INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

MC MINA ET SYNOPNYMA OMN UM GENERUM ET SPECIERUM
A LINNAEO USQUE AD ANNUM MDCCCLXXXV
COMPLECTENS
NOMINE RECEPTO AUCTORE PATRIA
UNICJIQUE PLANTAE SUBJECTIS

SUMPTIBUS BEATI CAROLI . ROBERTI DARWIN
DUCTU ET CONSILIO JOSEPHI D. HOOKER
CONJECIT B. DAYDON JACKSON

TOMUS

REFERENCE

OXONII
E PRELO CLARENDONIANO
MDCCC XCV

BOTANICAL SURVEY OF INDIA
LIBRARY
21 MAR 1959
No.
CAL OFFICE

OXFORD UNIVERSITY PRESS
AMEN HOUSE, E.C. 4
LONDON EDINBURGH GLASGOW NEW YO
TORONTO MELBOURNE CAFE TOWN BOMB
CALCUTTA MADRAS
GEOFFREY CUMBELEGE
PUBLISHER TO THE UNIVERSITY

First Edition 1895
Reprinted photographically in Great Britain
at the University Press, Oxford, 1946, by
John Johnson, Printer to the University

SURVEY OF INDIA
LIBRARY
No. 1957a
CENTRAL OFFICE

INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

A LINNAEC USQUE AD ANNUM M.DCCC.LXXXV

COMPLECTENS

AA—ABELMOSCHUS.

AA, Reichb. f. Xen. Orchid, i. 18 (1858)-Alton-Bteinla, H. B. ft K. (Orchid.).
argyrolepis, Reichb. f. 1. c.—Alt argyrolepis.
paleacra, Reichb. f. 1. c - Alt prieacea.

AAMA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 171 (1844), sphalm. - ADAMIA, Wall. = Diohroa, Lou. (Saxifr.).

ABACOSA, Alef. in Bonplaidia, ix. (1881) 102 -Viola, Linn. (Legmnin.).
americana, Alef. 1. c 104=V, americana.
canescens, Alet 1. c. 103 «V. cMiesccns.
dumetorum, Alef. L c. 104 = V. dumetorum.
Kingii, Alef. 1. c 103-V. Kingii.
micrantha, Alef. 1. c. 104=V. micrantha.
onobrychioides, Alef. 1. c. 108-V. onobrychioides.
pallida, Alef. U - V . palljda.
patagonica, Alef. 1. c - V. patagonica.

ABALON, Adans. Fam. ii. 511 (eiT. typ. 513) (1783) = Heloniaa, linn. (Mac.).
albiflorum, Rafin. New Fl. Am. i. 33.—Am. bor.

ABALUM, Adans. F«m. 4r (1768)-praec.

ABAMA, Adans. Fam. i.. 47 (1763)=Narthecium, Moehr. (Liliac).
antherieoides, Stend. Norn. ed. I. 550, in syfl (1821) =-N. ossifragnm.
glutinosa, Rafin. New Fl. Am. i. 36 - Tofieldia glntinosa.
ossifraga, DC. Fl. Fr. iii. 171-N. ossifragum.
pubens, Rafin. New Fl. Am. i. 35 =Tofieldia pnbens.
pusilla, Rafin. 1. c. 35.—Am. bor.
scabra, Rafin. 1. c. 85; Fl. Tellnr. 28 = Tofieldia pubens.

ABANDION, Adans. Fam. iL 64 (1768) - Bulb©-oodium, Linn. (LJiac.).

ABAPHUS, Rafin. F. Tellnr. iv. 19 (1836)-seq.

ABAPUS, Adans. Fam. ii. 57 (1763) - GothylUa, Lion. (AmarylL).
spiralis, Rafin. Fl. TeUnr. iv. 19-G. spiralis.

ABASICARPON, Andre, ex Reichb. in MoessL Handb. ed. II. 1150 (1853) = Arabis, Linn. (Crndf.).
patulum, Andre, ex Reichb. 1. a-Arab. auriculata.

ABASOLOA, U LUve, in Nov. Veg. D«c. fe*e. i. 11 (1824). *COUPOSITAE*, Benth. ft Hook, t ii. 862.
Taboada, *La Lint, I. c*—Mexic.

ABATIA, Ruii ft Pav. Prod. 78. t. 14 (1794). *SAMYDA CEAE*, Benth. ft Hook. f. i. 790.
GRANIBRA, Hand, ft Wcdd. ex Benth. ft Hook. f. I.e.
MYRIOTRICHK, Turct in Ball. Soc Nat Mosc. (1863), I. (54.
RALIICHIA, Gardn. in Hook. Lond. Jonro. Bot. iv. (1846). »7.

iBATIA:—
americana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 510.—Bras,
brasiliensis, *Baill. Adansonia*, x. (1872) 245.—Bias,
ptrviflora, *Ruin &" Pav. Syst.* i. 136; *Prod.* t. 14.—Pernv.; N. Gianat.
rtgosa, *Ruia b" Pav. It.* «.--Peruv.
tementosa, *Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 509.—Bias.
vtrbascifolia, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. v. 358-parviflora.

ABATTEIA, Becc Malesia, i. (1877) 169. *LEGUMINOSAE*.
ocelsa, *Becc. 1. c.*—Malaya.

\BAZICARPUS, Andrz.« DC. Syst. iL 218 (1821)-Arabis, Linn. (Crncif.).

S.BHEVILLEA, Berg, in Linnaea, xxvii. 425 (1856)-JampomaneBia, Ruiz *8c* Pav. (Myrtac).
cpasoides, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 436.—Bras.
chrysophylla, Berg, 1. c 4S7=Psidinm chrrsophyllnm.
tugenioides. Berg, 1. c 438.—Bras.
Ftndiana, Berg, 1. c. 433.—Bras.
Gardneriana, Berg, 1. c. 436.—Brai.
Cuamroba, Berg, 1. c. 432 - C . Gnaviroba
KlotzscUana, Berg, I.e. 434.—Bras.
Langsdorffiana, Berg, 1. c. 608.—Bras.
Martiana, Berg, 1. c. 435.—Bras.
naschalantha, Berg, 1. c 432.—Bras.
neriiflora, Berg, 1. :. 431—Bras.
phaea, Berg, 1. c. 435.—Bras.
plana, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 427 (sphalm. —*phaea)*.
punctulata. Berg, in Mart. Fl. Bra;, xiv. I. 432.—Bras.
reeunata. Berg, 1. c. 438.—Bras.
Regeliana, Berg, 1. c. 608.—Bras.
ru/a, Berg, L c 437 = Psidiom rufnm.
rugosa, Berg, 1. c.—Bras.
Schlechtendahliana, Berg, 1. c. 435.—Bras.
Sellomana, Berg, 1. c. 431.—Bras.
Widgrtniana, Berg, in Tinnaxi, xxxi. (1861-62) 260. —Bras.

ABBOTIA, Rafin. New Fl. Am. i. 36 (1836)=Triglochin, Linn. (Naiad.).
filiformis, Rafin. 1. c - T . triandrnm.
palustris, Rafin. 1. c. 37-T. palustre.
pumila, Rafin. 1. c =T. palustre.

ABBOTTIA, F. MueU. Fragm. ix. 181 (1875) *RUBIACEAE*.
singalaris, *F. MueU. I.* r.—Austral.

ABELIA, R. Br. in Abel, Chin. App. 376 (1818) IL 4. *CAPRIFOLIACEAE*, Benth. ft Hook. f. ii. 4.
Kiaio\n'cia,Hance,inJourn. Bet. ix. (1871) 132.—China,
biflora, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1437) VII. 152.—China,
chinensis, *R. Br. in Abel, Chin. App.* 876.—China.

ABELIA:—
coriacea, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 53.—Mexic.
corymbosa, *Regel V Sckmalk. in Ad. Hort. Petrop.* v. (1877) 608.—As. temp.
Davidii, Hance, in Seem. Jonra. Bot vi. (1868) 329 =biflora.
floribuada, *Decne. in Fl. des Serves*, Ser. I. ii. (Janv. 1846).—Mexic.
Hanceana, Mart, ex Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 216-chinensis.
hirsuta, Walp. Rep. vi. 3=speciosa.
rupestris, Lindl. in Joura. Hort. Soc. i. (1846) 63 = chinensis.
serrata, Sieb. ft Zncc. Fl. Japon. i. 76. t. 31 = nniflora.
spathnlata, *Sieb.* b* *Zucc. 1. c.* 77-1. 34.—Japon.
speciosa, *Decne. in Fl. des Serres*, ii. (1846) sub t. 5. —Mexic
splendens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 20-Lonicera caprifolioides.
triflora, *R. Br. in Wall. PI. As. Rar.* i. 14. t. 15.—Reg. Himal.
nniflora, *R. Br. in Wall. I. c*—China.

ABELICEA, Reichb. Consp. 84 (1828); Baill. Hist. PI. vi 186 (1875)-ZeLkova, Spach (Urtic).
aquatica, Rafin. New Fl. Am. iii. 41» Planera aquatics*.
crenata, BailL Hist. PI. vi. 181 = Z.crenata.
cretica, Rafin. New Fl. Am. iii. 41=Z. cretica.
Davidii, Bnek, Ind. Gen. DC. Prod. iv. 1 = Hemiptelea Davidii.
sibirica, Rafin. New FL Am. iii 41-Z. crenata.

ABELMOSCHUS, Medic. Malv. 45 (1787)-Hibiscus, Linn. (Malvac).
achanioides, Tnrez. in Bull. Soc Nat. Mosc xxxi. (1868) I. 196 = H. achanioides.
aculeatus,Vfs\p. Rep. L 308 — H.surattensis, cannabinus.
acuminatus, C. Mnetf. in Walp. Ann. vi 407.—Java.
albo-rubens, Benth. FL Austral, i. 209=seq.
albo-ruber, F. Mnell. Fragm. i. 67=H. ficnlneus.
angulosus, Wight ft Am. Prod. 53 = H. angulosus.
angusti/olius, Hook, ft An. in Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 152 - H . angnstifolins.
aquaticus, Walp. Rep. i. 311—H. roseus.
ascendens, Walp. 1. c 310—H. physaloides.
Bammia, Webb, Fragm. FL Aethiop. 48 -= H. escnlentus.
betulifolia, Wall. Cat p. 87 et n. 1916 - H. Abelmoschus.
cancellatus, WalL 1. c p. 87 et n. 1920 = H. cancellatus.
chinensis. Wall. 1. c. p. 87 et n. 1916 - H. Abelmoschus.
ciliaris, Walp. Rep. ii. 308=H. ciliaris.
cisplatinus, Walp. 1. c. 309 - H . cisplatinjs.
congener, Walp. 1. c. 808 «• H. cannabinns.
crinitus. Wall. PL As. Rar. i. 89 = H. cancellatus.
cruentus, Walp. Rep. i. 310 = H. crnentus.
cryptocarpus, Walp. 1. c — H. Abelmoschus.
cubensis, Walp. L c 309-H. Abelmoschus.
cucurbitaceus, Walp. L c. 810 = H. Abelmoschus.
decandrus, Medic. Malv. 46-PKVonia praemorsa.
divaricatus, Walp. Rep. i. 309 <-H. divaricatus.
esculentus, Moench, Meth. 617-H. esculentus.

ABELMOSCHUS :—
ficulneoides, Walp. Rep. i. 309 = H. ficulneoides.
ficulneus, Wight. & An. Prod. i. 53 - H. ficulneus.
fusiformis, Wall. Cat. p. 87 et n. 1921 = H. cancellatns.
Gennii, Walp. Rep. i. 810=H. Uliiflonis.
guineensis, Walp.l. c. = H. tiliaceus.
Haenieanui, Presl, Rel. Haenk. ii. 184.—Ins. Luzon.
laxifiorus, Walp. Rep. L 310 = H. laxiflorus.
longifolius, Kobtel. Allg. Med.-Pharm. Flora, v. 1859 a H. Abelmoschus.
maculafus, Bartl. in Linnaea, xii. (1838) Iitt. 81 «H. Bartlingianus.
magnificus, WalL Cat. p. 87 et n. 1919.—Ind. or.
Manihot, Medic. Malv. 46 = H. Manihot.
marianus, Presl, Rel. Haenk. ii. 131.—Ins. Marian.
moschatus. Medic. Malv. 46 = H. Abelmoschus.
multi/ormis, Wall. Cat. p. 87 et n. 1917.—Ind. or.
officinalis, Endl. ex Heynh. Nora. ii. 1~H. esculentus.
palustris, Walp. Rep. i. 311 = H. Moscheutos.
panduraeformis, Hassk. in Tijdschr. Nederl. Ind. i. (1843) 184 = 11. panduraefonnis.
peniaphyUus, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 118 - H. pentaphyllus.
persidfolius, Walp. Rep. i. 808 =?H. persicifolins.
Pseudo-abelmoschus, Blume, Bijdr. 70 = H. Abelmoschus.
pungens, Wall. Cat. p. 87 et n. 1924 = H. pungens.
qtiinquelobus, Walp. Rep. i. 310 = H. quinquelobus.
racemosus, Wall. Cat. p. 87 et n. 1929 = H. cancellatus.
rhodopetaltts, F. Muell. Fragm. ii. 118-H. rhodopetalns.
roseus, Walp. Rep. i. 311 = H. Moscheutos.
rostellatut, Walp. 1. c. 808 = H. rostellatus.
rugosus, Wight *Sc* Am. Prod. i. 43 - H. rugosus.
splendent, Walp. Rep, i. 809 = H. splendens.
strict us, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 119 = H. ficulneus.
sublobatus, Presl, Rel. Haenk. ii. 184.—Ins. Pacif.
tetra[illegible] p 8 e7n. 19 5=lp.tetra s lin
thriodes, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 120-H. sulphureus, *Voigt.*
tulipaefiorus, Walp. Rep. v. 92 *H. tulipaefloms.
venustus, Walp. I. c i. 309-H. mutabilis.
verrucosus, Walp. 1. c. 808 = H. cannabinus.
Vriesianus, Hassk. in Hoer. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 134; xii. (1845) 88.—Malaya.
warreensis, Dalz. in Hook. Kew journ. iii. (1851) 123 = H. tetraphyllus.
Zollingtri, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 407.—Java.

ABENA, Neck. Eleui. i. 296 (1790)=8taohytarph»ta, Vahl (Verbenac.).

ABEREMOA, Aubl. PI. Gui. i. 610, t. 245 (1775)-Duguetia, St. Hil. (Anonac).
furfuracea, Bail]. Hist Fl. i. 204.—Bras.
guianemis, Aubl. Fl. Gui. i. 610.—Guiana.
lanceolata. Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 146 ; (1878) 146.—Bras.
longifolia, Bjill. Hist. PI. i. 205 = D. longifolia.

ABERIA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 2.
BIX1NEAE, Benth. & Hook. f. i. 128.
ATELESTE, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 9,10.
abyssinica, *Clos, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. viii. (18575 236.—Aft. trop.
caffra, *Harv.VSond. Fl. Cap.* ii.*Add.*684.—Afr. austr.
edulis, T. Anders, in Jonrn. Linn. Soc vii. (1862) 67 - cafira.
Gardnerii, *Clos, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. viil (18571 235.—Zeylan.
longispina, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 585. i —Afr. austr.
anacrocalyx, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 122.—Afr. trop.
n.ollis, *Oliver, I. c.*—Afr. trop.
triins, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 9.—Afr. austr.
verrrcosa, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) *Bes. Beil.* 2.—Abyss.
Zeyheri. *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1860) 10.—Aft. austr.

ABESTNA, Neck. Elem. L 83 (1790)-Verbesintt, Linn. (Ciuipos.).

ABIES, D. Don, in Loud. Arb. Brit. iv. 2820 (1838)-Picea, Link (Conif.).

ABIES, [Tonm.] Linn. Fl. Lapp. 277 (1787); Link, in Linnaea, *xi.* (1841) 525. *CONIFERAE,* Benth. & Hook. f. iii. ,'rt.
PICEA, D. Don, IA Loud. Arb. Brit. iv. 2293 (1838).
ajanensis, Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. V. (1850)212=Piceaajauensis.

ABIES:—
alba, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 207=Picea alba.
alba, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 (1768) = pectinata (1806).
Albertiana, A. Mutt, in Free Hort. Soc iii. 1863) 149-Tsuga Mertensiana.
Alcockiana, LiniV ex. C. Koch, DendroL ii. II. 245 *> Picea Alcockiana.
Alcoqueana, Gord. Pinet. Supp. 8 (' desc. falsa*) =>raec amabilis, *Forb. Pin. Wob.* 125. t. 44.—Am. bor. ^c.
amabilis, PaiL in DC. Prod. xvi. II. 426, in parte*snb. alpina.
americana. Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 6 = Wa canadensis.
Apollinis, Link, in Linnaea, iv. (1841) 528=«phalonica.
Araragi, Siehold, in Verh. Batav. Gen. xii. (183)} 12 = Tsuga Sieboldii.
araucana, Poir. Encyc. Suppl. vL 524 - Aranaria excelsa.
arctica, A. Cunn. ex Gord. Pinet. 11-Picea rubr*
arctica, A. Murr. in Journ. Bot. v. (1867) 253=>>jcea alba.
argentea, De Cbambr. Traiti Prat. Arb. Rfain. 7» pectinata.
arotnatica, Rann. Atl. Journ. 119 = balsamea I
atlantica, Liniil. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (IIKIA 214 = Cedrusatlantica.
baborensis, Coss. ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 4!j numidica.
baldensis, Zuccagn. ex Nym. Consp. 874=pectinat;
balsamea, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 8.—Am. W
balsamifera, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 207-balsame,
batavorum, Siebold.—Cf. Carr. Conif. ed. II. 221 = Cunninghamia sinensis.
bicolor, Maiim. in Bull. Acad. Petes!), x. (1866) 48|_ Picea Alcockiana.
bifida, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 18 <*firma.
bifolia, A. Murr. Syn. Var. Conif. 29=lasiocarpa.
brachyphylia, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* (1866) 488.—Japon.
bracteaU, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 394.—Caif.
Bridgesii, Kellogg,Sn Proc. Calif. Acad. ii. (1868) i= Tsuga Mertensiana.
Brunmiana, Lindl. in Penny Cyclop, i. 30 = T, Bruinniana.
californica, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 1=Pfcncn. tsuga Douglasii.
campylocarpa, A. Murr. in Trans. Bot Soc. Edinb. ,i (1860) S70=magmfica.
canadensis, Michx. FL Bor. Am. ii. 206=Tsn{a canadensis.
canadensis,Mitt. Gard. Dieted.VIIL n. 4-Piceaall,
candicans, Fisch. ex Endl. Syn. Coglf, 96 = pectinata
cedroides, Griff, ex Carr. Conif. ed. L 188«Tsuja Brunoniana.
Cedrus, Poir. Encyc. vi. 510-Cedrus Libani,
cephalonica, lini, *in Linnaea,* xv. (1841)529 Graeci,
chiloinsis, Hort ex Can. Conif. ed. 1.222 - A. Pindrot
chilrowensis, Holt, ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 4SJ - Webbiana.
chlorocarpa, Pu'k. ex Nym. Consp. 674 = Picea excels;,
cilicica, *Ant. b' Kotschy, in Oestr. Wochenschr.* (1858) 409.—As. Min.
cilicica, *Carr. Conif.* ed. I. 229.—As. Min.
cinerea, Borkh. Forstb. i. 898 = Picea excelsa.
Clanbrassiliana, Hort. ex Loud. Encyc Fl. 804-f, excelsa.
coerulea, Lodd. ex Forbes, Fin. Wob. 99 = P. alba.
coerulescens, Hort. n C. Koch, Dendrol. ii. II. 242 = P. rubra.
Columbaria, Desf. Tabl. ed. IL 247 = Araucaria imbricata.
commutata, Gord. Pin*t. ed. IL 5-Picea Eugelmanni.
concolor, *Lindl. V Cord, in Journ. Hort. Soc.* v. (1860) 210.—Am. bor. occ.
cupressoides, Poir. Encyc vi. 524 = Iibocedrustetragosa.
cunifolia, SalUb. is Trans. Linn. Soc viii. (1807) 315 =Picea alba.
Dammara, Poir. Encyc. Suppl. v. 35 - Agathis loranthifolia.
Davidiana, *Franch. in Nom. Uim. Mus. Par.* vi. • (1884) 96.—As. or.
decidua, Wall.—Cf. C. Koch, Dendrol. ii. II. 258-Tsuga Brunoniana.
densa Griff. Notul. iv. 19.—Cf. Webfaiana.
denticulata, Poir. Encyc. vi. 620 = Picea nitre.
Deodara, Lindl. in Fenny Cyclop, i. 34 - Cedrus Deodara.

ABIES:—
diversifolit.Uxiim. in Bull. Acad. Petersb. xii.(1868) i '229-TsiigadiversifoUa.
Douglasii, Lindl. in Fenny Cyclop, i. 82-Fseudotsuga - Douglasii
Drummondi, Hort. ex Gord. Pinet. ed. 1.16 — praec.
dumosa. Load. &rb. Brit. iv. 2825 - Tsuga Brunoniana.
Eichleri, Lauche, in Berl. Gartenz. i. (1882) 63 -~ Veitchii.
elegans, Sm. ex Knight, Syn. Conif. 36 = Picea excelsa.
Engelmanni, Parry, in Trans. Acad. St. Louis, ii. (1866) 212- Picea Engelmanni.
eremita, Hon. Gall, ex C. Koch, DendroL ii. II. 287 ± Picea excelsa.
erythrocarpa, Purk. ex Nym. Consp. 674 = P. excelsa.
excelsa, Link, in Abh. Acad. Berl. (1827) 182-pectinata.
excelsa, Poir. Encyc. vi. 518 - P . excelsa.
exlrema, T. Fries, in Bot. Notiser (1867), 56=P. excelsa.
falcata, *Rafin. Atl. Journ.* 120.—Am. bor.
ftnedonensis, Hort. ex Gord. Pinet. Suppl. 4 = P. excelsa.
Finhtmnoskiana, R. tfeum. ex Parl. in DC. Prod. xvi. 11. 431-horolepis.
fiima, *Sieb. V Zucc. Fl. Jap.* ii. 15.1.107.—Japon.
Fischeri, *Lindl. ex Ledeb. Fl. Son.* ii. 172.—Rossia.
Fnfunei, A. Murr. Pin. Japan. 49 = Keteleeria Fortunei.
Fraseti, *Lindl. in Penny Cyclop,* i. 80.—Am. bor.
gigantea, Sm. ex Can. Conif. ed. II. 327 = Picea excelsa.
glauca, Roezl, ex Gord. Pinet. 149»religiosa.
ghucescens, Roezl, Cat. Gr. Conif. Mex. (1858-59) 5 = religiosa.
Clfkni, F. Schmidt, Reisen Amurl. 176 - Picea Gkhnii.
Gnriini, Rupr. ia Bcitr. Pfl. Ross. Reich, ii. 56« Larix dahurica.
Gordoniana, Carr. Conif. ed. II. 298-grandis.
grandis, *Lindl. in Penny Cyclop, i.* 30.—Am. bor. occ.
Gregoryana, Low, ex Gord. Pinet. Suppl. 4 — P. excelsa.
Criffithiana, Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 214-Larix Criffithii.
Hanburyana, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 32, 421 = Tsuga Sieboldii?
Harryana, McNab, in Proc. Roy. Irish Acad. (1876) 689-bomolepis.
htterophylla, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 295-sibirica.
heteropkylla, Rafin. Atl Journ. 119-Tsuga Mertensiana.
hirtolla, Lindl. in Penny Cyclop, i. 31 -religiosa.
hispanica, De Chamb. Trait. Prat. Arb. Resin. 339 - A. Pinsapo.
holophyUa, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* x. (1866) 487.—As. temp.
homolepis, *Sieb. (f-Zucc. fl. Jap.* ii. 17.—Japon.
Hoilfriana, A. Murr. in Eiinb. N. Phil. Joum. N. S. i. (Jan-Apr. 1855). 289= Tsuga Hookeriana.
Hudsmia, Bosc, ex Carr. Conif. ed. I. 200 = Fraseri.
humilis, La Pyl. in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 437=Fraseri.
imerta, R. Sm. ex Gord. Pinr.t. Suppl. 4 - P. excelsa.
jezoënsis, Lindl. & Paxt. Flov. Gard. L (1850-51) 42. *I* 26-Keteleeria Fortunei.
jezoënsis, Sieb. & Zucc FL Jap. ii. 19.1110-Picea Alcockiana.
Kaempferi, Lindl. in Penny Cyclop, i. 84=Pseudolarlx Kaempferi.
hmtschatica, Rupr. in Beitr. PH. Ross. Reich, ii. 57 =» Larix dahurica.
Khvtrov, Loud. Encyc Trees, 1032=Picea Morinda.
Kotschyana, *Fenil, ex Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 495.—As. Min.
lanceolata, Poir. Encyc. vi. 628=Cunninghamia sinensis.
Larix, Foir. Encyc SnppL vi. 511=Larix europaea.
losiocarpa, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 163.—Am. bor. occ
lasiocarpa, Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc v. (1860) 210 «• grandis, Lowiana.
laxa, C. Koch, DendroL u. 11.243=Picea alba.
Ledebourii, Rupr. ia Beitr. Pfl. Pnss. Reich, ii. 56= Larix dahurica.
leiodada, Stev. ex Gord. Pinet. 15!-Nordinanniana.
Lemmiana, Booth, ex Gord. 1. c ed. I. 5 - Picea excelsa.
leptolepis, Sieb. & Zucc. Fl. Japoa. 12. t. 103.=Larix japonica.
Lindleyana, Roezl, ex Can. Conif. ed. II. 275-religiosa.
Lowiana, *A. MUTT. Syn. Var. Conif.* 27.—Am. bor. occ

ABIES:—

luscomieuna, Loud. Arb. Brit. iv. 2325=cephalonic«,
magnifica, *A. Mttrr. in Proc. Roy. Hort. So<*iii. (1863)* 818.—Calif.
Mariana, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 6=Picea nigi,.
Mariesii, *Mast, in Gard. Ckron.* xii. (1879) 789.—As. a
Maximmiclii, R. Neum. Cat. (1866); exParl. in DC. Prod. zri. II. 431-Picea Maximowiczii
medioxima, Lawson, Pin. Brit, 169 =- P. excelsa.
Menziesii, Lindl. in Penny Cyclop, i. 82 •> Picei Menziesii.
Merkiana, Fisch. ex Parl. in DC. Prod, xvi II. 418 = Picea Menziesii.
Mertensiana, Lindl. & Gord. in Jonm. Hort. Soc. v. (I860) 211=-Tsuga Mertensiana.
metensis, Hort. Par. ex Gord. Pinet ed. II. 211 - pectinata.
microcarpa, LindL in Penny Cyclop, i. 88-Larix microcarpa.'
micropbylla, *Rafin.Atl.Joum.* (1820) 119.—Am. bor.
microsperma, Lindl. in Gard. Chron. (1861) 22-Picea ajanensis.
miniata, Knight, ex Gonf Pinet^ed. II. 8-P. excelsa.
minor, Duham. ex Gord. 1. c. edft. 143 = balsamea.
minor, Gilib. Exerc. PhytoL ii. 412=pectinata.
minuta, Poir. Encyc. vi. 623-P. rnbra.
Momi, SiebolJ, in Verb. Batav. Gen. xii. **(1880)** 12-firma.
mpntana, Nym. Syll. Suppl. 602 « P. excelsa.
Morinda, Loud. Encyc. PI. 1294 - P. Morinda.
mucronata, Rafin. Atl. Jonrn. 120-Psendotsuga Douglasii.
mucronata. Ranch, ex Carr.Conif.ed.il. S29-Picea excelsa.
nephrolepis, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. x. (1866) 486 = Veitchii
nigra, Desf. Hist. Arbr. et Arb. ii. 580=Picea nigra.
nigra, Dnroi, Harb. Baumz. ed. Pott, ii. 182=P. nigra.
nigra, Engelm. in Am. Jonm. Sc xxxiii. (18S8) 330-Picea Engelmanni.
nobilis, *Lindl. in Penny Cyclop,* i. 80.—Am. bor. occ.
Nordmanniana, *Spach, Hist. Vig. Phan.* xi. **418.**—Reg. Caucus.
A'raae-i4nj'/<a>.C.Koch,DendroMi.il.240=Piceanlgra.
nnmidica, *De Lannoy, ex Carr. in Rev. Hortic.* **(1866)** 106.—Afr. bor.
obliqua, Bong, ex Gord. Pinet. Sopp. 10=Pseudotsnga Douglasii.
obliquata, Rafin. ex Gord. 1. c.=praec.
obmata, Lond. Arb. Brit. iv. 2329 = Picea obovata.
Omoriia, Nym. Consp. 673=Picea Omorika.
orientalis, Poir. Encyc. vi. 618 =» Picea orientalis.
panachaica, Heldr. ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 422 = cephalonica.
Parsonsiana, Hort. ex Mast in Gard. Chron. (1880) I. 648 = Lowiana.
panmla, Knight, Syn. Conif. 86 = Picea excelsa.
Pattoni, Jeffrey, ex Gord. Pinet. Soppl. 6=seq.
Pattoniana, Jeffrey, ex A. Murr. in Bot. Exped. Oregon. Circ.-Tsuga Hoolceriana.
pectinata, *DC. Fl. Fr.* iii. 276.—Europ.
pectinata, Gilib. Exerc. PhytoL ii. 411-P. excels*.
pectinata, Poir. Encyc. vi. 623-Picea rnbra.
peloponnesiaca, Haage, ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 422=cephalonica.
pendula, Griff, ex Gord. Pinet. Suppl. 7 - Picea Morinda.
^Sf?'a;Li?dl-*Gord-m Jonm. Hort Soc. v. (1850) 21S«Lanx microcarpa.
Picea, Lindl. in Penny Cyclop, i. 29-pectinata.
Picea. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=Picea excelsa.
Pichta, Forbes, Pin. Wob. 118. t 89=sibirica.
Pindrow, *Spach, Hist. Vtg. Phan.* xi. 423.—Reg. Himal.
Pinsapo, *Baits, in Biil. Univ. Geneve* **(1838);** *ex ej Voy. Bot. Espagne,* **ii. 684.—Hispan.**
polita, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 20. t. 111 - Picea polita.
Reginae-Amaliae, Heldr. m Regel, Gartenfl. ix. (I860) 313=cephalonica.
religioaa, *Lindl. in Penny Cyclop,* i. 31.—Mexic.
Rinzi, Hort. Par. ex Gord. Pinet. Suppl. 60-tilidca.
Romania, Load, ex Stend. Nom. ed. II. i. 1=Finns Laricio.
rubra, Poir. Encyc. vi. 620 = P. rubra.
sachalinensis, *Mast, in Gard. Ckron.* (1879) II. 688—As. or.
saora, *Franch. in Noun. Arch. Mus. Par.* **vii. (1882)** 290.—As. or.
Schrenkiana, Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v (1860) 212 = Picea obovata.

ABIES:-

selinusia, Carr. in Fl. des Serres (1858), 69-cilicica.
O sibirica, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 202.—Sibir.
sitchensis, Lindl. * Gord. in Joum. Hort. Soc. v. (1850) 212 = Picea Menziesii
Smithiana, Lindl. in Penny Cyclop. i. 31=P. Morinda.
spectabilis, Spach, Hist Veg. Phan. xi. 422 - Webbiana.
spinulosa, Griff. Ittn.259, 266, 275=Picea Morinda.
Standishiana, C Koch, Dendrol. ii II. 267=Tsuga Douglasii.
subalpina, Engelm. ex L. Ward, in Am. Natural. (1876) 555 = lasiocarpa.
subarctica, Nym. Consp. 674 - Picea excelsa.
sumatrana, Desf. Hort. Par. ed. III. S66=Agathis loranthifolia.
taxifolia, Desf. 1. c. =* Pectinata.
taxifolia, Drum, ex Gord. Pinet. 16=Pseudotsuga Douglasii.
taxifolia, Jeffr. ex Gord. 1. c. 18=Tsnga Mertensiana.
taxifolia, PresL Epim. Bot 237 = Pseudotsuga Douglasii.
taxifolia, Rafin. New Fl. Am. i 38.—Am. bor.
rcA«tf«taW,Uwson,exGord.Pinet.Suppl.50-dlicica.
Thunbergii, Lindl. in Penny Cyclop, i. 34 - Picea polita.
Tlapalcatuda, Roezl, Cat. Gr. Conif. Mex. (1868-59) 5=religiosa.
Torano, Siebold, in Verh. Bat. Gen. xii. (1830) 12 = Picea polita.
trigona, Rafin. Atl. Jonm. (1820) 11» - Sequoia sempervirens?
Ttchonostiana, Regel, in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 82=homo!epis.
Tsuga, Sieb. & Zucc. FL Jap. ii. 14. t 106 "Tsuga Sieboldii.
Veitchii, *Lindl. in Gard. Ckron.* (18«1) 28.—Japon.
venusta, C. Koch, Dendrol. ii. II. 210=bracteata.
viminalis, Wahlenb. Fl. Snec. 630=Picea excelsa.
virescens, Hinterh. ex Nym. Consp. 673=P. alba.
milgaris, Poir. Encyc. vi. 514-pectinata.
Webbiana, *Lindl. in Penny Cyclop,* i. 80.—Reg. Himal.
Williamsonii, Bridges, ex Gord. Pinet Suppl. 12 = Tsuga Mertensiana.
Williamsonii, Newberry, in Williamson, in Pacif. Rail. Rep. vi. 63. t. 7=Tsuga Hoolceriana.

\BIGA, St. Lag. in Ann. Sot Bot. Lyon, vii. 85 (1880)

-Ajuga, Linn. (Labiat.).

dtti/aia, St Lag. 1. c. 86, 119-Ajuga Iva.

ABILDGAARDIA, Vahl, Enum. ii. 296 (1806)' = KmbristyUs, Vahl (Cyperac.).
apkylla, Kunth, Enum. ii. 248 = F. bahiensis.
aaeothryon, St. Hil. Voy. ii. 889 = F. bahiensis.
larbata, Beauv. Fl. Oware, ii. 47. t. 86. f. 1.—Afr. trop.
trevifolia, Stend. Syn. PI. Cyp. 72=F. setacea.
'inttamometorum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 347 = F. cyperoides.
"mpressa, J. & C. PresI, ReL Haenk. i. 179=F. monostachya.
Cyperoides, Nees & Meyen, in Wight. Contrib. 95 = F. cyperoides.
Eragrostis, Nees & Meyen, 1. c.=F. Eragrostis.
fioibristyloides, F. Mnell. Kragm. viii,-278 = F. disticha.
Afvescens, Thw. Enum. PI. Zeyl. 347 = F. rdlvescens.
ftsca, F. Muell. Fragm. viii. 278-F. cyperoides.
/*s«,Nees, in Wight, Contrib. 95.—Reg. Himal.
g'tninata, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 71 =F. bahiensis.
'idica, Nees, in Linnaea, ix. (1885) 289=F. monostachya.
javana, Nees, L c.-F. monostachya.
javanici; Steud. Syn. PL Cyp. 73 = F. juncea.
l>vigata,* WiUd. ex SteiuL. Nom. ed. II. i. 1 - P. monostachya.
lanceolata, Sebum. Gain. PI. 83=F. tristachya.
monostachya, Vahl, Enom. iL 298 ^ F. monostachya.
»«rv0»J.&C.Presl,ReLHaenk.i.l8O=F.schoenoides.
pauciflora, Kunth, Encm. PI. ii. 249.—Ins. Molucc.
piloia, Nees, in Linnaea, ix. (1835) 289.—Afr. trop.
falycethala, Brongn. in Dnperr. Voy. Bot 176. t. 82 «= Androtrichum polycephalam.
polygatna, Spreng. Nov. Prtiv. 45.—Bras.
Polystachya, Spreng. Fl. Hal Mant. 29 = Pharus angustifolius.
pubescens, J. & C. Presl, Reliq. Haenk. 180 - F . exilis.
RotttoeUiana, Nees, ex Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 272 - F . monostachya.
schoenoides, R. Br. Prod. 2M=F. sqnarrulosa.

ABILDGAARDIA .—
scirpoides, Nees, ia Linnaea, ix. (1835) 289 = F. bahiensis.
setacea, Griseb. Cat. PI. Cub. 288.—Cuba.
ternata, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 71 = F. bahiensis.
tristachya, Vahl, Enum. ii. 297-=F. tristachya.
vaginata, R. Br. Prod. i. 229 - F . Brownii.

ABILDGARDIA, Reichb. Consp. 56 (1828) = praec.

ABILGAARDIA, Poir. in Diet. Sc. Nat. i. Suppl. 3 (1816)-praec.

ABLANIA, AubL PI. Gui. i. 586. t. 234 (1775)-Sloanea, Linn. (Tiliac).
digitata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 210.—Itras.
guianensis, Aubl. PI. Gui. i. 585. t. 234 = S. guianensis.
laurifolia, Pens. Syn. ii. 81=S. guianensis.

ABOBKA, Naud. in ReivHortic. (1862) 111. *CUCURBITACBAE,* Benth. *tc* Hook. f. i. 834.
tenuifolia, *Naud. I. c*—Bras,
viridiflora, *Naud. I. c*—Am. anstr.

ABOLA, Adans. Fam. ii. 31 (1763) = Cinna, Linn. (Gramin.);

ABOIiA, Lindl. Fol. Orch. (1853). *ORCH1DBAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 666.
radiata, *Lindl. 1. c*—N. Granat.

ABOLARIA, Neck. Elem. i. 105 (1790)=Globularia, Linn. (Selagin.;.

ABOLBODA, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. ii. 10'.). 1.114 (1809). *XYRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 842.
CHLOERUM, WiUd. ex Lin'r, in Spreng. Jahrb. i. HI. 74 (1833).
POARCHON, Mart ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 223 (1855).
Aubletii, *Kunth, Enum. PI.* iv. 28.—Guian.
brasiliensis, *Kunth, I. c.* 26.—Bras.
grandis, *Griseb. in Linnaea,* xxi. (1848) 281—Bras.
imberbis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 256.—Guian.
inermis, Link, ex Steud. Nom. ed. II. i. 2 = imberbis.
Poarchon, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.223.—Bras.
Poeppigii, *Kunth, Enum. PI.* iv. 27.—Bras,
pulchella, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* ii. 110. t. 114. —Venezuela.

ABROCHIS,Neck. Elem. iii.180 (1790) - Orchis.Tourn.

ABBOMA, Jacq. Hort. Vind. iii. 11 (1776). *STER-"CUUACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 224.
AMBROMA, Linn. f. Suppl. 341 (1781).
alata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 605.—Ins. Philipp.
angulata, Lam. Encyc. i. 126=augusta.
angulosa, Poir. Encyc. Snppl. i. 322 = augusta.
augusta, *Linn.f. Sufpl.* 341 (Ambroma).—As. trop.
communis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 606 = augusta.
denticulata, *Miq. PI- Jungh.* 288.—Java.
elongata, Lam. Encyc. i. 127=augusta.
festuosa, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 409.—As. trop.; Austral.
fastuosa, Gaertn. Fruct. i. 307. t. 64=augusta.
fastuosa, Jacq. Hort. Vind. iii. 8. t 1 = augusta.
lavanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 183.—Java.
Mariae, *Mart, in Denkschr. Bayer. Ges.* **iii. (1887-48)** 297.—Java.
mollis, *DC. Prod. I* 485.—Ins. Molucc.
nitida, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* **in. 78.—Chili,**
obliqua, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 148.-Ins. Philipp.
tomWitosa, Steud. Nom. ed. II. i. 2, sphalm.-Cf. Ambora tomentosa.
Wheleri, Retz. Obs. v. 27-angnsta.

ABBONIA, Juss. Gen. 448 (1789). *NYCTA G/NEAE,* Benth. 8c Hook. f. iii. 7.
CYCLOPTERA, Nutt. ex A. Gray, in Am. Joum. Sc. Ser. II. xv. (1868) 319.
THICRATUS, L'Herit. ex Willd. Sp. R. i. 807 (179»).
arenaria, *Metaies, ex Hook. Exot. Fl.* **1193.—Calif.**
California, Raeusch.Jfom."ed. III. 191-umbellata.
Crux-Maltae, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* **ii. (1863)** 71. f. 16.-Calif.
Cycloptera, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Scr. II. xv. (18631 819.—Texas,
fragrans, *Nutt. etc Hook. Ken Journ.* v. (18SS1 261.—Calif.
glauca, *Menzies, ex Hook. Exot. Fl.* **t 194.—Calif,**
gracilis. *Benth. Bot. Voy, Sulph.* **A4.—Calif,**
latifolia, *Eschsch. in Mem. Acaal petersb.* **v. (182(1)** 281.-Calif.

A TIOnWT A.*—
maritima, *Nutt. ex S. Wats. Bot. Calif.* jj-*•-£«)£
mellifera, *Dougl. in Hook. Bot. Mag.* t. 2879.-Calif.
Meiuiesii, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. A m.* n. 125.-Cahf.
micrantha, **Choisy, in DC. Prod. Mil. II. 436 =** A. Cy lo|
nana, *S.CwJs™,~in Proc. Am. Acad.* **xiv. (1870) 294.** —AC. lo) °T
paHflSh,* *BIV K. NOV. Gen. et Sp.* **ii. 216.1.128.**
__jf, Granat,
rose a, Hartweg, ex Loud. Hort Brit Suppl. Hi. **479 =** umbellata?
mtundifolia, Gaettn. f. Fruct. iii. t. 214-*umbellata.
speciosa, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* **(186S)** 7.__Am, bor. occ
tuibinata, *Torr. ex S. Wats, in Bot. King's Exped.* "386. t. SI.—Am. bor. occ.
nmbellata, *Lam. Illustr.* i. 469. t 106.-Calif.
xespertina, Dougl. ex Ho*. Fl. Bor. Am. ii. 125= mellifna.
villosa, 5. *Wats, in Am. Naturalist,* vii. (1873) 802.—Am. bor.

ABROPHAËS, Rafin. Sylva Tellor. 99 (1838) = Fothergilla, Linn. f. (HamameL).
mitabilis, Rafin. 1. c.-F. alnifolia.

ABBOPHTLLUM, Hook. f. in Benth. Fl. Austral, ii. 437(1864). .£4*.mMGj&4£,Benth.&Hook.f.i.647.
BRACHYNEMA, F. Mudl. Fragm. iii. 90. (1862).
omans, *Hook.f. 1. c.*—Austral.

ABBOTANELLA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxvi. 27 (182S). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 481.
CBRATELLA, Hook. f. Fl. Antarct. i. 23.1.18 **(1844).**
SCLEROLEIMA, Hook, f. in Lond. Journ. Bot. v. (1846) 444.1.14.
TRINEURON, Hook. f.Fl. Antarct i. 23.1.17 (1844).
emargiData, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxxvi. 27 (1825).—Ins. Falkl.
forsterioides, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* **186**—N. Zel.; Austral.
inconspicua, *Hook.f. I. c.* 140.—N. Zel.
linearifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **v. (1861)** 187.—Fnegia.
linearis, *Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallst. Lund* (1877), viii. p. 14.—N. Zel.
nivigena, *F. Muell. in Benth. Fl. Austral,* **iii. 554.**—Austral.
pusilla, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* **139.-N. Zel.**
rhynchocarpa, *Balf. f. in Phil. Trans,* clxviii. (1879) 852.—In*. Rodr.
rosnUu, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* **139.-N. Zel.**
scapigera, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **iii. 654.**—Austral.
spathulata, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl,* **189.**—N.ZeL
submarginata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **v. (1861) 137.-Reg. MagelL**

ABROTANUM, [Tourn.] Linn. Syst ed. I (1785) = Artemisia, Tourn. (Compos.).
alpestre, ambiguum, brackylobium, congestum, incanescens, pauciflorum, pedunculate, platylobum, pulverulentum, rhodanicum, suave, virgatum, virl. dulum,xeropkiluM,Joii.&¥om. **Brey. PI. Nov. fasc. u. 69-72-Art. Abrotanam.**
frutescens, **Gilib. Fl. Lituan. i. 178-Art. campestris.**

ABBUS, Linn. Hort. Cliff. 488 (1787). *LEGUM1-NOSAE,* **Benth. & Hook. f. i. 527.**
ZAGA, Rafin. Fl. Tellur. fi. 33 (1886).
acutifolius, **Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. 160 = pnlchellns.**
arboreus, **Veil. FL Flum. 803 j vii. t. 99 = Ormosia nitida.**
canescens, *Welw. in Oliver, Fl. Trop.Afr.* **ii. 175.—Afr. trop.**
cantonienris, *Hance, in Journ. Bet.* **vi. (1868) 112.—**
fruticulosus, *Wall. Cat.* **n. 6820.—Ind. or.**
laevigatus, **E. Mey. Comm. i. 126 =pulchellus.**
luconns, *Veil. fl. Flum.* **302; vii. t. 97*.—Bras.**
maculatus, **Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790), Art. iv. 7-precatorius.**
melanmpermus, **Hassk. Cat PI. Hort Bog. Alt. 282-pulchellus.**
minor, **Desv. in Ann. Sc. Nat Sir. I. xi. (1826) 418-precatorius.**
mollis, *Hance, in Journ. Bot.* **ix. (1871) 480.—China.**
pauciflorus, **Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. L ix. (1826) 418-precatoriui.**

ABRTTS.-T-
precatorius, *Linn. Syst.* **ed. XII. 472.—Reg. trop.**
pulchellui, *Wall. Cat.* **n. 6819.—Ind. or.; Afr. austic**
squamulosus, **E. Mey. Comm. i. 126=precat onus,**
tenniflonis, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. 1.216.—Bras.**

ABRYANTHEMUM, Neck. Elem. ii. 82 (1790) - Mesembryanthemum, Linn. (Ficoid.).

ABSINTHIUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1736)-ArtemiBia, Toum. (Compos.).
alpinum, **Bess, in Bull. Soc Nat Mosc i. (1829) 240 =Art. lanata.**
arborescens, **Moench, Meth. 579=Art. arborescens.**
argenteum, **Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 272—Art. argentea.**
bipedale, **Gilib. Fl. Litnan. i 174-Art. Absinthium.**
boreale, **Bess, in Bull. Soc Nat. Mosc i. (1829) 265 = Art. borealis.**
campestre, **Dnlac, Fl. Haotes-Pyr. 502 - Art. campestris.**
camphoratum, **Bess, in Bull. Soc Nat Mosc. i. (1829) 230-Art camphorata.**
canariense, **Bess. 1. c. 229=Art. canariensis.**
candidum, **Bieb. ex DC. Prod. vi. 125=Art. firigida.**
cernuum, **Moench, Meth. 579=Art. crithroifolia.**
chinense, **DC. Prod. vi. 118 sub n. 189=Art. chinensis.**
congestum. **Lam. Fl. Fr. ii. 46-Art. glacialis.**
corymbosum, **DC. Prod. vi. 122. sub n. 161 = Art camphorata.**
dentatum, **Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 265—Art. rnpestris.**
divaritatum, **Fisch. ex Bess. 1. c. 263=Art. anethifolii.**
frigidum, **Bess, in Bull. Soc. Nat Mosc. i. (1829) 251—Art. frigida.**
glaciale, **Lam. Illustr. iii. 273. t 695-Art. glacialis.**
grandifiorum, **Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc i. (1823) 232=Art. grandiflora.**
grandifiorum, **Roehl. *a* Steud. Nom. ed. H. i. 2=Att. nipestris.**
lagocephalum, **Bess, in Bull. Soc. Nat Mosc i. (1889) 238=Art. lagocephala.**
lanatum, **Bess. 1. c 265 •> Art. lanata.**
laxum, **Lam. Fl. Fr. ii. 46-Art. Mutellina.**
mollissimum, **Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc i. (1829) 265=Art. mollissima.**
Moxa, **Bess. 1. c. 228=Art. Moxa.**
Mutellina, **Roehl. ex Stead. Nom. ed. II. i- 2-Art. Mutellina.**
fiiffiu, Bess, in Bull. Soc Nat Mosc. i. (1829) 235= Art. sericea.
officinale, **Brot. Fl. Losit. i. 357-Art. Absinthium.**
pedunculate, **Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 63=Art. splendens.**
petrosum, **Banmg. Enum. Stirp. Transs. iii. 90= Art. Banmgarteni.**
ponticum, **Bess. Enum. PI. Volh. 76-Art pontict.**
rupestre, **Schrank, Prim. Fl. Salisb. 203-Art. rnpstris.**
santonicum, **Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. {73. Art maritima.**
saxatile, **Bess, in BuU. Soc Nat Mosc L (1829) j8i = Art. camphorata.**
sericeum, **Bess. 1. c. 237-Art. sericea.**
Sieversianum, **Bess. 1. e. 259=Art. Sieversiana.**
spathulatum, **Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) Art IV. 6=Dichrocephala latifolia.**
spicatum, **Baumg. Enum. Slirp. Truss, iii. 90. Art spicata.**
splendens, **Bess, in Bull. Soc Nat Mosc *I* (1829) 238 -Art. splendens.**
tanacetifolium, **Gaertn. Fruct. ii. 393-Art. taiacetifblia.**
trifidum, **Schrank, Baier. Fl. ii. 862-Art. anstriaca.**
virescens, **Juss. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. viii. (1835) 29-Art. Jussieana.**
virgatum, **Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 597 - Art rupestris.**
viride, **Bess, in Bull. Soc Nat. Mosc i. (1829) 249-Art. rupestris.**
viridifiorum, **Bess. 1. c 246 * Art. rupestris.**
vulgare, **Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 602=Art. vnlgaris,**
vulgare, **Lam. Fl. Fr. ii 45-Art. Absinthium.**

ABSYNTHIUM, Gaertn. Meyer *Sc* Scherb. FL W'ett. Hi. 196 (1801) = praec

ABULFAU, Adans. Fam. U. 190 (1763)-Thymbra, Linn. (Labiat.).

ABUMON, Adans. Fam. ii. 54 (1768)>Agapanthua. L"H<rit. (Liliac).

ABTJTA, [Barr.] Aubl. PL Gui. i. 618. t. 250 (1776).
MENISPERMACEAE, **Benth. & Hook. *i.* i. 35.**
AN^ASMA, Miers, in Ann. Nat. Hist Ser. II. vn. (1851) 42.
BATSCHIA, Mutis, ex Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. UpsaL v. (1792) 120. t 2.
TRICHOA, Pers. Syn. ii. 634 (1807).
acntifolia. *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* **Ser. III. xiv. (1864) 259.—Bras.**
amara **Aubl. PL Gui. i. 620 - Aristolochia glaucescens.**
S . L , *in Ann. V Mag. Nat. Hist.* **Ser. III. xiv. (1864) 258.—Guiana.**
candicans, *Rich, ex DC. Syst.* **i. 54S.-Guiana.**
Candolld, *Triana & Planck, in Ann. Sc. Nat.* **Ser. IV. xvii. (1862) 47.—Guiana.**
concolor, **Be^ith. in Joum. Linn. Soc v. (1861) App. 49**
concolor, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* **u. 64. t. 188.—Am. austr.**
Grisebachii, *Triana* **6* *Planeh. in Ann. Sc. Nat.* &W.
heterophyUa, *Mips, in* Ann. tf Mag. Nat. Htst.* Ser. HI. xiv. (M64) 258.-Am. austr.
lJ£e,Eichl. in Flora, **xlvii. (1864) 889.-Bras.**
macrophylla, *Miers, in Ann.* G[1] *Mag. Nat. Hist.* Ser.m xiv. (1864) 258.-Am. austr.
oblonga, *Miers, I.* «.-Am. austr.
oblongifolU, *Miers, I. c*—Am. » * • 4) 390.—Bras. Fl. Bras. xiii. I.
[N]*2007-BotryopsUplatyphylla).*-*™.
tacemosa, *TrdZv Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvii.
rufescen . t. 250.—Guiana.
rufescens, **DC. Syst. i. ... _andollei.**
rufescens, **Griseb. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 109 = Grisebachii.**
scandens, **DC. Syst. i. 542 in syn. = rufescens.**
Seemanni, *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xvii. (1862) 50.—Darien.**
Selloana, *Eichl. in Flora,* **xlvii. (1864) 889.—Bras.**
spicata, *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. II. xvii. (1862) 119.—N. Granat.**
tomentosa, **Sagot, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) Suppl. ii. 51 (Coccolobae sp.).—Guian.**
umbellata, **Sagot, ex Benth. 1. c.=Sciadotaenia cayennensis.**

ABUTILAEA, F. Mnell to Linnaea, xxv. (1852) 879 vac.).
= **Abutilon, Tourn.** Abutilon MiUhelli.
cryptantha, **F. Muell. I.^**

ABUTILON, Tourn. ex A ^. Fam. U. 3[98] (1763).
ffl^Shuttlew. ex Benth. & Hook. f. Gen. ..
Bo(0[6]"Si[2]RpiA, Reichb. Non, M0 (1841).
HERISSANTIA, Medic Phil Bot 1. 90 (17B»;.
LASS, Adans. Fam. ii. 400 (W6«).
1 (1777).
i. 504 = Sida acerifolia.
3.—Reg. Argent.
ugh. 285 = crispum.
albidum, Sweet, Hort. Brit. ed ^ I. 54.—Ins. Canar. exic.
albidum, *Walp.* **Canar.**
albidum, **Webb**
canm.
X T r c , in Bull. Soc.NatMos.xxxi. (1858)
amplexifolium L i ^ ^ Brit ed. I. 5S=indio›m.
amplum, *Ben*
Andersonianum, *Garcke, ex Vegetat.* **230.—Ins. Galap.**
^erss. Galap. Oar.
Andrieuxii, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* **24.—Mexic.**
angulatum, **Mast. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 183 = intermedium.**
anodoides, *Bak. Hil. & Naud. in Ann. Nat.* **Sér. II. xviii. (1842) 49.—Bras.**
arborescens, **Medic. Malv. 29 = indicum.**
arboreum, *Sweet, Hort. Brit.* **ed. I. 53.—Peruv.**
Arnottianum, **Walp. Rep. i. 324 = Sida Arnottiana.**
asiaticum, *G. Don, Gen. Syst.* **i. 503.—Reg. trop.**
asiaticum, **Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 67 =**
Jtt/Swee., Hort. Brit f) - ^dicum.
atropurpurenm, *G. Don, Gen. Syst* 1 5O —Java.

ABUTILON:—
aurantiacum, 5. *Wats, in Proc. Am. Agad.* xx. (1886) 857.—Calif.
aureum, G. Don, fa Sweet, Hort. Brit. ed. III. 80=. Sida anrea.
auritum, *Sweet, I. c.* ed. I. 53.—Geront. trop.
anstrale, *Presl, Sot. Bemerk.* 20 ; *Garcke, Ind. Sent. Hort. Berol.* (1861) 10.—Austral.
Avicennae, *Gaertn. Fruct.* ii. 251.1.135.—Geront. trap.
Bedfordianum, *A. St. Hit. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xviii. (1842) 48.—Bras.
Behrianum, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 18 = A. AVicennae.
benedictum, *Bunt, in Proc. Linn. Soc.* i. (1841) 109.—Bras,
bidentatnm, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 66.—Abyss.; Ind. or.
blandum, *Fenzl, Delect. Sent. Hort. Bot. Vindob.* (1858).—Mexic.
californicum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 8 = A. Avicennae.
colycinnm, *Presl, Rel. Haenk.* h\115.—Peruv.
cameum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 205.—Bras,
ceratocarpnm. *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 164.—Chili.
Chapelieri, *Bail!, in Bult. Soc. S.inn^Par.* i. (1885) 608.—Madag.
cinereum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 45.—Keg. Argent.
circinnatnm, *G. Don, Gen. Syst.* i. 502.—Bras,
cistiflorum, *G. Don, 1. c.* 503.—Java,
coccineum, *Hort. ex Regel, Cat. PI. Hort. Aksaiov.* (1860) 1, nomen.—Hab. ?
confertiflornm, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* i. 153.—Cuba.
contractum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 64 = Sida contracta.
cornutum, Sweet, 1. c. 65 = Sida comnta.
crassifolium, *G. Don, Gen. Syst.* i. 504.—Ind. occ.
crispum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 53.—Reg. trop.
cryptopetalum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 201.—Austral.
Cunninghami, *Benth. I. c.* 205.—Austral,
cymosum, *Triana b" Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvii. (1862) 185.—Am. trop.
cysticarpum, Hance, in Walp. Ann. ii. 157=indicum.
Darwini, *Hooi.f. Bot. Mag.* t. 5917.—Bras,
decarpum, *Rafin. New FL Am.* i. 40.—Am. bor.
deflexum, *Moench, Meth.* 620.—Hab. ?
densiflorum, *Walp. Rep.* i. 324.—Chili.
denticulatum, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 51 = fruticosum.
depauperatum, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 232.—Ins. Galap.
dianthum, *Presl, Reliq. Haenk.* ii. 114—Peruv.
diplotrichum, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1862) 380 = Fraseri.
discissum, *Schlecht. in Linnaea,* 218.—Reg. Argent,
divancatum. *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 204.—Mexic.
domingense, *TurcB. I. c.* 205.—Ins. S. Doming.
elaeocarpoides, Webb, Fragm. FL Aethiop. 53 = ramosum.
elatum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 79.—Ind. occ.; Mexic
elegans, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 207.—Bra*.
elegans, Walp. Rep. i. 325=Sida elegans.
ellipticum, *Schlecht. in Linnaea,* xi. (1837) 868.—Mexic.
elongatum, Moench, Meth. Snppl. 205 = indicum.
erosum, *Schlecht. in Linnaea,* xi. (1837) 367.—Mexic.
esculentum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 240.—Bras.
excelsior, G. Don, Gen. Syst. i. 600-Wissadula excelsior.
exonemum, *F. Muell. Fragm.* xi. 63.—Austral,
exstipnlare, *G. Don, Gen. Syst.* i. 503.—IDS. Borbon.
falcatum, *St. Hil. tf Naud. in /Inn. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 48—Bras.
ferrugineum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 271 = Sida ferruginea.
Figarianum, Viebb, Fragm. Fl.Aethiop.52 " graveolens.
floribundnm, *Schlecht. in Linnaea,* xi. (1837) 366.—Mexic
foetidum, *Moench, Meth. Suppl.* 206.—Hab. I
Fraseri, *Walp. Ann.* ii. 158.—Austral.
frutescens, Medic Malv. 29-indicum.
fruticosum, *Guill. V Perr. Fl. Senega. Tent.* i. 70.—As. et Afr. trop.
furfurellum, *Mio. Fl. Ind. Bat.* i. II. 144.—Jaw.
geminifiorum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 274. L474.ibarrense.
geranioides, *Benth. Fl. Austral,* i. 202.—Austral.

ABUTILON :-
giganteum, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 116.—Am. trop.
glaucum, *G. Don, Gen. Sysk* i. 604.—Afr. trop.
t *glaucum,* Sweet, Hort Brit. ed. I. 54 = muticum.
glechomaefolium, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 198. t. 411.—Bras.
globiflorum, *G. Don, Gen. Syst.* i. 502.—Maurit.
Goudotianum, *Triana b" Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xviL (1862) 184.—N. Granat.
grandiflorum, G. Don, Gen. Syst i. 504=indicum.
grandifoliurn, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 53=molle.
graveolens, Seem. Bot Voy. Herald, 365=indicum.
graveolens, *Wight* Cr *Arn. Prod.* 66.—Geront. trop.
Grevilleanum, *Walp. Rep. i.* 324.—Chili.
Guichenotianum, *Decne. in Herb. Timor. Desc.* 106 (1836)—Ins. Timor.
gymnanthemum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 47.—Reg. Argent
Haenkeanum, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 115.—Mexic
halophilum, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 381 = Fraseri.
hernandioidts, Sweet, Hort Brit. ed. I. 53= Sida hemandioides.
heterotrichtm, Hochst. ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 187-hirtum.
hirsutissimum, Moench, Metb. Snppl. 205=indicum.
hirtum, *G. Den, Gen. Syst.* i. 503.—Reg. trop.
hirtum, Sweet, Hort Brit ed. I. 53= graveolens.
holosericeum, *Scheele, in Linnaea,* xxi. (1847) 471.—Texas.
Hulseanum, *Torr.ex A. Gray, PI. Fendl.* 23.—N. Mexic.
hypoleucum, *A. Gray, PI. Wright,* i. 20.—Texas,
ibarrense, *H. B. VK. Nov. Gen. et Sp.* v. 272.—Ecuador.
imberbe, G. Don, Gen. Syst. i. 502=crispum.
inaequilaterum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 198. t. 40.—Bras,
incanum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 53.—Ins. Sandvic.; Mexic
indicum. *Sweet, 1. c.* 54.—Geront trop.
insigne, *Planch, in Van Houtte, Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1850-51) 41.—N. Granat.
integerrimum, *Hook. Bot. Mag.* t. 4360.—Mexic.
intermedium, *Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 49.—Geront. trop.
Jacquini, *G. Don, ben. Syst.* i. 603.—Am. bor.
Julianae, *Endl. Prtd. Fl. Norf.* 135.—Ins. Norfolc.
Kotschyi, Hochst. in Webb, Fragm. FL Aethiop. 62 = hirtum.
anatum, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1S49) 553.—Bras.
Kixiflorum, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 66 - Wissadula rostra*.
Jiiospermum, *Grisei- Fl. Brit. W. Ind.* 79.—Ind. occ.
-Ummoni, *S. Wats in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 357.-Calif.
hidum, F. Muell. Fragm. vi. 168=Sida lepida.
'ischenaultianum, Sweet, Hort Brit. ed. I. 68 = Wissadula Leschenaultiana.
iencanthemum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 200.—Bras.
«ncopetalum, *F. Mtell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 200.—Austral.
\knosum, G. Don, Gen. Syst. i 501 = Jacquini.
"ngicuspe, *Hochst. ex A. Rick. Fl. Abyss,* i. 69.—Abyssin.
Joigilobum, *F. Muell. Fragm.* ix. ISO.—Austral.
lu:i»num, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 53.—Ind. occ
micranthum, *Peyr. i* Linnaea,* xxx. (1859-60) 59.—Mexic.
nwcianthum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 208.—Bras,
""crocarpum, *Guill. &" Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 69.—\fr. trop.
m*arocarpum, *St. Hil. V Maud, in Ann. Sc. Nat. iir.* II. xviii. (1842) 47.—Bras.
""Mrophyllum, *St. Hil.* Cf *Naud. I. c*—Bras.
"nMropodum, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i.* 69. t. •4.—Afr. trop.
m»jrum, *F. Muell. Fragm.* ix. 59.—Austral.
""Jkchroides, *St. Hil. V Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. L. xviii. (1842) 49.—Bras.
""""*Jnoratum,* Hort. ex Lem. in Illustr. Hortic. iii. (4)56) t. 82=Hibiscus marmoratus.
>*»+*itanicum,* Medic. Malv. 28 = seq.
"w+*itianum,* Sweet, Hort. Brit. ed. I. 53 = indicum.
"Kgpotamieum, *st* /«/. *v Naud- in A* [illegible] SK II. xviii. (1844) 49.-Am. trop.
mclaiophnm, *st. Hil.* b* *Naud. 1. c.* 48.—Bras,
mendocinum, *Phitm Sert. Mend. Alt.* 6.—Chili.
Menzesii, *Seem. Fl. Vit.* 16.—Ins. Sandvic.
mexicanum, *Presl, Rel Haenk.* ii. 115.—Mexic.

ABUTILON :—
micranthum, G. Don, Gen. Syst. i. 502, sphalm. - macranthum.
micropetalum, *Benth. Fl. Austral,* i. 201.—Austral.
microphyllum, A. Rich.Fl. Abyss. 1.70=fruticosum.
microspermum, *G. Don, Gen. Syst.* i. 601.—Hab. 1
Mitchelli, *Benth. Fl. Austral,* i. 201.—Austral.
molle, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 65—Peruv.
mollicomum, *Sweet, 1. c.* ed. I. 54.—Hab. I
mollissimum, *Sweet, I. c.* 53.—Peruv.
montanum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 207.—Bras.
mucronulatum, A. Gray, in Proc Am. Acad. v. (1862) 175=Wissadula mucronulata.
muticum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 66.—Geront. trop,
muticum, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 51=glaucum.
neilgherrense, *Munro, in Wight, III.* t. 66.—Ind. or.
neurocarpum, *Miq. PI. Jungh.* 285.—Java.
Newberryi, J. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 125.—Am. bor.
niveum, *Griseb. inifioett. Abh.* xix. (1874) 92.—Reg. Argent
notolophium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. y.* (1876) 175.—Mexic.
nudiflorum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 53 - Wissadula nudiflora.
Nuttallii, *Torr. V Gray, Fl. N. Am. i.* 231.—Am. bor.
obtusum, *G. Don, Gen. Syst. I* 601.—Hab. ?
ocddentale, Medic. Malv. 29 = Gaya subtriloba.
Ochsenii, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 618.—Chili,
orbiculatum, *G. Don, Gen. Syst.* i. 504.—China,
otocarpum, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (.1855) 13.—Austral.
oxycarpum, *F. Muell. Fragm.* ii. 12.—Austral,
oxypetalum, *Planch. V Linden, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) f84.—N. Granat.
oxyphyllum,Vtts\, Bot Bemerk. 20=polyandrum.
•paeoniaeflorum, *Walp. Rep.* v. 95.—Bras.
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 289.—Am. bor.
pannosum, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 52= glaucum.
paranthemoides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 46.—Reg. Argent
paranthemum, *Griseb. 1. c.*—Reg. Argent.
Parishii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 357.—Arizona.
parvinorum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 201.—Bras,
parvnlom, *A. Gray, PI. Wri"H. i.* 21.—Texas,
patens, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 200.—Bras,
pauciflorum, *A. St. Hil. I. c.* 206.—Bras,
pedunculare, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 273.—Bras.
peraffine.ShiMl. ex Chapm. Fl. S. U. St. 56=Jacquini.
periplod/olium, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 53 = Wissadula rostrata.
permolle, *Sweet, I. c*—Florida; Cuba,
petiolare, *H. B. V K. Nov. Gen.etSp.* v.272.—N. Granat.
pictum, *Walp. Rep.* i. 324.—Reg. Argent,
planiflorum, *C. Koch V Bouchi, in C. Koch, Allg.' Gartent.* (1857) 98.—Mexic
polyandrum, *G. Don, Gen. Syst.* i. 500.—Ind. or.
polyanthon, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 53 = Sida polyantha.
populi/olium, Sweet, 1. c =• indicum.
pubescens, Moench, Meth. 620 = A. Avieennae.
pulchellum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 53=seq.
pulchrum, G. Don, Gen. Syst. L 503*-Plagianthus pulchellus.
pyramidale, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 203.—N. Granat.
*i*cemos\im,Schlecht.inLinnaea,ii.(1837)367.*—Mexic.
ramiflorum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 199.—Bras,
ramosissimum, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 116.—Mexic.
ramosum, G. Don, Gen. Syst. i. 501 = Sida cordifolia.
ramosum, *Guill. VPerr. Fl. Seneg. Tent.* i. 68.—Geront. trop.
reflexum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 53; *Presl, Rel. Haenk.* ii. 114.—Mexic.
Regnellii, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 554.—Bras,
rigidum, *G. Don, Gen. Syst. i.* 504.—Afr. trop.
rivulare, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 202.—Bras.
rufescens, G. Don, Gen. Syst. i. 502- rufinerve.
rufescens, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) I. 202—Mexic.
rufinerve, *A. St. Hil. Fl.Bras. Mer.* i. 205. t. 42.—Bras.
rufinerve, Seem. Bot. Voy. Herald, 83 = cymosum.
Sellovianum, *Regel, in Ann. Sc.Nat.* Ser. IV. xii. (1859) 379.—Bra;.
septemlobum, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 654.—Bras,
sessiliflorum, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 113.—Mexic.

ABTTTIIiON:—
sidoides, Dal*. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. 18-ramosum.
sidoides, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 24.—Mexic.
Sonneratianum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1.54.—Afr. anstr.
Sonorae, *A. Gray, PI. Wright*, ii. 23.—Mexic.
sparmannioides, Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 70 =ramosom.
spedosum, G. Don, Gen. Syst i. 502"=Sida speciosa.
spicatum, H. R & K. Nov. Gen. et Sp. v. 271 = Wissadula spicata.
stenopetalum, *GJrcte, in Bot. Zeit.* viii. (1850) 683.—N.Granat
stipnlare, *Presl, Rel. Haent.* ii. 114.—Luzon,
striatum, *Diets, in Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 39.—Bras,
subviscosum, *Benth. Fl. Austral*, i. 202.—Austral,
sundaicum, *G. Don, Gen. Syst.* 1. 500 (1831).—Java,
terminale, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* I. 203.—Bras.
texense, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 231 = incanum.
Theophrasti, Medic. Malv. 28-A. Avicennae.
Thurberi, *A. Gray, PI. Nov. Thu**. 307.—Texas.; N. Mexic
thyrsodendron, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 48.—Reg. Argent.
Hliaefolium.Svett, Hort. Brit. ed. I.53=A. Avicennae.
timoriense, *G. Don, Gen. Syst.* i. 500 (1881).—Ins. Timor.
tomentosum, Wight *Sc* Am. Prod. 56-mutienm.
tortuosum, Cuill. *Sc* Pen. Fl. Seneg. Tent L 66= graveolens.
trichodum, A. Rich. Ess. Fl. Cub. i. 155-crispnm.
trilobatum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov. Mex.* 24.—Mexic.
triquetrum, *Presl, Reliq. Haenk.* ii. 115.—Mexic.
triquetnun, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 58.—Ind. occ.
truncatum, *G. Don, Gen. Syst.* i. **508.**—Ins. S. Doming,
tnbulosum, *Walp. Ann.* ii. 158.—Austral,
umbellatum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 53.—Ind. occ.
umbelliferum, G. Don, Gen. Syst. i. 501-seq.
umbelliflonim, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 204.—Bras.
uratocarpum, Walp. Rep. i. 324=ceratocarpum.
velutinum, *G. Don, Gen. Syst. i.* 504.—Afr. trop.
velutinum, A. Gray, Illustr. Gen. PI. Am. Bor. ii. 67. 1125=bolosericeum.
venosum, *Lent. Hortic. Univ. Misc.* 1844; *ex Fl. des Serres*, ii. (Mars 1846) t 5.—Mexic.
verbascoides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) I. 202.—Venezuela.
vesicarium, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 54=A. Avicennae.
vexillarium, E. Morr. Belg. Hortic. (1864) 289=megapotamicum.
virens, *St. Hil. V* A W. *in Ann. Sc. Nat.* Ser, II. xviii. (1842) 48.—'Bras.
virgatunr, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 53.—Hab. ?
vitifolium, *Presl, Rel. Haent.M* 116.—Chili.
Wagenerianum, *Regel, Cat. PI. Hort. Atsatn.* (1860) 1, nomec.—Hab.!
wissadifolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 47. —Reg. Argent.
Wrightii, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 162.—Texas.
zanubaricum, *Boj. ex Mast, in Oliver, Fl. Trot. Afr.* i. 186.-Afr. trap.

ABUTUA, Lour. Fl. Cochinch. 680 (1790)=Gnetum, Linn.
africana, Lour. 1. c. 681 (Quid t).—Afr. or.
indica, Lonr. 1. c 830=G. funiculare.

ACACAL-LIS, Lindl. FoL Orchid. 1853. *ORCHIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii 644.
cyanea, *Lindl. I.* f.—Bras.

[illegible] (1865). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hookf. 1594.
ARTHROSPRION, Hassk. Retzia, i. 212 (1SS5>
CHITONANTHDS, Lehm. PI. Preiss. ii. 868 (1847).
COPARILLA, DREPAPHYLA, EBURNAX, ESCLERONA, GUMIFERA,HECATANDRA,POPONAX,SENEOALIA ZIGMALOBA, Rafin. Sylva Tellur. 118-120 (1838).
FARNESIA, Gasp. Desc. Nuov. Gen. (1838).
HOOTESIA, Budtl. in Proc Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 433, partim.
PHYLLODOCE, Link, Handb. ii. 132 (1831).
TETSACHEUOS, Lehm. PI. Preiss. ii. 868 (1847).
yACHEU-lA, Wight & Am. Prod. 272 (1834).
abutina, Willd. Sp. PI. iv. 1051 = linilblia.
abstergent, Steud. Norn. ed. II. i. 3=co*rinoa.
abyssinica, *Hochst. ex Benth. in Hook. Lmd. Journ. Bot.* v. (1846) 97.—Abyssin.

ACACIA-
acanthocarpa, Willd. Enom. Hort Berol. 1057 =• Mimosa acanthocarpa.'
acanthoclada, *F. Muell. Fragm.* iii. 127.—Austral.
acantholoba, Humb. & Bonpl. ex WiUd. Sp. PI. iv. 1089=Mimosa acantholoba.
acanthophora, Stead. Nom. ed. II. i. 8=Mimosa acanthocarpa.
acapulcensis, Kunth, Mim. 78. t. 24=Lysiloma acapulcensis.
acatlensis, *Benth. in Hoot. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 513.—Mexia
adcularis, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 450= jnniperina.
adcularis, Humb. *Sc* Bonpl. ex WiUd. Enum. Hort. Berol. 1056 = Famesiana.
***»antas», Lindl. in Mitch. Three Exped*- ii. 267.—Austral.**
aciphylla, *Benth. in Linnaea*, xxvi. (1863-55) 627.—Austral.
Acradenia, F. Muell. in Journ. linn. Soc iii. (1850) 142=* umbellate,
acuifera, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 496.—Ins. Baham.
aculeaticarpa, Lag. Gen. et Sp. Nov.~A6=Mimosa acanthocarpa.
acuminata, *Benth. in Hook. Loud. Journ. Bot.* i. (1842) 873.—Austral.
aeutangula, Buch.-Ham. ex Wall. Cat sab n. 5271= Pithecolobium angulatum.
acutistipula, Mart, in Flora, xx. (1837) Beibl. ii. 107 = Mimosa acutistipula.
Adansonii, Guill. 8c Pen. Fl. Seneg. Tent i. 249 = arabica.
adenanthenides, Mart. & Gal. In Bull. Acad. Brux. xii. (1846) 311=Mimosaadenantheroides.
adenocarpa, Walp. Rep. t 924,sphalm.=seq.
adenopa, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (18331 206=A. Famesiana.
adenophora, Spreng. Syst iii. 140 =decnrrens.
adenostylis, fensl, in Flora, xxvii. (1844) 312 = Dichrostachys nntans.
adhaerens, *Benth. in Hook. Loud. Journ. Bot.* i (1842) 517.—Bras.
adiantoides, Spreng. Syst. iii. 146-Piptadenia laxa.
adnata, *F. Muell. in Melb. Chemist* (July 1882).^ Austral.
adstringens, A. Cunn. in G. Don, Gen. Syst ii. 405« falciformis.
adstringens, Mart. Reise Bras. i. 548-Stryphnodej. dron Barbatimam.
adunca, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 406= crassinscula.
aegyptiaca,SotH.i4iaBj««o,iv.(186S-64)82.—Aegnt
affinis, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.102=dealbaU.
alata, *R. Br. in Ait. Hort. Km.* ed. II. T. 464.—Ausfm.
alba, Colla, Hort. Rip. App. ii. 339 - Callianda portoricensis.
alba, *De Vriese, in Miq. PI. Jungh.* 27O.-Malaya.
Btta,Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 68=Uucophloa.
albescens, Steud. Nom. ed. II. i. 8=tortnosa.
aft>ra>H,Kunu,Mim.87.t.27=FithecoIobiumalbicE$_{ns}$.
albida, *Delile, Fl. Egypt.* 286. t 62. f. 3.—Afr. bor.
albida, Lindl. Bot. Reg. t. 1317*=tortuosa.
alliacea, Buch.-Ham. m Wall. Cat. n. 5258=caesit.
alpina, *F- Muell. Fragm.* iii. 129.—Austral.
amara, Willd. Sp. PL iv. 1074=Albizzia amara.
amazonica, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1(75) 523.—Am. trop.
ambigua, *Hoffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* Hi. 15.—Afr.trop.
ambigua,Ktff»/,fniin««««,x.(15S5-S6)600.—Am.-jop.
amblycarpm, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5260=penoata.
amblygona, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Jcurn.* Bot i. (1842) 332.—Austral,
amblyphylla, *F. Muell. in Wing, South Se. Rtcord* (July 1882).—Austral,
amentacea, *DC. Prod.* ii. 455.—Am. bor.
amentifera, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) I41.-Austral.
amoena, Sieber, ex Walp. Rep. i. 897«rubida.
amoena, *Wendl. Comm. Acac.* 16. t. 4.—Austral
amythethophylla, *Steud. ex A. Rich. PI. Abyss*, i. 245. —Abyssin.
anceps, *DC. Mim. lig.* xii. 44«.—Austral.
anceps, Hook. Ic. PI. t. 167=complanata.
aneura, *F. M*fil. in LUnaea*, xxvi. (1853-55) 627.—Austral.
Angico, Mart. Mat. Med. Bras. 53-Piptadenia rigida,
angulata, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 68=di$_{1co}$l$_{or}$.

ACACIA:-
angulosa, Bertol. Fl. Guatim. 42 = filicina.
»iwti/Wfo, Lodd. Bot Cab. t 768=longifolia.
•«^51S,Meissn.inLehm.Pl.Preis..i.l3=.triqnetra.
angustifolia Wendl .Comm . Acac. 84-suaveolens.
angust DC. Prod. ii. 470 = Piptadenia peregrina.
angustisiliqua, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 300 = Desmanthus virgatus.
anthelmintica, Baill. Hist. PI* «• 56=Albizria anthelmintica.
ap?Lat Meiasn. in Lehm. PI. Prei»- i- »-*• caerulea.
arabica, *Willd. Sp. Pl.* iv. 1085.—Afr.; As. trop.
Arar, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5249 = A. Intsia.
arborea, Benth. Pl. Hartw. 18 = Lysiloma microphylla.
arborea, Willd. Sp. Pl. iv. 1064 = Pithecolobium filicifolium.
Arcuthos, Spreng. Syst. iii. 184 = juniperina.
arcuata, *Decne. Herb. Timor. Descr.* 138.—Ins. Timor.
arcuata, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 135 = melanoxylon.
arenosa, Willd. Sp. Pl. iv. 1054 (err. typ. 1060) = Mimosa arenosa.
argyrophylla, Hook. ex F. Muell. Pl. Vict. ii. 18 = brachybotrya.
arida, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 404.—Austral.
armata, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 463.—Austral.
armata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2564=A. Farnesiana.
armatoides, Hort. ex Walp. Rep. i. 888=armata.
Aroma, Gill, in Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 206 - macracantha.
aromatica, Poepp. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 502 = A. Farnesiana.
Arrophula, D. Don ? in Wall Ca, n. 5257-Albi.ia stipulata ?
Arrophula, D. Don. Prod. Fl. Nep. 247 = pennata.
Asak, Willd. Sp. Pl. iv. 1077 = hamulosa ?
asparagoides, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales*, 348. —Austral.
aspera, *Lindl. in Mitch. Three Exped.* ii. 139.—Austral.
aspernlacea, F. Muell. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 123 = lycopodifolia.
aspidioides, G. F. W. iW «-«••-•*- Pentaclethra filamentosa.
asplenioides, Nees, in Flora, iv. (1821) 303 = Calliandra mertensioides.
astringens, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 405 = penninervis.
ataxacantha, *DC. Prod.* ii. 459.—Afr. trop.
ataxiphylla, *Benth. in Linnaea*, xxvi. (1853-55) 605. —Austral.
atomiphylla, Burch. Trav. i. 341 = haematoxylon.
atramentaria, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 392.—Chili.
Auckeri, Benth. l. c. 499 = nubica.
aulacocarpa, *A. Cunn. ex Benth. l. c.* 379.—Austral.
aurea, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) Art. IV. 6.—Java.
auriculaeformis, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 377.—Austral.
auriculata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 5237 = Albizzia stipulata.
auriculata, Charp. ex Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 400 = Albizzia auricalata.
aurita, Schlecbt. in Linnaea, xii. (1838) 565 = Lysiloma aurita.
auronitens, *Lindl. S«anR.* ^ ^ p . (1866) 106; —Tasmania.
Asak, G. Don, Gen. Syst. ii. 418 = hamulosa.
Bagsteri, *Benth. in Hook. Lond. Journ* . *Bo*, t (1842) 337.—Austra
bahamensis, GU Fl. Brit. W. ind. 221=LysU,a latl
bahiet& , r t . *H Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 525 —Am.trop. ™hecoloMumfragrans.
Balbisii, Spreng Syst mHO.. P ith ^ Rip. 1; DC. Prod. ii. 473 = Caesalpinia bijuga.
Banerofiiana, Bert. ex Colla, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 336.—Austral.
barbinervis, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1869) 146 = Albizzia basaltica.
basaltica, F. Muell. & Benth. in Journ. Linn. Soc. iii. Baseri, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 344.—Austral.
Baxteri, *Benth. l. c.* 337.—Austral.

ACACIA:—
Baxteri, Meissn. in Lehm. Fl. Freiss. i. 7 =congesta.
bella. Mart. ex Spteng. Syst. iii. 141=Calliandra bella.
Benthamii, Meissn. in Lehm. Fl. Preiss. 11 =ttochlearis.'
Berlandieri, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bat.* i. (1842) 622.—Mexic.
Bernieri. *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) S63. —Madag.
Berteriana. Balb. ex DC. Prod. ii. 470-Pilhecolobium fragrans.
Berteriana, *Spreng. Syst*. iii. 138.—Jamaica.
bicefis, Willd. Sp. Fl. iv. 1075=Leucaena glanca.
bidentata,.£«»tt. *in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 383.—Austral.
Bidwilli, *Benth. in Linnaea*, xxvi. (1853-66) 629.—Austral,
biflora, *R. Br. in Ait. Hart. Kern.* ed. II. v. 463.—Austral.
biflora, Paxt. Mag. ix. (1842) 221 - decipiens.
biglandulosa, Meissn. in Lehm. Fl. Preiss. ii. 205 = pentadenia.
Bilaura, Buch.-Ham. ex WalL Cat. snb n. 5234 = odoratissima.
bimucronata, DC. Prod. ii. 469 = Mimosa sepiaria.
binervata, *DC. 1. c.* 452.—Austral.
binervosa, DC. Mem. Leg. xii. 448 = bivenosa.
bivenosa, *DC. Prod*. ii. 452.—Austral.
Blomei, Ohlend. in Neue Allgem. Gartens. (1845) 369 =saligoa.
Boivini, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 368.—Madag.
bombycina, Benth. ex Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52). 101 = brachybotrya.
bonariensis, *Gill, in Hook. Bot. Misc*. iii. (1833) 207.—Reg. Argent.
Bonplandii, Gill, ex Hook. 1. c. 205-Mimosa Bonplandii.
bossiaeoides, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 323.—Austral.
bossiaeoides, Seem. Eingef. Acac. t l=glaucoptera.
botrycephala, Desf. Cat. Hort Pai. ed. III. 300 = discolor.
brachyacantha, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 1055=Mimosa acanthocarpa.
brachybotrya, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 847.—Austral.
brachyloba, WiUd. Sp. PI. iv. 1071 = Desmanthus brachylobus.
brachyphylla, *Benth. ex Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1858-56) 615.—Austral.
brachyptera, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 325=incurva.
brachystachya, *Benth. Ft. Austral*, ii. 408.—Austral,
brasiliensis, *Spreng. Syst.* iii. 142.—Bras.
brevifoUa, *Benth. Fl. Austral*, ii. 395.—Austral.
brevifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 1285=lunata.
brevipes, A. Cunn. in Bot. Mag. t. 358=melanoxylon.
Brovmiana, Wendl. in Flora, ii. (1819) 189=strigosa.
Brownii, Steud. Nom. ed. I. 2 = juniperina.
brunioides, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 404.—Austral.
Buchananiana, Voigt, Hort. Suburb. Calc.293=pinnata.
Burkei, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 98.—Afr. austr.
Bnrkittii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 400—Anstral.
Burmanniana, *DC. Prod*. ii. 461.—Ind. or.
buxifolia,^. *Cunn.inField,N.S. Wales*,344.—Austral.
Bynoeana, *Benth. in Linnaea*, xxvi. (1858-55) 614.—Anstral:
caduca, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PL iv. 1089 = Minosa caduca.
caesia, Roxb. ex Wall. Cat. n. 525S A=pennata.
caesia, *Wight If Am. Prod*. 278.—Ind. or.
caesia, Willd. Sp. PI. iv. 1090, ex parte=A. Intsia.
caffra, *Willd. 1. c.* 1078.—Afr. austr.
calamifolia, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 4 = quadrilateralis.
calamifolia, *Sweet, ex Bot. Reg.* t. 839.—Austral.
Caleyi, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 347 = podalyriaefolia.
callicoma, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 104.—Afr. austr.
calligera, F. Muell. ex Benth. in Jonm. Linn. Soc. iii. (1859) 141 -Wickhami.
Callistemon, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 568 = Calliandra grandiflora,
callosa, *Bertol. PL Nov. Hort. Bon. I* 9.—Hab. 1

ACACIA:-
callosa, Spreng. Syst. iii. 188=Piptadenia communis.
calyculata, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 379.—Austral.
Campbellii, Am in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. I. (1836) 883-planiformis.
campylacantha, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss. i. 242 = A. Suma.
campylophylla, *Benth. ex Scklecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-65) 605.—Austral.
Candolleana, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 206 = Drummondii.
canescens, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5256»pennata.
canescens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brnx. x. II. (1848) 814-Mimosa depauperata.
capensis, Burch. Trav. i. 195=horrida.
capensis, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxv. (1831) 175.—Afr. austr.
caracasana, Willd. Sp. Fl. iv. 1068=Calliandra caracasana.
carbonaria, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 571 = villosa.
cardiophylla, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. 'tend. Journ. Bot.* i. (1842) 385.—Austral.
Caringa, Buch.-Ham. in Wa". Cat. n. 5239 =Leucaena glauca.
cassioides, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 1051.—Hab. 1
Catechu, Brandis, For. Fl. 186=A. Sundra.
Catechu, Wight & Am. Prod. 272 = A. Suma.
Catechu, *Willd. Sp. PI.* iv. 1079.—Ind. or.
catechuoides, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 610 - A. Catechu.
caudata, DC. Prod. ii. 456=Entada polystachya.
Cavenia, Bert ex Bull. Férussac, xx. (1830) 108 = A. Famesiana.
Cebil, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1674) 186.—Reg. Argent,
cedroides, *Benth. ex Scklecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-56) 615.—Austral.
celastrifolia, Benth. in Hook. Lond. Jonm. Bot. i. (1842) 849=myrtifolia.
centrophylla, *DC. Prod*. ii. 465.—Jamaica.
centrota, Spreng. ex DC. 1. c. = praec.
Ceratonia, WiUd. Sp. PL iv. 1091 = Mimosa Ceratonia.
chlorantha, Zucc in Abh. Akad. Mnench. ii. (1882) 347 = filicina.
chordophylla, F. Muell. ex Benth. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 612=rigens.
choriophylla, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 495.—Ins. Baham.
chrysantha, *DC. Prod*. ii. 471.—Guiana.
chrysobotrys, Meissn. Ind. Son. Hort. Basil. (1842) l = spectabilis.
ckrysocoma, Miq. in Fl. Ind. Bat. L I. 6 = tomentosa.
Chundra, WiUd. Sp. PI. iv. 1078=A. Catechu,
cibaria, *F. Muell. in Melb. Chemist* (July 1882).—Austral.
ciliat" R. Br. in Ait Hort. Kew. ed. II. v. 465 ~ strigosa.
ciliata, *Humb. tf Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 1055.—Am. austr.
cincinnata, *F. Muell. Fragm*. xi. 85.—Austral.
Cineraria, Willd. Sp. PI. iv. 1057 =Prosopis spicigera,
cinerascens, Sieber, ex DC. Prod. ii. 454=glaucescens.
dnerea, Spreng. Syst iii. 148 = Dichrostachys cinerea.
Clausseni, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 518 = paniculata.
clavata, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 662 •» montana.
clavigera, *E. Mey. Comm. Pl.Afr.Austr.16%.*—Afr. austr.
Ce«,.Walp. Ann. iv. 626=A. Koa.
cochlearis, *Wendl. Comm. Acac*. 15.—Austral
cochliacantha, *Humb. (f Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv.* 1081.—Am. austr.
cochliocarpa, *G. Don, Gen. Syst*. ii. 422.—Bras,
cochlocarpa, *Meissn. in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 10.—Austral.
Colleana, Presl, Rep. Bot. Syst. 183 = Calliandra portoricensis.
colletioides, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 336.—Austral.
colletioides, F. Muell. PL Viet. ii. 5-continna.
colubrina, Mart. Herb. Fl. Bras. 107 = Piptadenia colubrina.
comorensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 363.—Afr. hop.
complanata, *A. Cunn ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842, »#.—AustraL
compressa, Schult. ex Colla, Hort. Kipul. App. ii. S93 -= visneoides.

ACACIA:—
concinna, *DC. Prod*. ii. 464.—As. trop.
concinna, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1870) II. 170.— Chili.
concinna, Wall. Cat. n. 5250 D=pennata?
concordiana, Loud. Hort Brit 409-; Pith ecqlobium urabellatum.
conferta, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 345.—Austral,
congesta, *Benth. 1. c.* 327.—Austral
conjunctifolia, *F. Muell. Fragm*. xi. 68.—Austral
conspersa, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 140.—Anstral.
conspicua, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 405 - vestita.
constricta, *Benth. in A. Gray, PI. Wright,* i. 66.— N. Mexic.
continna, *Benth. Fl. Austral*, ii. 822.—Austral.
contorta, DC. Prod. ii. 470 = Piptadenia contorta.
Cooleyi, Eaton, Man. ed. VI. (1833) 1-Desmanthus Jamesii.
cordata, *Steud. Nom.* ed. II. i. 4.—Anstral.
coriacea, *DC. Mini. Leg*. xii. 446.—Austral.
coriaria, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 5264 B = A. Famesiana.
cornigera, Willd. Sp. PI. iv. 1080 = *padicigera, sphaerocephala.
corom'llaefolia, *Desf, Tabl*. ed. II. 807.—Afr. bor.
costata, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 839.—Austral.
Coulteri, *Benth. ex A. Gray, PI. Wright,* i. 66.—N. Mexic.
Courrantiana, DC. Prod. ii. 465 = Mimosa acantholoba.
crassicarpa, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 379.—Austral,
crassifolia, *A. Gray, in Mem. Am. Acad*. N. S. v. (1855) 317.—Mexic.
crassistipula, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 326.—Austral.
crassiuscula, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 14^ pycnophylla.
crassiuscula, *Wendl. Comm. Acac*. 31. t. 8.—Austral,
crispnla, *Benth. ex Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853- 55) 606.—Austral.
cultrata, *Ait. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 4.—Austral,
cnltriformis, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 406.— Anstral
cumanensis, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI iv. 1058=Prosopis juli flora.
Cumingii, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 525=villosa.
enneata, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 42.—Austral.
Cunninghamii, *Hook. Ic. PI*. 1.165.—Austral.
Cunninghamii, Sweet, Hort. Brit ed. II. 164-trinervata.
curvifolia, *Bonpl. Desc. PI. Malm*. 99. t. 40.—Hab. ?
cuspidata, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Jonm. Bot. i. (1842) 837 = diffusa.
cuspidata, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 67S = fill cina.
cyanophylla, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Mile.* 46.—Austral.
cyclophylla, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) l!63 = obliqua.
Cyclops, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 404.— Austral.
cyclosperma, DC. Prod. ii. 456 = Albizzia fulgent.
eyenorum, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842 / 888=pnlchella.
eyenorum, Hook. Bot. M?^ t. 4653=obscure.
cygnorum, Meissn. in Lehm. i\. Preiss i< 22-pulchella.
cylindriflora, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* x (1843) 311.—Mexic.
cymbacantha,Zvcc. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 501=-cochliacantha?
cyperophylla, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* il. 400. —Austral.
Daintreana, F. Muell Fragm. iv. 6=«celsa.
Dalea, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 69 = Diclirdtechyf cinerea.
Dallachiana, *F. Muell. Fragm*. i. 7.—Austral
daphnifolia, Meissn. in Bot. Zeit xiii. (1855) fl - microbotrya,
dasyphyUa, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 3F9=lineata.
daviesiaefolia, *A. Cunn. ex Loud. Hort. Brit.* 406.— AustraL

ACACIA:—
daviesioides, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 402-diffusa.
dtalbata, A. Conn, in Field, N. S. Wales, 845-lunata.
dealbata, *Link^Enum. Hart. Bend.* 445.—Austral.
Decaitnei, Steud. Norn. ed. II. i. 4 = arenata.
decipiens, *R. Br. in Ait. Hort. Kern.* ed. II. v. 463.—Ind. or.; Austral.
decora, *Reichb. Ic. Exot.* 1.199.—Austral,
decurrens, *Willd. Sp. PI.* iv. 1072.—Austral.
dtcussata, Tenore, Cai. Ort. Nap. (1845) 77 -longifolia.
delibrata, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* i. (1842) 374.—Austral,
deltoidea, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 401.—Austral.
demostachya, Benth. Fl. Hartw. 12=acapulcensis.
Dempsteii, *F. Muell. Fragm.* xi. 65.—Austral.
densa, Wall. Cat n. 5262 = leucophloea.
densifolia, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 860 = aspera.
denticulosa, *F. Muell. Fragm.* x. 32.—Austral,
dentifera, *Benth. in Maund, Botanist,* ir. t. 179.—Austral.
denudata, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1842) = polchella.
depauperata, Mart, ex Steud. Norn. ed. II. i. 4-Desmauthus virgatus.
dependens, A. Cnnn. ex Benth. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. i. (1842) 372= longifolia.
dermatophylla, *Benth. Fl. Austral,* ii. 846.—Austral.
desmostachya, Benth. PI. Hartw. 13=Lysiloma acapulcensis.
detinens, *Burch. Trav.* i. 310.—Air. austr.
dittyocarpa, Benth. in Linnaea, xxvi. (1858-55) 816 — brachybotrya.
dictyophleba, *F. Muell. Fragm.* iii. 128.—Austral.
Dietrichiana, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 149.—Austral,
diftusa, *Lindl. Bot. Reg.* t 634.—Austral,
dilatata, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1858-55) 608.—Austral.
dilatata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 4.—Austral,
dimidiata, *Benth. in Hoot. Lond. Joum. Bot.* L(1842) 381.—Austral.
dineura, F. Muell. ex Benth. in Jonrn. Linn. Soc. iii. (1859) 130-binervata.
diptera, *Lindl. Swan River App.* 15.—Austral.
diptera, Willd. Enum. Hort. Berol. 1051 = Prosopis juliflora.
discolor, Whitley, ex Steud. Nom. ed. TI. i. 4=prismatica.
discolor, *Willd. Sp. PI.* iv. 1068.—Austral.
dissitiflora, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 371-longifolia.
dissoneura, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record* (July 1882).—Austral.
distachya, Moę. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 456-Mimosa distachya.
divaricata, A. Cunn. ex Stend. Nom. ed. II. i. 4 = dilatata.
«K»«r»Vair«, Willd. Sp. PI. iv.1070 - LysilomaSchiedeana.
divergens, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 331.—Austral.
diversifolia, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 571-Lencaena diversifolia.
dodonaeifolU, *Willd. Enum. Hort. Berol. Sufipl.* 68.—Austral.
dolabriformis, Colla, Hort Ripul. 1=decipiens.
dolabriformis, A. Conn, in Hook. Ic PI. 1.169-dimidiata.
dolabriformis, Wendl. Aeac. 56 — Daviesia incrassata.
domingensis.-Bert. ex DC. Prod. ii. 464 = Mimosa domiifgensis.
doratoxylon, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 345.—Austral.
doraioxylon, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 19 - acuminata.
drepuuxarpa, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1359) 187—Austral.
[illegible], *Benth.* in *Swan River Ap* P 15 ~ ^ ustral.
dnmetorum, *DC. Prod.* ii. 458.—Bras.
dumosa, Wight & Am. Prod. 274 =latronum.
dan,Benth. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 622.—Austral.
Durandiana, Buckl. in Proc Acad. Sc Philad. 1861 (1862) 453 - Greggii.
dysophylla, Benth. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. i. (1842) 346 = undulaefoli«.
eburnea, *Willd. Sp.* />;. j v. I081.-Oriens; Ind. or.

ACACIA .—
echinula, DC. Prod. ii. 449=joniperina.
Edgeworthii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* v. (1860) *Suppl.* 18.—Ind. or.
tdulis, H-nmb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 1066=A. Farnesiana.
eglandulosa, DC. Mini. Lég. xii. 445—cochlearis.
Ehrenbergiana, *Hayne, Araneigem.* x. t. 29.—Afr. trop.
Ehrenbergii, T. Nees, PI. Offic t. 334-praec.
Ehrenbergii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 5.—Mexic.
elata, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* L (1842) 383.—Austral.
elata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5238- Albfcria procera.
elegans, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 569 = filirina.
elephantina, Burch. Trav. ii. 236 = Elephantorrhiza Burchelli.
Elephantorrhita, Burch. ex DC. Prod. ii. 457 =praec.
elliptica, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 847 =bivenosa.
elongata, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 451.—Austral.
emarginata, Wendl. Comm. Acac. 27—stricta.
Emoryana, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 522.—Am. bor.
Endlicheri, Meissn. ex Lehm. PI. Preiss. i. 21=strigosa.
ephedroides, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 370.—Austral.
eriadenia, *Benth. 1. c.* v. (1846) 98.—Afr. austr.
eriantha, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 68.—Ind. or. ?
ericaefolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 345.—Austral.
erinacea, *Benth. I. c.* 360.—Austral,
erioclada, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 606.—Austral.
erioloba, Edgew. in Joum. As. Soc. Beng. xvL (1847) 1215-Edgeworthii.
erioloba, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. 171 -giraffae.
eriophylla, Hort. ex Loud. Encyc. PI. SuppL ii 1532 -viscidula.
erubescens, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 843.—Afr. trop.
erythrantha, Stend. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 243 — A. Suma.
erythrocephala, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot i. (1842) 862=aspera.
erythropus, Tenore, Ind. Sem. Hort. Nap. (1842) 12 = Riceana.
esculenta, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ir. (1843) 314-Lencaena pulverulenU.
esculenta, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 470=Leucaena esculenta.
EsterhazU, *Mackay, ex Regel, Cat. PL Hort. Aksakov.* 2.—Austral,
estrophiolata, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record* (July 1882).—Austral,
etbaica, *Schweinf. in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 330. t. 7, 8.—Afr. trop.
excelsa, *Benth. in Mitch. Trop. Austral.* 225.—Austral.
explanata, Jungh. Reise, 260; ex Miq. Fl. Ind. Bat. I. 9=lencophloea.
exsudans, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 214 = ver-« niciflua.
extensa, *Lindl. Swan River App.* 15.—Austral.
fagonioides, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot i. (1842) S87 = pulchella.
falcata, Desf. TabL ed. II. 207= Prosopis jnliflora.
falcata, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 5=plagiophylla.
fidcata, *Willd. Sp. PI.* iv. 1053.—Austral.
falcifolia, Hoftmgg. Ven. Pfl. Nachtr. 125, 201-procumbens.
falciformis, DC. Prod. ii. 452-penninerris.
/afciiW/a.Meissn.inBot.Zeit.xiii.(1855)ll-pycnantha.
falcineUa, *Tausch, in Flora,*ix.* (1836) 419.—Austral.
fallax, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 169-caffra.
farinosa, *Lindl. in Mitch. Three Exped.* \\. 146.—Austral.
Farnesiana, Wall. Cat. n. 6264 = planifrons.
Farnesiana, *Willd. Sp. PI.* iv. 1083.—Reg. trop.
fasciculata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = A. Lahal.
fasciculata, GuiU. ft Perr. FL Seneg. Tent i. 252-tortilia,
fasciculata,Kwith, Mim.75. t. 23 = Mimosa fasciculata.
fasciculifera, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 361.—Austral,
ferox, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* v. (1846) *f)1.*—Afr. austr.
ferox, *Mart. V GaL in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 312.—Mexic
ferruginea, *DC. Prod.* ii. 468.—Ind. or.

ACACIA :—
filicina, *Willd. Sp. PI.* iv. 1072.—Mexic.
filicoma, Mart, in Flora, xx. (1837) Beibl. ii. 109-Pipta&nia nitida.
filifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 869=ephedroides.
fimbriata, A. Conn, ex G. Don, Gen. Syst. ii. 406 = prominens.
Fistula, Schweinf. in Linnaea, *xxxv.* (1867-68) 344 = A. Seyal.
flaccida, *Spreng. Syst.* iii. 137.—Bras.
flava, Spreng. ex DC. Prod. li. 469 = Piptadenia flava.
flavescens, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 381.—Austral,
flexicaulis, *Benth. I. c.* 505.—Texas,
flexifolia, *A. Cunn. ex Benth. 1. c.* i. 869.—Austral.
flexuosa, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pi. iv. 1082 - macracantha.
flexuosa, Lag. Gen. et Sp. Nov. 16 —Prosopis juliflora.
fioribunda, Willd. Sp. PL iv. 1051-longifolia.
fluviatilis, Spreng. Syst. v. Ind. 3-polyphylla.
foetida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 265-Piptadenia foetida.
foliolosa, R. Grar. in Wall. Cat. n. 5241-Albizzia myriophylla.
formosa, Kunth, Mim. 102. t. 32-Calliandra formosa.
fragrans, Tenore, Cat Ort. Nap. 1 - Calliandra caracasana.
Fraseri, Hook. Ic. PL 1.171 =podalyriaefolia.
frondosa, Willd. Sp. PI. iv. 1076 = Lencaena glanca.
frutescens, *Steud. Nom.* ed. II. i. 5.—Ind. or.
fruticosa, Loud. Hort. Brit. 409—frutescens.
fruticosa, Mart. Herb. Fl. "Bras. 107=Piptadenia latifolia.
fruticosa, Voigt, Hort Suburb. Calc. 261 - Mimosa fruticosa, *Roxb.*
fulgens, Charp. ex Fourn. in Bull. Soc. Bot Fr. xix. (1865) 400-Albizzia Charpentieri.
fulgens, Labill. Sert. Austr. Caled. 68. t. 67=Albizzia fulgens.
furcata, Desv. Jonra. Bot. iii. (1814) 67-Prosopis juliflora.
furcata, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 206 .—Am. austr.
furcifera, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 267 — armata.
furfuracea, G. Don, Gen. Syst. ii. 405 = lunata.
galioides, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 344.—Austral,
gemella, *Hoffmgg. Ven. Pfl. Nachtr.* ii. 40; iii. 16—Hab. 1
genistifolia, link, Enum. Hort. Berol. ii. 442-diffusa.
genistoides, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 830.—Austral.
Gerrardi, *Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx.* (1875) 508. —Afr. austr.
gigantea, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) Art. iv. 5 -Parkia speciosa.
Gilberti, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 204.—Austral.
Gilesiana, *F. Muell. in Melb. Chemist* (July 1882).—Austral.
Gilliesii, Steud. Nom. ed.II. L 5-furcata.
draff a, Sieber, ex Steud. 1. c.-A. Seyal.
giraffae, Hochst ex A. Rich. Tent. FL Abyss, i. 238 - stenocarpa.
giraffae, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 1054.-Afr. austr.
glabrata, ScMecht in Linnaea, xii. (1838) 569 = filicina.
gladiiformis, *A. Cunn. ex Benth.* ifç *Hook. Lend. Journ. Bot.* i. (1842) 354.—Austral.
glandulosa, Guill. in Ann. Sc Nat *Sir.* II. vii. (1837) 360=Leucaena Forsteri.
glandulosa, Willd. Sp. PL iv. 1071 = Desmanthus brachylobus.
glauca, Moench, Meth. 466 -Lencaena glauca.
glaucescens, *Willd. Sp. PI.* iv. 1052.—Austral.
glaudfolia, Baumg. ex Lehm. PL Preiss. i. 14 in nota-cnltriformis.
glaucophylla, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 243.—Afr. trop.
giancoptera, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 604. —Austral,
glomerosa, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 621.—Am. austr.
glutinosa, F. Muell. Fragm. iv. 6 = ixiophylla.
Gnidium, *Benth. Fl. Austral,* ii. 359.—Austral.
gonoacantha. Mart, in Flora, xx. (1837) Beibl. ii. 109 - Piptadenia commnnis.

ACACIA:—
gonocarpa, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1869) 136.—Austral.
gonoclada, *F. Muell. I. c* 140.—Auitral.
gonophylla, *Benth. in Linnaea,* xxvL (1858-55) 613.—Austral.
gracilis, Mart. & Gal. in BulL Acad. 8nu. x. II. (1843) S1l = Calliandra formosa.
graminea, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1842) = extensa.
grandifiora, Willd. Sp. PL ÌT. 1074 - CalUandra grandiflora.
grandis, Henfr. in Card. Mag. Bot iii. (1851) 177 = pulchella.
grandisiligua, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842)618 = paniculate,
grandistipnla, *Benth. L. c.* 511.—Bras.
granulosa, LabilL FI. N. Caled. 87. t. 66-Albizzia granulosa.
grata, Willd. Enum. Hoit. BeroL 1056 = Piptadenia macrocarpa.
graveolens, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 404 - vemiciflua.
Greggii, *A. Gray, PI. Wright,* i. <"5.—N. Mexico.
Gregorii, *F. Muell. Fragm.* iii. 47.—Austral.
Greveana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (188S) 864.—Madag.
Guachapele, *H. B. & K. Nov. Gen.et Sp.* vi. 281 = Lysiloma Goachapele.
guadalupensis, DC Prod. ii. 464=riparia.
gualparensis, Steud. Norn. ed. II. i. 6 - Albizzia stipulata.
guatemalensis, Hook. & Arn. Bot Beech. Voy. 419 = Mimosa guatemalensis.
guayaquilensis, Desf. Tabl. Hort Par. ed. II. 208- Mimosa guayaquilensis.
guianensis, Willd. Sp. PI. iv. 1061-Stryphnodendron guianense.
Guilandinae, DC. Prod. ii. 465 - Mimosa obovata.
gummifera, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 79=spirocarpa.
gummifera, *Willd. Sp. PI.* iv. 1056.—Afr. bor.
Gunnii, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 382 - vomeriformis.
guttata, *Hoffmgg. Verm. Pfi. Nachtr.* L 201, 125.—Hab. 1
guttulifera, *Hoffmgg. I. c.* iii. 16 = Martinicos.
gyrocarpa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 241 -albida.
Habbas, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 444 = Mimosa asperai
habbasioides, Boj. Hort Maurit. 116=concinna.
hadiensis, *DC. Prod.* ii. 472.—Arab.
haematomma, Bert, ex DC. Mém. Lég. xii. 448. t. 68 = Calliandra haematomma.
Harmatox/lon, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 1066.—Afr. austr.
hakeoides, *A. Cu/tn. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 854.—Austral.
Hamiltoni, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 59 - Calliandra portoricensis.
haraulosa, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 509.—Arab,
harpophylla, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. S89.—Austral.
Hartwegi, Benth. PI. Hartw. 13-fiUcina.
Harveyi, *Benth. Fl. Austral,* ii. 368.—Austral,
hastulata, *Sm. in Sees, Cyclop,* xxxix. *Suppl.*—Austral.
Uayesii, *Benth. in Trans. Linn. Soc* xxx. (1875) 524.—Am. trop.
hebecephala, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 408 - elongata.
hebeclada, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 73; *Prod.* ii. 461—Afr. austr.
hccatophylla, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 242.—Afr. trop.
hemignosta, *F. Muell. in Journ. linn. Soc.* iii. (1859) 134.—Am. trop.
hemtteles, Benth. in Linnaea, xxvi. (1853-65) 619 - subcaerulea.
Hemu, Walp. Rep. v. 598 (sphalm. *pro A. Nemu).*
heteracantha, *Burch. Trav. I* 889,—Afr. austr.
heterocarpa, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 79 = Prosopis Stephaniana.
heterocliU, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss. I* 18.—Austral,
heteroneura, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1893-66) 624.—Austral.

ACACIA:—
heterophylla, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 81 = A. Koa.
heterophylla, *Willd. Sp. PI.* iv. 1054.—Ins. Mascar.
Hindsii, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 504.—Mexico.
hippuroides, *Heward, ex Benth. I. c.* 344.—Austral.
hirsuta, Schlecht. in Linnaea, xii. (1888) 572 = filidna.
hirta, *Boj. Hort. Maurit.* 115.—Ins. Maurit.
hirta. Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 1L (1843) 818 = Mimosa Galeottii.
hirta, Nutt. in Ton. & Gray, FL N. Am. i. 404 - filicina.
hirtella, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 167.—Afr. austr.
hisfidissima, DC. Prod. ii. 455-pulchella.
hispidula, *Willd. Sp. PI.* iv. 1054.—Austral.
Hoffmannseggii, *DC. Prod.* ii. 471.—Bras,
holocarpa, *Benth. Fl. Austral,* it 408.—Austral,
holosericea, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 407.—Austral.
homaloclada, *F. Muell. Fragm.* xi. 34.—Austral,
homalophylla, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* i. (1842) 365.—AustraL
homomalla, Wendl. Acac. 49. t. 13=glaucescens.
Hookeri, Meissn. in Lehm. PL Preiss. L 11 =ericifolia.
Hooperiana, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. L. 10 - concinna.
horrida, Span, in Linnaea, xv. (1841) 199-pennata.
horrida, *Willd. Sp. PI.* iv. 1082.—Afr. austr.
horridula, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 9.—Austral.
hostilis, Mart. Reise, i. 555—Mimosa hostilis.
Houstoni, Willd. Sp. PI. iv. 1062 - CalUandra Houstoni.
Huegelii, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 42.—Austral.
Humboldtii, Desv. in Ham. Prod. FI. Ind. Occ. 60 - macracantha.
humifusa, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i (1842) 382.—Austral.
humilis, Schlecht. in Linnaea, xii. (1888) 567 = CalUandra humilis.
Hunteri, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t 1850.—Arab.
hybrida, Lodd. Bot Cab. t. 1342=armata.
hypacantha, *Hoffmgg. ex Heynh. Nomencl.* i. 3, Domes.—Afr. austr.
idiomorpha, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. I* (1842) 329.—Austral,
ignorata, *C. Koch, in Allg. Gartm.* (1858) 195.—Hab. t
imbricata, F. Muell. Fragm. L 65=lineata.
implexa, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bet.* i. (1842) 868.—Austral,
impressa, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 133.-AustraL
impressa, Lindl. in Bot. Reg. t 1115-penninervis.
incana, Spreng. Syst iii. 187 = Mimosa incana.
incrassata. Hook. Ic. PI. t. 870 - decipiens.
incurva, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) S25.-Austral.
indica, Desv. Journ. Bot 1. (1814) 69 - Farnesiana.
ingrata, *Benth. Fl. Austral,* it 331.—Austral.
insignis, Hoffmgg. Verz. Pfl. 159 —Albizzia lophantha.
insignis. Mart. & GaL in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 818=filicina.
insularis, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 464.—Ind. occ.
insularam, *Guilt, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. vii. (1837) 860-Leucaena Forsteri.
intermedia, A. Cunn. ex Hook. Bot. Mag. t 3203 - longifolia.
intermedia, *Pasq. in AtH R. Acad. Nap.* ix. (1882) 7. -Hab.!
intertexta, Sieber, ex DC. Prod. ii. 464=longifolk.
Intsia, Willd. Sp. PL iv. 1091-caesia.
intsioides, DC. Prod. ii. 464-praec.
inundata, Mart. Reise, i. 556 = Pithecolobium multiflorum.
irrorata, Sieber, ex Spreng. Syst iii. 141=dealbata,
Isonbergiana, Schimp. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 236-Albizzia Julibrissin.
ittaphylla, F. Muell. ex Benth. in linnaea, xxvi. (1853-55) 617-neriifolia.
ixiophyUa, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. I* (1842) 364.—Austral.
Jacquemontii, *Benth. L c.* 499.—lad. or.
Jaubertiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. £888) 863.—Madag.
javanica, *DC. Prod.* ii. 471.—Java.
Julibrissin, Willd. Sp. PL it 1066 - Albixtia Julibrissin.

ACACIA:—
Julibrissin, Sieber, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 529 -paniculata.
julifera, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 374.—Austral.
julifera, F. Muell. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 139 — torulosa.
julifiora, Willd. Sp. PI. iv. 1076 = Prosopis juliflora.
jnncifolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 341.—Austral.
juniperina. *Willd. Sp. PI.* iv. 1049.—Austral.
Jupunba, Willd. 1. c. 1067-Pithecolobium trapezifolium.
Jurema, *Mart. Reise,* ii. 788; *Syst. Mat. Med. Fl. Bras.* 58.—Bras.
Kalkora, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 409-Albizzia Julibrissin.
Kantuffa, Bruoe, ex Steud. Norn. ed. I. 2-Mimosa KantuHa.
Karroo, Hayne, Arzneigew. x. t. 38-horrida.
Kempeana, *F. Muell. in Melb. Chemist* (July, 1882).—Austral.
Kirkii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 850.—Afr. trop.
Koa, *A. Gray, Bot. V. S. Expl. Exptd.* L 480.—Ins. Sandvic.
Kraussiana, *Meissn. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 615.—Afr. austr.
Kunthii, *Dehnh. Rivist. Nap.* i. 169; *ex Walp. Rep.* i. 924.—N. Granat.
lacerans, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 511.—Bras.
UchnophyUa, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record* (July, 1882).—Austral.
lacustris, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 801-Neptunia oleracea.
laeta, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 65.—Afr. bor.; Arab.
laevigata, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1069 = Prosopis juliflora.
laevis, Hort. ex Steud. Nom. ed. ii. i. 6 - Gleditschia triacanthos.
Lahai, *Steud. & Hochst. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 506.—Abyss.
Lambertiana, D. Don, in Bot. Reg. t 721-CalUandra Lambertiana.
lanata, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 815.—Mexico.
Langsdorfii, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i.* (1842) 521.—Bras,
lanigera. *A'. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 845.—Austral.
lanuginosa, Hort. ex Regel, in Gartenfl. (1854) 165 = pulchella?
laricina, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 6.—Austral.
lasiocarpa, Benth. in Enum. PL Hueg. 43 = pulchella.
lasiopetala, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 846.—Afr. trop.
lasiophylla, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1876) 527.—Am. trop.
latescena, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 880.—AustraL
latifolia. *Benth. I. c.* 382.—Austral.
latifolia, Desf. Tabl. Hort Par. ed. II. 207 = A. melanoxylon.
latifrons, Hort. ex Seem, ft Schmidt, in Flora, xxvii. (1844) 495-alata.
latipes, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. I* (1842) 834.—Austral.
latisiliqua, Willd. Sp. PL iv. 1067-Lysiloma latisiliqua.
latispinosa, Desf. Cat Hort. Par.ed. III. 299-Mimosa latispinosa.
Latrobei, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 10-adnacea.
latronum, *Willd. Sp. PI.* iv. 1077.—Ind. or.
laurifolia, *Willd. 1. c.* 1053.—Ins. Pacif.
Lawsoni. *Ait. ex Steud. Nom.* ed. II. L 6.—AustraL
laxa, *Willd. Sp. PI.* iv. 1069 -Calliandra laxa.
laxifiora, DC. Prod. ii. 455 - Pithecolobium laxiflorum.
laxophylla, vide *loxophylla.*
Lebbeck, Willd. Sp. PL iv. 1066 - Albizzia Lebbek.
lebbekoides, DC Prod. ii. 467-Albizzia lebbekoides.
Leichardtii, *Benth. Fl. Austral,* ii. 372—Austral.
leiophylla, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 351 - Albizzia saligna.
Unticellata, F. Muell. in Joum. Linn. Soc iii. (1859) 147 — Famesiana.
lenticularis, *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* a. 6244—Ind. or.

ACACIA:-

,. lentiscifolia, *Desf. Tabl. Hort. Par.* ed. II. 208.—Mexico.
lentiscifolia, *A. Rich. Ess. Ft. Cub.* 469.—Cuba,
lepidota, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1888) 206 «= Mimosa Bonplandii.
leprosa, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 460.—Austral,
leptocarpa. *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 876.—AnstraJ.
leptoclada, *A. Cunn. e/c Benth. I. c.* 886.—Austral,
leptoneura, *Benth. I. c.* 841.—Austral,
leptopetala, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1668-66) 619.—Austral.
leptophleba, F. Muell. in Joum. Linn. Soc iii. (1869) 143=aulacocarpa.
leptophylla, DC. Cat. Hort Monsp. 74=Farnesiana.
leptophylla, F. Muell. Fragm. xix. 9= A. Bynoeana.
leptosperma, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 266.—Ind. occ.
leptospermoides, *Benth. in Linnaea,* **xxvi.** (1868-65) 626.—Austral.
leptostachya, *Benth. Ft. Austral,* ii. 406.—Austral.
leucacantha, Bert, ex Spreng. Syst. iii. 144=tortuosa.
leucacantha, *Vatke, in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 276.—Afr. trop.
leueadendron, A. Conn, ex Benth. in Hook. Lond. Jonm. Bot. i. (1812) 874=glaucescens.
leucocephala, Link, Enum. Hort Berol. ii. 444 - Leucaena glauca.
leucolobia, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 165.—Austral,
leucophioea, *Willd. Sp. PI.* iv. 1088.—As. trop.
leucophylla, Colvill, ex Sweet, Hort. Brit ed. 1.101 = holosericea.
leucophylla, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 13 = pendula.
ligulata. *Ait. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 6.—Austral.—Cf. seq.
ligulata, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 362 = salicina.
ligustrina, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 208.—Austral,
limbata, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 145.—Austral,
linarioides, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 371.—Austral.
Lindleyi, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 14.—Austral.
linearis, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 691 = Calliandra portoricensis.
' linearis, *Sims, Bot. Mag.* t. 2156.—Austral,
lineata, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii **408.**—Austral,
linedlata, *Benth. ex Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-56) 626.—Austral,
lingvatouana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1888) 862.—Madag.
linifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1061.—Austral,
litakunensis, *Burch. Trav.* ii. 462.—Afr. austr.
littoralis, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 467.—Cuba.
lomatocarpa, DC. Prod. ii. 467-Albizzia stipulate
longifolia, Paxt. Mag. Bot xii. (1846) 269-dentifera.
longifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1052.-Austral.
longispicata, Beuth. in Mitch. Joum. Trop. Austr. 298—Cunninghamii.
longissima, Wendl. Comm. Acac. 45.111 = linearis.
lophantha, Willd. Sp. PI. iv. 1070=Albizzia lophantha*
lophanthoides, DC. Prod. ii. 457-villosa.
lpxocarpa, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 377.—Austral,
loxophylla, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1863-55) 622.—Austral. ' '
lncens, ***Boj.*** *Hort. Maurit.* 116.—Madag.
lucida, Baill. Hist. PI. ii. 61-Albizzia lucida.
Ludvigii, Ohlend, Verz. (1844) 74 j Walp. Ann. ii. 458-myrtifolia.
Luehmanni, *F. Muell. Fragm.* xi. 116.—Austral.
lunata, Hort Prag. ex Steud. Norn. ed. II. i. 6-falcinella.
lunata, Lodd. Bot. Cab. t.324=myrtifolia.
lnnata, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 452.—Austral.
lutea, Leavenw. in Am. Joum. Sc. vii. (1824) 61 = Neptunia lutea.
lycopodifolia, *A. Cunn. in Hook. Jc. PI.* t. 172.—Austral.
lyeotodioides.Devr.Jovan. Bot iii. (1814) 69 -Neptunia plena.
lysiploia, *f. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 187.—Austral.

ACACIA:—

tnacocentra, Walp. Rep. i. 876. in syn.—sphalm.—Cf. malacocentra.
macracantha, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 1080.—Am. austr.
macracanthoides, Bert, in DC. Prod. ii. 463 = macracantha.
macradenia, *Benth. in Mitch. Trop. Austral.* 360.—Austral.
macrocentra, Walp. Rep. iv. 200.—Cf. malacocentra.
macroloba, Willd. Sp. PI. iv. 1064=Pentaclethra filamentosa.
macrophylla, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 20=Albizzia **Lebbek.**
macrostachya, *Reichb. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 411.—Senegal.
Magdalenae, Bert, ex DC. Prod. ii. 455=Calliandra Magdalenae.
Maitlandi, F. Muell. Fragm. iii. 46 – patens.
malacocentra, Mart. Herb Fl. Bras. 106 = Mimosa malacocentra.
malacophylla, *Benth. in A. Gray, PI. Wright,* i. 64.—Mexico.
malacophylla, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 236 = Albizzia pallida.
mammifera, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 568.—Mexico.
Mangium, *Willd. Sp. PI.* iv. 1053.—Ins. Molucc.
marginata, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 6243 = Albizzia stipulata.
marginata, Steud. Nom. ed. I. 3=Albizzia odoratissima.
marginata, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 462 = myrtifolia.
maritima, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 384 = discolor.
Martii, *Benth. I. c.* 619.—Bras.
.martinicensis, Presl, Bot. Bemerk. 65=paniculata.
maschalocephala, *Griseb. Cat PI. Cub.* 82.—Cuba,
mauroceana, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 74.—Marocco.
media, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1848) 816 = Calliandra angelina.
megaladena, Desv. Joum. Bot iii. (1814) 69 =pennata.
megalantha, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 148— Austral.
megaphylla, F. Muell. 1. c. 117=anceps.
Meissneri, *Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb.* (1842).—Austral,
melanoceras, *Beurling, in Vet. Akad. Handl. Stocth.* (1864) 53.4Panama.
melanochaetes, Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Neel. Indie, iii. (1846) 80=leucopbloea.
melanoxylon, *R. Br. in'Ait. Hort. kew.* ed. II. v. 462.—Austral,
mellifera, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 507.—Abyss.
metrosideriflora, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 667. = Calliandra Houstoni.
metrosiderosifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 6 — dodonaeifolia.
micracantha, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 83 = annata.
micracantha, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 69 = Pithecolobium parvifolium.
micradena, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 618 = adhaerens.
rnicrantha, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* **xxx.** (1875) 526.—Mexico.
micrantha, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 59=seq.
microcantha, G. Don, Gen. Syst. ii. 476=Pithecolobium parvifolium.
microbotrya, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 353.—Austral,
microcarpa, *F. Muell. ind Gen. Report, 7.*—Austral.
microcephala, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 469=paniculata.
microcephala, K. Grah. in Wall. Cat. n. 5263=leucophloea.
microcephala, Macfad. Fl. Jamaic. i. 316'macracantha.
microneura, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 19.—Austral.
microphylla, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 6-Albizzia niyriophylla.
microphylla, Willd. Sp. PI. iv. 1073=Piptadenia peregrina.
Miersii, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 622.—Bras.

ACACIA:—

Mikanii, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1876) 526.—Am. trop.
minutifoliS, *F. Muell. Fragm.* viii. 243.—Austral.
Mirbeli, *Dehnh. Rivist. Nap.* i. 168; *ex Walp. Rep.* i. 922.—Austral,
misera, *Vatke, in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 275.—Afr. trop.
Mitchelli, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 387.—Austral.
modesta, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 27. t. 180.—Ind. or.
moesta, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 67=verticillata.
mollicula, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 318.—Mexico.
mollis, Wall. PI. As. Rar. ii. 76. t. 177= Albizzia Julibrissin.
mollissima, Willd. Enum. Hort Berol. 1053 = de-'omens.
monacantha, *Willd. I. c.* 1056.—Bras,
moniliformis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 136.—Reg. Argent,
montana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 360.—Austral. r
montana, is Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie, ii. (1845) 85 = Albizzia montana.
mossambecensis, Bolle, in Peters, Reise Mossamb. **Bot.** 1.15=albida.
mucronata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 68 - longifolia.
Muelleri,Benth. in Linnaea, xxvi.(1853-55)603=anceps.
multiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 277 - Pithecolobium multiflornm.
multiflora, Spreng. Syst iii. 142=polyantha.
multifoliolata, *Bertol. Misc. Bot.* xvi. 26.—Ins. S. Doming,
multijuga, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 105.—Afr. austr.
multinerna, DC. Mem. Leg. xii. 445 ; Prod.ii. 250 - lanigera.
multiBpicata, *Benth. Fl. Austral,* ii. 400.—Austral,
muricata, *Willd. Sp. PI.* iv. 1058.—Ind. occ.
Murrayana, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 370.—Austral.
myriadenia, Bert, ex Guill. in Ann. Sc Nat. *Sir.* II. vii. (1887) 859=Serianthes myriadena.
myriobotrya, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 16=microbotrya.
myriophylla, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6242-Albizzia myriophylla.
myrtifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1054.—Austral,
natalitia, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 167.—Afrju»tr.
Nebouеb, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 117.—Afr. trop.
Nellyrensa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5240-amara.
nematophylla, F. Muell. ex Benth. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 612=calamifolia.
Nemu, Willd. Sp. PI. iv. 1065 = Albizzia Julibrissin.
neriifolia, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 357.—Austral.
Nernstii, F. Muell. Fragm. iv. 3 = amblygona.
nervosa, *DC. Mini. Lie.* xii. 444.—Austral.
Neuciana, Buckl. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 592 sphalm. = Pithecolobium brevifolium.
neurocarpa, A. Cunn. in Hook. Ic PI. t. 168—holosericea.
nigra, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 253 = Calliandra chilensis.
nigrescens, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 840.—Afr. trop.
nigricans, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 465.—Austral.
nilotica, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 79; Desf. Tabl. / Hort. Par. ed. II. 208 = arabica.
Niopo, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 282 -Piptadenia peregrina.
nitida, Willd. Sp. PI. iv. 1086=Pithecolobium umbellatum.
nitidula, *Benth. Fl. Austral,* ii. 381.—Austral,
nodi flora, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1853-65) 621.—Austral.
nodosa, Willd. Sp. PI. iv. 1016 = Cassia bacillaris.
notabilis, *F. Muell. Fragm.* i. 6.—Austral,
nubica, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 498.—Nubia.
nudiflora, *Willd. Sp. PL* iv. 1058.—Ind. occ.
Nuceiana, Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad. '1861' (1862) 458 = Pithecolobium brevifolium.
nutans, Spreng. ex DC. Prod. ii. 4 29 = Mimosa leiocarpa ?
nyssophylla, F. Muell. Fragm. iv. 4 = colletioides.

ACACIA:—
obliqna, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 334.—Austral
obliqna, Desv. Journ. Bot. iii. (18141 67-suiveolens.
obliquifolia. Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux, x. II. (1848) 817 =Pithecolobium dulce.
obovata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 829.—Austral,
obscura, *A. DC. Not.* vi. *PI. Rar. Jard. Gen.* 23. t. 3.—Austral.
obtusa, Numb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1087 = macracantha.
obtusata. *Sieber, ex DC. Prod.* H. 463.—Austral.
obtusifolia, A. Cunn. in Field, New South Wales, 845-longifolia.
odorata, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 67=suaveolens.
odoratissima, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6233 = elata.
odoratissima, Willd. Sp. PI. iv. 1063 = Albizzia odoratissima.
offiicoalis, *Dehnh. Rivist. Nap.* i. 170; *ex Walp. Rep. I* 923.—Tasman.
Oldfieldii, F. Muell. Fragrx. iv. 17-acuminata.
oleaefolia, A. Cunn. ex G. Don,, Gen. Syst. ii. 405=. lunata.
oligoneura, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 139.—Austral.
oligophylla, *Hoffmgg. Verm. Pfl.Nachtr.* i. 201.—Hab. ?
Oliveri, *Vatke, in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 274.—Afr. trap.
omalophylla=homalophylla.
oncinocarpa, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 878.—Austral,
oncinophylla, *Benth. in Lindl. Swan Riv. App.* 16.—Austral
oraria, *F. Muell. Fragm.* xi. 66.—Austral.
ornithophora, Sweet, Fl. Austral, t. 24-=armata.
orthocarpa, F. Muell. ex Benth. in Joura. Linn. Soc. iii. (1859) 136=xylocarpa.
Oswaldi, *F. Muell. PI. Viet.* ii. 27.—Austral.
Ouyraxema, *DC. Prod,* it 469.—Guiana.
ovoidea, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 839=TerticiUata.
Oxycedrus, *Sieber, ex DC Prod.* ii. 468.—Austral,
oxyclada, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 811.—Austral.
oxyphylla, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5252-caesia.
pachycarpa, *F. Muell. in Journ. Linn- Soc.* iU. (1869) 139.—Austral.
pachyloma, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1108=Calliandra parviflora.
pallida, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 147.—Austral.
pallida, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PL Iv. 1069= Prosopu juliflora.
Palmeri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 850.—Am. bor. occ.
paludosa, Blnme, ex Miq.Fl. Ind. Bat. i. 14-pennata.
paniculaefiora, Steud. in Flora, xxvi. rt. (1843) 760 = Mimosa myriadenia.
paniculaU, *Willd. Sp. PI.* iv. 1074.—Bras.
papulaeformis, Walp. Rep. i. 898=buxifolia.
papyrocarpa, *Benth. Fl. Austral,* ii. 388.—Austral.
paradoxa, DC. Cat. Hort. Monsp. 74=armata.
parvifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 7 =guttata.
parvifolia, Willd. Sp. PI. iv. 1086 -Pithecolobium parvifolium.
patens, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 120.—Austral,
patula, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 1055.—Am. austr.
paudflora, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 461.—Cuba.
Pawlikowskyana, Ohlend. in Neue Allg. Gartenz. (1846) 369=myrtifolia.
pectinata, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 201 = Hoffmannseggiana.
pectinata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 282 = Parkia pectinata.
pedicellata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 522.—Bras.
pedunculata, Roxb. ex Steud. Nom. ed. IL i. 7« Parkia biglandulosa ?
pedunculata, Willd. Sp. PI. iv. 1084-Farnesiana.
pellacantha, Vog. in Nov. Act. Nat Cur. xix. Suppl. i. (1843) 19 = macracantha.
pendula, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 101.—Austral.
penicillifera, Lag. Gen. et Sp. Nov. 16=filicina.

ACACIA:-
pennata, *Willd. Sp. PI.* iv. 1090.—As. et Afr. trap,
pennatula, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 890.—Mexico.
penninervis, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 462.—Austral,
pennivenia, *Balf.f. in Proc. Ray. Soc. Edinb.* xii. (1884) 404.—Ins. Socotra.
pentadenia, *Lindl. in Bot. Reg.* t 1621.—Austral.
pentaedra, Regel, Gartenfl. (1852) 228, t 28=extensa.
pentagona, Hook. f. in Hook. Nig. FL 831 = pennata.
pentaptera, Welw. Apont. 584 » pennata.
peregrina, Kunth, Mimos. Humb. 96. t. 30=Piptadenia colubrina.
peregrina, Willd. Sp. PL iv. 1078 = Piptadenia peregrina.
Perrottetii, Steud. Nom. ed. II. i. 7=tortilis.
persica, Sterl. Hort, Nymph, ex Steud. Nom. ed. II. i. 7 = Prosopis Stephaniana.
personioides, *Ait. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 7.—Austral.
Pervillei, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 521.—Madag.
peruviana, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 1056.—Peruv.
Petersiana, *Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* i. 4.—Mossamb.
petiolaris, Lehm. Novit. PL Hort. Hamb. (1861) 7; Linnaea, xxv. (1852) 806=pycnantha.
Pence, *F. Muell. Fragm.* iii. 151.—Austral.
Pharnesiana, Risso, Fl. Nice, 186 = Farnesiana.
philippinarum, Benth. in Hook. Lond. Joura. Bot. i. (1842) 514 =concinna.
phlebocarpa, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 119.—Austral.
phlebophylla, F. Muell. 1st Gen. Rep. 12=longifolia.
piauhiensis, *Benth. -in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 523.—Bras.
piligera, A. Cunn. in Hook. Bot Mag. sub t 3394 = undulaefolia.
pilosa, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 607.—Austral.
pilosa, Bert, ex DC. Prod. ii. 455 = Calliandra htematomma ?
pinifolia, Benth. in Mitch. Trop. Austral. 342 = juncifolia.
pinnata, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 87 =.pennata.
pinnata. Link, Enum. Hort Berol. ii. 446=tamarindifolia.
pityoides, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 135.—Austral.
plagiophylla, F. Muell. I. c 181=undulaefolia.
plagiophylla, Spreng. Syst. iii. 185=falcata.
planifrons, *Wight & Arn. Prod.* 276.—Ind. or.
platyacantha, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1888) 566.—Mexico.
platycarpa, F. Muell. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 145=sericata.
platyloba, *Spreng. Syst.* iii. 114.—N. Granat.
platyloba, Bert, ex DC. Prod. ii. 472-Pithecolobinm sericiflorum.
platyphylla, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 102, nomen.—Austral.
platyptera, Lindl. in Bot. Reg. (1841) Misc. 8=alata.
plectocarpa, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 875.—Austral,
plnmosa, *Lowe, in Bot. Mag.* t 3366.—Bras,
pluricapitata, *Steud. Nom.* ed. II. i. 7.—As. trop.
podalyriaefolia, *A. Cunn. in G. Don, Gin. Syst.* ii. 405.—Austral.
polyacantha, Willd. Sp. PL iv. 1079 = A. Catechu.
polyantha, Spreng ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 591=Pithecolobium multiflorum.
polyantha, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 199 = juncifolia.
polybotrya, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 384.—Austral.
polycephala, DC. Prod. ii. 473 « concinna.
polycephala, R. Grah. in Wall. Cat n. 6255 = pluricapitata.
polymorpha, *Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap.* 1.—Austral.
polyphylla, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 254=Lysiloma polyphylla.
polyphylla, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 74; *Prod.* ii. 469.—N. Gr&uflt*
polystachya, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. journ. Bot.* i. (1842) 376.—Austral.
portoricensis, Willd. Sp. PL iv. 1069 - Calliandra portoricensis.
praecox, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. 136.—Reg. Argent.

ACACIAt—
praelongata, *F. Muell. in Melb. Chemist,* iii. (Aug. 1883).—Austral.
pramfolia, F. Mnell. Fragm. i. 4=sublanata.
pravissima,^. *Muell. 1st Gen. Report,* 12.—Austral.
Prnsiana, Lehm. Del. Sem. Hoit. Hamb. (1842)-obscura.
prensans, Lowe, in Bot. Mag. t. 3408 - pennata.
prismatica, *Hoffmgg. Vert. Pfl.* 159.—Hab. t
procera, Willd. Sp. PL iv. 1083=Albizzia procera.
prominens, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 406.—Austral,
prona, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) Art. iv. 6, nomen.—Java.
propinqua, A. Rich. Ess. Fl. Cub. i. 466=Albizda Lebbek.
prosopoides, Moc. *Sc Seise,* ex DC. Prod. ii. 460-Piptadenia patens,
prosopoma, *Schnyder, in Anal. Soc. Cient. Argent,* iii. (1877) 152.—Reg. Argent.
prostrata, Lodd. Bot Cab. t. 631=diffusa.
pruinescens, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) II. 296, 298.—Burma.
pruinosa, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 383.—Austral.
pruntfolia, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 937, sphalm.—Cf. pravifolia.
psendoarabica, *Blume, ex Miq. in Fl. Ind. Bat.* i. 8.—N. Guinea.
pseudointsia, Miq. 1. c 12=caesia.
pseudotrichodes, *DC. Prod.* ii. 466.—Ins. S. Doming.
psilostachya, DC. L c. 467=Piptadenia psilostachya.
Psoralea, DC. 1. c 464 = Mimosa Psoralea.
pteridifolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 621.—Am. trop.
pterigoidea, Seem, in Verh. Gartenb. (1846) 11-microbotrya.
pterocarpa, F. Muell. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 134-excelsa.
pterocarpa, Steud. Nom. ed. I. 3»Gagnebina tamariscina.
pteroclada, F. Muell. Fragm. iv. 3—trigonophylla.
pterophyUa, Hoffmgg. Verz. Pfl. (1824) 202 •= pennata.
pterygocarpa, Hochst. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 96=nubica.
ptychophylla, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 142.—Austral,
pubescens, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 467.—Austral,
pubescens, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 563.—Mexico.
pugioniformis, *Wendl. Comm. Acac.* 38. t. 9.—Austral.
pugioniformis, Wendl. in Flora, ii. (1819) 189 = juniperina.
pulchella, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. lit v. 464.—Austral.
pulcherrima, Willd. Sp. PL iv. 1061=Stryphnodendron floribundum.
pulverulenta, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Jonrn. Bot i. (1842) 342 = calamifolia.
pulverulenta, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 671 = Leucaena pulverulenta.
punctata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 800=Neptunia plena.
punctata, Humb. *Sc* Bonpl. ex Willd. Sp. PL iv. 1084 — macracantha.
pungens, Spreng. Syst. iii. 184 = juniperina.
purpurascens, *Vatke, in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 277.—Aft. trop.
purpurea, *Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 6.—Afr. trop.
purpurea, Steud. Nom. ed. II. i. 7=Inga tergemina.
pycnantha, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 851.—Austral.
pycnophylla, *Benth. Fl. Austral,* ii. 868.—Austral,
pycnostachya, *F. Muell. PI. Viet,* ii 33.—Austral
pyrifolia, *DC. Mim. Ug.* xii. 447.—Austral.
quadrangularis, Link, Enum. Hort Berol. ii. 445 = Calliandra tetragona.
quadnglandulosa, Mart in Flora, xx. (1888); Beibl. ii. 110=riparia.
quadrilateralis, DC. Prod. ii. 451=pugioniformis.
quadrilateralis, Decne. Herb. Tim. 177= juncifolia)
quadrimarginea, *F. Muell. Fragm.* x. 81.—AifctraL
quadrisulcata, *F. Muell. I. c.* iii. 127.—Austial.
Raddiana, Savi, Sopra Ale. Acac. Egiz,. 1=tortilis.
ramosissima, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1812) 356 ex parte.—Austral

ACACIA:—
ramosissima, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 956 ez parte-Harveyi.
reclinata, F. Mnell. 1st Gen. Rep. 12-leprosa.
recnrva, *Benth. in Hook. Lend. Joum. Bot.* i. (1842) 619.—Bias.
reficiens, *Wawra &Peyr. Serf. Benguel.* 16.—Afr. trop.
reniformis, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 1165.—MexicCK
restiacea, *Benth* in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1812) 828.—Austral.
reticulate, *Willd. Sp. Pi.* Iv. 1656.—Afr. anstr.
Ktinervis, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i.* (1842) 879.—Austral.
retinodes, Schlecht in Linnaea, zx. (1847) 661-neriifolia.
retivenea, *F. Uuell. Fragm.* iii. 128.—Austral.
retrona, Meissn. in Bot. Zeit. (1865) 10=sphacelate.
revoluta, Kunth, Mimos. Humb. 84. t 26-Mimosa revoluta.
rhigiophylla, *F. Muell. ex Schlecht. Benth. in Linnaea,* xxvi. (] 863-55) 611—Austral,
rhodacantha, *Desf. Tail. Hort. Par.* ed. II. 208.—Hab.I
rhombifolia, *Desf. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1876) 687.—Hab.I
rhombifolia, *Poir. ex Steud. Horn.* ed. I. 3.—Ins. Trinit.
Riceana, *Hensl. in Maund, Botanist,* t 136.—Tasman.
Richii, *A. Gray, Bot. V. St. Exfl. Exped.* i. 482. t 68.—Ins. Fiji,
rigens, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 408.—Austral.
rigidula, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 504-amen tacea.
riparia, Bert, ex Spreng. Syit. iii. 112-polyphylla.
riparia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 276.—N. Granat.
robusta, *Burch. Tram.* ii. 442.—Afr. anstr.
Roemeriana, *Scheele, in Linnaea,* xxi. (1848) 456.—N. Mexico.
Rohriana, DC. Prod. ii. 157-nudiflora.
rostellifera, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 366.—Austral.
rostel!ifera, Seem. Eingef. Acac t. 2=microbotrya.
rostrata, Hnmb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1054 (err. typ. 1060) — Lysiloma rostrata.
rotundata, *Benth. in Trans* Linn. Soc.* xxx. (187S) 521.—Am. trop.
rotundifolia, Hook. Bot. Mag. t. 4011-obllqua.
Rovumae, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 853.—Afr. trop.
Roxburghii, Kostel. Allg. Med. pharm. Flora, IT. 1367 = Albizzia myriophylla.
Roxburghii, Wight & Am. Prod. i. 276 = planifrons et elrarnea!
rubescens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1848) 815-Calliandralaxa.
rubida, *A. Cunn. in Field, New South Wales,* 344.—Austral.
rufa, Hassle. Cat. PI. Hort. Bog. 290-Albizzia rufa.
rugata, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 6251 - cencinna.
runciformis, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 404 = lineata.
rupestris, Stocks, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 638 - A. Senegal,
nipicola, *F. Uuell. ex Benth. in Linnaea,* xxvi. (1858-65) 610.—Austral.
ruscifolia, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst ii. 407 = verticillaU.
rutaefotia, *Ait. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 8.—Austral.
rutaefolia, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 144-nigricans.
Sabeana, Buckl. in Proc Ac. Sc Philad. • 1861 ^(1862) 458=Leucaena retusa.
sacchardta, Eenth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 605-albida.
salicina, *Lindl. in Mitch. Three Exped.* ii. 20.—Austral,
saligna, *Wendl. Comm. Acac.* 28.—Austral.
salinarum, DC. Prod. ii. 456 = Prosopis jnliniora.
Saltiana, Steud. Nom. ed. II. i. 8-A. Labai.
saltuum, Jungh. in Bot Zeit iii. (1846) 708=Albizzia montana.
Sandra, Bedd. FL Sylv. t 60-A. Sandra.
sanguinea, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 245—venosa.
sapindoides, A. Cunn. ex Sweet, Hort Brit. ed. III. 198 — Pithecolobium pruinosum.
saponaria, Heyne, ex. Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 581-= concinna.
sarmentosa, X)esv. Joum. Bot. iii. (1814) 70-caesia.
sarmentosa, Grtseb. Fl. Brit. W. Ind. 221. riparia.
Sana, *Baill. Hist. PI.* ii. 47.—Madag.

ACACIA:—
scabra, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 605.—Austral,
scalpelliformis, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 200.—Austral.
scandens, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 517—plnmosa.
scandens, Willd. Sp. PI. iv. 1067 « Entada scandens.
scandens, Willd. Enum. Hort Berol. 1057 = polyphylla.
scapuHformis, A. Cunn. in G. Don, Gen. Syst. ii. 4v5 - cultnformis.
schinoides, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 882=pminosa.
Schottii, *Torr. in Bot. Hex. Bound.* 62.—Am. bor.
scirpifolia, *Meissn. in Bot. Zeit.* (1855) 10.—Austral,
sclerophylla, *Lindl. in Mitch. Three Exped.* ii. 139.—Austral,
sclerosperma, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* (July, 1882).—Austral.
scleroxyla, *Tuss. Fl. Antill.* i. t 21.—bid. occ.
secundiflora, Juss. ex DC. Prod. ii. 425—Entada polystachya.
Seeressa, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 8-Albizzia Lebbek.
selenicarpa, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 60-albida.
Selloi, Spreng. Syst. UL 187-Calliandra brevipes.
semicordata, *Roxb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 8.—Ind. or.
semispinosa, Willd. ex Steud. 1. c-Mimosa semispinosa.
semitriptera, *Mart, ex Steud. I.* c—Bras.
semiverticillata, Knowl. & Westc. Fl. Cab. ii. (1838) 27=verticillata.
Senegal, *Willd. Sp, PI.* iv. 1077.—Geront trop.
Sentis, *F. Muell. ind Gen. Report,* 7 (1854).—Austral.
sericata, Ait. ex Steud. Nom. ed. II. i. 8=seq.?
sericata, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1642) 380.—Austral.
sericea. Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 311—acatlensis.
sericoeephala, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 812-Albizzia amara.
sericophylla, F. Muell. ex Benth. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 122-sttnophylla.
Serra, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 519.—Bras.
sertiformis, A. Cunn. in Bot. Mag. sub t. 3891-undulaefolia,
sessiliceps, *F. Muell. in Melb. Chemist* (July, 1882).—Austral.
sessilis, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1812) 836—sphacelate.
setigera, Hook. Ic. PI. t 361 = undulaefolia.
setosa, *Dehnh. Rimst. NapX* 169; *ex Walp. Rep.* i. 924.—Hab. ?
setosa, *Spreng. Syst.* iii. 187.—Bras,
setulifera, *Benth. in Linnaea,* xxvi. (1858-55) 625.—Austral.
Seyal, *Delile, Fl. Aegypte,* 2S6. t. 62. f. 2.—Aegypt.
Shuttleworthii, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 7.—Austral,
siculiformis, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 337.—Austral.
Sieberi, Tausch, ex Steud. Nom. ed. II. i. 8**crassiuscula.
Sieberiana, *DC. Prod.* ii. 468.—Senegal.
Sieberiana, Scheele, in Linnaea, xxvii. (1848) 887-discolor.
Sieberiana, Tausch, in Flora, xix. (1886) 420=erassiuscula.
signata, *F. Muell. Fragm.* iv. 7.—Austral.
Siliquastrum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 16—Prosopis juliflora.
similis, *Zoll. & Morr. in Nat. en Geneesk. Arch. N.Ind.* iii. (1846) 81.—Malaya.
Simsii, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 868—Austral.
Sing, Guill. & Perr. Tent Fl. Seneg. i. 251 -Sieberiana.
Sirissa, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 5265-Albizzia Lebbek.
smilacifolia, Field. *Sc* Gardn. Sert. Fl. t. 8-urophylla.
Smithiana, Roxb. ex Wall. Cat. n. 5387-Albizzia stipulate.
Sobeana, *Buckl. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.* (1861) 463.—Am. bor.
socotrana, *Balf.j. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xl. (1882) 611.—Ins. Socotra*

ACACIA:—
Solandri, *Benth. Fl. Austral,* ii. 406.—Austral,
somalensis, *Vatke, in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 2?4.—Afr? trop.
somnians, Sterler, ex Steud. Nom. ed. II. i. 8 = Mimosa somnians.
Sophorae, R. Br. in Ait. Hort. K«w. ed. II. v. 462 = longifolia.
spadicigera, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 694.—Jamaica,
spathulate, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 866.—Austral.
spathulata, Tausch, in Flora, xix. (1836) 420-longifolia.
speciosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 8-Albizzia lophantha.
speciosa, Willd. Sp. PI. iv. 1066 = Albizzia Lebbek.
spectabilis, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 383.—Austral,
sphacelata, *Benth. 1. e.* 338.—Austral,
sphaerocephala, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 594.—Mexico,
spinescens, *Benth. in Hoi*. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 328.—Austral. ~
Spini, *Balb. in Spin. Cat. Suppl.* (1823) 8.—Ins. Guadaloup.
spinosa, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. 170 = Dichrostechys- nntans.
spinosissima, *Benth. ex Schlecht* in Linnaea,* xxvi.. (1853-55) 621.—Austral.
spinnlosa, *Sweet, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 8.—Austral,
spirocarpa, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 289.—Afr. trop.
spirorbis, *Labill. Sert. Austr. Caled.* 69. t. 69.—N. Caled.
spondylophylla, *F. Muell. Fragm.* viii. 248.—Austral.
Sprengelii,G. Don, Gen. Syst. ii. 410= Berteriana.
Sprengelii,KooV. Sc Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 206 = Mimosa incana.
squamata, *Lindl. Swan Riv. App.* 16.—Austral.
squamata, Morr. in Ana. Soc. Gand, iii. (1847) 209. t 134—restiacea.
squarrosa. Mart, ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1844) 104-Calliandra squarrosa.
stellate, *Willd. Sp. PlAv.* 1078.—Arab,
stenocarpa, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 238.—Abyss,
stenophylla, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 386.—Austral,
stenoptera, *Benth. 1. c.* 825.—Austral.
stenostachya, Desv. ex Ham. Prod. Fl. Ind. Occ 59 = Piptadenia psilostachya.
Stephaniana, Willd. Sp. PI. iv. 1088 - Prosopis Stephaniana.
stereophylla, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 208.—Austral,
stigmatophylla, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 877.—Austral.
stipellata, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 574 = filicina.
stipulata, DC. Prod. ii. 469-Albizzia stipulate,
stipuligera, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 144.—Austral.
stipulosa, *F. Muell. I.e.* 119.—Austral.
stolonifera, Burch. Trav. ii. 241 - hebeclada.
striata, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 10S9.—Am. austr.
striatula, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 886.—Austral.
stricta, *Willd. Sp. PI.* iv. 1052.—Austral.
strigosa, Lindl. in Mitch. Three Exped. it 185-aspera.
strigosa, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 111.—Austral.
strigosa, Spreng. Syst. iii. 137-strigulosa.
strigulosa, *Steud. Nom.* ed. II. L 8.—Peruv.
strombulifera, Willd. Sp. PI. iv. 1055 - Prosopis strombulifera.
strongylophylla, *F. Muell. Fragm.* viii. 226.—Austral.
Stuartiana, F. Muell. ex Benth. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 609—siculiformis.
suaresensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 363.—Madag.
suaveolens, *Willd. Sp. PI.* iv. 1060.—Austral,
subalata, *Vatke, in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 276.—Afr. trop.
subbinervia, Meissn. ex. Lehm. Plant. Preiss. i. 16» rostellifera.
subcacrulea, *Lindl. in Bot. Reg.* 1.1075.—Austral.

ACACIA:—
subdimidiata, Splitgerb. in HOOT. & De..Vr. Tijdschr. ix. (1842) 112-Pithecolobium multiflomro.
suberosa, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* i. (1842) 499.—Austral.
subfalcata, Meissn. in Bot. Zeit (1865) ll = mioro botrya.
subinermis, Berr. ex DC. Prod, *îv* 46S =macracantha.
sublanata, *Benth. in Entfm. PI. Hueg.* 42.—Austral,
snbporosa, *F: Muell. PI. Viet.* ii. 24.—Austral,
snbrhombea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1888) 884.—Madag.
subtemata, *Ft Muell. & Benth. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 124.—Austral.
subtilifolia, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. vi. 288- Fiptadenia subtilifolia.
subtilinervis, *F. Muell. PI. Viet.* ii. 32.—Austral,
subtilis, *Hoffmgg. Ven. Pfl. Ntuhir.* ii. 43.—Austral,
subulata, *Bonpl. Jard. Malm.* 110. t. 45.—Austral,
sulcats, *R. Br. in Ait. Hort. Ken.* ed. II. v. 460.—Australl.
sulcipes, Sieber, ex G. Don, Gen. Syst ii. 419 = decurrens.
Suma, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6227 = A. Sundra.
Suma, *Kurt, ex Brandts. For. Ft.* 187.—Ind. or.
Sundra, *DC. Prod.* ii. 468 —Ind. or.
Sundra, Roxb. in Wall. Cat. n. 5227 = A, Suma.
taitensis, *Vatke, in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 278.—Afr.. trop.
tamarindifolia, Giiseb. Cat. PI. Cub. 82=Mimosa polyancistra.
tamarindifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1092.—Am. austr.
tamariscina, Willd. 1. c. lû62.=Gagnebŕaatamariscioa.
taxi/olio, A. Conn, in Field, New South Wales, 844—trinervata.
taxifolia, Lodd. Bot. Cab. t 1225 •= Riceana.
taxifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1050.—Cochinch.
Tayloriana, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record* (July, 18821.—Austral..
tenerrima, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 14. t. 1-pennata.
tenuiflora, Willd. Sp. PI. iv. 1088-Mimosa Cabrera,
tenuifolia, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i.* (1865) 87.—Austral.
tenuifolia, Willd. Sp. PI. iv. 1091-paniculata.
tenuissima, F. Muell. ex Benth. in Joura Linn. Soc iii. (1859) 135 = xylocarpa.
tephroloba, A. Gray, PL Wright, i. 65=Berlandien.
teretifolia, *Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* i. (1842) 826.—Austral.
tetragona, Willd. Sp. PL iv. 1089=Calliandra tetragona.
tetragonocarpa, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 4.—Austral,
tetragonophylla, *F. Muell. in Joum. Linn, Soc.* iii. (1869) 121.—Austral.
texensis, Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 404=fihcina.
thegtnocarpa, A. Cunn. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 198, sphalm.=trigonocarpa.
Thibaudiana, DC. Brod. ii. 456-Piptadenia monilifoimis.
Thoeetiana, F. Muell. Fragm. iv. &=Albizzia. Thozetiana.
Tomentilla, Zipp. ex Span, in Ltonaea, xv. (1841) 199-pennaia.
tomentosa, *Willd. Sp. PI.* iv. 1087.—Ind. or.
torquata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 16, n. 206-Prosopis torquata.
tonai&,Hayne,Artneigew. ix. t. 81.—Afr. trop.; Arab,
tortuosa, *Willd. Sp. PI.* iv. 108S.—Am. austr.
tonilosa, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iii. (185») 189.—Austral,
translucens, *A. Cunn. in Hook. 1c. PI.* t. 160.—Austral.
trapetoidea, DC. ex Stend. Norn. ed. II. i. 8 = decipiens.
triacantha, Hoehst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 244 = glaucophylla.
triangularis, Benth. Enum. PI. Hueg. 44 = biflora.
trichandra, Zucc. PI. Nov. Fasc. ii. 41-Leucaraa diversifolia.
trichodes, Willd. Sp. PI. iv. 1068-Leucaena trichodes.
trichophyUoides, Macfad. Fl. Jamaic, 320=Piptade»ia peregrina.
trigona, A. DC. Not. viii. PI. Rar. Jard. Gen. 20 = myrtifolia.
trigonocarpa, A. Conn, ex Load. Hort Brit. 407» longifolia.

ACACIA:—
trigonophylla, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 199^—Austral
trinervaU, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 451.—Austral,
trinervis, *Desv. Joum. Bot.* iii. (1814) 70.—Hab. 1
trineura, *F. Muell. PI. Viet:* ii. 26.—Austral,
triptera, *Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* i. (1842) 325.—Austral,
triptycha, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 887.—Asstral.
triquetra, *Benth. in Hook. Loud. Joum. Bot.* i. (1842) 358.—Austral.
trisperma. Mart. Herb. Fl. Bras. 108 - Piptadenia trisperma.
trispinosa, Stokes, Bot. Mat Med. iii. 168 = A. Senegal.
trissoneura, F. Muell, Fragm. iv. 6 = heteroclita.
tristis, R. Grah. m Bot. Mag. t. 3420 <= armata.
tristis, *Welw. ex Oliver, in Fl. Trap. Afn.* ii. 849 — Afr. trop.
truneata, Hort. ex Hoffmgg. PH.Vera. 34= decipiens 1
tuberosa, *Sterler, Hort. Nymph, ex Steud. Horn.,* ed. II. i. 8.—Hab.!
tubulifera, *Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* i. (1842) 520.—Perev.
tucumanensis, *Griseb. in Goett. Abh.xix.* (1874) 186.—Am. austr.
tumida, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1869) 144.—Anstral.
Tuundra, Steud. Nom. ed. II. i. 8, sphalm.=Sundra.
ulicina, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 202.—Austral,
umbellata, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* i. (1842) 878.—Austral.
umbettifera, Kunth, Mimos. Hnmb. 100. t. 18= filicina.
umbraculata, Wight, in Wall. Cat. n..5246«latroBUin.
umbrosa, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst ii. 406 = binervata.
uncifera, *Benth. in Mitch. Trop. Austr.* 841.—Austral.
uncinata, Lodd. Bot. Cab. t. 909=undulaefolia.
uncinella, *Benth. in Linnaea,* xxvL (1858-55) 613.—Austral.
uncinella, DC. ex.Steud. Nom. ed. II. i. 8=acanthocarpa.
uncinella, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 299-Mimosa uncinella.
unrfu/afa, Willd. Enum. Hort. Berol.Suppl.68~armata.
uodulaefolia, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 404.—Austral.
ungulata, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 68 - Calliandra portoricensis.
uniglandulosa, Seem. & Schmidt, in Flora, xxvii. (1844) 495=alata.
urophylla, *Benth. ex Lindl. in Bot. Reg.* (1841), *Misc.* 24.—Austral.
vaga, *Willd. Sp. PI.* iv. 1066.—Bras.
Valemuelana, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 462=villosa.
varians, Benth. in Mitch. Joum. Trop. Austral. 182 = salicina.
velutina, Benth. in Hook. Loud. Joum. Bot. i. (1842) ŏ12 = monacantha.
velutina, *Bertol. PI. N<m. Hort. Bonon.* ii. 18. t 4.—Ind. occ.
velutina, *DC. Prod.* ii. 459.—Bras,
venosa, *Hoehst. ex Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* v. (1846) 98/—Abyss,
venulosa, *Benth. 1. c.* 366.—Austral,
venusta, *Regel & Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1858) 58.—Hab. 1
venusta, Willd. Enum. Hort. Berol. 1062-Calliandra portoricensis.
vera, Willd. Sp. PI. iv. 1086=arabica.
VOrek, Guilk & Ptrr. Tent. Fl. Seneg. i. 245. t. 56 - A. Senegal,
verniciflua, *A. Cunn. in Field, New South Wales,* 344.—Anstral.
verticillata, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, ik 332= juniperina.
verticillata, *Willd. Sp. PI.* iv. 1049.—Anstral.
verugera, *Schweinf. in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 340. t 8, 10.—Afr. trop.
vespertina, Macfad. Fl. Jamaic. i. 818=Calliandra portoricensis.
vestita, *Ker-Gavl. in Bot. Reg.* t. 698.—Austral,
viarum, *Allem. ex Tenore, Cat. Ort. Napol.* 77.—Bras.
micioides, Terr. & Galio. Voŷ. Abyss. ilL 119-melliiera.

ACACIA:—
Vietoriae, Benth. in Mitch. Joum. Trop. Austral. 333 - sentis.
villosa, *Willd. Sp. PI.* iv. 1067.—Jamaica,
viminalis, *Ait. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 8.—Austral,
viminea, *Dietr. ex Steud. I. c.* 9.—Austral.
Kncentis, Griseb. FL Brit. W. Ind. 222-Pithecolobium tortnm.
Vdrchowiana, *Vatke & Hildeb. in Oest. Bot. Zeit.* xxx. (1880) 276.—Afr. trop.
virescens, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 74.—Am. austr.
virgata, Gaert. Fruct. ii. 817. t. 148-Desmanthus virgatus.
virgata, Lodd. Bot. Cab. t 1346=verniciflua.
virgata, *Rafin. Fl. Ludov.* 136.—Am. bor.
virgultosa, Vahl, ex Walp. Rep. i. 929-Inga virgultosa.
viridiflora, Kunth, Mimos. Hnmb. 81. t. 25-Piptadenia subtilifolia.
viridiflora, Tweed, ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot iii. (1844) 98=Calliandra viridiflora.
viridiramis, Burch. Trav. i. 300=Xerocladia Zeyheri.
viridis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 363.—Madag.
viscidula, Benth. in Maund, Botanist, iv. t. 179 = elongata.
viscidula, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 363.—Austral.
visciflua,¥. Muell. PL VHct. ii. 24=dodonadfolia.
Visco, *Lorenta, ex Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 122.—Reg. Argent.
viscosa, Schrad. ex Wendl. Comm. Acac. 30. t. 7 = dodonaeifolia.
Visite, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 135.—Reg; Argent,
visneoides, *Colla, in Linnaea, a.* (1829) *Lit.* 56.—Austral.
Vogeliana, Steud. Nom. ed. II. i. 9 = ambigua.
volubilis, *F. Muell. Fragm.* x. 98.—Austral,
vomeriformis, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* i. (1842) 332.—Austral.
vulcanica, Korth. Hort. Bogor. ex Flora, xxx. (1847) 705 = Albizzia montana.
Wallichiana, DC. Prod. ii. 468 = A. Catechu.
Wattsiana. *P. Muell. ex Benth. FU Austral,* ii. 374.—Austral.
Welwitschii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 841.—Afr. trop.
Westiana, DC. Prod. ii. 464=riparia.
Whanii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 386.—Austral.
Wickhami, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 379.—Austral.
WigUiana, R. Grah. in WalL Cat. n, 6259 = Albizzia amara.
Wightii, *Baker, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 506.—Ind. or.
Wightii, Wight & Arn. Prod. 274-Albizzia amara.
WUhelmiana, F. Muell. iruTrans. Ehil Soc. Victoria, i. (1865)37 = calamifolia.
Willdenowana, Wendl. Vera. K. Berggart. (1845) 5 = diptera.
Wrightii, *Benth. ex A. Gray, in PI Wright,* i. 64.—Texas.
xanthina, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot i. (1842) 355—bivenosa.
xanthophloea, *Benth. in Trans. Linn. Sic.* xxx. (1875) 511.—Afr. trop.
xiphocarpa, Hoehst ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 96 = abyssinica.
xylocarpa, *A. Cunn. ex Benth. I. c.* i. (1842) 370.—Austral.
xylocarpa, Willd. Sp. PI. iv. 1056 ~ Xylia. dolabriformis.
Zygia, *Baill. in Bill. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 364.—Madag.
zygioides, *Baill. 1. c.* 388__Madag.

ACAEUA., linn. Mant ii. 145 (1771).—*ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 628.
ANCISTRUM, Forst. Char. Gea. 3. t 2. (1776).
LASIOCARPUS, Banks & Solaad. ex Hook. f. Ft. Antarct. 264 (1847).
SPHAERULA, Anderss. ex Hook. f. 1. c 268 (-1847).
acnleata, *Meyen, Reise. i.* 348.—Chili,
adscendens, *Vahl, Enunu* i. 297.—Am. austr.; Austral.
aginis, Hook. f. Fl. Antarct. 26b. t 96=adscendens.

AC/LENA:—
agrimonioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 231. —Mexico,
alpina, *Poepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Snppl. i. (1843) 326.—Chili.
andicola, Gill, ex Walp. Rep. ii. 48 =pinnatifida.
andina, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1856) 636.—Chili,
antarctica, *Hook.f. Fl. Antarct.* 269.—Reg. MagelL
argentea, Bert, ex Steud. Norn. ed. II. i. 9 = Berteriana.
argentea, *Ruiz & Piv. Fl. Per.* i. 67. t. 108. f. b.—Chili.
Behriana, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 660= ovina.
Berteriana, *Bernh. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 9.—Chili.
Bnchanani, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 67.—N. Zel.
Cadilla, *Hook.f. Fl. Antarct.* 269.—Patagonia,
caespitosa, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. 307 (1833).—Chili.
Calcitrapa, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-66) 67.—Chili.
canescens, *Phil. Fl. Atac.* 18.—Chili.
Closiana, *C. Gay, Fl. Chil.* ii 298.—Chili.
Coxi, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-66) 63.—Chili,
cnneata, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. 307 (1833) = Reg. Magell.
cylindristachya, *Ruit & Pav. Fl. Per.* i. 68 t. 104. f. 2.—Peruv.
decumbent, Menzies, in Hook. f. Fl. Antarct 9 = Sangnisorbae.
depressa, *T. Kirk, in Trans. N.Z. Inst.* ix. (1877) 648. —N. Zeland.
digitata, *Phil, in Ancles Univ. Chil.* (1862) ii. 445.—Chili.
echinata, Lehm. PI. Preiss, i. 95=ovina.
elegans, *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 297.—Chili,
elongata, *Linn. Mant.* ii. 200.—Mexico.
Enpatoria, *Schlecht. in Linnaea*, ii. (1827) 80.—Uruguay,
exigua, *A. Gray, Bot. V. S. Expl. Exped.* i. 498.—Ins. Sandvic.
glaberrima, Phil, in Linnaea, xxviii. (1866) 685=pumila.
glabra, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* iv. (1872) 226. t. 14.—N. Zel.
Grahamiana, Gill, ex Walp. Rep. ii. 48 = adscendens.
hirsuta, *Phil, in Anales- Univ. Chil.* (1872) 712.—Chili.
Hnttoni, *R. Br. [ter.'] in Trans. N.Z. Inst.* xvi. (1884) 882.—N. Zeland.
incisa, Lindl. Bot. Reg. t. 1271=pinnatifida.
inermis, *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 54.—N. Zel.
integerrima, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (18S3) 806. —Chili.
Krausei, Phil, in Anales Univ. Chil. (1862) 711 = laevigata.
laevigata, *Ait. Hort. Kern.* ed. II. i. 68.—Reg. Magell.
lappacea, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* i. 66. L 108. f. a.—Peruv.
latebrosa, *Ait. Hort. Kew.* ed. II. i. 67.—Afr. austr.
laxiflora, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 9.—Am. austr.
leptacantha, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-66) 66.—Chili.
lncida, *Vahl, Enum. I* 296.—Ins. FalkL
lucida, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. L 9 - pinnatifida.
macrocephala, *Poepp. Fragm. Syn.* 25.—Chili,
macrorhiia, *Hook.f. Fl. Antarct.* 265.—N. Granat.
macrostemon, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1846) 476, 269.—Chili.
magellanica, *Vahl, Enum.* i. 297.—Reg. Magell.
micrbcephala, *Schlecht. in Linnaea*, xxviii. (1856) 463. —Chili.
microphylla, *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 66.—N. Zel.
montana, *Hook.f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1846) 276.—Tasman.
montana, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1856) 686.—Chili.
tnontevidensis, *Hook.* f. Fl. Antarct. 265 = A. Eupatoria.
multifida, A. Dietr. Sp. PI. i. 619=trifida.
multifida, *Hook.f. Fl. Antarct.* 265.—Patagonia,
myriophylla, *Lindl. Bot. Reg. t.* 1271.—Reg. Argent.
Noyae-Zelandiae, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 177.-N. Zel.
ochreata, *Wedd. Chlor. And.* ii. 240.—Peruv.
oligacantha, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-66) 66.—Chili. r
ovalifolia, *Ruit & Pav. Fl. Par.* i. 67. t. 103.—Am. austr.

ACAENA:—
ovalis, Pen. Syn. L 142=ovalifolia.
ovina, *A. Cunn. in Field, New South Wales*, 858.—Austral.
pectinate, *C. Presl, Epim. Bot.* 201.—Chili.
pinnatifida, Bert, ex Steud. Norn. ed. II. i. 9 =cuneata, myriophylla.
pinnatifida, Hort. ex Steud. 1. c. = A. Berteriana.
pinnatifida, Lindl. Bot. Reg. t. 1271 = trifida.
pinnatifida, *Ruie & Pav. Fl. Per.* i 68. t. 104.—Chili.
Poeppigiana, *C Gay, Fl. Chil.* ii. 284.—Chili,
polycarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 138.—Reg. Argent
poterioides, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 9.—Am. austr.
pumila, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 67.—Chili,
pumila, *Vahl, Enum.* i. 298.—Reg. Magell.
quinque6da, At7.»Z;i»»o«a,xxviii. (1856) 686.—Chili.
Sanguisorbae, *Vahl, Enum.* i. 294.—Austral.
sarmentosa, Carmich. in Trans. Linn. Sot xii. (1818) 602 = A. Sanguisorbae.
sericea, *Jacq.f. Eel.* i. 81. t. 55.—Mexico,
splendens, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 806.—Chili.
stellaris, *Meyen, Reise*, i. 348.—Chili,
stricta, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 138.—Reg. Argent.
suaveolens, A. Gray, Bot U. S. Expl. Exped. i. 748, sphalm. -=Acacia snaveolens.
subincisa, *Wedd. Chlor. And.* ii. 242.- Ecuador,
tridactyla, *Presl, Epim. Bot.* 201.—Mexico,
trifida, *Ruig & Pav. Fl. Per.* i. 67. t. 104. f. c—Calif, j Peru; Chili.
trifida, Steud. & Hochst. ex Steud. Norn. ed. II. i. 9 = Berteriana.
valdiviana, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 65.—Chili,
venulosa, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1864) 118.—Reg. Magell.

ACAENOPS, Schrad. ex Steud. Nom. ed. II. 9 (1840) <=DipBacus, Linn.
pilosus, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. N.S. xvi. (1868) 400=D. pilosus.
vulgaris, Schrad. ex Steud. Nom. ed. II. i. 9=D. pilosus.

ACAJOU, Toum. ex Adans. Fam. ii. 844 (1768)-seq.

AC A TUBA, Gaertn. Fruct. i. 192.140. (1788)=Anacardium, Linn.
occidentalis, Gaert. 1. c. =Anac ocddentale.

ACALYPHA, Linn. CorolL Gen. 19 (1737). *EUPHORBIACEAE, heath.* & Hook. f. iii. 311.
CALYPTROSFATHA, Klotzsch, ex Baill. Etudes Euph. 440 (1868).
CATURUS, Linn, ex Schreb. Gen. PI. 677 (1791).
CUPAMENI, Adans. Fam. ii. 356 (1763).
GALUKUS, Spreng, Anleit. ii. II. 864 (1817).
GYMNALYPHA, Griseb. in Bonplandia, vi. (1868) 2.
LINOSTACHYS, Klotzsch, ex Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 235.
ODONTEILKMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. I. (1848) 587.
USTERIA, Dennst Schluess. Hort Malab. 31 (1818).
abortiya, Hochst. ex Baill. Etud. Gen. Euphorb. 443 = indica.
accedens, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxiv. (1866-66) 85.—Bras,
acuminata, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1864) 329. —Bras.
acuminata, Void, ex Baill. Adansonia, i. (1860) 267 = spiciflora.
acuta, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult 646-Adenocline acuta.
adenophorafiiiseb. in Goett Nachr. (1865) 175 =membranacea.
adenostachya, *Muell. Arg. in Linnaea*, xzxiv. (1865) 21.—Mexico.
adenotricha, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, a 248.—Abyss.
adscendens, Hornem. Hort. Ham. Snppl. 108 = chamaedrifolia.
affinis, Klotzsch, in Nov. Act Acad. Nat Cur. xix. Suppl. i. (1843) 416~stipulacea.
agrimonioides, D. Dietr. Syn. v. 377 err. typ.=anemioides.
alnifolia, Poir. Encyc. vi. 203=Poiretii.

ACAIiTFHA:-
alnifolia, *Klein, ex Willd. Sp. PI.* iv. 525.—Ind. or.
alnifol'a, Wall. Cat. n. 7782 A=capitata.
alopecuroidea, Jafjr. *Ic. Rar.* iii. 19.1620; *Coll.* iii. 196. —Venezuela,
amblyodonta, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 865.—Bras.
amboynensis, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 283=grandis.
amentacea, Roxb. Fl. Ind. iii. 676-fr'nticosa.
andina, *Muell. Arg. in Flora*, Iv. (1872) 26.—Reg. Andin.
anemioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 94.—Mexico.
angatensis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 750.—Ins. Philipp.
angolensis, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 335.—Afr. trop.
angustata, Sond. in Linnaea, xxiii. (1860) 115—pedunculatis.
angustifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 99.—Ins, S. Doming,
anisodonta, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 819.—Ins. Pacif.
arborea, *Comm. ex Poir. Encyc.* vi. 205.—Ins. Masc.; St. Helen.
Arciana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 862.—Bras,
aristata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 98.—N. Granat.
zmns\s, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. &Sp.iil* 21.—Peruv.
australis, *Linn. Sp. PI.* 1004.—Keg. trop.
Bailloniana, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 44.—Afr. trop.
Baroni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 254.—Madag.
benguelensis, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* it (1864) 835.—Afr. trop.
Berteroana, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 88.—Porto-Rico.
betulaefolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 99 = scabrosa.
betulina, Retz. Obs. Fasc. v. 80 = fruticosa.
betulina, Schweinf. PI. quaedam Nilot. 18=Cephalocroton cordofanus.
betulina, Sond. in Linnaea, xxxiii. (1860) 116=glabrata.
betuloides, Klotzsch, ex Baill. in Adansonia, v. (1864-65)228 = variabilis.
betuloides, Pav. ex Klotzsch, in Seem. Bot. Herald, 101 =diveraifolia.
Bilbergiana, Klotzsch, I. c. =divereifolia.
bipartita, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 638.—Afr. trop.
bisetosa, *Spreng. Syst.* iii. 879.—Venezuel.
boehmerioides, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 459.—Ins. Pacif.
Boiviniana, *Baill. Adansonia*, i. (1860-61) 272.—Afr. trop.
boliviensis, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 162.—Bolivia.
Botteriana, *Muell. Arg. I. c.* 46.—Mexico.
brachiata, Krauss, in Flora, xxvii. (1846) 88, nomen « tenuis.
brachyandra, *Baill. in Adansonia*, v. (1864-66) 232. —Bras,
brachyclada, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 862.—Peruv.
brachystachya, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 909.—China,
bracteata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 406.—Malaya,
brasiliensis, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 37.—Bras,
brevibracteata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 855.—Ins. Pacif.
brevicaulis, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 13.—Mexico,
brevipes, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 34&—Bras.
brevipes, *Rafin. New Fl Am. i.* 44.—Am. bor.
Buchenavii, *Muell. Arg. in Bremen, Abh.* vii. (1880) 27.—Afr. trop.
bullata, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 17. —Peruv.
californica, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 51.—Calif,
callosa, *Benth. PI. Hartw.* 252.—N. Granat.
calyciformis, Wight, ex Wall. Cat n. 7786= brachystachya.
cancana, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 438. —N. Granat.
canescens, Wall. Cat. n. 7785 = indica.

ACALYPHA:—
capensis, D. Dietr, Syn. v. 878, sphalm.=corensis.
caperdnioides, Baill. Adansonia, iii. (1862-68) 167 = peduncularis.
capillipes, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 40.—Austral.
capitata, Wall. Cat. n. 7788. A, B=fruticosa.
capitata, *Willd. Sp. PI.* iv. 525.—Ind. or.
caroliniana, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 748=indica.
caroliniana, *Ell. Sketch,* ii. 645.—Am. bor.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 288 = virginica.
carpinifolia, Poepp. ex Baill. Etud. Gén. Euphorb. 442 = leptostachya.
carpinifolia, *Poir. in* ***Urn.*** *Encyc.* vi. 203. (1804).—Ins. S. Doming.
carthagenensis, *Yacq. Enum. PI. Carib.* 82.—N. Granat
Caturus, *Blume, Bijdr.* 629.—Java.
caudata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 95-macrostachya.
chamaedrifolia, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 879-reptans.
Chibomboa, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 269.—Ins. Comor.
chinensis, Roxb. Fl. Ind. **iii.** 677-aiulralis.
chorisandra, *Baill. Adansonia,* v. (1864-65) 285.—Bras.
ciliata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 162.—Geront. trop.
ciliata, Wall. Cat. n. 7779 J=indica.
cincta, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 20.—Mexico.
cirdnnata, A. Gray, ex Seem. List Vit. PI. 11 = Wilkesiana.
Clausseni, *Baill. Adansonia,* v. (1864-65) 226.—Bras,
codonocalyx. *Baill. 1. c-* i. (1860-61) 271.—Ins. Comor.
colorata, Spreng. Syst. iii. 879=integrifolia.
Commersoniana, BaiH. Adansonia, i. (1860-61) 267-inregrifolia.
communis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) .23=variabilis.
conferta, Roxb. Fl. Ind. iii. 677 = brachystachys.
consimilis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 807.—Ins. **Pacif.**
conspicua, *Muell. Arg. I. c.* 882.—Mexico,
contermina, ***Muell. Arg. in Linnaea,xxxn.*** **(1865-66)** 46.—Peruv.
corchorifolia, ***A. Rich, in Sagra, Hist. Cuba,*** **iii. 203.—** Ind. occ.
corchorifolia, Vahl, ex Baill. Etud. Gén. Euphorb. 443-fallax.
corchorifolia, Willd. Sp. PI. iv. 524-reptans.
cordata, Drège, ex Baill. Adansonia, iii. (1868) 158 = Eckloni.
cordata, Thunb. Prod. PI. Cap. 117-decumbens.
cordifolia. Hook. f. in Trans. Linn. Soc. **xx. (1847)** 186="parvula.
cordifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 97.—Reg. Argent.
cordifolia, Anderss. Galap. Veg. 108-parvula.
cordobensis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874)97 = seq.
cordoviensis, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 228—Reg. Argent.
corensisi *Jacq. Enum. PI. Carib.* 32.—Ind. occ.
crassa, Meissn. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 88—peduncnlaris.
crenata, ***Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,*** **ii. 245.** —Afr. trop.
crenulata, Rafin. New Fl. Am. i. 44 =virginica.
cucullata, Poir. Encyc. Suppl. iv. 683 = macrostachya.
cnneata, ***Poepp. & Endl. Nov. Gen.*** **iii. 22.—Am.** austr.
Cnnninghami, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 85.-Austral.
cuspidata, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 63. t. 243.—Am. austr.
cylindrica, Roxb. Fl. Ind. iii. 678=Poiretii.
decidua, ***Forsk. Fl. Aegypt. Arab.*** **161.—Arab,**
decumbens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 117.—Afr. anstr.
densiflora, Blume, Bijdr. 628 = hispida.
dentata, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PI. 410 = Mallotus oppositifolius.
denudata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 819.—Ins. Pacif.
depauperata, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866766) 180.—Mexico.
Deppeana, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) C86-Schiedeana.

ACALYPHA:-
dictyoneura, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 12.—Peruv.
diffusa, Anderss. Galap. Veget. 104=parvula.
digyneia, *Rafin. Fl. Ludov.* 112.—Louisian.
digynostachya, *Baill. Adansonia,* v. (1864-66) 288.—Bras,
dimorpha, ***Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.*** **xi. II, 864.—** Bras.
discolor, Boj. Hort. Manrit. 286=integrifolia.
discolor, £. Mey. Zwei Pfl. Docum. 129 (n. 20); in Flora, xxviii. (1845) 84=decumbens.
distans, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 820.—Cuba.
divaricata, Baill. in Adansonia, v. (1864-66) 284-gracilis.
divaricata, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 34.—Peruv.
divaricata, *Rafin. New. Fl. Am.* i. 44.—Am. bor.
diversifolk, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 68. t **244.—**Am. austr.
domingensis, Spreng. Syst Veg. iii. 880 - carpinifolia.
dnmetorom, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 834—Afr. trop.
Dupraeana, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 229 = accedens.
echinata, *Rafin. New. Fl. Am.* L 45.—Am. bor.
Eckloni, *Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 168.—Afr. austr.
elegantula, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 246=brachystachya.
elliptica, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 99.—Jamaica,
emimensis, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 270.—Madag.
eremorum, *Muell. Arg-in Flora,* xlvii. (1864) 440.—Austral,
erythrostachya, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 51.—N. Granat.
estrellana, Baill. Adansonia, v. (1863-64) 237 = brasilien sis.
exaltata, *Baill. I. c.* ii. (1861-62) 225.—N. Cale*
fallax, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 43.—As. trop.
fasciculata, *Muell. Arg. 1. c.* 81.—Ins. Mascar.
filiformis, Poir. Encyc. vi. 205=arborea.
filiformis, Klotzsch, ex Schlecht in Linnaea, xix. (1847) 235 = Schlechtendaliana.
fimbriata, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 272-Bailloniana et crenata.
fimbriata, ***Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,*** **ii 245.** —Abyss.
fimbriata, Schum. & Thonn. Beakr. Guin. PL 409 = ciliata.
firmula, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 21.—Am. centr.
fissa, Herb. Madr. ex. Wall. Cat. n. 7786. B.=brachystachya.
flaccida, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1847) 186 = parvula.
flexuosa, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 9-lanceolata.
Forsteriana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. 11. 807.—Ins. Pacif.
Fouraieri, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 162.—Mexico.
Frederici, *Muell. Arg: in DC. Prod.* xv. 11. 828.—Mexico.
fruticosa, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 161.—Geront trop.
fruticulosa, *Rafin. Fl. Ludov.* 112.—Louisiana,
fuscescens, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 821.—Afr. trop.
gemina, Spreng. Syst. iii. 880—australis.
glabrata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 117.—Afr. anstr.
glabrata, Vahl, ex A. Juss. Tent Enph. 105-Thecacoris madagascariensis.
glaudulifolia, Meissn. ex Kranss, in Flora, xxviii. (1845) 83=peduncularis.
glandulosa, *Blanco, Fl. Filip.* ed. 1.749.—Ins. Philipp.
glandulosa, ***Can. in Anal. Hist. Nat. Madr.ii.*** **(1800) 141.—**Mexico.
glechomaefolia, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 206 = reptans.
Goudotiana, Baill. Adansonis, L (1860-61) 268 = arborea.
gracilens, A. Gray, Man. Bot. N. Unit. States, 890= virginica.
gracilipes, Baill. Adansonia, i. (18W-61) 273=integrifolia.

ACALYPHA:—
gracilis, *Spreng. Syst.* iv; *Cur. Post.* 316.—Bras,
grandidentata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* XT. II. 823.—Afr. austr.
grandifclia, Poir. Encyc. vi. 204—Claoxylon crassifolium.
grandis, ***Benh. in Hook . Land. Journ. Bot.*** **ii. (184)** 232.—Malaya.
Hartwegiana, Benth. ex Baill. Etud. Gén. Euphorb. 442=diversifolia.
havanensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 49.—Cuba.
hederacea, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 200.—N. Mexico,
hemandifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 99.—Jamaica,
heterodonta, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 12.—Am. trop.
hirsuta, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 248-villicaulis.
hirsutissima, Willd. Sp. PI. iv. 528 = macrostachya.
hirta, Cav. in Anal. Hist Nat. ii. (1800) 141-phleoides.
hirta, Spreng. Syst iv; Cur. Post. S15»variabilis.
hispida, Blume, Bijdr. 628 = boehmerioides.
hispida, *Burm.f. Fl. Ind.* 303. t. 61.—Ind. or.
hispida, Wall. Cat. n. 7780. pro parte=fallax.
hispida, Willd. Sp. PI. iv. 623=Poiretii.
Hochstetteriana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 39.—Afr. trop.
hologyna, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) **441.** —Madag.
Hystrix, Balb. ex Spreng. Syst. iii. 883 = aristata.
indica, *Linn. Sp. PI.* 1008.—As. & Afr. trop.
indica, Veil. Fl. Flum. x. t. 64=Poiretii.
infesta, *Poepp. & Endl. Nov. Gen.* iii. 22.—Peruv.
infestans, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 23 = praec.
insulana, *Muell. Arg. in Flora* (1864) 489.—Ins. Pacif.
integrifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 580.—Ins. Mascar.
interrupta, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 386-Bemardia interrupta.
jamaicensis, *Rafin. New Fl. Am.* 46.—Jamaica.
japonica, Houtt ex Steud. Nom. ed. I. 4 = Boehmeria spicata.
Jardini, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 36.—Ins. Pacif.
Karwinskii, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 41.—Am. centr.
KlotBschiana, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. **857**-prnnifolia.
Kloteschii, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 281-longifolia.
Kraussiana, Buching. ex Kranss, in Flora, xxvii. (1846) 84=decumbens.
laevifolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 863.—Ins. Pacif.
laevigata, *Sw. Prod.* 99.—Jamaica.
laevigata, Willd. Sp. PI. iv. 527-carpinifolia.
Lagascana, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 27.—Am. centr.
lagoensis, ***Muell Arg. in Mart. Fl. Bras.*** **xi. II. 867.—Bras.**
lamiifolia, *Scheele, in Linnaea,* xxv.(1862) 687.—Afr. austr.
lanceolata, Wall. Cat n. 7789 = anstralis.
lanceolata, *Willd. Sp. PI.* iv. 524.—Ind. or.
Langiana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 159.— Mexico.
languida, E. Mey. & Sond. in Linnaea, xxiil. (1850) 116-petiolaris.
languida, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 29.—Afr. austr.
lantanaefolia, Boj. Hort Maurit 286-reticulata.,
latifolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. 11.817.—Ins.Paclf.
laxiflora, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 19.-Ind.occ
leonensis, *Benth. in Hook. Nig. Fl.* 604-.Mareya micrantha.
Lepinei, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 14. -Ins. Pacif.
leptoclada,B««tt. *in Bot. Voy. Sulph.* 164.—Mexico,
leptopoda, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 39.—Mexico.
leptorhachis, *Muell. Arg. I. c.* 7.—Cnba.
leptostachya, A. Rich, in Sagra, Hist. Cnba, iii. 205-laxiflora.
lepostachya, H. B. & K. Nov. Gen et Sp. ii. 96 -diversifolia.
Liebmanni, Muell. Arg. in DC. Prod. *xi.* II. 889-**seq.**

•af* "

***wg_ir »«»•"• ~-**

Ajll.ltn.Lgj •-

AOAMIBObBIU. l~ » I H . X. mi

ACANTHOLIMOIf:-

atropatanum, *Bunge, Gait. Acanthol.* 29.—Persia,
auganum, *Bunge, I. c.*—Afghan,
avenaceum, *Bunge, I. c.* 25.—Persia.
Balansae, Boiss. ex Bunge, 1. c. 86=armenum.
baltanense, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 838.—As. Min.
Bodeanum, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 42.—Persia,
brachyphyllum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 628.—Afghan,
brachystachyum, *Boiss. ex Bunge, Gatt. Acanthol.* 51.—Kurdistan,
bracteatum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 70.—Armen.; Persia.
breviscapum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 840>Kotschyi.
bromifolium, *Boiss. ex Bunge, Gatt. Acanthol.* 28.— Kurdistan.
cabulicum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 623.—Afghan,
caesareum, *Boiss. & Bal. Diagn.* Ser. II. iv. 66.—Cappadoc.
calocephalum, *Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 77.—Afghan.
Calverti, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 65.—Armenia,
caryophyllaceum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 78.—Kurdistan.
caryophyllaceum, Haussk. ex Bunge, Gatt. Acanthol. 37 = armenum.
cataonicum, Bunge, 1. c. 43=lycaonicnm.
cephalotum, St. Lag. in Ann. Soc Bot Lyon. vii. (1880) 118=A. Cephalotes.
Cephalotes, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 622.—Afghan,
curviflorum, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 57.—Persia.
cymosUm, *Bunge, 1. c.* 15.—Persia,
desertorum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 391.—Turkestan.
diapensioides, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 624.—Afghan,
distachyum, *Boiss. I.* c-623.—Afghan.
Echinus, Bunge, Gatt. Acanthol. 46 •= andiosaceum.
erythraeum, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 99.—Turkestan,
eschkerense, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 844.—Persia.
fasciculate, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 626.—Afghan.
Fausti, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 482.— Persia.
ferox, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 81=A. Scorpius.
Fetisdwi, *Regel, Dec. PI. Nov.* 8.—Turkest.
festucaceum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 76.—Persia,
flexuosum, *Boiss. ex Bunge, Gatt. Acanthol.* 51.— Persia.
genistoides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 76.—Persia,
glumaceum, *Boiss, I. c.* 75.—Armenia.
Griffithianum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 628.—Afghan,
gulistanum, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 67.—Persia.
Haüsknechti, Bunge, 1. c. 87—armenum.
heratense, *Bunge, 1. c.* 65.—Afghan.
Hohenackeri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 75.—Reg. Caucas.
Hohenackeri, Ledeb. Fl. Ross. iii. 470=glumaceum.
horridum, *Bunge, Gatt. Acanthol* 64.—Persia.
Huetii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 65.—Armenia.
Hystrix, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 71.—Persia,
iconicum, *Boiss.& Heldr. ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 839. —As. Min.
incomptum, Boiss. *8c* Buhse, in Nouv. Mém. Mosc xii. (I860) 183-A. Scorpius.
Karelinii, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 58.—Armenia,
kokandense, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 99.—Turkest
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 74.—Cilida.
Hurdicum, Bunge, Gatt. Acanthol. 62 - brachystachyum.
latifolium, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 61.—Kurdistan.
latifolium, Rupr. Sert. Thiansch. 69 = Ruprechti.
laxiflorum, Boiss. Fl. Orient, iv. 832=venustnm.
laxiflorum, *Boiss. ex Bunge, Gatt. Acanthol.* 28.— Syria,
leptostachynm, *Aitch. &• Hemsl in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 76.—Afghan.
leptuioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 77 —Reg. Caucas.
leucacanthum, Boiss. L c. 81 •> A. Scorpius.
libanoticum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 680.—Syria.
Listoniae, Boiss. 1. c 681—acerosum.
iongiflorura, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 62.—Afghan,
lycaonicum, *Boiss. & Heldr. ex Boiss. in DC. Prod.* xii. 627.—As. Min.

ACANTHOLIMON:-

lycopodioides, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 632.—As. centr.; Kashmir.
Maewskianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 391.—Samarkand.
melananthum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 74.—Persia.
Munroanum, *Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 76.—Afghan,
oliganthum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 77.—Persia.
Olivieri, *Boiss. I. c.* 80.—Persia,
parviflorum, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 78.—As. temp.
Peronini, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 842.—Cilicia.
petraeum, *Boiss. ex Bunge, Gatt. Acanthol.* 28.— Kurdistan.
phrygium, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 79=acerosum.
Pinardi, Boiss. 1. c—acerosum.
polystachyum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 624.—Afghan,
pterostegium, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 15.—Persia.
puberulum, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 62 = androsaceum.
quinquelobum, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 56.—Persia,
restiaceum, *Bunge, I. c.* 22.—Persia,
roseum, *Boiss. Diagn.* Ser. i. vii. 71.—Persia ; Afghan.
rubellum, Boiss. ex Bunge, Gatt. Acanthol. 66 = roseum.
Ruprechti, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 20.—Turkestan,
sahendicum, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mlm. Mosc.* xii. (1860) 188.—Persia,
sarawschanicum, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 73.—As. temp,
scabrellum, *Boiss. &• Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 845.—Persia.
schahrudicum, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 65.—Persia,
schirazianum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 72.—Persia,
scirpinum, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 22.—Persia.
scorpioideum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon. vii. (1880) 118 = A. Scorpius.
Scorpius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 81.—Persia,
senganense, *Bunge, Gatt. Acanthol.* 29.—Persia,
setiferum, *Bunge, 1. c.* 68.—Turkestan.
splendidum, Bunge, 1. c. 17 = bracteatum.
Stocksii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. p. 68.—Beluchistan.
subulatum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 629.—Afghan.
Stoviteii, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Mosc xii. (I860) 184 = Karelinii.
talagonicum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 625.—Persia,
tataricum, *Boiss. 1. c.* 623.—Turkestan.
Tchihatcheffi, Fisch. & Mey. in Ann. Sc Nat. Sér. IV. (1854) i. 30=acerosum.
tenuiflorum, *Boiss Diagn.* Ser. I. vii. 78.—Trans Caucas.
tibeticum, Hook. f. *8c* Thorns, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 479=lycopodioides.
tomentellum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 72.—Persia.
ToumeforLii, *Boiss. I. c.* 74.—Armenia,
tragacanthinum, *Boiss. 1. c.* 81.—Persia.
tragacanthinum, Griff, ex Bunge, Gatt. Acanthol. 64 = fasciculare.
truncatum, *Bunge, I. c.* 56.—Persia,
ulicinum, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 827.—Syria. _
venustum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 80.—As. Min.
viscidulum, *Boiss. 1. c.* 71.—Persia.
Wiedemanni, *Bunge, Gatt. Acanthol,* 45.—Anatolia.

ACANTHOLIPPIA, Griseb. in Goett Abh. xix. (1874) 244 = Lippia, Linn. (Verben.).
hastulata, Griseb. 1. c. xxiv. (1879) 279 =»L. hastulata.
salsoloides, Griseb. 1. *c* xix. (1874) 244.—Reg. Argent.

ACANTHOLOMA, Gaudich. ex Baill. Adansonia, vi. (1866) 231. t. **i=Pachystroma,** KloUsch (Euphorb.).
spinosum, Baill. 1. c. 237=P. ilicifolium.

ACANTHOHrffTHA, A. Gray, in Syn. Fl.N. Am. ii. 365 *(1S7S).—LABIATAE,* Berth. & Hook. f. ii. 1192.
ilicifolia, *A. Gray, I. c*—Calif.
lanceolata, *Curran. in Bull. Calif. Acad.* i. (1884) 13.— Calif.

ACANTHONEMA, Hook. f. Bot. Mag. t. 5339 (1862). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1021.
strigosum, *Hook.f. I. c.*—Afr. trop.

ACANTHONOTUS. Benth. in Hook. Nig. Fl. 298 (1849) = Indigofera, Linn. (Legum.).
echinatus, Bjath. 1. c.=I. echinaU.

ACANTHONYCHIA, Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. n. 249. t.56 (1872) = Pentaeaena, Bartl. (Illecebr.).
polycnemoides, Rohrb. 1. c. 250 = P. polycnemoides.
ratftosissima, Rohrb. I.e. 249. t. 66=P. polycnemoides.

ACANTHOPANAX, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 10 (1863). *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 939.
KALOPANAX, Miq. 1. c ^1863).
PLECTRONIA, Lour. Fl. Cochinch. 162 (1790).
aculeatum,&?m.i'n *Journ. Bot.* v.(1867)238.—As. trop.
asperatum, Franch. *8c* Sav. Enum. PI. Jap. ii. 378 = divaricatum.
divaricatum, *Seem, in Journ. Bot.* v. (1867) 289.—Japon.
innovans.f rancA. *& Sav. Enum. PI. Jap.* i. 193.—Japon.
japonicum, *Franch. & Sav. 1. c.* ii. 377.—Japon.
ricinifolium, *Seem, in Journ. Bot.* vi. (1868) 140. —Japon.
sciadophylloides, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 878.—Japon.
sepium. Seem, in Journ. Bot. v. (1867) 289 =aculeatuin.
sessiliflorum, *Seem. 1. c.*—China,
spinosum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 10.— Japon.
trichodon, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 877.— Japon.

ACANTHOPHIPPIUM, Blume, Bijdr. 353. t. 47 (1825). *ORCH/DEAE,* Bedth. *8c* Hook. f. iii. 512.
bicolor, *Lindl. Bot. Reg.* xx. (1835) 1730.—Zeylan.
Curtisii, *Reichb.f. in Gard. Chron. N. S.* xv. (1881) I. 169.—Malaya.
javanicum, *Blume, Bijdr.* 854.—Java,
parviflorum, *Hassk. Cat. Bog. Alt.* 43.—Malaya,
ringiflorum. Griff. Notul. iii. 347=sylhetense.
striatnm, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 41.—Reg. Himal.
sylhetense, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 177.—Reg. Himal.

ACANTHOPHOENIX, H. Wendl. in Fl. des Serres. Sir. II. vi. (1865-67) 181.1.1706. *PALMEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 898.
DECKENIA, H. Wendl. ex Seem, in Gard. Chron. (1870) 561.
crinita, *H. Wendl. I. c*—Ins. Mascarens.
rubra, *H. Wendl. 1. c.* sub 1.1706.—Ins. Mascarens.

ACANTHOPHYLLUM, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 37-Naasauvia, Juss. (Compos.).
axillare. Hook. *8c* Am. 1. c.(=Strongyloma glomerulosa).
rosulatum, Hook. *8c* Am. 1. c 48 = N. rosulata.

ACAHTHOPHYLLTTM, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 210 (1881). *CARYOPHYLLEAE,* Benth. & Hook. f. i. 145.
ALLOCHRUSA, Bunge, in Boiss. Fl. Orient, i. 559 (1867).
JORDANIA, Boiss. Diagn. Ser. I. viiu 98 (1849).
Alexandrae, *Smirn. ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 250.—Reg. Amur,
bracteatum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 43.—Persia.
Bungei, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii.(1873) 511.— Persia.
caespitosum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 42.—Persia,
crassifolium, *Boiss. 1. c.*—Persia,
elatius, *Bunge, in Boiss. Fl. Orient,* i. 561.—Persia; Turkest.
Fontanesii, Boiss. *8c* Buhse, in Nouv. Mém. Mosc. xii. (1860) 39 = glandulosum.
Fontanesii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 41.—Persia,
glandulosum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* i. 565.— Persia.
glaucum, Bunge, ex Boiss. 1. c. 566 = sordidum.
gracile, *Bunge, ex Boiss. 1. c.* 562.—Persia,
grandifiorum, *Stocks, in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 142.—Baluchist.
gypsophiloides, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 15.—Tnrkest.
Korolkowi, *Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 249.—Turkest.
laxiflorum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 182 = Gypsophila erinacea.
macrodon, *Edgev. in Hook. Fl. Brit. Ind.* i. 216.— Ind. or.; Afghan.
microcephalum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 43.—Persia,
artte, *Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. (1854). i. 35.11.—As. Min.

ACANTHOPHYLLUM:—
mucronttum, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 210.—Reg. Caucas.
mucronatum, Fend, in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 37-Toumefortii.
paniculatum, *Regel & Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) I. 539.—Turkest.
pungens, Boiss Fl. Orient, i. 661-spinosnm.
sordidnm, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient*, i. 565.—Persia.
spinosum, Bnnge, in Mém. Sav. *Hi.* Pétersb. vii. (1851) 227-elatius.
spinosum, *C. A. Mty. Vert. Pfl. Cane.* 210.—Reg. Caucas.; Sibir.
squarTosum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 81.—Persia.
Stocksianum, Boiss. 1. c.-squarrosum.
Toumefortii, *Fentl, in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 310.—Armenia,
versicolor, *Fiseh. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 81.—Persia.
verticfflatnm, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 210.—Armenia.

ACANTHOPHYTON, Less. Sy*. Comp. 128 (1832) = Cichorium, Linn. (Compos.).
spinosum, Less. 1. c.=C. spinosum.

ACANTHOPLEURA, C. Koch, in Bot. Zeit vii. (1849) 408-Polylophium, Boiss. (Umbell.).
tnvohicrata, C. Koch, 1. c - P. orientale.

ACANTHOPRASIUM. Spenn. in T. Nees. Gen. Fl. Gam. Gamop. ii. (1848)=Ballota, Linn. (Labiat.).
frutescens, Spenn. L c. = B. spinosa?

ACANTHOPSIS, Harv. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 28. *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. *L* ii. 1089.
dispérma, *Han. I. c*—Afr. austr.
nomda, *Nees, in DC. Prod.* xi. 278.—Afr. austr.

ACANTHORBIZA, H. Wendl. in Kerch. Palmiers, 280 (1878); Bot. Zeit. (1879) 147. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 925.
aculeata, *H. Wendl. in Kerch. Palmiers*, 230; *Illust. Hortic.* xxvi. (1879) t. 867.—Mexico.
Chnco, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 554.—Bras.
Mocinni, *Benth. & Hook./. Gen.* iii. 925.—Mexico.
stauracantha, H. Wendl. ex Linden, Cat. n. 87 (1871); Illust. Hortic. xxviii. (1881) 15=aculeata.
Wallisi, *H. Wendl. ex Regel, in Gartenfl.* xxviii. -- (1879) 163. t. 977. f.2.-Hab.t
Wancewiczii, *H. Wendl. in Kerch. Palmiers*, 230.—Panama.

ACANTHOSICYOB, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 80. *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 824.
horrida, *Welw. I. c.* 81.—Afr. trop.

ACANTHOSPERMA, Veil. Fl. Flum. viii. 1.162 (1827) = Acioarpha, Juss. (Calycer.).
httorale, Veil. 1. c.=Acicarpha spathulata.

ACANTHO8FEHMUM, Schrank, PI. Rar. Hort. Monac. t 53 (1819). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 349.
CENTROSPERMUM, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. iv. 270. t. 897 (1820).
tCHiNouiUM, Poiteau, ex Cass. in Diet. Sc. Nat. lix. 235 (1S29).
ORCYA, Veil. Fl. Flum. 344 (1825).
brasilum, *Schrank, PI. Rar. Hort. Monac.* ii. 53.—Bras.
hirsutum, DC. Prod. v. 522=brasilum.
hispidum, *DC. I. c.* 622.—Bras,
humile, *DC. I. c.* 522.—Ind. occ.
xanthioides, DC. 1. c. 621 = brasilum.

ACANTHOSPORA, Spreng. Anleit ii. I. 256 (1817); Syst. ii. 25 (1830)=T-iUandBla, Linn. (Bromeliac.).
conantha, Spreng. Syst. ii. 25=T. strobilantha.
juncea, Spreng. 1. c. 25=T. setacea.
vittata, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1056=Cryptanthus bivittUtusJ

ACAKTHOSTACHYS, Link, Klotrach & Otto, Ic. PI. Rar. i. 21. t. 9 (1841). *BROMELIACEAE*, Benth. 8c Hook. f. iii 668.
arobilacea, *Link, Klottsch, & Otto, 1. c.* 22. t. 9.—Bras.

ACANTHOSTEMMA, Blume, Rumphia, iv. 29 (1848)-Hoya, R. Br. (Asclepiad.).
Hasseltii, Blume, 1. c. = H. Hasseltii.
Kuhlii, Blame, 1. c. = H. longifolia.
longi/olium, Blume, l.,c. = H. Kumphii.
pictum, Blume, L c —H. picta.
pruinosum, Blume, 1. c. 30 = H. pruinosa.
puierum, Blume, 1. c. 29 = H. pubera.
Rumphii, Blume, 1. c. 29=H. Kumphii.

ACANTHOSYBIS, Griseb. in Goett. Abb. xxiv. (1879) 161. *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 224.
falcata, *Griseb. 1. c*—Reg. Argent,
spinescens, *Griseb. I. c*—Reg. Argent.

ACANTHOTHECA, DC. Prod. vi. 78 (1887) =DUnorphotheoa, Moench (Compos.).
dentata, DC. 1. c. 74»D. dentate.
integrifolia, DC. 1. c. 74 = D. integrifolia.
pinnatisecta, DC. 1. c. 73=D. pinnata.

ACANTHOXANTHIUM, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon. N.S. xvii. (1869) 110=Xanthium, Tonm. (Compos.).
spinosum, Fourr. I.e. 110=X. spinosum.

ACANTHUS, Tourn. ex Linn. Syst ed. I. (1785).
ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1090.
ACANTHODUS, Rafin. Princ. Somiol. 26 (1814).
CHEILOPSIS, Moq. in Ann. Sc. Nat Se>. I. xxvii. (1832) 230.
DILIVARIA, Juss. Gen. 108 (1789).
ZONABLEPHIS, Rafin. Sylva Tellur. 148 (1838).
arboreus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 116.—Aegypt
Barteri, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 37.—Afr. trop.
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 97.—Afr. austr.
caiduacens, *Griff. Notul.* iv. 138.—Reg. Himal.
carduifolius, Linn. f. Suppl. 294=Blepharis carduifolia.
dliaris. Burro. t Fl. Ind. 139—Blepharis boerhaviaefolia.
cristatus, Rottl. ex Nees, in DC. Prod. xi. 256=Lepidagathis cristata.
Delilei, Spreng. Syst. iii. 819 = Blepharis edulis.
Dioscoridis, *Linn. Cent.* ii. 28 {*Am. Acad.* iv. 821).—Syria.
Doloarin, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 487-ilicifolius.
ebracteatus, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 75. t. 40.—As. trop.
edulis, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 115 = Blepharis edulis.
furcatus. Linn. f. Suppl. 295=Blepharis furcata.
glaber, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 278-Blepharis carduifolia.
glaucus, E. Mey. ex Nees, 1. c 277 = Blepharis glauca.
glomeratus, Lam. Encyc i. 23 = Blepharis glomerata.
nirsutus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 86.—Oriens.
hispanicus, Hort. ex Lond. Hort. Brit. 256 = niger.
humilis, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 274 (=Acanthodium sinuatum.)
ilicifolius, *Linn. Sp. PI.* 639 (err. typ. 930).—As. trop.; Austral.
ilicifolius, Lour. Fl. Cochinch. 375=ebracteatus.
imbricatus, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1847) 217.—Ind. or.
integrifolius, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 276 = Blepharis furcata.
integrifolius, Thunb. Prod. PI. Cap. 97=Blepharis satnraejaefoHa.
Kirkii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 37.—Angola.
latifolius, Hort. ex Goeze, in Gard. Chron. (1867) 856, 903 = mollis.
leucostachyns, *Wall. Cat.* n. 2612.—Ind. or.
longibracteatus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 79.—Burma.
longifolius, *Pair. Encyc. Suppl.* i. 88.—Europ. austr.
longipetiolatns, *Kurt, For. Fl.* ii. 241.—Burma.
lusitanicus, Hort cf. Gard. Chron. (1867) 903 = mollis.
macer, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 276 = Blepharis furcata.
maderaspatanus, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 267 = Blepharis boerhaviaefolia.
maderaspatensis, Linn. Sp. PI. 639 (err. typ. 989) = Blepharis molluginifolia.
mollis, Graf & No*, ex Nees, in DC. Prod. xi. 270= longifolius.
mollis, *Linn. Sp. PI.* 639 (err. typ. 939).—Europ austr.

ACANTHUS:—
mollis, Riedel, ex Nees»in DC. Prod. xi. 271 — spinosus.
montanus, 7'. *Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 87—Afr. trop.
mucronatus, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Br. Ind. iv. 617 =Lepidagathis spinosa.
niger, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 2.—Lnsitan.
nitidus, 5. *Moore, in. Journ. Bot.* xviii. (1880) 232.—Afr. trop..
pectinatus, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 274 = Blepharis edulis.
polystachyus, *Delile, in Caill. Voy. au Miroi*, 2. t. 62. f. 2.—Afr. trop.
procumbens, Herb. Madr. ex Wall. Cat. sub n. 2513 = Blepharis boerhaviaefolia.
procumbens, Thunb. Prod. PL Cap. 97-Blepharis glomerata ?
pungens. Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2498 = Lepidagathis pungens.
Raddei, Trautv. in Act Hort. Petrop. iii. II. (1875) 2B9 = Dioscoridis.
repandus, Nees, in DC. Prod. xi. 435, sphalm.=Anthacanthus repandus.
repent, Vahl, Symb. Bot. ii. 76 = Blepharis molluginifolia.
rnbens, *Rafin. Fl. Ludov.* 36.—Am. bor.
spathularis, *E. Mey. ex Nees, in. DC. Prod.* xi. 277.—Am. bor.
spinosissimus, Desf. Tabl. Hort Par. 61=spinosns.
spinosissimus, Host, Fl. Austr. ii. 218 = mollis.
spinosus, *Linn. Sp. PI.* 639 (err. typ. 939).—Europ.
spinosus, Nees, in DC. Prod. xi. 271=hirsutus, syriacus
spinulosus, Host, Fl. Austr. ii. 217-= spinosus.
syriacus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 185.—Syria,
tetragonus, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 65; *Verm. Schr. ed. Nees*, iii. 249.—Abyss.
verus, *Wender. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 11.—Hab. *1*
volubilis, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 66. t. 172.—Ind. or.

ACANTHYLUS, Pomel. Nouv. Mat Fl. Atl. 179 (1874) =AnthyllB, Riv. (Legum.).
numidica, Pomel, 1. c-Anth. nnmidica.
tragacantkoides, Pomel, L c. = Astragalus armatus.

ACARNA, All. Fl. Pedem. i. 158 (1785)=AtractyUs, Linn. (Compos.).
caespitosa, Willd. Sp. PI. iii. 1700 = Atractylis caespitosa.
cancellata, All. Fl. Pedem. i. 153 = Atractylis csncellata.
chinensis, Bunge, Enum. PL Chin. Bor. 36-Atractylis ovata.
comosa, Spreng. Syst. iii. 880=Atractylis comosa.
cyanoides, Bess. Enpm. PI. Volh. 32 = Jurinea cyanoides.
cyanoides, WibeL Prim. H. Werth. 169= Jurinea Pollichii.
gummifera, Willd. Sp. PI. iii. 1699=Carlina guntmifera.
lancea, Willd. 1. c. 1700 = Atractylis ovata.
macrocephala, Willd. 1. c^Carlina Fontanesii.
macrophylla, Willd. 1. c.=Carlina macrophylla.
mollis, Bess. Ennm. PI. Volh. 32=Jurinea mollis.
ovata, Willd. Sp. PI. iii. 1701 - Atractylis ovata.
r:fi7fa,Godet,exDC. Prod.vi. 674= Jurinea longifolia.
serratuloides, Spreng. Syst. iii. 379=Atractylis serratuloides.

ACARNA, Hill, Veg. Syst. iv. 13 (1762) = Cnicus, Linn. (Compos.).
Casabonae, Hill, Hort. Kew. 59 - C. Casabonae.
leucographa, Hill, 1. c-Tyrimnus leucographus.
onopyxe, Hill, 1. c. = Carduus Onopyxos.

ACARPHA, Griseb. in Goett. Abh. vi. (1853-55) 125-Boopis, Juss. (Calycer.).
australis, Griseb. 1. c. 126-B. australis.

ACARPH AEA, Harv. & Gray, ex. A. Gray, in Mem. Am. Acad. iv. (1849) i. (PL Fendl.) 98 = Chaenactis, DC. (Compos.).
artemesiaefolia, Harv. & Gray, 1. c. «= C. artemisiaefolia.

ACASTE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 322 = Babiana, Ker-Gawl. (Irid.).
pulchra, Salisb. 1. c. 323 = B. stricta.
venusta, Salisb. 1. c. 322=B. rubrocyanea.

ACCA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1855) 1S3 = Psidium, Linn. (Myrtac).
domingensis, Berg, 1. c. 138.—Ind. occ.
peruviana, Berg, 1. c. 189.—Peruv.

ACCIA, St. Hil. Morphol. 499 (1840)=Plukenetia, Linn. (Enphorb.).
scandens, St. Hil. 1. c (—Fragariopsis scandeni).

ACCIPITRINA, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 81 (1745)-Sisymbrium, Linn. (Crucif.). -

ACCOROMBONA, Endl. Gen. Suppl. i. 1427 (1841) =• Galega, Linn. (Legum.).
tricolor, Benth. ex Walp. Rep. i. 672-G. officinalis.

ACEDILANTHUS, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 835 (1881) sphalm. = seq.

ACELIDANTHUS, Trantv. & Mey. In Middend. Reise (Fl. Ochot 94. t. 28) (1847)=Veratrum, Linn. (Liliac).
anticleoides, Trautv. & Mey. 1. c.»V. Maackii.

ACENTRA, Phil. Sert. Mendoc. Alt. 3 (1871) *VIOLARIEAE*.
serrata, *Phil. I. c.*—Reg. Argent.

ACER, [Toum.] Linn. Syst. ed. I. (1785). *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 409.
EUACER, Opiz, Seznam, 42 (1852).
abchasicum, *Rupr. Fl. Cauc.* 279.—Reg. Caucas.
acuminatum, *Wall, ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 249. —Reg. Himal.
aetnense, Hort. ex C. Koch, Dendrol. 531 —platanoides.
a fine, Hoffmgg. ex Walp. Rep. i. 410=campestre.
affine, Opiz, in Flora, vii. (1824) Beil. i. 88; xii. (1829) 547-campestre.
Amaliae, *Orphan.ex Boiss. Fl. Orient.i.* 951.—Graecia.
amoenum, Carr. in Rev. Hortic. (1867) 280 = palmatum.
argatum, *Maxim, ex Miq. in Arch. NJerl.* ii. (1867) 475.—Japon.
austriacum, Tratt. Arch. Gew. i. t. 36-campestre.
bar bat um, Hook. Fl. Bor. Am. i. 113-glabrum.
barbatum, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 252 — saccharinum.
barbinerve, *Maxim, ex Miq. in Arch. Nierl.* ii. (1867) 476.—Japon.
bohemicum, Presl, ex Opiz, Seznam, 9 - campestre.
Boscii, *Spach, Hist. Vig. Phan.* iii. 88.—Am. bor. t
Buergerianum, Miq. Ann. Mns. Bot. Lngd. Bat. ii. 88 = palmatum.
Buaimpala, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 249 •= oblongum.
caesium, *Wall, ex Brand. For. Fl.* iii. t. 21.—Reg. Himal.
californicum, D. Dietr. Syn. ii. 1288=Negundo aceroides.
califorDicum, *Torr. & Cray, Fl. N. Am.* i. 250.—Calif.
Campbellii, *Hook. f. if Thorns., ex Brand. For. Fl.* 109.—Reg. Himal.
campestre, *Linn. Sp. PI.* 1055.—Enrop.; Oriens.
canadense, Duham. Arb. i. t. 12 = pensylvanicnm.
capillipes. *Maxim, ex Miq. in Arch. Nierl.* ii. (1867) 477.—Japon.
carolinianum, Walt. Fl. Carol. 251-rubrum t
carpinifolium, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1845) 154.—Japon.
cassiaefolinm, *Blume, Rumphia*, iii. 198.1167. B. f. 2. —Java.
caudatum, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 4.—Reg. Himal.
cinerascens, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 29.—Persia,
circinnatum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 267.—Amer. bor.
circumlobatnm, *Maxim, in Bull. Acad. P/tersb.* xii. (|i867> 225.—Japon.
čissifolium, *C. Koch, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 252.—Japon.
coccineum, Michx. f. Arb. Am. i. 203-rubrum.
colchicum, Hartwiss, in Loud. Card. Mag. (1840) 632 — pictum.
Collinsona, *Thunb. Diss. Acere*, 6.—Hab. ?
collinum, Tenore, Syll. 194 —• campestre.
commutatum, J. & C. Presl, Delic. Prag. 81 = monspessulanum.
cordi/olium, Moench, Meth. 55 —tatarium.
coriaceum, Lodd. ex Spach, Hist. Vég. Phan. iii. 107 -polymorphiira.
coriaceum , *Bosc, ex Tausch, in Flora*, xii. (1829) 550. —Hab. ?
crataegifolium, *Sieb. & Zucc. in Abh. Aiad. Muench.* iv. II. (1845) 155.—Japon.

ACBB:—
creticum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1497.—Oriens.
creticum, Schmidt, ex Tratt. Arch. Gew. L t. 46 - parvifolium.
cnspum, *Moench, Vert. Ausl. Baeume*, 2.—Hab. 1
cultratum, Wall. PI. As. Rar. ii. 4 = pictum.
dasycarpnm, *Ehrh. Beitr.* iv. 24.—Am. bor.
Dedyle, Maxim, in Bull. Phys. Math. Acad. Sc. Pétersb. xv. (1856) 125 — spicatum.
diabolioum, *Blume, ex Koch, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 251.—Japon.
discolor, *Maxim, in Bull. Acad. Sc. Pitersb.* xxvi. (1880) 436.—China.
dissectum, Thunb. Fl. Jap. 160 - palmatum.
distylum, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1845) 154.—Japon.
Dittrichii, Opiz, Seznam, 9- A. Psendo-Platanus.
Douglasii, Hook. Lond. Journ. Bot vi. (1846) 77. t. 6 -glabrum.
Drummondii, Hook. & Am. in 1. c. i. (1834) 200 = rubrum.
eriocarpon, Opiz, in Flora, vii (1824) I. Beil. 83 = campestre.
eriocarpum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 258=dasycarpum.
Fabri, *Hance, in Journ. Bot.* xxii. (1884) 76.—China.
Fieberi, *Opiz, Setnam*, 9.—Bohem.
fioridanum, Hort ex C. Koch, Dendrol. 542-dasycarpum.
formosum, *Carr. in Rev. Hortic.* (1867) 300.—Japon.
fraxinifolium, Nutt. Gen. Am. i. 258-Negundo aceroides.
fraxinifolium, *Rafin. New Fl. Am.* i. 48.—Am. bor.
Friederici-Guillelmi, Can. in Rev. Hortic. (1867) 300 =p&lmfttum.
Ginnale, Maxim, in Bull. Phys. Math. Acad. Sc Pétersb. xv. (1856) 126-tataricum.
glaucum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. 543-sanguineum.
glaucum. Marsh, Arbust. 2 = rubrum t
glabram, *Torr. in Ann. Lye. New York*, ii. (1828) 172. —Am. bor.
granatense, Boiss. Elench. 25 - opulifolium.
grandidentata, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 249.—Am. bor.
Heldreichii, *Boiss. & Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 71.—Graecia.
heterolobum, Opiz, Natural, ix. (1825) 114 = campestre.
heterophytlum, Willd. Berl. Baumz. 10. t. 1- creticum.
hispanicum, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 305 ••opulifolium.
Hookeri, *Miq. in Arch. Nierl.* ii. (1867) 471.—Reg. Himal.
humile. Salisb. Prod. 281 -creticum.
hybridum, Bosc, Diet. Agr. v. 251-pensylvanicum.
hypoleucum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. 543 - nibram.
hyrcanum, *Fisch. & Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* iv. 31.—Oriens.
ibericum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 447 = monspessulanum.
illyricum, Jacq. f. in Flora, xii. (1837) 651—monspessulanum.
insigne, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mim. Mosc.* xii. (1860) 46.—Persia.
intermedium. Pang, ex Nym. Consp. 135—monspesralanum.
isolobum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xii. (1872) II. 304.—Burma.
italum, *Lauth, de Acere*, n. 8.—Enrop.; Oriens.
japonicum, *Thunb. Fl. Jap.* 166.—Japon.
javanicum, Jungh. in Hoev. & De Vr. *Tijdschr.* viii. (1841) 321.—niveum.
javanicum, *Burm.f. Fl. Ind.* 221.—Java.
jucundum, *Carr. in Rev. Hortic.* (1867) 880.—Japon.
laciniatum, Borckh. ex Tratt. Arch. Gew. 86=platano noides.
lactescens, Pers. Syn. i. 417-=platanoides.
laetum, C. *A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 286.—Oriens.
laevigatum, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 3. t 104.—Reg. Himal.
laurifolium, D. Don, Prod. Fl. Nep. 249-oblongum.
laurinum, *Hassk. in Hoev. & De Vr. Tijdschr.* x. (1843) 138-niveum.
laurinum, Hassk. 1. c.=niveum.
leiocarpon, Opiz, in Flora, vii. (1824) I. Beil. 82 - campestre.,,
leptoptemm, Guss. ex Nym. Consp. 13S-opulifolium.

ACER:—
lobatum, Bosc, ex C. Koch, Dendrol. 519-Boscii.
lobatum, *Rafin. New Fl. Am.* i. 48.
Labelii, Tenore, Fl. Nap. v. 29. t. 199-platanoides.
macrocarpon, Opiz, in Flora, vii. (1824) I. Beil. 82 - campestre.
macrophyllum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 267.—Am. bor.
macropterum, Vis, in Mem. 1st Venet. ix. (1860) 175; Suppl. 28 - Visianii.
ma/us, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 635 - A. Pseudo-Platanus.
mandshuricum, Maxim, in Bull. Acad. Sc Pétersb. xii. (1868) 228.—Manchur.
marsicum, Guss. PI. Rar. 376=campestre.
Martini, jord. Pugill. 62—opulifolinm.
marucum, Walp. Rep. i. 408—campestre.
Maximowiczianum, *Miq. in Arch. Nierl.* ii. (1867) 478. —Japon.
melliodorum, Opiz, Seznam, 9 - A. Pseudo-Platanus.
mexicanum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 176.—Mexico,
micranthum, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1845) 155.—Japon.
microcarpon., Masn.' ex Opiz, Natural, vi. (1824) 48; in Flora, vii. (1824) I. 83-campestre.
microphyllum, Opiz, in Flora, vii. (1824) I. Beil. 82; et Natural, vi. (1824) 48-campestre.
molle, Opiz, 1. c. 83—campestre.
Mono, Maxim, in Bull. Phys. Math. Acad. Sc. Pétersb. xv. (1856) 126-pictum.
monspessnlanum, *Linn. Sp. PI.* 1056.—Europ. austr.
montanum, Ait Hort. Kew.ed. II. iii. 435 - spicatum.
montanum, Lam. Fl. Fr. ii. 553-A. Pseudo-Platanus.
neapolitanum, Tenore, Fl. Nap. ii. 372. t. 100= opulifolium.
neglectum,*Hoffmgg. ex Walp. Rep.* i. 410-Hab.?
neglectum, *Lange, in Bot. Tidss.* xiii. (1882) 30.—An hybr.?
Negundo, Linn. Sp. PI. 1056 = Ncgundo aceroides.
nigrum, Michx. f Arb. Am. il. 238.1.16 - saccharinnm.
nikoense, Maxim, in Bull. Acad. Sc. Pétersb. xii. (1868) 227 - Maximowiczianum.
nikoense, *Miq. in Arch. Nierl.* ii. (1867) 478.—Japon.
niveum, *Blume, Rumphia*, iii. 193.—Java; Ind. or.
oblongum, *Wall, ex DC. Prod.* i. 593.—Reg. Himal.
obtusatum, Waldst *Sc* Kit. ex Willd. Sp. PI. iv. 984 -- opulifolium.
obtusifolium, Sibth. & Sm. Fl. Graec t. 361 = creticum.
Opalus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8=opulifolimn.
Opizii, *Ortm. ex Opit, Setnam*, 9.—Bohem.
opulifolium, Thuil. ex Loud. Hort. Brit. Supp. ii. 606 = A. Pseudo-Platanus.
opulifolium, *Vill. Hist. PI. Dauph.* iv. 802 * Europ.; Oriens.
orientate, Linn. Syst. ed. X. ii. 1300 = creticum.
omatum, *Carr. in Rev. Hortic.* (1867) 300.—Japon.
orthopteron, Masn. ex Opiz, Natural, vi. (1824) 4»; et Flora, vii. (1824) I. Beil. 82 ~ campestre.
pallidum, Ait. ex Steud. Norn. ed. II. i. 11 = dasycarpum.
palmatifidum, Tausch, ex Steud. 1. c. = platanoides.
palmatisectum, Ortm. ex Celak. Prod. Fl. Boehm. 538 —campestre.
palmatum, Rafin. New Fl. Am. i. 48 - macrophyllum.
palmatum, *Thunb. Fl.Jap.* 162.— Japon.
palmifolium, Borckh. Fl. Katzeln. 107= saccharinnm.
parvifiorum, Ehrh. Beitr. iv. 25=spicatum.
parviflorum, *Franch. & Sav. Enum. PL Jap.* ii. 321. Japon.
parvifolium, *Tausch, in Flora*, xii. (1829) 545.—Europ. austr.
pectinatum, Wall. PI. As. Rar. ii. 4-caudatum.
pennsylvanicum, Dnroi, Diss. 61-spicatum.
pensylvanicum. *Linn. Sp. PI.* 1055.—Am. bor.
pentapomicum, *Stewart, ex Brand. For. Fl.* 111.—Reg. Himal.
pictum, *Thunb. Fl. Jap.* 162.—Japon.
pilosum, *Maxim, in Bull. Acad. Sc. Pétersb.* xxvi. (1880) 436.—As. or.
pinnatum, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 649.—Cocbinch.
platanifolium.GW/. *ltin. Not.* 200 (-villosum?).--Reg. Himal.
platani/olium, Stokes, Bot. Mat Med. ii. 382-platanoides.
platanoides. *Linn. Sp. PI.* 1055.—Europ.; Oriens.
Platanus, Bunn. f. Fl. Ind. 221 (= quid ?).—Ind. or.
polycarpon, Opiz, Natural, vi. (1824) 49; in Flora, vii. (1824) i. Beil. 82 = campestre.

ACBB:-
polymorphum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Maench. IT. H. (1645) 158=palmatum.
polymorphum.Sfiack.Hist. Vig.Phan. iii. 107.—OHens.
Praecox, Opiz, Seznam, 9=campestre.
procerum, Salisb. Prod. 280=A. Pseudo-Platanus.
Pseudoplatanus, Falk, Beitr. ii. 279=platanoides.
Pseado-Platanns, *Linn. Sp. PI.* 1054.—Europ.; Oriens.
pubescens, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. XT. (1883) 246.-Turkest
pnrpurasceiu, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 320. —Japon.
pycnanthum, *C. Koch, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 250.—Japon.
tuinquelobatum, Wagn. ex Opii, in Flora, vii. l. (1824) Beil. 83 = campestre.
quinquelobum, C. Koch, Dendrol. 540 = creticum.
quinquelobum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 198=A. Pseudo-Plat anus.
rectangulum, Dulac, Fl. Hantes-Pyr.242=monspessulanum.
Reginae-Amaliae, Orphan, ex Boiss. Diagn. Ser. II. i. 109=Amaliae.
reticulatum, *Champ, ex Benth. in Ho*. Kew Journ.* lii. (1851) 312.-Hongkong.
Reygassei, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 5, 71 =hyreanum.
robustum, Opiz, Seznam, 9=campestre?
rotundifolium, Lam. Encyc. ii. 382 = italum.
rotundum, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 242=platanoides.
rubrum, Lam. Encyc. ii.380=dasycarpum.
robrum, *Linn. Sp. PL* 1055.—Am. bor.
rubrum, Wats. Dendrol. Brit t. 169 = rubrum.
ruftnerve, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. «. (1845) 155. —Japon.
saccharinum, Linn.Sp. PI. 1055=dasycarpum.
Saccharinum, *Wangenh. Nordamer. Holtarten* (1787) 38.1.11. f. 26.-Am. bor.
»a«*arophorum, *c. Koch & Fint. Wochenschr.* (1859) 3*9.—Am. bor.
Saira, Hort. ex C. Koch, Dendrol. 541=dasycarpum.
Wnguineum. *Carr. in Rev. Hortic.* (1867) 280.—Japon.
**«nguineum,* Spach, in Ann. Sc Nat Sfr. II. ii. (1834) 176 » rubrum.
£rA««rf/mi,Hort.exC.Koch,Dendrol.530-platanoides.
Semenovii, *Regel & Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) r. 550.—As. temp.
sempervirens, Linn. Mant i. 128 - heterophyllum.
•empervirens, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) 550.—Hab. ?
septemlobum, Thunb. Fl. Jap. 162 •= palmatum.
•erotinum, *Kit. in Linnaea,* xxxtt. (1863) 552.—Europ.
sessilifolium, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1845) 158=palmatum.
bieboldiannm, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 87. —Japon.
sikkimense, *Miq. in Arch. Nierl.* ii. (1867) 471.—Reg. Himal.
spicatum, *Lam. Encyc.* ii. 381.—Am. bor.
ttachyophyllum, *Hiern, in Hoot./. Fl. Brit. Ind.* i. 694. —Keg. Himal.
sterculiaceum, Griff. Itin. Notes, 148=pictum.
sterculiaceum, WalL PI. As. Rar. ii. 3.1.105 = villosum.
striatum, Du Roi, Harbk. Bauinz. i. 8 - spicatum.
suberosum, Dum. Fl. Belg. Prod. 113=campestre.
sylvestre, Wender. in Schr. Nat. Ges. Marb. ii. (1830) 250=campestre.
•yriacum, *Boiss.* cV *Gaill Diagn.* Ser. II. v. 72.—Syria; Cyprus.
tataricnm, *Linn. Sp. PI.* 1054.—Oriens.
tauricolum, Boiss. <5= Balansa, Diagn. Ser. II. v. 72 = hyrcanum.
Tauschianum, Opiz, Seznam, 9= campestrc
•epnentosum, *Maxim, in Bull. Phys. Math. Acad. Sc. Pttersb.* xv. (1856) 125.—Reg. Amur,
tematnm, *Moc. & Sesse, ex DC. Prod.* i. 696.—Mexico.
tomentosum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 242-opulifolium.
Thomsoni, Miq. in Areh.Neerl. ii. (1867) 470-villosum.
tomentosum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 652-campettre.
tomentosum, Derf.Cat. Hort. Par. ed. IIL 136-eriocarpum.
Trautvetteri, *Medw. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* vu. (1880) 428 in obs.—Hab. 1
triangulum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 370=pentilobum.
trifidum, Hook. 6V *Am. Bot. Beech. Voy.* 174.—China.
trifidum, Thunb. Fl. Jap. 163-Linden triloba.
tnfolutum. *Rafin. New Fl. Am.* i. 48.—Am. bor.
'nftltum, Duham, Arb. i. 1.10. f. 8=monspessulannm.

ACEB:-
trilobatum, Lam. Encyc ii. 382=monspessulanum.
trilobum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 198 = campestre.
trilobum, Moencb, Meth. 56»monspessulanum.
tripartitum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 248 —glabrum.
truncatum, Bunge, Enum. PL Chin. Bor. 10=pictum.
ukurunduense, Tiautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 24)= spicatum.
Van-Volxeraii, *Mast, in Card. Chron.* vii. (1877) 72. —Reg. Cancas.
velutinum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 28=insigne.
villosum, j & C. Presl, Delic. Prag. 31=A. Pseudo-Platanus.
villosum. *Wall. PI. As. Rar.* ii. 4.—Reg. Himal.
virens, *Thunb. Diss. Acere,* 8. (err. typ. 5).—Oriens.
virgatum, *Rafin. New Fl. Am.* i. 48.—Am. bor.
tnr^inionum,Mill, ex Sleud. Nom.ed. 1.6 = dasycarpum.
Visianii, *Nym. Censp.* 135.—Servia.
vitifolium, Opiz, ex TaHsch, in Flora,xii. (1829) II. 549 =platanoides.
Wondralekii, Opiz, Seznam, 9=campestre.

ACEBANTHTJS, Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1837) 849. t. 14. *BERBERIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 44.
diphyllus, *Morr. & Decne. 1. c.* 350.—Japon.
maciophyllus, *Blume, ex C. Koch, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 253.—Japon.
sagittatus, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ir. (1845) 175 = Epimedium sagitattum.
triphyllus, *C. Koch, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 253.—Japon.

ACEBAS, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 191 (1818). *ORCH/DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 621.
affinis, Boiss. Fl. Orient, v. 56.—As. Mm.
alpina, Steud. Nom. ed. II. i. 12 -Herminium alpinum.
angustifolia, Lindl. in Wall. Cat.n. 7061 =longicruris.
anthropomorpha, Steud. Nom. ed. II. i. 12=anthropophora.
anthropophora, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. r. 191. —Europ.
caprina, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 282"=Orchis hircina.
densiflora, Boiss. Voy. Espagne, ii. 595 = Habenaria intacta.
Duquesnei, Reichb. f. 1c. Fl. Germ, xiii-xiv. 171 = Orchis pyramidalia.
formosa, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 282 - Orchis fonnosa.
hircina, Lindl. 1. c. = Orchis hircina.
intacta, Reichb. f. Ic. *Ft* Germ, xiii-xiv. 2 = Habenaria intacta.
lancea, Steud. Nom. ed. II. i. 12 (^Ophrys laacea).
longibracteata, Reichb. f. Ic Fl. Germ, xiii et xiv. 3 = Orchis longibracteata.
longicruris, *C. Wright, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1858-9) 411.—Japon.
maculata, Gren. in Gren. ft Godr. Fl. Fr. iii. 282 in nota =Habenaria intacta.
pyramidalis, Reichb. f. Ic Fl. Germ, xiii-xir. 6 -Orchis pyramidalis.
secundiflora, Lindl. in Bot. Reg. t 1526 = Habenaria intacta.

ACERATES, Ell. Sketch, i. 316 (1827) = Oomphocarpus, R. Br. (Aselepiad.)..
angustifolia, Decne. in DC. Prod. viii. 522 = Asclepias stenophylla.
asperula, Decne. 1. c—Mexico.
atropurpurea, Kellogg, in Proa Calif. Acad. (1854-59) 65 ; repr, 69 = G. eordifolius.
auriculata, Engelm. ex Torr. in Bot. Mex. Bound. 160. —Am. bor.
bifida, Rusby, ex A. Gray, in Proa Am. Acad. xx. (1885) 296.—Arizona.
circinalis, Decne. in Ann. Sc Nat. Sér. II. ix. (1838) 322.—Mexico.
connivens, Decne. in DC. Prod. viii. 521 («= Anantherix conrtivens).
cordifolia, Benth. PI. Hartw. 323-=G. cordifolius.
decumbens, Decne. in DC. Prod. viii. 622 = Asclepiodora decumbens.
Feayi, Chapm. in Coulter, Bot. Gazette, iii. (1878) 12. —Florida.
gomphocarptides, Benth. PI. Hartw. 66=Nephradenia neriifolia.
gomphocarpoides, Decne. in Ann. Sc Nat. Sir. II. ix. (1838) 3-23.—Mexico.
humilis, Benth. PL Hartw. 291.—Mexico.

ACERATES:—
incarnaia, Decne. in DC. Prod. viii. 523.—Am. bor.
lanceolata, Stend. Nom. ed. II. i. 12 = G. viridiflorus.
lanuginosa, Decne. in DC. Prod. viii. 523.—Am. bor.
latifolia, Torr. *Sc* Fiém. in Frém. Rep. Exped. (1845) 317 = Asclepias cryptoceras.
longifolia, Ell. Sketch, i. 317 = Asclepias longifolius.
paniculata, Decne. in DC. Prod. viii. 521=Asclepiodora viridis.
Schar'Tneri, *Fourn. in Ann.* Sc. *Nat.* Sér. VI. xiv. (18S2) 386 —Mexico.
tomentosa, Torr. in Bot. Mex. Bound. 160=G. tomentosus.
vinosa, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xiv. (1882) 387.—Mexico)
viridiflora. Ell. Sketch, 817=G. viridiflorus.

ACERATIUM, DC. Prod, i.519 (1824) =ElaeooarpuB, Linn. (Tiliac).
Calomala, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 306 = E. nitidus.
oppositifolium, DC. Prod. i. 519 - E . oppositifolius.

ACEROTIS, Rafin. New Fl,Am. i. 49 (1836) = Asclepiaa, Tourn.

ACETOSA, Toum. ex Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1752) = Rumex, Linn. (Polygon.).
Acetosella,m\\. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 - R. Acetosella.
aculeata, Chaz. in Mill. Diet. Suppl. i. 8 = R. bucephalophorus.
agrestis, Rafin. New Fl. Am. iv. 52=R. Acctosa.
alpina, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = R. montanus.
alpina, Moench, Meth. 357 = R. alpinns.
amplexicaulis, Rafin. New Fl. Am. iv. 53 = R. Acctosa.
angustata, Rafin. 1. c. = R. Acctosa.
arifolia, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 64 = R. arifolius.
bidentula, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = R. Acetosa.
bipinnata, Chaz. in Mill. Diet. Suppl. i. 8 = R. pictus.
bucephalophora, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. N. S. xvii. (1869) 145 - R. bucephalophorus.
digyna. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=Oxyria digyna.
hastata, Moench, Meth. 357 - R. Acetosella.
hastifolia, Schur, Enum. PI. Transs. 581 - R. Acetosa.
hastulata, Rafin. New FL Am. iv. 52 = R. Acctosa.
heterophyla, Rafin. 1. c. = K. maximus!
integrifolia, Rafin. 1. c. - R. integrifolia.
intermedia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. N. S. xvii. (1869) 146=R. intermedius.
Lunaria, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 =R. Lnnaria.
luxurians,Chax.. in Mill. Diet. Suppl. i. 8 = R. luMirians.
magna, Gilib. Exercit. ii. 445 = R. Acetosa.
multifida, Chaz. in Mill. Diet. Suppl. i. 8 = R. multifidns.
officinalis, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Koss. iii. 510=R. Acetosa.
olitoria, Rafin. New Fl. Am. iv. 53 = R. Acetosa.
parva, Gilib. Exercit. ii. 44» = K. Acetosella.
pratensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = R. Acctosa.
repens, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PI. ii. 276 = R. Acetosella.
rosea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7 = R. roseus..
scutata, Mill. 1. c n. 3 = R. scutatus.
sterilis, Mill. 1. c. n. 8 = R. Acetosella.
subalpina, Schur, Enum. PI. Transs. 581 - R. Acetosa.
tingitana, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. N. S. xvii. (1869) 145 = R. tingitanus.
tuberosa, Ciax. in Mill Diet. Suppl. i. 8=R. tuberosus.

ACETOSELLA. Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 127 (1745)-Ruraex, Linn. (Polygon.).
vulgaris, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. N. S. xvii. (1869) 145 - R. Acetosella.

ACHAEMENES, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon. vii. (1880) 41=Aohlmens8, P. Br. (Gesnerac).

ACHAETA, Foura. (Gram. Mex. 109) ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1153 (1883)=Deyeuxi&, Clar. (Gramin.).
geniculata, Foum. 1. c. ex Hemsl. BioL Centr. Am. Bot iii. 553.—Mexico.
plumosa, Fonrn. 1. c. ex Hemsl. 1. c. 553.—Mexico.

ACHAETOGEBON, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N.S. iv. (184M) (PI. Fendl.) 72. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1232.
Galeottii, *A. Gray, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 119.—Mexico.
Seemannii, *A. Gray, ex Hemsl. 1. c.* 120.—Mexico.

ACHAETOOBBOIT :—
Wislizeni, *A. Cray, in Mem. Am. Acad. N. S.* iv. (1849) *(PI. Fendl.)* 72.—Mexico.

ACHANIA. Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 102 (1788) - Malvaviscus, Dill. (Malvac).
ciliata, Spreng. Syst. iii. 100=M. ciliatns.
coccinea, Salisb. Prod. 885 = M. arboreus.
• *concinna,* Spreng. Syst. iii. 100 = M. concinnns.
cordate, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act. Nat. Cor. xi. (1828) 99 = M. Balttsii.
floridana, Rafin. New Fl. Am. i. 49»Hibiscus floridanus I
Malmmiscus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 102=M. arborens.
mollis, Ait. Hort. Kew. ii. 459=M. mollis.
pilosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 102=M. pilosns.
Poeppigii, Spreng. Syst. iii. 100=Hibiscus Poeppigii.
stylosa, Schrank, in Flora, ii. (1819) 449.—Bras.
tomentosa, Sterler, ex Steud. Norn. ed. II. i. 12.—Hab. ?

ACHARIA, ThTinb. Prod. PL Cap. 14 (1794). *PASSIFLOREAE,* Benth. & Hook. f.i. 814.
tragodes, *Thunb. I. c.—kk.* austr.

ACHARITEA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1142 (1876). *VERBENACEAE,* Benth. *Sc* Hook, tennis, *Benth. I. c.*—Madag.

ACHARITERIUM, Bluff *Sc* Fingerh. Fl. Germ. ii. 845 (1825) = FUago, Linn. (Compos.).
arvense, Bluff & Fingerh. L c. 846 = F. arvensis.

ACHASMA, Griff. Notul. iii. 426 (1851)=Amomum, Linn. (Scitam.).
macrocheilos, Griff. 1. c 429.—Ind. or.
megalocheilos, Griff. I. c. 426.—Ind. or.
metriocheilos, Griff. L c. 427.—Ind. or.

ACHATOCABPUS, Triana, in Ann. Sc Nat Se>. IV. ix. (1858) 46. *AMARANTACEAE,* Benth. ft Hook, f. iii. 26.
nigricans, *Triana, I. c.* 46.—N. Granat
praecox, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 32.—Reg. Argent
spinnlosus, *Griseb. I. c.* 82.—Reg. Argent

ACHETARIA, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 566=Beyrichia, Cham. (Scrophularin.).
Sprengelii, Cham. & Schlecht. L c 657 = B. villosa.

ACHILLAEA, Linn. Phil. Bot. 29 (1764) = Aohfflea, Linn. (Compos.).

AOHHiLEA, Linn. Syst. ed I (1785). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 419.
ACERATOIDES, Ponted. ex Linn. Class. PL 527 (1747).
ALITUBUS, Delac, FL Hautes-Pyr. 499 (1867).
ARTHROLEPIS, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 14 (1849).
CONFORATA, Caesalp. ex Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon. N. S. xvii. (1869) 91.
MIU.EFOLIUM,Toura. ex Adans. Fam. ii. 128 (1768).
PTARMICA, [Toum.] Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 174 (1745).
abrotanifolia, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. L 12 (= Pyrethrum myriophyllum).
abrotanifolia, Linn. Sp. PL 897=Tanacetum millefoliatum.
abrotanoides, *Vis. Fl. Dalmat.* ii. 81. t 10. £ 1.—Europ.
absinthifolia, [Clairv.] Man. Herb. 251-Clavennae.
acuminata, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 15.—Sihiria.,
adulterina, Leresch, ex Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, xlviii. (1881) 167=obscura.
aegyptiaca, S. G. Gmel. It. ii. 198 <= Gerberi.
aegyptiaca, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 12 = semipectinata.
aegyptiaca, Linn. Sp. PL 900=Tonmefortii.
aegyptiaca, Sm. Fl. Graec ix. 71 = taygetea.
ageratifolia, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 420.—Graecia.
Ageratum, *Linn. Sp. PI.* 897.—Europ.
albicaulis, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc 76=tenuifolia.
albida, Willd. Enum. Hort BeroL Suppl. 61 = tenuifolia.
aleppica, *DC. Prod.* vii. 296.—Oriens.
alpina, *Linr. Sp. PI.* 899-Europ.
ambigua, Boiss. Fl. Orient iii. 255-A. Millefolium.
ambigua, Pollini, Viag. Lag. Garda, 117-magna.

ACHHiLEA :—
ambrosiaca, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 276.—Thessal.
amoena, C. A. Mey. Verz. PA. Cauc. 76-vermicularis.
anethifolia, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc Nat Mosc. (1885) I. 404 = A. Millefolium.
anglica, G. Don, in Loud. Hort Brit. 365-decolorans.
angustifolia, Salisb. Prod. 204-alpina.
anthemoides, *Willd. Sp. PI.* iii. 22uO.^-Hab. ?
arabica, *Kotschy. in Sited. Acad. Wien. Math. Nat.* Iii. Abth. I (1866) 255.—Arab.
arborea, Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 102=Gonospermum elegans.
argentea, Salisb. Prod. 204 - Clavennae.
argentea, Lam. Encyc. i. 29 = Tanacetum argenteum.
annenorom, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 269.—Armen.
asperula, Ces. & Pass, ex Nym. Consp. 862 = Anthemis asperula.
aspleniifolia, Leresch, ex Sch. Bip. in Oestr. Bot; Wochenschr. vi. (1856) 801 = Leieschei.
asplenifolia, *Vent. Jard. Cels,* t. 95.—Am. box. ?
atrata, *Linn. Sp. PI.* 899.—Europ.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 87.—Persia.
aurea, Lam. Encyc. L 26 = Chrysanthemum achilleaefolium.
auriculata, *Willd. Sp. PI.* iii. 2208.—Oriens.
baikalensis, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 41.—Sibir. baikal.
bandana, Boch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8291 = Chrysanthellum indiciim.
iannatica, Kit. ex DC. Prod. vi. 29 = crithmifolia.
Barbeyana, *Heldr. & Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien,* xlviii. (1884) 161.—Graecia.
Bardana, Buch.-Ham. ex DC. Prod. v. 631. sphalm.-*bandana.*
Barrelierii, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 15.—Europ.
biaristata, Spreng. Syst. iv. Cur. post. 303=Anacyclus clavatus.
bicolor, *Wender. in Flora,* xii. (1829) I. *Erg.* 25.—Europ. 1
bipinnata, Linn. Sp. PL 900(=Pyrethrum myriophyllum).
biserrata, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii. 334.—As. Min.
Bocconii, Koch, Ind. Sem. Hort Erlang. (1834) = alpina.
Boissieri, *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 272.—Persia.
Boissieriana, Heldr. ex Heimerl, in Denkschr. Acad. .Wien, xlviii. (1684) 162 = Barbeyana.
borealis, Bong. Veget. Ins. Sitcha, 149 = A. Millefolium.
brachyphylla, *Boiss. & Haussk. in 'Boiss. Fl. Orient.* iii. 273.—Mesopot.
buglossis, Frivald. in Flora, xix. (1836) 433 = Ungulata.
callichroa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 86.—Persia.
camphorata, Gilib. FL Lituan. i. 217-nobilis.
camtschatica, Rupr. ex Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, xlviii. (Ib84) 189 =sibirica.
Cancrini, *Gruner, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xli. (1668) II. 417.—Tauria.
capillaris, Poir. Encyc. Suppl. i. 102 = setacea.
capillata, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 534=chamaemelifolia.
capitata, Willd. Tract. Ach. 17=Clavennae.
cartilaginea, *Ledeb. Ind. Dorp, ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 274.—Europ.; Oriens.
chamaecyparissus, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 14.—Europ.
chamaecyparyssus, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xvi. 64. t. 1012 = praec
chamaemelifolia, *Pourr. in Mim. Acad. Tout.* iii. (1788) 305.—Mont. Pyren.
chrysantha, Griseb. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 265 = chrysocoma.
chrysocoma, *Frivald. in Flora,* xviii. (1835) 336.—Graecia.
cilicica, *J. Gay, ex Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 270.—As. Min.
claudiopolina, Janka, in Oestr. Bot. Wochenschr. (1854) 403=impatiens.
claudiopolitana, Wolff, ex Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, xlviii. (1884) 185 - impatiens.
Clavennae, *Linn. Sp. PI.* 898.—Europ.
Clusiana, *Tausch, in Flora,* iv. (1821) II. 551.—Europ.
Clusii, Sauter, in Flora, vii. (1824) I. 211 = Clusiana.
clypeolata, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* t. 893.—Oriens.
coarctata, Poir. Encyc. Suppl. i. 94-compacta.

AOHUXEA :—
collina, Becker, ex Reichb. FL Germ. Excurs. 850=A. Millefolium.
collina, Schur, ex Nym. Consp. 367<°setacea.
cor&mutata, *Heimerl, in Flora,* lxvi. (1883)885.—Europ.
compacta, Lam. Encyc, i. 27=magna.
compacts, *Willd. Sp. PI.* iii. 2206.—Oriens.
condensata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 85.—Java,
conferta, *DC. Prod.* vi. 32.—Oriens.
coronopifolia, Willd. Tract Ach. 18. n. 9. t 1. f. 2-tanacetifolia.
corymbifera, S. G. Gmel. It i. 137. t. 25. f. 1-nobilis.
crassifolia, Hort ex Steud. Norn. ed. II. i. 18 = A. Millefolium.
cretica, *Linn. Sp. PI.* 899.—Oriens.
crispa, Lam. ex DC. Prod. vi. 26=asplenifolia.
cristata, Hort. ex DC. I. c. 25 = tanacetifolia.
cristata, Retz. Obs. Fasc ii. 25 = falcata!
cristata, Willd. Tract. Ach. n. 4 et 8; Sp. PL iii. 2192=alpina.
crithmifolia, Frivald. ex Hampe, in Flora, xx. (1837) I. 22»=micrantha.
crithmifolia, *Waldst. & Kit. PI. Rar.Hung.* i. 68. t 66.—Oriens.
crusuta, *Schu.r, Enum. PI. Transs.* 329.—Transylv.
cuneata, *Sch. Bip. in Linnaea,* xix. (1836) 313=grandifolia.
cuneatiloba, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. Mosc.* xii. (1860) 117. t. 10. f. 2.—Persia.
cuneifolia, Lam. Encyc. i. 28 = A. Hcrba-rota.
cuspidata, Wall. Cat. n. 3280 = A. Millefolium.
cylindrical Poir. Encyc. Suppl. i. 95=nobilis.
damascena, DC. Prod. vii. 296 = falcata.
decipiens, Vest, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 60 = nobilis.
decolorans, *Schrad. in Willd. Enum.Hort. Berol.913.*—Europ.
decumbens, *Lam. Encyc.* i. 27.—Kamtschat.
dentato-serrata, *Heuffel, ex Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien,* xlviii. (1884) 179.—Europ.
denticulata, Bess, ex Heimerl, 1. c. 188=sibirica.
dentifera, DC. Fl. Fr. Suppl. 485=tanacetifolia.
dentifera, Reichb. Fl. Germ. Exc 230 = A. Millefolium.
depressa, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc Nat Mosc (1865)1. 405=sibirica.
depressa, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 204.—Balkan.
distans, Waldst. & Kit ex Willd. Sp. PL iii. 2207 = tanacetifolia.
diversifolia, Schur, Enum. PL Transs. 330-crithmifolia.
djimilensis, Boiss. Fl. Orient, iii. 259 = latiloba.
dracunculoides, Desf. Cat Hort. Par. ed. HI. 180-A. Ptarmica.
Dracunculus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 13 = Artemisia Dracunculus?
dshimilensis, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 824-latiloba.
dubia, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 13.—Sibir.
Dumasiana x, *Vatke, in Oestr.Bot. Zeitschr.xxii.* (1872) 374.—Enrop.
elegans, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 13.—Hispan.
erba-rota, 'Auct.' = A. Herba-rota.
eridania, Bertol. Fl. Ital. ix. 407-nobilis.
erioclada, DC. Prod. vii. 296-cretica.
eriophora, *DC. Prod.* vi. 31.—Persia.
Eupatorium, Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 337-nlipendulina.
falcata, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr, 534=chamaemelifolia.
falcata, *Linn. Sp. PI.* 897.—Oriens.
fasdculata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 27 - Eriocephalus umbellatus.
Feliciana x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. N. Fol.* xxiii-xxiv. (1880) 105.—Europ.
filicifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 338 = filipendulina.
fililoba, *Freyn, in Flora,* lxiv. (1881) 210.—Graecia.
filipendulina. *Lam. Encyc.* i. 27.-^-Oriens.
flabellifolia, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. I. xi. 27 = Tanacetum flabellifolinm.
flabelliformis, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. ix. 72»holosericea.
flava, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. IS -> Chrysanthemum achilleaefolium.
floscnlosa, *Desf. Tab. Hort. Par.* 105 (nomen)—Oriens.
formosa, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 13.—As. Min.
Fraasii, *Sch. Bip. 1. c.* xxv. (1842) *Beibl. 1*159.—Graecia.

ACHH1I1EA:—
fragilis, Balb. ex DC. Prod. vi. 28 = A. Ptarmica.
fragrantissima, *Sch. Bip. in Mora,* xxxviii. (1855) 18. Oriens; Aegypt.
fruticulosa, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. U. 536=Gerberi.
Genipi, Mnrr. App. Med. i. 168-moscbata.
Gerberi, Bieb. Fl. Tanr. Cane. i. 336-nobilis.
Gerberi, *Willd. Sp. PI.* iii. 2196.—Europ.; Caucas.
gilva, *Moench, Meth. Suppt.* 257.—Europ.'
Glavennae, (err. typ.) Schrank, Baier. FL ii. 409-Clavennae
glomerata, Bieb. FL Tanr. Cane. iii. 585-compacta.
goniocephala, *Boiss. & Bal. in Boiss.Diagn.* Ser. II. vi. 98.—As. Min.
gracilU, Rafin. ['Fl. texensis, 12'] Atl. Joum. 177 = A. Millefolimn.
grandiflora, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.ii.* 888.—As. Min.
grandifolia, *Frivald. in Flora,* xix. (1836), II. 488.—Oriens.
grandifolia, Bieb. FL Taut. Cauc. ii. 444 = A. Ptannica.
grandis, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc Nat. Mosc. (1865)1. 407 = A. Ptarroica.
grata, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 261 - odorata.
Gussonii, Ces. & Pass, ex NynR Consp. 862 = Anthemis abrotanifolia.
Haenieana, Tansch, in Flora, iv. (1821), 567 - A. Millefolium.
Halleri, Crantz, Inst. i. 808-atrata.
Haussknechtiana, Aschers. in Festschr. Ges. Naturf. Fr.Berl. (1873) 243-seq.
Hanssknechtii, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 264.—Persia,
helyetica, *Schleich. ex Gaud. Fl. Helv.* v. 368-valesiaca ?
Herba-rota, *All. Ft. Pedem.* i. 180.—Europ. merid.
Herba-rotta, Vill. Prosp. Delph. 32 = praec.
heterophylia, *Spreng, Nachr.* i. *Bot. Gart. Halle,* 9.—Sibir.
hispanica, Schrank, PL Rar. t. 70-nobilis.
nolosericea, *Sibth. & Sm. Fl. Grate* t. 894.—Graecia.
hybrida, *Gaud, in Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 409.—Europ.
imbricata, Aucher, ex DC. Prod. vii. 296 = aleppica.
imbricata, Vent. Jard. Cels, t. 54=membranacea.
impatiens, *Linn. Sp. PI.* 898.—Sibir.
impunctata. Vest, in Flora, iii. (1820) 3, 7-moschata.
incisa, *[Claim.] Man. Herb.* 251.—Europ.
vnodora, Linn. Sp. PL 900-Lonas inodora.
intermedia, Schleich. Cat PL (1821)6 = A. Millefolium.
ircutiana, Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1855) 16-A. Ptarmica.
Jaborneggi x, *Halacsy, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvii. (1877) 45.—Europ.
Jacea, Griseb. Iter, ji. 264. exSpicil. Fl. RumeL ii. 216—chrysocoma.
Jankae, *Sch. Bip. ex Nym. Consp.* 866.—Europ.
japoniea, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 125=sibirica.
kellalensis, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 263.—Persia.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 19-odorata.
Kraettliana x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ces.Graub. N. Fol.* xxiii-xxiv. (1880) 106, nomen.—Europ.
Laggeri, *Sch. Bip. in Oestr. Bot. Wochenschr.* vi. (1856) 300.—Enrop.
lanata, Lam. Fl. Fr. iii. 640 = A. Millefolium.
Unata, *Spreng. Cat. Fl. Hal. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 915.—Hab. ?
lannlosa. *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* vii. (1834) 36 = A. Millefolium.
latifolia, Salisb. Prod. 204-macrophylla.
latiloba, *Ledeb. exNordm. in Bull. Acad. Sc. Pitersb.* ii. (1837) 812.—Caucas.
Ledebourii, Heimerl, in Flora, lxvi. (1883) 889 = impatiens.
lenensis. Turcz. ex DC. Prod. vii. 295 = ircutiana.
leptophylla, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 885.—Tauria.
leptoph$la,C. Koch, ex Nym. Consp. 367 -crithmifolia.
Lereschd, *Sch. Bip. in Oestr. Bot. Wochenschr.* vi. (1856) 301.—Europ.
leucanthema, Pers. Syn. iL 467=A. Ptarmica.
Ugustica, *All. Fl. Pedem.* i. 181. t. 62. £ 2.—Europ.; Oriens.
Ugustica, Vis. ex Nym. Consp. 867-nohilis.
linearis, Steud. Nom. ed. II. i. 13 = A. Ptarmica.
lingulata, *Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung.* i. 2.—Europ. orient
livea, Scop. Delic. Insub. i. 6-moschata.
lobaŲ . *Fl. Aegypt. Arab.* 218.—Aegypt

ACHHiLEA:—
lucida. Salisb. Prod. 204-impatiens.
lycaonica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xl. 18-conferta.
macrocephala, Rupr. Beitr. Pfl. Runs. Reiches, ii. (1845) 41-A. PUrmica.
macrophylla. Pill. & Mitterb. It. Poseg. 111. 1.11 = Chrysanthemum macrophyllum.
macrophylla, *Linn. Sp. PI.* 898.—Europ.
macrophyUoides, Pang, ex Nym. Consp. 866 = A. grandifolia.
magna, Haenke, in Jiras. Beob. Riesengeb. 103-A. Millefolium.
magna. All. Fl. Pedem. i. 184-tanacetifolia.
magna, *Linn. Sp. PI.* ed. It 1267.—Europ.
magna, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ii. 194-ligustica.
major, *Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien,* xlviii. (1884) 157.—Europ.
marginata, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 632=A. Millefolium.
maxima, Fischer, ex Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, xlviii (1884) - A. Ptarmica.
membranacea, *DC. Prod.* vi. 32.—Oriens.
Michelii, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 14.—Europ.
micrantha. Bleb. Fl. Taur. Cane. ii. 336=pubescens.
micrantha, *Willd. Sp. PI.* iii. 2209.—Soongar; Oriens.
microloba, DC. Prod. vi. 32=teretifolia.
microphylla, Willd. Sp. PL iii. 2210 =. odorata.
Millefolium, Ledeb. Fl. Alt. iv. 124=setacea.
Millefolium, *Linn. Sp. PI.* 899.—Europ.; As.; Am.
mollis, *Andre, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1888) 451, nomen.—Rossia.
mongolica, Fisch. ex Spreng. Nov. Prov. Hort Hal. et Berol. (1818) i. 3-sibirica.
monocephala, *Boiss. & Bal. Diagn.* Ser. I. v. 110.—Cilicia.
montana, *Schleich. ex DC. Prod.* vi. 21.—Europ.
monticola, Martr. PL Crit. du Tarn, 31-A. Millefolium.
Morisiana, Reichb. Ic Fl. Germ. xvi. 66. t. 1019 -A. Herba-rota.
moschata, *Jacq. Fl. Austriac.* v. 45.—Europ.
mucronata, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 13 —heterophylla.
mncronulata, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 15.—Europ.
multifida, Griseb. SpiciL FL RumeL ii. 212 = strata,
multifida, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1655) 15.—Graecia.
multifida, Sprun. ex Nym. Consp. 867=setacea.
multiflora, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 818.—Am. bor.
multiplex, Renar. Fl. Orn. 78 = A. Ptarmica.
muricata, Ces. & Pass, ex Nym. Consp. S62=Anthemis muricata.
muschensis, C. Koch, in Linnaea, xxv. (1851) 829-vermicularis.
myriophylla, Willd. Enum. Hort. Berol. 916 = Tanacetum millefoliatum.
nana, Lam. Fl. Fr. ed. I. ii. 154 = A. Herba-rota.
nana, *Linn. Sp. PI.* 899.—Europ.
Neumayeri, Heldr. ex Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, xlviii (1884) 163=Fraasii.
Neilreichii, Kem. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxl (1871) 148 =nobilis.
nitida x, Pers. Syn. ii, 467-A. impatient,
nivea, *Sprun. ex Nym. Consp.* 865.—Enrop.
nobilis, *Linn. Sp. PI.* 899.—Europ.; Oriens.
nobilis, Roch. ex Nym. Consp. 367—crithmifolia.
Novae-Graeciae, *Sch. Bip. in Flora* (1841), i. 158.—Enum.
obscura x, *Nees, Ind. Sem. Hort. Bonn.* (1831) 1,—Europ.
ocddentalis, Rafin. ex DC. Prod. vi. 24=A. Millefolium.
ochroleuca, Eichw. Skizze, 149-A. Millefolium.
ochroleuca, Ehrh. Beitr. vii. 166=nobilis.
ochroleuca, Waldst & Kit. PI. Rar. Hung. i. 33=pectinata.
odorata, *Linn. Syst.* ed. X. 1225.—Europ.; Oriens.
odorata, Pall. Reise, i. 879= nobilis.
odorata, Wulf. in Jacq. Coll. i. 259 =setacea.
pligocephala, *DC. Prod.* vi. 32.—Mesopot.
oravicensis, A"ll. *& Kanitt, Reliq. Kitaib.* 82, *in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,* xiii. (1863) 506.—Europ.
ossica, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 823-A. Millefolium.
oxyodonta, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi VS.—Persia,

ACHUJJEA:—
oxylepis, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 271.—Persia,
oxyloba, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 15.—Afr. austr.
pallescens, DC. Prod. vii. 296 -grandifolia.
pallescens, *Linn. Syst.* ed. X. 1225.—Hab.!
pallida, Salisb. Prod. 204 = Touraefortii.
pannonica, Scheele, in Linnaea, xviii. (1835) 471 = MiUefolium.
partheniflora, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc Nat. Mosc. (1865) I. 407=A. Ptarmica.
partheniifolia, *Desf. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 14, nomen—Hab. J
paudfiora, Lam. Encyc. i. 26. = Tanacetum Vahlii.
pectinata, Lam. Encyc. i. 28=odorata.
pectinata, Willd. Sp. PL iii. 2197.—Hungar; Tauria.
Peronini, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 261 —As. Min.
peucedanifolia, Griseb. Spicil. FL Rumel. ii. 214 = grandifolia.
phrygia, *Boiss. & Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 99.—As. Min.
pilosa, *Willd. Sp. PI.* iii. 2196.—Hab. 1
pinnata, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 64; *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1865) 14.—Enrop.
polyphylla, Schleich. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 411=setacea.
pseudo-tanacetifolia, Wier. ex Reichb. Fl. Germ. xvi. 69-magna.
pseudo-pectinata, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 179.—Turcia.
Ptarmica, *Linn. Sp. PI.* 898.—Reg. temp. bor.
Ptarmica, Richards, in Frankl. ist Joum. ed. II. App. 33=multiflora.
ptarmicoides, Maxim. Prim. FL Amur. 154-sibirica.
pubescens, Sibth. & Sm. Fl .Graec. t 895=micrantha.
pubescens, *Linn. Sp. PI.* 897.—Oriens.
pubescens, Willd. Sp. PL Hi. 2206 - odorata.
pumila, Schur, Enum. PL Transs. S30=tanacetifolia.
punctata, Moench, Meth. 603 = alpina.
punctata, Tenore, ex Fenzl, in Tchihat Asie Min. Bot. ii. 264 -odorata.
pyrenaica, Sibth. ex DC. FL Fr. iv. 211 = A. Ptarmica.
ramosissima, Moench, Meth. Suppl. 256-alpinat
recurvifolia, Lapeyr. Hist Abr. PL Pyr. 634-chamaemelifolia.
Reichardtiana x, *G. Beck, in Sittb. Zool. Bot. Ges. Wien,* xxviii. (1878) 44.—Europ.
rigida, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 331.—Europ.
rosea, Desf. Tabl. Hort Par. ed. I. 105; ed.III. 181 = asplenifolia.
rosea, *Waldst. & Kit. PI. Hung. Rar.*—Hungar.
rosmarinifolia, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 11.—Europ. occ
rubra, Hildebr. ex Steud. Nom. ed. IL L 11-dentifera.
rupestris, *Huter, ex Beck, in Denkschr. Acad. Wien,* xlviii. (1882) 150.—Europ.
salicifolia, Bess, in DC. Prod. vi. 23-A. Ptarmica.
salina, Schur, Enum. PL Transs. 328-setacea.
sambucifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 180 = Chrysanthemum macrophyllum.
sambueina, Thouin, ex DC. Prod. vi. 68=Chrysanthemum macrophyllum.
Santolina, Falk, Beitr. ii. 243-Gerberi.
Santolina, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 76-teretifolia.
Santolina, Hort. ex Willd. Sp. PI. iii. 2200-anthemoides.
Santolina, Linn. *Sp. PI.* 896.—Oriens.; Afr. bor.
Santolina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 70=cretica.
Santolina, Willd. Tract Ach. ex Steud. Nom. ed. I. 6 — tenuifolia.
santolinoides, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* SO.—Hispan..
scabra, Host. Fl. Austr. ii. 612-A. Millefolium.
Schkuhrii, Spreng. ex Nym. Consp. 867-nobilis.
Schurii, Sch. Bip. in Oestr. Bot Wochenschr. vi. (1856) 300—oxyloba.
Seidlii, J. & C. Presl, FL Cech. 173-A. Millefolium.
semipectinata, Desf. Cat Hort. Par. ed. Ill (1829) 403=auriculata.
senecioniflora, *Vest, in Flora,* xii. (1829) *Erg.* j. 59 - dentifera.
sericea, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 579-compacts.
sericea, Vis. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. ii. 228 = Glavennae.
serrata x, Retz. Obs. Fasc. ii. 35.—Sibir.
serrata, Sm. Engl. Bot. t. 2531-decolorant.

ACHIUilSA:—
serratifolia, Salisb. Prod. 204=senate.
serrulata, Homem. Hort. Hafh. ii. 835 = A. Ptarmica.
setacea, *Waldst. & Kit. P. Rar. Hung.* i. 88. t. 66.—Enrop.; Oriens.
setacea, Schwein. in Long, Exped. ii. 119= A. Minefolium,
sibirica, *Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat,* (1811); *Fl. Ross.* ii. 528.—Reg. temp. bor.
sicula, Rafin. Préc Dec. 40; et in Joum. Bot. ii. (1814) 271 = ligustica.
Siegfriedi x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. N. Fol.* xxiii-xxir. (1880) 58.—Europ.
silvatica, Auct.=sylvatica.
simplicicaulis, Boiss. Fl. Orient, iii. 259=latiloba.
speciosa, Henckel, Adumbr. PI. Hort. Hal. 1=A. Ptarmica.
spinosa,*Sekur.in Verh.Sitbenb. Ver. Naturm.* x. (1859) 108.-Europ.
spinulifolia, *Fentl, ex Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 268.—Taurus.
spinulosa. Schur, ex Heimerl, in Denlcschr. Acad. Wien, xlviii. (1884) 185=impatiens.
spithamea, *Coss. & Dur. ex Cess, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 239.—Algeria,
squarrosa, *Ait. Hort. Ken.* ed. I. iii. 242 (sp. dubia). -Hab.?
squarrosa, Hassk. Cat. PI. Hort. Bogor. 101-sibirica.
stricta, Schleich. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 374 = magna.
subcartilaginea, *Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien,* xlviii. (1884) 188.—Europ.
subhirsuta, Gilib. Fl. Lituan. i. 217-A. Millefolinm.
sudetica, Opiz, in Hesperus (1813), 623, ex ej. Natural. n. vi. (1824) 49=A. Millefolium.
sulphurea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 17.—Syria.
sylvatica, Becker, Fl. Frankf. i. 295 - A. Millefolium.
sylvatica, Tenore, FL Nap. iv. 126=ligustica.
sylvestris, S. F. Gray, Nat. Arr. ii. 458 = A. Ptarmica.
Stowitni, Fisch. 5c Mey. ex DC. Prod. vi. 26-latiloba.
talagonica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 17.—Persia,
tanacetifolia, *All. Fl. Pedem.* i. 183 -Europ.; Oriens.
tanacetifolia, Mill. Gard. Diet. ed.VIII.n. 7- A. Millefolium 1
tauriea. Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 836 =1eptophylla.
taygetea, *Boiss. & Heldr. Diag.* Ser. I. xi. 16.—Oriens.
tenuifolia. *Lam. Encyc.* i. 26.—Oriens.
tenuifolia, Salisb Prod. 204 = A. Millefolium.
tenuis, Schur, Enum. PL Transs. 329-A. Millefolium.
teretifolia, *Willd. Sp. PI.* iii. 2198.—Oriens.
Thomasiana, *Hall.f. exlturith, Bot. Vol.* 49.—Europ.
Thomasii, Thomas, ex Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, xlviii. (1884) 167-praec.
tomentosa, Fraas, ex Nym. Consp. 367 « holosericea.
tomentosa, Frivald. ex Nym. Consp. 368=compacta.
tomentosa, *Linn. Sp. PI.* 897.—Enrop.; Oriens.; As. bor.
tomentosa, Pall. Ind. Taur. ex Ledeb. fl. Ross. ii. 536 -leptophylla.
tomentosa, Pursh, Fl. Am. Sept. 583 - A. Millefolium.
Toumefortii, *DC. Prod.* vi. 28.—Graecia.
Trautmanni x, *Stein, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 243, nomen ; *ef. Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien,* xlviii. (1882) 180.—Europ.
trichophylla, *Schretti, Enum. PI. Nov.* 48.—Loongaria.
trilingulata, Sen. Bip. ex Boiss. Fl. Orient iii. 271-aleppica.
tyrolensis.Wcndtx. in Flora,ix. (1826) 858 -Clavennae.
umbellate, *Sibth. & Sm. Prodr.* ii. 192.—Graecia.
valesiaca x, *Suter, Fl. Helvet.* ii. 199.—Europ.
velutina, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 180 - compacta.
vermicularis, *Trin. in Mem. Acad. Petersb.* vi. (1818) 494. t. 13.—Oriens.
vermiculata, DC. Prod. vi. 32=vermicularis.
versecensis, *Kit. ex Kanit; Reliq. Kitaib.* 82. in *Verh.-Zool.-iot. Ges. Wien,* xiii. (1863) 506.—Europ.
virgata, Hort. ex DC. Prod. vi. 81-tenuifolia.
viridis, *Reichb.f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 1.1012.—Europ.
viscosa, Lam. Fl. Fr. ii. 166 = A. Ageratum.
viscosa, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 14.—Enrop.
Wilhelmsii, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 328.—Orient.
Walffii, Schur, ex Nym. Consp. 365=lmpatiens.

ACHILLEOPSIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xxii. (1849) II. 9=Bulingia, K. Br. (StercuL).
densiflora, Turcz. L c. 10=R. densiflora.

ACHILLIOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon. vii. (1880) 118=AchiHea, Linn. (Compos.).
millefoliatus, St. Lag. 1. c.=A. Millefolium.

ACHIMENES, Vahl, Symb. Bot. ii. 71. (1791)=Artanema, D. Don (Scroph.).
sesamioides, Vahl, 1. c=Art. sesamoides.

ACHIMENES, P. Br. Hist Jamaic. 271. t. 30. £ 1. (1756). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 498.
CYRILLA, L'Hirit Stirp. Nov. 147. t. 71 (1784).
DOLICHODEIRA, Hanst. in Linn«».1 xivi. (1853) 205.
EuconoNiA, Hanst. 1. c 201.
GUTHNICMA, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 179.
HOUTTEA, Heyrth. Nom. ii. 306 (1846).
KOERNKKIA, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1857) 48 ; et Gartenfl. (1858) 309.
LOCHBRIA, Regel, in Flora, xxxi. (1848) 251.
MANDIROLA, Decne. in Rev. Hortic. (1848) 468.
SCHEERIA, Seem, in Bot. Mag. t. 4743 (1853).
TBEVIRANA, Willd. Enum. Hort. Berol. 637 (1809).
amabilis, Decne. in Fl. des Serres, Sét. II. ii. (1857) 21. t. 1192=Naegelia multiflora.
amoena, *Van Houtte, ex Hanst. in Linnaea,* xxvii. (1854) 713.—Mexico.
Andrieuxii, *DC. Prod.* vii. 586.—Mexico.
argyrostigma, Hook. Bot Mag. t. 4175=Koellikeria argyrostigma.
atrosanguinea, Lindl. in Journ. Hort Soc. iiL (1848) 818=foliosa.
autumnalis, *Hanst. in Linnaea,* xxvii. (1854) 784.—Guatemala.
Candida, Lindl. in Joum. Hort Soc. iii. (1848) 817 = Dicyrte Candida,
cardinalis, *A. Dietr. in Allg. Garten*,* xv. (1847) 814.—Mexico.
coccinea, *Pers. Syn.* ii. 165.—Ind, occ.
cochinchinensis, Spreng. Syst ii. 812 (= Diceros cochinchinensis).
comifera, *DC. Prod.* vii. 536.—Am. austr.
cordata, Hort ex Regel, in Flora, xxxii. (1849) 182-grandiflora.
comifera, Walp. Rep. ii. 719-comifera.
cupreata, Hook. Bot. Mag. t 4312 = Episcia enpreata.
Diceros, Gmel. ex Steud. Nom. ed. I. 7. 273 (-Diceros cochinchinensis).
divaricate, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 9.—Perev.
erinoides, *DC. Prod.* vii. 536.—Am. austr.
folioaa, *Morr. in Ann. Soc.Gand,* ii. (1846) 408. t 91.—Mexico.
Georgeana, *Hort. ex Belg. Hortic. x.* (1860) 66. 15.—Hab.!
Ghiesbrechtiana, Hort. ex Regel, in Flora, xxxi. (1849) 182 = grandiflora.
Ghiesbrechtii, Lindl. in Joum. Hort. Soc. v. (1850) 193 = grandiflora.
gloxiniaefiora, Forkel, ex Lena, in FL des Serres, Sir. I. iv. (1848) 318-Gloxinia glabrata.
gracilis, Warcsz. ex Regel, in Flora, xxxi. (1849) 180=>Dicyrta Candida.
grandiflora, *DC. Prod.* vii. 536.—Mexico.
Haageana, Otto, ex Regel, in Flora, xxxi. (1849) 1«2-longiflora.
heterophylla, *DC. Prod.* vii. 536.—Bras,
hirsute, *DC. I.* c—Bras,
ichthyostoma, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 434.—Bras.
ignescens, Lem. -in FL des Serres, Ser *I* ïï. (1847) t 248-heterophylla.
incisa, *Klottsch, ex Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 93.—Guatemala.
Jaureguia, Warscz. ex Haage, in FL das Serres, Sér. I. v. (1849) t. 536-longiflora.
Kleei, Paxt. Mag. Bot xvi. (1«49) 289 - longiflora.
Knightii, *Lem. in Fl. des Serres,* Sèr. I. iv. (1848) t 420.—Guatemala,
lanate, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 484.—Mexico.
Liebmanni, *Lem. in Fl. des Serres,* Sér. I. iii. (1847) t 262; *Misc.* 47 B.—Hab.?
longiflora, *DC. Prod.* vii. 536.—Mexico.
maculata, Walp. Kep. ii. 719=foliosa.
maculate, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ill. 8. t 207 A.—Peruv.
magnifica, Lindl. in Gard. Chron. (1856) 116 - Locheria magnifica.

ACHOOTNES:—
Martensiana, Walp. Rep. ii. 719-foliosa.
misera, Lindl. in Joum. Hort. Soc. iii. (1848) 319 - Dicyrta Warscewicziana.
mollis, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 9.—Chili,
multiflora, *Gardn. in Hook. Ic. PI.* t. 468.—Bras,
naegelioides. *Van Houtte, Fl. des Serres,* Sér. II. viii. (1870) 117.—Hab.?
ocellata, *Hook. Bot. Mag.* t. 4859.—N. Granat.
panamensis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 475.—Panama.
patens, *Benth. PI. Hartv.* 67.—Mexico,
pauciflora, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 91.—Costa Rica.
pedunculate, *Benth. PI. Hartw.* 78.—Mexico.
picta, Benth. in Hook. Bot Mag. t. 4126-Tydaea picta.
purpurea, Pritzel, Ind. Ic App. 3, sphalm.=seq.
pyropaea, Gordon, in Joum. Hort. Soc ii. (1847) 293. t. 4. f. 1-coccinea.
repens, Herb. Madr. ex Benth. in DC. Prod. x. 387 = Limnophila repens.
fosea, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) 65.—Guatemala.
rupestris, Gaifc. in Hook. Ic. PL t. 480.—Bras,
scabra, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 8.—Peruv.
Scheerii, *Hemsl. Biol. Centr.-Am. Bot.* ii. 476.—Mexico.
Skinneri, Gordon, fa Journ. Hort. Soc. ii. (1847) 293. t. 4. f. 2 = hirsute,
superba, *Moritt, ex Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 436.—N. Granat.
tenella, *DC. Prod.* vii. 536.—Mexico,
tenenima, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 9 Peruv.
urticaefolia, *Poepp. & Endl. I. c.* 8. t 207. B.—Peruv.
urticaefolia, Warcz. ex Regel, in Flora, xxxii. (1849) 181 = Dicyrta Warsiewicziana.
Warszewiczíana, *Regel, in Flora,* xxxii. (1849) 181.—Am. austr.

ACHIMUS, Poir. in Diet Sc. Nat. v. 61 (1827) = Streblus, Lour. (Urticac).

ACHIRANTHES, P. Br. Hist. Jamaic. 180 (1756) = Achyranthes, Linn. (Amarantac).

ACHIR1DA, Horan. Prod. Monog. SdUm. 18. t. 2. (1862) = Canna, Lino. (Scitam.).
iridifiora, Horan. 1. c.=C. iridiflora.

ACHLABNA. Griseb. Cat. PL Cub. 228 (1866). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1117.
piptostachya, *Griseb. I. c.* 229.—Cuba.

ACHI.TS, DC. Syst ii. 35 (1821). *BERBERIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 45.
japoniea, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xii, (1868) 61.—Japon.
triphytla, *DC. Syst.* ii. 35.—Am. bor.

ACHNATHERUM, Beauv. Agrost 19. t. 6. C 7 (1812) = Btipa, Linn. (Gramin.).
argenteum, Beauv. 1. c. 146=S. Calamagrostis.
bromoides, Beauv. L c. 146. 20=S. Aristella.
Calamagrostis, Beauv. 1. c 146=S. Calamagrostis.
capense, Beauv. 1. a 146 = Danthonia papillosa.
conspicuum, Beauv. L c. 146. 20 = Arundo conspicua.
Hallerii, Beauv. 1. c 146=S. Calamagrostis.
laneeolatum, Beauv. 1. c. 146. 20=Calamagrostis lanceolate.
miliaceum, Beauv. 1. c 146. 20(=Urachne parviflora).
soboliferum, Beauv. L c 146.20 = Muehlenbergia sobolifera.
spedosum, Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. Itel. v. (1873) 317, nomen.—Europ.
tenuifolium, Beauv. Agrost. 146. 20 = Agrostis canina.

ACHNEKIA, Beauv. Agrost. 72 (1812)=Sriachns, R. Br. (Gramin.).
brevifolia, Beauv. 1. c 78.146 = E. mucronate.
eapillaris, Beauv. 1. c. 73. 146 = E. capillaris.
mucronata, Beauv. 1. c 70. 146 =E. mucronate.
obtusa, Beauv. 1. c 73.146-E. obtusa.

ACHIHBBIA, Mnnro, in Harv. Gen. PI. Cap. ed. II. 449 (18 8).
GRAMINEAE, Benth. *tc* Hook. f. iiL 1158.

ACHNODON, Link, Hort. Betol. i. 66 (1827)-Phleum, Linn. (Gnmin.).
arenarius, Link, 1. c. -P arenarium.
Bellardi, Link, 1. c.=P. tenne. *

ACHNODONTON, Beauv. Agrost. 24. t 7. f. 6. (1812)-Phleum, Linn. (Gramin.).
arenarium, Trin. Gr. Unifl. 166-P. aienarium.
Bellardi, Beauv. Agrost. 25=P. tenue.
tenuis, Beauv. I. c—P. tenue.

ACHNOPHORA, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Anstral. *vi.* (1883) 32. *COMPOSITAE.*
Tatei, *F. Muell. 1. c.* 88.—Austral.

ACHRAS, Linn. Gen. ed. L 865 (1737). *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 657.
SAPOTA, *Gaertn. Fruct.* ii. 103 t 104 (1791).
arnhemica, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, iv. 280 -Sideroxylon amhemicum.
australis, R. Br. Prod. 630=S. anstrale.
Batata, Aubl. PI. Gui. i. 308-Mimusops Kauki.
brasiliensis, Willd. ex Steuc* Norn. ed. II. i. 16 = Chrysophyllum brasiliense.
Brownlessiana, F. Muell. Fragm. vñ. Ill-Sideroxylon Brownlessianum.
Cainito, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 18=Lucuma Cainito.
chartaeea, F. Muell. ex Benth. FL Austral, iv. 281 = Sideroxylon chartaceum.
costata, Endl. Prod. Fl. Ins. Norf. 49=S. co«Utnm.
eotini/olia, F. Muell. in Nuov. Giom. Bot iii. (1871) Sl = Hormogyne cotinifolia.
cuuei/olia, Poir. Encyc. vi. 534 -Sideroxylon obovatnm 1
dissecta, linn. f. SuppL 210; Font f. Plant Esc. 48 = Mimusops Kauki.
elengioides, Bedd. Fl. Sylv. t 236 -Sideroxylon tomentosum.
euphlebia, F. Mnell. Fragm. vii. 110-S. euphlebium.
ferruginea, Casar. Stirp. Bras. Dec. vii. 63-A. Sapota.
glaucescens, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 15-Lucnma Rivicoa.
Guapeda, Caaar. Stirp. Bras. Dec. vii. 61=L. laurifolia.
Homeana, V. Muell. Fragm. ix. 72-Sideroxylon Howeanum.
laurifolia, Casar. Stirp. Bras. Dec. vii. 62-Lucuma Casaretti.
laurifolia, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, iv. 282 = Sideroxylon Richardi.
Lucuma, Blanco, Fl. Filip. ed. L 237=Lncuma inaniniosa.
Lucuma, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 17=L. obovata.
mammosa, Bonpl. ex. Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 64 '=L. BonplandiL
mammosa, Linn. Sp. PI. ed. II. 469 - L. mammosa.
mammosa, Sieber, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 204= Mimusops Kauki.
mammosa, Tuss. Fl. Antill. iii. t 6 = Bassia Jusdaeu
montana, Poir. Encyc vi. 588 = Dipholis montana.
myrsinoides, A. Cunn. ex Benth. FL Austral, iv. 288 =Sideroxylon myrsinoides.
nigra, Poir. Encyc. vi. 582 = Dipholis nigra.
obovata, ¥. Muell. ex Benth. Fl. Austral. W. 283-Sideroxylon Brownii.
octodecemfida, Stokes. Bot Mat Med. iL 294-Mimusops Kauki.
pallida, Poir. Encyc. vi. 538-Sideroxylon pallidum.
pentagona, Poir. 1. c. 583=S. pentagonum.
Pohlmaniana, F. Muell. Fragm. v. 184=Sideroxylon Pohlemannm.
retusa, Deninst Schlness. Hort Malah. 30=Aglaia edulU.
retusa, Poir. Encyc. vi. 688 = Bnmelia retusa.
rotundifolia, Poir. 1. c. 584 = B. rotundifolia.
salieifolia, Linn. Sp. PI. ed. 11 = Dipholis salicifolia.
Sapota, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 470.—Am. austr.
sericea, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI.* 176.—Afr. trop.
serrata, Poir. Encyc. Soppl. v. 86=Pnuras caroliniana.
sessiliflora, Poir. Encyc. vi. 581.—Ins. Borb.
tomtntosa, Bedd. Forest Man. Bot. 142-Sideroxylon tomentosum.
(nun, Mart. Herb. Fl. Bras. 180-Locumavenosa.
verrucosa,Stok<s, Bot. Mat. Med. ii. 294 = A. Sapota (»),
mtMina,Tva. Fl. AntilL iv. 19=Lucnma pauciflora.
xerocarpa, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral iv. 281 = Sideroxylon xerocarpnm.
Zapota, Linn. Sp. PI. ed. I. app. 1190-A. Sapota.
Zapotilla, Jaeq. ex Nutt Sylv. Am. iii 90 = A. Sapota.

ACHROANTHES. Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 852-Hicrostylia, Lindl. (Orchid.).
acuminata, Rafin. New Fl. Am. i. 59 - M. monophylla.
dlifolia, Rafin. 1. c - M. monophylla.
laxiflora, Rafin. 1. c. 58 = M. ophioglossoides.
obtusifolia, Rafin. L c.=M. ophioglossoides.
xmifolia, Rafin. in. Med. Repos. New York, v. (1808) 352-M. ophioglossoides.

ACHROCHLOA, Griseb. Spicil. Fl. Rumel.iL 446 (1845) -Airochloa, Link (Gramin.).

ACHROMOLAENA, Cass. in Diet Sc. Nat lvi. 222 (1828)-CaSBinia, K. Br. (Compos.).
viscosa, Cass. 1. c - C. quinquefaria.

ACHROOSTACHYS, Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 134, err. typ.=Athroostaehys, Benth. (Gramin.).

ACHRYSUM, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 228-CalooephalUB, R. Br. (Compos.).
glomeratum, A. Gray, 1. c 229 - C. multiflorus.

ACHTTDEMIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 67. t. 20.' 1852' [1856]. *URTICACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 385.
japonica, *Maxim, in Bull. Acad. Pltersb.* xxiL (1877) 241.—Japon.
javanica, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 67. t 20.—Java.

ACHYMUS, Vahl, ex Juss. in Diet. Sc. Nat L SuppL 31 (1816) = Streblus, Lonr. (Urticac).
pollens, Soland. ex Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 79-S. asper.

ACHYRACHAENA, Schau. Del. Sem. Hort Vratisl. (1837) 3, ex Linnaea, xii. (1838) Litt. 87. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 396.
LEPIDOSTEPHANUS, BartL Ind. Sem. Hort. Goett (1837), ex Linnaea, xii. (1838) Litt 82.
mollis, *Schau. I. c.* 3— Am. bor. occ

ACHTRANTHES, Linn. Gen. ed. I. 34 (1737). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 35.
AMORGINE, Rafin. New Fl. Am. iv. 44 (1836).
CADELARIA, Rafin. Fl Tellur. iii. 39 (183S).
CENTKOSTACHYS, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 497 (1835).
CODIVALIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1836).
ECLOTOKIPA, Rafin. 1. c (1836).
STEIREMIS, Rafin. 1. c. (1836).
abyssinica, *Nees.in Del. Sem. Hort. Vratisl.* (1850) 3. —Abyss,
alba, *Eckl. SfZeyh. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 311. —Afr. austr.
alopecuroides. Lam. Encyc. i. 548—Aerva javanica.
alternifolia, Linn. Mant i. 60 — Digera arvensis.
alternifolia, Linn. f. Suppl. 159-Cyathula globosa.
alternifolia, Russ. ex Wall. Cat n. 6887-Digera arvensis.
altissima, Jacq. Enum. PL Carib. 17-Chamissoa altissima.
amaranthoides, Lam. Encyc. i 548 = Digera arvensis.
angustifolia, *Benth. in Hook. Nig. Fl.* 492.—Afr. trop.
aquatica, *R. Br. Prod.* 417.—Ind. or.; Afr. trop.
arborescens, *S. Br. 1. c.*—Ins. Norfolk.
argentea, Lam. Encyc. i. 545 = aspera.
aspera, Jacq. f. Eel. 109. t. 74 -crispa.
aspera, Linn. Sp. PL 204.—Geront. trop.
aspera, WalL Cat. n. 6924 H=bidentata.
atra, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 372= Telanthera elongata.
atropurpurea, Lam. Encyc. i. 646 - Pupalia atropurpurea.
australis, *R. Br. Prod.* 417—Austral,
avicularis, *E. Mey. ex Moq. in DC. Prod.* xiiL II. 311,— Afr. austr.
axillaris, Willd. Enum. Hort Berol. 270-Alternanthera spinosa.
baccata, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 250= Chamissoa altissima.
bengalensis, *Lam. Encye.* i. 459 (Sp. dub.).—Ind. or.
bidentata, *Blume, Bijdr.* 545.—As. trap,
borbonica, *Willd. ex Roem. et Sehult. Syst.* v. 549.— Ins-Borbon.
brachiata. Linn. Mant 50-Nothosaerua brachiata.
brasiliana, Thouin, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 360,, 318-Alteraanthera procumbens.

ACHYRANTHES :—
calceolata, Russ. ex Wall. Cat n. 6927=Psilotrichum calceolatum.
Calea, *Ibantt, in La Natural,* iii. (1879) 79. t 3.— Am. centr.
canescens, *R. Br. Prod.* i. 417.—Austral,
capitata, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* 48.—Arab.
capitata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 310=involncrata.
capituliflora, *Bert, in Colla, Hort. Ripul.* 4. t. 18.—N. Granat.
carnosa, WalL Cat n. 6931=Psilotrichum trichotomum.
ciliata, Lam. Encyc. i. 549=Digera arvensis.
conferla Ruiz, ex Seub. in Mart FL Bras. v. I. 223 = Guilleminea densa.
cordata, Hochst in Flora, xxvii (1844) Beil. 6=Psilostachys gnaphalobrya,
corymbosa, Heyne, ex WalL Cat. n. 6918-Celosia polygonoides.
corymbosa, Linn. Sp. PL 205=Polycarpaea corymbosa.
crispa, *Desf. ex Poir. Encyc. Suppl.* ii. 10.—Am. austr.
cylindriea, Boj. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 828 = Cyathula cylindriea.
debilis, Poir. Encyc Suppl. ii. 10=Cyathula prostrata.
decumbens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 47=Celosia polygonoides.
diandra, *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 504.—Zeylan.
dichotoma, *Linn. Mant.* 51.—Am. bor.
diffusa, Moench, Meth. 315-Cyathula prostrata?
Digera, Poir. Encyc. Suppl. i. 2. 11 = Digera arvensis.
dioica, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. H. 350=Alternanthera flavescens.
echinata, Retz. Obs. Fasc. ii. 12-Pupalia lappacea.
ellipticifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 479 = aspera.
exceha, Thou, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 315 = aspera.
fasciculata, *Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 179.—Afr. trop.
ferruginea, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 502=Psilo-
ficoidea, Lam. Encyc. i. 548 - Telanthera ficoidea.
filifolia, *Willd. ex Roem. et Sehult. Syst.* v. 549.— Venezuela.
frumentacea, *Burnt, f: Fl. Cap. Prod.* 7.—Afr. austr.
frutescens, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 16-Digera arvensis.
fruticosa, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 76-aspera.
fraticosa, *Lam. Encyc.* i. 545.—Ind. or.
geminata, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI.* 88.—Afr. trop.
geniculata, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 881-Telanthera capituliflora.
glabella, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 200.—Ins. Sandv.
globosa. Pen. Syn. i. 259-Cyathula globosa.
glauca, Heyne, ex WalL Cat n. 6927 - Psilotrichum cftlceol&ttixn.
globulifera, Boj. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 829-Cyathula globulifera.
grandifolia, *Moq. in DC. Prod,* xiil II. 318.—Java.
halimifolia, Lam. Encyc. i. 517 -Telanthera frutescens.
Heudelotii, Moq. in DC. Prod. xiii. H. 310~Pandiaka Heudelotii.
hirtiflora, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 175.—Cuba.
hispida. Moq. in DC. Prod. xiii. II. 312 - bidentata.
incana, *Fisch. ex Sehrank, in Denkschr. Bot. Get. Regensb.* ii. (1822) 36.—Bras.
incana, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 865 - Telanthera frutescens.
incana, Roxb. Fl. Ind. i. 671; ed. Carey, ii. 495=Aerva javanica.
indica. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-aspera.
involucrata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 310=Pandiaka involucrata.
javanica, *Moq. I. c.* 312.—Java.
javanica, Pers. Syn. i. 259—Aerva javanica.
lanata, Linn. Sp. PL 204-Aerva Unata.
lanceolata, Klein, in Wall. Cat. n. 6929-bidentata.
lanceolata, Zoll. & Mor. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 312-javanica.
lappacea, Linn. Sp. PL 204 = Pupalia atropurpurea.
lappacea, Willd. Sp. PL i. 1192 = Pupalia lappacea.
leptostachya, E. Mey. in Hook. Lond. Journ. Hot. ii. (1843) 548 (err. typ. 448)-alba,
linarifolia, *Sw. in Vet. Akad. Handl. SU;kh.* (1825) 48. —Ins. Molucc.
Linkiana, Roem. & Sehult Syst v. 545-Chamissoa macrocarpa.

ACHYBAKTHUS:—
lujnilina, Willd. ex Stead. Norn. ed. II. i. 16=Telanthera lupulina.
mauritiana, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 813.—Ins. Maurit
mollis, Lepr. ex Senb. in Mart. Fl. Bras. v. I. 230 = Cyathnla prostrata.
mollis, *Schum. & Tkonn. Beskr. Guin. PI.* 187.—Afr. trop.
Monsoniae, Pen. Syn. 1.-258-Aerva Monsoniae.
montana, Klein, ex Wall. Cat. n. 6926=Psilotrichum nndnm.
MoorcrofHana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. 8. lapsn, pro Axyridi = Euotia ceratoides.
mucronata. Herb, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 248 = Allmania albida.
mucronata, Lam. Encyc L 647=Alternanthera Achyrantha.
murieata. Linn. Sp. PI. ed. IL 295=Digera arvensis.
mutico, *A. Cray, ex H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 200.—Ins. Hawaii.
natans, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6932—aquatics,
nervosa, *Roth, Nov. PI. Sp.* 170.—Ind. or.
nivea, *Ait. Hart. Km.* i. 286.—Ins. Canar.
nivea, Link, in Buch, Beschreib. Canar. I11 = Altemanthera Achyrantha.
nodiflora, Roxb. Fl. Ind. i. 678=Allmania nodiflora.
nodosa, Bert, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 352 = Altemanthera argentata.—Am. trop.
nodosa, *Vahl, in Schum. & Tkonn. Beskr. Guin. PI.* 139.—Air. trap.
***Novae-Brasiliae, S/tmd.* Nom. ed. II. i. 15=seq.**
novae^rasilianae, Thouin, ex Roem. & Scbult. Syst v. 564 = Altemanthera procumbens.
nuda. Heyne, ex Wall, in Roxb. FL Ind. ed. Carey, ii. 507 = Psilotrichom nadnm.
obovata, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 359 = Altemanthera Achyrantha.
obovatifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 480«aspera.
obtusifolia. Lam. Encyc. i. 545 = aspera.
orbiculata, Heyne, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 507 = Pupalia lappacea.
ovata, *Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 185.— Afr. trop.
paludosa, Bnnb. in Proc. linn. Soc i. (1811) 109 = Telanthera philoxeroides.
paniculata, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 48=Celosia **Cftidftta.**
papposa, Forsk. 1. c 48=£urotia ceratoides.
patula, linn. *i.* Suppl. 160 = Pupalia Uppacea.
persica, Steud. Nom. ed. L 8 = Aerva javanica.
picta, *Passer, in Bot. Zeit.* (1864) 31.—Bras.
pilosa. Par. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 352=AIternanthera argentata.
piloselloides, Poit ex Moq. 1. c 837 = Gossypianthns lanuginosus.
polygonata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 6914-Banalia thyrsi flora.
polygonoides, Heyne, ex Wall. I. c. n. 6926=Psilotrichnm nndnm.
polygonoides, Lam. Encyc. i. 547=Telanthera polygonoides.
polygonoides, Retz. Obs. Fasc. ii. 12=Digera arvensis.
polygonoides, R. Br. Prod. 416=Telanthera polygonoides.
polystachya, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 48.—Arab.
porphyristachya, Wall. Cat. n. 6925 = aspera.
porrigens, Jacq. Hort Schoenb. iii. 54 = Telanthera porrigens.
prostrata, Linn. Sp. PI. ed. II. 296=Cyathula prostrata.
prostrata, Willd. Sp. PI. i. 1194=Cyathnla globosa.
pubescens, Roth, Nov. PI. Sp. 171 = Aerva Monsonia.
pungens, Lam. Encyc i. 546 = Aerva Monsonia.
purpurea, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 877 = Telanthera porrigens.
radieans, Cav. in Anal. Hist. Nat. Madr. iii. (1801) 27 = Altemanthera Achyrantha.
radieans, Heyne, in Roth, Nov. PI. Sp. 170=Aerva radieans.
repens, Ell. Sketch, i. 809 -Telanthera polygonoides.
repens, Heyne, in Roth, Nov. PI. Sp. 167=Cyathula prostrata.
repens, Linn. Sp. PI. 205 = Altemanthera Achyrantha.
rivinaefolia, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. HI. (1829) 390, 76.-Hab.1'
rosea, Spreng. Syst. iv. Cnr. Post 103 = Polycarpaea violacea.

ACHTRANTHES:—
rotundifolia, Klein, ex Wall. Cat. n. 6986=Pupalia orbiculata.
rubrofusea, Wight, Ic v. t. 1778—aspera.
sanguinolenta, *Linn. Sp. PI.* ed. IL 294.—Ind. or.
sarmentosa, Link, ex Seub. in Mart Fl. Bras. v. I. 241 =Chamissoa macrocarpa.
sarmentosa, *Vahl, Syntb. Bot.* ii. 44.—Ind. or.
scandens. Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xv. (1877) 189 =Sdlbanthus scandens.
scandens, Heyne, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 848 = Iresine amarantoides.
scandens, Roxb. FL Ind. i. 676.; ed. Wall. ii. 503 = Aerva scandens.
scandens, Thonn. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 831 = Pnpalia atropnrpurea.
sequax, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 506 = Cyathnla tomentosa.
sericea, *Heyne, ex Wall. Cat.* n. 6890.—Ind. or.
sericea, Koen. in Roxb. Fl. Ind. iii. 675; ed. Carey, il. 502 =Psilo9tachys sericea.
serpylli/olia, Poir. Encyc. Snppl. ii. ll=Telanthera serpyllifolia.
sessilis, Steud. Nom.ed. II. i. 16 = Alternanthera sessilis.
setacea, Roth, Nov. PI. Sp. 168 = Aerva Monsonia.
sicula, Roth, Catalect. Bot. i. 39=aspera.
spinosa, *Desv. Hort. Divion.* (1834-36).—Hab. I
spinosa, Hornem. Hort. Hafn. i. 240=Altemanthera spinosa.
splendeos, *Mart, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 316.— Ins. Sandv.
stellata, Willd. Sp. PI. i. 1195 = Polycarpaea stellata.
styracifolia, Lam. Encyc. i. 546 = Pupalia lappacea.
tenella, Poit. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 341=Iresine serpyllifolia.
tenuifolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 16=aspera?
tenuifolia, Willd. Sp. PL i 1196=Polycarpaea tenuifolia.
ternata, Host, ex Fisch. Mey. & Lall. Ind. Sem. Hoit. Petrop. ix. SuppL 12 = Gomphrena decumbens.
Thonningii, *Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI.* 137.—Afr. trap.
thyrsifiora, Heyne, ex WalL Cat. n. 6914 = Banalia thyrsiflora.
tomentella, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 845. —Malaya.
tomentosa, Roth, Nov. PL Sp. 167 = Cyathula tomentosa.
triandra, Roxb. Fl. Ind. i. 678=Altemanthera sessilis.
trichotoma, Perr. ex Moq. in DC. Prod. xiiL II. 322-aquatica.
uncinata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 551 -Cyathula achyranthoides.
nncinulata, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Goett.* (1883) 1.— Afr. austr.
velutina, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 68.—Ins. Societ.
Verreauxii, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 811=alba.
Verschaffeltii, Lem. Illustr. Hortic. (1846) t 409-Iresine Herbstii.
verticillata, *Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter,* i. (J803) 26.—Afr. austr.
villosa, Blanco, FL Filip. ed. I. 189=Altemanthera nodiflora.
villosa, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 48 = Aerva lanata.
violacea, Spreng. Syst iv. Cur. Post 102-Polycarpaea violacea.
virgata, *[Desfi] Poir. Encyc Suppl.* ii. 10.—Portorico.
virgata, Hort ex Stead. Nom. ed. II. i. 16=Celosia virgata.
virgata, Klein, ex Wall. Cat. n. 6915-Banalia thyrsiflora.
Wightiana, WalL Cat n. 6928-bidentata.

ACHYRASTRUM, Neck. Elem. i. 67 (1790)-Hyoserls, Linn. (Compos.).

ACHYROBACCHARIS, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 952 (1843) - **Baocharia,** Linn. (Compos.).

ACHYKOCIiINE, Less. Syn. Comp. 332 (1832). *COMPOSITAE.* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 305.
adoensis, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 428. —Abyss.
alata, *DC. Prod.* vi. 221.—Ecuad.
albicans, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 187 = satureioides.
argentine, *0. Hoffm. in Linnaea,* xliii. (1880-82) 135. —Reg. Argenu

ACHTBOCLLNE:—
batocana, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 839.— Afr. trop.
bogotensis, *DC. Prod.* vi. 221.—N. Granat
candicans, DC. I. c=satureioides.
capitata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 117 —Bras,
celosioides, *DC. Prod.* vi. 221.—Peruv.
citrina, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 187-satureioides.
coquimbeDse, *Klatt, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 112. —Chile,
disjuncta, *Hemsl. Bot. Voy. Challenger,* L II. 128.— Ins. Trinit.
flaedda, *DC. Prod.* vi. 220.—Bras.
flavescens,Gmeb.ia Goett. Abh. xix. (1874) 181=alata.
glumacea, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 840.—Afr. trop.
hirta, *Klatt, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 113.—N. Granat.
Hochstetteri, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 428.—Abyss.
latifolia, *Wedd. Chlor. And.* i. 148.—Boliv.
leptocephala, *DC. Prod.* vi. 220.—Madag.
luzuloides, *Vatke, in Li.inaea.xxiix.* (1875) 489; *et in* *Oestr. Bot. Ziitschr.* (1875) 826.—Afr. trop.
madioides, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1848) 275.—Peruy.
mathiolaefolia, DC. Prod. vi. 221-satureioides.
mollis, Benth. PL Hartw. 207= satureioides.
Moritziana, *Klatt, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 112.— N. Granat.
pterocaula, DC. Prod. vi. 221=alata.
rufescens, *DC. 1. c.* 220.—N. Granat.
rugosa, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 419 =Stenocline chionaea.
satureioides, *DC. Prod.* vi. 220.—Am. merid.
satureioides, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 424 =Stenocline Gardneri.
Schimperi, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 42S.—Abyss,
sclerochlaena, *Sch. Bip. ex Oliver & Hiern, in Oliver,* *Fl. Trop. Afr.* iii. 841.—Afr. trop.
Steetwii, Vatke, in Oestr. Bot Zeitschr. xxvii. (1877) 194-batocana.
tamariscina, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1821-22) 170=Stoebe fusca.
Trianae, *Klatt, in Linnaea,* xiii. (1878-79) **118.—**N. Granat.
Vargasiana, DC. Prod. vi. 220=satureioides.
Vautheriana, DC. L c= alata.
ventosa, *Klatt, in Linnaea,* xliL (1878-79) 112.— Mexico.

ACHYROCOMA, Cass. in Dict.Sc. Nat. v. 57 (1828) **-Vernonia,** Schreb. (Compos.).
tomentosa, Cass. 1. c. xxvi. 21 = V. Achyrocoma.

ACHYROCOME, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. fl«21-22) 147 & 170 - Elytropappus, Sch. Bip. (Compos.).
ambigua, Schrank, 1. c = E. ambiguus.

ACHVRONIA, Royen, ex Linn. Gen. ed. II. 846 (1742) **=Aspalathus,** Linn. (Legnmin.).

ACHYRONIA, Wendl. Obs. Bot. 89. t. 12. (1798) = Prieatleya, DC. (Legum.).
arborea, Spreng. Syst. iii. 285, iv. Cur Post. 271,287 = Carmichaelia australis.
villosa, Wendl. Obs. Bot. 89-P. Thunbergii?

ACH7BON7CHIA, Torr. *Sc* Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 830. *ILLECEBRA CEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 15.
Cooperi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 881. —N. Mexico; Calif.
Palmeri, Hook. f. in Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 16 = Parryi.
Parryi, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 36.—Mexico.

ACHYROPAPPUS, Bieb. ex Fisch. in DC. Prod. vi. 663 (1838) - Trieholepis, DC (Compos.).

ACHYROPAPPUS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 257. t. 390 (1820) = **Schkuhria,** Roth (Compos.).
antkemoides, H. B. *8c* K. 1. c. = Bahia anthemoides.
maritimus, Poepp. ex DC. Prod. v. 657 = Bahia ambrosioides.

ACHYROPAPPUS :—
pedatus. Less. Syn. Comp. 289 = Florestina pedata.
schkuhrioides, *D. Don, ex Hook. &• Arn. in Hook. Land. Journ. Bot.* iii. (1840) 822.—Hab. ?
schkuhrioides, Link ft Otto, Abb. Neuer Gew*. Gart Beit t. 80=Schkuhria senecioides.
Woodhousei, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi (1864-5) 648 = Bahia Woodbousei.

ACHYROPHORUS, Adans. Fam. it 112 (1763) - HypochoeiiB, Linn. (Compos.).
acaulis, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 448.—Chili,
albiflonis, *Sch. Bip. inPollichia,* xvi-xvii. (1869) 52.—N. Granat
alpicolus, Schnr, Enum. PI. Transs. 865 = H. maculata.
ambiguus, DC. Prod. vii. 98 = H. cretensis. *
andinus, DC. 1. c. 92 = H. andina.
angustissimus, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 127.—Chili.
apargioides, DC. Prod. vii. 94 = H. apargioides.
araucanus, Phil, in Linnaea, xxviii. (1866) 721.—Chili.
arenarius, DC. Prod. vii. 95 = H. arenaria.
aurantiacus, DC. 1. c. 93=H. grandiflora.
Balbisii, Hornem. Hort Ham,Suppl. 91 = H. Balbisii.
barbatus, Sch. Bip. in Pollichia, xvi-#vii. (1869) 48.—N. Granat.
Bipontinae, Sch. Bip. 1. c. 54 = H. Gardneri.
Boissierianus, Walp. Ann. ii. 956.—CreU.
brasiliensis, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cm. xxi. I. (1845) 106 = H. brasiliensis.
hrasiliensis, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 128 - H. Gardneri.
brevicaulis, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 127.—Chili.
chilensis, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat Cur. xxi. I. (1845) 104.—Chili.
chondrilloides, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1845) 145 = H. brasiliensis.
chrysanthus, DC. Prod. vii. 94 = H. chrysantha.
dliatus, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 128 = H. grandiflorus.
clarionoides, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 450.—Chili.
coronopifolius, Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1855) 128.—Reg. Magell.
cryptocephalus, Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr. 57.—Perov.
elatus, Wedd. Chlor. And. i. 223=H. data.
discolor, Godr. in Mém. Acad. Stanislas, Sér. III. [xvii.] 1853(1854), 4O7.-Hab.?
eriolaenus, Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr. 57.—Pernv.
foliosus, Phil. Fl. Atac. 29.—Chili.
Gardneri, Sch. Bip. in Pollichia, xvi-xvii. (1859), 64 = H. Gardneri.
glabrescens, Steud. Nam. ed. II. i. 16 = H. arenaria.
glaucus, Phil. Fl. Atac. 29 = H. andina.
graminifolius, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 338 = tenuifolius.
grandidentatus, Phil. Fl. Atac. 29.—Chili.
grandiflorus, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat Cur. xxi. I- (1845) 113.—Sibiria.
grandiflorus, Ledeb. Fl. Ross. ii. 777-H. grandiflora.
helveticus, Hornem. Hort. Ham. ii. 772 = H. uniflora.
helveticus, Less. Syn. Comp. 130=H. helvetica.
hispidus, Hornem. Hort. Hafn. ii. 772 = H. hispida.
Hohenackeri, Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr. 57.—Peruv.
Humboldtii, Sch. Bip. in PollichU, xvi-xvii. (1859) 62.—N. Granat.
humilis, Phil, in Anales Univ. Chil. (1873) 482.—Chili.
incanus, Sdi. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 100.—Am. austr.
Jussieui, Sch. Bip. 1. c 96.—Chili.
Lechleri, Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr. 54.—Chili.
Lessingii, Sch. Bip. 1. c. 98.—Chili.
maculatus. Scop. Fl. Cam. ed II. ii. 116 = H. maculata.
Meyenianus, Walp. Rep. vi. 336 - H. Meyeniana.
mierocephalus, Sch. Bip. in Pollichia, xvi-xvii. (1859), 69 = H. brasiliensis.
microphyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chili, iii. 449.—Chili.
minimus, Hornem. Hort. Ham: ii. 773 " H. minima.
montanus, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 720.—Chili.
odoratus, Walp. Rep. vi. 836.—Chili.
oxydontus, DC. Prod. vii. 92 = H. cretensis.
palustris, Phil, in Anales Univ. CbiL (1865) ii. 317—Chili.

ACHYROPHORUS :—
petiolaris, DC. Prod. vii. 94-H. petiolaris.
pinnatifidus, DC. 1. c. 98 = H. pinnatifida.
praemorsus, Webb, ex Walp. Rep. vi. 829 = Webbii.
psychrophilus, Wedd. Chlor. And. i. 222.—Chili.
quitensis, Sch. Bip. in Nov. Act Nat. Cur. xxi. I. (1845) 120.—Ecnad.
radicatus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 117 = H. radicata.
ramosus, DC. Prod. vii. 92.—Hab. 1
Robertia.Seh. Bip. in Nov. Act. Nat. Cnr. xxi. I. (1845) 127.—Italia.
roseus, Less, in Linnaea, v. (1880) 133. t. 2. t 5-Pinaropappus roseus.
sagittatus, Phil Sert. Mend. alt. 20.—Chili.
Scorionerae, DC. Prod. vii. 94 = H. Scorzonerae.
Setloi, Sch. Bip. in Pollichia, xvi-xvii. (185S), 60=H. brasiliensis.
serioloides, DC. Prod. vii. 98 = H. cretensis.
sessiliflorus, DC. 1. c. 95 = H. sessiliflora.
setosus, Wedd. Chlor. And. i. 220.—Peruv.
sonchoides, DC. Prod. vii. 95 = H. sonchoidcs.
spathulatus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 447—Chili.
spinuliger, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 721.—Chili.
stenocephala, A. Gray, ex Wedd. Chlor. And. i. 221.—Peruv.
taraxacifolius, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat Cur. xxi. I. (1845) 101 = H. radicata.
taraxacoides, Walp. Rep. vi. 336.—Peruv.
tenerifolius, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 446.—Chili.
tenuifolius, DC. Prod. vii. 94 = H. tenuifolia.
tenuisectus, Sch. Bip. in Pollichia, xvi-xvii. (1859), 67 = H. variegata.
thrincimdes, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 446.—Chili.
trichocephalus, Sch. Bip. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 57 = H. variegata.
unifloms, F. W. Schmidt, Samml. Pby. Aufz. i. (1795) 284 = H. uniflora.
variegatus, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 119 = H. variegata.
Volckmanni, Phil, in Anales Univ. Chil. (1873) 482.—Chili.
Webbii, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 97.— Ins. Falk.

ACHYHOPSIS, Benth. ft Hook. f. Gen. iii. 36 (1880). *AMARANTACEAE,* Benth. ft Hook. f. 1. c.
acicularis, *Benth. & Hook./. I.* c—Afr. austr.
alba, *Benth. & Hook./. I.* c—Afr. austr.
leptostachya, *Benth. & Hook.f. I.* c—Afr. austr.

ACHYROSERIS, Sch. Bip. in NOT. Act Nat. Cur. xxi. I. (1845) 165=8oorzonera, Linn. (Compos.).
macrospermum, Sch. Bip. 1. c = S. macrosperma.

ACHYBOSPEBHTTIC, Blnme, Bijdr. 840 (1826). *LABIATAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 1208.
LAMPROSTACHYS, *Boj. ex Benth. in DC. Prod.* xii. 457 (1848).
SIPHOTORIS, *Boj. ex Benth. I. c.* (1848).
aethiopicum, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 66.—Afr. trop.
densiflorum, *Blume, Bijdr.* 841.—Ins. Malay,
fruticosum, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 643 ft 745.—Madag.
philippinense, Benth. in DC. Prod. xii. 458 - densiflornm.
phlomoides, *Blume, Bijdr.* 841.—Java,
seychellarum, *Baker, Fl. Maurit.* 259.—Ins. Seychelles.
Wallichianum, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 673.—Reg. HimaL

ACHYROSTEPHUS, Kunze, ex Reichb. Coasp. 212[s] (1828). (Compos.).

ACIA, Schreb. Gen. ii. 458 (1791)-Couepla, Anbl. (Rosac).
amara, Willd. Sp. PI. iii. 717=C. guianensis.
dulcis, Willd. 1. c. = C. guianensis.

ACIACHNE, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1362 (1881). *GRAUINEAE,* Benth. ft Hook. C iii. 1143.
pulvinata, *Benth. 1. c.*—N. Granat.

ACIANTHERA, Scheidw. in Otto ft Dietr. Allgem. Gartenz. *x.* (1842) 292.=FleurothaJUs, R. Br. (Orchid.).
punctata, Scheidw. L C.-P. Acianthva.

ACIANTHU8, R. Br. Prod. 321 (1810). *ORCHIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 611.
atepalns, *Reichb. f. in Linnaea,* xii. (1877) 56.—N. Caled.
bifolius, R. Br. Prod. S22=Chiloglottis diphylla.
caudatns, *R. Br. I. c.* 321.—Austral,
elegans, *Reichb. f. in Linnaea,* xii. (1877) 56.—N. Caled.
exsertus, *R. Br. Prod.* 321.—Austral,
fornicatns, *R. Br. I. c.*—Austral.
petiolatus, D. Don, Prod. FL Nep. 29=Iiparis nepalensis.
rivularis, *A. Cunn. in Hook. Comp. Bot.Mag.* ii. (1888) 876.—N. ZeL
Sinclairii, *Hook.f. Fl. N. Zeal.* i. 246.—N. Zel.
viridis, *Hook.f. Fl. Tasm.* ii. 872.—Austral.

ACIALYPTUS, A. Gray, Bot. U. S. Expl. Exped. i. 651. t. 67. (1854). *MYRTACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 708.
Fullagari, *F. Muell. Fragm.* viii. 15.—Ins. D. Howe,
myrtoides, *A. Gray, Bot. U. S. Expl. Exped.* i. 561. t. 67.—Ins. Fiji.
myrtoides. Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 206 = Seemanni.
nitida,£ro»f*. *& Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 186; *et in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. iii. (1865) 227.—N. Caled.
Seemanni, *A. Gray, in Bonplandia,* x. (1862) 85.—Ins. Fiji.

ACICARPA,Raddi,AgrostBraj.31(1828)=Panicum, Linn. (Gramin.).
sacchariflora, Raddi, 1. c. 11. f. 4=P. leucophaeum.

ACICARPA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1818) 132 -seq.

ACICAKPHA, Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 847. t. 58. *CALYCEREAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 162.
ACANTHOSPERMA, Veil. FL Flum. Ic. viii. t 152 (1827).
CRYPTOCARPHA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 34.
ECHINOLEMA, Jacq. f. ex DC. Prod. v. 3 (1836).
SOMMEA, Bory, in. Ann. Gen. Sc Phys. vi. (1820) 92. t 87.
bupleuroides, Less, in Linnaea, vi. (1831) 527 =Boopis bupleuroides.
crassifolia, *Afiers, in Ann. & ifag. Nat. Hist.* Ser. III. vi. (I860) 402.—Bras.
lanata, *Lag. ex Pers. Syn.* ii. 488.—Mexico,
pinnatifida, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vi. (1860) 404.—Bras,
procumbens, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 627.—Bras.
runcinata, *Miers, in Ann. 6/ Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vi. (1860) 404.—Bras,
spathulata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 129.—Bras.
tribuloides, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ii. (1803) 348. t. 58.—Reg. Argent

ACICARPHAEA, Walp. Ann. ii. 877 (1852) = Chaenactifl, DC. (Compos.).
artemisiaefolia, Walp. L c = C. artemisiaefoUa.

ACICLINIUM, Ton. ft Gray, Fl. N. Am. ii. 231 in adnot (1841) = Bigelowia,DC. (Compos.).

ACIDANDRA, Mart, ex Sprang. Gen. i. 388 (1830)-Zollernla, Mart. (Legumin.).

ACIDANTHEKA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 25. *IRIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 706.
SPHAEROSPORA, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 725.
HOUTTUYNIA, Houtt. Handl. Plantenk. xii. 448. t 86 (1780).
aequinoctialis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 160.—Afr. trop.
bicolor, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) 25.—Abyss,
brachystachys, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 338.—Afr. trop.
brevicollis, *Baker, 1. c.* 389.—Afr. trop.
exsthpa. Baker, ex Bouchéft Wittm. in £?rl. Monatschr. Bef. Gartenb. xix. (1876) 16 = tnbulosa.
flexuosa, *Baker, ex Bouchi &> Wittm. I. c*—Afr.

ACTDANTHEBA:—
graminifolia, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 388.—Afr. trop.
Huttoni, *Baker, 1. c.* 839.—Afr. trap,
platypetala. *Baker, I. c*—Afr. »ustr.
tnbntosa, *Baker, in Journ, Linn. SOC.TA.* (1877) 160.—Afr. trop.
nnicolor, *Hochst. ex Baker, I.* c—Abyss.

ACIDOCBOTON, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 42 (1864). *EUPHORBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 291.
adelioides, *Griseb. I. c.*—Ind. occ

ACIDOTON", Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 83 (1788). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 328.
innocuus, *Baill. Etud. Gin. Euphorb.* 402.1.18.110-11.—Ind. occ.
nrens, *Sw. Prod. Veg. Ini. Occ.* 83.—Jamaica.

ACILEPIS, D. Don, Prod. FL Nep. 169 (1825) = Vernonia, Schreb. (Compos.).
cirsiifolia, Spreng. Syst. iii. 887=Pacourina cirsiifolia.
lanaia, Spreng. ex DC. Prod. vii. 86=Dicoma tomentosa.
squarnsa, D. Don, Prod. FL Nep. 169=V. teres.

ACINAX, Rafin. FL TeUnr. W. 53 (1886)=Costus, Linn. (Sdtam.).

ACINETA, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 67. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 551.
NEIPPERGIA, Morr. in Ann. Soc. Agr. Gand, v. (1849) 375. t 282.
Barkeri, *Lindl. in Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 68.—Mexico,
chrysantha, *Lindl. &• Paxt. Flow. Gard.* i. (1850-51) 81.—Am. centr.
cryptodonta, *Reichb.f. inBonplandia,* ii. (1854) 92.—Am. centr.
densa, *Lindl. &> Paxt. Flow. Gard.* L 91 (1850-51).—Am. centr.
erythroxantha, *Reichb.f. in Bonplandia,* ii (1854) 92.—Hab. \
fulva, KlotiKh, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. (1852) 146 = Humboldtii.
glauca. Linden, ex Lindl. & Paxt Flow. Gard. L (1850-61) 123=CycnochesPescatoreL
Hrnbyana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* N. S. xviiL (1882) II. 102.—N. Granat
Humboldtii, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 68.—Am. cenlr.
longiicapa, Reichb. f. in Bot Zeit x. (1852) 706 = Lacaena bicolor.
Schilleriana, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 609.—Hab.?
Sella-turcica, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 705.—Am. centr.
tnlcata, *Reichb. f. in Gard. Chron.* N. S. XL (1879) I. 652.—Ecuador?
tuperba, Reichb. in Walp. Ann. vi. 609-HomboldtiL
Warscevicni, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 145=densa.

ACINODENDRUM, Linn. Gen. ed. I. 129 (1737) = Melastoma, Bnrm.!
aurea, Rafin. Sylva Tellur. 94.—Hab.?
cymosa, Rafin. 1. c = Amphiblema cymosum!
laxiflora, Rafin. 1. c—Hab.!

ACINOLIS, Rafin. Sylva Tellur. 95 (1838)=Mela-Btoma, Burm.
elliptica, Rafin. 1. c.=M. ellipticnm?

ACINOS, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 233 (1745); Moench, Meth. 407 (1794) = Calamintha, Lam. (Labiat).
acuminatus, Frivald. in Flora, xviil (1836) 332=C. suaveolens.
acutifolius, Schnr, Ennm. PL Trams. 530 = C. alpina.
adscendens, Moench, Meth. Suppl. 138=C. patavina.
aestivalis, Kit in Iinnaea, xxxii. (1863) 432.—Europ.
alpinus, Moench, Meth. 407 »C. alpina.
canus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 827 = C. graveolens.
elinopodiifane, Gilib. Fl. Litoan. L 75=C. Acinos.
ctrsicus, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. IIL 768.—Corsica.
dijfwsm, Boenningh. Prod. FL MonaM. 182.—Europ.

ACINOS:-
erectus, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 333 - C. graveolens.
exigutu,. G. Don, ex Stead. Norn. ed. IL i. 17 ' C. graveolens.
grandiflorus, G. Don, ex Load. Hort Brit 239 = C. grandiflora.
graveolens, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 117=C. graveolens.
Herba-barona, G. Don, in Load. Hort. Brit 289 = Thymns Herba-Barona.
heterophyllus, G. Don, 1. c = C. suaveolens.
incanus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 128=C. maritima.
multiftorus, C. Koch, ex Boiss. FL Orient IT. 579 - C. umbroM.
patavinus, Pers. Syn. ii. 131. (err. typ. 151) - C. alpina.
purpurascens, Pert. 1. c.«C. graveolens.
rotundi/olius, Frivald. ex Walp. Rep. iii. 780-C. alpina.
rotundifolius, Pen. Syn. ii. 181. (err. typ. 151)-C. Nepeta.
suaveolens, G. Don, ex Loud. Hort. Brit 289 - C. snaveolens.
thymoides, Moench, Meth. 407=C. Acinos.
transsilvanica, Schnr, Ennm. PL Transs. 529=C. Nepeta.
villosus, Pen. Syn. ii. 181. (en. typ. 151) = C. Acinos.
vulgaris, Pers. 1. c = C. Acinos.

ACINOTUM, Reichb. Handb.260 (1887)=Mathlolfl, R. Br. (Crncif.).

ACIOA, AnbL PI. Gni. ii. 698. t. 280 (1775)-Couepia, Anbl. (Rosac).
amara, Stead. Norn. ed. I. 9 = C. gaianensis.
Bellayana, BailL Adansonia, vii. (1866-67) 224-Griffonia Bellayana.
dulcis, Stend. Norn ed. L 9«=C. gaianensis.
guianensis, Anbl. PL Gui. ii. 698=C. guianensis.
Icondere, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 223 = Griffonla Icondere.
pallescens, Baill. 1. c. 224=Griffonia pallescens.
Smeathmanni, BailL Lex. (1872) 244.—Afr. trop.

ACIOTIB, D. Don, in Mem. Wen. Soc. iv. (1828) 300. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. L 744.
SPENNERA, Mart, in DC. Prod. iii. 115 (1828).
acuminifolia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 51.—Am. trop.
acuminifolia, Triana, 1. c. -sphaerabthera, etc.
acntiflora, *Triana, 1. c.* 52. pro parte.—Am. trop.
acutiflora, Triana, 1. c pro parte=laxa.
aeqoatorialis, *Cogn. in Mart. ft. Bras.* xiv. ni. 464.—Bras.
amazonica, *Cogn. 1. c.* 46L—Bras,
annna, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 52.—Am. mend,
aquatica, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 174.—Guiana,
brachybotria, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviiL (1871) 51.—Bras.
canlialata, *Triana, 1. c.* 52.—Percy,
circaeifolia, *Triana, I c*—Bras.; Guiana,
dichotoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 460.—Guiana,
discolor, *D. Don, in Mem. Went. Soc.* iv. (1823) 301.—Ins. St. Vincent
dysophylla, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviiL (1871) 62.—Bras.; Peruv.
ferruginea, Triana, L c 51=brachybotria.
fragilis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 475.—Guiana.
herbacea, *Cogn. 1. c.* 468.-Bras.
indecora, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 52.—Bras.; Guiana
latifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 464.—Bras.
laxa, *Cogn. I. c.* 476.—Bras.
Levyana, *Cogn. I. c.* 460.—Nicarag.
longifolia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 52.—Bras.
Martians, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 463.—Bras,
palndosa, *Trianr, in Trans. Linn. Soc.* xxviiL (1871) 61.-Bras.

ACIOTISi-
pendulifolia,7h'ana, *in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 62.—Guiana.
polys.achya, *Triana, I. e.* 52.—Bras,
purpurascens, *Triana, I. c.* 52. t. 3. f. 36.—Am. trop.
rostellata, *Triana, 1. c.* 51.—Mexico,
rnbricaulis, *Triana, I. c.* 62. t 8. f. 86 b.—Bras.
Sieberi, Triana, 1. c 52«Nepsera aquatica.
sileniflora, *Triana, 1. c.* 52.—Bras,
sphaerantbera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 458.—Peruv.
oliginosa, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 61.-Venezuela.
viscosa, *Triana, I. c.* 52.—Am. trop.

ACIPETALUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) L 577=Cambeaaedesia, DC. (Melast.).
lineatum, Turcz. 1. c. 578=Pyramia pityrophylla.
rugosum, Torcz. 1. c. =C. rugosa,

ACIPHYLIiA, Forst. Char. Gen. 135. t. 68 (1776).—*UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 912.
ANISOTOME, Hook. f..Fl. Antarct i. 16.18,9 (1845).
CALOSCIADIWI, Endl. Gen. Suppl. iv. in. 7 (1850).
GINGIDIUM, F. Muell. in Trans. Phil. Inst Viet L (1855) 103.
Colensoi, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 92.—N. Zel.
crenulata, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 336.—N. Zel.
Dobsoni, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 98.—N. Zel.
glacialis, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 378.—Anstral.
Hectori, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* xiv. (1882) 346.—N. ZeL
Lyallii, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 92.—N. ZeL
Monroi, *Hook.f. Fl. N. Zel.* ii. 380.—N. Zel.
montana, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* iv. (1872) 290.—N. Zel.
procumbens, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 375.—Austral
simpliciiolia, *F. Muell. ex Benth. I. c*—Austral,
squarrosa, *Forst. Char. Gen.* 136.—N. ZeL
Traillii, *T. Kirk.in Trans. N.Z. Inst.* xvi. (1884) 871.—N.ZeL
Travenii, *F. Muell. ex J. Buch, 1. c.* vii. (1875) 835.—N.ZeL

ACIPHYLLAEA, A. Gray, in Mem. Am. Ac. N. S. iv. (1849) (PL Fendl.) 91 = Hymenatherum, Cass. (Compos.).
acerosa, A. Gray, L c > H. acerosum.

ACIPHYLLUM, Stend. Norn. ed. IL L 17 (1840) = Chorizema, LabilL (Legum.).

ACIS, Salisb. Parad. Lond. sub t. 74 (1807)=Leucctjum, Linn. (Amaryll.).
autumnalis, Salisb. 1. c.=L aotnmnale.
Broteri, Jord. & Fourr. Ic PL Europ. 25=L. tricbophyllum.
grandiflora. Sweet, Brit FL Card. iii. sub t 297 = L trichophyllum.
hiemalis, M. Roem. Syn. Ensat 24 = L hyemale.
hyemalis. Sweet, Brit Fl. Gard. iii. sub t. 297 =praec
longifolia, M. Roem. Syn. Ensat. 25 = L. lougifolium.
rosea. Sweet, Brit. Fl. Gard. t 297 = L. hyemale.
oporantha, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc. L 51 ^L. autumnale.
pulchtlla, Jord. & Fourr. L c =L auturanale.
roseus, Sweet, ex Loud. Hort Brit. Supp. iii. 482» L. roseum.
trichophylla, Sweet, Brit. FL Gard. iii. sub t 297=L. trichophyllum.

ACISAHTHBB.A, P. Br. Hist Jamaic. 217. t. 22. f. i. (1756). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 739.
ANISOCENTRDM, Tnrcz. in Bull. Soc Nat Mosc xxxv. (1862) I. 322.
DICKANANTHERA, Presl, Symb. Bot i. 75. t. 50 (1832).
EXODICILIS, Rafin. Sylva Tellur. 97 (1838).
MIOCARPUS, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. ii. (1844) 146.
NOTEROPHILA, Mart Nov. Gen. et Sp. iii. 110. t. 254 (1829).
URANTHERA, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. III. ii. (1814) 146.

ACISANTHERA:-
adscendens, **Wright, in Sauvalle, Cat. FL Cub. 52 = quadrats,**
alata, *Cqrn, in Mart. Fl. Bras.* **xiv. III. 225.-»Bras,**
alsinaefolia, *Triana,in Trans.Linn. Soc.xs.ivi.* (1871) **34. t 2. f. 18h-—Bras.**
Beccabunga, **Triana, 1. c 38= brevifolia.**
bivalvis, **Cogn. in Mart. Fl. Bras. «T. III. 216 - brevifolia.**
Boissieriana, *Cogn. 1. c.* **209.—Bras,**
brerifolia, *Griseb Fl. Brit. W. Ind.* **269.—Ind. occ.; Bras.**
brevifolia, **Triana, in Trans. Linn. Soc. xxvlii (1871) S3=trivalvis.**
divaricata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* **xiv. HI. 212.—Bras.**
fluitans, *Cogn. I. c.* **214.—Bras.**
Glazioviana, *Cogn. I. c.* **223.—Bras,**
hedyotoidea, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. **(1871) 33.—Bras.**
hedyotoidea, **Tnana, 1. c pro parte = Sa?zmanni.**
inmndata, *Trianp, I. c***—Bras,**
lunnobios, *Triana, I. c.* **t 11.—Am. trop.**
pellucida, *Wright, in Griseb. Cat. PI. Cub.* 104.—**Cuba.**
pulchella, *Cogn. in Mart. Fl. BtJS.* **xiv. lm. 211—Bras,**
punctatissima, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. **(1871) 34.1.11. £ 18 c—Bras.; N. Granat.**
*<l*ailmt&,Juss.exPoir.Eneyc. SuppLi.* 111.—Jamaica,
recurva, *Griseb. in Goett. Abh.* **ix. (1861) 58.-Bras.; Guiana,**
recurva, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) **34. t. 2. f. 18 b.—Bras.**
Salzmanni, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* **xiv. III. 209.—Bras,**
tetramera, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviil (1871) **33—Bras.**
trivalvis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv.* HI. 217.—Bras,
váriabilis. *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxvUL (1871) *ii.* **t 11. f. 18 g.—Bras.**

ACISPERMUM, Neck. Elem. i. 34 (1790)=Coreopsis, Linn. (Compos.).

ACISTOMA, Zipp. ex Span, in Linnaes, xv. (1841) 202 =Woodfordia, Sm. (Lythrar.).
coccineum, **Zipp. ex Span. 1. c - W. floribunda.**

ACKAMA, A. Cnnn. in Ann. Nat. Hist ii. (1839) 358. *SAXIFRAGEAE,* **Benth. & Hook, f i. 663.**
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* **ii. 444.—Austral,**
rosaefolia, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) **358.—N. Zel.**

ACLADODEA, Rniz & Pav. Prod. 138. t. 29 (1794) = Talisia, Aubl. (Sapind.).
pinnata, **Ruiz & Pav. Syst. Veg. 262=T. Acladodea.**

ACLEIA, DC. Prod. vi. 340 (1837)=Beneoio, Linn. (Compos.).
belbeysia, **DC. 1. c.=S. belbeysins.**

ACLEISAN7THES, A. Gray, in Am. Jonm. Sc Ser. II. xv. (1863) 259. *NYCTAGINEAE,* **Benth. & Hook. f. Hi. 6.**
PENTACROPHYS, *A. Gray, 11 cc.* **281 (1853).**
anisophylla, *A. Gray, I.* **r.—Texas.**
Berlandieri, *A. Gray, I. c.* **260.—Texas,**
crassifolia, *A. Gray, I. c***—Texas,**
longiflora, *A. Gray, I. c***—N. Mexico.**
Wrightii, *Benth. 6f Hook.f. ex Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* **iii. 6.—Texas.**

ACLINIA, Griff. Notul. iii. 820 (1851)=Dendrobium, Sw. (Orchid.).

ACLISIA, E. Mey. in Presl, Rel. Haenk. i 137. t. 25 (1827)=Pollia, Thunb. (Commel.).
celebica, **Hassk. Commel. Ind. 49=P. marrophylla.**
Cumingiana, **Hassk. 1. c. 47 = P. macrophylk.**
elegans, **Hassk. in Miq. PI. Jungh. 49 = I', sorzogonensis.**
florida, **Hort. Berol. (1887) ex Kunth, Enum. pi. iv. 47 = Athyrocaipus pallidus.**
gigantea, **Hassk. Commel. Jnd. 46=P. sorzogonensis.**
indica, **Wight, Ic. t 2088=P. sorzogonensis.**
orMogonensis,* **Kunth, Enum. PI. iv. 7 4= P. indica.
soraogonensis, **E. Mey. in Presl, Rel. Haenk. i. 188. t. 25 = P. sorzogonensis.**

ACLISIA:—
guayaquilensia, *G. Don, Gen. Syst.* **iv. 461.—Peruv.**
subumbellata, **C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng. t 80=P. subumbellata.**
Thomsoni, **C. B. Clarke, 1. c L 81 - A neilema Thomsoni.**
ZoUingeri, **Hassk. CommcL Ind. 51 = P. Zollingeri.**

ACMADEOTA, Bartl. & Wendl. f. Diosm. 59. t A (1824). *RUTACEAE,* **Benth. & Hook. f. i. 289.**
alternifolia,CAcm.in£i«na<'a,v. (1830)52.—Afr.auttr.
assimilis, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 383.—**Aft. austr.**
cassiopoides, **Tnrcr, in Bull Soc. Nat Most xxxi. (1858) I. 439 = Macrostylis dubia.**
cucullata, *E. Mey. ex Hare. & Sond. Fl. Cap.* i. **383.—Afr. austr.**
densifolia, *Sond. I. c***—Afr. austr.**
flaccida, *Ectl. & Zeyh. Enum.* **105.—Afr. austr.**
juniperina, *Bartl. & Wendl./. Diosm.* **61.—Afr. austr.**
laevigata, *Bartl. & Wendl./. 1. c.* **64—Afr. austr.**
laevigata, **E. Mey. ex Harv. & Sond. FL Cap. i. 383 = assimilis.**
Mundiana, *Eckl. & Zeyh. Enum.* **105.—Afr. austr.**
muraltioides, **Eckl. & Zeyh. 1. c 106 = juniperina.**
Niveni, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 380.—Afr. **austr.**
obtusata, *Bart. & Wendl./. Diosm.* **68.—Afr. austr.**
obtusata, **Eckl. & Zeyh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i 376=Dir>sma teretiioUa.**
psilopetala, *Sond. in Han. & Sond. L c.* **i. 380.—Afr. austr.**
pungent, *Bartl. & Wendl./. Diosm.* **64.—Afr. austr.**
pungens, **Eckl. & Zeyh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 381=obtusata.**
rosmarinifalia, *Bartl. in Linnaea,* **xvii. (1844) 855.—Afr. austr.**
strobilina, **E. Mey. ex Harv.** *Sc* **Sond. Fl. Cap. i. 881 = tetragona.**
tetragona, *Bartl.* **6" *Wendl./. Diosm.* 65.—Afr. aostr.**
tetragona, **Eckl. & Zeyh. Enum. 105=laevigata.**

ACMAJSTTHEBA, Grirsb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 28 (1858). *MALPIGHIACEAE,* **Benth. & Hook. f. i 253.**
Iatifolia, *Griseb. I. c.* **29.—Bras.**

ACMELLA, Rich, in Pers. Syn; ii. 472 (1807) = 8pilanthes, Jacq. (Compos.).
biflora, **Spieng. Syst. iii. 591-Wedelia biflora.**
brachyglossa, **Cass. in Diet. Sc. Nat 1.258 =S. Acmella.**
brasiliensis, **Spreng. Syst. iii. 592 = WedeUa paludosa.**
buphthalmoides, **Pers. Syn. ii. 478 = Heliopsis buphthalmoides.**
caulorrhUa^VdOe, **Cent. PI. Afr.** *Mitoi,* **45. t. iii. £ 7 =S. Acmella.**
eiliata, **Cass. in Diet Sc Nat. xxiv. 831=S. ciliata.**
debilis, **Cass. 1. c 331=S. debilis.**
fimbriata, **Cass. 1. c = S. fimbriata.**
flavicaulis, **Kafin. New Fl. Am. i. 52.—Am. bor.**
Garcini, **Spreng. Syst iii. 691 = Anvillea Garcini.**
globosa, **Spreng. 1. c 692=Zaluzania globosa.**
hirta, **Lag. Gen. et Sp. Nov. 80=Jaegeria hirta.**
intermedia, **Rich, ex Pers. Syn. ii. 472=S. intermedia.**
lanceolata, **Link, ex Spreng. Syst iii. 444 =S. Pseudoacmella.**
Linnaei, **Cass. in Diet Sc. Nat xxiv. 380=S. Acmella.**
mauritanica, **Rich, ex Pers. Syn. ii. 472 =S. Acmella.**
Mutisii, **Cass. in Diet. Sc. Nat xxiv. 881 =S. Mutisii.**
nudicaulis, **Rafin. New FL Am. i. 52.—Am. bor.**
Nuttaliana, **Rafin. 1. c - S. repena.**
occidentalis, **Nutt Gen. Am. ii. 171=S. repens.**
ocddentalis, **Rich, ex Pers. Syn. ii. 473 =S. Mutisii.**
pani/olia, **Rafin. New FL Am. i. 52.**
repens, **Rich. ex. Pers. Syn. ii. 478 =S. repent.**
spilanthoides, **Cass. Diet. Sc Nat xxiv. 329 = Wedalia caraosa.**
tenella, **Cass. in 1. c xxiv. 331=S. tenella.**
trilobata, **Spreng. Syst. iii. S91=Zaluzania triloba.**
uliginosa, **Cass. in Diet Sc Nat xxiv. 331 - S. Acmella.**

ACMENA, DC. in Diet Class. Hist Nat xi 401 (1826) =Eugenia, Linn. (Myrtac).
bracteolata, **Walp. Rep. ii. 181 = E. bracteolata.**
Championi. **Benth. in Hook. Kew Joum. Bot i. (1852) 118.—Hongkong.**
chinensis, **Planch. Hort Donat 84.—China.**
claviflora, **Walp. Rep. ii. 181 = E. claviflora.**
elliptica, **G. Don, ex Steud. Norn. ed. II. i. 17-E. bmithii.**

ACMENA:—
floribunda, **DC. in Diet. Class. Hist Nat. xi 401; et Prod. iii. 264- E. Smiihii.**
Gerrardi, **Harv. Gen. S. Afr. PL ed. II. 112.—Afr. austr.**
grata, **Walp. Rep. ii. 181 = E. grata.**
inophylla, **Wight, Ic ii. t: 623 = E. inophylla.**
Kingii, **G. Don, Gen. Syst. ii. 851 = E. Smithii.**
lanceolata, **Thw. Enum. PI. Zeyl. 119 = E. Wightiana.**
leptantha, **Walp. Rep. ii. 181 = E. leptantha.**
oblata, **Walp 1. c = E. oblata.**
parviflora, **DC. Prod. iii. 262 = E. zeylanica.**
Wightiana, **Walp. Rep. ii. 181 = E. Wightiana.**
teylanica, **Thw. Enum. PL Zeyl. 118=E. zeylanica.**

ACMISPON, Rafin. AtL Joum. 144 (1832)=Hosackia, Dougl. (Legumin.).
multiflorum, **Rafin. New Fl. Am. i. 53=seq.t**
sericeum,Rafin. **Atl. Jonm. 145 = H. sericea.**

ACMOSTIMA, Rafin. Sylva Tellur. 26 (1838). Payetta, Linn. (Rubiac).
brevifolia, **Rafin. 1. a «= P. pentandra.**
longi/olium, **Rafin. L c—P. baibata.**

ACNADENA, Rafin. Sylra Tellur. 41 (1838)-Cordia, Linn. (Borag.).
elliptica, **Rafin. L c 41=C. elliptica.**

ACN1BA, Linn. Diss. Chen. 32 (1750) (Am. acad. iii. 19). *AMARANTACEAE,* **Benth. & Hook. £ iii. 29. MONTELIA, A. Gray, Man. Bot. N. U. States, ed. II. 369 (1856).**
altissima, **Michx. ex. Moq. in DC. Prod. xiii. II. 277 = rusocarpa.**
altissima, **Ridd. ex Moq. 1. c.=tuberculata ?**
australis, *A. Gray, in Am. Natural,* **x. (1876) 489.—Am. bor.**
cannabina, **Chapm. FL S. U. St Suppl. 645=australis.**
cannabina, *Linn. Sp. PI.* **1027.—Am. bor.**
cuspidata, **Bert ex Spreng. Syst iii. 903=cannabina.**
Ellioti, *Rafin. New Fl. Am. I.* **64.—Am. bor.**
ñoridana, *£. Wats, in Proc. Am. Acad.* **xvii. (1881-82) 878.—Am. bor.**
obtusifolia, *Rafin. Nev Fl. Am.* **i. 54.—Am. bor.**
oioatB, F.G.LHetr. exMoq. in DC. Prod. xiii. II. 278, **nomen.—Hab. 1**
rhyssocarpa, **Steud. Nom. ed. II. L 17 =rusocarpa,**
ruscocarpa, **Willd. Sp. PL iv. 768=insocarpa.**
rusocarpa, **Moq. in DC. Prod. xiii. II. 277=tuberculata.**
rnsocarpa, *Michx. Fl. Bor. Am.* **ii. 234. t. 50.—Am. bor**
salicifolia, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* **ii. (1817) 43. —Am. bor.**
Umariscina, *A. Gray, in Am. Natural,* **x. (1876) 489.—Am. bor.**
tuberculata, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 277.—Am. bor.**

AC1TISTTJB, Schott, in Wien. Zeitschr. (1829) iv, 1180, ex Linnaea, vi. (1831) Litt. 54. *SOLANACEAE.* **Benth. ft Hook. f. ii. 894.**
CoDOCHONIA,Dun. in DC. Prod. xiii. I. 482 (1852).
LVCIOPLESIUM, Mien, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 330.
EFHAILA, HUANVCA, KOKABUS, PEDERLEA, PLICULA, TROZELIA, Rafin. Sylva Tellur. 54-55, 124 (1838).
aggregatus, *Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. **(1846) 341.-Peruv.**
arborescent, *Schlechf. in Linnaea,* **vii. (1832) 87.—Mexico.**
Benthami, *Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. **(1845) 342.—Mexico.**
breviflorns, *Sendtn. in- Mart. Fl. Bras,* **x-152/—Bras.**
caulifiorus, **Miers. in Hook. Lond. Journ. Bot iv. (1845) 337 = Miersi.**
canliflonis, *Schott, in Wien. Zeitschr.* (1829) iv. **1180.—Bras.**
etstroides. **Miers, in Hook. Lond. Jonm. Bot iv. (1845) 843=Lycium cestroides.**
confertiflorus, *Miers, in Ann. et* ***Mag. Nat.*** *Hist.* Ser. **IL iv. (1849) 81.—Peiuv.**
ellipticus, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1850) **205.—Ins. Galap.**
fasciculatus, *Benth. & Hook.f. Gen.* **ii. 894.—Boliv.**
floribundns, *G. Don, Gen. Syst.* **iv. 481.—Peruv.'**
frutescens, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) **299.—Porto Rica**
grandiflorus, *Miers, in Hook. Lond.* ***Journ.*** *Bot.* iv. **(1845) 344.—Venezuela.**

ACITISTTTS :—
guayaquilensis, *G. Don, Gen. Syst.* Iv. 461.—Peruv.
Miersi, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 497.—Bras,
parviflorus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 219.—Reg. Argent
Plomieri, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 340.—Am. anstr.
ramiflorus, *Miers, I. c.* 342.—Ind. occ.
sideroxyloides, *G. Don. Gen. Syst.* iv. 461.—N. Granat.
spatulatus, *G. Don, I. c.*—Peruv.
umbellate?, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 342.—Peruv.
virgatus, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 247.—Keg. Argent

ACOELOKBHAPHE, H. WendL in Bot Zeit. xxxvii. (1879) 148. *PALMAE.*

ACOIDIUM, LindL Bot. Reg. (1837) sub t 1951 = Trichooentruxa, Poepp. & Endl. (Orchid.).
fuscum, Lindl. L c.=T. fnscum.

ACOKANTHEHA, G. Don, Gen. Syst iv. 485 (1837). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 696. TOXICOPHLAEA, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot i. (1842) 24.
Lamarkii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 485.—Afr. anstr.
lycioides, *G. Don, 1.* c—Afr. anstr.
pubescens, *G. Don, I. c.* 486.—Afr. anstr.
spectabilis, *Hook.f. Bot. Mag.* t 6359.—Afr. austr
venenata, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 485.—Afr. austr.

ACOMA, Beuth. Bot. Voy. Sulph. 29. t. 17 (1844) = Coreocarpus, Benth. (Compos.).
dissectum, Benth. 1. c. *(=*Leptosyne disseeta).*

ACOMIS, F. MuelL Fragm. ii. 89 (1860). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 317.
macra, *F. Muell. I. c.* iv. 145.—Auitral.
rutidosea, *F. Muell. 1. c.* ii. 89.—Austral.

ACONCEVEIBTJM, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 389 (1869). *EUPHORBIACEAE.*
trinerve, *Miq. 1. c.*—Malaya.

ACONITUM, Toum. ex Linn. Syst. ed. I. (1735). *RANUNCULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 9.
ANTHORA, Hall, in Rupp. Fl. Jen. ed. HalL 290 (1745).
CAMMARUM, Fourr. in. Ann. Soc. linn. Lyon. N. S. xvi. (1868) 327.
LYCOCTONUM, Fourr. 1. c. 326.
NAPELLVS, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 275 (1746).
NIRBISIA, G. Don, Gen. Syst i. 63 (1831).
abbreviatum, Langsd. ex DC. Prod. i. 61 = Fischeri.
achrrnthnm, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 285.—Sib. altaic.
acuminatum, Reichb. Ueben. Aeon. 46-paniculatum.
acutum, Reichb. 1. c. 21 = A. Napellus.
aegophonum, Reichb. 1. c. 69= A. Lycoctonum.
alatum, Wender. in Iinnaca, xv. (1841) Lilt 99=A. Napellus.
albicans, *Host, Fl. Austr.* ii. 76.—Europ.
albidum, Bemh. ex Reicbb. Uebcrs. Aeon. 31 = A. Napellus.
album, Ait. Hort. Kew. ii. 246=variegatum.
alienutn, Reichb. Ueben. Aeon. 78. = A. Lycoctonum.
alpinum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7=variegatum.
altigaleatum, Hayne, Arm. Gew. xiL t 16 = variegatum.
altissimum, MilL Gard. Diet ed. VIII. n. 2=A. Lycoctonum.
ambiguum, Reichb. Monog. Aeon. 123=A. Napellus.
amoenum, Reichb. Uebers. Aeon. 23 • A. Napellus.
ampliflorum, Reichb. 1. c. 37= A. Napellus.
angustifolium, Bemh. ex Reichb. L c. 29 = A. Napellus.
Anthora. *Linn. Sp. PI.* 532.—Europ.; Oriens.; As. bor.
anthorum, St Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 119= A. Anthora.
anthoroideum, DC. Syst L 866 = A. Anthora.
arctopkonum, Reichb. Ueben. Aeón. 71=A. Lycoctonum.
arcnatum, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 27.—Reg. Amur.
Atees, Royle, in Journ. As. Soc Beng. i. (1832) 459 = heterophyllum.
atlanticum, '•*Coss. in Bull. Soc. Fr.* xxii. (1875) 63, nomen.—Afr. bor.
atrox, Walp. Rep. i. 57—ferox.
australe, Reichb. Ueben. Aeon. 71 "A. Lycoctonum.

ACONTTTJM: •.—
austriacum, Tratt. ex Reichb. Monog. Aeon. '18' (t. 71) = A. Canunnrum.
autumnale, Lindl. in Jonm. Hortic. Soc. ii. (1847) 77 = Fischeii.
autumnale, Reichb. Monog. Aeon. t. 17. f. 2=A. Napellus.
baicalense, *Turn, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 18.—Sibir. baical.
barbatum, Patr. ex Pen. Syn. ii. 83=A. Lycoctonum.
Baumgarteni, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iii. (1852) 84.—Europ.
Bemhardianum, Reichb. Ueben. Aeon. 34=A. Napellus.
Bernhardianum, Wallr. Sched. Crit. i. 250. t. 2-variegatum.
Besserianom, *Andrn. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 58, nomen.—Podolia.
bicolor, Schult. Obs. Bot. 101 = A. Cammarum.
biflorum, *Fisch. ex DC. Syst.* i. 380.—Sibir. altaic.
boreale,Set. ex Reichb. Ueben. Aeon. 62=A. Lycoctonum.
bracteosum, *Bercht. & Presl, Rostl.* i. *Ranunculac.* 127. nomen.—Europ.
Braunii, Reichb. Uebers. Aeon. 29 » A. Napellus.
Breiterianum, Keichb. 1. c. 64 = A. Cammarum.
bulbiferum, Reichb. 1. c. 65—variegatum.
caeruleum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 223 = A. Napellus.
callibotryon, Reichb. Monog. Aeon. 98. t 16. f. 2« A. Napellus.
Camarum, Schleich. Cat. (1821) 5=paniculatnm.
Cammaram, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 751.—Europ.
Cammarum, Jacq. Fl. Austr. v. t. 224-variegatum.
camtschaticum, aVLCt = iamtschaticum.
Candollei, Reichb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 18 = A. Anthora.
tanescens, Schleich. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 741 = A. Napellus.
Carmichaeli, Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord. xxxiii. (1879) 87 (Florule du Tientsin, 61) = Fischeri.
cernuum, Baumg. ex Schur, Enum. PI. Transs. 32 = A. Cammarum.
cernuum, Wulf. ex Koelle, Spicil. 17 = paniculatum.
Chamissonianum, Reichb. Uebers. Aeon. 37 = A. Napellus
ckinense, Siebold, ex Past. Mag. v. (1838) 3, cum tab. = Fischeri.
chinense. *Sieb.ex Sieb. & Zucc. Fl.Jap. Fam. Nat.* 76 [75].-Japon.
ciliare, DC. Syst. 1. 378=villosum, volubile.
Clairvilleanum x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiiL-xxiv. (1881) 82.—iiurop.
Clusianum, Reichb. Monog. Aeon. l'3 = seq.
Clusii, Keichb. Uebers. Aeon. 22 - A. Napellus.
columbianum, Nutt. in Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 84 = Fischeri.
commutatum, Reichb. Ueben. Aeon. 86 = A. Napellus.
compactum, Reichb. 1. c 27 - A. Napellus.
confertum, Reichb. 1. c. 36 = A. Napellus.
cordatum, Rafin. New Fl. Am. i. 56.—Am. bor.
cordatum, Royle, Illustr. 66=heterophyllum.
cynoctonum, Reichb. Uebers. Aeon. 73 = A. Lycoctonum.
Decandollii, Reichb. 1. c. 16 = A. Anthora.
decorum, Reichb. 1. c. 51 — A. Cammarum.
delphinifolium, DC. Syst. i. 380 = A. Napellus.
delphinifolium, Hort Prag. ex Steud. Norn. ed. II. i. 18 = A. Lycoctonum.
densifiorum, Hoppe, «x Steud. Norn. ed. IL i. 18—A. Napellus.
dissectum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 197-A. Napellus.
dissectum, Tausch, ex Reichb. Monog. Aeon, t 47 = A. Lycoctonum.
divergens, *Panl. Elem.* 18.—Europ.
divergens, *Rafin. Nev Fl. Am.* i. 56.—Am. bor.
elatum, SalUb. Prod. 375 = A. Napellus.
eminens, Koch, ex Reichb. Ueben. Aeon. 35=A. Napellus.
engadinense x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* IL xxiii-xxiv. (1880) 82.—Europ.
eriostemum, DC. Syst i. 877 «• A. Cammarum.
eulophum, Reichb. Ueben. Aeon. 15-A. Anthora.
eustachium, Keichb. 1. c. 24 = A. Napellus.
exaltatum, Bernh. ex Reichb. 1. c. 61 = A. Cnmmaram.
excelsum, *Reichb. Monog. Aeon.* t. 63.—Rossia; Sibir.
excelsum, Tur <z. Cat. Baikal, n. 70 = A. Lycoctonum.
ferox, *Wall, in Ser. Mus. Helv.* i. 160.—Keg. Himal.

ACONITX7M :—
ferox, WalL Cat. n. 4721 A (PI. As. Rar. t. 41) = A. Napellus.
firm'um, Reichb. Ueben. Aeon. 20=A. Napellus.
Fischeri, *Reichb. Monog. Aeon.* 122.—As. bor.; Am bor.
flaccidum, *Reichb. Uebers. Aeon.* 39.—Sibir.
flexicaule, Hoppe & Horasch. ex Reichb, Monog. t. 38 in syn.=paniculatum.
fiexuosum, Presl, ex Reichb. 1. c.t. 7 in syn.=variegatum.
flexuosum, *Rafin. New Fl. Am.* i. 65.—Am. bor.
formosum, Reichb. Uebers. Aeon. 36 = A. Napellus.
fornicatum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 285=A. Napellus.
Funciianum, Reichb. Monog. Aeon. t. 66=A. Napellus.
Funckii, Reichb. Ueben. Aeon. 28 = A. Napellus.
galeatum, Steven, ex Steud. Nom. ed. II. i. 18-orientate.
galeriftorum, Stokes, Bot. Mat Med. iii. 216 = A. Lycoctonum.
galectonum, Reichb. Ueben. Aeon. 67 = A. Lycoctonum.
geraniifolium. *Host, Fl. Austr.* ii. 76.—Europ.
gibbiferum, Reichb. Monog. Aeon, t 19 - paniculatum.
gibbosum, Ser. Mus..Helv. i. 141. t. 15. f. 14, 16 = variegatum."
giganteum, Host, ex Steud. Nom. ed. II. i. 18 = A. Napellus.
giganteum, Zumag. Fl. Pedem. ii. 345 = A. Lycoctonum?
glabrum, DC. Syst. i. 379 = variegatum.
Gmelini, Reichb. Uebers. Aeon. 68 - A. Lycoctonum.
gracile, Reichb. 1. c 55-variegatum.
grandiflorum, [Fisch.] Hort. Gorenk. ed. I. (1808) 77 =biflorum.
grandiflorum, Pall.; cf. Reichb. Ueben. Aeon. 38 » A. Napellus.
guttatum, Turcz. ex Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1861)11. 114 = A. Napellus.
gymnandrum, *Maxim, in Bull. Acad. Pltersb.* xxiii. (1877) 308.—China.
Halleri, Reichb. Uebers. Aeon. 27 = A. Napellus.
hamatum, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. i. 18 = variegatum.
hamatum, Reichb. in Cat. Hort. Berol. (1818); Ueben. Aeon. 48 = A. Cammarum.
Hamiltonii, G. Don, Gen. Syst. i. 62-A. Napellus.
hebegynum, DC. Syst. i. 376-paniculatum.
heterophyllum, *Wall. Cat.* n. 4722.—Reg. Himal.
hians, *Host, Fl. Austr.* ii. 71.—Europ.
hians, Reichb. FLGerm. Excurs. 742 = A. Napellus.
hispidum, DC. Syst. i. 367=A. Lycoctonum.
Hoppeanum, Reichb. Monog. Aeon. t. 65 = A. Napellus.
Hoppii, Reichb. Uebers. Aeon. 24 = A. Napellus.
hortense, Hoppe, ex Reichb. Monog. Aeon. t. 71 in syn. = A. Cammarum.
Hosteanum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 177 = A. Lycoctonum.
humile, Bernh. ex Reichb. Ueben. Aeon. 34-A. Napellus.
humile, Salisb. Prod. 375 = paniculatum.
illinitum, Reichb. Ueben. Aeon. 64=variegatum.
inclinatum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 9=A. Anthora ?
intermedium, DC. Syst. i. 374 = A. Cammaram.
intermedium. Gaud, ex Steud. Nom. ed. II. i. 18' variegatum.
intermedium. Host, Fl. Austr. ii. 69 = A. Lycoctonum.
inunctum, Koch, ex Reichb. Monog. Aeon. < 6. app.' (Index)—A. Napellus.
italicum, Tratt. ex Reichb. 1. c. t. 7. in syn. = variegatum.
Jacquini, Reichb. Uebers. Aeon. 17 = A. Anthora.
Jacquinianum, Host, Fl. Austr. ii. 68 = A. Lycoctonum.
Japonicum, *Decne. in Rev. Hortic.* (1851) 175.—Japon.
japonicum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 18=variegatum.
japonicum, Thunb. Fl. Jap. 231=uncinatum.
kamtschaticum, Pall, ex Reichb. Uebers. 39 = Fischeri.
Koehleri, Reichb. Uebers. Aeon. 80 = A. Napellus.
Koelleanum, Reichb. 1. c. 19 = A. Napellus.
Kusnezofni, *Reichb. Monog. Aeon,* t 21.—As. bor. or.
laciniosum, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 18 = variegatum.
laetum, Reichb. Ueben. Aeon. 21 = A. Napellus.
laeve, Royle, Illustr. 56 = A. Lycoctonum.
laeoigatum, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 18 » variegatum.
lagoctonum, Reichb. Uebers. Aeon. 71-A. Lycoctonum.
Lamarckii, Reichb. Monog. Aeon. t. 40 = A. Lycoctonum.
lasiocarpum, Reichb. Ueben. Aeon. 65 = variegatum.

ACOinTTTM:—
lasiostomum, *Sricki. Monog. Aeon.* t. 49.—Ross.; Podol.
lasiostomum, Spreng. Syst ii. 620-orien tale. •
laxifiorum, Schleich. Cat. (1821) 6=A. Napellus.
laxum, Reichb. Illustr. Acon.t 13 verso - A. Napellus.
leptanthum, *Reichb. Monog. Aeon.* 1. 64—Rossia.
lethale. Griff. Notul. iv. 732 *m* palmatum.
leucanthemum, Wender. in Linnaea, v. (1880) Litt 58 =variegatum.
leucanthum, *Reichb. Uebers. Aeon.* 55.—Hab.1
Lobelianum, *Host, Fl. Austr.* ii. 74.—Enrop.
Lubanskyi, Reichb. Monog. Aeon, t 20=Fischeri.
Lubarsdi, Heynh. Nom. i. 13=praec.
lufiqria, Reichb. Uebers. Aeon. 74-A. Lycoctonum.
lupteida, Reichb. L c. 70=A. Lycoclonum.
lundum, *Hook./. & Thorns. Fl. Ind.* i 56.—Reg. Himal.
lundum, Salisb. Prod. 875 = variegatnm.
Lycoctonum, Bess. Ennm. PI. Volh. 22=orientate.
Lycoctonum, *Linn. Sp.Pl.* 582.—Enrop.; As. bor.
macranthum, Reichb. Uebers. Aeon. 51=variegatum.
"""rtyhyllum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit 223 = orientate.
" ^^ Jn^ 1 „ 1111, *Turc*. in „Bull* S&- Nat. Mosc.* xv. (1842) 83.—As. temp.
maximum, Pall, ex DC. Syst. L 880; Prod. i. 61 = rischeri.
medium, Schrad. Cat. Hort. Goett. ex Reichb. Monog. Aeon, t 71 in syn.=A. Cammarum.
meloctonum, Reichb. Uebers. Aeon. 65=A Lycoctonnm.
Meyeri, Reichb. 1. c 83 = A. Napellus.
micTophyllunt, Gaud, ex Steud. Nom. ed. II. i. 19 = A. Napellus.
microstachyum, Reichb. Uebers. Aeon. 86 - A. Napellns.
Mielichhqferi, Reichb. 1. c 29=A. Napellus.
mixtum, Reichb. 1. c. 61-variegatum.
moldamcum, Hacq. ex Reichb. l.c. 67-A.Lycoctonnm.
molle, Reichb. L c 47=paniculatum.
monanense, Schmidt, ex Reichb. Monog. Aeon. L 61 m obs.=A. Lycoctonnm.
monogynum, Forsk. FL Aegypt. Arab. p. xxvii = Delphinium Aconiti.
multifidum, Koch, ex Reichb. Monog. Aeon. t. 70 - A. Napellns.
multifidum, Royle, Illustr. 66=A. Napellus.
™yoctonum,Rtichb. Uebers. Aeon.68-A. Lycoctonum.
nanum, Stephan, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 70-biflorum.
napelloides, Sw. ex Reichb. Monog. Aeon. t. 69 in syn. = A. Napellns.
Napellus, *Linn. Sp. PI.* 682.—Reg. bor. temp
Napellus, Pall. Reise, ii. 628-villosum.
rfapeUut, S. G. Gmel.lt i. 8 = A. Lycoctonnm.
Napellus, Thunb. Fl. Jap. 281-Fischeri.
nasutum, Fisch. ex G. Don, Gen. Syst. i. 61 (1831) 58 =variegatum.
nasutum, Hook. Fl Bor. Am. i 26=Fischeri.
neapolitanum, Tenore, FL Nap. iv. 327=A. Lycoctonum.
nemorosum, Bieb. ex Reichb. Uebers. Aeon. 17-A. Anthora.
neomontanum, Baumg. Fl. Transs. ii. 100=paniculatnm.
"tomontanum, Koelle, Spicil. 16-A. Napellus.
»«>wostan«w, Willd. Sp. Pl.ii. 1236 = A. Cammarum.
neubergense, DC. Syst i. 873=A. Napellus.
nitidum, Fisch. ex Steud. Nom. ed. tt L 19=barbatum.
nutans, Hort. Helmst ex Steud. Nom. ed. II. i. 19 - A. Napellus.
Nuttallii, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 884, nomen.—Am. bor.
obseurum, Reichb. ex S. Wats. BibL Ind. 2-A. Napellus.
obtusifolium, *Host, Fl Austr.* ii. 72.—Europ.
ochotense, Reichb. Monog. Aeon, t 18.—Sibir. or.
ochranthum, C. A. Mey. in Ledeb. FL Alt it 286 - A. Lycoctonum.
ochroleucum, Hort *ex* Steud. Nom. ed. II. L 19=A. Lycoctonum.
ochroleucum, Salisb. Prod. 376=A. Anthora.
ochroleucum, Willd. Sp. PL it 1233-orientale.
eliganthemum, Kem. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, i. (1870) 119-A. Napellus.
oligocarpum, Reichb. Uebers. Aeon. 24=A. Napellus.
owgonsense, *Rafin. Nev Fl. Am.* i. 67.—Oregon,
orientale, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 10.—Reg. Caucas.

ACONITTTH:—
Ottonianum, Reichb. Uebers. Aeon. 54=A. Cammarum.
matum, Lindl. in Bot. Reg. (1840) Misc. 58-heterophyllum I
Pallasii, Reichb. Uebers. Aeon. 18=A. Anthora.
pattidum, Nutt ex Loud. Hort. Brit. Suppl. 482, nomen=Nuttallii.
pallidum, Reichb. Uebers. Aeon. 65=A. Lycoctonum.
paimatifidum, Reichb. 1. c 48=A. Cammarum.
palmatum, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 196.—Reg. HimaL
paniculatum, *Lam. Fl. Fr.* iii. 646.—Europ.
paradoxum, Reichb. Monog. Aeon. 76. 1.10. f. S=A. Napellus.
parvifiorum, Reichb. Uebers. Aeon. 46=paniculatum.
parvifolium, *Host, Fl. Austr.* ii. 70.—Enrop.
paucifiorum, Bertol. Misc. xxiv. p. 17. t. 6-A. Napellns.
paucifiorum, Host, Fl. Anstr. ii. 70=A. Lycoctonum.
pernieiosum, Reichb. Uebers. Aeon. 68=A. Lycoctonum.
Phthora, Reichb. 1. c. 71.=A. Lycoctonum.
plicatum, Koehler, ex Reichb. I. c. 29=A. Napellus.
productum, Reichb. 1. c. t. 38=A. Napellus.
pubescens, Moencb, Meth. 310 = A. Napellus.
pubiceps, *Rupr. Fl. Caucas.* 42.—Reg. Caucas.
pumilum, Schur, Enum. PL Transs. 33=A. Napellns.
purpureum, *Host, Fl. Austr.* ii. 74.—Europ.
pygmaeum, Steud. Nom. ed. 1.10=A. Napellus.
pyramidale, MilL Gard. Diet ed. VIII. n. 6=A. Napellus.
pyrenaicum, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 20 = leptanthum.
pyrenaicum, Koelle. Spicil. 24=A. Lycoctonum.
pyrenaicum, Linn. Sp. PI. 682=A. Lycoctonum.
pyrenaicum, Pall. Reise, ii. 816 = A. Anthora.
Raddeanum, *Regel, in Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1861) 43; *et Fl. Ussur.* 11.—Mantchuria.
ranunculi/olium, Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. 22=A. Lycoctonum.
ranunculoides, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 78.—Rossia.
redinatum, A. Gray, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843.) 118 = A. Napellus.
recognitum, Reichb. Uebers. Aeon. 42=volubile.
rectum, Bemh. ex Reichb. 1. c. 89=A. Lycoctonum.
refiexum, Reichb. 1. *c* 48=paniculatum.
rhynchanthum, Reichb. I. c 56=variegatum.
rigidum, Reichb. 1. c 86 = A. Napellus.
rostratum, Bemh. Ind. Sem. Hort. Erf. (1815); Reichb. Uebers. Aeon. 56=variegatnm.
rotundifolium, Kar. ft Kir. in BnIL Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 139=A. Napellus.
rubellum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 9-A. Napellus.
rubicundum, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. i. 20=A. Lycoctonum.
sachalinense, *F. Schmidt, Reise Amurland.* 107.—Ins. Sachal.
scandens, Muhl. ex Reichb. Uebers. Aeon. 38=uncinatum.
scandens, *Rafin. fftw Fl. Am.* i. 65.—Am. bor.
Schleicheri, Reichb Uebers. Aeon. 86=A. Napellns.
Scznkini, *Turc*. in. Bull. Soc. Nat. Mosc.* xiii. (1840) 61.—Sibir.
semigeleatum, PalL ex Reichb. Uebers. Aeon. 38 = A. Napellus.
septentrionalt, Koelle, Spicil. 22=A. Lycoctonum.
sibiricum, Poir. Encyc Suppl. i. 113=bktbatum.
sinense, Siebold, ex Lindl. & Paxt Flow. Gard. L 17 =Fischeri.
speciosum, Otto, ex DC. Prod. i. 60 = A. Cammarum.
spicatum, Donn, Hort. Cantab, ed. X. 209=A. Napellus.
Sprengelii, Reichb. Uebers. Aeon. 85=A. Cammarum.
squarroaim, Linn, ex DC. Syst. i. 368 = barbatum.
squamsum, Koch, ex Reichb. Uebers. Aeon. 29 = A. Napellua.
Stoerkianum, Reichb. L c. 49=A. Cammarum.
strictissimum, Reichb. 1. c. 69=A. Lycoctonum.
strictum, Bemh. ex DC. Syst i. 873 = A. Napellus.
strictum, Willd. ex Reichb. Uebers. Aeon. 51 = A. Lycoctonum.
taurericum, Reichb. Monog. Aeon. 87. t 12=A: Napellus.
tauricum, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 112 = A. Napellus.
Tauschianunt, *Steud. Nom.* ed. II. i. 20.—Sibir.
tenuifolium, Reichb. Uebers. Aeon. 24=A. Napellns.
tenuifolium, Turcz. in Bull. Soc. Na*. Mosc. xv. (1842) 88=macrorhynchum.

ACON1TUH :—
tenuisectum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 65-A. Lycoctonnm?
thelyphonum, Reichb. Uebers. Aeon. 78-A. Lycoctonum.
theriophonum, Reichb.. l.c. 78 = A. Lycoctonum.
tianschanicum, Rnpr. Sert. Tianachan. 88 = A. Napellus.
tortuosum, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 576.—Sibir.
toxicarium, Salisb. Prod. 375=A. Lycoctonum.
toxicum, Reichb. Uebers. Aeon. 43 = paniculatum.
tragoctonum, Reichb. 1. c 78=A. Lycoctonnm.
transilvanicum, Lerch. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 166-A. Lycoctonum.
Trattinickii, *Bess, ex Reichb. Uebers. Aeon.* 75, nomen. —Hab.1
trichocarpum, *Reichb. I. c.* 29.—Hab. ?
triste, Fisch. ex Steud. Nom. ed. IL i. 20=A. Lycoctonum.
truncation, *Rafin. New Fl. Am.* i. 65.—Am. bor.
tuberosum, *Host, Fl. Austr.* ii. 72.—Europ.
tuberosum, Patr. ex Reichb. Uebers. Aeon. 16 = A. Anthora.
umbraticolum, Schur, in Verh. Naturf Ver. Braemk, xv. II. (1877) 65-A. Lycoctonnm.
uncinatum, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 20=variegalnm.
uncinatum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 750.—Am. bor.; Japon.
uncinatum, Sievers, ex PalL Nord. Beitr. vil 22» = billoruro.
variegatum, Hook. f. & Thorns. FL Ind. 56 = uncinatum.
variegatum, *Linn. Sp. PI.* 682.—Europ.
venustum, Reichb. Uebers. Aeon. 28=A. Napellus.
versicolor, Reichb. 1. c 50=A. Cammarnm.
versicolor, Ster. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 66 = A. Anthora.
villosum, Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. FL Amur. 468 =Knsnezoffi.
villosum, *Reichb. Uebers. Aeon.* 39.—Sibir.
nrgatum, Reichb. L c. 28=A. Napellus.
virosum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 196=A. Napellus.
volubile, Moench, Meth. SuppL 110=variegatum.
volubile, *Koelle, Spicil.* 21.—Sibir. altaic.
volubile, Muhl. Cat. ii. 64=uncinatnm.
vulgare,BC. Syst. i. 871=A. Napellus.
mlparia, Reichb. Uebers. Aeon. 70=A. Lycoctonum.
Willdenowii, Reichb. 1. c 35 = A. Napellus.
Wilemetianum, Delarb. FL Auv. ed. IL 499•paniculatum.
Wulfenianum, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 20= A. Napellus.
tooctonum, Reichb. Uebers. Aeon. 65=A. Lycoctonum.

ACONOGONUM, Reichb. Consp. 162 (1828)-Polygonum, linn.
alpinum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (185a) 64=P. alpinum.

ACONTIAS, Schott, Meleti. 19 (1832)=Xantho8oma, Schott (Aroid.).
conspurcatus, Schott, Prod. 198=X. conspurcatum..
cubensis, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 163=X. cubense,
diversifolius, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 44 ; Gartenfl.(1866) 68=X. platylobum.
hasti/olius, Schott, Melet. i. 19=X. hastifolium.
heUeborifolius, Schott, L c =X. helleborifolium.
Hofmanni, Schott, Prod. 196 = X. Hoffmanni.
luridus, G. Don, in Sweet, Hort Brit. ed. III. 682= Caladium luridum.
pentaphyllus, Schott, Syn. 66=X. pentaphyllum.
platylobus, Schott, in Ann. Mus. Logd. Bat i^279 = X. platylobum.
Plumitri, Schott, Syn. L 65 «X. Plumieri.
Riedelianus, Schott, Prod. 192=X. Riedelianum.
striatipes, Schott, 1. c.=Caladium striatipes.
variegatus, Kunth, Enum. PL iii. 45=X. helleborifolium.
Wendlandii, Scbott, in Oestr. Bot Zeitschr. vüi. (1858) 178=X. Hoffmanni.

ACOPHOHUM, Gaudich.ex Stend. Nom. ed. II. 20. (1840), nomen. *GRAMINEAE1*
caerulescens, *Gaudich, 1. c.*—Hab. 1

ACORIDIUM, Nees *Sc* Meyen, in Nov.' Act. Nat Cnr. xix. <Suppl. I. (1848) 131 = Ceratostylis, Blume (CaidoT
tenellum, Nees & Meyen, L a = C. gradlis.

ACORTTB, linn. Gen. ed. I. 104 (17S7). *AROIDEAE,* Bcnth. & Hook. f. iii. 999.
americanus, Rafin. New FL Am. i. 57 = A. Calamus t
angustifolius, Schott, in Ann. Mm. Bot Imgd. Bat. i. 284 = A. Calamus.
aromaticus, Cilib. Exercit ii. 507= A. Calamus.
Belangeri, Schott, in Ann. Mas. Bot Lugd. Bat i. 284 = A. Calamns.
brasiliensivm, Schott, ex Nees, in Mart. FL Bras. ii. I. 170 = Seleria hirtella.
Calamus, *Linn. Sp. PI.* 824.—Reg. bor. temp.
Calamus-aromaticus, [Clairv.] Man. Herb. 104 = A. Calamus.
Casia, Bertol. in Mem. Acad. Sci Bolog. Ser. II. iv. (1864) 310-A. Calamus.
cochinchinensis, *Schott, MeUt.* i. 22.—Cochinch.
Commersonii, Schott, in Ann. Mus. Lugd. Bot. i. 284 = A. Calamus.
commutatus, Schott, Prod. 578= A. Calamus.
elatus, Salisb. Prod. 263 = A. Calamns.
europaeus, Dam. Fl. Belg. 162 — A. Calamus.
flexuosus, Rafin. • New Fl. Tex. 29 •; Atl. Joum. 178 = A. Calamns.
floridanus, Rafin. New Fl. Am. i. 57 = A. Calamns.
gramineus, *[Soland.* in] *Ait. /fort. Kem.* ed. I. i. 474. —Japon.
Griffithii, Schott, in Oestr. Bot Zeitschr. (1858) 851 = A. Calamus.
humilis, Salisb. Prod. 268=A. gramineus.
nilaghirensis, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1859) 101 = A. Calamns.
odoratus, Lam. M. Fr. iii. 299-A. Calamus.
Palmita, Lichtenst Reise, ii. 256 = Prionium Palmita.
pusillus, Siebold, in Verh. Bat Genoot. xii. (1880) 2 = grarainens.
spurius, Schott, in Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 284 = A. Calamus.
Tatarinowii, Schott, in Oestr. Bot Zeitschr. (1859) 101 =A. Calamus.
terrestris, Spreng. Syst. ii. 118 = A. Calamus.
triqueter, Turcz. ex Schott, Prod. 578 = A. Calamus.
undulatus, Stokes, Bot Mat Med. ii. 282 = A. Calamus.
vents, Rafin. Med. Fl. i. 26 = A. Calamus.

ACOSMIA, Benth. in Wall. Cat n. 644 (1829) =Oypeophila. Linn. (Caryophyll.).
rupestris, Benth. 1. c. = G. cerastioidea.

ACOSMIUM, Schott, in .Spreng. Syst. iv. Car. Poet (06 (1827) = Bweetia, Spreng. (Legumin.).
lentiscifolium, Schott, 1. c = S. lentiscifolia.
lentiscifolium, Vog. in Linnaea, xi. (1887) 896-S. fmticosa.

ACOSMUS, Desv. in Dcsf. Cat. Hort. Par. ed. III. 238 (182ft) =Aspiearpa, Lag. (Malpig.).
pruriens, Desv. 1. c. —A. hirtella.

ACOSTA, Adans. Fam. a. 117 (17«3)=Centaurea, Linn. (Compos.).

ACOSTA, DC. Prod. *t.* 90 (1886) = Bpiraoantha, H. B. & K. (Compos.).
Rolandrae, DC. 1. c =S. comifolia.

ACOSTA, LOUT. Fl. Cochinch. 276 (1790) = Agapetee, G. Don (Vaccin.).
spicata. Lour. 1. c. = A. Acosta.

ACOSTA, Kniz & Pav. Prod. 1 (1794)=Moutabea, Aubl. (Polygal.).
amleata, Ruiz & Pav. FL Per. L 5 = M. Acosta.

ACOUROA, Anbl. PI. Gui. ii. 763. t 801 (1776) = XSoastaphyllum, Rich. (Legumin.).
violacea, Aubl. 1. c (•• *Geoffraea violated)**

ACOURTIA, D. Don, In Trans. linn. Soc xii. (1830) 203=Peresia, Lag. (Compos.).
formosa, DC. Prod. vii. 66 = P. frnticosa.
formosa, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvL (1830) 203 — P. tnrbinata.
formosa. Hook, *it* Am. Bot Beech. Voy. 437 = P. rigida.
formosa, Seh. Bip. in Seem. Bot Voy. Herald, t 56 = P. patens.
hcbeclada, DC. in Deles*. Ic Sel iv. t. 95=P. hebeclada.

ACOURTIA :—
•*macrocepkala,* Sch. Bip. in Seem. Bot Voy. Herald, t 65 = P. tnrbinata.
microcephala, DC. Prod. vii. 66=P. micrecephala.
moschata, DC. 1. c. = P. moschata.
rigida, DC. 1. c. = P. rigida.
Seemannii, Scb. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, t. 54 = P. Seemannii.
turbinata, DC. Prod. vii. 66=P. tuifcinata.

ACRACHNE, Wight & Am. ex Lindl. Introd. Nat Syst. ed. II. 381 (1836) =BleuBlno, Gaert. (Gramin.).
eleusinoides, Wight *Sc* Am. ex Steud. Nom. ed. II. i. 21 = E. verticillata.
verticillata.Vfight Sc Am.—Cf. LindL Introd. NatSyst. ed. II. 881-E. verticillata.

ACRADENTA. Kipp. in Proc. Linn. Soc. ii. (1852) 201; et Trans. Linn. Soc. xxi. (1855) 207. t 22. *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 292.
Frankliniae, *Kipp. II. cc.*—Tasmania.
sierioides, Kipp. in Proc Linn. Soc ii. (1852) 301 = Frankliniae.

ACRAEA, Lindl. in Benth. PI. Hartw. 155 (1845) = Fterichis, Lindl. (Orchid.).
Mandonii, Reichb. f. Xenia Orch. iii. 18.—Boliv.
multiflora, Lindl. Orchid. Linden. 26.—N. Granat.
parvifolia, Lindl. in Benth. PI. Hartw. 155.—Ecuador.
Mloba,UaA\. in Ann. Nat Histxv. (1845) 886.—Peruv.
Widgreni, Reichb. f. Otia Bot Hamb. 83.—Bras.

ACRANDRA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 435; et in Mart Fl. Bras. xiv. i. 459 (1867)=Campomanesia, Ruii *Sc* Pav. (Myrtac.).
laurifolia, Berg, in Mart FL Bras. xiv. 1.469 = C. laurifolia.
Sellowiana, Berg, 1. c—Bras.
verrucosa, Berg, 1. c—Bras.

ACBANTHERA, Am. ex Meissn. Gen. 162 (115) (1838); et in Ann. Nat. Hist. iii. (1889) 20. *RUBIACEAE,* Bcnth. *Sc* Hook. f. il. 64.
ANDROTROPIS, R. Br. in Wall. Cat. n. 8398 (18471).
anamaHica, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 6.—Jnd. or.
grandiflora, *Bedd. I. c.*—Ind. or.
Griffithii, *Haok.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 92.—Reg. Himal.
Maingayi, *Hook. f. I. c.*—Molucc
tomentosa, *Hook.f. I. c.*—Reg. Himal.
uniflora, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. lit (1872) II. 812 = Mussaenda uniflora.
zeylanica, *Am. in Ann. Nat. Hist.* iiL (1839) 21.—Zeylan.

ACRATHERUM, Link, Hort. BeroL i. 230 (1827) = Arundinella, Raddi (Gramin.).
fuscatum, Nees, ex Stend. Syn. PI. Gram. 114 = Arund. fuscata.
miliaceum, link, Hort. Berol. i. 820=Arund. nepalensis.
pumilum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 414 = Arund. pnmila.

ACBIDOCAKPTJ8, Guill. *Sc* Perr. Tent Fl. Seneg. i. 123. t. 29 (1882). *MALPIGHIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 256.
AMOMALOPTEKIS, G. Don, Gen. Syst. i. 647 (1831).
adenophorus, *A. Yuss.* in *Arch. Mus. Par.* iiL (IBM) 487.—Madag.
angolensis, *A. Juss. 1. c.* 490.—Afr. trop.
argyrophyllus, *A. Juss. 1. c.* 498.—Madag.
austro-caledonicus, *Baill. Adansonia,* xi. (1878-76) 248.—N. Caled.
Caxanillesii, A. Juss. in Arch. Mus. far. iiL (1848) t 15 **Smeathmanni.
chloropterus, *Oliver, Fl. Trop. Afr.*. i. 279.—Aft trop.
corymbosus. *Hook. f. in Hook. Ic. PI.* t 774.—Afr. trop.
exeelsns, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 489. —Madag.
galphimiaefolius, *A. Yuss. I. e.* 491.—Afr. trop.
quineensis, A. Juss. 1. c t. 16 = Smeathmanni.
Hirnndo, 5. *Moore, in Joum. Bot.* xviii. (1880) L—Afr. trop.
longifolius, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 244-Smc&thnnuini.
natalitios, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 486. —NataL

ACRIDOCABPUS :—
orientalls. *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 48f. —Natal,
plapioptems, *Guill. & Perr. Tent. Fl. Seneg.* i. 123. t. 29.—Senegamb.
pruricus, *A. Juss. in Arch. Mus. Par. HI* (1843) 492. —Natal.
Smeathmanni, *Guill. & Perr. Tent. Fl. Seneg. i.* 124. —Afr. trop.
zanzibaricus, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iiL (1843) 485. t. 15.—Zanzibar.

ACRILIA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 129 (1864) = Triohilia, Linn. (Meliac).
Sloanei, Griseb. 1. c. = T. terminalis.

ACKIOPSI8, Reinw. ex Blume, Cat Gew. Buitenz. 97 (1823); Bhime, Bijdr. 876 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 586.
densiflora, *Lindl. in Bot. Reg.* (1847) sub t. 20.—Borneo.
Griffithii, Reichb. in Bonplandia, ii. (1854) 92 =javanica.
indica, *Wight, Ic.* v. t. 1748.—Malaya,
javanica, *Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitena.* 97.; *Blume, Bijdr.* 377- -Malaya.
picta, LindL L. Bot Reg. (1843) Misc 69 = javanica.

ACRITJIiTJS, Ridl. in Joum. Linn. Soc xx. (1884) 336. *CYPERACEAE.*
griegifolius, *Ridl. I. c.*—Madag.
madagascariensis, *Ridl. I. c.*—Madag.

ACROANTHES, Rafin. in Joum. Phys. Ixxxix. 261 (1819)=Micro8tylis, Lindl. (Orchid.).

ACROCARPIDIUM, Miq. in Versl. en Medel. Kon. Nederl. Inst '1842' (1843) 198. t 2=Peperomia, Ruii & Pav. (Piperac).
brevipes, Benth. Bot Voy. Sulph. 166 = P. brevipes.
cordifolium, Miq. Syst. Pip. 56 = P. cordifolia.
exile, Miq. 1. c. =P. exilis.
guayaquillense, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot iv. (1845) 411 =P. guayaquilensis.
Guildingianum, Miq. 1. c. 412 = P. GuiUingiana.
hispidulum, Miq. Syst. Pip. 54 = P. hispidula.
Jamesonianum, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 412 = P. Jamesonjana.
tnajus, Miq. Sysl. Pip. 60=P. hederacea.
mexicanum, Miq. 1. c 58 =P. metapalcoensis.
nolle, Miq. in Versl. en Medel. Kon. Nederl. Inst. • 1842' (1843) 1»9 = P. mollis.
nummularifolium, Miq. L c. 198. t. 2=P. nummulari folia.
pulicare, Miq. 1. c 199=P. scandens.
repens, Miq. I. c. = P. scandens.
Totundifolium, Miq. 1. c = P. circularis?
scandens, Miq. Syst. Pip. 59 = P. scandens.
Sellomanum, Miq. 1. c. 55 = P. hispidula.
strpens, Miq. in VersL en. Medel. Kon. Nederl. Inst. '1842' (1848) 199=Verhuellia serpens.
tenellum, Miq. 1. e. = P. tenella.
urocarpum, Miq. Syst. Pip. 68 = P. urocarpa.
urospermum, Schlecht in Linnaea, xxviL (1854) 486 = praec. ?

ACROCARPUS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 158. t 16, 17 (.1842)-Cryptan«ium, Schrad. (Cyperac).
eampestris, Nees, I. c 160 = C. campestre.
ttensifolius, Nees, 1. c 159-C. densifolium.
humilis, Nees, 1. c. 181 =C. humile.
junciformis, Nees, 1. c = C. junciforme.
minarum, Nees, 1. c. 159 =C. minarum.
polyphyllus, Nees, 1. c 160 = C. polyphyllum.
stellatus, Nees, ex Boeck. in linnaea, xxxviii. (1874) 422 = C. stellatnm.

ACBOOABPTJS, Wight, ex Am. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1839) 547. *LEGUMINOSAE,* Benth. &. Hook. f. L 668.
combretiflorus, *Teysm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1866) 258.—Malaya,
fraxinifolius, *Wight &• Am. in Mag. Zool. & Bot.* ii. (1839) 647.—Ind. or.
grandis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 87.—Sumatra.

ACHOCENTRON, Cass. in Diet. Sc Nat. xliv. 37. (1826) = Centaurea, Linn. (Compos.).
Boissieri, Webb, Iter Hisp. 32=C. BoissierL

ACROCENTBOir:-
collinum, **Cats in. Diet Sc.Nat xlvii. 37 = C collina.**
granatense, **Webb, Iter Hisp. 82 = C. granatensis.**
ornatum, **Webb, 1. c. = C. oraata.**
tenuifolium, **Cass. in Diet. Sc. Nat 1.254 = C. rapestris.**

ACBOCEPHAIiUS, Benth. in Bot. Reg. sub tt 1282, 1300 (1829). *LABIATAE,* **Benth. & Hook. f. ii. 1173.**
axfflaris, *Benth. in DC. Prod.* **xii. 48.—Ind. or.**
Blumei, **Benth. in Bot. Keg. aub t. 1300 = capitatus.**
caeruleus, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1876) **136.—Afr. trop.**
capitatns, *Benth. in Bot. Reg.* **sub 11800.—Ind. or.; China,**
cylindracens, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* nix. (1875) **^85.—Afr. trop.**
ulacinus, *Oliver, I. c*—**Afr. trop.**
scariosus, **Benth. in Bot. Reg. sub t. 1282 = capitatus.**
verbenaceus, *Vatke, in Linnaea,* **xl. (1876) 178.—Afr. trop.**
villosus, *Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1800; *Lab. Gen. et Sp.* **23.—Madag.**

ACB.OCHAEKE, Lindl. FoT. Orch. (1858). *ORCH1DEAE,* **Benth.** *Sc* **Hook. f. iii. 507.**
punctata, *Lindl. I. c*—**Ind. or.**
Rimanni, *Reichb. f. in Gard. Chron.* **N. S. xvii. (1882) I. 796.—As. trop.**

ACROCLINIUM, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 270 = HeUptenun, DC. (Compos.).
multicaule, **A. Gray, 1. c 271 = H. chlorocephalum.**
phyllocephalum, **A. Gray, L c. = Podotheca fuscescens.**
roseum, **Hook. Bot. Mag. t 4801 = H. roseum.**
rubellum, **A. Gray, in Hook. Kcw Joum. iv. (1852) 71 = H. rubellnm.**

ACKOCOMIA, Mart. Hist. Nat Palm. ii. 66. tt. 56, 67 (1823). *PALMAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 943.**
aculeata, **Lodd. ex Mart. 1. c. iii. 286 = sclerocarpa.**
cubensis, **Lodd. ex H. Wendl. Ind. Cycl. Pand. Cycad. 1 = Usiospatha.**
fitsi/ormis, **Sweet, Hort. Brit. ed. I. 482 = lasiospatha.**
glaucophylla, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* **iii. ». 892.—Bras.**
Blobosa, *Lodd. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 286.—**Ins. S. Vincent**
guianensis, *Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 382, **nomen.—Guiana,**
horrida, *Lodd. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* Hi. 286.—**Ins. Trinit.**
•ntnmescens, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* **iii. II. 891.—Bras.**
Wospatha, *Mart, in Palm. Orbign.* **81.—Ind. occ.**
tasiospatha, **Wallace, Palms Amaz. 97. t 87 = sclerocarpa.**
mexicana, *Kara, ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 285. **t 188.—Mexico.**
minor, **Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 882 = lasiospatha?**
sclerocarpa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* **ii. 66. tt 56, 57, 100. f. 6.—Am. trop.**
sphaerocarpa, **Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 30 = sclerocarpa.**
tenuifrons, *Lodd. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. **286.—Ins. S. Domingo.**
Totai, *Mart, in Palm. Orbign.* **78. t 9. f. 1.—Boliv.**
vinifera, *Oerst. in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1868) 47. **—Nicaragua.**
Zapotecis, **Karw. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 230 = mexicana.**

ACROCORION, Adans. Fam. ii. 57 (1768) = Oalantbjua, linn. (Amaryll.).

ACROCORYNE, Turcz. in Bull. Soc Nat Most xxv. (1852) II. 316 = Metairtelma, R. Br. (Asclep.).
caribaea, **Turcz. 1. c. = M. bahamense.**

ACRODICLIDIT7K, Nees, Laurin. Disp. Progr. 18 (1833) *LAVRINEAE,* **Benth.** *Sc* **Hook. f. iii. 154.**
TRIPLOMEIA, Rafin. Sylva Tellur. 134 (1838).
Miacardioides, *Spruce, ex Meissn. in DC. Prod.* xv. I. **86.—Bras.**
brasiliense, **Nees, Syst Laurin. 267 = Aydendron brasiliense.**
Camara, *Schomb. in Hook. Land, fount. Bot.* iii **(1844) 680.—Guiana.**

ACBODICLrDIUM :—
chrysophyllum, *Meissn. in DC. Prod.* **xv. 1.87.—Guiana,**
dominicense, *Meissn. 1. c.* **86.—Ins. Dominic**
Gardneri, *Meissn in DC. Prod.* **xv. I. 87.—Bras,**
guianense, *Nees, Syst. Laurin.* **268.—Guiana.**
Ita-uba, *Meissn. in DC. Prod.* **xv. I. 86.—Bras.**
jamaicense, **Griseb. Fl. Brit W. Ind. i. 280, ex parte = Wrightii.**
jamaicense, *Nees, Syst. Laurin.* **270.—Jamaic**
Kunthianum, **Ness, 1. c 269 = Aydendron aciphyllum.**
oppositifolium, *Nees, in Linnaea,* **xxi. (1868) 500.—Guiana.**
lalidfolium, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* **i. 280.—Ind. occ.**
sericeum, *Griseb. 1. c.* **280.—Ins. Dominic.**
Sprucei, *Meissn. in DC. Prod.* **xv. I. 86.—Bras.**
Wrightii, *Meissn. I. c.* **85.—Cuba.**

ACRODRYON, Spreng. Syst i. 365 (1825) = CephalanthUB, Linn. (Kubiac).
angustifolius, **Spreng. 1. c. 836 = C. angustifolius.**
orientalis, **Spreng. 1. c. 336 = C. orientalis.**

ACROELYTRUM, Steud. ill Flora, xxix. (1846) 20-Iiophatherum, Brongn. (Gramin.).
japonicum, **Steud. 1. c. 21 = L. elatum.**

ACBOOLOCHIN, Schrad. Cat. Hort. Goett. ex Schult. f. Mant. i. 69, 227 (1822). *CHENOPODIACEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 48.**
BLITANTHUS, Reichb. Cat. Hort. Dresd. (1824).
LECANOCARPUS, Nees, Pl. Hort. Bonn. 4. t. 2. (1828).
chenopodioides, *Schrad. ex Schult. f. Mant.* i. 227.—**Reg. Himal.; China.**
persicarioides, **Moq. in DC. Prod. xiii. II. 254 = chenopodioides.**
Schraderiana, **Schult f. ex Moq. 1. c. = chenopodioides.**

ACROGLYPHE, E. Mey. Zwei Pfl. Docnm. 100 (1848). = Annesorhiaa, Cham. & Schlecht. (Umbell.).
fiexuosa, **E. Mey. 1. c. 100 = Ann. hirsnta + montana.**
hispida, **Sond. in Harv.** *Sc* **Sond. Fl. Cap. ii. 546 = Ann. villosa.**
hispidula, **E. Mey. Zwei Pfl. Docnm. 74 = Ann. villosa.**
runcinata, **E. Mey. 1. c. 100.—Afr. austr.**

ACROLEPIS, Schrad. in Comm. Gotting. vii. (1832) 142 = PicinlB, Schrad. (Cyperac).
ferruginea, **Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-78) 91.-Afr. austr.**
ramosissima, **Boeck. L c. 89 = F. ramosissima.**
trichodes, **Schrad. in Comm. Gotting. vii. (1832) 142-F. trichodes.**

ACROLOBUS, Klotzsch, in Verh. Akad. Berl. (1856) 236. t. 8 = Heisteria, Linn. (Olacin.).
parvi/olia, **Klotzsch, 1. c. 237. t. 3 = H. parvifolia.**
Schoenleinii, **Klotzsch, 1. c. 286. t. 8 = H. parvifolia.**

ACROLASIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 89. t 55. (1881) = Mentzelia, Linn. (Loasac).
bartonioides, **Presl, 1. c. 89. = M. albicaulis.**
Solierii, **C. Gay, Fl. Chit. ii. 430.—Chili.**
squalida, **Hook, £ in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 222 = M. aspera?**

ACROLOPHUS, Cass. in Diet. Sc. Nat 1. (1827) 253 = Centaurea, Linn. (Compos.).
maculosus, **Cass. 1. c. 258 = C. maculosa.**
Mierghii, **Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 97-C. paniculata.**
paniculatus, Cass. **in Diet. Sc. Nat. 1. 253 = C. paniculate.**
ragusinus, **Webb, ex Steud. Norn. ed. II. i. 23 = C. ragnsina.**
rigidulus, **Fourr. in Ann. Soc. Unn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 97 = C. paniculata.**
subalbidus, **Fourr. 1. c. = C. macnlosa.**
tenuisectus, **Fourr. 1. C.-C. maculos*.**

ACRONEMA, Falcon, ex Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 51 = PiinpineIla, Linn. (Umbellif.).
tenerum, **Edgew. 1. c. = P. tenera.**

ACRONIA, Presl, Rel. Haenk. i. 103 (1827); Symb. Bot. ii. 9 (1858) = Cryptostylis, R.<Br. (Orchid.).
phalangifera, **Presl, 11. cc. 104. 10.—Pernv.**

ACROKODA, Hassle Cat. Hort. Bogor. Alt. 208 (1844) = seq.

ACRONODIA, Blume, Bijdr. (1825) 123-Maeooarpus, Unn. (Tiliac).
punctata, **Blume, 1. c. = E. Acronodia.**

ACRONOZUS, Steud. Norn. ed. II. i. 21 (184O) = praec.

ACBOinrCHIA, Forst. ChaK Gen. 53. t. 27 (1776).
RUTACEAE, **Benth. & Hook. f. i. 302.**
CUNTO, Adans. Fam. ii. 446 (1763).
CVMINOSHA, Gaert. Frnct i. 280. t. 58 (1788).
DORRIENIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818).
GELA, Lour. Fl. Cochinch. 232 (1790).
HUONIA, Montrous. in Mem. Acad. Lyon, x. (1860) 185.
JAMBOLANA, Adans. Fam. ii. 508 (1763).
JAMROLIFERA, Linn. DUs. Dass. 15 (1747); Amoen. Acad. i. 398 (1749).
KOELFINIA, Scop. Introd. 231, et Ind. (1777).
SELAS, Spreng. Syst. ii. 216 (1825).
acidula, *F. Muell. Fragm.* **iv. 154.—Austral,**
apiculata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* **682.—Sumatra,**
arborea, *Blume, Bijdr.* **244.—Java.**
Baueri, *Schott, Fragm. Bot.* **5. t. 8.—Austral.**
Cunninghamii, **Hook. Bot Mag. t 8994 = Medicosma Cunninghamii.**
Endlicheri, *Schott, Fragm. Bot.* **S. t 2.—Ins. Norfolc.**
Halmaheirae, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 245. **—Malaya,**
heterophylla, *A. Gray, Bot. U. S. Expl. Exped,* L 333. **t. 32.—Ins. Samoa.**
HUM, **F. Muell. Fragm. i. 26 = Baueri.**
imperforata, *F. Muell. 1. c.*—**Austral,**
laevis, *Forst. Char. Gen.* **54. t. 27.—Austral,**
laurifolia, *Blume, Cat. Gen. Buitenm. 11.* 63; *Bijdr.* **245.—As. trop.**
laurina, **F. Muell. 3rd Rep. Veg. Viet. 7 i Fcagm. i. 27 = laevis.**
melicopoides, *F. Muell. Fragm.* **v. 8.—Austral.**
Minahassae, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 245. **—Ins. Celebes.**
oblongifolia, **Endl. ex Heynh. Nom. ii. 8 = laevis.**
ovata, **Endl. ex Heynh. 1. c. = Baueri.**
pedunculate **Miq. Fl. Jnd. Bat. Suppl. 532 = laurifolia.**
petiolaris, *A. Gray, Bot. U. S. Expl. Exped. i.* 335. t. **38.—Ins. Fiji.**
Porteri, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* **i. 498.—Malaya,**
retusa, *A. Gray, Bot. V. S. Expl. Exped.* i. 338. t. 34. **—Ins. Samoa.**
Richii, *A. Gray, I. c.* **386. t. 83.—Ins. Samoa.**
simplicifolia, **Steud. Nom. ed. II. i. 21 = Endlicheri.**
tetrandra, *F. Muell. Fragm.* **ix. 104. —Austral. ***
trifoliolata, *Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Ind.* **ii. (1845) 585.—Java,**
vestita, *F. Muell. Fragm.* **iv. 155.—Austral.**

ACROPERA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 172 (1833) = Gongora, Ruiz *Sc* **Pav. (Orchid.).**
armeniaca, **Lindl. in Lindl.** *Sc* **Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 94 = G.armeniaca.**
atropurpurea, **Hort. ex Heynh. Nom. ii. 8 = G. galeata.**
Batemanni, **Lindl. ex Reichb. f. in Gard. Chron. N. S. ii. (1874) I. 322 = G. galeata.**
citrina, **Hort ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 51 = G. galeata.**
cornuta, **Klotzsch, in Otto** *Sc* **Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 186 = G. armeniaca.**
fiavida, **Klotzsch, 1. c. xix. (1851) 217 = G. galeata.**
fuscata, **Hort. Belg. ex Heynh. Nom. ii. 8.—Mexico.**
grandifiora, **Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Napol. 3, nomen.—Hab. ?**
Loddigesii, **Lindl. Gen. et Sp. Orch. 172 = G. galeata.**
luteola, **Hort. ex fieynh. Nom. ii. 8—*fuscata.***
pallida, **Hort. ex Heynh. 1. c = G. galeata.**
purpurea, **Hort. ex Heynh. 1. c = G. galeata.**
sulphurea, **Hort. ex Heynh. 1. c. = *fuscata.***

ACROPETALUM, A. Tnss. in Orb. Diet. vii. 617 (1849) - XEROPETALUM, Delile = Dombeya, Cav. (Stercul.).

ACBOPHYIiIiTTM, Benth. in Maund, Bot. ii. t 95 (1840?). *SAX1FRAGEAE,* **Benth.** *Sc* **Hook. f. i. 65'J. CALYCOMIS, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. [ix.] f July-Oct 1830) 98.**

ACBOPHYIIIIUX :—
venosum, *Benth. in Maund, Bot.* ii. t. 95.—Austral.
vertidllatum. Hook. Bot. Mag. t. 4050=venosum.

ACROPHYLLUM, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 140 (lS43) = Kiggelarta, DC. (Bixin.).
obtusatum, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 233 = K. africana.
obtusum, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 140=K. africana.

ACROPODIUM, Desv. in Ann. Sc. Nat Sér. I. ix. (1826) 408=Aspalathus, Linn. (Legumin.).
suffruticosum. Desv. 1. c = Asp. suffruticosa.

ACROPSELION, Spach, Hist. Vég. Phan. xiii. 163 (1846) = ACROSPELION, Bess. = Trisetum, Pers. (Gramin.).

ACROPTILION, Endl. Ench. 247 (1841)=seq.

ACROPTILON, Cass. in Diet. Sc Nat. 1. 464 (1827) = Centaurea, Linn. (Compos.).
angustifolium, Cass. 1. c. 466=C. Picris.
obtusifolium, Cass. 1. c. 465 = C. Picris.
Picris, DC. Prod. vL 662=C. Picris.
repens, DC. 1. c. 688 = C. Picris.
serratum, Cass. in Diet. Sc. Nat. 1. 466=C. Picris.
subdentatum, Cass. 1. c. 465 = C. Picris.

ACROSAHTHES, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 328 (1837). *FICOIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 855.
DIDASTE, E. Mey. ex Harv. &Sond. Fl. Cap. it 472 (1862).
anceps, *Sond. in Harv. & Sond. 1. c.*—Afr. austr.
angustifolia, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 829.—Afr. austr.
decandra, *Fentl, in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 270. —Afr. austr.
fistulosa, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 328.—Afr. austr.
humifusa, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 472.—Afr. austr.
teretifolia, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 329.—Afr. austr.

ACROSPELION, Bess, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 59=Trisetum, Pers. (Gramin.).

ACBOSFIBA, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Bot. Ser. II. i. (1878) 255. t 84. *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 787.
asphodeloides, *Welw. 1. c*—Afr. trop.

ACROSSANTHES, Presl, Bot Bemerk. 22 (1844)=Vlsmia, VelL (Hypercin.).
Lhotskyanus, Presl. 1. c.=V. decipiens.

ACROSTEMON, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 227 = Orisebachia, Klotzsch (Ericac).
equisetoides, Klotzsch, 1. c. 228.—Afr. austr.
glandulosus, Rach, 1. c. xxvi. (1853-55) 790.—Afr. austr.
hirsutus, Klotzsch. 1. c. xii. (1838) 228.—Afr. austr.
incanus, Klotzsch, 1. c 228 = G. incana.
ineumus, Benth. in DC. Prod. vii. 702.—Afr. austr.

ACROTAPHROS, Steud. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 207. t 88 [1847] = Ormooarpum, Beauv. (Legum.).
bibracteata, Steud. ex A. Rich. 1. c. = O. bibracteatum.

ACROTICHE.Poir. in Diet. Sc. Nat i. Suppl. 50 (1816) .=Acrotrioho, R. Br. (Epacrid.).

ACBOTOME, Benth. in Endl. Gen. 627 (1838). *LABIATAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1206.
hispida, *Benth. in DC. Prod.* xii. 436.—Afr. austr.
inflata, *Benth. 1. c.*—Afr. austr.
paUescens, *Benth. 1. c.*—Afr. anstr.

ACBOTBEMA, Jack, in Malay Misc. i. (1820) Art. V. p. 86. *DILLENIA CEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 13.
Amottianum, *Wight, Illustr. Ind. Bot.* i. 9. t 3.—Ind. or.
bullatum, Thw. Enum. PL Zeyl. 20=uniflorum.
costatum, *Jack, in Malay Misc.* i. (1820) Art. V. p. 36. —Ind. or.; Malaya.
costatum. Wall. Cat. n. 1117B=Amottianum.
dissectum, *Thw. in Hook. Kew Journ,* viii. (1856) 242. —Zeylan.

ACROTREMA:—
Gardneri, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 8.—Zeylan.
intermedinm, *Thw. 1. c.*—Zeylan.
lanceolatum, *Hoot. Ic. PI.* sub 1.157.—Zeylan.
lyratum, *Thw. in Hoot. Kew Journ.* viii. (1856) 242. —Zeylan.
sylvaticum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 2=nniflornm.
Thwaitesii, *Hook. f. Gr Thorns, in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 241.—Zeylan.
uniflorum, *Hook. Ic. PI.* t. 157.—Zeylan.
Walkeri, *Wight, ex Thw. Enum. PI. Zeyl.* 8.—Zeylan.
Wigktianum, Wall. Cat. n. 8669=costatum.

ACROTRICHE, R. Br. Prod. 547 (1810). *EPACRIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 614.
FROEBELIA, Regel, Gartenfl. L (1852) 164. t 18.
affinis, DC. Prod. vii. 757=serrulata.
aggregata, *R. Br. Prod.* 547.—Anstral.
aristata, Benth. in Enum. PL Hueg. 76=Lencopogon cuspidatus.
cordata. K. Br. Prod. 548=ovalifolia.
depressa, *R. Br. 1. c.*—AustraL
divaricate, *R. Br. I. c.* 547.—Austral,
fasciculiflora, *Benth. Fl. Austral,* iv. 229.—Austral.
latifolia, A. Cunn. ex DC. Prod. vii. 757 = Leucopogon cordifolius.
Manglesii, Sond. in Lehm. PI. Prcias. i. 826=ramiflora.
ovalifolia, *R. Br. Prod.* 548.—Anstral.
patula. Hook. f. Fl. Tasm. i. 258=serrulata.
patula, *R. Br. Prod.* 547.—AustraL
prostrata. F. Muell. in Trans. Viet Inst. (1855) 40 = serrnlata.
ramiflora, *R. Br. Prod.* 547.—Austral.
ramifiora, Sond. in Linnaea, xxvi. (1853-55), 251 = fasciculiflora.
serrulata, *R. Br. Prod.* 647.—Anstral.
subcordata, DC. Prod. vii. 757 = ovalifolia.

ACROXIS, Trin. ex Steud. Norn. ed. II. i. 22 (1840) = Muehlenbergia, Schreb. (Gramin.).

ACROZUS, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 145, 149 (1827) =Elaeooarpus, Linn. (Tiliac).
punctatus, Spreng. 1. c =E. Acronodia.

ACRYPHYLLUM, Lindl. Introd. Nat Syst ed. II. 156 (1836) err. typ. = ARCYPHYLLUM, EIL = TephrosU, Lour. (Legum.).

ACTAEA, [Tourn.] Linn. Syst ed. I (1785). *RANUNCULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ L 9.
CHRISTOPHORIANA, Toum. ex Moench, Meth. 276 (1794).
acuminata, Wall. Cat. n. 4726=spicata.
alba, *Mill, Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—Am. bor.
americana, Pursh, Fl. Am. Sept 366=alba.
arguta, Nutt ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 35 = spicata.
aspera. Lour. FL Cochinch. 382.=Tetracera sarmentosa.
brachypetala, var. a, DC. Syst i. 885=alba.
brachypHala, var. 0, DC. 1. c. = spicata.
Christophoriana., Gonan, Fl. Monsp. 152=spicata.
Cimicifuga,Hoak. Fl. Bor. Am. i. 26 = Cimicifuga data.
Cimicifuga, Linn. Sp. PL 604=Cimicifuga foetida.
cordifolia, DC. Syst i. 383 = Cimicifuga cordifolia.
corymbosa. Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 176= spicata.
dahurica, Turcz. ex Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. L 21= Cimicifuga foetida.
davurica, Franch, PL David. 23=Cimicifuga davnrica.
dioica, *Walt. Fl. Carol.* 152.—Carolina.
erythrocarpa, Fisch. ex Fisch. & Mey. lad. Sem. Hort. Petrop. L 20 (1836)=spicata.
frigida. Wall. Cat n. 4725=Cimicifuga foetida.
grandis, D. Dietr. Syn. PL iii. 233 = Trautvetteria palmata.
gyrostachya, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. (1840).—Cf. Linnaea, xv. (1841), Litt. 100 = Trautvetteria palmata.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 221 = Cimicifuga japonica.
longipes, Spach, Hist Vég. Phan. vii. 888=spicata.
macrophylla, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. L (1879) 224 = Anemopsis macrophylla.
macropoda, Turcz. ex Fisch. *Sc* Mey. fide Ledeb. Fl. Ross. i. 73 = Cimicifuga foetida.
monogyna, Walt FL Carol. 151 = Cimicifuga racemosa.
nigra, Ga.it. Mey. & Scberb. FL Wett. ii. 265 = spicata.

ACTAEA :-
orthostathya, Wender. Ind. Sem. Hort Marb. (1840). —Cf. Linnaea, xv. (1841) Litt 100 - Cimicifuga ' racemosa.
paehypoda. Ell. Sketch, it 15 = alba.
palmata, DC. Syst. i. 383=Trautvetteria palmata.
pentacarpa, Michx. ex Ton. *Sc* Gray, Fl. N Am. L 88 =Cimicifuga americana.
pentagyna, Walt Fl. Carol. 151=Cimicifuga americana.
podocarpa, DC. Syst. i. 282 = Cimicifuga americana.
podocarpa, Scbleuht. in Linnaea, vi. (1831) 683= Cimicifuga foetida.
pterosperma, Turcz. ex Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 21 = Cimicifuga foetida.
racemosa, Geners. ex Steud. Norn. ed. II. i. 22 = Cimicifuga foetida.
racemosa, Gilib. Fl. Lituan. ii. 226=spicata.
racemosa, Linn. Sp. PL 504=Cimicifuga racemosa.
racemosa, Walt ex Steud. Norn. ed. II. i. 22=Trautvetteria palmata.
rubra, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 211=alba]
rubra, Willd. Enum. Hort. Berol. 561; Ledeb. Fl. Alt. ii. 275='picata.
simplex, Wormsk. ex Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 21 = Cimicifuga foetida.
spicata, *Linn. Sp. PI.* 504.—Reg. bor. temp.

ACTAEOGETON, Steud. Norn. ed. II. L 22 (1840)-Soirpus, Linn. (Cyperac).

ACTEGETON, Blume, Bijdi. 1148 (1826)=Axima, Lam. (Salvador).
sarmentosum, Blume, 1. c. 1144=A. sarmentosa.

ACTEG1TON, Endl. Gen. 1089 (1840), err. typ.=praec.

ACTEPHTLA, Blume, Bijdr. 581 (1825). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 269.
ANOMOSPERMUM, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 228.
LITHOXYLON, Endl. Gen. 1122 (1840).
bantamensis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 356=excelsa.
excelsa, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 78.—Ind. or.; Malaya,
grandifolia, *Baill. Adansonia,* vi. (1865-66) 330.—Austral.
javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 856=excelsa.
latifolia, *Benth. Fl. Austral,* vi. 89.—Austral,
major, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 77.—Java.
Mooreana, *Baill. Adansonia,* vi. (1866-66) 830.—AustraL
neilgherrensis, Wight Ic. t. 1910=excelsa.
petiolaris, *Benth. Fl. Austral,* vi. 89.—AustraL
puberula, *Kure, in Journ. As. Soc Beng.* xlii. (1873) II. 236.—Ins. Andaman,
rectinervis, *Kurt, in Journ. Bot.* xiiL (1875) 329.—Ins. Nicobar.
sessilifolia, *Benth. Fl. Austral,* vi. 90.—Austral.
Thomsoni, MuelL Arg. in Linnaea, xxxiv. (1863) 66 = excelsa.
teylanica, Muell. Arg. 1. c 77=excelsa.

ACTIMERIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195 sAotinomeria, Nutt. (Compos.).

ACTIM\ANTHTJ8, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 898. *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 903.
syriacus, *Ehrenb. I. c*—As. min.; Syria.

ACTINEA, JBSS. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 425. t. 61 =CephaIophora, Cav. (Compos.).
acaulis, Spreng. Syst. iii. 574 = Actinella acaulis.
alternifolia, Spreng. 1. c. = C. heterophylla.
biternata, Spreng. 1. c.= Coreopsis biternata.
chrysanthemoides, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 298. t 411 = Hymenoxis chrysanthemoides.
commutata, Spreng. Syst. iii. 574=Calea pinnatiftda.
heterophylla, Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 425 = C. heterophylla.
integri/olia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 297. t 410 = Helenium integrifolium.
integrifolia, *Torr. in Ann. Lye. New York,* ii. (1828) 213.—Am. bor.
lanata, Steud. Norn. ed. 1.15=Bahialanata.
oppositifolia, Spreng. Syst iii. 574=Blainvillea bahiensis.

ACTHTELLA, Nutt Gen. Am. ii. 178 (1818). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 414.
PHILEOZERA, Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad.' 1861.' (1862) 459.
PICRADENIA, Hook. Fl. Bor. Am. i. 817. t 108 (1833).
acaulis, *Nutt. Gen. Am.* ii. 173.—Am. bor.
argentea, *A. Gray, in Mem. Am. Ac.* iv. (1849) *{PI. Fendl.)* 100.—N. Mexico,
biennis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 873. —Am. bor. occ.
Bigeloyii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 96, in adnot—Mexico.
Brandegei, *T. C. Porter, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 378.—Am. bor. occ.
cnrysanthemoides, *A. Gray, 1. c.* xix. (1888) 82.—Mexico.
Cooperi, *A. Gray, 1. c.* vii. (1868) 359.—Calif,
depressa, *Harv. & Gray, ex Gray, in Mem. Am. Acad.* iv. (1849) *{PI. Fendl.) 100.—Am.* bor. occ.
glabra, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 379 = acaulis.
grandiflora, *Torr. & Gray,* >« *Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1847) 110.—Am. bor. occ.
insignis, *A. Gray, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. Ia*XVHL (1882-88) 109.—Am. bor. occ.
„?'". Nutt. in Trans. An>. PhiL Soc. N. S. vii. (1841) 379=acaulis.
Unata, Pursh, Fl. Am. Sept.ii. 560=Eriophyllum caespitosum.
lanuginosa, Buckl. in Proc. Ac. Sc Philad. (1862) 459 = scaposa.
leptoclada, *A. Gray, in Pad/. Rail. Rep.* iv. 107.—Am. bor. occ.
linearifolia, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 383.—Texas,
odorata, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* iv. (1849) *{PI. Fendl.)* 101,-Am. bor. occ.
ralmen, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 81. —Mexico.
Richardsonii, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. Rusii. (1841) 379 = biennis.
M^!;i4- Gray in Proc. Am. Acad. ix. (1885)83.—N. Mexico,
scaposa, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 379.—Am. bor. occ
torreyana, Nutt. 1. c. =acaulis.
Vas*fy'. *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) "!»•—Am. bor. occ.

ACTINELLA, Pers. Syn. ii. 469 (1807)=Cephalo-Phora, Cav. (Compos.).
heterophylla, Pers. 1. c. = C. heterophylla.

ACTINIDIA, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 439 (1836). *TERNSTROEMIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 104a
KALOMIKTA, Regel, in Bull. Phys. Math. Acad. Petersb. xv. (1857) 219.
TROCHOSTIGMA, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Wiss. Muench. iii. (1848) 726. t. 2. f. 2.
acuminata, *Budisch. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1888) 167.—Manchur.
arguta, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. i. 58=callosa.
callosa, *Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 439.—Reg. Himal.; Japon.; Manchur.
Champion *Benth. Fl. Hongk.* 26.—China,
cmnensis. *Planch, in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 808.—China,
cordifolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 15.—Japon.
Davidii, *Franch. PI. Davidian.* i. 57.—China,
eriantha, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 55.-Hab. ?
fulvicoma, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 821.—China.
Kolomikta, Maxim. Prim. Fl. Amur. 68 = callosa.
Platyphylla, *A. Gray, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 15__Japon.
polygama, *Franch. &Sav.Enum.Pl.Jap.* i. 59.—Japon.
rufa, Franch. & Sav. 1. c. 58=callosa.
stngosa, *Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc* v. (1861) 55.—Reg. Himal.
suifunensis, Budisch. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 167= acuminata.
volubilis, *Franch. & Sav. Enum. Fl. Jap. i.* 59.—Japon.

ACTINOBOLE, EndL Gen. Snppl. iii. 70 (1848) = Onaphalodes, A. Gray (Compos.).

ACTINOCARPUS, R. Br. Prod. 342 (1810)=Damasonium, Juss. (Alismac.).
australis, Spreng. in Ersch & Gruber, Encyc. i. 848 = D. australe.
Damasonium, Sm. in Rees, Cycl. Suppl. n. 1 = D. stellatum.
europaeus, Spreng. in Ersch & Gruber, Encyc. i. (1818) 348 = D. stellatum.
maior, Bercht & Presl, Rostl. i. Alismac. 8=D. stellatnm.
minor, R. Br. Prod. 343 = D. australe.

ACTUTOCABYA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 846 (1876). *BORAGINEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. ii. 846.
tibetica, *Benth. I. c*—Reg. Himal.

ACTINOCHLOA,Willd. ex Beanv. Agrost. 41 (1812) j et ex Roem. & Schult. Syst ii. (1817) 22. 417=Bouteloua, Lag. (Gramin.).
barbata, Roem. & Schult. 1. c. ii. 420 = B. barbata.
bromaides, Roem. & Schnlt. 1. c. = B. bromoides.
dliata, Willd. ex Beanv. Agrost. 41=Chloris ciliata.
gradlis, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 418 = B. oligostachya.
hirsuta, Roem. & Schult 1. c. 149 = B. hirsuta.
humilis, Willd. ex Beauv. Agrost. 41 = B. prostrata.
juncifolia, Roem. & Schult. Syst. ii. 420 = B. juncifolia.
ovata, Roem. *Sc* Schult. 1. c. = B. ovata.
procumbens, Roem. & Schult 1. c. 417 = B. tenuis.
prostrata, Roem. *Sc* Schult. 1. c. 419 = B. prostrata.
scorpioides, Roem. & Schult 1. c. 420=B. scorpioides.
simplex, Roem. & Schult. 1. c 418 = B. simplex.
tenuis, Willd. ex Beauv. Agrost. 41 = B. tennis.

ACTINOCLADUS, E. Mey. Ind.- Sem. Hort. Regiom. (1846) = Capnophyllum, Gaertn. (Umbellif).
cinerascenSiK Mey. 1. c = C. africanum.

ACTINOCYCLUS, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1857) 14=Pyrola, Tourn. (Ericaa).
secundus, Klotzsch, 1. c.=P. secunda.

ACTINODAPHNE, Nees, in Wall. Fl. As. Rar. ii. 68 (1831). *LAURINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 160.
IOZOSTE, Nees, 1. c. 63 (1831).
IOZOSMENE, Lindl. Introd. Nat. Sys'. ed. II. 202 (1836).
acuminata, *Meissn. in DC. Prod. x\. l.* 211.—Japon.
angustifolia,Hook. f. Sc Thorns, ex Meissn. in DC. Prod. xv. i. 218 = Hookeri.
angostifolia, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 84.—Ind. or.; Malaya,
areolata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 344.—Java.
Blumii, Nees, Syst Laurin. 598=Litsea femiginea.
bomeensis, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 218.—Borneo.
Candolleana, Meissn. 1. c. 219 = speciosa.
celebica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 972.—Ins. Celebes,
chinensis, *Nees, Syst. Laurin.* 600.—China,
cochinchinensis, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 216.—Cochinch.
concolor, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat i. 345 = scleroptera.
concolor, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 31.—Ind. or.
confertifiora, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 216.—Reg. Himal.
corymbosa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 343.—Sumatra.
elegans, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 256.—Zeylan.
furmracea, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 345.—Malaya.
glabra, *Blume, 1. c.* i. 844.—Java,
glauca, *Nets, Syst. Laurin.* 599.—Zeylan.
glomcrata. *Nees, I. c.* 597.—Java,
gracilis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 868.—Sumatra.
heterophylla, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat i. 342 = angustifolia.
hirsuta, *Blume, 1. c.* 345.—Java.
Hookeri, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 218.—Ind. or.
javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 969.—Java,
lanata. *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 219.—Ind. or.
lancifolia, *Meissn. 1. c.* 211.—Japon.
macrophylla, *Nees, Syst. Laurin.* 598.-«Java.
macroptera, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 970.—Sumatra.

ACTnrODAPHITE:—
mollis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I* 343.—Sumatra.
molochina, *Nees, Syst. Laurin.* 603.—Zeylan.
moluccana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 344.—Ins. Molucc.
Moonii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 256= molochina.
nrnltiAoTa, Benth. in Hook. Land. Journ. Bot. ii. (1843, 230.—Ins. Fiji.
obovata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 842.—Ind. or.
pauciflora, *Blume, 1. c.*—Borneo,
pedunculata, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 211.—China,
procera, *Nees, Syst. Laurin.* 605.—Java,
pruinosa, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 68.—Ind. or.
pubescens, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 345.—Malaya.
quercina, *Blume, 1. c.* 344.—Java.
Teticulata, *Meissn. in DC. Prod.* xvi. I. 212.—Ind. or.
rufesccns, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 343.—Malaya.
Rumphii, *Blume, 1. c.* 344.—Ins. Molucc.
salicina, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 212.—Ind. or.
scleroptera, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 972.—Malaya,
scsquipedalis, *Hook. f. & Thorns, ex Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 216.—Ind. or.
Sieboldiana, *Miq. in Zoll. Syst. Veri. Ind. Archip.* 114, 116.—Japon.
sikkimensis, *Meissn. in DC. Prod.* xvi. I. 213.—Reg. Himal.
speciosa, *Nees, Syst. Laurin.* 602.—Zeylan.
sphaerocarpa, *Nees, 1. c.* 605.—Java,
stenophylla, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 256.—Zeylan.
Thvaitesii, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 212 = stenophylla.

ACTINODIUM;, Schau. ex Schlecht in Linnaea, x. (1835) 311. *MYRTACEAE,* Benth. *Be* Hook. f. i. 696.
TRIPHELIA, R. Br. ex Endl. in Enum. PI. Hneg. 48 (1837).
Cunninghami, *Schau. ex Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 440.—Austral.
proliferum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 17 = Cnnninghami.

ACTINOLEMA, Fenzl, PugiL PI. Nov. Syr. 16. t. 12 (1842) = Astrantia, Linn. (Umbellif.).
eryngioides, Fenzl, 1. c.—Oriens.
macrolema, Boiss. Fl. Orient, ii. 831.—Oriens.

ACTIBTOLEPIS, DC. Prod. v. 655 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 899.
HYMENOXYS, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 880 (1841).
anthemoides, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 878.—Calif,
coronaria, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 197. -Calif.
lanosa, *A. Gray, 1. c.*—Utah.
Lemmoni, *A. Gray, 1. c.* xvi. (1881) 101.—Calif,
multicaulis, *DC. Prod.* v. 656.—Calif,
mutica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 197. —Calif.
nivea, *A. Gray, 1. e.*—Calif,
tenella, *A. Gray, I. c*—Calif.
Wallacei, *A. Gray, I. c*—Utah.

ACTOTOMEHIS, Nutt. Gen. Am. ii. 181 (1818). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 379.
ACTIMERIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195.
PTEROPHYTON, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 76.
RIDAN, Adans. Fam. ii. 130 (1763).
alata, Nutt. Gen. Am. ii. 181 = Verbesina occidentalis.
alba, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 835.—Am. bor.
alternifolia, DC. Prod. v. 572 = squarrosa.
Ellioti, *Rafin. New Fl. Am.* i. 61.—Am. bor.
helianthoides, *Nutt. Gen. Am.* ii. 181.—Am. bor.
heterophylla, *Chapm. in Coult. Bot. Gat.* iii. (1878) 6. —Am. bor.
longifolia, *A. Gray, in Smithson. Contrib.* v. (1853); *PI. Wright,* ii. 89.—Arizona,
nndicaulis, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 364.—Florida.
oppositifolia, DC. Prod. v. 575 = helianthoides.
oppositifolia, Fresen. Ind. Sem. Hort. Francof. (1836) =squarrosa.
ovata, *Nutt. Gen. Am.* ii. 181.—Mexico.

ACTINOMEBIS :—
panciflora, *Nutt. in Am. Joum. Sc.* v. (1822) 301.—Florida.
pedunculosa, DC. Prod. v. 576 = Verbesina Capitaneja.
procera, Steud. Nom. ed. II. i. 28 = squarrosa.
squarrosa, *Nutt. Gen. Am.* ii. 181.—Am. bor. occ.
stricta, *Hemsl. Biol. Certtr. Am. Bat.* ii. 186.—Mexico,
tetragona, *DC. Prod.* v. 676.—Mexico,
tetraptera, *DC. 1. c.* 575.—Mexico.
Wrightii, *A. Gray, m Mem. Am. Acad.* iv. (1849) {*PL Fendl.)* 85.—N. Mexico.

ACTINOMORPHE, Miq. Comm. Phjt. 102 (1840) = **Heptapleurum,** Gaertn. (Areliac).
humilis, Miq. 1. c. = H. parasiticnm.

ACTINOPAPPUS, Hook. f. ex A. Gray, in Hook. Kew Joam. iv. (1852) 226 = **Butidoeis,** DC. (Compos.).
Drummondii, A. Gray, 1. c. = R. Pumilio.
perpusillus, Hook. f. ex A. Gray, 1. c = R. Pumilio.

ACTTNOPHORA, Wall. Cat n. 1163 (1832) = **Schoutenia**, Korth. (Tiliac).
fragrans, Wall. 1. c. = S. ovata.

ACTINOPHYLLUM, Ruiz & Pav. Prod. 51. t. 8 (17!>4) = SciadophyIliun, P. Br. (Araliac).
acuminatum, Pav. in Mem. Acad. Med. Madr. i. (1797) 196 «S. acuminatnm.
angulatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 92 = S. Humboldtianum.
angulatum, Pav. in Mem. Acad. Med. Madr. i. (1797) 194 = S. angulatum.
conieum, Pav. 1. c. 195 = S. conicum.
digitatum. Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 28 = S. digitatum.
divaricatum, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 42 = S. divaricatum.
farinosum, Blume, 1. c. 43 =• S. tomentosum.
pedicellatum. Pav. in Mem. Acad. Med. Madr. i. (1797) 195 = S. pedicellatum.
pentandrum, Pav. 1. c. 197 = S. pentandrum.

ACTLNOBH V TIS, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 184. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 889.
calapparia, *H. Wendl.* c* ***Drude,** I. c*—Malaya.

ACTINOSCHOEKrUS, Benth. in Hook. Ic. PI. xiv. 83.1.1346 (1881). *CYPERACEAE*, Benth. *Sc* Hook, f. iii. 1068.
ARTHKOSTYLIS, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1873) . 523.
chinensis, *Benth. I. c*—Hongkong,
nliformia, *Benth. I. c*—Zeylan.
Thouarsii, *Benth. I. c*—Madag.

ACTINOSPERMUM, Ell. Sketch, ii. **448** (1824) = **Baldwinia,** Nutt. (Compos.).
angustifolium, Torr. *Sc* Ciray, Fl. N. Am. ii. 389 = B. multiflora.
multiflorum, Ell. Sketch, ii. 441 = B. multiflora.

ACTINOSPORA, Turcz. ex Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 21 (1835) = **Cimlciftlga,** Linn. (Ranunc).
dahurica, Turcz. ex Fisch. & Mey. 1. c = C. davnrica.
frigida, Msch. & Mey. 1. c. = C. frigida.
ptcrosperma, Walp. Rep. i. 60 = C. davurica.
Wallichii, Meissn. Gen. Comm. 4 = C. foetida.

ACTINOSTEMA, Lindl. Veg. Kingd. 281 (1846) err. typ. = ActinoBtemon, Mart. (Euphorb.).

ACTINOSTEMMA, Griff. PI. Cantor, 24. t. 3 (1887?). *CUCVRBITACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 888.
MITROSICYOS, Maxim, in Ann. Sc Nat Ser. IV. xiii. (1860) 95.
POMASTERION, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. ii. (1865) 80.
japonicum, Miq. 1. c. iii. 188 = racemosum.
lobatum, *Maxim, in Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* i. 175.—Japon.
paniculatum, *Maxim, ex Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 920.—China,
racemosum, *Maxim, ex Cogn. I. c.* 922.—China.

ACTHTOSTEMMA :—
tenerum, *Griff. PI. Cantor*, 25. t. &—Ind. or.
tenerum, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. V. (1866) 39-lobatum.

ACTINOSTEMON, Mart, ex Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 184. *EUPHORBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 388.
DACTVLOSTEMON, Klotzsch, 1. c 181.
acuminatus, Baill. Etud. Gen. Euphorb. 532. t. 5 = concolor.
angustifolius, Klotzsch, ex Regel, Gartenfl. (1859) 863 = concolor.
caribaeus, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 168.—Bras.; Ind. occ.
concolor, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1193 = caribaeus.
cuneatus, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 585.—Bras,
echinatus, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxii. (1863) 107.—Bras.
furcatus, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gen. Euph. 532 = caribaeus.
grandifolius, Baill. 1. c. = caribaeus.
imbricatus, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 216.—Bras.
Klotzschianus, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 334 (= ***Dactyiostemon grandifolius).***
lanceolatus, *Saldanha, in Baill. I. c.* viii. (1867-68) 263.—Bras.
lasiocarpoides, *Baill. I. c.* v. (1864-65) 834.—Bras,
lasiocarpus, *Baill. I. c*— Bras,
macrocarpns, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 597.—Bras.
marginatus, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gen. Euph. 582 = caribaeus.
mnltiflorus, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxii. (1868) 111.—Bras,
oligandrus, *Baill. Adansonia*, v. (1864-65) 335.—Bras.
polymorphus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 108 = caribaeus.
sessilifolius, Klotzsch, Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1851) 13=caribaeus.
Sprengelii,* Baill. Etud. Gen. Euph. 338 *(= Dactyiostemon Klottschii).
trachycarpus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 591.—Bras,
verticillatus, *Baill. Adansonia*, v. (1864-65) 884.—Bras.

ACTINOSTIGMA, Tnrcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxii. (1859) 259 = **Seringia,** J. Gay (Sterculiac).
lanceolatum, Turcz. 1. c—Austral.

ACTINOSTIGMA, Welw. Apont. 560 (1858) = **Symphonia,** Linn. f. (Gutlif.).
spedosum, Welw. 1. c. = S. globulifera.

ACTINO8TBOBU8, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 644 (1845). *CONIFERAE*, Benth. & Hook. £ iii. 425.
acuminatus, *Parl. Ind. Sem. Hort. Florent.* (1862) 25.—Austral.
pyramidalis, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.* i. 644.—Austral.

Acrnrorus, L»MH. PI. NOV. Hon. i. 67. 1804).
UMBELL1FERAE, Benth. & Hook. f. i. 880, 1008.
ERIOCALIA, Sm. Exot. Bot t. 78, 79 (1806).
HEMIPHUES, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 469.
HOLOTOME, Endl. Gen. 766 (1839).
bellidioides, *Benth. Fl. Austral*, iii. 369.—Austral.
Gibbonsii, *F. Muell. Fragm.* vi. 23.—Austral,
glomeratus, *Benth. Fl. Austral*, iii. 869.—Austral.
Helianthi, *Labill. PI. Nov. Holl.* i. 67. t. 92.—Austral.
leucocephala, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 56.—Austral, minor, *DC. Prod.* iv. 83.—Austral.
Novae-Zealandiae, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 324.—N. Zel.
omnifertilis, *F. Muell. ex Benth Fl. Austral,* iii. 868.—Austral,
rhoraboideus, *Benth. Fl Austral*, iii. 368.—Austral.

ACTIPSIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 43 (1886) = **Bolidego,** Linn. (Compos.).
glomerata, Safin. 1. c = S. glomerate.
squamosa, Rafin. **I.** c. = praec.1

ACTISPERMUM, Rafin. **New** Fl. Am. i. 61 (1886) (= ACTINOSPERMUM, Ell.) - **Baldwinia,** Nutt. (Compos.).

ACUAN, Medic. Theod. 62 (1786) = **Desmanthus.** Willd. (Legum.).
arboreum. Medic 1. c.—Hab. ?
virgatum, Medic. 1. c. = D. virgatus.

ACUBA, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 886 (1822), sphalm. = **Auouba,** Thunb. (Comae).

ACUBALUS, Neck. Elem. ii. 167 (1790) = **Cuoubalus,** Tourn. (Caryophyll.).

ACUNA, Endl. Gen. 759 (1839) = seq.

ACUNNA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 69.1.12 (1794) = **Befaria,** Mutis (Ericac).
lanceolata, Cav. ex DC. Prod. vii. 781 = B. coarctata.
lanceolata, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. 124 = B. aestuans.
oblonga, Ruiz & Pav. 1. c. 123 = B. oblonga.

ACURA, Hill.>Veg. Syst. v. 52 (1769) (Compos.).

ACUROA, T. F. Gmel. Syst. 1088 (1791) = ACOUROA, Aubl. = Ecastaphyllura, P. Br. (Legum.).

ACUSTON, Rafin. Sylva Tellur. 181 (1838) = Farsetia, Desv. (Crucif.).
clypeatum, Rafin. 1. c. 181 = F. clypeata.
lunaroides, Rafin. 1. c. = F. lunarioides.

ACYNOS, Pers. Syn. ii. 131 (1807) (err. typ. '151'). = ACINOS, Rnpp. = **Calamlntha,** Moench (Labiat).

ACYNTHA, Medic Theodora, 76 (1786) - **Sanseviera,** Thunb. (Haemodor.).
guinensis, Medic 1. c = S. guineensis.

ADA, Lindl. Fol. Orch. (1853). *ORCH1DEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 566.
aurantiaca, *Lindl. I. c.—H.* Granat

ADAMANTOGETON, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 165 (1842) = IiagenoearpuB, Nees, (Cyper.).

ADAMBEA, Lam. Encyc. 39 (1783) = **Lageratroamia,** Linn. (Lythrar.).
glabra, Lam. 1. c = L. Flos-reginae.
hirsuta, Lam. 1. c = L. hirsuta.

ADAMBOE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 73 (183(5) = **Argyreia,** Lour. (Convolv.).
bicolor, Rafin. 1. c. = A. tiliaefolia.

ADAMIA, Wall. Tent. Fl. Nep. 46. t. 36 (1824) = **Dichroa,** Lour. (Saxifrag.).
chinensis, Gardn. *Sc* Champ, in Hook. Kew Joum. i. 811 (1849) = D. febrifuga.
cyanea. Wall. Tent. Fl. Nep. 46. t. 36 = D. febrifuga.
sylvatica, Meissn. in Walp. Rep. ii. 877 = D. febrifuga.
versieolor, Fortnne, in Lindl. Joum. Hort. Soc i. (1846) 298 = D. febrifuga.

ADAMSIA, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 366, 367, in syn. (1821) = **O«tun,** Linn. (Rosac).
anemonoides, Fisch. ex Steud. 1. c. 366 = G. anemonoides.
glacialis, Fisch. ex Steud. I. c. 366 = G. glaciale.
reptans, Fisch. ex Steud. 1. c. 367 = G reptans.
rotundifolia, Fisch. ex Steud. 1. c. = G. rotundifolinm.

ADAMSIA, Willd. in Mag. Ges. Naturf. 'Fr. Berl. ii. (1808) 16 = **Puflchiinla,** Adams (Liliac).
sdlloides, Willd. 1. c. = P. scilloides.

AUANSOITIA, Linn. Sp. PI. 1190 (1763). *MALVACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 209.
BAOBAB, Adans. Fam. ii. 399 (1763).
OPHELUS, Lour. Fl. Cochinch. 412 (1790).
Bahobab, Linn. Sp. PI. ed. II. 960 = digitata.
Baobab, Gaert. Fruct. **ii. 253.** t. 135 = digitata.

ADAHBOHIA :—
digitata, *Linn. Sp. PI.* 1190.—Aft. trop.; Ind. or.
Gregorii, *F. Muellin Hook. Km Journ. is.* (18571 14. —Austral.
integrifolia, Rafin. Sylva Tellur. 149-A. Sitnla.
madagascariensis, *Baill. Adansonia,* xi. (1878-78) 251. —Madag.
microphylla, A. Rich. FI. Cub. Fanerog. il 825, lapsu =Adelia microphylla.
pedunculosa, A. Rich. 1. c. lapsu=Adelia pedunculosa.
Scutula, Steud. Norn. ed. II. i. 21, sphalm.=seq.
Situla, *Spreng. Syst.* iii. 124.—Afr. or.

ADAPHUS, Neck. Elem. ii. 240, *(1790)=IaamiB,* Toum.

ADA.TODA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 60 (1886) = Justicia, Linn. (Acanth.).
arborea, Rafin. 1. c. 61=J. Adhatoda.
Betonica, Rafin. 1. c.=J. Betonica.
repens, Rafin. 1. a—Hab. ?

ADELANTHUS, Endl. Gen. 132T. n. 6839; Suppl. ii. 80 (1841)=Pyrenaoaatha, Wight (©lacin.).
grandiflorus, Harv.ex Baill. Adansonia, x. (1872) 271 "P. grandiflora.
scandens, Endl. ex Baill. in DC. Prod. xvii. 18 = P. scandens.

ADELASTER, LindLin Proc. Roy. Hort. Soc. i. (1861) 668; Lem. in Illustr. Horde, t. 820=Branthemum Linn. 11 (Acanthac).
albivenis, Lindl. 11. cc—Hab. ?

ADELBERTIA, Meissn. Gen. PI. 114 (1887)=Merl. anla, Sw. (Melast).
calophyUa, Meissn. 1. c. *{=Davya calophylla).—Bna.*

ADELIA, P. Br. Nat. Hist. Jamaic. 361 (1766)=Fores-Uepa, Poir. (Oleac.).
acuminata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 225 = F. acuminata.
eassinioides, Steud. Nom. ed. II. i. 24 = F. cassinoides.
Ugustrina, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 224 = F. ligustrina.
<»>*ata,* fDesf.] Hort. Par. ex Pers. Syn. ii. 6S5.—Am. bor.
Porulosa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 221 = F. porulosa.
virgata, Poir. Encyc. Suppl. i. 182=Sccurinega buxifolia.

ADEMA, Linn. Syst. ed. X. (1759) 1298. *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 312.
RICINELLA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865) 153.
Aeidoton, Blanco, FI. Filip. ed. L 815-Sumbavia rottleroides.
Aeidoton, *Linn. Syst.* ed. X. 1298; *PI. Jam. Pugill.* 29.—Jamaica; Cuba.
anomala, Jnss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 24=ovata.
anomala, Poir. Encyc. Suppl. i. 182 - Erythrococca aculeata.
barbata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 561=Mallotus ncinoidea.
barbinervis, *Cham. & Schleckt. in Linnaea,* vi. (1881) 862.—Mexico.
Bernardia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 811=Mallotus ricinoides.
Bernardia, linn. Syst. ed. X. 1298=Bernardia dichotoma.
caperoniaefolia, Baill. Adansonia, iv. (1861) 876 = Bernardia caperoniaefolia.
castanicarpa, Roxb. Fl. Ind. iii. 848-Chaetocarpus castanocarpus.
celastrinea, Baill. Adansonia, iv. (1864) 876= Bernardia axillaris.
cordifolia, *Roxb. Fl. Ind.* Hi. 819.—Ins. Molucc.
cuneata, Wall. Cat. n. 7961 = Homonoia retusa.
dodteandra, Sesse, ex Cav. in Anal. Cienc Nat. v. (1802) 254 = Bernardia interrupta.
ftrruginea, Poit. ex Baill. Etud. Gen. Euph. 418 = Bemardia leprosa.
glandulosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 814 = Alchornea javensis.
graeilis, Salisb. Prod. 888-A. Aeidoton.
hrsutiuima. Baill. Adansonia, iv. (1861) 872 = Bernardia peduncularis.
Houlletiana, Baill. 1. c. 873 - Bemardia axillaris.
javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. u. 888.—Java.

ADELIA:—
Martii, Spreng. Syst iii. 147=Bernardia axillaris.
microphylla, *A. Rick. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 209.—Cuba.
monoica, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 561=>Mallotus moluccflnus.
myrtifolia, *Vent, ex Spreng. Syst.* iii. 117.—Hab.?
nereifolia, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 876 = Homonoia riparia.
oaxacana, *Hemsl. Bio!. Centr. Am. Bot.* iii. 129.—Mexico.
papillaris, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 562-Mallotus Zollingeri.
pedunculosa, *A. Rich. Ft. Cub. Fanerog.* ii. 210.—Cuba.
pulchella, Baill. Adansonia, iv. (1861) 371=Bernardia pulchella.
resinosa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 562=Claoxylon Wallichianum.
retusa, Wight, Ic t. 1869 = Homonoia retusa.
Ricinella, *Linn. Syst.* ed. X. 1298; *PI Jam. Pugill.* 29.—Ind. occ
scabrida, Baill. Adansonia, iv. (1801) 878=Bernardifl axillaris.
scandens, *Span, in Hoot. Comp. Bot. Mag.* L (1835) 350, nomen.—Malaya.
sparHoides, Baill. Adansonia, v. (1865) 319 = Bemardia spartioides.
sylvestris, *Griseb. in Goett. Naehr.* (1865) 171.—Cuba.
tamanduana, Baill. Adansonia, iv. (1861) 371 = Bemardia tamanduana.
timoriana, *Span, in Hook. Comp. Bot. Mag.* 1. (1835) 350, nomen.—Ins. Timor,
triloba, *Hemsl. BioL Centr. Am. Bot.* iii. 180.—Panama.

ADELIO1DES, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, i. 59 (1863) = seq.

ADELIOPSIS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. I. Add. 136 (1862). *MENISPERMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. Uen. i. I. Add. 136; i. 964.
ADELIOIDKS, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, i. 59 (1868).
decumbens, Benth. 1. c.; et Fl. Austral, i. 59.—Austral.

ADELMANNIA, Reichb. Consp. 110 (1828)-Borriohia, Adans. (Compos.).

ADELOBOTBY8, DC. Prod. iii. 127 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 750.
SARMENTARIA, Nand. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xviii. (1852) 110.
SPHANELLOPSIS, Steud. ex Naod. I. c. 187.
XKBACINA, Rafin. Sylva Tellur. 98 (1838).
adscendens, *Triana, in Joum. Bot.* v. (1867) 210.—Am. ttop.
barbata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 68.—Bras.
ciliata, *Triana, 1. c.* 68.—Guiana,
fuscescens, *Triana, I. c*—N. Granat.
laxiflora, *Triana, 1. c.*—Guiana.
Lindeni, *Naud. in Belg. Horde,* xv. (1865) 98.—Bras,
rottmdifolia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 68—Bras.
scandens, *DC. Prod.* iii. 127.—Guiana.
scandens, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 99 = adscendens.

ADELODA, Rafin. Kl. Tellur. iv. 61 (1836) = Jufl ticia, Linn. (Acanthac).
integra, Rafin. 1. c—Hab. ?
serrata, Rafin. 1. c = J. serrata.

ADELONEMA, Schott, Prod. Aroid. 316 (1860) = Homolonema Schott (Aroid.).
erythropus, Schott, 1. c. 817.—Bras.

ADELONEITGA, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 82. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 885.
Geelvinkiana, *Becc. t. c*—Malaya,
variabilis, *Becc. I. c*—Malaya.

ADEIiOSA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 176 (1850). *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1153.
microphylla, *Blume, I. c*—Madag.

ADELOSTEMMA, Hook. f. in Hook. Ic. PI. xv. (1888) 22. *ASCLEPIADEAE.*
gracillimum. *Hook./. 1. c.*—Burma.

ADELO8TIGMA, Steetz, in Petei-s, Reise Mossamb. Bot. 128 (1863). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. *I.* ii. 285.
athrixioides, *Steett, 1. c.* 130.—Afr. trop.
senegalensis, *Benth. in Hook.'Ic. PI.* t 1144.—Afr. trop.

ADENACANTHUS, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 *ic* 106 (1832) = 8trobilanthes, Blume (Acanthac).
acuminatus, Nees, 1. c. iii. 81 = S. acuminatus.
latifolia, Nees, in DC. Prod. xi. 197.—Hab. ?

ADENACHAENA, DC. Prod. vi. 19 (1837) = PhymaBpennum, Less. (Compos.).
UptophyUa, DC. 1. c.=P. leptophyllum.
parvifolia, DC. 1. c. = P. parvifolium.
pubescens, DC. 1. c. 19.—Afr. austr.

ADENAMDBA, Willd. Enum. Hort. Berol. 256. (1809). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 290.
GLANDULIFOLIA, WendL Collect, t. 83, 87 (1808).
HAENKAEA, Usteri, Ann. Bot. vi. (1793) 117.
HAENKEA, F. W. Schmidt, Neue u. Seltne Pfl. 19 (1798); nomen prius.
OCENIA, F. G. Dietr. Lex. Gaert. Nachtr. v. 307 (1819).
OCKEA, F. G. Dietr. 1. c i. 165 (1815).
OCKENIA, Steud. Nom. ed. II. 21. (1810).
OKEA, Steud. 1. c. ed. I. 562 (1821).
acuminata. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 88=amoena.
alba, *Roem. & Schult. Syst.* v. 151.—Afr. austr
altemifolia, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 52.—Afr. austr.
amoena, *Bartl. & Wendl.f. Diosm.* 80.—Afr. austr.
amoena, Link, Enum. Hort. Berol. i. 239=fragrans.
Bartlingiana, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 101 = viscida.
biseriata, *E. Mey. ex Bartl. & Wendl.f. Diosm.* 75.—Afr. austr.
brachyphylla, *Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) 199.—Afr. austr.
calycina, *Steud. Nom.* ed. II. i 24.—Afr. austr.
ciliata, *Sond. in Han. & Send. Fl. Cap.* i. 388.—Afr. austr.
dstoides, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 100=biseriata.
cordata, Link,-Enum. Hort Berol. i. 289 = Barosma serratifolia.
coriacea, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 100 ex Sond. in Harv. *Sc* Sond. FL Cap. i. 389=macrodenia.
coriacea, Bartl. *Sc* WendL f. Diosm. 75=biseriata.
coriacea, *Lichtst. in Roem. & Schult. Syst.* v. 452.—Afr. austr.
crenata, Willd. ex Bartl. *Sc* WendL f. Diosm. 8£=umbellata.
cuspidata, Eckl. & Zeyh. Enum. 101 ex Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 885 = obtunta.
cuspidata, *E. Mey. ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 87.* —Afr. austr.
fragrans, *A. Gonault, in Rev. Hortic.* Sér. IV. i. (1852) 821.—Afr. austr.
fragrans, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 99=serpyllacea.
fragrans, *Roem. & Schult. Syst.* v. 451.—Afr. austr.
glandulosa, Lichtst. ex Roem. *Sc.* Schult. Syst. v. 160= umbellata.
graeilis, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 101.—Afr. austr.
humilis, *Eckl. & Zeyh. 1. c.* 99.—Afr. austr.
intermedia, EckL *Sc* Zeyh. 1. c. 99=marginata.
Kraussii, *Meissn. in Flora,* xxvii. (1844) 801.—Afr, austr.
lasiantha, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 390.—Afr. austr.
linearis, A. Juss. in Mem. Mus. Par. xiL (1825) 471 = uniflora.
linifolia, *Bartl. in Linnaea,* xvii. (1843) 859.—Afr. austr.
macradenia, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 389.—Afr. austr.
marginata, Eckl. & Zeyh. Enum. 99=linifolia.
marginata, *Roem. & Schult. Syst.* v. 152.—Afr. austr.
mundiaefolia, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 99.—Afr. austr.
mnraltioides, *Eckl. & Zeyh. I. c.* 106.—Afr. austr.
obtusata, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 835.—Afr. austr.
ovata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 239= amoena.

ADENANDRA :—
pnbesccns, *Sond. in Hani. & Sond. Fl. Cap.* i. S85.— Afr. austr.
rosmarinifolia, A. Juss. in Mem. Mns. Pur. xii. (1825) 471 = marginata.
rotundifolia, *Eckl. & Ztyh. Enum.* 101.—Afr. anstr.
rugosa. Otto, ex Steud. Nom. ed. II. i. 24 = umbellata.
Schmidtiana, *Steud. I. c.*—Afr. iiustr.
serpyllacea, *Bartl. ir Linnaea,* xvii. (1843) 859.—Afr. austr.
serratifolia. Link, Enum. Hort. Berol. i. 289 = Barosma serratifolia.
speciosa, Link, 1. c. =nmbellata.
tetragona. Sweet, Hort Suburb. 45=Acmadenia tetragona.
trigona, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 100.—Afr. austr.
umbellata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 267.—Afr. austr.
uniflora, E. Mey. & Drege, in Harv. & Sond. FL Cap. i. 891 = serpyllacea.
uniflora, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 256.—Afr. austr.
villosa, Eckl. & *Zeyh.* Enum. p. 101 = pubescens.
villosa, Hort. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 388 = uniflora.
villosa, Lichtst. ex Roem. & Schult Syst v. 452 = cuspidata.
viscida, *EM. & Zeyh. Enum.* 101.—Afr. austr.
Wendlandiana, Eckl. & Zeyh. Enum. 100=umbellata.

ADENANTHEKA, Royen, ex Linn. Coroll. Gen. 7 (1737). *LEGUMINOSAE,* Benin. & Hook. f. i. 590.
GONSII, Adans. Fam. ii. 818 (1768).
PONGELION, Adans. Fam. ii. 819 (1768).
abrosperma, *F. Muell. Fragm.* v. 30.—Austral.
aculeata, Roxb. Hort. Beng. 90; Fl. Ind. it 37 = Prosopis spicigera.
bieolor, *Moon, Cat. PI. Ceyt.* 84, *ex Thw. Enum. PI. Zeyl.* 98.—Zeylan.; Malaya.
Bonplandiana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 311 = Entada polystachya.
chrysostachys, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1852) 843=Piptadenia chrysostachys.
circinalis, DC. Prod. ii. 446 = Pithecolobium clypearia.
falcata, *Linn. Diss. Herb. Amb.* 14 *{Amoen. Acad.* iv. 124).—Ins. Molucc.
Falcataria, Linn. Sp. PI. ed. II. 550 = falcata.
Gersenii, *Scheff. in Flora,* Hi. (1869) 807.—Malaya,
glauca, *Span, in Hoot. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 347, nomen.—Malaya.
Gogo, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 358 = Entada scandens.
microspenna, *Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdsckr. Ned. Ind.* xxvii. (1864) 58.—Java.
oudhensis. J. L Stewart, ex Brand. For. Fl. Ind. 168 = Piptadenisi oudhensis.
pavonine, *Linn. Sp. PI.* 884.—As. trop.; Malaya,
polita, *Mtq. Fl. Ind. Bat.* i. 47.-Malaya.
scandens, Forst f. Prod. 33 = Entada scandens.
scandens, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. ' (1865) 840 = Entada Adenanthera.
tetraptera, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 213 = Tetrapleura Thonningii.
triphysa, Dennst Schluess. Hort. Malab. 32=Ailanthus malabarica.

ADENANTHES, Knight, Prot. 96. (1809) = seq.

ADEKANTHO8, Lahill. PI. Nov. Holl. i. 28. t. 36 (1804;. *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 173.
apiculaia, *R. Br. Prod. Suppl.* 9.—Austral.
armata, Meissn. in DC. Prod. xiv. 313 = pungens.
barbigera, *Lindl. Swan Riv. App.* 36. n. 182.—Austral.
crenata, Willd. ex Spreng. Syst. i. 472 = cuneata.
cuneata, *Labill. PL Nov. Holl.* i. 28. t. 36.—Austral.
Cunninghamii, *Meissn. in Lekm. PI. Preiss.* i. 513.— Austral.
Detmoldi, *F. Muell. Fragm.* viii. 149.—Austral.
Dobsoni, *F. Muell. 1. c.* vi. 204.—Austral.
Drummondii, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. B14 = apiculata.
filifolia, *Benth. Fl. Austral,* v. 855.—Austral.
flabellifol'a, [Salisb. in] Knight, Prot. 96 = cuneata.
flavidiflora, *F. Muell. Fragm.* i. 157.—Austral.
Forrestii, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 230.—Austral,
linearis, *Mtissn. in DC. Prod.* xiv. 311.—Austral.

ADENANTHOS :—
Meissneri, *Lehm. PI. Preiss.* i. 512; ii. 248.—Austral,
obovata, *Labill. PL Nov. Holl.* i. 29. t 87.—Austral.
procumbens, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 512; ii. 248 =apiculata.
pungens, *Meissn. I. c.* i. 615.—AustraL
sericea, *Labill. PI. Nov. Holl. i.* 29. t. 88.—Austral,
terminals, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.x.* (1810) 152.— Austral.
velutina, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 312.—Austral,
venosa, *Meissn. I. c.*—Austral.

ADENANTHUS, Roem. *Sc* Schult Syst. iii. 22, 397 (1818)=praec.

ADENARIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 185. t. 549 (1823). *LYTHRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 777.
floribunda, *H. B. &• K. I. c.* 188. t. 549.—N. Granat.
griseleoides, H. B. & K. 1. c. 185 = floribunda.
Tanceolata, *Beurling, in Vet. Aiad. Handl. Stockh.* (1854) 124.—Panama.
parvifolia, Hook. Ic. PL t 166 = floribunda.
purpurata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.vi. 185=floribunda.

ADENARIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266 =Arenaria, Linn. (Caryophyll.).
marinum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 645 = Aren. peploides.
maritimum, Rafin. New Fl. Am. i. 62=Aren. peploides.
peploides, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266 = Aren. peploides.

ADENEIiEUTEBOPHOBA, Rodrig. Orch. Nov. ii. 170 (1881). *ORCHIDEAE.*
graminifolia, *Rodrig. 1. c.* 171.—Bras.

ADENEMA, G. Don, Gen. Syst iv. 201 (1837)-**Eni**costema, Illume (Gentian.).
hyssopifolium, G. Don, 1. c = R littorale.

ADENESMA, Griseb. in DC. Prod. ix. 65 (1845) = praec.

ADENIA, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 77 (1776)-Modecca, Linn. (Passif.).
venenata, Forsk. 1. c.—Arabia.

ADENIA, Torr. Fl. New York, ii. 1122 (1843) **=Pilea,** Lindl. (Urtic.).
pumila, Torr. 1. c = P. pumila.

ADENILEIMA, Reichb. Nom. 169 (1841) =seq.

ADENILEMA, Blume, Bijdr. 1120 (1826) **=NelIlla,** D. Don (Rosac.).
fallax, Blume, 1. c. 1121 = N. thyrsiflora.

ADENILEMMA, Hassk. Cat Hort. Bogor. Alt 170 (1844) = piaec.

ADEHTUM, Roem. & Schult Syst iv. 35 & 411 (1819). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 722.
arboreum, *Ehrenb. Symb. Pkys.* 4.—Afr. trop.
Honghel, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 412,—Afr. trop.
Honghel, Lindl. Bot. Reg. xxxii. t. 54 = obesum.
multi riorum, *Klotasch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 279.—Afr. trop.
namaquanum T. Wylty, ex Harv. Thes. Cap. ii. 11. t 117 = Pachypodium namaquanum.
obesum, *Roem. &° Schult. Syst.* iv. 411.—Arab.; Afr. trop.
speciosum, *Fentl, in Situb. Acad. Wien. Math. Nat.* Ii. *Abth.* II. (1865) 140.—Afr. trop.

ADENOBASIUM, Presl, Symb. Bot L 39. t 27 (1880) = Sloanea, Linn. (Tiliac.).
obtusifolium, Moric. PL Nouv. 83. t 55=S. obtusa.
salici/olium, Presl, Symb. Bot L 40. t. 27=S. monosperma.

ADENOCALYMMA, EndL Ench. 347 (1841) =seq.

ADENOCALYMMA, Mart, in Meissn. Gen. 300(208) et in DC. Prod. ix. 199 (1840). *BIGNONIACEAE,* Benth & Hook. f. ii. 1036.
LEGUMINARIA, Bar. Monog. Bignon. 42 (1864).

ADENOCALYMNA :—
MEMORA, Miers. in Proc Roy. Hort Soc iii. (1863) 185.
PACHYPTERA, DC. Prod. ix. (1840) 175.
acutissimum, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 3»6.—Bras.
alliaceum, Miers, 1. c. 394 = Bignonia alliacea.
brachybotrys, *DC. Prod.* ix. 208.—Guiana,
bracteatum, *DC. 1. c.* 200.—Bras,
bracteolatum, *DC. 1. c.* 200.—Bolivia,
divaricatum, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 890.—Bras,
comosum, *DC. Prod.* ix. 201.—Bras,
coriaceum, *DC. 1. c.* 202.—Bras,
flavidum, *Miers, in Ann.* fir *Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 889.—Bras,
flavum, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 202.—Bras,
floribundum, *DC. Prod.* ix. 201.—Bolivia,
grandifolium. *Mart, ex DC. I. c.* 199.—Bras.
Guillemim, *DC. I. c.* 202.—Bras,
inundatum, *Mart, ex DC. 1. c.* 201.—Bras.
japurense, Mart, ex DC. 1. c 203.—Bras.
laevigatum, Mart tx DC. 1. c. 200 = marginatnm.
lanceolatumJ *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 390.—Bras.
longeracemosum, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 201.—Bras.
macranthum, Mart ex. DC. 1. c. 203.—Bras,
macrophyllnm, *DC. 1. c.* 199.—Bras,
macrostachyum, *Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 180.—Bras.
magnificum, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 202.—Bras,
marginatum. *DC. 1. c.* 200.—Bras,
nitidum. *Mart, ex DC. 1. c.*—Bras,
prasinum, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 395.—Bras.
paniculatum, *Benth. ex Miers, 1. c.* 393.—Bras,
pliciflorum, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 202.—Bras,
prehensile, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 388.—Bras.
Salzmanni, *DC. Prod.* ix. 200.—Bras,
scabriusculum, *Mart, ex DC. 1. c.* 201.—Bras,
scansile, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 388.—Bras.
sepiarium, Mart ex DC. Prod. ix. 200=nitidum.
stiidula, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 392.—Bras.
N subsessilifolium, *DC. Prod.* ix. 199.—Bras.
verruciferum, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vii. (1861) 398.—Bras.

ADENOCALYX, Bert ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 330 Q823) = COULTEKIA, H. B. & K. = **CaeBal**pinia. Linn. (Legum.).
racemosus, Bert, ex H. B. & K. 1. c = C. mollis.
remotus, Steud. Nom. ed. II. L 428, sphalm.= praec.

ADENOCARPUM, D. Don, ex Hook. *8c* Am. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii.(1841) 318 = ADENObPERMUM, Hook. & Am.**=ChrysautheIlum.,** Rich. (Compos.).
tuberculatum, D. Don, ex Hook. & Am. 1. c = C. indicum.

ADENOCABPUS, DC. Fl. Fr. Suppl. 549 (1815). *LEGUMINOSAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 481.
anagyrifolius, *Coss. &= Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 246 ; xxii. (1875) 57, nomen.—Marocc.
anagyrus, *Spreng. Syst.* iii. 226.—Ins. Canar.
anisochilus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 5.—Hispan.
benguellensis, *Wel-m. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 47.—Afr. trop.
Bivonii, *Presl, Fl. Sic.* i. p. xix.=intennedius.
Boissieri, Webb, Iter Hispan. 53 = decorticans.
cebennensis, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1888) 1 = intermedius.
commutatus, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 875=intermedius.
complicatus, J. Gay, exGren. &Godr. Fl. Fr. i. 864 = intermedius.
decorticans, *Boiss. in Bibl. Univ. Genh.* (Feb. 1836).—Hispan.
divaricatus, Sweet, Hort. Brit ed. I. 112=intermedius.
foliolosus, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 549.—Ins. Canar.
frankenioides, Choisy, in DC. Prod. ii. 158> = anagyrus.
graecus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 10 = intermedius.
grandiflorus, *Boiss. in Bibl. Univ. Geniv.* (Feb. 1886). •^Gallia.
hispanicus, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 549.—Hispan.
intermedius, *DC. I. c.*—Europ.; Oriens.

ADENOCABPTTS:—
Mannii, *Hoot./, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 189. —Afr. trop.
parvi/olius, DC. Fl. Fr. Suppl. 649 - intennedins.*
speciosus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 178.—Afr. bor.
telonensis, DC. Fl. Fr. Suppl. 549=gTandiflorus1
umbellatus, *Coss. &• Dur. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. i. (18S4) 222, nomen.—Afr. bor.
villosus, Boiss. Diagn. Ser I. ii. 14 = intennedius.
viscosus ,Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 82=anagyrus
volgensis, Spreng. Syst. iii. 226 = Calophaca wolgarica.

ADENOCATTLOIT, Hook. Bot. Misc, i. 19. t. 15 (18801. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. £ ii. 844.
adhaerescens, Maxim. Prim. Fl. Amur. 162 = tricolor,
bicolor, *Hook. Bot Misc.* i. (1880) 19. t. 16.—As. bor.; Himal.; Am. bor.
chilense, *Less, in Linnaea,* vi. (1881) 107.—Chili.
himalaicum, Edgew. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 64 =bicolor.
integri/olium.Natt in Trans. Am. PhiL Soc. N. S. vii. (1841) 289=bicolor.
Lechleri, *Sch. Bip. in Flora,* x'xxviiL #865) 118.—Reg.Magell. *

ADENOCHAENA, DC. Prod. vi. 680 (1887) = ADENACANTHA, DC. = Fhymospermum, Less. (Compos.).

ADENOCHETON, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 812= Cooculus, Linn. (Menisperm.).
phyllanthoides, Fenzl, L c = C. Leaeba.

ADENOCHETUS, Baill. Etud. Gén. Enph. 658 (1858) =praec

ADEITOCHILTJS, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 246. t 56 (1858). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 618.
gracilis,*Hoot./. I. c.—H.* Zel.
Nortoni, *FitBg. Austral. Orch.* i. II. 2.—Austral.

ADENOCHLAEUA, Boiss. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 472 (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 807.
CENTROSTYLIS, Baill. Etud. Gen. Euph. 469 (1858).
SYMPHYLLIA, Baill. 1. c. 473. t 11 (1858).
SYMPHYLLIUM, Benth. in loum. Linn. Soc xvu. (1878) 228.
çalycina, *Bedd. For. Man. Bot.* 207.—Ind. or.
"Klica, *Bedd. Fl. Syh.* ii. t. 261.-Ind. or.
leucocephala, Baill. Etud. Gén. Euph. 478 = Cephalcroton leucocephalus.
silhetcnsis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 228.—Ind. or.
Mylanica, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 270.—Zeylan.

ADENOCLnrE, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xvi. (1848) 69. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 810.
DIPLOSTYLIS, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 118.
PARADENOCLINE, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1141 (1866).
acuta, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 457.—Afr. anstr.
humilis. *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvi. (1843) 61.—Afr. austr.
Mercurialis, *Tung. 1. c.* 60.—Afr. austr.
ovalifolia, *TurcB. I. c*—Afr. austr.
pauciflora, *TurcB. I. c.* 61.—Afr. austr.
•errata, *Turn. 1. c.* xxv. (1852) II. 180.—Afr. austr.
sessiliflora.fiatff. *Etud. Gin. Euph.* 457.—Afr. austr.
sessilifolia, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvi. (1848) 61.—Afr. austr.

ADENOCREPIS, BInme, Bijdr. 679 (1825) = Baecaurea, Lour. (Euphorb.).
javanica, Blume, 1. c = B. javanica.
lanceolata, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1868) 82 = B. lanceolata.
tetrandra, BailL Etud. Gen. Euph. 601 = B. tetrandra.

ADENOCHAENA, Steud. Nom. ed. II. i. 25 (1840) sphalm.=Adenachaena, DC.

ADENOCYCLUS, Less, in Linnaea, iv. (1629) 387 = Oliganthes, Cass. (Compos.).
condensatus, Less. 1. c. = O. condensate.

ADENODISCUS, Tura. in Bull. Soc. Nat Mosc xix. (1846) II. 604=BelOtia, A. Rich. (Tiliac).
mexicanus. Tuna. 1. c. =B. grewiaefolia.

ADENODUS, Lonr. Fl. Cochinch. 294 (1790)=ElaeocarpUB, Linn. (Tiliac).
sylvestris, Lour. 1. c = E. sylvestris.

ADENOOBAMMA, Reichb. Iconogr. Exot. ii. 3. t. 109 (1827). *FICOWEAE,* Benth. & Hook. f. i. 858.
STKUDELIA, Presl, Steud. Nov. PI. Gen. (1829); et Symb. L 8. t. 2 (1880).
diffusa, *FenBl, in Ann. Wien. Mus.* ii. (1840) 275 (err. typ. 256).—Afr. austr.
galloides, *Fenal, 1. c.* 277.—Afr. austr.
lampocarpa, *E. Mey. ex FenBl, in Ann. Wien. Mus.* ii. (1840) 276.—Afr. austr.
Mollugo, *Reichb. Iconogr. Exot.* it 8. t 109.—Afr. austr.
oppositifolia, *Hassk. in Flora,* xxxi. (1851) 764.—Java,
physocalyx, *FenBl, in Ann. Wien. Mus.* ii. (1840) 276. —Afr. austr.
rigida, *Sond. in Hare. & Sond. Fl. Cap.* 149.—Afr. anstr.
sylvatica, *FenBl, in Ann. Wien. Mus.* ii. (1840) 27S (err. typ. 256).—Afr. austr.

ADENOGYNA, *Rafin. New Fl. Am.* i. 62 (1836) = Baxifiraga, Linn.
sarmentosa, Rafin. L c. 68=S. sarmentosa.

ADENOGYNE, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 183 = 8ebaatianla, Spreng. (Euphorb.).
angusti/olia, Klotzsch, L c. 184-S. angustifolia.
brachyclada, Klotzsch, 1. c.=S. brachyclada.
discolor, Klotzsch, 1. c. = Gymnanthes marginata.
guianensis, Klotzsch, in Schomb. Fauna *8c* Fl. Gay. 1185 =S. guyanensis.
marginata, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 184 = Gymnanthes marginata.
mucronata, Klotzsch, 1. c = S. Schottiana.
pachystachya, Klotzsch, 1. c = S. pachystachys.
rotundi/olia, Klotzsch, 1. c«=S. brevifolia.
serrata, Klotzsch, 1. c = S. serrata.

ADENOGYNE, Rafin. Fl. Tellur. ii. 67 (1886) = Baxifraga, Linn.

ADENOGYNUM, Reichb, f. & Zoll. in Verh. Natuurk. Ver. Nederl. Indie, i. (1856) 23: et in Linnaea, xxviii. (1856) 325=Chloradania,£aill. (Euphorb.) 312.
discolor, Reichb. f. & Zoll. 11. cc = C. discolor.
odontophyllum, Miq. FL Ind. Bat i. II. 400.—Java.

ADENOGYRUS, Klotzsch, in App. Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) 1; et in Walp. Ann. iy. 226 (1857) = Bcolopia, Schreb. (Bixin.%
Braunii, Klotzsch, 11. cc—Hab. t

ADENOLEPIS, Lesi in Linnaea, vi. (1881) 610= Cosmos, Cav. (Compos.).
calva, Sch. Bip. in Miq. Fl. Ned. Ind. ii. 79=Cosmos sulphureus.
pulchella, Less, in Linnaea, vi. 510 (1881).—Ins. Sandvic

ADENOLINUM, Reichb. Handb. (1887) 306 = Unum, Linn.
alpicola, Reichb. 1. c 807 = L. alpinum.
alpinum, Reichb. 1. c.; et Ic Fl. Germ. xvi. 65 = L. alpinum.
angusti/olium, Reichb. 1. c. 807 = L. angustifolium.
auiiriatum, Reichb. 1. c 807; et Ic. Fl. Germ. xvi. 66=L. austriacum.
barbatulum, Reichb. Ic FL Germ. xvi. 78=L austriacum.
barbulatum, Sch or, Enum. PL Transs. 127 = L barbulatum.
Leonii, Reichb. Ic Fl. Germ. xvi. 65 = L. Leonii.
marginatum, Reichb. Handb. 807; et Ic Fl. Germ. xvi. 78=L. austriacum.
montanum, Reichb. Ic. Fl. Germ. xvi. 65=L, montanum.
nervosum, Reichb. Handb. 807 = L. nerypsum.
pallescens, Reichb. 1. c = L. pallescens.

ADENOUNUM:—
perenne, Reichb. Ic. Fl. Germ. xvi. 65 = L. percnne.
provinciate, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 850=L. alpinum.
pyrenaicum, Reichb. Handb. 807 = L alpinum.
sibiricum, Reichb. 1. c 307 =L. sibiricum.
squamulosum, Reichb. Ic FL Germ. xvi. 66 = L. squamulosum.
Tommasinii, Reichb. 1. c—Europ.

ADENONCOS. Blume, Bijdr. 881 (1825) = 8aroochilUB, R. Br. I (Orchid.),
virens, *Blume, I. c*—Java.

ADENONEMA, Bunge, in *Vlim.* Sav. Étrang. Pétersb. ii. (1836) 548; *reimpr.* Verz. SuppL Fl. Alt. 86 = StellaiJa, Linn. (CaryophylL).
petraeum, Bunge, 11. oc = S. petraea.

ADENOON, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 844. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 226.
indicum, *Dolt. 1. c.*—Ind. or.

ADENOPA, Rafin. FL Tellnr. iii. 87 (1836)=Dro8era, Linn.
anglica, Rafin. 1. c. = D. anglica,

ADENOPAPPU8, Benth. PL Hartw. 41 (1840). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook f. it 411.
persicaefolins, *Benth. 1. c.*—Mexico.

ADENOPELTIS, Bert, in Ball. Féniss. xxi. (1830), nomen; et ex A. Jnss. in Ann. Sc Nat. Sér. I. xxv. (1832) 24. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 388.
Colliguaya, *Bert. 1. c.*—Chili.

ADENOPETALUM, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. 1859 (1860) 250; et Abh. Acad. Berl. (1860) 47=Euphorbia, Linn.
boerhaavii/olium, Klotzsch & Garcke, 11. cc 250, 47 =E. boerhavifolia.
bracteatum, Klotzsch *Sc* Garcke, 11. cc 48 = E. scabrella.
discolor, Klotzsch & Garcke, 11. cc. 49 -=E. discolor.
ellipticum, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. 1859 (1860) 250 = £. graminea.
ellipticum, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 50 = E. saccharata.
gramineum, Klotzsch *Si* Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. U859) 250; et in Abh. Akad. Berl. (I860) 47 - E. graminea.
Hoffmanni, Klotzsch *Sc* Garcke, 11. cc. 250, 47=-E. graminea.
irasuense, Klotzsch *Sc* Garcke, 11. cc 250, 60 = E. graminea. *
mexicanum, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 50 = E. graminea.
Oerstedii, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. 1859) 250; et in Abh. Akad. Berl. (I860) 48 = E. graminea.
pictum, Klotzsch & Garcke, 11. cc. 250, 47.—Hab. ?•
pubescens, Klotzsch & Garcke, 1L cc. 250, 49 = E. graminea.
sphaerorhiBum, Klotzsch *Sc* Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859)260.—Hab. *1*
subsinuatum, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 250 ; et in Abh. Akad. Berl. (1860) 48 =E. graminea.

ADENOPETALUM, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 416=Vitiu, Linn. (Ampel.).
palmatum, Turcz. 1. c. 417.—Hab.!

ADENOPHAEDKA, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras, xi. II. 385. t 101 (1873). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 814.
megalophylla, *Muell. Arg. I. c.* 886.—Bras.

ADENOPHORA, Fisch. in Mém. Soc Nat. Mosc. vi. (1828) 165. *CAMPANULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 563.
FIOERKEA, Spreng. Anleit. ii. n. 623 (1618).
communis, *Fisch. 1. c.* 168.—Europ.
cordata, *Tausch, in Flora,* xxv. (1842) 288.—Hab. ?
coronata, A. DC. Mon. Camp 368 = marsupiiflora.
coronopifolia, *Fisch. in Mint. Soc. Nat. Mosc.* vi. (1828) 167.-AS. bor.
crispata, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 893-coronala.

ADENOPHORA .—
denticulate, Fisch. in Mém. Soc. Nat. Most vi. (1823) 167 = tricuspidata.
diraricata, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 428.—Japon.
Fischeri, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 75 = communis.
Gmelini, *Fisch. in Mlm. Soc. Nat. Mosc.* vi. (1823; 167.—Dahur.
intermedia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 249 = commnms.
intermedia, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat (1824) 1 = coronata.
Isabellae, *Hemsl. in Journ. Bot.* xiv. (1876) 207.—China.
Lamarkii, *Fisch. in Mlm. See. Nat. Mosc.* vi. (1823) 168.-Sibir.
latifolia, *Fisch. I. c*—Sibir.
liliflora, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853) 48 = communis.
tili/olia, Ledeb. Cat Hort. Dorp. (1822); ex A. DC. Prod. vii. 492 = communis.
marsupiiflora, *Fisch. in Mlm Soc. Nat. Mosc.* vi. (1823) 167.—Dahor.
montana, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) II. 484.—Dahur.
nikoensis, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 423.—Japon.
pereskiaefolia, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 74-latifoha.
periplocaefolia, *A. DC. Mon. Camp.* 361.—Sibir.
Pichleri, Vis. SuppL ex Nym. Consp. 479 = Campanula trichocalycina.
polymorpha, *Ledeb. Fl. Alt.* L 246 in nota.—Rossia.
pomponiifolia, Fisch. in Mem. Soc Nat Mosc. vi. (1823) 167 = Gmelini.
Rabelaisiana, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 75.—Sibir.
remotiflora, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 193.—Japon.
reticulata, *G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl.* 471.—Sibir.
sinensis, *A. DC. Mon. Camp.* 854.—China,
stricta, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 192.—Japon.
stylosa, *Aw*. in Mlm. Soc. Nat. Mosc.* vi. (1823) 168.—As. bor.
stylosa, Reichb. Iconogr. Exot. .32. t. 45 =- communis.
suaveolens, Reichb. 1. c. 22. t. 32 = communis.
tetraphylla, Fisch. in Mem. Soc. Nat Mosc. vi. (1823) 169 = verticillata.
trachelioides, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 186.—China.
tricuspidata, A. DC. Mon. Camp. 355 = denticulata.
triphylla, *A. DC. 1. c.* 365.—Japon.
verbenaefolia, *Bunge, ex Heynh. Nom.* ii. 9.—Japon.
verticillata, *Fisch. in Mlm. Soc. Nat. Mosc.* vi. (1823) 167.—Dahur.; Japon.

ADENOPHYLLUM, Pers. Syn. ii. 458 (1807). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 408.
DVSSODIA, Willd. Enum. Hort Berol. 900 (1809).
LEBETINA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 394 U822).
SCHLECHTENDAHLIA, Willd. Sp. VI. iii. 2125 (1808).
WILLDENOWA, Cav. Ic. PI. i. 81. t. 89 (1791).
capillaceum, DC. Prod. v. 638 = coccineum.
coccineum, *Pers. Syn.* ii. 458.—Mexico.
Porophyllum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 218.—Mexico.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 92.—Mexico.

ADENOPLEA, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1888) 406 = Buddleia, Houst. (Logan.).
toccata, Radlk. 1. c. 407 = B. sinuata.
sinuata, Radlk. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. ii. (1884) 261 = B. sinuata.

ADENOPLTJ8IA, Radlk. in Bremen Abh. viii. (1883) 461. *LOGANIACEAE.*
axillaris, *Radlk. 1. c.* 462.—Madag.
Wildenowii, *Radlk. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* ii. (1884) 259.—Madag.

ADENOPODIA, C. Presl, Epimel. Bot 206 (184*) = Entada, Adans. (Legum.).
spicata, C. Presl, 1. c. 207 = E. natalensis.

ADENOPUd, Benth. in Hook. Niger Fl. 372 (1849). *CUCURBITACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 828.
abyssinicus, *Hoot. f. in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 528.—Afr. trop.

ADENOPTTS :—
breviflorus, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 372.—Afr. trop.
Cienkowskii, Schweinf. Rel. Kotschy. 45. t 30= Peponia Cienkowskii.
eglandulosns,7/<wi./. *in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 529.—Air. trop.
longiflorus, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 872.—Afr. trop.

ADENORHOPIUM, Reichb. Consp. 195 (1828) = ADENOROPIUM, Pohl, = Jatropha, Linn. (Euphorb.).

ADENORIMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 112 (1836) = Euphorbia, Linn.
punicea, Rafin. 1. c. = E. punicea.

ADENOROPIUM, Pohl, PI. Bras. Ic. i. 12. t 9 (1827) = Jatropha, Linn. (Enphorb.).
Berterii, Pohl, 1. c. 14=J. Berterii.
divaricatum, Pohl, 1. c. 14=J. divaricata.
divergens, Pohl, 1. c. 15 = J. Pohliana.
elegans, Pohl, 1. c. 15=J. gossypifolia.
ellipticum, Pohl, 1. c. 13. t 9=J. elliptica.
Forskohlii, Pohl, 1. c 15=J. glandulosa.
glaucum, Pohl, 1. c. 15=J. glauca.
gossypifolium, Pohl, I. c. 16=J. gossypifolia.
hernandiaefolium, Pohl, 1. c 14=J. hernandiaefolia.
integerrimum, Pohl, 1. c. 14 = J. integerrima.
Jacquini, Pohl, 1. c. 15 = J. gossypifolia.
luxurious, Pohl, 1. c 16 = J. Pohliana.
Martiusii, Pohl, 1. c. = J. Martiusii.
mollissimum, Pohl, 1. c 16=J. Pohliana.
multifidum, Pohl, 1. c. 16=J. multifida.
mutabiU, Pohl, 1. c. 14=J. mutabilis.
panduraefolium, Pohl, 1. c. 14=J. hastata.
peltatum, Pohl, 1. c 16 = J. peltata.
ribi/olium, Pohl, 1. c. 15=J. gossypifolia.
Roxburghii, Kostel. Allg. Med.-pliarm. Flora, v. 1760-J. glandulifera.
spinosum, Pohl, PI. Bras. Ic. i. 15=J. spinosa.
tomentosum, Pohl, 1. c 16=J. tomentosa.
tripartitum, Pohl, 1. c 15 = Manihot tripartite
variegatum, Pohl, 1. c. 14 = J. variegata.
villosum, Pohl, 1. c 15 = J. Pohliana.

ADENOSACHMA, A. Juss. in Orb. Diet. xi. 255 (1849) = seq.

ADENOSACME, Wall. Cat n. 6280-82 (1832). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 69.
LAWIA, Wight, in Calc. Joum. Nat Hist. vii. (1847) 14.
MYCETIA, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 9.
cauliflora, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 215.—Malaya,
fasciculata, *Miq. I. c.* 216.—Java,
holotricha, *Miq. I. c.* 217—Sumatra,
lanceolata, *Miq. 1. c* 217.—Sumatra.
Lawii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 96.—Ind. or.
longifolia, *Wall. Cat.* n. 6280.—Ind. or.
inacrostachya, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 96.—Ind. or.
malayana, Wall. Cat. n. 6282 = longifolia.
nepalensis. Wall. 1. c. n. 6281=longifolia.
obovata, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 216 = fasciculata.
stipulate, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 95.—Ind. or.

ADENOSCILLA, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 187 (1855) = Sollla, linn. (Liliac).
bifolia, Gren. *Sc* Godr. 1. c. = S. bifolia.
nivalis, J. Gay, ex Baker, in Joum. Linn. Soc xiii. (1873) 239 = S. bifolia.
uni/olia, Texidor, in Rev. Prog. Cienc. xviii. (1869).—Cf. Bnll. Soc Bot Fr. xvi (1869); Bibl. 222 = S. bifolia?

ADENOSELEN, Sptch. Hist. Vég.Phan. x. 28 (1841) = ADENOSOLEN, DC, = Marasmodes, DC. (Compos.).

ADENOSEPALUM, Fourr. in Ann. Sot Linn. Lyon, N. S.xvi. (1868) 852 = Hyperieum, Linn.
hirsutum, Fourr. 1. c. 353 = H. hirsutum.
montanum, Fourr. 1 c = H. montanum.
nummularium, Fourr. 1. c = H. nummularinm.
pulchrum, Foex 1. c. 352 = H. pulchrum.
tomentosum, Fonrr. 1. c. = H. tomentosum.

ADENO8HA, R. Br. Prod. 442 (1810). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 949.
ANISANTHEKA, Griff. Notul. iv. 100 (1854).
PTEROSTIGMA, Benth. Scroph. Ind. 20 (1835).
SPATHESTIGMA, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 204 (1836).
Brownii, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 382, nomen.—Malaya.
coeruleum, *R. Br. Prod.* 443.—As. trop.; Austral,
camphoratum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 264.—Zeylan.
capitatum, *Benth. ex Hance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 114.—As. trop.
chenopodiifolia, *Spreng. Syst.* ii. 829.—Ins. Societ
chenopodioides, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841), 332, nomen.—Hab. *1*
cuspidatum, Benth. in Wall. Cat. n. 3852=Lindenbergia macrostachya.
fragrans, *Spreng. Syst.* ii. 829.—Ins. Societ.
grandiflornm, *Benth. ex Hance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1874) 114.—China,
hirsutum, *Kurt,, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876 II. 143.—Ins. Nicobar.
macrophylluni *Benth. in Wall. Cat.* n. 8858.—Ind. or.
malabaricum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 264.—Malabar.
microcephalum, *Hook.f. 1. c.*—As. trop.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* iv. 485.—Austral,
ovatum, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 268.—Malaya.
subrepens, *Benth. ex Hook. f. I. c.*—Zeylan.
triflora, Seem. Fl. Vit. 284 = Limnophila Roxburghii.
villosum, Benth. in Wall. Cat. n. 3851« caeruleum.

ADENOSMA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 (1832; — Cardanthera, Buch.-Ham. (Acanthac).
affinis, Griff. Notul. iv. 133 = Strabilanthes Acrocephalus.
africana, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 21—Afr. trop.
balsamea, Spreng. Syst. ii. 829 = C. balsamica.
biplicata, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 79 = C. avana.
elongata, Blume, Bijdr. 767 - Ebermaiera elongata.
Griffithii, T. Anders, in Journ. Linn. Soc ix. (1867) 454 - C. Griffithii.
lanceolata, Blume, Bijdr. 757 - E. lanceolata.
pinnatifida, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867, 455-C. pinnatifida.
polysperma, Spreng. Syst ii. 829«Hygrophila Serpyllum.
spatulata, Blume, Bijdr. 737 - Ebermaiera glauca.
Thy mus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 79-C. balsamica.
triflora, Nees, 1. c.=C. triflora.
Thwaitesii, T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl. 224; et in Joum. Linn. Soc ix. (1867) 455 = C. Thwaitesii.
uliginosa, Nees, in R. Br. Verm. Schrift. iii. 298 - C. uliginosa.
verticillata, Nees, in DC. Prod. xi. 69-C. verticillata.

ADENOSOLEN, DC. Prod vi. 136 (1837)=Maraamodes, DC. (Compos.).
tenuifolius, DC. *I* c—Afr. austr.

ADENOSPERMUM, Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 318 = Chrysanthellum, Rich. (Compos.;.
tuberculatum, Hook. *Sc* Am. 1. c.«=C. indicum.

ADENOSTEGIA, Berth, in Lindl. Syst. Nat ed. II. 445 (1836)=CordylanthU8, Nutt. (Scrophul.).
rigida, Benth. 1. c. = C. filifolius.

ADENOSTEMA, Desport. in Diet Sc Nat i. 256 (1816) -seq.

ADENOSTEMMA, Forst Char. Gen. 89. t. 45 (1776). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 239.
LAVENIA, SW. Prod. Veg. Ind. Occ 112 (1788).
angustifolium, Am. in Nov. Act. Nat Cur. xviii. I (1836) 847 = viscosum.
aquaticum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 81-viscosum.
Berterii, *DC. Prod.* v. 110.—Ins. S. Doming.
biflorum, Less. Syn. Comp. 136 = Wedelia bifiora.
brasilianum, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxv. 368.—Bras,
cafirum, *DC. Prod.* v. 112.—Afr. austr.
decumbens, Don, ex Heynh. Nom. i. 19 = Beretrii.
Dregei, *DC. Prod.* v. 111.—Afr. austr.

ADENOSTEMMA:—
elatum/V). Don, Prod. Fl. Nep. 181=viscosum.
erectum, DC. Prod. v. 113=viscosum.
fastigiatum, DC. 1. c. 111 = viscosnm.
glandulosum, Benth. ex Hook. f. Fl Brit. Ind. i. 242, sphalm. (=Odontostemma)=Arenaria Benthami.
glutinosum, *DC. Prod.* v. 111.—Ins. Sandv.
Gymnocoronis, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. FL Bras. vt. II. 183 «Gymnocoronis spilanthoides.
hirsutum, *DC. Prod.* v. 118.—Java,
hirtifloram, *Benth. PI. Hartv.* 75.—Mexico,
lanceolatnm, *Miq. Fl. Ind. Bat.* it 24.—Malaya.
latifolium, D. Don, Prod. Fl. Nep. 181-viscosum.
leiocarpum, DC. in Wight, Contrib. 9 = viscosum.
macrophyUum, DC. Prod. v. 113=viscosum.
madurense, DC. in Wight, Contrib. 9=viscosum.
mauritianum, DC. Prod. v. 110 = viscosnm.
microcephalum, DC. L c. lll=viscosum.
natalense, *DC. I. c.* 112.—Afr. austr.
nitidum, Spreng. Syst. ii. 857, lapsu=Gomortega nitida.
ovatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 25.—Malaya.
parviflorum, DC. Prod. v. 111 = viscosum.
Perrottetii, *DC. I. c.* 110.—Prom. Vii#l.
platyphyllum, *Cats, in Diet. Sc. Nat.* xxv. 868.—Peruv.
reticulatum, DC. in Wight, Contrib. 8= viscosum.
rivale, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 231 - viscosum.
RayUi, DC. Prod. v. 112=viscosum.
nifescens, *Seh. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 120, nomen.—Malaya.
rugosum, DC. in Deless. Ic. Sel. 4. t. 10-viscosum.
scaevoli/olium, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 186=suffruticosum.
Schimperi, *Seh. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i.** 381-Abyss.
Sttffruticosum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* **vi.** (1867) 438—Braa.
Swartzii, CMS. *in Diet. Sc. Nat.* xxv. 362.—Ind. occ.; Ecuador.
tinetorium, Cass. 1. c = viscosum.
triangulare, DC. Prod. v. 118-= viscosum.
viscosum, *Forst. Char. Gen.* 90.—Geront trop.

ADENOSTEMON, Spreng. Anleit. ii. 788 (1818) = seq.

ADENOSTEMUM, Pers. Syn. i. 467 (1806) = Gomortega, Ruiz & Pav. (Laurin. ?).
nitidum, Bert. Merc. Chil. 557; ex Am. Joutn. Sc. xix. (1881) 67 = Cryptocarya Peumus.
nitidum, Pers. Syn. i. 467 = G. nitida.

ADENOSTEPHANUS, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 51=Eupla88a, Salisb. (Proteac.).
austro-caledonicus, Brongn. *Sc* Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 229.—N. Caled.
bahiensis, Meissn. in Mart Fl. Bras. v. I. 94. t. 36.—Bras.
Bleasdalii, Benth. Fl. Austral, v. 417.—Austral.
guyanensis, Meissn. in Mart. FL Bras. v. I. 95 = E. roeridionalis.
incana, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 52.—Bras.
inaequalis, Endl. Gen. SuppL iv. II. 87.—Bras.
laxiflora, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. I. 94.—Bras.
nitida, Meissn. 1. c—Bras.
organensis, Endl. Gen. SuppL iv. II. 87.—Bras.
Selloaii, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 52.—Bras.

ADENOSTOMA, Blume, in Flora, viii. (1825) 680, **nomen.** ***SCROPHULARINEAE.***

ADENOSTOMA, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 139, et 338. t 30 (1882). *ROSACEAB,* Benth. & Hook. f. i. 618.
brnifolium, Nutt ex Torr. *Sc* Gray, FL N. Am. i. 430 = fasciculatum.
fasciculatum, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* **139, 888.** t 30.—Calif.
sparsifolium, *Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois.* 140; *Bot. Bound.* 63. t. 20.—Calif.; Mexico.

ADENOSTYLES, Cass. in Diet Sc. Nat. i. SuppL 59 (1816). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. i. ii. **247.**
ADENOSTYLIUM, Reichb. Ic Fl. Germ. xvi. it. t. 895 (1863).

ADENOSTYIiEB:—
albida, *Cass. 'Bull. Soc. Philom.* **1816;'** *Diet. Se. Nat.* i. *Suppl.* 60.—Europ.
albifrons, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 278-albida.
Alliariae, torn, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 12.—Europ.
alpina, Bluff *Sc* Fing. Corap. Fl. Germ. ii. 329 = viridis.
alpina, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxi. (1871) 12.—** Europ.
australis, Nym. Consp. 896 = viridis.
candidissima, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* **i.** *Suppl.* **60.—** Europ.
dubia, *Reichb./. Ic. Fl. Germ.* **xvi. n.—Europ.**
glabra, DC. Prod. v. 208=viridis.
hirsuta, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 401 = albida.
hybrida, DC. Prod. v. 204=alpina, candidissima, leucophylla, viridis.
leucophylla, DC. 1. c. vii. 271 = orientals.
leucophylla, Reichb. FL Germ. Excurs. 278=candidissima.
macrophylla, Tenore, Syll. ex Nym. Consp. 396 = viridis.
Nardosmia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 681 = Cacaliopsis Nardosmia.
nebrodensis, *Strobl, in Flora,* lxv. (1882) 196.—Sicil.
orientals, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 155.—Oriens.
Petasites, Bluff & Fing. Comp. Fl. Germ. ii. 329 = albida.
pontica, *C. Koch, in Linnaea,* xiii. (1839) 696.—As. Min.
pyrenaica, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* **(1861)** 64.—Hispan.
viridis, *Cass. in Did. Sc. Nat.* **i.** *Suppl.* **60.—Europ.**

ADENOSTYLES, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 599 (1888) err. typ. = seq.

ADENOSTYLIS, Blume, Bijdr. 414 (1825)=Zeuxine, Lindl. (Orchid.).
emarginata, Blume, I. c. = Z. sulcata.
integerrima, Blume, 1. c. = Z. integerrima.

ADENOSTYLIUM, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xvi. 2. t. 895 (1853) = Adenostylee, Cass. (Compos.).
dubium, Reichb. 1. c. = Adenostyles dobia.
hybridum, Reichb. 1. c = Adenostyles viridis.

ADENOTHECA, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 255 = **Schiaobasis,** Baker (Liliac).
aphylla, Welw. ex Baker, 1. c. =S. angolensis.

ADENOTRIAS, **Jaub.** *Sc* Spach, Illustr. PL Or. i. (1842) 76 = Hypericum, Linn.
***Kotschyi,* Jaub. & Spach, 1. c. 77 *(= Triadenia Russeggeri).*—Syria.**
phrygia, Jaub. & Spach, 1. c. 76 =praec.

ADENOTRICHIA, Lindl. Bot. Reg. t. 1190 (1828) = **Senecio,** Linn. (Compos.).
amplexicaulis, lindl. 1. c = S. adenotrichius.
senedoides, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 22 = S. sinuatilobus.

ADENUM, G. Don, Gen. Syst iv. (1837) 80 = **Adenivun,** Roem. *Sc* Schult. (Apocyn.).

ADESMIA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 94.
LEGUMINOSAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 517.
LOUDONIA, Bert, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 193.
PATAGONIUM, Schrank, in Muench. Denkschr. (1808) 98, nomen vetustius.
STREPTODESMA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iii. (1853) 6.
Aegiceras, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 684.—Chili,
affinis, *Hook.f. Fl. Antarct.* 257.—Terr. Magell.
alpina, GiU. ex Hook. Bot Misc. iii. (1833) 191 = trijuga.
angulata. Hook. £ Fl. Antarct. ii. 257 = incana.
angustifolia, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* **19.—** Chili.
aphylla, *Clos, in C. Gay, FL Chil.* ii. 177.—Chili,
aprica, *Phil, in Anales Univ. Chil.* **(1872) 697.—** Chili.
arachnipes, *Clos, in C. Gay, Fl. Chilrii.* **158.—Chili,**
araucana, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 638.—ChilL

ADESMIA:—
arborea, *Bert. Merc. Chil.* **xii. 559;** *ef. Bull. Fèruss.* **xx.** (1830) 108.—Chili.
arborea, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxvii. (1834) 58 =glutinosa.
argentea, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 191 = trijuga.
argentea, *Mey en, Reise,* **i. 402,** *et in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1848) 22.—Peruv.
argyrophylla, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 631.—**Chili.**
Arnottiana, Gill, ex Hook. Bot Misc. iii. (1833) 191 = trijuga.
arvensis,PA»7.«» *Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 55.-Chili,
aspera, *GUI. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 190.—**thili.**
atacamensis, *Phil. Fl. Atac.* 16.—Chili,
axillaris, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 683.—Chili,
balsamica, *Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Torin.* **xxxvii.** (1884) 59. t. 10.—Chili.
balsamifera,//ooA. *& Am. Bot. Beech. Voy.* 20.—Chili.
Berteroniana, Steud. Norn. ed. II. i. 27 = arborea.
bicolor, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Se'r. I. iv. (1825) 95.—Reg. Argent
bijuga, *Phil, in Anales Univ. Chil.* **(1884) reimpr. 3.** —ChilL
boronioides, *Hook./. Fl. Antarct.* 257.—Terr. Magell.
brachycarpa, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 684.—Chili,
bracteata, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* **iiL (1833)** 193.—Chili.
caespitosa, GiU. ex Hook. 1. c. 191=homida.
calocarpa, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1865) II. 834. —Chili.
calycina, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 75 = punctata.
Candida, *Hook.f. Fl. Antarct.* 257.—Patag.
canescens, *Phil, in Anales Univ. Chil.* **(1872) 703.—** Chili.
capricornica, GiU. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 191 -horrida.
Capricomu, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1862) II. 393 ; *et in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 58.-Chili.
Caragana, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 119.—Keg. Argent,
chillanensis, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1865) II. 326. —ChilL
ciliata, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 74.—Bras,
cinerea, *Clos, in C Gay, Fl. Chil.* ii. 179.—Chili.
Closù, *Phil, in Anales Univ. Chil.* **(1872) 700.—** Chili,
coluteoides, *GiU. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 190.—Reg. Argent,
coluteoides, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 783.-Chili.
compacta, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856)f 628.—Chili.
conierta. *Hook. * Am. Bot. Beech. Voy.* **20.—Chili,**
coronilloides, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 190. —Chili.
corymbosa, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 165.—Chili,
cuneata, *Meyen, Reise,* **i. 402,** *et in Nov. Act. Cur.* **xix.** *Suppl.* i. (1843) 22.—Chili.
curvifolia, *Clos, in C. Gay, Ft. Chil.* ii. 189.—Chili,
cytisoides, *Griseb. in Goett. Abh. xix.* **(1874) 119.—** Reg. Argent
Davilae, *Phi!, in Anales Univ. Chil.* **(1872) 699.—** Chili.
decipiens, *Steud. Norn.* ed. II. i. 27.—Chili,
decumbens, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 628.—Chili.
dendroidea, *Phil. 1. c.* **683.**-Chili.
dentata, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Se'r. I. iv. (1825) 96.—Chili.
dentata, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (18SS) **189**-Gilliesii.
denticulata, *Clos, in C. Gay, Fl. Chit.* ii. 191.—Chili,
denticulata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 27.-Chili,
denudata, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 66.—**Chili.**
deserticola, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1865) II. **344.** —Chili.
dichoioma, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 180.—Chili,
diffuse, *Bert, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 27.—Chili.
Dtniana, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 191 = **trijuga.**
Echinus, *Presl, Symb. Bot.* ii. 14. t. 16.—Am. austr.
elata, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* **ii. 160.—Chili,**
elegans, *Clos, I. c.* 188.-Chili.

ADESMIA:—
elongata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 688.—Chili.
emarginata, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 187.—Chili.
eremophila, *Phil. Fl. Atac.* 15.—ChiU.
erinacea, *Phil. I. c.* 16.—Chili.
exilis, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 150.—Chili.
filicaulis, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 702.— ChiU.
filifolia, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 157.—ChiU.
Wipes, *A. Gray, Bot. U^S. Expl. Exped.* i. 425.—Patag.
floribunda, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 288.—Mexico,
fiigida, *Phil. Fl. Atac.* 16.—Chili,
fruticulosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 282.—Mexico.
Gayana, *Phil, in Linnaea,* xzviii. (1856) 634.—Am. austr.
genistoides, *Presl, Symb. Bot.* ii. 16.—Am. austr.
Germaini, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 629.—Chili.
Gilliesii, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 188.—Chili.
glabriuscula, Vog. in linnaea, x. (1836) 692=radicans.
glandulosa, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1861) 47; *et* *in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 67.—Chili,
glauca, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 682.—Chili,
glaucescens, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 707. —Chili,
glomerata, *Auct. ex Phil,/, Cat. PI. Chil.* 49 (sp. dub.). —Chili.
glomerula, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 184.—Chili,
glutinosa, *Hook. If Am. Bot. Beech. Voy.* 19.-Chili,
gracilis, *Meyen, ex Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1848) 26.—Chili,
grandiflora, *GUI. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1888) 190. —Chili.
graveolens, *Phih Fl. Atac.* 16.—Chili,
grisea, *HooKf. Fl. Antarct.* 267.—Patag.
hirsuta, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 706.— Chili,
hispidula, *DC. in* **Ann.** *Sc. Nat. Sit.* I. iv. (1826) 96. —PeniT.
Hookeriana, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1888) 191 = trijuga.
horrida, *Gill, in Hook. I. c*—Chili,
humifusa, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 698.— Chili,
hnmilis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 682.—Am. austr.
Hystrix, *Phil. Fl. Atac.* 16.—Chili,
incana, *Vog. in Linnaea,* iii. (1838) 7ft.—Bras,
inconspicua, *Phil. I. c.* xxviii. (1856) 681.—Chili,
inflexa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 121.—Reg. Argent.
Kingi, *Phil. in Anales Univ. Chil.* (1872) 706.—Chili.
Lambertiana, Gill, ex Hook. But. Misc. iii. (1833) 191 = trijuga.
lanata, *Hook.f. Fl. Antarct.* 256.—Terr. Magell.
Landbecki, *Phil, in Linnaea,* xxxiii (1864-65) 59—Chili.'
latifolia, *Vog. I. c.* xii. (1838) 74.—Bras,
laxa, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 162.—Chili,
leioeaipa, *Hook. & Am, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 189.—Chili,
leptacantha, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 705. —Chili,
longipes, *Phil, in Linnaea,* xxviii (1856) 680.—Am. austr.
longiseta, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Set. I. iv. (1825) 95. -Chili.
lotoides, *Hook./. Fl. Antarct.* 225.—Terr. Magell.
Loudonia, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 192.—Chili,
macrostachya, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 55.—Bras.
Meyeniana, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 632.—Am. austr.
Meyeriana, Walp. Rep. i. 729=Aeschynomene micrantha.
micrantha, *Phil. Fl. Atac.* 15.—ChiU.
microphylla, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 19. t. 9. —Chili.
mimosoides, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 282.—Mexico,
miraflorensis, *Remy, in Ann. Sc. Nat. Set.* III. vi. (1846) 357.—Bolivia,
monosperma, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 184.— Chili.
monosperma, *Steud. Nom.* ed. II. i. 27.—Chili,
montana, *Phil, in Linnaea,* xxviii (1856) 629.—Am. austr.

ADESMIA:—
mucronata, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 189.—Chili.
multicuspis, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 190.—Chili.
muricata, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 27 = decipiens.
muricata, *DC. in Ann Sc. Nat. Sit.* I. iv. (1825) 95.—Patag.; Chili.
muricata. Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 188 = retrofracta.
obcordata, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 199.—Chili,
obovata, *Clos, I. c*—Chili,
obscura, *Clos, I.e.* 183.—Chili,
odontophylla. *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1865) II. 344.—Chili.
oligophylla, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 636.—**Chili.**
Ononnis, *Griseb. in Lechl.Berb. Am. Austr.bb,* nomen. —Chili,
oresigena, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 698.— Chili.
oxalidiphylla, *Phil. 1. c.* (1865) II. 845.—Chill
papposa,Bett. ex Steud. Nom. ed. II. i. 27 = angnstifolia.
papposa, *DC. in Ann. Sc. Nat. Set.* I. iv. (1825) 96.—Chili.
parviflora, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 158.—Chili,
parvifolia, *Phil, in Linnaea,* xxviii (1856) 683.—Am. anstr.
parvula, *Phil, in Angles Univ. Chil.* (1872) 697.— Chili,
pauciflora, *Vog. in Ntn. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 25.—Chili.
Fearcei, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) **704.—**Chili,
pedicellata, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1888) 191.—Chili.
pendula, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 27 =denticulata, diffusa.
pendula, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. iv. (1825) 96.—Reg. Argent.
phylloidea, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 186.—Chili,
pinifolia, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 192.—Chili.
polyacantha, *Wedd. Chlor. And.* ii. 265.—Am. austr.
propinqua, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 188.—Chili,
prostrate, *Clos, I. c.* 169.—Chili,
psilocarpa, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1865) II. 345.—Chili.
psoraleoides, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 80.—Bras,
pugionata, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 120.—Reg. Argent,
pulchra, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 632*.—Am. austr.
pumila, *Hook.f. Fl. Antarct.* 255.—Patag.
punctata, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. iv. (1825) 95. —Am. austr.
pungens, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 197.—Chili,
pusilla, *Phil. Fl. Atac.* 15.—Chili,
quadrijuga, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 705.— Chili.
racemosa, Steud. Nom. ed. II. i. 27=Aeschynomene micrantha.
radicans, *Bert, ex Steud. 1. c.*—Chili,
radicans, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. **173.—**Chili,
radicifolia, *Clos, 1. c.* 169.—Chili,
ramosissima,/>A:7.t» *Linnaea,* xxxiii (1864-65) 56.—Am. austr.
retrofracta, *Hook.* &" *Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 188.—Chill
retusa, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1855) 119.—Am. austi.
rupicola, *Wedd. Chlor. And.* ii. 266.—Am. austr.
Sckickendanzii, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 104.—Reg. Argent.
Schneideri, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 60.—Am. austr.
sericea, *Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 55, nomen. —Chili.
sessiliflora, *Phil. Fl. Atmc.* 16.—Chili.
Simonsi, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1872) 701.— Chili.
Smithiae, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 27 <= muricata.
Smithiae, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. iv. (1825) 95. —Am. austr.
spinosissima, *Meyen, Reise,* ii. 27; *et in Nov. Act. Nat.* *Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 24.—Chill
stipulacea, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 164.—Chili,
subterranea, *Clos, I. c.* 192.—Chili,
suffocata, *Hook.f Fl. Antarct.* 256.—Terr. Magell.
tenella, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 19.—Chill

ADESMIA :-
tomentosa, *Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 28.—Chili.
tribuioides, *Steud. Nom.* ed. II. i. 27.—Chili,
trifoliata, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) **194.—** Chill
trifoliata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 635.—Am. austr.
trijuga, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 191.—Chili.
tristis, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 77.—Bras,
ulicina, *Presl, Symb. Bot.* ii. 15.—Am. austr.
uspallatensis, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 192.—Chili.
Valdesia, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 174.—Chili,
vemicosa, *Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur-* xix. *Suppl.* I (1843) 20.—Chili,
vesicaria, *Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxvii. (1834) 58.-Chili.
villosa, *Hook.f. Fl. Antarct.* 256.—Reg. Magell.
virgata, *Bert, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 27.—Chili.
viscida, Bert. Merc. Chil. xii. 557 ; Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxvii. (1834) 59=mucronata.
viscosa, *Gill, fn Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 192.—Chili.
Volckmanni, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 619.—Am. austr.
Wallichiana, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 190 •-Aeschyuomene aspera.

ADHADOTA, Steud. Nom. ed. II. i. 27 (1840) err. typ. =seq.

ADHATODA, Nees, in DC. Prod. xi. 384 (1847). Genus minime retinendum, species fere omnes ad *Justiciam* referendae. Vide infra.

ADHATODA, Toum. ex Medic in Act. Acad. Theod. Palat. vl Phys. (1790) 898; Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 102 (1882). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1112.
CARIHA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 62 (1836).
DUVERNOYA, E. Mey. in Drcge, Zwei Pfl. Docum. 150 (1843), nomen.
acumioata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 400.—Abyss,
adenostachya, *Nees, I. c.* 408.—Bras.
amaranthoides, Nees, 1. c. 400=ceylanica.
anagalloides, *Nees, 1. c.* 408.—Afr. austr.
Anselliana, Nees, 1. c. 403=Dianthera Anselliana.
arenaria, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 108-Justicia trinervia.
argyrostachya, Nees, 1. c. 102 = Justicia argyrostachya.
aspera, *Nees, in DC. Prod.* xi. 897.—Ins. Philipp.
aurantiaca, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 47. —Hab. 1
auriculata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 407.—Bras,
bahiensis, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 148.—Bras.
Beddomei, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* 540.—Ind. or.
Betonica, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 103=Justicia Betonica.
boerhaaviaefolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 409.—Madag.
Bojeriana, *Nees, 1. c.* 386.—Madag.
candicans, Nees, 1. c. 396 = Dianthera candicans.
capensis, *Nees, 1. c.*—Afr. austr.
carthagenensis, Nees, 1. c 408=Beloperone violacea.
cheiranthifolia, *Nees, 1. c.* 887.—Afr. austr.
ceylanica, Nees, 1. c 400=Justicia ceylanica.
chinensis, *Benth. in Hook. Kev> Journ.* v. (1853) 184. —Hongkong.
chrysotrichoma, *Nees, in DC. Prod.* xi. 408.—Bras,
ciliata, *Nees, 1. c.* 396.—Bras,
congrua, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 147.—Bras,
cuneata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 392.—Afr. austr.
cuneifolia, *Nees, 1. c.* 405.—Bias,
cydoniaefolia, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 148.—Bras.
decussata, Nees, in DC. Prod. xi. 408= Justicia decussata.
diffusa, Benth. in Hook. Nigei FL 488-Justicia insularis.
diosmophylla, *Nees, in DC. Prod.* xi. 394.—Afr. austr.
Dipteracanthus, Nees, I.e. 396~Siphonoglossa pilosella.
divaricata, *Nees, 1. c.* 391.—Afr. austr.
divergens, *Nees, 1. c.* 406.—Am. merid.
diversiformis, Nees, 1. c. 399 > Justicia glauca.
Eustach'yana, Nees, 1. c. 404 = Beloperone Eustachyana.
fasciata, *Nees, I. c.* 402.—Afr. austr.

ADHATODA:—
Felisbertiana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 406.—Bras,
flava, *Nees, I. c.* 401.—Arab,
flexuosa, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 148.—BAs.
formosissima, *Kotasch, in Peters, Reise Mossamb. Bat.* 216.—Afr. trop.
furcata, Nees, in DC. Prod. xi. 398 = Justicia furcata.
genistifonnis, *Nees, 1. c.* 394.—Bras.
Gilliesii, *Nees, I. c.* 895.—Reg. Argent,
glandulosa, *Nees, I. c.* 405.—Bras,
glomerata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 881.—Malaya,
holosericea, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 148.—Bras.
Hookeriana, Nees, in DC. Prod. xi. 408=Justicia Hookeriana.
Hypericum, *Solms, ex Schveinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 102.—Afr. trop.
hyssopifolia, *Medic, in Act. Acad. Theod. Palatt* vi. *Phys.* (1790) 393=Dicliptera ocymoides.
hyssopifolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 392.—Afr. austr.
incana, *Nees, I. c.* 893.—Afr. austr.
jalappaefolia, Buchoz, ex Stead. Nora. ed. I. 16 = Dicliptera ocymoides.
Kotschyi, *Nees, in DC. Prod.* xi. 897.—Afr. trop.
leptantha, *Nees, I. t.* 890.—Afr. ausfc.
leptostachya, *Nees, I. c.* 403.—Arab.
Lindeniana, *Nees, I. c.* 405.—N. Granat.
Hthospermifolia, *Nees, 1. c.* 898.—Peruv.
longiflora, Torr. in Bot Mex. Bound. 125-Siphonoglossa longiflora.
longifolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 404.—Ins. Mascar.
lupulina, *Nees, I. c.* 885.—Afr.-austr.
Magnolia, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. 4. 6—Malaya,
major, *Nees, in DC. Prod.* xi. S97—Abyss.
Martiana, *Nees, I. c.* 405.—Bras,
matammensis, *Schweinf. in Verh.Zool. Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 674.—Afr. trop.
tnicrophylla, *Klotisch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 216.—Afr. trop.
minor, *Nees, in DC. Prod.* xi. 400.—Abyss,
mollissima, *Nees, I. c.* 891.—Afr. austr.
Moretiana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 830.—Malaya.
Moritziua, *Nees, in DC. Prod.* xi. 388.—N. Granat.
mossambicensis, *Klotisch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 217.—Afr. trap.
natalensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 891.—Afr. austr.
Neesiana, Nees, 1. c. 897-Justicia Neesiana.
nilgerrhensis, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 108 = Justicia nilgerrhensis.
nilgherrica, Nees, in DC. Prod. xi. 886=Justicia nilgerrhensis.
nnda, *Nees, I. c.* 402.—Arah.
odora, *Nees, I. c.* 399.—Arab.
Orbigniana, *Nees, I. c.* 404.—Bolivia,
orchioides, *Nees, 1. c.* 398.—Afr. austr.
origanoldes, *Nees, I. c.* 407.—Ind. or.
orixensis, Nees, 1. c. 400 = Justieia glauca.
pacifica, Ocrst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 164 = Justicia pacifiea.
palustris, *Nees, in DC. Prod.* xi. 402.—Afr. hop.
paniculata, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 482.—Afr. trop.
patula, *Nees, in DC. Prod.* xi. 893.—Afr. austr.
periplocifolia, *Nees, I. c.* 395.—Venezuela,
petiolaris, *Nees, 1. c.* 402.—Afr. trop.
pilosa, *Nees, 1. c.* 405.—Bras,
plicata, *Nees, 1. c.* 401.—Afr. trop.
protracta, *Nees, I. c.* 890.—Afr. austr.
pubescens, Moench, Meth. 481 = Gendarassa Adhatoda.
pygmaea, *Nees, in DC. Prod.* xi. 394.—Afr. austr.
quadrifaria, Nees, 1. c. 396 = Justicia quadrifaria.
ramosissima, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 103 = Justicia Bctonica.
reflexiflora, *Nees, in DC. Prod.* xi. 398.—Ind. oce.
rostellaria, Nees, 1. c. 897-Jnsticia neglecta.
rostrata, Hochst. ex Oliver, in Trans. Linn. Soe.*xix. (1872) 131 = Asystasia Schimperi.
rostrata, *Solms; ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 104.—Afr. trop.
rotundifolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 391.—Afr. austr.
scabra, *Nees, 1. c.* 407.—Venezuela.
Schimperiana, *Hockst. ex Nees, I. c.* 388.—Abyss.
sericea, Nees, fide Benth. fc Hook. f. Gen. ii. 1115 = Jacobinia mexicana.
sisparensis, Benth. in Joura. Linn. Soc. ix. (1867) 518 = Rungia sisparensis.
sphaerosperma, *Nees, in DC. Prod.* xi. 409.—Ind. occ.

ADHATODA:—
spicata, Burm. ex Steud. Norn. ed. L 15, 274 = Rungia repens.
spicata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 408.—Malaya,
striata, *Klotisch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 216.—Afr. trop.
suaveolens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 401.—Arab.
subserrata, *Nees, 1. c.* 409.—Ins. Philipp.
snlcata, *Nees, 1. c.* 401.—Arab,
tetramera, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 801.—Porto-Rico.
thymifolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 892.—Afr. austi.
tranquebariensis, Nees, 1. c 399 = Justicia tranquebariensis.
trinervia, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 103=Justicia trinervia.
tiistiflora, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 250.—Java,
tristis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 404.—Afr. trop.
tubulosa, *Nees, 1. c.* 392.—Afr. austr.
Tweediana, *Nees, 1. c.* 395.—Bras,
umbrosa, *Nees, 1. c.* 406.—Bras,
variegata, *Nees, 1. c.* 385.—Afr. austr.
vasculosa, Nees, I. c. 407 = Justicia vasculosa.
Vasica, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 103.—As. trop.
Velasquezii, *Nees, in DC. Prod.* xi. 409.—Guatemala.
ventricosa, Nees, 1. c. 407 = Justicia ventricosa.
verticillata, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 6.—Java.
•aynaadensis, Nees, in DC. Prod. xi. 406«Jnsticia wynaadensis.
Zollingeriana, Nees, L c. xi. 398=Justicia Zollingeriana.

ADHUNIA, Veil. Fl. Flum. 236 (1825) ; v. 1.118 (1827). —' Gen. dub.'
emarginata, Veil. 11. cc—Bras.

ADIANTHUM *truncatum,* Burm. f. FL Ind. 235. t. 06. t 4 >Acacia decipiens.

ADIANTUM *truncatum,* Mnrr. Syst. Veg. 790 = Acacia decipiens.

ADICEA, Rafin. Cat. 13 (1824)=TJrtdoa., Tourn.
glabra, Rafin. 1. c. =U. glabra.
pumila, RaKn. ex Torr. Fl. New York, ii. 223>Pilea pumila.
trinervia, Rafin. ex Torr. 1. c.=Pilea pnmila.

ADIKE, Rafin. New Fl. Am. i. 63 (1836); Fl. Tellur. iii. 48 (1836)=Filea, Lindl. (Urtic),
allophyla, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48* P. trianthemdides.
glaberrima, Rafin. New Fl. Am. a. 64 = P. smilaeifolia.
lanceolate, Rafin. 1. c = P . lanceolata.
pumila, Rafin. 1. c. 68 = P. pumila.
rhonhoidea, Rafin. 1. e. 64 = P. rhombea.

ADINA, Salisb. Parad. Lond. 1.115 (1807). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 30.
aralioides, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 80.—Java,
cordifolia, *Benth. & Hook./. I. c*—Ind. or.
globiflora, *Salisb. Parad. Lond.* 1.115 *(fiirore globifera)* —China.
Griffithii, *Hook./. FL Brit.Ind.* iii. 24.—lad. or.
microcephala, *Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 40. —Afr. trop.
peduncularis, DC. Prod. iv. 849 = globiflora.
polyeephala, *Benth. Fl. Hongi.* 146.—Ind. or.
racemosa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 184.—China; Japon.
rubella, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 114.—China.
KS&ilifolia, *Benth. & Hooi.f. Gen.* ii. 80.—Ind. or.
trichototna, *Benth. & Hooi.f. I. c*—Malaya.

ADINANDBA, Jack, in Malay Mise. ii. n. 7. p. 49 (1822). *TERNSTROEMIACBAE,* Benth. *Be* Book. *i.* i. 182.
HA&NKAEA, Usteri, Ann. Bot. vi. (1793) 117.
SAROSANTHEKA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. ed. Temminck, 103.1.16 (1840?).
acuminata, *Korth. 1. c. ed. Temminck,* 109.—Sumatra,
cordata, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Genh.* xiv. (1865) 114.
crenulata, *T. Anders, in Hooi.f. Brit. Ind. Fl. I* 283. —Ind. or.
cyrtopoda, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 478=dnmosa.

ADINANDBA:-
dasyantha, Choisy, in Mém. Soc Phys. Genèv. xiv. (1855) 180 = integerrima.
dasyantha,*Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. ed. Temminck.* 108.—Borneo,
dumosa, *Jack, in Malay Misc.* ii. (1822) n. 7. p. 50. —Malaya; China.
dumosa, Vidal, Sinops. Filip. t. 12=integerrima.
exceka, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. ed. Temminck,* 109.—Borneo.
glabra, Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl. i. 479 = dumosa.
Griffithii, *Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 282.—Reg. Himal.
integerrima, 7'. *Anders, ex Dyer, I. c*—Malaya.
Jackiana, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. ed. Temminck, 106=dumosa.
javaniea, *Choisy, inZoU.Syst. Vert. Ind. Archip.* 148, 146.—Java.
Lamponga, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 479.—.Sumatra,
lasiopetala, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* xiv. (1855) I14.-Zeylan.
leiopetala, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 104.—Snmatra.
maerantha, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 421.—Java.
maculosa, *T. Anders, ex Dyer, in Hooi.f. Fl. Brit. Ind.* i. 282.—Malaya.
Mannii, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 170.—Afr. trop.
Millettii, *Benth. & Hook.f. ex Hance, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 9.—China.
phlebophylla, *Hance, 1. c.* xiv. (1876) 240.—Cambodia.
Sarosanthera, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. n. 477.—Borneo.
stylosa, Miq. 1. c. Suppl. 478=dumosa.
sylvestris, *Jack, in Malay Misc.* ii. (1822) n. 7 p. iii. —Sumatra.
trichocoryna, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot ed. Temminck, 107=dumosa.
villosa, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Genh.* xiv. (1856). —Burma.

ADIPE, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 101 (1886)-Bifrenapia, Lindl. (Orchid.) (1843).
fulva, Rafin. 1. c.=B. racemosa.
racemosa, Rafin. 1. c •= B. racemosa.

ADIPERA, Rafin. Sylva Tellur. 129 (1838) = Gaasia, Tourn. (Legum.).
Herberti, Rafin. 1. c.=C. Herbertiana.

ADISA, Steud. Norn. ed. II. i. H8 (1840), sphalm.=seq.

ADISCA, Blnme, Bijdr. (1825) 609 = Mallotjia, Lour. (Euphorb.).
acuminata, Blnme, I. c. 610 = M. acuminatus.
albicans, Blnme, 1. c. 611=Cephalocrotonalbicaos.
floribunda, Blume, 1. c. 610 = M. floribundus.
subfalcata, Zoll. in Linnaea, xxix. (1857-58) 464-Macaranga subfalcata.
subpeltata, Blnme, Bijdr. 610 = M. subpeltatns.
timoriana, Span. Ic. n. 26 ; et in Linnaea, xv. (1841) 318 = M. repandus.
Zippelii, Blume, Bijdr. 611=M. ricinoides.

ADLERIA, Neek. Elem. ii. 642 (1790)=Eperua, Anbl. (Legum.).

ADLTJMIA, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 352. *PAPAVERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 65.
BICUCULLA, Borckh. inRoem. Arch. i. H. 46 (1797), nomen prius.
drrhosa, *Rafin. 1. c*—Am. bor.

ADNAJUA, Rafin. Fl. Ludov. 56 (1817). *VACCINIACEAB.*
odorata, *Rafin. I. c*—Am. bor.

ADNULA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 87 (18361 =Pelexla. Poit. (Orchid.).
petiolaris, Rafin. 1. c.-P. spiranthoides.

ADODENDRON, DC. Prod. vii. 725-seq.

ADODENDRUM, Neck. Elem. i. 2U (1790) =Khodothainnus, Reichb. (Ericac.).

ADOKETON, Rafin. Mus: N. Sc. 1 j New Fl. Am. i. 65 (1836) = Telanthera, R. Br. (Cbenop.).
saxatile, Rafin. 11. cc—T. frutescens.
uniflorum, Rafin. New Fl. Am. i. 66.—Am. bor..

ADOLIA, Lam. Encyc. i. (1783) 44 = 8cutia, Comm. (sec. Endl. Gen. Suppl. i. 1424) (Rhamnac).
alba. Lam. 1. c. 45 = S. indica.
rubra, Lam. 1. c.=S. indica.

ADOIiFHIA, Meissn. Gen. 70 (60) (1837). *RHAMNEAE,* Berth. & Hook. f. i. 384.
califomica, 5. *Wats. inProc. Am.Acad.* xi. (1876) 126.—Calif,
infesta, *Meissn. Gen. PL* 70 (60).—Mexico.

ADONANTHE, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 227 (1839) = Adonis, Linn. (Raminc).
pyrenaica, Spach, 1. c. 230=Adonis pyrenaica.
sibirica, Spach, 1. c. 229=Adonis sibirica.
vernalis, Spach, 1. c. 228 = Adonis vemalis.

ADONIASTRUM, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, XT. ii. (1877) 27 = Adonis, Dill. (Rannnc).
vernale, Schnr, 1. c = Adonis vemalis.

ADONIGERON, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404 = Senecio, Linn. (Compos.).
adonidifolius, Fonrr. 1. c—S. adonidifolius.

ADONIS, Dill, ex Linn. Syst. ed. I. (1736). *RANUNCVLACEAE,* Benih. & Hook. f. i. 6.
ADONANTHE, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 227 (1839).
ADONIASTRUM, SchuT, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 27.
COSMARIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 216 (1867).
aestivalis, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. iii. 378 = autumnalis.
aestivalis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 771.—Europ.; Oriens.
aestivalis, Link, ex Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. i. 12 = microcarpa.
aethiopica, Thunb. Prod. PI. Cap. 94 = Knowllonia gracilis.
aleppica, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvi. (1841) 860.—Syria.
ambigua, Gand. Fl. Helv. iii. 618-aestivalis.
amurensis, *Regel & Radde, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1861) II. 35. t. 2. f. 12.—Manchur.
annua, Linn. Sp. PI. 547 - aestivalis et autumnalis.
anomala, Wallr. Sched. Crit. 273-flammea.
apennina. Linn. Sp. PI. 648= vemalis.
apennina, Pall. Reise, ii. 388-wolgensis.
apennina, Schouw, ex DC. Prod. i. 25 = pyrenaica.
autumnalis, Bieb. Fl. Taor. Cauc. ii. 23 = aestivalis.
autumnalis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 771.—Europ.; Oriens.
baetica, Coss. Not. PI. Crit ii. 25=autumnalis.
caerulea, *Maxim, in Bull. Acad. PHersb.* xxiii. (1877) 806.—China.
capensis, Linn. Sp. PI. 548 = Knowltonia rigida.
capensis, Thunb. Prod. PI. Cap. 94 = Knowltonia gracilis.
caudata, Stev. in BulL Soc. Nat Mosc. xxL (1848) II. 271, 278 = flammea.
chaerophylla, Fisch. in DC. Prod. i. 25-wolgensis.
Chrysocyathns, *Hook.f. & Thorns, ex Hoot./. Fl. Brit. Ind.* 15.—Reg. Himal.
citrina, DC. Syst. i. 228 = ftammea.
citrina, Hoffm. Fl. Germ. i. 251= aestivalis.
coriacea, Poir. Encyc. Suppl. i. 146 »Knowltonia rigida.
Cupaninna, Guss. Syn. Fl. Sic. ii. 86=microcarpa.
cylienea, Boiss. Heldr. & Orph. Diagn. Se>. II. v. 5.—Graecia.
daucifolia, Lam. Encyc i. 46=Knowltonia daucifolia.
davurica, Reichb. Ic. Crit. Cent iv. 21. t. 821-vemalis.
dentata, *Delile, Fl. Egypte,* 287.—Europ.; Afr. bor.
dentata, Duby, ex Nym. Consp. 4=aestivalis.
distorta, *Tenore, Fl. Nap.* iv. 337. t. 149.—Ital.
eriocalycina, *Boiss. Fl. Orient,* i. 17.—Armenia.
erosifetala, Stokes, Hot. Mat Med. iii. 255 = autumnalis.
filia. Linn. f. Suppl. 271 = Knowltonia daucifolia.
flammea, *Jacq. Fl. Austr.* iv. 29. t. 855.—Europ.; Oriens.
flammea, Schleich. ex Steud. Num. ed. II. i. 28 = aestivalis.
/lava, Vill. Cat. Jard. Straib. 247 = aestivalis.

ADONIS :—
fulgens, *Hochst. in Lorent, Wanderungen,* 838.—As. Min.
gracilis, Poir. Encyc. Suppl. i. 147 «= Knowltonia gracilis.
Helleborus, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 82; ed. II. 110'-vemalis.
hirsuta, Poir. Encyc. Suppl. i. 147 = Knowltonia hirsuta.
hybrida, Wolff, ex Nym. Consp. 4 - wolgensis.
Inglisii, Royle, Illustr. Himal. PI. 63 = aestivalis.
intermedia, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 121 = microcarpa.
ircutiana, Fisch. ex DC. Prod. i. 25-vemalis.
laserpitiifolia, Poir. Encyc. Snppl. i. 147 - Knowltonia vesicatoria.
maculata, *Roth, Enum. PI. Phan. Germ.* ii. 602.—Europ.
maculata, Wallr. Sched. Crit. 270 - aestivalis.
magellanica, Raeusch, Norn. ed. III. 162 = Hamadryas magellanica.
marginata, Bienert, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 15 = scrobiculata.
Marschalliana, Andrz. ex Bess. Enum. PI. Volh. 47—wolgensis.
micrantha, DC. Syst. i. 222-autumnalis.
microcarpa, *DC. I. c.*—Enrop.
miniata, Jacq. Fl. Austr. iv. 28=aestivalis.
palaestina, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 1.—Syria.
palustris, Raeusch, Norn. ed. HI. 162 = Ranunculus sceleratus.
parviflora, *Fisch. ex DC. Prod.* i. 24.—Oriens.
parviflora, Janka, ex Nym. Consp. 4-vemalis.
perramosa, Schur, Enum. PI. Transs. 6 = autumnalis.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 4-dentata.
phoenicea, Bercht. et Presl, Rostl. i. Ranunculac. 42 — autumnalis.
pilosa, Raeusch, Nom. ed. III. 162 =.Ranuncnlus pensylvanicus.
polymorpha, Zumag. Fl. Pedem. ii. 862 = aestivalis, autumnalis.
pratensis, Ledeb. Fl. Ross. i. 24= vemalis.
Preslii, Tod. ex Nym. Consp. 4 = flammea.
pyrenaica, *DC. Fl. Fr.* v. 635.—Europ.
pyrenaica, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. 26 = A. Chrysocyathus.
riparia, *Rafin. New Fl. Am.* i. 66.—Am. bor.
scrobiculata, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 6.—Afghan,
sibirica, *Patrin, ex Ledeb. Ind. Hort. Dorp. Suppl.* (182411.—Sibir. altaic.
Sibthorpii, *Boiss. Orphan. & Heldr. in Bull. Congr. Bot. PHersb.* 1869 (1870) 124.—Graecia.
squarrosa, *Stev. in Bull. Soc. Nat.-'Mosc.* xxi. (1848) II. 271, 272-aestivalis.
vernalis, Asso, Syn. Stirp. Arag. 70=dentata.
vemalis, *Linn. Sp. PI.* 547.—Europ.; As. bor.
vesicatoria, Linn. f. Suppl. 272 = Knowltonia vesicatoria.
villosa, Ledeb. Ind. Hort. Dorp. Suppl. (1824) 1 = wolgensis.
wolgensis, *Stev. ex DC. Syst.* i. 645.—Europ.; Oriens; As. bor.

ADOPOGON, Neck. Elem. i. 55 (179O) = Xrfgia, Schreb. (Compos.).

ADORIUM, Rafin. Neogenyt. 3 (1825)=Seseli, Linn. (Umbellif.).
crassi/olium, Rafin. 1. c.=S. divaricatum.

ADOXA, Linn. Syst. ed. I. (1735). *CAPR1FOLIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 2.
MOSCATELLA, Adans. Fam. ii. 248 (1763).
MOSCHATELLINA, [Tonra.] Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 412 (1742).
inodora, Falc. ex Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 2=A. Moschatellina.
moschata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 462=A. Moschatellina.
Moschatellina, *Linn. Sp. PI.* 367.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
tuberosa, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 493 = A. Moschatellina.

ADRASTAEA, DC. Syst. Veg. i. 424 (1818). *DILLENIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 16.
ADXASTEA, Spring. Syst. ii. 360 (1825).
salicifolia, *DC. I. c*—Austral.

ADBIANA, Gaudich. in Ann. Ser. Nat. Ser. I. v. (1825) 228. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 306.
TRACHVCARVON, Klotesch, in Lehm. PI. Preiss. i. 175 (1844).
acerifolia, Hook, in Mitch. Joum. Trap. Austral. 871—glabrata.
Billardieri, Baill. Etud. Gén. Euph. Atl. 6. t. 8. f. 19 = quadripartita.
Gaudichaudi, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 31>—tomentosa.
glabrata, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat.* Sir. I. v. (1825'; 223.—Austral.
heterophylla. Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral. 371—glabrata.
Hookeri, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 8)1.—Austral.
Klotzschii, *Muell. Arg. 1. c.* 892.—Austral,
quadripartita, *Gaudich. Bo(. Voy. Freyc.* 489.—Austral,
tomentosa, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat.* Sex. I. v. (1825) 223.—AustraL

ADROMISCHU8, Lem-Jard. Fleur. ii. (1862) Misc. 69-Cotyledc-a, Toum. (Crassul.).
caryophyllaceus, Lem. 1. c. 60-C. caryophyllacea.
clavifolius, Lem. 1. c. = C. clavifolia.
cristatus, Lem. 1. c. = cristata.
cuneatus, Lem. 1. c.-cuneata.
hemisphaericus, I«m. 1. c. = C. hemisphaerica.
jasminiflorus, Lem. 1. c.—C. jasminiflora.
maculatus, Lem. 1. c. = C. maculata.
mammillaris, Lem. 1. c. = C. mammillaris.
mucronatus, Lem. 1. c. = C. maculata.
rhombi/olius, Lem. 1. c. — C. rhombifolia.
robustus, Lem. 1. c = C. trifloia.

ADULPA, Endl. Gen. (1836) 119 (err. typ.) = seq.

ADUPLA. Bosc, in Jaume St. Hil. Expos. Fam. Nat. i. 65 (1805) = Cyperus, Linn.

ADVENTINA, Rafin. New Fl. Am. i. 67 (1836). *COMPOSITAE.*
ciliata, Rafin. 1. c.—Am. bor.
parviflora, Rafin. 1. c.—Am. bor.

ADYSETON, Adans. Fam. ii. 420 (1768) = Alyssum, Linn. (Crucif.).
alpestre, Sweet, Hort. Brit.ed. I. 467 = Alyss. alpestre.
altaicum, G. Don, in Sweet, L c ed. III. 80-=Alyss. Fisclierianum.
argenteum, Sweet, 1. c. ed. I. 467=Alyss. argentenm.
atlanticum, G. Don, Gen. Syst. L 178-Alyss. atlantienm.
Bertolonii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 467 - Alyss. montanum.
calydnum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 13 - Alyss. calycinum.
campestre, Moench, Meth. Suppl. 87-Alyss. campestre.
cunei/olium, Sweet, Hort. Brit.ed. 1.467 = Alyss. cuneifolium.
dentatum, G. Don, Gen. Syst. i. 179=Camelinn sativa.
diffusum. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 467-Alyss. montannm.
dubium, G. Don, Gen. Syst. i. 179 = Alyss. dubium.
edentulum. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 157 = Alyss. gemonense
Fischerianum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 25-Alyss. canescens.
gemonense. Sweet, 1. c.-Alyss. gemonense.
gnaphalodes, G. Don, Gen. Syst. i. 179 = Vesicaria gnaphalodes.
hahmi/olium, Link, Enum. Hort. Beiol. ii. 157 = Alyss. halimifolium.
hyperboreum, G. Don, Gen. Syst. i. 179 = Alyss. hyberboreum.
lanigerum, G. Don, 1. c. 178-Alyss. lanigerum.
lenense, G. Don, 1. c.=Alyss. lenense.
maritimum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 157=Alyss. maritimum.
Marschallianum, Sweet, Hort. Brit.ed. II. 25-Alyss. Marschallianum.
montanum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 14-Alyss. Wulfenianum.
murale, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.467 = Alyss. argenteum.
mutabile, Moench, Meth. 267 •= Alyss. calycinum.

ADYSETON:—
netrodense, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 25 = Alyss. serpyllifolium.
obcordatum, G. Don, Gen. Svst. i. 179-Abyss, obcordatnm.
obtusifolium, Sweet, Hort. Brit ed L 467-Alyss. alpestre.
orientate. Sweet, 1. c. 467 - Alyss. orientale.
petalodes, G. Don, Gen. Syst. i. 179-Farsetia obovata.
repent, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 25 = Alyss. alpestre.
smranicum, G. Don, Gen. Syst. i. 178 = Alyss. alpestre.
saxaiile, Sweet, Hort. Brit ed. I. 467 = Alyss. saxatile.
serpyllifolium, Sweet, 1. c = Alyss. serpyllifolium.
sibiricum, G. Don, Gen. Syst. i. 179= Alyss. saxatile.
spathulatum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 467= Alyss. spathulatum.
spinosum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 157-Alyss. spinosum.
tortuosum, Sweet, Hort. Brit. ed.1.467 = Alyss. alpestre.
vernale, Sweet, 1. c. = Alyss. rostratnm
Wul/enianum, Sweet, 1. c.-Alyss. montanum.

ADYSETUM, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 157 (1822) -praec.

AECEOCLADES, Dnchartre, in Orb. Diet. ix. 170 (1849) err. typ.=OECEOCLADES, Ljndl.

AECHMAEA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. xv. (1841) 371 = Aechmea, Ruiz & Pav. (Bromel.).

AECHMANDRA, Am. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1841) 274=Melothria, Linn. (Cncnrb.V
Blumeana,H. Roem. Syn.Pepon. 88 = M. Rumphiana.
conocarpa, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 100 = Corallocarpus conocarpus.
deltoidea, Am. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1841) 274 = M. zeylanica.
epigaea, Arn. 1. c. = Corallocarpus epigaeus.
indica, C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. ii. 626 = M. indica.
odorata, Hook. f. &. Thorns, ex Benth. Fl. Hongkong, 124 = M. odorata.
rostrata, Arn. in Hook. Lond. Jonm. Bot. iii. (1841) 274 = Kedrostis rostrata.
•eelutina, Dalz. & Gibs, in Bomb. Fl. 200=Corallocarpus velutina.
teylanica, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 125=Cerasiocarpum zeylanicum.

AECHMANTHEEA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75, 87 (1837). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook f. ii. 1088.
gossypina, Nees, 1. c. 87=tomentosa.
leiosperma, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 429—Ind. or.
tomentosa, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 87.—Ind. or.
Walliehii, Nees, in DC. Prod. xi. 170=tomentosa.

AECHMEA, Ruiz & Pav. Prod. 47. t. 8 (1794). *BROMELIACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 668.
ANDROLEPIS, Brongn. ex Houllet, in Rev. Hortie. (1870) 12.
CANISTRUM, KMorr. Belg. Hortie. (1873) 257.1.15.
DISQUAMIA, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852-3) t. 269.
ECHINOSTACHYS, Brongn. in Planch. Hort. Donat. 25 (1854).
ERIOSTAX, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 25 (1836).
HOHENBBRGIA, Schult f. Syst. vii. II. 71, 1251 (1830).
HOPLOPHYTUM, E. Morr. Belg. Hortie. (1866) 162.
LAMPROCOCCUS, Beer, Bromel. 103 (1867).
MACROCHORDION, De Vriese, in Jaarb. Nederl. Maat. Tuinb. (1853) 14.
PIRONNEAVA, Gaudich. Voy. Bonite, Bot. t. 63. (1889-62).
POTHUAVA, Gaudich. 1. c. tt. 116,117 (1839-62).
angustifolia, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 43 •= spicata.
aquilega, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 592.—Ind. occ
augusta, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 162.—Am. trop.
aurantiaca, *Baker, I. c.* 2S5.-Am. trop.
Barteei, *Baker, in Card. Chron.* xx. (1888) 102.—Honduras.
braeteau, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 592.-Ind. occ.
brasiliensis, *Regel, Gartenfl.* (1885) 258.—Bras,
brassicoides, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 329.—Bnt. Guian.

AECHMEA :—
bromeliaefolia, *Baker, ex Benth. &• Hook. f. Gen.* iii. 6d4.—Am. trop.
Burchellii, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 281.—Am. trop.
caerulea, E. Morr. Cat. (1871) l=seq.
cserulescens, *Hort. ex Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 227.—Am. trop.
calyculaU, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 232.—Am. trop.
capitata, Baker, L c. 167=exsndans.
coelestis, *E. Morr. Fl. des Serres,* Ser. II. xi. (1875) 1. t. 2146.—Am. trop.
*colxnnnuis, Andrt, in Illustr. Hortie.*xxv.(1878) 60.—N. Granat.
comata, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 234.—Am. trop.
contracta, *Baker, I. c.*—Am. trop.
corallina, *Brongn. ex Beer, Bromel.* 166.—Bras.
Cornui, Carr. in Rev. Hortie. (1885) 36 =nadicaulis.
Cumingii, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 227—N. Granat.
cymoso-paniculata, *Baker, 1. c.* 165.—Venezuela,
dactylina, *Baker, 1. c.* 161.—Panama,
dichlamydea, *Baker, 1. c.* 133.—Ins. Tobago.
discolor, Morr. in Ann. Soc. Hort. Gand, il. (1846) 175. t. 65-fulgcns.
distans, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 592.—Ind. occ.
distorts, Griseb. PI. Cob. 253 = Wrightii.
distichantha, *Lem. Jard. Fleur.* iii. (1858) t. 269.—Bras,
exsudans, *E. Morr. ex C. H. Morr. in Belg. Hortie.* xxviii. (1878) 303.—Bras,
excavata, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 184.—Paraguay.
fasciata. *Baker, 1. c.* 231.—Am. trop.
floribunda, *Mart, ex Schult. f. Syst.* vii. II. 1271.—Bras,
fulgens, *Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xv. (1841) 371.—Guiana.
Furstenbergii, E. Moir. ex C. H. Morr. in Belg. Hortie. xxviii. (1878) 252=Streptocalyx Furstenbergi.
Glaxiom,Baier,in Journ. Bot.xvii. (1879) 133.—Bras,
glomerata, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6668.—Bras.
Hookeri, *Lem. Illustr. Hortie.* xi. (1864) *Misc.* 42.—Bras.
Hystrix, *E. Morr. ex C. H. Morr. in Belg. Hortie.* xxx. (1880) 90 *St.* 243.—Guiana.
Jenmani, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 829-Melinonii.
Lalindei, *Linden & Rodigas, in Illtstr. Hortie.* xxx. (1883) t. 481.—N. Granat.
laxiflora, *Benth. in Bot. Voy. SMfih.* 173.—Mexico.
Legrelliana, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 236.—Am. merid.
Lindeni, *E. Morr. ex C. Koch, Wochenschr.* viii. (1865) 398.—Bras,
lingulata, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 164.—Jamaic
Luddemanniana, Brongn. ex E. Morr. Cat. Bromel. (1871) l = caerulescens.
macracantha, Brongn. in Illustr. Hortie. (1880) 69 = Schiedeana.
Mariae-Reginae, *H. Wendl. in Hamb. Garten:* xix. (1863) 82.—Am. centr.
martinicensis, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 132.—Ins. Martinic.
melanacantha, *De Vriese, in Tuinb. Fl.* 1. (1865) 856.—Hab.
Melinonii, *Hook. Bot. Mag.* t. 6285.—Am. trop.
Mertensii, *Schult. f. Syst.* vii. H. 1272.—Am. austr.
mexicana, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 165.—Mexico.
Meyeri, Baker,*i.* c. xviii. (1880) 16-aquilega.
micrantha, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xv.(1841) 370 = Araeococcus micranthus.
mucronifiora, *Hook. Bot. Mag.* t. 4882.—Guiana,
mnlticeps, *Baker, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 49.—Am. trop.
Noettigii, *Wamra.in Oestr.Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 117.—Bras.
nudicaulis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 593.—Am. trop.
odora, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 226.—Am. trop.
organensis, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 116-floribunda.
ornata, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 162.—Am. trop.
Ortgiesii, *Baker, I. c.* 236.—Am. trop.

AECHMEA:—
paniculata, *Rui* & Pav. Fl. Per.* iii. 87.—Pernv.
panicnligera, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 693.—Ind. occ.
parviflora, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 167.—Bras.
patentissima, *Baker, I. a* 227.—Am. trop.
pectinata, *Baker, I. c.* 238.—Am. trop.
petropolitana, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 116.—Bras.
Pineliana, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 232.—Am. trop.
platyjiema, *Baker, 1. c.* 166.—Bras,
polycephala, *Baker, 1. c.* 164.—Ins. Jamaic.
pubescens, *Baker, I. c.* 185.—Nicarag.
pyramkJalis, *Benth.in Bot. Voy.Sulph.* 173.—Mexico,
ramosa, *Mart, ex Schult. f. Syst.* vii. II. 1272.—Bras,
xegularis, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 229.—Am. trop.
Schiedeana, *Schleckt. in Unnaea,* xviii. (1844) 437.—Mexico,
setigera, *Mart, ex Schult. f. Syst.* vii. II. 1273.—Bras.
spectabilis, Brongn. ex Houllet, Ot *Rev. Hortie.* (1875) 311.—Guatemala,
sphaerocephala, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 162.—Am. trop.
spicata, *Mart, ex Schult. f. Syst.* vii. II. 1273.—Bras,
suaveolens, *Knowl. & Westc. Flor. Cab.* iii. (1840) 177.—Bras,
subinermis, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 228.—Am. trop.
tillandsioides, *Baker, 1. c.* 134.—Bras.
Veitchii, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6329.—N. Granat.
viridis, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 235.—Am. austr.
vriesioides, Baker, I. c. 184 = tillandsioides.
Weilbachea, Carr. in Rev. Hortie. (1871) 17I=seq.
Weilbachii, *F. Didr. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. ii. (1854) 876.—Bras.
Wrightii, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 168.—Cuba.

AECHMOIiEPIS, Decne. in DC. Prod. viii. (1844) 498. *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 741.
rosmarini.olia, *Decne. I. c.*—Afr. bop.

AECHMOPHORA, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. (1840) 2»=Bromus,.Linn. (Gramin.).
arduensis, Spreng. ex Steud. 1. c= = B. arduensis.

AEDEMONE, Kotschy, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. ;1858) 116=Herminiera, Gnill. & Perr. (Legumin.}.
mirabilis, Kotschy, 1. c » H. Elaphroxylon.

AEDMANNIA. Spach, in Orb. Diet. i. (1841) 139, err. typ.=OEDMANNIA, Thunb. (Legum.).

AEDULA, Noronha, in Verb, Brtav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. 4. 1, nomen.

AEEGIPHILA.Sw. Prod.Veg. Ind. Occ. (1788) 81, err. typ. - Aegiphila, Jacq.

AEËRIDIUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 295 = Aërides, Lour. (Orchid.).
odorum, Salisb. 1. c.=Aerides odoratum.

AEGELAT1S, Roxb. Fl. Ind. ii. Ill (1832) err. typ.-AeglaUtla. R. Br. (Plumbag.).

AEGIALEA, Klotzsch, in Walp. Ann. ii. (1852) 1113 « Pieris, D. Don (Ericac.).

AEGIALINA, Schult. Mant. ii. (1824) 13, 222= Koelerla, Pers. (Gramin.X
tenuis, Schult. 1. c. =K. villosa.

AEGIALINITES, Presl, Bot Remerk. (1844) 103 = AegiaUtis, R. Br. (Plumbag.).
annulata, Presl, 1. c.=Aegialitis annnlata.
rotundifolia, Presl, 1. c. = AegiaUtis rotundifolia.

AEGIAIilTIB, R. Bi. Prod. (1810) 426. *PLUMBAGINEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 624.
AEGIAMNITES, Presl, Bot. Bemerk.^1844) 103.
annulata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) II. 217-rotundifolia.
annulata, *R. Br. Prod.* i. 426.—Austral,
rotundifolia, *Roxb. Fl. Ind.* ii. 111.—Ind. or.

AEGIALITIS, Trin. Fund. Agrost. 127. t. 9. (1820)-Koeteria, Pers. (Gramin.).
tennis, Trin. 1. C.-K. villosa.

AEGIALOPHILA, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. (1849) 105 = Centaurea, Linn. (Compos.).
eretiea, Boiss. & Heldr. 1. c. 106 = C. pumila.
pumila, Boiss. 1. c. 105=C. pnmila.

AEGIANILITES, C. B. Clarke, in Hook. f. JFl. Brit. Ind. iii. 479 (1882), err. typ.=Aegialitis, R. Br.

AEGIATILIS, Griff. Not. iv. 207 (1854), err. typ. =praec.

AEOTCEH.A8, Gaertn. Frnct. i. 216. t. 46 (1788). *MYRSINEAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 448.
MALASPINAEA, Presl, Reliq. Haenk. ii. 68. t. 61 (1880).
cerniculatum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 79 =majue.
ferreum, Blume, Bijdr. 693=majus.
floridum, Roem. & Schult. Syst. >iv. 512=majus.
fragrans, Kon. in Kon. *8c* Sims, Ann. Bot. i. (1805) 131 = majus.
majus, *Gaertn. Fruct.* i. 216. t. 46.—Geront. trop.
Malaspinaea, A. DC. Prod. viii. 143=majus.
minus, A. DC. 1. c. 41'2 = majus.
minus, *Gaertn. Fruct.* i. 216. t. 46.—Ind. or.
nigricans, A. Rich. Voy. Astrol. Bot. ii. 57. t. 21 = majus.
obcordatum, Steud. Nom. ed. II. i. 29 = majus.
obovatum, Blume, Bijdr. 693 = majus.

AEGICON, Adans. Fam. ii. 36 (1763)=TriUoum, Linn. (Gramin.).

AEGILOPS, Linn. Coroll. Gen. 20 (1737)=Tritieum, Linn. (Gramin.).
agropiroides, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 456.—Syria.
aromatica, Walt. Fl. Carol. 249-Ctenium amerieanum.
Aucheri, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 74—Agropyron Aucheri.
Augeri, Stead. Syn. PI. Gram. 355 (err. typ.) = praec.
bicornis, Jaub. & Spach, Illnstr. PI. Or. iv. 11 = T. bicome.
biuncialis, Vis. Fl. Dalm. 1.—Europ.
brachyathera, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 389.- Afr.bor.
caudata, Bertol. Fl. Ital. vi. 622=Agropyron Aucheri.
eaudata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 26 - T. Aegylops.
caudata, Balb. Elencho, 98 ; Griseb. SpiciU Fl. Rnmel. ii. 425 =T. cylindricum.
caudata, Linn. Sp. PI. 1051 = Agropyron villosum?
ciliaris, Koen. ex Roem..& Schult. Syst. ii. 772.—Ind* or.
comosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. 75. t. 94.—Graecia.
connata, Stead. Syn. PI. Gram. 356.—Graeeia.
crassa, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 123.—Oriens.
crithodium,Ste\id. Syn. PI. Gram. 355.- T. monococcum.
cylindrica, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 26 =T. Aegylops ?
cylindrica, Host, Gram. Austr. ii. 6. t. 7 —T. cylindricum.
cylindrica, Schur, Enum. PI. Transs. 813 = T. ovatum.
cylindrica, Sibth. *8c* Sm. Fl. Graec. t. 95 = T. caudatum.
divaricata, Jord. & Fourr. Brer. PI. Nov. Fasc. ii. 129 = T. ovatum.
echinata, Presl, Gram. Sic. 47 = T. triunciale.
Echinus, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic) i. (1855) 456.—Gallia ?
tlongata. Lam. Fl. Fr.iii. 632 = T. triunciale.
trig-ens, Jord. *8c* Fourr. Btev. PI. Nov. Fasc. ii. 131-T. ovatum.
erratica, Jord. *8c* Fourr. 1. c 130-T. ovatnm.
exaltata, Linn. Mant. -ii. App. 575 = Ophiurus corymbosus.
fluviatilis, Blanco, Fl. Filip. ed. T. 47.—Ins. Philipp.
fragilis, Parl. Fl. Ital. i. 515-T. fragile.
geniculata, Roth, CatalecL i. 121 = T. ovatum.
hordeiformis, Steud. Syn. PI. Gram. 354.—Mesopotam.
Hystrix, Nutt. Gen. Am. i. 86.—Am. bor.
incurva, Linn. Sp. PI. 1051—Lepturus incurvatus.
incumataf Linn. Sp. PI. ed. II. 1490 = praec.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 129=T. triunciale.
- *Larenti*, Steud. Syn. PI. Gram. *ZSi - Lorentii.*
loliacea, Jaub. & Spach, Illustr. PI. Or. ir. 23-*mutica.*

AEGILOPS:—
longearistata, Steud. Syn. PL Gram. 35C.—Guiana.
Lorentii, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 326-T. ovatum.
macrochaeta, ShuttL & Hnet, ex Duval, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 384 = T. ovatum.
macrura, Janb. *8c* Spach, Illustr. PI. Or. iv. 21=Agropyron Aucheri.
microstachys, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. Fasc. ii. 132 = T. ovatum.
muricata, Retz. Obs. ii. 27=Ischaemnmpectinatum.
mutica, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 73.—Oriens.
neglecta, Req. ex Bertol. Fl. Ital. i. 787=T. triaristatum.
nigricans, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. Fasc. ii. 128—T. ovatam.
Notarisii, Clem, in Mem. Ace. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 335=T. ovatum.
ovata. Linn. Sp. PI. 1050=T. ovatum.
ovata, Roth, in Usteri, Ann. iv. (1793) 41 = T. triaristatum.
parvula,. Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. "Nov. Fasc. ii. 131 = T. ovatum.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 129 = T. caudatum.
platyathera, Jaub. *8c* Spach, Illustr. PI. Or. iv. 17.—Mesopotam.
procera, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. Fasc. ii. 129 = T. ovatum.
pubiglumis, Jord. *8c* Fourr. 1. c 131-T. ovatum.
saccharina, Walt. Fl. Carol. 249 = Eleusine aegyptiaca.
singularis, Steud. Syn. PI. Gram. 354.—Persia.
sicula, Jord. & Fourr. B«v. PI. Nov. Fasc. ii. 129 = T. ovatum.
speltaeformis, Jord. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. iv. (1855) 313 = T. ovatnm.
speltoides, Tausch, in Flora, xxxix. (1837) 109 = T. bicome.
squarrosa, Willd. Sp. PI. iv. 944 = T. ventricosnm.
squarrosa, Cav. Ic. t. 90. f. 2 =*platyatkera.*
squarrosa, DC. ex Steud. Nom. ed. II. i. 29 - T. cylindricum.
squarrosa, Linn. Sp. Fl. 1051 =T. Aegylops.
subulata, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 388.—Afr. bor.
Tauschii, Coss. Notes Crit. 69 =T. Aegylops.
triaristata, Req. ex Bertol. Fl. Ital. i. 789 = T. triunciale.
triaristata, Willd. Sp. PI. iv. 943 = T. triaristatum.
tripsacoides, Jaub. & Spach, Illustr. PI. Or. ii. 121. t. *200 = mutica.*
triticoides x, Req. ex Bertol. Fl. Ital. i. 788.—Europ.
triuncialis, Linn. Sp. PI. 1051=T. triunciale.
truncata, Ledeb. ex Trantv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 312, nomen.—Rossia.
uniaristata, Steud. Syn. PI. Gram. 354.—Graecia.
uniaristata. Vis. Fl. Dalm. iii. 345.—Europ.
vagans, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. Fasc. ii. 130 = T. ovatum.
ventricosa, Tausch, in Flora, xxxix. (1837) 108=T. ventricosum.
virescens, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. Fasc ii. 130 = T. ovatum.

AEGINETIA, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 129 = Bouvardia, Salisb. (Rubiac).
capitata, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan. 1828) 389 = Coccocipselum capituliflorum.
longiflora, Cav. in Anal. Hist. Nat. iii. (1801) 130 = Houstonia longiflora.
multiflora, Cav. 1. c.=Botwardia Cavanillesii.

AEGINETIA, Linn. Syst. ed. I. (3735). *OROBANCHACEAE*, Benlh. & Hook. f. ii. 982.
CENTRONIA, Blume, Bijdr. 776 (1826).
CENTRONOTA, DC. ex Meissn. Gen. 303 (213) (X840); et Prod. ix. 286 (1846).
GASPARINIA, Endl. Gen. 1408 (1840).
TRONICENA, Steud. Nom. ed. II. ii. 741 (1841).
abbreviata, Buch.-Ham. ex Benth. Scroph. Ind. 55 = pedunculata.
acaulis, Walp. Rep. iii. 481 —pedunculata.
Centronia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 713.—Java.
cocdnea, Juss. ex Walp. Rep. iii. 481 = Phelypaea coccinea.
indica, *Linn. Sp. PI.* 632 ; *Roxb. PI. Corom.* i. 63. t. 91.—As. trop.
japonica, Sieb. *8c* Zucc. in Abh. Math. Akad. Muench. iv. in. (18ft) 341 = indica.
pedunculata, *Wall. Pl.As. Rar.* iii. 13. t. 219.—As. trop.

AEGIPHHiA, Jacq. Stirp. Am. t 16 (1763) j Obs. Bot. ii. 3. t. 27 (1767). *VERBENACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 1151.
AfcERiNA, DC. in Meissn. Gen. 278 (186) (1840).
BRUECKIA, Klotzsch & Karst. Ausw. Gew. Venez. 31.1.10 (1848).
MANABEA, Aubl. PI. Gui. 1. 61. t. 23, 25 (1775).
OMPHALOCOCCA, Willd. ex Roem. *8c* Sehalt. Syst. iii. Mant. 10 (1827 V
arborescens, *Vahl, Eclog.* i. 15. t. 10.—Am. austr.
aurea, *Turcm. in Bull Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) II. 218.—Cuba.
Berteriana, *Schau. in DC. Prod.* xi. 654.—N. Granat.
brachiata, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 371.—Mexico.
brachiata, Veil. Fl. Flum. 38 ; i. t. 93 = triantha.
casseliaeformib, *Schau. in DC. Prod.* xi. 651.—Bras,
cestrifolia, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot* v. (1846) 184—Bras.
cordata, *Poepp. ex DC. Prod.* xi. 650.—Peruv.
cornifolia, *Kunth, in Abh. Akad. Berl.* (1831) 215.—Bras.
cuspidata, *Mart, ex DC. Prod.* xi. 453.—Bras.
Deppeana, Sterd. Nom. ed. II. i. 29=brachiata.
diffusa, *Andr. Bot. Rep.* ix. t. 578.—Ind. occ.
dumosa, Salisb. Prod. 67 - martinicensis.
elata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 31.—Am. trop.
Wipes, *Mart. & Schau. in DC. Prod.* xi. 652.—Bras,
fiuminensis, *Veil. Fl. Flum.* 38; i. t. 95.—Bras,
foetida. *Sn. Prod. Veg. Ind. Occ.* 82.—Jamaic.
glabra. Lam. Illustr. t. 70. f. 1 = martinicensis.
glomerata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 154.—Ecuador.
grandiflora, Hook. Bot. Mag. t. 4230 - Clerodendron grandiflorum.
grandifolia, Walp. Rep. iv. 121=magnifolia.
graveolens, *Mart*, dr *Schau. in DC. Prod.* xi. 651.—Bras.
åirta, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Decad.* 47.—Bras.
Humboldtii, *Schau. in DC. Prod.* xi. 652.—Venezuela,
incana, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (18631 II. 218.-Cuba.
inflexa, Veil. Fl. Flum. 38; i. t. 96. (Rubiacea, sec. Schau.).—Bras,
integrifolia, *Jacq. Hist. Stirp. Am.* 15. t. 178. f. 7.—N. Granat.
laeta, *H. B. & K. Nov. Gen. etSp.* ii. 249.—N. Granat.
laevigata, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 76.—Ind. occ.
laevis, *Poepp. ex Walp. Rep.* iv. 119.—Bras,
laevis, *Willd. Sp. PI.* i. 617.—Guiana.
lanuginosa, Gardn. in Hook. Land. Joum. Bot. iv. (1845) 184=obducta.
latifolia, Willd. ex Walp. Rep. iv. 120 = Mutisii.
laxiflora, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 449.—Guiana.
Lhotskiana, *Cham, in Linnaea*, vii. (1882) 112.—Bras,
longifolia, *Turce. in Bull. Soc. Not. Mosc.* xxxvi. (1868) II. 218.—N. Granat
Luschnatii, *Schau. in DC. Prod.* xi. 651.—Bras.
lutea, Lam. Illustr. t. 70. f. 3=laevis.
macrophylla, Desf. Cat Hort. Paris, ed. III. 391 = magnifolia.
macrophylla, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 251.—Am. austr.
macrophylla, Sieber, ex Schau. in DC. Prod. xi. 655 (- Rubiacea, sec. Schau.).—Ins. Trinit.
magnifolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 29.—Ind. occ.
Manabaea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. i. 256 »laevis.
martinicensis, *Jacq. Obs. Bot.* ii. 3.—Ins. Martinic
mediterranea, *Veil. Fl. Flum.* 38 ; i. t. 94.—Bras,
membranacea, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) II. 219.—Am. trop.
mollis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 250. t. 130.—Am. austr.
multiflora, *Suit & Pav. Fl. Per.* i. 50. t. 76.—Peruv.
Mutisii, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 250. t. 131.—Am. austr.
Nuxia, Willd. Sp. PI. i. 616-Nuxia verlicillata.
obducta, *Veil. Fl. Flum.* 89 ; i. t. 97.—Bras,
obovata, *Andr. Bot. Rep.* ix. 578.—Ind. occ.
oleifera, Casar. Nov. Stirp. Bras. Decad. 47 = fluminensis.
peruviana, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) II. 219.—Peruv.
pubescens, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 29-salutaris.
punctata, *Tura. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) II. 219.—Jamaic.

A.EQIPHILA:—
racemosa, Veil. Fl. Flum. 87 ; i. t. 88 = cnspidata.
Riedeliana, *Schau. in DC. Prod.* xi. 649.—Bras,
salutaris; *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 249?-Am. austr.
Sellowiana, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 111.—Bras.
serrata, Veil. FI. Flum. 88 ; i. t. 92=graveolens.
splendens, *Schau. in DC. Prod.* xi. 648.—Bras.
stipulata, Veil. Fl. Flum. 87; i. t. 90 (Rubiacea, sec. Schau.).—Bras.
straminea, *Hqffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* iii. 18.—Bras,
tomentosa, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 110.—Bras,
triantha, *Schau. in DC. Prod.* xi. 650.—Bras,
trifida, *Sw. Prod. Veg. tnd. Occ.* 82.—Jamaic.
umbellata, Veil. Fl .Flum. 87 ; i. t. 89. (Rubiacea, sec. Schau.).—Bras.
verrucosa, *Schau. in DC. Prod.* xi. 650.—N. Granat.
vertidllata. Veil. Fl. Flum. 87; i. t. 91=tomentosa.
viburnifolia, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 76. —Ins. Philipp.
viUosa, *Vahl, Eclog.* i. 16.-Guiana.
virgata, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) II. 220.—Bras. *
vitelliniflora, *KlotBsek, ex Walp. Rep.* iv. 128.—Hab. I

AEGIPHYLA, Steud. Nom. ed. II. i. 29=Aegiphila, Jacq.

AEOUE, Correa, in Trans. Linn. Soc. v. (1800; 22. *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 306.
BELOU, Adans. Fam. ii. 408 (1768).
decandra, *F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed III. *Nov. App.* 88.—Ins. Philipp.
Marmelos, *Correa, in Trans. Linn. Soc.* v. (1800) 228.—Ind. or.
sepiaria, DC. Prod. i. 538=Citrus trifoliata.

AEGLE, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 48 (1867) =Po8idonia, Koen. (Naiad.).
fragilis, Dulac, L c=P. fragilis.

AEGOCHLOA, Benth. in Bol. Reg. sub 1.1622 (1883) = Oilia, Ruiz & Pav. (Polemon.).
atractyloides, Benth. 1. c. = G. atractyloides.
cotulaefolia, Benlh. 1. c. = G. cotulaefolia.
eryngioides, Benth. I. c. = G. Navarettia.
mtertexta, Benth. 1. c. = G. intertexta.
pubescens, Benth. 1. c. = G. cotulaefolia.
pungens, Benth. 1. c. = G. squarrosa.
Torreyi, G. Don, Gen. Syst. jv. 246=G. pungens.

AEGOMARATHRUM, Steud. Nom. ed. II. i. 80 (1840) ^Cachrys, Toum. (Umbell.).
crispum, Steud. 1. c. = C. crispa.
pterochlaena, Steud. 1. c.=C. sicula.
sticulum, Mor.ex Nym.Consp. 314 = Hippomarsthrum Bocconi.

AEGONVCHON, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 354 (1821)=Lithospermum, Linn. (Borag.).
arvense, S. F. Gray, 1. c. =L. arvense.
repens, S. F. Gray, 1. c.»L. purpureo-caeruleum.

AEGOPICRON, Giseke. Prael. 474 (1792) = AEGOPRICON, Linn. f.=Maprounea, Aubl. (Euphorb.).

AEGOPODION, St. Lae. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119 =seq. ^

AEGOPODITTM, Knaut, ex Linn. Syst. ed. I. (1735). *VMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 898.
PODAGRARIA, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 427 (1742).
alpestre, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 354.—Sibir. altaic.
"ngelicaefolium, Salisb. Prod. 169 = Ae. Podagraria.
Carum, Wibel, Prim. Fl. Werth. 199 = Carum Carvi.
tnvolucratum. Orphan, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 923 = Physospermum aegopodioides.
latifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscxvii. (1844) 711 = Ae. Podagraria.
Podagraria, *Linn. Sp. PI.* 265.—Euiop.; As. bor.
ternatum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 41 = Ae. Podagraria.

AEGOPOGON, Beauv. Agrost. 122. t. 22. f. 4. (1812) partim=Amphipogon, R. Br. (Gramin.).
ayenaceus, Beauv. 1. c. = Am. strictus.
aebilis, Beauv. 1. c. = Am. debilis.
'aguroides, Beauv. 1. c.=Am. laguroides.

AEGOPOGON:—
pusillus, Sprang. Syst. i. 270 = Chloris cruciate.
strictus, Beauv. Agrost. 122-Am. strictus.
turbinatus, Beauv. 1. c.=Am. turbinatus.

AEGOPOGON, Beauv. Agrost. 122 (1812) partim; Humb. & Bonpl. in Willd. Sp. PH iv. 899 (1806). *CRAM/NEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. Hi. 1121.
HYMEBOTHECIUM, Lag. Gen. et Sp. Nov. 4 (1816).
SCHELLINGIA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 231. t. 1.
bryophilus, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 239.—Bras.
cenchroides, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 899. —Venezuela.
geminiflorus, *Humb. & Bonpl. Nov. Gen. et Sp.* iv. 133. t. 48.—Am. trop.
multisetus, Steud. Syn. Fl. Gram. 146=cenchroides.
quinquesetus, Roem. & Schult. Syst. ii. 806 = cenchroides.
pusillus, Beauv. Agrost. 122=geminiflorus.
rigidisetus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 146.—Texas.
setifer, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 691-= cenchroides.
submuticus, *Rupr. ex Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. v. II. (1840) 3.—Hab. ?
tenellus. Trio. Gram. Unifl. 164=geminiflorua.
trisetus, Roem. & Schult. Syst. ii. 805 = cenchroides.
unisetus, Roem. & Schult. 1. 0=geminiflorus.

AEGOPORDON, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. (1845) 112= Jurinea, Cass. (Compos.).
berardioides, Boiss. 1. c. 113.—Persia.

AEGOPRICON, Linn. f. Suppl. 413 (1789) =seq.

AEGOPRICUM, Linn. PI. Surinam. 16 (1775); (Amoen. Acad. viii. 268) = Maprounea, Aubl. (Euphorb.).
betulinum, Linn. 1. c=M. guianensis.

AEGOSERIS, Steud. Nom. ed. II. i. (1840) 30 = Crepis, Linn. (Compos.).
leontodontoides, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 103 = C. leontodontoides.
setosa, Fourr. 1. c<=C. setosa.
suffreniana, Fourr. 1. c.=C. suffreniana.

AEGOTOXICON, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 298 (1810) =Aextoxicon, Ruiz *Sc* Pav. (Euphorb.).

AEGOTOXICUM, Endl. Ench. 589 (1841) = praec.

AEGYLOPS, Honck. Syn. i. 484 (1792) err. typ.= AEGILOPS, Linn.=Trlticum, Linn. (Gramin.).

AEIPHANES, Sprang. AnleH. ii. 11. 805 (1818) err. typ. = AIPHANES, Willd. = Martinezia, Ruiz & Pav. (Palm.).

AELTTROPTTS, Trin. Fund. Agrost. 148 (1820). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook, f.iii. 1198.
CALOTHECA, Spreng. Anleit. ii. 1.167 (1817); Syst. 1.847(1825).
CHAMAEDACTYLIS, T..Nees, Gen. Fl. Germ. Monocot, i. n. 66 (1840 ?).
arabicus, *Steud. Nom.* ed. II. i. SO.—Aegypt.; Abyss.
bombycinus, Figar. & De Not. in Mem. Ace Torin. Ser. II. xii. (1852) 258 = arabicus.
brevifolius, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 30-pubescens.
concinnus, Figar.. & De Not. in Mem. Ace. Torin. Ser. II. xii. (1852) 257 =laevis.
grandiflorus, *Munro, in Cat. Km Distrib. Griffith,* &c. 57, nonien.—Afghan,
hirsutus, *Munro, 1. c.* nomen.—Ind. or.
intermedius, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1868) 11. 292.—As. temp.
laevis, *Trin. Fund. Agrost.* US.—Oriens.
litortdis, Parl. Fl. Ital. i. 461 = laevis.
mucronatus, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 297 = arabicus
niliacus, *Steud. Nom.* ed. II. i. 80.—Aegypt.
pubescens, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 80.—Ind. or.
pungens, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 408 = laevis.
repens, Parl. Fl. Ital. i. 462 - villosus.
sinaicus, Figar. & De Not in Mem. Ace. Torin. Ser. II. xii. (1852) 257= laevis.
Smithii, *Steud. Nom.* ed. II. i 30.—Insf Canar.
villosus, *Trin. Fund. Agrost.* 143.—Afr. bor.; Graecia.

AENOTHERA, Urn. Encyc iv. 650 (1796), err. typ.-Oenothera, Linn. (Onagr.).

AEpLAKTHTJS, Mart. Amoen. Bot. Monac *i.* t. 2 (1825). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1176.
OROLLANTHUS, E. Mey. Comm. PL Afr. Ausfr. ii. 230 (1837).
abyssinicus, *Hochst. ex Benth. in DC. Prod.* xii. 80.-Abyss.
ambustus, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 138.—Afr. trop.
heliotropioides, *Oliver, 1. c.* 137.—Afr. trop.
Livingstonei, *C. Koch, Berl. Wochenschr.* iii. (1860) 183.—Afr. trop.
parvifolius, *Benth. in DC. Prod.* xii. 80.—Afr. austr.
pinnatifidus, *Hochst. ex Benth. 1. c.*—Abyss,
pubescens, *Benth. 1. c.*—Afr. trop.
repens, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 137. —Afr. trop.
suaveolens, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 247 = snavis.
Suavis, *Mart. Amoen. Bot. Monac. i.* t. 2.—Bras.; Afr.?
zanzibaricus, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xv. (1877) 68. —Afr. trop.

AEOLLANTHUS, Spreng. Syst ii. 750 (1825) = praec.

AEOKIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 817 (1824). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 584.
BRAGHYSTEFIS, Thou.exEritzel, Ind. Ic. 162 (1865).
OEONIA, Lindl. Orch. Seel. 14, err. typ. (1826).
alata, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvi. (1841) t. 11.—Ind. or.
Auberti, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 817.—Madag.
brachystachya, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 245.—Madag.
macrostachya, *Lindl. 1. c.* 245.—Madag.
polystachya, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 584.—Madag.
rosea, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 496.—Madag.

AEONIUM, Webb, ft Berth. Phyt. Canar. i. 184 (1836). t. 28=Sempervivum, linn. (Crassul.).
arboreum, Webb & Berth. 1. c. 185 =-S. arboreum.
balsami/erum, Webb & Berth. 1. c. 192 = S. balsamifbruxn.
barbatum, Webb & Berth. 1. c. 188 - S. pilifernm.
Berthelotianum, Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 239.
Bethencourtianum, Webb, ex Bolle, 1. c. 243.—Ins. Canar.
caespitosum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 191 = S. caespitosum.
canariense, Webb & Berth. 1. c. i. 196 = S. canariense.
Castello-Paivae, C. Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 240.—Ins. Canar.
dliatum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 195 = S. ciliatum.
cruentum, Webb & Berth. 1. c. 186 •= S. cruentum.
cuneatum, Webb & Berth. 1. c. 197 = S. cuneatum.
decorum, Webb, ex C. Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 241.—Ins. Canar.
frutescens, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 198 f-S. frutescens.
glandulosum, Webb & Berth. 1. c. 185=S. glandulosum.
glutinosum, Webb & Berth. 1. c. 185-S. glutinosum.
Goochiae, Webb. & Berth. 1. c. 190 - S. Goochiae.
gorgontum, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 258.—Ins. Cap. Verd.
Hauorthii, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 193-S. Haworthii. • *
holochrysum, Webb & Berth. 1. c. 194 - S. hotochrysum.
laxum, Webb *Sc* Berth. 1. c. i. 198 ?=S. laxnm.
leucoblepharum, Webb, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 314 = S. chrysanthum.
Lindleyi, Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. i. 189 - S. villosum.
manriqueorum, C. Bolle, in Bonplandia, vii. (1869) 241.-Ins. Canar. *if* , \ *j*
Meyerheimii, C. Bolle, 1. c. 239.—Ins. Mader.
Saundersii, C. Bolle, 1. c. 241.—Ins. Canar.
Smithii, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 187=S. Smithii. ».
strepsicladum, Webb *Sc* Berth. 1. c. = S. strcpsicladum.
abulaeforme, Webb & Berth. 1. c. 185-S. tabulaeforme.

AEONIUM :—
undulaium, Webb & Berth. Phyt. Canai. i. 197 = S. undnlatum.
urbicum, Webb & Berth. 1. c 194-S. urbicum.
viscatum, Webb, ex C. Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 241.—Ins. Canar.
Webbii, C. Bolle, 1. c.288.— Ins. Canar.
Youngianum, Webb *8c* Berth. Phyt. Canar. i. 197 = S. Youngianum.

A£RA, Aschers. Fl. Brandenb. 880 **(1864)=AJra,** Linn. (Gramin.).

AfiRANGIS, Reichb. f. in Flora, xlvüi. (1865) 190,= **Angraecuzn,** Thou. (Orchid.).
flabellifolia, Reichb. f. 1. c. 191.—Afr. trop.
Kotschyi, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 78 = Angr. Kotschyi.

AfiBAMTHES, Lindl. Bot. R*g. t. 817 (1824). ***ORCHIDEAE*, iii. 576.**
Arachnitis, *Lindl. Bot. Reg.* t. 817.—Ins. Mascar.
filiformis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 625.—Ind. occ.
grandiflorus, *Lindl. Bot. Reg. U* 817.—Madag.
grandiflorus, Lindl. Gen. et Sp. Oreh. 248, pro parte= A. Arachnitis.
jamaicensis, Reichb. f. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 625 = Angraecum micranthum.
sesquipedalis, Lindl. Bot Reg. snb t 817=Angraecum sesqnipedale.

AfiRANTHUS, Bartl. Ord.67 (1880) = praec.

AERANTHUS, Reichb. f. in Waip. Ann. vi. 899 (1861) . =Mystacidium, Lindl. (Orchid.), ftc.
aciculatus, Reichb. f. & Warm, in Otia BoL Hamb. 91. —Bras.
arachnanthus, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1886) 639.—Ins. Comor.
brachystachyus, Boj. Hort. Manrit. 314 =Aeonia brachystachya.
Calceolus, S. Moore, in Baker, Fl. Manrit. 353 = Angraeeum Calceolus.
comorentis, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1885) £40.—Ins. Comor.
Curnamanus, Reichb. f. in Gard. Chron. N. S. xix. (1883) I. 306.—Madag.
dentiens, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1886) 881.—Ins. Comor.
dtstichus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 901=Angraecom distichnm.
erythropollinius, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 190. —Afr. trop.
expansus,*S.* Moore, in Baker, Fl. Manrit. 351=Angraecum expansmn.
Fasciola, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 902=Angraecum Fasciola.
filicomis, Reichb. f. 1. c. 900 = M. filicome.
fragrans, Reichb. f. 1. c. 899=Angraecum fragrans.
funalis, Reichb. f. 1. c. 902-Angraecum fnnale.
Gerrardi, Reichb. f. in Flora, 1. (1867) 117.—Afr. austr.
Gladiator, Reichb. f. 1. c lxviii. (1886) 539.—Ins. Comor.
gladiifolius, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 900 = Angraecum gladiifolinm.
gradlis, Reicbb. C in Flora, 1. (1867) 117-M. gracile.
Grandidieranus, Reichb. f.l. c. lxviii. (1885) 381.—Ins. Comor.
Guyonianus, Reichb. f. 1. c xlviii. (1865) 190=Angraec.'.m Gnyoniannm.
hispidulus, Reichb. f. in Unnaea, xli. (1877) 81.—N. Granat.
hymenanthus, Griseb. Cat. PI. Cub. 26{=Dendrophylax hymenanthus.
intermedium, Reichb. f. & Warm, in Otia Bot, Hamb. 91.—Bras.
jamaicensis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 901 = Angraecum micranthum.
Lansbergii, Reichb. f. 1. c.=Angraecum Lansbergii.
Lehmanni, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 10.—Hab. ?
Leonii, Reichb. in Flora, lxviii. (1885) 380-seq.
Leonis, Reichb. f. in Gard. Chron. N. S. xxiii. (1885) 728 = Angraecum Humblotii.
Lindenii, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 902 = Angraecum Lindenii.
macrostaehys, Reichb. f. 1. c. 900=Aeonia macrostachya.

AERANTHUS:—
Meirax, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1885) 540.-Afr. austr.
micranthus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 90 = Angraecum micranthum.
Monteverdi, Reichb. f. in Flora, xlvüi. (1865) 279.—Hab.)
muscicola, Reichb. £ 1. c. 190.—Afr. trop.
neglectus, Reichb. f. & Warm, in Otia Bot. Hamb. 91. —Bras.
organensis, Reichb. f. in Walp. Ann.vi. 901 —Angraecum organense.
ornithorrhynchus, Reichb. f. 1. c. 903=Angraecom omithorrhynchum.
pachyrhyus, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 279.—Ind. occ
parahybunensis, Rodrig. Orch. Nov. ii.. 245.—Brag.
pectinatus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 900=Angraeenm pectinatnm.
phalaenophorus, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1885) 539. —Ins. Comor.
polystachyus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 901 = Aeonia polystachia.
porrectus, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 279.—Ind. occ.
pusillus, Reichb. f. 1. c. 1. (1867) 117=M. pusillnm.
rectus, S. Moore, in Baker, Fl. Maurit 351 = Angraecum rectum.
rutilus, Reichb. f. id Flora, lxviii. (1885) **540.—**Ins. Comor.
Sallei, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 902.—Ins. S. Doming.
Schiedei, Reichb. f. 1. c 901=Campylocentron Schiedei.
sesquipedalis, Reichb. in Flora, lxviii. (1885) 381 = Angraecnm sesquipedale.
spathaceus, Griseb. Cat. PI. Cub. 264.—Cuba.
Thouarsii, S. Moore, in Baker, Fl. Maurit. 35 = Angraecum filicomu.
trifurcus, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1885) 5*0.—Ins. Comor.
volucris, Reichb. f. in Walp. Ann. vi 900=Aeonia Auberti.
xanthopollinius, Reichb. 1. c. xlviii. (1866) 190.—Afr. trop.

AËBIDEB, Lour. Fl. Cochinch. 525 (1790). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 576.
A£ERIDIUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 295.
ORXERA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 37 (1886).
acuminatissimum, *Lindl. Gen. et Sp. Oreh.* 240.—Java.
affine, Wall. Cat. n. 7816=mulliflortam.
amplexicaule, Lindl. Gen. et Sp. Orch.239=Sarcochilns lilacinus.
ampullaceum, Roxb. Fl. Ind. iii. 476=Sarcolabium ampnllaceum.
anceps, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 242=Sarcochilus anceps.
angustifolium, Lindl. 1. c. 241 = Sarcochilus aneustifolius.
appendiculatum. Wall. Cat. n. 7815 - Sarcanthus appendiculatns.
Arachnites, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 238-Sarcochilus Arachnites.
Arachnites, Sw. in Schrad. Journ. ii. (1799) 233 = Arachnanthe xnoschifera.
Ballantinianum, Reichb. f. in Gard. Chron. N. S. xxiv. (1885) II. 198-suavissimum.
Bernhardianum, *Reichb.f. I. c.* 650.—Borneo.
tricolor, Reinw. ex Lindl. Fol. Orchid. Vanda, 4 = Vanda furva.
Borassi, *Buck.~Ham. ex Sm.in Rtes, Cyclop.* xxxix.«L 8.-Ind. or.
Brockessii, Heynh. Nora. ii. ll = crjspum.
Brookei, Batem. ex Lindl. in Bot. Reg. (1841) Misc. 55 =ensputn.
calceolare, *Teijsm. & Sinn, in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 19.—Sumatra.
calceolare, Buch.-Ham. ex Sin. in Rees, Cyclop, xxxix. n. ll = Saccolabium calceolare.
carnosum, Griff. Notul. iii. 865 = Doritis taenialis.
compressum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 240 = Dendrocolla compressa.
coriaceum, *Sw. in Schrad. Journ.* (1799) 234.—Madag.
cornutum, Roxb. Hort. Beng. B8; Lindl. Bot. Reg. t 1485=odoral urn.

AËRIDES :—
costatum, ' *Westk.' ex Steud. Norn.* ed. II. i. 30.—Ind. or.
crassifolium, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 145.—Burma,
criapum, *Lindl. in Wall: Cat. a.* 7819.—Malabar.
cyliniricum, Hook. Bot. Mag. t. 4982 = A. vandarum.
cylindricum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7817.—Ind. or.
decumbens, *Griff. Notul.* iii. 365; *Ic. PI. Asiat.* t. 820. —Burma,
dasypogon, *Sm. in Rees, Cyclop*, xxxix. n. 10.—Nepal.
dasypogon, Hort. ex Batem. in Hook. Bot. Mag. sub t 5680=Sarcanthus erinaceus.
difforme. Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 242-Ornithochilus fuscus.
diurnum, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 19.—Sumatra,
elongatnm, *Blume, Bijdr.* 367.—Java.
•*emarginatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 241 = Sarcochilus emarginatus.
Emericii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* xviii. (1882) II. 586.—Ins. Andam.
expansum, Rrichb. f. 1. c. 40=falcatum.
falcatum, *Lindl. & Paxt. Fl. Gard.* ii. (1851) 142.—Burma.
Farmeri, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. HI. *Nov. App.* 239.—Ins. Philipp.
Fenilianum, *Reichb.f. in Hamb. Garten, xvi. (I860)** 282.—Ins. Philipp.
Fieldingi, *Lodd. ex E. Morr. in Belg. Hortic.* (1876) 286. t. 10.—Reg. Himal.
flavidum, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52: 101=suavissimum.
Flos-alris, Sw. in Schrad. Journ. ii. (1799) 233 = Sarcochilus Arachnites.
guttatum, Roxb. Kl. Ind. iii. 471-Rhynchostylis retusa.
Houlletknum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1872) 1194. —Cochinch.
Hystrix, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 242=Sarcochilus Hystrix.
Hystrix, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 42 = Ornithochilus fuscus.
illustre, Reichb. f. in Gard. Chron. N. S. xviii. (1882; II. 71"=maculosum.
inflexum, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 324.—Malaya,
japonicum, *Reichb. f. in Hamb. Garten, xix (1863)** 210.—Japon.
jucundum, *Reichb.f. 1. c.* xvi. (1860) 281.—Java.
Larpentae, Hort. ex Reichb. f. in Otto et Dietr. Allg. Gartenz. xxiv. (1856) 219 -falcatum.
lasiopetala, *Willd. Sp. PI.* iv. 180.—Ind. or.
latifoliam, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 429.—Zeylan.
Lawrenciae, *Reichb.f. in Gard. Chron.* xx. (1883) 460. —As. trop.
Leeanum, *Reichb.f. 1. c.* xv. (1881) 656.—Hab.?
Leonaei, *Reichb. f.—Cl L'Orchidoph.* (1885) 301.— Burma,
lepidnm, *Reichb. f. in Gard. Chron. xix.* (1888) 466.— Ind. or.
Lindleyanum, Wight, Ic. PI. Ind. Or. 1677=crispum.
Lobbii, Hort. ex Lem. Illnstr. Hortic. xv. (1868) t. 55st = multiflorum.
Lobbii, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (18b2) 323.—Burma.
McMorlandi, *Williams, Man. Orch.* 66; ed. VI. 105.—Isd. or.
macrostackyon, Spreng. Syst. iii. 719=Aeonia macro. stachya.
maculatum, Buch.-Ham. ex Sm. in Rees, Cyclop. xxxix. n. 9 = Vanda spathulata.
maculatum, *Llanos, Fragm.* 93.—Ins. Philipp.
maculosum, *Lindl. Bot. Reg.* xxxi. (1845) 58.—Ind. or.
margaritacenm, *Williams, Man. Oreh.* 66; ed. VI. 105. —Ind. or.
marginatum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* N. S. xxiii. (1885)1. 533.—Hab. 1
matutinum, *Blume, Bijdr.* 366.—Java.
matutinum, Willd. Sp. PI. iv. 181 = Renanthera Arachnites.
Mendeli, Hort. ex £. Morr. in Belg. Hortic. (1876 288 » falcatum.
***minimum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 241-Sarcochilui minimus.**

AËRIDES:—
mitratum, *Reichb. f. in Bot. Zrit.* xxii. (1864) 415.—Ind. or.
multiflorum, *Roxb. Fl. Ind.* iii. 475.—Ind. or.
nobile. Warn. Sel. Orch. Ser. 1.1. 11 = suavissimnm.
obtusum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 239 = Sarcochilus obtusus.
odoratum, *Lour. Cochinch.* 525.—China; Ind. or.
odoratum, Reinw. ex Blume, Rumphia, iv. 53-suaveolens.
Ortgitslanum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* xxiii. (1885) 5Ol._Hab.!
Pachyphyllmn, *Reichb. f. 1. e.* xiv. (1880) 281.—Burma.
pallidum, *Blume, Rumphia,* iv. 58.—Ins. Timor.
pallidum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 241=Sarcochilus pallidus.
pallidum, Roxb. Fl. Ind. iii. 475 (- *Camarotis pallida).*
paniculatum, Ker-Gawl. Dot. Reg. iii. 220-Vanda paniculata.
praemarsum, Willd. Sp. PI. iv. ISO.—Rhynchostylis retusa.
purpurascens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 240.—Java.
pusillum, Lindl. 1. c. 241 = Sarcochilus jftsillus.
quinquevulnera, *Lindl. Sert. Orch.* 80.—Malaya,
radiatum, *Roxb. Fl. Ind.* iii. 476.—Ind. or.
radicosum, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. xv. (1841) 65. t. 1. f. c-Ind. or.
Xeichenbachii,lindea, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1858)61 = suavissimura.
retusum, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 283 = . Rhynchostylis retusa.
ngidurn, *Buch.-Ham. ex Sm. in Rets, Cyclop,* xxxix. n. 12.—Ind. or.
Roebelenii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* xxi. (1884) 610.—Ins.Philipp.
Rohanianum, Reichb. f. 1. c. 206«suavissimum.
roseum, Lodd. ex Paxt. Fl. Gard. t. 60-multiflorum.
rostratum, Roxb. Fl. Ind. iii. 474=Sarcochilus purpareus.
Ruekeri, *Hort. Donat. ex Lubbers, Cat. PI. Rar. San . Donato* (1880) 14.—Hab.J
Sanderianmn, *Reichb. f. in Gard. Chron.* xxii. (1884) 184.—As. trop.
Schroederi, Hort. ex Reichb. f. in Allgem. Gartent . (1855) 226-maculosum.
snibatianutn, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Ft. Philipp.* «• II. *Nov. App.* 2S9.—Ins. Philipp. j sphalm.!-Thibautianum.
'picatum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 81=Rhynchostylis retusa.
spurium, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 241.—Java,
snaveolens, *Blume, Rumphia,* iv. 58.—Java,
suaveolens, *Roxb. Fl. Ind.* iii. 478,—Ind. or.
TOavissimum, Lindl. in Jonm. Hort. Soc iv. (1849) 264.—Malacca.
subulatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 241=Sarcochilus subulatus.
Sulingi, Blume, Biidr. 367 = Renanthera Salingi.
taeniale, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 289=Doritis taenialis.
teres, *Lindl. I. c.* 240—Java.
to'gllatum, Wight, in Wall. Cat. n. 7818 = Vanda Roxburghii.
testaceum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 288=Vanda parviflora.
I'^'nni, *Miq. Choix PI. Buitmt.* 1.18.—Malaya,
rhibamianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1866) 100-—Polynesia.
Thunbergii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 205.—Japon.
timoranum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 695.—Ins.Timor.
tngonum, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiii. (1865) 177_mnl,inonim.
fmbellatum. Wall Cat. n. HS7=Saccolabium acutifolium.
uncinatum, *Teijsm. &Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxtv. (1862) 824.—Java.
undulatum, Sm. in Rees, Cyclop, xxxix. n. 18= Saccolabium praemorsum.
vandamm, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1867) 997—Ind. or.
Veitchi, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hortic (1876) 291, .xxxi. (1881) 128=multiflorum.
»«ms, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 41.—Hab.r
wndiflorum, *Thn. Enum. PI. Ziyi.* 430.—Zeylan.
Wightianum, Lindl. in WalL Cat. n. 7820-Vanda parviflora.

A&RIDES:—
Williamsii, Warn. Sel. Orch. Ser. 1.1. 21 - Fieldingi.
Wilsmianum, Hort. ex Gard. Chron. xxiii. (1885) 705 = suavissimum ?
Zollingeri, *Reichb. f. in Bmplandia,* v. (1857) 40.—Java.

AËRIDIUM, Pfeiff. Nom. i. 67 (1878) - AEERID1UM, Salisb.-ASrides, Lonr. (Orchid.).

AËROBION, Kaempf. ex Spreng. Syst iii. 679 (1826) = Angraeoum, Thou. (Orchid.).
aphyllum, Spreng. 1. c. 718=»Angr. aphyllum.
Calceolus, SprenR. 1. c. 717 = Angr. Calceolus.
carinatum, Spreng. 1. c. 718 = Eniophia virens.
caulescens, Spreng. 1. c. 717=Mystacidium caulescens.
citratum, Spreng. 1. c. 718 = Angr. citratnm.
crassum, Spreng. 1. c. 717 = Angr. crassum.
cucullatum, Spreng. 1. c. = Angr. cucullatura.
expansum, Spreng. 1. c. 716 = Angr. expansum.
filicornu, Spreng. 1. c = Angr. filicornu.
fragrans, Spreng. 1. c. = Angr. fragrans.
gladiifolium, Spreng. 1. c = Angr. gladiifolium.
gracile, Spreng. 1. c. 717 = Angr. gracile.
implicatum, Spreng. L c. 716-Angr. implicatum.
inapertum, Spreng. 1. c. 717 = Angr. inapertum.
maiulatum, Spreng. 1. c. 718 - Angr. maculatum.
multiflorum, Spreng. 1. c. 717-Angr. multiflorum.
palmiforme, Spreng. L c.« Angr. palmifonne.
parviflorum, Spreng. 1. c. 718 = Angr. parviflorum.
pectination, Spreng. 1. c. 717 = Angr. pectinatum.
rectum, Spreng. 1. c. 716=Angr. rectum.
recurvum, Spreng. 1. c. = Angr recurvam.
striatum, Spreng. 1. c. 717-= Angr. striatum.
superbum, Spreng. 1. c. 718 = Angr. superbum.
triquetrum, Spreng. 1. c. 717- Angr. triquetmm.

AEUOKORION, Scop. Ann. iv. Hist. Nat. 96 (1770) = AEROCORION, Adans. - aalanthus, Toum. (Amaryll.).

AERUA, Juss. Gen. 88 (1789) = Aerva, Forsk. (Amarant.).

AEBVA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 170 (1775.) *AMARANTACEAE* (Benth. & Hook. f. iii. 34).
aegyptiaca, J. F. Gmel. Syst. ii. 1026 = tomentosa.
ambigua, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 302.—Afr. austr.
bengalensis. Buch.-Ham. ex Wall. Cat. subn. 6911-scandens.
Bovii, Ldgew. in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 206 = tomentosa.
brachiata, Mart. Beitr. Amarant. £8= Nothosaerua bractuata.
Burchellii, Moq. in DC. Prod, xiii/ IP. 302 - A. leucsra.
caudaU, *Boj. Hort. Maurit.* 268.-Madag. 1
chenopodiifolia, Boj. 1. c=» Nothosaerua brachiata.
congesta, *Balf. f. ex Baker, Fl. Maurit.* 267.—Ins. Mascar.
elegans, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 803.—Arab.
floribunda, Wight, Ic. Fl. t. 177ti = lanata.
glabrata, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 728.—Ind. or.
incana, Mart, in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. xii. (1826) 291 = tomentosa.
javanica, Juss. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 131 - tomentosa.
lanata, *Juss. I.* c.—As. trop.; Arab,
leucura, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 302.—Afr. austr.
microphylla, *Moq. I. c.* 301.—' Mare rubrum.'
Monsonia, *Mart. Beitr. Amarant.* 83.—Ind. or.
nervosa, *Mart. I. c*—Ind. or.
ovata, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 174-tomentosa.
platyphylla, Ehrenb. ex Schweinf. 1. c. "tomentoaa.
pubescens. *Mart. Beitr. Amarant.* 88.—Ind. or.
radicans, Mart. 1. a—Ind. or.
revoluta, *Balf.f. in Proc. Soy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 92.—Ins. Socotr.
sanguinea, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. It. 300 = sanguinolenta.
sanguinolenta, *Blume, Bijdr.* 647.—Java.
scandens, Gamble, Trees of Darjeeling»Stilbanthus scandens.
scandens, *Wall. Cat. n.* 6911.—As. et Afr. trop.
sericea, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 304.—Ins. Sandvic.
setacea, Mart. Beitr. Amarant. 83 -=A. Monranla.
suaveolens, Edge*, in Jonm. Linn. Soc vi. (1862) 207—tomentosa.

AEBVA:—
timoreiisis, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 301.—Ins. Timor.
timoriensis, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 345 = sanguinolenta.
tomentosa, *Lam. Encyc.* i. 46.—As. et. Afr. trop.
toncafolia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6911 =* scandens.
Tmdalo, liuch.-Ham. I. c. 6909 = lanata.
trichophylla, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 174=tomentosa.
velutina, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 301-Pupalia lappacea.
villosa, *Moq. 1. c.* 304.—Ins. Maurit.
•*Hindis,* E. Mey. ex Moq. 1. c. = lanata.
Wallickii, Moq. 1. c. 300=tomentosa.
Wightii, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 728.—Ind. or.

AESCHINANTHUS, Endl. Gen. 716 (1838)=Aeschynanthus. Jack (Gesnerac).

AESCHINOMF.NE, Nocca in Usteri, Ann. Bot. v. (1798,' 16-Aesohynomene, Linn. (Legum.).

AESCHRION, Veil. FL Flum. 68; i. t. 152 (1827)-Fioraena, Lindl. (Simarub.).
crenata, Veil. 11. cc. = P. Velloiii.

AESCHYNANTHtTS, Jack, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1823) 42. *GESNERACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 1013.
RHEITHROPHYU.UM, Hassk. Cat Hort. Bogor. Alt. 123 (1844).
TRICHOSPORUM, D. Don, in Edinb. Phil. Joum. vii. (1822; 84 (nomen prius).
acuminata, G. Don, Gen. Syst. iv. 657 - ChiriU acuminata.
acuminata, *Wall. Cat. n.* 6897.—Ind. or.; China.
albida, A. DC. Prod. ix. '262 = purpurascens.
albida, *Steud. Nom.* ed. II. i. 32.—Java.
alba, Hon. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 418 = Codonanthe Devosiana.
amoena, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 47—Java.
Andersoni, *C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.* t. 48.—Burma.
angustifolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 32.—Java,
apicidens, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1889) 167.—China,
arfakensis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 36.—N. Gain.
atropurpurea, Van Hontte, Hort Vanhout. Fasc. ii. 42 = purpurascens.
atrosanguinra, Van Houtte, Cat. (1851) ex C. B. Clarke, in DC. Monog. v. 52.-Hab.!
Ancklandiae, *Low, Sarawak,* 382,886.—Borneo.
Aucklandi, Hort. Low, ex Load. Hort. Brit Supp. iii. 484-praec
Beccarii, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* V. 47.—Sumatra.
Blumei, Mor. ex C. B. Clarke, 1. c. 48 = A. Lamponga.
Boschiana, Qe Vriese, in Morr. Ann. Soc. Agric. Bot Gaud, ii. (1846) 403-A. Lamponga.
bracteata, Benth. Fl. Hongkong, 258— acuminata.
bracteata, *Wall. Cat. n.* 7714.—Ind. or.
brevicalyx, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 720.—Sumatra.
Candida, *Henders. Cat.* (1851) *ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 52.—Hab.l
caudata, C. *B. Clarke, 1. c.* 34.—Sumatra,
ceylanica, *Gard. in Cole. Journ. Nat. Hist.* vi. (1846) 474.—Zeylan.
ceylanica, Wight, Ic. t. 1317 -Perrottetii.
chinensis. Gard. & Champ, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 828 -acuminata.
chiritoides, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 28.—Reg. Himal.
conferta. Griff. Friv. Journ. 63. oomen - Lepionotus confertus.
cordifolia, *Hook. Bot. Mag.* t. 5131.—Borneo.
cryptantha, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* V. 50.—Borneo.
Curtisii, *C. B. Clarke, I. c.* 45.—Borneo.
discolor, T. Moore, in Paxt. Fl. Gard. iii. (1852-58) 55 — purpurascens.
elongata, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Pkan.f.* 45.—Borneo.
fulgens, *Wall. Cat. n.* 797.—Ind. or.
geminata, *Zoll. & Morr. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Ind.* il (1845) 574.—Java.

AESCHYTTANTHTXS :—
gracilis, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 418 = Codonanthe Devosiana.
gracilis, *Parish, ex C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t.* 48.—Ind. or.
grandiflora, J. Grah. Cat. PI. Bomb. 146 = Perrottetii.
grandiflora, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 238.—Ind. or.
Griffithii, *R. Br. in 3enn. PI. Jam. Rar.* 116.—Ind. or.
hians, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Pkan.* v. 51.—Borneo.
Hookeri, *C. B. Clarke, 1. c.* 21.—Reg. Hirnal.
Horsfieldij, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 116.—Java,
intermedia, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 414.—Malaya,
jayanica, *Hook. Bot. Mag.* t. 4508.— Java.
Kingii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Pkan.* v. 81.—Reg. Himal.
Lamponga, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 563.—Sumatra,
lepidosperma, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 35.—Borneo,
leptoclada, *C. B. Clarke, I. c.* 39.—N. Guin,
levipes, *C. B. Clarke, I. c.* 28.—Assam.
Lobbiana, *Hook, Bot. Mag.* t. 4260.—Java,
longicanlis, *Wall. Cat. n,* 888.—Ind. or,
longiflora, *Blume, Bijdr.* 766.—Malaya.
longiflora, Wall. Cat, n. 795=superba.
macrocalyx, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 46.—Sumatra,
maculata, *Lindl. Bot. Reg,* (1841) t. 28.—Ind. or.
Mannii, *Kurt, ex C, B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 29.—Ind, or.
marmorata, *F. Moore, in Paxt. Fl. Gard.* iii. (1852-58) 56.—Hab. I
Masoniae, *Kurt, ex C. B. Clarke, 1. c.* 29—Ind. or.
micrantha, *C. B. Clarke, 1. c.* 27.—Reg. Himal.
microphylla, *C. B. Clarke, 1. c.* 49.—Ins. Celebes,
microtricba, *C. B, Clarke, 1. c.* 61.—N. Guin.
miniata, *Lindl. Bot. Reg. N.* S. xix. t. 61.—Java.
Motleyi, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 20.—Malaya.
Neesii, Zoll. & Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 46=pulchra.
obconica, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 50.—Malacca.
oblongifolia, G, Don, Gen, Syst iv. 657 - Chirita acuminata.
obovata, *C.B. Clarke,in DC. Monog.Pkan.* v.47.—Java,
parasitica, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t 49 = Hookeri.
parasitica. Wall. Cat. n. 796=grandiflora, pro parte.
parviflora, C. B. Clarke, Comm, et Cyrt. Beng. t 47 - micrantba.
parviflora, *Spreng.Syst.iy.Cur.Post.298* — ramosissima.
pjrvifolia, *R. Br. in Benn. PI. Jav.* 115.—Banca.
Paxtonii, lindl. in Journ. Hort. Soc. iv. (1849) 79 - bracteata.
Peelii, Hook. f. & Thorns. Illustr. Himal. PI. 17=bracteata.
Perrottetii, *A. DC, in DC. Prod.* ix. 261.—Ind. or.
Perrottetii, Gardn. in Calc Joum. Nat. Hist. vi. (1846) 476 = ceylanica.
philippinensis, *C. B, Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 89.—Ins. Philipp.
podocarpa, *C. B. Clarke, I. c.* 40.—N. Guin.
pulchella, Hort. ex Hanst in Mart. Fl. Bras. viii. 418 = Codonanthe Devosiana.
pulchra, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 656.—Malaya,
pnrpurascens, *Hassk. Cat. PI. Hort. Bogor. Alt.* 164.—Java,
radicans, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1823) 48.—Malaya.
radicans, Wall. Cat n. 798 = Griffithii.
ramosissima, *Wall. Cat. n.* 799.—Ind. or.
Roxburghii, *Paxt. Bot. Diet, ex C. B. Clarke, in DC. Monog.* v. 52.—Hab. ?
rnbiginosa, *Teijsm. 6f Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1868) 413.—Java,
siphonantba, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 45.—Borneo.
speciosa, *Hook. Bot. Mag.* t. 4820.—Java.
splendens, Lindl. & Paxt Fl. Gard. iii. 169. t 108 = speciosa.
splendida x, *Lem. Jard. Fleur.* iii. (1858) t. 255.
superba, *C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.* t 46.—Ind. or.
Sacokhoffii, Hort Berol. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 4S=pulchra.
tetraquetra, *C. B. Clarke, 1. c.* 88.—Sumatra.

AE8CHYNAJNTHUS :—
Teysmanniana, *Miq. in Bot. Zeit.* vi. (1848) 509.—Java.
tricolor, *Hook. Bot. Mag.* t. 5031.—Java,
tubiflora, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 86.—N. Guin.
verticillata, *C. B. Clarke, I. c.* 40.—N. Guin.
viridiflora, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 34.—Ins. Celebes,
volubilis, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1823) 42. t. 3. f. 3.—Sumatra.
Wallichii, *Benn. PI. Jav. Rar.* I16.-Malaya.
Wilsoni, Walker, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. v. 26=ceylanica.
tebrina, Van Houtte [Cat. 1861] ex Walp. Rep. vi. 521= marmorata.
teylanica, Walp. Ann. iii. 95=ceylanica.
Zollingeri, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.v.* 44.—Java.

AESCHYXTOMEtfE, Linn. Gen. ed. I. 860 (1737).
LEGUMINOSAE, Benth. *8c* Hook. f. i. 615.
GAJATI, Rumph. ex Adans. Fam. ii. 328 (1768).
MANTODDA, Adans. Fam. ii. 508 (1768).
MACROMISCUS, Turcz. inBull.Soc.NatMosc.(1846) II. 607.
PATAGONIUM, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 122 (1835).
ROCKEA, Scop. Introd. 296 (1777).
RUEPPELIA, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 208.'t. 87 (1847).
abyssinica, Vatke, in Oest Bot. Zeitschr. nrix. (1879) 224 = Ruppellii.
aegyptiaca, Steud. Nom. ed. II. i. 31=Seshaniaaegyptiaea.
acutangnla, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 148.—Afr. trop.
americana, *Linn. Sp. PI.* 713.—Ind. occ.; Am. trop.
aquatica, Steud. Nom. ed. II. i. 81—aspera.
arborea, Linn. Sp. PI. 713 = Desmodinm umbellatum.
aristata, Jacq. Hort. Schoenb. i. 59 = Pictetia aristata.
aspera, *Linn. Sp. PI.* 713—Geront. trop.
aspera, Wall. Cat. n. 5666 = indica.
aspera, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1168=hispida.
atropurpurea, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 192.—Ins. Timor.
bUpinosa, Jacq. Ic. iii. 18=Sesbania aculeata.
bracteosa, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl, Trop. Afr. ii.* 150.—Afr. trop.
brasila, Schrank, in Denkschr. Bot Ges. Regensb. ii. (1822)63 = Martiusii.
brasiliana, *DC. Prod.* ii. 322.—Bras,
brevifolia, *Pair. Encyc.* iv. 451.—Madag.
brevipes, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 66.—Bras.
Burmanni, *Raeusch. Nom.* ed. III. 214.—Ind. or.
cachemiriana, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot 40= indica.
cannabina, Retz. Obs. Fasc v. 26=Sesbania aculeata.
cassioides, Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 51 = Histrix.
cassioides, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst ii. 240 ~ Sesbania cassioides.
ciliata, Vog. in Linnaea, xii. (1888) 84-bispida.
coccinea, Linn. f. Suppl. 380=Sesbania grandiflora.
coluteoides, Less. & A. Rich. Voy. Astrol. Bot ii. 87. t. 82 -Ormocarpum sennoides.
oonferta, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 483.—Gnian.
crepita, *Jacq. Fragm.* 87.142. f. 2.—Venezuela,
cristata, *Vatke, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 215.—Afr. trop.
debilis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 160.—Afr. trop.
decumbens, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 198 =sensitiva.
densiflora, *Benth. in Hook. Land Journ. Bot.* it (1840) 66.—Guian.
dentata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 22=Adesmia dentata.
diffusa, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 215 = Sesbania procumbens.
diffusa, Klein, ex Willd. Sp. PI. iii. 1164- indica.
dimidiata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 161.—Afr. trop.
divisa, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xii. (1826) 31=americana.
Echinus, *Vog. in Linnaea,* xii. (1888) 92.—Bras.

AJBBCitXJNOllKN*hi* :—
elegans, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 583.—Mexico.
elongata, Salisb. Prod. 341-Sesbania aegyptiaca.
erubescens, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 123.—Afr. austr.
evenia, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 27.—Cuba,
falcata, *DC. Prod.* ii. 322.—Bros,
fascicularis, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 684.—Mexic
filipes, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 416.—Madag.
filosa, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 01.—Bras,
fistulosa, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x.* (1881) 259.—Porto Rico.
floribunda, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 186=americana.
fluminensis, *Veil. Fl. Flum.* 310; vii. t. 119.—Bras.
frutescens, Poir. in Lam. Encyc. iv. 451 = Lespedeza capitata.
fruticulosa, Nees, ex G. Don, Gen. Syst. ii: 282 = Adesmia fruticulosa.
fulgida, *Wtiw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 149.—Afr. trop.
fusa, Steud. Nom. ed. 1.17, sphalm. - seq..
fusca, *Desf. Tabl. Cat. Hort. Par.* ed. I. 198.—Hab.?
gangetica, Poir. in Lam. Encyc iv. 463—Desmodium gangeticum.
glaberrima, Poir. Encyc. Suppl. iv. 76 = hispida?
glabrescens, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 148.—Afr. trop.
glandulosa, Benth. in Miq. PI. Jungh. 210—javanica.
glandulosa, Poir. Encyc. Suppl. iv. 76 - americana.
gracilis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 666 = paniculata.
gracilis, Vog. 1. c. xii. (1838) 891=falcata.
grandiflora, Linn. Sp. PL ed. IL 1050-Sesbania grandiflora.
guayaquilensis, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 284.—Ecuador,
nedysaroides, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 180.—Mexic
herbacea, *Aubl. PI. Gui.* ii. 775.—Guian.
heterophylla, *Lour. Fl. Cochinch.* 446.—Cochinch.
Heurckeana, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 130.—Madag.
hirsuta,Vitm. Summa PI. iv. 270=Burmanni.
hirsuta, DC. Prod, it 322-americana.
hirta, *Lam. Illustr. t.* 629, *ex ejusd. Encyc.* iv. 450.—Ind. or.
hispida, Roxb. ex Steud. Nom.-ed. II. i. 31-Robinia hispida.
hispida, *Willd. Sp. PI.* iii. 1163.—Am. bor.
hispidula, *H. B. & X. Nov. Gen. et Sp.* vi. 680.—N. Granat.
hispidula, Lag. Gen. et Sp. Nov. 22. n. 297=Adesmia hispidula.
Histrix, *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 77.—Guian.
honesta, Nees *8c* Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1826)32=sensitiva.
incana, G. F. W. Mey. ex DC. Prod. ii. 332-Desmodium incanum,
incana, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 90.—Bras.
indica, Burm. f. Fl. Ind. 169=Sesbania aegyptiaca.
indica, *Linn. Sp. PI.* 718.—Ind. or.
indica. Wall. Cat. n. 5667= aspera.
interrupta, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1840) 56.—Guian.
javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 275.—Java.
kashmiriana, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 151 -indica.
laevis, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x.* II. (1845) 180.—Mexico.
Lagenaria, Lour. Fl. Cochinch. ii. 446 = aspera.
laevis, *Noronka, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. *Art.* iv. 6.—Malaya.
latifolia, Spreng. Syst. ii. 322-Adesmia latifolia.
latisiliquosa, Hill, ex Steud. Nom. ed. II. I. 31 = Poiretia latisiliquosa.
laxiflora, *Boj. ex Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1984) 130.—Madag.
leptostachya, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. l. 65.—Am. austr.
littoralis, *Vog. in Linnaea,* xii. (1888) 96.—Bras.
longifolia, Cav. Ic iv. 8=Piscidia longifolia.
longifolia, Orteg. Hort. Matr. Dec. 70=Sesbania Cavanillesii.

AEBCHYNOMENE:—
macropoda, DC. Prod. ii. 320-indica.
maculata, Poir. in Lam. Encyc. iv. 452=Desmpdinm gangeticum.
marginata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 66.—Am. trop.
Martii, *Benth. 1. c.* 62.—Am. trop.
Martiusii, *Steud. Norn.* ed. II. i. 31.—Bras,
mazangayana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.i.* (1884) 415.—Madag.
micrantha, *DC. Prod.* ii. 821.—Madag.
microphylla, *Desv. ex DC. 1. c.* 822.—Bras.
mimosoides, Nees, ex G. Don, Gen. Syst ti. 282-Adesmia mimosoides.
mimulosa, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 276 - javanica.
miniate, Orteg. Hort. Matr. Dec. 28 » Piscidia pnnicea.
munosifoUa, *Vatke, in Oest. Bot. Zeitsckr.* xxix. (1879) 224.—Afr. trop.
mollicula, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi 682.—Am. anstr.
molaccana, *Kostel. Allg. Med.-plu.rm. Flora.n.* 1285.—Molucca.
montana, Span, in Linnaea, xv. (1841) 192-indica.
montevidensis, *Vog. in Linnaea,* xtft (1888) 88.—Reg. Argent,
mucronata, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1840) 56.-Guian.
mucronulata, *Benth. I. e.* 56.—Gnian.
multiflora, *Steud. Norn.* ed. II. i. 31.—Ind. or.
obovalis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1884) 415.—Madag.
oligantha, *Welm. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii 146—Afr. trop.
oroboides, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 64.—Am. anstr.
paludosa, Roxb. Fl. Ind. iii. 333-Sesbania aculeata.
paniculata, *WiUd. ex Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 95.—Bras.
papposa, Lag. Gen. et Sp. Nov. 28=Adesmia papposa.
papulosa, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* «. 146—Afr. trop.
parviflora, *Micheli, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 66.—Bras.
patagonica, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 31 = Adesmia muricata.
patuła, Poir. Encyc. Snppl. iv. 78-sensitiva.
pauciflora, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 93.—Bras.
P»ucifolia, *Vog. I. c.* 94—Bras.
paucijuga, DC. Prod. ii. 821=brasiliana.
ptcta, Cav. Ic. iv. 7 -Sesbania aegyptiaca.
pilosa, *Poir. in Lam. Encyc.* iv. 450.—Ind. or.
platycarpa, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 63.—Peruv.
platycarpa, Michx. Fl. Bor. Am. iL 75-Sesbania veacaria.
plenronervia, *DC. Prod.* ii. 321.—Ins. S. Doming,
plunarticulata, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 284.—Ecuador.
Podocarpa, Vog. in Linnaea, xii. (1888) 89-falcata.
procumbent, Roxb. FL Ind.iii.337=Sesbaniaprocumbens.
prostrata, Poir. Encye. Suppl. iv. 76 = visddula.
*P*eudoacacia,* Roxb. ex DC. Prod. ii. 261-RobinU Fseudacacia.
pseudoviscosa, Blume, ex Miq. FL Ind. Bat i. 276-Javanica.
puberula, DC. Prod. ii. 321-scoparia.
pubescens, *Poir. in Lam. Encyc.* iv. 450.—Ind. or.
pubescens, Valil, ex DC. Prod. ii. 265-Sesbania pabescens.
Pndica, *F. G.Dietr. Lexik. Gaertn.* i. 136.-Aegypt.
Pndica, *Zoll. & Morr. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Ind.* iii. (1846) 55, nomen.—Java.
Pnlchella, *Planch, ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ?• 149—Afr. trop.
Pilchra, *Vatke, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 260.—Afr. trop.
pumila, Linn. Sp. PI. ed. IL 1061-indica.
Punctaia, Steud. Norn. ed. I. 17=indica.
Pygmaea, *Wei*, ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 148.—Afr. trop.
iuadrata, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PL 856=indica.
racemosa, *Vog. in Linnaea,* xii. (1888) 92.—Bras.
*r**ota,* Poir. in Lam. Encyc. iv. 452=Desmodinm Scalpe.
rostrata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 60.—Bras.
Reidi, *Benth.* Spang. Syst iii. 322-indica.
[illegible] rt 116 -hispidula.

AESCHYNOMENE :—
Ruppellii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 149.—Afr. trop.
scabra, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 284.—Ecuador.
Schimperi, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 202.—Abyss.
Scoparia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 632—Peruv.
scoparia, *Splitgerb. in Hoev. &De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 107.—Bras.
Selloi, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 82.—Bras.
sensitiva, Beanv. Fl. Owar. 89. t. 53-indica.
sensitiva, *Sw. Fl. Ind. Occ.* iii. 1276.—Am. trop.
Sesban, Jacq. Collect, ii. 288-Sesbania aculeata.
Sesban, Linn. Sp. PI. 714 = Sesbania aegyptiaca.
siifolia, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 151.—Afr. trop.
spicata, Poir. in Lam. Encyc. iv. 452-Desmodium snpinum.
spinulosa, Roxb. Fl. Ind. iii. 3S8=Sesbania acnleata.
subviscosa, DC. Prod. ii. 821-indica.
sulcata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 530=sensitiva.
surattensis, *Wight & Am. Prod.* 219=Seabania acnleata?
Suymenta, Steud. Norn. ed. ILi. 31-Sesbania aegyptiaca.
tecta, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 87-ialcata.
tenuirama, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 150.—Afr. trop.
tennis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 72.—Cuba.
ternata.Spreng. exDC. Prod.ii.314 = Pictetiatemata.
timoriana. Span. Ic. 62 ; et in Linnaea, xv. (1841) 193 = sensitiva.
trachyloba, Miq. Fl. Ind. Bat i. 276-aspera.
tribuloides, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 414.—Madag.
trifiora, Poir. in Lam. Encyc. iv. 451=Desmodium triflorum.
triquetra, St Hil. ex Steud. Norn. ed. IL i. 82-Desmodium triquetrum.
trisperma, *Klotssch, in Schomb. Faun. & Fl. Guy.* 1103.—Guian.
tuberculata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 72.—Cuba.
uliginosa, Roxb. Fl. Ind. iii. 334=Sesbania aculeata.
nniflora, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 123.—Afr. anstr.
versicolor, *Wender. inBot.Zeit.* i. (1843) 847.—Mexic.
villosa, *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 76.—Ins. Porto-Rico.
violacea, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. *Art.* iv. 5.—Malaya.
virgata, Cav. Ic iii. 47-Coursetia virgata.
visddula, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 75.—Florida.
visddula, Roxb. ex WiUd. Enum. Hort. Berol. 776 = indica.
viscosa, *Vatke, in Bremen Ahh.* vii. (1882) 247.—Afr. trop.
Warmingii, *Micheli, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 68.—Bras.

AESCULTJ8, Linn. Syst. ed. II. 22 (1740). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 3U8.
BILLIA., Peyritsch, in Bot. Zeit. xvi. (1858) 158.
CALOTHYRSUS, Spach, in Ann. Sc. Nat Sir. II. ii. (1834) 62.
ESCULUS, Linn. Gen. ed. 1.109 (1737).
HIPPOCASTANUM, Tourn. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 291 (1745).
ISYPUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 73 (1836).
MACROTHYRSUS, Spach, in Ann. Sc. Nat Se'r. II. ii. (1884) 61.
NEBROPSIS, Rafin. Alsog. Am. 68 (1838).
OESCULUS, Neck. Elem. ii. 282 (1790).
OZOTIS, Rafin. Alsog. Am. 71 (1838).
PA VIA, Boerh. ex Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1752).
PAVIANA, Rafin. Fl. Ludov. 87 (1817).
PUTZEYSIA, Planch. *Sc* Linden, in Linden, Cat. n. 22 (1857), 8.
alba, *Rafin. Alsog. Am.* 69.—Am. bor.
arguta, *Buckl. in Proc.Acad. Phil.* (1860) 448.—Am. bor.
asplenifolia, Hort ex Loud. Encyc. Trees, 124-A. Hippocastanum.
assamica. Griff. Notnl. iv. 540-punduana.
barbata, *Rafin. Alsog. Am.* 70.—Am. bor.
califomica, *Nutt. in Torr. V Gray, Fl.N.Am.* i. 26L—Calif.
cornea, Wats. Dendr. Brit, t 121 -glabra.
Castanea, Gilib. Fl. Lituan. ii. 197-A. Hippocastanum.

AESCTTLUS:—
chinensis, *Bunge.in Mém. Sav. itr. Pttersb.il* (1882) 84.—China.
discolor, Pursh, Fl. Am. Sept i. 255-flava.
dissimilis, *Blume, Rumphia,* iii. 196.—Japon.
echinata, Muhl. Cat. PI.'Am. Sept. 88=glabra.
flava, *Ait. Hort. Kern.* i. 494.—Am. bor.
glabra, *WiUd. Enum. Hort. Berol.* 406.—Am. bor.
Hippocastanum, *Linn. Sp. PI.* 344.—Turc.
humilis, Lindl. Bot. Reg. t. 1018-Ae. Pavia?
hybrida, *DC. Hort. Monsp.* (1818) 75-flava.
indica, *Coleb. ex Wall. Cat.* n. 1181.—Reg. Himal.
intermedia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 32.—Am. bor.
levigata, *Rafin. Alsog. Am.* 70.—Am. bor.
livida, *Steud. Nom.* ed. II. i. 32.—Am. bor.
lutea, Wangh. in Schr. Berl. Ges. Naturf. Fi. viil. (1788) 133. t. 6=flava.
Lyonii, Loud. Arb. Brit i. 468-A. Pavia.
macrostachya, Michx. Fl. Bor. Am. i. 220=parviflora.
macrostachys, Pers. Syn. i. 403—parviflora.
Memmingeri, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 606=A. Hippocastanum.
mexicana, *Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* i. 218.-Mexic.
muricata, *Rafin. Alsog. Am.* 68.—Am. bor.
neglecta, Lindl. Bot. Reg. t 1009-flava.
ochroleuca.'/fajln. *Alsog. Am.* 68.—Am. bor.
odorata, *F. G. Dietr. Lexik. Gaertn. Nachtr.* i. 118.—Am. bor.
ohioensis, Michx. Arb. For. Am. Sept iii. 242—glabra.
pallida, WiUd. Enum. Hort. Berol. 406-glabra.
Parryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 200.—Am. bor.
parviflora, *Walt. Fl. Carol.* 128.—Am. bor.
Pavia. *Linn. Sp. PI.* 344.—Am. bor.
procera, Salisb. Prod. 280—A. Hippocastanum.
punduana, *Wall. Cat. n.* 1189.—Reg. Himal.
rosea, Hort ex Loud. Encyc. Trees, 127—glabra.
rubella, Wender. Ind. Sem. Marb. (1858) 1. et 4-glabrat
rubescens, Tansch, in Flora, xxi. (1838) I. BeibL 79 - A. Pavia 1
rubicunda, Lodd. Bot Cab. 11242-glabra.
rubra, Pers. Syn. i. 403=A. Pavia.
septenata, Stokes, Bot. Mat. Med.ii. 337-A. Hippocastanum.
turbinata, *Blume, Rumphia,* iii. 195.—Japon.
verrucosa, *Rafin. Alsog. Am.* 69.—Am. bor.
versicolor, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. (1868) 4-A. Pavia?
Watsoniana, D. Dietr. Syn. ii 1226-glabra.
Whitleyi, Hort exC Koch. Dendrol. i. 611-A.Pavia.

AETHEILEMA, R. Br. Prod. 478 (1810)=Phaylopais, WiUd. (Acanth.).
alopecuraides, Spreng. Syst. ii 826-Lepidagathis alopecuroidea.
anisophyllum, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 262 - P. longifolia.
glutinosum, Stend. Nom. ed. II. i. 82=P. parviflora.
Haenkri, Nees, in Mart Fl. Bras. ix. 72=Lepidagathis alopecuroidea.
imbricatum, R. Br. Prod. i. 478-P. longifolia.
javanicum, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 129—Java.
longifolium, Spreng. Syst Cur. Post. 286=P. longifolia.
micranthum, Benth. in Hook. Nig.Fl. 480.—Afr. trop.
mucronatum, Griff. Notul. iv. 137—P. parviflora.
parviflorum, Spreng. Syst. ii. 826—P. parviflora.
Rothii, Steud. Nom. ed. II. i. 82-P. parviflora.
reniforme, Nees, in WaU. Pi As. Rar. fii. 94-P. parviflora.
rigidum, Bartl. ex Nees, in DC. Prod. xi. 248-Barleriola solanifolia.
rupestre, Nees, i c. 262.—Madag.

AETHEOLAENA, Cass. in Diet. Sc. Nat xlviii 460 (1827)=Senecio, Linn. (Compos.).
involucrata, Cass. 1. c. 461=S. involucratus.

AETHEONEMA, Reichb. Nom, 183 (1841)-Oaertnsra, Lam. (Logan.).

AETHEOPAPPUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. *1*250 (1827) = Centaurea, Linn. (Compos.).
Balansae, Boiss. Fl. Orient, iii. 604-C. Balansae.
pulcherrimus, Cass. in Diet. Sc. Nat Ii. 52-C. pulcherrima.

AETHEORHIZA, Cass. in Diet. Sc Nat. xlviii. 425 (1827) = Crepis, Linn. (Compos.).
bulbosa, Cass. 1. c. = C. bulbosa.
montana, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 110 = C. montana.

AETHEORRHIZA, Reichb. Consp. 98 (1828) =praec.

AETHERIA, End]. Gen. 214 (1837) = Hetaerla, Blame (Orchid.).

AETHIONEMA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 80 (1812). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 88.
DIASTROPHIS, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 85 (1835).
DISTNOMA, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 81 (1836).
ETHIONEMA, Brongn. Enum. Gen. 92 (1843).
EUNOMIA, DC. Syrt. ii. 555 (1821V
OETHIONEMA, Knowl. *8c* Westc. Flor. Cab. i. (18S7) 41.
arabicum, Andrz. ex DC. Syst. ii. 660 = cappadocicum.
armenum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 191.—Armen.
Balansae, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 20 (= *Crenularia glaucescens).*
banaticum, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 558 = saxatile.
Beyricbii, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 411.—Persia.
Bourgaei, *Boiss. Fl. Orient,* i. 344.—Syria.
Buxbaumii, DC. Syst. ii. 660-cappadocicnm.
caespitosum, Boiss. Fl. Orient, i. 343 = Iberidella caespitosa.
campylopterum, *Boiss. 1. c.* 358.—Syria,
capitatum, *Boiss. (f Balansa, Diagn.* Ser. II. T. 48.—As. Min.
cappadocicum, *Spreng. Nov. Prov.* i. 2.—Oriens.
cardiophyllum, *Boiss.* &" *Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 43.—As. Min.
chloraefolium, *Boiss. Fl. Orient,* i. 344.—As. Min.
clandestinum, *Delile, in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. vii. (1837)285.—Hab.?
cordatum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 350.—Oriens.
coridifolium, *DC. Syst.* ii. 561.—Oriens.
coridifolium, Hort. ex Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 43 = pulchellum.
cristatnm, *DC. Syst* ii. 560.—Oriens.
diastrophis, *Bunge, Del. Sem. Dorp.* (1841) 7.—Armen.
elongatum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 17.—Persia,
fimbriatum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 193.—Persia.
Fischeri, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 410.—Sibir.
gracile, *DC. Syst.* ii. 559.—Camiol.
graecum, *Boiss. & Sprun. Diagn.* Ser. I. vi. 16.—Graecia.
grandifloram, *Boiss. & Hohen. 1. c.* viii. 42.—Persia,
helerocarpum, *J. Gay, in Fisch.* &» *Mey. Ind. Sen*. Petrop.* iv. 1, nomen.—Syria.
heteropkyllum, Boiss. Fl. Orient, i. 343 - Iberidella heterophylla.
iberideum, *Boiss. 1. c.* i. 351.—Oriens.
lacerum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 45.—Cilicia.
leptocarpium, *Delile, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. vii. 1,1887)285.—Hab.?
Ugnosum, *Boiss. &> Hausst. ex Boiss. Fl. Orient,* i. 348.—As. Min.
membranacenm, *DC. Syst.* ii. 561.—Persia,
monospermum, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. aO.-Hispan.
moricandianum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 051.—As. Min.
oppositifolium, *Boiss. I. c.* 344.—Syria.
ovalifolium, *Boiss. I. c.* 851.—Oriens.
polygaloides, *DC. Syst.* ii. 562.—Ins. Scios.
polygaloides, Ledeb. Fl. Ross. i. 209 = armennm.
pulchellum, *Boiss. & Huet, Diagn.* Ser. II. v. 43.—Oriens.
pyrenaicum, *Boutigny, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 777.—Mont. Pyren.
rotundifolium, *Boiss. Fl. Orient,* i. 344.—Reg. Cancas.
rubescens, *Boiss. 1. c.* 343.—As. Min.
sagittatuvi, Boiss. 1. c. 842 = Iberidella sagittata.
salmasium, *Boiss. I. c.* 350.—Persia,
sftxatile, *k.' Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 80.—Europ. anstr.
schistosum, *Boiss. & Kotschy, Diagn.* Ser. II. v. 42.—As. Min.
ipeciosum, *Boiss. & Huet, I. c.* 44.—Oriens.

AETHIOSEMA :-
spicatnm, *Post, in Hook. Ic. PI.* xv. 62,1.1478.—Syria,
stenopternm, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 1S2.—Persia,
stylosnm, *DC. Syst.* ii. 662.—Syria,
subulatnm, *Boiss. Fl. Orient,* i. 349.—As. Min.
Szowitzii, *Boiss. 1. c.* 346.—Persia.
tenue, Boiss. 1. c. 348 = Iberidella tennis,
thesiifolium, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 44.—As. Min.
Thomasianum, 7. *Gay, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. iv. (18461 81.—Europ.
Mnervium, Boiss. Fl. Orient, i. 342 = Iberidella trinervia.

AETHIOPIS, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (186!)) 134 = 8alvla, Toum. (Labiat).
Sclarea, Fonrr. 1. c. = S. Sclarea.
vera, Fourr. 1. c.=S. Aethiopis.

AETHONIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Jonm. >,Mar. 1829) 309-Tolpis, Adans. (Compos.).
filiformis, D. Don, 1. c. = T. filiformis.
fruticosa, D. Don, 1. c = T. frnticosa.
lagopoda, D. Don, 1. c = T. lagopoda.

AETHUSA, Linn. Sp. PI. 256 (1753). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 907.
CYNAFIUM, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 284 (1745).
ETHUSA, Linn. Syst. ed. I. (1735).
Ammi, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 260 = Ammi majns.
Bunius, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 236 = Carum Bunins.
capillacea, Nntt. ex DC. Prod. iv. 106 = Apiastrum angustifolium.
Cicuta, Neck. Delic. Gallc-Belg. i. 146 - A. Cynapium.
cynapioides,Bieb. Fl. Tanr. Cauc. i. 227 = A. Cynapium.
Cynapium, *Linn- Sp. PI.* 256.—Europ.; Oriens.
cynica, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 353-A. Cynapium.
divaricata, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 260 = Apium divaricatum.
elata, Friedl. ex Fisch. Cat Hort. Gorenk. (1813) 45 = A. Cynapium.
fatua, Ait. Hort. Kew. i. 852=Carum verticillatnm.
leptophylla, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 260 - Apium leptophyllum.
Meum, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 236 = Meum athamanticum.
micrantha, Opiz, ex Nym. Consp. 297 = A. Cynapium.
montana. Lam. Fl. Fr. iii. 649 = Canrn Bunius.
tnutellina, Lam. 1. c. 443 = Meum mutellina.
petroselinifolia, Gilib. Fl. Lituan. ii. 25=A. Cynapium.
pinnata, Nutt. ex DC. Prod. iv. 141 = Cynosciadinm pinnatum.
segetalis, Boenn. Prod. Fl. Monast. 85 = A. Cynapium.
tenuifolia, S. F. Gray, Nat An. Brit. PI. ii. 513-A. Cynapium.
tenuifolium, Salisb. Prod. 166=Meum athamanticum.
toxicaria, Salisb. 1. c = A. Cynapium.

AETIA, Adans., Fam. ii 84 (1763) = Combretum, Linn.

AEXTOXICON, Ruiz & Pay. Prod. 181.129 (1794). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 285.
AEGOTOXICON, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 298 (1810).
punctatum, *Ruie & Pav. Syst. Veg.* 260.—Chili

AFARCA, Rafin. Sylva Tellur. 30 (1838) = Sageretia, Brongn. (Rhamn.).
parviflora, Kañi. 1. c. = S. Michauxii.

AFFONSEA, A. St Hil. Voy. Diam. i. 387 (1833). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 599.
bullata, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 77. -Bras.
comosa, Benth. 1. c 76. t. 1 = juglandifolia.
densiflora, *Benth. I. c*—Bras/
juglandifolia, *A. St. Hil. Voy. Diam.* i. 385.—Bras.

AFZELIA, J. F. Gmel. Syst. 927 (1791)=-Beymeria» Pursh (Scrophul.).
cassioides, J. F. Gmel. 1. c. =S. tenuifolia.

AFZEMA, Sm. in trans. Linn. Soc. iv. (1798) 221. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i 580.
INTSIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 22 (1809).
atricana, *Sm. 1. e.*—Afr. trop.
attenuate, *Klotasch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* i. 20.—Afr. or. trop.
bijuga, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 467.—Ins. Pacif.
bijuga, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 170-Erioglossum cauliflorum.
bracteata, *Vog. ex Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 790.—Afr. trop.
cambodensis, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 258.—Cambod.
coriacea, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 275.—Ind. or.
cuaniensis, Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 302 = quantensis.
discolor, *Hort. exSteud. Nom.* ed. II. i. 33.—Afr. trop.
grandis, Hort. ex Loud. Hort. Brit. 168 = Erythrophleum guineense.
madagascariensis, Baill. Hist. PI. ii. 112=bijuga.
palembanica, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 275.—Ind. or.
Pancovia, I>'C. Prod. ii. 507 = Erioglossum cauliflorum.
Petersiana, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. i. 19 = quanzensis.
quanzensis, *Welw. Apont.* 586.— Angola,
retusa, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 78.—Malacca,
rhomboidea, *Vidal, Phanetog. Cuming. Philipp.* 26, 110.—Ins. Philipp.
splendens, Hort. ex Loud. Hort. Brit. 168 = Carapa procera.

AGALINIS, Rafin. New Fl. Am. ii. 61 (1836) = Oarardia. Linn. (Scrophul.).
aphylla, Rafin. 1. c. 65 = G. aphylla.
corymbosa, Rafin. 1. c. 63 = G. Plukenetii.
fasciculata, Rafin. 1. c. = G. purpurea.
filifolia, Rafin. 1. c. 65 = G. filifolia.
longifolia, Rafin. 1. c. 62 = G. aspera?
maritima, Rafin. 1. c. = G. maritima.
microphylla, Rafin. 1. c. 65.—Am. bor.
obtusi/olia, Rafin. I. c. 64 = Aulaya obtusifolia ?
palustris, Rafin. I. c. 62=G. purpurea.
perennis, Rafin. 1. c. 63 = G. linifolia.
Plukeneti, Rafin. 1. c - G. Plukenetii.
setacea, Rafin. 1. c. 64=G. setacea.
tenuifolia, Kafin. 1. c. = G. tenuifolia.
virgata, Rafin. 1. c. 62 = Seymeria virgata?

AQALLIS, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65"! 12. *CRUCIFERAE.*
montana, *Phil. I. c*—Chili.

AGALLOCHUM, Lam. Encyc. i. 48 (1783) - Aquilaria, Lam. (Thymel.).
officinarum, Lam. 1. c. = Aquil. malaccensis.
praestantissimum. Lam. 1. c. 48.—As. or.
sylvestre, Lam. 1. c. 49.—Ins. Timor.

AGALLOSTACHYS, Beer, Bromel. 35 (1857) = Bro. melia, Linn.
antiacantha, Beer, 1. c. 37 = B. fastuosa.
chrysantha, Beer, I. c. 38 = B. chrysantha.
Commeliniana, Beer, 1. c. 39 = B. fastuosa.
fastuosa, Beer, 1. c. 36 = B. fastuosa.
laciniosus, C. Koch, Wochenschr. ii. (1859) 140 - B. laciniosa.
Pinguin, Beer, Bromel. 36—B. Pinguid.
sylvestris, Beer, 1. c. 35 = B. sylvestris.
variegata, Beer, 1. c. 38 = Billbergia speciosa.

AGALMA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 751 (1855)=-Heptapleurum, Gaert. (Araliac).
aesculifolium, Seem, in Joum. Bot. ii. (1864) 298 = Brassaiopsis aculeata.
aromaticum. Seem-. 1. c.—Java.
elatum, Seem. 1. c. = H. elatum.
glaucum, Seem. 1. c. 299 = H. glaucum.
Griffithii, Seem. 1. c = H. elatum.
Horsfieldii, Seem. 1. c. 298.—Java.
kavaiense, Seem. Revis. Hederac. 103 •= H. kavaiense.
lucescens, Seem, in Joum. Bot. ii. (1864) 299 - H. octophyllum.
octophyllum, Seem. 1. c. 298 = H. octophyllum.
ractmosum, Seem. 1. c. = H. racemosum.
redivivum, Seem. 1. c. 299.—Borneo.

AGALMA :—
rostratum, Seem, in Jonra. Bot. ii. **(1864)** 298-H. rostratum.
rugosum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 762. t. 11.—MaWya.
simillimum, Miq. 1. c—Malaya.
tomentosum. Seem, in Joura. Bot. ii. **(1864)** 298-H. impressum.
vitiense, Seem. Fl. Vit. 116.—Ins. Fiji.

AGALMA, Stend. Nom.ed. II. i. S3 (1840) = **Sonohus,** Touin. (Compos.).

VGALMANTHUS, Hombr. & Jacquinot, exDecne. Bot. Voy. Astral, et Zel. 78 **(1846)=MetroBideros,** Banks (Myrtac).
unjbellata, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. I. c. = M. lucida.

AGAIiinTLA, Blume, Bijdr. 766 (1826). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1014.
ORITHALIA, Blume, Fl. Jav. Praef. 6 (1828).
ORYTHIA, • Blume,[1] ex Endl. Gen. Suppl. i. 1408 (1841). ™
""gustifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 728.*-Malaya.
asperi/olia, Blume, Bijdr. 767 = Dichrotrichnm asperifolium.
Beccarii, *c. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* **v. 57.—** Sumatra.
longistyla, Can. in Rev. Hortic. (1873) 271=starainea.
staminea, *Blume, Bijdr.* 767.—Java,
tuberculata, *Hook./. Ic. PI.* t. 897.—Borneo.

WiALOMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 116 (1836) = Eu-**Phorbia,** Linn.
<"tgustifolia, Rafin. 1. c. 117 = E. angustifolia ?
corollata, Rafin. 1. c. = E. corollata.
graminifolia, Rafin. l.c.-K. granulata.

IQANrPPEA, Mop. & Sesse, ex DC. Prod. vi. 3 (1837). *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 368.
HELIOGENES, Benth. PI. Hartw. 42 (1840).
belhdiflora, *Mof. & Sesse, ex DC. Prod.* vi. 3.—Mexic.
dentata, *DC. I. c*—Mexic.

AGANISIA, Lrodl. in Bot. Reg. xxv. (1839) Misc. 46; xxvi. t. 82 (1840). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 544.
KOELLENSTEINIA, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 17.
caerulea, *Reichb. f. in Gard. Chron.* N. S. vi. (1876) H. 226.—Bras.
cyanea, Reichb. f. in Nov. Act. Nat. Cur. xxxv. II. (1876) 18, t. 4 = Acacallis cyanea.
fimbnata, *Reichb. f. in Gard. Chron.* N. S. ii. (1874) ii. 452.—Guian.
lepida, *Linden & Reichb. f. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxxv. 11. (1876) 15. t. 5.-Am. trop.
Ulivenana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* N. S. ix. (1878) I. 658—Bras,
pulchella, *Lindl. in Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 45; xxvi. (1840) t. 32.—Guian.

AGANON, Rafin. Sylva Tellur. 161 (1838)-Calliearpa. Linn. (Verbcn.).
umbellata, Rafin. 1. c. = C. aiborea.

WJANOPE, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.151 (1855'j-DerriB, Lour. (Legumin.1.
floribunda, Miq. 1. c. = D. thyrsiflora.
Wrginata, Miq. 1. c. 152 = D. marginata.
nicrophylla, Miq. 1. c—Java.
suiavenis, Miq. 1. c. Suppl. i. 299.—Sumatra.
"tmatrana, Miq. 1. c. 300.—Sumatra.

AGj^NOSMA, G. Don, Gen. Syst. iv. 77 (1837). *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 717.
GANOSMA,Decne. in DC.Prod.viii. 625 a844),sphalm.
acuminata, G. Don, L c.-marginata.
fffims, G. Don, 1. c. = Ichnocarpus ovatifolius.
Wumei, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 4S2.-Java.
« « « « , Wight, 1c. t. 1305 = caryophyllata.
wlycina, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 432.—Ind. or.
wyophyllata, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 77.—Ind. or.
concanensis, Hook. Ic. PI. v. t. 841 - Parsonsia spiralis.
wferta.G. Don, in Loud. Encvc. PI. Suppl. ii. 1312 = cymosa.
cymosa, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 77.—Ind. or.

AGANOSB1A :—
Doniana, Wight, Ic. t. 1806=cymosa.
elegans, G. Don, Gen. Syst. iv. 77-cymosa.
Edithae, Hance. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (166) 227 - Cryptolepis elegana
euloba, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 447=acuminata.
gracilis, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 664.—Reg. Himal.
laevigata, J. Grah. Cat. bomb. PI. 118 (= Parsonsiae sp.?).—Ind. or.
laevis. Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 385 = Anodendron laeve.
macrocarpa, A. DC. in DC. Prod. viii. 434=marginata.
marginata, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 77.—Ind. or.
Roxburghii, G. Don, 1. c=calycina.
velntina, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 434.—Malaya.
Wallichii, G. Don, Gen. Syst. iv. 77 = calycina.

AGAPANTHU8, L'Herit. Sert. Angl. 17 (.1788). *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 798.
ABUMON, Adans. Fam. ii. 64 (1763).
MAUHLIA, Dahl, Obs. Syst. Linn. 25 (1787).
africanus, Hoffmgg. Verz. Pfl. 35=umbellatus.
ensifolius, Willd. Sp. PI. ii. 48 = Massonia ensifolia.
medius, Lodd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 83 =umbellatus.
minor, Lodd. Bot. Cab. t. 42 - umbellatus.
multiflorus, Willd. Enum. Hort. Berol. 353 = umbellatus.
praecox, Willd. 1. c. = umbellatus.
tuberosus, Linn, ex [DC. in] Red. Liliac. i. 6=urnbellatus.
umbellatus, *L'HMt. Sert. Angl.* 18.—Afr. austr.
umbelliferus, Poir. Encyc. Suppl. i. 155 = umbellatus.
variegatus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 33 = umbellatus.

AGAPATEA , Steud. in Bot. Zeit xiv. (1856) 391 = Distichia, Nees *Sc* Meyen (Juncac).
filamentosa, Buchen. in Bremen Abh. iv. (1874) 124 = D. filamentosa.
peruviana, Steud. in Bot Zeit. xiv. (1856) 390 = D. muscoides.

AGAPETES, G. Don, Gen. Syst. iii. 862 (1834). *VACC1N1ACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 671.
CALIGULA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 28.
PAPHIA, Seem, in Joum. Bot. ii. (1864) 77.
Acosta, Dun. in DC. Prod. vii. 556 = Vaccinium Acosta.
acuminata, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iii. 862 = Corallobotrys acuminata.
amblyornidis, *Becc. Malesia,* i. (1878) 208.—Malaya,
angulata, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 571.—Ind. or.
arborea, Dun. in DC. Prod. vii. 555 = Vaccinium Leschenaultii.
auriculata, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 571.—Ind. or.
bracteata. *Hook. f. ex C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 448.—Ind. or.
bnxifolia, *Nutt. ex Hook. f. Bot. Mag.* **t. 5012—Reg.** Himal.
campanulata, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* **iii.** 449.—Intl. or.
coriacea, G. Don, Gen. Syst. iii. 863= Vaccinium Korthalsii.
cuneifolia, G. Don, 1. c.=Vaccinium cuneifolium.
discolor, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **iii.** 448.—Reg. Himal.
elliptica, G. Don, Gen. Syst. iii. 862=Vaccinium ellipticum.
floribunda, G. Don, 1. c.=Vaccinium Teysmanni.
glabra, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **iii.** 444.-Ind. or.
grandiflora, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 571.—Ind. or.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* **Hi.** 449.—Reg. Himal.
hirsuta, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851138 = setigera.
laurifolia, G. Don, Gen. Sysl. iii. 862 = Vaccinium laurifolium.
linearifoiia, *C. B. Clarke, in Hook.f. FT. Brit. Ind.* **iii.** 449.—Reg. Himal.
Lobbii, *C. B. Clarke, 1. c.* **448.—**Ind. or.
loranthiflora, *D. Don, ex G. Don, Gen. Syst.* iii. 862.—Ind. or.
lucida, G. Don, 1. c. 863 > Vaccinium lucidum.
macrantha, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 571.—Ind. or.
macrophylla, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 445.-Reg. Himal.
macrostemon, *C. B. Clarke, 1. c.* 443.—Burma,
madagascariensis, *Dun. in DC. Prod.*-> vii. 555.—Madag.

AOAPETE8 :—
meliphagidum, *Becc. Malesia, i.* (1878) 208.—Malaya,
microphylla, *Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. 2nd.* ii. (1845) 85.—Java,
miniata, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 571.—Keg. Himal.
mitrarioides, *Hoot. f. ex C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 447.—Reg. Himal.
myrtoidea, G. Don, Gen. Syst. iii. 868»Vaccinium myrtoides.
Myzomelae, *Becc. Malesia,* i. (.1878) 20S.—Malaya,
nana, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 571—Reg. Himal.
Nutlallii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **iii.** 445.—Reg. Himal.
obliqua, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 571 = setigera.
obovata, *Benth. & Hook. 1. c.* 572.—Reg. Himal.
odontocera, Benth. & Hook. f. 1. c. 571 = variegata.
Parishii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **iii.** 445.—Ind. or.
pilifera, *Hook.f. ex C. B. Clarke, 1. c.* 448.—Reg. Himal.
pulcherrima, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 571 = variegata.
rosea, *Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Ind.* ii. (1845) 85.—Java?
salicifolia, *C. B. Clarke in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* **iii.** 445.—Reg. Himal.
salicifolia, Gardn. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 170=—Vaccinium Leschenaultii.
saligna, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 571.—Ind. or.
serrata, G. Don, Gen. Syst. ii. 862 - Vaccinium scrratum.
setigera, *D. Don, ex G. Don, 1. c.***—Ind. or.**
Sprengelii, ij. Don, 1. c. = Vaccinium Donianum.
symplocifolia, D. Don, ex G. Don, 1. c. = Vaccinium Leschenaultii.
vaccinacea, Dun. in DC. Prod. vii. 554=Vaccinium serratum.
variegata, Dun. 1. c. = setigera.
variegata, *D. Don, ex G. Don, Gen. Syst.* **iii. 862.—** Ind. or.
varingiaefolia, G. Don, 1. c. = Vaccinium varingiaefolium.
verticillata, D. Don, ex G. Don, 1. c. = setigera.
vulgaris, Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Ind. ii. (1846) 84 = Vaccinium ellipticum.
Wallichiana, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 38 = setigera.

ACARDHIA, Spreng. Syst. i. 4, 17 U825) = **Qualea,** Aubl. (Vochys.).
cryptantha, Spreng. 1. c 17 = Q. cryptantha.
grandiflora, Spreng. 1. c. = Q. grandiflora?

AGARISTA, DC. Prod. v. 569 (1836) = **Coreopsis,** Linn. (Compos.).
calliopsidea, DC. 1. c. = C. calliopsidea.

AGABI8TA, D. Don, in G. Don, Gen. Syst. iii. 837 (1834). *ERICACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 586.
AMECHANIA, DC. Prod. vii. 678 (l(-38).
anastomosans, *G. Don, 1. c.* iii. 838.—N. Granat.
bracamorensis, *G. Don, 1. c.* 837.—N. Granat.
buxifolia, G. Don, 1. c. — Agauria buxifolia.
chlorantha, *G. Don, I. c.* 838.—Bras,
eriophylla, *G. Don, 1. c.*—Bras,
eucalyptoides, *G. Don, 1. c.* 887.—Bras,
ilicifolia, *G. Don, I. c.* 838.—Peruv.
Itatiaiae, *Wawra, It. Princip. Coburg.* **i. 73.—Bras,**
mulliflova, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 837.—Bras,
neriifolia, *G. Don, I. c.* 838.—Bras,
nummularia, *G. Don, 1. c.* 837.—Bras,
oleifolia, *G. Don, 1. c.* S88.—Bras.
Pistrix, *G. Don, I. c*—Bras.
Pohlii, *G. Don, I. c.* 837.—Bras,
pulchella, *G. Don, 1. c.* 888.—Bras,
pulchra, *G. Don, 1. c.* 837.—Bras.
pyrifolia, G. Don, 1. c 838 = Agauria salicifolia.
salicifolia, G. Don, 1. c. 837 = Agauria salicifolia.
serrulata, *G. Don, 1. c.* 838.—Bras.
Sprengelii, *G. Don, 1. e.* 837.—Bras,
subrotunda, *G. Don, 1. c.*—Bras.

AGASSIZIA, Chav. Monog. Antirrh. 180. t. 11 (1830) = Galvezia, Domb. (Scrophul.).
limensis, Chav. 1. c.=G. limensis.

AGASSIZIA, Gray & Engelm. in Proc. Am. Acad. i. (1847) 46 = **CraiIlardia,** Fouger. (Compos.).
suavis, A. Gray & Engelm. 1. c. 50 = G. simplex.

AGASS1ZIA. Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 317 (1835) = Oenotbera, Linn. (Onagrar.).
cheiranthifolia, Spach, 1. c. 318=0. Agassizia.

AGASTA, Mieis, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 69 (1875) -Barrlngtonla, Forst. (Myrtac).
asiatica, Miers, 1. c 61=B. speciosa.
indica, Mieis, 1. c 63 = B. speciosa.
splendida, Miers, 1. c 60=B. speciosa.

AGA8TACHY8, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 168. *PROTEACEAB,* Bentb. & Hook. f. iii. 175.
odorata, *R. Br. I. c*—Tasmania.

AGASTIANIS, Rafin. in New Fl. Am. Ui. 86 (1836) = Sophora, Linn. (Legum.).
secundiflora, Rafin. 1. c 86=S. secundiflora.

AGASYLLIS, Spreng. in Ges. Nainrf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 259 = Siler, Scop. (Umbellif.).
caucasiea, Spreng. 1. c. = S. caucask-um.
Galbanum, Spreng. 1. c. = Pencedanum Galbanum.
lati/olia, Boiss. Fl. Orient ii. 980 = S. caucasicum.
salsa, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 259 = Peucedanum redivivum.

AGATEA, A. Gray, in Proc Am. Acad. ii. (1852) 823 =Agation, Brongn. (Violar.).
violaris, A. Gray, 1. c 324=Agation violare.

AGATEA, Rich, ex A. Gray, Bot. U. S. Expl. Exped. i. 609 <,1854) = Haplopetalum, A. Gray (Rhizoph.).

AGATHAEA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 175; Diet. Sc. Nat. i. Suppl. 77. t. 89 (1817) = Felicia, Cass. (Compos.).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 888=F. Richardi.
amelloides, DC. Prod. v. 225 - Aster rotundifblius.
amoena, Sen. Bip. ex Walp. Rep. ii. 956=Aster amoenus.
barbata, DC. Prod. v. 224=Aster barbatus.
Bergeriana, DC. 1. c. 223=Aster Bergerianus.
brevifolia, DC. 1. c. 225.—Afr. anstr.
coelestis, Cass. Opusc. i. 8 = Aster rotundifolius.
eoiymbosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxir.(1851) II. 60 = Gymnostephium corymbosum.
dentaia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 384 = F. Richardi.
diffusa, DC. Prod. T. 224=Aster demissns.
Edlonis, Nees, Gen. et Sp. Ast. 262 = Aster Ecklonis.
tlongata, Nees, 1. c 266 = Aster elongatus.
hirta, DC. Prod. v. 224 = Aster hirtns.
hispida, DC. 1. c.—Aster elongates.
Kra'ussii, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 95 = Aster Kraussii.
leiocarpa, DC. Prod. v. 225 = Aster leiocarpus.
linifolia, G. Don, in Loud. Hort Brit. 349=Enryops linifolius.
microphylla, Cass. in Bull. Soc Philom. (1817) 183 = Aster aethiopicus.
natalensis, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 956=Aster natalensis.
rotundi/olia, Nees, Gen. et Sp. Ast. 258=Aster rotundifolins.
scabrida, DC. Prod. v. 225 = Aster scabridus.
serrata, Nees, Gen. et Sp. Ast. 259 = Aster serratus.
spathulata, Fiscb. Mey. & Avl-LalL Ind. Sem. Hort. Petrop. x. 43 = Amellus annuus.
spathulata, Knnze, Pugill. PI. Ined. i. 9=Amelias hispidus.
itricta, DC. Prod. v. 224 = F. adfinis.
strigosa, Nees, Gen. et Sp. Ast. 263=Aster strigosos.
tenera, DC. Prod. v. 224 = Aster tener.
tricolor, Nees, Gen. et Sp. Ast. 267 -Aster tricolor.
Zeyheri, Nees, 1. c. 260=Aster linifolius.

AOATHEIiFIS, Choisy, in Mlm. Soc. Phys. Genèv. ii. (1824) 85, 89. *SELAGINEAE,* Benth. & Hook, t ii. 1129.
adnnca, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 252.—Afr. austr.
angustifolia, *Choisy, in Mlm. Soc.Pkys. Geniv.* ii. (1824) 95.—Aft. anstr.
brevifolia, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* i. 253.—Afr. anstr.
muctonata, *E. Mey. I. c*—Afr. austr.

AGATHELPIS :—
nitida, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 252.—Afr. austr.
parvifolia, *Choisy,in Mlm. Soc. Phys. Genh.n.* (1824) 95.—Afr. austr.

AGATHIS, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 311. t. 15. *CONIFERAE,* Benth. & Hook, f iii. 486.
DAMMARA, [Rumph.] Lam. Encyc. ii. 259 (1786).
australis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 34.—N. Zel.
Dammara. Rich. Conif. 83. t. 19=loranthifolia.
loranthifolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 312.1.15.—Malaya.

AGATHISANTHEMUM, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 294 (1861) = Oldenlandia, Plum. (Rubiac).
Bojeri, Klotzsch, 1. c. =O. Bojeri.
globosum, Klotzsch, 1. c. = O. globosa.
Petersii, Klotzsch, 1. c. 295=O. Bojeri.

AGATHISANTHES, Blume, Bijdr. 645 (1825) = Nyssa, Linn. (Cornac).
javanica, Blume, 1. c = N. sessiliflora.

AGATHOMERIS, Delann. in Bon Jard. (1805) ex DC. Prod. vi. 157 = Humea, Sm. (Compos.).

AGATHOPHORA, Bunge (Anabas. Revis. 92); in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VII. iv. (1862) a 11 = Halogeton, C. A. Mey. (Chenopod.).
alopecuroides, Bunge, 1. c. = H. alopecuroides.

AGATHOPHYLLUM, Juss. Gen. 431 (1789) = Bavensara, Sonner. (Lanrin.).
acuminatum, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 110 = R. acuminata.
aromaticum, Willd. Sp. PI. ii. 842=R. aromatica.
cupulare, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 340 (= *Mespilodaphne cupularis).*
cymosum, Meissn. in DC. Prod. xv. I. Ill ^*Mespilodaphne cymosa).*
heteromorphum, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 340 (= *Mespilodaphne heteromorphà).*
Lindleyanum, Blume, 1. c (=*Mespilodaphne Lindleyana.*
marginatum, Blume, 1. c. *(•'Mespilodaphne marginata).*
Neesianum, Blume, 1. c 889 (—*Mespilodaphne manritiana)*
obtusatum, Blume, 1. c 840 (=*Mespilodaphne heteromorpha).*
Persoonianum, Blume, 1. c 841 *{"Mespilodaphne Persooniana).*
Ravensara, Mirb. ex Steud. Nom. ed. *XL* 84=R. aromatica.
retusum, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xv. 1.110= R.retnsa.

AGATHOPHYTON, Moq. in DC. Prod, nit n.«4, in syn. (1849)=seq.

AGATHOPHYTUM, Moq. in Ann. Sc Nat. S<5r. IL i. (1834) 291.1.10. c. = Chenopodium, Linn.
acuminatum, Schnr, Ennm. PI. Transs. 87S; Index= C. acuminatum.
Bonus-Henricus, Moq. in Ann. Sc Nat. Sén II. i. (1834) 291=C. Bonus-Henricus.
crassifolium. Fuss, Fl. Transs. 658=C. crassifolium.
glaucum, Fuss, 1. c = C. glancum.
humifusum, Kitt. Taschenb. ed. II. 264=C. crassifolium.
rubrum, Reichb. FL Sax. 321=C. rubrum.

AGATHOSMA, Willd. Enum. Hort. Berol. 259 (1809). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 290.
Bucco, Wendl. Coll. t. 2. etc. (1808).
DICHOSMA, DC. ex Load. Hort. Brit. 85 (1880).
GYMNONYCHIUM, Bartl. in Linnaea, xvii. (1843) 354. t. 11.
HARTOGIA, Linn. Syst. ed. X. 939 (1759) (nomen prius).
acerosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 114.—Afr. austr.
acuminata, Drège, ex Walp. Ann. i. 155=punctata.
acuminata, Willd. Enum. Hort Berol. 260«=imbricata.
acutifolia, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 416.—Afr. austr.

AGATHOSHA :—
adenocaulis, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 115.—Afr. austr.
affinis, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 406.—Afr. aistr.
alaris, *Cham, in Linnaea,* v. (1880) 58.—Afr. austr.
ombigua, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap. i.* 426.—Afr. austr.
ambigua, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 89.—Afr. austr.
anomala, *E. Mey. ex Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 408.—Afr. austr.
apiculata, E. Mey. ex Sond. 1. c. 405=apiculata.
apiculata, E. Mey. in Bartl. & Wendl. f. Diosm. 178 = Baiosma apiculata.
aristata, *Presl, Bot. Bemerk.* 32.—Afr. austr.
asperifolia, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 111.—Afr. austr.
aulonophila, Eckl. & Zeyh. 1. c. 115=commutata, virgata.
barbata, Spreng. Pugill. i. 20=Macrostylis lanceolate,
barosmaefolia, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 111.—Afr. austr.
bàrosmoides, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 416.—Afr. austr.
Ba\ ilingiana, Eckl. & Zeyh. Enum. 114 = A. Cerefolium, serpyllacea.
berzeliaef olio, Eckl. Sc Zeyh. 1. c 115 = virgata.
bifida, Bartl. & Wendl. f. Diosm. 152 = umbellata.
biophylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 110=hirta.
bisulca, *Bartl. & Wendl./. Diosm.* 129.—Afr. austr.
blaerioides, *Cham, in Linnaea,* v. (1830) 55.—Afr. austr.
blaerioides, Eckl. & Zeyh. Ennm. 112-=chortophila.
brevifolia, Loud. Hort. Brit. 86-erecta.
bruniades. Loud. 1. c { G. Don, Gen. Syst. i. 787 = cuspidata.
ca.pitat&; Sond. in Han. &Sond. Fl. Cap. i. 434.—Afr. austr.
cephalotes, E. Mey. ex Sond. 1. c 406-globuliflora.
Cerefolium, *Bartl. & Wendl.f. Diosm.* 159.—Afr. austr.
chortophila, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 116.—Afr. austr.
ciliata, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 238.—Afr. austr.
clavata, Hoffmgg. Verz. Pfl. 36=obtusa.
collina, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 110.—Afr. anstr.
commutata, *Sond. in Han. &Sond. Fl. Cap.* i. 412.—Afr. austr.
condnna, *Hoffmgg. Vera. Pfl.* 36.—Afr. austr.
cordata, Hoffmgg. 1. c—subcordata.
corymbosa, G. Don, Gen. Syst. i. 789=villosa.
craspedota, *E. Mey. ex Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 415.—Afr. austr.
crassifolia, *Sond. 1. c.* 438.—Afr. austr.
cuspidata, *Bartl. & Wendl. f. Diosm.* 182.—Afr. austr.
cyminoides, Eckl. & Zeyh. Enum. 117—chortophila.
decumbens, *Eckl. & Zeyh. 1. c.* 116.—Afr. anstr.
dioica, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 89 = Barosma lanceolata.
Dregeana, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 410.—Afr. anstr.
Eckloniana, *Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 207.—Afr. austr.
elata, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 438.—Afr. austr.
elegans, *Cham, in Linnaea,* v. (1830) 54.—Afr. anstr.
erecta, *Bartl. & Wendl./. Diosm.* 135.—Afr. austr.
eriantha, Steud. Nom. ed. II. i. 85=Schlechtendalii.
ericoides, *Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) 206.—Afr. austr.
fastigiata, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 117.—Afr. austr.
filipetala, *Eckl. & Zeyh. 1. c.* 112.—Afr. austr.
florida, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 424.—Afr. austr.
flornlenta, *Sond. 1. c.* 487.—Afr. austr.
/oetidissima, Hort. ex Steud. Nom. ed. IL i. 36- Barosma foetidissima.
foliosa, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 421.—Afr. austr.
fraudnlenta, *Sond. I. c.* 415.—Afr. austr.
geminifolia, *Eckl. if Zeyh. Enum.* 115.—Afr. austr.
Gillivrayi, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 487.—Afr. austr.
glabra, Eckl. & Zeyh. Enum. 116—serpyllacea.
glabrata, *Bartl. & Wendl./. Diosm.* 165.—Afr. austr.
glabrata, E. Mey. ex C. MuelL in Walp. Ann. vii. 613=crassifolia.
glandulosa, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 420.—Afr. austi.
glauca, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 112=bisulca.
globuliflora, *Presl, Bot. Bemerk.* 31.—Afr. austr.
gnidioides, *Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) 206.—Afr. austr.

AOATHOSMA:—
gonaqnensis, *Eckl. & Zeyh. Enun.* 110.—Afr. austr.
gradlicaulis, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 409.—Afr. anstr.
graveolens, Meissn. in Flora, xxvii. (1844) I. 802 = collina.
hirta, *Bartl. & Wendl.f. Diosm.* 188.—Afr. anstr.
hirta, [Ker-Gawl.] in Bot Reg. t. 869-villosa.
hirtella, *Sond. in Han. & Sond. Fl. Cap.* i. 480.—Afr. austr.
hispida, *Bartl. &> Wendl.f. Diosm.* 182.—Afr. austr.
Hooken, *Sond. in Hart. <& Sond. Fl. Cap.* i. 406.—Afr. anstr.
humilis, *Sond. I. c*—Afr. anstr.
hybrida, Bartl. & Wendl. f. Diosm. 167-rngosa.
hyponeura, Eckl. & Zeyh. Enum. 114-serpyllacea.
imbricata, Drege, ex Walp. Ann. i. 155-polyphylla.
imbricata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 259.—Afr. anstr.
involucrata, *Eckl. &• Zeyh. Enum.* 109.—Afr. austr.
Joubertiana, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 207—Afr. austr.
juncea, Hoffmgg. Verz. Pfl. 86=imbricata.
juniperifolia, *Bartl. in Linnaea*, xvii. (1848) 876—Afr. atistr.
jnniperina, *Sond. in Harv. <& Sond. Fl. Cap.* i. 433.— Afr. anstr.
lanceolata, Sprang, ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 156 "Ciliata.
lancifolia, *Eckl. &>Zeyh. Enum.* 109.—Afr. austr.
lastophylla, G. Don, Gen. Syst i. 788 = villosa.
tattfolia, Loud. Hort Brit. 85 - Barosma serrati-(olia.
latipetala, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 482— Afr. austr.
laxa Bartl. & Wendl. f, Diosm. 162-villosa.
lediformis, *Eckl.* to" *Zeyh. Enum.* 109.—Afr. austr.
leptospermoides, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 405=aristata.
linifolia, *Lichtst. ex Roem. <& Schult. Syst.* v. 448— Afr. austr.
lycopodioides, *Bartl. &• Wendl. f. Diosm.* 148.—Afr. austr.
marifolia, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 118.—Afr. austr.
Martiana, *Sond. in Han.* cV *Sond. Fl. Cap.* i. 416— Afr. austr.
melalencoides, *Sond. I. c.* 43l.—Afr. austr.
Meyenana, *Presl, Bot. Bemerk.* 82.-Afr. anstr.
microphylla, *E. Mey. in Bartl. &> Wendl. f. Diosm.* 173.—Afr. austr.
minuta, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1881) 206.—Afr. anstr.
mollis, Bartl. & Wendl. f. Diosm. 168-rugosa.
mollis, Eckl. *Be* Zeyh. ex C. Muell. in Walp. Ann. vii. 514 = florida.
montana, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 207—Afr. anstr.
monticola, *Sond. in Han. <& Sond. Fl. Cap.* i. 409— Afr.- austr.
mncronulata, *Sond. I. c.* 417—Afr. anstr.
Mundtii, *Cham, in Linnaea*, v. (1880) 66—Afr. anstr.
myrsinites, G. Don, Gen. Syst. i. 789=ciliata.
nigra, *Eckl. &• Zeyh. Enum.* 117—Afr. austr.
mgromontana, *Eckl. & Zeyh. 1. c.* Ill—Afr. austr.
Niventi, *Sond. in Han. &Sond. Fl. Cap.* L 418—Afr. austr.
obtusa, *Bartl. &> Wendl.f. Diosm.* 169=mgosa.
obtusata, G. Don, Gen. Syst. i. 789= imbricata.
obtusifolia, *Presl, Bot. Bemerk.* 81.—Afr. anstr.
orbicnlaris, *Bartl. & Wendl. f. Diosm.* 175.—Afr. austr.
Owanii, *Han. & Sond. ex Han. Thes. Cap.* ii. 42— Afr. anstr.
parviflora, *Bartl.V Wendl.f. Diosm.* 181.—Afr. austr.
patens, Hort. ex Barth. & Wendl. f. Diosm. 169 = A. Cerefolium.
patentissima, Eckl. & Zeyh. Enum. 114 =-cuspidata.
patula, Eckl. & Zeyh. 1. c. 116=variabilis.
Patula, *G. F. W. Mey. ex Bartl. V Wendl. f. Diosm.* 134.—Afr. anstr.
pentachotoma, *E. Mey. ex Sond. in Han. &" Sond. Fl. Cap.i.* 405—Afr. anstr.
pwforata, *G. Don, Gen. Syst.* i. 789—Afr. austr.
Pilifera, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 206—Afr. anstr.
planifolia, *Sond. in Han. &• Sond. Fl. Cap. I* 418.— Afr. austr.
platypetala, *Eckl. <5- Zeyh. Enum.* 116—Afr. anstr.

AOATHOSKA:—
polyphylla, *Presl, Bot. Bemerk.* 32.—Afr. anstr.
prolifera, *Bartl. &* Wendl.f. Diosm.* 185.—Afr. austr.
prolifera, Eckl. *Be* Zeyh. Enum. 114=bisulca.
propinqua, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap.* i. 428— Afr. austr.
pubescens, G. Don, Gen. Syst. i. 788=villosa.
pubescens, *Sond. in Han. &* Sond. Fl. Cap.* i. 413— Afr. austr.
pubescens, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 259.—Afr. austr.
pnbigera, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap. i.* 414.— Afr. austr.
pulchella, Link, Enum. Hort. Berol. i. 238 -= Barosma pulchella.
punctata, G. Don, Gen. Syst. i. 789-ovata.
punctata, *Sond. in Han.* 6" *Sond. Fl. Cap.* i. 417.—Afr. austr.
recurvifolia, *Sond. I. c.* 415.—Afr. anstr.
reflexa, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 288.—Afr. austr.
robusta, *Eckl. &* Zeyh. Enum.* 110.—Afr. austr.
rubra, *Willd.V Lichtst. ex Bartl. &" Wendl.f. Diosm.* 178.—Afr. anstr.
rufescens, G. Don, Gen. Syst i. 789-rnbra.
rugosa, Link, Enum. Hort. Berol. i. 238=pubescens.
sabulosa, *Sond. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* i. 406— Afr. austr.
salina, Eckl. & Zeyh. Enum. Ill=asperifolia.
Schlechtendalii, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap. i.* 407.—Afr. austr.
Scklechtendahliana, Eckl,. ft Zeyh. Enum. 109 = Schlechtendalii.
sedifolia, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 206—Afr. anstr.
serpyllacea, *Lichtst. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 447.—Afr. austr.
serruriaefolia, Eckl. & Zeyh. Ennm. 109 = bifida.
speciosa, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 126 = laxa.
spicata, *Lichtst. ex G. Don, Gen. Syst.* i. 788.—Afr. austr.
spinosa, *Sond. in Han. ff Sond. Fl. Cap.* i. 417.— Afr. austr.
squamosa, *Bartl.* b" *Wendl.f.Diosm.* 141.—Afr. austr.
stadensis, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 113=microphylla.
stenopetala, Steud. Nom. ed. II. L S6=filipetala.
suaveolens, Eekl. & Zeyh. Enum. 113 = A. Cereiolium.
suhcordata, Hoffmgg. Verz. Pfl. 36, 163 = imbricata *1*
tabularis, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap.* i. 403— Afr. austr.
tennis, *Sond. 1. c.* 423.—Afr. austr.
tenuissima, Otto, ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 187 = erecta.
teretifolia, G. Don, Gen. Syst. i. ?87=Diosma teretifolia.
Thnnbergiana, *Bartl. (f Wendl.f. Diosm.* 150.—Afr. austr.
Thunbergiana, Schlecht. in Linnaea, vi. (1881) 204 = ambigua.
Thunbergiana, Sond. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. i. 425 = platypetala.
thymifolia, Hoffmgg. Verz. Pfl. 8&=acuminata.
thymifolia, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 206—Afr. anstr.
thuyoides, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 437 = glabrata.
thyoides, G. Don, Gen. Syst. i. 787; Eckl. & Zeyh. Enum. 116=glabrata.
trachyphylla, Eckl. & Zeyh. 1. c. 110=hispida.
umbellata, Sond. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. i. 408 = bifida.
variabilis, *Sond. 1. c.* 483—Afr. austr.
Ventenatiana, *Bartl. V Wendl.f. Diosm.* 161.—Afr. austr.
vestita, Willd. ex Roem. *8c* Schult. Syst. v. 447 = imbricata.
villoaa, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 259.—Afr. austr.
virgata, *Bartl. & Wendl.f. Diosm.* 189—Afr. austr.
virgata, E. Mey. ex Sond. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. i. 412=commutata.
virgata, Spreng. ex Bartl. *8c* Wendl. f. Diosm. 145 = imbricata.
Wendlandiana, G. Don, Gen. Syst i. 788=erecta.

AGATHOTES, D. Doc, in Phil. Mag. viii. (1836) 77 = **Bwertia,** Linn. (Gentian.).
alata, D. Don, ex G. Don. Gen. Syst. iv. 177 = S. alata.
Chirayta, D. Don, 1. c. 182=S. Chirata^
nenosa, G. Don, 1. c. 177 - S . nervnsa.

AGATHYRSUS, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joura. (1828-29) 310=Xiaotuoa, Linn, et Sonchus, Tourn. (Compos.).
alpinus, D. Don, 1. c = L . alpina.
cacaliaefolius, D. Don, I.e. *(=Mulgedium cacaliaefolius).*
caeruleus, D. Don, I. c.=L. alpina.
cyaneus, D. Don, 1. c.=L. hastata.
floridanus, D. Don, 1. c.=L. leucophaea.
leucophaeus, Beck, Bot. 170 = L. leucophaea.
macrophyllus, Beck, 1. c = L . macrophylla.
Plumieri, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (1828-29) 310 = L. Plumieri.
prenanthoides, D. Don,!. c.=L. prenanthoides.
pulchellus, D. Don, 1. c = L. pulchella.
sibiricus, D. Don, 1. c. = L. sibirica.
spicatus, D. Don, 1. c—Hab. *1*
tataricus, D. Don, 1. c. = L. tatarica.

AGATHYRUS, Rafin. New Fl. Am. iv. 84 (1886) = ENOXIS, Rafin. =Laotuoa, Lion.? (Compos.).

AGATI, Adans. Fam. ii. 826 (1763)=Sesbania, Pers. (Legum.).
cannabina, Desv. Joum. Bot. i. (1813) 120 •= S. acnleata.
coccinea, Desv. 1. c. t. 4 = S . grandiflora.
formosa, F. Muell. Fragm. ii. 88=S. grandiflora.
grandiflora, Desv. Journ. Bot i. (1813) 120. t. 4 = S. grandiflora.
tomentosa, Nutt. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 409=S. tomentosa.
virgata, Desv. Joum. Bot. i. (1813) 120 = Conrsetia virgata.

AGATION, Brongn. in Bnll. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 79. *VIOLARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 118.
AGATEA, A. Gray, in Proa Am. Acad. ii. (1852) 823. (nomen prins).
Pancheri, *Brongn. I. c.* 80.—N. Caled.
Vieillardii, *Brongn. 1. c*—N. Caled.
violare, *Brongn. 1. c.*—Ins. Fiji.

AGATOPHYTON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 144 = AGATHOPHYTUM, Moq.=» Chenopodium, Linn.

AOATTBIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 686 (1876). *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 586.
AGARISTA, D. Don, in G. Don, Gen. Syst. iii. 837 (1834) (quoad spp. Africanae).
buxifolia, *Baker, Fl. Mount.* 187, *in obs.*—Ins. Borb.
polyphylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 194—Madag.
salicifolia, *Hook. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 488— Afr. trop.

AGAVE, Linn. Hort. Ups. 87 (1748). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 738.
ALLIBERTIA, Marion, in Rev. Hortic. Bouch. Rhone (Nov. 1882), ex Baker, in Gard. Chron. (1883) • I. 176.
BONAPARTEA, Haw. Syn. Succ. 68 (1812).
LITTAEA, Tagliabue, in Bibl. Ital. i. 106 (1816).
MANFREDA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 78 (1866).
albicans, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxi. (1865) 256. —Mexic
Alibertii, *Baker, in Gard. Chron.* N. S. xix. (18S3) I. 176—Mexic?
aloides, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxii. (1866) 265. Hab. ?
aloina, *C.* Koch, Wochenschr. iii. (1860) 37 =<Sart6rii.
altissima, Zumag. Fl. Pedem. ii. 50 •= americana.
americana, *Linn. Sp. PI.* 323.—Am. trop.
amoena, Lem. ex Jacobi, in Hamb. Gartenz.xxi. (1865) 120=A. Scolymus.
amurensis, Jacobi, 1. c. xx. (1864) 5<18=xylonacantha.
ananassoides, De Jonghe & Jacobi, Nachtr. i. 82= Regeliana.
angustifolia. Haw. Syn. Succ. 72=rigida.
angustifolia, Hort. Par. ex Steud. Nom. ed. II. i. 84 = Furcraea tuberos>a.
angustissima, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis.* iii. (1875) 306.—Mexic.
antillarum, Descourt. Antill. iv. 289. t. P84 = sobolifera.
applanata, *Lem. ex Jacobi, in Hamb. Gartens,* xx. (1864) 550.—Mexic.

AGAVE:—
aspera, Jacq. Enum. Vindob. App. 307 = Furcraea cubensis.
asperrima, *Jacobi, in Hamb. GartenB.* xx. (1864) 561.—Texas,
atrovirens, *Harm, in Salm-Dyct, Hort.* (1831) 302.—Mexic.
attenuata, *Salm-Dyck, I. c.* 808.—Mexic.
auricantha, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) n. 40-A. Scolymus.
australis, Stead. Nom. ed. I. 18 = Furcraea cubensis.
Banian, *Perr. in Mem. Soc. Linn. Par.* iii. (1824) 97.—Java.
Beaucarnei, Lera. Illnstr. Hortic. xi. (1864) Misc. 65 = Kcrchovei.
Beauleriana, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 150 = mexicana.
Bernhardi, *Jacobi, Nachtr.* i. 38.—Mexic.
Besseriana, Oe Smet, ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxi. (1865) 155 = macroacsintha.
Bonnetiana, Peacock, ex Baker, in Gard. Chron. (1877) II. 40 = ferox.
Botterii, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6248.—Mexic.
Bouchei, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxi. (1865) 217.—Mexic.
brachystachys, *Cam. Descr.* 458.—Mexic.
bracteosa, 5. *Wats, ex Engelm. in Gard. Chron.* (1882) I. 776. f. 139.—Mexic.; Calif.
Bramiiana, *Jacobi, in Hamb. Garten, xxii. (1866)** 216.—Mexic.
bromeliaefolia, *Salm-Dyck, Hort.* (1834) 308.—Mexic.
bulbifera, Bonpl.ex Steud. Nom. ed. II. i. 34 = mexicana.
bulbifera, *Salm-Dyck, Hort.* (1834) 8, 808.—Mexic.
caerulescens, Salm-Dyck, ex Jacobi, Monog. 88 — lophantba.
caespitosa, Tod. Hort. Bot. Panorm. (1877) 32. t. 8 = Sartorii.
califomica, Jacobi, Nachtr. 47 = falcata.
Canartiana, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 147 = atrovirens.
Candelabrum, Tod. Hort. Bot. Panorm. (1877) 66. t. 15 = rigida.
Cantula, Koxb. Fl. Ind. ii. 167=vivipara.
caribaea, *Hort. Kew. ex Baker, in Gard. Chron.* (1879) II. 683.—Ind. occ.
Celsiana, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxi. (1865) 446 = Cclsii.
Celsii, *Hook. Bot. Mag.* t. 4934.—Mexic.
chiapensis, Hort. Belg. ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 213 = polyacantha.
chloracantha, *Salm-Dyck, in Otto, Allg. Garten*.* (1834) 50.—Mexic.
cinerascens, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xx. (1864) 553 = applanata.
coarctata, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 147 = atrovirens.
coccinea, *Roesl, ex Jacobi, in Hamb. Garten, xxi.** (1866) 61.—Mexic.
cochlearis, *Jacobi, Nachtr.* ii. 67.—Mexic.
Cohniana, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 321 = yuccaefolia.
Commelini, Salm-Dyck, Hort. (1884) 801 = Furcraea Commelyni.
concinna, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) II. 187.—Mexic.
concinna, Hort. Angl. ex Baker, 1. c. 717=albicans.
conduphcata, *Jacobi & Bond, in Hamb. Garten, xxi.** (1865)' 562.—Mexic.
Consideranti, Carr. in Rev. Hortic. (Nov. 1875) 429. f. 68 = A. Victoriae-reginae.
Corderoyi, Versch. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) II. 898.—Mexic.
cnnata, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxri. (1866) 176 = A. Scolymus.
cubensis, Jacq. Amer. 100—Forcraea cubensis.
cucullata, *Lent, ex Jacobi, in Hamb. Garten, xxi.** (1865) 124.—Mexico.
cuspidata, Hort. Saunders, ex Baker, in Gard. Chron. (1877) H. 137 - flaccida.
cyanophylla, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 175 = mexicana.
dasyliriokles, *Jacobi & Bouche', I. c.* xxi. (1865) 344.—Guatemal.
dealbata, Lem. ex Jacobi, 1. c. 346 "dasylirioides.
Debaryana, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 164 = prninosa.
Decaisneana, *Jacobi, I. c.* 153.—Mexic.
deflexispina, Jacobi, Nachtr. ii. 72=atrovirens.

AGAVE:—
Demeesteriana, Hort. ex Jacobi, Monog. 218=miradorensis.
De-Meesteriana, *Jacobi, in Hamb. Garten, xxii.** (1866) 167.—Mexic.
densiflora, *Hook. Bot. Mag.* t. 5006.—Mexic.
densiflora, Regel, Gartenfl. (1868) 274. t. 410 = rupicola.
dentata, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) II. 748 = pruinosa.
Deserti, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* iii. (1875) 310.—Calif.
Desmetiana, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1677) I. 621 = horrida.
Desmettiana, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 217 = miradorensis.
drimiaefolia, Hort. Petrop. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) H. 808-undulata.
Ehrenbergiana, Baker, 1. c. 620 = Ehrenbergii.
Ehrenbergii, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxi. (1865) 265.—Mexic.
echinoides, Jacobi, Nachtr. i. 48 = striata.
Ellemettiana, *C. Koch, Wockenschr.* viii. (1865) 103.—Mexic.
elongata, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxi. (1866) 168 = rigida.
ensifera, Jacobi, Nachtr. 14=univittata.
ensi/ormis, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) II. 556 = striata.
excelsa, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxii. (1866) 215.—Honduras.
expansa, Jacobi, Nachtr. ii. 26—americana.
falcata, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* iii. (1875) 304.—Mexic.
Fenzliana, *Jacobi, in Hamb. Garten*, yarn.* (1866) 170.—Mexic.
ferox, *C. Koch, Wochenschr.* iii. (1860) 23.—Mexic.
filamentosa, Salm-Dyck, in Bonplandia, vii. (1859) 94 = filifera.
filifera, *Salm-Dyck, Hort.* (1834) 309.—Mexic.
flaccida, Haw. Syn. Succ. 73 = rubescens.
flaccida, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxii. (1866) 174.—Mexic.
flavescens, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 8=macroacantha.
flavovirens, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxii. (1866) 270.—Hab.?
foetida, Linn. Sp. PI. 323 = Furcraea gigantea.
fourcroydes, Lem. Illustr. Hortic. xi. (lbt>4) Misc. 65 = rigida.
fragrantissima.yacy. *Enum. Vindob. App.* 309.—Hab.l
Fuerstenbergii, Jacobi, Nachtr. ii. 72 = americana.
funifera, Lem. Illustr. Hortic. xi. (1864), Misc. 65, sub t. 419 = Yucca funifera.
Funkiana, C. Koch & Bouche^ in C. Koch, Wochenschr. iii. (1860)47 =lophantha.
Galeottei, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) II. 40.—Mexic.
geminiflora, *Ker-Gawl. in Brande, Journ. Sc.* iii. (1817) no. 8. t 1—Peruv.
Ghiesbrechtii, *C. Koch, Wochenschr.* v. (1862) 83,143.—Mexic
gigantea, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1192 = Furcraea gigantea.
Gilbeyi, Hort. cf. Gard. Chron. (1873) 1805 = horrida.
glabra, *Kara, in M. Roem. Syn. Ensat.* 292.—Mexic.
glaucescens. Hook. Bot Mag. t 5833=attenuata.
glaucescens. *Otto, in M. Roem. Syn. Ensat.* 292.—Mexic.
Goeppertiana, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxii. (1866) 219;—Mexic.
gracilis, Jacobi, Nachtr. ii. 66=atrovirens.
grandidentata, Hort. Belg. ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 114 = horrida.
granulosa, *Scheidw. in C. Koch, Wochenschr.* iv. (1861) 286.—Mexic.
Guedeneyri, *Houllet, in Rev. Hortic.* (1875) 466.—Mexic.
Gustaviana, Hort. Corderoy,ex Baker, in Gard. Chron. N.S. viii. (1877) n. 201 = Maximiliana.
guttata, *Jacobi & Bouché, in Hamb. Garten, xxi.** (1865) 6«1.—Mexic.
Haselofni, *Jacobi, in Hamb. Garten, xxii. (1866)** 220.—Mexic.
Haworthiana, M. Roem. Syn. Ensat. 290=mexicana?
Haynaldi, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* i. t>8. t. 24.—Mexic?
heteracantha, Hort. ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866)62=lophanta.
heteracantha, *Zucc. in Nov. Act. Nat.* Cur.xvi. (1833) II. 676.—Mexic'

AGAVE:—
hexapetala, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 18.—Ind. occ.
Hookeri, C. Koch, Wochenschr. viii. (1865) 104=yucijaefolia.
Hookeri, *Jacobi, in Hamb. Garten, xxii. (1866)** 168.—Mexic.
Hookeri, Baker, in Bot. Mag. t. 6589 = Fenzliana.
horizontalis, *Jacobi, in Abh. Schles. Gesell.* (1869) 148, bis.—Mexic.
horrida, *Lem. ex Jacobi, in Hamb. Garten, xx. (1864)** 546.—Mexic.
Houlletii, Hort. Par. ex Jacobi, 1. c xxii. (1866) 268 = rigida.
Hnmboldtiana, *Jacobi, 1. c.* 264.—Mexic.
humilis, M. Roem. Syn. Ensat. 285 = brachystachys.
hybrida, Versch. Cat. n. 12 (1868-69)=xylonacantha.
Hystrix, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) u. 556= striata.
inaequidens, *C. Koch, Wochenschr.* iii. (1860) 28.—Mexic
Inghami, Versch. Cat. n. 16 (1871-72), ll=.Roezliana.
Ixtli, Karw. in Salm-Dyck, Hort. (1834) 304=rigida.
ixtlioides, Hook. f. Bot. Mag. t 5893=rigida.
Jacobiana, 6alm-Dyck, in Bonplandia, viii. (1860), 88=atrovirens.
Jacquiniana, Schult. f. Syst. vii. 727=lurida.
Karatto, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 6.—Mexic.
Karwinskii, Zucc. in Nov. Act. Nat. Cur. xvi. n. (1883) 675=rigida.
Kellocki, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 165 = pruinosa.
Keratto, Steud. Nom. ed. II. i. 36 = Karatto.
Keratto, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 304 = mexicana.
Keratto, Salm-Dyck, in Bonplandia, vii. (1859) 93 =Salmdyckii.
Kerchovei,*Lem.Illustr.Hortic.*^. (1864) 64.—Mexic.
kewensis, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xxii. (1866)218.—Mexic
Kochii, Jacobi, 1. c. 117=xylonacantha.
lamprochlora, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 150 = Smithiana,
laticincta, *Versch. Cat.* n. 12 (1868) 2.—Mexic.
latifolia, *Karw. in M. Roem. Syn. Ensat.* 292.—Mexic.
latissima, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xx. (1864) 551 •= atrovirens.
Laurentiana, *Jacobi, 1. c.* xxii. (1866) 266.—Mexic
laxa, *Hort. Monac. ex Salm-Dyck, Hort.* (1834) 8.—Am. austr.
Lecheguilla, Torr. Bot. Mex. Bound. 213 = heteracantha.
Legrelliana, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (186d) 266 = Ehrenbergii.?
Leguayana, Versch. Cat n. 12 (1868) 2=Ghiesbrechtii.
Lehmanni, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 146 = atrovirens.
Lemairei./forf. *J. Versch. ex Illustr. HorticM.* (1864) *Misc.* 65.—Hab.?
lepida, D. Dietr. Syn. ii. 1192=lurida.
Dndleyi, *Jacobi, in Abh. Schles. Gesell.* (1869) 152, bis.—Mexic.
linearis, Jacobi, in C. Koch, & Fint. Wochenschr. xii. (1869) 179 = macroacantha.
lophantha, *Schiede, in Linnaea*, iv. (1829) 582.—Mexic.
lurida, *Ait. Hort. Ken.* i. 472.—Mexic.
macrantha, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* ii. 11. t. xxvii.—Mexic?
macroacantha,Z»cr. *in Nov. Act. Acad. Nat. Cur.* xvi. II. (1838) 676.—Mexic.
maculata, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 16.—Texas.
maculosa, Hook. Bot. Mag. t. 5122=ma.cnlata.
madagascariensis, Spreng. Syst ii. 79••Furcraea madagascariensis.
Magni, Desf. Tabl. ed. II. 33=mexicana.
Maigretiana, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 121=horrida.
Malinesii, C. Koch, Wochenschr. v. (1862) 198-rndis.
Manguai, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. II. S3-mexicana.
marmorata, *Roetl, in Belg. Hortic.* (1883) 238.—Mexic
Martiana, *C. Koch, Wochenschr.* iii. (1860) 38.—M.exic.
Maximiliana, *Hort. Saunders, ex Baker, in Gard. Chron.* (1877) II. 201.—Mexic.

AGAVE :-
megalacantha, *Hemsl. Diag. PI. Nov. Mex.* 65.—Mexic
melanacantha, *Lem. ex Jacobi, in Hamb. Garten*.* xxi. (1865) 216.—Mexic
Mescal, Ellem. ex C. Koch, Wochenschr. viii. (1866) 94 = A. Scolymus.
mexicana, *Lam. Encyc.* i. 62.—Mexic.
micracantha, *Salm-Dyct, in Bonplandia,* vii. (1859) 98.—Mexic.
Milleri, Haw. Syn. Succ. 71 = americana.
miradorensis, *Jacobi, in Abh. Schles. Gesell.* (1869) 158.—Mexic.
mitis, *Mart. Del. Sem. Hort. Monac.* (1848) 4.—Mexic.
mitraeformis, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1859) 146-atrovirens.
Muilmanni, *Jacobi, I. c.* (1870-71) 76.—Mexic.
New ;S e 7 i> E *g ' l « > - » « *Trans. Acad. Sc. St. Louis,* iii. (1876) 80S.—Arizona.
Nissoni, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) I. 628.—Mexic.
Nowcki, Sartorii. Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxi. (1865) 221=
oblongata, *Jacobi, in Abh. Schles. GeselL* (1869) 155.—Mexic.
obscura, *Schiede, in Linnaea,* xviii. (1844) 413.—Mexic. ?
erfw-ote, Pers. Syn. i. 380-Furcraea cnbensis.
Offoyana, *De Smet, ex Jacobi, in Hamb. Garten:* o xxii. (1865) 214.-Havraa.
" g f y l l a , *Baker, in Gard. Chron.* (1878) II. 492.—
ornata, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxi. (1865) 69 = americana.
Ottonis, Jacobi, 1. c xxii. (1866) 820=atrovircns.
Ousselghemiana, Jacobi, in Abh. Schles. GeseU. (1869) 166 = albicans.
frUida. Salisb. Prod. 247=virginica.
P*liua', *Sartorius, ex Jacobi, in Hamb. Garten*.* XM. _ (1865) 171,-Mexic.
Palmeri, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* iii. (1875) 319._Arizona.
Parcyi, *Engelm. 1. c.* 811__Arizona, Mexic.
pamflora, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 214.—Mexic.
paucifolia, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* i. (1877) 77.—Mexic,
Pea = « W . *Croucher, in Gard. Chron.* (1873) 1400. t. 288.—Mexic
pendula, Schnitts. in Zeits. Gartenb. Darmst. (1857) Jun.n.21 = Sartorii.
ptrbella, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) 627, 628=xylonacantha.
Pvlucida, Jacobi, in Abh. Schles. Gesell. (1869) 151 = Smitniana.
picta, Salm-Dyck, in Bonplandia, vii. (1850) 88 = americana.
polianthoides, *M. Rom. Syn. Ensat.* 286.-Mexic
polyacantha, *Haw. Rev. PI. Succ.* 36.—Mexic.
Hyanthoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1881) &5«brachystachys.
polyanthoides, *Schiede, ex Schlecht. in Linnaea,* xviii. U844) 413.-Mexic.
polyphylla, C. Koch, Wochenschr. iii. (1860) 88 = mexicana.
Poselgerii, Salm-Dyck, in Bonplandia, vii. (1869) 92 = neteracantha.
potatorom, *Zucc. in Nov. Act. Nat. Cur.* xvi. (1838) it. 675.—Mexic.
pnunosa, *Lem. ex Jacobi, in Hamb. Garten*,* xxi. (1865) 449.^Mexfc.
P » n ! C e n 8 ' ***** & *Ortg. in Gartenfl.* (1874) 227. t. 804.—Mexic.
! > u P o n i f o T M is, *Zucc. in Nov. Act. Nat. Cur.* xvi. (1833) II. 676.—Mexic.
pulcherrima, Hort.ex C. Koch, Wochenschr. viii. (1866) 104 = Sartorii.
pnkhenima, *Otto, in M. Roem. Syn. Ensat.* 292.—Mexic.
Pnlchra, *Hort. Monac. in Salm-Dyck, Cat.* 8.—Am. anstr.
pnlveralenta, *Versch. Cat.* (1868).—Siena Nevada, punctata, *Hortt Berol fx Kunth Enum pl * u * 887 _* Mexic.
quadrata, *Lem. Illustr. Hortic.* xi. (1864) *Misc.* 85.-Mexic.
"mosa, Moench, Meth. 642=americana.
"curva, Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. III. (1845) 22 -stnata.

AGAVE :-
Regeliana, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. N. S. vii. (1877) I. 621=horrida.
Regeliana, *Jacobi, in Hamb. Garten*,* xxii. (1866) 214.—Mexic.
regia, *Hort. Sounders, ex Baker, in Gard. Chron.* N. S. viii. (1877), ll. 620.—Mexic.
revoluta, *Klottsch, in Ottn & Dietr. Garten*,* viii. (1840) 274.—Mexic.
rigida, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 8.—Mexic.
rigidissima, Jacobi, in C. Koch & Fint. Wochenschr. xii. (lh69)179 = Kerchovei.
Roezliana, *Baker, in Gard. Chron.* N. S. vii. (1877) I. 528. f. 79.—Mexic.
Rohanii, Hort. Belg. ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xx. (1864) 546=Ghiesbrechtii.
rnbescens, *Salm-Dyck, Hort.* (1834) 306-Mexic.
rubrocincta, Jacobi, in Abh. Schles. GeseU. (1869) 153=Sartorii.
rudis, *Lem. ex Jacobi, in Hamb. Garten*,* xxi. (1866) 216.—Mexic.
rufocincta, Jacobi, Nachtr. i. 88=Sartorii.
Rumphii, Hassk. in Hoev. *Sc* De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 121 -vivipara.
rupicola, *Regel, Gartenfl.* vii. (1858) 312.—Mexic.
Salmdyckii, *Baker, in Gard. Chron.* N. S. viii. (1877) II. 490.—Mexic.
Salmiana, Otto, in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. (1842) 51-atrovirens.
Saponaria, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 76=brachystachys.
Sartorii, *C. Koch, Wochenschr.* iii. (1860) 37.—Mexic.
Saundersii, Hook. f. Bot. Mag. t. 5493-A. Scolymus.
scabra, Salm-Dyck, in Bonplandia, vii. (1858) 89 = Wislizeni.
schidigera, *Lem. in lllustr. Hortic.* viii. t. 289, verso (1860) ix. t. 330.—Mexic.
Schlechtendahlii, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xx. (1864) 555=atroviiens.
Schnittspahnii, Jacobi, 1. c. xxi. (1865) 120=A. Scolymus.
Schottii, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* iii. (1875) 305.—Mexic.
Scolymus, *Kan. in Salm-Dyck, Hort.* (1834) 307.—Mexic.
Seemanniana, *Jacobi, in Abh. Schles. Gesell.* (1869) 154.—Gnatemal.
serrulata, *Kara, in Otto* b" *Dietr. AUg. Garten*.* (1842) 51.—Mexic.
sessiliflora, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 66.—Mexic.
Shawii, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* iii. (1875) 314. t. 2-4.—Calif.
sisalana, Perrine, ex Engelm. T. c. (reimpr. 28) = rigida.
Smithiana, *Jacobi, in Hamb. Garten*,* xxii. (1866) 268.—Mexic.
sobolifera, *Salm-Dyck, Hort.* (1834) 807, 809.—Ind. occ; Mexico.
spectabilis, Salisb. Prod. 247-americana.
spectabilis, *Tod. Hort. Bot. Pan.* ii. 4. t. 25.—Mexic. 1
spicata, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* v. (1802) 261; *Desc.* 454.—Cuba.
spicata, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 74 = bmchystachys.
spicata, Guss. Ind. Sem. (1825) ex Kunth, Enum. PI. v. 831=yuccaefolia.
spinosa, Steud. Nom. ed. II. i. S7=Fnrcmea tuberosa.
splendens, *Jacobi, in Abh. Schles. Gesell.* (1870-71) 63.—Mexic.
stenophylla, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 269 = vivipara.
striata, *Zucc. in Nov. Act. Nat. Cur.* xvi. II. (1838) 678.—Mexic.
strict a, Salm-Dyck, in Bonplandia, vii. (1859) 94 = striata.
subfalcata, Jacobi, in C. Koch *Sc* Fint Wochenschr. xii. (1869)179=macroacantha.
snbinermis, *M. Roem. Syn. Ensat.* 289.—Bras.
sudburyensis, Hort. Peacock, ex Baker, in Gard. Chron. N. S. viii. (1877) II. 137=concinna.
Taylori x, *Hort. cf. Gard. Chron.* N. S. ii. (1874) 60 et viii. (1877) 621. f. 125.
Taylorea x, Hort. Veitch. in Rev. Hortic (1877) 36 - Taylori.
thuaeanensis, Karw. ex Otto in Otto *3r* Dietr. Allg. Gartenz. (1842) 51=atrovirens.

AGAVE :—
teoxomuliana, Karw. ex M. Roem. Syn. Ensat. 292-bromeliaefolia.
Theometel, *Zuccagn. in Roem. Collect.* 138.—Mexic
Thomsoniana. *Jacobi, in Hamb. Garten*,* xxii. (1866) 262.—Mexic.
Toneliana, *Hort. Peacock, ex Baker, in Gard. Chron.* xv. (1881) I. 362.—Mexic. 1
triangularis, Jacobi, in C. Koch *tc* Fint. Wochenschr. xii. (1869) 178=horrida.
tuberosa, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 4-Furcraea tuberosa.
undnata, Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxi. (1865) 165-= polyacantha.
nndulata, *Klottsch, in Otto V Dietr. AUg. Garten*.* viii. (1840) 274.—Mexic.
univittata, *Haw. ex Salm-Dyck, Hort.* (1834) 308.—Mexic.
utahensis, *Engelm. in Bot. King, Exp.* 497.—Utah et Arizona.
Vandervinneni, *Lem. lllustr. Hortic.* xi. (1864;, *Misc.* 64.—Mexic
Vanderdonckii, Hort ex Baker, in Gard. Chron. N. S. vii. (1877) I. 527=xylonacantha.
variegata, Hort. ex Stend. Nom. ed. 1.18«americana.
variegata, *Jacobi, in Hamb. Garten*,* xxi. (1866) 469.—Mexic.
Vera-Crucis, Haw. Syn. Sncc 72-seq.
Vera-cru,* Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7=lurida.
Verschaneltii, *Lem. ex Jacobi, in Hamb. Garten*,* xxi. (1866) 122.—Mexic
Victoriae-Reginae, *T. Moore, in Gard. Chron.* N. S. iv. (1875) II. 485.—Mexic.
virginica, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. N. S. xix. (1883)1. 178 = Alibertii.
virginica, *Linn. Sp. PI.* 323.—Am. bor.
virginica, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 2=americana.
viridissima, *Hort. Peacock, ex Baker, in Gard. Chron.* N. S. viii. (1877), H. 137.—Mexic.
vivipara, Arruda, Diss. PI. Bras. 23-Furcraea agavephylla.
vivipara, *Linn. Sp. PI.* 323.—Mexic.
Wallisii, *Jacobi, Nachtr.* ii. 78.—N. Granat.
Warelliana, *Hort. cf. Gard. Chron.* N. S. v. (1876), I. 603, *et Baker, 1. c.* viii. (1877) U. 264.—Mexic.
wiesenbergensis, *Wittm. in Berl. Garten*.* (1885) 14.—Mexic.
Wislizeni, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* iii. (1875) 32O.-Mexic.
xalapensis, Roezl, ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxi. (1865) 61 = polyacantha.
xylacantha, Hort. cf. Gard. Chron. N. S. vii. (1877) I. 528 = xylonacantha.
xylonacantha, *Salm-Dyck, in Bonplandia,* vii. (1869) 92.—Mexico.
yuccaefolia, *DC. in Red. Lil.* t. 328, 829.—Mexic.
Yxtli, Karw. ex G. Don, in. Sweet, Hort. Brit ed. III. 705=rigida.
Zuccarinii, *Otto, in Allg. Garten*,* x. (1842) 51, nomen. —Mexic I

AGDE8TI8, Moc. & Sesse, ex DC. Syst. Veg. i. 543 (1818). *PHYTOLACCACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 87.
clematidea, *Moc. & Sesse, 1. c.*—Mexic.
teterrima, De Not. Ind. Sem. Bot. Gennens. (1856) 29 = clematidea.

AGEIiAEA, Soland. ex Planch, in Linnaea, xxiii. (1850) 437. *CONNARACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 432.
HEMIANDRINA, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiik (1860) 171. t. 28.
ferruginea, Soland. ex Planch. 1. c. 440-Cnestis ferrnginea.
glabrifolia, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 297.—Camhodia.
Koneri, *O. Hoffm. & Hildebr. ex O. Hoffm. Sert. Madag.* 15.—M&dflg.
Lamarckii, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 438.—Aft. trop.
nitida, *Soland. ex Planch. I. c.* 487.—Afr. trop.
obliqua, *Baker, in Oliver, ft. Trop. Afr.* i. 454.—Afr. trop.
pentagyna, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1882) 845 - Lamarckii.
pruriens, Soland. ex Planch, in Linnaea, xxiii. (1850) 440=Cnestis corniculata.

AQEIiAEA :—
Thouarsiana, *Baill. Adansonia,* vii. (1866-67) 240.—Madag.
vestita, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 46.—Malaya,
villosa, *Soland. ex Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 488.—Afr. trop.
Wallichii, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 47.—Malaya.

AGENIUM, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 447 (1836)->Andropogon, Linn. (Gramin.).
nutans, Nees, 1. c. = A. Neesii.

AGENORA, D. Don, in Edinb. New Phil. Jonrn. (Mar. 1829) 310-Hypochoeris, Linn. (Compos.).
laevigata, D. Don, 1. c.—H. laerigata.

AGERATINA, Spach, Hist. Vėg. Phan. z.286 (1841) = Eupatorium, Line (Compos.).
ageratoides, Spach, 1. c. = E. ageratoides.
aromatica, Spach, 1. c. = E. aromaticum.
cordata, Spach, 1. c. = E. aromaticum.

AGERATIOPSIS, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 246 (Ifc73)=Eupatorium, Linn. (Compos.).
opiculata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. FL Bras. vi. II. 362=E. apiculatnm.

AGERATIUM, 'Adam.[1] ex Stead. Norn. ed. II. i. 37 (1841) = AGERATUM, Tonm. - Erinua. Linn. (Scrophul.).

AGERATIUM, Reichb. Consp. 209 (1828), err. typ.= ACERAT1UM, DC.=-Elaeocarpus, Linn. (Tiliac).

AGERATOIDES, Ponted. ex Linn. Class. PI. S27 (1747) -Achillea, Linn. (Compos.).

AGERATTJM, Linn. Gen. ed. I. 247 (1737). *COMPOSITAti,* Benth. *Sc* Hook. f.ii. 241.
CAELESTINA, Cass. Diet. Sc Nat. vi. Suppl. 8. t. 93 (1817).
CARELIA, Adans. Fam. ii. 123 (1763).
COELESTINA, Cass. in Ball. Soc. Philom. (Jan. 1817) 10.
DECACHAETA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 462.
OXYLOBUS, Moc. ex DC. Prod. v. 115 (1836).
adscendens. *Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 243.—Mexic.
albidum, *Hetnsl. Bio!. Centr. Am. Bot.* ii. 81.—Mexic.
album, Stead. Norn. ed. I. 18=conyzoides.
altemifolium, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 195.—Eras.
altissimum, Linn. Sp. PI. 839 - Enpatoriam ageratoides.
angustifolium, Sprang. Syst. iii. 446-Calea angustifolia.
aquaticum, Roxb. Hort. Beng. 61; et FL Ind. iii. 416 —Adenostemma viscosum.
arbntifolium, *H. B. & X. Nov. Gen. et Sp.* iv. 149.—Mexic.
brachystephanum, *Regel, Gartenfl.* iii. (1854) 245. t. 108 *t* c—Caraccas.
caeruleum, Hort. ex Poir. Encyc. Snppl. L 241 = conyzoides.
campuloclinioides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 196.—Bras.
ciliare, *Linn. Sp. PI.* 839.—Ind. or. I
dlicre, *Lour. Fl. Cochinch.* 484.—Cochinch.
coelestinum, Sims, Bot. Mag. t 1730=corymbosum.
coeruleum, Desf. Tabl. ed. I. 98 = conyzoides.
coeruleum, Sieber, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 345 = Eupatorium macrophyllum.
confertum, *Baker, I. c.* 196.—Bras.
conspicuum, Hort. ex C. Koch *Sc* Fint. Wochenschr. i. (1658) 33= Eupatorium glcchonophyllam.
conyzoides, *Linn. Sp. PI-* 839.—Keg. trop.
conytoides, Sieber, ex Stead. Nom. ed. II. L 37 = Enpatoriam repandam.
cordifolium, Roxb. Fl. Ind. iii. 415-conyzoides.
corymbosum, Benth. *Sc* Hook. £ Gen. ii. 242=Agrianthus corymbosus.
corymbosum, *Zucc. ex Pers. Syn.* il. 402.—Mexic.
domingenst, Spreng. Syst. iii. 446.—S. Doming,
echioides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 81.—Mexic.

AQEBATTJM :—
febrifugum, Sesse, ex DC. Prod. v. 104=Piqneria tnnervia.
glanduliferum, *Sch. Bip. ex Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 242.—Mexic.
guianense, Aubl. PI. Gui. ii. 800-Eupatorium macrophyllum.
heterolepis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 198.—Bras.
hirsutum, Poir. Encyc. Suppl. i. 242=seq.
hirtum, Lam. Encyc. i. 54 =conyzoides.
Houstonianum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—Mexic.
humile, Salisb. Frod. 1(8 = conyzoides.
isocarphoides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 82.—Mexic.
Lasseauxii, Carr. in Rev. Hortic (1870-71) 90 = Conoclinium Lasseauxii.
latifolium, Cav. Ic. iv. 33 =• conyzoides.
latilolium, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 82.—Gnatemal.
lineare. Car. Ic. iii. 3. t 205 = Palafoxia linearis.
littorale, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 78.—Am. bor.
longifolium, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 197.—Bras.
maritimum, H. B. & K. Nov. Gtn. et Sp. iv. 150 = conyzoides.
matricarioides, *Less. Syn. Comp.* 155.—Cuba,
melissaefolium, *DC. Prod.* v. 109.—Bras.
mexicanum, Sims, Bot. Mag. t. 2524 = conyzoides.
mexicanum, Sweet, Brit. Fl. Gard. i. t. 89 = brachystephanum.
microcarpum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 82.—Costa-Rica.
microcephalum, *Hemsl. 1. c.*—Mexic.
micropappum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 198.—Bras,
microphyllum, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 298.—Mexic.
muticum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 356.—Jamaic.
nanum, Hort. ex Sch. Bip. in C. Koch *Sc* Fint. Wochenschr. i. (1858), Garten-Nachr. 26 = suffruticosum.
obtusifolium. Lam. Encyc. i. 54= conyzoides.
odoratum, Vilm. Fl. PI. Terre, ed. II. 42= conyzoides.
paleaceum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 83.—Mexic.
paniculatum, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 37 = Eupatorium paniculaium.
pedatum, Ortega, Hort. Matr. 38 = Florestina pedata.
petlolatum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 63.—Nicarag.
Pohlianam, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 197.—Bras,
punctatnm, *Jacq. Hort. Sckoenb.* iii. 28. t. 300.—Mexic.
punctatum, Ortega, Hort. Matr. 37 =Stevia Eupatoria.
purpureum, *Vitm. Summa PI.* iv. 474.—Guian.
purpureum, M09. & Sesse, ex DC. Prod. v. 122=Stevia viscida.
quadriflorum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 624 = Elephantopus spicatus.
rubens, *Viv. Elench. PI. Hort. Dinegro,* 9.—Hab. ?
salicifolium, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 83.—Mexic.
scabriusculum, *Hemsl. I. e.*—Mexic.
scorpioidenm, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 197.—Am. trop.
sessilifolium, *Schau. in Linnaea,* xix. (1847) 715.—Mtxic.
strictum, *Hemsl. BioL Centr. Am. Bot.* ii. 88.—Mexic.
strictum, Sims, Bot Mag. t 2410-Adenostemma viscosum.
suffruticosum, *Regel, Gartenfl.* iii. (1854) 389. t. 108.—Mexic.
tomentosum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 84.—Mexic.
viscosum, Ortega, Hort. Matr. 36=Stevia lncida, salicifolia.
Wendlandii, *Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, Suppl.* 2.—Mixic.
Wrightii, *Torr. & Gray, in Proc. Am. Acad.* i. (1848) 46.—Texas.

AGERATUM, Tourn. ex Adans. Fam. iL 210 (1763). Erinua, Linn. (Scrophul.).

AGERELLA, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 129=Veronica, Linn. (Scrophul.).
acinifolia, Fourr. 1. c = V. acinifolia.
artensis, Fourr. 1. c = V. arvensis.
verna, Fourr. 1. c = V. verna.

AGERIA, Adans. Fam. ii. 166 (1763) =Hex, Linn.
acuminata, Rafin. Sylva Tellur. 46 = 1. Macoucooa.
Cassena, Rafin. 1. c. 47 = 1. Cassine.
geminata, Rafin. 1. c. 48 = I. Cassine.
heterophylla, Rafin. 1. c. =I. Dahoon.
mucronata, Rafin. 1. c. 47.—Hab. \
obovata, Rafin. 1. c. 48 = 1. Dahoon.
opaca, Rafin. 1. c. 47 = 1. opaca.
ovalis, Rafin. 1. c. 48 = 1. ovalifolia?
palustris, Rafin. 1. c. 47 = 1. Dahoon.
retusa, Rafin. 1. c. 46 = I. retusa.
uniflora, Rafin. 1. c. 47 = I. nuiflora.

AGGERANTHUS, Wight, Ic. v. 18. t. 1737 (1852) = Eria, Lindl. (.Orchid.).
marchantioides, Wight, 1. c. = E. reticulata.

AGIALID, Adans. Fam. ii. 508 (1768)=Balsnltefl, Delile (Simarub.).

AGIHALID, Alp. ex Juss. in Diet. Sc. Nat. i. 297 (1804) = praec.

AG1NA, Neck. Elem. ii. 153 (1790) = Sagina, Linn. (Caryophyll.).

AGIRTA, Baill. Etnd. Gin.Enph. 463 (1858)=TrogU, Linn. (Euphorb.).
Boiviniana, Baill. 1. c. = T. Boiviniana.

AGLAEA, Steud. Nom. ed. I. 19 (1821J= Melasphaerula, Ker-Gawl. (Irid.).
graminea, Steud. 1. c. = M. graminea.

AGLAIA, Allem. in Nov. Act. Nat. Cur. iv. (1770) 93 - Cyperus, Tourn. t

AGLAIA, Lonr. Fl. Cochinch. 173 (1790). *MEUACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 334, 994.
AMERINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) Art. iv. 1.
ARGOPHILUM, Blanco, Fl. Filip. 186 (1837).
EUPHOKA, Griff. Notul. iv. 547 (1854).
M11NEA, Roxb. Fl. Ind. ed. Wall. ii. 430 (1824).
NEMEDRA, JOSS, in Mem. Mas. Par. xix. 223 (1830).
NYALELIA, Dcnnst. Schluess. Hort. Malab. 30 (181b).
SELBYA, M. Roem. Syn. Hesper. 89, 126 (1846).
acminatissima, *Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xvii. (18C4) 42.—Malaya.
ancolana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 506—argentea.
andamanica, *Hiern, in Hook. Fl. Brit. Ind.* i- 656.—Ins. Andaman,
angustifolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 55.—Sumatra,
apiocarpa, *Hiern, in Hook. Fl. Brit. Ind.* i. 565.—Zeylan.
argentea, *Blume, Bijdr.* 170.—Java,
aspera, *Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* xxvii. (1864) 42.—Java,
basiphylla, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped. 1.*237.—Ins. Fiji,
batjanica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 46.—Malaya.
chittagonga, Miq. 1. c. 44 — Amoora chittagonga.
cordata, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 557.—Malacca,
coriacea, *Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 57.—Borneo,
crassinervia, *Kurt, ex Hiern, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 556.—Tenasscrim.
Cumingiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat Most xxxi. (1858) 1. 40» = Hearnia Cumingiana.
decandra. Wall. Cat n. 1276 = Amoora decandra.
denticulata, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 410.—Luzon.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 507.—Sumatra.
Dookkoo, Griff. Notul.iv. 505 (=*Lansium domesticumi).*
edulis, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 237.—Ind. or.; Fiji.
edulis, Ilicrn, in Hook. Fl. Brit.Ind.iii.556-unduUta, minutiflora.

AOLAIA :_

edulis, **Seem. Fl. Vit. 87 - basiphylla.**
claeagnoidea, ***Benth. Fl. Austral,*** **i. 883.—Austral.**
elliptica, **Blume, Bijdr. 171 - Heamia elliptica.**
eximia, **Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 506-argentea.**
Forstenii, *Miq. in Ann. Afus. Bot. Lugd. Bat.* iv. ***8.—Amboina.**
Ganggo, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* \. 508 .—Sumatra.
glabrata, **Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. xxvii. (1864) 42 = Dysoxylum Halmaheirae.**
glabnflora, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 555.—**Malacca,**
grandis, *Korth. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. **56.—Borneo.**
grata, **Wall, ex Voigt, Hort. Subiwb. Calc. 186 - Roxburghiana.**
Griffithii, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) **H. 146._Malacca.**
Halmaheirae, **Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 58 - Dygoxylum Halmaheirae.**
hexandra, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) **I. 410—Lwon.**
nypoleuca, ***Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.*** **i. 507.—Sumatra.**
tnaequalis, **Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. xxvii. (1864) 305-Hearnia elliptica.**
khasiana, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 564.- **Ind. or.**
Korlhalsii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 42.— **Sumatra.**
Jatifolia, ***Miq. I.*** **r._Java.**
laxiflora, ***Miq. I. c.*** **52.—Borneo.**
lepidota, **Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl.** ***I*** **507 - Roxburghiana.**
leptantha, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 61.— **Sumatra.**
littoralis, ***Miq. 1. c.*** **46.—Nov. Guin.**
Llanosiana, ***C. DC. in DC. Monog. Phan.*** **i. 621.—Ins. Philipp.**
•ongifolia, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned.* ***Ind.*** **xxvii. (Ib64) 42.—Java,**
macrobotrys, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxl. **(1858) i. 409.—Luzon.**
"UKrophylla, **Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned. Ind. xxvii. (1864) 42 = Dysoxylum Halmaheirae.**
midnaporensis, **Carey, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 188 = Roxburghiana.**
minutiflora, ***Bedd. PI. Ind. Or.*** **i. 44.—Ind. or. .**
mucronulata, ***C. DC. in DC. Monog. Phan.*** **i. 601—Java.**
multyuga. ***Seem. Fl. Vit.*** **37.—Ins. Fiji.**
Worata, ***Lour. Cochinch.*** **173.—China.**
odoratissima, **Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1845) 21S = elaeagnoidea.**
odoratissima, **Bhime, Bijdr. 171 = Diepenhorstii.**
oligantha, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 603.— **Ins. Philipp.**
oligocarpa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 45.— **Sum.**
oligophylla., ***Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.*** **i. 607.—Sumatra.**
ovata, **Teijsm.** ***St*** **Binn. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. xxvii. (lstf4) 43 = Heamia elliptica.**
Pachyphylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 57.— **Sumatra.**
palembanica, ***Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.*** **i. 507.—Borneo.**
"mattonis, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 53. **—Borneo.**
Paniculata, *Run, in Joum. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) **II. 199.—Ind. or.**
Pedicellaris, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 607.— **Ind. or.**
pehtaphylla, **Kurz, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 48=odorata.**
P«viridis, *Hiern, in Hook. Fl. Brit. Ind.* i. 656.— **ind. or.**
pinfera, ***Hance, in Joum. Bot.*** **xv. (1877) 331.— China.**
Myantha, **Bedd. PI. Ind. Or. i. 44-minutiflora.**
Polyphylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 56.— **Java.**
Pl **n Roxb. FL Ind iL 429=Amoora**
Pycnocarpa, ***Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.*** **i. 196.—Sumatra.**
Pyramidata, ***Hance, in Joum. Bot.*** **xv. (1877) 381.— China.**
Pyrholepis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 47.— **Java.**
Reinwardtii, ***Miq. /. c.*** **51.-Celebes.**
"ofwrghiana, **Kurz, in Joura. As. Soc. Beng. xliv. (1876)II. 147- undulata.**

AGLAIA :—

Roxburghiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. **41.—As. or.**
rufa, ***Miq. 1. c.*** **49.—Sumatra.**
samoënsi.J,,A *Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 238.— **Ins. Navigat.**
sexipetala. **Griff. Notnl. iv. 505-edulis.**
sipamias, **Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 606=palembanica.**
Spanoghei, **Blume, ex Miq. 1. c. 197 •= Roxbarghiana.**
speciosa, ***Blume, Bijdr.*** **171.—Java.**
speciosa, **Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor. 211 = argentea.**
spectabilis, **Hort. Calc. ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 585 = Amoora spectabilis.**
subgrisea, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 64.— **Malaya.**
submonophylla, ***Miq. 1. c.*** **40.—Borneo.**
Sulingi, ***Blume, Bijdr.*** **170.—Java.**
Sulingi, **Hassle. Cat. Hort. Bogor. 220 •= Dlepenhorstii.**
tenuicaulis, *Hiern, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 656.— **Malaya.**
Teysmanniana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. **48.—Sumatra.**
tomentosa, **Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned. Ind. xxvii. (1884) 43 = palembanica.**
trichostemon, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 608.— **Borneo.**
Turczaninowii, C. ***DC. 1. c.*** **623.—Ins. Philipp.**
undulata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 44.— **Ind. or.**
Wallichii, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 555.— **Ind. or.**
Zippelii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 54.— **Nov. Guin.**

AGLAIOPSIS, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 68 (1868-69) = Heamia, F. Muell. (Meliac.).
landfolia, **Miq. 1. c. 59 = H. lancifolia.**
glaucescens, **Miq. 1. c. 58 = H. glaucescens.**

AGLAODENDRON, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xii. (187U) 175 = Plazia, Ruiz & Pav. (Compos.).
cheiranthifolium, **Remy, 1. c.*=P. cheiranthifolia.**

AGLAODORUM, Schott, Gen. Aroid. t. 68 (1858) = Aglaonema, Schott (Aroid.).
Griffithii, **Schott, 1. c.» Aglaonema palustre.**

AGIiAONEMA, Schott, Melet. i. 20 (1829). ***ARO1-DEAE,*** **Benth. & Hook. f. iii. 981.**
AGLAODORUM, Schott, Gen. Aroid. f. 58 (1858).
acutispathum, ***N. E. Br. in Gard. Chron.*** **N. S. xxiv. (1885) II. 89.—China.**
commutatum, **Schott, Syn. Aroid. 128=Scindapsus Cuscuaria.**
Cuscuaria, **Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 217-Scindapsus Cuscuaria.**
fallax, **Schott, ex Engl. in DC. Monog. ii. 439- simplex.**
gracile, **Schott, in Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 279 =pictum.**
Haenkii, ***Schott, in Bonplandid,*** **vii. (1859) 30.—Ins. Philipp.**
Hookeriannm, ***Schott, 1. c.*** **—Ind. or.**
integrifolium, ***Schott, Melet. i.*** **20.—Malaya.**
longicuspidatum, **Schott, Prod. 304 = Schottianum.**
maculatum, ***Blume, Rumphia,*** **i. 154.—Ins. Philipp.**
malaccense, **Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 80 - Schottianum.**
marantifolium, ***Blume, Rumphia.i.*** **153. t. 66.—Malaya.**
Mannii, ***Hook./. Bot. Mag.*** **t. 5760.—Afr. trop.**
modestum, *Schott, ex Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. **442.—Malaya.**
nitidum, **Kunth, Enum. PI. iii. 66= integrifolium.**
oblongi/olium, **Kunth, 1. c. 55 = marantifolium.**
palustre, *Teijsm. d> Binn. in Nat. Tijdschr. Ned.* ***Ind.*** **xxv. (1863) 399.—Malaya,**
pictum, ***Kunth, Enum. PI.*** **iii. 55.—Ind. or.; Malaya.**
princeps, **Kunth. 1. c. = simplex.**
propinquum, **Schott, in Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 280 = Schottianum.**
pygmaeum, **Hassle, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 161 - Chamaecladon pygmaeum.**
Schottianum, ***Miq. Fl. Ind. Bat.*** **iii. 216.—Malaya,**
simplex, ***Blume, in Rumphia,*** **i. 152. t. 65.—Java,**
subundulatum, *Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 76.— **Celebes.**

AGLITHEIS, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 17 (1886) - Allium, Linn. (Liliac).
carinata, **Rafin. 1. c. 18-All. carinatum.**
tatarica, **Rafin. 1. c. •• All. tataricum.**
ursina, **Rafin. 1. c."All. ursinum.**

AGLOTOMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. ***U*** **(1836) = Aster, Linn. (Compos.).**
multiflora. **Rafin. I. c.-» Aster multifloms.**

AGLYCIA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 87 (1840) - Briochloa, Kunth (Gramin.).
coarctata, **Willd. ex Steud. 1. c.-E. polystachya.**
distachya, **Willd. ex Steud. 1. c.-E. dutachya.**

AGNANTHUS, Vaill. ex Linn. Gen. ed. X. 366 (1787)- Cknrnutia, Linn. (Verben.).

AGNISTUS, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 608 (1839; err. typ.-Aoniatua, Schott (Solanac).

AGNOSTUS, A. Cunn. in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 580 (1832) = 8tenooarpuB, R. Br. (Proteac).
sinuatus, **A. Cunn. 1. c. =S. sinbatus.**

AGNUS-CASTUS, rToura.] Carr. in Rev. Hortic. xlii. (1870-71) 415-Vitex, Linn. (Verben.).
incisa, **Carr. 1. c. = V. Negundo.**
Negundo, **Carr. 1. c. — V. Negundo.**
robusta, **Carr. 1. c.=seq. ?**
vulgaris, **Carr. 1. c. 414-V. Agnus-castus.**

AaOlTAlfDEA, Miers, in Ann. Nat. Hist. Ser. II. viii. (1851) 172, nomen. ***OLACINEAE,*** **Benth. & Hook f. i. 349.**
brasiliensis, ***Benth. & Hook./. Gen.*** **i. 849.—Bras,**
excelsa, ***Grisei. in Goett. Abh.*** **xxiv. (1879) 149.—Am. austr.**

AOONIS, Iindl. Swan River App. 10 (1839). ***MYR-TACEAE,*** **Benth. & Hook. f. I. 70S.**
BILLOTTIA, R. Br. in Joum. Soc. Geogr. i. (1832) 19.
angusti/olia, **Schau. in Lehm. PL Preiss. i. 118- linearifoKa.**
conspicua, **Schau. 1. c=linearifolia.**
flexuosa, ***Lindl. Swan River App.*** **10.—Austral,**
floribunda, *Turca. in Bull. Soc.Nat.MoscxxA.* (1849) **II. 20.—Austral,**
glabra, *Turct. in Bull. Acad. Pitersb.* x. (1852) **834. —Austral.**
grandiflora, ***Benth. Fl. Austral,*** **iii. 100.—Austral,**
hypericifolia, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 117.— **Austral**
juniperina, ***Schau. 1. c.*** **118.—Austral,**
linearifolia, ***Lindl. Swan River App.*** **10.—Austral,**
marginata, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 117.— **Austral.**
obtusissima, ***F. Muell. Fragm.*** **xi. 119.—Austral,**
parviceps, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 119,— **Austral.**
Scortechiniana, ***F. Muell. Fragm.*** **xi. 118.—Austral,**
spathulata, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 119.— **Austral.**
theaeformis, **Schau. 1. c. ii. 223=hypericifolia.**
undulata, ***Benth. Fl.'Austral,*** **iii. 100.—Austral.**

AGONOLOBUS, Reichb. Nom. 183 (1841)-Cheiranthua, Linn. (Crucif.).

AGONOMYRTUS, Schau. ex Reichb. Handb. 25*8 (1837) -Iieptospennum, Forst.f (Myrtac).

AGOPHYLLUM, Neck. Elem. ii. 227 (1790)-Zygophyllum, Linn.

AGORRHINUM, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 126=Antirrhinum,Tourn.(Scrophul.).
Oruntium, **Fourr. 1. c. = Ant. Orontium.**

AGOSERIS, Rafin. Fl. Ludov. 68 (1817)-Troxlmon, Nutt. (Compos.).
cuspidata, **Steud. Nom. ed. II. i. 37—T. marginatum.**
glaucus, **Steud. 1. c.-=T. glaucum.**
panriftora, **D. Dietr. Syn. PI. iv. 1882 - T. parviflonun.**
rosea, **D. Dietr. I. c. = T. roseum.**
taraxad/olia, **D. Dietr. 1. c.-T. taraxicifolium.**

AGOSTANA, Bute, ex S. F. Gray, Nat An. Brit. PI. ii. 526 (1821)-Bupleurum, Tourn. (Umbell.).
divaricata, S. F. Gray, 1. c. 627 - B . Odontites.
tenuissima, Bate, ex S. F. Gray, 1. c. 526-B. tenuissimum.

AGRAPHIS, Link, Handb. i. 166 (1829)-8olUa, Linn. (Liliac.).
eampanulata. Link, I. c. «=S. hispanica.
cernua, Reichb. Fl. Getm. Excuis. 105 = S. cemua.
nutans, Link, Handb. i. 166 - S. nntans.
patula, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 106-S. hispanica.
serotina, Heynh. Nom. ii. 14—Dipcadi serotinum.

AGRAULUS, Beauv. Agrost. 5. t. 4 **(1812)=AgrostiB,** Linn. (Gramin.).
alpinus, Beauv. 1. c.—Agrostis rupestris.
anemagrostoid.es, Trin. in Spreng. N. Entdeck. ii. 56 = Agrostis effusa.
caninus, Beanv. Agrost. 5. t. 4. f. 7 = Agrostis canina.
fiavescens, Panz. ex Steud. Nom. ed. I. 19, 340 = Festaca varia.
mexicanus, Presl, Reliq. Haenk. i. 236 - Agrostis tolncensis.
montanus, Panz. ex Steud. Nom. ed. I. 19=Agrostis alpina.
pallidus, S. F.Gray, Nat. Arr.Brit. PI. ii. 149-Agrostis pallida.
setaceus, S. F. Gray, 1. c-Agrostis setacea.

AGRETTA, Eckl. Verz. 23 (1827) **-Trltonia,** Ker-Gawl. (Irid.).
crispa, Eckl. I. c. 24 - T . nndnlata.
grandiflora, Eckl. 23, nomen.—Afr. austr.
pallideflavens, Eckl. 1. c. 24.—Afr. austr.
pentandra, Eckl. 1. c 23=T. scillaris.
retusa, Steud. Nom. ed. II. i. 37.—Afr. austr.
stricta, Eckl. Verz. 23, nomen.—Afr. austr.

AORIANTHUS, Mart, ex DC. Prod. v. 125 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 244.
campestris, *Mart. I. c.*—Bras,
corymbosus, *DC. I. c.* vii. 266.—Bras,
empetrifolius, *Mart. I. c.* v. 126.—Bras.

AGRICOLAEA, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. (1808) 98-Clerodendron, Linn. (Verben.).
fragrans, Schrank, 1. c.=C. fragians.

AOBIMONIA, Tonrn. ex Linn. Syst. ed. I. (1735). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 622.
AMONIA, Nestl. Potent. 17 (1816).
AREMONIA, Neck. Elem. ii. 100 (1790).
SPALLANZANIA, Pollini, Hort. Veron. PI. Nov. 10 (1816).
acutifolia, Dum. Fl. Belg. Prod. 97=odorata.
adhaerens, Gilib. Fl. Litnan. ii. 186=A. Eupatorium.
adscendens ***Andre, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.*** viii. (1888) 311, nomen.—Rossia.
agrimonoides, *Linn. Sp. PI.* 448.—Europ.
americana, Luca, ex Wallr. Beitr. Bot. i. 43 = A. Eupatoria.
Blnmei, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 563.—Java; Japon.
bracteata, E. Mey. ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pe'tersb. x. (1842) 349 = A. Enpatoria.
bracteosa, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 51,142, nomen = A. Eupatoria.
caffra, E. Mey. ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 849 = A. Eupatoria.
canescens, Dum. Fl. Belg. Prod. 97 = odorata.
ceylanica, Wight, Ic t. 224 = zeylanica.
conopsea, Tschera. ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 346 = pilosa.
dahurica, Willd. ex Stev. ex DC. Prod. ii. 587 = pilosa.
davurica, Schlecht. pat. ex Ledeb. Fl. Rosa. ii. 32 = praec.
decumbens. Linn. f. Suppl. 251 — Acaena latebrosa.
elata, Moench, Meth. 674 = repens.
elata, Salisb. Prod. 361 = A. Eupatoria.
Eupatoria, Michx. Fl. Am. Bor. i. 287=parviflora.
Eupatoria, *Linn. Sp. PI.* 448.—Reg. bor. temp.
Eupatorium, Thw. Enum. PI. Zeyl. 102 = zeylanica.
euiatoroides, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 31 = A. Eupatoria.
glabrata, Spreng. ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 346=A. Eupatoria.
Goeteetiana, Andrz. ex C. A. Mey. l.c. = A. Eupatoria.

AOBIMONIA :—
graeca, ***Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient,*** **ii. 728 =** A. Eupatoria.
grandis, Andrz. ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 843 =A. Eupatoria.
gryposepala, Wallr. Beitr. Bot. i. 49 = A. Eupatoria.
hirsuta, ***Bong, ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.*** x. (1842) 347.—Bras,
humilis, *Wallr. Beitr. Bot.* i. 37.—Dalmat.
incisa, *Terr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 481.—Am. bor.
inermis, Pers. Syn. ii. 9 - agrimonoides.
javanica, Jungh. Java, i. 664, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 370 = Blumei.
lanata. Wall Cat. n. 709-A. Eupatoria.
leucantha, ***Kunze, Del. Sent. Hort. Lips.*** **(1842).—** Hab.»
major, Uspensky, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vii. (1834) 873-odorata?
microcarpa, Wallr. Beitr. Bot i. 39=-A. Eupatoria'.
minor, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = A. Eupatoria.
nepalensis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 229 = A. Eupatoria.
octandra, ***Luce, Topogr. Nackr. Ins. Oesel,*** **150.—Ins.** Ossil.
odorata, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n, 3.—Europ.
officinalis, Lam. Encyc. i. 62 = A. Eupatoria.
officinarum, Lam. Fl. Fr. iii. 477=A. Eupatoria.
parviflora, ***[Soland. in] Ait. Hort. Kew.*** **ed. I. ii. 130.** —Am. austr.
parviflora, Spreng. Syst. ii. 461 - A. Eupatoria.
pilosa, Ledeb. Ind. Hort. Dorp. Suppl. (1823) 1 = A. Eupatoria.
platycarpa, Wallr. Beitr. Bot. i. 38=A. Eupatoria.
procera, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 203; in Linnaea, xiv. (1840) 573-odorata.
pubeseens, Wallr. Beitr. Bot. i. 45 = A. Eupatoria.
pumila, Muhl. ex Rafin. Fl. Ludov. 134, nomen. —Am. bor.
repens, Eckl. & Zey. Enum. 264 = A. Eupatoria.
repens, *Linn. Syst.* ed. X. 1046.—Hispan.; As. Min.
repens, Mutel, Fl. Fr. i. 342 = odorata.
robusta, Andrz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 311 = odorata?
rostellata, Wallr. Beitr. Bot. i. 42 = A. Eupatoria.
serrifolia, Wallr. 1. c. 40 = A parviflora.
sessiliflora, Dum. Fl. Belg. Prod. 97 = odorata.
sororia, ***Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb.*** x. (1842) 844.—Oriens.
stipularis, Dum. Fl. Belg. Prod. 97 = odorata.
striata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 887 = A. Eupatoria.
suaveolens, Hort. ex C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 344=odorata..
suaveolens, Blume, Bijdr. 1113 = Blumei.
suaveolens, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 336 = parviflora.
sulcata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 303 = A. Eupatoria.
viscidula, Bunge, in Mem. Sav. etr. St. Pétersb. ii. 100; (Enum. PI. Chin. Bor. 26) = A. Eupatoria.
vulgaris, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 577 = A. Eupatoria.
teylanica, Moon, Cat 87 - Alchemella indica.

AGRIODENDRON, Endl. Gen. 144 (1837)=**Aloë,** Linn. (Liliac).

AGBIOFHYIiLUH, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 6 (1819). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 58.
arenarium, *Bieb. 1. c.*—As. bor.
axetarivm, Bunge, inMim. Sav. (tr. Pitersb. **vii. (1851)** 456 *{Lehm. Rel.* 280).—As. temp,
gobicum, ***Bunge, in Bull. Acad. St. Pitersb.*** **xxv.** (1879) 355.—Sibir.
lateriflorum, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 139.—Armen.
Iatifolium, ***Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** (1839) 170.—Oriens.
minus, *Fisch. & Mey. I. c.*—Turkest.
mongolicum, Hort. Aven. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 139=arenarium.
pungens, Link, ex A. Dietr. Sp. PI. i. 124 = Corispermum pungens.
squarrosum, Moq. in DC. Prod. xiii. n. 139-arenarium.
Tourne/ortii, Fisch. ex Moq. 1. c. = lateriflorum.

AGRIPHYLLUM, Juss. Gen. 190 **(1789)=Borkheya,** Ehrh. (Compos.).
asteroides, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. L 109 = B. fruticosa.

AGRIPHYLLUM :—
ciliare, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. l86=CoIlumia ciliaris.
eciUnatu m, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. 1.109 = B. cernua.
grandiflorum, Desf. Cat Hort. Par. ed. II. 186 - B . grandiflora.
incanum, Desf. 1. c. = B. fruticosa.
spinosum, Desf. ex Steud. Nom. ed. I. 19, 106 = B. fruticosa.

AGROCHARIS, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) I. 19 = Caucalifl, Linn. (Umbell.).
graeilis, Hook. f. in Joum. Linn. Soc. vi. (1860) 9 - C. tnelanantha.
melanantha, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) I. 19 - C. melanantha.

AGROPHYLLUM, Neck. Elem. ii. 227 (1790)-**Zygophyllii Ti y. Linn.**

AQBOFYBO2T, J. Gaert. in Nov. Comm. Petrop. xiv. (1770) I. 639. *GRAMINEAE* [Benth. *Sc* Hook, f. iii. 1202[1].
ANTHOSACHNE, Stend. Syn. PI. Gram. 237 (1855).
BRACONOTIA, Godr. 1. c. ed. I. iii. 191 < 1844).
COSTIA, Willk. in Bot. Zeit. (1858) 377.
CREMOPYRUM, Schur, Enum. PI. Transs. 807 (1866).
CRITHOPYRUM. Hort. Prag. ex Steud. Syn. PI. Gram. 344 (1855).
ELYTRIGIA, Desv. in Nouv. Bull. Soc Philom. ii. (1810) 190.
EREMOPYRUM, Jaub. *Sc* Spach, Illnstr. PI. Or. iv. 26 (1850-631
HAYNALDIA. Schnr, Enum. PI. Transs. 807 (186ft).
HETERANTHELIUM, Hochst. ex Jaub. *Sc* Spach, Illustr. PI. Or. iv. 24 (1850).
ROEGNEBIA, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 418.
SECALIOIUM, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 91.
acutum, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1843) 424-repens.
acutum, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 761.—Europ.
acutum, Reichb. ex Nym. Consp. 841 = pungens.
affine, Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 7-acutum.
alpinum, Schur, Enum. PI. Transs. 810.—Europ.
altissimum, Schur, 1. c. fcO9-repens.
angustifolium, Schult. Mant. ii. 412.—Sibir.
apricum, *Opia, in Lotos,* **iii.** (1853) 63.—Europ.
aristatum, Bess. Enum. PI. Volh. 41 = cristatum.
attenuatum, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 751.—Ecuador.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 75.—Oriens.
barbatulum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1653)21=seq.
barbulatum, *Schur, Enum. PI. Transs.* 809.—Europ.
bicorne, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 760=Triticum bicorne.
biflorum, ***Roem. & Schult. 1. c.*—Syria.**
biforme. Fig. *Sc* De Not. in Mem. Torin. Ser. II. xii. (1852'; 2 6 patulum.
Bourgaei, *Boiss. Fl. Orient,* v. 669.—Armen.
brachyphyllum, ***Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.*** v. 663.—Persia.
brevissimum, Beauv. Agrost. 102 (sphalm. pro laevissimo1 = Triticum polonicum.
bromiforme, Schur, tnum. PI. Transs. 808 = repens.
bulbosum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 75.—Persia.
caesium, J. & C. Presl, Delic. Prag. 213=repens.
caespitosum, *C. Koch, in Linnaea,* xxi. (1848) 424.—Armen.
Caldesii, *Goran, in Nuov. Giorn. Bot.* xii. 11880) 145. -Ital.
campestre, *Godr. & Gren. Fl. Fr.* iii. 607.—Europ.
caninum, *Beauv. Agrost.* 102.—Europ.
capillare, Beauv. 1. c. = repens.
caudatum, Beauv. 1. c =villosum.
collinum, Opiz, Natural, x. (1825) 248 ; Seznam, 12-repens.
concinnum, DeNot. ex Parl. Fl. Ital. i. 498= pungens.
condensatum, *Presl, Rel. Haenk.* i. 266.—Chili,
crinitum, *Link, Hort. Berol.* i. 32.—Hab. ?
cristatum, ***J. Gaert. in Nov. Comm. Petrop.*** **xiv. (1770)** I. 540.—Iberia ; Taoria; Sibir.
cristatum, ***Beauv. Agrost.*** **102; *Roem. & Schult. Syst.*** ii. 758.—Hab.?
curvifoiium, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 55 = scirpeum.
dasyanthum, ***Ledeb. in Ind. Sent. Dorpat.*** **(1820) 3.—** Rossia.

AOKOPTKONs-

dasystachyum, *Scrib. in Torrey Bot. Club.* x. (1888) 78. —Am. bor.
densiflorum, *Beam. Agrost.* 102.—Sibir.
desertorum, Schult. Mant. ii. 412=sibiricum ?
distant, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 426= Bourgaei.
distichum, *Beauv. Agrost.* 102.—Afr. aostr.
divaricatum, *Boiss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. FT.* iv. (1857) 307.—Oriens.
divergens, *Nets, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 847.—Am. bor.
dumetorum, *Trautv. in Act. Hurt. Petrop.* ix. (1884) 822.—Europ.
elatutn, Opiz, Seznam, 12=cristatnm.
elongatum, Host, ex Beauv. Agrost. 102 = rigidum.
elymogenes, Arndt, ex Nym. Consp. 84O=strictum.
farctum, Boiss. Fl. Orient, v. 665 in sjm. = juncenm
filiforme, *Pair, ex Roem. & Schult. Syst.* ii. 760.—Ins. Borbon.
firmum, J. & C. Presl, Fl. Cech. 28-repens.
geminatum, Schult. Mant. iii 655 •= Eleusine indica.
giganteum, Roem. & Schult. Syst. ii. 753 = rigidum.
glaucutn, Blanco, ex Nym. Consp. 84f=repens.
Rlaucum, *Roem. & Schult. Syst.* ti 752.—Europ.
Halleri, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 20=Festuca Poa.
hirsutum, Hort. Berol. ex Ledeb. Fl. Alt. i. 114 = cristatum.
hispanicum, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 49 = Festuca Poa.
hordeaceutn, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 67=orientate,
imbricatum, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 757.—Rossia.
intermedium, Beauv. Agrost. 102 = glancum.
intermedium, Keichb. Fl. Germ. Excurs. 140=glaucum, Junceum, et obtusiflorum.
junceum, *Beauv. Agrost.* 102.—Europ.
Kotschyanum, Boiss. & Hohenh. Diagn. Ser. I. xiii. 69 =patulum.
laevissimum, Beauv. Agrost. 146 =Triticum polonicum.
lasianthum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 68 = orientale.
laxum, ' Fr.' ex Willk. Sc Lange, Prod. i. 109 -acutum.
lazicum, *Boiss. Fl. Orient,* v. 661.—As. Min.
ligusticum, *De Not. in Atti Ottav. Riun. Sc. Hal.* 602.—Ital.
ligusticum, Savign. in Flora, xxx. (1847) 669 = friticum liguslicurn.
littorale, *Dum. O6s. Gram. Belg.* 97.—Europ.
loliiforme, Schur, Enum. PI. Transs. 808 = repens.
longearistatum, *Boiss. Fl. Orient,* v. 660.—Oriens.
longiglume, *Hack, ex Stapf, in Denischr. Acad. Wien,* 1- (1885) 11.—Europ.
waritimum, Beauv. Agrost. 102 = Cutandia maritime.
mucronatum, Opiz, Seznam, 12=glaucum.
nultiflorum, Beauv. Agrost 102 = repens.
muricatum, Eichw. Skizze, 119^cristatum.
muricatum, *Schult. Mant.* ii. 414.—Sibir.
nubigenum, *Nets, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 842.—Java,
obtusiflorum, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 753 —Batav.
obtusiusculum, *Lange, Handb.* ed. II. 48.—Dan.; Scan,
oriemale, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 767.—Oriens; Afr. bor.
panormitanum, *Part, ex Boiss. Voy.* 680 j *PL Rat. Sic. Fasc.* ii. 20.—Europ.; Oriens.
patulum, *Trin. Fund.* 152.—Aegypt.
Pauciflorum, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturv.* x. (1»59) 77.-Europ.
pectinatum, *Beauv. Agrost.* 102.—Austral.; N. Zel.
pectiniforme, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 758.—Tauria.
peruvianum, *Roem. & Schult. I. c.* 761.—Peruv.
Pilosum, *Presl, geliq. Haenk.* i. 267.—Mexic.
pilosum, Schur, Emim. PI. Transs. 809 = barbulatum.
Poutolsii, Godr. & Gren. Fl. Fr. iii. 608=glaucum.
prostratum, Beauv. Agrost. 102=triticeum.
pseudo-caninum, Schur, in Verh. Siebeab. Ver.Naturw. v. (1883)'Jl=caninum.
pumilum, Beauv. Agrost 102=triticeum.
pungens, Keichb. ex Nym. Consp. 840=acutum.
Pungens, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 753.—Europ.
Pycnanthum, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 606 = littorale.
Raegnerii, *Boiss. Fl. Orient,* v. 662.—Reg. Caucas.
jepens, *Beauv. Agrost.* 102.—Reg. temp.
Kichardsom, *Schrad. in Linnaea,* xii. (1888) 467 in , syn.—Am. bor.
ngidum, *Beauv. Agrost.* 102.—Europ.
Kothii, *Opig, i*$_n$ *Lotos,* iii. (1853) 64.—Europ.
Rouxii, *Gren. & Duval, in Mem. Soc. Bmul. Doubs,* III. iv. (1860) 891.—Europ.
lupestre, *Schult. Mant.* ii. 409.—Hab.T
Savignonii, *De Not. Prosp. Fl. Ligust.* 57.—Liguria.

AOROPTBOKT:-

scabrum, *Beauv. Agrost.* 102.—Austral,
scirpeum, *Presl, Gram. Sic.* 49.—Sicilia.
Serlbneri, *Vasey, in Bull. Torrey, Bot. Club,* x. (1883) 128.—Am. bor.
secundum, *Presl, Rel. Haenk.* i. 266.—Chili,
semicostaturo, *Nets, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 346.—AfTghan.
septum, Beauv. Agrost. 102 = repens.
sibiricum, *Beauv. I. c.*—Europ. or.; As. occ.
squarrosum. Link, Hort. Berol. i. 32-patulum.
stipaefMum, Czem. Consp. PL Charcov. 70, nomen. —Rossia.
striatum, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 346 •> Triticum striatum.
strictmm, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. iii. 1812.—Europ.
strigosnm, *Boiss. Fl. Orient,* v. 661.—Oriens.
subulatum, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 761.—Aleppo.
Tauri, *Boiss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 307.—As. Min.
tenerum, *Vasey, in Coult. Bot. GOB.* X. (1885) 258.—Am. bor.
tenuiculum, Steud. Nom. ed. II. i. 88=-Festuca Poa.
Toumefortii, *De Not. In Atti Ottav. Riun. Sc. Ital.* 602.—Oriens.
Toumefortii, Savign. in Flora, xxx. (1847) 569 - Aucheri.
triticeum, *J. Gaertn. in Nov. Comm. Petrop.* xiv. (1770) I. 539.—Euiop.; As. bot.
trnncatum, *Fuss, FL Transs.* 749.—Europ.
unilaterale, Beauv. Agrost. 102=Festuca tenuiflora.
vaginans, *Beauv. Agrost.* 102.—Am. merid.
Vaillantianum, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 823.—Europ.
variegatum, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 759.—Hab.J
velutinum, *Nees, in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1848) 417.—Austral.
villosum, *Link, Hort. Berol.* i. 31.—Europ.; Oriens.
viotaceum, *Vasey, Gram. Un. St.* 45.—Am. bor.

AGROPYRUM, Roem. & Schult. Syst. ii. 750 (1817)- praec.

AGROSINAPIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lvon, N. S. xvi. (1868) 829 ^Brassica, Toura. (Cruci'f.).
arvensis, Fourr. 1. c.=B. arvensis.

AGROSTANA, Hill, Veg. Syst. v. 82 (1772) - Bupleurum, Linn. (Umbell.).

AGROSTEMA, Lino. Syst. ed. I. (1735) =seq.

AGROSTEMMA, Linn. Gen. ed. I. 135 (1737)- Iiychnis, Linn. (Caryophyll.).
apetala, G. Don, Gen. Syst. i. 416=L. apetala.
alpina, Forbes, Hort. Wobum. 104 = L. alpina.
Banksia, Meerb. Fl. Sel. 28=L. coronaria.
brachypetala, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 44 »L. apetala.
Bungeana, D. Don, in Sweet, M. Gard. Ser. II. 317 =L. Bungeana.
Coeli-rosea, Linn. Sp. PI. 436=L. Coeli-rosa.
Coronaria, Linn. 1. c. = L. Coronaria.
Corsica, G. Don, Gen. Syst. i. 416 = L. Corsica.
declinis, G. Don, 1. C—L. diclinis.
decumbens, Denson, ex Loud. Hort. Brit Suppl. i. 580 =L. decumbens.
dioica, Dufour, ex G. Don, Gen. Syst. i. 416=L. diclinis.
fimbriata, G. Don, 1. c. 417=L. indica.
Flos-cuculi, G. Don, I. c. = L. Flos-cuculi.
Flos-jovis, Linn. Sp. PI. 436 = L. Flos-jovis.
Flos-jovis, Pollich, Hist. PI. Palat. i. 443 = L. coronaria.
fulgens, Doell, Rhein. Fl. 648 =L. fulgens.
Githago, linn. Sp. Fl. ed. II. 435=L. Githago.
Gitthago, Retz. Fl. Scand. 86 = praec.
gracilis, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 80.—As. Min.
grandiflora, Doell, Khein. Fl. 643=L. coronaria.
hirsuta, Gi!ib. Fl. Lituan. ii. 178=L. Githago.
hirsute, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 559=L. Githago.
inftata, G. Don, Gen. Syst. i. 417 = L. inflata.
involucrata, G. Don, 1. c. 416 -L. apetala.
laeta, G. Don, 1. c.-Silene laeta.
lusitanica, G. Don, 1. c. 417=L. Flos-cuculi.
nicaeensis, Pers. Syn. i. 519-L. Githago.
nivalis, G. Don, Gen. Syst. i. 416-L. nivalis.
parvifiora, Cav. ex Steud. Nom. ed. 1.19 =Silene laeta.
perennans, Haw. ex.Loud. Hort. Brit, Suppl. i. 580" L. Densoni.
pulchra, G. Don, Gen. Syst. 1. 417-Silene laciniata.

AGROSTEMMA:—
putilla, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. i, 88=L. Coeli-rosa.
pyrenaica, G. Don, Gen. Syst. i. 417 =L. pyrenaica.
saxatilis, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. 1II.67 = L. saxatilis.
sibirica, G. Don, Gen. Syst. i. 41&=L. sibirica.
suecica, Maund, ex Steud. Nom. ed. II. i. 38 = L. alpina.
sylvestris, G. Don, Gen. Syst. i. 416-L. dioica.
triflora, G. Don, 1. c. 417 = L. triflora.
variegata, G. Don, 1. c. 416-L. variegate.

AGROSTICULA, Raddi, Agrost Bras. 33. t l.f. 2 (1823) = Sporobolus, K. Br. (Gram.).
muralis, Raddi, I. c. = S. minuliflorus.

AGBOSTIS, Linn. Syst. ed. I. 11736); Gen. ed. I. 19 (1737). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 114«.
AGKAULUS, Beauv. Agrost. 5. t. 4 (1812).
A VENA. Hall, ex Scop. Introd. 74 (1777).
DBCANDOLIA,. Bast. H. Maine-et-Loire, 28 (1809).
NOSONEMA, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
PBREILEMA, Presl, Reliq. Haenk. i. 233. t. 87 (1830).
TKICHODIUM, Michx. Fl. Bor. Am. i. 41. t. 8 (1803).
VILFA, Adans. Fam. ii. 495 (1768).
ahakanensis, Less, ex Trin. in Mém. Acad. Pe'tersb. Sér. VI. vi. II. (1845) 325 = Michauxii.
aberrans, *Steud. Syn. PI. Gram.* 422.—Reg. Magell.
actinoclada, F. Muell. Fragm. vi. 84=Sporobolns actinoclados.
aculeata, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 62 -Crypsis aculeala.
acutiflora, Steud. Nom. ed. I. 19=- Deyeuxia acntiflora.
adscendens, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel (1860) 83-verticillata.
aemula, R. Br. Prod. 172 - Deyeuxia Forsteri.
aenea, Spreng. Syst. Cur. Post. 337 = Sporobolus aeneus.
aenea, *Trin. in Mem. Acad. Pitersb.* Se"r. VI. vi. II. 11845) 332.—Sitcha.
aequata, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 413 •= Deyeuxia aequala.
aequivalvis, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. u. (1845) 362-.—Am. bor. occ.
affinis, Kunth, Enum. PI. i. 228=>canina.
affinis, Schult. Mant. ii. 195 - Sporobolus Muehlenbergii.
africana, Poir. Encyc. Snppl. i. 254=Sporobolus capensis.
airaefonnis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 172.—Chili,
airoides, *Torr. ex Spreng. Syst. Cur. Post.* 31-= Sporobolus airoides.
alba, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 678 = Reuterii.
alba, *Linn- Sp. PI.* 63.—Europ.; As.
albicans, Buck), in Proc. Ac. Sc. Philad.' 1862' (1868), 91=exarata.
albicans, Presl, ex Steud. Nom. ed. 1.19.—Hah, t
albida, *Trin. in Mem. Acad: Pitersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 844.—Sarepta; Rossia.
algida, [Soland. in] Phipps, Voy. 200=Phippsia algida.
alopecuroides, Lam. Illustr. n. 812 = Polypogon monspeliensis.
alopecuroides, Link, ex Kunth, Enum. PI. i. 228—effusa.
alopecuroides, Vahl, ex Kunth, Enum. PI. i. 86 - Panicum Myurus.
alpestris, Laest. ex Nym. Consp. 802 = rubra.
alpicola, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 284.—Afr. or.
alpina, Leyss. Fl. Halen. 16 = canina.
alpina, Willd. Sp. PI. i. 368 - rupestris.
alpina, Savi [Fl. Pisana, i. 81 ?], ex Steud. Nom. ed. I. 19— vulgaris.
alpina, *Scop. Fl. Corn.* ed. II. i. 60.—Europ.
alpina, Stokes, in With. Bot. Arr. Brit. PI. ed, II. i. 71-setacea.
altbsima, *Tuckerm. in Am. Journ. Sc.* xlv. (1843) 44-elata.
ambigua, Roem. & Schult. Syst. ii. 354-alba.
anatolica, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 879 = verticillata.
andi»a,PAi7.in *Anales Univ. Chil.* (187S-) 561.—Chili.
Anemagrostis, Syme, Eng. Bot. cd. III. xi. 43 = Apera Spiua-venti, ct inteirupta.
anemagrostoides, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. iL 56 -enusa.
anomala, Willd. Sp. PI. i. S70=elata.
antarctica, *Hook. f. Fl. Ant arct.* 374. t 182—Reg. Antarct.
Antoniana, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 293.—Reg. Argent.
apetala, Bosc, ex Trin. in Mém Acad. Pétersb. Sér. VI. vi II. (1845) 287=Muehlcnbergiadiffusa.

AGBOSTIS :—

aphanes, ***Trin. in Mim. Aead. Pitersb.*** **Ser. VI. vi. II.** (1846) 846.—N. Zembl.
aquadca, ***Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad.'*** **1862.' (1868)** 80.—Am. bor.
aquatica, Pourr. in Mem. Acad. Tool. iii. (1788) 806 = verticillata.
arachnoidea, Poir. Encyc Snppl. i. 249 = Cinna arundinacea.
arachnoides, *Ell. Sketch,* i. 184.—Am. bor.
arenaria, Gouan, Illustr. 3=Sporobolus pnngens.
arenaria, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr ix. (1869) 61 = canina.
arenosa, Schnr, Enum. PI. Transs. 736 =canina.
argentea, Lam. Fl. Fr. iii. 570=Stipa Calamagrostis.
aristata, Sincl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 39 = alba,
aristulata, *C. Muell. in Bot.Zeit.* xiv. (1856) 349.—Ins. Falkland.
articulata,Brot. Fl. Lnsit.i. 73-Chaeturusfasciculatus.
arundinacea, Linn. Sp. PI. 61 •• Deyeuxia sylvatica.
amndinacea, *Presl, in Rel. Haenk.* i. 288.—Peniv.
arundinacea, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 79=Calamagrostis varia.
arvensis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1867-68) 87.—Chili.
aspera, Michx. Fl. Am. Bor. i. 53 = Sporobolos asper.
aspera, Willd. ex Stead. Norn. ed. II. i. 39-Muehlenbergia stipoides.
asperifolia, Trin. in Mem. Acad. Petersb. *Six.* VI. vi. II. (1845) 817=exarata.
asperigluma, *Steud. Syn. PI. Gram.* 422.—Chili,
asperula, *Phil, in Linnaea,xxix.* (1857-58) 87.—Chili.
atropurpurea, Hort. Hafn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 89-vulgaris.
atrovirens, Roem. & Schult. Syst. ii. 861=Sporobolus atrovirens.
aucklandica. Hook. f. Fl. Antarct. i. 96=Deschampsia caespitosa.
anstralis, *Lam. Encyc.* i. 57.—Europ.
australis, Linn. Mant. i. 80 = Gastridium australe.
avenacea, J. F. Gmel. Syst. i. 171 = Deyeuxia Forsteri.
avenoides, ***Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.*** **880.—N.** Zel.
barbata, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad.' 1862.' (1868) 834=Sporobolus ramulosus.
barbata. Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Nov. Zel. i. 298 = DicheIachne crinita.
barbata, Pers. Syn. i. 75 — Sporobolus virginicns.
Bergiana, *Trin. Gram. Unifl.* 208.—Afr. austr.
berica, Hort. Madr. ex Stead. Nom. ed. II. i. 39 (- ***Urachne parviflora).***
Berlandieri,'.fourn. ***Mex.Pl.En. Gram.it! ex Hemsl. Biol. Centr. Am Bot.*** **iii. 560.—Mexic**
bermudiana, Tuss. ex Kunth, Enum. PI. i. 259 = Cynodon Dactylon.
Berteriana, Spieng. ex Stead. Nom. ed. II. 39, 143-Arundinella martinicensis.
Biebersteiniana, Clans, Beitr. Russ. Reich, viii. 264 = trichoclada.
Billardieri, R. Br. Prod. 171-Deyeuxia Billardieri.
biseta, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 39, 143 = Arnndinella indica.
Boeckeleri, Seubert, ex Steud. Syn. PI. Gram. 218 (= ***Gymnopogon distichophyllus).***
borbonica, *Steud. 1. c.* 170.—Ins. Borbon.
borealis, Hartm. Skand. Fl. ed. IV. 28 = canina.
Bourgaei,' ***Fourn. Mex. PI. En. Gram.*** **95/** ***ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.*** **iii. 560.—Mexic**
brachyathera, *Steud. Syn. PI. Gram.* 422. —Reg. Magell.
brachyphylla, Steud. 1. c 175=Polypogon brachyphyllns.
brachyphylla, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 39 = Sporobolus atrovirens.
brachystachys, *Schult. Mant.* iii. 569.—Sicilia.
brasiliensis, Spreng. Nov. Prov. 45-Reimaria acnta.
brevifolia, *Nutt. Gen. Am.* i. 44.—Am. bor.
breviglnmis, *F. Muell. Census,* 133.—Austral.
brevis, Knapp, Gram. Brit 116'alba?
bromidioides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 293. —Reg.-Argent
bromoides, Linn. Mant. i. 30-Stipa Arigtella.
bryoides, *Dura. Fl. Belg.* 152.—Belgium,
byzantina, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 46.—Byzantium.
caerulesiens, Poir. Encyc. Suppl. i. 258 (= *Urachne* ***caeruleseens).***
caerulescens, vide etiam coernlescens, DC.
caespitosa, Gaudich. in Freyc Voy. Bot. 407 (» *Vilfa* ***Gaudichaudii).***

A.GBOSTIS :—

caespitosa, Hoppe, ex Steud. Nom. ed. II. i. 89 = ropestris.
caespitosa, Presl, Rel. Haenk. i.237=Preslii.
caespitosa, Torr. in Ann. Lye N. York, i. (1824) 162 - Torreyi.
caespitosa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 89 = Muehlenbergia quadridentata.
caespitosa, Salisb. Prod. 25 = Deschampsia caespitosa.
Calamagrostis, Georgi, Bessh. Russ. Reich, iii. IV. 687 — Calamagrostis lanceolata.
Calamagrostis, Linn. Syst. ed. X. 872-Stipa Calamagrostis.
Calamagrostis, Suter, Fl. Helv. i. 36 - Calamagrostis epigeios.
calamagrostoides, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.(1865) 38 «• Calamagrostis agrostoides.
calif arnica, Trin. Agrost. ii. 113 = exarata?
calydna, Willd. ex Stead. Nom. ed. II. i. 39; ii. 580-Schismus marginatns.
campestris, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 87.—Chili,
campyla, ***Tuckerm. in Am. Journ. Sc.*** **Ser. II. vi.** J1848) 231.—Am. bor.
canariensis, ***Parl. in Webb & Berth. Phyt. Canar.*** **iii.** 391.—Ins. Canar.
Candollei, Parl. Fl. Palerm. i. 68=alba,
canescens, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 253.—Reg. Argent.
canescens, Salisb Prod. 25—Corynephorus canescens.
canina, *Linn. Sp. PI.* 62.—Amphig.
canina, Ucria, Hort. Reg. Panom. 67-pallida.
capensis, *Lam. Encyc.* i. 58.—Afr. austr.
capensis, Stead, in Flora, xii. (1829) 467 = Bergiana.
capensis, Willd. Sp. PI. i. 372 = Sporobolus capensis.
capillaris, All. Fl. Pedem. ii. 233 = canina.
capillaris, Huds. Fl. Angl. ed. II. 27-alba.
capillaris, Boiss. ft Lange, ex Anderss. in Walp. Ann. vi. 981-truncatula.
capillaris, Desf. Fl. Atlant. i. 69-Reuterii.
capillaris, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 55 = trichoclada.
capillaris, *Linn. Sp. PI.* 62; *Huds.Fl.Angl.* 27.—Europ.
capillaris, Pall. Ind. Taur. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 55 = trichoclada.
capillaris, Pourr. ex Nym. Consp. 801 = olivetorum.
capillaris, Thore, Chlor. 26=elegans.
capillaris, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 73=vulgaris.
cenisia, De Not. ex Parl. Fl. Ital. i. 189-alpina.
Carmichaeli, *Roem. & Schult. Mant.* iii. 571.—Ins. Tristan d'Acugn.
caryophyllea, Salisb. Prod. 25 = Aira caryophyllea.
castellana, 5oisi. *& Reut. Diagn. Hisp.* 26.—Hispan.; Afr. bor.
chamaecalamus, ***Trin. in Mim. Acad. Pitersb.*** **Ser. VI.** vi. II. (1845) 365.—Peruv.
Chamissonis, *Trin. I. c.* 374.—Ins. Paschalis.
chilensis, *Kunte, ex Trin. 1. c.* 339.—Chili.
Chinantlae,' ***Fourn.Mex. PI. En. Gram.*** **96.'** ***ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.*** **iii. 550.—Mexic**
chinensis, Koen. ex Steud. Nom. ed. II. i. 39 — Leptochloa tenerrima.
chonotica, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 87.—Chili.
ciliaris, Stead. Syn. PI. Gram. 116 = Arundinella anomala.
ciliata, ***Trin. in Mem. Acad. Pitersb.*** **Ser. VI. vi. II.** (1815) 373.—Ind. or.
ciliata, Pall, ex Ledeb. Fl.Ross. iv.404—Pappophonun boreale.
ciliata, Thunb. Fl. Jap. 49 -Festuca Thunbergii.
ciliata, Willd. ex Stead. Nom. ed. II. i. 39 -Muehlenbergia ciliata.
cimicina, Poir. Encyc Suppl. i. 258-Panicnm dmicinum.
Cinna, Lam. ex Roem. & Schult Syst ii. 378-Cinna arundinacea.
Cinna, Retz. Obs. Fasc. v. 18-MuehlenbergU mexicana.
clandestina, Spreng. Fl. Hal. Mant. 32=Sporobolus asper.
dausa, *Phil.in Anales Univ. Chil.* (1873) 562.—Chili,
clausa, *Steud. Syn. PI. Gram.* 169.—Mesopot.
clavata, ***Trin. in Spreng. Neue Entdeck.*** **ii. 65.—** Kamtschat.
coarctata,Eiah.tx Hoffm. Fl. Germ.ed.II. i. 37-alba.
coerulescen%, DC. Fl. Fr. Snppl. 250-Piptatherum coerulescens.
cognata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 421.—Reg. Magell.

AGROSTIS :—

colorata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40 = Muehlen-^bergia elegans.
comosa, **Poir. Encyc. Suppl. i. 257 (—** ***Urachne parviflora).***
complanata, Ait. Hort. Kew. i. 96 — Chloris petraea.
composita, Poir Encyc. Suppl. i. 254.—Carolina.
compressa, Willd. in Roem. & Ust. Mag. iv. (1790) XI. 89 = alba.
compressa, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 268.—Carolina,
compressa. *Doell, in Mart. Ft. Bras.* ii. III. 27.—Bras.
compressa, Torr. Cat. PI. N. York, 91-Sporobolus compressus.
concinna, Tuckerm. in Joum. Am. Sc. Ser. II. xlv. (1843) 43 = canina.
condensata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40 = verticillata.
conferta, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Car. xix. Suppl. 812 = nana.
conferta, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40=alba.
conspicua, Roem. & Schult. Syst. ii. 364—Arundo conspicua.
contracta, F. Muell. ex Hook. f. Fl. Tasm. ii. 116 = Deyeuxia&abra.
Comucopiae, *Sm. ex Fraser, Monog.* 2.—Am. bor.
Cornucopiae, Lam. ex Stead. Nom. ed. II. i. 40 = laxiflora.
coromandeliana, Roxb. Fl. Ind. ed. Wall. i. 318 (= ***Vilfa Roxburghiana\—IaA.*** **or.**
caromandelina, Retz. Obs. Fasc. iv. 19 - Sporobolus coromandelinos.
corralensis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 286.—Chili.
cremenica, Bess.ex Steud. Nom. ed. II. i. 39, 40=alba.
crinita, Moench, Meth. 178-Polypogon monspeliensis.
crinita, *R. Br. Prod.* i. 170.—Austral.
crinita, Rich. ex. Trin. & Rupr. in Mem. Acad. Petersb. Se>. VI. vii. (1849) 4 - Dichelachne Forsteriana.
crudata, Linn. PI. Jam. Pugill. ii. 7 ; Syst. ed. X. 873 - Chloris cruciata.
cryptandra, Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 151 =Sporobolus cryptandrus.
cuspidata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40 = Calamagrostis toluccensis.
cylindrica, *R. Br. Prod.* i. 171.—Aastral.
dalmatica, ***Trin. in Mim. Acad. Pitersb.*** **Sir. VI. vi.** II. (1845) 357.—Enrop.
debilis, Poir. Encyc. Suppl. i. 249= Deyeuxia Forsteri.
debilis, Spreng. Syst. i. 262 = Muehlenbergia debilis.
decipiens, R. Br. Prod. i. 172-Deyeuxia scabra.
decipiens, Salzm. ex Steud. Syn. PI. Gram. 101 = Eriochloa polystachya.
decumbens, Host, Ic. Gram. iv. t. 54 = alba,
decumbens, *Link, Hort. Berol.* i. 80.—Mexic.
delicatula, ***Pourr. ex Kunth, Enum. PI.*** **i. 219.—** Lusitan.
delicatula,«n«f.j» *Lechl.Berb. Am. Austr.* 56.—Peruv.
Delislei, *Hemsl. in Bot. Chalieng.* i. II. 269.—Ins. Amsterdam.
densa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 56-verticillata.
densa, *F. Muell. Census,* 133.—Austral.
Desvauxii, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 288.—Chili.
diandra, Hornem. in Syll. Ratisb. i. (1824) 193 = dianthera.
diandra, Retz. Obs. Fasc. v. 19-Sporobolus diander.
dianthera, *Schult. Mant.* ii. 571.—Ind. or.
diapkora, Trin. in Mem. Acad. Petersb. Ser. VI. vi. II. (1846) 366 - Deyeuxia quadriseta.
difficilis, *Hemsl. Bot. Chalieng.* i. II. 268. t. 43. —Ins. Amsterdam.
diffusa, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. New Zeal. i. 298 = Deyeuxia Billardieri.
diffusa, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 68-verticillata.
diffusa, Host, Ic. Gram. iv. t. 55=alba.
diffusa, Mulh. Desc. Gram. 64-Muehlenbergia sylvatica.
digitata, Lam. Encyc. i. 59 = Paspalum digitatum.
dispar, Hoit. Par. ex Stead. Nom. ed. II. i. 40 (= ***Urachne parviflora).***
dispar, Michx. Fl. Am. Bor. i. 52-elatai
distans, Kunze, Del. Sem. Hort. Lips. (1847)-Deyeuxia scabra.
disticha, Schweig. ex Stead. Nom. ed. II. i. 39, 40-alba.
distichophylla, *Phil. Fl. Atac.* 64.—Chili,
distichophylla, *Roem. & Schult. SystM.* 354.—Anstral.

AOBO8TI8 :—

divaricata, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 81.—Ind. or.
divaricata, Hoffm. Fl. Genn. ed. II. i. 87= vulgaris.
divaricata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40 = Chaetunis fascicnlatus.
diyaricata, Salzm. ex Ball, in Jonm. Linn. Soc. xvi. (1878) 713 =alba.
domingensis, Schult. Mant. iii. 570=Sporobolus domingensis.
Dregeana, *Steud. Syn. PL Gram.* 173.—Afr. austr.
dubia, DC. Fl. Fr. iii. 21=vulgaris.
dubia, Leers, Fl. Herborn. 21 = canina.
dubia, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40 = Chaeturus fascicnlatus.
dulds, Hoit Par. ex Poir. Encyc. Suppl. i. 250 = alba.
dulcu, Sibth. ex Kunth, Enum. PI. i. 218=verticitfata.
dura, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40 = Sporobolus virginicus ?
Duriaei, Boiss. & Reut ex Nym. Consp. 802 = tnincatula.
Ecklonis, ***Trin. in Mim. Acad. Pitersb.*** **Sér. VL vi.** H. (1845) 364.—Afr. austr.
rffusa, Lam. Encyc. i. 59 = Milium effusum.
effusa, *Spreng. Syst.* i. 260.—Emop.
elata, ***Trin. in Mim. Acad. PUersb.*** **Sér. VI. vi II.** (1845) 317.—Am. bm.
elatior, *Steud. Syn. PI. Gram.* 174.—N. Zel.
elegans, Salisb. Prod. 25 = A. Cornucopiae.
elegans, Roem. & Schult. Syst. ii. 362 = Humboldtiana.
elegans, ***Thore, ex Loisel. in Journ. Bot.*** **ii. (lfcO9) 207.** t. 8.—Europ.
Elliotiana, Schult. Mant ii. 872 = arachnoides.
elongata, Lam. Illustr. i. 162 = Sporobolus indicus.
elongata. Roth, Nov. Sp. 41 = Sporobolus orientalis.
emincns, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 254.—Reg. Argent.
erecta, Spreng. Syst. i. 284 = Muehlenbergia aristata.
exarata, ***Trin. Gram. Unifl.*** **205;** ***Ic. Gram.*** **iii. t. 27.—** Am. boi.
exasperata, ***Trin. in Mim. Acad. Pitersb.*** **Sér. VI. vi.** H. (1845) 362.—Chili.
exigna, ***Thurb. in S. Wats. Bot. Calif,*** **ii. 275.—Calif.**
exilis, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1&27) 399 = elegans.
expansa, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40=Cinna arundinacoa.
falklandica, *Hook. f. Fl. Antarct.* 873.—Ins. Falkland.
fosncularis, Sincl. Hort. Gram. Wob. 154 = canina.
fasciculata, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 362.-Ecuador.
fertilis, Steud. Syn. PI. Gram. 170 = Sporobolus elongatus.
festucoides, Muhl. ex Kunth, Enum. PL i. 200 = Muehlenbergia glomerata.
festucoides, Vill. Prosp. 16 = alpina.
fiWolia, *Link, in Schrad. Journ.* ii. (1799) 313.-Lusitan.
filiformis, Koen. ex Kunth, Enum. PI. i. 261 = Cynodon elongatus.
fiKformis, Spreng. Fl. Hal. Mant 32 = Deyeuxia Forsteri ?
filiformis, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. /8 = alpina.
filiformis, Willd. Enum. Hort. Berol. 95 = Muehlenbergia mexicana.
flabellata, ***SaUm. ex Steud. Syn. PI. Gram.*** **53-** Setaria sulcata ?
flava, O. F. Muell. Fl. Dan. t. 751=alba.
fiavescens. Host, Ic. Gram. iv. 52 = alpina.
*fiavida,*Schur, in Oestr. BotZeitschr.ix.(1859)48 =alba.
Jayidula, *Steud. Syn. PI. Gram.* 421.—Reg. Magellan,
fohata, *Hook.f. Fl. Antarct.* 95.-N. Granat.
foliosa, Hort. ex Kunth, Enum. PI. i. 207 = Muehlenbergia mexicana.
foliosa, ***Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club,*** **x. (1888)** 63.—Am. bor.
*onclcii,/>A,Y. nlinn««,xxxiii. (1864-65) 286.—Chili.
Forsteri, Rich, ex Roem. & Schult. Syst ii. 869 = Deyeuxia Forsteri.
frigida, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, vii. 583 = Deyeuxia frigida.
frondosa, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 58.—Sidlia.
frondosa, Poir. Encyc Suppl. i. 252 = Muehlenbergia mexicana.
frondosa, Tenore, ex Spreng. Pugill. ii. 6=vulgaris.
fulva, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 294.—Reg. Argent.
gaditana, *Nym. Syll.* 408.—Lusitan.
gallecica, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 20 J ed. It i. 40 =Ahopsis agrostidea.

AGEOSTI8 :-

Gayana, ***E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.*** **vi. 313.—Chili.**
gelida, F. Muell. in Trans. Viet Inst. (1856) 43 = Muelleri.
gelida, ***Trin. in Mim. Acad. Pitersb.*** **Sér. VI. vi. II.** (1845) 348.—Peruir.
geminata, *Trin. Gram. Unifl.* 207.—Unalasch.
geniculata, Lam. Fl. Fr. iii. 572=canina.
Ghiesbreghtii, ***' Fount. Mex. PL En. Gram.*** **97,'** ***ex Hemsl. Biol. Centr. Am.*** **iii. 551.—Mexic.**
gigantea, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 81 = alba,
glabra, *Kunth, Enum. PI.* i. 226.—Chili.
glabra, Presl, ex Trin. in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. vi. II. (1845) 342=stricta.
glabrata, Spreng. Syst. i. 262 = Muehlenbergia glabrata.
glauca, Muhl. Desc. Gram. 76 = Deyeuxia Nuttaliana.
glauca, *Steud. Syn. PI. Gram.* 175.—Mexic.
glaucescens, Opiz, ex Steud. Nom. ed. IL i. 40 = parvula.
glaucescens, Spreng. Syst. i. 258 =sicula.
glaucina, Bast Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 25 = vulgaris.
globosa, Poir. Encyc. Suppl. i. 257= Milium globosum.
glomerata, *Kunth, Enum. PI.* i. 219.—Peruv.
glutinosa, Fisch. ex Kunth, 1. c. 138 = Melinis minuliflora.
gracilis. Kit. ex Schult. Fl. Austr. ed. II. i. 180; et in Linnaea, xxxii. (1863) 306 = alba.
gracilis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 40 = Muehlenbergia gracilis.
gracilis, Salisb. Prod. 25 = Koeleria cristata.
graeca, **Sibth. Fl. Grace, t. 66 (** ***= Urachne parriflora).***
grandis, Trin. in Mém. Acad. Petersb. Sér. VI. vi. II. (1845) 316 = exarata.
groenlandica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 175.—Greenland.
Gunniana, *F. Muell. Census,* 133.—Austral,
gynostyla, *Steud. Syn. PI. Gram.* 170.—Afr. austr.
Hegetschweileii x, ***Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges.*** *Graub.* II. xxv. (1862) 60.—Europ.
Helenae, *Steud. Syn. PI. Gram.* 171.—Ins. S. Helena.
herbacea, Stend. 1. c. 224 = Aira paradoxa.
Hillebrandii, Thurb. ex Boland. in Trans. Calif. Agr. Soc. (1864) 136 = aequivalvis.
hirsnta, *Linn.f. Suppl.* 108.—Teneriff.
hirtella, ***Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.*** **173.—** Abyssin.
hispanica. Boiss. & Reut. Pugill. 120=castellana.
hispida, Brot. ex Nym. Consp. 802=truncatula.
hispida, Willd. Sp. PI. i. 370=vulgaris.
holdformis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 54 = Oryzopsis holciformis.
Hornungiana, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 46 = vulgaris.
Humboldtiana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 40.—Quito.
humifusa, Roem. & Schult. Syst ii. 361 = Sporobolus humifusns.
humilis, ***Vasey, in Bull. Ton. Club,*** **x. (1883) 21.—** Am. bor.
hybrida, Gand. Agrost. i. 66=canina.
hygrometrica, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 404 (=£n>- ***midium hygrometricum).***
hyperborea, Laest. ex Nym. Consp. 802=rubra.
implicata, Spreng. Syst. i. 262 = Muehlenbergia implicata.
inaeqniglnmis, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 80.—Ind. or.
iuconspicua, ***Kunse, ex C. Gay, Fl. Chil.*** **vi. 315.—** Chili.
incurvata, Scop. Fl. Cam. ed. II. L 62 = Lepturus incurvatns.
indica, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 104. n. 66=Sporobolus coromandelinus.
indica, Linn. Sp. PI. 63= Sporobolus indicus.
infirma, ***Buese, in Miq. PI. Jungh.*** **342.—Java.**
insignita, Schur, Enum. Fl. Transs. 732=alba.
intermedia, Balb. Elench. 86=vulgaris.
interrupta, Linn. Syst. ed. x. 872 = Apera interrupts.
intricata, Nees, in Hook. Lond. Joum. Bot ii. (1843) 418 = scabra.
involuta, Muhl. Desc. Gram. 72 = Sporobolus asper.
involuta, *Poir. Encyc. Suppl. i.* 252.—Marocc.
jamaicensis, Poir. 1. c. 258=Digitaria filiformif.
Jamesoniana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 163=Am. merid,
japonica, *Steud. I. c.* 171.—Japon.
javanica, Bnrm. ex Kunth, Enum. PL i. 512—Ischaemum muticum.
juncea, Lam. Encyc. i. 60=Sporobolus tremulus.
j'uncea, Michx. FL Am. Bor. i. 62 -Sporobolus juiceus.

AGROSTIS :—

jundformis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 41-Deyeuxia jimcifonnis.
Juressi, *Link, in Schrad. Joum.* ii. (1799) 312.—Lusitan.; Hispan.
Kitaibeli, Schult. Fl. Austr. ed. II. i. 178- alba,
koelerioides, ***E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.*** **t vi. 317.—** Chili.
Labillardieri, Roem. & Schult. Syst. ii. 860=Deyeuxia Billardieri.
lachnantha, ***Nees, in Ind. Sent. Hort. Bot. Vratisl.*** (1S34).—Afr. austr.
Laersii, J. F. Gmel. Syst. ii. 169 -canina.
lanata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 136 = Epicampes **lanata.**
lanceolata, Roem. & Schult Syst. ii. 364-Calamagrostis lanceolata.
Langei, Nym. Consp. 801=vulgaris.
lanigera, *Desv. Opusc.* 61.—Bras,
lasianlha, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 87.—Chili.
lateriflv/a, Michx. Fl. Bor. Am. i. 53 - Muehlenbergia mexicana.
latifolia, Trevir. in Goeppert, Beschr. Bot. Gaert. in Breslau, 82=Cinna arundinacea.
laxa, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 147-vulgaris.
laxa, Schreb. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 61 = scabra.
laxiflora, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 255.—Am. bor.
laxiflora, Richards. Frankl. Voy. App. 3=scabra.
lazica, ***Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr.*** **xxL (1874) 12.** —Oriens.
Lechleri, *Steud. Syn. PI. Gram.* 422.—Chili.
Leersii, J. F. Gmel. Syst. 1495 = canina.
lendigera, Poir. Encycl. Suppl. i. 259=Gastridium australe.
lenta, Ait. Hort. Kew. i. 96=Panicum filiforme.
leptos, *Steud. Syn. PI. Gram.* 169.—Louisiana,
leptostachys, *Hook.f. Fl. Antarct.* 94.—Reg. Antarct.
leptotricha, ***E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.*** **vi. 316.—** Chili.
Lessoniana, Steud. Nom. ed. II. i. 41=Arundo conspicua.
ligulau, *Steud. Syn. PI. Gram.* 173.—Austral,
limonias, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 287.—Chili.
limosa, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 82; et Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 48 = alba.
Lii.deniana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 171.—Colombia.
linearis, Retz. Obs. Fasc. iv. 19 = Cynodon Dactylon.
lithuanica, Bess, ex Roem. & Schult Mant. 668, in add. =vulgaris.
litigans, *Steud. Syn. PL* ***Gram.*** 162.—Lusitan.
littoralis, Lam. Illustr. 161 = Sporobolus virginicus.
littoralis, With. Air. Brit. PL ed. 111. ii. 129. t.*23 = Polypogon littoralis.
lobata, R. Br. Prod. i. 171=Deyeuxia quadiiseta.
longiaristata, Herb. Ross, ex Kunth, Enum. i. 178 = Stipa splendens.
longiflora, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 41=Cinna' arundinacea.
longifolia, ***Torr. ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St.*** ed. I. 575 = Sporobolus asper.
longiseta, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 21, 645 = Chaeturus fasciculatus.
lusitanica, Steud. Syn. PI. Gram. 169-castellana.
lutescens, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 299 = Arundo conspicua.
lutosa, Poir. Encycl. Suppl. i. 249=Polypogon littoralis.
Lyallii, *Hook.f. Fl. N. Zeal.* 297.—N. Zel.
magellanica, *Lam. Illustr.* i. 160.—Reg. Mafcella'n.
malaccensis, Willd. ex Kunth, Enum. PI. i. 113 = Isachne pulchella.
maritima. Lam. Encyc. i. 61; Illustr. i. 161—alba.
maritima, With. Arr. Brit. PI. ed. III. ii. 132-Elymus arenariust
Matrella, Linn. Mant. ii. 185=Zoysia pungens.
maxima, Roxb. FL Ind. i. 319 = Thysanolaena Aerostis.
media, ***Carmich. in Trans. Linn. Soc.*** **xii. (1819) 504.** —Ins. Tiist. da Cunha.
melanosperma. **Lam. Encyc. i. 58 (** ***= Urachne Linnaei).***
melaleuca, Trin. in Mem. Acad. St. Petersb. ii. (1832) 170=aenea.
Mertensii, *Trin. in Linnaea,* X. (1835) 803—Chili; Unalaschk.
mexicana, *Kunth, Enum. PL* i. 223.—Mexic.
mexicana,. Linn. Mant 81 - Muehlenbergia mexicana.

AGROSTIS :—
mexicana, Pets. Syn. i. 78 =• Deyeuxia canadensis.
Meyeni, *Trin. in Mém. Acad. PUersb.* Sér. VI. vi. ir. (1845) 312.—Chili.
Micbaelis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 171.—Ins. Azor.
Michauxii, Trin. Gram. Unifl. 206 = scabra.
Michauxii, Zncuagn. in Roem. Collect. 123—Chaeturus fasciculatus.
micrantha, *Steud. Syn. PI. Gram.* 170.—Nepal.
microcarpa, Hort. ex Steud. Noni. ed. II. i. 164; ii. 41 = Muehlenbergia debilis.
microphylla, Steud. Syn. PI. Gram. 164=exarata.
microsperma. Lag. Klench. 2-•-Muehlenbergia debilis.
miliacea, Linn. Sp. PI. 61 = Plptathenim miliaceum.
Milium-comosum, Poir. Encyc. Suppl. i. 257=Piptatherum miliaceum.
minima, Linn. Sp. PI. 63 = Mibora vcma.
minima, *Lour. Fl. Cochinch.* 60.—Cochinch.
minor, F. Muell. ex Benlh. Fl. Austral, vii. 582 = Ueyeuxia minor.
minutiflora, Desf. ex Steud. Norn. ed. II. i. 41-Sporobolus rainutiflorus.
minutiflota, Steud. Syn. PI. Gram. 170 *{-Vilfa indica).*
minutissima, Steud. 1. c. 171 = Sporobolus raminulosas.
monandra, Hornem. Hort. Hafn. i. 72 *(—Urachne parviflora).*
monostachya, Poir. Encyc. Suppl. i. 266 —Panicnm amplexicaule.
montana, Kroclc. Fl. Sites, i. 110-alpina.
montana, R. Br. Prod. i. 171 = Deyeuxia montana.
montevidensis, *Spreng. ex Nees, Agrost. Bras.* 408 — Montevid.
monticola, Roem. & Schult. Syst. ii. 359=Deyeuxia montana.
Montis-aurei, Delarbre, Fl. Anverg. 8, ex Poir. Encyc. Suppl. i. 246 = Piptatherum multiflorum.
mucronata, *Presl, Rel. Haenk.* i. 238.—Am. bor. occ.
mucronata, Sprang. Syst. i. 262 - Muehlenbergia mucronata.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral*, vii. 676.—Austral.
Muelleri, Presl, Bot. Bemerk. 120 - verticillata.
multicaulis, *Hook. f. Fl. Antarct.* 96.—Ins. Campbell.
multicaulis, Kit. in Linnaea, xxzii. (1863) 300= alba.
Munroana, Aitch. *Sc* Hemsl. Journ. Linn. Soc xix. (1881) 192-Calamagrostis Munroana.
muricata, *Kunth, Enum. PI.* i. 219.—Peruv.
mnscosa, 7'. *Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 385.—N. Zel.
Mustaphae, *Steud. Syn. PI. Gram.* 169.—Afr. bor.
mutabilis, Knapp, Gram. Brit. 28=alba.
mutabilis, Sibth. Fl. Oxon. 36 = setacea.
Myuros, Lam. ex Beauv. Agrost. 4!) =Panicum Myurus.
nana, Delarbre, Fl. Auverg. ed. II. 684 = pumila.
nana, *Kunth, Enum. PI.* i. 268.—Peruv.
nardifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. **(1874)** 252.—Keg. Argent.
nebulosa, *Boiss. & Rent. Diagn.* 26.—Hispan.
nebulosa, Bourg. ex Reut. *Sc* Lange, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 47=delicatula.
Neesii, *Trin. in Him. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 361.—Afr. austr.
neglecta, Scbult. Fl. Austr. ed. II. i. 179=alba,
nemoralis, *Phil, in Linnaea*, xxx. (1859-60) 205.—Chili.
neogaea, *Steud. Syn. PL Gram.* 171.—N. Zembl.
nervosa, *Nees, ex Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 328.—Ind. or.
nevadensis, *Boiss. Blench.* 87.—Hispan.
nigra, With. Arr. Brit. PI. ed. III. ii. 181 = vulgaris.
nigrescens, *Saltm. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 41.—Bahia.
nigricans, Poir. Encyc. Suppl. i. 259 =MiIium nigricans.
nitens, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 50=Triplachne nitens.
nivatis, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. (1855) 4!* = Deyenxia nivalis.
nivea, Sincl. Hort. Gram. Woburn. 162 = alba?
nobilis, De Not. ex Part. Fl. Ital. i. 186 = canina.
nootkaensis, Trin. in Mém. Acad. P&ersb. Sér. VI. vi. II. (1845; 326 = nutkaensig.
Novat-Hollandiae, Beauv. Agrost. 148 — Deyeuxia Forsteri.
noveborácensis, Spreng. Syst. i. 260 - Epicampes lanata.
nutans, Poir. Encyc. Suppl. i. 255 = Ichnanthus pallens.
nutans, Spreng. Syst. i. 263 = Muehlenbergia gracilis.
nutkaeniis, *Kunth, Enum. PI.* i. 222.—Am. bor. occ
obliqua, Auct ex Trin. Gram. Unifl. 196=**alba.**

AGROSTIS :-
obliqna, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 306.—Austria.
obtusata, Auct. ex Stead. Nom. ed. II. i. 41 = Katonia obtusata.
odorata, *Lour. Cochinch.* 64.—Cochinch.
oligantha, Kocm. & Schult. Syst. ii. 872 = pauciflora.
olivetorum, *Gren. & Godr. FL Fr.* iii. 483.—Gallia.
orcophila, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. II. (1846) 323.—Am*. bor.
orientalis, Nees, Agrost. Bras. 393 = Sporobolus tenacissimus.
oseroensis, Seenus, Reise Istr. (1805) 50 *{=Urachne parviflora).*
ovata, Forst. f. Prod. 8 =Echinopogon ovatus.
tmarensis, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. Mant. 199 = Sporobolus pyramidalis.
pallens, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 328.—Am. bor.
pallida, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 251.—Europ.
pallida, Schk. Handb. 3; Nachtr. l-canina.
pallida, With. Arr. Brit. PI. ed. III. ii. 128. t. 22 = alba.
palustris, Huds. Fl. Angl. 27 = alba.
panicea, Lam. Encyc. i. 68; Illustr. 811-Gastridum australe.
panicea. Ait. Hort. Kew. i. 94=Polypogon monipeliensis.
panicoides, Lam. Illustr. 162 = Panicum Lamarckii.
paniculata, Hort. Madrit. ex Steud. Nom. ed. II. i. 41 - Muehlenbergiae sp. sec. Trin.
papposa, Gilib. Exercit ii. 524=Stipa Calamagrostis.
paradisiaca, Stead. Syn. PI. Gram. 163 = chilensis.
paradoxa*, Linn. Sp. t1. 62 (- *Orachne Linnaei).
paradoxa, R. Br. in Ross, Voy. ed. II. ii 192 = Colpodium latifolium.
parviflora, R. Br. Prod. 170=scabra.
parvula, Schult. FL Austr. ed. II. i. 182=Sporobolus minutus.
patagonica, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-68) 87.—Patagon.
patens, *Trin. in. Mim Acad. Pitersb.* Sir. VI. vi. II. (1845) 822.—Chili.
patula, Gaud. Agrost. H«lv. i. 80-alba,
pauciflora, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 63.—Am. bor.
pauciflora, Schrad. Fl. Germ. 3 • alba,
paucinodis, *Hack, in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 242.—Reg. Magell.
perennans, *Tuckerm. in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xlr. (1843) 44.—Am. bor.
pernambucensis, Spreng. Syst. i. 268—Panicum rivulare.
peruviana, Spreng. 1. c. 262 = Muehlenbergia Clomena.
phleoides, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 820.— Chili.
phleoides, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 41=Calamagrostis coarctata.
Pickeringii, *Tuckerm. in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xlv. (1848) 42.—Am. bor.
pilosa, Schleich. ex Gaud. Agrost. Helv. i. 75 = Calamagrostis tenella.
pilosa, *Less, in Rich. Voy. Astrol.* 134. t. 28.—N. Zel.
pilosa, Retz. Obs. Fasc. vi. 22 = Cynodon pilosus.
pilosula, *Trin. in Mem Acad. Pitersb.* Sir. VI. vi. II. (1845) 372.—Ind. or.
pisidica, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 255 'trichoclada.
planifolia, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. (1848) 380.—Armen.
plebeia, R. Br. Prod. i. 172 = Deyeuxia plebeia.
plicata, *Lour. Fl. Cochinch.* 64.—China.
plumosa, Tenore, Prod. i. 69=Panicum Teneriflae.
poae/ormis, Willd. ex Steud. Nom. ed. 1L i. 42 = Poa subuniflora.
polymorpha, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 81-alba, vulgaris.
Polypogon, Salxm. ex Steud. Syn. PI. Gram. 178 = Muehlenbergia brasiliensu.
polystachya, Bobc, ex Steud. Nom. ed. II. i. 42 = composita.
Pourretii, Spreng. Syst. i. 260 = Avena Pourretii.
Pourretii, Willd. in Gea. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 290=effusa.
praecox, Salisb. Prod. 24 —Aira praecox.
Preslii, *Kunth, Enum. PI. i.* 225.—Peruv.
procera, A. Rich. Voy. Astrol. 126 — Arundo conspicua. ,
procera. *Ret*. Obs.* iv. 19.—Malabar.
procumbens, Roem. & Schult Syst. ii. **871-alba.**

AGROSTIS :—
Prorepens, G. Mey. Korresp. BL Naturf. Vcr. Riga, xxvi. 56 (quid ?).—Rossia.
prostiata, *Hook./. Fl. Antarct.* 373.—Ins. Falkland.
pseudo-arundinacea, Schleich. ex Gaud. Agrost. Helv. i. 92 = Calamagrostis varia.
pubens, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 42 = Epicampes lanata.
pubescens, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 148-alba.
pubescens, H.B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 136 = Epicampes pubescens.
pulchella, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 68.—Sicilia.
pulchella, Kunth, Gram. i. 70 = Humboldtiana.
pulchella, Loisel. ex Trin. Gram. Unifl. 2b5 = elegans.
pulchella, Roth, ex Roem. *Sc* Schult. Syst ii. 367 = Sporobolus pulchellus.
pumila, Linn. Mant. 31=vulgaris.
pumila, *Steud. Syn. PI. Gram.* 171.—Ins. Adscens.
punctata, Lam. Encyc. i. 58. n. 17 = Eriochloa polystachya.
pungens, Muhl. Desc. Gram. 72 = Zoysia pungens.
pungens, Pall. ' Ind. Taur.' ex Georgi, Beschr. iii. IV. 688 = Aelbropus litoralis.
pungens, Schreb. Gracs. ii. 46=Sporobolus pungens.
pungens, Pursh, Fl. Am. Sept. 64 ~ Sporobolus virginiuus.
purpurasuens, *Bert, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 42.—S. Doming.
purpurascens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 25—Sporobolus purpurascens.
purpurea, Gaud. Agrost. Helv. i. 70-Apera Spica-venti.
pusilla, Dum. Obs. Gram. Belg. 129=canina.
pyramidalis, *Rich, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 153 (= *Vilfa Richardi).*—Ind. occ.
pyramidata, Lam. Illustr. i. 161 = Sporobolus affinis.
pyrenaea, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. IV. vi. (1856)97 = alpina.
pyrenaica, Pourr. 1. c. iii. (1788) 306 = rupestris.
quadridentata, Spreng. Syst i. 263-Muehlenbergia quadridentata.
quadrifida. La bill. PI. Nov. Holl. i. 20 = Pentapogon Billardieri.
quadriseta, R. Br. 'Prod. i. 171 = Deyeuxia qnadriseta.
quitensis, Spreng. Syst. i. 262 = Muehlenbergia elrgans.
quitensis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 42 = Muehlenbergia calamagrostidea.
racemosa, Michx. .H. Bor. Am. i. 53 = Muehlenbergia glomerata.
radiata, Linn. PI. Jam. Pugill. 7; Syst. ed. X. 873 = Chloris radiata.
ramosa, Poir. Encyc. Suppl. i. 257 = Eriochloa annulatn.
ramosa, Roem. & Schult. Syst. ii. 864—Calamagrostis lanccolata.
ramulosa, Carm. in Trans. Linn. Soc. xii (1818) 504 = Carmicbaeli.
ramulosa, Koetn. & Schult. Syst. ii. 811 = Sporobolus ramulosus.
rara, R. Br. Prod. i. 171 = Dichelachne fciurea.
rota, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pltersb. Sér. VI. vii. (1849) 3»Dichelachne sciurea.
Ravennae, Beauv. Agrost. 148 = Erianthus Ravennae.
refracta, Moench, Meth. Suppl. 60=verticillata.
Reinwardtii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 750.—Malaya.
repens, Sincl. Hort. Gram. Wobum. 148 = alba.
retrofracta, Willd. Enum. Hort. Berol. 94-Deyeuxia Forsteri.
Reuterii, *Boiss. Voy. Espagne*, ii. 645.—Hispan.
Reygeri, LHonck.] Verz. Aller Gew. Teut&chl. 204 -» alpina ?
rigescens, *Presl, in Rel. Haenk.* i. 237.—Peruv.
rigida. Lesson, ex A. Rich. Voy. Astrol. 124 = Dichclachne rigida.
rigida, Spreng. Syst i. 262 = Muehlcnhcrgia rigida.
rigida, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 42 = Calamagrostis recta.
rigidula, *Steud. Syn. PI. Gram.* 171.—Java.
rigidifolia, Poir. Encyc. Suppl. i. 257-Panicum rigidifolium.
rivularis, Brot. Fl. Lusit. i. 75 = verticillata.
rosea, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 253.—Reg. Argent.
Royleana, *Trin. Agrost.* Ii. 126.—Ind. or.
rubicunda, Bosc, ex Desv. Opusc 55 = Cinna arundinacea.
rubra, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 42=canina.

A0BO8TI8 :—
rubra, Huds. Fl. Angl. 26 = Gastridinm australe.
rabra, *Linn. Sp. PI.* 62.—Europ.
**ubra,* Wahlenb. ex Nym. Cunsp. 801 = vulgaris. »
rudis, Koem. & Schult. Syst. ii. 860 = Deyeuxia scabra.
rupestris, *All. Fl. Pedem.* ii. 237.—Europ-.; Am. bar.
rupestris, Willd. ex Kunth, Gram. i. 70=alpina.
Rnprechtii, *Boiss. Fl. Orient,* v. 517.—Caucas.
salina, Dam. in Bull. Soc Bot. Belg. vii. (1868) 866 = alba.
salmantica, *Kunth, Gram. I* 71.—Hispan.
scaberrima, *Hassk. PI. Jav. Rdr.* 26.—Java.
scabra, R. Br. Prod. 172 = Deyeuxia scabra.
scabra, *Tuckerm.in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xlv. (1845) 44.—Am. bor.
scabra, *Willd. Sp. PI.* i. 370.—Am. bor.
scabriglumis, Boiss. *Sc* Reut. Pugill. 125=alba.
scabriuscula, Buckl. in Proc. As. Sc Philad.' 1862.' (1863) 90=scabra.
Schaffneri, *Fourn. Mex. PI. En. Gram.* 94, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 551.—Mexic.
Schiedeana, *Fourn. I. c.* 96, *ex Hemsl. I. c*—Mexic.
Schiedeana, *Trin. in Mim. Acad. Pttensb.* Sér. VI. vi. (1845) 327.—Mexic.
Schimperiana, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 170.—Abyss.
Sehleicheri, Jord. *Sc* Verlot, in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. etAllem. 339, 847=alpina.
Schottii, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. (1845) 356.—Gibraltar.
Schultesii, *Kunth, Enum. PI.* i. 228.—Pannonia.
Schweinitni, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1845) 311=elate.
sciurea, R Br. Prod. i. 171 = Deyeuxia sciurea.
scoparia, Koen. ex Steud. Syn. PI. Gram. 115=Panicum semialatum.
Scouleri, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. (1845) 329.—Am. bor. occ.
semibarbata, Trin. 1. *c.* 878 = Deyeuxia Forsteri.
septum, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 12 *{ = Urachne parviflora).*
sericea, Banks *Sc* Soland. ex Hook. f. Fl. Nov. Zel. i. 299=Arundo conspicua.
sericea, Ell. Sketch, i. 135 = Muehlenbergia capillaris.
serotina, Linn. Mant. 30 = Diplachne serotina.
serotina, Torr. Fl. Un. St. i. 88=Spoiobolus serotinns.
sesquiflora, *£. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 318.—Chili.
setecea, *Curt. Fl. Land.* vi. t12.—Europ.
setacea, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 76=rupestris.
seti/olia, Brot. Fl. Ludt i. 74 = setacea.
setifolia, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 42=tenuifolia.
•etifolia, *Hook./. Handb. New Zeal.Fl.* 329.—N. Zel.
setifolia, *Fourn. Mex. PI. En. Gram.* 97; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 551.—Mexic
setosa, Muhl. Descr. Gram. 68=Muehlenbergia glomerate.
setosa, Spreng. Syst. i. 262-Muehlenbergia debilis.
Sibthorpii, Hort ex Steud. Norn. ed. II. i. 42 = verticillata.
sicula, Gusa. ex Steud. Norn. ed. II. 1. 42=Gastridium nuticum.
»icula, *Kunth, Rev. Gram.* i. 71—Sidlia.
signata, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 47 = alba.
umensis, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 173.—Abyss,
simulans, *Hemsl. in Hook. Ic. PI.* t. 1455.—Ins. Sta. Helena.
sinaica, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 46 = alba.
sobolifera, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 95 = Maehlenbergia sobolifera.
Solandri, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 60 = Deyeuxia Forsteri.
spicaeformis, Linn. f. Suppl. 108=Perotis latifolia.
spicata, Thunb. Prod. PL Cap. 19 -Sporobolus capensis.
spicata, Vahl, Symb. i. 9=Sporobolus spicatus.
Spica-venti, Linn. Sp. PI. ed. I. 61 = Apera Spicaventi.
Sporobolus, Spreng. Nov. Prov. 46=Sporobolus Sprengelii.
spuria, Roem. *8c* Schult. Syst. ii. 346-CaIamagrostis lanceolate.
stellata, Willd. Sp. PL i. 376 = Cynodon Dactylon.
stipata, Koel. Gram. 77=Stipa Calamagrostis.
stipoides, Spreng. Syst. i. 263 = Muehlenbergia stipoides.
stoloni/era. Host, Gram. iv. L 56-alba.

AGROSTIS:—
stoloni/era, Leers, Fl. Herb. t. 4. f. 6=vulgaris.
stolonifera, *Linn. Sp. PI.* 62.—Europ.
stoloni/era, Linn, ex Sm. Fl. Brit. i. 80=verticillata.
stolonieans, Bess, in Roem. *8c* Schult. Mant. 667, in add.=alba.
straminea, Hartm. Gram. Scand. 4=alba,
stricta, *Buese, in Miq. PI. Jungh.* 341.—Java,
stricta, *DeNot. ex Parl.Fl. Hal.* i. 187.—Italia.
stricta, J. F. Gmel. Syst. 170-=alba.
stricta, Sincl. Hort. Gram. Wobum. 150-canina.
stricta, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. (1845) 342.—Chili.
stricta, *Willd. Sp. PI.* i. 866.—Am. bor.
suaveolens, Blytt, in Mag. for Naturvidensk. (1837); sec Sommerfelt, in Skand. Akad. Handl. (1837) 25 = Cinna arnndinacea.
subaristate, *Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 192.—Affghan.
subulate, *Hook./. Fl. Antarct.* 95.—Ins. Campbell.
sylvatica, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. 687-Calamagrostis sylvatica.
sylvatica, Huds. Fl. Angl. 28= alba.
sylvatica, Koel. Gram. 92=vulgaris.
sylvatica, Torr. Fl. N. Amer. i. 87 — Muehlenbergia Willdenowii.
tabularis, Steud. Nom. ed. II. i. 42 = Bergiana.
tacubayensis, *Fourn. Mex. PI. En. Gram.* 96, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 551.—Mexic
tarda, *Drude, in Flora,* lx. (1877) 278.—Tyrolia.
tenacissima, Linn. f. Suppl. 197 — Sporobolus indicus.
tenella, Hoffin. Fl. Germ. ed. II. i. 36 -vulgaris.
tenella, Poir. Encyc Snppl. L 257 = Airopsis globosa.
tenella, Willd. ex Steud. Nom.ed. II. i. 42=Muehlenbergia tenuifolia.
tenella, Schleich. ex Gaud. Agrost. Helv. i. 76-Calamagrostis tenella.
tenerrima, Trin. Gram. Unifl. 206 •= elegans.
Tenorii, Otto, ex Loud. Hort. Brit. 26.—Italia?
tenuiflora, Willd. Sp. PI. i. 364 - Muehlenbergia Willdenowii.
tenuiflora, Steud. Syn. Fl. Gram. 163—perennans.
tenuifolia, Curt Brit. Gr. 42 = canina.
tennis, Bast, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 277 = canina.
tenuis, Sibth. Fl. Oxon. 36 - vulgaris.
tenuis, *Vasty, in Bull. Torr. Club,* x. (1883) 21.—Calif.
tenuissima, Spreng. Syst. i 258—Sporobolus indicus.
tenuissima, Vest, ex Steud. Nom. ed. II. i. 42-Polypogon monspeliensis.
Thunbergii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 163.—Japon.
thyrsoides, Bosc, ex Steud. Nom. ed. II. i. 42 (= *Vil/a /ulvescens).*
Tillierii, Willd. ex Steud. 1. c=Catebrosa aquatica.
tolucensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 135.—Mexic.
toluccensis, Willd. ex Steud. Syn. PI. Gram. 164 = virescens.
Torreyana, Schult. Mant. ii. 203 = compressa.
Torreyi, *Kunth, Enum. PI.* i. 226.—Am. bor.
transilvanica, Schur, in Oestr. Bot Zeitschr. ix. (1859) 50—canina.
tremula, Willd. Sp. PI. 1. 872 = Sporobolus tremulus.
triaristata, Knapp, Gram. Brit. 23-Polypogon monspeliensis.
trichantha, *Schrank, in Regensb. Pot. Denkschr.* ii. (1818) 4.—Labrador,
trichodada, *Griseb. in Ledeb. Fl. Ross,* iv. 439.—Oriens.
trichoides, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 861.—Peruv.
trichopodes, Ell. Sketch, i. 136 - Muehlenbergia trichopodes.
trichotoma, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 43-alba.
trichotoma, *Nees, ex Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. (1845) 388.—Monte Video,
trichotoma, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 806.—Austria.
tricuspidata. Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr.xxvii. (1677) 46=canina.
triflora, Hort. Ham. ex Steud. Nom. ed. II. i 43 = Ch&etnrus f&sciul&tus.
trinervate, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. vi. (1845) 347.—Caucus.
trisetoides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 173.—Chill
tropica, *Beam. Fl. Oware,* ii. 37.—Afr. trop.

AOBOSTIS:—
truncatula, *Part. Fl. Hal.* i. 185.—Europ.
uliginosa, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1865) II. 328. -Chili,
umbellate, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxix. (1836) 23.—Chili,
umbellulate, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi (1845) 370.—Afr. austr.
umbrosa, *Pers. ex Trin. 1. c.* 345.—Gallia.
umbrosa, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 47 = vulgaris.
vaginaeflora, Torr. in A. Gray, Man. 576 •» Sporobolus vaginaeflora.
vaginata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 173.—Ins. Sandvic.
valenlina, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 348.—Hispan.
valvata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 171.—Japon.
varia, Host, Gram. iv. t 57; FL Austr. 1.100 •» alba.
various, Thuil. Fl. Par. ii. 36 = canina.
varians, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. (1845) 314.-Am. bor.; Chili.
velutina, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. i. 43-Paspalum - velutinum.
ventosa, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 74 = Apera Spica-venti.
ventricosa, Gouan, Hort. Monsp. 89, 547 — Gastridum australe.
venusta, *Trin. in Mem. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vL (1846) 340.—Austral.
vernalis, Hort Dorp, ex Trin. Gram. Unifl. 198-alba.
vernalis, Poir. Encyc Suppl. i. 259=Millum vernale.
versicolor, Hoppe, ex Steud. Nom. ed. II. i. 43-alpina.
versicolor, Hort Ham. ex Trin. Gram. Unifl. 201, 203 —vulgaris.
versicolor, Stev. in Mim. Soc Nat. Mosc. iii. (1812) 282 = Catabrosa versicolor.
verticillata, Lam. Encyc. i. 69; Ulustr. n. ê Sl-Andropogon squarrosus.
verticillata, Thuil. Fl. Par. ii. 36-vulgaris.
verticillata, *Vill. Prosp.* 16.—Europ.
vestita, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 401.—Abyss*
Vidali, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1873) 561.—Chili.
Villarsii, Poir. Encyc Suppl. i. 261-verticillata.
villosa, A. Spreng. Syst. Suppl. 5—Sporobolus ciliatus.
villosa, Poir. ex Steud. Nom.ed. II. i. 48 = Tricholaena insularis.
villosa, Reichb. ex Steud. 1. c—Sporobolus villosus.
villosa, Vill. Hist. PI. Dauph. i. 378 = Calamagrostis sylvatica.
vinealis, [Honck.] Ven. aller Gew. Teutschl. 206-castellana.
vinealis, With. Arr. Brit. PI. ed. III. ii. 127-canina.
vinealis, Schreb. Spicil. 47-alba,
violacea, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1873) 560.—Chili.
violacea, Thuil. Fl. Par. ii. 85-vulgaris.
violaceo-purpurea, Gilib. Exercit ii. 525-canina.
virescens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. I35.r-Calif.; Mexic
virescens, Rupr. in Bull. Acad. Bmx. ix. (1842) 229-tolucensis.
virgata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 48-Ltptochloa tenerrima.
virginica, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 20 - Sporobolus spicatus.
virginica, linn. Sp. PL 63-Sporobolus virginicus.
virginica, Muhl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 48-Sporobolus vaginaeflorus.
viridis, Gouan, Hort. Monsp. 646 = Sporobolus pungens.
viridis, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1811) 866, nomen.—Am. bor.
Virletii, *Fourn. Mex. PI. En. Gram.* 96, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. S»t.* iii. 551.—Mexic.
vivipara, Bivona, ex Roem. *6c* Schult. Syst ii. 347 in note=alba,
vulgaris, *With. Arr. Brit. PI.* ed. III. ii. 182.—Reg. temp.
Wallichiana.Sfcrurf. *Syn. PI. Gram.* 174.—Reg. Himal.
Welwitschii, Steud. 1. c. 168 = Reuteri.
Wightii, *Nees, ex Steud. I. c.—lad.* or.
Youngii, *Hook./. Handb. New Zeal. Fl.* 330.—N. Zel.
Zeukeri, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi (1845) 368.—Ind. or.
zeylanica, *Klein, ex Steud. Syn. PI. Gram* 83.—Zeylan.

AGBOSTISTACHY8, Dalz. in Hook. Kew Jonrn. ii. (1850) 41. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook, f. iii. 302.
SARCOCUNIUM, Wight, Ic. v. 24. t. 1887, 1888, (1852).
africana, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 534.—Afr. trop.
Gaudichaudii, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxix. (1865-66) 144.—Ind. or.
Hookeri, *Benth. & Hook./. Gen.* iii. 303 —Zeylan.
indica, *Dale, in Hook. Kew Journ. Bot.* ii. (1850) 41. —Ind. or.
longifolin, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. 407.—Canara.
longifolia, Ktirz, For. FI. Brit. Banna, ii. 877 = Gaudichaudii.

ACHtOSTOCHIinTM, F. Mnell. Fragm. ii. 94 (1860). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 792.
stypandroides, *F. Muell. I. c.* 95.—Austral.

AGROSTOMIA, Cerv. in La Naturaleza (1870) 345 = Panicum, Linn. (Gramin.).
aristata, Cerv. 1. c.—Mexic.
barbata, Cerv. 1. c. 346.—Mexic.
mutica, Cerv. 1. c. 345.—Mexic.

A0BOSTOPHTXLTJM, Blume, • Bijdr. 868. t. 53 (1825). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 517.
DIPLOCONCHIOM, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. (1848) 428. t. 12.
callosum, *Keichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 296.—Reg. Himal.
Hasseltii, *Reichb. /. in Bonplandia*, v. (1857) 41 j *et in Walp. Ann.* vi. 909.—Ind. or.
javanicum, *Blume, Bijdr.* 369. t. 53.—Java,
khasiyanum, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* iv. (1844) 376.—Reg. Himal.
longifolium, *Reichb. f. in Bonplandia*, v. (1857) 41.—Java,
megalurum, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 296.—Ins. Samoa.
planicaule, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 909= khasiyanum.

AGUAVA, Rafin. SylvaTellur. 107 (1838) = Myrcia, DC. (Myrtac).
guianensis, Rafin. 1. c, =M. guianensis.
tomentosa, Rafin. 1. c. = M. tomentosa.

AGYLLA, Phil, in Anales Univ. Chil. (1865) I. 643 = Cladium, P. Br (Cypcrac).
ensifolia, Phil. 1. c. = C. scirpoideum.

AGYLOPHORA,Neck. Elem. i. 145 (1790)=Uncaria, Schreb. (Rubiac).

AGYNAIA, Hassk. in Flora, xxv. (1842); Beibl. 40 = seq.

AGYtfEIA, Linn. Mant ii. 161 (1771); Vent. Jard. Cels, t 23 (1800). *EUPHORBIACEAE*, Benth. &. Hook. f. iii. 271.
DIPLOMORPHA, Griff. Notnl. iv. 479 (1854).
affinis, Kurz, ex Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned. Ind. xxyii. (1864) 118 = bacciformis.
bacciformis, *A. Juss. Tent. Euph.* 24.—Ind. or.; Malay.
Berterii, Spreng. Syst. iii. 19 = Phyllanthus grandifolius.
ciliata. Wall. Cat n. 7852=Trigonostemon semperHorens.
coccinea, [Buch.-Ham. in] Symes, Embassy, ed. II. iii. 817 = Glochidion coccineum.
flexuosa, Heyne, ex Wall. Cat n. 7863=Glochidion zeylanicum.
glomerulala, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 447.—Sumatra,
hirsuta, *Miq. I. c.* i. II. 368.—Malaya,
impubera, *Miq. I. c.* 367.—Malaya.
impubera, Wall. Cat. n. 7869 = Glochidion multiloculare.
impubes, Herb. Madr.! Wall. Cat. n. 7990 partim = Glochidion littorale.
impubes, Linn. Mant. ii. 296 = Phyllanthus puberus.
impubes. Vent Jard. Cels, 28. t 23 » bacciformis.
lanceolata, *F. G. Dietr. Lexik. Gaertn.* i. 186.—Austral.?
latifolia, Moon, Cat. 65 = Aporosa latifolia.

AGYNEIA:—
multiflora, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 240 (=Phyllanthi, sp.).—Malaya.
multilocularis, Kottl. ex Willd. in Ges. Naturf. Freunde, Neue Schr. iv. (1803) 206-Glochidion multiloculare.
obliqua, Willd. Sp. PI. iv. 568=Glochidion zeylanicum.
ovata, Poir. Encyc. Suppl. i. 243 ; Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 367=Sauropus albicans.
phyllantkoides, Spreng. Syst. iii. 19 = bacciformis.
pinnata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 368 = Glochidion obscurum.
pubera, Linn. Mant. ii. 296 = Phyllanthus puberus.
sinica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 368 = Phyllanthus puberus.
tenera, Zoll. & Mor. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 865 = Andrachne australis.
tetrandra, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc xv. (1826) 125 = Phyllanthus Hamiltonianus.
tetrandra, Wall. Cat. n. 7852-Trigstemon Hookerianus.

AHOUAI, Tourn. ex Adans. Fam.. ii. 171 (1763) = Thevetia, Linn. (Apocyn.).

AICHRYSON, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 180. t. 27 (1840) = Sempervivum, Linn. (Crassul.).
Bethencourtianum, C. Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 243.—Ins. Canar.
Bollei, Webb, ex Bolle, I. c— Ins. Canar.
dichotomum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 181 = S. dichotomum.
pachycaulon, C. Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 244.—Ins. Canar.
palmense, Webb, ex C. Bolle, 1. c. 248.— Ins. Canar.
Parlatorei, C. Bolle, 1. c. 244.—Ins. Canar.
parviflorum, C. Bolle, 1. c. 243.—Ins. Canar.
porphyrogennetos, C. Bolle, 1. c.—Ins. Canar.
pulchellum, C. A. Mcy. ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Pctrop. ix. 55.—Hab. ?
punctatum, Webb *Sc.* Berth. Phyt. Canar. i. 182=S. punctatum.
pygmaeum, Webb & Berth. 1. c. 184.—Ins. Canar.
radicescens, Webb & Berth. 1. c. 183 = S. villosum.
sedifolium, Webb, ex C. Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 242.—Ins. Canar.
tortuosum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 184 = S. torluosum.
villosum, Webb & Berth. 1. c. 181 = S. villosum.

AIDELUS, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 17 (1827) = Veronica, Toum. (Scrophul.).
micrantkus, Spreng. 1. c—Nepal.

AIDIA, Lour. Fl. Cochinch. 143 (1790). Gen. hand recogn. Cf Benth. & Hook. f. ii. 29.
cochinckinensis, Lour. 1. c—Cochinch.

AIGIROS, Rafin. Alsog. Am. 42 (1838) = Populus, Toum. (Salic).
heterophylos, Rafin. 1. c. = P. heterophylla.

AIKINIA, R. Br. in Wall. PI. As. Rar. iii. 65. t. 288 (1832)=Epithema, Blume (Gesnerac).
Brunonis, Wall. PI. As. Rar. i'i. 66. t. 288=E. Brunonis.
carnosa, G. Don, Gen. Syst iv. 665 «E. camosum.
Horsfieldii, R. Br. in WalL PL As. Rar. iii. 66 = E. diffbrme.

AIKINIA, Salisb. ex A. DC. Monog. Camp. 135, 141 (1880)="Wahlenbergia, Schrad. (Campan.).
hederacea, Salisb. ex A. DC. 1. c = W. hederacea.

AIKINIA, Wall. PI. As. Rar. iii. t. 273. p. 46 (1832) = Batzeburgia, Kunth (Gramin.).
elegans, Wall. 1. c = R. pulcherrima.

AHiANTHTJS, Desf. in Mém. Acad. Sc. Par. 1786. (1789) 265. t. 8. *SIMARVBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 309.
excelsa, *Roxb. PI. Corom.* i. t. 23.—Ind. or.
flavescens, Carr. in Rev. Hortic. (1865) 366 = Cedrela sinensis.
glandulosa, *Desf. in Mém. Acad. Sc. Par.* 1786. (1789) 265. t. 8.—China.
gracilis, Salisb. Prod. 171 = Brncea sumatrana.

AILANTHUS:—
imberbiRora, *F. Muell. Fragm.* iii. 42; xix. 44.—Austral.
integrifolia, Lam. ex Steud. Norn. ed. II. i. 43 = moluccana.
japonica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. 569=glandulosa.
malabarica, *DC. Prod.* ii. 89.—Malabar.
moluccana, *DC. 1. c.*—Ins. Molucc.
Pongelion, J. F. Gmel. Syst. ii. 726=glandulosa.
procera, Salisb. Prod. 171=glandulosa.
punctata, F. Muell. Fragm. iii. 42=Pentaceras australis.
rhodoptera, F. Muell. 1. c 43 = glandulosa.

AILANTUS, DC. Prod. ii. 88 (1825) = praec.

AILUROSCHIA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 151=ABtragalus, Toum. (Legum.).
amygdaliger, Stev. 1. c. =Asirag. amygdaliger.
diffusa, Stev. 1. c. = Astrag. dulichophyllus.
galactites, Stev. 1. c.=Astrag. galactitcs.
glomeratus, Stev. 1. c — Astrag. glomeratus.
hypogaeus, Stev. 1. c. = Astrag. hypogaeus.
rupifraga, Stem 1. c. 152 = Astrag. rupifragus.
scabriseta, Stev. 1. c. 151 = Astrag. scabiisetus.

AILLYA.De Vriese, in Nat, Verh. Haarl.x. (1854) 75 = Ooodenia, Sin.
umbellata, De Vriese, 1. c. = G. filifurmis.

AIMORRA, Rafin. New Fl. Am. iv. 70 (1886). (Compos.).
acuminata, Rafin. 1. c—Am. bor.

AINSLIAEA, DC. Prod. vii. 13 (1838). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 493.
DIASPANANTHUS, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat ii. 186 (1865).
acerifolia, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 126.—Malaya.
affinis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 187 = acerifolia.
angustifolia, *Hook. /. & Thorns, ex Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 412.—Ind. or.
apiculata, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 126.—japon.
aptera, *DC. Prod.* vii. 14.—Reg. Himal.
aspcrrima, *Sch. Bip. in Pollichia*, xx-xxi. (1863) 407. —Nepal.
Brandisiana, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 318.—Burma,
cordifolia, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 416.—Japon.
dissecta, *Franch. & Sav. 1. c.* i. 264.—Japon.
fragrans, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 236.—Hongkong.
glumacea, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1868) 407 ; Klatt, in Sitzb. Muench. Akad. (1878) 97^angustifolia.
latifolia, *Sch. Bip. in Pollichia*, xviii-xix. (1861) 190. —Nepal.
pteropoda, *DC. Prod.* vii. 14.—Reg. Himal.
silhetensis, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 411 = pteropoda.
uniflora, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 126.—Japon.
Walkeii, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6225.—Hongkong.

AINSWORTHIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 343 = Tordyliiun, Linn. (Umbel!.).
Carmeli, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 44.—Palestin.
cordata, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. HI. i. (1844) S43 = T. cordatum.
elegans, Boiss. & Hal. Diagn. Ser. II. v. 100.—Taurus.
trachycarpa, Boiss. 1. c. Ser. I. x. 44.—Oricns.

AIOIiOTHECA, DC. Prod. v. 508 (1836). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 352.
parthenioides, *DC. 1. c.*—Mexic

AIOUEA, Aubl. PI. Gui. i. 310. t. 120 (1775). *LAUR1NEAE*, Henth. & Hook. f. iii. 153.
ApiVEA, Steud. Norn. ed. I. 25 (1821).
COLOMANDRA, Neck. Elem. ii. 142 (1790).
DOUGLASSIA, Schreb. Gen. PI. 809 (1791).
EHRHARDIA, Scop. Introd. 107 (1777).
brasiliensis, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 83.—Bras.

AIOTTEA:—
densiflora, *Nets, in Linnaea,* xxi. (1848) 518.—Am. trop.
elliptica, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 88.—Am. trop.
guianensis, Nees, Syst. Laurin. 363.—iCf. Meissn. in DC. Prod. xv. I. 82) = seq.?
gnianensis, *Aubl. PI. Gui.* i. 310 —Guiana.
guyanensis, Griseb. ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 83 = Aydendron nparium.
Malabonga, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 233.—Ins. Philipp.
saligna, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 82.—Bras.
Schomburgkii, *Meissn. 1. c.*—Am. trop.
tenella, Nees, in Linnaea, xxi. (1848) 512 = gnianensis.
tenuiflora, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. *I.* 510 (= *Mespilodaphne indecora).*
trinervis, *Meissn. 1. c.* 83.—Am. trop.

AIPIIANES, Willd. in Mém. Acad. Berl. (1804) 32 = Martinezia, Kuiz & Pav. (Palm.).
aculeaia, Willd. 1. c. = M. Aiphnnes.
caryotae/olia, H. Wendl. in Kerch, galm. 230 = M. caryotacfolia.
coralline, H. Wendl. I. c. = M. corallina.
elegans, H. Wendl. 1. c. = M elegans.
erinacea, H. Wendl. 1. c—N. Granat.
I-indeniana, H. Wendl. I. c. = M. Lindeniana.
Praga, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 303 = Euterpe Praga.
truncata, H. Wendl. in Kerch. Palm. 230 = M. truncata.

A1PYANTHUS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1851) I. 599 = Macrotomia, DC. (Bong.).
echioides, Stev. 1. c. 000 = M. echioides.

AIRA, Linn. Fl. Lapp. 27 (1737); Gen. ed. I. 835. n. 838 (1737). *GRAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 1156.
ANTINORIA, Parl. Fl. Palenn. i. 92 (1845).
ASPRIS, Adans. Fam. ii. 496 (1763).
FIORINIA, Parl. Fl. Ital. i. 232 (1848).
RUSSIA, Schur, Enum. PI. Transs. 754 (1866).
LEPTOPHOBA, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).
MOLINERIA, Parl. Fl. Ital. i. 236 (1848).
PERIBALLIA, Trin. Fund. Agrost. 133 (1848).
PROINEIA, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789).
acutigluma, *Steud. Syn. PI. Gram.* 221.—Chili,
aegilopsoides, *Walt. Fl. Carol.* 78.—Carolina.
aetnensis, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 151 = Corynephorus articulatus.
aggregata, Timer, ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 702 = caryophyllea.
agrostidea, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 61=insularis.
agrostidea, *Loisel. Notic.* 16.—Europ. austr.
alia, Vahl, in Koem. & Schnlt. Syst. ii. 688 = Deschampsia alba.
alia, Wulf. ex Kunth, Gram. 110=Sesleria elongata.
alpina, Liljebl. Utkast Sv. Fl. ed. I. 49; ed. II. 41 = Hierochloë alpina.
alpina, Linn. Sp. PI. 65 =Deschampsia alpina.
alpina, Roth, Tent Fl. Germ. ii. I. 98 = Deschampsia caespitosa.
alpina, Savi, Bot. Etrusc. i. 52=Deschampsia juncea.
alpina, Vahl, in Fl. Dan. t. 961 - atropurpurea.
alpina, Sobol. ex Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, iv. 37 = Deschampsia flexuosa.
altaica, Trin. in Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 8 = Poa soongarica.
altissima, Lam. Fl. Fr. iii. 581=Deschampsia caespitosa.
ambigua, Michx. Fl. Bor. Am. i. 61 = Deschampsia ambigua.
amtigua, De Not. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 365-capillaris.
Andraei, Auersw. ex Andrae, in Bot. Zeitschr. xiv. (1856) 205 = Deschampsia caespitosa.
anomala, *Trin. in Linnaea,* x. (1836) 301.—Chili.
antarctica, Forst. f. Prod. 8=Trisetum antarcticum.
antarctica, *Hook. Ic. PI.* t. 150.—Ins. Antarct.
aquatica, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 61-Catabrosa ochrcleuca.
aquatica, Linn. Sp. PI. 64 = Catabrosa aqnatica.
aquatica, Huds. Fl. Angl. ed. II. 34, proparte = GlycerU distans.
arctica, Spreng. Syst. Cor. Post 32=Deschampsia wespitosa.

AIBA:—
arenaria, *F. W. Schmidt, in Neu. Abh. Boehm. Ges. i.* (1791) 11.—Europ.
argentea, *Lowe, in Trans. Cambr. Phil. Soc.* iv. (1831) 9.—Ins. Mader.
aristulata, *Torr. Fl. U. St.* 132.—Am. bor.
articulata, Desf. Fl. Atlant. i. 70 = Corynephorus articulatus.
arundinacea, Liljebl. Utkast Sv. Fl. ed. I. 49 = Graphephorum arundinaceum.
arundinacea, Linn. Sp. PI. 64 = Poa tatarica.
atropurpurea, *Wahlenb. Fl. Lapp.* 37.—Europ.; Am. bor.
atrovirens, Thuil. Fl. Par. ed. II. i. 37 = Molinia cacrulea,
aurea, Steud. in Flora, xii. (1829) 470 = Airopsis aurea.
australis, Raoul, Choix, 12 = Deschampsia caespitosa.
australis, Steud. Syn. PI. Gram. 220 = Deschampsia australis.
avenacea, Spreng. Syst. i. 278 = Eriachne avenacea.
avenacea, Willd. ex Stead. Nom. ed. II. i. 44=Trisetum palustre.
baetica, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pé'tersb. i. (1836) 67 = Deschampsia baetica.
benghalensis, J. F. Gmel. Syst. i. 174 = Arundo bengalensis.
Berteroniana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Chili.
Bieiersteinii, Steud. 1. c. 219 = Deschampsia caespitosa.
bottnica, Wahlenb. Fl. Lapp. 36. t. 4 = Deschampsia caespitosa.
irasiliensis, Raddi, Agrost. Bras. 36 = Eragrostis airoides.
irasiliensis, Spreng. Syst. i. 278**Arundinella brasiliensis.
breviaristata, Gilib. Exercit. ii. 528=Deschampsia caespitosa.
ireviculmis, Loisel. Fl. Gall. i. 57 = Corynephorus canescens.
brevifolia, Bieb. Fl. Taur. Cane. iii. 63= Deschampsia caespitosa.
brevifolia, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 76.—Missouri.
irigantiaca, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 378 = Glyceria distans.
bulbosa, Krock. Fl. Sil. Suppl. i. 131 = Koeleria cristata 1
caerulea, Linn. Sp. PI. 63 = Molinia caerulea.
caespitosa, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct ii. 380, proparte = Festuca fuegiana.
caespitosa, Linn. Sp. PI. 64 = Deschampsia caespitosa.
caespitosa, Muhl. Desc. Gram. 85 =• Deschampsia ambigua.
calycina, *Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Eeruv.
canescens, All. Fl. Pedem. ii. 244=Corynephorus articulatus.
canescens, Host, Gram. iv. t. 36=caryophyllea.
canescens, Linn. Sp. PI. 65 = Corynephorus canescens.
capensis, Linn. f. Suppl. 108=Ehrharta calycina.
capensis, Steud. in Flora, xii. (1829) 468 = Koeleria capensis.
capensis, Spreng. Syst. ii. 114 = Ehrharta villosa.
capillacea, Hort. Madr. ex Wall. Cat. snb n. 3804 = Leptochloa filiformis.
capillacea, *Lam. Illustr.* i. 177.—Am. bor..
capillaris, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 64 =Avena corymbosa.
capillaris, *Host, Gram.* iv. 20. t. 35.—Europ.; Oriens.
capillaris, Lag. in Varied. Ciena ii. iv. (1805) 39 = Lagascae, Airopsis agrostidea.
capillaris, Salzm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 41=caryo< phyllea.
capillaris, Savi, Fl. Pis. i. 86 = Deschampsia juncea.
caryophyllaea. Leers, Fl. Herbom. ed. II. 24 = Deschampsia flexuosa.
caryophyllea, Bertol. [ex Steud.; an Fl. Ital. i. 455] = capillaris.
caryophyllea, *Linn. Sp. PI.* 66.—Europ.; Oriens.
catabrosoides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 228.—Caucas.
cespitosa, Muhl. Desc Gram. 85=Deschampsia ambigua.
Chamaemespilus, *Host, Fl. Austr.* ii. 8.—Europ.
chinensis, *Rets. Obs.* iii. 10.—China,
ciliaris, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 310.—Austria.
ciliaris, Auct. ex Steud. Nom. ed. I. 23, 487= Koeleria villosa. ft
ciliata, Spreng. Pugill. i. 7=Eragrostis minutiflora.
ciliata, Spreng. Syst. i. 278 •= Eriachne ciliata.

AIBA:—
clavata, Gilib. Exercit. ii. 526= Corynephorus canescens.
clavata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 44= Corynephorus articulatus.
collina, Dum. Obs. Gram. Belg. 121= Deschampsia flexuosa.
compressa, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1811) 356, nomen.—Am. bor.
controversa, *Steud. Syn. PI. Gram.* 224.—Am. bor.
complanata, Steud. Nom. ed. II. i. 44 = Chloris petraea.
Corsica, Jord. Pugill. 353 = sicula.
Corsica, Tausch, in Flora, xx. (1837) 102 = Deschampsia flexuosa.
corymtosa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 44 = caryophyllea.
corymbosa, Fauché & Chaub. Fl. Pelop. 5. n. 120. t. 7. f. 1 = intermedia.
cristata, Linn. Sp. PI. 63 = Koeleria cristata.
Cupaniana, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 145 = caryophyllea.
cuprina, Fuss, Fl. Transs. 722 = Deschampsia flexuosa.
curta, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. cd. III. ii. 701 in nota=caryophyllea.
dactyloides, Rochel, PI. Rar. Ban. 32. f. 3-Koeleria glauca.
danthonioides, Trin. in Mém. Acad. Pe'tersb. Sér. VI. i. (1830) 57 = Deschampsia calycina.
discolor, Thuil. Fl. Par. i. 39=setacea.
distichophylla, Spreng. Syst. i. 276 = Panicum subulatum.
divaricata, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 307 = caryophyllea.
duriuscula, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 76.—Hab. ?
Edouardi, Reut ex Jouve, in Bull. Soc Bot. Fr. xii. (18U5) 8 8 - Avena corymbosa.
effusa, Spreng. Syst. i. 278 = Eriachne pallescens.
elatior, 'Hoffmgg.' ex Steud. Nom. ed. II. i. 44 = Melica Bauhini?
elatior, *Steud. Syn. PI. Gram.* 423.—Reg. Magellan.
elegans, Willd. ex Gaud. Agrost. Helv. i. 130, 855 = capillaris.
elegans, 'Vill.' ex Steud. Nom. ed. II. i. 44= Airopsis agrostidea.
elegantissima, Schur, in Verb.. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853) 85=capillaris.
elodes, Brign. Fasc. PI. Foroj. 10; cf. Flora (1840), 104 = Poa nemoralis.
elongata. Hook. Fl. Bor. Am. ii. 243=Deschampsia elongata.
elongata, Salzm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 44=Koeleria phleoides.
euflexuosa, Syme, Engl. Bot. ed. III. xi. 67 = Deschampsia flexuosa.
fascicularis, Steud. Syn. PI. Gram. 219 = Corynephorus fasciculatus.
festucoides, Vill. Prosp. 16 ; Hist. PI. Dauph. ii. 86 = Deschampsia alpina.
filiformis, *Koen. ex Roxi. Fl. Ind.* i. 328.—Ind. or.
flammosa, Buchoz, ex Honck. Syn. PI. Germ. i. 521 = Deschampsia flexuosa.
flexilis, Linn, ex Giseke, Prael. 147 = Deschampsia flexuosa.
flexuosa, Linn. Sp. PI. 65 = Deschampsia flexuosa.
Gayana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Chili.
gigantea, Schrenk, ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 446 = Muehlenbergia alpestris.
gigantea, *Steud. Syn. PI. Gram.* 224.—Ind. occ.!
glabra, *Brot. Fl. Lusit.* 91.—Lusit.
glabrata, Brot. 1. c. 92 - lendigera.
glauca, Hartm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 44 = Deschampsia caespitosa.
glauca, Rochel, PI. Rar. Banat. 32 = Koeleria dactyloides.
glauca, Spreng. Nachtr. Bot. Gart. Halle, i. 10 = Dactylis glauca.
globosa, Thore, in Joum. Bot Paris, i. (1808) 197» Airopsis globosa.
glomerata, G. Don, ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PI. ii. 137 = Deschampsia caespitosa.
Gmelini, [Honck.] Verz. aller Gew. Teutschl. 212 = praecnx}
gracilis, Trin. ex Steud. Nom. cd. II. i. 44 = Kotkria cristata.
grandiflora, Bertol. Fl. Ital. i. 436 = Koeleria setacea.
grandiflora, Steud. Syn. PI. Gram. 220—Deschampsia grandiflora.
grandis, Nym. Consp. 807 —• Deschampsia caespitosa.

AIBA:-

Halleri, [Honck.] Vera. aller Gew. Tentschl. 212 = Trisetum rigidum.
Hartmaniana, Nym. Consp. 807 —Deschampsia caespitosa.
helodes- Steud. Nom. ed. II. i. 44-Poa nemoralis.
hirsuta, Hall. f. ex Schleich. Cat. Nov. 6-Koeleria hirsuta.
hispida, Spieng. Syst i. 276-Eriachne capillaris.
holci/ormis. Stead. Syn. PL Gram. 221-Deschampsia helciformis.
Holcus-lanatus, VilL Hist. PI. Dauph. 1L 87-Holcus lanatus.
Holcus-mollis, Vill. 1. c. 88 = Holcus mollis.
Hostii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 221.—Bohem.
humilis, Bieb. Fl. Tanr. Cane. i. 67 - Catabrosa humilis.
hybrida, Gand. Agrost. Helv. i. 124-Corynephorus articulatus.
incomplete Bosc, ex Steud. Nom. ed. II. i. 44 = Paspalum debile.
indica, Linn. Sp. PI. ed. II. 94-Panicum conglomeratum.
inflexa, Loisel. Fl. Gall. i. 56. t. 22 = A vena corymbose,
insnlaris, *Boiss. Fl. Orient,* v. 528.—Europ.; Oriens.
intermedia, *Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl.* i. 105.—Europ.
interrupta, Rottl. ex Steud. Syn. PI. Gram. 55 = Panicum canalicalatum.
involucrata, Cav. Ic. 1. 33. t. 44 = Deschampsia involucrata.
ischtumoides, Koen. ex Trin. in Mém. Acad. Pltersb. Sir. VI. iii. (1834) 328 = Panicum antipodum.
juncea, Vill. Prosp. 16 = Deschampsia juncea.
juneifolia, Wolf, ex Kunth, Enum. i. 822-Sesleria tenuifolia.
Kingii, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 376. t. 136 = Deschampsia caespitoso.
koelerioides, Pevr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 5 = Deschampsia koelerioides.
Koenigii, J. F. Gmel. Syst. i. 174-Eragrostis minutiflora.
labradorica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Labrador.
laevigata, Sm. Eng. Bot.t. 2102 = Deschampsia alpina.
laevis, Brot. Fl. Lusit i. 90 = Deschampsia laevis.
laevis, Spieng. Syst i. 278 = Eriachne glauca.
Lagascae, *Kunth, Gram.* i. 99.—Hispan.; Corsic.
latifolia, Hook, FL Bor. Am. ii. 248 = Deschampsia latifolia.
latifolia, Stead. Syn. PL Gram. 219 = Deschampsia caespitosa.
latigluma, *Steud. I. e.* 221.—Abyss.
laxa. Rich, in Act. Soc Hist Nat. Par. i. (1792) 106-Orthodada laxa.
Leersii, Kunth, Ennm. PL i. 289-caryophyllea.
Legei, Bor. in Soc Angers, xxiv. (1855); et Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 700-Deschampsia flexuosa.
lendigera, *Lag. in Varied, dene,* ii. IV. (1805) 39.—Hispan.
Lensaei, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 58-caryophyllea.
Lensii, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140[9]=praec.
Lenin, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 620-praec.
litoralis, Godr. ex Nym. Consp. 807-Deschampsia caespitosa.
macrantha, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 516-Koeleriacristata.
macranthera, *Steud. Syn. PI. Gram.* 219.—Hispan.
maderaspatana, *Nees, ex Steud. I. c.* 221.—Madras,
magellanica, *Hook./. Fl. Antarct.* ii. 376.1.184.—Reg. Magellan.
magellanica, Lam. ex Beauv. Agrost 66 = Hierochloë magellanica.
major, Syme, Engl. Bot. ed. III. xi. 63.—Deschampsia caespitosa, alpina.
media, Gouan, Illustr. 8 = Deschampsia jnncea.
media, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. (1831) Suppl. 57-Deschampsia caespitosa.
melicoides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 62 - Graphephornm melicoides.
znicrantha, *Steud. Syn. PI. Gram.* 423.—Madag.
miliacea, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 81=Poa miliacea.
minuta, *Loefl. It. Hist.* 117.—Europ.; Oriens.
minuta, Loisel. Fl. Gall. i. 45 = Airopsis agrostides,
missurica. Spreng. Syst. ii. 578 = brevifolia.
mollis, Muhl. Descr. Gram. 82 = Eatonia purpurascens.
mollis, Schreb. Spicil. 51 - Holcus mollis.
montana, Brot. ex Nym. Consp. 808 = Deschampsia **stricta.**

AIRA:-

montana, Desv. Obs. Angers, 65-setacea.
montana, Koel. Gram. 131 = Deschampsia flexnosa.
montana, *Linn. Sp. PI.* 65.—Europ.
mucronata, Spieng. Syst. i. 276-Eriachne brevifolia, mucronata.
multicaulis, Kunth, Enum. PI. i. 292 = caryophyllea.
multiculmis, Dnm. Obs. Gram. Belg. 121 -caryophyllea.
nana, Kunze, ex Steud. Nom. ed. II. i. 45=praecox.
nana, Spreng. ex Steud. 1. c.—caryophyllea.
nitida, Spreng. Mant. i. 32-Eatonia purpurascens.
nitida, *Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Mexic.
nivea, *Host, Fl. Austr.* ii. 8.—Europ.
Notarisiana, Steud. Syn. PL Gram. 221 = capillaris.
nutans, [Web. in] Wigg. Prim. Fl. Holsat 7 = Melica nutans.
obiusata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 62-Eatonia obtusata.
ormyetorum, Spieng. Pngill. ii. 18 = Festuca arundinacea.
pollens, Mnhl. Descr. Gram. 84=Trisetum palnstre.
pallens, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 36.—Hab. I
pallescens, *Kit. in Roem. & Schult. Syst.* ii. 685.—Hungar.
paludosa, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 1.96 - Deschampsia flexuosa.
paludosa, Wibel, Prim. FL Werth. 118 = Deschampsia caespitosa.
palustris, Pollini, Cat. Ort. Veion. (1814) 8 = Festuca arundinacea.
panicea, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 45 = Leptochloa filiformis.
paradoxa, *Steud. Syn. PI. Gram.* 223.—Guinea.
parviflora, Thuil. Fl. Par. ed. II. i. 38-Deschampsia caespitosa.
parvula, *Hoot./. Fl. Antarct.* ii. 377.—Fnegia.
patulipes, Jord ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 701-caryophyllea.
pensylvanica, Spreng. in Mém. Acad. Pe'tersb. (1810) 299. t. 7 —Eatonia purpnrascens.
petraea, Bellardi, ex Steud. Nom. ed. II. i. 45 ; ii. 361 —Poa nemoralis.
phleoides, Steud. Nom. ed. I. 24-Koeleria phleoides.
pictigluma, *Steud. Syn. PI. Gram.* 221.—Abyss,
pilosa, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 310.—Austria.
plesiantha, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. 1IL U. 701 = caryophyllea.
poae/ormis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 45=Poa depauperata.
praecox, *Linn. Sp. PI.* 65.—Europ.; Am. bor.
provincialis, Gennar. ex Nym. Consp. 814 = A vena corymbosa.
provincialis, Jord. ex Jouve, in BulL Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 84.1.1 = capillaris.
pubescens, Vahl, Symb. iii. 9 = Koe1eria villosa.
pulchella, Nocca & Balb. Fl. Ticin. i. 408. t. add. 1 = capillaris.
pulchella, Link, Hort Berol. L 130=Avena corymbosa.
pulchella, Willd. Enum. Hort. Berol. 101-lendigera.
pulchra, *Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Chili.
pumila, Agardh, ex Roem. & Schnft. Syst it 678 = minuta.
pumila, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 76 = Poa annua.
pumila, Vill. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881) 572 = Deschampsia juncea.
purpurea, Muhl. Descr. Gram. 85-Uralepsis aristulata.
purpurea.Vfah. FL Carol. 78=Triplasis puipurea.
purpureo-argentea, Gilib. Exercit ii. 626 = caryophyllea.
pusiila, Schur, Enum. PL Transs. 754=piaecox.
rara, Spreng. Syst. L 278-Eriachne rara.
refracta, Lag. in Varied. Cienc ii. IV. (1805) 89-Deschampsia refracta.
rigida, Dulac. Fl. Hautes-Pyr. 82 «caryophyllea.
Ruprechtii, Griseb. ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1861) 346-Avena Ruprechtii.
sabuletorum, Steud. Nom. ed. II. i. 45 = sabulonum.
sabulonum, *Labill. Sert. Austr. Caled.* 16. t. 21.—Nov. Caled.
saburralis, Jan, Blench. 2, ex Guss. FL Sic. Syn. i. 148 -caryophyllea.
saxatilis, Salzm. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881) 69=capillaris.
scabra, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 809.—Austr.
scabra, Hort. ex Kunth, Enum. PL i. 370 = Catabrosa viridula.

AEttA:-

scabra, Zuccagn. in Roem. Collect 124 - Catabrosa senhra,
scabrosetacea, Knapp, Gram. Brit. t. 82—Deschampsia flexuosa.
semineutra, Waldat. & Kit. in Schult. Oestr. Fl. i. 199 = Poa semineutra.
serotina, *Torr. sec. Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 45. —Am. bor.
setacea, *Huds. Fl Angl.* ed. 1.80; *RetM. Obs.* üi. 10.—Europ.
setacea, Pourr. ex Nym. Consp. 808-Deschampsia juncea.
setiformis, *Host, sec. Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 45.—Hab.?
sicula, Spreng. Syst. i. 277-Holcus tennis,
sicula, *Tod. Ind. Sem. Pan-* (1872) 88; *in Nuov. Giorn. Bot.* v. (1873) 156.—Slcilia.
spectabilis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 224.—Afr. austr.
spicaeformis, *Steud. 1. c.* 424.—Reg. Magell.
spicata, Linn. Sp. PI. 63 = Trisetum subsplcatum.
spicata, I-inn. 1. c. 64—Panicum indicum.
splendida, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 45-Deschampsia flexuosa.
squarrosa, Spreng. Syst. i. 278 = Eriachne squarrosa.
stoloni/era, Hausm. Fl. Tir. 890, sec. Neilr. Nachtr. 25 = Deschampsia caespitosa.
stricta, Nym. Consp. 808 = Deschampsia stricta.
subaristata, Faye, ex Anderss. in Walp. Ann. vi. 992 - Deschampsia juncea.
subspicata,Linn. Syst.ed. X. 878=Trisetum subspicatum.
subspicata, Rainv. in Gort. Fl. Belg. Foed. n. 74-praecox.
subtriflora, Lag. in Varied. Cienc. ii. IV. 39 = Deschampsia juncea.
superbiens, *Steud. Syn. PI. Gram.* 424.—Reg. Magell.
subulorum, D. Dietr. Syn. i. 839 err. = sabulonum.
tenera, *Kit. in Schult. Oestr. Fl.* ed. II. i. 199.—Slavonia; Banatus.
Tenorei, Fuckel, ex Willk & Lange, Prod. i. 65-Agrostis capillaris.
Tenorii, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 62 = A vena corymbosa.
tenuifolia, *Steud. Syn. PI. Gram.* 223.—Chili.
tenuissima, Spreng. Syst. i. 276=Sporobolus minutiflorus.
Todari, Tenore, ex Tod. Ind. Sem. Hort. Panorm. (1859) (Linnaea, xxx. (1859-60) 758) - caryophyllea.
triaristata, *Clarke, Trav.* ii. 462.—Palaestina.
trichodes, Spreng. Syst. i. 276-^Agtostis trichodes.
triflora, Frivald. in Flora, xix. (1836) 433 •= Deschampsia caespitosa.
triflora, Ell. Sketch, i. 158 = Graphephorum Elliotti.
triflora, Roem. & Schult Syst ii. 680 = Deschampsia juncea.
triflora, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 45 = Corynephorus canescens.
triglumis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 228.—Texas.
truncata, Muhl. Descr. Gram. 83 = Eatonia obtusata.
truncata, Salzm. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881) 58 = caryophyllea.
uliginosa, Weihe, ex Boenn. Prod. FL Monast. 25 - setacea.
uniaristata, *Cav. in Anales Cienc. Nat.* vi. (1803) 148.—Hab.?
valesiaca, Colla, Herb. Pedem. t. 94. f. l-Koeleria setacea,
valesiana, Bertol. Fl. Ital. i. 438 = praec
mtria, Jacq. Hort. Vindob. 15=Sesleria caernlea.
variegata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 223. - Graecia.
versicolor, *Roem. &• Schult. Syst.* ii. 679.—'Port. Egmont'
vestita, *Steud. Syn. PI. Gram.* 424.—Reg. Magell.
viatica, *Griff. Notul.* iii. 54.—Reg. Himal.
villosa, Gilib. Exercit. ii. 527 = montana.
villosm, Linn. f. Suppl. 109 = Ehrharta gigantea.
violacea, Gilib. Exercit. ii. 625-Catabrosa aquatica.
violacea, *Steud. Syn. PI. Gram.* 223.—Persia.
violacea, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 106 -Panicum antipodum.
vivipara, *Steud. Syn. PI. Gram.* 222.—Greenland,
viridula, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 75.—Hab. I
Wibeliana, *Sond. in Fl. Dan.* t. 2461, 2522.—Europ.
Wilhelmsii, Sleud. Syn. PL Gram. 219 = Deschampsia caespitosa.

AIRIDIUM, Steud. Syn. **PL Gram. 423 (1855) = Desohampsia, Beauv. (Gram.).**
***elegantulum,* Steud. 1. c. = D. antarctica.**

AIROCHLOA, Link, Hort. Berol. i. 126 j ii. 278 (1827) =Koeleria, Pen. (Gram.).
albescent, Link, 1. c i. 128 = K. albescens.
capensis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 821 = K. capensis.
caudata. Link, in Linnaea, zvii. (1848) 405 = K. crassipes.
cristata, Link, Hort. Berol. i. 127 - K. cristate
glauca, Link, ez Schor, Enum. PI. Truss. 751 = K. glauca.
gracilis. Link, Hort. Berol. ii. 276=K. cristata.
hirsute, Link, 1. c. i. 129 =K. hirsnta.
hispida, Link, 1. c. - K. hispida.
permoUis, Nees, ez Stend. Syn. PI. Gram. 298=K. permollis.
pubescens, Link, Hort. Berol. i. 128 = K. cristata.
unifiora, Hochst. in Flora, xxzviii. (1855) 830.—Air. or.
•oalesiaca, Link, Hort. Berol. i. 127 = K. setacea.
villosa, Link, 1. c. 128 - K. villosa.

AIHOP8I8, Desv. Joura. Bot. i. (1808) 200, pro parte. *GRAM1NEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1156.
agrostidea, *DC. Ft. Ft. Suppl.* 262.—Europ. austr.
ampla, *Nees, ex Steud. Norn.* ed. IIA 45.—Aft. aostr.
aurea, *Nees, in Linnaea,* vii. (1832) 817.—Afr. austr.
brevifolia, Roem. & Schult. Syst. ii. 578-Aira brevifolia.
Candolii, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 200 - agrostidea.
capillaris, Schur, in Oestr. Bot Zeitschr. ix. (1859) 828 - Aira capillaris.
caryophyllea, Schur, 1. c = Aira caryophyllea.
Cupaniana, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. f«60) 88 = caryophyllea.
globosa, *Desv. Journ. Bot.* i. (1808) 200.—Gall.; Hisp.
glabra, *Desv. Opuse.* 64.—Ins. Borbon.
insularis, Nym. Syll. 411=- Aira insnlaris.
involucrata, Desv. Joum. Bot. 1. (1808) 201 = Deschampsia involucrata.
jubata, *Griseb. in Goett. Abh.* zxiv. (1879) 292.—Reg. Argent.
lendigera, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 37=Aira lendigera.
millegrana, Griseb. in Goett. Abh. xiz. (1874) 252 = Eragrostis airoides.
minuta, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 201-Catabrosa minuta.
multiculmis, Lange. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 88 = Aira caryophyllea.
obtusaia, Desv. Journ. Bot. L (1808) 200-Estonia obtusata.
pallida, Nees, ez Stend. Norn. ed. II. i. 45 = Eriachne pallida.
peruviana, [Nees *Sc]* Meyenj Reise, i. 484-Dissanthelium supinum.
praecox, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 328 - Aira praecox.
pulchella, Tenore, Fl. Nap. iii. 56,102 = Avena corymbosa.
Steudelii, Nees, in Linnaea, vii. (1838) 818-Eriachne capensis.
triseta, Nees, ez Steud. Norn. ed. II. i. 45-Eriachne triseta.
tuberculata, Nees, ex Steud. 1. c.=Eriachne tuberculata.

AITCHI8OH1A, Hemsl. ex Aitch. in Joum. Linn. Soc. xix. (1882) 166. 1.14. *RUBIACEAE.*
rosea, *Hemsl. I. c*—Afghan.

AITHALES, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 178 (1886) - Sedum, Linn. (Crassul.).
caespitosa, Webb 8c Berth. 1. c 179, 180=S. caespitosum.
rubens, Webb & Berth. 1. c. 179 = S. rubens.

AITITARA, Endl. Gen. 254. (1837) = ATITARA, Marcgr.=Evodia, Forst (Rutac).

AITONIA, Thunb. in Phys. Sallslt. Handl. i. (1776) 166; Nov. Gen. 62. *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 411.
AYTONIA, Linn. f. Suppl. 49. 303 (1781).
capensis, *Thunb. II. a.—Afr.* austr.

AITOPSIS, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 91 (1888)»Bahrla, Tourn. (Lablat).
foliosa, Rafin. I. c - S. folios*.

AIZODRABA, Four, in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvt. (1868) 335-Draba, Linn. (Cracif.).
aieoides, Fonrr. 1. c. = D. aizoides.
beugesiaea, Jord. & Fonrr. 1. c.—Gallia.
ekrysantha, Jord. & Fourr. 1. c—Gallia.
ochroleuca, Jord. & Fourr. 1. c. = D. algida.
smxigena, Fourr. 1. c. = D. aizoides.
trichocarpa, Jord. & Fourr. 1. c—Gallia.

AIZOON, Linn. Gen. ed. 1.161 (1737). *FICOIDEAE,* Benth. & Hook. f. 1. 854.
VESTING™, Heist Syst. (1748); Fabric. Hort Helmst. 368 (1769).
angusttfolium, D. Dietr. Syn. PI. iii. 180-Acrosaathes angustifolia.
argenteum, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 325-rigidum.
Camforosma, *Reichb. ex Spreng. Syst. Cur. Post.* 195. —Afr. austr.
canariense, Andr. Bot. Rep t 201-Sesuvium pedunculatum.
canariense, *Linn. Sp* PI.* 488.—Ins. Canar.; Afr. bor.; Orient.
contaminatum, Eckl. & Zeyh. Enum. 826-Galenia secunda.
crystallinum, EekL *Sc* Zeyh. I.e. 827=Galena crystallina.
elongatum, Eckl. & Zeyh. 1. c 326 - Galenia secuada.
fistulosum, D. Dietr. Syn. PI. iii. 130-Acrosanthes fistulosa.
fruticosum, Eckl. &´ Zeyh. Enum. 827 - Galenia affinis.
fruticosum, Linn. f. Suppl. 261=Galenia fruticosa.
galenioides, *Fentl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 469.—Afr. austr.
glinoides, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 825 — Galenia secunda.
glinoides, Linn. f. Suppl. 261.—Afr. austr.
Herniaria, Reichb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 46-Galenia hemiariaefolia.
hirsutum, Eckl. & Zeyh. Enum. 326-glinoides.
hispanicum, *Linn. Sp. PI.* 488.—Hispan.
lanceolatum, *Murr. Syst. Veg.* ed. XIII. 892.—Afr austr.
microphyUtm, Bartl. in LUnaea, vii. (1882) 641-Galenia hemiariaefolia.
montevidense, Spreng. ex Rohr, in Mart. Fl. Bras. ziv. II. 310—Sesuvium Portulacastrum.
mossamedense, *Welw. ex Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 684.—Afr. trap.
paniculatum, *Linn. Sp. PI.* 488.—Afr. autr.
papulosum, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 826-Galenia papulssa.
perfoliatum. Linn. f. SuppL 261-Tetragonia Zeyheri.
procumbens, Cnntz, Inst i. 135 — canariense.
propinquum, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 326-Galenia secunda.
pubescens, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. = Galenia secunda. \
quadriñdum, *F. Muell. Fragm.* ii. 148.—Austral,
ngidum, *Linn.f. Suppl.* 261.—Afr. austr.
sarmentosum, *Linn.f. 1. c.* 260.—Afr. austr.
secundum, Linn. £ 1. c. 261—Galenia secunda.
sericeum, Fenzl, ez Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 470-rigidum.
sessilifiarum, Moench, Meth. 698=hispanicum.
spathulatum, *Eckl. & Zeyh Enum.* 825.—Afr. austr.
squamulosum, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 326-Galenia squamulosa.
stellatum, Lam. Encyc. iii. 418—sarmentosum.
tereti/olium, D. Dietr. Syn. PI. iii. lSO-Acrosanthes teretifolia.
tomentosum, Lam. Encyc. iii. 418-paniculatum.
virgatum, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 684.—Afr. toap.
Zeyheri, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i.* 470 — Afr. austr.
zygophylloides, *F. Muell. Fragm.* vii 129.—Austral.

AIZOUM, Linn. Syst. ed. I. (1755)-Aiaoon, Linn. (Ficoid.).

AJAX, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 343-Karoisaua, Linn. (Amaryll.).
(NOTA.—Cl. Baker *Aiaces* omnes ad *Narcissum Pseudo-Nardssum* ducit)
abscissus, Haw. Rev. 116,117 = N. abscissus.
albicans, Haw. Monog. 2 = N. Pseudo-Narcissus.
albus, Haw. Rev. 117 = N. moschatus.

AJAX:—
tricolor, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 346 - N. Pseudo-Narcissus.
breviflos, Haw. Monog. 2. n. 6 - N. Pseudo-Narcissus.
cambricus, Haw. 1. c. 3 — N. Pseudo-Narcissus.
capax, M. Roem. Syn. Ensat. 201=N. Pseudo-Narcissus.
cernuus. Haw. Monog. 2 - N. Psendo-Narcissus.
cuneiflorus, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 343 —N. Pseudo-Narcissus.
cuneifolius. Haw. Rev. 43 - N. Pseudo-Narcissus.
cyclamineus, Haw. Monog. 2. n. 4 - N. Pseudo-Narcissus.
fenestralis, S. F. Gray, Nat An. Brit PI. ii. 191 = N. Pseudo-Narcissus.
festalis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 347 - N. Pseudo-Narcissus, serratus.
glaucus, M. Roem. Syn. Ensat. 199 — N. propinquus.
grandiflorus, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 844 = N. major.
hexangularis. Herb. Amar. 305.—Hab. *1*
hispanicus, M. Roem. Syn. Ensat 200=N. Pseudo-Narcissus.
incomparabilis. Car. Prod. Fl. Tosc. 816 - N. incomparabilis.
lacinularis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 344 = N. propinquus.
lobularis. Haw. in Phil. Mag. (1830) 131=N. Pseudo-Narcissus.
longiflorus, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 849 — N. tortuosus.
lorifolius, Haw. Monog. 2. n. 7 - N. Pseudo-Nsrcissus.
lusitanicus, M. Roem. Syn. Ensat 202 - N. triandrus.
luteus, Herb. Amar. 304, 415. t. 88. f. 83 - N. major.
major, Haw. Rev. 116=N. major.
maximus, Haw. Monog. 3. n. 23 - N. Pseudo-Narcissus.
minimus. Haw. 1. c. 1. n. 1 - N. Pseudc-Nardaius.
minor, Hah. Amar. 299, 415 = N. Pseudo-Narcissus.
moschatus, Haw. Monog. 2 = N. moschatus.
nanus, Haw. 1. c. 2. n. 6 =• N. Pseudo-Narcissus.
nobilis, Haw. Syn. 327 - N. Pseudo-Narcissus.
obvallaris, Haw. Rev. 120 - N. Pseudo-Narcissus.
odorus, Car. Prod. Fl. Tosc. 616 - N. odorus.
patulus, Salisb. in Trans. Hort Soc i. (1812) 848-N. moschatus.
propinquus, Haw. Monog. iii. n. 22 — N. Psendo-Narcissus.
Pseudo-narcissus, Haw. 1. c. 2 - N. Pseudo-Narcissus.
pumilus, Haw. 1. c 1. n. 3 - N. Pseudo-Narcissus.
pygmaeus, M. Roem. Syn. Ensat 201-N. Pseudo-Narcissus.
radians, M. Roem. 1. c. 193=N. Pseudo-Narcissus.
reflexa, M. Roem. 1. c. 202=N. triandrus.
Rudbeckii, U. Roem. 1. 201 - N. Pseudo-Narcissus.
rugilobus, Haw. Monog. 8=N. Pseudo-Narcissus.
Sabiniamus, Herb. Amar. 806=N. Pseudo-Narcissus.
serratus, Haw. Rev. 114 = N. serratus.
sexangularis, M. Roem. Syn. Ensat. 201 - N. Pseudo-Narcissus.
spurius, Haw. Syn. 327 = N. Pseudo-Narcissus.
Telamonius, Haw. 1. c. 326 - N. Pseudo-Narcissus.
tortuosus, Haw. Monog. 2 —N. Pseudo-Naicissus.
tubaeflorus, Herb. Amar. 303 = N. Pseudo-Narcissus.

AJOVEA, Juss. Gen. 80 (1789)-Aiouea, Aubl. (Laurin.).
guianensis, Rafin. Sylva Tellnr. 134-Aiouea tenella.

AJTJOA, Linn. Gen. ed. I. 167. n. 466 (1737). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1222.
ABIGA, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 85.
BUGULA, Moench, Meth. 381 (1794).
GHAMAEPITYS, Toum. ez Rnpp. Fl. Jen. ed. Hall. 220 (1745).
MOSCHARIA, Forsk. Fl. Aogypt. Arab. 158 (1775).
PHLEBOANTHK, Tausch, in Flora, xi. (1828) 322.
acaulls, *Brocchi, in Bibliot. Hal.* xxix. 85.—Europ.
adulterina x, *Wallr. Beitr. Ft. Hercyn.* 221.—Enrop.
africana, Pers. Syn. ii. 109 = Teucriom africanum.
alpestris, Dnm. Fl. Belg. 42—genevensis.
alpina, Fries, Mant. iii. 54 = reptans.
alpina, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 847 = pyramidalis.
alpina, Linn. Mant. 80=geneveasis.
argyrea, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien* 1. (1886) 103.—Lycia.
arenosa, Stev. ez Ledeb. Fl. Ross, ii (49-oblongata,

AJTJCJA :—
nstolonosa, *Sckur, Enum. PI. Transs.* 545.—Enrop.
anstralis, *R. Br. Prod.* 503.—Austral.
Barrelieri, Tenore, Fl. Nap. t. 240. f. 2 = reptans.
bombycina, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 803.—As. Min.
brachystemon, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxvii.** (1883) 19-2.—Reg. Himal.
bractcosa, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* **i. 59.—Afr.** trop.; Ind. or.; As. or.
caespitosa, Schleich. ex Steud. Norn. ed. II. -i. 46 = pyramidalis.
capensis, Pers. Syn. ii. 109 = Teucrium africanum.
Chamaecistns, *Ging. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* **698.** —Persia.
Chamaepytis, Gnss. Fl. Sic. Prod. ii. 66=A. Chia.
Chamaepytis, *Schreb. PI. Vert. Unilab.* 24.—Europ. Oriens.
Chia, *Schreb. 1. c.* 25.—Oriens.
ciliata, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bar.* **51.—Chin. bor.**
comata, *Stapf, in Denischr. Acad. Wien,* **1. (1885) 50.** —Lycia.
controversa, *Bor. in Mlm. Soc. Acad. Maine-et-Loire,* vi. (1859) 136; xiv. (1863) 44.—Gallis.
crenata, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 597 = bracteosa.
cryptostylon, Lagrèze-Fosaat, ex Nym. Consp. 567 = genevensis.
cuncatifoliii, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* **1. (1885)** 102.—Lycia.
decumbens, Tenore, Fl. Nap. Prod.' p. xxxiii'=acaulis.
decumbens, *Thunb. Fl. Jap.* 243.—Japon.
decumbens, D. Don, Prod. 108=macrosperma.
densiflora, Wall. Cat. n. 2031; Benth. in Wall. PI. As. Rar. i. 696 = bracteosa.
densiflora, Tenore, Fl. Nap. t 239. f. 2=reptans.
depressa, Maxim, in Boll. Acad. P&ersb. xxvii. (1883) 192 = parvi flora.
diemenica, Benth. Lab. Gen. et Sp. 695=anstralis.
disticha, Roxb. Fl. Ind. iii. 2 = Anisomeles malabarica.
euphrasioides, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 63=A. Chamaecistus.
flaccida, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 234.—Madag.
foliosa, Tratt. Arch. Gewaechsk. i. 25 = genevensis.
fruticosa, Roxb. Fl. Ind. iii. 1=Anisomeles malabarica.
furcata, Lint, Enum. Hort. Berol. ii. 99 =Crainotome versicolor.
genevensis, *Linn. Sp. PI.* 561.—Enrop.; Oriens.
genevensis, With. Air. Brit PI. ed. III. iii. 516 = reptans.
geniculata, Maxim, in BnlL Acad. Petersb. xxix. (1883) 189=macrosperma.
gUbra, Benth. Lab. Gen. et Sp. 700=laevigata.
glabra,iPKs\, FL Sicul. Praef. 36=A. Chamaepitys.
glabrata, Benth. in Wall. Cat. n. 2041=Anisomeles ovata.
grosse-senata, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* **ii. 467.** —Japon.
Hampeana x, *A. Br. & Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 857.—Enrop.
hnmilis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 114.—Japon.**
hybrida K, *Kerner, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxiv. (1874)** 382 A.—Austria.
Hyoscfami, WalL ex Benth. in Wall. PL As. Rar. i. 59, 46 = bracteosa.
incisa, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxiii. (1877)** 390.—Japon.
intfgrifolia, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Net.* 108.—Nepal.
intermedia, Boiss. & Orph. ex Boiss.. Fl. Orient, iv. 802= A. Chia.
interrupta, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 407=genevensis.
Iva, *Schreb. PI. Vert. Unilab.* **15.—Reg. Mediterr.**
japonic*, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 114.—** Japon.
laevigaU, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 804.—Oriens.
lanata, F. Mart, ex Stead. Nora. ed. II. i. 46= genevensis.
latifolia, Host, Fl. Austr. ii. 119=genevensis.
latifolia, Schur, Enum. PI. Transs. 545 = astonolosa,
Laxmanni, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 697.—Oriens.
Iobata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 108.—Reg. Himal.
lucida, *Bor. in Mlm. Soc. Acad. Maine-et-Loire,* **xxii.** (1868) 9.—Corsica,
lupulina, *Maxim, in Bull. Acad. PHtrsb.* **xxiiL (1877) 890.—**China, bor.

AJU0A:—
lycia, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* **1. (1886) 102.** —Lycia.
inacrosperma, *Wall, ex Benth. in Wall. PI. As. Rar.* i. 58.—Ind. or.
mesogitana, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 62=A. Chia.
mollissima, Wall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 46 = Anisomeles ovata.
montana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 814= genevensis.
moschata, Mill, ex Schreb. PL Vert. Unilab. 26 =-A. Iva.
multiflora, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* **51.—China** bor.
nana, *Gilib. Fl. Lituan.* 828.—Europ.
Nanti, *Bor. in Mlm. Soc. Acad. Maine-et-Loire,* **xiv.** (1863) 44.—Gallia.
oblongata, *Bieb. Fl. Taur.* Case. *Suppl.* 388.—Cancas.
ophrydis, *Burch. ex Benth. in DC. Prod.* **xii. 597.-^** Afr. austr.
orientalis, *Linn. Sp. PI.* 561.—Oriens.
ovata, *Wall. Cat.* n. 2086.—Burma.
palaestina, Boiss. Diagn. Ser. I. xiL 62=A. Ohio.. -
parviflora, *Benth. in Wall. PI. As. Rar. i.* **59,—Reg.** Himal.
pseudoiva, Rob. Cast ex DC. Fl. Fr. v. 895 = A. Iva.
pseudo-pyramidalis, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver Naturw.* iv. (1853) 60.—Europ.
pnmila, *Schur, Enum. PI. Transs.* **545.—Europ.**
pygmaea, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* **N. S. VI.** (1858-9) 402.—Japon.
pyramidalis, Bieb. Fl. Tanr. Cane. ii. 32=genevensis.
pyramidalis, Hnds. Fl. Ang. ed. I. 219=reptans.
pyramidalis, *Linn. Sp. PI.* 561.—Enrop.
remota, Benth. in Wall. PL As. Rar. i. 69 = biaeteosa.
repens, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 447 = reptans.
repens, Roxb. FL Ind. iii. 8=macrosperma.
reptans. *Linn. Sp. PL* 561.—Europ.
robusta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xx. (1884) 235.—** Madag.
rotundifolia, *Willk. & Cut. ex Willk. in Linnaea,* **xxx.** (1859-60) 120.—Hispan.
rugosa. Host, Fl. Austr. ii. 120=genevensis.
rupestris, Schleich. ex Steud. Norn. ed. II. i. 46 = pyramidalis.
salicifolia, *Schreb. Fl. Vert. Unilab.* 26.—As. Min.
salicifolia, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 265=oblongata.
scoparia, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 63 = A. Chamaecistns.
sikkimensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. it 114 in syn. = macrosperma.
sinuate, *S. Br. Prod.* 503.—Austral,
stolonifera, *Jeanb. & Timb. in Bull. Sc. Phys. & Nat. Toulouse,* iii. (1875-76) 677.—Europ.
Tenorii, Presl, Fl. Sicnl. Praef. p. xxxvi. -acaulis.
Thomsoni, Maxim, in BnlL Acad. Petersb. xxix. (1883) 189 =s macrosperma.
tridentata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 701=australis.
tridactylites, Ging. ex Benth. L c. 699 = A. Chia.
trifida, Dulac,.Fl. Hautes-Pyr. 406 = A. Chamaepitys.
trifidifolia. Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 288=A. Chamaepitys.
vesiculifera, *Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xii. (1868)** I. 394.—As. temp.
vestita, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 62.—Graecia.
virgata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 700 = australis.
yesoensis, *Maxim, in Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 467.—Japon.

AJUVEA, Stend. Norn. ed. I. 25 (1821) - Aiouea, Anbl. (Laurin.).

AKANIA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 409 (1862). *SAP/NDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 409.
Hillii, *Hook.f. I.* c—Austral.

AKEA, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 353 (1812)=Blighia, Koen. (Sapind.).
***solitaria, Stakes,* L c. 354 = B. sapida.**

AKEBIA, Decne. in Arch. Mus. Par. i. (1837) 195. t 13. *BERBERIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 42.
clematifolia, *Sieb.* to" *Zucc. Fl. Jap.* i. 146.—Japon.
Iobata, *Decne. in Ami. Sc. Nat.* Ser. II. xii. (1839) 107. —Japon.
quercifolia, *Sieb. (f Zucc. Fl. Jap.* i. 146.—Japon.
quinata, *Decne. in Ann. Sc Nat.* Ser. IL xii. (1889) 107.-China.

AKEESIA, Tussac, Fl. Antill. i. 66 (1808)=Blighia, Koen. (Sapind.).
africana, Tussac, 1. c.=B. sapida.

AKENTRA, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 319=Utricularia, Linn. (Lentib.). •
inflata, Benj. 1. c.—Surinam.

AKLEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 114 (1836) = Euphorbia, Linn.
nudiflora, Rafin. 1. c. = E. nudiflora.

AKYLOPSIS, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1850) 3; cf. Otto, Hamb. Gartz. viii. (1852) 549=Matrlcarla, Linn. (Compos.).
suaveolens, Lehm. 1. c = M. discoidea.

ALACOSPERMUM, Neck. Elem. i. 167 (1790) = **Cryp**totaonia, DC. (UmbelL).

ALAFIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 11 (1809): *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 717.
BLASTOTKOPHE, Didrichs. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 192.
madagascariensis, Rich, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 415 = Thonarsii.
pauciflora, *Radii, in Bremen Abh.* viii. (1883) 403.—Afr.'trop.
Thouarsii, *Roem. Collect,* i. 203.—Madag.

ALAGOPHYLLA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 83 (1836) = Gesnera, Linn.
dasyanthes, Rafin. 1. c.—Hab.?

ALAGOPTERA, Mart. Gen. Comm. 267 (1842) = ALLAGOPTERA, Nees=Diplothemium, Mart. (Palm.).

ALALANTIA, Corr. in Ann. Mus. Hist. Nat. Par. vi. (1804) 883, *err. typ.* = Atalantia, Corr. (Rutac).

ALAMAWIA, LaLlave& Lex. Nov. Veg. Descr. Fasc. ii. (Orch. Opusc.)81. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 526.
punicea, *La Llave (f Lex. I. c.*—**Mexic.**

ALAMANNIA.Lindl. Orch. Seel. 14 (1826)-praec.

ALANDINA, Neck. Elem. ii. 456 (1790)=Moringa, **Juss.**

ALANOIUM, Urn. Enc'yc. i. 17á (1783). *CORNACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 949.
ANGOLAM, Adans. Fam. ii. 85 (1763).
KARA-ANGOLAM, Adans. Fam. ii. 84 (1768).
•*acuminatum,* Wight, ex Steud. Norn. ed. II. i. 47 = Lamarckii.
begoniaefolium, Baill. Hist. PL vi. 270 = Marlea begoniaefolia.
cordifolium, *Zoll. if Mor. ex ZolL Syst. Vert. Ind. Archip.* 68.—Malaya.
decapetalum. Lam. Encyc i. 174 •• Lamarckii.
ebenaceum, Griff, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 742 = Marlea ebenacea.
frntescens, *Zoll. & Mor. ex Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip. S3.*—**Malaya.**
glandulosum, Thw. Enum. PL Zeyl. 183 = Lamarckii.
hexapetalum. Lam. Encyc. i. 174=Lamarckii.
Lamarckii, *Thv>. Enum. PI. Zeyl.* 183.—Geront. trop.
latifolium, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. .ii. 741= Lamarckii.
Mohillae, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. vL (1856) 105. —Ins. Comor.
octopetalum, Blanco, Fl. Filip. ed. II. **810=**LamaTckii.
sundanum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 774=Lamarckii.
tomentosum,Lam. Encyc. i. 174=Lamarckii.

ALANIA, Endt. Gen. PI. 161 (1886). *LI LI ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 797.
ALLANIA, Meissn. Gen. 401 (304) (1842).
Cnnninghami, *Steud. Norn.* ed. II. i. 47.—Austral.
Endiicheri, £unth, Enum. PI. iv. 644 = CunninghamL

ALARQONIA, DC. Prod. v. 537 (18S6)=Wyethia, Nutt. (Compos.).
angustifolia, DC. 1. c.=W. angustifolia.
helenioides, DC. 1. c. = W. robusta.

ALATERNOIDES, Adans. Fam. ii. 304 (1763) = Fhylica, Linn. (Rhamnac).

ALATERNUS, [Tonra.] Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1752)=Bhamnus, Linn.
alpinus, Moench, Meth 844=R. alpinus.
angustifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = R. Alatemus.
balearica, Dubam. ex Steud. Norn. ed. I. 685 = R. Alatemus.
cordatus, Rafin. Sylva Tellnr. 27.—Hab. *1*
glabra, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n.2=R. Akternns.
glandulosus, Rafin. Sylva Tellur. 27 = K. glandulosus.
hispanicus, Hort. ex Steud. Norn. ed. I. 685 = R. Alatemus.
hybridus, Rafin. Sylva Tellur. 27 = R. hybridus.
integrifolius, Rafin. 1. c. = R. integrifolius.
lanceolatus, Rafin. 1. c. = R. lanceolilus.
lati/olia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 = R. Alateraus.
ovatus, Rafin. Sylva Tellur. 27.—Hab. ?
Phylica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = R. Alatemus.
prinoides, Rafin. Sylva Tellur. 27=R. prinoides.
pumilus, Rafin. 1. c. = R. pumilus.
rotundifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 685=R. Alatemus.
sempervirens, Roehl. ex Steud. Nom. ed. I. 493 = Lonicera sempcrvirens.
variegata, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 685 = R. Alatemus.

ALATHRAEA, Steud. Nom. ed. II. ii. 13, in syn. (1841) =seq.

ALATRAEA,Neck. Elem. i. 374 (1790)=Phfllypaea, Tourn. (Orobanch.).

ALBERSIA, Kunth, Fl. Berol. ed. II. ii. 144 (1888) = Amarantus, Linn.
arenaria, Schur, Ertum. Fl. Transs. 566 = Am. Blitum.
ascendens, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 142 = Am. ascendens.
Blitum, Kunth, Fl. Berol. ed. II. ii. 144 = Am. Blitum.
caudata, Boiss. Fl. Orient, iv. 992 = Am. viridis.
deflexa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 142 = Am. deflexus.
gracilis, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 237 = Am. gracilis.
Uvida, Kunth, Fl. Berol. ed. II. 144 = Am. Blitum.
oleracea, Kunth, 1. c. = Am. blitum.
polygama, Boiss. Fl. Orient, iv. 991= Am. polygamus.
polygonoides, Kunth, Fl. Berol. ed. II. ii. 144 = Am. polygondides.
polystachya, Kunth, 1. c. = Am. polystachyus.
prostrata, Kunth, 1. c.=Am. deflexus.

ALBERTA, E. Mey. in Iinnaea, xii. (1838) 258. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 109.
laurifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvlii. (1881) 271.—Madag.
mafina, *E. Mey. in Linnaea,* xii. (1838) 258.—Afr. austr.
minor, *Bai'll. Adansonia,* xii. (1876-79) 247.—Madag.

AIiBEBTIA, Regel & Schmalh. in Act. Hort Petrop. - (1877) 603. *UMBELLIFERAE.*
eommutata, *Regel & Schmalh. 1. c.* 604.—Turkestan,
roargaritifera, *Regel & Schmalh. 1. c.* 605.—Turkestan.
Paleacea, *Regel & Schmalh. 1. c.* 606.—Turkestan.

ALBERTINIA, Sprang. Neue Entdeck. ii. 133 (1821). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 227.
SYMBLOMERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 284.
arborea, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 286 = Vanillosmopsis arborea.
oardanoides, Mart, in DC. Prod. v. 81=Vemonia crotonoides.
bicolor, DC. Prod. v. 81 = Eremanthus bicolor.

AIiBBRTINXA. :—
bicolor, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 236 =• Eremanthus incanus.
brasiliensis, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 133.—Bras.
Candolleana, Gardn. in Hook Lond. Joum. Bot. v. (1846) 235 = Vanillosmopsis erythropappa.
capitata, DC. Prod. v. 82 = Vanillosmopsis capitata.
Clausseni.Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 15 = Vanillosmopsis erythropappa.
crotonoides, DC. Prod. v. 81 = Vernonia crotonoides.
Elaeagnus, Mart, ex DC. 1. c. = Eremanthus Elaeagnus.
erythropappa, *DC. in Deless. Ic. Sel.* iv. t. 5.—Bras.
erythropappa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 286-= Vanillosmopsis polycephala.
glomerulata, DC. Prod. v. 82 = Eremanthus glomerulatus.
gonoclados, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 144 = Fiptolepis Martiana.
goyazensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot vi. (1847) 425 = Eremanthus goyazensis.
incana, Less, in Linnaea, iv. (1829) 342=Eremanthus incanus.
incanescens. Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 15 = Vanillosmopsis erythropappa.
mollis, Sun. Bip. ex Baker, 1. c. 164=Eremanthus mollis.
multiflora, Mart, in DC. Prod. v. 82 •= Vanillosmopsis poLycephala.
obtusata, Mart. 1. c. 81 = Eremanthus glomerulatus.
Oleaster, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 145 = Vemonia Oleaster.
pallidiseta, DC. Prod. v. 81=Eremanthus glomerulatus.
polycephala, DC. 1. c. 82 = Vanillosmopsis polycephala.
rufiseta, DC. I. c. *HI* = Eremanthus glomerulatus.
saligna. Mart in DC. L c. 82=Vanillosmopsis polycephala.
stellata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ Bot.* v. (1846) 235.—Bras.
verbascifolia. Mart, in DC. Prod. v. 81 = Vemonia crotonoides.

ALBERTINIA, DC. Prod. v. 82, pro parte (1836) = Vanillosmopsia, Sen. Bip. (Compos.).

ALBERTI8IA, Becc. Malesia, i. (1877) 161. *MENISPERMACEAE.*
papuana/iterc. /. *c.* 162 =N. Guin.

ALBIKIA, *TJc* C. PresI, Rel. Haenk. i. 184 et 84, 35 (1828)=Hypolytrum, Rich. (Cyperac).
schoenoides, C. PresI, 1. c. 185 = H. trjnervium.
scirpoides, C. PresI, 1. c. = H. latifolium.

ALBINA,.Giseke.Prael. Linn. 199,207 (1792) = Alpinia, Linn. (Scitam.).

ALBINEA, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astral, et Zel. 37 (1858)=Pleurophyllum, Hook, f. (Compos, i.
oresigenesa, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. 1. c.=P. oresigenesora.

ALBIZIA, Auct. = seq.

AIiBIZZIA, Durazz. in Mag. Tosc. iii. IV. (1772) 11; F. Muell. in Joum. Bot. x. (1872) 8. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 596.
BESENNA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 253 (1847).
SERIANTHES, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 84 in nota.
SERICANDRA, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1888).
ZYGIA, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot iii. (1844) 92.
acrodena, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. *Suppl.* 281.—Sumatra.
affinis. Fount, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 371=amara.
altissima, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 332=Pithecolobium altissimum.
amara, *Boiv. in Encyc. xix. Siicle,* ii. 34.—Ind. or.
amoenissima, *F. Muell. Fragm.* viii. 166.—Austral,
angolensis, *Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 360.—Afr. trop.
anthelmintica, *Brongn. in Bull. Soc. Bot.Fr.* vil. (1860) 902.—Abyss,
auriculata, *Fourn.* in Ann. Sc. Nat Sér. IV. xii. (1865) 400.-N. Caled. ">
basaltica, *Benth. Fl. Austral,* ii. 422.—Austral.

AIiBIZZIA :—
Benthamiana, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. 30 = montana.
bigemina, F. Muell. Sel. PI. Indust Cult. 264 = Pithecolobinm bigeminum.
Boivini, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. xiv. (1860) 378.—Madag.
brachycalyx, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 361.—Afr. trop.
Brownii, *Walp. Rep.* i. 928.—Afr. trop.
bubalina, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiv. (1876) II. 12U.—Ins. Nicob.
canescens, *Benth. Fl. Austral,* ii. 423.—Austral.
Championi, Benth. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 79 = l'ithecolobium lucidum.
Charpentieri, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 400.—N. Calcd.
clypearia, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiv. (1876) II. 129.—Ins. Nicob.
conjugato-pinnata, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 278.—Afr. trop.
coriacea, E. Muell. Sel. PI. Indust. Cult 264=Pithecolobium subcoriaceutn.
coriaria, *Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 360.—Afr. trop.
cyclosperma, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 527=fulgens.
dulcis, F. Muell. Sel. PI. Indust. Cult. 12=Pithecolobium dnlce.
elata, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 527 =procera.
elegans, *Kurt, in Pegu Rep. App. B.* 47.—Burma,
elliptica, *Fourn. in Ann. Sc. Nat. Six.* IV. xiv. (18«0) 374.—Abyss,
fasciculate, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiv. (1876) H. 129.—Ins. Nicob.
fastigiata, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 361.—Afr. trop.
ferruginea, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot..* iii. (1844) 88.—Abyss.
floribunda, Fenzl, Reliq. Kolschy (1868). 6. h 4 = anthelmintica.
Forbesii, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 92.—Afr. trop.
Fournieri, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1865) 341 = Pithecolobium Foumieri.
fulgens, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 65.—Austral.; N. Caled.
glaberrima, *Benth. I. c.* 88.—Guinea,
glabrescens, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 857.—Afr. trop.
glomeriflora, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 74.—Burma,
granulosa, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 85.—N. Caled.
Harveyi, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 394'. —Afr. trop.
Hendersonia, F. Muell. in Joum. Bot. x. (1872) 10 = Pithecolobium Hendersonii.
heterophylla,Ar«rs, *in Journ. As. Soc. Beng.* xiv. (1876) II. 800.—Burma.
hypoleuca, Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 356 = Harveyi.
Isembergiana, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 527 = A. Julibrissin.
Jaubertiana, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xiv. (I860) 381.—Madag.
Jiringa, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiv. (1876) II. 300.—Burma.
Julibrissin, *Duratt. in Mag. Tosc.* iii. IV (1772) 11.—As.; Afr. trop.
Junghuhniana, F. Muell. in Joum. Bot. x. (1872) U = Pithecolobium Junghuhnianum.
latifolia, Boiv. in Encyc. xix. Siècle, ii. 83 = A. Lebbek
latisiliqua, F. Muell. Sel. PI. Indust. Cult. 12 = Lysiloma latisiliqua.
Lebbek, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 87.—Geront. trop.
lebbekioides, Benth. I. c. 89 = odoratissima.
lentiscifolia, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 659.—N. Caled.
littoralis, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned. Ind.* xxix. (1S66) 259.—Molucc.
lomatocarpa, DC. Prod. ii. 467 = odoratissima.
lophantha, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 86.—Austral.
lucida, *Benth. 1. c.*—Ind. or.; Malaya,
macrothyrsa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. *Suppl.* 281.—Java.
malacophylla, Walp. Ann. ii. 457 - ferruginea.
marginata, Iiuch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5243 = stipulate.

ALBIZZIA:—
micrantha, Boiv. in Encyc. xix. Siècle, ii. 34 = odoratissima.
Milleti, *Bentk. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1846) 89.—China.
mollis, Boiv. in Encyc. xix. Siècle, ii. 33 - A. Julibrissin.
molnccana, *Afiq. Fl. Ind. Bat.* i. 26.—Ins. Molncc.
monilifera, *F. Muell. in Journ. Bot.* x. (1872) 10.—Austral.
montana, *Bentk. in Miq. PI. Jungk.* 267.—Java,
mossambicensis, *Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* i. 4.—Aft. trap,
myriophylla, *Bentk. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 90.—Ind. or.
ne/asia, Walp. Ann. ii. 457 = Acacia abyssinica.
nellyrenea,K. Grah.inWall. Cat. n.5240=amara.
Nemu, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 527 = A. Julibrissin.
Neumanniana, *Heynh. Nom.* ii. 17.—AustraL
obovata, *Bentk. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1876) 568.—N. Caled.
odoratissima, *Bentk. in Hook. Lund. Journ. Bot.* iii. (1844) 88.—Ind. or.
paivana, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xv. (1861) 172.—N. Caled.
pallida, *Fount. I. c.* xiv. (1860) 875.—Abyss.
pallida, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 284-Harveyi.
pedicellata. *Baker, ex Bentk. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 563.—Malacca.
Petersiana, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 862.—Afr. trop.
polyphylla, *Fount, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiv. (1860) 872.—Madag,
proceia, *Bentk. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 89.—As. trop.; Austral.
pruinosa, F. Mnell. in Joora. Bot. x. (1872) 9-=Pithecolobium pruinosum.
purpurascens, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 28-stipulata.
purpurea, *Boiv. ex Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiv. (1860) 878.—las. Comor.
Qnartiniana, *Walp. Ann.* ii. 457.—Abyss,
ramiflora, *F. Muell. Fragm.* ix. 178.—Austral,
retusa, *Bentk. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 90.—Ins. Philipp.
rhombifolia, *Bentk. I. c.* 87—Senegal.
rivularis, Foum. in Ann. Soc. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 172=fulgens.
rosea, *Carr. in Rev. Hortie.* (1870-71) 490.—Am. bor.
rostrata, Blume, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 24=Pithecolobium rostratum.
rotnndata, *Blume, 1. e.* 20.—N. Guinea,
ruiiginosa, *Miq. I. c.* 27.—Java,
rnfa, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1844) 101.—As. trop.; Java.
salajeriana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* L I. 21.—Ins. Salager.
Saman, F. Muell. SeL PI. Indust. Cult. 12-Pithecolobium Saman.
saponaria, *Blume, Miq. Fl. Ind. Bat. i.* 1.19.—N. Guin.
Schimperiana, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* it 359.—Afr. trop.
sericocepkala, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 91=amara.
Smitkiana, Benth. 1. c. i. (1842) 527= stipulate.
spedosa, Benth. 1. C.-A, Lebbek.
splendens, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 280.—Sumatra,
stipulate, *Boiv. in Encyc. xix. Siicle,* ii. 33.—Ind. or.
streptecarpa, *Fourn. in Bull. Soc. Bot Fr.* xii. (1865) 399.—N. Caled.
subfalcata, *Bev'h. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 559.—N. Caled.
Sutherland!, *F. Muell. Fragm.* vL 22—Austral
tenerrima, De Vriese, in Miq. PI. Jungh. 270=Acacia pennata.
tengerensis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 25.—Java.
Teysmanni, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiv. (1876) II. 299, 800.—Burma.
Thozetiana, *F. Muell. ex Bentk. Fl. Austral,* ii. 422.—Austral.
tomentella, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 20.—Jana.
Toteri, F. Muell. in Joum. Bot x. (1872) 10-Pithecolobinm grandiflorum.
umbrosa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 86=Calliandra umbrosa.
Vaillantii, F. Muell. Fragm. v. 9-Arcbldendron Vaillantii.
venicolor, *Welv. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 869.—Afr. trop.

ALBIZZIA:—
viridis, *Fourn. in Ann. Se. Nat.* Sér. IV. xir. (1860) 877.—Madag.
Welwitschii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 862.—Afr. trop.
Wigktii, Wight & Am. Prod. 274 =amara.
Wigktiana, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5259=amara.

ALBRADIA, D. Dietr. Syn. v. 280 (1852) -seq.

ALBRANDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 609 (1826) = StreblUB, Lour. (Urtic).
Gaudickaudi, D. Dietr. Syn. PI. v. 280 - S. asper ?
orientalis, D. Dietr. 1. C.-S. asper.
spinosa, D. Dietr. 1. c -Taxotrophis zeylanlca.
timorensis, D. Dietr. 1. e. = Taxotrophis zeylanica.

ALBUCA, Linn. Sp. PI. ed. II. 438 (1762). *UUACEAE,* Bentb. *8c* Hook. f. iii. 809.
BBANCIONA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 36 (1866). °
FALCONERA, Salisb. 1. c. (1866).
NEMAULAX, Rafin. Fl. Tellur. iii. 52 (1836).
PALLASTEMA, Salisb. Gen. PL Fragm. 36 (1866).
VIRDIKE, Adans. Fam. ii. (19) (1768).
abyssinica, *Dryand. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* (1784) 297; *Jocq. CM.* i. 55.—Afr. anstr.
alba, Lam. Encyc. i. 76=altissima.
altissima, *Dryand. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* (1784) 292 ; *Jacq. Coll.* ii. 264.—Afr. austr.
angolensis, *Welv. Apont.* 591; *et in Sound. Ref. Bot.* t. 388.—.Angola.
atthericoides, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 417 = Oraitho.galum suaveolens.
aurea, *Jacq. Coll.* iv. 202.—Afr. austr.
Bainesii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii (1873) 290.—Afr. .trop.
oaudata, *Jacq. Coll.* iv. 208.—Afr. austr.
chlorantha, *Welvj. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (187S) 251.—Angola,
coarctata, *Dryand. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* (1784) 295.—Afr. austr.
Cooped, *Baker, in Joum. Bot.* xii. (1874) 866.—Afr. austr.
cornuta, [DC. in] Red. Liliac. i.t 70=altissima.
elastica, Salisb. Prod. 239 = abyssinica.
elata, Salisb. 1. c. 288=altissima.
Elwesi, Regel, in Act Hort. Petrop. vi. (1879) 538 = Wakefieldii.
exuviata, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 871=Urginea exuviata.
fastigiata, *Dryand. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* (1784) 296.—Afr. austr.
fibrosa, *Baker, in Card. Chron.* (1874) II. 886.—Afr. austr.
fili/olia, Ker-Gawl. Bot. Reg. vii. t. 557=Urginea filifolia.
flaccida, Baker, in Saund. Bot. Ref. t. 33i=Cooperi.
flaccida, *Jacq. Coll.* iv. 201.—Afr. anstr.
fragrans, *Jacq. Hort. Sckoenb.* i. 44. t. 84.—Afr. austr.
fugax, Ker-Gawl. Bot. Reg.iv. t.311 «• Urginea fragrans.
galeata, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 251.—Angola.
Gardeni, Hook. Bot. Mag. t. 4842=Speirantha convallarioides.
glandulosa, *Baker, in Gard. Chron.* (1875) I. 814.—Afr. austr.; China.
juncifolia, *Baker, I. c.* (1876) I. 584.—Afr. austr.
juncifolia, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser, II. i. (187fl) 251 = monophylla.
longifolia, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 47.—Afr. austr.
lutea, Lam. Encyc. i. 76-major, minor,
major, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 488.—Afr. austr.
maxima, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 9.—Afr. austr.
minor, Gleditsch, in Mem. Acad. Berl. (1796) 81 = Uropetalum serotinum.
minor, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 438.—Afr. austr.
monophylla, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 251.—Angola.
myogaloides, *Welw. ex Baker, I. c.* 250.—Angola.
Nekoni, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1880) II. 188.—Afr. austr.
nematodes, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 626.—Afr. austr.
parviflora, *Donn, Hort. Cant.* ed. II. 41.—Afr. austr.
physodes, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1046=-Urginea physodes.
polyphylla. *Baker, in Gard. Chron.* (1874) 1.471.—Afr. austr.
rigida, *Salisb. Prod.* 239.—Afr. austr.
setosa, *Jacq. Coll. Suppl.* 100.114.—Afr. auto.

ALBTJCA:—
Shawii, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 367.—Afr. •austr.
sordida, Salisb. Prod. 288 = major,
spiniis, *Linn. f. Suppl.* 196.—Afr. austr.
subspicata, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 251.—Angola,
tenuifolia, *Baker, in Saund. Ref. Bot.* t 335.—Afr. austr.
viridiflora, *Jacq. Coll. Suppl.* 98.—Afr. austr.
viscosa. *Linn.f. Sup/4.* 196.—Afr. austr.
vittata, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t 1329 - Ornithogalum vittatum.
Wakefieldii, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6429.—Afr. trop.
Yerburyi, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiL (1884) 870.—Aden.

ALBUCEA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 109 (1880)-Ornithogalum, Linn. (Liliac.).
chlorantha, Reichb. Ic Fl. Germ. t. 1032 = 0. nutans.
nutans, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 110 = 0. nutans.

ALBUGA, Schreb. Gen. i. 221 (1789) *err. typ.*=Albuoa, Linn. (Lili.ic).

ALBUGOIDES, Medic in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 372=Albuoa, Linn. (Liliac.).
erectum, Medic. 1. c.—Afr. austr. ?

ALCAEA, Hill, Hort. Kew. 218 (1768); Burm. f. Fl. Ind. 149 (1768)-Althaea, Linn. (Maine.).

ALCAMASPINORA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 6.—Quid?

ALCANNA, Gaertn. Fruct. ii. 133.1.110 (1791) - Lawaonia, Linn. (Lythrar.).
spinosa, Gaertn. L c. = li alba.

ALCANNA, Orph. in Bull. Congr. Bot. Pétersb. 1869 (1870) 138=AUcanna, Tausch (Borag.).

ALCEA [Toum.1 Linn. Syst. ed. I. (1736)*, Althaea, Toum. (Malvac.).
acaulis, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 251 = Alth. acaulis.
aegyptiaca, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 103-Alth. lavataeriflora.
africana, Lour. Fl. Cochinch. 421=Alth. africana
apterocarpa, Boiss. Fl. Orient, i. 830=Alth. apterocarpa.
Aucheri, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 252 - Alth. Aucheri.
Calverti, Boiss. Fl. Orient, i. 882 - Alth. Calverti.
denudata, Boiss. 1. c 833.—Armenia.
digitata, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 252 =• Alth. lavateraeflora.
Jicifolia, Linn. Sp. PI. 687=Alth. ficifolia.
ficifolia, Nym. Consp. 127 = Alth. rosea.
glabrata, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 252 = Alth. ficifolia.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient, i. 830.—Syria.
Heldreichii, Boiss. 1. c. 832-Alth. Heldreichii.
Hohenackeri, Boiss. 1. c 833 = Alth. Hohenackeri.
indica, Burm. f. Fl. Ind. 149.—Java.
iurdica, Alef. in Oestr. Bot Zeitschr. xii. (1862) 252, 253 = Alth. kurdica.
lasiocalycina, Boiss. FL Orient, i 830.—Armenia.
lavateraeflora, Boiss. L c. 828=Alth. lavateraeflora..
lilacina, Boiss. 1. c. 831—Alth. apterocarpa.
microckiton, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 254.—As. Min.
pallida, Bess. Enum. PI. Volh. 28-Alth. pallida.
palmata, Gilib. Fl. Lituan. i. 65=Malva Alcea.
pinnatifida, Gilib. 1. c. 66 = Malva moschata.
pontica, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 201.—Turcia
procumbens, Medic, in Act Acad. Theod. Palat. iii. Phys. (1775) S85. t. 17.—Hab.J
remotiflora, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 252=Alth. remotiflora.
rkyticarpa, Trautv. ex Boiss. Fl. Orient i. 827=Alth. sulphurea.
rosea, Linn. Sp. PI. 687 = Alth. rosea.
rosea, talk, Beitr. ii. 221 = Alth. ficifolia.
rufescens, Boiss. FL Orient, i. 828-Alth. rufescens.
rugosa, Alef. in Oestr. Bot Zeitschr. xii. (1862) 254 - ficifolia.
schiratana, Alef. 1. c. 252=Alth. kurdica.
setosa, Alef. 1. c. 256-Alth. setosa.
striata, Alef. 1. e. 262-Alth. striata.
sulphurea, Alef. 1. c-Altb, sulphurea.

ALCHEHTLIiA, Linn. Syst. ed. I. (1735). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 621.
APHANES, Linn. Gen. ed. I. 33 (1737).
PKRCEPIER, Dill, ex Moench, Meth. 690 (1794).
abyssinica, *Fres. in Mus. Senkenb.* ii. (1837) 161.—Abyss.
achilleaefolia, Remy, in Ann. Sc Nat. Sér. III. viU. (1817) 224, linea pennltima = pinnata.
aattilaba, Stev. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxix. (1856) II. 173—vulgaris.
data, Ruiz & Pav. ex Steud. Norn. ed. II. i. 47= pinnate,
algida *x, Bruegg. in Jahresb. Naturf I Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1680) 64.—Enrop.
alpestris, V. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 88 =vulgaris.
alpina, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 114=seric6u
alpina, *Linn. Sp. PI.* 123.—Reg. bor. temp.
ombigens,JoTi. ex Nym. Consp. 238-vulgaris.
Aphanes, Leers, Fl. Herbbra. 54=arrensis.
aphanoides, *Mutis, ex Linn. f. Suppl.* 122.—N. Granat.
argentea, Lam. Fl. Fr. iii. 803- alpina.
arvensis, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 115.—Reg. bor. temp,
barbata, *Presl, Epim. Bot.* 109.—Pentv.
Wiurcata, *mis. V Boj. ex Baill. in Bill. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 842.—Madag.
capensis, *Tkunb. Prod. PI. Cap.* 81.—Afr. austr.
ceylanica. Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 361, sphalm.-iadica.
ciliata, Willd. ex Steud. Norn. ed. IL i. 47, 48=orbiculata.
conglomerata, F. VV. Schmidt, FL Boëm. iii. 89=vulgaris.
conjunct a, Bab. in Mag. Nat Hist. x. (1842) 26=alpina.
cornucopioides, *Roem. VSchult. Syst.* iii. 471.—Hispan.
cryplantha, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 259.—Abyss.
cuneata. Gaud. Syn. Fl. Helv. 117-pentaphyllea.
cuneifolia, Nutt ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 432 -arvensis.
deodroidea, *Zoll. in Nat. en Genecsk. Arch. Need. Indie,* I (1844) 484.—Malaya.
Mandra, Willd. ex Stend. Norn. ed. II. 1. 48=rupestris.
elongata, *Eckl. If Zeyh. Enum.* 264.—Afr. austr.
equisetiformis, *Trev. in Bot. Zeit.* vii. (1849) 215.—Venezuela.
erodiifolia, *WtJd. Chi. And.* ii 247—N. Granat
npatoria, Michx. Fl. Bor. Am. i. 287.—Am. bor.
*fi**a,* Scham. ex Sturm, Deutschl. Fl. Heft 56 (1830) -pyrenaica.
"lgida, *Wedd. Chi. And.* ii. 245.—Boliv.
«»}ioides, *Benth. PI. Hartm.* 134.—N. Granat
galioides, *Trev. in Bot. Zeit.* vii. (1849) 215.—Venezuela.
Geheebii, *Siegfr. ex Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxv. (1882) 70.-fcurop.
glaherrima, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 89-vulgaris.
glabra, Suffr. in Flora, xix. (1836) 821=vulgaris.
glabrata, Tausch, ex Steud. Norn. ed. IL i. 48 = vulgaris.
glaucescens, Wallr. in Iinnaea, xiv. (1840) 849 = vulgaris.
^unae, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wtim,* xvii., 0868) 668—Afr. trop.
Helvetica x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* H. xxiii-xxiv. (1880) 64.—Europ.
*«¥««tfM/«,Schleich.ex Steud. Nom. ed. II. i. 48 = ..Pentaphyllea
nirsuta,ff. *B.VK.Ntn. Gen.etSp.vi.226.*—Am. austr.
kyirida, F. W- Schmidt, FL Boëm. iii. 89=vulgaris.
Wjca, *Gardn. in Cole. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) . 8—Mont. Nilghir.; Zeylan.
intermedia, [Clairv.l Man. Herb. 48=alpina.
'"Kfolia, Salisb. Prod. 361=vulgaris.
^WjWeriana, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 124.—Arg. Argent.
\obata, Pall. Reise, ii. 568=vulgaris.
'ycopodioides, *Trev. in Bot. Zeit.* vii. (1849) 216.—Venezuela.
"Wdagascariensis, *O. Hoffm. in Bremen Abh.* vii. --(1882)336.-Afr.trop.
Mandoniana, *Wedd. CM. And.* ii. 246.—Boliv.
™2?<«P«, *Boiss.* cV *Rent. Diagn. Hisp.* 11.—Hispan.•
*« " i Tausch, ex Host, Fl. Austr. i. 219 = pyrenaica.
"'Mf, Hudi. Fl. Angl. ed. I. 69= vulgaris.
**onandra,* Stokes, Bot. Mat. Med. i. 236 = arvensU.
Wonandria, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 88.—Ind. occ.
"">ntana,* F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 88-vulgaris.

ALCHEMILLA:—
multicaulis, Tausch, ex Steud. Nom. ed.IL L 48-vulgaris.
jnultifida, *Scheele, in Flora,* xxvi. (1848) 449.—Europ.
nivalis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 224. t 560.—Equador.
occidental, Nutt. in Torr. *Sc* Gray, FL N. Am. L 482 = arvensis.
orbiculata, *Ruit V Pav. Ft. Per.* i. 68.—PeniT.
palmata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfi. Docum.* 163, nomen.—Afr. austr.
palmata, Gilib. Exercit ii. 429-vulgaris.
palmatifida, Tausch, ex Reichb. PI. Crit i S> pyrenaica.
Paniculata, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 89 = vulgaris.
pectinata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vL 226 = orbicnlata.
pedata, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* L 260.—Abyss.
pentaphyllea, *Linn. Sp. PI.* 123.—Europ.
pinnata, *Ruia & Pav. Fl. Per.* i. 69.—Pernv.
polylepis, *Wedd. CM. And.* ii. 246.—Am. austr.
potentilloides, Hils. & Boj. ex Baill. in BulL Soc. Linn. Par. i. (1882) 843-madagascariensis.
pratensis, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 88=vulgaris.
pubescens, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 114=vulgaris.
pubescens, Willd. Hort BeroL t 79=praec.t
pusilla, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 159.—Afr. bor.
pyrenaica, *Dufour, in Ann. Gin. Sc. Phys.* viii. (1821) 228.—Mont Pyren.
repens, *Presl, Epim. Bot.* 199.—Peruv.
Rothii, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 378.—Afr. trop.
rupesiris, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 224.—Quito.
Rutenbergii, *O. Hoffm. in Bremen Abh.* vii. (1882) 836.—Afr. trop.
schizophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1864) 137.—Madag.
sericata, Reichb. PI. Crit. i. 6, in obs. = vulgaris.
sericea, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 171, in nota.—Oriens.
sibbaldiaefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 226. t 561.—Mexic
stemmatophylla, *Wedd. Chi. And.* ii. 248. t 76.—N. Granat.
subsericea. Rent. Compte-rend. Soc. Hallér. (1853-54) 20 = alpina.
sylvestris, F. W. Schmidt, FL Boëm. iii. 88=vulgaria.
tenuicaulis, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* tii. (1864) 191.—Afr. trop.
triloba, Gilib. Exercit. ii. 430 = arvensis.
tripartita, *Rui* b" Pav. Fl. Per.* i. 88.—Perov.
truncata, Tausch, ex Steud. Nom. ed. II. i. 48 = vulgaris.
velutina, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 864.—Am. bot.
venusta, *Cham. Vf Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 573.—Mexic.
villosa. *Jungh. in Nat. en Geneesh. Arch. Neerl. Indie,* ii. (1845) 46.—Java,
vulcanica, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 678.—Mexic.
vnlcanica, *Zoll.* b* *Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie,* ii. (1845) 687.—Malaya,
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 123.—Reg. bor. temp.
vulgaris, Wight, Ic. t. 229 = indica.

AIiCHOKETBA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 98 (1788).
EUPHORBIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 814.
APARISTHMIUM, Endl. Gen. 1112 (1841).
BLEEKERIA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 407 (1869).
CLADODES, Lour. Fl. Cochinch. 674 (1790).
COELEDOGYNE, T. Sm. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 509. t 86.
DIDEROTIA, Baill. Adansonia.i. (1860-61) 274.
HERMESIA, Humb. *St* BonpL in Willd. Sp. PL iv. 809 (1805).
LAUTEHBERGIA, BailL Etud. *da.* Euph. 451 (1858).
ORFILEA, Baill. 1. c. 452 (1858).
PALISSYA, BailL I.e. 602 (1858).
PSEDDOTREWIA, Miq. FL Ind. Bat. i. II. 414 (1869).
SCHOUSBOEA, Scham. Beskr. Guin. PL 449 (1827).
STIPELLARIA, Benth. in Hook. Kcjr Joam. vi. (1854) 2.
WETRIA, Baill. Etud. Gin. Enph. 109 (1858).

AIiCHOBNEA:—
acutifolu, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 171.—Peruv.
Blumeana, *Muell. Arg. I. c.* 167.—Java,
castaneaefolia, *A. Juss. Tent. Euph.* 42.—Fl. Orinoco,
columnularii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xL H. 378.—Bras,
cordata, *Benth. in Hoot. Niger Fl.* 607.—Afr. trop.
cordata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. IL 901.—Am. trop.
cordifolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 170.-Afr. trop.
coriacea, *Muell. Arg. 1. c.* 168.—Madag.
cuneata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat iv. 122™ cuneifolia.
enneifolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 900.—Sumatra.
Davidi, *Franch. PI. Davidian. I* (1884) 364.—Mongolia.
discolor, *Poepp. & Endl. Nov. Gen.* iii. 19.—Bras.
Duparquetiana, *Baill. Adansonia,* xi. (1878-76) 175.—Afr. trop.
erythrosperma, *Klottsch, ex Benth. in Hook. Kern Journ.* vi. (1864) 331.—Bras,
floribunda, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* i. (1863) 336.—Afr. occ.
Gardneri, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. il864) 435.—Bras,
glandulosa, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. etSp.* iii. 18. t 221.—Bras.
glandulosa, Poit. ex Baill. Etud. Gen. Euph. 446-latifolia.
grandiflora, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 170.—Venezuela.
grandis, *Benth. Bot. Sulph. Vcy.* 164.—Am. trop.
Hilariana, *Baill. Adansonia,* v. (1864-65) 240.—Bias,
hirtella, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 507.—Afr. trop.
ilicifolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 170.—Austral,
intermedia, *Klottsch, ex Benth. in Hook. Kev> Journ.* vi. (1854) 331.—Bras.
Iricurana, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* 24.—Bras.
javensis, MnelL Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 170 =rugosa.
janeirensis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 16-nemoralis.
latifolia, Klotzsch, in Hook. Lond. Journ. Bot U. (1843) 46-cordata.
latifplia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 98.—Ind. occ.
macrophylla. Mart Herb. Fl. Bras. 271-cordata.
madagascariensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 900.—Madag.
Martiana, *Muell. Arg, in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 876.—Bras,
megalophylla, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 484.—N. Granat
mollis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 168.—Ind. or.
multispicata, *Muell. Arg. I. c.* 168.—Madag.
nemoralis, *Mart. Herb. Fl. Bras.* 271.—Bras,
parviflora, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 168.—Ins. Philipp.
parvifolia, *Klotmsch, ex Benth. in Hook. Kev> Journ.* vi. (1854) 881.—Bras.
parvifolia. Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 797= nemoralis.
platyphylla, *Muell. Arg. 1. c.* xxxiv. (1866-66) 171.—Am. ccntr.
psilorhachis, Klotzsch, ex Benth. in Hook. Kew Joum. vi. (1864) 331 - nemoralis.
puberula, *Klottsch, I. c.*—Bras,
pyenogyne, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. n. 878.—Bras.
rotundifolia, Moric ex Baill. Etud. *Gin.* Euph. 447—nemoralis.
rufescens, *Franch. PI. Davidian.* i. (1884) 265.—Mongol,
rugosa, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 170.—Ind. or.; Malaya.
scandens, *Muell. Arg. I. c.* 170.—Cochinch.
Schomburgkii, Benth. in Hook. Kew Joum. vL (1854) 880 = Gardneri.
Schomburgkii, *Klottsch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1848) 46.—Am. austr.
sidaefolia, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 447.—Bras,
similis, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 434.—Mexic.

ALCHORNEA:—
subrotunda, Baill. Etud. Gén. Euph. 447=glandulosa.
Thozetiana, *Baill. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 187.— Austral,
tiliaefolia, *Muell Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 168.—Ind. or.
trewioides, *Muell. Arg. 1. c.*—China,
triplinervia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 909 = nemoralis.
villosa, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 168.—Malaya.
Zollingeri, Hassk. Cat. Hort Bogor. Alt. 37 ; Retzia, 156=villosa.

AIiCHOBNEOPSIB, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 156. *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 315.
floribunda, *Muell. Arg. 1. c.*—Feruv.

ALCHYMILLA, Rnpp. Fl. Jen. ed. Hall. 61 (1745) = Alchemilla, Linn. (Rosac).

ALCINA, Cav. Ic. i. 10.1.15 (1791)=Melampodlum, Linn. (Compos.).
minor, Cass. in Diet. Sc. Nat. lix. 243 = M. sericeum.
ovatifolia, Jacq. Eclog. PI. 78=M. divaricatum.
perfoliata, Cav. Ic. i. 11. t. 15 = M. perfoliatum.

ALCINIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 274 (1820) = praec.

AlCIOPE, DC. Prod. v. 209 (1886). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 489.
CELMisiA.Cass. in Diet. Sc. Nat. vii. 356 (1817).
lanata, *DC. Prod.* v. 210.—Afr. anstr.
tabnlaris, *DC. I.* r.—Afr. austr.

ALDAMA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc fasc. i. 14 (1824) = ScleroearpUB, Jacq. (Compos.).
dentata, La Llave, 1. c.=S. dentatus.
dentaia, Less, in Linnaea, v. (1830) 154 =S. Schiedeanus.
uniserialis, A. Gray, PI. Lindh. 228 - S . nniserialis.

ALDEA, Ruiz & Pav. Prod. 19 (1794)=Phaeelia, Juss. (Hydrophyll.).
circinnata, Willd. Enum. Suppl. 9=P. circinnata.
magellanica,yfil\A. ex Stend. Norn. ed. II. i. 48 = Hydrophyllum magellanicum.
peruviana, Ruiz & Pav. Fl. **Per.** il. 8. t 114 = P. peruviana.
pinnata, Ruiz & Pav. 1. c. =P. peruviana.

ALDELASTER, C. Koch, in Belg. Hortic. (1861) 321 = ADELASTER, Veitch - Eranthemum t Linn. (Acanth.).

ALDINA, Adans. Fam. ii. 328 (1763) = **Brya,** P. Br. (Legum.).

AT.TvrrA., Endl. Gen. 1322 (1841). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 560.
AIXANIA, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1840) 91.
discolor, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 12—Bras.
jheterophylla, *Benth. 1. c.* 18.—Bras,
insignis, *Endl. in Walp. Rep.* i. 848.—Guiana,
latifolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 12.—Bras,
macrophylla, *Spruce, ex Benth. 1. c.* 13.—Bras.

ALDINIA, Scop. Introd. 173 (1777) = Juatioia, Linn. (Acanth.).

ALDROVANDA, Monti, in Bonon. Sc. & Art. Inst. Comm. ii. in. 401. t 12 (1747); Linn. Diss. Chen. 89 (1751). *DROSERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 663.
verticillata, Roxb. Fl. Ind. ii. 113=vesiculosa.
vesiculosa, *Linn. Sp. PI.* 281.—Enrop.; Ind. or.

ALPUNATEA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 820. t. 38 (1819) = Chaetanthera, Ruiz & Pav. (Compos.).
ckilensis,* Remy, 1. c. 322. t. 38. f. *l(=Oriastrum chilense).

ALDUNATEA:—
gnaphalioides, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 323 (=• ***Oriastrum gnaphalioides).***
lycopodioides,* Remy, 1. c. *(= Oriastrum gnaphalioides).

ALECTOR1DIA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 447. t. 99 (1851)=Arthraxon, Beauv. (Gramin.).
Quartiniana, A. Rich. 1. c. 448=Arth. ciliaris.

ALECTOROCTONUM, Schlecht. in Linnaea, xix. 252 (1817)=Euphorbia, Linn.
caracasanum, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 40 ~E. caracasana.
cotinifolium, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 252 - E. cotinifolia.
cotinoides, Klotzsch *Sc* Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 218 = E. cotinoides.
dilatatum, Klotzsch *Sc* Garcke, 1. c.=E. dilatata.
nudiflorum, Klotzsch *Sc* Garcke, 1. c. 40 = E. nudiflora.
ovatum, Schlecht in Linnaea, xix. (1817) 262=E. Schlechtendalii.
petiolare, Klotzsch *Sc* Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 218 = E. periolaris.
Riedelianum, Klotzsch *Sc* Garcke, in Abh. 1. c. (1860) 41=E. cotinoides.
sanguineum, Klotzsch *Sc* Garcke, in Monatsb. 1. c. (1859) 248=E. haematodes.
scandens, Klotzsch *8c* Garcke, 1. c.=E. scandens.
Scotanum, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 262-E. Scotanum.
viride, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 248 = E.viridis.
Willdenowii, Klotzsch *Sc* Garcke, in Abh. 1. c. (1860) 11-E. cotinifolia.
Wrightii, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. 1. c. (1859) 218 = E. Wrightii.
Yavalquahuitl, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 252 = £*, Scot&mim*

ALECTOROLOPHUS, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 623 (1712); Moench, Meth. 440 (1791) = Bhinanthus, Linn. (ScrophuL).
alpinus, D. Dietr. Syn. PI. iii. 558 = R. major.
alpinus, Reichb. f. Ic Fl. Germ. xx. 66=R. Crista-galli.
angustifolius, D. Dietr. Syn. PI. iii. 658 = R. angustifolhis.
buccalis, Heynh. Norn. ii. 18=R. Crista-galli.
Crista-galli, Bieb. FL Tanr. Cape. ii. 68=R. Crista-galli.
glaber, All. Fl. Pedem. i. 58-R. Crista-galli.
grandiflorus, Wallr. Sched. Crit. 816 -R. Crista-galli.
hirsutus. All. Fl. Pedem. i. 58 = R. Crista-galli.
major, Reichh. Ic PI. Crit viii. 13. fig. 975; Ic. Fl. Germ. xx. 65 = R. major.
minor, Dum. Fl. Belg. 33-R. minor.
minor, Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 858=R. Crista-galli.
parviflorus, Wallr. Sched. Crit. 818=R. minor.
pulchella, Schum. ex Wimm. Fl. Schles. (1811) 277 = R. Crista-galli.
pulcher, Schum. ex Wimm. 1. c. ed. III. (1857) 410 = R. Crista-galli.
ramosus, Schur, Enum. PI. Transs. 880, Index-R. minor.
stenophyllus, Schm, 1. c.=R. minoi.
Trixago, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 68 = Bartsia Trixago.
villosus, Dum. Fl. Belg. 33=R. Crista-galli.

AIiECTBA, Thnnb. Nov. Gen. 81 (1784). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 966.
GLOSSOSTYLIS, Cham. *Sc* Schlecht in Linnaea, iii. (1828) 22.
HYMENOSPERMUM, Benth. in Wall. Cat. n. 3963 (1881).
STARBIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 7 (1806).
abyssinica, *A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* ii. 118.—Abyss,
asperrima, *Benth. in DC. Prod.* x. 840.—Abyss,
brasiliensis, *Benth. 1. c.* 839.—Bras,
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 97.—Afr. austr.
cordata, Benth. in DC. Prod. x. 339 = indica.
hirsuta, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 221.—Afr. trop.
indica, *£enth. in DC. Prod.* x. 839.—Ind. or.
lurida, *Ham. Gen. S. Afr. PI.* 250.—Afr. austr.

ALECTBA:—
major, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfi. Docum.* 163.—Afr. austr.
" melampyroides, *Benth. in DC. Prod.* x. 389.—Afr. austr.
minor, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfi. Docum.* 163.—Afr. austr.
orobanchoides, *Benth. in DC. Prod.* x. 810.—Afr. austr.
parasitica, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 117.— Abyss,
pedicularioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 211.—Madag.
Petitiana, *A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* ii. 118.—Afr. trop.
pumila, *Benth. in DC. Prod.* x. 810.—Afr. austr.
senegalensis, *Benth. I. c.* 839.—Afr. trop.
stricta, *Benth. I. c.* 838.—Bras.
Thomsoni, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 297.—Ind. or.
Vogelii, *Benth. in DC. Prod.* x. 889.—Afr. trop.

ALECTBYON, Gaertn. Fruct. i. 217. t. 16 (1788) *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 410.
canescens, *DC. Prod.* i. 617.—Austral,
carinatu'u, *Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 119.—N. Caled.
connatum, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. viii. (1878) 299, 807 = Nephelium connatum.
coriaceum, *Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 118.—Austral.
excelsum, *Gaert. Fruct.* i. 216. t. 46.—N. Zel.
ferrugineum, *Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 81.—Ins. Molucc.
glabrum, *Radlk. I. c*—Ins. Timor,
laeve, *Radlk. I. c.* 119.—Austral,
semicinereum, *Radii. 1. c.* 118.—Austral,
serratum, *Radlk. I. c.*—Austral,
gphaerococcum, *Radii. I. c.* 119.—Celebes,
subcinereum, *Radii, in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 521.—Austral,
subdentatum, *Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 117.—Austral,
tomentosum, *Radlk. I. c.*—Austral.

ALEGRIA, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. i. 516 (1824) = Luehea, Willd. (Tiliac).
Candida, Moç. *Sc* Sesse, 1. c. 517 = L. platypetala..

ALEOME, Neck. Elem. iii. 68 (1790) = Cleome, Linn. (Cappar.).

AIiEPIDEA, La Roche, Eryng. Hist. 19. t. 1 (1808). *UMBELL1FERAE,* Benth. & Hook. f. i. 878.
amatymbica, Eckl. & Zeyh. Enum. 339.—Afr. anstr.
ciliaris, *La Roche, Eryng. Hist.* 19.1.1.—Afr. austr.
cordata, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 163 = ciliaris.
ferrata,* Stead. Norn. ed. II. i. 18, *spha\m.=serrata.
longifolia, E. Mey. ex Steud. 1. c.=amatymbica.
peduncularis, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 820.—Abyss.
serrata, Eckl. *Sc Zeyh.* Enum. 339=ciliaris.
Woodii, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1452.—Afr. austr.

ALEPYRUM, B. Br. Prod. 252, 253 (1810) = **Centrolepis,** Labill.
monogynum, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 77. t. 138 = C. monogyna.
Muelleri, Hook. f. 1. c 78 = C. glabra.
muscoides, Hook. f. 1. c. 77 = C. muscoides.
muticum, R. Br. Prod. 253 = C. miitica.
pallidum, Hook. f. Fl. Nov. Zel. i. 268 = Gaimardia pallida.
polygynum, R. Br. Prod. 253 = C. polygyna.
Pumilio, R. Br. 1. c. = C. polygyna.
viride, T. Kirk, in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 286.—N. Zel.

ALETHRIS, Linn. Ord. Nat. (1764) =seq.

ALETBIS, linn. Diss. Chen. 15 (1751); (Amoen. Acad. iii. 11). *HAEMODORACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 677.
STACHYOPOGON, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 49. t. 91 (18K2).
albq, Michx. Fl. Bor. Am. i. 189 = farinosa.
arborea, Willd. Enum. Hort. Berol. 381= Dracaena arborca.
aurea, *Walt. Fl. Carol.* 121.—Am. bor.

ALETHIS :-
bifolia. Bum. f. Fl. Cap. Prod. 10 = Lachenalia pendula.
capensis,. Linn. Syst. ed. X. 985 = Veltheimia viridiflora.
chinensis, Lam. Encyc. i. 79 = Dracaena terminalis.
cochinchinensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 204.—Cochinch.
dracaenoides, Roxb. ex Roero. & Schult. Syst. vii. 347.—Ind. or.
farinosa. Ker-Gawl. in Bot. Mag. t 1418 = aurea.
farinosa, *Linn. Sp. PI.* 31!).—Am. bor.
farinosa, Thunb. Fl. Jap. 136 = japonica.
fragrans, Linn. Sp. PI. ed. II. 456 = Dracaena fragrans.
glauca, Ait Hort. Kew. i. 468 = Veltheimia glauca.
guineensis, Jacq. Hort. Vind. i. 63. t 84=Sanseviera guineensis.
hyadnthoides. Linn. Sp. Fl. ed. II. 456=Sanseviera guineensis.
japonica, Hontt Syst. xi. 486. t. 84. f. 2 = Funkia subcordata.
japonica, *Lamb, in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 407.—Japon.
japonica, Thunb. in Nov. Act. Ups. iii. (1780) 208 = *r* unkia ovata.
lingnaeformis, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 10.—Afr. austr.
littoralis, Kocn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 49 = Urginia in'ica ?
pumila, Ait. Hort. Kew. i. 464 *(=Tritomanthe pumila).*
pumila, Donn, Hort Cant ed. II. 42=Dracaena ovata.
punicea, Labill. PI. Nov. Holl. i. 85. t 111 = BIandlordia marginata.
sarmentosa, Andr. Bot. Rep. t. 54 (= *Tritomanthe media).*
Vvaria, Linn. Mant 367 = Kniphofia alooides.
"ylanica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=Sanseviera lanuginosa.

ALETJBITES, Forst. Char. Gen. iii. t. 56 (1776). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 292.
CAMIRIUM, Gaertn. Fnict. ii. 194. t. 125 (1791).
DRYANDRA, Thunb. FL Jap. 13. t. 27 (1784).
ELAEOCOCCA, A. JUSS. Euph. Tent. 38.1.11 (1824).
TELOPEA, Soland. ex Baifl. Etud. Gen. Euph. 845 (1858).
VERNICIA, Lour. Fl. Cochinch. 586 (1790).
Ambinux, Pers. Syn. ii. 579=triloba.
commutata, Geisel. Crot. Monogr. 82=triloba.
wrdata, *Steud. Nom.* ed. II. i. 49.—China; Japon.
cordifolia, Steud. 1. c. = triloba.
japonica, Blume, in Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iv. 120=cordata.
laccifera, Willd. Sp. PL iv. 590 = Cretan aromaticus.
lanceolata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 757=triloba.
lobata, Blanco, 1. c. 756 = triloba.
moluccana, Willd. Sp. PL iv. 590-triloba.
peltata, Geisel. Crot. Monogr. 81 = Mallotus peltatns.
Pentaphylla, *Wall. Cat.* n. 7959.—Ind. or.
japonaria, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 519.—Ins. Philipp.
tnjoba, *Forst. Char. Gen.* 112.—As. trop.; Ins. Pacif.
**>*sperma,* Blanco, Fl. Filip. ed. I. 755=triloba.
Vemicia, Hassk. in Flora, xxv. (1842); Beibl. ii. 40 = cordata.
vernidflua, Bull. Hist PI. v. 116 = praec.

ALEURITIA, Spach, Hist Veg. Phan. ix. 860 (1840) = •frimula, Linn.
cortusoides, Spach, 1. c. 361 = P. cortusoides.
farmosa, Spach, 1. c.=P. farinosa.
'ongiflora, Spach, 1. c. 362 = P. longiflora.

ALEURODENDRON, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Buitenz. 87 (1828), nomen; Syll. Ratisb. iii. (1828) 12 =Meloohia, Linn. (Sterculiat).
album, Reinw. 11. cc.=M. Aleurodendron.

ALEVIA, Baill. Etnd. Gén. Euph. 508 (1858) = Bernardia, P. Br. (Euphorb.).
leptostachya, BaiU. 1. c. 509 = B. interrupta.

^ X A , Moq. in DC. Prod. xiii. II. 168 in nota (1849).
LEGUMMOSAE, Benth. & Hook. f. i. 556.
ALEXANDRA, Schomb. in Hook. Lond. Journ. Bot 'v. (1845) 12.

A^ AN D H A , Bunge, in Linnaea, xvii. (1843) 120.
CHENOPODIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 67.
PTKROCALYX, Schenk, in Bull. Fhys. Math. Acad. Petersb. i. (1848) 861.
Lehmanni, *Bunge, in Linnaea* (1843), 120.—Soongar.

ALEXANDRA, Schomb. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845), 12; et Barbac. (1845) 18=Alexa, Moq. (Legum.).
Imperatricis, Schomb. 11. cc.—Guiana.

ALEXIA, Wight, Ic. t 1293 (1850)=Alyxia, R. Br. (Apocyn.).

ALEXIS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 284 = Amomum, Linn. (Scitam.).
bifurca, Salisb. 1. c.=A. exscapum.
grandiflora, Salisb. 1. c = A. grandiflorum.

ALEXITOXICON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 67=Vijioetoxicum, Moench (Asclep.).

ALFONSIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 806 (1815) =Elaeis, Jacq. (Palm.).
oleifera, H. B. & K. 1. c. 807=E. melanococca.

ALFREDIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1815) 175 = Carduus, Linn. (Compos.).
acantholepis, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc xv. (1842) 894 = C. acantholepis.
cernua, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1815) 175 - C. cernuus.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 185 = Cnicus japonicus.
Karelini, Ledeb. Fl. Ross. ii. 754 = C. acantholepis.
nivea, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc xv. (1842) 895 = C. niveus.
squarrosa, 'Kostel. Select. Sem. Hort. Bot. Prag. (1838).'—Hab.?
stenolepis, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 452 = C. stenolepis.
suaveolens, Rupr. Sert. Tiansch. 56=C. suaveolens.
tianschanica, Rupr. 1. c— As. centr.

ALGA, [Toum.] Urn. Fl. Fr. iii 589 (1778)=Zostera, Linn. (Naiad.).
marina, Lam. 1. c. = Z. marina.

ALGAROBIA, Benth. PI. Hartw. 18 (1839) = Prosopls, Linn. (Legnm.).
dulcis, Benth. 1. c.=P. juliflora.
glandulosa, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 399 = P. juliflora.
juliflora, Heynh. Nom. ii. 18=P. juliflora.

AXQERNONIA, Baill. in Ann. Sc Nat. Sér. IV. ix. 198 (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 339.
TETRAPLANDRA, BaiU. 1. c. 200 (1858).
brasiliensis, *Baill. 1. c.* 199.—Bras,
obovata, *Mtell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xl. II. 586.—Bras.

ALGUELAGUEN, Feuill. ex Adans. Fam. iL 505 (1768) =Sphacele, Benth. (Labiat.).

AXHAOI, Toum. ex Adans. Fam. iL 828 (1768); Desv. Joum. Bot i. (1813) 120. t 4. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 512.
MANNA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 246 (1825).
camelorum, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 72.—Oriens; As. centr.
graecorum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 114.—Graecia.
karduchoru.ni, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient ii. 559 •= maurorum.
kirghisorum.Sctntnk, Enum. PL Nov. 84=camelorum.
mannifera, Desv. Journ. Bot i. (1818) 120=maurorum.
mannifera, Jaub. & Spach, Illustr. t. 401=graecorum.
maurorum, *Medic, in Varies. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 897; *Desv. Journ.* i. (1813) 120. t. 4.—Oriens; Ind. or.; Syria.
napaulensium, DC. Prod. ii. 352= maurorum.
persarum, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat Mosc. xii. (1860) 76 = camelorum.
Pseudalhagi, Desv. Journ. Bot. i. (1818) 120 = camelorum.
turcorum, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 118=camelorum.

ALHAGIA, Reichb. Nom. 153 (1841)=praec.

ALIBEB.TIA, A. Rich, in M<1m. Soc. Hist. Nat Par. v. (1830j 234. t. 21. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 81.
CORDIERA, A. Rich. 1. c. 222. t. 20 (1880).

ALIBERTIA:-
GARAPATICA, Karst FL Colomb. i. 67. t. 28 (1858).
GARDENIOLA, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 247.
GENIPEIXA, Rich, ex DC. Prod. iv. 448 (1830).
MKLANOPSIDIUM, Poit. ex A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1830) 234.
SCEPSEOTHAMNUS, Cham, in Linnaea, ix. (1884) 248.
THIELEODOXA, Cham. 1. c 251 (1834).
ednlis, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1830) •234. t. 21.—Guiana.
hexagyna, *Karst. Fl. Colomb. i.* 57.—N. Granat.
jacquinioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 123.—Cuba.
Melloana, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1873) 520.— Bras.
utilis, A. Rich, in Mém. Soc. Nat Hist Par. v. (1830) t. 21=edulis.

ALIBREXIA, Mien, in Hook. Lond. Joum. Bot iv. (1845) 506-Dolia, Lindl. (Convolv.).
brevifolia, Phil, in Linnaea, xxxiil (1864-66) 209.—Chili.
Guyana, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, Atl. 1.105.—Chili ?
incana, Phil. *H.* Atac. 45.—Chili.
revoluta, Miers, in Hook. Lond. Joum. Bot iv. (1846) 508 = D. revoluta.
rupicola, Miers, 1. c. 506 = D. tomentosa.
tomentosa, Miers, 1. c. 508=P. tomentosa.
villosa, Phil. Fl. Atac. 45.—Chili.

ALIBUM, Less. Syn. Comp. 152 (1832)=Iiiabum, Adans. (Compos.).
liaboides, Less. 1. c =L. lyratum.

ALICABON, Rafin. Sylva Tellur. 56 (1888)=Physall8, Linn. ^Solauac.).
barbadense, Rafin. 1. c. 67 =P. barbadense.
somniferum, Rafin. 1. c. 56=P. somniferum.

ALICASTRUM, P. Br. Hist Jamaic. 872 (1756) = Brosimum, Sw. (Urticac).

ALICOSTA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 881 (1867) = Bartaia, Linn. (Scrophul.).
alpina, Dulac, L c = B. alpina.
spicata, Dulac, 1. c. = B. aspera.

ALICTERES, Neck. Elem. U. 804 (1790) - HeUcteres, Linn. (Sterculiac).

ALIFANA, Rafin. Sylva Tellur. 101 (1888) = Braohyotum, Triana (Melast), etc.
canescens, Rafin. 1. c.=Brachyotum canescens.
lutescens, Rafin. 1. c = Miconia lutescens.
montana, Rafin. 1. c.=Conostegia montana.
striata, Rafin. 1. c. = Brachyotum strigosum.

ALIFANUS, Pluk. ex Adans. Fam. ii. 234 (1768)« Bhexia, Linn. (Melast).

ALINA, Adans. Fam. iL 84 (1763).—Gen. dub.

ALIPENDULA, Neck. Elem. ii. 89 (1790)=Spiraea, Linn. (Rosac.).

ALIPSA, Hoffmgg. [Verz. Orchid. 20 (1840)] ex Linnaea, xvl (1842) Litt 228-Ijiparifl, Rich. (Orchid.).
foliosa, Hoffmgg. 1. c. = L. reflexa?

ALISETA, Rafin. New Fl. Am. ii. 22 (1836) = Arnica Linn. (Compos.).
plantaginea, Rafin. 1. c.=A. alpina.

AIiISMA, [Dill.] Linn. Syst ed. I. (1735). *ALISMACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1004.
BALDELLIA, Parl. Nov. Gen. PL Monocot. 57 (1854).
CALUESIA, Parl. Fl. Ital. itt. 598 (1858).
HELANTHIUM, Engelm. ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 1005 (1883).
NECTALISMA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1809) 156.
acanthocarpum, *F. Muell. Fragm.* i. 28.—Austral.
alpestre, Coss. in BulL Soc. Bot Fr. xi. (1864) 338 = Echinodorus alpestris.
Annie, Mart, ex Steud. Nom. ed. II. i. 49, nomen = Sagittaria guyanensis.
Andrieuxii, Hook. *Sc* Am. Bot Beech. Voy. 311 = a Echinodorus ellipticus.

ALI8KA:—
angustifolium, Gilib. Fl. Litnan. ii. 224-Echinodorus rannnculoides.
angustifolium, Hoppe, Taichenb. (1797) 13=A. Plantago.
apetalum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4996 = oligococcum.
aphylla, Steud. Norn. ed. II. i. 49-praec.
arcuatum, Micheli, in Bull. Soc. Sot FT. i. (1858) 312 • A. Plantago.
Berterii, Spreng. Syst. ii. 168 — Echinodorns rostratns.
Berteroanum, fialb. in Roem. & Schnlt. Syst. vii. 1605 = Echinodorus rostratns.
Bourgaei, Nym. SylL 879 =Damasonium Bourgaei.
californicnm, *Micheli, in A. DC. Monog. Phan.* iii. 84. -Calif.
calyophyllum, Wall. Cat. n. 4997 =pamassifolinm.
canaliculatum, A. Br. & Bouche, Ind. Sem. Hort. BCIOL (1867) 4-A. Plantago.
cordifolium, Linn. Sp. PI. 348=Echinodorus macrophyllus, rostratus.
cordifolium, Thunb. Fl. Jap. 153 = A. Plantago.
cristatum, WalL Cat. n. 4994 = Sagittaria guyanensis.
Damasonium, Desf. Fl. Atlant. L 324—Damasonium Bonrgaei.
Damasonium, Linn. Sp. PI. 343—Damasonium stellatum.
Damasonium, Willd. Prod. Fl. Berol. 132-parnassifolium.
difformifolium, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 53. —Chili.
diversifolium, Gilib. Fl. Litnan. ii. 223 = Elisma natans.
dubium, Willd. Prod. Fl. Berol. 132 = pamassifolium.
tchinocarpum, Senb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 105.1.13. f. 8 = Sagittaria guyanensis.
ellipticum. Mart, in Roem. ft Schnlt. Syst. vil 1607 = Echinodorns ellipticus.
enneondrum, Hochst ex Micheli, in DC. Monog. Phan. iii. 82 = Bumatia enneandra.
fiavum, Linn. Sp. PI. 343—Lunnocharis flava.
flavum, Thunb. Fl. Jap. 153=A. Plantago.
ftoribundum, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 109 = Echinodorus grandiflorus.
Geyeri, Torr. in Nicollet, Rep. Hydiog. Missinip. (1848) 162 = A. Plantago.
glandulosum, Thw. Enum. PI. ZeyL 832 - oligococcum.
gramineum, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 256 = A. Plantago.
graminifolium, Ehrh. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 40 = A. Plantago.
grandiflorum, Cham. & Schlecht in Iinnaea, ii (1827) 152 = Echinodorus grandiflorns.
Hamiltonianum, Wall. Cat n. 4993- Sagittaria guyanensis.
heterophyllum, Schur, Enum. PL Transs. 880, Index = A. Plantago.
humile, Rich, ex Kunth, Enmm. PI. iii. 154=Echinodorus humilis.
intermedium, *Griff, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 680.—Ind. or.
intermedium, Mart, in Roem. & Schuh. Syst vii. 1609 =Echinodorus Martii.
Kotschyi, Hochst. in Flora, xxvi. (1848) 492=Limnophyton obtusifolium.
lanceolatum, With. Bot An. Brit PI. ed. III. ii. 862-A. Plantago.
Lappula, Buch.-Ham. ex Kunth, Enmm. PI. iii. 162 = Sagittaria Lappula,
latifolium, Gilib. FL Litnan. ii. 222=A. Plantago.
Loeselii, Eichw. Skizze, 127 = A. Plantago.
macropkyllum, Kunth, Enmm. PL iii. 151 = Echinodorns macrophyllus.
rnaius, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 216=A. Plantago.
minus, Spreng. Syst. ii. 163 = Damasonium australe.
natans, Iinn. Sp. PL 848 = Elisma natans.
natans, Pollich, Hist. PI. Palat. iii. 319=A. Plantago.
nathpurense, Steud. Nom. ed. II. i. 49 = Echinodorus ellipticus.
nymphaeifolium, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 218.—Cuba.
obtusifolium, Thw. Enum. PI. Zeyl. 382 = Ltmnophyton obtusifolium.
odoratum, Rafin. Fl. Ludov. 17=-A. Plantago.
oligococcum, *F. Muell. Fragm.* i. 23.—Anstral.
paleaefolium, Kunth, Enum. PI. iii. 162 = Echinodorus ellipticus.

AIiIBMA:—
paniculatum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 884 - A. Plantago.
pamassifolium, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 4997 = calophyllum.
pamassifolium, *Bassi, ex Linn. Syst.* ed. XIL ii. 230.—Enrop.; Ind. or.; Afr. trop.; Austral.
parviflorum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 252=A. Plantago.
plantagineum, St. Lag. in Ann. Soc Bot Lyon, vii. (1880) 119=A. Plantago.
Plantago, *Linn. Sp. PI.* 842 (A. Plantago-aqnatica).—Reg. temp. bor.; Austral.
polyspermum, Nym. SylL 379 = Damasonium polyspermum.
pubescens, Buch.-Ham. ex WalL Cat n. 4998=Sagittaria guyanensis.
pubescens, Mart, in Roem. & Schnlt. Syst vii. 1607 = Echinodorus ellipticus.
ranunculoides, AIL Fl. Pedem. i. 234= A. Plantago.
ranunculoides, Linn. Sp. PI. 843 = Echinodorus ranunculoides.
ranunculoides, Willd. Prod. FL BeroL 188= Elisma natans.
reniforme, D. Don, Prod. Fl. Nep. 22= pamassifolium.
repens, Lain. Encyc. ii. 615=Echinodorns ranunculoides.
roseum, Rflfin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 354=A. Plantago.
rostratum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 169 = Echinodorus rostratus.
Sagittaria, Stnkes, Bot. Mat Med. ii. 835=Sagittaria sagittifolia.
sagittifolium, Willd. Sp. PL ii. 277-Limnophyton obtusifolium.
Sprengelii, Rich, ex Kunth, Enum. PI. iii. 154 = Echinodorus rostratns.
stellatum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4993=Sagittaria guyanensis.
stellatum, Lam. Fl. Fr. iii. 77=Damasonium stellatum.
subalatum, Mart, in Roem. & Schnlt. Syst. vii. 1609 = Echinodorus subalatus.
subcordatum, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 362 = A. Plantago.
subulatum, Linn. Sp. PL 848=Sagittaria natans.
subulatum, Hill, Veg. Syst. x. 88 = praec?
taeniaefolium, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 58.—Chili.
tenellum, Mart, in Roem. & Schnlt. Syst vii. 1600-Echinodorns tenellus.
trinerve, *Link, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 49.—Lusitan.
triviale, Push, Fl. Am. Sept. i. 252=A. Plantago.
verticillatum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 45 = A. Plantago.
virgatum, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 311 =

ALISMORCHIS, Thou. Orch. Afr. t. 86 (1822) = Calanthe, R. Br. (Orchid.).
Centrosis, Steud. Nom. ed. II. i. 49=C. sylvatica,

ALISSON, Vill. Prosp. 88 (1779)=AlyBSum, Linn. (Crncif.).

ALISSUM, Neck. Delic Gallo-Belg. i. 276 (1768)=praec.

ALITUBUS, Dulac, FL Hautes-Pyr. 499 (1867) = Aohillea, Linn. (Compos.).
Millefolium, Dulac 1. c 500=Ach. Millefolimn.
pyrenaicus, Dulac, 1. c=Ach. Ptannica.
tomentosus, Dnlac, 1. c.=Ach. tomentosa.

ALIX, Comm. ex DC. Prod. v. 318 (1836)-Paladin, Jacq. (Compos.).
salsifolia, Comm. ex DC. 1. c 819=P. retnsa.

AUSAXTSA, Tausch, in Flora, vii. (1824) 284.
BORAGINEAE, Benth. ft Hook. f. ii. 867.
BAFHORHIZA. Link, Handb. ii. 678 (1829).
CAJiJTOCAKPUS, C. Koch, in Linnaea, xvil. (1843) 304.
CAMFYLOCARVDM, DC. Prod. x. 97 in syn. (1846).
alba, Boiss. Voy. Espagne, 747=Nonea alba.
amplexicaulis, A. DC. in DC. Prod. x. 101 = Kotschyana.
areolata, *Boiss. Diagn.* Ser. L iv. 45.—As. Min.
Aucheriana, A. DC. in DC. Prod. x. 102 = syriaca, rostellata.
aiurea, Boiss. PI. Or. Dec. ii. 7=areolata.
baeotifo, DC. Prod. x. 98=graeca.
bicolor, Boiss. PL Or. Dec. ii. *j* = Kotschyana.
brachysolen, Boiss. 1. c. = Kotschyana.

ALKANNA:—
bracttosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 118.—Persia.
callieriisis, Heldr. ex Nym. Consp. 617-graeca.
cappadodca, Boiss. & BaL Diagn. Ser. II. vi. 128 = megacarpa.
eontroveisa. *A. DC. in DC. Prod. x.* 108.—Hab. >
cordifolia, C. *Koch, in Linnaea,* xxii (1849) 640.—Pontus.
JUaginoides, DC. Prod. x. 98-Pinardl.
frigida, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 32.—Persia,
galilaea, *Boiss. I. c.* Ser. I. xi. 118.—Palaestin.
graeca, *Boiss.* cV *Sprun. I. c.* Ser. L iv. 47.—Graecia.
hirsntissima, *A. DC. in DC. Prod.* x. 101.—Oriens.
incana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 45.—As. Min.
Kotschyana, *DC. Prod.* x. 98.—Oriens.
Uhmanni, A. DC. in DC. 1. c 688=tinctoria.
lutea,«4. *DC. 1. c.* 102.—Enrop.
macrophylla, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 120.—As. Min.; Syria.
macrosiphon, *Boiss. & Heldr. 1. c.* 120.—Graecia.
Mathioli, Tausch, in Flora, vii. (1824) 234=tinctoria.
megacarpa, *A. DC. in DC. Prod.* x. 101.—Oriens.
noneiformis, Griseb. SpiciL FL RumeL ii. 90 = A. Pulmonariu.
oriemalis, *Boiss. Diagn.* Ser. L iv. 46.—Oriens.
Pinardi, *Boiss. 1. c.* 48.—As. Min.
primuliflora, *Griseb. Spidl. Fl. Rumel.* ii. 89 —Thracia.
Pulmonaria, *Griseb. I. c.* 90.—Macedon.
rostellata, *Boiss! Diagn.* Ser. I. xi. 119.—Taurus.
Sartoriana, *Boiss. & Heldr. I. c.* Ser. II. iii. 134.—Graecia.
scardica, *Griseb. Spidl. Fl. Rumel.* U. 91.—Macedon.
Sieberi, *A. DC. in DC. Prod.* x. 99.—Creta.
strigosa, *Boiss. & Hohenh. in Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 46.—Syria,
syriaca, *Boiss. & Hohenh. PI. Or. Nov. Dec.* ii. 7.—Syria.
tinctoria, DC. Prod. x. 99-Sieberi.
tinctoria, *Tausch, in Flora,* vii. (1824) 234.—Orienn.
tomentosa, Griseb. Spidl. Fl. Rumel. ii. 88 in nota» Onosma mollis.
tnbulosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 48.—As. Min.
versicolor, *Orph. in Bull. Congr. BottPitersb.* 1869 (1870) 188.—Graecia.
viscidnla, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xL 118.—Cappadoc.
Wagneri, *Bartl. ex Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 107, nomen.—As. Min.

ALKEKENGI, Toum. ex Hall. Enum. Stlrp. Helv. ii. 508 (1742)=Phyaalla, Linn. (Solanac).
fissum, Moench, Meth. 472-P. viscosa.
officinarum,Moench,Metb. Suppl. 177 = P. AUcekengi.
procumbens, Moench, Meth. 478 = P. pubescens.
pubescens, Moench, L c = P. peruviana.
villosa, Moench, Meth. Suppl. 178-P. pubescens.

ALKIBIAS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 119 (1836) (Compos.).
hastata, Rafin. 1. c. *(^Linosyris hastata).*
mucronata, Rafin. 1. c = Iphinne joniperifolia,
ovata, Rafin. 1. c. =Chrysocoma ovata.

AliIiABANTHUS, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 302. t. 9. *URTICACEAE,* Benth. & Hook, t iii. 361.
luzonicus, *Benth. & Hook.f. Gen.* iii. 861.—Ins. Phil,
zeylanicus, *Thw. in Hoot. Kew Journ.* vi. (1854) 302. —Zeylan.

AUiAEOPHANIA, Thw. Enrm. PL Zeyl. 147 (1859). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 129.
Arnpttii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 48.—Zeylan.
decipiens, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 147.—Zeylan.

ALLAGANTHERA, Mart Hort Erlang. 69 (1814)-Alternaathera, Forsk. (Amarant).
Forskehlei, Mart L c-Alt. sesdlis.

ALLAGAS, Rafin. FL Tellur. iv. 58. (1886)-HaI©nia, Borckh. (Gentianac).

ALLAOOPAPPUS, Cass. in Diet Sc Nat lvi. 21. (1828). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 383.
chrysopsioides, Sen. Bip. in. Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 163-Pulicana petiolaris.
dichotomus, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* lvi. 22.—Ins. Canar.
viscosissimus, *C. Bolle, in Bonplandia,* vii. (1859) 298.—Ins. Canar.

ALLAGOPTERA, Nees, in Neuwied, Reise nach Bras. ii. 335 (1821) - Diplothemium, Mart. (Palm.). *Pumila,* Nees, U = D . maritimnm.

ALLAGOSPERMA, M. Roem. Syn. Pepon. 68 (1846) -Oayaponfa, Manso (Cucurb.).
Tayuya, M. Roem. 1. c - C . Tayuya.

ALLAGOSTACHYUM, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. L .60 (1840)=**Poa,** Linn. (Gramin.).
'asiochloa, Nees, 1. c = Poa allemans.

ALLAMANDA, Linn. Mant ii. 146. (1771). *APOCYNACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 690.
ORELIA, Aubl. PI. Gui. i. 270.1106 (1775).
"ngustifolia, *Pohl, PI. Bras. I* 73. t 59.—Bras.
Aubletii, Pohl, 1. c. 75=cathartica.
BUnchetii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 319.—**Bws.**
'rastliensis, Schott, ex Pohl, PI. Bras. i. 78=Schottii.
wthartica, *Linn. Mont.* ii. 214.—Am. trop.
cathariica, Schrad. in Goett. Gelehrt. Anz. (1821) 707 =Schottii.
Doniana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **vi. I. 11.—** Bras.
grandiflora, **Hendersoni,** *Bull* Lam. Encyc. iv. 601=cathartica.
e Dombr* *Fl°r- Mag.* **v. (1866) t**
- •MS.—Gniana.
latifolia, Presl, Bot Bemerk. 103=cathartica.
Ltnngi, Pohl, PI. Bras. i. 74=cathartica.
Martu, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **vi. 1.12.—Bras,**
nenifolia, *Hook. Bot. Mag.* t 4594.—Hab. ?
nobilis, *T. Moore, in Gard. Citron.* (1868) 180, 918.— Bras.
oenotheraefolU.i'oA/, *PI. Bras,* i 71. t 67.—Bras.
Pttviflora, *Presl, Bot. Bemerk.* 103.—Ins. Martin.
POivantha, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **vi. I. 12.—** Bras.
pubera , *A. DC. in DC. Prod.* viii. 319.—Bras.
*«*o«ii, Hook. Bot. Mag. t 4351-cathartica.
=*ottu, *PoU, PI. Bras.* i. /8. t. 58.—Bras.
•Wulosa, *Mig. in Linnaea,* xviii. (1844) 743.—Surinam.
thevetifolia, *Muell Arg.* *e- »« *Linnaea,* xxx. (1859-60) 888.—Bras.
verrucosa, Gardn. ex Muell. Arg. in Mart. FL Bras. vi. J ; . ".-puberula.
Vertic illata, *Desf. Tabl. Bot. Par.* ed. II. 93.—Hab.?
J^«r«p, Gardn. ft Field. Sert. t. 41 - Blanchetii.
"'ardleyana, Lehas, in Rev. Hort. (1877) 220 = **Henoersoni.**

ALLAWBLACKIA. Oliver, in Benth. ft Hook. £ f. ". 980 (1867). *GUTTIFERAE,* Benth. ft Hook. **i. 980.**
floribunda, Oliver, in Jonm. Linn. Soc. x. (1869) 43.— Atr. trop.

ALLANIA, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot H, (1840) **91 = Aldina,** Endl. (Legum.).
***insignis,* Benth.** 1. c-Gniana.

ALLANIA Meissn. Gen. 401 (304), (1842)=Alania, **Endl. (Liliac.).**

ALjL£NTOMA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874)291. *MYRTACEAE.*
aalac arpa, *»iers, I. c.* **296.—Bras.**
Burchelliana, *Miers, I. c.* 294.—Bras.
corbula, *Miers, I. c.* 297,-Bras.
cylindrica, *Miers, I. c.* 294.—Bras,
dictyocarpa *Miers, I. e.* 297.—Bras.
fagifolia, *Miers* '• ' 298.—Guiana.
lineata, *Miers, I. c.* 297.-Bras.
macrocarpa, *Miers, I. c.* 296,-Bras.
multiflora, *Miers* '• ' 291.-Guiana.
acutellata, *Miers, I. c.* 296,-Bras.
subramosa, *MUf* ft 292.—Guiana.
torulosa, *Miers, I. c.* 29S.-Bras.

ALA aDIA) Decne. in Jacquem. Voy. Bot 87. t. 95, '^(1841 ?;. *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii.
WALDHEIMIA, Kar. ft Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. **(1842) 125.**
glabra, Decne. 1. e. 88. t. 96.—Tibet
Huegeli **Sch. Bip** Pollichia, xx«xxi (18fl3) **442 = glabral'**
***Kana, Klatt, in Sitzb, Akad. Mench* (1878) 88.— Tibet.**

ALIiABDIA:—
lanata, Kurz, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 144- tomentosa.
nivea, *Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, I. e.* **145.—** Tibjrt. occ.
Stoliczkai, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 145.—Tibet occ.
tomentosa, *Decne. in jacquem. Voy. Bot.* **87. t 95.—** Tibet, occ.
tridactylites, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 442 =glabra.
vestita, *Hooi.f. & Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 145.—Reg. HimaL

ALLARDTIA. A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 242=Tillandala, Linn. (Bromel.).
cyanea, A. Dietr. 1. c =T. cyanea.
Potockii, Antoine, in Oestr. Bot Zeitschr. xxviii. (1878) 56=T. ntriculata.

AIiIiASI A, Lour. Fl. Cochinch. 84 (1790) Inc. sed.; cf. Benth. & Hook, f. i. 820.
Jobini, *Manso, Enum.* 86.—Bras.
Payos, *Lour. Fl. Cochinch.* 86.—Afr. or.

ALLAZIA, Manso, Enum. 36. (1886)=praec.

ALLELOTHECA, Stend. Syn. PI. Gram. 117 (1855) = Iiophatherum, Brongn. (Gramin.).
Urvillei, Steud. 1. c.=L. gracile.

ALLEMANIA. EndL Gen. 304 in nota (1837)-Allmania, R. Br. (Amarant).

ALLENDBA, La Llave, in La Llave *St.* Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 10 ^824). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 437.
lanceolata, *La Llave, I.* c—Mexic.

ALLETOTHECA, Benth. & Hook, f. iii. 1191 (1883) sphnlm. = ALLELOTHECA, Stend.=Lophatherum, Brongn. (Gramin.).

ALLIARIA, Marsh, ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 75 (1745); DC. Syst. Veg. ii. 488 - Siaymbrium, Linn. CCrucif.).
brachycarpa, Bieb. FL Taur. Cane. Snppl. 446-Erjrsimum brachycarpon.
Fuchsii, Rnpr. Fl. Cauc. 85 =S. Alliaria.
Mathioli, Rupr. 1. c - S . Alliaria.
officinalis, Andrz. ex DC. Syst Veg. ii. **489** - S. Alliaria.

ALLIBERTIA, Marion, in Rev. Hort. Bouch. Rhone, Nov. (1882); ex Baker, in Gard. Chron. N. S. xix. (1883)176=**Agave,** Linn. (Amaryll.).
intermedia, Marion, ex Baker, 1. c.»A. Alibertii.

ALLINUM, Neck. Elem. i. 179 (1790) - Selinum, Linn. **(Umbell.).**

AIIIIIONIA, Loefl. Iter, 181 (1768) j Linn. Syst. ed. X. 890 (1759). *NYCTAGINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 4.
WEDELIA, Loefl. Iter, 180 (1768).
aggregata, Spreng. Syst i. 384=Oxybaphns aggregatus.
albida, Walt. Fl. Carol. 84=Oxybaphusalbidus.
Cervantesii, Steud. Nom. ed. II. i. 60=Oxybaphus Cervantesii.
cucullata, Mey. ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii 66<=Oxybaphus cncullatus.
decumbens, Spreng. Syst i. 384=Oxybaphus deenmbens.
hirsuta, Pursh, FL Am. Sept ii. 728=. Oxybaphns hirsutus.
incamau, *Linn. Syst.ed.* X. 890.—Am. bor.; Ind. occ; Am. austr.
linearis, Pursh, 1. c. = Oxybaphns angnstifolius.
malacoides, Benth. Bot Voy. Sulph. 44 -=incarnata.
mendocina, *Phil. Sert. Mendoc. Alt.* **41.—Chili.**
nyctaginea, Michx. FL Bor. Am. i. 100-Oxybaphns nyctagineus.
ovata, Pursh, Fl. Am. Sept i. 97-Oxybaphns floribundns.
violacea, Linn. Syst. ed. X. 890-Oxybaphus.violaceus.

AIiUOM, [Tonra.] Linn. Syst. ed. I. (1785). *L1LIACEAE,* Benth. ft Hook. *I* iii. 802.
ANCUINDM, FOUJT. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160.

ALIilTTM:-
ASCALONICUM, Renanlt, Fl. Dip. One, 33 (1800).
CEPA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 108 (1787).
CODONOPRASDM, Reichb. Consp. 66 (1828).
GEBOSCON, Rafin. Cat. 14 (1824).
MUENCHIA, Medic, in Act. Acad. Palat vi. Phys. (1790) 348.
MOLIUM, Foarr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xviL (1869) 159.
MOLY, Boerh. ex Moench, Meth. 286 (1794).
NECTAROSCORDUM, Lindl. Bot Reg. 11912 (1836).-
OPHIOSCORODON, Wallr. Sched. Crit 129 (1822).
PORRUM, Toum. ex Linn. Syst ed. I. (1735).
RHIZIRIDKUM, Fourr. 1. c 160.
SATURNIA, Maratti, Diss. Romul. et Sat. 18. t. 2. (1772).
SCHOENOFRASVII, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i.227 (1815).
SCOROOON, Fourr. 1. c 160.
TRIGONEA, Parlat in Occhio, 161 (1839).
AGLITHEIS, ENDOTIS, GETUONIS, GYNODON, KA-**LABOTIS, KEPA, KROMON, LONCOSTEMON,** MALIGA, PANSTENUM, PI.EXISTBNA, STELMESUS, STEMODOXIS, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 17-21 (1836).
PERILUBA.PRASKOINON, Rafin. 1. c. iv. 87,29 (1886).
BERENICE, BRISEIS, BUTOMISSA, CAMARILLA, CANIOIA, HEXONYCHIA, HYLOGETON, JUI.US, MOLYZA,PHYLLODOLON,RAPHIONE,SCHOENISSA, XYLORHIZA, SalUb. Gen. PL Fragm. 88-92 (1866).
achaium, *Boiss. (f Orpk. ex Boiss. Fl. Orient,* **v. 259.** —Graeda.
acre, *J. & C. Presl, Delic. Prog.* **147.—Sicilia.**
acuminatum. *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 184.1196.—Am. bor.
acutangulum, Ambros. Fl. Tyr. Austr. i. 565=-fallax.
acutangulum, Reichb. Ic Crit. viii. t. 784 » montanum.
acutangulum, Schrad. Sem. Hort. Goett 180S=angmlosum.
acutiflorum, Bov^, ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 192 = paniculatum.
acutiflorum, Loisel. in Desv. Journ. Bot ii. (1809) 27-> =multifiorum.
acutum, Spreng. Pugill. L 28-A. Schoenoprasum.
adscendens, Kunth, Enum. PI. iv. 385-A. Ampeloprasum.
aestivum, Tineo, PL Rar. Sicil. 39=sphaerocephalum.
affine, Boiss. ft Heldr. Diagn. Ser. II. iv. 114-vineale.
affine, Ledeb. Fl. Ross. iv. 166 = margaritaceum.
africanum, F. G. Dietr. Gartenlex. Nachtr. i. 160 = odoratissimum.
of rum, Kunth, Enora. PI. iv. 455-Omithogalum airam.
Aitahisoni, *Boiss. Fl. Orient,* v. 248.—Afghan.
Akaka, *Gmel. ex Roem. (f Schult. Syst.* **vii. 1132.—** Sibir.
Akaka, Regel, in Act Hort. Petrop. iii. (1875) 243- karataviense.
alataviense, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xli. (1868)** I. 448—Turkestan.
alatum, Schreb. ex Roth, in Roem. Arch. i. in. (1798) 40 = cemuum.
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* **v. (1877) 632.—** Turkestan.
albescens, Guss. Enum. PL Inarim. 388-A. Ampeloprasum.
albidum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. Suppl. 260-flavescens.
albidum, *Fisch. Cat. Gorenk.(lil2)* 10.-Orient; Sibir.
albidum, J. ft C. Presl, Delic. Prag. 146-paniculatum.
album, Hort. ex[Delar. in] Red. Lil. v. 300 = ciliatnm.
album, Santi, Viaggi, 352. t. 7=neapolitannm.
album, Spreng. Syst. iL 88 - pendulinum.
Alexeianvm, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* **iii. (1875)** 244.—Turkestan.
alibile, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 880.—Abyss,
alpicolum, *Verl. in Bull. Soc. Slot. Isire,* **xiv. (1872)** 397.—Gallia.
alpinum, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 181=narcissiflorum.
alpinum, Hegetschw.Fl. Helv.822 = A. Schotnoprasum.
altaicum, Pall. Reise, ii. 787 -fistnlosum.
altissimum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 666. —Bokhara.
Amansii, Bor. Fl. Cent Fr. ed. IIL ii. 681. in obs.-pAniculatuxn.
ambiguum, DC. FL Fr. iii. 320=ochroleucum.
ambiguum, Sibth. ft Sm. Fl. Graec. t. 827 =-roseum.
amblyopetalum, Link, in Linnaea, ix. (1834) 139- neapolitanum.

ALLIUM,—
amblyophyllum, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 610.—Soongaria.
amethystinum, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. 258-A. Ampeloprasnm.
ammophilum, Heuff. in Flora, xxviii. (1815) 241 ; et Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 210=angulosum.
amoenum. G. Don, in Mem. Wem. Soc. ri. (1827) 75 =roseum.
Ampeloprasum, Boiss. Voy. Espagne (ii. 615) = polyantham, baeticum.
Ampeloprasum, *Linn. Sp. PI.* 295.—Europ.; Oriens.
Ampeloprasum, Thunb. Prod. PI. Cap. 65=rotnndnm.
amphibolnm, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 5. t. 357.—Sibir.
amplectens, Ton. in Pacif. Rail. Rep. iv'. 148=attennifolium.
anceps, *Kellogg, in Proc. Calif. Ac.* ii. (1863) 109. t. 82.—Calif.
Andersonii, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 69 = senescens.
andicolnm, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 211. —Peruv.
angolense, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 262.—Afr. tiop.
angnlare, *Pall. Reise,* iii. 299.—Sibir. baic
angulatum, Pali. 1. c. 4O8. = praec.
angulosum, All. Fl. Pedem. ii. 158 = albidnm.
angulosum, DC. Fl. Fr. iii. 222 =&llax.
angulosum, Krock. Fl. Sil. i. 524=acutangulum, fallax, senescens.
angulosum, *Linn. Sp. PL* 300.—Sibir.
angulosum, Lonr. Fl. Cochinch. 203=nliginosum.
angulosum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 223=reticulatum.
angustum, *G. Don, in Mem. Went. Soc.* vi. (1827) 83. —Sibir.
anisopodium, Ledeb. Fl. Ross. iv. 183-tennissimum.
apenninum, Hnet, ex Nym. Consp. 74O=paniculatum.
appendiculatum, Ram. ex Pers. Syn. i. 356 = suaveolens.
approximatum, Gren. & Godr. Fl.Fr. iiL 200 - sphaerocephalum.
arena-ñum, linn. Sp. PI. 497 = A. Scorodopiasum.
arenarium, Sadler, Fl. Pesth. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 40 = sativum.
arenarium, [Wahlenb. in! Svensk. Bot L 691 = vineale.
arenarium, Thunb. [Fl. Jap. 132] = japonicum.
armenum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient v. 254 = flavum.
armerioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 116.—Assyria.
arvense, Guss.-Ind. Sem. (1825)=sphaerocephalura.
ascalonicum, *Linn. Amoen. Acad.* iv. 454.—Ubique cult.
ascalonium, Bory & Chaub. Fl. Pelop. 21=gomphre-.noides.
ascendens, Tenore, SylL 164=A. Ampeloprasum.
Ascbersonianum, *Barbey, Herbor. au Levant,* 163. t. 4. —Oriens.
asperum, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 42-carinatum.
atropurpureum, Waldst & Kit. Ic PI. Rar. Hung. i 16. t 17 = stenopetalum.
atrorabens, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 352.—Calif,
atrosangnineum, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 508.—As. med.
atroviolaceum, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 112-A. Ampeloprasum.
atroviolaceum, Homem. ex Steud. Nom. ed. IL i. 50 = sphaerocephalum.
attenuatum, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad,* ii. (1863) .110. f. 83.—Calif.
attenuilolium, *Kellogg, 1. c.* 110. f. 34.—Calif.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 116.—Persia.
aureum, lam. Fl. Fr. iii. 260 = A. Moly.
auriculatum, *Kwnth, Enum. PI.* iv. 418.—Ind. or.
australe, Guss. ex Kunth, 1. c. 404=paniculatum.
atureum, Bunge, in Mem. Sav. Err. Acad. Pe'tersb. vii. (1851) 510 ; Reliq. Lehm. 334. n. 1366=urceolatum.
aaureum, Ledeb. Fl. Alt. ii. 13=caeruleum.
Babingtonii, Borrer, in Engl. Bot. t. 2906=A.Scordoprasum.
bachtiaricum, Boiss. Fl. Orient, v. 285=bakhtiaricum.
Backhousianum, *Regel, Gartenfl.* (1885) 213.—Reg. HimaL
baeticum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 113.—Hispan.
baicalense, W'illd. Enum. Hort. Berol. 300 = senescens.
Bakeri, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 141.—China; Japon.
bakhtiaricom, *Regel, I. c.* 222.—Persia.

ALLIUM:—
Balansae, *Boiss. Fl. Orient,* v. 268.—Pontus.
Bauerianum, *Baker, in Gard. Ckron-* (1874) II. 131.—Aegypt.; Turcia?
Baumannianum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 241=rotundum.
Beckerianum, Regel, Ind. Sem. Hort Petrop. (I860) 30=tataricum.
Bertoloni, De Not. Rep. Fl. Lig. 414=A. Ampeloprasum.
bidentatum, Fisch. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 157 = tenuissimum.
Bidwelliae, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 281.—Am. bor.
bifolium, *Willd. ex Sckult.f. Syst. Veg.* vii. 1117 = decipiens.
Bigeknii, 5. *Wats- in Bot. King, Exped.* v. 487. t 88. f. 8 & 9.—N. Mexic
bisceptrum, 5. *Wats. 1. c.* 351 & 487. t 37. f. 1-3.—Calif.
bisulcum, [Delar. in] Red. Lil. t 286=A. Stellerianum.
blandum, *Wall. PI. As. Rar.* iii. 38. t 260.—Tibet. occ.
Bodeannm, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii (1375) 238. —Persia.
bogdoicolum, *Regel, I. c.* vi. (1879) 530.—Turkestan.
Boissieri, Haussk. ex Regel, 1. c iii. IL (1875) 205 = frigid urn.
Boissieri, Regel, 1. c. 75 = Lehmannianum.
Bolanderi, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 229.—Calif,
bonariensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 319.—Reg. Argent,
borbonicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1876) 218.—Ins. Borb.
Borbasii, *Kerner, in Oesir. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 89.—Europ.
Borszczowi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 74.—Turkestan.
Boryanum, Kunth, Enum. PI. iv. 411=paniculatum.
bosniacum, Kmnra. & Sendt. in Flora, xxxii. (1819) 762=sphaerocephalum.
Bonddae, *Debeaux, in Actes Linn. Soc Bord.* xxxii. (1878) 24 j *Fl. du Tchlfou,* 137.—China.
brachyodon, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 117 = strictnm.
brackystemum, [Delar. in] Red. Lil. vii. t. 374 = subhirsutum.
brahuicum, *Boiss. Fl. Orient,* v. 278.—Beluchist.
Brandegei.S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii (1881-82) 380.—Colorado.
brevicaule, Boiss. & Bal. Diagn. Set. II. iv. 119 = paniculatum.
brevicuspis, *Boiss. (f Buhse, 1. c.* 114.—Persia.
brevipes, Ledeb. Fl. Ross. iv. 165 = Aucheri.
breviscapum, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien.l.* (1885) 14.—Persia,
brevistylum, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 350.—Am. bor. occ.
Breweri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 233. —Calif.
Broteri, Kunth, Enum. PI. iv. 454 = A. Schoenoprasum.
bucharicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 660.—Bokhara.
Buhseanum, Regel, 1. c. iU.il. (1875) 81=A. Schoenoprasum.
Bangei, *Boiss. Fl. Orient,* v. 267.—Persia.
byzantinum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 240= A. Ampeloprasum.
caerulescens, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1832) 34 = caeruleum.
caerulescens, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 115.—Armenia,
caeraleum, *Pall. Reise, ii.* 737.—Sibir.
caeruleum, Stschlgl&ew, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1854) I. 202 = urceolatum.
caeruleum, Wall. Cat. n. 6070-Wallichii.
caesium, *Schrenk, in Bull. Phys. Math. Acad. Pltersb.* ii. (1844) 113.—Turkestan,
caespitosum, *Siev. in Pall. Neu. Nord. Beitr.* iii. 304. —Soongaria.
calcareum, *Reut. in Compte-rend. Soc. Halle'r.* (1855-56) 127.—Helvet.
calcareum, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 196=angulosum.
callidiciyon, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 74 = Bors"Czowi.
callidyction, *C. A. Mey. ex Kunth, Enum. PI.* iv. 413. —Oriens.

ALLIUM:—
callimischon, Link, in Linnaea, ix. (1834) 140 = pani-.culatum.
callistemon, Webb, ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 189=flavum.
calyptratum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 30.—Syria.
C'ambiasii, De Not. Rep. Fl. Lig. 412=rotundum.
campanulaeflorum, *Gey. ex Hook. Kew Journ.* vii. (1856) 875.—Am. bor.
campanulatum, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 231.—Am. bor.
campestre, Schleica. ex Stend. Nom. ed. II. i. 51 = vineale.
canadense, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1007 = Purshii.
canadense, Herbb. ex Schnlt. f. 1. c. 1095 = mntabile.
canadense, *Linn. Sp. PI.* 1195.—Am. bor.
canadense, Michx. Fl. Bor. Am. i. 191=striatnm.
candidissimum, Cav. Lecc. 994 = neapolitanum.
candidum, *C. Presl, Fl. Sic.* 42.—Sicilia.
cdnescens, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1067=glaucum.
capillare, Cav. Icones, iii. 4. t. 206 = moschatmn.
capillare, Desf. Tabl. ed. I. 27 = pusillum.
capitellatum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 118.—Persia; Affghan.
cappadocicum, *Boiss.* 6**Balansa, ex Boiss. Fl.Orient.* v. 241.—Cappadoc
cardiostemon, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* vi. 48.—Persia.
carduchorum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 237 = Aucheri.
caridfolium, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat Mosc. (1841)«54 = Pallasi.
caricoides, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi (1879) 582. —Turkestan.
carinatum, Habl. Taur. 152 = flavnm.
carinatum, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 2»7.—Europ.
carinatum, Schulz, Fl. Starg. 86=arenarium.
carinatum, Sm. Engl. Bot. t. 1658 = oleraceum.
Carmeli, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 28.—Palaestin.
carneum, Tenore, Fl. Nap. 159=roseum.
carneum, Hort. ex Schnlt. f. Syst. vii. 1028=sibiricum.
carneum, Targ-Tozz. 1st. Bot. ed. II. Lt (S=ambiguum.
carneum, Willd. Enum. Hort. Berol. 359= ascalonicum.
caralinianum, *[Delar. in] Red. Lil.* t. 101.—Carolina,
caspium, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 265 ; iii. 260.—Ross. austr.; Turkest j Sibir.
cassium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 28.—Taurus; Syria.
caucasicum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. hi. 258 =globosum.
caucason, Turra, ex Sacc. in Atti 1st. Venet. Ser. III. ix. (1863-64) 487 = globosnm.
Cepa, Banks, ex Schult. f. Syst. vii. 1008 = proliferum.
Cepa, Falk, Beitr. ii. 157 > nstnlosum.
Cepa, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 300.—Persia; Beluchist
Cepa, Willd. ex Ledeb. FL Ross. iv. 169=galanthum.
cepaeforme, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 31 -A. Cepa.
cepaeum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii (1880) 113 = A. Cepa.
ceratophyllum, Bess, ex Schult f. Syst. vii. 1029 = fistulosnm.
cernuum, Hort ex Schult f. L e. 1081 = prostratum.
cemuum, *Roth, in Roetn. Archill,* i. II. 40.—Am. bor.
Chamaemoly, *Linn. Sp. PI.* 301.—Reg. Mediterr.
Chamaemoly, Viviani, Fl. Lib. Spec. 19 = subvillosum.
chamaespathum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 113.—Graecia.
chilense, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 218.—Chili.
chinense, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 88 = Thunbergii.
chinense, Maxim. Prim. Fl. Amur. 284 = odorum.
chionuntha, Boiss. Fl. Orient, v. 272 = zebdanense.
chloroneurum, *Boiss. 1. c.* 247.—Persia.
chloranthum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 33 = flavum.
Moranthum, Lall. ex Regel, in Act Hort. Petrop. iii. II. (1875) 246=decipiens.
chloranthum, Schur, Enum. PI. Transs. 672 = globosum.
Christii, *Janka, in Linnaea,* xxx. (1859-6U) 604.—Europ. austr.
chrysantherum, *Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 280.—Assyria,
chrysanthmn, *Regel, in Act Hort. Petrop.* iii. (1875) 91. —China.
ciliare, [Delar. in] Red. Lil. vi. t. 311 = subhirsutum.

ALLIUM:—
cUiatum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 11 = sphaerocfephalum.
dliatum, Cyr. PI. Rar. Neap. Fasc. ii. 16=subhirsutum.
cilicicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 115.—As. Min.
circinnatum, *Sieber, Reise Kreta*, ii. 816 —Graecia.
ctrrkasum, Raeusch. Nom. ed. III. 74=roseum.
arrhosum, Vand. Fasc. PI. ll = flavum.
dathratum, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 18.—Sibir. alt.
Clusianum, Boiy, Fl. Pelop. 21 = circinnatmn.
Clusianum, Retz. in Willd. Sp. PI. ii.79=subvillosum.
eolchicifolium,So»M. *Diagn.* Ser. II. iv. 112.—Armenia,
collhmim, *Dougl. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 228.—Am. bor. occ.
collinum, Guss. in Tenore, Syll. 169 = paniculatnm.
coloratura, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 110=A. Schoenoprasum.
coloratum, Spreng. Syst. ii. 88=flavum.
commune, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 6; ed. II. 68 (1827) = A. Cepa.
onmutatum, Guss. Enum. PI. Inarim. 17=-rotundum.
compactum, Thuil. Fl. Par. 167=vineale.
conplanatum, Boreau, Not. xxxv. p. 12=oleraceum.
condcnsatum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1054) ii. 121.—Sibir. baical.
confertum, Fisch. Cat. (1821).—Cf. G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 68=deflexum, strictum, senescens.
confertum, Jord. & Fourr. Brev. Fl. Nov. fasc. ii. 127 =roseum.
congestum, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 66 = Stcllerianum.
consanguineum, *Kunth, Enum. PI.* iv. 431.—Reg. Himal.
consimile, Jord. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 208 = carinatum.
"ontortum, Stokes, Bot. Mat Med. ii. 229 = A. Scorodoprasnm.
controversum, Costa, Suplem. Catal. 62 = pyrenaicnm.
contrmersum, Schrad. Cat. Goett. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 858 = sativnm.
'onvallari/olium, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 184 = A. Victortalis.
cc>ppoleri, Tineo, Cat. PI. Hort. Panonn. 18 = paniculatum.
'orbariense, Timb. ex Nym. Consp. 737 = subhirsutum.
comntum, *Clem. It. Dalm.* t. 1. f. 1.—Dalmatia.
cornutum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 340 = macrocephalum.
Covani, Lindl. Bot. Reg. t. 758=neapolitanum.
^-rameri, *Aschers. & Boiss. ex Boiss. Fl. Orient*, v. 279. 7-Aegypt.
cnnitum, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. 255=sphaerc-.<*phalum.
cnstatum, *Boiss. Fl. Orient*, v. 237.—Thracia.
C"s'?P^hi. *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) '68.—As. temp.
«oceum, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 218.—Calif.
^*umaria*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6072 = A. r Cepa.
Cpani; Guss. PI. Rar. 143 = moschatum.
iff[1]?[1] [Ra]*fi*[n]- *Caratteri*, (1818) 86. n. 206.—Reg. Mediterr.
^Pfiliferam, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) ~r[i]-~ Turkestan.
«rtum, *Boiss. b- Gaillard, Diagn.* Ser. II. iv. 116.—r Syna ; Aegypt.
^"scum, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 228.
bor occ
c v r
Cyaneum, *Regel> in Act» Hortm petro*p.. iii. (1875) 174. --Ghina.
£' Schott & Kotschy, ex Schott. in Oestr. BoL pjyochenbl. (1854) 217=cassium.
-y"'!. *Tenore, Fl. Nap.* iii. 864.—Italia; Graeaic; iauria.
fnubiale, Reichb. ex Kunth, Enum. PI. iv. 423 = senescens. 84)
A?"ubial<>> Spreng. Fl. Hal. Mant. 88 = angulosum.
(wJ Slcnmi *Re*S*el*> *in Act_ Hort_* p<*rop.- ii (18 °o».—Bokhara.
?«*«»«, Presl, Bot. Bemerk. 114 = flavum.
uec jP>ens, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 10.—
reg-Gaucasch. Turkest. Sibirn. *Pl. iv. 428*—Stel-
a«'j»arium, Reichb. Ic. FL Hort. Germ. v. 46. t. A" -Stellerianum.
taS F

ALLIXJM :-
deflexum, Willd. Sp. PI. ii. 65 = lineare.
delicatulum, *Sievers, ex Willd. in Roem. (f Schult. Syst.* vii. 1183.—Sibir.
densiflorum, De Not. Rep. Fl. Lig. 418=sphaerocephalnm.
denticulatum, Kit in Linnaea, xxxii. (1863) 342 = carinatum.
dentiferum, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 346. t. 234 = paniculatum.
denudatum, [Delar. in] Red. Lil. t. 357=albidum.
Derderianum, Regel, in Act. Hort. Petrop. ii. (1875) 242 =naemanthoides.
descendens, Koch, Syn FL Germ. ed. I. 719=vineale.
descendens, Linn. Sp. PL ed. I. 299 =sphaerocephalnm.
descendens, Pall. Ind. Taur. ex Schult. f. Syst. vii. 1011 = rotundnm.
descendens, Sibth. *8c* Sin. Fl. Gr. iv. 15. t. 816 = margaritaceum.
Disiglisei, Bor. Not. Nov. (1853) 17; (in Bull. Soc Indust. d'Angers).—Cf. Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire, i. (1857) 68 = sphaerocephalum.
deserti, Boiss. ex Regel, in Act. Hort Petrop. iii. (1875)76 = Boissieri.
desertorum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 72.—Aegypt
diaphanum, Janka, in Linnaea, xxx. (1869-60) 605 = tataricum.
dictyoprasum, Ledeb. Fl. Ross. iv. 166=dyctioprasuin.
dilutum, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien*, 1. (1885) 13.—Persia.
Dioseoridis, *Sibth. & Sm. Prod. Fl. Gr.* i. 222.—Europ. austr.; Oriens.
djimilense, *Boiss. ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875; 108.—Pontus.
doloncarense, *Regel, I. c.* 113.—Sibir.
Douglasii, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 184. t. 197.—Calif.
Douglasii, Wood, in Proc. Philad. Acad. (1868) 170 = unifolium, bisceptrum.
Drigeanum, Kunth, Enum. PL iv. 882=A Scorodoprasum.
Drummondi, Regel, in Act. Hort Petrop. iii. (1875) 112 = mutabile.
Duriaeanum, Regel, L c. 54 = A. Ampeloprasum.
Durieuanum, Walp. Ann. Bot. i. 860 = praec.
Duriaeanum, J. Gay, in Ann. Sc Nat Sér. III. viii. (1847) 218 = A. Ampeloprasum.
dyctioprasum, *C. A. Mey. ex Kunth, Enum. PI.* iv. 890. —Armenia.
effusum, Boiss. FL Orient v. 257=stamineum.
elatum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* via. (1884) 665.—Bokhara.
Elwesi, Regel, 1. c. v. (1877) 266=acuminatum 1
ellipticum, Wall. Cat. n. 5069= A. Victorialis.
eminens, Gren. ex Parl. Fl. Ital. ii. 667= sphaerocephalum.
Erdelii, Baker, in Bot. Mag. t 6426=orientals
Erdelii, *Zucc. in Abh. Math. Phys. Acad. Mueneh.* iii. (1848) 236. t. 5.—PaUestin.
erectum, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 18 = rotundum.
ericetorum, Thore, Chlor. Land. 123=ochroleucum, suaveolens.
eriophyllum, *Boiss. Diagn.* Ser. L viL 112. —Persia.
erubescens, C. Koch, in linnaea, xxii. (1849) 242 = rudbaricum.
erythraeum, *Griseb. Spirit. Fl. Rumel.* it 896.—Macedon.
erythraeum, Weiss, ex Boiss. Fl. Orient v. 258 = Weissii.
esculentum, Salisb. Prod. 235 = A. Cepa.
euosmum, Link & Otto, Ic. PI. Rir. Hort Berol. i. 15. t. 8=nudicaule.
euschoenoprasum. Syme, EngL Bot ed. III. ix. 316=A. Schoenoprasum.
exaltatum, Kar. *8c* Kir. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 178 = obliquum.
exile, Boiss. *8c* Orph. Diagn. Ser. II. iv. 118=sipylum.
exsertum, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 294 = Bakeri.
exsertum, *G. Don, in Wem. Went. Soc.* vi. (1827) 17. —Rossia.
falcifolium, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 400.—Calif.
fallax, *Schult. f. Syst.* vii. 1072.—Enrop.; As. Min.
Fedschenkoannm, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 82.—Turkestan.
Fetisowi, *Regel, 1. c.* v. (1877) 631.—Turkestan,
filidens, *Regel, 1. c.* iii. II. (1875) 174.—Turkestan.

AIiLITJM:—
filiforme, *Colla, Herb. Pedem.* t. 90. f. 3.—Italia.
fimbriatum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 282.—Calif.
Fischeri, Bess, in Roem. & Schult. Syst. vii. 1081 = Stellerianum.
Fischeri, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii II. (1875) 161.—Sibir.
fissile, S. F. Gray, Nat An. ii. 188 = A. Ascalonicum.
fissile, *Steud. Nom.* ed. II. i. 51, nomen.—As. Min.
fistulosum, *Linn. Sp. PI.* 301.—Sibir.
flavescens, Bess. Enum. PL Volh. 56=albidum.
flavescens, Poepp. ex Kunth, Enum. PI. iv. 459 = striatum.
flavidum, *Ledeb. Fl. Alt.* iL 7.—Sibir.
fiavum, Less, ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 172=delicatulum.
flavum, *Linn. Sp. PI.* 299.—Europ.; Oriens.
fiavum, Salisb. Prod. 285=A. Moly.
fiexifolium, Jord. in Gren. *8c* Godr. Fl. Fr. iii. 208 = carinatum.
flexum, Wallst & Kit PL Rar. Hnng. ii. 307=carinatum.
flexuosum. Host, Fl. Anstr. i. 422=carinatum.
fiexuosum, Urville, in Mém. Soc. Linn. Paris, i. (1822) 294 =staticaeforme.
foetidum, Willd. Enum. Suppl. 17 = flexum, carinatum.
foliosum, Clar. ex [DC. in] Red. Lil. t 214=A. Schoenoprasum.
Fontanesii, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Se>. III. viii. (1847) 209 = flavum.
fragrans, Boj. Hort. Manrit 848-Milla borbonica.
fragrans, Cyr. ex Tenore, Fl. Nap. iii. 864=Cyrilli.
fragrans, Vent Jard. Cels, 26 = Nothoscordum fragrans.
frigidum, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. L xiii. 84.—Graecia.
Frivaldtkyanum, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 311 = margaritaceum.
fuscum, Schrad. ex Hornem. Hort Hafn. ii. 962 = pulchellum.
fuscum, Spreng. Syst ii. 87=longispathum.
fuscum, Waldst & Kit. PL Rar. Hung. iii. 267. t. 241=paniculatum.
Fussii, *Kerner, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviiL (1878) 155.—Austria,
galanthum, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 508.—Soongaria.
gaditanum, *Pere*-Lara,ex Willi. inlllustr. Fl. Hisp.* 81.—Morocco.
Gardinia, Bertero, ex Steud. Nom. ed. II. i. 664* Brodiaea violacea.
Gasparrini, Guss. in Enum. PL Inarim. 337. t 16= A. Ampeloprasum.
Gayi, *Boiss. Fl. Orient*, v. 271.—Cilicia.
Geyeri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 227. -Calif.
Gherardi, De Not Rep. FL Lig. 412=sphaerocephalum.
giganteum, *Regel, Gartenfl.* (1883) 91.—Reg. Himal.
glandulosum, *Link & Otto, Ic. Rar.* i. 38. t. 17.—Mexic.
glaucum, [Desf.] Hort. Par. ex [DC. in] Red. Lil. iv. t 214 = foliosum.
glaucum, Hort. Par. ex Ledeb. Fl. Ross. ir. 167 = A. Schoenoprasum.
glaucum, Schrad. ex Poir. Encyc. Suppl. i. 265 = senescens.
globosum, *Bieb. Ft. Taut. Cauc.* i. 262; iii. 257.—Europ. austr.; Reg. Cane ; Sibir.
globosum, *[DC. in] Red. Lil.* iii. t. 179.—Hab. ?
glumaceum, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient*, v. 260.—Cataonia.
gomphrenoides, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. vii. 114.—Lycaonia.
gorumsense, *Boiss. Fl. Orient*, v. 233.—Cilicia.
Gouanii, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 85 = neapolitanum.
Govanianum, *Wall. Cat.* n. 5071.—Reg. Himal.
gracile, (Dryand. in] Ait. Hort. Kew. i. 429=Nothoscordum fragrans.
graecum, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient v. 271-Gayi.
graecum, Urville, in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 293 = trifoliatum.
gramineum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 239 = rotundum.
graminifolium, *Buch, in Abh. Acad. Berl.xvtl.* (1816) 862.'—Ins. Canar.
graminifolium, Loisel. Fl. Gall. i. 258-subhirsutum.
graminifolium, Pers. Syn. i. 356 - ochroleucum.
grandiflorum. Lam. Encyc. i: 68 = narcissiflomm.

ALLITJM :—
Grazi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1876) 126.—Japon.
Griffithianum, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 117°rubellum.
Grimmi, *Regel, Dec. PI. Nov.* 10.—Cf. *Act. Hort. Petrop.* Tiii. (1888) 272.—Turkestan.
Guicdardii, Heldr. in Atti Congr. Bot. Fiienze, 1874 (1876) 238 = flavum.
guttatum, Stev. in M&n. Soc Nat Mosc. ii. (1809) 178. t. 11 = margaritaceum.
haemanthoides, *Boiss. ex Regel, Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 240. -Persia,
haematochiton, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 227.—Calif.
Halleri, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 806=A. Scorodoprasnm.
Halleri, Cnmtz, Inst. i. 488 = lineare.
Halleri, G. Don, in Mem. Wem. Sot vi. (1827) 15-A. Ampelopiaium.
Heldreichii, *Beits. Diagn.* Ser. II. iv. 116.—Graecia.
hierochoDtinnm, *Boiss. Fl. Orient,* v. 244.—Palaestin.
himalayense, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 118=Stocksianum.
hirsutum, Lam. Fl. Fr. iii. 262 - aubhirsntnm.
hirsntnm, *Zucc. in Abh. Bayer. Akad.* iii. (1848) 232. t. 2.—Palestin.
hirtifolium, *Boiss. Fl. Orient,* v. 281.—Persia.
hirtovaginatum, Kunth, Enum. PI. iv. 412 = Cupani.
Hoeltzeri. *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viiL (1884) 657; *Regel, Gartenfl.* (1884) 291.—Turkestan.
holmense. Mill, ex Kunth, Enum. PI. iv. 884=A. Ampelopnsum.
Hookeri, Thw. Enum. PL Zeyl. 889-WallichiL
humile, *Kunth, Enum. PI.* iv. 442.— Ind. or.
hyalinum, *Curran, in Bull. Calif. Acad.* n. 8. (1885) 155.—Calif.
hyemale, Kafin. Fl. Ludov. 19=fragrant,
hymenorrhizum, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 12.—Turkest; Persia,
hymettium, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. II. iv. 120.—Graecia.
iliense, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xli. (1868) I. 452.—Soongaria.
illyricum, Jacq. Collect, iii. 278=roseum.
illyricum. Link & Otto, ex Kunth, Enum. PL iv. 422 = senescens.
inaequale, Janka, in Linnaea, xxx. (1869-60) 603 = TQosch&tuni*
incarnatum, Hornem. Hort. Hafh. L 328-roseum.
inderiense, Fisch. ex Roem. & Schult. Syst. vii. 1133 =tartaricum.
inodorum, Ait. Hort. Kew. L 427 -Nothoscordum fragrans.
inodorum, Willd. Sp. PL ii. 76=angulosum.
insubricum, Boiss. & Reut Cat. Sem. Jard. Geniv. (1854).—Cf. Linnaea, xxix. (1857) 721=narcissiflornm.
intermedium, DC. FL Fr. vi. 318=tataricum, paniculatum.
intermedium, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 88=oleraceum.
Jacquemonti, *Regel, in Act. Hort. Petrop. HI* II. (1875) 162.—Ind. or.
Jacquemontii, Kunth, Enum. PL iv. 899*=rubellum.
japonicum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 60.—Japon.
japonicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 183.—Japon.
jeholense, *Franch. in Noun. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* Sér. II. vii (1884) 113; *PI. Davidian.* i (1884) 806.—China,
jenischianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. IL (1875) 287.—Persia,
jesdianum, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 217.—Persia,
jnldusicolum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 523.—Turkestan.
junceum, Jacquem. ex Baker, in Jonm. Bot. xii. (1874) 295=Jacquemonti.
iuneeum, *Sibth. & Sm. Prod.* L 226.—Cyprus.
Inndfolium, *D. Don, ex Steud. Norn.* ed. II. 1. 62.—Chili,
karakense, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1876) 76.—Turkestan.
karataviense, *Regel, I. c.* 243.—Turkestan.
Kaufmanni, *Regel, 1. c.* 84.—Turkestan..
kermesinum, Reichb. Ic. Fl. Germ. x. 25-glbbosum.
Kesselringi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 272.—Turkestan.

AIiLIXTM :—
KlotBschi, Regel, in Act Hort. Petrop. iii. II. (1876) 255«=lilacinum.
Kockii, Langc, ex Nym. Consp. 736«vineale.
kokanicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 104.—Turkestan.
Korolkowi, *Regel, 1. c.* ii. (1878) 407.—Turkestan.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 117.—Persia.
Kunthii, *G. Don, in Mem. Went. Soc.* vi. (1827) 82.—Mexic.
Kuschakerwiczi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 117.—Turkestan,
laceratum, *Boiss. & Not, Diagn.* Ser. II. iv. 112.—Persia,
lachnophyllum, *Payne, in Pal. Expl. Soc. Cat. PL* 125.—Palaestin.
lacteum, Sibth. & Sm. Prod. 226=neapolitanum.
lacunosum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 231.—Calif.
lacteum, heath. PL Hartw. 389 = Brodiaea lactea.
laetum, Pollini, Cat. Veron. (1812) 7=neapolitanum.
laetum, Salisb. Prod. 235=A. Porrum.
Lallemanti, Regel & Rach, in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858)24-decipiens.
latifolium, Gilib. Exercit. ii. 470 =ursinnm.
latifolium, Jaub. & Spach, Illustr. PL Orient, ii. 8. t. 108 = A. Akaka.
laxiflorum, Tausch, in Flora, xii (1829) Erg. 46-vineale.
laxum, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi (1827) 63-angulosum,
Ledebourianum, *Schult. f. Syst.* vii. 1029.—Rossia.
Lehmannianum, *Merckl. ex Bunge, in Mint. Sav. £tr. Pitersb.* vii. (1851) 509; *(Rel. Lehm.* 833).—Turkestan.
Lemmoni, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 234.—Calif.
lepidum, Kunth, Enum. PI. iv. 408=paniculatum.
lepidum. Ledeb. Ic. FL Ross. iv. 17 = Pallasii.
leptophyllum,Sdua, Enum. PL Transs. 674=senescens.
leptophyllum, Wall. Cat. n. 5073-rubellum.
Lessingii, Kar. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 170=sabulosum.
Uucanthum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 240 = A. Ampeloprasum.
leucocephalum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 179 = flavidum.
Libani, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiif. 26.—Syria.
ligusticum, De Not Prosp. Fl. Lig. 65 = flavum.
macinnm,Klottsch, inBot.Ergeb. Waldem. Reise^HO.—Reg. Himal.
lilacinum, Koyle, ex Regel, in Act Hort. Petrop. iii. (1875) 89=rubens.
liliflorum, Zeyh. Cat Schwetz. (1818) 15=neapolitanum.
lineare, *Linn. Sp. PI.* 295.—Sibir.
lineare, Tenore, Fl. Nap. i. 154=sphaerocephalum.
lineare, Willd. ex Kunth, Enum. PL iv. 419=strictum.
littoreum, Bertol. Amoen. It 241 = vineale.
littoreum, G. Don, in Mem. Wern. Soc vi (1827) 8 = monspessulanum.
longibulbum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 110=A. Victorialis.
longicaule, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 180.—Am. bor.
longicaule, Hort. ex Schult. f. Syst vii. 1067=glaucum.
longicuspis, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* ilL II. (1875) 45.—Kokania.
longifolium, *Spreng. Syst.* ii. 38.—Am. mer.; Mexic
longifolium, lindl. Bot Reg. t 1034«glandulosuin.
longipetiolatum, St Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 119=ureinum.
longisepalum, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. v. (1842) 429=rubellum.
longispathum, [Delar. in] Red. LiL t. 316-paniculatum.
longistylum, Baker, in Jonm. Bot xiL (1874) 294 = sacculiferum.
loratum, *Baker, I. c.* 290.—Tibet ore.
lusitanicum, *Lam. Encyc.* i. 70.—Lusitan.
lusitanicum. Link, ex Regel, in Act Hort Petrop. iii. II. (1875) 78-A. Schoenopraum.
lusitanicum, [Delar. in] Red. LiL t. 271=angulosum.
luteum, Hort. ex Dietr. Lexic. Gart ed. II. i. 266-obliqutun.
Macleanii, *Bakér, in Bot. Mag.* 16707.—Affghan.
Macnabianum, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* (1878) 261. t. 77.£2-».-H«b.!

ALLIUM :—
macranthum, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 293.—Reg. Himal.
nTacrocephalum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 840.—Austria,
macrochactum, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* v. 239.—Assyria,
macrorhizon, Regel, in Act Hort. Petrop. iii. II. (1875) 164.—Turkestan.
macrorrhiBum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii 82-hymenorhizum.
macrospermum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. FL Orient. v. 282-orientalc
macrostemon, *Bunge, in Mém. Sag. £tr. Acad. Pitersb.* ii. (1885) 139.—China bor.
macrostylum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 296.—Tianschan.
macrum, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 283.—Am. bor.
madidum, *S. Wats. 1. c.* 228.—Am. bor.
magicum, Linn. Sp. PL ed. II. 424-nigrum.
majale, Cyr. PL Rar. Neap. Fasc i. IS. t. 4=roseum.
margaritaceum, Heldr. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1C76) 201=staticiforme.
margaritaceum, Moench, Meth. Suppl. 80 = A. Scorodoprasum.
margarilaceum, *Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. I* 224.—Europ.; Oriens.
marginatum, *Janka, in Termese. Fuuetek,* viiL (1884) 29.—Europ. anstr.
maritimum, Rafin. Caratt 86. n. 205=pusillum.
maritimum, *Torr. in Rep. V. St. & Mex. Bound.* 217.—Calif.
Maximowiczi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 153.—As. or.
medium, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 88-triquetrum.
megalobulbon, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 526.—Turkestan.
melananlherum, *Pant. Elem.* 64.—Europ. merid.
microcephalum, Tausch, in Flora, ii. (1819) 462 = strictum.
microcephalum, Willd. ex Kunth, Enum. Fl. iv. 425 = angulosum.
minutiflorum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 242.—Persia.
mobilense, Regel, 1. c. =mutabile.
modestum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 83=paniculatum.
mogadorense, Willd. ex Kunth, Enum. PL iv. 384 = A. Ampeloprasum.
Moly, Georgi, Beschreib. Russ. Reich, iii. iv. 896 = decipiens.
Moly, Griseb. & Schur, ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 199=globosum.
Moly, *Linn. Sp. PI.* 801.—Europ.
Moly, Ucria, Hort. Panorm. 153 =subhirsutum.
monadelphum, *Turca. ex Kunth, Enum. PI.* iv. 393.—Sibir. baical.
mongolicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 160.—Mongolia.
monserrotense, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. FL Hisp. i. 207 = carinatum.
monspessulanum, Gouan, Illustr. 24-*nigrum.
monspessulanum, Willd. Enum. Suppl. 16—panicolatum.
montanum, Guss. PL Rar. 142=tenuiflorum.
montanum, Reichb. Ic. FL Germ. x. t 468. f. 1060-flavum.
montanum, Tenore, Fl. Nap. iii. 867-Cupani.
montanum, F. W. Schmidt, ex Schult. £ Syst vii. 1072 =losum.
«u>nte«»j». Sibth. &Sm.Fl. Graec. t.319=paniculatum.
moschatum, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 299.—Europ.; Oriens.
moschatum, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 46=parciflornm.
moschatum, Sintenis, ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 199=globosum.
moschatum, Urville, in M^m. Soc. Linn. Par. i. (1822) 293-Cupani.
multibulbosum, Jacq.Fl. Austr. i. 9—nigrnm.
multiflorum, DC. Fl. Fr. vi. 316 = polyanlhum.
multiflorum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 288.—Algeria.
multiflorum, Kunth, Enum. PL iv. 387 = rotundnm.
multiflorum, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1876) 61, pro parte = rudbaricum.
Murrayanum, Regel, in Gartenfl. (1878) 260. t 770. /. l=acuminatum.
muUbile, *Michx. Fl.Am. Bor.* L 196.—Georgia.

ALLIUM :—

myrianthum, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 59 = A. Ampeloprasum.
Napus, Pall, ex Kunth, Enum. PI. iv. 395 = A. Cepa.
narcissiflornm, *Vill. Prosp.* 18.—Europ.
"arcissifolium,. Lam. Fl. Fr. iii. 263**pedemontanum.
nardssifolium, Scop. FL Cam. ed. II. i. 238 = senescens.'
neapolitanum, *Cyr. PI. Rar. Neap.* i. 13. t. 4.—Europ. j Oriens.
nebrodense, Gnss. Prod. Fl. Sic. i. 404 = flavum.
neglectum, Wender. in Schrift. Ges. Nat. Marb. ii. (1881) 211 = A. Scorodoprasum.
nemorale, Salisb. Prod. 235 - ursinum.
Nereiduin, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. v. (1866) 244,-China.
neriniflorum, *G. Don, ex Loud. Encyc. PI. Suppl.* ii. 1342—China.
nerinifolium, Baker, in Joum. Bot xii. (1874) 290 = Thunbergii.
nevadense, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 851, 487. t 38. f. 1-S.-Calif.
Ncvii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 281.—Calif.
nigruvi. All. Fl. Pedem. ii. 158. t 25 f. l=narcissiflorum.
nigrum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 266=decipiens.
nigrum, G. Dor, in Mem. Wera. Soc vi. (1827) 89 = multibulbosum.
nigrum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 430.—Europ.; Oricns.
nigrum, Sibth. & Sm. Fl. Graec t. 828 = Bauerianum.
mpponicum, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 627.—Japon.
nitens, Sauze & Maill. Cat. PI. Deux-Sevres, 51 = vineale.
nitidulum, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 171 = Pallasii.
Nitschmanni, Willd. ex Ledeb. 1. c. 175=flavum.
nivale, Jacquem. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1075) 178 = Govanianum.
nneum, Roth, Cat. Bot. fasc. ii. 85=subhirsntum.
Noeoanum, *Rent, ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. "• (1875) 235.—As. Min.
nndicaule, *Lehtn. Cat. Hort. Hamb.* (1826).—Bras.
nutans, Herbb. quorr. ex Schult. f. Syst vii. 1088 = cernuum.
nutans, *Linn. Sp. PI.* 299.—Sibir.
Nuttallii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 227.-Am. bor.
obliquum, *Linn. Sp. PI.* 296.—Sibir.
'iscurum, Bieb. ex Schult. f. Syst. vii. 1003=A. Scorodoprasum.
"otusiflomm, [DC. in] Red. Lil. t. 118 = pnsillum.
obtusifolium, *Klotasch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise,* 51.—Reg. Himal.
occidentals, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 890=attenuifoliuin.
ochroleucum, Reichb. Ic. Fl. Germ. x. t 498. f. 1090 = globosum.
ochroleucum, *Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 204. 1186.—Europ.
odoratissimum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 289. t. 83.—Afr. bor.
odorum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 8S4=angulosum.
odorum, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. Suppl. 48 = ochroleucum.
°<iorum, *Linn. Want.* 62.—Sibir.
odorum, Lour. Fl. Cochinch. 251-Thunbergii.
odorum, Tenore, Fl. Nap. Prod. 21=nigrum.
oforum, Thunb. Fl. Jap. 182=Thunbergii.
oleraceum, Des Moul. Cat. Dord. 142, ex parte = dentiferum.
oleraceum, *Linn. Sp. PI.* 299.—Europ.
""ganthum, Kar. & Kir. in Bull Soc. Nat. Mosc. (1841) 856=A. Schoenoprasum.
Ulrvieri, *Baits. Fl. Orient,* v. 284.—Mesopotamia,
ojympicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 58.-Thracia.
°*phioscorodon,* G. Don, in Mem. Wern. Soc. vi. (1827) 5=sativum.
°*pi'ii,* Wolfner, in Lotos, iv. (1854) 176=triqnetram.
oreophiloides, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) I14.-Turkestan.
o'eophilum, C. *A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 87.—Cancas.
°«oprasum, *Schrenk, in Bull. Sc. Acad. St. Petersb.* *• (1842) 354.—Turkestan,
onentale, *Boss. Diagn.* Ser. 1. xiii. 25.—Oriens.
ornutthogaloides, Walt. Fl. Carol. 121-striatum.

AIiLITTM :—

Ostrowskianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 545.—Turkestan.
oviflorum, *Regel, 1. e.* viii. (1884) 658.—Reg. Himal.
oxypetalum, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 87 = oleraceum.
Pallasii, *Murr. in Comm. Gott.* vi. (1775) 82. t 8.—Sibir.
pollens, Linn. Sp. PI. ed. II. 427=paniculatum.
pollens, Reichb. Ic. Fl. Germ. x. t 484. f. 1062 = flavum.
pallens, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* t. 817.—Graecia.
Palmeri, 5. *Wats. Bot. in Rep. Geol. Expl. Fortieth Parallel,* 487. t. 27. f. 10,11.—N. Mexico.
palustre, Pourr. ex Lag. Elench. 13 = A. Schoenoprasum.
palustre, Salisb. Prod. 285 = sibiricum.
paniculatum, All. Fl. Pedem. ii. 157 = flavum.
paniculatum, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t 1482 = caucasicum.
paniculatum, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 854 = intermedium.
paniculatum, *Linn. Syst.* ed. X. 978.—Europ.; Oriens.
paniculatum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. t. 818 = fnscum.
paniculatum, Viv. Fl. Lib. Spec. 19=nigrum.
pannonicum, Gromow. ex Trautv. in Act. Hort.Petrop. ix. (1884) 273, nomen.—Europ.
papillare, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 27.—Palaestin.
paradoxum, *G. Don, in Mem. Wern. Soc.* vi. (1827) 72.—Caucas.; Persia.
parciflorum, *Viv. App. Fl. Cars. Prod.* 2.—Conic.
Parishii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 880.—Am. bor.
Parryi, 5. *Wats. 1. c.* xiv. (1879) 281.—Calif.
parviflorum, Desf. Fl. Atlant. i. 290 = paniculatum.
parviflorum, Desv. Fl. Anj. 96=sphaerocephalum.
parvifiorum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 427.—Europ.
parvifiorum, ThnilL Fl. Paris, ed. II. i. 166 = oleraceum.
parvifolium, Crantz, Inst. i. 49= parviflorum.
parvum, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* iii. (1863) 54. f. 13.—Calif.
Paterfamilias, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 114.—Reg. Caucas.
paucibulbosum, *Haw. ex Steud. Norn.* ed. II. i. £3.—Hispan.
paucifiorum, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 210=parciflorum.
paudflorum, Willd. ex Ledeb. FL Ross. iv. 169=A. Cepa.
pedemontanum, Willd. Sp. PI. ii. 77 = narcissiflorum.
pendulinum, Tenore, Fl. Nap. i. 168. t. 31 =triquetrum.
permixtum, Guss. Fl. Sic. Prod. i. in add. 8=subhirsutum.
persicum, Fisch. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. H. (1875) 43= A. Scorodoprasum.
petiolatum, Lam. Fl. Fr. iii. 261 = ursinum.
petraeum, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 511-globosum.
phalereum, Heldr. *Sc* Sart. ex Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 238=staticiforme.
phanerantherum, *Boiss. & Haussi. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 235.—Syria.
philistaeum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 26-Erdelii.
phrygium, *Boiss. in Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 256.—Phrygia.
phthioticum, *Boiss. & Heldr. ex Boiss. t. c.* 274.—Oriens.
pilosum, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* t. 321.—Archip. Graec.
pisidicum, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 31 = Cupani.
plantaginense, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 211 = A. Victorialis.
plantagineum, Lam. Fl. Fr. iii. 262=A. Victorialis.
platycaule, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 234.—Calif.
platyspathum, *Schrenk, Enum.* 7.—Turkestan.
platystemon, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 514=oreophilum.
pleianthum, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 238.—Am. bor.
Plummerae, 5. *Wats. 1. c.* xviii. (1882-83) 195.—Mexic.
Poeppigi, *Kunth, Enum. PL* iv. 456.—Chili.
polyanthum, Schult. f. Syst. vii. 1016=rotundum.
polyphyllum, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 509.—Turkestan.
polyrhizum, *Turci. ex Regel, in Act. Hort. i itrop.* iii. (1875) 162.—Sibir. baical.

ALIiITTM :—

porphyroprasum, Heldr. *Sc* Sart. ex Boiss. Fl. Orient. v. 233=rotundum.
porraceum, S. F. Gray, Nat Arr. ii. 181 = A. Ampeloprasum.
Porrum, Georgi, Beschreib. Russ. Reich, iii. iv. 891 = obliquum.
Porrum, *Linn. Sp. PI.* 295.—Europ.
Potanini, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 295.—Mongol.
praecissum, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 17. t. 429 = paniculatum.
pratense, Schleich. ex Kunth, Enum. PI. iv. 882 = carinatum.
Preslianum, Schult. f. Syst. vit 1132=rotundum.
procerum, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 668 ; ix. (1884) 274.—Bokhara.
proliferum, Schrad. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 358 = A. Cepa.
prostratum, Maxim. Prim. Fl. Amur. 283=Maximowiczi.
prostratum, Trev. Ind. Sem. Vratisl. (1821)=Stellerianum.
pruinatum, Link, in Spreng. Syst. ii. 85 = monspessulanum.
Przewalskianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 164.—China occ
Pseudo-Cepa, Schrenk, in BulL Sc. Acad. Pétersb. x. (184-2) 355=galanlhum.
Pseudo-ochroleucum, Schur, Enum. PL Transs. 673 =globosum.
pulchellum, *G. Don, in Mem. Wern. Soc.* vi. (1827) 46.—Europ.; Oriens.
pulchrum, Clark, Trav. iii. 387= nigrum.
punctulatum, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 401 = A. Schoenoprasum.
purpureum, Salisb. Prod. 235=senescens.
purpureum, Schur, Enum. PI. Transs. 672=carinatum.
Purskii, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 10 = vineale.
pusillum, *Cyr. ex Tenore, Cat. Neap.* (1818) 4.—Ital.
pusillum, Presl, Delic. Prag. 147 = Cnpani.
pusillum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 17 = delicatulum.
pustulosum, *Boiss. & Haussi. ex Boiss. Fl. Orient.* V. 248.—Cataonia.
pylium, De Not. in Linnaea, xviii. (1844) 157= A. Ampeloprasnm.
pyrenaicum, *Costa, Suplem. Catal.* 92; *Costa & Vayr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* ix. (1880) 87.—Pyren.
Raddeanum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 155.—Sibiria.
ramosum, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. IV. 892 = odorum.
ramosum, Jacq. Misc. ii. 303=obliquum.
ramosum, *Linn. Sp. PI.* 296.—Sibina.
ramosum, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 184 =tataricum.
reflexum, F. G. Dietr. Lexic. Gaert. ed. II. i. 285 = A. Schoenoprasum.
reflexum, *Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 281.—Mesopot.
Regclii, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 275.—Transcauc.
Renari, *Regel, 1. c.* vi. (1879) 521.—Turkestan.
reticulatum, lienth. PI. Harlw. 339 = attenuifolinm.
reticulatum, *Fras. ex G. Don, in Mem. Wern. Soc.* vi. (1827) 86.—Am. bor.
reticulatum, J. & C. Presl, Fl. Cech. 73=strictum.
reticulatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119 = A. Victorialis.
reticulatum, Wallr. Sched. Crit. 135=angulosnm?
Reuterianum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 60.—As. Min.
riparium, Opiz, Natural, vi. (1824) 50=sibiricum.
robustum, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 853 = atropurpureum.
Rosenbachianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1881) 664.—Bokhara.
roseum, Krock. Fl. Siles. i. 516. t. 43 = sibiricum.
roseum, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 296.—Reg. Mediterr.
Rothii, *Zucc.in Abh.Bayer.Akad.* iii. (1843) 282. t. 2. f. 2.—Palaestin.
rotundifolium, Lumnitz. ex Steud. Nom. cd. II. i. 53 =rotundum.
rotundum, All. Fl. Pedem. ii. 155=acutiflorum.
rotundum, *Linn. Sp. PI.* cd. II 423.—Europ.; As. Min.
rotundum, Wimm. & Grab. Enum. 66= vineale.
Roxburghi, Knnth, Enum. PL iv. 454 = odorum

ALLIUM:-

rubellum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 264.—Europ.; Oriens; Sibir.
rubellum, Presl, Fl. Sic 42 = rohmdnm.
rubellum, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1875) 107 = Tschulpias
r«A*W»»«,Wmd.exLedeb. Fl.Ross.iv. 179=globosum.
rnbens, *Baker, in Jaurn. Bot.* xii. (1874) 293.—Reg. Himal.
rubens, Schrad. ex Willd. Enum. 360=Stellerianum.
rubicundum, Niven, ex G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 16 = rotnndum.
rnbicnndum, *Willd. ex Kunth, Enum. PI.* iv. **489.—** Hab. ?
Tubrovittatum, *Boiss. & Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 29.—Creta.
rudbaricum, *Boiss.* b" *Buhse, in Nouv. Mlm. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 215.—Persia.
rnpestre, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 259.—Iberia ; Taur.
rupestre, Fisch. ex Schrank, in Denkschr. Regensb. Hot. Ges. ii. (1822) 38 = saxatile.
rupestre, Stev. in Mém. Soc Nat Mosc. iii. (1812) 260=paniculatum.
Ruprechti, *Boiss. Fl. Oi-ient.* v. 264.—Caucas.
ruthenicum, Steud. Nom. ed. II. i. 54 = flavum.
sabulosum, *Fisch. ex Goebel, Reise,* ii. 811.—Reg. Casp.
sabulosum, *Stev. ex Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1842) 513.—Persia; Turkestan,
sacculiferum, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 281.—Reg. Amur,
sairamense, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 520—Turkestan.
Salesovianum, Fisch. ex Regel, 1. c. iii. ir. (1875) 162 = Fischeri.
Sanboraii, *Wood, in Proc. Ac. Nat. Sc. Philad.* (1868) 171.—Calif.
sapidissimum, Hedw. in Roem. Collect. 76 — fistulosum.
sarawschanicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 244.—Turkestan.
sardoum, Moris, Stirp. Sard. Elench. fasc. ii. 10 = sphaerocephalnm.
sativum, *Linn. Sp. PI.* 296.—Europ.
Savii, Parl. Fl. Ital. ii. 554-paniculatum.
savranicum, Bess. Cat. Sem. Hort. Crem. Suppl. (1818) =globosum.
saxatile, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 264 = globosum.
saxatile, Hohen. ex Boiss. Fl. Orient, v. 263 = lepidum.
saxatile, Pall. Reise, iii. 298 = fistulosum.
saxatile, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 181=albidum.
scaberrimum, Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 439 =sphaerocephalum.
scabrellum, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mlm. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 215.—Persia,
stabriflorum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 60.—Cappadoc.
scabriscapum, *Boiss. 1. c.* xiii. 31.—Persia.
scabrum, Gilib. Exercit. ii. 469=oleraceum.
scaposum, *Benth. in PI. Hartw.* 26.—Mexic.; Texas.
scariosum, Jan, ex Schult. f. Syst. vii. 1011=rotundum.
schergianum, *Boiss. Fl. Orient,* v. 251.—Syria.
Schmidtianutn, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) *Erg.* 45. —Bohemia.
schoenoprasioides, Fries, ex Nym. Consp. 741 = A. Schoenoprasum.
schoenoprasoides, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 630.—Reg. Himal.
Schoenoprasum, *Linn. Sp. PI.* 801.—Reg. temp. bor.
Schoenoprasum, Regel & Tiling, Fl. Ajan. 123 = Ledebourianum.
Schrenki, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 172,—Ind. or.
Schuberti, *Zucc. in Abh. Bayer. Akad.* iii. (1848) 234. t. 3. f. 1.—Oriens.
Schulleri, Stev. ex Regel, in Act Hort. Petrop. iii. 11.(1875) 69 = Aucheri.
scilloides, Dougl. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 229 = collinum.
Scordoprassum, Aschers. Fl. Braudenb. 725=seq.
Scorodoprasum, *Linn. Sp. PI.* 297.—Europ.; Reg. Cauc; Syria,
scorzoneraefolium, *[DC. in] Red. Lit.* ii. t. 92.—Europ. austr.
segetum, *Jan, ex Schult. f. Syst.* vii. 1020.—Sicilia.
Sellovianum, *Regel, in Act. Hart. Petrop.* ill. II. (1875) 117.—Bras.; Chili.
Semenovi, *Regel, in Bull. Sot- Nat. Mosc.* xii. (1868) I. 449.—Reg. Himal.
semiretschenskianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 630.—As. centr.

AIiLIUM:—

senescens, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1160»=glaucuin.
senescens, Host, Fl. Austr. i. 420=fallax.
senescens, *Linn. Sp. PI.* 299.—Europ.; Sibir.
senescens, Suter, Fl. Helv. i. 193 = acutangulum.
senescens, Miq. Ann. Bot. Lugd. Bot iii. 818 = odorum.
senescens, Thunb. Fl. Jap. 132 = japonicum..
serbicum, Vis. & Part!, in Mem. 1st Venet xii. (1864) 479 = moschatum.
serotinum, Lapeyr. Fl. Pyr. t. 84 = ochroleucum x suaveolens.
serotinum, Schleich. ex G. Don, in Mem. Went. Soc. vi. (1827) 63 = senescens.
serrulatum, Boiss. Fl. Orient v. 241=atroviolaceum.
serratum, S. *Wats. Bot. King, Exped.* 487. t 37. f. 4, 6.—Calif.
sessiliflorum, Fisch. ex Regel, in Act Hort. Petrop. iii. II. (1875) 140 = senescens.
setaceum, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hung. i. 70. t. 68 = moschatum.
setilblium, *Schreni, Enum.* 6.—Soongaria.
Sewerzowi, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1868) 463.—Turkestan.
sibiricum, Linn. Mant 562 = A. Schoenoprasum.
Sibthorpianum, Schult f. Syst. vii. 1057 = paniculatum.
siculum, Ucria, in Roem. Arch. i. 68 = Dioscoridis.
Sieberianum, Schult. f. Syst. vii. 1099=neapolitanum.
sikkimense, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 292.—Reg. Himal.
sinaiticum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 81.—Arabia,
sindjarense, *Boiss. &° Hausskn. ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 121.—Mesopotamia,
sinicum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. *Art.* iv. 6; ed. II. (1827) 68.—China,
sipyleum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 68.—Lydia; Ins. Chios.
sordidum, Schur, Enum. PI. Transs. 673=globosum.
spathaceum, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 830 = subhirsutum.
speciosum, Cyr. PI. Rar. Neap. Fasc ii. 13=nigruin.
spectabile, DeNot. Fl. Lig. 414 = A. Ampeloprasum.
sphaerocephalum, Crome, ex Schlecht Fl. Berol. ii. 249 = vineale.
sphaerocephalum, *Linn. Sp. PI.* 297.—Europ.; Oriens.
spirale, Hort Dorp, ex Kunth, Enum. PI. iv. 422 = spurium.
spirale, Willd. Ennm. Suppl. 17 = senescens, nutans.
splendens, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat iii. 164 = Bakeri.
splendens, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 1025.—Sibiria.
spurium, *G. Don, in Mem. Wern. Soc.* vi. (1827) 59 = senescens.
spurium, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1067 = glaucum.
stamineum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 119.—Oriens.
staticiforme, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* iv. t. 320.—Graecia.
stellatum, *Fras. ex Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t 1576.—Am. bor.
Stellerianum, Bess. Cat. Hort Crem. (1824) = albidum.
Stellerianum, *Willd. Sp. PI.* ii. 82.—Sibiria.
Stellerianum, Ledeb. Fl. Ross. iv. 179 = flavidum.
stenopetalum, *Boiss. & Kotschy, ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 231.—Cilicia.
stenopetalum, Guss. Sic. Syn. i. 894 = margaritaceum.
stenophyllum, Regel, ex Herd, in Bull. Soc Nat Mosc xii. (1868) II. 446 = doloncarense.
stenophyllum, *Schrenk, in Bull. Pkys.-Matk. Acad. Pltersb.* iii. (1844) 210.—Soongaria.
stenophyllum, Wall. Cat n. 6078 = Jacquemonti.
Stevenii, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 176=globosum.
stipitatum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 646. —As. centr.
Stocksianum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 117.—Beluchistan.
Stoliczki, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 160.—Tibet, occ.
Stracheyi, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 298.—Reg. Himal.
stramineum, Boiss. *Sc* Reut. Diagn. 25 = A. Moly.
stramineum, *Regel, Gartenfl.* xxv. (1876) 855.—Manchuria. >.
***stramineum,* Schtir, Enum. PL Transs. 674=angnlosum.**

ALLIUH:-

striatellum, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vi. (1851) 97. ..— Chili.
siriatum, Jacq. Coll. Suppl. 61 = Nothoscordum striatum.
strictum, *Schrad. Hort. Goett.* 1.1.—Europ.; Oriens.
suaveolens, Gaud. Fl. Helv. ii. 491 = strictum.
suaveolens, *Jacq. Coll.* ii. 305.—Europ.
suaveolens, Duby, Bot Gall. i. 470=ochroleucnm.
subalbidum, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 128=roseum.
subalpinum, Pall. Ind. Taur. ex Kunth, Enum. PL iv. 448=decipiens.
subbiflonim, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxix. (1836) 18. t. 62.—Chili.
subhirsutum, Delile, Fl. Aegypt. ex Boiss. Fl. Orient, v. 274 = neapolitanum.
subhirsutum, Desf. Fl. Atlant. 286=subvillosum.
subhirsutum, *Linn. Sp. PI.* 295.—Europ.; Oriens.
subhirsutum, Keichb. Fl. Germ. Excurs. 113 = subvillosam.
subhirsutum, Sieber, ex Kunth, Ennm. PI. iv. 441 = neapolitanum.
subquinqueflorum, *Boiss. Fl. Orient,* v. 264.—Armenia,
subtilissimum, *Ledeb. Ic. Fl. Alt.* ii. 22. t 360,-Sibjr. altaic
subvillosum, Salzm. ex Schult. f. Syst vii. 1104-subhirsutum.
sulcatum, [DC. in] Red. Lil. t. 482=neapolitanum.
Sulvia, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 53-fragrans.
Sawoiowi, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 546. —As. centr.
Synnotia, G. Don, in Mem. Wem. Soc vi. (1827) 19 =rotundum.
Synnotianum, Schult. f. Syst. vii. 1015=praec.
syntamanthum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 288 =rubellum.
syriacum, Boiss. Fl. Orient, v. 282=A. Ampeloprtlsunx.
Sgovitsi, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. II. (1876) 171 = strictum.
szurulense, *Lerch. ex Kaniti, in Verh. Siebenb. Ver. Naturm.* xxxiv. (1884) 55.—Europ.
talassicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 628. —Turkestan.
tartaricum, [Dryand. in] Ait. Hort Kew. ed. II. ii. 233 = odorum.
tartaricum, Hort ex Schult. f. Syst. vii. 1066 = nutans.
tartaricum, *Linn. f. Suppl.* 196.—Rossia; Sibiria; Persia.
tauricolum, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 118 = frigidnm.
tauricum, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1061 = flavum.
tauricum, Pall, ex G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 50 = globosum.
tchefouense, *Debeaux, in Aries Linn. Soc. Bord.* xxxii. (1878) 25; *Fl. Tchi-Fou,* 188.—China.
Tchihatschewii, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 551.—Armenia.
Tenorii, Spreng. Pugill. i. 29 j Syst. ii. 85 = rosemn.
tenue, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 238-rubellum.
tenue, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. S96 = erythraeum.
tenue, G. Don, in Mem. Wem. Soc. vi. (1827) 84-Pallasii.
tenue, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 206. —Turkestan.
tenuiflorum, Delastre, Fl. Vienne, 420=sphaerocephalum.
tenuiflorum, Tenore, Fl. Nap. i. 166. t. 80=paniculatum.
tenuifolium, *Frivald. in Syll. Ratisb.* ii. 33.—Europ.
tenuifolium, Salisb. Prod. 285 = A. Schoenoprasum.
tenuifolium, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 76 = globosum.
tenuissimum, Habl. Taur. 162-moschatum.
tenuissimum. *Linn. Sp. PI.* 301.—Sibiria.
teretifolium, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 629.—Turkestan.
thessalum, Boiss. Fl. Orient, v. 232=A. Ampeloprasum.
Tliomsoni, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 294.—**Reg. Himal.**
Thunbergii, *G. Don, in Mem. Wern. Soc.* vi. (1827) 84.—Japon; China.

ALLIUM :—

tianschanicum, Rupr. in Mém. Acad. P&ersb. Sér. III. xiv. (1869) S3. (Sert. Tiansch. 33)=hymenorhizum.

Tilingi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iiL II. (1876) 124. —**Calif.**

Tinei, J. Sc C. Presl, Delic. Prag. 145=subhirsutum.

Tolmiei, Baker, ex Coutt. Rocky Mt Bot. 849 = tnbracteatnm.

tortuosum, *Schur, in Verh. Siebent. Ver. Naturw.* iv. (1853) 185

7 6 —E ^ p .

»tuosum, Willd. ex Schult f. Syst. viL 1064 = lineare.

Tourneuxii, Boiss. Fl. Orient, v. 274=roseum.

trachyanthum, Griseb. Spicil. Fl. RumeL ii. 895 =rotundum.

trachypus, Boiss. & Spmn. Diagn. Ser. I. vii. 114 = iphaerocephalum.

uussilvanicum, *Lerch. ex Kanitt, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* xxxiv. (1884) 54.—Europ.

Irattvetterianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* -viii. (1884) 661.-Bokh£a.

ttbngteatum, *Torr. in Pad/. Sail. Ref.* iv. 148.—**Calif.**

Wchocnemis, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. /1847) 2l6.-Algeria.

tnçoccum, *[Solani. in] Ait. Hort. Kew. i.* 428.—Am. oor.

****coccum,* Blanco, FL Filip. ed. I. 239=uliginosum.

income, Desv. ex Regel. in Act. Hort. Petrop. iii. H. (1875) 145=angulosnm.

^icorne, Hort. ex Poir. Encyc Snppl. i. 270=cemuum.

'TM?™">. *Rafin. in Med. Repos. New York,* v. (1808) .*«?—Pennsylv.

tnfoliatnm, *Cyr. PI. Rar. Neap. Fasc.* ii. 11.—Europ.; Onens.

'"pedale, Trantv. in Act. Hort. Pttrop. ii. (1878) 485 —Dioscoridit

"««*r«,m, Hort. ex Schrad. in Schult. £ Syst. vii. 1078 = angulosum.

"iqoetrum, *Linn. Sp. PI.* 800.—Europ.; Afr. bor.

**yuetrum,* Lour. Fl. Cochinch. 202-Thunbergii.

*"9*etrum,* Sebast & Maur. Prod. FL Rom. 126 = .pendulinum.

*****

ALLOPHYI.U8:-
celebicus, *Blume, Rumphia,* iii. 128.—Ins. Celebes.
Cobbe, *Blume, I. c.* 181.— As. or.
Cominia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 62 = S. Cominia.
Commersoni, *Blume, Rumphia,* iii. 129.—Ins. Borbon.
dimorphus, *Radii, in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 126.—Ins. Philipp.
filiger, *Radii. 1. c*— Ins. Philipp.
fulvinervis, *Blume, Rumphia,* iii. 183.—Java,
integiifolius, *Blume, 1. c.* 129.—Malaya,
javensis, *Blume, 1. c.* 126.—Java.
lanatus, Koxb. Hort. Beng. 68=A. Cobbe.
leptococcus, *Radii, in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 126.—Ins. Key.
ligustrinus, *Blume, Rumphia,* iii. 126.—Sumatra,
litoialis, *Blume, I. c.* 121.—Java,
nigrescens, *Blume, I. c.* 129.—Madag.
ornitrophioides, Roxb. ex Wall. Cat. n. 8055 = A. Cobbe.
Pervillei, *Blume, Rumphia,* iii. 128.—Madag.
pinnatus, Koxb. Ic 1.1407 = Sapindus fruticosus.
racemosus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 62=S. occidentals,
rhnsiphyllns, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 507.—Ins. Socotra.
rigidus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 62=S. rigida.
rofescens, *Blume, Rumphia,* iii. 159.—Borneo.
TDgosns, *Blume, 1. c.* 138.—Java,
salignus, *Blume, I. c.* 129.—Madag.
serratus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) II. 185.—Burma.
sessilis, *Blume, Rumphia,* iii. 125.—Java,
sumatranns, *Blume, I. c.* 132.—Sumatra.
sundanus, Miq. Fl. Ind. Bat. i. u. 575 = A. Cobbe.
ternatus, Lour. Fl. Cochinch. 282 = A. Cobbe.
ternatus, Roxb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 55 «S. zeylanicus.
timorensis, *Blume, Rumphia,* iii. 180.—Timor.
timorensis, Miq. Fl. Ind. Bat ii. I. 575 = A. Cobbe.
zeylanicus, *Linn. Sp. PI.* 848.—Himal.

AIiIiOPLECTUS, Mart Nov. Gen. et Sp. iii. 53. t. 223 (18-29). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1008.
ANISOPLECTUS, CALANTHUS, CALOPLECTUS, CALVCOPLECTUS, CORYTOPLECTUS, ERYTIIRANTHUS, PRIONOPLECTUS, SACCOPLECTUS, Oerst. in Danske Vid. Selsk. Skr. V. v. (1858) 117-121.
CRANTZIA, Scop. Introd. 173 (1777).
HEINTZIA, Karst. Ausw. Gew. Venez. 34. t. 11. (1848).
GLOSSALOMA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 209.
LOPHIA, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 47 (1825).
LOPHALIX, Kafin. Sylva Tellur. 70 (1838).
MACROCHLAMYS, Decne. in Rev. Hortic. (1849) 243.
OROBANCHIA, Vand. Fl. Lusit Spec. 41. f. 18, 19 (1788).
POLYSTHYSANIA, Hanst. ex Oerst. in Danske Vid. Selsk. Skr. V. v. (1858) 121.
PTERYGOLOMA, Hanst in Linnaea, xxvi. (1853-1855) 211.
TYSSACIA, Reichb. ex Steud. Norn. ed. IL ii. 727 (1841).
VIREYA, Rafin. Speech, i. 194 (1?14).
angustifolius, *DC. Prod.* vii. 546.—Bras,
bicolor, *Klottsch, ex Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 377.—Bras.
bracteatus, *Linden, Cat.* n. 5 (1850) 2.—Hab. ?
calcaratus, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 655.—Reg. Andin.
capitctus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4452.—Am. austr.
chrysanthus, *Planch. & Linden, in Fl. des Serres, Sir.* I. viii. (1852-53) 211.—N. Granat.
circinnatus, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 65. t. 223. f. 1.—Bras.
coccineus, *Mart. I. c.* 57.—Guiana.
concolor, Hook. Bot. Mag. t 4871=dichrous.
coriaceus, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 363.—Costa Rica.
corymbosus, *Klottsch, ex Hanst. I. c.* 371.—Peruv.
cristatus, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 57.—Ind. occ.
darienensis, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 187.—Darien.
diehrons, *DC. Prod.* vii. 546.—Bras.
dichrous, Hook. Bot. Mag. t 4'216=sparsiflorus.
dimidiatus, *Benth. PI. Hartw.* 285.—N. Granat.
eriocalyx, Galeott ex Hook. Bot. Mag. t. 4371 = dichrous.
Forseitbii, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 375.—Am. centr.

AIIIJOPIIECTUS :—
glaber, *DC. Prod.* vii. 646.—Mexic.
hispidus, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 67.—Am. austr.
ichthyoderma, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 372.—Costa Rica.
Kunthii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 655.—N. Granat.
lanatus. *Seem. Bot. Voy. Herald,* 186.—Panama,
macrophyllus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 484.—Costa Rica.
melitti/olius, Mart, ex Loud. Encyc PI. 1402 = Tussacia pulchella.
meridensis, *Klotesch, ex Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 373.—N. Granat.
mnltifloras, *Hanst. 1. c.* 861.—Costa Rica,
parviflorus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 484.—Costa Rica.
Patrisii, *DC. Prod.* vii. 545.—Guiana,
peltatus, *Oliver, in Bot. Mag. t.* 6383.—Am. centr.-
pendulus, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 6. t 205.—Peruv.
Pinelianus; *Lem. in Fl. des Serres.* Sér. I. ii.(Août 1846) t. v.—Bras.
repens, *Hooi. Bot. Mag.* t. 4250.—Ind. occ.
sanguineus, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 57.—Am. austr.
scabridus,tem. Jard. Fleur. i. (1851) Misc. 51 = glaber.
Schlimii, *Planch. & Linden, in Fl. des Serres,* Sér. I. viii. (1852-53) 211. t. 827.—N. Granat.
Schottii, G. Don, Gen. Syst. iv. 655 = dicbrous.
semicordatus, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 5.—Peruv.
sparsiflorus, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 55.—Bras.
speciosus, Hort. ex Hook. Bot. Mag. t. 4152=capitatus.
speciosus, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 6,—Chili,
strigosus, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 374.—Mexic.
tenuis, *Benth. PI. Hartw.* 235.—Peruv.
tetragonus, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 368.—Costa Rica.
tigrinus, *Hanst. 1. c.* 866.—N. Granat.
villosus, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 407.—Bras,
vittatus, *Andrt, in lllust. Hortic.* xvii. (1870) 1.13.—Peruv.
zamorensis, *Linden & Andri, in lllust. Hortic.* xix. (1872) 110.—N. Granat

ALLOPLEIA.Rafin. Med. Fl. ii. 109 (1830) = Veronica, Tourn. (Scrophul.).
rotundi/olia, Rafin. 1. c.=V. rotundifolia.

ALLOPYTHION, Sehott, Gen. Aroid. t. 24 (1858) = Thomsonia, Wall. (Aroid.).
Hookeri, Schott, 1. c.=T. Hookeri.

ALLOSAMPELA, Safin. Med. Fl. ii. 122 (1830) = Vitis, Linn. (Ampel.).
heterophylla, Rafin. 1. c = V. heterophylla.

ALLOSCHEMONE, Schott, Prod. Syst Aroid. 358 (1860)=Monstera, Adans. (Aroid:).
Poeppigiana, Schott, 1. c. = M. occidentalis.

ALLOSPERMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 122 (1836) = Commelina, linn.
tuberosa, Rafin. 1. c = C. tuberosa.

ALLOSTIS, Rafin. Sylva Tellur. 104(1838) = Baeokea, Linn. (Myrtac).

AUiOTEKOP8IS, C. Presl, Rcl. Haenk. i. 343. t. 47 (1830). Gen. dub. *GRAMIN.* Benth. & Hook. f. iii. 1096.
distachya, *C. Presl, I. c*—Calif.

ALLOTRIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 70 (1836) = Commelina, Linn.
scabra, Rafin. 1. c. = C. scabra.

AZiZiOTBOFA, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. Bot. iv. 81 (1855); et in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 868. *MONOTROPEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 607.
virgata, *Torr. & Gray, in Proc. Am. Acad. I. c.* -Calif.

ALLOUYA, Plum, ex Aubl. PI. Gui. ii. 931 (1775) = maranta, Linn. (Scitam.).

ALLOZYG7A, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 309. t. 15 = Oxyspora, DC. (Melast.).
cernua, Naud. L c. = 0. ceraua.

ALLUGH AS, Steud. Nom. ed. 1.29 (1821) = ALUGH AS, Lindl. = Alpinia,.linn. (Scitam.).

ALMANA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 68 (1886) - Gloxinia, Linn. (Gesner.).
hirsuta, Rafin. I. c = G. hirsuta.

ALMEIDA, Cham, in Linnaea, v. (1830) 56 = seq.

AliMEIDEA, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 129. *RUTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 284.
ARUBA, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 152. t. 19, 27, 29.
acuminata, *St. Hil. ex G. Don, Gen- Syst.* i. 798.—Bras,
alba, *St. Hil. ex G. Don, I, c*—Bras,
caerulea, *St. Hil. ex G. Don, I. c*—Bras,
lanceolata, *St. Hil. PI. Rem.* 144.—Bras,
lilacina, *St. Hil. in Bull. Soc. Philom.* (1823) 129.—Bras.
longifolia, *St. Hil. I. c*—Bras,
longipes, *Presl, Bot. Bemeri.* 32.—Bras,
macropetala. *Fisch. & Mey. Sert. Petrop.* t. 10.—Bras,
myriantha, *Cham, in Linnaea,* v. (1830) 56.—Bras,
rabra, *St. Hil. in Bull. Soc. Philom.* (lt>23) 129.—Bras.

ALMELOVEENIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 32 (l818) = Moullava, Adans. (Inc. Sed.).
spinosa, Dennst. 1. c—Ind. or.

ALMIDEIA, Reichb. Nom. 197 (1841)=Almeidea, St. Hil. (Rutac).

ALMYRA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 336 = Pancratium, Linn. (Amaryll.).
illyrica, Salisb. Gen. PI. Fragm. 109 = P. illyricum.
parviflora, Salisb. 1. c.=P. parviflorum.
stellaris, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 336 - P. illyricum.

ALNASTER, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. xv. (1841) 200=Alnus, Tourn. (Cupul.).
fruticosus, Ledeb. Fl. Ross. iii. 655 = Alnus viridis.
viridis, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 201 =Alnus viridis.

ALNOBETULA, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858); (Enum. PI. Trans.) 68= Alnus, Tourn. (Cupul.).
viridis, Schur, 1. c. = Alnus viridis.

ALNUS, [Toum.] Linn. Syst. ed. II. (1735); Fl. Lapp. 260 (1737). *CVPULIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 404.
ALNASTER, Spach, in Ann. Sc. Nat *Sir.* II. xv. (1841) 200.
ALNOBETULA, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858); (Enum. PI. Trans. 68. n. 614).
CLETHROPSIS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 201.
SEMIDOPSIS, Zumag. Fl. Pedem. i. 249 (1849).
acuminata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 20.—Am. austr.
Alnobetula, C. Koch, DendroL ii. I. 625=viridis.
alpina, Borckh. Handb. Forstb. i. 477= viridis.
americana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 636 = serrulata.
arguta, *Benth. PI. Hartw.* 348.—Mexic.
arguta, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. xv. (1841) 205 =acuminata.
aurea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 1.630=glutinosa.
autumnalis, Hartig, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 305=serrulata.
badensis, Lange, ex Regel, in DC. Prod, xvl II. 188 = glutinosa.
barbata, Fries, ex Nym. Consp. 671=pubescens.
barbata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 43=glutinosa.
brembana, Rota, Prosp. Prov. Bergamasco, 79= viridis.
canadensis, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 378 = serrulata.
castanaefolia, *Mirb. in Mém. Mus. Par.* xiv. (1327) 468. t. 21.—Peruv.
cerifera, Hartig, ex Regel, in DC. Prod. xvi. H. 187 = glutinosa.
communis, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. 1.218=glutinosa.
cordata, Desf. 1. c. ed. II. 244 = cordifolia.
cordifolia, *Tenore, Fl. Nap. Prod.* 54. t. 99.—Europ.; Oriens.
corylifolia, *Kern, ex Dalla Torre, All. Alpenfl.* 199.—Europ.

ALNUS :—

crispa, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 55=undulata.
"•spa, Punk, Fl. Am. Sept. ii. 181.—Am. bor.
cuneata, Geyei, ex Walp. Ann. i. 286=Cercocarpus parvifolins.
denticulata, C. A. Mey. Vert Pfl. Cauc 48=glutinosa.
dioica, Roxb. Fl. Ind. Hi. 580=Aporosa Roxburghii.
dubia, Req. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 187 = glutinosa.
elliptica, Req. in Ann. Sc. Nat Sér. I. v. (1825) 881 = glutinosa.
emarginata, Krock. ex Steud. Nom. ed. 1.29=glntinosa.
februaria, Kuntze, Taschen. Fl. Leipz. 288= glutinosa.
ferraginea, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 17.—N. Granat.
firma, *Sieb. &> Zucc. in Abh. Acad. Muenck.* iv. Hi. U845) 280.—Japon.
fruticosa, Rnpr. Beitr. Pfl. Russ. Reich, ii. 58=viridis.
glauca, Michx. f. Arb. Am. iii. 820. t 4. f. 2 = incana.
glutmosa, *Medic. Pfl. Anat.* 898.—Europ.; As. bor.
Hgrinoki, Siebold, in Verh. Gen. Bat xii. (1880) 25 = japonica.
htrsuta, Turcz. in Bull. Soc Nat Mosc (1888) 101; xxvii. (1854) I. 4C6 = incana.
hybrida, Reichb. la Fl. Germ. xii. t 680. f. 1292=glutinosa, incana.
incana, Medic. Pfl. Anat. 898.—Reg. bor. temp.
incisa, Steud. Nom. ed. I. 29=glutinosa.
'"tegrifolia, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 56 = , Aporosa Roxburghii.
intermedia, Hort. ex C. Koch, Deodrol. ii. I. 681 = . oblongata.
interpedia, Schrad. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 189 =incana.
japonica, Sieb. & Zucc. in Abh. Alcad. Muench. iv. . HI. (1845) 230=maritima.
Japonica, Steud. Nom. ed. II. i. 55 = Betula alba.
jorullensis, Benth. PI. Hartw. 52=acuminata.
jomllensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 20.-Mexic.
kaciniata, Ehrh. Beitr. ili. 22=glutinosa.
fnuatnosa, Gilib. Exereit. ii. 402=incana.
*[illegible]*Ko, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 352=serrnlata.
Linde*m, Regel, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xiii. - -(1861) 144,-As. temp.
'obata, Nym. Consp. 671=incana.
"'.igifolia, Bové, ex Spach, in Ann. Sc Nat Sir. II. ™. (1835) 348 = orientalis.
"uerocarpa, Lodd. ex Loud. Hort Brit. 878=glutino»a.
""crocarpa, Reg. ex Nym. Consp. 672=cordifolia.
[illegible] Desf. ex Steud. Nom. ed. I. 29; fed. II. i. 66 = serrulata.
mantima, *Nutt. Sylv. Am. Suppl.* i. 84. t. 10 (1842). —Am. bor.
nucrophynaMn-rf, *in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) e»«. 39__Europ.
[illegible] Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xv. (1841) 2O4.-Amr.austr.
[illegible]na, M. A. Curtis, ex A. Gray, in Am. Joum. Sl. xiii. (1842) 42-crispa.
*[illegible]*x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* - -II, xxiii-xxiv. (1880) I15.-Europ.
Montana, Bertol. Fl. Ital. x. 163=glutinosa.
™>a, *[Claim.-] Man. Herb.* 280.—Europ.
P^tana, Savi, Tratt Alb. Tosc. ed. II. ii. 21 = cordifolia.
nepalensis, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 58.—Reg. Himal.
[illegible] Excreit. ii. 401=glutinosa.
[illegible]».in Linnaea, xxii. (1849)834=glutinosa.
WUda, *Endl. in Gen. Suppl.* iv. II. 2O.-Reg. Himal.
oocordata, C. A. Mey. ex Steud. Nom. ed. II. i. 56, sphalm.=cordifolU.
*[illegible]*t5«:hy, ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 185=orientalis.
oblongata, Regel, Monog. 118. t 7. £ 8-9 =maritima.
oblongata, *Willd. Sp. PI.* iv. 835.-Europ. austr.
oblongifoU, *Torr. Bot. if ex. Bound.* 204.-N. Mexic.
oregana. Nutt Sylv. i. 9 =rubra.
[illegible] (1835> 348.—Oriens.
°*«*ta,* Lodd. Bot. Cab. 1.1141=crispa.
°*y<*uanihifolia,* Lodd. Cat. (1886) = glutinosa.
Plicata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 688 = *prinoides.*
[illegible], Hort. ex C. Koch, 1. c 680=glutinosa.
P«tesc«w,Tausch, in Flora, xvii. (1884) 520=glutinosa x liftcana,
PMnila, *Steud. Nom.* ed. I. 29.-Am. bor.

AZiNUB:—

quercifoliaySiWi. Berl. Baumz. 45 <= glutinosa.
repens, Wormsk. Fl. Dan. t. 2738=viridis.
rhombifolia, *Nutt. Sylva,* i. 88.—Calif.
rotundifolia, Bertol. Fl. Ital. x. 160 = cordifolia.
rotundifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 869 = glutinosa.
rubra, *Bongard, in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. ii. (1888) 162.—Am. bor. occ.
rubra, Desf. ex Steud. Nom. ed. I. 29=serrulata.
rufescens, Liebm. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 165=acuminata.
rugosa, Hort. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 188 = serrulata.
rugosa, Spreng. Syst. iii. 848=acuminata.
serrulata, *Willd. Sp. PI.* iv. 836.—Am. bor.
sibirica, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 101; xxvii. (1854) I. 406 = incana.
suaveolens, Mor. ex Nym. Consp. 671 = glutinosa.
suaveolens, *Reg. in Ann. Sc. Nat.* v. (1825)381.—Europ.
subcordata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. = cordifolia.
subrotunda, *Desf. Tabl. Hort. Par.* ed. II. 244.—Hab. ?
tiliaifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 634 = subcordata.
tenuifolia, *Nutt. Syha,* i. 10.—Am. bor.
tirolensis, Nym. Consp. 671 = incana.
tomentosa, Hartig, ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 185 = orien talis.
tristis, Wormsk. ex Regel, 1. c. 182 = viridis.
undulata, *Willd. Sp. PI.* iv. 336.—Canada.
Vilmoriana, *Hort. ex Lebas, in Rev. Hortic.* (1866) 446.—Hab.?
viridis, *DC. Fl. Fr.* iii. 804; *Cham, in Linnaea,* vi. (1831) 538.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
viridis, A. Gray, Man. Bot. N. Un. St. (1848) 424 = crispa.
vulgaris, Pers. Syn. ii. 650=glutinosa.

AIiOCASIA, Neck. Elem. iii. 289 (1790); Schott, in Schott *Sc* Endl. Melet. 18 (1832). *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 975.
ENSOLENANTHE, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 368.'
acuminata, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 28.—Ind. or.
alba, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* ii. (1862) 59; (1854) 410.—Zeylan.
argyroneura, C. Koch, Berl. Wochenschr. (1861) 8 = Caladium Schomburgkii.
Beccarii, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 300. —Malaya.
commutata, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. (1854) 409 = Alocasia odora.
cucullata. *Schott, in Schott & Endl. Melet,* 18.—Ind. or.
cuprea, *C. Koch, in Berl. Wochenschr. iv.* (1861) 141; vii. (1864) 90.—Borneo,
decipiens, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 28.—Ind. or.
denudata, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 507.—Singapor.
erythraea, C. Koch, in Berl. Wochenschr. (1861) 8 = Colocasia Schomburgkii.
fallax, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 28 = navicularis.
fomicata, *Schott,in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1854) 410. —Ind. or.
grandis, *Clémenc. in Rev. Hortic.* (1868) 880.—Hab. ?
heteroneura, C. Koch, in Berl. Wochenschr. (1861) 283 = Caladium Schomburgkii.
indica, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1854) 410, pro parte.—Ind. or.; Malaya.
Jenningsii, Hort. Veitch. Cf. Gard. Chron. (1868) 26 ; in Ilhislr. Hortic. (1869) t. 585 = Colocasia affinis.
Johnstonii, Hort. in Gard. Chron. xiii. (1880) 759 ; in Iilustr. Hortic. xxvii. (1880) t. 895 = Cyrtosperma Johnstonii.
Korthalsii, *Schott, in Ann. Mus. Lugd. Bat.* i. 124.—Borneo.
Liervalii, *Hort. ex Hirincq, VHortic. Franç.* (1869) 248.—Ins. Philipp.
lobata, *Rafln. Fl. Tellur.* iii. 64.—Hab. ?
longiloba, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 207.-Malaya.
Lowii. *Hook. Bot. Mag.* t. 5876.—Borneo,
macrorhiza, *Schott, in Schott &• Endl. Melet.* 18.—As. trop.; Austral.; Ins. Pacific.
Marchalli, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 494 = Colocasia Marchalli.
montana, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1854) 410. —Ind. or.; Malaya.

AIiOCASIA :—

metallica, Hook. Bot. Mag. t. 5190=cuprea.
metallica.Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1854) 410 = indica.
navicularis, *C. Koch & Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) App. 2.—Reg. Himal.
odora, *C. Koch, 1. c.* (1854), *App.* 6.—Ind. or. ; China.
pallida, C. Koch *Sc* Bouché, 1. c. =alba.
pedata, Rafin. Fl. Tellur. iii. 64=Sauromatum pedatuin.
plumbea, Van Houtte, in Fl. des Serres, Sér. II. xi. (1875) 93. t. 2206=indica.
porphyroneura, Lem. in Iilustr. Hortic. (1861) t. 297 = Caladium picturatum.
Portei, *Becc. & Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 645.—N. Guin.
pubera, *Schott, Syn.Aroid.* 47.—Java.
Putzeysi, *If. E. Br. in Iilustr. Hortic.* xxix. (1882) t. 439, & p. 22.—Sumatra,
rapiformis, *Schott, Prod. Aroid.* 157.—Burma.
Regina, *N. E. Br.—Cf. Gard. Chron.* (1884) I. 711.—Borneo.
Roezlii, Hort. ex Gard. Chron. iii. (1875) 589-Caladium marmoi atura.
rugosa, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1854) 410 = cucullata.
scabriuscula, JV. *E. Br. in Gard. Chron.* (1879) II. 296. —Borneo.
Sedeni x, Hort Veitch.—Cf. Gard. Chron. (1869) 587, 615 = cuprea x Lowii.
sinuata, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1885) II. 678.—Malaya.
Thibautiana, *Mast. 1. c.* (1878) I. 527.—Borneo.
undipes, C. Koch & Bouché, in Ind. Sera. Hort. Berol. (1854), App. 5-Xanthosoma Jacquini.
variegata, C. Koch & Bouché, 1. c. =indica.
Veitchii, Schott, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 125 = Lowii.
virginica, Rafin. Fl. Tellur. iii. 64=PeItandra virginica.
zebrina, *C. Koch & Veitch, in Berl. Wochenschr.* vi. (1868) 881.—Ins. Philipp.

ALOE, Toum. ex Linn. Syst. ed. I. (1785). *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 776.
AGRIODENDRON, Endl. Gen. 144 (1687).
Bowi£A, Haw. in Phil. Mag. (1824) 299.
BUSIPHO, Salisb. Gen. PI. Fragm. 76 (1866).
CATEVALA, Medic Theodora, 67 (1786).
KUMARA, Medic 1. c 69. t 4 (1786).
PACHIDENDRON, Haw. Rev. PI. Succ. 35 (1821).
PTYAS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 76 (1866).
KHIPIOOIJENDRON, Willd. in Ges. Naturf. Fr. B»rL Mag. v. (1811) 164.
abyssinica, *Lam.Encyc.* i. 86.—Abyss.
acinacifolia, Jacq. Eel. 49. t. 31 = Gastena acinacifolia.
acuminata, Haw. Syn. PI. Sncc. 84 = A. humilis.
acuminata, Lam. Encyc. i. 90 = Gasteria verrucosa.
africana, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4.—Afr. austr.
africana, Salm-Dyck, Cat 81 = Salm-Dyckiana.
agavefolia, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* i. 85. t 23.—Afr. trop.
albicans, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 18 = Haworthia albicans.
albispina, *Haw. 1. c.* 22.—Afr. austr.
albocincta, Haw. Suppl. PI. Succ. 43=striata.
altilinea, Schult. f. Syst. vii. 638 = Hawoithia. altilinea.
americana, Crantz, Inst. i. 466 = Agave americana.
andongensis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 263.—Afr. trop.
angolensis, *Baker, 1. c.*—Afr. trop.
angulata, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 276 = Gasteria disticha.
angusta, *Schult. f. Syst.* vii. 710.—Afr. austr.
angusti/olia, Salm-Dyck, Obs. 57 = Gasteria disticha.
anomala, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 25 = Haworthia recurva.
arabica, *Lam. Encyc.* i. 91.—Arab.
arabica, Salm-Dyck, Cat. 27 = microstigma.
arachnoidea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 17 = Haworthia arachnoides.
arachnoides, Thnnb. Diss. Aloe, 7=Haworthia arachnoides.
arborea, Medic. Beobacht (1788) 305-arborescens.
arborescens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 3.—Afr. austr.

ALOIS:—
aristata, *Haw. in Phil. Mag.* (Oct. 1825) 280.—Afir. austr.
aristata, *Schult.f. Syst.* vii. 688.—Afr. austr.
aspera, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 6= Apicra aspera.
asperiuscula, Schult f. Syst. vii. 653 = Haworthia asperinscuk.
asperula, Schnlt. f. 1. c. 635 = Haworthia aspernla.
Atherstonei, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 170.—Afr. austr.
atrguirens, DC. PI. Grass, t 51 = Haworthia atro-Tirens.
attenuata, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 11 = Haworthia attenuata.
Bainesii, *Dyer, in Gard. Chron.* (1874) I. 667.—Afr. austr.
barbadensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=vera.
Barberae, Dyer, in Gard. Chron. (1874) I. 666 = Bainesii.
Barteri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 168.—Afr. trop.
Bayfieldii, Salm-Dyck, Monog. ii. % 29. f. 14 = Gasteria Bayfieldii.
bicarinata, Spreng. Syst. ii. 70; Schnlt f. Syst. vii. 652 = Apicra bicarinata.
bicolor, Schnlt f. 1. c. 682 = Gasteria tricolor.
Bolusii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 179.—Afr. anstr.
Bonrea, *Schult.f. Syst.* vii 704.—Afr. anstr.
Boureana, Schult. f. 1. c 662 = Gasteria pieta.
brachyphylla, Salm-Dyck, Hort. 332 = Gasteria brevifolia.
Bradlyana, Jacq. Hort. Schoenbr. iv. 11, in nota ad t. 421 = Haworthia atrovirens.
brevifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIIL in errat—Afr. anstr.
brevifolia, Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 23 = distans.
brevioribus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8, sphalm. = brevifolia.
brevis, *Schult.f. Syst.* vii. 649.—Afr. austr.
bullulata, Jacq. Fragm. 72. t. 109 = Apiera pentagons
caesia, *Salm-Dyck, Cat.* 29.—Afr. anstr.
Candelabrum, *Tod. Hort. Panorm.* (1876) 46.—Hab.?
candicans, Schnlt. f. Syst. vii. 681=Gasteria candicans.
capitata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 272.—Madag.
carinata, Ker-Gawl. in Bat Mag. t 1831 = Gasteria glabra.
carinata, DC. PI. Grass, t. 68 = Gasteria verrncosa.
carinata, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 21 = Gasteria carinata.
caroliniana, Hill, Veg. Syst xiii. 64=Agave virginica.
chinensis, *Steud. Nom.* ed, II. i. 56; *Baker, in Bot. Mag.* t 6801.—China.
chloracantha, Schult f. Syst. vii. 641=Haworthia chloracantha.
chloroleuca, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) II. 38.—Afr. austr.
ciliaris, *Haw. in Phil. Mag.* (Oct. 1825) 281.—Afr. austr.
clariperla, Schult f. Svst vii. 646, 1712 = Haworthia attenuata.
claviflora, *Burch. Tram.* i. 272.—Afr. austr.
coarctata, Schnlt. f. Syst vii.-647 = Haworthia coarctata.
Commelyni, Willd. in Ges. Natnrf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 282=mitrifomis.
commutata, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* i. 75. t. 18.—Hab.?
concinna, Schult f. Syst vii. 653=Haworthia viscosa.
congest a, Salm-Dyck, Monog. i. $ 2. f. 1=Apicra congesta.
consobrina, *Salm-Dyck, I. c. I* 18. f. 2.—Afr. austr.
conspurcata, Salm-Dyck, Obs. 59 = Gasteria disticha.
constricta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 168.—Afr. trop.
Cooperi, *Baker, in Gard. Chron.* (1874) I. 628.—Afr. austr.
cordifolia, Schnlt. £ Syst. vii. 653=Haworthia cordifolia.
crassifolia, Schult. £ 1. c 664 = Gasteria nigricans.
crassipes, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1680) 162.~-Afr. trop.
Croucheri, Hook. *I* Bot. Mag. t 5812 = Ga»teria Crouched.

ALOE:-
cryptopoda, *Baker, in Journ. Bot.* xxii. (1884) 62.—Afr. trop.
curta, *Spreng. Syst.* iL 69.—Afr. anstr.
cuspidata, Schult. f. Syst. vii. 639 - Haworthia cuspidate.
cylindracea. Lam. Encyc. i. 89 = Apicra spiralis, et Haworthia rigida.
cymbaefolia, Schrad. Neues Journ. ii. (1807) 17 = Haworthia cymbiformis.
cymbiformis, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 8 = Haworthia cymbiformis.
decipiens, Schult f. Syst. vii. 674-Gasteria dedpiens.
deltoidea, Hook. f. Bot Mag. t. 6071=Apicra deltoidea.
deltoideodonta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 271.—Madag.
denticulata, Schult. f. Syst vii. 639 = Haworthia denticslata.
dependens, Steud. Nom. ed. I. 30 = pendens.
depressa. *Haw. in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 16.—Afr. anstr.
depressa, Salm-Dyck, ex Steud. Nom. ed. II. i. 57 = distans.
dichotoma, *Linn.f. Suppl.* 206.—Afr. austr.
dictyodes, Schult. f. Syst vii. 663-Gasteria retata.
distans, *Haw. Syn. PI. Succ.* 78.—Afr. austr.
disticha, *Linn. Sp. PI.* 321.—Afr. austr.
disticha, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = saponaria.
disticha, Thunb. Diss. Aloë, n. 9 = Gasteria vernicosa,
dorsalis, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 28 = lineata.
drepanophylla, *Baker, in Gard. Chron.* iii. (1875) 814.—Afr. austr.
echinata, Willd. Enum. Hort Berol. 385=humilis.
Ecklonis, *Salm-Dyck, Monog.* ii. *i* 21. f. 2.—Afr. austr.
ekgans, *Tod. lad. Sem. Panorm.* (1880) 37.—Hab. ?
elongata, Murr. in Comm. Gott ix. (1789) 191 = vera.
elongata, Salm-Dyck, Monog. § 29. f. 15= Gasteria trigona.
ensifolia, Schult. f: Syst vii. 681 - Gasteria acinacifolia.
erecta, *Schult.f. I. c.* 649.—Afr. austr.
erecta, Salm-Dyck, Aloë, § 6. f. 7 = Haworthia margaritifera.
excavata, Willd. in Ges. Natnrf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 276 = Gasteria excavata.
expansa, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 8 = Haworthia rigida.
falcata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 181.—Afr. austr.
fasciata, Salm-Dyck, in Schult f. Syst vii. 1713 = Haworthia fasciata.
ferox, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 22.—Afr. anstr.
fiabelliformis, Salisb. Prod. 246=plicatilis.
fiava, Pea. Syn. i. 878 = vera.
Jlmispina, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 22 = mitriformis.
foetida, Crantz, Inst. i. 466= Agave americana.
foliolosa, Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 7 = Apicra foliolosa.
fonnosa, *Schult.f. Syst.* vii. 662.—Afr. anstr.
fragrantissima, Jacq. Enum. Stirp. Vind. App. 399 = Dracaena fragrans.
frutescens, Salm-Dyck, Cat. 80=arborescent.
fruticosa. Lam. Encyc. i. 87=arborescens.
gasterioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 166.—Afr. austr.
glabra, Salm-Dyck, Obs. 48-Gasteria glabra.
glabrata, Salm-Dyck, Hort. 325 = Haworthia glabrata.
glanca, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 16 —Afr. austr.
gracilis, *Haw. in Phil. Mag.* (Oct. 1825) 280.—Afr. anstr.
granata, *Schult.f. Syst.* vii. 650.—Afr. anstr.
granata, Salm-Dyck, Aloë, § 6. f. 6 = Haworthia margaritifera.
grandidentata, *Salm-Dyck, Obs.* (1822) 829.—Afr, anstr.
Greenii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 165.—Afr. austr.
guineensis, Jacq. Enum. Stirp. Vind. App. 808 = Sanseviera guineensis.
guttata, Salm-Dyck, Hort. 832 «= Gasteria nigricans.
Hanburiana, Naud. in Rev. Horde (1875) 165 = striata.
Haynaldi, *Tod. Hort. Panorm.* i. 75. t. 24.—Hab. ?
hebes, Schult f. Syst vii. 637 - Haworthia cymbiformis.

ALOE:-
herbacea, DC. Hort. Monsp. 76 = Haworthia reticnlata.
herbacea, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 18 = Haworthia atrovirens.
heteracantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 161.—Hab.?
hexapetala, *Salm-Dyck, Cat.* 28.—Hab. t
horrida, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 27 = ferox.
humilis, *Mill. Air. Gard. Diet.* ed. VI. n. 10 (1771).—Afr. austr.
hyacinthoides, Linn. Sp.Pl. 321=Sanseviera zeylanica.
hybrida, Salm-Dyck, Cat. 7 = Haworthia hybrida.
imbricata, Haw. in Trans. linn. Soc. vii. (1804) 7=> Apicra spiralis.
incuna. Haw. Syn. PI. Sncc. 86-humilis.
indica, Royle, IUnst. PI. Himal. 890=vera.
indnrata, Schult. f. Syst. vii. 654.—Afr. austr.
inermis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 74.—Arabia.
inermis, Hort. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xviii. (1880) 161 = heteracantha.
insignis x, *N. E. Br. in Gard. Chron.* xxiv. (1885) 40. f. 8.—Hab.?
intermedia, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 12 = Gasteria verrucosa.
Kraussii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 159.—Afr. austr.
laetepunctata, Schult f. Syst vii. 676=Gasteria laetepunctata.
laetevirens. Link, Enum. Hort. Berol. i. 335 = Haworthia laetevirens.
laevigata, Schult. Syst. vii. 636 = Haworthia albicans.
laevis, *Salm-Dyck, Cat.* 16.—Afr. austr.
latifolia, *Haw. Syn. PI. Succ.* 82.—Afr. austr.
leptocaulon, Boj. Hort. Maurit 345 = oligophylla ?
leptophylla, N. E. Br. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 165=latifolia.
limpida, *Schult.f. Syst.* vii. 638.—Afr. austr.
lineata, *Haw. in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 18.—Afr. austr.
Lingua, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1822 = Gasteria vcrmcosii.
Lingua, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 277 =sp. plurim.
Lingua, Thunb. Diss. Aloë, 8=Gasteria disticha.
linguiformis, DC. PI. Grass, t. 68 = Gasteria sulcata.
linguiformis, Linn. f. Suppl. 206=plicatilis.
linguiformis, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 13 = Gasteria disticha.
linguiformis, *Medic. Beebacht.* (1783) 64.—Hab.?
linita. *Schult.f. Syst.* vii. 682.—Afr. anstr.
littoralis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* i (1878) 293.—Afr. trop.
littoralis, Koen. ex Baker, in Joum. Linn. Soc xviii. (1880) 176 = vera.
lomatophylloides, *Balf. f. in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 22.—Ins. Mascar.
longiaristata, Schult. f. Syst vi. 684=aristata.
longifolia, Haw. Syn. PI. Succ. 88 = Gasteria disticha.
longifolia. Lam. Encyc. i. 90=Tritomanthe Uvaria.
longistyla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 158.—Afr. austr.
Lynchii x, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) I. 266.
macilenta, Nichols. Diet. Gard. i. 52=humilis.
Macowani, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xviii. (1881) 170.—Afr. austr.
macro, Haw. Suppl. PI. Succ 45,102»LomatophyUum macrum.
macracantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 167.—Afr. austr.
macrocarpa, *Tod. Hort. Bot. Panorm.* 36. t. 9.—Abyss.
macroclada, *Baker, 1. c.* xx. (1883) 273.—Madag.
maculata, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 765=Gasteria pulchra.
maculata, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. I. 25 = obscura.
maculata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 73=abyssinica.
maculata, Thunb. Diss. Aloë, 8 = Gasteria maculata.
maculosa, Lam. Encyc i. 87 = obscura, saponaria.
margaritifera, Burin, f. Fl. Cap. Prod. 10 = Haworthia margaritifera.
marginalis, DC. PI. Grass, t 31 - Lomatophyllum borbonicum.
marginata, Lam. Encyc i. 89 = Haworthia albicans.
marginata, Willd. Enum. Hort. Berol. 382=Lomatophyllum borbonicum.
marmorata, Hitchen, ex Steud. Nom. ed. II. i. 68 = fonnosa.

.AXOfi:-
micracantha, *Haw. Suppl. PI. Sues.* 106.—Afr. anstr.
micnatigma, *Salm-Dyck, Monog.* iL *i* 26. f. 4.—Afr. anstr.
minor, Schult f. Syst viL 648 = Haworthia margari. tifera.
mirabilis. Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 9 = Haworthia mirabilis.
mitraefbrmis, DC. PL´Grass. 99; Haw. Syn. Succ 77 —distans, nobilis.
mitrarformis, Willd. Enum. Hort. Berol. 886-mitriformis.
mitriformis, *MilL Gard. Diet.* ed. VIIL n. 1.—Afr. austr.
mollis, Schnlt Syst vii. 665-Gasteriamollis.
mucronata, *Schult.f. 1. c.* 688.—Afr. anstr.
multifaria, *Schult.f, I. c.* 635.—Afr. austr.
muricata, Haw. in Trans. Linn. Soc viL (1804) 26 = ferox.
muricata, Schult Obs. 70=glanca.
mntica, *Schult.f. Syst.* vii. 685.—Afr. anstr.
myriacantha, *Schult.f. I. c.* 704.—Afr. austr.
neglecta, *Tenore, in AM Accad. Sc. Nap.* v. I. (1887) p. 257.—Hab. t
nigra, Schnlt f. Syst vii. 667 -Haworthia nigra.
nigricans. Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 18 = Gasteria nigricans.
nitens, *Baker, in Journ. Linn. Sac.* xviii. (1880) 170. —Afr. austr.
nitens, Schult £ Syst. vii. 680 - Gasteria aanacifolia.
nitida, Salm-Dyck, Cat. 13-Gasteria nitida.
nobilis, *Han. Syn. PI. Succ.* 78.—Afr. anstr.
obliqua, DC. PL Grass, t 91-Gasteria pulchra.
ebliyua. Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 14 = Gasteria maculate.
obliqua, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 9=Gastena nigricans.
ohscura, *Mill. Gard. Did.* ed. VIIL n. 6.—Afr. njstf-
obscura, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Bert. Mag. v. (1811) 276 = Gasteria excavata.
obscurevirens, *Martinati, ex Vis. Orto Bot. Padov.* 182.—Hab.?
obtusa, Schult f. Syst. vii. 679-Gasteria obtusa.
obtusifolia, Salm-Dyck, Obs. 62-Gasteria obtusifolia.
officinalis, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 73 = vera.
oligophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 272,-Madag.
pallescens, Haw. Rev. PI. Succ 41-serrulata.
pallida, Schnlt. f. Syst vii. 641-Haworthia pallida.
Palmiformis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. IL *Sot.* i. (1878) 268.—Angola.
paniculata, Jacq. Fragm. 48. t 68 -striata.
papillosa, Salm-Dyck, Cat 7 - Haworthia papil.pra.
Parta, Schult f. Syst vii. 658 = Haworthia tesselUta.
Peacockii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 176 -abyssinica.
pellucens, Haw. Syn. PI. Sncc 96-Haworthia translneens.
P«ndens, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 74.—Arabia.
Pentagona, Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 7 = Apicra pentagona.
Pentagona, *Jacq. Fragm.* 72. t 111.—Afr. anstr.
Pentagona, SalSn-Dyck, Monog. L J 1. f. 4-quinquangularis.
percrassa, Tod. Hort. Bot Panorm. i. 81. t 21 = »hyssinica.
perfoliata. Linn. Sp. PI. 819, 820-sp. plurim.
Perfoliata, Meyen, Keise, iL 45 = arboiescens.
Penyi, *Baker, in Journ! Linn. Soc.* xviii. (1880) 161. —Ins. Socotra.
pertusa. Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 25 - Crassula corymbnlosa.
pKta, Thunb. Diss. Aloë, 6 - obscura.
planifolia, Baker, in Saund. Refog. Bot. t 162 - Gasteria planifolia.
Planifolia, Schult. f. Syst. vii. 688-Haworthia cymbiformis.
Plwylepis.sofc,, *in Gard. Chron.* (1877) n. 88—Afr. austr.
Platyphylla, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. IL i. (1878)264.—Angola.
pUcaUlis, *Mill. Card. Diet.* ed. VIIL n. 7.—Afr. anstr.
Pluridens, *Haw. in Phil. Mag.* (Oct. 1824) 299.—Afr. austr.
pluripunctata, *Schult.f. Syst.* vii. 681.—Afr. austr.
Postgenita, *Schult.f. I. c.* 1714.—Afr. anstr.

pratensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 156. —Afr. austr.
prolifera. Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 16 = brevifolia.
pseudaafricana, Salm-Dyck, Cat 31 = africana.
pseudoangulata, Salm-Dyck, 1. c 16-Gasteria subcarinata.
pseudoferox, Salm-Dyck, 1. c 81 = ferox.
pseudonigricans, Salm-Dyck, L c 17 = Gasteria nigricai
pseu^rigida, Salm-Dyck, 1. c. 9 & 41-Haworthia subrigida.
pseudotortuosa, Salm-Dyck, 1. c 8 & 41 = Haworthia viscosa.
pulchra, Jacq. Hort Schoenbr. iv. 10. t 419-Gasteria pulchra.
pumila, Linn. Sp. PL 322 = sp. plurim.
Pumilio, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 11 = Haworthia reticulata.
punctata. Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 26 = variegata.
punctata, *Martinati, in Vis. Orto Bot. Padov.* 182.—Hab.l
purpurascens, *Haw, in Trans. Linn. Soc.* viL (1804) 20.—Afr. austr.
purpurea, Lam. Encyc i. 85 — Lomatophyllum borbonicum.
pnsilla, *Schult.f. Syst.* vii. 674.—Hab. ?
qninquangularis, *Schult.f. 1. c.* 858.—Afr. anstr.
racemosa, Lam. Encyc. i. 91 = Gasteria vermcosa.
Radula, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 11.t. 422 = Haworthia Radula.
Radula, Ker-GawL in Bot Mag. t. 1346-Haworthia auenuam.
ramifera, *Schult.f. Syst.* vii. 686.—Afr. austr.
ramosa, Haw. in Trans. Linn. Soc viL (1804) 26 = purpurascens.
recurva, Haw. 1. c. 10-Haworthia recurva.
reflexa. Van Marum, ex Steud. Norn. ed. II. i. 59 = distans.
Reinwardtii, Salm-Dyck, Obs. (1821) 37-Haworthia Reinwardtii.
repens, Schult. f. Syst. vii. 674 = Gasteria repens.
reticulata. Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 9 = Haworthia reticulata.
retusa, Linn. Sp. PL S22 = Haworthia retusa.
retusifolia, Haw. ex Steud. Nom. ed. II. L 59 - Gasteria obtusifolia.
rhodacantha, DC. PI. Grass. 44 = glauca.
rhodocincta, Hort. ex Baker, in Joum. linn. Soc xviii. (1880) 163 -striata.
rigida, Ker-GawL in Bot Mag. t 1887-Haworthia tortuosa.
rigida, DC. PI. Grass, t 62-Haworthia rigida.
rigida, Salisb. Prod. 245 —Kniphona alooides.
rigida, Jacq. Fragm. t 108 — Haworthia subrigida.
rubescens, DC. Fl. Grass, t. 15-vera.
rufocincta, Haw. Suppl. PL Succ 45 — Lomatophyllum rnfocinctum.
rugosa, Salm-Dyck, in Schult £ Syst viL 1712-Haworthia rugosa.
Sabila, *Kara, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 59.—Mexic
Sahundra, *Poj. Hort. Maurit.* 345.—Madag.
Salm-Dyckiana, *Schult.f. in Syst.* vii. 710.—Afr. austr.
saponaria, *Haw. in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 17— Afr. austr.
scaberrima, Salm-Dyck, Hort. 882; Schnlt. f. Syst. vii. 1713 — Gasteria verrucosa.
scabra, Schult f. Syst viL 644 = Haworthia scabra.
Schimperi, *Tod. Hort. Panorm.* (1876) 46.—Abyss.
Schmidtiana, Regel, Gartenfl. (1879) 97=Cooperi.
Schweinfurthii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 175.—Afr. trop.
semiglabrata, Schult. f. Syst. vii. 660 — Haworthia semiglabrata.
semimargaritifera, Salm-Dyck, Cat. 6-Haworthia margari tifera.
Serra, *DC. PI. Grass,* t. 80.—Afr. anstr.
Serra, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Bert. Mag. v. (1811) 282 = depressa.
serrnlata, *Haw. in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 18.— Afr. anstr.
setosa, Schnlt. f. Syst vii. 641 = Haworthia setata.
aigmoidea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 177.—Afr. anstr.
sinuata, Thunb. Diss. Aloë, 6-succotrinn.
sinuata, Willd. Sp. PI. ii. 187=purpurascens.

ALOE:—
soccotorina, Schnlt f. Syst. vii, 701=seq.
soccotrina, DC. PI. Gross. 61. t. 85 = snecotrina.
sordida, Schult. f. Syst. vii. 644 = Haworthia sordida.
speciosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 178. —Afr. anstr.
spicata, *Linn. f. Suppl.* 205; *Haw. Syn. Succ.* 76.— Afr. austr.
spinulasa, Salm-Dyck, Obs. (1822) 4=mitrifonnis.
spiralis, Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 7 = Apicra pentagona.
spiralis. Linn. Sp. PI. 832 = Apicra spiralis.
spirella, Salm-Dyck, Cat. 10=Apicra pentagona.
squarrosa, *Baker, ex Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 97.—Ins. Socotr.
stenophylla, Schult. f. Syst vii. 641 — Haworthia angustifolia.
striata. *Haw. in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 18.— Afr. austr.
striatula, *Haw. in Phil. Mag.* (Oct. 1826) 281.—Afr. austr.
strigata, *Schult.f. Syst.* vii. 676.—Afr. austr.
subalbicans, Salm-Dyck,Monog. i. (6. f. 1 -Haworthia margaritifera.
subattenuata, Salm-Dyck, in Schult f. Syst viL 1712 = Haworthia subattenuata.
subcarinata, Salm-Dyck, Obs. 51 = Gasteria subcarinata.
suberecta, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 16 = humilis.
subfasciata, Salm-Dyck, in Schult. f. Syst. vii. 1712 = Haworthia subfasciata.
subferox, *Sprang. Syst.* iL 73.—Afr. anstr.
subnigricans, Sprang. L c 71 = Gasteria nigricans.
subrigida, Schult. *t.* Syst. vii. 654 = Haworthia subrigida.
subtortuosa, Schult. £ 1. c — Haworthia viscosa.
subtuberculata, Haw. in Phil. Mag. (Oct. 1825) 280 = humilis.
subulata, Salm-Dyck, in Schult. f. Syst vii. 1712 = Haworthia subulata.
suoverrucosa, Salm-Dyck, Obs. 6?-Gasteria subverrucosa.
succotrina, *Lam. Encyc.* i. 85—Afr. anstr.
sulcata, Salm-Dyck, Obs. 64 = Gasteria sulcata.
supralaevis, *Haw. in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 22. —Afr. austr.
tenuifolia, *Lam. Encyc.* i. 87.—Afr. austr.
tenuior, *Haw. in Phil. Mag.* (Oct. 1825) 281.—Afr. austr.
tessellata, Schult. '1 Syst. vii. 636-Haworthia tessellata.
Thraskii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 180.—Afr. austr.
torquata, Schnlt. f. Syst vii. 654 = Haworthia -viscosa.
tortuosa, Haw. in Trans. Linn. Soc vii. (1804) 7- Haworthia tortuosa.
translucens, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 300 = Haworthia translucens.
triangularis. Lam. Encyc. i. 89 = Haworthia viscosa.
trichotoma, Colla, Hort. Ripnl. 13 = saponaria.
tricolor, *Baker, in Bot. Mag.* t 6824.—Afr. anstr.
tricolor, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 26 <a Haworthia venosa.
trigona, Salm-Dyck, Monog. ii. { 29. f. 18-Gasteria obtusa.
tripetala, Medic. Beobacht. (1788) B5 = plicatilis.
tristicha, Medic. Theod. 74-Gasteria carinata.
tuberculata. Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 16 - humilis.
tuberculata, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* IS.—Hab. *1*
turgida, Schult f. Syst. vii. 636 = Haworthia turgida.
umbellata, DC. PI. Grass, t. 98-saponaria.
undata, Schult. f. Syst. vii. 677 = Gasteria snbcarioaU.
Uvarid,. Linn. Sp. PL 823 = Kniphofia alooides.
vacillans, Forsk. FL Aegypt. Arab. 74 = vera.
variegata, Forsk. 1. c. 74 = arabica.
variegata. *Linn. Sp. PI.* 821.—Afr. austr.
venosa, Lam. Encyc. i. 89 — Haworthia venosa.
venusta, *Schult.f. Syst.* vii. 681—Hab. t
vera. *Linn. Sp. PI.* 820.—Reg. medit.
vera, Mill. Gaid. Diet. ed. VIII. n. 15—succotrina.
verrucosa, Mill. 1. e n . 20 — Gasteria verrncosa.
verrucula, Medic. Beobacht. (1783) 68-praec
virens, *Ham. in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 17.—Afr. austr.
virascens, *Schult. f. Syst.* vii. 687.—Hab. t

ALOfi :-

virginica, Crantz, Inst. i. 466 = Agave virginica.
viscosa, Linn. Sp. PI. 822 = Haworthia viscosa.
vittata, *Sckult.f. Syst.* vii. 662.—Afr. austr.
vivipara, Crantz, Inst. i. 4tf6 = Agave vivipara.
vulgaris, Lam. Kncyc. i. 86=vera.
xanthacantha, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl.Mag. v. (1811) 282 = mitriformis.
yuccaefolia, A. Gray, in Froc. Am. Acad. vii. (1868) 890 = Hcsperaloe yuccaefolia.
zcbrina, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* i. (1878) 264.—Afr. trap.
Zeyheri, Hort. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xviii. (1880) 178 -Bainesii.
Zryheri, Salm-Dyck, Aloe, § 29. f. Sbis = Gasteria Zeyheri.
ecylanica, Jacq. Hort. Vind. 810 = Sanseviera zeylanica.

ALOËATHEROS, Endl. Gen. 95 (18S6)=ALLO1ATHEROS, Ell. - Gymnopogon, Beauv. ? (Gramin.).

ALOËXYLUM, Lour. Fl. Cochinch. 267 (1790)=Aquilaria, Lam. (Thymel.).
Agallochum, Lour. 1. c. = Aq. Agallochum.
verum, Lour. 1. c.=Aq. Agallochum.

ALOIDES, Boerh. ex Linn. Gen. ed. II. 253 (1742) = Stratiotes, Linn. (Hydrochar.).

ALOIOZONIUM, Lindl. Veg. Kingd. 718 (1847) = ALLOIOZONIUM, Kunze = Cryptostemma, R. Br. (Compos.).

ALOITIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 21 (1836) = Oentiana Linn.
anceps, Rafin. 1. c. 22.—Hab.!
parviflora, Rafin. 1. c. 21 = G. quinqueflora.
quinqueflora, Kafin. 1. c. 22 = G. quinqueflora.

ALOMIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 151,812. t. 854 (1820). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 240.
LYCAPSUS, Phil, in Bot. Zeit. (1870) 499. t. 8.
ORSINIA, Bertol. ex DC. Prod. v. 104 (1886;.
ageratoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 151. t. 854.—Mexic.
alata, *Hemsl. Bio!. Centr. Am. Bot.* ii. 79.—Mexic.
angustata, *Benth. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 190.—Bras.
Armani, *Baker, I. c.* 191.—Bras,
cinerea, *Benth. ex Baker, I. c.*—Bras.
fastigiata, *Benth. ex Baker, I. c.* 192.—Bras,
foliosa, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 240.—Bras,
myriadenia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 192.—Bras.
Fohlii, *Baker, I. c.* 190.—Bras,
polyphylla, *Baker, 1. c.* 191.—Bras.
ijtilanthoides, I). Don, ex Hook. & Am.in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 238 = Gymnocoronis spilanthoides.

ALONA, Lindl. Bot. Reg. (1844) t. 46. *CONVOLVULACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 879.
KAYERIA, Gaudich. Voy. Bonite, t. 108 (1839-46).
baccate, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub t. 46.—Chili,
balsamiflua, *Gaudich. Voy. Bonite,* t. 107.—Hab. ?
carnosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub t. 46.—Chili,
coelestis, *Lindl. 1. c.*—Chili,
deserticola, *Phil. Fl. Atac.* 44.—Chili,
dubia, *Phil, in Anales Univ.* CA«7.(1885) ii. 350.—Chili,
ericifolia, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 500.—Chili,
floribunda, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1873) 525.—Chili.
glanduiosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub t. 46.—Chili,
longifolia, *Lindl. I.* r.-Chili.
micrantha, *Phil. Fl. Atac.* 44.—Chili,
microphylla, *Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 501.—Chili,
mollis, *Phil. Fl. Atac.* 44.—Chili,
oblusa, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub t. 46.—Chili,
pusilla, *Phil. Fl. Atac.* 46.—Chili,
rcvoluta, *Lindl. Bot. Reg.* (18445 sub t. 46.—Peruv.
rostrata, Lindl. 1. c. = Osteocarpus rostratus.
sphaerophylla, *Phil. Fl. Atac.* 44.—Chili,
tomentosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub t. 46.—Chili,
vemicosa, *Phil. Fl. Atac.* 44.—Chili.
xerophila,J»Ai7. /. *c*—Chili.

ALONSOA, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 160 (1798). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 930.
H EMIMERIS, Pers. Syn. iii. 162 (1807) partim; H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 876 (1817).

ALONSOA :-

HEMITOMUS, L'Herit. ex Desf. Tabl. ed. I. 66 (1804).
SCHISTANTHE, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) Litt. 109.
acutifolia, *Ruíe & Pav. Syst. Veg.* 153.—Peruv.
caulialata, *Ruie & Pav. 1. c.* 152.—Peruv.
hirsute, *Steud. Norn.* ed. II. i. 60.—Bras.
incUifolia, *Rui* & Pav. Syst. Veg.* 154.— Perav.
intermedia, Lodd. Bot. Cab. t. 1456 = linearis.
linearifolia, *Steud. Norn.* ed. II. i. 60.—Peruv.
linearis, *Ruit & Pav. Syst. Veg.* 154.—Peruv.
linifolia, *Roeil, in Belg. Hortic.* xxiv. (1874) 38.—Peruv.
Mathewsii, *Benth. in DC. Prod.* x. 250.—Peruv.
Mutisii, G. Don, Gen. Syst. iv. 513 = caulialata.
myrtifolia, *Roeel, in Belg. Hortic.* xxiv. (1874) 89.—Peruv.
jiarviflora, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 613.—Venezuela.
procumbens, *Rui* & Pav. Fl. Per.* 154.—Peruv.
quadrifolia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 513.—Mexic
unilabiata, Ruiz & Fav. ex Steud. Norn. ed. I. 57,81 = Diascia unilabiata.
urticaefolia, Steud. 1. c. ed. II. i. 61 = incisifolia.
Warscewiraii, *Regel, in Gartenfl.* iii. (1854) 211. t. 91.—Peruv.

ALONZOA, Brongn. Enum. Genr. 59 (1848)-praec.

ALOPECIAS, Stev. in Bnll. Soc. Nat Most iv. 266 (1882)=Astragalus, Tourn. (Legum.).
alopecuroides, Stev. 1. c. = Astr. alopecuroides.
barbatus, Stev. 1. c. 266=Astr. barbatus.
ehartaceus, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 143=Astr. chartaceus.
Clausii, Stev. 1. c. 143=Astr. vulpinus.
dasyanthus, Stev. 1. c. iv. (1832) 266=Astr. dasyanthus.
dasycephalus, Stev. 1. c. 266 = Astr. roseus.
emarginatus, Stev. 1. c. 266 = Astr. emarginatus.
Kotschyanus, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 143 = Astr. Kotschyanus.
lanatus, Stev. 1. c. iv. (1832) 266 = Astr. lanatus.
Libanotis, Stev. 1. c. 269 = Astr. lanatus.
macrocephalus, Stev. 1. c. 266 = Astr. macrocephalus.
narbonensis, Stev. 1. c. 266=Astr. narbonensis.
orbiculatus, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 148 = Astr. orbiculatus.
ponticus, Stev. 1. c. iv. (1832) 266=Astr. ponticus.
roseus, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 143 = Astr. roseus.
Sieversianus, Stev. 1. c. 143=Astr. Sieversianus.
sphaerocephalus, Stev. 1. c. iv. (1882) 266 = Astr. macrocephalus.
vulpinus, Stev. 1. c. 266=Astr. vulpinns.

ALOPBCtTBTTS, Linn. Syst. ed. I. (1785); Gen. ed. 1.18 (1737). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1140.
COLOBACHNE, Beanv. Agrost. 22. t. 6 (1812).
TOZZETIA, Savi, in Mem. Soc. Ital. Sc. viii. (1798) 477.
aequalis, Sobol. Fl. Fetrop. 16 = fulvus.
affinis, *Desv. Opusc.* 55.—Hab. ?
agrestis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 89.—Europ.; Cauc.
agrestis, Sieber, ex Kunth, Enum. PI. i. 24 = creticus.
alpestris, Wahlenb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 61 = pratensis.
alpinus, *Sm. Fl. Brit.* iii. 1386.—Reg. bor. et arct.; Chili.
altissimus, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 13 = arundinaceus.
angustifolius, Sibth. & Sm. Fl. Grace, t. 64=vaginatus.
antarcticus, Gies. in Brewst. Edinb. Cycl. x. 494 = alpinus.
antarcticus, Lechler, ex Steud. Syn. PI. Gram. 148 = Lechleri.
antarcticus, Vahl, Symb. BoL ii. 18=alpinus.
anthoxantoides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 42.—Oriens.
aquatints, Dum. Obs. Gram. Belg. 183=nigricans.
aristatus, Gonan, Hort. Monsp. 37 = Polypogon monspeliensis.
aristulatns, *Michx. ft. Bor. Am.* i. 48.—Europ.; Am. bor.
arundinaceus, *Poir. Encyc.* viii. 766.—Europ.; Am. bor.; Oriens.
arvensis, G/omow. ex Trautv. in Act Hort. Petrop. ix. (1884) 353 «= pratensis.

AIiOPECtTRTJS :—

Aucheri, Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) 11 = vaginatus.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 41.—Persia.
australis, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 412 = geniculatus.
baikalensis, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 462 = brachystachyus.
borealis, Trin. Fund. Agrost 58=alpinu?.
brachyglossus, Peterm. Fl. Lips. (1844) 282 = pratensis.
brachystachyus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* 56.—Sibir.
brachystachyus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 883 « vaginatus.
brachystylus, Peterm. Fl. Lips. (1844) 230=pratensis.
bulbosus, With. Bot. Arr. Brit Fl. ed. II. i. 69 = geniculatus.
bulbosus, Poir. Voy. Barb. ii. 94=macrostachyos.
caesius, Schur, Enum. PI. Transs. 727 in syn.=geniculatus.
caespitosus, *Trin. Sp. Gram.* [xxi. 1241. *see. Pritael, Ic.* /»<*.].—Am. bor.
candicans, Salzm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 61 = pratensis.
capensis, Eckl. ex Steud. Syn. PI. Gram. 294=Koeleria Alopecuros.
capensis, *Thunb. Prod. Fl. Cap.* lfl.—Afr. austr.
capillaris, *Raeusch. Nom.* ed. III. 20.—Europ.
capitatus. Lam. Illustr. i. 168 = Phleum Gerardi.
carolinianus, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 10 -=Agrostis Comucopiae.
carolinianus, *Walt. Fl. Carol.* 74.—Am. bor.
cassius, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 41= vaginatus.
castellanus, *Boiss. & Reut. Diagn. PI. Hispan.* 26 = brachystachyus.
caudatus, Thunb. in Nov. Act. Ups. iii. (1780) 208 = Brylkinia caudata.
caudicans, Salzm. ex Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 707= pratensis.
dliatus. All. Fl. Pedem. ii. 285 = Koeleria phleoides.
dliatus, Vitm. Summa PI. i. 178 = Gerardi.
coerulescens, *Steud. & Hochst. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 60, noxncn.—As. Min.
colobachnoides, Trin. Fund. Agrost. 68 = brachystachyus.
creticus, *Trin. in Spreng. N. Entdeck.* ii. 45.—As. Min.; Crete.
creticus, Willk. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hispan. i. 41=agrestis.
crypsoides, *Griseb. Spidl. Fl. Rumel.* ii. 466.—Macedonia.
dasyanthus, Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 486 = vaginatus.
diandrus, *Griff. Notul.* iii. 11.—Ind. or.
echinatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 19=Lasiochloa adscendens.
effusus. Link, ex Kunth, Ennm. PI. i. 328=Agrostis effusa.
elongatus, *Peterm. in Flora,* xxvii. (1844) 230.—Europ.
elongatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 495=Polypogo elongatus.
exaltalus, *Las. in Linnaea,* ix. (1884) 207.—Sibir. ural.
fallacinus, *Gren. Fl. Mass. Adven.* (1859) 21.—Hab. ?
fasdculatus, Poir. Encyc. viii. 780=Chaeturus fasciculatus.
foliosus, Clark, Trav. ii. 261=vaginatus.
fulvus, Forsk. ex Steud. Nom. ed. II. i. 61 - Heleochloa alopecurioides.
fulvus, Sm. Engl. Bot. xxi. 1.1467 = geniculatus.
geniculatus, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 60.—Keg. bor. temp.
geniculatus, Lindh. ex Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 340 = Setaria polystachya.
geniculatus, Sibth. ex Steud. Nom. ed. II. i. 61 = Heleochloa alopecurioides.
Gerardi, *Vill. Fl. Delph.* 5j *Hist. PI. Dauph.* ii. 66. t. 2.—Europ.; Oriens.
Gieseckeanus, Roem. *Sc* Schult. Mant. ii. 154=alpinus.
glacialis, *C. Koch, in Linnaea,* xxi. (1848) 882.—Oriens.
glaucus, *Less, 1. c.* ix. (1834) 206.—Sibir.'ural.
glomeratus, Poir. Encyc. Suppl. v. 495 = Muehlenbergia glomerata.
gradlis, Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 486 = glacialis.
gracilis, *Willd. ex Trin. Agrost.* i. 16.—Carolina,
grannlatns, *Beauv. Agrost.* 4, nomen.—Hab. ?

AtOMJCXTSTJS :—
hordeiformis, Linn. Sp. PI. 60 = Pennisetum compressum.
hordriformis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 6^ = Pennisetum orientals,
hybridus, *Wimm. Fl. Schles.* ed. III. (1857) 81.—Europ.
indicus, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 92=Pennisetum Linnaei.
intennedins, *Hallier, in Bot. Zeit.* xxi. (1868) *App.* i. 6.—Ins. Heligol.
intermedius, Bock, ex Steud. Nom. ed. II. i. 61=-arundinaceus.
interruptus, Poir. Encyc. Suppl. v. 496=Polypogon interruptus.
japftnicus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 149.—Japon.
Aonradii, Opiz, ex Mert. & Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. >. 481=geniculatus.
laguriformis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1850) 182 = brachystachyus.
laguroides, Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) ll = vaginatus.
lanatus, *Sibtk. & Sm. Prod.* i. 48.—Oriens.
lasjochlamys, Boiss. Fl. Orient, v. 490 = textilis.
lasiostachyus, *Link, Hort. Berol.* i. 71.—Hispan.
latifohus, *Cav. Descr.* 37.—Ins. Tobago.
Lechleri, *Steud. Syn. PI. Gram.* 148.—Valdivia.
litoreus. All. Fl. Pedem. ii. 285 = Koeleria villosa.
longearistatus, *Maxim. Prim. Fl.Amur.* 827—Manchuria.
longiradiatus, Regel, ex Trautv. in Act. Hort Petrop. «.. (1884) 364 = longearistatus.
longistylus, *Opiz, in Lotos,* ii. (1852) 228.—Bohem.
macrostachyos, *Poir. Encyc.* viii. 775.—Afr. bor.
magellanicus. Lam. Illustr. i. 168=antarcticns.
malacostachyus, A. Gray, in Perry, Exped. Jap. ii. 328 =japonicus.
>*aritimus, Poir. Encyc." viii. 780=Polypogon mariumus.
monspeliensis, Linn. Sp. PI. 61=Polypogon monspeliensis.
muticus, Kar. & Kir. in BulL Soc. Nat Mosc xv. (1842) 527 = arundinaceus.
nyosuroides, Huds. Fl. Angl. 28=agrestis.
nepalensis, *Trin. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 148.—Nepalia.
>grescens, Jacq. Eel. ii. t. 18=arnndinaceus.
"'gncans, Hornem. Hort. Ham. i. 68=arundinaceus.
mgricans, Koch, Syn. Fl. Germ. ii. 896 - pratensis.
*Wncans, Wichura, in Jahrb. Schles. Ges. (1846) 61 - hybridus.
°°*curus,* Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 18 = pratensis.
ohporensis, *Griff. Notul.* iii. 94.—Affghan.
ovatus, Forst. Fl. Austral. 8=alpinus?
°*atus, Knapp, Gram. Brit. 15=alpinus.
fallasii, Trin. Sp. Gram. t. 2-vaginatus.
Palhdus, *Dum. Obs. Gram. Belg.* 188.—Belg.
paludosus, Beauv. ex Mert. & Koch, in Roehl., Deutschl. Fl. i. 481=genieulatus.
Paludosus, Crantz, Inst. i. 368=Polypogon monsPeliensis.
paniceus, Cav. Descr. 87=Polypogon maritimus.
paniceus, O. Muell. Fl. Dan. t. 861=geniculatus.
paniceus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 90; Lam. Fl. Fr. iii. 560=Polypogon monspeliensis.
Paniculatus, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 465.—Reg. Caucas.
P'dalis, Bosc, ex Beauv. Agrost. 4=gracilis.
Pf»«<w, Steud. Nom. ed. II. i. 61=praec.
pnalaroides, C. Koch, in Linnaea,xix.(1847) 5 = Gerardi.
Phleiformis, Beauv. Agrost. 4=villosus.
Ponticus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 382 = glacialis.
*'??"'"'• Bourg. ex Lange, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864)47=c?stellanns.
pratensis, *Linn. Sp. PI.* 60.—Reg. bor. temp.
Pratensis, Trin. Sp. Gram. t. 45=arundinaceus.
Pronus, Mitt, ex Hook, f. Stend. Fl. ed. I. 428 = geniculatus.
Purpurascens, link, in Linnaea, xvii. (1848) 400= agrestis.
"unosus, *Poir. Encyc.* viii. 776.-Carolina.
r'pens, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. iii. 54 = arundinaceus.
ruthenicus, Weinm. Fl. Dan. t. 2881; et Cat. Dorpat. (1810) 10=arundinaceus.
"'KealM, *Vasey, in Coult. Bot. Gat.* vi. (1881) 290.—Oregon.

AIiOPECUBXrS :—
scaber, Opiz, Natural, n. ix. (1825) 166=pratensis.
serieeus, Gaert. Fruct. i. 2. t. 1. f. 2 = pratensis.
setarioides, *Gren. in Mim. Soc. Emul. Doubs,* Sér. III. ii. (1858) 459.—Gallia.
sibiricus, Hort. Vind. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 271 = arundinaceus.
subaristatus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 66=geniculatus.
tenellus, Poir. Encyc. Suppl. v. 496 = Polypogon tenellus.
textilis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 40.—Oriens.
tonsus, Dum. Obs. Gram. Belg. 182=agrestis.
transsilvanicus, Schur, Enum. FL Transs. 727 = brachystachyns.
trivialis, Seidl, ex Opiz, Natural, n. ix. (1825) 116 = pratensis.
taricensis, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxv. (1882) 111.—Europ.
tuscheticus, Trantv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 354=gratilis.
typhoides, Burm. f. Fl. Ind. 27=Penicillaria spicata.
uralensis, *Uspenski, Ekaterinenburg.* 24.—Sibir. nral.
utriculatus, *[Soland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. it 243. —Europ.; Oriens.
vaginatus, *Pall, in Nov. Act. Acad. Petrop.* x. (1792) 804, nomen.—Tauria; Oriens.
variegatus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 148.—Chili.
varius, Auct. ex Steud. Nom. ed. I. 82, 771=Sesleria caerulea.
ventricosus, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 28=Gastridium australe.
ventricosus, Pers. Syn. i. 80=arundinaceus.
villosus, Gilib. Exercit. ii. 517 = pratensis
villosus, *Poir. Encyc.* viii. 777.—Helvet
Vlassovii, Trin. in Mèm. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. II. (1845) 42=brachystachyus.

ALOPHIA, Herb, in Bot. Mag. sub t. 3779 (1838)=. Herbertie, Sweet (Irid.).
Drummondiana, Herb. 1. c. = H. Drummondiana.
geniculata, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. I. 517.—Bras.
linearis, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 658 = H. lineata.
linearis, Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1872) 128.—Bras.
pulchella, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 692=H. pulchella, lineata.
Se«<mi«ana,Klatt,inLinnaea,xxxi.(1861-62) 657.—Bras.

ALOPHIUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. liv. 493 (1828)-Centaurea, Linn. (Compos.).
tenuifolium, Cass. 1. c.=C. Alophium.

ALOPHOCHLOA, Endl. Gen. 100 (1886) *sphalm.*= LOPHOCHLOA,Reichb.=Koeleria,Pera.(Gram.).

ALOPHYLLUS, Linn. Sp. PI. ed. II. 496 (1762) = ALLOPHYLUS, Linn. (1747) = Schmiedelia, Linn. (1764) (Sapind.).

ALOPICARPUS, Neck. Elem. ii. 369 (1790)=Paris, Rnpp. (Liliac.).

ALORANTHUS, F. S. Voigt, in Rich. Anal. Fmcht, 29 (1811) *sphalm.* = ChloranthUB, Sw.

ALOSEMIS, Rafin. Sylva Tellur. 96 (1888)-Melastoma, Linn.
grandiflora, Rafin. 1. c.—Hab. %
villosa, Rafin. 1. c—Hab. ?
eeylanica, Rafin. 1. c.—Zeylan.

ALOYSIA, Ort. & Palav. ex L'Hérit StiTp. 1. 21 (1784) =Lippia, Linn. (Verben.).
attenuata, Walp. Rep. iv. 42.—Bras.
chamaedryfolia, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 234 = L chamaedryfolia
ckamaedryoides, Stend. Nom. ed. II. i. 62=L. chamaedryfolia.
eitriodora, Orteg. ex Pers. Syn. ii. 189=L. citriodora.
fioribunda, Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux. xL (1844) II. 820=L.lycioides.
lyeioides, Cham, in Linnaea, vii. (1832)237=L. lycioides.
polygalaefolia, Cham. 1. c. 236 = L. polygalaefolia.
scorodonioides, Cham. 1. c. 234=L. scorodonioides.
urticoides, Cham. 1. c. 238=L. urticoide^
virgata, fuss, in Ann. Mns. Par. vii. (1806) 78=L urticoides.

ALPHANDIA, Bail]. Adansonia, xi. (1873) 85. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 800.
furfuracea, *Baill. I. c.* 86.—N. Caled.
resinosa, *Baill. I. c.* 86.—N. Caled.

A1PHITONIA, Reisselt, ex Endl. Gen. 1098 (1840). *RHAMNEAE,* Benth. & Hook. *I* i. 881.
Emmenosperma, F. Muell. Fragm. iii. 63 = Emmenosperma alphitonoides.
erubescens, *Baill. Adansonia,* xi. (1874-76) 271.—N. Caled.
excelsa, *Reisset, ex Endl. Gen.* 1098.—Austral,
franguloldes, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 280. —Ins. Viti.
moluccana, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* 221.—Molucca,
xerocarpus, *Baill. Adansonia,* xi. (1873-76) 270.—N. Caled.
zizyphoides, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 278.—Hab.?

AIiPHONSEA, Hook. f. *Sc* Thorns. Fl. Ind. i. 152 (1855). *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 29.
ceramensis, *Scheff. in nnn. Jard. Buitent.* ii. (1886) 29.—Malaya,
elliptica, *Hook.f. & Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 90.—Malacca,
javanica, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 840 ; in *Flora,* liu. (1870) 242.—Java,
lutea, *Hook.f. & Thorns. Fl. Ind.i.* 158.—Ind. or.
lutea, Teijsm. & Binn. ex Scheff. in Flora, liii. (1870) 242= javanica.
madraspatana, *Bedd. Fl. Sylv.* i. t. 76.—Ind. or.
Maingayi, *Hook.f. & Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 90.—Malacca.
sclerocarpa, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 11.—Zeylan.
ventricosa, *Hook./. & Thorns. Fl. Ind.* i. 152.—Ind. or.; Malaya,
zeylanica, *Hook.f. & Thorns. I. c.* 158.—Ind. or.

AIiFTNIA, Linn. Gen. ed. I. 832 (1737). *SC1TAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 648.
ALBINA, Giseke, Prael. Linn. 199,207 (1792).
ALUGHAS, Linn. Fl. Zeyl. 207 (1747).
BANGLIUM, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. snb n. 6579 (1832).
BOJERIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 60 (1886).
BUEKIA, Giseke, Prael. Linn. 199, 204 (1792).
CATIMBIUM, JUSS. Gen. 62 (1789).
CENOLOPHON, Blume, Enum. PI. Jav, 60 (1830).
DOXANTHES, Rafin. Fl. Tellur. iv. 51 (1886).
GALANGA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2; ed. II. 65 (1827).
HELLENIA, Willd. Sp. PI. i. 4 (1797).
HERITIERA, Retz. Obs. vi. 17.1.1 (1791).
KOLOWRATIA, Presl,Rel. Haeuk. i. 118. t. 20 (1827).
LANGUAS, Koen. in Retz. Obs. iii. 64 (1783).
MARTENSIA, Giseke, Prael. Linn. 199, 207 (1792).
MONOCYSTIS, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 445 (1886).
ZERUMBET, Wendl. Sert. Hannov. fasc. iv. 8.1.19 (1798).
acrostachya, Steud. Nom. ed. II. i. 62 (=Amomi sp.). —Java.
alba, D. Dietr. Syn. PI. i. 12=Elettaria alba,
alba, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii (1807) 346.—Ind. or.
alata, *A. Dietr. Sp. PI.* i. 45.—China.
AUughas, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 846. —Ind. or.
Antillarum, *Roem. & Schult. Syst. Veg. i.* 20.—Ind.'occ.
aqnatica, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 346.—Ind. or.
arctiflora, *F. Muell. Fragm.* viii. 25.—Austral.
aromatica, Aubl. PI. Gui. i. 3 = Renealmia domingensis.
auricuiata, *Rose. Scit. PI.* t. 74.—Ins. Molucc.
Blumei, D. Dietr. Syn. PI. i. 13=javanica.
Boia, *Seem. Fl. Vit.* 290.—Ins. Fiji.
bracteata, Rose, in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 281 = alata.
bracteata, Roxb. Fl. Ind. i. 61=Roxburghii.
brevilabris, *Presl, Rel. Haenk.* i. 110. t. 17.—Ins. Luzon.
breviscapa, Poepp. ft Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 1185 = Renealmia breviscapa.
caerulea, *Benth. Fl. Austral,* vi. 265.—Austral,
calcarata, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 347. —Ind. or.; China.

ALPHTIA:—
capitellata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 4. —Malaya.
Cardamomum, Roxb. in As. Re*, xi. (1810) 866-Elettaria Cardamomum.
Cardamon-medium, Roxb. Fl. Ind. i. 72=Amomum costatum.
earibaea, Gaert.Frnct i. 85.112—Renealmiaracemosa.
carnea, *Griff. Notul.* iii. 420.—Ind. or.
ceraua, *Sims, Bot. Mag.* t 1900.—Ind. or.
chinensis, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 846.—China.
coccinea, D. Dietr. Syn. PI. i. 12=Amomum coccinenm.
comesa, Jacq. Coll. iv. 112 = Costus comosns.
conchigera, *Griff. Notul.* iii. 424.—Ind. or.
costata, Rozb. Corom. Fl. iii. 48. t. 252=Amomum costatum.
cristata, *Griff. Notul.* iii. 421.—Ind. or.
diffissa, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* xi. (1815) 281.—China,
elatior, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 2.—Malaya.
erecta, Lodd. ex Stend. Norn. ed. II. i. 62=calcarata.
exaltata, Roem. & Schult. Syst. i. 21. add. 568 = Renealmia exaltata.
fasdculata, Stend. Nom. ed. II. i. 62 = Amomum fasciculatum.
ferruginea, Stend. Nom. ed. II. i. 62 = mollis.
foetens, D. Dietr. Syn. Fl. i. 12=Amomam foetens.
Galanga, *Willd. Sp. PI.* i. 12.—As. trop.
gigantea, *Blume, Enum. PI. Jan.* 59.—Java.
gigantea, F. Vill. in Blanco, Fl. Filip. ed. III. Nov. App. 225=gracilis.
globosa, *Horan. Prod. Scitam.* 84.—China,
gracilia, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 816.—Ins. Philipp.
Haenkei, *Presl, Symi.* 66. t. 48.—Chili.
Hamiltoniana, *Wall. Cat.* n. 6579.—Ind. or.
hemisphaerica, D. Dietr. Syn. PI. i. 13-Elettaria hemisphaerica.
hirsnta, *Horan. Prod. Scitam.* 84.—Cochinch.
humilis. Veil. Fl. Flum. 1; i. t. 4 (-Renealmiae sp.).—Bras,
humilis, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 827.—Java,
involucrata, *Griff. Notul.* iii. 422.—Ind. or.
jamaicensis, Gaert. Fruct. i. 86. t 12=Renealmia jamaicensis.
japonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 140.—Japon.
javanica, *Blume, Enum. PI. Jav.* 59.—Java.
javanica, D. Dietr. Syn. PI. l. *13=acrostachya.*
latifolia, Willd. ex Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) I. 130=Calathea latifolia.
linguiformis, Roxb. FL Ind. i. 73=Elettaria linguiformis.
macrantha, Poepp. & EndL Nov. Gen. et Sp. t 184 = Renealmia macrantha.
macrantha, *Scheff. in Ann. Jard. Buitene.* i. (1876) 56.—Malaya,
maculata, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 847.—Ind. or.
magnified, Rose. Scit t. 75=Amomum magnificum.
malaccensis, Presl, Rel. Haenk. i. 110 = Haenkei.
malaccensis, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 345.—Ind. or.; Java.
media, Sprang. Syst. i. 14=Amomnm costatum.
mesana, Horan. Prod. Scitam. 27 = Zingiber niacrostacbyum.
minor, D. Dietr. Syn. PI. i. 12=Elettaria minor.
minuta, D. Dietr. 1. c. = Elettaria minuta.
missionis, *Wall. Cat.* n. 6589.-Ind. or.
mollis, *Presl, Rel. Haenk.* 110.—Ins. Luzon.
multicaulis, Roem. & Schult. Syst i. 21 = Renealmia domingensis.
mutica, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 854.—Ind. or.
Neesana, *J. Grah. Cat. Bomb. PI.* 207.—Ind. or.
Nimmonii, J. Grah. 1. c. 206 = Zingiber Nimmonia.
nntans, *Rose, in Sm. Exot. Bot.* ii. 98.—Ind. or.
occidentalis, Sw. Prod. Veg. Ind. Oca 11 = Renealmia jamaicensis.
omcinarum, *Nance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 6.—China,
oxyphylla, *Miq. in Journ. Bot. Nlerl.* i. (1861) 93.—China.
Paco-Secora, Jacq. Fragm. 54. n. 17. t. 76-Renealmia Paco-Siecora.
pallida, D. Dietr. Syn. PI. i. 12-Elettaria pallida.

ALPINIA:—
paludosa, D. Die^r. Syn. PI.i. 12-Elettaria paludosa.
papuana, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent.* i. (1876) 66.—N. Guin.
parviflora, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 316.—Ins. Philipp.
penicillata, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* xi. (1314) 280.—China,
phoenicea, *Kamphoevener, ex Kurt, in Jturn. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) II. 154, nomen.—Ins. Nicobar.
Pininga, *D. Dietr. Syn. PI.* i. 12.—Java,
porrecta, *Wall. Cat.* n. 6576.—Ind. or.
Presliana, Stead. Nom. ed. II. i. 62 = Renealmia racemosa.
pumila, *Hook./. Bot.Mag.* t. 6832.—China.
punicea, Roxb. Fl. Ind. i. 71=Elettaria punicea.
pyramidata, *Blume, Enum. PI. Jav.* 68.—Java,
racemigera, *F. Muell. Fragm.* viii. 27.—Austral.
racemosa, linn. Sp. PI. ed. I. 2 >= Renealmia racemosa.
racemosa, Sw. Obs. 5 = A. Antillarum.
Rafflesiana, *Wall. Cat.* n. 6575.—Ind. or.
Renealmia, Sm. in Rees, Cyclop. Suppl. xxxix. n. 14 = Renealmia exaltata.
Rheedii, *Wight, Ic.* 6. t. 2026.—Malabar.
Roscoeana, Steud. Nom. ed. II. i. 63 = alata.
Roxburghii, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 390.—Ind. or.
rubra, *D. Dietr. Syn. PI.* i. 12.—Java.
Ruitnana, Stend. Nom. ed. II. i. 68-Renealmia Ruiziana.
serrnlata, *Willd. ex Steud. I. c*—Bras.
sessilis, Koen. in Retz. Obs. fasc. iii. 64-Kaempferia Galanga.
Simsii, *Gasp. Observ. Boccodifalc.* 6.—Hab. ?
Solaris, D. Dietr. Syn. PI. i. 12-Elettaria Solaris.
speeiosa, D. Dietr. 1. c. 18 = Elettaria speciosa.
spicata, Jacq. Enum. PI. Carib. ll=Costas spicatus.
spicata, Presl, Rel. Haenk. i. 109 = Renealmia racemosa.
spicata, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 356.—Ind. or.
spiralis, Jacq. Hort. Schoenb. i. 1-Costus Pisonis.
stachyodes, *Nance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1878) 126.—China.
striata, *Hort. Angl. ex Link, Enum. i. 5.*—Ind. or.
strobilifera, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. t. 136 - Renealmia strobilifera.
thyrsoidea, Steud. Nom. ed. II. i. 63=Renealmia thyrsoidea.
tomentosa, *D. Dietr. Syn. PI.* i. 12.—Java,
tubulata, *[Rose, in] Bot. Reg.* t. 777.—Ind. occ.
uviformis, *Horan. Prod. Scitam.* 35.—Malaya,
viridiflora, *Griff. Notul.* iii. 423.—Ind. or.
vitieusis, *Seem. Fl. Vit.* 290.—Ins. Fiji.
Walang, *D. Dietr. Syn. PI.* i. 13.—Java.

ALSCHINGERA, Vis. Fl. Dalm. iii. 69 (1849)=Physospermum, Cusson (Umbell.).
acteaefolia. Vis. sec. Tomm. fide Nym. Consp. 815 - P. verticillatum.
verticillata, Vis. Fl. Dalm. iii. 69= P. verticillatum.

AIJSEIS, Schott, in Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 404 (1827). *RUBIACEAE,* fienth. & Hook. *f.* ii. 38.
Blackiana, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 80.—Panama,
fioribunda, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 404.—Bras.

ALSENOSMIA, Endl. Ench. 284 (1841) sphalm.-Alseuosmia, A. Cunn. (Caprifol.).

ALSEODAPHNE, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 71 (1831). *LAURINEAE,* [Benth. & Hook. f. iii. 157.]
EUPHOEBE, Blnme, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 58, 59 in syn. (1864).
NOTHAPHOEBE, Blume, Mus, Bot Lugd. Bat. i. 828 (1851).
amara, Kostel. Allg. med.-pharm. Fl. ii. 484 = Nectandra cymbarum.
bancana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 916.—Banca.
breviflora, *Benth. Fl. Hongk.* 292.—China,
chinensis, *Champ, ex Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 28.—Hongkong.
costalis, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 72.—Ind. or.
Cujumary, Kostel. Allg. mei-pharm. Fl. ii. 484 = Ocotea Cnjumary.
cymbarum, Kostel. 1. c. = Nectandra cymbarum.
excelsa, *Illume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 382.—Java.
grandis, Kurz, For. Fl. Burma, ii. 298 = Dehaasia cuneata.

ALSEODAPHNE:—
grandis, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 72=Phoebe opaca.
lucida, *Nees, I. c.*—Singapore.
opt/era, Kostel. Allg. med.-pharm. Fl. ii. 484-Ocotea opifera.
polyneura, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 916.—Penang.
semicarpifolia, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 72.—Ind. or.

ALSEUO8MIA, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. ii. (18311) 209. *CAPRIFOUACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 6. FAGOIDES, Banks & Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 210.
atriplicifolia, A. Cunn. 1. c. 210=Banksii.
Banksii, *A. Cunn. I. c.* 209.—N. Zel.
bnpleurifolia, *A. Cunn. ex Heynh. Nom.* ii. 27.—N. Zel.
Hookeria, *Colenso, Excurs. North Isl.* 84.—N. Zel.
Ilex, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 210.—N. Zel.
ligustrifolia, A. Cunn. 1. c. 209-linariifolia.
linariifoJia, *A. Cunn. I. c.—H.* Zel.
macrophylla, *A. Cunn. 1. c.* 210.—N. Zel.
palaeiformis, A. Cunn. 1. c. •= Banksii.
pusilla, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 241.—N. Zel.
quercifolia, *A. Cunn. in- Ann. Nat. Hist.* ii. (1839, 210.—N. Zel.

ALSINANTHE, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. (1841) 29. t. 209=Arenaria, Linn. (Caryophyll.).
biflora, Reichb. 1. c. 30. t. 2U9. f. 4939 = Ar. biflora.
stricta, Reichb. 1. c. 29. t 209. f. 4985 = Ar. stricta.
uliginosa, Reichb. 1. c. t. 209. f. 4935 = Ar. stricta.

ALSINANTHEMOS, J. G. Gmel. Fl. Sib. iv. 46 (1769) = Trientalia, Linn. (Primal.).

ALSINANTHUS, Reichb. Handb. 298 (1887) = Arenaria, Linn. (Caryophyll.).
trinervius, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 847 =Ar. trinervia.

ALSINASTRUM, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 15=Elatine, linn.
callitrichoides, Rupr. Fl. Ingr. 197 = E. triandra.
galiifolia, Schur, m Verh. Siebenb. Ver. Nature, iv. (1853) 15 = E. Alsinastrum.
gyrospermum, Rupr. Fl. Ingr. 195 = E. Hydropiper.
orthospermum, Rupr. 1. c. 196 = E. Hydropiper'(
triandrum, Rupr. 1. c. 197 = E . triandra.

ALSINE, Burm. Fl. Zeyl. 18. t. 8 (1737)=UoUugo, linn. (Ficoid.).

ALSINE, Toum. ex Linn. Sysl. ed. I. (1735); Gen. ed. I. 138 1,1737) = Arenaria, Linn., Btellaria, Linn. *Sec.* (Caryophyll.).

ALSINE, Scop. Fl. Cam. ed. II. 224 (1772); Wahlenb. Fl. Lapp. 127 (1812)=Arenarla, Linn. (Caryophyll.).
aitoides, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 47.—Kurdistan.
alpina, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 238-Spergularia rnbra.
Alsinastrum, Crantz, Inst. ii. 405 = Elatine Alsinastrum.
anatolica, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 97 - Ar. setacea.
apetala. Kit ex Nym. Consp. Ill - Stellaria media.
arabica, Fisch. Mey. & Ave-Lall. Ind. Sem. Petrop. xi. 49-Ar. tenuifolia.
arctica, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 18; et 36 — Ar. arctica.
Arduinei, Fenzl, 1. c. in tab. ad p. 67 —Ar. graminifolia.
aretioides, Mert. & Koch, in Roehl. Deutsch. Fl. iii. 277 =» Ar. aretioides.
aristata, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 249.—Syria.
arvensis, Crantz, Inst. ii. 408—Spergula arvensis.
arvatica, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 608—Ar. mucronata.
attica, Boiss. *Be* Sprun. Diagn. Ser. I. v. 84=Ar. verna.
Aucheriana, Boiss. Fl. Orient, i. 678 = Ar. Aucheriana.
austriaca, Wahlenb. Fl. Lapp. 129-Ar. austriaca.
avicularum. Lam. Fl. Fr. iii. 46-Stellaria media.
barbata, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 537-Stellaria media.

ALSINE :—
Barrelieri, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loiie, vi. (1859) 57.—Gallia.
Bartolotti, Huet, ex Nym. Consp. 119 = Arenaria procnmbens.
banatica, Blnff & Fingh. Comp. ed. II. ii. II. 99=Ar. banatica.
Baukinorum, J. Gay, ex Lamotte, Prod. i. 144-Ar. linifolia.
bavarica, Crantz, Inst. ii. 407 - Ar. bavarica.
Biebersteinii, Rupr. Fl. Caue. 215.—Caucas.
biflora, Wahlenb. Fl. Lapp. 128=Ar. scandinavica.
Billardieri, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 96 = Ar. Meyeri.
bipariita, Gilib. FL Lituan. ii. 160-Stellaria media.
brachycarpa, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 87 = Ar. tenuifolia.
brachyfeiala, Opiz, Natural, xi. (1826) 406 =Stellaria media.
brnieaulis, Sterab. ex Nym. Consp. 119=Ar. lanceolata.
breviflora, Gilib. Fl. Litnan. ii. 150-Ar. tenuifolia.
brevifolia, Chapm. Fl. S. Un. St. 49 = Ar. brevifolia.
brnis, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 96.—Persia; Arabia.
Bufonia, Crantz, Inst ii. 405-Bufonia perennis.
raespitosa, Ehrh. ex Nym. Consp. 119 = Ar. vema.
• *ampestris,* Boiss. Voy. Espagne.ii. 723 (-*Minuartia campestris*^.—Hispan.
rampestris, Fenzl, Verbreit Alsin. in tab. ad p. 57 = Ar. montana.
eanaft«jJo(a,Dulac, Fl. Hantes-Pyr.246 = Ar. Cherleria.
rapillipes, Boiss. ex Stend. Norn. ed. II. i. 63=Ar. capillipes.
cappadocica, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 88-= A. setacea.
catarctantm, Janka, in Ktizlem. Magyar Tudom. Akad. xii. (1876) 165.—Enrop.
caucasica, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 87=Ar. montana.
caucasica, Rupr. Fl. Caucas. 208.—Caucas.
cerastiifolia, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 67 =Ar. cerastiifolia.
Cherleriae, Fenzl, 1. c. 37 -Stellaria petraea.
Cherleriana, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144 = Ar. Cherleria.
Cheveneauxii, Reut. ex Nym. Consp. 119 - Ar. recurva.
nliata, Crantz, Inst. ii. 408.—Italia.
condensata, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 67 = Ar. condensata.
con/erta, Jord. Pugill. 85-Ar. tennifolia.
confusa, Heldr. & Sart. ex Nym. Consp. 118=Ar. tnchocalycina.
corymbulosa, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 87=Ar. setacea.
rorymbulosa, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, vi. (1859) 57 = Ar. Barrelieri.
costata, Fenzl, Verbreit. Alsin. 87=Ar. costata.
Cupaniana, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 19 = otellaria media.
decandra, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 78.—Enrop.
<**ecipims,* Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. IS.—Syria.
Oelastrei, Bor. in Mem. Soc. Acad. Maine-et-Loire, ··viii. (i860) 12 = Ar. Barrelieri.
diandra, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 501=Ar. diandra.
Janthifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 99.—As. Min.
dtchotoma, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 57 = Minuartia dichotoma.
Oillenii, Vill. Fl. Delphin. 80.—Gallia.
Orunmondii, Fenzl, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. − 675=Stellaria Nuttallii.
Matino, Crantz, Inst. ii. 405=Elatine Hydropiper.
negans, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. 18=Ar. elegans.
elongata, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 19 = Stellaria media.
*n*orginata,* Fenzl, Verbreit Alsin. in tab. ad p. 57 = Ar. emarginata.
trecta, Crantz, Inst. ii. 405=Cerastium quatemellnm.
"ythrosepala, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 98.—As. Min.
'itrytamca, Boiss. 1. c. Ser. II. vi. 35.—Graeda.
extensa, Nym. Consp. 119 = Ar. procumbens.
Facchinii, Hansm. Fl. Tyr. 138.—Tyrol.
ffeata, Griseb. Fl. Rnmel. i.200 = Ar. setacea.
fasciculata, Wahlenb. Fl. Lapp. 129-Ar. fasciculate.
fastigiata, Bab. Man. ed. I. 51-Ar. fastigiata.
Mmosa, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 403.—Assyria.
FunUi, Jord. Pngill. 86=Ar. fasciculata.
Mifonnis, Fenzl, ex Heynh. Nom. ii. 27-Ar. picta.
iyurif.-, Wahlenb. Fl. Carpat. 132-AT. vema.
Hede- iii, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab, ad p. 18-Ar. vernn.

ALSINE:—
glabella, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 20-Steliaria media.
glabra, A. Gray, Man. ed. II. 57-Arenaria glabra.
glandulosa, Dulac, Fl. Haotes-Pyr. 246-Ar. cerastiifolU.
glandulosa, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 61-Ar. jnniperina.
glandulosa, Mutel, ex Nym. Consp. 116 = Ar. linifolia.
globulosa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc 219 = Ar. globulosa.
glomerata, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 46 = Ar. glomerata.
graminifolia, J. F. GmeL Syst. 507-Ar. Rosani.
grandiflora, Crantz, Inst. ii. 408—Ar. grandiflora.
granuliflora, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 346-Ar. setacea.
Griffithsii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 89-Ar. Griffithii.
grineensis, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 252 - Ar. Villarsii.
groenlandica, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. ad p. 18 = Ar. groenlandica.
Gussonii, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 20 = Stellaria media.
Halophila, Torcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 587.—Altai.
Heldreichiana, Boiss. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient, i. 677=Ar. juniperina.
Helmii, Fenzl. Verbreit. Alsin. tab. ad p. 18 = Ar. Helmii.
herniarioides,'SioTt, ex Nym. Consp. 119=Ar. aretioides.
heteromalla,'B\t\>. Fl. Taur. Cane. i. 860-Ar.setscea.
heterosperma, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 501.—Sicil.
fnrsuta, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. 46—Ar. reenrva.
hirta,. Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. III. 104=Ar. verna.
hispanica, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 46 = Queria hispanica.
hispida, Crantz, Inst ii. 408-Ar.hispida.
hybrida, Jord. Pugill. 33—Ar. tenuifolia.
imbricata, C. A. Mey. Verz. PH. Cane. 217 = Ar. imbricata.
inamoena, C. A. Mey. 1. c. 218 = Ar. imbricata.
intermedia, Boiss. Fl. Orient, i. 685.—As. Min.
intricata, Martr. PI. Crit. Tarn, 15.—Gallia.
irregularis, Vis. ex Boiss. FL Orient, i. 684=Ar. globulosa.
Jacquini, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 125=Ar. fasciculata.
Jacquiniana, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 144-Ar. fasciculata.
juniperina, Wahlenb. Fl. Lapp. 129 = Ar. juniperina.
Juressi, Fenzl, Verbreit. AUin. in tat. ad p. 67 = Ar. Jnressi.
kaiylica, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 327.—Afr. bor.
Kitaibelii, Nym. Consp. 116-Ar. laricifolia.
lanceolata, Mert. & Koch, in Roehl. Dentsch. Fl. ed. III. ii. 276=Ar. lanceolata.
lancifolia, Vis. Ic. Fl. Dalm. t. 34—AT. globulosa.
LangH, G. Reuss, Kvet Slav. (1853) 76-Ar. laricifolia.
laricifolia, Crantz, Inst. ii. 407-Ar. laricifolia.
laricifolia. Linn, ex Nym. Consp. 117=Ar. setacea.
laridna, Crantz, Inst. ii. 408—Spergula laricina.
lateriflora, Crantz, 1. c. 406 —Ar. lateriflora.
laiifolia, Dam. Fl. Belg. 109.—Belg.
laxa, Jord. Pugill. 34 = Ar. tennifolia.
leucocephala, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 45.—As. Min.
libanotica, Boiss. 1. c. viii. 98.—Libanus. »
lineata, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Ross.-Ar. juniperina.
liniflora, Vis. Fl. Dalmat. iii. I. 178-Ar. liniflora.
linifolia, Borb. in Kad. Jngos. Akad. Zagrab, xxxvi. (1876) 166.—Enrop. austr.
Lydia, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 86 = Ar. tenuifolia.
macrocarpa, Fenzl, Verbreit Alsin. tab. ad p. 18-Ar. macrocarpa,
marginata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 317-Sper. gularia media.
marginata, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. ad p. 18—Spergularia marginata.
marginata, Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 666. n. 3662 = Ar. media.
marginata, Schreb. Spicil. 31-Spergularia pentandra.
marina, Webb & Berth. Phyt Canar. i. 147-Spergularia Bourgeaei.
marina, Mert. ft Koch, in Roehl. Dentsch. Fl. ii. 293 —Spergularia media.

ALSINE:—
media, Linn. Sp. PI. ed. I. 272 = Spergnlaria media.
media, Veil. Fl. Flnm. 127; iii. t. 106-Drymaria cordata.
mediterranea, Gren. FL Massil. Adven. (1869) g.—Gallia.
mesogitana, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 45= Arenaria tennifolia.
Meyeri, Boiss. 1. c. Ser. I. viii. 96 = Arenaria globulosa.
mexicana, Bartl. ex Presl, Rel. Haenk. ii. 14 = Ar. mexicana.
Michauxii, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. ad p. 18 = Ar. stricta.
microsperma, Fenzl, ex Torr. *8c* Gray, FL N. Am. i. 674-Ar. Pitched.
minuta. Rohrb. in Linneea, xxxvii. (1871-72) 246.—Chili.
Moekringia, Crantz, Inst ii. 405 = Ar. mnscosa.
moehringioides, Rohrb. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 247 *{=Hymenella moehringioides).*
molluginea, Lag. Gen. et Sp. Nov. (1816) 13-Ar. molluginea.
montana, Crantz, Inst ii. 406=Ar. montana.
mucronata, Linn. Sp. PL ed. II. 389-Ar. mncronata.
mueronata, Poir. Encyc. Suppl. iv. 810-Ar. fasciculata.
multicaulis, Crantz, Inst. ii. 406—AT. multicaolis.
multinervis, Boiss. Fl. Orient, i. 683.—As. Min.
Munbyi, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 85-Ar. Munbyi.
muscorum. Adams, ex Ledeb. FL ROBS. i. 349-Ar. vema.
mutabilis, Lap. ex Nym. Consp. 118-Ar. rostrata.
nemorum, Schreb. Spicil. 80—Stellaria nemoram.
nodosa, Crantz, Inst ii. 408 — Sagina nodosa.
occulta, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc Nat Mosc xv. (1842) 590 = Ar. polygonoides, artica.
octandra, Schur, Enum. PL Transs. 882, Index-Ar. aretioides.
Orphanides, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 62 = Ar. tennifolia.
pallida, Dnm. Fl. Belg. 109; et in Bull. Soc Bot. Belg. xii. (1873) 176.—Belg.
palustris, Kellogg, in Proc Calif. Acad. iii. (1868) 61 — Ar. palnstris.
paniculata, Fenzl, Verbreit. Alsin. 87 = Ar. paniculata.
parnassica, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. i. 46.—Graecia.
patula.A. Gray, Mau. Bot. U. St. ed. II. 68-Ar. patula,
pauciflora, Kit. ex Nym. Consp. 119—Ar. vema.
pentandra, Crantz, Inst. ii. 408-Spergnlaria pentandra.
peploides, Crantz, L c. 406-Ar. peploides.
PestaloMoe, Boiss. Diagn. Ser. I. viii 99.—As. Min.
petraea, Jord. Obs. PL Crit vii. (1849) 14=Ar. rostrata.
pharnaceoides, Fenzl, Verbreit Alsin. in tab. ad p. 57 = Ar. filiformis.
picta, Fenzl, 1. c.=Ar. filiformis.
pilifera, Tnrcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xv. (1842) 688 = Spergula laricina.
pinifolia, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 46-Ar. pinifolia.
Pitcheri, Wood, Cl.-Book, 260 = Ar. Pitcheri.
polycarpa, Crantz, Inst ii. 405=Polycarpon tetraphyllum.
Preslii, Renss, Kvet. Slov. (1853) 75-Ar. graminifolia.
procumbens, Crantz, Inst. ii. 404—Sagina procumbens.
procumbens, Fenzl, Verbreit Alsin. in tab. ad p. 57 = AT. geniculata.
propinqua, Lange, Fl. Dan. t. 2903=Ar. vema.
prostrata, Forsk. FL Aegypt Arab. 207 - Polyearpea prostrata.
pubescens, Presl, ex. Nym. Consp. 117 —Ar. tennifolia.
pulmnaris, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 46.—Lydia.
Pumilio, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. ad p. 18-Ar. arctica.
purpurascens, Bubani, in Nuov. Ann. Sc. Nat. Boloe ix. (1843)94.—Italia»
purpurea, Heynh. Nom. i. 38-Spergnlaria purputea.
radicans, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 602-Spergnlaria rubra.
ramosissima, Fenzl, ex Schur, Enum. PL Transs. 113 — Ar. fasciculata.
recuma, Wahlenb. FL Helv. 87-Ar. recurva.
repens, Veil. FL Flnm. 127; iii. t 106-Stellaria media.

ALSINE:—
rimarum, Boiss. & Bal. in Boiss. Fl. Orient i. 678.—Cilicia.
Rosani, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 498=Arenaria Rosani.
rosea, Presl, ex Nym. Consp. 119 = Ar. procumbens.
Aurii, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. ad p. 18=Ar. stricta.
rostrata, Fenzl, 1. c. 46 = Ar. lostrata.
rotundifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 587-Drymaria cordata.
Roy lei, Fenzl, ex Hook. f. Fl. Brit Ind. i. 286=Ar. foliosa.
rubella, Schrenk, ex Ledeb. Fl. Ross. i. '349=Ar. vema.
rubella, Wahlenb. Fl. Lapp. 128. t. 6=Ar. vema.
rubra, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 148=Spergnlaria canariensis.
rubra, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 217=Spergularia salsuginea.
rubra, Crantz, Inst. ii. 407 = Spergularia rubra.
rupestris, Fenzl, Verbreit. Alsin. in tab. ad p. 57=Ar. ropestris.
Sagina, Crantz, Inst ii. 405 = Bartonia tenella.
saginoides, Crantz, 1. c. 408=Sagina Spergella.
saxatilis, Crantz, 1. c. 407 = Ar. saxatilis.
saxatilis, Wahlenb. Fl. Helv. 87 = Ar. verna.
Saxifraga, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 47=Ar. Saxifraga.
scabra, Stokes, Bot Mat. Med. ii. 588 = Stellaria Holostea.
Sckimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 47. —Abyss.
sclerantha, Fisch. & Mey. in BulL Soc. Nat Mosc. (1838) 400.—Caucas.
scleranthoides, Boiss. Diagn. Ser. II. i 88 = Ar. setacea.
sedoides, Froel. in Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 114 = Ar. sedoides.
segetalis, Linn. Sp. PI. 272 = Spergnlaria segetalis.
Seguieri, Tumi, ex Sacc. in Atti 1st. Venet. Ser, III. IX. (1863-64) 486.—Italia.
serpyllifolia, Crantz, Inst. ii. 406 = Ar. serpyllifolia.
setacea, Mert. & Koch, in Roehl. Dentsch. Fl. iii. 286 =Ar. setacea.
sinaica, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 100=Ar. picta.
Smithii, Fenzl, Verbreit Alsin. in tab. ad p. 57=Ar. globulosa.
spinuliflora, Fenzl, 1. c. = Habrosia spinuliflora.
'squarrosa, Fenzl, ex A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. II. 57 = Ar. sqnarrosa.
striata, Crantz, Inst. ii. 407=Ar. striata.
striata, Gren. in Mem. Soc. Doubs, (1841) 33. t. 1. f. 1 =Ar. laricifolia.
stricta, Mert. & Koch, in Roehl. Dentsch. Fl. iii. 278 = Ar. stricta.
stri:ta, Wahlenb. Fl. Lapp. 127-Ar. lapponica.
subtilis, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient i. 687 = Ar. tenuifolia.
subulifolia, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 503=Ar. mucronata.
succulenta, Delile, Fl. Egypt 211. t. 24=Polycarpon succulentum.
tauriea, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) I. 319 = Ar. Villarsii.
Tchihatchewii, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 247.—As. Min.
tenella, Fuss, Fl. Transs. 112=Ar. aostriaca.
tenuifolia, Crantz, Inst. ii. 407=Ar. tenuifolia.
tenuissima, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 327.—Afr. bor.
tetraquetra, Crantz, Inst. ii. 406=Ar. tetraquetra.
thymifolia, Fenzl, Verbreit Alsin. in tab. ad p. 57 = Ar. thymifolia.
trichoealycina, Heldr. & Sart. Diagn. Ser. II. i. 87.—Ital.; Graecia.
trifolia, Baring-Gould, ex Bab. in Joura. Linn. Soc xi. (1871) 298=Ar. norvegica.
trineruia, Crantz, Inst. ii. 406=Ar. trinervia.
uliginosa, Vill. Prosp. Dauph. 48 = Stellaria aquatica.
umbellata, Lam. Fl. Fr. iii. 45 = Holosteum umbellatum.
umbelli/era, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 61.—Cilicia.
unilateralis, Moench, Meth. 228=Spergularia segetalis.
uralensis, Clerc, in Bull. Soc. Oural. iv. 105.—Ural.
velutina, Boiss. & Orphan. Diagn. Ser. II. vi. 636 = Ar. glomerata.
verna, Wahlenb. Fl. Lapp. 129; Bartl. Beitr. ii. 63-Ar. vema.
verticillata, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 6.—Java.
Villarsii, Fenzl, in Ledeb. FL Ross. 350 = Ar. juniperina.

ALSINE:—
Villarsii, Mert. & Koch, in Roehl. Dentsch. Fl. iii. 282 = Arenaria Villarsii.
Villarsiana, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 144-praec,
villosa, Heynh. Nom. i. 89—Ar. vtllosa.
viscidula, Thouin, ex Nym. Consp. 117 = Ar. tennifolia.
viscosa, Schreb. Spicil. 80=Ar. tenuifolia.
mtlgaris, Moench, Meth. 228=Stellaria media.

ALSINELLA, Dill, ex Linn. Gen. ed. I. 118 (1737) = **Bagina,** Linn. (CaryophylL).

ALSINELLA, Hornem. Nom. 33 (1827) = **Spergularia,** J.& C. Presl (CaryophylL).
media, Hornem. 1. c.=S. marina.

ALSINELLA, [Sw.] Summa Veg. Scand. 17 (1814) pro parte; Benth. in Wall. Cat n. 630 (1832)=8tellaria, Linn. (CaryophylL).
biflora, Sw. 1. c. = S. biflora.
Wallichiana, Benth. 1. c.=S. media.

ALSINELLA, [Sw.] Summa Veg. Scand. 17 (1814) pro parte; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PL ii. 655 (1821) =**Arenarla,** Linn. (CaryophylL).
ciliata, S. F. Gray, 1. c. = Ar. ciliata.
rubella, Sw. Summa Veg. Scand. 17 = Ar. vema.
stricta, Sw. 1. c = Ar. stricta.
trinervis, S. F. Gray, Nat. Arr. ii. 655 = Ar. trinervia.
viscosa, Hartm. Fl. Dan. 1.1754-Ar. tenuifolia.
serpyllifolia, S. F. Gray, Nat. Arr. ii. 665=Ar. serpyllifolia.

ALSINELLA, Moench, Meth. 222 (1794) •= **CeraBtium,** Linn. (CaryophylL).
erecta, Moench, 1. c. = C. qnatemellum.

AliStNIDENDKON, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 311. *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 978.
trinerve, *H. Mann, I. c.* 312.—Ins. Sandvic

ALSOBIA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 207 = Episcia, Mart. (Gesnerac).
antirrhina, Oerst. in Videnskab. Selsk. Skr. V. v. (1861) 114.—Am. centr.
punctata, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 207=E. punctate.

ALSOCYDIA, Mart, ex DC. Prod. ix. 149, &c. (1845)-**Bignonia,** Linn. &c.
acutiflara, Mart, ex Buek, Ind. DC. Prod. iii. 14 = Lundia nitidula.
angustidens, Mart, ex DC. 1. c. ix. 179=Cuspidaria angustidens.
cordata, Mart, ex DC. 1. c. 168 = Bign. cordifolia.
craterophora, Mart, ex Buek, Ind. DC. Prod. iii. 14-Bign. craterophora.
dichotoma. Mart, ex DC. I. c ix. 150 = Bign. corymbifera.
erubescens. Mart, ex DC. 1. c. 157—Bign. erubescens.
firmula, Mart, ex DC. 1. c. 146 = Bign. brachypoda.
glandulosa, Mart, ex DC. 1. c 149, 164=Bign. glandulosa, lanceolata.
glutinosa. Mart, ex DC. 1. c. 162-Bign. glutinosa.
hebantha, Mart, ex Buek, Ind. DC. Prod. iii. 14=Lundia hebantha.
hirsuta, Mart, ex DC. 1. c. ix. 158-Bign. trichoclada.
lasianthera, Mart, ex DC. 1. c 180=Lundia cordata.
longidens, Mart, ex DC. L c. 190—Anemopaegma longidens.
nitidula, Mart, ex Buek, Ind. DC. Prod. iii. 14=Lundia nitidula.
noterophila, Mart, ex Buek, 1. c—Bign. noterophila.
tetragonocaulos, Mart ex DC. 1. c ix. 169 = Bign. tetragonocaulos.
triplinervia, Mart, ex Buek, Ind. DC. Prod. iii. 14-Bign. triplinervia.
variabilis, Mart, ex DC. 1. c. ix. 149 = Bign. varians.
•*villosa*, Mart, ex Buek, Ind. DC. Proti. iii. 14 = Bign. velutina.
virgirialis, Mart, ex Buek, 1. a-Lundia virginalis.

ALSODEIA, Thou. Hist. Veg. Afr. ii. 65. t. 17, 18 (1807). *V&LARIEAE*, Benlh. & Hook. f. i. 118.
CERANTHERA, Beauv. Fl. Owar. et Ben. ii. 10 (1807).

ALSODEIA :—
CERATANTHERA, Beauv. Fl. Owar. et Ben. ii. 10, in nota (1807).
CONOHORIA, Aubl. PL Gui. 289. t. 95 (1775).
COKORIA, Juss. Gen. 287 (1789).
CUSFA, Humb. Relat'. i. 866 (1814) ex H. B. *8c K.* Nov. Gen. et Sp. vii. 242.
DIORVKTANDRA, Hastk. Retzia, 125 (1855).
GONOHORIA, G. Don, Gen. Syst. i. 340 (1831).
JUERGENSIA, Spreng. Syst. iii. 50 (1826).
MEDUSA, Lour. Fl. Cochinch. 406 (1790).
MEDUSULA, Pers. Syn. ii. 215 (1807).
PASSALIA, Soland, ex R. Br. in Tuckey, Congo, 440 (1818).
PASSOURA, Aubl. PL Gui. [Suppl.] 21. t. 880 (1775).
PENTALOBA, Lour. Fl. Cochinch. 154 (1790).
PHYSIPHORA, Soland. ex R. Br. in Tuckey. Congo, 441 (1818).
PROSTHESIA, Blume, Bijdr. 866 (1826).
RIANA, Anbl. PI. Gui. 237. t. 94 (1775).
RINOREA, Aubl. 1. c. 236. t. 93 (1775).
VARECA, Roxb. Fl. Ind. i. 647 (1832).
albicaulis, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1863) I. 667.—N. Granat.
andina, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. vii. (1847) 366. —N. Granat.
angustifolia, *Thou. Hist. Veg. Afr.* ii. 57.118. f. 2.—Madag.
arborea, *Thou. 1. c.* 57. t. 17. f. 1.—Madag.
ardisiaeflora, *Welw. in Oliver, Fl. Trap. Afr.* **i. 108.—** Afr. trop.
Aucuparia, *Welw. 1. c.* 109.—Afr. trop.
auricalata, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. ix. (1868) 319.—Madag.
bahiensis, *Moric. PI. Nouv. Am.* 68. t. 46.—Bras,
bengalensis, *Wall, in Trans. Med. & Phys. Soc. Calc.* vii. (1846) 224.—Ind. or.
brachypetala, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1863) I. 558.—Afr. trop.
brevipes, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* **iv. (1842)** 106.—Guiana.
Browni, Korth. in Neder. Kruid. Arch. i. (1848) 361 = zeylanica.
caledonica, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1868) I. 558.—N. Caled.
calophylla, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. ix. (1868) 311.—Madag.
calycina, *Tul. I. c.* 313.—Madag.
castaneaefolia, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 99.—Bras,
castanioides, *Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **i. 110.—** Afr. trop.
caudate, *Oliver, 1. c.* 107—Afr. trop.
cauliflora, *Oliver, I. c.* 111.—Afr. trop.
ceylanica, Auct. vide zeylanica.
chrysodasys, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* **i. SBC-**Sumatra,
corylifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1868) I. 659.—Java.
Cuspa, *Spreng. Syst.* **iv.** *Cur. Post.* **99.—Cumana.**
cymulosa, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 116.—Java,
cymulosa, *Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **1. 108.—** Afr. trop.
dasycaula, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 391=mollis.
dasyprysis, *Miq. 1. c.*—Sumatra,
decora, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 203.—Zeylan.
deflexa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* **67.—Peruv.**
dentata, *Beauv. Fl. Owar. et Ben.* ii. 11. t 65.—Afr. trop.
disticha, *Zoll. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugi. Bat.* **iv.** 216.—Malaya,
echinocarpa, *Korth. in Neder. Kruid. Arch.* **i. (1848)** 360.—Sumatra.
elliptica, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* 1.108.—Afr. trop.
falcata, *Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* **xiii. I. 386.** —Bras,
fasciculate, *Turcn. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1863) I. 559.—Ins. Philipp.
flavescens, *Spreng. Syst.* i. 806.—Guiana.
floribunda, Monc. PL Nonv. Am. 70. t 47-Castaneaefolia.
glabra, *Burgersdyke, in Miq. PI. Jungh.* **122.—** Sumatra.
Gossypium, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. vii. (1847) 867.—N. Granat.
grandis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i.* **891.—Sumatra.**
Griffithii, *Hook.f. & Thorns, in Fl. Brit. Ind.* **i. 187.** —Burma.

AL8ODBIA:—
guianensis, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xili. I. 887.—Bras.
gnineensis, *Spreng. Syst.* i. 806.—Aft. trop.
naptobotrys, *Hassk. in Versl. Kon. Akad. Wetensch.* iv. (1856) 187.—Java.
Horneri, *Korth. in Neder. Kruid. Arch.* i. (1848) 860.—Borneo.
Horsfieldii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 117.—Java.
Horsfieldii, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) I. 659.—Java.
lUcifolia, *Welw. in Trans. Linn. Soc*: xxvii. (1869) 12.—Afr. trop.
integrifolia, *Steud. Norn.* ed. II. i. 64.—Bras.
Javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 117.—Sumatra,
lanceolata, *Oudem. in Arch. Neerl.* ii. (1867) 196; *et in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iii. 68.—Ind. or.**
latifolia, *Thou. Hist. Vig. Afr.* ii. 57. t. 18. f. 8.—Madag.
laxiflora, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1842) 107=gnianensis.
leucoclada, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. ix. (1868) 312.—Madag.
Lindeniana, Tul. 1. c. Ser. III. vii. (1847) 864-guianensis.
longiflora, *Oudem. in Arch. Nttrl.* ii. (1867) 195; *et in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iii. (1867) 68.—**Guiana,
longipes, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. ix. (1868) 809.—Madag.
longiracemosa, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xxxix (1S70) II. 63.-lnd. or.
macrocarpa, *Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 886.—Bras
macrophylla.'.Defne. *in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 468. t. 19.—Ins. Timor,
maculata, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. ix. (1868) 816.—Madag.
Maingayi, *Hook.f. & Thorns, ex Fl. Brit. Ind.* i. 188.—Malacca,
marginata, *Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvii. (1862) 127.—Nov. Granat.
Martinii, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) I. 557.-Guin.
Maximiliana, *Eichl. in Mart. Fl.- Bras.* xiii. I. 881.—Bras.
nwgapotamica, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 99.—Bras,
ndlis, *Hook. f. & Thorns. ex Fl. Brit. Ind.* i. 188.—Tenasserim.
monticola, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. ix. (1868) 315.—Madag.
mutica, *Tul. I. c.* 818.—Madag.
*n*gricans*, Boiv. ex Tul. 1. c. 805=pnbescens.
obhisa, *Korth. in Neder. Kruid. Arch.* i. (1848) 359.—Borneo.
owariensis, *Spreng. Syst.* i. 806.—Afr. trop.
VWii&, *Klotisch, in Schomb. Fauna et Fl. Guy.* 1165. -Tuui.
paniculate, *Mart. Nov. Gen. et Sp. i.* 80.—Bras.
Paradoxa, *Blume, ex Oudem. in Arch. Neerl.* ii. (1867) 4; *et in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. Bot.* iii. 71.—Java.
Panci*norai* *Thou. Hist. Vig. Afr.* & 57. t. 17.—Madag.
rernni, *Spreng. Syst.* i. 807.—Am. anstr.
*"ervillii, *Oudem. in Arch. Neerl.* ii. (1867) 206; *et in Miq Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iii. 72.—Madag.**
Physiphora, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 28.—Bras.
'>parea, Spreng. Syst. i. 807 = Casearia dentata.
Pranifolia, *Spreng. I. c*—Guiana.
Pubesc . t. 18. f. 3.—Mad .
pnbiflora,' *Bentk. in Hook. Joum. Bot.* iv. (1842) 106.-^Guiana.
Pugionifera, *Oudem. in Arch. Nlerl.* ii. (1867) 206; **{* «» *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 71.—**Madag.
"-eemosa. Hook. f. & Thorns, ex Fl. Brit. Ind. i. 187 =longiracemosa.
'acemosa, *Mart. & Zucc. Nov. Gen.* i. 29. t. 20.—Bras.
*R*gnellii*, **Walp.** Ann. ii. 67 - Ionidium atropurpureum.
Xi-orea, Spreng. Syst. L 807-panicnlata.
Roxburghii, *Hook. f. & Thorns, ex FL Brit. Ind.* i. 186.—Ind. or.
" P***\

AIiSTROECUEBIA :—
Burchellii, *Baker, in Journ. Bot.* xv. (1877) 262.—Bras.
Caldasiana, Herasl. Biol. Centr. Am. Bot iii. 386=seq.
Caldasii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 288=Bomarea. Caldasiana.
caryophyllacea, *Jacq. Schoenbr.* vi. 88. t. 465.—Bias,
chilensis, *J. Cree, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 608, nomen.—Chili,
chilensis, *Lent, in Ft. des Serres, Sit.* I. i. (1845) 98.—Chili.
chiloënsis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 71.—Ins. Chiloe.
chorillensis, *Herb, in Bot. Reg.* (1848) *Misc.* 64.—Chili,
ciliata, *Poepp. Fragm. Syn.* 6.—Chili,
ci^rina, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1364-45) 264-versicolor.
coccinea, Raiz & Pay. Fl. Per. iii. 62-Bomarea coccinea.
concolor, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58 — aurantiaca.
cordifolia, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 64.—Peruv.
crispata, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 70.—Chili,
crocea, *Phil. 1. c.* xxxii. (1864-65) 268.—Chili.
croeea, Ruiz & Pav. f 1. Per. iii. 61 = Bomarea ctocea.
Cummingiana, Herb. Amar. 96, 396-versicolor.
Cunea, *Veil. Fl. Flum.* iii. t. 121; *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. 172.—Bras.
Cunha, Veil. 1. c. 181 =praec
Curtisiana, E. Mey. ex Presl, Rel. Haenk. ii. 122-A. Ligtu.
Curtisiana, Schult. f. Syst. vii. 785=caryophyllacea.
declinata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. ii. 44. t. 160 = Bomarea dispar.
densiflora, Herb, in Bot. Mag. t. 5581 = Bomarea tomentosa.
denticnlata, *Ruia & Pav. Fl. Per.* iii. 62.—Perav.
Despuenta, *Pasq. Cat. Orto Bot. Nap.* 7.—Hab.
Diazi, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864) 261.—Chili.
Ridierana, *Jaub. in Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 118. —Peruv.
distichifolia, *Ruis & Pav. Fl. Per.* iii. 60,—Peruv.
distichophylla, Spreng. Syst. ii. 80 = Bomarea distichophylla.
dulcis, Hook. Bot. Misc. ii. (1881) 287.195-Bomarea glaucescena.
edulis, Andr. ex Poir. Encyc. Snppl. iv. 848-Bomarea edulis.
Errembanltii x, *Hort. ex Lent, in Fl. des Serres, Sir.* I. iii. (1847) 262.
exserens, Meyen, Reise, i. 84 -= A. Ligtu.
Feuillaeana, E. Mey. ex Presl, Rel. Haenk. ii. = A. Ligtu.
filipendula, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 180=caryophyllacea.
fimbriata, Rniz & Pav. Fl. Per. iii. 68-Bomarea fimbriata.
flava, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 268.—Chili,
floribunda, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 288.—Ecuador.
Flos-Martini, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. 1781=A. Ligtn.
fluminensis, *M. Roem. Syn. Ensat.* 260.—Bras,
foliosa, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 740.—Bras.
formosa, Pers. Syn. i. 881 —seq.
formosissima, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. iii. 64 = Bomarea formosissima.
Gardneri, *Baker, in Journ. Bot.* xv. (1877) 261.—Bras.
Gayana, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 71.—Chili.
glaucescens, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. i. 282 = Bomarea glaucescena.
gibrioca, Cham. *8c* Schlecht in Linnaea, vi. (1881) 51 — Bomarea edulis.
grandifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 285.—Bras,
haemantha, *Ruia & Pav. Fl. Per.* iii. 60.—Chili.
Herbertiana, M. Roem. Syn. Ensat. 250 = revoluta.
hirsuta, H.B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 285 = Bomarea hirsuta.
hirtella, H. B. *8c* K. 1. c. 284 = Bomarea edulis.
hirtella, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 70.—Chili.
Hookeri, Lodd. Bot. Cab. t 1272=A. Ligtu.
Hookeriana, *C. Gay, Fl. Chil.* v. 90.—Chili.
Hooieriana, Schult. f. Syst. vii. 733 - A. Ligtu.
inaequalis, *Phil, in Linnaeu,* xxix. (1857-58) 67.—Chili,
incongpicua, *Phil. Anales Univ. Chil.* (187S) 646.—Chill
inodora, *Herb. Amar.* 90. t. 2. f. 1.—Bras,
insignis, *Annie, ex Hhincq, L'Hortic. Franç,* iv. (1854) 2.—Perav.
Isabellana, *Herb. Amar.* 88, 896. t. 6. f. 4-6.—Bras.

AIiSTROEMXIIIIA:
Jacobi, *Hort. ex Neumann, Ann. Fl. et Pomone,* (1884) t. 29.—Hab.1
Jacquesiana, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. ii. (Dec. 1846) t. 182 = Bomarea Jacquesiana.
Kingii, Phil, in Anales Univ. Chil. (1873) 648-versicolor.
Kunziana, *Klotasch, ex Kunth, Enum. PI.* v. 769.—Chili.
Iatifolia, *Ruie & Pav. Fl. Per.* iii. 64.—Peruv.
Ligra, Crantz, Inst. i. 467 = A. Ligtu.
Ligtu, Cnrt. Bot. Mag. 1.125 = caryophyllacea.
Ligtu, *Linn. Diss. Alstroem.* 10.—Chili.
lineatiflora, Lindl. Bot. Reg. (1834) t. 58= chorillensis.
lineatiflora, *Ruia (f Pav. Fl. Per.* iii. 60 t. 289.—Pernv.
linifolia, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 282 = Bomarea linifolia.
longistaminea, *Mart, in Schult. /. Syst.* vii. 739.—Bras,
longistyla, *Schenk, in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 173.—Bras.
Macraeana, *Herb. Amar.* 90.—Chili,
macrocarpa, *Ruia & Pav. Fl. Per.* iii. 63.—Pernv.
magnifica, *Herb, in Bot. Reg.* (1848) *Misc.* 64.—Chili.
Meyeniana, *J. C. Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* I. (1843) 440.—Chili.
miniata. Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brnx. x. (1843) repr. 6 = Bomarea ednlis.
montana. Ker-Gawl. in Journ. Sc *Be* Arts, ii. (1817) 188 — Ixiolirion montanum.
monticola, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 739.—Bras.
multiftora, Linn. f. Suppl. 207— Bomarea multiflora.
mutabilis, Knnze, ex Kunth, Enum. PI. v. 777 = aurantiaca.
Neilliana, Herb. Amar. 94=spathulata.
Neillii, Gill, ex Hook, in Bot. Mag. t. 3105 -praec.
•*nemorosa,* Gardn. in Bot. Mag. t. 3958 = inodora.
nivalis, Meyen, Reise, i. 315 = versicolor.
nivalis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1867-58) 69.—Chili,
nubigena, *Phil. I. c.* 67.—Chili.
Ochagavii, *Annei, ex Hhincq, L'Hortic. Franç,* iv. (1854) 2.—Chili.
oculata, Lodd. Bot. Cab. 1.1851-Bomarea Salsilla.
odorata, *Knight & Perry, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* III. 486.—Hab. ?
Oreas, *J. C. Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* I. (1843) 440.—Am. austr.
ovata, Cav. Ic. i. 54. t. 76 —Bomarea edulis.
pallens, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 265.—Chill
pallida, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. (Jul.-Oct. 1829) 344=A. Ligtu,
parvula, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 261.—Chili.
pauciflora, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Se>. I. ii. (Dec. 1846} t. 182-Bomarea Jacquesiana.
pauciflora, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 284.—N. Granat.
paupercula, *Phil. Fl. Atac.* 51.—Chili.
Pelegrina, *Linn. Diss. Alstroem.* 10; *Amoen. Acad.* vi. 247.—Peruv.; Chili.
Pelegrina, Veil. Fl. Flum. 131; iii. t 119-caryophyllacea.
peregrina, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. iii. 61-A. Pelegrina.
peruviana, Van-Houtte, Fl. des Series, xxi. (1875) 51. t. 2175 = versicolor.
plantaginea, *Mart, in Sehult.f. Syst.* vii. 737.—Bras,
platyphylla, *Baker, in Joum, Bot.* xv. (1877) 261.—Bras.
Pohliana, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 172-A. Cnnea.
Preslana, Herb. Amar. 95. t. 1. f. 48 = A. Ligtu.
Presliana, Kunth, Enum. PL v. 773 -praec
psittacina, Lehm. Cat. Hort. Hamb. (1826) ex Schult. f. SysL vii. 739 - pulehella.
puberula, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 68-versicolor.
pulehella, Hort ex Vilm. FL PL Terre, ed. II. 48-versicolor.
pulehella, *Linn./. Suppl.* 206.—Am. aostr.
pulehella, Sims, Bot. Mag. t. 2354-haemantha.
pulehella, Salisb. Prod. 248-A. Ligtu.
pulchra, *Si>ns, Bot. Mag.* t. 2421-A. Ligtu.
purpurea, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. iii. 63- Bomarea purpurea.

AIiBTAOEIfERIA :—
purpurea, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 61, 62 = Bomarea Caldasiana.
pygmaea, *Herb. Amar.* 100, 897. t 8. f. 4-13.—Peruv.
quillotensis, Herb. 1. c. 47. t. 2. f. 2=A. Pelegrina.
reclinata, *Poepp. & Endl. Gen. et Sp.* ii. 44. t 160.—Chili.
recumiens, Herb. Amar. 97. t. 3. f. 2-versicolor.
reñexa, *M. Roem. Syn. Ensat.* 252.—Chili,
revoluta, *Ruie & Pav. Fl. Per.* iii. 59.—Chili.
Riedelliana, *Andot, in Rev. Hortic. Sir.* II. iv. (1845-46) 207.—Bras.
rosea, Hook. Exot. Fl. t 181-A. Ligtu.
rosea, *Phil. Sert. Mend. Alt.* 48.—Chili,
rosea, *Ruim & Pav. Fl. Per.* iii. 61.—Perav.
rosmarinifolia, Benth. PI. Hartw. 258 - Bomarea linifolia.
rubra, *Morel, in Rev. Hortic.* Sér. IV. ii. (1853) 81. f. 5.—Bras.
Salsilla, Linn. Diss. Alstroem. 10; Amoen. Acad. vi. 247 = Bomarea Salsilla.
Salsilla, Veil. Fl. Flum. 131; iii. t. 120-Bomarea edulis.
salsilloides, *Mart, in Schult. /. Syst.* vii. 748.—Bras,
scaberula, *Baker, in Journ. Bot.* xv. (1877) 261.—Bras.
secundifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 60-Bomarea secnndifolia.
Sellowiana, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 178.—Bras.
sepium, Schott, ex Seub. 1. c. 168 = Bomarea edulis.
serieantha, J. C. Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Snppl. I. (1843) 441-spathulata.
setacea, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. iii. 62-Bomarea tomentosa.
Simsii, Spreng. Syst. ii. 80—haemantha.
Simsii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 408-A. Ligtu.
spathulata, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 122. t. 22. f. 2.—Peruv.
stenopetala, *Phil, in Anales Univ. Chil.* (1873) 547.—Chili,
stenopetala, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 174.—Bras.
subrosnlacea. *Herb. Amar.* 397. t. 5. f. 1. 2.—Chili.
tenuifolia. Herb. 1. c 94. t. 1.*1* 47-versicolor.
tigrina, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-68) 68 - versicolor.
tigrina, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 174=brasiliensis.
tomentosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 62»Bomarea tomentosa.
torta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 283-Bomarea torta.
tricolor, Hook. Exot. Fl. t. 65-A. Ligtu.
triflora, Griff. Notul. iii. 240 - Ixiolirion montanum.
umbellata, Meyen, Reise, i. 356-spathulata.
uniflora, Matth. ex Kunth, Enum. PI. v. 782-Bomarea glaucescens.
venustula, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 260.—Chili.
versicolor, *Ruia & Pav. Fl. Per.* iii. 59.—Chili,
violacea, *Knight & Perry, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 486.—Hab.?
violacea, *Phil. Fl. Atac.* 61.—Chili
viridiflora, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1872) 113.—Bras.
xanthina, Phil, in Anales Univ. Chil. (1873) 646-versicolor.
zamioides, *Baker, in Journ. Bot.*- xv. (1877) 262.—Bras.

AIiTENBTEINIA, H. B. *8z* K. Nov. Gen. et Sp. i. 332. t. 72. 73 (1816). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 692.
AA, Reichb. f. Xen. Orchid, i. 18 (1868).
MVROSMODES, Reichb. f, L c. i. 19. t. 8 (1858).
a.rgyro\epis,Benth.&-Hook.f.{in Herb.Kew.).—Ecuad.
calceata, *Reichb./. I. c.* iii. 19.—Peruv.
erosa, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 51.—Peruv.
fimbriata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 333. t 72.—Ecuad.
gymnandra, *Reichb. f. Xenia Oreh.* iii. 18.—Boliv.
inaequalis, *Reichb. 1. c.* 19.—Boliv.
Mandonii, *Reichb./. I. a*— Peruv.
marginata, *Reichb./. 1. c.* 20.—Pernv.
Matthewii, *Reichb./. 1. c.* 19.—Peruv.
nubigena, *Reichb./. I. c.* 18 in nota.—Hab. t

ALTENSTEINIA:—
paleacea, *Kunth, Syn.* **i. 326.—Ecnad.**
paludosa, *Reickb.f. Xenia Orch.* **iB. 19.—Bollv.**
pilifera, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 388. t. *TZ.*—**Ecuad.**
rostrata, *Reiehb.f. Xenia Orch.* **iii. 18.—Ecnad.**
Sceptrum, *Reiehb.f. I. c.* **i. 18.—Ecuad.**
virescens, *Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist.* xv. **(1845) 885.—N. Granat.**
Weddelliana, *Reiehb.f. Xenia Orch.* **iii. 19.—Peruv.**

ALTHAEA, Forek. Fl. Aegypt. Arab. 28 (W75). *AMARANTACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 89
ALLAGANTHERA, Mart. Hort. Erlang. 69 (1814).
ILLECEBRUM, Spreng. Anleit. ii. I. 817 (1817); Syst. i. 818 (1825).
LITHOPHILA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 14 (1788); Fl. Ind. Occ. i. 47. t. 1 (1797).
LITOPHILA, Sw. Prod. 1. c.
PITYRANTHUS, Mart, in Denks. Acad. Mnench. v. (1817) 179.
acaulis, *Anderss. Galap. Öarnes Veget.* 164.—Ins. Galap.
Achyrantha, *R. Br. Prod.* **i. 417.—Am. trop.**
Achyranthes, **Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxix =** [illegible]
albida, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) *(PI. Lorent.* 36\—Reg. Argent.
amabilis, **Hort. ex Lem. lllnst. Hortic. xv. (1868) t. S58 - Telanthera ficoidea.**
angustifolia, **Moq. in DC. Prod. xiii. H. 824=polycephala.**
•ngustifolia, *R. Br. Prod.* **i. 417.—Austral,**
•rgentata, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 852.—Porto Rico,**
•nrata, *Moq. I. c.* **353.—Am. anstr.**
***xillaris,** D. Dietr. Syst. i. 866 in syn. - spinosa.
JJauen, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. H. 354.—Austral.**
Orachiata, **Hort. ex Moq. 1. c. 304 = Aerva brachiata.**
canescens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 204.—**Lumana.**
canescens, **Moq. in DC. Prod. xiii. II. 850-Iresine canescens.**
caracasana, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 205.—**Venezuela.**
earibaea, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 354.—Ind. occ.**
celosioides, *Moq. 1. c.* **860.—Ins. Philipp.**
cthata, **Poepp. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 183= A. Achyrantha.**
decipiens, *Benth. Fl. Austral,* **v. 251.—Austral.**
tenticulata, **R. Br. Prod. i. 417=nodiflora.**
yntjculata, **Wall. Cat. n. 6922 = sessilis.**
tubta, **Hort. Paris, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 361 -sessilis?**
d»tia, **H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 209- rrommsdorffia canescens.**
***chtnata,** **Hort. Bonn, ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 48 = armata.**
'chtnata, **Sin. in Rees, Cyclop. Suppl. n. 10 = A. Achyrantha.**
«*rt«, **Reichb. in DC. Prod. iii. 375-Polycarpaea linearifolia.**
ficoidea, **R. Br. Prod. 417; Roem. & Schult. Syst. v. 565-Telanthera ficoidea.**
flcoidea, **Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 67=Telanthera maritiroa.**
ficoides, **Beauv. Fl. Owar. ii. 66. f. 1-denticulaU.**
ficoides, **Reichb. ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 857 =** [illegible]
flavescens, **H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 207 = Telanthera flavescens.**
"avescens, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 850.—N. Granat.**
"Wescens, *R. Br. ex Spreng. Syst.* **i. 819 in syn.—Am. austr.**
glabra. **Moq. in DC. Prod. xiii. II. 361=denticulata?**
gorngirenoidej, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 208.** [illegible]
hwniarioides, *Beurling, in* ***Vet. Akad.*** *Handl. Stocih.* **(1854) 148.-Panama.**
"esinoides, **H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 209- Oomphrena iresinoides.**
tomurinosa, **Moq. in DC. Prod. xiii. H. 359 = 'ladothrix lanuginosa.**
'"Ppulacea, **Schlecht. ex Moq. 1. c. »29~Cyathula globulifera.**
'ati'Mia, **Moq. 1. c. 851=Iresine latifolU.**
"Ptophylla, *Benth. Fl. Austral,* **v. 251.—Austral,**
leucantha, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 357.—Jamaic.**

ALTEBNAMTHBHA:—
littoralis, **Beauv. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 365 = maritima.**
linearis, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xii. **(1883) 107.—Porto Rico,**
longipes, *Benth. Fl. Austral,* **v. 252.—Austral,**
lupulina, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 206.—Pernv.**
maritima, *D. Dietr. Syn. PI.* **i. 867.—Bras.**
maritima, **St. Hil. Voy. Brés. ii. 43 = Telanthera maritima.**
mexicana, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. n. 352.—Mexico ?**
muscoides. *Benth. & Hook.f. Gen.* **iii. 39.—Ind. occ.**
nana, **F. Bauer, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 341 = Iresine Brownii.**
nana, *R. Br. Prod.* **i. 417.-Austral.**
nigrieeps, **Hook. Bot.Misc. ii (1831) 237-Telanthera elongata.**
nigripes, **Steud. Nom. ed. II. i. 65. (sphalm.)=praec.**
nodifera, *Griseb. in Goett. Abh.* **xxiv. (1879) 86.—Reg. Argent.**
nodiflora, *R. Br. Prod.* **i. 417.—Geront. trop.**
paniculata, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xii. **(1888) 106.—Porto Rico,**
paniculata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 208.—**Cumana.**
paronychioides, **Hort. ex Rsgel, Gartenfl. (1869) 102-= Telanthera Bettzichiana.**
paronychioides, *St. Hil. Voy. Bris.* **ii. II. 43.—Am. austr.**
parviflora, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. n. 360.—Mcxic. ?**
philoxeroides, *Griseb. in Goett. Abh.* **xxiv. (1879) 36. —Reg. Argent.**
pilosa, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 857.—Bras,**
polycephala, *Benth. Fl. Austral,* **v. 251.—Austral.**
polygonoides, **R. Br. Prod. 417=Telanthera polygonoides.**
praelonga, **St. Hil. Voy. Brés. ii. II. 409 = Telanthera praelonga.**
procumbens, *Roem. & Schult. Syst.* **v. 564.—Bras.**
prostrata, **D. Don, Prod. Fl. Nep. 76=sessilis.**
puberula, **D. Dietr. Syn. PI. i. 866 •* Telanthera puberula.**
pubescens, **Hort. Prag. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 803 = Aervalanata.**
pulchella, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 205.—**Bras.**
pulverulenta, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 351.—Peruv.**
pungens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 206.—Bras.**
purpurea, **Hort. ex Pynaert, in Rev. Hortic. Beige, v. (1879) 25 - Telanlhera versicolor.**
radicata, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 262. **—Ins. Galapag.**
repens, **Steud. Nom. ed. I. 34=sessilis.**
repent, **Steud. 1. c. ed. II. i. 65=A. Achyrantha.**
Richardi, **Moq. in DC. Prod. xiii. II. 853—Iresine interrupta.**
rufa, **D. Dietr. Syn. PI. i. 866 = Telanthera rnfa.**
sericea, *H. B.* **to"** *K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 207.—Ecuad.**
sessilis, **Lem. Illustr. Hortic. (1865) t. 447-Telanthera amoena.**
sessilis, *R. Br. Prod.* **i. 417.—Reg. trop.**
sibirica, *Steud. Nom.* **ed. II. i. 66.—Sibir.**
spathulata, **Lem. Illustr. Hortic. xii. (186S) t 445- Telanthera ficoidea.**
spinosa, *Roem. & Schult. Syst.* **v. 555.—Am. trop.**
strigosa, *Hassk. in Horn. & De Vriese, Tijdschr.* v. **(1888-39) 259.—Malaya ?**
subscaposa, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) **189.—Ins. Galap.**
suffruticosa, *Torr. in Emory, Mex. Bound. Sun.* 181. **—N. Mexico.**
tenella, **Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxiii. (1829) 131. t. 9—Telanthera polygonoides.**
tenella, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 866.—Hab. I**
tomentella, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* **v. I. 186,—Bras.**
triandra, **Steud. Nom. ed. I. S3, 84 = Telanthera ficoidea.**
triandra, **Lam. Encyc. i. 95-sessilis.**
trnxillensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 206.— Peruv.**
versicolor, **Hort. ex Regel, Gartenfl. (1869) 101- Telanthera versicolor.**
villiflora, *Scheele, in Linnaea,* **xxii. (1849) 149.—Texas.**
villosa, **D. Dietr. Syn. PL i. 867 - Brandesin villosa.**
villosa, **H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 208 = Telanthera villosa.**
villosa, *Sm. in Rees, Cycl. Suppl.* n. 9.—H.ab. T
virgata, **Spreng. ex Moq. in DC. Prod. xiii. H. 864- Telanthera polygonoides.**

ALTERNASEMINA, Silva Manso, Enum. 36 (1836)- Cayaponia, Mart. (Cucurb.).
Tayuia, Silva Manso, 1. c. = C. Tayuya.

ALTHAEA, [Touro.] Linn. Syst. ed. I (1735). *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 200.
ALCEA, [Tourn.] Linn. Gen. ed. I. 206 (1737).
FERBERIA, Scop. Introd. 281 (1777).
acaulu, *Cav. Diss.* **ii. t. 27.1 3 (p. 93).—Syria.**
aegyptiaca, **Boiss. Diagn. Ser. II. i. 108 = lavateraeflora.**
africana, *Lam. ex G. Don, Gen. Syst.* **i. 467.—Afr. or.**
ambigua, **Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 2SU = Lavatera thuringiaca.**
apterocarpa, *Fensl, in Del. Sem. Hort. Vind.* (1858) **4.—Oriens.**
arborea, **Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 260 = Lavatera arborea.**
armeniaci, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1837) 1. **—Oriens.**
atropurpurea, **Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862 > 261=Malva atropurpurea.**
Aucheri,£«»,». *Diagn.* **Ser. I. vi. 28.—Persia; Afighai).**
borbonica, *DC. Prod.* **i. 438 (=Pavonia?).—Ins. Bor- bon.**
iorealis, **Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 261 = Malva borealis.**
Burchellii, **DC. Prod. i. 438=Pavonia Columella.**
Calverti, *Boiss. Diagn.* **Ser. II. v. 66.—Armenia,**
cannabina, *Linn. Sp. PI.* **686.—Europ.; Oriens.**
caribaea, **Sims, Bot. Mag. t. 1916=rosea.**
chinensis, **Wall. Cat n. 2689=rosea.**
coromandelina, **Cav. Diss. ii. 93-rosea.**
corymbosa, **Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 101-Pavonia paniculata.**
cretica, **Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 171=rosea.**
crispa, **Ale£ in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 261 = Malva crispa.**
digitata, **Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 106 - lavateraeflora.**
ficifolia, *Cav. Diss.* **ii. 92. t. 28. f. 2.—Sibir.**
ficifolia, **Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 663=rosea.**
flavo-virens, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mim. Svc. Nat. Mosc.* **xii. (1860) 44.—Sibir. baical.**
flexuosa, **Sims, Bot. Mag. t. 892 = rosea.**
Froloviana, *Fisch. ex G. Don, Gen. Syst.* **i. 467.—Sibir.**
Frutex, **Hort. ex Mill. Gard. Diet. ed. VIII - Hibiscus syriacus.**
garipensis, **E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 168 = Ludwigii.**
gariepina, **E. Mey. ex Boiss. Fl. Orient, i. 824 = praeu.**
glabnflora, *Ledeb. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 80.— **Sibir.**
Godroni, **Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 261 = Malva ambigua.**
grandiflora, **Scop. Del. Insub. ii. 33 = Hibiscus rostus,**
Heldreichii, *Boiss. Diagn.* **Ser. II. i. 103.—Thessal.**
hirsuta, *Linn. Sp. PI.* **687.—Europ.; Oriens.**
hirsuta, **Sieber, ex Stend. Nom. ed. II. i. 66=Malva cretica.**
hispida, **Moench, Meth. 612 « hirsuta.**
Hohenackeri,5oiss. &> Huet, Diagn. **Ser. II. v. 67.— Oriens.**
indica, **Steud. Nom. ed. II. i. 66.—Java.**
Jrolowiana, **Steud. 1. c. sphalm. = Froloviana.**
kirrindensis, **Boiss. Diagn. Ser. II. v. 67=lavateraeflora.**
Kotschyi, **Boiss. 1. c. Ser. II. i. 102=cannabina.**
Kraussiana, **Buching. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1844) 293 = Pavonia Kraussiana.**
knrdica, *Schlecht. in Linnaea,* **xvii. (1843) 127.— Oriens.**
laevis, **Moench, Meth. Suppl. 199 = Ludwigii.**
lavateraeflora, *DC. Prod.* **i. 437.—Oriens.**
laxiflora, *A. DC. ex Schlecht.in Bot. Zeit.* vi. (1848) **341.—Hab.?**
leucantha, **Fisch. ex Loud. Hort. Brit. 287-nudiflora.**
liladna, **Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i. 881 =apterocarpa.**
longiflora, **Boiss. & Rent. Diagn. PI. Hispan. 3- hirsuta.**
Ludwigii, *Linn. Mant.* **98.—Oriens; Afr. bor. et austr.**
mareotica, **Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 261=Malva mareotica.**
mauritiana, **Alef. 1. c. 260=Malva mauritiana.**
meonantha, **Link, in Linnaea, ix. (1834) 686-rosea.**
mexicana, *Kun»e, I. c.* **xx. (1847) 61, 404.—Mexic.**
microcarpa, **Alef. in Oestr. Bot Zeitschr. xii. (1862) 261-Malva parviflora.**
multiflma, **Reichb. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1867) 36=anneniaca.**

ALTHAEA:—
mutica, J. Gay, ex Ball, in Joum. Linn. Soc xvi. (187b) 376 = hirsnta.
narbonensis, Jacq. Coll. ii. 275 = cannabina.
narbonnemis, *Pouty. ex Cav. Diss.* ii. 94. t 29. f. 2.—Enrop.
nicaeensis, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 261 = Malva nicaeensis.
nudiflora, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vii. (1830) 251.—Sibir. altaic.
officinalis, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 686.—Europ.; Oriens.
pallida, *Wald.&Kit. PI. Rar. Hung.* t. 47.—Hnngar.; Turc.
parviflora, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 261 = Malva parviflora.
plebeia, Schnlt. ex Steud. Norn. ed. II. i. 68=Lavatera plebeia.
pnlchra, *Klottsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Seise,* 112.—Ind. or.
racemosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 102=Pavonia racemosa.
remotiflora, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 108.—As. Min.
rhyticarpa, Trautv. in Bull. Soc. Nat. Most (1860) I. 464=sulphurea.
rosea, *Cav. Diss.* ii. 91. t. 29. f. 3.—Oriens.
rosea, Hohen. ex Boiss. Diagn. Ser. I. v. 67-Hohenackeri.
rnfescens, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 102.—Syria,
setosa, *Boiss. I. c.* Ser. I. viii. 107.—Syria.
Sieberi, *Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 486.—Sicilia.
sinensis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 652 - rosea.
sinensis, *Cav. Diss.* ii. t. 29. f. 3.—China,
speciosa, *Vis. Cat. Orto Bot. Padov.* 132.—Hab.!
spicata, Spreng. Syst. iii. 108 - Hibiscus spicatus.
striaU, *DC. Prod.* i. 437.—Arab.
sublobata, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 530 = officinalis.
sulphurea, *Boiss. & Hohen. Diagn.* Ser. I. viii. 108.—Persia; Afighan.; Soongar.
sylvestris, *Briganti, ex Tenore, Sytl.* 540.—Italia.
tabrisiana, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat Mosc xii. (1860) 44=ficifolia.
taurinensis, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc 2O7=armeniaca.
taurinensis, DC. Prod. i. 436 - officinalis.
thuringiaca, Kuntze, Taschen-Fl. Leipz. 212=Lavatera thuringiaca.
Tournefortiana, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) 9__Creta.
ulmifolia, Pritzel, Ic. Ind. 50-Sida glomerata.
verticillata, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 261 = Malva verticillata.
vulgaris, Alef. 1. c 260 = Malva vulgaris.

ALTHEA, Crantz, Stirp. Aurtr. 144 (1769)=praec.

ALTHENTA, Petit, in Ann. Sc. Observ. L (1829) 451.
NA/ADACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1016.
Barraudoniù Duval-Jouve, in BulL Soc. Bot. Fr. xix. (1872) p. lxxxix; Compt-rend. lxxv. (1872) 95= filiformis.
filiformis, *Petit, in Ann. Sc. Observ.* i. (1829) 451.—Gallia.
setacea, Delile, ex Petit, 1. c.=filiformis.

ALTHERIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 19 (1809) = Meloehia, Linn. (Stercul.).
madagascariensis, DC. Prod. i. 498.—Madag.

ALTHINGIA, Steud. Norn. ed. II. i. 66 (1840) -seq.

ALTINGIA, [G. Don, in] Loud. Hort. Brit 408 (1830) =Arauoaria, Joss. (Conif.).
Cunninghamii, [G. Don,J 1. a = Ar. Cunninghamii.
excelsa, [G. Don,] 1. c.= Ar. excelsa.

ALTINOIA, Noronha, in Verh. Bat. Gen. v. (1785) Art. ii. 9 ; ed. II. 41. *HAMAMELIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 669.
SBDGWICKIA, Griff, in As. Res. xix. (1836) 98. t. 15.
chinensis, Oliver, ex Hance, in Joum. Linn. Soc. xiii. (1873) 103.—China.
caerulea, Poir. Encyc. Suppl. y. 545-LiquidambaT Altingia.
excelsa, *Noronha, in Verh. Bat. Gen.* v. ed. II. 41 (1827).—Malaya.

ALTORA, Adans. Fam. ii. 856 (176S)=Cluytia, Linn. (Euphorb.).

ALUGHAS, Linn. Fl. Zeyl. 207 (1747)=Alpinia, Linn. (Scitam.).

ALVABADOA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 100. *SAPINDACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 411.
amorphoides, *Liebm. I. c.* 101.—Mexic.
arborescens, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 50.—Cuba,
jamaicensis, *Benth. PI. Hartw.* 344.—Jamaica,
mexicana, *Liebm. ex Benth. I. c*—Mexic

ALVARDIA, Fenzl, in Flora, xivii. (1844) 312=Peucedanum, Linn. (Umbellif.).
arborescens, Fenzl, 1. c.=P. fraxinifolium.

ALVAREZIA, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 465 (1847) =Blechum, R. Br. (Acanth.).
disticha, Pav. ex Nees, 1. c. 246—Lophostachys ,Alvarezia.
parviflora, Pav. ex Nees, 1. c. 466 = B. Linnaei.

ALVESIA, Welw. Apont. 587. n. 47 (1858)=Bauhlnia, Linn. (Legum.).
bauhinioides, Welw. 1. c—B. tomentosa.

ALVESIA, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 55. 1.19. *LABIATAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1176.
rosmarinifolia, *Welw. 1. c.*—Afr. trop.

ALVISIA, Lindl. Fol. Orch. (1859)=Eria, lindl. (Orchid.).
tenuis, Lindl. 1. C.-E. articnlata.

ALYCIA, WiUd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 66 (1840) = Erioehloa, H. B. *Sc* K. (Gramin.).
coarctata, Willd. ex Stend. 1. c.=E. polystachya.
distachia, Willd. ex Steud. 1. c = E. polystachya.

ALYMERIA, D. Dietr. Syn. i. in Ind. p. xiii (1839) = AYLMERIA, Mart. = Polycarpaea, Lam. (Caryoph.).

ALYMNIA, Neck. Elem. i. 31 (1790)=Polymnia, Linn. (Compos.).

ALYOGYNE, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 12 -Fugosia, Juss. (Malvac).
hakeifolia, Alef. 1. c.=F. hakeaefolia.

ALYPUM, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 19 = Globularia, Toura. (Selagin.).
monspeliensium,¥oMTT. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S-xvii. (1869) 142.—G. Alypum.
salicifolium, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 19 = G. Alypum.
Solandri, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 873 - G. Alypum.

ALYSICARPTJS, Neck. Elem. ML 15 (1790); Desv. Joum. Bot i. (1813) 120. t. 4. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 522.
FABRICIA, Scop. Introd. 807 (1777).
HALLIA, J. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (Dec. 1813)192.
HEGETSCHWEILERA, Heer *Sc* Regel, Cat. Sem. Hort. Turic. (1842); ex Bot. Zeit. i. (1848) 47.
MYSICARPUS, Webb, in Hook. Niger Fl. 122 (1849) lapsu.
belgaumensis, *Wight, Ic.* t. 92.—Ind. or.
bupleuri/olius, Wall. Cat. n. 5761=rugosus.
bupleurifolius, *DC. Prod,* it 352.—Ind. or.
cylindricus, Desv. in Ann. Linn. Soc. Par. iy. (1826) 801 = styracifolras.
diversifolius, Wall. Cat. n. 6772-vaginalis.
ferrugineus, *Hochst. G* Steud. ex A. Rich Tent. Fl. Abyss, i.* 207.—Abyss.
glaber, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 126—rugosus.
glumaceus, *DC. Prod.* ii. 853.—Arab.
glumaceus, Wall. Cat.n. 5764=rugo»us.
gracilis, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 170 — bupleurifolius.
gramineus, *Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Ind.* iii. (1846) 69, nomen.—Malaya,
hamosus, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 171.—Ind. or.
Harnieri, Scheinf. Reliq. Kotschy, 24. t. 19=vaginalis. >
heterophyllus, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit Ind.il 168-vaginalis.

ALYSICABPtrS:—
Heyneanus, Wight & Am. Prod. i. 284=rugosas.
Hochstetteri, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 209 = rugosus.
longifolius, *Wight & Am. Prod. i.* 233.—Ind. or.
ludens, Wall. Cat n. 5762 = bupleurifolius, rugosus.
lupulinus, Stocks, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 159=rugosus.
monilifer, *DC. Prod.* ii. 358.—Ind. or.; Afr. trop.
nummularifolius, DC. 1. c.=vaginalis.
nummularioides, Zipp. ex Span, in Iinnaea, xv. (1841) 194=scaber.
nummularius, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1884) 432 = vaginalis.
obovatus, Edgew. in Joum. As. Soc. Beng. xxi. (1858) 169= rugosus.
paradoxus, *Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1884) 432.—Madag.
parviflorus, Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (18511 211 = Desmodium parviflorum.
pilifera, Wall. Cat. n. 6765=rugosus.
porrectus, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* il. 171.—Afr. trop.
pubescens, *Law, in Wight, Ic. i.* t. 250.—Ind. or.
pylifer, Steud. Nom. ed. II. i. 66-rugosus.
quadrangularis, Edgew. ex Baker, in Hook, f Fl. Brit. Ind. ii. 159=tetragonolobns.
Quartinianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 208 = rugosus.
racemosus, Benth. in Iinnaea, xxiv. (1851) 642 = belgaumensis.
rotundifolius, Dalz. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 172 = Desmodium rotundifoliutn.
rotundifolius, Wight, ex Hook. f. I. c. 157=hamosus.
Rubibarna, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6771 = vaginalis, monilifera.
mgosus, *DC. Prod.* ii. 353.—Reg. trop.
rapicola, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 170.—Ind. or.
scaber, *Span, in Linnaea.* xv. (1841) 194.—Malaya.
scariosus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6766 = rugosns.
spicatus, Royle, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 159 = longifolius.
styracifolius, DC. Prod. ii. 353 = rugosus.
tetragonolobus, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1863) 169.—Ind. or.
timorensis, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 194.—Ins. Timor.
trifoliatus. Stocks, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 158 = vaginalis.
vaginalis, *DC. Prod.* ii. 353.—Ind. or.
vaginalis, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 170=monilifer.
vaginalis, Wall. Cat. n. 6763= longifolius, rugosus.
varius, Wall. 1. c. n. 5768=vaginalis.
Wallichii, Wight & Am. Prod. i. 234=rugosus.
Zeyheri, *Hani, in Harv. &• Sond. Fl. Cap.* ii. 230.—Afr. austr.

ALYSSOIDES, Toum. ex Adans. Fam. ii. 419 (1763) = Vesicaria, Lam. (Crucif.).
creticum, Medic. Phil. Bot. i. 189 = Alyssum creticum.
gemonense, Medic. 1. c. = Alyssum geraoaense.
leucoifolium, Medic. Pflanzeng. 68 = V. graecaT
sinuatum, Medic Phil. Bot. i. 189=Alyssum sinnatum.
tomentosum, Moench, Meth. 264=Alyssum creticum.
utriculatum, Medic. Phil. Bot. 189=V. graeca.

ALYSSOP8IS, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 14 (1842). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 74.
deflexa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 58.—Persia.
Drumondii, Tnrcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 291 = Sisymbrium brachypodum.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 14.—Persia.
sagittata, Boiss. Fl. Orient, i. 182=deflexum.

ALYSSOPSIS, Reichb. Nom. 181. n. 6961 (1841)-Vesiearia, Lam. (Crucif.).

ALYSSON, Crantz, Stirp. Anstr. ed. II. 15 (1789)=seq.

ALYSSUM, Toum, ex Linn. Syst. ed. I. (1735). *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 73.
ADUSETA, Adans. Fam. ii. 420 (1763).
ANODONTEA, G. Don, Gen. Syst. i. 180 (1831).
AURINIA, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 162.
BERTEROA, DC. Syst. ii. 290 (1821).

ALY8STJM:-
GLYCE, Lindl. Syn. Brit. Fl. 26 (1828).
KONIG, Adans. Fam. ii. 420 (1763).
KONIGA, R, Br. in Denb.. Clapp. *Sc* Ond. Voy. App. 2H (1826).
LOBOIARIA, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 162.
MENIOCUS, Desv. 1. c. 178.
MOENCHIA, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 278 (1788).
OCTADEHIA, R. Br. ex Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 41 (1836).
ODQNTARRHENA, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 68 (1881).
ONODONTEA, G. Don, Gen. Syst 1. 148 (1831), sphalm.
PSILONEMA, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt iii. 50 (1831).
PTILOTWCHUM, C. A. Mey. 1. c. 64 (1881).
ScmvEMCKIA, Andrz. ex DC. Syst. ii. 800 (1821).
STEVENA, Andre, ex DC. Syst. ii. 291 (1821).
affine, Tenore, Syll. 815 = orientale.
aU°¡2es- ** »• »» A»«- *Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 1*3.—Armenia.
««««<:«««, Schlecht ex DC. Syst.ii. 809, et Prod. i. 162 =montanum.
algeriense, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 232.—Afr. bor.
alpestre, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 102, Suppl.482- "larschallianum.
alpestre, *linn. Mant.* 92.—Europ.
alpestre, Wnlf. ex Nym. Consp. 56=montanum.
alpestre, Salis, in Flora, xvii. (1877) H. Beibl. 77- Koberbanum.
alpestre, Sibth. ft Sm. Fl. Graec. t. 623-argenteum.
alpinum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 9=montanum.
alsinefolium. Host, Fl. Austr. ii. 248=calydnum.
altaicum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt iii. 55 = i'lscheriannjn.
alyssoides, Linn. Syst. ed. X. 1180 - calydnnm.
andmnm, *R,pr. Fl. Caucas.* 103.—Reg. Caucas.
<".\c]ticum, Wormsk. ex Vahl, in Fl. Dan. t 1520 = Vesicaria arctica.
arenarium, Loisel, Fl. Gallica, ed. I. 401-montannm.
arenarium, *Presl, Fl. Sic.* i. 58.—Sicilia.
"gentemn, *Vitm. Summ.* iv. 30.—Europ.; Oriens.
"(tyrophyllum, *Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 229.—As. Min.
annenum, *Boiss. Fl. Orient*, i. 278.—Armenia.
arvaticum, Jord. Diag. i. '200-calycinum.
atlanticum, Desf. Fl. Atlant. ii. 71. t. 149=montanum.
Aucheri, Boiss. in Ann. Sc Nat Ser. II. xvii. (1842) 156=foliosnm.
aurantiacum, *Bela. Fl. Orient*, i. 276.—Lyda.
aureum, *Boiss. I. e.* 286.—Oriens.
"ertholonii, Desv. Jonm. Bot. iii. (1814) 172* 185 = argenteum.
«>seri, *Stev. ex DC. Syst.* ii. 800=podolicnm.
"eugesiacum, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 10=montanum.
oidentatum, Nutt. ex Ton. *Sc* Gray, Fl. N. Am. *1*108 -Draba brachycarpa.
Bilimekii, *Will*, in Willk. # Unge, Prod.* iii. 830.- Hispan.
'rachystackyum, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. iii. 484= nmbellatum.
"apeatum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 77 sphalm.= Acanthophyllnm bracteatnm.
oracleatmn, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. See. Nat. Mosc.* xii. (I860) 18.—Persia; Armenia.
ir°»ifolium, Jord. *Sc* Fouir. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 11 .mofttamun.
°pgantiacum, Jord. *Sc* Fomr. 1. c: 12-monUnum.
«»ngei, *Boiss. Fl. Orient*, i. 274.—Persia.
coltnnum, Neck. Delic. Gallc-Belg. i. 277-calycmum.
eallickroum, Boiss. Diagn. Ser. IL v. 84-constellatum.
calyninum, Haensel. ex Nym. Consp. 56-campestre.
wycinum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 908.—Europ.; Oriens.
'alycinum, Pall, ex DC. Syst. ii. 818-dasycarpum.
«l/ocarpnm, *Rupr. Fl. Cauc.* 103, in textu.—Tauria.
camfiestre, Hoffm. FL Dentsehl. ed. II. ü. 48=calycmnm.
campestre, *Linn. Syst.* ed. X. 1180.—Europ.; Oriens.
campestre, Man. ex PolL Fl. Ver. ii. S62=montanum.
canariense, Del. ex Webb *Sc* Berth. Phyt Canar. i. 91 ••lybicum.
"ndidum, Schlecht ex DC. Syst. H. 308-Marschaluanum.
e-wscens, *DC. Syst.* H. 82a.-Sibir.; Reg. Himal.

ALiTSSUM:—
cassium, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. L viii. 34.—Syria.
castellanum, Bourg. ex Nym. Consp. 57 - serpyllifolium.
cedrorum, Schott *Sc* Kotschy, in Oestr. Bot Wochenbl. iv. (1864) 169=hirsutum.
Cephalotes, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 34.—Caria.
chalddicum, *Jania, in Oestr. Bot. Zeitsekr.* xxii. (1872) 176.—Turcia.
eheiranthifolium, Willd. Sp. PI. iii. 468»Farsetia clypeata.
cheiri/olium, Berger. ex Steud. Nom. ed. I. 84 = saxatile.
ehrysanthum, Boiss. Fl. Orient, i. 271=argenteum.
citiatum, Lam. Fl. Fr. ii. 479=Draba aizoides.
cilicicum, *Boiss. & Bal. Diagn.* Ser. II. v. 84.—Cilicia.
Clausonis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 236.—Afr. bor.
clypeatum. Linn. Sp. PI. ed. I. 651 = Farsetia clypeata.
cochlearioides. Roth, Nov. PI. Sp. 322=Cochlearia flava.
cochleatum, *Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 11.—Afr. bor.
cdlirmm, Brot. Phyt. Lusit. ii. 209.1.180-campestre.
collinum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 9 = montamim.
compactum, *De Not. ex Ces. Ic. Stirp. Ital.* fasc. iii. 16. t. 6.—Sidlia.
condensatum, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* i. 268.—As. Min.; Syria.
confertum, Hort. Berol. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér, II. xvii. (1842) 155=strictum.
constellatum, *Boiss. 1. c.* Sér. IV. ii. (1854) 244.—Cilida.
contemptum, Schott *Sc* Kotschy, in Oestr. Bot Wochenbl. iv. (1854) 177 - Szowitsianum.
cordatum, Sprang, ex Steud. Nom. ed. II. i. 67 = obcordatum.
cornutum, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 139 = rostratum.
corsicum, *Duty, Bot. Gall.* ed. II. i. 84.—Corsica.
corsicum, Rob. ex Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. i. 117 = Robertianum.
enrymbosum, *Boiss. Fl. Orient*, i. 265.—Tnrc.
corymbulosum, Boiss. 1. c. 282=umbellatum.
crennlatum, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 33.—Syria,
cretaceum, *Adams, in Mim. Soc. Nat. Mosc.* v. (1817) 109.—Sibir.
creticum, *Linn. Sp. PI.* 661.—Creta.
cryptopetalum, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga*, i. (1847) 142 ; *Lehm. Rel.* (1847) 142 = marginatum.
cuneifolium, Tenore, Fl. Nap. Prod, xxxvii. App.; Cat. Neap. (1815) 68=montannm.
dagestanicum, *Rupr. Fl. Caucas.* 104.—Caucas.
dahuricum, Schlecht ex DC. Syst ii. 715-canescens.
damascenum, *Boiss. & Gaill. Diagn.* Ser. II. vi. 38. -Syria,
dasycarpnm, *Steph. in Willd. Sp. PI.* iii. 469.—Oriens; Turkest; Affghan.
dauricum, Schlecht. in DC. Syst. ii. 322, & Prod. i. 164=canescens.
davuricum, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 138 - Fischeriantun.
decoloratum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 236.—Afr. bor.
decumbens, Herbich, Stirp. Rar. Bncov. 47=repens.
deltoideum, Linn. Sp. PI. ed. II. 908=Aubrietia deltoidea.
densiflorum, Desf. Cor. Tonrn. 65. t. 48=strictum.
dentatum, Nutt. Gen. Am. ii. 63=Draba ramosissima.
dentatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 671=Camelina sativa.
dicranoides, Boist *Sc* Huet, Diagn. Ser. II. v. 30 = Draba rigida.
diffusum, Jord. *Sc* Fourr. ex Nym. Consp. 57=argenteum.
diffusum, Tenore, App. Hort. Neap. (1815) 58 = montanum.
Draba, Bieb. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 672 = linifolium.
Draba, Hort ex Webb *Sc* Berth. Phyt Canar. i. 91 = lybicnm.
Draba, Willd. Enum. Hort. Berol. 672=hirsutnm.
dubium, Bory, in Ann. Gen. Soc. Phys. iii. (1820) 4 = Lagascae.
edentulum, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hung. i. 95. t. 92 —gemonense.

ALYSSUM:—
datum, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. S3—As. Min.
emarginatum, *Zahl. ex Vis. Ft. Dalm.* iii. 117.—Dalmat.
erigens, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 9 - montanum.
eriocarpum, Pourr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 67 = Clypeola eriocarpa.
eriop'horum, Willd. Enum. Hort. Berol. 671=Clypeola eriophora.
eriophyllum, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient*, i. 273.—As. Min.
erosulum, Genn. *Sc* Pestal. ex Clem, in Mem. Ace. Sc. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 248-suffrutescens.
erraticum, Jord. Diag. i. 200=celycinum.
filifolinm, *Waklenb. in /sis*, xxi. 998.—As. Min.
Fischerianum, *DC. Syst.* ii. 311.—Sibir.
fiexicaule, Jord. Obs. PI. Crit. i. (1846) 10-montanum.
floribundnm, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 33.—Cilida.
foliosum, *Bory & Ckaub. Nouv. Fl. Pilop.* 42 n. 1030.—Graecia; As. Min.
fruticulosum, Steud. Nom. ed. I. 84 = Vesicaria fruticulosa.
fulvescens, *Sibth. & Sm. Prod. Fl. Graec.* ii. 18.—Graecia; As. Min.
gemonense, *Linn. Mant.* 92.—Europ.
gemonense, Roth, Tent. Fl. Germ. iii. 85 (err. glemonense)» saxatile.
globosum, Steud. Nom. ed. I. 84-= Vesicaria globosa.
glomeratum, *Burch. ex DC. Syst.* ii. 316.—Afr. austr.
Gmelini, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 8 = montanum.
gnapkalodes, DC. Syst. ii. 311 = Vesicaria gnaphalodes.
gradle, *Safin, in Am. Monthly Mag.* (1811) 856, nomen.—Hab. *1*
granatense, Boiss. *Sc* Rent.Pugill. PI. Nov. (1852) 9 = calycinum.
granatense, Nym. Consp. 57 = serpyllifolium.
kalimifolium, DC. Fl. Fr. v. 594=pyrenaicum.
halimifolium, Lap. Hist. Abr. PI. Pyr. 371=macrocarpum.
halimifolium, Linn. Sp. PI. ed. I. 650=maritimum.
kalimifolium, Pall. Reise, iii. 161 = lenense.
halimifolium. *Willd. Sp. PI.* iii. 460.—Europ.
Hdderi, *Kroct. Fl. Sil. Suppl.il.* 168.—Europ.
Haussknechtii, *Boiss. Fl. Orient*, i. 269.—As. Min.
Heinzi, *Ullep. in Oestr. Bot. Zeitsekr.* xxxv. (1885) 307.—Europ.
helianthemifolinm, *Timb. & Jeanb. in Rev. Bot. Soc. Fr.* iii. (1884-85) 105.—Gallia.
keteropkyllum, Rniz *Sc* Pav. ex DC. Syst. ii. 642 = Lepidium perfoliatum.
heterotricbum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 15.—Persia.,
hirsutum, Bess, ex Nym. Consp. 56 =« rostratum.
hirsutnm, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 106.—Oriens.
hirsutum, Hohen. Enum. Elisabethpol. 243 = campestre.
homalocarpnm, *Boiss. Fl. Orient. I* 285.—Arabia.
korebicum, Boiss. in Ann. Sc Nat Ser. II. xvii. (1842) 156=homalocarpum.
Huetii, *Boiss. Fl. Orient*, i. 287.—As. Min.
hyperboreum, *Linn. Sp. PI.* 651.—Am. bor.
idaeum, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 85.—Creta.
illyricum, Willd. Enum. Suppl. 44=linifolium.
imbricatum, Schlecht ex DC. Syst ii. 808, & Prod. i. 161=canescens.
incanum, *Linn. Sp. PI.* 650.—Europ.; Sibir.
Jontklaspi, [Clairv.] Man. Herb. 216 = Clypeola Jonthlaspi.
Kotschyanum, Boiss. Fl. Orient i. 270-masmenaeum.
Lagascae, *Janka, in Termés*. Fiiuetek*, vii. (1883; 114.—Europ.
lanigerum, *DC. Syst.* ii. 808.—Persia.
lanuginosum, Pourr. ex DC. Syst. ii. 327=Clypeola eriophora.
Lapeyrousianum, *Jord. Obs. PI. Crit. I* (1846) 3 = Mont Pyren.
latifolium, *Vis. Ft. Dalm.* iii. 118.—Dalmat.
leiocarpum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 235.—Afr. bor.
lenense, *Adams, in Mtm. Soc. Nat. Mosc.* v. (1817) 110.—Sibir.
lepidotum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 73.—As. Min.
Lescorii, *A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. V. 72.—Am. bor.

AITTSSTJM :—
leucadenm, *Guss. PI. Rar.* 268.—Ital.
libycum, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 467.—Afr. bor.
linearifolium, Lag. Gen. et Sp. Nov. 19=linifolium.
linifolium, *Steph. ex Willd. Sp. PI.* iii. 467.—Enrop.; Oriens.
litorale, *Rupr. Fl. Cauc.* 108. in textu.—Littora Maris Bait,
longicaule, *Boiss. in Bibl. Geniv.* (1838) 407.—Hispan.
ludovicianum, Nutt Gen. Am. ii. 68-Vesicaria ludoviciana.
lunarioid.es, Spreng. ex DC. Syst. ii. 292 = mutabile.
lunarioides, Willd. Sp. PI. iii. 461 = Farsetia lunarioides.
lusitanicutn, Brot ex Njrm. Consp. 58 —campestre.
luteolum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ail.* 284.—Afr. bor.
macrocalyx, *Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. FT.* iv. (1857) 12.—Afr. bor.
macrocarpum, *DC. Syst.* ii. 821.—Gall. austT.
macropodum, *Boiss. & Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 18.—Cappadoc.
macrostylum, *Boiss. & Huet, ex Boiss. Fl. Orient,* i. 279.—As. Min.
marginatum, *Steud. Norn,* ed. II. i. 68 *{ex Boiss. in Ann. Sc. Nat.* xvii. (1842) 157).—Arab.; Persia; Affghan.
marginatnm, *Timb. & Veant. in Rev. Bot. Soc. Fr.* iii. (1884-85) 106.—Galtia.
maritimum, *Lam. Encyc.* i. 98.—Europ.
Marschallianum, *Andr*. ex DC. Syst.* ii. 308.—Caucas.
masmenneum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 36.—Cappadoc
medium. Host, Fl. Austr. ii. 244-gemonense.
meniocoides, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 158.—Mesopot
mesopotamicum, Fenzl, in Tchichat. Asie Min. Bot. i. 311=argenteum.
Meyerianum, Rupr. FL Cauc. 100, in textu=tortuosum*
micranthum, Fisch. & Mey. in Linnaea, x. (1886) 88 — campestre.
microcarpon, Vis. Fl. Dalmat. iii. 115 — corymbosnm.
microcarpum, Neilr. ex Nym. Consp. 55—gemonense.
microcephalum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 77, sphalm. — Acanthophyllum microcepfaalmn.
micropetalum, Fisch. in DC. Syst. ii. 818 = campestre.
micropetalum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 497.—Europ.
microphyllum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 68.—Sibir. alt.
minimum, Linn. Sp. PI. 651 = maritimum.
minimum, Pall. Reise, ii. 741 = linifolium.
minimum, *Willd. Sp. PI.* iii. 464.—Europ.; Oriens; Reg. Himal.
minutiflorum, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 73 = alpestre.
minutulum, Schleich. ex DC. Syst. ii. 807-alpestre.
minutum, Patr. ex DC. 1. c. 322—canescens.
minutum, *Schlecht. ex DC. 1. c.* 316.—Sibir.
modestum, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 17 = minutum.
montanum, Brot. Fl. Lusit. ii. 668 = campestre.
montanum, *Linn. Sp. PI.* 660.—Europ.; Oriens.
montanum, Pall. Reise, i. 252 = Fischerianum.
montanum, Patr. ex DC. Syst. ii. 322—canescens.
mouradicum, *Boiss. & Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 16.—As. Min.
Muellerii, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 16.—Armenia; Persia.
murale, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 103—alpestre.
murale, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. i. 6. t. 6 = argentenm.
mrtrciçum, Jord. ex Nym. Consp. 57 = serpyllifolium.
muricatnm, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (li>63) 498.—Europ.
mutabife, *Vent. Jard. Cels,* 85.—Ital.
myagroides, All. Fl. Pedem. i. 241—Graellsia saxatili•
Myag^um, Wibel, Prim. FL Werth. 204-Camelina sativa.
nanum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 236.—Afr. bor.
nebrodense, Tineo, Pugill. Fl. Sic. 12-serpyllifolium.
novum, Kit. Ind. Pesth, t. 6-alpestre.
nmnidicnm, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 377.—Afr. bor.
obcordatum, *DC. Syst.* il. 824.—Hab.»
obliquum, Sibth. *8c* Sm. Fl. Graec. t. 623 — mutabile.
obovatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1837) I. 57 — sibiricum.
obtusifolium, Stev. ex DC. Syst ii. 305 -alpestre.

ALiYSSUM:—
ochroleucum, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 86 = montanum.
Oederi, Durand, Fl. Bourg. i. 161 = Vesicaria utriculata.
orbiculare, *Timb. & Jeanb. in Rev. Bot. Soc. Fr.* iii. (1884-85) 106.—Europ.
orbiculatum, *Vrv. in Mim. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 835.—Graecia.
orientate, *Ard. Animad. Alt.* 32.—Graecia; As. Min.
orophilum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 11 — nontonnm.
ovirense, *A. Kern. Sched. Fl. Exsicc.* ii. 99.—Austria,
oxycarpum, *Boiss. & Bal. Diagn.* Ser. IL v. 35.—Cappadoc.
paniculatum, Desf. Choix, 67-Vesicaria pnnicnlata.
paniculatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 671 = Neslia paniculata.
parviflorum, Bieb. Fl. Tanr. Cauc iii.434—campestre.
parviflorum, Hochst. *Be* Steud. ex Steud. Norn. ed. II. i. 68 = marginatum.
parviflorum, Schloss. ex Nym. Consp. 57 = calycinum.
parvulum, *Schrad. in Linnaea,* x. (1836) *Lift.* 69.—Hab.?
patulum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 238.—Afr. bor.
pedemontanum, *Rupr. Fl. Cauc.* 102, *in textu.*—Europ.
peltarioides, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. II. xvii. (1842) 158.—As. Min.
persicnm, *Boiss. 1. c.* 162.—Pèrsia.
Perusianum, J. Gay, ex Gren. & Godr. Fl. FT. i. 118 — Lapeyrousi&num.
petalodes, DC. Syst. ii. 312-Farsetia obovata.
petraeum, Andrz. ex DC. 1. c. 302-saxatile.
petraeum, Ard. Animad. Alt. SO — gemonense.
petrophilum, Heldr. ex Nym. Consp. 56—montanum.
Peyrousianum, Willk. *Sc* Lange, Prod. FL Hisp. iii. 835 = Lapeyrousianum.
phymatocarpum, Schlosser & Vnkot. Syll. 166 — C3lv cinuni.
pleiospermum, Fenzl, in Russeg. Reise, Ilhutr. 64-aureum.
podolicum, *Bess. Cat. Hort. Crem.* (1816) 8.—Europ.; As. Min.; Sibir.
polyodon, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 17-campestre.
porphyreticum, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 11 — montanum.
praecox, *Boiss. Fl. Orient, i.* 275.—As. Min.
psammeum, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 9 = snontanum.
psilocarpum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, App. ii. 718 — calycinum.
purpureum, Lag. & Rodr. in Analés Cienc. Nat. v. (1802) 275-Lagascae.
pyrenaicum, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 371. *Suppl.* 91.—Mont. Pyren.
ramosissimum, *Webb, in Giorn. Bot. Ital.* ii. (1846) 215.—Graecia.
repens, Baumg. Enum. Transs. ii. 237—montanum.
rhodanense, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 10 *= montanum.
RoberHanum, *Bernard, ex Gren. & Godr. Fl. Fr.* i. 117.—Corsica.
Rockelii, Andrz. ex Reichb. Ic. PI. Crit xi. p. 8. n. 4273 b = montanum.
rostratum. *Stev. in Mim. Acad. Pitersb.* iii. (1809-10) 296. t. 16. f. 1.—Graecia; As. Min.
rostratum, Wierzb. ex Nym. Consp. 66—montanum.
ruderale, Jord. Diagn. i. 198 = calycinum.
rupestre, *Tenore, Fl. Nap.* t. 60.—Europ.
rupestre, Willd. Enum. Hort. Berol. 672 —Graellsia saxatilis.
saiulosum, Jord. Diag. i. 199 = calycinum.
samariferum, *Boiss. & Hausst. ex Boiss. Fl. Orient, i.* 272.—As. Min.
samolifolium, Desf. Choix, 66—Thlaspi samolifolium.
sativum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 9 = Camelina sativa.
savranicum, Andrz. ex Bess. Enum. PL Volh. 82 = alpestre.
saxatile, Bory *Sc* Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 41 = orientale.
saxatile, Crantz, Sn'rp. Austr. 16 — gemonense.
saxatile, *Linn. Sp. PI.* 650.—Europ.
saxatile, Sibth.' *Sc* Sm. Prod. Fl. Graec. ii. 11 = orientale.
scairum, JVeinm. Cat. Hort. Dorpat. (1810) 11 = ambellatum.

AIiYSSTJM :—
SMosseri, Henff. ex Schlosser *Sc* Vnkot Syll. 156-calycinum.
schirmanicum, Rnpr. Fl.tanc. 100—tortuosnm.
Scovittianum, Fisch. *Sc* Mey. in Linnaea, xii. (1838) sphalm. 151 = Szovitzianum.
scutigerum, *Dur. in Expl. Sc. Algir.* t. 72. *U* 4.—Air. bor.
semidodecandra, *Schrank, Baier. Fl.* ii. 189.—Europ.
serpyllifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 108 =• tortnosnm.
serpyllifolium, Desf. Fl. Atlant ii. 70-alpestre.
sibiricum, Fisch. ex DC. Syst. ii. 811 •> Fischerianum.
sibiricum, Trevir. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1811) 151-dasycarpum.
sibiricum, *Willd. Sp. PI.* iii. 466.—Sibir.
siculum, Jord. Diag. i. 202=calycinum.
simplex, Rudolphi, in Schrad. Joum. ii. (1799) 290 = campestre.
sinuatum, *Linn. Sp. PI.* 661.—Europ.; As. Min.
smyrnaeum, *C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* vii. (1840) 132.—Smyrna.
spathulatum, Adams, in Mem. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 110=alpestre.
spathulatum, *Steph. in Willd. Sp. PI.* iii. 465.—Sibir.
speciosum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl,* 237.—Afr. bor.
sphacioticum, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 35.—Greta.
spinosum, *Linn. Sp. PI.* 650.—Europ.
Spruneri, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 12 = montanum.
strictum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane 187-Szowitsianum.
strictum, *Willd. Sp. PI.* iii. 464.—As. Min.
strigosum, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed. II. ii. 267 = hirsutum.
strigulosum, *Amo, Fl. Iber.* vi. 571.—Hispan.
stylare, *Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient, i.* 287.—As. Min.
styriacum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov fasc. ii. *7* — montanum.
subalpestre, Schur, Enum. PI. Transs. 61-urgenteum.
sutalpinum, Pall. Ind. Taur. ex Bieb. FL Taur. Cauc. ii. 108 —tortuosum.
sublineare, Jord. Diagn. i. 201=calycinum.
subtumidum, Boiss. *8c* Heldr. ex Nym. Consp. 56 = foliosum.
suftrutescens, *Boiss. Fl. Orient,* i. 275.—Syria.
superbum, L'Hérit. ex 'DC. Syst. ii. 288 = Farsetia suffruticosa.
Szovitsianum, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 81.—Oriens.
tenuifolium, Bieb. FL Taur. Cauc. Suppl. 485 = canescens.
tenuifolium, *Steph. in Willd. Sp. PI.* iii. 460.—Ross.
tetraspermum, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. vi. (1844) 226— meniocoides.
tetrastemon, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 163.—As. Min.; Syria,
tortuosum, *Rupr. Fl. Caucas.* 98.—Caucas.'
tortuosum, Waldst. & Kit PI. Rar. Hung, i, 94. t. Ul -alpestre.
transsylvanicum, Schur, Enum. PI. Transs. 68 — m ontannni •
trichostachyum, *Rupr. Fl. Caucas.* 101.—Reg. Cancas.
triquetrum, Portenschl. ex DC. Syst. ii. 290 —Farsetia triquetra.
trochocarpum, Fenzl, in Tchibat Asie Min. Bot. i. 297 =argenteum.
tuberculatum. Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 498 = muricdtoni.
turkestanicnm, *Regel » Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 6.—Turkest.
umbellatnm, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 173 *Sc* 184. —As. Min.; Syria.
utriculatum, Linn. Mant i. 92-Vesicaria utriculata.
utriculatumiSOAh. &Sm. Fl. Graec. 1607-Vesicaria BarrelierL
vagum, Jord. Diag. i. 198•calycinum.
vernale, Kit. ex Horaem. Hort. Hafn. 601-montanum.
Vesicaria, Linn. Sp. PI. ed. I. 651-Vesicaria ntriculata.
vesicarioides, Andrz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 68-gemonense.
Wienbickii, Heuff. in Flora, xviii. (1836) I. 242-rostratum.

AI.Y8STJM:-
WiUkommii, De Roem. ex Willk. in Linnaea, xxv. C1852)8-granatense.
Wulfenianum, Willd. Ennm. Hort Berol. Suppi»44 = montanum.
**<mthocarpum,* Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. xvil. (1842) 164—macrostylnm.
xerophilum, Jord. & Fonir. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 10 montamun.

AL J XI . Bbakkse xHBBr Prodd.4889 (1810). *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook.ff.iii. 697.
OVNOPOGON, Foist Char. Gen. 85. t 18 (1776), nomen prins.
«rtinotkylla,A. Cunn. in Bot. Mae. rabt 3318-verticillosa.
Bf *Heunk & Uuetl Ar «- in Heurck, Obs. Bot.* IIIS .—N. Caled
aromatiea, Reinw! ex A. DC. in DC. Prod. viii. 848 = stellata.
bracteolosa, *Rick, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. U862) 882—Ins. Fiji,
orenflora, *Heurck & MueU. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* W5.-N. Caled.
™«ifolia, *R. Br. Prod.* 470.—Austral.
calophylla. Wall. Cat. n. 1607 = Winchia calophylla.
capitellata, Benth. in Enum. PI. Hueg. 81 = buxifolia.
ceylanica, *Wight, Ic. PI.* 1.1293.—Zeylan.
conacea, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 641.—Ind. or.
cusMdata, Wall, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 851 = Melodinns orientalis.
aaphnoides, *A. Cunn. in Hook. Bot. Mag.* t 8818.—Ins.Norfolc.
Pnaerocarpa, *Heurck & Muell. Arg. in Flora,* Ii. (1870) 169.—N. Caled.
erythrocarpa, *Vatke, in Bremen Abh.* ix. (1885) 124.—Ins. Mascar.
wsracularis, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 698, *innata ad Hunteriam.—Reg.* Himal.
Foreteri, *A. Cunn. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* i. 680 U830)=A. Gynopogon.
glaucescens. Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 542; G. Don, Gen. Syst. iv. 97 - Winchia calophylla.
tfancophylla, *Heurck & Muell. Arg. in Flora,* liii. (1870) 170.—N. Caled.
PMilis, *Benth. & Hook, f. Gen.* ii 697, *in nota ad G «»«fcria»—Reg.* Himal,
Opofon> *«*»• * *Schult. Syst.* iv. 440.—Ins. Norfolc.
Gynopogon, Wall. Cat. n. 1605-lncida.
®7i& >*?Bfl, St **£• m Ann. Soc. Bot Lyon, vii (1880) 119-Mq7^
ttilmahrarae, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 140.—Malaya.
•Hcifolia, *F. Muell. Fragm.* iv. 149.—Austral.
nT?• Ga «*f*- *in Freyc. Voy. Bot.* 451. t. 62.—Ins. Mauric. Caled.
Richardsonii, Sweet, Hort. Brit ed. I. 278-mscifolia.
ruscifolia, *R. Br. Prod.* 470.—Austral.
scandens, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 440—Ins. Societ.
sinensis, *Champ, ex Benth. in Hook. Kenjourn.* iv. (1862) 334—Hongkong.
«Panogheana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii 409—Ins. Timor.
"PJcata , * . *Br. Prod.* 470—Austral.
squamulosB, *c. Moore &F. MueU. in F. Muell. Fragm.* *n».47.-Ins. D.Howe.

ALTXIA:—
stellata, *Roem. &• Schult. Syst.* iv. 489—As. trop.; Malaya; Ins. Padf.
sulcata,. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 90=olivaeformis.
tetragona, R. Br. Prod. 470=spicata.
Thozetii, *F. Muell. Fragm.* x. 108.—Austral,
thyreiflora, *Benth. Fl. Austral,* iv. 809.—Austral.
Tisserantii, *Montr, in Mem. Acad. Lyon,* x. (1860) 283.—N. Caled.
Torresiana, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 461.—Ins. Marian.
Meylanica, Walp. Ann. ui. 88-ceylanica.

ALZALIA, F. G. Dietr. Lexik. Gaertn. i 299 (1802) = Alaateo, Ruiz & Pav. (Celastr.).

ALZINIANA, F. G. Dietr. ex Pfeiff. Norn. i. 129 (1873) = praec.

ALZATEA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 40. t. 7 (1794). *CELASTRINEAE,* Benth. & Hook. f. i 362.
mexicana, F. G. Dietr. Lexik. Gaertn. i. 299 (1802) Nachtr.=vertidllata.
vertidllata, *Ruit & Pan. Fl. Per.* iii 20. t 241.—Peruv.

AMADEA, Adans. Fam. ii. 230 (1763)-Androsaoe, Toum. (Primal.).

AMAGRIS, Rafin. in Prec. Somiol. 27 (1814) & Am. Monthly Mag. (1819) 190 = CalamagroBtia, Adans. (Gramin.).

AMAIOUA, Anbl. PI. Gui. Suppl. 13. t. 875 (1775). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 81.
EHRENBERGIA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 129 (1821) & Syst. ii. 12 (1825).
HEXACTINA, Willd.ex Schult. f. Syst. vii. 91 (1830).
affinis, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 618.—Surinam.
africana, Spreng. Syst. ii. 126=Coffea zanguebarica.
brasiliana, *A. Rich, in Mlm. Soc. Nat. Par.* v. (1829) 261! *(M4m. Rub.* 170).—Bras,
corymbosa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 419. t; 294—Mexic.
edulis, *Baill. Hist. PI.* vii. 887—Guiana,
eriopila, *Baill. 1. c.*—Guiana,
fagiiblia, *Desf. in Mim. Mus. Par.* vi. (1820) 14. t. 5.—Guiana.
gnndif61iA,Miq.inLinnaea;xvin. (1844) 291.—Guiana,
guianensis, *Aubl.Pl. Gui. Suppl.* 13. t. 376.—Guiana,
hirsuta, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii 25. t. 280.—Bras.
intermedia, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 90.—Bras.
Lancaster, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841); *Beibl.* ii. 84.—Bras.
longifolia, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 26—Bras.
peruviana, *Desf. in Mem. Mus. Par.* vi. (1820) 16. t. 4.—Peruv.
saedfera, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 91—Bras,
surinamensis, *Steud. in Flora,* xxvi. (1843) 763—Surinam.
utilis, BailL in Bull. Soc. Linn. Par. i (1879) 220-Alibertia edulis.

AMALAGO, Rafin. Sylva Tellur. 84 (1838)-Piper, Linn.
antillana, Rafin. 1. c.=P. officinamm.
Malamiri, Rafin. 1. c—praec

AMALIA, Hort. Hisp. ex Endl. Gen. 188 (1837) = TillondBia, Linn. (BromeL).
Aeris-incola, Hort. Hisp. ex Steud. Norn. ed. II. i. 69 =T. dianthoidea.

AMALIA, Reichb. Norn. 52 (1841) =Laolla, Lindl. (Orchid.).

AMALIAS, Hoffmgg. Preis-Verz. Orch. ex Linnaea, xvi. (1842) lift. 228=Laelia, Lindl. (Orchid.).
anceps, Hoffmgg. 1. c. = Laelia anceps.

AMALOBOTRYA, Kunth, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 186 (1866-57)-Symmerla, Benth. (Polygon.).
latifolia, Kunth, ex Meissn. 1. c~S. paniculata.

AMAMELJS, Lem. in Orbign. Diet iv.'746 (1849)-

AMANNIA, Blume, Bijdr. 1180 (1826)=Ammannla, Houst. (Lythrar.).

ASCANOA, Aubl. PI. Gui. i. 266.1101 (1776). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 268.
acuminata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 428 = Cleistanthus acuminatus.
Boiviniana, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 682.—Madag.
bracteata, Rich, ex Baill. 1. c 581= guianensis.
bracteosa, *Planch, in Hook. Ic. PI.* t. 797.—Afr. trap.
brasiliensis, Baill. Etud. Gen. Euph. 581. n. 4=Gonatogyne brasiliensis.
chartacea, Baill. 1. c 582—Cleistanthus chartaceus.
collina, Baill. 1. c. = Cleistanthus collinus.
Cunninghamii, Baill. Adansonia, vi (1865-66) 835 = Cleistanthus Cunninghamii.
Dallachiana, Baill. 1. *c*=Cleistanthus Dallachyanus.
divaricata, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 22. t. 226—Am. austr.
faginea, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 336 = Briedelia faginea.
ferrugi/iea, Thw. Enum. PI. Zeyl. 280=Cleistanthus ferrugineus.
grandiflora, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 2—Surinam.
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* i. 256. t 101.—Guiana.
indica, Thw. Enum. PI. Zeyl. 428 = Cleistanthus robustus.
indica, Wight, Ic. t 1911=Cleistanthus patulus.
Leichardtii, Baill. Auansonia, vi. (1865-66) 336 = Briedelia faginea.
oblongifolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 77—Bras.
ovata, BailL Adansonia, vi (1865-68) 836=Briedelia exaltata.
pallida, Thw. Enum. PL Zeyl. 280 = Cleistanthus pallidus.
patula, Thw. 1. c=Cleistanthus patulus.
purpurascens, *Poepp. ex Baill. Etud. Gin. Euph.* 598.—Bras,
racemosa, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii 23—Bras.
ramiflora, Poepp. & Endl. 1. c.=Richeria grandis.
robusta, Thw. Enum. PI. ZeyL 428 = Cleistanthus robustus.
strobilacea, *MueU. Arg. in Flora,* xlvii (1864) 615—Afr. oca
strobilantha, Planch, in Hook. Niger Fl. t. 47=bracteosa.
tomentosa, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 336= Briedelia tomentosa.

AMAPA, Steud. Norn. ed. 1.35 (1821)=Carapa, Aubl. (Meliac).
guianensis, Steud. 1. c - C. guianensis.

AMABABOYA, Linden, ex Mast, in Gard. Chron. (1871) 944. *MELASTOMACEAE.*
amabilis, *Linden, ex Mast. I. c.—N.* Granat.
princeps, *Linden, ex Mast. 1. c.*—N. Granat.
splendida, *Linden, ex Mast.* 1. c—N. Granat

AMARACANTHUS, Steud. Norn. ed. II. i. 69 (1840) sphalm.=seq.

AMABACABPTJS, Blume, Bijdr. 954 (1826). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 180.
microphyllus, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 211—Ins. Celebes,
pubescens, *Blume, Bijdr.* 964.—Java.

AMARACUS, Gleditsch, Syst 189 (1764) - Origanum, Linn. (Labiat).
cordifolius, Montbr. *St* Auch. ex Benth. in Ann. Sc Nat. Sér. II. vi. (1836) 43=O. cordifolium.
Dictamnus, Benth. Lab. Gen. et Sp. 888=O. Dictamnus.
sipyleus, Rafin. Fl. Tellur. iii. 88=O. sipyleus.
tomentosus, Moench, Meth. Suppl. 187=0. Dictamnus.
Tournefortii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 388-0. Tournefortii

AMARAUA, Welw. ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii 90 (1878)=8herbournia, G. Don (Rubiac.).
bignoniaeflora, Welw. 1. c. ii. 91-S. foliosa.
Doniana, Welw. 1. c = S. foliosa.

AMARANTESIA, Hort. ex Regel, Gartenfl. (18691 102 -TeUmthera, R. Br. (Arrant.).
brasiliensis, Hort. ex Regel, L c = T. Bettzichiana.

AMAEANTHUB, Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. 286 (1737). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 26.
ALBERSIA, Knnth, Fl. Berol. ed. II. 144 (1838).
AMBLOGYNA, Kafin. Fl. Tellur. iii. 42 (18S6).
BAJAN, Adans. Fam. ii. S06 (1768).
BLITON, Adans. 1. c. (1763).
BLITUM, Linn. Gen. ed. I. 20 (1737).
DIMEIANDRA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
DIMEIANTHUS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 41 (1836).
EUXOLUS, Rafin. 1. c. 42 (1836).
GLOMERARIA, Cav. Descr. 819 (1827).
MENGEA, Schau. in Nov. Act. Cur. xix. Suppl. I. (Pl. Meyen.) 405 (1843).
PENTRIOS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 42 (1886).
PYXIDIUM, Moq. Tand. in DC. Prod. xiii. n. 262 (1849) (vox fructns desc lapsn progenere habita).
ROEMERIA, Moencb, Meth. 341 (1794).
SARRATIA, Moq. ex DC. Prod. xiii. II. 233, 268 (1849).
SCLEROPUS, Schrad. Ind. Sem. Hort. Goett. (1835).

Acroglochin, Spreng. Syst. i. 927 —Acroglochin chenopodioides.
adscendens, Auct. vide *ascendens.*
aenens, *Bess. Cat. Hort. Volhyn.* (1816) 8.—Hab. >
aeruoides, Hochst. & Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 214 = Aerva lanata.
albiflorus. *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 263.—Hab. ?
albas, *Linn. Syst.* ed. X. 1268.—Am. bor. (Europ. alien.).
albus, Robin, Voy. Louis. 874 ; ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 285^-lencanthus.
alius, Rodsch. ex F. G. Dietr. Lex. Gaertn. Nachtr. 71. i. 196 = A. Blitum. .
albus, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. i. 215 = Thunbergii.
Alopecurus, Hochst. ex A. Br. *Sc* Boucbe', Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1872) 1-caudatus.
altissimus, Riddell. Syn. Fl. West. St. (18S5) 41 = Acnida rusocarpa.
amboinicus, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6987 = gangeticus.
Anacardana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 719-seq.
Anardana, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6903 — paniculatns.
angustifolius, Bieb. ex Willd. Sp. PI. iv. 381 = sylvestris.
angustifolius, Lam. Encyc. i. 115 = A. Blitum.
Arardhanus, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 569 = paniculatus.
arctioideus, Perr. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 332 — Pnpalia lappacea.
ascendens, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 107.—China.
ascendens, Loisel. Not. 141 = viridis.
atropurpurens, *Roxb. Fl. Ind.* iii. 608.—Ind. or.
atrosanguineus, Hort. Lugd. (1838) ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 266 —hypochondriacusj
aureus, Bess. Cat Hort. Volhyn. (1816) 8 = flavus?
aurens, *F. G. Dietr. Lexik. Gaertn.* i. 310.—Nepal.
aureus, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 269 = hybridus.
bahiensis, *Mart. Herb. Fl. Bras.* n. 969.—Bahia.
Bellardi, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 259 = hybridus.
Berchtholdi, Hort. ex Moq. 1. c. 257 - paniculatus.
Berchloldi, Seidl, ex Opiz, Boeheims Gew. 164; Natural. i. (1823) [2]-A. Blitum.
Berchtholdi, Hort ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 259 - hybridus.
Bernhardi, Hort. ex Moq. 1. c. 258 — flavin.
bicilor, Nocca, ex Willd. Sp. PI. iv. 884 = melancholicus.
bliloides, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 273.—Am. bor.
blitonius, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119 = A. Blitum.
Blitum, Auct. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 267,274 = viridis.
Blitum, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 990.—Reg. temp, et trap.
Blitum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 263 -sylvestris.
Blitum, Reichb. Ic ex Steud. Nom. ed. II. i. 69 = polygonoides.
brasiliensis, *Moq. in DC. Prod.* xii. II. 266.—Bras.
bullatus, Bess, ex Spreng. Syst i. 928-retroflexus.
californicus, 5. *Wats, in Bot. Calif,* ii. 42.—Calif,
campestris, *Willd. Sp. PI.* iv. 882.—Ind. or.
canariensis, *Bess. Cat. Hort. Volhyn.* (1816) 8.—Ins. Canar.

AMARANTHUS :—
capitatus. Cat Hort. Turic. (1827-28).—Hab. t
Caracam, Bess. Cat. Hort Volhyn. (1816) 8 = A. Cararu.
caracasanus, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 195.—Venezuela.
Caracu, Zucc. ex Steud. Nom. ed. II. i. 69 = A. Cararu.
Cararia, Bess. Cat. Hort. Volhyn. (1816) 8=praec. 7
Cararu, Hort. Paris, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 274 = caudatus.
Cararu, *Jacq.ex Zuccag. in Roem. Collect.* 168.—Hab. T
carneus, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 257 = panicnlatus.
Cathecu, Hort. ex Moq. 1. c. 259= hybridus.
Caturus, *Roxb. in Herb. Madr. sec. Wall. Cat.* n 6»00.—Ind. or.
caudatus, *Linn. Sp. PI.* 990.—Oriens; Afr. trop.; Ind. or.
cauliftorus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 389-Acroglochin chenopodioides.
celosioides, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 194.—N. Granat.
cernuus, Bess, in Cat. Hort. Turic. (1827-8) 'An Celosia?'
chlorostachys, Moq.-Tand. in DC. Prod. xiii. II. 259 - paniculatus.
chlorostachys, *Willd. Amarant.* 34. t 10. f. 19.—Europ.; Oriens; Ind. or.
chlorostachys.Wmk. ex Willk. &Lange,Prod. Fl. Hisp. i. 275 = retroflexus.
circinnatus, Hort. Paris, ex Poir. Encyc. Suppl. i. 311 = lividus!
coesius, F. *G. Dietr. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 266. —Hab. I
comnmtatos, *Kerner, in Oestr. Bot. Zeitschr* xxv. (1875) 194.—Austr.
coracanus, Mart Hort. Erlang. 197 = caracasanus.
crassipes, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 767-polygonoides.
cristatus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 7 = Celosia cristata.
crocatus, Bess. Cat. Hort. Volhyn. (1816) 9.—Hab.?
cruentus. Linn. Syst. ed. X. 1269 = paniculatus.
cruentus, Willd. ex Roxb. Fl. Ind. iii. 610 = caudatus.
curvifolius, Spreng. Syst. i. 928 - retroflexus.
cuspidatus, Vis. Cat. Hort. Patav. (1841)= gangeticus.
deflexus, *Linn. Mant.* ii. 296.—Europ.
Delilei, Richter *Sc* Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 816 = patulus.
diacanthus, *Rafin. Fl. Lvdov.* 31.—Am. bor.
diandrus, Spreng. Neue Entdeck. iii. 20 = Acroglochin chenopodioides.
diffusus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 174-A. Blitum.
dioicus, Michx. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 277 = Acnida rusocarpa.
divaricatus, *Andrt. ex Linden. Prod. Fl. Cherson.* 185.—Cherson.
dubius. Mart. Hort. Erlang. (1814) 197-tristis.
edulis, Michx. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 277 = Acnida cannabina.
emarginatus, *Salem, ex Moq. I. c.* 274 = viridis.
enervis, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 216.—Austral.
esculentus. Bess. Cat Hort. Volhyn. (1816) 9 ; ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 266 — paniculatus.
farinaceus, Roxb. ex Moq. 1. c = paniculatus.
fasciatus, Roxb. Fl. Ind. iii. 609 = viridis.
Fatine, Mart. Hort. Erlang. 197.—Hab. J
fimbriatus, *S. Wats, in Bot. Calif,* ii. 42.—Calif.
flavescens, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 359 = hybridus.
flavus, *Linn. Syst.* ed. X. 1269.—Ind. or.
flexuosus, Hort ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 260 = tristis.
floridus, Benth. Bot. Voy. Sulph. 168. t. 61 -scariasus.
frumentaceus, Buch.-Ham. in Roxb. Fl. Ind. iii. 699 = paniculatus.
frutescens, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 848 = Iresine amarantoides.
gangeticus, *Linn. Syst.* ed. X. 1268.—Reg. trop.
gangeticus. Wall. Cat. n. 6896 = A. Blitum.
giganteus, Bess. Cat Hort. Volhyn. (1816) 91; F. G. Dietr. Lexik. Gaertn. i. 313.—Hab. t
giganteus, L'Herit. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 277 = Acnida cannabina.
gracilis, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. I. 48 = caudatus.
graeciaans, Auct. Hisp. ex Cut. Fl. Comp. Madr. 579 =albus. •
graecimans, Linn. Sp. PI. 990=iylvestris.

AMARANTHUS :—
Greggii, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 274. —Am. bor. occ.
gu-delupensis, Hort ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 257 — paniculatus.
hecticus, Willd. Amaranth. 26-hybridus.
hierichuntinus, *Vis. in Att. 1st. Ven. Sc.* Ser. III. iv. (1858-59) 189.—Syria.
Huttoni, Hort. Veitch. cf. Gard. Chron. (1872) 216 = Celosia Huttoni.
hybridus, *Linn. Sp. PI.* 990.—Am. bor.
hybridus, Veil. Fl. Flnm. x. t. 28-flavus?
hypochondriacus, *Linn. Sp. PI.* 991.—Am. bor. (Europ. alien.).
inamoenus, Willd. Sp. PI. iv. 886 (1806) Amar. 14 = gangeticus.
incarnatus, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 257 — paniculatus.
incomptus, Willd. Enum. Hort. Berol. 64=gangeticus.
incurvatus, Gren. *Sc* Godr. Prosp. Fl. Fr. 8=chlorostachys.
intermedius, Guss. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 269 —chlorostachys.
interruptus, *R. Br. Prod.* 414.—Austral.
japonicus, Houtt. ex Steud. Nom. ed. I. 86 = gangeticus.
lacteus, Hort. Amstelod. (1814) 52 —Aerva sanguinolenta.
laetus, Willd. Amaranth. 28 ; Sp. PI. iv. 391 (1806) = hybridus.
lanatus, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 640-Aerva lanata.
lancefolius, Roxb. Hort. Beng. 67-gangeticus.
lanceolatus, Roxb. Fl. Ind. iii. 607 -gangeticus.
lancifolius, *Del. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 276 = interruptus.
laxifiorus, Cornell, ex Poll. Fl. Veron. iii. 114 = patulus.
leptostachyus, *Benth. Fl. Austral,* v. 214.—Austral,
leucanthus, *Rafin. Fl. Ludov.* 32.—Am. bor.
leucocarpus, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad. x.* (1875) 347.—Arizona.
lineatus, R. Br. Prod. 4]4-interruptus.
littoralis, Bemh. in Hort. Tur. (1818) ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 274 = viridis.
littoralis, Homm. Hort. Hafn. (1815) 893-albus.
lividus, Hort. Petrop. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 721 = A. Blitum.
lividus, *Linn. Sp. PI.* 990.—Am. bor.
lividus, Roxb. Fl. Ind. iii. 605-gangeticus.
macrocarpus, *Benth. Fl. Austral,* v. 216.—Austral.
macrocaulos, Poir. Encyc. Suppl. i. 814 = Acnida CUD HBblna.
macrostachyus, Merat, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 256 = hypochondriacus.
major, Salzm. exMoq. in DC. Prod.xiii. II. 274.—Hab.?
mangostanus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 711—melancholicus.
mangostanus, *Linn. Cent.* i. S3 ; *Am. Acad.* iv. 394.— Ind. or.
Mantegazdanus, *Passer, in Hort. Farm.* (1864) *.— Am. austr.
maximus. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = caudatus.
melancholicus, linn. Sp. PI. 989-gangeticus.
miamiensis, *Riddell, Syn. Fl. West. St.* (1885) 41.— Am. bor.
minor, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 289 - A. Blitum.
minutus, Leschen. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 304 = Aerva brachiata.
Mitchelli, *Benth. Fl. Austral,* v. 214.—Austral.
monstrosus. Cat Hort. Div. (1837); Hort. Tonelle, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 256 = hypochondriacus.
montevidensis, Hort. ex Moq. 1. c. 257 - paniculatus.
morosus, *Reichb. Ft. Germ. Excurs.* 685.—Europ.
mucronatus, Hort. Petrop. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 720=mangostanus.
mucronatus, Poir. Encyc. Suppl. i. 311-A. Blitum.
muricatus, *Gill. ex. Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 276.— Hab. t
neglectus, Hort. ex Moq. 1. c. 259 = hybridus.
nepalensis, Cat. Hort. Lugd. (1836); ex Moq. 1. c. — hybridus.
obovatus, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 275 —Am. bor.
officinalis, Gromow. ex Trantv. in Act Hort. Petrop. ix. (1884) 139-seq.?
oleraceus, *Linn. Sp. PI.* 1408.—Egypt.; Ind. or.
oleraceus, Rodsch. Essequib. 24 = A. Blitum.
oleraceus, Roxb. Fl. Ind. iii. 606—gangeticus.
olitorius, Bess. Cat. Hort. Volhyn. (1816) 9 - oleraceus?

AltARAMTHITS :—

pachystachys, Reichb. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 265 v parisiensis.
pallidiflorus, *F. Muell. Fngm.* i. 140.—Austral.
pallidus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. U. 399-A. Blitum.
Palmeri, 5. *Wats, in Proc. Am. Aead.* xii. (1877) 274.—Calif,
paniculatus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1406.—Am. bor. tin Orient, alien.).
Paniculatus, Wall. Cat. n. 6904=caudatus.
paraguayensis, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent.* »• (1878) 273; *Qontrib.* 79.—Reg. Argent
parisiensis, *Sckt. Hartdb.* iii. 249.—Hab. t
patulus, *Bertol. Comm. Neap.* 171. t 12.—Am. bor. (in Europ. alien.).
ptndulinus, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 268-caudatus.
P'ndulus, Hort. ex Moq. 1. c.=caudatus.
persicarioides, Hort. ex Poir. Encyc. Suppl. i. 811 = Acroglochin chenopodioides.
polychrca.Raeusch. Nom. ed. III. 275=Pellionia brevifolia ?
Polyflagellus, *Spreng. in Hort. Argent.* (1834) *ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 266.—Hab. 1
Polygamus, *Linn. Cent.* i.; *Am. Aead.* iv. 294.—Afr. trop.; Ind. or.
Polygamus, Wall. Cat. n. 514=A. Blitum.
polygamus, Thw. Enum. PI. Zeyl. 247=mangostanus.
polygamus, Roxb. Fl. Ind. iii. 607=gangeticus.
polygonoides, *Linn. Pl.Jam.Pugill.* ii. 27.—Jamaic; Zeyl.
Polygonoides, Zolling. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 274 = A. Blitum.
Polygonoides, Roxb. Fl. Ind. iii. 721=polygamus.
polystachyus, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8901 = viridis.
Polystachyus, *Willd. Sp. PI.* iv. 886.—Ind. or.
Powellii, 5. *Wats, in Proc. Am. Aead.* x. (1875) 847.—Am. bor.
prostratus, Balb. Misc. Bot. 44.t10=deflexus.
prostratus. Bast FL Maineet-Loire, 344=A. Blitum.
Pumilus, *Rafin. in Med. Repos. New York,* v. (1808) 86O. Am. bor.
*P*rgans*, Hort ex Moq. in DC. Prod. xiii. H. 287 = Paniculatus.
Pyramidalis, Noronha, in Verb, Batav. Gen. v. (1790), w. I. Art iv. 7=Celosia argentea.
qmtensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 194.—Perav.
recurvatus, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. (1829) 88 = retroflexns.
wtroflexus, *Linn. Sp. PI.* 991.—Am. bor. (in Eurqp. •lien.).
rnomoeus, R. Br. Prod. 414=interruptus.
"f»d«„Schult. ex Steud. Nom. ed. II. i. 70=retroflexns.
To tundifolius, Herb. Par. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II- 261=gangeticus.
"descent, Hort. ex Moq. 1. c 257-paniculatus.
mbricaulis. *Page; Hort. Angl. ex Moq. in DC. Prod.* »«. H. 267, nomen.—Ind. or.
^derglis, Koch, ex Moq. 1. c. 274=A. Blitum.
"alxafolius, *Hort. Veiteh.ex Card. Chron.* (1871) 1550. —Ins. Philipp.
^nguineus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1407=paniculatus.
sanguineus. *Veil. Fl. Flum.* x. t. 29.—Bras.
***guinolentus*, Schrad. ex Moq. in DC Prod. xiii. H. »B7-paniculatus?
«andens, *Linn.f. Suppl.* 419.—Am. austr.
«anosus§, *Benth. Bot. Voy. Sulph.Vt>i.* t 51.—Guatemala.
'Patnulatus, De»f. ez Moq. in DC. Prod. xiii. II. 276=lineatus.
'Peciosus, Sims, Bot. Mag. t. 2227 -paniculatus.
'ptcatus. Lam. Fl. Fr. it 192=retroflexus.
sptcatus, Wireen, Diss. PI. Casan. 454=paniculatus.
•Puatui, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 585=patulus.
spinosus, *Linn. Sp. PI.* 991.—Reg. trop.
"Piratus, *Zipp. ex Span, in Linnaea*, xv. (1841) 846, nomen.—Malaya.
stnetus, Tenore, Syll. 127=retroflexus.
"rictus, Willd. Amaranth. 27-paniculatus.
^wsrrw, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. I. 44.—Enrop.; Oriens.
tonuiflorus, Fisch. Hort. Hal. ex Moq. in DC. Prod. . *U'.H.267-seq.1
'"'tVolius, Roxb. Fl. Ind. iii. 602-A. Blitum.
wnuifolins, *Willd. Sp. PI.* iv. 381.—Ind. or.
ifolius. Wall. Cat. n. 6898-polygamus.
"•"rfs, *Benth. Fl. Austral*, v, 216.—Austral.

AMABAMTHtrS :—

Thunbergii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 262.—Afr. austr.
Timeroyi, jord. ex Moq. 1. c. 269 = patulus.
Torreyi, *Benth. ex S. Wats. Bot. Calif,* ii. 42.— Am. bor.
tortuosus, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 107.—Ins. S. Cruce.
tricolor, Linn. Sp. PI. 989=gangeticus.
tristis, Linn. 1. c=gangeticas.
tristis. Wall. Cat. n. 6905-mangostanus.
trivialis, Rota, in Giom. Bot. Ital. ii. II. (1846) 287-patulus.
undulatus, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 102-Mitchelli!
undulatus, R. Br. Prod. 414 = interruptus.
***mceolatos, Benth. in Bot. Voy. Sulph.* 158.—Guayaquil,**
venulosua, 5. *Wats, in Proc. Am. Aead.* xvii. (1881-82) 876.—Am. bor.
veraus, *OpU, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 267, nomen.—Europ.
verticillatus, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 270= polygonoides.
violaceus, Hort. ex Moq. 1. c.= paniculatus.
viridis, AH. Fl. Pedem. ii. 19 = A. Blitum.
viridis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1405.—Reg. trop.
viridis. Pall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 86=pallidus.
viridis, Pollich, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 268 = prostratus.
Wrightii, 5. *Wats, in Proc. Am. Aead.* xii. (1877) 275.—Am. bor.
zanensis, *Hornm. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 267.—Hab.?

AMARANTUS, Linn. Syst. ed. x. 1268 (1759)=**Amaranthus**, Linn.

AMARELLA, Gilib. Fl. Lituan. i. 86 (1781) = Gentiana, Linn.
actita, Rafin. Fl. Tellur. iii. 21=G. Amarella.
brevicaulis, Rafin. 1. c.—Hab. I
gracilis, Rafin. 1. c. =G. Amarella.
quadrifida, Gilib. Fl. Lituan. i. 86 = G. campeitris.
*quinquefida** Gilib. 1. c.=G. Amarella.
rugosa, Rafin. Fl. Tellur. iii. 21.—Hab.!
vulgaris', Rafin. 1. c. 20=G. campestris.

AMARENUS, C. Presl, Symb. Bot i. 46 (1880)-0Mfolium, Linn. (Legum.).
agrarius, C. Presl, 1. c.-T. agrarium.
aureus, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 362=T. agrarium.
badius, C. Presl, 1. c - T. badinm.
campestris, Fourr. 1. c.=T. procumbinst
filiformis, C. Presl, 1. c. = T. filiforme.
flavus, C. Presl, 1. c.=T. flavum.
micranthus, Fourr. 1. C.-T. filiforme.
patens, C. Presl, 1. c - T. patens.
procumbens, C. Presl, 1. c.—T. procumbens.
Schreberi, Fourr. 1. c.=T. procumbens.
Sebastiani, C. Presl, 1. c.-T. Sebastiani.
spadiceus, C. Presl, 1. c = T. spadiceum.
speciosus, C. Presl, 1. C.-T. speciosum.

AMARIA, Mntis, ex Caldas, in Seman. Nuev. Gran. ii. (1810) 25 = Bauhinia, Linn. (Legumin.).
petiolata, Mutis, 1. c = B. petiolata.
sessilifolia, Mutis, 1. c—N. Granat.

AMARIDIUM, Hort. ex Lubbers, Cat. PI. Rar. San Donate, 15 (1880) = **Camaxidlum,** Lind). (Orchid.).

AMABOBIA. A. Gray, Bot. U. St Expl. Exped. i. 856. t. 40 (1864). *SIMARUBEAB*, Benth. & Hook. f. i. 314.
soulameoides, A. Gray, 1. c—Ins. Fiji.

AKARTIIIIIS, Linn. Syst. ed. I. (1785). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 727.
ATAMOSCO, Adans. Fam. ii. 67 (1763).
BELLADONNA, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 606. (1830).
CALLICORE, Link, Handb. i. 193 (1829).
CALLIROK, Endl. Gen. 176 (1837).
acuminata, Ker-GawL in Bot. Reg. t. 684-Hippeastrum rutilum.
advena, Ker-Gawl. 1. c. t. 1126 = Hippeastrnm advenum.
***aethnensis*, 'Rafin.' vide *etnensis*.**
africana, Lam. Encyc. i. 124-Lycoris an.'ea.
Agatha, Steud. Nom. ed. II. i. 72 = H. reticulatnm.
alba, Forsk. Fl, Aegypt. Arab. 208-Crinum album.

AMABTLLIB.—
Alberti, Lem. IUustr. Hortic. (1886) t. 498-Hippeastrum Reginae.
alta, Steud. Nom. ed. II. i. 72 = Hippeastrum splendens.
Andersonii, Steud. 1. .c. i. 71-°Zephyranthes Andersoni.
***andicola*, Poepp. Fragm. Syn. S (=*Habranthus andicolus*).**
angusta, Schult. f. Syst. vii. 807=Hippeastrum bifidum.
Aramaseo, Linn. Sp. PI. ed. II. 420 (sphalm.) = Zephyranthes Atamasco.
anensis, F. G. Dietr. Lexic. Gaertn. Nachtr. i. 204 = peruviana.
Atamasca, linn. Sp. PI. 292=Zephyranthes Atamasco.
Atamasco, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 264 = Hippeastrum miniatum.
atanasia, Crantz, Inst. i. 486=Zephyranthes Atamasca.
aucta, Tratt. Thes. 4S=Nerine undulata.
aulica, Ker-Gawl. in Journ. Sc. & Arts, ii. (1817) 358 ; etin Bot. Reg. t. 444=Hippeastrum aulicum.
aurea, L'H&it Sert. Angl. 14=Lycoris aurea.
aurea, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 56 (=*Pyrolirion **aureum**).*
australasica, Ker-Gawl. hi Bot. Reg. t. 426 = Crinnm flaccidum.
austraHs, Spreng. Syst. ii. 54=praec.
Bagnoldi, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1177-Hippeastrum Bagnoldi.
bahiensis, DC. PI. Rar. Jard. Genève, 7«» Notice, 18 = Hippeastrum bahiense.
Bangoldi, Steud. Nom. ed. II. ». 70, sphalm. = ***Bagnoldi.***
Banisiana, Lindl. Bot. Reg. (1842), t. 11. & Append. 18=Brunsvigia Slateriana.
Belladonna, *Linn. Sp. PI.* 293.—Afr. austr.
Belladonna, E. Mey. ex Steud. Nom. ed. II. i. 70= Hippeastrum equestre.
***Berterii*, Spreng. Syst ii. 49 (=*Habranthus robustus*).**
bieolor, Ruiz & Pav. Fl. Per. ill. 67 = Hippeastrum bicolor.
bifida, Spreng. Syst. Cur. Post. 133 = Hippeastrum bifidum.
bifolia, Aubl. PI. Gui. i. 804 = Zephyranthes rosea.
bivoginata, Donn, Hort. Cantab, ed. VIII. 98 = Cyrtanthus pallidus.
blanda, Ker-GawL in Bot. Mag. t. 1450-A. Belladonna.
brasiliensis, Andr. Bot. Rep. t. 358 = Hippeastrum equestre, Reginae.
brasiliensis, Tratt. Tabul. t. 838 = Hippeastrum rutilum.
Broussonetii, [DC. in] Red. Liliac. ii. 62=Crinum yncaeflorum.
bulbisperma, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 9-Crinnm capense.
caerulea, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 320.—Reg. ArgeBt.
calyptrata, *Hoffmgg. in Linnaea*, xvi. (1842) *Lift.* 279—Hab. t
calyptrata, Ker-Gawl. Rev. 11; et in Journ. Sc. *Be* Arts, ii. (1817)858=Hippeastnimcalyptratum.
Candida, Lindl. in Bot. Reg. t 724 - Zephyranthes Candida.
Candida, Tratt. Tabul. t. 488-Crinum gigantenm.
capensis, linn. PL Afr. 10 ? (Amoen. Aead. vi. 86)= Hypoxisstellatus.
capensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 12-Crinnm longifolium*
carinata, Spreng. Syst. Cnr. Post. 152=Zephyranthes carinata.
carnea, Schult. f. Syst. vii. 799 » Zephyranthes rosea.
Carolinae, Staler, Hort. Nymph. (1826) 44-Hippeastrum reticulatum,
caspia, Willd. Sp. PL ii. 62 = AUium caspium.
chilensis, L'Herit Sert. AngL 11 - Hippeastiam chilense.
chilensis, Ruiz & Pav. FL Per, iii. 66-Hippeastrum miniatum.
chloroleuca, Ker-Gawl. in Joum. Sc. & Arts, ii. (1817) 347. t. 8. f. 1 = Zephyranthes chloroleuca.
ciliaris. Linn. Sp. PI. ed. II. 422 = Buphane ciliaru.
cinnamomea, L'Hfrit. Sert Angl. 16 = Hessea crispa.
citrina, Sibth. & Sm. Fl. Grace, iii. t. 311 = Stembergia colchiciflon.
clavata, L'Hérit. Sert. Angl. 11-Cyrtamnus nniflorus.
Clusiana, Ker-Gawl. in Journ. Sc. & Arts, ii. (1817) 846-Stembergia colchiciflora.

ABLARYLLIS :—
coccinea, Molina, Saggio Chil. ed. II. 284-chilensis,
colchiciflora, Hort. Mosq. ex Schult.f. Syst. vii. 1185= Bulbocodium versicolor.
colchiciflora, Ker-Gawl. in Jonm. Sc. *8c* Arts, ii. (1817) 345 = Stembergia colchiciflora.
concinna, *Morris, Ft. Conspic.* t 44.—Hab. ?
coracina, Stead. Nom. ed. II. i. 70=seq.
coranica, Ker-Gawl. in Bot Reg. ii. 139=Ammocharis falcata.
correiensis, Bury. Hexand. Fl. 9-Hippeastrom organense.
corusca, Ker-Gawl. in BoL Mag. fol. 1430-Nerine curvifolia.
crispa, Jacq. Hort. Schoenb. i. 37-=Hessea crispa.
crocata, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 88 = Hippeastram rotilum.
curvifolia, Jacq. Hort. Schoenb. i. 33 = Nerine curvifolia.
Cybister, Herb, ex Fl. des Series, v. t 455, 456= Hippeastram Cybister.
cylindracea, L'Hérit. Sert. Angl. 15 = Cyrtanthus angustifolios.
cyrtanthoides, Sims, Bot. Mag. t. 2399=Hippeastrum bicolor.
demissa, Stend. Nom. ed. II. i. 71.—Chili.
depauperata, Poepp. Fragm. Syn. 4 =Zephyranthes depauperata.
disticha, Sims, Bot Mag. snb t. 1948=Crinnm yuccaeflorum.
disticha, Linn. £ Suppl. 195 = Bnphane disticha.
Drummondii, Steud. Nom. ed. II. i. 71 = Cooperia Drommondii.
Dryades, Veil. Fl. Flum. ISO; iii. t. 117 = Griffinia Dryades.
dubia, Houtt. Plantenk. xii. 181. L 84. f. 1-Nerine samiensis.
dubia, Linn. Diss. PI. Surra, n. 39 j et Am. Acad. viii. 254 = Hippeastram equestre.
etata, Jacq. Hort. Schoenb. i. 32=Vallota pnrpurea.
elegans, Spreng. Pugill. ii. 59=Hippeastram solandraeflora.
Entreriana, Hoffmgg. in Linnaea, xliii. (1880-82) 187 = Zephyranthes mesochloa.
equestris, Ait. Hort. Kew. i. 417 = Hippeastram eqnestre.
etnensis, Rafin. Caratteri, 84=Stembergia colchiciflora.
exigua, Schousb. Vextr. Marokko, 180=Tapeinanthus hnmilis.
falcata, L'Hérit. Sert. AngL 13=Ammocharis falcata.
falcata, Lee, ex Steud. Nom. ed. II. i. 73, 475 = Cyrtanthus angnstifolius.
flaccida, Weinm. in Flora, iii. (1820) 608=Crinum flacddum.
flammea, Rniz & Pav. Fl. Per. iii. 56 *(= Pyrolirion flammeum).*—Pernv.; Chili.
flava, Pav. ex Roem. *k* Schnlt Syst vii. 805-Zephyranthes flava.
flavovirens, Schott, ex Stend. Nom. ed. II. i. 71.—Cf. *fulvovirens.*
flexuosa, Jacq. Hort. Schoenb. i. 35=Nerine flexuosa.
Forbesii, Lindl. in Trans. Hort Soc vi (1826) 87-Crinum Forbesiannm.
formosa, Salisb. Prod. 284=seq.
formosissima, Linn. Sp. PI. 298-Sprekelia fonnosissima.
Fathergillia, Andr. Bot.Kep.lii. 163 = Nerine curvifolia.
Fothergillii, Poir. Encyc. Snppl. i. 320=praec.
fuigida, Ker-Gawl. in Bot. Keg. t. 226 = Hippeastram rutilum.
fulvomrens.S&ott, in Sehreib'. Nachr. Oesterr. Natnrf. 129 = Hippeastram calyptratnm.
Gardneri, Stub, in Mart. Fl. Bras. iii. 149=Hippeastram organense.
gigantea, Ait Hort. Kew. ed. II. ii. 226-Crinum giganteum.
gigantea, Van Marum, in Verh. Maats, Haul. iii. (1806) 346=Brunsvigia Josephinae.
giaucescens, Mart in Schult f. Syst. vii. 813 = Hippeastrum rutilum.
gracilifolia, Schalt f. 1. c.806 *(•> Habranthus gracilifolius).*
gracilis, Spreng. Syst Car. Post. 133-praec,
grandiflora, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1181-Bronsvigia giandiflora.
grandiflora, Stend. Nom. ed. II. i. 73-Sprekelia formosissima.

AMABYIiLIS:—
guttatu, Linn. Sp. PI. 294=Buphane ciliaris.
haemanthoidea, Tratt Gartenpfl. 88 = Haemanthos amarylloides.
humilis, Jacq. Hort. Schoenb. i. 86=Nerine hnmilis.
humilis, Link, Ennm. L 818-Cyrtanthus uniflorus.
hyacinthina, Ker-Gawl. in Bot Reg. t 163=Griffinia hyacinthina.
ignea, Lindl. Bot. Reg. t. 809 = Hippeastram bicolor.
ignescens, Regel, Gartenfl. xxiii. (1874) 160=Hippeastram ignescens.
Ulustris, Veil. Fl. Flum. 131; iU. t. 118-Hippeastnim psittflcinnm.
insignis, Ker-Gawl. Bot. Reg. t 579=Crinnm latifolium.
intermedia, Lindl. Bot. Reg. t 1148 (=*Habranthus intermedius).*
intermedia, Spreng. Syst. iv. Car. Post. 133-Griffinia intermedia.
Jacquinii, Tratt Gartenpfl. 48=Nerine samiensis.
5fe£us, Thomps. Bot. Displ. t. 6 =• Crinumgigantenm.
Josephinae, [Del.] Red. Lil. vii. S70=Bransvigia Josephinae.
Josephiniana, Herb. Amar. 278=praec.
Karwinskii, Zucc. in Otto & Dietr. AUg. Gartz. ii. (1834) 245 = Sprekelia formosissima.
kermesiana, Lindl. in Bot Reg. 11688=Hippeastrum bifidum.
lateritia, *A. Dietr. in Otto &• Dietr. AUg.* Garf».xviii. (1850) 65.—Guinea.
laticoma, Ker-Gawl. in Bot. Reg. vi. 497 - Nerine lndda.
ldtifolia, Lam. Encyc. i. 124=Crinum giganteum.
latifoiia, L'Hefit. Sert. 14 = Crinnm ornatum.
leonensis, *Van Houtte, Hort. Vanhoutt. fasc. L* (1845) 6.—^Afr. trop.
Uopoldii, Hort. Vdtch. in Gard. Chron. (1870) 738-Hippeastram Leopoldi.
Lindleyana, Schult. f. Syst. vii. 802 - Zephyranthes carinata, Lindleyana;.
linearifolia, Molina, Chile, ed. II. 284=Hippeastram chilense.
linearis, Willd. Sp. PI. ii. 58=Crinum lineare.
lineata, Colla, Hort Rip. 8 - Hippeastrnm vittatum.
lineata, Lam. Encyc. i. 12S=Crinum zeylanicum.
littoralis, Salisb. Prod. 230-Crinum latifolium.
liturata, *Reichb. Ic.* t. 82.—Hab.!
longa, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 854 = Crinum yuccaeflorum.
longiflora, Stend. Nom. ed. II. i. 70,71=Hippeastram solandrifolinm.
longifolia, Linn. Sp. PI. 293=Crinum longifolium.
longipetala, *Urn. Illustr. Hortic.* xjii.(1366> *Misc.* 78. -^Hab. ?
lorifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 71 *{"Habranthus lorifolius).*—Am. austr.
Lowii, *Morr. in Ann. Soc. Agr. Gand,* ii. (1846) 141. t. 62.—Hab J
lucida, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1181 = Nerine lncida.
lutea, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 255 =• Stembergia Fischeriana.
lutea, Linn. Sp. PI. 292-Stembergia lutea.
lutea, Pav. ex Roem. & Schult. Syst vii. 797.—Cf. *lutescens.*
lutescens, Herb, exKunth, Enum. PI. v. 497-Hippeastram chilense.
maculata, L'Hérit Sert Angl. 10 (- *Habranthus maculatus).*
maranensis, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 719=Hippeastram stylosum.
marginata, Jacq. Hort. Schoenb. i. 34 •» Nerine marginat*.
mesochloa, Steud. Nom. ed. II. i. 71=Zephyranthes mesochloa.
mexicana. Hort ex Sari, FL Ital. iii. 29. t 94-VaUota pnrpnrea.
miniata, Ker-Gawl. in Jonm. Sc & Arts, ii. (1817) 365 = Hippeastram rutilum.
miniata, Rniz & Pav. Fl. Per. iii. 67=Hippeastrnm mlniatum,
minima, Griseb. in Goett Abh. xxiv. (1879) 821-Zephyranthes minima.
minima, Ker-Gawl. in Journ. Sc. *8c* Arts, ii. (1817) 850; Rev. 8 = Zephyranthes verecanda.
minor, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1180 = Brunsvigia minor.
minuta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 278-Zephyrarthes verecunda.
moluecana, Ker-Gawl. in Joum. Sc & Arts, iii. (1817) 109=Crinum latifolium.

ATWATrVT.T.TH.
montana, Labill. Ic PL Syr. Dec ii 6-Ixiolirion montanum.
multiflora, D. Dietr. Syn. PL ii. 1180=Bransvigia gigantea.
multiflora, Tratt Gartenpfl. 87=Haemanthus multifloras.
nervosa, H. B. ft K, Nov. Gen. et Sp. L 278 = Zephyranthes tnbispatha.
nervosa, Poir. Encyc. SuppL i. 321=>Bnmsvigia striata.
nivea, Schult. *I* Syst. vii. 799 = Zephyranthes Candida.
nobilis, Salisb. Prod. 285 = Brunsvigia gigantea.
ochroleuca, Ker-Gawl. ex Schult f. Syst vii. 797 = Zephyranthes chloroleuca.
orientalis, Linn. Sp. PL 293—Brunsvigia gigantea.
ornata, Ait Hort Kew. i. 418=Crinum yuccaeflorum.
ornata, Ker-Gawl. in Bot Mag. t. 1171-Crinum zeylanicum.
Osbectii, Sabine, ex Desf. Cat ed. IU 888 = Crinum Osbeckii.
ovigera, Schult f. Syst. vii. 840=Peliosanthes javanica *1*
pallida, [Del.] Red. Liliac. viii. 479=A. Belladonna.
pallida, Willd. ex Schult. f. Syst vii. 801-Zaphyranthes verecanda.
pardina, Hook. f. Bot. Mag. t 5645 = Hippeastram pardinuiD.
parvula, Seub. in Mart FL Bras. iii. 146-Zephyranthes minima.
pendula, Salisb. Prod. 231-Cyrtanthus obliquus.
perumana, Ker-GawL in Bot Mag. sub t 1089 *(<=Pyrolirion aureum).*
phycelloides, Steud. Nom. ed. IL i. 72-Hippeastram phycelloides.
platypetala, LindL ex Bury, Hexand. PI. 16-Lycoris aurea.
praeclara, Sweet, Hort Brit ed. II. 506-Hippeastram reticnlatum.
Princeps, Veil. FL Flum. 180; iii. 1115 - Hippeastram reticulatum.
Prindpis, Salm-Dyck, in Nov. Act. Nat Cur. x. (1821) 164=Hippeastrum reticulatum.
procera, Duchart. in Bull. Soc. Bot Fr. x. (1868) 76-Hippeastrum procerum.
procera, Salisb. Prod. 230—Crinum erubescens.
propinqua, *Salisb. I. c.*—Panama.
psittacina, Ker-Gawl. in Bot. Reg. 1.199 - Hippeastram psittacinum.
pudica, Ker-Gawl. in Journ. Sc. & Arts, ii. (1817) 848 =A. Belladonna.
pvlchella, Salisb. Prod. 229=Zephyranthes Atamasco.
pulchella, Spreng. ex Kunth, Enum. PL ii. 633-Hessea enspft*
pulckra, Salisb. Prod. 288=Nerine samiensis.
pulverulenta, Lodd. Bot Cab. t 4B4=Hippeastram rutilum.
pumila, Spin. Jard. Sebast 28; ex Spreng. Neue Entdeck. i. 262 = Zephyranthes pumila.
Pumilio, Ait. Hort. Kew. i. 415=Cyrtanthus unifloras.
punicea, Lam. Encyc. i. 122 = Hippeastram equestre.
purpurea. Ait. Hort Kew. i. 417 - VaUota purpurea.
radiata, L'Hent. Sert Angl. 15=Lycoris radiate.
Radula, Jacq. Hort. Schoenb. i. 86 = Brunsvigia Radnla.
Rayneri, Hook. Bot. Mag. t 5883 = Hippeastram procerum.
regalis, Salisb. Prod. 232=A. Belladonna.
Reginae, Linn. Syst Nat. ed. X. ii. 977 -Hippeastrum Reginae.
reticulata, L'Hent Sert. AngL 12 - Hippeastram reticulatum.
revoluta, L'H&it 1. c. 18=Crinum lineare.
riparia, Burch. ex Kunth, Enum. PI. ii. 580-Crinum longifdinm.
robusta, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartz. xviii. (1850) 41—Hippeastrum aulicum.
robusta, Sweet, ex Steud. Nom. ed. *II.* \.*H{-Habranthus robustus).*
Roeeli, Regel, Gartenfl. (1874) 290. f. 809-Hippeastram equestre.
rosea, Lam. Encyc. i. 122=A. Belladonna.
rosea, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 188=Zephyranthes rosea.
rotundifolia, Lam. Encyc. i. 124 = Eurycles sylvestris.
Rougieri, Hort. ex Can. in Rev. Horde (1882) 819-Hippeastrum aulicum.
mtila, Ker-Gawl. Rev. 16; in Bot. Reg. L t 28-Hippeastram rutilum.

AM

rutilans, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 74-Hippeastnun rutilnm.

""jiensis, Linn. Sp. PI. 298=Nerine sarniensis. ,

mlhifolia, Hort. Angl. ex Schult *i.* Syst. fit 864 = (»rinum distichum.

senibarbata, Steud. Nom. ed. II. i. 72, sphalm. *{loco* Antherici)=Bulbinebulbosa.

Sta

^ ^ ^ R eg. (m4) A pp. 6 = B n a „

solandraeflora, IindL Coll. Bot t H = Hippeastnun •oUndraeflornm.

*AM*a«a, Schnlt. £ Syst. vii. 808 (- *Habranthus*

«««««? L'He>iL Sert. Angl. 18=Vallota purpurea.

spectabilis > Andr- BoL Rep. t 390=Crinumymweflorum.

specta liz, **Lodd.** Bi * Cab_ L Reg^a e. 159=Hippeasrjum

spiral is, L'Hent. Sert. Angl. 10-Henea spirals

stamin o,,, Sub l in t M«t- Fl. Bras. iii. WO-Hippe- 52 .» stylosum.

stif an^Jacq. Hort. Schoenb. i. S7~Hessea stellaris.

stil oso, Buy, Hexand. PI. 183=Hippeastrum stylosnm,

st 22' *i*** Hort Sthoeob. i. 86-TSrunsvigia striata,

st Encyc_ L 126=Hippea»tram rntilum.

striatula, d, schult. f> SysL "L 801-Zephyraathes verecun_.

stylosa, **Sweet,** Hort. Brit. ed. I. 408-Hippeastrum stylosum.

subbarbata , Schnlt. f. Syst. *iL 819 - Hippeastnun rutilum.

superba, **Bury** 1 Hexani PL 81 - Hippeastmm vittatum.

Swertian **Steud. Nom.** e* IL 72=Hippeastrnm adoent

W*i , Herb. ex Sweet, Hort. Brit ed. II. 604= TMPpeastrnm reticalatum.

sylva Weo Mart_ "> Schult. f. Syst. vii. 807 *(=Habranthus sylvaticus).*

Symoni, Funck, in Journ. Hort. Prat. Se>. II. iii. [1869) 240 t 220.—rfab.!

ntartca, Georgi, Beschreib. Russ. Reich, ûi. IT. 890 laolmonledebouri.

J"0"01' Jail- Rdse, iii. 727=lxiolirion tataricum.

lenella, Thunb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 72-V»rpolysi spiralis.

toxi D. Dietr. Syn. PL ii. 1181 - Bnmsvigi» toxicaria.

tubiflora, **L'Hérit. Sert. Angl. 10(= *Pyrolirion aureum*).** —Peruv.

tubispatha, **L'Hérit.** l. c. 9=Zephyranthes tnbispatha.

Umbella, **L'Hérit.** 1. c. 15=Cyrtanthus obliquus.

undulata, **Linn.** Syst> e4 XH- 287=Nerine nndalata.

us &?*ulat*> Mart, ex Schnlt £ Syst vii. 189 = Ppeastrnm calyptratum.

vag A'tfa, D. Dietr. Syn. PL ii. 1181 =Stramaria ta cata.

valparadisi ca, Steud- N<M».ed. IL L 18S *(=Ha6ranthus pal*

variabilis, **Jacq. Hort.** Schoenb_ iTi „ „ *Ctiam* variabil e

venust «, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1090-Nerine annensis.

verecunda, Salisb. Prod. 229=Zephyr«nthes Atamajco.

verecunda, Schnlt f- Syst TM. 8*0 = Zephyranthes verecunda.

vernalis, **Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10 = Hypoxis stellatus.**

Verreauxii, *Hor* (1882) t. 119.

versic **Spreng.** Syst. Cur. Post 188 *(=Habra*tkus vers r).*

vit vhfj? L, * "rit Sert. Angl. 18=Hippeastnun vittatnm.

*yiri P*ra,* Lam. Encyc. i. 123-Crinnm defixnm.

m^°!1"' Thol»I»- Bot. Displ. t. 12 = Crinum

-ytanica, Linn. Sp. PI. 298-Crinum zeylanieutn.

AMARYLLIS, Sweet, Hort. F-it ed. a 506 (18»0)-**Hippeastrum, Herb.**

AMASONIA *VER-*

BENACEAE, Benth. & riook. f'ii. 1147.

DIPHYSTEMA, Neck. Elem. L 882 (1790).

Di^TfMMA, Neck.1 ex DC. Prod. vii. 306. in nota (1888) lapsu.

IAWGALEA, Aubl. PI. Gni. ii. 62S, 12S2 (1775).

AMASONIA:-

angnstifolia, *Mart. & Schau. in DC. Prod.* xi. 678.—Bras,

arborea, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 263.—Venezuela.

erecta, *Linn.f. Suppl.* 294.—Guiana,

hirta, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 451.—Guiana:

integerrima, *Spreng. Syst.* ii 766.—N. Granat

lasiocaulon, *Mart. & Schau. in DC. Prod.* xi. 678.—Am. anstr,

punicea, *Vahl, Sclog.* ii. 6L—Ins. Trinit

Taligalea, Auot ex Steud. Nom. ed. II. i. 74=erecta.

velutina, *Schau. in DC- Prod.* xi. 677<-^Bras.

AMATHEA, Rafin. Fl. TeUur. iv. 65· (1836)=Aphelandra, R. Br. (Acanth.).

pulchra, Rafin. L c-Aph. pnlcberriUO.

AMATULA, Medic. Bot Beobacht. 88 (1782) | Malv, 106 (1787) -=lyooperalouiji, Mill. (Solan.).

flava, Medic. Malv. 106 - L. esculentum.

rubra, Medic. L c L esculentum.

AMATTBIA, Benth. Bot Voy. Sulph. 31 (1844).

COMPOSITAE. Benth. & Hook. £ ii. 404.

dissecta, *A. Gray, PI. Pendl.* 104.—N. Mexic.

rotundifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 81.—Calif.

AMAXITIS, Adans. Fam. ii. 34 (1768)-Daotylis, Linn. (Gramin.).

AMBAIBA, Adans. 1. c. 477 (176»)=C3e«ropia Loefl. <Urtic.).

AMBASSA, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 364 (1868) = Vernonia, Schreb. (Compos.).

Hochstetieri, Steete, 1. c.-V. Hochstetteri.

AMBELAKIA, Aubl. Pi. Gui. i. 265. t. 104 (1775).

APOCYNACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 694.

BENTECA, Adans. Fam. ii. 166 (1763).

KASATLO, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818).

WILLUCHBEIA, Scop, in Schreb. Gen. 162 (1789).

adda, *Aubl. PL Gui.* i. 265.1.104.—Guiana,

cuneata, *Muell. Arg. in Mart, f 1. Bras.* vi. 1.17.—Bras,

laxa, *Muell. Arg. I.* c—Am. anstr,

macrophylla, *Muell. Arg. 1. c.* 18.—Bras,

quadrangularis, *Muell. Arg. I. c*—Bras.

Sugoti, Muell. Arg. in Linnaea, xn. X1869-A6) 389. —Guiana,

tenuiflora,if««. *Arg. in Mart. Ft. Bras.* vi. I. 16. —Bras.

AMBERBOA,Lesa. Syn. Comp. 8 (1882) = Volntaxella, C«ss. etc. (Compos.).

abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 45>*»Centaurea Hdchstetteri.

Bollei, Sch. Bip. ex C. Bolle,in BonpIandia,Tii. (1869) 297—Ins. Canar.

carthamMes, DC. Prod. vi. 661 *(^Phaeopappus carthamoides).*

crupinoides, DC. 1. c. 659 - V. tricolor.

decurrens, DC. 1. c. 560=Centaurea decurrensi

discolor, Lojac in Natural. Sicil. iv.(1885) 1»3.—Sicil.

erucifolia, DC Prod, vu 559=V. erucifolia.

glauca, Less. Syn. Comp. 8=Centaurea mojchata!

Goniocaulon, DC. Prod. vi. 558 •= Goniocanlon glabrnm.

Hochstetteri, Baching, ex Oliver, Fl. TrOp. Afr. iii. 438 =Centaurea Hochstetteri.

inamescens, DC. Prod. vi. 661=Centturea integrifolia.

indica, DC. 1. a 558=Goniocaulon glabrum.

lancifolia, DC. 1. *c* 661=C«ntanrea lancifolia.

leucantha, Coss. Ind. PI. Maroc. 21.—Algeria.

Lippii, DC. Prod. vi. 559=V. Lippii.

micractit, Boiss. & ReutDiagn. Ser. II. Ui. 62.—Algeria.

moschata, Less. Syn. Comp. 8 = Centaorea moschata.

muricata, DC. Prod. vi. 659=V. muricata.

odorata, DC. L c.-=Centanrea moschata.

Perralderiana, Coss. in Bull. Soc. Bot Fr. xxii. (1875) 62, nomen.—Afr. bor.

phaeopappa, DC. Prod. vi. 660=Centaurea leuteoides.

sinaica, DC. 1. c. 559-V. bicolor.

spectabilis. DC. 1. c. 561 *(=Phaeopappus spectabilis).*

WaUichiana, DC. 1. c. 668=Centaurea Wallichiana.

xantkocephala, DC. 1. c. 661 *("Psephellus xanthocephalus).*

AMBERBOI, Adans. Fam. ii. 117 (1768) - AMBERBOA.

AMBINAX,Comm.exJuss.Gen.SS9(1789)=Aleurites, Forst. (Enphorb.).

AMBLACHAENIUM, Tnrcz. ex DC. Prod. vii. 94 (1838) =Hypoohoerls, Linn. (Compos.).

auraittiacum, -Tarcz. ex DC. 1. c = H. grandiflora.

AMBLATUM, [Tourn.1 G. Don, Gen. Syst iv. 635 (18371 =ANBLATUM, Toum.=Latbjraea, linn. (Orobanch.).

AMBLEIA, Spach, Hist *Vig.* Phan. ix. 166 (1840), nomen s-Staohys, Linn. (Labiat).

AMBLIRION, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 265 =Fritillaria, Linn. (Liliac).

album, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 5&8 = K. alba.

camtschacense, Sweet, 1. c. = F. kamtschatcensis.

grecum, Rafin. Fl. Tellur. ii. 85 »=F. graecum t

lanceolatum, Sweet, 1. c. = F. kamtschatcensis.

pudicum, Kafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 265=F. pudica.

AMBLOGYNA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 42 (1886)=Amaranthus, Linn.

fimbriata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 167, 16a=Amar. fimbriatus.

palygonoides, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 219-Amar. polygamus.

polygonoides, Rafin. Fl. Tellur. iii. 42=Amar. polygonoides.

scariosa, Moq. in DC. Prod. Jtiii. II. 269; A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 169=Amar. scariosus.

squarrulosa, A. Gray, 1. c.—Ins. Galap.

Torreyi, A. Gray, 1. c. 167,169«Amar. Torreyi.

urceolata, Moq. in DC. Prod. xlii. II. 269; A. Gray, 1. c. 168"=Amar. urceolatus,

AMBLOSTIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 26 (1836)-Schoenolirion, Ton. (Liliac).

albiflora, Rafin. 1. c=Sc. Elliottii.

crocea, Rafin. L c=Sc. croceum.

latifolia, Rafin. ex S. Wats, in Proc Am. Acad. xiv. (1879) 242=Sc Elliottii.

AMBLOSTOMA, Scheidw. in Otto & Dietr. Gartenz. vi. (1888) 888. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 522.

cemuum, *Scheidv. 1. c.*—Bras,

densiim, *Reichb./. Xenia Orch.* iii. 22.—Peruv.

micranthum, *Reichb. f. in Saund. Refug. sub* t. 101. —Boliv.

tridactylum, Reichb. *f.* inWalp. Ann.vi. 485 -cernuura.

AMBLYACHYRUM. Hochst. -x Steud. Syn. Fl. Gram. 413 (1855)=ApoooplB, Nees (Gramin.).

mangalorense, Hochst ex Stead. I. c.: et in Flora, xxxix. (1856) 26=Apoo. Wightii.

AMBLYANTHERA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 50 (1849)=Osbeokia, Linn. (Melast.).

parnfolia, Blume, 1. c.=O. parvifolia.

truneata, Blume, 1. t = O. truncata.

AMBLYANTHERA, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras, vi 1. 141, t. 44, 4fi (1860)-Uandevilla, Lindl. (Apocyn.).

acutiloba, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 426 —Echites acutiloba.

andina, Muell. Arg. 1. c 425-Echites andina.

Andrieuxii, MuelL Arg. *h* c. 422-Mandevilla Andrieuxii.

angustifolia, Muell. Arg. 1. e. 430 «= Echites ingastifolia.

antennacea, Muell. Arg. L c. 448-Echites aotennacea.

Benthami, Muell. Arg. 1. c. 451=Echites Benthami.

bogotensis, Muell. Arg. 1. c, 452=Echites bogotensiB.

brachyloba, Muell. Arg. 1. c. 423 «Echites brachyloba

Bridgesii, Mnell. Arg. 1. c. 420.—Boliv.

campestris, Muell. Arg. in Mart Fl. Bras. vi. 1.148-Echites campestris.

ciliata, Muell. Arg. 1. c. 145 =Ethitesciliata.

Claussenii, Miers, Apocyn. 8. Am. 274, t. 25.—Am. austr.

convolvulacea, Muell. Aig. i* Linnaea, xxx. (1859-60.) 480 = M. convolvulacea.

AMBLYANTHERA :—
crassifolia, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1.143-Echites crassifolia.
euiabensis, Muell. Arg. 1. c. 145=Echites cuyabensis.
cuyabensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 150 = praec.
Fendleri, Muell. Arg. I.e. 417.-Venezuela.
foliola, Muell. Arg. 1. c. 427 = Mandevilla foliosa.
jluminensis,Mue\l. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 148 = Echites fluminensis.
funiformis, Muell. Arg. 1. c. 144=Echites funifonnis.
guyanensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 448 = Echites gnianensis.
hirsuta, Miers, Apocyn. S. Am. 185 = M. hispida ?
hispida, Muell. Arg. id Mart. Fl. Bras. vi. I. 147 = M. hispida.
Karwinskii, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 426 - M. Karwinskii.
lasiocarpa, Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 118 = M. hispida.
leptophylla, Muell. Arg. in Mart. Fl.Bras. vi. I. 142 = Echites leptophylla.
macrophylla, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 449 = Echites macrophylla.
madida, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 150-Echites madida.
membranacea, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 423, in nota = Echites membranacea.
mexicana, Muell. Arg. 1. c. 424-Echites mexicana.
microcalyx, Muell. Arg. 1. c 428=Echites microcalyx.
Moritaiana, Muell. Are. 1. c. 421.—N. Granat.
ovata, Miers, Apocyn. S. Am. 188.—Boliv.
oaxacana, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 447 - M. oaxacana.
palustris, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 145 = M. palustris.
pandurata, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 448 = Echites pandurata.
Pavonii, Muell. Arg. 1. c. 450 = Echites Pavonii.
Prieurei, Muell. Arg. 1. c. 448 = Echites Prieurei.
Schlimi, Muell. Arg. 1. c. 419.—N. Granat.
Spruceana, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 143.—Bras.
suaveolens, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 447 = M. suaveolens.
subsessilis, Muell. Arg. 1. c.=Echites subsessilis.
torosa, Muell. Arg. 1. c. 446 = Echites torulosa.
tubiflora, Muell. Arg. 1. c. 454 = Echites tubiflora.
versicolor, Muell. Aig. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 146 = Echites versicolor.

AMBLYANTHUS, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 83. t. 6. *MYRSINEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 648.
glgndulosus, *A. DC. I. e.*—Reg. Himal.

AMBLYCARPUM, Lem. in Orb. Diet i. 385 (1841) = Amblyocarpum, Fisch. *Sc* Mey. (Compos.).

AMBLYCHLOA, Link, in Linnaea, xvii. (1843) 399 = Sclerochloa, Beauv. (Gramin.).
dura. Link, 1. c = S. dura.

AMBLYGLOTTIS, Blume. Bijdr. 369. t. 64 (1825) = Calanthe, R. Br. (Orchid.).
abbreviata, Blume, 1. c. 371=C. abbreviata.
angustifolia, Blume, 1. a 369=C. angustifolia.
emarginata, Blume, 1. c. 370 = C. emarginata.
/lava, Blume, 1. c. t. 64 - C . veratrifolia.
pilosa, De Vriese, ex Lindl. Fol. Orch. Calanthe, 11 = C. pilosa. «
putchra, Blume, Bijdr. 871—C. curcnligoides.
speciosa, Blume, 1. c. 371—C. speciosa.
•veratrifolia, Blume, 1. c. 870 - C . veratrifolia.

AMBLYGONUM, Reichb. Handb. 236 (1837)=Polygonum, Linn.

AMBLYLEPIS, Decne. in Orb. Diet. i. 887 (1841) = Amblyolapis.

AMBLYOCALYX, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 698 (1876). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii.698.
Beccarii, *Benth. in Hook. Ic. PI.* 1.1179.—Borneo.

AMBLYOCARPTJM, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. SO (1887). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 836.
inuloides, *Fisch. &• Mey. 1. c*—Reg. Caspica.

AMBLYOGLOSSUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxv. (1852) II. 810=Tylophora,R. Br. (Asclep.).
brevipes, Turcz. 1. c 311-=T. brevipes.
longipes, Turcz. I. c.—Malaya.

AMBLYOLEPIS, DC. Prod. v. 867 (1836) - Heleolum, Linn. (Compos.).
setigira, DC. 1. c—Mexic

AMBLYOPAPPUS, Hook. *Sc* Am. in Hook. Jonrn. Bot iii. (1841) 321. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook, f. ii. 406.
AROMIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 39S.
INFANTEA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 257. t. 48 (1849).
mendocinus, *Phil. Serf. Mend. Alt.* 26.—Chili,
neo-mexicanus,^. *Gray, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 106.—Mexic.
pnsillus, *Hook. & Am. in Hoot. Journ. Bot.* iii. (1841) 321.—Chili.

AMBLYOPELIS, Steud. Nornenclat. ed. II. i. 75 (1840), sphalm. = AMBLYOLEPIS, DC.

AMBLYOPOGON, Fisch. *Sc* Mey. ex DC. Prod. vi. 561 (1887) = Centaurea, Tonrn. (Compos.).
Balansae, Boiss. Fl. Orient, iii. 604, in syn. = C. Balansae.
cmcinnus, Boiss. *Sc* Huet, Diagn. Ser. II. iii. 65 - C. pulcherrima.
incanescens, Fisch. *Sc* Mey. ex DC. Prod. vi. 561 - C. integrifolia.
speciosus, Boiss. Fl. Orient, iii. 604, in syn.=C. pulcherrima.

AMBLYORHINUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 168-Phyllaetia, Pers. (Valerian.).
angustifolium, Turcz. 1. c. 169.—Venezuela.
grandiflorum, Turcz. 1. c. 168.—Venezuela.
phylicoides, Turcz. 1. c. 171.—Venezuela.
spicatum, Turcz. 1. c. 170-P. cordifolia.
triplinerve, Turcz. L c.—Venezuela.

AMBLYSPERMA, Benth. in Enum PI. Hueg. 67 (1837) =Trichocline, Cass. (Compos.).
scapigerum, Benth. 1. c—T. scapigera.

AMBLYSTIGMA, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 748 (1876). *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. ii. 748.
cionophorum, *Fourn. in Ann. Sc. If at.* Sér. VI. xiv. (1882) 366.—Reg. Argent,
hypoleucum, *Benth. in Hoot. Ic. PI.* xii. 76. t. 1188.—Bolivia.
pedunculare, *Benth. I. c.* 77. sub 11188.—Bolivia.

AMBLYTES, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 80 (1887) = Molinia, Scop. (Gramin.).
caerulea, Dulac, 1. c = M. caerulea.

AMBORA, Juss. Gen. 401 (1789) - Tambourissa, Sonn. (Monim.).
alternifolia, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. iii. (1855) 81 = T. altemifolia.
amplifolia, Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 299 = T. amplifolia.
cymosa, Tul. in Ann. Sc. Nat. *Sh.* IV. iii. (1855) 31 (an Rubiacea?).—Hab. ?
elliptica, Tul. 1. c = T. elliptica.
Ficus, Tnl. 1. c. 30 « T. Ficus.
fruticosa, Boiv. ex Tul. 1. c.=T. purpurea.
grandifolia, R. Br. ex Baker, Fl. Maurit. 287 = T. amplifolia.
leptophylla, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. iii. (1855) 39 = T. leptophylla.
neglecta, Tul. in Arch. Mas. Par. viii. (1856-66) 432 = T. neglecta.
obmata, Tul. in Ann. Sc Not Se'r. IV. t. iii. (1855) 31 =T. obovata.
peltatus, R. Br. ex Baker, Fl. Maurit. 288=T. peltata.
purpurea, Tul. in Ann. Sc. Nat. *Sii.* IV. iii. (1855) 30 —T. purpurea.
quadrifida, Poir. Encyc. vii. 565=T. quadrifida.
racemosa, R. Br. ex Baker, Fl. Maurit. 288=T. quadrifida.
religiosa, Til. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* IV. iii. (1865) 30 =T. religiosa.

AMBORA :—
semperrirens.V.G. Dietr. Lexik. Gaertn. i. 842-T. quadrifida.
Sitteri, Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 304 = T. Sieberi.
Tambourissa, I Am. ex Stend. Norn. ed. I. 37, 535 - T. quadrifida.
Tambourissa, Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1866-58) 303=T. Boivinii.
tetragona, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. iii. (1865) 80=T. tetragona.
tomentosa, Bory,Voy. i. 317.1.13=Monimiarotundifolia.
tomentosa, Sieber, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. iii. tl855) 81=T. Sieberi.
vestita, Tul. 1. c.=T. vestita.

AMBOHELLA, Baill. Hist. PI. i. 328 in nota (1869); et Adansonia, x. 354 (1873). *MONIMIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 142.
trichopoda, *Baill. I. c*—N. Caled.

AMBRARIA, Cruse, Rub. Cap. 16. t. 1, f. 8, 4 (1825) = Nenax, Gaertn. (Rubiac).
acerosa, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. 34=N. acerosa.
glabra, Cruse, Rub. Cap. 16. t. 1=N. acerosa.
hirta, Cruse, 1. c.—Afr. austr.
microphylla, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. 34.—Afr. austr.

AMBRARIA, Heist.Syst. 11 (1748) = Anthospermum, Linn. (Rubiac).
Heisteri, Willd. Sp. PI. iv. 732 in syn.=Anth. aethiopienm.

AMBRINA, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 295 (1836) = Chenopodium, Linn.
ambrosioides, Spach, 1. c. 297 = C. ambrosioides.
anthelmintica, Spach, 1. c. 298 = C. ambrosioides.
Botrys, Moq. Chen. Enum. 37 = C. Botrys.
carinata, Moq. 1. c. 41 = C. carinatum.
chilensis, Spach, Hist. \ig. Phan. v. 297 =C. chilense.
denudata, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-68) 87 - Roubieva multifida.
dissecta, Moq. Chen. Enum. 88=C. bipinnatifidum.
foetida, Moq. 1. c. 88 = C. Botrys.
graveolens, Moq. 1. c. 41—C. graveolens.
indsa, Moq. 1. c. 86 = C. incisum.
obovata, Moq. 1. c. 40=C. obovatum.
pinnatisecta, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 296 = Roubieva multifida.
Pumilio, Moq. Chen. Enum. 42=C. Pumilio.
retusa, Moq. 1. c. 40=C. retusa.
spathulata, Moq. 1. c. 39 = C. spathulatum.
tenuis, Moq. 1. c. 42 = Roubieva multifida.
tomentoia, Moq. I. c. 87=C. tomentosum.

AMBROMA, Linn. f. Suppl. 64,341 (1781) = Abroma, Jacq. (Stercul.).
Augusta, Linn. f. 1. c 341 = Abr. fastuosum.

AMBROSIA, Bassi, in Comm. Bonon. v. (1763) 82 = Ambrosinift, Linn. (Aroid.).

AMBROSIA, Linn. Gen. ed. I. 287. n. 718 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 354.
abrotanifolia, *Wall. Cat.* n. 3234.—Bras.
absynthyfolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 183 =artemisiaefolia.
acanthicarpa, Hook. Fl. Bor. Am. i. 309=Franseria Hookeriana.
aptera, *DC. Prod.* v. 527.—Am. bor.
arborescens,Lara- Encyc. i. 127 =Franseriaartemisioides.
arborescens, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 6.—Peruv.
artemisioides, *Mey en & Walp. in Nov. Act. Nat, Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 268.—Peruv.
artemisiaefolia, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 890 = maritima.
artemisifolia, *Linn. Sp. PI.* 988.—Am. bor.
bidentata, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 182.—Am. bor.; Ind. occ.
cheiranthifolia, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound,* 87.—Mexic
chilensis, *Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1840) 311.—Chili.
confertiflora, DC. Prod. v. 526 = Franseria tenuifolia.
coronopifolia, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 271 = psilostachya.
crithmifolia, DC. Prod. v. 525= hispida.

AMBROSIA:-

cumanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 276.—Venezuela.
rtaja, Salisb. Prod. 175 -artemisifolia.
gigttor, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 889=maritima.
fruticosa, DC. Prod. p. 987-artemisifolia.
fruticosa, Medic. in Act. Acad. Nov. P«l*t. iii. Phys. (1775) 247 = arborescent
glandulosa, [illegible] in Linnaea, xvii. (1849) = psilostachya.
heterophylla, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 877 = artemisifolia.
hispida, Pursh, Fl. Am. Sept. Suppl. 743.-Florida.
hispida, Torr. in Ann. Lyc. N. Y. (1828) 216 = psilostachya.
humilis, Vell. Fl. 7W «• *• 25-Bras.
incisa, F. G. Stev. Lexik. Gaertn. 3" =artemisifolia.
integrifolia, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. 2,75-trifida.
Lindheimeriana, Scheele, in Linnaea, = psilostachya.
longistylis, Am. Gray in Pl. Fendler. '• = Franseria tenuifolia.
longustyli, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 844.-Am. bor.
maritima, Fenero, et DC. Prod. v. 525-crithmifolia.
maritima, *Linn. Sp. Pl.* 988.—Europ.; Oriens; Afr. bor.
maritima, Vell. Fl. Flum. «• *• 26=polystachya.
microcephala, DC. Prod. r. 6 2. 7 G W. —Peruv.
orobanchife
paniculata, [illegible] cluL Fl. Bor. Am. il. 183 = artemisifolU.
peruviana, DC. Prod. v. 526=psilostachya.
peruviana, Wil
Pitcheri, Torr. in Hook. Comp. Mag. (1886) 99 = Iva
polystac
phya, DC. *l. c.*—Am. bor. Bras.
pumila, A. Gray in Proc. Am. Acad. (1881-82) 217.—Am. bor.
pusilla, [illegible] DC. Prod. T. 827 = artemisifolia.
scabrida, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1840) 311.—As.
senegalensis, DC. Prod.-'-625-maritima.
simplicifolia, Raensch. N<"n- ed- ™. 274-artemisifolia.
tacorensis, Reise. «6.-Peruv.
tenuifolia, Gren. & Godr. Fr> U- 89S Fnulseria tenuifolia.
tenuifolia, Spreng. Syst. 851=polystadiya1
tomentosa, Nutt. Gen. Am. ii. 186=ttanseria discolor.
trifida, L. Sp. Pl. 987—Am. bor.
umbellata, Moench. Meth. Suppl. 272 = maritime,
villosa, Arrf. *Aegypt.Arab.* 160—Arabia.

AMBROSIN, *AROIDEAE.* Benth. & Hook. f. iii. 964. 17 (1764) = Amb.
Bassi in Comm. Bonon. v. (1768) 82.
Sprengel, Syst. iii. 517.-Europ.
ciliata, Roxb. Fl. Corom. 90=Cryptocoryne ciliata.
maculata, Ucria in Act. Acad. Sienna, 128=A. Bassii.
retzii, Eaton, Man. Bot. ed. 6, 24,176, sea Guss.
umbellata, Moench. Meth. Suppl. 272 = maritime,
villosa, Forsk. Descr. Arab. 160—Arabia.

AMBROSINIA, Linn. Gen. No. 1128 (1764) = Ambrosinia.
Bassii, Linn. Sp. Pl. 1482 (1753).—Europ.
Bassii, Linn. in Comm. Bonon. v. (1768) 82.
Sprengelii, Schott, Syst. iii. 517.-Europ.
ciliata, Roxb. Hort. Beng

AMERINA.DC. inMeissn. Gen.278(1840) - Aegiphila, Jacq. (Verben.).
ternifolia, DC. Prod. ix. 613.—N. Granat.
tomentosa, DC. 1. c - Aeg. tomentosa t
triphylla, DC. 1. c—Afr. auatr.

AMERINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) Art. iv. 1 j ed. IL (1827) 64=Aglaia, Lour. (Meliac.).

AMERINA, Rafin.AIsog.Amer. 15 (1838) =Salix,Tourn.
Balduiniana, Rafin. 1. c. 16.—Am. bor.
caroliniana, Rafin. I. c. 15=S. nigra.
glandulosa, Rafin. 1. c = S. pentandra.
Houstoniana, Rafin. 1. c—S. nigra.
missurica, Rafin. 1. c. 16.—Am. bor.
nigra, Rafin. 1. c 15=S. nigra.
tinctoria, Rafin. 1. c. 16.—Am. bor.
tomentosa, Rafin. 1. c - S. Lapponum.

AMETHYSTEA, Linn. Amoen. Acad. i. 386 (1749).
LABI ATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1220.
AMETHYSTINA, Mess, ez Hall, in Act. Upsal. 1742 (1748) 51. t 4.
caernlea, *Linn. Sj. PI.* 21.—Sibiiia.
corymbosa, Pers. Syn. i. 24= caernlea.
trifida, Hill, Veg. Syst xvii. 44=caernlea.

AMETHVSTINA, Mess, ex Hall, in Act. Upsal. 1742 (17*8)61. t 4=praec.

AMETRON, Rafin. Sylra Tellur. 160 (1888)=Bubus, Tonm. (Rosac).
pedatum, Rafin. 1. c. 161=R. pedatus.
fyrifolium, Rafin. Lc.=R. pyrifolius.

AMHEHSTIA, Wall. PI. As. Rar. i. 1.1.1, 2 (1830).
LEGUMINOSAE, Beniin. & Hook. f. i. 678.
nobilis, *Wall: I. c*—Burma.

AMIANTANTHUS, Kunth, Enum. PI. iv. 179 (1848)- AMIANTHIUM, A. Gray-Zygadflaus, Michx. (Liliac).

AMIANTHEMUM, Stend. Norn. ed. II. i. 76 (1840) - seq.

AMIANTHIUM, A. Gray, in Ann. Lye N. York, iv. (1848) 121-Zygadenus, Michx. (Iiliac).
angustifolium, A. Gray, I. c. 124 = Z. angustifolius.
aspericaule, A. Gray, 1. c. 126 = Melanthium aspericanle.
leimanthoides, A. Gray, 1. c. 126 = Z. leimanthoides.
macrotox, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 27 = Z. mnscaetoxicam.
muscaetoxicum, A. Gray, in Ann. Lye. N. York, iv. (1848) 122 = Z. mnscaetoxicum.
lfuttallii,A.Gnj,l. c 12S = Z.Nuttallii, pauiculatus.

AMIANTHUM, Rafin. Fl. Te lur. iv. 27 (1836)=praec

AHICIA, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 611. t. 600. (1823). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 614.
ZYGOMERIS, MOC. &Sesse,exDC. Prod. ii.315(1826).
glandnlosa, *H. B. & K. I. c*—N. Granat
medicaginea, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 106. —Reg. Argent.
Zygomeris, *DC. Prod.* ii. 316.—Mexico.

AMICTONIS, Rafin. Sylva Tellnr. 161 (1888) - Calli-oarpa, Linn. (Verbenac).
japonica, Rafin. 1. c—C. longifolia.

AMIDA, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) &90=Madia, Molina (Compos.).
gracilis, Nntt. 1. c. - M. glomerata.
hirsuta, Nntt I.e.=M. glomerata.

AMIDENA, Adans. Fam. ii. 470 (1763)-AriBaema, Mart. (Aroid.).
japonica, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 15 = Arisaemajaponicnm.

AMIRIS, La Llave, in La Natnraleza, vii Apénd. 71 (1885) = AmyriB, Linn. (Rntac.).

AMIROLA, Pers. Syn. ii. 565 (1807)=Llagunoa, Rniz & Pav. (Sapindac.).
glandulosa, Hook. & An. Bot. Beech. Voy. 12=LI. glandnlosa.
mollis, DC. Prod. i. 616-LI. mollis.
nitida, Pers. Syn. ii..565 = D. nitida.
parvifoliai Stend. Norn. ed. II. i. 76-LI. nitida.
pntnifolia, DC. Prod. i. 616 = LI. pmnifolia.

AMISCHOTOLYPE, Hassk. in Flora, zlvi. (1863) 891 — Forrestia, A. Rich. (Commelin.).
glabrata, Hassk. 1. c. 392 = F. glabrata.
marginata, Hassk. 1. c. = F. marginata.
mollissima, Hassk. 1. c. = F. mollis.

AMMANELLA, Miq. Fl. Ind. Bat i. 1.618 (1856) = Am-mannla, Linn. (Lythrar.).
linearis, Miq. 1. c. 619 = Ammannia octandra.

AMMAHTTIA, [Houst] Linn. Gen. ed. I. 337(1737).
LYTHRAR1EAE, Benth. & Hook. f. i. 776.
AMELETIA, DC. in Me'm. Soc. Phys. Genev. iii. II. (1826) 82.
CORNELIA, Ard. Specim. ii. 9.11 (1764).
CRYPTOTHECA, Blume, Bijdr. 1128 (1826).
NEXILIS, Rafin. New Fl. Am. iv.'9 (1886).
ORTEGIOIDKS, Soland. ex DC. Prod. iii. 76 (1828).
NIMMOIA, Wight, in Madras Jonrn. Sc. vii. (1887) 811. t. 20.
ROTALA, Linn. Mant ii. 143 (1771).
SEIAOWIA, Roth, ex Roem. & Schult Syst v. 407 • (1819).
SUFF&ENIA, Bellardi, in Act Tanr. vii. (1796) 446. t. 1.
TRITHECA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 614 (1855).
WINTBRLIA, Spreng. Syst. i. 619 (1826).
acutidens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 617 = peploides.
aegyptiaca, Kotschy, ex Koehne, in Engl. Bot Jahrb. *I.* (1881) 253, 254-urceolata, apiculata.
aegyptiaca, Willd. Hort. Berol. t. 6=salicifolia.
alata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 76.—Reg. Caucas.
anagalloides, Sond. in Linnaea, xxiii.(1850) 40-Nesaea anagalloides.
apicnlata, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 254. —Afr. trop.
arenaria, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 190= senegalensis.
aspera, Gnill. & Pen. Tent Fl. Seneg. i. 304-Nesaea aspera.
attenuate, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 278 —baccifera.
auriculata, Willd. Hort. Berol. i. 7. t 7-senega-lensis.
australasica, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. 1. (1856) 41 = multiflora.
baccifera, Roth, Sp. Nov. 100—leptopetala.
baccifera, *Linn. Sp. PI.* 120.—Geront. calid.
baccifera, Pollini, Fl. Veron. i. 178=salicifolia.
Boraei, Gu^p. Suppl. Fl. Maine-et-Loire, 39-Lythnun nnmmnlarifolinm.
borystkenica, DC. Prod. iii. 78=Lythnun nummnlari-folinm.
borystkenica, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. xiv. (1841) 421=Peplis altemifolia.
caspia, Hohen. Ennm. Talysch. 133= baccifera.
caspica, Bieb. FL Tanr. Cauc. ii. 457.; Suppl. 111 = salicifolia.
catholica, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 878-latifoIia.
catholica. Hook. *Sc* Am. ex Seem. Bot. Voy. Herald, 284-latifolia.
coccinea, Pen. Syn. i. 147 = octandra.
cocdnea, Rottb. PI. Hort. Univ. (Havn.) Programm. Descr. (1773) 7=latifolia.
cordata, *Wight & Am. Prod.* 304.—Ind. or.
crassicaulis, Gnill. *Sc* Perr. Tent Fl. Seneg. i. 803-Nesaea polyantha.
crinipes, V. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet Ui. (1859) 49—Nesaea crinipes.
cryptantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 346.—Madag.
debilis. Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 163= baccifera.
densiflora, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 569= salicifolia.
densiflora, Roth, Sp. Nov. 99—pentandra.
dentifera, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 65.—Am. bor.
dentelloides, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 76.—Bengal,
diandra, *F. Muell. Fragm.* iii. 108.—Austral.
diffusa, Willd. Enum. Hort Berol. i. 167-senega-lenais.
dodecandra, DC. in Mém. Soc. Phys. Genèv. iii. II. (1825) 89. t. 2-Nesaea Candollei.
elatinoides, *DC. I. c.* 92. t. 3. f. B.—Afr. trop.
elatinoides, Schimp. ex Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 468 (=*Rotala stagnina).*
elongata, Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. ii. 136 = peploides.

ATWTWATIfTBTA :
filiformis, Baill. Hist. PI. vi. 438 (= *Rotala fili-formii).*
filiformis, DC. in *Him.* Soc. Phys. Genèv. iii. n. (1825) t. 79 — senegalensis.
fimbriata. Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 569=pentandra.
florlbnnda, *C. B. Clarke, I. c.* 567.—Ind. or.
floribunda, Gnill. & Perr. Tent. Fl. Seneg. i. 802= senegalensis, multiflora.
glauca, Wall. Cat. n. 2100-salicifolia.
gracilis, Guill. *Sc* Perr. Tent. Fl. Seneg. i. 301-senega-lensis
hastata, DC. Prod. iii. 78-latifolia.
hexandra, Wall. Cat. n. 2103-pentandra.
Heyneana, Wall. 1. c. 2104 = pentandra.
Hildebrandtii, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 257.—Afr. trop.
humilis, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 99.—Am. bor.
hyrcanica, Fisch. ex Stend. Norn. ed. II. i. 77= auri-culata.
illecebroides. Am. ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 161 (=*Rotala decussata).*
indica. Lam. Illusfr. i. 311. n. 1565=baccifera.
japonica, Miq. in Ann. Mns. Bot. Lngd. Bat. U. 261.— Japon.
Unceolata, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 2106.—Ind. or.
latifolia, *Linn. Sp. PI.* 119.—Am. bor.; Ind. occ.
latifolia, Wall. Cat. n. 2096 - peploides.
latifolia, Walp. Rep. ii. 102=sangninolenta.
leptopetala, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 134.— Java.
lingulata, Griseb. Cat. PI. Cnb. 106=latifolia.
littorea, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 261.— Japon.
loandensis, Welw. ex Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 480 = Nesaea loandensis.
longipes, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 63.—Ind. occ.
lythrifolia, Salisb. Prod. 65-latifolia.
madagascariensis, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 129=mnltiflora.
microcarpa, DC. in Mém. Soc. Phys. Genev. iii. II. (1825) 93-multiflora)
monoflora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 64=latifolia?
multiflora, *Roxb. Hort. Beng.* 11; *Fl. Ind. ed. Carey,* i. 447.—Ind. or.
nana, Roxb. 11. cc. 11, 448 = peploides.
nana, Roxb. in Wall. Cat n. 2105 = pentandra.
Nuttallii, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed.[1] IV. add. p. xcii - Didiplis linearis.
occidental^, DC. Prod. iii. 78=hnmilis.
octandra, *Linn.f. Suppl.* 127.—Ind. or.; Malaya.
octandra, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, ii. (1627) 876 = latifolia.
pallida, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1823)8; (Linnaea, iii. (1829)9)=latifolia.
parm'flora, DC. Prod. iii. 77* multiflora.
passerinoides, Welw. ex Hiem; in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 480-Nesaea passerinoides.
pentandra, *Roxb. Fl. Ind.* i. 448.—Geront. trop.
peploides, *Spreng. Syst.* i. 444.—Oriens ; As. trop.
pinnatifida, *Linn.f. Suppl.* 127.—Java.
polystackya, Wall. Cat. n. 2094=peploides.
Portula, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1874) 87 = Peplis Portula.
Prieuriana, Guill. *Sc* Perr. Tent. Fl. Seneg. i. 303 = senegalensis.
prostrata, Buch.-Ham. ex Blume, Mns. Bot. Lngd. Bat. ii. 132'-baccifera.
purpurea, Lam. Encyc. i. 181 = humilis.
pusilla, Sond. in Linnaea, xxiii. (1848) 40=senega-lensis.
pygmaea, *Kurt, in Journ. Bot.* v. (1867) 876—Ind. or.
racemosa, Poir. Encyc. Suppl. i. 329 = arenaria.
racemosa, Roth, Catalect. fasc. iii. 26 = octandra.
ramosa, Hill, Veg. Syst. xi. 14=humilis.
ramosior, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 64 = peploides.
ramosior, Linn. Sp. PI. 120=humilis.
ramosior, Linn. Mant. ii. 382=latifolia.
repens, Rottl. ex Mart, in Acad. Muench. Phil. vi. (1820) 150, ex DC. Prod. iii. 80 = peploides.
retusa, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 254.— Afr. trop.
Ritchiei, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 566. —Ind. or.
robusta, Heer, Ind. Sem. Hort. Tnrie. (1842)-latifolia.
rosea, Poir. Encyc. Suppl. i. 329 (- *Rotala mexicana).*

AMMAinrcA:-
Rotala, *F. Muell. Fragm.* ill. 108.—Geront trop.
rotundifolia, *Buck-Ham, in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 220.—Ind. or.; China.
rubra, Bnch.-Ham. 1. c.-pentandra.
sagittata, DC. Prod. ili. 80-latifolia.
salicifolia, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. tt. 478-baccifera.
salicifolia, *Monti, in Comm. Bonon.* i. *Q39t)* 112.—As. ft Afr. trop.
Mlsnginosa, *Guill. & Perr. Tent. Fl. Sentg. I* 302.—Afr. trop.
sanguinolenta, Cham, ft Schlecht in Unnaea, v. (1830) 668-auriculata.
sanguinolenta, Heyne salicifolia.»« Stend. Norn, ed. H. 1. 77-
sanguinolenta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 83-latifolia.
"tguinolenta, Hook. ft Am. ex Seem.. Bot Voy. • Herald, 281 - latifolia.
tarçophylla, Welw. ex Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. "• 479-Nesaea sarcophylla.
•eaegaleusis, *Lam. Illustr.* i. 812. n. 166. t. 77. £ 3.—Geront. trop.
stylosa, Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. vll. 41-lattfolia.
subrotunda, *Wall, ex Kurt, in fourn. As. Soc. Beng.* «L (1871) II. 66—Ind. or.
witffcafa, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot L (1848) 484—rotundifolia.
subspicata, Hohen. ex Hook. £ FL Brit Ind. tt. 668-pentandra.
tenella, *Guill. frPerr. Tent. Fl. Seneg.* i 297.-A&. trop.
tennis, *C. B. Clarke, in Hook.f. FU Brit. Ind.* iL 667.—Ind. or.
texana, Scheele, in Linnaea, xxL (1848) 688-latifolia.
triflora, R. Br. ex Benth. Fl. AustraL ifi. 297-Nesaea lanceolate.
triflora, WalL Cat n. 6328-Nesaea triflora.
**ndulata,* C. A. Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. ix. 56= senegalensis.
"n^olata, *Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* tt. 478.—Afr. trop.
***rticillaris,* BaOL Hist. PI. vi. 489 *(-Rotalaverticillaris).*
nrticillata, Boiss. Fl. Orient il. 743-bacdfera.
verticillata, Lam. Encyc. i. 181-salicifolia.
"rtUittata, Wight ft Am. Prod. i. 804-lanceolate.
vencatoria, Roxb. Hort. Beng. 11; FL Ind. ed. Carey, .* *47-baccifera.
wn**, WiUd. ex Homem. Hort Ham. i. 146-bacdfera.
Wallichii, Kun, in Jonm. As. Soc Beng. xlvi. (1877) 11, 84-Hydrolythram Wallichtt.
Worniskioida, *Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* vu. 42.—Bras.
"ghtfl, *A. Gray, PI. Wright,* tt. 65.—Am. bor.

AMMANTHUS, Boiss. ft Heldr. Diagn. Ser. I. xi 18 <.lo49)-Chrysanthemiun, Toora. (Compos.).
"Sentifolius, Boiss. ft Heldr. ex Boiss. Fl. Orient ifl. 858 = C. maritimum.
Jutcaulis, Boiss. ft Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. L xL 19—Ins. Crete,
"writfmus, Boiss. ft Heldr. 1. c.=C. maritimum.

AM«H1, [Tourn.] Linn. Syst ed. L (1786); Gen. ed. I. ?2 (1787). *VMBELUFERAE,* Benth. ft Hook. £ 1. 089.
DASYSPERMUM, Neck. Elem. i. 276 (1790).
GOHORIA, Neck. 1. c. 172 (1790).
VISNAGA, Riv. ex Gaertn. Fruct *I* 92.121 (1788).
mfc, Spreng. in Roem. ft Schult Syst vi. 680-Chamaesciadinm acanle.
•nethifolium, *Lam. Encyc.* 1. 182.-Oriens; SiWr.
""ethifolium, Ledeb. Fl. Ross. ii. 246-ArtedU
fi«rtm,, Hellan. ex Hoffm. Gen. Umbell. p. xviilj Homem. Snppl. 32-majns.
Broussonetii, DC. Prod. iv. 118-majnst
eapillaceum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 164-Discoplenra <apillacea.
"cutaefolium, WiUd. ex Roem. ft Schnlt. Syst fi. 681—majns.
<**ctarium,* Waid. ex Roem. ft Schnlt 1. ft—Am. calid.

ABOUT :-
copticum, Tinn. Mant. 66-Carnm copticnm.
costatum, Ell. Sketch Fl. Carol, i. 860-Discoplenra capillacea.
crinitnm, *Guss. PI. Rar.* 128. t. 25.—Calabr.; Sidl.
daucifolium, Bnch.-Ham. in Wall. Cat n. 7209-Seseli daurifolinm.
daucifolium. Scop. Fl. Cam. ed. U. i. 207-Iibanotis Ath&ixicUitoidcfl.
daucoides, Salan. ex DC. Prod. iv. 118-Ammiopsis dancoides.
dilatatum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 119-A. Visnaga.
divaricatum, Michx. FL Bor. Am. i. 168-Apinm divaricatnm.
elatum,Sdiisb. Prod. 162-majns.
ferulaceum, Link, Enum. Hort.' Berol. L 266-Lignsticnm ferulaceum..
ferulatfolium. Lag. ex Loud. Hort Brit. 108-praec. I
glaudfolium, Blanco, FL Fflip. ed. I. 218-Carom copticnm.
glaudfolium, Linn. Sp. PL 248=>majns.
Huntii, *H. C. Wats, in Hoot. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 884.—Ins. Azof.
indicnm, *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* n. 7208.—Ind. or.
intermedium, DC. Prod. iv. 113-majns.
majos, *Linn. Sp. PI.* ed. L 248.—Enxop.j Oriens; Afr. bor.
majus, Walt Fl. Carol. 118-Discoplenra capillacea.
meoides, Pen. Syn. i. 808-anethifolinm.
minus, *Griseb. Hort. Gotting-* (1876) 8.—Enrop.
pauciradiatum, Hochst ex A. Rich. Tent Fl. Abyss.' i 822-majns.
petraselinoides, Presl, ex DC. Prod. iv. 102-Carom peregrinnm.
procernm, *Lome, Man. Fl. Mad.* 851.—Madera.
-psmilnm, *DC. Prod.* iv. 118.—Lnsitan.
pyrenaicnm, *Lapeyr. Hist. Air. PI. Pyr.* 145.—Pyren.
rubricaule, Homem. Hort Ham. i. 272-Discoplenra capillacea.
saxatile, *Tun*, ex Bess, in Flora,* xvii. (1884) I.; *Beibl.* 18, nomen.—Rossia.
trachycarpum, Fisch. ex Boiss. Fl. Orient, il. 855-Aphanopleara trachysperma.
Visnaga, *Lam. Fl. FT.* iii. 482.—Reg. Mediterr.

AMMIANTHUS, Spruce, ex Benth. ft Hook. f. Gen. ii. 98 (1878) - EetlnlphyUum, Hnmb. ft Bonpl. (Rnbiac.).

AHMIOF8IS, Boiss. Diagn. Ser. IL' A. 96 (1856). *VMBELUFERAE,* Benth. ft Hook. £ i. 927.
daucoides, Boiss. *I. c.* 97.—Manritan.

AMMIOS, Moench, Meth. 99 (1794)-Carum, Toum. (Umbellit).
muricata, Moench, 1. c.-C. copticnm.

AM3I0BTUM, R. Br. in Bot. Mag. t 2459 (1824). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. £ ii 816.
alatum, *R. Br. I. c.*—Austral,
craspedioides, *Benth. Fl. Austral,* iii. 684.—Austral.
pUntagineum, G. *Don, in Loud. Hort. Brit.* 838.—Austral.
spathulatum, Gaudich. Voy. Freyc Bot 467. t 91-alatum.

AMMOBBOMA, Torr. in Ann. Lye. N. York, viii. (1867) 61.11. *LENNOACEAE.Beath.* ft Hook. f. ii. 622.
Sonorae, *Torr. I. c.* 52.—N. Medc.

AMKOCHABIS, Herb. App. 17 (1821). *AMARYLLIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 727.
PALINKTZS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 116 (1866).
coranica, Herb. App. 17—falcata.
filcata, Herb. I. c.-Afr. anstr.
longifolia, M. Roem. Amar. 62-Crjnum longifolium.
Slateriana, Kunth, Enum. PL v. 613-Bnmsvigla Slateriana.

AMHOOSLOA, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 61 (1858). *GRAMINEAE.* Benth. ft Hook. f. iii. 1181.
CEPHALOCHLOA, COSS. ft Dor. in Ann. Sc Nat Ser. IV. i. (1864) 229.
palaestina, Boiss. Diagn. Ser. L xiii. 52-subacaulii.

AIOIOCHXOA:—
pungens, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiiL 52.—Afr. bor.
subacaulis, *Balansa, ex Coss. in Bull Soc. Bot. Fr.* i. (1864) 817; Iv. (1857) 899.—Syria; Afr. bor.

AMMODAUCUS,Coss. ft Dm. in Bull. Soc Bot. Fr. vi. (1869) 898-Dauoufl, Linn. (Umbellif.).
lencotrichus, *Coss. I. c. et* xxii. (1876) 60.—Algeria.

AMMODKNDBON, Fisch. ex DC. Prod. iL 528 (1826). *LEGUMINOSAE,* Benth. ft Hook. £ i. 654.
caspium, Eichw. Casp.-Canc. 7-Eichwaldii.
Conollyi, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 627.—Turkest.
Kichwaldii, *Ledeb. & Mey. in Eichw. Casp.-Caue.* 87. t. 38.—Reg. Cam.
Karelini, Bunge, PL ReL Lehm. 69-Conollyi.
Karelinii, *Fisch. & Mey. in Ledeb. Fl. Ross. i.* 717.—Reg. Casp.
Lehmanni, *Bunge, ex Boiss. Ft. Orient.* iL 628.—Turkest.
penicum, *Bunge, ex Boiss. I. c.* 627.—Persia.
Sievenii, *DC. Prod.* ii. 628.—Soongaria.
Zablotskii, *Fisch. & Mey. ex Kar. in Bull. Sec. Nat. Mosc.* (1889) 160, nomen.—Rossia.

AMMODENIA, Patrin. ex J. G. GmeL FL Sibir. iv. 160 (1789)-Aranaria, Linn. (Caryophyll.).
peplmdes, Rupr. in Beitr. Pfl. Rnss. Reich. iL 25-Ar. peploides.

AMMODIA, Nutt. in Trans. Am. PM. Soc Ser. II. vii. (1841) 821-Chzysqpaia. Nntt (Compos.).
oregana, Nutt. L c.=C. oiegana.

AMMODYTES, Stev. in Bull. Soc. Nat Mosc iv. (1882) 268=Astragalus, Tourn. (Legum.).
melilotoides, Stev. L c-Astr. melilotoides.

AMMOGETON, Schrad. Ind. Sem. Hort. Goett (1888) l-TrozUnon, Nutt. (Compos.).
scoraoneraefolius, Schrad. 1. c.-T. glaucom.

AMMOIDES, Adans. Fam. ii. 96 (1768)-Carom, Toum. (Umbellif.).

AMMOLIRION, Kar. ft Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 616-Eremurus, Bieb. (LiUac).
stenophyllum, Boiss. ft Buhse, in Nouv. Mém. Soc Nat Mosc xii. (1860) 218-E. Bungei.
Steveni, Kar. ft Kir. 1. c-E. inderiensis.

AMMONALIA, Desv. ex Endl. Gen. 966, in syn. (1840) -Arenarla, Linn. (CaryophylL).

AlOktOPHUiA, Host, Gram. Anstr. iv. 24. t 41 (1809). *GRAMINEAE,* Benth. ft Hook. f. itt. 1168. PSAHMA, Beauv. Agrost. 143. t 6. f. 1. (1812).
arenaria, Link, Hort. Berol. L 106-amndinacea.
amndinacea, *Host, Gram. Austr.* iv. 24. t 41.—Eoiop.; Am. bor.
baltica, *Lint, Hort. Berol. L*106; *Dum. Fl. Belg.* 152.—Enrop.
brevipilis, *Benth. ex Vasty, Cat. Gram. V. St.* 62.—Am. bor.
Curtissii, *Vasty, in Torrey Bot. Club,* xL (1884) 7.—Florida,
longifolia, *Vasty, Agric. Grasses U. St.* 71.—Am. bor.

AMMORRHIZA, Ehrh. PhytophyL (1789); 3eitr. iv, 146-Carex, Linn.

AMMO8ELLN'UM, Ton. ft Gray, in Padf. Rail. Rep. iL 166 (1856). *VMBELUFERAE,* Benth. ft Hook. £ i. 1009.
Popei, *Torr. & Gray, I. c.*—Texas.

AMMOSERIS, EndL Gen. 500 (1888) - Iaunaea, CHI. (Compos.).
asplenifolia, D, Dietr. Syn. PL iv. 1819=L. asDlenifolU.
beUidifolia, D. Dietr. 1. c 1320-L. bellldifolia.
Dregeana, D. Dietr. L c—Afr. austr.
nudicaulis, D. Dietr. 1. c 1819 - L. nudicauUs.
patens, D. Dietr. 1. c—Ind. or.
sarmentosus, D. Dietr. L C.-L. pranatifida.
surinamensis, D. Dietr. L c—Guiana.

AMHOSPEBMA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 82 (1862). *CRUCIFERAE,* Benth. *8c* Hook f. i. 82.
cinerea, ***Hook. f.l. c; Baill. Hist. PI.*** **iii. 278.—** Afr. bor.

AMMOTHAMNTJ8, Bunge, Ennm. PI. Lehm. 67. t. 12 (1847). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 555.
gibbosus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 628.—Assyria.
Lehmanni, *Bunge, 1. c.* 248.—Turkest.

AMMYRSINE, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 801 (1814) = LeiophyUum, Hedw. f. (Ericac).
buxifolia, Paish, 1. c = L. bturifolium.
Lyoni, Sweet, Hort. Brit ed. II. 844 = L. buxifolium.
prostrata, Sweet, ex Stend. Norn. ed. II. i. 78=L. buxifolium.
thymifolia, Forbes, Hort Wobnm. 93=L. buxifolium.

AMNI, Brongn. Ennm. Genr. 110 (1843) err. typ.= Annul, Toura.

AMOGETON, Neck. Elem. iii. 267 **(1790)-Aponogeton,** Thnnb. (Naiad.).

AMOLEIACHYRIS, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 951 (1848), sphalm.=.AMPHIACHYRIS, Nutt = Gutierrezla, Lag. (Compos,).

AMOMIS, Berg, in Linnaea, xxvii. (18S4) 416«Pimenta, Lindl. (Myrtac).
acris, Berg, 1. c. 417=P. acris.
oblongata, Berg, L c. 421 (=P. acris J).—Ind. or. cult; Guiana.
Pimento, Berg, L c. 418 (=P. acris T).—Ind. occ; Guiana.
pimentoides. Berg, 1. c. 420=P. acris.

AMOMOPHYLLUM. Engl. in Gard. Chron. (1877) I. 139 = SpathiphyHum, Schott (Aroid.).
floribundum, Engl. 1. c. 140 = S. floribundum.
Patini, Engl. L c. 189 = S. Patini.

AUOMUK, Linn. Mns. Cliff. 26 (1736); Gen. ed. 1.330 (1737). *SCITAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 644.
ACHASMA, Griff. Notnl. iii. 426 (1851).
ALEXIS, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 284.
CENOLOPHON, Horan. Prod. Monog. Scitam. 36 (1862).
DIRACODES, Blnme, Enam. PI. Jav. i. 55 (1830).
DONACODXS, Blame, 1. c. 54 (1830).
ETLINGERA, Giseke, Prael. Linn. 199, 209 (1792)
GEANTHOS, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 5.
GEOCAIXJS, Horan. Prod. Monog. Scit. 38 (1862).
GREENWAYA, Giseke, Prael. Linn. 199, 206 (1792).
HORNSTEDTIA, Retz. Obs. vi. 18 (1791).
MAROGNA, Salisb. in Trans, Hort Soc. 1. (1812) 283.
MEISTERA, Giseke, Prael. Linn. 199, 205 (1792).
NICOLAIA, Horan. Prod. Monog. Scitam. 32. t. 1 (1862)'.
PALUDANA, Giseke, Prael. Linn. 199,207 (1792).
PHAEOMEKIA, Lindl. Introd. Nat Syst. ed. II. 446 (1836).
STENOCHASMA, Griff. Notul. iii 431 (1851).
TORYMENES, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 283.
WURFBAINIA, Giseke. Prael. linn. 199, 206 (1792).
ZEDOARIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 53 (1836).
sculeatum, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 344.—Malaya,
acnminatum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 317.—Zeylari.
Afzelii, Rose, in Trans. Linn. Soc viii. (1807) 354-A. Grannm-paradisi.
Alpinia, Rottb. in Coll. Soc. Med. Ham ii. (1775) 246 t. 2 = Renealmia racemosa.
angustifolium, Hanb. in Joum. Linn. Soc. xiii. (1873) 155=Danielli.
angustifolium, Salisb. Prod. 4—Zingiber officinale.
angnstifolium, *Sonner. Voy. Indes,* iii. 276.—Madag.
aqnaticum, *Raeusch. Norn.* ed. III. 1.—Zeylan.
arboreum, Lour. Fl. Cochinch. 7=Costns Loureiri.
aromaticum, Roxb. Hort. Beng. 1; Fl. Ind. L 44.—Ind. or.
amndinaceum, ***Oliver &» Hani, in Joum. Linn. Soc.*** vii. (1864) 109.—Aft. trop.
Benthamianum, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 265.—Zeylan.

A1COMUM :—
bifidum, Stokes, Bot. Comment, i. 163 = Alpinia Allughas.
biflorum, *Jack, in Malay. Misc.* i. (1820) n. 1. p. 2.—Penang.
cannaecarpum, *Benth. &Hooi.f.Gen.iii.*644.—Ind. or.
capitatum, *Roxb. ex Link, Jahrb.* ii. (1811) 64.—Ind. or.
Cardamomum, Koen. in Retz. Obs. fast iii. 59=seq.
Cardamon, *Linn. Sp. PI.* 1.—Ind. or.; Malaya.
Cardamomum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 1 = Alpinia striata.
cerenm, ***Hook. f. in Kew Journ. Bot.*** **iv. (1854) 296.** —Afr. trop.
Cevuga, *Seem. Ft. Vit.* 291.—Ins. Fiji,
ciliatum, *Blume, Enum. PI. Jav.* 49.—Java.
citratum, Pereira, Mat. Med. ii. 1137=cereum.
Clusii, Hook. f. Bot. Mag. t. 5260«=Danielli.
Clusii, 5m. *in Rees, Cyclop,* xxxix. n. 4.—Afr. trop.'
coccineum, *Benth. & Hookf. Gen.* iii. 644.—Java.
compactum, Roem. & Schnlt. Syst. i. 28 = A. Cardamon.
corynostachyum, *Wall. PI. As. Rar.* i. 48 t. 68.—Ind. or.
costatum, *Benth. & Hook.f. Gen.* iii. 286.—Ind. or.
Curcuma, Jacq. Hoit. Vindob. iii. 5. t. 4=Curcuma longs.
Dallachyi, *F. Muell. Fragm.* viii. 25.—Austral.
DanielU, *Hook. f. in Ken Journ.* iv. (1854) 129. t. 5.—Afr. trop.
dealbatum, ***Roxb. Hort. Beng.*** **1;** ***Fl. Ind.*** **i. 43.—** Ind. or.
echinatum, Wllld. Sp. PI. 1. 8.—Ind. or.
elatum, Salisb. Prod. 6 = A. Grannm-paradisi.
Ensal. Raeusch. Norn. ed. III. l = Elettaria Cardamomum.
exseapum, Sims, in Kon. *8z* Sims, Ann. Bot. i. (1805) 549=A. Grannm-paradisi.
fasciculatum, *Benth. & Hook.f. GenM.* 645.—Ind. or.
Fenzlii, ***Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.*** **xlv. (1876) II.** 154.—Ins. Nicobar.
floribundum, *Benth. &> Hook.f. Gen.* iii. 644.—Zeylan.
foetens, ***Benth. &• Hook.f. I. c.—*** **Java,**
fulviceps, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 317.—Zeylan.
Galanga, Lour. Fl. Cochinch. 5-Alpinia Galanga.
giganteum, ***Oliver & Hanb. in Journ. Linn. Soc.*** **vii.** (1864) 109.—Afr. trop.
glaberrimum, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 644.—Malaya.
globosum, Lour. Fl. Cochinch. 4=Alpinia globosa.
gracile, ***Blume, Enum. PI. Jav.*** **49.—Java,**
gramineum, *Wall. Cat.* n. 6558.-"-In'd.'br.
graminifolium, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 480.—Zeylan.
grandiflorum, Sm. Exot. Bot. ii. 103. t. 11-A. Granum-paradisi.
Granum-paradisi, *Linn. Sp. PI.* 2.—Afr. trop.
heteranthum, *Blume, Enum. PI. Jav.* 49.—Java.
hirsutum, Lam. Illastr. i. 134. t. S = Costus speciosus.
hirsutum, Lour. Fl. Cochinch. 5 = Alpinia hirsuta.
hypoleucum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 318.—Zeylan.
involncratum, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 644.—Zeylan.
Koenigii, *Roem. & Schult. Syst.* i. 30.—Ind. or.
latifolium, *Afzel. Rented. Guin.* i. 5.—Afr. trop.
latifolium, Salisb. Prod. 4=Curcuma Zedoaria.
Leonurus, *Koen. exjletz. Obs.fasc.* iii. 69.—Malacca,
limhatum, ***Oliver & Hanb. in Journ. Linn. Soc.*** **vii.** (1864) 110.—Afr. trop.
linguiforme, *Benth. &" Hook.f. Gen.* iii. 644.—Ind. or.
littorale, *Koen. ex Ret: Obs.fasc.* iii. 52.—Burma,
longiscapnm, *Hook.f. in Journ. Bot.* vi. (1864) 296.—Afr. trop.
macrospermum, Sm. in Rees, Cyclop, xxxix. n. 8 = **Clusii.**
madagascariense, Lam. Ulustr. 12. f. 1=angustifolium.
magnificum, *Benth. &• Hook. f. Gen.* iii. 644.—Ins. Maurit.
Mannii, ***Oliver & Hanb. in Journ. Linn. Soc.*** **vii.** (1864) 110.—Afr. trop.
marginatum, ***Roxb. ex Spreng. Schrad. & Link, Jahrb.*** ii. (1811) 64.—Ind. or.
masticatorium, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 317.—Zeylan.
maximum, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 344.—Malaya.
medium, Lour. Fl. Cochinch. 4-Hellenia alba.
Melegueta, *Rose. Monog. Scitam.* t. 98.—Afr. trop.
Mioga, Thmb. Fl. Jap. 14 = Zingiber Mioga.
montanum, Koen. ex Retz. Obs. fasc iii. 51 = Zingiber

AMOMTJM :—
muricatum, ***Bedd. in Madr. Journ. Sc.*** **Ser. III. i.** (1864) 59.—Ind. or.
nemorale, *Benth. & Hooi.f. Gen.* iii. 644.—Zeylan.
nemorosum, Boj. Hort. Maurit. 327 = Danielli.
nigrum, Raeusch. Nom. ed. III. 1 = Alpinia Allughas.
nutans, Roem. & Schult. Syst. i. Mant. 40=Alpinia nutans.
palustre. *Afael. Stirp. Med. Nov.* 9.—Afr. trop.
parviftorum, Presl, Kel. Haenk. ii. 112. 1.19 = Alpinia parviflora.
petiolatum, Lam. Encyc. i. 136 = Costns spicatus.
pierardioides, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1864) 58.—Ind. or.
pilosum, ***Oliver & Hanb. in Journ. Linn. Soc.*** **vii.** (1864) 110.—Afr. oec
pterocarpum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 317.—Zeylan.
pulchellum, Thw. 1. c. 318 = Cyphostigma pulchellum.
pyramidale, Lam. Encyc. i. 185=- Renealmia racemosa.
racemosum, Lam. Illustr. t. 2. f. 2 = A. Cardamon.
racemosum, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 2 = Renealmia Ruiziana.
Renealmia, Lam. Illusfr. i. 5=Renealmia exaltata.
repens, Sonner. Voy. Indes, iii. 272 = Alpinia Cardamomum
roseum, *Benth. &° Hook.f. Gen.* iii. 644.—Malaya.
roseum, Roxb. PI. Corom. 2. t. 126—Zingiber roseum.
Rumphii, Sm. in Rees, Cyclop, xxxix. n. 16=Elettaria rnnsacea.
rnfescens, *Benth. & Hook.f. Gen.* iii. 645.—Zeylan.
Sceptrum, ***Oliver & Hanb. in Journ. Linn. Soc.*** **vii.** (1864) 109.—Afr. trop.
Scottii, F: Muell. Fragm. viii. 24 = Elettaria Scottiana.
scyphiferum, ***Koen. ex Retz. Obs. fasc.*** **iii. 68.—** Malacca.
sericeum, Roxb. Hort. Beng. 1; Fl. Ind. i. 44=dealbatum.
spirale, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 78 = Costus Pisonis.
spurium, J. F. Gmel. Syst. i. 6 = Zingiber Zerumbet.
spurium, *Roem. & Schult. Syst.* i. 30.—Ind. or.
striatum, Stokes, Bot. Comment, i. 159 = Renealmia sylvestris.
strobilaceum, 5m. *in Rees, Cyclop,* xxxix. n. 8.—Afr. trop.
subsericeum, ***Oliver & Hanb. in Journ. Linn. Soc.*** vii. (1864) 110.—Afr. trop.
subulatum, *Roxb. PI. Corom.* t. 227; *Fl. Ind.* i. 43.—Reg. Himal.
sylvestre, Poir. Encyc. Suppl. v. 548=Zingiber Zerumbet.
sylvestre, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 11-Renealmia sylvestris.
Taraca, Horan. Prod. 80 = Alpinia Allughas.
Taracca, Roxb. ex Rose. Monog. Scitam. in Obs. de Amomo = praec.
thyrsoideum, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. i. 2. t, 2 - Renealmia thyrsoidea.
nliginosum, *Koen. ex Retz. Obs.fasc.* iii. 56.—Ind. or.
undnatum, Stokes, Bot. Comment, i. 161=A. Cardamon.
villosum, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 4.—Ind. or.; China.
vitellinum, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* ii. (1847) 245.—Ind. or. ?
xanthioides, *Wall. Cat.* n. 6557.—Burma.
xanthorhiza, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 78 = Zingiber Cassumunar.
Zedoaria, Berg. Mat. Med. 41 = Curcuma Zedoaria.
Zerumbet, Koen. ex Retz. Obs. fasc. iii. 55=Curcuma Zedoaria.
Zerumbet, Linn. Sp. PI. 1 = Zingiber Zerumbet.
Zingiber, Blanco, Fl. Filip. 2 = Zingiber Blancoi.
Zingiber, Linn. Sp. PI. 1=Zingiber officinale.
Zinziba, Hill, Veg. Syst. xvi. 50=praec.

AMONIA, Nestl. Mon. Potent. 17 (1816) = Agrimonia, Linn. (Rosac).
agrimonoides, Steud. Nom. ed. I. 39, 19=Agr. Eupatoria.

AMOOBA, Roxb. PI. Corom. iii. 54. t. 258 (1819\ *MELIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 834.
ANDERSONIA, Roxb. Hort. Beng. 87 (1814); Fl. Ind. ii. 212 (1832).
AFHANAMIXIS, Blume, Bijdr. 165 (1825).
MONOSOMA, Griff. Notul. iv. 502 (1854).
NIMMOIA, Wight, in Calc. Joum. Nat. Hist. vii. (1847) 18.

AMOOBA:-
OKAOMA, Turos. in Bull. Soc Nat. Most (1858) I. 411.
SPHAEROSACME, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Oarey, ii. 429 (1824).
amboinensis, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* IT. 86.—Amboiaa.
Aphanamixis, *Schult.f. Syst.* vii. 1621.—Malaya.
auriculata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iv. 37 = cucnllata.
Balanseana, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 690.—N. Caled.
bomeensis, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 86. —Borneo,
canarana, *Him, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 560.—Ind. or.
Ckampionii, Benth. & Hook. f. Gen. i. 335; tiiern, in Hook. f. 1. c. 562=Pseudocarapa Championii.
chittagonga, *Hiern, in Hook.f. I. c.* 559.—Ind. or.
cncnllata, *Roxb. PI Corom.* iii. 54. t. 258.—Ind. or.
Cumingiana, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 580.—Ins. Philipp.
decandra, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 562.—Ind. or.
dysoxyloides, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) II. 200.—Bnnna.
filiciformis *Wight, lllustr. Ind. Bot.* i. 147.—Ind. or.
Ganggo, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlv. (1876) H. 123 = Aglaia Ganggo.
grandifolia, Walp. Rep. i. 429; C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 581 = A. Aphanamixis.
Korthalsii, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 36. —Borneo,
lactescens, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) H.200.-Bnnna.
knceolata, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 560.—Malacca.
fawii, *Benth. & Hook.f. Gen.* i. 385.-r-Ind. or.
laxa, Wight & Am. Prod. 119=cucullata.
nacrophylla, Nimmo, in J. Gal. Cat. Bomb. PL t. 31 - A. Rohituka.
Maingayi, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 562.—Malacca.
moulmeiniana, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 584.—Burma.
ajMula, *Benth. Fl. Austral,* i. 883.—Anstral.
«Tottetiana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 89.—Ins. Philipp.
gfystachya, Wight & Am. Prod. i. 119=A. Rohituka.
Rohituka, *Wight & Am. I. c*—Ind. or.
Koxburghiana, Korth. ex Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. «• 211=Santiria laevigata.
mbescens, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.* 561.—Singapore.
mbiginosa, *Hiern, I. c*—Malacca.
•Pectabilis, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 37. Jiurau.
•umatrana, *Miq. I. c.* 35.—Sumatra.
*f*y.*manniana,* Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. i. 608= . Aglaia Teysmanniana.
timoreosis, *Wight GfArn. ex Steud. Norn,* ed. II. L 78. —Ins. Timor.
tomentosa, Korth. ex Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. sn=Santiria tomentosa.
Vieillar[illegible].—N. Caled.

AM°0WA, Walp. Rep. i. 640 (1842), sphalm. = AMORIA, C. Presl,=TrifbUuin,Tourn. (Legum.).

AMORDICA,Neck. Elem.i. 241 (l790)=Momordioa, Toum. (Cncurb.).

AM[illegible]£?5A'Mo<l-» DeMe. Cat. Hort. Monsp. (1844).= Uyololoma, Moq. (Chenopod.).
Wtyphylla, Delile, 1. c.«C. platyphyliram.

AMOREUXIA, M09. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 688 (1825). *BIXINEAE,* Benth. & Hook. £ i. 124.
EUKYANTHB, Cham. fcSchlecht. in Linnaea, v. (1880) 224.
m»lvaefolia, *A. Gray, PI. Wright,* i. 29.—Am. bor.
Wuatifida, M09. *St.* Sesse, £x DC. Prod. ii. 688 = schiedeana?
°«iiedeana, *Planch, in Hook. Lend. Journ. Bot.* vi. (1846) 140. t. l.-Am. bor.
"nghtii, *A. Gray, Pl.Wright.* ii. 26.—Am. bor.

AMOREUXIA, Moq. in Mem. Soc. HUt. Nat. Monsp: (1826)-Cycloloma, Moq. (Chenopod.).
platyphylla, Moq. L c.=C. platyphyllum.

AMORGINE, Rafin. New Fl. Am. iv. 44 (1886) = Achyrantb.es, Linn. (Amaranth.).
albescens, Rafin. 1. c—Am. bor.

AMORIA, C. Presl, Symb. Bot. i. 45 (1830) - Trifolium, Toum. (Legum.).
angulata, C. Presl, 1. c. 47—T. angulatum.
Biasollettiana, C. Presl, 1. c.-T. repens.
caespitosa, C. Presl, L c.=T. Thalii.
calycina, C. Presl, 1. c 43. t 80=T. calycinnm.
caroliniana, C. Presl, 1. c. 47 = T. carolinianum.
elegans, C. Presl, 1. c.=T. elegans.
kybrida, C. Presl, 1. c.=T. hybridum.
isthmocarpa, C. Presl, 1. c. 50 = T. Jaminianum.
macropoda, C. Presl, 1. c 51. t 81=T. macropodnm.
Micheliana, C. Presl, 1. c..47=T. Michelianum.
nigrescens, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 362=T. Michelianum.
obcordata, C. Presl, Symb. Bot. i. 47=T. polymorphum.
pallescens, C. Presl, 1. c. = T. pallescens.
parviftora, C. Presl, 1. c.=Tj)arviflonim.
polymorpha, C. Presl, 1. c.=T. polymorphum.
repens, C. Presl, 1. c.=T. repens.
reflexa, C. Presl, 1. c.=T. reflexum.
Thalii, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 862=T. Thalii.
Vimanii, C. Presl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 78 = T. caeruleum.

AHOBPHA, Linn. Gen. ed. I. 229 (1737). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 492
California, *Nutt. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am.* i. 806. —Calif.
canescens, *Nutt. in Fras. Cat.* (1813).—Am. bor.
caroliniana, Croom, in Am. Joum. Sc. xxv. (1884) 74 = fruticosa.
coerulea, Lodd. Cat. (1880)=fraticosa.
croceo-lanata, Wats. Dendrol. 1.189=fruticosa?
cynostachya, M. A. Curt, ex Ton. ft Gray, Fl. N. Am. i. 305 (tit. falsa) = fruticosa.
elata, *Bouchl, ex Schlecht. in Linnaea,* xxiv. (1851) 687.—Hab.!
elata, Hayne, Dendrol. Fl. 134=fruticosa.
emarginata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 121. n. 466 = fruticosa.
fragrans, Sweet, Brit. Fl. Gard. iii. t. 241=fmticosa.
fruticosa, *Linn. Sp. PI.* 713.—Am.,bot.
fruticosa, Torr. Bot. Mex. Bound. 58=californica.
fruticosa, Thunb. Fl. Jap. 278=Cladrastis amurensU.
Gaertneri, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 70 = fruticosa.
Gardneri, Hort. ex C. Koch, 1. c. Index, 701=praec.
glabra, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. I. 192=fruticosa.
glandnlosa, *Blanco, Fl. Filip.* ed. 1.655.—Ins. Philipp.
herbacea, *Walt. Fl. Carol.* 179.—Am. bor.
herbacea, Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal. (1848) 8__Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 185=fruticosa.
humilis, Tansch.in Flora,xxi.(1838)ll.750=fruticosa!
laevigata, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 806.—Am. bor.
Lewisii, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 609 = fruticosa.
Ludmgii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 70=fruticosa.
lutea, *Rafin. Fl. Ludov.* 105.—Am. bo*,
microphylla, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 466.—Am. bor.
nana, Nutt. in Fras. Cat. (181S)-fruticosa?
nonperforata, Schk. Bot. Handb. ii. 383=fruticosa.
ornata, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. (1885) = fraticosa.
paniculata, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 806.—Am. bor.
pedalis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 553.—Ins. Philipp.
pendula, Can. in Rev. Hortic. (1868) 840 = fruticosa?
perforata, Schk. Bot. Handb. ii. 333=fruticosa.
pubncens, Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 691 = fruticosa.
Pubescens, Willd. Berl. Banrni. 17=herbacea.
pumila, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 64=herbacea.
pumila, Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal. (1848) 8.—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 185=frnticosa.
punctata, *Rafin. New. Fl. Am.* iii. 14.—Am. bor.
Rabiae, *Lex. in U Have & Lex. Nov. Veg. Dese.fasc,* i. 22.—Mexic.
Roemeriana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 461 = paniculata.

AMOKPHA:-
tenessensis, Sennit, in Kunie, Del. Sem. Hort. Lips. (1848) = frutico3a.
texana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. PhiUd.' 1861' (1862) 452=laevigata.
tomentosa, *Rafin. Fl. Ludov.* 105.—Am. bor.

AMOBPHOCALTX, Klotzsch, in Rich. Schomb. Faun. *Sc* Fl. Guian. 1104, nomen, (1848) (Legumin.).
Roraimae, *KlotMsch, I. c*—Guiana.

AMOBPHOPHALLXTS, Blume, in Batav. Diar. (1825); ex Decne. Herb. Tim. Descr. 38 (1836).
AROIDEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 970.
BRACHYSPATHA, Schott, Syn. Aroid. 85 (1856).
CANDARUM, Reichb. ex Schott, Melet. i. 17 (1832).
CONOFHALLUS, Schott, Syn. Aroid. 34 (1856).
CORYNOPHALLUS, Schott, in Oestr. Bot. WochenbL (1867) 389.
HANSALIA, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 82.
HYDROSMB, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1867) 88».
KUNDA, Rafin. Fl. Tellnt. ii. 82 (1836).
PROTEINOFHALLVS,[Hook.f. Bot. Mag.t 6195 (1875).
PYTHION, Mart, in Flora, xiv. (1881) 469.
TAPBINOFHALLUS, Baill. Diet. Bot. i. Ic. sine desc. (1877).
Beccarii, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 182.—Sumatra.
Blumei, Schott, in Ann. Mas. Lugd. Bat. i. 124 = giganteus.
buTbifer, *Blume, Rumphia,* i. 148.—Ind. or.
campanulatus, *Blume, ex Decne. Herb. Timor.* 38.—As. trap.
Chtity,Andri.IUustr.Hortic. six. (1872) 861.—Ind. or.
commutatus, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii, 319.—Ind. or.
consimilis, *Blume, Rumphia, i.* 149.—Afr. trop.
decurrens, *Kunth, Enum. PI.* iii. 581.—Ins. Philipp.
difformis, Blume, Rumphia, i. 149 = Anchomanes difformis.
dubius, *Blume, 1. c.* 142.—Ind. or.; Malaya.
Fontanesii, *Kunth, Enum. PI.* iii. 86.—Afr. trop.
Gigas, *Trijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Neder. Ind.* xxiv. (1862) 329.—Sumatra,
giganteus, *Blume, Rumphia,* i. 144. t. 84.—Ind. or.; Malaya,
gracilis, *Engl. in Engl. Bet. Jahrb.* i. (1881) 183.—Sumatra,
hirsntus, *Teijsm.* 6* *Binn. in Nat. Tijdschr. Neder. Ind.* xxiv. (1862) 832.—Java,
imperialis, *Hort. cf. Gard. Chron.* (1883) L 510.-Ins. Philipp.
Konjac, C.Koch, in Berl. AUg-Gartcui. (1858) 136 = Rivieri.
Lacourii, *Linden & Andrl, in lllustr. Hortic.* xxv. (1878) t. 316.—Cochinch.
leonensis, *tern, in Fl. des Serres,* Ser. I. ii. (1846) t. 161.—Afr. trop.
longistylus, *Kun, Rep. Andam.* 60, nomen.—Ins. Andaman.
lyratus, *Kunth, Enum. PI.* iii. 84.—Ind. or.
margaritifer, Kuntb, 1. c. - Plesmoninm margaritiferum.
mossambicensis, *Klottsch, ex Garcke, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 509.—Afr. trop.
Mulleri, *Blume, Rumphia,* i. 148..—Java.
nivosus, Lem. lllustr. Hortic. xii. (1865.) t. 424-Dracontium asperum.
palmaeformis, Dur. ex Riv. in Act. Linn. Soc. Bord. xxviii. (1869) 16; Rivière, L'Aaorph. 4, 5 = Ririeri.
papillosus, *Hort. ex Rafarin, in Rev. Hortic.* (1871) 476.—Hab.?
Peyri,c/. *Gard.Chron.* (1880) II. 120.—In*. Seychelles,
planus, *Trijsm & Binn. in Nat. Tijdschr. Neder. Ind.* xxiv. (1862) 331.—Sumatra,
punetnlatus, *Blume, Rumphia,* i. 148.—Java.
Rivieri, *Dur. ex Rivière, in Act. Linn. Soc. Bord.* xxviii. (1869) 16.—Cochinch. ; Japon.
sativus, *Blume, Rumphia, i.* 145.—Ins. Molncc.
spectabilU, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 816.—Java.
sylvaticus, Kunth, Enum. PI. iii. 34 - Synantheriaa silvatiens.
Titanum, *Bttc. in Bull. Soc. Tesc Ortic.* (1879) 46—Sumatra.
tuberculiger, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 317.—Reg. Himal.
vanabilU, *Blume, Rumphia,* 1.146. t. 35.—Java; Int. Philipp.

AMOBPHOPHALLU8:—
virosus, *N.B. Br. in Gard. Chron.* (1885) 1.759.—Siam.
Wallisii, Regel, Gartenfl. (1861) 833 - Dncontiam asperum.
zebrinus, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1896) 485.—Hab.1
zeylanicus, *Blume, Rumphia,* L 148.—Java; Zeylan.

AMORPHOSPERMUM, F. Mnell. Fragm. vii. 113(1870) -Iiuouma, Tuss. (Sapotac).
antilogum, F. Mnell. I. c.—Austral.

AMOSA, Neck. Elan. ii. 459 (1790)-Inga, Plum. (Legnm.).

AMOUREUXIA, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 340 (1857), sphalm.=Amoreuxia, Moj. & Sesse (Bixin.).

AMPAIiIS, Boj. Hort. Manrit. 291 (1837). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 865.
znadagascariensis, *Boj. I. c.*—Madag.

AMPELANUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192 -Enalenia, Nutt. (Asdep.).

AKPELOCEKA, Klotzsch, in Linnaea, zx. (1847) 641. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 353.
cubensis, *Griseb. Cat. PL Cub.* 67.—Ind. occ.
Rnizii, *Klotisch, in Linnaea,* xx. 642.—Peruv.

AMPELOCISSUS, Planch, in Jonni. Vigne Am. (1884) 874-Vitia, Linn. (Ampelid.).
abyssinica, Planch, in Jonm. Vigne Am. (1885) 24 = V. abyssinica.
acetosa, Planch. 1. c. 96.—Austral.
aculeata, Planch. 1. c. 95=V. aculeata.
angolensis, Planch. 1. c. 48=V. angolensis.
arcuata, Planch. 1. c. •> V. atcnata.
asarifolia, Planch. 1. c. 29 = V. asarifolia.
Bakeri, Planch. 1. c. 80=V. Schimperiana.
bombycina. Planch. 1. c. 31=V. bombycina.
cavicaulis, Planch. 1. c. 32 «V. cavicaulis.
Chantinii, Planch. 1. c. 27=V. Chantinii.
cinnamochroa, Planch. 1. c. 31.—Am. trop.
concinna, Planch. 1. c. 48 = V. concinna.
dissecta, Planch. 1. c.«=V. dissects.
divaricata, Planch. 1. c (1884) 376=V. divaricata.
elephantina, Planch. 1. c 879.—Ins. Borbon.
Harmandi, Planch. 1. c. 878.—Cochinch.
heracleifolia. Planch. 1. c. (1885) 48=V. heradeifolia.
indica, Planch. 1. c. (1884) 376-~V. indica.
ipomeaefolia. Planch. 1. c. (1885) 26=V. ipomeaefolia.
laHfolia, Planch. 1. c. (1884) 874=V. latifolia.
Lecardii, Planch. 1. c. (1885) 29 = V. Lecardii.
Itonensis, Planch. 1. c. 80=V. leonensis.
Leprieurii, Planch. 1. c. 44=V. multistriata.
mossambicensis, Planch. 1. c. 49 •> V. mossambicensis.
obtusata, Planch. 1. c. 48=V. obtusata.
platanifolia, Planch. 1. c. 47=V. platanifolia.
rugosa, Planch. 1. c (1884) 874-V.lanata, indica.
salmonea, Planch. 1. c. (1885) 31=V. salmonea.
sarcocephala, Planch. I. c. 45=V. sarcocephala.
Schimperiana, Planch. 1. c. 26=V. Schimperiana.
sikkimensis, Planch. 1. c. (1884) 375 = V. sikkimensis.
tomentosa, Planch. 1. c. 875 =V. tomentosa.

A3S.VELOJ3APBJSTE, Meissn. in DC. Prod. rv. 1. 81 (1864). *LAURINEAE,* Benth. & Hook. 1 iii. 153.
arunciflora, *Meissn. I.* c—Bras,
dasyantha, *Meissn. I. c*—Bras,
macrophylla, *Meissn. I. c*—Bras.

AMPELODESMA, Beanv. Agrost 78. t. 15. f. 11 (1812). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1178.
australe, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. Sl=»Arundo pilosa.
bicolor, *Kunth, Gram.* L 79.—Afr. trop.
effosom, *Steud. Syn. PL Gram.* 195.—Afr. bor.
festucoides, Stead. 1. c.-tenax.
tenax, *Link, Hort. Btrol* i. 136.—Reg. Mediterr.

AMPELODESMOS, link, Hort. Berol. i. 1S6 (1827)-praec.

AMPELODESMUS, Woods, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1838)84=praec.

AMPELOPLIS, Rafin. Sylva TeUnr. 83 (1838) -RVmtriTiia, Linn.
chinensis, Rafin. L c - R. theezans.

AMPELOPSIS, [Rich, in] Michx. FL Bor. Am. i 159 (1803) ex parte=Vitla, Linn. (AmpeUd.).
aconitifolia, Bnnge, Enum. PL Chin. Bor. 12-V. serjaniaefolia.
africana, Steud. Norn. ed. II. i. 219-V. africana.
bipinnata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 160—V. arborea.
Botria, DC. Prod. i. 688 - V. africana.
brevipedunculata, Maxim, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 176.—As. or.
citrulloides, Lebas, in Rev. Horde. (1875) 179.—Hab. t
cordata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 169 - V. indivisa.
cordifolia, Rafin. Med.Fl.il. 122-praec.
dissecta, Carr. in Rev. Hortic (1868) 10 - V. serjaniaefolia.
hederacea, DC. Prod. i. 688-V. hederacea.
heptaphylla, Bnckl. in Proc. Acad. Sc. Pbilad. • 1861' (1862) 460=V. hederacea.
heptaphylla, Roem. *Sc* Schult. Syst v. 321-V. heptaphylla
heteroph'ytta, Blume, Bijdr. 194 - V. Landnk.
heterophylla, Sieb. & Zncc. in Abh. Akad. Mnench. iv. 11. (1846) 196-V. heterophylla.
himalayana, Royle, Illustr. Himal. Bot. 149-V. himalayana.
hirsuta, Donn, Hort. Cantab. 166 - hederacea.
humulifolia, Bnnge, Enum. FL Chin. Bor. 12 - V. heterophylla.
indica, Blnme, Bijdr. 198-V. indica.
japonica, Hort—Cf. Gard. Chron. (1868) 1118.=V. inconstans.
laHfolia, Tausch, in Flora, xxi. (1888) II. 788; Kostel. Allg. Med.-Phann. Fl. iv. 1198=V. latifolia.
lucida, Can. in Rev. Hortic. (1868) 89 = V. serjaniaefolia.
minima, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1878) 1469 - V. inconstans.
napiformis, Can. in Rev. Hortic. (1870-71) 16.—China.
neilgherrensis, Wight, Spicil Neilgh. i. 32. t. 36; et Ic. t. 965=V. himalayana.
palmiloba, Carr. in Rev. Hortic. (1867) 451.—China.
pinnata, Roem. & Schult. Syst. v. 822=V. pinnata.
pubescens, Schlecht. in Linnaea, x. (1836) 251=V. pnbescens.
quinquefolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 169.1162=V. hederacea.
Regeliana, Carr. Rev. Hortic. (1866) 440.—Japoni
sempervirens, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1882) II. 491 & 790=V. striata.
serianaefolia, Bunge, Enum. PL Chin. Bor. 12=V. serjaniaefolia.
ternata, DC. Prod. i. 638=V. tomentosa.
tricuspidata, Sieb. & Zncc. in Abh. Akad. Mnench. iv (1846) 196=V. inconstans.
triloba, Carr. in Rev. Hortic (1868) 89 - V. serjaniaefolia.
tripartita, Carr. 1. c. = V. serjaniaefolia.
tuberosa, Carr. 1. c. (1870-71) 16=V. serjaniaefolia.
Veitchii, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1868) 814 = V. inconstans.

AMPELOSICYOS, (AMPELOSYCIOS), Thou, Hist Veg. Isles Afr. austr. 68. t. 22 (18O7)=Telfairia, Hook. (Cucurb.).
scandens, Thou. 1. c.=T. pedata.

AMPELYGONUM, Lindl. in Bot. Reg. (1888) Misc. 62 =Polygonum, Linn.
chinense, Lindl. 1. c.=P. chinenie.
tinctorium, Stend. Nom. ed. II. i. 79 ='=P. tinctorium.

AMTKRTIA, A. Joss. Euph. Tent 86. t. 10 (1824) *EVPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ iii. 265.
conferta, *Benth. Fl. Austral,* vi. 88.—Austral.
cuneiformis, F. Muell. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 455 =spartioides.
ericoides, *A. fuss. Tent. Euph.* 112.1.10.—Austral,
micrantha, *Benth. Fl. Austral,* vi 83.—Austral,
protensa, *Nees, in Lehm. PL Preiss.* ii. 229.—Austral.
rosmarinifolia, Klotzsch, in Lehm. 1. c L 176= ericoides.
spartioidei, *Brongn. in Duperr. Voy. Bot.* 226. t. 49.—AnstraL

AMPEB3SA:—
subnuda, *Nees, in Lehm. PL Preiss.* ii. 229.—Austral,
volubilis, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 82.—Austral.

AMPHANIA, Banks, ex DC. in Mem. Soc. Phys. Genev. i. (1821) 4p8=Tern8troemla, Linn.
inUgrifolia, Soland. ex DC. 1. c 410 - T. elliptica.

AMPHEREPHIS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 31. t. 814,316 (1820)=Centratherum, Caas. (Compos.).
aristata, H. B. & K. 1. c. 25 = C. puncUtum.
indica, Wall. [Cat. n. 2956]; Less, in Linnaea, vi. (1881) 686 = C. reticulatum.
intermedia. Link, Abbild. 5. t. 29=C. intermedium.
mollis. Wall. Cat. n. 2957 =C. molle.
mutica, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 26, 816-C. muticum.
pilosa, Cass. ex Steud. Nom. ed. II. i. 824, in syn,=C. muticom.
psUocarpa, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act Nat. Cor. xii. (1824) 4 = Oiospermum inrolucratum.
pulcheUa, Cass. ex Steud. Nom. ed. II. i. 79=C. pnlchellnm.
senegalensis, Less, in Linnaea, vi. (1881) 687=Herderia truncata.
Wightiana, Wall. Cat. n. 2958=Carpesium cemuum.

AMPHIACHTBI8, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 813. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook, *t* ii. 250.
AHFHIPAPFUS, Torr. *Sc* Gray, in Proc. Bost. Soc. i. (1844) 210.
dracnnculoides, *Nutt. 1. c.*—Am. bor.
Fremontii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1878) 683.—Calif.

AHPHIARTHUS, Torr. in Ann Lye. N. York, iv. (1837) 82. *SCROPHULARINEAE,* Beuth. & Hook, f. ii. 958.
pusillus, *Torr. I. c*—Am. bor.

AMPHIBECIS, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 86 = Centratherum, Cass. (Compos.).
violacea, Schrank, 1. c = C. intermedium.

AMPHIBIiEBOIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850)t7; xv. (1851)50. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 754.
cymosum, *Naud. 1. c.* xv. (1851) 51.—Afr. trop.
molle, *Hoot. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 456; *in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 79.—Afr. trop.
setosnm, *Hooi.f. II. cc.*—Afr. trop.

AMPHIBOL1B, C. Agardh, Sp. Alg. ii.l. 474 (1822). *NAIADACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1015.
GRAUMUELLERA, Reichb. Consp. 43 (1828).
antarctica, Aschers. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 164 = Cymodocea antarctica.
bicorais, C. *Agardh, Sp. Alg.* ii. I. 474.—Austral.
gosteraefolia, C. Agardh, L c. 475 = Cymodocea antarctica.

AMPHIBROMUB, Nees, in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848) 420. *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1161.
fluitans, *T. Kirk, in Trans. N. Zeal. Inst.* xvi. (1884) 874. t. 28.—N. Zel.
Neesii, *Steud. Syn. PL Gram.* 328.-Austral.

AMPHICALEA, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 411 = Calea, linn. (Compos.).
fruticosa, Gardn. 1. c. 412 -=C. rotundifolia.
gentianoides, Gardn. 1. c. = Geissopappus gentianoides.

AMPHICALYX, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vii (1828) - Diplyoosia Blnme (Ericac).

AMPHICAEPAEA, Ell. in Journ. Acad. Philad. i. (1818) 872 (Amphicarpa). *LEGVMINOSAE,* Benth. & Hook. f.i. 629.
CRYFTOLOBVS, Sprang. Syst. iii. 218 (1826).
FALCATA, J. F. Gmel. Syst. 1131 (1791).
LOBOMON, Rafin. New Fl. Am. i. 81 (1886).
SAVIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 852.
TKTRODEA, Rafin. New Fl. Am. i. 81 (1836).
ciliata, *Rafin. 1. c.* 82.—Am. bor.

AltPHICABPAEA :—
comosa, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 814-monoica.
cnspidata, *Rafin. New Fl. Am.* i. 83.—Am. bor.
deltifolia, Rafin. 1. c.-= monoica. *
Edgewoithii, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 281.—Reg. Himal.
Ellioti, Rafin. New Fl. Am. i. 88-monoica.
ferruginea, Benth. in Miq. PI. Jnngh. 231=Shuteria ferruginea.
heterophylla, Rafin. New Fl. Am. i. 82=monoica.
monoica, *Ell. in Joum. Acad. Philad.* i. (1818) 872 ; * *ex Nutt. Gen. Am.* ii. 115.—Am. bor.
Kteheri, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 292.—Am. bor.
tarmentosa, Ell. ex Nutt. Gen. Am. ii. 114 •smonoica.
Msperma, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.ii. 181, in obs.=Edgeworthii.
villosa, Rafin. New Fl. Am. 1.82-= monoica.

AMPHICARPON, Rafin. in Am. Monthly Mag. *(Jan.* 1818) 176=seq.

AMPHICAKPUM, Knnth, Gram. i. 28 (1829). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. Hi. 1099.
flondanum, *Chapman, Ft. S. U. St.* 572.—Florida.
Purshii, *Kunth, Gram.* i. 28.—Am. bor.

AMPHICOME, Royle, Illnstr. Himal. PI. 298. t. 72. f. 1 (1836). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1049.
argnta, *Royle, I. c.—Reg.* Himal.
Emod', *Royle, ex Lindl. Bot. Reg.* (1838) 1.19.—Reg. Himai.

AMPH1DERRIS, Spach, Hist *Vie.* Phan. *x.* 402 (1841) = Orites,R.Br.(Proteac.).

AlpHIDETBS, Fonm. in Mart. Fl. Bras. vL IV. 213(1885). *ASCLEPIADEAE.*
laamatns, *Fourn. 1. c.* 214.—Bras,
qmnqnedentatns, *Fourn. 1. c.* 218.—Bras.

AMPHIDONAX, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syit. ed. «. 449 (1886) = Arundo, linn. (Gramin.).
oengalensis, Nees, 1. c.=Arundo bengalensis.

AMPHIDONAX, Nees, ex Stend. Syn. PI. Gram. 197- Zenkeria, Trin. (Gramin.).
qtfana, Nees, ex Steud. 1. c—Japon.
"eynii, Nees, ex Stend. 1. c. = Z. elegans.
obtusiflora, Thw. Enum. PI. Zeyl. 370=Z. obtnsifiora.
tenella, Wight & Am. ex Stend. Syn. PI. Gram. 197. —•Ind. or.

AMPHIDOXA, DC. Prod. vi. 246 (1837). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 800.
filaginea, *Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. See.* Ser. "• ii. (1881) 21.—Afr. hop.
gnaphalodes, *DC. 1. c*—Afr. anstr.

AMPHIGENES, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 619 =-fi'estuoa(Linn. (Gramin.).
tarpathica, Janka, 1. c - F . carpathica.
**utans,* Janka, 1. c.=F. nntans.

A50>HIQ1088A, DC. Prod. vi. 258 (1837). *COMfOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 824.
*lopecuroides, *Sch. Bip. in Pollichia,* xviii-xix. (1861) 182.—Afr. austr.
callnnoides, *DC. Prod.* vi. 259.—Afr. anstr.
corrudaefolia, *DC. 1. c.* 268.—Afr. anstr.
nihdula, *DC. I. c.* 259.—Afr. austr.
perotrickoides, DC. 1. c. 258=Pterothrix perotrichoides.
tomentosa, *Han. in Han. & Sond. Fl. Cap.* iii. 276. —Afr. austr.
'"flora, DC. Prod. vi. 268-Pterothrix spinescens.

AMPHIGLOTT1S, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 294»Epidendrmn, Linn. (Orchid.).
lunda, Salisb. 1. c. - E. anceps.
***cunda,* Salisb. 1. c - E . secnndum.

AMPHILOBIUM, Loud. Hort. Brit. 242 (1830), sphalm. oAmphilophium, H. B. & K. (Bignon.).

AMPHILOCHIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 127. t. 77 (1824)=Qualea, Aubl. (Vochysiac.).

AMPHILOCHIA j—
acuminulata, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot ii. (1848) 843=Q. cryptantha.
cordata, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 129=Q. cordata.
dichotomy Mart. 1. c. 128. t 77=Q. dichotoma.
Lundii, Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867) 27 = 6. Lundii.
marginata, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 798 - Q. mflrffj nft tfl •

AlEFHUiOFHItTM, Kunth, in Joum. Phys. lxxxvil. (1818) 451. *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. il. 1089.
glanduliferum, Mart, ex DC. Prod. ix. 193 "Vanthieri.
macrophyllum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 149. —N. Granat.
molle, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 120. —Mexic.
Mutisii, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 149. t 219. —N. Granat
panicnlatom, *H. B. & K. I.* c—Honduras.
pubescent, Spreng. Syst. ii. 836-Bignonia fallax.
Vauthieri, *DC. Rev. Bignon.* (1838); *Prod.ix.* 198.—Bras.

AMPHINOMIA, DC.Prod. ii.522 (1825) =Lotononiu, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
decumbens, DC. L c.=L. polycephalus.

AMPHIOLANTHUS, Griseb. Cat. PI. Cub. 18S (1866) =Mloranthemum, Michx. (Scrophul.).
arenaroides, Griseb. 1. c. 187.—Cuba.
bryoides, Griseb. 1. c. 186.—Cuba.

AMPHION, Salisb. Gen. PI. Fragm. 66 (1866)=Semele, Kunth (Liliac.).

AMPHIONE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 79 (1836) - Ipomaea, Linn. (Convolv.).
asari/olia, Rafin. 1. c. = I. asarifolia.
ckenopodia, Rafin. 1. c—Hab. ?
cymosa, Rafin. 1. c.=I. cymosa.
lobata, Rafin. 1.1—Hab. *1*
splendens, Rafin. Sylva Tellur. 130=Argyreia splendens.
venosa, Rafin. Fl. Tellur. iv. 79=1. venosa.

AMPHIPAPPUS, Torr. *tc* Gray, in Proc. Bost. Soc. i. (1844> 210; Bost. Joum. Nat. Hist v. (1847) 107- AmphiachyTiB, Nutt. (Compos.).
Fremontii, Torr. *8c* Gray, 1. c 10§-Amphiachyris Fremontii.

AMPHIPLEIS, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 75 (1836) = STicotiana, linn. (Solanac).
fetida,.Rafin. 1. c—Hab.?
quadrivalvis, Rafin. 1. c.=N. quadrivalvis.

AMPHIPOOON, R. Br. Prod. 175 (1810). *GRAMINE AE,* Benth. & Hook. f. iii. 1145.
AEGOPOGON, Beauv. Agrost 122. t. 22. f. 4 (1812), partim.
GAMILYTHKUM, Nees, in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 416.
PENTACRASPEDON, Steud. Syn. PL Gram. 161 (1865).
menaceus, R. Br. Prod. 175(1810) =strictus.
Brownei, F. Muell. Fragm. viii. 201=strictu«.
carieinus, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 445- strictus.
cygnorum, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 100.—Austral,
debilis, *R. Br. Prod.* i. 176.—Austral.
gracilis, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 101=strictus.
laguroides, F. Muell. Fragm. viii. 201» cygnorum.
laguroides, *R. Br. Prod.* i. 175.—Austral,
strictus, *R. Br. I. c*—Austral,
turbinatus, *R. Br. I. c*—Austral.

AMPHIREPHIS, Nees & Mart, in Nov. Act Acad. Nat. Cur. xii. (1824) 4-AMPHEREPHIS, H. B. & K.= Centratherum, Cass. (Compos.).

AMPHIRHAPIS, DC. Prod. v. 848 (1886) = Inula, Linn.; Hicroglossa, DC. *8c* Solidago, Linn. (Compos.).
albescens, DC. Prod. v. 843=M. albescens.
chinensis, *Sch. Bip. in Flora,* xxxv. (1852) 58 = Solidago Virga-aurea.

AMPHIRHAPIS:—
cuspidata, DC. Prod. v. 843-Inula cnspidata.
heterotricha, DC. 1. c.=I. eupatorioides.
indica, 'Less.' ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 227, in syn.=Centratherum reticulatum.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 172.—Japon.
leiocarpa, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 488=Solidago Virga-aurea.
mollis, 'Wall.' ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 227, in syn. = Centratherum molle.
peduncularis, DC. Prod. v. 844=Asier asperulna.
pubescens, DC. 1. c. 848=Solidago Virga-aurea.
rubricaulis, DC. 1. c.-=I. rubricaulis.
Wightiana, Hook. f. Fl.Brit. Ind. iii. 301=Carpesium abrotanoides.
teylanica, DC. Prod. vii. 279=M. zeylanica.
Zollingeriana, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 126, nomen.—Malaya.

AMFHTBItHOZ, Spreng. Syst. Cut. Post. 61 (1827). *VIOLARIEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 118.
BRADDLEYA, Veil. Fl. Flum. ii. 1.140 (1827).
SPATHULAWA, St. Hil. PI. Rem. 817. t. 28 (1824).
latifolia, *Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xih. I. 376.—Bras.
longifolia, *Spreng. Syst. Cur. Post.* 61.—Bras,
surinamensis, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 377.—Bras.

AMPHISCOPIA, Nees, in Wall. PI. As. RaT. iii. 112 (18S2)=Jufitlcia, Linn. (Acanth.).
aequilabris, Nees, in DC. Prod. xi. 858.—Bras.
Beyrichii, Nees, in Mart Fl. Bras. ix. 180=J. nummularia.
ciliata, Moricand, ex Nees, 1. c.—Bras.
dliata, Nees, in DC. Prod. xi. 859.—Reg. Argent.
comosa, Nees, 1. c. 360=J. comosa.
cuneifolia. Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 180-J. cuneifolia.
inficUns, Nees, in DC. Prod. xi. 857=J. inficiens.
lancifolia, Nees, I. a—Peruv.
Martiana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 130.—Bras.
Middletoni, Nees, in DC. Prod. xi. 356.—Afr. trap.
montana, Nees, 1. c. 859.—Bras.
Moricandiana, Nees, 1. c. 857.—Bras.
Pohliana, Nees, 1. c. 359.—Bras.
polystachya, Nees, 1. c. 356=J. polystachya.
retusa, Nees, 1. c. 357=J. retusa.
rosea, Nees, 1. c. 858—Eranthemum roseumi
serpens, Nees, 1. c. 857 = Hypoestes serpens?
strobilacea, Nees, 1. c. 858.—Bras.
venosa, Nees, 1. c. 358-J. cristata.

AMPHISCOPIUM, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. 119 (1880)-praec.

AMPHISTELMA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 417 (1864) =Vinoetozlcum, Moench (Asclep.).
angulatum, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 226.—Bras.
aphyllum, Foum. 1. c.—Bras.
ephedroides, Griseb. Cat. PI. Cub. 174.—Cuba.
exsertum, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 229.—Reg. Argent.
ferrugineum, Fonm. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. (1885) 224.—Bras. *
filiforme, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 418.—Ind. occ.
graminifolium, Griseb. Cat PI. Cub. 174.—Cuba.
leptocladon, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 418 = V. leptocladum.
linearifolium, Griseb. Cat. PI. Cub. 175.—Cuba.
melanthum, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 226-V. melanthum.
paroiflorum, Foum. 1. c. 224.—Bras.
Riedelii, Foum. 1. c. 225.—Bras.
salinarum, Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub. 175.—Cuba.
Selloanum, Foum. in Mart. FL Bras. vi. IV. 224•—Bras.
streptolobium, Fourn. 1. c. 225.—Bras.
tomentosum, Foum. 1. c 226.—Bras.

macrophylla, *Miers, ix BaUl. in Rev. Hortic.* (1882) 465.—Am. centr.
nigripes, *Baill. I. c*—Am. trop.?

AMPHITHAIiEA, Eckl. & Zeyh. Enum. 167 (1886). *LEGUMINOSAE.* Benth. & Hook. f. i. 472.
CRYPHIANTHA, Eckl. & Zeyh. Enum. 171 (1886).
EFISTEMUM, Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 478.
IKGENHOUSSIA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 20 (1886).
ciliaris, Eckl. & Zeyh. Ennm. 169=Coelidram ciliare.
cuneifolia, *Eckl. & Zeyh. 1. c.* 167.—Air. austr.
densa, *EcU. & Zeyh. I. c.—Afr.* anstr.
densiflora, Eckl. & Zeyh. 1. c. 168=ericaefolia.
ericaefolia, *Eckl. & Zeyh. I. c.* 169.—Afr. anstr.
hilaris, Eckl. & Zeyh. 1. c-= ericaefolia.
humilis, Eckl. & Zeyh. 1. c. 168=intermedia.
incurvifolia, Eckl. & Zeyh. 1. c =ericaefolia.
intermedia, *Eckl. & Zeyh. I.* c.—Afr. austr.
Kraussiana, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 66-virfrata.
micrantha, *Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 470.—Afr. austr.
multiflora, Eckl. & Zeyh. Ennm. 168-ericaefolia.
perplexa, Eckl. & Zeyh. 1. c 170—Coelidinmroseum.
phylicoides, *EM. & Zeyh. 1. c*—Afr. austr.
spinosa, Stend. Nom. ed. II. i. 80=Coelidium spinosum.
tortilis, Steud. 1. c = Coelidium Vogelii.
vertidllata, Steud. 1. c.=Priestleya elliptica.
violacea, *Benth. in Hoot. Lond. Joum. Bot.* ii. (1843) 461.—Afr. austr.
virgata, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 169.—Afr. amtr.
Vogelii, Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 472 ^ericaefolia.
Wuliamsonii, *Harv. in Hare. & Sond. Fl. Cap.* ii. 23.—Air. austr.

AMPHIZOMA, Miers, in Trans. Linn. Soc xxviii. (1872) 422 = 8alaola, Linn. (Hippocrat).
laxiflora, Mien, 1. c. = S. laxiflora.
Martiana, Miers, 1. c. 428=S. Martiana.
tenuicula, Miers, 1. c.—Bras.

AMPHOCHAETA, Anderss. in Vet. Akad. Hand. Stockh. (1853) 136«Pennlsetum, Pers. (Gramin.).
exaltata, Anderss. 1. c.=P. exaltatum.

AMPHODUS, Lindl. Bot Reg. t. 1101 (1827) = Kennedya, Vent. (Legum.).
ovaius, Lindl. 1. c. = K. rubiennda.

AMPHORCHIS, Thou. Orch. lies Afr. Tabl. Synopt. (1822) = Cynorchis, Thou. (Orchid.).
calcarata, Thou. 1. c. t 4 = C. squamosa.
colorata, Stend. Nom. ed. II. i. 80, sphalm.» praec.
inrrmis, Thou. Orch. Isles Afr. t 6—Arnottia inermis.
laxiflora, Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat ii. 190.—Malaya.
lilacina, Ridl. in Journ. linn. Soc. xxi. (1888) 518.—Madag.
nilarmis, Steud. Nom. ed. IL i. 80, sphalm.= inermis.
occidentalis, Lindl. in Joura. Linn. Soc. vi. (1862) 189.—Afr. trop.

AMPHOBICARPUS, Visiani, FL Dalm. ii. 27. t. 10. f. 2 (1844). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 466.
Neumayeri, *Visiani, Ft. Dalm.* ii. 28. t 10. f. 2.—Dalmat.

AMPHORICARPUS, Sprnce, ex Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 288 = Couratarl, Aubl. (Myrtac).
uaupenris, Spruee, ex Miers, 1. c = C. uaupensis.

AMPHYMENIUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 380 (1823)=PteroearpU8, Linn. (Legum.).
cordatum, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guyan. 1205, nomen.—Guiana.
floridum, Benth. in Hook. Kew Joum. ii. (I860) 234 = P. Rohrii.
latifolium, Klotzsch, in Schomb. Faun, et FL Guyan. 1205, nomen.—Guiana.
laxiflorum, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot ii.(1840) 85.—Bras.
laxum, Klotzscb, in Schomb. Faun, et Fl. Guyan. 1206, nomen.—Guiana.
longi/olium, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 289=P. ancylocalyx.

AMPHYMENIUM :—
mediterraneum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 95 = Martia parvifolia.
nitidum, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guyan. 1206, nomen.—Guiana. -
orbiculatum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 95 = P. orbiculatus.
pubescent, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. vi. 880=P. Amphymenium.
reticulatum, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guyan. 1205, nomen.—Guiana.
Rohrii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 880=P. Rohrii.
tenuifolium, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guyan. 1205, nomen.—Gniana.
villosum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 95=P. villosus.
violaceum, Walp. Rep. i. 798- P. riolacens.

AMPOMELE, Ra6n. Sylva Tellnr. 160 (1838) - Bubus, Toura. (Rosac).
triphylla, Rafin. 1. c.=R. triGdus.

AMSQTCKIA, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1831) 7. *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 851.
BENTHAMIA, Lindl. Nat. Syst. ed. I. 241 (1830).
angustifolia, *Lehm. I. c*—Chili,
baastaminea, *Cesati, in Atti Ace. Sc. Nap.* v. (1873) VII. 14.—Reg. Andin.
Douglasiana,A. DC. in DC. Prod. x. 118-spectabilis.
echinata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 54.—Calif,
humifusa, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 371.—Reg. Argent.
intermedia, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. (1836) 26.—Calif,
lycopsioides, *Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb* (1881) 7.—Calif,
mexicana, *Mart. & Galeot. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1844) reimpr. 28.—Mexic.
parviflora, Bernh. DeL Sem. Hort. Erf. (1838) = angustifolia.
spectabilis, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. (1886) 26.—Calif,
tessellata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 64.—Calif,
veraicosa, *Hook. & An. Bot. Beech. Voy.* 870.—Calif.

AMSOHTA, Walt Fl. Carol. 98 (1788). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii 702.
angustifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 121.—Am. bor.
brevifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acpd.* xii. (1877) 64.—Utah; Arizona.
ciliata, Walt. Fl. Carol. 98 = angustifolia.
elliptica, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 432.—Japon.
lati/olia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 121-A. Tabemaemontana.
longiflora, *Ton. Bot. Mex. Bound.* 169.—N. Mexic
orientalis, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 105-Rhazya orientalis.
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii (1877) 64.—Arizona.
salicifolia, Push, Fl. Am. Sept. i. 184-A. Taberaaemontana.
Tabernaemontana, *Walt. Fl. Carol.* 98.—Am. bor.
tomentosa, *Torr. & Frlm. in Fr&m. Rep.* 1843-44 (1845) 316.—Am. bor.
tristis, Sm. in Rees, Cycl. xxxv. ad calc. art. Tabemaemontanae, n. 2—A. Tabernaemontana.

AMSORA, Bard. Ord. 636 (1830), sphalm.=Amoora, Roxb. (Meliac.).

AMURA, Schult. f. Syst vii. p. 11,75 (1829) - Amoora, Roxb. (Meliac.).

AMYDRItrM, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat i. 127 (1863). *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 993.
humile, *Schott, I. c*—Borneo.

AMYGDALOPHORA, Neck. Elem. ii. 70 (1790)- PrunuB, Toum. (Rosac.).

AMYGDALOPSIS, Carr. in Rev. Hortic. (1862) 91 - Prunua, Toum. (Rosac).
eburnea, M. Roem. Syn. Rosifl. 16 = P. ebumea.
furcata, M. Roem. 1. c. - P. eburnea.
horrida, M. Roem. 1. c 15 *(-Amygdalus horrida).*—Persia.

AMYGDALOPSIS :—
Lindleyi, Cat. in Rev. Hortic. (1862) 91; (1868) 197 = P. triloba.
lyckides, M. Roem. Syn. Rosifl. 16 (=*Amygdalus lydoides).*—As. Min.; .Syria.
Scorpius, M. Roem. 1. c.«=P. ebumea.
virgata. Can. in Rev. Hortic. (1872) 200=P. virgata.

AMYGDALUS, [Toum.] Linn. Syst. ed. L (1735) = FrunUB, Toura. (Rosac).
agrestis, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 1.—Syria.
amara, Hayne, Arzn. iv. in nota ad t 89. £ i.-P. Amygdalus.
amygdalina, Oken, ex M. Roem. Syn. Rosifl. 8-P. Amygdalus.
arabica, Olivier, Voy. t. 47.—Arabia.
argentea, Lam. £ncyc i. 108—orientalis.
Armeniaca, Dum. Fl. Belg. 91=P. Armeniaca.
Armeniacaria, Oken, ex M. Roem. Syn. Rosifl. 10-P. Amygdalus.
Balansae, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 71.—Phrygia.
Besseriana, Schott, ex Schlecht. in'Abh. Naturf. Ges. Halle, ii. (1854) 1=P. nana.
BoissierU, Carr. in Rev. Hortic (1875) 362.—As. Min.
Bovei, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. II. xix. (1843) 124.—Syria.
brahuica, Boiss. Fl. Orient, ii. 645.—Beluchist
camelliaefiora, Morr. in Belg. Hortic. viii. (1858) 97. t. 26=P. Persica.
campaniflora, Carr. in Rev. Hortic. (1872) 129.—Hab.!
campestris, Bess. Enum. PI. Volh. 46=P. nana.
caryophyllacea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 85=«P. Persica.
cerasina, Oken, ex M. Roem. Syn. Rosifl. 9 = P. Amygdalus.
chinensis, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 85=P. Persica.
chinensis, Leroy, ex C. Koch, 1. c. 79-P. nana.
cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. 816.—Cochinch.
collinus, Wall. Cat n. 723-P. Persica.
communis, Bunge, Euum. PL Chin. Bor. 21-P. Persica.
communis, Linn. Sp. PI. ed. I. 478-P. Amygdalus.
cordifolia, Roxb. Fl. Ind. ii. 500.—China.
dasylepis, Miq. in Joum. Bot. N&rl. i. (1861) 122 « P. Persica.
dianthiflora, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 86-P. Persica.
discolor, M. Roem. Syn. Rosifl. 12 - orientalis.
dulcis, MiU. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-P. Amygdalus.
eburnea, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 123.—Persia.
elaeagrifolia, Spach, 1. c. 120.—Persia.
elata, Salisb. Prod. 356=P. Amygdalus.
Fischeriana, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér II. xix. (1843) 125.—Hab.)
fragilis, HelL Fl. Wirceb. i. 600-P. Amygdalus.
frutescens, Steud. Nom. ed. II. i. *61-(A.fruticosa).*
fruticosa, Wender.in Bot. Zeit. (1865) 338. t. 12.—Hab.!
furcatus, Spach. in Ann. Sc Nat Sér. II. ax. (1843) 124=P. eburnea.
Gaertneriana, Schlecht. in Abh. Ges. Halle, ii. (1854) 19-P. nana.
georgica, Desf. Hist. Arbr. ii. 221=P. nana.
glandulosa, Hort. ex C. Koch, DendroL 1,118-P microphylla.
glandulosa, Hook. Ic. PI. t. 288 = P. glandulosa.
glandulosa, Leroy, ex C. Koch, Dendrol. i. 116 = P. japonica.
grandiflora, Hort. ex C. Koch, L c. 81=P. Amygdalus.
grandiflora, Hort. Gall, ex C. Koch, L c. i. 80-P. Persica.
grata, Salisb. Prod. 356=P. Persica.
heterophylla, Hort ex C. Koch, DendroL i. 81-P. Amygdalus.
Heuckeana, Schlecht in Abh. Ges. Halle, (1854) 1.22.—Sibir.
horrida, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. IL xix. (1843; 121.—Persia.
humilis, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 44 - P. JacquemontiL
hybrida, Dierb. ex M. Roem. Syn. Rosifl. 11-P. Amygdalus.

AMYGDALUS :—
incana, Pall. Fl. Ross. \. 18. t 7-Pnram pro»trat«.
"pahanensis, Thouin, in Ann. Mns. Par. Ser. I.,viii. .,(1826) 425=P. Persica.
Kotschyi, Hohen. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. xix. . (1843) *117=eleagnifolia.*
'amis, D. Dietr. Syn. PI. iii. 42=P. Persiea.
Lrfetouriana, Schlecht. in Abh. Ges. HaUe, (1854) 1 .«P. nana.
letocarpa, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 52.—Persia.
lyaoides, Spach, in Ann. Sc Nat. Set. II. xix. (1843) 120.-As.Min.; Syria.
"ncrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 245. t. 664 = P. microphylla.
minor, Duh. Arbr. Frnit. i. t. 7.—Hab. ?
****a,* Linn. Sp. PI. 478.—Europ.; Reg. Cauc; Sibir.
Nvci-pertica, Reichb. FL Germ. Excun. 847 - P. Persica.
orientalis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4,-As. Min.; oyna.
Pallasiana, Schlecht. in Abh. Ges. Halle, (1854) 1-
Pallasii, Turcz. ex Stend. Norn. ed. II. i. 81-P. pedunculate.
pedunculata, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 22 = P. tnloba.
pedunculata, Pall, in Nov. Act Petrop. vH. (1789) 355. t. 6, f. —Stolt.
Persŕa, Linn. Sp. PI. 472=P. Persica.
Pfaco-amygdala, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 647-P. Amygdalus.
persicoides, C. Koch, Dendrol. i. 84 = P. Persica.
pilosa, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Most v. (1832) 189.—China.
prostrata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 178-P. prostrata.
pumila, Linn. Mant. i. 74 = P. japonica.
Reuteri, Boiss. & Bnhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) *l%=horrida.*
rosęflora, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 85=P. Persica.
«8l»n/0«B, Boiss. & BaL Diagn. Ser. II. vi. 671 = Webbii.
sativa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = P. Amygdalus.
***"'"«, Spach, in Ann. Sc Nat. Ser. II. xix. (1843) 109.—Persia.
**corpius,* Spach, 1. c. 122 = P. eburnea.
serratifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. L 79=P. nana.
nbirica, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 199.—Sibir.
anensis, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 81=*cochin-*c*"inensis.*
'^'*oides,* Spach, in Ann. Sc Nat. Ser. IL xix. (1843) 1U8—Syria-; Persia.
opatkulata, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 58=P. ebnmea.
D»osissima,* Bunge, Rel. Lehm. 10B.-rTurkest.
•fw*a'a»o, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 45.—Beluchist.
tomentosa, Hort. ex C. Koch. Dendrol. i. 81=P. Amygdalus.
tomentosula, Steud. Norn. Bot. ed. II. L 81 = P. Amygdalus.
Wrf«»\jSpach, in Ann. Sc. Nat Ser. II. xix. (1843) 117.—Phrygia.

A* £ H I S , P. Br. Hist Jam. 208 (1756). *BURSERA-*C*AE,* Benth. & Hook. f. i. 327.
{"•SMI, Adans. Fam. ii. 842 (1768).
{a-EMiFERA, Linn. Hort. Cliff. 486 (1787).
RJTINOPHORA, Neck. Elem. ii. 229 (1790).
onvntnata, Poir. Encyc Suppl. ii. 186=Idea acu-•nmata.
"""ninata, Roxb. Hort. Beng. 28; Fl. Ind. ii. 246 . ^ Commiphora caudata.
"gaUocha, Roxb. Hort. Benc. 28 (1814)=Commiphora B Agallocha.
"'•"low, Willd. Sp. PI. U. 836=Protium altissimum.
"mbrosiaca, Linn, t Suppl. 216=Protium Icicariba.
"nbrosiac, M09. & Sesse, in DC. Prod. ii. 77, 78 = «'ca serrata.
"mbrosiaca, Spreng. Syst. ii. 218, pro parte=Protium gnianense.
owjranoco, Willd. Sp. ii. 335=Protium heptophyllum.
<">u>rosiaca. Veil. Fl. Flom. iv. t 8=Protium hepta-Phyllnm}
"nisata, Roxb. ex Stend. Norn. ed. II. i. 81=Claujena heptaphylla.
»»«<«, Willd. Sp. PL ii. 887=Clausena anisatum.
anisata, Spreng. Syst. i Yl Cur> PML «9=EU Phrium ariense.
armata, Sprang. Syst. ii. 219 - Zanthoxylon Thunbergii.
axillifiora, Griseb.Cat. PI. Cub. 66.-Cuba.

AMYKIS:—
balsamifera, *Linn. Syst.* ed. X. 1000.—Jamaica.
bicolor, Willd. ex Engl. in DC- Monog. Phan. iv. 54 - Bursera bicolor.
bipinnata, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 82=Bursera bipinnata.
brachybotrys, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 614.—Bras.
brasiliensis, Spreng. Syst. ii. 217=Protium brasiliense.
brasiliensis, Willd. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 64 =Protium heptaphyllum.
capensis, Spreng. Syst. ii. 218 *{=Fagarastrum capense}.*
Carana, Humb. Relat. ii. 421=Protium Carana.
caranifera, Willd. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 49 - Bursera graveolens.
Commiphora, Roxb. Fl. Ind. ii. (1824) 244=Commiphora Agallocha.
Cataf, 'Forsk.'=A *Kataf.*
copallifera, *Oliva, in La NaturaUta,* (1870) 40.—Mexico.
copallifera, Spreng. Syst. ii. 219=Elaphriom copalliferum.
cymosa, Reichb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 81=sylvatica.
decandra, *Brotero, ex Prito. in Bot. Zeit.* i. (1843) 561.—Bras.
decandra, Willd. Sp. PI. ii. 336 = Idea decandra.
dentata, Blume, Bijdr. 1160=Clausena javanica.
dentata; Willd. Sp. PI. ii. 387=Clausena Willdenowii.
dUtrypa, *Spreng. Neue Entdeci.* iii. 48 ; *Syst.* ii. 217. —Ins. S. Doming.
dioica, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 81 = Schinus dependens.
Elaphrium, Spreng. Syst ii. 219=Bursera glabra.
elegans, Willd. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 57 = Bursera excelsa.
elemifera, Koen. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 218 = Canariom zeylanicum.
elemifera, Linn. Syst. ed. X. 1000-Plumieri.
enneandra, Willd. Sp. PI. ii. 835 = Protium decandrum.
*fagaroid*In, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 148=Bnrsera *fagaroides.*
floridana, *Ware, ex Nuti. in Am. Journ. Sc.* v. (1822) 294.—Florida.
Funckiana, *Tuns, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) I. 475.—Venezuela.
fruticosa, *Roxb. Hort. Beng.* 28.—Ind. or.
gileadensis, Roxb. Hort. Beng. 28; Fl. Ind. ii. 246 = C. Berryi.
giliadensis. Linn. Diss. Opob.; Amoen. Acad. viL 68 = Commiphora Opobalsamum.
graveolens, Buch.-Ham. ex Steud. Norn. ed. II. i. 81 = Clausena excavata.
graveolens, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 148=Bursera graveolens.
guianensis, *Aubl. PI. Gut.* i. 836.—Guiana.
guianensis, Willd. Sp. PI. ii. 325= Protium guianense.
heptaphylla, Roxb. Hon. Beng. 28; Fl. Ind. ii. 248 = Clansena heptaphylla.
heteropkylla, Willd. Sp. PI. ii. 335 = Protium Aracouchini.
hexandra. Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 84 = Dacryodes hexandra.
Hypelate, Robinson, ex Lunan, Hort. Jamaic. i. 149. Hypelate trifoliata.
inaequalis, Spreng. Syst ii. 218=Clausena inaeqoalis.
jorullensis, Spreng. Syst Cur. Post 148 •= Bursera jorullensis.
Kafal, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 80=an seq.!
Kataf, Forsk. 1. c.=Commiphora Kataf.
lanuginosa, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 149=Bursera lanuginosa.
Linaloe, La Llave, in La Natnraleza, vii. (1885) Ap^nd. 73=seq.
Linanoi, La Llave, ex Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 252=BnrseraAloëxylon.
lineata, *C. Wright, ex Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viU. (1861) 177.—Ind. occ.
Lunani, Sprengj Syst. ii. 217-maritime.
Lypelata, Stend. Norn. ed. II. i. 81, sphalm.=Hypelate trifoliata.
maritima, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 19.—Am. trap.
maritima, Llanos, in Mem Acad. Madr. Ser. III. ii. III. (1866) 503.—Ins. Philipp. 1
maritima, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 82= A. Tecomaca. *
multijuga, *Turcm.inBull. Soc. Nat. Mosc.xxxi.* (1858) I. 476.—Bras.

A1TYBI8:—
nana, Roxb. Hort. Beng. 28=Clausena Willdenowii.
Novae-Hollandiae, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 81 = Botryceras laurinnm.
oleosa, Lam. Encyc. i. 362=Canarium microcarpum.
Opobalsamum, Linn. Diss. Opob.; Amoen. Acad. vii. 68; Forsk. Fl. Aegypt. 79=Commiphora Opobalsamum.
papyrifera, Caill. ex Del. Voy. Meroj, 99 = Boswellia papyrifera.
penidllata, Spreng. Syst. ii. 219=Bursera penicillata.
pentaphylla, Roxb. Hort. Beng. 28; Fl. Ind.ii. 247 = Clausena pentaphylla.
pemambucensis,i4rr«<ij, *in Koster, Trav. Brat.* 500.—Bras.
PhUippaea, Robinson, ex Lunan, Hort. Jam. i. 150 •» Hypelate trifoliata.
pinnata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 87.—Am. trop.
Plumieri, *DC. Prod.* ii. 81.—Ind. occ.
polygama, Cav. Ic. iii. 20—Schinus dependens.
Protium, Linn. Mant. i. 65 = Protium javanicum.
pubescens, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, xvii. (1842) 527=Elaphrium pnbescens.
punctata, Roxb. Hort. Beng. 28; Fl. Ind. ii 251 = Clausena excavata.
Robinsonii, *DC. Prod.* ii. 82.—Jamaica.
rugosa, Willd. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 58 = Bursera jorullensis.
serratifolia, Rottl. ex A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 629 = Balsamodendron Roxburghii.
simplicifolia, Roxb. Fl. Ind. ii. 244=Atalantia Roxburghiana.
suffruticosa, Roxb. 1. c. 250=Clausena suffruticosa.
sumatrana, Roxb. Hort. Beng. 28; Fl. Ind. ii. 250 = Clausena excavata.
sylvatica, *Jacq. Am. Select.* 107.—Ind. or.
Tecomaca, *Moç. & Sesse, Fl. Mex. ined.* t 195, *ex DC. Prod.* ii. 82.—Mexico,
terebinthifolia, *Tenure, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1837) 1.—Bras,
thyrsiflora, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) 1. 476.—Mexico.
tomentosa, Spreng. Syst ii. 219 •= Bursera tomentosa.
toxifera, *Linn. Syst.* ed. X. 1000.—Ind. occ.
ventricosa, Llave, ex Schlecht m Linnaea, xvii. (1843) 246=Bursera fagaroides.
teylanica, Retz. Obs. fasc iv. 25=Canarium zeylanicum.

AMYRSIA, Rafin. SylvaTellur. 106 (1838)=Eugenia, Linn. (Myrtac).
compressa, Rafin. 1. c.=E. compressa.
discolor, Rafin. 1. c. = E. discolor.
foliosa, Rafin. 1. c - E . foliosa.
microphyla, Rafin. 1. c *(=Myrtus microphylla).*

ANABAENA, A. Juss. Euph. Tent. 46. t. 16 (1824) = Plukenetia, Linn. (Euphorb.).
tamnoides, A. Juss. 1. c 1.15=P. tamnoides.

ANABASIS, Linn. PI. Camts. (1750) (Amoen. Aead. ii. 847). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 72.
BORITH, Adans. Fam. ii. 262 (1763).
BRACHYLEPIS, C. A. Mey. Fl. Alt i. 370 (1829).
FRBDOLIA, COSS. ft Dur. ex Moq. *Sc* Coss. in Bull. Soc. Bot Fr. ix. (1862) 801.
MICROLEPIS, Eichw. Casp. Cauc 2 (1881).
affinis, Bunge, Rel. Lehm. 480~Arthrophytum subulifolium. *
affinis, C. A. Mey. in Schrenk, Enum. PI. Nov. Song. (1841)10 = brevifolia.
alopecuroides, Moq. in DC. Prod. xiii. 11. 210-Halogeton alopecuroides.
Ammodendron, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 875 = Haloxylon Ammodendron.
annua, *Bunge, Anab. Rev.* 46.—Persia,
aphylla, *Linn. Sp. PI.* 223.—Oriens; Sibir.
arbuscula, *Thunb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 81.—Hab. ?
aretioides, *Moq. *• Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix (1862, 301. t. 2,—Afr. bor.
erticulata, Choulette, ex Pomel, Nouv. Mat. Fl• Atl• 834=prostrata.
articulata, *Moq. in DC. Prod.* xiii. H. 212.—Afr. bor. ; Syria,
brachiata, *Fi*h. & Mey. ex Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv (1842) 433,-Oriens; Turkest.
brachiata, Kar. & Kir. 1. c. = truncata.

ANABASIS:—
brachylepis, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 996.—Reg. Case,
brevifolia, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* i. 877.—Sibir. alt.
caespitosa, Steph. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 216-Nanophyton caspicum.
cinerea, Moq. 1. c 214-Seidlitzia florida.
clavata, S. G. Gmel. It. ii. 41-Salsola clavifolia.
conjugata, Hoffm. Hort. Mosq. (1808) No. 184-Petrosimonia brachiata.
crassa, Moq. Chenop. Ennm. 166=articulata.
entaeea, C. A. Mey. Ennm. ez Bnnge, Anab. Rev. 89 = brachiata.
cretacea, *Pall. Seise,* i. 498.—Sibir.
cretica, Vitm. Samm. PI. ii. 104=cretacea.
Echinus, Bieb. Beschr. Laend. Cup. 152-Noaea spinosissima.
Ehrenbergii, *Schweinf. ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 970, in nota.—Nubia; Arab.
florida, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 190-Seidlitzia florida.
foliata, Pall, ex Bunge, Anab. Rev. 47-Salsola foliosa.
foliosa, PalL Reise, i. 880=Salsola clavifolia.
foliosa, linn. Sp. PI. 223-Salsola foliosa.
glomerata, Bieb. in Mem. Soc Nat Mosc i. (1808) 110—Halogeton glomeratus.
Hanssknechti, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 969.—Persia.
keterophylla, Walp. Ann. i. 671 (sphalm.=seq.).
heteroptera.Jsab. ft Spach, Illnstr. ii. 45. t. 134<»Girgensohnia oppositiflora.
intermedia, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 214 = phyllophora!
juncea, Bieb. ex Moq. 1. c. 208=Ofaiston monandnun.
Kareliniana, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. iii. 825 = trnncata.
lutea, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 216-setifera.
maeroptera, *Moq. I. c.* 213.—Affghanist
monandra, Schrad. Nenes Joan. iii. (1809) 89= Ofaiston pauciflorum.
multiflora, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 212 = Haloxylon multiflorum.
oppositiflora, Bieb. in Mem. Soc. Nat. Mosc. i. (1808) 148 = Girgensohnia oppositiflora.
oppositifolia, Bieb. Beschr. Laend. Casp. App. 154-Petrosimonia crassifolia.
oppositifolia, Schrad. Venes Joum. iii (1809) 89-Halogeton oppositifl^fus.
phyllophora, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 781.—Syria; Soongaria.
prostrata, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Alt.* 834.—Afr. ,bor.
ramosa, *Sievers, in Pall. If. N*rd. Beitr.* vii. 804.—Sibiria.
setifera, *Moq. Chenop. Enum.* 164.—Aegypt.; Oriens.
Sieversii, Willd. in Roem. ft Schult. Syst. vi. 223 = Nanophyton caspicum.
spinosissima, Linn. f. Suppl. 178-Noaea spinosissima.
subulifolia, C. A. Mey. in Bnll. Acad. P&enb. Sir. IV. i. (1848) 860-phyllophora.
tamarisdfolia, Linn. Syst ed. X. 949=SalsoU tamarisdfoluL
tamarisdfolia, Webb, Iter Hisp. 17=Salsola Webbii.
tatarica, Pall. Illnstr. 13. t 8 = aphylla.
Tournefortii, Janb. ft Spach, Illnstr. PI. Or. ii. 43.1.182-Noaea Tournefortii.
triandra, Bieb. Beschr. Laend. Casp. App. 164 = .Petrosimonia Volvox.
truncaia, *Bunge, Anab. Rev.* 38.—Reg. Casp.

AHABATA, Willd. ex Roem. ft Schnlt Syst iv. 60, 707(1819). Gen. dub. *LOGAN.* Bentb. ft Hook, t iL 788.
SULZERIA, Roem. ft Schnlt. 1. c
odorata, *Humb. ex Roem. & Schult. I. c*—Am. austr.

AHACAMPBEBOS, Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. 1.152 (1737). *PORTULACEAE,* Benth. ft Hook, f. i. 157.
RUELINGIA, Ehrh. Beitr. iii. 132 (1788).
TALINUM, Adans. Fam. ii. 246 (1763).
TELEPHIASTRUM, Medic. Phil. Bot. 1.100 (1789).
angnstifolia. *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1.170.—Afr. austr.
arachnoides, *Sims, Bot. Mag.* t. 1868.—Afr. austr.
filamentosa, *Sims, I. c.* 1367.—Afr. anslr.
intermedia, Haw. ex G. Don, Gen. Syit iii. 76-A. Telephiastrum.

ANA.CAMPSEBOS:—
lanceolata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1.170.-A.fr. anstr.
lanigera, *Burch. Trav.* ii. 888.—Afr. austr.
papyracea, *E. Mey. ex Send, in Han. & Sond. Fl. Cap.* ii. 383.—Afr. anstr.
polyphylla, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1.170.—Afr. anstr.
qninaria, *E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 383.—Afr. austr.
rotundifolia, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1.170.—Afr. anstr.
rubens, Sweet, 1. c. 170—arachnoides.
rufescens, Sweet, 1. c. 170-arachnoides.
Telephiastmm, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 77.—Afr. anstr.
trigona, *DC. Prod.* iii. 356.—Afr. anstr.
ustulata, *E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 388.—Afr. anstr.
varians, Sweet, Hort Brit. ed. I. 170-A. Telephiastrum.

ANACAMPSEROS, [Tourn.] Adans. Fam. il. 248 (1768); Haw. Syn. PI. Sncc 111 (1812)-Sedum, Linn. (Crassul.).
Aitoon, Haw. Syn. PI. Sncc 112-S. Aizoon.
albicans, Haw. 1. c. 111=S. albicans.
albida, Haw. ex DC. Prod. iii. 402-S. Telephium I
alpestris, Jord. ft Fonrr. Brev. Nov. PI. fasc. i. 22-S. maximum.
angustifolia, Timb. in Bnll. Soc. Hist. Nat Toulouse, iv. (1870) 168.—Gallia.
aprica, Jord. & Four. Brev. PI. Nov. fasc. i. 19-S. maximum.
arguta, Haw. Rev. PI. Sncc. 25=S. argutum.
assurgens, Jord. ft FOUR. Brev. PI. Nov. fasc. i. 24-S. maximum.
aurigerana, Jord. ft Fonrr. 1. c 80-S. Telephium.
beugesiaca, Jord. ft Four. 1. c. 24=S. Telephium.
Borderi, Jord. ft Fonrr. 1. c. 30-S. Telephium.
buxicola, Jord. ft Fonrr. 1. c 27-S. Telephium.
caerulescens, Timb. in Bnll. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toulouse, ii. (1874) 70-S. caeruleum?
Cepaea, Willd. Sp. PI. ii. 762-S. Cepaea.
cebennensis, Jord. ft Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 18 = S. maximum.
chlorotica, Joid. ft Fonrr. 1. c. 20-S. maximnm.
ciliaris, Haw. Syn. PI. Sncc. 113—S. involncratum.
collina, Jord. ft Four. Brev. PI. Nov. fasc i. 23=S. maximum.
conferta, Jord. ft Fourr. Ic PI. Eur. i. 36=S. Telephium.
convexa, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 29=S. Telephium.
Corsica, Jord. ft Fourr. 1. c. 17=S. maximum.
delphinensis, Jord. ft Fourr. 1. c. 21—IS. maximum.
dentata, Haw. Rev. PI. Succ. 26 -=S. dentatum.
divaricata, Haw. Syn. PI. Succ. 113-S. divaricatum.
dumeticola, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 28-S. Telephinm.
erubescens, Jord. ft Fourr. 1. c. 18—S. maximnm.
formosa, Timb. in Bull. Soc. Hilt. Nat. Toulouse, iv. (1870) 168.—Gallia.
hybrida, Haw. Syn. PI. Succ. 113-S. hybridum.
Julliana, Jord. & Fourr. Ic. PI. Eur. i. 86-S. Telephinm.
lapidicola, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 29 = S. Telephium.
linguaefolia, Hort. ex Lem. Illnstr. Hortic. x. (1863) Misc. 81=Cotyledon linguaefolia.
livida, Haw. Rev. PI. Sncc. 26-S. lividum.
lugdunensis, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 28 = S. Telephinm.
maxima, Haw. Syn. PI. Succ. ed. Germ. 121=S. maximum.
Millieri, Jord. ft Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 28=S. maximum.
minor, Jord. ft Fourr. 1. c. 19—S. maximnm.
monticulorum, Jord. ft Fonrr. 1. c. 26=S. Telephinm.
Navieri, Jord. ft Fourr. I. c. 27-S. Telephinm.
pachyphylla, Jord. ft Fonrr. 1. c. 17 = S. maximnm.
paucidens, Haw. Rev. PI. Sncc 24.—Hab.t
pectinata. Haw. 1. c. 24-S. pectinatnm.
populifolia, Haw. Syn. PI. Sncc. 113-S. populifolium.
Pourretii, Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toulonse.iii. (1876-76) 556.—Gallia.
praecelsa, Jord. ft Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc i. 26-S. Telephium.
praeruptorum, Jord. ft Fonrr. 1. c. 20=S. maximum.
purpurea, daw. ex DC. Prod. iii. 402-S. Telephium.
pyenantha, Jord. ft Fonrr. Brev. PL Nov. fasc i. 26-S. Telephium.

ANACAMPSEROS:—
pyramidalis, Timb. in Bull. Soc Hist Nat Toulouse, iv. (1870) 169.—Gallia.
recurva, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc. i. 20 = S. maximum.
repens, Jord. ft Fourr. 1. c. 31—S. Telephium.
rhodanensis, Jord. ft Fourr. 1. c. 24-S. Telephium.
rubella, Jord. ft Fourr. 1. c. 80=S. Telephinm.
rupifraga, Jord. ft Fourr. 1. c 29=S. Telephium.
Saxifraga, Jord. ft Fonrr. 1. c. 26=S. Telephium.
sempenirens, Haw. Syn. PI. Succ 112=S. Anacampseros.
serotina, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc i. 22—S.. maximum.
silvatica, Timb. in BulL Soc Hist. Nat Toulouse, iv. (1870) 167.—Gallia.
spathulata, Hort. ex Stend. Norn. ed. II. i. 82=S. spathulatum.
spectabilis, Jord. ft Fourr. Ic PL Eur. i. 87-S. spectabile.
spuria, Haw. Rev. PI. Succ 25-S. stoloniferum.
stellata. Haw. Syn. PI. Succ 114-S. stellatum.
subalbida, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc. i. 27 = S. Telephium.
subrotunda, Jord. & Fourr. 1. c. 19-S- maximum.
subpyrenaica, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat Toulouse, iv. (1870) 169.—Gallia.
telephioides, Haw. Syn. PL Succ. 114-S. telephioides.
ternata, Haw. 1. c.=S. ternatum.
ternata, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 21=-S. maximum*
Thevensei, Timb. in M&n. Acad. Toulouse, Sér. VII. vi. (1874) 646.—Gallia.
triphylla, Haw. Syn. PL Succ. 111-S. Telephium.
VerloH, Jord. ft Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc i. 22=S. maximum.
viridula, Jord. ft Fourr. 1. c. 26 = S. Telephium.
vogesiaca, Jord. ft Fourr. 1. c. 81-S. Telephium.
vulgaris, Haw. Syn. PL SQCC 112-S. Telephinm.

ANACAMPTA, Mien, Apocyn. S. Amer. 64 (1878)-Taberaaemontana, Linn. (Apocyn.).
acutissima, Miera, 1. c. 66-T. acutissima.
angulata, Miers, 1. c. 66-T. angulata.
congesta, Miers, 1. c.-T. rubrostriolata.
hirtula, Miers, 1. c. 67=T. hirtula.
longifolia. Mien, 1. c. 66-T. longifolia.
submollis, Mien, 1. c.67=T. snbmollis.

ANACAMPTIS, Rich, in Mem. Mm. Par. iv. (1818) 47, 65-Orchis, Linn.
Brancifortii, Lindl. Gen. etSp.Oreh. 275-0. Brancifortii.
condensata, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 286, in syn.—O. pyramidalis.
Durandi, Brlb. Fl. Norm. ed. II. 268-0. pyramidalis.
pyramidalis, Rich, in Mem. Mus. Par. iv. (1818) 55-O. pyramidalis.
quadripunctata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 275-0. Brancifortii.
trichocera, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 286 = 0. quadripunctata.

ANACARDIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119-Anaoardiiun, Linn.
rhinocarpa, St. Lag. 1. c-Anacardium Rhinocarpus.

AKACABDIUK, linn. Syst ed. I. (1735); Gen. ed. I. 129 (1737) i Rottb. in Act Hafn. ii. (1776) 252.
ANACARDIACEAE, Benth. ft Hook. f. i. 420.
ACAJOU, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 844 (1763).
ACAJUBA, Gaertn. Fruct i. 192. t. 40 (1788).
CASSUVIUM, Lam. Encyc. i. 22 (1783).
MONODYNAMUS, Pohl, PI. Bras. ii. 67. t. 144 (1831).
RHINOCARPUS, Bert, ft Balb. ex H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vii. 5. t. 601 (1825).
brasUiense, *Barb. Rodr. in Ret. Engenh.* (28 Jul. 1883) repr. p. 6.—Bras,
curatellaefolium, *St. Hit. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. xxUi. (1831) 272.—Bras.
dubium, Roxb. Hort Beng. [88]; FL Ind. iL 813-Gluta Benghas.
encardium, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art iv. 5.—Malaya.
giganteum, *Hancock, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 410 *{errore Hance).—HUM.*

ANACABDIUM :—
gigaoteum, *Loud, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 82, nomen. —Guiana.
humite, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 411-nanum.
humile, Mart. Reise, i. 814=pumilum.
numile, *St. Hil. in Ann. Sc.Nat. Sit.* I. xxiii. (1881) 272.—Bras.
latifolium, Lam. Encyc. i. 189-Semecarpns Anacardium.
longifolium, Lam. I. c.—Semecarpus Anacardium.
mediterraneum, *Veil. Fl. Flum.* 168; iv. t 46.—Bra».
S» 272—Bras.
occidentale, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 888.—Ind. occ.
Wutnale, Pritz. Ind. la 69=Semecarpas Anacardium.
"fficinarum, Gaertn. Fruct i. 192 = Semecarpns Anacardium.
orientate, Anct. ex Steud. Norn. ed. II. i. 82-Seme, carpus Anacardium.
Pwpilum, Walp. Rep. i. 555-nanum.
Kbinocarpus, *DC. Prod.* ii. 62.—Am. aostr.
'olitarium, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 159 - Semecarpns Anacardium.
oprnceanum, *Bentk. ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 410 Bras.
**ubcordatum,* Presl, Bot. Bemerk. 40 - curatellaefolram.
nbterraneum, Iiais, Climate, etc., Brisil, 604 - hnmile.

ANACHARIS, Rich, in Mem. Inst ii. (1811) 62 = Elodea, Michx. (Hydroch.).
Mnpastrum, Bab. ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. » (1849) 74 = E. canadensis.
calhtrichoides, Rich, in Mem. Inst. U. (1811) 7. t 2.—Bras.
nnadensis, Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xi. (1849) 75=E. canadensis.
'Mensis, Planch. 1. c.-Chili.
Huariana, Casp. olim ex Casp. in Monatsb. Berl. Akad. (1867)18=E.Naias.
***tkewHi,* Planch, in Ann. Sc. Nat. *Sit.* III. xi.(1849) 73—Peray.
"uttallii, Planch. 1. c 74 - E canadensis.
*P°**raniea,* Peterm. Deutschl. Fl. (1849) 629. t 82. fig. 680 = E. canadensis.
Trifteris, Steud. Nom. ed. II. i. 82 (#A«/m.=Anacis, Sehrank) = Coreopsis Tripteris.

ANACHEILIUM, Hoffmgg. ex Linnaea, xvi. (1842) Utt. 229=Epldendrum, Linn. (Orchid.).
fckleatum, Hoffmgg. 1. c. = E. cochleatum.

ANACHRIS, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (I860) 103=Paspalum, Linn. (Gramin.l.
*P«*paloides,* Nees, 1. c.=P. malacophyllnm.

ACHVMUM, Stead. Syn. PL Gram. S3 (1855)- pnec.

ANACIS Schrank, in Denkschr. Acad. Muench. v. (1817) 5=IF°**&**° - (Compos.).
Trifteru, Schrank, 1. c = C. Tripteris.

ANACOLOSA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 250. t. 46 (1850) *OLACINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 848.
"Pes, *Kurn, in Journ. As. Soe. Beng.* xliv. (1876) II, 168.—Pegu.
M°S' - »—Ttavancor.
SJ^fM. *fom«, *Mus. Bot. Lugd. Bat. I* 251.—Java, ^nffithu, Jforf. i. 680.—Burma.
|j?Ptandra, *Maingay, ex Mast. I. c.* 681.-Malacca.
^•des, *Mast. I.e.* 58O.-Reg. Himal.
»ngayi, *Mast. I.* c.-Singapore.
ftulleana, *Baill. Adanslnia,* iii. (1862-«8) 119.-{•». Mascar.
pe If 5i^ **'% 5«»"-«- *As. Soc. Beng.* xli. (1872) ii. 297.—Ins. Andaman.

ANACOLUS, Griseb. in DC. Prod. ix. 70 (1846) - Gardn. (Gentian.).
Gen.nen, Griseb. I. c = H. montana.

ANA5?"ORION, Rafin. Fl. Tellur. W. 84 (1836) - rrs^coio,.
. Rafin. l.c.-S.gale«ta.

AN ACTINIA. Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 8 (1849) =Nardophyllum, Hook. [Compos.).
Hooheri, Remy, 1. c.=N. hnmile.

ANACTIS, Cass. in Diet Sc. Nat xlvii. 510 (1827) = Atraetylie, Linn. (Compos.).
caespitosa, Cass. 1. c. 1. 56=At. caeBpitosa.
glabra, Rafin. Fl. Tellur. it 44 = Aster vimineusl
pilosa, Rafin. 1. c-Carthamus lanatns.
arratuloides, Cass. in Diet. Sc. Nat 1. 66-At. serratuloides.

ANACYCLODON, Jnngh. in Nat en Geneesk. Arch. NeerL Indie, ii. (1846) 49=Ieucopogon, R. Br. (Epacrid.).
pungens, Jungh. 1. c-L. javanicus.

ANACTCL1J8, Linn. Gen. ed. I. 256 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 419.
ARTBROLEPIS, Boiss. Diagn. Ser. I. xl 14 (1849).
CTRTOLEPIS, Less, in Linnaea, vi. (1831) 166.
HIORTHIA, Neck. Elem. i. 97 (1790).
LEOCOCVCLUS, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 18 (1849).
alexandrinus, *Willd. Sp. PI.* iii. 2178.—Afr. bor.
anomalus, j. Gay, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 288-Anthemis palestina.
anthemoides, tag. ex Spreng. Syst. iii. 497-Anthemis abrotanifolia.
aristulatus, Link, ex Nym. Consp. 863 =clavatus.
aureui, Brot Fl. Lnsit. i. 363=ndiatus.
aureus, Lam. ex DC. Fl. Fr. iv. 202 = Matricaria aurea.
aureus. Linn. Mant ii. 287=Anthemis aurea.
australis, Sieber, ex Spreng. Syst iii. 497=Cotula australis,
Barrelieri, Gnss. PI. Rar. 357-Achillea Barrelierii.
bicolor, Pen. Syn. ii. 465-radiatns.
Candolii, Nym. Syll. 8=davatus.
ciliatus, Traut. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xii. (1868) I. 461 - Anthemis ciliata.
davatus, *Pers. Syn.* ii. 465.—Reg. Mediterr.
cretieus, Linn. Sp. El. 892-Anthemis cretica.
cyrtolepidioides, *Pomel, Noun. Mat. Fl. All.* 64.—Afr. bor.
depressus, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 866.—Marocco.
dissimilis, *Pomel, Nom. Mat. Fl. All.* 58.—Afr. bor.
divaricatus, Cav. ex Steud. Nom. ed. i. 41=davatus.
formosus, *Fenml, ex Boiss. Diag.* Ser. L xi. 14.—Cilicia.
hirsutus, Lam. Fl. Fr. ii. 47—valentinns.
inconstans, *Pomel, Nom. Mat. Fl. Ail.* 62.—Afr. bor.
inflatus, *Lehm. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 81—Sibir.
lanuginosus, Moench, Meth. 581-viJentinns.
linearilobiis, *Boiss. & Rent. Pugill. PI. Hispan.* 67.—Hispan.
maroccanus, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 365.—Marocco.
mauritanicus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 55.—Afr. bor.
membnnaceus, *Benth. & Hoot. f. Gen.* iii. 419.—Syria.
mucronulatus, Gnss. PI. Rar. 856-Achillea Barrelierii.
mucronulatus, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 82-clavatus.
nigellaefolins, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 13.—Syria; Assyr.
officinarum, *Hayne, Anneigew.* ix. t 46.—Eorop. austr.
orientalis, Linn. Sp.- PI. 892—Anthemis montana.
pallescens, Guss. Fl. Sic Syn. ii. 494-radiatus.
pectinatus, Bory & Chaub. Fl. Pelop. 69. t. 30-Anthemis taygetea.
pednnculatus, *Pers. Syn.* ii. 465.—Barbar.
prostratns, *Pomel, Noun. Mat. Fl. Atl.* 62.—Afr. bor.
Pseudopyrethrum, *Asekers. in Bonplandia,* vi. (1858) 123.—Hab.?
pubescens, Brot. ex Link, Handb. i. 763; Reichb. Fl. Exc.ii.225-clavatns.
puUher, Bess, ex DC. Prod. vi. 16-orKcinarnm.
purpuraseens, DC. Fl. Fr. v. 481-radiatus.
Pyrethraria, Spreng. Syst iii. 497-Cotula Pyrethraria.
Pyrethrum, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 480.—Afr. bor.; Oriens.
radiatus, *Loisel. Fl. Gall.* ed. I. 683; *Pers. Syn.* ii. 465.—Reg. Mediterr.
tomentosus, DC. Fl. Fr. Snppl. 481-davatus.
truneatus, J. Gay, in Boiss. Fl. Orient iii. 288=Anthemis palestina.
valentinns, *Linn. Sp. PI.* 892.—Reg. Mediterr.

ANACYLANTHUS, Steud. Nom. ed. II. i. 82 (1840), sphalm.-Ancylknthos, Desf. (Rubiac.).

ANADELPHIA, Hack, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) 240-Andropogon, Linn. (Gramin.).
virgata, Hack. 1. c. 241=Andr. leptocomus.

ANADENDKTTM, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45. *AROIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 991.
affine, *Schott, in Ann. Mus. Lugd. Bat. i.* 282.—Sumatra.
cordatum, *Schott, 1. e.* 283.—Sumatra.
Lolbi, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45-montannm.
marginatnm, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 116.—Ind. or.
medium, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45-Epipremnum medium,
montanum, *Schott, I. e.*—Java.
pitnctulatum, Schott, Prod. Aroid. 398-Monstera punctulata.
semivestitum, Schott, in Ann. Mas. Lngd. Bat. i. 283 -affine.

ANADENDRON, Wight, Illnstr. Ind. Bot. ii. 164 (1850) err. typ.=Anodendron, A. DC. (Apocyn.;.

ANADEMIA, Agardh, Aphor. 236 (1826), sphalm.- seq.

ANADENIA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1809) 166 -Orevillea, R. Br. (Proteac).
anethifolia, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, v. 483-G. anethifolia.
Aquifolium, Lffidl. Swan River App. 81-G. monticola.
Caleyi, R. Br. Prot. Nov. 16 - G. ramosisslma.
filifolia, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 209 - G. didymobotrya.
flexuosa, Lindl. Swan River App. 31 - G. flexuosa.
gradlis, Lindl. 1. c - G. Synapheae.
hakeoides, Lindl. 1. c. SO-Hakea nndnUta.
iliei/olia, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1809) 167-G. ilidfolia.
integrifolia, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 209 •=G. integrifolia.
Uanglesii, R. Grah. in Hook. Ic. PI. t 337 - Manglesia cuneata.
pulchella, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1809) 167 - G. pulchella.
Roei, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 83 = G. didymobotrya.
tenuiflora, Lindl. Swan River App. 81—G. tenuiflorsu
trifida, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1809) 167 =-G. trifida.
triternata, A. Cunn. ex Heynh. Nom. it 84 «G. triternata.

ANAECTOCALTX, Triana, ex Benth. *tc* Hook. f. Gen. i. 766 (1867). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 765.
bracteosa, *Triana, I. e. & in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 97.—Venezuela.

ANAECTOCHILUS, lindl. Orch. 498 (1840)-Anoeotoohllufl, Blnme (Orchid.).

ANAFRENIUM, Am. in Hook. Lond. Tonrn. Bot iii. (1841) 148-ANAPHRENIUM, E. Mey.-Kb.ua, linn. (Anacard.).

ANAGALLIDASTRUM, Mich, ex Adans. Fam. iL 280 (176S)-Centunculus, linn. (Primul.).

ANAGALLIDIUM, Griseb. Gen. et Sp. Gent 811 (1836) -BWBTtla, Linn. tGentian.).
dichotoma, Griseb. 1. c 312-S. dichotoma.
tetrapetalum, Griseb. 1. c.-S. tetrapetala.

ANAQALLIS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. 48 (1737). *PRIMULACEAE,* Bemhf & Hook. f. ii. 637.
EUPAREA, Banks & Soland. in Gaertn. Frnct i. 230. t. 50 (1788).
IRASEKIA, S. F. Gray, Nat. Arr. ii. 299 (1821V
RASE, A. F. W. Schalidt, Nene (1793).
TIRASEKIA, G. DoDl h Sweet Hoit 563 (1839). Brit.ed.III.

ANAGALLIS :—
alba, Buch.-Ham. ez Steud. Norn. ed. II. i. 83.—(Quid *1)* Ind. or.
altemifolia, *Cav. Ic.* vi. 3. t. 506.—Chili.
angustifolia, Salisb. Prod. 121 = linifolia.
aquatica, Emdl, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 31 = Samolus Valerandi.
arabica, *Duty, in DC. Prod.* viii. 69.—Arab,
arvensis, *Linn. Sp. PI.* 148.—Europ.; As. temp.
caerulea, Lam. Fl. Fr. ed. I. ii. 285 = arvensis.
capensis, *Linn. Sp. PI.* 149.—Afr. austr.
camea, Schrank, Baier. Fl. i. 461=arvensis.
Centunculus, Afzel. Veget. Suecan. (1786) l=Centunculus minimus.
collina, Schousb. Marok. 64 •= linifolia.
crassifolia, *There, Chlor. Land.* 62.—Hispan.; Marocco.
filifonnis, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 225.—Bras.
foemina, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = arvensis.
fruticosa, Vent. Choix, 14-linifolia.
Gmelini, *Steud. Norn.* ed. II. i. 88.—Camtsch.
grandiflora, Andr. Repos. t. 367 = linifolia.
Hnttoni, *Ha.ro. in Proc. Dub. Univ. Zool. & Bot. Assoc.* i. (1859) 141.—Afr. austr.
indica. Sweet, Fl. Gard. t. 132=arvensis.
Jacquemontii, Duby, in DC. Prod. viii. 69 = arvensis.
latifolia, Linn. Sp. PI. 148 = arvensis.
linifolia,, *Linn. I. c.* ed. II. 212.—Europ.
Marryattae x, Sweet, ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 563.
mas, Vill. Hist. PI. Danph. ii. 461 = arvensis.
Monelli, Bieb. Fl. Tanr. Cauc.i. 143 = arvensis.
Monelli, Linn. Sp. PI. 148 = linifolia.
multangularis, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 503 = Lysimachia pyramidalis.
nummularifolia,*Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 196.—Madag.
orientalis, Hort. ex Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 49=arvensis.
ovalis, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 8 - Centunculus pentandnis.
palustris, [Clairv.] Man. Herb. 59 =tenella.
parviflora, *Hoffmgg. & Link, Fl. Port.* i. 325. t 64.—Lnsitan.
parviflora, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 491=arvensis.
pedunculata, Salzm. ex Duby, in DC. Prod. viii. 72 = Centunculus pentandrus.
peploides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 196.—Madag.
Philipsii, Hort. ex Duby, in DC. Prod. viii. 70—linifolia.
Phoenicia, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 189=arvensis.
pilosa, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 83 = Lysimachia japonica.
platyphylla, *Baudo, in Exped. Alg.* t. 67.—Algeria.
pulchella, Salisb. Prod. 120 = arvensis.
pumila, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 40 = Centuncnlns pentandrus.
punctifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 806=arvensis.
pusilla, Salisb. Prod. 121-= Centunculus minimus.
repens, DC. Fl. Fr. v. 381=arvensis.
repens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 126.—Algeria.
rubricaulis, Bpj. ex Duby, in DC. Prod. viii. 72(-*Micropyxis rubricaulis*).
serpens, *Hochst. ex A. DC. Prod.* viii. 668.—Abyss.
serpyllifolia, Dum. FL Belg. 29=tenella.
sessilis, Salzm. ex Duby, in DC. Prod. viii. 72-Centnnculus pentandrus.
spicata, *Noronka, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 6.—Malaya,
tenella, *Linn. Mant.* 335.—Europ.
tennlcanlis, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 172.—Madag.
vertidllata. All. Fl. Pedem. i. 87 = arvensis.
Webbiana, Penny, ex Loud. Gard. Mag. v. (1829) 471—*Marryattae.*
Wellsianax, *Penny, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* i. 580.
Willmoreana, Don, ex Hook. Bot Mag. t. 3380-linifolia.

ANAGALĹOIDES, Krock. Fl. Siles. ii. I. 398 (1790)-Vandellia, Linn. (Scrophnl.).
procumbens, Krock. 1. c. = V. erects.

ANAGANTHOS, Hook. f. in Fl. N. Zeal. i. 226 (1854) =Australina, Gaudich. (Urticac.).

ANAQLYPHA, DC. Prod. y. 311 (1836). *COMPOSITAEtBenth.* & Hook. f. ii. 326.
OXYLAENA, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1109 (1876).
acicularis, *Benth. I. c.* xii. 9. t. 1109.—Afr. austr.
aspera, *DC. Prod.* v. 311.—Afr. •ustr.

ANAQYBIS, Linn. Syst. ed. I. (1736); Gen. ed. I. 219 (1787). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 465.
barbata, R. Grah. in Wall. Cat n. 5341=Thermopsis barbata.
cretica, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 2.—Ins. Archip.
foetida, *Linn. Sp. PI.* 374.—Reg. Mediterr.; Oriens.
/«««<*«, Lour. Fl. Cochinch. 260; ed. Willd. i. 318-sinensis.
glauca, Hort. ex Loud. Hort. Brit. 162 = foetida.
indica, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i 83=sinensis.
indica, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 245 = Piptanthus nepalensis.
inodora, *Lour. Ft. Cochinch.* 260.—Cochinch.
latifolia, *Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 439.—Teneriffa.
neapolitana, Tenore, Syll. 198-foetida.
nepalensis,, R. Grah. in Wall. Cat.n. 5340=Piptanthus nepalensis.
sinensis, *Steud. ex DC. Prod.* ii. 98 (' forte ad Ormosiam referend.*).—China.

ANAITIS, DC. Prod. v. 628. (1836)=Sanvitalia, Linn. (Compos.).
acapulcensis, DC. I.e. 629 = S. acapulcensis.

ANALECTIS, Juss. in Jaume St Hil. Expos, ii. 362 (1805) = Symphoreina, Roxb. (Verben.).

ANALITON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1886) = Rumex, Toum. (Polygon.).
bipinnatus, Rafin. I. c.=R. lacerus.

ANALYRIUM, E. Mey. Zwei Pfl. Docam. 163 (1848), *nomen;* Presl, in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 505-Peuxsedxuium, Koch (Umbell.).
millefolium, E. Mey. 1. c. = P. millefolium.

ANAMENIA, Vent Malm. 22. t. 22 (1803)-Knowltonia, Salisb. (Ranunc).
capensis, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 204 = K. rigida.
coriacea, Vent. Malm. 22=-K. rigidat
daucifblia, Vent, ex Cav. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1803) 344 = K. daucifolia.
gracilis. Vent. Malm. i. 22, obs.-K. gracilU.
hirsuta, Vent, ex Cav. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1803) S44 = K.hirsuta.
laserpitiifolia, Vent, ex Cav. I. c. = K. vesicatoria.
vesicatoria, Dum.-Cours. Bot. Cult. iv. 438 = K. vesicatoria.

ANAMIRTA, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 52. *MENISPERMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 35.
Baueriana, Endl. Atalct. Bot. t. 39, 40-A. Cocculus.
Cocculus, Wight *SL* Am. Prod. i. 446-paniculata.
flavescens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 79-A. Cocculus.
florescens, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 63, sphalm.= flavescens.
jucunda, *Miers, Contr. Bot.* iii. 56.—Java.
lemniscata, *Miers, 1. c.* 54.—Java.
Lourieri, *Pierre, Fl. For. Coch. Chin.* t. 110.—Cambodia.
lnctuosa, *Miers, Contr. Bot.* iii. 56.—Java.
paniculate, *Colebr. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 66.—Ind. or.
popnlifera, *Miers, Contr. Bot.* iii. 64.—Timor.
racemosa, Colebr. ex Steud. Norn. ed. II. i. 83-Cocculus suberosus.
toxifera, Miers, Contr. Bot iii. 53-paniculata.

ANAMOMIS, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 240 (1864) = Myrtua, Linn.
esculenta, Griseb. I.e. in obi. =» Eugenia esculenta.
ferruginea, Griseb. Cat PI. Cub. 91-Eugenia ferrugiifea!
fragrans, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 240-Myrda fragrans?

ANAMOMIS :—
Guayabillo, Griseb. Cat. PI. Cub. 90-Eugenia Guaya-*billo.
punctata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 240-Myrda Balbisiana.

ANAMORPHA, Karst. & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 443=Melochia, Linn. (Stercul.).
walther ioides, Karst. & Triana 1. c.=M. lupulina.

ANANAS, Gaertn. Fruct. i. 30.1.11 (1788)=Bromelia, Linn.
Pinguin, Gaertn. I. C.=B. Pinguin.

ANANAS, Toum. ex Linn. Syst. ed. I. (1785); Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1752) ; Adans. Fam. ii. 67 (1763).
BROMEUACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 662.
ACANTHOSTACHYS, Link, Klotzsch & Otto, Ic. PI. Rar. i. 21. t 9. (1841).
ANANASSA, Lindl. Bot. Reg. sub 1.1068 & t. 1081 (1827).
arvensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 83.—Bras,
bracteatus, *Schult.f. Syst.* vii. 1286.—Bras.
debilis, Schult. f. 1. c. 1287 = sativus.
glaber, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 (et corr.) = sativus.
lucidus, Mill. 1. c. n. 4 = sativus.
macrodontes, *E. Morr. Belg. HorHc.Tsrtt.* (1878) 140. t. 4 et 5.—Bras.
Mordilona, Hort. Linden, ex E. Morr. in Bele. Hortic. xxix. (1879) 302=sativus.
muricatus, Schult. f. Syst. vii. 1287 = bracteatus.
ovatus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = sativus.
Porteanus, Hort. Veitch, ex C. Koch, Wochenschr. xiv. (1871) 130=sativus.
pyramidalis.WW. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2= sativus.
Sagenaria, Schult. f. Syst. vii. 1286=bracteatus.
sativus, *Schult.f. I. c.* 1288.—Am. trop.
semiserratus, Schult. f. 1. c. 1286=sativus.
serotinus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5=sativus.
viridis, Mill. 1. c. n. 6 = sativus.

ANANASSA, Lindl. Bot. Reg. snb t. 1068 et t. 1081 (1827)=Ananas, Toum. (Bromel.).
bracamorensis, Linden, Cat. n. 98. (1878) 8=-Ananas sativus.
bracteata, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1068 et t. 1081 = Ananas bracteatus.
debilis, Lindl. 1. c. sub 1.1068=Ananas sativus.
lucida, Lindl. 1. c.=Ananas sativus.
Mordilona, Linden, Cat. n. 22. (1869) 2 = Ananas sativus.
muricata, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1088 = Ananas bracteatus.
Porteana, Carr. in Rev. Hortic. (1878) 140 = Ananas sativus.
Sagenaria, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1088 = Ananas bracteatus.
sativa, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1068=Ananas sativus.
semiserrata, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1088 = Ananas sativus.

ANANDRIA, Siegesb. ex Linn. Amoen. Acad. i. 243. t. 11 (1745) = Oerbera, Gronov. (Compos.).
Bellidiastrum, DC. Prod. vii. 40 = G. Anandria.
dimorpha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) II. 88 = G. Anandria.
discoidea, Less, in Linnaea, v. (1830) 847. t. 3 = G. Anandria.
radiata, Less. 1. c 846. t. 4 = G. Anandria.

ANANTHERIX, Nutt. Gen. Am. i. 169 (1818)=Asclepiodora, A. Gray (Asclep.).
angustifolia, Rafin. Atl. Joum. 146.—Am. bor.
Bungei, G. Don, Gen. Syst. Iv. 146-Pycnostelma chinense.
eonnivens, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 66 =Asc. viridis.
decumbens, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 203=Asc. decumbens.
grandiflora, Rafin. in New Fl. Am. iv. 59.—Am. bor.
Nuttaliana, G. Don, Gen. Syst. iv. 146 = Asc. decumbens.
ovata, Rafin. Atl. Joum. 146.—Am. bor.
paniculata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 203-Asc. viridis.
pumilis, Nutt. 1. c.—Am. bor.
Torreyana, G. Don, Gen. Syst tv. 146=Asc. viridii.
verrucosa, Rafin. New Fl. Am. iv. 60=Asc. viridis.
viridis, Nutt. Gen. Am. i. 169=Asc. viridis.

ANANTHOCYCLUS, Vaill. ex Linn. Syst. ed. I. (1785) = CotuIa, Tonm. (Compos.).

ANANTHOPUS, Rafin. Fl. Ludov. 20 (1817) = *6om-*malina, Linn.
clandestine, Rafin. 1. c. 21=C. ignorata.
cordatus, Rafin. 1. c. 22-C. Rafinesquei.
undulatus, Rafin. Fl. Tellur. Hi. 70=C. undulata.

ANAPHAIiIS, DC. Prod. vi. 271 (1837). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 308.
MARGARIFES, DC. ex Steud. Norn. ed. II. ii. 101 (1841).
adnata, *DC. Prod.* vi. 274.—Reg. Himal.
"lata, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 478.—As. or.
araneosa, *DC. Prod.* vi. 275.—Reg. Himal.
anstata, *DC. in Wight, Contrib.* 21.—Ind. or.
Beddomei, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 282.—Ind. or.
wevifolia, *DC. Prod.* vi. 273.—Zeylan.
Busua, DC. 1. c. 275=araneosa.
chionantha, DC. 1. c. 273 = Royleana.
cinnomoraea, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 104.—Ind. or. j China; Japon.
omtorta. *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 284.—Reg. Himal.
cuneifolia, *Hook./. 1. c.* 28O.-Reg. Himal.
entchica, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 111.—Kutch.
elliptica, DC. Prod. vi. 274 = oblonga.
falconeri, C. B. Clarke, Comp. Ind. 107 = contorta.
fruticosa, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 282.—Zeylan.
(?) iflithii, *Hook.f. 1. c.* 280.—Reg. Himal.
Hancockii, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. ,U8S1) 479—China.
Hooken, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. . 282,-Reg. Himal.
japomca, *Maxim. In Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) . 480.—Japon.
javanica. *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* . 124.—Java.
«ctea, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1381) . 479.—As. or.
leptophylla, *DC. Prod.* vi. 273.—Ind. or.
Imearis, DC. 1. c. 274 - marcescens ?
longifolia, DC. 1. c.-Java.
marcescens, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 286—Ind. or.
margaritacea, *Benth. & Hook.f. Gen.il* 808.—Am. bor.
monocephala, DC. Prod. vi. 272 =nubigena.
mucnnata, DC. 1. c.=nubigena.
neeleerryana, *DC. I. c.*—Ind. or.
Notoniana, *DC. 1. c.* 278.—Ind. or.
nubi$_{gena>}$ *DC. 1. c.* 272.—Reg. Himal.
oblonga, *DC. 1. c.* 274.—Ind. or.
ougandra, *DC. I. c.* 275.—Madag.
Pojylepis, DC. 1. 4. 272 = Royleana.
Pterocanlon, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 478.—As. or.
racemifera, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xvi. _ (1883) 310.-As. or.
Royleana, *DC. Prod.* vi. 272.—Reg. Himal.
Moyleana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 104=Grifl5thii.
fmidecurrens, C. B. Clarke, 1. c. 109=araneosa.
»"«a, *Hance, in Journ. Bot.* xii. (1874) 261.-China.
Stohcikai, C. *B. Clarke, Comp. Ind.* 108.—Tibet. occ.
sobumbellata, *C. B. Clarke, 1. c.* 104.—Reg. Himal.
«««a, DC. Prod. vi. 278=contorta.
rhwaitesii, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 110.—Zeylan.
J\mmua, D. Don, Prod. Fl. Nep. 174=cinnamomea.
Wpunervis, *Sims, ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 105.—Reg. Himal.
triplinenis, Benth. ex Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) .12=Hancockii.
virgata, *Thorns, in C. B. Clarke, Comp. Ind.* 107.—Reg. Himal.
viscida, *DC. Prod.* vi. 274.—Java.
W...ghtiana, Thw. Enum. PI. Zeyl. 168=«ylanica.
"Jghtiana, *DC. Prod.* vi. 278.—Ind. or.
Xy!£rhiza> *Sch.- Bip.*tx Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. J81.—Reg. Himal.
yedoensis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 480.—Japon.
*eylanica, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. _ 288.—Zeylan.
toUingeri, Turcz. in Bull. Soc. N«t. Mosc. xxiv. (1851) _ II, 64 = Antennaria saxatilis.
£*oUingeriana,* Sch. Bip. ex Zoll. Syst. Verz. Ind. A«*ip. 124-praec.

ANAPHRAGMA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. 265 (1832) = Astragalus, Tonm. (Legnm.).

AJSAPHBENITXM, E. Mey. ex Endl. Gen. Suppl. i. 1425 (1841). *ANACARDIACEAE,* [Benth. & Hook, f. i. 419J.
HEEKIA, Meissn. Gen. Comm. 55 (1887V
OZOROA, Delile, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xx. (1848) 91.1.1.
ROEMERIA, Tbonb. Nov. Gen. PI. ix. 180 (1798), pro parte.
abyssinicum, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) 82.—Afr. trop.
argenteum, *E. Mey. Zwei Pfl. Docum.* 168.—Afr. anstr.
concolor, *E. Mey. I. c.*—Afr. anstr.
dispar, *E. Mey. 1. c*— Afr. austr.
longlfolium, Bernh. in Flora, xxvii. (1844) I. 849 = Protorhus longifolia.
mucronatum, *Bernh. I. c.*—Afr. anstr.
mucronifolium, *Sond. in Haro. & Sond. Fl. Cap.* i. 622 = praec.
paniculosum. *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 858.—Afr. anstr.
pulcherrimnm, *Schweinf. Fl. Aethiop. Beitr. i.* 82.—Afr. trop.

AXTAFHYIIIITTM, Schott, Gen. Aroid. t. 88 (1858). *AROWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 996.
Wightii, *Schott, I. c.—ini.* or.

ANAPODOPHYIXUM, Tonm. ex Moench, Meth. 277 (1794)=Podophyllum, Linn. (Berberid.).
peltatum, Moench, 1. c. = P. peltatnm.

ANARMODIUM, Schott, in Bonplandia, ix. 868 (1861) =Dracunculus, Schott (Aroid.).
canariense, Schott, 1. c.=D. canariensis.

ANARMOSA, Mien, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 338 -Tetilla, DC. (Saxifrag.).
gracilis, Miers, ex Hook. I. c.=T. hydrocotylifolia.

ANABBHINUH, Desf. Fl. Atlant. ii. 51 (1800). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 933.
CARDIOTHECA, Ehrenb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 282 (1840).
SIMBULETA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 115 (1775).
abyssinicum, *Jaub. & Spach, Illustr. PI. Or.* v. 52. t. 447.—Abyss.
arabicum, *Jaub. & Spach, 1. c.* v. 50. t. 446.—Arabia,
bellidifolinm, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 51; *Chav. Monog.* 176. t. 10.—Reg. Mediterr.
bellidifolium, Fenzl, ex Jaub. *Sc* Spach, Illustr. PI. Or. v. 54 ~ orientate,
brevifolium, *Coss. & Krai, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 407.—Afr. bor.
canadense,Vda. Encyc Snppl. L 334, in obs.=Linaria canadensis.
corsicum, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 41-bellidifolinm.
crassifolium, Willd. Sp.Pl. iii. 261=Linaria origanifolia.
Dnriminium, *Pert. Syn.* ii. 159.—Lusitania.
ecalcaratum, Fenzl, ex Jaub. & Spach, Illustr. PI. Or. v. 54=orientale.
fruticosum, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 52.—Afr. bor.
fruticosum, Schimp. ex Benth. in DC. Prod. x. 289 = orientate.
hirsutum, Hoffmgg. & Link, FL Port. 227. t 88 = A. Duriminium.
incarnatum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 18, in obs. =Linaria bipartita.
Linnaeanum, Jord. Ac Fourr. Brev. PI. Nov. fasc i. 41 =bellidifolinm.
laxiflorum, *Boiss. Elench.* 71.—Hispan.
lusitanicum, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc i. 41« bellidifolium.
murale, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 557=A. Duriminium.
orientale, *Benth. in DC. Prod.* x. 289.—Orient,
pedatum, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 51. t. 141.—Afr. bor.
pedicellatum, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* i. (1860) 26.—Aden.
pubescens, *Fresen. in Mus. Senkenb.* i. 89.—Arab. petr.
pubescens, Hort. ex Loud. Hort Brit 250=A. Duriminium.
tenellum, *Willd. Sp. PI.* iii. 262.—Hispan.
violaceum, Dulac, Fl. Hauto-Pyr. 373=beUidifolium.

ANABTHHIA, R. Br. Prod. 248 (1810). *REST/ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1030..
canaliculata, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 62 = gracilis.
gracilis, *R. Br. Prod.* 249.—Austral.
gracilis, Nees, ex Benth. Fl. Austral, vii. 216 = Lepyrodia Anarthria.
grandifiora, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 50=gracilis.
humilis, Nees, 1. c.=gracilis.
ischaemoides, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 62=gracilis.
laevis, *R. Br. Prod.* 249.—Austral.
paudflora, R. Br. 1. c. 249=prolifera.
polyphylla, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 63.—Austral,
prollfera, *R. Br. Prod.* 249.—Austral,
scabra, *R. Br. 1. c.*—Austral.

ANABTHKOPHYIiLUM, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 478 (1865). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 478.
andicolum, *Phil.f. Cat. PI. Chil.* 52.—Chili.
Bergii, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iii. (1879) 840.—Keg. argent.
Cumingii, *Phil.f. Cat. PI. Chil.* 52.—Chili,
desideratum, *Benth. in Benth. & Hook.f. Gen.* i. 478. —Patagon.
elegans, *Phil.f. Cat. PI. Chil.* 52.—Chili.
juniperinum, *Phil. f. 1. c.*—Chili.
rigidnm, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iii. (1879) 840.—Reg. Argent,
umbellatum, *Phil.f. Cat. PI. Chil.* 52.—Chili.

ANARTHROSYNE, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 124 (1835) ^Pseudarthria, Wight *Sc* Am. (Legum.).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 204 = Desmodium spirale.
cordata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 3<J. t. 7 = Desmodium latifolium.
densiflora, Klotzsch, 1. c 41=P. Hooker!.
gracilis, Klotzsch, 1. c. 40 = P. confertiflora.
robusta, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 124 = P. Hookeri.

ANARTIA, Miers, Apocyn. S. Amer. 79. (1878) =Tabernaemontana, Linn. (Apocyn.).
bogotensis, Miers, 1. c. 82.—N. Granat.
flavescens, Miers, 1. a =Malouetia flavescens.
flavicans, Miers, 1. c. =T. flavicans.
glabrata, Miers, 1. c. 81=T. oblongifolia.
Meyeri, Miers, 1. c. 80=T. Meyeri.
recuna, Miers, 1. c.=T. reenrva.
Wulfschlaegelii, Miers. 1. c. 81=T. WulUchlaegelii.

ANASCHOVADI, Adans. Fam. ii. 122 (U63)=Slephantopua, Vaill. (Compos.).

ANASSER, Juss. Gen. 150 (1789)=Genio8toma, Forst. (Logan.).
Borboniae,). F.Gmel. Syst. i. 303 = G. borbonicum.
borbonica, Lam. Illustr. ii. 40 = G. borbonicum.
moluccana. Lam. 1. c = Strychnos Pseudo-quina.
Rumphii, Span, in Linnaea, xv. (1841) 325=Pittosporum timorense.

ANASSERA, Pers. Syn. i. 265 (1806)=piaec.

ANASTATICA, Linn. Gen. ed. I. 191 (1737). *CRUCIFERAE,* Benth. * Hook. f. i. 71.
HIERICONTIS, Adans. Fam. ii. 421 (1763).
IERIKONTIS, Adans. 1. c. 565 (1763).
hierachuntica, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. faSc. i. 7-Euclidium syriacum.
hierochuntica. *Linn. Sp. PI.* ed. II. 895.—Oriens.
littoralis, Salisb. Prod. 286=hierochuntica.
syriaca, Linn. Sp. PI. ed. II. 895 = Euclidium syriacum.

AMA8TRABE, E. Mey. ex Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 54. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. it 937.
integerrima, *E. Mey. ex Benth.. I. c*—Afr. austr.
serrulata, *E. Mey. ex Benth. I. c*—Afr. austr.

ANASTHAPHIA, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1880)295. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f.ii 4'J1,
ilicifolia, *D. Don, I. c*—Am. trop.
intertexta, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 158.—Cuba.
mantuensis, *Wright, ex Griseb. I.* c.-Cuba.
microcephala, *Griieb. I. c*—Cuba.

ANASTREPHIA, Decne. in Orb. Diet L 432 (1841) = Anastraphia, D. Don (Compos.).

ANASTROPHEA, Wedd. in DC. Prod. xvii. 78 (187S) = Sphaerothylax, Bisch. (Podostem.).
abyssinica, Wedd. L c 79.—Abyss.

ANASTROPHUS, Schlecht. in Bot. Zeit viii. (1850) 681 = Faspaluin, Linn. (Gram.).
barbatus, compressus, dissitifiorus, nematanthus, pectinatus, pellitus, platycaulis, platyculmis, pulchellus, setifolius, Schlecht, L c. 682, 683, omnes Paspali homonymae.

ANASYLLIS, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 16 (1848)- IiOXOBtylis, Spreng. (Anacard.).
angustifolia, E. Mey. L c. = L. alata.
latifolia, E. Mey. 1. c - L . alata.

ANATHALLIS, Barb. Rodrig. Orch. Nor. i 28 (1877) - HeurothaUis, R. Br. (Orchid.).
densiflora, Rodrig. 1. c. ii. 73.—Bras.
fasciculata, Rodrig. 1. c. L 23.—Bras.
hebesepala, Rodrig. 1. c. ii. 76.—Bras.
heteropkylla, Rodrig. 1. c. ii. 74.—Bras.
micrantha, Rodrig. 1. c ii. 76.—Bras.
nectarifera, Rodrig. 1. c ii. 74.—Bras.
osmosperma, Rodrig. 1. a ii. 73.—Bras.
parahybunensis, Rodrig. L c ii. 76.—Bras.
pulvinata, Rodrig. 1. c. ii. 77.—Bras.
racemosa, Rodrig. 1. c. i 24.—Bras.
secunda, Rodrig. 1. c. ii. 72.—Bras.

ANATHERIX, Slend. Norn. ed. I. 41 (1821) err. typ.- ANANTHERIX, Nutt. = Asolepiodora, A. Gray (Asdep.).

ANATHERUM, Beauv. Agrost. 128. t. 22. f. 10, 11 (1812)=Andropogon, Linn. (Gram.).
abortivum, Beauv. Agrost. 169=Panicnm abortivum.
Berterianum, Spreng. ex Roem. ft Scholt. Syst. ii. Mant. ii. 443 = Imperata exaltata.
bicorne, Beanv. Agrost. 128=Androp. bicomis.
brasiliense, Spreng. ex Stead. Nom. ed. II. i. 84 = Androp. leucostachyus.
caudatum, Schnlt. Mant. ii 445 •= Imperata exaltata.
domingense, Roem. ft Schult. Syst. ii. 809= Androp. lencostachyus.
glabrum, Schult. Mant. ii. 446=Androp. intermedia*.
holcoides, Nees, Agrost. Bras. 324=Saccharum holcoides.
inerme, Griseb. Cat PI. Cab. 236=Androp. spathiflorns.
nacrurum, Griseb. PI. Wright. Cob. ii. 684=Androp. macrourus.
megapotamicum, Spréng. Syst. Cor. Post. 8S = Elionurus rostratus.
montanum, Roem. ft Schnlt. Syst Mont. ii. 445 = Androp. montanos.
muricatum, Beanv. Agrost 160=Androp. squarrosus.
muticum, Beauv. 1. c—Chloris petraea?
nitidum, Spreng. Syst. i. 290-Chrysopogon fuscua.
parvifiorum, Spreng. 1. c. -=Chrysopogon violascens.
pedunculosum, Desv. Opnsc 70.—Ind. occ.
portoricense, Spreng. 1. c. = Imperata exaltata.
refractum, Beauv. Agrost. 150=Androp. refractus.
scoparium, Desv. Opnsc. 70.—Afrit
setifolium, Spreng. Syst. i. 290=Androp. setifblinm.
spathiflorum, Griseb. Cat PL Cub. 236 - Androp. spathiflorus.
tquarrosum, Beauv. Agrost. 128, 150=Panicum abortivum.
tripsacoides, Spreng. Syst i. 290-EUonarus tripsacoides.
virgatum, Desv. Opasc 71-Androp. spathifloms.
virginicum, Spreng. Pugill. ii 16—Androp. virgiaicus.

ANATROPA, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 402 = Tetradiolia, Stev. (Rntac).
tenella, Ehrenb. 1. c. 404=T. salsa.

ANAUA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 410 (1880)=Hemicydia, Wight ft Am. (Enphorb.).
sumatrana, Miq. 1. c.-H. snmatrana.

ANAUXANOPETALUM, Teijsm. ft Binn. in Tourn. Bot Néerl. i. (1861) 868 - Bwintonia, Griff. (Anacard.).
SckvenM, Teijsm. ft Binn. L c - S . Schwenkii

ANAVINGA, Adans. Fam. ii. 448 (1763) ; Lam. Illustr. t 356 = Caseari&, Jacq. (Samyd.).
comocladifolia, Rafin. Sylva Tellur. 149 = C. comocladifolia.
fuliginosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 372=C.fuliginosa.
ilicifolia, Rafin. Sylva Tellur. 149 = C. ilicifolia.
lanceolata, Lam. Encyc. i. 148 - C . tomentosat
ovata, Lam. 1. c - C . ovata.
parvifolia, Lam. Tabl. ii. 484=C. parvifolia.
Satnyda, Gaertn. f. Fruct. iii. 240. t. 224=C. Samyda.

ANAXAGORAEA, Mart Fl. Bras, xiii I. 89 (1841)- seq.

A2TAXAGOBEA, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1825) 91. *ANONACEAE,* Benth. ft Hook. £ i. 25. RHOPALOCARPUS, Teijsm. ft Binn. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 22 (1866).
acuminata, *St. Hil. I. c*—Bras,
brevipes, *Benth. in Hook. Ken Journ.* v. (1858) 8.—Bras.
crassipetala, *HemsL Diagn. PL Nov.* 2.—Nicaragua,
fruticosa, *Scheff. in Flora,* Ui (1869) 802.—Malaya t
javanica, *Blume, FL Jan. Anon.* 66.—Java,
lnzonensis, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 27.—Ind. or.; Ins. Philipp.
Meyeriana, *Zoll. in Linnaea,* xxix, (1857-58) 328.—Java.
phaeocarpa, *Mart. Ft. Bras,* xiii I. 40.—Bras,
prinoides, *St. Hil. &A.DC. in if An. Soc. Phys. Cenh.* v. (1832) 211.—Bras.
sumatrana, *Miq. FL Ind. Bat. Suppl.* i 882.—Sumatra.
meylanica, Hook. t ft Thorns. FL Ind. i. 144=luzonensis.

AHAXETOMT, Gaertn. Fruct ii. 406 (1791); Cass. in Diet Sc. Nat. xxvi. (1823) 62; xxxiv. 87 (1825). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 814.
ARGYRANTHUS, Neck. Elem. i. 76 (1790).
arborescens, Less. Syn. Comp. 354-arboTeum.
arboreum, *Gaertn. Fruct.* ii 407.—Afr. austr.
asperum, *DC. Prod.* vi. 268.—Afr. austr.
crispum, Gaertn. Fruct. ii. 407 = Helichrysum crispnm.
floridum, Lam. Tabl. iii. 269-arboreum.
foetidum, Gaertn. Fruct ii 406. t 166-Helichrysum foetidum.
hirsutum, *Less. Syn. Comp.* 856.—Afr. austr.
nudifolium, Gaertn. Fruct. ii. 407 - Helichrysum nudifolium.
nycthemerum, *Less. Syn. Comp.* 356.—Afr. anstr.
lecurvum, *DC. Prod.* vi. 368.—Afr. austr.
septentrionalis, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 194-Gnaphaliom stenophyllam.
virgatum, *DC. Prod.* vi. 268.—Afr. anstr.

ANAXETON, Schrank, in Denkschr. Acad. Muench. viii. (1824) 146 et 162 = HeUptorum, DC. (Compos.).
eximium, Schrank, 1. c. = Helipternm eximium.
racemosum, Schrank, 1. c. = Helichrysum mucronatam.

ANBLATUM, Toum. ex Adans. Fam. ii 207 (1763) = Iiathraea, Linn. (Orobanch.).
tartaricum, Fisch. Hort Gorenk. ed. II. 18 -Phelipaea salsa.
Tournefortii, G. Don, Gen. Syst iv. 685=Lathraea Squamaria.

ANCANA, F. Mnell. Fragm. v. 27. t 85 (1865)- TJnona, Linn. f. (Anonac).
stenopetala, F. Mnell. 1. c.-U. Ancana.

ANCANTHIA, Steud. Nom. ed. II. i 85 (1840) err. typ. -seq.

ANCATHIA, DC. in GniU. Arch. Bot. ii (1883) 381- Cnloua, Toum. (Compos.).
igniaria, DC. in Deless. lc. Set iv. t 78-C. igniarios.

AKCHXETEA, A. St. Hil. in Ann. Sc Nat. *Sir.* I. ii. (1824) 262; in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 464; PI. Us. t 19 (1824); PI. Rem. Bras. 290 (1824). (70- *LARIEAE,* Benth. ft Hook. f. i 117.
exaltata, *Eichl. in Mart. Fl. Bras,* xiii I. 365.—Bras.
pyrifolia, G. Don, Gen. Syst. i 340=salutaris.
pyrifolia, *A. St. Hil. PI. Bern. Bras.* 290.—Bras.
Roquefeilliana, Spreng. Syst iv. Cor. Post 98- salutaris.

AXTCHTJiTEA •—
salutaris, *A. St. Hil. in Ann. Sc. Nat. Sir. L* ii. 11824) 262.—Bras.
SeHoviana, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 148.—Bras.

ANCHIONIUM, Reichb. Consp. 181. err. typ. - Anohonium, DC.

ANCHOHANEB, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. Hi. (1863) 314. *AROIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 973.
difformis, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 304 - llookeri.
dubius, *Schott, Prod. Aroid.* 135.—Afr. occ.
Hookeri, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* iii. (1863) 814.—Afr. trop.

ANCHONIUM, DC. in Mém. Mus. Par. vii (1821) 242. *CRUCIFERAE,* Benth. ft Hook. f. i. 101.
Billardierii, *DC. I. c*—Syria.
elichrysifolium, Boiss. Fl. Orient i. 240=Tournefortii.
Tournefortii, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* H. xvii. (1842) 886.—Oriens.

ANCHUSA, Linn. Syst. ed. I. (1736). *BORAGINEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 855.
BBUNNERA, Stev. in Bull. Soc Nat. Most (1851) I. 682.
BUGLOSSOIDES, Tausch, ex Reichb. Fl. Germ. Eicon. 344 (1881).
BUGLOSSUM, Gaertn. Fruct. i 822. t. 67 (1788).
CARYOLOPHA, Fisch. ft Trautv. Ind. Sem. Hort Petrop. iii. 31 (1837).
PENTAGLOTTIS, Tausch, in Flora, xii. (1829) 643.
STOMOTECHIUM, Lehm. Asperif. 395 (1818).
Adami, [Pieri] in Ionios Anthol. v. 182 = sempervirens.
aegyptiaca, DC. Prod. x. 48-flava.
aegyptiaca, Maly, ex Nym. Cocsp. iii 611 = Lycopsis variegata.
affinis, *R. Br. in Salt, Vqy. Abyss. App.* 62.—Abyss,
africana, *Burm./. Prod. FL Cap.* 4.—Afr. austr.
Agardhii, *Lehm. Asperif.* 241.—Sibir.
aggregate, *Lehm. I. c.* 219. t. 47.—Sicil.; Oriens.
alpestris, Stev. in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 409. t 82 =Nonea alpestris.
altissima, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 397.—Hab.l
amoena, J. F. Gmel. Syst. ii. 318-italica.
amplexicaulis, Sibth. ft Sm. Prod. Fl. Graec. i 116- hybrida.
angustifolia, Balb. Misc. Alt. 9=undulata.
angustifolia, DC. Fl. Fr. ed. III. iii. 632 = officinalis.
angustifolia, Georgi, It. i. 200 (= *Stenosolenium saxatile).*
angustifolia, *Linn. Sp. PL* 133.—Europ. austr.
angustifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. i. 178 - ochroleuca.
angustissima, Bourg. ex Nym. Consp. 610=undulata.
angustissima, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 683 = ochroleuca.
annua, Pall. Ind. Taur. ex A. DC. in DC. Prod. x. 48 sstylosa.
arvalis, Reichb. FL Germ. Excurs. 343 = qffidnalis.
arvensis, Bieb. FL Taur. Cauc i 123 = Lycopsis arvensis.
arvensis, Tausch, in Flora, vii (1824) 283=officinalis.
aspera, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sir. IV. ii (1854) 248 —ochroleuca.
asperrima, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 65 - Amebia hispidissim&.
atlantica, *Ball, in Journ. Bot.* xi (1873) 873.—Marocco.
Ancheri, *A. DC. in DC. Prod.* x. 49.—As. Min.
asurea, MiU. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9=italica.
aturea, Schur, Enum. PL Transs. 466—ochroleuca.
BarreUeri *Vitm. Summa PL* i 888.—Europ.; As. Min.
Baumgarteni, Nym. Consp. iii. 510=officinalis.
biceps, *Vest, in Flora,* iv. (1821) 148.—Ital.
bracteolata, Viv. Fl. Lib. Spec. 10. t 4-Alkanna tinctoria.
bnlbosa, *[Pieri] in Ionios Anthol.* v. 182.—Corcyra.
calcarea, *Boiss. Voy. Espagne,* ii. 431. t 128.—Hispan.
canescens, MuhL Cat. 19—Lithospermum canescens.
caneseens, Stev. ex Ledeb. FL Ross. iii. 118-ochroleuca.

AKCHUSA:—
Capellii, Moris, Stirp. Said. Elench. ii. 6=hybrida.
capensis, *Tkunb. Prod. PI. Cap.* 84.—Afr. austr.
Cesatiana, Fend, in Frieder. Reise in N. G'riech. 282=Pnl$_{m0}$nariamollis.
cespitosa. *Lam. Encyc.* i. 504.—Creta.
cihata, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 440.—Bras,
o/iote, Schlecht ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 118 = ochroleuca.
elavata, Viv. ex DC. Prod. x. 52-undulata.
"ronensis, Schnr, Enmm. PI. Transs. 466=Barrelieri.
cretica, MilL Gard. Diet. ed. VIIL n. 7=Lycopsis variegata.
cnspa, *Moris, Stirp. Sard. Elench.* iii. 9.—Sardinia.
ensfia, Viviani, FL Cora. App. l = hybrida.
mspqta, Presl, Fl. Sic. i. p. xxxiù=hybrida.
cTunata, Cham, in Linnaea, iv. (1829) 488=Antiphytum cradatum.
dasyantha, *Cham. L e.* 437.-Bras.
tefl Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1823) 17 = hispida.
dio africata, Mnrr. in Nov. Comm. Gotting. (1776) 25= Nonea lutea.
Dregei, *A. DC. in DC. Prod.* x. 44.—Afr. anitr.
dubia, Nocca, Hort. Ticin. t. 3=Nonea lutea.
tchinata, Lam. Encyc. L 505=strigosa.
tchundes, Bieb. FL Tanr. Cane. i. 128=Macrotomia echioides.
*exas*plata,* Clark, Trav. ed. in. i. 625-ochroleuca.
/"wo, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 40 - aegyptiaca.
f^?*o*a, Lehm. ex DC. Prod. x. 53=Myosotis foliosa.
»«/»»»», Ledeb. ex Spreng. SysL i. 562 = ochroleuca.
Panatensis, *Boiss. Voy. Espafne,* ii. 430.—Hispan.
tr«»atensis, Lange, Pugill. 191=ljybrida.
»«, Michx. ex DC. Prod. x. 53=Lithospermum hirtum.
hispida, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 40.—Oriens; Turkest.;Ind.bor.
is-£,, PalL ex Ledeb. FL Ross. iii. 120-stylos*.
"isfndssima, Sieber, ex DC. Prod. x. 94 = Amebia hispidissima.
"yfotricha, Boiss. PL Or. Nov. Dec. ii. 9 = Aucheri.
{rfe} ^{20}, BoUs_ ex DC_ Prod_ *• 42=granatensis.
nybrida, 2Vno$_{W>}$ /v. A ^ . i. 65.1.11.—Ital.; Oriens.
tncana, Ledeb. Fl. Ross. iii. 117-ochroleuca.
"uantata, Schrad. ex Steud. Nom. ed. L 42 - officinalis.
*"nnedia, Schur, Enum. PL Transs. 466-ochroleuca.
"»uca *R$_{etM, 06s}$* j $_{12}$._Reg. Mediterr.
"?'». Walp. in Nov. Act Nat Cur. xix. Suppl. i. laxiat V«43)872=AntiphytumWalpersii.
for"" ^{LiDIL} Sy8t- ^ ^{X}- 91*=Cynoglossum cheiri-I'nceolaia, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 85 = la Krynitzkia linifolia.
iSI?**^{1A}"»- "• ^ '^ **»* 41—BelgU.
<«^W»a, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1821) 2=Nonea lea.
^xiflora, DC. Fl. Fr. iii. 631-Bongo laxiflora.
to*»*-*-*a, Boiy, Fl. Pelop. t. 7. f. 8=Nonea obtusifolia.
leptophylla, Koch, Syn. FL Germ. ed. II. iL 578-officinalis.
Htophylla, Roem. ft Schult. Syst. iv. 90=ochroleuca.
K»uantha, Willd. ex DC. Prod. x. 122-Antiphytum unifouum.
tesi$_{2tf^{olia}}$ ^{Ishm}- Asperif. 249 = Echinospermum b——tum.
li*cofisipula,* Tardent, Ess. Hist. Nat. Bessar. 67 = J^nwpulla.
J,bata, a$_{ote}$. *Dia*^ ^ $_{L, ri}$· 99·_AS. Min.
'"""*folia,* Hochst in Lorent, Wandernngen, 334 = ocbroleuca.
'"'"*rifolia,* Urrille, in Mem. Soc Linn. Par. i. (1822) a/0- ochroleuca.
{»»»/oKo, Lehm. Asperif. 216 = Krynitzkia linifolia.
SS$^{a>}$ *"»*». »» ^f« *Ottava Riun. Ital. Scienri,* 66 — Sardin.
«*gifolia, *Lam. Encyc.* i. 504.—ItalU.
f^fjri, A. DC. in DC. Prod. x. 52=ochroleuca.
fuscia ^{Vittm_Summ}» H- »• 387-italica.
«uchani, *Wettstein, ex Staff, in Denkschr. Acad.* , ,"'"». 1- (1885) 86,-Lycia.
lutea, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 126=Nonea lutea.
«'•«, Cav. Ic. *i* 50 = Myosotis versicolor.
*»*idis, Bess, ex Lint, Enum. Hort. BeroL i. 166 = officinalis.

ANCHUSA:—
Lycopsidis, Retz. f. Pngill. 8 = Nonea lutea.
macrocarpa, *Boiss. & Hohen. Diagn.* Ser. I. iv. 42.—Kurdist.
macrophylla, *Desf. Fl. Atlant.* i. 157.—Marocco.
maculata, Homem. ex Steud. Nom. ed. II. i. 85 — officinalis.
micrantha, Roem. *Sc* Schult Syst iv. 98 = aggregata.
microcalyx, *Vis. in Flora,* xii. (1829) 8.—Dalmat.
Milleri, *Willd. Enum. Hort. BeroL* i. 179.—Aegypt.; Arab.
moltkioides, Benth. in Royle, Illustr. PI. Himal. t 73. f. l=Mertensia moltkioides.
myosotidiflora, *Lehm. Asperif.* 234.—Sibir.; Caucas.
neglccta, *A. DC. in DC. Prod.* x. 49.—Oriens.
nigricans, Brot FL Lusit. i. 298=Nonea nigriçans.
nonneoides, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sen IV. L (1854) 35-nndulata.
obliqua, *Vis. Ind. Sem. Hort. Patav.* (1836).—As. Min.
ochroleuca, Baumg. Fl. Transs. i. 120-officinalis.
ochroleuca, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 125.—Transsylv.; Oriens.
officinalis, Bieb. 1. c. 124—ochroleuca.
officinalis, Gouan, Hort Monsp. 81; Lam. Encyc. i. 602=italica.
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 138.—Enrop.
officinalis, Thunb. Prod. 84; Fl. Cap. ed. Schult 162 =riparia.
oppositifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 91 = Krynitzkia linifolia.
orientalis, Linn. Sp. Fl. 188—Alkanna orientalis.
orientalis, Reichb. f. Ic. FL Germ. xviu. 63 t 1810-Lycopsis orientalis.
orientalis, Pall. Reise, iii. 694-Nonea lutea.
ovata, Lehm. Asperif. 222-Lycopsis orientalis.
paniculata, Ait. Hort. Kew. i. 177-iUliea.
•*pamassica,* Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. iii. 134-officinalis.
paroiflora, Sibth. ft Sm. Fl. Graec. ii. 57. t. 187-aggregate.
parviflora, Willd. Sp. PL i. 759. (Sp. delenda; cf. Boiss. Fl. Or. iii. 162).—As. Min.
pauciflora, Roem. ft Schult. Syst. iv. 774-Eritrichism rupestre.
perlata, Lam. Encyc. i. 604; Illustr. n. 1820—Lycopsis variegata.
petiolata, Hook. Bot Mag. t 3858-Cynoglossum petiolatum.
picta, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 127=Nonea picta.
Pinardi, Boiss. PL Or. Nov. Dec. ii. 8 = hybrida.
procera, Bess, ex link, Enum. Hort BeroL L 166 — ochroleuca.
pubescens, *Kit. in Rochel, PI. Bann.* 11.—Bannat.
pulla, Bieb. FL Taur. Cauc i. 125 = Nonea pulla.
postulate, *Schur, Enum. PI. Transs.* 465.—Transsylv.
pygmaea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii 92 = Krynitzkia linifolia.
racemosa, DC. Prod. x. 50-Mertensia racemosa.
rhiwochroa, Viv. Dec. n. 20 = Alkanna tinctoria.
riparia, *DC. Prod.* x. 43.—Afr. austr.
rosea, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 125=Nonea rosea.
rupestris, Roem. ft Schult Syst. iv. 101-Eritrichium rupestre.
ryssosperma, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 88 = MiUeri.
sdbulosa, Stev. ex Ledeb. FL Ross. iii. 118=ochroleuca.
saxatilis, Pall. Reise, iii 718 *(-Stenoselenium saxatile).*
Sellowiana, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 115.—Bras.
sempervirens, *Linn. Sp. PI.* 134.—Europ.
sericea, Roem. ft Schnlt Syst iv. 774-Eritrichium sericeum.
sikkimensU, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 168.—Reg. HimaL
spathulata, R. Br. ex Roem. ft Schult Syst. iv. 100-Myosotis spathulata.
spicata, Lam. Illustr. n. 1810-angustifolia.
spinocarpos, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 40-Echinospermum spinocarpum.
Spruneri, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 98-stylosa.
stoechadifolia, Cham, in Linnaea, iv. (1829) 439-Antiphytum stoechadifblium.
strida, *Herbich, in Flora,* xxxviii. (1855) 641.—Europ.
strigosa, *Labill. Syr. Dec.* iii. 7. t 4.—Syria; Persia.

ANCHUSA:—
strigosa, *[Soland. in] Suss. Aleppo,* ed. II. ii. 246.—Syria,
stylosa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 128.—Graecia; As. Min.; Tauria.
snbrepanda, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 437.—Europ.
tenella, Homem. Hort. Ham. i. 176—Bothriospermum teoellum.
tenuiflora, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 142 = Eritrichium saxatile.
tetraquetra, Cham, in Linnaea, viii. (1833) 118 = Antiphytum tetraqnetrnm.
thessala, *Boiss. & Sprun. Diagn.* Ser. I. xi. 99.—Thessal.
tinctoria. Linn. Sp. PI. ed. II. i. 192-Alkanna tinctoria.
tinctoria, PalL Ind. Taur. ex Lehm. Asperif. 266 = Nonea pulla.
tinctoria. Sieber, ex Steud Nom. ed. II. i. 86=Lycopsis orientalis.
tinctoria, Woodv. Med. Bot. t 92 - officinalis.
tomentosa, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 133=ochroleuca.
tuberculata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 40'Alkanna tinctoria.
tuberosa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 92.—Amer. austr.
undnlata, *Linn. Sp. PI.* 133.—Reg. Mediterr.
undulata, Pall. Reise, iii. 682-ochroleuca.
undulata, Sibth. ft Sm. Fl. Graec. ii. t. 166-hybrida.
undulata, Vabl, ex DC. Prod. x. 42-granatensis.
variegata, Lehm. Asperif. 223—Lycopsis variegata.
ventricosa, Sibth. ft Sm. FL Graec. ii. 58. t 169 = Nonea alba.
ventricosa, Viv. Fl. lib. Spec. 10. t 6. f. 1=Nonea Vivianii.
verrucosa, Lam. Encyc. i. 504 ; Illustr. 403. n. 1819-aegyptiaca.
verrucosa, Lejeun. ex Reichb. FL Germ. Excurs. 342-Lycopsis variegata.
versicolor, Schur, Ennm. PL Transs. 466—ochroleuca.
versicolor, Stev. in Mem. Soc Nat. Most iii. (1812) 254—Nonea rosea.
villosa, Roem. ft Schult. Syst iv. 775-Eritrichium villosum.
villosa, *Spreng. Syst.* i. 560.—Hab. t
virginiana, *Linn. Sp. PI.* 133 (= Lithospermum hirtum!).—Am. bor.
virginica, Linn. Syst. ed. XIL 145=praec
vulgaris, Dum. Fl. Belg. 41 = sempervirens.
teylanica, Jacq. £ ,Eclog. i. 47. t. 29 — Bothriospermum tenellum.
Meylanica, Vahl, ex Homem. Hort. Hafn. i. 176 — Cynoglossum denticulatum.

ANCHUSOPSIS, Bisch. Del. Sem. Hort. Heidelb. (1852) 8-Iiindelofla, Lehm. (Borag.).
longiftora, Bisch. 1. c = L. spectabilU.

ANCISTROCARPHUS, A. Gray, in Proc Am. Acad. vii. (1868) 355*Micropus, Linn. (Compos.).
filagineus, A. Gray, 1. c 356.—Calif.

ANCISTROCARPUS, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. ii. 186.1122. (1817)=Xiorotea, Sw. (Phytolacc).
hexander, J. Gay, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 17,18 —M. maypurensis.
maypurensis, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. ii. 186 - M. maypnrensis.
maypurensis, Spreng. Neue Entdeck. i. 257-M. Sprengelii.
Sckrankii, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorp. (1822) - M. maypurensis.

ANCI8TROCABPU8, Oliver, in Toum. Linn. Soc ix. (1867) 173. *TILIACEAE,* Benth. & Hook. f. i! 986.
bsevispinosus, *Oliver, I. c.* 174.—Afr. trop.
densispinosus, *Oliver, 1.* c—Afr. trop.

ANCISTBOCABTA, Maxim, in BnU. Acad. Petenb. xvii. (1872) 443. *BORAGINEAE,* Benth. ft Hook f. ii. 861.
japonica, *Maxim. I. c.* 444.—Japon.

ANCISTBOCLADUS, Wall. Cat. n. 1052 C1882). *D1PTEROCARPEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 191.
BICAMBA Koenig, ex Endl. Gen. 1183 (1840).

ANCISTROCLADUS :-
WORMIA, Vahl, in Skrift. Nat. Selsk. Kjobenh. vi. (1810) 104.
attenuates, *Dyer, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 800.—Burma.
extensus, *Wall. Cat. n.* 1052.—Burma.
Griffithii, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. *III.* xiii. (1849) 818.—Burma.
guineensis, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 175.—Afr. trap.
Heyneanus, *Wall. Cat.* n. 7262.—Ind. or.
pinangianus, *Wall. 1. c.* n. 1054.—Malaya.
sagittatus, Wall. 1. c. n. 1055-Tetramerista glabra.
stelligerus, Wall. l.c. n. 1058 = Wallichii.
VahUi, *Am. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1886) 325.—Zeylan.
Wallichii, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xiii. (1819) 319.—Ind. or.

ANCISTRODESMUS, Nand. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. xiii. (1850) 802=Microlepis, Miq. (Melast.).
oleaefolius, Naud. 1. c 303 = M. oleaefolia.

ANCISTROLOBUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Mr. II. v. (1836) 852. t. 6 = Cratoxylon, Blume (Hyper.).
brevipes, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 383=C. polyanthum.
floribundus, Turcz. 1. c. 882=C. floribundum.
formosus, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 25 = C. formosum.
glaucescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 383 = C. arborescens.
ligustrinus, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. II. v. (1836) 352 = C. polyanthum.
micradenius, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858)1. 382 = C. Blancoi.

ANCISTROPHORA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. Ser. II. vi. (1859) 457=Verbeslna, Linn. (Compos.).
Wrightii, A. Gray, 1. o = V. Wrightii.

ANCI8TKOPHYLLUM, G. Mann & H. Wendl. in Kerch. Palm. 230 (1878). *PALMAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 987.
LACCOSPERMA, G.Mann *Sc* H.Wendl. 1. c. 249 (18781.
secundiflorum, *G. Mann & H. Wendl. 1. c.*—Afr. trop.

ANCISTROSTIGMA, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 293; Nov. Stirp. Dec. 85 (1838)=Trianthema, Linn. (Ficoid.).
cypseleoides, Fenzl, 1. c. «T. cypseleoides.

ANCISTRUM, Forst. Char. Gen. 3. t. 2 (1776) = Acaena, Linn. (Kosac.).
Acaena, Lag. Gen. et Sp. Nov. 7=Acaena sericea.
acorna, DC. Prod. ii. 592, sphalm.=praec
adscendens, Poir. Encyc. Suppl. i. 847 = Acaena adscendens.
anserinaefolium, Forst Char. Gen. 4 = Acaena Sanguisorbae.
argenteum, Poir. Encyc. Suppl. i. 346 = Acaena argentea.
barbatum, Lam. IUustr. i. 77. t. 22. f. 8 = Margyricarpus setosus.
cylindristachyum, Poir. Encyc Suppl. L 847=Acaena cylindristachya.
decumbens, Gaertn. Fiuet i. 163. t 82-Acaena Sanguisorbae.
decumbens, Thunb. Prod. PL Cap. 6 = Acaena latebrosa.
dianirum, Forst. f. Prod. 10=Acaena Sanguisorbae.
elongatum, Poir. Encyc. SuppL i 345 = Acaena elongata.
hutnile, Pers. Syn. i. 80=Acaena adscendens.
laevigatum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 7=Acaena laevigata.
lappaceum, Poir. Encyc Suppl. i. 344 = Acaena lappacea.
latebrosum, Ait. Hort. Kew. i. 16= Acaena latebrosa.
lucidum, Ait. 1. c. 15 = Acaena lncida.
magellanicum. Lam. IUustr. i. 76. t. 22. f. 2—Acaena adscendens, laevigata.
ovalifolium, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 148 - Acaena ovalifolia.
pinnatifidum, Poir. Encyc Suppl. i 345 = Acaena pinnatifida.
pumilum, Poir. 1. c 847 = Acaena pumila.
repens, Vent. Jard. Cels, 6. t. 6 = Acaena ovalifolia.
Sanguisorbae, Linn. f. SuppL 89 "Acaena Sanguisorbae.

ANCISTRUM:—
sarmentosum, Thou. Fl. Tristand'Acugna, 44"Acaena Sanguisorbae.
trifidum, Poir. Encyc. Suppl. i. 846=Acaena trifida.

ANCLYANTHUS, A. Juss. in Orb. Diet, xl 254 (1849) «=Anoylantho8, Desf.

ANCRTJMIA, Harv. ex Baker, in Hook. Ic. PI. t. 1227 (1877). *ULIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 806.
cuspidata, *Harv. ex Baker, I. c.*—Chili.

ANCYLANTHOS, Desf. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 5. t. 2. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 112.
Bainesii, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 180.—Afr. trop.
cinerascens, *Welw. ex Hiern, I. c.* 159.—Afr. trop.
cistifolius, *Welw. ex Hiern, 1. c.*—Afr. trop.
fulgidus, *Welw. ex Hiern, 1. c.*—Afr. trop.
Monteiroi, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1208.—Afr. trop.
rubigmosa, *Desf. 1. c.*—Angola.

ANCYLOCALYX, Tul. in Ann. Sc Nat. Sir. II. xx. (1843) 136. t. 2 = Pterooarpus, Linn. (Legumin.).
acuminata, Tul. 1. c 137 = P. Ancylocalyx.

ANCYLOCLADUS, Wall. PI. As. Rar. iii. 45 (1882) = Willughbeia, Roxb. (Apocyn.).

ANCYLOGYNE, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 63. t. 7 (1847) = Sanchezia, Ruiz* Pav. (Acanth.).
capitata, Nees, in DC. Prod. xi. 222.—Peruv.
longiflora, Hook. f. Bot. Mag. t. 5588.—Ecuador.
macrecnemis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 64.—Am. trop.
munita, Nees, 1. c—Am. trop.
peruviana, Nees, in DC. Prod. xi. 222.—Peruv.

ANCYROSSEMON, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. t. 272 (1845)-seq.

ANCYROSTEMMA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 65 (1845)=Sclerothriz, Presl (Loasac).
micranthum, Poepp. & Endl. 1. c. = S. fasciculata.

ANDA, A. Juss. [in Diet. Sc. Nat. ii. 118 (1816)] ; Euph. Tent. 89. t. 12 (1824) = JoanneBia, Veil. (Euphorb.).
brasiliensis, Raddi, in Mem. Mod. .xviii.; Fis. (1820) 404 = J. Princeps.
Gomesii, A. Juss. Euph. Tent. 39.1.12 = J. Princeps.
fomesii, Mart, in Regensb. Arch. Gew. iv. (1830) 85 = praec.
Pisonis, Mart, ex Stend. Norn. ed. II. i. 86«=J. Princeps.

ANDACA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 82 (1836)=Lotus, Toum. (Legumin.).
arabica, Rafin. 1. c. - L . arabicus.

A2STDEBSONIA, R. Br. Prod. 553 (1810). *EPACRIDEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 617.
AMTKEROCEFHALA, DC. Prod. viL 755 (1839).
HOMALOSTOMA, Stschegl. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1859) L 22.
SPHINCTEROSTOMA, Stschegl. 1. c. 21.
aristata, *Lindl. Swan Riv. App.* 25.—Austral,
bracbyanthera, *F. Muell. Fragm.* vi. 61.—Austral.
brachyota, F. Muell. 1. c iv. 125=parvifolia.
brevifolia, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 332.—Austrai.
coeralea, *R. Br. Prod.* 554.—Austral,
colossea, *F. Muell. Fragm.* vi. 63.—Austral
depressa, *R. Br. L c.* 558.—Austral.
depressa, A. Cunn. ex DC. Prod. yii. 767=squarrosa.
Fraseri, Sond. in Lehm. PI. Preiss. i. 381= sprengelioides.
gracilis, *DC. Prod.* vii. 767.—Austral.
grandiSora, *Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxii. (1859) I. 21.—Austral,
heterophylla, *Sond. in Lehm. PL Preiss.* i. 333.—Austral.
homatostftna, *Benth. Fl. Austral*, iv. 253.—Austral,
involucrata, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 331.—Austral.

ANDEBBONIA :—
lanuginosa, A. Cunn. ex DC. Prod. vii. 767=depressa.
latiflora, *F. Muell. Fragm.* vi. 61.—Austral.
Lehmanniana, Sond. in Lehm. PI. Preiss. i. 330 = sprengelioides.
macranthera, F. Muell. Fragm. iv. 124 = heterophylla,
macronema, F. Muell. 1. c viii. 61 = Sprengelia macronema.
micrantha, *R. Br. Prod.* 553.—Austral.
parvifolia, *R. Br. I. c.*—Austral.
patens, Sond. in Lehm. PI. Preiss. i. 831'Sprengelioides.
patricia, *F. Muell. Fragm.* vi. 79.—Austral.
pauciflora, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 332.—Austral.
prostrata, Sond. 1. c. 833 = depressa.
pubescens, Sond. 1. c. 331« sprengelioides.
setifolia, *Benth. Fl. Austral*, iv. 252.—Austral.
spirophylla, F. Muell. Fragm. vi. 62=grandiflora.
sprengelioides, *R. Br. Prod.* 558.—Austral.
squarrosa, R. Br. Prod. 558•'depressa.
subsessilis, *Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 67.—N. Caled.
subulate, *Benth. Fl. Austral*, iv. 256.—Austral.
variegata, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 834.—Austral.

ANDERSONIA, Buch.-Ham. ex WalL Cat. sub n. 4014 (1882)=Anogeisaus, Wall. (Combret.).
acuminata, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 316=Anog. acuminata.
altissima, Roxb. ex Wight & Am. I. c-Anog. latifolia.
lanceolata, Buch.-Ham. ex WalL L c. = Anog. acuminata.

ANDERSONIA, Roxb. Hort. Beng. [87] (1814) j Fl. Ind. ii. 212 (1832)=Amooro, Roxb. (Meliac).
cucullata, Roxb. 11. cc. = Am. cncullata.
Rohituka, Roxb. 11. cc. 87, 213 =.Am. Robituka.

ANDERSONIA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst v. 21 (1819) = Gaertnera, Lam. (Logan.).
vaginata, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. 1. c. = G. vaginata.

ANDICUS, VelL- Fl. Flnm. 80 (1825)=Joannesia, Veil. (Euphorb.).
pentaphyllus, Veil. 1. c » J. Princeps.

ANDIHA, Lam. Encyc. i. 171 (1783). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 550.
LUMBKICIDIA, Veil. Fl.Flum. 305 (1825).
POLTOLOBIUM, Presl, Bot. Bemerk. 63 (1844).
VOUACAPOUA, Anbl. PI. Gui. Suppl. 9.1. 373 (1775).
acuminata, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 109 -inermis.
Amazonum, *Mart, ex Benth. I. c.* 107.—Bras,
anthelminthica, *Benth. I. c.* 108.—Bras.
Araroba, *Aguiar, Mem. sobre a Araroba,* 31.—*Cf. Pharm. Journ.* Ser. III. x. (1879-80) 44.—Bras.
Aubletii, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 108.—Guiana.
bracteosa, Benth. 1. c 107=Amazonum.
cinerascens, Mart. Herb. FL Bras. n. 1156=Tipuana macrocarpa.
cubensis, *Benth. in Journ. Linn. Soc. iv.* (1860) *Suppl.* 1 2 L-Cuba.
cuiabensis, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 295.—Bras.
excelsa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 385.—Mexic.
fraxinifolia, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 108.—Bras.
frondosa, *Mart, in Walp. Rep.* i. 803.—Bras,
gabonica, *Baill. in Adansonia,* vi. (1866) 219 (adnot).—Afr. trop.
grandifiora, Guill. *Sc* Perr. Tent. Fl. Seneg. i. 254 = inermis.
Harfieldii, Leschen. in Ann. Mus. Par. xvL (1810) t. 24-seq.
Horsfieldii, Leschen. L c. 481 (err. Harsfieldii) •= Euchresta Horsfieldii.
humiUs, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 109.—Bras,
inennis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 385.—Ind. occ.; Bras,
laurifolia, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 109.—Bras.

ANDIRA :—

microcarpa, *Griseb. in Mm. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 179.—Cuba,

mtida, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 109.—Bras.

oblonga, **Benth. in Jonra. Linn. Soc iv. Suppl. (1860) 121=retusa.**

ormosioides, **Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 108 =anthelminthica.**

Panicnlata, *Benth. I. c.* **109.—Bras,**

parvifolia, *Mart, ex Benth. 1. c.* **108.—Bras.**

Pauciflora, *Benth. 1. c.* **109.—Bras.**

Pisonis, **Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 87=A. Aubletii.**

Pisonis, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 108—Bras.

racemosa, **Lam. Encyc i. 17=excelsa.**

retusa, *H. B. & K. Nov. Gen.'et Sp.* **vi. 385.—Guiana. "Paria,** *H. B. & K. 1. c.*—**S. Granat.**

losea, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 108.—Bras,

sapindoides, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 128.-Ind. occ.

spmulosa, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 108—Bras.

stipulacea, *Benth. I. c.* **107.—Brs-**

vermifuga, *Mart, ex Benth. I. c.* **108.—Bras.**

ANDMSCUS, Veil. Fl. Flum. ii. t. 86 (1827) = Andious, Veil.

ANDOUINIA, Reichb. Consp. 160 (1828) err. typ.= Audouinia, Brongn. (Bruniac).

ANDRACHITE, Linn. Syst. ed. I. (1735). *EUPHORBIACEAB,* **Benth. & Hook. f. iii. 270.**

ARACHNE, Neck. Elem. ii. 348 (1790).

ERACLISSA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 208 (1775).

LEPIDANTHUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1841) 175.

LEPTOPUS, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 155.1.156 (1844).

MASCHALANTHUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. „ (1837) 175.

PHYLLANTHIDIA, Didrichs. in Vidensk. Meddel. Kjoeb. (1857) 150.

TELEPHIOIDES, Tourn.ex Moench, Meth. Suppl. 310 • (1802).

apftala, **Roxb. ex Wall. Cat. n. 7956 = Bischofia javanica.**

"borea, *Mill. Card. Diet.* **ed. VIII. n. S.-Campech.**

aspera, *Spreng. Syst.* **iii. 884.—Oriens ; Aft. trop.; Ind. or.**

australis, *Zoll. & Mor. in Natur. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie,* **ii. (1845) 17.—Java.**

Lodishaco, **Roxb. ex Wall. Cat. n. 7877=Cleistanthus collinus.**

eapensis, *Baill. in Adansonia,* **iii. (1862-63) 163.—Air. austr.**

chinensis, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bar.* 59.—China,

oolchica, *Fisch. & Mey. ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 1137. —Cancas.

eordifolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* **xv. 11.234.—Reg. Himal.**

bfcmsneana, **Baill. Etud. Geh. Euphorb. 577=cordifolia.**

"ecaisnei, *Benth. Fl. Austral,* **vi. 88.—Austral.**

Ooonhyboisca, **Heyne, ex Wall. Cat. n. 7879 = Bnoelia retusa.**

°regeana, *Baill. Adansonia,* **iii. (1862-63) 164.—Aft. austr.**

«liptica, *Roth, Nov. Sp.* **364.—Ind. or.**

Mtescens, **Ehret, in Phil. Trans, lvii. (1768) 114. t 6 *" Arbutus Andrachne.**

fruticosa, **Decne. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. , 285 = Decaisnei.**

"Micosa, *Linn. Sp. PI.* **1014.—China ; N. Hisp.**

frgcosa, **Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 287- Phyllanthus suberosus.**

ffnticulosa, *Boiss. Diagn.* **Ser. I. vii. 86.—Persia,**

nuroccana. *Ball, in Journ. Bot.* **xiu. (1875) 205.—Marocco.**

microphylla, *Baill. Etud. Gin. Euph.* **677.—Peruv.**

orticularis, **Muell. Are. in DC. Prod. xv. II. 610, in syn. =seq.**

orbiculata, **Roth, Nov. Sp. B64=Cleislanthus collinus.**

"»»««, *Muell. Arg. in Linnaea.xxai.* (1863) 78.-Aft. austr.

ANDBACHNE :—

ovata, **Lam. ex Poir. Encyc. Sappl. i. 243, in syn. = Agyneia ovata.**

phyllanthoides, **Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 485, in syn. = Roemeriana.**

Roemeriana, *Muell. Arg. I. c.* **234.—Amer. bor.**

rotundifolia, **Eichw. ex C. A. Mey. Casp. 18. t. 20= telephioides.**

telephioides, *Linn. Sp. PI.* **1014.—Reg. Medilerr.; Oriens; Ind. or.**

tenera, *Miq. Fl. Ind. Bat.* **i. II. 866.—Malaya.**

trifoliata, **Roxb. Hort. Beug. 70; Fl. Ind. iii. 728 = Bischofia javanica.**

ANDBADEA, AllemXo, Diss. Andrad. (1845). *NYCTAGINEAE,* **Benth. & Hook. £ iii. 11.**

floribunda, *Allemdo, 1. c.*—**Bras.**

ANDRASTIS, Rafin. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 86-Virgilia» Lam. (Legum.).

ANDREOSKIA, Boiss. Fl. Orient, i. 803 (1867) = Andrzeiowekia, Reichb. (Crucif.).

ANDREOSKIA, DC. Prod. i. 190 (1824) = Dontostemon, Andrz. (Crucif).

crassi/olia, **Bunge, ex Turcz. in Bnll. Soc. Nat. Mosc xv. (1842) 271.—Mongolia.**

dentata, **Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 6 =D. dentatus.**

eglandulosa,L>C. **Prod. i. 190=D. eglamlulosus.**

integri/olia, **DC. 1. c.=D. integrifolius.**

panifiora, **Turcz. Cat. PI. Baic. n. 155. sec Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 269 = Malcolmia Ledebonrii.**

pectinata, **DC. Prod. i. 190=D. pectinatus.**

ANDREUSIA, Dun. in DC. Prod. vii. 560 (1839) = Hornemanaia, Vahl (Vaccin.).

guadalupensis, **Dun. 1. c.=H. martinicensis.**

ANDREUSIA, Vent. Jard. Malm. 108. t. 108 (1807)^= MyoTxirmn, Banks.

debilis, **Vent 1. c sub 1.108=M. debile.**

glabra. **Vent 1. c. 1.108 «=M. ellipticum.**

salicifolia, **Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 87 = Freylinia cestroides.**

scabra, **Zeyh. ex Steud. 1. c =M. parviflorum.**

ANDREWSIA, Spreng. Anleit ii. I. 474 (1817); Syst. i. 428 (1825)=Bartonia, Muhl. (Gentian.).

autumnalis, **Spreng. Syst. i. 162=B. tenella.**

paniculata, **Bart, ex Steud. Nom. ed. II. l. 87 = B. tenella.**

verna, **Spreng. Syst. i. 162=B. verna.**

ANDRIALA, Decne. in Orb. Diet. i. 485 (1841) err. typ. -=Andryala, Linn. (Compos.).

ANDRIAPETALUM, Pohl, PI. Bras. Ic. i. 113 (1827) = Panopsis, Salisb. (Proteac).

cayennense, **Klotzsch, ex Meissn. in Mart Fl. Bras. v. I. 78.—Bras.**

ferrugineum, **Meissn. in DC. Prod. xiv. 345.—Peruv.**

multiflorum, **Schott, ex Endl. Suppl. iv. II. 82.—Bras.**

polystachya, **Schott, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 345. —N. Granat.**

reticulatum, **Pohl, PI. Bras. 1.115. t. 92.—Bras.**

rubescens, **Benth. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 347- *Sprucei.***

rubescens, **Pohl, Fl. Bras. i. 114. t 91.—Bras.**

stssilifolium, **Benth. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 846 -cayennense.**

sessili/olium, **Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 53=P. hameliaefolia.**

Sprucei, **Meissn. in DC. Prod. xiv. 847.—Bras.**

suaveolens, **Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 472.—N. Granat.**

Yolombo, **Posado, in Bull. Soc. Bot. Fr. xviii. (1871) 374.—N. Granat.**

ANDRIEUXIA, DC. Prod. v. 559 (1836)=Heliopsis, Pen. (Compos.).

mexicana, **DC. 1. c. et in Deless. Ic Sel. iv. t. 31 = H. bupbthalmoides.**

quitensis, **Benth. PI. Hartw. 206.—Ecuador.**

ANDBOCEHTRTTM, Lem. in Fl. des Serres, Sir. I. iii. (1847) 242, verso. *ACANTHACEAE,* **Benth. & Hook. f. ii. 1084.**

multiflorum, *Lem. 1. c.*—**Mexico.**

ANDROCERA, Nutt. Gen. Am. i. 129 (1818)-Solanild, Linn.

lobata, **Nutt. 1. c-S. rostratum.**

ANDROCHILUS, Liebm. in Bot. Notlser, (1844) 101 = Liparis, Rich. (Orchid.).

campestris, **liebm. 1. c. 197.—Mexico.**

ANDROCOMA, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 896 = Scirpus, Linn. (Cyperac).

speciosa, **Nees, 1. c. 397-S. gi^anteus.**

ANDROCTMBITTM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 21. I. 2. *LIUACEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 822.**

CYMBANTHES, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 329.

ERYTHROSTICTUS, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 90.

PLEXINIUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 32 (1886).

Burchellii, *Baker, in Journ. Bot.* **xii. (1874) 246.—Aft. austr.**

Burkei, *Baker, I. c.*—**Afr. austr.**

circinatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 443.—Afr. austr.

cocullatum, *Ectl. Vert. 7.*—**Afr. austr.**

cuspidatum, *Baker, in Journ. Bot.* **xii. (1874) 245.—Afr. austr.**

Dregei, *Presl, Bot. Bemerk.* **116.—Afr. austr.**

eucomoides, **Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 165 = leucanthum.**

encomoides, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 21.—Afr. austr.

leucanthum, *Willd. I. c*—**Afr. austr.**

littorale, *Eckl. Vert.* **7.—Afr. austr.**

longipes, *Baker, in Journ. Bot.* **xii. (1874) 246.—Afr. austr.**

melanlhioides, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* **ii. (1808) 21.—Afr. austr.**

palaestinnm, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xvii. (1880) 445.—Palaestin.**

punctatum, **Baker, in Journ. Bot xii. (1874) 246- leueanthum.**

punctatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 445.—Afr. bor.

striatum, *'Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 836. —Abyss,

subulatum, *Baker, in Journ. Bot.* **xii. (1874) 245.—Afr. austr.**

volutare, *Burch. Trav.* **i. 213.—Afr. austr.**

volutum, **Burch. ex Baker, in Journ. Bot. xii. (1874; 245=volutare.**

ANDROGLOSSA, Benth. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 42=Sabla, Colebr.

reticulatum, **Benth. 1. c.°>S. limoniacea.**

ANDBOOBAPHIS, Wall. PI. As. Rar. iii. 77 (1832). *ACANTHACEAE,* **Benth. & Hook. f. ii. 1099.**

ERIANTHERA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 77 (1832).

affinis, *Nees, 1. c.* **iii. 116.—Ind. or.**

alata, *Nees, in DC. Prod.* **xi. 516.—Iud. or.**

Beddomei, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 506.—Ind. or.

ceylanica, **Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 313=macrobottys.**

ceylanica, **Wight, Ic. 11560=viscosula.**

echioides, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* **iii. 117.—Ind.or.**

elongate, *T. Anders, in Journ. linn. Soc.* ix. (1867) 502.—Ind. or.

glandulosa, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* **iii. 115.—Ind. or.**

gracilis, **Nees, in DC. Prod. xi. 516 = Wightiana.**

humifusa, **Wall, ex Nees, 1. c 514=serpyllifolia,**

lineata, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* **iii. 116.—Ind. or,**

lobelioides, *Wight, Ic.* **t. 1557.—Ind. or.**

macrobotrys, *Nees, in DC. Prod.* **xi. 516.—Ind. or.**

Neesiana, **Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 504-stellulata.**

Neesiana, *Wight, Ic.* **t. 1561.—Ind. or.**

orbiculata, **Wall, ex Nees, in DC. Prod. xi. 614 - serpyllifolia.**

ovata, *Benth. &Hook.f. Gen-* **ii. 1100.—Ind , or,**

paniculata, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* **iii. 116.—Ind. or.**

Rothii, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 506. —Ind. or.

serpyllifoUa, *Wight, Ic. t* **517.—Ind. or.**

ANDBOGRAPHI8 :—
stellnlata, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 604.—Ind. or.
stenophylla, *C. B. Clarke, 1. c.* 503.—Ind. or.
snbspathulata, *C. B. Clarke, I. c.* 602.—Ind. or.
tenniflora, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (18S7) 602.—Ind. or.
viscidula, Stead. Nom. ed. II. i. 87 = viscosnla.
viscosula, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 116.—Ind. or.
Wightiana, *Am. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 517.—Ind. or.
Wightiana, T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl. 232 —macrobotrys.

ANDROGYNE, Griff. Notnl. iii. 279 (1851)-Paniaea, Lindl. (Orchid.).

ANDROLEPIS, Brongn. ex Houll. in Rev. Hortic. xliL (1870) 12-Aechmea, Rniz ft Pav. (Bromel.).
Skinneri, Brongn. 1. c.—Guatemala.

ANDROMACHIA, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. ii. 104. t 112 (1809)=Liabum, Adans. (Compos.).
aeaulis, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 98 - L. acaule.
alternifolia, Knnze, ex Steud. Nom. ed. II. i. 87 — Aplopappns chrysanthemifolius.
Deppeana, Less, in Linnaea, vi. (1831) 401-L.Deppeanum.
excelsa, Poepp. ft Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 44.— Peruv.
grandiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 99 = L. grandiflorum.
hieracioides, H. B. ft K. 1. c. 08-L. hieracioides.
igniaria, Humb. ft Bonpl. PI. Eq. ii. 101. t. 112-L. igniarinm.
Jussieui, Cass. in Bull Soc. Philom. (1817) 184 = L. Jussieni.
melastomoides, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 101. t 137 = L. melastomoideg.
nubigenum. H. B. ft K. 1. c. 102 = L. nubigenum.
Poiteaui, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 184 = L. Brownei.
sessilifolia, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 102 = L. sessilifloram.
solidaginea, H. B. ft K. 1. c. 100=L. solidagineum.
verbascifolia, H. B. ft K. 1. c.=L. verbascifolium.
volubilis, H. B. ft K. L c. 102 - L. volubile.

ANDBOMEDA, Linn. Syst. ed. I. (1785); Gen. ed. I. 123 (1737), pro parte. *ERICACEAE,* Benth. ft Hook, f. ii. 687.
XOLISMA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 193.
aVumjnata, Ait. Hort. Kew. ii. 70-Leucothoë acuminata.
acuminata, Sm. Exot. Bot ii. 69-Leucothoë Catesbaei.
adenothrix, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat i. 81-Ganltheria adenothrix.
alata. Herb. Dombey, ex Dun. in DC. Prod. vii. 562 ***{=Proclesia alata).*—Pernv.**
ambigua, *Schrad. in Goett. Gel. An:* i. (1821) 710.— Hab.T
americana, Hort. ex DC. Prod. vii. 607-A. Polifolia.
anastomosans, Mutis, ex Linn: f. Snppl. 8S0=Gaultheria anastomosans.
angustifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 291-Cassandra calyculata.
arborea, Linn. Sp. PI. ed. I. 394—Oxydendrnm arboreum.
axillaris, Lam. Encyc. i. 157=Leucothoë axillaris.
axillaris, Michx. Fl. Bor. Am. i. 253=Lencothoë Catesbaei.
baccata, Wangenh. Beitr. Am. 30. t. 39. £ 69 -Gaylossacia resinosa.
bracomorensis, H. B. ft K. Nov. Gen. etSp. iii. 288. t 263 — Agarista bracomorensis.
bracteata, Cav. Ic vi. 42 - Ganltheria bracteata, tomentosa.
bracteosa, DC. Prod, vii. 607-Arctostaphylos tomentosa.
bryantha. Linn. Mant. 238 - Bryanthus Gmelini.
buxifolia, Lam. Encyc. i. 159=Aganria buxifolia.
caerulea, Linn. Sp. PI. 393 = Phyllodoce taxifolia.
calyculata, Linn. 1. c. 394 = Cassandra ealyculata.
oampanulata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 81.— Japon.
***tanadensis,* Cels, ex Lam. Encyc. L 168"A. Polifolia.**

ANDBOMEDA:—
Candida, Veil. Fl. Flam. 175; iv. t. 98 - Gaultheria Candida.
capricida, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 148 = Pieris ovalifolia.
cassinefolia. Vent. Jard. Cels, 60 = Zenobia speciosa.
Catesbaei, Walt. Fl. Carol. 187 - Leucothoë Catesbaei.
cerea. Linn. f. Suppl. 238—Vacciniutn cereum.
cemua, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 81„— Japon.
chinensis, Lodd. Bot. Cab. t 1642=Vacdninmbracteatum.
chlorantha, Cham, in Linnaea, viii. (1833) 508 = Leucothoë chloranthus.
dliata, Nees, in Princ. Neuwied, Reise, i. 104 = Leucothoë ciliata.
ciliicalyx, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 30 = Menziezia ciliicalyx.
dliosa,* Boj. ex DC. Prod. vii. *90S* = *(,LeucothoHBojeri). —Madag.
coccinea, Nees, in Princ. Neuwied, Reise, i. 104 — Leucothoë coccinea.
coccinea, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 709-Gaylassacia Pseudo-vaccinium.
columellaris, Fisch. ex Herd, in Act. Hort. Petrop. i. (1871-72) S30 = Cassiope Redowskyi.
coriacea, Ait Hort. Kew. ed. I. ii. 70=Pieris nitida.
coriifolia, Thunb. ft Billb. PI. Bras. Dec. 1. n. 5 = Leucothoë coriifolia.
crassifolia, Pohl, PI. Bras. ii. 34-Leucothoë crassifolia.
crispa, Hort. Paris, ex Poir. Encyc. Suppl. i. 356 = Cassandra calyculata.
cubensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 51.—Cuba.
cupressiformis, Wall, ex D. Don, in Mem. Wem. Soc. iii. (1821) 411 = Cassiope fastigata.
cupressina, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 38=Cassiope Mertensiana.
Dabolcia, Linn. Syst. ed. XII. 800 = Daboëda polifolia.
Daboida, Pall. Fl. Ross. ii. 67 = Phyllodoce taxifolia.
dealbata, Lindl. Bot. Reg. t. 1010-Zenobia speciosa.
droseroides. Linn. Mant. 239 = Erica glutinosa.
elegans, Meerb. PI. Sel. Ic. Pict. t. 27 = Leucothoë racemosa.
elliptica, Sieb. 4. Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. HI. (1846) 126 = Pieris ovalifolia.
empetrifolia, Lam. Encyc. i. 155=Pemettya empetrifolia.
erieoides, Pall. Fl. Ross. i. II. 56—Cassiope .ericoides.
eriophylla, Veil, in Vandel. Fl. Lusit. et Bras. Sp. ed. Roem. 107 — Gaultheria ferruginea.
eucalyptoidfs, Cham, ft Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 518'Leucothoë eucalyptioides.
fasdculata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 73=Lyonia fasciculata.
fastigiata, Wall, in As. Res. xiii. (1820) 894 = Cassiope fastigiata.
ferruginea, Walt. Fl. Carol. 138=Lyonia ferruginea.
fiexuosa. Moon, Cat. ex Walp. Ann. i. 480-Gaultheria fragrantissima.
floribunda, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 293-Pieris floribunda.
Fontanesiana, Steud. Nom. ed. II. i. 88—Leucothoë axillaris.
formosa, WalL in As. Res. xiii. (1820)395; Wall. Cat. n. 761 = Pieris formosa.
formosissima, Bart. Trav. N. ft S. Car. Georg. ii. (1791) = Leucothoë acuminata.
frondosa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 296-Lyonia paniculata.
glandulow, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 84.—Cuba.
glauca, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 1.118 -Zenobia speciosa.
glaudfolia, Wender. Ind. Sem. Hort Marb. (1827) in App.n. 2-A. Polifolia.
glaucophylla. Link, Enum. Hort. Berol. L 894-A. PolifolU.
globulifera, Hort ex DC. Prod. vii. 699 = Lyonia paniculata.
glomerata, Cav. Ic vi. 42 = Ganltheria anastomosans.
grandifiora, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 88-A. PolifolU.
grandifiora. Herb. Mus. Par. ex Dun. in DC. Prod. viL 553 = Ceratostemma grandiflorum.
grandifiora, Meerb. PI. SeL Ic. Pict t 25=Pieris Mariana.
Hahniana,nil/>fr4. /. *c.* t 24.—Hab. t
Halmiana, Steud. Nom. ed. I. 44; ed. II. i. £8, sphalm.—Hahniana.

ANDROMEDA :—
hirsuta, Veil. Fl. Flum. 175; iv. t. 99 = Gaultheria ferruginea.
tiirta, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 23 •= Leucothoë hirta.
hispidula, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 155 = Leucothoë Martii.
humilis, Banks ft Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct ii. 326 *Pernettya pumila.
hypnoides, Linn. Sp. PI. ed. I. 393=Cassiope hypnoides.
ilicifolia, Pers. Syn. i. 481=Leucothoë ilicifolia.
jamaicensis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 73 = Lyonia jamaicensis.
japonica, Naves, in Blanco, Fl. Filip. ed. III. 120-Micromelum tcphrocarpum.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 181=Pieris japonica.
kalmiaefolia, *Hogmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* i. 204.— Am. bor.
katagherensis, Hook. Ic. PI. t. 246 - Gaultheria fragTantissima.
lacustris, *Wright, in Sauv. Ft. Cub.* 85.—Cuba.
lanceolata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 136-Leucothoë Catesbaei.
lanceolata, Wall, in As. Res. xiii. (1820) 390 = Pieris ovalifolia.
lanceolata, Veil. Fl. Flum. 176 ; iv. t. 97-Leucothoë multiflora.
latifolia, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 85.—Cuba.
laurina, Michx. Fl. Bor. Am. i. 253 = Leucothoë acuminata.
laxiflora, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 157 = Leucothoë laxiflora.
ledifolia, H. B. &. K. Proleg. p. xvi - Arctostaphylos polifolia.
Hgustrina, Muhl. Cat. 44; Ell. Sketch, i. 490 = Lyonia paniculata.
littoralis, Steud. Nom. ed. II. i. 88 = Leucothoë littoral is.
longifolia, Pursh, Fl. Bor. Sept. i. 293=Leucothoë Catesbaei.
lucida, Jacq. Coll. i. 95 = Lencothoë acuminata.
lucida, Lam. Encyc i. 157 = Pieris nitida.
lycopodioides, Pall. Fl. Ross. i. II. 55 = Cassiope lycopodioides.
marginata, Duham. Arb. ed. nov. i. 168. t. 40 = Pieris nitida.
mariana, Jacq. Ic Rar. iii. t. 465-Pieris nitida.
mariana, Linn. Sp. PI. 393 = Pieris mariana.
Mertensiana, Bong. Veget Ins. Sitcha, 152. t. 5 = Cassiope Mertemiana.
mexicana, *Hemsl. in Biel. Centr. Am. Bot.* ii. 282.— Mexico.
montana, Buckl. in Am. Journ. Sc xlv. (1843) 172 = Pieris floribunda.
montana, Salisb. Prod. 290=Daboëda polifolia.
multiflora, Pohl, PI. Bras. ii. S3. t. 122 = Leucothoë multiflora.
musciformis, Poir. Encyc Suppl. i. 853=Bryanthiu Gmelini.
myrsinites, *Lam. Encyc.* i. 155.—Reg. Magell.
myrtifolia, Salisb. Prod. 290 = Pieris nitida.
myrtifolia, Willd. ex DC. Prod. vii. B03=Agarisla bracamorensis.
nana, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xviii. (1873; 47— Japon.
nereifolia. Cham, ft Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 522 = Leucothoë nereifolia.
nitida, Bartr. ex Marsh. Arbust. (1785) 8 = Pieris nitida.
nitida, Veil. Fl. Flum. 174; iv. t 94 = Leucothoë revoluta.
nummularia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1626) 520=Leucothoë nummularia.
obtusa, *Wright, in Sauv. fl. Cub.* 84.—Cuba.
octandra, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 73=Lyonia octandra.
oleaefolia, *Hoffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* i. 204.—Hab.?
oleifolia, Cham, in Linnaea, viii. (1833) 504 = Leucothoë oleifolia.
oleifolia, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 89 = A. Polifolia.
ovalifolia, Wall, in As. Res. xiii. {1820) 391; Cat. n. 763 = Pieris ovalifolia.
ovat'a, Soland. ex DC. Prod. vii. 598 = Zenobia speciosa.
paniculata, Linn. Sp. PI. 894 — Lencothoë racemosa.
paniculata, Willd. Sp. PI. ii. 612=Lyonia paniculata.

ANDROMEDA :—
parabolica, -Duham. Arb. ed. II. i. 191-Lyonia parabolica.
perulata, Miq. in Ann. Mua. Bot. Logd. Bat. L'31 = Enkianthus japonicus.
Pkillyreaefolia, Hook. It PL t. 122 = Pieri« phillyreaefolia.
pilulifera, Hort. ex DC Prod. vii. 11. 599=Lyonia paniculata.
Pistrix, Cham, in Linnaea, viii. (1833) 508= Leucothoë subrotunda.
Polifolia, *Linn. Sp. PI.* 393.—Reg. bor. et arct.
polyantha, Steud. Norn. Bot. ed. II. i. 88-Lyonia paniculata.
populifolia, Lam.Encyc. i. 159 - Leucothoë acnminata.
prostrata, Cav. Ic. vi. 43=Pernettya microphylla.
pubescent. Poir. Encyc. Snppl. i. 355-Lyonia rubiginosa.
putckelia, Cham, ex Meissn. in Mart. Fl. Bra». vii. 161 = Leucothoe pulchra.
pttlcheUa, Cham, in Unnaea, viii. (1833) 509 = Leucothoe pnlchella.
pulchella, Hniiib. Prod. 289 = Pieris mariana.
pulchra, VelL Fl. Flum. 174; iv. U 96 = Gaultheria venusta.
pulchra. Cham. & Schlecht in Iinnaea, i. (1826) 521 - Leucothoe pulchra.
pulverulenta, Bartr. Trav. N. &S. Car. Georg. U. 476 = Lenobia speciosa.
punctata, Domb. ex Dnn. in DC. Prod. vii. 564 = rhibaudia punctatifolia.
pyrifolia, Thou. Obs 14; Pen. Syn. i. 481-Agauria salicifolia.
racemosa, Linn. Sp. PI. 394=Leucothoe nicemosa.
racemosa, Walt. Fl. Carol. 188=Lyonia paniculata.
recurva, Bnckl. in Am. Journ. Sc. xlv. (1843) 172-Leucothoë recurva.
Redowskii, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 517 -Cassiope Redowskii.
reticulata, Walt Fl. Carol. 187 = Leucothoë acnminata.
revoluta, Bouton, ex DC. Prod. vii. H. 603-Leucothoë Bojeri.
revoluta, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 89-A. Polifolia.
revoluta, Spreng. Neue Entdeck. ii. 181=Lencothoe revoluta.
rhomboidalis, Veill. in Duham. Arb. ed. II. i. 192 = Oaultheria ferruginea.
ngida, Humb. Itin. i. 397-Gaultheriarigida.
ngid,* Pursh, Fl. Am. Sept. i. 292=Lyonia ferruginea.
rosmarinifolia, Gilib. Fl. Lithuan. i. 8=A. Polifolia.
rubiginosa, Pers. Syn. i. 481-Lyonia nibiginosa.
rupestris, Forst. f. Prod. n. 195~Gaulthena rupestris.
salicifolia, Lam. Encyc. i. 159 = Agauriasalicifolia.
seeunda, Moench, Meth. 4S7=A. Polifolia.
sellowii, Steud. Nom. ed. II. i. 89=Leucothoë Pulchra.
serrata, Sm. ex DC. Prod. vii. II. 609=Leucothoë acuminata.
serrata, VelL FL Flum. 174; iv. t 95-Ganltheria elliptica.
Tatifolia, Hort. ex DC. Prod. vii. 602=Zenobia •peciosa.
serrulata, Cham, in Linnaea, viii. (1833) 606 = Leucothoë serrulata.
tnensis, Steud. Nom. ed. II. i. 89 = Vaccininm bracteatum.
**peciosa,* Michx. FL Bor. Am. i. 256=Zenobia speciosa.
speeiosa, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 89=Leucothoë racemosa.
**picata,* Wats. Dendrol. i. 186-Leucothoë racemosa.
**pinulosa,* Pursh, Fl. Am. Sept. i. 293-Leucothoë Catesbaei.
squamulosa, D. Don, Prod. FL Nep. 149-Pieris ovalifolia.
Stelleriana, Pall. Fl. Ross. i. II. 68=Cassiope Stelleriana.
subrotunda, Pohl, PI. Bras, it 32. t. 121-Lencothoë subrotunda.
subsessilis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 32.—Japon.
**y>nplocifolia,* Wall. Cat. n. 1522-Vaccintam Leschenaultii.

ANDBOMEDA :-
taxifolia, Pall. Fl. Ross. ii. 64. t 72. f. 2=PhyUodoce taxifolia.
tetragona, Linn. Sp. PL 393=Cassiope tetragona.
tomentosa, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iii. 495 = Lyonia racemosa.
trinervis, Domb. ex Dun. in DC. Prod. vii. 563 (-= *Proclesia bracteata).*—Peruv.
vaccinifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 1.116 = Pieris floribunda.
venulosa, DC. Prod. vii. 607 = Aretostaphylos Hookeri.
villosa, Wall. Cat. n. 782=Pieris villosa.
Walteri, Willd. Enum. Hort. Berol. 458=Leucothoë Catesbaei.
Watsoniana, Steud. Nom. ed. II. i. 89=Lyonia parabolica.

ANDBOMYCIA, A. Rich. FL Cub. Fanerog. ii. 282. t 89 (1853). *AROIDEAE,* Berth. & Hook. f. iii. 987.
cubensis, *A. Rich. I. c*—Cuba.

ANDROPHORANTHUS, Kant, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1859) 5 = Caperonia, St. Hil. (Euphorb.).
glandulosus, Karst. I. c 6=C. palustris.

ANDROPHILAX, Steud. Nom. ed. II. i. 89 (1840)=seq.

ANDROPHYLAX, Wendl. Beobacht. 38 (1798)-Cocculus, Linn. (Menisp.1.
scandens, Wendl. 1. c.=C. carolinus.

ANDROPHTHOE, Scheff. in Flora, liii. (1870) 249, err. typ. = DENDKOPHTHOE, Mart. - Loranthus, Linn.

ANDROPHYSA, Moq. ex seipso in DC. Prod. xiiL II. 201 (1849)=Halocharis, Moq. (Chenop.).

ANDBOPOGON, Linn. Sp. PL cd. I. 1045 (1763).
CRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1133.
ACENIUM, Nees, in Lindl. Inttod. Nat. Syst ed. II. 447 11836)-
ALLOIANTHENA, Steud. Syn. PL Gram. 217 (1855).
ALLOIATHEROS, Kafin. in Ser. Bull. Bot. 221 (1830).
ANADELFHIA, Hack, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) 240.
ANATHERUM. Beauv. Agrost. 128 t. 22 (1812).
ARTHROSTACHYS, Desv. Opnsc 74. t. 6 (1831).
CVMBACHNE, Retz. Obs. vi. 86, obs. ad calc. (1791).
CYMBOPOGON, Spreng. Pugill. ii 14 (1615).
DICHANTHIUM, Willem. in Ust. Ann. Bot. xviii. 11 (1798).
DIECTUMIS, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 193. t. 64 (1815).
DIMEIOSTEHON, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
DIPLASANTHUM, Desv. Opusc 66 (1831).
DISCHANTHIUM, Kunth, Juium. PL i. 498 (1833).
ERIOPODIUM, Hochst in Flora, xxix. (1846) 115, in obs.
EUKLASTAXON, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 1.229 ; Syn. PI. Gram. 412 (1854).
EUPOCON, Desv. Opusc. 67, in obs. (1831).
EXOTHECA, Anderss. in Nov. Act. Upsal. ii. (1856) 253. t. 3.
GRAYA, Am. ex Stend. Nom. ed. II. i. 70S (1840).
GYMNANDROPOGON, [Munrol Duthie, in Atkins. Gaz. N. W. Ind. 638 (1878 ?), nomen.
GYMNANTHELIA, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aeth. 299 (1867).
HETEROCHLOA, Desv. Opusc. 66. t. 5. f. 3 (1831).
HoMOitATHERUM.Nees, in Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 28» (1836).
HYPARKHENIA, Anderss. in Nov. Act. Upsal. ii. (1856) 231, nomen.
HYPOGYNIUM, Nees, Agrost. Bias. 364 (1829).
LENORMANOIA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; Syn. PL Gram. 359 (1854).
LEPEOCERCIS, Trin. Fund. Agrost. 203 (1820).
MANDELORNA, Steud. Syn. PL Gram. 559 (1854).
OROTOGON, Neck. Elem. iii. 211 (1790).
PITHECURUS, Willd. ex Kunth, Enum. PL i. 490 (1833).
SCHIZACHYRIUM, Nees, Agrost. Bras. 331 (1829).
SCHIZOPOGON, Reichb. Consp. 52 (1828).
SPIROTHEROS, Rafin. in Ser. Bull. Bot. L (1830) 221.

ANDBOPOQO2S-:-
VETIVERIA, Thou, ex Virey, in Joura. Phar. Sér. I. xiii. (lt>27) 499.
abyssinicus, *R. Br.ex Fres. in Mus. Senienb.* ii. (1837) 146.—Abyss.
acicularis, Willd. Sp. PL iv. 906=Chrysopogon aciculatus.
aciculatus, Retz. Obs. v. 22=Chrysopogon aciculatus.
aculeatus, Steud. Nom. ed. II. 1. 90 = Chrysopogon aciculatus.
adustus, Trin. in Mem. Acad. Petersb. Sér. VI. II. (1833) 259=Elionuius Iatiflorus.
aesthenos, Steud. Syn. PL Gram. 376-Ischaemum ciliare.
aethiopicus, Rupr. ex Steud. Syn. PL Gram. 372-Gayauns.
afer, Bruce, Trav. v. App. 47 (Pollinias sp.). Afr. bor.
affinis, J. Presl, in Kel. Haenk. i. 843=Sorghum halepense.
affinis, *RR. Br. Prod.* i. 201.—Austral.
affinis, Spreng. Nov. Prov. 5=annulatus.
Agenium, Steud. Syn. PI. Gram. 395=NeesL
agrostoides, *Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent,* xvi. (1883) 136.—Reg. Argent.
agrostoides, Speg. PL Nov. Am. Austr. Dec. ii. 27; ex Anal. Soc. Cient. Argent, xvi. (1883) 15 = Chrysopogon avenaceus.
albescens, Koura. Mex. PL Enum. Gram. 56; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 680 = Chrysopogon nutans.
albidus, *Wall. Cat.* n. 8821.—Ind. or.
Alectoridia, Steud. Syn. PL Gram. 383-Arthraxon ciliaris.
Allionii, DC. Fl. Fr. iii. 97 = Heteropogon contortus.
alopecuroides. Linn. Sp. PL 1045 - Erianthus saccharoides.
alternans, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 842 = Chrysopogon violascens.
altissimus, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxix. (1836) 2». t. 60=saccharoides.
altissimus, *Hochst. ex A. Br. in Flora,* xxiv. (1841) 277.—Abyss.
amounts, Buese, in Miq. PL Jungh. 360-Pollinia praemorsa.
ambiguus,Geaasa\,ex. Barbey, Consp. Fl. Sard. 190 = Heleropogon hirtus.
ambiguus, Michx. FL Bor. Am. i. 58-Gymnopogon racemosns.
ambiguus, Steud. Syn. PI. Gram. 385 = exaltatus.
amethystinus, *Steud. I. c.* 871.—Afr. trap,
amplectens, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 104.—Afr. austr.
amplexifolius, Trin. in Mem. Acad. Petersb. Ser. VI. ii (1833) 274-Aithraxon ciliaris.
ampliflorus, Steud. Syn. PL Gram. 388=A. Nardus.
amplus, J. Presl, in Kel. Haenk. i. 339=glaucescens.
angustatus, Steud. Syn. i. 370=apricus.
angustifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 184 - Trachypogon angustifolius.
angustifolius, Parl. FL Palerm. i. 269=pertusus.
angustifolius, Sibth. & Sm. Prod. FL Graec. i. 47=A. Ischaemum.
anias, *Llanos, Fragm.* 29.—Ins. Philipp.
annulatus, F. Muetl. Fragm. viii. 123 = sericens.
annulatus, *Forst. Fl. Aegypt. Arab.* 173.—Afr. bor.; Ind. or.; Austral.
annulatus, F. Schmidt, Fl. Ins. Capverd. 157-A. Ischaemum.
annulatus, Schult. Mant. ii. 458 = foveolatus.
annuus, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 137.—Afr. trop.
anomalus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 397.—Arabia.
anthephoroides, Steud. 1. c. 375 = Ischaemum anthephoroides.
anthisterioides, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 468.—Abyss.
anthisterioides, Rupr. in Boll. Acad. Brux. ix. (1842) 245=Ruprechtii.
appendiculatus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 105.—Afr. austr.
apricus, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Petersb.* i. (1888) 70.—Reg. trop.
arctatus, *Chapm. in Coult. Bot. Gat.* iii. (1878) 20.—Florida.
arcuatus, Stend. Syn. PI. Gram. 374 = Ischaemum fasciculatum.
trenarins, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 134.—Uruguay.

ANDROPOGON:—
argenteus, DC. Cat Hort. Monsp. 77 = saccharoides.
argenteus, EIL Sketch, 148=argyreus.
argutus, Steud. Syn. PI. Gram. 391 = Chrysopogon argutus.
argyreus, *Schult. Mont.* ii. 460.—Am. bor.
Ariani, Edgew. in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 208 = A. Iwarancusa.
aristatum, Poir. Encyc. Snppl. i. 585=caricosns.
aristidoides, Steud. Syn. PI. Gram. 397 — Chrysopogon ciliolatns.
aristulatus, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 397 = Chrysopogon Wightianus.
aristulatus, Stend. Syn. PI. Gram. 372 (Ischaemi sp. ?).—Ins. Borbon.
annillaris, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 90.—Ind. or.
Arnottianus, Stend. Syn. PI. Gram. 876-Ischaemum rugosum.
Amottii, *Nees, ex Steud. I. c.* 380.—Ind. or.
aromaticus, Roxb. ex Schult. Mant. 442 = muricatus.
aromaticus, Sieber, ex Schult. 1. c. 481, 888 = A. Schoenanthns.
arrhenobasis, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 460 = Heteropogon arrhenobasis.
arundinaceus, Bag. Desc PI. Cap. 356-Bergii.
arundinaceus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 271 = Sorghum halepense.
arundinaceus, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 706 = Anthistiria gigantea.
asper, Kunth, Rev. Gram. i. 166 - Danthonia papillosa.
asperi/olius, Hack, in Flora, lxviii. (1885) 140 = Zollingeri.
assimilis, Stend. Syn. PI. Gram. 397=Chrysopogon pictus.
astkenos, Steud. 1. c. 376»Ischaemum ciliare.
asthenostachys, Steud. 1. c. 381 = Pollinia articulaU.
astictus, *Buese, in Miq. PI. Jungh.* 860.—Sumatra,
attenuates, *Bertol. in Mem. Ace. Sc. Bolog.* x. (1859) 84 ; *Misc. Bot.* xx. 10. t. 2.—Guatemala.
Aucheri, BOIES. Diagn. Ser. I. v. 77 = Chrysopogon serrulatus.
aureo-fuhus, Steud. Syn. PI. Gram. 373 — Pollinia Cumingii.
aureo-villosus, Steud. Syn. PI. Gram. 380-Pollinia aurea.
aureus, Bory, Voy. i. 367. t. 21 = Pollinia aurea.
australis, *Sprung. Syst. i.* 287.—Austral.; Timor.
avenaceus, Berg. Desc. PI. Cap. 356-Bergii.
avenaceus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 189 = Sorghum halepense.
avenaceus, Michx. Fl. BOT. Am. i. 58 = Chrysopogon " avenaceus.
barbatus, *Linn. PI. Jam. Pugill.* 30; *Mant.* ii. 302 =Chlorisbarbata.
barbigerus, Steud. Syn. PI. Gram. 376 = Ischaemum aristatum.
barbinodis, Lag. Gen. et Sp. Nov. 8=saccharoides.
Barteri, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 124.—Afr. trop.
Bellardi, Bubani, in Nuov. Giom. Bot. Ital. v. (1873) 817 — Heteropogon contortus.
bellariensis, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 123.—Ind. or.
Belvisii, Desv. Opusc. 67= argyreus.
Benthamianus, Steud. Syn. PI. Gram. 882=condensate.
Bergii, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 813.—Afr. austr.
Berteronianus, Steud. & Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 880= saccharoides.
Besseri, Kunth, Rev. Gram. i. 166=Sorghnm vulgare.
besukiensis, Steud. Syn. PI. Gram. 367 = Heteropogon contortus.
biaristatus, Steud. 1. c 879 = Pollinia ciliata.
bieolor, Nees, Fl. Afr. Austr. 113 » dichrous.
bicolor, Roxb. Hort. Beng. 21; Fl. Ind. i. 272 = Sorghum vulgare.
bicqrnis, Benth. PI. Hartw. 263-condensatus.
bicoraU, *Linn. Sp. PI.* 1046.—Am. austr.
bicornis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 173 = A. Schoenanthns.
bifidus, Steud. Syn. PL Gram. 873 - Ischaemum ciliare.
bifoveolatus, Steud. 1. c. 880—pertusus.
Ulinguis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. U. (1833) 262-Elionurus bilinguis.

.ANDROPOGON.—
binatus, Retz. Obs. v. 21 = Spódiopogon pertusus.
binatus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 255 = tenellus.
bipennatus, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 142.—Afr. trop.; Madag.
bisquamulatus, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 245 = Gayanus.
Bladhii, Retz. Obs. ii. 27 = annulatus.
Blumii, Steud. Syn. PI. Gram. 373 = Spodiopogon Blumii.
Boivini, *Steud. 1. c.* 431.—In*. NossiW.
bombycinus, *R. Br. Prod.* i. 202.—Austral.
Bourgaei, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 134.—Mexico.
bourouensis, Steud. Syn. PI. Gram. 382 = Ischaemum digitatum.
brachyatherus, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) 24i.—Abyss,
brachystachyus, *Chapm. Fl. S. Un. St. Suppl.* 668.—Florida.
bracteatus, *Willd. Sp. PI.* iv. 914.—Am. trop.
breviaristatus, Steud. Syn. PI. Gram. 396 => Chrysopogon Wightianus.
brevifolius, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 26.—Geront. trop.
brevis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 268-lateralis.
Brongniarti, *Steud. Norn.* ed. II. i. 90.—Ins. Molucc.
Brownii, Kunth, Rev. Gram. i. 163 = Ischaemum laxum.
Byronis, Steud. Syn. PI. Gram. 398-Spodiopogon Byronis.
Cabanisii, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 133.—Am. bor.
caerulescens, Kunth, Enum. PL i. 504 = Chrysopogon violascens.
caespitosus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 451 = Elionums argenteus.
caespitosus, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 275 = hirtiflorus.
caffrorum, Kunth, Rev. Gram. i. 165 = Sorghum vulgare.
campestris, Kunth, Enum. PI. i. 489-tener.
campestris. *Trin. in Mim. Acad. Petersb.* Sér. VI. ii. (1838) 277.—Bras.
camporum, Trin. ex Steud. Syn. i. 878=campestris.
canaliculatus, *Schum. Beskriv. Guin. PI.* 52.—Guinea.
candidus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 260—Elionuius candidus.
canescens, Kunth, Enum. PI. i. 487-Trachypogon polymorphus.
canus, *Steud. Norn.* ed. II. i. 90.—Mexico.
capensis, Houtt Plant.-Syst. xii. t 98. f. 8 = Chloris petraea.
capillaris, Heyne, ex Steud. Syn. PI. Gram. 116 = Arundinella mutica.
capillaris, *Kunth, Rev. Gram.* i. 166.—Afr. austr.
capilliflorus, Steud. Syn. PI. Gram. 397 = Chrysopogon violascens.
caricosus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1480.—As. trop.; Ins. Mascar.
carinatus, *Nees, Agrost. Bras.* ii. 330.—Bras.
castratus. Griff. Notul. lii. 89 = Arthraxon rude?
caucasicus, Trin. in Mém. Acad. Pétereb. Se>. VI. ii. (1883) 286=intermedius.
caudatus, Bieb. Tabl. Prov. Cdte Occ. Mer Casp. 58 = Erianthus Ravennae.
ceresiaeformis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 109.—Afr. austr.
ceriferus, Hack, in Mart. Fl. Bras. ii. in. 281 = A. Nardus.
cernuus, Kunth, Enum. PI. i. 601-Sorghum halepense.
cernuus, Roxb. Fl. Ind. i. 270—Sorghum vulgare.
chloridiformis, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 412 = Dimeria pilosissima.
chlorostachys, Trin. in Mem. Acad. Pltersb. SeV. VI. ii. (1833) 260 = Elionurus restrains.
chordatus, Stend. Syn. PI. Gram. 898-Spodiopogon Blumii.
chrysatherus, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 443 = sericens.
chrysopus, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 68 — Aucheri.
chrytostacftyus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 377.—Abyss.
ciliaris, Trin. in Mém. Acad. Pétereb. Sér. VI. ii. (1838) 260-Elionurus latiflorus.

A1TDROPOGON:—
dliatus, Ell. Sketch, i. 144-Chrysopogon avenaceus.
cliiatus, Thunb. Fl. Jap. 40=Anthisliria barbata.
ciliolatus, Steud. Syn. PI. Gram. 396 - Chrysopogon serrnlatus.
cinctus, Steud. 1. c. 398 = Chrysopogon violascens.
circinnatus, Hochst. & Steud. ex Steud. 1. c. 387 = laniger.
cirratus, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 119.—Am. bor.
citratus, Hort. ex DC. Cat. Hort. Monsp. 78 = A. Schoenanthus.
citreus, R. Br. Prod. i. 203 = EHonurus citreus.
citriodorus, Hort. ex Desf. Tabl. ed. II. 15 = A. Schoenanthus.
citrosus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 90 = A. Nardus.
clandestinus, Hale, ex Vasey, Gram. Un. St. 19 - Elliottii.
clandestinus, Nees, ex Sleud. Syn. PI. Gram. 388= A. Schoenanthns.
coeruleus, Steud. 1. c. 895 = Chrysopogon serrulatus.
coesius, Nees, ex Hook. & Are. Bot. Beech. Voy. 244 - A. Schoenanthus.
cognatus, Steud. Syn. PI. Gram. 874-schirensls.
coleotrichus, *Steud. 1. c.* 386.—Abyss.
commutatus, Aitch. in Joum. Linn. Soc. xix. (1882) l»l = laniger.
commutatus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 887.—Abyss.
comoroinsis, Steud. 1. c. 431 (=Ischaemi sp.).
comosus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 461 = coleotrichus.
comosus. Link, Hort. Berol. i. 289-annulatus.
compactus, Brot. Fl.Lusit. i. 88 = Sorghum halepense.
condensatus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 188.—Amer. austr.
condensatus, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. (1842) 244 = Chrysopogon irancavillanus.
condylotnichus, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 377.—Abyss.
confertiflorus, Steud. I. c. 385 = A. Nardus.
confinis, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 461.—Abyss.
conjugatus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 260 (Polliniae sp.).—Bengal.
connatus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 464 = A. Schoenanthus.
consanguineus, *Kunth, Enum. PI.* i. 494.—Bras.; Uruguay.
consanguineus, Trin. in Linnaea, x. (1836) 291 = condensatus.
consimilis, Steud. Syn. PI. Gram. 894=serratus.
contortus, Linn. Sp. PI. ii. 1045 = Heteropogon contortus.
contrmersus, Steud. Syn. PI. Gram. 891-Sorghum halepense.
cordatifolius, Steud. 1. o. 376 = Ischaemum conjugation.
cordofanus, Hochst. in Flora, xxvii. (1844; 245 - Gayanus.
Cornucopiae, *Hack. 1. c.* lxviii. (1885) 126.—Afr. trop.
corollatus, Steud. Syn. PI. Gram. 369 — Ischaemum corollatum.
cotuli/er, Thunb. Fl. Jap. 41 = Pollinia cotulifera.
courtallumensis, Steud. Syn. PI. Gram. 877 = Apocopis Wightii.
corassipes, Stend. 1. c. 875 = Ischaemum Sieboldii.
crinitus, Thunb. Fl. Jap. 40-Pogonatherum saccharoideum.
Crupina, Kunth, Rev. Gram. i. 166=Sorghum halepense.
cryptatherus, Steud. Syn. PI. Gram. 376 = Ischaemum australe.
cubensis, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 121.—Cuba.
curtipendulus, Steud. Nom. ed. II. i. 90 - Eutriana curtipendula.
Curtisianus, Steud. Syn. PI. Gram. 890=virginicus.
cuspidatus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 456 — Arthraxon cuspidatus.
cymbarius, *Linn. Mant.* ii. 303.—Afr. trop.; Ind. or.
dactyloides, Steud. Syn. PI. Gram. 881-Trachypogon polymorphus.
debilis, Kunth, Enum. PI. i. 488 - brevifolius.
decolorans, H. *U.* & K. Nov. Gen. et Sp. i. 190 -» Sorghum halepense.
decussatus, Steud. Syn. PI. Gram. 377 = koleostachys.
demissus, *Steud. 1. c.* 388.—Ind. or.
densiflorus, Steud. 1. c. 386 - A. Schoenanthus.

ANDKOPOOON:-

densus, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 8-condensatus.
depauperatus, *Kunth, Rev. Gram.* i. 166.—Bengal.
depressus, Steud. Syn. PL Gram. 873=Spodiopogon depressus.
Oianae, Steud. 1. c.871=Ieucostachyus.
diatherus, Steud. 1. c. 878 = Ischaemum latifolium.
dichroanthus, Steud. 1. c 398 = serratus.
aichroos, *Steud. I. c.* 38!).—Afr. anstr.
digitatus, Hochst ex Steud. 1. c. 382=Trachypogon dactyloides.
digilatus, *Vahl, ex Trin. Fund.* 186.—Hab.!
diplandrus, *Hack, in Flora*, Ixviii. (1885) 128.—Afr. trop.
dissitiflorus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 57=virginicus.
dissitiflorus, Trin. in Mem. Acad. Petersb. Ser. VI. ii. (1883> 267 = consanguineus.
dissolutus, Steud. Syn. PI. Gram. 881=Trachypogon polymorphus.
distachyos, *Linn. Sp. PI.* 1046.—Reg. Mediterr.
distans, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 887-A. Nardus.
dharicatus, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. i. 99 =Arislida Humboldtiana.
O'varicatus, *Linn. Sp. PI.* 1045.—Virginia.
dtversiflorus, Stend. in Zoll. Syst. Verz. 58 = PollinU praemorsa.
domingensis, Foum. Mex. PL Enum. Gram. 61; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 630=leucostachyus.
domingensis, Spreng. ex Stend. Nom. ed. II. i. 91 = Trachypogon polymorphus.
dpmingensis, Steud. 1. c 45=leucostachyus.
Oonianus, Benth. in Hook. Niger Fl. 570-Elionurus platypus.
Dregeanus, Nees. Gram. Afr. Austr. 112 = Schimperi.
Drummondiii, Steud. Syn. PL Gram. 898=Sorghum vulgare.
dubttatus, Steud. 1. c. 394 = Sorghum halepense.
dubius, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 448 = Sorghum halepense.
dubius, Knnth, Rev. Gram.i. 166 = Elionurus restrains,
qulcis, *Burnt, f. Fl. Ind.* 219=Sorghum vulgare.
aurus, Steud. Nom. ed. II. i. 91 = Erianthus strictus.
echmatus, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 182.-Ind. or.
echinatus, Heyne, in Steud. Nom. ed. II. i. 91= Arthraxon laneeolatus.
"ktnulatus, Steud. Syn. PI. Gram. 897-Chrysopogon Oryllus.
elatus, Steud. 1. c. 376=Ischaemum aristatum.
tiegans, J. Gay, ex Steud. 1. c. 864=Elionurus elegans.
*I™*g*ntissimus*, Steud. 1. c.=Elionurus Royleanus.
tlliottii, *Chapm.Fl. S. Un. St.* 581.—Am. bor.
elongatus, Spreog. Syst. i. 287= Chrysopogon elongatus.
elythrophyllus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 878.—Mexico.
"nersus, Fourn. Mex. PL Enum. Gram. 58; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 527=saccharoides.
enantnoides, *F. Muell. Fragm.* x. 75.—Austral.
Erianthus, Link, Hort. Berol. i. 248 = Erianthus saccharoides.
triophorus, Scheele, in Flora, xxvii (1844) 61=virguicus.
eriophorus, Willd. Sp. PL iv. 910=laniger.
'riostackyus, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 8S9 = tematus.
erythrocoleos, *Steud. Syn. PI. Gram.* **391.**—Nepal.
Esenbeckii, Steud. 1. c.375 = Ischaemum aristatum.
eucnemis, *Trin. in Mem. Acad. Pttersb.Six.* VI.. ii. (1833) 275.-Guinea.
«"comus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 104.—Afr. trop. et austr.
exaltatus, *R. Br. Prod.* i. 202.—Austral,
exaratus, *Hack, in Flora*, Ixviii. (1885) 185.—Paraguay.
***cavatus*, Hochst. 1. c. xxix. (1846) 116=A. Schoenanthus.
«ilis, *Hochst. I.e.* xxvii. (1844) 142.—Afr. trop.
txsertus, Steud. Syn. PL Gram. 866 = brevifolius.
falcatui, Steud. 1. c. 869=Ischaemum pectinatum.
{anuliaris, *Steud. 1. c.* 885.—Afr. trop.
fiKacularis, *Roxb. Hort. Beng.* e2 J *Fl. Ind.* i. 269.—Ind. or.
fascicularis, Thw. Enum. PL Zeyl. 487=intermedius.
Mciculatus, Linn. Sp. PL 1047=Chloris radiata.
fasciculatus, Steud. Syn. PL Gram. 882 = Ischaemum fasciculatum.
«stigiat$_{M|}$ $„ *p$_{ro}$i, veg. Ind. Occ.* 26.-Rcg. trop.

ANDROPOaON:—

feensis, Fourn. Mex. PI. Enum. Gram. 62 ; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 527=hirtiflorus.
ferrugineus, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 877 = chrysostachyus.
festucoides, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 340 = squarrosus.
filifolius, *Steud. Syn. PI. Gram.* 374.—Afr. austr.
filiformis, Pers. Syn. i. 103 = caricosus.
filiformis, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 260 = Dimeria ornithopoda.
filipendulus, *Hochst. in Flora*, xxix. (1846) 115.—Afr. trop.; Zeylan.; Austral,
finitimus, *Hochst, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 465.—Abyss.; Ins. Mascar.
firmandus, Steud. Syn. PI. Gram. S70=Pollinia praemorsd.
firmus, Kunth, Enum. PI. i. 486 = Heteropogon firmns.
flabellifonnis, *Roxb. ex Spreng. Pugill.* ii. 9.—Ind. or.
flaccidus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 452= brevifolius.
flavescens, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 389.—Peruv.
flexile, Poir. Encyc Suppl. i. 583 = scoparius.
flexuosus, Nees, ex Stend. Syn. PI. Gram. 388 = A. Nardus.
floridus, Trin. in Mem. Acad. Petersb. Ser. VI. ii. (1883) 265 = brevifolius.
foliatus, Steud. Syn. PI. Gram. 889= A. Schoenanthus.
foveolatus, *Delile, Fl. Egypte*, 160. t. 8. f. 2.—Afr. et As. trop.
fragilis, R. Br. Prod. i. 202'=brevifolins.
fragillimus, Hochst. ex Stend. Syn. PI. Gram. 384 = exilis.
Francavilleanus, Foum. PI. Mex. Enum. it 66; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 530 » Chrysopogon avenacens.
fnlvibarbis, *Trin. in Mem. Acad. Pitersb.* Ser. VI. ii. (1883) 287.—Afr. trop.
fulmcomus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 463 = rufus.
fulvispica, Steud. Syn. PL Gram. 879 = Pollinia Cumingii.
fulvus, *Spreng. Pugill.* ii. 8.—Bengal.
furcatus, Muhl. in Willd. Sp. PL iv. 919=provincialis.
fuscus, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 842-serratus.
Galcottii, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 56 ; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am.* iii. 527=Chrysopogon nutans.
galloinsulanus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 371.—Ins. Mascar.
garipensis, Stend. 1. c. S79=annulatus.
Gayanus, *Kunth, Rev. Gram.* i. 168;—Senegal.
geniculatus, Steud. Syn. PL Gram. 376 = Ischaemum aristatum.
Gerardi, Vitm. Summa PL vi. 16=provincialis.
gibbus, Stend. Syn.Pl.Gram. 376—Ischaemum aristatnm.
Gidarba, *Buch.-Ham. in WalU Cat.* n. 8797 —Ind. or.
giganteus, Fenzl, ex Steud. Syn. PL Gram. 8b6~A. Iwarancusa.
giganteus, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 242 = A. Schoenanthus.
giganteus, Tenore, Fl. Nap. v. 285 =• Heteropogon hirtns.
glaber, Roxb. Hort. Beng. 7; Fl. Ind. i. 271=intermedins.
glabratus, Steud. Nom. Bot ed. II. i. 91=Pollinia glabrata.
glabratus, Stend. Syn. PL Gram. 895—Chrysopogon Gryllns.
glabrescens, Hochst. ex Steud. 1. c. 374=polyatherus.
glabriusculus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 468.—Abyss.
glaucescens, Foum. PL Mex. ii. 60; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 627, partim-Bourgaei.
glaucescens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 186.—Am. austr.
glaucescens, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 39 = virginicus.
glaucopsis. Ell. ex Steud. Nom. ed. II. i. 91 - macrourus.
glaucopsis, Steud. Syn. PL Gram. 897 =montanus.
glaucus, Muhl. Descr. Uber. 278 = macrourus.
glaucus, Retz. Obs. v. 20 = Apluda mutica.
glaucus, Torr. in Ann. Lye N. York, i. (1824) 157-saccharoides.
Glaaovii, *Hack, in Mart. Fl. Bras*, it III. 286.—Rio de Janeiro.
Goeringi, Steud. in Flora, xxix. (1826) 22 = A. Nardus.
gracUipes, *Hade, in Flora*, Ixviii. (1886) 120.—Paraguay.

AKDBOPOaON.—

gracilis, *J.* Presl, in Rel. Haenk. i. 886-tener.
gracilis, *Spreng. Syst.* i. 284.—Ind. occ.
grandiflorus, *Hack, in Flora*, Ixviii. (1885) 127.—Aïr. trop.
grandis, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 39U~A. Nardus.
Grayia, Steud. Nom. ed. II. i. 91=pseudograya.
Griffithsiae, Steud. Syn. PL Gram. 375»Ischaemum rugosnm.
Grisebachii, Steud. I. c. 365 = Elionurus Royleanus.
Gryllus, Linn. Cent. PL ii. 33=Chrysopogon Uryllns.
guianensis, Steud. Syn. PL Gram. 382=Ischaemum guianense.
guineensis, Schum. Beskr. Guin. PL 51 = Gayanns.
Haenkei, *J.* Presl, in Kel. Haenk. i. 340=intermedius.
halepensis, Brot. Fl. Lusit. i. 8!)=Sorghum halepense.
Hallii, *Hack. inSittb. Acad. Wien*, lxxxix. (1884) 127.—Am. bor.
hamatulus. Hook. & *Am.* Bot Beech. Voy. 344 - A. Nardus.
hamulatus, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 388 = A. Nardus.
hermaphroditum,*Yonn.in.Mem.* Acad. Toul. iii. (1788) 308=Stipaaristella.
heteranthus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 370.—Hab. ?
htteranthus, Trin. exSteud. Nom. ed. II. i. 91 = bicornis.
heteroclitus. *Nees,Fl. Afr. Austr.* 115.—Ind. or.
hexastachyus, Steud. Syn. PL Gram. 380=Pollinia argenlea.
Hildebrandtii, *Hack, in Flora*, Ixviii. (1885) 141.—Madag.
himalayensis, Steud. Syn. PL Gram. S77 = Apocopis Royleanus.
hirsutus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 186=saccharoides.
hirtiflonUrKunrA, *Rev. Gram.* ii. 569.1.198.—Am. trop.
hirtifolius, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 338.—Mexico.
hirtinoides, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (188U) 657 = Ischaemum hirtinodes.
hirtus, Linu. Sp. PL 104.6 = Heteropogon hirtus.
hispidissimus, Steud. Syn. PL Gram. 367 = Heteropogon contortus.
kispidus, Willd. Sp. PI. i». 908 = Arundinella brasiliensis.
Hochstetteri, Steud. Syn. PL Gram. 384 - fastigiatus.
Hohenackeri, Hochst. ex Steud. 1. c 868=Heteropogon contortus.
holcoides, Kunth, Rev. Gram. ii. 49. t. 160=Sacchanim holcoides.
Humboldtianus, Steud. Syn. PL Gram. 392 = Chr}Sopogon avenaceus.
humilis, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 453.—Abyss.
humilis, Wright, ex Steud. Syn. Gram. i. 388 - demissus.
hypogynus, *Hack, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 2JO.—Bras.
imberbis, *Hack, in Flora*, Ixviii. (1885) 119.—Paraguay.
imberbis, Steud. Syn. PL Giam. 875 = Ischaemum aristatum.
importunus, *Steud. 1. c.* 382.—China.
incertus, Stend. 1. c. 375 = Ischaemum ciliare.
incomplete, *J.* Presl, in Rel. Haenk. i. 342 = Chrysopogon nutans.
increscent, Steud. Syn. PL Gram. 896=Chrysopogon serrulatus.
incurvatus, Koen. ex Trim in Spreng. Neue Entdeck. ii. 91=caricosus.
incurvatus, *Retm. Obs.* v. 21.—Ind. or.
inermis, Steud. Syn. PL Gram. SU0 = spathifloius.
infirmus, Steud. 1. c. 369 = Ischaemum fragile.
insculptus,*Andeta.* in Schweiof. Beitr. M. Aethiop. 31C — Ischaemum laxum.
insculptus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 458 = pertusus.
insularis. Linn. PI. Jam. Pugill. 30; Syst. ed. X. 1304 = Pnnicum leucophaeum.
intermedius, *R. Br. Prod.* i. 202.—Oriens; Afr. et As. trap.; Austral.
intonsus, Nees, Fl. Afr. Austr. 114=]epidus.
intortum, Crantz, Inst. i. 398 = Sporobolus indicus.
intrans, *F. Muell. Census*, 132.—Austral.
inundatus, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1862) 44 - intermedius.
involucratus, Koen. ex Steud. Nom. ed. II. i. 91 = Apluda aristata.
involutus, Steud. Syn. PL Gram. 873=Spodiopogon anguitifolius.

AUDBOPOGON :—
Ischaemum, *Linn. Sp. PI.* 1047.—Ear.; As. et Afr. trop. et temp.
Ischaemum, Thnnb. Fl. Cap. i. 108 —appendicnlatus.
ischyranthus, Steud. Syn. PI. Gram. 867 = triticeus.
Iwarancusa, Boiss. Fl. Orient, v. 460 = A. Schoenanthus.
Iwarancusa, Nees, Fl. Afr. Austr. 117 =. A. Nardus.
Iwarancusa, *Roxb. in Phil. Trans,* lxxx. (1790) 284.—Ind. or.; Afr. trop.
Jamesii. Torr. in Marc. Rep. (1852) 302-saccharoides.
Javanicus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 448.—Java.
javanicus, Steud. Syn. PI. Gram. 896 —Chrysopogon aciculatus.
jubatus, Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) 322 --sericeus.
junceus. *Rich, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 91.—Ins. S. Domingo,
juncifolius, *Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ.* 9.—Ins. S. Cruz.
Koenigii, Raeusch. Nom. ed. III. 293 = caricosus.
koleostachys, *Steud. Syn. PI. Gram.* 376.—Ins. Mascar.
koretrostachys, Trin. in Me'm. Acad. Pétersh. Sir. VI. ii. (18S3) 27S = Pollinia articulate.
lachnatherus, Benth. Fl. Austral, vii. 584= filipeudulus.
laguri/ormis, Giiseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) S09 = saccharoides.
laguroides, DC. Cat. Hort. Monsp. 78 = saccharoides.
lanatus, R. Br. Prod. i. 202 =exaltatus.
lanceolatus. Baker, FL Maur. and Seyén. 414 - Arlbiaxaa cuspidatus.
lanceolatus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 262 = Arthraxon lanceolatus.
lancifolius, Trin. in Me'm. Acad. Pétersb. *Sir.* VI. ii. (1x33) 271 = Arthraxon microphyllus.
laniger, *Desf. Fl. Attant.* ii. 379.—Oriens; Ind. or.; Afr. bor.
laniger, Munro, in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 409 = Spodiopogon laniger.
lanuginosus, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. i. 187 = leucostachyus.
lasiocoleus, Steud. Syn. PL Gram. 388 = Arthraxoa cilUris.
lateralis, *Nees, Agrost. Bras,* iL 329.—Am. trop.
latjflorus, Steud. Syn. PL Gram. 364 = Elionurus latinorus.
lati/olius, Knnth, Rev. Gram. L 166 = Centotheca lappacea.
lati/olius. Sprang. Syst L 286 = Ischaemum latifQlium.
laxiflorus, Steud. Syn. PI. Gram. S80 = Trachypogon polymorphus.
laxus, Roxb. Hort. Beng. 7 ; Fl. Ind. ed. Carey, i. 271 = Sorghum halepense.
lax-us, Willd. Sp. PL iv. 907-serratns.
Lechleri, Stend. ex Hack, in Mart. FL Bras. ii. in. 297 = condensatus.
lepidus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 113.—Abyss.
leptanthus, Stend. Syn. PL Gram. 391 = intermedius.
leptocladus. *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 122.—Paraguay,
leptocomus, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sir. VL ii. (1883; 264.—Sierra Leone.
leptophyllus, Trin. 1. c-tener.
leptos, Steud. Syn. PL Gram. 897 = tener.
leptostachyus, Benth. in Hook. Niger Fl. 571-semiberbis.
Leschenaultianus, Decne. Herb. Timor. Descr. 29 = Pollinia Cumingii.
leucopogon, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 694 = saccharoides.
leucostachyus, *H. B. & K. Nov. Gen. «t Sp.* i. 187 — Am. trop.
Lhotskyi, Steud. Syn. PL Gram. i. 384 = condensatus.
lianatherus, Steud. 1. c. 367 = Heteropqgon insignis.
Liebmanni, *Hack, in Flora,* lxviii. (18K5) 132.—Mexico.
ligularis, Kunth, Emim. PL i. 497 —Trachypogon polymorphus.
Lindeni, Steud. Syn. PL Gram. 389 = apriens.
lineatus, Steud. 1. c. 369 — Ischaemum laxum.
lithophilus, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Seł. VI. ii. (1833) 277.—Bras.
lividus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 367.—Ind. or.
lodicularis, Steud. Syn. PL Gram. 376-Ischaemum anstatnm.
lolioides, Fourn. Mex. PL Enum. Gram. 62 ; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 528 = scoparius.
longiberbis, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 131.—Florida.

ANDBOFOaON :—
longipes. *Hack. 1. c.* 138.—Ind. or.
Louisianae, Steud. Syn. PL Gram. 883 = virginicus.
macer, Steud. 1. c. 371.—' Mont, cerul.'
Macraei, Stend. 1. c. 377 = Ischaemum ciliare.
macroglossus, Steud. 1. c. 368 = Trachypogon polymorphus.
macrolepis, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 125.—Afr. trop.
macrostachyus, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Acthiop. 310 —Ischaemnm laxum.
fiuzCT0£Arx'.x,Foum.Mex. Pl.Enum.Gram. 60; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 628 - Liebmanni.
tnacrothrix, Trin. in Me'm. Acad. P&ersb. Sér. VI. ii. (1833) 270 = teraatus.
macrourus, *Michx. Fl. Bor. Am.* 1. 58.—Am. bor.; Mexico.
madagascariensis. Hack, in Flora, lxviii. (1885) 136 = trichozygus.
malacophyllus, Hochst. ex Stend. Syn. PL Gram. 372 = Ischaemum ciliare.
malaeostachyus, Fourn. PL Mex. PL Enum. Gram. 62; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 528 = hirtiflorus.
malaeostachyus, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 837.—Am. centr.
Mannii. *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 232. —Fernando Po.
marginatus, Steud. in Flora, xii. (1829) 472 = A. Nardns.
Atariannae, Steud. Syn. PL Gram. 382 = Ischaemum digitatum.
maritimus, Chapm. Fl. S. Un. St. Suppl. 668 = scoparius.
Martini, Roxb. Hort. Beng. 7; Fl. Ind. i. 280-A. Scboenanthn».
Martini, Thw. Enum. PL Zeyl. 367 = A. Nardus.
medius, Steud. Syn. PL Gram. 382 —Ischaemum intermedium.
megapotatnicus, Spreng. Syst. iv. Car. Post. 38 = Trachypogon polymorphus.
melanocarpus, til. Sketch, i. 146 — Heteropogon acuminatus.
messanensis, Biv. ex Parl. Fl. Ital. i. 148 = Heteropogon conlortns.
Meyenianus, Stend. Syn. PL Gram. 375 —Ischaemum aristatum.
micans, Steud. L c. 882— Arthraxon cuspidatus.
micranthus Kunth, Rev. Gram. i. 165 = Chrysopogon violascens.
microphyllus Trin. in Me'm Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 276-Arthraxon microphyllus.
microstachyus, *Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ.* 8. —Ind. occ.
miliaceus, *Roxb. Hort. Beng.* 7 i *Fl. Ind. 1*276.—Ind. or.
mili/ormis, Schult. Mant ii. 448 = praec.
Minarum, Kunth, Enum. PL i. 507 = Chrysopogon stipoides.
minor. Stead. Syn. PL Gram. 877 = Ischaemum Urvilleanum.
minutiflorus, Steud. I.e. 879 = Pollinia argentea.
mollicomus, Kunth, Rev. Grain, i. 365. t. 96 = caricosus.
mollis, Kunth, 1. c. ii. 561. 1.195 = Trachypogon polymorphus.
monandrus, Roxb. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. i. 264 = Pogonatherum saccharoideum.
monatherus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 462.—Abyss.
monostachys, Spreng. Pugill. ii. 9 = foveolatus.
monastachyus, Steud. Syn. PL Gram. 309 — Ischaemum aristatum.
montanus, Koen. ex Trin. in Spreng. Neae Entdeck. ii. 93 = Chrysopogon montanus.
montanus, Nees, in Nov. Act. Nat. Cnr. xix. SuppL I. (1843) 188 = micranthus.
montanus, *Roxb. Hort. Beng.* 82; *Fl. Ind.* i. 271-Chrysopogon pictus.
monticolus, Schult. Mant iii. 665 —Chrysopogon montanus.
Montu/ari, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 184 = Trachypogon polymorphus.
Muehlenbergianus, Schult. Mant iL 455 — argyreus.
multicanlis, Steud. Syn. PI. Gram. 383 = Arlhraxon microphyllus.
multinervis, Hochst. ex Steud. 1. c. 374 = polyatherus.
muricatus, Retz. Obs. iii. 43 — squarrosus.
murinus, Steud. Syn. PL Gram. 877 = Ischaemum murinum.
muticus, Liin. Sp. PL ed. II. 1482 = Chloris petraeal
muticus, Sleud. Syn. PI. Gram. 374 = Ischaemum muticum.

ANDROPOGON :—
Myosurus, Hack, in Mart. Fl. Bras. ii. III. 300-hixtiflorus.
Myòsurus, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 337.—Mexico.
nardoides, Xees, Fl. Afr. Austr. 116 = A. Suhoenanthus.
Nardus, *Linn. Sp. PI.* 1046.—Reg. trop.
Nardus, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 90 = A. Schoenanthus.
Neesi, *Kunth, Enum. PI.* i. 491.—Bras.
Neesii, Trin. in Mém. Acad. Pétcrsb. Sér. VI. ii. (18SS) 2«3 = tener.
nemophyllus, Steud. Syn. PI. Gram. 377 = Ischaemum filiforme.
nervatus, Hochst. in Flora, xxvii. (1814) 243 = A. Schoenanthus.
nervosus, Roltl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (lcO3) 218 = Ischaemum laxum.
Newtonii, *Hack, in Bol. Soc. Broter.* iii. (1885) 137.—Angola.
niger, Kunth, Rev. Gram. i. 164 = Sorghum vulgare.
nigritanus, Benth. in Hook. Niger Fl. 573 = squarrosus.
nitens, Schreb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 92 = serratus.
nitidus, Kunth, Rev. Giam. i. lt!0 = serratus.
nodulibarbis, Hochst. ex Steud. Syn. PL Gram. 896 — Chrysopogon Amottianus.
nodulosus, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 116.—Afr. trop.
notopogon, Steud. Syn. PL Gram. 373=Spodiopogon angustifolius.
nudus. Steud. 1. c. 383 = Arthraxon ciliaris.
Nuttallii, Chapm. H. S. Un. St. 580 = Elionuros tripsacoides.
nutans, *Linn. Mant.* ii. 303 = Anthistiria ciliata.
nutans. Linn. Sp. PL 1045 = Chrysopogon nutans.
nutans, Muhl. Descr. Ubcr. 2c4 = avenaccus.
obliquiberbis, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 117.—N. Caledon.
obtusi/olius, Poir. Encyc Suppl. i. 583 = lirevifolius.
obtusus, Nees, in Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 243 — Annul til us.
obvallatus, Sieud. Syn. PI. Gram. 373 = Spodiopogon angustil'olius.
odoratus, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 92 = squarrosus.
oliganthus, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 368.—Ind. or.
oligostachyus, Chapm. Fl. S. Un. St. 581 = hirtiflorus.
Olivieri, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 76 = laniger.
orthos, Schult. Mant. ii. 455 —foveolatus.
pachnodes, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 284 = A. Schoenanthus.
paleaceus, Steud. Syn. PI. Gram. 876 = Apocopis Royleanus.
pallidus, Kunth, Rev. Gram. i. 165 = Chrysopogon Gryllus.
paniceus, Steud. Syn. PL Gram. i. 375 = Ischaemum intermedium.
paniculatus, Kunth, Enmm. PL i. 494 = condensatus.
paniculatus. Lam. Fl. Fr. iii. 633 = Chrysopogon Gryllus.
panormitanus, Parl Fl. Ital. i. 140 = pertusus.
papillipes, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 460. —Abyss,
papillosus, *Hochst. ex A. Rich. 1. c.* 457.—Afr. trop.
parviflorus, Roxb. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. i. 277 = brevifolius.
pantispica, Steud. Syn. PL Gram. 397 = Chrysopogon violascens.
patentivillosus, Steud. 1. c. 873 = Ischaemum ciliare.
patulus, Moench, Meth. 180 = A. Ischaemum.
pauciflorus, Salzm. ex Steud. Syn. PL Gram. 371 — virginicus.
pectinatus, *Steud. I. c.* 369 = Ischaemum pectinatum.
pedicellatus, Steud. 1. c 394 = serratus.
peduncularis, *Kunth, Rev. Gram.* i. 106.—Ind. or.
peduncularis, Baker, Fl. Maur. 444 = A. Alopecuras.
pendulus, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 368-A. Nardus.
peninsulae, Steud. 1. c. 396 = Chrysopogon Amottianus.
pennatus, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 92 = laiiucinosus.
per/oratus, Trin. ex Fourn. Mex.- PL Enum. Gram. 6'J, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 529=saccharoides.

ABDBOPOQO1T:-

per/ossus, Nees & Meyen, ex Stend. Nom. ed. II. i. 92 =intermedius.
pertusns, *Willd. Sp. PL* iv. 921—Sidl.; As. et Afr. trop.; Austral.
petiolaris, Steud. Syn. PL Gram. 898 « PollinU Lehmanni.
Petitianus, Balansa, in Ball. Soc. Bot. FT. six. (1872) 322=obliquiberbis.
Petitianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 461-exilIs.
pilifer, Steud. Syn. PI. Gram. 378 = pilosns.
Pilosns, *Klein, ex Willd. Sp. PL* iv. 920.—Ind. or.
pilosus, Sieber, ex Kunth, Lnum. PL i. 514 = Ischaemum .Utifolium.
Piptathenis, *Hack, in Mart. Ft. Bras.* ii. III. 298.—Bras.
Plagiofius, Hochst. ex Stend. Syn. PI. Gram. 874 = Polyatherus.
Platypus, Trin. in Mém. Acad. Pétereb. Sér. VI. ii (1883) 2tJl = EHonmni8 platypus.
plnnosus, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 918 = Tiachypogon polymorphus.
Podotrichus, Hochst ex Steud. Syn. PL Gram. 884 = Heteropogon hirtus.
Poecilotrichus, *Hack, in Bol. Soc. Broter.* iii. (1885) 138.—Afr. trap.
pogonanthus, Boiss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. FT. T. (1858) 188=Spodiopogon pogonanthus.
Pohlia$_{nU8j}$ *Hack, in Mart. Fl. Bras.* ii. Hi. 804.—Bras.
Polyatherus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss*, ii. «5.-Abyss.
Polydartylon, Linn. Atnoen. Acad. v. 412; Sp. PI. ed. . II. 1488 = Chlorispolydactyla,
Polymorphus, Steud. Syn. PL Gram. 875=Ischaemum nvuticum.
Polyneuros, Steud. 1. c. 885=A. Schoenanthus.
Po'yptychos, *Steud. I. c.* 380.—Zeylan.
P°lystachyus, Roxb. Hort. Beng. 82 ; FL Ind. L 265 = Heteropogon contortus.
Polystichus, Hochst. ex Steud. Syn. PL Gram. 369 = Heteropogon acuminatus.
£ʳ«i, Kunth, Ennm. PL i. 489 = tener.
Pnnceps, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 47O = TheIe-Pogon elegans.
Pnonodes, Steud. Syn. PL Gram. 383 = Arthraxon l»nceolatus.
P"Kerus, F. Muell. Fragm. viii. 124 = filipendulns.
PWcerus, *R. Br. Prod.* i. 202.—Austral.
Productus, Regel, in Bull. Acad. P&ersb. x. (1866) 878 ^Polliniatenuis.
Pnpinquus, Kunth, Enum. PL i. 502 - Sorghum oalepense.
Prostrates, Linn. Mant. ii. 304 = Anthistiria prostrata.
Provincialis, Rett Obs. iii. 48 = Chloris radiata.
P/ovincialis, *Lam. Encyc.* i. 376.—Europ.; Am. bor.
Pnximus, Hoch»t. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, n. 464 = A. Iwarancnsa.
Pruinosus, Nees, ex Stend. Syn. PL Gram. 388=A. fccnoenthus.
Psendograya, *Steud. 1. c.* 865.—Zeylan.j China; Madag.
*P**<lohirtus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 471 = A. Nardns.
Pseodoischaemum, *Nees, tx Steud. Syn. PI. Gram.* 380.—Ind. or.
*P*6escens*, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew, ed. I. iii. 428 ^Chloris ciliata.
P-fescens, Visiani, in Flora, xii. (1829) '• E* ⁸ = Heteropogon hirtus.
P«iescens, Willd. ex Kunth, Enum. PI. i. 498 = niollicomis.
Puiiftorus, Foum. Mex. Fl. Enum. Gram. 57; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 52!) -hirtifolius.
D. Don, in Hook. Niger Fl. 671.-Afr. trop.
P^Uus, *Roxb. Hort. Beng.* 7i *Ft. Ind.* i. 277.-«d. or.
P"«ctatus, Roxb. 11. cc 82, 268 = Intermedius.
*P*rpurascens*. Muhl. ex WUld. Sp. PI. W. 918 = •eoparius.
P«!pureo-sericeus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* 11. 469.—Abyss.
P"«illus. *Hook.f. in Journ. Unn. Soc.* viL (1864) 283.—Afr. trop.
Wadrivalvh, Linn. Syst. ed. XIII. 788-Anthittiria ciliata.

AXTDROPOGON:—

Quartinianus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 469.—Abyss.
quinqueplumis, Hochst. ex A. Rich. 1. c 460-Chrysopogon serrulatus,
radicans, Lehm. Ind. Hort. Hamb. (1828); ex Kunth, Enum. PI. L 499=A. Ischaemum.
racetnosus, Poir. ex Steud. Nom. ed. I. 412, in syn. = ramosus.
ramosus, Blanco, FL Filip. ed. I. 37=Ischaemum ciliare.
ramosus, *Forsk. Ft. Aegypt. Arab.* 173.—Aegypt.; Arab.
Ravennae, Linn. Sp. PL ed. II. 1481 - Erianthus Ravennae.
reconditus, Steud. Syn. PL Gram. 888 =• Gayanus.
rectirhachis, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 61; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am.* iii. 529.—Mexico.
rectus, Steud. Syn. PI. Gram. 889=A. Nardns.
refraclus, *R. Br. Prod.* i. 202.—Ins. Molncc. et Pacific; Austral.
relictus, Steud. Syn. PL Gram. 877—Ischaemum muticum.
repens, Steud. 1. c. 374-Ischaemum muticum.
RetBii, Steud. 1. c. 376 = Ischaemum ciliare.
rhiiophorus, Steud. 1. c. 881=Spodiopogon albidus.
Riedelii, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VI. ii. (1833) 263.—Am. austr.
Robertianus, Steud. Syn. PL Gram. 369-Ischaemum laxum.
rostratus, Trin. in Mém. Acad. Pe'tersb. Sér. VI. ii. (Ifc33) 261 = Elionurus rostratus.
rottboellioides, Steud. Syn. PL Gram. 382 = Rottboellia ophiuroides.
Roxburghianus, Schult Mant. ii. 451=Dimeria omithopoda.
Roxburghii, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 895 = A. Nardus.
Royleanus, Steud. 1. c. 397=Chrysopogon Gryllus.
rubens, Kunth, Rev. Gram. i. 164 = Sorghum vnlgare.
rudis, Steud. Syn. PL' Gram. 383 = Arthraxon rudis.
rufidulus, Steud. 1. c. 392 = Chrysopogon avenaceus.
rufispica, *Steud. I. c.* 379.—Java,
rufus, *Kunth, Enum. PL* i. 492.—Afr. trop.; Bras.
rufus. Rich, ex Kunth, 1. c 478=Saucharum cayennense.
rugosus, Steud. Syn. PL Gram. 376»Ischaemum rugosum.
Ruprechtii, *Hack, in Flora*, lxviiù (1885) 126.—Afr. trop.; Mexico.
saccharatus, Kunth, Enum. PL i. 502 = Sorghum vnlgare.
saccharatus, Roxb. Hort. Beng. 7; Fl. Ind. i. 274 = Sorghum vulgare.
saccharoides, *Sv. Prod. Veg. Ind. Occ.* 26.—Am. temp, et trop.
ganguinarius, *Schreb. Beschr. Graes.* ii. 48.—Afr. hor.
scaberrimus, Kunth, Enum. Fl. i. 504=Chrysopogon nutans.
scabriflorus, *Rupr. ex Hack, in Mart. Fl. Bras.* ii. Hit 2H9.—Bras.; Paraguay.
scandens, Roxb. Hort. Beng. 7; FL Ind. L 262 = annulatus.
Schaffneri, Griseb. ex Fourn. Mex. PL Enum. Gram. 57; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 529 = hirli. folius.
schangulensis, Rupr. ex Steud. Syfe PI. Gram. 889 = Ischaemum laxum.
Schimperi, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ir. 466.—Abyss.
schirensis, *Hochst. I. c.* 456.—Abyss.
Schlumbergerii, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 59, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am.* iii. 629.—Mexico.
Schoenanthus, Benth. FL Austral, vii. 584 = A. Nardus.
Schoenamhus, *Linn. Sp. PL* 1046.—As. et Afr. trap, et subtrop.
Schoenanthus, Thunb. Fl. Cap. i. 108; Wall. PL As. Rar. t. 2bO = A. Nardus.
Schottii, *Rupr. ex Hack, in Mart. FL Bras.* ii. III. 299.—Am. trop.
Schweinfurthii, *Hack, in Flora*, Ixviii. (1885) 118.—Afr. trop.
scoparius, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 57—Am. bor.; Mexico.
scoparius, *J.* Presl, in Rel. Haenk. i. 838=condensatus.
scrobiculatus, Kunth, Enum. PL i. 507 - Heteropogon acuminatus.

ANDKOPOOOKT:—

secundus, Kunth, Enum. PL i. 487 = Trachypogon polymorphus.
secundus, Willd. ex Nees, Agrost. Bras. 304 = Heteropogon contortus.
segaenensis, Steud. Syn. PL Gram. 367 = Heteropogon acuminatus.
segetum, Steud. 1. c. 876=Ischaemum rugosum.
Sehima, Steud. 1. c. 869=Ischaemum laxum.
semiberbis, *Kunth, Enum. PL i.* 489.—Afr. et Am. trap.
semisagittatus, Steud. Syn. PI. Gram. 376 = Ischaemum semisaiittatun).
sennarensis, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 243 = A. Iwarancusa.
sericeus, *R. Br. Prod.* i. 201.—Malaya; Austral.
serratus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 290 = Chrysopogon violascens.
serratus, Retz. Obs. v. 21=caricosus.
serratus, *Thunb. Fl. Jap.* 41.—As. et Afr. trop.; Austral.
serrulatus. Link, Enum. Hort. Berol. i. 241=Arthraxon lanceolatus.
setifolius, *Kunth, Rev. Gram.* i. 166.—Afr. austr.
setosus, Griseb. Cat PL Cub. 235=Chrysopogon avenaceus.
sibiricus, Steud. Syn. PL Gram. 898 = Spodiopogon sibiricus.
simillimus, Steud. 1. c. 878 = Ischaemum ciliare.
simplex, *Schum. Beskr. Guin. PL* 49.—Afr. trop.
sinaicus, Del. Ind. Sem. Hort. Monsp. (1836); et in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 2»5 - Heteropogon hirtus.
Smithianus, *Hook. f. in fourn. Linn. Soc.* vii. (1864) 232.—Afr. trop.
Sorghum, Brot. Fl. Lusit. i. 88-Sorghum vulgare.
spathaceus, Trin. Fund. Agrost. 186 = macrourus.
spnthiflorus, *Kunth, Enum. PI.* i. 406.—Bras.
speciosus, Hort. Goett. ex Steud. Nom. ed. II. i. 93 = saccharoides.
speciosus, Steud. Syn. PL Gram. 375-Rottboellia speciosa.
spicatus, Steud. Nom. ed. IL i. 98=Trachypogon polymorphus.
Sprengelii, Kunth, Rev. Gram. i. 166=Chrysopogon montanus.
squamulatus, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 244 = Gayaaus.
squarrosus, Koan. ex Kunth, Enum. PL i. 126 = Panicum abortivum et paludosum.
squarrosus, *Linn.f. Suppl.* 433.—Reg. trop.
stenophyllus, Roem. & Schult. Syst. ii. 818«Trachypogon angustifolius.
stipaeformis, Steud. Syn. PI. Gram. 377 = Dim£ria ornithopoda.
stipoides, *Cham. V Schlecht. in Linnata*, vi. (1881) 89 = Chrysopogon Francavillanus.
stipoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 189=Chrysopogon arenaceus.
stipoides, Kunth, Enum. PI. i. 487-Trachypogon polymorphus.
stipoides, Steud. Syn. PI. Gram. 368= Trachypogon polymorphus.
stipoides, Trin. in Mém. Acad. Pe'tersb. Se>. VI. ii. (1883) 288 = Chrysopogon avenaceus.
striatus, Klein, ex Willd. Sp. I'l. iv. 90S - Ischaemum laxum.
strictus. Host, Gram. ii. 2. t 2-Erianthus Hostii.
strictus, Roxb. Hort. Beng. 82; FL Ind. i. 265 - foveolams.
subglabreseens, Stend. Syn. PL Gram. 893-Sorghum vulgare.
submembranaceus, *Steud. I. c.* 481.—Ins. Mascar.
submuticus, Steud. 1. a 382 = Arthraxon ciliaris.
subrepens, Steud. 1. c. 397 = montanus.
subtilis, Stead. 1. c. 896=Chrysopogon subtilis.
subulatus, J. Presl, in Rel. Hacnk. i. 341-Chrysopogon aciculatus.
subunifoveolatus, Steud. Syn. PI. Gram. 380 «= nertusus.
superciliatus, *Hack, in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 239.—Austral.; Timor.
Tabina, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56=hirtiflorus.
tacaiensis, Steud. Syn. PL Gram. 369 - Ischaemum laxum.
tahitensis. Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 72 = refractus.

AMDBOPOGOIT:—
Tamba, Hochst ex Steud. Syn. PI. Gram. 385 = lepidus.
tectornm, *Sckum. & Thonn. Beskr. Guin. PI.* 49.—Guinea.
tenellus, J. Presl, in ReL Haenk. i. SS5 =brevifolius.
tenellus, *Roxb. Hart. Beng.* 6; *Fl. Ind.* i. 259.—Bengal,
tener, *Kunth, Rev. Gram.* ii. S65. >t 197.—Am. bor. et austr.
tenuiculus, Steud. Syn. PI. Gram. 371=sericeus.
tenuifolius, Steud. 1. c. 8S5 = Elionnrus argenteus.
tenuipedicellatus, Steud. 1. c 398 = australis ?
tenuirachis, Foum. Mex. PL Enum. Gram. 5b ; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. iii. 529=saccharoides.
tenuis, R. Br. Prod. i. 201 = Heteropogon contortus.
ternarius, Bertol. Bot. Misc. xi. 14 -= provincialis.
ternarius, Desv. Opusc. 68=squarrosus.
ternarius, Michx. Fl. Bor. Am. i. 57 --provincialis J
tematas, *Nees, Agrosi. Bras.* ii. 826.—Am. austr.
telrastachyus, Ell. Sketch, i. 150=virginicus.
Thunbergii, Kunth, Rev. Gram. i. 166 = Danthooia livida.
thymiodorus, Steud. Syn. PL Gram. 365=Elionurus thymiodorus.
timorensis, Steud. 1. c. 376=Spodiopogon Blumii.
tomentellus, Steud. 1. c371=Gayanus?
Tong-Dong, Steud. 1. c. 876 = Ischaemum rugosum.
Torreyanus, Steud. Nom. ed. II. i. 9S=saccharoides.
tortus, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 92 = Trachypogon polymorphic.
trachypus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 280 = bracteatus.
trichozygus, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1884) 300.—Madafj.
tridentatus, Hochst. Jn Flora, xxvii. (1844) 246 = Gayanus.
tridentatus, Roxb. Hort. Beng. 82 ; Fl. Ind. i. 261 = Apocopis trjdentata.
Trinii, Steud. Syn. PL Gram. 395 = Chrysopogon serrulatus.
tripsacoides, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 92; et Syn. PL Gram. 364=Elionuras tripsacoides.
trispicatus, Schult. Mant. ii. 452 = Pollinia argentea.
tristackyos, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. '261 = Pollinia argentea.
tristachyus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 187 = glaucescens.
triiiceus, R. Br. Prod. i. 201 = Heteropogon insignis.-
triticiformis, Stend. Syn. PL Gram. 876 •> Ischaemum triticeum.
tropicus, Kunth, Fnum. PL i. 503=australis.
tropicus, Spreng. Syst. i. 287 = serratus.
truchmenorum, Walp. Ann. iii. 801=Sorghum vulgare.
truncatus, Stend. 1. c. 368 - Trachypogon polymorphus.
tumbackianus, *Roxb. ex Kunth, Enum. PL* i. 507, *in syn.*—Afr. austr.
tumbuckianus, Steud. Nom. ed. II. i. 93-praec.
umbrosus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 467 •= lepidus.
undatus, Jacq. Coll. iii. 237=Oplismenns Jacquini.
undulatus, Pers. Syn. i. 105 = annulatus.
urceolatus, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 115.—Afr. centr.
Urvilleanus, Stend. Syn. PI. Gram. 876 = Ischaemum Urvilleanum.
usorum, Steud. 1. c. 392 =Sorghum vulgare.
Vachcllii, Nees. ex Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 243 = intermedius.
vaginatus, Ell. Sketch, 148=virginicus.
vaginatus, J. Presl, in ReL Haenk. i. 886=«emiberbis.
velatus, Kunth, Enum. PI. i. 488 = semiberbis.
venustus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 367.—Zeylan.
versicolor, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 388= A. Schoenanthus.
vertieillatus, Boj. Hort. Maurit. i. 57=squarrosus.
vertidllatus, Roxb. Hort. Beng. 82; FL Ind. L 267 = Chrysopogon verticillatns.
vertieillatus, Schum. Beskr. Guin. PL 50=fnlvibarbis.
vertieillifloms, Sleud. Syn. PL Gram. 393= Sorghum halepense ?
vestitus, *Steud. 1. c.* 378.—Bras.
villi/erus, Steud. 1. c. 376 = Ifchaemum aostrale.-
villosulus, Steud. 1. c. 397=Chrysopogon violascens.
villosus, Gilib. Exercit ii. 522= A. Ischaemnm,

ANDBOPOGON:—
villosus, Lam. Fl. Fr. iii. 634 = A. Ischaemum ct provincialis.
villosus, Thnnb. Prod. PL Cap. 20 = Pollinia villosa.
vimineus, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 268 = Pollinia imberbis.
violaceus, Heyne, ex Steud. Syn. PL Gram. 414 = Arthraxon ciliaris.
violascens, Nees, ex Steud. 1. c 396 = Chrysopogon violascens.
virens, Spreng. Syst. 1. 287 •-Arundinella brasiliensis.
•*virgatus. Vesv.* in Ham. Prod. Ind. Ooc. 9 -spathiflorus.
virginicum, *Linn. Sp. PI.* 1046.—Am. bor.
•*virginicus,* Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1838) 269 = leucostachyus.
Wightianus, Steud. Syn. PI. Gram. 395 - Chrysopogon Wightianus.
Wrightii, *Hack, in Flora,* lxviii. (1885) 189.—Am. bor.
xanthoblepharis, *Trin. in Mem. Acad. Petersb.* Sér. VI. ii. (1833) 281.—Afr. trop.
Wrightii, *Munro, ex Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 201. —Cuba.
Zeae, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 818.—N. Granat.
eeylanicus, Am. ex Benth. Fl. Hongk. 428=A. pscudograya.
teylanica, Steud. Syn. PL Gram. 397 =Chrysopogon Arnottianus.
Zollingeri, *Steud. I. c.* 3«9.—Java.

ANDBOSACE, [Toura.] Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. 40 (1737). *PRIMULACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 632.
AMADEA, Adans. Fam. ii. 230 (1763).
ARKTIA, Linn. Sp. PL ed. I. 141 (1753).
acaulis, Hort. ex Diiby, in DC. Prod. viii. 52 -septentrionalis.
acaulis, *Otto, ex Duby, I. c.* 56.—Sibiria.
acutifolia, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 98 = A. Chamaejasme.
affinis, Biroli, in Brugnat. Giora. Fis. II. iii. (1820) 143. t 6 = obtusifolia.
Aizoon, *Duby, in DC. Prod.* viii. 50.—Reg. Himal.; China.
alba, *Duby, 1. c.* 55.—Am. bor.
albana, *Stev. in Trans. Linn. Soc.* xi. (1815) 410. t. 34.—As. Min.; Caucas.
alismoides, Hornem. Hort. Hafo-.i. 185=lactiflora.
alpina, *Lam. Fl. Fr.* iii. 642.—Europ.
altaica, *C. Koch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 6*12.—Reg. altaic.
apennina, Huet, ex Nym. Consp. 607=alpina.
aquatica, [Clairv.] Man. Herb. 58 = Hottonia palustris.
arachnoidea, Schott, Nyman & Kotschy, Anal. Bot. 17 = villosa.
aictica, *Cham, in Linnaea,* i. (1826) 220.—Am. arct
Aretia, D. Dietr. Syn. i. 632 = bryoides.
Aretia, Lap. Hist. Ahr. PL Pyr. 91 = imbricata.
Aretia, *Vill. Hist. PI. Dauph.* ii. 469.—Europ.
aretioides, Heer, ex Duby, in DC. Prod. viii. 51 = obtusifolia.
aretioides *x , Kerner, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 159.—Europ.
argentea, Lap. Hist. Abr. PL Pyr. 92=imbricata.
arizonica, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 221.—Am. bor.
armeniaca, *Duby, in DC. Prod.* viii. 52.—As. Min.
articulata, *Schur, Enum. PI. Transs.* 551.—Europ.
baikalensis, Fisch. ex Ledeb. FL Ross. iii. 19=lactiflora.
baikalensis, Schlecht ex Roem. & Schult. Syst. iv. 786 =ochotensis.
bidentata, C. Koch, in linnaea, xxiii. (1850) 610 = multiscapa.
Bocconi, Hort. ex Homem. Hort Hafn. i. 184 = elongata.
brevifolia$_L$ Vill. Hist. PL Dauph. it 480=septentrionalis.
brigantiaca, Jord. & Four. Btev. PL Nov. fasc ii. 105 =carnea.
Braeggeri x, *Jaegg. ex Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. Neue Fol.* xxii. (1879) p. sxix.—Helret.
bryoides, *DC. Fl. Fr.* iii. 440.—Helvet
caespitosa, *Lehm. ex Spreng. in Isis,* (1817) 1288. n 162. t. 9.—Persia,
cana, *Willd. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 93.—Am. austr. **
capitata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 786 = A. Chiunaejasme.

ANDBOSACE :—
carinata, Torr. in Ann. Lye. Nat. Hist. New York, i. , (1824) 80 = A. Chamaejasme.
carnea, *Linn. Sp. PI.* 142 —Europ.
carnosula, Duby, in DC. Prod. viii. 54=saxifragaefolia.
Chaixi. *Gren. & Godr. Fl. Fr.* ii. 458.—Europ.; Dahuria ?
Chamaejasme, Bieb. FL Taur. Cane iii. 182 = villosa.
Chamaejasme, *Willd. Sp. PI.* i. 799.—Europ.; As. Min.; As. bor.
Chamaejasme, Wulf. in Jacq. Coll. i. 194 =obtusifolin.
Charpentieri, *Heer, in Moritai, Graub. Vere.* 113.—Helvet
ciliata, *DC. Fl. Fr.* iii. 44 k—Europ.
commutata, *Schlecht. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 521.—As. temp,
cordifolia, *Wall, in As. Res.* xiii. (1820) 371.—Reg. Himal.
coronopifolia, Andr. Bot Repos. t. 647 = lactiflora.
Croftii, *Watt, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1884) 17—Reg. Himal.
cylindrica, *DC. Fl. Fr.* iii. 439.—Mont Pyren.
dasyphylla, Bnnge, in Ledeb. Fl. Alt. i. 218 = villosa.
Diapensia, Vill. Hist. PL Dauph. ii. 472 = bryoides.
diapensioides, Lap. Hist. Abr. PI. Pyr. 93 = pyrenaica.
elegans, Duby, in DC. Prod. viii. 55 = rotundifolia.
elongata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. *App.* 1668.—Europ.; Caucas.
elongata, Richards. App. Frankl. 1st Voy. 7S3=septentrionalis.
elongata, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. iii.'21=filiformis.
Esclieri x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. Neue Fol.* xxiii-xxiv. (1880) 100.—Helvet.
farinosa, Spreng. Pugill. ii. 87 = Primula farinosa.
fasciculata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst iv. 786 = septentrionalis.
filiformis, *Ret*. Obs.* ii. 10.—Persia ; As. bor.; Am. bor.
foliosa, Duby, ex Deene. in Jacquem. Voy. Bot. 142. t. 146=sarmentosa.
foliosa, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 293 = strigilosa.
Friesii *Trautv. in Act Hort. Petrop.* ix. (Ibb4) 7.—N. Zemlaya.
frutescens, Lap. Hist. Abr. PL Pyr. 92 =• cylindrica.
geraniifolia, *Watt, in Joum. Linn. Soc.xx.* (1882) 17. —Reg. Himal.
glacialis, Hoppe, in Koch, Syn. ed. II. ii. 670=alpina.
globifera, *Duby, in DC. Prod.* viii. 48.—Reg. Himal.
globifera, Klatt, in Linnaea, xxxii. *\lb6'A)* 2D2^ microphylla,
globifera, Schur, Enum. PI. Transs. 651=villosa.
Gmelini, *Gaert. Fruct.* i. 232.—Sibir.
Halleri, [Honck.] Verz. Gew. Teutschl. 561 = carnea.
Halleri, *Linn. Sp. PI.* 142.—Europ.
Hausmanni, *Ijyb. in Flora,* xxxv. (1852) 401.—Austria,
hedreantha, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 8.—Thracia.
Heerii, Hegetschw. ex Hausm. Fl. Tirol, iii. 1474 = Hausmanni.
Heerii, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 670 = bryoides.
helvetica, All. Fl. Pedem. i. 91 = bryoides.
hirtella, L Dufour, in Act. Soc. Linn. Bord. viii. (1836) 100 = pubescens.
Hookeriana, *Klatt, in Linnaea,* xxxii. (1863) 293.—Reg. Himal.
hybrida X, *Kerner, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 159.—Europ.
imbricata, *Lam. Fl. Fr.* ii. 253.—Europ.
incana, Lam. Illustr. i. 432 = villosa.
incisa, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 16 - rotundifolia.
intermedia, Ledeb. Fl. Ross. iii. 20 = armeniaca.
Jacquemontii, Duby, in DC. Prod. viii. 50 = villosa.
Lachenalii, C. C. Gmel. FL Bad. i. 2=camea.
lactea, *Linn. Sp. PI.* 142.—Europ.
lactea, Vill. Hist. PL Dauph. ii. 476 »obtusifolia.
lactea. Pall. Reise, ii. 618 = septentrionalis.
lactiflora, *[Fisch.) Hort. Gorenk.* ed. I. (1808) 80.—Sibir.
lactiflora, Kar. *8c* Kir. in Bull. Soc. Nat. Most (1841) 728. n. 717=septentrionalis.
Laggeri, *Huet, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xix. (1853; 254.—Europ.
lanuginosa, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 15.—Reg. Himal.
Lehmanni, *Wall. Cat.* n. 617.—Reg. Himal.
Lehmanniana, Spreng. in Isis, (1817) 1239 = A-Chamaejasme.
linearis, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. (Apr.-June, 1829) 179=septentrionalis.

ANDBOSACE:—
longifolia, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 610 = albana.
longifolia, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* v. (1832) 202.—Mongolia.
longiscafia, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 611=A. Chamacjasme.
longiseta, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 61=obtusifoli».
'"tea, Lam. Fl. Fr. ii. 258-Douglasia Vitaliana.
macrantha, *Boiss. &> Huet, Diagn.* Ser. II. iii. 119.—Amen,
macrocarpa, *Ledeb. ex Duby, in DC. Prod.* viii. 55, nomen.—Sibir.
Mathildae, Levier, la Nuov. Giorn. Bot ix. (1877) 48 =alpina.
maxima, *Linn. Sp. PI.* 141.—Europ.; Oriens; As. et Afr. bor.
mioophylla, *Hoot. f. Ft. Brit. Ind.* Hi. 498.—Reg. Himal.; Chin,
macronitblia, *Watt, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 17—Reg. Himal.
**ultiflora,* Lam. Fl. Fr. ii. 252=septentrionalis.
multiflora, Stead. Norn: ed. II. i. 94=imbricata.
multiscapa, *Duby, in DC. Prod.* viii. 51.-As. Min.; oyna.
moscoidea, *Duby, I. e.* 48.—Reg. Himal.
"ana, Hornem. Hort. Hafn. i. 184=elongata.
neglecta, *Cltve, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlv. (1872) I. 430.-Mont Ural.
oknata, Wall, ex Duby, in DC. Prod. viii. 85 - Frimula floribnnda.
obtusifolU, *All. Fl. Pedem. i.* 90. t. 46. f. 1—Europ.
«*<»«>Ka, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 18 = A. Chamaejasme.
occidenlalis, *Punk, Fl. Am. Sept. i.* 187.—Am. bor.
ochotensis, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 788.—oibir.
«*oratissima,* Schreb. Dec. PL Min. Cogn. 7. t. 4 = villosa.
olympica, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 87 = villosa.
orouularis, Roem. ft Schult. Syst. iv. 816, Ind.= Gtnelini.
Pacheri, Leyb. in Flora, xxxvi. (1858) 585=alpina.
Porviflora, Jacq. ex Duby, in DC. Prod. viii. 64 = rotundifolia.
patens, Wright, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N.S. vi. (1858-9) 401=saxifragaefolia.
Pauciftora, Vill. Hist. PI. Dauph. «. 477 = obtusifotfa.
trt'nontana, Reichb Ic. Fl. Germ. xvii. 48 = obtusifolia.
Pedunculate, *[Claim.] Man. Herb.* 57.—Eorop.
PtniciUata, Schott, Nyman ft Kotschy, Anal. Bot. 18 =vnlosa.
Pennina, Gaud. Fl. Helv. ii. 108=alpina.
P'nocarpa, Walp. Ann. iii. 7=seq.
plnoscapa, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 611 = anneniaca.
*"'»«''««, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 66=Primula pusilla.
Primuloi'des, D. Don, Prod. 81=Primula pnsilU.
pT'muloides, Dnby, in DC. Prod. viii. 61=sannentosa.
Primuloides, Moench, Meth. Suppl. 152=Primula corturioides.
Puberula, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fast ii. 105 = carnea.
Pyraiaica, Lam. Illustr. i. 432.—Pyren.
*<£?'' Lehln- «> Koem. * Schnlt SysL iv. 164 = nliformis.
Rn>erchoni, Jord. ft Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 105 =carnea.
rotnn., Jord. ft Fourr. 1. c. 104=carnea.
'difolia, Hardu. in As. Res. iv. (1795) 85O.-Reg. Himal. j China.
*r<>'u*difolia,* Lehm. ex Roem. ft Schnlt. Syst. iv. 165 = m1i11.
*y *, Sin. Exot. Bot. ii. 107=saxirragaefolia.
*T*gosa.* [Clairv.] Man. Herb. 67 - Douglasia Vitaliana.
armentosa, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 14. -Reg. Himal.
"WUragaefolia, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 53.—China.
^wgo. *Hoot./. & noms. ex Watt, in Journ. Linn. Soc.* xx. (U82) 18.—Reg. Himal.
PWvivoides, *Jacquem. ex Duby, in DC. Prod.* viu.—Keg. HiiaL; Mongol.

ANDROSACE:—
septentrionalis, *Linn. Sp. PI.* 142.—Europ.; Cancas.; As. et Am. bor.
spathulata, Cav. Ic. v. 56=Samolus spathulatus.
spatulata, Steud. Nom. ed. II. i. 93=praec.
stricta, Hartm. ex Duby, in DC. Prod. viii. 44 = Primula stricta.
Strigilosa, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 10.—China.
tomentosa, Schlecht. ex Duby, in DC. Prod. viii. 47 = imbricata.
triflora, *Adans. in tf/m. Soc. Nat. Mosc.* v. (1817) 89.—Sibir.
valerianoides, Lehm. ex Spreng. in Isis, (1817) 162 = albana.
villosa, Hook. f. ft Thorns, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 498-microphylla.
villosa, Jacq. Fl. Austr. t. 852=A. Chamaejasme.
villosa, *Linn. Sp. PI.* 143.—Europ.; Oriens; As. temp.
villosa, S. G. Gmel. It. ii. 196 = maxima.
Vitaliana, Lap. Hist. Abr. PI. Pyr. 94=Douglasia Vitaliana.
Wiedemanni, *Boiss. Ft. Orient,* iv. 16.—Anatol.
Wul/eniana, Sieber, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. ii. 670=hedreantha.

ANDROSAEMUM, [Toum.] ex Adans. Fam. ii. 444 (1763)=Hyperictun, Linn.
calycinum, Presl, ex Steud. Nom. ed. IL i. 94 = H. calycinum.
Cambessedesii, Coss. ex Nym. Consp. 131.—Ins. Balear.
foetidum, Spach, ex WUlk. ft Lange, Prod. iii. 589 = H. hircinum.
grandifblium, Reichb. Ic. Fl. Germ. xvi. 70.—Europ.
iircinum.Spaeh, Hist. Veg. Phan. v. 419 = H. hircinum.
efficinale, All. Fl. Pedem. ii. 147 = H. Androsaemnm.
parnfiorum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. v. (1886) 361 = H. datum.
pyramidale, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 417 = H. datum.
vulgare, Gaert. Fruct. i. 282. t. 59 = H. Androsaemum.
Webbianum, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 418 = H. grandiflornm.
xylostei/olium, Spach, 1. c. 420 = H. inodorum.

ANDROSCEPIA, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 77 (1829)=Anthifltiria, Linn. (Gram.).
Anathera, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1856) 249=Anth. Anathera.
Barteri, Anderss. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1876) 176 = Anth. Barteri.
gigantea, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 78 = Anth. gigantea.
tremula, Anderss. in Nov. Act. Upa.ll. Ser. III. ii. (1856) 247=Anth. tremula.

ANDROSEMUM, Neck. Elem. ii. 895 (1790)=praec

ANDROSTEMMA, Lindl. Swan Riv. App. 46 (1839) = Conostylia, R. Br. (Haemodor.).
junceum, Lindl. 1. c.=C. Androstemma.

AMDBOSTEPHItTM, Torr. in Bot. Mex. Bound. 218 (1858). *L1LIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 801.
breviflorum, *S. Wats, in Amer. Natural,* vii. (1873) 803.—Utah,
violaceum, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 219.—Texas.

ANDROSTOMA, Hook. f. Fl. Antarct i. 44. t 30 (1845) = Cyathodes, LabiU. (Orchid.).
empetrifolia. Hook. f. 1. c.=C. empetrifolia.

ANDROSTYLIUM, Miq. in Nat. Verh. Wet. Haarl. vii. (Stirp. Surin.) 93 (1851)=Clusta, Linn. (Guttif.).
Focieanum, Miq. 1. c=C. Fcckeana.

ANDROSYNE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 61 (1866). An Diosoorea, Linn. • Genns duhium, prope Faridem.' -Cf. Benth. ft Hook. f. Gen. iii. 762.
gracilis, Salisb. 1. c.—Ins. Nicob.

AHDBOTBICHTJM, Brongn in Duperr. Voy. Coq. Bot. 177. t. 82 (1829). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1046.
COMOSTEMDM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283.
polycephalum, *Brongn. 1. c.*—Bras.

ANDROTROPIS, R. Br. ex Wall. Cat. n. 8898 (1847) =Acranthera, Am. (Rnbiac).
tomentosa, R. Br. ex Wall. l.c.=Acranth. tomentosa.

ANDBYALA, Linn. Gen. ed. I. 238 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 617.
ERIOPHORUS. Vaill. ex DC. Fl. Fr. iv. 36 (1808).
FORNEUM, Adans. Fam. ii. 112 (1768).
ROTHIA, Schreb. Gen. PI. 531 (1791).
VOIGTIA, Roth, in Roem. & Ust. Mag. iv. (x.) 17 (1790).
aestivalis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 259 (err. typ. oestivalis).—Afr. bor.
Agardhii, *Haensel. ex DC. Prod.* vii. 244.—Hispan.
allochroa, *Hoffmgg. V Link, Fl. Port.* ii. 154.—Hispan.
arenaria, Boiss. ft Rent. Pugill. PI. Hispan. 71 = integrifolia.
aurea, Scop. Ann. ii. Hist. Nat (1769) 68=Crepis aurea.
Bourgeauii, Sch. Bip. ex Webb. *Sc* Berth. Phyt. Canar. ii. 417=pinnatifida.
candidissima, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 399 = varia.
cheiranthi/olia, L'Herit. Stirp. Nov. 85. t 18 = varia.
cheiranthifolia, Link, ex Steud. Nom. ed. II. i. 94 = pinnatifida.
chondrilloides, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. ii. 116.—Europ.
coronopifolia, Hoffmgg. ft Link, Fl. Port. ii. 165 = pinnatifida.
corymbosa, Brot. Fl. Lusit. i. 337=nigricans.
corymbosa. Lam. lllustr. iii. t. 667 - sinuata.
cossyrensis, Gnss. Fl. Sic Syn. ii. 407 -dentata.
crithmifolia. *Ait. Hort. Kern.* iii. 129.—Ins. Canar.
dentata, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* t. 811.—Reg. Mediterr.
denudata, Soland. ex Lowe, Man. Fl. Mad. i. 568 = cheiranthifolia,
diffusa, Jan. ex DC. Prod. vii. 246=integrifolia.
dissecta, *Hoffmgg. & Lint, Fl. Port.* ii. 153.— Hispan.
Ficalheana, *Daveau, in Bolet. Soc. Brot.* i. (1883) 42, 51.—Lusit.
floccosa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 8.—Afr. bor.
glandulosa, Lam. Encyc. i. 154=varia.
gomeraea, Sch. Bip. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 417 =pinnatif!da.
incana, DC. Fl. Fr. Snppl. 445=ragnsina.
integrifolia, *Linn. Sp. PI.* 808.—Keg. Mediterr.
integrifolia, Ucria, Hort. Panhorm. 336, ex Gnss. Fl. • Sic Syn. ii. 404 = Hieracium crinitum.
ladniata, Lam. Encyc. i. 163 = ragusina.
lanata, Habl. Tanr. 155 = Lcontodon biscutellaefolius.
lanata, Linn. Cent. i. n. 57, in Amoen. Acad. iv. *iii* = Hieracium andryaloides.
lanata, Vill. Hist. PL Dauph. iii. 65=integrifolia.
lanata, Sibth. ft Sm. Prod. il. 141 = Hieracium pannosum.
laxiflora, *DC. Prod.* vii. 246.—Hispan.; Marocc.
lyrata, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 308 - ragusina.
macrocephala, Boiss. ex DC. Prod. vii. 244 • ragusina.
malacitana, Haensei. ex Willk. in Willk. ft Lanee, Prod. ii. ?72 - laxiflora.
mogadorensis, *Coss. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 6010.—Marocc.
mollis, [Asso] Mant. Stirp. Arag. 176=integrifolia.
nemausensis, Vill. Prosp. 37 = Pterotheca sancta.
nigricans, *Pair. Voy. Barb.* ii. 228.—Numidia.
nudicaulis, Lam. Encyc. i. 154 = Pterotheca sancta.
oestivalis, err. typ. *vide* aestivalis.
parviflora. Lam. Fl. Fr. ii. 117=integrifolia.
pinnatifida, *Ait. Hort. Ken.* «d. I. iii. 129.—Ins. Canar.
pontana, Vill. Prosp. 37=Crepis montana.
ragusina, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1136.—Reg. Mediterr.
ramosissima, Boiss. Elench. 63 = ragusina.
Rebondiana, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 259.—Afr. bor.
robusta, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1838) repr. 18.—Ins. Mader.
Rothia, *Pers. Syn.* ii. 378.—Hispan.
runcinata, Pers. 1. c. = integrifolia.
sinuata, Linn. Sp. PI. 808=integrifolia.
sinuata, Reichb. Ic. Fl. Germ. xiv. *US6* = integrifolia.
sinuata, Willk. & Lange, Prod. ii. 2n = ragusina.
tenuifolia, *DC. Prod.* vii. 245.—Sicilia,
tenuifolia, Tenore, FL Neap. Syll. App. v. 38 = dentata.
tomentosa, Salisb. Prod. 182=ragusina.

K

ANDBYALA:—
tomentosa, Scop. Delic Insub. ii. 12=varia.
undulata.'J. & C. Presl, Delic. Prag. 113=integrifolia.
uniflora, Schrank, Baier. Fl. ii. 343 = integrifolia.
varia, *Lowe, ex DC. Prod.* vii. 245.—Ins. Mader.
Webbiana, Sch. Bip. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 417 = pinnatifida.

ANDBZEIOWSKIA, Reichb. PI. Crit. i. 15. t. 13 (1837). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 70. MACROCERATIUM, Reichb. Consp. 184 (1828).
Cardamine, *Reichb. 1. c.*—Pontus; Syria.

ANECHITE8, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 410 (1864). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 707.
adglutinata, *Miers, Apocyn. S. Am.* 236.—Ind. occ.
Asperuginis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 410.—Cuba,
circinalis, *Miers, Apocyn. S. Am.* 236.—Ind. occ.
lappulacea, *Miers, I. c.* 287.—Ins. S. Doming,
revoluta, *Miers, 1. c.* 238.—Bias,
thomasiana, *Miers, I. c.* 237.—Ins. S. Tbomae.

ANECIO, Neck. Elem. i. 28 (1790) = Senecio, Linn. (Compos.).

ANECOCHILUS. Blume, Bijdr. 411. t. 15 (1825)=" **Anoectoohilus,** Blume (1828) (Orchid.).

ANECTOCHILUS, Blume. Orch. Archip. Ind. 44 (1858) =Anoectoohilus, Blume (Orchid.).

ANEILEMA, R. Br. Prod. 270 (1810). *COM ME-LINACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 849.
AMELINA, C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng. 88. t. *W* (1874).
ANILEMA, Kunth, Enum. PI. iv. 64 (1843).
APHYLAX, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 271.
BAUSCHIA, Seub. in Vidensk. Meddel. Kjoeb. 123 (1872).
DICHOESPERMUM, Wight, Ic. vi. 31. t. 2078 (1853).
DICTVOSPERMUM, Wight, 1. c. 29. t. 2069 (1853).
DILASIA, Kafin. Fl. Tellur. iv. 122 (1836).
LAMPRODITHYROS, Hassk. in Peters, Mossamb. Reise, Bot. 529 (1863).
MURDANNIA, Royle, Illustr. Bot. Himal. 403. t. 95 (1839).
PILETOCARPUS, Hassk. in Flora, xlix. (1866) 212.
PRIONOSTACHYS, Hassk. 1. c.
RHOPALEPHORA, Hassk. ex Mohl & Schlecht. in Bot Zeit (1864) 58.
STREPTYLIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 122 (1836).
TALIPULIA, Rafin. 1. c. ii. 17 (1836).
'acuminatum, Benth. Fl. Austral, vii. 85 = laxnm.
acuminatum, *R. Br. Prod.* 270.—Austral.
adhaerens, Kunth, Enum. PI. iv. 72 = aequinoctiale.
aequinoctiale, *Kunth, I. c.*—Afr. trop.
affine, R. Br. Prod. 271 = gramineum.
africanum, Beauv. Fl. Owar. ii. 57. t. 93 = Floscopa africana.
anthericoides, R. Br. Prod. 271=gramineum.
asperum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 5204 = Floscopa scandens.
beninense, *Kunth, Enum. PI.* iv. 73.—Afr. trop.
biflorum, *R. Br. Prod.* 270.—Austral.
bracteolatum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. ii. 59 = ovato-oblongum.
hrasiliense, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iiL 225.—Bras.
calaadrinoides, *F. Muell. Fragm.* ix. 191.—Austral.
canaliculatum, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 137=spiratum.
eompressum, Dalz. 1. c. 138=nudiflorum.
consptcuum, *Kunth, Enum. PI.* iv. 6H.—Ind. or.
cordatum. Buch.-Ham. ex Wall. Cat sub n. 5228 = Commelina herbacea.
crispatum, R. Br. Prod. 270=Pollia crispata.
crocea, Griff. Notul. iii. 235=ochraceum.
cymosum, Kunth, Enum. PI iv. 69 = Floscopa scandens.
debile, Wall. Cat n. 5215=nudiflorum.
densiflorum, Kunth, Enum. PI. iv. 69 = Floscopa scandens.
diandrum, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5211 -nudiflorum.
didymum, Buch.-Ham. 1. c. n. 5202 = Commelina didyma.
didymum. Seem. Bot. Voy. Herald, 422 = Pollia sorzogonensis.

ANEUJ3MA:—
dimorphum, *Dais, in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 138. —Ind. or.
dimorphum, Thw. Enum. PL Zeyl. 822=zeylanicum.
divergens, *C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng.* 28. t. 16.—Ind. or.
diversi/olium, Hassk. in Miq. PI. Jungh. 142=nudiflorum.
Dregeanum, *Kunth, Enum. PI.* iv. 78.—Afr. austr.
Ehrenbergii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 229.—Afr. trop.
datum, *Dale, in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 137. —Ind. or.
datum, Kunth, Enum. PI. iv. 70=herbaceum.
ensifolium, Wight, Ic. PI. Ind. Or. t. 2072 =giganteum.
esculcntum, *Wall. Cat.* n. 5208.—Ind. or.
esculentum. Wall. 1. c. litt. C. (nee A. B.)=sinicum.
filiforme, Buch.-Ham. Wall. 1. c. n. 5209=vaginatùm.
filipes, Mart in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. ii. 69 = geniculatum.
floribundum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 311 = Leptorhoeo filiformis.
foliosum, Hassk. in Miq. PI. Jungh. 144=nudiflorum.
Forekalei, *Kunth, Enum. PI.* iv. 71.—Arab.
Gardneri, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. 269.—Bras,
giganteum, *R. Br. Prod.* 271.—Austral,
glaucum, *Thw. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 200.—Zeylan.
gracile, *C. B. Clarke, 1. e.* 228.—Afr. occ
gramineum, *R. Br. Prod.* 270.—Austral.
Hamiltonianum, *Wall. Cat.* n. 5222.—Assam,
herbaceum, *Wall. I. c.* n. 5223.—Ind. or.; Malaya.
herbaceum, Wall. 1. c. n. 8223 - protensum.
hirtum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 348.—Abyss.
hispidum, D. Don, Prod. 45 — Floscopa scandens.
Hookeri, *C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng.* 28. t. 17.—Ind. or.
japonicum, *Kunth, Enum. PI.* iv. 70.—Japon.
Junghunianum,- Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 528=nudiflorum.
Keisak, *Hassk. Commel. Ind.* 32.—Japon.
Koenigii, *Wall. Cat.* n. 5214.—Ind. or.
lanceolaium, Baker, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 227 = Schweinfurthii.
lanccolatum, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 546.—Afr. trop.
lancifolium, Griff. Notul. iii. 238=nudiflonim.
lanuginosum, *Wall. Cat.* n. 5221.—Ind. .or.
lati/olium, Wight, Ic. PI. Ind. Or.t. 2072=herbacenm.
laxum, R. Br. Prod. 270=Commelina laxa.
laxiflorum, Benth. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 226=ovato-oblongum.
laxum, *R. Br Prod.* 270.—AustraL
lineolatum, Kunth, Enum. PI. iv. 69=herbaceum.
longifolium, Hook. Exot. Fl. t. 204 -= giganteum.
longifolium, Wall. Cat. n. 5213 = divergens.
loriforme, Hassk. in Miq. PI. Jungh. 143=nudiflorum.
Loureirii, *Hance, in Seem. Journ. Bot.* vi. (1868) 250. —China.
macropkyllum, R. Br. Prod. 270 = Pollia macrophylla.
medicum, *R. Br. I. c.* 271.—China.
melanosticum, Hance, in Seem. Journ. Bot. vii. (1869) 167=esculentum.
micranthum, *Kunth, Enum. PI.* iv. 70.—Ind. or.
minutum, Kunth, 1. c 661=nudifloruin.
monadelphum, *R. Br. ex Kunth, 1. c.* 70.—Java.
montanum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 322 = zeylanicum.
montanum, *Wight, in Wall. Cat.* n. 5203.—Ind. or.
nanum, Kunth, Enum. PI. iv. 65 = spiratum.
nudicaule, Kunth, 1. a 67 = nudiflorum.
nudiflorum, F. Muell. Fragm. viii. 62=giganteum.
nudiflorum, Miq. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 208, 215=dimorphum, Koenigii.
nudiflorum, *R. Br. Prod.* 271.—Ind. or.
nudiflorum, Wall. Cat. n. 5224=vaginatnm.
Nummularia, Miq. Fl. Ind. Bat. 535=spiratum.
ochraceum, *Dale, in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 135.—Ind. or.
oliganthum, Franch. & Sav. Enum. PL Jap. ii. 522" Keisak.
ovalifolium, *Hook. f. ex C. B. Clarke, in DC. Monog.* *Phan.* iii. 219.—Ind. or.
ovatum, *Wall. Cat.* n. 5206.—Malaya,
ovato-oblongum, *Beauv. Fl. Owar.* ii. 71.1.104.—Afr. trop.
paniculafum, *Wall. Cat.* n. 5216.—Ind. or.
paniculatum, Wight, Ic PL Ind. Or. t. 2076-dimorphum.

ANEILEMA:—
pauciflorum, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 136=vaginatum.
pauciflorum, *Wight, Ic. PL Ind. Or.* t 2077.—Ind. or.
pedunculosum, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 228.—Afr. austr.
Petersii, *C. B. Clarke, 1. c.* 225.—Afr. trop.
pilosum, Wall. Cat. n. 5219=Commelina pilosa.
poaeoides, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. 259.—Bras,
protensum. *Wall. Cat.* n. 5218.—Ind. or.
protensum, Thw. Enum. Fl. Zeyl. 322=zeylanicum.
radicans, D. Don, Prod. Fl. Ncp. 45 = nudiflorum.
reniforme, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5205 = Pollia subumbellata.
rivulare, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 842 = Floscopa rivularis.
scaberrimum, Kunth, Enum. PI. iv. 69=protensum.
scapifloium, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* i. 127,— Ind. or.
scapiflorum, Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 203=divergens.
Schomburgkianum, *Kunth, Enum. PI.* iv. 661.—Bras.
Schweinfurthii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 227.—Afr. trop.
sclerocarpum, *F. Muell. Fragm.* viii. 61.—Austral.
secundum, Wight, Ic PI. Ind. Or. t 2074 = sinicum.
secundiflorum, Kunth, Enum. PL iv. 69 = Pollia sorzogonensis.
semiteres, Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 138 = paniculatum.
gepalosum, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iiL 202.—Afr. trop.
serotinum, Don, ex C. B. Clarke, 1. c. 200=scapiflorum.
siliculosum, F. Muell. Fragm. viii. 61 - acuminatum.
siliculosum, *R. Br. Prod.* 270.—Austral.
simplex, Kunth, Enum. PI. iv. 71 = sinicum.
sinicum, Herb. Berol. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 211=nudiflorum.
sinicum, *[Lindl. in] Bot. Reg.* t. 659.—China.
spectabile, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) H. 77=Loureirii.
spicatum, Wall. Cat. n. 5217 = Loureirii.
spiratum, *R. Br. Prod.* 271.—Ind. or.
Tacaateanum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 343 = aequinoctiale.
Tacaaeeanum, Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1872) 163=lanceolatum.
terminate, Wight, Ic. PI. Ind. Or. t. 2076=nudiflorum.
Thomsoni, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 121.—Reg. Himal.
trichocoleum, Schau. in Nov. Act. Acad. Leop. Carol, xix. (1843) Suppl. i. 448 (PI. Meyen.)~ nudiflorum.
triquetrum, *Wall. Cat.* n. 5220.—Ind. or.
tuberosum, Buch-Ham. in Wall. Cat. n. 5207 = scapiflorum.
umbrosum, Kunth, Enum. PL iv. 71=ovato-oblongum.
vaginatum, *R. Br. Prod.* 271.—Ind. or.
versicolor, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* iii. (1861) 136. —Ind. or.
violaceum, F. Muell. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 206=gramineiim.
vitiense, *Seem. Fl. Vit.* 314. t. 96.—Ins. Fiji.
Welwitschii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phantiü-* 229.—Angola,
zeylanicum, *C. B. Clarke, 1. c.* 204.—Zeylan.

ANELASMA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vib(1851) 42=Abuta, Aubl. (Menisp.).
concolor, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 260 = Ab. concolor.
Gardnerianum, Miers, 1. c Ser. II. vii. (1851) 48 = Ab. concolor.
guianense, Miers, 1. c. = Ab. concolor.
intaminatum, Miers, 1. c. Ser. III. xiv. (1864) 260.—Bras.
jamaicense, Miers, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. v., Suppl. ii. (1861) 50 = Pachygone domingensis.
lauri/olium, Sagot, ex Benth. 1. c. = Ab. concolor.
laurifolium, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (18B4) 260.—Ins. & Thomae.
Martianum, Miers, 1. c. = Ab. concolor.
minutiflorum, Sagot, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 50 - Pachygone domingensis.

ANELASMA:—
pallidum, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 260 - Ab. concolor.
Sellomanum, Miers, 1. c,—Bras.
Spruceanum, Miers, ex Benth. in Hook. Kew Jovr . ii. (1851) 116 = Ab. concolor.
strumosum, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 260.—Bras.
urophyllum, Miers, 1. c—Bras.

ANEMAGROSTIS, Trin. Fund. Agrost. 128 (1820) = Apera, Adans. (Gram.).
intermpta, Trin. 1. c. 12J = Ap. interrnpta.
Neesiana, Wight & Am. ex Steud. Syn. PI. Gram. 115 = Panicum semialatum.
Spica-venti, Trin. Fund. Agrost 129 = Ap. Spica-venti.
tenella, Wight, ex Steud. Syn. PI. Gram. 115 = Anuidmella tenella.

ANEMANTHUS, Fourr. in Ann. Sot Linn. Lyon, N. S. xvi. (J868) 323=Anemone, Toum. (Ranirac.).
nemorosus, Fourr. 1. c. = Anemone nemorosn.
ranunculoides, Fourr. 1. c — Anemone ranunculoides.

ANEMABBHENA, Bunge, in Mém. Acad. Pétersb. "• (1881) 140 (Enum. PI. Chin. Bor. 66). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. Hi. 782.
•sphodeloides, *Bunge, II. cc*—China.

ANEMIA, Nutt in Ann. Nat Hist Ser. I. i. (1838) 186 = Houttuynia, Thunb. (Piperac.).
Wtfornica, Nutt. 1. c. = H. califomica.

ANEMIOPSIS, Endl. Gen. Snppl. I. 1874 (1841) = ANEMOPSIS, Hook. & Am.

ANEMITIS, Rafin.FI. Tellur. iii. 87 (1886)-Phlomis, Tourn. (Labiat.).
"tgida, Rafin. L c - P. Herba-venti.

ANEMONANTHEA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. it '24 (1821)= Anemone, Linn. (Ranunc).
"pennina, S. F. Gray, 1. c 724 = Anemone apennina.
nemonsa, S. F. Gray, 1. c. 725-Anemone nemorosa.
nnuncidoides, S. F. Gray, 1. c. -Anemone rananculoides.

ANEMONE, linn. Syst ed. I. (1785). *RANUNCULACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 4.
ANEMANTHUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 823.
ANEMONANTHEA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 724 (1821).
ANEMONELLA, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 240 (1889).
BAKNEOUDIA, C. Gay, Fl. Chil. i. 29.11 (1845).
FLAMMARA, Hill, Veg. Syst. xvi. 37 (1770).
HARTIANA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
HEPATICA, Dill, ex Linn. Syst. ed. I (1785).
"OMALOCARPUS, Schur, Enum. PL Transsyl. 8 - (1886).
«0PYRt,M> Adans. Fam. ii. 460 (1763).
O*IBA, Adans. 1. c. 459 (1763).
PREONANTHUS, Ehh Hi tr. iv. 149 (1789).
PULSATILLA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
SYNDESMON, Hoffmgg. in Flora, xv. (1832) Intell. 84.
acanthifolia, *Rich. Ind. Sem. Hort. Patav.* (1841).—Hab. !
aconitifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 820=dichotomy
aconitifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) W=narcissiflora.
•cutiloba, *lavs. Ranunc. Canad.* 30.—Am. bor.
'Wptlc; «Schleich. Cat PL Helv. ed. IIL 6 = A. Pulsatilla.
aequinoctUlis, *Poepp. Fragm. Syn.* 27,—Peruv.
offinu, G. Don, Gen. Syst i. 21 = pratensis.
«*.«, Gilib. Fl. Lituan. ii. 275=nemorosa.
[a]«*o, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) 2*8. t. 20. f. l=>sylvestris.
«»o, Goaty & Pons, in Bull. Soc. Bot Fr. xxx. (1888) - P-lxxix-coronaria.
»'>*na, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 264. -Oriens; As. bor.
'*loorosea*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 276=veraalis.
alch
(1841) 758.-A&. austr.

ANEMONE:—
alpina, *Linn. Sp. PI-* 539.—Europ.; Caucas.; Am. bor.
alpina, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 384 = baldensis.
altaica, *Fisch. ex Ledeb. Fl. Alt.* ii. 882.—Sibir. a'tai.-.
ambigua, Turcz. ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 601 = albana.
angulosa, *Lam. Encyc.* i. 169.—Europ. or.
anomala, *Rafin. Fl. Ludov-* 82 (quid ?).—Am. bor.
antucensis, *Poepp. Fragm. Syn. $1.*—Chili.
apennina, Auct Orient, ex Boiss. Fl. Orient, i. 13 = blanda.
apennina, *Linn. Sp. PI.* 641.—Europ.
apiifolia, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 385=alpina.
arborea, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 95-capensis.
arctica, Fisch. in Linnaea, vi. (1831) 674-Kichardsoni.
argentea, Raim. ex Wedd. Chlor. Andina, ii. 805 = Ranunculus Raimondii.
aimena, *Boiss. Fl. Orient*, i. 10.—As. Min.
baicalensis, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 40.—As. temp.
baldensis, G. Don, Gen. Syst. i. 18-multifida.
baldensis, Lam. Encyc. i. 614—alpina.
baldensis, *Linn. Mant.* i. 78.—Europ.
barbulata, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. VII. 149.—China.
Bauhini, *Tausch, in Flora*, xxv. (1842) I. 69.—Europ.
Berlandieri, Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 628 = decapetala.
bieolor, Poepp. ex Pritz. 1. c. 624 - decapetala.
biflora, *DC. Syst.* i. 201.—Oriens ; Reg. Himal.
bilobata, Phil. f. Cat. PI. Vase. Chil. 6=decapetala.
blanda, *Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wockenbl.* iv. (1854) 129.—Oriens.
Bogenhardiana, *Prite. in Linnaea*, xv. (1841) 591.—Europ.
borealis, Richards, in Frankl. 1st Joura. ed. II. App. 22-parviflora.
Bungeana, *Pritg. in Linnaea*, xv. (1841) 603.—Sibiria.
Burseriana, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 885-alpina.
caelestina, *Franck. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1886) 4.—China.
caerulea, *DC. Syst.* i. 203.—Sibir.
caerulea, Lam. Fl. Fr. iii. 818—appenina.
cafira, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* 9.—Air. austr.
Campanella, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 22-albana.
campanifiora, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 247-pratensis.
canadensis, Linn. Syst ed. XII. iii. App. 231 = dichotoma.
capensis, *Lam. Encyc.* L 164.—Afr. austr
caroliniana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. *i.* 12, partim-heterophylla.
caroliniana, Walt. FL Carol. 156 = decapetala.
caucasica, Willd. ex Rupr. Fl. Caucas. 14—blanda.
cemua, *Thunb. Fl. Jap.* 288.—Japon.
chilensis, Spreng. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 152=decapetala.
chinensis, *Bunge, Enum. PI. Chin.* 2.—China.
coccinea, Jord. Diag. i. 57 = coronaria.
collina, Salisb. Prod. 871-A. Pulsatilla.
Commersoniana, DC. in Deless. Ic. i. 4 = multifida.
coronaria, *Linn. Sp. PI.* 539.—Reg. Mediterr.; Oriens.
coronarioides, Hanry, Prod. Hist. Nat. Var, 142 = coronaria.
crassifolia, *Hoot. Ic. PI.* t. 257.—Tasmania.
cuneata, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 574—parviflora.
cuneifolia, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) 248. t. 21=parviflora.
curia, Wall. Cat. n. 4690-Clematis montana.
cyanea, Risso, Fl. Nice, 7 -coronaria.
cylindrica, *A. Gray, in Ann. Lye. N. York*, iii. (1828-36) 221.—Am. bor.
cynosurus. Griff. Notul. iv. 735-Ranunculus falcatns.
dacica, Freyn, ex Borb. in Just, Bot. Jahresb. (1874) 1076, *err. typ.*=Arabis dacica.
dahurica, *Fisch. ex DC. Prod.* i. 17.—As. temp,
debilis, *Fisch. ex Tung, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 274 [bis].—Sibir.
decapetala, J. F. Gmel. Syst. 871-Geum rivale.
decapetala, *Arduini, Animad. alt.* 27.—Am. bor. et austr.
decapkilla, Krock, Fl. Sil. ii. I. 235-Geum rivale.
deltoidea, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Ame-i.* i. 6. t. 8. f. A.—Am. bor. occ.
demissa, *Hoot./. & Thorns. FUnd.* i. 23.—Reg. Himal.

ANEMONE:—
dichotoma, *Linn. Sp. PI.* 540.—As. bor.; Am. bor.
discolor, Royle, Illustr. Bot. Himal. 62 = obtusilolra.
dodecaphilla, Krock, Fl. Sil. ii. I. 235 = Geum rivale.
Drnmmondii, *S. Wats. Bot. Calif*, ii. 424.—Calif.
dubia, Bell. App. Fl. Pedem. 232 = narcissiflora.
dubia, Wall. Cat n. 4697-rivularis.
elegans, Decne. in Rev. Hortic. (1852) 41. cum ic. - japonica.
elongata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 194.—Reg. Himal.
eranthoides, *Regel, in Act. Hort. Pitrop.* viii. (1884) 691.—As. temp,
exigua, *Maxim, in Bull. Acad. Pltersb.* xxiii. (187?) 806.—China.
Falconeri, *Thorns, in Hook. Ic. PI.* t. 899.—Reg. Himal.
Fanninii, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* ed. II. 2, noraen.—Natal.
fasdculata, Linn. Sp. PI. 542-narcissiflora.
fasciculata, Vahl, Symb. Bot. iii. 74-umbellata.
Fischeriana, *DC. Prod.* i. 20.—Sibiria.
flaccida, *Fr. Schmidt, Reisen Amur I.* 103.—Japon. China.
flava, Gilib. Fl. Lituan. ii. 274-ranunculoides.
flavescens, Zucc. in Mora, ix. (1826) I. 371-patens.
fiemmensis, Scop. Ann. ii. Hist. Nat. (1796) 64-alpina.
formosa, *Clark, Trav.* ii. 145.—As. Min.
fragifera, Wulf. in Jacq. Misc. ii. 55=baldensis.
fulgens, y. *Gay, in DC. Prod.* i. 18.—Rep. Mediterr.
fumariaefolia, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) 247 =triteraata.
geraniifolia. Wall. Cat. n. 4693-rivularis.
gigantea, Raim. ex Wedd. Chlor. And. ii. 304-Ranunculus gigantea.
glacialis, [Clairv.] Man. Herb. 180-Halleri.
Glazioviana, *Urb. in Linnaea*, xliii. (1880-82) 25.—Bras.
globosa, Nutt. ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 673 = multifida.
Gmeliniana, *Presl, ex Pritg. 1. c.* 697.—Sibiria.
Gortschatmvii, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat. Mosc. xv. (1842) 131 = biflora.
Govaniana, Lindl. Bot Reg. (1844) Misc. 45 = polyanthes.
Govaniana, Wall. Cat. n. 4688 = obtusiloba.
gracilis, *Fr. Schmidt, Reisen Amur I.* 102.—Japon.
grandiflora, Hoppe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 732 =alpina.
grassensis, Goaty & Pons, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. (1863) p. lxxviii—coronaria.
Grayi, *Behr. ex Kellogg, in Bull. Calif. Acad.* n. 1. (1884) 5.—Calif.
Griffithii, *Hook. f. & Thorns. Fl. Ind.* i. 24.—Kes;. Himal.
groenlandica, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 566 = Coptis trifolia.
Hackelii, Stend. Nom. ed. I. 48 = Halleri.
Halleri, *All. Fl. Pedem.* ii. 170.—Europ.
helleboriflora, Richter, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 598 = pratensis.
helleborifolia, *DC. Syst.* 1. 211.—Am. austr.
Hepatica, *Linn. Sp. PI.* 588.—Europ.; Oriens; Am. bor.
hepaticifolia, *Hook. Ic. PI.* t. 1.—Clùli.
heterophylla, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i.* 12.—Am. bor.
hirsuta, Gilib. Fl. Lituan. ii. 276-sylvestris.
hirsuta, Moench, Meth. SuppL 105 = virginiana,
hispida, Wall. Cat. n. 4694-nvularis.
hortensis, Linn. Sp. PI. 640 = stellata.
hortensis, Thore, Chi. Land. 238=fulgens.
Hudsoniana, Richaids. in Frankl. 1st Joura. ed. II. App. 22-multifida.
hybrida, Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed. I. 74» japonica.
hybrida, Miq. ex Pritz in Linnaea, xv. (1841) 573 = Halleri.
incisa, Ledeb. Ind. Hort. Dorp. Suppl. (1824) 1 = caerulea.
indeterminata, Banks, ex Walp. Rep. i. 23, sphalm - parviflora.
integrifolia, *Humb. & Bonpl. ex DC. Syst.* i. 217,—Am. mend.
intermedia, G. Don, Gen. Syst. i. 21-patens.
intermedia, Hoppe, ex Sieud. Nom. ed. I. 48, 49 *m* montana.
intermedia, Schult. Obs. 101-A. Pulsatilla.

ANEMONE :—
intermedia, Winkl. ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 652 — A. nemorosa.
irregularis. Lam. Encyc. i. 167=dichotoma.
isopyroides, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iii. (1804) 249. —Sibir.
Jamesoni, *Hook. Ic. PI.* t. 670.—Ecuador.
Jankae, *F. Schults, in Flora,* xxxix. (1856) 205.—Transsyl.
japonica, *Sieb. & Zucc. Fl.Jap.* i. 15.—Japon.
lancifolia, Flush, Fl. Am. Sept. ii. 886=nemorosa.
lanigera, C. Gay, Fl. Chil. i. 22 = mnltifida.
latifolia. Bell, ex Re, in Mem. Ace. Sc. Torin. xxxiii. (1829) 233 = fulgens.
Laxmanni, Steud. Norn. ed. II. i. 96 = dichotoma.
lepida, Jord. Diag. i. 59 = hortensis.
linearilοba, *Fisch. ex Prits. in Linnaea,* xv. (1841) 697.—Kamtschatka.
linearis, Schleich. ex Pritz. 1. c. 661 = caerulea.
lobata, Pers. Syn. ii. 96=palmata.
longipeiala, Schleich. ex Steud. Norn. ed. I. 48, 49 = patens.
longiscapa. Wall. Cat. n. 4691 = polyanthes.
ludoviciana, Nutt. Gen. Am. ii. 20 = patens.
lutea, Lam. Fl. Fr. iii. 818 = ranunculoides.
macrorrhita, Domb. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1.151 = decapetala.
malvifolia, Linn. Sp. PI. 1197 = palmata.
mexicana, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 83.—Mexic
micrantha, Hort ex Stead. Norn. ed. II. i. 96 = alpina.
micrantha, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Keise, 133 = obtusiloba.
millefoliata, Bertol. Amoen. 574=alpina.
minima, DC. Syst. i. 206=nemorosa.
minuta, *Laxm. ex Steven, in Pall. Neu. Nord. Beitr.* vii. 153.—Sibir.
mollis, Wall. Cat n. 4689 = obtusiloba.
montana, *Hoppe, ex Sturm, Fl. Deutschl. Heft* xc n. 2.—Europ.; Caucas.
Mouansii, Hanry, ex Ardnino, Fl. Alp. Marit. 12 = coronaria.
multifida, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 364.—Am. bor. et austr.
myrrhidifolia, Vill. Prosp. 50=alpina.
narcissiflora, *Linn. Sp. PI.* 642.—Enrop.; Oriens; As. bor.; Am. bor.
narcissiflora, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 121 = multifida.
nemorosa, *Linn. Sp. PI.* 541.—Europ.; As. bor.; Am.bor.
nemorosa, Schang. in Pall. Neu. Nord. Beitr. vi. 34 = altaica.
nemorosa-alba, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 101; ed. II. 121-nemorosa.
nemorosa-lutea, Crantz, 1. c.= ranunculoides.
nikoènsis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. (1875) 275.—japon.
ttobilis, Jord. Diag. i. 57 = coronaria.
Nuttalliana, DC. Syst. i. 198 = patens.
Nuttallii, Nutt. in Journ. Acad. Soc. Nat. Phil. v. (1825) 158 = patens.
obsoleta, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 98=pratensis.
obtusiloba, *D. Don, Prod.* 194.—Reg. Himal.
obtusiloba, Lindl. Bot Reg. xxx. (1844) t. 65=scaposa.
occidentalis, *S. Wats.in Proc. Am. Acad.xi.* (1876) 121. -Calif.
ochotensis, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 47 =sylvestris.
ochroleuca x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 77.—Helvet.
octopetala, *Patrin, ex Pritm. in Linnaea,* xv. (1841) 697, nomen.—Hab. ?
Oenanthe, Ucria, in Roem. Arch. i. 69= coronaria.
palmata, *Linn. Sp. PI.* 538.—Reg. Mediterr.
parviflora, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 319.-Am. bor.
patens, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft xlvi. 1 = H alień.
patens, *Linn. Sp. PI.* 538.—Europ.; Am. bor.
Pavoniana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 6 j *et ex Leresche & Levier, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 196.—Iberia.
pavonina. Lam. Encyc. i. 166 =• hortensis.
pedata, Rafin.in Med. Repos. New York, v. (1808) 361 —nemorosa.
Pennsylvania, Linn. Mant. 247= dichotoma.
pentaphylla, Hook, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 657 • nemorosa.
pinnatifida, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 214-Halleri.
pisdensis, Sism. Agr. Tosc. 223 (1801)-A. Pulsatilla.

ANEMONE :—
Pittonii x, *Glowacki, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xix. (1869) 901.—Europ.
polyanthes, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 194.—Reg. Himal.
praecox, Salisb. Prod. 371=A. Hepatica.
praestabilii, Jord. Diagn. i. 58 = coronaria.
pratensis, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 248 = montana.
pratensis, *Linn. Sp. PI.* 539.—Europ.
pratensis, Pall, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 687 = sylvestris.
pratensis, Sibth.Fl.Ox. 169; With. An.Brit.Pl.ed.III. 498-A. Pulsatilla.
propinqua, G. Don, Gen. Syst. i. 21= pratensis.
pubescens, Domb. ex Stend. Nom. ed. I. 458, in syn.- Ranunculus Krapfia.
Pulsatilla, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 18 = montana.
Pulsatilla, *Linn. Sp. PI.* 639.—Europ.
Pulsatilla, Sturm, Fl. Deutschl. i. Heft lxxxix. 12 - pratensis.
punica, Sism. Agr. Tosc. 223 = A. Pulsatilla.
pusilla, DC. Syst. i. 197 = coronaria.
pusilla, Gaertn. ex Steud. Nom. ed. I. 49 = Geum anemonoides.
pygmaea, Hort ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed. III. 90 = apennina.
pyrenaica. Pall, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 640 = apennina.
quinquefolia, Linn. Sp. PI. 541—nemorosa.
Raddeana, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxiv. (1861) II. 16.—Reg. Amur.
ranunculiflora, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119=ranunculoides.
ranunculiformis, St. Lag. 1. c. 67= ranunculoides.
ranunculoides, *Linn. Sp. PI.* 641.—Europ:; Caucas.; Sibir.
ranunculoides, Richards, in Frankl. 1st Journ. App. 12 x Richardsoni.
ranunculoidi-nemorosa, Kunze, in Fl. Dan. t. 2723 = nemorosa.
reflexa, Ledeb. ex Spreng. Syst. ii. 662 = caerulea.
reflexa, *Steph. in Willd. Sp. PI.* ii. 12b2.—Sibir.
Regina, Kisso, Fl. Nice, 6 = coronarw?
Richardsoni, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 6. t. 4.—Am. arct
rigida, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 25.—Chili.
Rissoana, Joid. Diag. i. 58-coronaria.
rivularis, *Buck.-Ham ex DC. Syst.* i. 211.—Ind. or.
rivularis, Wall. Cat. n. 4692= elongate.
rosea, Hanry, ex Nym. Consp. 3=coronaria.
Rossii, 5. *Moore, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 376 t. 16.—China.
rubra. Lam. Encyc. i. 163 = A. Pulsatilla.
rupestris, Jacquem. Bot. Voy. 5=rupfcola.
rupestris, *Wall. Cat.* n. 4696.—Reg. Himal.
rupicola, *Comb, in Jacquem. Bot. Voy.* iv. 5.—Reg. Himal.
Salesovii, Fisch. ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 655» altaica.
sanguinea, Pursh, ex Pritz. 1. c. 672 = multifida.
scaposa, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 27 = polyanthes.
Sellowii, *Prit: in Linnaea,* xv. (1841) 667.—Bras,
sibirica, *Linn. Sp. PI.* 541.—Sibir.
silvestris, vide sylvestris.
slavica, *Reuss, Bertcht. Oestr. Litt.* i. 82.—Europ.
sordida, Schur, Enum. PI. Transs. 3=sylvestris.
speciosa, Adams, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 685 =narcissiflora.
speciosa, *Rupr. Fl. Caucas.* 12.—Caucas.
sphenophylla, *Poepp. Fragm. Syn.* 27.—Chili.
stellata. Lam. Encyc. i. 166 = hortensis.
stolonifera, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxii. (1877) 225.—Japon.
sulphurea, All. Fl. Pedem. ii 170=vemali».
sulphured, Linn. Mant. 78=alpina.
sumatrana, *De Vriese, in Miq. PI. Jungh.* 76.—Sumatra.
sylvestris, *Linn. Sp. PI.* 540.—Europ.; Caucas.
sylvestris, Vill. Hist. PL Dauph. iii. 726=A. Pulsatilla.
tenella, Banks, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 682- parviflora.
tenella, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 386=decapetala.
tenuifolia, *DC. Syst.* i. 196.—Afr. austr.
tenuifolia, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 7 = Bogenhardiana.
tetrasepala,' *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 53.—Reg. Himal.
thalictroides, *Linn. Sp. PI.* 642.—Am. bor.

ANEMONE:-
Thomsoni, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 397.—Afr. trop.
transylvanica, *Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien,* (1858) 42.—Europ.
tnfolia, DC. Prod. i. 20=reflexa.
txifolia, *Linn. Sp. PI.* 540.—Europ.; Am. bor.
trifoliata, Georgi, Beschr. Ross. Reich, iii. IV. 1058- . reflexa.
triloba. Stokes, Bot Mat. Med. iii. 243=A. Hepatica.
trilobata, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) 247.1.1 = decapetala.
trilobata, Pers. Syn. ii. 97 = parviflora.
tritemata, *Vakl, Symb. Bot.* iii. 74. t. 65.—Am. austr.
trullifolia, *Hook. f. & Thorns. Fl. Ind.* i. 22.—Reg. Himal.
Tschernaewi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 690.—As. temp,
udensis, *Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot.* 6).—Manchur.
umbellata. Urn. Fl. Fr. iii. 822; Willd. Sp. PI. ii. 1284=narcissiflora.
umbrosa, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 361.—Sibir.
uniflora, Pursh, ex Steud. Nom. ed. II. i. 96 = Thalictrum anemonoides.
uralensis, Fisch. ex DC. Prod. i. 19= caerulea, baldensis.
Vaklii, Horaem. Fl. Dan. t. 2176 - Richardsoni.
variata, Jord. ex Nym. Consp. 3 = hortensis.
Ventreana, Hanry, ex Arduino, Fl. Alp. Marit. 12- coronaria.
vernalis, *Linn. Sp. PI.* 538.—Europ.
versicolor, Jord. Pugill. (1852) 1 = coronaria.
versicolor, Salisb. Prod. S71=bortensis.
villosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 52 — polyanthes.
virginiana, *Linn. Sp. PI.* 540.—Am. bor.
vitifolia, *Buch.-Ham. ex DC. Syst. i. 210.*—Reg. Himal.
Wahlenbergii, *Stontagh, ex Nym. Consp.* 2.—Enrop.
Wallichiana, Royle, Illustr. Bot. Hiinal. 52 = albana.
Walteri, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 387.—Am. bor.
Wighliana, *Hook. Ic. PI.* ii. t. 176.—Ind. or.
Wightiana, Wall. Cat. n. 4697 = rivularis.
Woifgangiana, *Bess, ex Koch, in Roehl. Deutschl. Fl.* iv. 106.—Europ.

ANEMONELLA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 239 (18*0 = Anemone, Linn. (Ranunc).
thalictroides, Spach, 1. c. 240 = Anemone thalictroides.

ANEMONOPSIS, Pritz. Ind. Ic. 71, sphalm. - ANEMOPSIS, Hook.-

ANEMONOPSIS, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1846) 181. *RANUNCULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 8.
XAVERIA, Endl. Gen. Suppl. iv. 30 (1847).
macrophylla, *Sieb. & Zucc. I. c.* 182.—Japon.

ANEMONOSPERMUM, Commers. ex Steud. Nom. ed. II. i. 450, in syn. (1840) = Cryptostemma, R. Br. (Compos.).

ANEMOPAEGMA, Mart, ex DC. Prod. ix. ll>7 (1845). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1037.
acutifolium, *DC. Prod.* ix. 188.—Bras.
album, *Mart, ex DC. I. c*—Bras.
citrinum, *Mart, ex DC. 1. c.* 189.—Bras.
clematideum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 222. —Reg. Argent.
floridum, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 188.—Bras.
glaucum, *Mart, ex DC. 1. c.*—Bras.; Peruv. T
laeve, *DC. I. c.* Ié9.—Bras.
lanceaefolium, *DC. 1. c.* 188.—Bras.
longidentatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119=seq.
longidens, *DC. Prod.* ix. 190.—Bras.
mirandum, *Mart, ex DC. I. c.* 187.—Bras.
orbiculatum, *DC. 1. c.* 190.—Panama.
Poeppigii, *DC. I. c*—Am. austr.
prostratum, *DC. 1. c.* 189.—Bras.
quinquedentatnm, *Mart, ex DC. I. c.* 190.—Bras.
racemosum, *Mart, ex DC. 1. c.* 189.—Bras.
scabriusculnm, *Mart, ex DC. I. c.* 188.—Bras.
sessili/olium, Mart, ex DC. 1. c. 187 = mirandum.
triplinervium, *Mart, ex DC. I. c.* 188.—Bras.
Vargasianum, *DC. 1. c.* 190.—Bras.
velutinum, *Mart, ex DC. I. c.* 189.—Bias.

ANEMOPSIS, [Hook.] in Ann. Nat. Hist i. (1888) 186, m nota; Hook, & Am. Bot. Beech. Voy. 890. t. 92 -Houttuynia, Thunb. (Piperac).
Berlanderi, C. DC. in Linnaea, xxxvii. (1871-78) 383 = H. californaica.
caiifornica, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 890. t 92 = H. califomica.
Ludovici-Salvatoris, Willk. in RegeL, Gartenfl. xxvi. (1877) 228-Calif.

ANEPSA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 81 (18S6)=Veratrum, Tonra. (Liliac.).
carinata, graminifolia, latifolia, spicata, Rafin. 1. c—(Spp. ignotae).

ANEPSIAS, Schott, Gen. Aroid. t 78 (1858)=Bhodo-JJPatha, Poepp. (Aroid.).
Mtmtiianus, Schott, l.'c—Veneznela.

ANERIWCLEISTUS, Korth. in Verh. Nat. Gesch. Temminck, 250. t. 68 (1842). *MELASTOMA-CEAE,* Benth. *to* Hook. f. i. 753.
iTiffithu, *Hook, f. ex Triana, in Trans. Unn. Soc.* «vm. (1871) 75.-Ind. or.
Helferi, *Hook.f. ex Triana, I. c*—Ind. or.
nirsutus, *Korth. in Verh. Nat. Gesch.* 250. t 68.—Sumatra.

ANER MA, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.170 (1842) = Seleria, Berg. (Cyperac).
>>*tspidula,* Schrad. ex Nees, 1. c.-S. hispidnla.

ANESLEA, Reichb. Consp. 16 (1828) - ANNESLEA, Andr.=-Euryale, Salisb. (Nymph.).

ANESORHIZA, Endl. Gen. 773 (1839), sphalm.= unesorhiza, Cham. *to* Schlecht. (Umbell.).

ANETANTHUS, Hiem, ex Benth. & Hook. f. Gen. J-.1025 (1876). *GESNERACEAE,* Benth. *to* Hook. *I-* u. 1026.
alatus, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 1025.-Bras.
gracilis, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 93.—Bras.
parviflora, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 1025.-Mexic.
«osa, *Benth. & Hook. I. c*—Bras.

ANETHUM, Tonm. ex Linn. Gen. ed. I. 82 (1787) = «ueedamun., Linn. (Umbell.).
«"=«<«, Bess. Ind. Sem. Hort. Crem. (1820) = Carum Kidolfia.
anense, Salisb. Prod. 168=Peucedannm graveolens.
«%nse, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaett L (180&) = Carumcapense.
*chryse*um *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 32.-Hispan.
cynoocarpum, DC. Prod. iv. 186 = Cymbocarpum nethoides.
Ice, DC. Cat. Hort. Monsp. 78 = Foeniculnm vnlgare.
trythraeum, DC. Prod. iv. 186 = Cymbocarpum erytnraeum.
fitniculum, Linn. Sp. PI. 263 = Foenicnlum vnlgare.
Fotniculum, Thunb. Prod. PI. Cap. 61-Carum capense.
Paveolens, Linn. Sp. P1.268=Peucedanuin graveolens.
graveolens, Ucria, Hort. Pan. 138 = Carum Ridolfia.
Unus, Gouan, Illustr. 20 = Foenicnlum vnlgare.
P'tnurium, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 156 -praec.
rastinaca, Wibel, Prim. Fl. Werth. 146=Peucedanum rastinaca.
*P>*natum,* Ruiz *to* Pav. ex Urban, in Mart. Fl. Bras. M..I. 342=Apium Ammi.
rtpentum, Ucria, in Roem. Arch. i. 68=Foenicolum P'Peritum.
"»«««, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 97=Carnm Ridlfi.
Pestre, Salisb. Prod. 168 = Foeniculnm vnlgare.
getum. Linn. Mant. 219=Carum Ridolfia.
*«««, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 156 = tedanum graveolens.
P *um,* Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. ii. 96-mp.neiu Heyneana.

ANE A, Endl. Gen m (1839) = Eyrsanthus, GS L (Sanyd.).
fyrsanthus, Steud. Nom. ed. II. i. 97-B. Brownii.

AJTEUTJOPHTTS, Benth. in Benth. *to* Hook. f. Gen. i. 244(1862). *LINEAE.*
CAUCANTHUS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 91 (1775).
africanus, *Benth. I. e.—Ab.* trop.

ANEURISCUS, Presl, Symb. Bot L 71. t. 48 (1882)-Symphonia, Linn. (Guttif.).
Aubletii, Presl, 1. c. 72=S. globulifera.
exsemu, Presl, 1. c. t. 48=S. globulifera.

AWGADENIA, Mien, Apocyn. S. Amer. 17S (1878). *APOCYNACEAE.*
almadensis, *Miers, I. c.* 179.—Bras.
amaeonica, Miers, I. a 175 *(=Anisolobusamatonicus).*
Berterii, *Miers, I. c.* 180.—Ins. S. Doming.
cognata, Miers, 1. c. 176 *(=Anisolobus cognatus).*
coriacea, *Miers, I. c.* 177.—Guiana,
cubensis, *Miers, 1. c.* 182.—Cuba.
Cururu, Miers, 1. c. 175 *(=Anisolobus Cururu).*
elegans, *Miers, 1. c.* 178.—Reg. Amazon,
elliptica, *Miers, 1. c.* 180.—Bras.
geminata, Miers, L c. 178=Odontadenia geminata.
grandifolia, *Miers, 1. c.* 175.—Reg. Amazon.
Eavanensis, *Miers, 1. c.* 181.—Cuba.
hypoglauca, Miers, 1. c. 178=Odontadeniahypoglauca.
latifolia, *Miers, 1. c.* 176.—Bras.
Lindeniana, *Miers, I. c.* 180.—Cuba,
majuscula, *Miers, I. c.* 174.—Reg. Amazon.
nitida, Miers, 1. c. 177=Odontadenia nitida.
pandurata, Miers, 1. c. lb2=Echites pandurata.
Poeppigii, Miers, 1. c 179-Odontadenia Poeppigil.
Prienrii, *Miers, I. e.* 182.—Guiana,
pruinosa, *Miers, I. c.* 177.—Bras,
reticulata, *Miers, I. c.* 179.—Bras.
Sagraei, Miers, 1. c. 181=Echites Sagraei.
Sprucei, Miers, 1. c 176 *(=Anisolobus Sprucei).*
sylvestris, Miers, 1. c. 174=Odontadenia sylvestris.
Valentuelana, Miers, L a 181 = Echites Vaienzuelana.

ANGEJA, VandeUi, Fast PL 18 (1771)=Quid ?
Vandellii, Steud. Nom. ed. II. i. 97.—Bras.

ANGELANDRA, Endl. Gen. Snppl. iii. 69 (1843)-Engebnannia, Torr. & Gray (Compos.).
pinnatifida, Endl. ex Walp. Rep. ii. 976=E. pinnatifida.

ANGELANDRA, Endl. Gen. Suppl. iv. III. 91 (1850) = Croton, Linn. (Euphorb.).
elliptica, Baill. Etud. Gen. Euph. 379=C. ellipticum.

ANGELESIA, Korth. in Ned. Kruidk. Arch. iii. (1855) 384=Triohooarya, Miq. (Rosac).
splendens, Korth. 1. c.=T. splendens.

A1TOELICA, [Riv.] Linn. Syst ed. I (1785). *VM-BELLIFERAE,* Benth. *to* Hook. f. i. 916.
ANGELOFHYLLUM, Rnpr. Rev. Umb. Kamtsch. 8 (1859).
CALUSACE, Fisch. in Hoffm. Gen. Umb. ed. II. 170 (1816).
EUSTYLIS, Hook. f. Fl. N. ZeL t 19 (185S).
GINGIDIUM, Forst Char. Gen. 41. t. 21 (1776).
GOMPHOPETALUM, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc (1841) 587.
OSTERICUM, Hoffm. Gen. Umb. 162 (1814).
alpina, Krock. ex Steud. Nom. ed. I. 49=sylvestris.
angustifolia, Hoffm. Gen. Umb. 162 = Peucedanum angustifolium.
anomala, Ave-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 57 = sylvestris.
aquilegifolia, Lam. Fl. Fr. iii. 462=Siler trilobum.
Archangelica, Linn. Sp. PL 260=Archangelica olficinalis.
arguta, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 620.—Am. bor.
atropurpurea, Unn. Sp. PI. ed. *X.* 251-Archangelica atropurpurea.
bracteata, Roxb. in Beats. Tracts, App. 297=Sium heleniannm.
Breweri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 848.—Calif.
Candollei, Wall. Cat. n. 582-Selinnm Candollii.
Carvifolia, Vill. Prosp. 25; Spreng. Umbellif. Prod. 16 » Selinum Carvifolia.
chaerophyllea, *Lottsrm. ex Eysenh. Diss, Accur. PI. Pruss.* 12.—Livon.
citriodora, *Hance, in Jaurn. Bot.* ix. (1871) 131.—China.

ANGELICA :-
controversa, *Zumag. Fl. Pedem.* ii. 11.—Italia.
Cnrtisii, *Buckl. in Am. Jmrn. Sc.* xlv. (1843) 178.—Am. bor.
dahnrica, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 85.—As. or.
Dawsoni, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 869.—Am. bor.
decipiens, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 98.—N. Zel.
Dieffenbachii, *Benth. & Hook. f. Gen.* i. 916.—N. Zel.
diversicolor, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 345-Razulii.
dura, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 357 *{•=Tommasinia purpurascens).*
ebulifolia, Lap. Hist. Abr. PI. Pyr. 156=sylvestris.
Fischeri, Spreng. in Roem. *to* Schult. Syst. vi. 605 = Silans longifolius.
flmescens, Hoffm. Gen. Umb. 162 = sylvestris.
Fkuenti, *Franch. & Sav. ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 274.—Japon.
geniculata, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 98.—N. Zel.
genuflexa, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 620.—Am. bor.
Gingidium, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 97.—N. Zel.
glanca, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 53.—Reg. Himal.
Gmelini, Wormsk. ex DC. Prod. iv. 170 = Archangelica Gmelini.
gracilis, *Franch. in Mlm. Soc. Sc. Nat. Cherb.* xxiv. (1884) 222.—China.
graveolens, Steud. Nom. ed. II. ii. 555 in syn.—Peucedanum graveoleni.
grosseserrata, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 275.—China bor.
hakonensis, *Maxim. 1. c.* 277.—Japon.
heterocarpa, *Lloyd, in Bull. Soc. Bot. Fr.* vi. (1859) 709.—Hispan.
hirsuta, Muhl. Cat. 30-Archangelica hirsuta.
inaequalis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 1M.—Japon.
integrifolia, *Walt. Fl. Carol.* 115.—Carolina.
intermedia, Schult. ex Steud. Nom. ed. I. 49 = Archangelica officinalis.
japonica, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-9) 390.—Japon.
Kiusiana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. (1878) 284.—japon.
laevigata, Fisch. Cat. Hert Gorenk. (1812) 45** Peucedanum latifolium.
laevis, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. vi. (1S86) 221 (err. typ. 121).—Hispan.
lancifolia, *Spreng. Syst.* i. 916.—Hab. ?
leporina, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 252.—Am. bor.
Levisticum, All. Fl. Pedem. ii. 10= Levisticnmofficinale.
linearilobа, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 347.—Calif.
litoralis. Fries, Fl. Halland. 51 = Archangelica officinalis.
lobata, *Walt. Fl. Carol.* 115.—Am. bor.
lucida, *Linn. Sp. PI.* 251.—Canada.
Lyallii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 374—Am. bor.
macrophylla, Schur, Entim. PI. Transs. 282=sylvestris.
maculata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 72.—Ins. Kuril.
major, Gilib. Fl. Lituan. ii. 24=Archangelica officinal is.
major, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 13.—Hispan.
Maximowiczii, *Benth. ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 274.-Sibir.
mexicana, *Vatie, App. Sem. Hort. Berol.* (1876) *App.* 2. n. 12.—Mexico.
minor, Gilib. Fl. Lituan. ii. 23=sylvestris.
Miqueliana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 276.—Japon.
mongolica, *Franch. in Nouv. Arch, if us. Par.* Ser II vi. (1883) 21; *PI. Davidian.* i. (1884) 141.-Mongol.
montarta, Brot. Fl. Lusit. i. 426-sylvestris.
nemorosa, Tenore, Fl. Nap. t. 231; Syll. 561-sylvestris.
norvegica, *Nym. Syll. Suppl.* 26.—Norveg.
offictnalis, Bernh. Syst Verz. Erf. 170-Peucedanum Ostrsthium.

ANGELICA:—
oMcinalis, Moench, Meth. 81 = Archangelica officinalis.
pachycaipa, *Lange, Descr. Ic. III.* 7. t. 9.—Hispan.
pachyptera, Avė-Lall. Ind. Sem. Hort. Petiop. ix. 58 —sylvestris.
paludapifolia, Lam.i Fl. Fr. iii. 451 = Levisticum officinale.
palustris, *Hoffm. Gen. Umb.* 162.—Enrop.
paniculata, Lam. Encyc. i. 172 = Trochiscanthes nodiflorus.
pinnata, 5. *Wats, in King, Rep.* v. 126.—Am. bor.
polyclada, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 86.—Japon.
polymorpha, *Maxim, in Bull. .Acad. Petersb.* xix. (1874) 185.—Japon.
pratensis, Bieb. in Fisch. Hort. Gorenk. (1812), ex Bess. Entim. PI. Volh. 94 = palustris.
pratensis, J. & G Presl, Fl. Cech. 61-sylvestris.
pubescens, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 84.—Japon.
proeera, Salisb. Prod. 164 = Archangelica officinalis.
pyrenaea, Spreng. Umb. 62=Selinum pyrenaeum.
Raznlii, *Gouan, Illustr.* 13. t. 6.—Pyren.
Raiulii, All. Fl. Pedem. ii. 10=sylvestris.
refracta, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 138.—Ins. Sachalin.
Reuteri, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 87.—Hispan.
rosaefolia, *Hook. Ic. PI.* t. 581.—N. Zel.
ruthenica, Schott, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 296 = sylvestris.
sachalinensis, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 137.—As. or.
sativa, Mill. Gaid. Diet. ed. VIII. n. 1 =Archangelica officinalis.
saxatilis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 729.-Sibii.
scabra, Petit, in Ann. Sc Obs. i. 99. t 8=Xatardia scabra.
scotica, Lam. Encyc. i. 173 =Ugusticum scotienm.
Sieboldi, Miq. Ann. Mu's. Bot Lngd. Bat. iii. 61 (fide Maxim. = A. pubescens, Kinsiana et dahurica).—Japon.
songorica, *Regel & Schmalh, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 690.—Kokania.
Strattomana, *Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 164.—Affghan.
sylvestris, *Linn. Sp. PI.* 251.—Europ.; 'Oriens; As. bor.
ternata, *Regel & Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 82.—As. temp,
tomentosa, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 141.—Calif.; Am. bor.
Torirnefortiana, Cusson, ex Stead. Nom.ed. I. £0 = Razulii.
Traversii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. .729 = Aciphylla Traversii.
triloba, Desf. ex Steud. Nom. ed. L 464, 50-Siler trilobum.
triquinata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 167= Archangelica atropurpurea.
triquinata, Turcz. ex Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 44) = Physolophium saxatile.
nrsina, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 690.—Kamtsch.
vertidllaris. Linn. Maift. 217 =.Peucedanum verticillare.
verticillata, *Geyer, ex Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 233.—Am. bor.
villosa, Lag. Gen. et Sp. Nov. 12=sylvestris.
Wheelėn,S. *Wats, in Am. Natural,* vii. (18.73) 801.—Amer. bor.

ANGELINA, Pohl, ex Tnl. in Arch. Mus. Nat. Par. viii. (1885) 363 = 8iparuna, Aubl. (Monim.).
divergentifolia, Fohl, ex Tul. 1. c. = S. guianensis.

ANGELOCARPA, Rnpr. in Mém. Acad. Sc Pétersb. Sér. VII xiv. (1869) D. IV. (Sert. Tiansch.) p. 48. *UMBELLIFERAE.*
brevicanlis, *Rupr. I. c.*—As. centr.

ANGELONIA, Humb. & Bonpl. PI. Aeqnin. ii. 92. t. 108 (lbO9). *SCROPHULARINEAE,* Besth.& Hook. *i.* ii. 930.
PHYLACANTHUS, Benth. Scroph. Ind. 1 (1885).
PHYSIDIUM, Schrad. in Goett. Gel.'Anz. i. (1821) 714.
SCHBLVXSIA, Nees & Mart, in Flora, iv. (1821) 299.

ANGELONIA:-
TIIYLACANTHA, Nees & Mart, in Nov. Act Nat. Cur. xi. (1822) 45.
angustifolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 254.—Mexic.
arguta, *Benth. 1. c.* 252.—Bras,
biflora, *Benth. I. c.* 254.—Bras,
bisaccata, *Benth. I. c.* 252.—Bras.
Blanchetii, *Benth. I. c.* 253.—Bras,
campestris, *Nees & Mart, in Flora,* iv. (1821) I. 299.—Bras.
ciliata, Gardn. ex Hook. Bot. Mag. sub 4. 8848 = coroigera.
ciliolata, Benth. in DC. Prod. x. 262 = Hookeriana.
Coffreana, Moric. ex Benth. in DC. Prod. x. 262 = procumbens.
comigera, *Hook. Bot. Mag.* t. 3848.—Bras,
crassifolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 252.—Bras,
eriostachjs, *Benth. I. c.* 254.—Bras.
Gardneri, *Hook. Bot. Mag.* t. 3754.—Bras,
goyayensis, *Benth. in DC. Prod.* x. 253.—Bras,
grandiflora, *C. Morr. in Ann. Soc Hort. Gand,* iii. (1847) 98. t 119.—Bras,
hirta, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 27.—Bras.
Hookeriana, *Gardn. ex Benth. in DC. Prod.* x. 251.—Bras.
integerrima, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 285.—Bras.
Xeandri, *J. Kickx, in Bull. Acad. Belg.* vi. I. (1839) 309.—Bras.
linearifolia, Moric. ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 242=Blanchetii.
lobelioides. Mart, ex J. A. Schmidt, 1. c 246 = comigera.
micrantha, *Benth. in DC. Prod.* x. 252.—Bras,
minor, *Fisch. &> Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* v. 38.—Bras,
pilosella, 7. *Kickx, in Bull. Acad. Btlg.* vi. I. (1839) 309.—Cuba,
pratensis, *Gardn. ex Benth. in DC. Prod.* x. 258.—Bras,
procumbens, *Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1822) 45.—Bras,
pubescens, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 15.—Bras,
salicariaefolia, *Humb. & Bonpl. PI. Aequin.* ii. 92. L 108.—Am. austr.
serrata, *Benth. in DC. Prod.* x. 253.—Bras.
spectabilis, Moric. ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 243-eriostachys.
tomentosa, *Moric. ex Benth. in DC. Prod.* x. 254.—Bras.
veronicoides, Mart, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 240 = procumbens.
viscosa, Mart, ex J. A. Schmidt, 1. c. 244=tomentosa.

ANGELOPHYLLUM, Rupr. in Beitr. Pfl. Ross. Reich. xi. (Rev. Umb. Kamtsch.) 8=Angelica, Linn. (Umbell.).
dahuricum, Rupr. 1. c. 9 •= Angelica sylvestris.
ursinum, Rnpr. 1. c 8=Angelica ursina.

ANGELOPOGON, Poepp. ex Poepp. & EndL Gen. et (Sp. i. 1 (1835)-MysK>dendron, Banks & Soland. Santal.).

ANGERVILLA,Neck. Elem. i. 351 (1790) =Stemodia, Linn. (Scrophul.).

ANGIANTHUS, Wendl. Coll. ii. 81. t. 48 (1809). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 319.
CEPHALOSORUS, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 152.
CHKYSOCORYNE, Endl. in Bot. Zeit. i. (1843) 457.
CROSSOLEPSIS, Benth. in Enum. PI. Hueg. 61 (1837).
CYLINDROSOHUS, Benth. 1. c. 62 (1887).
DITHYROSTEGIA, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 100.
EPITRICHE, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 74.
ERIOCLADIUM, Lindl. Swan Riv. App. 24 (1839).
GAMOZYGIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 75.
HYALOCHLAMYS, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 101.
OGCEROSTYLUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlix. 221 (1827).
OXEROSTYLUS, Steud. Nom. ed. IL ii. 242 (1841), sphalm.

AJTGIAHTHUS;—
PHYLLOCALYMMA, Benth. in Enum. PI. Hueg. 61 (1837).
PIPTOSTEMMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. More. xxiv. (1851) I. 191.
PLEUROPAPPUS, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. (1855) 87.
POGONOLEPIS, Steetz, in Lehm. Fl. Preiss. i. 440 (1845).
SILOXERUS, Labill. PI. Nov. Holl. u. 67. t 20!) (1806), nomen prins.
SKIRRHOPHORUS, DC. ex Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 260 (1836).
STYLONCERUS, Spreng. Syst. iii. 356, 451 (1826).
amplexicaulis, *Benth. Fl. Austral,* iii. 568.—Austral,
brachypappus, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i.* (1855) 44.—Austral.
codonopappus, *F. Muell. Fragm.* ix. 2.—Austral.
Cunninghamii, *Benth. Fl. Austral,* iii. 565.—Austral,
demissus, *Benth. 1. c.* 5G7.—Austral.
Drummondii, *Benth. 1. c.* 566.—Austral,
eriocephalus, *Benth. 1. c.* 567.—Austral.
ftavescens, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 488 = tomentosus.
globifer, *Benth. Fl. Austral,* iii. 567.—Austral,
humifusus, *Benth. I. c.* 563.—Austral,
microcephalus, *Benth. 1. c.* 566.—Austral,
micropoides, *Benth. 1. c.* 565.—Austral.
Milnei, *Benth. 1. c.* 564.—Austral,
myosuroides, *Benth. 1. c.* 563.—Austral,
phyllocephalus, *Benth. I. c.* 565.—Austral,
platycephalus, *Benth. I. c.* 566.—Austral,
pleuropappus, *Benth. 1. c.* 563.—Austral,
plumiger, *Benth. 1. c.* 568.—Austral.
Preissianus, *Benth. I. c.* 566.—Austral,
pusillus, *Benth. I. c.* 564.—Austral,
pygmaeus, *Benth. 1. c.* 567.—Austral,
strictus, *Benth. 1. c.* 568.—Austral,
tenellus, *Benth. 1. c.* 564.—Austral,
tomentosus, *WendL Coll.* ii. 31. t. 48 (1809).—Austral.

AUGIOPETALTTM, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 7. *MYRSINEAE.*
punctatum, *Reinw. 1. c.*—Java.

ANGKAIiAUTHUS, Balf. f. in Proc Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 88. *ACANTHACEAE.*
oligophylla, *Balf./. I. c.* 89.—Socotra.

ANGOLAEA, Wedd. in DC. Prod. xvii. 300 (1873). *PODOSTEMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 111.
fluitans, *Wedd. I.* f.—Air. trop.

ANGOLAM, Adans. Fam. ii. 85 (1763)=Alaiigiuin, Linn. (Cornac).

ANGOLAMIA, Scop. Introd. 107 (1777)=praec

ANGOFHOBA, Cav. Ic iv. 21. t. 338 (1797). *MYRTACEAE,* Benth.'& Hook. f. i. 707.
cordifolia, *Cav. I. c.*—Austral.
fioribunda. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 209 = Eugenia Smithii, Ventenatii.
intermedia, *DC. Prod.* iii. 222.—Austral,
lanceolata, *Cav. Ic.* iv. 22. t. 837.—Austral.
subvelutiua, *F. Muell. Fragm.* i. 31__Austral.
Woodsiana, *F. M. Bailey, in Proc. Linn. Soc. N. S. W.* vi. (1881) 148.—AustraL

ANGORCHIS, Nees, in R. Br. Verm. Schrift ii. 423, in adnot. (1826) = Angraecum, Bory (Orchid.).

ANGOSTURA, Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 188 (1819)-Galipea, Aubl. (Rutac).
Cupare, Roem. 8c Schult. 1. c.-G. trifoliate.

ANGOSTYLE8, Benth. in Hook. Kew Joum. \i. (1854) 328. *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. iii. 327.
longifolia, *Benth. I. c*—Bras.

ANGBAECTTM, Bory, Voy. i. 359. t. 19 (1804). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 683.
AERANGIS, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 190.
AEROBION, Kaempf. ex Spreng. Syst. iii. 679(1826).
ANGORCHIS, Nees, in R. Br. Venn. Schrift. ii. 423 in adnot. (1826).

ANGRAECT7M >—
LISTROSTACHYS, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 980.
MICROCAELIA, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 286 (1851).
PLECTRELMINTHUS, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 42 (1836).
alcicome, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 117.—Afr. trop.
aphyllum, *Thou. Orch. Afr.* t. 78.—Ins. Masc.
apiculatum, *Hook. Bot. Mag.* t 4159.—Air. trop.
arachnopus, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 98.—Afr. trop.
arcuatum, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1838) 204.—Afr. austr.
"rcuatum, Lindl. ex Hook. f. in Bot. Mag. t. 5589.-Chailluarmm.
armeniacum, *Lindl. in Bot. Reg.* (1889) *Misc.* 67.—Afr. trop.
articulatum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1872) 78.—Madag.
ashantense, *Lindl. in Bot. Reg.* (1848) *Misc.* 56.—Afr. uop.
bicaudatum, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1886) 205.—Afr. anstr.
bilobum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 68.—Afr. occ.
Boutoni, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 117..—Ins. Comor.
bractcosum, *Balf.f. & S. Moore, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 298.—Ins. Borbon.
brevifolium, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) sub t. 68.—Bras.
Urongniartiannm, *Reichb. f. ex Linden, Pescatoria,* i. t. 16.—Ins. Mascar.
Burchellil, *Reichb. f. in Flora,* 1. (1867) 117.—Afr. anstr.
Calceolus, *Thou. Orch. Afr.* t. 78.—Ins. Mascar.
tampyloplectron, *Reichb.f. in Bonplandia,* iii. (1855) 22B.—Hab.t
capense, Lindl. Gen. et Sp. Oreh. 248=Mystacidram filicome.
capitatum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi (1862) 137.—Afr. tiop.
carinatum, Kostel. Allg. MecL-phann. Fl. i. 250-tulophia virens.
carpophorum, *Thou. Orch. Afr.* t. 76.—Afr. trop.
caudatum, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1844.—Afr. trop.
caulescens, Thou. Orch. Afr. t. 76 = Mystacidium caulescens..
Chailluanum, *Hooi.f. Bot. Mag.* t 6589.—Afr. trop.
Cniloschistae, *Reichb. f. in Linnaea,* xx. (1847) 678.—Natal.
Christyanum, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1880) I. .*06.-Hab.t
cjtratum, *Thou. Orch. Afr.* t. 61.—Madag.
clandestinum, *Lindl. in Hoot. Comp. Bot. Mag.* u. , (183S) 206—Afr. trop.
oavigerum, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxl. (1885) «5.—Madag.
conchiferum, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 206.—Afr. austr.
cornutum, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1885) 538.—Ins. Comor.
Cowanii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 484.—Madag.
"assum, *Thou. Orch. Afr.* tt. 70 et 71.—Madag.
"yptodon, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) I. 807.—Madag.
wcullatum, *Thou. Orch. Afr.* t. 48.—Ins. Mascar.
culiciferum; *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1885) 688.—. Jns. Comor.
aescendens, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) I. .. 658.-Hab.?
aistichum, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1781.—Afr. trop.
eburneum, Lindl. 1. c. (1882) xviii. 1522=superbum.
e|»nmeum, *Bory, Voy.* i. 859. t. 19.—Ins. Borbon.
«<»«, Thou. Orch. Afr. t. 79=Cryptopus eUtus.
«lisii, *Reichb. f. in Flora,* lv. (1872) 278.—Madag.
*pansum, *Thou. Orch. Afr.* t. 67.—Ins. Mascar.
Jalcatum, *Lindl. Coll. Bot.* 15.—China.
*asciola, *Lindl. Bot. Reg.* xxvi. (1840) sub t. 68.—. Demeraia.
wstuosum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) II. 748, *4.—Madag.
p.icornu, *Thou. Orch. Afr.* t. 52.—Ins. Mascar.; Madag.
""forme, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 248.—Ind. occ.
"orulentum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1885) I. 787; «n *Flora,* lxviii. (1885) 380.—Ins. Comor.
"agrans, *Thou. Orch. Afr.* t. 54.—Ins. Mascar.
finale, Lindl. in Gard. Chron. (1846) 135=Dendrophylax funalis.

ANOEAECUM:—
fuscatum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 488.—Madag.
Galeandrae, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 189.—Afr. occ.
Gilpinae, *Reichb. f. & S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 206.—Madag.
gladiifolium, *Thou. Orch. Afr.* t. 53.—Ins. Mascar.; Madag.
globulosum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 285 = Guyonianum.
glomeratuni, *Ridl. in Card. Chron.* (1885) II. 678.—Afr. trop.
gracile, *Thou. Orch. Afr.* t. 77.—Ins. Mascar.
Grantii, Bateman, ex Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. (3876) 153-Kotschyi.
Guyonianum, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 865.—Abyss.
Hildebrandtii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) I. 725.—Afr. trop.
Humblotii, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1885) 881.—Ins. Comor.
hyaloides, *Reichb.f..in Gard. Chron.* (1880) I. 264.—Madag.
ichneumoneum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 136.—Afr. occ.
imbricatum, *Lindl. 1. c.* 187—Afr. occ..
implicatuin, *Thou. Orch. Afr.* t. 58.—Madag.
inapertum, Thou. 1. c. t. 50= Mystacidium inapertum.
infundibulare, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 136.—Afr. occ.
jamaicense, *Reichb. f. & Wullschl. in Walp. Ann.* vi. 901.—Jamaic.
japonicum, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 64.—Japon.
Kotschyi, *Reichb. f. in Gard. Chron..* (1880) II, 456.—Afr. trop.
Lansbergii, *Reichb. f. in Nederl. Kriudk. Arch.* iv. (1859) 316.—Caracas.
Leonis, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1885) II. 80-81 = Aëranthus Leonis.
lepidotum, *Reichb. f. 1. c.* (1880) I. 806, in obs.—Hab.?
Lindenii, *Lindl. 1. c.* (1846) 185.—Cuba,
luridum, *Lindl. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 98.—Afr. trop.
maculatum, Lindl. Coll. 15 = Eulophia macnlata.
maxillarioides, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 479—Madag.
megalorrhizum, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 117.—Afr. trop.
micranthum, *Lindl. Bot. Reg.* xxi. t. 1772.—Afr. trop,
modestum, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6698. Madag.
monodon, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 102.—Afr. occ.
monophyllum, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. ir.'(1828) 58 = Eulophia monophylla.
multiflorum, Thou. Orch. Afr. t. 74- Mystacidium caulescens.
Mystacidii, *Reichb. f. in Linnaea,* xx. (1847) 677.—Natal,
odoratissimum, *Reichb. f.in Bonplandia^.* (1866) 826.—Hab. ?
organense, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 901.—Bras,
omithorhynchum, *Lindl. Bot. Reg.* xxvi. (1840) sub t. 68.—Bras.
palmatum, Thou. Orch. Afr. t. 69 - palmiforme.
palmiforme, *Thou. 1. c.* 68.—Ins. Mascar.
parviflorum. *Thou. 1. c.* t. 60.—Ins. Mascar.
parvulum, *Ayres, ex Baker, Fl. Maurit.* 857.—Ins. Mascar.
pectimtum, *Thou. Orch. Afr.* t. 51.—Ins. Mascar.; Madag.
pellucidum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 134.—Afr. occ.
pertusum, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 205.—Afr. occ.
Pescatorianum, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* iv. (1849) 263.—Ins. Borbon.
physophorum, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* (1881) 77 et 449.—Ins. Mascar.
Poeppigii, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 858.—Cuba,
polystachyum, *Lindl. Bot. Reg.* xxvi. (1840) sub t. 68.—Peruv.
polystachyum, *A'. Rich, in M4m. Hist. Nat. Par.* iv. (1828) 66=Aeöniapolystachya.
pugioniforme, *Klottsch, Ind. Sem. Hort. Berol. Apt.* (1361) 12.—Venezuela.

ANGHAECUM :—
pusillum, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 205.—Afr. anstr.
pygmaeum, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 64.—Japon.
ramosum, *Thou. Orch. Afr.* t. 59.—Ins. Mascar.
rectum, *Thou. I. c.* 55.—Ins. Mascar.
recurvum, *Thou. I. c.* t. 56.—Ins. Mascar.
rhipsalisocium, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 189.—Afr. occ.
Rohrii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 117.—Abyss,
rostellare, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1885) 380; *et in Gard. Chron.* (1885) I. 726.—Ins. Comor.
rostratum, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 485.—Madag.
Rutenbergianum, *Kraent*. in Bremen Abh.* vii. (1882) 257.— Afr. trop.
sacdferum, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 205.—Afr. austr.
Schiedei, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 857 = Campylocenlron Schiedei.
Schimperianum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* iii. 573.—Abyss.
Scottianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) II. 656.—Ins. Comor.
Sedeni, Hort. ex Nichols. Diet. Gard. i. 79 =arcuatum.
Sellowii, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 867.—Bras,
sesquipedale, *Thou. Orch. Afr.* tt. 66 et 67.—Madag.
spathulatum, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 478.—Madag.
striatum, *Thou. Orch. Afr.* t. 72.—Ins. Mascar.
subulatum, *Lindl. in. Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1886) 206.—Afr. occ
superbum, *Thou. Orch. Afr.* tt. 62 et 64.—Madag.
tenue, *Lindl. Bot. Reg.* xxvi. (1840) sub t. 68.—Bras,
teretifolium, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 484.—Madag.
tridens, *Lindl. I. c.* vi. (1862) 135.—Afr. trop.
tridentatum, *Ham. Thes. Cap.* ii. 6.—Afr. austr.
triquetrum, *Thou. Orch. Afr.* t. 49.—Ins. Mascar.
vagans, *Lindl. in Journ. Linn. Soc* vi. (1862) 185.—Afr. occ.
virens, Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 19=ebumeum.
vesicatnm, *Lindl. I. c.* (1848) *Misc.* 6.—Afr. trop.
Wdgelti, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 857.—Guiana,
xylopus, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1885) 538.—Ins. Comor.
yuccacfolium, *Boj. Hort. Maurit.* 818.—Ins. Maurit.
7eylanicum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 40.—Ind. or.

ANGOTXLAHIA, R. Br. Prod. 273 (1810). *LIUACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 824.
australis, F. Muell. Fragm. vii. 74=dioica.
biglandulosa, R. Br. Prodr. 278=dioic.i.
capensis, Spreng. Syst ii. 146-Androcymbinm leucan thum.
caricina, *Schult.f. Syst.* vii. 1539.—Ind. or.
cochinchinensis, *Spreng. Syst.* ii. 147.—Cochinch.
densiflorae *Benth. Fl. Austral,* vii. 29.—Austral.
dioica, *R. Br. Prod.* 273.—Austral.
Heyneana, Wall. Cat. n. 5086 = Iphigenia indica.
indica, R. Br. Prod. 273 = Iphigenia indica.
monantha, Endl. in Lehin. Fl. Preiss. ii. 45 = dioica.
pygmaea, Endl. 1. c. = Wurmbea pygmaea.
racemosa, Schult. f. Syst. vii. 1589 = Iphigenia indica.
tenella, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 45=Wurmbea tenella.
uniflora, R. Br. Prod. 278=dioica.

ANGUILLARIA, Gaert. Frnct.i. 372(1788) = Ardisia, Sw. (MyrsinA
bahamensis, Gaertn. 1. c. 373 =Ar. excelsa.
Barthesia, Lam. Illustr. ii. 109 = Ar. Barthesia.
chrysophylla. Lam. 1. c. = Ar. serrulata.
coriacea, Poir. Encyc. vii. 6l*5 = Ar. coriacea.
crenulata, Poir. 1. c 688=Parathes.is erenulata.
excelsa, Lam. Illnstr. ii. 110=Ar. excelsa.
Icaeorea, Lam. 1. c. 109 = Ar. acuminata.
lateriflora, Lam. 1. c. = Ar. lateriflora.
latifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 98 = AT. laurifolia.
laurifolia, Lam. Illustr. ii. 109 = Ar. laurifolia.
parasitica, Lam. 1. c. = Grammadenia parasitica.
pyratnidalis, Cav. Ic. vi. 1 = Ar. pyramidalis.
serrata, Cav. 1. c. 2 = Ar. Cavanillesii.
serrulata, Poir. Encyc. vii. 686=Ar. serrulata.
solanacea, Poir. 1. c. 688=Ar. humilis.

ANGUILLARIA:—
tinifolia, **Lam. Illustr. ii. 109-Ardisia tinifolia.**
meylanica, **Gaertn. Fnict i. 878. t. 77. £ 1-Ar. Moonii.**

ANGUINA, Mich, ex Lino. Syst. ed. I. (1735)-TrichoBanthes, Linn. (Cuonrb.).

ANGU1NUM, Foun. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. 160 (1869) = Allium, Toum. (Liliac).
Victorialis, **Foun. 1. c.=Allium Victorialis.**

AVCtTTLOA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 118. t. 26 (1794). *ORCHWEAE,* **Berth. & Hook. f. iii. 645.**
Clowesii, *Lindl. Bot. Reg.* **(1844)** *Misc.* **26.—Venezuela,**
dubia, *Reichb.f. in Gard. Citron.* **(1882) I. 764.—N. Granat.**
ebumea, *Hort. ex Nichols. Diet. Gard.* **i. 79.—N. Granat.**
grandiflora, **H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. i. 845 = Stanhopea Bucephalus.**
Hernandezii, **Kunth, Syn. i. 882 = Stanhopea tigrina.**
Hohenlohii, *Morr. in Belg. Hortic.* **iii. (1853) 201. t. 81.—N. Granat.**
lurida, **Link, in Prenss. Gait. Ver. i. 289. t: 8 = Catasetum luridum.**
media *x,Reichb.f. in Gard. Ckron.* **(1881) II. 88.**
purpurea, *Linden, in Illustr. Hortic.* **xxviii. (1881) t. 427.—Venezuela.**
Rucleri, *Lindl. Bot. Reg.* **(1846) t 41.—N. Granat.**
squalida, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* **i. 74.—Pernv.**
superba, **H. B. &K. Nov. Gen. et Sp. i. 843. t. 98 = Acineta Humboldtii.**
uniflora, *Ruim & Pav. Syst.* **228.—Peruv.**
virginalis, **Hort.—Cf. Gard. Chron. (1851) 892 = uniflora.**

ANGTTBIA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I. (1785). *CUCURBITACEAE,* **Benth.** *Be* **Hook. f. i. 833.**
aculeolata, **Schlecht. in linnaea, xxiv. (1851) 748 = Wilbrand a verticillata.**
affinis, **Schlecht. 1. c. 760 = pedata.**
Arrabidae, **Schlecht. 1. c. 736 = Gurania multiflora.**
hignoniacea, **Poepp. & Endl. NOT. Gen. et Sp. ii. 53 = triphylla, Gurania cissoides.**
Boissieriana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* **iii. 673.—Perav.**
capitata, **Poepp. & Endl. NOT. Gen. et Sp. ii. 62 = Gurania capitata.**
eissoides, **Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 242 = Gurania eissoides.**
Ctlrullus, **Mill. Gard. Diet ed. VIII. add.=Citrullus vulgaris.**
dentata, **Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 713 = pedata.**
dubia. **Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 292 = Cayaponia attenuata.**
eriantha, **Poepp. & Endl. NOT. Gen. et Sp. ii. 52. t. 169 = Gurania eriantha.**
eriantha, **Seem. Bot. Voy. Herald, 127=Gnrania Seemanniana.**
Gaudichaudiana, **Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 753 = Wilbrandia verticillata.**
glomerata, **Eggers, Fl. St. Croix & Virgin. Isl. 55 = Corallocarpus glomeratus.**
grandiflora, *Cogn. in Mint. Cour. Acad. Belg.* **8vo. xxvii. (1877).—Bras.**
guianensis, **Klotzsch, in Schomb. Reis. Brit. Guian. iii. 988 = Gurania guianensis.**
heterophylla, **Willd. ex Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 772 = Gurania eissoides.**
integrifolia, *Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* **xii. (1824) 9.—Bras,**
indica, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* **v. (1790) ed. I. Art. iv. 6.—Malaya.**
Jacquiniana, **Schlecht in Linnaea, xxiv. (1851) 708 = trilobata.**
Kegeliana, **Schlecht. 1. c. 776=- Gurania Kegeliana.**
Kunthiana, *Schlecht. 1. c.* **762.—Bras.**
laciniosa, **Schlecht. 1. c 755 = Apodanthera laciaiosa.**
leptantha, **Schlecht. 1. c. 779 = Helmontia leptantha.**
lobata, *Linn. Amoen. Acad.* **viii. 268.—Guian.**
longipedunculaU, *Cogn. in Mém. Cour. Acad. Belg.* **8vo. xxvii. (1877).—Mexie.**
Makoyana, **Lem. in FL des Series, Sér. I. Hi. (1847) 222 = Gurania Makoyana.**

ANGUBIA :—
Meyeniana, **Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 750 = Wilbrandia verticillata.**
multiflora, **Miq. in Linnaea, xviii. (1846) 366 = Gurania multiflora.**
obtusiloba, **Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 744 = (Vitis sp.).**
Ottoniana, *Schlecht. 1. c.* **758.—Cuba,**
pallida, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* **8vo. xxvii. (1877) 10, 22.—Ecuador.**
pedata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* **8.—Ins. S. Doming.**
pedata, **Willd. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 828 = Cyclanthera leptostachya.**
pedatisecta, **Nees & Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xii. (1824) 10=Cyclanthera pedata.**
pedisecta, *Nees & Mart. I. c.*=**Apodanthera pedisecta.**
Plumieriana, *Schlecht. in Linnaea,* **xxiv. (1851) 709. —Ins. Martinic.**
Poeppigiana, **Schlecht. 1, c. 769=Dieudonnaea rhizantha.**
polyanthos, **Klotzsch, in Schomb. Reis. Brit. Guian. iii. 988 = Gurania Klotzschiana, G. subnmbellata.**
polyphyllos, **Schlecht in Linnaea, xxiv. (1851) 712 = pedata.**
rhiiantha, **Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 52. t. 171 = Dieudonnaea rhizantha.**
rosea, **H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 122 = trilobata.**
Schombnrgkiana, *Schlecht. in Linnaea,* **xxiv. (1851) 765.—Guiana.**
Sellowiana, **Schlecht. 1. c. 746 = Gurania Sellowiana.**
Sellowiana, **Wawra, Bot Maximal. Reise, i. 67. t. 52 = Gurania Wawraei.**
sinuata, **Benth. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 242 = Gurania sinuata.**
spedosa, **Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 51.1.169 ~ Gurania speciosa.**
spinulosa,?oepp. **& Endl.** *1.* **c. 52. t. 170=Gurania gpinulosn.**
subumbellata, **Miq. in Nat. Verh. Wet Haarl. vii. (1851) (Stirp. Sunin. Select.) 108 = Gurania subumbellata.**
temata, *M. Roem. Syn. Pepon.* **i. 26.—Bras.**
trifoliata, **Aubl. PI. Guian. ii. 842 = Gurania eissoides.**
trifoliata, *Linn. Sp. PI.* **ed. II. 1376.—Ins. S. Doming.**
trifoliata, **Veil. Fl. Flum. x. t. 2-ternata.**
trilobata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* **81.—N. -Granat**
trilobata, **Veil. Fl. Flum. x. t. l=Guraaia multiflora.**
triphylla, **Klotzsch, in Schomb. Reis. Brit. Guian. iii. 968 = Schombnrgkiana.**
triphylla, *Miq. in Linnaea,* **xix. (1847) 136.—Guian.**
umbrosa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 121.—Mexic.**
Wageneriana, **Schlecht in Linnaea, xxiv. (1851) 785 = Gurania Wageneriana.**
Warmingiana, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* **8vo. xxvii. (1877) 21.—Bras.**
Warmingii, *Cogn. I.* **c—Bras.**
Warscewicriana, **Hort. Belg. ex Cogn. 1. e. 18 = seq.**
Warscewiczii, *Hook. f. in Bot. Mag.* **t. 6804.—Mexic.**

ANGUSTINEA, A. Gray, Bot. U. St Expl. Exped. i. 598, in syn. (1854) = AUGUSTINEA, St. Hil. & Naud.=Mioonia, Ruiz & Pav. (Melast).

ANHALONIUM, Lem.Cact. Nov. Gen. et *Sp.* **L (1839)-Mammillaria, Haw. (Caot.).**
areolosum, **Lem. Illustr. Hortic. vi. (1859) Misc. 36.—Mexic.**
elongatum, **Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. (1845) 15 = M. elongata.**
Engelmanni, **Lem. Cact. 42=M. fissurata.**
fissipedum, **Monv. Cat ex Korst. Cact. Handh. ed. II. i. 23'2=sulcatnm.**
fissuratum, **Engelm. Cact. Mex. Bound. 75-M. fissurata.**
KoUhubeyi, **Lem. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 5 = Mammillaria sulcata.**
Kttschoubeyanum, **Lem. Cact. 41; Illustr. Hortic. xvi. (1869) Misc. 72.—Mexic.**
prismaticum, **Lem. Cact. Nov. Gen. et Sp. 1«M. prismatic.**
pulvilligerum, **Lem. Illustr. Hortic xvi. (1869) 72; Hort. Monv. i. 275-Mammillaria elongata.**

ANHALONIUM :—
retusum, **Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. (1845) 15-Mammillaria prismatica.**
sulcatum, **Salm-Dyck, 1. c. ed. II. 5, 78.—Mexic.**
***Williamsii,* Lem. ex Korst. Handb. Cact. ed. II. i. 283 =Echinocactu3 Williamsii.**

ANIA, Lindl. in Wall. Cat. n. 3740-41; et Gen. et Sp. Orch. 129 (1831)=Talnia, Blame (Orchid.).
angustifolia, **Lindl. in Wall. Cat n. 3740.—Ind. or. ; China.**
bicornis, **Lindl. in Bot. Reg. (1842) Misc. 87 - T. bicornis.**
lati/olia, **Lindl. in Wall. Cat. n. 3741-T. latifolia.**
laHfolia, **Wight, Ic. PI. iii. 914 = T. bicornis?**
maculata, **Thw. Enum. PI. Zeyl. 801 = (Chrysoglossi sp.).—Zeylan.**

ANIBA, Aubl. PI. Gui. I. 327 (1775)-Oootea, Aubl. (Laurin.).
guianensis, **Aubl. 1. c = O. commutata.**

ANICTOCLEA, Nimmo, in J. Grah. Cat. PI. Bomb. 252 (1839)=Tetrameles, R. Br. (Datisc.).
Grahamiana, **Nimmo, 1. c. = T. nudiflora.**

ANIDRUM. Neck. Elem. i. 188 (1790) -Bifora, Hoffm. (Umbell.).

ANIGOSIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 327 = Anigozanthoa, Labill. (Haemodor.).
flavida, **Salisb. 1. c. = Anigozanthos flavida.**

ANIGOZAKTHOS, LabiU. Voy. i. 409. t. 22 (1798). *HAEMODORACEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 676.**
ANIGOSIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 827.
SCHWAEGRICHEMA, Spreng. Syst ii. 2b (1825).
bicolor, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* **ii 26.—Austral.**
coccinea, **Paxt. Bot. Mag. v. 271 = flavida.**
flavescens, **Steud. Norn. ed. II. i. 98 = flavida.**
flavida, *[DC. in] Red. Lil.t.* **176.—Austral.**
fuliginosa, **Hook. Bot. Mag. t. 4291 = Macropodia fumosa.**
grandiflora, **Satisb. Parad. Lond. t. 97 = flavida.**
humilis, *Lindl. Swan Riv. App.* **46. t. 6 B.—Austral.**
Manglesii, *D. Don, in Sweet, Brit. Fl. Gard.* **Ser. II. t. 265.—Anstral.**
Manglesii, **Maund, Botanist, t. 67 = flavida.**
minima, **Lehm. PI. Preiss. ii. 274 = Preissii.**
Preissii, *Endl. in Lehm. I. e.* **26.—Austral,**
pulcherrima. *Hook. Bot. Mag.* **t. 4180.—Austral,**
rufa, *Labill. Voy.* **i. 409. t/22.—Austral.**
tyrianthina, **Hook. Bot. Mag. t 4507 =rufa.**
viridis, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* **ii. 25.—Austral.**

ANILEMA, Kunth, Enum. PI. iv. 64 (1843)=Aneilema, R. Br. (Commel.).

ANIOTUM, Soland. ex Endl. Gen. 332 (1837) = Inoarpus, Forst. (Legum.).

ANISACANTHA.R. Br. Prod. 410 (1810). *CHENOPODIACEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 62.**
bicornis, **F. MuelL Fragm. vii. 14 = Sderolaena bicomis.**
bicuspis, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* **(1865) 188.—Austral.**
Birchii, *F. Muell. Fragm.* **viii. 163.—Austral,**
brevicuspis, *F. Muell. 1. c.* **iv. 150.—Austral.**
diacantha. **Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 636=Sderolaena diacantha.**
divaricata, *R. Br. Prod.* **410.—Austral.**
Drummondii, *Benth. Fl. Austral,* **T. 199.—Austral,**
echinopsila, *F. Muell. Fragm.* **vii. 14.—Austral,**
erinacea, *Moq. in DC. Prod.* **xiii. II. 122.—Austral,**
glabra. *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **v. 200.—Austral.**
gracilicuspis, *F. Muell. Fragm.* **ii. 170.—Austral.**
incana, **A. Cunn. ex Moq. in DC. Prod, xiii II. 122-muricata.**
kentropsidea, **F. Muell. in Trans. Viet Inst (1855) 133 =Sclerolaena diacantha.**
lanicuspis, **F. Muell. Fragm. ii. 170 = Sclerolaena lanicnspis.**
mnricata, *Moq. Chenup. Enum.* **84.—Austral.**
quinquecuspis, **Muell. in Trans. Viet. Inst. (1885) 134 =muricata.**
tricuspis, *F. Muell. 1. c.* **133.—AustraL**

ANIBACANTHTJS, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 807. *ACANTHACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1117.
BIRNBAUMIA, KosteL Ind. PL Hort. Pr»g. (W«) 21.
pregBii, *A. Gray, Synop. Fl. N. Am.* **ii. 828.—Mexic.**
juncea, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **622.—Mexic.**
pumilus, *Nees, in DC. Prod.* **xi. 445.—Mexic.**
Thurberi, *A. Cray, Synop. Fl. N. Am.* **ii. 828.—Am. bor.**
TJJgularis, *Nets, in DC. Prod.* xi. 446.—Mexic.
Wnghtii, *A. Gray, Synop. FL' If. Am.* **ii. 828.—Am. bor.**

ANKACTIS, Dulac, FL Hantes-Pyr. 847 (1867) = Carum, Linn. (Umbell.).
HgttalU, **Dulac, 1. c.=C. Petroselinum.**

ANISADBNIA, Wall. Cat. n. 1610 (1880). *UNEAE,* . Benth. & Hook. f. i. 248.
***hasyana,* Griff. Notul. : •. 584 = saxatilis.**
pobescens, *Griff. I. „* **686.—Reg. Himal.**
»"a«Us, *Wall. Cat.* **n. 1B10.—Reg. Himal.**

ANISANDRA, Bartl. in Lehm. PL Preiss. i. 861 (1846) = Mioroeopya, R. Br. (Labiat.).
***Glaira,* Bartl. 1. c.-M. glabra.**

ANISANDRA, Planch, ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 848 »»«yn. (1868) = Ptychopetaluin, Benth. (Olacin.).
"greseens, **Planch. 1. c. =P. anceps.**

ANISANTHA, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 894 - Bromus, Linn. (Gramin.).
pontica, **C. Koch, 1. c. = B. tectorum.**

ANISANTHERA, Griff. Notnl. iv. 100 (1864) - Ada- •"•ma, R. Br. (Scrophul.).

ANKANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1886) = Caooinia, Savi (Borag.).
tthata, **Rafin. 1. c = C. Rauwolfii.**

ANBANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 60 (1886) = Crotalaria, Toum. (Legum.).
hastqta, **Rafin. L c. 61=C. verrncosa.**
verstcolor. **Rafin. 1. c 60=C. verrucosa.**

ANBANTHUS, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 896 (1827)- Aatholyza, Linn. (Irid.).
"Vfriwow, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 844-Antholyia abyssinica.
e«rw>pkyllaceus, **KUtt, 1. c= Watsonia homilis.**
C«»on.a, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 897=Anth. Cunonia.
***£*•»*». KUtt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 344.-Afr. trop.**
V^rangularis, **Sweet, Hort. Brit. ed. I. 897-Anth. qnadrangularis.**
***oceaha,* Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867-68) 800=Anth. aaccata**
splendent, **Sweet, Brit Flow. Card. Ser. II. i. t 84 = Anth.caffra.**

ANISANTHUS, Willd. ex Roem. & Schult. Syst y. p. *»(1819)=Symphorioarpos, Juss. (Caprifol.).
" W * * , Willd. ex Roem. *Sc* Schult. L c 223 = «• microphyllus.

ANISEIA, Choisy (Conv. Or. 99) in Mém. Soc Genev. !£ (1838) 481; viii. (1838) 65=Ipomoea, Linn. IVonvolv.).
<*/««», G. Don, Gen. Syst iv. 296-Hewitti. bicolor.
" ^•«a, Meism. in Mart Fl. Bras. vii. S19.-Bras.
«w<:Kellogg, in Proc. Calit Acad. r. (1878) 88.- Cali.
***barlerioides,* ChoUy, Conv. Or. 102=1. barlerioides.**
***bifiora,* Choky Lc. 101=1. bifiora. „ . .. ..**
***bracteata,* Hassk. PL Rar. Jav. 616-HewittHi bicolor.**
'^»«.Chotay,Ccov.Or.lOO=Lcalyciiia.
'"ystegtoides, Choisy, in DC. Prod. **• *8[1=1sI]- crassipes.
ca»«eu, Griseb. FL Brit W. Ind. 471, *pkalm.= cernua.
***cernua,* 88.—Bras.**
***costata,* Nat. Cur. xix. Suppl. 1. (1843)**
***diversifol*Vi, Walp. Lt-ChiU.**

ANISEIA:—
emarginata, Hassk. Cat Hort. Bog. Alt 189 - Ipomoea martinicensis.
***ensi/olia,* Choiiy, Conv. Rar. 144=1. martinicensis.**
***fulvicaulis,* Hocfast ex Choisy, in DC. Prod. ix. 481.—Abyss.**
***gracillima,* Choisy, 1. c. 430.—Bras.**
***hastata,* Meisso. in Mart. Fl. Bras. vll. 819-1. phylloneura.**
***heterantha,* Choisy, in DC. Prod. ix. 480.—Bras.**
***heterophylla,* Meissn. in Mart. FL Bras. vii. 821=1. heterophylla.**
***martinicensis,* Choisy, Conv. Rar. 144=1. martinicensis.**
***Medium,* Choisy, Conv. Or. 100=1. denticulata.**
***nitens,* Choisy, Conv. Rar. 145.—Bras.**
***salieifolia,* Choisy, 1. c. 144=1. martinicensis.**
***tomentosa,* Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 821=1. martinjcensis.**
***unifiora,* Choisy, Conv. Or. 101 = 1. martinicensis.**
***Velloaiana,* Choisy, in DC. Prod. ix. 480.—Bras.**

ANISEION, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. 119 (1880)=praec.

ANISEPTA, Rafin. Cat 18 (1824)=Croton, Linn. (Euphorb.).
***graveolens,* Rafin. 1. c.—Am. bor.**

ANISOCALYX, Hance, in Walp. Ann. iii. 195 (1868) = Herpestis, Gaertn. (Scrophul.).
***limnanthiflorus,* Hance, L c - H . Monniera.**

ANISOCARPUS, Nutt. in. Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 888=Madia, Molina (Compos.).
***Bolanderi,* A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 860=M. Bolanderi.**
***madioides,* Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. Ser. II. vii. (1841) 388=M. Nnttallii.**

ANISOCENTRA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 59S=Tropaeolum, Linn. (Geran.).
***cardiopetala,* Turcz. 1. c.=T. speciosum.**

ANISOCENTRUM, Turcz. in BnlL Soc. Nat. Mosc. (1862) I. 322=Acisanthera, P. Br. (Melast).
***Gardneri,* Turcz. L c. 323 = Ac. punctatissima.**

ANISOCHAETA, DC. Prod. v. 109 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 498.
mikanioides, *DC. 1. e.* 110.—Afr. anstr.

ANTSOCHILUS, Wall. PI. As. Rar. ii. 18 (1831). *LABI ATAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1177.
adenanthus, *Dal*. & Gibs. Bomb. Fl.* 206.—Ind. or.
***albidus,* Wight, Ic. iv. t 1435=dysophylloides,**
caraosus, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 18.—Ind. or.
***crassus,* Benth. in DC. Prod. xii. 81-caraosns.**
***decussatus,* Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 206=eriocephalus.**
dysophylloides, *Benth. in Wall. PL As. Rar.* ii. 19.—Ind. or.
eriocephalus, *Benth. in DC. Prod,* xii 81.—Ind. or.
euneurus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 957.—Java.
***glaber,* Schrad. Ind. Sem. Hort. Gott. (1883) 1 = carnosus.**
pallidns, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 18.—Ind. or.
panicnlatus, *Benth. in DC. Prod.* xii. 82.—Ind. or.
plantagineus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 628.—Ind. or.
polystachys, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* ii. 19.—Ind. or.
***purpureus,* Wight, Ic iv. t. 1435=dysophylloides.**
robustus, *Hooh.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 629.—Ind. or.
***rupestris,* Wight, ex Hook. f. FL Brit. Ind. iv. 627 = camosus.**
scaber, *Benth. in DC. Prod,* xii 81.—Ind. or.
sericens, *Benth. 1. c.* 82.—Ind. or.
sinensis, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 827.—China.
suffrnticosiis, *Wight, Ic.* iv. 11437.—Ind. or.
***suffruticosus,* Thw. Enum. PL Zeyl. 288-paniculatust**
verticUlatus, *Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 629.—Ind. or.
Wightii, *Hook./. L c.* 628.—Ind. or.

ANI80C0UA, Ton. & Gray, in Bost. Jonm. **Nat** Hist. v. (1844) 111. t 18. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 518.
PTEROSTEPHANUS, Kellogg, in Proc. CaliC Acad. iii. (1888) 20. f. 4.
acaulis, *Torr. & Gray, 1. c.*—Calif.

ANISODENS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 485 (1867) = Scabiosa, Toum. (Dipsac).
***arvensis,* Dulac, 1. c. = S. arvensis.**
***longifolius,* Dulac, 1. c = S. sylvatica.**
***sylvaticus,* Dulac, 1. c. = S. sylvatica.**

ANISODERIS, Cass. in Diet. Sc Nat XIYUL 429 (1827) =Crepis, Linn. (Compos.).
***foetida,* Fisch. & Mey. Ind. Sem. Petrop. iv. 32=C. foetida.**
***rhoeadifolia,* Fisch. & Mey. 1. c.=C. foetida.**
***rubra,* Cass. in Diet. Sc Nat. xlviii. 429=C. rubra.**

ANISODONTEA, Presl, Bot Bemerk. 18 (1844) (in Abh. Boehm. Ges. Fol. V. iii.) = Sphaeraloea, St. Hil. (Malvac).
***Dregeana,* Presl, L c.=S. Dregeana.**

ANISODUS, Link & Otto, Ic. Sel. PL 77. t. 35 (1824) - Soopola, Jacq. (Solanac).
***humilis,* Hook. f. ex C. B. Clarke, in FL Brit Ind. iv. 242 = Mandragora caulescens.**
***luridus,* Link & Otto, Ic. Sel. PL 77 *=S. lurida.**
***stramonifolius,* G. Don, in Loud. Hort Brit. 61=S. lurida.**

ANISOLEPIS, Steetz, in Lehm. PL Preiss. i. 446 (1846) - Helipterum, DC. (Compos.).
***Pyrethrum,* Steetz, 1. c. 447 = H. Pyrethrum.**

ANISOLOBUS, A. DC. Prod. viii. 395 (1844) - Odontftdenia, Benth. (Apocyn.).
***anuuonicus,* Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 114. —Bras.**
***anomalus,* Heurck *Sc* Muell. Arg. Obs. Bot 160.—Peruv.**
***cognatus,* Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1.118. —Bras.**
***Cururu,* Muell. Arg. 1. c 112.—Bras.**
***distinctus,* Miers, Apocyn. S. Am. 169.—Am. austr.**
***Fockei,* Miq. in Nat Verh. Wet. HaarL vii. (1851) (Stirp. Sunn. Sel.) 159.—Guian.**
***gracilipes,* Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 116.—Bras.**
***hebecarpus,* Muell. Arg. 1. c. 111.—Bras.**
***Hostmanni,* Miq. in Nat. Verh. Wet. Haarl. vii. (1851) (Stirp. Surin. Sel.) 159.—Surinam.**
Kappleri,* Miq. in Linnaea, xviii. (1844) *1ST = Curun.
***oblongus,* Miers, Apocyn. S. Am. 169.—Am. austr.**
***Perrottetii,* A. DC. in DC. Prod. viii. 395.—Bras.**
***Pohlianus,* Miers, Apocyn. S. Am. 171.—Am. austr.**
***psidiifolius,* Miers, 1. c. 172.—Am. austr.**
***pulcherrimus,* Miers, 1. c. 171.—Am. austr.**
***puncticulosa,* Miq. in Nat. Verh. Wet Haarl. vii. (1851) (Stirp. Surin. Sel.) 158.—Guian.**
***rubidulus,* Miers, Apocyn. S. Am. 178.—Am. austr.**
***Salimanni,* A. DC. in DC. Prod. viii. 396.—Bras.**
***Sprucei,* Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1.114.—Bras.**
***Stadelmeyeri,* Muell. Arg. 1. c. 118.—Bras.**
***Zuccarinianus,* Miers, Apocyn. S. Am. 171.—Am. austr.**

ANISOLOTUS, Bemh. Sem. Hort Erf. (1837); Linnaea, xii. (1838) Litt. 75=HoBackia, Dougl. (Legum.).
***anthylloides,* Bemh. 11. cc-H. subpinnata.**
***Poeppigiana,* Bemh. 11. cc.—Chili.**
***Wrangeliana,* Bemh. 11. cc. = H. subpinnata.**

ANISOMAXLON, Baill. Adansonia, xi. (1874) 197. *OLACMEAE.*
clnsiaefolium, *Baill. 1. c—N.* Caled.

ANISOMELES, R. Br. Prod. 503 (1810). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1207.
albiflora, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 976.—Malaya,
australis, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 226.—Austral,
candicans, *Benth. in Wall. PI. As. Rar. 15*9.—Ind , or.
enneata, *Jacq. Eel. PI.* 127.—Ind. or.
***disticha,* Heyne, ex Roth, Nov. PL Sp. 264=ovata.**
***furcata,* Loud. Hort. Brit. 282 = Craniotome versicolor.**
***glabrata,* Benth. in WalL Cat. n. 2041=ovata.**
Heyneana, *Benth. in Wall. PL As. Rar.* i. 59.—Ind. or.

ANODONTEA:—
Aucheri, D. Dietr. Syn. PI. iii. 643 = Alyssum foliosum.
canescens. Sweet, Hort Brit, ed II. 25=Alyssnm canescens.
dasycarpa, Sweet, 1. c. = Alyssnm dasycarpum.
edentula. Sweet, 1. c. ed I. 467 -Alyssum gemonense.
halimifolia, Sweet, 1. c. = Alyssum halimifolium.
macrocarpa, Sweet, 1. c. = Alyssum macrocarpum.
marginata, D. Dietr. Syn. PI. iii. 643=Alyssum marginatum.
meniocoides, D. Dietr. 1. c=Alyssum meniocoides.
peltarioides, D. Dietr. 1. c. = Alyssnm peltarioides.
pyrenaica, G. Don, Gen. Syst. i. 180=Alyssum pyrenaicnm.
rupestris,Sv/eet, Hort Brit. ed. 1.467 = Alyssum rupestris.
spinosa, Sweet, 1. c> Alyssum spinosum.
tenuifolia, G. Don, Gen. Syst. i. 180 = Alyssnm tenuifolium.
xanthocarpa, D. Dietr. Syn. PI. iii. 643=Alyssnm macroitylum.

AlTODOPETAIiTnC, A. Cnnn. ex Endl. Gen. 818 (1839). *SAXIFRAGEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 652.
biglandulosum, *A. Cunn. ex Hook.f. Fl. Tasm.* i. 148.—Anstral.
glandulosum, Baill. Hist. PI. iii 878=biglandulosum.

AXTOECTOCHIIiUS, Blnme, Bijdr. 411. t. 15 (1825) (Anecochilus). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 598.
albo-lineatus, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc zxx. (1874) 141-=brevilabris.
albo-marginatus, *Lour. Encyc. PI. Suppl.* ii. 1539.—Cochinch.
argenteus, Hort. ex Loud. Hort. Brit. Snppl. iii. 608 = Physurus argentens.
argyroneurus, *C. Koch Of Louche, in Berl. Allg. Garten*,* xxv. (1857) 4.—Java.
aureus, Hort. ex C. Koch & Lanche, 1. c. = setaceus.
bievilabrìu, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 499.—Ind. or.
Bnlleni, *Low, ex Morr. in Belg. Horiic.* xii. (1862) 10.—Borneo,
crispus, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 180.—Ind. or.
Croesus X, *Reichb. f. in Hamb. Garten*,* xvi. (1860) 424.—Hab.?
Dawsonianus, Low, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1868) 1038 = Haemaria discolor.
Dominii x.—*Cf. Burbridge, in Gard. Chron.* (1871) 44.
elatus, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 178.—Ind. or.
elongatus, *Miq. Ft. Ind. Bat.* iii. 734.—Java.
fiavescens, Blume, Bijdr. 412 = Odontochilus flavescens.
flavus, Benth. *8c* Hook f. Gen. iii. 598 = Odontochilus flavus.
Frederici-Augusti, *Reichb. f. in Hamb. Garten*,* xvi. (1860U77, 424.—Hab.t
glaber, *Miq. Fl. Ind. Bat.* üi. 783.—Malaya,
gracilis, *Blume, Bijdr.* 413.—Malaya.
grandifiorus, Lindl. in Journ. linn. Soc. L (1857) 179 =Odontochilus grandiflorns.
Hasseltii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 734.—Java,
intermedius, *Hort. ex Loud. Encyc. PI. Suppl.* ii. 1492.—Ind. or.
intermedius, *Reichb. f. in Hamb. Garten*,* xvi. (1860) 177.—Hab.?
Jaubertii, Gaudich. in Voy. Bonite, L 100 = Odontochilus Jaubertii.
lanceolatus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 499=Odontochilus lanceolatus.
latomaculatus, Hort. ex Blnme, Coll. des Orch. i. 50 = Roxburghii.
Lobbianus, Planch, in Fl. des Serres, Sir. I. v. (1849) 519 = Roxburghii.
longifiorus, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 294-Odontochilus longifloros.
Lewii, Hort. ex Loud. Encyc PI. Suppl. ii. 1492 = Dossmia marmorata.
luteus, Lindl. in Joufn. Linn. Soc. i. (1857) 179 = Odontochilus lanceolatus.
neglectns, *Blume, Orch. Arch.* 47 *in nota.*—Zeylan. t
occultus, *Miq. Fl. Ned. Ind.* iii 734.—Java.
Ordianus, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1869) 1236 = Haemaria discolor.
Ortgieti, *Hort. ex Van-Geert, Cat.* n. 70 (1873).—N. Granat.
Nerilleana, *Low, ex C. Morr. in Belg. Hortic.* xii. (1862) 10.—Hab. f

ANOECTOCHTLUS :—
pictus, Hort. ex Loud. Hort. Brit Suppl. iii. 608-Physurus pictus.
pubescena, *Blume, Bijdr.* 412.—Java,
regalis, *Blume, Orch. Arch. Ind.* 46.—Zeylan.
regalis, Low, ex C. Morr. in Belg. Hortic. xii. (1862) 4=setaceus.
Reinwardtii, *Blume, Orch. Arch. Ind.* 48.—Malaya.
Roxburghii, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7887.—Ind. or.
Ruckeri, *Low, ex C. Morr. in Belg. Hortic.* xii. (1862) 10.—Borneo.
Rumphii, *Low, ex C. Morr. I. c.* 5.—Malaya,
sandwicensis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 600.—Ind. Sandv.
setacens, Blume, Bijdr. 412.—Java. *
setaceus, Lindl. Bot. Reg. t. 2010=regalis.
setaceo-pictus, *C. Koch & Louche, in Berl. Allg. Garten*,* xxv. (1857) 4.—Hab.t
spicatus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 734.—Borneo.
striatus, Hort. ex Loud. Encyc. PL Suppl. ii. 1492 = Zeuxine regia.
uniflorus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 783.—Sumatra.
Veitchianus, Hort. ex Blume, ColL des Orch. i. 119 = Macodes petola.
xanthophyllus, Planch. Fl. des Series, Sér. I. v. (1849) 519 = Frederici-Augusti.

ANOOEIS8TJB, Wall. Cat. n. 4014 (1832) *COMBRETACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 687.
ANDEKSONIA,Buch.-Ham.ex\Vall Cat I.e. (1832).
acuminata, *Wall. Cat.* n. 4014.—Ind. or.
hirta, Wall. Cat. n. 4016=acuminata.
latifolia, *Wall. Cat.* n. 4015.—Ind. or.
leiocarpa, *Guill. & Perr. Tent. Fl. Seneg.* i 280. L 65.—Afr. trop.
myrtifolia, Wall. Cat. n. 4017-pendula.
pendula, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 171.—Ind. or.
phillyreaefolia, *Heurct & Muell. Arg. Obs. Bot.* 209.—Burma.

ANOGRA, Spach, in'Nouv. Ann. Mns. Par. iv. (1885) 339 = Oenotnera, Linn. (Onagr.).
Douglasiana, Spach, 1. c. 340=0. albicaulis.
Nuttalliana, Spach, 1. c = 0. albicaulis.
pinnatifida, Spach, 1. c 341=0. albicaulis.

ANOGYNA, Nees. in Hook. Jonrn. BoL it (1840) 895 = Iiagenocarpus, Nees (Cyperac.).
tremula, Nees, 1. c. =L. tremnla.

ANOIGANTHUS, Baker, in Joum. Bot xvi. (1878) 76. *AMARYLUDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii 722.
breviflorus, *Baker. I. c*—Natal.
luteus, Baker, 1. c. 77=breviflorus.

ANOMA.Lour. FL Cochinch. 278 (1790)=Moringa, Juss.
cochinchinensis, Lour. 1. c 280 (Caesalpinaeae sp. t).
Moringa, Lour. 1. c. 279 = M. pterygosperma.
Morunga, Lour. L c = M. pterygosperma.

ANOMALANTHUS, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 238=8imocheilus, Klotzsch (Ericac.).
discolor, Klotzsch, 1. c. 239.—Afr. anstr.
scoparius, Klotzsch, 1. c.—Afr. austr.

ANOMALOPTERIS, G. Don, Gen. Syst i. 647 (1831) = Acridooarpus, Guill. *8c* Perr. (Malpig.).
longifolia, G. Don, 1. c = A c Smeathmanni.
obovata, G. Don, 1. a = Ac. plagiopterus.
spicata, G. Don, 1.-c=Ac. Smeathmanni

ANOMALOSTEMON, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot 162. t. 28 (1861)«Cleome, Linn. (Capparid.).
bororensis, Klotzsch, L c.—Afr. trop.

ANOMALOTIS, Steud. Syn. PI. Gram. 198 (1866) = Trisetaria, Forsk. (Gramin.).
quinqueseta, Stend. 1. c. = T. quinqueseta.

AlfOBlAKTHODIA, Hook. f. in Benth. *8c* Hook. Gen. ii. 87 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. ft Hook, f. ii. 87.
auriculata,/foo*./. *I.e.*—Malaya.

ANOMANTIA, Rafin. ex DC. Prod. v. 617 (1836) = Verbeaina, Linn. (Compos.). (V. virginica, Linn.)

ANOMATHECA, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot i. (1805) 227=Iiapeirouflia, Poun. (Irid.).
a.tgolensis, Baker, in Joum. Bot xiv. (1876) 837.—Afr. austr.
calami/olio, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 355.—Afr. austr.
cruenta, Lindl. Bot. Reg. t. 1369.—Afr. austr.
grandiflora, Baker, in Joum. Bot xiv. (1874) 337—Afr. anstr.
juncea, Ker-Gawl. in Kon: *8c* Sims, Ann. Bot. i. (1806) 227 = L. juncea.
xanthospila, Ker-Gawl. ex Sprang. Syst i. 164.—Afr. austr.

ANOMAZA, Laws, ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 8'23=Iiapeirousia, Pourr. (Irid.).
excisa, Laws. Cat. 2; ex Salisb. 1. c. = L. juncea.

ANOMIANTHUS, Zoll. in Linnaea, xxix. (1857-58) 324. *ANONACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 27.
heterocarpus, *Zoll. 1. c.*—Ins. Bantam.

ANOMOCARPUS, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. vi. (1860) 351 ; Contrib. ii. 28 = Calicera, Cav.
axillaris, Miers, 11. cc. 352; 28.—Chili.
eryngioides, Miers, 11. cc. 353 ; 29 = C. eryngioides.
leucanthemus, Miers, 11. cc. 355; 31.—Chili.
puhrtnatus, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. vi. (I860) 354 = C. pulvinata.
subsessiliflorus, Miers, 1. c 352; Contrib. ii. 28=C. sessiliflora.
tenuifolius, Miers, 11. cc. 356; 33 = A. tennifolia.
tenuis, Miers, 11. cc. 856 ; 82.—Chili.

ANOMOCHLOA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 868. t. 23. *GRAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 1111.
macrantoidea, Pritz. Ind. Tc. 74 = marantoidea.
marantoidea, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xvi. (1851) 869.—Bras.

ANOMORHEGMIA, Meissn. Gen. i. 80S (1840)-Btauranthera, Benth. (Gesner.).
Miquelii, Meissn. 1. c. ii. 212=S. ecalcarata.

ANOMOSANTHES, Blume, Rumphia, iii. 161, in obs. (1847)-Hemigyrosa, Blume (Sapind.).
deficiens, Blume, 1. c = H. deficiens.

ANOMOSPERMUM, Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 228 = Actcphila, Blume (Euphorb.).
excelsum, Dalz. 1. c=ActepUila excelsa.

ANOMOSPERMTJlff, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 39. *MENISPERMACEAB,* Benth. & Hook. f. i. 35.
ELISSARKHENA, Miers, 1. c. Ser. III. xiii. (1864) 124.
axilliflorum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 4.—Cuba,
grandifolinm, *Eichl. in Flora,* xlvii. (1864) 388.—Bras.
Hostmanni, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 103-Schombnrgkii.
japurense, *Eichl. in Flora,* xlvii. (1864) 888.—Bras,
lncidum, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. HI. xiv. (1864) 103.—Guian.
nitidum, Miers, 1. c.=Schomburgkii.
oblongatum, *Miers, 1. c.*—Bras,
ovatum, *Miers, I. c.*—Bras,
reticulatum, *Eichl. in Flora,* xlvii. (1864) 888.—Bras.
Schomburgkii, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. II. vii. (1851) 102; Ser. III. xiv. (1864) 103.—Guian.

ANOMOSTEPHIUM, DC. Prod. v. 560 (1836)-A»-pilia, Thou. (Compos.).
angustifolium, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. vii (1848) 290=Aspilia foliacea.
buphthalmoides, DC. in Deless. Ic. Sel. iv. t 81.—Guadalup.
eUipticum, DC. Prod. v. 660=AspilU elliptica.
foliosum, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot vii (1848) 290 = Aspiliafoliosa.
oblongifolium, DC. Prod. v. 560 = AspilU foliacea.
ovatifolium, DC. 1. c-Aspilia ovalifolim.

ANONA, Linn. Syst. ed. I. (1785); Gen. ed. I. 158 (1737). *ANONACEAE*, Benth. & Hook, t L 27.
ANNONA, Linn. Hort. Cliff. 222 (1737).
wutiflora, *Mart. FL Bras.* ziii. I. 10.—Bros.
aethiopica, Steud. Nom. ed. II. ii. 787 = Xylopia aethiopica.
africana, *Linn. Sp. PL* 637.—Hab. I
amara, *Raeusch. Nom.* ed. III. 161.—Guiana.
Ambotay, *Aubl. PL Gui.* i. 616. t. 249.—Am. trop.
unplexicaulis, *Lam. Encyc.* ii. 127.—Madag.; Ins. Mascar.
•ntioquensis, *Linden, Cat.* n. 87 (1871).—N. Granat.
arenaria, Schum. & Tbonn. Beskr. Guin. Fl. 257 = senegalensis.
'romatica, Boj. Hort Maurit. 6 = Xylopia Richardi.
asiatica, Heyne, ex Wall. Cat mb n. 6475 = Unona pannosa.
•siatica, *Linn. Sp. PI.* 537.—Zeylan.
asiatica, Vahl, Symb. Bot. iii. 78 = Fonkahlii.
atabapensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 68.—Gnian.
aostralis, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 88.—Bras.
Milliflora, *DC. Prod.* i. 86.—Gnian.
Barteri. *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 477.—Aft. trop.
Kbracteata, Hook. Ic PI. iv. t. 328 - Gnatteria bibracteata.
Bonplandiana, H.B. & K. Nor. Gen. et Sp. v. 58 = muricata.
onllata, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 31.—Cuba.
<&<ans, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1873) 155.—Bras.
cascarilloides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 2.—Cuba,
cauliflora, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 16.—Bras.
Cherimolia, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Am. trop.
cherimolioides, *Triana & Planch, in Ann. Se. Nat.* Sir. IV. xvii. (1862) 27.—N. Granat
cheriqnensis, *Linden, Cat.* n. 87 (1871).—N. Granat.
mrysocarpa, Lepr. in Guill. & Perr. Tent. Fl. Seneg. i. 6=palustris.
«ysopetala,5<«<.»» *Flora*, xxvi. (1848) 754,—Guian.
•Awsophylla, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* xx. (1880) 53.—Ins. Mascar.
cinerea, *Dunal, Monog. Anon.* 71. t 8.— Ind. occ.
colorata. *Veil. Fl. Flum.* 239; v. t. 129.—Bras.
«aica, *Suit & Pav. Fl. Per.* v. t. 490; *ex G. Don, Gen. Syst.* i. 88.—Peruv.
WWophylla, *Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 27.—N. Granat
coriacea, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 6.—Bras,
comifolia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 33.—Bras,
ttusifolia, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 6.—Bras,
crotonifolia, *Mart. 1. c.* 46.—Bras,
densicoma, *Mart. 1. c.* ».—Bras,
depress*, *Baill. in Adansonia*, via. (1868) 267.—Mexic
>oica, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 34.—Bras.
distincta, Raeusch. Nom. ed. III. 160 = Forskablii.
Mstincta, Willem. in Ust Ann. Bot. xviii. 42 - Gnatteria Willemetiana.
dodecjpetala, Lam. Encyc it 127—Talauma Plnmieri.
tolabripetala, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 894 = Rollinia longifolia,
echinata, *Dunal, Monog. Anon.* p. 68. t 4.—Gnian.
'xalbida, Veil. FL Flum. 240; v. t. 131-Rollinia exalbida.
excelsa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 59.—Mexic.
exsucca, Dunal, Monog. Anon. 77 = Kollinia exsucca.
fcgifolia, *St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. xvii. (1842) 132.—Bras.
«*tida, *Mart. Fl. Bras.* xiii. 1.16.—Bros.
Jonkahlii, *DC. Syst.* i. 472.—Aegypt
hrfnracea, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 84.—Bras.
glabra, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 102 = Forskahlii.
glabra, *Linn. Sp. PI.* 687.—Hab.?
glauca, *Schum. & Thonn. in Dan. Vid. Selsk. Afh.* iv., (1824) 31.—Guinea,
globiflora, *Schlecht. in Linnaea*, x. (1886) 235.—Mexic
gnmdiflora, *Urn. Ennc.* ii 126.-Ins. Mascar.; Madag.
emndiflora, Bart Trav. 20 & 17L t 2 - Asimina grandiflora.
g™ndifolia,5r. *Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 131.—Bras,
"•ematantha, *Miq. in Linnaea*, xxii. (1849) 465.—Gnian.
apetala. Linn. f. SuppL 270 = Artabotrys odoratissima.

A3SONA. :-
Hortmanni, *Steud: in Flora*, xxvi. (1843) II. 754.—Guian.
Humboldtiana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 66-seq.
Hnmboldtii, *Dunal, Monog. Anon.* 64. t. 3.—Cumana.
humilis, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1861) 118.—Bras.
hypoglanca, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. IS.—Bras,
involucrata. *Baill. Adansonia*, viii. (1868) 265.—Mexic.
ionophylla, *Triana, & Planch, in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. xvii. (1862) 27.-N. Granat
laevigata, *Mart. Fl. Bras.* xiii. 1.17.—Bras.
Iaevis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 60.—Gnian.; Venezuela.
lanceolata, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 100-Guatteria maypnrensis.
lasiocalyx, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 16.—Bras,
laurifolia, *Dunal, Monog. Anon.* 65.—Ind. occ.
lepidota, *Miq. in Linnaea*, xix. (1847) 129.—Gnian.
Liebmanniana, *Baill. Adansonia*, viii. (1868) 266.—Mexic
longifolia, Aubl. PI. Gni. i. 615. t 248=Duguetia longifolia.
madagascariensis, Pers. Syn. ii. 96 = grandiflora.
Manirote, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 69.—Guian.
Mannii, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1010.—Afr. bop.
Marcgravii, *Mart. Ft. Bras.* xiii. I. 6.—Bras,
mexicana, *Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 227.—Mexic.
micrantha, *Bert, ex Spreng. Syst.* ii. 640.—Ins. S. Doming.
microcarpa, Jacq. Fragm. 40. t 44 = Diospyros Cargillia.
microcarpa, *Rul* & Pav. Fl. Peruv.* v. t 487; *ex G. Don, Gen. Syst.* i. 90.—Peruv.
montana, *Macfad. Fl. Jamaic.* i. 7.—Jamaic.
monticola, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 7.—Bras.
mucosa, Jacq. Obs. i. 16 = Rollinia mucosa.
muricata, *Linn. Sp. PI:* 536.—Am. trop.
muscosa, Aubl. PL Gui. i. 618 = Rollinia mncosa.
Myristica, Gaertn. Fruct ii. 194. t 125=Monodora Myristica.
nitida, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 9.—Bras.
nitida, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 101 = Guatteria mayputensis.
obovata, Willd. Sp. PI. ii. 1269 = Asimina grandiflora.
obtusiflora, Tuss. FL Antill. t. 28 = Rollinia mtfeosa.
obtusifolia, DC. Prod. i. 84 = Rollinia mucosa.
paludosa, *Aubl. PI. Gui.* i. 611. t. 246.—Guian.
palustris, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 757.—Am et Afr. trop.
Pavomi, *G. Don, Gen. Syst. i.* 89.—Penlv.
peduncularis, *Steud. in Flora*, xxvi. (1843) ii. 764.—Guian.
pendula, Salisb. Prod. 380 -Asimina triloba.
Perrottetii, *A. DC. in Mim. Soc. Phys. Gent**, v. (1832) 197.—Senegal.
peruviana, Humb. *Sc* Bonpl. ex Dunal, Monog. Anon. 67 = uliginosa.
phaeoclados, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 46.—Bras.
Pisonis, *Mart. 1. c.* &.—Bras,
polycarpa, *DC. Syst.* i. 499.—Afr. trop.
Porpetac, Boiv. ex Baill. in Bull. Soc linn. Par. i. (1882) 341 = senegalensis.
pubescens, Salisb. Prod. 380 = A. ChermoKa.
punctata, *Aubl. PI. Gui.* i. 614. t. 247.—Guian.
punicifolia, *Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 26.—N. Granat.
purpurea, *Mof. & Sesse, ex Dunal, Monog. Anon.* 64.—Mexic.
pygmaea, Bartr. Trav. 18. t 1=Asimina pygmaea.
pyriformis, *Boj. Hort. Maurit.* 6; *Baker, Fl. Maurit.* 3.—Ins. Mascar.
quinduensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 60.—N. Granat
reticulata. *Linn. Sp. PI.* 537.—Am. trop.
reticulata, Sieber, ex A. DC. in Mem. Soc Phys. Genev. v. (1882) 200 = Rollinia mucosa.
reticulata, Veil. Fl. Flum. 289; v. t 130-Pisonis.
rhizantha, *Eichl. in Eichl. Jahrb. Berl.* it (1883) 322.—Bras,
rhombipetala, *Ruim & Pav. Fl. Per.* v. t. 489; *ex G. Don, Gen. Syst.* i. 87.—Peruv.
riparia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 69.—Peruv.
rufa, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 75.—Am. trop.
rufescens,' Aubl.' ex Steud. Nom. ed. I. 61 (lapsn pro [1] Abnta rufescens ')•—Guian.

ANON A .—
Salzmanni, *A. DC. in Mim. Soc. Phys. Geniv.* v. (1882) 197.—Bras.
senegalensis, *Pers. Syn.* ii. 95.—Afr. trop.; Gnian.
sericea, *Dunal, Monog. Anon.* 69.—Guian.
sessiliflora, *Benth. in Hook. Kew Journ.* v. (1858) 8.—Bras.
stivesMs, Veil. Fl. Flum. 239; v. t. 128-Rollinia sylvatica.
sinensis, *Raeusch. Nom.* ed. III. 160.—China,
sphaerocarpa, *Splitg. in Hoeven & De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 96. -Guian.
spinescens, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 11.—Bras.
squamosa, Delile, 111. Aegypt. 17 = Forskahlii.
squamosa, *Linn. Sp. PL* 587.—Ind. occ.
squamosa, VelL FL Flum. 239; v. t 127 - obtnsiflora.
lorriffa, *Roxb. Hort. Beng.* 48, nomen.—Ind. or.
sylvatica, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 82 = Rollinia sylvatica.
sylvestris, Auct—Cf. *silvestris*.
tenniflora, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 10.—Bras,
tenuifolia, *A. DC. in Mim. Soc. Phys. Geniv.* v. (1882) 198.—Guian.
triloba, Linn. Sp. PI. 637-Asimina triloba.
tripetala, Ait Hort Kew. ii. 252=A. Cherimolia.
tuberosa, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 7.—Malaya,
uliginosa, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* V. 56.—Peruv.
uncinata, Lam. Encyc ii. 127 - Artabotrys odoratissima.
uniflora, Dunal, Monog. Anon. 76 = Dugnetia Candollei.
velntina, *St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 182.—Bias,
vepertonum, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 16.—Bras.
xestropetala, Spreng. Syst ii. 641-Rollinia longifolia.
xylopifolia, *St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 132.—Bras.

ANONIS, Toura. ex Scop. Fl. Cam. ed. *U.* ii. 54 (1772) — Ononla, Linn. (Legnm.).
americana, AubL PI. Gni. ii. 763 - Stylosanthes proenmbens, viscosa.
arvensis, Lam. Fl. Fr. ii. 611— O. arvensis.
fruticosa, Lam. 1. c 612 = O. fruticosa.
minutissima. Lam. 1. c 608 = 0. minutissima.
Natrix, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 55 = 0. Natrix.
pinguis. Lam. Fl. Fr. ii. 609 - O. Natrix.
pusilla, Lam. L c. 610 = O. reclinata?
reclinata, Lam. 1. c 611=O. reclinata.
rotundifolia, Lam. 1. c 612 = 0. rotundifolia.
scariosa, Moench, Meth. 157 — 0. mitissima.
spinosa, Scop. FL Cam. ed. II. ii. 64 = O. spinosa.
variegata, Lam. Fl. Fr. ii. 608 - O. variegata.
viscosa, Lam. 1. c 609 = O. viscosa.

ANONYCHIUM, Schweinf. Reliq. Kotschy. *7.* t 7 (1868)=Prosopis, linn. (Legum.).
lanceolatum, Schweinf. 1. c. =F. oblonga.

ANONYMOS, Walt Fl. Carol. (1788) (passim pro omnibus dubiis).
aquatica, Walt L c 87 •= Limnanthemum tnchyspermum.
aquatica^ Walt. 1. c 230=Planers aquatica.
aquatica, Walt 1. c 109 = Saururus cernuus.
aquatica, Walt L c 137 = Nesaea verticillata.
asteroides, Michx. ex DC. Prod. v. 301-Boltonia asteroides.
bracteata, Walt Fl. Carol. 181 = Zomia tetraphylla.
capitata, Walt. 1. c. 69 = Burmannia capitata.
carolinensis, Walt 1. c 60 = Elytraria virgata.
carolinensis, Walt. L c 91=Lithospermnm hirtum.
carolinensis, Walt. L c 164 = Verbena Aubletia.
carolinensis, Walt L c. 168 = Roellia carolinensis.
carolinensis, Walt 1. c. 188=Amphicarpaea nonoica.
cassioides, Walt. 1. c 171-Seymeria tenuifolia.
ciliata, Walt 1. c 197 = Liatris graminifolia 1
corymbosus, Walt. 1. c 189.—Am. bor.
dioscoroides, Croom, in Am. Journ. Sc xxix. (1886) 165—Croomia pauciflora.
erecta, Walt Fl. Carol. 160=-Houstonia caerulea.
flams, Walt. 1. c. = Gerardia flava.
frondoaa, Walt 1. c 139.—Am. bor.

ANONYMOS:—
frutescens, Walt. Fl. Carol. 186 = Wistaria speciosa.
graminifolia, Walt. 1. c. 197=Liatris gnminifolia!
ligustrinus, Walt 1. c 139.-Am. bor.
odoratissima, Walt. 1. c. 198 = Trilisia odoratissima.
paniculata, Walt. 1. c-Trilisia paniculata.
jbedicularis, Walt. 1. c. 170 = Gerardia 1.
petiolata, Walt. 1. c. 108=Mitreola petiolata.
pilosa, Wait 1. c. 197 = Liatris pycnostachya.
pinnatifida, S. Wats. Bibl. Ind. 247, lapsu=seq.
pinnatus, Walt. Fl. Carol. 103 = Pe'aldstemoii corymbosus.
procumbent, Walt. 1. c 86=Anotis rotundifolia.
pudica, Walt. 1. c 123=Uvnlaria perfoliata.
purpurea, Walt. 1. c. 170 = Gerardia purputea.
quatemata, Walt. 1. c. 246=Gerardiae sp.
quinata, Walt 1. c. = Gerardiae sp,
ramosa, Walt. 1. c. 198 = Liatris scariosa.
repens, Walt. 1. c. 110 = Dichondra repens.
ripens, Walt. 1. c. 160 = Mitchella repens.
rotundifolia, Walt. 1. c. 181=Crotalaria ovalis.
sagittate, Walt. 1. c. = Crotalaria sagittalis.
sempervirens, Walt. 1. c. 98*=Gelsemium sempervirens.
sessilifolia, Walt. 1. c. 108 = Mitreola petiolata.
setacea, Walt. 1. c. 170-Gerardia setaceaf
tinctoria, Walt 1. c. 68=Lachnanthes tinctoria.
umbrosa, Walt. 1. c. 63 = Micranthemum orbicnlatnm.
uniflora, Walt. 1. c. 198 -Carphephorus bellidifolius ?

ANOOSPERMA, Kunze, in Bnt Zeit. i. (1818) 661, *err.* ^.-Oncoaperma, Blume (Palm.).

ANOPLANTHUS, Endl. Gen. 727 (1839) = Fhelypaea, Tonrn. et Aphyllon, Mitch. (Orobanch.).
Biebersteinii, Rent, in DC. Prod. zi. 42 = P. coccinea.
coccineus, Walp. Rep. iii. 481 = P. coccinea.
eomosus, Walp. 1. c. 480 = Aphyllon comosnm.
fasciculatus, Walp. 1. c. = Aphyllon fascicnlatnm.
Tournefortii, Rent in DC. Prod. xi. 42= P. coccinea.
unifierus, Endl. Ic. Gen. t. 72=Aphyllon nniflonim.

ANOPLOCARYUM, Ledeb.Fl. Ross, iii. 154 (1847) = Eritrichium, Schrad. (Bong.).
compression, Ledeb. 1. c.—Rossia.

ANOPLON.Reichb. Consp. 212 » (1828)=Fhelypaea, Tonrn. et Aphyllon, Mitch. (Orobanch.).
Biebersteinii, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 104=Phelypaea coccinea.
biflorum, G. Don, Gen. Syst. iv. 634=Aphyllon uni- ' flornm.
fasciculatum, G. Don, 1. c 683=Apbyllon fascculatnm.
Tournefortii, G. Don, L c=Pherypaea coccinea.

ANOPLOPHYTUM, Beer, in Flora, xxxvii. (1854) 346 = Tillandflia, Una. (Bromel.).
aeranthos, Beer, Bromel. 40 =T. dianthoidea.
amcenum, E. Morr. ex C. MOIT. in Belg. Hortic xxxiii. (1883) 265. t. 17 = T. pulchra.
Benthamianum, Beer, Bromel. 268 «=T. Benthamiana.
bicolor, Beer, I. c. 41 = T. stricta.
calothyrsum, Beer, 1. c. 283=T. calothyrsns.
dianthoideum, Beer, 1. c 41 = T. dianthoidea.
didistichum, E. Morr. ex C. Morr. in Belg. Hortic. xxxi. (1881) 164-T. LorenUiana.
Duratii, Beer, Bromel. 42=T. Dnratii.
ftexuosum, Beer, 1. c. 43 = T. flexuosa.
geminiflorum, E. Morr. ex C. Morr. in Belg. Hortic xxix. (1879) 226, *Sc* xxx. 191. t 111 = T. geminiflora.
guianense, Beer, Bromel. 44.—Gnian.
ineanum, E. Morr. ex C. Morr. in Belg. Hortic xxxi. (1881) 209. t 11=T. Gardner!.
Hneare, Beer, Bromel. 42-T. linearis.
longebracteatum, Beer, 1. c 264 = T. purpurea.
pulchettum, Beer, 1. c 41=T. pulchra.
Rollissoni, E. Morr. ex C. Morr. in Bele. Hortic xxix. (1879) 275.—Bras.
roseum, Beer, Bromel. 40 - T . dianthoidea.
rubidum. Beer, 1. c = T . geminiflora.
setaceum, Beer, 1. c. 266=T. compressumf
stramineum, C. Koch, in Ind. Sem. Hort Berol. (1856) 7-T. straminea.
Sprengelianum, Beer, Bromel. 268-T. Sprengeliannm.

ANOPLOPHYTUM :—
strictum, Beer, Bromel. 39 =Tillindsia stricta.
strobilanthum, Beer, I.e. 42=T. strobilantha.
vestitum, Beer, 1. c. 266=T. Benthamiana.
•violaceum, Beer, 1. c. = T. violacea.
vittatum, Beer, 1. c. 48=T. vittata.

ANOFTEKTJS, Labill. Pl. Nov. Holl. i. 85. t. 112 (1804). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 648.
glandnlosns, *Labill. I. c.* 86.—Tasrnan.
Macleayanas, *F. Muell. in Journ. Pharm. Soc. Viet.* (1858) 43.—Austral.

ANOSMIA, Bemh. in Linnaea, vii. (1832) 608 = Smyrnium, Linn. (Umbell.).
idaea, Bemh.1. c. 609=S. apiifolinm.

ANOSPORUM, Nees, in Linnaea, ix. (1835) 287 = Cyperus, Linn.
Cephalotes, Kurz, in J im. As. Soc Beng. xxxix. (1870) II. 84 = C. Cephalotes.
Colymbetes, Boeck. in Bot Zeit xxvii. (1869) 26= C. Colym betes.
cubense, Boeck. 1. c = Scirpus cubensis.
monocephalum, Neea, in Linnaea, ix. (1835) 287 = C. Cephalotes.
nudicaule, Boeck. in Bot Zeit. xrvii. (1869) 26 = C. nndicaulis.
pallidum, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 412 = C. platystylis.

AKOTIS, DC. Prod. iv. 431 (1830). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 59.
affinis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 69=Leschenaultiana.
boerhaavioides, *Maxim, in Bull. Acad. Pdtersb.* xxix. (1883) 165.—China.
calycina, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 73.—Ind. or.
capitata, Korth. in Ned. Kruid. Arch. ii. (1851) 161 = Hedyotis stipul'ata ?
caraosa, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 69.—Ind. or.
Cervantesii, DC. Prod. iv. 432 = Hedyotis Cervantesii.
ciliolosa, G. Don, Gen. Syst. iii. 535 = Houstonia purpurea.
coerulea, G. Don, 1. c. = Houstonia caerulea.
con/erta, DC. Prod. iv. 431 = Mallostoma.conferta.
decipiens, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 72.—Ind.or.
denteUoides, Steud. Nom. ed. II. i. T01=Oldeiilandia dentelloides.
ericoides, DC. Prod. iv. 433 = Hedyotis ericoides.
filiformis, DC. 1. c. 431 = Mallostoma filifomis.
Finlaysoniana, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 60.—Sumatr.
foetida, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 69--Ind. or.
gentianoides, Walp. Rep. iv. 230 = Houstonia caerulea.
gracilis, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 71.—Reg. Himal.
hypnoides, DC. Prod. iv. 432 = Hedyotis hypnoides.
ingrata, *Benth. & Hook.f. Gen.* il. 59 ; *et Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 71.—Reg. Himal.
juniperifolia, DC. Prod. iv. 432=Mallostoma juniperifolia.
lanceaefolia, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 69=lancifolia.
lanceolata, DC. Prod. iv. 433 = Houstonia pnrpurea.
lancifolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 73.—Ind. or.
laricifolia, DC. Prod. iv. 432 - Mallostoma laricifolia.
Lechleriana, Schlecht in Linnaea, xxviii. (1856) 488 =Oldenlandia Lechleriana.
Leschenaultiana, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 59; *et Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 72.—Ind. or.
longifiora, Benth. Pl. Hartw. 23=Houstonia triflora.
longifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 535 = Houstonia purpurea.
microphylla, DC. Prod. iv. 432"Hedyotis microphylla.
mitragacmoides, *Benth. & Hook. f. Gen.* it 60.—Austral,
monosperma, *Benth. & Hook. f. 1. e.* 50; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind. Hi.* 75.—Ind. or.
Montholoni, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii 73.—Ind. or.
nuramularia, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 60; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 75.—Zeylan.
nummulariformis, Benth. *Sc* Hook. f. 1. c-praec
oxyphylla, *Hook.f. I. e.* 72.—Ind. or.

ANOTIS :—
pilifera, *Schlecht. in Linnaea,* xxviii. (1866) 487.—JPeruv.
pterospora, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 60.—Austral.
purpurea, G. Don, Gen. Syst. iii. 535 = Houstonia purpurea.
quadrUocnlaris.itoitA. *& Hook.f. Gen.* ii. 59; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 74.—Ind. or.
Rheedii, *Benth. V Hook.f. I. c. ; et Hook.f. I. c.* 73.—Ind. or.
Richardiana, *Benth. & Hook. f. I. c.; et Hook.f. I. c.* 76.—Ind. or.
Ritchiei, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 74.—Ind. or.
rotnndifolia, *DC. Prod.* iv. 433.—Am. bor.
Saltmanni, DC. 1. c. = Oldenlandia Salzmanni.
serpens, *DC. 1. c.*—Am. austr.
serpyllifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 585 = Houstonia serpyllifolia.
setosa, DC. Prod. iv. 482 = Mallostoma setosa.
tenella, G. Don, Gen. Syst. iii. 535 = Honstonia tenella.
Thwaitesiana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxix. (1883) 165.—China.
thymifolia, DC. Prod. iv. 432 = Mallostoma thymifolia.
urophylla, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 59; *et Hook. /• Fl. Brit. Ind.* iii. 72.—Ind. or.
Wightiana, *Benth. & Hook.f. I. c.* 60; *et Hook.f. I. c.* 75.—Ind. or.

ANPLECTBTJM, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 597 (1864). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 758.
APLECTRUM, Blume, in Flora, xiv. (1881) 502.
annnlatum, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871' 84.—Penang.
assamicum, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* it-546.—Reg. Himal.
barbatnm, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 84.—Burma.
biligulatnm, *Triana, 1. c.* 86.—Sumatr.
confine, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 88.—Sumatr.
cyanocarpum, Triana, in Trans. linn. Soc. xxviii. (1871)84=glaucum.
divaricatum, *Triana, 1. c.*—Ind. or,
glaucnm, *Triana, 1. c.*—Malaya.
Korthalsii, *Triana, 1. c.* 85.—Borneo,
latifolium, *Triana, I. c.*—Borneo,
ligulatum, *Triana, 1. c.*—Java.
myrtiforme, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xv. (1851) 305 = Medinilla myrtiformis.
myrtifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 555=Medinilla myrtiformis.
nodosum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 37. Sumatr.
nodosum, *Blume, I. c.* 37.—Sumatr.
ovalifolium, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. l. 597 = Allomorphia ovalifolia.
palleni, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. SSL—Malaya.
paroiflorum, Benth. Fl. Hongk. 116 = Blastus cochinchinensis.
reformatum, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 85.—Borneo.
rostratum, *Blume, in Flora,* xiv. (1831) 602.—Malaya,
stipulare, *Blume, 1. c.* 503.—Java,
viminale, *Blume, I. c.* 502.—Malaya.

ANQUETILIA, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 161. t. 161 (1848) = BMmm.1a, Thunb. (Rutac).
Laureola, Decne. 1. c = S . Laureola:

AITREDEBA, Juss. Gen. 84 (1789). *CHENOPODIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 78,1219.
BERUSA, Steud. Nom. ed. II. i. 199 (1840).
CLAIRISIA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 78 (1880).
CLARISIA, Abat, in Act Soc. Med. Sev. x. 418 i ex Sprang. Gen. i. 202 (1830).
SIEBERA, Presl, in Oken, Isia, xxi. (1828) 275.
Cumingii, Hassk. in Flora, xlviii. (1865) 401 = spicata.
scandens, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 230=spicata.
spicata, *Pers. Syn.* i. 297.—Am. trap.; Ins. Philipp.
vesicaria, Gaertn. f. Fruct. iii. 176. t. 213 = spicata.
vesiculosa, Poir. Encyc Suppl. i. 391 = spicata.

ANSEIiEIA, Lindl. Bot. Reg. xxx. (1844) sub t 12. *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 687.
africana, *Lindl. I. c.*—Afr. trop.
gigantea, *Reichb.f. in Linnaea,* xx. (1847) 678.—Natal

ANSERINA, Dnm. Fl. Belg. 21 (1827)=Chenopodium, Linn.
Ronus-Henricus, Dum. 1. c—C. Bonus-Henricus.

ANSONIA, Bert, ex Hemsl. Bot Voy. Challenger, i. III. 63 (1884)=LactoriB, PhiL (Piperac).
"odulosa, Bert ex Hemsl. 1. c = L. femandezia.

ANSONIA, Rafin. New Fl. Am. iv. (1886) 58=Ameonla, Walt. (Apocyn.).
flliptica, Rafin. L c—Am. bor.
latifolia, Rafin. 1. c—Amsonia Tabemaemontaaa.
salidfolia, Rafin. 1. c. = Amsonia Tabernaemontana.
tenuifolia, Rafin. 1. c—Am. bor.

ANSTRUTHERIA, Gardn. in Calc Journ. Nat. HUt. vi. (1846) 344. t. 4=Weihea, Spreng. (Rhizoph.).
•tfricana, Benth. in Joom. Linn. Soc. iii. (1859) 78 = W. africana.
"eylanica, Gardn. in Calc. Journ. Nat Hist. vi. (1846) 845=W. ceylanica.
"wdagascariensis, Benth. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 78=W.madagascariensis.
•eylanica, Henslow, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. it 441 =* W. ceylanica.

ANTACANTHUS, Rich, ex DC. Prod. iv. 484 (1880) = Scolosanthus, Vahl (Rnbiac).

ANTAGONIA, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 144 = Cayaponia, Manso (Cucurb.).
ntrulli/olia, Griseb. L c. 145=C. citrullifolia.
Sandia, Griseb. in Lorentz, Veg. del Nordest. Prov. EntreRios, 69 = C. Sandia.

ANTAUREA, Neck. Elem. i. 70 (1790)=Ceutaurea, Linn. (Compos.).

ANTJSiiAEA, Gaertn. Fruct I 277. t. 68 (1788). Genus inc. sed.
gnescens, Cels, ex Heynh. Norn. ii. 38.—Hab. 1
javanica, *Gaertn. Fructt.* i. 277.—Java.

ANTENNABIA, Gaertn. Frnct. ii. 410.1.167 (1791). *COMPOSITAE,* Bentb. & Hook. f. ii. 301.
DISYNANTHUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
alpina, *Gaertn. I.* c—Reg. bor.
andma, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 188.—Am. austr.
aretioides, *A. Gray, I.* c—Peruv.
"fgentea, *Benth. PI. Hartw.* 819.—Calif,
otpathica, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 123. .a.-iSf- tem P- bor-
otlensis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 235.—Chili.
"mamamea, DC. Prod. vi. 270=Anaphalis cinnamomea.
contorta, D. Don, in Bot Reg. t. 605 = Anaphalis contorta.
»orpha, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 481.—Am. bor.
dioica, *Gaertn. Fruct.* ii. 410. t. 167. f. 8.—Europ.; As. bor.
"•feUaris, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (188L-82) 212.-Am. bor.
«eyeri, *A. Gray, PI. Fendl.* 107.—Am. bor.
Vperborea, D. Don, in Engl. Bot. Suppl. t. 2640-dioica.
JiPonica, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat ii. 178 = Anaphalis margaritacea.
japonica, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 126; Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxiv. (1851) I. 200=praec.?
Javanica, *DC. Prod.* vi. 271.—Java.
'airadorica, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 406=alpina.
leontopodina, DC. Prod. vi. 269 = Leontopodium sibiricum.
Leontopodium, Gaertn. Fruct ii. 410"Leontopodium alpinum.
'tucophylla, Holl. & Reichb. in Flora, xiii. (1880) 382 = Helichrysnm obconicum.
iineanfolia, *Wedd. Chlor. And.* i. 160.—Bolivia.
Uwuloides, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 480.—Am. bor. occ.
magellanica, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 117.—«*g. Magell.
"wrgaritacea, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 128 = Anaphalis margaritacea.

ANTENNABIA:—
Meredithae, F. Muell. in Papers Roy. Soc. Tasm. (1870) 15=Leontopodium Meredithae.
microcephala, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x, (1874) 74.—Calif.
monocephala, DC. Prod. vi. 269= alpina.
monoica, *Wedd. Chlor. And:* i. 150.—N. Granat.
montana, S. F. Gray, Nat AIT, ii. 458=dioica.
muscoides, *Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, Camp. Ind.* 100.—Reg. Himal.
nana, *Hook. f. tf Thorns, ex C. B. Clarke, I. c*—Reg. Himal.
nivalis, Tenore, ex Nym. Consp. 883=Leontopodium alpinum.
nubigena, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 45 = Raouliacatipes.
parvifolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 406 = dioica.
Planchoni.F. Muell. Census, 80-Raoulia Planchoni.
plantaginea, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 123.—Am. bor.
plantagini/olia, Hook. Fl. Bor. Am. i. 380-plantaginea.
racemosa, *Hook. 1. c.*—Am. bor.
rubicunda, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 49 = Helichrysum aienarium.
saxatilis, *DC. Prod.* vi. 271.—Java.
semideeurrens, DC. 1. c. = Anaphalis araneosa.
sordida, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vers. Ind, Archip.* 124.—Java.
Steetziana, *Tung, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1857) I. Add. p. xxxix.—Dahnria.
stenophylla, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 213.—Am. bor.
triplinenis, Sims, Bot. Mag. t. 2468 = Anaphalis triplinervis.
uniceps, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 105.—Austral.
villosissima, D. Don, Prod. Fl. Nep. 175= Anaphalis araneosa.
viscida, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vers. Ind. Archip.* 124.—Malaya.

ANTENORON, Rafin. Fl. Ludov. 28 (1817)-Polygonum, Linn.
racemosum, Rafin. 1. c. = P. virginianum.

ANTEPHORA, Steud. Syn. PI. Gram. Ill (1855) = Anthephora, Schreb. (Gram.).

ANTERISCIUM, Meyen, Reise, i. 815 (1884) spbalm.= Asterisoium, Cham. & Schlecht. (Umbellif.).

ANTHACANTHA, Lem. Illustr. Hortic. (1858) Misc. 64 "Euphorbia, Linn.
Desmetiana, Lem. 1. c = E. hexagona.

AKTHACANTHTJS, Nees, in DC. Prod. xi. 460 (1817). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. *I* ii. 1097.
CRATEOLA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 64 (1886).
OPLONIA, Rafin. 1. c.
acicularis, *Nees, I. c.*—Jamaica,
armatus, *Nees, 1. c.*—Jamaica,
bispinosus, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 525.-Ind. occ
cuneatus, *Nees, in DC. Prod.* xL 461.—Jamaica.
cunei/olius, Nees, L c 432 = cuneatus.
emarginatus, *Nees, 1. c.* 461.—Ins. S. Thorn,
jamaicensis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 457.—Jamaica,
lycioides, *Nees, in DC. Prod.* xi. 481.—Ind. occ.
microphyllus, *Nees, 1. c.*—Ind. occ
purpurascens, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 198.—Cuba,
repandus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 462.—Ins. Tanna.
sinuatus, *Nees, I. c.*—Ins. Tanna.
spinosus, *Nees, 1. c.* 460.—Am. austr.
Sprengelii, *Nees, 1. c.* 461.—Ins. S. Doming,
tetrastichus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 197.—Cuba,
vincoides, *Nees, in DC. Prod.* xi. 461.—Madag.

ANTHACANTHUS, Rich, ex DC. Prod. iv. 484 (1830) cSoolos&nthus, Vahl (Rubiac).

ANTHACTINIA, Bory, in Ann. G&. Sc. Pays. iL (1819) 139=Fassiflora, Linn.
Horsfteldii, M. Roem. Syn. Pepon. 191 - P. Horefieldii
longipe's, Bory, in Ann. Gen. Sc Pbys. ii. (1819) 139-P. longipes.

ANTHACTINIA:—
moluccana, M. Roem. Syn. Pepon.]90=Passiflora moluccana.
nepalensis, M. Roem. l.*c. = P. nepalensis.
penangiana, M. Roem. 1. c 192=Modecca nicobarica.
singaporiana, M. Roem. I. c = Modecca singaporiana.
sumatrana, M. Roem. 1. c. 191 = P. sumattana.
timorensis, M. Roem. 1. c. = P. moluccana.
Walkerii, M. Roem. 1. c = P. suberosa.

ANTHADEN1A, Lem. Hort. Vanhoutt. fasc. i. 4 (1845); Fl. des Serres, ii. (Avr. 1846) 10. t. 6 = Seaamum, Linn. (Pedalin.).
sesanwides, Lem. 11. cc—Afr. trop.

AMTHAENAUTTIA, Beauv. Agrost. 48. t. 10. f. 7 (1812). *GRAM1NEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 109&
ANTHENANTIA, R. Br. in Flind. Voy. ii. App. m. 582 (1814).
AULAXANTHUS, EIL Sketch Bot. Carol, i. 102 (1817).
AULAXIA, Nutt. Gen. Am. i 47 (1818).
LEPTOCORYFHIUM, Nees, Agrost. Bras. 83 (1824).
lanata, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 39.—Mexic
rufa, *Schult. Mant.* ii. 258.—Am. bor.
villosa, *Beauv. Agrost.* 48.1.10. f. 7.—Am. bor.

ANTHAERIUM, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 179 *err. typ.*=Anthurium, Schott (Aroid.).

ANTHALOGEA, Kafin. New Fl. Am. iv. 88 (1836) = Polygaift, Linn.
polygama, Rafin. 1. c.=E. rubella.

ANTHANEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 90 (1836) = Cusouta, Linn. (Cunvolv.).
capitata, Rafin. 1. c =C. capitata.
paradoxa, Rafin. 1. c =C. glomerata,
verticillata, Rafin. L c.=C. glomerata.

ANTHANOTIS, Rafin. Fl. Ludov. 62, 149 (1817)-Asclepiodora, A. Gray (Asclep.).
pedicellata, Rafin. 1. c. 52 = Podostigma pubescens.
procumbens, Rafin. 1. c. 149.—Am. bor.
viridis, Rafin. 1. c. 52 = Asc. viridis.

ANTHEIDOSORUS, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 178=MyriocephaliiB, Benth. (Compos.).
gracilis, A. Gray, 1. c. = M. gracilis.

ANTHEILEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 66 (1836) » Phaylopsis, Willd. (Acanth.).
imbricata, Rafin. 1. c. = P. longifolia.
paniculata, Rafin. 1. c.=Ruelfia paniculata.

ANTHEISCHIMA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. ed. Temminck, 137 t. 27 (1840) = Gordonia, Ellis (Ternstroem.).
excelsa, Korth. I. c. = G. excelsa.

ANTHEIiIA, Schott, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 127 (1863-64). *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 963.
nobilis, *Schott, I. c*—Celebes.

ANTHELIS, Rafin. Chi. Aetn. 9 |.I813) = Helianthemum, Toum. (Cistin.).
albidus, Rafin. 1. c—Italia.
arenaria, Rafin. New Fl. Am. iii. 81.—Am. bor.
glaucus, Rafin. Chi. Aetn. 9 = H. glaucum.
glutinosus, Rafin. L c. = H. glutinosum.
laempes, Rafin. L c = H. laevipes.
podanisia, Rafin. New Fl. Am. iii. 30.—Am. bor.

ANTHELMINTHICA, P. Br. Hist. Jamaic 156 (1766) — Spigelia, Linn. (Logan.).

ANTHEMA, Medic Malv. 42 (1787) » Lavatera, Toum. (Malvac).
arborea, Medic 1. c.-L. arborea.
cretica, Medic. 1. c.=L. cretica.
scabra, Moench, Meth. 612=L. cretica.
Tenoreana, Fresl, Fl. Sicul. i. 181=L. cretica.

ANTHEMIOPSIS, Boj. ex DC. Prod. v. 647, 648 (1836) =Wedelia, Jacq. (.Compos.).
elongata, Boj. 1. c. 548 = W. elongate.
macrophylla, Boj. 1. c 547.—Afr. trop.

ANTHEMIS, Mich, ex Linn. Syst ed. I. (1735). *COMPOSITAB,* Benth. & Hook. f. ii. 420.
CHAMAEMELUM, Tonrn. ex Adam. Fam. ii. 128 (1768).
CHAMOMILLA, Godr. Fl. Loir, ii. 19 (1843).
COTA, J. Gay, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 866 (1844).
LBPIDOPHOBUM, Neck. Elem. L 14 (1790).
LEUCANTHEMUM, Adans. Fam. ii. 127 (1763).
LYONNETIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. I. 106 (1827).
MARCELIA, Cass. L c. xxxiv. 107 (1825).
MARUTA, S. F. Gray, Nat. Air. ii. 456 (1821).
MATRICAKIA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 127 (1768).
ORMENIS, Cass. in Diet Sc. Nat. xxix. 180 (1828).
PKRIDERAEA, Webb, Iter Hisp. 87 (1838).
RHETINOLEPIS, COSS. in Bull. Soc. Bot Fr. iiL 707 (1856)

abrotanifolia, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 490.—Italia; Lnsitan.
abrotanifolia, Willk. in Bot Zeit v. (1847) 858 = montana,
absinthifolia, *Boiss. & Sprun. Diagn.* Ser. L iv. 8.—Caria.
aiyssinica, J. Gay, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 418 =A. Cotola.
abyssinica, *Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aetkiop.* 142, nomen.—Abyss.
aciphylla, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 7.—As. Min.
adonidifolia, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 317.—Armenia,
aetnensis, *Sc/wuw, in Spreng. Syst.* iii. 695.—Mont. Aetna.
afra, Bnim f. Fl. Cap. Prod. 27=Osmites dentaU.
afra, *Linn. Syst.* ed. X. 1223.—Afr. austr.
ageratifolia, Sibth. & Sm. FL Grace, ix 68. t 887 = AchiUea ageratifolia.
agrestis, *Presl, Fl. Sic.* p. xxix, nomen.—Sicilia.
agrestis, Wallr. Sched. Crit 484=arvensis.
aitoides, Boiss. *St.* Orph. ex Hook. f. Bot Mag. t 6117 — AchiUea ageratifolia.
Aitoon, Griseb. Spicil. Fl. RumeL ꝟl. 210-AchiUea ageratifolia.
albida, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 10.—As. Min.
alpina, Gouan, Fl. Monsp. 370 = montana.
alpina, *Linn. Cent.* ii. 31. n. 195.—Europ.
alpina, Moric ex Nym. Consp. 360-carpatica.
altaica, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. IL (1812) 41.—Sibir. alt.
altissima, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 12 = coelapoda.
altissima, Bell, in Mém. Acad. Torin. v. (1790-91) 246-peregrina.
altissima, Guss. ex Nym. Consp. 859=brachycentros.
altissima, *Linn. Sp. PI.* 888.—Europ.; Oriens.
americana, Linn. L c. 896 = Chrysanthellum procumbent
americana, Mutis, in Linn. f. SuppL 378-Spilanthes Mutisii.
ammophila, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 9.—Pamphyl.
Anacyclus, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient iii. 299 = cretica.
anatolica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 10.—As. Min. '
anemoni/olia, Boj. ex Steud. Norn. ed. II. L 102-Epallage anemonifolia.
anglica, Spreng. Syst iii. 594—arvensis.
apennina, *Tausch, in Syll. Ratisb.* ii. 250.—Europ.
apiifolia, R. Br. in Bot Reg. t 527 = parthenoides.
arabica, Linn. Sp. PL 896=Cladanthus arabicus.
arabica, Viv. Fl. Lib. Spec. 66=Cyrtolepis alexandrina.
arenicola, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 306.—Cilicia.
argaea, Boiss. & Bal. Diago. Ser. II. vi. 97—ptarmicaeformis.
artemisiaefolia, Willd. Sp. PL iiL 2184=Chrysanthemnm sinense
artemisifolia, Willd. in Ges. Naturt Fr. Nene Schr. UL (1801) 431=praec!
arvensis, *Linn. Sp. PI.* ed. I 894.—Europ.; Oriens.
arvensis, Pall, ex Bieb. FL Taur. Caac ii. 830=altissima.
aspernla, *Bertol. Fl. Hal.* ix. 368.—Corsica,
atlantica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 289.—Afr. bor.
atrata, *Schur, ex Heimerl. in Denhschr. Acad. Witn,* xlviiL (1884) 137.—Europ. austr.
Aucheri, Boiss. Diagn. Ser. JL xiii. 77, sphalm.» Achillea Aucheri.
anrea, *Brot. Fl. Lusit.* L 394.—Europ. austr.
aurea, DC. Prod. vi. 7 -nobilis.
aurea, Webb, ex Nym. Consp. 875 = Matricaria anrea.
auriculata, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 5.—As. Min.
australis, Sibth. *Sc* Sm. FL Grace, ix. 67 -cypria.
australis, Willd. Sp. PI. iii. 2177 -incrassata.

ANTHEMI8:—
austriaca, *Jacq. Fl. Austr.* v. 22.—Europ.; Oriens.
Barrelieri, Tenore, FL Nap. ji. 245 « AchiUea Barrelieri.
Baumgarteniana, Schur, Enum. PI. Transs. 334 = montana.
Bellidiastrum, Linn. Syst ed. X. 1223 = Osmites Bellidiastrum.
biaristata, DC. Fl. Fr. iv. 204 = Anacydus clavatus.
Biebenteiniana, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 320.—Oriens.
Blancheana, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 292.—Syria.
Bollei x, Asch. ex Nym. Consp. it 363=A. Cotula.
Bourgei, *Boiss. & Rent. Pugill. PL Hispan.* 66.—Hispan.
Boveana, *J. Gay, in Bxpl. Sc. Algir.* t 60. £ 2.—Algeria.
Bovei, Willk. *Sc* Lange Prod. ii. 91=praec.
Brachmanni, *Boiss. dꝛ" Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 84.—Graecia.
brachycentros, *J. Gay, in Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 414.—Graecia; As. Min.
brachyglossa, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 318 = tinctoria.
buphthalmoides, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 13 - Heliopsis buphthalmoides.
bytantina, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 321 = montana.
caespitosa, Herbich, in Flora, xl. (1857) 509=tenuifolia.
cairica, Vis. Fl. Quaed. Aegypt. 36. t 6.—Aegypt.; Arab.
callichroa, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 77, sphalm. = AchiUea callichroa.
camptocarpa, Boiss. Fl. Orient, iii. 319 =tripolitana.
candicans, *Boiss. I. c.* 293.—Lycia.
candidissima, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 693.—Oriens; Lycia.
canescens, *Brot. Fl. Lusit. i.* 395.—Lusit
canescens, Tenore, ex Nym. Consp. 359 = brachycentros.
camea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 4.—As. Min.
carpathica, *Willd. Sp. PI.* iii 2179.—Europ.; As. Min.
Cassia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 10.—Graecia.
caucasica, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 71 = Chrysanthemum caucasicum.
caucasica, Henckel, in Donnersm. PL Select. H. Halens. 9 = tinctoria.
caucasica, Hornem. Hort. Ham. 832 = Triumfetti.
caucasica, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 75=iberica.
Chamomilla, Tenore, Syll. 440=brachycentros.
Chamomilla, *Willd. Enum. Hort. Berol.nO.—'Emop.* austr.'
Chamomilla-romana, Crantz, Inst.i. 300=nobilis.
chamomilloides, Steven, ex Bieb. FL Taur. Cane, it 331 = candidissima.
chia, *Linn. Sp. PI.* 894.—Graecia; As. Min.
chilensis, *Walp. in Nov. Act. Hat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 247.—Chili.
chronia, Nym. Syll. Suppl. 2-montana.
chrysantha, *J. Gay, in Expl. Sc. Algir.* 160. f. 2.—Afr. bor.
chrysantha, Schur, Enum. PL Transs. i. 331 = tinctoria.
chrysocephala, Boiss. & Rent Diagn. Ser. IL iiL 25 = montana,
chrysoleuca, *J. Gay, ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. 50.—Algeria,
ciliata, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 812.—Reg. Caucas.
cinerea, *Pane. Elem.* 39.—Europ. austr.
Clausonis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 50.—Afr. bor.
clavata, Desf. Fl. Atlant ii 287 = Anacyclus clavatus.
davata, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 865.—Sicilia.
coarctata, Sibth. & Sm. FL Graec. ix. 68=tinctoria.
coelopoda, *Boiss. Diagn.* Ser. L xi 12.—As. Min.; Syria.
collina, Jord. Cat. Jard. Dijon, (1848) 18 = montana.
concinna, Guss. Fl. Sic. Syn. ii 870=intermedia,
confusa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 49.—Afr. bor.
coronopifolia, *Willd. Sp. PI.* iiL 2176.—Hispan.
Comucopiae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 8.—Palaest.
corymbosa, Haenke, in Jacq. CoU. ii. 73-AchiUea atrata.
corymbulosa, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient.* iii 316.—Mesopot
Cossoniana, Reichb. f. Ic FL Germ, xvi 63. t 1000-austriaca.
cossyrensis, Guss. Fl. Sic Sp. ii. 870 - seenndiramea.
Cota, Kojh, Syn. Fl. Germ. 414-brachycentros.
Cota, *Linn. Sp. PI.* 893.—Europ. austr.
Cota, Sari, ex DC. Prod. vL 11 = austriaca.

ANTHEMIS:—
Cota, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 880 = mixta.
Cotula, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 638 - Eclipta erecta.
Cótnla, *Linn. Sp. PI.* 894.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
Cotula-foetida, Crantz, Inst. i. 300 = A. Cotula.
cotuloides, Rafin. ex DC. Prod. vi. 18=A. Cotnla.
crassifolia, Humb. ex Steud. Nom. ed. IL L 102-Iva cheiranthifolia.
crassipes, Boiss. Diagn. Ser. I. xl. 9-hyalina.
cretica, *Linn. Sp. PI.* 895.—Reg. Mediterr.
cronia, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 22-montana.
Cupaniana, Tod. ex Nym. Consp. 860—montana.
cypria, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 800.—Ins. Cyprus,
cyrenaica, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xix. (1872) 82.—As. Min.
dalmatica, *Scheele, in Linnaea,* xviiL (1844) 484.—Europ. austr.
damascena, *Boiss. & Gaill. in Boiss. Fl. Orient,* iii-815.—Syria.
dentata, Boj. ex DC. Prod. vi. 4=Epallage dentata.
dentata, DC. Prod. vi. 291, in syn. =. Osmites anthemoides.
dentata, Moench, Meth. 606 = austriaca.
deserti, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 305.—Arab.
diffusa, Salzm. ex DC. Prod. vi. 5=arvensis.
discoidea, *Spreng. Nachtr.* L *Bot. Gart. Halle,* 11.—Hab. ?
discoidea, *Willd. Sp. PI.* iii. 2187 - tinctoria.
divergens, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 300.—Cappadoc.
drepanensis, Huet, ex Nym. Consp. 861 = maritima.
dubia, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II-880 = arvensis.
Duriaei, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1843) ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 50=chrysoleuca.
erucaefolia, *J. & C. Presl, Delic. Prag.* 102.—Sicilia.
euxina, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 282.—Reg. Caucas.
fallax, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 60=fuscata.
fimbriata, *Boiss. Fl. Orient,* iii 806.—Cilicia.
foetida, Lam. Fl. Fr. ii. 164 = A. Cotula.
fruticosa, C. Sm. ex DC. Prod. vi. 14 = Gonospermnm revolutum.
fruticosa. *Linn. Cent. PI.* ii 31. n. 196; *Amoen. Acad.* iv. 330.—Afr. bop.
fruticulosa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 329.—Reg. Caucas.
fumariaefolia, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 804.—Cappadoc.
fnmarioides, *Hochst. in Lorent, Wanderungen,* 380.—Amen,
fungosa, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 818.—Persia.
fascata, *Brot. Fl. Lusit. i:* 394.—Reg. Mediterr. occ
Garcini, Bunn. f. Fl. Ind. 18S=Anvillea Garcini.
Gayana, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 318.—Persia; Beluchist.
Gemmellari, *Tineo, PI. Rar. Sidl.* 47.—Mont. Etna.
Gerardiana, Jord. Obs. PL Crit. vii (1849) 31-montana.
glabra, Jacquem. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot iv. 88 = AUardiaglabra.
globosa, Orteg. Hort, Matr. 46 = Zaluzania globosa.
granatensis, Boiss. Elench. 60—arvensis.
grandiflora, Host, FL Austr. ii. 606 = carpatica.
grandiflora, Jacquem. Voy. Bot iv. 87 = AUardia tdmentosa.
grandiflora, *Des Moul. in Act. Linn. Soc. Bord.* xx. (1855) 556.—Gallia.
grandiflora, Ramatuelle, in Journ. Hist Nat Par. ii. (1792) 284=Chrysanthemum sinense.
granulata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl.* iitf.290.—Aft. bor.
graveolens, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) (Sert. FL Trans.) 40=carpatica.
graveolens, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 295.—Lycia.
Guicciardii, Heldr. & Sart. ex Boiss. FL Orient iii. 808 = peregrina.
halimifolia, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii (1855) 284.—Algeria,
halophila, *Boiss. & Bal. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 286.—Cilicia.
Haussknechtii, *Boiss. & Reut. I. c.* 310.—Syria; Mesopot.
Haynaldi, Janka, in Oestr. Bot. WochenbL vi. (1866) 1 = arvensis.
hebronica, *Boiss. & Kotschy, Diagn.* Ser. II. v. 108.—Palaest
hemisphaerica, Herbich, Stirp. Rar. Bucov. 59-macrantha.
hemistephana, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 814.—Persia.

ANTHEMIS :—
keracleotica, Boiss. & Heidi, ex Nym. Consp. 862 = peregrina.
neterophylla, *Ball, in Journ. Linn. Sac.* «vi. (1878) 507.—Marocco.
heterophylla, *Wallr. Britr. Fl. Hercyn.* 281.—Europ.
hirpina, Tenore, ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 868 = montana.
hispanica, Zuccagni, in Roem. Collect. 155-mixta.
hondensis, WillJ. ex Steud. Norn. ed. II. L 102 = Wedelia acapulcensis.
hungarica, Homem. Hort. Hafh. Suppl. 101=austriaca.
hyalina, *DC. Prod.* vi. 4.—Syria; Mesopot.
hydruntina, *Grows, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) . 638.—ltd.
iberica, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 328.—Reg. Caucus,
inclsa, *Viviani, Fl. Ital.* 9.—Italia.
inconspicua, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc xxxviii. (1865) I. 409-Matricaria discoidea.
incrassata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 345 = Anacyclus clavatus.
incrassata, Loisel. Not 129 = arvensis.
indurata, *Delile, Fl. Egypte,* 274. t. 47. f. 3.—Aegypt.
inodora, Gilib. FL Litnan. i. 223 = arvensis.
intermedia, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 491.—Sicil.
italica, *Linn. Syst.* ed. X. 1223.—Ital.
kahirica, Boiss. Fl. Orient, iii. 816 = cairica.
Kitaibelii, DC. Prod. vi. 7 = carpatica.
Kitaibelii, Spreng. Syst. iii. 592—montana.
Kotschyana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 23.—Cilicia.
lanuginosa, Moench, Meth. 606 = Anacyclus radiatus.
Uxa, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 52.—Hab. »
'eucantha, Linn. PI. Rar. Afr. 23-Osmites ant be • moides.
leucanthemifolia, *Boiss. & Blanch. Diagn.* Ser. II. iii. 20.—Syria.
jeucanthemoides, *Boiss. 1. c.* Ser. I. iv. 9.—Smyrna.
letcocephala, Schnr, Enum. PI. Transs. 334-montana.
libanotica, DC. Prod. vi. 9 « A. chia.
Lindleyi, Nym. Syll. 7=montana.
Hthuanica, Bess, ex DC. Prod. vi. 18=A. Cotnla.
Httoralis, Roj.-Clem. Ens. Vit. And. 807 - maritima.
'ttescens, Cerv. in La Llave et Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i 80=Zaluzania angusta.
tyonnetioides, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 286.—Syria,
macedonica, *Boiss. & Orph. Diagn.* Ser. II. vi. 97.—Macedon.
•aacrantha, *Heuff. in Flora,* xvi. (1833) 362.—Austria.
toantima, Urville, Enum. PL Orient. 114-secundiramea.
""Ultima, *Linn. Sp. PI.* 893.—Reg. Mediterr.
"wrrtiBia, PalL ex Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 330 = nithenica.
Titfmo, Sibth. & Sm. Fl. Grace ix. 64 = tinctona.
Marschalliana, Willd. Sp. PI. iii. 2187-Bieberstein-iniana.
Melampodia, Spreng. Syst. iii. 592 = seq.
•aelampodina, *Delile, Fl. Egypte,* 268. t. 45—Aegypt.; Arab,
melanacme, *Boist. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 315.—Mesopot.
"vlanoloma, Trautv. in BnlL Soc Nat. Mosc. xli. (1868) 1.461-rigescens.
"Mnbranacea, Labill. Ic PI. Syr. dec. iii 14-Achillea membranacea.
Micheliana, Bertol. Cat. Sem. HorL Bonon. (1838); et Fl Ital. ix. 364 -maritima.
Mtcheliana, Guss. Fl. Sic. Syn. it II. 868, obs.= montana.
micrantha, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii 300.—Assyria.
"Ucrosperma, *Baits. & Kotschy, Diagn.* Ser. II. v. 108.—Aegypt.; Arab.
"'lle/olia, Linn. Sp. PI. 896 »Chrysanthemum millefoliatum.
nillefoliata. Pall. Reise Statthalt. Ross. Reich, i. 87, 129-praec
"Unuta, *Lehm. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 108.—Hab. ?
•*nisella,* ' H. S.' ex Nym. Consp. 361 - parnesia.
"axta, *Linn. Sp. PI.* 894.—Reg. Mediterr.
nonantha, Willd. Sp. PI. iii. 2187 = tinctoria.
monilicostata, *Pomel, Nouv. Mai. Fl. AH.* 41.—Afr. bor.
Montana, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 415=carpatica.
"""tana, Ledeb. FL Ron. u. 523-sterills.
montasa, *Linn. Sp. PI.* ed. IL 1261.—Enrop.; Oriens.

ANTHEMIS :—
montana, Sibth. & Sm. Prod. Fl. Grace ii. 190 = carpatica.
mucronulata, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 319 = Chrysanthemum caucasicum.
mucronulata, Bertol. Amoen. 46 = Achillea Barrelierii.
mucronulata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 108 = Anacyclus clavatus.
mucronulata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 227 = carpatica.
multicaulis, Boist. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient, iii. 301 = arvensis.
multicaulis, *Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vi. (1856) 363.—Europ. austr.
muricatn, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 490.—Sicil.
mysorensis, Herb. Madr. ex DC. Prod. v. 551 = Guizolia oleifera.
Neilreichii, Ortm. in Flora, xxxv. (1852) 676 = ruthenica.
nicaelnsis, Willd. Sp. PI. ill 2182-arvensis.
nigrescens, Vest, in Flora, iii (1820) 8=austriaca.
nigricans, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 365=rigescens.
nobilis, *Linn. Sp. PI.* 894.—Europ.
occidentalis, Willd. Sp. PI. iii. 2185 - Spilanthes Mutisii.
odontostephana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 85.—Persia; Ind. or.
odorata, Ait Hort. Kew. iii. 288-Ursinia odorata.
odorata, Lam. Fl. Fr. ii. 163 = nobilis.
oppositifolia, Lam. Encyc i. 576=Spilanthes Mutisii.
armeniaides, Boiss. Diagn. Ser. L iv. 6 = Wiedemanniana.
ovatifolia, Orteg. Hort Matr. 73 - Heliopsis buphthalmoides.
oxylepis, *Boiss. Fl. Orient,* iii 282.—Cilicia.
oxyloba, Schur, Enum. PL Tnnss. 884, sphabn. = Achillea oxyloba.
paecilolepis, Boiss. Fl. Orient iii. 288 = Kotschyana.
palestina, *Keut. ex Boiss. 1. c.* 283.—As. Min.; Syria.
pallescens, Heldr. ex Nym. Consp. ii. 359=tinctoria.
pamphylica, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 8.—As. Min.
parnassica, Nym. Syll. Suppl. 1=tinctoria.
Parnassii, Boiss. & Heldr. ex Nym. Consp. 359 = tinctoria.
parnesia, *Boiss. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 806.—Gtaecia.
parthenioides, *Benth. ex Hornem. Hort. Hafn.* ii. 883.—Hab.?
pauciloba, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi 83.—Syria; Mesopot.
pectinata, *Boiss. & Reut. I. c.* Ser. I. iv. 6.—As. Min.
peduacularis, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 422.—Afr. bor.
pedunculata, Bory & Chanb. FL Pflop. 89=Anacyclus clavatus.
pedunculata, Desf. FL Atl. ii. 288-Anacyclus pedunculatus.
pentelica, Boiss. ex Nym. Consp. 860-montana.
peregrina, Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. S31=candidissima.
peregrina, *Linn. Syst. Nat.* ed. X. 1223.—Ital.; Graecia; As. Min.
persepolitana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi 7.—Persia,
persica, *Boiss. 1. c.* Ser. L vi. 85.—Persia.
Pestalooae, *Beiu. I. c.* Ser. I. xi. 12.—Lyeia.
petraea, Tenore, Fl. Nap. ii. 246-carpatica.
philistea, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 302.—Palcstin.
piscinalis, *Durieu, ex Munby, Fl. Algir.* 96, nomen.—Algeria.
platyglossa, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1861) 819 = rigescens.
plebeia, *Boiss. & Not, in Boiss. Fl. Orient,* iii. 813 Kurdist.
poecilolepis, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 24-Kotschyana.
pontica, Urville, Enum. PL Orient 114 - ruthenica.
pontica, Sibth. & Sm. Fl. Grace, ix. 66-tricolor.
pontica, Willd. Sp. PI. iii. 2184-montana.
praecox, Link, ex Willd. 1. c. 2162 = foscata.
prolifera. Pen. Syn. ii. 467 = Cladanthus arabicus.
pseudo-atrata, Schur, Enum. PI. Transs. 327=tenuifolia.
pseudocota, Visiani, Fl. Dalm. ii 78-brachycentros.
pseudocotula, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 86.—Oriens.
pserosperma, Tenore, Viag. Abruz. 128 - A. Cotnla.

ANTHEMIS :—
ptarmicaefolia, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 71 = Achillea grandiflora.
ptarmicaeformis, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 319.—As. Min.
pterygantha, C. Koch, 1. c xvii. (1843) 44-candidisbima.
pubescens, Willd. Sp. PI. iii. 2177 = Anacyclus clavatus.
punctata, Guss. ex Nym. Consp. 360 = montana.
punctata, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 91. t. 46.-Atlas; Sicilia.
purpurascens, Nym. Consp. 363=Anacyclus radiatus.
pygmaea, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. vi. (1843) 237 (Misc. Bot. ii. 23) - Matricaria praecox.
pygmaea, *Seh. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 142, nomen.—Afr. trop.
pyrenaica, *Milgev. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. 1,1865) 897.—Mont. Pyren.
pyrenaica, Seh. Bip. in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 164=austriaca.
pyrethriformis, Schur, Enum. PL Transs. 335 - carpatica.
Pyrethrum, Gouan, Fl. Monsp. 370-montana.
Pyrethrum, Linn. Sp. PI. 895 = Anacyclus Pyrethrum.
ramosa, Link, ex Spreng. Syst iii. 698 = A. Cotula.
Rascheyana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 8.—Syria.
reflect ens, Reichb. f. Ic Fl. Germ. xvi. 61. t. 1006 - arvensis.
reflexa, Moench, Metta. 605=altissima.
repanda, *Linn. Sp. PI.* 896.—Lusitan.
repens, Walt Fl. Carol. 211-Spilanthes repens.
Requienii, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 861—ruthenica.
retusa, Delile, FL Aeg. Illustr. 74 =cairica.
retusa, Link, ex Spreng. Syst. iii. 593=nithenica.
retusa, Tenore, ex Nym. Consp. 859 = brachycentros.
Reuteriana, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 8 = smyrnaea.
revoluta, Chr. Sm. ex Buch, in BcrL Acad. Abh. 1816-17 (1819) 370-Gonospermumrevolutum.
rhodensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 11.—Ins. Rhodus.
rigescens, *Willd. Hort. Berol.* i. t. 62.— Reg. Caucas.
rosea, Jacquem. Voy. Bot iv. 88=Allardia glabra.
rosea, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.X.* 887.—Cyprus,
rotata, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 818. - Aegypt; Arab.
Rudolphiana, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 72 -Biebersteiniana.
rupestris, Boj. ex Steud. Nom. ed. II. i 103 = Epdlage rapes tris.
ruthenica, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 330. n. 1772.—Europ. austr. or.; Reg. Caucas.
ruthenica, Sch. Bip. ex Schur, Km™, PI. Transs. 332 -austriaca.
salvifolia, Boj. ex DC. Prod. v. 3 - Epallage salvifolia.
santolinoides, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1856) 284.—Algeria.
saxatilis, Bluing, ex Schur, Enum. PL Transs. 334 - Baumgarteniana.
saxatilis, Bieb. FL Taur. Cauc. iii 581 - sterilis.
saxatilis, DC. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 910 - montana.
scaposa, J. Gay, in Boiss. FL Orient iii. 318 = Gayana.
scariosa, Boiss. Diag. Ser. I. xi 7-persepolitana.
scariosa, *DC. Prod,* vi 4.—Syria; Mesopot
scariosa, *[Soland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. ii 268.—Syria,
schizostephana, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient.* iii. 314.—Kurdist.
Schurii, Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, xlviii (1884) 137-Achillea oxyloba.
secundiramea, *Bivona, Sicul. PI. Cent,* ii 10.—Sicil.; Aegypt.
segetalis, Tenore, FL Neap. Syll. App. v. 54 =brachycentros.
sessilis, Salisb. Prod. 204 = Cladanthus arabicus.
Sibthorpii. *Griseh. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 210.—Graecia.
sicula, Guss. FL Sic. Syn. ii. 866—arvensis.
sinuata, Cerv. in La Llave et Lex. Nov. Veg. Desc fasc i 30 = Zalnzania triloba.
Sismondaeana, *Clem, in Mem. Accad. Sc. Torino,* Ser. II. xvi. (1867) 297 *(Serf. Orient.* 61).—Byzant
smyrnaea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 7.—Smyrna.
sphacelata, Willk. in Bot Zeit v. (1847) 858-Anacyclus clavatus.

ANTHEMIS :—
sphacelata, *J. & C. Presl, Delic. Prog.* 108.—Sicilia,
Spruneri.itAa. & Heldr. DUgn. Ser. II. iil 24 = montana.
sterilis, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1856) ii. 379.—Tauria.
. stiparum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 48.—Afr. bor.
stipulacea, Moench, Metb. Snppl. 258"Chrysanthemum sinense.
styriaca, Vest, in Syll. Ratisb. i. 12=carpatica.
suaveolens, *Schwaegr. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 108.—Hab.?
subulicola, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 49.—Afr. bor.
soffruticosa, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 101.—Hab.?
sulphureax, Wall, ex Nym. Consp. 888=A. Cotula.
Tatrae, *Kit. ex Schult. Fl. Austr.* ii. 534.—Enrop.
taygetea, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. vi. 83.—Graecia.
tenella, *Host, Fl. Austr.* ii. 607.—Emop.
tenuifolia, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturm.* ii. (1851) 171.—Transsylvan.
tenuiloba, Boiss. Diagn. Ser. II. Hi. 25 = montana.
tenuisecta, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 868.—Marocco.
tenuisecta, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 301.—Armenia,
tennisecta, *Pomel, Nouv. Mat. PL. Atl.* 60.—Algeria,
tennispherica, *Herbich, Stirp. Rar. Bucov.* 59.—Austria,
tigrensis, *J. Gay, ex A. Sick. Tent. Fl. Abyss,* i. 418.—Abyss.
tinctorla, *Linn. Sp. PI.* 896.—Europ.; Oriens.
tomentosa, Gouan, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 821 = Anacyclus clavatus.
tomentosa, *Linn. Sp. PI.* 893.—As. Min.
tomentosa, O. F. Muell. in Fl. Dan. xii. t. 685 - arvensis.
lomentosa, Linn, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 291 = montana.
tomentosa, Willd. Sp. Fl. iii. 2176=peregrina.
tricolor, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 288.—Cyprus.
triloba, Orteg. Hort. Matr. 72 = Zaluzauia triloba.
trinervia, *Raeusth. Norn.* ed. III. 249.—Am. mertd,
tripolitana, *Boiss. & Blanch. Diagn.* Ser. II. iii. 22.—Syria.
TriumfetH, All. Fl. Fedem. i. 187=austriaca.
Trotzkiana, *Claus, in Beitr. Pflans. Suss. Reich,* viii. 299.—Turkestan.
tubaeformis, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 870 = Anacyclus clavatus.
tnberculata, *Boiss. Blench.* 59. n. 107.—Hispan. j , Afr. bor.
tnbidna, *Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 319.—Mesopot.
ubensis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 289.—Afr. bor.
umbilicata, *Boiss. & Huet, Diagn.* Ser. II. iii. 24.—Armenia.
Urvillaeana, Sch. Bip. ex Nym. Consp. ii. 362 = tomentosa.
Urvillaei, Nym. Syll. 7=cretic*.
valentina. Linn. Sp. PI. 895 = Anacyclus radiatus.
viridis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 436 = Eclipta erecta.
Visianii, Weiss, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 811 = chia.
vulgaris, Fl. Dan. ex Steud. Nom. ed. I. 58 = Matiicaria inodora.
vulgaris, Linn, ex Steud. Nom. 1. c—Matiicaria Chamomilla.
Wtedemanniana, *Fisch. & Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* ii. (1835) 27.—As. Mia.

ANTHEPHORA, Schreb. Beschr. Graes. ii. 105. t. 44 (1779). *GSAMINEAE,* Bench. & Hook. f. iii. 1122.
ANTBPHOKA, Stend. Syn. PI. Gram. Ill (1855).
HYPUDAEURUS, Reichb. Nom. 37 (1841).
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, il. 389 = Hochstetteri.
axillifiora, Stend. Syn. PI. Gram. Ill = Buchloe dactyloides.
Belangeri, Stend. 1. c-Hilaria cenchroides.
cuspidate, *Anderss. Enum. PI. Ins. Galap.* 141__Ins. . Galap.
elegans, Rupr. ex Steud. Syn. PI. Gram. Ill = Hochstetteri.
elegans, *Schreb. Beschr. Graes.* ii. 105. t. 44.—Mexico.

ANTHEPHOBA :—
Hochstetteri, *Nees. in Flora,* xxvtt. (1844) 249.—Abyss.
Kotschyi, Hochst. ex Stend. Syn. PI. Gram. 111-Hochstetteri.
persica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 44.—Persia.
pubescens, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 74=Cenchrus pubescens.
punctulata, *Steud. Syn. PI. Gram.* i. 111.—Mexico.
villosa, Spreng. Nene Entdeck. iii. 14=elegans.

ANTHERICLIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195; Joum. Phys. lxxxix. (1819) 261= Tipularia, Nutt. (Orchid.).

AKTHEBICTTM, Linn. Syst. ed. I (1735). *LIL1ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 788.
DILANTHES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 70 (1866).
HESPERANTHES, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 241.
LILIAGO, Salisb. Gen. PI. Fragm. 70 (1866).
PESSULARIA, Salisb. 1. c. (I860).
PHALANGANTHUS, Schrank, ex Haw. Syn. PI. Succ. 67 (1819).
PHALANGIUM, JOSS. Gen. 62 (1789).
TRACHVANDRA, Kunth, Enum. PI. iv. 573 (1843),
BLEPHANTHERA, ENDOGONA, LICINIA, OBSITILA, TRACHINEMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27, 59; iii. 57.
adenanthera, Forst. f. Prod. 24 = Dianella ensifolia.
affine, *Baker, in Journ. Bot.* x.,(1872) 188.—Afr. austr.
Aitoni, Baker, in Joum. linn. Soc. xv. (1876) (= Bnlbinella, Gen. PI.) 294.—Afr. austr.
albucoides. Ait. Hort. Kew. i. 449 = Omithogalum suaveolens.
aloi/olium, Salisb. Prod. 250-Bulbine alooides.
alooides, Linn. Sp. PI. 311=Bulbrae alooides.
altissimum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8=Bulbine longiscapa.
amoenum, Salisb. Prod. 250=A. Liliago.
anceps, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 806.—Afr. austr.
anceps, Soland. ex Baker, 1. c. 363 = Tricoryne anceps.
andongense, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 257.—Afr. trop.
angulicaule, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 305.—Afr. austr.
angustifolium, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 332.- Abyss.
annuum, Linn. Sp. PI. 811 = Butbine annua.
annuum, Pourr. ex Willie. *Be* Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 208 = Asphodelus tenuifolius.
aphyllum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 209.—Arabia,
arenarium, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 259.—Afr. trop.
asperatum, *Baker, in Journ. Bot.* x. (1872) 188.—Afr. austr.
asphodeloides. Ait. Hort. Kew. i. 450 = Bnlbine longiscapa.
asphodeloides, Linn. Sp. PI. 311 = Bnlbine asphodeloides.
asphodelum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 209.—Ins. Rhodus.
auratum, *Fisch. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 281.—Soongaria.
autumnale. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 247-=Scilla ftutunwalis.
baeticum, Steud. Nom. ed. II. i. 108- A. Liliago.
benguellense, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 257.—Angola.
bicolor, Desf. FL Atl. i. 804 = Morgagnia bicolor.
bifolium, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 247-SciUa bifolia.
bipedunculatum, Jacq. Coll. Suppl. 88-triflorum.
blepharophoron, Schult. f. Syst.vii. 461 = ciliatum.
boeticum, Boiss. Voy. Espagne, ii. 619. t. 172 = A. Liliago.
brasiliense, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 806.—Bras.
Brehmeanum, *Baker, in Journ. Bot.* x. (1872) 139.—Afr. austr.
brevicaule, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 298.—Afc\ austr.
brevifolium, *Thunb. Prod. PL Cap.* 62.—Afr. austr.
bulbosum, R. Br. Prod. 275-Bnlbine bulbosa.

AHTHEBICTTM :—
Burkei, Baker, in Joum. Bot. x. (1872) 140-Bnlbinella Burkei.
caeruleum, Ruiz ft Pav. Fl. Per. iii. 67. t. 299= Pasithea caerulea.
calyculatum, Georgi, It. i. 206-Tofieldia cemua.
calyculatum, linn. Sp. PI. 811 - Tofieldia calyculata.
calyculatum, Pall. Reise, iii. 83=Tofieldia palustiis.
calyptrocarpnm, *Baker, in Trans. Linn. Soe.* Ser. II. i- (1878) 268.—Afr. trop.
Cameroni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 96, 814.—Afr. trop.
canalicnlatnm, *Ait. Hort. Kew.* i. 448.—Afr. austr.
capillare, Spreng. Syst. ii. 83; Schult. f. Syst. vii. 457 -Bnlbinella capillaris.
carnosum, Baker, in Joum. Linn. Soc xv. (1876) 296 (= Bulbinellae sp. Gen. PI.).—Hab. ?
Cauda-felis, Linn. f. Suppl. 202 = Bulbinella caudata.
caudatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 63=Bulbinella caudata.
caulescens, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 808.—Afr. trop.
cemuum, *Hornem. Hort. Hafn.* i. 382.—Hab. ?
Chamaemoly, Hochst. in A. Rich. Tent. FL Abyss, ii-332 = Chlorophytum tetraphyllum.
ciliatum, *Linn./. Suppl.* 20*2.—Afr. austr.
ciliatum, Schult. f. Syst. vii. 466 - Humboldtii.
ciliatum, *Spreng. 1. c.* ii. 84.—Venezuela.
ciliolatum. Baler, in Journ. Bot x. (1872) 137 = Bnlbinella ciliolata.
cirrhatum, Forst. f. Prod. n. 148—Arthropodium cirrhatum.
coarctatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 67=Excremis ramosa.
colubrinum, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. IL i. (1878) 256=Dasystachys colubrina.
comosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 63 = Chlorophytum Stembergianum.
contortum, *Linn.f. Suppl.* 202.—Afr. austr.
Cooperi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 804.—Natal.
corymbosum, *Baker, in Journ. Bot.* xv. (1877) 71.—Afr. trop.
costatum, *Andr. Bot. Sep.* t. 298.—Afr. austr.
crispum, Thunb. Prod. PI. Cap. 63 =• Chlorophytum crispum.
croceum, *Schult. f. Syst.* vii. 476.—Georgia.
dendroides, Stev. in M£m. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 249 = Asphodeline prolifera.
dissitiflorum, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 257.—Angola.
divaricatum, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 7 - revolutum.
Dorsetii, Hort. ex Baker, in Joum. linn. Soc. xv. (1876) 301=ramosnm.
Dregeanum, *Baker, in Journ. Bot.* x. (1872) 138.—Afr. austr.
Drimiopsis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 801.—Afr. trop.
eccremorrhizum, *Ruit & Pav. Fl. Per.* iii. 67.—Peruv.
echeandioides, *Baker, in Bot. Mag.* cxi. (1865) t 6809.—Mexic.?
elatum, Ait. Hort. Kew. i. 448 = Chlorophytum elatum.
elongatum, Willd. Sp. PI. 136-Jacquinianum.
ensatum. Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zeal. i. 255 = Dianella intermedia,
ensiforme, *Veil. Fl. Fium.* 148; iii. t 162.—Bras.
ericetorum, Berger. Fl. Pyr. ii. 168=Simethi» bicolor.
esculentum, Spreng. Syst. ii. 84«Camassia esculenta.
exuviatum, Jacq. Coll. Suppl. 89 = Urginea exuviata.
falcatnm, *Linn.f. Suppl.* 202.—Afr. austr.
falcatum, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 256=Dasystachys falcata.
fasciculatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 816.—Afr. austr.
fastigiatum, Steud. Nom. ed. I. 58=Chlorophytum elatum.
favoium, Thunb. Prod. PI. Cap. 6S = Bulbine favosa.
filifolium, Jacq. Coll. Suppl. 9S = Urginea filifolia.
filifolium, Thunb. Prod. PI. Cap. 62=Urginea nematodes.
filiforme, Ait. Hort. Kew. i. 451 - Bulbinella triquetra.

AHTHERICTJH :—
JUi/orme, Thnnb. Prod. PI. Cap. 62=Jacquinianum.
fimbriatum, Stend. Nom. ed. I. 35=Dichopogon Sieberianus 1
fimbriatum, Thnnb. Prod. PI. Cap. 6S=longifolium.
fiagelliforme, Baker, in Joum. Bot. x. (1872) 140 = Schizobasis flagellifonnis.
flavescens, *Schult.f. Syst.* vii. 1692.—Mexic.
flexifolium, Jacq. Coll. SuppL 98=Jacquinianum.
flexifolium, *Linn./. Suppl.* 201.—Afr. austr.
fiexuosum, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, vii. 50=Corynotheca dichotoma.
fioribundum, Ait. Hort Kew. L 447=BuIhinella latifolia.
fragrant, Jacq. Hort Schoenb. i 45 — Urginea fragrans.
frutescens, Linn. Sp. PI. 810-Bnlbine frutescens.
fntticosum, Salisb. Prod. 250 = praec.
fugax, Moris, Elench. i. 46=Urginea fugax.
Gerrardi, *Baker, in Joum. Bet.* x. (1872) 137.—Afr. austr.
glaucnm, *Ruii & Pan. Fl. Per.* iii. 68.—Peruv.
Gtnelinianum, Schult f. Syst. vii. 48l=Melanthium sibiricum.
gracile, Baker, in Joura. Botx. (1872) 187-Bulbinella gradlis.
gracile, Salisb. Prod. 249=ramosum.
gracillinmm, *Regel, in Act. Hort. Petrot.* vL (1879) 289.—Hab. ?
graecum, Linn. Sp. PI. ed. II. 444 = Lloydia graeca.
gramineum, *Veil. Fl. Flum.* 143 ; iii. L 161.—Bras,
gramineum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 3O2.-Madag.
graminifolium, Willd. Sp. PI. ii. 189=undnlatum.
grandiflorutn, Salisb. Prod. 250 = Paradisea Iiliastrum.
gramini/orme, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 116=Paradisea Liliastrnm.
Grantii, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 160. 1.108 R—Afr. trop.
gntptophyllum, *Baker, in Card. Chron.* (1882) L 460. —Ins. Socotra.
Heynei, RottL ex Baker, in Joum. linn. Soc XT. (1876) 828=Chlorophytum Heyneanum.
hinutum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 63.—Afr. austr.
hispidum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 446.—Afr. austr.
Hookeri, Colenso, ex Hook. f. Handb. New Zeal. Fl. 286(= Bulbinellae sp. Gen. PI.).—N. Zel.
Humboldtii, *Hemsl. Bid. Centr. Ant. Bot.* iii 874. —Mexic
humile, *Hochst. ex A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* ii 831.—Abyss.
hyacinthoides, Willd. ex Kunth, Enum. PL iv. 836 = . Scilla indica.
Uconspicuum, *Baker, in Joum. Bot.* XT. (1877) 71.—, Afr. trop.
tncurmim, Thunb. Prod. PI. Cap. 62 = Bulbine rostrate.
intermedium, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 202=A. Liliago.
intricatum, Baker, in Joum. Bot x. (1872) 140 = . Schizobasis intricata,
•nvolncratum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xr. (1876) 811.—Afr. austr.
Jacquinianum, *Schult./. Syst.* vii. 462.—Afr. austr.
japonicum, *Thunb. Fl. Jap.* 138.—China ; Japon.
'"*gopus,* Thunb. Prod. PL Cap. 68 = Bulbine longiscapa.
bti/otium, linn. f. SuppL 202=Bnlbinella latifolia.
'"ti/olium, Schult f. Syst vii 477=simplex.
btifolium, Banks & Soland. ex Kunth, Enum. PI. iv. 622 = Arthropodium cirrhatum.
lepto*p*yllum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* XT. (1876) 817.—Mexic.
Lilia*g*o, *Linn. Sp. PI.* 310.—Europ.; Afr. bor.
Uliastrum, linn. 1. c ed. II. 445=Paradisea Liliastrnm.
umosum, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) , 257—Afr. trop.
longepedunculatum, *Steud. ex Schult./. Syst.* vii 467, 1692—Afr. austA
«ngt/olium, A. Rich. Tent FL Abyss, ii 883-Chloro-. phytum longifolium.
jongifolium, *Jacq. Coll. Suppl.* 92.—Afr. austr.
•ongipes, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1882) II. 297. . —Bras.
longiscapum, Jacq. ColL Suppl. 84-Bulbine longiscapa.

AMTHEH.ICTJM :—
longistylum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* XT. (1876) 805.—Afr. austr.
Macowani, *Baker, I. c.* 809.—Afr. austr.
puurophyllum, A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 884 = Chlorophytum macrophyllum.
Makoyanum, *Regel, Gartenfl.* (1880) 36.—Hab. I
marginatum, Thunb. Prod. PL Cap. 68 = Urginea marginata.
Mattiasti, Vand. Fasc PL 12=Simethis bicolor.
mesembryanthemoides, Baker, in Joum. Bot. x. (1872) 136=Bulbine mesembryanthemoides.
milleflorum, [DC. in] Red. Lil. t. 58 - Arthropodium paniculatum.
minus, Steud. Nom. ed. I. 63=Arthropodium minus,
molle, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 259.—Angola,
monophyllum, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 324. —Afr. trop.
muricatum, *Linn. /. Suppl.* 202.—Afr. austr.
nanum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* XT. (1876) 806.—Mexic
nematodes, Schult. f. Syst vii 472=Urginea nematodes.
nepalense, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 135 » Chlorophytum nepalense.
nidulans, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 814. —Afr. trop.
Nimmonii, J. Grab. Cat PL Bomb. 220 - Chlorophytum glaucum.
niveum, Spreng. Syst ii. 34; Schult f. in Roem. &. Schult. Syst viL 480-Chlorophytum tuberosum.
nm.ramosum, Gilib. Exercit ii. 465-A. Liliago.
nubicum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 801. —Afr. trop.
Nuttalliannm, *Schult./. Syst.* vii. 477.—Am. bor.
nutans, Jacq. Coll. Suppl. 86=Bulbine nulaus.
nutans, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 68.—Afr. austr.
Oatesii, *Baker, in Joum. Bot.* xvi. (1876) 824.—Afr. trop.
orchideum, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Sac.* Ser. II. i. (1878) 258.—Afr. trop.
ornithogaloides, Baker, in Joum. Linn. Soc xv. (1876) 294 = Bulbinella omithogaloide*.
ornithogaloides, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss. il. 882=Chlorophytum tuberosum.
ossi/ragum, Georgi, Beschreib. Russ. Reich, iii. IV. 907=Tofieldia cemua.
ossi/ragum, Linn. Sp. PL 311 = Narthecium ossifragum.
pachyphyllum, *Baker, in Journ. linn. Soc.* xv. (1876) 304.—Afr. austr.
palustre, Salisb. Prod. 250=Narthecium ossifragum.
paniculatum, Andr. Bot. Rep. t. 395=Arthropodium paniculatum.
paradoxum, *Schult./. Syst.* vii. 459.—Afr. austr.
Parkeri, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 269.—Madag.
parmflorum, Benth. Fl. Hongk. 873=Chlorophytum laxum.
parvum, *N. £. Br. in Gard. Chron.* (1880) II. 688.—Bras.
paucifiorum, Thunb. Prod. PI. Cap. 63=triflorum.
pendulum.Honum. Hort. Ham. i. 338=Arthropodium paniculatum.
peronatum, Baker, in Joum. Bot. x. (1872) 137 = Bulbinella peronata.
perumanum, Willd. ex Kunth, Enum. PL iv. 696 = HumboldtU.
physodes, Jacq. ColL Suppl. 94; Ic t 418-Urginea physodes.
pilosum, Jacq. 1. c 87; Ic t. 416=Omithogalum hispidum.
plani/olium, Linn. Mant. ii 224=Simethis bicolor.
pleiostachyum, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i (1878) 255'Dasystachys pleiostachya.
plutnosum, Ruiz *Sc* Pav. FL Per. iii. 68=Bottionea thysanotoides.
pomeridianum, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 664 = Chlorogalum pomeridianum.
praemorsum, Jacq. Coll. Suppl. 85=Bulbine praemorsa.
Pseudo-asphodelus, Jacq. Enum. Vind. 59,238=Tofieldia calyculata.
pterocaulon, *Welw. ex Baker, in Trans^Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 258.—Angola,
pubescens, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 309. —Afr. austr.

ANTHERICUM :—
pubirhachis, *Baker, I. c.* 802.—Afr. trop.
pudicum, *Baker, I. c.* 808.—Afr. austr.
pugioni/orme, Jacq Coll. Suppl. 83 = Bulbine pugioniformis.
pulchellum, *Baker, in Journ. Bot.* x. (1872) 140.—Afr. austr.
Pusillum, Jacq. Coll. SuppL 95=Urginea pusilla.
pyrenicarpnm, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 269.—Afr. trop.
Quamash, Steud. Nom. ed. 1.64 - Camassia escnlenta.
ramosisHmum, *Schult. /. Syst.* vii. 469.—Mexic.
ramosum, Steud. Nom. ed. I. 64 = Melasphaerula . graminifolia.
ramosum, *Linn. Sp. PI.* 810.—Eun>p.
reflexum, Cav. Ic. iii 21 = Echeandia temiflora.
revolutum. *Linn. Sp. PI.* 810.—Afr. austr.
rigidum. *Baker, in Joum. Bot.* x. (1872) 141.—Afr. austr.
Rossil, *Hook. J. Handb. New Zeal. Fl.* 285 (=Bulbinellae sp. Gen. PL).—N. Zel.
rostratum, Jacq. Coll. Suppl. 82=Bulbine rostrate.
Saltii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* XT. (1876) 309.—Abyss.
sardoum, Muell. ex Kunth, Enum. PL iv. 385=Urginea fugax.
scabrellum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* XT. (1876) 318.—Mexic
scabmm, *Linn./. Suppl.* 202 Afr. austr.
Schultesii, *Baker, in Journ. Bot.* x. (1872) 140.—Afr. austr.
sdlliflorum, *Eckl. ex Steud. Nom.* ed. II. i 248, in syn. , *et ex Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 298.—Afr. austr.
sdlloides, *Schult./. Syst.* vii. 477—Reg. Argent
semibarbatum, Hook. Bot. Mag. t 8129 = Bulbine bulbosa.
semibarbatum, R. Br. Prod. 275=Bulbine semibarbata.
serotinum, Linn. Sp. PL ed. IT. 444=Lloydia alpina.
sessilifiorum, Steud. Nom. ed. II. i 104=scilliflorum.
setosum, Willd. ex Schult f. Syst vii I. 478=Bulbinella robusta.
sibiricum, *Hort. Erf. ex Steud. Nom.* ed. IL i 104.—Sibir.
simplex, *Willd. ex Kunth, Enum. PI.* iv. 596.-Reg. Colomb.
Skinneri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (Io76) 318. —Am. trop.
sphacelatum, *Baker, 1. c.* 803.—Afr. trop.
spirale, linn. Mant ii. 224 = Eriospermum spirale.
spiratum, Thunb. Prod. PL Cap. 62 = Urginea filifc'.ia.
squameum, Linn. f. Suppl. 202=hispidum.
stenocarpum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 317.—Mexic.
Sternbergianum, Schult. f Syst. vii. 1693=Chlorophytum Stembergianum.
strictum, Steud. ex Steud. Nom. ed. 1.54—Dichopogon strictns.
subpetiolatum, *Baker, ir. Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 802.—Afr. trop.
subtrigynum, Jacq. ColL iii 273=Amianthium muscaetoxicum.
succulentum, Salisb. Prod. 350 = Bulbine asphodeloides.
sulphureum, Waldst. & Kit. PL Rar. Hung, i 98 = Umithogalum pyrenaicum.
superpositum, *Baker, in Joum. Bot.* xvi. (1878) 324. —Afr. trop.
tenellum, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. 1. (1878) 256.—Afr. trop.
thrysoideum, *Baker, in Journ. Bot.* x. (1872) 189.—Afr. austr.
Torreyi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 317. —Mexic.
trinorum, *Ait. Hort. Kew.* i. 448.—Afr. austr.
trinervium, Viviani, FL lib. Spec 21.18. f. 2 •= Lloydia alpina.
tripedale, *Baker, in Joum. Bot.* xx. (1882) 269.—Madag.
triquetrum, linn. f. Suppl. 202 = Bulbinella triquetra.
tuberosum, Roxb. PL Corom. ii 20. t 138 • Chlorophytum tuberosum.
undnlatum, *Jacq. Coll. Suppl.* 87.—Afr. anstr.
undulatum, Thunb. Prod. Fl. Cap. 63=hispidum.
uniflorum, *Roxb. Hort. Beng.* 87 ; *Fl. Ind.* ii. 149.—Ind. or.

ANTHEBICTJM:-
ustulatnm, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. IL i. (1878) 258.—Afr. trop.
variegatum, Hort. ex Fl. Mag. N. S. t 162=Chlorophytnm elatum.
vermiculare, Soland. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xv. (1876) S08 = longepedunculatum.
vespertinum, Jacq. Hort. Schoenb. i. 44 = falcatum.
vestitum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) S07. —Mexic
villosum, Labill. Ic. PL Syr. Dec. v. 14. t. 9 = Gagea bohemica.
viscosum, *Baker, in Joum. Bot.* x. (1872) 141.—Afr. anstr.
Williamsii, Hort. ex Gard. Chron. (1875) I. 490= Chlorophytnm elatnm.
yedoënse, *Maxim, ex Franck. & Sam. Enum. PI. Jap.* ii. 629.—Japon.
zanguebaricum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 802.—Afr. trop.
Zeyheri, *Baker, in Joum. Bot.* x. (1872) 140.—Afr. austr.

ANTHEROCEPHALA, DC. Prod. vii. 755 (1889) = Andersonia, R. Br. (Epacrid.).
Drummondii, DC. 1. c.=And. aristata.

ANTHEROCERAS, Bert, in Am. Joura. Sc. xix. (1881) 301=Iieucocoryne, Lindl. (Liliac).
odorata, Bert. (Merc. Chil. 561) in Am. Journ. Sc. xix. (1881) 301.—Chili.
omithogaloides, Bert. 11. cc—Chili.

ANTHEROSPERMA, Poir. exStend. Nom. ed. II. i. 105 (1840), err. typ. = Atherospenna, Labill. (Monim.).

ANTHBBOTOMA, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. 1 745 (1867). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 746.
Afzelii, *Hook./, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 444.-Afr. trop.
Naudini, *Hook./, in Benth. & Hook. f. I. c*—Madag.

ANTHEROTRICHE, Tnrcz. in Bnll. Soc. Nat. Mosc. (1846) H. 605 =Anisoptera, Korth. (Dipterocarp.).
lanceolata, Tnrcz. 1. c 606=Anisopt thurifera.

ANTHEBUBA, LOOT. Fl. Cochinch. 144 (1790). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 29.
rnbra, *Lour. I. c*—Cochinch.; Molncc.

AHTHEBYIiIUM, Rohr & Vahl, in Skr. Natnrb. Selsk. Hafn. ii. (1792) 1.211. t. 8. *LYTHRARIEAE,* Benth. & Hook. f. j. 782.
floribundum, Spreng. Syst. ii. 474=Adenaria floribunda.
grisleoides, Spreng. 1. c.=Adenaria floribnnda.
nndiflomm, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 18.—Mexic.
purpuratum, Spreng. 1. c.=Adenaria floribnnda.
Rohrii, *Vahl, in Skr. Naturh. Selsk. Hafn.* ii. (1792) I. 211.—Ind. occ.

ANTHERYTA, Rafin. Sylva Tellnr. 95 (1838) - Tetraaygia, Rich. (Melast.).
granulosa, Rafin. 1. c. 96=T. granolosa.

ANTHESTERIA, Spieng. Anleit. ii. I. 79 (1817) = Aathistiria, Linn. f. (Gramin.).

ANTHILLIS, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 303 (1768) = Anthyllis, Linn. (Legum.).

ANTHIPSIMUS, Rafin. in Joum. Phys. lxxxU. (1819) 106=Panlcum, Linn.? (Gramin.).
gonopodos, Rafin. 1. c—Am. bor.

ANTHIRRINUM, Moench, Meth. 621 (1794)=Antirrhinum, Tonrn. (Scroph.).

ANTHISTIBIA, Linn. f.Nov. Gram. Gen. 35 (1779) (Amoen. Acad. x. 88). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1136.
ANDROSCEPIA, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 77(1829). t- 7 «M
ARISTARIA, Jungh. in Hoev. *Sc* De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 296.

ANTHISTIRIA :-
EXOTHECA, Anderss. in Nov. Act Upsal. Ser. III. i. (1856) 253.
GERMAINIA, Balansa & Poitrasson, in Bull. Soc. Hist. Nat. Tonl. vii. (1873) 844.
HETERELYTRON, Jungh. in Hoev. *8c* De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 294.
ISEILEMA, Anderss. in Nov. Act. Soc. Upsal. Ser. HI. i. (1856) 250.
PEROBACHNE, Presl, Rel. Haenk. i. 348. t. 48 (1830).
THEMEDA, Forsk. FL Aegypt. Arab. 178 (1776).
abyssinica, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* it 449. —Abyss,
anathera, *Nees, in Steud. Syn. PI. Gram.* 402.—Ind. or.
andropogonoides, Steud. I.e. = Andropogon bracteatus.
argentea, Nees, Gram. Afr. Austr. 127= imberbis.
arguens, *Willd. Sp. PI.* iv. 901.—Ins. Molncc.
arguens, Nees, Fl. Afr. Austr. 124= imberbis.
arguta, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 401.—Ind. or.; Burma.
arundinacea, Hassk. in Hoev. *Sc* De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 115 = arguens.
arundinacea, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 251 = gigantea.
australis, R. Br. Prod. i. 200= imberbis.
avenacea, F. Muell. Fragm. v. 206= gigantea.
barbata, Desf. in Joum. Phys. xl. 294. t. 2=ciliata.
Barteri, *Munro, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 176.—Afr. crop.
basiserícea, F. Muell. Fragm. v. 207 = gigantea.
Bladhii, *Wight, in Wall. Cat.* n. 8770.—Ind. or.
brachyantha, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 71=imberbis.
caespitosa, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. IIL ii. (1856) 241 = imberbis.
caudata, Nees, ex Hook. & Am. BoL Beech. Voy. 245 =gigantea.
ciliata, Cav. ex Spreng. Syst. i. 291=australis.
ciliata, *Linn.f. Diss. Nov. Gram. Gen.* 35.—Ind. or.; Afr.; Jamaic
ciliata, Retz. Obs. fasc. iii. ll=imberbis.
dmicina, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxL (1868) 182=prostrata.
cuspidata, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1856) 242-imberbis.
cymbaria, *Roxb. Hort. Beng.* 6; *Fl. Ind.* i. 251.—Ind. or.
depauperata, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1856) 243-imberbis.
Desfontainii, Kunth, Rev. Gram. i. 161=imberbis.
dissoluta, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 400 (est Andropoginis sp. ign.).—Afr. trop.
fasciculata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 366-=Andropogon filipendulus.
flosculosa, F. Muell. Fragm. x. 75=gigantea?
foliosa, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 191 = Cymbopogon Humboldtii.
Forskalii, Kunth, Rev. Gram. i. 162=imberbis.
frondosa, R. Br. Prod. i. 200= arguens.
gigantea, *Cav. ic.* v. 85.—Ins. Philipp.
glabrifolia, Desv. Opusc. 71 (='ciliata, Sw.[1]).—Ind. occ.
glandulosa, Wight, ex Steud. Syn. PI. Gram. 400 = prostrata.
glauca, Desf. Fl. Atl. ii. 380. t. 254~Imberbis.
keteroclita, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 249 = Andropogon heteroclitus.
hispida, Thunb. Fl. Cap. i. 403-imberbis.
Hookeri, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 91=gigantea.
Humboldtii, Nees, Agrost Bras. 869=Cymbopogon Humboldtii.
imberbis, *Ret*. Obs.* iii. 11.—Afr. austr.
japonica, Willd. Sp. PI. iv. 901=imberbis.
Junghuhniana, Nees, ex Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1866) 233-arguens.
latifolia, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot 562 =Andropogon lepidus.
laxa, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. HI. ii. (1856) 248=imberbis,
Linneana, Steud. Syn. PI. Gram. 401=prostrata.
membranacea, *Lindl. in Mitch. Trop. Austr.* 88.—Austral.
multiplex, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 449 = Andropogon multiplex,
mntica, *Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr.* x. (1843) 117-gigantea.
paleacea, *Ball, in Joum. Linn. Soc.* xvi. (1878) 734.—Morocco.

AJM THISTCBIA :—
pilifera, Steud. Syn. PI. Gram. 400=arguens.
pi'osa, Presl, Rel. Haenk. i. 348 = Cymbopogon Humboldtii.
polystachya, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 248= imberbis.
prostrata, *Willd. Sp. PI.* iv. 901.—Ind. or.
pseudo-cymbaria, Steud. Syn. PI. Gram. 399=Cymbopogon elegans.
puberula, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1856) 240=imberbis.
punctata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 448 = imberbis.
quinqueplex, Steud. Syn. PI. Gram. 400 » Cymbopogon elegans.
ramosa, Thunb. ex Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1866) 247 = Apluda gigantea.
reflexa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 191 = Cymbopogon Humboldtii.
icandens, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 248 = ciliata.
setosa, Thunb. ex Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1856) 283-arguens.
subglabra, Buese, in Miq. PI. Jungh. 368=imberbis.
subsericans, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 401*= gigantea.
syriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 72=imberbis.
tortilis, Presl, Rel. Haenk. i. 347 = Andropogon Nardus.
tremula, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 401.—Ind. or.
villosa, Lam. Illustr. t. 841. f. 3=gigantea.
vulcanica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 400.—Ins. Santorin.
vulpina, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. (1856) 245 = gigantea.
Wightii, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 400 = prostrata.

ANTHOBOLTJS, R. Br. Prod. 357 (1810). *SANTALACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 230.
exocarpoides, *F. Muell. Fragm.* ix. 3.—Austral,
filifolius, *R. Br. Prod.* 357.—Austral,
foveolatus, *F. Muell. Fragm.* i. 212.—Austral,
leptomeroides, *F. Muell. I. c.* 21.—Austral.
triqueter, A. Cunn. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 687 = filifolius.
triqueter, *R. Br. Prod.* 857.—Austral.

ANTHOCEPHALTJS, A. Rich, in M<?m Soc. Hist. Nat. Par. v. (1884) 237, excl. syn.; Korth. Verh. Nat. Gesch. 154. t. 48 (1840?). *RUBIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 29.
CEPHALIDIUH, A. Rich. 1. c 290.
Cadamba, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 185 = morindaefolius.
chinensis, Hassk. in Flora, xxviii. (1845) 231 = Cephalanthus orientalis.
chinensis, Walp. Rep. ii. 491=Nauclea purpurea.
indicus, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1884) 288=Nauclea purpurea.
morindaefolius, *Korth. Verh. Nat. Gesch.* 154. t. 48; Obs. Naud. Ind. 20.—Sumatr.; Ind. or.

ANTHOCERAS, Baker, in Joum. Linn. Soc. xi. 874 (1871)=ANTHEROCERAS, Bert. -Leucocoryne, Lindl. (Liliac.).

ANTHOCERASTES, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 225=Toxanthus, Turcz. (Compos.).
Drummondii, A. Gray, 1. c = T. perpusillus.
Muelleri, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 480 = T. Muelleri.

ANTHOCEBCIS, Labill. Nov. Holl. PL ii. 19. t. 158 (1806). *SOLAN ACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 812.
CYPHANTHERA, Miers, in Ann. Nat Hist. Ser. II. xi. (1853) 876.
EADESIA, F. Muell. in Trans. Phil. Inst Viet. ii. (1858) 71.
albicans, *A. Cunn. in Field, New South Wales, App.* 835. t 2.—Austral.
amblyantha, F. Muell. Fragm. i. 179=myosotidea.
angustifolia, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1865) 21.—Austral.
anisantha, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 201.-Austral.

ANTHOCEBCIS :—
arborea, *F. Muell. Fragm.* i. 212.—Austral.
Eadesii, *F. Muell. I. c.* ii. 139.—Austral,
fasciculata, *F. Muell. 1. c.* i. 122.—Austral,
genistoides, *Mien, Illustr. S. Am. PI.* ii. *App.* 27. t. 83 D.—Austral.
glabella, Mien, I. c. = viscosa.
liracilis, *Benth. in DC. Prod. x.* 192.—Austral.
Hopwoodii, *F. Muell. Fragm.* ii. 138.—Austral.
Hicifolia, Hook. Bot Mag. sub t. 2961 = viscosa.
intricata, *F. Muell. Fragm.* i. 211.—Austral.
Leichhardtii, *F. Muell. I. c.* vi. 142.—Austral.
littorea, Endl. Iconogr. t. 68 = viscosa.
littorea, *Labill. PI. N. Holl.* ii. 19. t. 158.—Austral,
niicrophylla, *F. Muell. Fragm.* i. 179.—Austral,
myosotidea, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 20.—Austral.
Odgersii, *F. Muell. Fragm.* x. 19.—Austral,
racemosa, *F. Muell. 1. c.* i. 211.—Austral,
scabrella, *Benth. in DC. Prod.* x. 192.—Austral.
spinescens, F. Muell. Fragm. i. 122 = genistoides.
ta«manica, *Hoot./. Fl. Tasm.* i. 289. t. 92.—Austral,
viscosa, *R. Br. Prod.* 448.—Austral.

ANTHOCEROS dissectus, Mont, ex Wedd. in DC. Prod, xvii. 62 (= *Neolacis dissecta)* = Apinagia, Tul. (Podost).

AWTHOCHLAMYS, Fenzl, ex Endl. Gen. 300 (1837). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 58.
PELTISPERMUM, Moq. Chenop. Enum. 102 (1840).
Polygaloides, [A M I I] *Moq. I. c.* 102.—Reg. Caocas.

ANTHOCHORTUS, Fjidl. Gen. 121 (1837); Kunth, Enum. PI. iii. 485 (18411 =ANTOCHORTUS, Nees = WiUdenowia, Thunb. (Resiiac).

ANTHOCHYTRUM, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 89. t. 1432 (1859) = Grepis, Vaill. (Compos.).
"Ipinum, Reichb. f. 1. c 39. t. 81 = C. alpina.

AWTHOCLEISTA, Afzel. ex R. Br. in Tuckey, Congo, App. 449 (1818). *LOGANIACEAE,* Benth. * Hook. f. ii. 795.
madagascariensis, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 173—Madag.
macrophylla, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 471.—Afr. trop.
nobilis, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 68.—Afr. trop.
scandeus, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 16.—Afr. trop.
vogelii, *Planch, in Hoot. Ic. PI.* t. 793.—Afr. trop.

ANTHOCOMA, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Need. Indie, ii. (1845) 569 = Phlomia, Linn. ? (Labiat.).
fiavescens, Zoll. & Mor. 1. c 570.—Malaya.

ANTHOCOMETES, Nees, in DC. Prod. xi. 311 (1847) —Monothecium, Hochst. (Acanth.).
aristatus, Nees, 1. c. 312 = M. arista torn.

ANTHODENDRON, Reichb. in Moessl. Handb. i. p. xl. 244, 308 (1827)=Bhododendran, Linn. (Ericac).
fiavum, Reichb. 1. c. 309 = R. flavum.
"udiflorum, Reichb. 1. c. = R. nudiflonim.
Ponticum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 416 = R. ponticum.
viscosum, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. 424 = R. viscosum.

ANTHODISCUS, Endl. Gen. 1091 in syn. (1841)-ANTHODON, Ruiz & Pav.=Salaoia, Linn. (Hip-Pocrat.).

AWTHODISCTJS, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 193 (1818). *TERNSTROEMIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 181.
guianensis, *G. F. W. Mey. I. c*— Guiana,
peroanus, *Baill. Adansmia,* x. (1872) 241.—Pernv.
tnfoliatns, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* (1818) 194. —Gaiana.

ANTHODON, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 45. t. 74 (1798) = Salacia, Linn. (Hippocrat.).
"Piculatum, Miers, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. I. 137 = Hippocratea megacarpa.
"assifolium, Mart, in Schult. Mant. i. 348 = S. erassifolia.

ANTHODON :—
decussatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 45. t. 74. t 2 = Hippocratea decussata.
ellipticum. Mart, in Schult. Mant. L 348 = Salacia elliplica.
glomeratum, Mart. 1. c. = S. glomerate.
grandiflorum, Benth. in Hook. Kew Jonm. iv. (1852) 10 = S. grandiflora.
grandifolium, Mart, in Schult. Mant. i. 348 = S. grandifolia.
laevigatum, Steud. Norn. ed. II. i. 105 = S. laevigata.
laxiflorum, Benth. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 10 = S. laxiflora.
micranthum, Mart, in Schult. Mant. i. 348 = S. micrantha.
oblongifolium, Mart. 1. c - S . elliptica.
paniculatum, Mart. 1. c. = S. paniculata.
Selloanum, Schult. Mant. iii. Add. II. 411.—Bras.
trinerve, Schult. 1. c.—Bras.
undulatum, Mart, in Schult. Mant. i. 348 = S. arborea.
verrucosum, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 172.—Cuba.

ANTHODUS, Mart, ex Roem. & Schult. Syst. Mant. i. 253 (1822)-ANTHODON, Ruiz & Pav. - Salacia, Linn. (Hippocrat.).

ABTHOOONIDM, Wall, ex Lindl. Introd^Nat Syst. ed. II. 341 (1836), nomen. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 515.
gracile. *Wall. Cat.* n. 7898.—Reg. Himal.
Griffithii, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 90 = gracile.

ANTHOLOMA, Labill. Voy. Rech. Pérouse, ii. 235. t. 41 (1800). *T1UACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 239.
Billardieri, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* ix. (1865) 835.—N. Caled.
montana, *Labill. Voy. Rech. Pérouse,* 236. t. 41.—N. Caled.

ABTTHOIiYZA, Linn. Syst. ed. I. (1735) ; Gen. erf. I. 10 (1737). *IR1DEAE,* Benth. &. Hook. f. iii. 710.
ANISANTHUS, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 600 (1830) ; Brit. Fl. Gard. Ser. H. t. 84 (1838).
CUNONIA, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. (1768).
GLADIOLUS, Gaertn. Fruct. i. 31. t. 11. f. 4. (1788).
HOMOGLOSSUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 825.
PETAMENES, Salisb. 1. c. 324.
abbreviata, Pers. Syn. L 42—quadrangularis.
abyssinica, *A. Brongn. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 306.—Abyss.
aethiopica, *Linn. Syst.* ed. X. 868—Afr. austr.
aletroides. Barm. f. PI. Cap. Prod. l = Watsonia aletroides.
bicolor. Gasp, ex Tenore, Cat. Orto Nap. (1846) 78; fide E. Morr. in Belg. Hortic. ii. (1852) 145 = aethiopica.
brevifolia, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 105 = Gladiolus brevifolius.
brevifolia, Eckl. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 179 = caff™,
caffra, *Banks, ex Ker-Gawl. in Konig Sf Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 232.—Afr. austr.
caryophyllacea, Bunn. f. Fl. Cap. Prod. l = Watsonia humilis.
caryophyllea, Vahl, Enum. PI. ii. 123 = Watsonia humilis.
cepacea, *Linn. Mant.* ii. 176.—Afr. austr.
coccinea, Spreng. Neue Entdeck. i. 253 — A. Cunonia.
Cunonia, *Linn. Sp. PI.* 37.—Afr. austr.
fimbriata, Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867-68) 299 = Babiana fimbriata.
floribunda, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 324 — aethiopica,
fucata. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 180.—Afr. austr.
fulgens, Andr. Bot. Rep. t. 192 = Watsonia Meriana.
hirsuta, Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867-68) 379 - Gladiolus sericeo-villosus.
hirsuta, Lam. Encyc. ii. 211 = Gladiolus mollis.
hirta, Pers Syn. i. 42 = Babiana Thunbergii.
huillensis, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn! Soc.* Ser. II. i. (1878) 270.—Afr. trop.
hypogaea, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1883) 346.—Afr. austr.

ABTPHOLYZA:-
intermedia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (18) 180, nomen.—Afr. austr.
Iuddior, *Linn./. Suppl.* 96.—Afr. austr.
luddior, Vahl, Enum. PI. ii. 122 = Watsonia plantaginea.
Ludwigii, Eckl. Verz. 34 = aethiopica ?
marginata, Page, ex Steud. Nom. ed. II. 1. 10S = Watsonia marginata.
Maura, Linn. Mant. ii. 175=Witsenia Maura.
Meriana, Blanco, ¥\. Filip. ed. I. 24 = Sisyrinchium palmifolium.
Meriana, Linn. Sp. PI. ed. II. 64 = Watsonia Meriana.
Merianella.CuTt. Bot. Mag. t. 441 -Watsonia aletroides.
Merianella, *Murr. Syst.* ed. XIII. 77.—Afr. aastr.
Meriania, Linn. Syst. ed. X. 863 = Watsonia Meriana.
montana, [Ker-Gawl. in] Konig *8c* Sims, Ann. Bot. L (1806) 238 = Gladiolus montanus.
nemorosa, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 346.—Afr. austr.
nervosa, *Thunb. Prod. PL Cap.* 7.—Afr. austr.
orchidiflora, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 783 - Gladiolus arenarins.
paniculata, *Klatt, in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 379.—Afr. austr.
plicata. Linn. f. Suppl. 96 = Babiana Thunbergii.
praealta, [Del. in] Red. Liliac. vii. t. 387 = aethiopica.
quadrangularis, *Burm./. Fl. Cap. Prod.* 1.—Afr. austr.
q-aiaqaeaerria^Schrank.Comm. Jrid.Cap. 56.—Afr. austr.
ramosa, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1868) 734 = Gladiolus montanus.
revoluta, *Burm./. Fl. Cap. Prod.* 1.—Afr. austr.
ringens, Andr. Bot. Rep. t. 32 = aethiopica.
ringens. Linn. Sp. Fl. 87 = Babiana ringens.
rupestris, Eckl. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 179 = caffra.
saccata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 180. —Afr. austr.
spicata, Andr. Bot. Rep. t. 56 = Watsonia brevifolia.
spicata, *Brehm, ex Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 845.—Afr. austr.
spicata. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = Gladiolus Milleii.
splendens, *Steud. Nom.* ed. II. i. 106.—Afr. austr.
striata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 346.—Afr. austr.
tubulosa, Andr. Bot. Rep. t 174= Watsonia aletroides.
vittigera, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 324 = aethiopica.

ANTHOMELES, M. Roem. Syn. (Rosiflorae) 102 & 140 (1847) = CrataegUB, Linn. (Rosac).
aestivalis, M. Roem. 1. c. 141 = Cr. aestivalis.
Douglasii, M. Roem. 1. c. 140 = Cr. Douglasii.
/lava, M. Roem. 1. c. 142 = Cr. flava.
fiexispina, M. Roem. 1. c. = Cr. parvifolia.
glandulosa, M. Roem. 1. c 141 = Cr. flava.
opaca, M. Roem. 1. c. = Cr. aestivalis.
rotundifolia, M. Roem. 1. c. 140 = Cr. coccinea.
sanguinea, M. Roem. 1. c. = Cr. sanguinea.
stipulosa, M. Roem. 1. c 142 = Cr. stipnlosa.
subserrata, M. Roem. 1. c.=»Cr. subserrata.
turbinata, M. Roem. 1. c = Cr. flava.

ANTHONOTA, Beauv. Fl. Owar. et Ben. i. 70. t. 42 (1805) = Maerolobium, Schreb. (Legum.).
crassi/olia, Baill. Adansonia, vi. (1864-65) 179.—Afr. trop.
elliptica, Desv. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. ix. (1826) 430. —Am. merid.
macrophylla, Beanv. Fl. Owar. et Ben. i. 70. t. 42 = M. Palisoti.

ANTHOPHYLLUM, Steud. Syn. PI. Cyp. 160 (1858)-Scirpus, Linn. (Cyper.).
Urvillei, Steud. 1. c = S . frondosus.

ANTHOPOGON,Neck.Elem.ii.l2(1790)-Gentiana, Linn.
barbata, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 25 = G. barbata.
ciliata, Rafin. 1. C.-G. ciliata.
crinita, Rafin. 1. c = G. crinita.
detonsa, Rafin. 1. c. = G. serrata.
virgata, Rafin. 1. c—Am. boi.

ANTHOPOGON, Nutt. Gen. Am. i. 81 (1818) = Oymnopogon, Beauv. (Gram.).
aliescens, Rafin. New Fl. Am. iv. 91.—Am. bor.

ANTHOPOGON :—
brevifolium, Rafin. NewFl. Am. iv. 91 = Gymnopogon brevifolius.
incarnatum, Rafin. 1. c. 90.—Am. bor.
lepturoides, Nutt. Gen. Am. i. 82 — G. racemosus.

ANTHOPTERUS, Hook. Ic Pl. t 243 (1840). *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 668.
calycinus, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 570 = Ceratostema calycinum.
longiflorus, Benth. ex Benth. & Hook. f. 1. c.« Ceratostema longiflonim, *Benth. & Hook./.*
raircronatus, *Benth. PI. Hartw.* 221.—Reg. Colomb.
racemosus, *Hook. Ic. PI.* iii. t. 243.—Peruv.
Wardii, *Ball, in Hook. Ic. PI.* t. 1465.—Reg. Colomb.

ANTHORA, Hall, in Rupp. Fl. Jen. 290 (1746); DC. Prod. i. 66=Aoonitum, Town. (Ranunc).
saxatilis, Foun. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 326=Ac. Anthora.
versicolor, Stev. ex Ser. in DC. Prod. L 67-Ac. Anthora.

ANTHOSACHNE, Stend. Syn. PI. Gram. 237 (1855) = Agropjrron, J. Gaertn. (Gramin.).
australasica, Steud. L c.=Agrop. scabrum.

ANTOSCHMIDTIA, Steud. Syn. PI. Gram. 199 (1855) = 8chmidtia, Stend. (Gramin.).

ANTHOSCIADIUM,Fenzl,inEndLGen. Snppl, iv. m, 9 (1850) = SeUnum, Linn. (Umbell.).

ANTHOSPERMTTM, linn. Gen. ed. I. 802 (1787). *RVBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 140.
CHRYSOSPERMUM, Rdchb. Consp. 166 (1828) }
aethiopicum, *Linn. Sp. PI.* 1058.—Afr. anstr.
ambrosiacum, Moench, Meth. SnppL 269-= aethiopicum.
aromaticum, Salisb. Prod. 59=aethiopicnm.
asperuloides, *Hock.f. in Journ. Linn. Soc.* vi. (18621 11.—Fernando Po.
Bergianum, *Cruse, Rub. Cap.* 8.—Afr. anstr.
Bnrkei, *Sond. in Ham. & Sond. Fl. Cap.* iii. 29.—Air. austr.
calycophyllum, *Sond. 1. c.* 31.—Afr. austr.
ciliare, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1521.—Afr. anstr.
ciliare, Thunb. ex Sond. in Harv. *Sc* Sond. FL Cap. iii 80=hirrom.
confertum, *Cruse, in Walp. Rep.* ii. 462.—Afr. austr.
Crocyllis, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 82 Air. anstr.
Dregei, *Sond. 1. c.* 29.—Afr. austr.
Ecklonis, *Sond. I. c.* 32.—Afr. austr.
emirnense, *Baker, in Journ. Bet.* xx. (1882) 139. Madag.
ferrngineum, *EcU. & Zeyh. Enum.* 366.—Afr. austr.
foetidum, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 30 - lanceolatum.
galioides, Rdchb. eiSpreng. Syst. iv. Cur. Post. 338 = ciliare.
Galopina, Thunb. Prod. PI. Cap. 82 = Galopina drcaeoides.
hedyotideum, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 80.—Afr. anstr.
herbejceum, Linn. f. SuppL 440 = lanceolatum.
hirsutum, DC. Prod. vi. 680=hirtum.
hirtum, *Cruse, Rub. Cap.* 11.—Afr. anstr.
hispidulnm.f. *Mey.exHaro. & Sond. Fl. Cap.* iii. 29.—Afr. anstr.
lanceolatum, Sieber, ex Harv. & Sond. 1. c. 80-hirtum.
lanceolatnm, *Thunb. Prod. Fl. Cap.* 82.—Afr. anstr.
latifolium, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. 1. c. 30 = lanceolatum.
Lichtensteinii, *Cruse, Rub. Cap.* 9,16.—Afr. austr.
muriculatum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. 345.—Abyss.
nodosum, E. Mey. ex Harv. & Sond. FL Cap. iii. 30 = lanceolatum.
pachyrrhizum, *Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 229.—Afr. trop.
paniculatum, *Cruse, Rub. Cap.* 9, 15.—Afr. anstr.
plicatum, Hilsenb. *Sc* Bqj. ex Baker, in Tonm. Linn. Soc. xx. (1884) 143 = Myosnrandra moschata.
polyacanthun, *Baker, 1. c.* 171.—Madag.

ANTHOSPKRMTJM: :—
prostratum, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 28.—Afr. anstr.
pumilum, *Sond. I. c.* 31.—Afr. anstr.
rigidnm, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 867.—Afr. anstr.
rubiaceum, Reichb. ex Sprang. Systav. Cor. Post. 838 =hirtum.
scabrum, Thunb. Prod. PL Cap. 32 - Carpacoce scabra.
spathulatum, Spreng. Nene Entdeck. iii. 45=ciliare.
spermacoceum, Reichb. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 838 — Carpacoce Spermacoce.
thymoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 171—Madag.
tricostatnm, *Sond. in Harv. &Sond. Fl. Cap.* iii. 28.—Afr. anstr.

ANTHOSTEttA, A. Tuss. Enph. Tent. 66. t. 18 (1824). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 261.
madagascariense, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 60, 544.—Madag.
senegalensis, *Juss. Euph. Tent.* 117.—Afr. trop.

ANTHOTItTM, R. Br. Prod. 582 (1810). *GOODENOVIEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 687.
glabrum, Poir. in Diet Sc Nat ii. Snppl. 80 = humile.
humile, *R. Br. Prod.* 582.—Austral,
rnbriflornm, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iv. 45.—Austral.

ANTHOTBOCHE, Endl. Nov. Stirp. Dec. 6 (1889). *SOLANACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 912.
Blackii, *F. Muell. Fragm.* viiL 232.—Austral.
pannosa, *Endl. Nov. Stirp. Dec.* 7.—Austral.
Walcottii, *F. Muell. Fragm.* i. 123.—Austral.

AHTFHOXANTHT7M, Linn. Gen. ed. I. 18 (1787). *GRAMINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1138.
XANTHANTHOS, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, viii. 189 (1881).
XANTHONANTHOS, St. Lag. 1. c. vii. (1880) 119; viii. 189 (1881).
aculeatum, Linn. f. Snppl. 89-Crypsis aculeata.
alpinum, Schur, Enum. PI. Transs. 725=odoratum.
amarum, *Brot. Phyt. Lusit.* 11. t. 4. f. 1.—Lusitan.
angustifolium, Plan.-Gir. Ensaya Fl. Gallega, 398 = Puelii.
aristatum, *Boiss. Voy. Espagne*, 688.—Hispan.
aristatum, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. 676 = Puelii.
asperum, Mann, ex Opiz, Natural vii. (1824) 61 = odoratum.
avenaceum, Pourr. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 26=amarum.
avenaceum, *Rets. Obs.* 3, 8.—Ind. or.
Carrenianum, Parl. PL Nov. 37=aristatum.
crinitum, Linn. f. Snppl. 90=Dichelachne crinita.
giganteum, Walt Fl. Carol. 65 = Erianthus saccharoides.
glaucum, Vahl, ex Roem. *Sc* Schult Syst. i. 288 = marum.
gradle, *Bivon. Stirp. Rar. Sicil.* i. [13] t. 1. f. 2.—Reg. Mediterr.
indicum, Linn. Sp. PL 28 -Perotis latifolia.
lasianthum, *Salem, ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 709.—Marocco.
Lloydii, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 697 = aristatum.
myrthense, Tod. ex Nym. Consp. 790=Puellii.
odoratum, *Linn. Sp. PI.* 28.—Europ.; As. bor.; Afr. bor.
ovatum, *Lag. Elench.* 2. n. 15.—Hispan.; Marocco.
paniculatum, Linn. Sp. PI. 28 = Festuca spadicea.
Puelii, *Lecoq & Lamotte, Cat. PI. Auver.* 385.—Europ.
pulchellum, D. Dietr. Syn. PL i. 625, err. typ. 69 = pulchsnimum.
pulcherrimnm, *Lour. Fl. Cochinch.* 86.—Cochinch.
Sommierianum, Ricei, in Nuovo Giorn. Bot xiii. (1881) 135=aristatum.
spiculatforme, Auct. ex Steud. Norn. ed. II. i. 106 = Perotis latifolia.
•*oilloium*, ,TJum. Obs. Gram. Belg. 129 = odoratum.

ANTHBISCU8, Bemh. Syst. Verz. Erf. 118 (1800). *UMBELUFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 899.

AHTHRISCUS:—
abortiva, Jord. Obs. PL Crit. vii. 28=alpestris.
afrioana, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 195.—Afr. occ.
alpestris, *Wimm. & Grab. Fl. Silesiae*, i. 289.—Europ.
alpina, Jord. Obs. PL Crit. vii. 29=sylvestris.
anatolica, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 59—nemorosa.
capensis, Spreng. in Roem. & Schult. Syst. vi. 626 = Carntn hispidum.
Caucalis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 280 = vnlgaris.
Cerefolium, *Hoffm. Gen. Umb.* 41, 47. t. 1.—Europ.; Oriens; As. bor.
chaerophyllus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119 - A. Cerefolium.
Cicutaria, Duby, in DC. Bot. Gall. i. 239-alpestris.
dubia, Kabath, Fl. Gleiw. 80=alpestris.
elatior, Bess. Enum. PL Volh. 65=sylvestris.
fumarioides, *Spreng. Umb. Prod.* 27.—Europ.
gracilis, Hampe, in Flora, xxv. (1842) I. 64-tenerrima.
heterosantha, Schur, Enum. PL Transs. 273-alpestris.
humilis, Bess. Enum. PL Volh. 18=alpestris.
intermedia, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1868)Sl=sylvestris.
Kotschyi, *Fenil, ex Boiss. Diagn.* Ser. IL v. 102.—Oriens.
laevigata, Griseb.' SpidL Fl. Rumel. i. S67=sylvestris.
Umprocarpa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ii. (1844)69.—Syria; CiUc.
longirostris, Bertol. Fl. Ital. iii. 197= A. Cerefolium.
macrocarpa, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 100 = nemorosa.
mollis, *Boiss. & Rent. I. c.* 99.—Afr. bor.
neglecta, Boiss. *Sc* Rent, ex Lange, Ind. Sem. Haun. (1854) 22; Lose. *Sc* Pard. Ser. Inconf. Arag. 46 = vnlgaris.
nemorosa, Baker *Sc S.* Moore, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1879) 382= sylvestris.
nemorosa, *Spreng. Umb. Prod.* 27.—Europ.; Oriens.
nitens, *Bemh. in Linnaea*, xU. (1838) *Litt.* 76 = Ruthenia.
nitida, *Garcke, Fl. Deutschl.* ed. VII. 180.—Europ.
nodosa, Pers. Syn. i. 820=Chaerophyllum nodosum.
odoratissima, *Gueldenst. Reisen durch Russl.* i'. 190.—Rossia.
pilosa, Schur, Enum. PL Transs. 272-sylvestris.
Prescottii, *Veesenm. in Beitr. Pfl. Russ. Reich*, ix. 84.—Rossia.
procera, Bess. Enum. PI. Volh. 18=sylvestris.
rivularis, Dolliner, ex Vukot. in Rad. Jugos. Akad. Zagreb, xxxix. (1877) 209—nemorosa.
rupicola, Godet, Fl. Jura, i. 800=alpestris.
Ruprechti, *Boiss. Fl. Orient*, ii. 914.—Reg. Caucas.
saliva, Bess. Enum. PL Volh. 13 = A. Cerefolium.
scandens, Steud. Nom. ed. II. i. 107, sphalm. = seq
Scandix! Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 231=Chaerophyllum nodosum.
sicnla, *DC. Prod. iv.* 223.—SiciL
sicula, Vis. ex Nym. Consp. 301—fumarioides.
sylvestris, *Hoffm. Gen. Umb.* 40,46.11. £ 19.—Europ.; Reg. Caucas.; As. bor.
taurica, *Fisch. ex Loud. Hort. Brit.* 101.—Tauria.
tenerrima, *Boiss. & Sprun. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ii. (1869) 60.—Graecia; As. Min.
torquata, Duby, in DC. Bot. Gall. i. 239=alpestris.
trachysperma, Rdchb. ex Nym. Consp. 801 = A. Cerelolium.
trichosperma, Pers. Syn. i. 320 = Caucalis trichospenna.
trichosperma, Spreng. in Roem. *Sc* Schult Syst. vi. 625 = A. Cerefolium.
tuberculata, *Spreng. in Roem. & Schult. Syst.* vL 627.—Hab.1
villosa, Boiss. Fl. Orient, ii. 911=nemorosa.
vulgaris, *Vert. Erf.* 168.—Europ.; Oriens.

ANTHROCEPHALUS, [Schlecht. in] Linnaea, xiv. (1840) Litt. 179,sphalm.=Anthocephalufl, A. Rich. (Rubiac.).

ANTHROPODIUM, Sims, in Bot Mag. Ind. (1816) 6, *at.* typ.=Arthropodium, R. Br. (Iiliac).

ANTHROSTYLIS, D. Dietr. Syn. PL i. 129,207 (1889), err. typ.=Arthroetylifl, R. Br. (Cyper.).

ANTHtntlTTM, Schott, in Wien. Zeitschr. f. Kunst, iii. 828 (1829). *AROIDEAE*, Berth. & Hook. f. iii. 998. PLEUROSPA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 8 (1886). STREPSANTHERA, Rafin. 1. c. 13 (1886).
acaule, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 83. t. 294.—Peruv.
acaule, *Schott, Melet.* i. 22.—Ind. occ.
acuminatum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855) 66-gracile.
aduncum, *Schott, Prod. Aroid.* 478.—Bras,
aemulum, *Schott, in Bonplandia*, vii. (1869) 165.—Mexic.
aeranthe, *Hort. ex Baker, in Sound. Ref.* t. 278.—Am. trop.
affine, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1866) 82.—Bras,
agnatum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1868) 181.—Nicaragua.
albo-costatum, *Miq. Hort. Amstelod.* (1868).—Hab. J
alienatum, *Schott, Prod. Aroid.* 507.—Peruv.
alienigenum, Schott, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 130 = Olfersianum.
amoenum, *Kunth, Ind. Sen. Hort. Berol.* (1848) 11.—Perav.
"mplum, Kunth, Enum. PI. iii. 77 = Hookeri.
andegavense x, Hort. cf. Gard. Chron. (1888) I. 510.
Andenonii, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 825.—Ind. occ.
andicola,£ẁ6m.ť» *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1849) 22.—Mexic.
Andraeannm, *Linden, Illustr. Hortic.* (1877) 48. t. 271.—Reg. Colomb.
angustatum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 79.—Venezuela.
Appunianum, *Schott, Prod. Aroid.* 512.—Venezuela,
araliaefolium, *Regel, in Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1869) 10 ; *Gartenfl.* (1870) 98. t. 648.—'N. Caled.'
assimile, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. (1865) 82 = Harrisii.
aitenuatum, Miq. Cat Hort. Amstel. (1858)=acaule.
Aubletii, Kunth, Enum. PL iii. 81 = pentaphyllum.
augustinum, *C. Koch & Louche, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) 7 = trinervium.
tahiense, N. E. Br. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 638=helium.
Bakeri, *Hoot./. Bot. Mag.* t. 6261.—Am. centr.
Belangeri, Engl. in Engl. Bot. Jahrb. L (1881) 480=gracile.
bellum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1859) 100.—Bras.
Beyrichianum, Kunth, Enum. PI. iii. 69-Harrisii.
Binoti, Linden, in Kegel, Gartenfl. (1872) t 723 = bellum.
bogotense, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 3O2.-Reg. Colomb.
bombacifolium, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. „ (1858) 182.—Costa Rica.
Boucheanum, *C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1865) *App.* 7.—Venezuela.
brachygonatum, *Schott, Prod. Aroid.* 468.—Mexic.
orachyspathum, C. Koch & Bouché, in Koch, Allg. Gartenz. (1857) 288 = trinerve.
™edemeyen,5f*ott, *in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii.(1857) 269.—Bras
breviscapum,' *Kunth, Enum. PI.* iii. 78; *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 84.—Peruv.
Btownii, *Mast, in Gard. Chron.* (1876) H. 744.—Reg. Colomb.
candidum. Bull, Cat. (1875) S.t. 11 - brevirostre.
cardiophyllum, C. Koch & August, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 9=nymphaeifolium.
carinatum, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1886) 275.—Reg. Colomb.
cartilagineum, *Kunth, Enum. PI.* Hi. 79.—Venezuela,
caucanum, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 274.—Reg. Colomb.
caudatum, Kunth, Enum. PL iii. 80-undatum.
Chamissonis, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 269 =» Gaudichaudtanum.
dulseiensis x, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) II. 650.
cUvigerum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. tt Sp.* iii. 84.—Peruv.
cochleatum, Moritz, ex Schott, Prod. Aroid. 499 = nymphaeifolium.
colocasiaefolium, *Devans. in Rev. Hortic.* (1879) 452.—Am. trop.!
commutatum, *Schott, in Bonplandia, %.* (1862) 148,.—Hab. 1
comtum, *Schott. I. c.* 87.—Bras.

ANTHUJbUUM:—
concinnatum, Schott, Prod. Aroid. 522—bogotense.
concinnum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1867) 801-Guildingii.
consanquineum, Kunth, Enum. PI. ill 71 = Harrisii.
consimile, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 294,—Peruv.
consobrinum, *Schott, 1. c.* v. (1855) 66.—Nicaragua.
contemtum, Schott, ex Engl. in DC. Monog. Phao. ii. 129 = Harrisii.
corallinum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 84.—Peruv.
cordato-sagittatum, Schott, in Oesta Bot. Zeitschr. ix. (1859) 100-rubrinervium.
cordatum, *C. Koch & H. Sello, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1858) *App.* 5.—Venezuela.
cordatum, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 638 = Pothos cordata.
cordatum, Schott, Prod. Aroid. 491 = Lhotzkyanum.
cordifolium, Hort. ex Gard. Chron. (1865) 934-grande.
cordifolium, *Kunth, Enum. PL* iii. 76.—Costa Rica,
coriaceum, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. HI. 688.—Bras,
costatum, *C. Koch & Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) *App.* 6 —Venezuela,
crassifolium, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1888) I. 10.—Reg. Colomb.
crassinervium, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 138 = acaule.
crassinervium, *Schott, Melet.* i. 22.—Panama.
crenatum, Kunth, Enum. PI. iii. 75 = acaule.
cristallinum, *Linden & Andre', in Linden, Cat.* (1878) n. 90.1128.—Peruv.
cucullatum, Koch & Sello, Ind. Sem. Hort. Berol. (1858) App. 6=andicola.
cupreum, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1886) 278.—Reg. Colomb.
cuspidatum, *Mast, in Gard. Chron.* (1875) I. 428.—Reg. Colomb.
cuspidifolium, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 180.—Costa Rica,
cymatophyllum, *C. Koch & Sello, in C. Koch, Weckenschr.* xi. (1S68> 276.—Bras.
Dechardi, AndnS, in Illustr. Hortic. xxiv. (1877) t 269 = Spathiphyllum cannaeforme.
decurrens, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 88. t 298—Peruv.
denudatum, Engl. in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1886) 880.—Reg. Colomb.
Devansayanumx, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1888) I. 510.
digitatum, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 633.—Peruv.
dolosum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 179=scandens.
Dombeyanum, *Brongn. ex Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 146.—Peruv.
dominicense, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 350.—Ind. occ.
egregium, Schott, Prod. Aroid. 475 = ellipticum.
datum, C. Koch & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 5=pentaphyllum.
elegant, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 482.—Ins. Martinica.
ellipticum, *C. Koch & Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1858) App. 6.—Venezuela,
emarginatum, *Baker, in Sound. Refug.* t. 274.—Am. trop.
eminens, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1865) 278.—Peruv.
erythropodum, Miq. Hort. Amstelod. (1868) 8 = Harrisii.
fallax, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. vii. (1867) 309 = Guildingii.
Fendleri, *Schott, Prod. Aroid.* 468.—Venezuela.
Ferrierense x.—*Cf.* Gard. Chron. (1883) II. 768.
fissum, *C. Koch, in Ender, Ind. Aroid.* 102.—Reg. Colomb.
flavescens, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 88.—Peruv.
flavidum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1886) II. 651.—Reg. Colomb.
flexile. *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1868) 180.—Costa Rica.
flexuosum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 82.—VSnezuela.
floribundum, Linden & Andre,' in Illustr. Hortic. (1874) 22. t. 169-Spathiphyllum floribundum.

AHTHTTHITJM:—
Fontanesii, *Schott, in Bonplandia*, x. (1862) 847.—Venezuela.
formosum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 181.—Costa Rica.
Fraseri, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 112.—Ecuador.
fraternum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 293—Lindenianum.
Friedrichsthalii, Schott, 1. c. v. (1865; 65 - Rudgeanum.
fucatum, Schott, 1. c. viii. (1858) 887 -nymphaeifolium.
funifemm, Klotzsch & Karst. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. I1l = Bredemeyeii.
Galeottianum, *C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1865) *App.* 6.—Bras.
Galeottii, *C. Koch, 1. c.* (1854).—Mexic.
Gaudichaudianum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 74.—Bras.
Geitnerianum, *A. Regel, in Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 88.—Am. trop.
Ghiesbrechtii, Linden, ex Schott, Prod. Aroid. 538 = podophyllum.
gladiifolium, *Schott, in Journ. Bot.* i. (1868) 6.—Bras.
glaucescens, Knntb, Enum. PI. iii. 78 - coriaceum.
glaucum, Schott, Melet. i. 22 = cotiaceum.
Glaziovii, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6833.-Bras,
gracile, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1636.—Guiana,
grande, *Hort. Bull, ex Gard. Chron.* (1865) 934.—Am. austr.
grandifolium, *Kunth, Enum. PI.* Ui. 77.—Reg. Colomb.
grossum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1859) 101 = pentaphyllum.
Guildingii, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 801.—Ind. occ.
Gustavi, *Regel, Gartenfl.* (1878) 824, nomen; (1862) 67.—Reg. Colomb.
gymnopus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 219.—Cuba occ.
Hahnii, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 481.—Ins. Martinica.
Harrisii, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 683.—Bras.
helleborifolium, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 205-variabile.
helleborifolium, *Schott, in Bonplandia*, x. (1862) 148.—Hab.?
Hoflimanni, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1868) 181.—Costa Rica.
Hoffmannsegtt, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1667) 325.—Bras.
Holtonianum, *Schott, I. c.* 317.—Reg. Colomb.
Hookeii, *Kunth, Enum. Pi.* iii. 74.—Ind. occ
Hookeri, Schott, Prod. Aroid. 472 - tetragonum.
Huegelii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855) 83 -Hookeri.
Humboldtianum, Kunth, Enum. PI. iii. 78-rubrinervium.
Humboldtianum, Schott, Prod. Aroid. 624-polyrrhizon.
humile, Schott, 1. c. 442-amoenum.
hybridum, *Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 191.—Hab. 1
hygrophilum, *Engl. in Bot. Jahrb.* vi.(1886) 276.—Reg. Colomb.
ianthinopodum, Schott, ex Engl. in Mart. FL Bras. iii. II. 89 - Harrisii.
illepidum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1869) 100-longifolium.
imperiale, *Miq. ex Schott, Prod. Aroid.* 466.—Hab. I
inamoenum, Schott, 1. c. 504 = nymphaeifolium.
inconditum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1868) 181 — gracile.
inconspicuum, *N.E. Br. in Gard. Chron.* (1886) I. 787.—Bras,
indecorum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 350.—Peruv.
indecorum, Schott, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 205-variabile.
insigne, *Mast, in Gard. Chron.* (1878) I. 430.—Reg. Colomb.
intermedium, Kunth, Enum. PI. iii. 70 = Harrisii.
Isertianum, Schott, Prod. Aioid. 493-Guildingii.
Jilekii, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 5 = Harrisii.
Kalbreyeri, *Hort. ex Gard. Chron.* (1881) II. 117.—N. Granat. 1
Karwinskyi, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* ix. (1859) 101; *Prod. Aroid.* 553.—Am. cent.

ANTHUKIUM :-
Kastelskii, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* U859) 100. —Chili.
Kellermannii, *Schubert, ex Kellerm. in Wien. Illustr. Gart. Zeit.* ix. (1884) 6.—Hab. t
Kunthianum, *Liebm. in Ann. Sc. Nat.* Se''r. IV. ii. (1854) 872.—Mexie.
Ranthli, Poepp. & Endl. Nov. Gen.etSp.iii. 84.—Peruv.
lactiflorum, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 277. —Keg. Colotnb.
lanceolatum, *Kunth, Enutn. PI.* iii. 71.—Am. nustr.
lanceolatutn, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 634 -Willdenowii.
lancifolium, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 180. —Costa Rica.
Langsdorffii, *Schott, Prod. Aroid.* 458.—Bras.
lapathifolium, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 309 = ochranthum
Laucheanum, *C. Koch, in Allgem. Gartent.* (1857) 191.—Bras.
Lechleiianum, *Schott, Prod. Aroid.* 634.—Peruv.
leptostachyum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855) 66=Olfersianum.
leucocarpum, Schott, 1. c (1857) 58 = scandens.
leuconeurum, *Lent, in Illustr. Hortic.* ix. (1862) t. 314. —Am. tiop.
Lhotzkyanum, *Schott, Prod. Aroid.* 491.—Bras.
Libonianum, Lindl. & Regel, in Gartenfl. (1867) 291. t. 558 = Gaudichaudianum.
Liebmanni, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 165.—Mexic
Cindenianum, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 176 = nymphaeifolium.
Lindenianum, *C. Koch & August, in C. Koch, Allg. Garten:* (1857) 234.—Reg. Colomb.
Lindigii, He'rincq, L'Hortic. Franç. (1866) 17 ; N. E. Br. in Gard. Chron. (1879) n. 554=Lindenianum.
linguifolium, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 124 = Geitnerianum.
longifolium, P-..t. ex Engl. 1. c. 129 = Harrisii.
longifolium, *Gft'Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 638; *Kunth, Enum. PI.* iii. 69.—Bras,
longispathum, *Schott, Prod. Aroid.* 520.—Costa Rica,
lncidum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 78.—Bras.
Luschnathianum, Kunth, 1. c. = Olfersianum.
macilentum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 165 = gracile.
Macleani, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1«58) 350. —Peruv.
macrolobium x, *Hort. Bull, in Gard. Chron.* (1883) l. 404.—Hab. ?
macrophyllum, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. . 633 = Pothos macrophylla.
macrophyllum, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. v. (1855) 88=Selloum.
macrospadix, *Lem. Illustr. Hortic.* ix. (1862) *Misc.* 20. —Guiana,
magnificum, *Linden, in Belg. Hortic.* xv. (1865) 98.—Reg. Colomb.
magnificum, Hort. ex Gard. Chron. (1865) 934=grande.
Malyi, *Maximil. {Archd. Austr.) ex Schott, in Bonplandia,* x. (1862) 822.—Bras.
mandiocanum, Schott, Prod. Aroid. 454 = Harrisii.
margaritaceum, Baker, in Saund. Refug. t. 280 = Hoffmanui.
Martianum, *C. Koch & Kolb, in C. Koch, Wochenschr.* xi. (1868) 276.—Guiana.
Martini, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 325.—Guiana,
martinicense, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 480. —Ins. Martinica.
Maximiliani, *Schott, in Bonplandia,* x. (1862) 5.—Bras.
membranuliferum, Schott & Ohlend. ex Engl. is DC. Monog. Phan. ii. 196 = podophyllum.
metallicum, *Linden, i.r Schott, Prod. Aroid.* 606.—Hab. ?
mexicamun, *Engl. in DC. Monog. Phan.* it 106.—Mexic.
mexicanum.Uebm. inKjoeb. Vidensk.Meddel. (1849) 21 = Schlechtendalii.
microphyllum, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 633.—Bras.
microspadix, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 180 =porrectum.
microstachyum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 72.—Reg. Colomb.
Miquelianum, *C. Koch & August, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) 6.-Bras,
montannm, *Hems'- Diag. PI. Nov.* 36.—Guatemala.

ANTHURIUM:—
myosuroides, *Endl. ex Kunth, Enum. PI.* iii. 72.—Reg. Colomb.
neglectum.Miq. in Cat. Hort. Amstel. (1853) = Hookeri.
nitidum, *Benth. PI. Hartw.* 255.--Reg. Colomb.
nymphnefolium, *C. Koch & Bouchè, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1858) *App.* 6.—Venezuela,
obliquatum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 387.—Venezuela,
oblongatum, *Schott, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 290 = Olfersianum.
obtusifolium, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 633 ; *Kunth, Enum. PI.* 79.—Barbadoes.
obtusilobum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 181.—Costa Rica,
ochranthum, *C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1858) *App.* 6.—Am. trop.
Oerstedtianum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 180.—Costa Rica.
Olfersianum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 72.—Bras.
ornatum, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. (1857) 294 = nymphaeifolium.
Ottonianum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 82.—Bras.
oxybelium, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 310 *= nitidum.
oxycarpum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 83.—Peruv.
pachiraefolium, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1855) 273.—Bras,
pallens, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 180.—Costa Rica,
palmatifidum, *Van Houtte, ex Schott, Prod. Aroid.* 557.—Hab. ?
palmatum, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 633 ; *Kunth, Enum. PI.* iii. 80.—Ins. Dominic,
panduraeforme, *Schott, Prod. Aroid.* 536.—Costa Rica,
panduratum, *Mart, ex Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1855) 278.—Bras.
panduratum, Schott, 1. c.=panduraeforme.
parvispathum, *Henisl. Biol. Cent. Am. Bot.* iii. 432. —^Guatemala.
Patini, R. Hogg, in Gard. Chron. (1876) I. 524 = Spathiphyllum Patini.
pedatifidum, Regel & Linden, Petrop. (1865) 44; et in Gartenfl. (1866) 66. t. 501 -= pedato-radiatum.
pedato-radiatum, *Schott, in Bonplandia,* vii. (16*69) 387.—Mexic.
pedatum, *Endl. ex Kunth, Enum. PI.* Mi. 78.—N. (>ranat.
peltatum, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 83. t. 294 = Homalonema peltata.
pentaphyllum, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 633; *Kunth, Enum. PI.* iii. 81.—Bras,
podophyllum, *Kunth, I. c.* 80.—Mexic
Poiteanum, Kunth, 1. c. 68=gracile.
Poiteauanum, Schott, Prod. Aroid. 453= gracile.
polyrrhizon, *C. Koch & August, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) *App.* 7.—Venezuela.
polytomum, Schott, in Bonplandia, vii. (1869) 387 = podophyllum.
popayense, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 274. —Reg. Colomb.
porrectum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 180. —Costa Rica.
protensum, *Schott, 1. c.* 181.—Am. centr.
pseudopodophyllum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 338=podophyllum.
pulchellum, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 273. —Reg. Colomb.
Purdieanum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 53.— Reg. Colomb.
quindiuense, Schott, 1. c. 293 = fratemum.
quinquenervhim, *Kunth, Enum. PI.* iii. 76.—Keg. Colomb.
quinquevulnerum, Schott, ex EngL in Mart Fl. Bras. iii. II. 100 = undatum.
Tadicans, *C. Koch & A. Haage, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) *App.* 10.—Bras,
recusatum, *Schott, Prod. Aroid.* 467.—Cuba,
reflexum, *Hort. Par. ex Regel, Gartenfl.* (1866) 259.—Am. trop.
reflexum, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 633 = coriaceum.
regale, *Linden, in Belg. Hortic.* xvi. (1866) 200.—Am. trop.
Regnellianum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 96.—Bras.

ANTHUBIUM:—
repandum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1867) 817. T-Reg. Colomb.
reptans, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 633.—Bras.
reticulatum, *Benth. PI. Hartw.* 255.—Peruv.
rigidulum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 180 —Costa Rica.
Roezlii, *Regel, in Gartenfl.* (1872) 331.—Reg. Colomb.
Rothschildianum x, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1883) I. 510.
rubescens, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. IIL 634.—Bras.
rubidum, Schott, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 129—Harrisii.
rubricaule, Kunth, Enum. PI. iii. 89 = Harrisii.
rnbrinervium, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. IH.,633. —Venezuela.
Rudgeanum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1855) 65.—Bras,
rugosum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 389. —Venezuela.
sagittaria, Linden, ex Schott, Prod. Aroid. 587=pandoraeforme.
sagittatum, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 633 =rubrinervium.
Salviniae, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 36.—Guatemala,
sanguineum, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1886) 279. —Reg. Colomb.
Saundersii, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6218.—Bras,
scandens, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 78.—Bras.
Scherzerianum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 53.—Guatemala.
Schlechtendalii, *Kunth, Enum. PI.* iii. 75.—Mexic.
scolopendrinum, Knnth, 1. c. 68=gracile.
scolopendroides, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 129 = Harrisii.
Selloum, *C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) — Ins. S. Juan.
Sellowianum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 70.—Bras,
signatum, *C. Koch & L. Mathieu, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) 8.—Keg. Colomb.
sinuatum, *Benth. ex Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 318.—Bras.
smilaciforme, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) 8 = undatum.
solitarium, Schott, Prod. Aroid. 478 = affine.
Sonderianum, Schott, in Bonplandia, vi. (1858) 872 = pentaphyllum.
sororium, *Schott, Prod. Aroid.* 622.—Peruv.
spathiphyllum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1877) 1.652. —Hab. ?
spectabile, *Hirincq, L'Hortic. Franç.* (1866) 17.—N. Granat.
spectabile, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 181. —Costa Rica,
splendidum, *Hort. Bull, ex Illustr. Hortic.* xxx. (1883) t. 510. *{Cf. Gard. Chron.* (1883) I. 381).—Reg. Colomb.
stipitatum, *Benth. PI. Hartw.* 255.—Reg. Colomb.
striatum, *C. Koch & L. Mathieu, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) 7.—Peruv.
strictum, *N. E. Br. in DC. Monog. Phan.* ii. 638. —Paraguay,
snbeordatum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 181.—Guatemala.
snbhastatum, *Schott, 1. c.* 350.—Reg. Colomb.
subsagittatum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 79.—Venezuela,
subsignatum, *Schott, in Bonplandia,* ix. (1862) 368.—Costa Rica,
subtriangulare, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 279.—Reg. Colomb.
subtrilobum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 198.—Venezuela,
surinamensis, *Miq. in Nat. Verh. Wet. Haarl.* vii. (1851) 211.—Surinam.
Swartzianum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1867) 238.—Ind. occ.
Upinostachyum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1868) 180.—Costa Rica.
tetragonum, *Hook, ex Schott, Prod. Aroid.* 476.—Hab. ?
tolimense, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1886) 277. —Reg. Colomb.
fn/WuOT.Oliver.inHook.f. Bot.Mag.t.6S39 ^signatum.
trilobum, Hort. Lindl. in Illustr. Hortic xxiv. (1877) t. 288 = signatum.
trinerve, *Miq. in Linnaea,* xvii. (1843) 67.—Bras,
trinervium, *Kunth, Enum. PI.* iii. 76.—Bras.

ANTHURIUM:—
triphyllnm, *Brongn. ex Schott, Prod. Aroid.* 648.— Bolivia.
truncatulum, *Bngl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi (1885) 276.—Reg. Colomb.
Wnbrosum, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1849) 21.—Mexic.
aadatum, *Schott, Melet.* i. 22.—Bras.
"ndulatum, C. Koch & Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol. (1364) App. 107=Harrisii.
undulifolium, C. Koch, ex Ender, Ind. Aroid. 17 = undatum.
Urylleanwn, Schott, Prod. Aroid. 469 - Harrisii.
*v*anabile, *Kunth, Enum. PI.* iii. 81.—Bras.
variant, Miq. Hort. Amstel. (1853)«acaule.
.VnMieum, Hort. in Rev. Hortic. (1877) 37 =seq.
Vettchi, *Mast, in Gard. Citron.* (1876) 776.—Reg. Colomb.
Vellozianwm, Schott, Prod. Aroid. 482=Olfersianum.
venosum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 219.—Cuba.
vtolaceum, Schott, Melet. i 22=scandens.
inolascens, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1854) 89 = costatum.
•oiride, C. Koch & Bouche", Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) 6=Sellowiannm.
•Irgosum, *Schott, in Oestr. Sot. Zeitschr.* ix. (1859) 100.—Bras.
Wagenerianum, *C. Koch &• Bouchi, Ind. Sem. Hort.*
vi £r°L (1855) APP- 7.—Venezuela.
Wwlisii, *Mast, in Gard. Chron.* (1876) 429.—Reg. —Colomb.
Waluiewi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi (1879) 290.
u—Venezuela.
Warocqueanum, *Moore, Florist & Pomol.* (1878) 101. —Reg- Colomb.
Wartcnricni, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) ..App. 4; et in Ender, Ind. Aroid. 17=sinuatum.
Wendlandii, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1858) 182.
—Costa Rica.
WilUenowii, Kunth, Enum. PI. iii. 71 = lanceolatum.
WMiamsii, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. H7 "Scherzerianum.

ANTHYU,IS, Riv. ex Linn. Syst. ed. I (1785). ^*GUMINOSAE,* Benth. & Hook. *i.* i. 488.
ACANTHYLLIS, Pomel, Nouv. Mat FL Ad. 179
BARBA-jovis,Toum. ex Adans. Fam. ii. 321 (1763).
CORNICINA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 162 (1843).
DORYCNOPSIS, Boiss. 1. c. 163 (184S).
FAKKLOBA, Rafin. Sylva Tellur. 69 (1888).
PHYSANTHYLLIS, Boiss. Voy. Bot Espagne, t. 162 **(1843).**
foooNITis, Reichb. Handb. 226 (1887).
TRIPODION, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. it (1787)348.
VULNERARIA, Toum. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 669 (1742).
ZENOPOGON, Link, Handb. ii. 481 (1881).
"ffinis, Britting. ex Koch, in Roehl. Deutschl, Fl. ed. HI. v. 124-A. Vulneraria.
dpestris, Kit ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. ii. 317= A. Vulneraria.
oltfno, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 283=A. Vulneraria.
<"-gentea, Dew. in Ann. Sc. Nat Sèr. L ix. (1826) 408 =Cytisopsis dorycnifolia.
ar gentea, Salisb. Prod. 832-A. Barba-Tovis.
orundana, Boiss. & Reut. Pugill. PL Nov. (1852) 85 = A. Vulneraria.
A'palathi, Ser. in DC. Prod. ii. 169-A. Hermanniae.
•uphaltoides, Linn. Cent. PI. ii ; Amoen. Acad. iv. 326 =Aspalathus anthylloides.
aurea, *Welden. ex Host, Fl. Austr.* ii. 319.—Graeda; Dalmat.
Wlearica, *Coss. ex Mares & Vigin. Cat. PI. Balear.* 75—ins. Balear.
farba-Jovis, *Linn. Sp. PI.* 720.—Reg. Mediterr.
"cephalos, Gilib. Fl. Lituan. ii 96=A. Vulneraria.
"color, Bertol. Fl. ItaL vii. 401=A. Vulneraria.
Edentata, *Munby, Fl. Alger.* 76.—Algeria,
"flora, *ISoland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. U. 269.— ayna.
talcicola, Schur, Enum. PL Transs. 150=A. Vulneraria.
npensis, turn. Encyc. i. 205=Lebeckia cyHsoides.
ЧК?[08], *•."*<*•§» *Magyar Nintent. Lapak,* **vi. (1882)** *62.—Europ.

ANTHYliLIS:—
chilensis, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 107=Adesmia Loudonia.
chilensis, Ser. in DC. Prod. ii. 171 = Hosackia subpinnata.
cicerifolia, *Pourr. ex Colm. in Anal. Soc. Hist. Nat.* i. (1872) 88—Hispan.
collina, Salisb. Prod. 882= A. Vulneraria.
cornicina, *Linn. Sp. PI.* 719.—Hispan.
cornicina, Pall, ex Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr. 294 = Medicago cretacea.
cornicina, Poir. Voy. Barb. ii. 211=hamosa.
cretica, Lam. Encyc. i. 204 = Ebenus cretica.
cuneata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. N«p. 246 = Lespedeza eriocarpa.
cytisoides. *Linn. Sp. PI.* 720.—Europ.
tHllenii, Schult ex Steud. Nom. ed. I. 66=A. Vulneraria.
Erinacea, Linn. Sp. PI. 720=Erinacea pungens.
flava, Gouan, Herbor. 173, nomen=A. Vulneraria.
Genistae, *Dufour, ex DC. Prod.* ii. 169.—Hispan.
genistoides, Dufour, in Bull. Soc Bot Fr. vii. (1860) 824=A. Genistae.
Gerardi, *Linn. Mant.* 100.—Reg. Mediterr. occ.
glaucescens, Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 612= alpestris.
gracilis, Salisb. Prod. 832 = A. cytisoides.
hamosa, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 151.—Hispan.; Aft. bor.
Hermanniae, *Linn. Sp. PI.* 720.—Reg. Mediterr.; Oriens.
heterophylla, *Linn. 1. c.* ed. II. 1013.—Hispan.
hispida, Boiss. & Reut. PugilL PL Nov. (1852) 36 = A. Vulneraria.
Hystrix, Sweet, Hort. Brit ed. 1.114, nomen» Erinacea pungens?
incisa, Willd. Sp. PI. iii. 1017=Cicer ervoides.
indica, *Lour. Fl. Cochinch.* 429.—Cochinch.
involucrata, Linn. Mant 265=Lotononis involucrata.
italics, Hort. ex Loud. Hort Brit Suppl. ii. 610 = A. Vulneraiia.
Jacquini, *A. Kern, in Zeitschr. Ferdinand. Tirol.* III. xv. (1870) 287.—Europ.
leguminosa, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PL ii 597= A. Vulneraria.
Lemanniana, *Lowe, in Hoot. Ken Joum.* viii (1856) 291.—Ins. Madera.
linifolia, Linn. Mant. 265 = Aspalathus linearifolia.
lotoides, *Linn. Sp. PI.* 720.—Hispan.
macrocarpa, Walp. Rep. i. 634=A. Vulneraria.
macrocephala, Wender. in Linnaea, v. (1830) Litt 54 = A. Vulneraria.
maritima, Schweig. in Fl. Dan-12728*= A. Vulneraria.
monottphalos, Gilib. Fl. Lituan. ii. 97'= A. Vulneraria.
montana, *Linn. Sp. PI.* 719.—Europ.
numidica, *Coss. &* Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1867) 396, nomen.—Algeria.
onobrychioides, *Cav. Ic.* ii. 40. t. ISO.—Hispan.
onoides, Burm. £ FL Cap. Prod. 21-=Ononis anthylloides.
pallida, Opiz, ex Nym. Consp. 164=A. Vulneraria.
pentaphylla, *Steud. Nom.* ed. II. i. 107.—Sibir.
podocephala, *Boiss. Elench.* 34.—Hispan.
polycephala, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 150. t 195.—Atlas.
polycephala, Reichb. FL Germ. Excurs. 516=aurea.
polyphylla, Kit ex DC. Prod. ii. 170=A. Vulneraria.
pseudo-cytisus, Walp. Rep. ii 846=Cytisopsis dorycnifolia.
pubescens, Stokes, Bot Mat Med. iii 517=A. Vulneraria.
quinqueflora. Linn. f. Suppl. 325=Aspalathus araneosa, parviflora.
Ramburei, *Boiss. Elench.* 35.—Hispan.
rosea, Willk. ex Rodr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat viii. (1879) 58=balearica.
rubicunda, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. i. 107=A. Vulneraria.
rubra, Gouan, Herbor. 173, nomen=A. Vnlneraria.
rupestris, Coss. Notes Crit. 155.—Hispan.
rustica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3=A. Vulneraria.
rusticana, Wender. in Linnaea, v. (1.830) Litt. 54-A. Vnlneraria.
sanguinea, Schur, Enum. PL Transs. 150, in syn."A. yulueraria.
sericea, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 22.—Hispan,
sericea, Willd. Sp. PL iii. 1014=Ebenus Sibthorpii.
sptendens, Willd. 1. c. 1018 = A. Barba-Jovis.
Spruntri, Heldr. ex Nym. Consp. 164 = A. Vulneraria.

ANTHYXIiS:-
subsimplex, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 320.—Algeria.
tejedensis, *Boiss. Elench.* 86.—Hispan.; Marocc
tetraphylla, *Linn. Sp. PI.* 719.—Reg. Mediterr.
Tournefortii, Schult. ex Steud. Nom. ed. L 56=A. Vulneraria.
tragacanthoides, Desf. Fl. Atlant ii. 150 = Astragalus armatus.
tragacanthoides, Labill. Ic PL Syr. Dec. ii. 16=Astragalus coluteoides.
tricolor, *Vukot. in Rod. Jugos. Akad. Zagrab,* xxxiv. (187B).—Europ.
variegata, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 81 = A. Vnlneraria.
visciflora, *Linn./. Suppl.* 335.—Afr. austr.
Vulneraria, *Linn. Sp. PI.* 719.—Europ.; Oriens; Abyss.
vulnerarioides, *Bonj. ex Reichb. Fl, Germ. Excurs.* 515.—ItaL
Webbiana, Webb, ex Walp. Rep. i. 63=tejedensis.
Webbiana, Hook. Bot. Mag. t. 3284 = A. Vulneraiia.
Weldeniana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 515=A. Vulneraria.

AKTIARIS, Lesch. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 478. t 22. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 371.
ANTSCHAR, Horsf. in Verb. Bat. Gen. vii. (1814) 8.
IPO, Pers. Syn. ii. 566 (1807).
LEPURANDBA, J. Grah. Cat. PL Bomb. 198 (1839).
Bennettii, *Seem, in Bonplondia,* x. (1862) 8.—Ins. Fiji.
d-Jbia, Span, ex Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1886) 310 =toxicaria.
innoxia, Blurae, Rumphia, 172. t. 54=toxicaria.
macrophylla, *R. Br. in Flind. Voy.* ii. 602. t 5.—Austral,
palembanica, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 424.— Sumatra*
rufa, *Miq. I. c.* 423.—Sumatra.
sacddora, Dalz. in Hook. Kew Joura. iii. (1851) 28J = toxicaria.
toxicoria, *Lesch. in Ann. Mus. Par.* xvi. (1610) **478.**— Ind. or.; Malaya.
teylanica, Seem, in Bonplandia, x. (1862) 4, in nota; et Fl. Vit. 253=toxicaria.

ABTICHABIS, Endl. Nov. Stirp. Dec. 22; Gen. 682 ^1839); Iconogr. t. 93. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 928.
DORATANTHERA, Benth. in Endl. Geii. 685 (1889).
MEISARRHENA, R. Br. in Salt, Abyssin. App. 68 (1818).
arabica, *Endl. Nov. Stirp. Dec.* 23.—Arabia.
arabica, Hocbst. ex Benth. in DC. Prod. x. 347^ linearis.
glandulosa, *Asckers. in Monatsb. Acad. Berl.* (1868) 880.—Aegypt.; Arab.; Ind. or.
linearis, *Hochst. ex Aschers. 1. c.* 882.—Afr. trap.; Arab.; Ind. or.

ANTICHLOA, Steud. Nom. ed. II. i. 108 (1840)=ACTINOCHLOA, Willd.=Bouteloua, Lag. (Gram.).

ANTICHORUS, Linn. Mant. i. 9 (1767) **=Corchorus,** Linn. (Tiliac).
depressus, Linn. 1. c 64 = C. Antichorus.

ANTICLEA, Kunth, Enum. PI. iv. 191 (1843)=Zygadenua, Micbx. (Liliac.).
Fremonti, Ton. in Pacif. Rail. Rep. iv. 144-Z. Fremonti.
glauca, Kunth, Enum. PL iv. 192=Z. glaucos.
mexicana, Kunth, L c. 193 = Z. mexicanus.
Nuttallii, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 144 •= Z. Nuttallii.
sibirica, Kunth, Enum. Fl. iv. 191 = Z. sibiricus.
volcanica, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1880) 482=Z. volcanicus.

ANTICORYNE, Tnrcz. in Bull. Math.-Phys. Acad. Petersb. x. (1852) S32=Baeekoa, Unn. (Myrtac).
diosmoides, Turcz. 1. c. = B. ovalifolia.

ANTIDAPHNE, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 70. t. 199 (1838). *LORANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 216.
viscoidea, *Poepp. & Endl. I.* c—Peruv.

ANTIDESMA, Bnnn. ex linn. Diss. de Anandr. 6 (1745); Amoen. Acad. i. 249 (1749). *EUPHORBIACEAE*, Benth. *Sc.* Hook.f. Hi. 284.
BESTRAM, Adans. Fam. ii. 354 (1763).
MINUTALIA, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312.
RHYTIS, Lour. Fl. Cochinch. 660 (1790).
STILAGO, Linn. Mant. i. 16 (1767).
acidum, Retz. Obs. v. 30 = A. Ghesaembilla.
acuminatum, *Wight, Ic.* t. 1991.—Ind. or.
Alexiteria, Gaertn. Frnct. i. 188. t. 89=A. Menasol
Aleriteria, *Linn. Sp. PI.* 1027.—Ind. or.
Alexiteria, Willd. Sp. PI. iv. 762 -nigricans.
alexiterium, PresI, Epim. Bot. 284 = leptocladum.
alnifolinm, *Hook. Ic. PI.* t. 481.—Afr. austr.
amboinense, Miq. Ann. Mils. Bot Lngd. Bat. i. 218 = stipulare.
attenuatum. Wall. Cat. n. 7286 -= velntinosam.
aurilum, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. III. XT. (1851) 203.—Java.
barbatum, PresI, Epim. Bot. 238-rostratum.
bicolor, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 81=Excaecaria bicolor.
bifrons, Tnl. in Ann. Sc Nat. Sir. III. XT. (1851) 229 =venosum.
Blutnei, Tul. 1. c. 211=tetrandrum.
Boivinianum, Baill. Adansonù, ii. (1861-62) 45 = venosum.
Boutoni, *Baker, Fl. Maurit.* 806.—Ins. Mascar.
Bunius, *Spreng. Syst.* i. 826.—Ind. or.; Malaya.
Bunius, WalL Cat. n. 7282 A.=nigricans.
celebicum, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 218.—Ins. Celebes.
ciliatum, PresI, Epim. Bot. 234 = A. Bunius.
comptum, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* xr. (1851) 190.—Ind. or.
cordi/olium, PresI, Epim. Bot. 285-A. Bunius.
coriaceum, Tul. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. XT. (1851) 204=fallal.
Cumingii, *Muell. Arg. in DC. Prod.* XT. II. 249.—Ins. Philipp.
cnspidatum, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 67.—Ind. or.
Dallachyannm, *Baill. Adansonia*, vi (1865-66) 887.—Austral,
diandrum, *Htyne, ex Roth, Nov. PL Spec.* 869.—Ind. or.
diandrum, *Spreng. Syst.* i. 826; *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. XT. (1851) 196.—Ind. or.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 467.—Sumatra,
digitaliforme, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IIL XT. (1851) 191.—Ins. Philipp.
diversifolium, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 468.—Sumatra,
erostre, *F. Muell. ex Benth. FL Austral*, vi. 87.—Austral,
erythrocarpum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* XT. II. 258.—Java,
erythroxyloides, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. XT. (1851) 208.—Madag.
excavatum, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 218.—Ins. Celebes,
fellax, *MuelL Arg. in Linnaea*, mdv. (1865-66) 68.—Malaya.
filiforme, Blume, Bijdr. U24 = Bennettia filiformis.
flexumum, Tul. in Ann. Sc. Nat. Seŕ. IIL XT. (1851) 225=nigricans.
fioribundum, Tul. 1. c. 189=A. Bunius.
frutescens, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1890) n. VII. 91.—Sumatra,
fruticosum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 259.—Cochinch.
fruticulosum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 237.-Pegu.
Ghesaembilla, *Gaertn. Fruct.* i. 189. t. 39.—Ind. or.; Malaya; Austral.; Afr. trop.
glabrum, Tul. in Ann. Sc. Nat Seŕ. IIL XT. (1861) 188 = A. Bnnius.
Grtu*u/arṫ<i,Raeusch.Nom.ed. III. 287=Embelia Ribes.
guineensis, G. Don, ex Hook. Niger FL 615, nomen—Uapaca guineensis.
heterophyllum, *Blume, Bijdr.* 1123.—Java.
heterophyllum, PresI, Epim. Bot. 234=leptocladum.
japonicum, *Sieb. & Zucc. in Abh-Baier. Akad.* iv. III. (1846)212.-China; Japon.
taciniatum, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 629.—Afr, occ.
lancaefolium, *Boj. Hort. Maurit.* 289.—Ins. Mascar.

ANTIDESMA:—
lanceolarium, Wall. Cat. n. 7284=diandrum.
lanceolarium, Moritzi, Syst. Verz. Pfl. Zoll. 7S=lanceolatum.
lanceolatum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 237=A. Menun.
lanceolatum, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. XT. (1851) 195.—Dad. or.
leptobotryum, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (1864) 529.—Afr. trop.
leptocladum. TuL in Ann. Sc. Nat Seŕ. IIL XT. (1851) 199 = Moritzii.
leucopodum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 465.—Sumatra,
littorale, *Blume, Bijdr.* 1123.—JaTa.
Lobbianum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* XT. II. 254.—JaTa.
longifolium, *Boj. Hort. Maurit.* 289.—Im. Mascar.
longifolium, Decne. ex Baill. Adansonia, v. (1865) 349, noraen = Richeria grandis.
lunatum, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. 467-Aporosa lunata.
macrophyllum, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 295, nomen.—Ind. or.
madagascariense, *Lam. Encyc.* i. 206.—Madag.
Mannianum, MuelL Arg. in Flora, xlvii. (1864) 519 - Thecacoris Manniana.
martabanicum, *PresI, Epim. Bot.* 232.—Burma,
membranaceum, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 68.—Afr. occ.
Menasu, *Miq. ex Tul. in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. IIL XT. (1851) 216.—Ind. or.
Menasu, Kurz, For. Fl. ii. 360 = martabanicum.
minus, *Blume, Bijdr.* 1123.—JaTa.
minus, Wall. Cat. n. 7288=coriaceum.
molle. Wall. Cat. n. 7287; Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 67 — velutinosnm.
montanum, *Blume, Bijdr.* 1124.—Java.
montanum, Thw. Enum, PI. Zeyl. 289-pyrifolinm.
Moritzii, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 67.—Ind. or.; Malaya.
natalensis, Harv. Thes. Cap. ii. 45-= venosum.
nervosum, WalL Cat. n. 7289 = Gironniera nervosa.
neurocarpum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 466.—Sumatra,
nigricans, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. III. XT. (1861) 225.—Ind. or.
nitidum, Tul. 1. c 193=leptocladum.
oblongatnm, *MuelL Arg. in DC. Prod.* XT. II. 254.—Ind. or.
oblongifolium, *Blume, Bijdr.* 1125.—Java,
ovalifolium, *Zipp. ex Span, in Linnaea*, XT. (1841) 350.—Ins. Timor,
patificnm, *Muell. Arg. in DC. Prod.* XT. II. 254.—Ins. Pacif.
palembanicum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 465.—Sumatra.
paniculatum, Roxb. ex Willd. Sp. PL iv. 764=A. Ghesaembilla.
parvifolium, *F. Muell. Fragm. v̀r.* 86.—Austral,
persimile, *Kurt, in Journ. Bot.* xiii. (1876) 330.—Ins. Nicobar.
petiolare, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. *xr.* (1851) 207.—Madag.
platyphyllum, *H. Mann, inProc. Am. Acad.* vii (1867) 202.—Hawaii,
pleuricum, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. III. xv. (1851) 213.—Ins. Philipp.
puberum, *Zipp. ex Span, in Linnaea*, XT. (1841) 350.—Ins. Timor.
pubescens, Moritzi, Verz. Pfl. Zolling. 73 = Moritrii.
pubescens, Roxb. PI. Corom. ii. 35.1. 167-A. Ghaesembilla.
pnncticulatnm, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 468.—Sumatra,
pyrifolium, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 68.—Zeylan.
refractum, MnelL Arg. in DC. Prod. XT. II. 257 = acuminatum.
retusum, *Zipp. ex Span, in Linnaea, xr.* (1841) 350, nomen.—Ins. Timor,
rhamnoides, *Brongn. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IIL XT. (1851)217.—Hab. i
Ribes, Raeusch. Norn. ed. III. 287 =Embelia Ribes.
rostratum, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. XT. (1861) 218.—Ins. Philipp.
rotatum, MuelL Arg. in DC. Prod. XT. H. 266-enspid&tutn.
rotnodifolium, *Boj. Hort. Maurit* 289.—Ins. Mascar.

ANTIDESMA:—
Roxburghii, *Wall. Cat.* n. 7288; *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. HI. xv. (1851) 234.—Ind. or.
rufescens, Tul. in Ann. Sc. Nat Seŕ. III. XT. (1861) 231— venosum.
rugosum. *Wall, ex Voigt, Hurt. Suburb. Cole.* 295, nomen.—Ind. or.
Rumphii, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. xv. (1851) 238.—Amboina.
salaccensf, Zoll. & Moritzi, Syst Verz. ZolL 74-tetrandrum.
salicifolium, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 467.—Malaya.
salicifolium, PresI, Epim. Bot. 288=rostratum.
scandens, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 617.—China.
Schultzii, *Benth. Fl. Austral*, vi. 86.—Austral.
simile, Muell. Arg. in DC. Prod. XT. II. 259—acuminatum.
sinuatum, *Benth. Fl. Austral*, vi. 87.—Austral,
sphaerocarpum, *Muell. Arg. in DC. Prod. xr.* II. 256.—Ins. Pacif.
spicatum, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.794 - A. Ghesaembilla.
stenopetalum, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 520 =Thecacoris stenopetala.
Stilago, *Pair. Encyc. Suppl.* i. 403.—Hab. t
stipulare, *Blume, Bijdr.* 1125.—Ins. Molucc.
sylvestre, Lam. Encyc i. 207=A. Ghesaembilla et A. Bunins.
sylvestre, Wall. Cat. n. 7281-diandrum.
tetrandum, *Blume, Bijdr.* 1124.—Java.
Thwaitesianum, MuelL Arg. in DC. Prod. XT. II. 263 = A. Bunius.
tomentosnm, *Blume, Bijdr.* 1126.—Java.
tomentosum, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. II. 427 =• velutinosum.
tomentosum, Voigt, Hort. Suburb. Calc 294; Wight, Ic t. 767-768=Roxburghii.
triplinemium, Spreng. Neue Entdeck. it 116-A1-chornea triplinerria,
Tulasneanum, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 602.—In*. Mascar. I
velutinosum, *Blume, Bijdr.* 1125.—Burma; Malaya.
velutinosum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. IL 428 = molle.
velutinum, *TuL in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. IIL xv. (1851; 223.—Burma.
venosum, *E. Mey. ex Tul. 1. c.* 232.—Afr. austr.
vestitum, PresI, Epim. Bot. 232 = A. Ghesaembilla.
Vogelianum, *Muell. Arg. in Flora*, xlvii. (18ò4)529—Afr. trop.
Wallichianum, PresI, Epim. Bot. 235=diandrum.
zeylanicum. *Lam. Encyc.* i. 207 ; *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* n. 8672.—Zeylan.
trylanicum, PresI, Epim. Bot 234 = pleuricum.

ANTIGONA, Veil. FL Flum. 186; iv. 1145 (1827)-Caaearia, Jacq. (Samyd).
serrata, Veil. 11. cc. 187. t. 145-C. lasiophylla.

ANTIQONON, EndL Gen. 810 (1887). *POLYGONACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 108.
cinerascens, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1848) 14.—Mexic.
cordatum, *Mart. & Gal. I. c.*—Mexic
guatemalense, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 184.—Guatemala.
insigne, Mast, in Gard. Chron. (1877) I. 780-guatemalense.
leptopus, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 308. t. 69.—Am. austr.
platypus, *Hook. & Am. I. c.* 309.—Mexic

ANTINORIA, Parl. Fl. Palerm. i. 92 (1845)= Aim Linn. (Gram.).
agrostidea, Parl. 1. c. 96-Aira agrostidea.
insularis, Parl. 1. c 94 = Aira insularis.

ANTIPHYLA, Rafin. New Fl. Am. iv. 16 (1836) - Melochia, Dill. (Stercul.).
serrata, Rafin. 1. c - M. serrata.

ANTIPHYLLA, Haw. Ernun. Saxif. 48 (1821) -Saxifraga, Linn.
arctica, Haw. 1. c 45-S. muscoides.
bifiora, Haw. 1. c. 44 - S. biflora.
caerulea, Haw. 1. c 43-S. oppositifolia.
oppositifolia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 386=S. oppositifolia.
retusa, Haw. Enum. Saxif. 44 = S. retusa.
spathulata, Haw. 1. c = S. spathulata.

ANTIFHYTUM, DC. ex Meissn. Gen. 280 (1840). *PORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 859.
crncUtnm, *DC. Prod.* x. 121.—Bras.
fioribundum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 55 = Krynitzkia floribunda.
fruticosum, Moç. ex DC. Prod. x. 121 = mexicanum.
keliotropioides, A. DC. 1. c. 122 = Krynitzkia heliotropioides.
Hnifolium, DC. 1. c-Krynitzkia linifolia.
mexicanum, *DC. I. c.*—Mexic.
Parryi, S. Wats, in Proc Am. Acad. xviii. (1882-88) 122 - Krynitzkia Parryi.
staechadifolium, *DC. Prod.* x. 121.—Bras,
tetraquetrum, *DC. I. c.* 122.—Bras.
Walpersii, *A. DC. I. c*—Peruv.

AMTIRRHOEA, Comm. ex Jnss. Gen. 204 (1789) (Antirhea). *RUB/ACEAE[Bmth.* & Hook. f. ii. 1001.
GUETTARDELLA, Champ, in Hook. Kew Journ. iv. 197 (1852).
PITTOMOTIS, Griseb. in Bonplandia, vi. (18S8) 8.
STENOSTOMUM, Gaertn. f. Kruct. iii. 69 ;18O5).
STURMIA, Gaertn. 1. c. t. 192 (1805).
aristata, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 100.—Ind. oca
bifurcata, *Benth. & Hook. I. c*—Ind. occ.
borbonica, J. F. Gmel. Syst. i. 244-Qnivisia Sieberi.
dichotoma./iWiu/. *Biol. Centr.Atn.Bot.* ii. 42.—Mexic.
dioca, Bory, ex DC. Prod. iv. 459=verticillata.
frangnlacea, *DC. Prod.* iv. 459.—Ins. Mascar.
lucida, *Benth. &Hook.f. Gen.* ii. 100.—Ind. occ.
Lostaeana, Comm. ex DC. Prod. iv. 459 -borbonica.
philippinensis, *Rol/e, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 312.—Ins. Philipp.
protracta, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.*ii. 42.—Mexic.
rotnndata, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 100.—Cuba,
ttrigosa, *Korth. in Neder. Kruid. Arch.* ii. II. (1851) 217.—Somatr.
temiifolia, *F. Afuell. tx Benth. Ft. Austral,* iii. 418.—Austral,
trichantha, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 42.—Panama.
verticillata, DC. Prod. iv. 459= borbonica.
viscosa, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 100.—Ind. occ.

AWnHBHUnTM.Tourn.ex Linn. Syst. ed. I (1785). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 934.
AGORRHINUM, Four, in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 126.
ASARINA, Tourn. ex Mill. Gard. Diet. ed. VIII (1768).
GAMBELIA, Nntt. in Journ. Acad. Phil. Ser. II. i. (1847) 149.
ORONTIUM, Pers. Syn. ii. 158 (1807).
SAIROCARPUS, Nntt. ex A. DC. in DC. Prod. x. 592 (1846).
acutangulum, Tenore, Fl. Nap. ii. 47. t. 69-Linaria Cymbal aria.
Adamii, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 207 = Linaria macroura.
aegyptiacum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 112.—Arab.
<"*gyptiacum,* Linn. Sp. PI. ed. I. 618 = Linaria aegyptiaca.
aequitrilobum, Viv. Fl. Lib. Spec. 68; Fl. Cors. Sp. Nov. 10 = Linaria aequitriloba.
"trugineum, Gouan, Illustr. 88 = Linaria tristis.
albescent, Medic. Beobacht. (1783) 136 = Linaria aegyptiaca.
albifrons, Sibth. & Sm. Prod. i. 482 = Linaria albifrons.
album, Lam. Fl. Fr. ii. 345 = Linaria chalepensis.
"Ipinum, Linn. Sp. PI. 615 = Linaria alpina.
alanaefolium, Viv. Fl. Lib. Spec. 67; Fl. Core. Sp. Nov. 10 = Linaria alsinaefolia.
ambiguum, *Lange, in Kjoeb. Vidtnsk. Meddel.* (1863) 37 *{Pugill.* 203).—Hispan.
amethysteum, Vent, in Lam. Encyc. iv. 363 = Linaria amethystea.
amethystinum, Steud. Norn. ed. II. i. 108-Linaria anu-thystea.
'"gvsti/olium, Poir. Encyc Suppl. iv. 27-sicnlum.
angustifolium, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 329-tortnosum?
""gustissimum, Loisel. Not. Snppl. 167 = Lfcaria italica.
aparinoides, Willd. Sp. PI. iii. 247-Linaria stricta.
«P><yllum, Thnnb. Prod. PI. Cap. 105 = Utricularia capensis.
aquaticum, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 384 (Utricnlariae *P- »)•—Cochinch.

AXTTIBRHINTJlf •—
arenarium, Poir. Encyc. Suppl. iv. 26 - Linaria arenaria.
arvense. Linn. Sp. PI. 614=Linaria arvensis.
asarifolium, Salisb. Prod. 98-seq.
Asarina, *Linn. Sp. PI.* 612.—Italia.
asarinum. Lam. Fl. Fr. ii. 348—A. Orontium.
assurgens, Bianca, ex Camel, in Parl. Fl. Ital. vi. 656 -siculum.
auriculatum, Linn. Fl. Fr. ii. 339-Linaria Elatine.
barbarum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 105.—Afr. anstr.
Barrelieri, *Bar. Graines Rec. Jard. Bot. Angers* (1854). —Hispan.
Bauhinii, Gaud. Fl. Helv. iii. 154 = Linaria italica.
bellidifolium, Linn. Sp. PI. 617-Anarrhinum bellidifolium.
bicorne. Linn. PI. Rar. Afr. 11 (Amoen. Acad. vi. 88) •= Nemesia bicornis.
bipartitum, Vent Jard. Cels.t. 82 = Linaria bipartita.
bipunctatum, Cav. Ic i. t 33. f. 1 = Linaria amethystea.
bipunctatum, linn. Sp. PI. ed. L 614 = Linaria glauca.
bipunctatum, ThuilL Fl. Paris, ed. II. 811 •= Linaria supina.
breviflorum, Gilib. Fl. Lituan. i. 187 = A. Orontinm.
Breweri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 374. —Calif.
Broussonetii, Poir. Encyc. Suppl. iv. 28 = Linaria mnltipunctata.
caesium, Lag. ex Pers. Syn. ii. 157 = Linaria tristis*.
calycinum, *[Soland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. ii. 256.—Syria.
calycinum, Vent, in Lam. Encyc. iv. 365 = A. Orontium.
canadense, Linn. Sp. PI. 618-Linaria canadensis.
capenie, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 16.—Afr. austr.
capense, Thnnb. Prod. PI. Cap. 105 = Nemesia linearis.
capitatum, C. & J. Presl, Delic. Prag. 74=scmpervirens.
capitellatum, Vent in Lam. Encyc iv. 358 = Linaria glauca.
caprarium, Camel, in Parl. Fl. Ital. vi. 862 = Linaria capraria.
caucasicum, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 205 = Linaria spuria.
chalepense, Linn. Sp. PI. 617-Linaria chalepensis.
Cbaridemi, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1881) 99.—Lusit.
chytrospernum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii (1877) 81.—Arizona.
cimbalaria, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 267 = Linaria Cymbalaria.
cirrhosum, linn. Mant ii. 249 = Linaria cirrhosa.
comintanum, Blanco, FL Filip. ed. I. 502 = Hygrophila salicifolia.
commune, Lam. Fl. Fr. ii. 340 = Linaria vulgaris.
compositum, *Lojac. in Natural. Sicil.* ii. (1683) 297.—Sicilia.
confertiflorum, Benth. in DC. Prod. x. 592 = Mohavea viscida.
confertum, Jan, ex Benth. 1. c 278 = Linaria striata.
Cooperi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 376. —Calif.
cordatum, Buch, ex Chav. Monog. 181 = Linaria lanigera.
cornutnm, *Benth. PI. Hartm.* 328.—Calif.
cornutum, Dnrand, in Pacit RaiL Rep. v. 11. t. 10 = leptaleum.
conicum, *Vitm. Summa,* iii. 495.—Corniea.
Coulterianum, *Benth. in DC. Prod.* x. 692.—Calif.
craniolare, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 383-A. Orontium.
crassi/olium, Cav. Ic. ii. 11 = Linaria origanifolia.
cyathifemm, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 40. t. 19.—Calif.
Cymbalaria, Gueldenst. ex Ledeb. FL Ross. iii. 205 = Linaria Elatine.
Cymbalaria, linn. Sp. PL ed. I. 612 = Linaria Cymbalaria.
Cymbalaria, Sieber, ex Benth. in DC. Prod. x. 267 = Linaria acntangula.
dalmaticum, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 209 - Linaria genistifolia.
dalmaticum, linn. Sp. PI. ed. I. 616 - Linaria dalmatica.
delawariana, *Roxb. Hort. Beng.* 45, nomefS—Am. bor. 1
dentatum, Poir. Encyc Snppl. iv. 22 = Nemesia monomotapensis.

ANTIRRHINUM :—
dentatum, Vahl, S)mb. Bot. ii. 66 = linaria scarioaa.
diffusum, Uerah. ex Steud. Norn. ed. II. i. 108-latifolium.
diffusum, Brot. Phyt. t 141 = Linaria multicaulis.
diminutum, *Pome!, Nouv. Mat. Fl. All.* 100.—Algeria.
dubium, Vill. Hist PI. Dauph. ii. 487 = Linaria supina.
Duriminium, Brot H. Lusit. i. l'J7 — Anarrhinum Duriminium.
ecaudatum, *Lucé, Topog. Nachr. Oesel,* 218.—Ross.
Elatine, linn. Sp. PI. 612 "linaria Elatine.
elatiniflorum, Wahlenb. in Isis, xxi. 989-Linaria Elatine.
elatinioides, Tenore, Syll. 48. f. 2 = Linaria Elatine.
elatinoides, Willd. Sp. PI. iii. 235 = Linaria elatinoide;.
elegans, Pen. Syn. ii. 156 = linaria amethystea.
elegans, Tenore, Viag. Abruz. 175 = A. Orontium.
filiforme, Poir. Encyc. Suppl. iv. 27-Linaria rubiifolia.
filipes, *A. Gray, in Bot. Ives, Report,* 19.—Colorado.
fiamim, Poir. Voy. Barb. ii. 191 = Linaria flava.
flexuosum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 100.—Algeria.
flexuosum, Willd. Sp. VI. iii. 250 = Linaria flexuosa.
iragrans, *Pall. Reise Statth. Russ. Reich,* i. 111, 129.—Reg. Casp.
fruticans, Thunb. Prod. PI. Cap. 105 = Nemesia fruticaus.
fruticosum, Willd. Sp. PI. iii. 287 = Linaria fruticosa.
fugax, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 160 = linaria persica.
gallioides, Vent, in Lam. Encyc iv. 351 = Linaria striata.
genistaefolium. ' Vill.' ex Benth. in DC. Prod. x. 272 = Linaria italica.
genisti/olium, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 354 = Linaria vulgaris.
genisti/olium, Linn. Sp. PI. 616-linaria genistifolia.
genisti/olium, Vill. Hist. PI. Dauph.fi. 440=Linaria italica.
gibbosum. Wall. Fl. As. Rar. ii. 44=A. Orontium.
glandulosum, Lejenne, H. Spa, 320=Linaria vulgaris.
glandulosum, *Lindl. Bot. Reg. X.* 1893.—Calif.
glaucophyllum, Brot Phyt. Lusit. 188 = Linaria glaucophylla.
glaucum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 352 = Linaria supina.
glaucum. Linn. Cent. 1. n. 43 ; in Amoen. Ac iv. 27 7 — Linaria glauca.
glaucum, Stocks, in Wight, Ic iv. t 1459-Sdhweinfurthia sphaerocarpa.
glaucum, Thore, Chi. Land. 265 = Linaria thymifolia.
glutinosum, *Boiss. & Reut. Pugill. PI. Nov.* (1852) 82. —Hispan.
gracile, Pers. Syn. ii. 156 = Linaria Pelissenana.
gracile, Reut. Ind. Sem. Hort. Genev. (1852) 4; ex Lange, in Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. U. 682 = A. Orontium.
graecum, Bory ft Chaub. FL Pelop. 176. t 21-linaria graeca.
grandiflorum, Stokes, Bot Mat Med. iii. 384-majus.
gratissimum, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 266 =Limnophila Roxburghii.
Haelava, *orsk. FL Aegypt Arab. 111 = Linaria Haelava.
hederaceum, Lam. FL Fr. ii. 388 = Linaria Cymbalaria.
hederaefolium, Salisb. Prod. 96 = Linaria Cymbalaria.
hepatiei/olium, Poir. Encyc Suppl. iv. 19=Linaria hepaticaefolia.
heterophyllum, Schonsb. Vextr. Marokko, 194; Willd. Sp. PI. iii. 234 = linaria heterophylla.
hexandrum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 43 = Vandellia Crustacea.
hirtum, Linn. Sp. PI. ed. I. 616 = Linaria hirta.
hispanicum, *Chav. Monog.* 83.—Hispan.
Huetii, Reut. in Ann. Sc Nat Ser. IV. ii. (1864) 880 -sempervirens.
humile, SaUsb. Prod. 98 = A. Orontinm.
hybridum, *Benth. Cat. PI. Pyren.* 60.—Mont. Pyren.
incarnatum, Vent in Lam. Encyc iv. 364 = Linaria bipartita.
indieum, Royle, ex Ball, in Jonm. linn. Soc xvi. (1878) 595-A. Orontium.
intermedium, Debeaux, in BulL Soc Bot. Fr. xz. (1873) 13-latifolium.
intermedium, Hort ex Stead. Nom. ed. II. L 108 = itriatam.

ANTHtRHIMXTM :—
intricatum, *Ball, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 173.—Marocco.
italicum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = majus.
jamaicense, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. L 108 = siculnm.
jnncenm,i4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1888) 377.—CaUf.
junceum, Linn. Cent. i.; Amoen. Acad. iv. 277; Vent, in Lam. Encyc. iv. 852=Linaria spartea.
junceum. Pall. Reise, ii. 832 = Linaria Loeselii.
Kelloggii, *Greene, in Torrey Bot. Club,* x. (1883) 126.—Calif.
Kingii, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 915. t. 21.—Utah.
laevigatum, Herb. Banks, ex Benth. in DC. Prod. x. 258 = Diascia parviflora.
lagopodioides, Linn. f. Snppl. 279 = Linaria saxatilis.
lanigerum, Willd. Sp. PI. iii. 233=Linaria lanigera.
latifolium, Bouig. ex Willie & Lange, Prod. ii. 584 = hispanicum.
latifolium, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4; *DC. Ft. Fr.* v. 411.—Europ.
latifolium, Willd. Sp. PI. iii. 288=Linaria latifolia.
laxiflorum, Willd. 1. c 242 = Linaria laxiflora.
leptaleum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1888) 378.-Calif.
Linaria, Linn. Sp. PI. 616 = Linaria vulgaris.
linarioides, Linn. 1. c. ed. II. 858=Linaria vulgaris.
linifolium, linn. 1. c. 858 = Linaria linifolia.
linifolium, Pall. Ind. Taur. 161 = Linaria macronra.
Linkianum, Boiss. & Rent Diagn. Ser. II. iii. 160 = latifolium.
linogriseum, Brot. Phyt. 135 = Linaria bipartita.
littorale, Bemh. in DC. Fl. Fr. v. 410; Poir. Encyc Suppl. iv. 20 = Linaria littoralis.
Umgicorne, Thunb. Prod. PI. Cap. 105 = Diascia Thunbergiana.
lusitanicum, Vent in Lam. Encyc. iv. 361=Linaria tristis.
lusitanicum, Link, ex Steud. Nom. ed. IL i. 109 = Linaria pedunculate.
macrocarpum, Soland. in Ait. Hoit. Kew. ii 835 = Nemesia chamaedrifolia.
macrourum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 75 = Linaria macroura.
maculatum, Mop, ft Sesse, ex DC. Prod. vii. 634 = Achimenes foliosa.
majus, *Linn. Sp. PI.* 617.—Reg. Mediterr.
marginatum, Desf. in Act Soc. Hist. Nat Par. i. (1794) 36. t. 7=Linaria tristis.
maritimum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 23=Linaria supina.
utassiliense, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. L 57, 482 = Linaria maritima.
manrandioides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1868) 876.—Texas.
medium, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. L 109=striatum.
meionantkum, Brot. Phyt t. 126=sempervirens.
meonanthum, Hoffmgg. & Link, FL Port i. 261. t. 51 =sempervirens.
micranthum, Cav. Ic i. 51 = Linaria parviflora.
microcarpum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 99.—Algeria.
minus, Linn. Sp. PI. 617=Linaria viscida.
molle, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 503 = Hygrophila undulata.
molle, Boiss. Voy. Espagne, 449= hispanicum.
molle, *Linn. Sp. PI.* 1198.—Mont. Pyren.
mollei St. Amans, Bouq. Pyren. n. 154 = sempervirens.
monspessulanum, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. IV. 1106 = Linaria Loeselii.
monspessulanum, Linn. Sp. PI. 616 = Linaria striata.
montevidense, Mart, ex Colla, in Mem. Ace. Torino, xxxv. (1831) 178= majus.
multibracteatum, Brot. ex Steud. Nom. ed. II. i. 109—variabile.
multicaule, Linn. Sp. PI. 615 = Linaria multicaulis.
multicaule, Tenore, Fl. Nap. Prod. 86 = Linaria stricta.
multipunctatum, Brot Fl. Lusit i. 195 = Linaria amethystea.
murale, Salisb. Prod. 98=majus.
muralis, Pers. Syn. ii. 155=Linaria Cymbalaria.
neglectum, Spreng. Neue Entdeck. iii. 160=Linaria triphylla.
nicaeense-, Risso, Fl. Nice, 347=latifolium.
Nevinianum, *A. Gray, in Coult. Bot. Gatette,* ix. (1884) 54.—Calif.

ANTIRRHINUM :—
Nuttallanum, *Benth. in DC. Prod.* x. 592.—Calif.
ochroleucum, Salisb. Prod. 98=Linaria vulgaris.
ocimi/olium, Pourr. ex Spreng. Syst ii. 798 = Linaria ocimifolia.
odoratissimum, Gueldenst. ex Ledeb. FL Ross. iii. 208 =Linaria Loeselii.
odor-urn, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 75=Linaria Loeselii.
oppositiflorum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 28=Linaria villosa.
orbiculare, *Medic. Beobacht.* (1788) 242.—Hab. ?
orchidiflorum, [Desf.] ex Pers. Syn. ii. 155= Linaria bipartita.
Orcuttianum, *A. Gray, in Coult. Bot. Gaaette,* ix. (1884) 53.—Calif.
origanifolium, Gouan, Hort. Monsp. 801 = Linaria rubrifolia.
origanifolium, Linn. Sp. PL 615 = Linaiia origanifolia.
Orontium, *Linn. Sp. PI.* 617.—Enrop.: As. Min.; Afr. bor.
ottomanum, *Janka, in Termiss. Fiitetek,* iv. (1880) 297.—Tnrcia.
Osyris, CyrilL PI. Neap. Nov. Fasc. ii. 21 = Linaria chalepensis.
pallidiflorum, Lam. Fl. Fr. ii. 341 = Linaria genistifolia.
pallidum, Tenore, FL Nap. i. 828=Linaria pilosa.
papilionaceum,IJsai.t/!.uiL 86=Schvreinfurthia sphaerocarpa.
parviflorum, Jacq. Coll. iv. 204=Linaria arvensis.
parviflorum,Yfil\A. Sp. PI. iii. 245=Linaria parviflora.
patens, Thunb. Prod. PL Cap. 105=Nemesia patens.
paucifiorum, Steud. Nom. ed. IL i. 109= Linaria multicaulis.
paucifiorum, Poepp. ex Chav. Monog. 149 = Linaria canadensis.
pedunculatum, Linn. Sp. PL ed. IL 857= Linaria pedunculata.
Pelisserianum, Linn. 1. c. ed. I. 615 = Linaria Pelisseriana.
Pelisserianum, Mout.-Font. ex Chav. Monog. 155 = Linaria gracilis.
pilosum, Bory, Fl. Peiop. 39 = Linaria microcalyx.
pilosum, Jacq. Obs. Bot. ii. 28= Linaria pilosa.
pinifolium,Poui. Voy. Barb. ii. 198 = Linariareticulata.
pinnatum, Linn. f. Suppl. 280 = Nemesia pinnata.
polygalaefolium, Brot Phyt t 138 = Linaria supina.
polygalaifolium, Poir. Encyc. Suppl. iv. 21=Linaria italica.
polygalatfolium.Vfittd. ex Steud. Nom.ed.II. L 109 = Linaria tristis.
polygonifolium, Poir. Encyc. Suppl. iv. 26 = Linaria amethystea.
porcinum, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 384.—Cochinch.
praecox, Brot. Phyt t. 131 = Linaria spartea.
prostratum, Cyrill. ex Chav. Monog. 120=Linaria reflexa.
pterospermum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 115 = Schweinfurtbia pterosperma.
pubescens, Pers. Syn. it 157 = Linaria arenaria.
pubescens, Tenore, Fl. Nap. Prod. 86 = Linaria pallida.
pumilum, Poir. ex Steud. Nom. ed. IL i. 109=Linaria flava.
purpureum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 374=A. Orontium.
purpureum, Linn. Sp. PL ed. I. 618=Linaria purpurea.
pygmaeum, *Gouan, Illustr.* 37.—Europ. austr.
pyramidale, Vent, in Lam. Encyc iv. 360 = Linaria pyramidata.
pyramidatum, Benth. in DC. Prod. x. 272 = praec.
pyrenaicum, Ram. ex DC. Fl. FT. iii. 581 = Linaria supina.
quadrifolium, *G. Shaw, Cimel. Phys.* 84. t. 44.—Hab. 1
quinquelobatum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 119 = A. Asarina.
quinquelobum, Stokes, Bot. Mat Med. iii. 885=Linaria Cymbalaria.
ramosissimum, *Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 254.—Algeria.
reflexum, Linn. Syst. ed. X. 1112 = Linaria reflexa.
repens, Linn. Sp. PL 614=Linaria striata.
reticulatum, Sin. Ic Pict. [2] = Linaria reticulata.
Rhodium, Boiss. ex Benih, in DC. Prod. x. 291=majns.
rhytidospermum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. ii. 27 = Linaria persica.
romanumf, Seb. & Maur. ex Nym. Consp. 636 = tortuosum.
rosmarinifolium, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art IV. 6.—Malaya.

ANTIRRHINUM :—
rotundifolium, Gilib. FL Iituan. i. 138=Linaria spuria.
rubrifolium, Poir. Encyc. Suppl. v. 737=Linaria rubrifolia.
rupestre, Boiss. & Rent. Pugill. PI. Nov. (1852) 82 = glutinosum.
rupestre, Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. ii. 586 = hispanicum.
ruseinonense, Debeaux, in Bull. Soc Bot Fr. xx. (1873) 14 = Barrelieri.
rytidocarpum, G. Don, Gen. Syst iv. 616 = Linaria persica.
rytidospermum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 27 = Linaria persica.
sagittatum, Poir. Encyc Suppl. iv. 19=Linaria sagittata.
saphyrinum, Brot FL Lusit. i. 197=linaria amethystea.
saphyrinum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 109 = Linaria Pelisseriana.
saxatile, Bonani, Nann. Prod. 69 = Linaria arenaria.
saxatile, Linn. Cent. P>. i. 16=Linaria saxatilis.
scabrum, Thunb. Prod. PI. Cap. 105=Nemesia chamaedrifolia.
scariosum, Vent, in Lam. Encyc. iv. 849 = Linaria scariosa.
sempervirens, *Lapeyr. Fl. Pyr.* i. 7. t. 4; *Hist. Abr. PI. Pyr.* 354.—Mont. Pyren.
serpyllifolium, Pourr. ex Chav. Monog. 93 = Linaria villosa.
siculnm, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 6; *Ucria, in Roem. Arch.* i. 69.—Sicilia.
simplex, *Lint, in Schrad. Neues Journ.* ii. (1799) 300.—Gallia.
simplex, Willd. Sp. PL iii. 243=Linaria arvensis.
sparteum, Linn. Sp. PL ed. I. 1197=Linaria spartea.
sparteum, Viviani, Fl. Lib. Spec. 33=Linaria viscosa.
spartum, Linn. Cent. i. 17, postea *sparteum.*
spedosum, Donn, Hort. Cant. ed. IV. 139=Linaria bipartita.
speciosum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 376.—Calif.
spinescens, Viviani, FL Lib. Spec. 82. t. 27. t 2 = Linaria acgyptiaca.
spv.riv.rn, Brot ex Stead. Nom. ed. II. i. 109 = Linaria reticulata.
spurium,Uwn. Sp. PI. 613=Linaria spuria.
striatum, Lam. FL Fr. it 343 = Linaria striata.
striatum, *Schrank, ex Steud. Nom.* ed. I. 57.—Europ.
strictum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 375.—Calif.
strictum, Sibth. & Sm. FL Graec. vi. 75. t. 594-Linaria Sibthorpiana.
strumosum, Banks, ex Benth. in DC. Prod. x. 260-= Nemesia strumosa.
subalpinum, Brot. Fl. Lusit. i. 196=Linaria alpina.
snbeordatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 806.— Calif,
subsessile, *A. Gray, in Coult. Bot. Gaiette,* ix. (1884) 68.— Calif.
subulatum, CyrilL ex Chav. Monog. 136 = Linaria Loeselii.
supinum, Brot. Fl. Lusit. i. 191=Linaria.reticulata.
supinum, Linn. Sp. PL 615 = Linaria supina.
supinum, Pall. Reise, ii. 522 = Linaria Loeselii.
supinum, Sibth. &. Sm. Fl. Giaec vi. 75. t. 595 - Linaria genistifolia.
teneltum, Cav. Ic ii. 61. t. 180. f. 1 = Linaria tenella.
tenue, Viviani, FL Lib. Spec. 33.1.16. f. 5-6 ; Spreng. Syst. ii. 495 = Linaria viscosn.
Thuillierii,'Pott. Encyc.Suppl. iv. 26 = Linaria supina.
thymifolium, Vahl, Symb. Bot. ii. 67 = Linaria thymifolia.
tortuosum, *Bosc, ex Lam. Encyc.* iv. 365.—Reg. Mediterr. occ.
Tournefortii, Poir. Encyc. Suppl. iv. 24=Linaria Tournefortii.
tricolor, Hort. ex Chav. Monog. 118 = Linaria triphylla.
tricolor, Pourr. ex Chav. 1. c 172 = Linaria amethystea.
triornithophorum, Linn. Sp. PL 613 = Linaria triornithophora.
triphyllum, Cav. Ic. ii. 61. t. 179=Linaria Cavanillesii.
triphyllum, Linn. Sp. PL 613 = Linaria triphylla.
tnste, linn. 1. c = Linaria tristis.
unifiorum, Moc. &. Sesse, ex DC. Prod. vii. 582-3 - Gesneria uniflora.

ANTIRRHINUM :—
unilabiatum, Linn. f. Snppl. 279 = Diascia unilabiata.
vagans, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 876.—Calif.
variable, *Link, ex Steud. Norn.* ed. I. 57.—Lnsit.
versicolor, Linn. Sp. PI. 866 = Linaria versicolor.
vexillo-calyculatum, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* i. ed. II. (1873) 7,26.-Calif?
•oillosum, Lap. Fl. Pyren. 358=Linaria origanifolia.
inllosum, Linn. Sp. PI. ed. II. 852 = Linaria villosa.
violaceum, Salisb. Prod. 97 = Linaria Pelisseriana.
Virga, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 873—Calif.
•rirgatulum, Brot. Fl. Lnsit. i. 193=Linaria spartea.
mrgatum, Poir. Voy. Barb. ii. 192 = Linaria virgata.
viscosum, Curt. Bot. Mag. t. 868 = Linaria hirta.
viscosum. Linn. Cent. ii. 21 = Licaria viscosa.

ANTISOLA,Rafin. Sylva Tellur. 97 (1838) =Jtieonia, Ruiz & Pav. (Melast.).
racemosa, Rafin. 1. c. = M. racemosa.

ANTISTHIRIA, Pers. Syst. 127 (1797), err. typ.= AntMstiria, Linn. (Gramin.).

ANTISTBOPHE, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 84. *MYRSINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 647.
oxyantha, *A. DC. I. c*—Reg. Himal.
serratifolia, *Hook./, in Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 647.—Ind. or.

ANTITAXIS, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 87 ; Ser. III. xx. (1867) 18. *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 88, 859,ifi.256.
calocarpa, *Kura, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 324.—Ins. Nicob.
canliflora, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. xx. (1867) 14.—Java,
fasciculata, *Miers, I. c*—Malaya.
Jongifolia, *Miers, I. c*—Ins. Timor,
lucida, *Miers, I. c*.—Java.

ANTITHRIXIA, DC. Prod. vi. 277 (1837). *COMPOSITAE*, Benth. & Hbdlc. f. ii. 329.
abyssinica, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 829.—Afr. trop.
angustifolia, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Afr. Trop.* iii. 356.—Afr. trop.
navicoma, *DC. Prod.* vi. 278.—Afr. austr.

ANTITRAGUS, Gaertn. Fruct. ii. 7. t. 80 (1791) = CrypBis, Ait. (Gram.).
aculeatus, Gaertn. 1. c = C. acnleata.

ANTIZOMA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 41; Ser. III. xvii. (1866) 266 = Cissampeloa, Linn. (Menisp.).
angnstifolia, Miers, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 11 = C. angustifolia.
Burchelliana, Miers, 1. c. = C. calcarifera.
calcari/era, Miers, 1. c. 12=C. calcarifera.
Harveyana, Miers, 1. c. = C. angustifolia.
lycioides, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xvii. (1866) 266.—Afr. austr.
Miersiana, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 18.—Afr. austr.

ANTOCHORTUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 451 (1886)=WiUdenowla, Thunb. (Restiac).
Scklonii, Nees, 1. c. = W. striata?

ANTODON, Neck. Elem. i. 68 (1790)=Leontodon, Lum. (Compos.).

ANTOMMARCHIA, Colla, Hort. Ripnl. App. ii. 845 (1826) = Correa,Sm.(Rntac).
rubra, Colla, 1. c. 25. t. 72 = C. speciosa.
speciosa, Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) Litt. 56 = C. speciosa.

ANTONIA,R. Br. in Wall. PI. As. Rar. iii. 65 (1832) = Rnynchoglossum, Blume (Gesner.).
ooliqua, R. Br. 1. c. = R. obliquum.

ANTONIA, Pohl, PI. Bras. Ic. ii. 13. t. 109 (1831). *LOGAN1ACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 796.

AITTONIA :—
Griffithii, Wight, Illnstr. Ind. Bot. ii. t. 156b=Norrisia malacensis.
ovata, *Pohl, PI. Bras.* ii. 18. t. 109.—Bras.
pilosa, Hook. Ic. PI. t. 64=ovata.
pubescens, Bong, in M(5m. Acad. Petersfc Se>. VI. iii. (1835) 2. t. 1 = ovata.

ANTONIANA, Tuss. Fl. Antill. 2. t. 16 (1818) ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 388=Faramea, Aubl. (Rubiac).
laurifolia, Tuss. 1. c.=F. odoratissima.

ANTOPETITIA, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xiv. (1840) 261 = OrnithopUB, linn. (Legum.).
abyssinica, A. Rich. 1. c. 262 = O. coriandrinus.
cancellata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 210 = Helminthocarpon abyssinicum.

ANTOPHYLAX, Poir. in Diet. Sc. Nat. ii. Suppl. 95 (1816),err. typ. = ANDROPHYLAX, Wendl.-Coeculus, DC. (Menisp.).

ANTOSCHMIDTIA, Stend. Syn. Gram. 199 in syn. Schmidtiae (1855) = Behmidtia, Stead. (Gram.).
quinqueseta, Boiss. Fl. Orient, v. 550=S. quinqueseta.

ANTRIBA, Rafin. Sylva Tellur. 126 (1888) =Iioranthus, Linn.
budleoides, Rafin. 1. c. = L. Scurrula.

ANTROLEPIS, Welw. Apont. 578 (1858) =Ascolepis, Nees (Cyper.).
anthemiflora, Welw. 1. c.=A. anthemiflora.
elata, Welw. 1. c. = A. elata.
leucantha, Welw. 1. c.=A. protea.
santolina, Welw. 1. c = A. protea.
sulphurea, Welw. 1. c.=A. protea.

ANTROSPERMUM, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 773 = Venldium, Less. (Compos.).
ftoribundum, Passer. Ind. Sem. Parm. (1859).—Hab. ?
Kraussii, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 778 = V. Kraussii.

ANTSCHAR, Horsf. in Verb. Bat. Gen. vii. (1814) 8 = Antiaria, Lesch. (Urtic).

ANTURA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 63 (1775) = Carissa, Linn. (Apocyn.).
hadiensis, J. F. Gmel. Syst. 405=C. edulis.

ANTTBIAS, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 398. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 975.
Afzelii, *Schott, I. c.* 899.—Afr. occ.
Barteri, *Schott, Prod. Aroid.* 159.—Afr. occ.
heterophylla, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 485.—Afr. trop.

ANURUS, Presl, in Weitenw. Beitr. ii. (1837) 24 = LathyruB, Linn. (Legum.).
linifolius, Presl, I. c. = L. Nissolia.
Nissolia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 866 = L. Nissolia.

AITVTLIiEA, DC. Prod. v. 487 (1836). *COMPOSITAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 838.
SYCODIUM, Pomel, Nouv. Fl. Atl. 89 (1874).
Garcini, *DC. Prod.* v. 487.—Aegypt.; Persia,
radiata, *Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 471, *nomen*.—Algeria.

AHYCHIA, Michx. Fl. Bor. Am. i. 112 (1808). *ILLECEBRACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 16.
BUINALIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 40 (1836).
Argyrocoma, Michx. Fl. Bor. Am. i. 114 = Paronychia Argyrocoma.
Baldwinii, Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 172 = Paronychia Baldwinii.
canadensis. *Ell. Sketch*, i. 807.—Am. bor.
capillacea, *DC. Prod.* iii. 369.—Am. bor.
conferta, *Rafin. Atl. Journ.* (1832) 16.—Am. bor.
dichotoma, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 113.—Am. bor.
divaricata, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 42.—Am. bor.
fastigiata, *Rafin. Atl. Journ.* (1832) 16.—Am. bor.
Herniariae, Pers. Syn. l. 261 = Illecebrnn; hemiarioides.
herniarioides, Ell. Sketch, i. 808 = Herniaria americana.
hemiarioides, Michx. FL Bor. Am. i. 118=Paronychia hemiarioides.

ANTCHIA :—
lateralis, *Rafin. Atl. Journ.* (1832) 16.—Am. bor.
nudiflora, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 43.—Am. bor.
polygonoides, *Rafin. Atl. Journ.* (1832) 16.—Am. bor.

AOPLA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 (1885) = Habenaria. Linn.
reniformis, Lindl. 1. c.=H. renifonnis.

AOTTTS, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1806) 504. *LEGUM1NOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 470.
carinata, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* ii. 215.—Austral,
cordifolia, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 98.—Austral.
cordifolia, Lindl. & Paxt. Fl. Gaid. i. 76>Pullenaea tcmata.
dillwynioides, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 60-Dillwynia floribunda.
Drummondii, *T. Moore, in Gard. Comp.* (1852) 97.—Austral.
ericoides, G. Don, Gen. Syst. ii. 120=villosa.
ferruginea, Lubill. PI. Nov. Holl. i. t. 182 = villosa.
genistoides, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 268.—Austral.
gracilis, Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 610=gracillima.
gracillima, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 59.—Austral.
intermedia, Meissn. 1. c. 60=gracillima.
lanigera, *A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 78.—Austral.
moWis, Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 286.—Austral,
passerinoides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 61.—Austral,
phylicoides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, ii. 92.—Austral.
Preissii, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 214.—Austral.
procumbens, Meissn. 1. c. i. 60 = Preissii.
Tietkensii, *F. Muell. Fragm.* x. 33.—Austral,
villosa, *Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 504.—Austral.
virgata, *DC. Prod.* ii. 108.—Austral.
Wuerthii, Kegel, in Bot. Zeit. ix. (1851) 596 = Dillwynia floribunda.

APABTTTA, Griseb. Ges. Abhandl. 280 (1880), nomen. *MENISPERMACEAE*.

APACTIS, Thunb. Nov. Gen. 66 (1783)=Boydsia, Roxb. (Capparid.).
japonica, Thunb. 1. c.—Japon.

APALANTHE, Planch, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist Ser. II. i. (1848) 87-Elodea, Michx. (Hydroch.).
granatensis, Planch. 1. c = E. granatensis.
guyanensis, Planch. 1. c. = E. guyanensls.
Schweinitrii, Planch. 1. c = E. canadensis.

APALANTUS, 'Adans. Fam. ii. p. (19)' fide Pfeiff. Norn. i. 225 (1870)=Hapalanthus, Jacq.

APALATOA, Aubl. PI. Gui. i. 382. t. 147 (1775) = Crudia, Schreb. (Legumin.).
aromatica, Lam. Encyc. iv. 559 = C. aromatica.
bantamensis, Baill Hist. PI. ii. 104.—Java.
guianensis, Lam. Encyc. i. 208 = C. Apalatoa.
spicata, Aubl. PI. Gui. i. 383 = C. Apalatoa.

APALOCHLAMYS, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvi. 228 (1828~i = CaBBinla, R. Br. (Compos.).
Billardierii, DC. Prod. vi. 157 - C. spectabilis.
Endlicheri, DC. 1 c. = C. spectabilis.
Kerrii, DC. 1. c.^C. spectabilis.

APALOPTERA, Nutt. ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1858) 819=Abronia, Juss. (Nyctag.).
annua, Nutt. ex Hook. Kew Journ. v. (1858) 261 = Ab. cycloptera.

APALUS, DC. Prod. v. 507 (1836) = Blennosperma, Less. (Compos.).
anthemifolius, DC. 1. c. = B. chilense.

APAMA, Lam. Encyc i. 91 (1783) = Bragantia, Lour. (Aristoloch.).
laurifolia, Rafin. Sylva Tellur. 13-B. Wallichii.
siliquosa, Lam. Encyc. i. 91 = B. Wallichii.

APARGIA, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 113 (1772^ = Zieontodon, Linn. (Compos.).
alpina, Willd. Sp. PI. iii. 1547 = L. pyrenaicus.
angustifolia$_K$ Schleich. ex DC. Prod. vii. 102 = L. tenuiflorus.'
annua, Visiani, PI. Aeg. 38. t. 6 = L. hispidnlns.
arenaria, Moretti, ex DC. Prod. vii. 108=L. Berinii.
aspera, Spron. ex Nym. Consp. 468 = L. graecus.
aspera, Waldst & Kit PL fear. Hung. ii. 114-L. asperus.
aurantiaca, Tenore, Syll. 892-L. pyrenaicus.
aurea, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Anfs. L (1795) 282 (Hoppe, ex DC. Prod. vii. 167) = Crepis aurea.
autumnalis, Hoffm. Deutschl. FL ed. II. ii. 113-L. autumnalis.
Berinii, Jan, ex DC. Prod. vii. 103 = L. Berinii.
borealis, Bongard, Veget Ins.Sitcha, 148 = L. borealis.
Brumati, Schied. ex Stead. Nom. ed. II. i. 110=L. hastilis.
bulbosa, Balb. in Mem. Acad. Tor. (1808) 224 -L. tuberosus,
canescens, Sieber, ex DC. Prod. vii. 108 =L. Berinii.
caucasica, Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 247 = L. hastilis.
caucasica, Reichb. in MoessL Handb. ed. II. ti. 1378 = L. asperu5.
chillensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 8 = L. chillensis.
cichoracea, Tenore, Prod. 46; Fl. Nap. ii. 166 = L. cichoraceus.
dliata, Presl, Fl. Ricui. p. xxxi=L. Preslii.
communis, Spenn. Fl. Friburg. iL 558=1. hwpidns.
coronopifolia, Willd. Sp. PI. iii. 1658=Ficris radicata.
crispa, Willd. 1. c. 1551=L. crispus,
crocea, Less, in Linnaea, ix. (1834) 152.1182.—Sibir. ural.
crocea, Pollin. Fl. Veron. ii. 565. t 2. f. 8 - L. pyrenaicus.
danubialis, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 114 -L hastilis.
dubia, Willd. Sp. PI. iii. 1549 = 1. hastilis.
ericetorum, Richt. [Tasehenb. ed. II. (1880)] -L. hastilis.
fasciculate, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. ii. [11] t. 2=L. cichoraceus.
Gouani, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 7 = L. hirtus.
guestphalica, Boenning. ex Reichb. in DC. Prod. vii. 102 =L. bastilis.
Haenkei, Stemb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 110=L. pyrenaicus.
hastilis, Host, Syn. 423 - L. hastilis.
hastilis, Viviani, Fl. 1ib. Spec. 60. t. 26. f. 1=L. Salzmannia.
heterophylla, Moench, Meth. 643 =>L. hastilis.
hieradoides, Willd. Sp. PI. iii. 1554=Picris bieracioides.
hivta, Geners. ex Stead. Nom. ed. II. i. 110; ii. 28 = L. pyrenaicus.
hirta, Steud. 1. c. i. 110 = L. hispidus.
hirta, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 114 = L. hirtns.
hispanica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 248 = L. asperu.
hispanica, Willd. Sp. PL iii. 1552-L. hispanicns.
hispida, Bory, in Ann. Sc. Gen. Phys. iii. (1820) 5=L. Boryi.
hispida, Hoffm. Deutschl. FL ed. *U.* iL 113-L. nispidus.
hispida, Willd. Sp. PL iii. 1553 =L. hastilis.
hyoseridiftora, Saut. ex Schur, Enum. PI. Transs. 859 = L. caucasicus.
hyoseridifolia, Less. Syn. Comp. 182=Crepis hyoseridifolia.
hyoseroides, Sieber, in Sprang. Syst. iv. 664 = L. creticus.
hyoseroides, Vest, in Flora, iii.(1820) 7 = L. hirtus t
incana, Mart. FLMosq. 185=L. hastilis.
incana, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 114-L. incanns.
incrassata, Moench, Meth. Suppl. 220 =L. hispidus.
intermedia, Schuit. ex Steud. Nom. ed. II. L 110=L. hastilis.
laevis, Moench, Meth. 541 ^L. hirtus.
livida, Moench, 1. c. 543 = L. hastilis.
lucida, Tenore, Cat. Hort Neap. App. (1819) 71 =L. lucidns.
lyrata. Tenon, Fl. Nap. Prod. 46 = L. tnberosus.
macrorrhita, Guenth. ex Spreng. Syst. iii. 665=L. macrorrhizus.
media, Host, Fl. Austr. iL 404 = L. pyrenaicus.
obtusa. Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 405.—Europ. austr.
pratensis, Link, Handb. L 791-L. autumnalis.
pyrenaica, Stemb. & Hoppe, ex Steud. Nom. ed. I. 58 =>L. alpinus.

APARGIA:—
rigens. Mart, ex Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1877 = Picris hieracioides.
Rosani, Tenore, Fl. Nap. App. v. 26 —Leontodon Villarsii.
salina, Gaert. Meyer *Sc* Scherb. Fl. Wett. iii. 146 = L. crispus.
salsa, Schur, Enum. PL Transs. 884, Index = Taraxacum palustre.
saxatilis, Tenore, Cat. Hort. Neap. (1819) 69-L. crispus.
scabra, Nocca, ex Steud. Nom. ed. II. i. 110 = Picris asplenioides.
serotina, Jan, ex Steud. 1. c. = Hypochoeris radicata.
setosa, Moench, Meth. Suppl. 219=Crepis setosa.
sicula, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 899 =L. hastilis.
sinuata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 404.—Europ. austr.
strigosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 249 = L. asperrimus.
sudetica, Link, ex Spreng. Syst. iii. 664 =L. hispidus.
Taraxaci, Horaem. in Fl. Dan. t. 1623 = L, autumnalis.
Taraxaci, Willd. Sp. PI. iii. 1550 - L. Taraxaci.
taraxaciflora, Viv. Fl. Lib. Spec. 50. t 22. f. l=Picris taraxaciflora.
tenuiflora, Gaud. Fl. Helv. vi. 362 = L. alpinus.
tergestina, Hoppe, ex DC. Prod. vii. 103=L. crispus.
tuberosa, Willd. Sp. PL iii. 1549 = L. tuberosus.
umbellata, Schrank, in Denkschr. Kegensb. Bot. Ges. ii. (1818) 66 = Picris hieracioides.
variegata, Willd. Sp. PI. iii. 1552 - Hypochoeris variegata.
vena, Salzm. in Delile, Sem. Hort. Monsp. (1836)-L. Salznuuini.
Villarsii, Willd. Sp. PI. iii. 1553=L. Villarsii.

APAHGIDIUM, Torr. *Sc* Gray, fl. N. Am. ii. 474 (1841) wlieontodoii, Linn. (Compos.).
boreale, Torr. Sc Gray, 1. c. = L. borealis.

APARINANTHUS, Fonrr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 897 = GaUum, Toura. (Rubiac).
muralis, Fourr. 1. c. = G. murale.
verticillatus, Fourr. L c. = G. verticillatum.

APARINE, Toum. ex Mill.Gard. Diet. ed. VI. (1752). Qalium, Toum. (Rnbiac.).
borealis. Hill, Herb. Brit. ii. 161 - G. boreale.
hispida, Moench, Meth. 640 = G. Apwine.
latifolia, Moench, I. c. = G. CrucUU.
minima, AIL ex DC. Prod. iv. 610 = G. murale.
pariscensis, Hill, Herb. Brit. ii. lpO^G-. parisiense.
tpuria, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 397 = G. spurium.
tenera, Fourr. 1. c = G. spurium.
tricornis, Fourr. 1. c =G. tiicorne.
verrucosa, Moench, Meth. 640—G. saccharatum.
viscidiflora, Rafin. Ann. Nat. (1820) 14.—Am. bor.
Vaillantii, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 397 = G. spurium.
vulgaris, Hill, Herb. Brit. ii. 149 - G. Aparine.

APARINELLA, Fourr. in Ann. Soc linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 897=QaUnm, Toum. (Rubiac.).
dedpiens, Fonrr. 1. c. =G. parisiense.
divaricata, Fourr. 1. c - G. divaricatum.
litigiosa, Fourr. I. c. = G. parisiense.
parisiensis, Fourr. 1. c. = G. parisiense.
ruricola, Fourr. 1. c. = G. parisiense.
setacea, Fourr. L c. = G. setaceum.
tenuicaulis, Fourr. 1. c = G. divaricatum.

APARISTHMIUM, Endl. Gen. 1112 (1840) - AI-ohornea, Sw. (Euphorb.).
cordatum, Baill. Adansonia, v. (1868-44) 807-Al. eordata.
javense, Hassk. Hort. Bogor. 235=A1. ragosa.
Spruceanum, Baill. Adansonia, v. (1868-64) 307-Al. eordata.
sumatranum, Reichb. f. & ZoU. in Verh. Nat. Ver. Nederl. Ind. i. (1856) 28-Al. villosa.

APATANTHUS, Viv. Fl. Ub. Spec. 64. t. 7. f. 3 (1824)=Hieraoiuin, Linn. (Compos.).
crinitus, Viv. 1. c. = H. crinitum.

AFATELIA, DC. Mém. Temstr. 34. t. 8 (1822) - Saurauja, Willd. (Terastroem.).

APATELIA :—
biserrata, DC. Prod. i. 626 = S. biserrata.
glabrata, DC. Prod. i. 526=Saurauja serrata.
lanceolata, DC. 1. c. = S. lanceolata.
scabra, G. Don, Gen. Syst. i. 569 = S. excelsa.
tomentosa, G. Don, 1. c. 568=S. tomentosa.

APATEMONE, Schott, Gen. Aroid. t. 67 (1858). *AROWEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 984.
Motleyana, *Schott, I. c*—Borneo.

APATITIA, Desv. in Ham. Prod. PL Ind. Occ. 42 (1826) = BeUuoia, Neck. (Meliac).
blakeoides, Desv. 1. c. = B. Aublctii.

APATURIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 130 (1831) = - Faohystoma, Blume (Orchid.).
chinensis, Lindl. 1. c. 181 = P. cbinense.
Lindleyana, Wight, Ic. PL Ind. v. 1662- P. senile.
montana, Lindl. in Wall. Cat. n. 8738 = P. senile.
senilis, Lindl. 1. c. n. 3789 = P. senile.
Smithiana, Lindl. 1. c. n. 8787 = P. senile.

APEGIA, Neck. Elem. i. 251 (1790) = CeropegU, Linn. (Asclep.).

AFEIBA, Aubl. PI. Gui. i. 637. t. 213 ad 216 (1775). *TILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 237.
AUBLETIA, Schreb. Gen. 853 (1789).
OXYTANDRUM, Neck. Elem. ii. 255 (1790).
aspera, *Aubl. 1. c.* i. 545. t. 216.—Guiana.
australis.A. Rich. Fl. Nov. Zel. t. 34 = Entelea arborescens.
Cimba\axia,Arruda,inKoster, Trav. Brat. 488.—Bras,
discolor, *G. Don, Gen. Syst.* i. 555.—Bras,
echinata, *Gaertn. Fruct.* ii. 189. t. 121.—Hab. ?
emarginata, Lam. Encyc. i. 210=Sloanea emarginata.
glabra, *Aubl. PI. Gui.* i. 541. t. 214.—Guiana.
hirsuta. Lam. Encyc. i. 208.—A. Tibourbou.
hispida, Gaertn. Fruct. ii. t. 121 = A. Petoumo.
hypoleuca, *Steud. in Flora,* xxvi. (.1848) It. 755.—Guiana.
laevis, *G. Don, Gen. Syst.* i. 555.—Guiana.
laevis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 83=glabra.
levis, Aubl. PL Gui. t. 214 = glabra.
membranacea, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) *Suppl.* ii. 61.—Venezuel.
Petoumo, *Aubl. PI. Gui.* i. 543. t. 215.—Guiana.
Tibourbou, *Aubl. 1. c.* 588. t. 213.—Guiana; Venezuel.
ulmifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v.* 847.—Venezuel.

APEMON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 11 (1836)=Datura, Linn. (§olan.).
crassicaule, Ra6n. 1. c.=D. ceratocaula.

APENTOSTERA, Rafin. New Fl. Am. ii. 72 (1886) = Penstemon, Mitch, et Chelone, Linn. (Scrophul.).
secundifiora, Rafin. 1. c=P. Menziesii.
triflora, Rafin. 1. c 78=Chelone nemorosa.

APELLA, Scop. Introd. 107 (1777)=APPELLA, Adans. =Laiirua> Linn.

APENULA, Neck. Elem. i. 234 (1790) = Speeularia, Heist (Campan.).

APEBA, Adans. Fam. ii. 495 (1768). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1152.
ANEMAGKOSTIS, Trin. Fund. Agrost 128 (1820).
arundinacea, Hook, *t* Fl. N. Zeal. 285. t 67 (=Stipae sp.).—N. Zel.
aspera, Beauv. Agrost. 151=Sporobolus asper.
crinita, Beauv. 1. c 31 = Dichelachne crinita.
effusa, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL iL 148 = A. Spica-venti.
interrupta, *Beauv.* Agrost. 81.—Rossia austr.; Oriens.
palustris, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI. iL 148 = Agrostis alba.
procumbens, Auct. ex Steud. Nom. ed. n. L 111-Agrostis alba, vulgaris.
purpurea, Beauv. Agrost. 31; et Reichb. Ic Fl. Germ. i. 32=A. Spica-ventL
Spica-venti, *Beauv. 1. c.*—Europ.; Oriens.
tenuiflora, Beauv. 1. c. 161 = Muehlenbergia Willdepowii.

APERIPHRACTA, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 111 (1864)=Ocotea, Aubl. (Laurin.).

APERIPHRACTA:—
cuneata, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 119 *(=Oreodaphne cuneata).*—Pernv.
Martiana, Nees, 1. c. 117 -Ocotea rufo-tomentosa.
Minamm, Nees, 1. c. 140 = 0. umbrosa.
velutina, Nees, 1. c 182=0. velutina.

APERULA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 365 (1861) -Iiindera, Thunb. (Laurin.).
assamica, Meissn. in DC. Prod. xvi. 240=L. assamica.
citriodora, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 866.—Japon.
confusa, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 248.—Java.
cuspidata, Blume, Mus. Bob Lugd. Bat. i. 867.—Ins. Celebes.
densifiora, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 242.—Java.
'nsignis, Blume, in Mus. Bot Lugd. Bat i. 367.—Sumatr.
lanceeiata, Blume, 1. c—Java.
lucida, Blume, 1. c 866.—Java.
macrophylla, Blume, 1. c. 867.—Java.
Neesiana, Blume, 1. c 366=L. Neesiana.
°*yphylla,* Blume, I. c.-L. oxyphylla.
piporicarpa, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 242.—Sumatr.
polyantha, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 866.—Java.
puberula, Blume, 1. c. 367.—Java.
reticttlata, Blume, I. c =L. reticulata.
salicifolia, Blume, 1. c—Java.

APERULA, Gled. in Mém. Acad. Bert. (1751) 127, sphalm.=Auperula, Linn. (Rubiec.).

AEETAHIA, Baill. in Bull. Sot Linn. Par. i. (1882) 311. *LOBELIACEAE.*
wiateensis, *Baill. 1. c*—Ins. Padf.

APETALON, Wight, Ie. v. 22. t. 1758 (1852) =Didymoplexis, Griff. (Orchid.).
minutum, Wight, 1. c. = D. pallens.

APHACA, [Tourn.] Linn. Gen. ed. I. 217 (1787) = tathyrug, Linn. (Legum.).
Msperma, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xi. (1861) 282.—Aegypt.
"tarmorata, Alef. 1. c. '= L. polyanthus.
Pseudophaca, Alef. in Bonplandia, U. (1861) 189-L. pseudoaphaca.
v'garis, C. Presl, in Weitenw. Beitr. ii. (1887) 24 = L. Aphaca.

•^HAEWANDBA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 341 (1856). *RVBIACEAE.*
sumatiana, *Miq. I. c*—Sumatr.

APHAEBEMA, Miers, in Proc. Hort. Soc. iii. (1868) ²?4- *SAMYDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 799.
«P»cata, *Him, I. c*—Bras.

APHABTACTIS, Wedd. Chlor. And. i. 142. t 87 A ..(1S55). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. £ ii. 860.
Jamesoniana, *Wedd. I.* c—Ecuador.

APHANAMIXIS, Blume, Bijdr. 165 (1825)=Amoora, Roxb. (Meliac.).
«am«,Span. Ic. 14; et fii Linnaea, xv. (1841) 182 = Am. timorensis.
gyandiflora, Blume, Bijdr. 165 = Am. grandifolia.
Ptrrottetiana, A. fuss. Mém. Mél. 108-Am. Perrotretiana.
""Hginosa, Griff, ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 585=Am. rubiginosa.
timorensis, A. Juss. Mem. Mel. 107-Am. timorensis.

APHANANTHE, Link, Enum. Hort. Berol. i. 883 (1821)=Microtea,Sw. (Phytolacc.).
celosioides, Link, 1. c. = M. niaypurensis.

APHANASTHE, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. »j (W48) 265. *VRTICACEAE,* Benth. & Hook. £ ii . 365.
HOMOIOCELTIS, Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat. ii. 64. t- 34 (1852) [18561.
aspera, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 208.—Japon.
ctupidata. Planch. 1. c 209 - Gironniera reticulata.
PwUppinensis, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IIL x. (1848) J37.-Austral.
retCerv, *Planch. DC. Prod,* xvii 208.—Amtral.

APHANANTHEMUM, Steud. Nom. ed. II. i. Ill (1840) -HeUanthemum, Tourn. (Cistin.).
salicifolium, Fourr. in Ann. Soc linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 840=H. salicifolium.

APHANES, Linn. Gen. ed. I. S3 (1787)=Alehemilla, Linn. (RosacA
alata, Steud. Nom. ed. I. 68-Al. pinnata.
arvensis, Linn. Sp. PI. ed. I. 123—Al. arvensia,
cornucopieides, Lag. Gea et Sp. Nov. 99. n. 7-A1. comncopioides.
monogyna, [Pieri] in Ionios AnthoL Iii. (1884) 694 = Al. arvensis.
orbiculata, Pers. Syn. i. 150. -Al. orbiculata.
pinnata, Pers. 1. c. = Al. pinnita.
triloba, Gilib. Exercit. ii. 430 = A1. arvensis.
tripartite Pers. Syn. i. 150 = A1. tripaxtita.
vulgaris, Schur, Enum. PI. Transs. 884-Al. arvensis.

APHANIA, Blume, Bijdr. 286 (1825) - Sapindus, Linn.
bifoliata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Munich. viii. (1878) 238 = S. bifoliatus.
cuspidata, Radlk. 1. c.=S. cuspidatus.
Danura, Radlk. 1. C.=S. Danura.
longipes, Radlk. Sapind. Holland-Ind. Nachtr. 68.—Malaya.
microcarpa, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. viii. (1878) 238 = S. microcarpus.
montana, Blume, Bijdr. 236=S. montanus.
paucijuga, Radlk. Sapind. Holland-Ind. Nachtr. 68.—Malaya.
rubra, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. viii. (1878) 288=S. attenuates.
senegalensis, RadUc. 1. c. =S. abyssinicus.
sphaerococca, Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 91.—N. Guinea.

APHANISHA, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 54 (1849). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 50.
CBYFTANTKUS, Nutt. ex Moq. 1. c.
blitoides, *Nutt. ex Moq. 1.* c—Calif.

APHANOCALTX, Oliver, in Hook. Ic. PI. xi. 53. t. 1066 (1870). *LEGUMINOSAE.*
cynometroides, *Oliver, 1. e.*—Afr. occ.

APHANOCHILUS, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1282 (1828)=Elsholtzla> Willd. (Labiat.).
ilandus, Benth. 1. c=»E. blanda.
eriostachyus, Benth. 1. c = E. eriostachya.
flavus, Benth. 1. c.=E. flava.
fattens, Benth. 1. c. — E. incisa.
incisus, Benth. 1. c. = E. incisa.
paniculatus, Benth. 1. c. = E. incisa.
pilosus, Benth. 1. c.=E. pilosa.
polystachyus, Benth. 1. c = E. polystachya.

APHANODON, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 110=Henriettella, Naud. (Melast.).

APHANOMYBTUS, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 480 (1855). *LAURIN.* gen. dub. («Baeckia?).
rostrata, *Miq. 1. c.* 481.—Malaya.

APHANOMYXIS, DC. Prod. vii. II. 766, in nota (1889) -APHANOMIXIS, Blume = Amoora, Roxb. (Meliac).

APHANOPAPPUS, Endl. Gen. Suppl. ii. 43 (1842)-Iiipochaeta, DC. (Compos.).
Nuttallii, Walp. Rep. *ü.* 620-L. micrantha.

APHANOPETALUM, Endl. Gen. 818 (1839). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 650.
PLATVPTELEA, J. Drum, in Hook. Kew Joum. viL (1855) 65.
occidental, *F. Muell. Fragnu i.* 228.—Austral,
resinosum, *Endl. Nov. Stirp. Dec.* 85.—Austral.

APHANOPLEUBA, Boiss. Fl. Orient, ii. 855 (1872). *VMBELUFERAE.*
trachysperma, *Boiss. 1. c.*—Armenia.

APHANOSTEMMA, SL HiL FL Bras. Mei. i. 12 (1825) •= Ranunculus, Linn.
apii/olia, St. HtL 1. c. 13-R. apiifolius.

APHANOSTEPHU8, DC. Piod. v. 310 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 262.
KEEKLIA, DC. Prod. v. 309 (1836), ex parte.
LEUCOPSIDIUM, DC. Prod. vi. 43 (1887).
arifonicus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 81=humilis.
arkansanus, *A. Gray, PI. Wright, i.* 98.—Texas,
humilis, *A. Gray, I. c.*—Texas.
pilosus, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad.' 1861' (1862) 457—ramosissimus.
ramosissimus, *DC. Prod.* v. S10.—Texas,
ramosus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 81.—Mexic
Riddelii, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 189=ramosissimus.

APHANTOCHAETA, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 99 (1856). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. *I* ii. 251.
exilis, *A. Gray, I. c.* 100.—Calif.

APHARICA, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) LitL 78 = APHANIA, Blume=8apindufl, Linn.

APHEIiANDBA, R. Br. Prod. 475 (1810). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1102.
AMATHEA, Raftn. Fl. Tellur. iv. 65 (1836).
HEMISANDRA, Scheidw. in BulL Acad. Brux. ix. I. (1842) 22.
HEMITOME, Nees, in DC. Prod. xi. 295 (1847).
HYDROMESTUS, Scheidw. in Otto & Dietr. Gartenz. x. (1842) 285.
LAGOCHILIUM, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 86. t. 10 (1847).
POECILOCNEMIS, Mart.« Nees, in DC. Prod. xi. 295 (1847).
STROBILORHACHIS, Link, Klotzsch & Otto, Ic. PI. Rar. 117. t. 48 (1839).
SYNANDRA, Schrad. in Goett. Gel. ADZ. i. (1821) 735.
acanthifolia, *Hook. Ic. PL* 1.113.-Pernv.
Acanthus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 802.—Ecuador,
acntifolia, *Nees, I. c.* 299.—Ind. occ.
atrovirens, *N. E. Br. in Illustr. Hortic.* xxxi. (1881) t. 527.—Bras.
aurantiaca, *Lindl. Bot. Reg.* 31. t. 12.—Mexic.
bullata, *H. Wendl. in Hamb. Gartenk.* xix. (1863) 30.—Am. centr.
carduifolia, Hook. Ic PI. t. 718=formosa.
chartacea, *T. Anders, in Joum. Bot.* ii. (1864) 289—Peruv.
Chamissoniana, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 90.—Bras.
Clava, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. JÖ.* (1862) 174.—Bras.
cristata, *R. Br. Prod.* 475, in obs.—Ind. occ
cristata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 286-pectinaU.
cristata, Lindl. Bot. Reg. 1.1477 -tetragona.
Dehnhardtii, *Tenore, Ind. Sen. Hort. Neap.* (1829) 14.—Hab. t
Deppeaua, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 96.—Mexic.
Fascinator, *Linden &Andrt,Il\ustT. Hortic.* xxi. (1874) t. 164.—Am. trop.
flava, *Nees, in DC. Prod.* xi. 297.—Reg. Colomb.
formosa, *Nees, 1. c.* 301.—Peruv.
fulgens,/>*cne.i» *Rev. Hortic.* Sér. III. i. (18.47) 21.—Mexic
fulgens, *Hort. ex Regel & Rach, Gartenfi.* (1858) 34'2=tenuiflora.
glabrata, *Willd. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 296.—Am. merid.
Ghiesbreghtiana, Hort. ex Lem. in Fl. des Series, Sér. I. iv. (1848) S38=Jacobinia Ghiesbreghtiana.
Haenkeana, *Nees, PI. Haeni. ex DC. Prod.* xi. 298.—Am. centr.
Hartwegiana, *Nees, in Benth. PI. Hartm.* 236.—Reg. Colomb.
Hieronymi, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 260.—Reg. Argent.
hirsuta. Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 417 = Beloperone hirsute,
hydromestus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 512.—Mexic.
ignea, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. Ill=Stenandrium igneum.

APHELANDRA:—
illustrate.—*Cf Gard. Chron.* v. (1876) 603.—Bias,
lateritia, *Loud. Encyc. PI.* 1589.—Guatemala.
Leopoldii, Van Hontte, iu Fl. des Serres, ix. Sér. I. (1853) 86=squarrosa.
Iiboniana, *Linden, ex Hook./. Bot. Mag.* 5463.—Am. trop.
longiracemosa, Hort. ex Lindl. in Paxt. Fl. Gard. ii. 78 = Thyrsacanthus callistachys.
longiscapa, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Sir. I. iii. (1847) 240 = Thyrsacanthus Lemairianus.
lntea, *Nees, in DC. Prod.* xi. 300.—Bras,
lyrata, *Nees, I. c.* 802.—Am. austi.
macrostachya, *Nees, in Wort. Fl. Bras.* ix. 88.—Bras.
Margaritae, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxxiii. (1888) 315.1.19.—Bras,
marginata, *Nees is Morr. in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) i. 52.—Bras,
mediaurata, *Cogn. & March. PI. Ornem.* i. (1873) t. SO.—Bras,
melgariensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 297.—Reg. Colomb.
roicans, *Morite. ex Vatke, Ind. Sent. Hort. Berol.* (1876) *App.* 1.—Venezuela.
monticola. Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 364 = Jacobinia monticola.
mucronata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 301.—Peruv.
nemoralis, *Mart, ex Nees, in Mart. Ft. Bras.* ix. 90.—Bras,
nervosa, *T. Anders, in Journ. Bot.* ii. (1864) 289.—Peruv.
nitens, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5741.—Reg. Colomb.
nitida, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. I. (1823) 67 = Geissomeria nitida.
nobilis, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1867) 461.-Hab.?
nuda, *Nees, in Mart. Ft. Bras.* ix. 89.—Bras,
oostachya, *Wawra, in Oestr. Bot.Zeitschr.* xii. (1862) 172.—Bras,
oraata, *T. Anders, in Journ. Bot.* ii. (1864) 289.—Bras.
pectinata, *Willd. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 297.—Am. austr.
Porteana, *Morel, in Fl. des Serres,* Sér. I. x. (] 854-55) 41. t. 984.—Bras,
prismatica, *Hiem, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 78.—Am. centr.
pulcherrima, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. PI.* ii. 236.—Reg. Colomb.
pulcherrima, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 295 = tetragona.
pumila, *Nichols. Diet. Gard. i.* 91.—Bras,
punctata, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1881) II. 86; *Illustr. Hortic.* xxix. (1882) t. 457.—Am. merid.
imercifolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 802.—Reg. Colomb.
repanda, *Nees, I. c.* 728.—Peruv.
Roeelii, Can. in Rev. Hortic. (1872) 100=aurantiaca.
runcinata, *Klotesck, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 802.—Reg. Colomb.
Schiedeana, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 95,-Mexic.
sciophila, *Mart, ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 91.—Bras.
Sinclairiana, *Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph.* 146. t. 47.—Am. centr.
Sinitzini, *Linden, Cat.* n. 95 (1876); *Rev. Hortic.* (1876) 237.—Peruv.
squarrosa, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 89.—Bras,
stephanophysa, *Nees, 1. c.* 90.—Am. austr.
sulphurea, *Hoot. f. Bot. Mag.* t 5951.—Ecuador.
tarapotensis, Linden, ex Rafarin, in Rev. Hortic (1877) 88=Sinitzini.
tenuiflora, *Regel & Rack, Gartenfi.* (1868) 342.—Hab. t
tetragona, *Nees, in DC. Prod.* xi. 295.—Reg. Colomb.
tridentata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 513.—Costa Rica,
variegata, *Morel, Fl. des Serres,* Sér. L x. (1854-55) 33. t. 981.—Hab.?
verticillata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 281.—Mexic.

APHELANDROS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. 119 (1880)=Aphelandra, R. Br. (Acanth.j.

APHELEXIS, D. Don, in Mem. Wera. Soc. T. (1826) 646=Hellchry8um, Toum. (Compos.).
adhaerens, Boj. ex DC. Prod. vi. 217.—Madag.
Candollei, Boj. ex DC. I. c—Madag.
ericoides, Sweet, Hort Brit ed. I. 223 - Helichrysum ericoides.

APHELEXIS:—
fasdculata, D. Don, in Mem. Wem, Soc. v. (1826) 546=H. scsamoides.
filiformis, D. Don, 1. c. 647 = H. sesamoides.
heterophylla, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 878 = Hclipterum heterophyllum.
humilis, D. Don, in Mem. Wem. Soc. v. (1826) 547 = H. humile.
hypnoides, DC. Prod. vi. 218.—Madag.
incana, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 379 = Helipterum incanum.
lycopodiodes, Boj. ia DC. Prod. vi. 217.—Madag.
macrantha, Paxt. Fl. Mag. xv. 269 = H. humile.
selaginifolia, DC. Prod. vi. 217.—Madag.
sesamoides, D. Don, in Mem. Wern. Soc. v. (1826) 546 = H. sesamoides.

APHELIA, R. Br. Prod. 251 (1810). *CENTROLEPIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1026.
BRIZULA, Hicron. in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1878) 206, 208 (Centrolep. 92, 94).
Brizula, *F. Muell. Fragm.* v. 203.—Austral,
cyperoides, *R. Br. Prod.* i. 252.—Austral.
Drummondii, *Benth. Fl. Austral,* vii. 201.—AusrraL
gracilis, *Sond. in Linnaea,* xxviii. (1855) 227.—Austral.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 75. t 188 = gracills.
monogyna, Hieron. in Abh. Naturf. Gcs. Halle, xii. (1873) 208 (Centrolep. 94) = Centrolepis monogyna.
nutans, *Hook. f. ex Benth. Fl. Austral,* vii. i00.—Austral.
Pumilio, *F. Muell. in Linnaea,* xxviii. (1855) 226.—Austral.

APHILLANTHES, Neck. Elem. iii. 199 (1790) = Aphyllanthes, Toum. (Liliac).

APHLOIA, Benn. PI. Jav. Rar. 192 (1888) in adnot. *B/XINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 126.
NEUMANNIA, A.Rich. Fl. Cub. 96, in adnot. (1845).
integrifolia, Benn. PI. Jav. Rar. 192 in adnot. = mauritiana.
madagascariensis, *Clos, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 278.—Madag.
mauritiana, *Baker, Fl. Maurit.* 12 —Ins. Mascar.
theaeformis, Benn. PI. Jav. Rai. 192, in adnot.=mauritiana,

APHOMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 31 (18S6)=Iphigenia, Kunth (Liliac).
angustiflora, Rafin. 1. c. 32=1. indica.
cuneata, Rafin. 1. c.=I. indica.

APHOMONIX, Rafin. Fl. Tellur. ii. 65 (1886)=Baxifraga, Tourn.
hederacea, Rafin. 1. c = S. sarmentosa.

APHONINA, Neck. Elem. iii. 237 (1790)=Parlana, Aubl. (Gramin.).

APHORA, Neck. Elem. iii. 50 (1790) = Virgilia, Lam. (Legum.).

APHORA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. v. (1837) 174-Argithamnia, P. Br. ("-iphorb.).
Blodgettii, Torr. ex Chapm. Fl. S. U. St 408.—Florida.
catamariensis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 58 =Arg. catamariensis.
Drummondii, Engelm. & Gray, PI. Iindh. i. 25.—Texas.
humilis, Engelm. & Gray, 1. c E4 =• Arg. hnmilis.
humilis, Torr. Bot. Mex. Bound. 196=Arg. neomexicana.
laevis, A. Gray, ex Torr. 1. c.=Arg. laevis.
lanceolata, Engelm. & Gray, PI. Lindh. i. 25 = Arg. lanceolata.
mercurialina, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. v. (1837) 174 = Arg. mercurialina.
pilosissima, Torr. in Bot. Mex. Bound. 197= Arg. mercurialina.
serrata, Torr. 1. c.=Arg. serrata.

APHRAGMIA, Nees, in Iindl. Nat. Syst. ed, II. 444 (18S6)-=Ruellia, Linn. (Acanth.).
HaenieifNees, L c. = R. albicaulis.
rotundifolia, Nees, ex Benth. Bot. Voy. Sulph. 146-R. floribunda.

APHRAGMUS, Andrz. ex DC. Prod. i. 209 (1824) = Braya, Stemb. & Hoppe (Crucif.).
Eschscholtsiana, Andrz. ex DC. 1. c—Ins. Aleutian.

APHVLAX, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 271 = Aneilema, R. Br. (Commelin.).
spiralis, Salisb. I.e. — An, spiratum.

APHYTiTr ANTHES, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 857 (1737). *L/LJACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 795.
juncea, Salisb. Parad. Lond. t. 9=monspeliensis.
monspeliensis, *Linn. Sp. PI.* 294.—Reg. Mcditerr.

APHYLLEIA, Champ, in Calc. Joum. Nat. Hist. vii. (1847) 468 = Sciaphila, Blume (Triurid.).
erubescens, Champ. 1. c. = S. erubescens.

APHYLLOCAULON, Lag. Amen. Nat. i. 38 (1811) = Qerbera, Gronov. (Compos.).

APHYLLOCLADUS, Wedd. Chlor. And. i. 11. t. 3 (1856) = Hy alls, D. Don (Compos.).
decussatus, Hieron. Ic. PI. Argent. 28. t. 5. f. 1.—Reg. Argent.
spartioides, Wedd. 1. c.—Bolivia.

APHYLLOSTACHYS, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 221. *OROBANCHACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 983.
ANOPLON, Reichb. Consp. 212[b] (1828).
GVMNOCAUHS, Nutt ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 983 (1876).
LOXANTHES, Rafin. Neogenyt. 8 (1825).
MYZORRHIZA, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 36.
THALESIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267-
californicum, *A. Gray, in Bot. Calif, i.* 584.—Am. bor. occ.
comosum, *A. Gray, 1. c.*—Am. bor. occ.
Cooperi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 807.—Am. bor. occ.
Dugesii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 132.—Mexic
fasciculatum, *Torr. & Gray, in A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. I. 281.—Am. bor.
ludovicianum, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 685.—Am. bor.
multiflorum, *A. Gray, 1. c.*—N. Mexic
pinetornm, *A. Gray, 1. c.*—Am. bor. occ.
tuberosum, *A. Gray, I. c.*—Calif,
unifloram, *A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. I. 290.—Am. bor.

APHYIIIIOBCHIS, Blume, 'Bijdr. t. 77 (1825)' (nobis latet). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 606.
Hasseltii, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 31.—Java,
montana, *Reichb. f. in Linnaea,* xii. (1877) 57.—Ind. or.
pallida, *Blume, Bijdr.* t. 77; *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 80.—Malaya.
Spiculaea, *Reichb. f. in Linnaea,* xii. (1877) 58.—Borneo.

APHYTEIA, linn. Diss. Aphyt. 7 (1776); (Amoen. Acad. viii. 310. t. 7) (1785) =Hydnora, Thunb. (Cytin.).
Acharii, Steud. Nom. ed. II. i. Ill, sphalm. (Cf. Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 499) = H. africana.
Hydnora, Linn. f. Diss. 10 = H. africana.
multiceps, Burch. Trav. i. 213, in nota = Cytinus dioicus.
triceps, Steud. Nom. ed. II. i. Ill = H. triceps.

APIASTBTJM, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 643 (1840). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 888.
angustifolium, *Nutt. 1. c.* 644.—Calif.
latifolium, Nutt. 1. c.=angustifolium.

APICBA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 167. *LILIACEAE.'&ttiCa. St* Hook. f. iii. 776.
APRICA, D. Dietr. Syn. ii. 1097 (1840).
CATEVALA, Medic. Theod. 67 (1786).
albicans, Willd. 1. c. 271 = Haworthia albicans.
anomala, Willd. 1. c. 273 = Haworthia recurva
arachnoides, Willd. 1. c. 168 = Haworthia arachnoides.
aspera, *Willd. I. c.* 274.—Afr. austr.

APICKA :—
asperula, Haw. ex Steud. Norn. ed. II. i. lll=Haworthia aspenila.
atrovirens, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 168 = Haworthia atrovirens.
attenuata, Willd. 1. c. 270 = Haworthia attenuata.
bicariaata, Haw. Suppl. 63.—Afr. anstr.
oullulata, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 273=pentagona.
congesta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 218. —Afr. aus.tr.
<*ymbaefolia,* Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 271 = Haworthia cymbiformis.
deltoidea. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 217. —Afr. austr.
**xpansa,* Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 272 = Haworthia rigida.
fasciata, Willd. 1. c. = Haworthia fasciata.
foliolosa, *Willd. 1. c.* 274.-Afr. austr.
granata, Willd. 1. c. 269 = Haworthia margaritifcra.
imbricate, Willd. 1. c. 278=spiralis.
margaritifera, Willd. 1. c. 269 - Haworthia margaritifera.
maxima, Steud. Nom. ed. I. 59; ed. II. i. 112= Haworthia margaritifera.
minor, Steud. 11. cc. = Haworthia margaritifera.
mirabilis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 269 = Haworthia mirabilis.
"igra, Haw. ih Phil. Mag. (1824) 802 = Haworthia nigra.
patula, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 272 = Haworthia rigida.
pentagona, *Willd. 1. c.* 273.—Afr. austr.
P'eudo-rigida, Haw. Suppl. 62-Haworthia subrigida.
Pumilio, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 271 -Haworthia reticulate.
iuinquangularis, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 521 = Aloë quinquangularis.
Radula, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 270 = Haworthia Radula.
recurva, Willd. 1. c. = Haworthia recurva.
"eticulata, Willd. 1. c. 272 = Haworthia reticulata.
retusa, Willd. 1. c. 271 -Haworthia retusa.
ngida, Willd. 1. c. 272 = Haworthia snbrigida.
'Piralis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 217. —Afr. austr.
'Piralis, Willd. in Ges. Naturf. FT. Berl. Mag. v. (1811) 278 = pentagons
**piretla,* Willd. ex Haw. Suppl. PL Suce. 64=pentagona.
tortuosa, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 274 = Haworthia viscosa.
trqnslucent, Willd. 1. c. 168 = Haworthia translucent
tricolor, Willd. 1. c. 271 = Haworthia venosa.
viscosa, Willd. 1. c. 274 = Haworthia viscosa.

APILIA, Rafin. Alsog. Am. 89 (1838)-Fraadnus, Toum. (Oleac).
«**nniata,* Rafin. 1. c. = F. excelsior, var.?
macrophyla, Rafin. 1. c. = F. macrophylla.
Pendula, Rafin. 1. c. = F. excelsior.

AJ>INAGHA, Tul. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. xi. (1849) Hl. PODOSTOMACEAE> *Baiih_ * Hook_ f_* "
BLANDOWIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ui. (1809) 100. t. 4. f. 2, nomen princeps.
MONOSTYLIS, Tul. Podost. Monog. 201 (1852).
^BOLACIS, Wedd. in DC. Prod. xvii. 59 (1873).
vancata, *Tul. & Wedd. ex Tul. I. c.*—Bras,
njeouies, *Tul. I. c.* 98.—Bras,
"ardneriana, *Tul. I.* <-,—Bras,
nembranacea, *Tul. 1. e.* 98.—Bras,
^issn, *Tul. in Arch. Mus. Par.* vi. (1852) 108.—
psyllo par, *Tul. & Wedd. ex Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. HI. xi. (1849} 97.-Bras.
pusilla, *Tul. I.* c. 99—Guiana.
W gea, *Tul. I.* c.-Bras.
Rttdel,,. *Tul. I. c.* 98,-Bras.
"•Ppwides, *Tul. I.* c.-Reg. Colomb.
striata, *Gri Wedd. in DC. Prod.* xvii. 64.—Perav. "*" **
Willdenowii, *Tul. in Arch. Mus. Par.* vi. (1858) 106. —J'eruv.; Chili.

APINELLA, Neck. Elem. i. 191 (1790) = Trinia, Hoffm. (Umbellif.).

APINUS, Neck. Elem. iii. 369 (1790) =PinUB, Toum. (Conif.).

APIOCARPUS, Montrous. in Mim. Acad. Lyon, x. (1860) 190-Akania, Hook. 1 (Sapindac).
Moguini, Montrous. L c. 191.—N. Caled.

APIOPETAIiTTM, Baill. Adansonia, xii. (1878) 133. *ARALIACEAE.*
glabratum, *Baill. I. c.* 184.—N. Caled.
velutinum, *Baill. I. c.—N.* Caled.

APIO8, Moench, Meth. 165 (1794). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 532.
BRADLEA, Adans. Fam. ii. 324 (1763).
CYRTOTROPIS, Wall. PI. As. Rar. i. 49. t. 62 (1830).
americana, *Medic, in Varies. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 355.—Am. bor.
camea, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 188.—Reg. Himal.
chinensis, Spreng. Syst. iii. 810 = Wisteria chinensis.
Fortunei, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. (1873) P96.—China; Japon.
frutescens, Pursh, FI. Am. Sept. ii. 474 = Wisteria frutescens.
tubeiosa, *Moench, Meth.* 165.—Am. bor.

APIOSPERMUM, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1853) 351, 352 = PiBtia, Linn. (Aroid.).
obcordatum, Klotzsch, 1. c. = P. Stratiotes.

APIROPHORUM, Neck. Elem. ii. 72 (1790)=Pyrus, Toum. (Rosac).

APISTA, Blume, Bijdr. 296 (1825) = FodochUus, Blume (Orchid.).
tenuis, Blume, 1. c =P. tennis.

APIUM, [Toum.] linn. Syst ed. I. (1785). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 888.
CELERI, Adans. Fam. ii. 498 (1763).
CICLOSPERMUM, Lag. Amen. Acad. Madr. it 101 (1811).
CRITAMUS, Hoffm. Gen. Umb. 182 (1814).
CYCLOSPERMUM, DC. Prod. iv. 105, in syn. (1830).
HELODIUH, Dum. Fl. Belg. 77 (1827).
HELOSCIA, Dum. Anal. Fam. 34 (182!t).
HELOSCIADIUM, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (1825) 125.
LEPTOCAULIS, Nutt ex DC. Prod. iv. 107 (1830).
MAUCHARTIA, Neck. Elem. i. 172 (1790).
SELINON, Adans. Fam. ii. p. ' (23)' 603 (1768).
SIUMIS, Rafin. New KL Am. iv. 31 (188B).
SPERMOLEPIS, Rafin; Neogenyt. 2 (1825).
Ammi, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fast iii. 109; ed. II. 217 = Ammi majus.
Ammi, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 341.—Bras.
Amomum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 156 = Sison Amomum.
Anisum, Crantz, Cl. Umb. Emend. 101=Pimpinella Anisum.
australe, Thou. Fl. Trist d'Acugn. 43=prostratum.
bipinnatum,Viz\t. Fl. Carol. llo^Selinumcanadense.
biternatum, Stokes, Bot. Mat Med. ii. 150 = Aegopodium Podagraria.
Carsonii, *Benth. & Hook.f. Gen.* i. 888.—Am. bor.
Corn, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc iii. 110; ed. II. 218=CarumCarvi.
Celleri, Gaertn. Fruct. i. t. 22=graveolens.
chilense, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 358.-Chili.
Commersoni, *DC. Prod.* iv. 101.—Hab. ?
crassipes, *Reichb.f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 9.—Hispan.
crispum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = Carom Petroselinum.
decumbens, Eckl. & Zeyh. Enum. 340 = graveolens.
divaricatum,*Benth. & Hook.f. ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot.* 412.—Am. bor.
dulce, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 5 - graveoleus.
echinatum, *Benth. & Hook. f. ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot.* 412.—Am. bor.
filiforme. Hook. Ic. t. S19 = prostratum.
nexuosum,^Ai7.inZ:i»na«i,xxxiii.(,18(>4-65)91.—Chili.
fractophyllum,#orn«n. *Hort.Hafn Suppl.* 128.—Hab. 1
glaucescens./T. *B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 17.—Reg. Colomb.
glaucum, Crantz, Cl. Umb. Emend. lOO^TrinU vulgaris.
gracile, *Benth. & Hook.f. Gen.* i. 888.—Chili.

APIDK:—
graveolens, Cham, in Linnaea, i. (1826) 388 = prostratum.
graveolens, *Linn. Sp. PI.* 264.—Europ.; Oriens; Ind. bor. occ.; Calif.
humile, *Benth. & Hook.f. Gen.* i. 888.—Afr. austr.
inundatum, *Rrichb.f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 9.—Europ.
involucratum, Roxb. ex Flem. in As. Ke>. xi. (181U, 157 =Carum Roxburghianum.
junceum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 155=Carum segetum.
laetum, Salisb. Prod. 169 =Carum Pcrroselinum.
latifolium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3=Carum Petroselinum.
latifolium, Poir. Encyc. iv. 369—Carum peregrinum.
leptophyllum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 372. —Austral.
lineare. *Benth. & Hook.f. Gen.* i. 888.—Am. bor.
lobatum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 41= graveolens.
lusitanicum, Mill. Gard. Dict.ed. VIII. n. 7 ^graveolens.
maritimum, Salisb. Prod. 169 = graveolens.
montanum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 17.—Reg. Colomb.
nodiflorum, *Reichb.f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 10.—Europ.
patens, 5. *Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot.* 413 —Am. bor.
peregrinum, Crantz, Cl. Umb. Emend. 101-Carum peregrinum.
petraeum, Crantz, L c 104 = Ammi majus.
Petroselinum, Cham, in Linnaea, i. (1826) 389=prostratum.
Petroselinum, Linn. Sp. PI. ed. I. 264 = Carum Petroselinum.
Popei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (18C8) 843.—Am. bor.
prostratum, *Labill. Relat.* i. 141; *Vent. Jard. Malm.* 81.—Austral.; Reg. Antarct.
pumilum, Crantz, Stirp. Austr. ed. 1. fasc. iii. 103 ; ed. II. 213 =Trinia vulgaris.
ranunculifolium, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 18. t. 421.—Reg. Colomb.
rapaceum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = graveolens.
repens, *Reichb.f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 10.—Europ.
romanum, Zuccagni, in Roem. Collect. 135=- Carum Petroselinum.
segetum, Dum. Fl. Belg. 71 —Carum segetum.
Simm, Crantz, Stirp. Au»tr. ed. I. fasc iii. lOti; cd. II. 215 = Sium erectum.
ternatum, Pall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 112 = Archangelica Gmelini.
ternatum, Schlecht ex Roem. & Schult. Syst. vi. 431 = Ligusticum scoticum.
ternatum, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 4(i = ligusticum acutilobum.
trifoliatum, Wight & Am. Prod. i. 368, sphalm:- Pimpinella Heyneana.
tuberosum, Steud. Nom. ed. I. 551 = Carum Petroselinum
Visnaga, Crantz Cl. Umb. Emend. 104 -- Ammi Visnaya.
vulgare, Lam. Fl. Fr. iii. 444=Carum Petroselinum.

APLACTIS, Rafin. FL Tellur. ii. 42 (1836) ^ Solidago. Toum. (Compos.).
paniculata, Rafin. 1. c.=S. paucifloscnlosa.

APLARINA, Kafin. New H. Am. iv. 9U (1836) ^ Euphorbia, Toum.
microphyla, Rafin. 1. c. 100 = ¥.. thymifolia.
prostrata, Rafin. 1. c. 99 = E. proatrata.

APLECTRA, Rafin. Cat. 13 '1824) = Aplectrum, Xutt. (Orchid.).
elatior, Rafin. 1. c. = Aplectrum hyemale.

APLECTROCAI'NOS, Boiss. *Sc* Reut. Diagn. Ser. I. v. 79 (1844)=SarcocapnoB, DC. (Papav.).
boetica, Boiss. & Rc-ut 1. c. = S. baetica.
integrifolia, Bois<. Diagn. Ser. II. i. 13 =S. baetica.

APLECTSTTM. Torr. Comp. Fl. St. 322 (1826). *ORCHIDEAE,* Henth. & Hook. f. iii. 497.
APLECTKA, Rafin. Cat. 13 (1824).
hyemale, *Torr. 1. c.*—Am. bor.

APLECTRUM, Blume, in Flora, xiv. (1831) 502 = Anplectrum, A. Gray (Melast).
confine, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 38=Anpl. confine.
myrtiforme, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (18511 805 - Medinilla myrtiformis.
nodosum, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 37-Anpl. nodosum.

APLECTRUM :—
ovalifolium, Naud. ex A. Gray, Bot. U. St Expl. Exp. L 597 =Allomorpha ovalifolia.
pollens, Blume, Mug. Bot. Lngd. Bat. i S8 = Anplectrum pallens.
rostratum, Blume, in Flora, xiv. (1881) 502=Anpl. rostratum.
stipulate, Blume, 1. c 603=An pi. stipulare.
viminale, Blume, 1. c 602=Anpl. viminale.

APLEURA, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 89. *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 875.
nucamentacea, *Phil. I. c.* 90.—Chili

APLEXIA, Rafin. Neogenyt 4 (1826)=Leersia, Sw. (Gram.).
virgata, Rafin. in Ser. Bull. Bot. 220 = L. virginica.
virginica, Rafin. Neogenyt. 4 = L. virginica.

APLILIA,Rafin. New FL Am.iii. 98 (1836)=Fraxinus, Toura. (Oleac).
laciniata, Rafin. 1. c. = F. excelsior.
macrophyla, Rafin. 1. c. = F. excelsior.

APLINA, Rafife. Fl. Tellur. iv. 119 (1836)=Staehelina, Linn. (Compos.).
fuscata, Rafin. 1. c.=S. unifloscula.

APLOCA, Neck. Elem. i. 255 (1790)=Periploea, Toum. (Asclep.).

APLOCARYA, Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 46-Dolia, Lindl. (Convolv.).
divaricata, Lindl. 1. c—Chili.

APLOCHLAMIS, Steud. Nom. ed. II. i. 309, in syn. (1840) sphalm.-APALOCHLAMYS, Cass. = Cas-Binia, R. Br. (Compos.).

APLOLEIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 17 (1836) = Trade-Beantia, Linn. (Commelin.).
diffusa, Rafin. 1. c—Hab. ?

APIiOLOPHIUM, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 556. *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1038. HAPLOLOPHIUM, Endl. Gen. 712 (1839).
Blanchetii, *DC. Prod.* ix. 192.—Bras,
bracteatum, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 556.—Bras.
Lundii, *DC. Prod.* ix. 192.—Bras.

APIiOPAPPUS, Cass. in Diet. Sc. Nat lvi. 168 (1828).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 253.
ACAMFHOPAPFUS, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 684.
CHROILEMA, Bemh. Del. Sem. Hort. Erf. (1840).
CROILEMA, Heynh. Nom. ii. 171 (1846).
CROPTILON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 47 (1836).
ERIOCARPUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 320.
HAPLOPAPFUS, Endl. Gen. 385 (1838).
HOMOPAPPUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 330.
HOOREBEKIA, Comeliss. in Mussch. Hort Gand. 120 (1817), nomen princepg.
ISOPAPPUS, Torr. & Gray, Fl.N. Am.ii. 239(1841).
PRIONOPSIS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 329.
PYRROCOMA, Hook. Fl. Bor. Am. i. 306.1.107 (1833).
SIDERANTHUS, Fras. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 227 (1826).
STENOTUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 334.
acaiilis,/I. *Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 353.—Calif,
acerosus, *Bert, ex Phil, in Linnaea,* xxvili. (1856) 724.—Chili.
acuminates, DC. Prod. v. 348 = Lencopsis sericeus.
alpigenus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 241=Aster pulchellus.
alternifolius, Steud. Nom. ed. II. i 87, sphalm.= chrysanthemifolius.
anthylloides, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) £61.—Chili,
apargioides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 854.—Calif,
araucanus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 491.—Chill
arbutoides, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 53.—Chili,
arenanus, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 24 (Asteris sp. 1).—Cali£
argenteus, *Steud. Nom.* ed. II. i. 112.—Chili.

APIiOPAPPUS :—
armerioides, *A. Gray, Color. Exp. Surv. Bot.* (1860) 16.-N.Mexic.
aureus, *A. Gray, PL Fendl.* 76.—Texas.
baccharoides, Benth. Bot. Voy. Sulph. 24=Solidago occidentalis.
Baylahuen, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 42.—Chili.
bellidioides, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 112 = Erigeron pappochroma.
Berberidis, *A. Gray, Syn. Fl. N.Anu* i. II. 126.—Calif.
Berterii, *DC. Prod.* v. 848.—Chili.
blephariphyllus, A. Gray, PI. Wright, i. 97 = Aster gymnocephalus.
Bloomeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1865) 541.—Am. bor.
Brandegei, *A. Gray, Syn. Fl.N. Am.* i II. 182.—Am. bor.
bustillosianus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 49.—Chili,
caespitosa, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 880.—Chili,
calendulaceus, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 179.—Reg. Argent.
canescens, DC. Prod. v. 349=Chrysopsis villosa.
carthamoides, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* (1863) 65.—Am. bor.
cervinus, *Rothrock, in Wheeler, Gtogr. Surv.* 40. t 6.—Am. bor.
cervinus, S. Wats, in Am. Natural, vii. (1878) 301 = ntuius.
Chamissonis, *DC. Prod.* v. 847.—Chili,
chrysanthemifolius, *DC. I. c.* 348.—Chili,
ciliatus, *DC. I. c.* 346.—Am. bor.
coronopifolius, *DC. 1. c.* 347.—Chili.
Coulteri, Harv. & Gray, ex A. Gray, PI. Fendl. 75 = spinulosus.
croceus, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* '1863' (1864) 66.—Am. bor.
cuneatus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873)635.—Calif,
cuneifolius, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1B41) 830.—Chili.
decurrens, *Remy, iH C. Gay, Fl. Chil.* iv. 68.—Chili,
densifolius, *Remy, 1. c.* 63.—Chili.
diffusus, DC. Prod. v. 349 = Leucopsis diffusa.
Diplopappus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 53.—Chili.
discoideus, DC. Prod. v. 850 = Bigelovia veneta.
divaricatus, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 99.—Am. bor.
Doellianus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 489.—Chili.
ericoides, *DC. Prod.* v. 347.—Calif.
filifolius, DC. Prod. vii. 280=Erigeron filifolius)
florifer, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 361=Townsendia florifera.
foliosus, *DC. Prod.* v. 846.—Chili.
Fremonti, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* (1868) 65.—Am. bor.
glabratus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 727.—Chili.
glutinosus, Cass. ex DC.Prod. v.847 ••coronopifolius, pulchellus.
glutinosus, *DC. Prod.* v. 347.—Chili,
gracilis, *A. Gray, PI. Fendl.* 76.—Texas.
gramineus, Benth. PI. Hartw. 65 (err. typ. 61) = Chrysopsis graminifolia.
Greenei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi (1881) 80.—Am. bor.
grindelioides, *DC. Prod.* v. 848.—Chili.
Gunnii, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi (1847) lll.=Erigeron pappochroma.
gymnocephalus, DC. Prod. v. 846 — Aster gymnocephalus.
Haenkei, DC. 1. c 349=Corethrogyne filaginifolia.
Hallii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 389.—Oregon.
hirtellus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 726.—Chili
hirtus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 127.—Am. bor.
hispidulus, *DC. Prod.* v. 348.—Chili.
Hookerianus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 131.—Texas.
Hookerianus, *DC. Prod.* vii. 279.—Chili
hookerianus, A. Gray, PI. Lindh. i. 40=divaricatus.
Hoorebekia, *DC. Prod.* v. 346.—Chili.
Howellii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 446.—Oregon.
hypoleucus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1861) i. 177 = Bigelovia hypoleuca.
ilicifolius, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 65.—Chili.
illinitus/PAJ/. *in Linnaea,* xxviii. (1856) 727.—Chili,
integrifolius, *T. C. Porter, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 79.—Am. bor.

APIiOPAPPUS:-
inuloides, Torr. & Gray, FL N. Am. ii.241«uniflorus.
junceus, Greene, in Bull. Acad. Calif, i. (1884) 190 = spinulosus.
lanatus, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 216.—Ins. Galapag.
lanceolatus, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 241.—Calif,
lanuginosus, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* ii. 347-—Am. bor.
laricifolius, *A. Gray, PI. Wright,* it. 80.—N. Mexic.
Lastarrianus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 45.—Chili
linearifolius, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. • 1861' (1862) 457=Baccharis texana 9.
linearifolius, *DC. Prod.* v. 847.—Calif.
Lyallii, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* '1863' (1864) 64.—Am. bor.
Macraeanus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 122.—Chili.
macrocephalus, *DC. Prod.* v. 348.—Chili.
Macronema, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 542.—Am. bor.
marginalia, PAi/. *in Linnaea,* xxxiii (1864-65) 189.—Chili.
marginatus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 149.—Cuba,
medicinalis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 729.—Chili.
Afenaiesii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii 241=Bigelovia Menziesii
Meyenii, *Walp. in Nov. Act. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 261.—Chili.
mollis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 80 = Greenei.
monactis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 1.—Calif.
mucronatus,/fo<)*. *& Am. Bot. Beech. Voy.* 147.—Chili
multicaulis, *A. Gray, in Am. Natural,* viii (1874) 213.—Am. bor.
nanus, *Eaton, in Bot. King, Exped.* 159.—Am. bor.
nevadensis, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.m.* (1863) !).—Calif.
Nuttallii, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 242.—Am. bor.
ochagavianus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 725.—Chili.
Orcuttii, *A. Gray,inProc. Am. Acad.*xx. (1885) 297.—Am. bor.
Palmeri, *A. Gray, I. c.* xi. (1878) 74.—Calif.
paniculatus, A. Gray, 1. c. vii. (1868) 854 = racemosus.
paniculatus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 490.—Chili.
pappochroma, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot vi. (1847) lll = Erigeron pappochroma.
Parryi, *A. Gray, in Am. -Journ. Sc.* Ser. II. xxxiii. (1862) 239.—Am. bor.
parvifolius, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 122.-Chili.
patagonicus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 726.—Chili,
paucidentatus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 492,-ChiU.
pectinatus, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 140.—Chili,
pedunculosus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 51.—Chili.
phyllocephalus, DC. Prod. v. 847•nibiginosus.
pinifolius, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1878) 686.-Calif.
pinnatifidus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 330.—Am. bor.
Poeppigianus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1862) 121.—Chili.
polyphyllus, *Phil, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 192.—Chili.
pnmelloides, *DC. Prod.* v. 846.—Chili,
pulchellus, *DC. 1. c.* 347.—Chili,
pygmaeus, *A. Gray, in Am. Joum. Sc.* Ser. II. xxxiii. (1862) 239.—Am. bor.
racemosus, *Torr. in Sitgreave, Rep.* 162.—Am. bor.
radicans, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 46.—Chili.
ramulosus, DC. l'rod. v. 350 » Baccharis ramulosa.
reflexus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 728.—Chili
Remyanus, *Wedd. Chlor. And.* i. 210.—Chili.
Rengifoanus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 43.—Chill.
resinosus, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. it. 848-nanus.
reticulatus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 726.—Chili

APLOPAFFTJS :—
rigidus, *Phil. Fl. Atac.* 80.—Chili.
rubiginosus, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 240.—Am. bor.
scaposus, DC. Prod. v. 850 = Leucopsis scaposa.
scaposus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 50.—Chili,
scrobiculatus, *DC. Prod.* v. 348.—Chili,
sericeus, *DC. I. c.* 849.—Chili
sericeus, Phil, in Linnaea, xxviii. (1866) 724«=Poeppigianua.
sphaerocephala, *Harv. & Gray, ex A. Gray, PI. Fendl.* 76.—Calif,
spinulosns, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 490.—Chili.
spinnlosns, *DC. Prod.* v. 847.—Am. bor.
squarrosus, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 146.—Calif.
stellatus, Hook. f. in Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 112 — Erigeron pappochroma.
stelliger, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 52.—Chili,
stenophyllus, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* ii. 347. Calif.
stoloniferus, *DC. Prod.* v. 849.—Mcxic.
suffruticosus, Eaton, in Bot. King, Exped. 159=Watsoni.
suffruticosns, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1866) 642—Calif.
tasmanicus, Hook. f. in Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 110 = Erigeron pappochroma.
tenuieaulis, Eaton, in Bot. King, Exped. 160= lanceolatus.
tortifolius, Torr. & Gray, in BosL Journ. Nat Hist. v. (1845) 109-Aster tortifolius.
nndnatus,/>A»7. *in Linnaea*, xxviii. (1856) 728.—Chili,
uniflorus, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 241.—Am. bor.
velutinus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 57.—Chili,
•nllosus, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1856) 725.—Chili.
Jjrgatus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 491.—Chili.
Watsoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 79. ,_.—Am. bor.
Whitneyi, *A. Gray, I. e.* vii. (1868) 853.—Calif.

APLOPHYLLUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiii. 472 (1824)-Mutisia, Linn. (Compos.).
decurrens, Cass. 1. c. = M. decurrens.
thcifolium, Cass. 1. c.-M. ilicifolia.
bnearifolium, Cass. 1. c = M. linearifolia.

APLOPHYLLUM, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1826) 464=Ruta, Linn.
otuti/olium, G. Don, Gen. Syst. i. 780 = R. acntifolia.
"raiicum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 127-R. tuberculata.
'rbusculum, Franch. in Revoil, Comali, 23.—Afr. trop.
armenum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. HI. xi: (1849) 179 = R.Suaveolens?
Besseri, Spach, 1. c. = R. Besseri.
Biebersteinii, Spach, 1. c. 178 = R. Bnxbanmii.
Blanchei, Boiss. Fl. Orient, i. 937.—Oriens.
Botsserianum, Viv. & Pang, in Mem. 1st Venet. xv. (1870)14 = R.patavina.
Vourgaei, Boiss. Fl. Orient, i. 928.—Armenia.
Broussonetianum, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 244 j xxii. (1875) 56, nomen.—Afr. bor.
Buhsei, Boiss. Fl. Orient, i. 926.—Persia.
Bungei, Trautv. in Act Hort.Petrop. viii. (1883) 183. —Turkestan.
Buxbaumii, G. Don, Gen. Syst. i. 780 = R. Buxbanmii.
Buxbaumii, Schur, Ennm. PL Transs. 140 = R. suaveolens.
fnaliculatum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 128.—Persia.
Candolleanum, Spach, ex Jaub. & Spach, Illustr. PI. Or. t. 270-R. gfebra.
Ppadocicum, Spach, ex Janb. & Spach, 1. c. t. 263.—Cappadoc.
*Chesney*anum, Boiss. Fl. Orient, i. 941.—Mesopot.
citatum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 180 = R. suaveolens.
dlicicum, Boiss. Fl. Orient, i. 927.—Cilieia.
ngestum, Janb. *Sc* Spach, Illustr. PI. Or. iii. 77-R. suaveolens.
nsanguineum, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, i. 941.—Persia.
rdatum, G. Don, Gen. Syst. i. 780 = R. cordata.
"oronatum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 129=R. patavina.
'orymbuiosum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 116=R. Buxbaumii.

APLOPHYLLUM:—
crenulatum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 117.—Beluchist.
dahuricum, Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 464-Ruta dahurica.
damtricum, Ledeb. Fl. Ross. i. 492 = praec.
dichotomum, G. Don, Gen. Syst. ij»780=R. dichotoma.
dichotomum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 131 = R. Buxbaumii.
datum, Fisch. & Mey.exKar. in Bull. Soc Nat.Mosc. (1839) 149.—Turcomania.
erythraeum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 114.—Afghan.
filifolium, Spach, ex Jaub. *8c* Spach, Illustr. PI. Or. t. 265.—Persia.
flexuosum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 118.—Afghan.
fruticulosum, G. Don, Gen. Syst. i. 780=R. fruticulosa.
furfuraceum, Bunge, in Boiss. Fl. Orient, i. 934.—Persia.
glaberrimum, Bunge, 1. c. 930.—Persia.
glabrum, G. Don, Gen. Syst. i. 780=R. glabra.
Griffithianum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 115.—Afghan.
halepense, Spach, in Janb. & Spach, Illustr. PI. Or. t. 266=R. Buxbaumii.
hirsutum, Regel & Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch. 17.—As. temp. or.
hispanicum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 176-R.linifolia.
hispidulum, Bunge, in Boiss. Fl. Orient, i. 933.—Persia.
Kotschyi, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xi. (1849) 186.—Persia.
Kowalenskyi, Stschlg. in Bull. Soc. Nat. Mosc. ixiv. (1851) H. 467.—Reg. Caucas.
lasianthum, Bunge, in Schrift. Natnrf. Ver. Riga, i. (1847) 206; et PI. Lehm. 239.—Turkest.
latifolium, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 398.—As. cent.
lineare, G. Don, Gen. Syst. i. 780=R. linearis.
linifolium, G. Don, 1. c. = R. linifolia.
linifolium, Reichb. ex Nym. Consp. 142 = R. patavina.
linifolium, Schur, Enum. PI. Transs. 140 = R. suaveolens.
longifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 127.—Palaestin.
mesopotamicum, Boiss. 1. c. Ser. II. i. 116=R. Buxbaumii.
myrtifolium, Boiss. 1. c. Ser. I. i. 63.—As. Min.
obtusifolium, Ledeb. Fl. Ross. i. 490 = R. obtusifolia.
patavinum, G. Don, Gen. Syst. i. 780 = R. patavina.
pedicellatum, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, i. 925.—Persia.
perforatum, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1841) 397 =R. acutifolia.
pilosum, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 248, t. 13.—Turkest.
pilosum, Sczegl. ex Tuns, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 273.—Persia.
propinquum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 189.—Mesopot.
ptilostylum, Spach, ex Jaub. *Sc* Spach, Illustr. PI. Or. t. 267.—Persia.
pubescens, Boiss. Voy. Bot. Espagne, i. 871 = R. linifolia.
pubescens, G. Don, Gen. Syst. i. 780 = R. pubescens.
pumilum, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 62.—As. Min.
Reuteri, Boiss. 1. c. I. v. 87.—Caria.
robustum, Bunge, in Schrift. Naturf. Ver. Riga, i. (1847) 208, etPl. Lehm. 249.-Persia.
rosmarinifolium, G. Don, Gen. Syst. i. 781 = R. rosmarinifolia.
Sieversii, Fisch. in Schrenk, Enum. PI. Nov. 89-R. acutifolia.
spathulotum, Reichb. ex Nym. Consp. 143=R. Buxbaumii.
Stocksianum, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 117.—Beluchist.
suaveolens, G. Don, Gen. Syst. i. 780 = R. suaveolens.
suaveolens, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 126 -R. Buxbaumii.
subcordatum, Bunge, in Boiss. Fl. Orient, i 932. -Persia.
sulphureum, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 87.—As. Min.
syhaticum, Boiss. 1. c viii. 126.—Syria.
iauricum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. IIL xi. (1849) 178-R. taurica.
Tchihatcheri, Boiss. Diagn. Ser. II. vi *i\=sulphureum.*
Ulephioides, Boiss. Fl. Orient, i. 929.—Cappadoc.
tenue, Boiss. 1. c. 932.—Armenia.
thesioides, G. Don, Gen. Syst. i. 780=R. thesioides.

APLOPHYLLUM :—
trichostylum, Bunge, in Boiss. Fl. Orient, i. 941.—Persia.
tuberculatum, *Juss.* in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 528. t. 17 = R. tuberculata.
•versicolor, Fisch. *Sc* Mey. in Bull. Phys. Math. Akad. Pétersb. iii. (1845) 807 = *lasianthum.*
villosulum, Boiss. *Sc* Haussk. in Boiss. Fl. Orient, i. 936. —Syria.
villosum, G. Don, Gen. Syst. i. 780 = R. villosa.
mrgatum, Spach, ex Jaub. *Sc* Spach, Illustr. PI. Or. t. 267.—Persia.
vulcanicum, Boiss. *8c* Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 126.—Lycaonia.

APLOSTELLIS, Thou. Orch. lies Afr. t. 24 (1822) = Fogonla, Juss. (Orchid.).
ambigua, A. Rich, in Mém. Soc. Hist Nat Par. iv. (1828) 36 = P. Thouarsii.
simplex, Thou. Orch. Isles Afr. t. 24=P. Thouarsii.
truncata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 111.—Ins. Mascar. *1*

APLOSTEMON, Rafin. in Journ. Phys. Ixxxix. (181'J) 105 = Scirpus, Linn. etc. (Cyper.).
atropurpureum, Rafin. 1. c. = Eleocharis atropurpurea.
bracteatum, Rafin. 1. c. =S. bracteatus.
compressum, Rafin. L c. = S. Caricis.
polytrichoid.es, Rafin. 1. c. = Fimbristylis polytrichoides.
triquetrum, Rafin. 1. c.» Fimbristylis argentea.

APLOSTYLIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 91 (1836) = CUBcuta, Linn. (Convolv.).
lupuliformis, Rafin. 1. c. = C. lupuliformis.

APLOTAX1S, DC. in Guill. Archiv. Bot. ii. (1833) 330 = 8ausBurea, DC. (Compos.).
albescens, DC. Prod. vi. 540 - S. albescens.
andryaloides, DC. 1. c. 542 = S. sorocephala.
auriculata, DC. 1. c. 541=S. hypoleuca.
australasica, F. Muell. Fragm. i. 36=S. affinis.
Bungei, DC. Prod. vi. 639=S. affinis.
Bungei, Less, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 758=Leuzea salina.
caespitosa, DC. Prod. vi. 589=S. taraxadfolia.
candicans, DC. 1. c. 540=S. candicans.
Candolleana, DC. 1. c. 541 =S. Candolleana.
carthamoides, Ham. in DC. 1. c. 640=S. affinis.
cirsoides, DC. 1. c.=Cnicus arvensis.
deltoidea, DC. 1. c. 541-S. deltoidea.
denticulata, DC. 1. c. 539 =S. denticulata.
discolor, DC. 1. c. 541=S. piptathera.
fastuosa, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 97.1.105 = S. denticulata.
foliosa, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 77 = S. foliosa.
Frolovii, DC. Prod. vi. 638 = S. Frolovii.
gnaphalodes, Royle, Illustr. Bot. Himal. 251. t 59. f. 1-S. sorocephala,
gossypina, DC. Prod. vi. 541=S. gossypiphora.
involucrata, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 389.—As. temp.
Jacea, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 79. t. 79=S. Jacea.
Lappa, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 96. t. 104 - S. Lappa.
leontodontoid.es, DC. Coll. Mem. ix. 29.1.10 (Prod. vi. 589) =S. Kunthiana.
multicaulis, DC. in Deless. Ic. Sel. iv. t. 68 = S. affinis.
nepalensis, DC. 1. c. t. 67=S. Eriostemon.
nivea, DC. Prod. vi. 541 =S. deltoidea.
obvallata, DC. in Deless. 1c. Sel. iv. t. 69 =S. obvallata.
pungens, DC. Prod. vi. 539=Cnicus arvensis.
Roylei, DC. Prod. vi. 588=S. Roylei.
scaposa, Edgew. in Tuns. Linn. Soc xx. (1846) 76 =S. candicans.
Simpsoniana, Field. & Gardn. Sert. PI. t. 26 - S. andryaloides.
sorocephala, Schrenk, Enum. PI. Nov. (1841) 43 = S. sorocephala.
taraxadfolia, DC. Prod. vi. 532=S. taraxacifolia.
uniflora, DC. 1. c. 639=S. uniflora.

APLOTHECA, Mart, ex Cham, in Linnaea, v. (1830) 91 =Froelichia, Moench. (Amarant).
interrupta, Mart, ex Chun. 1. c. = F. interrupta.

APLUDA, Linn. Sp. PI. ed. I. 82 (1753). *GRAMI.VEAE*, Uenth. & Hook. f. iii. 1137.
C\LAMINA, Ueauv. Agrost. 128. t. 28. f. 1 (1812).
DiECioMis, lteauv. 1. c. 132. t. 28. f. 5 (1812).
nristata, Linn. Cent. ii. 7; Sp. PL ed. II. 1487 = mutica.
ciliata, *Anrlerss. in Oefver. Vet. Acad. Stockh.* (1865) 177.—Ind. or.
communis, Nees *Si* Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. ^1843• 194-^ mutica.
Cnmingii. Buese, ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Reinw.]('5 ^mit ca.
digit at a, Linn. f. Siippl. 434 = Polytoca braclcata.
tiistaehya, Beauv. Agrost. 133, 151 = Andropogon distachyus.
genii·itlata, Koxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 327 = mutica.
gigantea, Sprcng. Syst. i. 290 --mutica.
glauca, Schreb. Gracs. ii. 99 = mulica.
Gryllus, Beauv. Agrost. 133 - mutica.
Cryllns, Presl, C'yp. & Gram. Sic. 55 — Chrysopogon Gryllus.
liumilis, Kunth, Enum. PI. i. 517 = mutica.
imberbis, Steuil. Nom. ed. II. i. 251, sphalm. = Anthistiiia imberbis.
inermis, Regcl, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 658 = mutica.
Kabila, Uuch.-IIam. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Snppl. i. ′1843) Ifl4=mutica.
microstachva, N'ees, 1. c. 103-mulica.
mucroiialu, Steud. Syn. l'l. Gram. 404—mutica.
mutica, *Linn. Sp. PL* 82.—As. trop.; Polyncs.; Austral.
pedicellate, Huese, ex De Vriese, PI. Iml. Bat. Reinw. 105 -mulicn.
rostratu, Am. & Xees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) I'>4 = mutica.
scabra, Auderu. in Uefver. Vet. Acad. Stockh. (1855) 17» = mutica.
scirpuides, Walt. Fl. Carol. 250 (pi. duhia).—Carolina.
villosa, Schreb. firaes. ii. !)2 = mutica.
Zeugites., Linn. S\st. ed. X. 1806; PI. Jam. Pugill. 30 - Zeugitcs americana.
Zcygites, Aubl. PI. Gui. ii. 933=Ichnanthus pallens.

APOBALLIS, Schott. in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 318 = Sehismatoglottis, Zoll. (.Aroid.).
neglect-i, Schott, 1. c. 817 = S. rupestris.

APOCHORIS. Duby, in DC. Prod. viii. 67 (1844). *PRIML'LACEAE*, Benth. *Sc.* Hook. f. ii. 635.
pentapetala. *Duby, I. c.*—China.

APOCOPIS. Xees, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 93. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1128.
AMBLYACIIYRUM, Huchst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 413 (18S5).
Beckettii, Thw. ex Trimen, Cat. PI. Ceylon, 107 = Wiijhtii.
Royleana. *Nees, in Proc. Linn. Soc.* i. (1841) 94.—Ind. or.
tridentata. *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (18821 67.—Ind, or.
Wightii. *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 377.—Ind. or.; China.
Wrightii. Munro, in Proc. Am. Acad. iv. (18G4-65) 363 = Wightii.

APOCOI\SIS.Meissn. Gen. 429 (S28)(1843)=Apocopis, Nees (Gram.).

APOCYNUM, [Toura.] Linn. Syst. ed. I. (1785); Gtn. cd.I. 65 (1787 >. *APOCYNACEAE*, Benth. 4 Hook. f. ii. 716.
QI'IRIVELIA, Poir. Encyc. vi. 42 (1804).
Acouci, Aubl. PI. Gui. i. 274 = Forsteronia Acouci.
africanum, *Lour. Fl. Cochinch.i.* 168 (Quid?).—Zanzib.
agglomeiatum, *Poir. Encyc. Suppl. i.* 407.—Ins. S. Doming.
al/rrniflnrum, Lour. Fl. Cochinch.i. 168 = Strophanthus alterniRorus.
androsnemifblium, *Linn. Sp. PI.* 213.—Am. bor.
bursiflorum, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 5.—Malaya,
ca. ien'.e, *Lam. Encyc.* i. 212.—Ins. Canar.
cannabinum, *Linn. Sp. PI.* 213.—Am. bor.
citrifotium, Dcscourt. Fl. Med. Antill. iii. 180.1.191 = Echites citrina.
compressum, Moench, Meth. 464 = venetum.

APOCYNUM:—
cordatum, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 10 = Rhabdadenia cordata.
cordatum, Thunb. Prod. l'l. Cap. 47= Astephanus cordatus.
cordifolium, Tenore, ex .Steud. Nom. ed. II. i. 113-praec. !
cotinifolium, *Lam. Encyc.* i. 215.—Java.
crassifoli urn, Salisb. Prod. 149 = Ichnocarpus frutescens.
cumanense, Willd. ex Koem. & Schult. Syst. vi. 7U6 = Metaplexis limbriatum.
erertum. Veil. H. Klum. 123 ; iii. t. 87 = Barjonia racemosa.
Jiliforme, Thunb. Prod. PI. Cap. 47-Eustegia filiformis.
floristratutn, Xoronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1700) ed. I. Art. IV. S =Strophanthns dichotomus.
foethlum, Buim. I. Fl. Ind. 71- Paederia foetida.
frutescens, Afzcl. Rcmed. Guin. Coll. iv. 28-Ichnocarpns Afrelii.
frutescens. Linn. Sp. PI. 213 = Ichnocarpus frutescens.
hastatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 47 - Eustegia hastata.
Hendcrsouii, *Hook.f. in Hume & Headers. Lahore to Yarkand*, 827.—Tuikest.
hypericifolium, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 804-cannabinum.
indicum, I Jim. Encyc. i. 214 = reticulatum.
Jurentas, Lour. Fl. Cochinch. 167 ~ Tylophora ovata.
lanceolatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 47 - Astephauus lanceolatus.
liueare, Linn. f. Suppl. 169 = Astephanus linearis.
macidatum, Descourt. Fl. Mcd. Antill. iii. 177.1.190 = Echites maculata.
minutum. Linn. f. Suppl. i. 169 = Eustegia hastata.
mucronatum, Blanco, fl. Filip. ed. 1.852 = Toxocarpus gracilis.
muscipulum, Moench, Mcth. 464 = androsaemifolium.
ncrvosum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Vera Crux.
obliquum, Mill. I. c. n. 8 = Echites umbellata.
odoratissimum, *Lour, ex Prite. Ic. Ind.* 83.—Malaya.
orixense, Rottler, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 6 = Cryptolepis ilegans.
paniculatum, Lam. Encyc. i. 214 = Forsteronia Acouci.
pictum, *Schrenk, in Bull. Phys. Math. Acad. Pitersb.* ii. .(1844) 115.—Soongaria.
piscatarium, Dougl. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 439 = cannabinum.
pi a t van t hum, Salzm. ex A. DC. 1. c. 594 = Philibertia cynanchoides.
pubescens, R. Br. in Mem. Wem. Soc. ;. (1809) 68 = cannabinum.
purpureum, *Tausch, in Flora*, xix. (,1836) II. 385.—Am. bor.
rectinerve, Salzm. ex Decne. in DC. Prod. viii. 608 - Blepharodon pallidum.
reticulatum, Herb. Madras, ex Wall. Cat. n. 8247 = Decalepis Hamiltonii.
reticulatum, *Linn. Sp. PI.* 214.—Ind. or.
reticulatum, Lour. Fl.Cochinch. 208 –^Parsonsia Helicandra.
salicifolium. Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 406 = Gomphocarpus fruticosus.
salicifolium, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 7DC.—Ins. S. Doming.
scandens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5=Echites asperuginis.
sibirieum, Jacq. Hort. Vindob. iii. 37 = cannabinum.
sibiricum, Pall, ex Roem. *3c* Schult. Syst. iv. 405« venetum.
soleare, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.v.* (1790) ed. I. Art. iv. 5.—Malaya.
speciosissiminn, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 (— *Haemadictyon suberectum*^.
stellatum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 5.—Malaya,
stylospermum, *Noronha, I. c.*—Malaya.
syriacum, S. G. Gmel. Reisc, ii. 198, 257 •> Calotropis procera.
tiliaefolium. Lam. Encyc. i. 214 = Dregea volubilis.
triflorum, Linn. f. Suppl. 169 = Astephanus triflorus.
umbellatum, Aubl. PI. Gui. i. 275=Thenardia umbellata.
umbellatum. Salzm. ex Decne. in DC. Prod. viii. 585 = Ox,rpetalum densiflomm.
venetum, A. DC. I'rud. viii. 440=cannabinum.
venetum, *Linn. Sp. PI.* 213.—Keg. Mediterr.; Oriens; As. bor.; Ind. or.

APOCYNUM:—
villosum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 11.-Vera Crux.
viminale, Bassi, in Comm. Bonon. (,175s) ex Roem. a-Schult. Syst. vi. 118 = Sarcoslemma viminale.
vincacfolium, *Btirm. f. Fl. Ind.* 71.—Ind. or.
volatile, Veil. Fl. Flum. 128; iii. t. 88=Araujia calycina.

APODANTHERA, Am. in Hook. Joum. Bot. iii. 274 (1841). *CUCURBITACEAE*, Benth. *Si* Hook, f. i. 834.
argentea, *Cogn. in Mém. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878) 42.—Bras,
aspera, *Cogn. I. c.* 43.—Mexic.
biBora, *Cogn. 1. e.*—Ecuador,
liuracavi, *Cogn. 1. c.* 44.—Mexic.
Galeottii, *Cogn. I. c.* 45.—Mexic.
gracilis, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 99 •= Melothria fluminensis.
laciniosa, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* Svo. xxviii. (1878) 12.—Bras.
Mandonii, *Cogn. 1. c.* 41.—Bolivia.
Mathewsi, *Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 274.—Peruv.
mucronata, *Cogn. in MJm. Cour. Acad. Belg.* 8vu. xxviii. (1878) 40.—Peruv.
pedisecta, *Cogn. I. c.* 17.—Bras,
scabra, *Cogn. in Bull. AcaH. Belg.* Sér. II. xlix. (1880 192.—Ecuador,
smilacifolia, *Cogn. in M4m. Cour. Acad. Belg.* S\»-xxviii. (1878) 42.—Bras,
undulata, *A. Gray, PI. Wright*, ii. 60.—X. Mexic.

AP0DANTHF3, Poit. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iii. (1824) 422. t. 26. *CYTINACEAE*, Benth. & Hook, f. iii. 118.
FROSTIA, Bertero, ex Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (18341 19, in nota.
PILOSTYL.ES, Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. 11. ii. (1834) 21. t. 1.
SARNA, Karst. in Nov. Act. Nat. Cur. xxvi. (,1858 < 920. t. 65.
Berterii, *Gardn. in Hook. Ic. PL* t. 655.—Chili.
Blanchetii, *Gardn. I. c.* t. 655 b.—Bras.
Calliandrae, *Gardn. 1. c.* t. 644.—Bras.
Caseariae, *Poit. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. iii. (,18241 422. t. 26.—Am. austr.
Flacourtiae, *Karst. in Linnaea*, xxviii. (1856) 413.—Venezuela.

APODOCEPHALA, Baker, in Joum. Linn. Soc. xxi. (18sõ) 4ir. *COMPOSITAE*.
pauciHora, *Baker, I.* c—Madag.

APODOIiIRION, Baker, in Journ. Bot. xri. (187s) 74. *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 722.
Bolusii, *Baker, I. c.* 75.—Afr. austr.
Buchanani, *Baker, I. c.*—Natal,
lanceolatum, *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 722.—Afr. austr.
Mackenii, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (187V 75.—Natal.

APODOSTACHYS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. .xxi. (1848) I. 557 = EP0illa, A. Juss. (Phytolac).
densiflora, Turcz. 1. c. = E. volubilis.

APODYNOMENE, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 111 (1835) = Tephrosia, Pers. (Legum.).
aemula, E. Mey. 1. c. 113 = T. aemula.
diffusa, E. Mey. 1. c.=T. diftusa.
grandiflora, E. Mey. 1. c. 111=T. grandiliora.
macropoda, E. Mey. 1. c. 112–T. macropoda.
Meyeri, Presl, Bot. Bemerk. 57-T. grandiflora.

APODYTES, E. Mey. ex Bernh. in Linnaea, xii. ;1838> 136; et ex Arn. in Hook Journ. JJot. iii. (.1841) 155. *OLACINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 851.
NOTHAPUDYTES, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.i. *'H** (1850).
RHAPHIOSTYMS, Planch, ex Benth. in Hook. Niger fl. 25!t (1849).
acutifolia, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. *'M* = dimidiata.
andamanica, *Kurt, Andam. Rep.* 33.—Ins. Andam.
Bcddomei, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 588 — Iml. or.
beninensis, *Hook.f. in Hook. Ic. PL* t. 778.—Afr.irop.

APODYTES >—
Benihamiana, *Wight, Ic.* t. 1158.—Ind. or.
brachystylis, *F. Muell. Fragm.* ix. 149.—Austral,
dimidiata, *E. Mey. ex Bernh. in Linnaea,* xii. (lėS8) **136.—Afr. anstr.**
***Gardneriana,* Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. ix. (185:81 889 = Benthamiana.**
grandilolia, *Benth. & Hook.f. Gen.* i. 352.—Madag.
i&anritiana, *Benth. & Hook.f. I.* c—Ins. Mascar.

APOGANDRUM, Neck. Elem. i. 216 (1790) = Erica, Linn.

APOGETON, "Schrad. ex Steud. Nom. ed. II. i. 114 (1840)=Aponogeton, Linn, f. (Naiad.).

APOGON, Ell. Sketch, ii. 267 (1824). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f. ii. 509.
LAXANON, Kafin. New Fl. Am. ii. 16 (1636).
gradlis, *DC. Prod.* vii. 79.-Am. bor.
hamilis, *Ell. Sketch,* ii. 267.—Am. jor.
***humilis,* Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. ▷. vii. (1841) 424 =gracilis.**
***lyratum,* Nun in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 71 = humilis.**
ʷrightii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 411.-Texas.

APOGONIA, Fonrn. Gram. Mex. 63 ex Benth. & Hook. •• Gen. iii. 1130 (1883) - Rottboellia, Linn. (Gramin.).
***glabrata,* Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. °21 = Andropogoii imberbis.**
***ramosa,* Fourn. ex Hcmsl. 1. c = K. aurita.**

Al'OLANESIA, Reichb. Nom. 154 (1841) = Apo-Planeaia, Presl (Legum.).

APOLEPSIS, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 150 (1844) .^Lepidagathis, Willd. (Acanth.).
***aispar,* Hassk. 1. c. = L. repanda.**
***"tpanda,* Neeg, in DC. Prod. xi. 261=L. repanda.**

APOLLINARIS, Linn. Syst. ed. I. (1735) =Nicotlaaa, Lum.!₍ᵢSolan.).

APOLLONIAS, Nees, Laurin. Expos. 10 (1833). *IAVRINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 162.
Arnottii, *Nees, Syst. Laurin.* 670.—Ind. or.
***'arbiisana,* A. Br. in Verh. Befoerd. Gartenb. Preuss. Wi. (1852) lu-canariensis.**
canariensis, *Nees, Syst. Laurin.* 696.—Ind. or.
***eylanica,* Thw. Eiium. PI. Zeyl. 253 = Bdlschmiedia oppositifolia.**

APOMAEA, Neck. Elem. ii. 24 (1790) = Ipomooa, Lmn. (Convolv.).

APOMOEA, Stend. Nom. ed. II. i. 114 (1840) = praec

APONOA, Ra6n. Sylva TeUnr.84 (1838) - Oolmnnea, Ltan. (Gesner.).
***"Pent,* Rafin. 1. c = C. scandens!**

APONOOETON, Linn. £ Suppl. 82 (1781). *NAIA-OACEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 1013.
AMOCETON, Neck. Elem. iii. 267 (1790).
AFOGETON, Schrad. ex Steud. Nom. ed. II. i. 114 (1840).
HYDROGETON, Pers. Syn. i. 400 (1805).
LIMNOGETON, Edgew. in Lindl. Veg. Kingd. 210 (1847).
OOVIRANDRA, Thou, in Roem. Collect. 196 (1809); .. Gen. Nov. Madag. 2 (1810).
O'ATHIUM, Edgew. in Joum. As. Soc. Beng. (1842) 145.
ab Sᵢⁿⁱᶜᵘᵐ, *Hoch*t. ex A. Rich.* ***Tent.*** *Fl. Abyss,* ii. **851—Abyss,**
ingustifolium, *Ait. Hort. Kew.* i. 495.—Afr. anstr.
Be ¹Λ"?*ᵐᵐ¹ᵐ, *Hook*- /• •ʰ ***Bmtk.*** ** Hook./. Gen.* iii. **•W14.—Madag.**
oinifolium, *Lehm. ex Steud. Nom.* ed. 1L i. 114.—Air. austr.
crispum, *Thunb. Nov. Gen.* 73.—Zeylan.
lesertorum, *Zeyh. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 114.-Afr. austr.
***distachys,* Edgew. in Hook. Lond. Journ. Bot. ui. . U844) 402 = disUchyum.**

APOITOOETON:—
distachyum, *Thunb. Nov. Gen.* 74.—Afr. austr.
echinatum, *Roxb. Hort. Beng.* [87]; *et Fl. Ind. ed. Carey,* **ii. 210.—Ind. or.**
elongatum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 188. **—Austral,**
fenestrale, *Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen.* iii. **1014.—Madag.**
Holubii, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1470.—Afr. trop.
junceum, *Lehm. ex Steud. Nom.* cd. II. i. 114.—Afr. austr.
lcptostachyum. *E. Mey. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* **xxix. (1875) 158.—Afr. anstr.**
***lineare,* Vahl, Symli. Bot. iii. 61 = monoslachyon.**
microphyllum, *Roxb. Hort. Beng.* 2d ; *Fl. Ind. ed. Carey,* **ii. 211.—Ind. or.**
***monostachys,* Edgew. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 402 = seq.**
monostachyon, *Linn./. Suppl.* 214.—Ind. or.; China,
natalense, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1471.—Afr. austr.
Rehmanni, *Oliver, I. c.* 1471 B.—Afr. trop.
spathaceum, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 165, *nomen.—Mr.* austr.
quadrangulare, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. **(1881) 279.—Madag.**
ulvacenm, *Baker, 1. c.*—Madag.
***undulatum,* Roxb. Hort. Beng. 26 ; Fl. Ind. ed. Carey, ii. 211 = crispnm.**
vallisnerioides, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* xxix. **(1875) 158.—Afr. trop.**
zosteraefolium. *Schrad. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 114 (an lapsu = Potamogeton zosteraefolius *1* Schum.). —Am. bor.

APOPHRAGMA, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 168 (1839) = Curtia, Cham. & Schlecht (Gentian.).
***tenui/olium,* Griseb. 1. c.—Guiana.**

APOPHYIiLUM, F. Muell. in Hook. Kew Joum. ix. (1857) 306. *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. £ i. 109.
anomalum, *F. Muell. 1. c.* 307.—Austral.

APOPIiANESIA, Presl, Symb. Bot. • i. 63. t 41 (1831L *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 492.
paniculata, *Presl, I. c*—Mexic.

APOPLEUMON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 72 (1836) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
***bignonioides,* Rafin. 1. c. = 1. bignonioides.**

APORANTHUS, Bromf. Fl. Vect. 117 (1856) = Trigonella, Lian. (Legum.).
***Trifoliastrum,* Bromf. 1. c. = T. omithopodioides**

APORETIA, Walp. Ann. U. 217 (1851-52) =seq.

APORETICA, Forst. Char. Gen. 131. t. 66 (1776) = Schmidelia, Linn. (Sapind).
***gemella,* Blanco, Fl. Filip. ed. II. 203-S. Cobbe.**
***gemella,* DC. Prod. i. 610 = S. cochinchinensis.**
***penicillata,* Blanco, Fl. Filip. ed. I. 291 = S. Cobbe.**
***pinnata,* Forst. f. Prod. n. 892 = S. Cobbe.**
***pinnata,* Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 61 = Gnioa lentiscifolia.**
***ternata,* Font. Char. 132 = S. Cobbe.**

APOROCACTUS, Lem. IUustr. Hortic. vii. (1860) Misc. 67 = Cereua, Linn. (Cact.).
***Baumanni,* Lem. 1. c = C. Baumanni.**
***colubrinus,* Lem. 1. c. = C. colubrinns.**
***flagelliformis,* Lem. 1. c. = C. flagellifonnis.**
***flagri/ormis,* Lem. Cact. 68 = C. flagriformis.**

APOROSA, Blurae, Bijdr. 514 (1824). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Be* Hook. f. iii. 282.
LEIOCARPUS, Blume, Bijdr. 581 (1825).
LEPIUOSTACHYS, Wall. Cat. n. 6816 (.1882).
SCEPA, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 441 (1886).
TETRACTINOSTIGMA, Hassk. Hort. Bogor. De^cr. 55 (1855).
acuminata, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 288.—Ind. or.
***affinis,* Baill. Etud. Gen. Euph. 645 = Lindleyana.**
arborea, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. ii. 470.—Java,
arborescens, *Muell. Arg. 1. c.*—Java,
aurita. *Baill. Etud. Gin. Euph.* 645.—Ins. Philipp.
***aurita,* Miq. Fl. Ind. Bat. i. n. 431=microcalyx.**

APOROSA :—
australiana, *F. Muell. Census,* 20.—Austral.
***Cumingiana,* Baill. Etud. Gen. Euph. 645 ^ microcalyx.**
***dioica,* Muell. Arg. iii DC. Prod. xv. II. 472-Roxburghii.**
ficifolia, *Baill. Adansonia,* xi. (1873-7t>. 17 7.—Malaya; Cochinch.
frutescens. *Blume, Bijdr.* 514.—Java.
***frutescens,* Benth. Fl. Hongk. 317 - microcalyx.**
fruticusa, *Mueli. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 475.—Java,
fusiformis, *Thw. Eiium. PI. Zrvl.* 268.—Zeylan.
glalirifolia, *Kurt, in Journ. 'Bot.* xiii. (1875) 330.—Ins. Nicobar.
***lanceolata,* Kurz, For. Fl. Burma, ii. 363 = Planchoniana.**
lanceolata, *Tine. Enum. PI. Zeyl.* -288.—Zeylan.
latifolia, *Thw. I. c*—Zeylan.
***leptostachya,* Benth. i\. Hongk. 317 - microcalyx.**
Lindleyana, *Baill. Etud. Gen. Euph.* 645 (Lyndleyana).—Ind. or.
lunatnm, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. C1873) **II. 239.—Malaya,**
macrophylla, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 470.—Burma,
microcalyx, *Hassk. in Bull. Soc. Bot. France,* vi. ^185!') **714.—China ; Austral.; Malaya,**
microstachya, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 474.—Burma.
Miqucliana, *Muell. Arg. 1. c.*—Sumatra,
oblonga, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 78.—Burma.
Planchoniana, *Baill. Etud. Gen. Euph.* 645.—Burma,
quadrilocularis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 476. —Sumatra.
Roxburghii, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 845.—Ind. or.
***sphaerocarpa,* Muell. Arg. in Flora, xlvii. (U64) 61'.) = Lindleyana.**
tetrapleura, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 260.—Cambodia.
***Thwaitesi,* Baill. Etud. Gen. Euph. 645 = fusiformis.**
***Tulasneana,* Baill. 1. c. = microstachya.**
villosa, *Baill. 1. c.*—Burma; Cochinch.
villosula, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) **II. 239.—Burma.**

APORRHIZA, Radlk. in Sitzb. Math. Phys. Acad. Mucnch. vüi. (1878) 338. *SAPINDACEAE.*
panicnlata, *Radlk. I. c.* 339.—Afr. trop.

APORUM, Blume, Bijdr. 334. t. 39 (1825)=Dendrobium, Sw. (Orchid.).
***acinaciforme.* Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (18*6) 870 = D. acinaciforme.**
***anceps,* lindl. in Wall. Cat. n. 2020 = P. Nathanielis.**
***anceps,* Lindl. Gen. et Sp. Orch. 71 — D. anceps.**
***concinnum,* Lindl. ex Reichb. f, in Tran>. Linn. Soc. xxx. (1874) 149 = D. atropurpureum.**
***cuspidatum,* Wall, ex Lindl. in Bot. Reg. (1841) Misc. 2 = D. Nathanielis.**
***incrassatum,* Blume, Bijdr. 331 = D. incrassatum.**
***incrassatum,* Brongn. ex Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (185!*) 60 = Epidendrum aporoides >.**
***indivisum,* Blume, Bijdr. 334. t. 39 = D. indivisum.**
***indivisum,* lindl. Gen. et Sp. Orch. 70 - D. Leonis.**
***Jeniinsii,* Griff, in Calc. Joum. Nat. HUt. v. (1845) 367 = D. parciflorum.**
***Leonis,* Lindl. in Bot. Keg. (1840) Misc. 50 -, D. Leonis.**
***lobatum,* Blume, Bijdr. 334 = D. lobatum.**
***micranthum,* Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. iv. (1844) 375. t. 16. f. 7 = D. Serra.**
***Roxburghii,* Griff. 1. c. v. (1845) 370 = D. Roxburghii.**
***Serra,* Lindl. in Wall. Cat. n. 2021 = D. Serra.**
***sinuatum,* Lindl. in Bot. Reg. (1841), Misc. 1 = D. sinuatum.**
***subteres,* Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845J 370 = D. acerosum.**

APOSERIS, Neck. Elem. i. 57 (179U) = Hyoseris, Linn. (Compos.[1]).
***foetida,* Cass. in Diet. Sc. Nat. xlviii. 427 = II. lucida.**
***foetida,* Less. Syn. Comp. 128 = H. toetida.**
***lucida.* Less. 1. c = H. lncida.**

APOSTASIA, Blume, Bijdr. 428. t. 5 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 635.
MESODACTYLIS, Wall. PI. As. Rar. i. 74, in obs. (1830:.

AFOSTASIA :—
NEUMAYERA, Reichb. f. in Flora, Iv. (1872) 278.
NIEMEYERA, F. Mnell. Fragm. vi. 96 (1867).
Brunonis, Griff. Notnl. ili. 243 = nuda.
Lobbii, *Reichb. f. in Flora,* Iv. (1872) 278.—Borneo.
Hilda, *R. Br. in Wall. PL As. Rar.* i. 76. t. 85.—Ind. or.; Malaya.
odorata, *Blume, Bijdr.* 428.—Java,
stylidioides, *Reichb. f. in Flora,* Iv. (1872) 278.—Austral.
Wallichii, *R. Br. in Wall. PI. As. Rar. i.* 76. t. 84.—Ind. or.; Malaya.

APOTERIUM, Blnme, Bijdr. 218 (1825) = Calophyllum, Linn. (Guttif.).
Sulatri, Blume, 1. c.=C. spectabile.

APOXYANTHERA, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 78 =Raphionacme, Harv. (Asclep.).
pubescent, Hochst. 1. c.=R. pube^cens.

APOZIA, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 114 (1840) = Mloromeria, Bentb. (Labiat.).
chamaedryoides, Willd. ex Steud. 1. c. = M. Brownei.
herniarioides,\i\&&.a Steud. 1. c. = Herpestis herniarioides.
serpyllacea, Willd. ex Stend. 1. c. =M. Brownei.

APPELLA, Adans. Fam. ii. 84 (1768)=Lauras, Dnn.

AFPENDICULA, Blume, Bijdr. 297. t. 40 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 588.
CONCHOCHILUS, Hassle, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 146.
METACHILUM, Lindl. Gen. et Sp. Orcb. 74 (1830).
SCOLIOCHILUS, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 118, in obs. (1872).
alba, *Blume, Bijdr.* 299. -Java,
anceps, *Blume, I. c.*—Java,
angustifolia, *Blume, I. c.* 301.—Java,
bifaria, *Lindl. ex Benth. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 35.—Ind. or.; China.
bracteosa, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 299.—Ins. Fiji,
buxifolia, *Blume, Bijdr.* 300.—Java,
callosa, *Blume, 1. c.* 303.—Burma; Malaya,
carnosa, *Blume, 1. c.* 300.—Java.
Chalmersiana, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* N. S. (I. May 1885).—N. Guin.
congenera, *Blume, Bijdr.* 303.—Java,
coranta, *Blume, I. c.* 302.—Java,
cristata, *Blume, 1. c.* 298.—Java,
elcgans, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 41.—Java,
graminifolia, *Teijsm. &Binn. in Tijdschr. Neder. Ind.* xxiv. (1862) 822.—Java.
Hasseltii, £/«»)<>, *Bijdr.* 304.—Burma.
Hasseltii, Wight, Ic. t. 1748 = Agrostophyllum khasyanum.
Kuhlii, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 116.—Java.
Levisii,Griff. in Cole. Joum. Nat. Hist. iv. (1844) 378.—Malaya.
longifolia, *Blume, Bijdr.* 804.—Java,
membranacea, *Teijsm. & Binn. in Kruid. Arch.* iii. (1855) 399,-Java.
micrantha, Lindl. in Ann. Nat. Hist xv. (1845) 386.—Ins. Philipp.
monoceras, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 41.—Java,
muricata, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Neder. Ind.* xxiv. (1862) 322.—Java,
pauciflora, *Blume, Bijdr.* 800.—Java,
pendula, *Blume, 1. c.* 298.—Java,
penicillata, *Blume, Rumphia,* iv. 46.—N. Guin.
peraligera, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 41.—Java,
purpurascens, *Blume, Bijdr.* 802.—Java.
ramosa, *Blume, 1. c.* 299__Java.
reduplicata, Par. & Reichb. *t* Otia Bot Hamb. 45 = bifaria.
leflexa, *Blume, Bijdr.* 801.—Java,
rhodiola, *Reichb. f. Xenia Orchid,* it 118.—Java,
sororia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 703.—Java.
stipulata, Griff. Notul. iii. 858 = callosa.
tens, Griff. 1. c. 369 = Ceratostylis teres.
tomentella, *Zoll. in Nat. en Ceneesi. Arch. Neerl. Indie,* i. (1844) 403.—Java,
torta, *Blume, Bijdr.* 803.—Malaya.

APPENDICTTLA :—
tricornis, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 41.—Hab.?
nndulata, *Blume, Bijdr.* 801.—Java.
Vieillardi, *Reichb. f. in Linnaea,* xU. (1877) 76.—N. Caled.
viridiflora, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Neder. Ind.* xxiv. (1862) 821.—Java,
xytriophora, *Reichb. f. in Seem. FL Vit.* 299.—Malaya.

APPENDICULARTA, DC. Prod. iii. 114 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 741.
thymifolia, *DC. 1. c.*—Guiana.

APPUMTA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 120 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii 120.
BELLVNKIA, Muell. Arg. in Flora, xlviii. (1876) 465.
angulata, *Baill. Hist. PI.* vii. 415.—Bras,
tenuiflora, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 120.—Guiana.

APRADUS, Adans. Fam. ii. 102 (1763)=Arctopus, Linn. (UmbeU.).

APRELLA, Steud. Nom. ed. II. i. 152 (1840), err. typ.= ASPRELLA, Schreb.=Leersia, Sw. (Gram.).

APREVALIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. 1. (1884) 428. *LEGUMINOSAE.*
floribunda, *Baill. I. c*—Madag.

APTAIJDRA, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 201. *OLACINSAE,* Benth. & Hook. f. L 845.
Benthamiana, Miers, 1. c. Ser. III. iv. (1859) 360 = liriosmoides.
liriosmoides, *Spruce, ex Miers, I. c.*—Bras.
Sprnceana, *Miers, I. c.* Ser. II. viii. (1851) 202.—Bras,
tubicina, *Benth. ex Miers, I. e.* Ser. III. iv. (1859) 860.—Bras.

APTERIA, Nutt. in Jonm. Acad. Sc. Philad. vii. (1834) 64. t. 9. *BURMANNIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 458.
NEMITIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 33 (1836).
STEMOPTERA, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1840) 62.
hymenanthera, Miq. in Verb.. Nat. Wet. Haarl. vii. 11861) 216. t64=setacea.
liladna, Miers, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 546. t 37=setacea.
orobanchioides, Hook. Ic PI. t 254 = Dictyostega orobanchioides.
setacea, *Nutt. in Journ. Acad. Sa Philad.* vii. (1884) 64. L 9.—Am. bor.

APTERANTHES, Mik. in Nov. Act. Nat Cur. xvii. (1835) 593. t. 41=Boucerosia, Wight & Am. (Asclep.).
cylindrica, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiii. (1870-1) 406.— Abyssin.
Gussoneana, Mik. in Nov. Act. Nat Cur. xvii. (1885) 594. t 41 = B. Gussoniana.
tessellata, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiii. (1870-1) 406=Echidnopsis cereiformis.

APTEROCARYON, Opiz, in Lotos, v. (1855) 268 = Betula, Linn. (Cupulit).
Michauxii, Opiz, 1. c. 259=B. Michauxii.

APTEBON, Kurz, in'Joum. As. Soc. Beng. xlL (1872) II. 800. *RHAMNEAE.*
lanceolatum, *Kure, I. c.* 301.—Tenasserim.

APTEUXIS, Griff. Notnl. iv. 672 (1854)=Pteraandra, Jack (Melast).
trinervis, Griff. 1. c.=P. caerulescens.

APTOSHCtTM, Burch. Trav. i. 219 (1824). *SCROPHULARINEAE,* Benth. 8c Hook. f. ii. 927.
CHILOSTIGMA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 872.
OHLENDORFIA, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1835).
abietinum, *Burch. Trav.* i. 308.—Afr. austf.
depressum, *Burch. I. c.* i. 260.—Afr. austr.
enocephalum, *E. Mey. ex Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1882.—Afr. austr.
indivisum, *Burch. Trav.* i. 219.—Afr. austr.
procumbens, Burch. ex Stead. Nom. ed. II. i. 114=depressum.

APTOSIMTJM: •.—
pumilum, *Benth. in DC. Prod.* x. 345.—Afr. austr.
tragacanthoides, *E. Mey. ex Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1882.-rAfr. austr.
viscosnm, *Benth. I.* f.—Afr. austr.

APTOTHECA, Miers, Apocyn. S. Am. 150 (1878). *APOCYNACEAE.*
corylifolia, *Miers. 1. c*—Cuba.

APULEIA, Gaertn. Frnct. ii. 489.1.171 (1791)=Berkheya, Ehrh. (Compos.).
asteroides, Gaertn. 1. c. 440 - B . fruticosa.
atractyloides, Less. Syn. Comp. 64 *(=Stobaea atractyloides).*
fruticosa, Bartl. Sem. Goett. (1835).—Cf. Linnaea, xii. (1838) Litt. 80=B. fruticosa.
fruticosa, Gaertn. Fruct. ii. 440=B. grandiflora.
heterophylla, Less. Syn. Comp. 65 *(=Stobaeaheterophylla).*
rigida, Gaertn. Frnct ii. 439. t. 171 *(=*Stobaea Gaertneri).*
Zeyheri, Less. Syn. Comp. 64=B. Zeyheri.

APULEIA, Mart. Herb. Fl. Bras. 123 (1887). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 574.
ZENKERIA, Am. in Mag. Zool. 8c Bot. ii. (1888) 548.
molaris, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 177.—Bras,
praecox, *Mart. Herb. Fl. Bras.* 123.—Bras.

AQUARTIA, Jacq. Enum. PI. Carib. i. 12 (1760) = Solarium, linn.
aculeata, Jacq. 1. c. = S. Aquartia.
microphylla, Lam. Illustr. n. 1604. t. 82. f. 2=S. microphyllum.
microphylla, Willd. Sp. PI. i. 622.—Ins. S. Doming.
solanacea, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 114.—N. Granat.
tomentosa, Lam. Illustr. n. 1603. t. 82. f. 1 = S. Aquartia.

AQUIFOLIUM, Toum. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 467 (1742)=Hex, Linn.
croceum, Rafin. Sylva Tellur. 44=1. Aquifoliumt
ferox, Mill, ex Rafin. 1. c. = 1. Aquifolium.
heterophyllum, Rafin. I. c. = I. Aquifolium.
Ilex, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 116 = 1. Aquifolium.
japonicum, Rafin. Sylva Tellur. 44 = Berberis japonica.
lanceolatum, Rafin. I. c—Hab.?
planifolium, Rafin. 1.c—Hab.?
spinosum, Lam. Fl. Fr. iii. 652 = 1. Aquifolium.
undulatum, Rafin. Sylva 'Tellur. 44 = 1. Aquifolium.
vulgare, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1830) 128 = 1. Aquifolium.

AQUTLAHIA, Lam. Encyc. ii. 610 (1783). *THYMELAEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 200.
AGAIXOCHUM, Lam. Encyc. i. 47 (1783).
OPHIOSPEKMUM, Reichb. Consp. 82 (1828).
OPHISPERMUM, Lour. Fl. Cochinch. 280 (1790).
Agallocha, *Roxb. Hort. Beng.* 88 ; *Fl. Ind.* ii. 422.—Ind. or.; Burma.
bancana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 856=Gonostylus Miquelianni.
chinensis, Sprang. Syst. ii. 356=A. Ophispermum.
grandiflora, *Benth. Fl. Hongk.* 297.—China.
macrophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 856 = Gono. stylus Miquelianus.
malaccensis, Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1868) 185=grandiflora.
malaccensis, *Lam. Encyc.* i- 49.—Malaya,
microcarpa, *Baill. Adansonia,* xi. (1878-76) 304.—Borneo.
Ophispermum, *Pair, in Diet. Sc. Nat.* xviii. 161.—China.
ovata, Cav. Diss. vii. 877 = malaccensis.
pentandra, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 373.—Ins. Philipp.
secundaria, *DC. Prod,* ii 59—Ins. Molucc.

AQUILEOIA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I. (1785). *RANUNCULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 8.
advena, *Regel, in Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1866) 32.—Hab. I
aggericola, Jord. Diagn. i. 87—vulgaris.
alpina, Deless. Ic. t. 48 = jucunda.
alpina, Georgi, It. i. _220=glandulosa.
alpina, Lam. Encyc. i. 150 = pyrenaica.

AQUILEOIA:—
alpina, *Linn. Sp. PI.* 633.—Enrop.; Sibir.
Amaliae, *HeULr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 11.-Thesial.
anemonoides, Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 4011. 9. f. 8 = Isopyrum grandiflornm.
aragonensis, *Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 966.—Hispan.
arbascensis, *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toulouse,* ii. (1874) 449 j *{Massiv d'Arbas,* 86).-Europ.
areiica, Lond. Hort. Blit. 610=formosa.
atrata, Koch, in Flora, xiii. (1880) I. 118 " vulgaris.
"tropurpurea, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 8 = Buergeriana.
"iropurpurea, Willd. Enum. Hort. Berol. 677=viridiflora.
aurea, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 174 =chrysantha.
Bauhini, Schott, in Verh. Bot. Zool. Ver. Wien, iii. (1858). 128 = Einseleana.
Bernard,, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 46=vulgaris.
Hertolonii, *Schott, in Verh. Bot. Zool. Ver. Wien,* iii. (1853) 127.—Europ.
bicolor, Ehrh. Beitr. viii. 146=sibirica.
Uandax, Lem. Illustr. Hortic. (1857) t. 146=vulgaris.
hochyccras, Turcz. ex Fiscb. & Mey. in Mannd, Bot. – Gard. n. 755=leptoceras.
Uraunii, *Borbas, in Magyar Tudom. Aiad.* xii. n. VI. (1882) 10, nomen.—Europ.
brevistyla, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 34.—Am. bor.
Buergeriana, *Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.* »v. H. (1846) 18S.-Japon.
caenilea, *James, in Long, Exped. Rocky Mount.* «. 345.—Am. bor. occ.
Mlifornica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) f 28.—Am. bor. occ.
ealifornica, Hartw. in Gard. Chron. (1854) 886=formosa.
ounpylocentra, *Borbas, in Magyar Tudom.Akad.* xii. n- vi. (1882) 10.—Europ.
canadensis, Hook. Fl. Bor. Am. i. 24=formosa.
canadensis, *Linn. Sp. PI.* 588.—Am. bor.
canadensis, Pall. Reise, iii. 230-viridiflora.
raucasica, Ledeb. ex Rupr. Fl. Cauc. 32=olympica.
chrysantha, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 621.-N. Mexic.
coerulea, Auct. = caerulea.
colhna, Jord. Diag. i. 84=vulgaris.
concolor, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. **116** = vulgaris.
confusa, Rota, Prosp. Fl. Bergamo, 99 = Einseleana.
comiculata, Vill. Cat. Hort. Strasb. 250=vulgaris.
cornuta, Gilib. Fl. Lituan. ii. 286= vulgaris.
Corsica, Soleir. ex Nym. Consp. 18=vulgaris.
cyclophylla, Jeaub. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Jt Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 555; (Massif Laurenti, 189) = nyrenaica.
jahurica, Patr. in Deless. Ic. Sel. t. 49=viridiflora.
djchroa, *Freyn, in Flora,* xliii. (1880) 26.—Europ.
dloica, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 10, nomen.—Europ.
discolor, Steud. Nom. ed. II. i. 115= glandulosa.
discolor, *Levier & Leresche, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 197—Hispan.
dumcticola, Jord. Diag. 1. 86=vulgaris.
bbneri, Zimm. ex Nym. Consp. 18=vulgaris.
ecalcarata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 116 = vulgaris.
EmseTeana, *Fr. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem.* 135. —Europ.
elata, Ledeb. Ind. Hort. Dorp. Suppl. (1824) 41 = vulgaris.
'Ifgans, Pope, ex Steud. Nom. ed. II. i. 115=vulgaris.
"egans, Safisb. Prod. 874=canadensis.
eximia, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 10, nomen.—Europ.
'ximia, Van Houtte, ex Planch, in Fl. des Serres, Ser. «• ii. (1857) 18. t. 1188 = formosa.
flabellata, *Sieb. &- Zucc. in Abh. Akad. Muench.* IV. II. (1846) 18S.-Japon.
flava, Lam. Encyc. i. 149=viridiflora.
flavescens, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 10.—Calif.
fianflora, Tenney, in Am. Natural, i. (1868) 388 = ttnadensis.
formosa, *Fitch, in DC. Prod.* i. 60.—Kamtsch.
formosa, Hook. f. Bot. Mag. t. 6552 = Hookeri.

AQUHiEGIA:-
fragrans, *Benth. in Maund, Botanist*, iv. t. 181.—Reg. Himal.
Gaertneri, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 10, nomen.—Europ.
Garnieriana, Sweet, Brit H. Gard. Ser. II. v. 1.103 = sibirica.
Gebleri, *Bess, ex Turct. in Flora,* xvii. (1834) I. *Beibl.* 5.—Europ.
glandulosa, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 48; *etex Link, Enum. Hort. Berol.* **ii. 84.—Sibir. altaic.**
glandulosa, Miq. iu Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 8 = flabellata.
glanca, *Lindl. Bot. Reg.* xxvi. (1840) t. 46.—Reg. Himal.
glaucescens, Baker, in Gard. Chron. (1878) II. 203 = vulgaris.
glaucophylla, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 407 = vulgaris.
grandiflora, Patr. ex DC. Syst. i. 837 = alpina.
grandiflora, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 49 = glandulosa.
grata, *Maly, ex Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. vi. (1882) 8, nomen.—Europ.
Haenkeana, Koch, Syn. Fl. Germ. 23=vulgaris.
Haynaldi, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 9.—Europ.
hirsuta, *Timb.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882), *Bibl.* 47.—Gallia mend,
hispanica, *Borbas, in Magyar Tudom.Akad.* xii.n. VI. (1882) 10.—Hispan.
Hookeri, *Borbas, in TermitB.FUietek,* viii. (1884) 311. —Am. bor.
Huteri, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 9.—Europ.
hybrida, Sims, in Bot. Mag. t. 1221 = vulgaris.
inversa. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = vulgaris.
Jonesii, *Parry, in Am. Natural*, viii. (1874) 211.—Am. bor.
jucunda, Fisch. & Lallem. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. (1840) 43=glandulosa.
jucunda, Fisch. & Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 736 = vulgaris.
kanaoriensis, Jacquem. ex Camb. in Jacquem. Voy. Bot. 7. t. 5 = Moorcioftiana.
Karelini, Baker, in Gard. Chron. (1878) II. 76 = vulgaris.
Kareliniana, *C. A. Mey. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 63.—Hab. 1
Kitaibelii, *Schott, in Verh. Bot. Zool. Ver. Wien,* iii. (1863) 129.—Armenia,
lactiflora, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 374.—Sibir.
leptoceras, *Fisch. &• Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 33.—Sibir.
leptoceras, Nntt. in Journ. Ac. Philad. vii. (1834) 9 = caerulea.
longisepala, *Zimm. ex Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 9, nomen.—Europ.
longissima, *A. Gray, ex S. Wats. in. Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 317.—Am. bor.
lutea. *Lam. Encyc.* i. 149.—Hab. ?
lutescens, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 10, nomen.—Europ.
macrantha. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 817. t. 72 = caerulea.
macrocentra, *Borbas, in Magyar Tudom. Aiad.* xii. n. vi. (1882) 10, nomen.—Europ.
Magnolii, Loret, in Loret & Barraud. Fl. Montp. ii. 796-Kitaibelii.
mexicana. Hook. Bot. Mag. t. 3919 - Skinneri.
minuta, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 53 =• Isopyrum grandiflorum.
mollis, *Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. tt Nat. Toulouse,* iii. (1875-76) 555.—Gallia.
montana, Stemb. in Regensb. Denkschr. ii. (1818) 60 alpina.
Moorcroftiana, *Wall. Cat.* n. 4713.—Reg. Himal.
Moorensteniana, Steud. Nom. ed. II. i. 115, sphalm. •= praec.
nemoralis, *Jord. Diag.* i. 83.—Gallia.
nevadensis, *Boiss. & Rent. Cat. Hort. Genev.* (1854) 4; *et in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. ii. (1854) 880.—Hispan.
nigricans, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 104 > vulgaris.
nivalis, Falc. ex Baker, in Card. Chron. (1878) n. 76 «=flauca.

AQUIIiEGIA:—
nivea, Baumg. ex Baker, in Gard. Chron. (1878) II. 76 = vulgaris.
olympica, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvi. (1841) 360.—Oriens.
orthantha, *Borbas, in Magyar Tudom. Aiad.* xii. n. VI. (1882) 10, nomen.—Europ.
Ottonis, *Orph. ex Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 11.—Graecia.
oxysepala, *Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot.* 10).—As. or.
paraplesia, Schur, Enum. PI. Transs. 28 = vulgaris.
parviflora, *Ledeb. in Mém. Acad. Pitersb.* v. (1814) 544.—Sibir.
platysepala, Reichb. Ic. Fl. Germ. t. 4730=vulgaris.
plena, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 115=vulgaris.
praecox, Jord. Diag. i. 85=vulgaris.
pnbiflora, *Wall. Cat.* n. 4714.—Ind. or.
pyenotricha, *Borbas, in Magyar Tudom. Aiad.* xii. n. vi. (1882) 10.—Europ.
pyrenaica, *DC. Fl. Fr.* iv. U12.—Pyren.; Appcnin.
pyrenaica, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 24 = Einseleana.
pyrenaica, Reichb. Ic. Fl. Germ. t. 4732 » Bertolonii.
Reuteri, lioisa. Diagn. Ser. II. i. 10 = Bertolonii.
Reuteriana, Reichb. f. ex Nym. Consp. 18=alpina.
ruscinonensis, *Timb. & Jeanb. in Bull. Soc. Sc. Nat. Toulouse,* iii. (1875-76) 554.—Gallia.
Schinneri, Poit. in Rev. Hortic. Sér. II. iv. (1845-46) 185 = Skinneri.
Schottii, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 10.—Europ.
sibirica, Don, ex Sleud. Nom. ed. II. i. 115=vulgaris.
sibirica, *Lam. Encyc.* i. 160.—Sibir.
sibirica, Schur, ex Nym. Consp. 18 = glandulosa.
silvestris, Neck. Delic. Gallo-LSelg. i. 284=vulgaris.
sinensis, *Heynk. Nom.* ii. 41.—China.
Skinneri, *Hook. Bot. Mag* t. 8919.—Mexic.
speciosa, DC. Syst. i. 336 = sibirica.
spedosa, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, iv. (1870) 155 = arbascensis.
spectabilis, Lem. in Illustr. Hortic. xi. (1864) t. 403 = sibirica.
stellata, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 61; ed. II. i. 115 = vulgaris.
stenopetala, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. vi. (1882) 8, nomen.—Europ.
Sternbergii, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 749 = alpina.
subalpina, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. HI. ii. 24 = vulgaris.
subscaposa, Borbas, in Magyar Tudom. Akad. xii. n. vi. (1862) 18=vulgaris.
sulphurea, *Zimm. ex Borbas, I. c.* 9.—Europ.
sylvestris,* vide *silvestris.
sylvestris, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 4=vulgaris.
Szaboi, *Borbas, in Magyar Tudom. Akad.* xii. n. VI. (1882) 10, nomen.—Europ.
thalictrifolia, Schott & Kotschy, in Verh. Bot. Zool. Ver. Wien, iii. (185S) 130 = Einseleana.
thalictraides, Sclilecht. in Linnaea, vi. (1831) 681 = parrflora.
transsilvanica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (3-52) 94; iv. (1858) 4= vulgaris.
truncata, Kisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1843) Suppl. 8 = formosa.
variegata, Moench, Metb. 311 = canadensis.
versicolor, Salisb. Prod. 874—vulgaris.
viridiflora, *Pall, in Act. Petrop.* (1779) 260. t. 11.—Sibir.
viscosa, Gounn, Fl. Monsp. 267 = Kitaibelii. •
viscosa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 748 = Einseleana.
viscosa, Suffr. ex Reichb. 1. c. 749 = pyrenaica.
volubilis, *Maack, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 64.—Manchuria.
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 533.—Europ.; Oriens.
vulgaris, Richards. App. Frankl. Joum. ed. II. 21 = brevistyla.
vulgaris, Thunb: Fl. Jap. 232=flabellata.
Wittmanniana, Stev. ex Fisch. & Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. l'etrop. xi. Suppl. 15 = olympica.

AQUILICIA, Linn. Mant. ii. 211 (1771)=Leea, Linn. (Ampel.).
Ottilis, Gaertn. Fruct. i. 275 = L. sambucina.
sambucina, Linn. Mant. 211 = L. sambucina.

ARABIDAEA.—Cf. Rev. Hortic. (18C8) **154=Arrabidaea,** DC. (Bignon.).

ARABIDIUM, Spach, Hist. Veg. Phan. vi. 436 (1838) = Arabia, Linn. (Crucif.).
alpestre, Spach, 1. c. 488 = Arabis alpina.
alpinum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 332 = Arabis alpina.
saxaticolum, Fourr. 1. c. = Arabis saxatilis.

ARABIDOPSIS, Schur, Enum. PI. Transs. 55 (1866) = SiBymbrlum, Linn. (Crucif.).
pinnatifida, Rupr. Fl. Cancas. 86 = Braya pinnatifida.
Thaliana, Schur, Enum. PI. Transs. 55 = S. Thalianum.

ARABIS, Adans. Fam. ii. 422 (1768) = Iberia, Dill. (Crucif.).

ABABIS, Linn. Gen. ed. I. 198 (1787). *CRVCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 69.
ABASICARPON, Andrz. ex Reichb. in Moessl. Handb. ii. 1150 (1828).
ARABIUIUM, Spach, Hist. Veg. Phan. vi. 436 (1838).
ARABISA, Reichb. Handb. 260 (1S41).
CAULOPSIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. zvi. (1868) 332.
LOMASPORA, DC. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 65 (1841).
PILOSELLA, Kostel. Hort. Prag. 104 (1844).
PSILARABIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 832.
STEVENIA, Adams & Fisch. in Mem. Soc. Nat. Mosc. v. 84 (1820).
TURRITIS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I. (1737).
accedens, Jord. Diag. i. 115=hirsuta.
aizoides, *Bonato, Cat. PI. Hort. Patav. (sec. Steud. Nom.* ed. II. i. 115).—Hab. ?
alaschanica, *Maxim, in Bull. Acad. Phersb.* xxvi. (1880) 421.—Mongolia,
albida, *Stev. in Fisch. Cat. Hort. Gorenk.* 51.—Reg. Mediterr.; Oricns.
Alliaria, Bernh. Syst. Verz. Erf. 195 = Sisymbrium Alliaria.
AUionii, *DC. Fl. Fr.* iv. 676.—Pedemont.
alpeslris, *Schleich. ex Reichb. 1c. Fl. Germ.* ii. 13. n. 4338 b.—Helvetia.
alpina, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. IV. 1187 = albida.
alpina, Krock. ex Steud. Nom. ed. II. i. 115 = sagittate,
alpina, *Linn. Sp. PI.* 1364.—Kurop.; Am. bor.
alpina, Lucé, Fl. Osil. 228 = Gerardi.
amara, Banks, ex DC. Syst. ii. 246 = Cardaminc rhomboidea.
ambigua, DC. Syst. ii. 231=petraea.
amplexicaulis, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 31.—Reg. Himal.
andicola, Ii. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 81 = Sisymbrium hispidulum.
androsacea, *Penal, Pugill. PL Nov. Syr.* 13.—As. Min.
angustifolia. Lam. Encyc. i. 220 = Hntchinsia alpina.
apennina, *Tausch, in Syll. Ratisb.* ii. (1823) 244.—Italia.
arcuata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 200 = Sisymbrium Thalianum.
arcnata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. 187.—Calif.
arcuata, Shuttlw. ex Godet, Fl. Jura, i. (1852) 38 = alpestris.
arenaria, *Schrank, Fl. Monac.* iii. 256.—Europ.
arenosa, Cham. & Schlecht. in Iinnaea, i. (1826) 17 = kamtschatica.
arenosa, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. ii. 82.—Europ.
arvensis, Bernh. Syst. Verz. Erf. 195 = Conringh austriaca.
arvensis, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 32.—Ind. bor. occ.
aspera, All. Ped. Auct 18. t. ?. f. 2 = auriculata.
attenuata, Royle, ex Hook. f. in Jonrn. Linn. Soc. vi. (1862) 143 = tibctica.
aubrictioides, *Boiss. Fl. Orient*, i. 175.—Cilicia.
Aocheri, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 52.—As. Min.; Syria.
auriculata, *Lam. Encyc.* i. 219.—Europ.; Oriens.
Balansae, *Boiat. & Reut. Diagn.* Ser. II. v. 17.—Algeria.
Barbarea, Bernh. Syst. Verz. Erf. 195 = Barbarea vulgaris.
bellidifolia, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 42; ed. II. 44=pnmila.
bellidifolia, *Jacq. Obs. Bot.* i. 22.—Europ.
bellidifolia. Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 31 = Cardamine alpina.

ABABIS:—
bettidioid.es, Lam. Encyc. i. 220 = Cardamine alpina.
bijnga, *Watt, in Journ. Linri. Soc.* xviii. (1881) 378.—Reg. Himal.
Billardieri, DC. Syst. ii. 218 = albida.
blepharophylla, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 321.—Calif.
Boissieri, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 248 = drabaeformis.
borealis, Andrz. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hurt. Petrop. v. 88=hirsuta.
Boryi, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 26. t. 5 = Braya pinnatifida.
brachycarpa, *Rupr. Fl. Cauc.* 73, in *textu*.—Reg. Caucas.
brachypoda, Boiss. Elench. 8=parvula.
bracteata, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. i. (1864) 291.—Bolivia.
brassicaeformis, *Wallr. Sched. Crit.* 359.—Europ.
Breutelii, *Lange, Consp. Fl. Groenl.* i. 50.—Groenl.
brevifolia, DC. Syst. ii. 218 = albida.
Breweri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 123.—Calif,
bryoides, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 55.—Graccia.
bulbosa, Muhl. Cat. 68; Spreng. Fl. Hal. Mant. 46 = Cardamine rhomboidea.
bursifolia, Lam. Fl. Fr. ii. 511 = Sisymbriuni bursifolium.
cadmea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 21.—Caria.
caerulea, *Haenke, in Jacq. Collect*, ii. 56.—Europ.
caespitosa, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 8.—Helvet.
camtschatica, Willd. ex DC. Syst. ii. 242 = Stelleri.
canadensis, *Linn. Sp. PI.* 665.—Am. bor.
canadensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = Diplotaxis muralis.
canescens, Brocchi, in Bibliot. Ital. xxix. 90=alpina.
canescens, *Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 83.—Am. bor.
•antabrica, *Leresche & Lemer, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 197.-Hispan.
capensis. Linn. Syst. ed. X. 1135; Burnt, f. Prod. Fl. Cap. 18 = Heliophila pusilla.
Cardamines, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 292.—Austral.
carduchorum, *Boiss. Fl. Orient*, i. 173.—Armenia,
carpetana, *Willk. in Willt. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 822.—Hispan.
caucasica, Willd. Enum. Hort. Berol. "Suppl. 45 = albida.
cebennensis, *DC. Syst.* ii. 234.—Gallia.
cenisia, Reut. Cat. Jard. Bot. Genèv. (1653) 4 = alpestris.
chinensis, Rottl. ex Wight, IUustr. i. sub t. 12 = Lepidium sativum.
ciliaris, Willd. Enum. Hort. Berol. 684 = pumila.
ciliata, *R. Br. in Ait. Hort. Ken.* ed. II. iv. 107.—Europ.
ciliata, Auct. ex Nym. Consp. i. 33 = alpestris.
ciliata, Tausch, Ind. PI. Sndet. (sec. Steud. Nom. ed. II. i. 117)=hireuta.
cilicica, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. IL v. 17 = ionocalyx.
Clusiana, Schrank, Fl. Monac. ii. 125=alpina.
coerulea, vide caerulea.
colchaguensis, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 293.—Chili,
collina, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* 39.—Italia.
collisparsa, Jord. Diagn. i. 116=hirsuta.
colorata, *Tausch, in Flora*, ***. (1836"(II. 405.—Europ.
Commersonii, *DC. Syst.* ii. 228.—Reg. Argent.
conferta, Willd. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 680-hirsuta.
conringioides, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 297.—Marocc.
constricta, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 249 ~ hirsuta.
contracts, *Celak. Prod. Fl. Boehm.* 155.—Bohem.
contracta, Spenn. Fl. Friburg. iii. 925=hirsuta.
cordata, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. II. xviii. (1842) 51 = Iaxa.
Costae, *Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 820.—Hispan.
Crantliana, Ehrh. Beitr. v. 177=petraea.
crassifolia, *Ledeb. in Baier. Bot. Ges. Denkschr.* iii. (1841) 107.—Rossia.
cremocarp'a, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. v. 16=laxa.
crepidiopoda, Griseb. ex. Pant, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 268=pseudotunitis.

ABABIS:—
cretica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 20-= muralis.
crispata, Willd. Enum. Hort. Berol. 684= alpina.
croatica, Scùott, ex Nyman & Kutschy, Analect. Bot. 44 = neglecta.
cuneifolia, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 17 » alpina.
curtisiliqua, DC. Syst. ii. 228-hirsuta.
Cusickii, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82 868.—Am. bor.
dacica, Heuff. ex Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 307--Halleri.
dasycarpa, Andrz. ex DC. Syst. ii. 244=auriculata.
declinata, Schrad. Ind. Sem. Hort. Goett. (1831); (ex Linnaea, viii. 11833) Litt. 22) =Holboellii.
decumbens, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 287.—Marocco.
deflcxa, *Boiss. Fl. Orient*, i. 175.—Lycia.
dentata, [Clairv]. Man. Herb. 228 = Braya pinnatifida.
dentata, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 80.—Am. bor.
docica, Fuss, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. xiii. (1662, 150, sphalm. = dacica.
Douglassii, Ton. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 83, in syn. (cum cit. falsa) = Cardamine rotundifolia.
drabaeformis, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 55.—Bithyn.
drabaeformis, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 248-bryoides.
Dregeana, *Ham. & Sond. Fl. Cap.* i. 22.—Afr. austr.
Drummondii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. 187.—Am. bor.
elongata, Salisb. Prod. 272=A. Turrita.
eriocarpa, Schur, Enum. PI. Transs. 46 = A. Turrita.
eriopoda, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 63.—Sibir. or.
erubescens. *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 297.--Marocco.
erysimoides, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 145.—Soongaria.
EschscholUiana, Andrz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 118 = hirsuta.
falcata, Michx. Fl. Am. Bor. i. 31 = canadensis.
falcata, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. 17 = Abyss.
falklandica, Benth. & Hook. f. Gen. i .69 = macloviana.
farinacea, *Rupr. Fl. Caucas.* 71.—Caucas.
fastigiata, Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 324 = Cardamine fastigiata.
flagellosa, *Miq. in Ann.Mas. Bot. Lugd. Bat.* it 72.—Japon.
flaviflora, *Bunge, in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1859) 582.—Armenia.
flexuosa, Hort. Berol. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 679=serpyllifolia.
floribunda, Schur, Enum. PI. Transs. 44=petraea.
foliosa, *Royle, ex Hook.f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1S62) 160.—Reg. Himal.
fruticulosa, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iii. 19.—Sibir. alt.
furcata, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 362.—Am. bor.
Gerardi, *Bess, in Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. I. 38.—Europ.; Reg. Cauc.
gigantea, Hook. Ic. PI. t. 259 = Cardamine stylosa.
glabra, Bernh. Syst. Verz. Erf. 195 - perfoliata.
glandulosa, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 146.—Tibet.; Soongar.
glareosa, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1850)106; iv. (1853) 59 = arenosa.
glastifolia, *Reichb. Ic. Fl. Germ.* xii. 13.—Europ.
Gmelini, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 131=Parrya macrocarpa.
gracilescens, Jord. Diag. i. 119 = hirsuta.
gracilis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 185=Sisymbrium molUssimum.
gracilis, Royle, ex Hook. f. & Thorns in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 158=Sisymbrium Wallichii.
grandiflora, Linn. Amoen. Acad. ii. 279=Parry a macrocarpa.
grandiflora, Royle, ex Hook. f. & Thorns, in Jouni. Unn. Soc. v. (1861) 142 = alpina.
Halleri, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 929.—Europ.
Halleri, Lucé, Fl. Osil. 228=arenosa.
hastulata, Bert, ex DC. Prod. i. 150 = Cardamine resedifolia.
Heliophila, DC. Syst. ii. 237 = Farsetia Jacquemonti.
hesperidoides, A. Gray, Man. Bot. IT. St. ed. V. 68 = Thelypodium pinnatifidum.

AHABIS:—

heteromalla, Schrad. Ind. Sem. Hort. Goett. ex Linnaea, viii. (1833) Litt. 22 = Holboellii.
neterophylla, Foist, ex DC. Syst. ii 265=Caidamine hirsuta.
heterophylla, Nutt. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 81 =laevigata.
heterophylla, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 59.—Austria,
himalaica, *Edgea. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 31. —Reg. Himal.
Mrsuta, DC. Fl. Fr. iv. 675=ciliata.
husuta, *Scop. Fl. Corn.* ed. II. ii. 30.—Europ.; Oriens; Am. bor.
hirsuta, Koyle, ex Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc. v. (1861) 142 = alpina.
hirta, Lam. Encyc. i. 220 = stricta.
hirtella, Jord. Diag. i. 120=hirsuta.
kispida, Soland. in Ait. Hort Kew. ed. I. ii. 400 = stricta.
Hspida, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 501 (cf. Linn. f. Suppl. 298)-petraea.
**upida*, Moench, Meth. 258 = pendula.
Holboellii, *Hornem. Fl. Dan.* t. 1879.—Am. bor.
HolboeUiana, Hort. Hafn. ex Trevir. in Flora, xvi. (1838) 124=praec.
Hookeri, *Lange, Consp. Fl. Groenl.* i. 50.—Groenl.
Hornungiana, *Schur, Enum. PI. Transs.* 43.—Transsylv.
Hnetii, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1878) 496.—Reg.Caucas.
kumUis, Schleich. ex DC. Syst. ii. 224 = muralis.
?y*n<ia,Reut Suppl. Cat. PI. Genev. 8 = alpestris.
'danensis, Jord. Diag. i. 117= hirsuta.
\ncana, Moench, Meth. 257=alpina.
incana, *Roth, Catalect. Bot.* i. 79.—Europ.
"tcana, Willd. Enum. ex Steud. Norn. ed. II. i. 116 = muralis.
incana, Willd. Herb, ex Steud. 1. c.=collina.
tncanescens, Munro, PI. Agra, 6, ex Hook, f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 148=Farsetia Hamiltonii.
jncamata, *Lamb, ex DC. Syst.* ii. 210.—Sibir.
•ntegnfolia, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.SSS. Suppl.* 93. —i-urop.
intermedia, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ces. Craub.* "• xxv. (1882) 92.-Europ.
'ntertnedia, Hoppe, ex Steud. Nom. ed. II. i. 116 = bellidifolia.
ionocal(γX) *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 20.—As. Min.
»ponica, *Regel, Gartenfl.* (1863) 808. t. 414.—Japon.
l«ponica,*K.* Gray, in Mem. Am. Acad.N. S. vi. (1858) »81 = Arabia Stelleri.
jugicola, Jord. Diag. i. 121=bellidifolia.
tomtschatica, Auct. vide *camtschatica*, Willd.
"amtschatica, *Fisck. ex DC. Syst.* ii. 281.—Kamtschatca.
**amtschatica*, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 185 = Sisymbnum mollissimum.
tonaarensis, Royle, ex Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 142 = amplexicaulis.
***«, Jord. Diag. i. 112 = Gerardi.
K0kan,ka, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 6.—Turkestan,
^orolkowi, *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* •• (1877) 232.-Tnrkestan.
lactea, Stev. ex Rupr. Fl. Cauc. 289=mollis.
""gata, DC. Syst. ii. 237.—Am. bor.
laevigata. Hook. Fl. Bor. Am. i. 43=Drummondii1
•anau, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 248.-Peruv.
jaaoloba, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 163.—Mexico.
"Uenpendens, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 120 = A. Turrita.
™Jfoha, *Duri in Expl * Sc * Al^r-1* 2._Algeria.
hifolia, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 131-Parrya -Unnaeana.
£», *Sibth. &• Sm. Prod. Fl. Graec.* ii. 28.-As. Min.
ifpiocarpa, Wall. Cat. n. 4784-Sisymbrium Wallichii.
"P'narpaea, Fisch. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. «80 = alpina.
Urch. fnfeldiana, Schur, Enum. PI. Transs. 42-alpina.
**rta*, Poir, Encyc. Suppl. i. 411=laevigata.
***7?* Schrad - I'd. Sem. Hort. GoetL vii. (1882) 42 = Holboellii.
longesiliqua, C. fir *J. Presl, Delic. Prog.* 16.—Sidlia.

ARABIS :—

longifolia, DC. Syst. ii. 219=albida.
longirostris, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 17.—Calif.
longisiliqua, Wallr. Sched. Crit. 859=A. Turrita.
lucens, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 202 = bellidifolia.
lncida, *Linn./. Suppl.* 298.—Europ.
ludoviciana, *C. A. Mey. ex Fisch. Afey. &• Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. 60.—Am. bor.
lusitanica, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 20.—Lusitan.
Lyallii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 122. —Am. bor. occ.
lyraefolia, DC. Syst. ii. 244=canadensis.
lyrata, *Linn. Sp. PI.* 665.—Am. bor.
macloviana, *Hoot. Ic. PI.* t. 498.—Ins. Falkland.
macrocarpa, Torr. Mex. Bound. Rep. 32 = perfoliata.
madonia, *C. V J. Presl, Delic. Prog.* 15.—Sicilia.
major, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 676 = A. Turrita.
Marschalliana, Hort. ex Steud. Nom. ed. IL i. 116 = hirsuta.
mexicana.S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 319.—Mexico.
microphylla, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 82 — Dnimmondii ?
minor, Hort. Berol. ex DC. Syst. ii. 226=incana.
mollis. Rafin. in Am. Monthly Mag. ii. (1817) 43 = canadensis.
mollis, *Stev. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 270. —Reg. Caucas.
montana, Bemh. ex DC. Syst. ii. 225 = stricta.
montana, Lam. Encyc. i. 219 = hirsuta.
Montbretiana, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 53.—Oriens.
monticola, Jord. Diag. i. 107-= alpina.
moschata, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 680 = incana.
multicaulis, Bell, ex DC. Syst. ii. 283 = Halleri.
multiflora, *DC. Syst.* ii. 243.—Mont. Pyren.
multijuga, *Borb. in Linnaea*, xli. (1877) 604.—Europ.
muralis, *Brrtol. Rar. Hal. PI. Decad.* ii. 87.—Graecia.
muralis, Salisb. Prod. 272=Sisymbrium Thalianum.
muricola, Jord. Diag. i. 125=muralis.
Nasturtium, [Clairv.] Man. Herb. 223=Nasturtium officinale.
neglecta, *Schult. Oestr. Fl.* ii. 248.—Mont. Carpath.
nemoralis, Steud. Nom. ed. II. i. 117= hirsuta.
nemorensis, C. A. Mey. Vere. Pfl. Cauc. 179 = Gerardi.
nemorensis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 681-hirsuta.
nepetaefolia, *Boiss. Fl. Orient*, i. J 77.—Persia.
nivalis, Guss. PI. Rar. 389 = serpyllifolia.
nivalis, Spreng. Syst. ii. 898 = Macropodium nivale.
Nordmanniana, Rupr. Fl. Cauc. 72=mollis.
nova, Vill. Prosp. 39 = saxatilis.
nuda, Belang. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 54=Sisymbrinmnudum.
nudicaulis, DC. Syst. ii. 240 = Parrya macrocarpa.
nudiuscula, *E. Mey. ex Hare. V Sond. Fl. Cap.* i. 22. —Afr. austr.
nutans, Moench, Meth. 258=pumila.
nutans, Sims, Bot. Mag. t. 2219 = Allionii.
oblongata, *Wender. Hort. Marb.* (1824) ex Steud. Nom. ed. II. L 117.—Hab. i
obtusifolia, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853)58, 6 = alpina.
ochroleuca, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. IL i. 2L—Graecia.
ochroleuca, Lam. Encyc. i. 218 = A. Turrita.
olympica, Sibth. ex DC. Syst. ii. 219 = albida.
ovata, Poir. Encyc. Suppl. v. 557 = hirsuta.
ovirensis, Wulf. in Jacq. Coll. i. 196 = Halleri.
owaihiensis, *Cham. V Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 17.—Ins. Sandvic.
oxyota, DC. Syst. ii. 236=pendula.
pachyrhiza, *Kar. If Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 144.—Soongaria.
pangiensis, *Watt, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 378.—Reg. Himal.
parviflora, Rafin. in Am. Monthly Mag. ii. (1817) 43 = Sisymbrium Thalianum.
parvula, *Dufour, in DC. Syst.* ii. 228.—Europ. austr.
patens, Royle, ex Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc v. (1861) 142 = amplexicaulis.
patens, *Sulliv. in Am. Journ. Sc.* i. (1819) **42,** 49.—Am. bor.

ARABIS :—

Patriniana, DC. Syst. ii. 236=pendula.
patula, *Host, Fl. Austr.* ii. 271.—Austria.
patula, Torr. Bot. Mex. Bound. 32 - Holboellii.
patula, Weinm. Cat Hort Dorp. (1810) 18=auriculata.
pauciflora, Garcke, Fl. Deutschl.ed. IV.22 = brassicaeformis.
pedemontana, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 60=cebennensis-
pelligera, Fenzl, in Kotschy, Reise Cilic. Taur. 891 = ionocalyx.
pendula, Lachen. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 681 = A. Turrita.
pendula, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 665.—Sibir.; Am. bor.
pendula, Stell. ex DC. Syst. ii. 242 = Stelleri.
perfoliata, *Lam. Encyc.* i. 219.—Europ.; Sibir.; Reg. Himal.
permixta, Jord. Diag. i. 110 = Gerardi.
petiolaris, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-66) 187.—Texas.
petiolata, Bieb. Fl. Taur. Cauc it 126 = Sisymbrium AUiaria.
petraea, *Lam. Encyc.* i. 221.—Reg. bor. temp.
petricola, Jord. Diag. i. 121 = hirsuta.
petrogena, Kem. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863; 141=arenosa.
Piasezkii, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 420.—China.
pinnatifida, Lam. Encyc. i. 221 = Braya pinnatifida.
planisiliqua, Pers. ex Reichb. Ic FL Germ. xii. 13 =• Gerardi.
platysperma, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 619.—Calif.
praecox, Waldst *8c* Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 684=procurrens.
procera, Jord. Diag. i. 114 = Gerardi.
procurrens, *Waldst. (f Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 164. t. 144.—Hungar.; Banat.; Thracia.
propera, Jord. Diag. i. 118 = hirsuta.
propinqua, Jord. 1. c. = hirsuta.
pseudoturritis, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. II. i. 20.—Graecia.
pterosperma, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 83 =alpina.
puberula, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 82 = canescens.
pubescens, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 413.—Algeria,
pubicalyx, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 72. —Japon.
pubigera, Jord. Diag. i. 115 = Gerardi.
pumila, *Jacq. Fl. Austr.* iii. 44.—Europ.
purpurascens, Presl, Fl. Sicul. i. 50=longisiliqua.
purpurea, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* vii. t. **643.—**Ins. Cyprus.
ramosa, Lam. Fl. Fr. ii. 510=Sisymbrium Thalianum.
recta, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 819=auriculata.
Reichenbachii, Syme, Eng. Bot. ed. III. i. 168 = hirsuta.
repanda, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 122. —Calif.
reptans, Lam. Encyc. i. 222=Draba carolinianai
resedifiora, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 81 = Nasturtium arabifonne.
resedifolia, Lam. Fl. Fr. ii. 511 = Cardamine resedifolia.
retrofracta, R. Grah. in Edinb. PhiL Joum. (1827) 7 =Holboellii.
Retgiana, Beurl. ex Nym. Consp. i. 88=h.irsnU.
rhaetica, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxv. (1882) 86.—Europ.
rhomboidea, Pen. Syn. ii. 204=Cardamine rhomboidea.
rigida, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 200=brassicaefonnis.
rigida, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 229=auriculata.
rigidula, Jord. Diag. i. 108 = Gerardi.
Roemeriana, Andrz. ex DC. Syst. ii. 228=parvula.
rosea, DC. Syst. ii. 215=muralis.
rosella, Jord. Diag. i. 126=muralis.
rotundifolia, Rafin. in Am. Monthly Mae. ii. (1817) 43 = Draba caroluuana.
rubricaulis, Jord. Diag. i. 113=Gerardi.
rugosa, Moench, Meth. 269 = A. Turrita.
runcinata, Lam. Encyc. i. 222=petraea.
runcinata, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 319.—Am. bor.
rupestris, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 81 = hirsuta.
sabauda, *Bruegg. injahresb. Naturf. Ges. Graub.* **II. xxv.** (1882) 87.—Europ.

ABABIS:-
sagittata, DC. Fl. Fr. vi. 892=hirsnta.
saxatilis, *All. Ft. Pedem.* i. 268__Europ.
saxeticola, Jord. Diag. i. 106=alpina.
saxicola, *Edges, in Trans. Linn. Soe.* xx. (1816) 88.—Reg. Himal.
saxigena, Jord. Diag. i. 127=muralis.
scabra, All. Fl. Pedem. i. 268=serpyllifolia pumila.
scabra, Gilib. Fl. Litoan. ii. 61=Sisymbrium Thalianum.
scapigera, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. IL xvii. (1842) 54=Siiymbrlum nudum.
Schievereckiana, *Andr: in DC. Prod.* i. 145.—Tyrol.
Scopoliana, *Boiss. ex Nym. Consp.* i. 86.—Europ.
segetalis, Schur, Enum. PI. Transs. 45=arenosa.
serpyllifolia, Hoppe.exDC. Syst ii. 211=vochinensis.
serpyllifolia, *ViU. Prosp.* 39.—Europ.
jerrata, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* i 38.—Japon.
ribirica, *Hart, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 117.—Sibir.
sicuU, *Huet, ex Rent. Cat. Grain.* (1857).—Sicilia.
sicula, Stev. ex Nym. Suppl. 82=albida.
Sieberi, *Tauseh, in Flora,* xix. (1886) II. 405.—Austr.
silicufoia, Lam. Encyc i. 221=Parrya macrocarpa.
simplidfolia, Schur, Enum. PI. Transs. 48=petraea.
sinaica, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 21=auricmata.
sinaica, *Steud. Nom.* ed. II. i. 117, nom.—Arab,
sinuata, *Turn, in Bull. Soe. Nat. Mosc.* (1810) 61 — Sibir.
sisymbroides, Hook, ex Hook. f. in Trans. Linn. Soe. xxiii. (1861) 311=petraea.
Sophia, Bemh. Syst Verz. Ert 196 = Sisymbrium Sophia.
Soyeri, *Rent. & Huet, ex Huet, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. xix. (1858) 261.—Mont. Pyren.
sparsiflora, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 81 = Holboellii.
spathulata, *DC. Syst.* ii. 227.—Am. austr.
spathulata, *Nutt. ex Torr. &• Gray, Fl. N. Am.* L 81.—Am. bor.
Stelleri, *DC. Syst.* ii. 212.—As. bor. or.
stellulata, Deav. & Berthol. in Desv. Toum. Bot ii. (1813) 76=pumila.
stenocarpa, Boiss. & Sent. Diagn. PI. NOT. Hisp. 1 = saxatilis.
stenopetala, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 16.—Hab.f
Steveniana, *Rupr. Fl. Cauc.* 289.—Reg. Cane.
stolonifera, Clairv. ex DC. Syst it 233 = HallerL
stolonifera, *Hornem. Hort. Hafn.* ii 618.—Hab. J
stricta, Costa, Ampliac. 22 = Costae.
stricta, *Huds. Fl. Angl.* 292.—Europ.; Am. bor.
stricta, Sieber, ex Tauseh, in Flora, xix. (1886) II. 106 =alpestris.
subcoriaeea, Gren. ex Nym. Consp. 84=bellidifolia.
snbnivalis, *Bruegg. injahresb. Naturf. Ges. Graub.* IL xxv. (1882) 88.—Europ.
subnitens, Jord. Diag. i. 121=alpestris.
subpinnatifida, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 363.—Am. bor. occ
sudetica, Tausch, in Flora, xix. (1886) II. 107 = hirsuta.
sueeica, Fries, Summa Veg. 30, 147= Sisymbrium suecicum.
suffrutescens, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 362.—Am. bor. occ.
sulphurea, *Boiss. Fl. Orient,* i. 173.—Persia.
supina, Lam. Fl. Fr. ii. 612—Sisymbrium supinum.
syhmstris, Scop. Fl. Cam. ed. IL ii. 32 = Brassica Cheiranthos.
taraxaeifolia, T. Anders, in Hook. f. Fl. Britlnd. i. 136 = arvensis.
tatarica, Pall. Reise, ii. 676 = Parrya macrocarpa.
tenella, 6«a. *V Tenore, Fl. Neap. Syll. App.* v. 20.—Lucania.
tenella, Host, FL Austr. ii 273 = Halleri.
Tenorii, Huet, ex Nym. Consp. 34 =albida.
Thaliana, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 89=petraea.
Thaliana, Linn. Sp. PI. 665 = Sisymbrium Thalianum.
Thomsoni, Hook. f. & Thorns, in Jonm. Linn. Soe. v. (1861) 116=tibetica.
thyrsoidea, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. t. 642=albida.
tibet ica, *Thomson in Hook. f. Jour. Linn. Soe.* v. (1861) 148.—Reg. Himal.
toxophylla, Bieb. FL Taur. Cwc. iiL 448-Sisymbriom toxophyllum.
transsilvanica, Schur, Enum. PL Transs. 48=petraea.

ABABIS:—
trichopoda, *Turct. in Butt. Soe. Nat. Mosc.* (1840) 68.—Rossia.
tuberosa, Muhl. ex Pen. Syn. ii. 204 = Cardamine rhomboidea.
Turczaninowil, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 123.—Sibir.
Tunita, *Linn. Sp. PI.* 665.—Europ.; Oriens.
Turritis, [Clairv.] Man. Herb. 228=A. Turrita.
umbrosa, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fast i. 48; ed. II. 11=A. Tunita.
umbrosa, Turcz. ex Steud. Nom. ed. I. ii. 118=petraea.
undulata, Link, Enum. Hort. Berol. ii 161=* alpina.
uralensis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 120=petraea.
verna, *R. Br. in Ait. Hort. Km.* ed. II. iv. 105.—Reg. Mediterr.
vesula, Jord. Diag. i. 128=alpestris.
violacea, Moench, Meth. 259=vema.
virescens, Jord. Diag. i. 109=Gerardi.
virginica, Foir. Encyc. Suppl. i. 413=Cardamine hirsuta.
viscosa, DC. Syst ii. 216=albida.
vochinensis, *Spreng. Pugill.* i. 16. n. 81.—Austria.
wolgensis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross, i 185=Sisymbrium toxophyllum.
yokoscensis, *Franch. &* Sav. Enum. PI. Jap.* i. 84.—Japon.
Zeyheriana, *Tuna, in Bull. Soe. Nat. Mosc.* xxvii. (1851) II. 292.—Afr. austr.

ARABISA, Reichb. Handb. 260 (1887)-Arabia, Linn. (Cracif.).

ARACHIDNA, Plum, ex Moench, Meth. 121 (1791) = Arachis, Linn. (Legum.).
hypogaea, Moench, 1. c. 122=Arachis hypogaea.
quadrifolia, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. *I* Art. IV. 7.—Malaya.

ARACHIS, Linn. Syst. ed. I. (1735). *LEGVMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 618.
ARACHIDNA, Moench, Meth. 121 (1791).
MUNDUBI, Adans. Fam. ii. 323 (1763).
africana, Bum. f. Fl. Cap. Prod. 22=Voandzeia subterranea.
africana, Lour. FL Cochinch. ii. 430 = hypogaea.
americana, Tenore, in Mem. 1st. Incorr. I. (1811) 48 = hypogaea.
aprica, Walt. Fl. Carol. 188 = Stylosanthes elatior.
asiatica. Lour. Fl. Cochinch. ii. 480=hypogaea.
fruticosa, Retz. Obs. Fasc. v. 26—Stylosanthes mucronata.
glabrata, *Benth. in Trans. Linn. Soe.* zviii (1811) 159.—Bras.
hypogaea, *Linn. Sp. PI.* 711.—Reg. trop. (cult),
marginata, *Gardn. in Hook. Ic. Pl.* t. 600.—Bras,
prostrata, *Benth. in Trans. Linn. Soe.* xviii. (1811) 159.-Bras.
pusilla, *Benth. I. c*—Bras,
tuberosa, *Benth. 1. c.*—Bras,
villosa, *Benth. I.* c—Am. austr.

AKACHWANTHB, Bltune, RumphU, iv. 55. t. 196 (1828). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii 672.
AKACHNIS, Blume, Bijdr. 865 (1825).
ARMODORUM, Breda, Orch. Kuhl. *Sc* Hass. (1827).
ARRHYNCHIUM, Lindl. in Paxt. Fl. Gard. i. 142 (1851).
ESMERALDA, Reichb. f. Xenia Orch. ii 38 (1874).
bilinguis, *Benth. in Journ. Linn. Soe.* xviii. (1881) 332.—Ind. or.
Cathcartii, *Benth. tf Hook. f. Gen.* iiL 673.—Rep. Himal.
Lowei, *Benth. V Hook.f. I. c*—Borneo,
moschifera, *Blume, Rumphia,* iv. 56.—Malaya.
Snlingi. *Benth. in Journ. Linn. Soe.* xviii. (1881) 332.—Malaya.

ARACHNE, Neck. Elem. ii. 348 (1790) - Andrachne, Linn. (Euphorb.).

ARACHNIMORPHA, Desv. in Ham. Prod. FL Ind. Occ. 28 (1825)=Bondeletia, Linn. (Rubiac).
incana, Ham. 1. c.=R. incana.

ARACHNis, Blume, Bijdr. 865 (1825)=Araohnanthe, Blume (Orchid.).
moschifera, Blume, I. c.=Arachnanthe moschifera.

ARACHNITES, F. W.Schmidt, Fl. Boëm. i. 74 (1798) = QphryB, Linn. (Orchid.).
alpina, F. W.Schmidt, 1. c. = Herminium alpinum.
anthropophora, F. W. Schmidt, 1. c 77 = Aceras anthropophora.
apifera, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 180=O. apifera.
atrata, Tod. Hort Panor. ii. t 28=0. aranifera.
Benoitii, Tod. 1. e.—Hab. I
Bertolonii, Tod. Orch. Sicul. 79=O. Bertolonii.
Biancae, Tod. 1. c. 83=O. Biancae.
bombyliflora, Tod. 1. c. 91 = 0. bombyliflora.
fudflora, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 76=0. Arachnites.
fusca, Tod. 1. c. 98 = 0. fusca.
Insengae, Tod. Nouv. Gen. 12=O. Inzengae.
lunulata, Tod. Orch. Sicul. 77=0. lunulata.
lutea, Tod. 1. c. 95 - O. fusca.
Monorchis, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 179 - Henninium Monorchis.
musdflora, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 75-O muscifera.
oxyrhynchus, Tod. Orch. Sicnl. 81-0. Arachnites.
pallida, Tod. 1. c. 100 = O. pallida.
Speculum, Tod. 1. c. 98=0. Speculum.
tenthredinifera, Tod. 1. c. 85 = 0. tenthredinifera.

ABACHNITIS, Phil, in Bot. Zeit. 217 (1864). *BURMANNIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 460.
nniflora, *Phil. I. c*—Chili.

ARACHNOPOGON, Berg, ex Haberl, Cat Pesth.; ex Steud. Nom. ed. II. i 118 (1840), nomen.
heterospermum, Berg, 1. c—Hab. 1

ARACHNOSPERMUM, Berg (sec. Steud. Nom. ed. IL i. 118) = HypocbaeriB, Linn. (Compos.).

ARACHNOSPERMUM, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. 271 (1795) = Boorzonera, Linn. (Compos.).
laciniatum, F. W. Schmidt, 1. c.-S. laciniata.
resedifolium, F. W. Schmidt, 1. c.-praec t

ARACHNOTHRIX, Walp. Ann, ii. 776 (1862) =seq.

ARACHNOTHRYX, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. v. (1849) sub t. 442=Bondeletia, Linn. (Rubiac.).
buddleioides, Planch. 1. c. = R. buddleoides.
discolor, Planch. 1. c.-R. discolor.
elongata. Planch. 1. c. = R. elongata.
hispidula, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 825.—Ind. occ.
laniflora, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. v. (184U) subt 442 = R. laniflora.
leucophylla, Planch. 1. c.-R. leucophylla.
refiexa, Planch. 1. c. = R. reflexa.
rosea, Linden, Hort. Linden. (1869) 3.—N. Granat.

ARACHUS, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii-(1787) 360=Viola, Tourn. (Legum.).
mcioides, Medic. 1. c.=V. bithynica.

ARACIUM, Neck. Elem. i. 49 (1790) = Orepie, Linn-(Compos.).
alpinum, Monn. Ess. Hierac. 73 = C. alpina.
aureum, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1829 = C. aurea.
ehondrilloides, D. Dietr. 1. c. 1830=C. Jacquini
eydoniaefolium, D. Dietr. 1. c=Hieracium cydoniaefolium.
Froelichianum, D. Dietr. 1. c.-=C. incamata.
Gmelini, D. Dietr. 1. c. = C. Gmelini.
incarnatum, D. Dietr. 1. c 1329 = C. incamata.
laevigatum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 111=C. laevigata.
lyratum, Herd, in Bull. Soe. Nat Moscxliii. (1870) l-214=C. lyrata.
mauritianum, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1330=C. mauritanum.
multicaule, D. Dietr. 1. c.-C. multicanlis.
paludosum, Monn. Ess. Hierac. 73 - C. paludosa.
Pancicii, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-iv. (1866) 820.—Europ.
praemorsum, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1829 =-C. praemorsa.
prenanthoides, D. Dietr. 1. c. 1880-Hieracinm prenanthoides.
pubescens, C. Koch, in Iinnaea, xxiii. (1850) 681--' As.Min.?
pygmaeum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 111 = C. nudicanlis.
succisaefolium, D. Dietr. Syn. PL iv. 1380=C. succisaefolia.

ARAEOCOCCUS, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. jv. (1841) 370. *BROMELIACEAE*, Berth. & Hook. f. iiL 664.
micranthus, *Brongn. I. c*—Guiana.

ARAGUS, Steud. Nom. ed. II. i. 118 (1840) - ARAGALLUS, Nedc-AfltragalUB, Toum. (Legumin.).

AEALIA, Tonm. ex LUm. Syst. ed. I. (1785); Gen. ed. I- 88 (1787). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i.986.
AURELIANA, Lafit ex Catesb. Nat. Hist. Carol. App. 16 (1754).
BLAKWELLIA, Scop. Introd. 326 (1777).
DIMORPHANTHUS, Miq. Comm. Phyt. 95 (1840).
GYNAPTEINA, Spach, Hist. Veg. Phan. viii. 118 (1839).
MOTHERWELLIA, F. Muell. Fragm. vii. 107 (1870).
NALAGU, Adans. Fam. ji. 445 (1768).
"kyssinica, Hochst.ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 886 — Heptapleurnm abyssinicum.
"cerifolia, Willd. ex Roem. *8c* Schult. Syst. vi. 699 = Oreopanax acerifoliam.
oculeata, Ham. ex Seem, in Joura. Bot vi. (1868) 186 -Brassaiopsis aculeata.
«*«/,W,a, WiUd. ex Roem. & Schult. Syst. vi. 697= Brassaiopsis acnleata.
"npdaris, Willd. 1. c. 698=Oreopanax angulare.
"rborea, Linn,Pl. Jam. Pugill. ii. 11; Syst. ed. X. 967 =Dendropanax arborenm.
arborea, Veil. FL Flum. 129: iii. t. 110-Gilibertia brasiliensis.
"rgentata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 4=Oreopanax argentatum.
"gentea, *Linden, Cat.* n. 18. p. 7.—Hab. ?
annata, *Seem, in Joum. Bot.* vi. (1868) 184.-Ind. or.
"romatica, Blume, Bijdr. 271 *(=Agalma aromaticum).* —Java.
avcenniaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 2. t 2 = Oreopanax avicenniaefoUum.
"astardiana, Decne. Bot Venus, 24 = Panax Bastardianum.
Mfinnata, Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Reinw. 83=montana.
aptnnata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 222 = javanica.
WpinnatindX *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* u. 722.—Reg. Himal.
•"evifoUa, *March, in Bull. Acad. Belg.* Sér. n. xlvii. (1879) 74—Mexic.
ca*emirica.2)«oi*. *in Jacquem. Voy. Bot.* 72. t 81—^eg. Himal.
<aWbrnica, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 144. —Calif.
calyculata, Zoll. *Sc* Morita, Syst Vera. Zoll. 41«=Maeropanax oreophilum.
'anescens, Sieb. *Sc* Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 94 = spmosa.
'"pitata, Jacq. Enum. PI. Carib. 18-Oreopanax capitatum.
«Pitulata, *Jungh. &• De Vriese, in Ann. Sc.Nat.* Sir. "I. vi. (1846) 116—Sumatra.
"Xalpatfolia, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. VL 697 —Oreopanax capitatum.
<*nrophyll„* Spreng. Syst. i 958=Oreopanax cheirophyllum.
'Mnensis, Blume, Bijdr. 87O=dasyphylla.
'?*?/»«*. Linn. Sp. PI. 278=spinosa.
oanfolia, *Griff, ex Seem, in Jmrn. Bot.* vi. (1868) 184. —Reg. Himal.
"'Meata, Lam. Encyc. i. 224=Panax cochleatum.
wraata, *Thunb. Fl. Jap.* 127.—Japon.
"assi/oHa, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat Hist. H. (1889) 214=Pseudopanax crassifolium.
crasnnervia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. v. 5 = Oreopanax crassinervium.
tfnanensis, H. B. *Sc* K. 1. c. 3 = Oreopanax cumanense.
OMyphyUa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 751.-Java.
Oecaisneana, Hance, in Jonm. Bot iv. (1866) 172 = spbosa.
decomposita. *Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Reinw.* o4,—Java.
*£rara, Roxb. Hort Beng. 22 j Fl. Ind. ii. 107 = tteptapleunun venulosum.
"gtota, Willd. ex Roem. *8c* Schult. Syst. VL 701 = Oreopanax xalapense.
ttscolor, H. B. *Sc* iLNov. Gen. et Sp. v. 4 = Oreopanax discolor.
Asppma, Blume, Bijdr. 872 - Macropanax oreophilum.

ABAIIA:-
dubia, Spreng. Syst. iv. Cor. Post. 125-Trevesia palmata.
Echinops, Cham. & Schlecht in Linnaea, v. (1830) 409 = Oreopanax Echinops.
edulis, Sieb. *Sc* Zncc Fl. Jap. i.' 57. t. 25=cordata.
elata, Seem, in Joum. Bot. vi (1868) 184-spinosa.
elegantissima, *Veitch, in Gard. Chron.* (1878) 782—Hab.?
erinacea, Hook, in Brewst Edinb. Joum. Sc. vi. (1827) 64 - Fatsia horrida.
Faribnki, *Sieb. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 16.—Japon.
farinosa, Delile, ex Fen. *Sc* Galin. Voy. Abyss, iii. 135 =Panax pinnatum.
ferox, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 750—Malaya.
ferruginea, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 701= Stiadophyllum fermgineum.
filicifolia, *Chr. Moore, ex Fourn. in Illustr. Hortic.* xxiii. (1876) 72. t. 240.—Ins. Pacif.
Finlaysoniana, *Seem, in Journ. Bot.* vi. (1868) 184.— Ind. or.
floribunda, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. v. 6. t 416 - Oreopanax floribundum.
foliolosa, *Seem, in Joum. Bot.* vi. (1868) 184.—Reg. Himal.
fragrans, G. Don. ex Loud. Hort. Brit 112-Heteropanax fragrans.
Gemma, *Linden.—Cf. Gard. Chron.* (1880) II. ISO.— N. Caled.
georgica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 8.—Am. bor.
GhiesbrechHi, Versch. ex Morr. in Belg. Hortic. xiii. (1808) 8=Oreopanax xalapense.
Ginseng, *Baill. Hist. PI.* vii. 197.—China.
glomerulata, Blume, Bijdr. 878 = Brassaiopsis speciosa.
gradllima, Linden, in Rev. Hortic. (1877) 88 = Veitchii.
grandis, Miq. Comm. Phyt 95= elata.
Guilfoylei, *Cogn. V March. PI. Ornem.* ii. (1874). t 58—Ins. Pacif.
heptaphylla, Willd. ex Spreng. Syst. i. 952=Sciadaphyllum ferrugineum.
heterophylla, A. Cunn. ex Hook. Ic. PL t. 683-584= Pseudopanax crassifolium.
heterophylla, Mutis, ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.v. 1=Oreopanax Mutisianum.
heterophylla, Willd. ex Roem. *8c* Schult Syst. vi. 698 = Oreopanax acerifolium.
hispida, *Vent. Jard. Cels,* t. 41; *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 185.—Am. bor.
Humboldtiana, Roem. *Sc* Schult Syst vL 699-Oreopanax floribundum.
humilis, *Cat. Ic.* iv. 7. t 818.—N. Mexic.
hypoleuca, Presl, Epim. Bot. 250=spinosa.
incisa, Willd,ex Roem. *Sc* Schult Syst vi. 699-Oreopanax floribundum.
japonica, Hort. ex Seem, in Joum. Bot. vi (1868) 135 =Leroana.
japonica, Thunb. FL Jap. 128 = Fatsia japonica.
jatrophaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 6 = Oreopanax jatrophaefolium.
javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 749.—Java.
Kleinii, Steud. Nom. ed. II. i. 118-Miquelia Kleinii.
laetevirens, C. Gay, Fl. Chil. iii. 151 *(=Cheirodendron laetevirens).*—Chili,
lappaefolia, *Raeusch. Nom.* ed. III. 88; *et Ret*. Obs.* vi. 27.—Ind. or.
Laribuki, *Keiske, ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 16.—Japon.
lati/olia, Wight *8c* Am. Prod. 876=Polyscias pinnata.
Leroana, *C. Koch, Wochenschr.* vii. (1864) 869.—Am. bor.
Lessoni, Hook. f. FL Nov. Zel. 96=Pseudopanax Lessoni.
longifolia, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1035—Java.
longifolia, Reinw. ex App. Hort. Spaara. Berg. 2-Brassaia littorea.
lucescens, Blume, Bijdr. 872 (=Heptapleuri sp.).—Java,
lucida, *Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt.* 164.—Malaya.
lutescens, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. err. typ.= Incescens.
Lyallii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 222, 295-(Pseudopanscis sp. ?).—N. Zel.
macrophylla, A. Cunn. in Sweet, Hort. Brit Suppl. i. 501=Merytalatifolia.
macrophylla, Lindl. in Bot. Reg. (1844) Misc. 78 - cachemirica.

ATrATTA:—
malabarica, *Bedd. Fl. Syh.* ii. 151—Ind. or.
mandschurica, Seem, in Journ. Bot. vi. (1868) 184 = spinosa.
mandshurica, *Rupr. in Bull. Acad. Pttersb.* xv. (1856) 134—As. or.
Maralia, Roem. & Schult. Syst. vi. 704 - Panax Maralia.
Maximowicni, Van Hontte, Fl. des Serres, *Sir.* II. xx. (1874) 89. t. 2067=Acanthopanax ricinifolium.
micans, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 701 - Panax splendens.
Mitsde, Siebold, in Linnaea, xxvi. (1858-65) 754 - Dendropanax japonicum.
monogynia, Veil. Fl. Flum. 129; iii. t 111 =• Gilibertia monogyna.
montana, *Blume, Bijdr.* 870.—Java.
Moorei, F. Muell. Fragm. ii. 108 - Heptaplenmm venulosum.
Motherwelli, *F. Muell. I. c.* vii. 107.—Austral.
Muehlenbergiana, Roem. *8c* Schult. Syst vi. 704» hispida.
mtdtiflora, Pohl.ex DC. Prod. iv. 262=Oreopanax capitatum.
Mutisiana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 1-Oreopanax Mutisianum.
nobilis, *Hort. Williams.—Cf. Gard. Chron.* (1878) II. 56; (1880)1. 769—Hab. ?
nodosa, Blume, Bijdr. 87S=Polyscias nodosa.
nudicaulis, Blume, 1. c. 870=cordata.
nudicaulis, *Linn. Sp. PI.* 274.—Am. bor.
nutans, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 876— Japon.
obtusiloba, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 6-Oreopanax obtusilobum.
occidental, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 376 - Fatsia horrida.
octonata, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 181 - Heptapleurum octophyllum.
octophylla, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 158 = Heptapleurum rigidum.
octophylla. Lour. Fl. Cochinch. i. 187 - Heptaplenmm octophyllum.
palmata. Lam. Encyc. i. 224 = Trevesia Zippeliana.
palmata, Lour. Fl. Cochinch. 187=Brassaiopsis Hainla.
palmata, Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat Reinw. 82 =Trevesia sundaica.
palmata, Willd. ex Roem. *8c* Schult Syst. vi. 699 = Oreopanax cheirophyllum.
paniculata, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 694 = Panax valdiviense.
papyri/era, Hook. Kew Joum. iv. (1852) 50 = Fatsia papyrifera.
parvifolia, *Panch. V Sebert, Not. Bois. Nouv. Calid.* 204—N. Caled.
pendulafiUnco, Fl. Filip. ed. 1.223 -Polysdas nodosa.
pennata, Poir. Encyc. Suppl. L 418, sphalm.= Trevesia palmata.
pentaphylla, Thunb. FL Jap. 128 - Acanthopanax spinosum.
pergamacea, Blame, Bijdr. 878=Heptaplenmm pergamaceum.
pinnata, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 335— Abyss.
pinnatifida, Jungh. *8c* De Vriese, in Ann. Sc. Nat. Se>. III. vi. (1846) 116=Aralidinm pinnatifidum.
Planchoniana, Hance, in Joum. Bot iv. (1866) 172 = Acanthopanax spinosum.
platani/olia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. v. 6 = Oreopanax platanifolium.
polaris, Hombr. & Jacqninot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zel. 55=Stilbocarpa polaris.
Polyscias, Spreng. ex Seem, in Joum. Bot vi (1868) 188 = Polyscias umbellata.
Pseudo-ginseng, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 721—Reg. Himal.
pubescens, DC.Cat. Hort. Monsp. (1818) 80=humilis?
quinduensis, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 8 = Sciodaphyllum quinduense.
quinquefolia, *Decne. V Planch, in Rev. Hortic.* Se>. IV. iii. (1854) 106—Am. bor.
racemosa, *Linn. Sp. PI.* 278.—Am. bor.
ramiflora, Pohl, ex March, in Mar! Fl. Bras. xi. i, 260 = Gilibertia cuneata.
Regeliana, *March, in Bull. Acad. Belg.* Sir. II. xlvii. (1879) 78.—Mexico.
Reinwardtiana, Seem, in Joum. Bot. vi. (1868) 138 —Trevesia sundaica.

ABALIA:—
reticulata, Willd. ex Roem. & Schult. Syrt. vi. 699 = Oreopanax reticulata.
rigida, Blume, Bijdr. 874 = Heptapleurum rigidum.
rugosa, Blume, 1. c. 872 (= Heptapleuri sp.).—Java,
lalicifolia, *Vent, ex Seem, in Journ. Bot.* vi. (1868). 188.—Hab. ?
scabra, Presl, ex DC. Prod. iv. 258-pubescent
scandens, Poir. Encyc. Suppl. i. 419= Brassaiopsis Hainla.
Schefflera, Sprang. PI. Pugill. *i.* 28=Schefflera digitata.
Sciodaphyllum.Sw. Prod. Veg.Ind. Occ. 56=Sciodaphyllum Brownei.
septemnervia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 8 = Oreopanax capitatum.
Sieboldii, Hort. ex C. Koch, Dendiol. i. 678 = Fatsia japonica.
simillima, Blume, Bijdr. 871(= HepUpleurisp.).—Java,
soratensis, *March, in Bull. Acad. Belg.* Sér. II. xlvii. (1879) 75.—Bolivia.
spectabilis, Hort. Bull.—Cf. Gard. Chran. (1876) 1.60S = filifli .
ipinosa, *Linn. Sp. PI.* 273.—Am. bor.
tarchonanthifolia, Willd. ex Roem.& Schult. Syst. vi. 698 = Oreopanax avicenniaefolium.
tenuifolia, *Puncher, ex Baill. Adansonia,* x. (1871-72) 372.—N. Caled.
Thibautii, *Versch. ex Morr. in Belg. Hortic.* xiii. (1868). —Mexic.
Thomsonii, *Seem, in Journ. Bot.* vi. (1868) 134.—Reg. Himal.
trifolia, Banks *8c* Soland. ex Walp. Ann. v. 84 = Pseudopanax crassifolium.
trifolia, *Decne. V Planch, in Rev. Hortic.* Sér. IV. iii. (1854) 105.—Am. bor.
tri/oliata, Meyen, Reise, ii. 832 = Acanthopanax aculeatum.
trigyna, Gaudich. Voy. t. 98 (=Panacis sp.).—Hab.?
triphylla, Poir. Encyc. Suppl. i. 418=trifolia.
tripinnata, Blanco, Fl. Filip. ed I. 223-Panax fruticosum.
turbacensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 8 = Oreopanax turbacense.
umbellata, Pav. ex Seem, in Joum. Bot. vi. (1868) 138 = Gilibertia umbellata.
umbellata, Pohl, ex March, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 250 — Gilibertia cuneata.
umbellifera, Lam. Encyc. i. 225=Osmoxylon amboinense.
umbraculi/era, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. iii. 108 = Polyscias nodosa.
urticaefolia, *Blume, ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. , Bat.* i. ».—Hab.?
valdiviensis, C. Gay, Fl. Chil. iii. 152=Panax valdiviense.
Veitchii, *Hort. ex T. Moore, in Flor. V Pom.* (1874) 5. —Hab. ?
vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. ExpL Exped. i. 715 = Schefflera vitiensis.
Wallichiana, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1035.—Ind. or.
xalapensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 8. -Oreopanax xalapense.

ABAI.IDIUM, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.762. t IS (1855). *ARAUACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 936.
dentatum, *Miq. Fl. Ind. Bat. SuppL* 840.—Sumatra,
pinnatifidum, *Miq. I. c.* i. I. 763. t. IS.—Malacca.

ARALIOPSIS, Kun, inAndam.Rep. 39 (1870) -Brass-Baiopsis, Decne. & Planch. (Araliac).
andamanica, Kurz, 1. c. = B. palmata.

ARAPABACA, Adam. Fam. ii. 225 (1763)-8pigelia, Linn. (Logan.).

ARARIBA, Mart, in Siub. Acad. Muench. (1860) 323 -Sickingia, Willd. (Rubiac.).
alba, Mart 1. c. 324.—Bras.
rubra, Mart. 1. c.—Bras.

ABABOCABPUS, Scheff. in Ann. Jard. Buiteni. ii. (1885) 10. *ANONACEAE.*
velutinus, *Scheff. I.* c—Java.

ARASCHCOOLIA, Sch. Bip. PI. Kotsch. Nub. Exs. n. 101 (1873); ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 337-Greigeria, Griessel. (Compos.).
acaulis, Sch, Bip. ex Oliver, Fl. Trap. Afr. iii. 868-G. acanlis.

ABAUCAHIA, Juss. Gen. PI. 413 (1789). *CONIFERAE,* Benth. & Hook. f. iii. 437.
ALTINGIA, Loud. Hort. Brit. 403 (1830).
COLUMBEA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 817.
DOMBEYA, Lam. Encyc. ii. 301. t. 828 (1786).
EUTACTA, Link, in Linnaca. xv. (1841) 548.
EUTASSA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 316.
QUADRIFARIA, Manetti, ex Gord. Pinet. Suppl. 14 (1862).
albospica, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 611 = excelsa.
araucana, C. Koch, Dendrol. ii. II. 206 = imbricata.
Balansae, *Brongn. V Gris, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xiii. (1870-71) 351.—N. Caled.
Bibbiani, Hort. Ital. ex Gord. Pinet. 24-brasiIiana.
Bidwillii, *Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 503. L 18, 19— Austral,
brasiliana, *A. Rich, in Did. Class. Hist. Nat.* i. 512.—Bras.
brasiliensis. Loud. Hort. Brit. 40S = praec.
chilensis, Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 49 = imbricata.
^*eolumnaris,* Hook, in Bot Mag. t. 46S5=Cookii.
Cookii, *R. Br. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xviii. (1841) 164.-N. Caled.
Cunninghamii, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 475.—Austral.
Dombeyi, A. Rich. Conif. 86. t 20 = imbricata.
elegans, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 415 = brasiliana.
excelsa, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 412.—Austral.; Ins. Norf.
glauca, Antoine, Conif. 105. t 44 = Cunninghami.
Goldieana, *Hort. ex T. Moore, Flor. tf Pom.* (1877) 89. - N . Caled.
gracilis, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 415—brasiliana.
imbricata, *Pav. in Mem. Acad. Med. Madr.* i. (1797) 199.—Chili,
intermedia, *R. Br. ex Vieill. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xvi. (18611 54.—N. Caled.
lanceolata, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 171 = Cunninghamia sincnsis.
Lindleyana, Van Houtte, ex Gord. Pinet 24 = brasiliana.
m on tana, *Brongn. b" Gris, in Ann. Sc. Nat.* Sir. V. xiii. (1870-71) 358.—N. Caled.
Muelleri, *Brongn. V Gris, 1. c.* 362.—N. Caled.
Ridolfiana, Savi f. in Atti Firenz. (1841) 458 et 788; et Giom. Bot Ital. ii. (1846) fasc. i. 52-brasiliana.
Rulei, *F. Muell. ex Lindl. in Gard. Chron.* (1861) 868. - N . Caled.
Saviana, *Part, in Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 89.—Bolivia.
subulata, *Vieill. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvi. (1861) 55.—N. Caled.

ARAUCASIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 919 (1888), s^Aa/m.= ARAUSIACA, Blume = Orania. Zipp. (Palm.).

ABAUJIA, Brot. in Trans. Linn. Soc. xii. (1818) 62. *ASCLEPIADEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 761.
LAGENIA, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 293 (1885).
PENTAPHRAGMA, ZUCC. ex Reichh. Consp. 131 (1828).
PHYSIANTHUS, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 53. t. 32 (1624).
SCHUBERTIA, Mart. L c. 55. t. 33 (1824).
albens, G. Don, Gen. Syst. iv. 149-seridfera.
angustifolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 119.—Bras.
calycina, Decne. in DC. Prod. viii. 534—sericifera.
fusca, Griseb. ex Lorentz, in Goett. Abh. xxiv. (1879) 232 - megapotamica.
hortornm, *Foum. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 298.—Bras.
megapotamica, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 149.—Bras,
sericifera, *Brot. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 62.—Peruv.
subhastata, *Foum. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 293.—Bras.
undulata, Visiani, Hort Patav. (1832) 134=hortorum.

ARAUSIACA, Blume, Rumphia, in praef. p. 8. (1836) tt 119, 122=Orania, Zipp. (Palm.).
excelsa, Blume, L c = O. regalia.

ABBUTUS, [Tonrn.] linn. Syst. ed. I (1735). *ERICACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 581.
UNEDO, Hoffmgg. & link, Fl. Port. i. 415 (1809).
acaditnsis, linn. Sp.PL 396 (plants obtcura).—Am. bor.

ARBUTUS:—
acerba, Gilib. Fl. Litoan. i. 5 = Arctostaphylos Uva-ursi.
alpina, Linn. Sp. PI. 895 = Arctostaphylos alpina.
Andrachne, *Linn. Syst.* ed. X. 1024. n. 488.—Reg. Mediterr. or..
andrachnoides x, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 395.—Hab. <
arguta, Zucc. ex Steud. Nom. ed. II. i. 120, 119 = Arctostaphylos arguta.
buxi/olia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 509 - Arctostaphylos Uva-ursi.
Callicarpa, Buch, Canar. 146-canariensis.
canadensis, *Poir. ex Steud. Nom.* ed. I. 62.—Canada,
canariensis, *Duham. Arb.* cd. II. i. 80.—Ins. Canar.
cassinifolia, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 119.—Ins. Madera.
coriacea, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 67 = Vaccinium Kórth.ilsii.
crispa, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. (1824) 204 = A. Unedo.
Croomii, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1884) II. 492 = A. Unedo.
densiflora, Benth. PI. Hartw. 15-glandulosa.
densirlora, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 280. t. 260. —Mexic.
discolor, Hook. Ic. PI. t. 29 = Arctostaphylos arguta.
empetri/olia, Pers. Sjn. i. 488 = Peraett)a empelrifolia.
ferruginea, *Linn./. Suppl.* 238.—Reg. Colomb.
fili/ormis, Lam. Encyc. i. 228 - Chiogenes serpyllifolia.
floribunda, *Mart, £* Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. (1842 534.—Mexic.
furiens, *Hoot. Bot. Beech. Voy.* 38.—Chili,
glabemima, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (17»«; ed. I. Art. IV. 6.—Malaya,
glandulosa. *Mart,* b* *Gal. in Bull. Acad. Brux.* (1842) 533.—Mexic.
herpetica, Coleb. ex Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 412=Pieris ovalifolia.
hybrida, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 619 - andrachnoides-.
integri/olia, Lam. Encyc. i. 227 = A. Andrachne.
integri/olia, Sieber, ex Klotzsch, in Liunaea, xxiv. (1851)71 = Sieberi.
integri/olia, Sims, Bot. Mag. t. 2819-A. Unedo.
intermedia, Heldr. ex Nym. Consp. 400 = A. Unedo.
lanceolata, Lam. Encyc i. 227 — Prunus caroliniana.
lauri/olia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep-151 = Gaultheria fragrantissima.
lauri/olia, Linn. f. Suppl. 238 (Cf. A. Gray, Syn. H. N. Am. ii. I. 896) = A. *Vuedo.*
lauri/olia, Lindl. Bot. Reg. (1839) t. 67 - xalapensU.
laurina, *Mart. If Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. (1842 535.—Mexic.
leucocarpa, Poepp. *8c* Kunze, ex DC. Prod. vii. 686 * Pernettya leucocarpa.
longi/olia, Andr. Bot. Rep. x. 664-canariensis.
lucida, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 119 - A. Andrachne.
macrophylla. *Mart.* 6* *Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix-(1842) 534.-Mexic.
Madrono, Humb. Nouv. Espagne, ii. 454, ex H. B. & K-Nov. Gen. et Sp. iii. 2t;2 = Arctostaphylos pungens.
Menziesii, *Pursh, Fl. Bor. Am.* i. 282.—Am. bor.; Mexic.
microphylla, Foist, f. in Comm. Gotting. ix. (1789) »-— Pernettya microphylla.
microphylla, Hort—Cf. Gard. Chron. (1884) II. 49 - A. Unedo.
Milleri, *Sveet, Hort. Brit.* ed. II. 331.—Oriens.
mollis, *H. B. &" K. Nm. Gen. et Sp.* iii. 281. t. 26'.'.—Mexic.
mucronata. Linn. f. Suppl. 289 = Pemettya mucronata.
myrti/olia, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 120,119 - Arctostaphylos pungens.
myrtilloides, Humb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 119 ' Vaccinium stamincum.
myrtilloides, Poepp. ex DC. Prod. vii. 593 - Pernettya myrtilloides.
nuda, Steud. Nom. ed. II. i. 119 - Arctostaphylo* pungens.
obtusifolia, *Rafin. Fl. Ludav.* 55.—Am. bor.
officinalis, Boi». Fl. Orient, iii. 967 - Aretoitaphylos Uva-ursi.
ovata, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* (1842 533.-Mexic.
paniculate, *Mart, (f Gal. 1. c.* 535.—Mexic

ABBTJTTT8 :—
petiolaris, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 281.—Mexic.
phyllireaefolia, Pers. Syn. i. 483 = Pemettya phyllireaefolia.
pilosa, R. Grah. in Bot. Mag. t. 8177=Pemettya pilosa.
procera, Dong], ex Lindl. Bot. Reg. t. 1758-Menaiesii.
procera, Soland. ex DC. Prod. vii. 581=canariensis.
procnmbens, *Kluk, ex Bess. Fl. Galic.* ii. 355.—Galicia.
procumbent, Salisb. Prod. 289 = Arctostaphylos Uva-urei.
prostrata, Cav. Ic. vi. 43. t. 662 = Pemettya parvifolia.
Prunifolia, *Klottsch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 73.—Mexic.
pumila, Font. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) 32 = Peraettya cmpetrifolia.
Punctata, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 33.—Calif.
pungens, Hook. *Sc* Am. L c. 144 = Arctostaphylos Hookeri.
rigida, Banks, ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 826 = Perneltya mucronala.
ngida, Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Sc. Torin. xxxviii. (1835) 120 = Pemettya rigida.
ngida, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 120, 119-Arctostaphylos pungens.
rubescens, Bertol. Fl. Gnatimal. 20. t. 7=Arctostaphylos pungens.
, *Cels, ex Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* I. (1824) 204,-Oriens.
**°rpyllifolia*. Lam. Encyc. i. 225 = Gaultheria antipoda.
**erratifolia*, Lodd. Bot. Cab. t. 580=A. Andrachne.
frratifolia, Salisb. Prod. 288 = A. Unedo.
sibinca, *Forbes, Hort. Woburn.* 95, nomen.—Sibir.
!>teberi, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 71-A. Andrachne.
spinulosa, *Mart.* to[1] *Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. (1842) 532-Mexic.
texana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. '1861[1] (1862) 460 = MenziesiL
'hmifolia, Ait. Hort. Kew. ii. 72=Chiogenes serpyllhfolia.
'»w«iitea,Pursh,Fl.Am.Sept.i282-ArctosUphylos pungens.
turbinata, Pers. ex Reichb. Fl. Germ. Excnrs. i. 416 = A. Unedo.
Unedo, *Linn. Sp. PL* 395.—Reg. Mediterr.; Hibem.
Uva-ursi, Linn. 1. c. = Arctostaphylos Uva-ursi.
vanans, *Benth. PI. Hartw.* 77.—Mexic.
•*"rnalis*, Poepp. *Sc.* Endl. Nov. Gen. i.26. t. 42=Ganltheria vernalis.
«««<w$_a$, Willd. ex Klotzscb, in Linnaea, xxiv. (1851) 72=glandulosa.
**«lqpensis*, Andr. ex Hook. Ic PI. t. 27=Arctoslapnylos oaxacana.
«iipensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 279.—Mexic.
Mntaocarpa, *Wangen. Beitr.* 80.—Am. bor.

ARCANOELISIA, Becc. MalesU, i. (1877) 145. *MENISPERMACEAE.*
wclt *B EA*
Ijta, *Becc. 1. c.* 147.—Java; Celebes, lemnucata, *3ecc. 1. c*—N. Gum.

ARCAULA, Rafin. Alsog. Am. 30 (1888) = Quercus, Town. (Cupul.).
**P'cata*, Rafin. 1. c. = Q. spicaU.

ABCEUTHOBniM, Bieb. Fl. Tanr. Cane. Soppl. «?9 (1819). *LORANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. •u. 213.
KAZODMOWSKIA, Hoffm. ex Bieb. 1. c. (1619).
th'tinum, Eneelm ,in Proc. Am. Acad. viii. (1873) «01 = occidentale.
"'urieanum, Nutt. ex A. Gray, in Bost. Jonm. Nat. Hist. vi. (1850) 214 = A. Oxycedri.
canipylopodum, *A. Gray, I. c*—Am. bor.
ct>prnse, J. S. Pnsj, Rostl. ii. 28 = Viscum capense.
cryptopodum, A. Gray, in Bolt. Jonm. Nat. Hist. vi. .. (1850) 214-vaginatum.
wvancatnm, *Engelm. in Wheeltr, Rep.* vi. 253.—Am. bor.
Duglasii, *Engelm I.* c.-Am. bor.

ABCEUTHOBIUM :—
gracile, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 59.—Am. bor.
minutum, *Engelm. in Bull. Torrey Bot. Club*, ii. (1871) 43, 47.—Am. bor.
occidental^ *Engelm. ex S. Wats, in Bot. Calif*, ii 107. -Calif.
opuntioides, J. Presl, Rostl. ii 28 = Dendrophthora opuntioides.
Oxycedri, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* 629.—Europ.; Am. bor.
robustum, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 59.—Am. bor.
vaginatum, *J. Presl, Rostl.* ii. 28.—Am. bor.

ARCEUTHOBIUM, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 314 (1864) =Dendrophthora, Eichl. (Loranth.).
Bonaniae, Griseb. Cat. PI. Cub. 121 = D. Bonaniae.
cupressoides, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 315-D. cupressoides.
domingense, Griseb. Cat. PI. Cub. 121=D. domingensis.
Epiviscum, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 192-D. Epiviscum.
glaucum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 315 = D. glaucom.
gracile, Griseb. 1. c. = D. gracilis.
Mancinellae, Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub. 121 = D. Mancinellae.

ARCEUTHOS, Ant. *Sc* Kotschy, in Ocstr. Bot. Wocbenbl. (1854) 249 = Juniperufl, Linn. (Conif.).
drupacea. Ant *Sc* Kotschy, 1. c.=J. dmpacea.

ARCHAITQEIJCA, Hoffm. Gen. Umb. ed. I. 161 (1814); ed. II. 166 (1816). *UMBELUFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 917.
COEXOFLEURUM, Ledeb. Fl. Ross. ii. 361 (1844).
CZERNIAJEVIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most (188b) 93.
atropurpurea, *Hoffm. Gen. Umb.* 162.—Am. bor.
brevicaulis, *Reichb. f. in Journ. Bot.* xiv. (1876) 46.—As. temp,
commutata, *C. A. Mey. ex Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich*, xi. 13.—Kamtschatka.
decurreus, Ledeb. Fl. Alt. i. 316 = officinalis.
dentata, *Chapm. in Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 622.—Florida,
discocarpa, *Fries, in Bot. Notiser*, (1857) 60.—Europ.
Gmelini, *DC. Prod.* iv. 170.—Am. bor.; As. bor. occ.
hirsuu, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 622,—Am. bor.
inaequalis, *Maxim, ex Franch. b" Sav. Enum. PI. Jap.* j. 188.—Japon.
Keiskei, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii 62.—Japon.
littoralu, *Agardh, ex DC. Prod.* iv. 170.—F.uiop. arct.
major. Lag. Gen. et Sp. Nov. 13 = littoralis ?
noraegica, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, ii. 37 = officinalis.
officinalis, *Hoffm. Gen. Umb.* 162.—Europ.; Sibir.; Reg. Himal.
officinalis, Hook. Fl. Bor. Am. i 267 = Gmelini.
peregrina. Nun. ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 622 = Gmelini.
Roy lei, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 232 = officinalis.
sativa, Bess. Enum. 13= officinalis.
slavica, Reuss, *Kvit* SIov. (1853) 184-officinalis.
spuria, Wahlenb. Fl. Casp. 84, in obs.=littoralis.

ARCHEMORA, DC. Prod. iv. 188 (1830)=Peuoedanum, Linn. (Umbell.).
ambigua, DC. 1. c. — P. ternatnm.
denticulata, DC. 1. c.=P. tematum.
Fendleri, A. Gray, PI. Fendl. 56.—Texas.
rigida, DC. Mém. OmbelL 52; Prod. iv. 188-P. tematum.
ternata, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, FL N. Am. i. 681 = P. tematum.
tricuspidata, DC. Prod. iv. 188 = P. teraatnm.

ABCHEEIA, Hook. f. Fl. Tasm. i 262. t. 80, 81. *EPACRWEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 614.
eriocarpa, *Hook.f. 1. c.* 263. t. 80 B.—Tasmania,
hirtella, *Hook.f. 1. c.* t. 81.—Tasmania.
minor, Hook. f. 1. c. 264=serpyllifolia.

AKCHEKIA:—
raeemosa, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 180.—N. Zel.
serpyllifolia, *Hook. f. Fl. Tasm.* i. 263. t 80 B.—Tasmania.
Traversii, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 180.—N. Zel.

ARCHIDENDBON, F.Muell. Fragm. v. 5U (1865). *LEGUMINOSAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 1004.
Lacyi, *F. Muell. 1. c.* vi. 201.—Austral.
Vaillantii, *F. Muell. I. c.* v. 60.—Austral.

ARCHIMEDEA.Leandr. Sacram. ex A. St. Hit. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. vii. (1887) 32=Iiophophytum, Schott & Endl. (Balanoph.).
pyramidalis, Leandr. Sacram. 1. c. = L. mirabili.

ARCHITAEA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 116. t. 73 (1824)=Archytaea, Mart. (Teroslr.).,

ABCHONTOPHOENIX, H. Wendl. *Sc* Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 182. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 889.
Alexandrae, *H. Wendl. & Drude, 1. c.* 212.—Austral.
Cunninghamii, *H. Wendl. &• Drude, 1. c.* 214.—Austral.
Veitchii, *H. Wendl.* W *Drude, 1. c*—Hab.l

ABCHYTAEA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 117 (1824). *TERNSTROEM/ACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 188.
PLOIAROM, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 135. t. 25 (1842).
multiflora, *Benth. in Hook. Loud. Journ. Bot.* ii. (1843) 363.—Guiana,
sessilis, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxii. (1871) 406.—Malaya.
triflora, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 117.—Bras.
Vahlii, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. GenH.* xiv. (Ib65) 163.—Malaya.

ARCTAGBOSTIS, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 434 (1853). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1160.
latifolia, *Griseb. I. c*—Reg. Arct.

ARCTIO (et ARCT1ON), Lam. Encyc. i. 235 (1783) =Berardia, Vill. (Compos.).
lanuginosa, Lam. 1. c.»B. subacanlia.

ARCTIODRACON, A. Gray, in Mem. Am. Ac-.d. Ser. II. vi (1858-») 408=IiyBichitum, Schott (Aroid.).
camtschaticum, A. Gray, I.e. 409 =-L. camtschatense.
japonicum, A. Gray, 1. c.=L. camtschatense.

ARCTIUM, Lam. Fl. Fr. ii. 70 (1778)=Berardia, Vill. (Compost.
lanuginosum, I Jim. 1. c. = B. subacanlis.

ABCTIUM, Linn. Syst. ed. I (1736). *COMPOS1TAE*, Benth. & Hook. f. ii. 466.
LAPPA, Jnss. Gen. 173 (1789).
adhaerens, Gilib. Fl. Iituan.i. 182 = A. Lappa.
Bardana, Willd. Sp. PI. iii. 1682 = A. Lappa.
Carduelis, Linn. Mant. i 108 =Carduus arctioides.
conglomeration, Schur, ex Nym. SylL Suppl. 4 — minus.
eutninus, Syme, Engl. Bot. ed. III. v. 26=minns.
grandiflorum, Desf. Cat. Hort. Tar. ed. III. 154 = majus.
intermedium, Bab. in Ann. *Sc* Mag. Nat Hist. Ser. II. xvii. (1856) 374 = majus.
intermedium, Lange, Fl. Dan. t. 2663=nemorosum.
Lappa, Kalm, FL Fennic n. 449; Sm. EngL Bot. t. 1228=minus.
Lappa, Willd. Sp. PI. iii. 1631-majns.
Lappa, *Linn. Sp. PI.* 816 (=majus, minus, *Sec).* —Europ.
majus, *Bernh. Syst. Vert. Erf.* 154.—Europ.
minus, *Bernh. 1. c.*—Europ.
montanum, Schweig. ex Steud. Nom. ed. II. i. 120 = minus.
nemorosum, *Lejeune, in Reichb. Ic. Fl. Germ.* xv. 81. —turop.
Personata, linn. Sp. PI. 816 = Carduus Personata.

ABCTITTM: :—
Personata, Pall. Reise, iii. 439 (planta ignota).—Davnria.
pubens, Bab. in Ann. ft Mag. Nat. Hilt. Ser. II. xvii. (1866) 876=nemorosum.
ruderale, Salisb. Prod. 184 = A. Lappa.
tomentosum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 8; Bernh. Syst. Verz. Erf. 164=majus.

ARCTOCALYX, Fenzl, in Otto ft Dietr. Allg. Gartenz. xvi. 305 (1848)=Solenophora, Benth. (Gesner.).
Endlickeriahus, C. Heller, ex Fenzl, 1. c. 807-S. EndHcherlana.
insignis, Fenzl, 1. c. 806=S. insignis.

ARCTOCARPUS, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.666 (1837) = Artocarpus, Font. (Urtic.).

ARCTOGERON, DC. Prod. v. 260 (1886)= Aster, Linn. (Compos.).
gramineum, DC. 1. c. 261.—Sibir.

AECTOMECON, Ton. ft Frem. in Frtm. Rep. 312. t. 2 (1845). *PAPAVERACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 62.
califomicom, *Terr.* &" *Frim. I. c.*—Calif

ARCTOPHILA, Rnpr. in Beitr. Pfl. Rust Reich, ii. 82 (1845)-Poa, Linn. (Gram.).
fulva, Nym. Consp. 830 = P. fulva.
Laestadii, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, ii. 62=P. Laestadii.
pendulina, Nym. Consp. 830 •= P. Laestadii.

ABCTOPTTS, Linn. CoroIL Gen. 31 (1737); Hort Cliff. 495 (1787). *VMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 879.
APRADUS, Adans. Fam. ii. 102, 509 (1763).
Dregei, *Sond. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 666.—Afr. anstr.
echinatns, *Linn. Sp. PI.* 1058.—Afr. anstr.
monacanthus, *Carmich. ex Hare,* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 565.—Afr. austr.

AJtCTOBTAPHYIiOS, Adans. Fam. ii. 165 (1768). *ERICACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 581.
COMAROSTAPHYLIS, Zucc. in Abh. Akad. Muench. ii. (1837) 331.
DAPHNIDOSTAPHVLIS, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 78.
MAIRANIA, Neck. Elem. i. 219 (1790).
UVA-URSI, Tonm. ex Moench, Meth. 470 (1794).
1 XEROBOTXYS, Nntt. in Trans. Am. Phil. Ser. II. viii (1843) 267.
XYLOCOCCUS, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. viii. (1843) 258.
acuta, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. viii. (1843) 258-Hookeri!
alpina, Payot.—Cf. Bull. Soc Bot. Fr. xxix. (1882) Bibl. 43, *\apsw angustifolia.*
alpina, *Spreng. Syst.* ii. 287.—Am. bor. et arct.
Andeisonii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* ix. (1876) 88.—Calif,
angnstifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 278.—Mexic.
angusti/olia, Payot, Fl. dn Mont Blanc, Phan. 174 = A. Uva-ursi.
•rbutoides, *Hemsl. Bûd. Centr. Am. Bot.* ii. 278.—Guatemala,
arguta, *Zucc. in Linnaea,* xii. (1838) *Lift.* 86; *DC. Prod.* vii. 585.—Mexic.
attenuate, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 278.—Mexic.
bicolor, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 366.—Calil
Clevelandi, A. Gray, 1. c xii. (1877) 61=bicolor.
eordi/olia, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1791-tomentosa.
discolor, DC. Prod. vii. 585- arguta.
diversifolia, *Parry, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 897.-Calif.
glauca, *Lindl. Bot. Reg.* sub t 1791.—CaliC
glauca, S. Wats, in Bot. King, Exped. 210=pungens.
glaucescens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 278.—Mexic.
Hartwegiana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 278.—Mexic.
Hookeri, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 836.—Calif.
UUifoHa, Walp. Rep. ii 726-seq.

ARCTOSTAPHYI.O8 :—
ledifolia, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. (1842) 536.—Mexic
longiiolia, *Benth. PI. Hartm.* 44.—Mexic
mucronata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 279.—Mexic.
raucronifera, *DC. Prod.* vii. 585.—Mexic.
nevadensis, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 27.—Calif.
nitida, Benth. PI. Hartw. 66 - arguta.
nummularia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) S66.-Calif.
oaxacana, Benth. PI. Hartw. 45=Hartwegiana.
oaxacana, *DC. Prod.* vii. 586.—Mexic.
officinalis, Wimm. ft Grab. Fl. Siles. i. 391=A. Uva-ursi.
oppositifolia, *Parry, in Proc. Davenport Acad. Nat. Sc.* iv. (1884) 37.—Calif,
polifolia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 277. t. 258.—Mexic
polifolia, Torr. Bot. Mex. Bound. 108 = oppositifolia.
procera, Lindl. ex Pritz. Ind. Ic. 90, sphalm. = tomentosa.
procumbens, Patze, Mey. ft Elk. Fl. Preuss. 188» A. Uva-ursd.
pumila, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. viii. (1843) 266.-Cali£
pungens, A. Gray, in Bot Calif, i. 458, partim= Hookeri.
pungens, *H. B.* &• *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 278. t. 259.—Calif.; Mexic.
rubescens, *Hemsl, Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 279.—Guatemala.
salidfolia, Parry, in Proc. Davenport Acad. iv. (1884) 37 = oppositifolia.
spinulosa, Mart ft Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. (1842) 587—arguta.
tomentosa, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1791.—Calif.
Uva-ursi, *Spreng. Syst.* ii. 287.—Reg. bor. et arct.
Veatchii, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 19 = bicolor.

AHCTOTHECA, Wendl. Beobacht. 41; et Hort Herrenh. 8. t. 6 (1798). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 468.
grandiflora, Drège, ex Turcz. in Bull. Soc Nat-Mosc xxiv. (1851) 93=Arctotis Dregei.
grandiflora, Schrad. in Ind. Sem. Hort. Goett (1832) 1=repens.
hirta, *Schrad. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 120.—Afr. austr.
repens, *Wendl. Beobacht.* 41; *et Hort. Herrenh.* 8. t. 6.—Afr. anstr.

ABCTOTI8, Linn. Gen. ed. I. 261 (1787). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 453.
ANEMONOSPERMOS, Adans. Fam. ii. 127 (1768).
LYCOTIS, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nacbtr. ii. 99 (1826).
ODONTOPTERA, Cass. in Diet Sc. Nat. xxxv. 396 (1825).
STEGANOTUS, Cass. 1. c. (1825).
abrotanifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 120—Ursinia abrotanifolia.
acaulis, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 486=canescens.
acaulis, Jaoq. Hort. Schoenb. ii. 16. t. 158=adpressa.
acaulis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1306.—Afr. anstr.
adpressa, *DC. Prod.* vi. 485.—Afr. austr.
adpressa, Eckl. ex Harv. ft Sond. Fl. Cap. iii. 465-Haplocarpha lyrata.
aenea, *Jacq.f. Eclog.* 1.1 62.—Afr. austr.
amoena, *Jacq. Fragm.* 76.—Afr. austr.
amplexicaulis, *Less. Syn. Comp.* 25.—Afr. austr.
angusti/olia, Jacq. Hort Schoenb. ii. 21=aspera.
angustifolia, *Linn. Sp. PI.* 923.—Afr. austr.
anthemoides, Linn. Syst. ed. X. 1234=Ursinia anthemoides.
anthemoides, Thunb. ex Harv. ft Sond. Fl. Cap. iii. 152 = Ursinia chrysanthemoides.
arborescens, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 23.—Afr. austr.
arborescens, Willd. ex Harv. ft Sond. Fl. Cap. iii. 453—aspera.
argentea. Ait Hort Kew. iii. 273=linearis.
argentea, *Thunb. Diss. Arct.* 4 et 7.—Afr. austr.
aspera, *Linn. Sp. PI.* 922.—Afr. austr.
asplenifclia, Bunn. f. FL Cap. Prod. 28-Gazania pinnata.
aurea, *Bt rm.f. Fl. Cap. Prod.* 28.—Afr. austr.
aureola, Ker-Gawl. in Bot Reg. i. t. 32—aspera.
auriculata, Jacq. Hort. PI. Schoenb. 2. t. 169=aspera.
bellidifolia, *Berg. Desc.Pl. Cap.* 318.—Afr. anstr.

AKCTOTIS:—
bicolor, Willd. Enum. Hort. Berol 936= aspera.
breviscapa, Thunb. Diss. Arct. 12=leptorhiza.
Calendula, Linn. Sp. PL 922=Cryptostemma calendulaceum.
calendulacea, Linn. Syst ed. XII. 678-Cryptostemma calendulaceum.
calendulacea, Thunb. ex Harv. ft Sond. FL Cap. ,'"• 463=Venidium hirsutum.
campanulata, *DC. Prod.* vi. 485.—Afr. austr.
Candida, *Thunb. Diss. Arct.* 14.—Afr. austr.
canescens, *DC. Prod.* vi. 485.—Afr. austr.
carduifolia, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 28.—Afr. austr.
caroliniana, *Walt. Fl. Carol.* 216.—Carolina.
caulescens, Thunb. Diss. Arct. 11=aspera.
cernua, Thunb. 1. c 17 = Ursinia anthemoides.
Cineraria, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 24.—Afr. austr.
coronopifolia, Salisb. Prod. 210=Ursinia crithmifolia.
corruscans, DC. Prod. vi. 496 = Cryptostemma calendulaceum.
crithmifolia, Harv. in Harv. ft Sond. Fl. Cap. iii. 144 = Ursinia crithmifolia.
crithmoides, Berg. Desc. PL Cap. 826 = Ursinia crithmifolia.
crithmoides, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 15 = Ursinia pilifera.
cuneata, DC. Prod. vi. 489=stoechadifolia.
cuprea, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 120=aenea.
cuprea, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 25=aspera.
decumbens, Jacq. 1. c iii. 68. t. 381=angustifolia.
decumbens, Thunb. Diss. Arct. 9=stoechadifolia.
decurrens, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 20. t. 166 » angustifolia.
dentata, Linn. PL Afr. Rar. 25; Amoen. Acad. vi. 107—Ursinia dentata.
dentata, Thunb. Diss. Arct. 17 (- *Sphenogyne discolor)* •—Afr. austr.
denudata, Thunb. 1. c. 14-laevis.
difiusa, *Thunb. I. c.* 9.—Afr. austr.
Dregei, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) »• 93.—Afr. austr.
echinata, DC. Prod. vi. 486=Landtia hirsuta.
elatior, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 28.—Afr. austr.
elatior, Willd. ex DC. Prod. v. 488=amplexicaulis.
elegans, Thunb. Diss. Arct 14 = Chrysanthemum indicum.
elongata, *Thunb. I. c.* 9.—Afr. austr.
fastuosa, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 20. t 166.—A^-austr.
flaccida, *Jacq. I. c.* 19.—Afr. austr.
flammea, *Jacq.f. Fragm.* 41.—Afr. austr.
foeniculacea, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 15=Ursinia foeniculacea,
formosa, Thunb. Diss. Arct. 11=aspera.
gigantea, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 449.—Abyss.
glabrata, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 25 =laevis.
glandulosa, *Thunb. Diss. Arct.* 8.—Afr. austr.
glaucophylla, Jacq. Hon. Schoenb. ii. 22-Candida.
glutinosa, Sims, Bot. Mag. t. 1843-Dimorphotheca cuneata.
grandiflora, Ait Hort Kew. iii. 272=acaulis.
grandiflora, Jacq. Hort. Schoenb. iii. t. 878-laevis.
grandis, Thunb. Diss. Arct. 8=stoechadifolia.
hispidella, Juss. ex DC. Prod. vii. 258=Hispidell» hispanica.
humilis, Salisb. Prod. 210= acaulis.
hypochondriaca, Willd. Sp. PL iii. 2343=Cryptostemma calendulacenm.
incisa, Thunb. Diss. Arct 10 = aspera.
interrupta, Thunb. I.e. 12=Arctotheca repens.
Jacobaea, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 772 = aspera.
Kraussii, Sch. Bip. 1. c. 771-angustifolia.
laciniata, *Lam. Encyc.* i. 237.—Afr. austr.
laevis, *Thunb. Diss. Arct.* 10.—Afr. austr.
lanata, Thunb. 1. c. 11 = Haplocarpha Thunbergii.
lancea, Thunb. ex DC. Prod. vi. 503 = Didelta tomentosum.
lanceolata, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* iii. 455—Afr. austr.
Leichtliniana, *Lynch, in Gard. Chron.* (1885) II. 38—Afr. anstr.
leiocarpa, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 451—Afr. austr.
leptorhiza, *DC. Prod.* vi. 486.—Afr. austr.
leucantha, *Hoffmgg. Vert. Pfl.* 40.—Hab.t
leucanthemoides, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 19. t. 164.—Afr. austr.

AECTOT18:—
linearis, *Thunb. Diss. Arct.* 7.—Afr. austr.
lyrata, Willd. Sp. PI. iii. 2356-aspen.
maculata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 67-aspera.
Massoniana, Spreng. Syst. iv. COT. Post. 804=laevis.
nelanocycla, Willd. Ennm. Hort. Berol. 987=aspera.
micrantha, Thunb. ex DC. Prod. vi. 498 - Venidinm decnrrens.
muricaia, Thunb. Diss. Arct. 10=bellidifolia.
nodosa, Thunb. 1. c. 15-Chrysanthemum nodosum.
nudicaulis, Thnnb. I. c. 16 (=*Sphenogyne nudicaulis).* —Afr. austr.
odorata, Stend. Norn. ed. II. i. 121-Ursinia odotata.
oocephala, *DC. Prod.* vi. 486.—Afr. anstr.
paleaeea, Linn. PI. Afr. Rar. 25; Amoen. Acad. vi. 107=Ursinia crithmifolia.
paleaeea, Thunb. Diss. Arct. 16=Ursinia paleaeea.
paniculata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 68 = bellidifolia.
pannucea, *jacq. I. e.* iv. 21.—Afr. austr.
paradoxa, Ait Hort. Kew. iii. 373-Ursinia anthemoides.
paradoxa, Linn. Cent. ii. 82; Amoen. Acad. iv. 880 = Urania paradoxa.
paradoxa, Thunb.' Diss. Arct. 17-Ursinia chrysanthemoides.
pectinata, Thnnb. 1. c. 14=Ursinia dentate.
Petolata, *Thunb. I. c.* 10.—Afr. austr.
ptlifera, Thunb. 1. c. 18=Ursinia pilifera.
Piligera, Berg. Desc. PI. Cap. 325 - Ursinia dentaU.
pinnaia, Thunb. Diss. Arct. 16-Ursinia filiformis.
pumatifida, *Thunb. I. c.* 7.—Afr. austr.
Plantaginea, Linn. Sp. PI. ed. II. 1806 = Venidinm semipapposum.
Plttntagini/olia, Salisb. Prod. 210 = Venidium semipapposum.
Populifolia, Berg. Desc. PL Cap. 823=Cryptostemma luveum.
P"ostrata, Salisb. Prod. 210 - Aretotheca repens.
punctata, Thunb. Diss. Arct. 16 *(-Sphenogyne punctata).~Afr.* anstr.
Porpurea, *Willd. Enum. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 121.—Afr. austr.
Posilla, *DC. Prod.* vi. 489.-Afr. austr.
Pygmaea, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 448.—Abyss.
radicans, Linn. Mant. ii. 479, 480 - angustifolia.
r'pens, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 31 =Aretotheca repens.
reptans, *Jacq. I. c.* 69. t. 382.—Afr. austr.
revoluta, *Jacq. I. c.* ii. 24.—Afr. austr.
tgida, Bum. f. Fl. Cap. Prod. 28=»Ga«nia Pavonia.
rosea, Jacq. Hort. Schoenb.'ii. 18=stoechadifolia.
runcinata, *Hoffmgg. Vert. Pfl.* 40.—Hab.J
scabra, Thunb. Diss. Arct 9 = Venidinm semipapposum.
scapigera, Thunb. 1. c. 12=acaulis.
««nõ$_{M>}$ Ait. Hort. Kew. iii. 274 - Ursinia scariosa.
* "'« «, Thunb. Diss. Arct. 18 (=*Sphenogyne sericea).* —Afr. anstr.
*s*rrata,* Thnnb. 1. c. 8=Ursinia senate.
spathulata, Thnnb. ex Spreng. Syst iii. 628=Venidinm Perfoliatura.
spe.osa, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 18 -acaulis.
speciosa Salisb. Prod. 209 = Cryptostemma calendulaceum.
spinulosa, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 21-festuosa.
squarrosa, Jacq. 1. c. 25 - laevis.
**t»t,cefolia, Prni.* Encyc. Suppl. i. 4S8=Gaauua subulate.
stoechadifolia, *Berg. Desc. PI. Cap.* 824.—Afr. anstr.
Mphurea, Gaertn. Fruct. ii. 439 = Cryptostemma bypochondriacum.
sulphurea, Salisb. Prod. 210 = aspera.
**perba,* Linn. Cent. ii. 82; Sp. PI. ed. II. 1305 = Cryptostemma calendulaceum.
te nui/oli„ Linn. Mant, 288-Ursinia tenuifolia.
tcnuifolia, Poir. Encyc. Suppl. i. 439 = Dimorphotheca graminifolia.
tenuifolia, Salisb. Prod. 210=Ursinia scariosa.
tomentosa, Thunb. ex DC. Prod. vi. 492-Vemdram semipappos n.
tricolor, Jacq.itlort. Schoenb. ii. 16-acaulis.
tr H'lor, Willd. ex DC. Prod. vi. 486 -elongate.
tr fida, Thunb. Diss. Arct 15 ^*Sphenogyne tnfida).* —Afr. austr,
trifuTcata, Burm. £ FL Cap. Prod. 28=Ursinia "ithmifolia.
**»*«*, Linn. Sp. PI. 982-Cryptostemma catenduIaccum.
*«*dulata,* Gaertn. Fruct ii. 438=laciniate.
*u*dulata,* Jacq. Hort Schoenb. ii. 16=acaulis.

ABCTOTIS:-
undulata, Thunb. Diss. Arct. 13-aspera.
venidioides, *DC. Prod.* vi. 489.—Afr. austr.
verbascifolia, *Horn, in Han. V Send. Fl. Cap.* iii. 452. —Afr. austr.
virgata, *Jacq. Hort. Schoenb.* Hi. 32.—Afr. austr.
vitellina, *Hoffmgg. Vert. Pfl.* 40^-Hab.i

ABCYTTOSPEBJIUM, Turcz. in Bull. Soc Nat Mosc. (1858) I. 191. *MALVACEAE* (gen. dub.), Benth. & Hook. f. Gen. i. 199.
nodiflorum, *Tuna. I. c.*—Mexic.

ARCYPHYLLUM, EIL in Journ. Acad. Philad. i. (1818) 371-BhynchoBla, Lour. (Legum.).
cariboeum, Ell. 1. c. 872= R. caribaea.
capitatum, Benth. in Linnaea, xxii. (1849) 525 - R. Clausseni.
difforme, Ell. in Jonm. Acad. Phil. i. (1818) 872 - R. tomentosa.
erectum, Ell. L c. = R. tomentosa.
leucophyllum, Benth. in Linnaea, xxii. (1849) 625=R. leucophylla.
reticulatum, Ell. in Jonm. Acad. Philad. i. (1818) 372 =R. reticulate.
rhombifolium, Ell. 1. c - R. minima.
simplicifolium, Ell. 1. c. 871=R. tomentosa.

ARCYTHOPHYLLUM, Willd. ex Schlecht in Linnaea, xxviii. (1856) 491 -seq.

ARCYTOPHYLLUM, [Willd.] Roem. & Schult Mant. iii. 5 (1827) =Mall08toma, Karst. (Rubiac).
blaerioides, [Willd. ex] Roem. & Schult. 1. c.-M. carticasflna.
nitidum, Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1866) 492-M. nitida.
setosum, Schlecht. L c. = M. setosa.

ARDERNIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 35 (1866)-Ornlthogalum, Linn. (Liliac.).
fuscata, Salisb. 1. c. = O. fuscatum.

ARDINGHELIA, Comm. ex A. Jnss. Tent. Euph. 21 (1824)=Fhyllanthu8, Linn. (Euphorb.).

ARDISIA, Gaertn. Fruct ii. 78. t. 94 (1791)-Cyathodea, LabilL (Epacrid.).
acerosa, Gaertn. 1. c.=C. acerosa.
lanceolata, Gaertn. f. 1. c. iii. 148. t. 210.—AmtraL
montana, Gaertn. f. 1. c. 149.—Austral.
procumbens, Gaertn. f. 1. c 149 = Melichrus rotatus.
ruficarpa, Gaertn. f. I. c. 148. t. 21O.-^AustraL

AKDISIA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 8. 48 (1788); Fl. Ind. Occ. i. 467.110 (1797). *MYRSINEAE,* Benth. & Hook. f. ii 645.
ANGUILLARIA, Gaertn. Fruct i. 372 (1788).
BADULA, JUSS. Gen. 420 (1789).
BLADHIA, Thunb. Nov. Gen. i. 6 (1781), *nomen prius.*
BARTHESIA, Comk. ex A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 112.
CLIMACANDRA, Miq. PI. Jungh. i. 199 (1852).
GALIZIOLA, Rafin. Sylva Tellur. 167 (1838).
ICACOREA, Aubl. PL Gui. ii. Snppl. i. t. 868 (1775).
KATOUTHEKA, Adans. Fam. U. 169 (1763).
MILNEA, Rafin. Sylva Tellur. 167 (1838).
MONOPORUS, A. DC. in Ann. Sc. Nat Ser. II. xvi. (1841) 91.
PICKERINGIA, Nutt in Joum. Acad. Sc. Philad. vii. (1834) 95.
PUKKINJIA, Presl, Symb. Bot ii. 17. t. 64 (1838).
PYRGUS,LOUT. Fl. Cochinch. i. 120 (1790).
STYLOGYNE, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvi. (1841) 91.
WEDELIA, Stend. Nom. ed. II. L 133 (1840).
VEDELA, Adans. Fam. U. 502 (1763).
acuminata, Spreng. Syst. i. 661-lateriflora.
acuminate, *Willd. Sp. PI.* i. 1062.—Ind. occ.
adenanthera, Miq. in Mart Fl. Bras. x. 285 - Parathesis ftdduuithcrft.
affinis, Blume, ex A. DC in DC. Prod. viii. 96 - Myrsine affinis.
altemata, A. DC. in Ann. Sc Nat Ser.'n. a (1841) 296, sphalm.=oxyphylla.
ambigua, *Mart. Herb. Fl. Brat.* 803.—Bras.

ABDISIA:—
amboinensis, *Scheff. Comm. Myrsin.* 75.—Amboin.
Amkerstiana, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 120=refleia.
amplexicanlis,5^rf. *Ic. PI. Ind. Or. i.* 37.—Ind. or.
anceps, Blume, Bijdr. 685-Blumii
anceps, WalL in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 280-colorate.
andamanica, *Kurt, For. Fl. Burma,* ii. 108.—MaUya.
angustifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 134.—Ins. Philipp.
arborescens, Wall. Cat. n. 2289=humilis.
argute, *H. B.* CS *K. Nov. Gen.etSp.* iii. 247.—Am. austr.
attenuata, Wall. Cut. n. 2286-oxyphylla.
avenis, Blume, Bijdr. 691-Myrsine capitellata.
bahamenuis, A. DC. in Trans. Linn. Soc xvii. (1834) 128-excelsa.
Barthesia, *Steud. Nom.* ed. I. 64.—Zeylan.
Basaal, Roem. & Schult Syst iv. 617-Embelia robust*,
bhotanica, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. •528.—Reg. Himal.
bipinnate, *Baker, in Joum. linn. Soc.* xx. (1884) 201. —Madag.
Blumii, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 117 —colorata.
Boissieri, A. DC. in DC. Prod. viii. 129-lanceolate,
borneensis, *Scheff. Comm. Myrsin.* 79.—Borneo,
bracteate, *Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 495.—Afr. trop.
bracteosa, *A. DC. in Trans. Unit. Soc.* xvii. (1884) 127. —Mexic.
Brandisiana, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xL (1871) II. 67.—Bonn*.
brasiliensis, *Spreng. Syst.* i. 662.—Bras,
breviflora, *A.DC. in DC.Prod.* viii. 122.—Peruv.
brevipedate, *F. Muell. Fragm.* vi. 163.—Austral,
bumelioide*, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 516.—Cuba,
calothyrsa, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxl (1870) 871; *et in Flora,* liii. (1870) 254.—Sumatra,
calycosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 292.—Nicaragua.
canaliculata, *Lodd. Bot. Cab.* 1.1083.—Reg. Colomb.
capitate, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) 381.—Ins. Fiji,
capollina, *Moc. & Sesse, ex A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1884) 116.—Mexic.
caribaea, *A. DC. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 289, in adnot—Ins. Dominica,
cauliflora, *Mart. V Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 291.—Bras.
Cavanillesii, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 515.—Ins. Philipp.
celebica, *Scheff. Comm. Myrsin.* 83.—Ins. Celebes,
cestrifolia, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* >U. 218.—Reg. Colomb.
chinensis, *Benth. Fl. Hongk.* 207.—China.
chrysophylloides, Miq. FL Ind. Bat. Suppl. 574-tuberculate.
clnsioides, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 396.—Ind. occ.
coccinea, *Jungh. in Hon. V De Vriese, Tijdschr.* vii. (1840) 804 ('104' err. typ.).—Java.
colorata, Link, Enum. Hort. BeroL i. 194=paniculate,
colorata, *Roxb. Hort. Beng.* 16; *Fl. Ind.* i. 581.—Ind. or.
complanata, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 280 — colorata.
compressa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* itt. 246.—Reg. Colomb.
confinis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 576.—Sumatra.
coriacea, Ledru, ex Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genèv. xiv. (1855) 105-Temstroemia brevipes.
coriacea, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 48.—Ind. occ.
courtellensis, *Wight, Ic.* 1.1215.—Ind. or.
crassa, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* itt. 518. —Malaya.
crenata, *Sims, in Bot. Mag.* t I960.—China,
crenata, *Roxb. Hort. Beng.* 86; *Fl. Ind.* i. 688.—Malaya; China.
crenulata, Lodd. Bot Cab.t. 2=crenata.
crenulata, Vent. Choix, t. 6—Parathesis crenulata.
crispa, A. DC. in Trans. Linn. Soc xvii. (1884) 124-crenate.
cubana, *A. DC. I. c*—Cuba.
Cnmingiana, *A. DC. in DC. Prod.* via. 136.—Ins. Philipp.
cuspidate, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 123.—Ins. Cocos.

AKDISIA:—
cybianthoides, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1028.—Malaya,
cymosa, *Baker, in Oliver, Fl. Tr.op. Afr.'m.* 485.—Afr. trop.
cymosa, *Blume, Bijdr.* 689.—Java,
decipiens, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 125.—Peruv.
decus-montis, *Miq. PI. Jungh.* 198.—Java,
demissa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1018.—Malaya.
densa, Miq. 1. c. Snppl. 575 = crenata.
denticulata, *Blume, Bijdr.* 691.—Java,
depressa, C. *B. Clarke, in Hook. Fl. Brit. Ind.* iii. 522. —Reg. Himal.
disticha, A. DC. in DC. Prod. viii. 129 = Pimelandra disticha.
divaricata, *Willd. ex Roem. tf Schult. Syst.* iv. 804.— Hab.?
divergens, *Roxb. Hort. Beng.* 85; *Fl. Ind.* i. 583.— Malaya.
divergens, Thw. Enum. PI. Zeyl. 174 pro parte = Gardneri.
Doca, Buch.-Ham. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 126 = paniculata.
Doma, Wall, ex A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 118=humilis.
domingensis, *Willd. ex Roem. tf Schult. Syst.* iv. 803. —Ins. S. Domingo.
dnbia, *Scheff. Comtn. Myrsin.* 67.—Malaya,
durifolia, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 214.—N. Granat.
elegans, Andr. Bot. Repos. t. 623 = lentiginosa.
elliptica, Bedd. For. Man. 138 = humilis.
elliptica, *Thunb. Nov. Gen.* viii. 119.—Zeylan.
erythroxyloides, *Thou, ex Roem. tf Schult. Syst.* iv. 804.—Madag.
escallonioides, *Schlecht. tf Cham, in Linnaea,* vi. (1831) 393.—Mexic
escnlenta, *Pav. ex A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 128.—Am. austr.
eugeniaefolia, Kurz, For. Fl. Burma, ii. 111=Pimelandra Griffithii.
eugeniaefolia. Wall. Cat. n. 2276=Pimelandra eugeniaefolia.
excelsa, *Ait. Hort. Kev>.* i. 261.—Ins. Baham.; Mader.
eximia, *Miq. PI. Jungh.* 1!>6.—Java,
femiginea, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 244.—N. Granat.
fertilis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 576 —Sumatra,
floribunda, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 304.—Madag.
floribunda. Wall, in Roxb. Fl. Ind. cd. Carey, ii. 272 «> neriifolia.
floribunda, *Willd. exSteud. Norn.* ed. II. i. 122, *nomen.* —Madag.
foetida, *Willd. ex Roem if Schult. Syst.* iv. 803.— Am. austr.
formosana, Rolfe, in Joum. Bot. xx. (1882) 358 = Sieboldii.
Forstenii, *Scheff. Comm. Myrsin.* 61.—Malaya,
frangulaefolia, *Zipp. et Scheff. I. c.* 82.—Malaya,
fuliginosa, *Blume, Bijdr.* 692.—Java,
fusca, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 127. t. 2.—Costa Rica,
fusco-pilosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 200.—Madag.
Gardneri, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 521.—Zeylan.
glabra, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 123 = japonica.
glabrata, Blume. Bijdr. 692=-villosa.
glofndulosa, Blnme, 1. c. 690=crenata.
glandulosa, Roxb. Hort. Beng. 16; Fl. Ind. i. 584 = Amblyanthus glandulosus.
glandulosa-marginata, Oersf. *in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 128.—Costa Rica,
gracilis, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 287.—Bras.
grandiflora, Wall. Cat. n. 2272 - colorata.
grandifolia, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 122.—Burma,
grandis, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 259; *Fl. Vit.* 150—lns. Fiji.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 523. —Reg. Himal.
guadalupensis, *Duchass. ex Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 237—Ins. Dominic.
Harailtonri, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 126.—Ind. occ.
Hasseltii, Blume, ex Scheff. Comm. Myrsin. 86.= **lanceolata.**

ABDISIA:—
Helferiana, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 86.—Burma,
hortoram, *Maxim, in Gartenfl.* (1865) 863. t. 491.—Japon.
Hostmanni, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 288.—Guian.
humilis, Blume, Bijdr. 687 =javanica.
humilis, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 40.—Ind. or.; Malaya.
Hymenandra, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 282 = Hymenandra Wallicbii.
Icara, *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* n. 2264.—Ind. or.; Burma.
insularis, *Baker, Fl. Maurit.* 190.—Maurit.
iuvolucrata, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 68.—Reg. Himal.
irasnensis, *Oerst.* in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 124.—Costa Rica,
jacquinioides, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1868) 517.-Ind. occ.
jambosioides, Miq. PI. Jungh. 196=crassa.a
Japonica, *Blume, Bijdr.* 690.—China; Japon.
javanica, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 130.—Java.
Junghuhniana, *Miq. PI. Jungh.* 192.—Sumatra.
Keenani, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 526.—Reg. Himal.
Ichasiana, *C. B. Clarke, 1. c.* 527.—Reg. Himal.
Korthalsiana, Scheff. Comm. Myrsin. 57=Pimelandra Wallichii.
Kuraii, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 525. —Burma.
laevigata, *Blume, Bijdr.* 690.—Java,
laevis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 125. —Costa Rica.
lamponga, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 577.—Sumatra,
lanceolata, *Roxb. Hort. Beng.* 85 *; Fl. Ind.* i. 583.— Malaya.
lateriflora, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ* 48.—Ind. occ.
latifolia, Roem. & Schult. Syst. iv. 514 = laurifolia.
latifolia, Sieber, ex A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 113=guadalupensis.
latipes, *Mart. Herb. Fl. Bras.* n. 570.—Bras,
laurifolia, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1884) 116.—Ind. occ.
lentiginosa, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 533=crenata.
lepidota, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 247.—N. Granat.
leptantha, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 286.—Bras.
Leschenaultii, A. DC. in DC. Prod. viii. 133 = lanceolata.
Lhobkya, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1884) 127.—Bras.
Liebmannii, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 129. t. 2.—Mexico.
Lindleyana, D. Dietr. Syst i. 617=crenata.
linearifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl:* 577.—Sumatra,
lineata, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 804.—Am. austr.
littoral is, Andr. Bot. Rep. t. 630=humilis.
Lobbiana, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 529.—Ind. or.
longifolia, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 290.— Bras,
longipes, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 421. —Madag.
lurida, *Blume, Bijdr.* 687.—Java,
luzonensis, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 65.—Ins. Philipp.
macrocalyx, *Scheff. Comm. Myrsin.* 91.—Borneo,
macrocarpa, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 277. —Reg. Himal.
macrophylla, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 691.—Java.
macrophylla, Wall. Cat. n. 2290 = grandifolia.
macroscypha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 420.—Madag.
maculata, *Poit. ex A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 116.—Ins. S. Doming,
mamillata, *Hance, in Journ. Bot.* xxii. (1884) 290.—China.
marginata, *Blume, Bijdr.* 688.—Java.
Martiana, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 285.—Bras.
melanosticta, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 626-Parathcsis melanosticta,
membranacea, *Wall. Cat.* n. 2288; *ex A. DC. Prod.* viii. 134.—Reg. Himal.
metallica, *N. E. Br. in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) t. 421.—Sumatra,
micrantha, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 246.— Venezuela.
microphylla, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 804.—Madag.
Miqueliana, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 367; *et in Flora,* liii. (1870) 253.—Malaya.

ABDISIA:—
missionis, *Wall. Cat.* n. 6524; *et ex A. DC. Prod.* viii. 180.—Zeylan.
mollis, Blume, Bijdr. 689=villosa.
Moonii, C. *B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 628.—Zeylan.
mucronata, Blume, Bijdr. 685 = lanceolata
multi flora, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1868) 516.—Ind. occ.
multifiora, Willd. ex Roem. & Schult Syst. iv. 804-revoluta.
myriantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 419.—Madag.
myristicaefolia, *Blume, ex Scheff. Comm. Myrsin.* 63. —Malaya.
nana, Buch.-Ham. ex A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1884) 118 =humilis.
neriifolia, A. DC. Prod. viii. 127, pro parte=andamanica.
neriifolia, Knrz, in Journ. As. Soc. Beng. xlvi. (1877> II. 225 = depressa.
neriifolia. *Wall. Cat.* n. 2278.—Reg. Himal.
nicaraguensis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 123.—Nicaragua.
nigrescens, *Oerst. 1. c.* 130. t. 2.—Mexic
nigricans, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 289.—Bras,
nitidula, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 200. —Madag.
nigro-punctata, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 127. t. 2.—Costa Rica,
nutans, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 121. —Java.
oblonga, A. DC. 1. c. = oxyphylla.
obovata, Blume, Bijdr. 6b8 = humilis.
obovata, Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 28 = Hamiltonii.
odontophylla, Lindl. Bot. Reg. t. 1892=chinensis.
odontophylla, *Wall. Cat.* n. 227!).—Reg. Himal.
oleracea, Boch.-Ham. ex A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1884) 118=humilis.
oligantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885, 41'J.—Madag.
Oliveri, *Mast, in Gard. Chron.* (1877) H. 680.—Costa Rica.
Opegrapha, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 126.—Costa Rica,
orinocensis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* Hi. 244.— Fluv. Orinoco.
ovata, Thunb. Nov. Gen. viii. 119= colorata.
oxyantha, Wall. Cat. n. 2275 = Antistrophe oxyantha.
oxyphylla, *Wall. I. c.* n. 2291; *A. DC. Prod.* viii. 13U. —Burma; Malaya.
palembanica*, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 575.—Sumatra.
paniculata, A. DC. in DC. Prod. viii. 189 = A. Samara,
paniculata, *Roxb. Hort. Beng.* 16; *Fl. Ind. i.* 580.— Ind. or.
parasitica, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 48=Grammadenia parasitica.
parvifblia, *Humb. ex Willd. sec. Roem. If Schult. Syst.* iv. 804.—Peruv.
pauciflora, Benth. Fl. Hongk. 206=pentagona.
pauciflora, *Heyne, ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 279. —Ind. or.
pavonina, Buch.-Ham. ex A. DC. Prod. viii. 136 = odontophylla.
pedunculata, Boj. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xx. (1884, 203 = Oncostemum pedicellatum.
pednnculosa. *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 279- —Reg. Himal.
pellucida, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 130. t 2.—Mexic.
pentagona, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1884) 124.—Java.
pergamacea, Blume, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 85 •« Embelia pergamacea.
Perrottetiana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvi.' (1841) 95.—Ins. Philipp.
peruviana, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 290.—Peruv.
petocalyx, *Scheff. Comm. Myrsin.* 91.—Sumatra,
philippinensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 128.—Ins. Philipp.
Pickeringia, *Torr. tf Gray, ex DC. Prod.* viii. **124.—** Florida.
plagioneura, *Scheff. Comm. Myrsin.* 85.—Malaya.
polycarpa. Wall. Cat. n. 2285=colorata.
polycephala, *Wall. I. c.* n. 2293; *A. DC. Prod.* viii. 131.—Burma.
polycephala, Wight, Illustr. t. 145 = humilis.
polygama, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 138.—Molucca.

ARDISIA:-

polyneura, Miq. PI. Jnngh. 198 = colorata.
polysticta, Miq. Fl. Ind. Bat Snppl. 576=crcnata.
porosa *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* **Hi. 622.** —Malaya,
primulaefolia, *Gardn. V Champ, in Hooi. Kew Journ.* i. (1849) 324.—China.
procumbens, Goertn. f. Fract. iin. t. 210=Melichnis rotatns.
propinqna, *H. B.* to* *K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 218.—Venezuela.
pseudo-Icacorea, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 283.—Bras.
Psendojambosa. *F. Muell. Fragm.* iv. 81.—Austral.
Pterocaulis, *Miq. PI. Jungh.* 194.—Snmatra.
pteropoda, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii 1025.—Malaya,
pubicalyx, *Miq. I. c. Suppl.* 676.—Snmatra.
pumila, Blmne, Bijdr. 688=Labisia pothoina.
punctata, Blume, 1. c. 687=nutans.
punctata, Jack, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 276= divergens.
punctata, Lindl. Bot Reg. t. 827=crenata.
punctulosa, D. Dietr. Syn. PI. i. 616 = divergent
purpurea, Reinw. in Blume, Bijdr. 684=lanceolate.
PHsilla, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 126. —Japon.
Pyramidalis, *Pers. Syn.* **i. 233;** *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 123.—Ind. occ.
Pyramidalis, Roth, Nov. PI. Sp. 123 = colorata.
Pyrgina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) U9-A. Pyrgus.
Pyrgus, *Xoem* *v* *Schult. Syst.* iv. 618.—China.
Pynfolia, *mild, ex Roem. & Schult. 1. c.* **804.—Madag.**
qmnqnangularis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. 1L xvt (1841) 96.-A$_{55}$am.
Vtnquegona, Blume, Bijdr. 689 = pentagona.
racemosa, *Spreng. Syst.* i. 661.—Uras.
Wmiflora, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* **(1861)** 132.—Costa Rica.
Wchnata, *Scheff. Comm. Myrsin.* 69.—Malaya.
»eflexa. *Wall. Cat.* n. 2282 ; *A. DC. Prod.* viii. 182.— Burma,
revoluta, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **iii- 246.—** Mexico.
'bomboidea, *Wight, Ic. PI.* t. 1213.—Ind. or.
"lyncnocarpa, *Scheff. Comm. Myrsin.* 68.—Malaya,
'nynchophylla, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* . W. 62D.-Reg. Himal.
"6J<ia, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* **xlii. (1878) II.** 87—Burma.
*'*trata,* Hassk. in Flora, Ii. (1868) 26=hnmilis.
Kothii, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 117- colorata.
Roxburghiana,T>. Dietr. Syn. PL I. 617=Amblyanthu« glandulosus.
rubiginosa, *Miq. PI. Jungh.* 192.—Sumatra.
salicifolia, A. DC. in DC. Prod. viii. 129=humilis.
""nara, *A. DC. ex Buck, Index,* iii. praef. 8.—Ind. or.
^"*guinolenta,* Blnme, Bijdr. 686=colorata.
"'"*guinolenta,* Wall. Cat. n. 2287 - Wallichii.
«»ndens, *Blume, Bijdr.* 686.—Java.
*™oinburgkiana,*Miq. *in Mart. Fl. Bras.x.* 289.—Bras.
sc«>biculau) *Seem. Fl. Vit.* 160.—Ins. Fiji.
**»*ucrenata,* Mart. Herb. Fl. Bras. 571-acuminata.
«nudenuta, *Miq. PI. Jungh.* 191.—Java.
"rrata, Pers. Syn. i. 233 - Cavanillesii.
"rrafifolia, Bedd. in Madr. Joum. Ser. III. i. (1864) °1 - Anlistrophe serratifolia.
""*rulata,* Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) . " • 8 ' = A . Icara.
"^"]ata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 48.—Ind. occ.
«ssilis, *Scheff. Comm. Myrsin.* 69.-Malaya.
Sebe <*?*.J *Baker* > *m* - *Maurit.* 190.—MauriU
a>eooldi, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iii. 190.** .—Japon.
"nensis, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 122- A - Pyrgis.
Panacea, Roxb. Hort. Beng. 16; Fl. Ind. i. 680= humilis.
onanoghei, *Scheff. Comm. Myrsin.* 62.—Malaya.
Neriifolia, Blume« Kidr- 684 = lanccolata.
Zeylanica, asis> *Sehe ff-* ^»«»»- *Myrsin.* 65.—Malaya.
spicata Wall. Cat. n. 227S = Labisia pothoina.
squamulosa, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 66.—Ins. Luzon.
Storckii, *Seem FL Vit* - 15O.-Ins. Fiji.
SS?'** *Mio- Pi* - ***Jungh.* 196.—Java.**
™»U neata, *Mi* o- *Fl* - ">*<• *Bat.* fl. 1028,-Malaya.
S»SK rana« *Ui* 1- *PL* ?«&• 198—Sumatra.
"ombavana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1027.-Malaya.

ABDISIA:—

surinamensis, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 288.—Guiana.
tavoyana, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1884) 125 -villosa.
synnenra, *Scheff. Comm. Myrsin.* 80.—Malaya.
tenuiflora, Kollmann, ex A. DC. Prod. viii. 127 = pauciflora.
tenuifolia, *Blume, Bijdr.* 686.—Java,
tenuiramis, *Miq. PI. Jungh.* 198.—Java,
tematensis, *Scheff. Comm. Myrsin.* 58.—Ins. Ternate.
tetrandra, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 248 = Cybianthus Humboldtii.
Teysmanniana, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. <1870) 868; *et in Flora,* liii. (1870) 263.—Malaya.
thyrsiflora, D. Don, Prod. Fl. Nep. 148=neriifolia.
tinifolia, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 48.—Jamaica,
tomentosa, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 66.—Ins. Luzon.
Tsjeriam-Cottam, Roem. & Schult. Syst iv. 618 = Embelia robnsta.
tuberculata. *Wall. Cat.* n. 2274.—Malaya,
turbacensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 246.—N. Granat.
nmbellata. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xxi. (1885)** 420.—Madag.
umbellata, Roxb. Hort. Beng. 16; Fl. Ind. i. 582 = humilis.
umbrosa, *Zoll. tf Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie,* ii. (1845) 676.—Java,
undnlata, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl.Brit. Ind.* **iii. 624.** —Reg. Himal.
verrncosa, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 65.—Ins. Pbilipp.
vestita, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 274 = villosa.
villosa, *Roxb. Hort. Beng.* **85;** *Fl. Ind.* **i. 582.—** Malaya.
virens, *Kurt, For. Fl.* ii 576.—Reg.Himal.; China,
viridifloia, *Blume, ex A. DC. in DC. Prod.* **yiii. 88.—** Malaya.
vitiensis, *Seem. Fl. Vit.* 150.—Ins. Fiji.
volubilU, Wall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 122 = colorata.
Wallichii, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1834) 123. —Burma.
Wallichii, Thw. Enum. PI. ZeyL 174-Moonii.
Wightiana, Wall. Cat. n. 2330=humilis.
xylosteoides, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 395.—Jamaica
zeylanica, C. *B. Clarke, in Hook. Fl. Brit. Ind.* **iii. 520.** —Zeylan.
Zollingeri, A. DC. in DC. Prod. viii. 670-colorata.

ARDISIANDBA, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 205. t. 1. *PRIMULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. it 633.
sibthorpioides, *Hook./. I. c.—Ab. trap.* **occ.**

ARDUINA, Adans. Fam. ii. 499 (1763) = KunJ-mannia, Scop. (Umbell.).

ARDUINA, Mill. Ic. ii. t. 300 (1769); Linn. Mant. i. 7 (17S7) = **CariBsa,** Linn. (Apocyn.).
acuminata, E. Mey. Comm. PI. Air. Anstr. 191-=C. acuminata.
bispinosa, Linn. Mant. i. 52 = C. bupinosa.
bispinosa, Lodd. Bot Cab. t. 387=C. ferox.
edulis, Spreng. Syst i. 669 - C. edulis.
erythrocarpa, Eckl. in S. Afr. Journ. i. (1830) 872=C. erythrocarpa.
ferox, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 191 - C. ferox.
grandiflora, E. Mey. 1. c. 190 = C. grandiflora.
haematocarpa, Eckl. in S. Afr. Joum. i. (1830) 372 = C. haematocarpa.
maerocarpa, Eckl. 1. c — C. macrocarpa.

ABECA, linn. Sp. PI. ed. L 1189 (1763). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 883.
ARECCA, Linn. Fl. Zeyl. 186(1747).
alba, Bory, Voy. i. 306 = Dictyosperma albnm.
Alicae, *W. Hill, ex F. Muell. in Gartenfl.* **(1879) 199.** —Austral.
angulpsa, *Giseke, Linn. Praelect.* **80.—Ind. or.**
arundinacea, *Becc. Malesia,* i. (1877) 23.—Borneo.
augusta, Kurz, in Journ. Bot. xiii. (1876) 331 = Ptychorapbis augusta.
aurea, Hort in Fl. des Series, Sir. II. vii. (1867-68) 43=Dictyosperma aureum.
Bacaba, *Arruda, in Kosttr, Trav. Brat.* **490.—** Pemambuc.

ABECA:—

Banksii, A. Cunn. ex Kunth, Enum. PI. iii. 185 = Rhopalostylis Baueri.
Baueri, Hook. f. ex Lent. IUustr. Hortic. xv. (1868) 576 = Rhopalostylis Baueri.
borbonica, Hort. ex Kunth, Enum. PI. iii. 186 = Dictyosperma album.
bomeensis, *Becc. Malesia,* i. (1877) 22.—Borneo.
Calapparia, Blume, Rumphia, ii. t. 100. f. 2=Acţino-rhytis Calapparia.
Catechu, *Linn. Sp. PI.* 1189.—Ind. or.; Malaya.
Cathecu, Bunn. 1. Fl. Ind. 241 = A. Catechu.
cincta, Walp. Ann. T. 808=Acanthophoenix crinita.
cocoides, Griff, in Calc. Jonm. Nat Hist. iv. (1846; 454=Aclinorhytis Calapparia.
communis, Zipp. ex Blume, Rumphia, ii. 73, 119. t. 128 = Drymophloeus communis.
concinna, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 328.—Zeylan.
comuta, *Giseke, Linn. Praelect.* **81.—Ind. or.**
coronata, Blume, in Mart Hist. Nat. Palm. 179 = Pinanga coronata.
costata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 200 (=Pinangae sp.).—Ins. Nicobar.
crinita, Bory, Voy. i. 807=Acanthophoenix crinita.
euneifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 318=humilis.
curvata, Grift. Ic. PI. As. t. 248 = Pinanga disticha.
cunata, Griff. Notul. iii. 164 = Pinanga paradoxa.
Dicksonii, Roxb. Hort Beng. [106]; Fl. Ind. iii 616 = Pinanga Dicksonii.
disticha, Roxb. 11. cc. B20 = Pinanga disticha.
elaeocarpa, Reinw. ex Kunth, Enum. PI. iii. 196 = Drymophloeus olivaefdrmis.
erythrocarpa, H. Wendl. ex Kerch. Palm. 231 = erythropoda.
erythropoda, Miq. in Joum. Bot. Neerl. i. (1861) 6- Cyrtostachys Renda.
Faufel, Gaertn. Fruct. i. 19. t. 7. fig. 2 - A . Catechu,
furcata, *Becc. Malesia, i.* (1877) 23.—Borneo.
furfuracea, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 231 = Dictyosperma furfuraceum.
gigantea, Hort. 1. c. 254 = Pinanga tematensis.
glondiformis, *Lam. Encyc.* i. '241.—Ins. Molucc.
globulifera. Lam. Encyc S95 = Pinanga Kuhlii.
gracilis, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 619 = Pinanga gracilis.
gracilis, Thou, ex Kunth, Enum. PI. iii. 188-Dypsis - pinnatifrons.
gracilis, Giseke, Linn. Praelect. 80 = Drymophloeus appendiculata.
haematocarpon, Griff. Notul. iii. 165-Pinanga malaiana.
hexasticha, Kurz, in Jonm. As. Soc. Beng. xliii. (1871) II. 201 = Pinanga hexasticha.
himalayana. Griff, ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 231 ~ A. Catechu.
horrida, Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist, v (1845) 465=Oncospenna horrida.
hortensis, Lour. Fl. Cochinch. 568, in obs.— A. Catechu.
humilis, Blanco, ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 231- triandra?
humilis, Roxb. ex H. Wendl. 1. c.=Pinanga disticha.
humilis, Willd. Sp. PI. iv. 596 = Drymophloeus saxatilis.
jobiensis, *Becc. Malesia, i.* (1877) 21.—N. Gvdn.
lactea, Hort Bogor. ex Miq. Fl. Ind. Bat iii. 10 = Dictyosperma album.
lansiformis, *Giseke, Linn. Praelect.* 81.—Ind. or.
latisecta, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxii. (1871) 168-Pinanga latisecta.
laxa, *Buch-Ham. in Mem. Wern. Sec.* **v. (1824) 809.** —Ins. Andam.
litoralis, Blume, Rumphia, ii. 123, in obi. = Drymophloeus communis.
lutescens, Bory, Voy. ii. 296 — Chryaalidocarpiu lutescens.
macrocalyx, *Zipp. ex Blume, Rumphia,* **ii. 75. t.** 101, 160, 163 D.—N. Guinea,
madagascarica, *Stadtmann, ex Boj. Hort. Maurit.* **805.** —Madag.
madagascarier*is,ilfarf./fKf..Ara›./Wm.l79.—Madag.
malaiana, Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 457 = Pinanga malaiana.
minuta, *Scheff. in Ann. Jard. Buitenm.* **i. (1876) 146.** —Borneo.
monostachya, Mart. Hist. Nat Palm. 178. t. 1 5. f. 4 = Bacularia monostachya.
nagensis, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* **v. (1845) 458.—Ind. or.**

AKECA:—
Nenga, Blume, in Mart. Hist. Nat. Palm. 179-Nenga Wendlandiana.
.Vii«n^, Griff, ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 231 = Oncosperma filamentosa.
Nibung, Mart. Hist. Nat. Palm. 178. t. 150. f. 4 = Oncosperma horrida.
nigra, Giseke, ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 231=A. Catechu.
nobilis, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1868) 349 = Nephrosperma Van-Houtteana.
Nbrmanbyi, *F. Muell. Fragm.* viii. 235.—Austral.
oleracea, Jacq. Am. Select. 278=Oreodoxa oleracea.
olivae/ormis, Giseke, in Ord. Nat. PI. 79 = Drymophloeus olivaeformis.
orizaeformis, Gaertn. Fruct. L 20=Pinanga Kuhlii.
oviformis, *Giseke, Linn. Praelect.* 81.—Ind. or.
oxycarpa, *Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch.* xi. (1868) n. v. 1.—Malaya.
paniculata, Scheff. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 281 = Mischophloeus paniculata.
paradoxa. Griff, in Calc. Jonrn. Nat. Hist v. (1845) 463 = Pinanga paradoxa.
parva, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 6.—Malaya,
polystachys, *Mia. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 232.—Malaya.
propria, Hort. Bogor. ex Miq. Fl. Ind. Bat iii. 10 = Dictyosperma album.
procera, Zipp. ex Blume, Kumphia, ii. 95 = Kentia procera.
pumila, Blume, in Mart. Hist. Nat. Palm. 177.1.158. fig. 1-3 «= Nenga Wendlandiana.
punicea, Zipp. ex Blame, Rnmphia, ii. 72. t. 122 = Drymophloeus puniceus.
purpnrea, *Hort. in Illustr. Hortic.* xxiv. (1877) t. 298.—Maurit.
rubra, Bory, Voy. i. 306= Acanthophoenix rubra.
rubra, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 232= Dictyosperma rubrum.
sanguinea, Zipp. ex Blnme, Rumphia, ii. 72=Drymophloeus punicens.
sapida, Soland. ex Foist, f. PI. Esc. 66=Rhopalostylis sapida.
saxatilis, Bnrm. f. Fl. Ind. 42 = Drymophloeus saxatilis.
spicata, Lam. Encyc. i. 241 = Calyptrocalyx spicatus.
spinosa, Hasselt & Kunth, Enum. PI. iii. 185 —Oncosperma filamentosnm-.
sylvestris. Lour. Fl. Cochinch. ii. 568 = glandiformis.
tenella, *Becc. Malesia,* i. (1877) 22.—Borneo.
tigillaria, Jack, in Malay. Misc. ii. (1820) n. VII. p. 88 = Oncosperma filamentosum.
triandra, *Roxb. Hart. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 617.—Ind. or.
umbrosa, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 403, nomen.—Hab.»
vaginata, Giseke, Linn. Praelect 78 = Drymophloeus appendicnlatns.
Venehaffelti, Hort ex Lem. in Illustr. Hortic. xiii. (1866) t. 462-3 = Hyophorbe Verschaffelti.
vestiaria, *Giseke, Linn. Praelect.* 78.—Hab. ?
Wallichiana, Mart. Hist Nat Palm. 178 = Iguanura Wallichiana.
Wendlandiana, Scheff. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 882=Nenga Wendlandiana.

ARELINA, Neck. Elem. i. 88 (1790) - Berkheya, Ehrh. (Compos.).

AREMONIA, Neck. Elem. ii. 100 (1790) - Agrimonia, Linn. (Rosac.).
agrimonoides, DC. Prod. ii. 588-Agrimonia Eupatoria.

ARENARIA, Adans. Fun. ii. 256 (1763)-Bpergula, Linn. (Caryophyll.).

AKENAKIA, Rupp. ex Linn. Syst ed. I. (1785}.
CARYOPHYLLEAE, Benth. & Hook. f. i. 149.
ADENARIUM, Rann. in Am. Monthly Mag. (1818) 266.
ALSINANTHUS, Reichb. Handb. 298 (1887).
ALSINE, Scop. Fl. Cam. ed. I. 224 (1772).
ALSINELLA, [SW.] Summa Veg. Scand. 17 (1814), pro parte; S. ir. Gray, Nat An. Brit. PI. ii. 655 (1821).

AKENABIA:—
AMMODENIA, Patrin, ex S. Gmel. Fl. Sibir. iv. 160 (1769).
BIGELONIA, (Bigelowia) Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. „1819) 289.
BRACHYSTEMMA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 216 (1828).
CHERLERIA, Hall. It. Helv. ii. n. 79. t. 1 (1740).
CHETROPIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1886).
DOLOPHRAGMA, Fenzl, in Ann. Wien. Mas. i. (1886) 68. t. 7.
EREMOGONE, Fenzl, Verbr. Alsin. 18. t. ad p. 18 (1888).
EUTHALIA, Rupr. Fl. Caucas. 220 (1869).
FACCHINIA, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 29 (1841).
GOVFFEIA, Robill. & Cast, in DC. Fl. Fr. v. 609 (1815).
GRENIERA, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iv. 27 (1S45).
GyrsoPHVTUM, Adans. Fam. ii. 256 (1763).
HALIANTHUS, Fries, Fl. Halland. 75 *(VM).*
HONKENVA, Ehrh. Beitr. ii. 180 (1788).
LEPTOPHYLLUM, Ehrh. 1. c. iv. 147 il789).
LEPYRODICLIS, Fenzl, in Eudl. Gen. 966 (1840).
MERCKIA, Fisch. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 59.
MERKIA, Reichb. Handb. 298 (1837).
MINUARTIA, Linn. Sp. PI. 89 (1753).
MOEHRINGIA, linn. Syst. ed. II. 22 (1740).
NEUMAYEBA, Reichb. Ic Fl. Germ. v. 80 (1641).
ODONTOSTEMMA, Benth. in Wall. Cat. n. 645 (1828); G. Don, Gen. Syst. i. 449 (1831).
PETTERA, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 33. t. 220 (1841); Norn. 205 (1841).
PLINTHINE, Reichb. Handb. 298 (1837).
RHODALSINE, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Sér. III. iv. 25 (1845).
SABULINA, Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 785 (1882).
SIEFERA, Hoppe, in Flora, ii. (1819) 24.
SOHERAUERA, Hoppe, 1. c. 26 (1819).
STROPHIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 247 (1867).
TRYPHANE, Reichb. Nom. 205 (1841).
WIERZBICKIA, Reichb. 1. c (1841).
WILHELMSIA, Reichb. Consp. 206 (1828).
XERALSINE, Fonrr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 347.
abietina, J. & C. Presl, Delia Prag. i. 63-grandiflora.
acerosa, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. Iu3.—As. Min.
achalensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 26.—Reg. Argent
acicularis, Fisch. ex DC. Prod. i. 403 »juniperina.
acnleaU, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 40.—Am. bor.
adenotrichia, Bong, ex Ledeb. FL Ross. i. 291 — Gypsophila petraea.
af&nis, *Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr, Berl. Mag.* vii. ;l»13) 198.—Hab.?
africana, *Hook./, in Joum. Linn. Soc.* vii. (1864) 184.—Afr. trop.
agglomerata, Poir. Encyc. Suppl. v. 6-glomerata.
aggregata, Boiss. Elench. 28, in obs. —ennacea.
aggregata, Loisel. Fl. Gall. i. 317=tetraquetra.
airaefolia, Fisch. ex DC. Prod. i. 402 = capillaris,
algarbiensis, *Welv. ex Willk. Ic. PI. Hispan.* i. 93.—Lusilan.
Alpamarcae, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped. 1*116.—Peruv.
alpicola, Tenore, Fl. Nap. iv. 224-graminifolia.
alpina, Porter, Fl. Colorad. 14 = obtusa.
alsinoides, Raddi, Brev. Observ. 13=Stellaria uliginosa
alsinoides, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 2ul -lanuginosa.
altaica, Fisch. ex DC. Prod. i. 404=arctica.
amabilis, Bory, in Ann. Gen. Sc. Phys. iii. (1820) 5. tetraquetra.
andicola, *Gill, in Hoot. Bot. Misc.* iii (1889) 148.—Chili,
andina, *Rohrb. in Linnaea,* xxxvii. (1871-72) 265.—Bolivia.
androsacea, Fisch. ex DC. Prod. i. 402-rigida.
apetala, Vill. Prosp. 48 - biflora.
aphananth*, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Séc. V. i. (18641 293.—Peruv.
arabica, Hort. Berol. ex Fisch. Mey. & Av^-LalL Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 41) = tenuitolia.
arctica, *Stev. ex DC. Prod.* i. 404 —Reg. bor. et arct
Arduini, Vis. Stirp. Dalm. 8. t. 8. f. 2~eiaminifolia.

ARENAKIA:—
aretioides, *Portenschl. ex J. Gay, in Ann. Sc. Sat-*Sér. I. iii. (1824) 84, nota.—Europ.
aristata, Rafin. Caratteri, n. 187 = setacea.
armeniaca, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 48.—Armenia.
Armeriastrum, *Boiss. Elench.* 22.—Hispan.
armerina, *Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys.* iii. (1820) —Hispan.
arvatica, Presl, Fl. Sicul. 163=mucronata.
arvensis, Wallr. Sched. Crit. 200 = Spergula arvensis.
Aucheriana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 50.—Persia.
austriaca, All. Fl. Pedem. ii. 112. t. 64. f. 2 = Villarsli.
austriaca, *Jacq. Fl. Austr.* iii. 89. t. 270.—Europ.
baetica, Salzm. ex Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (18*I j* 365 =* cmarginata.
baicalensis, Stend. Nom. ed. II. i. 127-uliginosa.
Balansae, *Boiss. Fl. Orient,* i. 700.—As. Mm.; PeW«-
baldensis, Reichb. ex Nym. Consp. 113 = bavarica.
balearica, *Linn. Syst. Nat.* ed. XII. App. 23O.-»ns-Balear.; Corsic.
banatica, *Heuff. in Flora, xxi.* (1838) 869.—Hungan»-
Barrelieri, Vill. Hist PI. Danph. iv. 634 - tenui»oli»-
Bartolloti, *Tineo, PI. Rar. Sic. Pugill.* i. 10.—Si"'1*-
bavarica, *Linn. Cent.* ii. 17 ; *Amoen. Acad.* iv. 315.—Enrop.
bavarica, *Pall. Reise,* ii. 622.—Rossia.
Benthamii, *Edge*. V Hook./, in Hook./. Fl. Brit. J«a-* i. 242.—Reg. Himal.
Benthamii, *Fentl, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i.6<3-—N. Mexic.
Berteroana, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) «?s Spergularia villosa ?
Biebersleinii, Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. »* vii. (1813) 202-graminifolia.
biflora, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 203=rotondi»l»-
biflora, *Linn. Mant.* 74.—Europ.
bisulea, *Fentl, ex Rohrb. in Linnaea,* XXXTU. (1871-'a 248.—Peruv.
blepharophylU, *Boiss. Fl. Orient,* i. 698.—Armenia.
Bocconi, Soleir. ex Stend. Nom. ed. II. i. 123, I-9 Spergularia media.
bonariensis, *Gill, in Hook. Bo!. Misc.* iii. (1883; «—Reg. Argent.
Bourgaeana, Coss. ex Willk. in Linnaea, xl. («"117»incrassata.
Bourgaei, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 21.—Mexic
brevicaulis, Stemb. in Spreng. Pugill. i. 31 -lane*0"*
breviflora, Gilib. Fl. Lituan. ii. 155—«erpyHifolt»-
brevifolia, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.* (1883)—Am. bor.
Brotherana, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* vul 151.—Rossia.
brvaides, Kisch. ex DC. Prod. i. 404-arctic*.
bryoides, *Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr-* »' *Mag.* vii. (1813) 201.—Mexic.
buxi/olia, Poir. Encyc. vi. 362 = lateriflora.
caerulescens, Rudolph, ex Ledeb. FL Ro«. »* Gypsophila petraea.—Chili.
eaespitosa, Ehrh. Beitr. V. 177 = verna.
eaespitosa, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 673
eaespitosa, Salisb. Prod. 299 = balearica.
eaespitosa, J. Vahl, ex Nym. Consp. Ml* nivalis.
califomica, *Brewer, in Bot. Cali/.* i. 69.—Calif-
calycantha, Ledeb. in Mem. Acad. Sc Peters"- (1812) 534 - Stellaria borealis.
calydna, Haenscl. ex WUlk. & Lange, Prod. ui. »«• Sagina snbulata.
calydna, Hort. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 848-team"
calycina, *Poir. Voy. Barb.* ii. 167.—Afr. bor.
calyculata, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 7.—Hunga
campestris. All. Fl. Pedem. ii. 114-Spergnl»n»/"-
canadensis. Pen. Syn. i. 604 = Spergularia "*gu.*-^ Hab.
canescens, *Vahl, ex Homem. Hort. Ha/n.* i-—
cantabrica, Amo, Fl. Iber. *ii.* 140-serpyllifo}'*-
capensu, *Steud. Nom.* ed. II. i. 124.—Afr. »"»'•
capillacea. All. Fl. Pedera. u. 866-gnuidiflora=
capillacea, Willd. ex Ledeb. Fl. Rosa. •• laris.
capillaris, *Poir. Encyc.* Ti. 88O.-Sibir.; Am-
capillipes, *Boiss. Voy. Bot. Etpagne,* *<% *' Hiipan.; Afr.bor.
capiuta, *Urn. Fl. Fr.* iii. 89—Hisp.; Lu««-
cariafolia, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* »• Armenia.
caroliniana, Wait Fl. Carol. 141 -«q»M*J»-
cassia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. lul.—Syn»-

ARENARIA :—

eaucasica, Adams, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 854 = pioiifolia.
Cephalotes, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 346.—Tauria.
cerastiiflora, Spreng. Syst. v. 62 Ind. = cerastiifolia.
cerastiifolia, *Ramond, ex DC. Fl. Fr.* v. 783.—Pyren.
cerastioides, Pere. Syn. i. 602 = pnrpurascens.
cerastioides, Poir. Voy. Barb. ii. 166=spathulata.
t-ervianae, *Cham. & ScUtckt. in Linnaea,* i. (1826) 62.—Chili.
Cherleria, *Hook.f. Stud. Fl.* ed. I. 60.—Enrop.
Cherleriae, Fisch. ex DC. Prod. i. 409 - Stellaria Petraea.
cherlerifolia, G. Don, in Lond. Hort. Brit. 478 = hirta.
cherlerioides, Vill. Prosp. 48-lanceolate,
cnilensis, *DC. in Mem. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1833) . 222.—Chili.
"liaru. *Lose. Trat. PI. Aragon.* i. 69, 79.—Hispan.
aliata, *Linn. Sp. PI.* 425.—Europ.; Am. bor.
"J'ata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 4S8=cretica.
alioUta, *Edgew. tf Hook.f. in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* . •• 240.—&g. Himal.
cinerea, *DC. Fl. Fr.* v. 611.—Gallia.
"andestina, *PortensM. PI. Dalm.* 13.—Dalmatia.
coerulescens, Auct. vide caerulescens.
"lima, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 849-vema.
eolorata, Tuns, ex Steud. Norn. ed. II. i. 124 - capillaris.
condensata, C. & J. Presl, Delia Prag. i. 62-recurva.
conferta, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 51.—Graecia.
<=onfena, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V.i. (1864) 293.—Bolivia,
eongesta, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N.Am.i.* 178.—Calif.
conjea, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 98. t. 31.—Hispan.
commbriceMis, *Brot. Fl. Lusit.* ii. 200.—Lusitan.; Hispan.
c°nimbricenHs, J. Gay, ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 260 = controversa.
Janata, *R„fi«. Ml. Journ.* 151.—Am. bor.
watroversa, *Boiss. Pugill. PI. Nov. Hisp.* 100.—Hispan.; Gallia.
cornea, Stend. Nom. ed. II. i. 124 - balearica.
costata, *Bunge, ex Ledeb. Fl. Alt.* ii. 170.—Sibir.
oetica, *Spreng. Syst.* ii. 896.—Graecia; Cyprus; Creta.
™eubaloides, *Sm. PI. le. /tied.* i. 17.1.17.—Armenia.
yluriea. Fisch. ex DC. Prod. i. 402-juncea.
*de*urica,* Spreng. Syst ii. 898 = Stellaria petraea.
d >ius, *Hook. f.Fl. Brit. Ind.* i. 242.-Reg. Himal.
" bilis, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross.i. 348 = vema.
"'cussata, Salisb. Prod. 299-tetraquetra.
<Jecussa[illegible] *Willd. ex Schlecht. in Ges.Naturf. Fr. Berl. Mag.* vii. (1813) 212—Mexic.
t'flexa, Decne. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. iil- (1835) 277 - -graveolens.
*ae*sa,* Kit. » Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. " »«• (1813) 200 = gracilis.
deasusima, *Wall. Cat.* n. 640.—Reg. Himal.
"Miculata,/>*,;. *Fl. Atac.* 10.—Chili.
"Pauperata, C. *Gay, Fl. Chil.* i. 270.—Chili.
"andra, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 515 = Spergnlana diandra.
dl «nthoides, Hort. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 365-gypso- philoides.
o'apthoides, *Sm. PI. Ie. Ined.* i. 16. t. 16.—Armen.; dichot[illegible]orna, *Krock. Fl. Sil.* ii. I. 55.—Silesia,
"[rtoromo, Moench, Meth. 224=tenuifolia.
"•jranoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 34.—Mexic.
*y«M, Ell. Sketch,!. 519-lannginosa.
V " ' WiUd_ " S^1"*4_ TM G^_ Naturf_ Fr> BerL j« -*?* ^'* (Ibl3) 201 = scopuloruin»
t'varicata, Adams, ex Ser. in DC. Prod. i. 405- verna.
"oug^asii, *Fentl, ex Torr. ff Gray, Fl. N. Am.* i. 674.
dS? *idea> Boi«- Diagn.* Ser. I. i. 49.-A*. Min.
«"D«, *Suter, Fl. Helv.* i. 266.—Helvet.
«*inata, *Poi, Encyc_* ^ .377.-Europ. austr.
rto°eans, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 57 = stncta.
"oagata, Balbis, ex Schlecht in Ges. Naturf. Fr. Berl. _ M a S- »"• (1813) 200-austriaca, grandiflora.
emargmau, *Brot. Fl. Lusit.* ii. 202.—Lusiten.; Marocco.
'"""»"». *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 108.—Hispan.
[illegible]-[illegible]pia*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 98-setacea.

ABENAEIA :—

extensa, *Dufour, in Ann. Sc. Gen. Phys.* vii. (1820) 291.—Hispan.
fasciculate, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 211.—Arabia,
fasciculata, *Gouan, Illustr.* 30.—Europ.
fasciculata, Hohen. Enum. PI. Elisabethpol. 232-sclerantha.
fasciculata, PalL Ind. Taur.; Bieb. Casp. App. 209 = glomerate.
fasciculata, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. v. 30=globulosa.
fastigiata.fAiV. *in Linnaea,* xxviii. (1856) 673.—Chili.
fastigiata, Sm. Eng. Bot. xx. t. 1744~rostrata.
iastigiata, *Schur, Enum. PI. Transs.* 112.—Transsylv.
Fendleri, *A. Gray, PI. Fendl.* 13.—Am. bor.
festneoides, *Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 81. t. 21. f. 3.—Reg. Himal.
filicaulis, Fenzl, in Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 203 = graveolens.
filvfolia, Bieb. FL Taor. Cane. i. 344 -=graminifolia.
filifolia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 211=setacea.
filiformis, Labill. Ic. PI. Syr. dec. iv. 8-=picta.
fimbriata, Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 352 = laricina.
fimbriata, Salzm. ex Kindberg, Monog. Lepigon. 22 = Spergularia fimbriata.
fiaccida, [Clairv.] Man. Herb. 149 •= Villarsii.
fiaccida, Froel. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 790 = lanceolata.
fiaccida, Roxb. Hort. Beng. 34; Fl. Ind. ii. 447 = Spergnla pentandra.
fiaccida, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. III. 46 = verna.
flexnosa, *Rafin. Atl. Journ.* 151.—Am. bor.
floribunda, C. *Gay, Fl. Chil.* i. 289.—Chili,
foliosa, *Royle,ex Edgew V Hook.f. in Fl.Brit. Ind.* i. 236.—Reg. Himal.
formosa, Fisch. ex DC. Prod. i. 402=capillaris.
Franklinii, *Dougl. ex Hook. Fl.Bor. Am. i.* 101.—Am. bor.
frigida, *Supr. Fl. Caucas.* 202.—Caucas.
frutescens, Kit. ex Sennit. Oestr. Fl. ed. II. i. 667 = setacea.
galioides, *Ser. in DC. Prod.* i. 410.—Hab.J
genicnlata, *Poir. Voy. Barb.* ii. 166.—Reg. Mediterr.
Gerardi, Willd. Sp. PI. ii. 729=vema.
Giesekii, Hornem. Fl. Dan. t. 1518<=vema.
glabra, Balb. Misc. 21 = Villarsii.
glabra, Ell. Sketch, i. 520=Stellaria uniflora.
glabra, *Miehx. Fl. Bor. Am. i.* 274.—Am. bor.
glabra, Torr. Fl. U. St 455=groenlandica.
glabrata, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 56 = vema.
glanduligera, *Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 240.—Reg. Himal.
glandulosa, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 56.—Afr. austr.
globiflora, *Wall. Cat.* n. 639.—Reg. Himal.
globosa, Spreng. Syst. ii. 400=globulosa.
globnlosa, *Labill. Ic. PI. Syr. dec.* iv. «.—Oriens.
glomerata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 350.—Tauria.
glutinosa, Bieb. 1. c. 344=Holostenm umbellatum.
glutinosa, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. ii. „1854) 247. t. 2 = Ledebouriana.
glutinosa. Willd. ex Ledeb. Fl. Ross, i 353=imbricate.
Gmelini, Bong, ex Ledeb. 1. c. 851 — Villarsii.
Gmelini, Fisch. ex DC. Prod. i. 402-=Gypsophila Gmelini.
gorgonea, *J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins.* 278.—Ins. Cap. Verd.
gothica, *Fries, Mant.* ii. 33.—Enrop.
Gouffeia, Puel, in Dnch. Rev. Bot. i. (Avr. 1846) 450 -controversa.
Gouffeia, *Chaub. Fl. PJlop.* n. 701. t. 24. f. 2.—GalL occ.
gracilis, *Kit. ex Schult. PI. Rar. Hung.* iii. 305.—Croat.; Dalmat.
graeca, Boiss. exNym. Consp. 114—graveolens.
graminea, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 124 = grandiflora.
graminea, *C. A. Mey. Vert. Pfi. Cauc.* 220.—Reg. Caucas.
graminifolia, *Arduin. Animad. Alt.* 25.—Italia; Dalmat.
graminifolia, *Schrad. Hort. Goett.* i. 5.—Hangar.; Reg. Cauc.; Sibiria.
grandiflora, Coss.ex Willk. in Linnaea, xl. (1876) 117—incrassata.
grandiflora, *Linn. Syst.* ed. X. 1034.—Enrtp.
grandiflora, Pall. Reise, iii. 84—arctica.
grandis, H. B. *tc K.* Nov. Gen. et Sp. vi. 30-Spergularia grandis.

ATtimTATtTA :—

graveolens, *Schreb. in Nov. Act. Nat. Cur.* iii. (1767) - 478.—Graecia; As. Min.; Syria; Arab.
Griffithii, *Boiss. Fl.Orient,* i.697.—Tibet, occ.; Afghan.
grineensis, Thomas, Suppl. Cat. (1842)-Villarsii.
groenlandica, *Spreng. Syst.* ii. 402.—Am. arcL
Guicciardii, *Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 60.—Graecia.
Guilielmi-Waldemarii, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 142 = festucoides.
gypsophiloides, *Linn. Mant.* i. 71.—As. Min.; Persia.
gypsophiloides, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 365-cucubaloidcs.
gypsophiloides, Willd. ex Ledeb. 1. c. 366-juncea.
Haenkeana, Bartl. ex Presl, Rel. Haenk. ii. lfi-lateriflora.
Halleri, Raeuscb. Nom. ed. III. 130=tenuifolia.
Halleri, Vitm. Summa, iii. 109=bifiora.
halophila, Bunge, ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 163=Spergularia media.
Helmii, *Fisch. ex DC. Prod.* i. 404.—Sibir. ural.
herniarifolia, Desf. Fl. Atlant. i. 858 = geniculata.
heteromalla, Pers. Syn. i. 504—setacea.
helerosperma, Guss. Fl. Sic Syn. i. 501-Spergularia media.
hirsuta, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 349-recurva.
hirta, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1S38) 272-cretica.
hirta, WorsmsV. in Fl. Dan. t. 1646=vema.
hispanica, Spreng. Syst. ii. 396-spathulata.
hispida, *Linn. Sp. PI.* 425.—Europ.
hispida, Salzm. ex Presl, Fl. Sicul. 164 - Salzmanni.
Holostea, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 345.—Reg. Caucas.
Holostea, Beaupr. ex Ser. in DC. Prod. i. 402-rigida.
holosteoides, *Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 241.—Reg. Himal.
Hookeri, Nutt. ex Torr. & Gray, FL N. Am. i. 178 = Franklinii.
Howellii, 5. *Wats, in Proc. Am, Acad.* xx. (1885; 354.—Oregon.
humifusa, Wahlenb. Fl. Lapp. 129-ciliata.
Huteri, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872, 368.—Europ.
hybrida, Vill. Prosp. 48=tenuifolia.
imbricata, Banks, ex Steud. Nom. ed. II. i. 124, 125 = glabra.
imbricata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 344.—Reg. Caucas.
imbricata, Lag. Rodr. in Anal. Cienc. Nat. v. (1802, 278 = tetraquetra.
imbricata, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 361=squarrosa.
inamoena, Steud. Nom. ed. II. i. 125 - imbricata.
ihcrassata, *Lange, PI. Nov. Hisp.* fast L 8. t. 4. f. 2.—Hispan.
intricata, Dufour, ex Ser. in DC. Prod. i. 410-montana.
intricata, *J. Gay, ex Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 617, in syn.—Hispan.
isaurica, *Boiss. Fl. Orient,* i. 695.—As. Min.
Jamesoniana, *Rohrb. in Linnaea,* xxxvii. (1871-72) 267.—Ecuador.
juncea, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 309.—Tauria.
juniperina, *Linn. Mant.* 72.—Oriens; Tnrkest
juniperina, Pursh, Fl. Am. Sept. 319-vema.
juniperina, Vill. Hist. PL Dauph. iii. 624-grandiflora.
Juressi, *Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* vii. (1813) 212.—Hispan.
Jussiei, *St. Hil. Fl. Bras. Med.* ii. 174.—Bras,
kansuensis, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxvi. (1880) 428.—China,
kashmirica, *Edgew. in Hook.f. Fl.Brit. Ind.* i. 236.—Reg. Himal.
Koriniana, *Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 363.—Rossia.
Kotschyana, Fenzl, in Russegg. Reise, ii. 930-tmolea.
lanceolata, *All. Fl. Pedem.* ii. 114.—Europ.
lannginosa, *Rohrb. in Mart. Fl. Bras.* xiv. n. 274.—Am. bor. et austr.
lappomca, *Spreng. Syst.* ii. 402.—Lappon.
laricifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 347 - pinifolia.
/orio/o/ia.Lapeyr. [Abr. i. 255] ex Sieud. Nom. ed. II i. 124= grandiflora.
landfolia, *Linn. Sp..Pl.* 424.—Europ.
laricifolia, Pall. Ind. Taur. [61] ex Stend. Nom. ed. I, 66; ed. IL i. 127=setacea.
laricifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 319-arctica.
laricina, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1828) 57 - Spergula laricina.
lateriflora, *Linn. Sp. PI.* 423.-Sibir.; Am. bor,

ABEITAKIA:-
lateriflora, Darl. Fl. Cestr. 277 = Stellaria borealis.
laxa, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 404=grandiflora.
Laxmanni, Fisch. ex Ser. 1. c. 402=capillaris.
Ledebouriana, ***Fentl, in Russegg. Reise,*** **ii. 931.—** Armenia.
Uptoclados, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 284=serpyllifolia.
leptoclados, *Boiss. Fl. Orient,* i. 701.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
leptophylla, ***Cham,*** **b*** ***SchUcht. in Linnaea,*** **v. (1830)** 283.—Mexic.
Lessertiana, *Penal, in Russegg. Reise,* ii. 932.—Peisia.
lesarina, ***Loret, Herb. Lot. et Prost.*** **13.—Gall. mer.**
libanotica, Kotschy, in Boiss. Fl. Orient, i. 699 = setacea.
Liebmanniana, *Rohrb. in Linnaea,* xxxvii. (1871-72) 274.-Bras.
ligericina, Lee. & Lamotte, Cat. Fl. Cent. Fr. 104 = lesurina.
lignosa, *Phil. Fl. Atac.* 10.—Chili.
linearifolia.. Poir. Encyc. vi. 366=montana.
lineata, ***C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Ross.*** **i. 851.—Rossia.**
liniflora, Jacq. Fl. Anstr. v. 22=vema.
liniflora. Linn. Sp. PI. ed. II. 607=laridfolia.
liniflora, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 899=grandiflora.
littoralis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 678.—Chili.
littoralis, Salisb. Prod. 299 = peploides.
Lloydii, Jord. Pngill. 37=serpyllifolia.
longifolia, DC. Prod. i. 402=graminifolia.
longifolia, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. i. 345=saxatilis.
Loscosii, ***Texid. in Lose. Trot. PI. Aragon,*** **ii. 28.—** Hispan.
lychnidea, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 347.—Reg. Caucas.
lychnidea, WilM. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 367=capillaris.
lycopodioides, ***Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr.*** *Berl. Mag.* vii. (1818) 212.—Mexic.
macradenia, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 867.—Am. bor.
macrocalyx, *Tausch, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 243.—Syria.
macrocarpa, Homem. Hort Hafti. i. 964-canescens.
macrocarpa. Kit. ex Ser. in DC. Prod. i. 404-landfolia.
macrocarpa, *Pursh, Ft. Am. Sept.* i. 816.—Am. bor.
macrophylla, *Hook. Fl.Bor.Am.*i. 102-As. or.; Am. bor. occ.
macrorrhita, Gnir. ex Willie. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 166-Spergularia media.
macrorrhita, Reqnien, ex Loisel. N0U7. Not. 22 = Spergularia macrorrhiza.
macrosepala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 52.—As. Min.
macrotheca, Homem. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 53-Spergularia macrotheca.
Mandoniana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V.i. (1864) 294.—Reg. And.
marginata, DC. Fl. Fr. v. 793-= Spergularia marginata.
marginata, ***Schlecht. in Get. Naturf. Fr. Berl. Mag.*** vii. 1.1813) 212.-Libir. or.
marina. All. Fl. Pedem. ii. 114•Spergularia media.
marina, Pall. Reise, iii. 603 = Spergularia marina.
marina, Roth, Tent. FL Germ. i. 189=Spergularia salina.
maritima, Stend. Nom. ed. II. i. 125=Spergularia media.
Marschlinsii, Koch, in Flora, xxiv. (1841) II. 609 = serpyllifolia.
media, DC. Prod. i. 401=Spergularia marina.
media, Linn. Sp. PI. ed. II. 606 = Spergularia media.
media, Poll, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 617, in syn. - Spergula pentandra.
mediterranea, Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 4Sl = mucronata.
melaudryoides, ***Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** i. 241.—Reg. Himal.
mexicana, *Steud- Nom.* ed. II. i. 125.—Mexic.
Meyeri, ***Edgem. V Hook.f. in Fl. Brit. Ind.*** **i. 286.—** Oriens; Ind. bor. occ.
Meyeri, *Fentl, ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 868.—As. temp.
Michauxii, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xxiii. (1861) 287, 322=stricta.
microphylla, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 673.—Peruv.
minuta, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 273.—Chili.
mixta, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 255=grandiflora.
modesta, ***Dufour, in Ann. Sc. Gin. Phys.*** **vii. (1820';** 291.—Hispan.

AKENABIA:—
molluginea, *Ser. in DC. Prod.* i. 400.—Mexic
molluginifolia, ***Pourr. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr.*** *Berl. Mag.* vii. (1813) 201.—Hispan.
montana, *Linn. Cent.* i. 12; *Amoen. Acad.* iv. 272.—Gall.; Hisp.
montana, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 125 = macrocalyx.
monticola, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. '1861.' (1862) 449-Benthamii.
monticola, ***Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** **i. 238.—** Reg. Himal.
Moritzii, ***Bruegg. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol.*** **III.** ix. (I860) 117.—Europ.
mucronata, DC. Fl. Fr. iv. 791=rostrata.
mucronata, *Linn. Sp. PI.* 424.—Ital.; Gall.
mucronata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 294=tennifolia.
multicaulis, Linn. Amoen. Acad. i. 162 = dliata.
multicaulis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 673.—Chili.
Munbyi, ***Munby, Cat. PI. Alger.*** **6.—Algeria.**
muralis, Sieber, ex Spreng. Syst. ii. 397—graveolens.
musdformis, ***Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.*** IV. xvii. (18621 150.—N. Granat.
musciformis, *Wall. Cat.* n. 6401.—Tibet
musdpula, *Fentl, Verbr. Alsin.* anal. tab. iii.—Afr. bor.
muscoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 34.—Am. austr.
muscorum, Adams, sec. Fisch. ex DC. Prod. i. 407 - uliginosa.
mnscornm, *Fisch. ex DC, I. c.* 409.—Kamtschatka.
muscosa, ***Med. in Act. Acad. Theod. Palat.*** **iii. *Phys.*** (1775) 202. t. 12.—Europ.
mutabilis, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 266=fasdculata.
nana, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 108.—Creta.
nana, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1818) 201 = muscoides.
nardifolia, Ledeb. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 98 (1830) =capillaris.
neelgherrensis, Wight & Am. Prod. i. 48.—Reg. Him.; Mont. Nilgiri.
nemorosa, **H. B.** & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 35 = lanuginosa.
nemorosa, Steud. Nom. ed. II. i. 126, 127 = trinervia.
nepalensis, *Spreng. Syst. Cur. Post.* 181.—Nepal.
nervosa, Lam. Fl. Fr. iii. 36 »trinervia.
nevadensis, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 90=conferta.
nilgherensis, Fenzl, var. a, 7, ex Boiss. Fl. Orient, i. 700, in syn.—Balansae.
nitida, *Rohrb. in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 249.—Peruv.
nodosa, Bory & Chaub. Fl. Pelop.' 28. t 15-juniperina.
nodosa, Wallr. Sched. Crit 200, in obs. -= Sagina nodosa.
norvegica, *Gunn. Fl. Norn.* ii. 1100. t. 9. f. 7-9; *ex Hornem. in Fl. Dan.* t. 1269.—Scandin.
nudiuscula, Bertol. Bot. Misc. ii. 222. t. 8 = picta.
obtusa, All. Fl. Pedem. ii. 114 = polygonoides.
obtusa, ***Torr. in Ann. Lye. New York,*** **ii. (1828) 170.** —Am. bor.
obtusiflora, *Kunte, in Flora,* xxix. (1846) 632,—Hispan.
oeeulta, Fisch. ex DC. Prod. i. 408=polygonoides, aictica.
oligospenna, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 272.—Chili,
orbicularis, *Vis. Fl. Dalm.* iii. 180.—Euiop.
orbiculata, ***Royle, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** **i. 240.—** Reg. Himal.
Orbignyana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. i. (1864) 293.—Bolivia.
oreophila, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 238.—Tibet,
otitoides, ***Adams, ex Fisch. in DC. Prod.*** **i. 402.—** Sibir.
oxypetala, ***Sibth. (f Sm. Fl. Graec. Prod.*** **i. 308.—** Grocci&j Crete.
palustris, *C. Gay, Fl. Chil.* L 271.—Chili,
palustris, *S. Wats. Bot. Calif,* i. 70.—Calif,
pamphylica, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 102.—As. Min.
paniculata, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* Ii. 168.—Sibir. alt.
papillosa, Steud. Nom. ed. II. i. 126-graveoIens.
paradoxa, Bartl. ex Presl, Rel. Haenk. ii. 16 = lanuginosa.
parviflora, *Benth. PI. Hartw.* 163.—N. **Granat**

ARKETABIA:—
patagonica, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 671.—Patagonia.
patula, Martr. Fl. Tam, 107-serpyllifoUa.
patula, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 273.—Am. **bor.**
pauciflora, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 610.—Hungar.
pedunculosa, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. i. (1864) 294.—Bolivia,
pendula, *Waldst. V Kit. PI. Rar.* i. 90. t. 87^-Banat.; Thracia.
pensylvanica, Muhl. Ind. FL Lane. 169 - lateriflorat
pentagyna, *Moc. (f Sesse, ex DC. Prod.* i. 895.—Mexic.
pentandra, Dufour, in Ann. Sc. Gen. Phys. vii. (1820 - 292=tenuifolia.
pentandra, ***Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.*** **xxvi. (1880)** 429.—Soongaria.
pentandra, *Turce. in Flora,* xvii. (1834) I. *Beibl.* 8.—Sibir. baical.
Pentandra, Waldr. Sched. Crit. 206 = Spergula pentandra.
peploides, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 251 -Porycarpon peploides.
peploides, *Linn. Sp. PI.* 423.—Reg. bor. temp. et arct.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 49 -.Lessertiana.
peruviana, Poepp. ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 275—lanuginosa.
Peyritschii, *Rohrb. in Linnaea,* xxxvii. (1871-78) 264.—Mexic.
pharnaceoides, Ser. in DC. Prod.i. 408 »picta.
physodes, *Fisch. ex DC. 1. c.* 413.—Am. bor.
picta, ***Sibth. b- Sm. Fl. Graec. Prod.*** **i. 804.—As. Min.;** Syria.
pilifera, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 862 -Spergula laricina.
pimfolia, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 348.—Reg. Cancas.
Pissisi, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 20.—Chili.
Pitcheri, ***Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.*** **i. 180.—** Am. bor.
plantaginea, Mert. *8c* Koch, in Roehl. FL Dentschl. iii 273, in syn. = trinervia.
Poeppigiana, *Rohrb. in Linnaea,* xxxviL (1871-72) 265.—Peruv.
polycnemifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 48.—Armenia ; Persia,
polygonoides, *Wulf. in Jacq. Coll.* i. 241. t. 15.—Europ.; As. bor.
polytrichoides, ***Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.*** 287.—Reg. HimaL
Pomeli, ***Munby, in Butt. Soc. Bot. Fr.*** **xi. (1864) 45.—** Algeria.
Ponae, Reichb. Ic. PI. Germ. ii. 26-bavaHca.
portulacea, Lam. Fl. Fr. iii. 38=peploides.
Preslii, Nym. Consp. 118-graminifolia.
procera, Spreng. ex Hornem. Hort. Ham. **424-gra**minifolia.
procumbens, Bove, ex Decne. in Ann. Sc. Nat Ser. II. iii. (1835) 277-graveolens.
procumbens, *Rupr. Fl. Cauc.* 202.—Cancas.
procumbens, Vahl, Symb. Bot. i. 50. t. 83 - geniculata.
propinqua, Richards, in Frankl. 1st Joum. ed. II. App. 17-verna.
prostrata, Ser. in DC. Prod. i. 400 = Polycarpaea prostrata.
Przewalskii, ***Maxim, in Bull. Acad. Ptiersb.*** **xxvi.** (1880) 428.—China,
pseudarmeriastrum, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 46.—Gallia.
pubescens, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 126-pubigera.
pnbestens, ***Xedowski, ex Ledeb. Fl. Ross. i.*** **849.—** Rossia,
pubescens, Steud. Nom. ed. I. 66=Spergalaria media.
Pubescens, Urville, in Mem. Soc Linn. Par. i. (1822> 306=graveolens.
pubigera, *Steud. Nom.* ed. II. 1. 126,-Sicilia.
pulchella, Hoffm. Hort. Mosq. 4-Gypsophila elegans.
pulchra, ***Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl.*** *Mag.* vii. (1813) 212.—Armenia,
pulvinata, ***Edgew. in Hook.f. Fl. Brit. Ind.*** **i. 238.—** Reg. Himal.
Pumilio, R. Br. in Parry, 2nd Voy. App. 391 -arctic*-
pungens, ***Clem, in Lag. Gen. et Sp. Nov.*** **15.—Hispan. i** Marocco.

ARENARIA:—

pungent, Steph. ex Ser. in DC. Prod. i. 408 -subulate.
Pungens, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 179.—Am. bor. occ.
purpurascens, *Ramond, ex DC. Fl. Fr.* iv. 785.—Pyren.
purpurea, Pen. Syn. i. E04 = Spergularia purpurea.
purpurea, Willd. ex Schlecbt. in Ues. Naturf. Fi. Beit Mag. vii. (1818) 211-rubicunda.
Purskiana. Ser. in DC Prod. i. 41* - Stellaria hnmifusa.
pusilla, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xrii. (1881-82) 367.—Am. bor.
Pycnophylla, *Rohrb. in Linnaea,* xxxvii. (1871-72) 2S0.—Bolivia.
pyrenaica, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 126 = montana.
tuadrivalvis, R. Br. in Parry, lstVoy. App. 271 = Terna.
Vriatdn, Ponrr. ex Willk. in Hot. Zeit. T. (1847) 289 = capitata.
racemou, *Willk. I. c*—Hispan.
Raddiana, Ser. in DC. Prod. i. 412 - Stellaria oliginosa.
radians, *Benth. PI. Hartm.* 163.—N. Granat.
radicans, Hort. ex Steud. Norn, ed II. i. 126 —pendula.
radicans, Spreng. Syst. ii. 400=Spergularia rubra.
Rafinesquiana, Ser. in DC. Prod. i. 409 = squarrosa.
Ramondi, Poir. Encyc. Snppl. v. 3 = cerastiifolia.
rasnosissima, Bieb. ex Steud. Nom. ed. I. 67 = setacea.
ramosissima, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 24.—Hungar.
recorya, *All. Fl. Pedem.* ii. 118. t. 89. f. 8.—Enrop. Oriens.
Redowskii, *Cham. V SchUcht. in Linnaea,* i. (1826) 66.—As. or.
"Pens, *Ser. in DC. Prod.* i. 410.—Hab. I
«ptaiu, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 22.—Mexic.
ntusa, *Boiss. Voy. Hot. Espagne,* 99. t. 27.—Hispan.
rkodia, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 62 = oxypetala.
rigida. *Bub. Ft. Taur. Cauc.* i. 846.—Tauria.
nvularis, *Phil. Fl. Atac.* 10.—Chili.
Rohrbachiana, *Garde, in Linnaea,* xxxvii. (1671-72) 811.—Mexic.
Rosani, *Tenure, Prod. Fl. Nap.* 26.—Ital.; Dalmat.
rosea, Presl, Fl. Sicul. 165=geniculata-
rosea, Salzm. ex Ball, in Joum. linn. Soc. xvi. (1878) 865 = emarginata.
Rossii, R. Br. in App. Parry, Voy. 18-stricta.
Roylei, Fend, ex KloUsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 142-festucoides.
rosirata, AValdst. *Be* Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 481 ^laricifolia.
"•strata, *Pen. Syn.* i. 504.—Europ. alp.
rotondifolia, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 848.—Graecia ; Reg. Caoc.; As. Min.
'"*Mia,* Sm. Engl. Bot. Suppl. t. 2588=vema,
"ibicunda, *Spreng. Syst.* iL S99.-Sibii.
rubra, Linn. Sp. PI. 428-Spergularia rubra.
'npestris, *Labill. PI. Syr. dec.* iv. 8. t. 4. f. 1.—liban.
•*vpicola,* Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 243 err. typ.-seq.
Tpifraga, Fenzl, e* Ledeb. Fl. Ross.i. 780=Thylacosperrnum rupifragum.
""scifolia, *Poir. Encyc.* vi. 366.— Canada.
"Sa/olia, Requien, in Guer. Vaud. ed. II. 254 = cinerea.
^linea, *Griseb. in Russegg. Seise,* ii. 888.—Mesopot.
sajanensis, *Willd. ex SchUcht. in Ges. Naturf. Fr.Berl. Mag.* vU. (1818) 200.—Sibir. alt.
•«»<, Ser. in DC. Prod. i. 401 = Spergnlaria marina.
"dsuginea, Bunge, ex Ledeb. Fl. Alt ii. 163 = Spergii-
Una diandra,
aalzmanni, *Presl, Fl. Sicul.* 168.—Sicil.
""eta, *Janka, in Ter-nls*. Fuceetek,* vi. (1882) 165.—*-urop. austr.
•aponarioides, *Boiss. Vf Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 86.—Phrygia.
'"**atilis,* Bout. «x Willk. in Willk. * Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 621-obtusiflora.
'oxatilis, Auct ex Steud. Nom. ed. II. i. 127=setacea.
'axatilU,, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 267 -veraa.
s«»tilis, *Linn. Sp. PI.* 423.—Enrop.; Sibir.
•«<MUi, VilL Fl. Delphin. 43-rostrata.
Saafraga, *Frivald. in Flora,* xix. (1886) II. 484.—Rumelia.
"«»», *A. Gray, PI. Wright,* ii. 18.—N. Mexic.
**«». *Poir. Encyc.* vi. 377.—Europ.
'""•*dinavica,* Spreng. Syst. U. 899 .-Stellaria biflora.
xanosa, *Boa,, in Tchihat. Asie Min. Bot.* i. 284.—Armenia.
•Eopulorum, *H. B. &• K. Not. Gen. et Sp.* vi. 81.—Peruv.
••Jwdes, *Froel. ex Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. 1.114.—*yrol.

AKE2TABIA:—

segetalis, Lam. Fl. Fr. iii. 43=Spergularia aegetalis.
sericea, Ser. in DC. Prod. i. 414 = purpnrea.
serpens, Fisch. ex Ser. 1. c. 404-arcdca.
serpens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 82.—Ecuador.
serpyllifolia, Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 619-nevadensis.
serpyllifolia. *Linn. Sp. PI.* 428.—Enrop.; As., temp.; bid. or.
serpyllifolia, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 495 - leptoclados.
serpylloidei, C. *Gay, Fl. Chil.* i. 271.—Chili.
setacea, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 402 = lychnidea.
setacea, Adams, ex Ser. 1. c. 408 = capillaris.
setacea, *Thuill. Fl. Par.* ed. II. 220.—Reg. Mediterr.; Oriens; Sibir.
setosa, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 368 = capillaris.
sibirica, Pers. Syn. i. S04-capillaris.
sipylea, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 51 = graveoleng.
sitchensis, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1565=peploides.
Smithii, Steud. Nom. ed. II. i. 127=globulosa.
soratensis, *Rohrb. in Linnaea,* xxxvii. (1871-72) 266.—Bolivia.
sordida, *Chaub. Fl. Pllop.* n. 699. t. 24. f. 1.—Graecia.
spathulata, *Desf. Fl. Atlant.* i. 868.—Hispan. j Afr. bor.
Spergula, Dufour, in Ann. Gen. Sc. Phys. vii. (1820) 293 = Spergnlaria media.
sperguloides, *Rafin. Atl. Joum.* 153.—Am. bor.
sperguloides, *Trevir. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 127.—ChiU.
sphaerocarpa, Martr. Fl. Tarn, 107spatula.
sphaerocarpa, 'lènore, Syll. Fl. Neap. iv. 222-serpyllifolia.
spinulifiora, Ser. in DC. Prod. i. 406 - Habrosia spinulirlora.
squarrosa, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 278.—Am. bor.
stellarutides, Pers. Syn. i. 603 = austriaca.
stellarioides, *Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* vii. (1813) 209.—Cancas.
stenocarpa, *Phil. Fl. Atac.* 10.—Chili.
stenopetala, Turcz. Cat. Baikal, n. 257, in Bull. Soc Nat. Mosc. (1888) 89-arctica.
sfenophylla, Ledeb. Ind. Hort. Dorp.; Fl. Alt. ii. 166 graroinifolia.
Steveniana, *Boiss. Ft. Orient,* i. 692.—Armenia.
stolonifera, Vill. ex DC. Prod. i. 404 - graudiflora.
Stracheyi, *Edgew. in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 240.—Tibet.
striata. Linn. Cent, ii 17[M]capillacea, cephaelotes, laricifolia, recurva, saxatilis, Terna.
striata, *Vill. Hist. PI. Dauph.* iv. 680. t. 47.—Gallia.
stricta, *Michx. Fl. Bor. Am. i.* 274.—Am. bor.
stygia, Boiss. Sc Heldr. Diagn. Ser. I1..I. 91=.cretica.
suhulata, Ser. in *DC. Prod.* i. 408.—Sibir.
subulifolia, Presl, Fl. Sicul. 162=mucronata.
succulenta, Ser. in DC. Prod. i. 400 = Polycarpon succulentum.
sulcata, Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1818) 212-hirta.
Szowitsii, *Boiss. Fl. Orient.* 1. 695.—Reg. Caucas.
tenella, *Kit. in Schult. Oestr. Fl.* ed. II. i. 663.—Hungar.
tenella, *Nutt. ex Torr.* &• *Gray, Fl. N. Am. i.* 179.—Am. bor.
tenella, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 127 = stricta.
tenera, *Edgew. in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 242.—Reg. Himal.
tenuiBora, *Schrad. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 127.—Hab. 7
tenuifolia, *Linn. Sp. PL* 424.—Europ.
tenuis, 7. *Gay, in Walp. Ann.* vii. 800.—Hispan.
feres, Kit. ex Steud. Nom. ed. I. 67 = setacea.
teretifolia, *Phil. Fl. Atac.* 10.—Chili,
tetragyna, *Willd. ex Schlecht. Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* vii. (1818) 201.—Am. austr.
tetraquetra, *Linn. Sp. PI.* 423.—Gallia.
tetrasticha, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 60.—Persia,
thedifolia, *Froel. ex Xeichb. Ic. Fl. Germ.* v. t. 219.—Alp. Algoviae.
thymifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 817-Stellaria humifusa.
thymifolia, *Sibth. 6r Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 804.—Creta.
tmolea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 50.—As. Mr.
tomentosa, *Willk.in Linnaea,xm.{IS62)lt.*—Hispan,
tremula, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 101.—Syria.
triandra, Schrank, Hort. Monac. t. Sl=mncronata.

ABJENAKIA:—

trichocalycina, *Tenore V Guss. ex Boiss. Fl. Orient, i.* 681.—Graecia.
trichotoma, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 60-Ledebouriana.
trichotoma, *Royle, ex Hoot. f. Fl. Brit. Ind. I* 286.—Reg. Himal.
trifiora, Linn. Mant. 240 = grandiflora.
triflora, ViU. Prosp. 48 - Villarsii.
trinervia. *Linn. Sp. PI.* 428.—Europ.
tschuktschorum, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) I. 264—Sibir.
ucranica,' Spreng. in Erech.' sec Steud. Nom. ed. II. i. 124,127=graminifolia.
uliginosa, Schleich. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1818) 307 =stricta.
umbeUata, [Clairv.] Man. Herb. 149-Holosteum nmbellatum.
umbeUata, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. T. 28-Holosteum tenerrimum.
umbellaU, *{Sdand. in] Russell, Aleppo,* ed. II. iL 252.—As. Min.
umbrosa, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 173.—Sibir. alt.
uniflora, *Luce, Topog. Nachr. Oesel,* 141.—In& Ossil.
unifiora. Poir. Encyc. vi. 375 = recurva.
unilateralis, Steud. Nom. ed. II. i. 127 = segetalis.
uralensis, *Pall, ex Spreng. Syst.* ii. 396.—Sibir. ural.
varia, Dulac, Fl. Haules-Pyr. 249 = serpyllifolia.
Valentino, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 90.—Europ.
verna, Georgi, Beschr. Kuss. Reich, iii. IV. 979 = setacea.
verna, Hort. ex Vilm. F'. ">]. Terre, ed. I. 756 = Sagina subulata.
vena, *Linn. Mant.* 72.—Europ.; Am. bor.
verHcillata, Willd. Sp. PI. iL 725 = Acanthophyllqm verticillatum.
Villarsii, *Balb. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* vii. (1813) 199.—Europ. med.
villosa, *Ledeb. in Mém. Acad. Pitersb.* v. (1812) 584.—Sibir. or.
villosa, Wulf. in Jacq. Coll. iv. 319 - Wulfenii.
violacea, *Ledeb. in Mim. Acad. Pitersb.* v. (1812) 638. -Sibir.
viscida, Loisel. Not. 68 = serpyllifolia.
viscidula, Thuill. Fl. Par. i. 219 = tenuifolia.
viscosa, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 403 = subulata.
viscosa, Pers. Syn. i 504 = tenuifolia.
viscosa, Pourr. ex Webb & Berth. Phyt Canar. i. 149 = procumbens.
vulcanorum, *Maxim, in Franch. tf Sm. Enum. PI. Jap. i.* 62.—Japon.
vulgaris, Bernh. Syst. Verz. Erf. 259 = Stellaria media.
Wallichiana, Ser. in DC. Prod. i. 411 = serpyllifolia.
Wulfenii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 128.—Alp. Camiol.

ARENBERGIA, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Bmx. xi. I. (1844) S73 = EUBtoma, Salisb. (Gentian.).
glauca. Mart. & Gal. 1. c. 874 = E. exaltatum.

ARENGA, Labill. in Mém. Inst. Par. iv. (1801) 209.
PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 917.
GOMUTUS, Correa, in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 288. t. 24. f. 1.
SAGUERUS, Adans. Fam. ii. 24 (1763).
Griffithi, Seem, ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 282 = saccharifera.
javanica, *Hort. ex H. Wendl. 1. c.*—Java,
obtusifolia, *Mart. Hist. Nat. Palm.* 191. t. 147, 148.—Ind. or.; Malaya,
saccharifera, *Labill in Mim. Inst. Par.* iv. (1801) 20U.—Malaya.
Westerhoutii, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 474 ~ obtusifolia.
Wightii, *Griff. I. c.* 475.—Ind. or.

ABBTHUSA, Gronov. Fl. Virg. 184 (1748). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 614.
CRYBE, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446 (1836).
EFIFACTIS, Adans. Fam. ii. 70 (1763).
ORCHIDION, Mitchell, in Act. Nat. Cur. viil (1748) 218, App.
alaris, Raeusch. Nom. ed. III. 262 = Ptcrygodium catholicum.
alata, Poir. Encyc. Suppl. i. 443 = PterostylU praecox.
bengalensis, Herb. Calc. ex Hemsl. in Joum. Linn. Soc, xx. (1884) 811 = Didymoplexis pallens.
biplumata. Linn. f. Suppl. 405 = Bipinnnla bonariensis,
bulbosa. *Linn. Sp. PL* 960.—Am. bor.

ABETHTTSA :—
capensis. Linn. Diss. PI. Rar. Afr. 28; Atnoen. Acad. vi. 111 = Disperis capensis.
catenata, Sm. Exot. Bot. ii. 89=Caladenia camea.
ciliaris, Linn. f. Suppl. 405 = Bartholina pectinata.
cordata, Poir. Encyc Sappl. i. 444=Disperis cordata.
crispa, Thunb. Prod. PI. Cap. 8 = Corycium crispum.
cucuttata, Poir. Encyc. Suppl. i. 444 = Disperis cucullata.
divaricata, Linn. Sp. PI. 951=Pogonia divaricata.
ecristata, Griff. Notul. iii. 378 = Didymoplexis pallens.
foliosa, *Walt. Fl. Carol.* 222.—Am. bor.
gentianoides, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1436=Pogonia gentianoides.
glutinosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 641-Geodornm semicristatum.
japonica, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-9) 409.—Japon.
lutea, Gaudich. in Ann. Sc. Nat. Sir. I. v. (1825) 101 = Chloraea Gaudichaudii.
medcoloides, Pursh, Fl. Am, Sept. ii. 691=Pogonia verticillata.
ophioglossoides, Linn. Sp. PI. 951=Pogonia ophioglossoides.
parviflora, Michx. Fl. Am. Bor. ii. 160-Pogonia pendula.
pendula, Willd. Sp. PI. iv. 82 = Pogonia pendula.
petraea, *Pers. Syn.* ii. 512.—Afr. trop.
picta, Anders, in Trans. Soc. Arts, xxv. (1807) 199 = Spiranthes picta.
plicata, Andr. Bot. Rep. v. 321=Pogonia plicata.
racemosa, Walt. Fl. Carol. 222 = Ponthieva glandnlosa.
rosea, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 848.—Mexic.
secunda, Tbunb. Prod. PI. Cap. 3 = Disperis secunda.
simplex, Thou. Orch. Afr. t. 24=Pogonia Thouarsii.
spicata, Walt. Fl. Carol. 222=Aplectrum hyemale.
tigridiaefolia, *La Have (f Lex. Nov. Veg. Desc.* fasc. ii. *(Orch. Opusc)* 14.—Mexic.
trianthopkoros, Sw. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (lbOO) 230 = Pogonia pendula.
verticillata, Muehl. ex Willd. Sp. PI. iv. 81=Pogonia verticillata.
villosa, Linn. f. Suppl. 405 = Disperis villosa.

ARETIA, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 485 (1742); Linn. Sp. PI. ed. I. 141 (1753)=Androsace, Linn. (Primul.).
alba, Rafin. Fl. Ludov. 81 = Andr. alba.
alpina, Linn. Sp. PI. 141 = Andr. alpina.
alpina, Wulf. in Jacq. Fl. Austr. 36=Andr. hedreantha.
argentea, Gaertn. f. Fruct. iii. 107 = Andr. imbricata.
baldensis, Turra, Fl. Ital. Prod. 63.—Italia.
irevis, Hegetschw. Fl. Schw. 190 = Andr. alpina.
brutia, Nym. Conip. 607 = Andr. hedreantha.
bryoides, Loisel. Fl. Gall. ed. 1.111= Andr. bryoides.
cana, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 129, 527 = Draba aretioidcs.
Charpentieri, Heer, in Hegetschw. Fl. Schw. 987 = Andr. imbricata.
dliata, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 112 = Andr. alpina.
cylindrica, Loisel. 1. c. 111=Andr. cylindrica.
glacialis, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 8= Andr. alpina.
Halleri, Linn. Sp. PI. ed. II. 204, in syn.=Andr. camea.
Eausmanni, Nym. Consp. 607 = Andr. Hausmanni.
hedraeantha, Nym. 1. c. = Andr. hedreantha.
Heerii, Hegetschw. Fl. Schw. 188 = Andr. Hausmanni.
helvetica, Georgi, Beschreib. Russ. Reich, iii. IV. 760 =Andr. villosa.
helvetica, Murr. Syst. ed. XIII. 162 = Andr. bryoides.
hirtella, Nym. Consp. 607 = Andr. alpina.
longiflora, Fisch. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 668 = Dionysia odora.
multiflora, Vand. Fasc. PI. 8.—Lusit. ?
pennina, Murith, Bot. Val. 63 = Andr. alpina.
pubescens, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 111 = Andr. alpina.
pyrenaica, Loisel. 1. c. = Andr. pyrenaica.
rubra, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 128 = Andr. hedreantha.
tomentosa, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. III. 8 = Andr. imbricata, bryoides.
Vandeli, Turra, Fl. Ital. Prod. 63.—Italia.

ARETIA:—
Vitaliana, Murr. Syst. ed. XIII. 162 = Douglasia Vitaliana.
Wulfeniana, Sieber, ex Nym. Consp. 607 = Andr. hedreantha.

ARETIA, Link, Handb. ii. 411 (1829) = Primula, Linn.
auriculata, Link, 1. c —P. Auricula.
carniolica, Link, 1. c. 412=P. carniolica.
dliata, Link, 1. c. =P. ciliata.
crenata. Link, 1. c. 411=P. marginatat
Floerkeana, Link, 1. c. 413 = P. Floerkeana.
glaucescens, Link, 1. c 412 = P. calycina.
glutinosa, Link, 1. c. 418 = P. glutinosa.
integrifolia. Link, 1. c. 412=P. integrifolia.
minima. Link, 1. c. 413-P. minima.
Palinuri, Link, 1. c. 411=P. Palinnri.
spectabihs, Link, 1. c. 412=P. spectabilis.
truncata. Link, 1. c. 413 = P. minima.
•*villosa,* Link, 1. c. 411-P. villosa.

ARETIASTRUM, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 304 (1841) = Vitaliana, Linn.

ARGAN, Dryand. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 225 = seq.

ARGANIA, Roem. & Scholt. Syst. iv. 46 (1819). *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 655.
VERLANGIA, Neck. Elem. ii. 125 (1790); Rafin. SylvaTellur. 83(1838).
Sideroxylon, *Roem. &• Schult. 1. c.* 502.—Morocco.

ARGELASIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 857 = Genista, Toum. (Legum.).
Corsica, Fourr. 1. c.=G. Corsica.
Scorpius, Fourr. 1. c.—G. Scorpius.

ARGELIA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (18S8) 331.1.11, G-Solenostemma, Hayne (Asclep.).
Delilii, Decne. 1. c.=S. Argel.

ARGEMONE, Toum. ex Linn. Syst. ed. I. (1785). *PAPAVERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 52.
ECHIRUS, Lour. Fl. Cochinch. 344 (1790).
alba, *Lestib. Bot. Belg.* ed. II. iii. II. 133 (=seq.1).
alba, Rafin. Fl. Ludov. 83 = mexicana.
albiflora, Homem. Hort. Hafn. 469 = mexicana.
armeniaca, Linn. Sp. PI. 509 = Papaver armeniacum.
Barclayana, *Penny, ex Loud. Gard. Mag.* vi. (1830) 115. —Mexic.
cambrica, Desf. in Diet Sc Nat. ii. 481 - Meconopsis cambrica.
fruticosa, *Thurber, ex A. Gray, in- Mem. Am. Acad.* N. S. v. (1855)(rt. *Nov. Thurb.j* 306.—Mexic.
Georgiana, Croom, in Am. Joum. Sc Ser. I. xxv. (1U84) 75 = mexicana.
grandiflora, Sweet, Brit. Flow. Gard. iii. t. 226 = mexicana.
hispida, *A. Gray, PI. Fendl.* 5.—Am. bor.
Hunnemanni, Otto, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 298 =• Hunnemannia fumariaefolia ?
intermedia. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 585 = Barclayana.
mexicana, *Linn. Sp. PI.* 508.'—Am. bor.; Mexic.
mucronata, Dum.-Cours. ex Steud. Nom. ed. II. i. 128 =mexicana.
munita, Dur. & Hilg. in Journ. Acad. Nat. Sc.Philad. Ser. II. iii. (1855) 87=hispida.
ochroleuca, *Sweet, Brit. Fl. Gard.* iii. t. 242.—Mexic.
platyceras, *Link V Otto, Ic.* ii. 43.—Mexic.
pyrenaica, Linn. Sp. PI. 509 = Papaver pyrenaicum.
rosea, *Hoot. Bot. Misc.* ii. (1831) 207.—Chili.
sexvalvis, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 195 = mexicana.
spinosa, Moench, Meth. 227 = mexicana.
sulphurea, Sweet, ex Loud. Hort. Brit. 216 = ochroleuca.
versicoler, Salisb. Prod. 376 > mexicana.

ARGENOPE, Salisb. Gen. PI. Frag. 102 (1866) = Narcissus, Linn. (Amaryll.).
serotina, Salisb. 1. c.=N. serotinus.

ARGENTINA, Lam. Fl. Fr. iii. 118 (1778) = Potentilla, Toum. (Rosac).
rubra, Ljun. 1. c 120=P. palustris.
rupestris, Lam. 1. c. = P. rupestris.
supina. Lam. 1. c. 119 = P. supina.
vulgaris, Lam. 1. c.=P. Anserina.

ARGITHABINXA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 39 (1788), emend, in ej. Fl. i. 385 (1797). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 803.
APHORA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. v. 174 (1887).
ARGOTHAMNIA, Spreng. Syst. iii. 847 (1826).
ARGYROTHAMNIA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865) 65.
ARGYTHAMMA, P. Br. Hist. Jamaic. 838 (1756).
CHIROPKTALUM, A. JUSS. in Ann. Sc Nat. Sér. I. xxv. (1832) 21.
CHLOROCAULON, Klotzsch, in Endl. Gen. Suppl. iv. III. 89 (1847).
DESFONTAENA, Veil. Fl. Flum. 95 (1825).
DITAXIS, A. Juss. Euph. Tent. 27. t. 7 (1824).
PHILYKA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 199.
SEROPHYTON, Benth. Bot. Voy. Sulph. 52 (1844).
STENONIA, Didrichs. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 146.
adenophora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 294.-Mexic.
anisotricha, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 314.—Bras,
aphoroides, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66, 146.—Texas.
Berteroana, *Muell. Arg. I. c.* 151.—Chili,
boliviensis, *Muell. Arg. I. c.* 149.—Chili,
brasiliensis, *Muell. Arg. I. c.* 144.—Bras,
breviramea, *Muell. Arg. I. c.* 146.—Bolivia,
calycina, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 10.—Ind. occ.
candicans, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 89.— Ind. occ.
canescens, *Phil.f. Cat. PI. Vase. Chil.* 262.—Chili,
cantonensis, *Nance, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 14.—China,
catamarcensis, *Hieron. in Bull. Acad. Nac. Cordova,* iv. (1881) 449.—Reg. Argent,
desertorum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 810.—Bras,
dioica, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 145. —Bras.
fascicuUta, *Muell. Arg. 1. c.* 146.—Ind. occ.
Fendleri, *Muell. Arg. I. c.* 145.—Venezuela,
foliosa, *Muell. Arg. I. c.* 150.—Bras.
Gardneri, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 310. —Bras,
guatemalensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 145.—Mexic.
gymnadenia, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 816.—Bras.
herbacea, *Sprung. Syst.* iii. 848.—Am. bor.
heterantha, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 735.—Mexic.
humilis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 147.—Mexic.
illimaniensis, *Muell. Arg. I. c.* 146.—Mexic.
laevis, *Muell. Arg. 1. c.* 147.—Mexic.
lanceolata, *Muell. Arg. I. c.* 148.—Calif,
lancifolia, *Muell. Arg. 1. c.* 145.—Ind. occ.
lineata, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 288.-Bras.
melochiaeflora, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 736. —Bras,
mercurialina, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (18S5 -66) 148.—Texas.
mollis, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 289.—Bras,
montevidensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 147.—Reg. Argent,
neo-mexicana, *Muell. Arg. I. c.*—N. Mexic.
pauciflora, *Mirb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 128.—Am. austr.
Pavoniana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 149.—Perav.
pilosissima, *Muell. Arg. I. c.* 148.—Texas,
quinquecuspidata, *Muell. Arg. 1. c.* 150.—Peruv.
Kuiziana, *Muell. Arg. 1. c.* 151.—Peruv.
Schiedeana, *Muell. Arg. 1. c.* 150.—Mexic.
sericea, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 44.—Ind. occ.
sericophylla, *A. Gray, in Bot. Calif,* ii. 70.—Calif,
serrata, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 147. —Calif.
Simoniana, *Muell. Arg. 1. c.* 146.—Bras,
sponiella, *Muell. Arg. I. c.* 148.—Peruv.
tricocca, *Muell. Arg. 1. c.* 150.—Bras,
tricuspidata, *Muell. Arg. 1. c.*—Chili,
tuberculata, *Muell. Arg. I. c.* 144.—China.

ARGOLASIA, Juss. Gen. 60 (1789)=Lanarla, Ait. (Haemodor.).
aurea, Puish, Fl. Am. Sept i. 224, in syn. =- Lophiola aurea.
capensis,]. F. Gmel. Syst. ii. 660=L. plumosa.
lanata, Lam. ex Poir. Kncyc. Suppl. i. 448 = L. plumosa.
plumosa, Joss. Gen. ed. Usteii, 67 = L. plumosa.

ARGOPHILUM, Blanco, Fl. FUip. 186 (1887)=**Aglaia,** Lour. (Meliac.).
pinnatum, *Blanco, I. c.* 186••Aglaia angnstifolia.

ARGOPHYLLUM, Blanco, Fl. Filip. p. Ixv (1887)-= praec.

ARGOPHYLLX Font. Char. Gen. 29.1.15 (1776). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 646.
ellipticnm, ***Labill. Serf. Aust. Caled.*** **39. t. 41.—** N. Caled.
Lejourdani, *F. Muell. Fragm.* iv. 33.—Austral,
nitidum, *Forst. Char. Gen.* 80.—N. Caled.
sericeum, Poir. Encyc. Suppl. i. 449 = nitidum.

ARGORIPS, Rafin. Alsog. Am. 18 (1838) = **Salix,** Toura.
alia, Rafin. 1. c. = S. alba.
cerulea, Rafin. 1. c. = S. alba.

AHOOSTEMMA, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 324 (1824). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 54.
POMANGIUM, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 10.
acutum, Wall, ex Hook, f", Fl. Brit. Ind. iii. 43 = verticillatum.
angustifolium, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 163.—Malaya,
begoniaceum, *Miq. 1. c.* 348.—Malaya,
borragineum, *Blume, in DC. Prod.* iv. 417.—Java.
calycinum, R. BT. ex Benn. PI. Jav. Rar. i. 97 =Neuiocalyx Wightii.
toenosciadicum, *Suring.in Arch. Nierl.* v. (1870;' 116. —Java.
connatum. Dab. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 345=courtallense.
courtallense, *Am. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1889) 22.— Ind. or.
Elatostemma, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 45.— Malaya.
fulvnm, ***Zoll. (f Moritti, Syst. Ven. ZoU.*** **61.—Java.**
glttberrimum, Dalz. in Hook. Kew Jonrn. iB. (1861) 345= verticillatum.
nnmile, *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 94.—Reg. Himal.
waequale, *Benn. I. c.* 96.—Sumatra,
"laequilaterum, *Benn. I. c.* 95.—Java.
Jnnghnhnii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 164.—Malaya,
khasianum, ***C. B. Clarke, in Hoot./. Fl. Brit. Ind.*** **iii.** 43.—Reg. Himal.
Korthalsii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 165.—Malaya.
Kurai, C. ***B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.*** **iii. 45.** —Burma.
jaeve, *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 96.—Java,
laevigatnm, *Benn. I. c*—Java.
U>bbii, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 44.—Burma,
longiiblium, *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 97.-Sumatra.
macrosepalum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 849.—Malaya,
microenide, *Miq. I. c. Suppl.* 539.—Sumatra,
montanum, *Blume, in DC. Prod.* iv. 418.—Java.
Neesianum, ***Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.*** **xix.** ***Suppl.*** i. (1848) *[PI. Meyen.]* 349.—Ins. Philipp.
neurocalyx, ***Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **iv. 229.—** Malaya,
oligantha, ***Kurt, in Joum. As. Soc. Ben?,*** **xlvi. (1877)** II. 181.—Ins. Andam.
ophirense, ***Maing. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** **iii. 45.—** Malaya.
Farishii, *Hook.f. I. e.* 44.—Burma.
PMvifblium. *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 96.—Malaya.
Pauciflorum, *Blume, in DC. Prod.* iv. 418.—Java,
pedunculosum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 349.—Malaya.
P'ttum, ***Korth. in Neder. Kruid. Arch.*** **ii. II. (1851)** 122.—Sumatra.
Pictum, ***Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,*** **ii. 827.—** Penang.
Pnlchrum, ***Korth. in Neder. Kruid. Arch.*** **ii. II. (1851)** 122.—Sumatra.
pumilum,5«,». *PI. Jav. Rar.* i. 95.—Ind. or. j Afr. trap,
rostratum, ***Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,*** **ii. 326.** —Reg. Himal.
SMmentosum, *Wall. I. e.* 824.—**Reg.** Himal.

ARGOSTEMHA:-
soneriloides, ***Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.*** **xli. (1872)** II. 310.—Ins. Andaman,
spinulosum, ***C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.*** **iii.** 46.—Singapore.
subinaequale, *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 96.—Java,
tavoyanum, *Wall, ex Benn. 1. c.* 94.—Burma.
Teysmannianum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 349.—Java,
timorense, *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 95.—Timor,
uniflorum, *Blume, in DC. Prod.* iv. 418.—Java,
unifolium, *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 94.—Penang.
unifolium, Kurz, in Joum. As. Soc. xlvi. (1877) II. 131 = Kurzii.
verticillatum, Wall. Cat. n. 8894. partim=khasianum.
verticillatum, ***Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,*** **ii.** 825.—Ind. or.
Wallichii, ***Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.*** **xix.** ***Suppl. i.*** 350 (1848) [PI. Meyen.].—Ins. Philipp.

ARGOTHAMNIA, Sprang. Syst. iii. 847 (1826) = **Argithamnia,** Sw. (Euphorb.).

ARGUZIA, Amm. ex Steud. Norn. ed. I. 68 (1821); Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1851) I. 558 -= Tournefortia. Linn. (Borag.).
cimmerica, Stev. 1. c. 660=T. sibirica.
Messerschmidia, Stev. 1. c.-T. sibirica.
montana, Steud. Nom. ed. I. 68=T. Arguzia.
repens, Kafin. Sylva Tellur. 167.—Sibir. ?
rosmarinifolia, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1851) I.559 = T. sibirica.

AROYLIA, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. ix. (1828) 260. *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1043.
adscendens, *DC. Prod.* ix. 285.—Chili,
australis, ***Phil, in Anal. Univ. Chil.*** **(1873) 512.—** Chili.
Bustillosii, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 13.— Chili,
canescens, ***D. Don, in Edinb. Phil. Journ. (Apr.-June*** 1829) 88.—Chili,
chrysantha, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 180.— Chili.
eremophila, *Phil. I.* c—Chili.
Feuillei, *DC. Prod.* ix. 235.—Chili,
geramoides, *DC. 1. c.*—Chili,
glabriuscula, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 179. —Chili.
glutinosa, *Phil. Fl. Atac.* 86.—Chili,
huidobriana, ***Clos, in C. Gay, Fl. Chil.*** **iv. 411.—** Chili.
incana, *Phil. Fl. Atac.* 36.—Chili,
lutea, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (18,73) 511.—Chili,
potentillaefolia, *DC. Prod.* ix. 285.—Chili,
puberula, *DC. I. c*—Chili,
radiata, ***D. Don, in Edinb. Phil. Journ.*** **ix. (1823) 260.** —Peruv.
radiata, Endl. Ic. n. 4112" canescens.
tomentosa, *Phil. Fl. Atac.* 86.—Chili.
trifoliata, DC. Prod. ix. 287 = uspallatensis.
uspallatensis, *DC. 1. c.* 236.—Chili,
villosa, ***Phil, in Anal. Univ. Chil.*** **(1873) 512.—** Chili,
viridis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 181.—Chili.

ARGYRA, Noronha, ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 162 = Croton, Linn. (Euphorb.).
fasciculata, Noronha, ex Baill. 1. c.=C. Noronhae.

ARGYRANTHEMUM, Webb, ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 258 (1886-50) = Chrysanthemum, Linn. ^Compos.).
anethifolium, Webb, 1. c. 265-267 = C. anethifolium.
coronopifolium, Webb, 1. c. 272 = C. coronopifolium.
crithmifolium, C. Bolle, Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1861) 5-C. anethifolium.
dissectum, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 464 = C. dissectum.
foeniculaceum, Webb, ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 262 = C. anethifolium.
frutescens, Sch. Bip. 1. c. 264=C. frutescens.
gracile, Sch. Bip. 1. c.261=C. gracile.
haematomma, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 468 = C. haematomma.
jacobaeifolium, Webb, in Webb & Berth, *t'hyt.* Canar. ii. 251.—Ins. Canar.
ochroleucum, Webb, 1. c. 259=C. ochroleucum.

ARGYRANTHEMUM :—
pinnatifidum. Webb, in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 269 = C. pinnatifidum.
Webbii, Sch. Bip. in Webb & Berth. 1. c. =C. Webbii.

ARGYRANTHUS, Neck. Elem. i. 75 (1790) = **Helipterum,** DC. (Compos.).

ARGYREIA, Lour. Fl. Cochinch. 134 (1790). *CONVOLVULACEAE,* Benth. & Hook", f. ii. 869.
ADAMBOE, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 73 (1886).
ARGYREON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 120.
SAMUDRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 72 (1886).
abyssinica, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 832.—Abyss.
acuta, Benth. Fl. Hongk. 237, in syn. = Championi.
acuta, *Lour. Fl. Cochinch.* 135.—China; Ind. or.
aggregata, Am. ex Choisy, Conv. Or. 45 • Lettsomia aggregata.
alata, ***Montrous. in Mém. Acad. Lyon,*** **x. (1860) 236.** —N. Caled.
aiulata, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 587 = Ipomoea Turpethum.
ampla, Choisy, Conv. Or. 88 = Roxburghii.
arborea, *Lour. Fl. Cochinch.* 185.—China,
argentata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 588.—Malaya,
argentea, *Am. ex Choisy, Conv. Or.* 36.—Ind. or.
barbigera, Choisy, 1. *c* 42=Lettsomia barbigera.
Bona-nox, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 2SJ = Rivea hypocrateriformis.
bracteata, *Choisy, Conv. Or.* 39.—Ind. or.
capitata, Am. ex Choisy, 1. c. 41-Lettsomia strigosa.
capitata, Brand. For. Fl. 343 -= Lettsomia Thornsoui.
capitata, Kurz, For. Fl. Burm. ii. 216 = Lettsomia peguensis.
Championi, Benth. Fl. Hongk. 236 = Lettsomia Championi.
Choisyana, ***Regel V Koern. in Ind. Sem. Hort. Petrop.*** (1858) 40.—Hab.?
Choisyana, ***Wight, ex Hook. f. in Fl. Brit. Ind.*** **iv.** 190.—Ind. or.
courtallensis, Wight, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 829 = malabarica.
cuneata, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 661.—Ind. or.
cymosa, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 289.—Ind. or.; Malaya.
Daltoni, ***C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** **iv.** 190.—Ind. or.
elliptica. Am. ex Choisy, Conv. Or. 35 = Lettsomia elliptica.
festiva. Wall. PI. As. Rar. 68. t. 76.—China,
floribunda, ***Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.*** **352,** *nomen.*—Ind. or.
fulgens, *Choisy, Conv. Or.* 33.—Ind. or.
glabra, ***Choisy, ex Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.*** **128,** 130.—Malaya.
Guichenotii, *Choisy, Conv. Or.* 41.—Malaya.
hancorniaefolia, Gardn. ex Tow. Enum. PI. Zeyl. 210 =Lettsomia hancorniaefolia.
hirsute, ***Wight &" Am. in Nov. Act. Nat. Cur.*** **xviii.** (1836) I. 356«.—Ind. or.
Hookeri, C. ***B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** **iv.** 185.—Reg. Himal.
involucrata, *C. B. Clarke, I. c.* 187.—Ind. or.
lanceolata, *Choisy, Conv. Or.* 39.—Burma; Malaya.
laurifolia, Voigt, Hort. Subnrb. Calc. 351 = Lettsomia elliptica.
Lawii, C. ***B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.*** **iv. 190.** —Ind. or.
Leschenaultii, *Choisy, Conv. Or.* 31.—Ind. or.
Leschenaultii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 209 = sericea.
malabarica. *Am. ex Choisy, Conv. Or.* 38.—Ind. or.; Malaya,
megapotamica, *Griseb. in Goett.Abh.* xxiv. (1S79) 263. —Reg. Argent.
mollis, *Choisy, Conv.* Or.-38.—Ind. or.; Malaya.
multiflora, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 352^Roxburghii.
nellygherya, *Choisy, Conv. Or.* 32.—Ind. or.
nervosa, *Boj. Hort. Maurit.* 224.—Ins. Mascar!
nitida, *Choisy, Conv. Or.* 40.—Ind. or.; Ins. Philip,
oblonga, ***Benth. Bot. Voy. Sulph.*** **183.—Mexic.**
obtecta, C. ***B. Clarke, in Hook. f.Fl. Brit. Ind.*** **iv. 186.** —Burma; Malaya.
obtusifolia, Lour. Fl. Cochinch. 135-obtecta.
omata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 289 = Rivea ornata.

ABGYREIA :—
osyrensis, Choisy, in DC. Prod. ix. S34=Lettuomia aggregate.
palfida, *Choisy, Conv. Or.* 34.—Borma.
pilosa, *Wight tf Arn. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (18S6) I. 356'.—Ind. or.
pomacea, *Choisy, Conv. Or.* 32.—Ind. or.
populifolia, *Choisy, I. e.*—Zeylan.
populifolia, Choisy, in DC. Prod. ix. 329 = Hookeri.
Reinwardtiana, *Miq. FL Ind. Bat.* ii. 689.—Malaya.
Roxbuxghii, *Arn. ex Choisy, Conv. Or.* 37.—Ind. or.
rubicunda, Choisy, I.e. 44 = Letuomiarubicunda.
sericea, *Data. tf Git. Bomb. Fl.* 169.—Ind. or.
semna, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 120-argentea.
setosa, Am. ex Choisy, Conv. Or. 43=Lettiomia setosa.
speciosa, *Boj. Hart. Maurit.* 224.—Maurit.
speciosa, *Sweet, Hart. Brit.* ed. L 289.—Ind. or.; Malaya.
$plendens,.5wrt, /. *c*—Ind. or.
tiliaefolia. *Wight, Ic.* iv. I. 12. t 1368 (sphalm. *tillaefolia).* Ind. or.^
tomentosa, *Choisy, Conv. Or.* 44.—Burma.
uniflora. Sweet, Hort Brit. ed. L 289=Rivea'hypocrateriformLs.
venttsta, Cboisy, Conr. Or. 87 =-argentea.
Wallichii, *Choisy, I. e.* 39,-Ind. or.
teylanica, Kurz, For. Fl.. Brit. Burma, ii. 215, excl. syn. - Lettsomia Kurzii.
teylanica, Voigt, Hort Suburb. Calc. 851=pomacea.

ARGYRELLA, Nand. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiiL (1850) 800. t. 6"Difl8Otl8, Benth. (Melast.).'
canescens, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 113 = D. incana.
ineana, Nand. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1850) 300. t. 6. f. 7 = D. incana.
.phaeotricha, Naud. 1. c. = D. phaeotricba.

ARGYREON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. 120 (1880)-Argyreia, Lour. (Convolv.).

ARGYREXIAS, Rafin. Fl. Tellur. ÍT. 86 (1836) = Eohium, Town. (Borag.).
candicans, Rafin, 1. c. = £. candicans.

ARGYROCHAETA, Cav. Ic. iv. 54. t. 378(1791) = Parthenium, Linn. (Compos.).
bipinnatifida, Ca.v. l.c. = P. Hysterophorum.

ARGYROCOMA, Rafin. New Fl. Am. iv. 41 (1836) = Anyohla, Rich. (Ulecebr.).
imbricata, Rafin. 1. c. 43-Anychiadichotoma.

ARGYROCOME, Gaertn. Fruct. ii. 410 (1791); Schrank, in Denkschr. Acad. Wiss. Muench. viii. (1824) 146 et 163=Helipterum, DC. (Compos.).
apiculata, Cass. in Diet. Sc Nat. xxxix. 40 = Helichrysum apiculatum.
tracteata, Cass. 1. c. = Helichrysnm rutilans?
ericoides, Poir. Tabl. Encyc iii. 270-Helichrysum ericoides.
ferruginea, Schrank, in Denkschr. Acad. Wiss. Muench. viii. (1824) 163 = Helip. speciosissimum.
imbricate, Buek, Ind. DC. Prod. ii. 15=Metalasia nniflora.
retorta, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 39 - Hclichryram stoloniferum.
relorta,Gncrta. Fruct. ii. 1.187 = Heliehrysum retortum.
seminula, Schrank, in Denkschr. Acad. Wiss. Muench. viii. (1824) 184 —Helip. speciosissimum.
semipapposum, Cass. in Diet Sc. Nat xxxix. 40= Helichrysum semipapposum.
Staehelina, Schrank, in Denkschr. Acad. Wiss. Muench. viii. (1824) 165 * Helichrysum squamosum.
vermiculata, Poir. Tabl. Encyc. iii. 270«Metalasia nniflora.
vulnerata, Schrank, in Denkschr. Acad. Wiss. Muench. viiL (1824) 164 = H. canescens.

AKGYKODENDRON, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 100 (1861) - OlOton.Linn. (Euphorb.).
bicolor, Klotzsch, 1. c. 102=C. pulchellus.
ovatum, Boiv. ex Bull. Adansonia, i. (1861) 152 = C. Bemieri.
Petersii, Klotzsch, in Peten, Reise Mossamb. Bot. i. 101 (-Combreti sp.).—Afr. trop.

ARGYRODENDRON, F. Muell. Fragm. i. 2 (1858).* TarrieOa, Blnme (StercuL).
trifoliolatum, F. Muell. 1. c. = T. Argyrodendron.

ARGYROGLOTTIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxÍv. (1851)' II. 83=Helichrysum, Vaill. (Compos.).
turbinata, Tnrcz. 1. c. 84=H. Argyroglottis.

ABQTBOIiOBIUM, Eckl. & Zeyh. Enum. 184 (1835). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 480.
CHAMAECYTISUS, Vis. Fl. Dalm. 272. t. 56 (1850).
CHASMONE, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 71 (1836).
DIOLOTVS, Tausch, in Flora, xxv. (1842) 284.
GAMOCHILUM, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 50ft
TEPHROTHAMNUS, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 126 (1830), nomen prius.
TRICHASMA, Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 510.
abyssinicum, *Jaub. tf Spach, Illustr.* i. 115.—Abyss,
aequinoctiale, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 46.—Afr. trop.
Andrewsianum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 129.—Afr. austr.
angustifolinm, *EeU. tf Zeyh. Enum.* 188.—Afr. anstr.
arabicnm, *Jauh. tf Spach, Illustr.* i.116; *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 13.—Arab.
argenteum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 184.—Afr. anstr.
argenteum, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 464=Linnaeanum.
ascendens, *Walp. in Linnaea,* xiii. "(1889) 507.—Afr. austr.
baptisioides, *Walp. I. c.* 506.—Afr. austr.
barbatum, *Walp. Rep.* ii. 845.—Afr. anstr.
biflorum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 186.—Afr. anstr.
Bottae, *Jaub. tf Spach, Illustr.* i. 115.—Arab.
calycinum, Ball, in Journ. Linn. Soc xvi. (1878) 396, in obs. = Linnaeanum.
calycinum, *Jaub. tf Spach, Illustr.* i. 116.—Dalmat.; Reg. Caucas.; Persia.
candicans, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 186.—Afr. austr.
collinum, *Eckl. tf Zeyh. I. c*—Afr. austr.
comanthum, Vog. ex Steud. Norn. ed. II. i. 129-baptisioides.
connatum, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* 72.—Afr. austr.
crassifolium, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 184.—Afr. austr.
crinitum, *Walp.in Linnaea.xiä.* (1839) 506.—Afr.austr.
crotalarioides, *Jaub. tf Spach, Illustr.* i. 114,116.—Syria.
dasycarpum, Hochst. ex Baker, in Oliver, FL Trop. Afr. ii. 46 = A. Schimperiannm.
divaricatum, Jaub. *Ic* Spach, Illustr. i. 116—flaccidnm.
doryennides. *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 45.—Afr. trop.
emimense, *Baker, in Journ. Linn.JSoi.* xx. (1888) 125.—Madag.
fallax, Ball, in Jonra. Bot. xi. (1873) 302 - Linnaeanum.
filiforme, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 186.—Afr. austr.
flaccidum, *Jaub. tf Spach, Illustr.* i. 116.—Ind. or.
goodioides, *Walp. Rep.* it 845.—Afr. austr.
gracile, Fenzl, in Flora, xxvi. (1848) I. 394=crotalaroides.
grandiflorum, *Boiss. tf Rent. Pugill. PI. Nov.* (1852) 29.—Afr. bor.
incanum, Eckl. & Zeyh. Enum. 185=crassifolium.
involucratum, *Harv. in Harv. If Sond. Fl. Cap.* 75.—Afr. austr.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 32.—Persia.
KrctMiunum, *frrsi, Bot. Bemerk.* 139.—Afr. austr.
lanueolatuni, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 186.—Afr. anstr.
Linnaeanum, *Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 508.—Reg. Mediterr.
longifolium, *Walp. Hep.* ii. 844.—Afr. austr.
lotoides, *Bunge, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1878) 619.—Armenia,
lotoides, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* 595.—Afr. anstr.
microphyllum, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 303.—Marocco.
modestum, Hochst in Flora, xxvii. (1844) I. 100 = abyssinicum.
molle, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 187.—Afr. anstr.
obcordatum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 130.—Afr. austr.
obovatum, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 165.—Afr. austr.
obsoletum, *Harv. in Harv. b" Sond. Fl. Cap.* ii. 70.—Afr. austr.
ornithopodioides, Jaub. & Spach, Illustr. i. 116 — roseum.
patens, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 185.—Afr. austr.

ABOYBOIrOBnnC .—
-pauciflorum, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 186.—Afr. anstr.
pedunculare, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* iii. (1844) S48.-Madag.
petiolare, *Steud. Norn.* ed. II. i. 130.-Afr. austr.
Petitiannm, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 163.—Abyss,
pilosum, *Harv. in Harv.* &* *Sond. Fl.* ***Cap.*** 71.—**Afr. austr.**
polyphyllum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 184.—Afr. austr.
prostratum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 18.—Assyria,
pumilum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 186.—Afr. anstr.
ramosissimum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 46.—Afr. trop.
remotum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.'i.* 162.—Abyss,
roseum, *Jaub. V Spach, Illustr.* i. 116.—Persia; Beluchist.
rnpestre, *Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 608.—Afr. aus(T.
Saharae, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 177.—Algeria.
Sandersoni, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 594.—•Afr. austr.
Schimperianum, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) 1.100.—Afr. trop.
sericeum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 184.—Afr. austr.
sess'ilifolium, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 175.-Turcia.
speciosum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 187.—Afr. austr.
splendens. *Walp. Rep.* ii. 845.—Afr. austr.
stenophyllum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 32.—Afghan,
stipulaceum, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 302.—Marocco.
stipulaceum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 187.—Afr. austr.
strictum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 130.—Afr. austr.
Sutherlandi, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* 594.—Afr. austr.
syriacum, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 13—crotalarioides.
tenue, *Walp. Rep.* i. 632.—Afr. austr.
trigonelloidcs, *Jaub. tf Spach, Illustr.* i. 116, 118.—Persia.
tuberasum, *Eckl. If Zeyh. Enum.* 188.—Afr. austr.
umbellatum, *Vog. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 130.—Afr. austr.
uniflorum, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 72.—Afr. austr.
uniflorum, *Jaub. tf Spach, Illustr. i.* 115.—Oriens.
velntinnm, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 186.—Afr. austr.
vennstum, *Eckl. tf Zeyh. I. c.* 185.—Afr. austr.
virgatum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 46.—Afr. trop.

ARGYROPHANES, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847; 596 = Helichrysum, Vaill. (Compos.).
Behrii, Schlecht. 1. c = H. Baxter!.

ARGYROPHYLLUM, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras, vi. II. 150 (1878)*=8oaresia, Sch. Bip. (Compos.;.
ovali-ellipticum, Pohl, ex Baker, 1. c.=S. velutina.

ARGYROPHYTON, Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1886) 163 = Argyroziphium, DC. (Compos.).
Douglasii, Hook. 1. c. = Argyroxiph. sandwicense.

ARGYROPSIS, M. Roem. Syn. Ensat. 126 (1847)-Zephyranthes, Herb. (Amaryll.).
Candida, M. Roem. 1. c. = Z. Candida.

ABOTBOBCHIS, £lume, OrciuArchip. Ind. 120. t. 81, 86 (1868). *ORCHJDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 606.
javanica, *Blume, I. c*—Java.

ARGYROTHAMNIA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865) 144=Argithamnia, Sw. (Euphorb.).

ABG'rTBOZIFHIUM, DC. Prod. v. 668; et Mém. Comp. t. 8 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f. ii. 393.
ARGYROPHYTON, Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1836; 163.
macrocephalum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* ii. (1862) 16O.-Ins. Sandvic.
sandwicen*, *DC. Prod.* v. 668.—Ins. Sandvic

ARGYTAMNIA, Duchesne, in Diet. Sc Nat iv. 98 (1804)=Argithamnia, Sw. (Euphorb.).

AROYTHAMNIA, P. Br. Hist. Jamaic 338 (1756, , sphalm. = Argithamnia, Sw. (Euphorb.).

ARHYNCHIUM, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1860-61) 142-Arachnanthe, Blume (.Orchid.).

ARIA, Jacq. f. Cat. Hort. Vindob. (1B26) ex Host, Fl. Austr. ii. 7 (lSSl)=PjmiB, Linn. (Rosac).
alnifolia, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. S<r. I. x. (1874) 166 = P. alnifolia.
alpina, M. J. Roem. Syn. iii. Rosifl. 124=P. alpina.
ambigua, Decne. in Nouv. Areh. Mus. Par. Sir. I. x. (1874) 165.-Hab.l
*arguta.iS.*J. Roem. Syn.iii. Rorifl. 129=P. intermedia.
betulaefolia, M. J. Roem. 1. c. 124 = P. betulaefolia.
Chamaemespilus, Host, Fl. Austr. ii. 8=P. Chamaemespilus.
crenata, Decne. in Nonv. Arch. Mns. Par. *Sit.* I. x. (1874) 162 = P. crenata.
cuspidata, M. J. Roem. Syn. iii. Rosifl. 126=P. cnspidata.
Decaisneana, Lavall. Arbor. Segrez. 61.—Hab.I
aeppiens, M. J. Roem. Syn. iii. Rosifl. 129 - P. rotnndifolia.
edulis, Gnimp. ex Lavall. Arbor. Segrez. *8S=Decaisneana.*
**f<*Hs,* M. J. Reem. Syn. iii. Rosifl. 124=P. edulis.
flabellifolia, M. J. Roem. 1. c. 127 = Crataegus corymbosa.
graeca, M. J. Roem. 1. c.=P. Aria.
Mostii, Carr. Rev. Hortic. (1877) 210 = P. Hostii.
HoMi, Jacq. f. Cat. Hort. Vindob. (1826) ex Host, Fl. . Austr. ii. 8 = P. intermedia.
intermedia, Schur, Enum. PI. Transs. 207=P. intermedia.
japonica, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Se>. I. x. - (1874) 164 = P. japonica.
temaonensis, M. J. Roem. Syn. iii. Rosifl. 180 = P. lanata.
**umaonensis,* Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Ser. I. - *• (1874) 162 = praec.
anata, Decne. 1. c 163=P. lanata.
tetifolia, M. J. Roem. Syn. iii. Rosifl. 128 = P. rotundifolia.
Mougeoti, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. .(1868) 878 = P. Aria.
**>vea,* Host, Fl. Austr. ii. 8=P. Aria.
oo[illegible]ata, M. J. Roem. Syn. iii. Rosifl. 125 -> P. obtu-
"lundifolia, M. J. Roem. 1. c. 129 = P. rotundifolia.
scandica, M. J. Roem. 1. c. 127 = P. intermedia.
"emilobata, M. J. Roem. 1. c. 129=P. rotundifolia.
S'ovitsii, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. .. U874) 165—Hab.?
"Itaefolia, Decne. 1. c 166=P. alnifolia.
**«<»ra,* M. J. Roem. Syn. iii. Rosifl. 125=P. vestita.

ARIETINUM, Beck, Bot. N. and Midi. U. St. 852 (1838) = Cypripedium, Linn. (Orchid.).
"nericanum, Beck, 1. c = C. Arietinnm.

ARILLARIA, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlii. (1878) ". 70=Ormosia, Jack (Legum.).
T«oust«, Kurz, i. c. 71=0. robusta.

ARILLASTRUM, Panch. ex Brongn. ft Gris, in Bull. |°c Bot. Fr. xiv. (1867) 268 = Spennolepifl, Brongn. & Gris (Myrtac.).
s"mmiferum, Panch. 1. c. =S. gummiferum.

AWNEM1A, Kafin. Sylva TeUnr. 49 (1888) = nex, fount.
lanceolaia, Rafin. 1. e.=I. lanceolata.

ARIOCARPUS, Schddw. in Bull. Acad. Brux. v. (1888) 481 = Kammillaxia, Haw. (Cactac.).
returns, Scheidw. 1. c. 492. t. 1 = M. prismatica.

ARIODENDRON, Meissn. Gen. Comm. 301 (' 1886-43'), »phalm. = AGRIODENDRON, Endl. = Aloë, Linn. (Liliac).

ARIONA, Pers. Syn. i. 212 (1805)-Aijona, Comm. (.oantal.).

AH5?P8IS> J- Grab. Cat. Bomb. PI. 262 (1839). *AHOIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 973.
Pdtata, *J. Grah. I. c*—Reg. Himal.
Protanthera, N. E. Br. in Rep. Roy. Gard. Kenr, (1877) W = pelata.

ABI8ACONTIB, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 129. *AROIDEAEX* Benth. & Hook. f. iii. 963.
Chamissonis, *Schott, I. c*—Ins. Radack.

AEISAEMA, Mart, in Flora, xlv. (1881) II. 459. *AROWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 965.
AMIDBNA, Rafin. Fl. Tellur. iy. 16 (1886).
abbreviatum, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1857) 882.—Reg. Himal.
affine, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 27 = concinnum.
album, *N. E. Br. in. Joum. Linn. Soc.* xviii. (1882) 247.—Siam.
alienatum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 26= concinnum.
amplissimum, *Blume, Rumphia,* i. 110.—Japon.
amurense, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 264.—Reg. Amur,
angustatum, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 507.—Japon.
atrorubens, *Blume, Rumphia,* i. 97.—Am. bor.
Boscii, Blume, 1. c. 104 = A. Dracontium.
Bottae, *Schott, Prod. Aroid.* 42.—Arabia.
brasilianum, Blume, Rumphia, i. 97 = atrorubens.
caudatum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 559.—Ind. or.
cochinchinense, Blume, Rumphia, i. 107 = Pinella Wawrae.
commutatum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 26 = tortuosum.
concinnum, *Schott, 1. c.* 27.—Reg. Himal.
consanguineum, Schott, 1. c. =erubescens.
comutum, *Schott, 1. c.*—Reg. Himal.
costatum, *Mart, in Flora,* xiv. (1831) II. 459.—Reg. Himal.
Cumingii, *Schott, Syn. Aroid.* 28.—Ins. Philipp.
curvatum, Hook. Bot. Mag. t. 5981 = tortuosum.
curvature, *Kunth, Enum. PI.* iii. 20.—Reg. Himal.
cuspidatum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 536.—Penang.
decipiens, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1857) 378.—Java.
dolosum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 26=intermedium.
Dracontium, *Schott, Meletem.* i. 17.—Am. bor.
echinatum, *Schott, I. c*—Reg. Himal.
eminens, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1857) 357 = speciosum.
enneaphyllum, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 352.—Abyss.
erubescens, *Schott, Meletem. i.* 17.—Reg. Himal.
exile, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 26.—Reg. Himal.
fallax, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat i. 123 = filiforme.
filicaudatum, *N. E. Br. in Joum. Linn. Soc.* xviii. (1882) 258.—Zeylan.
filiforme, *Blume, Rumphia,* i. 102. t. 28.—Java.
filiforme, Thw. Enum. PI. Zeyl. 334=neglectum.
fimbriatum, *Mast, in Card. Citron.* (1884) II. 680.—Ins. Philipp.
flavum, *Schott, Prod. Aroid.* 40.—Arabia.
Franchetianum, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 487.—Tibet.
fraternum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 26 = Leschenaultii.
galeatum, *N. E. Br, in Gard. Chron.* (1879) II. 102.—Reg. Himal.
gracile, Kunth, Enum. PI. iii. 21=Typhonium grncite.
Griffithil, *Schott, Syn. Aroid.* 28.—Reg. Himal.
hastatum, Blume, Rumphia, i. 96=atrorubens.
helleborifolium, Schott, Syn. Aroid. 29=tortuoBum.
beptaphyllum, *Blume, Rumphia,* i. 1G9.—Ind. or.
hettrophyllum, Blume, I. c. 110 = Thunbergii.
Hookerianum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 334 = Griffithii.
Hookeri, Schott, Gen. Aroid. 6. f. 11-19=Griffithii.
Huegelii, Schott, Syn. Aroid. 27=LeschenaultiL
inclusum, *N. E. Br. in Joum. Linn. Soc.* xviii. (1881) 249.—Java.
intermedium, *Blume, Rumphia,* i. 102.—Reg. Himal.
Jacquemontii, *Blume, I. c.* 95.—Reg. Himal.
japonicum, *Blume, 1. c.* 106.—Japon.
laminatum, Benth. VI. Hongk. 842 = penicillatum.
laminatum, *Blume, Rumphia,* i. 99. t. 27.—China.
latisectum, Blume, 1. c. 110 = japonicum.
Leschenaultii, *Blume, 1. c.* 93.—Ind. or.
lobatum, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 487.—Tibet.
Loureiri, Blume, Rumphia, i. 108=PineIlia tuberifera.
macrospathum, *Benth. PI. Hart*. 52.—Mexic.

AHISAEMA:—
macrourum, Kunth, Enum. PI. iii. 644— Pinellia tuberifera.
Maioyanum, Kunth, in Ind. Sent. Hort Berol. (1846) 9 = filiforme.
mirabile, Schott, in Oestr. Bot Zeitschr. (1867) 866 = speciosum.
Murrayi, Hook. Bot. Mag. t. 4888=Jacquemontii.
neglectum, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1869) 26.-Zeylan.
nepenthoides, *Mart, in Schott, Meletem. i.* 17.—Reg. Himal.
ochraceum, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 27.—Reg. Himal.
oraatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 220.—Sumatra.
papiUosum.Stend. ex Schott, Prod. Aroid. 46 = Leschenaultii.
penicillatum, *N. E. Br. in Joum. Linn. Soc.* xviii. (1881) 248. t. 6.—Hongkong.
pentaphyllum, *Schott, Meletem.* i. 17.—Ind. or.; China.
Plukenetii, Blume, Rumphia, i. 110—A. Dracontium.
ptaecox, De Vriese, ex C. Koch, Allg. Gartenz. (1867) 85=ringens.
propinquum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1867) 338 = intermedium,
pulchrum, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 262. t. 6.—Ind. or.
pumilum, Blume, Rumphia, i. 107—trilobatum,
Pythonium, Blume, 1. c. 108-Zomicarpa Pythonlnm.
quinatum, *Schott, Syn. Aroid.* 28.—Am. bor.
ringens, *Schott, Meletem.* i. 17.—Japon.
Roxburghii, Kunth, Enum. PI. iii. 18=cuspidatnm.
Schimperianum, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1869) 27.—Abyss.
serotinum, Mtq. ex Franch. *8c* Sav. Enum. PL Jap. ii. 4 = Sierotium.
serratum, Schott, Meletem. i. 17—japonicum.
Sieboldii, De Vriese, ex C. Koch, Allg. Gartenz. (1867) 85 = ringens.
Sierotium, *Siebold, ex Regel, in Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 44.—Japon.
sikokianum, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 507.—Japon.
speciosum, *Mart, in Schott, Meletem.* i. 17.—Reg. [illegible].
Steudelii, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 26.—Ind. or.
stictopodum, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 219 = filiforme.
Stracheyanum, Schott, in Oestr. Bot Zeitschr. (1867) 338 = intermedium.
Tatarinowii, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1869) 27.—China.
Thunbergii, *Blume, Rumphia,* i. 105.—Japon.
tortuosum, *Schott, Meletem.* i. 17.—Reg. Himal.
tortuosum, Steud. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 544= Steudelii.
tripartitum, *Engl. 1. e.* 638.—Japon.
triphyllum, *Schott, Meletem. i.* 17.—Am. bor.
utile, *Hook./, ex Engl. in DC. Monog. Phan.* ii 637.—Reg. Himal.
verrucosum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1867) 341.—Reg. Himal.
vituperatum, Schott, in Bonplandia, vii. (1869) 28-erubescens.
Wightii, Hook. f. Bot. Mag. t. 5507-peglectum.
Wightii, Schott, in Bonplandia, vii. (1869) 26-Jacqueitiontii.
mebrinum, Hort. ex Nichols. Diet. Card. i. 113-•> triphyllum.

ARISARON, Adans. Fam. ii. 470 (1768)=ArlBarum, Toum. (Aroid.).

ARISARUM, Hall, in Rupp. Fl. Jen. ed. II. 251 (1746) = Calla, Rich. (Aroid.).

ARISARTTM, [Toum.] Targ. Toz. in Anal. Mas. Hs. Fir. ii. II. (1810) 67. *AROIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 966.
ABISARON, Adans. Fam. ii. 470 (1763).
BALMISA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17 (1816).
HOMAIDA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 63 (1836).
aspergillum, Dun. in *Him.* Acad. Mont p. (Sect Sc.) i. (1847) 8=simorrhinum.
australe, Rich, in Guill. Arch. i. (1883) 20-vulgare.
asoricum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1867) 190 =vulgare.
Balansae, Schott, 1. c.—vulgare.
Clusii, Schott, Prod. Aroid. 23-vulgare.

ARISARUM :—
crassifolium, Schott, in BonpUodU, ix. (1861) 869 = vulearc.
Forbesii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 190 =vulgare.
hastatum, *Pontel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 390.—Algeria.
italicum, Rafin. Fl. Tellui. iii. 63 = Arum italicnm.
jacquini, Schott, Prod. Aroid. 22-vulgare.
Libani, Schott, 1. c 21-vulgare.
maculatum, Rafin. Fl. Tellur. iii. 68=Arum macolatnm.
oligocarpnm, *Pomel, Noun. Mat. Fl. Ail.* 890.—Algeria.
ovatum, Rafin. Fl. Tellur. iii. 68 = Lagenandra toxicaria.
pictum, Rafin. 1. c.-Arum pictum.
proboscideum, *Savi, Osserv. Div. Piante,* 6.—Italia.
serpentrium, Rafin. Fl. Tellur. iii. 68 = Aris.irum vulgare.
Sibthorpii, Schott, Prod. Aroid. 21 = vulgare.
simorrhinum, *Dur. in Duck. Rev. Bot.* i. (1845-46) 860.—Algeria.
subalpinum, Kotschy, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 668=vulgare.
subexertum, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 293 = vulgare.
tingitanum, Schott, Prod. Aroid. 22=vulgare.
Veslingii, Scholt, 1. c 20=vulgare.
vulgare, *Targ. Tom. in Anal. Mus. Fis. Fir** ii. II. (1810) 07.—Reg. Mediterr.

ARISTAEA, A. Rich, in Orb. Diet ii. 136 (1842) = Arietea, Soland. ilrid.).

ARISTARIA, Jungh. in Hoev. *Sc* De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 296-Anthistiria, Linn. (Gramin.).
barbata, Jungh. 1. c. 297=Anth. arguens.

ARISTEA, fSoland. in] Ait. Hort. Kew. i. 67 (1789); iii. 506. *IR/DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 701.
CI.EANTHE, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 312.
GENLISIA, Reichb. Consp. 60 (1828).
NIVENIA, Vent. Dec. Gen. Nov. 5 (1808).
WREDOWIA, Eckl. Verz. 16 (18275.
africana, *Hoffmgg. Vert. Pfl.* 40.—Afr. trap,
alata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 405.—Afr. trop.
anceps, *Eckl. ex Klatt, in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 550.—Afr. austr.
angolensis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878)270— Afr. trop.
angustifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 269.—Madag.
bracteata, Pers. Syn. i. 41=capitata.
capitata, *JCer-Gawl. in Bot. Mag.* t 605.—Afr. austr.
cladocarpa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 268.—Madag.
coerulea, Vahl, Enum. ii. 124=capitata.
compressa, *Bucking, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi (1878) 111.—Natal.
cyanea, *[Soland. in] Ait. Hort. Kern,* i. 67.—Afr. austr.
dichotoma, Eckl. ex Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 551 = Eck)oni.
dichotoma, *Ker-Gawl. Gen. /rid.* 18.—Afr. austr.
diffusa, *Eckl. Vert.* 16, nomen.—Afr. austr.
Eckloni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 112.—Afr. austr.
eriophora, Pers. Syn. i. 41 = cyanea.
fruticosa, *Pers. 1. c.*—Afr. austr.
glauca, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 881.—Afir. austr.
intermedia, Eckl. Verz. 16=dichotoma.
juncifolia, *Eckl. 1. c.; Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 267.—Afr. austr.
Kitchingii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 269.—Madag.
lacera, Stokes, Bot. Comment, i. 224 = cyanea.
lugens, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. i. 130 = melaleuca.
madagascariensis, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 267.—Madag.
major, Andr. Bot. Rep. t. 160- capitata.
melaleuca, *Ker-Gawl. in Km. &* Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 236.—Afr. austr.
pusilla, *Ker-Gawl. I. c*—Afr. austr.
racemosa, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 267.—Afr. austr.
repens, *A. Dietr. Sp. PI.* ii. 516.—Afr. austr.
schizolaena, *Han. ex Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 267.—Afr. austr.

ARISTEA :—
spathacea, Spreng. Syst. i. 158-Bobartia spathacea.
spicata, Pers. Syn. i. 41= capitata.
spiralis, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 236.—Afr. austr.
torulosa, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Hoik,* xii. (1882) 382.—Afr. austr.
umbellata, *Spreng. Syst.* i. 158.—Afr. austr.
Wredowia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 130.—Afr. austr.

ARI8TEGA, Miers, Contrib. Bot. iii. 875 (1871). *MENISPERMA CEAE.*
laevifolia, *Miers, 1. c.* 376. t. 61.—Ind. or.

ARISTELLA, Bertol. Fl. Ital. i. 690 (1833) = 8tlpa, Linn. (Gram.).
bromoides, Bertol. 1. c.=S. Aristella.
longiflora, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 645.—As. temp.

ARISTIDA, Linn. Sp. PI. ed. I. 82 (1753). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1140.
ARTHRATHERUM, Beauv. Agrost. 32. t. 8. f. 8 (1812).
CHAETAKIA, Beauv. 1. c. 30. t. 8. f. 5, 6 (1812).
CURTOPOGON, Beauv. 1. c. 32. t. 8. f. 7 (1812).
KIELBOUL, Adans. Fam. ii. 31 (1763).
MOULINSIA, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 221.
ORTACHNE, Nees, in Seem. Bot. Voy. Herald, 225 (1852-57).
SCHISTACHNE, Figar. & De Not in Mem. Accad. Torin. Ser. II. xii. (1852) 2S2.
STIPAGROSTIS, Nees, in Linnaea, vii. 290 (1832).
STREPTACHNE, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 124. t. 40 (1815).
TRIXOSTIS, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 221.
abyssinica, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Se>. VI. vii. (1849) 134 = coerulescens.
acntifiora, *Trin. &" Rupr. I. c.* 167.—Aegypt.; Arabia,
adoënsis, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 370.—Abyss.
Adscensionis, *Linn. Sp. PI.* 82.—Reg. temp, et calid.
Adscensionis, Walt. Fl. Carol. 74 = oligantha.
Adscensionis, Sw. Obs. 40=cognata.
aequiramea, *Schlecht. in Linnaea,* xxii. (1849) 343.—Texas.
aethiopica, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pftersb. Sér. VI. vii. (J 849)134=Adscensionis.
affinis, Kunth, Rev. Gram. i. 61=purpurascens.
americana, Linn. f. PI. Jam. Pugill. 7; Syst. ed. X. 879 = Bouteloua bromoides, juncifolia.
amplissima, *Trin.* b* *Rupr. in Mem. Acad. Pitersb. Sit.* VI. vii. (1849) 155.—Afr. trop.
AntUlarum, *Pair. Encyc. Suppl.* i. 451.—Ind. occ
Antoniana, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 56.—Peruv.
arabica, Trin. *Sc* Rupr. in Mém. Acad. Pe'tersb. Se"r. VI. vii. (1849) 135 = Adscensionis.
arenaria, *Gaudick. in Freyc. Voy. Bot.* 407.—Austral,
arundinacea, *Linn. Mant.* 146.—Ind. or.
avenaria, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 68 = setifolia.
barbata, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 78, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 532.—Mexic.
barbicollis, *Trin. V Rupr. in Mem. Acad. Petersb.* Sér. VI. vii. (1849) 152.—Abyss,
basiramea, *Vasey, in Coult. Bot. Gat.* ix. (1884) 76.—Am. bor.
Behriana, *F. Muell. iH Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 44.—Austral.
Beyrichiana, *Trin.* to* *Rupr. in Mint. Acad. Pétersb. Sir.* VI. vii. (1849) 104.—Am. centr.
bipartita, *Steud. Syn. PI. Gram.* 140.—Afr. austr.
brachypoda, *Tausch, in flora,* xix. (1886) 506.—Aegypt.; Arabia,
brachyptera, *Coss. &" Bal. in Bull. Soc. Bot. FT.* V. (1858) 169.—Afr. bor.
brevifolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. ISO.—Afr. austr.
breviseta, Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad.' 1862' (1863) 92=purporea.
bromoides, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 122.—Am. bor. occ.; Ecuador.
bromoides, Salzm. ex Trin. *Sc* Rupr. in Mém. Acad. P&ersb. Se>. VI. vii. (1849) 118 = longifolia.
caffra, *Bory, Voy.* ii. 376.—Afr. trop.
californica, *Thurb. ex Boland. in Trans. Calif. Agr. Soc.* (1864) 184—Calif.

ARISTIDA :—
caloptila, Boiss. Fl. Orient, v. 497 = paradisea.
calycina, *R. Br. Prod:* i. 173.—Austral.
canariensis, Willd. Enum. Hort. Berol. 99 = Adscensionis.
capensis, Savi, in Mem. Moden. (1837) 198=plnmosa.
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 19.—Afr. austr.
capillacea, Cav. Ic. v. 43. t. 158. f. 1 - Cumingiana.
capillacea, *Lam. Illusti* i. 156.—Ind. or.; Am. austr.
capillaris, Kunth, Enum. Fl. i. 188, in syn.-Cumingiana.
caudatum, *Anderss. Enum. PI. Ins. Galap.* 144.—Ins. Galap.
chaetophylla, *Steud. Syn. PI. Gram.* 420.—Madag.
chapadersis, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Petersb.* i. (1836) 68.—Bras.
chinensis, *Munro, in Proc. Am. Acad.* iv. (1864-65; 863.—China.
Chloris, Salzm. ex Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. III. 83 — Gymnopogon foliosus.
ehrysopila, *Steud. Nom.* ed. II. i. 131.—Arabia.
ciliata, *Desf. in Schrad. N. Journ.* iii. (1809) 255.—Afr. bor. austr.; Arabia.
ciliata, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. i. 131 =hirtigluma.
coarctata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 122-setifolia.
coarctata, Lichtst. ex Kunth, Enum. PI. i. 190-congesta.
coerulescens, Desf. Fl. Atlant i. 109 = Adscensionis.
coerulescens, Sieber, ex Trin. in Me'm. Acad. Pe'tersb. Sér. VI. i. (1831) 88 = Sieberiana.
coerulescens, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 13H = adoënsis.
cognata, Trin. *Sc* Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Ser. VI. vii. (1849) 127 = purpurascens, stricta.
compacts, *Anderss. Enum. PI. Ins. Galap.* 145.—Ins. Galap.
complanata, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VI. i. (1831) 85.—Bras,
condnna, *Sond. ex J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins.* 140.—Afr. austr.
condensata, *Ckapm. in Coult. Bot. Gat.* iii. (1878) 19.—Am. bor.
congesta, *Roem.* b* *Schult. Syst.* ii. 401.—Afr. austr.
contorta, F. Muell. in Trans. Viet Inst. i. (1855) 44 = arenaria.
crinita, Stend. Nom. ed. II. i. 131=Stipa crinita.
crinita, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 223.—Peruv.
Cumingiana, *Trin. &" Rupr. in Mem. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 141.—Ins. Philipp.
curtiseta, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. < 1862 ' (1868) 834=purpurea.
curvata, *Nees, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 392.—Abyss.; Afr. austr.
curvifolia, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 78, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 533.—Mexic.
cyanantha, *Steud. Syn. PI. Gram.* 141.—Afghan,
decorata, *Steud. I. c.* 421.—Palaestin.
deUcatula, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 393.—Abyss.
densispica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 189.—Afr. trop.
depressa, Retz. Obs. iv. 22 = Adscensionis.
depressa, Trin. Gram. Unifl. 175=setacea.
desmantha, *Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pitersb. Sic.* VI. vii. (1849) 109.—Texas,
dichotoma, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 41.—Am. bor.
diffusa, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i. (1836) 68 = vestita.
dispersa, *Trin. &" Rupr. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 129.—Mexic.
divaricaU, *Humb. V Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 99.—Mexic
divaricata; Jacq. Eclog. 7. t. 6=coerulescens.
diyaricata, Lag. Elench. 3 - spadicea.
divulsa, *Anderss. Enum. PI. Ins. Galap.* 143.—Ins. Galap.
domingensis, Kunth, Rev. Gram. i. 62«Andropogon hirti floras.
Dregeana, *Trin.* to* *Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 168.—Afr. austr.
Ehrenbergii, *Trin. b" Rupr. Stipac.* 136.—Arabia.
elatior, Cav. Ic. vi. 65. t 589 = Adscensionis.
elegans, Rudge, Fl. Guian. 22. t. 80 = capillacea.
Elliotiana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 133.—Carolina,
elliptica, *Kunth, Enum. PI.* L 193.—Bras.

ARISTZDA:-

fasciculata, *Ton. in Ann. Lye. N. York,* i. (1834) 154. —Canada.
Fendleriana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 420.—N. Mexic.
festucoides, *Pair. Encyc. Suppl. i.* 463.—Afr. trop.
filipendula, Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad. < 1862' - (186S)93=purpurea.
flaccida, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Piter si.* Se>. - VI. vii. (1849) 117.—Bras,
nexuosa, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 77, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* Hi. 538.—Mexic.
fioccosa, Coss. *Sc* Dur. in Expl. Sc. Algér. i. 82- - plumosa.
poridana, *Vasey, Gram. V. St.* 21.—Am. bor.
roenicularis, *Edgea. in Journ. As. Soc. Btng.* xxi. (1852; 160,183.-Ind. or.
Porskaehlei, Tansch, in Flora, xix. (1836) 506=plumosa.
freycinetii, Steud. Nom. ed. II. i. 181-Stipa crinita.
funicularis, *Trin. ex Steud. I. c*—Nubia,
funiculata, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* «r. VI. vii. (1849) 159.—Afr. bar.; Arab.; Beluchist.
furcata, Poit ex Roem. 4 Schult Syst ii. 711 = Bouteloua bromoides.
Gardneriana, Stend. Syn. PI. Gram. 187 =setifolia.
geminaia, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 181 = Gymnopogon foliosa.
geminiflora, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 77, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 588.—Mexic.
gtniniflora, Steud. Syn. PI. Gram. 144 = geminifolia.
gemjnifolia, *Trin. V Rupr. in Mém. Acad. Pitersb.* Ser. VI. vii. (1810) 169.—Afr. anstr.
geniculate, *Rafin. Am. Monthly Mag.* (1817). *ex Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Seï. VI. vii. (1849) 379.—Am. bor.
Gfyeriana, Stend. Syn. PI. Gram. 133=purpurascens.
gibbosa. *Kunth, Enum. PI.* i. 189.-Bra».
gfgantea, Linn. f. Suppl. 118 = Adscensionis.
glaberrima, *Steud Syn. PI. Gram.* 135.—Chili.
g'auca, Steud. 1. c.=longiramea.
gossypina, *Bosc, ex Beauv. Agrost.* 80, nomen; *Roem. & Schult. Syst.* ii. 891.—Carolina
gracilis, *Ell. Sketch,* i. 141.—Am. bor.
graallima, *Oliver, in Trans Linn. Soc.* xxix. (1875) -, 173—Afr. trop.
Imsebachiana, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 78, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 538.—Mexic.
P^Mensis, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* «r. VI. vii. (1848) 187.—Guinea,
gyrans, *Chapm. in Coult. Bot. Go**. Hi. (1878) 18.-Am. bor.
Heymanni, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 649. - -+-As. centr.
•uatiglnma, *Steud. Nom.* ed. JI. L 181; *Trin. V Rupr.* '« *Mim. Acad. Pitersb.* Ser. VI. vii. (1849) 171.— Aegypt. j Syria; Arabia,
hordeacea, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 142 - Steudeliana.
"jwfcacea, *Kunth, Rev. Gram.* ii. t 173.—Afr. trop.
numboldtiana, *Trin. (f Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* »r. VL vii. (1849) 118.—Mexic.
humilii, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 12L-Vene-Mela.
hygrometrica, *R. Br. Prod.* 174.—Austral.
Hystrix, *Linn. f. Suppl.* 118.—Afr. austr.
implexa, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb.* i. (1836) 68. - -Bras.
Wwrupta, *Cav. Ic.* v. 45. t 471. C 2.—Mexic
Jacqumiana, *Tausch, in Flora,* xix. (1886) 508.—Am. - austr.
jorullensis, *Kunth, Rev. Gram.* i. 62.-Mexico.
jonciformis, *Trin.* b[1] *Rupr. in .Mim. Acad. Pétersb.* -aer. VI. vii (1849) 143.—Afr. austi.
£arwinskiana, *Trin. tf Rupr. 1. c.* 121.—Mexic.
Kotschyi, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 142= - funiculata.
Konthiana, *Trin. tf Rupr. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. - VJ. v. (1849) I51.-Afi. crop.
«*». *Kunth, Enum. PI.* i. 192.-Bras.
fnarckii, Steud. Nom. ed. I. 69 -amplissima.
Lanata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 25-plumosa.
{•nata, *Poir. Encyc Suppl.* i. 458.—Am. bor.
«nosa, *Muhl. Descr. Vber.* 174.-Am. bor.
""*tuginosa,* Bosc, ex Trin. in Mem. Acad. Petersb. Sér. . »!• IT. II. (1838) 46=stricta
""a. *Cm. Ic.* v. 44. t. 470.—Ins. Philipp.; Am. austr.

AHISTIDA:—

laxa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 85=flaccida.
laxa, Willd. ex Trin. & Rupr. 1. c vii. (1846) 130 = dispersa.
leiocalycina, *Trin.* b* *Rupr. I. c.* 161.—Guinea,
leptopoda, *Benth. Fl. Austral,* vii. 562.—Austral.
Liebmannii, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 78, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 634.—Mexic.
longeradiata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 140.—Afr. trop.
longespica, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 452.—Am. bor.
longifolia, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VL i. (1881) 84.-Bras.
longiramea, *J. Presl, in Rel. Haent.* i. 224.—Mexic.
longiseta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 420.—N. Mexic.
lutescens, *Steud. 1. c.* 145.—Afr. austr.
luzoniensis, *Cav. Ic.* v. 45. t. 470.—Ins. Philipp.
macranthera, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient, v. 493- funicalata.
macrathera, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 393-praec.
macrochaeta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 184.—Am. bor.
macrochloa, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 200.— Afr. or.
mantima, *Steud. Syn. PI. Gram.* 137.—Guadel.
mauritiana, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 392.—Abyss.
mauritiana, Kunth, Rev. Gram. i. 265. t. 44=Adscensionis.
meccana, *Hochst. ex Trin. tf Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 162.—Arabia,
megapotamica, *Spreng. Syst. Cur. Post.* 81.—Bras,
mendocina, *Phil. Serf. Mend. Alt.* 47.—Chili,
micropoda, *Trin. & Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 107.—Am. bor.
minuta, Poit. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 711 *(=Eutriana Ledebourii).*—Ins. S. Doming,
modatica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 189.—Abyss,
muehlenbergioides, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 79, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 534.— Mexic.
muriua, *Cm. Ic.* v. 44. t. 469.—Reg. Argent,
mutabilis, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 150.—Afr. trop.
namaquensis, *Trin. V Rupr. I. c.* 174.—Afr. austr.
nana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 181.—Chili.
Neesiana, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 113.—Bras.
nigrescens, *J. Presl, in Rel. Haent.* i. 223.—Mexic.
nutans, *Ekrenb. & Hempr. ex Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Seï. VI. TÖ. (1849) 185.—Anbia.
nutans, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. i. 131a Adscemionis.
obtusa, *Delile, Fl. Egypte,* 175.118. f. 2.—Afr. bor. et austr.; Arab.
oligantha, *Michx. Fl. Br. Am.* i. 41.—Am. bor.
orizabensis, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 78, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii.'584.—Chili
pollens, Nutt. Gen. Am. i. 57=oligantha.
pallens, *Cav. Ic.* v. 43. t. 468.—Chili.
Palmeri, *Vasey.in Torrey Bot. Club,* x. (1883) 42.— Am. bor.
pallida, *Steud. Syn. PI. Gram.* 148.—Nubia,
palustris, *Vasey, Cat. Gram. U. St.* 85.—Am. bor.
panicnlata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 25.—Arabia,
papposa, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VL vii. (1849) 178.-Abyss.
paradisea, *Edgev. in Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1847) II. 1219.—Persia; Afghan.; Aegypt.; Arab.
paradoxa, J. A. Schmidt, Beitr. FL Cap. Verd. Ins. 140=funiculata.
parviflora, Steud. Syn. PI. Gram. 140=vagans.
paudflora, Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad. '1862' (1863) 92 = oligantha.
pennata, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* vi. (1815) 488. —Persia; Turkestan,
perennis, *Pant, ex Trin.* fa[1] *Rupr. 1. e.* Sér. VI. vii. (1849) 104.—Carolina.
pitigens, Burch. ex Spreng. Syst i. 269=capensis.
piligera, Burch. ex Roem. & Schult. Syst. iC Mant. 579 =capensis.
pilosa, *Labill. Serf. N. Caled.* 12.1.17.—N, Caled.
plumosa, Desf. Fl. Atlant i. 109-ciliata.
plumosa, *lim. Sp. PI.* ed. II. 1666.—Reg. Mediterr.; Persia; Arab.
pogonoptila, *Boiss. Fl. Orient,* v. 496.—Beiucbistan.
prodigiosa, *Welt,, in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 80.—Afr. trop.
proxima, *Steud. Syn. PI. Gram.* 145.—Afr. austr.

ABISTIDA :-

pseudo-hystrix, *Steud. Syn. PI. Gram.* 142.—Afr. austr.
pumila, Decne. in Ann. Sc Nat Seï. II. iv. (1885) 85 »= Adscensionis.
pnngens, *Desf. Fl. Atlant.* i. 109. t. 85.—Afr. bor.; Turkestan.; Sibiria.
pungens, Sieber, ex Trin. Gram. Unifl. Diss. i. 181 = vulnerans.
pungens, stend. Syn. PI. Gram. 145=scoparia.
purpnrascens, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 452.—Am. bor.; Jamaic.
purpurea, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* v. (1837) 145—Am. bor.
pusilla, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 140.—Afr. austr.
qninqueseta, *Steud Syn. PI. Gram.* 420.—Maurit.
racemosa, Muhl. Desc Uber. 172^purpurascens.
racemosa, *Spreng. Mant. i.* 35.—Ins. S. Helen.
Raddiana, *Savi, in Mem. Moden.* (1837) 198.—Aegypt.
ramosa, *R. Br. Prod.* i. 178.—Austral,
ramosissima, *Engelm. ex A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. V. 618.—Am. bor.
KCttmUL,H.B.&K.Nov.Gen.etSp.ll23.—A.m.smstr.
refracta, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 228,-Cuba.
repens, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. (1881 87.—Ins. Galap.
Riedeliana, *Trin.* b" *Rupr. I. c.* Sir. VI. vii. (1849) 113. —Panama.
rigescens, *Roem. V Schult. Syst.* ii. 400.—Ind. or.
rigida, *Cav. Ic.* v. 44. t. 469.—Ins. Philipp.
rigida, Roth, Nov. PI. Sp. 42=rigescens.
riparia, *Trin. in Bull. Acad. Pitersb.* i. (1836) 68. —Bras.
Roemeriana, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 348. — Texas.
Royleana, *Trin. If Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1848) 160.—Ind. or.
rnfescens, *Steud. Syn. PI. Gram.* 421.—Ins. Mascar.
sabulosa, Kunth, Enum. PI. i. 197=setifolia.
Sanctae-Luciae, *Trin. Diss.* ii. 25.—Bras,
scabra, *Kunth, Rev. Gram. i.* 62.—Mexico.
Schafiheri, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 78, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 584.-Mexic
Schlediana, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 120.—Mexic
Schimperi, Hochst & Steud. ex Steud. Syn. PI Gram. 143=ciliata.
Schveiafurthii, *Boiss. Fl. Orient,* v. 493.—Aegypt. ; Arab,
scoparia, *Trin.* b* *Rupr. in Mtm. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 176.-Aegypt.
secunda, Ledeb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 132 (=£«. *triana Ledebourii).*—Ins. S. Doming.
sericea, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 497=paradisea.
setacea, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 182=Adscensionis.
setacea, *Rete. Obs.* iv. 22.—Ind. or.
setacea, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831.) 84=Adscensionis.
setifolia, *H.B.tfK. Nov. Gen. et St. i.* 122.—Mexic: Bras.
Sieberiana, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 61.— Afr. bor.; Creta; Syria,
similis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 420.-Madag.
simpliciflora, *Chapm. in Coult. Bot. Gat.* iii. (1878) 18. —Am. bor.
simplicissima, *Steud. Syn. PI. Gram.* 139.—Ins. Borbon.
sorzogonensis, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 224 Ins. Luzon,
spadicea, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 123.—Am. austr.
spadicea, Trin. in Mém. Acad. Pétenb. Sér. VI. iii. n. (1888)43=tincu.
spicHormis, *Ell. Sketch, i.* 141.—Am. bor.
spicigera, *Trin. V Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 136—Arab.
squarrosa, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 62.— Am. bor.
Steudeliana, *Trin. br R„p,. ,,, aim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vii. (1849) 155,-Abyss.
stipacea, Ehrenb. & Hempr. ex Boiss. Fl. Orient, v. 493 =funiculata.
stipaeformis, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 148 = pallida.
stipiformis, *Urn. Illustr.* i. 157—Afr. trop.
stipoides, *R. Br. Prod.* i. 174.-Austral.
stricta, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 41.—Am. bor. et austr.

AEISTXDA :—
stricta, Mnhl. Desc Gram. 174=spidfonnis.
stricta, Auet ex Steud. Norn. ed. II. i. 182=virgata.
stricta, Stead. Syn. PI. Gram. 138=purpurascens.
snbftcanlis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 132.—Afr. anstr.
suboequans, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 19.—Bras,
sobbiflora, *Steud. Syn. PL Gram.* 188.—Ins. Guadelonpe.
subrecurvata, *Beam. Agrost.* 1S2, nomen.—Hab. t
snbspicatt, *Trin. (f Rupr. in Mint. Aead. Pitersb.* Sėt. VI. vii. (1849) 125.—Ins. Galap.
Swartnåna, Steud. Syn. PI. Gram. 137 -=purpurascens.
Teneriffae, *Steud. 1. c.* 420.—Ins. Tenerifta.
tenuiflora, *Steud. I. c.* 138.—Afr. trop.
tenuis, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 200.—Abyss,
tennis, *Kunth, Rev. Gram.* i. 62.—Cumana; Mer'e,
temipes, *Cav. Ic.* v. 46.—Panama.
Thonningii, *Trin. (f Rupr. in Mėm. Acad. Pitersb.* Sir. VI. vii. (1849) 187.—Afr. Irop.
tincta, *Trin. V Rupr. 1. c.* 111.—Guiana,
torta, *Kunth, Enum. PL* i. 190.—Bras,
trichodes, *Nees, in Hook. Kern Journ.* ii. (1850) 101. —Ins. Philipp.
tripilis, Thunb. Fl. Ceyl. Diss. 2, ex Trin. & Rupr. in Mlm. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 147 = Hystrix.
tuberculosa, *Nutt. Gen. Am.* i. 57.—Am. bor.
unilateral, Willd. ex Stead. Norn. ed. II. i. 182 = Bonteloua aristioides.
uniplumis, *Lichtst. in Roem. V Sehult. Syst.* ii. 401.— Afr. austr.
Urvillei, *Steud. Syn. PI. Gram.* 141.—Ins. Falkland,
vagans, *Cav. Ic.* v. 45. t. 471.—Austral,
vestita, *Thunb. Prod. PL Cap.* 18.—Afr. austr.
virgata, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 60.— Am. bor.
Virleti, *Fount. Mex. PL Enum. Gram.* 76, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. But.* iii. 585.—Mexic.
vulgaris, Trin. & Rupr. in *Him.* Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 181-Adscensionis.
vulnerans, Trin. & Rupr. 1. c. 175-pungens.
vulpioides, *Nance, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. v. (1866) 251.—China.
Zeyheri, *Steud. Norn.* ed. II. i 182.—Afr. austr.
Zittelii, *Aschers. in Verh. Bat. Ver. Brand,* xxi. (1880) 70.-Aegypt.

ARISTIDIUM, Lindl. Veg. Kingd. 116 (1847)=Bouteloua, Lag. (Gramin.).

ARISTOMENIA, Veil. Fl. Flum. 845 (1825) viiL t 84 =8tifltia, Mikan (Compos.).
ftvticosa, Veil. 1. c. 846 ; viii t. 84 - S . chrysantha.

ABI8TOLOCHIA, Toum. ex Linn. Syst. ed. I. (1785).
ARISTOLOCHIACEAE, Benth. *8c* Hook. *L* iii. 128 ; 1220.
AUBUYA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 (1886).
DICTYANTHES, Rafin. in Load. Card. Mag. viii. (1832) 247.
DIGLOSSELIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 (1836).
EINOMEIA, Rafin. Med. Fl. i. 62 (1828).
ENDODECA, Rafin. 1. c. (1828).
GLOSSULA, Reichb. Handb. 173 (1887).
GUACO, Liebm. in Forhandl. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 203.
HEXAPLECTRIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 97 (1886).
HOCQUARTIA, Dam. Comm. Bot. 30 (1822).
HOWARDIA, Klotzsch, in Monatsb. Acad. BerL (1859) 607.
ISIFKIA, Rafin. Med. Fl. ii. 232 (1830).
ISOTREMA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195.
PISTOLOCHIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 (1836).
PLAGISTRA, Rafin. 1. e. (1836).
PSOPHIZA, Rafin. 1. c 99. (1886).
PTERIPHIS, Rafin. 1. c. (1836).
SIPHISIA, Rnfin. Med. Fl. i. 62 (1828).
TROPEXA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 (1886).
abbreviata, Mart ex Mast, in Mart. Fl. Bras. iv. II. 109=cyinbifera.
abyssinica, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 598-bracteata.
acuminata, *Lam. Encyc.* i. 254.—Ind. or.
acuminata, Roxb. Hort. Beng. 64; Fl. Ind. iii. 489 = Roxburghiana.
acntifolia, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii (1854) 64.-F1. Amazon.

ABI8TOLOCHIA :—
aethiopica, *Weltc. Apont.* 648.—Afr. trop.
albida, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. *IV.* ii. (1854) 75. -Afr. occ.
altissima, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 324. t. 249.—Reg. Mediterr. or.
anatolica, Boiss. Fl. Orient, iv. 1080—maurorum.
anguicida, *Jacq. Enum. PL Carib.* 80.—Am. austr.
anguicida, Pav. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 448 = velutina.
anguicida, Sieber, ex Duch. 1. c 479—acuminata.
angnlata, *Boj. ex Duch. I. c.* 497.—Madag.
angulisans, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 258—tomentosa.
angulosa, Wall, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 480= Roxburghiana.
angastifolia, *Boj. Hort. Maurit.* 277.—Ins. Maurit.
angustifolia, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 211.— Bras,
antihysterica, *Mart, ex Duch. in DC. Prod.* xv. I. 477. —Bras.
appendiculata, Veil. Fl. Flam. ix. t. 98=macroum.
arborescens, *Linn. Sp. PL* 960.—Am.
arcuate, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* iv. II. 101.—Am. trop.
arenicola, *Hance, in fount. Bot.* xiv. (1876) 261.— Cambodia,
argentine, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 156.— Reg. Argent.
arkasana, *Lodd. Cat.* ed. XIV. (1826) 37.-Am. bor.
atlantica, *Pomel, Nouv. Mat. FL Atl.* 136.—Algeria.
attica, Orphan, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 487 = longa.
Aucherii, Jaub. & Spach, IUustr. i. 174. t. 99- maurorum.
aurantiaca, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 475.— Venezuela.
auricularia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 49.—As. Min.
aurita, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 482.—Madag.
baetica, *Linn. Sp. PL* 961.—Europ.
barbata, *Jacq. Coll.* iii. 221.—Venezuela.
Baueri, Duch. in DC. Prod. xv. I. 484=Thozetii.
Bernieri, *Duch. I. c.* 482.—Madag.
biflora, Willd. ex Duch. 1. c. 467 = maxima,
bilabiate, *Linn. Sp. PL* ed. II. 1361.—Ins. S. Doming.
Billardieri, *Jaub. V Spach, IUustr.* i. 175. t. 100.— Syria; Cilicia.
bilobata, *Linn. Sp. PL* 960.—Ins. S. Doming,
birostris, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 60.—Bras.
Bodamae, *Dingl. in Flora,* xlvi. (1888) 301.— Thracia.
Bonplandi, Tenore, Cat. Sem. Hort. Neap. (1842) 12 = fimbriata.
Bottae, Jaub. & Spach, Illnstr. i. 173. t. 98=maurorum.
brachyura, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 446.—Ins. S. Doming.
bracteata, *Ret*. Obs.* v. 29.—Ind. or.
bracteolata, Lam. Encyc. i 258= bracteata.
bracteosa. *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 37.—Mexic.
Branicdana, *Andr*. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 155, nomen.—Hab. »
brasiliensis, *Mart. V Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 77.— Bras.
brevipes, *Benth. PL Hartw.* 15.—Mexic.
Bridgesii, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 463.—Chili.
Bruguieri, Jaub. & Spach, Illnstr. ii. 40. t 129 = Olivieri.
Burchellii, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* iv. II. 90.— Am. trop.
californica, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 128.—Calif.
campanaeformis, DC. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 432 = Holostylis reniformis.
caracasana, Spreng. Syst iii. 758=trilobate.
caudata, Herb. Berol. ex Duch, in DC. Prod. xv. I. 446 =brachyura.
caudata, Booth, ex IindL in Bot. Keg. t 1458 = macroura.
caudata, *Jacq. Enum. PL Carib.* 30.—Ins. S. Doming.
candaU,Parodi,inAnal. Soc. Cient. Argent, v. (1878) 155 *{Contrib.* 48).—Reg. Argent
Chamissonis, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 462.—Bras,
chilensis, *Miers, Trav. Chil.* ii. 581.—Chili
chiquitensis.ZWA. *in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. ii. (1854) 49.—Bolivia.
ciliata, Hook. Bot. Mag. t. 3756=fimbriata.
ciliosa, Benth. in Maund, Bot t 90=fimbriata.

ABISTOIiOCHIA *t*—
Claussenii, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 67.—Bras.
clavidenia, *Griseb. Cat. PL Cub.* 116.—Cuba.
Clematitis, *Linn.Sp. PL* 962.—Europ.; Reg. Caucas.; As. Min.
dypeata, *Linden V Andre, IUustr. Hortic.* xvii. (1870) t. 40.—N. Granat.
conduplicata, Poit ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 460= oblongata.
conferta, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 11.—Mexic.
constricta, *Griseb. in Goett. Abh.vH.* (1867) 226.—Reg. Argent
contorta, *Bunge, Enum. PL Chin. Bor.* 68.—China bor.
cordiflora, *Mutts, ex H. B.* &[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 149.—N. Granat
cordigera, *Willd. exKlotasch, in Monatsb. Akad. Berl.* (1859) 621.—Bras.
coriacea, *Rafin. Atl. Journ.* 146.—Hab. *1*
cornuta, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* iv. II. 97.—Am. trop.
costaricensis, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 450.—Costa Rica.
crenata, Ehrenb. ex Duch. 1. c. 478=bracteata.
cretica, *Lam. Encyc.* i. 225.—Creta.
cubensis, *Linden, Cat.* n. 11. *Suppl.* (1866) 12.— Cuba.
cucullata, Pohl, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 482= Holostylis reniformis.
cyclochilia, Ducb. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1864) 45=passifloraefolia.
cymbifera. *Mart. V Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 76. t. 49.—Bras.
cynanchifolia, *Mart, ff Zucc. 1. c.* 77. t. 61.—Bras,
debilis, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. III. (1846) 197.—Japon.
deltantha, *F. Muell. Fragm.* vi. 179.—Austral,
deltoidea, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 146. t. 112. —Bras,
dictyantha, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1864) 40.—Venezuela.
Duchartrei, Andr<*, Le Mouv. Hortic. (1867) 61; Mast. in Gard. Chron. (1868) 516=Ruiziana.
dnrior, *Hill, Veg. Syst.* xxi. 57.—Am. bor.
ecaudata, DC. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 446 = dictyantha.
egensis, Poepp. ex Duch. 1. c. 465-acntifolia.
Ehrenbergiana, *Cham, in Linnaea,* vii (1882) 210.— Ins. S. Doming,
elegans, *Mast, in Gard. Chron.* (1885) II. 801.— Bras.
elliptica, Duch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. a. (1854) 61 =tigrina.
emarginata, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 467.—Bras.
emarginata, Willd. ex Dnch. 1. c 466—nummalarifolia.
erecta, *Linn. Sp. PL* ed. II. 1862.—Vera Crux,
eriantha, *Mart, b" Zucc. Not. Gen.et Sp, t* 78. t. 68.— Bras.
Eschscholtzii, Ledeb. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 481 =A. Tagala.
enrystoma, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1864) 41.—Bras.
fasciculata, Lam. FL Fr. iii. 387=A. Pistoloohia.
filipendula, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1864) 70.—Bras,
fimbriata, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 210. t 6.— —Bras,
flexnosa, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. ii (1854) 86. Mexic.
floribunda, *Lent. IUustr. Hortic.* (1868) t. 668.—Bras.
fluminensis, Buek, in DC. Prod. Index, iv. 28-odora.
foetens, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1824.—Ind. occ.
foetida, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 147.1.114.— Mexic.
Fontanesii, Boiss. & Reut. Pugili PI. Hispan. 108- longa.
Fordiana, *Hemsl. in Journ. Bot.* xriii. (1886) 286.— China,
fragrantissima, *Ruit, in Mem. Bejuc. Estrell.* (1805) 46.—Peruv.
frutescens. Marsh. Arb. Am. 24=macrophylla.
galeata, *Mart, tf Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 76. t 50.— Bras.
galeata, Moritri, Syst. Verz. 70-cymbifera.
Galeotti, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1864) 44.—Mexic.

ABISTOLOCHIA :—
Gardneri, *Duck, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. ii. (1854) 69.-Bras.
Gaudichaudii, *Duck. I. c.* 72.—IDS. Rawak.
geminiflora, H. B. *Sc* K. Nor. Gen. et Sp. ii. 148. L 117=maxima,
gibboia, *Duck, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. ii. (1854) 53. —Mode.
Giberti, *Hook. Bot. Mag.* t. 5345.—Reg. Argent.
gigantea, Hook. L c 4221=grandin'ora.
gigantea, *Mart, tf Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 76. t 48. —Bras.
Gigas, Lindl. in Bot. Reg. (1842) Misc. 51. t 60 = grandiflora.
gkndulosa, *Kickx, in Bull. Acad. Brux.* déc. vii. (1889) n. 11.—Cuba.
glauca, Desf. Fl. Atlant. ii. t. 250-baetica.
glauca, Salisb. Prod. 215 = snbglauca.
glancescens, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 147. t. 115.—N. Granat.
Glaziovii, *Mast, in Mart. FL Bras.* iv. II. 90.—Am. trop.
Goldieana, *Hook._f. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1865) 185.1.14.—Afr. trop.
Goudotii, *Duck, in Ann. Se. Nat.* Ser. IV. ii. (1854) 66.—N. Granat
giadlis, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 460.—Am. anstr.
grandiflora, *Arruda, in Koster, Trav. Brat.* 499.—Pemamb.
grandiflora, Gomez, Obs. Bot.Med. ii.(1803) 14. t 3; et in Mem. Ac. Usboa, iiL (1812) Mem. dos Corresp. 64-cymbifera.
grandiflora, *Sw. Prod. Veg. lnd. Occ.* 126.—Jamaica.
grandifolia, Salisb. Prod. 215 = macrophylla.
Griffithii, *Hmh. f. V Thorns, ex. Duck, in DC. Prod.* xv. I. 437.—Reg. Himal.
kastata. H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 148 = pentandra.
hastata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 6.—Malaya.
kastata, Klotzsch, in Monatsb. Acad. Berl. (1869) 697 = Zollingeri.
hastata, Nntt. Gen. Am. ii. 200=A. Serpentaria.
Wans, *Willd. in Mem. Soc. Nat. Mosc.* ii. (1809) 100. —Venezuela.
Hilariana, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 451.—Bras.
hirsuta, Linn. Syst. ed. XII. 601-hirta.
kirsuta, MuhL Desc. Uber. 18-tomentosa.
hirta, Bnek, in DC. Prod. Index, iv. 28=torta.
kirta, Georgi, Beschreib. Russ. Reich, iii. V. 1276 = pontica.
Wrta, *Linn. Sp. PI.* 961.—As. Min.
hispida, *Pokl, ex Duck, in DC. Prod.* xv. I. 498.—Bras.
iberica, *Fisek. V Mey. ex Duck, in DC. Ptod.* xv. I. 498.—Reg. Caucas.
unbricata, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 494. —Ins. Philipp.
incua.. *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 490.—Anatolia,
"ndica, *Linn. Sp. PI.* 960.—lnd. or.
infesta, Salisb. Prod. 215 = A. Clematitis.
">«ata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 146. t 111•—. N. Granat.
uriguis, *Versck. ex Gard. Ckron.* (1868) 849.—Bras.
Ipemi, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1878) 153 *{Contrib.* 46).—Paraguay.
Jackii, Stead. Norn. ed. II. i. 141=hastata.
Japonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 136.—Japon.
Kaempferi, *Willd. Sp. PI.* iv. 152.—Japon.
Karwinskii, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 442.—Mexic
Kotsckyi, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 237 = bracteata.
labiata, WiHd. in Mém. Soc Nat Moscii. (1809) 101. t. 6 = brasiliensis.
labiosa, Ker-GawL in Bot. Reg. (1822) t. 689 = cymbifera.
lanceolata, Wight, Ic v. t. 1868=indica.
Leprieurii, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 451.—Guiana,
leuconeura, *Linden, in Belg. Hortic.* viii. (1858) 165. —Am. anstr.
Ljndeniana, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 453.—Cuba,
linearifolia, *Wrigkt, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 115.—Cuba.
lineata, *Duck, in Rev. Hortic.* Sér. IV. iii. (1854) 284. ,. 1.15.—Japon.
nttoralis, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1878) 156 *{Contrib.* 47).—Reg. Argent.

ABISTOLOCHIA t—
longa, Georgi, Beschr. Rnss. Reich, iii. v. 1274=A. Clematitis.
longa, *Linn. Sp. PI.* 961.—Reg. Mediterr.
longa, Thunb. Fl. Japon. 144 = debilis.
longa, Woodv. Med. Bot. ii. t. 107 = baetica.
longiflora, *Engelm. V A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 269.—Texas,
longifolia, *Champ, ex Bentk. in Hook. Kew Journ.* vi. (1864) 116.—Hongkong.
longifolia, Roxb. Hort. Beng. [102]; Fl. lnd. iii. 490 =moluccana.
lutea, Desf. Choix, 18. t. 8=pallida.
lutescens, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 461.—Bras.
macradenia, Hook. Bot. Mag. t. 4467=glandnlosa.
macrocarpa, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 497.—Afr. occ.
macroglossa, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 38. t. 127 = Toumefortii.
macrophylla, *Duck, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 68.—Guiana.
macrophylla, Lam. Encyc. i. 252-A. Sipho.
macrota. *Duck, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1864) 48. —Guiana,
macroura, *Gome*, in Mem. Ac. Lisboa,* iii. (1812) *Mem. dos Corresp.* 77.—Bras.
Mannii, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1865) 186. —Afr. trop.
marsnpiiflora, *Schrad. in Goett. Gel. An*,* i. (1821) 719.—Hab.J
Mathewsii, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 497.—Peruv.
mauritiana, Pers. Syn. ii. 527=bracteata.
maurorum, Klotzsch, in Monatsb. Acad. Berl. (1859) 698 = bracteata.
manromm, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1363.—As. Min.; Persia.
maxima, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 208=Cbamissonis.
maxima, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 30.—lnd. occ.
maysorensis, Fisch. ex Dnch. in DC. Prod. xv. I. 479 = indica.
melastoma, *Manso, ex Duck. I. c.* 461.—Brat,
mexicana, *Kostel. Allg. Med.-Pkarm. Fl.* ii. 467.—Mexic.
mexicana, A. Dietr. Syn. v. 196=maxima,
micrantha, *Duck, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 85. t. 5.—Mexic.
microphylla, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 68.—Hab. 1
micTostoma, *Boiss.* b* *Sprun. Diagn.* Ser. L v. 50.—Graecia.
microura, Pohl, ex Dnch. in DC. Prod. xv. I. 496 = setosa.
mollissima, *Hance, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 800.—China,
moluccana, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 488.—Ins. Molncc
mosckata, Wedd. ex Dnch. 1. c. 475=odoratissima.
multiflora, *Duck, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 73.—Ins. Comoro,
multinervis, *Pomel, Noun. Mat. Fl. Atl.* 187.—Algeria.
nervosa, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 480.—lnd. or.
nummularifolia, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 145.—Venezuela.
oblonga. Veil. Fl. Flum. ix. t. 99=rumicifolU.
oblongata, *Jacq. Hort. Sckoenb.* ii. 29.—Hab. ?
obtusata, Sir. *Prod. Veg. lnd. Occ.* 126.—lnd. occ.
odora, *Steud. Norn.* ed. II. i. 133.—Bras.
odoratissima, Benth. PI. Hartw. 82=gibbosa.
odoratissima, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1362.—Jamaica.
odoratissima, Veil. Fl. Flum. ix. t. 97=odora.
officinalis, T. Nees, PI. Offic. 1.144 = A. Serpentaria.
Olivieri, *Colleg. ex Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 50.—Mesopot.
orbicularis, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 59.—Bras.
orbiculata, Veil. Fl. Flum. ix. t 96 = cymbifera.
ornithocephala. Hook. Bot. Mag. t. 4120 = brasiliensis.
Ottonis, Klotzsch, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 476 = pandurata.
ovalifolia, *Duck, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 50.—Mexic.
paecilantha, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 104.—Syria.
pallida, Salzm. ex Ball, in Joum. Linn. Soc xvi. (1878) 666=longa.
pallida, *Willd. Sp. PI.* iv. 162.—Europ.; As. Min.
pandmata, *Jacq. Hort. Sckoenb.* Iv. 49. t 497.—Venezuela.

ABISTOLOCHIA :—
pandurata, Wall, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 479 = indica.
panduriformis, Willd. Sp. PI. iv. 152-pandurata.
pannosa, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1876) 493. —Peruv.
papillaris, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* iv. II. 100.—Am. trop.
paraguariensis, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1878) 166 *(Contrib.* 48).-Paraguay,
paramaribensis, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 496.—Bras.
pardina,Z)iM*. *in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. ii. (1854) 47. —Mexic.
parviflora, *Griseb. in Goett. Abk. air.* (1879) 148.—Reg. Argent
parvifolia, *Sibth. V Sm. Fl. Grate. Prod.* ii. 222.—Syria; Cyprus; Graecia I
parvifolia, Sprun. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 485 = microstoma.
pawfloraefolia, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 195.—Cuba.
paucinervis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl.AU.* 136.—Algeria.
Pavoniana, *Duck, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. S. (1854) 54.—Mexic
Pearcei, *Mast, in Journ. Linn. Sor.* xiv. (1876) 498.—Peruv.
Pearcei, *Phil, in Ann. Univ. Ckil.* i. (1861) 68; *Linnaea,* xxxiii. (1865) 231.—Chili,
peltata, *Linn. Sp. PI.* 960.—Ins. S. Doming.
peltata, Sw. Obs. 341-renifonnis.
pentandra, *Jacq. Enum. PL Carib.* 30.—Cuba.
Petersiana, *Klotisch, in Monatsb. Akad. Berl.* (1859) 599.—Afr. trop.
picta. Karat. Ausw. Schoen. Pfl. Venez. ii. 34•pandurata.
pilosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 146. t 113.—Ecuador.
piperifolia, *Griff, /tin. Bot.* 19.—Reg. Himal.
Pistolochia, Aucher, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 491 =incisa.
Pistolochia, *Linn. Sp. PI.* ed. IL 962.—Reg. Mediterr. occ
platanifolia, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 487.—Mexic
platyloba, *Garcke, in Linnaea,* xxii. (1849) 69.—Guiana,
podocarpa, *A. Bertol. in Nov. Comm. Acad. Sc Bbn.* iv. (.1840) 437.—Gnatem.
Pohliana, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 496.—Bras,
polyrrhizos, *Sprang. Syst.* iv. *Cur. Post.* 810.—Am. bar.
pontica, *Lam. Encyc.* i. 265.—As. Min.
praevenosa, *F. Muell. Fragm.* ii. 166.—Austral,
promissa, *Mast, in Gard. Ckron.* (1879) I. 494.—Afr. trop.
prostrata, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1864) 68.—Bolivia. •
pubera, F. Bauer, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 484 = Thozetii.
pubera, *R. Br. Prod.* 849.—Austral.
puberula, F. Muell. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 484 ~ pubera.
pubescens, Hort ex C. Koch, DendroL ii. i. 895 = tomentosa.
pubescens, *Page, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 188.—Am. bor.
pubescens, *Willd. ex Duck, in DC. Prod.* xv. I. 450.—Bras.
punctata, Balbis, ex Duch. 1. c 446 =brachyura.
punctata, *Lam. Encyc.* i. 253.—Ins. S. Doming.
pusilla, Pohl, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 466 = Clausseni.
quadriflora, *Gueldenst. Reisen Russl.* i. 421.—Reg. Caucas.
Raja, *Mart,* b* *Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 78.—Bras,
recurvilabra, *Hance, in Journ. Bot.* xi. (1878) 76.—China.
refracta, Burcn.ex Mast in Mart. Fl. Bras. iv. II. 93 = Chamissonis.
reniformis, Veil. Fl. Flum. ix. t 100- A. Raja,
remformis, *Willd. Sp. PI.* iv. 158.—Ins. S. Doming,
repens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 12.—Mexic.
reticulata, Holton, ex Dnch. in DC. Prod. xv. 14.'>7 = maxima.
reticnlata, *Nutt. in Trans. Am. Pkil. Soc.* N.S. v. (1837) 162.—Am. bor.
reticulata. Seem. Bot. Voy. Herald, 193 - Mathewsii.
rigida, *Duch. in DC. Prod.* xv. 1.495.—Afr. austr.
ringens, link & Otto, Ic. PI. Sel. i. 38. t. 13- brasiliensis.

ARISTOLOCHIA :—
ringens, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 99.—Jnd. or.
rotunda, Bovrf, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 487 = longa.
rotunda, Georgi, Beschr. Ross. Reich. Hi. v. 1274-A. Clematitis.
rotunda, *Linn. Sp. PI.* 962.—Reg. Mediterr.
rotunda. Mo?. *Sc* Sesse, ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 442•bncteosa.
Roxburghiana, *Klotgsch, in Monatsb. Aiad. Bert.* (1869) 696.—Ind. or.; Malaya.
rubromarginata, Fisch. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 451=Leprieurii.
rufomarginata, Leprieur, ex Duch. 1. c. = Leprieurii.
rugosa, Lam. Encyc. i. 252 = obtusata.
Ruiziana, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 476.—Peruv.
rumicifolia, *Mart. V Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 79.—Bra*.
rumicifolia, R. Schomb. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 447=dictyantha.
Rumphii, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Ft.* ii. 465.—Ins. Banda.
saccata. Hook. f. & Thorns, ex Klotzsch, in Monatsb. Akad. Eerl. (1869) 608 -seq.
saccata, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 2. t. 103.—Reg. Himal.
sagittata, *Muhl. ex Duch. in DC. Prod.* xv. I. 484=A. Serpentaria.
scabrida, Boiss. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 494 = hirta.
scabridula, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 105=paecilantha.
scandens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 10.—Hispan.
Sellom'ana, Duch. in DC. Prod. xv. I. 458 = triangularis.
sempervirens, *Forsk. Ft. Aegypt. Arab.* 156.—Arabia,
sempervirens, *Linn. Sp. PI.* 961.—Creta.
sempervirens, Orph. ex Nym. Consp. 645=altissima.
sepicola, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* iv. II. 100.—Am. trop.
sericea, *Benth. PI. Hartv.* 81.—Mexic.
sericea, *Blanco, Fl. Filip.* 288.—Ins. Philipp.
Serpentaria, *Linn. Sp. PI.* 961.—Am. bor.
sessifiora, DC. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 480 = nervosa.
sessilifolia, *Duch. I. c.* 464.—Bras.
setigera, Klotzsch, in Monatsb. Acad. Berl. (1859) 617 =chilensis.
setosa, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 496.—Bras,
cicala, *Tineo, in Guss. Ft. Sic. Syn.* ii. 878.—Sicilia.
ainaram, *Lindl. in Gard. Chron.* (1859) 708.-China.
Sipho, *L'Hfrit. Stirp. Nov.* IS.—Am. bor.
smilacina, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 459.—Bras,
lomaliensis, *Oliver, in Hook. 1c. PI.* t 1278.—Afr. i trop.
Soyauxiana, *Oliver, 1. c.* t. 1410.—Afr. trop.
spathulata, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 448.—Ccba.
Sprucei, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* iv. II. 88.- Am. trop.
strictiflora, Duch. in DC. Prod. zv. I. 484-pubera.
•ubclausa, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 872.—Mexic.
subcordata, Willd. ex Duch. in DC. Prod. xy. I. 468 = deltoidea.
subglauca, Lam. Encyc. i. 267 i Brot. Fl. Lusit. ii. 598 -baetica.
subsagittata, Blanco, Fl. Filip. ed. I, 283-A.Tagala.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 246-macrota.
surinamensis, *Willd. Sp. PI.* iv. 151.—Guiana.
Tagala, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 207.—Ins. Luzon,
•taliscana, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 809.—Mexic.
Umnifolia, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 448.—Bras.
tapetotricha, Lem. IUustr. Hortic. iii. (1866) Misc. 22 — N. macronra.
tenera, *Pohl, ex Duch. in DC. Prod.* xv. I. 466.—Granat.
theriaca, *Mart, ex Duch. I. c.* 455.—Bras.
Thozetii, *F. Muell. Fragm.* ii. 167.—Austral.
Thwaitesii, *Hook. Bot. Mag.* t. 4818.—China,
tigrina, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 194.—Cuba,
timorensis, *Decne. Herb. Tim. Descr.* 41.—Ins. Timor,
tomentosa, *Sims, Bot. Mag.* t. 1869.—Am. bor.
torta, Willd. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 458 = inflata.
Tournefortii, *Jaub. V Spach, IUustr.* ii. 38. L 128.—As. Min.; Ins. Chios.
triactina, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1865) 186.—Afr. trop.

ABISTOLOCHIA :-
Trianaei, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 462.—N. Granat.
triangularis, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 209. t 6.—Bras,
tricaudata, *Lem. IUustr. Hortic* xii. (1865) *Misc.* 49 j xiii. (1866) t. 523.—Mexic.
trichostoma, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 190.—Cuba.
trifida, Lam. Encyc. i. 251= trilobata.
triloba, Salisb. Prod. 214=trilobata.
trilobata, Lam. Encyc. i. 251 = surinamensis.
trilobata, Lindl. Bot. Reg. t. 1399—macroura.
trilobata, *Linn. Sp. PI.* 960.—Ind. occ.
tripteris, *Rafin. Fl. Ludov.* 24.—Am. bor.
trulliformis, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* iv. II. 101.—Am. trop.
truncata, *Field.* to" *Gardn. Serf. PI.* t. 44.—Peruv.
turbacensis, *H. B. &* K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 149.—Am. bor.
Uhdeana, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 465.—Mexic.
undata, Moench, Meth. 719=sempervirens.
ungulifolia, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 494.—Borneo.
utriculata, Seem. Bot. Voy. Herald, 198 - Mathewsii.
valentina, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 89.—Mexic.
variifolia, *Duch. I. c.* 65.—Mexic.
velutina, *Duch. 1. c.* 39.—Mexic.
veraguensis, *Duch. in DC. Prod.* xv. I. 458.—Am. centr.
Wageneriana, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1858) 631.—N. Granat
Warmingii, *Mast, in Mart. Fl. Bras.* W. II. 109.—Am. trop.
Weddellii, *Duch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 62.—Bras.
Westlandi, *Hems!, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 286.—China.
Wrightii, Seem. Bot. Voy. Herald, 83L t. 72-brevipes.
Zollingeri, *Miq. Fl. Ind, Bat.* i. 1066.—Java.

ARISTOTELA, Adans. Fam. ii. 125 (1763) =Othonna, Linn. (Compos.).

ARISTOTELA, J. F. Gmel. Syst. 751 (1791) = AriBtoteUa, L'Hérit (Tiliac).

ARISTOTELEA, Lour. Fl. Cochinch. 522 (1790) = Spiranthes, Rich. (Orchid.).
spiralis, Lour. 1. c = S. australis.

ARISTOTELEA, Spreng. Syst ii. 450 (1826)-Ariatotelia, L'Hérit. (Tiliac.).

ABISTOTELIA, L'Hérit. Stirp. Nov. 81. t. 16 (1784). *TILIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 239.
BEAUMARIA, Deless. ex Steud. Nom. ed. II. i. 192 (1840).
FWESIA, DC. Prod. i. 620 (1824).
australasica, *F. Muell. Fragm.* ii. 79.—Austral.
Braithwaitei, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, i.* (1881) 149.—N. Hebrid.
Colensoi, *Hook./. Handb. New Zeal. Fl.* 88.—N. Zel.
erecta, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 209.—N. Zel.
fruticosa, *Hook./. Fl. N. Zeal. I* 84.—N. Zel.
glabra, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. ii. (1868) 44; *et Contrib. Bot.* ii. 180.—Am. merid.
glandulosa, Ruiz & Pav. Syst Veg. 125=A. Macqui.
lucida, Salisb. Prod. 345 - A. Macqui.
Macqui, *L'Hérit, Stirp. Nov.* 31. t. 16.—Chili,
megalosperma, *F. Muell. Fragm.* ix. 84.—Austral,
pedunclaris, *Hook. f. Fl. Tasm.* i. 62.—Tasmania,
racemosa, *Hook./. Fl. N. Zeal.* i. 88.—N. Zel.

ARIVELA, Rafin. Sylva Tellur. 110 (1838)-=Cleome, Linn. (Capparid.).
viscosa, Rafin. 1. c.=C. viscosa.

ARIVONA, Steud. Nom. ed. II. i. 130 (1840) = Aljona, Comm. (SantaL).

ARJOMA, Comm. ex Cav. It iv. 57. t. 383 (1797). *SANTALACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 220.
AKIVOIM, Steud. Nom. ed. II. i. 130 (1840).
ARJOONA, Endl. Gen. 325 (1838).
andina, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* ii. (1862) 405; *et in Linnaea,* xxxiiL (1864-65) 232.—Chili.

ARJONA :—
appressa, *Phil, in Linnaea,* xxxiiL (1864-65) 233. - Chili,
linearis, *Miers, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 138.—Reg. Argent,
longifolia, *Phil, in Anal. Univ. Chil* ii. (1862) 405.—Chili,
minima, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iv. (1881, 80.—Chili,
patagonica, *Homb. V Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zil.* 22.—Patagon.
pungens, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 637.—Chili.
pusilla, *Hook./. Fl. Antarct.* ii. 842.—Patagon.
rigida, *Miers, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 132.—Reg. Argent,
ruscifolia, *Poepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Sup pi.* i. (1843) *{PL Meyen.)* 112.—Chili,
tuberosa, *Cav. Ic.* iv. 57. t 383.—Am. merid.
tuberosa, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 231 = rigida.

ARKEZOSTIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 100 (1836) - Cayaponia, Manso (Cucurb.).
quinqueloba, Rafin. 1. c. = C. Boykinii.

ARKOPODA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 73 (1836) = Reseda, Toum.
Luteola, Rafin. 1. c. - R. Luteola.

ARMANIA, Bert, ex DC. Prod. v. 57<T (1838)=Encella, Adans. (Compos.).
/ruticulosa, Bert. 1. c.—Am. austr.

ARMENIACA, Toum. ex Mill. Gard. Did. ed. VI. (1752) = Frunus, Tourn. (Rosac.).
amarella, Schur, Enum. Pl. Transs. 178 = P. amarella.
atropurpurea, Loisel. id Duham. ed. Nov. v. 172. t. 552=P. dasycarpa.
berricoccia, Delarb. FL Auv. ed. II. 326 = P. Armeniaca.
brigantiaca, Pers. Syn. ii. 86 = P. brigantiaca.
dasycarpa, Pers. I.e. —P. dasyc›rpa.
Davidiana, Can. in Rev. Hortic. (1879) 237.—China.
duracina, Dierb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 133 = 1*. amarella.
epirotica, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 167 —P. Armeniaca.
fusca, Turp. 8c Poit in Nouv. Duham. Arb. Fruit i. 123. t. 60 = P. dasycarpa.
longifolia, Desc. Fl. Antiil. ii. 108-P. occidentals.
lucida, May, in Rev. Hortic. (1875) 179 = P. lucida.
Mume, De Vriese, Tuinb. Fl. i. (1855) 1. t 1 = 1'. Mume.
nigra, Pers. Syn. ii. 86 = P. dasycarpa.
pedunculata, Hort. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 610 = P. pcddnculata.
persicifolia, LoiseL in Duham. ed. Nov. v. 172. t. 652 =P. dasycarpa.
sibirica, Pers. Syn. ii. 36 = P. sibirica.
verrucosa, May, in Rev. Hortic. (1875) 299.—As. Min.
trichocarpa, M. Roem. Syn. Rosifl. 34=P. tomentosa.
vulgaris, Lam. Encyc. i. 2 = P. Armeniaca.

ARMENIASTRUM, Lem. Jard. Flenr. iv. (1854) Misc. 76=Espadaea, A. Rich. (Verben.).
apiculatum, Lem. L c. 78 = E. apiculata.

AB2CEBIA, Linn. Syst. ed. I. (1785); Willd. Enum. Hort Berol. 383 (1809). *PLUMBAGINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 626.
FOLYANTHEMUM, Medic, in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys. Oek. Ges. i. (1791) 228.
alliacea, Ebel & Hoffmgg. in HorTmgg. & Link, Fl. Port i. 441=plantaginea.
alliacea, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 296 - cariensis.
alliacea, Mutel, Fl. Fr. iii. 86. f. 405 = plantaginea.
alliacea, *Roem. (TSchult. Syst.* vi. 773.—Reg. Mediterr. occ.
alliacea, Schousb. Vext. Marok. 146 = baetica.
alliacea, Webb, ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 560=mauritanica.
allioides, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* \\. 524.—Hispan.
allioides, Willk. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 866=longearistata.
alpina, Ebel, Armeriae Gen. Diss. (1840) 28 = Halleri.
alpina, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 2D0 =cariensis.

ABMBBIA:—
alpina, Guss. Fl. Sic. Prod. 378 = nebrodensis.
alpina, Tenore, Syll. 160, ex Boias. in DC. Prod. xii. 685=majellensis.
alpina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mow. (1838) 99; xxv. (KJ62) II. 399-sibirica.
alpina, *mild. Enum. Hort. Berol.* **333.—Europ.**
andicola. C. Gay, ex Boias. in DC. Prod. xii. 682 = andina.
andina, *Poepp. ex Boiss. I. c*—**Chili.**
androsacea, Boiss. 1. c. 679 = vulgaris.
arctica, *Wallr. Beitr.* i. 193.—Unalashka.
arcuata, Welw. ex Boiss. & Reut. Pugill. PI. Nov. 101 = boetica.
arena-rid, Schnlt. in Roem. & Seinnit. SysL yi. 771 = maritima.
argyrocephala, *Wallr. Beiir.* i. 206.—Europ.
atlantica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 184.—Algeria,
australis, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 526.—Hispan.
berlengensis, *Daveau, in Bid. Soc. Broter.* **ii. (1884)** 24.—Lusitan.
boetica, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 749.—Hispan.
Boissieriana, *Coss. Notes Crit.* 44.—Hispan.
Bourgaei, Boiss. ex Nym. Consp. 616 = Duriaei.
brachyphylla, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 682—Chili.
brevifolia, Kunze, ex Boiss. 1. c. = chilensis.
oupleuroides, Gren. & Godr. Fl. Fr. H. 736 = plantaginea.
caespitosa, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 679.—Hispan.; Lusitan.
campestris, Wallr. Beitr. i. 203=maritima.
canescens, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 686.—Dalmatia.
cantabrica, *Boiss. &• Reut. ex Willk. V Lange, Prod. PI. Hisp.* ii. 366.—Hispan.
canensis, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 677.—As. Min.
^phulotes. Hook. Bot. Mag. t. 4128 = mauritanica.
Cephalotes, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 440 = latiloiia.
Cephalotes, Schousb. Vext. Marok. I46=plantaginea.
Cephaiotus, Boiss. in DC. Prod. xii. 675 = pinifolia.
ehilensis, *Boiss. 1. c.* 681.—Chili.
Uumlettiana, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **135.**- Algeria.
cinerea, *Welw. ex Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 101.—Lusitan.
cnmfolia, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* **xxxix. (1835)** 6—Hab.?
"trvifolia, Bert, in Merc. Chil. 568; et Boll. Ferussac, xx. (1880) 108 = chilensis.
aoiticulata, *Bertol. Amoen. Ital.* 77.—Italia.
aenticulata, Portensch. PI. Dalm. t. 6 = canescens.
atanthoides, Homem. *Sc* Spreng. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 683 = plantaginea.
iniriael, *Boiss. 1. c.* 684.—Hispan.
duriuscula, Bab. in Ann. Nat Hist. Ser. II. Ui. (1848) 436 = pubescens.
ebractcata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 132.—Algeria,
elongau, *Hoffm. Deutschl. Fl.* i. 150.—Europ.
elongata, Koch, in Mert. *Sc* Koch, Roehl. Deutschl. Fl. ed. III. ii. 487 =maritima-
enophila, *Willk. in Bol. Soc. Broter.* ii. (1884) 145.—Lusitan.
expansa, Wallr. Beitr. L 197=pubescens.
b"™<nla.tlL,Willd.Enum.Hort.Berel.i.33i.—**Hispan.;** Sardin.
Rbrosa, *Pomel, Nouv. Mot. Fl. Atl.* **138.—Algeria,**
nlicauli,, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 527. t. 154.—**His**pan.
formosa, Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed. I. 848 = atatice Pseudo-aruieiia.
formosa, Heynh. Norn. ii. 45—mauntanica.
lruticosa, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1587.—Europ. austr.
gajitaua, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 676.—Hispan.; Marocco.
glauca, Wallr. Ann. 215 *• boetica.
glaucescens, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 79.—Hab.?
globosa, Link, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 684 = latifolia.
gracilis, Tenore, Syll. 158 = nebrodensis.
grandiflora, Hort. Schwetz. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 684-latifolia.
Gnssonei, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 687.—Sicil.
HaUeri, Wallr. Beitr. i. 194 = alpina.
"ftrrophylla, Wallr. 1. c. 188 = nebrodensis.
hirta, Porrr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 369 = pubigera.
hirta, Willd. Enum. Hort. Berol. 383-boetica.
humilis. Link, Handb. ii. 2«8-caespitosa.

ARJQJHIA:
intermedia, Link, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 681 = pnbescens.
juncea, *Girard, in Attn. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 324.—Gall, merid.
juncea, Wallr. Beitr. i. 212=allioides.
juniperifolia, Ebel. Armeriae Gen. Diss. (1840) 80 = filicaulis.
juniperifolia, J. Gay, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 684 = Duriaei.
juniperifolia, Koch, in Flora, vi. (1823) 711-leucocephala.
juniperifolia, Willd. ex Hoffmgg. *Sc* Link, Fl. Port. i. 442-caespitosa.
Kochii, Boiss. in DC. Prod. xii. 686 = leucocephala.
labradorica, *Wallr. Beitr.* i. 185.—Groenl.; Labrador,
lachnolepis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **134.**—Algeria.
Langei, *Boiss. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 59.—Hispan.
latifolia, Moris, Fl. Sard. Elench. fasc. iii. 10 = Morisii.
latifolia, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 334.—Lusitan.
leucantha, Salzm. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 625 = allioides.
leucocephala, *Koch, in Flora, vi.* (1823) 712.—Corsica.
littoralis, Boiss. in DC. Prod. xii. 67« = Welwitschii.
littoralis, *Hoffmgg. &• Link, Fl. Port.* t. i. 441.—Lusitan.
littoralis, Willd. Enum. Hort. Berol. 333 = boetica.
longearistata, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* **103.**—Hispan.
longearistata, Bonrg. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 643 = plantaginea.
longifolia, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 79, nomen.—Hab.?
lusitanica, Link, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 675—pioifolia.
macloviana, *Cham, in Linnaea,* vi. (1831) 567.—Ins. Falkland,
macrophylla, *Boiss. If Reut. Pugill. PI. Nov.* **100.**—Hispan.
macropoda, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 688.—Italia.
maculaia, Poepp. ex Boiss. 1. c. 882=- andina.
maderensis,£<>w, *in Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. 11833) 12.—Madera.
majellensis, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 685.—Italia.
maritima, Girard, ex Boiss. 1. c. 680 = ruscinonenf is.
maritima, *Willd. Enum. Hort. Berol.* **838.—Europ.**
mauritanica, *Wallr. Beitr.* i. 217.—Afr. bor.
meridionalis, Foepp. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 682 » chilensis.
montana, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 114 = maritima.
montana, Soleir. ex Wallr. Beitr. i. 196 = leucocephala.
montana, Wallr. 1. c. 210 = plantaginea.
Morisii, *Boiss. in DC. Prod.* xii. d87.—Sicil.
Muelleri, Huet, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xix. (1858) 255 = alpina.
multiceps, Wallr. Beitr. i. 196 = leucocephala.
nebrodensis, *Guss. Fl. Sic. Syn.* i. 366.—Italia,
neglecta. *Girard, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 324.—Lusitan.
Orphanidis, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 71—majellensis.
pinifolia, Boiss. ex Nym. Consp. 614 = macrophylla.
plnifolia, *Hoffmgg. b' Lint, Fl. Port. i.* 437.—Lusitan.
planifolia, Nym. Consp 616 n. 85=pubescens.
plantaginea, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 626 = boetica.
plantaginea, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 834.—Europ.
plantaginea, Webb, It. Hisp. 18 = latifolia.
praecox, Jord. in Bull. Soc. Daupb. fasc. iii. 79—plantaginea.
pseudoarmeria, BroL Fl. Lusit. i. 488 = plantaginea.
pseud-Armeria, Murr. Syst. Veg. ed. XIV. 300 = latifolia.
pubescens, Heyne, ex Steud. Nom. ed. II. i. 133 = maritima.
pubescens, £,•»*, • *in Repert. Nat. Cur. Berol.* i. 180.'—Europ.
pubigeru, Boiss. in DC. Prod. xii. 678 = maritima.
pubinervis, *Boiss. I. c.* 688.—Gallia.
pungens, *Hoffmgg.* b* *Link, Fl. Port.* i. **439.**—Lusitan.
purpurea, Koch, in Flora, vi. (1823) 710-elongata.
rhenana, Gremli, Exc. Fl. Schw. ed. IV. 350-maritima.
rigida, Wallr. Beitr. i. 199-plantaginea
rumelica, Boiss. in DC. Prod. xii. 677 =caricnsis.
ruscinonensis, *Girard, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 323.—Hispan.

AHM33BIA:
saiulosa, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 637 = plantaginea.
sangninolenta. *Wallr. Beitr.* i. 207.—Am. bor.
sardoa, *Spreng. Syst. Cur. Post.* 127.—Sardin.; Conic.
scabra, Kunze, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 683=andina.
scabra, *Pall, in Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* **vi.** 776.—As. bor.
scabriuscula, Kunze, ex Boiss. in DC. Prod. xii. 683-andina.
scortoneraefolia. Tenore, Syll. 160-macropoda.
scormoneraefolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 334-plantaginea.
scorBoneraefolia, Link, in Schrad. Journ. iii. (1800) 60 = latifolia.
scormonerifolia, Balb. *Sc* Nocca, Fl. Ticin. t. 6 = plantaginea.
scormonertfolia, Friv. ex Nym. Consp. 616 = rnmelica.
setacea, Delile, ex Nym. 1. c. 616—juncea.
seticeps, Reichb. Ic. Kl. Germ. v. 54 = plantaginea.
sibirica, *Tun*, ex Boiss. in DC. Prod.* **xii. 678.**—Sibiria.
sicula, Heldr. ex Boiss. 1. c 685—nebrodensis.
simplex, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **132.—Algeria,**
Soleirolii, Duby, Bot. *GM.* Suppl. 1032 = leucocephala.
spinulosa, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 675.—Barbaria.
splendens, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 749.—Hispan.
stenophylla, Girard, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. ii. (1844) 323 = plantaginea.
tenuis, Balb. ex Boiss. in DC. Prod. xii. 685 = sardoa.
tenuis, Wallr. Beitr. i. 184 - filicaulis.
thessala, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 70 = cariensis.
Thomasii, Nym. Consp. 615—leucocephala.
tingitana, Boiss. ft Reut. Pugill. PI. Nov. 102-gaditana.
trigonoides, Hort. Berol. ex Ebel, Armeriae Gen. Diss. (1840) 34-plantaginea.
undulata, Boiss. in DC. Prod. xii. 685 - argyrocephala.
velutina, *Welw. ex Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 100.—Lnsitan.
vestita, Willk. in Willk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 366 •= longearistata.
villosa, *Girard, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 328.—Hispan.
vulgaris, Moris, Elench. ex Nym. Consp. 616 «• sardoa.
vulgaris. Vis. Fl. Dalmat. ii. 6 = canescens.
vulgaris, Willd. Enum. Hort. Berol. 333 = elongata.
Welwitschii, *Boiss. in DC. Prod.* xii. 676.—Hispan.
Willkommii, *Henriques, in Bol. Soc. Broter.* **iii. (1384)** 199, 224—Hispan.

ARMERIASTRUM, Iindl. Veg. Kingd. 041 (1847)-**Acantholimon,** Boiss. (Flumbag).

ARMODORUM, Breda, Orch. Kuhl. *Sc* Hass. (1827)-Araohnanthe, Blume (Orchid.).
distichum, Breda, 1. c. [t. 6]-Arachnanthe Sulingi.

ARMOKACIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. **Wett** ii. 426 (1800); Bernh. Syst. Verz. Erf. '258' (1800)-Coehlearia, Linn. (Crucif.).
amphibia, Peterm. Fl. Lips. iExcurs. 477 = Nasturtium amphibium.
aquatica, Kostel. Allg. Med-Pharro. Fl. v. 1571=. Nasturtium amphibium.
austriaca, Wimm. Fl. Scales. (1841) 30 - Nasturtium austriacum.
lapathifolia, Gilib. Fl. Lituan. ii. 53 = C. Armoracia.
macrocarpa, Baumg. hinum. Stirp. Transsylv. ii. 240—C. macrocarpa.
rustica, Schur, in Verb.. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858)8 = seq.
rusticana, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 426 " C. Armoracia.
sativa, Bemh. Syst. Verz. Erf. 191 = C. Armoracia.
valdiviana, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 671.—Chili.

ABNBBIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 62 (177S).
BORAG1NEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 862.
DIOCLEA, Spreng. Syst. i. 502 (1826).
MENEGHINIA, Endl. Gen. 648 (188V).
STKNOSOLENIUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moac. (1840) **253.**

ABITBBIA:—
STROBILA, G. Don, Gen. Syst. iv. 827 (1887).
TOXOSTIGMA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 86. t. 77 (1851).
Bnngei, *Baits. Fl. Orient,* iv. 215.—Persia.
calycino, Stev. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1851) 698-cornnta.
Cephalotes, A. PC. in DC. Prod. x. 96-Macrotomia Cephalotes.
comnu, *Fisch. V Mey. Ind. Sent. Hort. Peirop.* i. (1885)22.—Oriens; Tnrkest
decumbens, *Coss.* CT *Kralik, in Bull. Soc. Bat. Fr.* iv. (1857) 398, 402.—Oriens.
densiflora, Ledeb. FL Ross. iii. 140-Macrotomia Cephalotes.
echioides, A. DC. in DC. Prod. z. 96=Macrotomin echioides.
endochroma, Aitch. in Journ. Linn. Soc, ZTiii. (1882) 81=- Macrotomia perennis.
fimbriata, *Maxim, in Bull. Aead. Pttersb.* xxvil. (1881) 507.—As. centr.
fimbriopetala, *Stocks, in Hook. Ken Journ.* iii. (1861) 180.—Persia; Beluchist.
JUnescens, Boiss. Diagn. Ser. I. zi. 117-linearifolia.
Griffithii, *Boiss. I. c.* Ser. II. iii. 185.—Ind. bor. occ; Affghan.
guttata, *Bunge, Ind. Sent. Hort. Dorpat.* (1840) 7.—Sibir.
hispidissima, *DC. Prod.* x. 94.—Afr. bop.; Arab.; Ind. bor. occ
linearifolia, *DC. I. c.* 95.—Aegypt.; Syria; Persia.
longiflora, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 640-Macrotomia echioides.
minima, *Wettstein, ex Staff, in Denksehr. Acad. Wien,* 1. (1885) 30.—Persia,
obovata, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 407 *(Lehm. Rel. Bat.* 281).—Tnrkest.; Ind. or.
Olgae, *R'g'l, PI- No*- Fedsch.* 68.—As. centr.
perennis, A. DC. in DC. Prod. z. 95=Macrotomia perennis.
Sewerzowi, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 58.—As. centr.
tetrasligma, *Forsk. Ft. Aegypt. Arab.* 02.—Arab.
Thomsoni, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 176.—Tibet, occ.
tibeuma, *Kurn, in Journ. At. Soc. Beng.* xliil. (1874) II. 189.—Tibet, occ.
tinctoria, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 68.—Aegypt.; Arab.
tingens, A. DC. in DC. Prod. x. 96- Macrotomia pereanis.
Vivianii, Coss. & Dnr. ez Cos*, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1864) 240=cornnta.

ARNEDINA. Reichb. Norn. 'n. 1984' (1841)- Arundlna, Blnme (Orchid.).

ARNICA, Rnpp. ez Linn. Syst. ed. I. (1735). *COMPOSITAE,* Benin. & Hook. f. ii. 440.
alpina, *Olin V Ladau, Diss.* 11.—Enrop. j Am. bor.
alpina, Salisb. Prod. 201=Doronicum scorpioides.
alpina, Willd. ez Steud. Nom. ed. I. 70=montana.
altaica, *Turn, in Bull. S c. Nat. Mosc.* xx. (1847) II. 12.—Mont. Altai,
amplezkanlit, *Nutt. in Trans. Ant. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 408.—Am. bor. occ.
amplexicaulis, Wall, ex DC. Prod. vi. 814-Senedo amplexicaulis.
angustifolia, A. Gray, in Am. Jonrn. Sc. Ser. II. xzxiii. (1862) 238~Panyi.
angustifolia, Tnrcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 622= montana.
angustifolia, Vahl, Fl. Dan. t. 1524 * alpina.
auriculata, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 632=Senecio caucasicus.
austriaca, Hoppe, ex Schnr, Enum. PI. Transs. 840 = Doronicnm austriacnm.
Bellidiastrum, All. Fl. Pedem. i. 206-Aster Bellidiflstrnm.
brevicanlis, *Kafin. Nem Fl. Am.* ii. 23.—Am. bor.
caflra. *Linn. Syst.* ed. X. 1219.—Afr. austr.
Chamissonis, *less, in Linnaea,* vi. (1831) 288.—Am. bor.; Unalaschk.
ciliata, Thnnb. Fl. Jap. 818 - Hypochoeris grandiflorus.
Claytoni, Pnrsh, Fl. Am. Sept. ii. 527-nudicaulis.
Clusii, All. Fl. Pedem. L 206. t 17. f. 1-Doronicom Clasii.

ARNICA:—
cordata, E. Mey. ez DC. Prod. vii. 16 = Gerbera tomentosa.
cordata, Thunb. Prod. PI. Cap. 154=Gerbera cordata.
cordata, Wulf. in Roem. Arch. iii. III. 408 = Doronicnm caucasicum.
cordifoiia, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 881.—Am. bor.
coronopifolia, Linn. Sp. PI. 885-Gerbera coronopifolia.
Corsica, Loisel. Fl. Gall. 676. t. 20 - Doronicnm comcuin.
crenata, Thnnb. Prod. PI. Cap. 154-Mairia crenata.
crocea, Linn. Sp. PI. 885 «-Gerbera Bnrmanni.
discoides. *Benth. PI. Hartw.* 319.—Calif.
Doronicum, Jacq. Fl. Anstr. i. 57= Senecio Doronicom.
Doronicum, Pnrsh, Fl. Am. Sept Ii. 628-Senecio Pseudo-arnica.
floccosa, Bert, ex DC. Prod. vi. 357-Senecio arachnoidens.
fotion, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N.S. vii. (1841) 407.—Am. bor.
fulgens, Pnrsh, FL Am. Sept. ii. 527 = alpina.
Gerbera, Bonn. f. Fl. Cap. Prod. 27-Gerbera ferruginea.
Gerbera, Linn. Sp. PI. 886=Gerbera asplenifolia.
glacialis, Wulf- in Jacq. Coll. i. 280; et Ic. Rar. iii. 16. t 686=Doronicum glaciale.
grandis, Thunb. Prod. PL Cap. 154=AIciope lanata.
helvetica, G. Don,ex Loud. Hort. Brit. 351-montana.
hirsuta, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 151-Gerbera hirsnta.
- *incana,* Pen. Syn. Ii. 452='Trichocline incana.
intermedia, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* zxiv. (1851) I. 208.—Sibir.
inuloides, Vahl, Symb. Bot. ii. 91 - Heterolepis dedpiens.
japonica, Thimb.Fl. Jap. 319 = Senecio japonicns.
lanata, Thnnb. Prod. PI. Cap. lCi - Alciope lanata.
lanceolata, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. N. S. vii. (1841) 407-Chamissonis.
lanigera, Tenore, Prod. FL Neap. (1811) 49-Senecio arachnoidens.
latjfolia, *Bongard, Vlg.Isl. Sitch.* 29.—Am. bor. occ
linifolia. Wall. Cat. n. 8285-Senecio linifolins.
longifolia, *Eaton, in Bot. King, Exped.* 186.—Am. bor. occ.
macrophylla, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 408-cordifoiia.
maritima, Linn. Sp. PL 884-Senecio Pseudo-arnica.
Mennèsii, Hook. FL Bor. Am. i. 831=latifolia.
mierophylla, Walp. Rep. ii. 652, err. *typ." macrophylla.*
Mollii, *Schrank, Prim. Fl. Salisb. $13.—Earop.*
mollis, Hook. Fl. Bor. Am. i. 831-Chamissonis.
montana, Hook. 1. c 380 (pro parte)=foliosa.
montana, *Linn. Sp. PI.* 884.—Europ.; As. bor.
nevadensis,i4. *Gray, in Proc.Am. Acad.* xiz. (1888)55.—Calif.
nivea, Wall. Cat n. 3143-Gerbera nivea.
nudicaulis. *Ell. Sketch,* ii. 383.—Am. bor.
obtusifolia. *Less, in Linnaea,* vi. (1881) 236.—Unalaschk.
obtusifolia, Wall, ez DC. Prod. vi. 314-Senedo anncoides.
operina, Rich. & Less. Fl. Nov. Zel. 231 =seq.
aporina, Forst. f. Prod. 56=Olearia operina.
palmate, Thnnb. Fl. Jap. 319=Senecio syneilesis.
Panyi. *A. Gray, in Am. Nat.* viiL (1874) 213.—Am. bor. occ
parviflora, *A. Gray, in Proc. Am. AcadMi.* (1868) 363.—Calif.
peruviana, Pen. Syn. ii. 462 — Wemeria rigida.
petiolata, *Schur, Enum. PI. Transs.* 342.—Europ.
Pilosella, Bum. ex DC. Prod. vii. 17 (=a» Arctotidea?—*Cf. DC. in loc.).*—Afr. austr.
piloselloides, Linn. PL Afr. Rar. 22. n. 78 (1760) = Gerbera piloselloides.
plantaginea, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 627.—Am. arct
plantaginisfolia, Gilib. Fl. Lituan. i. 210=montana.
pyrolaefolia. Pen. Syn. ii. 454—Gerbera Burmanni.
rotundifolia, Willd. Sp. PL iii. 2110-Bellium rotundifolium.
sachalinensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 55.—Ins. Sachal.
scorpioides, Adams, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 682 = Senecio caucasicus.

ABNICA:—
scorpioides, *Jacq. Austr.* iv. 26. t. 349.—Enrop.
scorpi rides, Linn. Sp. PL 884—Doronicum grandiflornm.
senecionaides, Fenzl, ez Boiss. FL Orient, iii. 396 = Senecio cilicius.
serrata, Thunb. Fl. Cap. ed. Schnlt. 669 = Gerbera ferruginea.
sinuata, Thunb. Prod. PI. Cap. 164 = Gerbera ferruginea.
spinulosa. Pen. Syn. ii. 452-Alciope tabularis.
styriaca, Vill.Prosp. 82-DoronicnmClusii.
tabularis, Thunb. Prod. PL Cap. 154 = Alciope tabularis.
tussilaginea, Bnrm. f. Fl. Ind. 182-Senecio Kaempferi.
nnalaschkensis, *Less, in Linnaea,* vi. (1881) 238.—Ins. Aleut.; Unalaschk.
viscosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xUi. (1878) 874.—Calif.
Wulfeniana, Pollini, in Giorn. Fis. Pav. ix. (1826) 185 = Doronicnm Columnae.

ABNOCBrNTUM, Endl. *Sc* Lehm. ex Lehm. PL Preiss. ii. 41 (1846). *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 796.
Drummondii, *Endl. ex Lehm. 1. c.*—Austral,
glabrum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 416.—Austral.
Preissii, *Lehm. PI. Preiss.* ii. 42.—Austral.

ARNOGLOSSUM, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 293 (1821)-PIantago, Tourn.
alpinum, S. F. Gray, 1. c 294 = P. alpina.
gramineum, S. F. Gray, I. c. 293-P. maritima.
incanum, S. F. Gray, 1. c. 292=P. media.
lanceolatum, & F. Gray, 1. c. 298 = P. lanceolata.
maritimum, S. F. Gray, 1. c.-P. maritima.
subulatum, S. F. Gray, 1. c. 294=P. Coronopns.

ARNOGLOSSUM, Rafin. Fl: Lndov. 64 (1817). *COMPOSITAE.*
plantagineum, Rafin. 1. c. 65 (quid?).—Am. bor.

ARNOLDIA, Blume, Bijdr. 868 (1826) = Weinmannia Linn. (Saxifr.).
fraximfolia, Blume, in Flora, xli. (1858) 254-VV. fraxinifolia, *Miq.*
heterophytta, Blume, Bijdr. 868 = W. Blumei, *A. Gray,*
pinnata, Blume, 1. c = W. Blumei, *Planch.*

ARNOLDIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxx. 330 (1824) = Dimorpbotheoa, Moench (Compos.).
aurea, Cass. 1. c. 331-D. chrysanthemifolia.
chrysanthemifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 256-D. chrysanthemifolia.
Tragus, Steud. Nom. ed. II. i. 25B = D. Tragus.
Ventenatiana, PresL Repert. 192, in nota=D. chrysanthemifolia.
viscosa, Steud. Nom. ed. II. i. 256 - D. cuneata.

ARNOPOGON, Willd. Sp. PL iii. 1496 (1808) =TJrobpermum, Scop. (Compos.).
asper, Willd. 1. c 1497-U. picroides.
capensis, Willd. 1. c. = U. picroides.
DaUchampii, Willd. 1. c. 1496=U. Dalechamitii.
picroides, Willd. L.c-U. picroides.

ABNOSEBI8, Gaertn. Fruct. ii. 355. t. 157 (1791). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. S07.
foetida, Dum. Fl. Belg. 63=Crepis foetida.
gradlis, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 301 = Apogon gracilis.
humilis, Sch. Bip. 1. c. —Apogon humilis.
minima, Dum. FL Belg. 63 = pusilla.
pnsilla, *Gaertn. Fruct.* ii. 855.1.167.—Europ.

AHNOTTIA, A. Rich, in Mém. Soc Hist. Nat. Par. iv. (1828) 29. *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. iii. 622.
inermis, *S. Moore, in Baker, Fl. Maurit.* 339.—Ins. Mascar.
mauritiana, *A. Rich, in Mim. Soc. Hist. Nat. Par.* iv. (1828) 30.—Ins. Mascar.

AROMADENDRON, Blume, Bijdr. 10 (1825)-Talauma, Juss. (MagnoL).
elegans, Blume, 1. c. 10 - T. elegans.
glaueum, Korth. ez Miq. Fl. Ind. Bat. i. 2. 16-T. glauca.

AROMADENDRON, Andr. ex Steud. Norn. ed. II. i. 184 (1840) et AROMADENDRUM, Andr. ex Steud. '. c. 599, in syn. (1840) =Buoalyptus, L'Hirit. (Myrtac).

AROMIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Sot Ser. It vii. (1841) 395=Amblyopappua, Hook. (Compos.).
*t*nuifolia,* Nutt 1. c. 896=Amblyop. pusUlus.

ARON, Adans. Fatn. ii. 470 (1763).
dracunculum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 119 _ Dracunculus vulgaris.
olocasium, St. Lag. L c-Colocasia antiqnomm.

ARONGANA, Choisy, In DC. Prod. i. 641 (1824)-Harang a, T ha (Hyperic).

ARONIA, Mitchell, in Act. Acad. Nat Cur. viii. (1748) 206, App.=Orontium, Linn. (Aroid.).

ARONIA, Medic PhiL Bot i. 140 (1789)=Oateomelas, Lindl. (Rosac).

ARONIA, Pets. Syn. ii. 39 (1807)-Amel«noJiier, Lindl. (Rosac.).
arbutifolia, Nenm. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) I. Beibl. i. 77=AmeI. canadensis.
ejnifolia, Nutt Gen. Am. L 306-Amd. alnifolla.
Amelanchier, Dum. Fl. Belg. 92 = Amel. vulgaris.
artmea, Barton, Comp. Fl. Phil. i. 228 = Amel. canadenris.
"•iutifolia, Medic. Phil. Bot i. 140-Pyrns arbnti-'olia.
oria-chamaemespilus, Reichb. Fl. Germ. Excurs.6S0= Pynu Chamaemespilas.
<uiatica, Sieb. & Zncc Fl. Jap. i. 87. t 42=Amel. canadensis.
Botryapium, Pen. Syn. ii. 39-AmeL canadensis.
Chamaemespilus, Pen. 1. c. - Pyrus Chamaemespilus.
cordata, Rafin. Med. Fl. ii. 196-Amel. canadensis.
cretica. Pen. 1. c 40 = Amel. vulgaris.
»«<>&>ra, Spach, Hist. Veg. Than. ii. 88=Pyrus • arbntifolia.
ffpressa, Spach, 1. c. 90-Pyrns arbutifolia.
floribunda, Spach, 1. c 89-Pyrus arbntifolia.
fioribunda. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 485=Pyrus spectabilis.
glaorescens, Spach, Hist Vie. Phan. ii. 89-Pyrus arbutifolia.
fandifolia, Sweet, Hort Brit ed. II. 177-Pyrus •-arbutifolia.
"«««», Carr. in RCT. Hortic (1878) 470-Pyrns intermedia.
j'ponica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 179-Pyrus , japonica.
btifolia, Riddell, Suppl. Cat PI. Ohio, 24=AmeL canadensis ?
"Ulanocarpa, Natt ex EU. Sketch, i. 656-Pyrus arbutifolia.
««wo, Neum. ex Tansch, in Flora, xxL (1838) 714= Amel. canadensis.
«"»«, Pers. Syn. ii. 39=Amel. canadensis.
*t*nea,* Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 206.—Europ.
praaox, Neum. ex Tausch, in Flora, xxi. (1888) 715 = Amel. canadensis.
putens, Spach, Hist *Vie.* Phan. ii 90=Pyrns arbutifolia.
*»*Ua,* M. Roem. Syn. ilL Rosin. 161=Pyrus arbutifolia.
tyrifolia, Lam. Encyc. i. 8S=Pyn» arbutifolia.
ncnuaa, Schur, Enum. PI. Transs. 207-Amel. aetica.
"Hundifolia, Pen. Syn. ii. 39-Amel. vulgaris.
""guinea, Nutt Gen. Am. i. 306=Amel. canadensis.
"rfyvlia, Spach, HUt Veg. Pban. ii. 87-Pyrus spuria.
**P*ria,* M. Roem. Syn. iii. Rosin. 168-Pyrus spuria.
—teorddta, Rafin. ex DC. Prod. ii. 682-AmeL eanadensis.
tomentosa, Wallr. Beitr. FL Hercyn. 206-Amel. »«lgarisl
Watsoniana, M. Roem. Syn. iii. Rosin. 159=Pyres Pinnatifida.

ARONICUM, Neck. Elem. i. 27 (1790)=DoponIouni,)f>». (Compos.).
aureum, DC. Prod. vi. 320=D. altaicum.

ARONICUM:—
Bauhini, Reichb. f. Ic. FL Germ. xvi. 82-D. hizsutum.
carpathicum, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 187=D. grandiflomm.
Clusii; Koch, Syn. ed. I. 382=D. hirsutum.
cordatum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ir. (1858) 41-D. cordatum.
eorsicum, DC. Prod. vi. 319-D. corsicum.
Dormicum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 233=D. Clusii.
glaciate, Reichb. 1. c. 234-D. glaciate.
lati/olium, Reichb. 1. c.=D. grandiflorum.
scorpioides, DC. Prod. vL 819; Koch, Syn. ed. I. 882-D. graadidorum.
scorpioideum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 119 = D. grandiflorum.
viscosum, Freyn & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxviii. (1881) 60.—Europ.

AROSMA, Rafin. Fl. Tellur. Ui. 66(1836)=Caladlum, Vent. (Aroid.).
acutifolia, Rafin. 1. c.-C. bicolorf
obtuafolia, Rafin. 1. c.-C. tricolor!

AROTON, Neck. Elem. iL 336 (1790) - Croton, Linn. (Euphorb.).

AROUNA, Aubl. PI. Gai. i. 16. t 5 (1775)=Dialium, Linn. (Legumin.).
divaricatum, Willd. Sp. PI. L 166=D. divaricatum.
guianensis, Aubl. PL Gui. i. 16—D. divaricatum.

ARPITIUM, Neck. Elem. i. 168 (1790)-Idgustiouin, Linn. (Umbell.).
simplex, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 691 - L. simplex.

ABPOPHTLLUBC, Have & Lex. Nov. Veg. Descr. fasc. ii. (Orch. Opusc.) 19 (1825). *ORCH1DEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 492.
alpinum, *Lindl. in Benth. PI. Hart*.* 93 (1842).—Mexic.
cardinale, *Linden* b* *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 282.—Mexic.
giganteum, *Hartv. ex Lindl. in Ann. If at. Hist.* iv. (1840) 884.—Mexico,
medium, *Reieht. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 89.—Guatemala,
spicatum, *Llave V Lex. Nov. Veg. Descr.* fasc ii. *(Orch. Opusc).* 20.—Mexico.
squarrasum, Hort. Donat. ex Lubbers, Cat. *PI.* Rar. San Donato (1880) 16=spicatum.

ABBABIDAEA, DC. in Bibl Univ. Genev. xvii. U838) 126 (Rev. Bign. 10). *B1GNONIACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 1032.
CHASMIA, Schott, in Spreng. Syst Cur. Post 409 (1827).
VASCONCELLIA, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 12 (Herb. Fl. Bras. 252).
aculifolia, *DC. Prod.* ix. 186.—Bras.
Agnus-castus, *DC. I. c.* 183.—Bras,
argentea, *Wamra, in Oestr. Bot. Zeitsekr.* (1879) 216.—Bras.
Blanchetii, DC. Prod. ix. 186-Bignonia BlanchetiL
candicans, *DC. 1. c.* 185.—Guiana.
Ckica, Verl. in Rev. Hortic (186<l) 154 = Bignonia Chica.
Clausseni, *DC. I. c.* 186.—Bras,
conjugate, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) u. *Beibl. in.*—Bras.
corchoroides, *DC. Prod.* ix. 183.—Bras,
cordifolia, *Klotisch, in Schomt. Fauna V Fl. Guy.* 1168,-Guiana.
desertornm, *DC. Prod.* ix. 185.—Bras,
fasciculate, *DC. I.* c—Bias,
florida, *DC. 1. c.* 184.—Bras,
obovata, *DC. 1. c.* 185.—Bras.
Orbignyana, *DC. I. c.* 184.—Bolivia,
paniculate, *Seem, in Trans. Linn. Soc.* xxiiL (1862) 14.—Ins. Martinic.
platyphyllIa,£C. *Prod. ix.* 186.—Bras.
Pleei, *DC. I. c.* 184.—Venezuela,
pruincsa, *KlotMsch, in Schomb. Fauna V Ft. Guy.* 1158.—Guiana.
rosea, *DC. Prod.* ix. 185.—Bras.
rubrinervis, *Miers, in Pnc. Roy. Hort. Soc. vi.* (1863) 192.—Bras.
Salimanni, *DC. Rev. Bign.* 10. (1838).—Bias.

ARRABIDABA :—
Sego, DC. in Bibl. Univ. Genev. xvii. (1838) 126 ; et Prod. ix. 188=A. Agnus-castus.
Sieberi, *DC. I. c.* 186.—Bras.
suKncana, DC. 1. c. 184 = Bignonia subincana.
tuberculata, *DC. 1. c.*—Bras,
virescens, *DC. 1. c.*—Bras.

ARRABIDAEA. Steud. Kom. ed. II. i. 185 (1840) = Cormonema, Reissek (Rhamn.).
spinosa, Steud. 1. c.=C. spinosum.

ARRACACHA, DC. in Bibl. Univ. Genev. xl. (1829) 74; et Prod. iv. 243 (1830) -seq.

AHKACACIA, Bancr. in Jamaic Journ. iv. (1826) 18. *UMBELLIFERAE,* Benth. ft Hook. f. i. 884.
ARRACACHA, DC. in Bibl. Univ. Genev. xl. (1829) 74; et Prod. iv. 243 (1880).
BANCROFTIA, Billb. in Linneska Samfund. Handl. i. 1832 (1833) 39.
DEWEYA, Torr. ft Gray, Fl. N. Am. i. 641 (1840).
PENTACRYPTA, Lehm. in Llnnaea, v. (1830) 380. t. 5.
VELAEA, DC. Prod. iv. 230 (1830).
acuminate, *Benth. PI. Hartv.* 187.—Mexico,
atropurpurea, *Benth. V Hoot. f. ex Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot. i.* 564.—Mexico,
decumbens, *Benth. If Nook./. 1. c.*—Mexico.
esculenta, DC. Prod. iv. 244=xanthorrhiza.
glaucescens, *Benth. PI. Hartw.* 187.—Mexico,
moschata, *DC. Prod.* iv. 244.—Am. merid,
tolucensis, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* i. 564.—Mexico,
xanthorrhiza, *Bancr. in Jamaic. Journ.* iv. (1826) 18.—Jamaica.

ARRHENACHNE, Cass. in Diet. Sc. Nat Iii. 253 (1828)=Baooharis, Linn. (Compos.).
juncea, Cass. 1. c=B. juncea.

ARRHENATHERtrM, Beauv. Agrost 65.1.11. f. 6 (1812). *GRAM1NEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 1161.
americanum, Beauv. 1. c 56 = A vena pensylvanica.
asperum, Opiz, in Lotos, iii. (1853) 65=avenaceum.
avenaceum, *Beauv. Agrost.* 56.111. f. 5.—Europ.
avenaceum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 667-erianthum.
hiaristatum, Peterm. Fl. Lips. Excurs. 106 = avenaceum.
bulbosum, Kunze, ex Anderss. in Walp. Ann. vi. 1003 " erianthum.
bulbosum, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 29 = avenaceum.
cechicum, Opiz, in Lotos, iii. (1853) 66-avenaceum.
elatius, Beauv. Agrost. 56=avenaceum.
erianthum, *Boiss. V Reut. Diag. PI. Hispan.* 121.—Lusit; Alg.
exserens, Opiz, in Lotos, iii. (1858) 65-avenacenm.
kentuckense, *Torr. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 136.—Am. bor.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 122.—Oriens.
longifolium, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 78=pallens.
palaestinum,Boist.TAiga. Ser. I. xiii. 51=avenaceum.
pallens. *Lint, Hort. Berol.* i. 124.—Lusit; Hisp.
pennsylvanicum, Torr. Fl. N. Am. i. 130-Avena pensylvanica.
precatorium, Beauv. Agrost. 56=avenaceum.
rivulare, *Opi», in Lotos,* iii. (1853) 65.—Europ.
rupestre, *Dum. Obs. Gram. Belg.* 146.—Europ.
Thorei, Desm. Cat. Don). (1840) = pallens.
Mavadilianum, Opiz, in Lotos, iii. (1863) 66-avenaceum.

ARRHOSTOXYLON, Mart, ex Nees, in Mart FL Bras. ix. 67. t 6 et 209 (1847)=seq.

ARRHOSTOXYLUM, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 209 (1847)=Ruellia, Unn. (Acanth.).
achimenifiorum, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 181 -R. achimeniflorum.
acutangulum, Mart, ex Nees, in Mart Fl. Bras, ix. 58 -R. acutangnla.
affine, Nees, in Mart FL Bras. ix. 69.—Bras.
album, Nees, I. c. 60-Ruellia alba.
amplexicaule, Nees, 1. c. 59.—Bras.
ciliatiflorum, Nees, in DC. Prod. xi. 216-R. dllaUflora.

ARRHOSTOX YLUM :—
coccineum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 63 = R. coccinea.
costatum, Nees, 1. c. 61-R. costata.
cuTviflorum, Nees, 1. c. 62 = K. cuiviflora.
formosum, Nees, in DC. Prod. xi. 215 = R. formosa.
fulgidum, Nees, in Mart. El. Bras. ix. 69 =R. fulgida.
glabrum, Nees, 1. c. 58.—Bras.
Haenteanum, Nees, in DC. Prod. xi. 211.—Peruv.
Hartwegianum, Nees, 1. c. 209. - N. Granat.
in flat urn, Nees, I. c. '215-K. iuflata.
jussieuoides, Nees, 1. c. 212 -R. jussieuoides.
laxum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 57.—Bras.
longiflorum. Noes, 1. c. 6'2=scq.
longifolium, Nees, in DC. Prod. xi. 214 = R. longifolia.
microphyllum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 61 = Calophanes microphylla ?
nitidum, Nees, 1. c. 5:).—Bras.
pedunculosum, Nees, in DC. Prod. xi. 211 = R. pedunculosa.
repens, Mart. Fl. Bras. ix. 60.—Bras.
roseum, Nees, 1. c. 61.—Bras.
rubrum, Nees, in DC. Prod. xi. 209 =R. rubra.
silvaccola, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 60-R. formosa.
splendidulum, Nees, 1. c.—Bras.
stemonacanthoides, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 130 = K. stemonacanthoides.
subsessile, Nees, in Mart. fl. Bras. ix. 58.—Bras.
terminate, Nees, in DC. Prod. xi. 214.—Peruv.
violaceum, Nees, 1. c. 216 = R. violacea.
Willdetumianum, Nees, 1. c. 20a.—Ind. occ.

ARRHYNCHIUM. Lindl. in Paxt. Flow. Gard. i. 142 (1850· 51)=Arachnanthe, Blume (Orchid.\
labrosum, Lindl. & Paxt. 1. c. = Arachn. bilinguis.

ARROSTIA, Rafin. Caratteri, 75 (1810) = Gypsophila, Linn. (Caryophyll.).
altissima, Rafin. Fl. Tcllur. ii. 54 = G. allissima.
dichotoma, Rafin. Caratteri, 75 = G. Arrostii.
paniculata, Ratin. Fl. Tellnr. ii. 53 = G. paniculata.

ARROWSMITHIA, DC. Prod. vii. 254 ;1838;. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 329.
styphelioides, *DC. I. C.—MT.* austr.

ARROZIA, Schrad. ex Kunth, Enum, PI. i. 11 (1833) = Iiuziola, Juss. (Gramin.).
micrantha,* Schrad. 1. c. *(= Caryochloa brasilieniis). ,—Bras.

ARRUDEA, A. St. Hil. & Camb. Fl. Bras. Mer. i. 318. t. 66 (1827) = ClUsift, Linn. (Guttif.).
tricolor, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 166-C. bicolor.
elusioides, A. St. Hil. et Camb. Fl. Bras. Mer. i. 319.—Bras.
purpurea, Split;;, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 103.—Guiana.

ARSACE, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 113=Erica, Linn.
arborea, Foarr. 1. c. = E. arborea.

ARSIS, Lour. Fl. Cochinch. 335 (1790) = **Grewia,** Linn. (Tiliac).
rugosa, Lour. 1. c = G. Microcos.

ABTAB0TRY8, R. Br. in Bot. Reg. t. 423 (1820). *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 21.
ROPALOPETALUM, Griff. Natal, iv. 16 (1845).
Blumei, Benth. Fl. Hongk. 10=houkongcnsis.
Blumei, ***Hook.f. V Thorns. Fl. Ind.*** **i. Ii8.—Java,**
brachypetalus, ***Benth. in Trans. Linn. Soc.*** **xxiii.** (1862) 467.—Afr.
burmanicus, ***DC. in Mém. Soc. Phys. Geniv.*** **v. (1832)** 212.—Burma.
caudatus, *Wall. Cat.* n. 6417.—Reg. Himal.
crassifolius, ***Hook. f. b[1] Thorns, in Hoot. f. Ft. Brit. Ind.*** i. 54.—Burma; Malaya.
Cumingir.nus, ***Vidal, Phan. Cuming. Philipp.*** **169.—** Ins. Philipp.
densiflorus, ***Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.*** **16,** nomen.—Ind. or.
hamatus. Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 257—honkongensis.

ARTABOTRYS:—
hamatus, Blume, Fl. Jav. Anon. 60. t 29 = odoratissimus.
Hildebrandtii, ***O. Hoffm. Serf. PI. Madag.*** **3.—** Madag.
honkongensis, *Nance, in Journ. Bot.* viii. (1870) 71.—Hongkong,
inodorus, ***Zipp. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **ii. 41.**—N. Guinea.
intennedius, ***Hassk. Cat. PI. Hort. Bogor.*** **176.—Java.**
Kurzii, ***Hook.f. V Thorns, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.*** **i.** 54.—Burma,
macrophyllus. *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 207.—Afr. trop.
madagascariensis, ***Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **ii.** 42.—Madag.
Maingayi, ***Hook. f.*** **to" *Thorns, in Hook. f. Fl. Brit.*** *Ind.* i. 55.—Malacca.
malayanus, Griff. Notul. iv. 713=Xylopia ferruginea.
odoratissimus, Blume, Fl. Jar. Anon. 59=honkongensis.
odoratissimus, *R. Br. in Bot. Reg.* t. **423.—**Ind. or.; Malaya,
parviflorus, ***Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **ii. 41.—** Sumatr.
pleurocarpus, ***Maing. ex Hook.f.*** **&" *Thorns, in Hook.*** *f. Ft. Brit. Ind.* i. 54.—Malacca,
polygynus, ***Miq. Ann. A/us. Bot. Lugd. Bat.*** **ii. 41.—** Borneo.
siamensis, *Miq. I. c.* 42.—Siam.
speciosus, ***Kure, ex Hook.f.*** **b* *Thorns, in Hook.f. Fl.*** *Brit. Ind.* i. 55.—Ins. Andam.
suaveolcns, *Blume, Ft. Jan. Anon.* 62.—Ind. or.; Malaya,
sumatranus, ***Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.*** **i. 375.—** Sumatr.
Thumsoni, *Oliver, Ft. Trop. Afr.* i. 29.—Afr. trop.
urfguieulatus, *Wall. Cat.* n. 6415 F.—Ind. or.
uncatus, Baill. Hist. PI. i. 232 = odoratissimus.
zeylanicus, ***Hook. f.*** **b* *Thorns. Fl. Ind.*** **i. 128.—** Ind. or.

ARTANUMA, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 234 (1829). *SCROPHVLARINEAE,* Benlh. & Hook. f. ii. 953.
ACHIMKNES, Vahl, Symb. Bot. ii. 71 (1791).
DICEROS, Pers. Syn. ii. 164 (1807).
angustifolium, *Benth. Scroph. Ind.* 39.—Singapore,
fimhriatum, ***D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard.*** **Ser.** II. t. 234.—Austral,
sesamoides, *Benth. Scroph. Ind.* 39.—Ind. or.

ARTANTHE, Miq. Comm. Phyt. 40. t. 7, 8 (1840) = Fiper, Linn.
tbtitilifolia, Miq. Syst. Pip. 385 = P. abutilifolium.
abtitiloides, Miq. 1. c. 884 = P. abutiloides.
acutifolia, Miq. 1. c. 428=P. acutifolium.
adenandra, Miq. 1. c 515=P. adenandrum.
adenophora, Miq. I. c. 514 = P. adenophorum.
adenophylla, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 170=P. colubrinum.
aduncа, Miq. Comm. Phyt. 49. t. 4=P. adnncum.
aequalis, Miq. Syst. Pip. 511 = P. aequale.
aegttirophylla, Mi'|. 1. c. 391 = P. cardiophyllum.
affinis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 228=P. affine.
alaris, Miq. Syst. Pip. 406 = P. alare.
albida, Miq. 1. c. 415 = P. albidum.
alnoides, Miq. 1. c. 462 = P. alnoides.
alpma, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 451-P. alpinum.
alveolata, Miq. Syst. Pip. 406=P. alveolatum.
amatonica, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 146 = P. amazonicum.
ampla, Miq. Syst. Pip. 501 = P. Rohrii.
amplectens, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 154 = P. amplectens.
andicola, Miq. Syst. Pip. 415=P. andicolum.
angusta, Miq. 1. c. 398 = P. angustum.
angustifolia, Miq. 1. c. 528 =P. consanguineum.
anonaefolia, Miq. 1. c. 504 = P. anonaefolium.
apiculata, Klotzsch, in Hook. Joum. Bot. iv. (1842) 321 - P. anonaefolium.
appendiculata, Benth. PI. Hartw. 254=P. appendiculatum.
arcuata, Miq. Syst. Pip. 533=P. Opizianum.
areolata, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 454 = P. areolatum.
aspera, Miq. 1. c. 456=P. hirsutum.

ARTANTHE:—
asperifolia, Miq. Syst. Pip. 441 = Piper hirsutum.
asperiuscula, Miq. 1. c. 464 = P. hirsutum.
auriculata, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 167 = P. auriculalum.
aurita, Miq. Syst. Pip. 400=P. auritum.
avellana, Miq. 1. c. 478 = P. avellanum.
baccans, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 166 = P. baccans.
bahiensis, Fresl, Epim. Bot. 227 = P. bahiense.
barbata, Miq. Sy»t. Pip. 414= P. barbatum.
Barclayana, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 460=P. hirsutum.
Bartlingiana, Miq. Syst. Pip. 510=P. Bartlingiannm.
Beecheyana, Miq. 1. c. 403 = P. ellipticum.
begoniaefolia, Miq. 1. c. = P. begoniaefolium.
Benthamiana, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 447 = P. Benthamianum.
berbicensis, Miq. Syst. Pip. 500=P. Hostmannianum.
Blanchetii, Miq. 1. c. 473 - P. Blanchetii.
Botrytis, Miq. 1, c. 588 = P. Botrylis.
brachypoda, Benth. Bot. Voy. Sulph. 167. t. 64 = P. brachypodon.
brachystachya, Miq. ex C. DC. in DC. Prod. **xvi.** I. 296 = P. brachystachyum.
brasiliensis, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 140.—Brat.
Bredemeyeri, Miq. Syst. Pip. 429 = P. Bredemeyeri.
brevispicata, Miq. 1. c. 608-= P. brevispicatum.
Brongniartii, Miq. 1. c. 486=P. Brongniartii.
Brunoniana, Miq. 1. c. 509= P. lanceolatum.
caladiifolia, Miq. 1. c 387 = P. caladiifolium.
caldasiana, Miq. in Verb. Kon. Akad. Wetensch. 11. v. (1871) 237 i et in Arch. Néerl. vi. (.1871) 175.—Bras.
calocoma, Miq. in Seem. Bot. Voy. Herald, 199=P. calocoma.
Cambessedei, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 161 = P. Cambessedesii.
caracasana, Miq. Syst. Pip. 898 = P. caracasanum.
cardiophylla, Presl, Epim. Bot. 225 = P. cardiophyllum.
caripensis, Miq. Syst. Pip. 522=P. caripense.
casapiensis, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot iv. (1815) 468 = P. casapiense.
cassinoides, Miq. Syst. Pip. 490 = P. cassinoides.
catalpaefolia, Miq. in Versl. en Medel. Kon. Nederl. Inst. • 1842' (1843) 197=P. marginatum.
caudata, Miq. 1. c 196 = P. marginatum.
cearensis, Miq. Syst. Pip. 466=P. angustifolium.
celtidifolia, Miq. 1. c 452 = P. celtidifolium.
cernua, Presl, Epim. Bot. 225 = P. cernuum.
Chamissonis, Miq. Syst. Pip. 457 = P. Chamissonis.
chavicoides, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 135=P. chavicoides.
chelseana, Miq. Syst. Pip. 533 = P. tomentosum.
chimonanthifolia, Miq. 1. c. 466=P. cbimonanthifolium.
Churumayu, Miq. 1. c 481=P. Churumayu.
cinnamomifolia, Miq. 1. c. 419.—Peruv
Clausseniana, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 153= P. Claussenianum.
coccoloboides, Miq. Syst. Pip. 397=P. coccoloboides.
colubrina, Miq. I. c. 512 = P. colubrinum.
concinna, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 151=P. concinnum.
consanguinea, Miq. Syst. Pip. 528 = P. consanguineum.
controversa, Miq. 1. c. 448 = P. hispidum.
cornifolia, Miq. 1. c. 479=P. comifolium.
coruscans, Miq.]. c. 411 = P. coruscans.
corylifolia, Klotzsch, in Hook. Journ. Bot. iv. (1842[V], 821 = P. dilatalum.
corylifolia, Miq. Syst. Pip. 474=P. dilatatum.
crassispicata, Miq. 1. c. 521 = P. crassispicatum.
crocata, Miq. 1. c. 429 = P. crocatum.
cumanensis, Miq. 1. c. 484 = P. cumanense.
curvata, Miq. 1. c. 522 = P. curvatum.
cuspidata, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845; 468 = 1'. pseudo-peruvianum.
dasyoura, Miq. 1. c. 452 = P. dasyourum.
dasypoda, Miq. 1. c. 458 = P. dasypodum.
decipiens, Miq. Syst. Pip. 462 = P. decipiens.
decurrens, Miq. 1. c. 402 = P. tuberculatum.
decurrens, Koum. in Illustr. Hortic. xxiii. (1876) t. 239 = P. decurrens.
demerarana, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot iv. (1»45) 464 = P. demeraranum. -
denudans,Miq. in Linnaea,xx. (1847) 172 = P.denadam.
dimidiata, Presl, Epim. Bot. 225=P. dimidiatum.
diospyrifolia, Miq. Syst. Pip. 477=P. diospyrifolinm.
divergens, Presl, lipiin. Bot. 228 = P. divergent.
dubia, Miq. SysL Pip. 535 = P. chilense.

ARTANTHE:—
Durvilleana, Miq. Syst. Pip. 507= P. anonaefolium.
elongata, Miq. 1. c. 484 = P. angnstifolium.
tnckeoides, Miq. 1. c. 412=P. crassinervium.
Endlicheriana, Miq. in Hook. Lond. Jouin. Bot. iv. (1845) 447 = P. fonnosum.
eriopoda, Miq. 1. c. 459=P. eriopodon.
mcalyptifolia, Miq. Syst Pip. 505 = P. eucalyptifolium.
'xcavata, Miq. 1. c. 584-= P. excavalnm.
eximia, Miq. 1. c. 898 = P. obliquum.
exserens, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 148 = P. crassinervium.
flagellaris, Miq. Syst. Pip. 898 = P. nobile.
fiexicaulis, Miq. 1. c. 538=P. tiexicaule.
flexuosa, Miq. 1. c. 464 = P. flexuosum.
formosa, Miq. 1. c. 386=P. formosum.
fidiginea, Miq. 1. c. 465 = P. fuliginenm.
fuscescens, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 144=P. estrellense.
Gabrieliana, Miq. Syst. Pip. 476 = P. Gabrielanum.
Galeottii, Miq. 1. c. 451 = P. aduncum.
Gaudichaudiana, Miq. 1. c. 469 = P. Gaudichaudianum.
grniculata, Griseb. Cat. PI. Cub. 65=P. rigidum.
geniculata, Miq. in Versl. en Medel. Kon. Nederl. lust. '1842' (1848) 194-P. geniculatum.
glabella, Miq. Syst. Pip. 518 = P. glabellum.
glahrata, Miq. 1. c. 481 = P. cumanense.
glabrescens, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot iv. (1846)481 = P. glabrescens.
gracilis, Miq. Syst. Pip. 448 = P. gracile.
grandifolia, Miq.). c. 408 = P. grandifolium.
granulosa, Miq. 1. c. 435 = P. angustifolium.
guianensis, Klotzsch, in Hook. Ji n. Bot. iv. (1842) 822 = P. guianense.
Ouilleminiana, Miq. Syst Pip. 409=P. crassinervium.
Haenkeana, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 145 = P. Paulianum.
kalesiaefolia, Miq. Syst. Pip. 419 = P. halesiaefoliom.
Hartvegiana, Benth. PL Hartw. 254-P. Hartwegianum.
keterophylla, Miq. Syst. Pip. 502=P. heteropbyUum.
k'xagyna, Miq. 1.c 412 = P. Betle.
Hilariana, Miq. 1. c. 421=P. Hilariannm.
• *hirsuta,* Miq. 1. c. 446 = P. hirsutum.
>tirtula, Presl, Epim. Bot. 226 = P. hirtulum.
Mspida, Miq. Comm. Phyt. 60. t. viii. £ A-P. asperifolia.
Hookeriana, Miq. in Hook. Lond. Jonm. Bot. iv. (1845) 446 = P. Houkerianuui.
Hostmanniana, Miq. 1. c. 465 = P. Hostmannianum.
tymenophylla, Miq. Syst. Pip. 582=P. Kegelii.
imperialis, Miq. in Seem. BoL Voy. Herald, 198. t. 88=P. imperiale.
msignis, Miq. Syst. Pip. 894=P. insigne.
Jaequemontiana, Miq. 1. c. 463 = P. citrifolium.
jalapensis, Miq. 1. c. 444=P. jalapense.
jamaicensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 170=P. genicnlatora.
japwensis, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 168-P. japurense.
javitensis, Miq. Syst. Pip. 401=P. javiterise.
Jussiaeana, Miq. 1. c. 420 = P. Jussiaeannm.
Karwinskiana, Miq. 1. e. 476 = P. Karwinskiannm.
Kegeliana, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 77 - P. Kegclianum.
Kunthiana, Miq. Syst. Pip. 458=P. hirsutum.
laeunosa, Miq. 1, c. 427 = P. lacunosum.
lanceaefolia, Miq. 1. c. 433 = P. lanceaefolium.
lanceata, Miq. 1. c. 526 = P. lancifolinm.
tapathifolium, Miq. 1. c. 401 = P. lapathifolinm.
laurifolia, Miq. 1. c. 52U = P. laurifolium.
L-ehmanniana, Miq. in Hook. Loud. Joum. Bot. iv. (1845) 466 = P. salicariaefolium.
'entaginoides, Miq. Syst. Pip. 520 = P. rivinoides.
Lrprieurii, Miq. 1. c. 525.—Uuiana.
leptura, Miq. 1. c. 523=P. lepturum.
Lessertiana, Miq. 1. c. 405 = P. lapathifolium.
kucophylla, Miq. 1. c. 460 = P. vevbascifolium.
Ŷfotsiyana, Miq. 1. c. 417 = P. LhoUkyanum.
Lmdeniana, Miq. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. iv. (1845)453= P. Artanthe.
'tneata, Miq. Syst. Pip. 459=P. lineatnm.
hnguifolia, Miq. 1. c. 533 = P. linguaefolium.
iMcaeana, Miq. 1. c. 523 = P. Lucaeanum.
Luschnathiana, Miq. 1. c. 494 = P. geniculatum.

ARTANTHE:—
macrophylla, Griseb. FI. Brit. W. Ind. 171 = P. geniculatum.
macrophylla, Miq. Syst. Pip. 428=P. macrophyllum.
macrorhyncha, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 173 = P. macrorhynchon.
macrostaehya, Presl, Epim. Bot. 227 = P. macrostachyum.
magnified, Linden, ex Fourn. in Illustr. Hortic. xxiii. (1876) t. 239 = P. deenrrens.
magnifica, Miq. Syst. Pip. 391=P. obliquum.
tnalacophylla, Presl, Epim. Bot. 227"P. malacophyllum.
marginata, Miq. Syst. Pip. 381 = P. marginatum.
Mariiana, Miq. 1. c. 422 = P. Martianum.
Martinicae, Miq. 1. c. 418.—Ins. Martinica.
Maximiliona, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 169 = P. juliflorum.
melanosHcta, Miq. Syst. Pip. 404=P. melanostictnm.
mexicana, Miq. 1. c. 458 = P. mexicannm.
Meyeniana, Klotzsch, ex Miq. 1. c. 624=P. lepturum.
Meyeri, Miq. 1. c. 454 = P. divaricatum.
mierostachya, Miq. 1. c. 527 = P. microstachyon.
Miersiana, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 449 = P. Miersinum.
Mikaniana, Miq. Syst. Pip. 388-P. Parthenium.
mitis, Miq. 1. c. 407 = P. mite.
modesta, Miq. 1. c. 517 = P. modestum.
mollicoma, Miq. 1. c. 438 = P. mollicomum.
molds, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 165=P. mollipilosum.
Moritntna, Miq. 1. c. xviii. (1844) 714=P. Moritziaoum.
nitida, Miq. Comm. Phyt. 47. t. vii=P. nitidum.
nitidula, Miq. Syst. Pip. 534 = P. nitidurăm.
nubigetia, Miq. 1. c. 432 = P. crocatum.
tbesa, Miq. 1. c. 470=P. scabrum.
oblonga, Miq. 1. c. 480=P. oblongum.
oblongata, Miq. 1. c. 535 = P. oblongatum.
oblongifolia, Klotzsch, in Hook. Joum. Bot. iv. (1842) 322 = P. oblongifolium.
obovata, Miq. Syst. Pip. 508 = P. colubrinum.
obtusa, Miq. 1. c. 416 = P. fluminense.
obumbrata, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 142=P. obumbratum.
Olfersiana, Klotzsch, in Hook. Joum. Bot. iv. (1842) 321 = P. hirsutum.
Opirii, Miq. Syst. Pip. 440=P. asperifolium.
opulifolia, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 160 = P. Cambessedesii.
paraënsis, Miq. 1. c. 156=P. paraënse.
Parkeriana, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 46=P. Parkerianum.
patens, Miq. Syst. Pip. 534 = P. nervpsum.
patula, Miq. 1. c. 554 = P. patens.
Patoni, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 450 = P.Pavoni.
pedunculatis, Miq. Syst. Pip. 531=P. pednnculare.
persicariaefolia, Miq. 1. c. 499=P. persicariaefolium.
peruviana, Miq. 1. c. 482 = P. pscudo-peruviannm.
phthinotricha, Miq. 1. c. 527=P. phthinotrichon.
phytolaccaefolia, Miq. 1. c. 584=P. phytolaccaefolium.
pilosiuscula, Miq. 1. c. 476 = P. pilosiusculum.
plantaginea, Miq. 1. c 389= P. plantagineum.
Poeppigii, Miq. 1. c. 437 = P. pscudomollicomura.
polyneura, Miq. 1. c 604= P. indecorum.
populifolia, Miq. 1. c. 418 = P. populifolium.
pothifolia, Miq. 1. c. 399 = P. pothifoliutn.
pothomorpha, Miq. 1. c. 408 = P. Pothomorphe.
prunifolia, Miq. 1. c 428=P. prunifolram.
pseudo-churumayu, Miq. 1. c. 407=P. pseudochurumayu.
psilostachya, Miq. 1. c. 448 = P. psilostachyum.
punetata, Miq. 1. c 522=P. punctatum.
pyrifolia, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 159 = P. Mastersianum.
Radula, Miq. 1. c. 426 = P. Bredemeyeri.
ramiflora, Miq ex C. DC. in DC. Prod. xvi. I. 288 = P. Hostmannianum.
Regnellii, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 574=P. Regnellii.
renitens, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 221.—Am. trop.
reticulosa, Miq. Syst. Pip. 554 = P. reticulosum.
rkododendrifolia, Miq. 1. c. 506-P. anonaefolium.
rkynchostachya, Miq. 1. c. 526=P. rhynchostachyum.
richardiaefolia, Miq. 1. c. 396 = P. richardiaefoliura.
riparia, Miq. 1. c. 409 = P. grandifolium.
rivinoides, Miq. 1. c. 519 = P. rivinoides.

ARTANTHE:—
Rudgeana, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 77-P. Rudgeanum.
rudis, Miq. Syst. Pip. 467 = P. rude.
rugosa, Miq. I. c. 4(8 = P. Rohrii.
Ruiaiana, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 444 = P. pnngoënse.
rumicifolia, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 141«P. rumicifolium.
salicariaefolia, Miq. Syst. Pip. 468 = P. salicariaefolium.
salicifolia. Miq. 1. c. 533=P. salicifolium.
saliunca, Miq. 1. c. 528—P. salicinnm.
salviaefolia, Miq. 1. c. 430 = P. salviaefolium.
sancta, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 714-P. sanctum.
saururoides, Miq. Syst. Pip. 414 = P. saururoides.
scabra, Miq. 1. c. 447 = P. hirsntum.
scabrata, Presl, Epim. Bot. 226.—Mexico.
scabrifolia, Miq. Syst. Pin. 461 = P. scabrifolinm.
seabriuscula, Miq. 1. c. 447 = P. scabriusculum.
Schachii, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 448-P.Schachii.
Schlechtendalii, Miq. Syst. Pip. 386 = P. reticulatum.
Schomburgkii, Klotzsch, in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 822.—Guiana.
Schottii, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 157=P. Schottil.
scopulorum, Miq. Syst. Pip. 396 = P. scopulorum.
scutaia, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 445 = P. subscutatum.
secunda, Miq. Syst. Pip. 516 = P. scenndnm.
Seemanniana, Miq. in Seem. Bot. Voy. Herald, 199. t. 39 = P. auritum.
Sellmiana, Miq. Syst. Pip. 416-^ P. Sellovianum.
septuplinervia, Miq. in Seem. Bot. Voy. Herald, 199. t. 40 = P. septuphnervium.
sororia, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 443= P. sororium.
spectabilis, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 138 = P. cernuum.
staminea, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 461 = P. geniculatum.
stellipila, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 163=P. stellipilum.
stupposa, Miq. Syst. Pip. 430=P. crocatum.
subaequalis, Presl, Epim. Bot. 226=P. subaequale.
subauriculata, Miq. in Linnaea, xx. (1847) 160-P. subauriculatum.
superba, Miq. 1. c. 187=P. obliquum.
Swartsiana, Miq. Syst. Pip. 490 = P. Swartzianum.
tectoniaefolium, Miq. 1. c. 396 = P. tectoniaefolium.
tejucensis, Miq. 1. c. 496 = P. tejucense.
tennicuspis, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot iv. (1845) 457 = P. tenuicuspe.
tiliaefolia, Miq. Syst. Pip. 388= P. tiliaefolium.
trichoneura, Miq. 1. c. 4S8.—Guiana.
trichostachya, Miq. 1. c. 488 = P. citrifolium.
tricuspis, Miq. ex Seem. Bot. Voy. Herald, 200. t. 42.—Panama,
trinervis, Miq. 1. c. 200. t. 41 = P. trinerve.
tuberculata, Miq. Syst. Pip. 497 = P. tuberculatum.
tumida, Miq. 1. c. 465 = P. tuinidum.
ulmi/olia, Miq. 1. c. 472 = P. dilatatum.
umbrosa, Miq. 1. c. 470 = P. umliroium.
variegata, Miq. 1. c. 485 = P. variegatum.
Vellomana, Miq. 1. c. 436 = P. aduncum.
velutina, Miq. 1. c. 471 = P. velutinum.
verbascifolia, Miq. 1. c. 431 = P. vcrbascifolium.
verrucosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 171 = P. geniculalum.
Warakabacoura, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1846) 469 = P. Warakaboura.
Wydleriana, Miq. Syst. Pip. 487^ P. cuspidatum.
xestophylla, Miq. 1. c. 491 = P. geniculatum.
xylopitiides, Miq. 1. c 492 = P. geniculatum.
xylosteoides, Miq. 1. c. 422— P. xylosteoides.

ABTEDIA, Linn. Gen. ed. I. 71 (1737). *UMBELLIFERAE,* Benih. & Hook. f. i. 927.
muricata, Linn. Sp. PI. 212 = Daucus muricatus.
squamatsi, *Linn. I. c.*—Oriens.
squamata, Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1797) 308 = Sanicula crithmifolia.

ABTEMISIA, Linn. Syst ed. I (1735). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 485.
ABROTANLM, [Tourn.] Neck. Elem.i. 98 (1790).
ABMNTMUM, Tourn. ex Linn. Syst ed. I (1785).

ARTEMISIA:—
OLIGOSPORUS, Cass. in Bull. Soc Philom. (1817)33.
PICROTHAMNUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 417.
abrotanifolium, Salisb. Prod. 191 = A. Abrotanum.
abrotanifolium, *Sin. in Pall. N. Nord. Britr.* vii. 809. —Rossia.
abrotanoides, Jacq. ex DC. Prod. vi. 106-vestita.
abrotanoides, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 399=califomica.
Abrotanum, Habl. Tanr. 128=maritima.
Abrotanum, *Linn. Sp. PI.* 845.—Europ.; As. temp.
Abrotanum, Savi, Mat. Med. t. 38 - camphorata.
Abrotanum, S. G. Gmel. It. i. 21=procera.
absinthia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119=A. Absinthium.
Absinthii, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 829 = pallens.
absinthioides, Poir. Encyc. Suppl. i. 461—Siversiana.
Absinthium, *Linn. Sp. PI.* 848.—Europ.
abyssinica, *Sch. Bip. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 420. —Afr. trop.
acetica, Jacquem. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1886) 86=maritima.
achilleae/olia, Tenore, Fl. Nap. 190=camphorata.
achilleoides, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc v. (1832) 195=Tanacetum achilleoides.
Adamsii, *Bess, in Nouv. Mini. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1884) 27.—As. bor. or.
aemula, Steph. ex Bess. 1. c. 22 = rutaefolia.
aethiopica, Linn. Sp. PI. 846 = A. Herba-alba.
affinis, Hassle, in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 22 = vulgaris.
affinis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 136.—Sibir.
afra, *Jacq. Hurt. Schoenb.* iv. 34. t. 467.—Afr. uustr.
alba, Habl. Taur. 144=austriaca.
alba, Pall. Reise, i. 502=maritima.
alba, Tuna, Fl. Ital. Prod. 67 -camphorata.
albida, Ledeb. Fl. Alt. iv. 85=maritima.
albida, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 566=inodora.
Allionii, Nym. Consp. 377—nana.
alpina. Pall, ex Willd. Sp. PI. iii. 1824-lanata.
alpina, DC. ex Stead. Nom. ed. II. i. 136=campestris.
alpina, Sen. Bip. ex Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 746 — lanate.
altaica, Desf. Cat. Hort. Paris. (1829) 160=pontica.
altissima, Ehrh. ex DC. Prod. vi. 108=procera.
ambigua. Linn. Sp. PL ed. II. 1190-»Trichogyne laricifolia.
ambigua, Thunb. Prod. PI. Cap. 147=Seriphiam veriniculatuin.
Ammaniana, *Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* viii. (1885) 60.—Sibir.
amorpha, *Rafin. Fl. Ludov.* 69.—Louisiana,
amygdalina, *Decne. in Jacquem. Voy. Bot.* 92.1100.—Reg. Himal.
andicola, Don, ex Hook. *8c* Arc in Hook. Journ. Bot iii. (1841) 325=mendozana.
androsacea, Seem. Bot. Voy. Herald, 34. t. 6-senjavinensis.
anethifolia, Fisch. ex DC. Prod. vi. 108=procera.
anethifolia, *Weber, ex Steehm. Artem.* 29.—Sibir.
anglica, Hort ex DC. Prod, vi 10S=maritima.
angusti/olia, S. F. Gray, Nat An. Brit PL ii. 460 = A. Abrotanum.
annua, *Linn. Sp. PI.* 847.—Oriens; As. bor.
annua. Pall. Reise, ii. 523-sacrorum.
anomala, *S. Moore, in Journ. Bot.* xiiL (1876) 227.—China,
anthriscifolia, *Presl, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 186.—Hab f
apetala, Hort Pest ex Steud. 1. c=vulgaris.
apiacea, *Hance, in Walp. Ann.* ii. 895.—China.
aprica, Gebl. ex DC. Prod. vi. 125 = frigida.
aquatica, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 490.—China.
aragonensis, Lam. Encyc. ii. 269 = A. Herba-alba.
arboreseens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1188.—Reg. Mediterr.
arbuscula, *Nutt. in Trans. Am. Phil. See.* Ser. II. vii. (1841) 398.—Am. bor. oca
arctica, Bess, ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 823-Richardsoniana.
arctica. Less, in Linnaea, vi. (1881) 213=norvegico.
arenaria, *DC. Prod.* vi. 94.—Reg. Caucas.
argentea, Buch, Beschr. Canar. 148, 164=canariensis.
argentea, *L'HMt. Sert. Angl.* 22.—Sicil.; Madera.
argentea, Seb. & Maur. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 68 = arborescent,
argyrophylla, *Ledeb. Fl. Alt. 'n.* 166.—Sibir.

ARTEMISIA:-
armeniaca, *Lam. Encyc.* L 263.—Armenia.
armeniaca, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 592 - Tonnefortiana.
Assoana, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.ii. 69 = lanate.
arragonensis, Auct. vide *aragonensis.*
Athanasia, Bess, in Bull. Soc. Nat Mosc vii. (1884) 24 = Tanacetum fruticulosum.
atlantica, *Coss. V Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 298.—Algeria.
atrata. Lam. Encyc. i. 253=spicata.
atropurpurea, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc Nat Mosc (1867)1. 231-arctica.
Aucheri, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 367.—Persia.
australis, Ehrh. ex DC. Prod. vi. 120 - biennis.
australis, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 522.—Ins. Sandvie
austriaca, *Jacq. Fl. Austr.* i. 61.—Europ. or.; Oriens; As. bor.
baicalensis.VfiWd. ex DC. Prod. vi. 107=sacrorum.
Balsamita, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 57 = pontica.
bargusinensis, Spreng. Syst iii. 49S=borealis.
Barrelieri, *Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* ix. (1836) 87. —Hispan.
basilica, Webb, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hup. ii. 70—granatensis.
Baumgarteni, *Bess, in Nouv. Mint. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 73.—Europ. anstr. or.
Besseriana, Ledeb. Fl. Ross. ii. 690-lagocephala.
Biasolettiana, Visiani, Ind. Sem. Hort Patav. (1886) =• camphorata.
biennis, *Willd. Phyt.* 11. n. 39.—Am. bor.; Sibir. ; Reg. Himal.
biflora, *Spreng. Nachr.* i. *Bot. Gart. Halle,* 12.—Hab. t
Bigelovii, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 110.—Am. bor.
Billardieriana, Bess, in Bull. Soc Nat Moscix. (1836) 81 = A. Herba-alba.
blepharolepis, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pittrsb.* vii. (1851) 340 *{Lehm. Reliq. Bot.* 164).—As. centr.
Bocconi, All. Fl. Pedem. i. 169 «nana, spicata.
Bolanderi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 49.—Calif.
borealis, *Pall. Reise,* iii. 765.—Am. bor. et arct.; Sibir.
Boschniakiana, DC. Prod. vi. 104=maritime,
brachyloba, *Franch. PI. Davidian.* i. 171.—Mongol.
brnifolia, Wall. Cat n. 3306-maritima.
caerulescens, *Linn. Sp. PI.* 848.—Reg. Mediterr.
caespitosa, Bess, in Hook. Fl. Bor. Am. L 824 = Richardsoniana.
caespitosa, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 80.—Sibir. alt
caliiomica, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 623.—Calif.
Campbellii, *Hoot, f.tf Thorns, ex Clarke, Comp. Ind.* 164.—Reg. Himal.
campestris, Auct Hisp. ex Willk. & Lange, Prod. FL Hisp.ii. 72-glutinosa.
campestris, Ledeb. Fl. Alt iv. 86-commuteta.
campestris, *Linn. Sp. PI.* 846.—Europ.; As. bor.; Oriens; Ind. or.
campestris, Pursh, FL Am. Sept it 622=canadensis t
campestris. Scop, ex Steud. Nom. ed. II. i. 186-camphorata.
campestris, Turcz. ex DC. Prod. vi. 96 = Ledebouriana.
camphorata, *Vill. Presp.* 31.—Europ. austr.
camtschatica, Schlecht ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 568-borealis.
cana, *Pursh, Fl. Am. Sept.* 621.—Am. bor.
canadensis, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 129.—Am. bor.; As. bor. or.
canariensis,' *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 217.—Ins. Canar.
canescens, Willd. Sp. PI. iii. 1843-armeniaca.
cannabina, Jacquem. ex Bess, in DC. Prod. vi. 97 = desertorum.
capillaris, Miq. in Ann. Mas. Bot Lugd. Bat. ii. 175 = scoparia.
capillaris, *Thunb. Fl. Jap.* 309.—Japon.
capillifolia. Fitch, ex DC. Prod. vi. 122 - subviscosa.
capillifolia, Lam. Encyc. i. 266-Eupatorium foeniculaceum.
carnifolia, Buch.-Ham. ex Roxb. Fl. Ind. iii. 422-seq.
caruifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 61.—Ind. or.; China.
carvifolia, Bess, in Nouv. Mém. Soc Nat. Mosc. iii. (1834) 81=caruifolia.
caucasica, *Willd. Sp. PI.* iii. 1828.—Reg. Caucas.
caudate, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 129.—Am. bor.

ARTEMISIA:-
centiflora, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.xxn.* (1880) 493.—Mongolia.
cephalantha, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc Nat. Mosc. xl. (1867) I. 227=glomerate.
cernua, Dufour, ex Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 71—hispanica.
cernua, Nutt. Gen. Am. ii. 143=dracunculoides.
cernuiflora, Dufour, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 71=hispanica.
chamaemelifolia, *Vill. Prosp.* 82.—Gall.; Reg. Cauca*.; Persia.
Chamissoniana, Bess, ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 824-norvegica.
chamomillifolia. Parrot, in Engelh. *8c* Parrot, Reise Knn. Kauk. ii. 131 - chamaemelifolia ?
Chiajeana, *Kunte, ex Rich. Bot. Mid.* ii. 612; *ex Steud. Nom.* ed. II. i. 187.—Oriens ?
chinensis, Bess, in Linnaea, xv. (1841) 92 =lagocephala.
chinensis, Burm. ex DC. Prod. vi. 125 = mollis.
chinensis, *Linn. Sp. PI.* 849.—China; Sibir.
chinensis, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 521-Stelleriana.
chrysantha, Fisch. ex DC. Prod. vi. 125-frigida.
chrysantha, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 697—rupestris.
Chrysanthemum, Russ. ex DC. Prod. vi. 140 - Sphaeromorphaea Russeliana.
Cina, *Berg, Darstell.* iv. t. 29*.—Oriens.
cinerea, Hort. Par. ex DC. Prod. vi. 122=camphorata.
Clausonis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 56.—Algeria.
coarctata,]. H. Fore, in Linn. Inst. Skrift. (reimpr. 12) —vulgaris.
coarctata, Tuna, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 567-campestris.
coerulescens, Pall. Reise, ii. 2S5=sericea.
coerulescens, Presc. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 664-Ammaniana.
collina, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 89= campestris.
columbiensis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 898 - cana.
Columnae, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 14 - camphorata.
commutata, Bess, in Bull. Soc Nat. Mosc. viii. (1885) 70=campestris.
compacta, Fisch. ex DC. Prod. vi. 102=maritima.
Contra, Linn. Mant. 282=Sieberi.
Contra, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 494=maritima.
controversa, Jan, ex DC. Prod. vi. 126=Siversiana.
Copa, *Phil. Fl. Atac.* 88.—Chili.
corymbosa, Fisch. ex Bess, in Nouv. Mém. Soc Nat. Mosc. iii. (1834) 74=glomerate.
corymbosa, Lam. Encyc. i. 265 - camphorata.
crithmifolia, *Linn. Sp. PI.* 846.—Lusit; Gall.
crithmifMa, Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 333 - glabella.
cuneifolia, DC. Prod. vi. 126-parviflora.
c»n«/o/ià,Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 162-mexicana!
curilensis, Bess, in Nouv. Mém. Soc Nat. Mosc. iii. (U84) 67=Meyeriana.
curilensis, Spreng. Syst. iii. 489=leontopodioides.
Cyna, Pall. Reise, iii. 680=maritima.
Czekanowskiana, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 72.—Sibir.
davnrica, *Vitm. Summa,* v. 12.—Dahuria.
Decaisnei, *F. W. Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 329.—Ind. or.
Deliliana, Bess. Enum. PI. Volh. Suppl. 89-monospenna.
delphinensis, Ben. in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1886) 19-Mutellina.
densifiora, Viv. App. Alt. Con. ii. 4. t. 2=gallica.
dentata, Willd. Sp. PI. iii. 1826 = rupestris.
depressa, Turcz. ex DC. Prod. vL 107=Adamsii.
desertorum, Bess, ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 325-canadensis.
desertorum, *Spreng. Syst.* iii. 490.—As. centr.; Sibir.; Reg. Himal.
discolor, *Dougl. ex DC. Prod.* vi. 109.—Am. bor. oca
discolor. Ton. !c Gray, in Pacit RaiL Rep. iL 126-fransericides.
Douglasiana, Ben. in Nouv. Mém. Soc Nat. Mosc. iii. (1834) 60=ludoviciana.
dracunculoides, *Pursh, Fl. Am. Sept.* 742.—Am. bor.
Dracunculus, *Linn. Sp. PL* 849.—Europ. or.; Oriens; Reg. Himal.

ARTEMISIA:—
Draeunculus, Porsh, Fl. Am. Sept. ii. 621 = dracunculoides.
dubia, WalL Cat. n. 3807= vulgaris.
fcchegarayi,/fonm. *in Bol. Acad. Nac. Ordova,* iv. (1881) 42.-Reg. Argent
elfgans, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 679=procera.
elegans, Jan, ex Bess, in Bull. Soc. Nat Mosc ix. (1836) NM=glacialis.
'Ugans, Roxb. Hort. Beng. 81 j Fl. Ind. iii 421 - scoparia.
Regans, Salisb. Prod. 191=arborescens.
eranthema, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pttersb.* vii. (1851) 939 *(Lehm. Reliq. Bat.* 163).—Tnrkest.
"tantha, Tenore, Ind. Sem. Hort Neap. (1880) 14 = Baumgarteni.
eriocarpa, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. U851) 836 *(Lehm. Reliq. But.* 160). — Persia; 1 urkestan.
eriophora, Schlecht ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 586 = .vulgaris.
ěnopoda, *Bunge, Enum. Chin. Bar.* 87.—Chin. bor.
tsdüseholtziana, *Bess, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 24.—Ins. Sandvic.
**uis, Fisch. ex DC. Prod. vi. 119-annna.
**lconeri, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. S28.-Tibet. occ.
wsciculata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 298.—Reg. Caucas.; Persia.
fasciculata, Hook. f. & Thorns, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 418 = Tanacetum artemisioides.
fiiforii, Stschurm Artem. N29 Fedtschenkoana (1828) 211.—Am. bor.
Fischeriana, Bess, in Nouv. Mém. Soc Nat. Mosc. iii. (1834)21 = californica.
foeniculacea, Stev. ex DC. Prod. vi. 108=procera.
foetida, Jacquem. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1836) 96 = desertorum.
foliosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 397=californica.
'ontanesiana, *Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* viii. (1835) 52.—Hab.l
fiagrans, Eichw. Casp. Cauc. 6-Sieberi.
fragrans, Willd. Sp. PI. iii. 1836 = maritima.
fran«noides, *Greene, in Bull. Torrey Club,* x. (1883) 42.—Am. bor. occ.
*f*gida,* Eichw. Casp. Cauc. 81 = austriaca.
:"pda, *Willd. Sp. PI.* iii. 1888.—Sibir.; Am. arct.
"ttescens, *Pall. Reise Statth. Russ. Reich,* i. 94, 177. —Rossia.
fruticans, Comm. ex DC. Prod. vi. 261=Stoebe Paniculata.
fruticosa, Willd. ex DC. 1. c. 94=arenaria.
fureata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 567 = trifurcata!
gallica, Schur, Enum. PI. Transs. 824-maritima.
gallica, *Willd. Sp. PI.* iii. 1824.—Gall.; Hisp.
garganica, Tenore, ex DC. Prod. vi. 122=campnorata.
Gayana, *Bess. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* viii. (1835) 35. -Hispan.
geltda, Ledeb. in Mim. Acad. Pétersb. v. (1805) 565 = borealis.
Gtnipi, Stechm. Artem. 17=spicata.
Plvescens, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 175.-Japon.
Klabella, *Kar. b- Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 441.—Soongaria.
glabra, Jacquem. ex Bess, in DC. Prod. vi. 97 = «seriorum.
glabrata, DC. in Wight, Contrib. 20 = parviflora.
glatrescens, Stokes, Bot Mat Med. iv. 188=cam-·pettris.
*»«n«/«, Bourg. ex Willk. ftLange, Prod. Fl. Hisp. ii. 70-granatensis.
glatialis, Vitm. Sagg. 44-lanata.
glactalis. Herb. Mosc. ex Bess, in Nouv. Mem. Soc Nat Mosc iii. (1884) 67 = Triniana.
giaaalis, *Linn. Sp. PI.* ed.II. 1187.—Europ. austr. med.
glactalis, Wuli: in Jacq. Coll. it 118 - Mutellina.
glaaalis, Schang. i„ i>aii. N. Nord. Beitr. vi. 93 = commutata.
glaüca, Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 564=Ammaniana.
glSibir. *Pall, ex Willd.* sp_Pl> iii. 1881. __ * * Himal_;
*el<*ularia,* Cham, ex Bess, in Nonv. Mém. Soc. Nat Mosc iii. (1884) 64=no-vegica.

ABTEMI8IA:—
globularia, Ledeb. ex Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xvii. (1872) 436-glomerata.
glomerata, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 125= senjavinensis.
glomerata, *Ledeb. in Mém. Acad. Pitersb.* v. (1805) 664.—Am. occ. et As. or. arct.
glomerata, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 489-Sieberi.
glomerulata, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 489 = Sieberi.
glutinosa, Boiss. ex Walp. Rep. vi. 214=variabilis.
glutinosa, *J. Gay, in DC. Prod,* vi 95.—Gallia ; Ital.
Gmelini, Fisch. ex Bess, in Nouv. *Him.* Soc. Nat. Mosc. iii. (1884) 28=sacrorum.
Gmelini, *Stechm. Artem.* 30__Sibir.
Gmelini, Willd. ex Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 67 = Lagopus.
gnaphalioides, Bess, in DC. Prod. vi. 105 = mendozana.
gnaphalodes, Nutt. Gen. Am. ii. 148=ludoviciana.
gorgonum, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 142.—Ins. Cap. Verd.
gradlis, L'H&it. ex DC. Prod. vi. 100 = scoparia.
granatensis, *Boiss. ex DC. 1. e.* 298.—Hispan.
grandiflora, *DC. I. c.* 122.—Sibir.
grandifiora, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc Nat. Mosc. xl. (1867)1. 217 = ponlica.
grandiflora, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 136 = rupestris.
grata, Heyne, ex Stend. Norn. ed. II. i. 137=Roxburghiana!
grata, Wall. Cat n. 3294; Comp. n. 404=Roxburghiana.
Griffithiana, Boiss. Diagn. Ser. IX. iii. 81=macrocephala.
groenlandica, Wormsk. in Fl. Dan. t. 1585 = borealis.
Halimodendron, Ledeb. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 321 = salsoloides.
Halodendron, *TUTCB. in DC. Prod.* vi. 94.—Dahur.; Mongol.
Hausknechtii, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 374.—Persia.
helvetica, Schleich. Cat. PL Helv. ed. III. 8 = nana.
hemisphaerica, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl.Ind. iii. 422 = Cotula bemisphaerica.
Herba-alba, *Asso,Syn. Arag.* 117.—Hispan.; Marocc.; Oriens.
herbacea, Clarke, ex DC. Prod. vi. 108 =procera.
herbacea, *Ehrk. in Willd. Sp. PI.* iii. 1828.—Sibir.
herbacea, Hort. Wratisl. ex Bess, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc iii. (1834) 30 = procera.
hermaphrodita, Kit ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 566 = campestris.
heterophylla, Bess, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 74 = Richardsoniana?
heterophylla, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 400=vulgaris.
Heyneana, Wall. Cat. n. 8295=vulgaris.
hirsuta, Rottl. in Spreng. Syst. iii. 490=Cyathocline lyrata.
hispanica, Jacq. Coll. i. 98-biennis.
hispanica, *Lam. Encyc.* i. 263.—Hispan.
hispanica, Stechm.ex Bess, in Bull. Nat. Soc. Mosc. ix. (1836) 11*=vulgaris.
hololeuca, *Bieb. ex Bess, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 46.—Ukrania.
hololeuca, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient, iii. 374 = Haussknechtii.
holosericea, Ledeb. Fl. Alt. iv. 65=sericea.
Hookeriana, Bess, in Nouv. Mem. Nat Soc. Mosc. iii. (1834) 89 = ludoviciana.
humilis, Bieb. Casp. App. 83 = maritima.
humilis,Um. Card. Diet. ed. VIII. n. 7=A. Abrotanum.
humilis, Wulf. in Jacq. Coll. iv. 295 =camphorata.
kypoleuca, Edgew. in Trans. Linn. Soc xx. (1846) 71 = Roxburghiana.
hyrcana, Spreng. Syst. iii. *S4 = annua.
iberica, *Boiss. ex Boiss. & Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 120.—Reg. Cauc.
igniaria, Maxim. Prim. Fl. Amur. 161 = vulgaris.
incanescens, Jord. in Ann. Soc Agric. Lyon ; ex Gren. & Godr. *VI.* Fr. ii. 127=camphorata.
ineompta, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 400= discolor.
uonspicua, Spreng. Nachr. i. Bot Gart. Halle, 12 = biennis.
inculta, Delile, Fl. Egypte, 264 = A. Herba-alba.

ABTEMISIA:—
inculta, Sieber, ex DC. Prod. vi. 95=monosperma.
indica, Willd. Sp. PI. iii. 1846=vulgaris.
infirma, S. G. Gmel. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 666 = campestris.
inodora, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 295=campestris.
inodora, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 150^ dracunculoides.
inodora, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 16=A. Absinthium.
inodora, Willd. Enum. Hort. Berol. 864 = A. Draeunculus.
insipida, *Schur, Enum. PI. Transs.* 322.—Transsylv.
insipida, *Vill.Prosp.* 32.—Gallia.
integrifolia, *Falk, Beitr.* ii. 289.—Reg. Casp.
integrifolia. Linn. Sp. PI. 848 = vulgaris.
integrifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. 520 = ludoviciana.
integrifolia, Richards. App. Frankl. Journ. ed. II. 30 = Pursh iana.
intermedia, Host, Fl. Austr. ii. 160 = camphorata
intricata, *Franch. PI. Davidian.* i. 170.—Mongol.
involucrata, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 699-frigida.
italica, Bieb. ex Ledeb. 1. c. 666 = campestris.
italica, *Stechm. Artem.* 28.—Italia.
Jacquemontiana, Bess, in Bull. Soc Nat. Mcsc. (1835) 59 = desertorum.
Jacquini, Raeusch. *Norn.* ed. III. 237= biennis
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 310.—Japon.
japonica, F. Schmidt, Fl. Sachal. 149 = Keiskeana.
jenisea, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 598 = seq.
jeniscensis, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 489 = frigida.
judaica, *Linn. Fl. Palaest. in Amoen. Acad.* iv. 463 ; *et Mant.* 281.—Aegypt.; Arab.
judaica, Lour. Fl. Cochinch. 489 = Loureiri.
juncea, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 383.—Soongaria.
Jussieana, *J. Gay, ex Bess. 1. c.* viii. (1835) 28.—Hispan.
iamtschatica, Willd. ex Bess. 1. c. 67 = leontopodioides.
Keiskeana, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 176.—Japon.
Koelreutenana, *Bess, in Bull. Sec. Nat. Mosc.* viii. (1835) 16.—Hab. ?
kohatica, *Klatt, in Siteb. Akad. Muench.* (1878) 91.—Ind. or.
Kottebuensis, Bess, in* Nouv. Mem. Soc. Nat Mosc. iii. (1834) 80 = Chrysanthemum bipinnatum.
Krascheninnikoviana, Bess. 1. c. 41 = macrobotrys, latifolia.
Kruhsiana, Bess. 1. c. 22 = lagocephala.
kulbadica, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 120.—Reg. Casp.
kurilensis, Walp. Rep. vi. 217= A. Lagopus.
laciniata, *Willd. Sp. PI.* iii. 1843.—Reg. Himal. ; Sibir.
lactiflora. Wall, ex DC. Prod. vi. 115 = vulgaris.
lagocephala, *Fisch. ex Bess, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 22.—Sibir.
lagopina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 119 = seq.
Lagopus, *Fisch. ex Bess, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 69.—Sibir.
lanata, Koch, Syn. Fl. Germ.ed. II. 402 = nitida.
lanata, Lam. Encyc. i. 267 = variabilis.
lanata, *Willd. Sp. PI.* iii. 1823.—Hisp.; Ital.; Taur.
lanuginosa, Poir. Encyc. Suppl. i. 462=lanata.
laricifolia, S. G. Gmel. It. ii. 3 = maritima.
lasiocline, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 92 = splendens.
latifolia, Ledeb. in Mem. Acad. Petersb. v. (1805) 569 =laciniata.
lavandulaefolia, DC. Prod. vi. 110=vulgaris.
lavanduli/olia, Salisb. Prod. 191=caerulescens.
Ledebouriana, *Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* viii (1835) 37.—Sibir.
lednicensis, Rochel, ex Spreng. Pugill. ii. 77 = campestris.
Lehmanniana, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb.* vii. (1851) 340 *(Lehm. Reliq. Bot.* 164).—Afghan.; Turkest.
leontopodioides, Fisch. ex Bess, in Nouv. Mem. Soc Nat. Mosc. iii. (1834) 63 = glomerata. Nepal.
leptophylla, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 183 (sp. dubia).—
leptostachya. DC. Prod. vi. 113=vulgaris.
Lercheana, Kar. *8c* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc f 1841: 441 = maritima.

ABTEMISIA:—
Lereheana, Prese. ex Bess. In Bull. Soc Nat Mosc viii. (1885) 88=arenaria.
Lereheana, Weber, ex Stechm. Artem. 24=fragrans.
Lerchii, Boeber, ex Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. iv. 1235 = maiitima.
Lessingiana, *Bess, in Linnaea,* xv. (1841) 90.—Sibir.
leucanthemifolia, Desf. ex DC. Prod. vi. 98-desertotum.
lencodes, *Schrenk,inBull.Phys.-Math. Acad. Pétersb.* iii. (1845) 106.—Soongor.
leucophylla, Turcz. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 162 = vulgaris.
Lewisii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 417 (nom. delend.).
Libanotis, Iiieb. ex Bess, in Nouv. Me'm. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 42 = macrobotrys.
Lindheimeriana, Scheclc, in Linnaea, xxii. (1849) 168 =mexicai>a.
Lindleyana, *Bess, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (18S4) 35.—Am. bor. occ.
linearis, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 660 = salsoloides.
Lippii, Jan, ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1886) 79 = A. Herba-alba.
lithophila, Turcz. ex DC. Prod. vi. 122=lagocephala.
littoralis, Retz. Obs. v. 28 = Epaltes anstralis.
Lobelii, All. Fl. Pedem. i. 166 «= camphorata.
Iobulifolia, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 364.—Affghan.
longepedunculata, Rudolphi, ex Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 77-=norvegita.
longifolia, *Nutt. Gen. Am.* ii. 142.—Am. bor. occ.
Loureiri, *Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl.* ii. 669.—China.
ludoviciana, Bess, in Nonv. Mém. Soc. Nat. Mosc iii. (1834) 38=discolor.
ludoviciana, *Nutt. Gen. Am.* ii. 143.—Am. bor. occ.
mdcra, *Boiss. (f Haussh. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 864.—Cataonia.
macrantha, Lf deb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1805) 573=sacrorum.
macrobotrys, Ledeb. Fl. Alt. iv. 73=laciniata.
macrocephala, *Jacquem. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* ix. (1886) 28.—Affghan.: Tibet.; As. cenlr.
macrophylla, Fisch. ex Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 41=laciniata.
macrorhiza. *Turn, in Bull.'Soc. Nat. Mosc.* (1840) 73.—Sibir.
maderaspatana, Linn. Sp. PI. 849 = Grangea maderaspatana.
magellanica, *Sck. Bip. in Flora,* xxxviii (1855) 116.—Reg. Magell.
maracandica, Bunge, in Me'm. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 845 (Lehm. Rel. Bot. 169) = fragrans.
maritima, *Linn. Sp. PI.* 846.—Europ.; Reg. Caucas.; Sibir.
maritima, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 74 = gaIlica.
maroccana, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 61.—Marocco.
Marschalliana, Spreng. Syst. iii. 496 = campestris.
matricarioides, Less, in Linnaea, vi. (1831) 210-Matricaria discoidea.
megacephala, *Rupr. Serf. Tiansch.* 52.—As. centr.
melanolepis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 27.—Persia,
mendozana, *DC. Prod.* vi. 10S.—Am. austr.
Mertensiana, Wallr. Sched. Crit. 466. t. 4=laciniata.
Messerschmidiana, Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 27=sacrorum.
Messerschmidii, Weber, ex Stechm. Artem. 19=maritima.
mexicana, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 490.—Mexico.
Meyeriana, Bess, in Linnaea, xv. (1841) 96 = A. Lagopus.
Michauxiana, Bess, in Nouv. Me'm. Soc. Nat. Mosc. iii. (18S4) 71-discolor.
Michauxii, Bess, ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 324 = praec.
millefoliata, Bieb. ex DC. Prod. yi. 107=sacrornm.
minima, Linn. Sp. PI. 849 = Centipeda orbicularis.
minor, *jacquem. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* ix. (1836) 22.—Tibet.
mollis, *J. Gay, in DC. Prod.* vi. 125.—Hab. ?
mollissima, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 182 (sp. ignot).—Nepal.
molluccana, *Roxb. Hort. Bcng.* [101]; *Fl. Ind.* iii. 417.—Ins. Molucc

ARTEMISIA:—
mongolica, Fisch. ex Bess, in Nonv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 53=vulgaris.
monogyna, Waldst. & Kit. PL Rar. i. 177. t. 75 = fragrans.
monosperma, *Delile, Ft. Egypte,* 263.—Syria; Aegypt.; Arab,
monostachya, *Bunge, ex Maxim. Fl. Amur.* 482.—Mongolia.
monspeliensis, Nym. Consp. 377=glutinosa.
montana, Schlechr. ex Ledeb. FL Ross. ii. 691 = Richardsoniana.
montevidensis, *Spreng. Syst.* iii. 487.—Reg. Argent.
monticola, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 347 = cancasica.
Moorcroftiana, *Wall. Cat. Comp.* n. 406.—Himal. bor. occ.
Moxa, *DC. Prod.* vi. 121.—China.
multicaulis, Ledeb. Fl. Alt. iv. 60 = anethifolia.
mutabilis, Salisb. Prod. 191= A. Santonicum.
Mutellina, S. G. Gmel. It. i. 159=splendens.
Mutellina, *Vill. Prosp.* 31.—Europ. med.
myriantha, Wall. Cat. n. 8297= vulgaris.
nana, *Gaud. Fl. Helv.* v. 231.—Helvet.
naronitana, Visiani, ex DC. Prod. vi. 108= procera.
neapolitana, Tenore, Prod. Fl. Nap. App. v. 28 = variabilis.
neglecta, Spreng. in Willd. Enum. Hort. Berol. it. 860 = deseitorum.
nepalensis, *Nees, in Flora,* xiv. (1831) 290.'—Ind. or.
nilotica, Linn. Cent. i. 27; Sp. PI. ed. II. 1188-Cotula anthemoides.
nitens, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 595 =sericea.
nitida, *Bertol. Mant.* 58.—Italia,
nitrosa, *Weber, ex Stechm. Artem.* 24.—Sibir.
nivea, Redowsk. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 863 = austriaca.
norica, Leyb. in Flora, xxxvii. (1854) 869 =nana.
norvegica, *Fries, Novit. Suec.* ed. I. (1817) 56.—Norveg.
nubigena, Wall. Cat. n. 3283=Tanacetnm nnbigenum.
nutans, Fras. ex Pursh, Fl. Am. Sept 742=dracunculoides.
nutans, Willd. Sp. PI. iii. 1831=maritima,
Nuttalliana, Bess, ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 826-dracnnculoides.
obtusiloba, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 68.—Sibir. alt.
occitanica, Salzm. ex DC. Prod. vi. 96 — campestris.
odoratissima, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 268.—Algeria.
officinalis, Gater. Fl. Montaub. 144 = vulgaris.
officinalis, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 600.—Rossia.
ohotensis, Steph. ex Ledeb. 1. c. 597 -rnpestris.
oligantha, Miégev. iu Bull. Soc. Bot Fr. xviii. (1871) 368-Mutellina.
Oliveriana, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 342 (Rel. Lehm. 150) = fragrans.
Oliveriana, J. Gay, ex Bess, in DC. Prod. vi. 101=A. Herba-alba.
Ontina, Dufour, in Ann. Gén. Sc. Phys. vii. (1820) 294 = A. Herba-alba.
orientalis, Herb, Madr. ex DC. Prod, vi 120 = pallens.
orientalis, Willd. Sp. PI. iii. 1836=austriaca.
pachystachya, DC. Prod. vi. 114=pycDocephala.
pacifica, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 401=canadensis.
Pallasiana, *Fisch. ex Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834} 61.—Rossia.
Pallasii, Spreng. Syst. iii. 494 = maritima.
Pallasii, Willd. ex Spreng. 1. c 493=borealis.
pallens, *Wall, ex DC. Prod.* vi. 120.—Ind. or.
pallida, Salisb. Prod. 191=pontica.
palmata, Lam. Encyc. i. 268=eaerulescen3.
palmata, Lap. Hist. ACT. PL Pyr. 504=gallica.
palmata, Steph. ex Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1884) 22 = rataefolia.
Palmeri,v4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 79.—Calif.
palustris, *Linn. Sp. PI.* 846.—Dahur.; Mongol.
paniculaeformis, DC. Prod. vi. 107 = vulgaris.
paniculata, *Lam. Encyc.* i. 265.—Ital.; Gall.
paniculata, Rottl. tx Wight, Contrib. 12=Cyathocline lyrata.
paniculata, Roxb. Hort Beng. 61; Fl. Ind. iii. 418-vulgaris.

ABTEMISIA:—
paniculata, Sen. Bip. ex Willk. in Flora, xxxiv. (1861) 747=variabilis.
Parishii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-83) 220.—Calif.
Parryi.,^. *Gray, 1. c.* vii. (1868) 861.—N. Mexico,
parviflora, *Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng.* 61; *Fl. Ind.* iii. 420.—Ind. or.; Burma.
parviflora, Wight, Cat. n. 1460=vulgaris.
pauciflora, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 290-arenaria.
pauciflora, Georgi, Beschr. Rnss. Reich. Nachtr. 806-maritima.
pauciflora, Spreng. Syst. iii. 491-desertomm.
pectinata, *Pall. Reise,* iii. 255.—Dahnr.; Mongol,
pedatifida, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 399.—Am. bor.
pedemontana, Balb. ex Loisel. Not. 126=lanata.
peduncularis, Bieb. Fl. Taur. Cauc iii. 566 = splendens.
pedunculata, Stend. Nom. ed. II 72=splcndens.
pednnculosa, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 176.—Japon.
pendula, Salisb. Prod. 191-A. Absinthium.
pendula, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 39 = fragrans.
persica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 91.—Persia; Affghan.; As. centr.
petraea, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 698=frigida.
petrosa, Jan, ex DC. Prod. vi. 118 = Baumgarteni.
peucedani/olia, Juss. ex DC. Prod, vi 99 = canadensis.
pinnatifida, Jacquem. ex DC. Prod. vi. 120-Touraefortiana.
piperita, Pall, ex Ledeb. Fl. Alt. iv. 88=scoparia.
plattensis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 397-filifolia.
plumosa, Fisch. ex Bess, in DC. Prod, vi 119-annna.
pontica, Burm. f. Prod. 2t>—afra.
pontica, *Linn. Sp. PI.* 847.—Europ.; Reg. Caucas.; Soongaria.
potentillaefolia, Fisch. ex Spreng. Syst. iii 494-armeniaca.
potentilloides, A. Gray, in Proc Am. Acad. vi. (18S4) 551 = Tanacetum potentilloides.
Prescottiana, *Bess, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 72.-Am. bor. occ.
procera, Lap. Hist. Abr. PI. Pyr. 503-variabilis.
procera, *Willd. Sp. PI.* iii 1818.—Europ. austr. or.; As. Min.; Sibir.
procumbens, Schrad. ex DC. Cat. Hort. Monsp. 80-frigida.
pseudo-pontica, *Schur, Enum. PI. Transs.* 323.—Europ.
pubescens, *Ledeb. in Mim. Acad. Pitersb.* v. (1805) 568.—Sibir. or.
pulchella, Gmel. ex DC. Prod. vi. 102=maritima.
putnila, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 816 = frigida.
pumila, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 640=Lindleyana.
punctata, Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc iii. (1834) 43 = latifolia, macrobotrys.
purpurascens, Jacquem. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1836) 60 = Roxburghiana.
Purshiana, *Bess, in Nouv. Me'm. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 59.—Am. bor.
pusilla, *Luce, Topog. Nachr. Oesel,* 2?2i—Europ. bor.
pycnocephala, *DC. Prod.* vi. 99.—Sibir.
pyenorrhiza, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 79.—Sibir. alt.
pyenostachya, Torr. & Gray, Fl. N. Am. 422-pycnocephala.
Pyromacha, Viviani, Fl. Lib. Spec. 54. t 13. f. 5-hispanica.
quadripedalis, Gilib. Fl. Lituan. i. 174 - vulgaris.
quinqueloba, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc,* xxxix. (1866) I. 348.—As. temp.
racemifera, Steph. ex Bess, in Nonv. Me'm. Soc. Nat. Mosc. iii. (1884) 28=sacrorum.
racemosa, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 886.—Europ.
racemosa, Mie"gev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 341; xviii. U871) 867 =spicata.
radicans, C. Sin. ex DC. Prod. vi. 102= rep tans,
ramosa, *C. Sm. ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins.* 148.—Ins. Canar.
ramosa, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 71 shispanica.

ARTEMISIA :—
Redmoskyi, Ledeb. in Mém. Acad. Pt-tersb. v. (1805) 574 = A. Dracunculus.
repens, Pall, ex Willd. Sp. PI. iii. 1810=austriaca.
reptans, *C. Sm. ex Lint, in Buck, Beschr. Canar. Ins.* 148 —Ins. Canar.
revoluta, Edgew. in Trans. linn. Soc xx. (1846) 72 = Roxburghiana.
riiodantha, *Rupr. Sert. Tiansch.* 52.—As. centr.
Richardsoniana, A. Gray, in Am. Joum. Sc Ser. II. xxxiii. (1862) 239 = norvcgica.
Richardsoniana, *Hook. Fl. Bor. Am.* 323.—Am. arct
ngida, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xix. (1883) 48.—** Am. bor. occ.
riparia, Buch.-Ham. ex DC. Prod. vi. 119=carvifolia.
Roihrockii, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 618.—Calif.
Roxburghiana. *Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **ix. (1836)** 57.-Reg. Himal.
Royleana, *DC. Prod.* vL 115 (sp. dnbia).—Ind. bor. occ.
rubella, Moench, Meth. 572=caerulescens.
rubriflora, Turcz. ex Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1836) 54=vulgaris.
ruderalis, Salisb. Prod. 191=vulgaris.
rupestris, All. Fl. Pedem. i. 169 - Mntellina.
rupestris, Asso, Syn. Arag. 117=1anata.
rupestris, Lag. & Rodr. in Anal. Cienc. v. (1802) 284 = granatensis.
rupestris. Lam. Encyc i. 262-splendens.
rupesiris, *Linn. Sp. PI.* 847 ; *It. Goth.* 285.—Oeland.; Saxon.; Sibir.
rupestris, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 801=norvegica.
rupestris, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 146 = camphorata.
rupestris, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 246=spicata.
rutacea, Stev. ex DC. Prod. vi. 106 = rutaefolia.
mtaefolia, *Steph. ex Spreng. Syst.* iii. 488.—Sibir. or.
sabulosa, Slev. ex DC. Prod. vi. 108 = procera.
sabulosa, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross, ii 561=-arenaria.
saekaliensis, Tiles, ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. viii. (1885)48 = capillaris.
Mcrorum, *Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb.* **v. (1805)** 671.—Rossia; Tibet.; Sibir.
Saharae, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **56.—Algeria.**
*«*ligna,* Tenore, Prod. FL Náp. Suppl. i. 63=-variabilis.
salina, Bess. Enum. PI. Volh. 76«=maritima.
salina, *Willd. Sp. PI.* ii. 1834.—Europ.
salsa, F. Martini, Gesch. Nat. vii. 288=nitrosa.
•alsoloides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1832.—Reg. Caucas.; Tibet.; Sibir.
samamisica, Bess, in Nouv. Mém. Soc Nat. Mosc. iii. (1884)50 = vulearis.
santolinaefolia, Turcz. ex Bess. 1. c. 87=sacrorum.
Santonica, Lam. Encyc. i. 268 = caerulescens.
Santonica, Pursh, Fl. Am. Sept. 521 (sp. obscura).—Am. bor.
Santonica, Woodw. Med. Bot. t. 128= suaveolens.
Santonicum, *Linn. Sp. PI.* 845.—As. bor.
Santonicum, Sievers, ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1336) 112 = campestris.
saxatilis, Reichb. Fl. Geim. Exeurs. 202=incanescens.
saxatilis, Waldst. & Kit in Willd. Sp. PI. iii. 1630 = camphorata.
fxorum, F. Schmidt, Reisen Amurl. 50, *err. typ.*= sacrorum.
**cariosa.* Rich, ex Bess, in DC. Prod. vi. 126=Sieveisiana.
Schimpcri, *Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 142, nomen.—Afr. trop.
Schlaginlweitiana, *Klatt, in Sitgb. Acad. Muench.* (187b) 90.—Turkestan.
Schmidtiana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb,* **xvii.** (1&72) 489.—Japon.
Schrenkiana, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 575.—Sibir.
scopaeformis, *Ledeb. I. c*—Sibir.
scoparia, *Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung.* **i. 66. t 65.—** tnrop.; Oriens; Ind. or.
scopulorum, *A. Gray, in Proc. Ac. Sc. Pkilad.'* **1863'** (1864) 66.—Am. bor. occ.
selengensis, Turcz. ex Bess, in Nouv. Me'm. Soc. Nat. Mo,c. iii. (1634) 50 = vulgaris.
Sfmavinensis, Bess. 1. c. 65 = senjavinensis.
Semsek, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* **218.—Arabia,**
aenccionis, *Jacquem. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* »x. (1836) 75.—Ind. or.
senjavinensis, *Bess 1. c.* 64—Am. occ. et As. or. arct.
•ericea, *Weber,* in *Stechm. Artem.* 16. n. 5.—Sibir.

ABTEMISIA:—
sericophylla, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, it. 41 = borealis.
Seriphium, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. ii. 71=hi.*panica.
Seriphium, Wallr. Sched. Crit. 458 = maritima.
serotina, *Bunge,in Mém. Sav. Etr. Prtersb.* **vii. (1851)** 340 *{Lehm. Reliq. Bot.* 165).—Turkestan,
serrata, *Nutt. Gen. Am.* ii. 142.—Am. bor.
sibirica, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 429 = Tanacetum sibiricum.
Sieberi. Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1836) 80 = A. Herba-alba.
sipontina, Tenore, Fl. Nap. v. 215=caerulescens.
Siversiana, *Ehrh. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1845.—Rossia ; As. bor.; Reg. Himal.
sogdiaira, *Bunge, in Mint. Sav. Etr. Petersb.* **vii.** (1851) 843 *(Lehm. Reliq. Bot.* 167).—Turkestan,
soongarica, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 49 (1871).—Soongaria; Turkest.
spicata, *Wulf. ex Jacq. Fl. Austr.* **v. 46.—Europ.**
spicigera, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 345 = fra grans,
spinescens, *Eaton, in Bot. King, Exp.* 180.1.19.—Am. bor. occ.
spithamaea, Pursh, FL Am. Sept. 522 - borealis.
splcndens, *Willd. Sp. PI.* iii. 1822.—As. Min.; Reg. Caucas.
Stechmanniana, Bess, in Nonv. Mini. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 35 = chamaemelifolia.
Stelleri, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 568-borealis.
Stelleriana, *Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* **iii.** (1834) 79.—Am. bor.; Graecia; Kamtschaika.
sternutatoria, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 423 = Centipeda orbicularis.
Steveniana, Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc iii. (1834) 64=glomerata.
Stewartii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 163=annua.
Stracheyi, *Hoot. f. V Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 164.—Tibet, occ.
stricta, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* **xx. (1846) 73.—** Reg. Himal.
stricta, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) I. 204=desertorum.
stricta, Heyne, ex DC. Prod. vi. 874 = Cyathocline lyrala.
suaveolens, Fisch. in DC. 1. c. 119 = annua.
suaveolens, *Lam. Encyc.* i. 269.—Europ.
snavis, *Jord. Ind. Sem. Hort. Divion.* **(1848) 18.—** Gallia.
subcanescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 861 = camphorata.
subspinescens, Boiss. Diagn. Ser. I. vi.-91 = persica.
subulata, Willd. ex Steud. Norn. éd. II. i. 140= arenaria.
subulosa, Willd. ex DC. Prod. vi. 94 = arenaria.
subviscosa, *Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **ix. (1886) 24.** —Sibir.
succulenta, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 81.—Sibir.
supina, Stev. ex DC. Prod. vi. 112=hololenca.
sylvatica, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 161.—Mandchur.
sylvatica, Schlecht. ex Ledeb. FL Ross. ii. 581 - laciniata.
tanacetifolia, All. Fl. Pedem. i. 166 = spicata.
tanacetifolia, Georgi, It. i. 229 = sacrorum.
tanacetitolia, *Linn. Sp. PI.* 848.—Sibir.
tanacetoides, Less, in Linnaea, vi. (1831) 210=Matricaria multiflora.
tatarica, *Weber, ex Stechm. Artem.* 19.—Tataria.
taurica, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 291.—Taur.
taurica. Less, in Linnaea, x. (1835-36) 170=Lessingiana.
taurica, Willd. Sp. PI. iii. 1837 = fragrans.
tenella, *Weber, ex Stechm. Artem.* **26.—Hab. t**
tenuiftora, Jacquem. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1836) 62 = Tanncetum tenuifolium.
tenuifolia, Adams, in DC. Prod. vi. 107 = Adamsii.
tenuifolia, Ehrh. ex Ledeb. FL Ross. ii. 567=commntata.
tenuifolia, Moench, Meth. 571=pontica.
tenuifolia, Willd. Sp. FL iii. 1819 - Eupatorinm fotmiculaceum.
tenuissima, Spreng. ex Bess, in Nouv. Mlm. Soc. Nat. Mosc iii. (1834) 30=proccra.
Thunbergiana, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. xvii. (1872) 432=apiacea.
thuscnla, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* iv. (1801) 86.—Ins. Teneriffa.

AKTEMISIA :—
Hbetica, Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 329 = minor.
tifiiensis, Adams, ex Hess, in Nouv. *Him.* Soc Nat, Mosc. iii. (1834) 62 = fasciculata.
Tilesii, Ledeb. in Mém. Acid. Pétersb. v. (1805) 568=vulga'ris.
tomentella, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxix.** (1866; 1. 351.—As. centr.
Tournefottiana, *Reichb. Ic. Exot.* i. 6. t. 5.—Oriens; Reg. Himal.
transsilvanica, Schur, Enum. PL Transs. 321-Banmgaiteni.
Trautvctteriana, *Bess, in Mém. Sav. Etr. Petersb.* **iv.** (1845) 464. t. 5.—Oriens ; Afghan.
trichophylla, Wall. Cat. n. 3305 = scoparia.
tridentata, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* **Ser. II.** vii. (Ib41) 398.—Am. bor. occ.
trifida, *Nutt. I. c.*—Am. bor. occ.
trifida, Turcz. in Hull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 196 = Tanacetum trifidum.
trifurcata, Drsf. Cat. Hort. Par. ed. III. (1829) 161 et 3'JJ " Fontanesiana.
trifurcata, *Steph. ex Spreng. Syst.* iii. 488.—Soongaria.
Triniana, *Bess, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* **iii.** (1834) 67—Sibir.
Tschernieviana, Mess, in Bull. Soc Nat. Mosc viii. (1835) 33=arenaria.
Turczaninoviana, *Bess, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1834) 23.—Afghan,
turkeslanica, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Set. VI. xvi. (1B83) 311.—Turkestan.
ucranica, Iiess. ex Nym. Consp. 378 = HaussknechtiL
umbelliformis, Linn, iincyc. i. 262 = Mutellina.
umbrosa, Turcz. ex DC. l'rod. vi. 113 -selengensis.
uralensis, *Spreng. ex Bess, in Flora,* xvii. (1834) I. *Beibl.* 16, nomen.—Sibir.
Vahliana, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* **ii. 698.—** Persia.
valentina, Lam. Encyc i. 269 = A. Herba-alba.
vallesiaca, All. Fl. Pedem. i. 169=seq.
vallesiana, *Lam. Encyc.* i. 269.—Helv. austr.; Ital.
varubilis, *Tenore, Fl. Neap. Prod. App.* **v. 28.—Neap.;** Hisp.
Verlotorum, Lamotte, in Mém. Assoc. Franç. Cong. Clerm.-Ferr. (1876) 511 = vulgaris.
vermiculata. Linn. Mant. 291 =• Stnebe artemisioides.
vermiculata, Schang. ex DC. Prod. vi. 99 = borealis.
vestita. *Wall. Cat.* n. 3301.—Reg. Himal.; China.
Villarsii, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 130 = Baumgarteni.
violacea, Desf. Tabl. ed. II. 112-=vulgaris.
violacea, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1805) 567 = borealis.
virens, Moench, Meth. Suppl. 233=vulgaris.
virgata, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* **ii. 600.—** Ucrania.
virgata, Richards, in Frankl. Joura. App. 306 - frigida.
viridifolia, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1828) 2 = rupestris.
viridis, Willd. ex DC. Prod. vi. 124 = rupestris.
viscosa, DC. 1. c. !)5 = glutinosa.
milgaris, Burm. f. Fl. Ind. 177 = indica.
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 848.—Reg. temp. bor.
Wadei. Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 72 = annua.
Wallichiana, Bess, in Nonv. Me'm. Soc. Nat. Mosc iii. (1834) 63 = Koxliuryhiana.
Willdenowii, Dietr. ex Bess, in Bull. Soc. Nat. Mosc. ix. (1836) 115 = camphorata.
Wrightii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 48. —Mexico.
Wulfenii, Schlcich. Cat PL Helv. ed. IV. 8 - Mutellina.
Zollingeriana, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Ver*. Ind. Archip.* 126.—Malayaj

ARTENEMA, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 516 (1839)=Artanema, D. Don (Scrophul.).

ARTHOSTEM A, Neck. Elein. ii. '280 (1790) = Qnetum, Linn.

ARTHRATHERUM, Beanv. Agrost.32. t. 8. f. 8 (1812) =Aristida, Linn. (Gramin.).
arenarium, NLCS, in Lehm. PI. Preiss. ii. 98 = Aristida aienaria.
brachyatherum, Coss. *Sc* Dur. Expl. Alger Glum. 291 = Aiistida acutiflora.

ARTHRATHERUM :—
brevifolium, Nees, Fl. Afr. Anstr. i. 188-Aristida brevifolia.
caloptilum, Janb. & Spach, IUnstr. iv. 54«Aristida paradises.
capense, Nees, Fl. Afr. Anstr. 177=Aristida capensis.
ciliatum, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 287 = Aristida ciliata.
comosum, J. Gay, ex Knnth, Ennm. PI. i. 104 = Aristida stipiformis.
elatunt, Boiss. & Buhse, Diag. Ser. II. iv. 128 = Aristida pogonoptila.
hirtiglume, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 52-Aristida birtigluma.
hygrometricum, Beanv. Agrost. 83 = Aristida hygrometrica.
Hystrix, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 287 = Aristida vestita.
Kotsckyi, Hochst. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1819) 159 = Aristida funiculata.
lutescens, Nees, Fl. Afr. Anstr. i. 179=Aristida lutescens.
megapotamicum, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 124 = Aristida implexa.
vamaquense, Nees, Fl. Afr. Anstr. i. 185 = Aristida namaquensis.
obtusum, Nees, 1. c 179 = Aristida obtnsa.
pauciflorum, Boiss. & Bnhse, Diag. Ser. II. iv. 127.—Persia.
plumosum, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 182=Aristida plumosa.
pagonopHlum, Janb. &. Spach, Illustr. iv. 56=Aristida pogonoptila.
pungens, Beauv. Agrost. 38=Aristida pnngens.
rigidum, Schult. Mant. it 212 = Aristida rigescens.
Schimperi, Nees, Fl. Air. Anstr. 178 = Aristida ciliata.
stipoides, Beanv. Agrost. 38 = Aristida stipoides.
subacaule, Nees, Fl. Afr. Austr. 180 = Aristida subacaulis.
uniplume, Nees, 1. c. 181-Aristida nniplnmis.
vestitum, Nees, 1. c. 174 = Aristida vestita.
Zeyheri, Nees, 1. c. 177 = Aristida Zeyheri.

ABTHBAXON, Beauv. Agrost. 111. 111. f. 6 (1812). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. £ iii. 1128.
ALECTORIDIA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 447. t. 99 (1651).
BATRATHERUM, Nees, in Edinb. N. PhiL Journ. xviii. (1885) 180.
LASIOLYTRUM, Steud. in Flora, xxix, (1846) 18.
LUCAEA, Kunth, Rev. Gram. ii. 48J. 1.159 (1880).
PLIUROPLITIS, Trin. Fund. Agrost. 174 (1820).
PSILOPOGON, Hochst. ex Reichb. Norn. 26 (1841).
ciliaris, *Beauv. I. c.*—Orieus; As. et Afr. trop.; Austral.
coloratus, Hochst. in Flora, xxxix. (1856) 188-ciliaris.
cnspidatus, *Hochst. I. c*—Ind. or.
echinatus, Hochst. 1. c. = lanceolatus.
gracilis, Hochst 1. c = ciliaris.
japonicum, Miq. Ann. Mus. Bot Lngd. Bat. ii. 288 - ciliaris.
Jnnghuhnii, *Hochst. in Flora*, xxxix. (1856) 189.—**Java.**
lanceolatus, *Hochst. I. c.* 188.—Ind. or.; Abyss.; Japon.
lancifolius, Hochst. 1. c.=microphyllus.
Langsdorfianus, Hochst 1. c. = ciliaris.
lasiocoleos, Hochst 1. c. 189 - ciliaris.
major, Hochst. I. c. 188-ciliaris.
micans, *Hochst. I. c*—Ind. or.
microphylius, *Hochst. 1. c.*—Ind. or.
minor, Hochst. 1. c.=microphylius
nudus, Hochst. 1. c—ciliaris.
plumbtus, Hochst. 1. c. 189 = ciliaris.
rndis, *Hochst. I. c.* 188 = cuspidatns.
Schimperi, Hochst. 1. c. 189 = ciliaris.
Schmidtii, Hochst. 1. c.=ciliaris.
serrulatus, Hochst 1. c 188 = lanceolatus.
submuticus, Hochst. 1. c. = ciliaris.
violaceus, Hochst. 1. c. = ciliaris.

ABTHBOCABPTJM, Bait f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (It82) 510. *LEGUMINOSAE.*
gracile, Balf. f. L c. 511.—las. Socotn.

ARTHROCHILUS, F. Muell. Fragm. i. 42 (1858) = **Drakaea,** Lindl. (Orchid.).
irritabilis, F. MuelL L c. **43-D.** irriUbflts.

ARTHROCHORTUS, Lowe, in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 801-LoUum, Linn. (Gram.).
loliaceus, Lowe, 1. c—Ins. Dezsertas (Madera).

ABTHBOCLIANTHTTS, Baill. Adansonia, ix. **(1870) 296.** ***LEGUMINOSAE.***
sangnineus, *Baill. I. c.* 297.—N. Caled.

ARTHBOCNEMTTM, Moq. Chenop. Ennm. 111. (1840), partim. *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 65.
ambiguum, *Moq. Chenop. Enum.* 112.—Austral.
arbuscula, Moq. 1. c. 113=Salicoraia arbuscula.
australasicum, F. Muell. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 803-Salicornia quinqueflora.
Belangerianum, Moq. Chenop. Enum. 112 = Halocnemum caspicum.
bidens, Nees, in Lehm. PI. Pn.iss.-i. 638=Salicomia bidens.
caspicum, Moq. in DC. Prod. xiii. 11.150- Halocnemum caspicum.
ciliolatum, *Bunge, in Linnaea*, xxviii. (1856) 573, nomen.—As. Min. ?
coralloides, *Lose.* **6"** ***Pard. Ser. Imperf. PL Arag.*** **90;** ed. II. 361.—Hispan.
fruticosum, Moq. Chenop. Enum. 111 - Salicornia fruticosa.
fruticosum, Torr. in Stansbnry, Rep. 394 =Spirostachys occidentalis.
glaucum, ***Delile, Fl. Egypt.*** **69;** ***Ung. Sternb. in Atti*** *Congr. Bot. Firenae*, 1874 (1876) 283.—Graecia; Afr. trop.; Ind. or.
kalocnemoides, Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 632 = Salicornia arbuscula.
indicum, *Moq. Chenop. Enum.* 113.—Ind. or.; Afr. trop.
indicum.Thw. Enum. Pl.Zeyl. 246=Salicornia brachiata.
macrostachyum, ***Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst.*** *Salicorn.* 67.—Reg. Mediterr.
macrostachyum, Mor. & Delporte, in Ind. Sem. Hort. Bot Taur. (1854) 85-glaucum.
macrostachyum, Torr. Bot. Mex. Bound. Surv. 184 = Spirostachys occidentalis.
triandrum, F. Muell. Fragm. L 139 = Salicornia robnsta.

ARTHROLEPIS, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 14 (1849) = Achillea, Vaill. (Compos.).
imbricata, Boiss. 1. c. 15 = Ach. membranacea.
membranacea, Boiss. 1. c. = Ach. membranacea.

ARTHROLOBIUM, Reichb. Ccmsp. 151 (1828) = AKTROLOBIUM, Desv. = Ornitfaopua, Linn. (Legum.).
ebracteatum, Auct.=O. ebracteatus.

ARTHROLOBUS, Andrz. ex DC. Syst. U. 430 (1821) = Bapifrtrum, Crontz (Cnicif.).
perennis, Andrz. ex DC. 1. c. 431 = R. perenne.
rugosus, Andrz. ex DC. 1. c. 482 = R. rugosum.

ARTHROLOBUS, Stev. ex DC. Syst. ii. 579 (1821) = Sterigma, DC. (Crucif.).
torulosus, Stev. ex DC. 1. c.580 = S. torulosum.

ARTHROMISCHUS, Thw. Ennm. Pl.Zeyl. 47 (1858) = Paramignya, Wight (Rntac).
armatus, Thw. 1. c. = P. armata.

ABTHBOPH'V liliTXM, Blume, Bijdr. 878 (1826). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 944.
MORMORAPKIS, Jack, ex Wall. Cat. n. 4931 (1831).
alternifolium, Maing. ex C. B. Clarke, in Hook. f.'Fl. Brit Ind. ii..734 = pinnatum.
Blumeanum, Zoll. & Morita, Syst Verz. Pfl. Zoll. 41 = diversifolium.
ceylanicum, ***Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **i. 27.** —Zeylan. 1
dilatatum, *Miq. Fl.Ind. Bat.* i. I. 768.—Java,
diversifolium, *Blume, Bijdr.* 879.—Malaya.
ellipticum, Blume, 1. c = diversifolium.
javanicum, Blume, 1. c.= diversifolium.
malifolium, Jungh. & De Vriese, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. vi. (1846) 117= diversifolium.
pinnatum, ***Maing. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.*** *Brit. Ind.* ii. 784.—Malaya,
reticnlatum, ***Blume, ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.*** *Bat.* i. 27.—Malaya.
ienad(oli\an,Miq.Fl.fnd.Bat.Supfl.3il.—JDS.'BaDca.

ARTHROPHYLLUM, Boj. Hort. Manrit.221 (1837)-Phyllarthron, DC. (Bignon.).
comorense, Boj. 1. c. = P. comorense.
madagoscariense, **Boj. 1. c—Madag.**

ABTHBOPHYTUM, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iii. (184S) 211. *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 70.
Lehmannianum, *Bunge, Revis. Anab.* 46-subnlifolium.
subulifolium, *Schrenk, I. c*—Turkestan.; Soongaria.

ABTHBOPODITTM, R. Br. Prod. 276 (1810). *LILIACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 790.
appendiculatum,4««* ***Lall.ex Fisch. Mey. & Avé-Lall-Ind. Sem. Hort. Petrop.*** **xi. 52.—Austral.**
caespitosum, Spreng. Syst ii. 87 = Stypandra caespitosa.
candidum, ***Raoul, Choix PI. Nouv. Zil.*** **14.—N. Zel.**
capillipes, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 34.—Austral,
cirrhatum, *R. Br. in Bot. Mag.* t. 2850.—N. ZeL
dianellacenm, *F. Muell. Fragm.* x. 65.—Austral.
elongatum, DC. Cat. Hort. Monsp. 81, in obs.=panicnlatum.
fimbriatum, R. Br. Prod. 276 = Dichopogon Sieberianns.
glaucum, Spreng. Syst ii. 87—Stypandra glauca.
hispidum, Spreng. 1. c.=Anthericum bispidum.
imbricatum, Spreng. 1. c.=Stypandra glauca.
laxum, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 51 = Dichopogon strictus.
laxum, *Sieber, ex Schult. f. Syst.* vii. 441.—Austral.
Lindleyi, Kunth, Enum. PI. iv. 621=paniculatum.
minus, Lindl. Bot. Reg. t. 866=panicnlatum.
minus, *R. Br. Prod.* 276.—Austral.
muricatum, Spreng. Syst. ii. 87 = Anthericum muricatum.
neo-caledonicum, ***Baker, in Journ. Linn. Soc.*** **xv.** (1877) 852.—N. Caled.
paniculatum, *R. Br. Prod.* 276.—Austral,
pendulum, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 80 = paniculatum.
Preissii, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 85.—Austral.
scabrum, Spreng. Syst. ii. 87 = Agrostocrinum stipandroides.
strictum, R. Br. Prod. 276 = Dichopogon strictus.
umbellatum, Spreng. Syst. ii. 87 - Stypandra umbellata.

ARTHBOPOGON, Nees, Agrost Bras. 819 (1829). *GRAMINEAE*, Benth. *St.* Hook. f. iii. 1119.
stipitatus, ***Hactel, in Sittb. Acad. Wien,*** **lxxxix. (1884)** 125.—Cuba,
villosus, *Nees, Agrost. Bras.* 319.—Bras.

ABTHROSOLEN, C. A. Mey. in Bull. Phys-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 359. *THYMELAEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 193.
anthylloides, C. A. Mey. 1. c = Lasiosiphon anthylloides.
calocephalus, *C. A. Mey. I. c*— Afr. austr.
chrysanthus, ***Solms, ex Sckveinf. Beitr. Fl. Aethiop-*** 165.—Afr. trop.
glaucescens, ***Oliver, in Journ. Linn. Soc.*** **xv. (1871)** 96.—Afr. trop.
gymnostachys, ***C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad.*** *Pétersb.* i. (1848) 359.—Afr. austr.
inconspicuus, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 560.—Afr. anstr.
laxus, C. ***A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb.*** i. (1848) 359.—Afr. austr.
ornatus, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 559.—Afr. austr.
pimelioides, *Meissn. 1. c.* 560.—Natal,
polycephalus, ***C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math.Acad.*** *Pétersb.* i. (1843) 859.—Afr. austr.
sericocephalus, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 561,—Afr. austr.
soznalensis, ***Franch. in Revoil, Çomali,*** **62. t. vi.—** Somali,
spicatus, ***C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad.*** *Pétersb.* i. (1843) 859.—Afr. austr.
subspicatus, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 63 = Wikstroemia subspicata.

ARTHROSPRION, Hassk. Retzia, i. 212 (1855) - Acacia, Willd. (Legum.).
stipulatum, Hassk. 1. c. - Acacia concinna.

ARTHROSTACHYA, Link, Hort. BeroL i. **151 (1887)** =Gaudinla, Beauv. (Gram.).
coarctata, Link, 1. c. = G. geminiflora.

ARTHROSTACHYS, Desv. Opnsc. 74 (1831)=Andro-Pogon, Linn. (Gramin.).
gracilis, Desv. 1. c.—Ind. or.

ARTHBOSTEMA, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 828 (1802). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. *f.* i. 740.
HETERONOMA, DC. Prod. iii. 122 (1828).
MELANIUM, Rich, ex DC. 1. c. 136 (1828).
alatum, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 85.—Venezuela.
alpestre, Nand. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xiii. (1860) 367=Pterolepis alpestris.
angusturense, DC. Prod. iii. 135=Pterolepis glomeraU.
Aubletii, DC. 1. c. 137=Comolia AnbletiL
Bmplandii, DC. 1. c. 138 = Monochaetum Bonplandii.
oraehyandrum, Cham, in Linnaea, it (1884) 454 = Pterolepis glomerata, Tibouchina versicolor.
calcaratum, DC. Prod. iii. 188 = Monochaetum calcaratum.
*<**npanulare,* DC. 1. c. 186 = Brachyotum campanulare.
campanulare, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 85.—Am. trop.
capilatum, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xiii. (1850) 361.—Ind. occ.
cataphractum, Nand. 1 c 360 = Pterolepis cataphracta.
atulialatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 827=Aciotis caulialata.
"rastiifolium, DC. ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiv. (1850) 122= Tibouchina cerastifolia.
CHiatum, *Ruia &• Pav. Fl. Per.* iv. t. 326.—Peruv.
didemioides, Miq.. in Linnaea, xxii. (1849) 541 = Pterolepis didemioides.
"ftense, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 550 =Chaetolepis cubensis.
Oeppeanum, Schlecht. & Cham, in Linnaea, v. (1830) 6B6=Monochaetum Deppeasum.
"'cranantherum, DC. Prod. iii. 138 = Monochaetum dicranantherum.
'tiguum, Naud. in Ann. Sc. Nat Ser. III. xiii. (1850) 359=Pterolepis exigua.
fil'forme, Naud. 1. c. 358=Pterolepis filiformis.
floribundum, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1889) 431 = Monochaetum rivulare.
*f*ragle, *Lindl. in Journ. Hort. See.* iii. (1848) 74.—Mexic.
glomeratum, Cham, in Linnaea, (1884) ix. 454 = Pterolepis glomerata.
Goudotianum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xiu. (1860) 859 «. Pterolepis Goudotiana.
**erbaceum,* DC. Prod. iii. 137-Tibouchina herbacea.
Merostemon, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiii. U850) 360=Pterolepis filiformis.
""•sutissimum, DC. Prod. iii. 187 = Tibonchina herbacea.
h""sutissimum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiii. (1850) 357 = Pterolepis paudflora.
tadanoides, DC. Prod. iii. 186 = Pterolepis pusilU.
Janceolatum, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. vm. (1861) 186.—Cuba.
*la*Wium, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1828) 299,-Guiana.
fneatum, D. Don, 1. c. =Monochaetum lineatum.
"Kescens, *DC. Prod.* iii. 186 = Brachyotum lutescens.
^*aganthera,* Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 540= Tibouchina sebastianopolitana.
u""rtinsianum. DC. Prod. iii. 137=Tibouchina sebastianopolitana.
>Jtiftorum,* DC. 1. c. 138 = Monochaetum multiflorum.
nultiflorum, D. Don, in Mem. Wera. Soc. iv. (1828) 299-. Monochaetum dieranantherum.
*m*ytoideum, DC. Prod. iiii. 138=Monochaetum myrtoideum.
"itidum, R. Grah. in Edirib. N. Phil. Journ. xii. (1382) 186=Tibouchina nitida..
""nmularioides, DC. Prod. iiL 137=Comolia nummularioides.
teniculatum, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 299 =Oxyspora paniculata.
P'fciflorum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. am. (1850) 857 = Pterolepis pauciflora.
Woselloides, DC. Prod. iii. 186=Castratella piloielloides.
Polygonoides, DC. 1. c. 187 = Pterolepis polygonoides.
*t*milu*m, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiu. (1850) 857=Pterolepis pusilla.
***nllum,* Naud. 1. c. 361-Pterolepis pusilla.

ABTHBO8TEMA :—
quinquenerve, DC. Prod. iii. 136 = Brachyotum qoinquenerve.
nsmarinifolium, DC. 1. c = Brachyotum rosmarinifolium.
Salmannii, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiii. (1850) 856=Pterolepis Salzmannii.
Schiedeanum, Steud. Norn. ed. II. i. 141 *(-Pleroma longiflorum* ?).—Mexic.
uruguayense, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 453 = Tibouchina nitida.
versicolor, DC. Prod. iii. 187 = Tibouchina versicolor.
villosum, DC. 1. c = Comolia villosa.
villosum, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 499=Comolia ovalifolia.
volubile, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 35.—N. Granat
Weddellianum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xiii. (1850) 856=Pterolepis Weddelliana.

ARTHROSTEMMA, DC. Prod. iii. 184 (1828) pro parte =Brachyotum, Triana (Melast).

ARTHROSTEMMA, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xiii. (1850) 355=Pterolepis, Miq. (Melast.).

ARTHROSTYGMA, Steud. Norn. ed. II. i. 141 (1840) =Petrophila, R. Br. (Proteac).

AHTHBOSTYI/LDIUM, Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. (1889) 117. *GRAM1NEAE,* Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1208.
AULONEMIA, Goudot, in Ann. Sc Nat Sir. III. v. (1846) 75. t. 5.
Bnrchellii, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 43.—Bras,
capillifolium, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 531.— Ind. occ.
cubense, *Rupr. in Mém. Acad. Pitersb.* Sir. VI. v. (1839) 118. t. 4. f. 13.—Cuba,
excelsum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 529.—Ind. occ.
fimbriatum, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1868) 531.—Ind. occ
Haenkei, *Rupr. in Mém. Acad. Pttersb.* Sir. VI. v. (1839) 117. t 8. f. 12.—Peruv.
leptophyllum, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 175.—Bras,
longiflorum, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 41.—Venezuela,
maculatum, *Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. v. (1839) 118. t. 5.—Peruv.
pubescens, *Rupr. 1. c.* 119. t. 4. f. 14.—Ind. occ.
racemiflorum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 386.—Mexic
Schomburgkii, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 41.—Guiana.
Trinii, *Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. v. (1839) 119. t. 4. f. 15.—Bras.

ABTHROSTYIiIS, R. Br. Prod. 229 (1810). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1058.
aphylla, Boeck. in Linnaea, xxxvil. (1871-78) 524 = Actinoschoenus Thouarsii.
aphylla, *R. Br. Prod.* 229.—Austral.
chinensis, Benth. Fl. Hongk. 897 = Actinoschoenus chinensis.
filiformis, Thw. Enum. PI. Zeyl. 852-Actinoschoenus filiformis.
Thouarsii, Kunth, Enum. PI. ii. 284=Actinoschoenus Thouarsii.

ARTHROSTYLIS, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 623 = ActinOBChoenus, Benth. (Cyperac).
aphylla, Boeck. 1. c. 524 = Act. Thouarsii
filiformis, Boeck. 1. c. = Act. filiformis.

ARTHROTAXIS, Endl. Gen. SuppL i. 1372 (1841) err. typ.=AthrotazlB, D. Don (Conif.).

ARTHROTHAMNUS, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 251= Euphorbia, Linn.
Bergii, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 63.—Afr. austr.
brachiatus, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1869) 251; et Abh. Akad. Berl. (1860) 62 = E. brachiata.
Burmanni, Klotzsch & Garcke, 11. cc. = E. Burmauni.
cymosus, Klotzsch & Garcke, 11. cc 251, 68 = E. nudiflora.

ARTHROTHAMNUS :—
densifiorus, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 251; et Abh. Akad, Berl. a860) 62.—Afr. austr.
Ecklonii, Klotzsch & Garcke, 11. cc. 251,63.—Afr. austr.
scopiformis, Klotzsch *Sc* Garcke, 11. cc.=E. scopiformis.
Tirucalli, Klotzsch *Sc* Garcke, 11. cc 251, 62 = E. Tirucalli.

ARTHROTRICHUM, F. MuelL in Trans. Bot. Soc. Edinb. vii. (1863) 600; et Kdinb. N. Phil. Journ. N. S. xvii. (Jan.-Apr. 1863) 234 = Triohinlum, R. Br. (Amarant.).
calostachyum, F. Muell. 11. cc.=T. calostachyum.

ARTHROZAMIA, Reichb. Consp. 40 (1828) ^Encephalartos, Lehm. (Cycad.).

ABTOCABPTJS, Forst. Char. Gen. 101. t. 51 (1776). *URTICACEAE,* Benth. &, Hook. f. iiL 876.
DURIO, Adans. Fam. ii. 399 (1763).
POLYFHEMA, Lour. Fl. Cochinch. 546 (1790).
RADERMACHIA, Thunb. in Handl. Vet. Akad. Stockh. (1776) 252.
RIMA, Sonner. Voy. Nouv. Guin. 99. t. 57 ad 60 (1776).
SITODIUM, Gaertn. Fruct. *I.* 344. t. 71, 72 (1791).
angustifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 66, nomen.—Ins. Malay.
anisophylla, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 422.—Sumatia.
benghalensis, Roxb. ex Wall. Cat. sub n. 4655-A. Lakoocha.
bifaria, Wall, ex Miq. Ann. Bot. Mus. Lugd. Bat. iii. 21S = Sloetia Sideroxylon.
biformis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 419.—Sumatra.
Blumei, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. viii. (1847) 111.—Java,
brasiliensis, *Gomea.inMem. Ac. Lisbon,* iii. (1812) *Mem. dos Corresp.* 84.—Bras.
calophylla, *Kurt, For. Fl.* ii. 481.—Tenasserim.
Camansi, *Blanco, Fl. Filip.* ed. L 670.—Ins. Philipp.
canarana, *Miq. in Verh. Nederl. Inst.* III. v. (1852) *(Anal. Bot. Ind.)* 20.—Ind. or.
Cannoni, *Hort. Bull, ex Van Houtte, in Fl. desSerres,* xxi. (1875) 181.—Ins. Soc
cerifera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 212.—Java.
Chama, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4657=A. Chaplasha.
Champeden, Spreng. Syst. iii. 804 = A. Polyphema.
Chaplasha, *Roxb. Hort. Beng.* 66; *et Fl. Ind.* iii. 525.—Ind. or.
communis, Forst Char. Gen. 100=incisa?
Cumingiana, *Trie, in Ann. Sc. Nat. Sa.* III. viii. (1847) 119.—Ins. Philipp.
cuspidata, Griff. Notul. iv. 400-rigida.
Dadak, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 420.—Sumatra,
dasyphylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 212.—Ins. Celebes,
dimorphophylla, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 417.—Ins. Banca.
echinata, Roxb. Hort Beng. 66; et FL Ind. iii. 527 = rigida.
elastica, *Reinw. in Blume, Bijdr.* 481.—Borneo.
elongata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 419=Sloetia Sideroxylon.
erythrocarpa, Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 213 = A. Dadak.
erythrocarpa, Teijsm. ex Miq. 1. c. 212 = dasyphylla.
exculpta, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1878) II. 84.—**Hab.** ?
Finlaysoniana, *Wall. Cat.* n. 4662.—Malaya.
glauca, *Blume, Bijdr.* 483.—Java.
glaucescens, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. viii. (1847) 120.—Java.
Gomeziana, *Wall, ex Trie. I. c.* 118.—Ind. or.
heterophylla, Lam. Encyc. iii. 209=integrifolia.
hirsuta, *Lam. Encyc.* iii. 211.—Ind. or.
hirsutissima, *Kun, in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 182.—Ins. Banca.
hypargyrea, *Hance, ex Benth. Fl. Hongk.* 825.—Hongkong.
incisifolia. Stokes, Bot. Mat. Med, iv. 831=incisa.
incisa, *Linn.f. Suppl.* 411. —Malaya ; Ins. Pacif.
iDtegrifolia, *Linn.f. I. c.* 412.—Ind. or.; Malaya.
Jaca, Lam. Encyc. iii. 209=integrifolia.
Kemando, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 418.—Sumatra.

ASTOCABFUB:—
Kertau, *Zoll. Syst.* ***Vert.*** *Ind. Archip.* 89, 95.—**Malaya,**
laciniata, *Hort.—Cf. Card. Citron.* **(1875) II. 169;** *et* **/?«.** *Hortic.* **(1877) 38.—Ins. Pacit**
Laeucha, **Roxb. Hort. Beng. 68, nomen—A. Lakoocha.**
laevis, *Hassk. in Horn. V De Vriese, Tijdschr. X.* **(1818) 124.—Java.**
Lakoocha, *Roxb. Fl. Ind.* **ill. 524.—Ind. or.; Malaya.**
lamellosa, **Blanco, FL Filip. ed. I. 667 =nitida.**
lanceaefolia, *Roxb. Hart. Beng.* **[108]; *Fl. Ind.* iii. 527.—Malaya,**
lanceolata, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* **Ser. III. viii (1847) 121.—Manila.**
Limpato, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppt.* **421.—Sumatra,**
madagascariensis, *Boj. Hort. Afaurit.* **290.—Madag.**
mariannensis, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* **Ser. III. viii. (1847) 114.—Ins. Mariann.**
maxima, **Blanco, Fl. Filip. ed. L 669-integrifolia.**
mollis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 420.—Sumatra.
mollis, **Wall. Cat. n. 4661=A. Lakoocha.**
Nanca, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. t. **Art. IV. 7.—Malaya,**
nitida, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* **Ser. IIL viii. (1847) 119.—Ins. Philipp.**
nobilis, *Thv. Enum. PI. Ztyl.* **282.—Zeylan.**
odoratissima, *Blanco, Fl. Filip.* **ed. 1.671.—Ins. Philipp.**
ovata, **Blanco, L c. 666 = Cumingiana.**
ovata, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. **Art. IV. 7.—Malaya.**
palembanica, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* **424.—Java,**
parviflora, *Voigt, in Syll. Ratisb.* **iL '(1828) 53.—Hab. ?**
peduncularis, *Kurt- in Journ. Bat.* **xiii (1876) 331.—Ins. Nicobar.**
petiolaris, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* **422.—Sumatra,**
philippensis, *Lam. Encyc.* **iii. 210.—Ins. Philipp.**
pilosa, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. **Art. IV. 7.—Malaya.**
pilosa, **Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 211 = A. Polyphema.**
Polyphema, *Pars. Syn.* **ii. 581.—Malaya.**
pomiformis, **Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. zxv. (1863) 400-Gomeziana.**
Ponga, **Dennst Schluessel, 80=Broussonetia integrifolia.**
pubescens, *Blume, Bijdr.* **481.—Java.**
pubeseens, **Moon, Cat PI. Ceyl. 61-nobilis.**
pubescent, **Willd. Sp. PL iv. 189=integrifolia.**
reticulata, **Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 4655=A. Lakoocha.**
reticulata, *Miq.* ***Ann.*** *Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 213.—**Ins. Celebes.**
Riedelii, *Miq. I. c.—Int.* **Celebes,**
rigida, *Blume, Bijdr.* **482.—Burma; Malaya.**
rigida. **Wall. Cat. n. 4658 A-Gomeziana.**
Rima, **Blanco, Fl. Filip. ed. I. 671=incisa.**
rufa, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 428.—Malaya,
rufescens, *Kurt, For. Fl.* **ii. 481.—Ind. or.**
rufescens, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* **420.—Malaya.**
serrata, **Roxb. Hort. Beng. 66, nomen.—Ind. or.**
Tampang, **Miq. FL Ind. Bat. Suppl. 421 = rufescens,** *Miq.*
tephrophylla, *Miq. 1. c.* **422.—Sumatra.**
Teysmanni, *Miq. I. c.* **418.—Sumatra,**
tylophylla, *Miq. Fl. Ind. Bat.* **i. II. 289.—Malaya,**
varians, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* **417.—Sumatra,**
venenosa, *Zoll. &" Mor. in Nat. en Geneesi. Arch. Neerl. Indie,* **ii. (1845) 213.—Java.**
Vriesiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 212.—**Ins. Celebes.**
Zollingeriana, *Miq. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* **90, 96.—Malaya.**

ARTROLOBIUM, Desv. Joum. Bot. L (1818) 121. t 4—Coronilla, Linn., Ornithopua, Linn., etc. (Legumin.).
creticum, **Desv. L c=Coronilla cretica.**
durum, **Desv. 1. c -Ornithopus durus.**
ebracteatum, **Desv. 1. c. = Ornithopus ebracteatus.**
micranthum, **Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 51.—Am. trop.**
repandum, **DC. Prod. ii. 811-Ornithopus repandus.**
scorpioides, **Desv. Journ. Bot i. (1813) 121-Coronilla scorpioides.**
Spassiii, **Kalen. in Bull. Soc Nat Mosc xviii. (1845) I. 233.—Tauria.**
tauricum, **Kalen. 1. c—Tauria.**

ARUANA, Bum. f. Ind. Alt (sign. G, veno) (1769) -Myrtetioa, Linn.
silvestris, **Burm. f. 1. c. =M. moschata.**

ARUBA, Aubl. PI. Gui. i. 293.1.115 (1775)-EUmaba, Aubl. (Simarub.).
guianensis, **Aubl. 1. c.—Guiana.**

ARUBA, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act Nat. Cur. xi. (1828) 172.1.19, 27,29=Almeidea, St. Hil. (Rutac.;.
acuminata, **Nees *8c* Mart. L c 176 = Almeidea acuminata.**
alba, **Nees & Mart. 1. c. 174 = Almeidea alba.**
coerulea, **Nees *8c* Mart. 1. c = Almeidea caerulea.**
myriacantha, **Nees *Sc* Mart ex Steud. Norn. ed. II. i. 142=Almeidea myriantha.**

ABT7H, [Toura.] Linn. Syst. ed. L (1735), partim.
AROIDEAE, **Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 967.**
GYMNOMESIUM, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. (1855) 17.
abyssinicum, **A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 852-Sauromatum abyssinicum.**
aculeatum, **Steud. Nom. ed. I. 78=Caladium aculeatum.**
alatum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. **Art IV. 4.—Malaya.**
albinervium, **Kotschy, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 590=hygrophilum.**
albispathum, **Hort. ex Engl. 1. c 591=italicum.**
albispathum, **Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 9 = orientale.**
alpinum, **Sctiott *Sc* Kotschy, in Bot. Zeit. ix. (1851) 285=maculatum.**
alternans, **Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 372 = Philodendion crassinervium.**
alternum, **VelL FL Flum. ix. t 116 = Philodendron crassinervium.**
omphibium, **Veil. L c 112=Philodendron ampbibium.**
aquaticum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) **ed. I. Art. iv. 6.—Malaya,**
angulatum, *Griff. Notul.* **iii. 143.—Ind. or.**
aphyllum, **Hook, in W. Gray, Western Afr. 386. t A—Amorphophalli sp.**
arborescens, **Linn. Sp. PI. 967 = Montrichardia arborescens.**
Arisarum, **Linn. I. c. 966=Arisarnm vulgare.**
Arisarum, **Lour. Fl. Cochinch. 665 = Typhonium cochinchinense.**
atrorubens, **Ait. Hort. Kew. Iii. 816 = Arisaema atrorubens.**
atrorubens, **Sprang. Syst iii. 769->PitielHa tuberifera.**
auritum, **Linn. Syst. ed. X. 1261; PI. Jam. Pugill. 26 = Syngonium auritum.**
auritum, **Veil. Fl. Flum. ix. t 113 = Syngonium Vellozianuin.**
balearicum, **Buchoz, Dec. PL viii. ll=pictum.**
Besserianum, **Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 849=maculatum.**
betifolium, *Mill. Gard. Diet.* **ed. VIII. n. 12.—Am. bor.**
bicolor, **Ait. Hort. Kew. iii. 316=Caladiom bicolor.**
bubalinum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) **ed. L Art. iv. 4.—Malaya.**
bulbiferum, **Roxb. Hort. Beng. 66; Sims, Bot Mag. t. 2072=AmOrphophallus bulbifera.**
bulbiferum, **Salisb. Prod. 260 = Pinellia tuberifera.**
bulbosum, **Pers. ex Kunth, Enum. PL iii. 54-Pinellia tuberifera ?**
bygantinum, **Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 212-= italicum.**
caeruleo-punctatum, **Zipp. ex Kunth, Enum. PI. Iii. 33 =Amorphophallus variabilis.**
calyptrale, **Salisb. Prod. 261=Arisarum vulgare.**
campanulatum, **Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 609 = Amorphophallus campanulatus.**
canariense, **Webb *8c* Berth. Fhyt. Canar. iii. 298= italicum.**
cannaefolium, **Linn. f. PL Surin. n. 123=Spathiphyllum cannaeforme ?**
carratracense, **Haensel. in Bot. Zeit. iv. (1846) 313 = Biarum Bovei.**
catavericum, *Noronha, in Verh. Baton. Gen. v.* (1790) **ed. I. Art. IV. 4.—Malaya.**
ciliatum, **Hort. ex Loud. Encyc. Suppl. iL 1608-Cryptocoryne ciliata.**

ASUK:—
cilidcum, **Kotschy, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 589=rupicolum.**
clavatum, **Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 385=Sauromatum pedatom.**
Colocasia, **Linn. Sp. PL 966=Colocasia antiquorum.**
colocasioides, Desf. **Cat. Hort. Par. ed. III. 7 et 385 « Colocasia antiquorum.**
concinnatum, **Schott, Ic. Aroid. t. 39 s italicum.**
eonophalloides, **Kotschy, ex Schott, Prod. Aroid. 97 = orientale.**
consobrinum, *Schott, I. c.* **87.—Reg. Cauc.**
cordatum, **VelL Fl. Flum. ix. t. 111=Philodendron cordatum.**
cordifolium, **Bory, Voy. i. 876; ii. 67 = Alocasia indica.**
corsicum, **Loisel. Fl. Gall. ii. 617=pictum.**
costatum, **Wall. Tent Fl. Nep. t. 19 = Arisaema costatum.**
crassipes, **Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 9 = Helicophyllum crassipes.**
crenatum, **Wight, in Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 100 = Theriophonum crenatum.**
creticum, *Boiss.* **b* *Heldr. Diagn.* Ser. I. xiii. 9.—Creta.**
crinitum. **Ait. Hort Kew. iii. 814 = Helicodiceros muscivorus.**
crudele, **Salisb. Prod. 261 = Dieffenbachia Seguine.**
cucullatum, **Lour. Fl. Cochinch. ii. 636=Alocasia cucnllata.**
curvatum, **Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 606-Arisaema curvatum.**
cuspidatum, **Blume, Cat. Gew. Buitenz. 101=Typhonium cuspidatum.**
cuspidatum, **Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 506 = Arisaema cuspidatum.**
cylindraceum, **Gaap. in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. II. 697 = italicum.**
cyprium, **Schott, in Bonplandia, x. (1861) 868-Dioscoridis.**
decurrens, **Blanco, Fl. Filip. ed. I. 656-Amorphophallus decurrens.**
detruncatum, *C. A. Mey. ex Schott, Prod. Aroid.* 8.—**Pers. bor.**
Dioscoridis, *Sibth. (f Sm. Fl. Graec. Prod.* ii. 245.—**Graecia; As. Min.**
discolor, *Voigt, in Syll. Ratisb.* **ii. 50.—Hab. f**
divaricatum, **Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 46 = italicum.**
divaricatum, **Linn. Sp. PL 966=Typhonium divaricatum.**
diversi/olium, **Blume, Cat. Gew. Buitenz. 102 = Typhonium divaricatum.**
Draamtium, **Linn. Sp. PL 964=Arisaema Dracontium.**
Dracontium, **Lour. Fl. Cochinch. 583 = Pinellia Wawrae.**
Dracontium, **Thunb. Fl. Jap. 233-Arisaema Thunbergii.**
Dracontium, **Veil. Fl. Flum. ix. t. 103=Staurostifima Luschnathianum.**
Dracunculus, **Linn. Sp. PL 964=Dracunculus vulgaris.**
Dracunculus, **Thunb. FL Jap. 233= Arisaema japonicum.**
echinatum, **WalL PL As. Rar. ii. 30. t. 136-Arisaema echinatum.**
Ehrenbergii, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. **(1858) 386.—Syria.**
elongatum, **Stev. in Bull. Soc. Nat Mosc xxx. (1867) II. 67—orientale.**
erubescens, **Wall. PL As. Rar. ii. 30. t. 135=Arisaenls erubescens.**
esculentum, **Linn. Sp. PL 965=Colocasia antiquorum.**
exsertum, **Salisb. Prod. 260=A. Dracontium.**
filiforme, **Reinw. in Blume, Cat Gew. Buitenz. 103 = Arisaema filiforme.**
flagelliferum, *Griff. Notul.* **iii. 144.—Ind. or.**
flagelli/orme, **Roxb. Hort. Beng. 65; Lodd. Bot Cab. t. 396—Typhonium cuspidatum.**
flavum, **Forsk. FL Aegypt Arab. 157 = Arisaema flavum.**
foetidum, **Salisb. Prod. 261 = italicum.**
fornicatum, **Roth, PI. Ind. Or. 362 = Pinellia tuberifera.**
fornicatum, **Roxb. Hort. Beng. 65; FL Ind. iii. 501-Alocasia fornicata.**
fornicatum, **Wight, Ic iii. t. 789 = Alocasia decipiens.**
fugax, **Salisb. Prod. 260-venosum.**
gracile, **Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 505-Typhonium gracile.**
gracile, **Unverr. ex Schott, Prod. Aroid. 91=maculatum.**
gramineum, **Lam. Encyc iii. 30=Biarum gramineum.**

ABTJM:-
gramineum, [Soland. in] Ross. Aleppo, ed. II. ii. 264 =Bianim Rnssellianum.
grandifolium, Jacq. Hort. Schoenbr. t. 189-Philodendmro grandifolinm.
&-atum, Schott, Syn. Aroid. 11-orientate.
Gnffithii, *Schott, I. c.* 15.—Afghanist
guellekense, Kotschy, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 589=rupicolura.
guttatum, Salisb. Prod. 260 = Draennculus vnlgaris.
guttatum, Wall. PI. As. Rar. ii. 10. t. 115 = Sauromatum gnttatum.
luderaceum, Jacq. Enum. PI. Carib. 31 = Philodendron Hoffmannii.
foderaceum, Willd. Sp. PI. iv. 486 = Philodendron hederaceum.
Heldrrichii, Orph. ex Boiss. Fl. Orient T. 40 = maculatum.
Mleborifolium, Jacq. Coll. iii. 217 = Xanthosoma helleborifolium.
h'terophyllum, Aucher, ex Blume, Rnmpbia, i. 121 — Helicophyllum Ranwolffii.
nygrophifum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 8.—Syria.
immaculatum, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 6; Schott, Prod. Aroid. 94-italicum.
incomptum, Schott, 1. c. 89 = orientale.
"tcurvatum, Lam. Fl. Fr. iii. 688—Arisanun vulgare.
indicum, Lour. Fl. Cochinch. ii. 536 =-Colocasiaindica.
integrifolium, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 394 = Aglaonema integrifolium.
intermedium, Schor, ex Schott, Prod. Aroid. 91 = macnlatum.
intortum, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 264-. Helicophyllum Rauwolffii.
"alicum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—Enrop.
Jacquemontii, *Blume, Rumphia,* i. 118.—As. trop.
Korolkowi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* ii. (1878) 407. —Turkestan.
Kotschyi, *Boiss. & Hohen. Diagn.* Ser. I. xiii. 8.—Pers. bor.
laceratum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art iv. 4 = seq.?
'ecerum, Jacq. Hort. Schoenb. w. 35 = Philodendron lacerum.
lanceolatum, Veil. Fl. Flnm. ix. t. 114-Philodendron crassinerviom.
Uepoldii, Schott, Prod. Aroid. 77-Dioscoridit.
"ngnlatum, *Linn. PI. Jam. Pugill.* 26; *Syst.* ed. X. 1251.—Jamaica.
Kniferum, Amida, in Koster, Tray. Braz. 483-Montrichardia linifera.
Hvidum, Salisb. Prod. 260=Colocaaiaantiquorum.
longicyrrhum, Schott, Syn. Aroid. 14=hygrophilum.
longispathum, Reichb. Ic. Fl. Germ. rii. 6=orientale.
'yratum, Roxb. Hort. Beng. [108]; Fl. Ind. iii. 508 — Amorphophallus lyratns.
""Krorrhieum, Linn. Sp. PI. 965 - Alocasia macrorrhiza.
macrourum, *Bunge, Enum. PL Chin. Bor.* 67.—China bor.
""xulatum, All. Fl. Pedem. ii. 228 = italicum.
"wculatum, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 9 = orientale.
"wculatum, *Linn. Sp. PI.* 966.—Enrop.
**«lyi, Schott, Prod. Aroid. 98 = maculatum.
"Mrgaritiferum, Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 512 = Plesmonium margaritifernm.
maximum, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 5.—Malaya.
"uirmoratum, Schott, Prod. Aroid. 85=italicnm.
melanopus, *Bout. Fl. Orient,* v. 40.—Oriens.
ninutum, Willd. Sp. PI. iv. 484 = Theriophonnm crenatura.
"'>ntanum, Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 497-Colocasia montana.
nucronatum, Lam. Encyc iii. 12 = Alocasia macrorrhiza.
**«cronatum, Spreng. Syst. iii. 769-Xanthosoma mucronatum.
**ulleri, Zipp. ex Blume, Rumphia, i. 143-Amor-Phophallus Molleri.
Murrayi, J. Grah. Cat. Bomb. PI. 22» = Arisaema Jacqnemontii.
"uscivorum, linn. f. Suppl. 410 = Helicodiceros muscivorus.
npenthoides. Wall. Tent. Fl. Nep. 26.118 - Arisaema nepenthoides.
"ickellii, Schott, Prod. Aroid. 85=italicnm.

ABUM:-
nigrum, *Schott, in Oestr. Bot. Woehenbl.* (1857) 212.—Europ.
nigrum, Veil. Fl. Flam. ix. t. 107-Xanthosoma vjolacenm.
Nordmanni, Schott, Syn. Aroid. 12=orientale.
novum, *Linn.f. PI. Surin.* n. 122.—Guiana.
numidicum, Schott, Syn. Aroid. 10 = italicum.
nymphaeifolium, Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 495 = Colocasia antiquorum.
oblongum. Veil. Fl. Hum. ix. t. 115= Philodendron oblongum.
obtusilobum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 398.—Hab.l
odoratum, Heynh. Norn. ii. 46-seq.
odorum, Roxb. Hort. Beng. 66; FL Ind. iii. 499 = Alocasia odora.
orientale, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 207.—Taur.; Caucas.
orientale, Vis. ex Nym. Consp. 754=nigrum.
orixense, R. Br. Prod. 838=Typhonium Brownii.
orixense, Roxb. ex Andr. Bot. Repos. t. S56 = Typhoninm trilobatum.
natum, Linn. Sp. PL 967-Lagenandra toxicaria.
palaestinum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 6.'—Oriens.
pedatum, Fisch. ex Spreng. Syst. iii. 769—Sauromatum gnttatnm.
pedatum, WUld. Ennui. Hort. Berol. Snppl. 54-Sauromatum pedatum.
pellucidum, Fnlchir, ex Knnth, Enum. PI. iii. 42 = Caladium bicolor.
peltatum, Lam. Encyc. iii. 13 = Caladium esculentum.
pentaphyllum, Linn. Sp. PL 964—Arisaema pentaphyilum.
pentaphyUum,Ve\\. FL Flnm. ix. 1104-Xanthosoma pentaphyllum.
peregrinum, Linn. Sp. PI. 966—Alocasia macrorrhiza.
Petteri, Schott, Syn. Aroid. 12-orientale.
philistaenm, *Kotschy, ex Schott, Prod. Aroid.* 79.—Palaestina.
phryginm, *Boiss. ex Tchihat. Asie Mitt. Bot.* ii. 648.—As. Min.
pictum, */.inn./. Suppl.* 410.—Ins. balear.; Conic
pictum, Pett. Bot. Wegw. (1832); ex Schott, Syn. Aroid. 13-orientale.
pinnatifidum.Jaai. Hort. Schoenb. ii. 31-Philodendron pinnatindnm.
pinnatifidum, Veil. Fl. Flnm. ix. 1110 = Philodendion bipinnatifidum.
polymorphum, *Bucil. in Am. Journ. Sc.* xlv. (1843) 173.-Am. bor.
polyphyllum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 393.—Am. austr.
pontieum, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 148 = italicum.
proboscideum, Linn. Sp. PL 966 - Arisamm proboscideum.
ptychiurum, Zipp. ex Kunth, Enum. PI. iii. 26 = Typhonium cuspidatnm.
pulchrum, Salisb. Prod. 260-Caladium bicolor.
pumilum, Kotschy, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 586—philistaenm.
pumilum, Lam. Encyc iii. 8-Typhonium trilobatum.
punctatum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 385 = Alocasia indica.
punctulatum, Zipp. ex Kunth, Enum. PL iii. 34 = Amorphophallus bnlbifer.
purpareum, *Thunb. Fl. Jem.* 20.—Japon.
pyrenaeum, Dufonr, in Lap. Hist. Abr. PI. Pyr. Suppl. 143—maculatum.
Pythonium, Mart Auswahl, 18 — Zomicarpa Pythonium.
quinatum, Nutt. Gen. Am. ii. 222 - Arisaema quinatum.
ramosum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 894.—Hab.?
rapiforme, Koxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 497 = Alocasia rapiformis.
Rauwolffii, Blume, Rumphia, i. 122 = Helicophyllnm Rauwolffii.
regnium, Rodsch. 'in Bald. Dlar. xxviii. 32'; ex G. F. W. Mey. Esseq. 273-Dieffenbachia Seguine.
ringens, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 337.—Japon.
Rumphii, Gandich. in Freyc. Voy. Bot 127. t. 84 = Amorphophallus campanulatus.
rnpicola, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 7.—Syria.
sagittaefolium, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 143 — Caladium hastifolium.

ABTTM:—
sagittaefolium, Linn. Sp. PI. 966-Xanthosoma sagittaefolinm.
sagittatum, *Noronha, in Verh. Baton. Gen. v. {1790)* ed. I. Art. IV. 4.—Malaya.
sagittifolium, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 893 = Xanthosoma hastifolium.
sagittifolium, Rodsch. Observ. 80 = Urospatha sagittifolia.
Satensoo, Burger, ex Knnth, Enum. PL iii. 19—Arisaema japonicum.
Segu\\ne, Jacq. Enum. PL Carib. 81-Dieffenbachia Seguine.
Seguinum, Linn. Sp. PL ed. II. 1371-Dieffenbachia Seguine.
seJSu'miThmib. in Trans. Linn. Soc iL (1794) 838 - Arisaema japonicum.
sessiliflorum, *Roxb. Hort. Beng.* 65 ; *Fl. Ind.* iii. 507. —Ind. or.
simlense, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 671 =Sauromatum venosum.
spedosum, WalL Tent. Fl. Nep. 29. t. 20 = Arisaema speciosum.
spectabile, Schott, in Oestr. Bot. Woehenbl. (1867) 175 —Dioscoridis.
spectabile, Zipp. ex Kunth, Enum. PL iii. 34-Amorphophallus bulbifer
spiculatum, Blume, Rumphia, L 121-Helicophyllnm crassipes.
spirale, Retz. Obs. i. 30 -Cryptocoryne spiralis.
spirale, Salisb. Prod. 259 - Helicodiceros crinitus.
stercorarium, Zipp. ex Kunth, Enum. PL iii. 33-Amorphophallus variabilis.
strepsiceros, *Sieber, ex Steud. Norn.* ed. II. L 143.—Palaestina.
subulatum, Desf. Cat. H,ort. Par. ed. III. 7 et 886 = Pinellia tuberifera.
syhaticum, Roxb. Hort Beng. [108]; Fl. Ind. iii. 511 sSynantherias silvatiens.
syriacum, Blume, Rumphia, i. 119-Dioscoridis.
syriacum, Spreng. Syst iii 768-Bianim Rnssellianum.
tenuifolium, Linn. Sp. PI. 967 - Biarum tenuifohum.
ternatum, Thunb. Fl. Jap. 233-Pinellia tuberifera.
tortuosum, Wall. PL As. Rar. iL 10=Arisaema tortuosum.
irapeBuntinum, Schott, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 592-italicum.
trifidum, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 7 et 885-Hydrosme FontaneriL
trifoUatum, *Noronha, in Verh. Baiav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 4.—Malaya.
trilobatum, Linn. Sp. PI. 965-Typhonium dlvaricatum.
trilobatum, Thnnb. Fl. Jap. 234 - Pinellia tripartita.
tripartitum, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 38. t. 190-Philodendron tripartitum.
triphyllum, Houtt. Plantenk. ii. II. 184-Pinellia tuberifera.
triphyllum. Linn. Sp. PL 965 =• Arisaema atrorubens.
triphyllum, Thunb. Fl. Jap. 233 = Arisaema ringens.
•cariolatum, Schott, Prod. Aroid. 81 = Xanthosoma violaceum.
venosum, Ait Hort. Kew. iii. 316— Sauromatum gnttatum.
venosum, Balb. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 487 —Xanthosoma helleborifolium.
ventricosum, *Hoffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* ii. 25.—Bras.
vermitoxicum, Veil. FL Flum. ix. t 108 - Caladium bicolor.
vernale, Salisb. Prod. 261—maculatum.
virginicum, Linn. Sp. PI. 966=Peltandra virginica.
viviparum, Roxb. Hort Beng. 65; Fl. Ind. iii. 496 = Remusatia vivipara.
virescens, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 6. —Persia.
vittatum, Salisb. Prod. 260-Arisaema atrorubens.
vulgare, Lam. Fl. Fr. iii. 537-maculatum.
xanthorrhiion, Jacq. Hort. Schoenbr. ii. 32-Xanthosoma sagittifolinm.
Zelebori, Schott, Prod. Aroid. 94 - maculatum.

ARUNA, Schreb. Gen. i. 26 (1789) - AROUNA, Aubl. - Dialium, Linn. (Legumin.).

ARUNCUS, Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. 310 (1787)=Spiraea, Tourn. (Rosac).
americanus, Rafin. Sylva Tellur. 152 - S. Arnncus.
astilboides, Maxim, in Act. Hort Petrop. vi. (1879) 171=S. Aruncus.
Sylvester, Kostel. Ind. Hort. Prag. 15=S. Aroncus.
vulgaris, Rafin. Sylva Tellur. 152 - S. Aruncus.

ABTTNDINA, Blume, Bijdr. 401 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 521.
DILOCHIA, Lindl. Gen. et Sp. Oreh. 88 (1830).
affinis, Griff. Notnl. iii. 3S0=chinenBis.
bambusifolia, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 8751.—Ind. or.; Malaya.
chinensis, *Blume, Bijdr.* 402.—Reg. Himal.; China,
densa, *Lindl. in Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 25.—Singapore.
Meyenii, *Reickb. f. in Linnaea,* xxv. (1852) 227.—China.
minor, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 125.—Zeylan.
pentandra, *Reichb.f. Xenia Orch.* ii. 11.—Java.
Philippi, Reichb. f. in Linnaea, ixv. (1862) 227-=chinensis.
pnlchella, *Teijsm. V Binn. in Nederl. Kruid. Areh.* iii. (1855) 400.—China,
pnlchra, *Miq. in Journ. Bot. Neerl.* i. (1861) 90.—China.
speciosa, Blnme, Bijdr. 401. t. 73=densiflora.
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PL Tahiti,* 37.—Ins. Pacif.
Wallichii, *Reichb. f. Xenia ~\}rch.* ii. 18. t. 105.—Malaya.

ABTJNDINARIA, Michx. FI. Bor. Am. i. 73 (1803). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1207.
LUDOLFIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 320.
MACRONAX, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 352.
MIEGIA, Pers. Syn. i. 101 (1805).
THAMNOCALAMUS, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) S3.
TRIGLOSSUM, Fisch. Cat. Jard. Gorenk. (1812).
acnminata, *Munro, in- Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 26.—Mexic.
amplissima, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 479.—Bras,
aristulata, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 165.—Bras.
attenuate, *Doell, I. c.* 170.—Bras.
bambusina, Trin. Fund. Agrost 97=macrospeima.
callosa, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) SO.—Reg. Himal.
debilis, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 375.—Zeylan.
decalvata, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 170.—Bras.
densifolia, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 82.—Zeylan.
distans. *Trin. in Mint. Acad. Pitersb. Sit.* VL iii II. (1835) 621.—Bras,
elegans, *Kurm, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 249.—Banna,
falcata, *Nees, in Linnaea,* ix. (1884) 478.—Reg. Himal.
dexuosa, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 339.—China.
floribunda, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 375.—Zeylan.
Fortunei, Fenzi, in Gard. Chron. (1876) II. 778=Simoni.
Fortnnei, *Rivihe, in Bull. Soc. Acclitn. Sir.* III. v. (1878) 897.—Japon.
gigantea, *Nutt. Gen. Am.* i. 89.—Am. bor.
glaucescens, *Beauv. Agrost.* 144, 152.—Ind. or.; China?
Grimthiana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvL (1868) 20.—Reg. Himal.
Hindsii, *Munro, I. c.* SI.—Hongkong,
hirsuta, *Munro, 1. c.* 80.—Reg. Himal.
hispida, Stend. Syn. PI. Gram. 385 = Wightiana.
Hookeriana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi (1868) 29.—Reg. Himal.
intermedia, *Munro, I. c.* 28.—Reg. Himal.
interrupta, Trin. in Mem. Acad. Pitersb. Sér. VL iii. II. (1835) 620=&lcata.
japonica, *Sieb. tf Zucc. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 384.—Japon.
khasiana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 28.—Reg. Himal.
knrilensis, *Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* viil (1860) 121.—Ins. Kurd*.

ABUffDINABIA :—
longifolia, *Fount. Mex. PI. Enum. Gram.* 131, *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ill 686.—Mexic.
longiramea, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi (1868) 19= sinica.
macrosperma, *Michx. Ft. Bor. Am.* i. 74.—Am. bor.
macrostachya, *Nees, in Linnaea,* ix. (1884) 481.—Bras.
MaximomicBii, Hort. ex A. & C. Riviere, in Boll. Soc. Acclim.Sdr.III. v. (1878) 788=Simoni
Metake, Siebold, ex Miq, Ann. Mus. Bot Lugd. Bat.ii. 284= japonica.
microphylla, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 32.—Reg. Himal.
moliniformis, Hochst. ex Munro, 1. c. 19=Wightiana.
multiflora, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 166.—Bras.
parviflora, Trin. in Mem. Acad. P&ersb. 5er. VI. iii. II. (1835) 619=Arthrostylidium Trinii.
pinifolia, Nees, in Mart FI. Bras, il 625=Chusquea pinifolia.
procera, Wall, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 34=spathiflora.
racemosa, *Munro, I. c.* 17.—Reg. Himal.
radiata, *Rupr. in M(m. Acad. Pitersb.* Sér. VI. v. (1839) 116. -i. 15. f. 9.—Bras.
Schomburgiii, Benn. in Trans. Linn. Soc xviil (1841) 562 - Arthrostylidium Schomburgkii.
Simoni, *A.&'C. Riviere, in Bull. Soc. Acclim.* Sér. III. v. (1878) 774.—China,
sinica. *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviil (1862) 235.—China,
spathiflora, *Tnn. in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. iii. II. (1835) 617.—Reg. Himal
stolonifera, Knrz, Cat. Hort. Bot Calcnt. 79=Phyllostachys nigra.
suberecta, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 82.—Reg. Himal.
tecta, *Muhl. Desc. Uber.* 191.—Am. bor.
tessellata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi (1868) 81.—Afr. austr.
Trianae, *Munro, I. c.* 25.—N. Granat.
Trinii, Hack, in Mart Fl. Bras. ii. HI. 174=Arthrostylidium Trinii.
utilis, Cleghom, in Journ. Agr. Soc. Ind. xiiL (1865) 388 = falcata.
verticillata, *Nees, m Mart. Fl. Bras,* il III. 523.—Bras.
Walkeriana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 21.—Zeylan.
Wightiana, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 482.—Ind. or.
Wightiana, Thw. Enum. PI. Zeyl. 444 = Walkeriana.
Wightii, Benth. FL Hongk. 434-sinica.

ABTTNDINEIIIIA, Raddi, Agrost Bras. 87. t. 1 (1823). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1118.
ACRATHERUM, Link, Hort. Berol. i. 230 (1834).
BRANDTIA, Kunth, Rev. Gram. ii. 511. t 170 (1830).
CALAMOCHLOE, Reichb. Consp. 52 (1828).
GOLDBACHIA, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 81 (1821).
RIEDELIA, Trin. ex Kunth, Enum. PI. L 515 (1888).
THYSANACHNE, Presl, Thysan. Nov. PL Gen. (1829); et Rel. Haenk. i. 252 (1830).
Acratherum, *Nees, ex Steud. Nam.* ed. II. L 148.—Ind. or.
agrostoides, Trin. Ic. xxiii. t. 265 » holcoides.
anomala, *Steud. Syn. PI. Gram.* 116.—Japon.
auletica, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. (1842) II. 242 =Deppeana.
avenacea, *Munro, ex Thw. Enum. PI. Zeyl.* 862.—Zeylan.
brasiliensis, *Raddi, Agrost. Bras.* 37.—Bras,
ciliata, *Nees, ex Miq. in Verh. Nederl. Inst.* III. iv. (1851) 30.—Ind. or.
crinita, *Trin. in Linnaea,* x. (1886) 299.—Peruv.
cubensis, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1868) 638.—Ind. occ.
Deppeana, *Nees, in Bonplandia,* iii (1856) 84.—Mexic
Ecklonii, Nees, Fl. Afr. Austr. 80=nepalensis.
elegantula, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 288.—Aft. occ
flammida, *Trin. Gram, Sp.* xxiii. t 267.—Bras,
fuscata, *Nees, ex Buese, in Miq. PI. Jungh.* 369.—Ind. or.
glabra, *Hook. & Am. Bat. Beech. Voy.* 287.—China.

ARUNDINELLA :—
Goeringii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 116.—Japon.
hirsuta, Hochst. ex Steud. 1. c. 115 =setifera.
hirsuta, *Nees, ex Steud. I. c*—Reg. Himal.
holcoides, Trin. in Bull. Sc. Acad. P&ersb. i. (1836) 71 =Brandtia holcoides.
indica, *Trin. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 143.—Ind. or.
khasiana, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 115.—Reg. Himal.
latifolia, Foum. Mex. PI. Enum. Gram. 54; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 616 = Deppeana.
martinicensis, *Trin. Gram. Panic,* ii. 62.—Ins. Martinic
mesophylla, *Nees, ex Steud. Syn. PL Gram.* 115.—Ind. or.
Metzii, *Hochst. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst.* III. iv. (1851) 31.—Ind. or.
Mihani, Nees, Agrost. Bras. 465=brasiliensis.
mutica, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 116.—Ind. or.
nepalensis, *Trin. Sp. Gram.* t. 268.—Ind. or.
nervosa, Nees, ex Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 287 =Panicum semialatum.
pallida, *Nees, Agrost. Bras.* 465.—Mexic.
peruviana, *Steud. Syn. PL Gram.* 115.—Peruv.
phragmitoides, *Griseb. Cat. PL Cub.* 234.—Cuba.
pilosa, Hochst. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. iv. (1851) 30-ciliata.
pumila, *Steud. Syn. PL Gram.* 114.—Abyss,
purpurea, *Hochst. ex Steud. I. c.* 116.—Ind. or.
rigida, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 80.—Afr. austr.
Schultzii, *Benth. Fl. Austral,* vii. 546.—Austral.
scoparia, Fourn. Mex. PI. Enum. Gram. 65; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 515=Deppeana.
setifera, *Steud. Syn. PL Gram.* 115.—Ind. or.
setosa, *Trin. Gram. Panic.* 65.—Nepal,
stipoides, *Hack, in Sit»b. Acad. Wien,* lxxxix. (1884) 128.—Madag.
stricta, *Nees, in Hook. Kern Journ.* ii. (1850) 102.—Hongkong,
tenella, *Nees & Wight, ex Steud. Norn.* ed. II. L 143.—Ind. or.
tricuspidula, *Buese, in Miq. PL Jungh.* 860.—Java,
villosa, *Am. ex Steud. Syn. PL Gram.* 116.—Zeylan.
Wallichii, *Nees, ex Steud. 1. c.* 114.—Ind. or.
Zollingeri, *Steud. 1. c.* 115.—Java.

ARUNDO, Beauv. Agrost. 60. t 13. *i.* 2 (1812) > PhragmiteB, Trin. (Gram.).

ARUNDO, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 19 (1787). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1179.
AMPHIDONAX, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 449 (1836).
DONACIUM, Fries, Bot. Notiser, (1843) 181.
DONAX, Beauv. Agrost. 77 (1812), pro parte.
SCOLOCHLOA, Mert. & Koch, in Roehl. Dentschl. Fl. i. 528 (1823).
acutiflora, Pollini, Fl. Veron. i. 88=Deyeuxia varia.
acutifiora, Schrad. Fl. Germ. L 217=Deyeuxia acutiflora.
aegyptia, Delile, FL Aeg. IUustr. 4-A. Donax.
aegyptiaca, Hort. ex Vilm. Fl. PL Terre, ed. III. 984-praec.
aggerum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 807.—Enrop.
agrestis, Lour. Fl. Cochinch. 57=Bambusa agrestis.
Agrostis, Lap. ex Willk. & Lange, Prod. FI. Hisp. i. 88=Molinia caemlea.
Agrostis, Scop. FI. Cam. ed. II. i. 88= Deyeuxia acutiflora,
Agrostis, [Weber, in] Wigg. Prim. FL Holsat. 10 = Deyeuxia acutiflora ?
agrostoides, Pursh, Fl. Am. Sept L 86=Deyeuxia canadensis.
airaeformis, *Raddi, Obs. Madera,* 10.—Madera.
airoides, *Poir. Eneyc.* vi. 270.—Am. bor.
Alopecuros, Gaudich. ex Urv. in M^m. Soc Linn. Par. iv. (1826) 602 = Festuca Alopecuros.
alpestris, Hall, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. il 60S" Deyeuxia Halleriana.
alpina, [Honck.l Verz. Gew. Teutschl. 321; Schult. Oestr. FL ed. II. i. 189=Calamagrostis tenella.
alpina, Vill. ex Kunth, Enum. PL i. 238'Deyeuxia Halleriana.
altissima, Benth. Cat. PL Pyr. 62=Phragmites commnnis.
Ampelodesmos, Cyrill. PL Rax. Neap. Fasc. ii. 80 = Ampelodesma tenax.
annulata, Roem. *Sc* Schult. Syst il. 603^*Calamagrostis littorea.

ARUNDO :—
Antarctica, Urv. in Mem. Soc Linn. Par. iv. (1828) 602 = Festuca antarctica.
arborea, Mill Gaid. Diet. ed. VIIL n. 6-Bambusa arundinacea.
arenaria. Goiter, FL Ingr. 18-Deyeuxia neglects.
arenaria, Linn. Sp. PI. 82-Ammophila arundinacea.
"gentea, \Clairv] *Man. Herb.* 16.-Helvet.
australis, Cav. ex Roem. & Schult. Syst U. 511 = roragmitet australis.
"*Gratis,* A. Rich. ex. Stead. Norn. ed. II. i. 148, 250 "conspicua.
baltica, Flnegg. ex Schrad. Fl. Germ. 228. t 5. f. 4-f unmophila baltica.
Bambos, Barm, ex Stead. Norn. ed. II. i. 148=Bambusa agrestis.
oantAoj, Linn. Sp. PI. 81 = Bambusa amndinacea.
Bambu, Lour. FL Cochinch. 66=praec
ngalensis, Boi. Hort. Maurit 868=Phraemitescommnnis.
t*ngalensis, Ret». Obs. r.* 20.—Bengal
bicolor, *Desf. Fl. Atlant.* i. 107; *Pair. Voy. Barb.* ii. 104.-Afr.bor.
bersteiniana, Roem. & Schult. Syst. U. Mint 285 =Calamagrostis littorea.
«6ria, tfrf,. Ofe. i. 29.—Ind. or.
flora, Lam. Ulustr. i. 196=Ampelodesmos tenax.
Boivini, *Steud. Syn. PI. Gram.* 428.—Madag.
nyvipilii, Torr. Fl. U. St 95 = Ammophila brevipilis.
Calamagrostis, Bieb. Fl. Taut. Cauc. i. 78; ii. 466= Calamagrostis epigeios.
Calamagrostis, Hall f. in Roem. Arch. *i.* II. 10= Deyeaxia Halleriana.
Calamagrostis, Leyss. Fl. Halens. 28-Deyeuxia sylvatica.
Cdamagrostis, Linn. Sp. PL 82=Calamagrostis lanceolata.
Catamaria, Salisb. Prod. 24 = Calamagroitis lanceolata.
'lyeina, WiUd. ex Steud. Norn. ed. IL i. 144 = niUda.
'tnadensis, Michx. Fl. Am. Bor. i. 78-Deyeuxia canadeasis.
<">*nadensis,* Steud. Norn. ed. II. i. 144-Deyeuxia Nuttalliana.
onescens, [Weber, inl Wigg. Prim. Fl. Holsat 10 = Calamagrostis epigeios, lanceolate.
"*mila,* Molina, ex Steud. Syn. PI. Gram. 836=Chusquea Cumingii.
capillata, *Nem. ex Chaub. in Actes Linn. Soc. Bord.* »* (1853)44.-Hab.?
°>ta, *[Clairv'i Man. Herb.* 16.-Helvet
""*noides,* Muhl. Desc Uber. 187-Deyeuxia Nuttalliana.
c'«rto»ů,Loisel. Fl. Gall. 719=Deyeuxia Halleriana.
vnrctata, Poir. Encyc. Suppl. iv. 704 = Deyeuxia coarctata.
'oarctata, Torr. Fl. U. St. 94-Deyeuxia Nuttalliana.
«>»>ia, Tenore, Fl. Nap. t 108 = Pliniana.
e«o»ora. Ait. HortKew.i. 116=Phalaris amndinacea.
e°*nfinis,* Willd. Enum. Hort. Berol. 127-Calama-Rrostis confinis.
Cons Picua, *Forst.f. Prod.* 9.—N. Zel.
^*tracta,* Gilib. Exerdt. it S42 = Calamagrostis "nceolata.
cuspidata, Schult Mant. iii. 604-Calamagrostis cuspidata.
Vlindrica, J. Gay, ex Steud. Norn. ed. II. i. 144-. .Deyeuxia aeutiflora.
a*orca, Spreng. Syst. i. 861-Gynerium argenteum.
*J«ca, *Lour. Fl. Cochinch.* 70.—CocUnch.
D°*nax,* Georgi, Beschreib. RUM. Reich. iii. IV. 706= Anmdinaria kurilensis.
"°nw, *Linn. Sp. PI.* 81.—Reg. Mediterr.: Oriens.
Wusa, C. C. Gmel. FL Bad. 262-Calamagrostis uttorea.
^""«i Poir. Eneyc Snppl. iv. 706=Deyenxia effusa.
"•*gmontiana,* Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 511=Phragnutes Egmontianus.
'frgrios, Trorsk. ex Steud. Norn. ed. II. i. 144 = imperau arundinacea.
'Pi*e as, Huds. Fl. Ang. ed. I. 48; ed. IL 64 = Calamagi i s UnceoUta,
epigeios, Linn. Sp. PI. 81-Calamagrostis epigeios.
erianthe, Poir< Encyc> SuppL iv,, 706 =Deyeuxia erianthe.
'*cels*a*, Salisb. Prod. 24-Bambusa arundinacea.
J«rcta, Aubl. PL GuLi. 62=Calamagrostis farcta.

ABUISTDO:—
fastucsa, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 144 = Gynerinm saccharoides.
Fax, Lour. FL Cochinch. 68=Melocanna humilis.
festucacea, Willd. Enum. Hort. BeroL 126-Graphephorum amndinaceum.
.*festucoides,* Desf. Fl. Atlant. i. 108 = Ampelodesmos teoax.
filiformis, *Hassk. in-Hon. V De Vriese, Tijdschr.* x. (1848) 117.—Java.
fissa, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. L 144 = Deyeaxia canadensis.
flexuosa, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. 29. t. 4 = Phragmites flexuosus.
flexuosa, [Chirr.] Man. Herb. 16=Aira fleruosa.
fnlvida, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* vi. (1874) 242. —N. Zel.
Gayana, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 326.— Valdivia.
gigantea, Walt Fl. Carol. 81 = Arnndinaria macrosperma.
glauca, Bieb. Fl. Taur, Cauc i. 79 - Calamagrostis littorea.
glauca, Horaem. Hort. Hani. 74=Deyeuxia Nuttalliana.
graeca, Link, is Linnaea, ix. (1884) 186=Phragmites communiSi
groenlandica, Schrank, in Regensb. Denkschr. i. II. (1818) 8=Calamagrostis groenlandica.
Halleri, WUld. Prod. Fl. Berl. 60=Stipa Calamagrostis.
Halleriana, Gaud. Agrost Heir. i. 97 = Deyeuxia Halleriana.
Henslowiana, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 248.—China.
Hostii, Roem. *Sc* Schult. Syst ii. 508-Deyeuxia varia.
humilis, Roem. & Schult 1. c 510-Calamagrostis lanceolata, tenella.
hyperborea, Trin. ex Steud. Syn. PL Gram. 286 (=*Dupontia psilothantha).*
indica, *Noronha, in Verh.Batm. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 7.—Malaya.
intermedia, C. C. Gmel. Fl. Bad. L 266 = Calamagrostis epigeios.
isiaca, Delile, Fl. Aeg Illnstr. 82=Phragmites communis,
junciformis, Poir. Encyc. Suppl. iv. 705-Deyeuxia jondfonnis.
Kakao, Steud. Syn. PI. Gram. 194-conspicuaf
Karka, *Rets. Obs.* ir. 21; *Roxb. Hort. Beng.* 8; *Fl. Ind.* i. 348.—Ind. or.
Kilo, Spreng. ex Steud. Nom.ed. II. i. 144-Gynerium argenteum.
laevis, Steud. Nom. ed. II. i. 144=?<ta laevis.
Langsdorfii, Link. Enum. Hort Berol. i. 74 - Deyeuxia purpurea.
lapponica, Wahlenb. Fl. Lapp. 27. t. 1 = Deyeaxia lapponica.
latifolia, Salisb. Prod. 24=A. Donax.
laxa, Roem. & Schult Syst ii. 603= Calamagrostis littorea.
Leersii, Oett. Syst Verz. Oberlaus. 17-Calamagrostis lanceolata.
Leersii, J. Koch, Handb. 49 = Stipa Calamagrostis.
levis, Poir. Encyc Suppl. iv. 707 - Poa laevis.
ligulata, *Poir. I. c.* 706 = Deyeuxia ligolata.
lithuanica, Schult Mant. ii. 602 - Calamagrostis lonceolata.
litorea, Schrad. FL Germ. 212—Calamagrostis littorea.
littoralis, Stead. Nom. ed. II. i. 144 - Ammophila arondinacea.
madagascariensis, *Kunth, Rev. Gram.* L 273. t 48.—Madag
maritimai *Agardh, in Flora,* vii. (1824) 581.—Scandin.
mauritanica, Poir. Voy. Barb. ii. 104; Desf. FL Atlant. i. 106=Pliniana.
maxima, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 24-Phragmites communis.
maxima, Lour. Fl. Cochinch. 58-Bambusa maxima.
mierantha, Lam. Ulustr. i. 196-Pliniana.
minudflora, *Brongn. in Duperr. Voy. Bot.* 29.—Ins. Molucc
mitis, Lour. Fl. Cochinch. 67-Bambusa mitis.
montana, [Clairr.] Man. Herb. 15—Deyeuxia montana.
mmtana, Roem. Sc Schult. Syst. ii. 508-Deyeuxia sylvatica.
multiplex, Lour. FL Cochinch. 58 - Gigantochloa verticillata.

ABJTNDOt—
Naga, Koen. ex Steud. Nom. ed.II.i.144-Phragmites australis.
Naya, Koen. ex Steud. L c. ii. 321 -praec
neglecta, Ehrh. Beitr. vi. 84,137—Deyeuxia neglecta.
nemorosa, Schult. Oestr. FL ed. II. i. 187-Deyeuxia varia,
nitida, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* L 149. t. 688.—Ecuador,
occidentalis, *Sisber, ex Schult. Mant.* ii. 289.—Ins. Martin.
orieutalis, Mill. Gard. Diet ed. VHI. n. 6-Sacchanun ńscum.
pallens, *Muhl. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 144.—Am. bor.
palustris, Salisb. Prod. 24—Phragmites communis.
penidllata, LabilL NOT. Holl. PI. i. 26-Danthonia racemosa.
Phragmites, linn. Sp. PI. 81—Phragmites communis.
picta, Kunze, ex Steud. Nom. ed. II. i. 144-Poa picta.
pilosa, *Urv. in Mim. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 608.—Ins. Falkland.
piscatoria, *Lour. Fl. Cochinch.* 55.—Cochinch.
plani/olia, Poir. Encyc. Suppl. iv. 707 = Deyeuxia planifolia.
plebica, Poir. L c-Deyeuxia plebeia.
Pliniana, *Turra, Farset.* 11; *Fl. Hal. Prod.* 63.—Reg. Mediterr.
Plinii, Turn, Farset. 11-Pliniana.
plumosa, Schnlt. Mant. 604-Stipa papposa.
poaeformis, LabilL Nov. Holl. PL i. 27. t 35-Poa Billardieri.
poaeoides, Poir. Encyc Suppl. iv. 705 = Poa subuniflora.
Pseudophragmites, HalL *I* ia Roem. Arch. i. II. 11 = Calamagrostis littorea.
Pseudophragmites, Lejeune, Fl. Spa, 64=Pbragmites communis.
Pseudophragmites, Schrad. FL Germ. 213-Deyeuxia Halleriana.
Pseudophragmites, Wahlenb. FL Lapp. 28-Calamagrostis lapponica.
pungens, Auct ex Steud. Nom. ed. II. i. 144-Phragmites communiSa
pUTpurascens, Schult Mant. iii. 60S—Deyeuxia pur. purascens.
purpurea, Trin. in Spreng. Nene Entdeck. ii. 62 = Deyeuxia purpurea.
pygmaea, *Moretti, ex Pollini, in Brugnat. Giorn. Fis.* ix. (1816) 22.—Italia.
Pygmaea, Spreng. Pugill. i. 9=Trisetum hispanicum.
Quila, Molina, Sagg. Chil. 279 = Chusquea Femandeziana.
Quila, Poir. Encyc vi. 274 = Chusquea Quila.
quitensis, Poir. 1. c Suppl. iv. 704 = Muehlenbergia calamagrostidea.
Ragamowskii, Hort.—Cf. Card. Cbron. (1876) II. 847 -Hambusa tessellata.
ramosa, Schult Oestr. Fl. ed. II. i. 186 - Calamagrostis lanceolata.
recta, Poir. Encyc. Suppl. iv. 706-Deyeuxia recta.
Reynaudiana, *Kunth, Rev. Gram.* i. 276. t 49.—Pegu.
rigida, Poir. Encyc. Suppl. iv. 706=Deyeuxia rigida.
riparia, Salisb. Prod. 24—Phalaris arnndinacea.
riparia, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 144 = Calamagrostis lanceolata.
rivularis, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. L 144=Phrag-
Roxburghii, Kunth, Rev. Gram. i. 79-A. Karka.
Rugi, *Molina, Sagg. Chil.* 279.—Chili.
Sabuli, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 306.—Europ.
saccharoides, Poir. Encyc. Suppl. iv. 703-Gynerium saccharoides.
sagittata, Pers. Syn. i. 102 - Gynerium saccharoides.
sativa, Lam. Fl. Fr. iii. 616 = A. Donax.
Schleicheriana, Bess. FL Galic i. 69=Calamagrostis lanceolata.
Schwabii, Schult. Mant. iii. 603 = Gastridium australe.
scriptoria, Linn. Amoen. Ac. iv. 150-A. Donax.
sedenensis, Loisel. Fl. Gall. 719-Deyeuxia varia.
Selloana, Schult. Mant iii. 606 = Gynerium argentenm.
semiannularis, LabilL Nov. Holl. PL i. 26. t 88-Danthonia semiannularis.
semifarcta, Hort. Ticin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 144 =Pliniana.
speciosa, Schrad. Fl. Germ. i. 219. t. 6. f. 8=Stipa Calamagrostis.

AKTTKDO:—
spUndida, Schkr. ex Steud. Norn. ed. II. i. 144 = Deyeuxia acutiflora.
strieta, Gilib. Exercit. ii. 542-Calamagrostis epigeios.
stricta, Hofft. Cat. Kursk. 7 =Deyenxia neglecta.
strieta, Spreng. Nene Entdeck. i. 247 =- Deyeuxia Nuttalliana.
strieta, Timm, in Siemss. Meklenb. Mag. ii. 2S5, ex Schrad. Fl. Germ. 215 = Deyeuxia strieta.
strigosa, Wahlenb. Fl. Lapp. 29. t 2 = Deyeoxia strigosa.
subulata, J. Gay, ex Reichb. FL Germ. Excura. 27 = Deyenxia acutiflora.
sylvatiea, Schrad. FL Germ. i. 218. t. 4. f. 7 = Deyeuxia sylvatiea.
Tabacaria, Lour. Fl. Cochinch. 58 = Bambusa Tabacaria.
tecta, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 48=A. Karka.
tecta, Walt. Fl. Carol. 81=Arundinaria tecta.
tenax, Vahl, Symb. Bot ii. 25=Ampelodesmos tenax.
tenella, Schrad. Fl. Germ. 220 - Calamagrostis tenella.
tenella, Spreng. Pugill. ii. 6 = Muehlenbergia tenuifolia.
tenuifolia, Poir. Encyc. Suppl. iv. 704 •= Muehlenbergia tennifolia.
tolucensis, Poir. 1. c, 705 = Deyeuxia tolucensis.
triodioides, Trin. Sp. Gram. t. 851 = Schedonorus littoralia.
valdiviana. *Molina, Saggio Chil.* 279.—Chili.
Vallatoria, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 128 = Phragmites communis.
varia, Schrad. Fl. Germ. 216-Deyeuxia acutiflora.
versicolor, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 - A. Donax.
villosa, Auct ex Schult. Mant iii. 287=Calamagrostis syWatica.
Tillosissima, *Forsi. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 145.—Reg. Byzant
vilnensis, Schult. Mant iii. 602 = Calamagrostis lanceolata.
virideseens, Steud. Syn. PL Gram. 192=seq.
viridiflavescens, Poir. Encyc vi. 271 = Deyeuxia yiridiflavescens.
vulgaris, Lam. Fl. Fr. iii. 615 = Phragmites communis.
vulnerans, Gilib. Exercit. ii. 541=Phragmites communis.
Webbiana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 194.—Afir. austr.
Wilhelmsii, Ledeb. in Mém. Acad. Pctersb. vi. (1814) 59S = Trisetum rigidum.
Zollingeri, *Buese, in Miq. PL Jungh.* 248.—Java,

ARUNGANA, Pers. Syn. ü. 91 (1807) = Haronga, Thou. [1809] (Hyperic).
crenata, Pers. 1. c = H. crenata.
mollusca, Pers. 1. c — H. mollusca.
paniculata, Pers. 1. c.=H. madagascariensis.

ARUNIA, Pers. Syst 251 (1797), *sphalm. =Brvnia,* Linn.

ARVERSIA, Cambess. in St. HiL Fl. Bras. Mer. ii. 184. t. 112 (1829) =Folyoarpon, Linn. (Caryophyll.).
depressa, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. i. 140 = P. depressum.
frankenoides, Cambess. in St. HiL Fl. Bras. Mer. ii. 184 = P. depressum.
Loeffiingii, Walp. Rep. i. 268=P. depressum.

ARVIELA, Salisb. Gen. PL Fragm. 185 (1866)-Zephyranthes, Herb. (Amaryll.).
tubispatka, Salisb. 1. c.=Z. tubispatha.

ARYTERA, Blume, RumphU, iH. 170 (1847)=Batonia, DC. (Sapind.).
angustifolia, Radlk. in SiUb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 552.—Hab.?
areuata, Radlk. 1. c. 554.—N. Caled.
brachyphylla, Radlk. L c 652.—N. Gain.
Bradunridgei, Radlk. 1. c. 656.—Ins. Fiji.
chartacta, Kadlk. 1. c. 558.—Hab.!
distylis, Radlk. 1. c—Austral.
divaricata, F. MuelL in Trans. Phil. Inst. Victoria, iii. (1869) 25 = Nephelium divaricatum.
fmeolata, F. Muell. 1. c.=Nephelium foveolatum.
gigantosperma, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 674__Sumatra.
Karang, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 610.—Sumatra.

ARYTERA:—
Leichhardtii, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 563.—Austral.
lepidota, Radlk. 1. c. 555.—N. Caled.
littoralis, Blume, Rumphia, iii. 170.—Sumatra.
macrocarpa, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. i. 510 =-Triomma malaccensis.
microphylla. Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 558.—Austral.
montana, Blume, Rumphia, iii. 171.—Malaya.
morocarpa, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. i. 610.—Sumatra.
oligolepis, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 555.—Ins. Navig.
O'Shanesiana, Radlk. 1. c. 554.—AustraL
pachyphylla, Radlk. 1. c—N. Caled.
ru/escens, Radlk. 1. c 552.—Ins. Philipp.
semiglauea, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Victoria, iii. (1859) 25=Cupania semiglauea.
Silaka, Miq. FL Ind. Bat. SuppL i. 510.—Sumatra.

ASACARA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825)=Gleditaehia, Linn. (Legum.).
aquatica, Rafin. 1. c.=G. monospemu.

A8AEMIA, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 187 (1864), in syn. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 488.
axillaris, *Han. I. c.*—Afr. austr.

A8AGBAEA, Baill. Adansonia, ix. (1870) 282. *LEGUMINOSAE.*
spinosa, *Baill. I. c.* 233.—Am. bor. oca

ASAGRAEA, Lindl. Bot. Reg. t. 88 (1889)=8choenocaulou, A. Gray (Liliac).
earacasana, Ernst, in Joum. Bot (1871) 91 = S. officinale.
caricifolia, Kunth, Enum. PL iv. 666=S. officinale.
officinalis, Lindl. in Bot. Reg. (1889) t. 33=S. officinale.
tenuifolia, Kunth, Enum. PI. iv. 700=S. officinale.

ASAPHES, DC. Prod. ii. 90 (1825)=ToddaUa, Joss. (Rutac).
undulata, DC. 1. c. =T. lanceolata.

ASAPHES, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 222 (1827) = Horina, Tourn. (Dipsac.).
nepalensis, Spreng. 1. c 282 - M. persica.

ASARCA, Poepp. ex Lindl. in Quart. Joum. R. Instit. i. (1827) 52-Chloraea, Lindl. (Orchid.).
acutiflora, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 14. t. 120, A.—Chili.
acuti/olia, Steud. Nom. ed. II. i. 145, sphalm. = praec.
alaris, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 408-C. alaris.
arauacana, Phil, in Linnaea, xxix. (1867-68) 56.—Chili.
aurantiaca, Lindl. in Hook. Joum. Bot i. (1834) 4 = C. aurantiaca.
Berteri, Reichb. £ in Linnaea, xix. (1847) 377.—Chili.
bidentata, Poepp. *Be* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 15. t. 121.—Chili.
brachychila, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1865) II. 332.—Chili.
ckrysostachya, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-68) 55.—Chili.
Commersonii, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 851 = C. Commersonii.
glandulifera, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 14. t. 120. B = C.vol"cris.
Kingii, Hook. f. Fl. Autarct ii. 351.—Reg. Magell.
leucantha, Poepp. *8c* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 18. t 119.—Chili.
maculata, Steud. Nom. ed. II. i. 145»seq.
maculosa, Poepp. Fragm. Syn. PL Chil. 20 = C. galeata.
edoratissima, Poepp. *Be* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 18. t. 118.—Chili
parviflora, Poepp. Fragm. Syn. PL Chil. 20.—Chill
plafyantha, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 862.—Chili.
sinuata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 408 - C. longibracteata.
speciosa, Lindl. in Quart. Joum. R. Instit i. (1827) 62 - C . Pavonii.

ASARfA.—
spectabUis, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 65 *• Chloraea spectabilis.
sulphurea, Phil. 1. c. 57.—Chili.
verrucosa, A. Rich, ex C. Gay, Fl. Chil. v. 465. t. 66 = C. verrucosa.

ASARINA. Toum. ex Mill. Gard. Diet ed. VIII. (1708) ^Antirrhinum, Tourn. (Scrophul.).
cordifolia, Moench, Meth. Suppl. 172=Ant. Asarina.
erecta, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 2 - ' Penstemon,' Mitch.!—Am. bor.
Lobelii, Quer, Fl. Esp. iii. 115. t. 30 = Ant. Asarina.
procumbens, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. l=Ant. Asarina.

ASAKUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *ARISTOLOCHIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 122.
HITEROTKOPA, MOIT. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér.'II. ii. (1834)314.1.10.
HEXASTYLIS, Rafin. Neogenyt. 3 (1825\
albivenium, *Regel, Gartenfl.* xiii. (1864) 296. t 440.—Japon.
arifolium, *Michx. ft. Bor. Am.* L 279.—Am. bor.
Blumei, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 427.—Japon.
canadense, *Linn. Sp. PI.* 442.—Am. bor. *
caulescens, *Maxim, in Bull. Acad. Pltersb.* xvii. (1872) 162.—Japon.
carolinianum, Walt. Fl. Carol. 148=canadense.
caudatum, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1399.—Calif,
caudigerum, *Nance, in Joum. Bot.* xix. (1881) 142.—China.
elegans, *Duck, in DC. Prod.* xv. I. 426.—Japon.
europaeum, *Linn. Sp. PI.* 442.—Europ.; As. Min.; Sibir.
farcatum, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 20.—Am. bor.
grandifolium, *Lodd. Cab. ex Loud. Hort. Brit.* 187.—Am. bor.
grandiflorura, *Klottsch, in Monatsb. Acad. Berl.* (1859) 586.—Am. bor.
grandiflorum, Steud. Nom. ed. II. i. 145 = grandifolium.,
Hartwegii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 346.—Calif.
heterotnpoides, F. Schmidt, Reisen Amnrl. 171 •• Sieboldii.
himalaycum, *Hook. f. V Thorns, ex Klotnsch, in Monatsb. Akad. Berl.* (1859) 585.—Reg. Himal.
Hookeri, Field. & Gardn. Sert. t 82 = caudatum.
Hypocistis, Linn. Sp. PI. 442 = Cytinus Hypocistis.
ibericum, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 553 = europaeum.
latifolium, Salisb. Prod. 344=canadense.
Lemmoni, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 294.—Calif.
leucodictyon, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat ii: 135 =albivenium.
lucidum, Salisb. Prod. 844=europaeum.
maculosum. Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 7=virginicum.
medium, Rafin. New Fl. Am. ii. 20=arifolium!
officinale, Moench, Meth. 292=europaeum.
parviflorum, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866; 89= elegans.
parvi/olium, Rafin. New Fl. Am. ii. 20=virginicum.
renifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 5 = europaeum.
reniforme, Gilib. Exercit. ii. 424=europaeum.
rotundifolium, Rafin. New Fl. Am. ii. 21 — virginicum.
Sieboldii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 134.—Japon.
Thunbergii, *A. Br. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1861) *App.* 18.—Japon.
variegatum, *A. Br. (f Boucht, 1. c.* 12.—Japon.
mllosum, Muhl. ex Duch. in DC. Prod. xv. I. 424 = canadense.
virginianum, Crantz, Inst. i. 134=seq.
virginicum, *Linn. Sp. PI.* 442.—Am. bor.
virginicum, Thunb. Fl. Jap. 190=albivenium.
•*virginicum,* Walt. Fl. Carol. 148=arifolium.
viridiflorum, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (186!!') 83=variegatum.

ASCALEA, Hill, Veg. Syst iv. 14 (1762) = Carduus, Linn. (Compos.).
lanceata, Hill, Hort Kew. 60 = Cnicus lanceolatus.
nutans, Hill, I. c.-Card. nutans.

ASCALONICUM, Renault, Fl. Dép. Ome, 33 (1800) = ~~Aiiinm,~~ Toum. (Liliac.).
sativum, Renault, L c =A1L Ascalonicum.

ASCALONICUM :-
Sckoenoprasum, Renault, Fl. Dép. Orne, 33 (1800)-Allium Schoenoprasum.
Scorodoprasum, Renault, 1. c.=AU. Scorodoprasum.

ASCANICA, Crantz, Inst. ii. 318 (1766)=Pfttagonula, Linn. (Borag.).
patagonica, Crantz, 1. c. = P. americana.

ASCARICIDA, Cass. in Diet. Sc. Nat. iii. Snppl. 88 (1816)=Vernonia, Schreb. (Compos.).
adotnsis, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 358 = V. adoënsis.
anthelminthica. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 219 - V. anthelminthica.
Buehingeri, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 359 = V. Buchingeri.
indiea, Cass. in Diet. Sc. Nat. iii. Soppl. 88 = V. anthelminthica.
Kotschyana, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 859 = V. Kotschyana.
"""sambiquensis, Steetz, L c 858 - V. mossambiquensis.
Xiehardi, Steetz, 1. c.=V. adoënsis.
tnplinervia, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 333-Baccharis triplinervis.

ASCARIDIA, Reichb. Nom. 99 (1841)-praec.

ABCAHINA, Forst. Char. Gen. 117. t. 59 (1776). *CHLORANTHACEAE,* Bentb. & Hook, t iU. 184.
lanceolata, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* i. (1850), 127.-Ins.Padf.
»nada, *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 228.—N. Zel.
lurida, Solms, in DC. Prod. xvi. I. 478=rubricaulis.
Polysuchya, *Forst. Char. Gen.* 69, 117. t. 69.-Ins. Societ.
rubra, Poir. Encyc. ix. 475-Myrica sapida.
rubricaulis, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 478.—N. Caled.
serrata, Blume, Enum. PI. Jav. i. 79 = Chloranthus brachystachyus.

ASCHAMIA, Salisb. Gen. PL Fragm. 184 (1866)-Hippeastrum, Herb. (Amaryll.).
tuestru, Salisb. 1. c. = H. equestre.
Pjittacina, Salisb. 1. c. =H. psittacinum.
Keginae, Salisb. 1. c.=H. Reginae.

ABCHEITBORNIA, Schau. in Linnaea, xix. (1847) ,' W. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 241.
neteropoda, *Schau. I. c*—Mexic.

•WCHENFELDTIA, F. Muell. ex Meissn. in DC. Prod. »v. S15 (1856) = Pimelea, Banks *Sc* Soland. (Thymel.).
pimeleoides, F. Muell. ex Meissn. 1. c. = P. microcephala.

A.8CIADIUM, Griseb. Cat. PI. Cub. 118 (1866). *VMBELLIFERAE.*
coronopifolium, *Griseb. I. c*— Cuba.

ASCLEPIAS, Schreb. Gen. 358 (1789)-=Norantea, Aubl. (Ternstr.).
odantantium, Steud. Nom. ed. II. i. 14B=N. ada•nantium.
"nomalum, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 207-N. anomala.
*A*bUtii,* Spreng. Syst. ii. 599=N. guianensis.
Btrttni, Spreng. 1. c.=N. Berterii.
goyaaense, Steud. Nom. ed. II. i. 145 = N. goyazensis.
Japurense, Steud. 1. c. = N. japurensis.
"orantea, Raeusch. Nom. ed. III. 156-N. guianensis.
paraënse, steud. Nom. ed. II. i. 145=N. paraënsis.
Se!!;o> Spreng. Syst. ii. 599 = N. coneifolia, biasi-,'iensis.
nolaceum, Vahl, Ed. Am. ii. 41. t. 20=N. guianensis.

ASCLEIA, Rafin. Sylva Tellur. 53 (1888) (= I y d n m ? L»p.) (Solan.).
""xicana, Rafin. U { » L capsulare).—Mexic

ASCLEPIAS, Linn. Gen. ed. I. 84 (1737). *ASCLEPIADEAE.* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 754.
ACEKoTis, Rafin. New Fl. Am. i 49 (1886).
CRASSA, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 26 (1745).
DASSOVIA, Neck. Elem. i. 257 (1790).
OLIGORON, Rafin. New Fl. Am. iv. 60 (1836).
OTANEMA, Rafin. 1. c. 61 (1836).
OTARIA, Kunth, in H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 192 (1818).
acanthocarpus, Gmel. ex Decne. in DC. Prod. viii. 571 =Gonolobus hirsutus.
aceratoides, *M. Curt, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. vii. (1849) 407.—Am. bor.
acida, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 81=Sarcostemma brevistigma.
acomuta, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* i. (1865) 64.—Calif.
acuminata, Pnrsh, FL Am. Sept i. 182=rnbra.
acuminata, Roxb. Hort. Beng. 21; Fl. Ind. ii. 55 = Gymnema acuminatum.
acuminata, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 82, 145=Klaprothiana.
aeguicomu, *Fourn. in Mart. FL Bras.* vi. IV. 201.—Bras,
ageratoides, *M. Curt, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. vii. (1849) 407.—Am. centr.
alia, Cav. Ic. iv. 6=Sarcostemma Dombeyanum ?
alba, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 1; Urn. Fl. Fr. ii. 301=Vincetoxicum omcinale.
albiñora, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 62.—Am. bor.
albo-aurantiaca, Hort. ex Jacq. Fragm. 86=nivea.
alexicaca, Jacq. Coll. ii. 101 =Hoya pendula.
alexitoxica, St. Lag. in Ann. Soc. Bot.Lyon, vii. (1880) 120 " Vincetoxicum officinale.
alpina, Veil. Fl. Flnm. 116; iii. t 57=Oxypetalum megapotamicum.
alticola, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 871.—Mexic.
altissima, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 17—Ind. occ.
amoena, Brongn. in Ann. Sc. Nat Sér. I. xxiv. (1831) 275. t. 13=incamata.
amoena, Linn. Sp. PI. 214=purputascens.
amplexicaulis, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 115.—Am. bor.
angulosa, *Regel, Cat. PI. Hort. Atsaiov.* 18.—Hab. J
angustifolia, Ell. Sketch, i. 385-Michauxii.
angustifolia, Hort Berol. ex Roem. *Sc* Schult Syst. vi. 70=praec.
angustifolia, *Schweig. Enum.Pl. Hort. Bot. Regiomont.* (1812) 18.—Mexic
angnstissima, *Anderss. Om Galap. Oarnes Veget.* 136.—Ins. Galapag.
annularia, Roxb. Hort. Beng. 20; FL Ind. il. 87-Holostemma Rheedianum.
aphylla, Bqj. ex Decne. in DC. Prod. viii. 546-Decanema Bojerianum.
aphylla, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 50--=Sarcostemma Forskohlianum.
aphylla, Roxb. ex Wight, Contrib. 60-Sarcostemma brevistigma.
aphylla, Thunb. Prod. PI. Cap. 47=Sarcostemma aphyllum.
Apodnum, Gater. Desc. PL Montaub. 58=syriaca.
arborea, Salisb. Prod. 150=seq.
arborescens, Linn. Mant. 216 = Gomphocarpus arbo-Tescens.
arenaria, *Torr. in Bot. Hex. Bound.* 162.—Am. bor. occ.
argentata, *Nonnha, in Verh. Bator. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 6.—Malaya,
armata, *Spreng. Syst.* i. 849.—N. Granat.
arvensis, Veil. Fl. Flnm. 117; iii t. 63 = Oxypetalnm campestre.
asthmatica, Linn. f. Suppl. 171 =Tylophora asthmatica.
aurantiaca, Salisb. Prod. 150 = curassavica.
auriculata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 191. t. 228.—Mexic.
axillaris, *Veil. Fl. Flum.* 115; iii. t. 61—Bras,
barjoniaefolia, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 372.—Bolivia.
bicolor, Moench, Meth. 717=curassavica.
bidentata, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* ii. 321—Mexic.
Blanchetii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 201.—Brat,
brachystephana, *Engelm. ex Torr. in Bot. Mex. Bound.* 163.—Am. bor. occ.
boliviensis, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1883) 881.—Bolivia,
bracteolata, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 200.—Bras.
trevicornu, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 766 = Asclepiodora decumbens.
Bridgesii, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 388.—Bolivia.
campestris, *Decne. in DC. Prod.* viii. 566.—Bras.
campestris, Veil. Fl. Flum. iii. t 63=Oxypetalum campestre.
cancellata, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 7.—Afr. austr.
Candida, *Veil. Fl. Flum.* 118; iii. t. 65.—Bras.
canescens, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neu. Schr. iii. (1801) 418=Cynanchum glaucum.
canina, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art iv. 6.—Malaya.
carnosa, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.208 = Hoya multiflora.
carnosa, Linn. f. Suppl. 170 = Hoya carnosa.
ciliata, Murr. ex Decne. in DC. Prod. viii. 572=-Xysmalobinm undulatum.
cinerea, *Walt. Fl. Carol.* 105.—Am. bor.
cirrosa, *Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 182.—Afr. trop.
citrifolia, Hook. *Sc* Am. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 295=campestris.
citrifolia, Jacq. Coll. ii. 290=variegata.
clausa, Jacq. Enum. PI. Carib. 17 =Sarcostemma glaucum.
clusiaefolia, *Horsf. ex Roem. (f Schult. Syst.* vi. 82.—Java.
communis. Veil. Fl. Flum. 115; iii. t 63 = Oxypetalnm Banksii.
compressa, Moench, Meth. 717 = purpnrascens.
connivens, Baldw.in Ell. Sketch, L 820-Asclepiodora viridis.
consanguinea, *Kunte, in Linnaea,* xx. (1847) 26.—Hab.?
contorta, Forsk. FL Aegypt. Arab. p. cviii. n. 188 = Sarcostemma Forskohlianum.
convolvulacea, Heyne, ex Decne. in DC. Prod. viii. 572 = Holostemma Rheedianum.
convolvulacea, Willd. Sp. PL i. 1269=Daemia angolensis.
cordata, Bnrm. f. Fl. Ind. 72 = Pergularia minor.
cordata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 49 = Daemia cordata.
cordata, Walt. Fl. Carol. 105=rubra?
cordata. Veil FL Flum. 116; iii. t. 56-Ronlinia flnminensis.
Cornuti, Decne. in DC. Prod. viii. 564=syriaca.
Coulteri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 71.—Mexic.
crassifolia, Hort. Par. ex Decne. in DC. Prod. viii. 572 " Gomphocarpus arborescens.
crassifolia, Linn, ex Decne. 1. c. = Gomphocarpus fruticosus.
crispa, Berg. Desc. PI. Cap. 75=Gomphocarpus crispus.
cryptoceras, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 2»3. t. 28.—Am. bor. occ.
cnbensis, *Wender. in Bot. Zeit.* i. (1843) 880.—Cuba.
curassavica, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 159-campestris.
curassavica, *Linn. Sp. PI.* 215; *Willd. Sp. PI.* i. 1266.—Am. austr.
curassavica, Lour. Fl. Cochinch. 170=Toxocarpns Wightianus.
Curtusii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 85.—Am. bor.
Curupi, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 384.—Paraguay,
cutea, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1817) 859.—Am. bor.
cynanchoides, *Humb.* b* *Bonpl. ex Roem.* b* *Schult. Syst.* vi. 86.—Venezuela.
Daemia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 208—Gymnema tingens.
Daemia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 51 - Daemia extensa.
dasypus, *Rafin. Atl. Tpurn.* 152.—Am. bor.
davurica, Willd. Sp. PI. i. 1272—Cynanchum roseum.
debilis, *Michx. Fl. Am. Bor.* i. 116.—Am. bor.
decumbens, Linn. Sp. PL 216=tuberosa.
densa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 17.—Ind. occ.
dichotoma, RottL in Wall. Cat. n. 8200=Tylophora tenuis.
Douglasii, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 53. t. 97 - speciosa.
echinata, Herb. Madr. ex Hook. £ Fl. Brit. Ind. iv. 85 =Mandenia tenacissima.
echinata, Roxb. Hort Beng. 20; Fl. Ind. ii. 44-Daemia extensa.

A8CLEPIA8:—
ethinata. Deem, in DC. Prod. viii. 544 = Daemia angolensis.
ecornuta, Kellogg, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1.100 = Gomphocarpus cordifolius.
data, Benth. PI. Haitw. 290=glancescens.
elegans, *Veil. Fl. Flum.* 116; iii. t. 65.—Bras,
eriocarpa, *Benth. PI. Martw.* 828.—Calif.
eriocarpa, Ton. in Pacif. Rail. Rep. iv. I28 = vestita.
erosa, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 162.—Calif,
eaphorbiaefolia, *Engelm. in Proc. Am. Acad.* xvl. (1881) 104.—Mexic.
exaltata. Linn. Amoen. Acad. iii. 404—syriaca.
exaltata. Link, ex Spreng. Syst. i. 848-Asclepiodora viridii
exaltata, Muhl. ex Bigel. Fl. Bost. 102 = phytc-laccoides.
fasciculans, Decne. in DC. Prod. viii. 509 = mexicana.
fasciculata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot ii. 821, sphalm. =praec
Feaji, *Chapm. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1876) 72.—Am. bor. trop.
ferruginea, *Humb.* 6* *Bonpl. ex Roem. V Schult. Syst.* vi. 88.—Venezuela.
filiformis, Jacq. Enum. PI. Carib. 17=Sarcostemma Jacquini.
filiformis, linn. f. SnppL 169 *(=Lagarintkus tenuis).*—Ind. occ.; Afr. austr.
floridana, Lain. Encyc. i. 284 = Gomphocarpus longifolia.
foetida, Cav. Ic ii. 45. t. 158-= Ronlinia Jacquini.
Forekohlei, *Roem. V Schult. Syst.* vi. 85.—Arab,
fragrans, *Decne. in DC. Prod.* viii. 571.—Guatemala,
fragrans, *Rafin. in tied. Repos.N. York,* v. (180b) 354.—Am. bor.
Fr&nontii, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* vi. 87.—Calif.
fruticosa. Linn. Sp. Pi. 216 = Gomphocarpus fruticosus.
fusca, Lour. Fl. Cochinch. 170—Vineetoxicum medium.
fuscata, Willd. Ennm. Hort. BeroL Suppl. 13 - praec.
Galeotti, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiv. (1867) 250.—Mexic.
galioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 148 = verticillata.
geminata, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 46 = Gymnema sylvestre.
gigantea, Linn. Sp. PI. 214=Calotropis procera.
gigantea, Willd. Sp. PI. i. 1264 = Calotropis gigantea.
glabra, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 51 = Doemia glabra.
glabra, Mill. Card. Diet. ed. VIIL n. 12 = Gompho-carpus frnticosus.
glancescens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 290. t. 227.—N. Mexic.
glebosa, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 4 =syriaca.
gonocarpos, J. F. Gmel. Syst. 446 = Gonolobus graminea, *Lam. Encyc.* i. 288.—Ind. or.
grandiflora. Linn. £ SuppL 170 = Gomphocarpoi grandiflorus.
grandiflora, *Fourn. in Ann. Sc.Nat.* Sér. VI xiv. (1882) 379.—Mexic.
grandifolia, BertoL in Mem. Ace. Sc Bolog. iii. (1851) 189 (Misc. Bot. xii. 47) = syriaca.
Greeniana, *Nutt. ex- Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 493.—Am. bor.
Hallii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 69.—Colorado.
kastuta, Bunge, in M6n. Sav. Etr. Acad. Pétersb. ii. (1(35) 117 = Cynancbum Bongei.
herbacea, Roxb. Hort. Beng. 21; Fl. Ind. ii. 50 - Calotropis Ada.
hispida, Veil. Fl. Flam. 116; iii. t. 62 = Ditassa Gnilleminiana.
humistrata, Walt. Fl. Carol. 105 - amplexicaulis.
hybrida, Michx. Fl. Am. Bor. i. 115=variegata.
illinoinsis, Michx. ex Steud. Norn. ed. IL i. 146 - syriaca.
incarnata, *Linn. Sp. PI.* 215.—Am., bor.
incarnata, Walt. Fl. Carol. 106—Gomphocarpus longifolius.
involucrata, *Engelm. ex Torr. in Bot. Mex. Bound.* 163.—N. Mexic
Jacquiniana, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 841-Sarcostemma Jacquini.
Jamesii, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 162.—Am. bor.
javanica, Burm. ex Decne. in DC. Prod. viii. 628 = Leptadenia reticulaU.

ASCLEPIAS:—
Klaprothiana, *Roem. tf Schult. Syst.* vi. 82.—Am. bor.
lactifera, lion. Sp. PI. 216=Gymnema lactiferum.
lanceolata, Ives, in Am. Joum. Sc. i. (1819) 252 = Gomphocarpus viridiflorus.
lanceolata, Walt. 1-1. Carol. 106=paupercula.
landfolia, Steud. Nom. ed. L 77 ^ rubra.
lanifiora, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 61 = Kanahia laniflorá.
Langsdorffii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 203.—Bras,
lanuginosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 193.—Mexic.
lanuginosa, Nutt. Gen. Am. L *168(=Acerates lanuginosa).*—Am. bor.
latifolia. *Rafin. Atl. Joum.* 146.—Am. bor.
laurifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 117= rubra.
laurifolia, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 49 = Genianthns laurifolius.
laxiflora, *Decne. in DC. Prod.* viii. 671.—Mexic.
Lemmoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 85.—Arizona.
leucophylla, Engelm. in Am. Natural, ix. (1875) 348 - erosa.
Iinaria, *Cav. Ic.* i. 42. t 57.—Mexic.
Lindheimeri, Engelm. & A. Gray, PI. Lindh. 250 - longicornu.
Lindleyi, GilL ex Stead. Nom. ed. n. i. 145, 148 - vanegata.
linearifolia, Pav. ex Decne. in DC. Prod. viii. 589 = Sarcostemma Dombeyanum.
linearis, *Scheele, in Linnaea,* xxi. (1848) 758=verticillata.
linifolia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 190 = angustifolia, virgata !
linifolia, *Lag. ex Spreng. Syst.* i. 847.—Mexic
longicomis, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* i. (' 1855 *) 65.—Calif.
longicornu, *Benth. in PI. Hartw.* 24.—Calif.
longifiora, Jacq. Enum. PL Carib. *17{=Schubertia longiflora).*—Ind. occ
longifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 116.—Am. bor.
longipetala, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 757 - Asclepiodora viridis.
longistigma, Roxb. Hort Beng. 85; FL Ind. ii. 46 = Toxocarpus Roxburghii.
lutea, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 361.—Am. bor.
lutea, MilL Gard. Diet ed. VIII. n. 8=Vincetoxicum luteum.
maerantha, *Hochst. ex Decne. in DC. Prod.* viii. 658.—Abyss,
mac'rophylla, *Humb.* to* *Bonpl. in Roem. tf Schult. Syst.* vi. 86.—Cumana.
macrophylla, Nutt in Joum. Acad. Philad. Ser. II. i. (1847) 180 = mexicana.
macrotis, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 164. t 45.—N. Mexic.
margaritacea, *Hoffmgg. ex Roem.* to* *Schult. Syst.* vi. 86.—Bras.
marginata, Decne. in DC. Prod. viii. 666-Candida.
maritima, jacq. Enum. PL Carib. 17 — Ibatia maritima.
maritima, *Pall. Reise,* iii. 567.—Rossia austr.
maritima, Rafin. ex Decne. in DC. Prod. viii. 667 = incarnata.
Meadii, *Torr. ex A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. II. *Add.* 704.—Am. bor.
media, Hort ex Steud. Nom. ed. II. L 146-Vincetoxicnm medium.
megalotis, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 61.—Am. bor.
melantha, *Decne. in DC. Prod.* viii. 570.—Mexic
mellodora, St Hil. PL Rem. Bias. 227 =nervosa.
mexicana, *Cav. Ic.* i. 42. t. 58 = Calif.; Mexic
Michauxii, *Decne. in DC. Prod.* viii. 569.—Am. bor.
micrantha, *Roxb. Hort. Beng.* 21; *Fl. Ind.* ii. 50.—Ind. or.
microphylla, Heyne, ex Roth, NOT. Sp. PL 177-seq. ?
microphylla, Roxb. Hort. Beng. 85; FL Ind. tt. 86 - Pentatropis microphylla.
monantha, Veil. Fl. Flum. 115 ; iii. t. 64=Oxypetalum mouanthum.
montana, Roxb. Hort. Beng. 85; FL Ind. ii. 45 = Gymnema tingens.
montevidensis, *Spreng. ex Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 202.—Reg. Argent.
mucronata, Thunb. Prod. PL Cap. 47 *{"Metaplexis mucronata).*—Afr. austr.

ASCLEPIAS:—
multicaulis, Veil. FL Flum. 117; iii. t. 60-Oxypetalum campestre.
maltinervis, *Fourn. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xiv. (1B82) 383.—Paraguay.
muricata, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL 153 =- Doemia angolensis.
neglecta, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 325.—Mexic
nervosa, *Decne. in DC. Prod.* viii. 568.—Bras.
nigra, Linn. Sp. PL 216 = Vincetoxicnm nigrum.
nitida, Veil. Fl. Flum. 116; iii. t. 59=Oxypetalum umbellatum.
nivalis, J. F. Gmel. Syst. 444=seq.
nivea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 51 -• Forekohlei.
nivea, *Linn. Sp. PI.* 215.—Ind. occ.
nivea, Sims, Bot. Mag. 1.1181 - phytolaccoides.
nuda, *Thonn. if Schum. Beskr. Guin. PI.* 165.—Afr. trop.
nnmmularia, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 168. t 46.—Am. bor.
nutans, Muhl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 146 *(=Acerates viridiflorus).*—Am. bor.
Nuttalliana, A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. II. 352, 704 = ovalifolia.
Nuttalliana, Torr. in Ann. Lye N. York, ii. (1828) 218 *(=Acerates lanuginosa).*—Am. bor.
nyctaginifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877; 69.—Calif.
obovata, *Ell. Sketch,* 321.—Am. bor.
oitusifolia, Hort. Prag. ex Kunze, in Linnaea, xx. (1847; 27 = consanguinea.
obtusifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 116.—Am. bor.
odoratissima, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 47 = Pergularia minor.
oenotheroides, Cham. & Schlecht in Linnaea, v. (1880) 128=longicornu.
otarioides, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 378.—Mexic.
ovalifolia, *Decne. in DC. Prod.* viii. 667.—Am. bor.
ovata, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 146=Vincetoxicnm officinale.
ovata, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1842) StiS.—Mexic.
pallida, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xiv. (1882) 888.—Paraguay.
pallida, Roxb. Hort. Beng. 20; FL Ind. ii. 48 = Pergularia pallida.
paniculatum, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 43.—China.
parasitica, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 42 = Hoya parasitica.
paraiflora, Ait. Hort. Kew. i. 807 = perennis.
parmflora, Leconte, ex Decne. in DC. Prod. viii. 570 - verticillata.
parviflora, Roem. *Sc* Schnlt. Syst. vi. 82, sphalm.- parvifolia.
parvifolia, Decne. in DC. Prod. viii. 668 = perennis.
parvifolia, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 801, ind.—Am. austr.
patula, Auct ex Decne. in DC. Prod. viii. 586 = Calotropis procera.
paupercula, *Michx. Fl. Bor. Am. i.* 118.—Am. bor.
pedicellata, Walt Fl. Carol. 106 = Podostigma pubescens.
pellucida, *Fsurn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xiv. (1882) 381.—Mexic
pendula, Roxb. Hort. Beng. 85 ; Fl. Ind. ii. 36 = Hoya pendula.
peregrina, Blanco, FL Filip. ed. I. 207 =Sarcolobus carinatus.
perennis, *Walt. Fl. Carol.* 107 —Am. bor.
periplocaefolia, Nutt. Gen. Am. i. 167 = rubra.
phytolaccoides, *Lyon. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 180.—Am. bor.
pilosa, Veil. Fl. Flum. 117; iii. t. 62=Oxypetalum foliosnm.
pinifolia, Greene, in Torrey Bot. Club, viii. (1881) 5 - A. Linaria.
planifiora, Jacq. Ennm. PL Carib. 17 = Gonolobus planiflorus.
plicata, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 176.—Ind. or.
polystachya, Walt. Fl. Carol. 107= rubra 1
pratensis, *Benth. PI. Hartw.* 45.—Mexic
Princeps, *Bart I. Ind. Sem. Hort. Gott.* (1839); *ex Kunte, in Linnaea,* xx. (1847) 27.—Am. bor.
procera. Ait Hort. Kew. i. 805 = Calotropis procera.
proenmbens, *Rafin. Fl. Ludov.* 61.—Am. bor.

ASCLEPIAS:—
pseudosarsa, Roxb. Hort Beng. 20 j Fl. Ind. ii. 89 = Hemidesmns indicns.
puberula, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 104.—Mexie.
pubescens. Linn. Mant. 215 = Gomphocarpus arborescens.
pubescens, Moench, Meth. 716 = syriaca.
pubigera, Dnm. Fl. Belg. 52 = syriaca.
pulckella, Roxb. Hort. Beng. 21; Fl. Ind. ii. 54 = Raphistemma pulchcMum.
pulchella, Salisb. Prod. 150 = perennis.
pulchra, Ehrh. ex Willd. Ennm. Hort. Berol. 278^ incarnata.
pulchra. Veil. Fl. Flum. 116 ; iii. t. 68=Oxypetalum pulchrum.
purpurascens, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. IV. 813=Vincetoxicum pnrpurascecs.
purpurascens, *Linn. Sp. PI.* 214.—Am. bor.
Purpurascens, Walt. Fl. Carol. 105 = obtnsifolia.
Purpurea, Pall. Reise, iii. *•260(= Cynoctonum roseum).* —Rossia.
qnadrifolia, *Jacq. Obs. Bot.* ii. 8.—Am. bor.
qmnquedentata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 71.-N. Mexic.
quinqueflora, *Veil. Fl. Flum.* 118; iii. t. 68.—Bras.
racemosa, Jacq. Enum. PI. Carib. 17 - Roulinia Jacquini.
racemosa, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 32 = Cosmostigma racemosum.
radians, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 49 = Steinheilia radians.
»mosa, *Fourn. in* Ann. *Sc. Not. Sit.* VI. xiv. (1882) 373.—Bolivia,
repanda, *Forsk. ex Steud. Norn.* ed. I. 76; ed. II. i. 146 = Gomphocarpus crispus.
revoluta, *Rafin. Fl. Ludov.* 51.—Am. bor.
rosea, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 189.—Mexic.
rosea, Roxb. Hort. Beng. 20 j Fl. Ind. ii. 40-Oxystelma escnlentum.
rotundifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 15.—Afr. austr.
rotnndifolia, *Rafin. AH. Journ.* 152.—Hab. ?
robra, *Linn. Sp. PI.* 217.—Am. bor.
rubra, Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 329 = =Apocynum Venetum.
rubricaulis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 148.— Mexic.
Mlicifolia, *Lodd. Bot. Cab.* t 272.—Mexic.
tcandens, Beam. Fl. Owar. i. 93. t. 56 = Daemia Mgolensis.
Kandens, Mill. Gard. Diet. ed.VIII. n. 19 = Sarcostemma Swartriannm.
Scnaffneri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 103.-Mexic.
SeHoana, *Fourn. in if art. Fl. Bras.* vi. IV. 202.—Bras.
Serpentaria, *Rafin. Fl. Ludov.* 52.—Am. bor.
"etwa, *Benth. PI. Hartw.* 24.—Mexic.
«*osa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 51 = Gompho*pus KtosOS.
•ibirica, *Linn. Sp. PI.* 217.—Sibir.
-*birica,* Mnrr. in Comm. Gotting. (1779) 23 = Vincetoxicum sibirienm.
•[flulis, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot. n.* S26.-Mexic.
»«>gularU. *Veil. Fl. Flum.* 117; iii. t. 61.—Bras,
snuosa-. *Burm.f. Fl. Cap. Prod. T.*—Afr. austr.
spedosa, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* ii. (1828) 218. .—Am. bor. occ
'Pinosa, *Veil. Fl. Flum.* 118; Hi-1. 67.-Bras.
'Piralifiora, Stokes, Bot. Mat Med. ii. 6=seq.
'piralis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 49=Pentatropis spiralis.
tellata, Bnrm. ex Decne. in DC. Prod. viii. 573 = Hoya multiflora.
stenophylU, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1876) 72.-Am. bor.
iKpitacea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 51=Sarcostemma tipitaceum.
"'aveolens, Uconte, ex Decne. in DC. Prod. viu. 569 = Michauxii.
"*-'««, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. ii. 38 = ^eptadenia reticulata.
Wbulata, *Decne .in DC.Prod* .viii. 671.-Calif.
**l>ulata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cviii. n. 198. t 7 e .TCanalluma subulata.
swlivantii, *Engelm. ex A. Gray, Man. Bot.* ed. I. 868. —Am. bor.
s*llivan'tii, Ton. Bot Mex. Bound. 163=glancesceni.

ASCLEPIAS:—
Sussuela, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 31 = Hoya imperialis.
syriaca, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 204=curassavica.
syriaca, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 214.—Am. bor.
tenacissima, Roxb. PI. Corom. iii. 35. t. 240 = Marsdenia tenacissima.
tenuis. Herb. Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 41 = Tylophora cappariditolia.
tenuissima, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 41 = Tylophora tenuissima.
tetrapetala, Dcnnst. Schluess. Hort. Malab. 35=Pentatropis microphylla.
tinctoria, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 43 = Marsdenia tinctoria.
tingens, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 21; Fl. Ind. ii. 53 = Gymnema tingens.
tomentosa, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 35 = Marsdenia tenacissima,
tomentosa, *Ell. Sketch,* i. 320.—Am. bor.
tomentosa, Thonn. ex Decne. in DC. Prod. viii. 628 = Leptadenia loncifolia.
toxicaria, *Salisb. Prod.* 150 = Vincetoxicum officinale.
truncata, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 18.—Hab. I
truncata, Roxb. ex Decne. in DC. Prod. viii. 529 = Cynanchum alatum.
tuberosa, *Linn. Sp. PI.* 217.—Am. bor.
tuberosa, Hort. ex Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 27.—Hab.?
tuberosa, Roxb. Fl. Ind. ii. 38=Leptadenia reticnlata.
tunicata, Roxb. Hort. Beng. 20; 1. c. 35 - Cynanchum paucifiorum.
tunicata, Hort. Calc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 45 =Tylophora asthmatica.
nmbellata, *Veil. Fl. Flum.* 118; iii. t. 66.—Bras,
uncialis, *Greene, in Coulter, Bot. Ga».* v. (1880) 64. —Am. bor. occ.
undulata, Jacq. Enum. PI. Carib. 17 = Xysmalobium undulatum.
undulata, Linn. Sp. PI. 214=Pachycarpus crispus.
Vanilla, Rafin. in Am. Monthly Mag. iv. (1818) 39 = quadrifolia.
variegata, *Linn. Sp. PI.* 215—Am. bor.
verecunda, Salisb. Prod. 150=incarnata.
verticillata, *Linn. Sp. PI.* 217.—Am. bor.
vestita. *Hook. & Am. in Bot. Beech. Voy.* 363.—Calif.
vicinalis, Mart. FL Bras. vi. IV. 235=Sarcostemma barbatum.
villosa, Balb. in Mem. Ace. Torin. vii. (1802-3) 386 = Lachnostoma Balbisii.
villosa, MiW. Gard. Diet ed. VIII. n. 14 = Gomphocarpus fruticosus.
villosa, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 353, nomen.—Am. bor.
viminalis, Steud. Nom. ed. II. i. 146=Sarcostemma viminale.
viminalis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 53 - Philibertia viminalis.
Vincetoxicum, Linn. Sp. PI. 216 = Vincetoxicum officinale.
virgata, Balb. in Cat. Hort. Taur. (1813) 14=angustifolia.
viridiflora, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 860; Push, Fl. Am. Sept. i. 181 = Gomphocarpus viridiflorus.
viridiflora, Roxb. ex Decne. in DC. Prod. viii. 573 = Hoya viridiflora.
viridis, Walt. Fl. Carol. 107 = Asclepiodora viridis.
viridula, *Chapm. Fl. S. V. St.* 363.—Am. bor. trop.
Virletii, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 378.—Mexic.
volubilis, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 68 = Leptadenia reticulata.
volubilis, Linn. f. Suppl. 170 = Dregea volubilis.
volubilis, Domb. ex Decne. in DC. Prod. viii. 539 = Sarcostemma Dombeyanum.
vomitoria, Keen, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 45 = Tylophora asthmatica.
Weddellii, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 381.—Bolivia.
Wrightii, Greene, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 102 = nyctaginifolia.
teylanica, Bnrm. ex Decne in DC. Prod. viii. 628 = Leptadenia reticulata.

ASCLEPIODOEA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1876) 66. *ASCLEPIADEAE.*
ANANTHERIX, Nutt. Gen. Am. i. 169 (1818).
ANTHANOTIS, Rafin. H. Ludov. 52, 149 (1817), nomen prius.
asperula, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xiv. (1882) 369.—Mexic.
circinalis, Fourn. I. c. = Asclepias brachystephana.
decumbens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1876) 67.—Am. bor.
gomphocarpoides, *Tourn. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xiv. (1882) 369.—Mexic
viridis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1876) 66.—Am. bor.

ASCOCHILUS, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vi. (1828) = Geodorum, Jack (Orchid.).

A8COLEPIS, Nees, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 105 (1855). *CYPERACEAE,* Bcnth. & Hook. f. iii. 1054.
ANTROLEPIS, Welw. Apont. Phyto-Ueograph. in Annaes do Consel. Ultramarin. (1858) 578.
PLATYLEPIS, Kunth, Enum. PI. ii. 269 (1835\
PTERACHNE, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 62, in nota (1842).
PTEROGYSE, Schrad. ex Nees, in Mart. 1. c. (1842).
anthemiflora, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 77.—Angola,
capensis, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. Bot. ii. ;1884) 164.—Afr. austr. et trop.
elata, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 79.—Angola,
eriocaulides, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 105.—Abyss.
kyllingioides, Steud. 1. c. = Lipocarpha microcephala.
protea, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 75.—Afr. trop.
pusilla, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. Bot. ii. (1884) 164.—Afr. occ.
speciosa, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 78.—Angola.
tenuior, Stead. Syn. PI. Cyp. 105=Scirpus squarrosus.

ASCRA, Schott, in Spreng. Syst iv. Cur. Post. 407 (1827) =Banara, Aubl. (Samyd.).
brasiliensis, Schott, 1. c. = B. brasiliensis.

ASCYRUM, Linn. Gen. ed. 1.231 (1737). *HYPERICINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 164.
HYPERICOIDES, Adans. Fam. ii. 443 (1763).
ISOPHYLLUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 367.
amplexicaule, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 77.—Am. bor.
calicinum, Poir. Tabl. Encyc. iii. 199 = Hypericnm calycinum.
coriaceum, Moench, Meth. 130 = Hypericum calycinum.
crudatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyou, vii. (18801 69 = A. Crux-Andreae.
Crux-Andreae, Linn. Sp. PI. 787 = Hypericum mutilum.
Crux-Andreae, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1107.—Am. bor.; Ind. occ.
cubense, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 40.—Cuba,
filicaule, *Dyer, in Hook./. Fl. Brit. Ind. i.* 252.—Reg. Himal.
glandulosum, Moench, Meth. Suppl. 42 = Hypericum balearicum.
grandiflorum, Rafin. Fl. Ludov. 87=stans.
helianthemi/olium, Spach, Hist Veg. Phan. v. 460= A. Crux-Andreae.
humifusum, LabilL Nov. Holl. PI. ii. 33. t. 175 = Hypericum japonicum.
hypericifolium, Sw. ex Rafin. Sylva Tellur. 116=A. Hypericoides.
Hypericoides, *Linn. Sp. PI.* 788 & ed. II. 1108 pro max. parte.—Ind. occ.
Hypericoides, Marsh. Arbust. 14 = scans.
grandiflorum, Rafin. Fl. Ludov. 87 = stans.
involutum, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 32. t 174 = Hypericum gramineum.
linifolium, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 459 = A. Crux-Andreae.
Michauxii, Spach, 1. c. 460 = A. Crux-Andreae.
mierosepalum, Torr. & Gray, FL N. Am. i. 157 = Hypericum mierosepalum.
monogynum, Moench, Meth. Suppl. 42 = Hypericum monogynum.
montanum, Rafin. Sylva Tellur. 116 = A. Hypericoides.

ASCYKUJt:—
multicaule, Michx. ex Willd. Sp. PL iii. 1472=A. Crux-AndrcftC.
nummularifolium,-Buiks, ex Steud. Norn. ed. I. 77 = pnmilum.
oblongifolium, Spach, Hist. Vég. Phau. v. 461-A. Crux-Andreae.
pauciflorum, Nutt Gen. Am. ii. 16=pumilum.
Plumierii, Bertol. in Mem. Ace Sc. Bolog. iv. (1853) 77 (Misc. Bot. xiii. 19)-A. Cnix-Andreae.
pumilum, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 77.—Am. bor.
sibiricum, Poir. Tabl. Encyc iii. 200 =Hypericnm Ascyrnm.
simplex, Zeyh. ex Turcz. in BnlL Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1868)1. 389 = stans.
spathulatum, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 462=A. Cnix-Andreae.
stans, *Michx. FL Bòr. Am.* ii. 77.—Am. bor.
tetragonum, Moench, Meth. 180=Hypericum Ascyion.
mllosum, Linn. Sp. PI. 788=Hypericum setosum.

ASCYUM, Vahl, ex DC. Prod. i. 666 (1824)=ASCIUM, Schreb.-Norantea, Aubl. (Ternstr.).

ASEMEIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 88 (1836) =Folygala, Linn.
alba, Rafin. 1. c.=P.alba.
cornea, Rafin. 1. c—"Am. bor.
leptopsis, Rafin. 1. c—Am. bor.
rosea, Rafin. 1. c.=P. Senega.

ASEJOTAKTHA, Hook. £ in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 106 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 106.
pnbescens, *Hook./. I. c.* 107.—Mexic

ASEPHANANTHES, Bory, ex DC. Prod. iii. 323 (1828)=PMBiflora, Linn.

ASICARIA, Neck. Elem. ii. 211 (1790)-Prilygoiniin, Tourn.

ASIMIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 61 (1821)= Aflimina, Adans. (Anonac.).

ASIMINA, Adans. Fam. ii. 366 (1763). *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 24.
ORCHIDOCARPUM, Michx. Fl. Bor. Am. i. 329 (1803).
aurantiaca, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat ii. 25-Oropnea aurantiaca.
Blainii, *Griseb. Cat. PL Cub.* 8.—Cuba,
campechiana, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 61.—Mexic
campaniflora, Spach, Hist. Ve"g. Phan. viL 528 - triloba.
eonoidea, Spach, L c. 530=trilobat
cuneata, Shnttlw. ex Chapm. Fl. S. U. St. 15-gtandiflora.
glabra, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 384=tnloba.
grandiflora, *Dun. Monog. Anon.* 84.1.11.—Am. bor.
grandiflora, Hort. ex Spach, Hist. *Wig.* Phan. v. 530= *eonoidea.*
lanceolata, Hook. f. in Joum. Linn. Soc. I (1867) 129, *err.* †j#.=Ascarina lanceolata.
neglecta, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 8.—Cuba,
parviflora, *Dun. Monog. Anon.* 82. t 9.—Am. Lor.
pygmaea, *Dun. I. e.* 84. t. 10.—Am. bor.
reticulata,5A»«Zir. *exChapm. Fl. S. U. St.* 15.—Florida,
rhombifolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 3.—Ind. occ.
secundiftora, Shuttlw. ex Chapm. FL S. U. St. 15 =pygmaea.
triloba, *Dun. Monog. Anon.* 83.—Am. bor.

ASIPHONIA, Griff, in Trans. Linn. Sot xix. (1845) 333. t S7-=Braganti», Lour. (Aristoloch.).
piperiformis, Griff. L c = B. corymbosa.

A8KIDIOSPERMA, Stend. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; et Syn. PL Cyp. ii. 257 (1855). *RESTIACEAB,* Benth. & Hook. f. iii. 1032.
capitatnm, *Steud. II. cc.*—Afr. austr.

ASKOFAKE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 108 (1886)-UWcularia, Linn. (Lentib.).
recurva, Rafin. 1. c = U. recurva.

ASKOLAME, Rafin. Fl. Tellnr. iL 11 (1886)-Villa, Cav. (Liliac.).
biflora, Rafin. 1. c 12-M. biflora.

A8PALATHTJ8, Linn. Sp. PI. 711 (1763). *LEGVMINOSAE,* Benth. & Hook. f. L 478.
ACROPODIUM, Desv. in Ann. Sc Nat. ix. (1826) 408.
CYPHOCALYX, HETEROLATHUS, LAPASANTHUS, PACHYRAPHEA,PARASPALATHUS,PLAGIOSTIGMA, PSILOLEPUS, STREPTOSEMA, et TMNCURIA, Presl, in Abh. Boehm. Ges. Wiss. Folge V. iii. 656-662 (Bot. Bemerk. 126-132 (1844).
DIALLOSPERMA, Rafin. Sylva Tellnr. 69 (.1888).
ERIOCYLAX, Neck. Elem. iii. 25 (1790).
NEFRAKIS, Rafin. Sylva Tellnr. 69 (1888).
SARCOCALYX, Walp. in Linnaea, jda (1839) 479.
SARCOPHYIXUS, Thnnb. in Schrad. Tourn. L (1799) 823.
SCALIGEKA, Adans. Fam. ii. 873 (1763).
SEMETOR, Rafin. Sylva Tellnr. 69 (1888).
•*abietina,* E. Mey. Comm. fl. Afr. Austr. 48 = adphylla.
abietina, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 128.—Afr. austr.
acanthes, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 215.—Afr. anstr.
acanthophylla, Eckl. & Zeyh. 1. c. 221=Chamissonis.
acicnlaris, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* 46.—Afr. anstr.
adphylla, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 129.—Afr. austr.
acnleata, *Thunb. Prod. PI. Cat.* 128.—Afr. anstr.
acuUata, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 486 =tndentata.
acuminata, *Lam. Encyc.* i. 287.—Afr. austr.
acuminata, Thunb. Prod. PI. Cap. 125=ambigua.
adelphea, *Eckl.* to" *Zeyh. Enum.* 212.—Afr. austr.
adscendens, Stend. Norn. ed. IL i. 147=elongato.
aemula, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 42.—Afr. austr.
affinis, Eckl. & Zeyh. Enum. 212 = microdon.
affinis, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 60=pinguis.
affinis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 127.—Afr. anstr.
Agardhiana, *DC. Prod.* ii. 143.—Afr. anstr.
albanensis, Eckl. & Zeyh. Enum. 211 - frankenioides.
albens, E. Mey. ex Benth. in Hook. Lond. Tourn. Bot. vii. (1848) 648=exilis.
albens, *Linn. Mant.* ii. 261; *Thunb. Prod. PL Cap.* 126.—Afr. anstr.
albens, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 499 = armata.
albifiora, Eckl. & Zeyh. Enum. 207=thymifolia.
alopecuroides, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 62 = setacea.
Alopecurus, *Burch. ex Benth. in Hopk. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 628, (err. typ. 6187.—Afr. austr.
alpina, Eckl. & Zeyh. Enum. 218=rubro-fusca..
alternifolia, *Han. in Han. & Sond. Fl. Cap.* ii. 141.—Afr. austr.
alternifolia, *Spreng. Syst.* iii. 187.—Afr. austr.
ambigua, *DC. Prod.* ii. 143.—Afr. austr.
angustissima, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* 44.—Afr. austr.
anthylloides, Berg. Desc. PL Cap. 211=lotoides.
anthylloides, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1002.—Afr. anstr.
appendiculata, E Mey. in Linnaea, vii. (1832) 157 = ciliaris.
arachnoidea, Otto, ex Stend. Norn. ed. II. i. 147,149 •» setacea.
arachnoidea, *Walp. in Linnaea,* xiii (1889) 497.—Afr. austr.
araneosa, *Linn. Sp. PI.* 712.—Afr. austr.
arborea, *Lour. Fl. Cochinch.* 481.—Cochinch.
argentea, Eckl. & Zeyh. Enum. 203=aemula.
argentea, *Linn. Sp. PL* 713.—Afr. austr.
argentea, J. F. Gmel. Syst. 1093=sericea.
argyraea, *DC. Prod.* ii. 139.—Afr. austr.
arida, *E. Mey. in Linnaea,* vii. (1832) 156.—Afr. anstr.
armata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 126.—Afr. austr.
ascendens, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 41 = elongata.
asparagoides, *Linn.f. Suppl.* 821.—Afr. austr.
astroides, WilW. ex V.'alp. in Linnaea, xiii. (1889) 508=racemosa.
astroites, *Linn. Sp. PL* 711.—Afr. austr.
astroites, Thunb. Prod. PL Cap. 128=racemosa.
aulonogena, EckL & Zeyh. Enum. 216—ciliaris.
batodes, Eckl. & Zeyh. 1. c. 216 = aciphylla.
Benthamii, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 111.—Afr. austr.

ASPAIiATHUS :—
bicolor, Eckl. & Zeyh. Ennm. 206-retroflexa.
biflora, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 64~ peduncalata.
bracteata, *Thunb. Prod. PL Cap.* 128.—Afr. auitr.
BnreheUiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 623.—Afr. austr.
calcarata, *Han. in Han. <f Sond. Fl. Cap.* iL 116.—Afr. austr.
callosa, *Linn. Sp. PI.* 713.—Afr. austr.
callosa, Sims, Bot Mag. t. 2329-araneosa.
canaliculata, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 44 = stenophylla.
candicans, *Ait. Hort. Km.* ed. II. iv. 264.—Afr. austr.
canescens, *Linn. Mant.* ii. 262.—Afr. austr.
capillaris, *Benth. in Hook. Lond. fount. Bot.* viL (1848) 653.—Afr. austr.
capitata, *Linn. PL Afr. Rar.* 14; *Amoen. Acad.* vi. 92.—Afr. austr.
capitella, Burch. ex Benth. in Hook. Lond. Journ.·Bot viL (1848) 597 -inops.
cqrmalnsis, EckL ft Zeyh. Enum. 1404-thymifolla.
caraosa, *Berg. Deser. PI. Cap.* 206.—Afr. austr.
carnosa, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 220-pachyloba.
carnosa, Linn. Mant 261=sarcantha.
Cephalotes, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot vii. (1848) 615 = Forbesii.
Cephalotes, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 126.—Afr. anstr.
cerrhantha, Eckl. & Zeyh. Enum. 208-spicata.
Chamissonis, *Vog. in Linnaea,* x. (1886-36) 697.—Afr. austr.
Chenopoda, *Linn. Sp. PL* 711.—Afr. austr.
ehortophila, EckL & Zeyh. Enum. 211 = frankenioides.
ciliaris, Sims, Bot Mag. t 2283=A. Chenopoda.
ciliaris, *Linn. Mant.* 262.—Afr. austr.
cinerascens, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 64.—Afr. austr.
einerea, Thunb. Prod. PL Cap. 125=cytisoides.
coerulescens, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 54 = Lebeckia microphylla.
cognata, Presl, Bot. Bemerk. 126=corymbosa.
collina, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 22O.-Afr. austr.
comosa, EckL & Zeyh. 1. c. 209 = A. Alopecurus.
comosa,K Mey. Comm. PL Afr. Austr. 56 - Benthamii.
comosa, *Thunb. Prod. PL Cap.* 126.—Afr. austr.
comosa, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 490 = capitata.
conferta, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 596-exigua.
corrudaefolia, Berg., Descr. PI. Cap. 207=genistoides, pungens.
corrudaefolia, DC Prod. iL 189 = rigescens.
corymbosa, *E. Mey. in Linnaea,* vii. (1832) 159.—Afr. austr.
costulata, *Benth. in Hook. Lond. Jburn. Bot.* vii. (1848) 641.—Afr. austr.
crassifolia, *Andr. Bot. Rep.* t 351.—Afr. austr.
cretica, Linn. Sp. PL 712=Anthyllis Hermanniae.
cuneata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 246 = Lespedeza sericea.
cuneata, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* 37.—Afr. austr.
cymbaeformis, DC. Prod. ii. 140-=uaiflora.
cytisoides, *Lam. Encyc.* i. 292.—Afr. austr.
dasyantha., Eckl. V Zeyh. Enum. 201.—Afr. austr.
deciduifolia, Eckl. & Zeyh. 1. c. 210=nigra.
densifolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 632.—Afr. austr.
diffusa, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 208.—Afr. austr.
divaricata^ *Thunb. Prod. PL Cap.* 128.—Afr. austr.
divergens, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 45 =praec
divergens, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiiL (1889) 493= microphylla
Dorycnium, Lam. Encyc L 290 = Dorycnium sufiruticosum.
Dregeana, Walp. iii Linnaea, xiii. (1839) 486=" incurva.
dubia, E. Mey. in Linnaea, viL (1832) 157=ciliaris.
dubia, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 504 « Amphithalea ericaefolia.
Ebenus, Linn. Syst ed. X. 1158=Brya Ebenus.
echinata, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 51 "• rigescens.
echinata, St. Lag. in Ann. Soc Bot Lyon, viL (1880) 119-A. Hystrix.
Ecklonis.Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 489 = ciliaris.

A8PAI1ATHTT8 :—
elongaU, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 202.—Afr. austr.
elongata, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 68 = iucurva.
ericaefolia, Berg. Desc. PI. Cap. 206=uniflora.
ericifolia, *Linn. Sp. PI.* 711.—Afr. austr.
ericae/olia, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiiL (1889) 495=thymifolia.
ericoides, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 160 = .ericifolia.
erinacea, *Urn. Encyc.* i. 291.—Afr. anstr.
eriophylU, *Walp. in Linnaea,* xiii. (1889) 499.—Afr. anstr.
ttythrodes, *Eckl.* 6* *Zeyh. Enum.* 200.—Afr. austr.
exigua, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 697 =marginata.
exjgua, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 198.—Afr. anstr.
enlu, *Han. in Han.* b[1] *Sond. Fl. Cap.* ii. 186.—Afr. austr.
Weata, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* viL (1848) 856.—Afr. anstr.
fcrox, *Haro. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii 138.—Afr. austr.
ferrnginea, *Banks, ex Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1848) 607.—Afr. anstr.
nlicaulis, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 204.—Afr. anstr.
filifolia, E. Mey: in Linnaea, vii. (1882) 168= abietina.
flawscens, PresL Bot Bemerk. 126=spinosa.
ftexuosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 127-moffls.
Jlexuosa, Willd. ex Walp. in Linnaea, xUt (1889) 495 =ericifolia.
floribunda, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 686.—Afr. anstr.
Forbesii, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 114.—Afr. austr.
fomicata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 646.—Afr. anstr.
trankenioides, *DC. Prod.* ii. 189.—Afr. ansti.
frankenioides, Eckl. ft Zeyb. Enum. 207-thymifolia.
frutescens, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 487 =pinea.
fusca, Thunb. Prod. PL Cap. 126; FL C»p. ed. SchulL f/4 = callosa.
g*le«a, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 49.—Afr. anstr.
galioides, Berg. Desc. PI. Cap. 210=retronexa.
galioides, *Linn. Mant.* ii. 260; *Thunb. Diss. Aspal.* 19—Afr. anstr.
galioides, Sieber, ex Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 602 =divaricata.
galioides, Willd. ex Walp. 1. c. 498,502-pedunculate,
ganpensis, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 44.—Afr. austr.
genistoides, Eckl. ft Zeyb. Enum. 215=laricifoHa.
genistoides, *Linn. Mant.* 261.—Afr. austr.
geniştoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 128=pungens·
G»«», Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 627 = setacea.
glauca, Eckl. ft Zeyh. Enum. 221=obtusata.
globosa, *Andr. Bot. Sep.* t. 610.—Afr. anstr.
globosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 148-nigra.
ghbosa, Eckl. ft Zeyh. Enum. 209=spicata.
globulosa, E. Mey. in Linnaea, vii. (1882) 169-nigra.
glomerata, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 623.—Afr. austr.
glomerata, Linn. f. Suppl. 821=càpitata.
PMdiflora, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vu. (1848) 6S2.-Afr. austr.
aeterophylU, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 40.—Afr. austr.
^*erophylla.* Linn. f. SnppL 321; Thunb. Prod. PI. Cap. 126-lotoides.
**ftuum,* Eckl. ft Zeyh. Enum. 212-frankenioides.
»»*», Eckl. ft Zeyh. I. c. 214-laricifolia.
h"ta. *B. Mey. in Linnaea,* vii. (1832) 166.-A&. .anstr.
*K#*i, Sieber, ex Presl, Bot Bemerk. 131 = nniflora.
nspida, Thnnb. Prod. PI. Cap. 127=thymifolia.
holosericea, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 87 = Bucheuroedera holosericea.
*°*mda,* Eckl. ft Zeyh. Enum. 221-spinosa.
*y*tri,, EckL ft Zeyh. 1. c. 219 = Willdenowiana.
ttystnx, *Linn./. Suppl.* 822.—Afr. austr.
tncomta, E. Mey. ex Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. vu. (1848) 643-lactea.
incomta, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 127.—Afr. austr.
tneuna, Eckl. ft Zeyh. Enum. 208-comosa.
tacnrva, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 127.—Afr. austr.

A8PALATHTTS :—
incurvifolia, *Vog. ex Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 497.—Afr. austr.
indica, Linn. Sp. PI. 712=Indigofera aspalathoides.
iniquua, Eckl. ft Zeyh. Enum. 212-adelphea.
inops, *Eckl.* b" *Zeyh. 1. c.* 197.—Afr. anstr.
intermedia, Eckl. ft Zeyh. 1. c 211=frankenioides.
involuerata, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 88 = undnlatfl.
involucrata, Pappe, ex Harv. ft Sond. FL Cap. il 114 -nigra.
Jacobaea, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 41.—Afr. austr.
Joubertiana, Ecltl. *8c* Zeyh. Enum. 214-canesceni.
juniperina, Thunb. Prod. PL Cap. 128'galioides.
kannaensis, Eckl. ft Zeyh. Enum. 207-ericifolia.
Kraussiana, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. iL (1848) 69-anthylloides.
lactea. *Thunb. Prod. PI. Cap.* 127.—Afr. austr.
lanata.f.ilfcy. *Comm. PI. Afr. Austr.* 64.—Afr. anstr.
lanceolata, *E. Mey. I. c.* 87.—Afr. austr.
laricifolia, *Berg. Desc. PI. Cap.* 204.—Afr. austr.
laricifolia, Lam. Encyc. i. 287 = leptophylla.
laricina, DC. Prod. ii. 141-laricifolia.
laridna, Steud. Nom. ed. II. i. 149-tridentata.
laxata, *Linn. Mant.* 268.—Afr. anstr.
lepida, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 68.—Afr. austr.
leptocoma, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 205 = divaricata.
leptophylla, *Eckl.* b* *Zeyh. I. c.* 219.—Afr. austr.
leptothria, Eckl. ft Zeyh. 1. c 213=frankenioides.
leu.cocephc.la, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 41 = virgata.
leucophaea, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* iL 112.—Afr. austr.
linearifolia, *DC. Prod.* iL 142.—Afr. anstr.
linifolia, E. Mey. in Linnaea, vii. (1882) 162=lineari. folia.
linifolia, Steud. in Flora, xiii. (1880) 643-hetero. • phylla.
longifolia, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 624.—Afr. anstr.
longipes, *Han. in Han. & Sond. Fl. Cap.* iL 141.—Afr. austr.
lotoides, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 42-Meyeri.
lotoides, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 126.—Afr. austr.
lotoides, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 486, 503-tridentata.
macrantha, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* iL 117.—Afr. austr.
macrocarpa, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 208.—Afr. anstr.
maciosepala, *Steud. Nom.* ed. II. L 149.—Afr. austr.
marginalis, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 213.—Afr. anstr.
marginata, *Han. in Han.* b* *Son4- PI- Cap.* ii. 103.—Afr. austr.
melanoides, Eckl. ft Zeyh. Ennm. 210—nigra.
Meyeri, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii 106.—Afr. anstr.
Meyeriana, Eckl. ft Zeyh. Enum. 218-ciliaris.
micrantha, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 161-thymifolia.
microcarpa, *Burch. ex DC. Prod.* ii. 139.—Afr. austr.
microdon, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 642.—Afr. austr.
microphylla, DC. Prod. ii. 143-divaricata.
microphylla, *Steud, in Flora,* xiii. (1830) II. 645.—Afr. austr.
minutifoKa, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 500 = pinguis.
mollis, *Lam. Encyc.* i. 290.—Afr. anstr.
mucronata, Linn. f. Suppl. 320=Viborgia armata.
multiftora, Thunb. Prod. PL Cap. 128 = thymifolia.
multiflora, Sieber, ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 495=ericifolia.
Mundiana, Eckl. ft Zeyh. Enum. 220=vemicosa.
muraltioideSf'Edd. ft Zeyh. 1. c. 209—mollis.
myrtillifolia, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 597.—Afr. austr.
neanthes, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 213—canescens.
nervosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 62.—Afr. austr.
nigra, *Linn. Mant.* 262.—Afr. anstr.
nigrescens, E. Mey. in Linn«»», yii, (1832) 159 — nigra.
nivea, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 126.—Afr. anstr.
nivea, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 486-purpurea.
nodosa, *Vog. ex Walp. 1. c.* 496.—Afr. anstr.

ASPAIiATHTJB :—
nudiflora, *Han. in Han. & Sond. Fl. Cap.* ii. 140.—Afr. austr.
obtusata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 125.—Afr. anstr.
opaca, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 217.—Afr. austr.
orbiculata, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 595.—Afr. anstr.
oresigena, Eckl. ft Zeyh. Ennm. 217 = ciliaris.
orientalis, *Linn. Mant.* 263.—Oriens.
pachyloba, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 688.—Afr. austr.
pollens, Eckl. ft Zeyh. Enum. 210=nigra.
pallescens, *Eckl. & Zeyh. I. c.* 218.—Afr. austr.
papillosa, EckL ft Zeyh. 1. c. 217=ciliaris.
Pappeana, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 117.—Afr. austr.
parviflora, *Berg. Desc. PI. Cap.* 208; *Thunb. Prod. PI. Cap.* 122.—Afr. austr.
pedicellata, *Harv. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 185.—Afr. austr.
pedunculata, E. Mey. ex Walp. Ann. iL 338=bracteata, capillaris.
pedunculata, *L'Hirit. Serf. Angl.l.* 26.—Afr. austr.
persica, Burm. f. Fl. Ind. 155 = Lotus Uardni.
pilqsa, Eckl. ft Zeyh. Enum. 202=trident ata.
pilosa, *Linn. Mant.* 263.—Afr. austr.
pilosa, Sieber, ex Walp. in Linnaea, xiii (1833) 488 = araneosa.
pinea, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 128.—Afr. anstr.
pinguis, Eckl. & Zeyh. Enum. 220=arida.
pinguis, E. Mey. Comm. PL Afr. Anstr. 60-amnis.
pinguis, *Thunb. Prod. PL Cap.* 127.—Afr. austr.
pinnata, *Linn. PI. Bar. Afr.* 14; *Amoen. Acad.* vL 92.—Afr. austr.
Plukenetiana,'E&l. ft Zeyh. Enum. 200-rugosa.
poliotes, Eckl. ft Zeyh. 1. c. 218-frankenioides.
polyantha, *Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 485.—Afr. austr.
polycephala, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 89.—Afr. austr.
Priori, *Han. in Han.* b[1] *Sond. Fl. Cap.* iL 127.—Afr. austr.
procumbens, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 202.—Afr. austr.
procumbens, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 162 = lotoides.
propinqua, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 53.—Afr. austr.
prostrata, *Eckl.* b[1] *Zeyh. Enum.* 206.—Afr. anstr.
psoraleoides, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 598.—Afr. anstr.
pulchella, E. Mey. Comm. PL Afr. Anstr. 38=>Buchenroedera tenuifolia.
pungens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 129.—Afr. austr.
purpurascens, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 44-purpurea.
purpurea, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 201.—Afr. anstr.
quinquefolia, Linn. PL Rar. Afr. 14; Amoen. Acad. vi. 92=lotoides.
quinquefolia, Thunb. Fl. Cap. 575=virgata.
racemosa, *E. Mey. in Linnaea,* vii (1882) 157.—Afr. austr.
ramulosa, E. Mey. L c. 163 = aemnla.
recurva, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 642—Afr. austr.
remota, *Eckl. b" Zeyh. Enum.* 218.—Afr. anstr.
retroflexa, Eckl. ft Zeyh. 1. c 204=abietina.
retroflexa, *Linn. Sp. PI.* 712.—Afr. austr.
rigescens, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 52.—Afr. anstr.
rostrata,£raM. *in Hook. Lond. Journ. Bot.* viL (1848) 631.—Afr. austr.
robens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 126.—Afr. austr.
rubescens, Eckl. ft Zeyh. Enum. 213 = adelphta.
rnbromsca, *Eckl.* b* *Zeyh. I. c.* 216.—Afr. austr.
rugosa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 125.—Afr. anstr.
sanguinea, EckL & Zeyh. Enum. 212—vermiculata.
sanginea, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 127.—Afr. austr.
sarcantha, *Vog. ex Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 689.—Afr. austr.
sarcodes, *Vog. ex Walp. 1. c.* 480.—Afr. austr.
scaphoides, Eckl. ft Zeyh. Enum. 206 - uniflora.
Scholliana, *Presl, Bot. Bemerk.* 129.—Afr. austr.
secunda, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 47-pnngens,
securifolia, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 198.—Afr. austr.
sericantha, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 49-laricifolia.
sericea, *Berg. Desc. PL Cap.* 212.—Afr. austr.

ASPAXATHUS:—
sericea, Eckl. &. Zeyh. Enum. 202=Jacobaea.
sericea, Lam. Encyc. i. 288=nivea.
sericea, *Linn.f. Suppl.* 821.—Afr. austr.
sericea, Thunb. Prod. PI. Cap. 125«=Argyrolobium obsoletum.
setacea, *Eckl. If Zeyh. Enum.* 216.—Afr. austr.
Simsiana, Eckl. & Zeyh. 1. c. 200=araneosa.
spathulata, Eckl. & Zeyh. 1. c. 198=securifolia.
gpeciosa, *Steud. in Flora*, xiii. (1880) 544.—Afr. austr.
spicata, *Thunb. Prod. PL Cap.* 127.—Afr. austr.
spinescens, DC. Prod. ii. 188=arida.
spinescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 221 = divaricata.
spinescens, *Thunb. Prod. PL Cap.* 129.—Afr. austr.
spiniflora, L'He'rit. ex Steud. Norn. ed. II. i. 107, 149 = Anthyllis Hermanniae.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1000.—Afr. austr.
squamosa, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 581 = pedunculata.
squarrosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 128 - pedunculata.
stachyera, Eckl. & Zeyh. Enum. 202 = lotoides.
staurantha, Eckl. & Zeyh. 1. c. = argentea.
stellaris, *Eckl. (f Zeyh. 1. c.* 197.—Afr. austr.
stenophylla, *Eckl. if Zeyh. I. c*—Afr. austr.
Steudeliana, B[rongn.] in Bull. Fe'russ. xxvi. (1881) 278 = microphylla.
stricta, Steud. in Flora, xiii. (1830) II. 543=elongata.
suaveolens, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 199.—Afr. austr.
subinermis, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 643.—Afr. austr.
subtingens, Eckl. & Zeyh. Enum. 212 - adelphea.
subulata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 128.—Afr. austr.
sueculenta, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 159 = verrucosa.
suffruticosa, *DC. Prod.* ii. 144.—Afr. austr.
sulcata, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 490 = **erythrodes.**
tenuifolia, *DC. Prod.* ii. 143.—Afr. austr.
teres, *Eckl. if Zeyh. Enum.* 215.—Afr. austr.
tkymifolia, Lam. Encyc. i. 288 =canescens.
thymifolia, *Linn. Sp. PI.* 711.—Afr. austr.
thymifolia, Thunb. Prod. PI. Cap. 127 =comosa.
tomentosa, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 55=frankenioides.
trichodes, E. Mey. I. c. 38 = Bucbenroedera trichodes.
tridentata, Berg, ex Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 482 = pilosa.
tridentata, Eckl. & Zeyh. Enum. 201 = ferruginea.
tridentata, *Linn. Sp. PL* 712.—Afr. austr.
trigona, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 128.—Afr. anstr.
triquetra, *Thunb. I. c.* 127.—Afr. austr.
truncate, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 197.—Afr. austi.
tubercnlata, *Walp. in Linnaea*, xiii. (1839) 497.—Afr. austr.
tylodes, Eckl. & Zeyh. Enum. 200=callosa.
ulicina, *Eckl. tf Zeyh. 1. c.* 205.—Afr. austr.
undulata, *Eckl. (f Zeyh. I. c.* 199.—Afr. austr.
uniflora, Eckl. & Zeyh. 1. c. 219 = macrantha.
uniflora, *Linn. Sp. PL* 712.—Afr. austr.
uniflora, Thunb. Diss. Aspal. 20 = Willdenowiana.
varians, Eckl. & Zeyh. Enum. 209=ericifolia.
variegata, *Eckl. tf Zeyh. 1. c.* 201.—Afr. austr.
venosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 89.—Afr. austr.
yermiculata, *Lam. Encyc.* i. 288.—Afr. austr.
verrucosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 220 = tuberculata.
verrucosa, *Linn. Sp. PI.* 712.—Afr. austr.
verrucosa, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 486 = Willdenowiana.
versicolor, *E.* Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 48 — collina.
vjllosa, *Thunb. Prod. PL Cap.* 125.—Afr. austr.
mminea, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 38-Buchenroedera viminea.
virgata, *Thunb. Prod. PL Cap.* 126.—Afr. austr.
volvularis, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art IV. 7.—Malaya.
vulnerans, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 621 = hirta.
vulnerans, *Thunb. Prod. PL Cap.* 128.—Afr. austr.
Willdenowiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 630.—Afr. austr.
Wurmbeana, £.3/<y ***Comm.*** *PL Afr. Austr.* 58.—Afr. austr.

ASPALATUS, St. Hil. in Diet. Sc. **Nat.** iii. 211 (1804) —**Aspalathus,** Linn. (Legum.).

ASPALTHIUM, Medic. Phil. Bot. i. 211 (1789) =ASPHALTHIUM, Medic.=**Psoralea,** Linn. (Legum.).

ASPARAGOPSIS, Kunth, in Abh. Akad. Berl. (1842) 35=**Asparagus,** Tourn. (Liliac).
abyssinica, Kunth, Enum. PI. V. 101 = Asparagus raccmosus.
acerosa, Kunth, 1. c. 102 = Asparagus acerosus.
adscendens, Kunth, 1. c. = Asparagus adscendens.
aethiopica, Kunth, 1. c. 95 = Asparagus aethiopicus.
alba, Kunth, 1. c. 84 = Asparagus albus.
arborescens, Kunth, 1. c. 79= Asparagus arborescens.
ascendens, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 624 = Asparagus adscendens.
Brownei, Kunth, Enum PI. v. 103 = Asparagus racemosus.
consanguinea, Kunth, 1. c. 76 = Asparagus consanguineus.
Curilla, Kunth, 1. c. 102 = Asparagus Curillus.
Dscaisnei, Kunth, 1. c. 103 = Asparagus racemosus.
decumbens, Kunth, 1. c. 77 = Asparagus crispus.
densiflora, Kunth, 1. c. 96 - Asparagus sarmentosus.
denudata, Kunth, 1. c. 82 = Asparagus deuudatus.
Dregii, Kunth, 1. c. 84 = Asparagus Thunbergianus.
flagellaris, Kunth, 1. c. 103 = Asparagus flagellaris.
floribunda, Kunth, 1. c. 98 = Asparagus racemosus.
grandiflora, Kunth, 1. c. 80=Asparagus umbellatus.
Hohenackerii, Kunth, 1. c 100 = Asparagus racemosus.
humilis, Hassk. in Versl. en Med. Akad. Wetensch. v. (1857) 93.—Japon.
javanica, Kunth, Ennm. PI. v. 100 = Asparagus racemosus.
juniperina, Kunth, 1. c 85 = Asparagus africanus.
Krebsiana, Kunth, 1. c. 93 = Asparagus racemosus.
Lamarckii, Kunth, 1. c. 87 = Asparagus africanus.
lancea, Kunth, 1. c. 104 = Asparagus sarmentosus.
Lmaei. Baker, in Journ. Linn. Sue. xiv. (187S) 6 U - Aspvagus umbellatus.
microrhaphh, Kunth, Enum. PI. v. 83. - Asparagus microrhaphis.
minutiflora, Kunth, I.e. 89 = Asparagus minutiflorus.
Niveniana, Kunth, 1. c. 88 = Asparagus africanus.
passerinoides, Kunth, 1. c. 90 = Asparagus capensis.
retrofracta, Kunth, 1. c 88 = Asparagus retrofractus.
retrofracta, Schweinf. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 623 = Asparagus racemosus.
rubricaulis, Kunth, Ennm. PI. v. 87 = Asparagus rubricaulis.
sarmentosa, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 246=Asparagus racemosus.
sarmentosa, Kunth, Enum. PI. v. 97 = Asparagus sarmentosus.
scandens, Kunth, 1. c 78=Asparagus scandens.
Schlechtendalii, Kunth, 1. c 90=Asparagus Thunbergianus.
scoparia, Kunth, 1. c. 80 = Asparagus asiaticus.
setacea, Kunth, 1. c. 82 = Asparagus declinatus.
sinica, Miq. in Joura. Bot. Néerl. i. (1861) 90 (= Aspaiagus lucidus!).—Hongkong.
spinescens, Kunth, Enum. PI. v. 93=Asparagus stipulaceus.
stipulacea, Kunth, 1. c. 91=Asparagus stipulaceus.
suaveolens, Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 617 = Asparagus suaveolens.
subquadrangularis, Kunth, Enum. PI. v. 94 = Asparagus racemosus.
Thunbergii, Kunth, 1. c 85 = Asparagus Thunbergianus.
triacantha, Kunth, 1. c. 91 = Asparagus stipulaceus.
umbellata, Kunth, 1. c. 79=Asparagus umbellatus.
umbellulata, Kunth, 1. c 81=Asparagus umbellulatus.
Willdenowii, Kunth, 1. c. 86 = Asparagus asiaticus.
Zeyheri, Kunth, 1. c. 92 = Asparagus stipulaceus.

ASPARAGUS, Toum. ex Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. 98 (1787). *LILIACEAE*, Benth. & Hook, f. iii. 765.
ASPARAGOPSIS, Kunth, in Abh. Akad. Berl. (1842) **85.**
ELIDE, Medic. Phil. Bot. ii. 71 (1791).
HECATRIS, Salisb. Gen. PL Fragm. 66 (1866).
MYRSIPHYLLUM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 25.
abyssinicus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss*, ii. 819.—Abyssin.
abyssinicus, Schweinf. ex Baker, in Journ. Linn. Soc **xiv.** (1875) «16«SchweinfarthiL

ASPABACUS:—
acerosus, *Roxb. Hort. Beng.* 24; *Fl. Ind.* ii. 150.—Ind. or.; Burma,
acerosus, *Thunb. ex Schult. f. Syst.* vii. 837.—Afr. austr.
acutifolius, *Linn. Sp. PL* 814.—Reg. Mediterr.
adscendens, *Roxb. Hort. Beng.* 24; *Fl. Ind.* ii. 158.—Keg. Himal.; Afghan,
aethiopicus, *Linn, if ant.* 1.—Afr. austr.
aetnensis, Tornab. in Atti Ace. Gioenia, Ser. II. xii. (1856) 845 = acutifolius.
africanus, *Lam. Encyc.* i. 295.—Afr. austr.
Agul, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. lxv. *ex Schult. f. Syst.* vii. 337.—Arabia.
albus, *Linn. Sp. PL* 818.—Reg. Mediterr. occ.
albus, Thunb. Prod. PI. Cap. 66 = Thunbergianus.
altilis, Aschers. Fl. Brandenb. 780 = officinalis.
altissimus, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 287.—Algeria.
amarus, DC. Cat Hort. Monsp. 81=scaber.
ambiguus, De Not. Rep. Fl. Lig. 401=acutifolius.
angolensis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 254.—Afr. trop.
aphylius, *Linn. Sp. PL* 314.—Reg Mediterr.
arborescens, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 337.—Ins. Teneriffa.
ascendens, Auot. vide adscendens.
asiaticus, *Linn. Sp. PL* 313.—Ind. or.; Afr. trop. et austr.
asiaticus, Wight, Ic. t. 2055 = subalatus.
benguellensis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. l. (1878) 253.—Angola,
brachyphyllus, *Tuns, in Bull. Soc. Nat. Afosc.* (1840) 78.—Reg. Danub.; Soongaria; Afghan.
Breslerianus, Schult. f. Syst. vii. 828 = maritimus.
brevifolius, *Boiss. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 602.—Lyda.
brevifolius, Tomal). in Atti Ace. Gioenia, Ser. II. xii. (1856) 359 = acutifolius.
Broussonetii, *Jacq. Eclog.* 3. t. 40.—Afr. bor.
Burchellii, *Baker, in Journ Linn. Soc.* xiv. (1875) 618.—Afr. austr.
Burkei, *Baker, 1. c.* 607.—Afr. anstr.
Buxbaumius, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 199 = vetticiUatus.
capensis, *Linn. Sp. PL* 314.—Afr. austr.
capitatus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 607. —Ind. bor. occ.; Beluchist.
caspius, Hohen. Enum. PI. Talusch. 24 = officinalis.
caspius, *Hort. Vind. ex Schult. f. Syst.* vii. 322.—Reg. Casp.
Chesneyi, Baker, in Joum, Linn. Soc xiv. (1875) 603 = filifolius.
collinus, Jan, ex Parl. Fl. Ital. iii. 14=tenuifolius.
collinus, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 355 = officinalis.
commutatus, Tenore, Fl. Nap. iii. 374 = acutifolins.
consanguineus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 615.—Afr. austr.
Cooperi, *Baker, in Gard. Chron.* (1874) I. 818.—Afr. austr.
Corruda, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 248=acutifolius,
crispus, Boj. Hort. Maurit 850 = umbcllulatus.
crispus, *Lam. Encyc.* i. 295.—Afr. austr.
Curillus, *Buch.-Ham. ex Roxb.* 24 ; *Fl. Ind.* ii. 152.—Reg. Himal.
Curillus, Wall. Cat n. 5155E = filicinus.
cuscutoides, *Burch. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 606.—Afr. austr.
davuricus, *Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol.* i. **348.** —Davuria.
declinatus, Eckl. & Zeyh. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 615=consanguineus.
declinatus, *Linn. Sp. PL* 313.—Afr. austr.
declinatus, Sieber, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 621 = retrofractus.
declinatus, Schousb. Vextr. Marok. 173=foeniculaceus.
decumbens, Jacq. Hort. Schoenb. i. 51=crispus.
deflexus, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 254.—Angola,
densus, *Soland. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 616.—Afr. austr.
denudatus, *Baker, 1. c.* 606.—Afr. austr.
defendens, Schlecht ex Kunth, Enum. PI. v. 85 = juniperinus.
dependens, Thunb. Prod. PL Cap. 66=africanus.
dichotomus, Brouss. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii.327=umbtllatus.

ASPARAGUS :-

dlvarirnt[illegible] (1875) 616.= asiaticus.

divaricatus, Royle, Illustr. Bot. Himal. i. 398.—Ind. o[illegible]r.

rege' Linn. Sp. PI. ed. II. 451 = Dracaena Draco.

Afr. austr.

nophyll[illegible], *Welw. ex. Baker, in Trans. Linn. Soc.* A.V (1878> 254.-Afr. trop.

«u6tus, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (18S4) 368 = raceraosus.

[illegible] *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 608—Ecl[illegible]loni, *Baker, I. c.* 615,-Afr. austr.

[illegible] Ledrn, ex Webb & Berth. Phyt. Canar. m. 828=arborescens.

equisetoides, [illegible] *Linn. Soc.* H-1. (1878) 258—Angola.

erectus, Thunb. Prod. PI. Cap. 65.—Afr. austr.

esculentus, Salisb. Prod. 252 = officinalis.

euphraticus, exalt.us Kunth> Enum. Pl. v. 73 = filifolius.

[illegible] Sm. & Buch, ex Webb * Berth. Phyt. [illegible] = scoparills.

exuvialis, Burch. Trav. i. 432.—Afr. austr.

falcatus, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 493 = lucidus.

falcatus, Linn. Sp. PI. 313.-Afr. trop. & austr.; Zeylan.

falcatus, Thunb. Fl. Jap. 189=lucidus.

fasciculatus, Jf. Br. Prod. 281 = racemosus, acerosus.

fasciculatus, Thunb. Fl. Cap. ii. 329.—Afr. austr.

filicinus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 49.—Reg. Himal.; Burma.

filifolius, Bertol. Nov. Comm. Acad. Bonon. v. (1842) 430 (*Misc. Bot. i.* 20).-Mesopot.

flagellaris. egambia.

flexuosus, [illegible] Prod. PL Cap. 66=crispus.

floribundus, Rot[illegible] (1875) 611 = R[illegible] Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. 39s.—Ind. or.

floribundus, Royle, Illustr. Bot. Himal. i.

foeniculaceus, Lowe, in Journ. Linn. Soc. v. (1864) 44.—Madeira.

[illegible] (1878) 606 = denudatus.

[illegible]dianus Kunth> Enum. Pl. v. 71.—Cochinch.

[illegible]us Kunth, Enum. Pl. v. 61 = davuricus.

gonoclados, [illegible] 627.-Indor.

gracilis, Royle, Illustr. Bot. Himal. i. 393.—Reg. Himal.

gracilis: Salisb. Prod. 252=asiaticus.

graminifolius, Linn. Sp. PI. ed. II. 460 = Dracaena graminifolia.

[illegible]orus, Vill. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. [illegible] = utnbellatus.

Griffith, Baker> [illegible] = Jc-6 = caspius> officinalis.

hetrocarpus, Andr. ex Baker> Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 603.

horridus, Unn. f. Suppl. 203 = stipularis.

hystrix, Murr. W. ed. XIII. 274.-Hab. ?

Hohenacker, Mill. ex Baker> in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 598 = officinalis.

[illegible] Tornab. in Atti Acc. Gioenia, Ser. II. (1856) 368 = acutifolius.

[illegible]eriensis, Blume, ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 44 = maritimus.

insularis, Hance, in Amw. Nat. Hist. v. (1866) 245 = lucidus.

irregularis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 610.—Afr. austr.

Jacquemonti, Bak[illegible]-615-Ind. or.

Krausii, Baker, l. c. 628—Afr. austr.

laetus, Salisb. Prod. 258=aethiopicus.

*lanceolatus, Steud. [illegible] Linn. Soc. 923.—Ind. or.

lanuginosus, Burch. Trav. i. 537-Ab. austr.

ligneus, [illegible] *littoralis,* [illegible] 9 [illegible] (1857) II. [illegible]

longifolius, French. Pl. David. Nov. i. 80.—As. or.

[illegible], Steud. Nom. ed. [illegible] 1.—Siberia.

ASPABAOUS :—

Lowei, Kunth, Enum. PI. v. 78.—Madera.

Lownei, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 601.—Palaestin.

lucidus, Lindl. Bot. Reg. (1844) *Misc.* 29.—Japon.

Macowani, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 609.—Afr. austr.

madagascariensis, Baker, 1. c. xvi. (1878) 206.—Madag.

marinus, Reichb. Ic. Fl. Germ. t. 520-scaber.

maritimus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=scaber.

maritimus, Pall. Reise, ii. 329.—Rossia; Reg. Cauc.; Persia; Sibiria.

mauritianus, Lam. ex Desf. Tabl. ed. I. 20=declinatus.

medeoloides, Thunb. Prod. PI. Cap. 66.—Afr. anstr.

micranthus, Lindl. Swan Riv. App. 58 = Corynotheca dichotoma.

micranthus, Sieb. & Zncc. ex Baker, in Jeurn. Linn. Soc. xiv. (1875) 604 = schoberioides.

microphyllus, Burch. ex Baker, 1. c. 619— africanus.

microraphis, Baker, 1. c. 612.—Afr. austr.

minutiflorus, Baker, 1. c. 616.—Afr. austr.

mitis, A. Rick. Tent. Fl. Abyss, ii. 319.—Abyss,

monophyllus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 604.—Beluchist

mozambicus, Kunth, Enum. PI. v. 72.—Afr. trop.

multiflorus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 610.—Afr. austr.

neglectus, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat Mosc. (1841) 750 = trichophyllus.

Nelsoni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 617.—Afr. austr.

nepalensis, Baker, I. c. 622.—Reg. Himal.

Nivenianus, Schult.f. Syst. vii. 331.—Afr. austr.

nodosus, Soland. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 608.—Afr. austr.

officinalis, Linn. Sp. PI. 313.—Europ.; Reg. Caucas.; Sibir.

oligoclonos, Maxim. Prim. FLAmur. 286.—Reg. Amur,

oligophyllus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 604.—As. temp.

orientalis, Bess. Cat. Hort. Crem. (1814).—Hab. ?

oxyacanthus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 625.—Afr. austr.

oxycarpus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) II. 92 = officinalis.

palaestinus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 602.-Palaestin.

pallidus, Salisb. Prod. 252-=albns.

paragus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 197 = officinalis.

parviflorus, Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 130.—Sibir. baical:

Pastorianus, Webb & Berth. PhyU Canar. iii. 329. t. 229=albus.

Pauli-Guilelmi, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 476.—dubius.

pauciflorus, Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiv. (1875) 603.

pendulinus, [illegible] Kunth, Enum. PI. v. 72.—Afr. trop. ?

Petitianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 820.—Abyss.

phyllacanthus, Lam. Encyc. i. 296=aphyllus.

pilosus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 610.—Afr. trop.

planiuscula, Burm.f. Fl. Cap. Prod. 10.—Afr. austr.

plocamoides, Webb, in Steud. Nom. ed. II. i. 150 = scoparius.

plumosus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 613.—Afr. austr.

polyphyllus, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 198 = officinalis.

prestratus, Dum. Fl. Belg. 188 = officinalis.

psilurus, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 253.—Angola,

puberulus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1876) 618.—Afr. austr.

pubescens, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 254.—Angola.

purpurascens, Bieb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 602=trichophyllus.

racemosus, Willd. Sp. PI. ii. 152.—Ind. or.; Afr. trop.; Austral.

ramosissima, Baker, in Gard. Chron. (1874) II. 6.—Afr. austr.

retrofractus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 73—Arabia.

ASPARAGUS.—

retrofractus, Linn. Sp. PI. 313.—Afr. austr.

retrofractus, C. Sm. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 328=arborescens.

retrofractus, Schousb. Vextr. Marok. 174 (sp. dubia).—Marocco.

rivalis, Burch. ex Schult.f. Syst. vii. 337.—Afr. austr.

Rottleri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 611.—Ind. or.

ruber, Burm.f. Fl. Cap. Prod. 10.—Afr. anstr.

rubricaulis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 616.—Ind. or.

rubicundus, Berg. Desc. PI. Cap. 88 = africanus, capensis, stipulaceus.

sarmentosus, Heyne, in Wall. Cat. n. 5154=volubilis.

sarmentosus, Linn. Sp. PI. 314.—Ind. or.

sativus, Mill. Gard. Diet ed. VIII. Add. = officinalis.

scaber, Brign. Fasc. PI. Forojul. 22.—Reg. Mediterr. et Caucas.

scaber, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 11 =utnbellatus.

scaberulus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 320.—Abyss.

scandens, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 199 = verticillatus.

scandens, Thunb. Prod. PI. Cap. 66.—Afr. austr.

schoberioides, Kunth, Enum. PI. v. 70.—Japon.

Schweinfarthii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 616.—Afr. trop.

scoparius, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1881) 11.—Marocco; Ins. Madera.

Sieboldii, Maxim. Prim. Fl. Amur. 287.—Japon.

simulans, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 609.—Madag.

sinensis, Noisset, ex Baker, 1. c. 607 = cnspus.

Smithianus, Webb, ex Steud. Nom. ed. II. i. 150, nomen.—Ins. Teneriff.

spinescens, Steud. in Schult. /. Syst. vii. SSi.—A(r. austr.

squarrosus, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 165—Ins. Cap. Verd.

stachyoides, Spreng. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 624.—Afr. austr.

stellatus. Baker, I. c. 612.—Afr. austr.

stipulaceus, Lam. Encyc. i. 296.—Afr. austr.

stipularis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 72.—Reg. Mediterr.; Ins. Canar.

striatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 65.—Afr. austr.

suaveolens, Burch. Trav. i. 226.—Afr. austr.

subalatus, Steud. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 614 {*err.* subulatus).—Ind. or.

subnlatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 66.—Afr. austr.

sylvaticus, Burch.'ex Baker, in'Saund. Ref. Bot. t. 214=virgatus.

sylvaticus, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. iii. 228 = tenuifolius.

Tauscheri, Fisch. ex Ledeb. Fl. Alt ii. 44=maritimus.

tenuifolius, Gilib. Exercit. ii. 459 = officinalis.

tenuifolius, *Lam. Encyc.* i. 294.—Europ. austr.

terminalis. Linn. Sp. PI. ed. II. 450 = Cordyline tenninalis.

tetragonus, Bresler, Diss. n. 15=racemosus.

Thunbergianus, *Schult.f. Syst.* vii. 333.—Afr. austr.

triacanthus, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 10.—Afr. austr.

tricarinatus, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 266 = verticillatus.

tricarinatus, *[Delile, in] Red. Lil.* t 451.—Hab.?

trichophyllus, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 65.—Afghan.; As. med.; Chin. bor.

umbellatus, *Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins.* 140.—Ins. Canar.

umbellatus, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* i. 393.—Ind. or.

umbellulatus, *Bresler, Diss.* n. 24.—Ins. Maurit.

umbricola. *Kit. ex Kanitt, Reliq. Kitaib.* 121; *in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,* xiii. (Ib63) 545.—Europ.

undulatns, *Tkunb. Prod. PI. Cap.* 66.—Afr. austr.

vaginellatus, *Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 612.—Madag.

verticillaris, Lam. Kncyc. i. 297 = verticillatus.

verticillatus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 450.—Ross, austr.; Oriens.

virgatus, *Baker, in Saund. Ref. Bot.* t. 214.—Afr. austr.

volubilis, Georgi, Beschreib. Russ. Reich. Nachtr. 268 = verticillatus.

volubilis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 5154 = adscendens.

volubilis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 66.—Afr. austr.

ASPARAGUS :-

vulgaris, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 197 = officinalis.
Wrigbtii, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-59) 413.—Japon.
zanzibaricus, *Baker, in Journ. Linn- Soc.* xiv. (1875) 61*.—Afr. trop.

ASF ASIA, Iindl. Gen. et Sp. Orch. 189 (1833). *0R-CHIDEAE,* Bentb. *Sc* Hook. f. iii. 660.
TROPHIANTHUS, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xii. (1814) 218.
Biberiana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 849 =seq.
Bibriana, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 90.—Hab.?
epidendroides, *Lindl. in Hook. Journ. Bat.* i. (1834) 6.—Panama.
fragrant, Klotzsch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 12 —epidendroides.
lunate, *Lindl. Bot. Reg.* xxii. (1836) sub t1907.—Bras,
lyrata, *[Reichb. f. in] Bot. Zeit.* x. (1852) 721.—Bras,
papilionacea, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1876) II. 100. —Costa Rica,
principissa, *Reichb. f. in Bot. Zeit. x.* (1852) 687.—Veraguas.
pshtacina, *Reichb. f. in Gard. Chron.* x. (1878) II. 684. —Ecuad.
variegate, *Lindl. Bot. Reg.* xxii. 1.1907.—Am. austr.

ASPASIA, E. Mey. ex Pfeiff. Nom. i. 295 (1878)- Staohys, Linn. (Labiat.).

ASPASIA, Salisb. Gen. PI. Fiagm. 34 (1866) = Ornlthogoluzn, Linn. (Liliac).
aurea, Salisb. 1. c. = O. thyrsoides.
fiavescens, Salisb. 1. c.=O. thyrsoides.
lactea, Salisb. L c.=O. lacteum.
revoluta, Salisb. 1. c. = O. revolntum.
thyrsoides, Salisb. 1. c.=O. thyrsoides.

ASPEGRENIA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. it 12. 1116 (1837) = Octomeria, R. Br. (Orchid).
scirpoidea, Poepp. & Endl. 1. c. = O. scirpoidea.

ASPELINA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xli. 166 (1826) = Senecio, Linn. (Compos.).
nivea, Cass.l. c.=S. Aspelina.

ASPERA, Colnmna, ex Moench, Mcth. 641 (1794) = Galium, Toum. (Rubiac).
muralis, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 369 - G . mnrale.
nutans, Moench, Meth. 641 = G. murale.

ASPEBBLIiA, Humb. in Roem. & Ust. Mag. iii. vn. 6 (1790). *GRAMINEAE,* Benin. *Sc* Hook. *f.* iii. 1207 (Asprella).
GYMNOSTICHUM, Schreb. Beschr. Graes. ii. 127. t. 47 (1810).
HYSTRIX, Moench, Meth. 294 (1794).
Hystrix, *Numb. I. c*—Oriens.

ASPERTXGO, [Toum.] Linn. Syst. ed. I. (1785). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 858.
aegyptiaca, Linn. Sp. PI. ed. II. 198=Anchusa flava.
alba, [Pieri] in lonios Anthol. v. 192 =procnm bens.
divaricata, Murr. in Nov. Comm. Gotting. (1776) 25. t. 2=Nonea lutea.
procumbens. *Linn. Sp. PI.* 138.—Europ.; Arab.; Oriens; As. bor.
vulgaris, Dum.-Cours. Bot. Cult. ii. 167 = procumbens.
verrucosa, Boiss. FL Orient iv. 159, in syn.=Anchnsa flava.

A8PEBULA, Linn. Syst. ed. I (1735). *RVBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ ii. 150.
LEPTUNIS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix.(1856) II. 396, in textu.
BLEPHAROSTEMMA.CHLOROSIEMMA, CYNANCHICA, et GALIOPSIS, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 898.
acerosa, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 31-IiIadflora.
affinis, Boiss. *Sc* Huet, Diagn: Ser. II. ii. 110=cynanchica.
algerica, Pers. Syn. i. 124—hirsute.
AUionii, Baumg. Enum. i. 80=hexaphylla.
alpigena, Schur, Enum. PI. Transs. 277 - cynanchica.
alpina, Bieb. Fl. Taur. Cane. Suppl. 103-cynanchica.
Aparine, *Bess. Fl. Galic.* i. 114.—Europ. aostr. occ.; Oriens; Sibiria.

ASPERUXA :—
arcadiensis, *Sims, Bot. Mag.* t. 214?.—Graecia.
arenicola, Reut. Cat. PI. Geneve, ed. II. 101=cynanchica.
aristata, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 165-longiflora.
aristaU, *Linn./. Suppl.* 120.—Europ.; Oriens.
arundana, Ball, ex Nym. Consp. ii. 334=pendula.
arvensis, *Linn. Sp. PI.* 103.—Europ.; Oriens.
aspera, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 28.—Reg. Cauc.; Persia,
asperrima, *Boiss. Elench.* 56.—Hispan.
Athoa, Bpiss. Diagn. Ser. I. x. 62=suberosa.
aturea, Jaub. *Sc* Spach, IUustr. i. 151. t. 82=orientalis.
Boissieri, Steud.ex Boiss_Voy.Bot.Espagne,787 -eflusa.
Boissieriana, Steud. Nom. ed. II. i. 151=praec.
brachyantha, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 66.—Persia,
breviflora, *Boiss. 1. c.* Ser. I. x. 68.—Syria,
brevifolia, *Vent.jard. Cels,* t. 68.—As. Min.
brunnea, Boiss. Fl. Orient iii. 32=brevifolia.
bryoides, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 106.—Lycia.
calabrica. Linn. f. Suppl. 120=Putoria calabrica.
canescens, Vis. Fl. Dalmat. iii. 11. t. 25=aristata.
capitata, Kit. ex Reichb. £ Ic. Fl. Germ. xvii. t 1182 — hexaphylla.
cespitosa, Boiss. Fl. Orient, iii. 89-= lilaciflora.
chlorantha, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. II. vi. 90.—Graecia.
ciliaris, DC. Prod. iv. 582 =stylosa.
ciliata, Moench, Meth. 484=Putoria calabrica.
ciliata, *Rochel, Banat.* t. ix. f. 22; *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1864) 21.—Bannat.
collina, Salisb. Prod. 58 = cynanchica.
commutata, Presl, Fl. Sic. Prod. 62=longiflora.
conferta, *Hook./, in Lend. Journ. Bot.* vi. (1847) 463 [bis].—Austral.
consanguinea, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 87 = Galium triflorum.
crassifolia, Linn. Mant. S7=tomentosa.
cretacea, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 529- - cynanchica.
cruciate, *Veil. Fl. Flum.* 44 ; i. t. 114.—Bras,
cyanea, *Veil. 1. c.* 44; i. t. 113.—Bras,
cynanchica, *Linn. Sp. PI.* 104.—Europ.; As. Min.
Danilevskiana, *Basiner, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* ii. (1644) 202.—Turkestan.
debilis, Ledeb. Ind. Hort Dorp. Snppl. (1824) 2-humifusa.
deficiens, *Viviani, in Ann. Star. Nat.* iv. 231.—Corsica.
denudata, Vahl, ex VVillk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 301*= hirsute.
digyna, Dufour, in Ann. Sc. Gen. Phyt vii. (1820) 295 = aristata.
divaricata, *Bischoff, Del. Sem. Hort. Heidelb.* (1848) 4. —Hab.?
divergens, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 90-graveolens.
dubia, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst iii. Mant 189 =arvensia.
effusa, *Boiss. Voy. Bat. Espagne,* **280.—**Hispan.
elongate, *Sckrenk, Enum. PI. Nov.* 68.—Soongaria.
eriocarpa, Boiss. Elench. 57 = asperrima.
fallax, Ehrh. ex Steud. Nom. ed. II. i. 151-laevigate.
fasciculata, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 60 = stricta.
flaccida, Tenore, Fl. Nap. t. 110 = longiflora.
foetida, Pen. Syn. i," 524 = Putoria calabrica.
fragillima, *Boiss.* b[1] *Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 36.—Persia,
fragrantissima, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiv. (1882) 859.—N. Zel.
galioidea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 13; et viii. (1881) 161=galioides.
galioides, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 101.—Europ.; Reg. Cauc.
galioides, Bourg. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. FL Hisp. ii. 312—Galium mnrcicum.
galioides, Jacquem. Joum. ex Hook. £ FL Brit Ind. iii. 205 = Galiura triflorum.
geminifolia, *F. Afuell. Fragm.* v. 147.—Austral.
glaberrima, Bunge, ex Nym. Consp. 833-involucrata.
glabra, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 31 = involucrate.
glauca, Bess. Enum. PI. Volh. 7=galioides.
glomerate, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 166.—Oriens.
gracilis, C. *A. Mey. Verm. Pfl. Cauc.* 164.—Reg. Caucas.
graveolens, *Bieb. ex Bess, in Roem.* b" *Schult. Syst.* iii. *Mant.* 876.—Tauria; As. Min.
Gunnii, *Hook./, in Hook. Land. Journ. Bot.* vi **(1847) 468** [bis].—Austral.

ASKEKDXA:—

Gussonii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 63.—Sicil.
Hausknechtii, *Boiss. PI. Or. Nov. Dec.* i. 1.—Assyria,
hexaphylla, *All. Fl. Pedem.* i. 12. t. 77. f. 3.—ItaL; Hangar.
hexaphylla, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. iv. 728 = cretacea.
hirsute, *Desf. Fl. Atlant.* i. 127.—Lusit.; Aft. bor.
hirte, *Ramond, in Bull. Soc. Philom.* (1800) 131. t 9. —Mont. Pyren.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 87 = Galium triflorum.
humifusa, *Bess. Cat. Hort. Crem.* (1811) *Suppl.* iii. 4; *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* 106.—PodoL'j Oriens.
incana, Bory *Sc* Chaub. Nouv. H. Pelop. 10 =taygetea.
incana, *Sibth. &* Sm. Prod. Fl. Graec. I* 88.—Crete,
involucrata, *Wahlenb. in Isis,* xxi. (1828) 971.—As. In* In*
Jordani, Perr. *Sc* Song, ex Nym. Consp. 334=longiflora.
Kotschyana, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 27.—Kurdistan.
laevigata, DC. Prod. iv. 682, partim=involucrata.
laevigata, *Linn. Mant.* 38.—Europ. austr.
laxiflora, *Boiss. in Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 87.—Pontus.
libanotica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 59.—Syria,
lilaciflora, *Boiss. 1. c.* iii. 33.—As. Min.
littoralis, *Sibth. V Sm. Prod. Fl. Graec.* i. 88.—Pontus.
longiflora, Noe, ex Nym. Consp. 838=cynanchica.
longiflora, *Waldst.* b* *Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 162. t. 150.—Europ.
longi/olia, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 87' Galium longifolium.
lutea, *Sibth.* b* *Sm. I. c.* 88.—Graecia.
Lycia, *Stop/, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 105.—Lycia.
macroclada, Huet, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xix. (1853) 2S8=cynanchica.
macrorrhita, Hoffmgg. *Sc* Link, Fl. Port. ii. 41. t. 84. = aristata.
maritima, Tenore, ex Nym. Consp. 384=tomentosa.
matrisyha, Gilib. Exercit. Bot. Univ. Vila. 5 =odorata.
microphylla, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 84.—Peisia.
minima, *Hook./, in Land. Journ. Bot.* vi (1847) 464 [bis].—Tasmania.
minor, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 481 = cynanchica.
mollis, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 31=arcadiensis.
molluginoides, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 206.—Reg. Caucas.
Montana, Waldst. *Sc* Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 151 = cynanchica.
mncronata, *Otto, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 151.—Hab.?
multiflora, Lapeyr. Hist. Abr..Pl. Pyr. 62 = cynanchica.
Mungieri, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. I. x. 61 = lutea.
muscosa, *Boiss. (f Heldr. 1. c.* Ser. II. ii. 109.—Thessalia.
mutica, Boiss. Fl. Orient, iii. 48=suavis.
neglects, Moris, Elench. Sard. ii. 4—pumila.
neglecta, *Guss. PI. Rar.* 70.1.13. f. 2.—Italia.
Neilreichii, *Beck, in Verh. Zoel.-Bot. Ges. Wien,* xxxii. (1883) 182.—Europ.
nemoralis, Salisb. Prod. 68-taurina.
nitens, Guss. PI. Rar. 70. t. 13. f. 2=neglecta.
nitida, *Sibth.* b[1] *Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 89.—As. Min.
odora, Salisb. Prod. 67=odorata.
odorate, *Linn. Sp. PI.* 103.—Europ.; Oriens.
oligantha, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 111, 112 = Rubia syrticola.
oppositifolia, *Regel* b" *Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 42.—As. centr.
orientelis, *Boiss.* b* *Hohen. Diagn.* Ser. I. iii. 30.—*Ai.* Min.; Reg. Caucas.
ovali/olia, Boiss. *Sc* Huet, Diagn. Ser. II. ii. 113-gracilis.
palustris, Tenore, Fl. Nap. lll=tinctoria.
paniculata, Boiss. Elench. 56=eflusa.
panicnlate, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* i. 140.—Sibir. alt.
papillosa, Kem. ex Nym. Consp. 325-Galium aristatum.
papillosa, *Lange, in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* **III** *(JPugiU.* ii. 161).—Hispan.
pendula, *Boiss. Elench.* 55.—Hispan.

ABPEKDliA:—
perpusilla, *Hook. Ft. Nov. Zel.* 114.—N. Zel.
PestaloMtae, Boiss. DUgn. Ser. II. ii. 113=graveolens.
Hatygalium, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 284.—Manchur.
pontica, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 39.—Pontus.
prostrate, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1861) 461.—Armenia.
pulvinaris, Nym. Consp. ii. 334-lutea.
pnmila, *Moris, in Mem. Ace. Torin.* xxxviii. (1885) 26.—Sardinia.
pusilla, HQOIC. f. in Hook. Load. Joom. Bot. vL (1847) 464 [bit] = GunniL
Pycnantha, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 64=humifusB
Pyrenaica, Linn. Sp. PI. 104 = cynanehica.
repens, Brot. Fl. Lusit. i. 152 = hirsute,
ngida, *Si6th. &• Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 89—Creta.
rivalis, Sibth. & Sm. 1. c. 87=A. Aparine.
rotundi/olia, Linn. Mant ii. 280 = laevigata.
ruoeola, Gratel. in Bull. Soc. Nat. Hist. Bord. L (1826) 811 &- cypapchica.
rubeola, Lam. Fl. Fr. iii. 875-cynanchica, tinctoria.
rubioides, *Schur, Enum. PI. Transs.* 276.—Enrop.
rumelica, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 118=graveolens.
rupestris, Reichb. FL Germ. Excurs. 205 = scutellans.
rupUola, lord. Pugill. 76=cynanehica.
saxatilis, Urn. IUustr. n. 139-nitida, pyrenaica.
scabm, Link, Enum. Hort. Berol. i. 184=tomentosal
«airo, Moris, Elench. Sard. ii. 4=pumila.
scabm, J. & C. Presl, Delic. Prag. 124 =aristate.
•coparia, *Hook. f. in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 463 [bill.—AnstraL
Kutellaris, *Vis. Sem. Rar. Hort. Patav.* (18S6)[1].-Albania.
setiepmis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 65.—Persia.
***»*,.*Jaub. & Spach, IUustr.* i. 162. t. 82. B.-Syna; Persia.
sftulosa, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 61=UMoralis.
tqerardioides, *Jaub. & Spach, IUustr.* i. 153.—Persia.
anaica, I>eHle, ex Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. ii. (1884) 268 = Galium sinaienm.
tquarrosa, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 461 = glomerate.
StaWana, *Vis. Fl. Dalmat.* iii. 11.—Dalmatia.
*wfci *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 38.—Graeciaj As. Min.
strictissima, SchuT, Ennm. PI. Transs. 277-galioides.
stylosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. SL—Persia.
Stoveolns, Schrad. ex DC. Prod. iv. 583=longiflora.
•uavis, *Fisch. Mey. & Avi-Lall. Ind. Sem. Hort. P'trop. a.* 62.,-Anatolia.
subalpina, Schur, Enum. PI. Transs. 277=cynanchica.
suberosa, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 180 = Gussonri.
suberosa, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 89.—Graecia.
mbsimplex, *Hook. f. in Hook. Land. Journ. Bot.* n. U847) 463 Fbis].—Tasmania.
f&velutina, DC. Prod. iv. 685 = Galium leiophyllum.
sufiruticosa, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. II. ii. HI·—Graecia.
"tpina, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 101=cynanehica.
taunna, *Linn. Sp. PI.* 103.—Europ.; Oriens.
"ygetea, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 60.—Graecia.
Tenori, Walk, ex Koem. & Schult. Syst iii. Mant. 189, u»adn.=tomentosa.
tenuiflora, Jord. PugilL 77=cynanehica.
tenuifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 82.—As. Min.
tenuissima, *C. KochTin Linnaea,* xxiv. (1851) 462.-Oriens.
thessala, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. Ill - longinora,
fnctoria, *Linn. Sp. PI.* 104.—Euro^.
tomentosa, *Tenore, Prod. Fl. Neap.* p. xii.—Ins. Caprae.
Toumefortu, *Sieber, Reise Kreta,* i. 289; ii. 316.—Creta.
Mandra, Gilib. Fl. Litnan. i. 14=tinctoria.
tnchodes, *J. Gay, in DC. Prod.* iv. 582.—Persia.
trinervia, Lam. Fl. Fr. iii. 876 = taurina.
tubifloya, Gueldst. ex Steud. Norn. ed. I. 80 j ed. II. i 161-=molluginoides.
tyraica, Bess. Enum. PI. Volh. 41=galioides.
umbellata, Willd. ex DC. Prod. iv. 586=hexaphylla.

ASPHALATHUS, Bnrm. *f.* Fl. Ind. 155; et FL Cap. "ad. 21 (1768)-A8palathUB, Linn. (Legnm.).

ASPHALTHIUM, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. "• (1787) 380-FBoralea, Linn. (Legnm.).

ASPHALTHIUM :—
bituminosum, Medic. PhiL Bot. i 211 - Psoralea bituminoss.
ellipticum, Medic, in Vorles, Chnrpf. Phys. Ges. ii. (1787) 381=seq.l
frutescens, Medic. 1. c. 880-P. bituminosa.
herbaceum. Medic. 1. c. 881=praec. ?
nigrum, Medic. 1. c.=praec.t
palaesHnum, Medic. 1. c.=P. palaestina.

ASPHALTIUM, Fourr. in Ann. Soc. I.yon, N. S. xvi. (1868) 865=ASPHALTHIUM, Medic.=Puoralea, Linn. (I^egum.).

ASFHOPBLIirE, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 116 (1830). *LIUACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 783.
DORYDIUM, Salisb. Gen. PI. Fragm. 72 (1866).
HEROION, Rafin. Fl. Tellur. iv. 12 (1836).
ambigua, *J- Gay, ex Baker, in Journ., Linn. Soc.* xv. (1877) 276.—Oriens.
Balansae, *J. Gay, ex Baker, I. c.* 277—Cilicia.
brevicaulis, *J. Gay, ex Baker, I. c.* 276.—As. Min.; Mesopot
capillaris, *Kunth, Enum. PI.* iv. 562.—Hab. ?
cretica, Boiss. ex Baker, in Journ. Linn. Soc xv. (1877) 276=brevicaulis.
cretica, Vis. Fl. Dalm. i. 152-libnmica.
damascene, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 276.—Syria.
globifera, *J. Gay, ex Baker, Le.* 274.—Syria,
isthmocarpa, *J. Gay, ex' Baker, I. c.* 278.—As. Min.
liburnica, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 116.—Europ. austr. or.
lutea, *Reichb. 1. c*—Reg. Mediterr. et Cancas.; As. Min.
Morisiana. Clem, 'in Mem. Ace. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 326=taurica.
parviflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 276.—Byzantium,
prismatocarpa, *J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient,* v. 320.—Cappadoc.
prolifera, *Kunth, Enum. PI.* iv. 568.—Armenia; Reg. Cane
rigidiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 277.—As. Min.
Stmitsii, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 261 = tenuior.
taurica, *Kunth, Enum. PI.* iv. 561.—Oriens.
tenuior, *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 198.—Oriens; Reg. Caucas.; Persia.

ASPHODELOIDES, Moench, Meth. 634 (1794) ~ A B - phodelus, Linn. (Iiliac.).
ramosa, Moench, 1. c.=Asphodelusramosus.

ASPHODELOPSIS, Strnd. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 821 = Chlorophytum, Ker-Gawl.
arangadinensis, Steud. ex Baker, 1. c 332=C. attenuatum.

ASPHODELTJ8, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735).
ULIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 782.
ASPHODELOIDES, Moench, Meth. 634 (1794).
CLAUSONIA, Pomel, Mat. Fl. AtL 1 (1874).
GETHOSYNK, Salisb. Gen. PI. Fragm. 72 (1866).
OPHIOPRASON, Salisb. 1. c. (1866).
VERINEA, Pomel, Mat Fl. Ad. 1 (1874).
abyssinicus, Hort ex Schult f. Syst. vii. 500=Albuca abyssinica.
acaulis, *Desf. Fl. Atlant.* i. 302. t. 89.—Barbaria.
aestivus, Brigant Stirp. Rar. i. 5 = Asphodeline libumica.
aestivus, Brot. Fl. Lusit. i. 525=microcarpus.
aestivus, Reichb. PL Crit t 451 = tenuifolius.
affinis, Parl. Fl. Ital. ii. 596-microcarpus.
africanus, Lam. Encyc. i. 800=Albuca abyssinica.
africanus, Jord. in Bull. Soc Bot. Fr. vii. (1860) 730 =ramosus.
albus, Boiss. Voy. Bot Espagne, 618=cerasiferns.
alius, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 3=ramosus.
albus, T. Nees, Gen. iv. t. 20=fistulosus.
albus, *Willd. Sp. PI.* ii. 183.—Europ. austr.
altaicus. Pall, in Act Acad. Petrop. (1779) II. 258. 10 = Eremurus altaicus.
ambigens, *Jord. in Bull. Soc. Bot. Fr.* vii. (1860) 736.—Gallia.

ASPHODELtTS :—
apiocarpus, Hoflmgg. ex Kunth, Enum. PL iv. 557 = aestivus.
approximatus, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. iii. 223=fistulosus.
Arrondeaui, Lloyd, Fl. Ouest Fr. ed. III. 817 = albus.
asiaticus, *Haw. Syn. PI. Succ.* 332.—Asia.
Audibertii, Requien, ex Schult. f. Syst. vii. 1695-ramosus.
australis, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 124—ramosus.
bracteatus, Willd. ex Schult f. Syst vii. 484=Asphodeline taurica.
brevicaulis, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. v. (1842) 480 (Misc. Bot. i.20) = Asphodeline brevicaulis.
canariensis, C. Sm. & Buch, in Abh. Acad. Berl. (1816-17) 362, 368=intermedius.
capensis, Burm. f. FL Cap. Prod. 10 (=Cyanellat).—Afr. austr.
capensis, Linn. Syst ed. X. 982 - Chlorophytum elatum.
capillaris, [DC. in] Red. Lil. t. 880=Asphodeline libumica,
cerasiferus, *J. Gay, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 810; *et in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. vii. (1857) 127.—Reg. Mediterr. occ.
Chamaemoly, Hochst. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc xv. (1877) 828=Chlorophyturn tetraphyllum.
Chambeironi, Jord. in Bull. Soc. Bot Fr. vii. (1860) 736=ramosus.
clavatus, Koxb. Hort Beng. 24; Fl. Ind. 148-tenuifolius.
clavosus, Don, ex Steud. Norn. ed. IL i. 152,sphalm.—clavatua.
collinus, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 123 =• ramosus.
comosus, Houtt. Plantenk. xii. 336. t. 83=Encomis punctata.
comosus, Jord. in Bull. Soe. Bot Fr. vii. (1860) 787-ramosus.
corsicus, Jord.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 739 =ramosus.
creticus, Lam. Encyc i. 200=Asphodeline libumica.
crinipes, Jord. in Bull. Soc. Bot Fr. vii. (1860) 729= albus.
damascenes, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 22=Asphodeline damascena.
delphinensis, Gren. *Sc* Godr. in Mlm. Soc Emul. Doubs, Ser. II. vi. (1855) 18 = albus.
Disiglisei, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 121= ramosus.
fistulosus, *Linn. Sp.Pl.* 309.—Reg. Mediterr.; Oriens.
fuscatus, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 128= ramosus.
glaucus, Aucher, ex Boiss. Fl. Orient, v. 823 = Eremurus cappadocicus.
glaucescens, Jord.—Cf. Bull. Soc Bot. Fr. vii. (1660) 789 = ramosus.
gramineus, Mill, ex Steud. Norn. ed. I. 80, 278; ed. II. i. 162=Melaspbaerula graminea.
grandiflorus, Jord. *Sc* Fourr. Brev. Fl. Nov. fasc. ii. 123=ramosus.
inderiensis, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc iv. (1832) 257 — Eremurus inderiensis.
infestus, Yaxl Fl. Ital. ii. 600-microcarpus.
intermedius, Horaem. Hort 11am. Suppl. 131—6stulosus.
latifolius, Breyn. ex Schult *t* Syst. vii 485=Wachendorfia paniculate.
liburnicus, Scop. Fl. Cam. ed. II. L 245= Asphodeline libumica.
littoralis, Jord. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 729 = albus.
luteus, Linn. Sp. PI. 309 = Asphodeline lutea.
macrocarpus, Parl. Fl. Ital. ii. 604=albus.
major, Pourr. ex Willk. & Lange, Piod. FL Hisp. i. 204=albus.
micranthus, Coss. *Sc* Kralik, ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 497 - viscidnlus.
microcarpus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 117; Ic Fl. Germ. ix. 30. n. 1116 = tenuifolius.
microcarpus, *Viviani, Fl. Cors.* 5.—Rep. Mediterr.; Ins. Canar.
Morisianus, *Parl. Fl. Ital.* ii. 596.—Italia.
neglectus, Schnlt. f. Syst. vii. 488=albus.
nervosus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 885.—Afr. bor.
occidentalis, Jord. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (I860) 781 » albus.

ASPHODELTTB:—
oliiensis, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fast ii. 122 = ramosus.
Oeanoni, Jord. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 783 = ramosus.
parviflorus, Wight, Ic. t. 2062=fistulosus.
pendulums, *Coss. W Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 399, 497.—Algeria; Arab.
persicus, Fisch. & Mey. ex Boiss. Fl. Orient, v. 317 =Asphodeline tenuior.
persicus, Jaub. *Sc* Spach, IUustr. ii. 2.t. 102 = Eremurus persicus.
pratensis, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. i. 203=microcarpus.
proeerus, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 124 = ramosus.
proli/erus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 280 = Asphodeline prolifera.
proterophyllus, Jord. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 787= ramosus.
pyrenaicus, Jord. 1. c. 782=albus.
racemosus, link, Ennm. Hort. Berol. i. 328 = ramosus.
ramosus, Colm. ex Willk. *Si* Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 203 = microcarpus.
ramosus, Gouan, ex Willk. & Lange, L c. 204=cerasiferus.
ramosus, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 188=neglectus.
ramosus, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 310.—Europ. austr.
ramosus, Linn. 1. c. ed. II. 444 = microcarpus, cerasiferus.
ramosus, Murr. in Nov. Comm. Gotting. (1776) 37. t. 71 = albus.
ramosus, Sturm, Deutschl. Fl. Heft vi. t. 6 = fistulosus.
refractus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. (1854) 28 = pendulinus.
regius, Hort. ex Heynh. Norn. ii. 48 = Eremurus spectabilis.
repens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 256.—Afr. bor.
rigidifolius, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. L xiii. 22 - Asphodeline rigidifolia.
Rouxii, Jord. in Bull. Soc Bot. Fr. vii. (1860) 738 = ramosus.
serotinus, Sibth. ex Jacq. Eclog. 113••Asphodeline libumica.
sibiricus, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 483 = Asphodeline lutea.
sibiricus, Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 257 = Eremurus altaicus.
simplex, Pers. Syn. i. 367 = albus.
spkaerocarpus, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 223=albus.
spicatus, Desf. ex Baker, in Joura. Lion. Soc xv. (1877) 271 = ramosus.
stoechadensis, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 122 = ramosus.
strictus, *Burrn./. Fl. Cap. Prod.* 10.—Afr. austr.
subalpinus, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 224 = albus.
Stovitsii, C. Koch, in linnaea, xxii. (1849) 261 = Asphodeline tenuior.
tardiflorus, Jord. in Ball. Soc. Bot Fr. vii. (1860) 736 =ramosus.
tauricus, Lodd. Bot Cab. t 1102 = Asphodeline tenuior.
tauricus, Pall, in Nov. Act. Petrop. x. 309; Bieb. Fl. Taur. Cauc i. 279= Asphodeline taurica.
tenuiflora, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 261 = Asphodeline tenuior.
tenuifolius, *Can. in Anal. Gene. Nat.* iii. (1801) 46.—Ind. or.
tenuior, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 9=Asphodeline tenuior.
validus, Jord.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 740 = ramosus.
Villarsii, Verl. ex Jord. Billotia, 107, 109; et in Bull. Soc. Stat. Isère, Sér. IL iv. (1860) 151 = ramosus.
virgatus, Jord.—Cf. Bull. Soc Bot Fr. vii. (1860) 738 - ramosus.
viscidulus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 118.—Afr. bor.; Arab.

ASPICARIA, D. Dietr. Syn. i. 2, 27 (1839) = seq.

A8PICABPA, Rich, in Mém. Mus. Par. ii. (1815) 898. t. 1; Lag. Gen. et Sp. Nov. 1 (1816). *MALPIGHIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 261.
ACOSMUS, Desv. in Desf. Cat. Hort Par. (1829) 233.
Hartwegiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 598.—Mexic

ASPIC ARPA:-
hirtella, *Rich, in Mim. Mus. Par.* iL (1816) 399. t. IS.—Mexic.
hyssopifolia, *A. Gray,* in Bost Jonra. Nat. Hist. vi. (1850) 167.—Texas.
longipes, *A. Gray, PI. Wright,* i. 87.—N. Mexic.
sericea, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 68.—Keg. Argent.
urens, Lag. Gen. et Sp. Nov. i. 1. n. 5=hirtella.

ASPIDALIS.Gaertn. Fruct. ii. 1171 (1791)=Berkheya, Ehrh. (Compos.).
araneosa, Gaertn. 1. c. = B. cemua.

ASPIDANDRA, Hassk. in Versl. en Med. Akad. Wetensch. iv. (1855) 141. *EUPHORBIACEAE1* 'Gen. dub."
fragrans, *Hassk. I.e.*—Java.

ASPIDANTHERA, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 217 = Ferdinandusa, Pohl (Rubiac).
rudgeoides, Benth. 1. c.—Bras.

ASPIDEIUM, Zollik. ex DC. Prod. vii. 150 (1838) = Chondrilla, Tourn. (Compos.).

ASPIDISTRA, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 628 (1823).
LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 772.
MACROGYNE, Link & Otto, Ic. PI. Sel. t. 31 (1823).
PLECTOGYNE, Link, in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. (1834) 266.
PORPAX, Salisb. pen. PI. Fragm. 9 (1866).
elatior, *Blume, in Horn, (f De Vriese, Tijdschr.* i. (1884) 76. t. 4.—Japon.
lurida, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 628.—China.
lurida, Sieber, ex Presl, in Flora, xii. (182M) 568 = WachendorSa hirsuta.
punctata, Lindl. in Bot. Reg. t. 977 = lurida.
variegata, Regel, in Flora, xxxiii. (1850) 354=elatior.

ASPIDOCARPUS, Neck. Elem. ii. 123 (1790) = Bhamnus, Tourn.

A8PIDOCARYA, Hook. f. *Sc* Thorns. Fl. Ind. i. 180 (1855). *MENISPERMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 33.
hirsuta, *Becc. Malesia,* i. (1877) 186.—Malaya,
uvifera, *Hook. f. & Thorns. Fl. Ind.* i. 180.—Reg. HimaL

ASPIDOGLOSSUM, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 200 (1837) = SohiBOglo8Biun, E. Mey. (Asclep.).
biflorum, E. Mey. 1. c. 201.—Afr. austr,
fascicutare, E. Mey. 1. c. 200.—Afr/ austr.
heterophyllum, E. Mey. I. c—Afr. austr.

A8PIDOPTEBYB, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sir. II. xiii. (1840) 266. *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 259.
canarensis. *Dale, in Hook. Ktrm Journ.* iii. (1851) 37.—Ind. or.
concava, *A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xiii. (1840) 266.—Burma.
cordata, *A. Juss. 1. c.* 267.—Ind. or.
elliptica, *A. Juss. I. c.* 266.—Ind. or.
glabriuscula, A. Juss. 1. c. 267 = Roxburghiana.
glomerata, Wight, Ic. t. 1986=canarensis.
Helferiana, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 187.—Burma,
hirsuta, *A. Juss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xiii. (1840) 267.—Burma.
lanuginosa, A. Juss. 1. c.=nutans.
nutans, A. Juss. 1. c. = Wallichii.
nutans, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 421.—Reg. Himal.
oxyphylla, A. Juss. in Ann. Sc. Nat Sér. II. xiii. (1840) 267=Roxburghiana.
rotundifolia, A. Juss. L c - nutans.
Roxburghiana, *A. Juss. 1. c.*—Ind. or.
tomentosa, *A. Juss. 1. c.*—Java.
Wallichii, *Hoot./. Fl. Brit. Ind.* i. 421.—Reg. Himal.

ASPIDOSPERMA, Mart. & Zncc. Nov. Gen. et Sp. i. 57. t. 84 ad 36 (1824). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 702.
MACAGLIA, Rich, ex Vahl, in Skrivt Nat. Selsk. Kiobenh. vi. (1810) 107.
PELTOSPERMUM, DC. in Bibl. Univ. Genev. xvii. (1888) 133.

ASPIDOSPERKLA:—
anomalum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 61.—Bras,
argenteum, *Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 104.—Bras,
australe, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 58.—Bras.
bicoloT, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 60.—Bras,
camporum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 49.—Bras.
condylocarpon, *Muell. Arg. 1. c.* 55.—Bras,
cylindrocarpum, *Muell. Arg. I. c.* 54.—Bras,
dasycarpon, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 396.—Bras,
decipiens, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 398.—Venezuela,
desmanthum, *Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 52.—Bras.
discolor, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 398.—Bras,
dispennum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 60.—Bras,
eburaeum, *Allem. ex Saldanha, in Ann: Sc. Nat.* Sér. V. xix. (1874) 213.—Bras,
excelsum, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 245.—Guiana.
Francisii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 398.—Guiana.
Gardneri, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 47.—Bras.
Gomezianum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 397.—Bras.
Hilarianum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 50.—Bras,
lagoënse, *Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 102.—Bras.
latisiliqua, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 676.—Guiana,
leucomelanum, *Muell. Arg. in Kjoeb. Videnik. Meddel.* (1869) 105.—Bras.
Lhotzkianum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 60.—Bras.
macrocarpon, *Mart. Nov. Gen. et Sp:* i. 69.—Bras,
macrophyllum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 397.—Guiana.
Martii, *Silva Manso, in Mart., Herb. Fl. Bras.* 163.—Bras,
megalocarpon, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 400.—Mexic.
melanocalyx, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 52.—Bras.
molle, Mart. Herb. Fl. Bras. 162 = pyrifolium.
multiflorum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 897.—Guiana,
nitidum, *Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 59.—Bras.
nobile, *Muell. Arg. 1. c.* 44.—Bras,
oblongum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 399.—Guiana,
obscurum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 48.—Bras.
olivaceum, *Muell. Arg. I. c.* 57.—Bras,
pachypterum, *Muell. Arg. I. c.* 61.—Bras,
pallidiflorum, *Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 101.—Bras.
parvifoliumj *A. DC. in DC. Prod.* viii. 398.—Bras,
platyphyllum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 46.—Bras.
polyneuron, *Muell. Arg. 1. c.* 57.—Bras.
Pohlianum, *Muell. Arg. I. c.* 44.—Bras,
populifolium, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 897.—Bras,
pyricollum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. fi8.—Bras.
pyrifolium, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 60.—Bras.
Quebracho-bianco, *Schlecht. in Bot. Zeit.* xix. (1861) 187.—Am. austr.
Quebracho-colorado, *Schlecht. I. c.* 189.—Am. anstr.
ramiflorum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 55.—Bras.
refractum, *Mart. Nov. Gen. et Sp. i.* 60.—Bras.
Riedelii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 56.—Bras.
Sellowii, *Muell. Arg. I.* c—Bras,
sessiliflorum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 399.—Ins. Trinit.
Spruceanum, *Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 52.—Bras,
subincanum, *Mart. Herb. Fl. Bras.* n. 262; *ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 897.—Bras,
tomentosum, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 58. t. 34.—Bras.
Vargasii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 399.—Venezuela.
velutinum, Fisch. ex Muell. Arg. in Mart. FL Bras. vi. I. 45 = tomentosum.
verbascifolium, *Muell. Arg. 1. c.* 46.—Bras.

ASPIDOSPERMA :—
venosum, *Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 103.-Bras.
verrucnlosum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **vi. 1.51.** —Bras.
Waraiingii, *Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (W69) 101.-Bras.

ASPSTIGMA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 18 = ToddaUa, Jus. (Rnlac.)
<*uminatum, Hochst 1. c. = T. nobilis.

ASPIDOSTEMON, Thou. Gen. NoT. Madag. 12 (1806). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 371.
ANOMPSTRPHIUM, DC. Prod. v. 560 (1886).
CORONOCARPUS, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 398(1827).
DIPTEROTHECA, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) 484.
HARPEPHORA, Endl. Gen. Suppl. i. 1382 (1841).
WIRTGENIA, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) 485.
abyssinica, *Oliver &" Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* in. 379—Afr. trop.
abyssinica, *Vatke, in Linnaea,* xxxix. (1875) 495.—Abyss,
angustifolia, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* "i. 38O.-Afr. trop.
•nomala, *Baker, in Mart. Fl. BrasM.* **III.** 204.—Bras,
anstata, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 191.—Reg. Argent.
asperrima, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 200.—Bras,
attenuata, *Baker, I. c.* 19B.—Bras,
aurantiaca, *Griseb. in Goett. Abh.* **xlx.** (1874) 188.—Reg. Argent.
Baroni, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* **xx. (1884) 188—** Madag.
«>jen, *DC. Prod.* v. 561.—Madag.
buphthalmiflora, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 186.—Reg. Argent,
oubrasilii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 194.—
calendulacea, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 191 =bnphthalmiflora.
UaussenUna, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 202.—Bras.
ediptaefolia, *Baker, 1. c.* 197.—Bras,
etegans, *Benth. t? Hook./. Gen.* ii. 372.-^8.
«"ptica, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 192.—Bras,
nonbunda. *Baker, 1. c.* 198.—Bras,
jo!acea, *Baker, 1. c.* 193.—Bras,
loliosa, *Benth. &• Hook./. Gen.* ii. 872.—Bras.
Lroticosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 204.—Bras,
^ayana, *Benth. &• Hook./. Gen.* ii. 372.—Afr. trop.
8'abra, *Benth. (f Hook. f. I. c.***—Bras,**
graphs, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 198.—Bras,
nelianthoides, *Benth. U Hook. f. Gen.* ii. 872.—Afr. trop.
Bursuta, *Benth. &• Hook./. I. c***—Bras.**
Mspidula, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* **vi. ill. 201—** Bras.
K-otschyana, *Benth. &• Hook. f. Gen.* it 872.—Afr. trop.
laevissima, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. in. 202.—Bras.
»Kia> OKver *& Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **iii.** 879.—Afr. trop.
luiearifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 192.-
linearifolia, *Oliver &• Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* in. 88O._Afr. trop.
Martu, *Baker, in Mart. Fl. Bras,* vi III. 195.—Bras.
Wexicana, *Benth. &• Hook.f. Gen.* ii. 872.—Mexic.
multiflora, *Oliver &• Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iu.878.-Afr.trop.
oblonga, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 198.—Bras,
ovahfolia, *Baker, 1. c.* 199.—Bras.
Pascaloides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 191—Keg. Argent
Pnyllostachya, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 201.—Bras.
Podophylla, *Baker, I. e.* 200.—Bras.
*-ohlu, *Baker, I. c.* 201.—Bras,
"lcureana, *Benth. &• Hook.f. Gen.* ii. 872.—Afr. trop.
pusilla, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 194.-
reflexa, *Baker, I. c.* 196.-Bras.
reticulata, *Baker, I. c.* 202,-Bras.
Riedelii, *Baker, 1. c.* 196.-Bras.

ASFH.IA :—
rudis, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **iii.** 380.—Afr. trop.
Schimperi, *Oliver V Hiern, I. c.* 379.—Afr. trop.
serrnlata, *Baker, in Mart. Fl. Bras,* vi III. 204.—Bras,
setosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 192.—Reg. Argent.
silphioides, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 872.—Bras.
Smithiana, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii 880.—Afr. trop.
sqnarrosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. IİI. 203.—Bras.
strigosa, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 872.—Mexic.
subalpestris, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 202.—Bras.
subpetiolata, *Baker, I. c.* 203.—Bras.
Thonarsii, *DC. Prod.* v. 561.—Madag.
tomentosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 199.—Bras.
Warmingii, *Baker, I. c.* 192.—Bras,
wedeliaeformis, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxvii.** (1877) 197—Afr. trop.

ASPILOBIUM, Soland. ex A. Cnnn. in Ann. Nat. Hist. (Sept. 1838) 45=Geni08toma, Forst. (Logan.).

ASPIl.OTUM, S[oland.]exSteud.Nom.ed. II. i 669,152 (1840) = 0'eniostoma, Forst. (Logan.).
laevigatum, S[oland.] ex Steud. 1. c = G. ligustrifolimn.

ASPITIUM, Neck, ex Stend. Nom. ed, II. ii. 10 (1841) =Iia8erpitium, Linn. (Umbell.).

ASPLA, Reichb. Nom. 50 (1841) err. typ.=AOPLA, Lindl. = Habenaria, Linn. (Orchid.).

ASPRELLA, Host, Gram. Anstr. iv. 17. t. 29 (1809) = Psilurus, Trin. (Gram.).
nardiformis, Host, 1. c » P. nardoides.

ASPRELLA, Willd. Enum. Hort. Berol. 132 (1809) = Asperella, Humb. (Gram.).

ASPRELLA, Schreb. Gen. 45 (1789)-Leersia, Sw. (Gram.).
australis, Roem. & Schult. Syst. ii. 267 =L. hexaudra.
brasiliensis, Koem.Sc Schult Mant. 153 = L. brasiliensis.
digitata. Lam. IUustr. i. 167=L.digitata.
echidnea, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 190.—Am. bor.
flexuosa, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 71 =L. oryzoides.
hexandra, Roem. *Si* Schult. Mant. 551 = L. hexandra.
Hystrix, Link, Enum. Hort Berol. 100=Asperella Hystrix.
imbricata, Roem. *8c* Schult. Syst ii. 268-=L. virginica.
lenticularis, Roem. & Schult. 1. c. 267=L. lenticularis.
major, Fres. ex Steud. Nom. ed. II. i. 150 = Asperella Hystrix.
mexieana, Roem. & Schult. Mant 551 =L. hexandra.
monandra, Roem. & Schult. 1. c = L. monandra.
'oryBoides, Lam. IUustr. i. 167; Beauv. Agrost 2. t. 4. f. 2=L. oryzoides.
ovata, Roem. & Schult. Syst. ii. 267 - L. lenticularis.
purpurea, Boj. Hort. Maurit. 876=L. hexandra.
sibirica, Trautv. in Act Hort. Petrop. v. (1877) 182.—Sibir.
virginica, Roem. & Schult. Syst. ii. 266=L. virginica.

ASPRIS, Adans. Fam. ii. 496 (1763)=Atra, Linn. (Gramin.) (=Aira,praecox).

ASSA, Houtt. Plantenk. v. 275 (1776)=Tetraoera, Linn. (Dillen.).
exotica, F. G. Gmel. Syst. 839=T. Assa.
indica, [Christm. & Panz. in] Houtt Pflanz. Syst. iv. 40 = T. Assa.

ASSARACUS, Haw. Monog. Narciss. 4 ; in Sweet, Brit. Flow. Gard. iv. (1838) = Narcissus, Linn. (Amaryll.).
capax, Haw. 1. c. = N. triandrns.
reflexus, Haw. 1. c.=N. triandrus.

ASSONIA, Cav. Dim. iii. 120. t.42(1786)=Dombeya, Cav. (Stercul.).
Erythroxylon, Sims, Bot Mag. snbt. 1000=Trochetia Erythroxylon.
populnea, Cav. Diss. iii. 120. t. 42. f. 8 = D. populnea.
viburnoides, DC. Prod. i. 498.—Ins. Borbon.

A8TABTEA, DC. in Diet Class, xi. 400 (1826); Prod. ii. 210 (1828). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i702.
ombigua, *F. Muell. Fragm.* ii. 82.—Austral.
aspera, Schau. in linnaea, xvii. (1843) 242 =fascicularis.
clavulata, *Turet. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 333.—Austral.
eornieulata, Schau. in Lehm. PI. Preiss. i. 113=fascicularls.
Endlieheriana, Schau. in Linnaen, xvii (1848) 242-fascicularis.
fascicularis, *DC. Prod.* iii. 210.—Austral.
glomerulosa, Schau. in Linnaea, xvii. (1848) 242 = fascicularis.
intratropica, *F. Muell. Fragm.* i 83.—Austral.
laridfolia, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 242=fascicularis.
leptophylla, Schau. 1. c=fascicularis.
muricata, *Turce. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 834.—Austral.
scoparia, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 242—fascicularis.

A8TELIA,Banks & Soland.ex R. Br. Prod. 291 (1810).
LIUACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 781.
FUNCKIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 19.
HAMELINIA, A. Rich. Voy. Astrolob.; Fl. Nonv. ZL\. 158; t. 24 (1832).
albicans, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* **xvii. (1885)** 252.—N. Zel.
alpina, *R. Br. Prod.* 291.—Austral.
Banksii, *A. Cunn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* **ii. (1886)** 374.—N. Zel.
Cunninghamii, *Hook.f. Fl. If. Zel.* i. 259.—N. Zel.
fragrans, *Colenso,.in Trans. N. Z. Inst.* **xv. (1883)** 888.—N. Zel.
grandis, *Hook. f. ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* i. (1868) 93.—N. Zel.
Hookeriana, T. Kirk, 1. c. iv. (1872) 244 = Cunninghamii.
linearis, *Hook.f. Fl. Antarct.* 76.—Ins. Antarct.
Menziesiana, *Sm. in Sees, Cycl.* **xxxix.** *App.; SchUlt. f. Syst.* vii. 1506.—Ins. Sandvic.
microsperma, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* **xvii.** (1885) 251.—N. Zel.
montana, *Seem. Fl. Vit.* 313.—Ins. Fiji,
nervosa. *Banks &• Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel.* **i.** 260.—N. Zel.
polynenron, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* **xiv. (1882)** 238.—N. Zel.
psychrockaris, F. Muell. in Hook. Kew Joum. viii. (1856) 332=alpina.
pumila, *R. Br. Prod.* 291.—Terr. Magell.
Ricardi, Kunth, Enum. PI. iii. 365 = Banksii.
sericea, Banks *8c* Soland. ex Hook. £ Fl. N. Zel. i. 261 -Banksii.
Solandri, *A. Cunn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* **ii.** (1836) 874.—N. Zel.
spicata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* **xiv. (1882)** 335.—N. Zel.
stylosa, F. Muell. in Hook. f. Fl. Tasm. ii. 61 = Milligania stylosa.
trinervia, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. i.* **(1868) 93.** - N . Zel.
veratroides, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bit.* **420. t. 81.—** Ins. Sandvic.
Waialealia, *Wawra, in Flora,* lviii (1875) **248—** Ins. Sandvic

ASTELMA, R. Br. in Bot. Reg. sub t. 632 (1820)-Eelichrysum, Vaill. et Hellpteruin, DC. (Compos.).
canescens, D. Don, in Mem. Wern. Soc. v. (1824) 545 = Helipterum canescens.
crassifolium, D. Don, 1. c. 543 = Helipterum ferrugineum.
eximium, R. Br. in Bot Reg. sub t 532=Helipterum **cximiuxiL**
fragrans, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 222 = Helichrysum fragrans.
fruticans, Ker-Gawl. Bot Reg. t. 726 = Helichrysum fruticans.
imbneatum, D. Don, in Mem. Wern. Soc. v. (1824) 544 = Helichrysum imbricatum.
lineare, D. Don, 1. c = Helichrysum ericaefolium.
milleflorum, D. Don, 1. c. 642 = Helipterum phlomoides.

ASTELMA:—
medestum, Sirber.ex Hook. BotMag.t. 2710 = HeIipterum gnaphaloides.
proteoides, D. Don, in Mem. Wem.Soc. v. (1824) 5*3.—Afr. austr.
retorium, D. Don, ex Steud. Norn. ed. II. i. 152» Helichrysum retorium.
speciosissimum, D. Don, in Mem. Soc. Wem. v. (1824) 644 = Heliptemm speciosissimum.
spirale, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 878 = Helipternm variegatum.
Staehelina, D. Don, in Mem. Wera. Soc. v. (1824) 648 = Heliptemm speciosissimnm.
variegatum, D. Don, 1. c. 644 = Heliptemm variegatum.
virgatum, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 878 = Helipternm virgatum.

ASTBMMA, Less. Syn. Comp. 216 (183-2). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 3S6.
dnbium, *Less. I. c*—Ecuador.

ASTEMON, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 88 -Bystropogon, L'Hém. (Labiat).
graveolens, Regel, 1. c. *(an* Hyptis tnaveolens ?).—Bolivia.

ASTEPHANANTHES, Bory, in Ann. Gén. Sc Phys. ii. (1810) 188=Paasiflora, Linn.
Ulobata, Bory, 1. c. = P. bilobata.

ASTEPHAUTTS, R. Br.in Mem. Wem. Soc i. (1809) 64. *ASCLEPJADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 747.
HAEMAX, E. Mey. Conim. Pl. Afr. Austr. 223 (1837).
TYLODONTIA, Griseb. Cat. Pl. Cub. 176 (1866).
arenarius, *Decne. in DC. Prod.* viii. 607.—Madag.
badins, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 224.—Afr. austr.
Berterii, *'Spreng. Syst.* i. 866.—N. Granat.
cernuui, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 842.—Ins. Pemba.
cordatns, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 54.—Afr. austr.
cordifolius, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* ii. (1862) 399 ; *et Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 176.—Chili,
cubensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 206. t 237.—Cuba.
Dregei, *D. Dietr. Syn. Pl.* ii. 909.—Afr. austr.
dumosus, D. Dietr. 1. c. = Rhyssolobium dumosum.
frutescens, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 223.—Afr. austr.
'fruticosus, Steud. Nom. ed. II. i. 153 = frutescens.
Uardneri, *Fourn. in Mart. Ft. Bras.* vi. IV. 199.—Bras,
geminiflorns, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 342.—Chili,
lanceolatus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 54.—Afr. austr.
linearis, *R. Br. I. e.—Ah.* anstr.
marginatus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 508 —Afr. austr.
Massoni, *Roem. b" Schult. Syst.* vi. 124.—Afr. anstr.
mitophorus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 205.—Reg. Argent,
mncronatus, *Schlecht. in Linnaea,* viii. (1833) 518.—Mexic
nigrescens, *Fourn. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xiv. (1881) 367.—Mexic.
ova\ifulius, *A. Rick. Ft. Cub. Fanerog.* ii. 96.—Cnba.
pvatus, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 842.—Madag.
pauciflorus, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 224.—Afr. austr.
peruvianus, *Fourn. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xiv. (1882) 867.—Peruv.
recurvatus, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 274.—Afr. trop.
Schimperi, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvi. (1876) 145.—Afr. trop.
•treptocarpus, *Fourn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xiv. (1882) 367.—Puragnay.
triflorus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 64.—Afr. austr.
urceolalus, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 178.—Cuba,
ntahensis, *Engelm. in Am. Natural,* ix. (1875) 849.—Am. bor. occ.
Zeyheri, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) li. 314.—Afr. anstr.

ASTER, Touts, ex Linn. Syst. ed. I (1795). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 271.
ACTIPSIS, AGLOTOMA, ANACTIS, DIPLACTIS, FIMBRISTIMA, GALACTELLA (GALATELLA), KALIMARKS, LEIACHENIS, MESOUGUS, TRIPOLION, VENATRIS, VIRGULUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 43-47 (1836).
ARCTOGERON, DC. Prod. v. 260 (1836).
BELLIUIASTRUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxvii. 468 (1885).
BIOTIA, DC. Prod. v. 264 (1836).
CALIMERIS, Nees, Gen. et Sp. Aster. 226 (1833).
CRINITA, Moench, Meth. 578 (1794).
CRINITARIA, Cass. in Diet. Sc Nat xxxvii. 475 (1825).
DIETERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 300.
DIFLOFAPPUS, Cass. in Bull. Soc Philom. (1817) 137; et in Diet. Sc. Nat. xiii. 308 (1819).
DOELLINGERIA, Nees, Gen. et Sp. Aster. 177 (1833).
EUCEPHALUS, Nott. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 298.
EURYBIA, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. Pl. ii. 464 (1821).
EXATHAMNUS, D. Don, ex Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 46.
GALATEA, Cass in Bull.Soc Philom. (1818) 165; et in Diet. Sc. Nat. xviii. 56 (1820).
HELEASTRUM, DC. Prod. v. 263 (1836).
HERSILEA, Klotzsch, Bot. Ergeb. Waldem. Reise Bot. 83 (1862).
HETEROCHAETA, DC. Prod. v. 282 (1836).
HOMOSTYLIUM, Nees, in Linnaea, xviii. (1844) 518.
KAMMERIS, Cass. in Diet. Sc Nat. xxxvii. 464 (1825).
LiNOSYkis, Cass. I. c 460, 476 (1825).
MACHAERANTHERA, Nees, Gen. et Sp. Aster. 224 (1833).
MARGARITA. Gaud. Fl. Helv. v. 335 (1829).
NOTICASTRUM, DC. Prod. v. 279 (1836).
PINARDIA, Neck. Klem. i. 5 (1790).
PSYCH ROGETON, Boiss. Fl. Orient, iii. 156 (1875).
RKINACTINA, Less, in Linnaea, vi. (1831) 119.
SYMPHYOTRICHUM, Nees, Gen. et Sp. Aster. 135 (1833).
TRIPOLIUM, Nees, 1. c. 152 (1833).
TURCZANINOWIA, DC. Prod. v. 257 (1836).
VIRGARIA, Rafin. ex DC. Prod. v. 243 (1836).
XYLORHIZA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 297.
abbreviatus, Nees, Syn. Aster. 16=patulus.
abyssinicus, Hod\st. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 383 = Felicia Richardi.
acaulis, *Wedd. Chlor. And.* i. 189.—Peruv.
Acmellus, Pall. Reise, iii. 820 = A. Amellus.
acris, S. G. Gmel. It. i. 172.t. 38. f. 2 = dracunculoides.
acris, Lapsyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 518 = salignus.
acris, Leyss. Fl. Halens. 2.15 = A. Amellus.
acris, *Linn. Sp. Pl.* ed. TL 1228.—Europ. austr.; Caucas.
acris, Willd. Sp. Pl. iii. 2028=trinervis.
aculeatus, Labill. Nov. HolL Pl. ii. 5l t. 200 = Olearia ramulosa.
acuminalus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 109.—Am. bor.
acuminatus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 60 = patulus.
adcnolasius, F. Muell. Fragm. v. 67— Olearia adenolasia.
adenophorus, F. Muell. 1. c. 78=Olearia adenophora.
adfinis. Less. Syn. Comp. 174 = Felicia adfinis.
adnatus, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 82.—Am. bor.
adscendens, *JAndl. in DC. Prod.* v. 281.—Am. bor.
adulterinus, Willd. Enum. Hort Berol. ii. 884=Novi-Belgii.
aestivus, [Dryand. in] Ait Hort. Kew. ed. I. iii. 203 = longifolms.
aestivus, A. Gray, Man. Bot. U. St ed. V. 238 partim =junceus.
aestivus, Rothrock, in Wheeler, Rep. 864= occidentals.
aethiopicus, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 27.—Afr. austr.
ageratoides, Turcz. in BulL Soc Nat. Mosc. (1837) n. VII. 154 = trinervius.
Aitonii, *Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Hab.?
alatus, Aikin, in Eaton & J. Wright, Man. Bot. 146 = patens.
albescens, Wall. Cat. n. 2974 = Microglossa albescent.

ASTER:—
a/4»i,Eaton& J.Wright, Man. Bot. 147=ptarmicoldes.
albus, Willd. ex Spreng. Syst iii. 528=A. Amellus.
alpicola, F. Muell. Fragm. v. 70=Olearia alpicola.
alpigenus, A. Gray, in Proc Am. Acad. viii. (1872) 389=pulchellus.
alpinus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 476-A. Amellus.
alpinus, *Linn. Sp. Pl.* 872.—Europ.; Oriens; As. bor.
altaicus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 881.—Persia; Reg. Himal.; As. bor.
altissimus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 20.—Am. bor.
altissimus, Moench, Meth. 601=Novae-Angliae.
alwartensis, Lodd. Cat. (1807) ex Sims, Bot Mag. t 2321 = Erigeron pulchellus.
olyssoides, T«rc«. *in Bull. Soc. Nat. Mosc.* v. (ISC 2) 198.—Mongol,
amabilis, *Wender. ex Nees, Gen. et Sp. Aster.* 282.—Hab.?
ambiguus, Bemh. ex Nees, L c 138=macrophyllus.
amelloides, Hor'Tm. in Goett Gel. Anz. xx. (1800) 1825 = A. Amellus.
Amellus, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 168* pseudamellns.
Amellus, *Linn. Sp. Pl.* 873.—Europ.; As. Min.; Reg. Caucas.
amethystinus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 294.—Am. bor.
Ammani, Lindl. ex DC,Prod. v. 229=sibiricus.
amoenus, *Hare, in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 84.—Afr. austr.
amoenus. Lam. Encyc. i. 306, 307 = puniceus.
amplexicaulis, Lam. 1. c. 804=Novae-Angliae.
amplexicaulis, Muhl. in Willd. Sp. Pl. iii. 2046 = laevis.
amplexicaulis, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 114 = patens,
amplus, *Lindl. in DC. Prod.* v. 236.—Am. arct.
amygdalinus. Lam. Encyc i. 305=umbellatus.
Andersoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 852.—Calif.
Andersonii, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Am. bor.
andinus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 290.—Am. bor.
angustifolius, Jacq. Hort Schoenb. iii. 63 = Felicia angustifolia.
angustifolius, Lindl. in Royle, Illustr. Bot Himal. 281. t. 58=altaicus.
angustissimus, Tausch, in Flora, xi. (1828) 487 s-Hcteropappus hispidus.
angustus, Nees, Syn. Aster. 26=paniculatus.
angustus, Schur, Enum. Pl. Transs. 306 = Kayserianus.
angustus, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* ii. 162.—As. bor.; Am. bor.
annectens, *Ham. in Han. V Sond. Fl. Cap.* iii. 78.—Afr. austr.
annuus, Linn. Sp. Pl. 875 = Erigeron annuus.
anomalus, *Engelm. in Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 503.—Am. bor.
Ansif, *Mart, in Dentschr. Muench. Aiad.* vi. (1820) 196.—Arabia.
antirrhinifolius, Salisb. Prod. 197=Cymbalariae.
aragonensii, *Asso, Syn.* 121. t. 8. f. 2; *Lam. Encyc. i.* 802.—Hispan.
aragonensis. bout, ex W'illk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 36 = WillkonimIL
ardense, *Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Hab.?
arenarioidrs, *Eaton, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 647.—Am. bor. occ
argenteus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. lll=sericeus.
argophyllus, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 62. t. 201-Olearia argophylla.
argunensis, DC. Prod. v. 227 - flaccidns.
argutus, K. Br. ex Benth. Fl. Austral, iii. 488=Olearia arguta.
argutus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 69=Novi-Belgii.
Arnottii, Nees, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii 116-patens.
arragonensis, Auct= aragonensis.
artemisiaefiorus, Poir. Encyc Suppl i. 600 « Tradescanti.
artemisimdes, F. MnelL Fragm. v. 66=Olearia tnbuliflora.
ascendens, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 8=adscendens.
asper, Buch.-Ham. ex DC. Prod. v. '277=asperrimui.
asper, *Nees, Gen. et Sp. Aster.* 84.—Am. bor.
asprrrimus, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 143.—Mexic.
asperrimus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 293=grandiflorus.

A8TEH:-
asperrimus, Wall. Cat. n. 2970-trinervis.
osperugineus, Eaton, in Bot King, Exp. 142 » Erigeron asperugineus.
otptrulus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 120-undulatus.
Mperulus, *Wall. Cat.* n. 2968, *ex Nets, Gen. et Sp. Aster.* 281.—Reg. Himal.
asterotriehus, F. Mnell. Fragm. v. 79-Olearia astercricha.
aHenuatus, Lindl. ex Hook. Comp. Bot Mag. i (1836) 97-virgatus.
atticus, Pall. Reise Stath. Rnss. Reich. L 846 ~ A. Amellus?
mtrantius, linn. Sp. PL 877 - Dyssodia appendienlata.
aureus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 178 - Solidago aurea.
"frieulatus, Schloss. ex Nym. Comp. S87=salignus.
auritus, Lindl. in DC. Prod. v. 282-patens.
tutralit, Hort. ex DC. L c. 270 - Olearia nunulosa.
mtlumnalis, Wender. ex Nees, sec. Torr. & Gray, FL N. Am. ii. 119=undulatus.
turillarte, F. Muell. Fragm. v. 64=Olearia axillaris.
Mnreus, *lindl. ex Hoot. Comp. Bot. Mag.* i. (1885) 98. —Am. bor.
naccharoides, *Steetg, in Seem. Bot. Voy. Herald*, 885. —China.
Baldvinii, Tqrr. & Gray, Fl. N. Am. H. 127 = nndulatus.
Balli, *F. Muell. Fragm.* viii. 148.—Austral,
oarbatus, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* Hi. 81.—Afr. anstr.
Beirii, Schlecht. in Linnaea, xxi. (1848) 446-Vittadinia anstralis.
Bellidiastrnm, *Nees, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* *i*. *Suppl.* i. (1848) 268.—Chili,
fellidiastrnm. *Scop. Fl. Corn.* ed. II. ii. 168.—Europ.
teUidiflorus, Nees, Syn. Aster. 21=leucanthemus.
tellidiflorus, Steud. Norn. ed. II. i. 158=spectabilis.
wlidiflorus, WilW. Enum. Hort. Berol. 886 = panicnlatns.
lellidioides, Buch.-Hara. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 177 = Erigeron bellidioides.
bellidioides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 24.-Bras.
*l**ghalensis*, Heyne, ex DC. Prod. v. 292 - Erigeron uteroides.
Benthami, *F. MueU. Census*, 78.—AnstraL
Benthamii, Steetz, in Seem. Bot Voy. Herald, 885 = ttinervius.
brierifolius, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 268 - Olearia myrsinoides.
Bffgerianus, *Han. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* iii. 78. —Afr. anstr.
tessarabicus, Bemh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 246 —A. Amellus.
Kcolor, Dietr. ex DC. Prod. v. 289=longifolius.
tricolor, Nees, Syn. Aster. 26; Gen. et Sp. Aster. 283= Solidago bicoior.
bennis, Ledeb. in Ind. Sem. Hort. Dorpat Suppl. i. (1811)=hispidus.
™»»«, Nutt. Gen. Am. ii. 155-canescens.
oiennis, Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 211-commutatns, oblongifolius.
Infidus, Nees, Syn. Aster. 18-dracuncnloides.
nflorus, Michx, Fl. Bor. Am. ii. 114-Radnla.
Kflorus, Presc. ex DC. Prod. v. 2Sl=sibiricus.
bifrons, All. Fl. Pedem. i. 197-Innla bifrons.
bifrons, Lindl. in DC. Prod. v. 243=diflusiis.
Bi[illegible]ii, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 97.110.—wo. bor. occ.
Uandus, Putsh, Fl. Am. Sept. ii. 555=puniceus.
Mepharophyllns,^. *Gray, PI. Wright, n. 11.-V^*
Moomeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-fiS) 639=campestris.
*°*ariensis*, Spreng. Syst. iU. 628=Erigeron flaucum.
wrtalis, Provanch. Fl. Canad. L 808-ranceus.
fwreri, *Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Hab. t
"ntoniensis, Hort. ex Baker, in Card. Chion. (1884) M. 74i=amethystinus.
botryanthus, *C. Koch, in Linnaea*, xxfii. (1850) 701(-toliaoeus)).—Oriens,
«**««, *Han. in Han. VSond. Fl. Cap.* iiL 78.—Afr. Wstr.
hackycomoides, F. MuelL Fragm. v. 86-VittadinU brachycomoides.

A8TEB:—
br£teatus, Turcz. ex Herd, in Ball. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1866) I. 887>tataricus.
iracteolatus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc, Ser. II. vii. (1841) 298 = Hallii.
breviflorns, *Phil, in Linnaea*, xxxiU. (1864-65) 181.—Chili.
brevipes, *Benth. Fl. Hongk.* 175.—China.
britannicus. All. Fl. Pedem. i. 197=Inula britannica.
brumalis, Nees, Gen. et Sp. Aster. 70-Novi-Belgii.
Bubortium, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 178 -•• InnU spiraeifolia.
bupleurifolius, Hort. Monsp. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 286 -laeris.
bnpleuroides, *Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Hab.!
Burchellii, Hook. f. Ic. PI. sab 11066-Commidendron Bnrchellii.
Bnrkd, *Harv. in Han. tf Sond. Ft. Cap.* iii. 76.—Afr. austr.
cabulicus, Lindl. Bot Reg. (1843) Misc. 62 = Microglossa albescens.
caespitosus, Hort. ex Lindl. Bot Reg. xix. 1.1671-Novi-Belgii.
caespitoans, *E. Font, ex Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Hab. I
caffrorum, Less. Syn. Comp. 179-Felicia caffromm.
calcareus, *F. MueU. Census*, 78.—Austral,
calendulaefolius, *Loisel. Herb. Amat.* iv. 274.—Hab. 1
californicus, Less, in Linnaea, vi. (1831) 88=Erigeron glaucus.
campestris, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 293.—Am. bor. occ.
campornm, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot:* vii. (1848) 79.—Bras.
Canbyi, Vasey, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. 193= foliacens.
Candollii, *Han. in Han. tf Sond. Fl. Cap.* iii. 80.—Afr. austr.
canescens, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 547.—Am. bor. occ.
canus, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung. i.* 28.—Europ.
capensis, Less. Syn. Comp. 168 - rotundifolius.
Capnsi, *Franck. in Ann. Se. Nat.* Ser. VL xvi. (1883) 804.—Turkest.
caricifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 92. t. 333-pauciflorus.
carneus, Fries, ex Baker, in Gard. Chron. (1884) II. 680-paniculatns.
carneus, *Nees, Syn. Aster.* 26.—Am. bor.
carneus, Torr. & Gray, paitim, ex Baker, in Gard. Chron. (1884) II. 68U=salicifolins.
carnosus, *A. Gray, ex Hemsl. in Bid. Centr. Am. Bot.* ii. 120.—Am. bor. occ.
carnosus, Gilib. Fl. Lituan. i. 214-A. Tripolinm.
carolinianns, *Walt. Fl. Carol.* 208.T—Am. bor.
caryophyllus, Steud. Nom. ed. II. 1. 154, sphalm.—*argophyllus*.
cassiarabiens, *Maund. Bot. Gard.* vi. n. 672.—Rossia.
Cassiniae, F. Muell. Fragm. v. 68-Olearia Cassiniae.
catalaunicus, *Willk. V Costa, in Linnaea*, xxx. (1859-60) 105.—Hispan. •
caubulicus, Hook. Bot. Mag. lxxiii. (1847) App. 34 = Microglossa albescens.
cancasiens. *Wind. Sp. PI.* iii. 2020.—Reg. Cancas.
Celmisia, F. MueU. Kragtn. v. 84 - Celmisia longifolia.
chamaedrifolius. Lam. ex DC. Prod. vii. 13=l'iintyia Bergii.
Chamissonis, *A. Gray, in Torr. Bot. U. St. Expl. Exped.* 341.—Calif.
Chapmani, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* ii. 161.—Am. bor.
Charieis, Less. Syn. Comp. 171 = strigosus.
chilensis, Nees, Gen. et Sp. Aster. 123=Chamissonis.
chinensis, Linn. Sp. PI. 877 = Callistephus hortensis.
chtysanthemi/olius, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 164-nlifolius.
ckrysanthemoides, Willd. ex Spreng. Syst iii. 688= tanacetifolius.
chrysocomifolius, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 154 = Nolletia chrysocomoides.
chrysocomoidts, Desf. Arb. i. 232 = Nolletia chrysocomoides.
chrysocomoides, Turcz. ex DC. Prod. vii. 272 « alpinus.
chrysophyllus, A. Cunn. ex DC. L e v. 266-Olearia ctirysophylla.
ciliaris, Thunb. ex DC. L c. 218 = Mairia taxifolia.
ciliatus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 295 = phyllolepis.
ciliatos, *Walt. FL Carol.* 209 (sp. dub.).—Am. box.

ASTEE:—
ciliatus. Muhl. in Willd. Sp. PI. iii. 2027 = mnltiflorus.
dliolatus, Lindl. in DC. Prod. v. 236-Lindleyanus.
coerulescens, DC. 1. c. 235-saIicifolius.
Collinsii, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 82 -=Sericocarpns tortifolius.
collinus, Salisb. Prod. 198-A. Amellus.
coloradoënsis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 76.—Colorado,
commutatus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 185.—Am. bor. occ.
concinnus, Colla, Hort Ripnl. App. iii. 22. t 19-Novae-Angliae.
concinnus, Salisb. Prod. 197 = rruticosus.
concinnus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 884.—Am. bor.
concolor. *Linn. Sp. PI.* 874.—Am. bor.
confertus, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 401»pnnieens.
confertus, Nees, Syn. Aster. 21=versicolor.
conocephalus, F. MueU. Fragm. v. 67 - Olearia conocephala.
consanguineus, Ledeb. FL Ross. ii. 47S=peregrinns.
conspicuus, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xix. (1846) 144=Utaricus.
conspicuos, *Lindl. in DC. Prod.* v. 230.— Am. bor. occ.
Conytae, Griessel. Kleine Bot. Schrift 122 - Inula vnlgaris.
conytoides, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 175-Felicia angustifolia.
conytoides, Willd. Sp. PI. iii. 2043 = Sericocarpns conyzoides.
cordifolius, *Ijaa.* Encyc i. 307-paniculatns.
cordifolius, *Linn. Sp. PI.* 875.—Am. bor.
cordifolius, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 112=corymboms.
cordifolius, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 2035-sagittifolios.
coriaceus, Forst. f. Prod. 56. n. 297 — Celmisia coriacea.
coriaceus, Hort. ex DC. Prod. v. 276—fruticosns.
coridifolius, Michx. ex Willd. Sp. PI. iii. 2028-dumosus.
cornifolius, Muhl. ex Willd. I c. 2039 =infimms.
Cornuti, Mill, ex Nees, in DC. Prod. v. 234 = abbreviatus.
Cornuti, Wendl. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 68 = patulus.
.urymbosus, *[Oryand. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I iii. 207. —Am. bor.
corymbosus, Moench, Meth. Snppl. 260-Inula germanica.
crassifolius, *F. W. Klatt, in Abh. Naturf. Get. Halle*, xv. (1882) 326.—N. Granat.
crenatus. Less. Syn. Comp. 166-Mairia crenata.
crinitus, Linn. PL Rar. Afr. 21 — Athrixia heterophylla.
crinitus, Thunb. Prod. PI. Cap. 160=Athrixia capensis.
crispus, Forst Fl. Aegypt Arab. 150 = Pnlicaria crispa.
crocatus, *Bertol. Fl. Guatimal.* 84.—Guatemala,
crocifolius, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 89.—N. Granat
cuneatus, A. Cunn. ex Steud. Nom. ed. IL L 164-Olearia stellulata.
Cunninghami, *F. Muell. Census*, 78.—Austral.
Curtisii, *Torr. tf Gray, Ft. N. Am.* ii. 110.—Am. bor.
Cnsickii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 99. —Am. bor. occ.
cyaneus, Hoffm. Phyt. Blaett. i. (1803) 71 =lacvis.
cyanodiscus, F. Mnell. Fragm. v. 83—Olearia ramosissima.
cydoniaefolius, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 267-Olearia cydoniaefolia.
cylleneus, Orphan, ex Nym. Consp. 387 = alpinus.
Cymbalariae, *Ait. Hort. Kern.* ii. 1!>7; *Thunb. Prod. PI. Cap.* 180.—Afr. austr.
dahuricus, *Benth. ex Baker, in Gard. Chron.* (1885) I. 208.—Sibir.
debilis, Boj. ex DC. Prod. vi. 276-Athrixia debilis.
decorus, Desf. ex DC. 1. c. v. 246-lnevis.
decumbens, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vL III. 24.—Bras.
decurrens, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 269-Olearia decurrens.
decurrens, Moench, Meth. Snppl. 251-Innla bifrons.
drftexus, Moench, 1. c. 250*-acris.
deflexus, *Tausch, in Flora*, xxii. (1839) 77.—Hab.»
demfcsns, *Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Hab. ?

ASTEH:—
demissos, *Hani, in Hani.* &* *Sond. Fl. Cap.* iii. 79. —Afr. aostr.
dentatus, Andr. Bot Rep. t. 61 = Olearia dentata.
dentatus, Tbunb. Prod. PL Cap. 159=Felicia fragilis.
denudatus, Nutt. in Trans, in Am. Phil. Soc Ser. IL vii. (1841) 292=adscendens.
deiressus, Kit in Linnaea, xxxii. (1863) 373=A. Tripolium.
desertornm, *Tchertk. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* vi. (1833) 15.—Rossia.
dichotomus, Ell. Sketch, ii. S66=reticnlatns.
diffususy DC. Prod. v. 242, partim = vimineus.
diffusus, *[Dryand. in] Ait. Hurt. Km.* ed. I. iii. 205. —Am. bor.
dimorphophyllns, *Franch.* &* *Sav. Enum. PI. Jap.* i. 224.—Japan,
diplostephioides, *Benth.* b* *Hook.f. Gen.* ii. 272.—Reg. Himal.
discoideus, Boiss. & Rent Pngill. 54 = Willkommii.
discoideus, £11. Sketch, ii. 358 = Solidago discoidea.
discoideus, *Sond. ex Han. & Sond. Fl. Cap.* iii 76.— Afr. anstr.
distortus, Tnrcz. ex Av^-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop. viii 58. n. 546 = altaicns.
divaricatus, Lam. Encyc i. 305 = acuminates.
divaricatus, Linn. Sp. PI. 878 = corymbosus.
divaricatus, *Nutt. in Torr. (f Gray, fl. N. Am.* ii. 163.—Am. bor. et anstr.
divaricatus, Rafin. ex DC. Prod. v. 241=divergens.
divaricatus, Sprang. Syst. iii. 529 = umbellatus.
divaricatus, Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. 168= exilis.
divergens, [Dryand. in] Ait Hort. Kew. ed. I. iii. 205 =diffusus.
diversifolius, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 113=undulatus.
diversifolius, Spreng. Syst. iii. 583=heterophyllus.
Donii, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 188.— Hab.?
Douglasii, Eaton, Bot. King, Exp. 141 = foliaceus.
Douglasii, *Lindl. in DC. Prod.* v. 239.—Am. bor. occ.
dracunculoides, Bess. Enum. PI. Volh. 83=acris.
dracuncnloides, *Lam. Encyc.* i. 303.—Europ. austr.; As. bor.
dracunculoides, Willd. Sp. PI. iii. 2050=paniculatus.
Dregei, *Haro. in Ham.* to" *Sond. Fl. Cap.* iii. 7 4.—Afr. austr.
Drummondii, *Lindl. ex Hook. Comp. Bot. Mag.* i (1885) 97.—Am. bor.
dumosus, DC. Prod. v. 241=ranltiflorus.
dumosus, Hoffm. Phytogr. Blaett i. (1803) 88 = ericoides.
dumosus, *Linn. Sp. PI.* 873.—Am. bor.
dumosus, Nees, Syn. Aster. 31=ericoides.
Durontfii, Nutt exDurand, in Pacif. Rail. Rep. v. 8 = Menziesii
dysentericus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. l71=Pulicaria dysenteries.
echinatus, Less. Syn. Comp. 177 = Felicia echinata.
Ecklonis, *Less. I. c.* 170.—Afr. austr.
Ehrenbergii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 302.—Mexic.
elaeagnifolius, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 267 =Olearia furfuracea.
elaeophilus, A. Cunn. 1. .c. 269 = Olearia heterophila.
elatus, Bert, ex Steud. Nom. ed. IL i. 154 = corymbosus.
elegans, Hort Par. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. H. 18'4=concinnus.
elegans, *Hook. f. (f Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 44.—Sikkim.
elegans, Nees, Syn. Aster. 20 = A. Amellus.
elegans, *Torr.* 6* *Gray, Fl. N. Am.* - ii. 159.—Am. bor. occ.
elegans, Willd. Sp. PI. iii. 2042=spectabilis,
Elfiottfi, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 140.—Am. bor.
ellipticus, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 271 = Olearia elliptica.
elodes, Torr. 8c Gray. Fl. N. Am. ii. 136 - Novi-Selgii.
elongatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 160.—Afr. austr.
elongifolius, A. Cunn. in Ann. Nat Hist. ii. (1839) 127, spbalm. *"elaeagnifolius.*
eminens, Lindl. in Bot. Reg. t. 1614 = Novi-Belgii.
eminens, Nees, Gen. et Sp. Aster. 87 = junoeus, paniculatus.

ASTEB:—
eminens, Willd. Enum. Hort. Berol. 886-salicifolius.
Engelmannii, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. IL xxxiii. (1862) 238.—Am. bor. occ.
ensifolius. Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 174=Inula ensifolia.
erectus, *Forbes, Hort. Woburn.* 188.—Hab.!
eremophilus,.8s<Kj?, *Vert. Suppl. Fl. Alt.* 103.—Sibir. altaic. *
ericaefolius, Forsk. Fl. Aegypt Arab. lS0»Athrixia ericaefolia.
ericaefolius, *Rothr. in Coulter, Bot. Gat.* Ii (1877) 70. —Mexic.; Texas.
ericoides, Lam. Encyc. i. 304=raultiflorus.
ericoides. *Linn. Sp. PI.* 875.—Am. bor.
erigeroides, *Ham. in Ham. V Sond. Fl. Cap.* iii. 74. —Afr. austr.
erigeroides. Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 48=Erigeron fruticosus.
erubescens, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, iii. 471 = Olearia myrsinoides.
eryngiifolins, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 502.— Am. bor.
espenbergensis, Nees, Gen. et Sp. Aster. 86=sibiricus.
exasperatus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 328 = Olearia ramulosa.
exigui/olius, F. Muell. Fragm, v. 67 = Olearia exiguifolia.
exilifolius, F. Muell. 1. c. 69=Olearia exilifolia.
exilis, *Ell. Sketch,* ii. 344.—Am. bor.
exscapus, Richards. App. Frankl. Journ. ed. II. 32 = Townsendia sericea.
expansus, Nees, Syn. Aster. 23=laevis.
Exsul, Lindl. Swan Riv. PI. App. 24 = Olearia rudis.
falcatus, Eaton, in Bot. King, Exped. 140, ex parte = adscendens.
falcatus, *Lindl. in DC. Prod.* v. 241.—Am. arct
fascicularis, E. Mey. ex DC. 1. c 220 «= Felicia muricata.
fastigiatus, *Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii (1812) 74.—Sibir.
fastigiatus, Ledeb. Ic. PI. Fl. Ross. t. 161=Hauptii.
Fendleri, *A. Gray, PI. Fendl.* 66.—Am. bor.
Ferresii, F. Muell. Fragm. v. 75 = Olearia Ferresii.
ferrugineus, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 64 = Microglossa albescens.
ferrugineus, Wendl. in Flora, ii (1819) 676=Olearia dentata.
ficoidea, *Hare, in Haro. V Sond. Fl. Cap.* iii. 76.— Afr. austr.
filaginifalius, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 146 = Corethrogyne filaginifolia.
filifolius, *Vent. Jard. Malm.* 82.—Afr. austr.
filifolius, Willd. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 210 = Felicia muricata.
filiformis, Eckl. ex DC. Prod. v. 218=Mairia taxifolia.
filiformis, Steud. Nom. ed. II. i. 154=Felicia muricata.
firmus, *Nees, Syn. Aster.* 25.—Am. bor.
Fischeri, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 188.— Hab.?
Fischerianus, *DC. Prod.* v. 247.—Sibir.
flaccidus, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pitersb.* ii. (1835) 599.—Sibir.
flexuosus, Fisch. in Mem. Soc Nat Mosc. iii (1812) 73 = Fischerianus.
flexuosus, Nutt. Gen. Am. ii. 154 = tenuifolius.
floribundus, *Nutt. I. c.* 158.—Am. bor.
floribundus, Willd. Sp. PI. iii. 2048= Novi-Belgii.
florulentus, F. Mneli. Fragm. v. 82 = Olearia floribunda.
fiuminensis, *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 123.—Bras,
foliaceus, *Lindl. in DC. Prod.* v. 228.—Am. bor. occ.
foliolosus, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 202 =vimineus.
foliolosus, Ell. Sketch, ii. 845 = dumosus.
foliosus, Pers. Syn. ii. 443=dumosus.
formosissimus, *Hort. ex Heynh. Nom.* ii. 51. nomen; *Vilm. Fl. PI. Terre,* ed. 1. 98.—Hab. I
Forsteri, *Borr. ex Forbes, Hort. Woburn.* 188 Hab.?
fragilis, Lindl. in Bot. Reg. 1.1587=dumosus.
fragilis, Jacq. ex Steud. Nom. ed. I. 82=linariifolius.
fragilis, Nees, Gen. et Sp. Aster. 101 = vimineus.
fragilis, *Schloss. & Vukot. Syll. Fl. Croat.* 57.— Croatia.
fragilis, Willd. Sp. PI. iii. 2051=Tradescanti.

ASTEB:—
Fremonti, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 191.—Am. bor. occ
frondosus, *Torr.* 6* *Gray, Fl. N. Am.* ii 165.—Am. bor. occ.
frutetorum, Wimm. ex Nym. Consp. ii 887=salignus.
fruticosus, *Linn. Sp. PI.* 872.—Afr. austr.
fruticulosus, Sims, Bot. Mag. t. 2286=pluriflorns.
fruticulosus, Burm. f. Prod. 27 = Felicia angustifolia.
fruticulosus, Krebs, ex DC. Prod. v. 276 = filifolius.
fruticulosus, Willd. Sp. PI. iii. 2018, pro parte = obtusatus.
fruticulosus, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 633-fruticosus.
fugax, Brot Fl. Lusit. 385 = aragonensis.
furfuraceus, A. Rich. & Lesson, Fl. Nov. Zel. 216 = Olearia furfuracea.
Gardneri, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 25.—Bras.
Garibaldii, Bruegg. in Verh. Schweiz. Naturf. Ges. Samaden, 1863 (1864) 229=alpinus.
Gayanus, *DC. Prod.* v. 227.—Chili.
Gebleri, Bess, ex DC. 1. c. 259=altaicus.
Garlachii, *Hance, in Journ. Bot.* xviii (1880) 262.— China.
giganteus, Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed I 928 = Vernonia noveboracensis.
Gilliesii, *Hook, tf Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 49.—Chili.
glabellus, Nees, Syn. Aster. 31=ericoides.
glaber, E. Mey. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 68 = vimineus.
glaber, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 17.—Am. bor.
glabriusculus, Torr. ft Gray, Fl. N. Am. ii 159 = xylorrhiza.
glacialis, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 291.—Am. bor.
glandulosus, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 50. t 197 = Olearia glandulosa.
glaucescens, Wender. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 133 =laevis.
glaucus, Nees, Syn. Aster. 23=laevis.
glaucus, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* ii. 159.—Am. bor. occ.
glomeratus, Bernh. ex DC. Prod. v. 265 = macrophyllus.
Glehni, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 146.—As. or.
glutescens, F. Muell. Fragm. v. 77=Olearia glutinosa.
glutinosus, Cav. Ic ii. 53 = Grindelia glutinosa.
glutinosus, Roxb. in Beats. App. 303=Commidendron rugosum.
Gmelini, Ledeb. in Denkschr. Baier. Bot Ges. iii. (1841) 77=Senecio Gmelini.
Gmelini, Tausch, in Flora, xi. (1828) 486-Heteropappus hispidus.
Gmelini, Tausch, 1. c. xxii. (1839) I. 78=altaicns.
gracilentus, Banks, ex DC. Prod. v. 827=Chrysopsis villosa.
gracilentus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii 166- virgatns.
gracilis, *Nutt. Gen. Am.* ii. 158.—Am. bor.
graminifolius, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 545 = Erigeron hyssopifolius.
grandifloms, *Hoffm. Phyt. Blaett.* i. (1803) 65.— Hab.?
grandiflorus, *Linn. Sp. PI.* 877.—Am. bor.
grandiflorus, Nutt Gen. Am. ii. 186 = paludosus.
graveolens, Nutt. in Journ. Ac. Nat Sc Phil, ii (1821) 116 = oblongifolius.
gravis, F. Muell. Fragm. v. 82=Olearia gravis.
Greenii, Nees, ex Torr. *St.* Gray, Fl. N. Am. ii. 158 = nemoralis.
Greenii, Torr. & Gray, 1. c 134=salicifolius.
gummiferus, Hook. f. Ic. PI. t. 1056=Commidendron spurium.
gymnocephalus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 32.—Texas; Mexic.
Haenkei, *Nees, Gen. et Sp. Aster.* 68.—Chili.
Hallii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 388 = Am. bor. occ.
Hauptii, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 100.—Sibir.
Hauptii, Turcz. ex DC. Prod. v. 256=dahnricus.
Haydeni, Porter, in Hayden, Geol. Rep. 1871 (1872) 485=pulchellus.
hebecladus, DC. Prod. v. 242=multiflorus.
Helenium, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 171=Inula Helenium.
heUopkUus, F. Muell. Fragm. v. 66= Olearia heleophila.

ASTER :—
Herailei, *Klatt, Comp. Herb. Schlag. Hochas.* 868.— As. temp.
Herveyi, *A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. V. 280.—Am. bor.
hesperins, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. H. 192.—Am. bor. occ.
keterochaeta,C. B. Clarke, Comp. Ind. 44 = Heterochacta asteroides.
heteromallus, Wender. in Schrift Marb. ii. (1881) VI. 64=undulatus.
heterophyllus, Nees, Syn. Astei. 15=paniculatns.
hetrrophyllus, Thunb. Prod. PL Cap. 160=Athrixia heterophylla.
heterophyllus, Willd. Sp. PL iii. 55 - cordifolius.
heterophyllus, *Schloss. V Vukot. Syll. Fl. Croat.* 55.— Croatia.
Heynri, F. Moell. Fragm. v. 86 = OIearia xerophila.
hjemalis, Nees, Gen. et Sp. Aster. 77 - longifolius.
himalaicus, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 48.—Reg. Himal.
hirsuticaulis, Lindl. in DC. Prod. v. 242=diffusus.
hirsutus. Host, Fl. Austr. ii. 485=alpinus.
hlrsntus, *Harv. in Hani.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 80.—Afr. austr.
hirtellus, Lindl. in DC. Prod. v. 283=sagittifolins.
nirtus, *Harv. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 82.—Afr. anstr.
Mrtns, *c. Koch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 701.—Armenia.
hirtus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 178=Inula hirta.
hirtus, Thunb. Prod. PL Cap. 159 = Felicia angustifolia.
hispidus, *Baker, in Saund. Ref. Bot.* t. 842.—Afr. austr.
hispidus, Lam. Encyc. i. 807=puniceus.
hispidus, Thunb. Fl. Jap. 315 = Heteropappus hispidus.
holosericeus, Forst. f. Prod. 56. n. 296 = Celmisia holosericea.
homolepis,Y. Muell. Fragm. v. 65 = Olearia homolepis.
Hookerii, *Forbes, Hart. Woburn.* 189.—Hab. ?
honiontalis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 402=diftusus.
ft«egelii, F. Muell. Fragm. v. 79=Olearia ciliata.
humilis. Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. L. 125 = Vittadinia australis.
humilis, Willd. Sp. PI. iii. 2038=infirmus.
hungaricus, Poir. Encyc. SuppL i. 496=salignus.
Hunnemanni, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 189. —Hab. ?
nybemus, *E. Forst. ex Forbes, 1. c.*—Hab. ?
hydrabadensis, Wall. Cat. n. 2973 = Pulicaria Wigbtiana.
hgrophilus, A. Conn, ex DC. Prod. v. 269=Olearia hygrophila.
»yssopifolius, Berg. Desc. PI. Cap. 287 = Felicia angustifolia.
hssopifolius, Cav. Ie. t. 282 - sedifolius.
hssopifolius, Linn. Mant. 114 =acris.
rtericus, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 811 = A. Amellus.
Jgnoratus, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) ll.-Ind. or.
**linfolius,* A. Cunn. ex DC. Prod. v. 268=Olearia myrsinoides.
illitus, F. Muell. Fragm. v. 76=Olearia elliptica.
"nbricatus, *Linn. PI. gar. Afr.* 21.—Afr. austr.
tmbricatus, Walp. Rep. ii. 574=arenarioides.
u»equalis, *HM, Hort. Kew.* 16.—Am. bor.
incanus, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 822.—Calif.; Mexic
mcisus, *fisch. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 76. —Sibir.
inconspicnus, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 143.—**Mexic.**
'«*"«, Heyne, in Wall. Cat n. 2971=Pnlicaria Wightiana.
tndicus, Linn. Sp. PL 876 = Boltonia indica.
"nfirmus, *ifichx. Fl. Bor. Am.* ii. 109.—Am. bor.
inflexus, *Desf. Tabl.* ed. II. 122.—Hab.!
Jntegrifolius, *Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb.* W"v-(1884). 224.—China.
Wtegrifolius, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Set.* II. *n. (1841) 291.—Am. bor. occ.
\ntermedius, Turcz. ex DC. Prod. vii. 272 =flaccidus.
mtybaceus, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort Berol. (1845) ll = tataricus.
inulaefolius, *Boiss.* f *Bal. exBoiss. Fl. Orient,* iii. 159. —Reg. Caucas.

A8TEB:—
***inuloides,* D. Don, Prod. FL Nep. 178=Erigeron** multiradiatus.
inuloides, Fisch. ex DC. Prod. v. 231=sibiricus.
iodochrous, F. Mnell. Fragm. v. 81 = Olearia iodochroa.
ircutianus, DC. Prod. v. 229 = tataricus.
italicus, *Hill, Veg. Syst.* ii. 88.—Italia,
jamaicensis, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 144.—Mexic.; Ind. occ.
japonicus, *Less, ex Nees, Gen. et Sp. Aster.* 33, 34.— Japon.
junceus, *Ait. Hort. Kew.* iiL 204.—Am. bor.
junceus, Nees, Syn. Aster. 26=tenuifolius.
Kayserianus, *Schur, Enum. PI. Transs.* 306.— Europ.
Kingii, *Eaton, Bit. King, Exp.* 141.1.16.—Am. bor. occ.
Kraussii, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* iii. 84.—Afr. austr.
Kumleini, Fries, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. n. 179 = oblongifolius.
lacerus, Lindl. ex DC. Prod. v. 231=sibiricus.
lacunaram, *Aitch.* b* *Hemsl. in Journ. Linn. Soc* xix. (1882) 168.—Afghan.
laetus, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross, ii 479=pnnctatus.
laevigatus, Hook. Bot. Mag. t. 2995 = laevis.
laevigatus. Lam. Encyc. i 307 - Novi-Belgii.
laevigatus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 553=longifolius.
laevigatus, Willd. Sp. PI. iii. 2046=versicolor.
laevis, Lindl. in Bot. Reg. t 1500=versicolor.
laevis, *Linn. Sp. PI.* 876.—Am. bor.
laevis, Vahl, ex DC. Prod. v. 288 = longifolius.
Laka, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 49.—Reg. Himal.
Lamarckianus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 100=paniculatos.
lanceolatus, Willd. Sp. PI. iii. 2050=paniculatus.
lanceolatus, Nutt. Gen. Am. ii. 158 = salicifolius.
lanuginosus, *Wendl. Beytr.* ii. 9.—Afr. austr.
lasiocarpus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 76.— Afr. austr.
lateralis, Hort. Bonn, ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 74 = longifolius.
latifolius, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 176=macrophyllus.
latifolius, Banks, ex Steud. Norn. ed. II. i. 155 = acuminatus.
latifolius, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 26=trinervis?
lautureanus, *Franch. in Mim. Soc Sc. Nat. Cherb.* xxiv. (1884) 224.—China.
lavandulaceus, *Willd. ex DC. Prod.* v. 274.—Mexic.
laxifolius, Lindl. in Hook. Fl. Bor. Am. Ii. 10= junceus.
laxifolius, Nees, Gen. et Sp. Aster. 69=longifolius.
laxus, Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. 184=Novi-Belgii.
laxus, Willd. Enum. Hort BepL'ii. 867-paniculatus.
ledifolius, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 269=Olearia ledifolia.
ledifolius, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 544=nemoralis.
ledophyllus, A. Gray, in Proa Am. Acad. xvi. (1880) 98 = Engelmanni.
leiocarpus, *Harv. in Harv. if Sond. Fl. Cap.* iii. 84.— Afr. austr.
Lehmanni, F. Muell. Fragm. v. 66=Olearia heleophila.
leiophyllus, *Franch.* &* *Sav. Enum. PI. yap.* i. 223.— Japon.
leiophyllus, Schloss. *Sc* Vukot. Syll. Fl. Croat. 56 = salignus.
Lemmoni, *A. Gray, Syn. Ft. N. Am.* i. II. 199.— Arizona.
lepidophyllus, Pers. Syn. ii. 442=Olearia lepidophylla.
leptophyllus, *Desf. Tabl.* ed. II. 268; *DC. Prod.* v. 256. —Am. bor.
leptophyllus, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. H. (1812) 89, nomen.—Sibir.
leptophyllus, Hort. Par. ex DC. Prod. v. 242*=eri* coides.
Lerchenfeldianus, *Schur, Enum. PI. Transs.* 806.—Hungar.
leucanthemus, Desf. Cat. Hort. Par. ed. IIL 401= Tradescanti.
leucanthemus, *Safin, in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 359.—Am. bor.
liatroides, Mubl. ex DC. Prod. v. 230=surculosus.
lilacinus, *Hoffmgg. Vert. Pft.* 41.—Hab. ?
Lima, *Lindl. in DC. Prod.* v. 230.—Mexic.
linariifolius, *Linn. Sp. PI.* 874.—Am. bor.
Lindeni, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 302.— Mexic.

ASTER:—
Lindleyanus, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 122.—Am. bor.
linifolius, Burin, f. Prod. 27=Senedo rosmarinifolius.
linifolius, *Harv. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 8*1.— Afr. austr.
linifolius, Linn. Sp. PI. 874 = acris.
linifolius, Torr. *Sc* Gray, FL N. Am. ii. 162=subulatus.
linoides, Hort Gaybac ex DC. Prod. v. 221= Felicia canrorum.
Linosyris, *Bernh. Syst. Vert. Erf.* 151. —Europ.
liratus, Sims, Bot Mag. t. 1509= Olearia stelfulata.
lithospermifolius, Desf. Tabl. ed. II. 268; DC. Prod. v. 259=altaicus?
litoralis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 486 Chili.
Imrius, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 189.— Hab.?
longicaulis, Desf. ex DC. Prod. v. 258=A. Tripolium.
longifolius, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 400.—Hab.?
longifolius, A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. V. 233 = Novi-Belgii.
longifolius, *Lam. Encyc.* i. 306.—Am. bor.
longifolius, Nees, Syn. Aster. 26= laxifolius.
longipes, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot vii (1848) 78=Leucopsis scaposa.
lucidus, Hort. Kew. ex Loud. Hort. Brit. 347=laevis.
luddus, Wender. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 25 = puniceus.
lucidus, *Moench, Meth. Suppl.* 252.—Hab. ?
lusitanicus, BrotPhyt. 63. t. 29=aragonensis.
lutescens, Torr. & Gray, FL N. Am. ii. 160 = ptarmicoides.
luxurians, Spreng. Syst. iiL 538; Nees, Gen. et Sp. Aster. 88=Novi-Belgii.
lyratus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 188, in syn.=Olearia stellulata.
Maackii, *Regel, in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VIL iv. 11861) n. iv. 81.—Japon.
Macleaii, *E. Forst. ex Forbes, Hart. Woburn.* 189.— Hab.?
macrophyllus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. ii. 1282.—Am. bor.
macrorrhigus, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 260=Vittadinia macrorrhiza.
macrorrhizus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 169.—Afr. austr.
magellanicus, Lam. Illnstr. iii 259. t. 681=Perezia lactucoides.
magellanicus, Spreng. Syst iii. 526=Chiliotrichium amelloideum.
magniflorus, F. Muell. Fragm. v. 80— Olearia magniflora.
marginatus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 91 N. Granat
maritimus, Salisb. Prod. 198-A. Tripolium.
Martii, *Baker, in Mart. Fl. Bras,* vi III. 23.—Bras.
marylandicus, Michx. Fl. Bor. Am. ii 108=Sericocarpus conyzoides.
maximus, Less. Syn. Comp. 182=Erigeron maximus.
megalophyllus, F. Muell. Fragm. v. 70 = Olearia megalophylla.
megapotainicus, *Spreng. SysL* iii 526.—Bras.
Menziesii, *Lindl. in DC. Prod.* v. 248.—Am. bor. occ.
mesopotamicus, Steud. Nom. ed. I. 82 — megapotamicus.
mesopotamicus, *Spreng. Nachr.* i. *Bot. Cart. Halle,* IS.—Hab.?
mespilifolius, Less. Syn. Comp. 180=Nidorella mespilifolia.
microcephalus, *Franch. V Sav. Enum. PL Jap.* i. 223.—Japon.
microphyllus, Labill. Nov. Holl. PL ii. 51 - Olearia lepidophylla.
microphyllus, Torr. ex Lindl. in DC. Prod. v. 244 - adnatus.
microphyllus, Vent Jard. Malm, sub t. 83=Olearia ramulosa.
microspermus, *Harv. in Ham. VSond. Fl. Cap.* iii. 72. —Afr. austr.
Milleri, *Forbes, Hort. Woburn.* 189.—Hab.}
mirabilis, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 165.—Am. bor.
miser, [Dryand. in] Ait. Hort Kew. ed. I. iii 206 = Tradescanti
miser, Lam. Encyc. i. 308=virgatus.
miser, Linn. Sp. PL 877 (delend.—Cf. A. Gray, Syn. Fl. i. II. 172).

ASTEB:—
miser, Nutt Gen. Am. ii. 158=diffnsus.
Mitchellii, *F. Muell. Fragm.* v. 78.—Austral,
modestus, *Lindl. in DC. Prod.* v. 231.—Am. bor. occ.
mollinscnlus, *Wall. Cat.* n. 2972.—Reg. Himal.
monanthus, *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 121.—Bras,
mongolicus, *Franch. PI. Davidian.* i. 161.—As. or.
monocephalus, Boiss. ia Bal. ex Boiss. FL Oiient. Hi. 160 = caucasicus.
montanus, All. Fl. Pedem. 1. 196=Inula montana.
montanus, Nutt. Gen. Am. ii. 156-sericeus.
montanus, R. Br. in Richards. App. Frankl. Journ. ed. I. 749-abirijns.
montevidensis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 170 -Leucopsis iliffusa.
monticolus, Lindl. ex DC. Prod. v. 287 = Erigeron monticolus.
Mooneyi, *F. Muell. Fragm.* viii. **144.—**Austral,
moranensis, *H. B. &" K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 93.—Mexic.
Muehlenbergii, Tausch, in Flora, xxil. (1889) 77, in adnoL =ampleiucanUs.
Mnelleri, *F. Muell. Census*, 78.—Anstral.
multiceps, Lindl. in DC. Prod. v. 237 =oblongifolius.
multiflorus, ***[Dryand. in] Ait. Hort. Ken.*** **ed. L iii.** 116.-Am. bor.; Mezic.
multiflorus, BertoL Misc. Bot. v. t 6=dumosus.
multifiorus, Nutt. Gen. Am. ii 156 = vimineus.
multiradiatus, WalL Cat. n. 2969=Erigeron mnltiradiatus.
muricatus, F. Muell. Fragm. v. 66-Olearia muricata.
muricatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 159 - Felicia muricata,
mutabilis, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 205 -Novi-Belgii.
mutabilis, *Veil. Fl. Flum.* viii 1.122.—Bras,
mutabilis, *Linn. Sp. PI.* 876 (sp. obscnra).—Am. bor.
mutabilis, Willd. Sp. PI. iii. 2045=versicoloi.
mutatus. Ton-. & Gray, Fl. N. Am. ii. 142-modestus.
myriantus, *Carr. in Rev. Hortie.* '(1666) 439.—Hab. ?
myrsinoides, Labill. NOT. Holl. PL ii 53. t 202-Olearia myrsinoides.
myrtifolius, Willd. Enum. Hort BeroL SuppL 59 = miser,
namaquanus, ***Ham. in Hart. V Sond. Fl. Cap.*** **iii 79.** —Afr. nustr.
nanus, E. Mey. ex DC. .Prod. v. 218 -Mairia microcephala.
natalensis, ***Horn, in Ham. (f Sond. Fl. Cap.*** **iii 81.—** Afr. austr.
Ifeesii, Sch. Bip. in Flora, xxxix. (1856) 364 = Chamissonis.
nemoralis, ***[Dryand. in] Ait Hort. Kern.*** **ed. L iii. 198.** —Am. bor.
Nernstii, F. Muell. Fragm. v. 81-Olearia Nernstii.
nervosns, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 28.—Am. bor.
nitidnlus, *DC. in Wight, Contrib.* 9.—Ind. or.
nivalis, Adam, in Weber *8c* Mobr, Beitr. i. 67 = alpiaus.
Noianus, Sch. Bip. ex Nyra. Consp. 887 = A. Amellus.
notosericeus, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 178.—Reg. Argent.
Novae-Angliae, *Linn. Sp. PI.* 875.—Am. bor.
Novae-Scotiae, ***Forbes, Hort. Woburn.*** **189;** ***Steud. Norn.*** ed. II. i. 156.—N. Scotia.
Novi-Belgii, *Linn. Sp. PI.* 877.—Am. bor.
nudicaulis, Lam. Eneyc. L 808 - Lagenophora Commersonii.
nudifiorus, Nutt. Gen. Am. ii. 157-A. Radula.
Nuttallii, Tort *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 126-adscendens.
obcordatus, F. Muell. Fragm. v. 69=Olearia obcordata.
obliquus, DC. Prod. v. 237 = carnens.
obliquus, Nees, Syn. Aster. 27 - salicifolius.
oblongifolius, *Nutt. Gen. Am.* ii. 156.—Am. bor.
obovatus, hll. Sketch, ii. 868-reticulatus.
obovatus, ***C. A. Mey. in Ledeb.Fl. Alt.*** **iv. 95.—Sibir.** altaic
obtusatus, *Thunb. Prod. PL Cap.* 159.—Afr. austr.
occidentals, *Torr. b" Gray, Fl. N. Am.* ii. 164.—Am. bor. occ.
ochraceus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 84 = Tetramolopium ochraceum.
Oculus-Christi, Cav. ex Steud. Norn. ed. IL i 156 = Inula Oculus-Christi.
odontophyllus, Wall. Cat n. 3285-Senecio linifolius.
odorus, *All. Fl. Pedem.* i. 197.—Italia.
officinalis, AIL 1. c. 194 = Inula Helenium.

ASTEB:—
oliganthemus, *F. Muell. Census*, 78.—Austral.
onustus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 122 =- Novi-Belg·i.
oolentangiensis, Riddell, Syn. Fl. W. States, 55-azureus.
oppositi/olius, Linn. Amoen. Acad. v. 369—Cymbalariae.
orarius, F. Muell. Fragm. v. 78—Olearia glntinosa.
oreganus, *Torr. (f Gray. Fl. N. Am.* ii. 168.—Am. bor. occ.
orientalis, S. G. Gmel. It L 165. t 86. f. l-Iiinla bxitannica.
ornatus, Hort Angl. ex Stead. Norn. ed. IL i. 166-Herveyi.
Ottonis, ***E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.*** **189.—** Hab. I
pollens, Willd. Enum. Hort Berol. SuppL 68-patulus.
pallidulus, B. C. Vog. in Trew, PI. Rar. t 28-cordifolius.
Palmeri ***A. Gray, in Proc. Am. Acad.*** **xvii (1881-82)** 209.—Texas,
paludosus, ***[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.*** **ed. I. iii. 201.** —Am. bor.
palustris, Lam. FL Fr. ii 148 - A. Tripolium.
panduratus, ***Nees, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.*** xix. *Suppl.* i. (1843) 258.—China.
paniculatus, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii 207 = lindleyanus.
paniculatus, *Lam. Encyc.* i. 306.—Am. **bor.**
paniculatus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 24.—Hab. I
paniculatus, Mnhl. in Ell. Sketch, ii 865-sagittifolius.
paniculatus, Nntt Gen. Am. ii. 166-undulatus.
paniculatus, Willd. Sp. PL iii. 2036-cordifolius.
pannonicus, Jacq. Hort Vindob. i. 3-A. Tripolium.
pannosus. F. Muell. Fragm. v. 83-Olearia pannosa.
Pappd, ***Han. in Ham. V Sond. Fl. Cap.*** **iii. 79.—** Afr. austr.
patlosus., Willd. ex Sprang. Syst iii. 626-Printzia **Bergii.**
Parryi, *A. Gray, in Am. Natural*, viii. (1874) 212.—Am. bor. occ.
parviflorus, *A. Gray, in Bot. Calif*, i. 822.—Mexic.
parviflorus, Darlingt. FL Cestr. 446=diffuses.
parviflorus, Nees, Syn. Aster. 29-Tradescanti
patens, ***[Dryand. in] Ait. Hort. Ken.*** **ed. I. iii. 201.—** Am. bor.
patentissimus, UndL in DC. Prod. v. 232-patens.
Pattersoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 272.—Colorado.
patulus, *Lam. Encyc.* i. 308.—Am. bor.
paucidentatus, F. Muell. Fragm. v. 66-Olearia paucidentata.
pauciflorus, lindl. ex DC. Prod. v. 281-sibiricus.
pauciflorus, Martens, in Bull. Acad. Bmx. viii. (1841) 67—eticoides.
pauciflorus, *Nutt. Gen. Am.* ii. 164.—Am. bor.; Mexic.
peduncularis, Wall. Cat. n. 2967-asperulus.
pellitus, ***H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.*** **iv. 91.—** N. Granat.
pendulus, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 205 — diflusus.
pensihanicus, Poir. Encye. SuppL i. 498-laevis.
peregrinus. Less, in Linnaea, vi. (1831) 1'23-foliaeeus.
peregrinus, *Pursh, FL Am. Sept.* ii. 556.—As. or.; Am. bor. arct
perenbides, Less. Syn. Comp. 167-Mairia perezioides.
persoonioides, A. Cunn. in DC Prod. v. 267-Olearia persoonioides.
pesthiensis, *DC. Prod.* v. 287.—Hungar.
petiolatus, *Ham. Thes. Cap.* ii. 35. t. 154.—Afr. austr.
philadelpbicus, *Bart. Fl. Phil. Prod.* 81.—Am. bor.
phlogifolius, Muhl. in Willd. Sp. PL iii. 2034-patens.
phlogopappus, Ubill. Nov. Holl. PL ii 49. t. 496-Olearia stellulata.
phlogotrichus, Spreng. Syst. iii. 525-Olearia stellulata.
phylicoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 98-Tetramoloplum phylicoides.
pkyllolepis, *Torr. V Gray. PI. N. Am.* ii. 113.—Am. **bor.**
pichinchensis, Willd. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 208 =< Tetramolopium tenerrimum.
pilosus, Willd. Sp. PL iii. 2025-ericoides.

A8TEK:-
pimeleoides, A. Cunn. in DC. Prod. v. 268=Olearia pimeleoides.
pinifolius, F. Muell. Fragm. v. 71-Olearia pinifolia.
pinifolius, Nees, Syn. Aster. 29 = polyphyllus.
pinnatus, Cav. Ic iii. 6. t. 212 *> Dyssodia pubescens.
plantagineus, Poepp. ex DC. Prod. v. 418-Senecio plantagineus.
plantaginifolius, Nutt. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 299 -Sericocarpus conyzoides.
pluriflorns, ***G. Don, in Laud. Hort. Brit.*** **346.—Afr.** austr.
Poblii, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. in. 28.—Bras,
polifolius. *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1224-Printzia Bergii
politus, Nees, Syn. Aster. 23-Iaevis.
polyphyllus, Moench, Meth. SuppL 263-macrophylIns.
polyphyllus, Pur»h, ex DC. Piod. v. 245^tenuifolius.
polyphyllus, ***Willd. ·Enum. Hort. Berol.*** **888.— Am. bor.**
Porteri, ***A. Gray, in Proc. Am. Acad.*** **xvi. (1880) 99.** —Am. bor. occ.
potosinus, *A. Gray, 1. c.* xv. (1880) 82.—Mexic
pradensis, *Phil, in Linnaea*, xxriii (1856) 729.— **Chili.**
praealtus, Torr. ft Gray, Fl. N. Am. ii 184-Novi-Belgii
praealtus, Poir. Encye. Suppl. i. 493-salicifolius.
praecox, Lindl. in Hook. Fl. Bor. Am. ii 9-Lindleyanus.
praecox, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 19-pyrenaens.
praecox, Willd. Enum. Hort. BeroL SnppL 68 ** patnlus.
pratensis, *Rafin. Fl. Ludov.* 67.—Am. bor.
Preissii, F. Muell. Fragm. v. 66-Olearia heleopbila.
prenanthoides, *Muhl. in Willd. Sp. PI.* iii. 2046.—Am. bor.
Prescottii, Lindl. in DC. Prod. v. 281-=sibiricus.
procumbens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 32 —Mexic.
propinquus, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 270-Qlearia ramulosa.
pseudamellus, Wender. in Schrift. Marb. ii. (18 1) 226-atnelloides.
pseudamellus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 249.—Ind. or.
pseudoamellus, DC. FL Fr. Suppl. v. 469-A. Amellus.
pseudodiffusus, ***E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.*** 189.—Hab. ?
pseudodumosus, *E. Forst. ex Forbes, I.* c—Hab. ?
ptarmicoides, *Torr. &- Gray, Fl. N. Am.* ii 160.—Am. bor.
pubescens, Homem. Hort. Hafn..SuppL 98-heterophyllus.
pubescens, Lam. Encyc. i. 807 — tataricus.
pubescens, Moench, Meth. 600—Inula squarrosa.
pubescens, Nees, Syn. Aster. 16-sagiltifolius.
pulchellus, *Eaton, in Bot. King, Exp.* 143. t. 16.—Am. bor. occ
pulchellus, Hohen. in Bull. Soc Nat Mosc vi. (1888) 256=alpinus.
pulchellus, Willd. Sp. PL iii. 2019-Erigeron pulchellus.
pulchellus, Turcz. ex Herd, in Bull. Soc Nat Mosc xxxviii (1866) I. 376 = flaccidus.
pulcherrimus, Lodd. Bot. Cab. i. t 6-linariifolins.
Pulicaria, All. Fl. Pedem. i. 197 = Pulicaria vulgaris.
pulicarius, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 172-Pulicaria vulgaris.
pulverulentus, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i (1824) 165-Olearia stellulata.
pumilus, Banks & Soland. ex Hook. *I* Fl. N. Zeal. i. 125-Vittadinia australis.
pumilus, Fisch. Cat Hort Gorenk. (1808) 62; ed II. (1812)89=altaicns.
punctatus, Lapeyr. Hist Abr. PL Pyr. 513-Jasione tuberosa.
Punctatus, Waldst & Kit. PL Rar. Hung, ii t. 109-acris.
puniceus, Ell. Sketch, ii. 255 = EUiottii.
puniceus, *Linn. Sp. PI.* 875.—Am. bor.
purpurascens, ***Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,*** 166.-Mcxic
purpuratus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 118-virgatus.
purpureo-caerulescens, *Hill, Hort. Kew.* 17—Am. bor.
purpureus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross, ii 477 - A. Amellus?
purpureus, *Jacq. ex Steud. Nom.* ed. I. 88.—Hab. *1*

ASTER:—
pusillus, *Hornem. Hart. Hafn.* ii. 812.—Hab.I
Pygmaeus, *Lindl. in DC. Prod.* v. 228.—Am. arct.
Pyrenaeus, *DC. Fl. Fr.* iv. 146.—Mont. Pyren.
tyrenaieus, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788)308 -Erigeron uniflorus.
pyrrhopappus, *Boiss. Fl. Orient*, iii. 168.—Afghan.
ouercifolius, Less, ex Walp. Rep. vi. 123=Erigeron quercifolius.
Vurdfolius, Sieber, ez DC. Prod. v. 272-Olearia stelfulata.
qnitensis, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 538.-Ecuador.
racemosus, *Ell. Sketch*, ii. 848.—Am. bor.
Radula, *[Dryand. »»] Ait. Hart. Ken.* ed. I. iii. 210.—Am. bor. »
Sadula, Less, in Linnaea, vi. (1831) 126-Chamissonis.
radulinus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viil. (1872) 388.—Am. bor. occ.
ramosissimus, Mill. Gard. Diet ed. VIIL n. 21-encoides.
ramosus, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 848.—Am. bor.
ramulosus, LabilL Nov. Holl. PI. ii. 61-Olearia ramulosa.
ramulosus, lindl. in DC. Prod. v. 243 - falcatus.
ramulosus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 298=adscendens.
ranuncnloides, *Moench, Meth. Suppl.* 254.—Hab. ?
reeunatus, Guenth. ex Nees, Gen. et Sp. Astei. 97 = btllidiflorus.
reeunatus, Nees, 1. c. 98=tennifo1ius.
reeunatus, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 556 = Tradescanti.
reeunatus, Spreng. in Schrad. Jonm. Bot (1800) 195 "fquarrulosus.
reeunatus, Willd. Sp. PI. iii. 2047= diffuses.
reftexus, Linn. Sp. PI. 877 = Felicia reflexa.
-"galis, Salisb. Prod. 198=CalIislephus hortensis.
Kegntlii» *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 21.—
Bras.
re eng p; *H. 3. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 90. t. 832.—N. Granat.
"ticulatus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 548.—Am. bor.
retroflexus, A. Cunn. ex Hook. f. Fl. N. Zeal. i. 148 = oeneuoglastifolius.
Wroflexus, *Lindl. in DC. Prod.* v. 242.—Am. bor.
Keversii, Hort. ex Decne. in Rev. Hortic. Ser. IV. i. (1852) 181=ericoides.
revolutus, *F. Muell. Census*, 78.-Austral.
"homboideus, Lindl. ex DC. Prod. v. 230-tataricus.
Kiehardsonii, Spreng. Syst. iii. 52 8-sibiricus.
"'pdulus, Desf. Tabi. ed. II. 122=salicifolios.
r'gidulus, Nees, Syn. Aster. 29 - leucanthemus, .patulus.
"gidus, Linn. Sp. PI. 874 (ex parte)=linariifolius.
"gtdus, Moench, Meth. Suppl. 251 = Inula salicina.
nparins, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 92.—Arizona; Mexic.
rifiarius, Nees, Gen. et Sp. Aster. 280=pesthiensis.
nvnlaris, *Cass. ex Loud. Hort. Brit.* 847.—Am. bor.
rtvularis, Less, in linnaea, v. (1830) 143=Erigeron repens.
robustus, Hort. Bonn, ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 282 = strictus.
"bustus, Hort. ex Nees, 1. c. 800=salicifolins.
'oseus, *Bieb, ex stev, fn Mifju Soc, Natm Mou.* a U812) 245.—Reg. Caucas.
roseus, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 401-Novae-Angliae.
"nnarinifolius, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 268 = Olenria rosmarinifolu.
'»>narinifolius*, Spreng. Syst. iii. 626=obtusatus.
fotundifolius, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 160.—Afr. austr.
^*xburghii*, Hook. f. in Hook. It PL »• 46=Com- -midendron robustum.
™oer, *Forbes, Hort. Woburn.* 189.—Hab. ?
nibicundus, *Forbes, I.* t.-Hab.»
""fOHfts, Lam. Encyc i. 805=laevis.
mfibarbis, *Han. in Hart. & Send. Fl. Cap.* iii. 76.-A'r. anstr.
"^losus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xv. (1871) 226, 220—Japon.
"iPstris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 94 = 'etiarnolopium rupestre.
Waeodorus, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 269=Oleaiia glandalosa.
"fittifolius, Ell. Sketch, ii. 262-undularus.

A8TEB:—
sagittifolins, *Wedem. ex Willd. Sp. PI.* iii. 2035.—Am. bor.
salicifolius, *Ait. Hort. Kern*, iii. 203; *Lam. Encyc.* i. 306.—Am. bor.
salicifolius, Nees, Syn. Aster. 26=longifolius.
salicifolius, Richards. App. Frankl. Journ. ed. I. 748 = junceus.
salicifolius, Scholl. Fl. Barb. Suppl. 328=paniculatus.
salicinus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 171, in syn.-salignus.
salicinus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 172-Inula salicina.
salignus, Willd. Sp. PI. iii. 2040=panicnlatus.
salinus, Schrad. Hort. Gotting. 9=A. Tripolium.
salsuginosus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 6, partim = peregrinus.
salsuginosus, Less, in Linnaea, vi. (1831) 124-sibiricus.
salsuginosus, Richards, ex R. Br. in App. Frankl. Joum. ed. I. 749 = Erigeron salsuginosus.
sanguineus, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 533—paniculatus.
satureiaefolius, Banks, in Reliq. Houston. 119 - Pectis satureioides.
Sayianus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 294 = modestus.
scaber. Ell. Sketch, ii. 363=undulatus.
scaber, *Moench, Meth. Suppl.* 258.—Hab. ?
scaber, *Thunb. Fl. Jap.* 816.—Japon.
scaberrimus, *Less, in Linnaea*, v. (1830) 143.—Mexic.
scaberulus, *Miq. in Journ. Bot. Nierl.* i. (1861) 100.—China,
scabridus, *E. Mey. ex DC. Prod.* v. 225.—Afr. austr.
scabridus. Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 47-trinervius.
scabris. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 16 = alpinus.
scabrosus, BertoL Misc. Bot. vi. 29=Sericocarpus tortifolius.
scandens, Jacq. f. ex Spreng. Syst iii. 524=caroHnianns.
scapigerus, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 472.—Slbiria.
scaposus, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 84 = moliiusculus.
scepusiensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 373 •< A. Amellus.
Schreberi, Nees, Syn. Aster. 16-macrophyllus.
scoparius, DC. Prod. v. 242=multiflorus.
scoparius, Nees, Syn. Aster. 28 = diffusus, Tradescanti.
scopulorum,.^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1880) 98.—Am. bor. occ.
scorpioides, Scop. Fl. Cam. ed.II.ii. 169 = Doronicum scorpioides.
scorzonerifolius, *Regel, Gartenfi.* (1873) 1; *et in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 308.—Mexic.
secundiflorus, Desf. Tabl. ed. II. 268 = viminens.
secundirameus, Zeyh. ex Sen. Bip. Tanacet 20 = Matricaria nigellaefolia.
sedifolius. Linn. Sp. PI. 874-^acris.
seliger, Nees, in Neuwied, Keise Nord. Am. ii. 439 = OlifUSUSa
sericeus, *Vent.Jard. Cels*, t. 33.—Am. bor.
serotinus, Willd. Sp.Pl. iii. 2049=Novi-Belgii.
serratifolius, Schloss. & Vukot. Syll. FL Croat. 57 = panicnlatuf.
serratus, Lag. ex DC. Prod. v. 815-Grindelia inuloides.
serratus, *Thunb. Prod. PI'. Cap.* 160.—Afr. austr.
serrulatns, *Hare, in Han. & Sond. Fl. Cap.* iii. 73.—Afr. austr.
sessilifolius, *Fisck. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 167.—Am. bor.
setosus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 22.—Bras,
shastensis, *A. Gray, in Bot. Calif, i.* 822.—Calif.
Shortii, *Lindl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 9 ; *Riddell, Syn. PI. W. States*, 65.—Am. bor.
sibiricus. Lam. Encyc. i. 305 = pyrenaeus.
sibiricus,.*Linn. Sp.Pl.i12.Siha.*;' Am. bor. occ.
sibiricus, Turcz. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. .107 = montanus.
Siemssenii, F. Muell. Fragm. v. 71-Olearia vlscidula.
sikkimmensis, *Hook./. If Thorns, in Bot. Mag.* t. 4557.—Ind. or.
silenifolius. *Turn, in DC. Prod.* v. 227.-Sibiria.
simplex, Eaton, in Bot King, Kxped. 140 = oreganos.

ASTER:—
simplex, Willd. Enum. Hort. Berol. 887 = paniculatus.
simulans, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 73.—Afr. austr.
sinuatus, A. Conn, ez DC. Prod. v. 272=Olearla quercil'olia.
Solandri, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 189.—Hab.J
solidagineus, Michx. ez Willd. Sp. PI. iU. 2024-Sericocarpus solidagineus.'
solidaginoid.es. Pen. Syn. ii. 443-Sericocarpui solidagineus.
Sonderi, F. Muell. Fragm. v. 83=Olearia grandiflora.
Sonorae, A. Gray, PI. Wright, ii. 76-riparins.
sparsifiorus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 112-dumosus.
sparsiflorus, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 547=tenuifolius.
spartioides, C. B. Clarke, Comp. Ind. 46=altaict».
spathularis, Brouss. ez DC. Prod. v. 316 - Grindelia •inuloides.
spathulatus, Hort. ex Steud. Nona. ed. II. i. 167 = Inula salicina.
spathulatus, Lag. ex Nees, Gen. et Sp. Alter. 288-Grindclia inuloides.
spathulatus, *Lindl. in DC. Prod.* v. 281.—Am. arct.
spathnlifolins, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xvi. (1871) 216.—Japon.
speciosus, Homem. Hort.. Hafn. ii. 816 -spectabilis.
spectabilis, *[Dryand.* in] *Ait.Hort.Kew.ti.l.* iii. 209.—Am. bor.
spectabilis. Hook, ft Am. Bot. Beech. Voy. 146-Chammissonis.
spectabilis, Willd. Sp. PL iii. 2048=Novi-Belgii.
spinosus, *Senth. PLHartm.* 20.—Am. bor.; Mexic.
spinulosus, *Chapm. Fl. S. U. St.* 199.—Florida.
spurius, Willd. Sp. PL iii. 2032 - Novae-Angliae.
squarrosulus, Nees, Gen. et Sp. Aster. 86=longifolius.
squarrosus. All. Fl. Pedem. i. 196-Inula spiraeifolia.
squarrosus, Banks, ex Steud. Norn. ed. II. L 167 — linariifolius.
squarrosus, *Walt. Fl. Carol.* 209.—Carolina.
Steetni, F. Muell. Fragm. v. 66 = Olearia strigosa.
stellulatus, LabilL Nov. Holl. PI. ii. 60. t 196 -Olearia stellulata.
stenomeres,i4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 209.—Am. bor. occ.
stenophyllus, Lindl. in DC. Prod. v. 242=si>licifolius.
Stracheyi, *Hook. f. Fl.. Brit. Ind.* iii 250.—Reg. Hinial.
striatus, *Champ, ez Benth. in Hook. Kev Journ.* iV. (1852) 238.—China.
strictus, Poir. Encyc. Suppl. i. 498=paniculatus.
strictus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 566-A. Radula.
strictus, Wender. in Schrift. Marb. ii. (183<J) VI. 64-dracunculoidcs.
strigosus, *Lichtenst.ex Han. V Sond. Fl. Cap.* iii. 83.—Afr. austr.
strigosus, Thunb. Prod. PI. Cap. 159 = Amellus annuus.
Stuartii, F. Muell. Fragm. v. 76=Olearia Stuartii.
subasper, Lindl. ex Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1836) 97-salicifolius.
subcymosus, Bernh. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 138 — macrophyllus.
subspicatus, Nees, 1. c. 74 = Douglasii.
subulatus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 157-eiicoides.
subulatus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 111.—Am. bor.
succulentus, Gilib. Exercit. i. 174 = A. Tripolium.
surculosus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 118.—Am. bor.
tanacetifolius, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 96.—Calit; Mexic.
tardinorus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1231.—Am. bor.
tardifiorus, Willd. Sp. PI. iii. 2049 - Novi-Belgii.
tataricus, *Linn.f. Suppl.* 373.—Tataria.
tataricus, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. (1838) 91-sibiricus.
taxifolius, Linn. PL Afr. 22; Amoen. Acad. vi. 102 -Mairiataxifolia.
tenellus, Linn. 11. cc.=Felicia fragilis.
tenellus, *Thunb. Fl. Cap.* 686.—Afr. austr.
tener, *Harv. in Han. V Sond. Fl. Cap.* lit 80.—Afr. aastr.
tenerrimus, Less, in Linnaea, iv. (1829) 120-Tetramolopium tcnerrimum.

ASTER.—
tenue, *Kellogg, in Prac. Calif. Acad.* vii. (1877) 1U.—Calif.
tenniculus, *Bart. Fl. Phil. Prod.* 81.—Am. bor.
tenuifolius, Ell. Sketch, ii. 847 = vimineus.
tenuifolins, *Linn. Sp. PI.* 878.—Am. bor.
tenuifolius, Nees, Syn. Aster. 119,partim=polyphyllus.
tenuifolius, Willd. Sp. PI. iii. 2026=ericoides.
tennis, *Less, ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 488.— Rossia.
teretifolius, F. Muell. Fragm. v. 77= Olearia teretifolia.
Thomson!, *C. B. Clarke, Comb. Ind.* 48.—Reg. Himal.
thyrsiflorus, Hoffm./Phyt. Blaett. i. (1803) 88 = Novi-Belgii.
tibeticus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 251.—Tibet. occ
Tilesii, Wichstr. in Nya Handl. Stockh. (1822) 13 = peregrinns.
tinctorius, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 271; et in Linnaea, xiv. (1840) 641 = A. Amellus.
tomentellus, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 146-Corethrogyne filaginifolia.
tomentosus, Schrad. in Wendl. Sert. Hann. 8. t. 24 = Olearia dentata.
tortifolius, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 358.—Am. bor. occ
tortifolius, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 109 = Sericocarpns tortifolius.
Townshendii, Hook. f. Bot. Mag. t. 6430 = Bigelovii.
Tradescanti, Hoffm. Phyt Blaett. i. (1803) 68. t. A. f. 2 spatulas.
Tradescanti, *Linn. Sp. PI.* 876.—Am. bor.
Tradescanti, Micbx. Fl. Bor. Am. ii. 118=diffusus.
Tradescanti, Nees, Syn. Aster. 28 =paniculatns.
trianthus, *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 120.—Bras,
tricephalus, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 43.—Reg. Himal.
tricolor, *Spreng. in Flora*, xiii. (1830) I. *Beil.* 15, nomen.—Afr. austr.
trifurcatus, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 317 = Senecio trifurcatus.
trilineatns, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina*, xx. (1884) 91.—Mexic.
trinervifolius, Less, in Lionaea, ix. (1834) 183 = panicnlatus.
trinervis, *Desf. Tabl.* ed. II. 122.—Gallia.
trinervis, Ruiz *Sc* Pav. ex DC Prod. vii. 22 *(=Diaeaeuxis trinervis)*.—Peruv.
trinervius, Gilib. Fl. Lithuan. iii. 214 = A. Amellus.
trinervius, *Roxb. Hort. Beng.* 61; *FL Ind.* iii. 433.—Reg. Himal.
Tripolium, *Linn. Sp. PI.* 872.—Europ.; Afr. bor.; Oriens; As. bor.
Tripolium, Walt. Fl. Carol. 209 =tenuifolius.
tubuliflorus, F. Muell. Fragm. v. 65 = Olearia tubuliflora.
turbinatus, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 132.—China.
turbinellns, *Lindl. ex Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 98.—Am. bor.
Turceaninowii, F. Muell. Fragm. v. 67=Olearia imbricata.
turkestanicus, *Franck. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xvi. (1883) 303.—Turkestan,
nmbellatus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. a. 22.—Am. bor.
unalaschkensis, Less, in Linnaea, vi. (1831) 122 = peregrinus.
unalaschkensis, Less, ex Bong. Veg. Isl. Sitcha, 148 =salsuginosus.
unctuosus, Steud. Nom. ed. II. i. 157 = Novi-Belgii.
undulatus, Ell. Sketch, ii. 361=patens,
undulatns, *Linn. Sp. PI.* 875.—Am. bor.
undulatus, Moench, Meth. 600=Inula britannica.
uniflorus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 110=nemoralis.
uniflorus, Moench, Meth. 602 = Novi-Belgii.
urophyllus, Lindl. in DC. Prod. v. 233=sagittifolius.
vagans, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 190.—Hab.t
Vaillantii, AIL FL Pedem. L 196=Inula Vaillantil.
Vahlii, *Hook. (S Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 49.—Chili.
vernicosus,¥. Muell. Fragm. v. 67= Olearia passerinoides.
vernus, Linn. Sp. PL 876 = Erigeron nudicaulis.
versicolor, Hort. ex Steud. Nom. ed. II i. 157 = mutabilis.

STER:—
versicolor, *Willd. Sp. PI.* iU. 2045.—Am. bor.
villosns, *Sch. Bip. in F. Sckultt, Arch. FL* 130.—Europ.
villosus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 113-ericoides.
villosus, Thnnb. Prod. PI. Cap. 169 ~ Felicia angustifolia.
vimineus, *Lam. Encyc.* i. 806.—Am. bor.
vimineus, Nees. Gen. et Sp. Aster. 68 = tardiflorus.
vimineus, Willd. Sp. PI. iii. 2046=virgatus.
virgatus, *Ell. Sketch*, ii. 353.—Am. bor.
virgatus, Moench, Meth. Suppl. 250=tennifolins.
virgatus, Nees, Syn. Aster. 27 =salicifolius.
virgineus, Nees, 1. c. 22=longifolius.
viscosus, Labill. Nov. Holl. PL it 53 = Olearia viscosa.
Walpersianus, *Nees, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl. i.* (1843) 269.—China.
Warmingii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 23.—Bras.
Watsoni, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 201.—Am. bor. occ.
WiUdenovii, *E. Forst. ex Forbes, Hort. Woburn.* 190.—Hab.1
Willkommii, *Sch. Bip. ex Willk. in Flora*, xxxiv. (1851) 742.—Hispan.
Wolfii, Favrat, in Bull. Soc. Murith. vii-viii. (1879) 4 = alpinos.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright*, ii. 75.—Mexic.; Texas.
xerophilus, F. Muell. Fragm. v. ;'6=Olearia xerophila.
xylorrhiza, *Torr.* &• *Gray, Fl. N. Am.* ii. 158.—Am. bor. occ.
Zeyheri, Less. Syn. Comp. 177 = Felicia Zeyheri.

ASTERACANTHA, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 75 (1832)=Hygrophila, R. Br. (Acanth.).
auriculata, Nees, in DC. Prod. xi. 248 = H. spinosa.
longifolia, Nees, in WalL PI. As. Rar. iii. 90 = H. spinosa.
macracantha, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 146 = H. spinosa.

ASTERANpRA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 200 = Phyllanthus, Linn. (Euphorb.).
cornifolia, Klotzsch, 1. c. = P. grandifolius.
Sellowiana, Klotzsch, 1. c. = P. grandifolius.

ASTERANTHA, Reichb. Handb. 190 (1837) = ASTE. RACANTHA, Nees, = Hygrophila, R. Br. (Acanth.).

ASTERANTHEMUM, Kunth, Enum. PI. v. 151 (1850) = 8milacina, Desf. (Liliac).
dahuricum, Kunth, 1. c 153=S. dahurica.
trifoliatum, Kunth, 1. c. =S. trifolra.
vulgare, Kunth, L c 152=S. stellata.

ASTEBAHTHEBA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 211. *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1011.
chiloënsis, *Hanst. 1. c.*—Chiloe.
ovate, *Hanst. 1. c.* xxxiv. (1865-86) 417.—Chili

ASTERANTHO8, Desf. in Mém. Mus. Par. vi.(1820) 9. t. 8. *MYRTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 724.
ASTERANTHUS, Spreng. Syst. it 568 (1825).
brasiliensis, *Desf. 1. c.*—Bras.

ASTERANTHUS, Endl. Gen. 293 (1887) = ASTRANTHUS, Lour. = Homalium, Jacq. (Samyd.).

ASTERIAS, Borckh. in Roem. Arch. i. I. (1796) 25 = Gentians, Linn.
hybrida, G. Don, Gen. Syst. iv. 184=G. lutea.
lutea, Borckh. in Roem. Arch. i. I. (1796) 25=G. lutea.

ASTEBIASTIGMA, Bedd. Forest. Man. Bot. 236 (1873). *BIXINEAE*.
macrocarpa, *Bedd. 1. c.*—Ind. or.

ASTERIDEA, Lindl. Swan Riv. App. 24 (1839) = Atbrixia, Ker-Gawl. (Compos.).
gracilis, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 274 = Athr. gracilis.
multiceps, A. Gray, 1. c.—Athr. multiceps.
puberulenta, Lindl. -Swan Riv. App. 24 =• Athr. australis.
stricta, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1S52) 275 <=Athr. stricta..

ASTERIDIUM, Engelm. ex Walp. Rep. ii. 958 (1843) = Chaetopappa, DC. (Compos.).

ASTERINGA, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 138 (1837) - Fentzia, Thunb. (Compos.).

ASTERIOIDES, Ponted. ex Linn. Class. PL 530 (1747) =BuphthalmuB, Linn. (Compos.).

ASTERIPHOLIS, Ponted. ex Linn. Class. PI. 530 (1747)=Aster, Linn. (Compos.).

A8TEEI8CIUM, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 254. t. 5. *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook, f. *i.* 877.
BUSTILLOSIA, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 106. t. 32 (1847).
CASSIDOCARPUS, Presl, ex DC. Prod. iv. 82 (1830).
DIPTERYGIA, Presl, 1. c. 80 (1880).
EREMOCHARIS, Phil. Fl. Atacam. 25. t 2 B (1860).
GYMNOPHYTON, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 102. t. 82 (1847).
TRITAENICUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xx. (1847) I. 169.
aemocarpon, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 101.—Chili,
anethoides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (18i7) >• 170.—Chili,
chilense, *Cham. V Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 254. t. 5.—Chili.
flexuosum, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 16.—Mexic.
isatidicarpunr, *Hook, tf Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 349.—Chili.
oemocarpum, Walp. Ann. i. 978 = aemocarpon.
Poeppigii, DC. Prod. iv. 82 = chilense.
polycephalurn, *Gill. V Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 332.—Chili.
pozoides, *Clos, in C. Gay, Ft. Chil.* iii. 100.—Chili,
ramosissimum, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 90.—Chili.
robustum, *Baill. Hist. PI.* vii. 145.—Chili.
verrucosum, Meyen, Reise, i. 815=chilense.

ASTERISCUS, Moench, Meth. 592 (1794) = Odontospennum, Neck. (Compos.).
aquaticus, Less. Syn. Comp. 210 = O. aquaticum.
aureus, Lange, Pugill. ii. 118.—Hispan.
brachiatus, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 60 = O. marititnum.
Daltoni, Walp. Ann. ii. 844=O. Daltoni.
flosculosus, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 202=Anvillea Garcini
graveolens, Less. Syn. Comp. 210=O. graveolens.
imbricatus, DC. Prod. v. 487=0. imbricatum.
lanuginosus, Aucher, ex DC. 1. c. vii 287 = 0. lanuginosum.
littoralis. Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 60 = O. maritimum.
maritimus, Less. Syn. Comp. 210 = O. maritimum
mauritanicus, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fasc. »• 61 =O. maritimum.
nanus, Nym. Consp. 891 = O. aquaticum.
odorus, DC. Prod. v. 486=0. odorum.
pygmaeus, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 471.—Afr. bor.; Palaest.; Beluchist.
Schimperi, Boiss. Fl. Orient, iii. 180.—Arab.
sericeus, DC Prod. v. 486 = O. sericeum.
sessilis, Moench, Meth. 592 = O. aquaticum.
Smithii, Walp. Ann. ii. 844 = O. Smithii.
Vogelii, Walp. I. c. 845 = O. Vogelii.

ASTERISCUS, Toum. ex Sch. Bip. in Webb, Phytogr. Canar. ii. 229 (1835-60) =PaUenia, Cass. (Compos.).
spinosus, Sch. Bip. 1. c. 280 = P. spinosa.

ASTERISCUS, Reichb. Consp. 144 (1828) = Asteriscium, Cham. (UmbelL).

ASTEROCARPUS, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 122 (1835) = Pterooelastrus, Meissn. (Celastrin.).
arboreus, Eckl. *Sc* Zeyh. L c. 123 ~ P. variabilis.
Burmanni, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c 122 = P. tricuspidatus.
litoralis, Eckl. *Sc Zeyh.* 1. C.-P. litoralis.
nervosus, Eckl. & Zeyh. 1. c. 123 = P. variabilis.
rostratus, Eckl. *Sc* Zeyh. L c.=P. rostratns.
stenopterus, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c - P. stenopterus.
tetrapterus, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c.=P. variabilis.
tricuspidatus, Eckl. & Zeyh. L c. 124 = P. rostratus.
typicus, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 122=P. tricuspidatus.

ASTEROCARPUS, Reichb. Handb. 261 (1837); Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 190-Aetroearpus, Neck. (Resed.).

ASTEROCEPHALUS, [Vaill.] Adans. Fam. ii. 152 (15"63) = Scabiosa, Linn. (Dipsac).
acutifiorus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 194-S. maritima.
africanus, Spreng. Syst. i. 880 = S. cretica.
agrestis, Spreng. 1. c. 888 = S. gramontia.
altissimus, Spreng. L c.=S. africana.
ambiguus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 194-S. maritima.
amoenus, Spreng. Syst. i. 381=S. amoena.
arenarius. Vis. PL Aeg. 6. t. 1 =S. arenaria.
argenteus, Spreng. Syst. i. 382=S. ncranica.
atropurpureus, Reichb. Ic. Fl. Germ. xiL 11868 =S. maritima.
atropurpureus, Spreng. 1. c. 881=S. atropurpurea.
bannaticus, Spreng. Syst. i. 883=S. banatica.
Biebersteinii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 205 = S. micrantha.
oipinnatus, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fcsc B. 68 = S. ochroleuca.
orachiatus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 194 = S. brachiata.
brevicomus, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc it 57 = S. rotata.
eaneseens, Lag. Gen. et Sp. Nov. 8, in obs.; Spreng. Syst. i. 880 = S. suaveolens.
caucasicus, Spreng. 1. c. 381 = S. caucasica.
cochinchinensis, Spreng. 1. c. 880=S. cochinchinensis.
Columbaria, Wallr. Sched. Crit 48=S. Columbaria.
Columnae, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 196 = S. holosericea.
crenatus, Spreng. Syst. i. 382=S. crenata.
creticus, Spreng. L c. 380=S. cretica.
daucoides, Spreng. 1. c. 383 = &. daucoides.
dentatus, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 57 = S. stellata.
dichotomus, Lag. Gen. et Sp. Nov. 8=& dichotoma.
diffusus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 88=S. diffusa.
divaricates, Lag. ex Steud. Nom. ed. L 84; ed. II. J. 158 =S. sicula.
'mrneus, Spreng. Syst. L 382 = S. ncranica.
ekgans. Lag. Gen. et Sp. Nov. 8=S. caucasica.
flavescens, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 61-S. ochroleuca.
graminifolius, Spreng. Syst. i. 880-S. gramimfolia.
gramuntius, Spreng. 1. c. i. 38S=S. gramontia.
grandiflorus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 205 = S. numtima.
Hladnikianus; Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 171 =S. lucida.
hMosericeus, Spreng. Syst. i. 381 =*S. holosencea.
nolosericeus, Webb, Iter, 40=S. sphaciotica.
\nduratus, Spreng. Syst. i. 380=S. africana.
wtegrifolius, Lag. ex Steud. Nom. ed. ILL 158=S. intsgrifolia.
intermedius, Lag. Gen. et Sp. Nov. S-S. lusitamca.
tsetensis, Spreng. Syst. L 383 = S. isetensis.
tfponensis, Spreng. 1. c. 879-S. legionensis.
**>monifolius,* Spreng. 1. c S80=S. limonifolia.
lobatus, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc IL 67-a. rotata.
lucidus, Spreng. Syst. L 880 =S. nitens.
fyratus, Spreng. 1. c. 881=S. sicula.
ngritimus, Spreng. 1. c. 382=S. maritima.
Massoni, Sweet, Hort. Brit ed. I. 205=S. nitens.
micranthus, Spreng. Syst. i. 881-S. micrantha.
mollissimus, Spreng. 1. c 888=S. Columbaria.
lumspeliensis, Zumag. Fl. Pedem. i. 182; Jord. ft Fourr. Ic. PL Europ. i. 47 =S. monspeliensis.
monlanus, Schur, Enum. PL Transs. 299=S. ochroleuca.
ochnleucus. Wallr. Sched. Crit 50; Spreng. Syst *I* 383=S. isetensis.
Palaestinus, Spreng. 1. c. 880=S. palaestina.
paucisetus, Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 681=S. gramontia.
Ptctinatus, Lag. Gen. ft Sp. Nov. 8-=S. pectinata.
ptlosus. Lag. I.e. =S. ucranica.
Poiytomus, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc u. 68 = S. rotata.
Pnlifer, Spreng. Syst. i. 880 = S. prolifera.
Pseudo-banaticus, Schur, Enum. PI. Transs. 300-5. lucida.
Pumilus, Spreng. Syst. i. 882-S. Columbaria,

ASTEROCEPHALUS:—
pyrenaicus, Sweet, Hort Brit. ed. I. 205-S. Columbaria.
rotaius, Spreng. Sy«t. i. 381-S. rotata.
rutaefolius, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.205=S. rutaefolia.
saxatilis, Spreng. Syst. i. 379=S. saxatilis.
Scopolii, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 195=S. Scopolii.
sericeus, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 59 =S. graminUolia.
setifer, Spreng. Syst. L 381-S. setifera.
siculus, Spreng. L *cS.* sicula.
silentfolius, Spreng. 1. c. 380=S. brachiata.
simplex, Spreng. 1. c. 388-S. monspeliensis.
sphacioticus, Spreng. 1. c 382=S. sphaciotica.
stellatus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 194; et Ic Fl. Germ. xii. f. 1870=S. stellata.
stellatus, Spreng. Syst. i. 381=S. monspeliensis.
strictus, Spreng. 1. c. 380-S. lucida.
suaveolens, Lag. Gen. ft Sp. Nov. 8, in obs.; Wallr. Sched. Crit. 51 = S. suaveolens.
Succisa, Wallr. Sched. Crit. 62=S. Succisa.
iomentosus, Spreng. Syst. i. 381 =S. Succisa.
triniaefolius.Vii. in Mem. 1st Venet. xxi. (1880-82) 482 =S. triniaefolia.
ucranicus, Spreng. Systi. 382=S. ucranica.
urceolatus, Spreng. 1. c. =S. rutaefolia.
vesiinus, Facch. ex Reichb. Ic FL Germ. xii. 20. n. 1373=S. vestina.
mrescms,, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. faac. ii. 59-S. graminifolia.
Wehbianus, Spreng. Syst. i. 381-S. ochroleuca.
Wulfenii, Reichb. FL Germ. Excnrs. 194, in sp. n. 1156=S. ucranica.

A8TEROCHABTE, Nees, in Unnaea, ix. (1884) 300.
CYPERACEAE, Berth, ft Hook. f. Gen. iii. 1062.
angustifolia, *Nees, 1. c*—Afr. austr.
arundinacea, *Kunth, Enum. PI.* ii. 312.-N. Caled.
capitellata, *Nees, in Linnaea,* ix. (1884) 300; x. (1836) 194.—Afr. austr.
elongata, *Kunth, Enum. PI.* ii. 312.—Ins. Maorit.
glomerata, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 800; x. (1836) 194—Afr. austr.
Ludwigii, *Hochst. in Flora,* xxviii. (1845) 759, innota.—Afr. anstr.
nitens, *Kunth, Enum. PI.* ii. 318.—Ins. Maurit.
tenuis, *Kunth, 1. c.* 812.—Afr. anstr.

ASTEROCHITON, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxv. (1852) II. 138-Thomasia, J. Gay (StercU.).
pygmaeus, Turcz. 1. c 189=T. pygmaea.

ASTEROCHLAENA, Garcke, in Bot -Zeit. viiL (1850) 666=Pavonia, Cav. (Malvac.).
cusptdata, Garcke, I. c. 668.—Peruv.

ASTEROCYTISUS, Schur, ex Fuss, Fl. Transs. 154 (1866)= Genista, Linn. (Legumin.).
radidtus. Schur, ex Fuss, 1. c.=G. radiata.

ASTEROGEUM, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PL ii. 294 (1821)=Plantago, Toum.
laciniatum, S. F. Gray, 1. c.=P. Coronopus.

A8TBEOGYNE, H. Wendl. ex Benth. ft Hook. f. Gen. Hi. 914 (1688). *PALMAE,* Benth. ft Hook. f. «L 914.

ASTEBOLASIA, F. Muell. in Trans. Phil. Soc Viet. L (1855) 9; et Hook. Kew Journ. viii. (1856) 84. *RUTACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 294, 990.
PLEURANDROPSIS, Baill. Adansonia, x. (1872) 805.
UROCARPUS, J. Drumm. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 64.
bnxifolia, *Benth. Fl. Austral,* i. 351.—Austral.
ckorilaenoides, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. i. (1855) 116=Microcybe pauciflora.
correifolia, *Benth. Fl. Austral.* L 360.—Austral,
grandiflora, *Benth. I. c.* 352.—Austral,
mollis, *Benth. I. e.* 851.—Austral.
Mnelleri, *Benth. I. c.* 860.—Austral,
pallida, *Benth. 1. c.* 352.—Austral,
phebalioides, *Benth. I. c*—Austral.
phebalioides, F. Muell. in Trans. Phil. Soc Viet. i. (1856) 10-pleurandroides.
pleurandroides, *F. Muell. ex Benth. Fl.AustralA.* 351.—Austral,
squamuligeia, *Benth. I. c.* 852.—Austral.

ASTEROLASIA:-
trymalioides, *F. Muell. in Trans. Phil. See. Viet.* i. (1855) 10.—Austral.

ASTEROLINION, Brongn. Enum. Gen. 69 (1843)-seq.

ASTEROLIH-OIf, Hoffmgg. ft Link, Fl. Port i. 332 (1820). *PRIMULACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 686.
PELLETIERA, A. St. Hil. in Mém. Mas. Par. ix. (1822) 865.
adoënse, *Kunie, in Linnaea, xx.* (1847) 87.—Abyss.
Linum-stellatum, Duby, in DC. Prod. viii. 68-stellatura.
lysimachioideum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 64 = A. stellatum.
serpyllifolium, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 226.—Patagon.
stellatum, *Hofmgg. V Link, Fl. Port. i.* 388.—Lusitan.
tri&um, *Baudo,* in *Ann. Se. Nat.* Seŕ. II. xx. (1848) 350.—ChilL

ASTEROMAEA, DC. Prod. v. 302 (1836)-seq.

ASTEROMOEA, Blnme, Bijdr. 901 (1826)=Boltonla, L'He'rit. (Compos.).
indica, Blume, 1. c.=B. indica.
pekinensis, Hance, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. xv. (1861) 225-B. pekinensis.

ASTEROMYRTUS, Schau. in Linnaea, xvii. (1848) 242 =Melaleuca, Linn. (Myrtac).
Gaertneri, Schau. 1. c. 248=M. angustifolia.

ASTEROPEA, Tul. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. viii. (1857) 79=seq.

ASTEROPEIA, Thou. Hist. V^g. Afr. 51.115. (1807). *SAMYDACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 801.
amblyocarpa, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 81.—Madag.
densiflora, *Baker, in Journ. Bot.* xz. (1882) 49.—Madag.
multiflora, *Thou. Hist. Vtg. Afr.* 51. 1.15.—Madag.

ASTEROPHYLLUM, Schimp. ft Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 1077 (1829)-Asperula, Linn. (Rubiac), ftc
Aparine, Schimp. ft Spenn. 1. c.=Galium Aparine.
Asperula, Schimp. ft Spenn. 1. c.=Asperula odorata.
galioides, Schimp. ft Spenn. 1. c in obs. = Asperula galioides.
Galium, Schimp. ft Spenn. L c. = Galium verum.
Scherardianum, Schimp. ft Spenn. L c.=Sherardia arvensis.
sylvaticum, Schimp. ft Spenn. L c In obs.=Asperula odorata.
tinctorium, Schimp. ft Spenn. 1. c=Asperula tinctoria.

ASTEROPSIS, Less. Syn. Comp. 188 (1832)=Podoooma, Cass. (Compos,).
matroephala, Less. L c.—Bras.

ASTEROPTERUS, Adans. Fam. ii. 124 (1763); Gaertn. Fruct ii. 460. t 173 (1791)=Leynera, Linn. (Compos.).
Callieornia, Gaertn. Fruct. ii. 460 - L. Callicomia.
ceruleus, Rafin. Fl. Tellur. iL 48 =an praec I

ASTEROPUS, Schult. Mant. Ui. 15 (1827) — ASTROPUS, Spreng. - Waltheria, Linn. (Stercul.).

ASTEROSCHOENUS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.124 (1842)=Bynchospora, Vahl (Cyperac).
consanguineus, Nees, L c. 125 = R. consanguinea.
rigidus, Nees, 1. c 126=R. rigida.
speciosus, Nees, 1. c. 125=R. speciosa.

ASTEROSPERMA, Less. Syn. Comp. 889 (1832) = Felicia, Cass. (Compos.).
chrysocomoides, Less. 1. c—Afr. austr.

ASTEROSTEMMA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 271. t. 10. *ASCLEPIADEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 775.
repandnm, *Decne. I.* c—Java,

ASTEROSTIGMA, Fisch. & Mey. in Ball. Phys-Math. Acad. Pétersb. iii. (1845) 148; Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1852) 67 = **Stauroatigma,** Scheidvr. (Aroid.).
colubrinum, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 86 - S. concianum.
cencinnum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1852) 67 = S. concinnum.
Langsdorffii, C. Koch, in Ind. Sem. Hort Berol. (1854) 8 = S. concinnum.
lineolatum, Schott, in Bonplandia, *X.* (1862) 86 = S. concinnnm.
Luschnathianum, Schott, Syn. Aroid. 126 = S. Luschn&thi iu u DI •
Pavonii, Schott, Prod. Aroid. 839 = S. Pavoni.
Tweedianum, Schott, in Oestr. Bot Zeitschr. (1859) 88 = S. Tweedianum.
Velloaianum, Schott, Syn. Aroid. 126-=S. Luschnatnianam.
vermitoxicum, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 247 = S. vermitoxicum.
sebrina, Linden, in Belg. Hortic. xv. (1865) 98.—Bras.

ASTEROSTOMA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 50 (1849) = OBbeckia, Linn. (Melast.).
aspera, Blnme, 1. c. = O. aspera.
decandra, Blume, 1. c. = O. decandra.
decumbens, Blume, 1. c = O. decumbens.
Kleinii, Blume, 1. c. = 0. aspera.
multiflora, Blume, 1. c. = O. multiflora.
octandra, Blume, 1. c. = O. octandra.
repens, Blume, I. c. = Melastoma repens.
rotundifolia, Ulume, 1. c. = O. rotundifolia.
virgata, Blume, 1. c. = O. virgata.
Walkeri, Blumé, 1. c. = O. Walkeri.
Wightiana, Blume, 1. c = O. octandra.

ASTEROTHRIX, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlviii. 434 (1827) = I«ontodon, Linn. (Compos.).
asperrima, Cass. 1. c. = L. asperrimus.
crispa, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 100 = L.crispus.
hispanica, DC. Prod. vii. 127 = L. hispaniens.

ASTEROTRICHION, Klotzsch, in Link, Klottsch & Otto, Ic PL 19. t. 8 (1841) = Plagiantlius, Forst. (Malvac).
sidoides, Klotzsch, 1. c. = P. sidoides.

ASTHENOCHLOA. Bucse, in Miq. PI. Jungh. 867 (1854). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. Gen. iii. , 1096.
tenera, *Buese, I. c.* 368.—Java.

ASTHOTHECA, Miers, ex Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (I860) 254 = Clusia, Linn. (Guttif.).

ASTIANTHUS, D. Don, in Edinb. Phil. Joum. ix. (1843) 262 = Tecoma, Juss. (Bignon.).
longifolius, D. Don, 1. c. = T. viminalis.

ASTTLBB, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. FI. Nep. 210 (1825). *SAXIFPAGEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 634.
HOTF.IA, Morr. & Decne. in Ann. Sc Nat. Sér. II. ii. (1834) 316. t. 11.
Aruneus, Trev. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 819-Spiraea Aruncus.
bdrbata, Hort.—Cf. Card. Chron. (1871) 547 = japomca.
chinensis, ***Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* i. 144.**—China; Japon.
decandra, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 211.—Am. bor.
japonica, *A. Gray, in Hook. Lond. Journ. Bot.* **ii.** (1843) 124.-J.ipon.
odontophylla, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd- Bat. iii. 96 = chinensis.
podophylla, Baill. Hist. PI. iii. 332 - Rodgersia podophylla.
lirularis, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Ft. Nep.* **210.**—Reg. Himal.
rnbra, *Hook./,* **b"** *Thorns, ex Hook. Bot. Mag.* **t. 4959.**—Reg. Himal.
speciosa, Jungh. Java, i. (1853) 250 - rivnlaris.
Stoliezkai, *Kurt, ex Seem, in Journ. Bot.* **v. (1867)** 240 (Spiraeae sp. ?).—Himal. bor. occ.
Thunbcrgii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat,* **ill 96.—Japon.**

ASTIRIA, Lindl. in Bot. Reg. (1844) Misc. 27. t. 49. *STERCUUACEAE,* Benth. & Hook. £ i. 221.
rosea, *Lindl. I. c.*—Maurit.

ASTOMA, DC. Coll. M<sm. v. 71. t. 17 (1829); et Prod. iv. 249 (1830). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 885.
ASTOMAKA, Reichb. Handb. 218 (1837).
seselifoliuin, *DC. II. ce.*—Syria.

ASTOUGANTHUS, Endl. Cat. Hort. Vindob. ii. 196 (1843) = Melicope, Forst (Rutac).
Huegelii, Endl. 1. c. = M. simplex.

ASTRADELPHUS, Rémy, in Ann. Sc Nat. Sér. III. **xii.** (1849) 185 - Erigeron, Linn. (Compos.).
calbucanus, Phil, in Anal. Univ. ChiL (1873) 485.—Chili.
chilensis, Rémy, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xii. (1849) 185 =»E. chilensis.

ASTRAEA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 194 = Croton, Linn. (Euphorb.).
divaricatum, Klotzsch, 1. c. = C. Klotzschii.
diversifolia, Klotzach, 1. c. = C. Klotzschii.
glandulifera, KloUsch, ex Wawra, Bot. Ergeb. Maxim. Bias. 31. t. 42 = C. Klotzschii.
Jatropha, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 194 = 0. carnosus.
Klotzschii, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 137 = C. Klotzschii.
lobatum, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 194 = C. lobatus.
Manihot, Klotzsch, 1. c. = C. lobatus.
palmata, Klotzsch, 1. c. = C. lobatus.
Paulina, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 138 = C. Paulinus.
prunifolia, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 194 = C. Klotzschii.
Seemanni, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 103 = C. lobatus.
tomentosum, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 194 = C. comosus.

ASTRAEA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = Thryptomene, Endl. (Myrtac).
saxicola, Schau. 1. c. 239 = T. saxicola.

ASTRAGALOIDES, Adans. Fam. ii. 323 (1763) = Astragalus, Toum. (Legum.).
Alopecurus, Moench, Meth. 168 = Astragalus alopecuroides.
alpina, Medic, in Vorles. Chnrpf. Phys. Ges. ii. (1787) 37<J = Astragalus alpinus.
australis, Medic. 1. c. = Astragalus australis.
bicolor, Moench, Meth. Suppl. 57 = Astragalus uliginosus.
Cicera, Moench, Meth. 168-Astragalus Cicer.
frigida, Medic, in Vorles. Churpf. Phy«. Ges. ii. (1787) 378 = Astragalus frigidus.
Glaux, Moench, Meth. 168 = Astragalus Glaux.
syphilitica, Moench, 1. c. = Astragalus exscapus.

ASTBAGAIiTJS, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 215 (1797). *LEGVMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 506.
AILUROSCHIA, Stev. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 151.
ALOPECIAS, Stev. 1. c. 143 (1856).
AMMODVTES, Stev. 1. c. iv. (1832) 263.
ANKYLOBUS, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 148.
ARAGALUS, Neck. Elem. iii. 12 (1790).
ARACUS, Steud. Norn. ed. II. i. 118 (1840}.
AULUSEMA, Walp. Kep. i. 694 (1842).
CARYOLOBIUM, Ster. in Bull. Soc Nat Mosc. iv. (11:321 266.
CHONDROCARPUS, Stev. 1. c. 268 (1832).
CRACCINA, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 144.
CYMBICARPUS, Stev. 1. c. iv. (11-82) 266.
CYSTIUM, Stev. 1. c xxix. (1856) II. 147.
DIDYMOPELTA, Regel & Schmalh. in Act Hort Prtrop. v. (1877) 669.
DIPELTA, Regel & Schmalh. 1. c. 578 (1877).
DIPLOTHECA, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 595.
EROPHACA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 176 (1839-45).
EUILUS, Stev. in BulL Soc. Nat Mosc xxix. (1856) II. 149.
EUPREPM, Stev. 1. c. iv. (1832) 268.

A8TBAOALU8 :—
FEIUANTHUS, Stev. in Ball. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 148.
GLANDULA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 374.
GLOTTIS, Medic 1. c 877 (1787).
GLYCYPHYLLA, Stev. in Bull. Soc Nat Mosc iv. (1882) 266.
HAMARIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N.S. xvi. (1868) 364.
HAMOSA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 876.
HEDYPHYLLA, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 142.
HOMALOBUS, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 350 (1840).
HYPOGLOTTIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi: (1868) 364.
KENTROPHYTA, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 353 (1840).
KIRCHNERA, Opiz, in Lotos, viii. (1858) 65.
MACROSEMA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (18S6) II. 145.
MEDYPHYLLA, Opiz, in Lotos, viii. (1858) 65.
MYOUROMA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (.18561 II. 150.
ONIX, Medic, in Voiles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 378.
PEDINA, Stev. in Bull. Soc. Nat Mosc xxix. (1856) II. 144.
PHACA, Roy. ex Linn. Coroll. 13 (1737).
PHILAMMOS, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc xxix. (1856) II. 146.
PHYSONDRA, Rafin. Atl. Joum. 145 (18821.
PICRAENA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc iv. (1832) 263.
PODOCHREA, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 364.
PODOLOTUS, Royle, Illnstr. TSot. Himal. 198 (18351.
PROSELIAS, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc iv. (1832) 268.
PSYCHRIDIUM, Stev. I. c. 263 (1832).
RYSODIUM, Stev. 1. c. (1832).
SEWERZOWIA, Regel *Sc* Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 580.
SOLENOTUS, Stev. in BulL Soc. Nat. Mosc xxix. (1856) II. 143.
SPIESIA, Neck. Elem. iii. 13 (1790).
STELLA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. U. (1787) 377.
THIUM, Steud. Norn. ed. I. 833 (1821).
TIUM, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 373.
TRIQUETRA, Medic. 1. c 376 (1787).
XEROPHYSA, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxix. (1(56) II. 160.
abakanensis, Less, ex Bonge, Astrag. ii 22 = multicaulis.
abbreviatus, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xv.** (1842) II. 343,-As. temp,
aboriginorum, *Richards, in Frankl. 1st Journ. App-* 746.—Am. bor. arct
abyssinicus, *Steud. ex A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* **i. 193.**-Abyss.
acanthostachys, Fisch. in Boll. Soc Nat. Mosc xxvi. (1853) II. 326-Roussaeanus.
acaulis, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **ii. 132.**—Reg. Himal.
acicularis, *Bunge, Astrag.* i. 90; ii. 161.—Cappadoc
acinaciferus, *Boiss. Diagn.* Ser. L ix. 72.—Arab,
acmonotrichns, *Fentl, Pugill. PI. Nov. Syr.* **6.**—Ciliua.
acmophyllas, *Bunge, Astrag.* i. 93; ii. 166.—Cappadoc.
acmotrichus, Bunge, 1. c. i. 109; ii. 189 = acmouoliichas.
acutiflorus, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Biit. Ind. ii. 120-Falconeri.
acutifolius, *Bunge, Astrag.* i. 130; ii. 227.—Persia.
acutifolius, DC. ex Steud. Nom. ed. 1.88 = A. Stella,
acutifolius, *Schleich. Cat. PL Helv.* **ed. IV.** *9.*—Europ.
acutirostris, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 360.—Calif.
acutus, *Bunge, Astrag. i.* 71; ii. 118.—Persia,
adesmiaefolius, *Benth. ex Bunge, 1. c.* i. 4; ii. 2—Tibet, occ.
adpressus, Ehrenb. ex Walp. Ann. iv. 502 - gummUer-
adscendens, *Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ♂ 317.—Persia.

ASTRAGALUS :—
adsurgens, *Pall. Astrag.* 40. n. 44. L 81.—SiMr.j Am. bor.
"dsurgens, Ton-, in Stansbnry, Rep. 885-iodanthus.
adsurgens, Willd. ex Stead. Nom. ed. II. i. 199 = virgatns.
adunciformis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 42.—As. Mb.
"duncus, Bunge, Astrag. i 102; ii. 179 - nsturtends.
aduncus, Bieb. Fl. Tanr. Cane. ii. 196-Bungeanus.
aduncus, Hohen. Talysch. 107-Cephalotes.
•dunens, *Willd. Sp. PI-* iii. 1269.—Keg. Caucas.
Mustns, *Bunge, Astrag.* i. 80; ii. 134.—Kurdistan.
Aegiceras, *Willd. Enum. Hart. Berol. Suppl.* 52=Ins. Chio.
•cgobromus, *Boiss.* &• *Hohen. Diagn.* Ser. I. it 74.—Persia.
"gyptiano, Mill Gard. Diet. ed. VIIL n. 11° annnlaris.
ae&pHacus, Spreng. Syst. iii. 298=kahiricus.
aeluropus, £xnft, .rfrfra^. i. 89; U. 157.—Reg. Caucas.; Persia.
•eacarius, PoH. tfriw, iii. 751.—Sibir.
"ffghanus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 1095 (emend.).—Beluchist.
»Jfnis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 159.—Chili,
afneanus, *Bunge, Astrag.* i. 81; ii. 104.—Algeria.
Agraniotii, *Orph. ex Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 29.—Uconia.
Vrestis, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i 148 = hyDoglottis.
"atabicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 86.—Syria; Mesopotam.
Aitchisoni, *Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 121.—Ind. bor. occ.
Ajfreidii, *Aitch. V Baker, in Journ. Linn. Sec.* xix. (1882)lS7.-Afghanist.
•jubensis, *Bunge, Astrag.* i. 61; ii. 102.-Persia.
"Usensis, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii (1875) 57, nomen.—Afr. bor.
[illegible] *Bunge, AstTtg, U* 25:. a,, 80,, —Sibir.
[illegible] *an, Bunge,* r* Jfoxim. *in Bull. Aead. Pitersb.* »iv, (1878) 81.-Mongolia.
alatevicns, *Kar.* &• *Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 844—Alatau.
•'hens, *Greene, in Bull. Calif. Aead.* i ('1885") 156.—Calif
A]j*rjillai *Steud. Nom.* ed. II. i. 159.-Chili.
Albert!, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 876.—Turkestan.
"ibicans, *Bong. Vers. Pfl. Saisang-Nor,* 21. t 2.—Soongaria.
ibicsiulis, *DC. Astrag.* 182. n. 59. t. 21.—Reg. Cancas.
MHcaulis, Ledeb. Fl. Ross. i. 628 = medlus.
Hindus, Waldst. & Kit. PI. Rax. Hong. i. 89. t. 40 - •esicarius.
"eppicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. H. 58.—Syria; Mesopotam.
•lexandrinus, *Boiss. I. c.* ix. 75.—Aegypt; Arab.; ,s)ria.
••gwbiensis, *Coss. ex Bunge, Astrag.* i. 9; « «.—Hispan.
wwnns,^. *Gray,Bot. U. St.Expl. Exped.* i. 418.—Pernv.
» U K W• *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 85.-Caria,
"Uochorns, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* xiil. (1878) S66.-Am. bor.
Alopecias, C. Koch, ex Bnnge, Astrag. ii 97 - maximns.
Alopecias, *Pall. Astrag.* 12. t. 9.—Persia; Turkestan.
a"opecuroides, Ledeo.Fl. Ross. i 683. n. 88 = maximus (ex parte).
•lopecnroides, *Linn. Sp. PI.* 755.—Sibiria; Helv.; Kamtschatka.
"'opeeuroides. Pall. Astrag. 9. t. 7-mlplnm.
oiopecuroideus. Lam. Fl. Fr. ii. 636 - narbonnensis.
••topecuros, *Pall, ex DC. Astrag.* 11. t. 8.—As. med.
Alpamareae, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 417.—*eruv.
"Vpinus, Ledeb. Fl, Rosa. i. 601=arcticus.
«nnus, *Fisch. sp. pi.* i. 700.—Reg. hor.et arct.
«*«« *Vill. Hist. PI. Dauph.* i. 802 = AAOmbrycMs.
»'aicus, *Bunge, Astrag.* i. 37; ii. 46.-Mont. Allai.
"taicus, Pall. Astrag. 56 = Oxytropis brevirostra.
"lyssoides, Kottchy, ex Walp. Ann. ii. 874-elbrn. sensis.
wyssoides, *Lam. Encyc.* i. 817.—Armenia.

A8TBAGALU8:-
amalecitanus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 46.—Palacstin.
amanus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 290.—Syria,
amarus. *Pall. Astrag.* 8. t. 6.—Reg. Casp.
amatus, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil,* ii. 115.—Chili,
ambiguus, *Bunge, Astrag. i.* 86; ii. 150.—Syria.
ambiguus, Pall. Astrag. 54 = Oxytropis ambigua.
amblolepis, *Fiseh. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi (1853) II. 372.—Kurdistan.
Amherstianns, *Benth. in Xoyle, Illustr. Bot. Himal.* 199.—Keg. Himal.
ammocryptus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 59. =tribuloides.
Ammodendron, *Bunge, Astrag.* i 130; ii. 228.—As. med.
Ammodytes, *Pall. Voy. Ed. Gall. App.* n. 872. t. 88.—Sibir. or.
ammophilus, Bieb. ex Bess, in Flora, XV. (1832) II. Beibl. 83-virgatus.
ammophilus, *Kar. & Kir. in Bull. Soe. Nat. Mosc* xv. (1842) 335.—Persia; Soongaria.
ammotrophus, *Bunge, Astrag.* i. 112; ii. 192.—Turkestan.
amoenus, *Feml, Pugill. PI. Nov. Syr.* 4.—Cilicia.
amphilogus, *Bunge, Astrag. i.* 90; ii. 161.—Anatolia,
ampbioxys, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* xiii. (1878) 866.—Am. bor.
ampullarins, 5. *Wats, in Am. Natural,* vii (1878) 800.—Calif.
ampullatus. Pall. Reise, i. 750 - Oxytropis ampnllnta.
a'mpulli/er, Griseb. Spidl. Fl. Rnmel. i. 58-physocalyx.
amygdaliger, Less, in Linnaea, ix. (1884) 176-testiculatus.
amygdalinus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 228.—As. temp,
anacamptns, *Bunge, Astrag.* i. 110; ii. 190.—Persia,
anacardius, *Bunge, 1. c.* i. 61; ii. 105.—Persia,
anatolicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 77.—Anatolia,
ancistrocarpus, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 463.—Mesopotam.
ancistron, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 186.—Algeria,
ancocarpus, *Pomel, 1. c.* 187.—Algeria,
ancyleus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 240.—Cappadoc.
andalanicns, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. 1. c.* 845.—Persia.
Andnsonii, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* vi. (1864-65) 524.—Calif.
Andrachne, *Bunge, Astrag.* i. 89; ii. 168.—Syria ; Mesopotam.
andrachnaefolins, *Penal, Pugill. PI. Nov. Syr. 4.*—As. Mio.; Syria,
anemophilus, *Greene, in Bull. Calif. Aead. i.* (1885) 186.—Calif.
anfractuosus, Bnnge, Aitrag. i. 125; ii. 218 = subulatns.
angarensis, *Turca. ex Bunge, 1. e.* i 126; ii. 222.—Sibir. baical.
angorensis, Bunge, 1. c. ii. 176=lencocyaneus.
angulosns, *DC. Astrag.* 234. t. 45.—Syria.
angustatus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 47 = roscifolius.
angustatus, *Bunge, Astrag.* i. 126; ii. 220.—Persia,
angustiflorus, *C. Koch, in Linnaea,* xv. (1840) 720.—Armenia; Persia,
angustifolius, *Lam. Encyc* i 821.—Graecia; As. Min.
angustissimus, Bunge, Astrag. i 135; ii. 282—oxypetalus.
anisacanthus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 103.—Afghan.
anisacanthus, Bunge, Astrag. ii 128=jubatus.
anisomerus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 228.—As. temp,
ankylotus, *Fisch. V Mey. lnd. Sem. Hort. Petrop.* ii. 27.—Keg. Casp.
ankylotus, Stschegl. in Bull. Soc Nat. Mosc (1854) I. 162 = commix tus.
annularis, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* 139.—Aegypt.; Syria.
annuus, *DC. Astrag.* 127. n. 25.—Hab.J
anomalus, *Bunge, Astrag. i.* 85; ii. 62.—Tibet, occ
anscrinaefolius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 76.—Persia,
antabicus, *Boiss. I. c.* ix. 86.—Anatolia.
anthylloide»,"£am. *Encyc.* i. 820.—As. Min.
anthylloides, Pall. Astrag. 15 = inflatns.
Antilibani, *Bunge, Astrag.* i. 55; ii. 90.—Syria.
Antiselli, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 152.—Calif,
antoninus, *S. Wats, in Proc. Am. Aead.* xvii (1881-82> 843.—Am. bor. occ.
Apollineus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 27.—Graecia.
apricus, *Bunge, Astrag.* i. 40; ii 58.—Persia.

ASTRAGALUS :—
arabicus, Ehrenb. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. lnd. ii. 121 = prolixus.
arabicus, Ehrenb. ex Bunge, Astrag, i 9; ii. 6 = fatinensis.
arabicus, *Kotschy, in Sittb. Aead. Wien, Math.-Nat.* Iii. *Abth.* I. (1866) 264.—Arabia.
arborescens, Bunge, Astrag. ii 225 = paucijugus.
Arbuscula, *Pall. Astrag.* 19. n. 24.1.17.—Sibir.
Arbuscula, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross, i 683 - frulicosus.
arcticus, *Bunge, Astrag.* i. 23 ; ii. 27.—Europ. arct.
arcticus, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 288=Oxytropis uralensis.
arcticua, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 61.—Hab.1
arcuatus, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 407.—As. Min.
arcuatus, Sieph. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 649 - seaberrimus.
arenarius, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 429 - baionnensis.
arenarius, *Linn. Sp. PI.* 759.—Dania; Suecia.
arenarius, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 614 = danicns.
arenarius, PalL Astrag. t. 34=hypoglottis.
arenicola, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 184.—Algeria.
arenosus, S. G. Gmel. ex Pall. Astrag. 26=hyrcanus.
arequipensis, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* I. (1848) 17.—Peruv.
argaeus, *Boiss. tf Bal. Diagn.* Ser. IL vi 53.—Cappadoc.
arganaticus, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) II. 23.—As. temp.
argentatus, Pall. Astrag. 60. t. 48-Oxytropis argentata.
argenteus, Bertol. ex Vis. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 18=Muelleri.
argophyllus, Nutt ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i 331 -glareosus.
arguricus, *Bunge, Astrag.* i. 103; ii. 181.—Mont. Ararat.
argntensis, *Bunge, I. c.* i. 98 ; ii. 170.—Armenia,
argyrophyllus, *Boiss. (f Gaill. ex Boiss. Ft. Orient,* ii. 858.—Syria,
argyrostachyus, *Boiss. Diagn.* Sei. I. vi. 41.—Persia,
argyrothamnus, *Boiss. 1. c.* ix. 89.—Syria,
aridus, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* vi. (1864) 223.—Am. bor. occ.
aristatus, *L'Hirit.SHrp. Nov.* 170.—Europ. austr.
aristatus, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 159 = angustifolia.
aristatus, Sibth. & Sin. Fl. Graec. viii. 25. t. 734 •» Parnassi.
arizonicus, *A. Gray, in Proe. Am. Aead.* vii. (1868) 898.—Arizona,
arkalycensis, *Bunge, Astrag.* i. 139; ii. 238.—As. temp.
armatus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1330.—Numidia.
armeniacus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 86.—Armenia.
armeriastrum, Decne. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 387 - cephalanthus.
arnacantha, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii 205.—Reg. Caucas.
arnoceras, Bnnge, Astrag. 118 ; ii. 14—brachyceras.
arpilobus, *Kar. & Kir. in Bull. Sac. Nat. Mosc.* xv. (1842) 386.—As. temp,
arrectus, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* viii. (1870) 289.—Am. bor.
Arthu-Schottii, A. Gray, 1. c vi. (1864) 209-Conlteri.
aitipes, *A. Gray, 1. e.* xiii. (1S78) 870. - Am. bor.
asaphes, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 251.—As. temp,
asciocalyx, *Bunge, Astrag.* i. 137 ; ii. 234.—As. Min.
ascophorus, Fisch. ex Buuge, 1. c ii. 60 = brachystachys.
askius, *Bunge, I. c. i.* 120; ii. 208.—Persia.
aspadanus, *Bunge, I. c.* i. 68; ii. 107.—Persia,
asper, *Jacq. Ic. Rar.* i. 13.1.152.—Europ. austr.; Reg. Caucas.
asperulus, Dufour, in Ann. Sc. Gin. vii. (1820) 296 - A. epiglottis.
Asterias, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 267 = cniciatus.
astraboides, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 186.—Algeria,
atlanticus. *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1878) 806.—Afr. bor. occ.
atratus, *S. Wats, in Bot. King. Exp.* 69.—Am. bor. occ
atropatanns, *Bunge, Astrag.* i 82; a. 188.-Persia.

ASTRAGALUS :—

atropatanus, Fisch. ex Bunge, Astrag. ii. 90 = pulchellus.
atropurpureus, *Baiss.* to" *Heldr. Diagn.* Ser. I. ix. 54.—As. Min.
atticus, Nym. Consp. 190 = Wulfenii.
Ancheri, *Baiss. Diagn.* Ser. I. ii. 46.—Armenia.
Aucherianus, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.- xxvi. (1853) II. 398. = ptilodes.
anganus, *Bunge, Astrag.* i. 36 ; ii. 45.—Afghanist.
aulacolobus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 64.—Syria; Mesopotam.
aureus, *Willd. in Mem. Acad. Berl.* (1794-96) 29. t. 1.—Oriens.
Austinae, *A. Gray, Bot. Calif,* i. 156.—Calif,
australis, *Lam. Ft. Fr.* ii. 637; *Bunge, Astrag.* i. 22 ; ii. 24.—Mont. Pyren.; Hispan.
austriacus, Delarb. Fl. Anv. ed. II. 466 = hamosua.
austriacus, *Linn. Sp. PI.* 1070.—Europ.; Reg. Caucas.; Sibiria.
austriacus, Pall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 159 = versicolor.
austriacus, Thore, ex DC. Prod. ii. 283 = baionnensis.
bachtiaricus, *Bunge, Astrag.* i. 38 ; ii. 63.—Persia,
bactrianus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) 354.—Turkestan.
baeticus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1068.—Hispan.; Sicil.
baghensis, *Bunge, Astrag.* i. 80 ; ii. 135.—Persia,
baibutensis, *Bunge, I. c.* i. 91 ; ii. 162.—Armenia,
baicalensis, *Bunge, I. c.* i. 139 ; ii. 238.—As. centr.
baicalensis. Pall. Astrag. 64. t. 52 = Oxytropis coerulea.
baicalia, Pall. Astrag. 93. t. 77. f. 1-Oxytropis baicalia.
baionnensis, *Loisel. Ft- Gall.* ed. I. 474.—Gallia occ.
bakaliensis, *Bunge, in Mini. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 268 *(PI. Lehm.* 92. t. 14).—Persia,
baknensis, *Bunge, Astrag.* i. 37 ; ii. 46.—Reg. Casp.; Ind. bor. occ.
Balansae, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 59.—Cappadoc.
banaticus, Rochel, ex Nym. Consp. 189 = chlorocarpus.
Barba-Aronis, Ehrenb. ex Bunge, Astrag. ii. 65 = Sieberi.
Barba-Jovis, *DC. Astrag.* 188.—As. Min.
Barba-Jovis, Fenzl, ex Bunge, Astrag. ii. 149 = Fenzlii.
Barba-Mosis, *Ehrenb. ex Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 486.—Mont. Sinai,
bcrbatus, *Lam. Encyc.* i. 314.—Armenia.
barbatus, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 88 = Sibthorpianus.
Barrelieri, Dufour, in Ann. Sc. Gén. vii. (1820) 297 = incanus.
basianicus, *Boiss. tX Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 361.— Mesopotam.
bayonnensis, Auct. vide baionnensis.
Beckerianus, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iv. (1876) 363.—Reg. Caucas.
Beckwithii, *Torr. b" Gray, in Pact/. Rail. Rep.* iii. (1854) 120.—Am. bor. occ.
Behen, Bertol. in Nov. Comm. Bonon. vi. (1844) 233 (Misc. Bot. ii. 19) = Russelii.
Belangerianus, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) 484 = leioclados.
Benthamianus, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 187.—Chili.
Bergii, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iii. (1879) 343.—Reg. Argent.
Bsrteri, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxvii. (1834) 57.—Chili,
berytheus, *Boiss. V Blanche, Diagn.* Ser. II. ii. 33.—Syria.
berytius, *Bunge, Astrag.* i. 50; ii. 78.—Cataonia.
bethlehemiticus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 85.—Palaestin.
bhotanensis, *Baker, in Hoot./. Ft. Brit. Ind.* ii. 126.—Reg. Himal.
bicarinatus, Steud. Nom. ed. II. i. 159 «= Gueldenstaedtia pauciflora.
tricolor, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 478 = pictus.
bicolor, *Lam. Encyc.* i. 317.—Armenia.
bicolor, Steud. Nom. ed. II. i. 159=nliginosus.
bicristatus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 75.-Calif.
bicuspis, *Boiss. Ft. Orient.* 1094 (emend.).—As. Min.
bicuspis, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 406.—Tibet, occ.
bidentatus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 493.—Am. calid.

ASTRAGALUS :—

bidentatus, Ehrenb. ex Bunge, Astrag. ii. 17-hispidulus.
Biebersteinii, *Bunge, 1. c.* i. 114; ii. 194.—Reg. Caucas.
Bienerti, *Bunge, I. c.* i. 80 ; ii. 133.—Persia.
bifidus, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 605-= multicaulis.
bifiorus.Linn. Mant. 273 = Crotalaria biflora.
biflorus. Fall. Reise, iii. 206 = Gueldenstaedtia pauciflora.
biflorus, *Viv. Fl. Lyb. Spec.* 44. t. 20.—Afr. bor.
Bigelovii, *A. Gray, PL Wright,* fl. 42.—Am. bor. j Mexic
bingoellianus, Kptschy & Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. ii. S57=muschianns.
biovulatus, *Bunge, Astrag.* i. 11; ii. 11.—Persia.
biserratus, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 120 = A. Biserrula.
Biserrula, *Bunge, Astrag.* i. 11; ii. 9.—Persia,
bisulcatus, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* xii. 42. t. 1.—Am. bor. occ.
bludhistanus, *Bunge, Astrag.* i. 76 ; ii. 129.—Beluchist.
Bodeanus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 435.—Persia,
boeticus, *Linn. Sp. PI.* 758.—Reg. Mediterr.
bohemicus, Mayer, in Abh. Boehm. Ges. iii. (1787) 314. t. l = virgatus.
Boissieri, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 824.—Hispan.
Boissieri, Bunge, Astrag. ii. 132, pro parte = creticus.
Bolanderi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 337.—Calif,
bombycinus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 50.—Aegypt. -; Arab.; Persia.
Bonanni, J. & C. Presl, Delic. Prag. (1822) 42 = leucophaeus.
Bonannianus, Bunge, Astrag. ii. 242 = depressus.
bounacanthus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 370.—Lycia.
bounophilus, *Boiss.* &* *Hohen. Diagn.* Ser. 1. ix. 99.—Persia.
Bourgaeanus, *Coss. Notes Crit.* 160.—Hispan.
Bourgovii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 227.—Am. bor. occ
brachybius, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc. iv. (1832) 267 = bamosus.
brachybotrys, *Bunge, Del. Sent. Dorp.* (1839) 8 ; *et in Linnaea,* xiv. (1840) *Litt.* 116.—Sibir. alt.
brachycalyx, *Fisch. ex Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 90; *et in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 360.—Kurdist.
brachycarpus, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii. 301.—Reg. Caucas.
brachycentrus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 337.—Persia.
brachyceras, C. Koch, ex Bunge, Astrag. ii. 7 — tribuloides.
brachyceras, *Ledeb. Cat. Hort. Dorp.* (1822) 3.—Syria ; Persia ; Tauria.
brachycladus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 393.—Persia,
brachylobus, *DC. Prod.* ii. 286.—Reg. Casp.
brachyodontus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 46.—Persia.
brachyphyllus, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) II. 394 = condensates.
brachypodus, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 69 = lagurus.
brachypterus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1863) II. 397.—Oriens.
brachypus, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 79.—Soongaria.
brachystachys, *DC. Prod.* ii. 303.—Syria; Mesopotam.
brachytropis, *C. A. Mey. Verm. Pfl. Cauc.* 140.—Reg. Caucas.
Brackenbridgei, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 416.—Peruv.
bracteolatus, DC. Astrag. 208 = angnstifolius.
bracteosus, *Boiss.* &• *Not, Diagn.* Ser. II. ii. 31.—Anatolia.
bracteosus, C. A. Mey. ex Bunge, Astrag. ii. 185 = hyalolepis.
bracteosus, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 160 = melanostachys.
Brandegei, *Porter & Coult. Fl. Col.* 24.—Am. bor. occ.
brahuicus, *Bunge, Astrag.* i. 119, 205.—Belnchist.
brazoēnsis, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* '1861' (1862) 452.—Texas.
brevicarinatus, DC. Astrag. 241. t. 49 = Gueldenstaedtia pauciflora.
brevifiorus, DC. 1. c. 194. t. 31 —eriocephalus.
brevifiorus, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxvi. (1863) II. 368=polyanthus.

ASTRAGALUS :—

brevifiorus, Fenzl, ex Bunge, Astrag. ii. 149 = Fenzlii.
brevifolius, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 884.—Sibir. alt.
brevipes, *Bunge, Astrag.* i. 9<4; ii. 172.—Persia.
brevirostris, Poir. Encyc. Suppl. i. 628 = Oxytropis brevirostra.
Breweri, *A. Gray, in Proc. Acad. Calif,* iii. (1863) 108.—Calif.
Bruguieri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 102.—Persia.
Buceras, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 61.—Ins. Maurit.
buchtonnensis, *Pall. Astrag.* 176. t. 62.—Sibiria.
buchtormensis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 585 = Oxytropis Pallasii.
Buhseanus, *Bunge, Astrag.* i. 120 ; ii. 207.—Persia.
Bulla, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1863) II-438 = cephalanthus.
bullarius. Pall. Keise, iii. 218 = Oxytropis mixotricha.
Bungeanus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 436.—Reg. Caucas.
Burkeanus, *Benth. ex Han. Tkes. Cap.* i. 62. t. lxxxii.—Afr. austr.
Bustillosii, *Clos, in C. Gay, Fl. Chit.* ii. 117.—Chili.
bymantinus, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1868) S79 = prusianus.
cabulicus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 48 = Oxytropis cabulica.
cachinalensis, *Phil. FL Atac.* 16.—Chili,
cadmicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 44.—As. Min.
caelestis, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 470.—Reg. Caucas.
caeruleus, Pall. Reise, iii. 293 = Oxytropis caerulea.
caeruleus, *Hort. Par. ex Bunge, Astrag. i.* 103; ii-184.—Zeylan.
caespitosus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 230.—Am. bor. occ.
caespitosus. Pall. Astrag. 70. t. 57 = Oxytropis caespitosa.
calabricus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) 402.—Calabria,
califomicus, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* n. 3 (1885) 157.—Calif.
callichrous, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 62.—Palaestin.
callipbysa, *Bunge, Astrag.* i. 76 ; ii. 128.—Persia,
callistachys, *Buhse, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 463.—Persia,
calophyllus, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. II. ii. 26.—Anatolia.
calvescens, *Bunge, Astrag.* i. 42 ; ii. 65.—Persia,
calycinus, *Bieb. Fl. Tuur. Cauc.* ii. 199.—Reg. Caucas.
calycosus, *Torr. ex S. Wats, in Bot. King, Exp.* 66.—Calif,
camelorum, *C. V W. Barbey, Herb. Levant,* 131. t. 3.—Aegypt.
campestris, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vL (1864) 229.—Am. bor. occ.
campestris, Linn. Sp. PL 761—Oxytropis campestris.
camporum, *Benth. ex Bunge, Astrag.* ii. 3.—Afghanist
camptoceras, *Bunge, I. c.* i. 12; ii. 12.—Cappadocia.
campylanthus, *Boiss. Diagn.* Ser. L vi. 42.—Persia,
campylorhynchns, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 23.—As. Min.; Persia; Soongaria.
campylosema, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 82.—Cilicia.
campylotrichus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 207.—A*-temp.
canadensis, *Linn. Sp. PL* 767.—Am. bor.
canaliculatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 52 *• scorpioides.
cancellatus, *Bunge, Astrag.* ii. 178.—Persia,
candicans, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* n. S (1885) 166.—Calif.
candicans, Pall. Astrag.61. t. 49-Oxytropis candicans.
candidissimus, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 309.—Sibir. alt. i Calif.
Candolleanus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 80.—Persia.
Candolleanus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 199-Royleanus.
canescens, *Bunge, Astrag.* ii. 174.—Armenia.
canescens, DC. Astrag. 114. t. 16 = onobrychoides.
canescens, Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc-iv. (1881) 34-Solandri.
canesc ns, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 625.—Hungar.
caniculatus, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 52" scorpioides.
cano-ater, *Bunge, Astrag. i.* 50; ii. 80.—Cappadoc.
canus, *Bunge, I. c.* ii. 180.—Persia.
canus, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 606-multicaulis.
capillipes, *Fisch. ex Bunge, Astrag.* i. 20; it 21.-" China.

ASTRAGALUS:—

capitatus. Lam. Fl. Fr. it 840-A. Glanx.
capitatus, Linn. Sp. PI. 755=emarginatus.
Capito, *Boiss. V Hohen. Diagn. Set. I.* ix. 40.—Persia,
cappadocicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 74.—As. Min.
caprinus, Guss. Fl. Sic. Syn. it 815 = Huetii.
caprinus, £iB».S£..PZ.ed. II. 1071.—Barbaria; Oriens.
caprinus, Pall. Reise, ii. 329=dasyanthus.
Caragaiiae, *Fisch. V Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1888) **844.**—Reg. Caucus.; Persia,
•arduchorum, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Fl- Orient.* ii. 31O.-Persia.
«ariensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 68.—As. Min.
carittalis, Benth. ex Bunge, Asfrag. i. 23; ii. 28= himalayanus.
carnosus, Nutt.Gen. Am. ii. 100=caryocarpus.
carnosus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 740-Sophora sericea.
tanlinianus, Linn. Sp. PI. 757=canadensis.
caryocarpus, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* 1.176.—Am. bor.
"ryocarpus, Ton. in Ann. Lye N. York, il (1828) 179=plattensis.
earyolobus, *Bunge, Astrag.* i. 87.—Persia.
«asapaltensis, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 88.—And. Peruv.
Ca«i, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 154.—Calif,
"aschmirensis, *Bunge. Astrag.* L 80; iL 84.—Kashmir,
raspicus, *Biet. Fl. Tour. Cauc.* ii. 204.—Reg. Casp.; As. temp.
'aspius, Hohen. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 841 = praec
casUnaeformis, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 861.—Arizona.
castellanus, *Bunge, Astrag.* i. 9; ii. 5.—Hispan.
owacamptus, *Bunge, 1. c.* ii. 191.—Persia.
*ta**linensis,* Nntt. in Toum. Acad. Sc PhiL N. S. I. (1847) 152=didymocarpus.
otaonicus, Boiss. Fl. Orient. iL 247 = affghanus.
cataonicus, *Bunge, Astrag. i.* 107; ii. 188.—Cataonia.
antcatiau, Bieb. FL Taur. Cauc. ii. 205=Marschallianns.
caucasicus, *Pall. Astrag.* 2. t. 2.—Reg. Caucas.
caudatus, Pall. 1. c. 62. t. 50=Oxytropissongonica.
eaudiculosns, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 25.—Armenia.
[illegible] *Phil, in Anal. Univ.* CA.7.(1872) 691.—Chili.
Cedreti, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 39.—Mont. Libanus.
«Phalanthus, *DC. Astrag.* 169. t. 88.—Persia.
"PhoJamkus, Hohen. ex Bunge, Astrag. iL 117 = "OhenackerL
"P'μdanthus, Kotschy, ex Bnnge, L c. iL 120=schirasicus.
*cet*alonicus,* Fisch. in Bull Soc Nat. Mosc. xxvi. (J[88]S).n.424=aristatus.
Wphalonicus, *Presl, Bot. Bemerk.* 67.—Cephaloma.
^ephalotes, *Pall. Astrag.* 29. t. 24.—Reg. Caucas.
Cephalotes, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed II. u. 260 A. Andrachne.
eefasinus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1878) 47.—Afghan.
«rasocrenus, *Bunge, Astrag.* i. 93; ii. 167.—Persia.
«*ratoides, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 492,-Sibir. alt
"'atoides, Bunge, Enum. Alt. 71=stenoceras.
Cervini, Thomas, ex Steud. Nom. ed. II. i. 160 = laponica.
cnaborasicas, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 4[illegible].—Mesopotam.
chaetodon, *Bunge, in Mfm. Sav. Etr. Acad. Pitersb.* vii. (1851) 272 *{PI. Lehm.* 96).—Turkestan.
chaelodon, Ton. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. n, (1866) 194 = Spaldingii.
cnaetolobus, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Acad. Pitersb.* U. C1835) 692.—Sibir. alt
TMaetopodus, *Bunge, Astrag.* iL 208.—Persia,
cnalaranthus, *Boiss.* b[1] *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* IL - 890.—PersU.
Chamaeleuce, *A. Gray, in Ives, Rep. Bot.* 10.—Am. —oor. occ.
Uiardini, *Beits. Diagn.* Ser. I. iL 74.—Persia.
Ojartacens, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 684.—Persia,
cnartostegius, *Boiss.* b" *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* "«.310.-Oriens; Persia.
<-"*«ubardi,* Bunge, Astrag. i. 118 ; ii. 202 = Wulfem.
enjnensis, *Linn.f. Decad. i.* t. 3.-China.
chionobius, *Bunge, Astrag.* ii. 74.—Persia.
chionophilus, *Boiss.* b[1] *Heldr. Diagn.* Ser. L ix. 52.—As. Min.
chionophilus, Kotschy, ex Bunge, Astrag. ü. 76 = "epressus.

ASTRAGALUS .—

chius, Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 870= trojanus.
chiwensis, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 247.—Khiva.
chlorantkus, Pall. Astrag. 30. t. 25 = asper
chlorocarpus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 60-A. Onobrychis.
chlorocyaneus, *Boiss.* b* *Reut. Diagn.* Ser. I. ix. 56.—Hispan.; Afr. bor. occ.
chlorodontus, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) II. 29.—As. temp.
chlorophaeus, Bunge, Astrag. i. 60; iL 79=oxytropifolius.
chlorosphaerus, *Boiss.* b" *Nol, Diagn.* Ser. II. iL 28.—**Oriens.**
chlorostachys. Hook. f. & Thorns, ex Bunge, Astrag. ii. 28=carinalis.
chlorostachys, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vii. (1880) 249.—Reg. Himal.
chlorostegius, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 413.—Mesopotam.
choicus, Bunge, Astrag. i. 119; ii. 204=httifolius.
chorassanicus, *Bunge, I. c.* i. 83; iL 145.—Persia,
chordorrhizus, *Fisch. ex Bunge, 1. c.* i. 52; ii. 86.—Reg. Caucas.
chorinensis, *Bunge, 1. c.* i. 22; ii. 24.—Sibir.
Christianus, Aucher, ex Bunge, 1. c. 86=diptherolobus.
Christianus, Heldr. ex Bunge, 1. c. ii. 88=pisidicus.
Christianus, *Linn. Sp. PI.* 765.—As. Min.; Syria.
Christianus, Russell, ex Bunge, Astrag. ii. 36=alepicus.
Christianus, Pinard, ex Bunge, 1. c. ii. 88=columnaris.
Christianus, Siev. in Fall. N. Nord. Beitr. vii. 293 = Sieveraianus.
Christianus, Sibth. ft Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 85 = graecus.
Christianus, Vahl, Symb. Bot. i. 57=tomentosns.
chromolepis, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. ix. 84 = aureus.
chrysanthus, *Boiss. V Hohen. I. c.* 73.—Persia.
ckrysochlorus, Boiss. *Sc* Kotschy, in Boiss. 1. c. Ser. II. v. 86=pannosus.
chrysomallus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 310.—As. temp,
chrysophyllus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 38.—Syria;
chrysopterus, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Pétersb.* xxiv. (1878) 82.—China,
chrysostachys, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 69.—Persia,
chrysotrichns, *Boiss. I. c.* 76.—Persia,
chtonocephalus, *Boiss.* b* *Bal. Diagn.* Ser. II. vL 67.—Cappadoc.
Cicer, *Linn. Sp. PI.* 767.—Europ. austr.; Reg. Caucas.; Sibiria.
cicerellus, *Boiss.* b[1] *Bal. Diagn,* Ş n. II. vi. 53.—Cappadoc.
cicerifolius, *Royle, ex Bunge, Astrag.* i. 41; ii. 70.—Reg. Himal.; Tibet occ.
cicerifolius, Royle, ex Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) II. 404=scariosus.
cicerinus, St. Lag. in Ann. Soc Bot Lyon, vii. (1880) 120=A. Cicer.
cilirius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 69.—Cilicia.
ciliolatus, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i. 27 ; ii. 88.—Reg. Himal.
cinerascens, PC. ex Steud. Nom. ed. IL i. 160=rupifragus, testiculatus.
cinereus, Bess. Enum. PI. Volh. 29=pallescens.
cinnreus, DC. Astrag. 178=reduncus.
cinereus, Turcz. Fl. Baic.-Dah. i. 322=mnlticaulis.
cinereus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1315.—Armenia,
citrinus, *Bunge, Astrag.* i. 34; ii. 42.—Persia.
clandestine, Roth, ex Spreng. Syst. iii. 300=cymbiformis.
Clausii, C. A. Mey. in Goebel, Reise, iL 266. t. 5 = vulpinus.
clavatus, *DC. Astrag.* 230. t. 44.—Armenia.
clavatus, Ledeb. Fl. Ross. i. 648 = brachycarpua.
Clevelandi, *Greene, in Torrty Bot. Club.* ix. (1882) 121.—Am. bor.
Closianus, *Phil, in Anal. Univ. Ckil.* (1872) 691.- Chili.
Clusii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 101.—Hispan.
Clusii, *Pollini, ex Steud. Nom.* ed. I. 85; ed. II. L 160.—Italia,
coarctatus, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iv. (1876) 865.—Armenia.
cobrensis, *A. Gray, PL Wright,* ii. 43, in adnot.—Am. bor. occ.

ASTHAOAIitrS:-

cognatus, *C. A. Mey. in Schrenk, Enum. PI. Nov.* 81. —As. centr.
collinus, *Boiss. PI.* **Orient,** ii. 488.—As. Min.
collinus, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* 141, in syn.— Am. bor. occ.
columnaris, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 70.—As. Min.
coluteocarpus, *Boiss. I. c.* 65.—Tibet, occ.; Afghanist
coluteoides, *Willd. in Mint. Acad. Berl.* (1794-95) 27.—Syria,
commixtus, *Bunge, in Arb. Nat. Ver. Riga,* i. (1847) 246.—As. Min.; Persia; Turkest.
comosus, *Bunge, Astrag.* i. 66; ii. US.—Persia.
compactus, Fisch. ex Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1853) II. 3<>8 = zachlensis, strictifolius.
compactus, *Lam. Encyc.* i. 322.—Armenia.
compactus, C. A. Mey. Vera. Pfl. Cauc. 143 = Meyeri
complanatus, *R. Br. ex Bunge, Astrag.* ii. 1.—Chin. bor.
complicate, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 187.—Chill
compiessus, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 304.—Sibir. alt.
concinsus, *Benth. ex Bunge, Astrag.* ii. 50.— Beluchist.
concretus, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 199 =vicioides.
condensatus, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 639.—Reg. Caucas.
conduplicatus, *Bertol. in Nov. Comm. Bonon.* vi. (1844) 231 *{Misc. Bot.* ii. 17).—Syria; Mesopotam.
confertifloras, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 368.—Am. bor.
confertus, Benth. ex Bunge, Astrag. ii. 27=hippocrepidis.
confusus, *Bunge, 1. c.* ii. 216.—Persia.
Congdoni, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 360.—Calif,
congestus, *Baker, ex Aitch. in Joum. Linn. Soc.* xix. (1882) 158—Ind. or.
conjunctus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 871.—Am. bor.
consanguineus, *Bong,* b" *C. A. Mey. Vert. Pfl. Saisang-Nor,* 22. t. 3.—China,
contortuplicatus, *Linn. Sp. PI.* 758.—Europ. austr. occ; Sibiria; Ind. or.
contortuplicatus, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. viii. 21. t. 729=cruciatus.
Cooperi, *A. Gray, Man. Bet. U. St.* ed. II. 98.— Am. bor.
cordatns, *Bunge, Astrag.* i. 69; ii. 114.—Persia,
coriaceus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i.* 268.— Mexic
comiculatus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 492.—Bessarab.; Podol.
comiculatus, Turcz. Cat. Fl. Baic. 356 = angarensis.
comutus, *Bunge, Astrag.* L 76; ii. 130.—Afghanist.
cornutus, Pall. Reise, i. 499=vimineus.
Coronilla, *Bunge, Astrag.* ii. 10.—Persia,
corrugatus, *Bertol. Amoen. Ital. 38.*—Aegypt.; Arab.; Pen.; Afghanist.
corydalinus, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 101.—Turkestan.
Cossonii, Bunge, Astrag. i. 118; ii. 192 = chlorocyaneus.
costatus, *Bunge, I. c.* i. 35; ii. 61.—Afghanist.
Coulteri, *Benth. PI. Harta.* 307.—Calif.
Cracca, *DC. Astrag.* 101. t. 9.—Peruv.
crassicarpus, Fras. Cat. ex DC. Prod. ii. 287 = caryocarpus.
crassicaulis, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5932=Caragana crassicaulis.
crassinervius, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 88.—Kurdistan.
crassipes, Fras. ex Steud. Nom. ed. II. i. 160= caryocarpus.
crassispinos, *Bunge, Astrag.* i. 132; ii. 280.—Afghanist
crassus, *Bunge, I. c.* i. 42; ii. 63.—Persia.
crenatus, Schnit. Obs. 186"= corrugatus.
crenophilus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 90.—Kurdistan,
cretaceus, *Boiss. 1. c.* Ser. II. v. 84.—Syria.
cretaceus. Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1776) 56 = tauriens.
cretensis, Pall. Astrag. 5=caspicus.
creticus, Boiss. Voy. Sot. Espagne, 181 = Boissieri.
creticus, DC. ex Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 82 = crnentifloras.
creticus, *Lam. Encyc.* i. 321.—Graecia.
creticus, Pinard, ex Bnnge, Astrag. ii. 160=ptilodes.
creticus, Willd. in Mém. Acad. Berl. (1794-1)5) 23 " echinoidet.

ASTKAG.AI.T78 :-

ereticus, Sibth. Fl. Graec. viii. 26. t. 786=prusianus.
criacanthus, Stev. ex FUch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1663) II. 331=arnacantha.
crinitus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 55.—Armenia.
cristatus, Gouan, Illustr. 50 = pentaglottis.
Cristophi, *Trautv. in Act. Hort. Petnp.* viii. (1884) 878.—Rossia.
Cretalariae, A. Gray, in Froc. Am. Acad. vi. (1864) 216=oocarpus.
cruciatus, *Link, Enum. Hort. Berol* ii. 256.—As. Min.; Syria.
cruciatus, Auct. ex Bunge, Astrag. ii. 8=pseudostella.
cruciatus, Auct. quib. ex Boiss. Fl. Orient, it 226, in nota=polyaciinuss.
ernentiflorui, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 82.—Syria.
eruentus, Balb. Cat. Taur. App. i. 8 = corrugatus.
Cruikschanlcii, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 108.—Reg. Argent
cryptanthus, *Wedd. Chlor. And.* ii. 259.—Am. uutr.
ctyptocarpos, *DC. Astrag.* 187.—Armenia,
cucallaris, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 39.—Mesopotam.
cumanus, Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 607=lasioglottis.
cumanus, Willd. ex Steud. Nom. ed. IL i. 160,159 = aduncus.
cuneifolius, *Bunge, Astrag.* i. 44; ii. 68.—Afghan,
cortipes, *A. Gray, in Proc. Calif. Acad.* iii. (1863) 108.—Am. bor. occ.
curviflorus, *Boiss. Diagn.* Ser. L ii. 67.—Persia,
curvirostris, *Boiss. I. c.* Ser. L vi. 88.—Oriens.
Cuscutae, *Bunge, Astrag.* i. 120; ii. 207.—Reg. Caucas.
Cnsickii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 370.—Am. bor.
cuspidatus, Bunge, Astrag. i. 117; ii. 198 = schizopterus.
cyaneus, *A. Gray, PI. Fendl.* 34.—Am. bor. occ.
cygneus, Fisch. ex Bnnge, Astrag. ii. 190=subbijngus.
cylindraceus, *DC. Astrag.* 223.—Armenia.
cylindraceus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 143 = macrourus.
cylleneus, *Boiss. V Heldr. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1858) II. 855.—Graecia.
cymbaecarpus, *Brat. Fl. Lusit.* ii. 167.—Lusit
cymbiformis, Willd. ex Brot. Phyt. 69=eymbaecarpus.
cymbostegis, *Bunge, Astrag.* i. 85 ; ii. 14.—Cataonia.
cyprius, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 469.—Ins. Cyprus,
cyrenaicus, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xix. (1872) 80.—Cyren.
cyrtobasis, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 497.—Turkestan.
cyrtoides, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864) 901 = Gibbsii.
cysticalyx, *Ledeb. Fl. Ross. i.* 643.—Rossia.
cytisoides, *Binge, Astrag.* i. 128; ii. 224.—Turkestan,
dacicus, *Heuff. in Verk. Zool. Bot. Ges. Wien,* (1858) 93.—Europ.
dactylocarpus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 60.—Mesopotam.
daenensis, *Boiss. 1.* c. Ser. I. vi. 35.—Persia.
daguricus, Pall. Astrag. 88.172=Oxytropis prostrata.
dahnricns, *DC. Prod.* ii. 286.—Dahuria; China.
dahuricus, Patrin, ex DC. 1. c. 277 =- Oxytropis dissitiflora.
dalguricus, Willd. Sp. PI. iii. 1*01 - Oxytropis prostrata.
dalmaticus, Bunge, ex Nym. Consp. 190=Soyeri.
Daitonianus, Bunge, Astrag. i. 44; ii. 69=polyacanthus.
damascenes, *Boiss. tf Gaill. Diagn.* Ser. IL vi. 56.—Syria.
damascenus, DC. Prod. ii. 298=coluteoides.
danicus, *Rets. Obs.* iii. 41.—Europ.
Darumbium, *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 112.—Chili,
dasyonthus, *Pall. Astrag.* 79. L 65; *Reise,* iii. 749.—Hungar.; Sibir.; Keg. Cauc.
dasycephalus, Bess, ex Stev. in BulL Soc. Nat. Mosc. (1832) 264 = roseus.
dasyglottis, Fisch. ex DC. Prod. ii. 282-A. Hypoglottis.
dasyglottis. Pall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 160 = pentaglottis.
dasyphyllos, Pall. Astrag. 91. t 75 - Oxytropis lanata.
dauricus, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 719 = Stevenianus.
dauricus, Auct. = dahuricus.

ASTRAGALUS:—

davuricus, Ledeb. Ic. Fl. **Ross.** t. 818 =dahuricus.
davuricus, Patrin, ex Ledeb. Fl. Ross. L 697 = Oxytropis disaitiflora.
dealbatus, Ehrenb. ex Bunge, Astrag. ii. 164=Roussaeanus.
dealbatus, Pall. Astrag. t. 23. f. 1 > albicaulis.
debilis, *A. Gray, in Proc Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 60.—Am. bor.
decemjugus, Bunge, Astrag. i. 43; ii. 67 = psilacanthus.
decipiens, Bunge, 1. c. i. 1U7 ; ii. 188=Sibthorpianus.
declinatus, SaUtb. Prod. 837 = monspessulanus.
declinatus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1294.—Armenia.
decumbens, Boiss. M. Oiient. ii. 429 = leucocyaneus.
decumbens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 229.—Am. bor. occ.
decurrens, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 40.—Mesopotam.
defiexus. Pall, in Act. Acad. Petrop. ii. (1779) 268. t. 15 = Oxytropis derlexa.
deinacanthus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 76.—Syria.
deluensis, Bunge, Astray, i. 55 ; ii. 91 = griseus.
demavendicns, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. Soc.* *Nat. Mosc.* xii. (I860) 70.—Persia.
demissus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. ix. 50 = amoenus.
dendridium, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1858)11. 427=lydoides.
dendroides, *Kar. & Kir. 1. c.* xv. (1842) 339.—Dahuria.
densiflorus, *Kar. VKir.l c.* 329.—Reg. Himal.; Sibir.
densifolius, *Lam. Encyc.* i. 317.—Armenia.
densifolius, Ton. in Pacif. Kail. Rep. vii. 10 = Menziesii.
denudatus, Kotschy, ex Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) II. 885=myriacan thus.
denudatus, Stev. 1. c 328 = roicrocephalus.
depauperatin, *Ledeb. Fl. Alt.* i i. 814.—Sibir. alt.
dependens, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 471.—China occ.
depressus, Bertol. in Nov. Comm. Bonon. vi. (1844) 232 (Misc. ii. 232)=crudatns.
depressus, *Linn. Cent. PL* ii. 29; *Amoen. Acad.* iv. 827—Europ. austr.; Oriens.
depressus, Pall. Reise, i. 289 =diffusns.
depressus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 84. t. 733 = leucophaeus.
derbendicus, *Bunge, Astrag.* i. 40; ii 55.—Persia,
desertorum, *Lehm. ex Spreng. Syst.* iii. 800.—Deserta Asiae.
dianthus, *Bunge, Astrag. Fedsck.* 283.—As. centr.
diaphanus, Bougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 161 = lentiginosus.
dichopterus, Pall. Astrag. t. 39 » austriacus.
dictyocarpus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 84.—Syria,
dictyolobus, *C. A. Mey. ex Bunge, Astrag.* i. 60; ii. 90.—Persia,
dictyophysus, *Reut. ex Bunge, 1. c.* i 74; ii. 124.—Pontus.
dicystis, *Bunge, Astrag. Fedsck.* 225.—As. centr.
didymocarpus, *Hook. V Am. Bot. Beeck. Voy.* 884.—Calif.
didymophysns, *Bunge, Astrag.* i. 118; ii. 193.—Persia.
diffusus, Willd. Sp. PI. iii. 1321 = dolichophyllus.
dilectus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 690.—Chili,
dilutus, *Bunge, Del. Sem. Dorpat.* (1840) *I.—Cf.* *Linnaea,* xv. (1841) *Lift.* 85.—Oriens.
diopogon, *Bunge, Astrag.* i. 70; .ii. 117.—Belnehist.
dioriticus, Schott, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 508 = Oxytropis diorilica.
dipelta, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 868.—Turkestan,
diphacus, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 842.—Am. bor. occ.
diphtherites, *Fenil, in Flora,* xxvi. (1843) 396.—Mesopotam.
diphtherolobns, *Bunge, Astrag.* i. 81; ii. 36.—Syria.
diphyllus, Lam. Encyc. i. 330-Oxytropis microphylla.
diphysus, *A. Gray, PI. Fendl.* 34.—Am. bor. occ.
dipodurus, *Bunge, Astrag.* i. 88 ; ii. 166.—Syria,
dipsaceus, *Bunge, 1. c.* i. 59 ; ii. 97.—Anatolia,
discolor, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxiv. (1878) 33.—Mongolia,
dispermus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 365.—Am. bor.
dissitiflorus, *Bunge, in Mim. Acad, Pttersb.* Ser. VL vii. (1859) 585.—As. temp.

ASTRAGALUS :-

distans, Benin, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 128 = macropterus.
distans, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 472.—Persia,
distans, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 412.—Patagonia,
distortus, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 383.—Am. bor.
divaiicatus, *Bunge, Astrag.* i. 98 ; ii. 166.—Persia.
diversifolius, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864) 230 = junceus.
Dodtii, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 48.—Am. austr.
dolichophyllus, *Pall. Astrag.* 84. n. 90. t 68.—Reg. Caucas.
dolius, *Boiss. tf Haussi. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 340.—Kurdistan.
Dombeyi, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1863) 483.—Peruv.
Donianus, *DC. Prod.* ii. 283.—Nepal,
dorenceras, *Bunge, Astrag.* i. 13; ii. 14.—Cilicia; Mesopot
dorychnoides, Scop. Delic. Insub. ii. 104=lusitanicus.
doryenioides, Dougl. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 268 = succumbens.
Douglasii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 215.—Am. bor. occ.
drepanocarpus, Hochst ex Bunge, Astrag. L 14; ii. 16 = gyzensis.
drepanolobus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 75.—Am. bor. occ.
drepanophonu, *Griseb. in Goett. Abk.* xxiv. (1879) 102.—Reg. Argent.
Drummondii, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 153.—Am. bor.
drupaceus, *Orphan, ex Boiss. Diagn.* Ser. II. it 32.—Graecia.
drnsorum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 78.—Syria.
dubius, DC. Astrag. 167. n. 115=buchtormensis.
dycHocarpus, Boiss. Diagn. Ser. L ii. 84, sphalm.= dictyocarpus.
ebenoides, *Boiss. I. c.* Ser. I. ii. 70.—Persia,
ecbatanus, *Bunge, Astrag.* i. 71; it 118.—Persia.
Echegarayi, *Hierotu in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iv. (1881) 22.—Reg. Argent.
Echidna, *Bunge, Astrag.* i. 82; ii. 143.—Persia.
eckinatus, Murr. Hort. Bot. Stirp. 222=pentaglottis.
eckinoides; L'Hérit. Stirp. Nov. 170=ungustifolius.
Echinops, *Aucher, ex Boiss. Diagn.* Ser. L ii. 57.—Syria.
Echinus, Boiss. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. **Hisp.** iii. 280 = Boissieri.
Echinus, *DC. Astrag.* 197. t. 34.—Syria.
Echinus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 143 = caspiuf.
echioides, Willd. Sp. PI. iii. 1326=angustifolius.
edulis, *Dur. ex Coss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. i-(1854) 222.—Afr. bor.
effusns, *Bunge, Astrag.* i. 102; ii. 179.—Persia.
Ehienbergii, *Bunge, I. c. i.* 61; ii. 102.—Syria.
***tUlxxs,Boiss.lf Bal.Diagn.Scr.* II. \i 57.—Cappadoc.**
elbrnsensis, *Boiss. L c.* Ser. I. ix. 45.—Peisio.
elegans, *Bunge, Astrag.* i. 55; ii. 89.—Persia.
Elliotii, 1>. Dietr. Syn. PI. iv. 1080 = obcordatus.
ellipsoideus. Bong. & Mey. SuppL Alt. 84, partim-" kurtschumensis.
ellipsoideus, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 319.—Sibir. alt.
elmaluensis, *Bunge, Astrag.* i. 121; ii. 211.—Lyda.
elongatus, *Willd. Sp. PL* iii. 1314.—As. Min.
elymailicus, *Boiss. (f Hausst. ex Boiss. Fl. Orient,* ii-346.—Persia.
emarginatus, *DC. Astrag.* 150.—Oriens.
emarginatus, *Labill. Ic. PI. Syr. Dec.* L 19.—Syria.
Emodi, *Steud. Nom.* ed. II. i. 161.—Reg. Himal.
enoplus, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iv. (1878) 364.—Reg. Caucas.
entomophyllus, *Boiss. & Hausst. ex Boiss. Fl. Orient.* it 259.—Persia.
ephippium, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 183.—Algeria.
epiglossus, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii (1880) 120=epiglottis.
epiglottis, *Linn. Sp. PI.* 769.—Reg. Mediterr.
tpiglottoides, Willk. in Bot Zeit iii. (.1845) 428 - A. Epiglottis,
episcopus, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad. x.* (1875) 346.—Am. bor. occ.
eiemophilus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii 54.—Aegypt.; Arab.; Beluchbt.

ASTRAGALUS:—
eremospartoides, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 103.—Turkestan,
eremothamnus, *Kar. tf Kir. in Bull. Sor. Nat. Mosc.* xv. (.1842) 834.—Soongaria.
eriacmus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 345.—Cappadoc.
trianthus, Fisch. ex Boiss. Fl. Orient ii. 328 = crenophilus.
trianthus, Willd. Sp. PL iii. 1382 ^ gummifer.
erinaceus, *Fisch. tf Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 825.—Persia.
erinaceus, Presl, Bot. Bemerk. 57 = anfrustifolius.
erioealyx, *Bunge, Astrag.* L 86; ii. 150.—Cilicia.
eriocarpus, DC. Astrag. 237. t. 47=mollis.
eriocarpus, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 71 & 440.—Am. bor. occ.
triocaulos, DC. Astrag. 188 -mi=rocephalus.
triocephalus, Balansa, ex Bunge, Astrag. ii. 161 = acicularis.
triocephalus, Waldst. & Kit. PL Rar. Hung. i. 46. t. 46 = dasyanthus.
enooephalus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1333.—Armenia,
enoceras, *Fisch. tf Mey. in Ledeb. Fl. Ross. I* 626.—As. med.
triolobus, Bunge, in Me'm. Sav. Etr. Acad. P&ersb. ii. (1885) 691 = depauperatus.
erfonotus, *Benth. ex Bunge, Astrag.* L 33; ii. 40.—Afghan.
enophyllus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. S9.-As. Min.
enopodus, *Baits. I. c.* Ser. I. ii. 48.—Persia,
enosphaerus, *Boiss. tf Haussi. ex Boiss. Fl. Orient.* U. S47.-Persia.
enostylus, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. I. c.* 816.—Persia.
trpocaulos, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. S8=tribuloide3.
oroides, *Hook, tf Am. Bot. Beech. Voy.* 417.—Mexic.
tnoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 90 = miniatus.
trythrolepidius, St. Lac. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 120=erythrolepis.
erythrolepis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 65.—Persia,
erythrotaenius, *Boiss. I. c.* vi. 89.—Mcsopotam.
e»chkerensis, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 828.-Persia.
enbrychioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 41.—Cappadoc.
eocephalus, *Boiss. 1. c.* ii. 56.—Syria,
euoplus, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iv. (1876) 864.—As. temp.
txqltatus, Bunge, Astrag. i. 25=secundus.
eximius, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 244.—As. centr.
txpansus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 48 - Kotschyanus.
exsjapns, *Linn. Mant.* 275.—Europ.
txscapus, Auct. Transs.—Ct Nym. Consp. 198-pubi-norus.
fabaceus, DC. Prod. ii. 302=ntriger.
Jabaceus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii 496.—Reg. Caucas.
fabaceus, Jan, ex Nym. Consp. 19a= HuetiL
falcatus, Dest Fl. Atlant. ii. lS8=falcifonnis.
falcatus, *Um. Encyc.* i. 810.—Reg. Caucas.; Sibir.
lalciformis, *Desf. Emend. Atl. ex DC. Astrag.* 176.—Algeria.
wlcineUus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 63.—Aegypt.
*«lconeri, *Bunge, Astrag.* i. 4; ii. 2.—Tibet, ore.
f«Uax, Fisch. in BulL S6c. Nat. Mosc. xxvi. (1858) IL 340 = mesoleios.
*)**> *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 362.—Mexic.
Wus, *Bung,, in Mem. Sat. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 276 *{PI. Lehm.* 108).—Turkestan.
«*ciculaius, *Bertol. in Nov. Comm. Bonon.* vi. (1844.), 23—Hab. I
wsciculifolius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. U. 73.—Persia,
fetidiosus, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* n. 4 (1885) 186.—Calif.
•Mmensis, *Hochst. ex Bunge, Astrag.* ii. 16.—Arabia; Beluchist.
J Fldri, *A. Gray. PL Wright,* ii. 44.—NN Mexic.
fenzlii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 89.—Cilicia.
•wrugineus, *C. Gay. Fl. Chil.* ii. 114.—Chili.
fifgineus, Boiss. Diagn. Ser. 1. ix. 89=gossypinu*.
h'amentosus, *Bunge, Astrag.* i. 89; ii. 51.—Kurdist.
nlicaulis, *Fisch. tf Mey. Enum. PI. Turc. et Pers.* 256. TT^Re B- C»sp.; Turkest.; Afghan.
Mfolius, A. Gray, in Pacif. RaiL Rep. iv. 80=pictus.
"lifolius, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 111.—Chili.
Mformis, Poir. Encyc. Suppl. L 528 = tauricus.
far**, *Torr. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1866) 22(1—Am. bor. occ.
finitimus, *Bunge, Astrag.* L 61; ii. 102.—Persia.

ASTRAGALUS:-
Fiscker, Buhse, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1863) II. 429 = mucronifolius.
Fischerianus, Bunge, Astrag. i. 90; ii.]60=-pilodes.
flaccidus. *Bieb. Fl. Taur.* ii. 196. n. 1484.—Reg. Caucas.
flaccidus, Ledeb. Fl. Ross. i. 607=onobrychioides.
flavescens, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 64.—As. Min.
flavus, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 385.—Am. bor.
flexuosns, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* i. 141, in syn.—Am. bor.
flexus, *Fisch. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1844) 307, in nota.—Persia; Beluchist.; Soongaria.
floccosus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 61.—Persia.
floribundus, PalL Astrag. 47. t. 37-Oxytropis floribunda.
floridus, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i. 24; ii. 28.—Reg. Himal.
floridus. Scop. Delic. Insub. ii. 108 = Christianus.
flomlentus, *Boiss. if Haussk. Fl. Orient,* ii. 317.—Persia,
fodinaram, *Boiss. V Noi, ex Bunge, Astrag.* i. 121; ii. 209.—Armenia.
foetidus, Vill. Prosp. 42=Oxytropis foetida.
foliolosus, *Bunge, Astrag. i.* 74; ii. 125.—Anatolia,
follieularis, *Pall. Astrag.* 19. t 14.— As. centr.
Fontanesii, *Coss. tf Dur. ex Bunge, Astrag.* i. 75; ii. 126.-Algeria.
Forskahlei, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 101.—Aegypt.; Arab.; Syria.
fragiferus, *Bunge, Astrag.* i. 72; ii. 119.—Persia.
fragiformis, Willd. Sp. PI. iii. 1261=inflate,
fragrans, *Willd. I. c*-1294.—Oriens.
Kraxinella, *Bunge, Astrag.* i. 39 ; ii. 52.—Persia,
fraxinifolius, *DC. Astrag.* 142. n. 71.—Armenia.
Frimontii, Torr. in Pacif Rail. Rep. iv. 80=malacns, lentiginosus.
Fresenii, *Decne. in Ann. Sc.Nat.* Sir. II. iii. (1835) 268.-Arab.
Frickii, *Bunge, AstragX* 117 ; ii. 201.—Reg. Cancas.
firigidus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 219.—Am. bor.
Friwaldskianus, Boiss. Diagn.Ser. I. ii. 73 = physocalyx.
frutescens, Hort. ex Kunth, Ind. Hort. Berul. (1845) 12 = Brongniartia robinioides.
fruticosus, Asso, Oryctogn. Arag. t. 2. f. 3=Clnsii.
fruticosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 389 = tomentosus.
fruticosus, Stead. Norn. ed. II. i. 161 = Hedysaram fruticosum.
fruticosus, *Pall. Astrag.* 21. n. 24. 1.19.—Sibir. or.
fruticosus, Ledeb. K Alt. iii. 303=vimjneus.
gseobotrys, *Boiss. tfBal. in Boiss.Diagn.* Ser. II. vi. 62»—Cappadoc
Gaillardoti, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 375.—Syria.
galactites, Ledeb. Fl. Ross. i. 656, ex parte=brevifolios.
galactites, *Pall. Astrag.* 85. t. 65.—Sibir.; Dahur..
galegiformis, Hohen. Enum. PI. Elisabethpol. 250 = A. Glycyphyllos.
galegiforinis, *Linn. Sp. PI.* 756.—Reg. Cancas.
galegiformis, PalL Reise, ii. 192 = uliginosus.
galeqoides, Nutt. Gen. Am. ii. 100 - racemosus.
(Jarbancillo, *Cav. Ic.* i. 59, in textu.—Peruv.
Garbantillo, Pers. Syn. ii. 336=praec.
GananniUo, Cav. Ic. i. t 85 = Garbancillo.
Gebleri, *Pitch, ex Bong. Vert. Pfl. Saisang-Nor,* 24. t. 4.—Soongaria.
geminanus, *Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 830.—Persia.,
geminiflorus, *Humb. tf Bonpl. PI. Aequin.* i. 126.—Ecuador.
genargenteus, Moris, Stirp. Sard. Elench. 11 = sirinicus.
genicnlatus, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 186. t. 205 —Algeria,
genistoides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 97.—Afghanist.
geobotrys, *Boiss. I. c.* Ser. II. vi. 52.—Phrygia.
geocyamus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 474.—Cappadoc.
georgicus, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 42=Cephalotes.
Gerardi, *janka, in TermisB. Futetek,* viii. (1884) 310.—Europ.
Gerardianus. R. Grah. in Wall. Cat. n. 5938=Caragana Gerardiana.
gerensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 71.—Persia.
gerensis, Boiss. & Buhse, ex Bunge, Astrag. ii. 64 = spinescens.
Germanii, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 621.—Am. austr.

ASTRAGALUS.—
Geyeri.i4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 214.—Am. bor. occ.
ghilanicus, *Fisck. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 329.—Persia.
gibberosus, Berlol. in Nov. Comm. Bonon. vi. (1844) 231 (Misc. Bot. ii. 17) = Chesneya rhytidosperma.
gibbosus, DC. Prod. ii. 300=Ammotbamnusgibbosns.
Gibbsii, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 161. f. 50.-Calif.
giganteus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 370.—Am. bor.
gilensis, *Greene, in Torrey Bot. Club,* viii. (1881) 97.—N. Mexic.
Gilliesii, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 898.—Am. austr.
gilvus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 71.—Caria.
glaber, DC. Astrag. 118-fragrans.
glaber, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 66.—Am. bor.
glaber, Lam. Encyc. i. 525 = Oxytropis glabra.
glabrifolius, *Bunge, Astrag.* i. 93; ii. 167.—Afghanist.
glabhusculus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 204.—Am. bor. occ.
gladiatus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 45.—As. Min.; Syria,
glanduliferus, *Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord.* xxxiii. (1879) 39.—China,
glareosus, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* i. 151.—Am. bor. occ.
glaucacanthos, *Fisck. in Bull. Sec. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 481.—Persia,
glauciformis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 183.—Algeria.
glaucoides, S. G. Gmel. It. i. 127.121 = Coronilla varia.
glaucophyllus, *Bunge, Astrag.* i. 118; ii. 2U0.—Anatolia.
glaucus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 20S=vesicarius.
Glaux, *Linn. Sp. PI.* 759.—Hispan.; Afr. bor. occ.
Glaux, fall. Rcise, ii. 464 = A. Hypogloltis.
glidpkillos, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. (1768) 312 = A. Glyciphyllos.
globiceps, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 872.—As. centr.
globiflorus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 81.—Persia.
globigerus, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 64-hiuutus.
globosus, *Vahl, Symb. Bot.* i. 60.—Armenia,
glomeratus, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 327.—Sibir. alt.
glumaceus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 69.—Persia,
glycyphylloides, *DC. Prod.* ii. 292.—Reg. Caucas.
Glycyphyllos, *Linn. Sp. PI.* 788.—Europ. ; Reg. Caucas.; Sibiiia.
Gmelini, *Scop. Delic Insub.* ii. 109.—Europ.
Gmelini, Steud. Nom. ed. II. i. 161« Laxmanni.
gomboeformis, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Atl.* 187.—Algeria.
Gombo, *Coss. tf Dur. ex Bunge, Astrag.* i. 42 ; ii. 63.—Algeria.
Gompholobinm, *Benth. ex Bunge, I. c.* i. 39 ; ii. 50.—Beluchist.
goniatus, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 830 = hypoglottis.
gossypinus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 873.—Kurdist.; Persia.
Govanianus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5925=chlorostachys.
gracilentus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 223.—Am. bor. occ.
gracilipes, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i. 15; ii. 17.—Tibet.
gradlis, *Nutt. Gen. Am.* ii. 100.—Am. bor.
gracilis, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 609 = Stevenianos.
gracilis, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 179 = microlobus.
graecus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 57—Graeda.
Grahami, Steud. Nom. ed. II. i. 161 =vicioid«.
Grahamianus, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1853) II. 406 = Jacquemontii.
Grahamianus, Koyle, IUustr. BoL Himal. 199. t. 36. f. 2 = polyacanthus.
grammocalyx, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 52.—Persia.
granatensis, Lam. ex Steud. Nom. ed. 1.86 : ed^ II^ i^ 161-A. Poterium.
granatensis, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 177(Pugill.372) = A.Glanx. ^
grandiflorus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 229.—As. centr.

ASTRAGALUS:-
grandifiorus, Linn. Sp. PL 761 = Hedysarum grandiflorum.
grandifiorus, Pall. Astrag. 57. t. 46 =Oxytropis grandiflora.
grandiflorus.S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii.(1881-82) 370.—Am. bor.
Grantii, *Bunge, Astrag.* i. 83 ; ii. 50.—Afghanist.
graveolens, *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* n. 5929.—Reg. Himal.
Grajrii, *Parry, ex S. Wats, in Am. Natural,* viiL (1874) 212.—Am. bor. occ.
Greenei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 105. - N . Mexic.
Greggii, 5. *Wats. 1. c.* xvii. (1881-82) 343.—Am. bor. occ.
Griffithii, *Benth. ex Bunge, Astrag.* ii. 192.— Afghanist.
griseus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 86.—Persia,
gryphus, *Coss. V Dur. ex Bunge, Astrag.* i. 12; ii. 13. —Algeria,
guatemalensis, *Hemsl. Biol. Centr- Am. Bot.* i. 264. Guatemala,
gudranensis, *Boiss.* &* *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 462.—Assyria.
Guldenstaedtiae, *Bunge, Astrag.* i. 119; ii. -203.— Persia.
gummifer, *Labill. in Joum. Phys.* (1790) 46.—Syria,
guttatus, *[Soland. in) Russell, Aleppo,* ed. II. ii. 260. —Aleppo,
gymnolobus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Ifosc.* xxvi. (1853) II. 426.—Armenia.
gymnopodus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 66.—Afghanis,
gypsophilus, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 278, nomen.—Uallia.
***gyiensis,Delile, Fl. Egypt. Suppl.* 64.—Aft. bor.j Arab.;** Persia; Soongaria.
Haarbachii, *Sprun. in Boiss. Diagn.* Set. I. ii. 50.— Graecia.
haematocarpus, *Bunge, Astrag.* i. 118; ii. 201.—Reg. Cancas.
halepensis, Fisch. ex Boiss. Fl. Orient, it 274 = alepPicos.
halicacabus, *Lam. Encyc.* i. 220.—Armenia.
halicacabus, Ledeb. Fl. Ross. i. 643 = mesites.
Halleri, All. FL Pedem. i. 343 = Oxytropis foetida.
Hallii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 224.— Am. bor. occ.
Halodendron, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) II. 21.—As. temp.
hamatus, Lam. ex Willk. & Lange, Prod. El. Hisp. iii. 271 = A. Stella.
hamosus, Balansa, ex Bunge, Astrag. ii. 17=commixtus.
hamosus, Kotschy, ex Bunge, Astrag. iL 14-^amoceras.
hamosus, *Linn. Sp. PI.* 758.—Reg. Mediterr.; Transcauc ; Ind. bor. occ
hamosus. Pall. Reise, iii. 653=reduncns, trimestris.
Hancockii, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 471.—China bor.
harpilobus, Boiss. Fl. Orient, ii. 234, in syn. «• gyzensis.
Hartwegi, *Benth. PI. Hariw.* 10. n. 53.—Am. bor. occ.
hasbeyanns, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 77.—Syria.
Hauarensis, Boiss. 1. c. Ser. I. ix. 63=gyzensis.
Hausknechtii, *Bunge, Astrag.* i. 49; ii. 77.—Cataonia.
Haydenianus, *A. Gray, in Brandegee, Fl. S. W. Col.* 235.—Am. bor. occ.
hedysaroides,lAmi. Sp. PI. 756 - Hedysarom obscuram.
hedysaroides, Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr. viL 265 =A. Onobrychis.
hedysaroides, Willd. Sp. PI. iii. 1264=macrostachys.
heldaviensis, Lerch. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853) 19 = A. Cicer.
Heldreichii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 48.—As. Min.
hellenicus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 292.—Graecia.
Helleri, *Fenml, in Bonplandia,* viii. (1860) 56.— Mexic.
Helmŭ, *Fisch. ex DC Prod.* iL 301.—Mont. Ural.
helminthocarpus, Vill. Prosp. 42=depressus.
hemiphaca, *Kar.* 6* *Kir. in Bull. Soc. Nat. Ifosc.* xv. (1842) 828.—Sibir.
Hemsleyi, *Aitch. (f Baker, ex Aitch. in Joum. Linn. Soc.* xix. (1882) 168.—Afghanist.
Hendersoni, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 120.— Tibet, occ.
heratensis, *Bunge, Astrag.* i. 83; ii. 145.—Afghanist.
hermoneus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 94.—Syria,
heterodoxus, *Bunge, Astrag.* i. 58; ii. 88.—Persia.

ASTRAGALUS:-
Heydei, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 118.— Tibet, occ.
hians, Jacq. Coll. i. 87=Oxytropis deflexa.
hilaris, *Bunge, Astrag.* i. 89; ii. 168.—Syria,
himalayanus, *Klotisch, in Bot. Ergeb. Waldem. Seise,* 160.—Reg. Himal.
himalayensis, Hort. Par. ex Bunge, Astrag. ii. 82 = chlorostachys.
himalayensis, Jacqaem. ex Heynh. Nom. ii. 52=aeq.
himalensis, Jacquem. ex Baker, in Hook. FL Brit. Ind. ii. 128=chlorostachys.
Hinkei, SadL ex Bunge, Astrag. ii. 217=argen tens.
hippocrepidis, Benth. ex Bunge, 1. c L 5; ii. 8.— Afghanist.
hippoglossus, St Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 120=hypoglottis.
hirsutisEimus, *DC. Astrag.* 119. t. 19.—Syria,
hirsntus, *Vahl, Symb. Bot.* i. 59.—As. Min.·
hirtellus, Ledeb. Fl. Ross. L 606=viciaefolius.
hirticalyx, *Boiss. (f Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 380.—Kurdistan.
hirtulus, Ledeb. Fl. Ross. i. 606=viciaefolius.
hirtus, *Bunge, Astrag.* i. 64 ; ii. 87—Persia,
hispanicus, *Coss. ex Bunge, I. c.* i. 135; ii. 281.— Hispan.
hispidulns, *DC. Astrag.* 182.113.—Arabia.
hispidulus, Michx. ex Steud. Nom. ed. I. 86 = gumroifer.
hispidus, Labill. Ic. PI. Syr. Dec i. 18=barbatus.
Hoantchy, *Franch. PI. Dam'dian.* i. 86 —As. or.
Hohenackeri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 70.—Reg. Caucas.
holargyreus, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pétersb. -vii. (1851) 278 (PL Iehm. 97) =Schrenkianus.
hololeucus, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 59.—Persia,
holopsilus, *Bunge, Astrag.* i. 56; ii. 93.—Persia,
holopterus, *Turn, ex Bunge, 1. c.* L 98; ii. 170.— Sibiria.
holosemius, *Bunge, 1. e.* i. 55; ii. 89.—Persia.
Hookerianus, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1086=ervoides.
Hookerianus, *A. Gray, Proc. Am, Acad.* vi. (1864) 215.—Am. bor: occ
horiiontalis, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 406=Arbuscula.
Homii, *A. Gray, in Proc Am. Acad.* vii. (1868) 398. —Am. bor. occ.
horridus, *Boiss. Diagn.* Ser. LU. 66.—Persia.
horridus, Willd. ex Bunge, Astrag. ii. 186=arnacantha.
Hosackiae, *Greene, in BulL Calif. Acad.* L n. 3 (1885) 157.—Calif,
hosaclcioides, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit.* *Ind.* iL 128.—Reg. Himal.
hostilis, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 806.—Belnchist.
Howelli, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 46. —Am. bor.
Huetii, *Bunge, Astrag.* L 87; ii. 49.—Sicilia.
Humboldtii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 195.—Am. bor.
humifusus, Jacquem. ex Baker, in Hook. £ Fl. Brit. Ind. ii. ll»=subumbellatus.
humifusus, Willd. Sp. PI. iii. 1286=viciaeiblius.
humilis, *Bieb. FL Taur. Cauc.* iL 203.—Reg. Caucas.
humilis, Geyer, ex Hook. Lond. Joum. BoL vi (1847) 211=Shortianus.
humilis, Willd. ex Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 83 = Lamarckii.
humillimus, *A. Gray, in Brandegee, Fl. S. W. Col.* 285.—Am. bor, occ
humistratus, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 43.—Am. bor. occ
hyalolepis, *Bunge, Astrag.* i. 106; ii. 185.—Reg. Caucas.
hybernus, Ehrenb. ex Bunge, 1. c. ii. 81 = birsutissimus.
hybridus, S. G. Gmel. It i. t 18 = flaccida.
hybridus, Willd. ex Ledeb. FL Ross. i. 628=vesicaiius.
hymenocalyx, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 55.—Persia.
hymenocarpus, Fisch. ex Bunge, Astrag. ii. 95 = chartaceus.
hymenochlaenus, Fisch. ex Bunge, 1. c. 4. 88; ii. 5 1 ' angustiflorus.
hymenocystis, *Fisch.* b* *Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvù (1853) II. 449.—Persia,
hymenostegis, *Fisch. (f Mey. 1. c.* **448.—**Persia.

ASTRAGALUS:—
hypogaens, *Ledeb. Fl. Ross. Alt.* t. 95; *Fl. Alt.* iii. 329.—Sibir. alt.
hypoglottis, Brot. Phytogr. t. 60=pentaglottis.
hypoglottis, *Linn. Want.* 274.—Reg. bor. temp.
hypoglottis, Desf. Fl. Atlant. ii. 183-A. Glaux.
hypoglottis, DC. Astrag. 118 = danicus.
hypoglottoides, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 124.-Tibet. occ.
hypoleucus, *Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 747.— Mexic.
hypoxylus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 192.—Am. bor. occ.
hypsogeton, *Bunge, Astrag.* i. 82; ii. 140.—Persia.
hyrcanus, Kar. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1839) 152 = A. Ammodendron.
hyrcanus, *Pall. Astrag.* 25. t. 22.—Reg. Casp.
Hystrix, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 403.—Persia,
ibicious, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* iL 293. —Persia.
ictericus, *Dingl. in Flora,* lxiv. (1881) 881.—Thracia.
idaeus, *Bunge, Astrag.* i. 107; iL 187.—Ins. Creta.
iliensis, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) II. 20.—As. temp.
aiyricus, [Bemh.] Sel. Sem. Hort Erf. (1836).—Cf. Linnaea, xii. (1838) Litt 74 = Wulfenii.
immersus, *Baker, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xviii- (1881) 45.—Afghanist
impressus, Ehrenb. ex Bunge, Astrag. ii. 19-pertgrinus.
inarius, Pall. Astrag. 94. t 77. f. 2=Oxytropis inaria.
incanus, Chaub. ex Bunge, Astrag. ii. 202 — Chaubarti.
incanus, Gilib. Fl. LUhuan..ii. 112=arenarius.
incanus, *Linn. Syst.* ed. X. 1175.—Gall, austr.
incanus, Fall. Astrag. iii. t. 84 = brachycarpus.
incanus, Sib'th. & Sm. FL Grace, t. 732 = Spruneri.
incanus, Siev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 692=Oxytropis argentata.
incanus, Wulf. in Jacq. Coll. i. 320=Wulfeni.
incertns, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 647.—Reg. Caucas.; Armenia,
inconspicuus, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 126. —Reg. Himal.
incurvus, *Desf. Ft. Atlant.* ii. 182. t. 103.—Hispan.; Afr. bor. occ.
incurvus, Reichb. FL Germ. Excurs. 512 = Wulfeni.
inderiensis, *Claus, in Beitr. Pfi. Russ. Reich,* viii. 64. —Rosiia.
indigoferoides, Horan. ex Bunge, Astrag. ii. 21 = capillipes.
ineptus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 525=lentiginosus.
infestus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 95.—Afghanist.
infinnus, *Steud. Nom.* ed. II. L 161.—Chili,
inflatus, *DC. Astrag.* 90. n. IS.—Desert. Kirgh.
inflatus, *GilL ex Steud. Nom.* ed. II. i. 161.—Chili,
inflexus, *Dougl. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 256.—Am. bor. occ.
insularis, *Kellogg, in Bull. Calif. Acad.* n. i. (1884) *6.* —
intarrensis, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xv. (1883) 258.—Turkest.
intermedius, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 53=commixtus.
intermedius. *Host, Fl. Austr.* ii. 361.—Europ.
intermedius, *Kar. if Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 340.—Dahuria.
interruptus, Benth. ex Bunge, Astrag. ii. 10 » ammophilus.
iodanthus, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 70.—Am. bor. occ
iodotropis, *Boiss. V Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 100.— Persia.
iranicus, Bunge, Astrag. i. 66; ii. 92=mollis.
ischredensis, *Bunge, I. c.* i. 37; U. 47.—Persia.
isetensis, Hort. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 783 - falcatus, faloiformi*.
isopetalus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 67 = kahiricus.
ispahanicus, *Boiss. 1. c.* Ser. I. ii 52.—Persia,
ispirensis, *Boiss. tf Huet, 1. c.* Ser. II. ii. 26.—Armenia.
Jacquemontii, Bunge, Astrag. i. 44; iL 68=polyacanthus.
janthinus, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 828. —Persia.
Jaubertianus, *Boiss. Fl. Orient.* iL 24.—Phrygia.
Jaubertianus, Bunge, Astrag. i. 90; ii. 160 =»macroptUus.

ATOHAOALUS:—

W C'a f Watsn Bot Kingt Exp. 78, 442.—Am.
jenisiensis, Less. ex Bnge Astrag. ii. 188 = semibilocularis.
jesdianus, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 61.—Persia.
Jessenii, Bunge, Astrag. i. 61 —Persia.
jodos Na. Mosc. xit. (1860) 60.—Persia.
Johann
52 *••«• '• '• «* 104—Persia; Afghan.
junceus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864) 280. —Am. bor. occ.
ju^ us, ^ deb m Spren S- Sy8'-ifl- 297=Stevenianus. Aegypt.
kadschorensis, Bunge, Astrag. i. 108; ii. 182.—Reg. Cauci
kahi DC. Pros r. ii. 292.—Aegypt; Arab.; Persia; A
kapherrianus, Fisch. in BulL Soc Nat Mosc. xxvi. (1858) II. 446 = persicus.
karabaghensis, Bunge, Astrag. i. 98; ii. 165.—Persia.
karakugensis, Bunge in Arb. Naturf. Ver. Riga, i. (1847) 282.—As. Min.
karamasicus, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. U. vi. 50= orthodontus.
Karelini, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1839) 152 = communxtus.
karpatanus, Boiss. ATy*. Ser. II. ii. 26—Armenia.
karsian *> Bung, Astrug. ii. llB.-AnnenU.
kashe mi S " 4 ' Ung L o_ " 2i6 ' Indel = cali kellalen Boiss 5 Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 388.
J8S Buhse, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. TSP 412.—Persia.
trophyte, 4. Gray, in Proc. Acad. Philad. (1868) ke Am. bor. occ.
Ke*v!? 1S \?*'f**' ^**«W- »• 73 i a. 122.—Persia. ii. (1860) i. 2 Soongaria.? ' **• Nat Utsc mi ngii, Bunge, Astrag i- 82; ii. 189,-Peisia. us, Benth. ex Bunge 27 ; a. 82.-Reg. Himal.
kirghisicus, Stschegl. in BuB. Soc. Nat. Mosc. xxvil (1854) i. 161 = tribuloides.
kirrindicus, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 32.—Persia.
kobarensis, Bunge, Astrag. i. 116; ii. 196.—Mongolia.
kohistanus, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 254.—Turkest.
kohrudicus, Bunge, Astrag. i. 67 i il 109.-Persia.
kokandensis, Bunge, Astrag. ArfscA. 216.—As. temp.
k in Hook. f. aalm> bor occ
KoroliT WU A n1 ils ra Fedsch. 220.—As. temp.
koschtensis, Boiss. Fl. Orient. ii. *92.-Afghan.
Kc anus, Boiss. Diagn. Ser. 1 « ". - syria; Mesopotam.
Kotschyanus, Fisch Bnnge Astn ii. 19 =tnber culosus.
Krauseanus, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1876) 104.—Turkestan.
kuhistanus, Bunge, Astrag. 82 i « 1 « P « sia.
kuldschensis, Bunge, in Act. Hart. Petrop. rii. (1880) 874 Turkestan.
kuramensis, Baker, in Journ. Linn Soc ^ (1881) 46.—Afghan.
kurdicus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 84.-Kurdistan; Syria.
kurrum Petrop. vii. (1880)
kUrt :~Afghan.
. i. 189; ii. 236.—
labradoricus, DC< Prod »• 287»alpinus.
lacteus, Heldr. r. II. ii. 31. —Graecia.
lactiflorus, Ledeb Fl Alt iu S88=testiculatus.
laetus, Bunge, A**rag- i. 84; ii. 41.-Afghan.
lagocephalus, Math. Acad. "*«»*»• >I (1844) 197.—As. temp.
lagonyx, Fisch. in Bull. S x. Nat. osc. xxvi (1863) II. 364.—Persia.
lagopodioideU V « ". Symb. Bot i. 64=Iagopoides.
lagopoides, Bun =uranioliinneus.

ASTRAGALTTS:-

lagopoides, Lam- Encyc. i. 822.—Armenia.
Lagowskii,7ra»ro. in Bull. Phys.-Matk. Acad. Pitersb. xyi. (18S8) 824.—Armenia,
iagnroides, Pall. Reise, iii. 760.—Sibir.
Lagurus, Eichw. Casp. Cane. 631=persicus.
Lagurus, PalL Astrag. 18.1.16-Iagnroides.
Lagums, Willd. in Mim. Acad. Berl. (1794-95) 28.—Reg. Caucas.; Persia.
Lamarckii, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 82.—As. Min.
Lambertii, Spreng. Syst iii. 808=Oxytropis Lambertii.
lanatns, Laiill. Ic. PI. Sar. Syr. i 21. t. 11.—Syria.
lanatus, Pall. Astrag. 108. t. 81=Oxytropis Pallasii.
lancearius, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xiii. (1878) 870.—Am. bor.
lanceolatus, Bunge, Astrag. i. 85; ii. 60.—Afghan.
lanceolatus, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 246=stipulate.
lanigerus, Desf. Fl. Atlant. ii. 181. t. 202.—Afr. bor.
lanigerus, Viv. Fl. Lib. Spec. 44 «• alexandrinus.
lanuginosus, CIos, in C. Gay, PI. Chil. ii. 121.—Chili.
lanuginosus, Desc. Fl. Pitt. Antill. Ind. yiii. 58 = Sophora tomentosa.
lanuginosus, Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 409.—As. temp,
laricns, Boiss. ff Hohen. Diagn. Ser. I. ix. 61.—Persia.
lasianthus, C. A. Mey. in Bong. 8c Mey. Suppl. Fl. Alt. n. 92=lasiopetalus.
lasiocaulos, Bunge, Astrag. L 88; ii. 144=pachyacanthus.
lasiocladus, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 135=bicuspis.
lasioglottis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 486.—Reg. Caucas.
lasiopetalns, Bunge, in Del. Sent. Dorp. (1889).—Cf. Linnaea xiv. (1840) Litt. 117.—Soongaria.
lasiophyllus, Ledeb. Fl. Ross. i. 627.—Oriens.
lasiosemius, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 96.—Afghan,
laaostylos, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1858) II. 367.—Turkestan.
latebracteatus, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. L 54. -macrochlamys.
lateritius, Boiss. b* Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 839.—Kurdistan.
latifolius, DC. Astrag. 285»Candolleanns.
latifolius, Lam. Encyc. i. 819.—Armen.; Persia.
laxiflorus, Boiss. Fl. Orient, ii. 418-bracteosus.
laxiflorus, Fisch. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1863) II. 390 = psilodontius.
Laxmanni, Jacq. Hort. Vind. iii. 22. L 87 = adsurgens.
Laxmanni, Nutt. Gen. Am. ii. 99 =» striatus.
laxus, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient ii. 269 s remotifolius.
Layneae, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. 8. (1885) 156.-Calif.
Lehmannianus, Bunge, in Arb. Nat. Ver. Riga, i. (1847) 252.—Turkestan.
leiocalyx, Benth. ex Bnnge, Astrag. i. 86; ii. 49 = laetus.
leiocarpus, Shnttlew. in Mag. ZooL ft Bot. ii. (1888) 620=exscapns.
ldoclados, Boiss. Diagn. Ser. I. il. 62.—Persia,
leiolobus, Bunge, Astrag. i. 14 ; ii. 15.—Persia,
leiophysa, Bunge, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 104.—Turkestan.
Lemmoni, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viiL (1873) 626.—Am. bor. occ.
lentiformis, A. Gray, in Bot. Calif, i. 166.—Calif,
lentiginosus, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 151.—Am. bor. occ.
leontinus, Wahlenb. FL Lapp. 191. t. 12. f. 4 = oroboides.
leontinus, Wulf. in Jacq. Misc. ii. 59.—Austr.; Helv.
leontonyx, Bunge, Astrag. i. 89; ii. 157 =* oleaefolins.
lepidanthus, Boiss. Diagn. Ser. L ix. 85.—Syria,
leporinus, Boiss. I. c. Ser. II. ii. 80.—Armenia,
lepsensis, Bunge, Astrag. i. 25; ii, 29.—Soongaria.
leptacanthus, Benth. ex Bnnge, 1. c. i. 44; ii. 69 = leptocentrus.
leptacanthus, Boiss. V Buhse, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1853) II. 432—Persia.
Ieptaleus,i4. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864) 220. —Am. bor. occ

ABTBAGkAIiTJS :—

leptocarpus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 334—Texas.
leptocaulis, Ledeb. Fl. Alt. iii. 296.—Sibir. altaic.
leptocentrus, Bunge, Astrag. i. 44; ii. 69.—Reg. Himal.
leptodendron, Fisch. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) II. 845-caspius.
leptodermus, Bunge, Astrag. Fedseh. 210.—As. centr.
leptophyUus, Desf. Fl. Atlant. ii. 188. t 207—Algeria.
leptophyUus, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 18=stenophyllus.
leptophyUus, Pall. Reise, iii. 749=Oxytropis leptophylla.
leptopus, Benth. ex A. Gray, PI. Wright, ii. 43
leptostachys, Pall. Astrag. 60. t 40=suIcatus.
Uptostachys, Siev. in Willd. Sp. PL iii. 1266 = pubernlua.
leptothalamus, Boiss. ex Bnnge, Astrag. i. 185; ii. 232 ~seq.
leptothamnus, Boiss. Fl. Orient, ti. 480—Cilicia.
leptus, Boiss. I. c. 305.—Afghan.
Iessertioides,£«ifA. ex Bunge, Astrag. i. 24; ii. 28—Reg. Himal.
leucacanthus, Boiss. Diagn. Ser. I, ix. 98.—Aegypt.
leucantkus, Pall. Astrag. 59. t. 47 - Oxytropis leucantha.
lencocephalus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5928.—Reg. Himal.
leucocladus, Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxix. (1866) 27—As. temp,
leucocyaneus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 60—As. Min.
leucolachnus, Boiss. Ft. Orient, ii. 857.—Syria,
leucomallus, Phil, in Linnaea, xxx. (1859-60) 186—Am. austr.
lencomelas, Bunge, Astrag. i. 32; ii. 88.—Afghan,
leucophaeus, Sm. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 252. —Sidlia.
leueophyllus, Hook. Loud. Joum. Bot vi. (1847) 211 =
leueophyllus, Torr. V Gray, Ft. N. Am. L 386—Am. bor. occ.
leueophyllus, Willd. Sp. PI. iii. 1881=angustifolins.
leucopsis, Torr. Bot. Mex. Bound. 66. t. 16.—Calif.
leucoptilus, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 320.—Kurdistan.
leucospermus, Bunge, in Arb. Nat. Ver. Riga, i. (1847) 260=A. Alopecias.
libanoticus, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 87=A. Echinus.
Libonotis, Willd. Sp. PI. iii. 1808=lanatus.
lignosns, DC. Astrag. 176. t. 39.—Sibiria.
lilacinus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 42.—Persia.
Lindheimeri, Engelm. ex A. Gray, PI. Wright, i. 62. —Am. bor. occ.
linearifolius. Pen. Syn. ii. 336= A. Onobrychis.
linearius, Willd. Sp. PL iii. 1302=Oxytropis inaria.
lineatus, Lam. Encyc. i. 314.—Armenia.
Listoniae, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 87.—Anatolia,
lithophilus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 844.—Soongar.
litoreus, Phil, in Linnaea, xxxiiL (1864-66) 47—Chili,
litostachyus, Boiss. to" Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 360.—Oriens; Kurdistan.
Hindus, Monb. ex Bunge, Astrag. ii. 19—tuberculosns.
lobophorus, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 31.—Persia. •
lonchocarpus, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 80.—Am. bor. occ.
longebracteatus, Steud. Nom. ed. II. i. 182—sanguinolentus.
longicaulis,5o*«-, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. ii. 129.—Kashmir,
longicaulis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH. 185—Algeria.
longicuspidatus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, viL (1880) 120=longicuspis.
Iongiscuspis, Bunge, Astrag. i. 121; ii. 211.—Reg. Caucas.
longiflorus, Delile, Fl. Egypte, 256, t. 89-kahiricus.
longiflorus, Gilib. Fl. Tithnan. ii. 111=A. Onobrychis.
longiflorns, Pall. Astrag. 73. t. 60.—Reg. Casp.
longifolins, Lam. Encyc. i. 322.—Armenia.
longifolius, Boiss. ft Heldr. ex Boiss. FL Orient ii. 480

ASTHAQAI.TJB:—
longipes, Stead. Nom. ed. II. i. 162—rnpifntgas.
longipes, Kar. & Kir. in Ball. Soc. Nat MOBC. (1841) 405-macropterus.
longirostrus, Poir. Encyc. Sappl. i. 528=Oxytropis longirostra.
longistyrus, *Bunge, Astrag.* i. 81; ii. 187.—Persia,
lotiflorus, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 152.—Am. bor. CCC.
lotoides. Lam. Encyc. i. 816 = sinicua.
lunatus, Gilib. Fl. Lithnan. ii. 110—glycyphyllos.
lunatus. *Pall. Astrag.* 44.—Persia,
lnpnlinus, *Pall. Seise*, iii. 750.—Sibiria.
lusitanicus, *Lam. Encyc. i.* 812.—Reg. Mediterr.; As. Min.
luteo-caeruleus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1878) 47.—Afghanist.
luxuriant, *Bunge, Astrag. i.* 28 ; ii. 25.—Sibir.
Lyalli, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 196.—Am. bor. occ.
lycioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 66.—Persia,
lycius, *Boiss. 1. c.* ix. 45.—Lycia.
lydius, Boiss. 1. c. ii. 43 = leucocyanens.
lydius, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxvi. (18B8) II. 893=amphilogus.
macranthus, Willd. ex Ledeb. FL Ross. i. 650= brachycarpus.
macrobotrys, *Bunge, Astrag.* i. 129; ii. 226.—Persia,
macrocarpus, *DC. Astrag.* 143. t. 28.—Syria.
macrocarpus, Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1776) 56 =subulatus.
maerocephalus, *Willd. Sp. PL* iii. 1260.—As. Min.; Syria.
macroceras, C. A. Mey. ex Bong. Vert PfL Saisang-Nor, 24=macrolobus.
maciochlamys, *Boiss. ex Bunge, Astrag.* L 49 ; ii. 77.—As. Min.
macrocladus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 293.—As. centr.
macrodon, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 216.—Am. bor. occ.
macrolacis, Boiss. & Buhse, in Nonv. Me'm. Soc Nat. Mosc. xii. (1860)63=stenolepis.
macrolobus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 498.—Sibir. altaic.
macrolobus, Bunge, Ennm. Alt. 70=macroceras.
macrolobus, Ledeb. Fl. Alt. iii. 807 = eriolobus, chaetolobus.
macronyx, *Bunge, Astrag. Fedsch*, 286.—As. centr.
macropelmatns, *Bunge, Astrag.* i. 36 ; ii. 43.—Persia,
macropetalos, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1844) 307.—As. temp.
macropodius, Fisch. in Ball. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1863) II. 8S2=aureus.
macropterus, *DC. Prod.* ii. 283.—Tibet, occ.; Sibir.
macroptilns, *Boiss. ex Bunge, Astrag.* i. 90; ii. 160.—Phrygia.
macropus, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 61=macroscepus.
macropus, *Bunge, in Arb. Nat. Ver. Riga*, i. (1847) 238.—As. med.
macrorrhizus, *Can. Ie.* ii. 28. t. 138.—Hispania.
maerorrhinis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 245 = Donianus.
macroscepus, *Boiss. in Bunge, Astrag.* i. 49 ; ii. 77.—Cappadocia.
macrosemius, *Boiss.* 6" *Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 98.—Persia.
macrostachys, *DC. Astrag.* 141. t. 15.—Armenia,
macrotropis, *Bunge, Astrag.* i. 127 ; ii. 228.—Soongaria.
macronrus, *Fisch. (f Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 346.—Reg. Caucas.; Persia,
maculates, *Bunge, Astrag.* i. 119 ; ii. 206.—Persia.
maculatustiam. Encyc. I. 816 = annularis.
Maddenianus, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 127.—Reg. Himal.
majellensis, Huet, ex Nym. Consp. 198=australis.
malacensis, Salzm. ex Bunge, Astrag. ii. 12=sesameus.
malacophyllus, *Benth. ex Bunge, 1. c.* i. 36 ; ii. 61.—Reg. Himal.
malacophyllus, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 307=galegiformis.
malacotrichus, Fisch. & Kotschy, ex Bunge, Astrag. ii. 164 = Roussaeanus.
malacus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 336.—Am. bor. occ.
mareoticus, *Delile, Fl. Egypt.* 257. t. 39. f. 8.—Aegypt.
maritimus, *Moris, Fl. Sard.* L 528.—Sardinia,
maroniensis, *Dingl. in Flora*, lxiv. (1881) 882.—Thracia.

ASTBAOALUS:-
maroniticus, Boiss. & Balansa, Diagn. Ser. II. v. 68 = drusorum.
marosportensis, Lerch. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1863) 19-dasyanthus.
Marschallianus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 828.—Oriens; Reg. Caucas.
marusiensis, Lerch. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (,1858) 19=arenarius.
masanderanus, *Bunge, Astrag.* i. 114; ii. 193.—Persia.
massiliensis, *Lam. Encyc.* i. 320.—Gallia.
Matthewsii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-88) 192.—Am. bor.
mauritanicus, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1856) 673.—Algeria,
mauritanicus, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* iv. (1832) 267.—Algeria.
Maximowiczii, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 379.—Rossia.
maximus, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. L 162=A. Onobrychis.
maximus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1258.—Reg. Caucas.; Armenia.
Maxwellii, Royle, IUustr. Bot. Himal. 199 = tibetanus ?
medicagineus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 42 = Kotschyanus.
medius, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* ii. (1843) 196.-Soongaria.
medullaris, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 66=graveolens.
megacarpus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 215.—Am. bor. occ.
megalanthus, *DC. Astrag.* 131. t. 20.—Sibir.
megalocystis, *Bunge, 1. c.* ii. 122.—Persia,
megalomerus, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 879.—As. centr.
megalotropis, C. *A. Mey. ex-Bunge, Astrag.* i. 60; ii. 99.—Reg. Caucas.
melaleucus, *Bunge, Astrag.* ii. 100.—Persia,
inelanocalyx, *Boiss. in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 59.—Persia.
melunocarpus, *Bunge, Astrag.* i. 51; ii. 81.—Oriens.
melanocarpus, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 150.—Am. bor.
melanocarpus, Richards. App. Frankl. Journ. ed. IL 87=missouriensis.
melanocephalus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 60.—As. Min.
melanodon, *Boiss. 1. c.* Ser. I. vi. 36.—Persia,
melanophrurius, *Boiss. Fl. Orient*, ii. 276.—Cappadoc.
melanostachys, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i. 21; ii. 22.—Reg. Himal.
melanotrichus, Boiss. ex Bunge, 1. c. ii. 188=cataonicus.
melanotrichus, *Ledeb. Fl. Alt.* ifi. 828. — Sibir. altaic.
melilotoides, *Pall. Voy.* t. 33; *Desc.* iii. 748.—Sibir.; China.
melinus, *Boiss. Fl. Orient*, ii. 446.—Cappadocia.
melitenensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 43.—Cappadocia.
membranaceus, *Bunge, Astrag.* i. 26; it 30.—As. temp.
membranaceus, Moencb, Meth. 167=trimestris.
Menziesii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 217.—Calif.
Mercklinii, *Boiss.* to" *Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 70.—Persia,
meridionals, *Bunge, Astrag.* i. 61; ii. 104.—Persia.
meschedensis, *Bunge, 1. c. i.* 82 ; ii. 140.—Persia,
mesites, *Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 66.—Armenia.
mesogitanus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 41.—As. Min.
mesoleios, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 63=radkanensis.
mesoleios, *Boiss. (f Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 91.—Persia.
mesopotamicus, *Boiss. I. c.* ii. 68.—Mesopotam.
mesopterus, *Griseb. Spicil. Ft. Rumel.* i. 49.—Macedon.
mexicanus, A. Gray, PI. Lindh. 176 = plattensis.
mexicanus, *A. DC. PI. Nov. Hort. Geniv.* v. 17.—Am. bor.
Meyeri, *Boiss. Diagn.* Ser. L ix. 88.—Armenia.
Michauxianus, *Boiss. 1. c.* ii. 62.—Kurdistan,
micracme, *Boiss. ff No?, 1. c.* Ser. II. v. 87.—Armenia,
micrancistrus, *Boiss.* to" *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 476.—Oriens; Assyria,
micranthellus, *Wedd. Chlor. And. I* 262.—Peruv.
micranthus, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 78.—Hab. t

A8THAOALTTS:—
micranthus, Nutt in Joum. Acad. Philad. ii. (1821) 122 = Nuttallianus-
micranthus, PalL ex Ledeb. Fl. Ross. i. 637 = striatellus.
microcarpus, *DC. Astrag.* 104.—Sibir.
microeephalus, *Willd. Sp. PL* iii. 1882.—As. Min.
microcystis, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 806.—As. centr.
microcystis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 220.—Am. bor. occ.
microdontus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1S81) 46.—Afghan,
microlobus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 203.—Am. bor.
microphyllus, Bess, ex Steud. Nom. ed. II. i. 162=A. Onobrychis.
microphyllus, Georgi, Beschr. Ross. Reich. Nachtr. 296=adsurgens.
microphyllus, *Linn. Sp. PI.* 757.—Sibir.
microphyllus, Jacqnem. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 184 = cicerifolius.
microphyllus, Pall. Astrag. 92. t. 76=Oxytropis microphylla.
microphyUus, Schuebl. & Martens, Fl. Wuertemb. 474 =A. Cicer.
microphysa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 71.—Persia,
micropterus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 896.—Anatolia,
microrchis, *Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.* xxi. (1888) 95.—Helvetia,
microthamnus, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 393.—Assyria.
miniatus, *Bunge, Astrag.* i. 98; ii. 169.—Mongolia.
minimus, DC. Astrag. 64=alpinus.
minimus, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1848) 18.—Peruv.
minor, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 107.—Chili,
minutissimus, *Wedd. Chlor. And.* ii. 257.—Peruv.
minutus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 58=tribuloides.
minutus, Buhse, ex Bunge, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xv. (1869) n. I. ll=biovulatus.
mirpoureanus, Camb. in Jacquem. Voy. Bot. 39. t. 46 = Gueldenstaedtia mirpourensis.
miser, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 152.—Am. bor. occ.
missouriensis, *Nutt. Gen. Am.* ii. 99.—Am. bor.
Mitchellianus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 80.—Phrygia.
mixtus, Bieb. Cent. PI. Rar. i t. 26 = vesicarius.
modestus, *Boiss.* &" *Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 75.—Persia.
modestus, *Wedd. Chlor. And.* i. 263.—Am. austi.
Moellendorffii, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 472.-China bor.
mogollonicus, *Greene, in Torrey Bot. Club*, viii. (1881) 97.—Calif,
mohavensis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 361.—Am. bor. occ.
mokiacensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 367.—Am. bor. occ.
moldavicus, Steud. Nom. ed. I. 87=A. Onobrychis.
mollis, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 495.—Reg. Caucas. Persia.
mollissimus, Presl, Bot Bemerk. 57=bethlemiticus.
mollissimus, *Torr. in Ann. Lye. N. York*, ii. (1828) 178.—Am. bor. occ.
monadelphus, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxiv. (1878) 82.—China.
monanthemus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 78.—Persia,
mongholicus, *Bunge, Astrag.* i. 25; ii. 80.—Mongolia,
monophyllus, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 473.—Mongolia.
monspessutanus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 60 = Wulfeni.
monspessnlanns, *Linn. Sp. PI.* 761.—Europ. austr.; Reg. Cauc.
montanus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 197 = Oxytropis cyanea.
montanus, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 429 = Oxytropis pyrenaica.
montanus, Linn. Sp. PI. 760=Oxytropis montana.
montanus, Pall. Reise, iii. 199 = Oxytropis uraleusis.
montanus, Brot. ex Steud. Nom. ed. I. S7 = macrorrhizus.
montanus, Jacq. Fl. Austr. 131=alpinus.
monticola, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 47." Chili.

A8TKAOALTJ8:—
Moorcroftianus, R. Grah, in Wall. Cat n. 6938 = Sophora Moorcroftiana.
Mortoni, *Nutt. in Journ. Acad. Phil.* vii. (1884) 19.—Am. bor. occ.
mossulensis, *Bunge, Astrag.* i. 101; ii. 177.—Persia j Mesopotam.
mucidus, *Bunge, ex Boiss. PI. Orient,* ii. 279.—Turkestan.
mudferus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 223.—As centr.
mucronatus, *DC. Astrag.* 140. t. 26.—Armenia,
mucronifolius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 68—Persia.
MuelUri, Slend. & Hochst in Flora, x. (1827) 72 = A. Onobiychis.
nugodsharicus, Bunge, Astrag. i. 124 J ii. 216=mugosaricus.
mugosaricus, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga,* i. (1847) 236.-Trknsural.
multicaulis, *ledei. Fl. Alt.* iii. 296.—Sibir. altaic et baical.
****licaulis,* Nutt. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 336 -pubbentissimus.
nullHiulis, Turez. in Bull. Soc Nat. Mosc. (1838) »0=bifidus.
multiceps, *Wall. Cat.* n. 6237 i *Bunge, Astrag.* ii. 69.—Reg. Hiraal.
ttultiflorns, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 226.—Am. bor. occ.
mnltijugns, *DC. Prod.* ii. 301.—Mesopotam.
Munroi, .»,„«. *ex Bunge, Astrag.* i. 30; ii. 85.—Reg. Himal.; Kashgar.
nuiradicus, *Bunge, I. c.* i. 90; ii. 161.—Phrygia.
muricatus, Pall. Astrag. 89. t7S=Oxytropis muricata.
nmrinus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 72.—Persia,
muschianus, *Kotschy V Boiss. ex Boiss. Fl. Orient,* ü. 857.—Armenia.
mutabilis, Boiss. Fl. Orient, ii. 448 -paedlanthus.
nutabilis, Jacquem. ex Baker, in Hook. f. FL But. Ind. a. 126=strictus.
ttyriacanthus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 91.—Persia,
myriophyllns, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 282.—As. centr.
nyriophyllus. Pall. Astrag. 87. t. 71-Oxytropis "synonyma. nivfiorigiiia.
"anodes, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 877.—Turkest.
nwns, *DC. Astrag.* 114. t. 17.—Cilicia; Syria,
narbonensis, *Gouan, Illustr.* 49—Gallia; Hispan.
narbonensis, PalL Astrag. 18. t. 10=ponticus.
**arbonensis,* C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 148 = megalotropis.
wbrodensis, Presl, ex Steud. Norn. ed. II. i. 162= Boissieri.
"eglectus, *Fisch. ex Steud. I. c*—Sibir.
nematodes, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 425.—Turkestan,
ner,vistipulns, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* 0. 884.—Kurdistan.
neurocarpus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 59.—Syria,
neurophyllus. *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xv. (1883) 260—Turkest
nevadensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. it 68.-Hispan.
Newberryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 65.—Utah.
nicharensis, *Bunge, Astrag.* i. 39; ii. 50.—Beluchist.
***grescens,* A. Gray, in Am. joura. Sc. Ser. H. xxxiu. .(1862) 410-multiflorus.
™*grescens,* Nutt. in Joum. Acad. Philad. Ser. II. 1. .1*847) 153=didymocarpus.
***grescens,* Pall. Astrag. 65. t. 58=Oxytropisnigrescens.
*>*grostriatus,* C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 719 = ornithopodioides.
H'tens, Boiss. & Buhse, in Nouv. *Him.* Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 61=viridis.
"'"ens, *Boiss. &• Heldr. Diagn.* Ser. I. ix. 61.—As. Mm.
»«ens, *Host, Fl. Austr.* ii. 362.—Europ.
nihdus, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. L 149 = adsurgens.
nivalis, *Kar. &• Kir. in Bull. Soc. If at. Mosc.* xv. (1842) .841—Tibet, occ.; Soongaria.
"""«, Coq. Monbr. ex Bunge, Astrag. u. 189 = ^PeW'Rer.
«°aeanus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 24-Armema.
oodiflorus, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1866) II. 147.-Rossia.
Nuttallii, *Nutt. in Journ. Acad. Phil.* vU. (1834) 19.—Am, bor.
Borvegicus, *Graver, Dec.* 13.—Norvegia.

ASTBAGALUBr-
nothoxys, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 282.—Am. bor. occ.
nubigenus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 245 = Caragana crassicaulis.
nnciferus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 223.—Cappadoc.; Mesopotam.
nucleiferas, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 83.—Oriens.
nudatus, Bunge, Astrag. i. 85; ii. 147-kurdicus.
nudus, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 115 (1846).—Chili,
nndus, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 74, 448.—Am. bor. occ.
nnmmularioides, *Desf. Fl. Atlant. Emend, ex DC. Astrag.* 283.—Numidia.
nummularius, *DC. Astrag.* 221. t. 2. f. 2.—Ins. Creta.
nummularius, Deaf. Fl. Atlant. ii. 182=nummularioides.
nummularius, Lam. Encyc. i. 817=pinetornm.
nummularius, C. A. Mey. ex Bunge, Astrag. ii. 57 = talyschensis.
nurensis, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosci* xii. (1860) 58.—Persia.
Nuttallianus, *DC. Prod.* ii. 289.—Am. bor. occ.
obcordatus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 88 =anacardius.
obcordatus, *Ell. Sketch,* ii. 227.—Am. bor.
oblongifolius, *Clos, in C. Gay.Fl. Chil. ii.* 109.—Chili,
obscurus, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 69, 437.—Am. bor. occ.
obtusifolius, *DC. Prod.* ii. 296.—Assyria.
obvallatus, Ehrenb. ex Bunge, Astrag. ii. 149 = cruentifloms.
obvelatus, Ehrenb. ex Bunge, 1. c. ii. 168=drusorum.
ochreatus, *Bunge, 1. c.* i. 127; ii. 224.—Persia.
Ochrias, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) S3.—Mongolia,
ochrobius, *Bunge, Astrag.* i. 82; ii. 141.—Persia,
ochroleucus, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 57.—Marocco.
ochroleucus, Gilib. Fl. Iituan. ii. lll-=pilosus.
ocrochlorus, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 88—Persia.
odessanus, Bess. Enum. PI. Volh. 80—fruticosus.
odoratus, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1080 in syn. = obcordatus.
odoratus, *Lam. Encyc.* i. 811.—Reg. Caucas.; Persia; Soongaria.
oleifolius, *DC. Astrag.* 192.—As. Min.
o/eifolius, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxvi. (1863) 862=aeluropns.
Olgae, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 228.—As. centr.
Olgini, Bunge, Astrag. i. 180; ii. 177 =mossulensis.
oliganthus, Horan. ex Bunge, L c. ii. 1 = complanatus.
oliganthus, Kar. & Kir. in Bull. Soc, Nat. Mosc. xv. (1842) 887 =reticulatus.
oligophyllus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 47.—Persia.
oligophyllus, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. ii. (1844) 197=unijugus.
Olimieri, Klotzsch, ex Bunge, Astrag. i. 69; ii. 115 = mesopotamicus.
olopterus, DC. Prod. ii. 284-austriacus.
olopterus, Turcz. ex Steud. Norn. ed. II. i. 162,164-versicolor.
olympicus, Bunge, Astrag. ii. 162=baibutensis.
olympicus.tam. ex Walp. Ann. iv. 614=angustifolius.
olympicus, Pall. Astrag. 4. t. 4=angnstifolius.
oncotrichus, *Bunge, Astrag.* ii. 11.—Persia.
onobrychioides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 486 = A. Cephalotes.
onobrychioides, Bunge, Astrag. ii. 188=Bungeanus.
Onobiychis, *Linn. Sp. PI.* 760.—Europ. austr.; Oriens; Sibir.
Onobrychis, Poll. Hist. PI. Palat. ii. 327=hypoglottis.
oocarpus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 213.—Am. bor. occ.
oocephalus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 56.—Syria,
oophorus, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 73, 441.—Am. bor. occ.
ophiocaipns, *Benth. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 224.—Persia; Tibet, occ.
oplites, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 134=cicerifolius.
orbicularis, Walp. Rep. i. 702=seq.
orbiculatus, *Ledei. Fl. Ross. Alt.* t. 290; *Fl. Alt.* iii. 811.—Afghan.; Turkest.; Sibir. altaic.
Orbignyanus, *Wedd. Chlor. And.* ii. 260.—Bolivia.
Orcuttianus, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1886) 361.—Calif.

ASTRAGALUS :—
oreades, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 141.—Reg. Caucas.
oreganus, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. S36.—Am. bor. occ.
orientalis, Pers. ex DC. Prod. ii. 29S=macrocephalns.
omitbopodioides, *Lam. Encyc.* i. 812.—As. Min.; Persia.
oroboides, *Hornem. in Fl. Dan.* 1.1896.—Am. bor.
orthanthus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 195—Mexic.
oithocarpus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 68.—Afghan.
orthocarpus, Dougl. ex A. Gray, in Proc Am. Acad. vi. (1864) 196=canadensis.
orthodontus, Bunge, Astrag. i. 101; ii. 178-karamasicus.
ortholobus, *Bunge, I. c.* i. 127; ii. 228—Mont Ural,
otiporensis, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 271.—Afghan,
ourmitanensis, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xv. (1888) 266.—Turkest.
oviiis, Boiss. V Bal. Diagn. Ser. IL vi. 62.—Cappadoc.
ovallensis, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 116.—Chili,
ovatus, *DC. Astrag.* 212. n. 107.—Armenia,
ovigerus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 67.—Persia,
ovinus, *Boiss. I. c.* 76.—Armenia.
Owerini, *Bunge, Astrag.* i. 106; iL 186.—Reg. Caucas.
oxyglottis, *Stev. in Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 192.—Reg. Caucas.; Persia; Turcoman,
oxyodon, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 126.—Tibet occ.
oxypetalus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 278.—As. centr.
oxyphyllus, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 376.—Syria.
oxyphyllus, PalL Astrag. 90. t. 74=Oxytropis oxyphylla.
oxyphysus, *A. Gray, in Proc. Calif. Acad.* iii. (186S) 103.—Am. bor. occ.
oxyrhynchus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. I* 265.—Mexic.
oxysemius, *Bunge, Astrag.* f. 118; ii. 202.—Anatolia,
oxytropifolius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 37.—As. Min.
oxytropoides, Bunge, in Mlm. Acad. Pitersb. Se>. VI. vii. (1859) 585; Sér. VII. xv. (1869) 185=incertus.
pacbyacanthus, *Bunge, Astrag.* i. 82; ii. 148.—Persia.
pachycarpus, Torr. ft Gray, Fl. N. Am. i. 882-caiyocarpui.
pachypus, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. n. 8. (1885) 167.—Calif.
pachystachys, *Bunge, Astrag. i.* 80; ii. 184.—Persia,
paecilanthus, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. IL vi. 64.—Phrygia.
Pallasii, *Fisch. Hort. Gorenk.* (1818) 71; *et ex DC. Prod.* ii. 305 (1825).—Deserta Casp.
Pallasii, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* (1807) 48—Rossia.
pallescens, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 489.—Bessarab.; Podol.
pallidus, Boiss. FL Orient, ii. 872=drusorum.
Palliseri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 287.—Am. bor.
Palmeri, *A. Gray, 1. c.* vii. (1868) 398.—Am. bor. occ.
pamphylicus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 289—Cilicia.
Pancicii, *Heuff. in Flora,* xxxvi. (1853) 621.—Enrop.
panduratus, *Bunge, Astrag. i.* 59; ii. 95.—Anatolia.
pannonicus, Schult. Oestr. Fl. ed. II. ii. 835=dasyanthus.
pannosus, *Fentl, in Tchihat. Ash Min. Bot.* i. 2.—Cilicia.
paphlagonicus, Bunge, Astrag. i. 121; ii. 210-atropurpurens.
paradoxus, *Bunge, 1. c.* i. 64; ii. 108.—Persia,
paralipomenus, *Bunge, I. c.* i. 81; ii. 136.—Persia,
paralurges, *Bunge, I. c.* i. 67; ii. 111.—Persia.
paraplesius, *Bunge, I. c. i.* 46; Ii. 78.—Persia.
Parishii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 76.—Am. bor.
Parnassi, *Boiss. Diagn.* Ser. L ix. 80.—Graecia; Oriens.
Parnassi, Heldr. ex Nym. Consp. 192=aristatus, cephalonicus.
parrowianus, *Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 820.—Persia.
Parryi, C. Anders. Cat. PI. Nev. 120 = malacus.
Parryi, *A. Gray, in Am. Joum. Sc.* Ser. II. xxxiii. (1862) 41O.-Am. bor. <ic.
parviceps, *Bunge, Astrag. i.* 91; ii. 162.—As. Min.
parviflorus, Desf. ex Spreng. Syst. iii. 800, in syn.-racemosus.
paniflorus, Urn. Encyc. i. 310=OxyUopis **deflexa.**

ASTRAGALUS :—
parvi/olius, Nutt ex A. Gray, In Proc. Am. Acad. vi. (1864) 202=gracilis.
parvus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i 266.—Marie.
Pastellianus,?o\\iid,in Brugnat Giom. Fis. iz. (1816) 95-vedcarins.
Fattersoni, *A. Gray, in Brandegee, Fl. S. W. Col.* 285.—Am. bor. occ
pauciflorus, A. Gray, in Proc Acad. Philad. (1863) 60—leptaleus.
pauciflorus, Hook, in Lond. Jonm. Bot vL (1849) 210 •calplnus.
pauriflorus, *Hook. Fl. Bor. Am. i.* 149.—Am. bor. occ.
pauciflorus. Pall. Astrag. 81. t. 66-Gueldenstaedtia paudflora,
paudjugus, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* ii. (1844) 196.—Turkestan,
pauper, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 224.—As. centr.
pectinate, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* i. 142.—Am. bor.'
pectinatus, *Boiss. Diagn.* Ser. L it 64.—Syria,
peduncularis, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 199.—Tibet. occ.
Pehuenches, *Niederl. in Roca, Exped. Rio Negro,* ii. 206.—Patagonia.
pelliger, *Fentl, Pugill. PI. Nov. Syr.* 6.—Cilicia.
pellitus, *Bunge, Astrag.* i. 83; ii. 39.—Persia.
penduliflorus, Lam. Fl. Fr. ii. 636=alpinus.
pendulus, DC. Astrag. 282=elongatus.
pendulus, Bunge, Astrag. ii 211-caelestis.
pennatus, *Bunge, I. c.* Ii. 148.—Cataonia.
pentaglottis, *Linn. Mant.* 274.—Reg. Mediterr.
pentapetaloides, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. vil. (1661) 274=nexus.
peregrinus, Fisch. *Sc* Mey. ex Bunge, Astrag. ii. 34 — A. Caraganae.
peregrinus, *Vahl, Symb. Bot.* i 67.—Aegypt.; Palaestin.
peristereus, *Boiss. tf Hattssk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 861.—Persia.
permiensis, C. A. Mey. ex Rupr. FL Bor. Ural, ii 82. t ll = Helmii.
perpusillus, Bertol. in Nov. Comm. Bonon. vi (1844) 230-tribaloides.
persepolitanus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 60 = ammophilus.
persiens, *Fisch. tf Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 3.— Reg. Casp.; Persia,
pernvianus, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 18.—Peruv.
Pestalottae, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 41=cadmicus.
petraeus, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xr. (1842) 838.—Mont. Alatav.
petropylensis, *Bunge, Astrag.* i 139; ii. 237.—Sibir.
phacaeformis, *Bunge, in Mini. Sav. Etr.- Pitersb.* ii. 590; *Vert. Suppl. Fl. Alt.* 90.—Sibir. altaic.
phlomoides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 66.—Persia,
physaloides, *DC. Prod.* ii. 300.—Anatolia vel Syria,
physocalyx, *Fisch. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* ii. (1837) 74 —Thracia.
phys'ocalyx, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc Nat Mosc. (1841) 409-cysttcalyx.
physocarpus.Lcdeb. Fl. Alt. iii. 335=physodes.
physodes, *Linn. Sp. PI.* 760.—Reg. Casp.
Pickeringii.yi. *Gray, Bot. U.St. Expl. Exped.* i. 415.— Peruv.
pictus, Boiss. *Sc* GailL Diagn. Ser. H. vi. 65-conduplicatns.
pictus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi (1864-65) 214. —Am. bor. occ.
pictus, *Steud. Norn.* ed. *TL* i. 163.—Chili,
piestolobus, *Bunge, Astrag.* i. 38; ii. 52.—Persia.
pilosus, Linn. Sp. PI. 756=Oxytropis pilosa.
Pinardi, *Boiss. Diagn.* Ser. L ix. 56.—As. Min.
pinetorum, *Boiss. I. c.* ii. 77.—As. Min.; Syria,
piptocephalus, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* li. 376.—Persia.
pisidicus, *Boiss. tfHeldr. Diagn.* Ser. I.ix. 70.—Pisidia.
Pistacia, Rost ex DC. Prod. ii. 305 - elongates,
placens, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 109.—Chili
plattensis, *Nutt. ex Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 332. —Am. bor.
platyphyllus, Fisch. ex Bunge, Astrag. ii. 205 = choicus.
platyphyllus, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 846.—Soongar.
platyraphis, *Fisch. ex Bunge, Astrag.* L 37; ii. 48.—Syria; Kurdist.; Mesopot.
platysematus, *Bunge, Astrag.* L 120; ii. 206.—Persia.

ASTRAGALUS :—
platytropis,^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 626.—Am. bor. occ.
plebejus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi 37.—Persia.
plumosus, DC. ex Bunge, Astrag. ii. 148=Lamarckii.
plumosus, Sieber, ex Bunge, 1. c ii 59=bethlemiticus.
plumosus, *Willd. Sp. PI.* iii 1338.—Galatia.
podocarpus, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 142.—Reg. Caucas.; Persia.
podocarpus, R. Grah. in Wall. Cat n. 6930 « A. Emodi.
podocarpus, *Buch.-Ham. in Wall. 1. c.*—Ind. or.
podolobus, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 49.—Persia,
podosphaems, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 256.—Kurdistan.
poecilanthus, Bunge, Astrag. ii. 188=paecilan thus,
polaris, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxiii (1861) 323. —Am. arct. occ.
polemius, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 306.—Beluchist.
polemoniacus, *Bunge, Astrag.* i 186; ii. 238.—Anatolia.
poliotes, *Bunge, Astrag. i.* 116; ii 197.—Sibir. altaic.
polyacanthus, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 199.—Reg. Himal.
poly acanthus, WalL Cat n. 69S4=Caragana polyacantha.
polyactinus, *Boiss. Fl. Orient,* ii 226, in nota.—Hispan.; Aft. bor.
polyanthus, *Bunge, Astrag.* i. 93; ii. 166.—Persia,
polybotrys, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 64.—Afghan.
polycephalus, Tenore, ex Bunge, Astrag. ii. 96 = ponticus.
polyceras, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 382.—Soongar.
Poly gala, Pall. Astrag. n. 116. t. 83 = sanguinolcntus.
polyphyUns, *Bunge, Astrag.* i 36; ii 69.—Reg. Caucas.
polyphyllus, Willd. Sp. PI. iii. 1800=Oxytropis mlcrophylla.
ponticus, *Pall. Astrag.* 14. t. 11.—Reg. Caucas.; As. Min.
porphyracmns, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 367.—Cappadoc
porphyrobaphis, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) II. 462.—Persia.
porphyrolepis, Fisch. 1. c 378=radkanensis.
porrectus, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 76, 411.—Am. bor. occ.
Poterium, DC. Astrag. 160=Clusil.
Poterium, Pall. Astrag. 1. UJ. = amacantha.
Poterium, *Vahl, Symb. Bot.* i 63.—Hispan.
praecox, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 862-Wulfeni
praetermissns, *Ball, in Journ. BoWtX.* (1873) 306.—Marocco.
Preussii, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-35) 222.—Am. bor. occ.
procerus, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 464.—Persia,
procerus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii (1870) 369. —Am. bor.
***pTocumbens,Hook.(f Arn.Bot.Beech. Voy.* 18.—Chili.**
procumbens, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 18 = pentaglottis.
proenmbens, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1886) 861.—N. Mexic.
prolixus, *Sieber, ex Bunge, Astrag.* i. 9; ii. 6.—Afr. bor.; Ind. bor. occ
prostratus, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc (1838)90=adsurgens.
prostratus, *Hook. tf Am. Bot. Beech. Voy.* 18.—Chili
prostratus, Scop. Delia Insub. ii. 106=Oxytropis prostrate.
prusianus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 88 = Boissieri.
Pxzewalskii, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 32.—China,
pseudaustralis, *Fisch. tf Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. *Suppl.* 16.—Sibir. altaic.
pseudocaspius, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1868) II. 347.—Anatolia.
pseudocicer, Opiz, in Flora, iv. (1821) 758 = A. Cicer.
pseudonobrychis, *Andrt. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 238, nomen.—Hab. T
pseudopentagloitis, Boiss. *Sc* Noe, ex Boiss. Fl. Orient ii. 226=triradiatus.
pseudostella, *Delile, Fl. Egypt. Suppl.* 64.—Graecia; Acgypt* j **Hab.**

ASTRAOALUS :—
pseudotragacantha, Pall. Astrag. 8. t. 3=aureus.
pseudotragacantha, Urv. in M^m. Linn. Soc. Par. i. (1822) 848 x=thracicus.
psilacanthus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 97.—Afghan.
psilacanthus, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) 407 =tenuispinus.
psilacmos, *Bunge, Astrag.* i. 86; ii. 151.—Syria'.
psilocentros, Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1853) II. 406 =polyacanthus.
psilodontius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 86.—Syria.
psiloglottis, Stev. in DC. Prod. ii. 288=oxyglottis.
psilopterus, Bunge, Astrag. i. 45 ; ii. 71 = genistoides.
psilopus, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Petersb. x. (1842) 254 = spartioides.
psilostylus, *Bunge, Astrag.* i. 87 ; ii. 152.—Persia.
psoraleoides, Boiss. ex Bunge, 1. c. ii. 285 = asciocalyx.
psoralioides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1309.—Cappadoc.
psoraloides, Lam. Encyc. i. 817 ; DC. Astrag. 145. t. 18=canescens.
pterocarpus, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 71.—Am. bor. occ.
pterocephalus^ttHjv, *Astrag. Fedsch.* 252.—As. centr.
pterostylis, *DC. Prod.* ii. 294.—Austral,
ptilocephalus, *Baker, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 47.—Afghan,
ptilodes, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 81.—As. Min.
ptychophylhn, *Boiss. I. c.* vi. 42.—Persia,
pubentissiinus, *Torr.* b* *Gray, Fl. N. Am. i.* 693.—Am. bor. occ.
puberulus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc (1841) 405. n. 240 = macropterus.
puberulus, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 299.-Sibir. altaic.
pubescens, Schrank, Prim. Sal. 2=frigidus.
***yimana, DC. Astrag.* 173.—Sibir.**
putigerus, Pall, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1888) 288=pubiflorus.
pugioniferus, *Fisch. ex Bunge, Astrag.* i. 125; ii. 219. —Macedonia.
pugniformis, L'Herit. Stirp. Nov. 170=longifolius.
pugniformis, Willd. Sp. PI. iii 1334=oleaefolius.
pulchellus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 86.—Persia.
pulchellus, Salisb. Prod. 837 =danicus.
Pulsiferi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 69. —Am. bor. occ.
pulvinatus, *Bunge, Astrag.* i. 82; ii. 142.—Persia.
Pumilio, Pall. Astrag. 67. t 65-Oxytropis Pumilio.
punctatus, *Bunge, Astrag.* i. 120; ii. 209.—Persia.
pungens, Willd. Sp. PI. iii. 1825=angustifolius.
purpurascens, *Bunge, Astrag.* i. 35 ; ii. 42.—Afghan.
purpurascens, Jacq. f. ex Steud. Nom. ed. II. i. 163 = A. Onobrychis.
purpureus, Lam. Encyc. i. 314 "hypoglottis.
Purshii, *Dougl. ex G. Don, Gen. Syst.* ii 271.—Am. bor. occ
pusillus, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* (1843) 19.—Peruv.
pycnocephalus, *Fisch. in Bull. Sec. Nat. Mosc.* (1853) H. 371.—Kurdistan,
pycnocladus, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii-386.—Persia,
pycnolobus, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* ii-(1836) 594.—Sibir. altaic.
pycnophyllus, Kotschy, ex Bunge, Astrag. ii. 138 = mesoleios.
pycnophyllus, Stev. in Mem. Soc Nat. Mosc.iv. (1814) 67 = microcephalus.
pyenorrhizus, *Wall. Cat.* n. 5927.—Reg. Himal.
pyenostachyus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. 1,1864-65) 527.—Am. bor. occ.
pygmaeus, DC. ex Bunge, Astrag. ii. 86=nanus.
pygmaeus, Pall. Astrag. 66. t. 64 « Oxytropis nigrescens.
pyramidulus, Salzm. ex Bunge, Astrag. ii. 6=epiglottis.
pyrrhotrichus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 73.—Afghan,
quadrisulcatus, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga,* (1847) 248.—Persia; Afghan.; Tnrcoman.
quinquefoliolatus, *Bunge, Astrag.* i 119; ii 204.—Persia.
Quisqualis, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 222.—As. centr.
racemosus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. *Suppl.* 740.—Am-bor.
racemnlosus, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. fl. Orient.* ii. 891.—Persia.
Raddeanus, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 40 =flaccidus.
radians, *Pomel, Nouv. Mat. It. Atl.* 185.—Algeria.
'adiatus, Steud. Nom. ed. II. i. 163-Sieberi.

ASTRAGALUS:—

radiatus, *Ehreni. ex Bunge, Astrag.* L 11; ii. 8.—Aegypt; Arab.
radiatus, Stev. in Bnll. Soc. Nat Mote. iv. (18S2) 267 = A. Stella.
radicans, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 708—Hab.T
radicatus, Decne. in Ann. Sc Nat Ser. II. iii. (1835) 268=Sieberi.
radiciflorus, Steud. Norn. ed. II. i. 168=testiculatiis.
radkanensis, *Bunge, Astrag.* i. 81; ii. 188.—Persia,
ramosissimus, *Scop. Delia. Insub.* ii. 106.—Sibir.
repmodontus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 96.—Afghan,
randoms, £«feft. *Fl. Alt.* iii. 818.-Soongaria.
Rattani, 4. *Gray, in Proc. Am. Aead.* xix. (1888) 76.
Rauwolfii, Vahl, Symb. Bot. i. 63->Kusselii.
Reboudii, *Coss. ex Bunge, Astrag.* i. 87; ii. «.—Afr. bor.
recognitns, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1868) H. 452.—Peisia.
reenrvus, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. n. 8. (1885) 165.—Calif.
reduncus, *Pall. Astrag.* 109. t 82.—Reg. Caucas.
reflexistipulns, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 44.—Japon.
Wflexus,rorr. *V Gray, Fl. N. Am.* i. 884.—Am. bor. occ.
refractus, Boiss. & Bnhse, in Boiss. Diagn. Ser. II. ix. 57 = Bnhseanus.
Ifftactus, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 144.—Reg. Caucas.
Regelii, *Trautt. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 472.—Armenia.
Reinii, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 432.—Marocco.
remotiflorus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 72.—Persia.
«motifolius, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. ft. Orient.* ii. 1095 (emend.).—Persia.
wmotijngus, *Boiss. (f Hohen. Diagn.* Ser. I. u. 74.—Persia.
"Ptans, *WittO. Hort. Berol.* ii. 88. t 88.—Merit
resupinatus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. Ui. 493=fragrant
raamocarpus, *Boiss , Hohen. ex Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 68.—Persia,
reticularus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 491.—Reg. Caucas. j Afghan.
**etrofiexus,* Pall. Astrag. 88. t 27=Oxytropisdeflexa.
retusus, DC. Astrag. 205. t 86=coluteoides.
retusus, Willdfin Mem. Acad. Berl. (1794-95) 24. t 2=angustifolius.
Renterianus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 71.-Persia.
^entus, *A. Gray, ;„ Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 48. —Am. bor.
rtacodes, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 808.—As. temp.
rhuanthus, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 88=canen«s.
"uanthus, *Koyle, Illustr. Bot. Himal.* 199.-Reg. Himal.
rhuocephalus, *Baker, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1878) 46.—Ind. or.
rtiodochrous, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Onent.* n. 825.—KurdisUn.
rhodoscrnius, *Boiss. tf Haussk. I. c.* 863.—Persia.
R'diii, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 414.—Perov.
ngidulns, *Benth.exBunge, Astrag.* ii. 25.—Reg.Himal.
rtgidus, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 65=melanocephalus.
Robbinsii, *A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. II. 98.-Am. bor.
Robbinsii, Matthew, PI. Acad. 15=alpinus..
robustus, *Bunge, Astrag.* i. 122; ii. 212.-Peraa.
Rockelianus, Heuff, ex Griseb. & Schenk, in Wiegm. Arehiv, xviii. (1852) I. 298=A. Onobrychis.
»»us, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 380.—Sibir. altaie.
Rostani, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 45-=densffoUos, chrysophyllns.
WKtratus, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 144.—Reg. Caucas.
"otundifolius, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 188 = glyc; hyllu rotundffolius)' Royle, Illustr. Bot. Himal. 199 = graveolens.
fotundi/olius, Willd. Sp. PI. iii- 1 s W = nummularioides.
Roussaeanus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 61.—Syna; Mesopotam.
RoyUonus, Bunge, Astrag. i. 30; ii.34=Candolleanus.
Royleanus, D. f&,r. sj*n. pi. iv. I090=strobilif«us, *Royle.*
wbriflorus, *Bunge, Astrag.* i. 67 J ii. 109.—Persia.

ASTRAGALUS:—

rubrostriatus, *Bunge, Astrag.* i. 68; ii. 118.—Persia.
rudbaricus, Bunge, 1. c i. 123; ii. 216=confusus.
rugosus, *Fisch. ex Bunge, I. c.* Ii. 58.—Kurdistan.
rumelicus, Bnnge, 1. c. 81; ii. 187=veluchensis.
runcinatus, *Boiss. Ft. Orient,* ii. 368.—Cappadoc.
rupicda, Ehrenb. ex Bnnge, Astrag. ii. 19=peregrinns.
rupifragus, *Pall. Astrag.* 86. t. 70.—Reg. Caucas.; Ural.
Ruprechti, *Bunge, Astrag.* i. 101; ii. 174.—Reg. Caucas.
Rnsbyi, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. n. 1 (1884) 8.—Calif.
ruscifolius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. il. 47.—Persia.
Russelii, *[Soland. in] Suss. Aleppo,* ed. II. ii. 260. t 18.—Syria; Mesopotam.
rytidocarpus, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 815.—Sibir. altaie.
rytilobus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 209.—As: temp.
sabuletorum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 408=arkalycensis.
sabnletorum, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 321.—Sibir. altaie.
sabulorum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 868.—Am. bor.
saccatus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 63.—Persia.
satcharensis, Ehrenb. ex Bunge, Astrag. ii. 18 = gyzensis.
saccocatyx, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 83.—Soongaria.
sachalinensis, *Bunge, Astrag.* i. 28; ii. 26.—Ins. Sachalin.
saganlugensis, *Trautv. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* rri. (1868) 323.—Armenia.
Sahatae, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 184.—Algeria.
Sahendi, *Buhse, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 416.—Persia.
sakkarensis, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 234 = gyzensis.
salataricus, *Bunge, Astrag.* i. 117; ii. 201.—Reg. Caucas.
salsugineus, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 841.—Soongaria.
salsula, *Seep. Delic. Insub.* ii. 104.—Sibir.
salvatoris, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 281=massiliensis.
samamensis, *Boiss. tf Buhse, in Nouv. M4m. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 68.—Persia,
sanctus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 47.—Syria,
sanguinolentus, *Bieb. Casp.* 190.—Reg. Caucas.
saratagius, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 269.—As. temp,
scabem'mus, *Bunge, in Mim. Sao. Etr. Pitersb.* ii. (1835) 91.-China bor.
scabrifolius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 81.—Armenia,
scabrisctus, *Bong. Vert. Pfl. Saisang-Nor,* n. 89. t. 5.—Soongaria.
scaposus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 366.—Am. bor.
scariosus, Benth. ex Bunge, Astrag. i. 44; ii. 71 = polyacanthus.
schahrndensis, *Bunge, 1. c. i.* 61; ii. 103.—Persia.
Schanginianus, *Pall. Astrag.* 77. t. 78.—Sibiria.
Schelichowii, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 68.—Ochotsk.
Schimperi, *Boiss. Diagn.* Ser. L ii. 53.—Arabia,
schirasiens, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) n. 457.—Persia.
schistocalyx, *Bunge, Astrag.* i. 46; ii. 75.—Persia,
schistosus, *Boiss. V Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 49.—Persia.
sehizopterus, *Boiss. 1. c.* ii. 82.—Cilicia; Syria.
Sehmalhauseni, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 869.—Turkestan.
Schottianus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 89.—Cilicia; Cappadoc.
Schrenkianus, *Fiseh. V Mey. in Bull. Phvs-Mcth. Acad. Pitersb.* ii. (1844) 197.—Turkestan,
schnrabicus, *Punge, Astrag.* i. 76; ii. 129.—Persia,
sciadophorus, *Fmnch. PI. Davidian.* i. 84.—As. or.
sciureus, *Boiss. V Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 98.—Persia,
sderocarpus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 226.—Am. bor. occ
scleroclads, *Bunge, Astrag.* i. 46 ; ii. 75.—Persia,
sderopodiua, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 826; *Fl. Ross. Alt.* t. 295.—Sibir. altaie.
scleroxylon, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga,* i. (1847) 241.—Turkestan.
scopaeformis, Ledeb. ¥\. Ross. i. 615=tauricus.
scoparius, *Schreni, Enum. PI. Nov.* 82.—As. temp,
scopuloium, *Porter (X Coult. Fl. Col.* 24.—Colorado.

A8TBAGALTTB;—

scorpioides, *Pourr. ex Willd. St. PI.* iii, 1280.—Hbpan.
scorpius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 108.—Persia.
scorpius, Buhse, ex Bunge, Astrag. it 127 *=glaucacanthus.
Scorpiurus, Bunge, 1. c. i. 6 ; ii. 8=hippocrepidis.
Scottianus, Stocks, ex Bunge, 1. c. ii. Sl=medullaris.
scrobiculatus, Boiss. Fl. Onent. ii. 490=gymnolobus.
secundus, *DC. Astrag.* 128. n. 56.—Sibir. austr.
secundus, Miclix. Fl. Bor. Am. ii. 67=alpinus.
segetalis, Boiss. Fl. Orient, ii. 277 = neurocarpus.
Segethi,Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 47.—Chili,
seidabadensis, *Bunge, Astrag.* i. 68; ii. 118.—Persia.
Seidlitrii, *Bunge, 1. c.* i. 40; ii. 56.—Persia.
Semenovii, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1666) II. 22.—As. temp,
semibilocularis, *DC. Astrag.* 170.—Sibiria.
semibilocularis, *Fisch. ex Bunge, Astrag. i.* 10S; ii. 183.—Sibir. altaie.
semipellitus, *Bunge,* i *c. i.* 83; ii 144.—Persia.
sempervirens, Lam. Encyc. i. 320=aristatns.
senganensis, *Bunge, Astrag. i.* 82 ; ii. 142.—Persia.
serbicus, PanS. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 268=glycyphylloides.
sericeus, DC. Astrag. 148=globosus.
sericeus, Lam. Fl. Fr. ii. 645=versicarius, A. Oxytropis, sordida.
sericeus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 51 = hamosus.
sericoleucus, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xxxiii. (1862) 410.—Am. bor. occ.
saicophyllta,Griseb.Spicil.Fl.Rumel. i. 53.—Graeda.
sericostachyus, *Stocks, in Hook. Ken Journ.* iv. (1852) 146.—Beluchist
serotinus, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* xii. 18, 51.—Am. bor. occ.
sesameus, *Linn. Sp. PI.* 769.—Reg. Mediterr.
sesameus, Pall. Astrag. 98 = oxyglottis.
sesamoides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 59.—Afghan.
sesbanoides, Benth. in Royle, Illustr. Bot Himal. 199=trichocarpus.
sesquiflorus, *S. Wats. Proc. Am. Acad.* x. (1875) 346.—Utah.
setiferus, DC. Prod.ii. 296=Comnlaca tragacanthoides.
setosus, Pall. Astrag. 55. t. 44=Oxytropis setosa.
setulosus, *Boiss. V Bal. Diagn.* II. vi. 50.—Cappadoc.
Sewersovii, Boiss. Fl. Orient, ii. 289=seq.
Sewertzowii, *Bunge, Astrag.* i. 38; ii. 54.—Turkest.
seytunensis, *Bunge, 1. c.* i. 87; ii. 154.—Syria.
Shortianus, JV«M. *ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 331.—Am. bor. occ.
Shortianus, S. Wats. PI. Wheeler, 7 = cyancus.
sibiricus, *Scop. Delic. Insub.* ii. 104.—Sibiria.
Sibthorpianus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 84.—Bithynia.
siculus, *'Bivon. Giorn. Palerm.* n. 4.'—Sicilia.
siculus. Gasp, ex Nym. Consp. 192 - calabricns.
siculus, Sehimp. ex Nyra. 1. c. = cephalonicus,
Sieberi, *DC. Prod.* ii. 295.—Aegypt.; Arab.
Sieversianus, *Pall. Astrag.* 15. t. 12.—Persia; Soongaria.
Sieversianus, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 592-Oxytropis argentata.
Sieversii, Coq. Monb. ex Bunge, Astrag. ii. 36 = dlphthcrolobns.
sigmoideus, *Bunge, I. c.* L 123; ii. 214.—Anatolia,
sikkimensis, *Benth. ex Bunge, 1. c.* i. 23; ii. 28.—Reg. Himal.
si'.iquosus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 51.—Persia.
siliquosus, Boiss. 1. c. vi. 40=lobophorus.
silvicolus, Pritz. Ic. Ind. J28 = Oxytiopis sylvaticn.
simplicifolius, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 281.—Am. bor. occ.
sinaicus, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 67-pseudostella.
singarensis, *Boiss. IT Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 263.—Mesopotam.
sinicus, *Linn. Mant.* i. 103.—China.
sinicus, Thunb. Fl. Jap. 290=lotoides.
sirinicus, *Tenon,' Prod. Fl. Neap. App.* v. 25 (1820)' • *Fl. Neap.* v. 182. t. I71.-Itaiia.
sisyrodytes, *Bunge, Astrag.* i. 33 ; ii. 40.—Turkestan,
sitiens, *Bunge, I. c.* i. 128; ii. 220.—Persia,
sivasicus, *Bunge, 1. c.* i. 98; ii. 166.—Armenia.
sVyXteoyxBunge.ex Maxim, in Bull. Acad.Pitersb. xxiv. (1878) 31.—China,
soficus, *Bunge, Astrag.* i. 81; ii. 186.—Persia.
sogdianus, . B « w *Astrag. Fedsch.* 268.—As. temp.

ASTRAGALUS:—
Solandri, *Lowe, in Hook. Kea Journ.* viii. (1856) 294.—Marocco; Madera.
zomcheticus, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 720 = sanguinolentus.
songaricus, Pall. Astrag. 68. t 61 = Oxytropis songarica.
Sonorae, A. Gray, PI. Wright, ii. 44 = arizonicus.
sordidus, Willd. Sp. Fl. iii. 1318 = Oxytropis campestris.
Soyeri, *Bucking, ex Bunge, Astrag.* i. 118 ; ii. 199.—Dalmat.
Spachianns, *Boiss. tf Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 67.—Persia.
Spaldingii, *A. Gray, in Proc. Am, Acad.* vi. (1864-65) 524.—Am. bor. occ.
sparsifloras, *A. Gray, in Proc. Acad. Philad.* (1863) 60.—Am. bor. occ.
sparsus, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. iii. (1835) 267—Arab,
spartioides, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 380.—Soongar.
speciosus, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 67.—Persia,
speirocarpns, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65)'225.—Am. bor. occ.
sphaeranthus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 37.—Persia,
sphaerocalyx, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 647.—Mont. Ararat,
sphaerocarpus, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 117.—Chili,
sphaerocarpus, *Desf. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 168.—Chili,
sphaerocephalos, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 241.—Reg. Cancas.
sphaerocystis, *Bunge, in Mém. Sao. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 273 *(Lehm. Rel. Bot.* (1847) 97).—As. centr.
sphaerophysa, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 338.—Soongar.
spicatus, Burm. ex Guill. & Perr. Teat Fl. Seneg. 182 = Indigofera hirsnta.
Epicatus, *Pall. Reise*, ii. 742.—Soongar.
spicatus, Nntt. in Ton, & Gray, Fl. N. Am. i. 336 = Mortoni.
spinellus, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* fi. 316.—Persia.
spinescens, *Bunge, Astrag. i.* 42; ii. 64.—Persia.
spinosissimus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, rii. (1880) 120-A. Tragacantha.
spiisosissimus. *Wall. Cat.* n. 5935.— Ind. or.
Spruneri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 79.— Graecia.
squalidos, *Boiss. 1. c.* Ser. II. ii. 29.—As. Min.
squamulosus, Poir. Encyc, Suppl. L 528-Oxytropis aqnamnlosa.
sqnarrosus, *Bunge, Astrag.* i. 129; ii. 226.—Persia.
Ssahendi, Boiss. Fl. Orient, ii. 811-Sahendi.
Stella, Bieb. Fl. Tanr. Cane, it 191-cruciatus.
Stella, *Gouan, Jllustr.* 50.—Gall, anstr.; Afr. bor.
stellafus, Lam. Fl. Fi. ii. 641-A. Stella,
stenanthus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 274.—As. temp,
stenoceras, *C. A. Mey. in Bong. Verm. Pft. Saisang-Nor*, 24.—Soongar.
stenocystis, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 801.—As. temp,
stenolepis, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 887.—Persia.
stenolobus, Bunge, in Mém. Say. Etr. Pétersb. ii. (1885) 593=ceratoides.
stenophyllus, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 829.—Am. bor.
stenorhachis, Fisch. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvi. (1853) II. 888-andrachnaefolius.
stenosemius, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 27.—Armenia,
atenostegius, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 314.—Knrdistan.
Stevenianus, *DC. Prod.* ii. 285.—Reg. Cancas.; Persia.
Stewartii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 129.— Ind. bor. occ.
itipitatns, *Benth. tx Boiss. Fl. Orient,* ii. 305.— Afghanist.
stipitatus, Sims, Bot. Mag. t. 2880-stipulates.
sHpularis, Sims, ex D. Don, 1. c. 1. Index =seq.
stipulates, *D. Don, ex Sims, I. c.* t 2380.—Reg. Himal.
stipulates, Jacquem. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 181-graveolens.
Stocksii, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i. 6; ii. 4.— Afghan.
stoUenburgensis, Lerch. ex Schnr, Ennm. PI. Transs. 164 — ciiocephsjlus.

ASTRAGALUS:—
straminens, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 85.—Syria,
streptopus, *Greene, in Bull. Calif. Acad. i. a.* 8 (1885) 155.—Calif,
striatellus, *Bieb. Ft. Tour. Cauc.* ii. 189.—Reg. Caucus.
striatus, Nutt. in Torr. & Gray, FL N. Am. i. 880-adsurgens.
strictifolius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 78.—Kurdistan.; Persia.
strictispinus, *Boiss. Fl. Orient*, ii. 866.—Lycia.
strictissimus, Sievers, ex Pall. Astrag. 16-follicularis.
strictus, *R. Grali. in Wall. Cat.* n. 5924.—Reg. Himal.
strictus, Siev. ex Fisch. in DC. Prod. ii. S01=follicularis.
strigillosus, *Bunge, Astrag.* i. 102; ii. 178.—Anatolia,
strigulosus, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 494.— Mexic.
strobiliferus, *Lindl. in Bot. Reg.* (1849) *Misc.* 89.—Armenia,
strobiliferus, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 199.—Reg. Himal.
stromatodes, *Bunge, Astrag.* i. 85; Ii. 148.—Syria.
subacaulis, Bunge, 1. c i. 101; ii. 176=karputanus.
subalpinus, *Boiss. tf Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 69.—Persia,
subbarbellatus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 227.—Turkestan.
subbiflorus, Lag. ex DC. Prod. ii. 289=scorpioides.
subbijugus, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 627.—Turkestan.
subcaulescens, Ledeb. Fl. Ross. i. 644 = Ruprechti, hyalolepis.
subcaulescens, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 199.— Ind. or.
subcinereus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 366.—Am. bor.
subcompressns, *A. Gray, in Brandegee, Fl. S. W. Col.* 234.—Am. bor. occ.
suberosus, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed. II. ii. 260=tubercnlosa.
submitis, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. L ix. 100.—Persia.
snbsecundus, *Boiss. tf Hohen. I. c.* 64.—Persia.
subulatus, Desf. Fl. Atlant. ii. 186=annularis.
subulatus, Koch, in Flora, ex Steud. Nom. ed. II. i. 159, in syn. = argenteus.
subulatus, *Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 193.—Reg. Caucas.; Tibet.; Afghan.; Sibir.
subuliferus, *Boiss. tf Kotschy.ex Bunge, Astrag.* i. 31; ii. 87.-Cilicia.
subuliformis, DC. Astrag. 107=Jubularus.
subutnbellatus, Klotzsch, in Bot Ergeb. Waldem. Reise, 159 =hippocrepidis.
succulentus, Richards, in Frankl. 1st Jonra. App. 746 — caryocarpus.
***Boccambeas,Dougl.exG.Don, Gen.Syst.*ii. 263.—Am.** bor. occ.
succumbens, Torr. & Gray, in Padf. Rail. Rep. ii. 163=Parryi.
suffalcatus, *Bunge, Astrag.* i. 125 ; ii 219.—Afghan,
suffruticosus, *DC. Astrag.* 82.—Sibir.
suffruticosus, Pall. Reise, i. 440 - fruticosus.
suidunensis, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 378.—Turkestan.
sulcatus, Lam. Fl. Fr. ii. 639 = austriacus.
sulcatus, *Linn. Sp. PI.* 756.—Sibir.
sulfureus, *Bunge, Astrag.* i. 2!); ii. 33.—Afghan.
sultanensis, Bunge, I.e. i. 17; ii. 19 = bombycinus.
superbns, *Bunge, I. c.* i. 62; ii. 105.—Persia,
supinus, *C. A. Mey. ex Bunge, I. c.* i. 51; ii. 82.—Persia,
surugensis, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 402.—Mesopotam.
snsianus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 64.—Persia.
susianus, Kotschy, ex Bunge, Astrag. ii. 119~acutus.
sylvaticus, Willd. Sp. PI. Ui. 1300 - Oxytropis sylvatica.
sylvicolus, Pall. Astrag. 95-Oxytropis sylvatica.
syriacus, *Linn. Sp. PI.* 769.—Syria.
syriacus, Pall, ex Ledeb. Fl. Alt iii. 295 = Laxmanni.
syriacus, Linn. Herb, ex Bunge, in Boiss. FL Orient, ii. 479=vimineus.
syrtschensis, *Bunge, Astrag.* i. 46; ii. 74.—Persia.
Szovitsii, *Fisch. tf Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1863) II. 473.—Armenia.

ASTBAGALU8:—
tabrizianus, *Buhse, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1858) II. 445.-Persia.
taeniolepis, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. ix. 99 = **persicus.**
talagonicus, *Boiss. tf Hohen. I. c.* 87.—Persia,
talasseris, *Boiss. tf Bal. I. c.* Ser. II. vi. 58.—Cappadoc.
talyschensis, *Bunge, Astrag.* i. 40; ii. 67.—Reg. Caucas.
tanaiticus, *C. Koch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 94.—Oriens.
tarijensis, *Wedd. Chlor. And.* ii. 262.—Bolivia,
taschkendicus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 280.—As. temp,
tataricus, *Franch. PI. Davidian.* i. 87.—Mongolia,
tauricolus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 86.—As. Min.
tauricus, Clans, in Goebel, Reise, ii. 269=scopaeformis.
Uaaicas, *Pall. Astrag.* 48. t. 38.—Reg. Cancas.; Ural.; Soongar.
Tavemieri, *Boiss. tf Diagn.* Ser. I. ii. 78.—Persia,
tegetarius, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 76, 444.— Am. bor. occ.
teheranicus, *Boiss. tf Hohen. in Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 44.—Persia.
tenax, *Bunge, Astrag.* i. 67; ii. 110.—Persia,
tenellus, *Bunge, 1. c.* i. 120 ; ii. 206.—Persia.
tenellus, Pnrsh, Fl. Am. Sept. ii. 473=muUiflorus.
tenellus, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i 164 = strigulosus.
tener, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864) 206.—Calif.
tennesseensis, A. Gray, ex Chapm. Fl. S. U. St 98 = plattensis.
tenuicaulis, *Benth. ex Bunge, Astrag.* 1. 28; U. 28.—Reg. Himal.
tenuifolius, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 186.—Algeria.
tenuifolius, Georgi, It. i. 226=versicolor.
tenuifolius, Linn. Sp. PI. ed. II. 1065 = A. Onobrychis.
tennirugis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 61.—Arab,
tennis, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 90 *(Cat. Baikal*, n. 854).—Sibir. baical.
tenuispinus, Bunge, Astrag. i. 44 ; ii. 70—cicerifolius.
tephrodes, *A. Gray, PL Wright*, ii. 45.—N. Mexic.
tephrolobus, *Bunge, Astrag.* i. 127; ii. 222.—Sibir. altaic
tephrosioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 69.—Afghan.
teres, Lam. Encyc. i. 624=Oxytropis floribunda.
tenninalis, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 370.—Am. bor. occ.
testicnlatus, *Pall. Astrag.* 82. t. 67.—Reg. Caucas.; Soongar.; Sibir.
tetragonocarpus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 52.—Persia,
tetrapterus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 369.—Am. bor. occ.
tetrasrjehus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 279.—As. temp..
thessalus, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 80=Spruneri.
Thompsonae, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 345.—Am. bor. occ.
Thomsonianus, Benth. ex Bunge, Astrag. Ii. 284 = nivalis.
thracicus, *Griseb. Spicil. PI. Rumel. i.* 65.—Thracia.
Thurberi,i4. *Gray, in Mem. Acad. Am.* N. S. v. (Ib5.) 312.—Arizona,
tianschanicus, *Bunge, in Rupr. Serf. Tiansch.* 43.— As. temp,
tibetanus, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i. 52; ii. 85.—Afghanist.
tigreensis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 193 =venosus.
Tigridis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 55.—Mesopotam.
timuranus, *Franch. in Ann.Sc. Nat.* Ser. VI. xv. (1883) 256.—Turkest.
tmoleus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 79.—Lydia.
toeniolepis, Boiss. & Hohen. ex Boiss. 1. c 99 = persicus.
tokatensis, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1858) II. 370.—Anatolia.
tomentosus, *Lam. Encyc.* i. 312.—Aegypt.
torrentum, *Bunge, Astrag.* i. 40; ii. 55.—Persia,
tortuosus, *DC. Prod.* ii. 2!)9.—Mesopotam.
Toumefortii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 92.—Cappadoc.
trachyacanthos, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 381.—Persia,
trachytrichns, *Bunge, Astrag. I* 101; ii. 173.—Armenia.
Tragacantha, Ucria, Hort. Panor. 316 = siculus.
Tragacantha, Habl. Taur. 112 - amacantha.

A8THA.OALTT8:—
Tragacantha, *Linn. Sp. PI.* 762.-Reg. Medit. or.
Tragacantha, Pall. Astrag. 14. f. 1. PI. 2 = massiliensis.
Tragacantha, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 47O=aristatns.
tragacanthoides, Hohen. Knnm. PI. Talysch. 8=talyschensis.
tragacanthoides, Lam. ex Stead. Norn. ed. II. i. 164 = declinatus.
tragacanthoides, Linn. Sp. PI. 762=longiflorns.
tragacanthoides, Willd. Sp. PI. iii. 1323-lanigeras.
tragacanthoides, Pall. Reise, i. 148=diffusus.
tragacanthus, Lam. Fl. Fr. ii. 642=A. Tragacantha.
tragoides. Linn. Syst ed. X. 1175 = longiflorus.
transoxanns, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) H. 888.-Tnrkestan.
tmnssilvanicns,yon*o, *in TermesM. FUtetei,* viii. (1884) 807.—Kurop.
Trautvetteri,.B»«^, *Astrag.* i. 89 ; ii 54.—Soongaria.
trjangularis, *DC. Prod.* ii. 281.—Hab.»
tnbnlifolins, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i. 4; a. 2.-Tibet. occ.
tribuliformis, Hochst ex Boiss. Fl. Orient, iii. 225 = tnboloides.
tnbuloides, *Delile, Fl. Aegypt. Illustr.* 70.—Afr. bor.; Odens.
tribuloides, Kotschy, ex Bnnge, Astrag. ii. 10=ammopbilus.
tricarinatos, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii (1877) 68—Am. bor.
trichocalyx, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. t 882 "•mexicanus.
trichocalyx, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iv. (1876) M8«2—Reg. Cancas.
Wchocarpus, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5926.-Reg. Himal.
tnchocarpus, Young, FL Texas, 228=Nuttallianus.
Wcholobus, *DC. Prod.* ii. 299.—Persia,
tnchopodns, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-.65) 218.-Am. *boi.* occ.
mchoptems, *Bolt. Fl. Orient,* ii. 292.-Syria.
Jnchostigma, *Bunge, Astrag.* L 40; iL 57.—Anatolia,
tricolor, *Bunge, I. c.* i. 189; ii. 287.—Soongar.
tndactylicns, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-.65) 527—Am. bor. occ.
tnflorns, *A. Gray, PC Wright,* ii. 46.—Am. bor. occ.
tnfoliatns, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (18S6) 681.-*nui.
Jrifoliolatui, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 48.—Syria,
mgonelloides, *Boiss. I. c.* 49.—Armenia,
wgonocarpus, *Bunge, Astrag.* i. 22; ii. 28.—As. centr.
trigonns, *DC. Astrag.* 186.—Aegypt.; Arab.
tngonus, Sieber, ex DC. Prod. ii. 295 = Sieberi.
tnmestris, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 190-brachyceras.
tnmestris, *Linn. Sp. PI.* 761.—Aegypt.
tnmestris, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 868=hamosus.
tnmorphus, Viv. Fl. Lyb. Spec. 44. t 10 - annularis.
tnphyllus, Pall. Astrag. 68. t. 66. f. a-Oxytropis tnphylla,
triphT-Uus, *pursh FL Am. sept.* ii. 740.—Am. bor.
tnquetrus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) »67.—Am. bor.
WradUtus, *Bunge, Astrag.* i. 10; iL 7.—Cilicia; Mesopotam.
tristis, Nutt in Torr. & Gray, FL N. Am. i. 886 •= Mortoni,
troglodytes, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 862.—Arizona,
•rojanus, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) U. 401.—Graecia; As. Min.; Oriens.
tsawjensU, *Bunge, Astrag.* i. 22 j ii. 24.-Sibir. altaic.
tuberculosus, *DC. Astrag.* 83. t 22.—Syria; Meso-Potam.
tumidus, Bieb. FL Tanr. Cane. ii. 198 = febacens.
tutntdus, DC. Astrag. 166 - Rosselii
tvmidus, Willd. in Mem. Acad. Berl. (1794-95) 26 = Lossii.
Jnnetanus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1277.—Algeria,
tarbinatus, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga,* i. (1847)261.—Persia; Turkestan,
tnpcomaniens, *Bunge, Astrag.* i. MO; & 227.-Turcom.
lurczaninowii, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* XV- (1842) 342.—Turkestan.
tlirile>tanasi *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient.* «. 278.—'Tkestan.
t>n>phresteus, *Boiss. V Sprun. Diagn.* Ser. I. ii. 68.—Graecia.

ASTBAGAI.TJS:—
tyrolensis, Sieber, ex Steud. Norn. ed. ,11. i. 164-Oxytropis campestris.
ulachanensis, *Franch. PI. Damdian.* i. 87.—Mongolia.
uliginosus, Bieb. Fl. Taur. Cauc iL 188 «glycypbylloides.
uliginosus. *Linn. Sp. PI.* 757.—Sibiria.
umbellatus, *Bunge, Astrag.* L 24; it 29.—N. Zemlaia.
umbellatus, Pers. Syn. ii. 335 - lotoides.
uncatus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1072.—Aleppo.
uncatus, Linn. Herb, ex Boiss. FL Orient ii. 234 = tnmestris.
nncinatus, *Bertol. Fl. Hal.* viii. 54.—Ins. Corsica.
uncinatus, Moench, Meth. 166=baeticus.
uncinatns, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 322.—Algeria,
uniflorns, *DC. Astrag.* 243. t 50.—Peruv.
unifoliatus, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga,* i. (1847) 281.—Turkestan.
unifultus, *L'Herit. Stirp. Nov.* 168.—Peruv.; Chili,
unijugus, *Bunge, Astrag.* i. 180; ii. 228.—Soongaria.
unilateralis. *Kar. If Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 404.—Sibir. altaic.
uralensis, Linn. Fl. Suec. 267 = Oxytropis campestris.
uralensis, Vahl, in Fl. Dan. t. 1011 - Oxytropis sordida.
uraniolimnens, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 380.—Armenia,
urmiensis, *Bunge, Astrag.* i. 37; ii. 44.—Persia,
ursinus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 867.—Am. bor.
nstiurtensis, *Bunge, Astrag. i.* 102; ii. 179.—Reg. Casp.
utahensis, *Torr. V Gray, in Pacif. Rail. Rep.* ii. (1854) 120.—Am. bor. occ.
utriger, Friv. ex Bunge, Astrag. ii 108=phy*ocalyx.
utriger, Boiss. & Bnhse, ex Boiss. Fl. Orient ii. 281 = macropelmatus.
utriger, *Pall. Astrag.* 76. t. 61.—Tauria.
utriger, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 143=bakuensis.
utriger, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 654 = pubiflorus.
vaccaram, /i. *Cray, PI. Wright,* ii. 43.—Am. bor. occ.
vaginans, *DC. Astrag.* 210. t. 37.—Cilida.
vaginatus, *Pall. Astrag.* 46. t. 86.—Sibiria.
vaginatus, Richards, in Frankl. 1st Joura. App. 746 = Hallii.
valesiacus, Thomas, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 182=Oxytropis lapponica.
Vanillae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii 60.—Persia,
variabilis, *Bunge, ex Maxim, in Bull. Acad. PiUrsb.* xxiv. (1878) 33.—Mongolia,
variegatus, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xv. (1883) 259.—Turkest
varius, S. G. Gmel. It L 116. t. 17-virgatus.
Vaseyi, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 870.—Am. bor. occ.
vegetus, *Bunge, Astrag.* i. 102; ii. 181.—Persia.
vegliensis, Sadl. Fl. Pest. i. 199 in nota=Mnelleri.
veluchensis, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 819.—Graecia.
velutinus, Sieber, ex Steud. Norn. ed. II. i. 164° Oxytropis Halleri.
venosus, Aucher, ex Bunge, Astrag. ii. 217=Ancheri.
venosus, *Hqchst. ex A. Rich-, Tent. Fl. Abyss,* i. 193.—Abyss.
venosus, Ehrenb, ex Bunge, Astrag. ii. 229 = angustifolius.
ventorum, *A. Gray, ex S. Wats, in Am. Natural,* viii. (1874) 212.—Am. bor. occ.
venulosus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 75.—Cappadoc.
veraus, *Georgi, Bemerk. Reise Russ. Reich,* i. 226.—Kossia.
verrucosus, *Moris, Stirp. Sard. Blench.* 12.—Sardinia.
versicolor, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 65=Sibthoipianns.
verjicolor, *Pall. Astrag.* 45. t. 86.—Sibiria or.
verticillaris, *Bunge, Astrag.* i. 53; ii. 88.— Afghanist.
verticillaris, Lino. Mint ii. 276«Oxytropis myriophylla.
verticillaris, Georgi, Beschr. Ross. Reich, iii. IV. 1185'Oxytropis verticillaris.
verticillaris, *Scop. Delic. Insub.* ii 107.—Sibiria.
verus, DC. ex Bunge, Astrag. ii. 164=Roussaeanus.
verus, *Olivier, Voy.* iii. t 44.—Persia.
vesicarius, Lam. FL Fr. ii. 687 = A. Cicer.
vesicarius, *Linn. Sp. PI.* 760.—Europ. austr.; Tauria.
vesicarius, Pall. Reise, iii.. App. 761 = Oxytropis caespitosa.
vesicarius, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 274 = inflatus.
vesiculosus, *Clos, in C. Gay, Fl. CM.* Ii. 120.-Chili.

ASTBAQAIiTJS :-
vesiculosus, Jacquem. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 188-moIlis.
vestitns, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. ix. 98.—Graeda.
vestitns, 5. *Wats. Bibliog. Ind.* 202.—Calif,
vexillaris, *Boiss. Diagn.* Ser. I. it 49.—Mesopotam.
viriaefolius, *DC. Astrag.* 119.—Reg. Cancas.; As. Min.
vicioides, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6981.—Reg. Himal.
vicioides, Ledeb. Fl. Alt. iii. 801-macropteras.
villosissimus, *Bunge, Astrag.* i. 129; ii. 225.—Turkestan.
vitlosus, Gneldenst ex Ledeb. Fl. Ross. i. 654» pubiflorus.
viUosus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 67.—Am. bor.
vimineus, Pall. Astrag. 24. t. 21=-fruticosus.
virescens, Ait. Hort. Kew. iii. 7S=falcatus.
virgatus, *Pall. Astrag.* 20.1.18.—Hung.; Taur.
virgatus, Reichb. ¥1. Germ. Excurs. 510,868 = Mnelleri.
viridis, *Bunge, Astrag.* i. 186; ii. 281.—Armenia.
viscosus, Chaix, ex Vill. Prosp. 42=Oxytropis campestris.
Volckmanni, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1861) I. 46.—Chili
Vulnerariae, *DC. Prod.* ii. 300.—As. Min.
vulnerarioides, AIL Fl. Pedem. i. S48=Anthyllis Vulneraria.
vulpinus, Ledeb. Fl. Alt. iii. 818=lagocephalus.
vulpinus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1259.—Turkestan.
Wagneri, *Bartl. ex Bunge, Astrag.* ii. 126.-Persia.
Wardii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 55.—Utah,
urtoënsis, *Boiss. tf Kotschy, ex Bunge, Astrag.* 1. 87; ii. 153.—Armenia,
Webberi, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 154.—Calif.
Webbianus, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6986.—Reg. Himal.
Weidmannianus, *Fisch. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) II. 396.—Anatolia.
Whitneyi, *R. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 526.—Calii
Wilhelmsii, *Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i.* 603=resupinatus.
vingatanus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (,1882-83) 192.—Am. bor. occ.
wolgensis, *Bunge, Astrag.* i. 36; ii. 47.—Rossia.
Wrightii, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1860) 176.—Texas.
Wulfeni, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 207.—Dalmatia; Graecia.
xanthomelas, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 314.—As. temp,
xanthotrichos, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 324.—Sibir. altaic
xerophilus, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 007.—Mont. Ararat.
Xiphidium, *Bunge, Astrag.* i. 25; ii. 218.—Reg. Caucas.
xiphocarpns, *Benth. ex Bunge, I. c.* i. 27 ; ii 32.—Reg. Himal.
xylorrhizus, *Bunge, Astrag. Fedsch.* 267.—As. temp,
yuralicus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. Stitf.—Cappadocia.
zacharensis, *Bunge, Astrag.* i. 28; ii. 27.—Syria,
zachlensis, *Bunge, I. c.* l. 88; ii. 154.—Syria,
zagrosicus, *Boiss. V Haussi. ex Boiss Fl. Orient,* ii. 286.—Persia,
zanskarensis, *Benth. ex Bunge, Astrag.* i 43; ii. 67.—Reg. Himal.
zerdanus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 51.—Persia.
aeylanicus, Ledeb. ex Bunge, Astrag. ii. 184 => caenileus.
Zohrabi, Bunge, 1. c. i. 68; ii. 112 = lagopoidea.

ASTRANTHIUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 312 = BelliB, Linn. (Compos.).
integrifolia, Nutt 1. c.=B. integrifolia.

ASTRANTHUS, Lour. Fl. Cochinch. 221 (1790)-Homalium, Jacq. (Samyd.).
cochinchinensis, Lour. 1. c. 222 •=• H. fagifotium.
foetida, Wall, ex Mast in Hook. f. FL Brit, liid.ii. 598 - H. foetidnm.

ASTRANTIA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735).
UMBELLIFERAB, Benth. & Hook. f. i. 879.
ACTINOLEMA, Fend, Pugill. PL Syr. 66.1.12 (1842).
alpina, Stur, ex Nym. Consp. 318=gracili».
alpina, [Clairv.] Man. Herb. 78-minor.
bavarica, Schult in Flora, xii. (1858) 161~gracilis.

ABTRANTIA:—
Hebersteinii, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 28.—Reg. Cancas.
Candida, Mill. Gaid. Diet. ed. VIII. n. 2=major.
carinthiaca, Hoppe, ex Koch, Syn. fl. Germ. ed. 1.281 =major.
carniolica, *Wulf. in Jacq. Fl. Austr.* v. 81.—Carinth.
carniolica, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 280=gracilis.
caucasica, Willd. ex Spreng. Umb. 17 = major,
ciliaris, *Linn./. Suppl.* 177.—Afr. austr.
croatica, *Tomm. ex Vukot. in Rod. Jugos. Akad. Zagreb,* xliv. (1878) 216.—Croatia.
Diapensia, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 186=Sanicula europaea.
digitata, Moench, Meth. 94=minor.
dondiaefolia, Schur, Enum. PI. Transs. 245=gracilis.
elatior, Frivald. in Flora, xix. (1886) 434=major.
Epipactis, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 18S = flacqnetia Epipactis.
europaea, Linn, ex Rehm. Notiz. Veg. Gest Schwarz. Meer. 68 = major?
gracilis, *Bartl. in Linnaea,* xv. (1841) *Litt.* 98.—Camiolia.
gracilis, Schnr, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 22 = carniolica.
grandiflora, Foepp. ex DC. Prod. iv. 668 *("Pogoa coriacea).*—Reg. Andin.
helleborifolia, *Solid). Prod.* 169.—Reg. Cancas.
heterophylla, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Nene Schr. iii. (1801) 419=helleborifolia.
intermedia, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. Snppl. 194 « major.
major, Bieb. 1. c. n. 509 = Biebersteinii.
major, *Linn. Sp. PI.* 235.—Reg. Caucas.
maxima, Pall, in Nov. Act. Petrop. vii. (1793) 857. t. 11-helleborifolia.
microphylla, Schur, Ennm. PI. Transs. 245—gracilis.
minor, *Linn. Sp. PI.* 285.—Eorop.
minor, Scop. Fl. Can. ed. II. i. 187 = carniolica.
minor, Vitm. Snmma Veg. ii. 124 = pauciflora.
montana, [Clairv.] Man. Herb. 78=major,
neglecta, *C. Koch V Bouchi, in App. Sent. Hort. Berol.* (1858) 22.—Europ.
nigra, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 188=major.
pallida, Presl, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 280; ed. II. 809 = major,
pauciflora, *Bertol. in Desv. Journ. Bot.* ii. (1818) 76.—Italia.
ranunculifolia, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xxi. 8.—Europ.
saniculaefolia, Salisb. Prod. 159 = major.
speciosa, Hort. ex Heynh. Nom. ii. 63=helleborifolia.
transsilvanica, Schur, Enum. PL Transs. 245 = carniolica.
tridentata, *Parrot, Reise Krym Kaui.* ii. 130, nomen. —Reg. Caucas.
trifida, Hoffm. Umb. ed. II. 1. praef. 8 in nota=major.

ASTRAPAEA, Lindl. Coll. Bot t. 14 (1822)-Dombeya, Cav. (StercuL).
penduliflora, DC. in Mém. Soc. Phys. Genèv. iv. (1828) 90-D. WaUichii.
tiliaefolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 58=D. acutangnla.
viseosa, Sweet, 1. c. = D. cannabina.
WaUichii, Lindl. Coll. Bot. t. 14=D. WaUichii.

ASTKEBLA, F. Muell. [Fragm. x. 76 (1876), nomen] ex Benth. Fl. Austral, vii. 602 (1878). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1170.
elymoides, *F. Muell. ex F. M. Bailey, Grass. Queensl.* i. —Austral,
pectinata, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 602.—Austral,
triticoides, *F. Muell. I. c*—Austral.

ASTREPHIA, Dufr. Hist. Valer. 50 (1811), proparte. *VALERIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 153.
OLIGACOCE, Willd. ex DC. Prod. iv. 632 (1830).
carnosa, Dufr. 1. c. 51=Valeriana camosa.
chaerophylloides, *DC. Prod.* iv. 629.—Peruv.
chinensis, *Dufr. Hist. Valer.* 51.—China.
coarctata, Dufr. 1. c. = Valeriana coarctata.
crispa, *Dufr. I. c*—Chili.
hyalinorrhima, Dufr. 1. c. 52 = Valeriana hyalinorrhiza.
interrupta, Dufr. 1. c. 41 = Valeriana interrupts.
laciniata, Dufr. I. c. 56=chaerophylloides.
laxa, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 364. —Chili,
lobata, *Hook, (f Am. i.* c—Chili.

ABTREPHIA:—
mexicana, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. Suppl. 481 =Phyllactis mexicana.
mexicana, Seem. Bot Voy. Herald, 297=Valeriana mexicana.
oblongifolia, Dufr. Hist Valer. 60=Valeriana oblongifolia.
polystachya, Dofr. 1. c. 61 = Valerianopsis polystachya.
pratensis, Benth. PI. Hartw. 39=Phyllactis pratemis.
serrata, Dufr. Hist. Valer. 60 =» Valeriana serrata.

ASTROCARPTJS, Neck. Elem. ii. 243 (1790). *RESEDACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 111.
SESAMELLA, Reichb. Consp. 186 (1828).
abyssinicus, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 103 = Caylusea abyssinica.
Clusii, *J. Gay, in F. Schulii, Arch. Fl. Fr. et Allem.* 33.—Hispan.
cochlearifolius, *Nym. in Ofver. Vet. Akad. Stockh.* xviii. (1861) 191.—Lositan.
interruptus, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 7-sesamoides.
minor, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1865) 85 *{Pugill.* 280. t 4. f. 1).—Europ.
purpurascens, Rafin. Fl. Tellur. iii. 73 = Clusii.
sesamoides, Colm. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 899 = Clusii.
sesamoides, *DC. ex Duty, Bot. Gall.* i. 67.—Europ.
spathulaefolius, *Revell, ex Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire,* i. (1867) 87.—Gallia.
suffruticosus, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1866) 83 *(Pugill.* 278. t. 4).—Hispan.

ASTROCARYTOE, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 265 (1818). *PALMAS,* Benth. & Hook. f. iii. 942.
ToxoPHOENlx.Schott, Nachr. K. K. Oester. Naturf. in Brasil. Anh. ii. (1822).
acanthopodium, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 20.—Bras,
acaule, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 78. t. 24. 63. f. 5. —Bras.
aculeatum, Barb.-Rodr. Ennm. Palm. Nov. 20 = Rodriguesii.
aculeatum, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 266.—Guiana.
aculeatum, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 280 = Acrocomia sderocarpa.
aculeatum, Wallace, Palm Trees Amaz. 111. t. 43 = minus ?
argentenm, *Hort. Bull.—Cf. Gard. Chron.* (1876) I. 491.—Hab.«
aureum, *Griseb. V H. Wendl. in Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 521.—Ind. occ
Awarra, De Vriese, in Jaarb. Maatsch. (1848) 12 = aculeatum.
Ayri, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 71. t 59'.—Bras.
Borsigianum, C. Koch, ex Regel, Gartenfl. (1861) 29 =Stevensonia grandifolia.
campestre, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 79. t. 63. f. 4. —Bras,
candescens, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 22.—Bras.
Chichon, Linden, Illustr. Hortic xxviii. (1881) 15-mexicanum.
Chonta, *Mart, in Palmet. Orb.* 84. t. 4. f. 1. 2.—Peruv.
farinosum, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 21.—Bras,
flexuosum, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 232. —Hab.!
guianense, *Splitg. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 823. —Guiana.
gynacanthum, *Mart. 1. c.* ii. 71. t. 60, 61.—Bras.
gynacanthum, Wallace, Palm Trees Amaz. 103. t. 89=A. Munbaca?
Huaimi, *Mart, in Palmet. Orb.* 86. t. 13. fig. 8.—Bolivia,
humile, *Wallace, Palm Trees Amai.* 116. t. 45.—Bras.
Jauari, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 76. t. 52 et 65. f. 1. -Bras.
Jucuma, Linden, Illustr. Hortic. xxviii. (1881) 15, sphalm.» A. Tucuma.
Malybo, *Karst. in Linnaea,* xxviii. (1856) 245.—N. Granat.
mexicanum, *Liebm. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 823. —Mexic.

ABTBOCABTTJM::-
minus, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 78.—Bras.
Munbaca, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 74.—Bras.
Murumura, *Mart. 1. c.* 70. t. 58, 59.—Bras.
Mummuru, *Wallace, Palm Trees Amat.* 101. t 38. —Bras,
panamense, *Linden, Illustr. Hortic.* xxxviii. (1881) 15. —N. Granat.
Paramaca, *Mart, in Palmet. Orb.* 88.—Guiana,
plicatum, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 875.—Guiana; Bras.
Princeps, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 22.—Bras,
pygmaeum, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 885.—Bras,
pnmilum, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 232.—Hab.!
Rodrignesii, *Trail, in Joum. Bot.* xv. (1877) 79.—Bras.
Tostratum, *Hook. Bot. Mag.* t 4773.—Bras.
sclerocarpum, Hort ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 282 = Acrocomia sderocarpa.
sclerophyllum, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* ifi. II. 377. —Bras.
segregatum, *Drude, I. c.* 882.—Bras,
tenuifolium, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 15. —Bras.
Tucuma, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 77. t. 66. f. 2. —Bras.
t\}cumoidea,Drude,inMart.Fl. Bras.iil II. 881.—Bras,
vuhjare, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 74. t. 62, 63.—Bras.
Warszewiczii, *Karst. in C. Koch V Fint. Wockenschr.* (1858) 297.—Am. austr.
WeddelUi, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 383.—Bras.

ASTROCEPHALUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 94 (1836; = ASTEROCEPHALUS, Vaill.=8cabioaa, Toura. (Dipsac).
dliata, integrifolia, rigida, sylvatica, tatarica, uralensis, Rafin. 1. c.=Scabiosae totidem homonymae.

A8TROCOCCTJ8, Benth. in Hook. Kew Joum. vi. (1864) 327. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 826.
coriaceus, *Baill. in Adansonia,* v. 308.—Bras,
comutus, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 827. —Bras.

ASTROCOMA, Neck. Elem.i. 112 (1790) = Staavia, Dahl (Bruniac).

ASTRODENDRUM, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818)=Storculla, Linn.
malabaricum, Dennst 1. c.=S. guttata.

ASTROGLOSSUS, Reichb. f. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 588 (1883)=Trichocero8, H. B. & K. (Orchid.).

ASTROGYNE, Benth. PI. Hartw. 14 (1839) = Croton, Linn. (Enphorb.).
crotonoides, Benth. 1. c. = C. gracilis.

ASTROGYNE, Wall, ex Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. (1875) 629=Siphonodon, Griff. (Celastr.).
coriacea, Wall, ex Laws. 1. c.=S. celastrineus.

ASTROLOBIUM, DC. Prod. ii. 311 (1825) = Omithopus, Linn, et Coronilla, Linn. (Legumin.).
creticum, DC. 1. c. 310 = C. cretica.
durum, DC. 1. c. 811=O. durns.
ebracteatum, DC. 1. c. = O. ebracteatum.
repandum, DC. 1. c. = C. repanda.
scorpioides, DC. 1. c. = C. scorpioides.

ASTBOIiOMA, R. Br. Prod. 538 (1810). *EPACRIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 611.
MESOTRICHA, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1859) I. 6.
PENTATAPHRUS, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 618.
STENANTHERA, R. Br. Prod. 588 (1810).
STOMARRHENA, DC. Prod. vii. 738 (1838).
VENTENATIA, Cav. Ic. iv. 79 (1797).
VIHTENATIA, Cav. 1. c. 28 (1797).
Baxteri, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vii. 73!).—Austral.
Candolleanum, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 302.—Austral,
compactum, *R. Br. Prod.* 538.—Austral.

ABTKOLOMA:—
conostephioides, *F. Muell. ex Benth. Ft. Austral,* iv. 158.—Anstral.
cuneifolium, Sond. in Lehm. PI. Preiss. L 299=compactum.
denticulatum, R. Br. Prod. 688=humifusum.
dilatatum, Sond. in Lehm. PI. Preiss. i. 298 = longinorms.
discolor, Sond. 1. c. = longiflornm.
oivaricatom, *Sond. 1. c.* 299.—Austral.
Drummondii, *Smd- L* <••—Austral,
foliosum, *Sond. 1. c.* 297.—Austral.
glaucescens, Sond. 1. c. 298=macrocalyx.
htrsutum, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1859) 1.7 =Drummondil.
humimsum, *R. Br. Prod.* 588.—Austral.
juniperinum, F. Muell. Fragm. vi. 86 = microphyllum.
lasionemum, F. Muell. 1. c. 40=stomarrhena.
laUfolium, Sond. in Lehm. PI.. Preiss. i. 802 = tectum.
longiflorum, *Sond. I. c.* 297.—Austral,
•nacrocalyx, *Sond. I. c.* 801.—Austral.
wrginatum, Sond. I. c. 299=divaricatum.
nucrocalyx, *Sond. I. c.* 298.—Austral,
nucrodonta, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 155.—Austral,
microphyllnm, *Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1859) I. 7.-Austral.
Pallidum, *R. Br. Prod.* 688.—Austral.
Pallidum, Sond. in Linnaea, xxvi. (1868-55) 246 = numifusum.
Pinifolium, *Benth. Fl. Austral,* iv. 159.—Austral.
Prostratum, *R. Br. Prod.* 588.—Austral.
Pungens, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1859) 1.8 = divaricatum.
splendens, Planch, in Fl. des Serres, Sèr. I. x. (1854-55) 129. t. 1018=divaricatum.
stomarrhena, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 801.—Austral.
tatum, *S. Br. Prod.* 538.—Austral.
Mrophyllum, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 301.—Austral.

A8TBO1TIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) *a- I. Art. iv. 1 j Blume, Bijdr. 1080 (1826). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 771.
ASTRONIDIUM, A. Gray, Bot. U. St Expl. Exped. i. T 582. t. 72 (1854).
LOMANODIA, Rafin. Sylva Tellur. 97 (1888).
NAUDINIA, Decne. ex Triana, in Seem. Fl. Vit. 86 11866).
eoncolor, Zipp. ex Steud. Nom. ed. II. i. 165=macroPhylla.
confcrtiflora, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 579. —Ins. Fiji.
Lnmingian^ *vtdal, Phan. Cuming. Pkilipp.* 174.—«. Philipp.
Fo 9?eri> *Naui*-_>». ^«- *• «*• SEr_IIL xriii_ (1852) . 258.-I_ns_. Tahiti.
Sterna, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 576. t. , '*—Ins. Tahiti.
fraterna, Seem. Fl. Vit. 85, 86 = Forsteri.
»««, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 152 . = foeteii.
>*termedia,* Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 9-spectabills.
macrophylla, *Blume, Bijdr.* 1080.—Malaya.
ovalifoli TaM_ti. •*'*IfmUL '* DtCne, Sot, Voy, VAtUS, 12t~ Ins.
P»PeUria, *Blume, Bijdr.* 267.—Ins. Molucc.
P q?<? Ora> 7 '«a»B.»» *Tram. Linn. Soc.* xxwîi. (1871) – 152.—Ins. Fiji,
ttckeringii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 577. t. 72.—Ins. Fiji
pa f?l*t«. *Triana', in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 152.-103. Tahiti.
ro husta, *Seem. Fl. Vit.* 86.-Ins. Fiji.
Rotlei PHi'ippensis, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 3.—Ms. Samoa.
sa *Vidal, Phan_ Cumin_e- philipp_* 174>_I ns.
moensis, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) «2.-Malaya.
'Pectabilis, *Blume, Bijdr.* 1080.—Java.
*P"tabilis, Zipp. ex Steud. Nom. ed. II. i. 186-
pap Storck *£Ei*nan Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) "2.—Ins. Fiji.

ASTRO1TIA:—
subcordata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 580.—Ins. Samoa,
tomentosa, *Seem. Fl. Vit.* 86.—Ins. Fiji.

ASTRONIDIUM, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 581. t. 72 (1854)=Astronia, Blume (Melast.).
panriflorum, A. Gray, 1. c. 582. t. 72 = Astronia parviflora.
Storckii, Seem. Fl. Vit. 87=Astronia Storckii.

ASTBOHTTJM, Jacq. Enum. PI. Carib. 10. *ANACARDIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 423.
Balansae, *Engl. in Bot. Jahrb.* i. (1881) 45.—Paraguay.
Candollei, *Engl. I. c*—Paraguay.
condnnum, *Schott, in Spreng. Syst. Cur. Posi.* 404.—Bras.
fraxinifolfam, *Schott, in Spreng. 1. c.*—Bras,
gracile, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 75.—Bras.
graveolens, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 88.—N. Granat.
insigne, March. Rev. Anac. 177 = Parishia insignis.
juglandifolium, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 94=A. Unmdeuva.
Libonianum, *J. Linden, Cat.* n. 17. (1862) 7.—Bras.
macrocalyx, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 75.—Bras.
obliquum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 176.—Ind. oce.
Planchonianum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 899.—Am. trop.
Urundeuva, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 45.—Bras.

ASTROPANAX, Seem, in Journ. Bot. iii. 176 (1865) = Heptapleurum, Gaertn. (Araliac).
abyssinicum, Seem. 1. c. 177 = H, abyssinicum.
Baiiiei, Seem. 1. c. = H. Baikiei.
Barteri, Seem. 1. c. = H. Barteri.
elatum, Seem. 1. c. = H. elatum.
Manni, Seem. 1. c. = H. Mannii. •

ASTROPETALUM, Griff. Notul. iv. 411. t. 565 (1854) = Swintonia, Griff. (Anacard.).

ASTROPHEA, Reichb. Consp. 132 (1828) -Paasiflora, Linn.
emarginata, M. Roem. Syn. Pepon. 152=P. emarginata.
glaberrima, Klotzsch, in Schomb. Fauna & Fl. Guy. 1168, nomen.—Guiana.
glauca, M. Roem. Syn. Pepon. 151 = P. arborea.
ovata, M. Roem. 1. c. = P. ovata.

ASTROPHIA, Nutt. in Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 278 (1838) = Iiathyrus, Linn. (Legum.).
littoralis, Nutt. 1. c = L. Uttoralis.

ABTBOFHTIiLTJH, Torr. *Sc* Gray, in Bot. Pope Exped. (Padf. Rail. Rep. ii.) 161 (1856). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 296.
dnmosum, *Torr.* to" *Gray, I. c.*—Am. bor. occ.

ASTROPHYTUM, Lem. Cact. Gen. Nov. Gen. et Sp. 3 (1889)=Eohinooaotus, Unk *Sc* Otto (Cact.).
Asterias, Lem. Cact. 50=E, Asterias.
myriostigma, Lem. Cact Gen. Nov. et Sp. 4 = E. myriostigma.
prismaticum, Lem. Caet. 60 = E. myriostigma.

ASTROPUS, Sprang. Neue Entdeck. iii. 64 (1822) = Waltheria, Linn. (Stercnl.).
tomentosus, Spreng. 1. c. = W. Astropus.

ASTROSCHOENUS, Lindl. Veg. Kingd. 118 (1847) = Asteroschoenus, Nees (Cyperac).

A8TH.OSTEMMA, Benth. in Hook. Ic PI. xiv. 7. t 1311 (1880). *ASCLEPIADEAE.*
spartioides, *Benth. 1. c.*—Borneo.

A8TROTEJCHA, DC. Coll. Mém. v. 29 t. 5 (1629); Prod. iv. 74 (18S0). *ARAUACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 937.
asperifolia, F. Muell. ex Klatt, in Linnaea, xxix. (1858) 709=ledifolia.
floccosa, *DC. Coll. Mém.* v. 30. t. 5.—Austral.
Hamptoni, *F. Muell. Fragm.* vi. 125.—Austral,
hoveoides, *A. Cunn. ex Benth. Enum. PI. Huegtl.* 55.—Austral,
latifolia, *Benth. I. c.* 54.—Austral.

ASTSOTBICHA:-
ledifolia, *DC. Coll. Mim.* v. 30. t. 6.—Austral,
linearis, *A. Cunn. ex Benth. Enum. PI. Huegel.* 56.—Austral.
longifolia, *Benth. 1. e.*—Austral,
pterocarpa, *Benth. Fl. Austral,* iii. 379.—Austral.

ASTYDAMIA, DC. Coll. Mém. v. 53 (18-29;; Prod. iv. 190 (1830). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 909.
canariensis, *DC. Prod.* iv. 190.—Ins. Teneriff.
latifolia, Baill. Hist. PI. vii. 208-canariensis.

ASTYLIS, Wight, Ic. t. 1992 (1853) = Hemioyolia, Wight & Am, (Euphorb.).
venusta, Wight, 1. c. = H. venusta.

ASTYLUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 188 (1867) = Hutehlnsia, R. Br. (Crucif.).
alpinus, Dulac, 1. c. •= H. alpina.
petraea, Dulac, 1. c. = H. petraea.

ASTYRIA. Lindl, Veg. Kingd. 364 (1847) = Astiria, Lindl. (Stercul.).

ASYNEUMA, Griseb. *Sc* Sehenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 335 = Phyteuxaa, Linn. (Campan.).
canescens, Griseb. & Sehenk, I. c. = P. canescens.

A8Y8TASIA, Blume, Bijdr. 796 (1826). *ACANTHACEAE,* Benth & Hook. f. ii. 1094.
DICENTRANTHERA, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. vii. (1863) 52.
HENFREYA, Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 31.
INTRUSARIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 66 (1836).
MACKAYA, Harv. Thes. Cap. i. 8. t. 13 (1859).
RAMUSIA, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docnm. 215 (1843).
acuminata, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 201.—Afr. trop.
africana, *Hort. Bogor. ex T. Anders, in Journ. Agri.-Hart. Soc. Ind.* N. S. i. (1868) 287.—Afr. trop.
atroviridis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 526.—Reg. Himal.
Blumei, Nees, in DC. Prod. xi. 167=intrusa.
Bojeriana, Nees, 1. c. 166 = coromandeliana.
calycina, Benth. in Hook. Niger Fl. 478=Strobilanthea Helictus.
capensis, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 856-coromandeliana.
Charmian, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 88.—Afr. trop.
chelonoides, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 89 — Ind. or.
chinensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 228.—China.
comorensis, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 166 = coromandeliana.
coromandeliana, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 89.—Ind. or.; Malaya ; Afr. trop. et austr.
coromandeliana, Wight, Ic. t. 1506 -= crispata.
crispata, *Benth. in Linnaea,* xxiv. (1851) 647.—Ind. or.
denticulata, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 89 = Strobilanthes denticulatus.
floribunda, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 200.—Afr. trop.
formosa, Hort. Calc. ex T. Anders, in Journ. Agri.-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 270=Ruellia formosa.
gangetica, T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl. 235 = coromandeliana.
intrusa, *Blume, Bijdr.* 796.—Malaya.
intrusa, Nees, in DC. Prod. xi. 166 = coromandeliana.
Kunthiana, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 89.—Penang.
lanceolate, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 624.—Burma.
Lawiana, *Dale, in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 344 — Ind. or.
macrocarpa, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 89 — R«r Himal.
multiflora, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 203.—Afr. trop.
myurenis < *T-* Anders, in Joum. linn. Soc. ix. (1867) 524 = Lawiana.
Neeuana, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 89 — Ind. or.; Burma.
nemorum, Nees, 1. c. 90=intrusa.
Panichanga, Nees, 1. c. - Strobilanthes Panichanga.

A8YSTA8IA :—
Pariskii, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 526 = Eianthemum Parishii.
pauciflora,H<xs, in Wall. Fl. As.Rar. iii. 90 »Codonacanthus pauciflorus.
plumbaginea, Nees, 1. c. 89 = coromandeliana.
podostachys, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 199.—Afr. trop.
pubescens, *Klottsch, 1. c.* 202.—Afr. trop.
quartema, *Nees, in DC- Prod.* xi. 166.—Afr. trop.
querimbensis, *klottsch, in Peters, Seise Mossamb. Bat.* 204.—Afr. trop.
rostrata, Solms, in Schweinf. Fl. Aethiop. 242 = Schimperi.
scabrida, *Klotnsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 202.—Afr. trop.
scandens, *Hook. Bot. Mag.* t. 4449.—Afr. trop.
Schimperi, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 40, 53.—Abyss,
snbhastata, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 200.—Afr. trop.
tkyrsacanthus, T. Anders, in Jonm. Linn. Soc. ix. (1867) 525 = Eranthemum indicum.
travancorica, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 39.—Ind. or.
violacea, *Dal*, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 494.—Ind. or.
violacea, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (I860) 139 = coromandeliana.
Vogeliana, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 479.—Afr. trop.
Welwitschii, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 308. t. 218.—Afr. trop.

ATACCA, Lem. Jard. Flenr. ii. (1852) t. 186, 187 = seq.

ATACCIA, Fresl, Rel. Haenk. 149 (1828)=Tacoa, Forst.
aspera, Kunth, Enum. PI. v. 464 = T. integrifolia.
cristala, Kunth, 1. c. 466 « T. cristata.
integrifolia, Presl, Rel. Haenk. 149 - T . integrifolia.
laevis, Knnth, Enum. PI. v. 466 = T. laevis.
lancaefolia, Kunth, 1. c. 465 = T. lancaefolia.

ATADINUS, Rafin. Sylva Tellur. 30 (1838) = Bhamnus, Linn.
alpinus, Rafin. 1. c.=R. alpinos.

ATAENIA, Endl. Gen. Suppl. v. 5 (1850)=ATENIA, Hook. & Am.-Carom, Linn. (Umbell.).

ATALANTA, Nutt. Gen. Am. ii. 78 (1818) - Cleome, Linn. (Cappar.).
serrulata, Nutt. 1. c. = C. serrulata.

ATALANTHUS, D. Don, in Edinb. N. Phil. Jonm. (Mar. 1829) 811 = Bonchus, Linn. (Compos.).
angustifolius, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 8 ^*Zollikoferia angustifolid).*—Afr. bor.
arboreus, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 278=S. arboreus.
Candolleanus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 8 *(=ZolIikoferia Candolleana).*—Afr. bor.
divaricatus, Pomel, 1. c. 7=S. divaricatus.
longilobus, Pomel, 1. c *(—Zollikoferia longiloba).*—Afr. bor.
nudieaulis, Pomel, 1. c. = Launaea nudicanlia.
pinnatus, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Mar. 1829) 811 - S . leptocephalus.
qttercifolius, Pomel, L c. 8—S. quercifolius.
resedifolius, Pomel, L c. (*=Zollikoferia resedifolia).* —Afr. bor.
spinosus, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (Mar. 1829) 311-Launaea spinosa.

ATAT.ANTIA, Correa, in Ann. Mua. Par. vi. 983 (1805). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 805.
CHILOCALYX, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc. (1863) I. 688.
HELIE, M. Koem. Syn. Hesper. 42 (1846).
LAMPETIA, M. Roem. 1. c. (1846).
MALNAREGAM, Adans. Fam. ii. 344 (1763).
MEROPE, M. Roem. Syn. Hesper. 44 (1846).
RISSOA, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 324.
SCLEROSTYLIS, Blume, Bijdr. 138 (1825).
SEVERINIA, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1840).
bilocularis, Wall. Cat. *a.* 6356 - Limonia bilocularis.
buxifolia, *Oliver, in Benth. Fl. Hongk.* 51.—China.

ATAT.ATTOIA:—
buxifolia, Oliver, in Jonm. Linn. Soc. v. SuppL ii. (1861) 26 = Limonia bilocularis.
capitellata, Lindl. in Wall. Cat. n. 6365-racemosa.
carissoides, Wall. 1. c. n. 6854 = monophylla.
caudate, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 613.—Reg. Himal.
ceylanica, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 25.—Ind. or.
citrifolia, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 69.—Burma.
floribunda, Wight, Ic. iv. t. 1611=monophylla.
glauca, *Benth. V Hooi.f. Gen.* i. 306.—Australl.
Hindsii, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 26.—China,
longispina, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 295.__Burma.
Loureiriana, *M. Roem. Syn. Hesper.* 37.—Cochinch.
macrophylla, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) II. 136.—Ins. Nicobar.
missionis, *Oliver, in Joum. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 25.—Ind. or.
monophylla, Benth. in Hook.Lond. Journ. Bot. i. (1842) 488 = Hindsii.
monophylla, *DC. Prod.* i. 635.—Ind. or.
monophylla, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 172 = buxifolia.
nitida, *Oliver, in Joum. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 25.—Malaya.
parvifolia, M. Roem. Syn. Hesper. 37—racemosa.
platystigma, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 108=monophylla.
puberula, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 211.—Siam.
racemosa, *Wight V Am. Prod.* 91; *et in Hook. Joum. Bot.* i. (1834) 64.—Ind. or.
recurva, *Benth. Fl. Austral,* i. 870.—Austral.
Roxburghiana, Jftmi.^. *FLBrit. Ind.* i. 513.—Malaya.
Roxburghii, Oliver, in Joum. Linn. Soc. v. Suppl. ii. 25=caudata.
trimera, *Oliver, I. c.*—Malaya.
umbellata, M. Roem. Syn. Hesper. 87=monophylla.

ATALAYA, Blume,Rumphia, iii. 186 (1847). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 401.
annularis, *Blume, Rumphia,* iii. 186.—Malaya.
australis, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. viii. (1878) 327=Sapindus australis.
bijuga, Span. Ic. n. 19; in Linnaea, xv. (1841) 180 = Cupania salicifolia.
cochinchinensis, *Blume, Rumphia,* iii. 186.—Cochinch.
coriacea, *Radlk. in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 826.—Ins. Dom. Howe.
hemiglauca,^. J/«f«. *ex Benth. Fl. Austral,* i. 463.—Austral.
multiflora, *Benth. 1. c.*—Austral,
salicifolia, *Blume, Rumphia,* iii. 186.—Timor.; Austral,
variifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 468.—Austral.

ATAMASCO, Rafin. Neogenyt. 3 (1825)-Amaryllis, Lion.

ATAMI8QTTEA, Miers, Trav. Chili, ii. 529 (1826). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 109.
emarginata, *Miers, I. c.*—Chili.

ATAMOSCO, Adans. Fam. ii. 57 = Amaryllis, Linn.

ATAMOSKO, Adans. Fam. ii. 628=praec.

ATASITES, Neck. Elem. i. 7 (1790) = Oerbera, Gronov. (Compos.).

ATAXIA, R. Br. Chlor. Melv. in App. Parry, Voy. 292 (1824) = Hierochloe, S. G. Gmel. (Gramin.).
Ecklonis, Nees, ex Trin. in Mém. Acad. P&ereb. v. (1840) 77 = H. Ecklonii.
Hookeri, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 77.—Ind. or.
Horsfieldii, Kunth, Gram. i. 22; R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 8. t. 8.—Java.
mexicana, Rupr. in Bull. Acad. Brox. ix. (1842) 233—H. mexicana.
tenuis, Trin. in Mém. Acad. P&enb. v. (1840) 78.—Afr. austr.
Tongo, Nees, ex Trin. 1. e.«=H. Tonga

ATE, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 326 (1836)«Habenaria, Willd. (Orchid.).
acuminata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 809 = H. acuminata.
virens, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 827 - H. barbate.

ATECOSA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836)-Bum0Xr Linn. (Polygon.).

ATELANDRA, Bello, in Anal. Soc Esp. Hist. Nat. x. (1881) 289.1.10. *MYRSINEAE.*
laurina, *Bello, I. c.*—Porto Rico,
obtnsifolia, *Bello, I. c*—Porto Rico.

ATELANDRA, Lindl. Swan Riv. App. 40. t. 5 (1839) -Hemigenia, R. Br. (Labiat.).
incana, Lindl. 1. c. = H. incana.
polystachya, Lindl. 1. c 40-H. incana.

ATELEA, A. Rich. PI. Vase Cub. 454 (1845) «= Ateleia, Moç. & Sessi (Legumin.).

ATELANTHERA, Hook. f. & Thorns, in Jonm. Linn. Soc. v. (1861) 129. *CRUCIFERAE,* Benth. * Hook. f. i. 68.
perpusilla, *Hook.f. br Thorns. 1. c.* 138.—Tibet ocC.

ATEIEIA, Mof. & Sesse, ex DC. Mém. Leg. 395. t. 57 (1825). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 558.
apetala, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 80.—Cuba,
cubensis, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. & viii. (1861) 180.—Cuba.
Glazioveana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1881) 306.—Bras,
gummifera, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 1219.—Ins. S. Doming.
microcarpa, *D. Dietr. 1. c.*—Am. austr.
peltaria, *D. Dietr. 1. c.*—Afr. austr.
pterocarpa, *Mof.* &• *Sesse, ex DC. Lig. Mém.* 394.—Mexic

ATELESTE, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 9, 1U -Aberia, Hochst. (Bixin.).
tristis, Sond. 1. c. 9 = Aberia tristis.
Zeyheri, Sond. 1. c. 10 = Aberia Zeyheri.

ATELIANTHUS, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. x. 455, in nota (1846)=8ynthyris, Benth. (Scrophul.).
veronicoides, Nutt. ex Benth, L c - S . plantaginea.

ATENIA, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 349 (1840) = Carum, Linn. (Umbell.).
Gairdneri, Hook. & Am. 1. c.-C. Gairdneri.

ATERAMNUS, P. Br. Hist. Jamaic. 339 (1756); ' nom. delend.' Benth. & Hook. f. Gen. iii. 256.

ATHALMUS, Neck. Elem. i. 20 (1790)=PaIleni8. Cass. (Compos.).

ATHAMAMTA, Linn. Syst. ed. I (1735). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 900.
KILLINGA, Adans. Fam. ii. 498 (1763).
LIBANOTIS, Hall, Enum. Stirp. Helv. ii. 460 (1742).
PETRO-CARVI, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 356.
TRIBULA, Hill, Veg. Syst. vL 10 (1764).
TURBITH, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 348.
achilleifolia, Wall. Cat n. 568 -Piinpinella acfailleifolia.
Ajoaan, Wall. Cat. n. 672 = Carum copticum.
alata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 214=Ligusticum alatum.
alpina, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 79=cretensis.
ambigua, *Ret*. Obs.* iii. 28.—Hab.t
anethifolia, Wall. Cat. n. 669-Carum anethifolium.
annua, linn. Sp. PL 245—cretensis.
arctica, *Nym. Syll.* 155.—Europ.
aurea, *Vis. ex Reichb. Ic. Fl. Germ.* xxi. t. 1935." Europ.
canescens, DC. Prod. iv. 165 fcerte non Ath. sp. ex Boiss. Fl. Orient ii. 971).—Oriens.
capensis, Bonn. f. Fl. Cap. Prod. 7 = Ligusticum capense.
capillacea, Lam. Encyc. i. 325 = cretensis.
caruifolia, [Web. in] Wigg. Prim. Fl. Hols. 27-Selinum Carvifolia.
carvifolia, *Steph. ex Roem. (f Schult. Syst.* vi. 496.—Rossia.
carvifolia, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. U. 272-Seseli Hippomarathrum.
carvifolia, Willd. ex Ledeb. 1. c. 314-Pencedanum baikalense.
caucasica, Hort Par. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 89 = Seseli athamantoides.

ATHAKAHTA:—
Ctnaria, Linn. Syst. ed. X. 956 - Penoedannm Cervaria.
cervariaefolia, *DC. Prod.* iv. 155.—Ins. Tenerlff.
frvariae/olia, Schrad.ex Sprang. PngiU. ii. 56=Se*eli ouchtormensis.
"rvariaefolia, Viv. ex Steud. Norn. ed. H. i. 166 = Lecokia.cretica.
eiuliosdadia, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. II. ii. 86.—Graeda.
thinensis, Linn. Sp. PI. 246-Selinum Monnieri.
eoarctata, Ag. ex Nym. Consp.296=Sesell granatense.
colhna, Salisb. Prod. 163=Seseli Libanotis.
'ompacta, Ledeb. FL Ait i. 327 = Schultaia compacta.
condensata, Linn. Sp. PI. 1195-Seseli condensatnm.
«~*«u<i<a, Pall, ex Steud. Norn. ed. IL i. 108 = Fallasiana.
attends, *linn. Sp. PII* 245.—Europn anstr.
feteruis, Schrank, Baier. FL i. 545=MatthioH.
cretensis, Ucria, Hort. Panonn. 127 = sicnla.
**nntta,* Ledeb. FL Alt i. 326=Schultzia crinita.
cnthmifolia, Juss. ex DC. Prod. iv. 145-Seseli gummiferum.
crithmoides, Lapeyt. Hist. Abr. PI. Pyr. 148-Seseli Monnieri.
™**cifolia.* Host, FL Anstr. i. 362-Seseli Monnieri.
>ucoitUs, J. F. Gmel. Syst. 477=SeseU Libanotis.
decussata, Gilib. FL Lituan. ii. 18 = Peucedannm Cervaria.
""««, *Boiss.* b[1] *Orph. Diagn.* Ser. II. v. 98.—Imecia.
*»«*tfa, Fisch. ex Homem. Hort. Ham. SuppL 82 \=*Cenolophium Fiseheri)* —Rossia.
*£«»>D. Don, Prod. FL Nep. 184 - Cortia hdleyi.
iiffusa. Wall. Cat. n. 670=Seseli indicum.
aivaricata, Gilib. FL Lituan. ii. 17=Pencedanum Oreoselinum.
"naricifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 78-praec.
fiavescens, Vis. Orto Bot Padov. (1842) 185 = Portenschlagia ramosissima.
flexuosa, Juss. ex DC. Prod. iv. I79=Peucedanum palnstre.
Galatta, Gmel. ex DC. Prod. iv. 2S0=Pleurospermum Golaka.
Golaka, Hacq. PI. Cam. t. 5-Pleurospermutn Golaka, Pgjntea,/)./}«,, *Prod. Ft. Nep-M* (Sp. dubia).—JNepal.
"oynaldi, Borb. & Uechtr. in Termte. Füzetek, i. (1877) 30. t. 6, 7=Matthioli.
"ngarica, Borb. ex Nym. Consp. 294 = Matthioli.
**canu,* Steph. ex Willd. Sp. PL i. 1402 = Seseli graveolens.
'"«?»««, Willd. ex Roem. & Schnlt. Syst. vi. 494-ftmpinella villosa.
latenflora, *Eckl. &• Zeyh. Enum.* 348.—Afr. austr.
latifoHa, Viv. FL Ital. 22-Peucedanum Cervaria.
""Hpermum, Poir. Encyc. SuppL i. 532-Seseli leucospennum.
Lvanotis, Linn. Sp. PL 244=SeseIi Libanotis.
lucida, ****. *Obs* - »» 29. Hab.:
macedonica, ^r«,^. *in Rcem.V Sehult. Syst.* vi. 491.—Graeda; Aft. bor.
Mathioli, DC. FL Fr. iv. 318-cretensU.
™atthioli, *Wulf. in Jacq. Coll.* i. 211.—Eur. austr. or.
"«?«•«, Choisy, in DC. Prod. iv. 155-cervariaefoha.
£«««, *Nym. Syll.* 154.—Europ.
««««», Linn. Sp. PL 245-Meum athamanticum.
fount, Pall. Rdse, ii. 28=Schultda crinita.
"onrtrosa, Steph. ex Roem. & Schnlt. Syst. Veg. YI. 495—Schultzia compacta.
multi/Tem, Sibth. & *Sm.* FL Graec. HL 69. t. 276-v-arum mnltifloram.
".Httellinoides, Lam. Encyc. i. 825-cretensis.
yreoselinum, Huds. FL Angl. 115-Seseli Ubanotis.
?stUnum, Linn. Sp. PL 244-Peucedanum Oreose-Imnm.
*Pa*siana, Sibiria, *Vest, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 166.-
fanacf,/*ic Spreng. Sp. Umb. 140 - Magydaris Panacina, tomentosa.
*P**«*a, SavL in Ust. Ann. Bot xxL 7-Pencedumm PalnB.
P<*sceks,* ReU. Obs. iii. 28-Seseli Libanotis.
tyrenaica, Jacq. Hort Vindob. ii. 93-Seseli Monnieri.
a SfV?'"1"'Link * Hoffmgg. FL Port 405.1.106-«»elitortnosum.

ATHAMANTA:—
ramosissima, Portschl. in Roem. *tc* Sehult Syst. vi. 496-Portenschlagia ramosissima.
Rdchenbachii, *Nym. Syll.* 164.—Europ.
rigida, Hornem. Hort. Hain. 960-Seseli buchtormensis.
rigida, *Roth, Enum. PL Phan. Germ.* i. 907.—Europ.
Riviniana, Host, ex Steud. Norn. ed. II. i. 166-Seseli Libanotis.
Roxburghiana, Wall. Cat. n. 571 - Carum Roxburghianum.'
rupestris, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 470-MatthiolL
rttpestris, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 648-cretensis.
scabra, *Burm.f. Prod. Ft. Cap.* 7.—Afr. anstr.
sibirica, Linn. Sp. PL 244-Seseli sibiricum.
sicula, *Linn. 1. c*—Ital.; Afr. bor.
sicula, Ucria, Hort. Panor. 187-Knndmannia sicula.
stricta, *Ledeb. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 166.—Sibiria.
sylvestris, [Web. in] Wigg. Prim. Fl. Hols. 26= Angelica sylvestris.
tenui/olia, Pall, ex Roem. & Schnlt. Syst. vi 495-Seseli tennifolium.
tenuifolia,.VHai. ex Spreng. in Roem. & Schnlt. 1. c. -Peucedanum salinum.
terra, *D. Don, Prod. Fl. Nep,* 185 (Sp. dnb.).—NepaL
tortuosa, Spreng. Syst. i. 900 *{-Drverra tortuosd).*—Aegypt.
Turbith, Brot Phytog. Lusit. 200. t. 169=Seseli tortuosum.
verticillata, Portschl. Enum. PL Dalm. 14. t. 4 = Portenschlagia ramosissima.
verticillata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 68. t. 275 = Carum graecom.

ATHAMUS, Neck. Elem. i. 85 (1790)-Oarlina, Linn. (Compos.).

ATHANA8IA, Linn. Sp. PL ed. II. 1180 (1762).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 416.
BEMBYCODIUM, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 816.
HOLOPHVLLBlf, Less. Syn. Comp. 262 (1833).
HYMENOLEPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 1S8; et in Diet. Sc. Nat. xxii. 315 (1821).
METAGNANTHUS, EndL Gen. 438 (1838).
MORYSIA, Cass. in Diet. Sc Nat. xxxiii. 59 (1824).
PRISTOCARFHA, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 86 (1837).
SAINTMORYSIA, EndL Gen. 488 (1838).
acerosa, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 1401:—Afr. austr.
annua, Linn. Sp. Fl. ed. II. 1182-Lonas inodora.
aspera, *Thuni, Prod. PI. Cap.* 145.—Afr. anstr.
canescens, *Thunb. I. c.* 144.—Afr. austr.
eapitata, Berg. Desc. PL Cap. 237-scabra.
capitata, *Linn. PI. Rar.'Afr.* n. 50; *Amoen. Acad.* vi. 97.—Afr. austr.
einerea. Linn. f. SuppL 361—tomentosa.
coronopifolia, *Harv. in Harv. V Sond. Ft. Cap.* iii. 191.—Natal.
crenata, *Linn. Sp. PI.* 1180.—Afr. .tr.
crithmifolia, *Linn. I. e.* 1181.—Af. austr.
cuneifolia, *Lam. Encyc.* i. 827.—Air. austr.
Cuneiformis, *DC. Prod.* vi. B9.—Afr. austr.
cupressiformis, Comm. ex DC. Prod. v. 814-Lepidophyllum cuprestdforme.
dentata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1181.—Afr. anstr.
dentata, Linn. f. SuppL 361=serrata.
dimorpha, *DC. Prod.* vi. 87.—Afr. austr.
Dregeana, *Han. in Ham. if Sond. Fl. Cap.* UL 191.—Afr. austr.
ebracteata, £. *Mey. ex DC. Prod.* vi. 87.—Afr. austr.
eriopoda, *DC. I. c.* 88.—Afr. austr.
fascicnlata, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 1401.—Afr. austr.
filiformis, *Linn./. Supil.* 861.—Afr. austr.
flabellifera, Salisb. Prod. 189 - Pentxia flabelUformis.
flexuosa, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 91-microcephala.
flexnosa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 144.—Afr. anstr.
genistoefolio, Linn. Mant 464-Relhanla genistaefolia.
globra, Thunb. Prod. PL Cap. 144 - capitata, micro h l la.
glabrescens, *DC. Prod.* vi. 88.—Afr. austr.

ATHANABIA:—
glutinosa, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 288 - Relhania genistaefolia.
graminifolia, Walt FL CaioL 200 - Marshallia angustifolia.
hastata, Walt. 1. c. 201 = Melanthera hastata.
hirsnta, *Thunb. Prod. PL Cap.* 144.—Afr. austr.
imbricata, tfarv. *in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 196.—Afr. austr.
incisa, *Harv. 1. c.* 190.—Afr. austr.
indica, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 417 - Goniocanlon glabrnm.
indlvisa, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* iii.. 190.—Afr. austr.
jnncea, *D. Dietr. Syn. PL* iv. 1401.—Afr. anstr.
laevigata, Linn. PL Afr. n. 50; Amoen. Acad. vi. 61=aspera.
lanuginosa, Cav. Ic i. 2-canescens.
lencoclada, *Harv. in Harv.* b* *Sond. Ft. Cap.* iii. 191.—Afr. anstr.
linifolia, *Harv. 1. c.* 198.—Afr. austr.
Hni/olia, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 23-longifolia.
longifolia, *Lam. Encyc.* i. 326.—Afr. austr.
maritime, Linn. Sp. PL ed. 11. 1182 - DiotU maritima.
microcephala, D. Dietr. Syn. PL iv. 1401-linifolia.
microphylla, *DC. Prod.* vi. 87.—Afr. austr.
Mundtii, *Han. in Han.* b[1] *Sond. Fl. Cap.* iii. 196.—Afr. austr.
obmata, Walt. Fl. Carol. 201 -Marshallia lanceolata.
pachycephala, *DC. Prod.* vi. 88.—Afr. anstr.
palmatinda, *DC. Ire.* 89.—Afr. austr.
paniculata, Walt. Fl. Carol. 201 - Actinomeris alba.
parviflora. *Ait. Hort. Km.* iii. 167.—At. anstr.
parviflora, *Thunb. Prod. PL Cap.* 145.—Afr. austr.
pauciflora, *D. Dietr. Syn. PL* iv. 1401.—Afr. austr.
pectinata, *Linn./. Suppl.* 361.—Afr. austr.
pinnata, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 85-incisa.
pinnata, *Linn./. Suppl.* 361.—Afr. austr.
pnbescens, *Linn. Sp. PL* ed. II. 1182.—Afr. austr.
pubescens, Thunb. Prod. PL Cap. 144-rngulosa.
pumila, Linn. f. Suppl. 362-Relhania pedunculata.
punctata, Berg. Desc. PL Cap. 238-capitata.
punctata, *Harv. in Harv. V Sond. FL Cap.* iii. 190.—Afr. austr.
punctata, Thunb. Prod. PL Cap. 144=capitata.
quinquedentata, *Thunb. Prod. PL Cap.* 146.—Afr. austr.
recunifolia, Salisb. Prod. 189-dentata.
rotundifolia, *DC. Prod.* vi. 87.—Afr. austr.
rugulosa, *E. Mey. ex DC. I.* <•.—Afr. austr.
salidfolia, *Dietr. ex Steud. Nom.* ed. I. 91.—Afr. austr.
scabra, *Thunb. Prod. PL Cap.* 144.—Afr. austr.
scariosa, *DC. Prod.* vi. 88.—Afr. austr.
schizolepis, *Han. in Han. tf Sond. Fl. Cap.* iii. 190.—Afr. austr.
serrata, *Vitm. Sumtna Veg.* iv. 487.—Afr. austr.
sertulifera, *DC. Prod.* vi. 87.—Afr. austr.
sessiliflora, Linn. f. SuppL 862-Relhania sessiliflora.
spathulata, *D. Dietr. Syn. PL* iv. 1401.—Afr. austr.
squarrosa, Linn. PL Rar. Afr. n. 52; Amoen. Acad. vi. 98—Relhania squarrosa.
tanacetifolia, *Roth, Catalecta,* ii. 104.—Afr. anstr.
tomentosa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 144.—Afr. austr.
tricuspis, Poir. Encyc. Suppl. i. 533-trifurcata.
tridentata, Salisb. Prod. 189 -trifurcata.
trifurcata, *Linn. Sp. PL* ed. II. 1181.—Afr. austr.
trinenia, Walt. Fl. Carol. 201-Marshallia latlfolia.
unifiora. Linn. f. Suppl. 362-Relhania enneata.
velutina, *D. Dietr. Syn. PL* Iv. 1401.—Afr. austr.
virgata, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 11. t 148.—Afr. austr.

ATHECIA, Gaertn. Fruct i. 141 (1788)-Foratera, Linn. f. 1 (Stylid.).
glabra, Gaertn. 1. c. = F. sedifoliat

ATHENAEA, Adans. Fam. ii. 121 (1768)-8pargano-phoruB, Vaill. (Compos.). *»ns»u

ATHENAEA, Schreb. Gen. 259 (1789)-Cuearia, Jacq. (Samyd.).

ATKEWABA, Sendt in Mart Fl. Bras. x. 133 (1846).
SOLANACEAE, Benth. & Hook. £ a. 890.

ATHENAEA :—
LAKNAX, Mien, in Ann. & Mae. Nat. Hist. *Set.* II. iv. (1849) 87.
WITHERINGIA, Miers, 1. c. iii. (1849) 145.
anonacea, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 187.1.18.—Bras,
hirsuta, *Sendt. I. c.* 187.—Bras.
Martiana, *Sendt. I. c.* 186.—Bias,
micrantha, *Sendt. I. e.* 185.—Bras,
picta, *Sendt. 1. c.* 134.—Bras,
poeogena, *Sendt. I. c.* 135.—Bras.
Pohliana, *Sendt. I. c.* 136.—Bras.
Schottiana, *Sendt. I. c.* 185.—Bras,
xalapensis, *Hemsl. Biel. Centr. Am. Bot.* ii. 422.—Mexic.

ATHENANTHIA, Knnth, in Mém. Mus. Par. ii. (1815) 71=Anthaenantia, Beauv. (Gramin.).

ATHEOLAENA, Reichb. Consp. 106 (1828) = AETHEOLAENA, Cass. = 8enecio, Linn. (Compos.).

ATHEBANDBA, Decne. in DC. Prod. viii. 497 (1844). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 748.
acominata, *Decne. I. c*—Java,
acutifolia, *Decne. 1. c.*—Malaya.
cuspidata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 147=acntifolia.
pubescens, Blume, 1. c. = acutifolia.
Wallichii, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 744 = Atherolepsis Wallichii.

ATTTinR. A TjpiTTin-R. A Mast, in Oliver, FI. Trap. Afr. ii. 519 (1871); Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 640. *PASSIFLOREAE*.
panicnlata, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 519.—Afr. trop.
Welicitschii, Mast, in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 640=panicnlata.

ATHERNOTUS, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 74 (1867; = CalamagroBtis, Adans. (Gramin.).
epigeios, Dulac, 1. c. = C. epigeios^
laneeolatus, Dulac, 1. c. 75 = C. lanceolatus.
pyramidalis, Dulac, I. c=Deyeuxia sylvatica.

ATHEROCEPHALA, DC. Prod. vii. 755 (1889) = Andersonia, R. Br. (Epacrid.).
Drummondii, DC. 1. *c."* Andersonia aristata.

ATHEBOLEPSIS, Hook. f. in Hook. Ic. Fl. xv. 26. t. 1483 (1888). *ASCLEPIADEAE*.
Wallichii, *Hook.f. I. c*—Burma.

ATHEROPHORA, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 167 (1840) = Aegopogon; Humb. & Bonpl. (Gramin.).
secunda, Willd. 1. c = Aegopogon geminiflorus.

ATHEROPOGON, Muhl. *ex* Willd. Sp. PI. iv. 987 (1805)-Bouteloua, Lag. (Gramin.).
acuminatus, Foum. Mex. PI. En. Gram. 139; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 564.—Mexic.
affinis, Foum. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1169 = B. disticha ?
americanus, Foum. Mex. PI. En. Gram. 140; ex Hemsl. BioL Centr. Am. Bot. iii. 561 = B. bromoides.
Antillarum, Spreng. Syst. i. 294=Aristida Antillarum.
apludoides, Willd. Sp. PI. iv. 937 = B. racemosa.
aristidoides, Koem. & Schult. Syst ii. 415-B. aristidoides.
bromoides, Rpem. *Sc* Schult. 1. c. = B. bromoides.
chondrosioides, Roem. & Schult. 1. c. 416 = B. ovata.
curtipendulus, Foum. Mex. PI. En. Gram. 138; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 663=B. racemosa.
distiehus, Spreng. Syst. i. 294=B. disticha.
domingensis, Spreng. 1. c. 293 *(=Eutriana junced).*—Ins. S. Doming.
filiformis, Foum. Mex. PI. En. Gram. 140; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot iii. 564.—Mexic.
gracilis, Spreng. Syst. i. 298 = B. oligostachya.
kirtus, Spreng. 1. c.=B. hirsnta.
kumilis, Spreng. 1. c. = B. prostrata.
juncifolius, Spreng. 1. c. 294 = B. jundfolia.
medius, Foum. Mex. PI. En. Gram. 139; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 664.—Mexic.
oligostachyus, Nutt Gen. Am. L 78=B. oligottachya.

ATHEROPOGON :—
Pentarrhaphis, Spreng. Syst. i. 294 *(=Eutriana Pentarrhaphis).—Mexic.*
polymorphic, Foum. Mex. PI. En. Gram. 141; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 564.—Mexic.
procumbens, Jacq. Eclog. Gram. 12 = B. tennis.
radicosus, Foum. Mex. PI. En. Gram. 140; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 561-B. bromoides.
repens, Roem. & Schult. Syst ii. 416 = B. bromoides.
scorpioides, Spreng. Syst. i. 298 = B. scorpioides.
stolonifer, Fourn. Mex. PI. En. Gram. 140; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 565.—Mexic.
Triaena, Spreng. Syst. i. 298-B. Triathera.
villosus, Steud. Nom. ed. II. i. 167 *{= Eutriana villosa).*—Bras.

ATHEBO8PEBMA, Labill. Nov. Holl. PL ii. 74. t. 224 (1806). *MONIMIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 144.
integrifolium, A. Cunn. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 676=mosj;latnm.
micranthum, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. iii. (1855) 46 = Daphnandra micrantha.
moschatum, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 74. t. 224.—Austral.
Novae-Zelandiae, *Hook.f. Handb. New Zeal. Ft.* 240.—N. Zel.
repandulutn, *F. Muell. Fragm.* x. 105.—Austral.
Sassafras, A. Cunn. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 676 = Doryphora Sassafras,
sempervirens, *Baill. Adansonia,* ix. (1868) 116; *Hist. PI.* i. 322.—Chili.

ATHEBOSTEMON, Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 126 (1849). *ASCLEPIADEAE*.
javensis, *Blume, I. c.*—Burma; Java.

ATHERSTONEA, Pappe, Sylva Cap. ed. II. 29 (1862) = Strychnos, linn. (Logan.).
decussata, Pappe, 1. c. = S. Atherstonei.

ATHERURUS, Blume, Rumphia, i. 186 (1835) - Pinella, Tenore (Aroid.).
ternatus, Blume, 1. c.=P. tuberifera.
tripartite, Blume, 1. c. 187= P. tripartita.

ATHESIANDRA, Miers, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 346 (1862) = Ftychopetalum, Benth. (Olacin.).
anceps, Miers, ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 348-P. anceps.

ATHLIANTHUS, Endl. Gen. Snppl. ii. 63 (1842)-Juaticia, Linn. (Acanth.).
spiciflorus, Heynh. Nom. ii. 54.—Afr. trop.

ATHBIXIA, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 681 (1823)-*COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 328.
ASTERIDIA, Lindl. Swan Riv. App. 24 (1839).
CKRYSODISCUS, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 460 (1845).
KLENZEA, Sch. Bip. ex Steud. Nom. ed. II. i. 847 (1840) ; et in Walp. Rep. ii. 973 (1843), partim.
TRICHOSTEGIA, Tnrcz. in Boll. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 81.
angustissima,Z>C. *Prod.* vi. 277.—Afr. anstr.
australis, *Steeti, in Lehm. PI. Preiss.* i. 482.—Austral,
capensis, *Ker-Gawl. in Bot. Keg.* t. 681.—Afr. austr.
Chatopodo, *F. Muell. Fragm.* x. 56.—Austral,
debilis, *DC. Prod.* vi. 276.—Madag.
elata, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 67.—Afr. anstr.
ericaefolia, *DC. Prod.* vi. 277.—Arabia,
fontana, *Mac Owan, in Journ- Linn. Soc.* xviii. (1881) 891.—Afr. austr.
Gerrardi, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* iii. 292.—Afr. austr.
glandulosa, *Kunth, Ind. Sent. Hart. Berol.* (1848) 15.—Afr. austr.
gracilis, *Benth. Fl. Austral,* iii. 599.—Austral,
neterophylla, *Less. Syn. Comp.* 865.—Afr. anstr.
multiceps, *Benth. Fl. Austral,* iii. 699.—Austral,
phylicoides, *DC. Prod.* vi. 277.—Afr. austr.
rosmarinifolia, Oliver *Sc* Hiera, in Oliver, FI. Trop. Afr. iii. 855.—Afr. trop.
sessilifolia, *DC. Prod.* vi. 277.—Afr. austr.
stricta, *Benth. Fl. Austral,* iii. 600.—Austral,
tenella, *Benth. I. c*—Austral.
tomentosa, Legs. Syn. Comp. 864—Pterothrix tomentosa.

ATHRODACTYLIS, Font. Char. Gen. 149 (1776)-Pandanus, Linn.
spinosa, Forst. 1. c. 150 = P. odoratissimns.

ATHBOI8MA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1838) 516. *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 296.
laciniatum, *DC. 1. c.* 517.—Ind. or.
viscida, Zoll. *Sc* Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nerl Indie, ii. (1845) 282=laciniatum.

ATHROISMA, Griff. Notnl. iv. 477 (1854) = Trigonostemon, Blume (Euphorb.).
dentatum, Griff. 1. c. 478-T. longifolius.
serratum, Griff. 1. c. 477-T. heteranthus.

ATHRONIA, Neck. Elem. i. 32 (1790)=Spilanthe», Jacq. (Compos.).

ATHBOOSTACHTS, Benth. ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 1208 (1883). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1208.
capitata, *Benth. I. c.* 1209.—Bras.

ATHBOTAXT8, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1839) 171. t. 13,14. *CONIFERAE*, Benth. *Sc* Hook, f. iii. 480.
ARTHROTAXIS; Endl. Gen. Suppl. i. 1372 (1841).
alpina, Van Houtte, ex Gord. Pinet. 31=selaginoides.
araucarioides, Brongn. ex Parl. in DC. Prod. xvi. !•• 496=Dacrydium araucarioides.
cnpressoides, *D. Don, in Trans. Linn. Soe.* xviii. (1838, 178.1.18.—Tasmania.
Doniana, Henk. & Hochst. Nadelh. 221 =laxifolia.
Gunneana, *Hook, ex Carr. Conif.* ed. II. 207.—Tasmania.
imbricata, Hort. ex Carr. 1. c. 204 =selaginoides.
imbricata, Maule, ex Gord. Pinet. Suppl. 16 = cupressioides.
Joucadan, Hort ex Carr. Conif. ed. II. 65=Juniperus gracilis.
laxifolta, *Hook. Ic. PI.* t. 578.—Tasmania,
selaginoides, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xviii. (ltSi») 172. t. 14.—Tasmania.
tetragona, Hook. Ic. PI. t 660 - Microcachrys tetragona.

ATHRUPHYLLUM, Lour. Fl. Cochinch. 120 (1790)-Myrsine, Linn.
lineare, Lour. 1. a — M. Athruphyllnm.

ATHYMALUS, Neck. Elem. ii. 353 (1790)-Euphorbia, Linn.

ATHYBOCABPUS, Schlecht in Linnaea, xxvi. (1853-55) 454. *COMMELINACEAE*, Benth. * Hook. f. iii. 847.
PHAEOSPHAERION, Hassk. in Flora, (1866) 212.
leiocarpos, *Benth. b" Hook.f. ex Hemsl. Biol. Centr-Am. Bot.* iii. 386.—Mexic.
pallidus, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 151 = Commelina pallida.
pallidus, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 454.—Am. trop.
persicaViaefolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* >•• 386.—Panama.

ATHYRUS, Neck. Elem. iii. 39 (1790) = Lathyrus. Linn. (Legumin.).

ATHY8ANUB, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1886) 72. *CRUCIFERAE*.
pusillus, *Greene, I. c*—Calif.

ATIMETA, Schott, Gen. Aroid. t. 71 (1868)=BodOspatha, Poepp. (Aroid.).
filamentosa, Reissek, ex Peyr. Aroid. Maxim. 28. t. *V*>> 20.—Bras.
Martii, Schott, Prod. Aroid. 349-R. oblongata.
Videniana, Schott, Gen. Aroid. t 71-R. oblongata.

ATIRSITA, Rafin. New Fl. Am. iv. 86 (1836)=Eryngium, Toum. (Umbell.).
pumila, Rafin. 1. c. 37=E. gradle.

ATITARA, Marcgr. ex Joss, in Diet Sc Nat. iii. 277 (1816)-Evodla, Forst. (Rntac.).

ATKINSONIA, F. Muell. Fragm. v. 84 (1865)-IioraiithuB, Linn.
ligustrina, F. MneU. 1. c. v. 84; vi. 262-L. epigaeo*-

ATLANTIA, Knra, For. Fl. Brit. Burma, i. 19* (1877) = AtalontU, Conea (Rutac.).

ATOCION, Adans. Fam. U. 254 (1768)=8ilene, Linn. (Caryophyll.).
Armeria, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 344=S. Armeria.

ATOLARIA, Neck. Elem. iii. 81 (1790)-Crotalaria, Uan. (Legum.);

ATOMOSTYUS, Stend. in Flora, xoiii. (1860) 229; «>yn. PL Cyp. 315 (18iS5} = Cyperua, Linn.
Vptriformis, Stend. Syn. PI. Cyp. 816=C. nudicaulis.
flavescens. Steud. in Flora, xxxiii. (18.0) 229. =C. nudicanlis.

ATOSSA, Alef. in Bosplandia, ix. (1861) 100= Viola, i.inn. (Legum.).
"«*», Alef. 1. c. 101 =• V. oroboides.
septum, Alef. 1. c. = V. sepium.

ATRACTYLIA, Reichb. Nom. 'n. 3416' (1841) = seq.

ATBACTYI.I8, Linn. Gen. ed. 1.246 (1737). *COMPOS1TAB,* Benth. & Hook. f. ii. 466.
ACARNA, All. Fl. Pedem. i. 158 (1785).
ANACTIS, Cass. in Diet. Sc. Nat.xlvii. 610 (182-7).
ATRACTYLODES, DC. Prod. viL 48 (1838).
CHAMAELEON, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlvii. 809 (1827).
CIRSELLIUM, Gaertn. Fnict. ii. 454.1.168 (1791).
CROCODYLCS, 'Adans.* ex Steud. Nom. ed. Ilu i. [1]«'iiniyn.(1840).
SfAUACTis, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlvii. 510 (1827).
vault,. Pen. Sp. ii. 882, in syn.=gummifera.
"nplexicaulis, Poir. Encyc vi. 80 (=Stobaeae sp.).—Afr. anstr.
[a]**gustifolia,* Houtt. Plantenk. x. 618-Berkheya lanceolata.
*o*mena.* Poir. Encyc. Suppl. iv. 687 ^*Onobroma* °«»«««»»0.—Armen.; Persia,
"topetosa, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 254. t. 225.—Afr. bor.
'wtfrtota, Viv. Fl. lib. Spec. 52 = cancellata.
«ncellata, *Linn. Sp. PI.* 880.—Reg. Mediterr.; Oriens.
"?"«. Salzm. ex Ball, in Journ. linn. Soc. xvi. (1878) 519 = cancellata.
chi..ens ciliaris, ', DC_ *Pl0i*_vi-_ 64S=ovata.
ci-i *Linn. Syst.* ed. X. 1202.—' Aethiopia."
V??. Coss. *8c* Kralik, in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 471=flava.
comosa, *Sieber, ex Cass. in Diet. Sc. Nat. I* 68.—
«*kana, *Boiu. Fl. Orient.* iii. 454.—Afehanist.
Oln»a, *Cass. in Bull See. Bat. Fr.ā.* (1867) 888, «»on»*n—Algeria.
«*«ata, *p o m e l t Nouv— Mat pi , AtL* 274.-Algeria.
fiava Coss. & Dur._Cf. BulL Soc. Bot. Fr. iv. (1867) 471-dtrina.
[a]J*'[1]^-«..d«*anr.ii.254.t.262.-Afr. bor.; Arab.; le ..t .
fatidosa, linn. Sp. PI. 829=Berkheya fruticoia.
"«*ts-agrestis,* Gaertn. Fruct. ii. 381. t. 161 = Carwamus Unatus.
[c]ynnmi era, *Linn. Sp. PI.* 829—Reg. Mediterr.
gummifera, Salzm_*_B. «_in_Juss._Linn._Soc._xvi._(1878) 51[b] = Carlina raceniosa.
hu null,. *Linn. Sp. PI.* 829.—Eurep. austr. occ.; Marocco.
lanat—, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 134= Carthamus - lanatus.
Knuea, Thunb. Fl. Jap. 306 = ovata.
/Z[Cocephala] Moench, Melh. 663=Carthamus Unatus.
"'•*ephaeo,* Gaertn. Fruct. ii. 321-Carthamus leuco-Muhs.
macrocephala, Desf. Fl. Atlant. ii. 253.—Afr. bor. occ.
macrophylla, Desf. 1. c. 255.—Algeria.
mexicana, Linn. f. Suppl. 860-Lycoseris mexicana.
*microcepha*la, Coss. *8c* Dur. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* 1 v. i. (1854) 240-serratuloides.
*oppositifol*ia, linn. Mart. ii. 477-Berkheya grandiflora.
ovata, *Thunb. Ft. Jap.* 806.—Japon.
persic Boiss. Dugn. Ser. I. vi. 110 - Thevenotia
Pnieolepis, *P*_*ome.l, ttouv. Mat. Fl. Atl.* 278,-Algeria.
pilosa, laoench, Meth. 668=Carthamus lanatus.

ATEACTTIiIS :—
polycephala, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv.* (1857) 481,-nomen.—Algeria.
Preauxiana, *Sch. Bip. in Webb V Berth. Phyt. Canar.* ii. 850.—Ins. Canar.
prolifera, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 96.—Palaestina.
purpurata, linn, ex Sm. Ic. fasc. iii. 65-seq.
purpurea, linn. f. Suppl. 849 = OnoserU purpurea.
radiciflora, *DC. Prod.* vi. 651.—Gall, austr.
rigida, Poir. Encyc. Suppl. iv. 637=Carthamus rigidus.
scabra, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi 109.—Persia,
serrata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 20.—Afr. bor.
serratuloides, *Sieber, ex Cass. in Diet. Sc. Nat.* 1. 58.—Algeria; Palaest.
stfciosa, DC is Deless. Ic. Sel. iv. t. 71=comosa.
Mplinervia, Vahl, ex Steud. Nom. ed II. i. 168; ii. 83 =Lycoseris triplinervia.

ATRACTYLODES, DC. Prod. vü. 48 (1888)=Atraetylis, Unn. (Compos.).
lancea, DC. 1. c. -Atractylis ovata.
lyrata, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 193=Atractylis ovata.
ovata, DC. Prod. vii. 48=Atractylis ovata.

ATRAGENA, linn. Syst. ed. I. (1785) =seq.

ATRAGENE, Linn. Diss. Dass. 21 (1747); Amoen. Acad. i. 182 = Clematis, Linn. (Kanunc).
alpina, Linn. Sp. PI. 542 ; Rev. Hortic. (1855) 823. t. 17. f. 1=C. alpina.
alpina, Pall. Fl. Ross. ii. 69 = C. verticillaris.
americana, Sims, Bot. Mag. t. 887-C. vertidllaris.
austriaca, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 387 = C. alpina.
austriaca, Wender. in Iiiinaea, xi. (1887) 648, in obs. = C. Wenderothii.
balearica. Pets. Syn. ii. 98 = C. cirrhosa.
capensis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 16, pro parte= Anemone tenuifolia.
capensis, Linn. Sp. PI. 648=Anemone capensis.
ceylanica, Steud. Nom. ed. II. i. 168, vide *zey lanica.*
cirrhosa, Pers. Syn. ii. 98=C. cirrhosa.
Clematides, Crantz, Stirp. Anstr. ed. I. fasc. ii. 111; ed. II. 127 = C. alpina.
columbiana, Nutt. in Joum. Acad. Phil. vii. (1834) 7 = C. verticillaris.
eordata, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. i. 168 = C. Wenderothii.
fiorida, Pers. Syn. ii. 98=C. florida.
indica, Desf. Tabl. ed. 1.128 - C. florida.
indiea, Heyne, ex Steud. Nom. ed. II. i. 168, 879 = C. Gouriana.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 238 = C. polypetala.
japonica, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 168 =C. Gouriana.
lobata, Llanos, Fragm. 73 =Naravelia zeylanica.
macropetala, Ledeb. Fl. Alt. ii. 376 = C. macropetala.
occidentalis, Homem. HortHafn. ii. 620=C. occidentalis.
ochotensis, Pall. Fl. Ross. i. U.69 = C. ochotensis.
patens, Decne. in Belg. Hortic. (1858) 16 =C. patens.
platysepala, Trautv. *8c C.* A. Mey. in. Middend. Reise, (Fl. Ochot. 6).—As. bor. occ
polygama, Jacq. Am. Select. 171=C. dominica.
polypetala, Thunb. Fl. Jap. 289 = Anemone japonica.
sibirica, Linn. Sp. ed. I. 848=alpina.
speciosa, *Weinm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1850) I. 538,-Rossia.
tenuifolia. Linn. f. Suppl. 270-Anemone tenuifolia.
tenuis, Thunb. Fl. Jap. 239=Anemone tenuifolia.
tritfrnata, DC. Syst. i. 160=C. triternata.
Wenderothii, Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 650=C. Wenderothii.
teylanica, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 4»l=Naravelia laurifolia.
teylanica, linn. Sp. PI. 642 =Naravella zeylanlea.

ATBAPHAXI8, Linn. Syst ed. I (1785). *POLYGONACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 96.
PEDALIUM, Adans. Fam. ii. 277" (1763).
PERSICARIA. Neck. Elem. ii. 210 (1790).
TRAGOPYRUM, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 284 (1819).
afghanica, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 7ft.—Afghanis!,
angnstifolia, *Jaub. (f Spach, IUustr. PI. Or.* ii. 15, 21.1.115.—Armenia,
aphylla, *Pall. Kris**, i. 386.—Rossia.

ATBAFHAXI8:—
Aucherii, *Jaub. V Spach, IUustr. PI. Or.n.* 15, 20. t. 114.—Persia.
Billardieri, *Jaub. V Stack, 1. c.* 14, 17. t. 111.—Graecia; As. Min.; Syria,
buxifolia, *Jaub. V Spach, I. c.* 14.—Reg. Caucas.
Calverti, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 76-spinosa.
Candida, *Boiss. V Haussh. ex Boiss. Ft. Orient,* iv. 1021.—Persia,
canescens, *Bunge, Ind. Sent. Hort. Dor pat.* (1839) 3. —As. bor.
compacta, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 55.—Turkestan.
crassifolia, Agardh, in Schult. f. Syst. vii. 188= spinosa.
cuneifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 585.—Am. bor.
davuriea, Jaub. & Spach, IUustr. PI. Or. ii. 15 = Laxmanni.
decipiens, Jaub. *Sc* Spach, 1. c. = Laxmanni.
densiflora, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 212-spinosa.
dioica, Bosc, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 80 = Polygonella parvifolia.
Fischeri, Jaub. *Sc* Spach, IUustr. PI. Or. ii. 12-spinosa.
frutescens, C. Koch, Dendrol. ii. I. 360 = Laxmanni.
graeca, Meissn. in DC. Prod. xiv. 77-Billardieri.
grandiflora, *Jaub. (f Spach, IUustr. PI. Or.* ii. 15, 19.1.118.—Armenia; Cappadoc.
inermis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=undulata.
Karelini, Jaub. *Sc* Spach, IUustr. PI. Or. ii. 12 = spinosa.
laetevirens, *Jaub. If Spach, I. c.* 14.—Soongaria.
lanceolata, *Bunge, in Mint. Sav. Etr. Pitersb.* vii (1851) 483 *(Lehm. Rel.* 307).—As..temp.
lanceolata, Meissn. in DC. Prod. xiv. 78 = Laxmanni.
Laxmanni, *Agardh, in Schult. f. Syst.* vii. 1382.—Sibir.
micrantha, *Jaub. V Spach, IUustr. PI. Or.* Ii. 16.—Sibiria.
pungens, *Jaub. & Spach, 1. c.* 14.—Soongaria.
pyrifolia, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 488 *(Lehm. Rel.* 307).—Turkestan.
replicata, Lam. Encyc. i. 329—spinosa.
sinaica, Fresen. in Mus. Senkenberg. i. 74; Jaub. *Sc* Spach, IUustr. PI. Or. ii. 12-spinosa.
spinosa, Eichw. Casp. Cauc. 7= compacta.
spinosa, Laxm. ex Agardh, in Schult. f. Syst. vii. 1382 =crassifolia, Laxmanni.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 475.—Oriens.
suaedaefolia, *Jaub. if Spach, IUustr. PI. Or.* ii. 15.—Persia.
Touraefortii, *Jaub. If Spach, 1. c.* 14, 18. t 112.—. Armenia.
undulata, Linn. Sp. PL 338. = Polygonnm atraphaxoides.
undulata, *Willd. Sp. PI.* ii. 249.—Afr. austr.
variabilis, Jaub. *8c* Spach, IUustr. PI. Or. ii. 11, 13, 16. t. 110 = Billardieri.

ATRATEGIA, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 74 (]872j=Gonothalamus, Blume (Anonac).
Thomsoni, Bedd. ex Hook. f. 1. c. 75=G. cardiopetalus.

ATREMA, DC. Coll. Mém. v. 71. t. 18 (1829) ; et Prod, iv. 250 (M30)=Bifora, Hoffm. (Umbellif.).
americanum, DC. Coll. Mém. v. 71. t. 18 = B. americana.
testiculatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 744 = B. testi-•culata.

ATHICHO8ERI8, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. n. 410 (1884). *COMPOSITAE.*
platyphylla, *A. Gray, I. e.*—Am. bor. occ.

ATBIPIiEX, [Toum.] linn. Syst. ed. I (1735) ; Gen. 817 (1737). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 58.
ENDOLEFIS, Torr. ex A. Gray, in Pacif. Rail Reo v, xii. 47. t. 3 (1860).
HAtiMUS, Wallr. Sched. Crit. 117 (1822).
OBIONE, Gaertn. Fruct. ii. 198.1.126 (1791).
PHYLLOTHECA, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. H. 98 (1849).
PTEROCARYA, Nutt. ex Moq. 1. c. 106 (1849).
PTEROCHITON, Ton. in Frem. Rep. 818 (1846).
SCHIZOTHECA, Lindl. Veg. Kingd. 513 (1847).
THELEOPIIYTON, Moq. in DC. Prod. xiii. 11 115 (1849).

ATHIPIiEX:—
abbreviata, Opiz, in Flora, viL (1824) I. Beil. 81 = laciniata.
acanthocarpa, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 117.—Texas.
acuminata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 641 = hortensis.
acuminata. Waldst. & Kit PI. Rar. Hung. ii. 107. t. 103=nitens.
agrestis, Schur, Ennm. PI. Transs. 575 —patula.
alaskensis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 108.—Am. bor. occ.
alia, Crantz, Inst. i. 206-Chenopodium album.
alba, Salisb. Prod. 152 = Exomis atriplicioides.
alba, Scop. Delic. Insub. ii. 16. t. 8 = rosea.
albicans, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. hi. 430-Exomis atriplicioides.
albicans, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 194 = rosea.
albicans, W'illd. Sp. PI. iv. 962 = laciniata.
Aldamae, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 282.—Cuba,
alexandrina, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 914.—Aegypt.
amarant aides, Gmel. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 116 = Axyris amaranthoides.
amblyostegia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1862) II. 416.—As. centr.
ambrosioides, Crantz, Inst. i. 207 = Chenopodinm ambrosioides.
angulata, *Benth. Fl. Austral,* v. 174.—Aus .1.
angustifolia, Sm. FL Brit. 1092 = patnla.
antheimintica, Crantz, Inst. i. 207•-Chenopodinm ambrosoides.
arabicum, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 917 = farinosa.
arenaria, *JVutt. Gen. Am.* i. 198.—Am. bor.
arenaria, Tineo, Cat. Hort. Panorm. 276; Woods, in Bab. Man. ed. III. 271 = laciniata.
argentea, *Nutt. Gen. Am. i.* 198; *ex S. Wats. Rev. Chenop.* 117.—Am. bor. occ.
argentea, PalL ex Stead. Nom. ed. II. i. 168 = nitens.
argentea, Scbxad. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 92 = rosea.
aristata, Crantz, Inst. i. 208 = Chenopodium aristatum.
Assoi, *Dufour, in Bull. Soc. Bot. Fr.* vii. (1860) 432.—Hispan.
astracanica, Balb. Hort. Tnric. (1813)-laciniata.
astracanica, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* (1816) 3.—As. temp.
astrachanica, Lcdeb. Fl. Ross. iii. 719 = laciniata.
atacamensis, *Phil. Fl. Atac.* 48.—Chili.
Aucherii, Moq. Chenop. Enum. 51 = nitens.
australasica, Moq. 1. c. 59 = patula.
axillaris, Tenore, Fl. Nap. Prod. i. 54 = rosea.
Babingtonii, Woods, in Bab. Man. ed. III. 270 = patula.
Barclayana, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 637.— Am. bor. occ.
Belangeri, *D. Dietr. I. c.* 635.—Persia; Afghanist.
benghalensis, Lam. Encyc. i. 276 = hottensis.
Berlandieri, Moq. Chenop. Enum. 66 *w* canescens.
Besseriana, Roem. & Schult. Syst. vi. 284—rosea.
BilUrdieri, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 215.—Austral.; N. Zel.
Bocconi, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 588 = laciniata.
Bonus-Henricus, Crantz, Inst. i. 206 = Chenopodium Bonus-Henricus.
Botrys, Crantz, 1. c. 207-Chenopodinm Botrys.
bracteosa, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. n. 1 (1870) 17 = dimorphostegia.
bracteosa, 5 *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 116.—Calif.
Breweri, *S. Wats. I. c* 119.—Calif.
Bunburyana, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 274.—Austral.
californica, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 98.—Calif,
calotheca, *Fries, Novit. Fl. Suec. Mant.* iii. 164.—Suecia.
campanulata, *Benth. Fl. Austral,* v. 177.—Austral.
campestris, Koch & Ziz, Cat. PL Palat. 24 = tatarica.
cana, *C. A. Uey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 806; *Moq. Chenop. Enum.* 61.—Sibiria.
candicans. *Link, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 168.—Luiitan.
canescens, *James, Cat.* 178.—Am. bor. occ.
canescens, Nutt. Gen. Am. i. 197 —Nuttallii.
capensis, *Moq. Chenop. Enum.* 63.—Afr. austr.

ATBIPIiEX:—
Chanicowii, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 9]3.—Persia,
chilensis, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxix. (1836) 7. t 48.—Chili.
chrystallina, Hook. f. In Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 279-BilUrdieri.
cinerea, *Pair. Encyc. Suppl.* i. 471.—Austral.; N. Zel.
confertifolia, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 119.— Am. boi. occ.
coriacea, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 175.—Aegypt.
coriacea, Raddi, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 108 = glauca.
coronata, S\ *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 114.—Calif,
Coulteri, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 637.—Calif,
crassifolia, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 309.—Turkestan.; Ind. or.; Sibir.
crispa, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 536.—Persia.
cristata, Heyne, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 99 ; Koen. ex Moq. 1. c. 109 = repens.
cristata, *Humb.* &" *Bonpl. ex Willd. Sp. PL* iv. 959.—N. Granat.
crystalline, Moq. 1. c. 106, 116 = Billardieri.
crystallina, *Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 915.—Aegypt.
decumbens, Roem. & Schult. Syst. vi. 289 = prostrata.
decumbens, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 275.—Calif.
deltoidea, Bab. Man. ed. I. 258 = hastata.
denticulata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 97-semibaccata.
deserticola, *Phil. Fl. Atac.* 47.—Chili.
diffusa, Tenore, Prod. Fl. Nap. i. 67 = laciniata.
dimorphostegia, *Kar. br Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 438.—Soongar.
dioica, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176 — Purshiana.
Drummondii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 102.—Austral.
elachophylla, *F. Muell. Fragm.* vii. 8.—Austral.
elaeagnoides, Moq. Chenop. Enum. 65 = cinerea.
elegans, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 537.—Mexic
elongata, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 692-hastata.
Endolepis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 110.—Am. bor.
erecta, Hods. Fl. Angl. ed. I. 376-patula.
exilifolia, *F. Muell. Fragm.* vii. 9.—Austral,
expansa, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 116.—Am. bor. occ
farinosa. Din. Fl. Belg. 20-laciniata.
farinosa, Moq. Chenop. Enum. 55 = Verreauxii.
farinosa, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 123^-Aegypt.; Arab,
fasciculate, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 877.—Am. bor.
fissivalvis, *F. Muell. Fragm.* ix. 123.—Austral.
Flabellum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 912.—Persia; Turkestan.
flavescens, Dum. Fl. Belg. 20 (Quid ?).—Belgium,
flexuosa, *Moq. Chenop. Enum.* 57.—Afr. austr.
foliolosa. Link, in Schrad. Joum. (1800) I. 54= rosea.
foliolosa, *Phil, in Bot. Zeit.* xxviii. (1870) 500 ; *Anal. Univ. Chil.* (1875) 192.—Chili.
foliosa, Guss. ex Nym. Consp. 628—rosea.
fruticosa, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. it. 112-caoescen s.
Gardneri, D. Dietr. Syn. PI. v. 537 = Gordoni.
gigantea, Poir. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 94 = hastata.
glauca, Brot. Fl. Lusit i. 472 —candicans.
glauca, Crantz, Inst. i. 207 = Chenopodium glaucum.
glauca. Pall, ex Roem. & Schult. Syst. v. 277 = verrucifera.
glauca. Pall. Reise, i. 494-cana.
glauca, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 645.—laciniata.
glauca, *Linn. Cent.* i. 33.—Enrop.
glomulifera, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* i. 634.—Austral.
Gmelini, *C. A. Mey. in Bong. Veg. Sitch.* 42__As. bor. or.
Gordon!, *Hook. Kew Journ.* v. (1858) 281.—Am. bor.
gradlis, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 95 = hastata.
graeca, Sibth. & Sm. Fl. Graec. x. t. 963 - tatarica.
graeca, Willd. Sp. PI. iv. 968-hastata.

ATRIPLEX:—
Graed, Tineo, Cat. Hort. Panorm. 277 —rosea.
Greggii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 118.—Mexic.
Griffithii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 102.—Persia; Afghanist.
halimoides, *Lindl. in Mitch. Three Exp. i.* 285.—Austral.
halimoides, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176 -hastata.
halimoides, *Tineo, Cat. Hort. Panorm.* 277.—Hab.1
Halimus, R. Br. Prod. 406 - cinerea.
Halimus, *Linn. Sp. PI.* 1052.—Afr. bor. et austr.
Halimus, Nees, in Lehm. Fl. Preiss. i. 633 — cinerea, isatidea.
Halimus, Pall. Reise, ii. 477 = cana.
Halimus, Ritter, ex Moq. in DC. Prod. xiii. [I. 110 (= *Obione crispa).*—Ins. S. Doming.
hastaefolia, Salisb. Prod. 153 = hastata.
hastata, Geners. ex Steud. Nom. ed. II. i. 169-laciniata.
hastata, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 702 - calotheca.
hastata, *Linn. Sp. PI.* 1058.—Europ.; As. bor.
hastilifolia, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 169 = patula.
Hermannii, Villem. Phytogr. iii. 1222—nitens.
heterantha, Wight, Ic. v. t. 1787-hortensis.
heterophylla, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. It. 112—canescens.
heterosperma, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 448 *{Lehm. Rel.* 272).—As. centr.
hispanica, *S. G. Gmel. It.* iv. 40.—Ross, austr.
holocarpa, *F. Muell. Rep. Babb. Exp.* 19.—Austral,
hortensis, *Linn. Sp. PI.* 1053.—Cosmopol. (cult.),
humilis, *F. Muell. Fragm.* iv. 48.—Austral.
hybrida, Crantz, Inst. i. 207 = Chenopodium hybridum!
hymenelytra, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 119.—Am. bor. occ
hymenotheca, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 101.—Austral.
hypoleuca, Nees, in Lehm. PL Preiss. i. 633 = cinerea.
imbricata, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 536.—Bolivia,
incana, *F. G. Dietr. Vollst. Gaertn. Lexik. Nachtr.* i. 418.—Hispan.
incisa, Bieb. Fl. Taur. Cane iii. 641 = tatarica.
incisa, Hohen. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 720 — laciniata.
incrassata, *F. Muell. Rep. Babb. Exp.* 20.—Austral.
inflata, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. ii. (1858) 75-halimoides.
integrifolia, Krock. ex Steud. Nom. ed. II. i. 169 - triangularis.
isatidea, *Moq. Chenop. Enum.* 63.—Austral,
julacea, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 870.—Calif.
Kataf, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 916 = A. Halimus.
Koenigii, Wall. Cat. n. 6951-repens.
Kunthiana, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 636.—Am. austr.
lacera, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 389— calotheca.
laciniata, Aitch. Cat. PI. Panjab 125 = crassifolia.
laciniata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 641-rosea.
laciniata, *Linn. Sp. PI.* 1053.—Europ.; Am. bor.
laciniata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 199 = Purshiana.
laciniata, Schkuhr, Handb. t. 349 = hastata.
laevis, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 60.—Sibir.
Lampa, *Gill, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. n. 110.—Chili.
lasiantha, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 95 — tatarica.
latifolia, Wahlenb. H. Suec. ii. 660 = hastata.
Lehmanniana, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. vii. (1861) 461 = tmrcomanica.
lenticularis, *C. A. Mey. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 99, nomen.—As. temp.
lenticularis, Tansch, in Flora, xxiii. (1840) I. 16 = Tauschii.
lentiformis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 118.—Am. bor. occ
leptocarpa, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* •• (1858) 74.—Austral.
leptoclada, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 74 - turcomanica.
leucoclada, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 95.—A-gypt-i Arab.
leucophylla, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 636.—Calif,
limbata, *Benth. Fl. Austral.* •. 178.—Austral,
limosa, *Schur, Enum. PI. Transs.* 576.—Europ.
Lindleyi, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 100-halimoides.

ATRIMJ3X .—
linifolia,H»mt. &• *Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* W. 958.—Mexic
littoralis, *Linn. Sp. PI.* 1054.—Reg. bor. temp.
longipes, Drejer & Fries, Summa Veg. Scand. 201 - hastata.
lucida, Desf. ex Mat. & Koch, in Roehl. FL Deutechl. ii. 311-nitens.
ferùfo, Moench, Metb. Suppl. 121 - sibinca.
lunulata, Del. ex Moq. m DC. Prod. xin. II. »9 - mollis.
macrodira, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 592-patula.
macrotheca, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiu. II. 94 - calotheca.
marina, Linn. Mant ii. 300-littoralis.
maritima, Crantz, Inst. i. 208-Suaeda mantima.
maritima. Pall. Reise, iL 289 = littoralis.
mauritanica, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* luo.—His
micra E5«, Kar. & Kir. in Bnll. Soc. Nat. Mosc. (1841) 738 — ni s.
micranthaTc. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iv. 808 = hastata.
micrantha, *Moq. Chenop. Enum.* 62.—Sibir.
microcarpa, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 636.—Calif,
microcarpa, *Benth. Fl. Austral,* v. 176.—Austral.
microcarpa, Waldst *8c* Kit. PI. Rar. Hung, ui 5"B. t. 250 — hastate.
microphylla, D. Dietr. Syn. PI. v. 636-palvlfolia, H.B, & K
microphylla, Willd. Sp. PL iv. 958-Chenopodium microphyllum.
microphylla, *Phil. Fl. Atac.* 48.—Chili.
microphylla, Schur, Enum. PL Transs. 6,8-laciniata.
microsperma, Bab. Man. ed. I. 253-hastato.
«.VrM$«wa; Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. in. 278. t. 250 = hastata.
microtheca, Fries, Corp. Fl. Suec. 133-hastata.
microtheca, Moq?in DC. Prod. xiii. II. 91-hortensiB.
mollis, *Desf. Fl.Atlant.* ii. 891.—Algeria.
mollis, Uspenski, Jekaterinenburg. 106 £l^i-
Moneta, *£«», «i £««. «. Orient,* iv. 912.—Persia,
monififerati. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 111.— Am. bor.
monoica, Moench, Meth. S5S=rosea.
montevidensis, S^re**-. Sj-rf. iii. 918.—Reg- A'B™j,
Moquiniana, *Webb, ex Uoq. in DC. Prod.* xliL II. 97 •—Austral.
mucronata, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 170 - arenaria.
mucronata, *Phil. Fl. Atac.* 47.—Chili.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* v. 176.—
multifida, Crantz, Inst i. 207-Roubieva multifida.
multifida, Desf. Tabl. ed. II. 61 = calotheca.
muralis, Crantz, Inst i. 206 = Chenopodium
muricata, *Humb. &" Bonpl. ex Willd. Sp. PI-* Iv. »59. Am. austr.
nemorensis, Schur, Enum. PL Transs. 675=patula. Europ.
nitens, *Schkuhr, Handb.* iii. (1803) 641.— Oriens.
nudicaule, *Boguslavi, in Erman, Archiv,* «. »»• Rossia.
nummularia, «ndf. in Jftfc*. y<wrn. 7><#- *Austr.* (1848) 64.—Austral.
Ntttalu, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 116 —Am. bor. occ.
oahuensis, *Meyen, Reise,* ii. 127.—In* Sa»*nc.
oUongifolia, Host, Fl. Austr. i. 820 =hastata.
°hlon%olia, Waldst. & Kit. PL Rar. Hung. m. 278 t 211 - patula.
obovata, *Moq. Chenop. Enum.* 61.—Mexic.
obtusa, *Willd. S/ PI.* iv. 964.—Sibina.
obtusata, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861, 42.—Hisparf
<**cidentalis7T>.* Dietr. Syn. PL v. 537-canescens.
ocymifolia, Viv. Eg. 23 = coriacea.
odorata, Pers. Syn. i. 298 = Exomis albicans.
Olivieri, Moq. Chenop. Enum. 62-tatanca.
oppositifolia, DC. Rapp. i. 12-hastata.
oppositifolia, *Vill. Prosp.* 21.—Gallia. (1874)
oppositifolia, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. orbiculari Mexic *Wat.* bor. *I. c.* xvii. (1881-82) 377—Am.
Palaitina, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 96.-Syria Assyria.

ATRIPLEX:—
rubra, Crantz, Inst. i. 206 — hortensis.
ruderalis, Wallr. Sched. Crit. 115-hastata.
saccaria, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 112. —Utah.
Sackii, Rostc. *Sc* Schum. Fl. Sedin. 401. t. 1= hastata.
sagittata, Borckh. in Reinsch. Mag. 477 — nitens.
salici/olia. Lag. ex Moq. Chenop. Enuni. 74 = polygarna.
salicina, Fall. Reise, i. 495 = littoralis.
salina, Sievers, in Pall. X. Nord. Beitr. vii. 327 = littoralis.
salina, Desf. in Joum. Bot i. (1813) 48= patula.
scoparia, Crantz, Inst. i. 208 = Kochia scoparia.
semibaccata, *R. Br. Prod.* 406.—Austral.
semibaccata, Moq. in DC. .Prod. xiii. II. 97 — spongiosa.
semibrncteata, Steud. Nom. ed. II. i. 169, sphalm. — semibaccata.
serotina, Crantz, Inst. i. 206-= Chenopodium serotinum.
serpyllifolia, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 642.—Sibiria; Turltest.
serrata, Huds. Fl. Angl. ed. I. 377-littoralis,
sibirica, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1493.—Sibiria.
sicula, *Ucria, in Roem. Arch.* i. 70.—Sicilia.
sinuata, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 277 -laciniata.
Smithii, Syme, Eng. Bot. ed. III. viii. 32 = hastata.
spectabilis, Ehrh.ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 91 = hortensis.
spicata, Stokes, Bot. Mat. Med. iL 24 = Anredem scandens?
spicata, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 108. —Calif.
spinacifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 23-hastata.
spinosa, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 536.—Am. centr.
spongiosa, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* ii. (1858) 74.—Austral.
stipitata, *Benth. Fl. Austral,* v. 168.—Austral.
stipitata, Westerl. in Linnaea, xl. (1876) 165-calotheca.
Stocksii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 73.—Scinde.
stylosa, *Viv. PI. Eg.* 2S. f. 21.—Lybia.
subopposita, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1863) 63.—Europ.
Suckleyana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 111.—Am. bor.
sulcata, Michx. ex Roem. & Schult Syst. vi. 290 = littoralis.
tartarica, Crantz, Inst. i. 205— tatarica.
tatarica, Auct. fid. Boiss. Fl. Orient, iv. 909 = patula.
tatarica, *Linn. Sp. PI.* 1053.—As. centr.
tatarica, Scfakuhr, Handb. t. 349 = oblongifolia.
Tauschii, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 638.—Hab. ?
tetrandra, Ton. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 93 - FuTshisn a.
texana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 113.— Texas.
thunbergiaefolia, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 911 Babylonia.
Thunbergiana, Roem. & Schult. Sy>t. vi. 281— laciniata.
Tornabeni, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 689 - laciniata.
Torreyana, *Rafin. Atl. Joum.* 146.—Am. bor.
Torreyi, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 118. —Am. bor. occ.
transsilvanica, Schur, Enum. PL Transs. 677 = hastata.
Mangularis, 'Willd. Sp. PL iv. 963-hastata.
truncata,^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 398. —Am. bor. occ.
turcomanica, *Fisck. (T Mey. ex Karel. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1839) II. 169.—Persia.
turcomanica, Turcz. ex Ledeb. FL Ross. iii. 720 - laciniata.
undulata, *D. Dietr. Syn. PI.* v. 5S6.—Fatagon.
urbica, Crantz, Inst i. 206 — Chenopodium urbicum,
velutinella, *F. Muell. Rep. Babb. Exp.* 20.—Austral.
veneta, Moq. Chenop. Enum. 54=microtheca.
veneta, Willd. Sp. PL iv. 962 = Utarica.
Verreauxii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 98.—Afr. austr.
verrucifera, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 441 Reg. Caucas.; Persia.
vertidllata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 12-rosea.
vesicaria, *Hemard, tx Benth. Fl. Austral,* v. 172.— Austral.
virgata, Roth, Nov. Sp. PI. 877=hortensis.
virgata, Scop. Delic. Insub. ii. 14 i'Hoffm. DenUcH. Fl. ed. II. it 277-patula.

ATfflPIiJBX:—
viridis, Crantz, Inst. i. 207-Chenopodium album.
viridis, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 90 = nitens.
Vulvaria, Crantz, Inst. i. 207 * Chenopodium Vulvaria.
Wolfii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 112.—Am. bor.
Wrightii, *S. Wats. I. c.* 113.—N. Mexic.
zosteraefolia, *S. Wats. l.mc.* 109.—Am. bor.

ATBOPA, Linn. Gen. ed. I. 49 (1787). *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 900.
BELLADONA, Adans. Fam. ii. 819 (1763).
acaulis, Stokes, Bot Mat. Med. i. 896 = Mandragora officinarum.
acuminata, Royle, IUnstr. Bot. Himal. 279 - A. Belladonna.
ambigua, Salisb. Prod. 182 = Scopola carniolica.
arborea, Willd. ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 497 = Acnistas arborescens.
arborescens, Linn. Cent. ii. 10 (Amoen. Acad. iv. 807) =Acnistns arborescens.
arborescens, Roem. *Sc* Schult Syst. iv. <86 -= Acnistns Plnmieri.
arenaria, Willd. ex Roem. & Schnlt. Syst. iv. 686-Nectonxia formosa.
aristata, Poir. Encyc. Suppl. i. 609-Withania aristata.
aspera, Ruiz & Pav. Fl. Pernv. ii. 45 = Hebecladns asperns.
baetica, *Willk. inLinnaea*, xxv. (1852) 5O.-Hispan.
Belladonna, *Linn. Sp. PI.* 181.—Europ.; Oriens; Ind. or.
bicolor, Rniz *Sc* Pav. Fl. Perav. ii. 45 = Hebecladns bicolor.
biftora, Ruiz *Sc* Pav. 1. c. = Hebedadus biflorus.
cmtorta, Pers. Syn. i. 219 = Saracha centorta.
daturaefolia, Thore, Chlor. Land. 74 = Nicaadra physaloides.
dentata, Pers. Syn. i. 219 •= Saracha dentata.
dependens, Mathews, ex Hook. Ic. PI. t. 107 = Salpichroa dependens.
ereeta, Hornem. Hort. Hafn. 957 = Hebecladns bi. floras.
ereeta, Zuccagni, in Roem. Collect 129-Saracha Znccagniana.
Jlexttosa, Willd. ex Roem. *Sc* Schnlt. iv. 686; Dan. in DC. Prod. xiii. 465 = Hebecladus viridiflorus.
frutescens, Linn. Sp. PI. 182 = Withania frutescens.
glandulosa, Hook. Hot. Misc. ii. ',1831) 230-=Salpichroa glandulosum.
gymnosperma, Schmid. Ic. 67. t. 18 = Nolana prostrata,
herbacea, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 3.—Campechia.
hirsuta, Meyen, Reise, i. 466 — Salpichroa hirsntum.
hirtella, *Spreng. Syst.* i. 699.—Bras.
humifusa, Goiian, Hort. Monsp. 106 = Nolana prostrata.
humilis, Sal'sb. Prod. 1-82= Mandragora offlcinarum.
lethalis, Salisb. 1. c. = A. Belladonna.
lutescens, Jacquem. ex-C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 241=A. Belladonna.
Mandragora, Linn. Syst ed. X. 988 - Mandragora officinarum.
Mandragora, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec iii. 26. t. 282 = Mandragora aotumnalis.
origanifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. ill. 396-Physalis cnrasa-ìca, origanifolia.
physalodes, Linn. Sp. PI. 181-Nicandra physaloides.
physaloides, Georgi, Beschr. Ross. Reich. Nachtr. 261 - Scopola physaloides.
physaloides, Linn. Syst. ed. XII. *ill'physalodes.*
plicata. Roth, Catalecta, ii. 24-Saracha procumbens.
procumbens, Cav. Ie. i. 53 =Saracha procumbens.
punctata, Pers. Syn. i. 219. = Saracha punctata.
ramosissima, Mathews, ex Dunal, in DC. Prod. xiii. I. 473 = Salpichroa ramosissimum.
refiexa, Walp. Rep. iii. 103, in syn.=«seq.
revoluta, F. G. Dietr. Vollst. Gaertn. Lexik. Nachtr. i. 422 - Hebecladus nmbellatus.
rhomboidea, Gill. *Sc* Hook, in Hook. Bot Misc. i. (1830) 186-Salpichroa rhomboideum.
Rothii, Poir. Encyc. Suppl. i. 610 - Hebecladns nmbellatus.
sideroxyloides, Willd. ex Roem. & Schult Syst. iv. 486 « Acnistns arborescens.

ATROPA:—
solanacea, All. ex Stend. Norn. ed. II. i. 170 = Acnistus arborescens.
solanacea, Linn. Mant. ii. 205 = Solatium aggregatum.
spinosa, Meyen, Reise, i. 466 = Donalia lycioides
umbellata, Rniz & Pav. Fl. Pernv. ii. 44 = Hebecladns nmbellatus.
villosa, Zuccagni, in Roem. Collect. 130 «Hebecladus umbellatns.
viridiflora, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 11 - Hebecladus viridiflorus.

ATROPIS, Rupr. Fl. Samoj. [Beitr. Fl. Russ. Reich, ii.] 64 (1845)-Olyoeria, R. Br. (Gramin.).
angustata, Griseb. in Ledeb. FL Ross. iv. 390=G. distans.
californica, Munro, ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. fhilad. ' 1862' (1668) 386.—Am. bor. occ
capillaris, Schur, Enum. PI. Transs. 779 = G. distans.
carinata, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 291.—Reg. Argent.
convoluta, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 889 = G. distans.
distans, Rnpr. Fl. Samoj. 64; Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 388 = G. distans.
festucaeformis, Schur, Enum. PI. Transs. 780 =,G. maritixna.
intermedia, Schur, 1. c. 779=G. maritima.
magellanica, E. Desv. in C. Gay, FL ChiL vi. 394 = G. magellanica.
maritima, Griseb. in Ledeb. FL Ross. iv. 889=G. maritima.
pauciflora, Thurb. in S. Wats. Bot. Calif, ii. 310 = Poa pauciflora.
procumbens, Thnrb. 1. c. 809.—Am. bor.
Pseudo-maritima, Schur, Enum. PI. Transs. 780«G. maritima.
pumila, T. Kirk, in Gard. Chron. (It82; I. 261; Trans. N. Z. Inst. xiv. (1862) 879.-N. Zel.
scabrella, Thurb. in S. Wats. Bot. Calif, ii. 310 = Poa scabrella.
tenuiflora, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 389 = G. distans.
tenui/olia, Thurb. in S.Wats. Bot. Calif, ii. 810 = G. tenuifoUa.
transsilvanica, Schur, Enum. PL Transs. 889, Index= G. DQfrJIiIDQA*

ATBUTEGIA, *Bedd. in Madr. Journ.* Ser. III. i. (1864) 37. *i.* 1. *ANONACEAE*, Benlh. & Hook. f. Gen. i. 957.
wynadensis, *Bedd. I. c.*—Ind. or.

ATTALEA, H.B. *Sc* K.Nov.Gen.et.Sp. i.309(1815). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 947.
acaulis, *Hort. ex H. Wendl. Cycl. Pand. Cycad.* 4.—Hab. ?
agtestis, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 42=microcarpa.
amygdalina, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 310. t. 95.—Am. austr.
blepharopus, *Mart, in Palmet. Orb.* 116. t. 5. f. 2.—Bolivia.
butyrosa, Lodd. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 232-humilis.
Cephalotus, -Poepp. ex -Mart, in Palmet. Orb. 119-Scheelea Cephalotes.
Cohune, *Mart. I. c.* 121; *et Hist. Nat. Palm.* iii. 300. 1.167.—Honduras,
eompta, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 137. t. 41, 76, 97.—Bras,
coronata, *Lodd. ex H. Wendl. Cycl. Pand. Cycad.* 5.—Hab.1
excelsa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* -ii. 138. t. 96. f. 3. -Bras,
exigua, *Drude, in Mart. Ft. Bras*, iii u. 439.—Bras,
fonifera, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 130. t 95, 96. f. 4. -Bras.
gomphocoeca, *Mart. 1. c.* 801.—Am. austr.
grandis, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 233.—Hab.?
Humboldtiona, *Spruce, Palm. Amaa*, 168.—Am. trop.
humilis, *Mart, in Spreng. Syst.* ii. 624.—Bras.
Iimbata, *Seen, ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 233.—Hab.t
macrocarpa, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 15.—Bra*.

ATTALEA:—
Magdalenae, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 15.—N. Granat.
Manaca, *Linden, 1. c.*—N. Granat.
maracaibensis, *Mart, in Palmet. Orb.* 124.—Pernv.
Maripa, Mart. 1. c. 123=Maximiliana Maripa.
microcarpa, *Mart. 1. c.* 125.—Bras.
monosperma, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 42 — spectabilis.
nuci/era, Karat, in Linnaea, xxviii (1866) 255-amygdalina.
phalerata, *Mart, in Spreng. Syst.* ii. 624.—Bras.
Pixuna, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 43—spectabilis.
Princeps, Mart, in Palmet. Orb. 118. t. 4. f. 2 = Scheelea Princeps.
purpnrea, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (188l) 16.—N. Granat.
puruënsis, *Linden, I. c*— Fl. Amazon.
racemosa, Spruce, Palm. Amaz. 166 = Orbignia racemosa.
Rossii, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 387.—Bras,
rostrata, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 50.—Costa Rica.
speciosa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 188.—Bras,
spectabilis, *Mart. 1. c.* 186. t 96. f. 1, 2.—Bras,
spinosa, *Meyen, Reise*, i. 469.—Pernv.
Tiasse, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16, nomen.—Fl. Amazon.
transitive, *Barb.-Rodr. Prot. App.* 49.—Bras.
venatorum, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 825=Maximiliana venatorum.

ATTRACTILIS, Hall, ex Scop. Introd. (1777) 124 = Atractylis, Linn. (Compos.).

AT.ULANDRA, Rafin. Sylva Tellur. 31 (1838) = •R,hw-.-Th-n1.1.o. Lino.
arragonensis, Rafin. 1. c. = R. lycioides.
valentina, Rafin. 1. c. = R. pumila.

ATUNA, Rafin. Sylva Tellur. 153 (1838) = Heritors, Dryand. (Stercul.}.
racemosa, Rafin. 1. c.-H. littoralis.

ATYIiOSIA, Wight & Am. Prod. 267 (1884). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 542.
CANTHAROSPERMUM, Wight & Am. Prod. 255 (1834).
albicans, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 243.—Ind. or.
barbata, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 216.—Ind. or.; Malaya,
calycina, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 186.—Ind. or.
candicans, Kurz, 1. c. = Rhynchosia arvensis.
Candollei, *Wight &• Arn. Prod. i.* 257.—Ind. or.
dnerea, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, ii. 264.—Austral.
drcinnalis, Benth. in Miq. PI. Jungh. 244 = Dunbaria circinalis.
elongaU, *Benth. I. c.* 243.—Ind. or.
geminiflora, *Dale, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 186.—Ind. or.
glandulosa, Dalz. 1. c.— mollis.
goënsis, Dalz. 1. c 186-barbata.
grandiflora, *Benth. ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 214.—Keg. Himal.
grandifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, ii. 264.—Austral,
kulnensis, *Dale, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 186.—Ind. or.
iLawii, *Dale. I. c*—Ind. or.
Lawii, Wight, Ic. i. t. 93-lineata.
lineata, *Wight V Arn. Prod.* i. 258.—Ind. or.
major, Wight & Am. 1. q. 257 = Candollei.
marmorata, *Banks, ex Benth. Fl. Austral*, ii. 263.—Austral,
mollis, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 243.—Ind. or.; Malaya.
nivea, *Benth. I. c.*—Burma,
platycarpa, *Benth. I. c*—Reg. Himal.
pluriflora, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, ii. 264.—Austral.
punctata, Dalz. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 186 = Dunbaria conspersa.
reticulata, *Benth. Fl. Austral*, ii. 263.—Austral,
rostrata, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 216.—Ind. or.
rugosa, *Wight tf Arn. Prod.* i. 257.—Ind. or.

ATYLOSIA:—
scarabaeoides, Austral. . *Fungk.* 242.—
•erica, *Benth. ex Baker, in Hoot./. Fl. Brit. Ind.* ii. *18—Ind. or.
**6rhombea, Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat iii. 51=
villosa, Bak. in ffmt. /• n. Brit. Ind. ii. 21*.—Reg. Himal.

AT^US. &M»b. Pared. Load, sub t. 67 (1807)-Petro-PWla, R. Br. (Proteac.).
^«>V.Wwa, Salisb. 11. c.=Isopogon anemonifolius.
folta, Salisb. 1. C.-P. pnlchelfe.

AUBENTONIA, Domb. ex Steud. Norn. ed. I. 98 (1821) .=Waltherla, Linn. (Steroul.).
tomentosa, Domb. ex Steud. 1. c. = W. ovata.

AUBERTIA, Bor* V- *• S6«- *• " (1804)=Zanthoxylum,Linn.t(Rutae.).
Bajarnardia, Buch.-Ham. in Wall. Cat. sub n. 7118 = Z.Bajamaidia.
borbon^a. Boiy, Voy. i. 856.1.18 (an Enodiae sp. »-Cf. Benth. f. Hook. f. Gen. *• 296)=Z. Aubertia.
*pisp, ta*Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 7117=Z. anultonianum.
Timbor, ich.-Ham. ex Wall. l. c. n. 7116 am
thopod Sp. Bory ex Steud. Nom. ed. II. i. 171=Z. Aubertia.

AUBERTIA, Chapel, ex Baill. Adansonia, i. (1861) 162, 166=Croton,Tinn. (Euphorb.).
argentea, Chapel, ex Baill. 1. c. 162 = C. Noronbae.
gianduiosa, ChapeL ex Baill. L c. 166-C. Chapelieri.

AUBION, Rafin. Sylva Tellur. 110 (1888) = Cleome, Linn, (Capparid.).
Chelidonii, Rafin. l. c.=C. Chelidonii.

AUgLETIA, Gaertn. Froct. i. 879. t. 78. £ 2 (1788) = J^5*tta.Linn.f.(Lytbxar.).
Gaertn. 1. c=S. acida.

AUBLETIA, Lour. Fl. Cochinch. 283 (1790) - Paliurus, Town. (Rhamnac.).
romosissima, Lour. 1. c.=P. ramosissimus.

AUBLETIA, Neck. Elem. i. 356 (1790) = BuelUa, W (Acanth.).

AUBLETIA, Rich, in Pen. Syn. ii. 688 (1807)=JConnieria, Linn. (Rutac.).
trifoliat.<h Pers.l. c.=M. trifoUa.

AUBLETIA, Schreb. Gen. 353 (1789) = Apeiba, Aubl. (Tiliac.).
"?*ry, Willd. Sp. PL ii. 1156-Apeiba aspera.
dispar, Spteae- Nene Mor. Entdeck. ii. 166 = Apeiba dispar.
laevis, Willd. Sp. PL ii. 1156=Apeiba glabnt.
*Petoun**, Willd. 1. a-Apeiba PetoumaT
Tibourbo». Willd. 1. c.=Apeiba Tibourbou.
Tiburbu, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 944=piaec.

AUBRIETIA, Adans. Fam. ii. 420 (1763) (Aubrieta); i... w Mem. Mns. Par. vii. (1821) 232; SysL a. »3. *CRVCIFERAE,* Benth. & Hook. f. Gen. i. 73.
Columnae, Boiss. Fl. Orient i. 252=deltoidea.
Guss. PI. Rar. 266.-Ital.
croatica, Schott, Nyman & Kotschy, Analect. Bot. 47.
wUoidea, ZC. *Syst.* ii. 294.—Italia; Graeda; As. Min.
*&HfV*S?, ren8- SJ*- a- 871 = Heliophila diflusa.
wvtula, ^o;«. w. On>B/_ i# 254.—Knidistan.
Graecia.
fieri uada, Shc Hist V<e Han, * 49-dd,
to-fen.
gracilis, Sprun. ex Boiss. CV^w. Ser. I. i. 74—Graecia.
|Tff[a]> Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. i. 268=deltoidea.
d[t]oidea.
integrifolia, Fisch- & Mey. in Ann. Sc. Nat Ser. IV. i. (1854) 85 = <Mtoidea.
intermedia, Heldr. & Orph 86.—Graecia. *BtUs_Diagn,Sa,ILL

ATIBBIETIA:—
Kotschyi, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. viii. 82.—Petsia.
italica, Boiss. Fl. Orient *i.* 252, in nota-Columnae.
lepidioides, Spreng. Syst. ii. 871 = Heliophila diSusa.
libanotica, *Boiss. b* Hohen. Diagn.* Ser. I. viii. 82.—Mont. Libanng.
olympica, *Boiss. Fl. Orient,* i. 251.—Bithynia.
pairiflora, *Brrio. Diagn.* Ser. I. vi. 14.—Persia.
Pinardi, *Boiss. 1. c.* Ser. II. i. 37.—As. Min.
purpurea, DC. Syst. ii. 294=Arabis purpurea.

AUBBTA, Baill. Adansonia, ii. 265 (1861-62). *HUMIRIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 988.
gabonensis, *Baill. I. e.* 266.—Afr. trop.

AUCHERA, DC. Coll. Mém. ix. t 11; Prod. vi. 557 (1837)-Couslnia, Cass. (Compos.).
fioribunda, Regel, Cat PI. Hort. Akaakov. 13.—Hab. ?
orientalis, DC. Coll. Mém. ix. 1.11=C. orientalis.

AUCKLANDIA, Falc. in Trans. linn. Soc. xix. (1845) 23=Saussurea, DC. (Compos.).
Costus, Falc. 1. c.=S. Lappa.

ATTCTTBA, Thunb. Nov. Gen. 61 (1788). *CORNACEAE,* Benth. A Hook. f. i. 950.
EUBASIS, Salisb. Prod. 68 (1796).
chinensis, *Benth. Fl. Hongk.* 138.—China,
himalaica, *Hook./. & Thorns. Illustr.Himal. PI.* t 12.—Reg. Himal.
japonica, *Thunb. Nov. Gen.* 61.—Japon.

AUCUBA, Cham, in Linnaea, v. (1880) 56, in syn.= ARUBA, Nees & Mart.=KapuUa, Anbl. (Rutac).

ATTCUBAEFU V JJIITJM, Ahlburg, in Bot Zeit. xxxvi. (1878) 118. *CORNACEAE.*
liookiense, *Ahlburg, I.* c—Japon.

AUCUPARIA, Riv. ex Rupp. FL Jen. ed. Haller. 140 (1745) = Pyrus, Linn. (Rosac).
pinnata, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 878=P. Ancnparia.
sylvestris, Medic. Gesch. 86-P. Aucuparia.

AUDIBERTIA, Benth. in Bot. Reg. snb 11282 (1829)-Mentha, Linn. (Labiat).
paniflora, Nym. Consp. 697— M. Reqsieni.
pusitta, Benth. in Bot. Reg. sub 11282=M. Requieni.

AXJDIBBKTIA, Benth. in Bot. Reg. t. 1469 (1831). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1197.
capitata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1808) 387.—Calif.
Cleveland!, *A. Gray, I. c.* z. (1874) 76.—Calif.
deeurrens, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xii. 359 = grandiflora.
Dongi=*Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 190.—Calif.
grandiflora, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 812.—Calif.
Enmilis, *Benth. I. c.* 313.—Calif,
incana, *Benth. in Bot. Reg.* 1.1469.—Am. bor. occ.
nivea, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 318.—Calif.
Palmeri, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 601.—Calif,
polystachya, *Benth. Lab. Gen. et St.* 314.—Calif.
spinulosa, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xii. 859= stachyoides.
stachyoides, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 818.—Calif.
Vaseyi, *T. C. Porter, in Coult. Bot. Gatette,* vi. (1881) 207.—Calif.

•ATTDOTJINIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat viii. (1826) 884. t. 38. *BRUNIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 673. PAVINDA, Thunb. ex Bartl. Ord. 874 (1830).
capitata, *Brongn. I. c.*—Afr. austr.

AUGANTHUS, Link, Handb. i. 415 (1829) - Primula, Linn.
praenitens, Link, 1. c.=P. sinensis.

AUGEA, Thunb. ex Retz. Obs. v. 8 (1789)=Lanaria, Ait. (Haemod.)-
lanata, Thunb. ex Retz. 1. c =L. plumosa.

ATTOBA, Thunb. Prod. PI. Cap. 80 (1794); et Nov. Gen. 182 (1798). *ZYGOPHYLLEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 265.
capensis, *Thunb. It. cc.* 80 et 133.—Afr. austr.

AUGIA, Lonr.Fl. Coehincb. 837 (1790). 'Genus ignoturn,'Benth. & Hook. f. Gen. i. 418.
sinensis, Lour. 1. c { = *Calophyllum Augia* ex Steud. Norn. ed. II. i. 171).—China.

AUGUSTA, Leandr. Sacram. in Denkschr. Akad. Muench. vii. (1819) 235. t 14=8ttfftla, Mikan (Compos.).
grandiflora, Leandr. Sacram. 1. c.=S. dirysantha.
parmflora, Leandr. Sacram. 1. c.=S. parviflora.

AtTGTTSTA, Pohl, PI. Bras. Ic ii. 1. t. 101-105. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 51.
BONIFACIA, Manso, ex Stead. Nom. ed. II. i. 216 (1840).
SCHKEIBERSIA, Pohl, in Flora, viii. (1825) 188.
attenuate *Pohl, PI. Bras. Ic.* ii. t 104.—Bras,
glancescens, *Pohl, I. c.* 1.105.—Bras,
lanceolate, *Pohl, I. c* t. 101.—Bras,
oblongifolia, *Pohl, I. c.* t 108.—Bras.
parvifolU, *Pohl, 1. c.* 1.102.—Bras.

AUGUSTEA, DC. Prod. iv. 404 (1830) «= Augusta, Pohl (Rubiac.).

AUGUSTIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 124; et Abh. Akad. Berl. (1854) 80. t 8. B.-Begonla, Linn.
caffra, Klotzsch, 11. cc. 124 &81 = B. caffra.
Dregei, Klotzsch, 11. cc 124 *Sc* 80 = B. Dregei.
natalensis, Klotzscb, IL cc 181 & 80=B. natalensis.
suffruticosa, Klotzsch, 11. cc. 124 *Sc* 82 - B. suffrnticosa.

AUGUSTINEA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 395 = Bactris, Jacq. (Palm.).
balanoidea, Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1868) 39-B. balanoidea.
major, Karst in Linnaea, xxviii. (1866) 396 » B. major.
ovata, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1868) 88 = B. ovata.

AUGUSTINEA, St. Hil.&Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. IU.ii. (1844) 145=Miconia, Ruiz & Pav. (Melast).
speciosa, St. Hil. *Sc* Nand. 1. c. = M. spedosa.

AULACIA, Lour. Fl. Cochinch. 273 (1790) = Clausena, Buna. f. (Rutac.).
falcata, Lour. FL Cochinch. 278 *(-Cookiafalcata).*—Cochinch.
falcifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 482 = praec.
punctata, Raeusch. Nom. ed. III. 119-CL Wampi.

AULACIDIUM, Rich, ex DC. Prod. iii. 112 (1828)-Kaorocentnim, Hook. *I* (Mekst).
cristatum, Rich, ex DC. I. c. 113 = M. cristatum.
fasdculatum, Rich, ex DC. 1. c.=M. fascicnlatum.

AULACINTHUS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 155 (1835) =Lotononifl, EckL *Sc* Zeyb. (Legum.).
gracilis, E. Mey. 1. c = L. gracilis.
rigidus, E. Mey. 1. c. - L. rigidus.

ATTLACOCAIiYX, Hook. f. in Hook. Ic. PI. 1.1126 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 109.
jasminifloia, *Hook.f. 1. c.*—Afr. trop.

AUXACOCAKPU8, Berg, in Linnaea, xxvii. (< 1854') 845. *MYRTACEAE,* Benth. *Sc* Hoc*, f. i. 720.
crassifolius, *Berg, I. c.* 846.—Ins. Gorgona,
qnadrangularis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 239.—Ind. occ.
Sellowianus, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (' 1854 ') 346.—Bras.
Wrightii, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 90.—Cuba.

AUXACODISCTTS, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 71 (1873)(no« *Ehrenb. quae Crypt.). RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 71.
premnoides, *Hook.f. 1. c.*—Malaya.

AULACOPHYLLUM, Regel, Gartenfl. (1876) 141-Zomia, Linn. (Cycad.).
Lindeni, Regel, L c.»Z. Lihdeni.
montanum, Regel, 1. c. = Z. montana.
Ortgiesi, Regel, 1. c. = Z. Chigua.
Roetli, Regel, 1. c.=Z. psendo-parasitica.
Skinneri, Regel, 1. c. 143=Z. Skinneri.
Wallisii, Regel, 1. c - Z. Wallisii

AULACORHYNCHUS, Neei, in Linnaea, iz. 806 (1834); ib. x. 198 (18S5). *CYPERACEAE*, Beoth. & Hook. f. Gen. iii. 1048.
crinifiona, Steud. Nom. ed. II. i. 171-seq.
crinifolius, *Nees, in Linnaea*, iz. 305; et z. 199.—Air. anitr.

AULACOSPERMUM, Ledeb. Fl. Alt ẇ. 344 (1833)-Fleurospennum, Hoffm. (Umbel!.).
anomalum, Ledeb. 1. c. 386.—Mont Altai.
cuneatum, Ledeb. 1. c.—Mont. Altai.
multifidum, Meinsh. in Iinnaea, zzz. (1859-60) 615. —Jobir.
simplex, Rupr. Sert. Tiansch. 49 = P. stellatnm.
Unuilobum, Mrinsh. in Linnaea, zzz. (1869-60) 515. —Sibir.

AULACOSTIGMA, Tnrez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. zz. (1847) 1.149=Hhynohotheea, Ruiz&Pav. (Geran.).
inerme, Tnrcz. 1. c. 150.—Reg. Andina.

AUIiAX, Berg. Descr. PI. Cap. 33 (1767). *PRO. TEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii 168.
cneorifolia, *Knight, Prat.* 16.—Afr. austr.
pinifolia, *Berg. Descr. PI. Cap.* 33.—Afr. austr.
umbellata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. z. (1810) 50 = cneorifolia.

AULAXANTHUS, Ell. Sketch, i. 102 (1817) - Anthaenantla, Beanv. (Gramin.).
cUiatus, EU. 1. c = Anthaenantia villosa,
rufus, Ell. 1. c. t. 6—Anthaenantia rob.

AULAXIA, Nntt Gen. Am. i. 47 (1818)-Anthaenantia, Beauv. (Gramin.).
ciliata, Nutt 1. c.=Anthaenantia villosa.
rufa, Nntt. 1. c.—Anthaenantia rufa.

AULAXIS, Haw. Enum. Sazif. 46 (1821) = Saxifraga, Linn.
micranthifolia, Haw. 1. c. 47-S. erosa.
nuda, Haw. 1. c.-S. erosa.

AULAXIS, Steod. Nom. ed. II. i. 171(1840) = AULAYIA, Nutt. =AnthaenantIa, Beauv. (Gramin.).

AULAYA, Harv. Gen. PI. Afr. Austr. 249 (1838) = Harveya, Hook. (Scroptral.).
capensis, Harv.L c. 250 = H. capensis.
coccinea, Harv. Thes. Cap. i. 23.—Afr. augtr.
grandiflora, Benth. in DC. Prod. z. 528.—Afr. austr.
obtusifolia, Benth. 1. c. = H. obtusifolia.
pauciflora, Benth. 1. c. 524.—Afr. austr.
purpurea, Benth. L c. 523 = H. pnrpurea.
scarlatina, Benth. 1. c. 624.—Afr. austr.
squamosa, Harv. Gen. PL Afr. Austr. 250-H. squamosa.

AULEYA, D. Dietr. Syn. PL UL 589 (1843) - pnec.

AULICA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 10 (1836)=Hippea-Strum, Herb. (Amaryll.).
latifolia, Rafin. 1. c. = H. anlicum.
platypetala, Rafin. 1. c. -=H. aullcnm.
striata, Rafin. 1. c. = H. aulicum.

AULIPHAS, Rafiu. Sylva TeUnr. 95 (1838) = Miconia, Ruiz & Pav. (Melast.).
ligustrina, Rafin. 1. c - M. ligustrioides.

AULIZA, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 294-[illegible] Linn. (Orchid.).
ciliaris, Salisb. 1. c. - E. dnaie.

AULOMYRCIA, Berg, in Linnaea, zzvii. (1854) 85 = Myrda, DC. (Myrtac).
Abrantea, Berg,.l. c. zxx. (1859-60) 659.—Bras.
acetosans, Berg, L c. 662.—Ind. occ
acrantha, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 71.—Bras.
acutata, Berg, 1. c - M. acutata.
acutifolio. Berg, L c. 89.—Bras.
Aethusa, Berg, 1. c. 112.—Bras.
alagolnsis, Berg, 1. c 120=M. alagoënsis.
albo4omentosa, Berg, in Iinnaea, zzvii. (1854) 62 = M. albo-tomentosa.
alloiota. Berg, L c. 54.—Bras.
altemifolia, Berg, 1. c 72-M. alterhifolia.
amamoriua, Berg, L c, 41—M. anrnimin.

AULOMYRCIA:—
amethystina, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 108.—Bras.
andromedoides, Berg, in Linnaea, zzvil. (1854) 40-Myrcia andromedoides.
androsaemoides, Berg, 1. c. xzz. (1869-60) 661.—Guiana.
angustifnlia, Berg, in Mart Fl. Bras. ziv. I. 186.—Bras.
anomala, Berg, 1. c. 96-M. anomala.
apiocarpa.Tierg, L c. 64.—Bras!
atropilosa, Berg, L c 101.—Bras.
atrovirens. Berg, 1. c. 121.—Bras.
aureo4anata, Berg, in Linnara, zzviL (1864) 52.—Bras.
badia, Berg, in Mart Fl. Bias. ziv. I. 547.—Bras.
bahiensit,Vexg, 1. c. 113.—Bras.
hello, Berg, 1. c. 71-M. bella.
bicarinata, Berg, L c. 118.—Bras.
bicudoensu, Berg, 1. c. 567.—Bras.
biformis, Berg, 1. c. 141.—Bras.
Billardiana, Berg, in Linnaea, zzvii. (1864) 51 - M. Billardiana.
bimarginata, Berg, in Mart Fl. Bras. ziv. I. 118.—Bras.
Blancketiana, Berg, 1. c. 65.—Bras.
bombydna, Berg, 1. c. 68.—Bras.
Botrys, Berg, 1. c 116.—Bras.
bracteata, Berg, 1. c 654-M. bracteata.
brmramis, Berg, 1. c. 66.—Bras.
bullata, Berg, 1. c 96=M. bullata.
buxifolia, Berg, 1. c. 80=M. bnxifolia.
buxitans. Berg, in Linnaea, zzz. (1859-60) 664.—Guiana.
caerulescens, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 80.—Bras.
caesia, Berg, 1. c. 83.—Bras.
calyptranthoidjcs, Berg, 1. c. 67.—Bras.
Camaraeana, Berg, 1. c. 88 = M. Camaraeana.
Cambessedeana, Berg, in T.innaei, zzvii. (1854) 40 = M- Cambessedeana.
campestris, Berg, 1. c. 74=M. campestris.
capitata, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 564-M. capitata.
capivarhyensis, Berg, in Linnaea, zzviL (1864) 86 - M. capivarhyensis.
caracasana, Berg, 1. c 53=M. caracasana.
cardiophylla, Berg, in Mart Fl. Bras. ziv. 1.108 » M. cardiophylla.
cassinoides, Berg, in Linnara, zzvii. (1864) 74=M. cassinoides.
castrensis. Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 111.—Bras.
chapadensis, Berg, 1. c. 654.—Bras.
chilensis, Berg, in Linnaea, zzvii. (1854) 88 - M. chilensis.
chtysopkylla. Berg, in Mart. Fl, Bias. ziv. I. 126.—Bras.
Clausseniana, Berg, 1. c. 118.—Bras.
collina, Berg, in Linnaea, zzvii. (1854) 40.—Bras.
comosa, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 138.—Bras.
conduplicata, Berg, in Linnaea, zzvii. (1864) 76.—Guiana.
confusa, Berg, 1. c. 56.—Bras.
coriacea, Berg, 1. c 70—M. coriacea.
corymbifiora, Berg, 1. c 74.—Bras.
corymbosa, Berg, L c. 41=M> coiymbosa.
costata, Berg, in Mart. Fl. Bras. MY. I. 79 - M. costata.
Coumeta, Berg, in Linnaea, zzvii. (1854) 60 = M. Comneta.
crassicaulis. Berg, 1. c. 74 = M. crasslcaulis.
crassifolia, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 128.—Bras.
crenulata, Berg, 1. c. 141.—Bras.
cuneata. Berg, in Linnaea, zzvii. (1864) 72.—Venezuela.
cuprea, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 77.—Bras.
curatellaefolia, Berg, in Linnaea, zzvii. (1864) 65 — M. curatellaefolia.
cymosa, Berg, in Mart Fl. BIBS. ziv. I. 652.—Bras,
daphnoides, Berg, in Linnaea, zzvii. (1864) 77=M. daphnoides.
dealbata, Berg, 1. c. 61 - M. dealbata.
debilis, Berg, 1. c 62 - M. debilis.
decrescens,Seig, in Mart Fl. Bras. ziv. 1.135.—Bras.
densa, Berg, in Linnaea, zzvii. (1854) 87=Calyptranthes densa.
desertorum, Bag, in Mart FL Bras. ziv. I. 656.—Bras.
detergent, Berg, in Linnaea, zzvii. (1864) 46 - M. detergent.

AULOMYRCJA:—
diaphana, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 82.—Bras.
dichroma, Berg, in Linnaea, zxvii. (1854) 65.—Guiana.
dictyophUba, Berg, in Mart Fl. Bras. ziv. I. 560.—Bras.
dictyophylla, Berg, 1. c. 72.—Bras.
dimorpha, Berg, 1. c. 101.—Bras.
divaricata, Berg, in Linnaea, zxvii. (1854) 68 = M. divaricata.
Doniana, Berg, in Mart FL Bras. xiv. I. 516-M. Donlana.
dumoso, Berg, in Linnaea, zxx. (1859-60) 666.—Guiana.
edulis, Berg, 1. c. 657.—Guiana.
egensis, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 99.—Bras.
elaeodendra. Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 76 = M. elaeodendra.
emarginaia, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. *u* 134.—Bras.
eumecophylla, Berg, 1. c 98.—Bras.
exsucca, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 79 » M. exsucca.
Fenmliana, Berg, 1. c. 63=M. Fenzliana.
ferruginea, Berg, in Mart FL Bras. ziv. J. 562 - M. faruginea.
fragUis, Berg, 1. c. 117—Bras.
Gardneriana, Berg, L c. 129 = M. Gardneriana.
garopabensis, Berg, in Iinnaea, xxvii. (1854) 47 •* M. • garopabensis.
Gaudichaudiana, Berg, in Mart Fl. Bras. ziv. 1. 88.—Bras.
gigantea, Berg, 1. c. 648.—Bras.
glabra, Berg, L c 119.—Bras.
glandulosa. Berg, in Linnaea, zzvii. (1854) 79.—Bras.
glauca, Berg, 1. c 60 = M. glanca.
glaucescens, Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 81.—Bras.
goyamensis, Berg, 1. c. 85 = M. goyazensis.
grandiflora, Berg, 1. c. 113.—Bras.
grandifolia, Berg, 1. c. 97 - M. grandifolia.
hepatica.Bng, *I* c. 132.—Bras.
hirtiflora, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 40 = M. hirtiflora.
holosericea, Berg, in Mart. Fl. Bias. xiv. I. 99.—Bras.
Hostmanniana, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 42.—Guiana.
hypericoides, Berg, 1. c. 62 = M. hypericoides.
imbricata, Berg, T. c. 61=M. imbricata.
insularis. Berg, in Mart. Fl. Bras. ziv. I. 98=M. insularis.
intermedia, Berg, 1. c. 107.—Bras.
Jacquiniana, Berg, in Linnaea, xxvii. (1S54) 69 »M. coriacea.
jequitinhonhensis, Berg, in Mart. FL Bras. ziv. I. 137—Bras.
KlotBschiana, Berg, 1. c. 111 = M. Klotzschiana.
laciniosa, Berg, 1. c. 545.—Bras.
lancea, Berg, 1. c. 88.—Bras.
lancifolia, Berg, in Linnaea, xxx. (1859-60) 668.—Guiana.
Langsdorffii, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 550 = M. Langsdorffii.
lanuginosa, Berg, 1. c 102 = M. lanuginosa.
laricina. Berg, 1. c. 61.—Bras.
Laruottiana, Berg, in Iinnaea, xxvii. (1854) 68 = M. Laiuottiana.
Laureola, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1.110.—Bras.
laurifiora. Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 64 = M. laurifloia.
laurifolia, Berg, 1. c =M. lanrifolia.
laxifiora, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. -1)* = M. laziflora.
leptoclada, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 40 = M. leptoclada.
Leucadendron, Berg, 1. c. 64=M. Leucadendron.
leucantha, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 93.—Bras.
linearifolia, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 35 - M. linearifolia.
lineata, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 68.—Bras.
Lingua, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 77.—Bras.
linguaeformis, Berg, in Mart. FL Bras. xiv. 1.125.—Bras.
longipes, Berg, in Iinnaea, zzvii. (1854) 65.—Bras.
lucida, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 118.—Bras.
macrocarpa, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 41 - M. macrocarpa.
macrophylla, Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. I. 99»M. macrophylla.
Manstni, Berg, 1. c. 121.—Bras.

AULOMYRCIA:—
Uaraguana, Berg, in Mart. FL Bras. xir. I. 120-Myrcia Maraguana.
Mariana, Berg, L c. 668.—Bnx.
ttartiana, Berg, L c. 138 = M. MartUna.
Matkevsiana, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 46—Pernv.
micrantka, Berg, in Mart. FL Bras. xiv. I. 616—Bras.
microcarpa, Berg, 1. e. 81 = M. microcarpa.
"icropetala. Berg, in linnaea, xxviL (1884) 66.—Bras.
"wntana, Berg, 1. c. 36-M. montana.
»ugiensis, Bag, L c. = M. mugiensis.
**ultiflon,* Berg, L c. 47 -M. mnltifloia.
mutabilh, Berg, in Mart. FL Brag. xiv. I. 70.—Bras.
"yrtillifolia, Berg, in Iinaaea, xxvii. (1864) 36-M. myrtillifolia.
Neesiana, Berg, L c. 86=M. Neesiana.
nigrescent, Berg, 1. c. 71=M. nigrescens.
nigricans, Berg, In Mart Fl. Bras. xiv. 1.101.—Bras.
mgro^unetata, Berg, L c. 116.—Braa.
ntvea, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 61-M. nivea.
"ilongata, Berg, 1. c. 87=M. oblongata.
eiooata, Berg, 1. c 72.—Bras.
ohscura, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1.181—Bras.
oottcta, Berg, 1. c. 117.—Bras.
oitusa. Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 66-M. obtusa.
ntusata, Berg, 1. c. 89—Bras.
"tbopkylla, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 549—Bras.
OttonU, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 55—Guiana.
"ali/olia, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 81.—Bras.
°"«{Wi Berg, I. c 107.—Bras.
tehyclada, Berg, 1. c. 133.—Bras.
fid'ens, Berg, in Linnaea, xxvii. (1884) 7S-M. pallens.
Pallida, Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. I. 87.—Bras.
Panicularis, Berg, 1. c 84.—Bra*.
tanuulata, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864).60—Bras.
Paraensis, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 76.—Bras.
*P<"*ahibensis,* Berg, 1. c. 135.—Bras.
f^nfiora, Berg, L c. 860=M. pauciflora.
Ptrforata, Berg, L c. 83.—Bras.
P»tusa, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 47-M. pertusa.
fauhienas, Berg, in Mart. FL Bras/xiv. i. 87.—Bras.
hfaritha, Berg, L c. 665—Bras.-
**"f?«* Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 85-M. pi-ifolia.
pirarensis, Ba S' L c. 41—Guiana.
platyclada, Beig, Mart. Fl. Bras. xiv. I. 846-M. platyclada.
*Pj*mbea,* Berg, 1. c. 142.—Bras.
*P<*Ppigiana,* Berg, In Linnaea, xrvii. (1854) 78.-Bras.
PohUana, Berg, In Mart. FL Bras. xiv. I. 72.—Bras.
Polyantha, Berg, 1. c. 82-M. Kunthiana.
poiyn Bra?**1, BeiR> fa UBDUR ntTlL (18M) *•"" *pruinosa,* Berg, in Mart. FL Bras. XIT. 1.114.—Bras.
prunifolia, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) M-M-Pninifolia.
P^ieruUi, Berg, 1. c. 54=M. pubenda.
Pwnftora, Berg, 1. c. 40=M. pubiflora.
P>"chra, Berg, in Mart. FL Bras. xiv. I. 68.—Bn*.
*P*nctata,* Berg, 1. c. 646 -M. punctata.
P«lla,* Berg.1 c. 140—Bras.
Pynfolia, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 44.—Bras.
*'«*m«ia,* Berg, 1. e. 52.—Bras.
^nuliflora. Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 64—Bras.
ramulosa, Berg, in Linnaea, xxvn. (1864) 86-M. ramulosa.
Kfg'liana, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. L 667.—Bm.
ntuulata, Berg, 1. c. 108 - M. reticulata.
rehcutosa, Berg, in Linnaea, xxvii. (.1864) 62-M. reticnlosa.
rrtma, Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. 1.142^-Bras.
Richi aSt,"*"1 BtrBl fa LiBMe »> "* C 186*60) *m* *Ridelliana,* Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 661.—Bras.
roraimensis, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 68.-Guiana.
ror?,s Berg, in Mart. Fl. Brat. xiv. 1.552—Bras.
rostrata, Bog, L c. 644 -M. rortraU.
*T"*1<HU.* Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 54—Bras.
r«jg/olia,* Berg, in M.rt. Fl. Bns. xiv. I. 128—a.

AULOMYRCIA:—
rubella, Berg,tin Linnaea, xxvii. (1854) 40-M. rabella.
rufa, Berg, in Mart. FL Bras. xiv. i. 65.—Bras.
rufipes, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 77-M. rnfipes.
rugosa, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 110.—Bras.
Sagraea, Berg, in Linnaea, xxx. (1869-60) 655.—Cuba.
salieifolia, Berg, 1. c. xxvii. (1864) 78-M. salicifblia,
Saltmanni, Berg, in Mart. FL Bras. xiv. I. 116—Bras.
Schomburgkiana, Berg, in LJnnaea, xxvii. (1864) 76—Bras.
Schrankiana, Berg, 1. c. 78-M. Schrankiana.
scrobiculata, Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. 1.187-M. " scrobicolata.
Sonderiana, Berg, 1. c 110—Braa.
sfathulata. Berg, 1. c. 01—Braa.
iphturocarpa, Berg, in Linnaea, xxvii. (1B64) Sl-M. sphaerocarpa.
spkenmdes, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 68—Bras.
Sprueeana, Berg, 1. c. 76.—Bras.
sienophylla, Berg, in Linnaea, xxx. (1859-60) 654.—Paraguay.
sKctophyUa, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 67.—Bras.
stricta, Berg, 1. c. 548.—Bras.
sumeolens, Berg, in Linnaea, xxvfl. (1864) 78 = M. suaveolens.
sutalpestris, Berg, 1. c. 78=M. subalpestris.
subavenia, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 69.—Bns.
subcordoto. Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 62-M. snbcordata.-'
subobliqua, Berg, 1. c. 67.—Guiana.
sttboerticillaris, Berg, L a 73.—Bras.
suffruticosa, Berg, in Mart. FL Bras. xiv. 1.186.—Bras.
supraaxillaris, Berg, 1. c. 69.—Bras.
surinamensis, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 64-M. surinamensis.
tenuifolia. Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 68.—Bras.
ternifolia, Berg, 1. c. 134.—Bras.
thyrsiflora, Berg, in Linnaea, xxviL (1854) 74.—Bras.
torta, Berg, 1. c. 78-M. torta.
tortuosa, Berg, in Mart. FL Bras. xiv. I. 558.—Bras.
trichantha, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 215—Bras.
trifiora, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 79 - M. triflora.
trifolia, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1.107.—Bras.
undulata, Berg, 1. c. 89.—Bras.
vacciniifolia, Berg, 1. c. 140.—Bras.
variabilis. Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 91-M. variabilis.
Vautheridna, Berg, 1. c. xxx. (1859-60) 655-M. Vauthieriana.
veUensis, Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. 1.560.—Bras.
venulosa, Berg, in Linnaea,' xxrii. (1854) 63-M. vennlosa.
vestita, Berg, 1. c. 74-M. vestita.
mViara,Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1.1S6 = M. virgata.
Widgreniana, Berg, 1. c. 70.—Bias.
WullxUaegeliana, Berg, in Linnaea, xxviL (1854) 48.—Guiana.

AULONEMIA, Gondot, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 76. t. 6 - Arthrostylidlum,Rnpr. (Gramin.).
Gueit, Goudot, L c—N. Granat.

AULONIX, . Rafin. Sylva Tellnr. 25 (18S8)-Cjrtlras, Linn. (Legnmin.).
biflorus, Raiin. 1. c - C . biflorus.

AULOSEMA, Walp. Rep. i. 694 (1842)-Aatragalus, Linn. (Lefijnmin.j.
eximium, Walp. 1. c. -Astr. hypogaeus.

AURANTIUM, Tonm. ex Mill. Gard. Diet ed. VI (1762)-Citrus, Linn. (Rntac.).
acre, Mill. L c. ed. VIII. n. 1 = C. Anrantinm.
decumana, Mill. L c. n. 4-C . decnmana.
humiU, Mill. 1. c. n. 5 - C. humilis.
myrtifolium, Desconrt. Fl. Med. Antill. iii. 808. t 219-C. Anrantinm.
orientate. Mill. Gird.Dicted.VIH.n.S-C. Aorantinm.
tilmstre, Pritz. Ie. Ind. 127-C. Anrantinm.
siiunst.Mill Gard.Diet.ed. Via n. 2-C. Anrantium.

AURELIA, Cass. BnlL Soc. Fhilom. (1816) 175; et in Diet. Sc. Nat xxxvii. 488 (1816)-Griiideli«, Willd. (Compos.).
amflexicaulis, Cats. 1. c.-G. sqnarrosa.
decurrtns, Cass. 1. c. - G. glntinosa.

AURELIA :—
gluHnosa, Cass.—Cf. BalL Soc Phflom. (1815) 175 = Grindelia glntinosa.
squarrosa, Cass. ex Stend. Nom. ad. IL L 171-G. sqnarrosa.

AURELIA, J. Gay, in Ann. Sc. Nat Sir. IV. x. (1868) 95-Naroissua, Tonm. (Amaryll.).
Broussonetii, J. Gay, 1. c 96=N. BronssonerJi.

AURELIANA, Lafit ex Catesb. Nat. Hist Carol. App. 16 (1754)=Aralla, Linn.

AURELIANA, Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 138. t. 19. (1846) =BaaaoTte, Aubl. (Solan.).
fasciculate, Sendt 1 c 140-B. fkscicuUU.
glomuliflora, Sendt. 1. c. 188.—Bras.
lucidr, Sendt 1. c. 189.—Bras.
tomentosa, Sendt. 1. c 140-B. tomentosa.
velutina, Sendt. 1. c.-B. velutina.

AUREOLARIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 58 (1886)-Qerardia, Linn. (Scrophul.).
cuneifolia, Rafin. 1. c. 59 = Herpestis pnbescens 1
gleuca, Rafin. 1. c 60—G. quercifolia.
lengaia, Rafin. 1. c. 69=G. laevigata.
reticulata, Rafin. 1. c.—Am. bor.
rupestris, Rafin. 1. c. 60=G. rnpestris.
millosa, Rafin. 1. c. 59 = G. flava.

AURICULA, Tonrn. ex Spach, Hist. Veg. Phan. ix. 856 (1840) = Primula, Tonm.
crenata, Spach, 1. c. 368=P. maiginaU.
gluHnosa, Spach, 1. c. 359=P. glutinosa.
hortensis, Spach, 1. c. 357-P. Auricula.
integrifolia, Spach, 1. c. 859=P. integrifolia.
minima, Spach, 1. c 860-P. minima.
Palinuri, Spach, L c 357 - P. Palinnri
villosa, Spach, 1. c 358-P. minima.

AURILA, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 1, nomen (Quid)).'

AURINIA, Desv. Jonrn.Bot. iii.(1813) 162-Alyssum, Linn. (Cracit).
capensis, Desv. I. c. - Heliophila difinsa.
corymbosa, Giiseb. Spicil. Fl. Rumel. L 271 - AI. cotyinbosum.
edentula,»Tach. Mey. & Trantv. Ind. Sem. Hort. Petrop. HL 4-A1. gemonense.
gemonensis, Griseb. Spicil. FL RnmeL L 272-AI. gemonense.
media, Sctrar, Ennm. PI. Transs. 61 - Al. gemonense.
obcordata, Desv. Joura. Bot. iii. (1818) 162-Al. obcordatum.
orientalis, Griseb. SpiciL Fl. RnmeL L 272-Al. orientate.
petraeum. Fuss, Fl. Transs. 64-Al. gemonense.
saxatilis, Desv. Jonrn. Bot. iii. (1818) 162 - AL saxatile.
saxaHlia, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 273-AL orientale.
sinuaia Griseb. 1. c 271-AL nnnatmn.

AUROTA, Rafin. FL TeHor. HL 61 (1886)-Ouroallgo, Gaertn. (AmarylL).
latifolia, Rafin. 1. c. =C. latifelia.

AURORA, Noronha, in Verb. BaUv. Gen. v. (1790) ed. ' I. Art. iv. l-Quiaqualla, Linn. (Combret).

AUSTERIUM, Poit. ex DC Prod, it 885 (1825)-B [illegible] (Legmnin.).

AUSTRALINA, Gandich. in Freyc Voy. Bot 505 (1826). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. £ iii. S94.
ANAGANTHOS, Hook. f. Fl. N. ZeL i. 226 (1864).
DIDYMOTOCA, E. Mey. Zwei Pa. Docum. 178 (1848), nomen.
aeomiaata, *Vfedd, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. i. (1864) 212—Afr. aostr.
capensis, *Wedd. I.* f.—Afr. anstr.
flaedda, Wedd. in Arch. Mns. Par. viii. (1855-56) 646. t 20 C. - Schimperiana.
integrifolia, *Vnid. in Ann. St. Nat.* Ser. IV. L (1854) 212—Afr. anstr.
Mnelleri, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* vUL (1866-56) 645.—AustraL
Novae-ZtUnduu, Hook. f. FL N. ZeL i. 226-pnsilla.

AUSTBALUTA:-
puiilla, *Gaudich. in Freye. Voy. Bot.* 505.—Anstral.; N. Zel.
Schimperiana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 212.—Abyss.
tasmanica, Hook. f. Fl. N. ZeL i. 226-pusilla.

AUSTROBUXUS, Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl. 444 (1860) -Barcoeocca, Lindl. (Enphorb.).
nitidus, Miq. 1. c.—Sumatra.

AUTOGENES, Rafin. Fl. Tellur. iv. 20 (1836)-Narcissus, Tonra. (Amaryll.).
angustifolius, Rafin. 1. c-N.-poeticus.
bifiorus, Rafin. L c. = N. biflorns.
poiticus, Rafin. 1. c.«N. poëticus.
tenuior, Rafin. 1. c—N. gTacilis.

ATTXKMTWA, Mien, in Trans. linn. Soc Ser. II. i. (1875) 23. t. 6. *BORAGINEAE,* tenth. & Hook. f. ii. 840.
Gaidneriana, *Mien, I. c.* 24. t 5.—Bras.

AVELLANITA, Phil, in Linnaea, xxziii. (1864-65) 237. *EUPHORBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 289.
Bustillori, *Phil. I. c.* 288.—Chili.

AVELLINIA, Patl. PI. Nor. 59 (1842). *GRAMINEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 1184.
Michelii, *Part. I.* c—Italia.
Savi, *Parl'.l. e.* 61.—Italia.
scabriuscula, Nym. Consp. 816—Koeleria scabriuscnla.
tennicnla, *Nym. I. c.*—Hispan.

AVENA, Hall, ex Scop. Introd. 74 (1777) - Agroette, Linn. (Gramin.).

AVENA, Linn. Syst ed. I (1735). *GRAtflNEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 1160.
ELICTOTRICHON, Bess, ex Andrz. Rys Botan. i. (1823) 9.
HELICOTMCHIIM, Bess, in Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 14C. n. 352 (1832).
HEUFFKLIA, Schnr, Ennm. PI. Transs. 760 (1866).
abyssinica, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 415.—Abyss.
adsnrgens, *Sehur, Enum. PI. Transs.* 762.—Hnngar.
affinis, Bernh. ex Steud. Norn. ed. IL i. 171, 173-sterilis.
tgraria, Brot. Fl. Lusit i. 105-strigosa.
agraria-mutica, Brot. 1. c. 106 = strigosa.
agraria-sesquialtera, Brot. 1. c.—stngosa.
agropyroides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiñ. 50.—Graecia.
agrostidea, Fries, Mant. iii. 3—Trisetnm agrostidenm.
agrostoides, Griseb. SpicU. Fl. Rnmel. ii. 464-Trisetnm myrianthnm.
airoides, Koel. Gram. 208-Trisetnm snbspicatnm.
airoides, Ponrr. ex Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 290 = Ponrretii.
alba, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 24.—Gall, austr.; Afr. bor.
albinervis, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 656.—Hispan.
Alopecuros, Roth, Catalecta, iii. 20 = Trisetnm Alopecnros.
alpestris, DC. Fl. Fr. vi 260 • Trisetnm pretense.
alpestris. Host, Gram. Austr. iii. 27. t. 39=T. alpestre.
alpina, [Honck.] Verz. Gew. Tentschl. 302 - Aira montana ?
alpina, Latonr. Chlor. Lugd. 3-Scheuzeri.
alpina, Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 835-pratensis.
alpina, Trin. Fund. Agrost 157 - Deschampsia alpina.
alto, Cav. ex Roem. ft Schult. Syst U. 681 = strigosa.
ambigua, Schoenb. ex Nym. Consp. 810-= fatua.
amethystine, *DC. Fl. Fr.* iii. 66 ; vi. 260.—Gallia.
andropogoides, *Steud. in Flora,* xii. (1829) II. 486.—Afr. anstr.
anglica, Hort ex Roem. ft Schult. Syst ii. 669-sativo.
antarctica, Roem. ft Schult 1. c 676 - Trisetnm snturcticDzn*
antarctica, Thunb. Prod. PI. Cap. 22=D»nthonia antarctica.

AVENA:—
arduensis, Lej. ex Steud. Norn. ed. II. i. 171-strigosa.
arenaria, Sprang. Syst. i. 333=Trisetum arenarium.
argaea, *Boiss. Fl. Orient,* v. 646.—Cappadoc.
argentoideum, Schnr, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 74-Trisetum alpestre.
.argentea, Willd. Ennm. Hort. Berol. 126 - Trisetnm argentenm.
ariguensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 283.—Chili.
anštidoides, Stend. in Flora, xii. (1829) II. 481. n. 23 = Danthonia Thunbergii.
aristidoides, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 22.—Afr. anstr.
arundinacea, Delile, Fl. Egypte, 171. t 12-Danthonia Forskohlei.
arvensis, Salisb. Prod. 23—Bromos arvensis.
aspera, *Munro, ex Thw. Enum. PI. Zeyl.* 372.—Zeylan.
atheranthera, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 30-barbate.
atropurpurea. Link, Hort. Berol. i. 119—Aira atropurpnrea.
aurata. All. FL Pedem. ii. 255 = setacea, Agrostis alpina.
australis, Part. Fl. Ital. i. 285-pratensis.
barbata, *Brot.Fl. Lusit.* i. 108.—Reg. Mediterr.; As. Min.; Arab,
barbata, *Pott, ex Link, in Schrad.. Journ.* it (1799) 815.—Lusitan.
baregensis, Nym. Consp. 818=Trisetnm agrostidenm.
Baumgartenii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 233.—Hungar.
Bellardi, *Colla, Herb. Pedem.* t 98. f. 2.—Italia,
benghalensis, *Schwaegr. ex Steud. Norn.* ed. I. 94.—Ind. or.
Besseri, *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 415.—Ross. med.
bifida, *Beauv. Agrost.* 158, nomen.—Hab. t
bipartite, Link, Hort Berol. i. 118-Danthonia temiannularis.
Blavii, Aschers. & Janka.—Cf. Aschers. & Kan. Cat. Coron. Serb. 9 -compressa.
borbonia, *Steud. Syn. PI. Gram.* 234.—Ins. Borbon.
brni/olia, Host, Gram. iii. t 40 =± Trisetnm distichophyllnm.
brevifolia, Spreng. Syst i. 834-Trisetnm rigidum.
brevis, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 40.—Europ.
bromoides, *Gouan, Hort. Monsp.* 52.—Reg. Mediterr.
bromoides, Mert ft Koch, in Roehl. Fl. Dentschl. ed. III. i. 570-pratensis.
Brownei, Spreng. Syst. i. 386—Danthonia pallida.
Bruhnsiana, *Gruner, in Bull. Soc. Nat. Uosc.* xii. (1867) II. 468.—Reg. Casp.
bulbosa, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Nene Schr. ii. (1799) 116. t 5. f. l=Arrhenathernm avenaceum.
Burnoufii, Nym. SylL 413 ••= Trisetnm Bnmoufii.
byiantina, C. Koch, in Linnaea, xxt. .(1848) 892 = fittua.
caespitosa, Knntze, Taschen-Fl. Leipz. 45 - Deschampsia caespitosa.
calicina, Vill. Hist PI. Danph. ii 148-Danthonia provindalis.
callosa, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Uosc.* xxlx. (1856) I. 36.—Sibir.
calydna, Lam. Illustr. i. 200-Danthonia calydna.
calydna, Willd. Sp. PI. i. 453, in syn.-Danthonia provindalis.
canariensis, *Nets, ex Steud. Norn.* ed. IL i. 171.—Ins. TenerifT.
Candollei, Nym. Consp. 812 = Trisetnm pratense.
canescens, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Hols. 9 = Corynephorns canescens.
cantabrica, Lag. in Herrer. Agr. 141—filifolia.
capensis, Bnrm. f. Fl. Cap. Prod. 3-Anthistiria ciliata.
capensis, Linn. f. Snppl. 112-Aristida capensis.
capensis, Steud. in Flora, xii. (1829) 481 - Danthonia papillose.
capillacea, *Beauv. Agrost.* 153, nomen.—Hab. ?
capillaris, *Mert. V Koch, in Roehl. Deutschl. Fl.* ed. III. i. 573.—Europ.
Canneli, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 50.—Syria.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 81-Trisetum palustre.
carpatica, Host, Gram. Austr. ir. 18. t 81-Trisetum carpathicum.
caryophyllea, *Sibth. tf Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 67.—Archip. Graec.
caryophyllea, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Hols. 10= Aira caryophyllea.
CamnUlesii,. Hort ex Roem. ft Schult. Syst ii 691 = strigosa.

AVENA:—
Cavanillesii, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 797 - Trisetnm Cavanillesii.
Cavantilesii,lag. in Varied. Cienc. ii. IV. (1806) 89 = Stipa arenaria.
eernua, Kunth, Enum. PI. i 806—Trisetum cemnum.
chinensis, Fisch. ex Roem. ft Schult. Syst ii. 669» nnda.
chlorantha, Link, in Linnaea, xvii. (1848) 401 - Trisetum anreum.
ciliaris, Kit ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i 268 = Trisetum carpathicum.
cinerea, Auct ex Roem. ft Schnlt. Syst. ii. 689-sativa.
danda, *Dur. in Duck. Rev. Bot. t* (1846-46) 360.—Graecia; As. Min.; Afr. bor.
coarctata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. IH. (1829) 22 = Gaudinia geminiflora.
colorata, Stend. in Flora, xii. (1829) II. 481. n. 11= Danthonia tortuosa.
compacta, *Boiss. Cf Heldr. Diagn.* Ser. I. iii. 122.—Graecia; Servia.
compressa, *Heujf. in Flora,* xviii. (1885) 244.—Hungar.
condensata, Link, Enum. Hort. Berol. i 82-Trisetnm anreum, *Tenore.*
convolnta, *Presl, Cyp. et Gram. Sic.* 31.— Enrop. austr. or.
coguimbensis, Roem. ft Schult. Syst. ii. 677 - Hierochloë ntrienlata.
coronensis, *Schur, Enum. PI. Transs.* 763.—Transsylv.
corymbosa, *Nym. Consp.* 814.—Corsica.
cristata, Anct. ex Roem. ft Schnlt. Syst ii. 768 = Agropyron cristatum.
Cupaniana, *Nym. Syll.* 414.—Ital.; Creta.
cuspidata, Willd. ex Kunth, Enum. PI. i. 239 - Calamagrostis cuspidata.
daenensis, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 128 = Trisetum rigidum.
decora, *Janka,in Termis*. Fűtetek,* viii (1884) 28.—Europ.
depauperata, Sieber, ex Trin. in Mim. Acad. Pétersb. *Siit.* VI. i (1831) 68 - Danthonia provindalis.
desertomm, *Less, in Linnaea,* ix. (1884) 208.—Sibir.
deyeuxioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 147-Deyeuxia triflora.
dispermis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1-sativa.
distans, *Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xx. (1870) 22.—Europ.
disticha, Lam. Encyc. i. 330—Trisetum rigidum.
distichophylla, Host, Gram. Austr. ii. 89. t. 63-Trisetum argentenm.
distichophylla, Vill. Prosp. 16 ; PL Dauph. ii. 144-Trisetum distichophyllum, rigidum.
dubia, Leers, Fl. Herborn. 41-Gaudinia tennis.
Dufourei, Nym. Consp. 813-Trisetum Dufourei.
dura, Salisb. Prod. 22=Festuca duriuscula.
elata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 19.—Constantinop.
elata, Salisb. Prod. 23=Arrhenatherum avenaceum.
elatior, linn. Sp. PI. 79=Arrbenatherum elatius.
elegans, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand, iii.—iv. (1861-62) 279 = capillaris.
elephantina, Spreng. ex Stend. Norn. ed. II. i. 172= andropogoides.
elephantina, Thunb. Prod. PL Cap. 23-Danthonia elephantina.
elongata, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i. 148 = Trisetum elongatum.
eriantha, *Dur. in Duch. Rev. Bot.* i. (1845-46) 860.—Afr. bor.
eriantha, *Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvii. (1877) 122.—Hispan.
fallax, De Not. Ind. Sem. Hort Reg. Genuens. 24-sempervirens.
fallax, Pollini, Fl. Vernon. iii. 77S=pubescens.
fallax, Roem. & Schult. Syst. ii. 692-montana.
fallax, Tenore, Fl. Nap. iii. 96=convoluta.
fatna. *Linn. Sp. PI.* 80.—Europ.; Oriens; As. bor.
fatua, Schreb. Beschr. Graes. 109. t. 15 = sterilis.
fatua, Viv. Fl. lib. Spec. 6=barbata.
fertilis. All. Auct. Pedem. 45-Gaudinia tennis,
festucaeformis, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1865) 275.—Afr. or.
filifolia. *Lag. Gen. V Sp. Nov.* 4.—Hispan.
filiformis, Font. f. Prod. 9-DeyenxU Forsteri.
JUiformis, Labill. Nov. HolLPl.i.24. t 31-DeyeuxU Billardieri.
flava, Hort. ex Roem. ft Schult. Syst. ii. 669^sativa.

AVEBTA:-
flmescens, Boat, ex Willie. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 72=Trisetnm galledcum.
flavescens, Linn. Sp. PL 80-Trisetum pretense.
flexuosa, Mert. & Koch, in RoehL DeutschL Fl. ed. III. i. 570-DeBchampsia flexuosa.
nexuosa, *Schrank, in Denksckr. Reg. Bot. Ges.* ii. 7.—Labrador.
Forsiolri, Vahl, Symb. Bot ii. 25-Danthonia Forjkolei.
Forsteri, Konth, Rev. Gram. i. 194 - Deyeuxia Forsteri.
fragilis, Linn. Sp. PL 80 = Gaadinia fragilis.
Frrita, Orteg. [ex Spreng.] Bot. Gart. Halle, 14-strigosa.
/* « «, Ard. in Saggi Ace. Pador. ii. (1789) t 4-sativa.
fusca, Kit. ex Schalt. FL Oestr. ed. II. i. 268 - Trisetam carpathicam.
fusca, *Schur, Enum. PL Transs.* 766.—Hungar.
fuscoflora, Schur, 1. c. = fusca.
gallecica, Nym. Syll. Snppl. 71 •= Trisetam gallecicum.
geminiflora, Knnth, Rev. Gram. 108, 299. t 61 = Gaudinia geminiflora.
Georgiana, Koem. & Schult Syst ii. 669-satlva.
gnrgica, Boiss. olim ex Fl. Orient, v. 640 = Ventenata macra.
gtorgica, Znccag. in Roem. Collect. 126-»ativa.
gtgantea, Salisb. Prod. 28 = Bromns giganteus.
glabra,C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 5=pubescens.
glabrata, Brot ex Steud. Norn, ed II. i. 172-corymbosa.
glacialis, Boiss. Elench. 87; Voy. Bot Espagne, ii. 654=Trisetum glaciate.
glquea, Lapeyr. Hist Abr. PL Pyr. Snppl. 20-ocheuzeri.
glomerata, Steud. in Flora, xii. (1829) II. 483 = Danthonia curvifblia.
glumosa, *Ell. Sketch,* 11.—Am. bor.
glumosa, Michx. Fl. Bor. Am. i. 72 = Danthonia spicata.
graeilis, Moris, Stirp. Sard. Elench. fasc i. 60=Trisetum Morisii.
Heldreichii, Part. Fl. Ital. i. 275-convoluta.
heteromalla, Moench, Meth. 195-orientalis.
hexantha, Stend. in Flora, xU. (1829) n. 487. n. 87-Danthonia stricU.
hirsuta, Moench, Meth. SuppL 64; Roth, CatalecU, .ui.l9=barbati.
h'tta, *Schrad. in Goett. Gel. An:* (1821) III. 2075.—Aft. austr.
Krtifolia, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 128=pubescens.
fartula, Lag. Gen. et Sp. Nov. 4 = barbata.
/"spanica. Aid. in Saggi Ace. Padov. ii. (1789) 112 = sativa.
hitpanica, Hort ex Roem. & Schult Syit U. 691-stngosa.
Kspanica, Lange, in Kjoeb. Videnslc. Meddel. (1860) 41 = Arrhenathernm erianthum.
bispida, linn. f. Snppl. lll=Tristachyaleucotlirix.
•aipida, Nym. Syll. Snppl. 71 = Trisetam bispidum.
hybrida, Peterm. ex Reicnb. Fl. Saxon. 17 — latua.
Hoppeana, *Scheele, in Flora,* xxvii. (1844) 57.—Istria.
Hostii, Boiss. & Rent. Pugill. 121 = Parlatorii.
Hugeninu, *De Not. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 426.—Italia.
hnngarica. *Luce, Topogr. Nadir. Oesel,* 20.—Hungar.
kydnphila, F. MueUT ex Hook. f. Fl. Tasm. i. 121 = Amphibromus Neesdi.
intermedia, Lindgren, in Bot Notiser (1841), 151 = fatua.
intermedia, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 16 = corymbosa.
tnvolucrata, Schrad. in Goett Gel. An*. (1821) in. 2075 - Danthonia involucrata.
tnvoluta, Presl, ex Stend. Norn. ed. EL i. 172-sem-pervirens.
japonica, Stend. Syn. PI. Gram. 281-birsuta.
Junghuhnu, *Buese, in Miq. PI. fungh.* 846.—Java.
* * « W, Spreng. Syst. i. 836 = Axistida amndinaeea.
KoUchyi, *Steud. Syn. PI. Gram.* 288—Persia.
iMhnantha, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 227.—Air. trop.
fonica, Nym. Syll. Suppl. 71-Trisetum laconicnro.
taeta, Salisb. Prod. 22-Brachypodium pinnatutn.
laevigdta, Schnr, in Oestr. Bot Zeitschr. x. (1860) 72-pubescens.
'*evis, Hack. 1. c. xxvii. (1877) 46-albinervU

AVBNA:-
lanata, Koel. Gram. 808—Holes* lanatns.
lanata, Schrad. in Goett Gel. ADZ. (1821) III. 2076 ** Danthonia lanata.
lanuginosa, Gilib. Exercit ii. 539-fatna.
lasiantka, Link, in Linnaea, ix. (1884) 186-Bromus intermedins.
latifolia, Host, Gram. Anstr. iv. 19. t. 32-planiculmis.
lendigera, Salisb. Prod. 23—Gastridium australe.
leonina, Steud. in Flora, xii. (1829) II. 484 =. Danthonia antarctica!
leptostachys, *Hook. f. Fl. Antarct.* 878.—Reg. Magellan.
lens, Nym. Consp. 811-albinervis.
lodunensis, Delastr. in 'Cat. Hort Pict (1836)'-sulcata.
Loefflingiana, Cav. Ic i. t. 46. £ 1-Trisetnm Gaudinianm.
Loefflingiana, Geuns. ex Roem. & Schult. Syst ii. 370 = Aira praecox.
Loeflingiana, Balb. Misc. Bot. i. 12=>Trisetum Cavanillesii.
Loeflingiana, Linn. Sp. PL 79 = Trisetnm hispanicum.
Loeflingiana, Lam. Encyc. i. 882 = Trisetum paniceum.
longifolia, Req. in DC. & Duby, Bot Gall. i. 514-praten sis.
longifolia, Spreng. Syst. i. 386 =. Danthonia longifolia.
longifolia, There, Prom. Golf. fasc. 92 = Arrhenatherum pallens.
longiglumis, *Dur. in Duck. Rev. Bot.* i. (1846-46) 359.—Afr. bor.
lucida, Bertol. Fl. Ital. i. 701 = pubescens.
ludamciana, Dur. in Bull. Soc Linn. Bord. xx. (1855) i. 41-sterilU.
lupulina, Steud. in Flora, xiL (1829) II. 486-Danthonia lanata.
lupulina, Thunb. Prod. PL Cap. 23 - Danthonia inpulina.
lntea, *Linn./. Suppl.* 112.—Ins. Martinic
madlenta, Gnss. Fl. Sic. Prod. Suppl. i. 29 = Koeleria macilenta.
macra, Hohen. Enum. PI. Elisabethpol. 214 = rigida.
macra, Stev. in Bieb. Fl. Taur. Cane i. 77=Ventenata macra.
maerocalycina, Steud. in Flora, xii. (1829) II. 482-Danthonia macrantha.
macrocarpa, Moench, Meth. 196=sterilis.
macrostachya, *Balansa* b* *Dur. in Bull. Soc. Cot. Fr.* i. (1854) 318.—Algeria.
magellaaica, *Beauv. Agrost.* 153, nomen. -Reg. Magellan.
Mandoniana, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 185, nomen = marginata *1*
marginata, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* vl. (1838) 529.—Ins. Madera.
maxima, *Presl, Fl. Sicul.* p. xliv.—Sicilia.
mediolanensis, Balansa & De Not in Comoll. Fl. Comens. i. 147 = Trisetum myrianthnm.
Uiehelii, Guss. Fl. Sic. Syn. 161 = Koeleria macilenta.
mollis, Koel. Gram. 800 = Holcus mollis.
mollis, Michx. Fl. Am. Bor. i. 72=Trisetum subspicatom.
mollis, Salisb. Prod. 23-Bromus mollis.
montana, Brot. Fl. Lusit. i. 109 - Arrhenathernm Thorei.
montana, Roem. *8c* Schult. Syst. ii. 674, in syn.-pratensis.
montana, *Vill. Fl. Dauph.* ii. 151.—Mont. Pyren.
montana, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat 9 = Deschampsia flexuosa.
multiculmis, Dum. Agrost. 121 = Aire caryophyllea.
muralis, Salisb. Prod. 22 = Festuca Myurus.
muricata. Spreng. Neue Entdeck. i. 247=ArisrJda capensis, Danthonia papillosa.
mutica, *Krock. Fl. Sil. Suppl.* i. 187.—Europ.
myriantha, Bertol. Fl. Ital. i. 722 = Trisetum myrianthum.
mysorensis, Spreng. Syst. i. 337.—Ind. or.
nana, Kunze, ex Steud. Norn. ed. II. i. 172, 45 = Aira praecox.
Neesii, *Hook.f. in Joum. Linn. Soc.* vii (1864) 229.—Afr. trop.
neglecta, Bertol. Fl. Ital. i. 718-Trisetum Gaudinianum.
neglecta, Savl, Fl. Pis. t. 1. f. 4-Trisetum panicenm.
nemoralis, Salisb. Prod. 28 = Bromus asper.
nervosa, Lam. Illnstr. n. 1116-strigosa.
nervosa, R. Br. Prod. i. 178-Amphibromus Neesii.

AVZITA:—
Neumeyeriana, Vis. Fl. Dalm. iii. 339=compacta.
nigra, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 174; *et in Linnaea,* xiv. (1840) 644.—Europ.
nitida, Des£ Fl. Atlant i. 102-Trisetum nitidum.
nodosa, Cullum, It. Scan. 251—Anhenatherum avenacenm.
Noeana, Nym. Syll. Suppl. 71 — Trisetam auream, *Tenore.*
Notarisii, Parl. FL ItaL i. 279; ex Stead. Syn. PL Gram. 425=sempervirens.
nuda, *Linn. Amoen. Acad.* iii. 401.—Enrop. austr.
nuda, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 49-brevis.
nutans, St. Lag. Rech. Hist—Cf. BulL Soc Bot. Fr. xxxi. (1884) Bibl. 201-sterilis.
nutkaensis, *J. Presl, in Xel. JJaenk.* i. 254.— Sinus Nootka.
occidentalis, *Dur. Cat. Gr. Bord.* (1864) *25.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr.* xii (1866) *Bibl.* 78.—Int. Ferro.
odorata, DC. Fl. Fr. iii. 42 = Hierochloe australis.
odorata, Pens. Syst. i. 100 = Hierochloe borealis.
oligostachya, *Munn, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 108; xix. 198. t. 30.—Afghanist.
orientalis, *Schreb. Spicil.* 52.—Europ. austr.; Oriens.
ovata, C. C. Gmel. ex Kunth, Enum. PL i. 296 — Trisetnm ovatam.
ovina, Salisb. Prod. 22 = Festnca ovina.
palaestina, *Steud. Syn. PI. Gram.* 426.—Palaestina.
pallens, Link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 314 = Arrhenatherum pallens.
pallida, Salisb. Prod. 24 = Holcus lanatns.
pallida, Thunb. Prod. PL Cap. 22 - Danthonia pallescens.
palustris, Michx. Fl. Bor. Am. L 72 - Trisetum palnstre.
panicea, Hort ex Roem. & Schult. Syst. ii. 625, 660 - Koeleria phleoides.
panicea, Lam. Ulustr. i. 202—Trisetnm paniceum.
papillosa, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) ill. 2075 — Danthonia papillosa.
papillosa, Steud. in Flora, xii. (1829) II. 434-Danthonia scabra.
paradensis, *Kit. ex Kanitm, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,* xiii. (1863) 543 *(Reliq. Kitaib.* 119).—Enrop.
paradoxa, Willd. ex Kunth, Enum. PL i. 188 = Aristida dichotoma.
Parlatorii, *Woods, ex Dalla Torre, Atl. Alpenfl.* 228.—Italia.
parviflora, Desf. Fl. Atlant i. 98-Trisetam parvi. floram.
parviflora, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Bert. Mag. ii. (1808) 289-Trisetnm micranthum.
pauciflora, Auct. ex Roem. & Schult Syst ii 660-Trisctum pflniccuni.
paupercula, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 94.—Chili.
pendula, Gilib. Exercit. 539-sativa.
penidllata, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 172; ii. 714 = Trisetnm rigidum.
Pennsylvanid, Muhl. Descr. Uber. 186 - Arrhenatherum kentuckense.
pensylvanica, Forsk. FLAegypt Arab. 23 —Danthonia Forskolri..
pensylvanica, *Linn. Sp. PI.* 79.—Am. bor.
pensylvanica, Presl, Cyp. et Gram. Sic 30—maxima,
persica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 280.—Persia.
peruviana, Hort. ex Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 290 —Trisetam panicenm.
phleoides, Urv. in Mém. Soc Linn. Par. iv. (1826) 601 — Trisetum phleoides.
pilosa, Aucher, ex Dur. in Dncfa. Rev. Bot i. (1845-46) 360-dauda.
pilosa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 84.—As. Min.; Syria; Afr. bor.
pilosa, *J. Presl, in Ret. Haenk.* i 253.—Chili,
pilosa, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 86.—Carniolia.
planicnlmis, *Schrad. Fl. Germ.* i. 881. t. 6. f. 2.—Europ.; As. bor.
planiculmis, Sm. Engl. Bot. t. 2141 = pratensis.
podolica. Pascal, ex Zuecagni, in Roem. Collect 126-sativa.
Pourretii, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 290. t 8.—Hispan.
praecox, *Beauv. Agrost.* 89.—Lusitan.
praeusta, Reichb. FL Germ. Excurs. 140-pratensis.
pratensis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 656 - broraoides.
pratensis, Brot. Fl. Lusit ii. 110 = sulcata.

AVENA:—
pratensis, Gouan, 'Hort. S3'; Kuntb.'Enum. PL i. 300-pubescens.
pratensis, *Linn. Sp. PI.* 80.—Euiop.; As. bor.
pratensis, Sibth. ft Sm. Fl. Gnec. Prod. L 67=caryophyllea.
precatoria, Thnill. Fl. Par. cd. II. 58=Arrhenatherum ftYCDftCCTHB.
Preslii, *Kunth, Enum. PL* i. 304.—Chili.
provincialis, Nym. Syll. Suppl. 71=capillaris.
provincialis, Poir. Encyc. Suppl. i. 611 — Danthonia provincialis.
pseudoludda, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschi. x. (1860) 72-pubescens.
pseudoviolacea, *Kern, ex Dalla Torre, Atl. Alpenfi.* 228.—Europ. alp.
puberula, Gun. in Tenore, Prod. FL Nap. App. v.= Koeleria macilenta.
pubescens, *Huds. Fl. Angl.* 42.—Enrop.; As. bor.
pulchella, Beauv. Agrost. 151, nomen—Aira lendigera.
pumila, Desf. Fl. Atlsnt. i. 103 = Trisetum pnmilam.
pumila, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 267 — Trisetum anrenm, *Tenore.*
purpurascens, DC. Cat. Hort. Monsp. 82 = Trisetom pretense.
purpurascens, De Not. Ind. Sem. Genuen. (1817); Ann. Sc Nat. Sér. IIL ix. (1848) 823=Tri3etum alpestre.
purpurea, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 419.—Kossia.
purpurea. Linn. f. Suppl. 112 = Danthonia pnrpnrea.
pusiUa, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Hols. 9 = Aira praecox.
quadridentula, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 100.—Bras.
quadriseta, Labill. Nov. Holl. PI. i. 25.132 - Deyeuxia quadriseta.
quinqueseta.. Stead, in Flora, xii. (1829) II. 185 = Trisetum Steudelii.
racemosa, *Thuill. Ft. Par.* ed. II. 59.—Gallia.
Radnla, *Franrh. tf Sav. Enum. PI. Jap.* ii 174.—Japon.
redolens, Pers. Syn. i. 100 = Hierochloë redolent.
rigida, Bieb. Fl. Taur. Cauc. L 77=Trisetum rigidum.
rigida, *Steud. in Flora,* xii. (1829) II. 482.—Afr. anttr.
Rotae, De Not. ex Parl. Fl. Ital. i. 264 = Trisetum argenteum.
rubra, Zuccagni, in Roem. Collect. 126=sativa.
'upestris, J. F. Gmel. Syst. I Jt = Agrostisrupestris.
Kuprechrji, *Ledeb. Fl. Ross.* if. 418.—Kossia arct
sativa, *Linn. Sp. PI.* 79.—Terr. temp. (cult.).
scabriuscula, Lag. in Varied. Cienc. ii. IV. (1805) 212 — Koeleria scabriuscula.
scabrivalvis, *Trin. in Butt.Sc. Acad. PJtersb.* i. (1836) 67.—Chili.
Schelliana, *Hack, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1881)342.—Hab. I
Scheuchzeri, *All. FL Pedem.* ii. 255.—Europ.; Reg. Caucas.
secalina, Salisb. Prod. 22 = Bromus secalinus.
secunda, Salisb. 1. c=Arrhenatherum avenaceum.
sedenensis, DC. FL Fr. iii. 719-mon tana.
segetalis, Bianca, ex Nym. Consp. 810-barbata.
sempervirens, Bory ft Chaub. Fl. Pélop. 7. n. 179-Heldreichii.
sempervirens. Holt, Gram. iii. 28. t 41=Parlatorii.
sempervirens., Bess. Enum. PL Volb. 6-Besseri.
sempervirens, Lapeyr. ex Benth. Cat. PI. Pyr. 65 = montana.
sempervirens, Ledeb. Fl. Alt i. 89-desertorum.
sempeirirens, *Vill. Prosp.* 17.—Europ.; As. bor.
sesquiflora, *Ledeb. Ft Ross.* iv. 419.—As. or.
sesquitertia, Bieb. Fl. Taur. Cue i. 77-Trisetum rigidum.
sesquitertia, ComoL Prod. 18-lucida.
sesquitertia, Host, Syn. FL Austr. 60 = Trisetum alpestre.
sesquitertia, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 96 — barbata.
sesquitertia. Linn. Mant. L 81*-pubescens.
sesquitertia, Tenore, ex Steud. Nom. ed. IL i 173 = sem pel vueus.
sesquitertia, Willd. Sp. PI. L 448 - Trisetum ar entum.
trtacta, Baumg. ex Schur, Enum. PL Trans*. 735 = Agrostis rupestris.
setacta, Baumg. L c 768 = Deschampsia flexuosu.
srtaceo, Part. FL Ital i. 133-Parlatorii.

AVENA:—
setacea, Muhl. ex Trin. in Mlm. Acad. Ptftersb. *Six.* VI. i. (1831) 87 = Aristida dichotoma.
setacea, *Vill. Prosp.* 16.—Europ. austr.
setifolia, Brot FLLusit 108 - Arrhenatherum pallens.
sibirica, Linn. Sp. PL 79=Stipa sibirica.
Sibthorpii, Nym. Syll. 412=bromoides.
sicula, Spreng. Syst. i. 385 «• Trisetum aureum, *Tenore.*
Smithii, *Porter, ex A. Gray, Man. Bot. V. St.* ed. V. 640.—Am. bor.
spicaeformis, Auct ex Roem. ft Schnlt. Syst il 690 •= Danthonia spicaeformis.
spicata. All. ex Kunth, Enum. PL i. 312-Triodia decumbens, Danthonia provincialis.
spicata, Ell. Sketch, i. 174 = Danthonia sericea.
spicata, Gilib. Exereit. 610=pratensis.
spicata, Linn. Sp. PL 80=Tnsetum snbspicatum.
spicata, Willd. Sp. PL i. 168, partim= Danthonia provincialis.
splendens, Boiss. Elench. 88=albinervis.
splendens, Auct GalL ex Steud. Nom. ed. II. i. 173 = pratensis.
splendens, Gins. Fl. Sic. Prod. i. 126-Trisetum pratense.
squarrosa, *Schrank, in Denkschr. Regensb. Ges. i.* II. (1818) 7.—Labrador.
sterilis, Delile, ex Boiss. Fl. Orient, v. 613 = fatua.
sterilis, *Linn* Sp. PI.* ed. II. 118.—Reg. Mediterr.; Oriens.
stipaeformis, *Linn. Mant.* 34.—Afr. austr.
stipoides, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 173; it 146 =Oryzopsis fimbriata.
striata. Lam. Encyc. i. 332=sempervirens.
striata, Trin. in Mém. Acad. Petersb. *Six.* VL iv. II. (1838) 28 = callosa.
striata, *Michx. Fl. Bor. Am.* L 73.—Am. bor.
striata, *Schousb. ex Willk. (f Lange, Prod. Fi. Hisp. i.* 60.—Hispan.
striata, Vis. Fl. Dalm. i. 70=convoluta.
stricta. Host, FL Austr. i. 127= Danthonia provincialis.
strigosa, *Schreb. Spic.* 62.—Europ.; Reg. Casp.
strigosa, Vogler, Schediasma Bot. 22 = Gaudinia tennis.
subalpestris, Hartm. Handb.ed. III. ex cj. ed. IV. 29 = Trisetum agrostideum.
subcylindrica, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient T. 536 - Trisetum glumaceum.
subspicata, [Clairv.] Man. Herb. 17 = Trisetum subspicatum.
subulata, Lam. Illustr. n. 1113=setacea.
subvillosa, Schur, Enum. PI. Transs. 768=convoluU.
sulcata, *J. Gay, in Delastre, FL.Viénite,* 477. t 4.—Hispan.
syhatica, Salisb. Prod. 24 = Holcus mollis.
symphicarpa, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 173 = hirta.
syriaca, Boiss. & Bal. ex Boiss. FL Orient, v. 642 = sterilis.
tatarica, Ard. in Saggi Ace. Padov. ii. (1789) 101.1.1 = orientalis.
taygetana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 283.—Graecia.
Tenorii, Nym. Consp. 814-=corymbosa.
tenuiflora, *Bertol. ex Reichb. Ic. Fl. Germ.* i. 41. n. 16SI.—Italia.
tennis, Moench, Meth. 195=Ventènata avenacea
Thorei, DC. Ac Duby, Bot. GalL i. 614 = Arrhenatheram pallens.
tolucensis, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et *Sp.* i. 148 = Trisetum tolaccense.
Maristata, VilL Prosp. 17=Venten«tiavenacea.
trichophylla, C. Koch, in Iinnaea, xxi. (184b) 893 = fatua.
trichopodia, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 254,-Menic.
triseta, Thunb. Prod. PL Cap. 22=Danthonia Thunbergii.
trisperma, Auct. ex Roem. & Schult Syst ii. 669-sativa.
triticoides, *Lindl. in Mitch. Journ. Austral.* 865.—Austral.
truncate, Dulac, Fl. Hastes-Pyr. 83=bromoides.
tuberosa, Gilib. Exereit. 'A. 688 = Arrhenatherum avenaceum.
unifloia, *Parl. PL Nov.* 81.—Ins. Canar.
unilateralis, Brouss. ex Roem. ft Schult. Syst il. 669 - orientalis.
vaUsiaca. Nym. Syll. 411 -Trisetum Cavanfficsii.

AVENA:—
varia, Schnr, in Oestr. Bot Zeitschr. x. (1860) 75 =Trisetum carpathicum.
velutina, *Nym. Consp.* 812=Trisetum velntinom.
ventricosa, *Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr. I* (1864) 14 —Algeria.
versicolor, Baumg. ex Steud. Syn. PL Gram. 283 <= Baumgartenii.
versicolor, Vill. Prosp. 17=ScheuzerL
versicolor, St Am. FL Agen. 48= sulcata.
vilis, *Wallr. Beitr. Fl.Hercyn.* 173; *etin Linnaea,* xiv. (1840) 648.—German.
villosa, Bertol. Exc de Re Herb. 6. n. 8-Trisetum villosum.
villosa, Lag. ex Roem. ft Schult. Syst ii. 670=hńsuta.
virescens, *Regel, in Act. Hort. Petrop. vii.* (1880) 685. —Turkestan.
viridis, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i. 147 - Deyeuxia viridis, *Fourn.*
Wiestii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 231.—Aegypt; Arab.; Persia.
Wilkelmsii, Spreng. Syst. L 838=Trisetum rigidum.

AVENELLA, Koch, ex Steud. Nom. ed. II. L 173 (1840); Parl. Fl. Ital. i. 244 (1848)-Deschampsia, Beauv. (Gramin.).
cuprina, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 85 = D. flexuosa.
flexuosa, Parl. FI. Ital. i. 246 - D . flexuosa.
rubra, Jord. ex Nym. Consp. 808 - D. flexuosa.
uliginosa, ParL Fl. ItaL i. 216 =>D. uliginosa.

AVEBBHOA, Linn. Syst. ed. I (1735). *GERANIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 277.
CAKAHBOLA, Adans. Fam. ii. 608 (1763).
acida, Linn. Sp. PI. 428 - Phyllanthus Cicca.
acutangula, Stokes, Bot Mat. Med. it 648-A. Carambola.
Bilimbi, *Linn. Sp. PI.* 428.—Ind. or.; China.
Carambola, *Linn. Sp. PL* 428.—Ind. or.; China.
frondosa, Salisb. Prod. 318 = Phyllanthus Cicca.
obtusangula. Stokes, Bot Mat. Med. ii. 542-A. Bilimbi.
pentandra, Blanco, Fl. Filip. ed. L S92=Connaropsis philipnica.
ijfu'ca, Hance, in Walp. Ann. ii. 241«=Rourea microphylla.

AVEBBHOLDITJM, Baill. Adansonia, id. 244 (1874). *SAPINDACEAE.*
Gardnerianum, *Baill. 1. c.*—Bras.

AVERSIA, G. Don, Gen. Syst. iii. 92 (1834)-ARVERSIA, Cambess. - Folyoarpon, Linn. (Caryophyll.).

AVICENTTIA, Linn. Syst ed. I (1785); Gen. ed. 1.27 (1737). *VERBENACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 1160.
BONTIA, Linn. Gen. ed. 1.180 (1787).
DONATIA, Loefl. Iter, 193 (1758).
HALODENDRUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 8 (1806).
RACKA, J. F. Gmel. Syst. 245 (1791).
SCEDRA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 37 (1778).
UPATA, Adans. Fam. ii. 201 (1768).
africana, Beauv. Fl. Owar. i. £0. t. 47=officinalis.
alba, Blame, Bijdr. 821=offidnalis.
elliptica, Thunb. PL Bras. Dec. iii. 87=officinalis.
fioridana, Rafin. Atl. Journ. 148=officinalis.
intermedia, Griff, in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 6 = officinalis.
Lamarckiana, Presl, Bot. Bemerk. 99=officinalis.
Meyeri, Miq. in Linnaea, xviii. (1811) 262 = officinalis.
nitida, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 25.—Am. trop.; Afr. trop.
eblongi/olta, Nutt. ex Chapm. Fl. S. U. St. 310-officinalis.
obovata, Griff. Notnl. iv. 189 - officinalis.
Oepata, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc xvii. (1837) 221-officinalis.
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 110.—Litton tropics.
resini/era, Font. I. PI. Escul. 72-officinalis.
tomentosa, Jacq. Enum. PL Carib. 26-officinalis.

AVICEPS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 346 (1888) - Satyrlum, Sw. (Orchid.).
pumila, Lindl. L c. 846 = S. pnmilum.

AVICULARIA, Steud. Nom. ed. II. i. 174 (1840) = Polygonum, Tourn.
indica, Didrichs. in Bot. Notiser, (1850) 187 = P. plebeium.
maritima, Didrichs. l. c. = P. maritimum.
vulgaris, Didrichs. l. c. = P. aviculare.

AVIUNCULUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 367 = Coronilla, Linn. (Legum.).
scorpioides, Fourr. l. c. = C. scorpioides.

AVORNELA, Rafin. Sylva Tellur. 24 (1838) = Genista, Linn. (Legum.).
canariensis, Rafin. l. c. = G. canariensis.
candicans, Rafin. l. c. = Cytisus candicans.
linifolia, Rafin. l. c. = Cytisus linifolia.

AWAYU [illegible] Rafin. Sylva Tellur. 151 (1838) = Spiraea, Linn.
1'ponicus, Rafin. l. a 151 - S. japonica.

[illegible] jdr_1002 (1826) = Urophyl.
«£>*rea,* Blume, 1. c. 1003-U. glabrum.
[illegible] Biumeanum. ist. vii. (1847)
ceylanica = U. zeylanicum.
corymbos 1003 = U. corymbosum.
eli [illegible] alc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847)
uneand, [illegible] i^-Anlacodiscnspremnoides.
[illegible] Wifiht, 1. c. 147 = U. Griffithianum.
[illegible] htnutum, lfolinm.
macrop [illegible] =U. macropbyllum.
[illegible] —Ins- Luzon.
[illegible] Prod iv. "l-InsTTlmor.
[illegible] >e, ex DC. L c. 440-U. tomen-
S'anica, Wight, Ic. t 1168-U. zeyknicum.

AXANTHOPSIS, [illegible]; i» Nederl. Kmidk. Arch, ii. (1851) 195 = [illegible] (Rubiac.).
elongata, Kortl [illegible] n.

AXENFELDIA, Baill. Etod. Gén. Euph. 419 (1858) = Mallotus, Lour. (Euphorb.).
intermedia, Baill. l. c. = M. mnricatns.

AXIA. Lour. Fl. Cochineh. 86 (1790). *VALERIANEAE!*
cochinchinensis, Lour. l'. c. 36.—Cochineh.

AXILLARIA Rafin. fa Am. Monthly Mag. (1818) 266 = Polygonatum, Adans. (Liliac.).

AXINAEA, Ruiz & Pav. [illegible] (1794). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 749.
CHASTENAEA, [illegible] 102 (1828).
bracteata, Zipp. ex Blume, [illegible] FlorB, (1831) 519 = Medinilla bracteata.
crassinoda, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 69.—Peruv
dependens, Ruis [illegible]. ftr. iv. t. 411.-Peruv.
floribunda, Tri [illegible] *Trans Linn Soc,* viii. (1871) 69.—Ecuad
[illegible] *R* [illegible] W [illegible] iv l "2-Pen v.
[illegible] *Tnana*>*in Trans.Linn.* Socxxviii. (1871) 69.—Venezuela.
lanceolata, [illegible] 122.
—Peruv.
lepidota, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 69.—Ecuador.
macrophylla, Triana. ^-Ecuador.
Merianiae, Triana, l. c—Venezuela
muricata, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 321 = Miconia muricata.
purpurea, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. 410; Syst. i. 122 = Meriania radula.
Radula, Benth. Pl. Hartw. WO-Meriania Radnla.
sclerophylla, [illegible] *n Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 68.—Ecuador.
scutigera, Triana, l. [illegible] «9—N. Gianat
sessilifolia, Triana, l. c. a8.-Peruv.

AXINEA, Juss. in Diet. Sc Nat. xxix. (1828) 608-pracc.

AXTN-ANDBA, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1864) 62 t. 7ii. C. *LYTiiRARIEAE.* Beuth. & Hook. f. i!
alata, *Baill. Adansonia,* xii (1876) 86.—Malaya
Beccariana, *Baill. I. c.* 85.—Malayi raliaya
coriacea, *Baill. I. c*—Malaya.
[illegible] *C. B,* [illegible] *H0ok f.* [illegible] pice [illegible] *THW,* [illegible] *HeOk Kn>* [illegible] W> (18[illegible]> 67 [illegible] ZSyUn [illegible]

[illegible] SE!^&&£$•*"_(1869_60)
Betluda, Karst. 1. c - B. Axinanthera.
macrophylla, Karst. 1. c - B. superba?

AXINIPHYLLUM, [illegible]Jh. in Hook. Ic. Pl. xii. 16. t. 1118 (1872). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 862.
corymbosum, *Benth. 1. c.*—Mexic.
tomentosum, *Benth. I. c.* sub 11118.—Mexic

AXIRIS, Linn. Diss. Chen. 43 (1761)=Axyrto, Linn. (Chenop.).

AXOLOPHA, Alef. in Oestr. Bot Zeitschr. xii. (1862) 258=Lavatera, Linn. (Malvac).
aegyptia, Alef. 1. c. 259 = Maiva aegyptia.
althaeoides, AleC L c - Malva altbaeoides.
hirsuta, Alef. I. c.=Althaea hirsuta.
Ludwigii, Alef. 1. c.=Althaea Ludwigii.
maritima, Alef. 1. c = L. maritima.
Wigandi, Alef. 1. c. - L. maritima.

AXOLUS, Rafin. Sylva Tellur. 01 (1838) - Cephalanthus, Linn. (Rnbiac).
angustifolius, Rafin. 1. c—C. angostifolius.

AXONOPUS, Beauv. Agrost 12 (1812) - Paspalum, Linn. (Gramin.).
aureus, Beauv. 1. c» P. aureum.
cimicinus, Beauv. 1. c.=Panicum dmidnam.
compressus, Beauv. L c. - P. compressum.
corymbosus, Schult Mant ii. 177 -> Panicnm corymbosnm.
digitatus, Beauv. Agrost 12=P. digitatum.
paniceus, Beauv. 1. c=Panicum latifolium.
Poiretii, Roem. *Sc* Schnlt. Syst ii. 318 * P. compressum.
savannarum, Schlecht. in Linnaea xxvi. (186&-66) 132=P. savannarum.

AXONOTECHIUM, Fenzl, in Ann. Wien. Mm, i. (1836) 354=Oiygia, Forsk. (Ficoid.).
trianthemoides, Fenzl, 1. c 856=O» decumbent

AXTRIS, Linn. Syst. ed. VI. Add. (1748); Amcen. Acad. 24 (1761). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 66.
amaranthoidos, *Linn. Sp. PI.* 979.—As. bor.
ceratoides, Linn. L c - Eurotia ceratoides.
hybrida, Linn. 1. c 980=amaranthoides.
Moorcroftiana, R. Br. in Wall. Cat n. 6950 - Eurotia ceratoides.
pentandra, *Jacq.Am. Select.* 244.—Cuba.
prostrata, Unn. Sp. PI. 980=amaranthoides?
sphaerospenna, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* vi (1839) 46.—Mont Altai.
triflora, Moench, Meth. Suppl. 120=amaranthoides.
villosa, *Mo». in DC. Prod.* xiii. II. 117.—Afghan.

A YAP ANA, Spach, Hist Veg. Phan. x. 290 (1841) = Eupatorium, Linn. (Compos.).
officinalis, Spach, 1. c = E. Ayapana.

AYDENDBON, Nees, in Linnaea, viii. (1883) 36. *LAVRINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 168.
ENDLICHERIA, Nees, in Linnaea, viii. (1883) 87.
GOEPPEKTIA, Nees, Syst. Laurin. 866 (18361.
SCHAVEKA, Nees, in Lindl. Nat Syst ed. II. 202 in adnot (1836).
adphylban,Nees,inLinnaea, xxi. (1846) 496.—Guiana,
affinis, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 92.—Bras,
amazonicum, *Meissn. 1. c.* 89.—Bras,
argenteum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 286.—Ind. occ.
bracteatnm, *Nees, Syst. Laurin.* 256.—Ins. S. Vincent.

ATDEHTJBO1T:—
brasUiense, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. II. 180.—Bras.
Cannella, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 90.—Guiana,
cayennense, *Meissn. 1. c.* 96.—Guiana.
citrifolium, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 284 - trinitatis.
citrifolium, *Nees, Syst. Laurin.* 257.—Bras,
cubense, *A. Rich. Fl. Cub. Faner.* ii. 187.—Cuba.
Cujumary, *Nees, Syst. Laurin.* 247.—Bras,
curvirameuzn, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 190.—Guiana.
desertoram, *Nees, Syst. Laurin.* 260.—Bras,
firmulum, *Nees, in Linnaea,* viii. (1836) 36.—Bras,
floribundnm, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 88.—Bras.
Gardneri, *Meissn. 1. c.* 89.—Bras,
glancum, *Klotisch* b* *Karst. ex Meissn. I. e.* 90.—N. Granat
goyazeuse, *Meissn. 1. e.* 94.—Bras.
Hostmannianum, *Nees, in Linnaea,* xxi. (1848) 499^—Guiana.
intermedium, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 89.—Bras,
laevigatum, *Meissn. 1. e.* 88.—Bras.
Laurel, *Nees, Syst. Laurin.* 249.—Venezuela,
macrophyllum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 92.—N. Granat.
microDotryum, *Nees, Syst. Laurin.* 264.—Ins. Portorico.
Muca, *Nees, in Linnaea,* xxi. (1848) 498.—Pernv.
nitidum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. 1.95.—Bras,
obtusifolium, *Nees, Syst. Laurin.* 268.—Am. austr.
pachycarpum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 96.—Gniana.
pallidum, *Meissn. 1. c.* 93.—Bras,
panurense, *Meissn. 1. c.* 89.—Bras,
parvifloram, *Meissn. 1. c.* 90.—tiras.
permolle, *Nees, Syst. Laurin.* 2,46.—Bras,
piauhyense, *Meissn. in DC. Prod.* xv. 1.93.—Bras,
riparium, *Nees, in Linnaea,* xxi. (1848) 497.—Guiana,
robustum, *Klottsch V Karst. ex Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 90.—N. Gianat.
salicifolium, *Nees, Syst. Laurin.* 262.—Ind. occ. ; Guian.
Sellowii, *Meissn. in DC. Prod.* xv. 1.88.—Bras,
sericeum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 286.—Ind. occ.
suaveolens, *Nees, in Linnaea,* viii. (1833) 87.—Bras,
tenellum, *Meissn^in DC. Prod.*xv. 1.93.—Bras,
trinitatis, *Meissn. 1. c.* 91 —Ins. Trinit
verrucosum, *Nees, Syst. Laurin.* 259.—Bras,
verticillatum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 91.—Ins. S. Vincent.

ATENIA.Loefl. It. 199(1768). *STERCUUACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 225.
CYBIOSTIGMA, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xxv. (1852) H. 155.
DAYENIA, Mill. Gard. Diet ed. VII. (1769).
JDNGIA, Locfl. It. 199 (1758).
abatilifblia, Turcz. in BulL Soc. Nat Mosc xxxvi. (1863)1. 569 = magna.
acalyphifolia, *Griseb. in Goett. Abk.* xxiv. (1879) 60.—Reg. Argent
angustifolia, *A. St. HiL V Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 34.—Bras.
cardiopetala, Sesse, ex DC. Prod. i. 488-magna.
cordifolia, *Sesse, ex DC. I. c.*—Mexic
cordobensis, *Hieron. Ic. PL Argent.* 50.—Reg. Argent.
euphrasiaefolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 29.—Cuba,
hirta, *A. St. Hit. V Naud. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xviii. (1842) 84.—Bras.
inermis, Medic ex Steud. Norn. ed. IL i. 174-pusilla.
laevigata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 97.—Ins. Jomaic.
lingulata, *Griseb. in Goett. Abk.* xxiv. (1879) 60.—Keg. Argent.
magna, *Linn. Syst.* ed. X. 1247.—Mexic.
mexicana, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 569.—Mexic
microphylla, *A. Gray, in Smithson. Contr.* iii. (1862)
ovata, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 4.—Mexic.
pusilla. *Linn. Syst.* ed. X. 1247.-Ins. Carib. j Perav.
lotnhdifolia, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 4—Mexic.
sidaefolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 186- . mexicana.
sidaefolia, DC. Prod. L 488-tomentosa.

ATENIA:—
sidaeformis, Loefl. It. 257=tomentosa.
stipularis, *Planch.* &* *Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 834.-N. Granat.
tomentosa, *Linn. Syst.* ed. X. 1247.—Venezuela.

AYLANTUS, Juss. Gen. 373 (1789) = Ailanthus, Desf. (Simarub.).

AYLMERIA, Mart Amaranth. 68; et in Nov. Act. Nat. Cur. ziii. (1826) 276=Polyearpaea, Lam. (Caryophyll.).
rosea. Mart. 11. cc. = P. violacea.
violacea, Mart. 11. cc. = P. violacea.
Zollingerii, Fend, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 141.-Malaya.

AYPARIA, Rafin. Sylva Tellnr. 154 (1888)-8ymplocoa, Linn. (Styrac).
crenata, kafin. 1. c. (- *Dicalix cochinchinensis,* LOOT.). —Cochinch.

AYTONIA, Linn, *t* SnppL 49, SOS (1781)-AItonla, Thnnb. (Sapind.).

AZADIRACHTA, A. Jnss. in Mém. Mas. Par.rix. (1830) 220 (Mél. 68) (18S0)=Melia, linn.
indica, A. Jnss. 11. cc. 221, 69-Melia Azadirachta.

AZALEA, Gaertn. FmcL i. 301. t. 63 (1788), propane-Iioiseleuria, Desv. (Ericac.).

AZALEA, Linn. Syst. ed. I (1735)-Biiododendr&ii, Linn. (Ericac).
alba, Blame, ex DC. Prod. yii. 721 = R. album.
alba, Sweet, in Ann. Fromont, i. (1829) 104 = R. ledifolinm.
amoena, Lindl. in Paxt. Flow. Gard. iii. (1862) t. 89= R. indicum.
arborea, Bart ex Stead. Norn. ed. II. i. 174-R. arborescens.
arborea, linn. Sp. PI. 150=R. ponticum.
arboreseens, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 153=R. arbo-Tescens.
aurantiaca, Dietr. Darst Von. Zierpfl. Heft L 5. t 1 — R. calendulaceum.
Bealii, Fortune, ex C. Koch, DcndroL ii. IU 175 => R. sublanceolatnm.
bicolor, Pursh, Fl. Am. Sept i. 163-R. nudiflorum.
bullata, Foist ex Stead. Norn. ed. IL i. 174= Lebetanthus americana.
Burgeri, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. L 34=R. indicom.
calendulacea, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 361=R. occidentale.
calendulacea, Michx. Fl. Bor. Am. i. 161 = R. calendulaceum.
eali/ornica, Torr. *Sc* Gray, ex Durand, in Joura. Acad. Nat.-Sc. Philad. Ser. II. ùi. (1855) 94-R. californicum.
calycina, Lem. Jard. Fl. iii. (1853) t. 257=R. indicum.
canescens, Michx. FL Boi. Am. i. 150 »R. nudiflorum.
celebica, Ulume, ex DC. Prod. viii. 725=R. malayanum.
ckinensis, Stand. Nom, ed. II. i. 175 = R. sinense.
crispiflora, Hook. Bot. Mag. t. 4726-R. indicum.
crocea, Hoffmgg. Ven. Pfl. Nachtr. iii. 22 = R. calendulaceum?
dahurica, C. Koch, DendroL ii. II. 181 = R. daurienm.
Danielsiana, Paxt Mag. Bot. i. 129 = R. indicnm.
decumbens, DC Prod. vii. 718 = R. indicum.
Farrerae, C. Koch, Dendrol. ii. II. 178 = R. Farrerae.
ferruginosa, Pall. Fl. Ross. ii. t 70-R. Anthopogon.
fimbriata, Dum.-Cours. Bot. Colt. ed. II. iii. 337.— China.
flammea, Pritz. Ic Ind. 181=R. calendnlacenm,
/lava, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 62 = R. calendulaceum!
fragrans, Adams, in Mém. Acad. Pe'tersb. ii. (1808) 382 = R. Anthopogon.
fragrans, Rafin. Ann. Nat. 12—R. arboresoens.
fulva, Michx. ex Lam. Jonm. Hist Nat i. (1792) 410 — R. nudiflorum.
gandavensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 18S =• R. ponticum.
glauca, Lam. Ulustr. 493. t. 110-R. viscosum.
glauca, Meerb. PI. Sel. Ic t. 6-R. glaucumt

AZALEA:—
hispida, Push, Fl. Am. Sept. i. 154=R. viscosum.
indica-alba, Lindl. in Bot. Reg. t. 811 (1824) = R. ledifolium.
indica, linn. Sp. PI. 150= R. indicum.
japonica, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 400.—Japon.
javanica, Blume, ex DC. Prod. vii. 721=R. javanicum.
Jodogava, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 162-R. Keiskei.
lapponica, Linn. Sp. PI. 151 =R. lapponicum.
lapponica, Pall. Fl. Ross. ii. 52. t 70. f. 1 =R. Anthopogon.
ledifolia, Hook. Bot. Mag. t. 2901 = R. ledifolium.
lilliflora, Poit. in Rev. Hortic. (1869) 299 = R- ledifolium.
linariaefolia, Can. 1. c. (1872) 100 = seq.»
linearifolia. Hook. f. Bot. Mag. t. 5769 = R. linearifoliom.
lucida, Meerb. PI. Sel. Ic. 7-R. lucidum.
Ludoviciae, Herb, in Bot. Reg. xxxi. 60.—Hab.l
lugens, Dmn.-Cours. But. Cult. ed. II. iii. 837.— China.
lutea, Linn. Sp. PI. 150=R. nudiflorum.
macrantha, Bnnge, Enum. PI. Chin. Bor. 41 = R. indicum.
mollis, Blume, Bijdr. 853 «R. molle.
Morierii, Sweet, ex Loud. Hort Brit Suppl. iii. 496 » R. calendulaceum.
Mortieriana, Hort. ex Spae, in Ann. Gand. ii. (1846) 325 = R. calendulaceum.
mucronata, Blume, Bijdr. 858=R. ledifolium.
multiflora, Turcz. ex DC. Prod. vii. 7i5 = R. Anthopogon.
myrtifolia, Champ, in Hook. Bot. Mag. lxxvii. (1851) sub t 4609 = R. ovatuin.
narcissiflora, Fortune, ex Planch, in Rev. Hortic. Sér. IV. iii. (1854) 67 = R. ledifolium.
nitida, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 153=R. nitidum.
nnea, Dehnh. Cat PI. Hort. Camald. ed. II. 17.— Hab.t
nudifiora, Linn. Sp. PI. ed. II. 214 =R. nudiflorum.
obtusa, lindl. in Joum. Hort. Soc. i. (1846) 162 = R. indicum.
occidentalis, Torr. & Gray, ex Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 116=R. occidentale.
ovata, lindl. in Joum. Hort. Soc i. (1846) 149-R. lapponicum.
pallida, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 96; xxi. (1848) II. 498.—Mont. Baical.
periclymena, Pers. Syn. i. 213-R. nudiflorum.
periclymenoides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 151 = R. nudiflorum.
phaenicea, Hort. ex Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. ix. (1853-54) 79=R. puniceum.
pilosa, Michx. in Lam. Joura. Nat. Hist. i. (1792) 410 ' = Menziesia globularis.
pontica, linn. Sp. PI. 150 = R. ponticum.
procumbent, Linn 1. c. 151—Loiseleuria pracumbens.
prolifera, Poit. in Ann. Fromont, i. (1829) 104-R. Simsii.
punctata, Lour. Fl. Cochinch. 118; ed. Willd. i. 189-R. Loureirianum.
punicea, Sweet, in Ann. Fromont, i. (1829) 104 -=R. sublanceolatum.
purpurea, Dum.-Coun. Bot Cult. ed. H. iii 837.— Ind. or.
ramentacea, lindl. Joum. Hort. Soc. iv. (1849) 291 = R. indicum.
Sawsonii, Paxt. Mag. Bot. ii. 121.—Hab.!
retusa, Blume, ex Steud. Nom. ed. II. i. 175 = R. retusum.
rosmarini/olia, Bonn. f. Fl. Ind. 43=R. ledifolium.
rubra, Meerb. PI. Sel. Ic. 8.—Hab. f
scabra, Lodd. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. II. 42-R. viscosum.
seTpyllifolia, A. Gray, in Perry, Jap. Exped.ii. 315 = R. serpyllifolium.
Seymouri, lindl. in Bot. Reg. t 1976 = R. Seymouri.
sinensis, Lodd. Bot. Cab. t 885=R. sinense.
spedosa, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 10=R. speciosum.
squamata, Lindl. in Joum. Hort Soc. i. (1849) 162 = R. Farrerae.
tomentosa, Duroi, ex Steud. Nom. ed. I. 97— Loiseleuria procumbens.
tubiflora, Blume, ex DC Prod. vii. 725=R. malayanum.

AZALEA :—
verHciUata, Bart, ex Lodd. Cab. t. 1632.—Am. bor
virens, Dum.-Coors. Bot Cult. ed. II. iii. 335= R-viscosum.
viscosa, linn. Sp. PI. 161 = R. viscosum.
vittata, Dum.-Cours. Bot Cult ed. II. iii. 837-K. vittatum.
mittato-punctata, Lem. Illustr. Hortic. (1854) t. 20 = praec. ?

AZALTEA, Walp. Rep. i. 539 (1842) = Alzatea, Ruiz *Sc* Pav. (Celastr.).

AZAMARA, Hochst ex Reichb. Nom. 145 (1841) = Schmidelia, Linn. (Sapind.).
trifoliata, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr. 421 = S. africana.

AZANZA, Alef. in Bot. Zeit. xix. (1861) 298 = ThOspesia, Corr. (Malvac.).
acuminata, Alef. L c. 299 = T. populnea.
Lampas, Alef. 1. c. 297 = T. Lampas.
Zollingen; Alef. 1. c. 298.—Java.

AZANZA, Moç. *St* Sessé, ex DC. Prod. i. 458 (1824) = Hibiscus, Linn. (Malvac).
insignis, Moç. & Sesse ,1. c. 454 - H. Azanza.

AZAOLA, Blanco, Fl. Filip. 402 (1837) = Payena, A-DC. (1844). (Sapot).
Beiis, Blanco, 1. c.=P. Betis.
Leerii, Teijsm. *Sc* Binn. in Tijdschr. Neder}. Ind. vi. (1854) 116=P. Leerii.

AZARA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 79. t. 36 (1799). *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 127.
MVKTOPHYLLUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1863) I. 604.
SILENIA, Bert, in Merc. Ghil. (1829) ex Bull. Féruss. xx. (1830) 108.
alpina, *Poepp.* b* *Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 80. t. 167-—Chili.
Berteroniana, *Steud. in Mora,* xxxix. (1856) 420.—Chili,
celastrina, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* x. (Dec. 1830) 119.—Chili.
chiloënsis, *ffvot.f. ft. Antarct.* 243.—Chili,
dentata, *Ruia V Pav. Syst.* 138.—Chili,
dubia, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 418.—Chili.
Fernandesiana, C. Gay, Fl. Coil. i. 196-serrata.
Gilliesii, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 144.—Chili.
hirtella, *Miq. in Linnaea,* xxv. (1852) 650.—Chili.
integrifolia, Bert, ex Steud. in Flora, xxxix. (1856) 420 = Berteroniana.
integrifolia, Miq. ex Steud. 1. c. = Lechleriana.
integrifolia, *Ruit* b* *Pav. Syst.* 138.—Chili,
intermedia, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 194.—Chili,
lanceolata, *Haok.f. Fl. Antarct.* 243.—Chili.
Lechleriana, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 420.' Chili.
Lilen, Bert, in Merc. Chil. (1829).—Cf. BnlL Fémssac, xx. (1880) 108= celastrina, sparsiflora.
microphylla, *Hook./. Fl. Antarct.* 244.—Chili,
salicifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 20.— Reg. Argent.
serrata, Bert, ex C. Muell in Walp. Ann. vii. 226-dubia.
senate, *Ruie (f Pav. Prod.* 79. t. 36; *Syst.* 137—Chili.
sparsiflora, *Steud. Nom.* ed. II. i. 176.—Chili,
tomentosa, *Bert, ex Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 419-—Chili.
umbellata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 610.—Chili-
untbellata, Presl, Rel. Haenk. ii. 92=Laetia apetaU-Valdiviae, *Lechler, ex Steud. in Flora,* xxxix. (1860) 420.—Chili.

AZAROLUS, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1224 (1803)-Pyrus, Linn. (Rosac).
alpina, Borkh. 1. c. 1234=P. alpina.
arbutifolia, Borkh. 1. c. 1225=P. aibutifolia.
Aria, Borkh. 1. c. 1229 = P. Aria.
Chamaemespilus, Borkh. 1. c. 1227 = P. ChamaesW' spilus.
crataegoides, Borkh. I. c. 1258—Crataegus Azarolus.
heterophylla, Borkh. 1. c. 1248.—Hab. ?
hybrida, Borkh. 1. c. 1239 = P. rotundifolia.
intermedia, Borkh. 1. c. 1232=P. intermedia.

AZAROLUS :—
manccana, M. Roem. Syn. Rosifl. 183-Crataegas Azarolus.
Oliveriana, M. Roem. 1. c.=Crataegos penUgyna.
ptnnatifida, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1245-Pyrus pinnatifida.
Platxphylla, M. Roem. Syn. Rosifl. 13S-Crataeeu» Pentagyna.
PoUviUeriana, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1261-P. Pollveria.
fiubescens, M. Roem. Syn. Rosifl. 134=Crataegus pubescens.
torminalis, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1235 = P. torminalis.

AZEDARA, Rafin, FL Lndov> 185 **(1817) = Melia, Linn.**
'peciosa, Rafin. 1.C.=M. Azedarach.

AZEDARAC, Adans. Fam. iL 312 (1763) -seq.

AZEDARACH, Tonm. ex Linn. Gen. ed. I. 127 (1737) =Jaella, Linn.
Commelim, Medic. Bot. Beobacht. (1782) 164 = M. Azedarach.
de...na, Medic. Malv. 115 = M. Aiadir. 'ata.
"tule, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 5=Sandoricum indicnm.
/ranmfolia, Moench. Meth. Suppl. 58=M. Azadirachta.
nigrum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 5.—Malaya.
odoratum, Noronha, 1. c = M. Azedarach.
'amiflorum, Noronha, 1. c.=Epicharis cauliflora.
••'cisum, Noronha, 1. c.—Malaya.

AEttEDIA, Arruda, ex AllemSo, Desenb. cnm Ic. (1846). *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 125. pernambucana, *Allemão, I.* r.-Bra's.

AZ SF** Lam_ Enc y^c. ... 843 C1?89)- *SALVADORACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 681.
ACTEGETON, Blume, Bijdr. 1143 (1826).
KANDENA, Rafin. Sylva Tellnr. 138 (1838).
MONETIA, L'Herit. Stirp. Nov. i. t. 1 (1784).
«neustifolia, *A. DC. in DC. Prod.* xvii. 29.-Madag.
aiacantha, Lam. Encyc. i. 343 = Plectronia parviflora.
nova, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 68.—Ins. Philipp.
"°»o, J. F. Gmel. Syst. 262 - tetracantha.
saranentosa, *Benth. & Hook. /. Gen.* ü. 681.—Burma; Malaya.
sanuntosa, Vill. ex Vidal, Suiops. t. 65. f. C-tetracantha?
scandens, Baill. Hist. PI. vi. 13 = sarmentosa.
tetracantha, *Lam. Encyc.* i. 343.—Ind. or.

AZOPHORA, Neck_Elem> 1L 861 (1790) = Bjdzopll0ra> Linn.

AZOKELi|A| Lam. Encyc. i. 344 (1783). *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 874.
BOLAX, Comm. ex juss. Gen. 226 (1789).
CHAMITIS, Banks, ex Gaertn. Fruct. i. 94. t 22 (1788).
DICHOPETALUM, F. Muell. in Hook. Kew Journ. — vu. (1855) 378. t. 11.
JARGAS ARRiiz & Pav. Prod. Fl. Per. 43. t 84 (1794).
MICROSCIADIUM, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847; 468.
QSCHATZIA, Walp. Ann. i. 340 (1849).
rECTOPHYTUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 28. t. 426 (1821).
J|?*0*1 U Gen -<* Sp. Nov_18 (1818)-
»Pada, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* L 699.—
Vilh.
aretioides, *Willd. ex DC. Prod.* iv. 77.—Ecuador.
bilobe, *Wedd. Chlor.And.ii.* 196.—Bolivia.
bolacina, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 8O.-Chili.
bryoides, *Pha, in Linnaea* xx^ (1856) 686.—
Chili.
caespitosa, *Gav. Ic.* v. 57. t. 484.-Chili.
<*fsp,tosa, Vahl, Symb. BoL iii. 48=glebaria.
X™»«*. Pers. Syn. i. 303 = filamentosa.
dadorrhiza, *pers. I.* ,._Peruv.
an»pressa, Labill. Nov. Holl. PL i. 76.1.101 -Siebera compressa.
eorymSosa, *Pen. Syn.* i. 305.—Peruv.
"essi/olia, Pen. 1. c. S03=caespitoia.

AZOBELliA:—
crenata, *Pers. Syn.* 302.—Peruv.
cuneifoUa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 365.— Austral.
daucoides, Urv. in M^m. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 613 =Oreomyrrhis andicola.
depauperata, *Phil. Fl. Atac.* 24.—Chili,
diapensioides, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 702.—Peruv.
dichopetala, *Benth. Fl. Austral,* iii. 365.—Austral,
diversifolia, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 86.—Chili,
filamentosa, *Lam. Encyc.* i. 844.—Terr. Magellan.
Gayana, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 658.—Chili.
GiUiesii, *Hoot. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 847.—Chili.
glabra, *Wedd. Chlcr And.* 67.—Bolivia,
glebaria, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 701.— Chili.
gummifera, Poir. Encyc. Suppl. i. 661-caespitosa.
Hookeriana, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 81 = caespitosa.
indsa, *Wedd. Chlor. And.* ii. 197.—Bolivia.
integrifolia, Raessch. Nom. ed. III. 84=filamentosa.
lanceolata, Labill. Nov. Holl. PI. i. 74. t. 69=Siebera Billardieri.
linearifolia, Cav. Ic v. 67-Siebera linearifolia.
lycopodioides, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat.* Ser. *X.* v. (1825) 105. t. 3.—Reg. Magellan,
madreporica, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 79.— Chili.
monantha, *Clos, I. c*—Chili.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* iii. 364.—Austral,
multifida, *Pers. Syn.* i. 308.—Peruv.
muscoides, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 696.—Chili.
nervosa, *Phil. I. c.* 696.—Chili.
ovata, Labill. Nov. Holl. PI. L 74. t. 100=Siebera Billardieri.
pedunculata, *Willd. ex DC. Prod.* iv. 78.—Ecuador,
piligera, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 652.—Chili,
pulvinata, *Wedd. Chlor. And.* ii. 194.—Ecuador.
Ranunculus, *Urv. in Mem. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 613.—Reg. Magell.
reniformis, Pers. Syn. i. 303.—Peruv.
Saxifraga, *Benth. Fl. Austral,* iii. 865.—Austral.
Selago, *Hoot./. Fl. Antarct.* 284.—Terr. Magell.; Ins. Kerguelen.
sessiliflora, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 652.—Chili.
spinosa, *Pers. Syn.* i. 80S.—Chili.
triscuspidata, Lam. IUustr. 1.189"Caespitosa.
triscuspidata, Poir. Encyc. Snppl. i. 551=lycopodioides.
trifoliata, Walp. Ann. v. 62=trifofiolata.
trifoliolata, *Hoot./. Fl. N. Zel.* i. (1863) 1.18.—N. Zel.
trifoliolata, *Clos, in C. Gay.Fl. Chil.* iii. 85. t. 80. f. 2.—Chili.
tri/uscata, Hook. Ic. PI. t. 639=seq.
trifurcata, *Pers. Syn.* i. 303.—Reg. Magellan,
utriculata, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 122.—Reg. Magellan.

AZURINIA, Fourr. in Ann.^oc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 128= Veronica, Tourn. (Scrophul.).
aphylla, Fourr. 1. c 128- V. aphylls.

B

BABACTES, DC. in Meissn. Gen. 302; Comm. 211 (1840); et Prod u. 260 (1845)=CUrita, Bach.-Ham. (Gesnerac.).
oblongi/olia, DC. 1. c.=C. acuminata.

BABBAOIA, F. Muell. Rep. Babb. Exped. 21 (1658).
CHENOPODIACEAE, Benth. & Hook. £ iii. 61.
acroptere, *F. Muell. (f Tote, in Trans. Roy. Soc. S. Austral,* vi. (1883) 108.—Austral,
dipterocarpa, *F. Muell. Rep. Babb. Exped.* 21.—Austral,
pentaptera, *F. Muell. V Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral,* vi. (1883) 108.—Austral,
scleroptera, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* (Nov. 1886).—Austral.

BABIANA, Ker-Gawl. in Bot Mag. t. 676 (1802)
1RIDEAE, Benth. *It* Hook. f. iii. 706.
ACASTE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 322.
angustifolia, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 396; *EM. Vert.* 31.—Afr. austr.
atrocyanea, *EM. Vert.* 33.—Afr. austr.
atrodeltoidea, *Eckl. I. c*—Afr. austr.
Bainesii, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 385.—Afr. austr.
caesia, *Ectl. Vert.* 32.—Afr. austr.
caerulescens, *Eckl. I. c*—Afr. austr.
cuneifolia, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 335.—Afr. austr.
densiflora, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 848.—Afr. austr.
disticha, *Ker-Gawl. in Bet. Mag.* t 626.—Afr. austr.
Dregei, *Baker, in Journ. Bat.* xiv. (1876) 336.—Afr. austr.
Ecklonii, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 348.—Afr. austr.
fimbriata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 166.—Afr. austr.
flabellifolia, *Ham. ex Klatt, in Linnaea,* **xxzv.** (1867-68) 380.—Afr. austr.
flavocaesia, *Eckl. Vert.* 32.—Afr. austr.
fragrans, *Eckl. 1. c.* 31.—Afr. austr.
Gladiola, *Spreng. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 176.—Afr. austr.
hypogaea, *Burch. Trav.* ii 589.—Afr. austr.
lilacina, *EM. Vert.* 31.—Afr. austr.
lineolata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 347.—Afr. anstr.
maculata, *Klatt, 1. c.* 349.—Afr. austr.
mucronata, *Ker-Gawl. in Kon. V Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 234.—Afr. austr.
multiflora, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 851.—Afr. austr.
nana, *Spreng. Syst.* i. 156.—Afr. austr.
nervosa, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot.i. (1805) 284=Antholyza nervosa.
obtusifolia, *Ker-Gawl. I. c.*—Ins. Mascar.
ochroleuca, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 896.—Afr. austr.
parviflora, *Brehm, ex Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 360.—Afr. austr.
plicata, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 576.—Afr. austr.
punctata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 848.—Afr. austr.
punicea, *Eckl. Vert.* 82.—Afr. anstr.
purpurea, Ker-Gawl. in Bot. Mag. snb t 1019 = villosa.
pygmaea, *Spreng. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 176.—Afr. austr.
pygmaea. Baker, in Jonm. Linn. Soc xvi. (1878) 165 = **nana.**
quadripartita, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 850.—Afr. austr.
reflexa, *EM. Vert.* 33.—Afr. austr.
refiexa, Ker-Gawl. Gen. hid. 154=plicata.
ringens, *Ker-Gawl. in Kon. (f Sims, Ann. Bot. i.* (1805) 233.—Afr. austr.
rosea, *Ectl. Vert.* 82.—Afr. austr.
rubro-coerulea, Pritz. Ind. Ic. 184=seq.
rnbrocyanea, *Ker-Gawl. in Kon.* b* *Sims, Ann. Bot. i.* (1805) 284.—Afr. austr.
sambucina, *Ker-Gawl. I. c.*—Afr. austr.
scabra, *Brehm, ex Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 349.—Afr. austr.
secunda, *Ker-Gawl. Gen. Irid.* 154.—Afr. austr.
socotrana, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6585.—Ins. Socotr.
spathacea, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 688.—Afr. austr.
Sprengelii, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 106 = pygmaea.
stellata, *Ectl. Vert.* 32.—Afr. austr.
stricta, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 621, **637.—**Afr. anstr.
snlphurea, *Ker-Gawl. in Kon. If Sims, Ann. Sot.* i. (1805) 234.—Afr. austr.
tenuiflom, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1.396, nomen.—Afr. austr.
Thunbergii, *Ker-Gawl. in Kon.* b" *Sims, Ann. Bot. i.* (1805) 238.—Afr. anttr.
tubata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 396; *Eckl. Vert.* 38.—Afr. austr.
tubiflora, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t 680.—Afr. austr.
tubulosa, Ker-Gawl. Gen. hid. 154=tubiflora.
u. s. -crocea, *ttd. ; Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 850.—Afr. anstr.
u d U t o A T)

BABIAMA.:—
villosa, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t S83.—Afr. austr.
villosula, *Ker-Ga-ml. ex Steud. Nam.* ed. II. i. 176.—Afr. anstr.

BABINGTONIA, Lindl. in Bot. Reg. (1842) t. 10 = Baeckea, Linn. (Myrtac.).
Camphorosmae, Lindl. 1. c. = Baeckea Camphorosmae.
corynophylla, F. Mncll. Fragm. iv. 74 = Baeckea corynophylla.
crispiflora, F. Mnell. 1. c. = Baeckea crispiflora.
densifolia, F. Mnell. 1. c. = Baeckea densifolia.
gracilis, F. Muell. 1. c. = Baeckea polyandra.
novo-anglica, F. Mnell. 1. c. = Baeckea densifolia.
ovalifolia, F. Muell. 1. c — Baeckea ovalifolia.
pentagonantha, F. Muell. L c. = Baeckea pentagonantha.
pentandra, F. Mnell. 1. c= Baeckea pentandra.
Preissiana, F. Mnell. 1. c. = Baeckea pentandra.
robusta, F. Muell. 1. c. = Baeckea robusta.
subcuneata, F. Moell. 1. c. = Baeckea subcnneata.
virgata, F. Muell. 1. c — Baeckea virgata.

BABIRON, Rafin. New Fl. Am. iv. 23 (1836) - Daueus, Tourn. (Umbell.), *Sec.*
Jichotomum, kafin. 1. c. 24 = Apium divaricatum.
divaricatum, Rafin. 1. c. = Apium divaricatum.
pusillum, Rafin. 1. c. 23 —D. pusillns.

BACA, Rafin. Princ Somiol. 25 (1814) = Boea, Commas. (Gesnerac.).

BACASIA, Rniz & Pav. Prod. Fl. Per. 105. t. 22 (1794) = Barnadesia, Mutis (Compos.).
corymbosa, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. 189 = Bam. corymbosa.
laneeolata, Rjiiz Sc Pav. ex DC. Prod. vii. 8 = Bam. laneeolata.
spinosa, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. 188 — Chuquiraga spinosa.

BACCAUBEA, Lour. Fl. Cochinch. 651 (1790). *EVPHORB1ACEAE,* Benth. *St.* Hook. f. iii. 283.
ADENOCREPIS, Blnme, Bijdr. 579 (1825).
CALYFTROON, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 471 (1860).
COCCOMELIA, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (182b) 5.
HEDYCARPUS, Jack, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) 118.
MICROSEPALA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 444 (1860).
PIERARDIA, Roxb. Hort. Beng. 28 (1814); Fl. Ind. ii. 254 (1832).
acuminata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 463.—Sumatra.
affinis, Muell. Arg. 1. c. 469 = parviflora.
Barteri, *Muell. Arg. 1. c.* 464.—Afr. txop. occ.
bomeensis, *Muell. Arg. I. c.* 460.—Borneo,
bracteata, *Muell. Arg. 1. c.* 466.—Malaya,
cauliflora, *Lour. Fl. Cochinch.* 661.—Cochinch.
costulata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 464.—Snmatra.
courtallensis, *Muell. Arg. I. c.* 459.—Ind. or.
dasystachya, *Muell. Arg. 1. c.* 458.—Java.
deflexa, *Muell. Arg. 1. c.* 462.—Java,
dulcis, *Muell. Arg. 1. c.* 460.—Sumatra.
flaccida, *Muell. Arg. 1. c.* 459.—Burma.
Griffoniana, *Muell. Arg. 1. c.* 464.—Afr. occ.
javanica, *Muell. Arg. I. c.* 465.—Java,
laneeolata, *Muell. Arg. 1. c.* 457.—Malaya,
macrocarpa, *Muell. Arg. I. c.* 459.—Malaya,
macrophylla, *Muell. Arg. 1. c.* 464.—Malaya.
mdcrostachya, Wight, Ic. PI. t. 1913 = sapida.
minntiflora, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. n. 463.—Java.
Motleyana, *Muell. Arg. 1. c.* 461.—Malaya,
parviflora, *Muell. Arg. I. c.* 462.—Burma; Malaya.
propinqua, Muell. Arg. 1. c. 463 = sapida.
pubera, *Muell. Arg. I. c.* 458.—Sumatra,
pyrrhadasya, *Muell. Arg. 1. c.* 462.—Sumatra,
racemo&a, *Muell. Arg. I. c.* 461.—Java,
ramiflora, *Lour. Fl. Cochinch.* 661.—Cochinch.
sapida, Bedd. Fl. Sylv. t. 280 = courtallensis.
sapida, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 459.—Ind. or.; Malaya.
Seemanni, *Muell. Arg. 1. c.* 462.—Ins. Pacif.
stylaris, *Muell. Arg. I. c.* 465.—Ins. Facif.
sumatrana, *Muell. Arg. I. c.* 466.—Sumatra,
sylvtstris, *Lour. Ft. Cochinch.* 662.—Cochinch.
taitensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 468.—Ins. Pacif.
tetrandra, *Muell. Arg. 1. c.* 465.—Ins. Philips.
Wilkesiana, *Muell. Arg. 1. e.* 461.—Ins. Pacif.

BACCHARIOIDES, Linn. Fl. Zeyl. 196 (1747) = seq.

BACCHARIS, Linn. Hort. Cliff. 404 (1737). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 286.
ACHYKOBACCHARIS, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 952 (1843%
ARRHENACHNE, Cas«. in Diet. Sc Nat. Iii.253 (1828).
MOLINA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. Fl. Per. 111. t. 24 (1794).
PINGRAEA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xli. 57 (1826).
POLYPAFPUS, Less, in Linnaea, iv. (1829) 314.
PTEROCLADIS, Lamb, ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 849 (1839).
SERGILUS, Gaertn. Frnct. ii. 409. t. 174 (1791).
STEPHANANTHUS, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1826).—Cf. Flora, x. (1827) 96.
TURSENIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxvii. 480 (1825).'
absinthioides, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 57 = Tessaria absinthioides.
acerosa, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 67.—Ecuador.
acutiloba, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 87*-incisa.
adnata, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 870 = Pluchea subdecurrens.
adscendens, *Pers. Syn.* ii. 424.—Penxv.
aegyptiaca, Forsk. ex DC. Prod. v. 450 = Pluchea Dioscoridis.
affinis, DC. 1. c. 413 = subopposita.
affinis, Spreng. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ill. 94 — retusa.
Alamanni, DC. Prod. v. 402=glutinosa.
alata, Hort. Berol. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 612 =genistelloides.
alatemoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 51.—Peruv.
alatemoides, Foepp. ex DC. Prod. v. 410 = Poeppigiana.
albida, *Hook. V Am. in Hook. Journ. Bot.* ill. (1841) 41.—Reg. Argent,
alnifolia, *Meyen &" Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl. i.* (1843) 264.—Peruv.
alpestris, *Gardn. in Hook. Land, Journ. Bot.* iv. (1846) 122.—Bras.
alpestris. Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 64 =. rufescens.
alpina, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 48.—Peruv.
amplexicaulis, Wall, ex DC. Prod. v. 439 = Laggera flava.
amygdalina, Griseb. in Goett. Abb, xix. (1874) 175 = oxyodonta.
angulata, *Griseb. 1. c.* xxiv. (1879) 180.—Reg. Argent.
angustifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 16S-B. Pingraea.
angustifolia, *Michx. Fl. BOT. Am.* ii. 125.—Am. bor.
anomala, *DC. Prod.* v. 403.—Bras,
aphylla, *DC. I. e.* 424.—Bras.
apiculata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras, vi ill. 74 = trinervis.
arborea, *Linn. Mant.* 284.—Ins. Johann. (Afr. or.).
arborescens, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 412 = arborea.
arbutifolia, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 97.—Peruv.
arctostaphyloides. *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. III. 88.—Bras.
arenaria, *Baker, 1. c.* 62.—Bras,
aretioides, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 54, nomen.—Peruv.
aretioides, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 67.—Ecuador.
arguta. Gill, ex Hook. *St.* Am. in Hook. Jonm. Bot. iii. (1841) 36 = racemosa.
arguta, Pers. Syn. ii. 423 = Psiadia trinervia.
artemisioides. *Hook.* to" *Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 41.—Reg. Argent,
articulata, *Pers. Syn.* ii. 425.—Bras.
arunca, Schrank, ex DC. Prod. v. 881 = Conyza Gouani.
asperifolia, Benth. Fl. Hartw. 86 = Conyza asperifolia.
asperula, *Schau. in Linnaea,* xix. (1847) 724.—Mexic.
assuensis, *H. B. &* K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 67.—Ecuador.
asteroides, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1835) 14. t. 25. f. 1 (_ = *Tripolium conspicuumV).*—Chili,
attennata, *D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook, yourn. Bot.* iii. (1841) 34.—Uruguay.
auriculata, Wall, ex DC. Prod. v. 442 = Blumea hieracifolia.
avicenniaefolia, *DC. 1. c.* 414.—Bras.

BACCHARIS :—
axillaris, *DC. Prod.* v. 407.—Bras.
axillaris, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. *si* — halimimorpha.
bahiensis. *Baker, 1. c.* 88.—Bahia.
Bairdii, *Hook. V Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 30.—Umguay.
Baldwinii, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 181° tridentata.
Baldwinii, Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot. Hi. (1841) 28 = rufescens.
balsamifera, *Benth. PI. Hartw.* 202.—N. Granat
balsamifera, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 204 = Blumea balsamifera.
banksiaefolia, Bert, in Merc. Chil. (1829).—Cf. Bull. F^russac, xx. (1830) 108 = Tessaria absinthioides.
berberidifolia, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 314 = brachylaenoides.
berberifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 67.—Ecuador.
Bezanilleana, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 98.—Chili-
bifrons, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 54.—Bras.
Bigelovii, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 84.—Am. bor.; Mexic.
Blanchetiana, DC. Prod. vii. 281 = Moquinia flavescens.
bogotensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 61.—N. Granat.
brachylaenoides, *DC. Prod.* v. 421.—Bras,
brachyphylla, *A. Gray, PL Wright,* ii. 83.—Am. bor. °cc.
bracteata, Hook. & Am. in Hook. Jonm. Bot. (1841) 36-dracunculifolia.
bracteolata, *DC. Prod.* v. 418.—Hab. t
brasiliana, Linn. Sp. Fl. ed. II. 1205 = Vemoniascabra.
brevifolia, *DC. Prod.* v. 409.—Bras.
breviseta, DC. 1. c. 402 = serrulata.
bryoides, *Pers. Syn.* ii. 425.—Reg. Magellan,
buddleoides, *H. B. V K. New. Gen. et Sp.* iv. 64.—Peruv.
bupleuroides, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot vii-(1848) 86 - Iigustrina.
Burchellii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 44.—Brasbuxifolia, *Pers. Syn.* ii. 424.—Peruv.
cacalioides, *Spreng. Nachr.* i. *Bot. Gart. Halle,* 14.—Hab. I
caerulescens, DC. Prod. v. 402=glutinosa.
caespitosa, *Pers. Syn.* ii. 425.—Peruv.
calistemioides, *Meyen V Walp. in Nov. Act. Nat. C»r-*xix. *Suppl.* i. (1843) 265.—Chili,
calliprinos, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 177.—Reg. Argent.
calvescens, *DC. Prod.* v. 413.—Bras,
camporum, *JJC. I. c.* 399.—Bras.
Candolleana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 177.—Peruv.
canescens, *Spreng. Syst.* iii. 466.—Reg. Argent,
capitata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 53.—Amanstr.
caprariaefolia. *DC. Prod.* v. 416.—Bras,
cassinefolia, *DC. 1. c.* 412.—Bras.
cassinoides, DC. 1. c = cassinefolia.
cataphracta, *Spreng. Syst.* iii. 462.—Peruv.
Cephalotes, *DC. Prod.* v. 421.—Bras.
Chilco, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 56.—N-Granat.
ckilensis, Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 21" Podanthus ovatifolins.
chilolnsis, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1866) 55= »-Chilquilla.
Chilquilla, *DC. Prod.* v. 419.—Chili.
chinensis, Lour. Fl. Cochinch. ii. 494 = Blnm<* chinensis.
dliata, *Gard. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 122.—Bras.
cinerea, *DC. Prod.* v. 400.—Bras,
cinnamomifolia, *H. B. &* K. Nov. Gen. et Sp. if.* 65—Ecuador.
Clausseni, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. HI. 99—Bras.
Clausseni, Sch. Bip. ex Baker, L c 82 = cassinefolia.
cochinchinensis, *Spreng. Syst.* iii. 466.—Cochinch.
cognata, *DC. Prod.* v. 413.—Bras.
collina, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 70" Lundii.
concava, *Pers. Syn.* ii. 425.—Perov.; Chili,
conferta, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 6S.—Mexic.
confertifolia, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxvW-(1835) 16. t. 25. f. 2 = B. Chilquilla.

BACCHABI8 :-
congesta, *DC. Prod.* v. 410.—Mexic.
consanguinea, DC. 1. e.=pilularis.
eonyzoides, *DC. I. e.* 403.—Bias,
condifolia, *DC. 1. c.* 422.—Bras.
Corydalis, DC. ex Sch. Bip. in Linnaea, xxx. (1889-80) 181=cassinefolia.
corymbosa, *Meyen, Reise,* i. 811.—Chili,
corymbosa, *Pers. Syn.* ii. 424.—Perav.
crenulata, *Spreng. Syst.* iii. 465.—Bras.
tntpa, Spreng. 1. c. 468=genistelloides.
cultrata, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. III. 98.—Bras.
cuneata, DC. Prod. v. 408=conferta.
euneifolia, DC. 1. c. 406=magellanica.
tuneifolia, Moench, Meth. 674=halimifolia.
atwifolia. Wendl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 177,179 - Wendlandii.
eunifolia, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848)b7=.rufescens.
atpressiformis, Pen. Syn. ii. 425 - Lepidophyllnni cupressifonne,
ylmdrica, *DC. Prod. v.* 426=genistelloides.
daphnoides, Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 84=cassinefolia.
Uarmnn, *Hook. If Am. I. c.* 39.—Patagon.
oeUoidea, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ill. 90.—Reg. Argent.
jjensiflora, *Wedd. Chlor. And.* i. 175.—Bolivia,
aenhculata, *D. Don, in DC. Prod.* vii. 282.—Patagon.
aentifolia, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. m. «6=recurvata.
yntosa, Mart, ex Baker, 1. c. 91=snbopposita.
**epauperata,* Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 120=serrulata.
aependens, *Pers. Syn.* ii. 424.—Perav.
ojoiea, *Vakl, Symb. Bot.* iii. 98.—Ins. C«rib.
Ouseoridis, Bove, ex DC. Prod, v. 382 = Conyza aegyptiaca.
*Dl°*oridis, lion.* Cent. PI. i. 27 i Amoen. Acad. iv. J89=Plncheahirsuta.
d'ptera, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. ill. 88=articulata.
discolor, *Baker, I. c.* 48.—Bras.
discolor, Sch. Kp. ex Baker, I. c. 54 = B. Lychnophora.
tustKha, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 68=calvescens.
awergens, *DC. Prod.* v. 400.—Mexic
** 7 f M «, Spreng. ex Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 958=ErigeronSprengelii.
Domana, *Hook. tf Am. in Hook. Journ. Bat.* iii. (1841)26.-Bras.
Douglasii, *DC. Prod.* v. 4OO.-Calif.
owcunculifolU, *DC. 1. c.* 421.—Bras,
"""a, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 177.—Reg. el Argent.
"—ex, *Steud. ex Sch. Bip. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 181—Bras.
eiaeoides, *Remy, in C. Gay, FL Chil.* iv. 88.—Chili,
ellipticus, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 60. t. 824.—Mexic.
elliptica, *Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 88.—Bras,
emarginata, *Pers. Syn.* ii. 424.—Perav.
"•"noryi, *A. Gray, in Ton. Bot. Mex. Bound.* 83.—Am. bor. occ
ericoides, Pers. Syn. ii. 425 = ljabum ericoides.
ericeroides, *DC. Prod.* v. 418.—Bras,
enpdada, *DC. I. c.* 415.-Bras.
"•'"*Ptera,* Benth. in Ann. Nat Hist H. (1889) 441 = rterocanlon virgatum.
enpatorioides, *Hook. (f Am. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 22.-Chili.
Jartnosa, Spreng. in Ersch & Grub. Allgem. Encyc. »"• (1821) 27=glutinosa.
"•deulosa, *Klatt, in Leopoldina, ix.* (1884) 91.—Mexic.
Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 89.—Bras.
Sinea, *Pers. Syn.* ii. 425.—Peruv.
Fevillei, *DC. Prod.* v. 403.—Peruv.
filifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 69 = polyphyiii
nabellata, *Hook. tf Am. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 28.-Chili.
"exnosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ill. 88.—Bra*.
fiocculosa, Mart, ex Baker, 1. c. 53-calvescens.
Honbunda, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 64.—w. Granat.
ribunda *Phil ,in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 145.—°Chili.

BACCHABIS:-
foetida, Linn. Sp. PI. 861 =Pluchea camphorata.
foliosa, *GUI. ex Hook. V Am. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 80.—Chili.
frigida, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 49.—Peruv.
fuchsiaefolia, Gardn. in Hoot. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 88-orgyalis.
fitliginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 68 = Bigelovia faliginea.
fusca, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 67.—Ecuador.
Gaudichaudiana, DC. Prod. v. 424=articulata.
genistelloides, *Pers. Syn.* ii. 425.—Peruv.
genistelloides, Poepp. ex DC. Prod. v. 425 - sagittalis.
genistifolia, *DC. I. c.* 423.—Bras.
Gibertii, *Baker, in Mart. Fl. Bras,* vi III. 62—Bras.
Gillesii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 123.—Chili.
glabra, *Spreng. Syst.* iii. 466.—Reg. Argent,
glauca, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 268.—Chili.
Glaziovii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. in. 44.—Bras,
glomeruliflora, *Pers. Syn.* ii. 423.—Am. bor.; Ins. Bennud.
glutinosa, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 31 = Douglasii ?
glutinosa, *Pers. Syn.* ii. 425.—Am. bor. et austr. occ
gnaphalioides, *DC. Prod.* v. 415.—Bras.
gnaphalioides, Spreng. Syst. iii. 461—Lucilia acutifolia.
gnidiifolia, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 61.—Ecuador.
gracilis, *DC. Prod.* v. 423.—Bras,
grandinora, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 58.—Ecuador.
gratissima, Blame, ex DC. Prod. vi. 447-Blumea appendicnlata.
graveolens, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 54, nomen.—Peruv.
grindeliaefolia, *Wedd. Chlor. And. i.* 177.—Peruv.
grisea, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 65.—Bras.
Grisebachii, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ctrdova,* iv. (1881) 36.—Reg. Argent,
guianensis, *Schomi. Fauna if Flora Guy.* 1135.—Guiana.
Haenkei, DC. Prod. v. 401=Douglasii.
halimifolia, *Linn. Sp. PI.* 860.—Am. bor.; Ind. occ.
halimifolia, Moench, Meth. Suppl. 235 — Conyza >aefolia.
halimimorpha, *DC. Prod.* v. 411.—Bras,
hambntensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 62.—Ecuador.
Havardi, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i.* II. 224.—Texas,
helichrysoides, *DC. Prod.* v. 415.—Bras.
hemiprionodes,£u«/i, *Ind. Gen. DC. Prod.* i. p. v.—Bras,
heterophylla, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 62.—Mexic.
heterophylla, Spreng. Syst. iii. 464, pro parte - sebastianopolitana.
hieraci/olia, Lam. Encyc. i. 847 = Conyza Gonani.
bieraciifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 129.—Mexic
hirta, *DC. Prod.* v. 405.—Bras,
hirtella, *DC. I. c.* 418.—Mexic.
Hookeriana, DC. Prod. v. 414 "Aplopappus Hookerianns.
humifusa, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 311 • Melalema humifusa.
humifusa, *H. B. (f X. Nov. Gen. et Sp.* iv. 48. t. 322.—Ecuador,
hmnilis, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 92.—Bras.
Huydobriana, Remy, in C. Gay, FL Chil. iv. 90 = B. Pingraea
hypericifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 69.—Bras.
hyssopifolia, E. Mey. ex DC. Prod. v. S2S=Nidorella foliosa.
Uicifolia, Lam. Encyc. i. 845=Brachylaena dentata.
Ilinissae, *Benth. PI. Hartw.* 202.—N. Granat.
ilinita, *DC. Prod.* v. 412.—Bras.
inamoena, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 81-trinervis.
incarum, Wedd. Chlor. And. i. 170=microphylIa.
indsa, *Hook, (f Am. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 29.—Reg. Argent.
indica, Linn. Sp. PI. 861 =Pluchea indica.
intermedia, *DC. Prod.* v. 411.—Chili.

BACCHARIS:—
interroixta, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 84.—Bras,
iresinoides, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 63.—N. Granat.
ivaefolia, Blanco, FL Filip. ed. I. 627 = Conyza viscidula.
ivaefolia, Linn. Sp. PI. 860 = Conyza ivaefolia.
juncea, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 168.—Bras,
junciformis, *DC. Prod.* v. 426.—Bras.
lacrymans, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. HI. 94=retnsa.
laevis, *Spreng. Syst.* iii. 466.—Cochinch.
lanceolata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 63.—Peruv.
lancifolia, *Less, in Linnaea,* ix. (1834) 266.—Mexic.
lanuginosa, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1846) 82=helichrysoides.
lateralis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 100.—Bras,
latifolia, *Pers. Syn.* ii. 424.—Peruv.
laxa, *Gardn. in Hoot. Lond. Journ. Bot* iv. (1845) 121.—Bras.
Lechleri, *Sch. Bip. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 53, nomen.—Chili.
ledifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 50.—Perav.
lepidophylla, DC. Prod. v. 427 = Helichrysum baccharoides.
leptocephala, DC. 1. c. 41S = rnfescens.
leptophylla, DC. 1. c 423>rufescens.
leptospermoides, DC. 1. c. 421=dracunculifolia.
Lessingiana, *DC. I. c.* 414.—Bras.
leucanthemifolia, Burm. f. ex DC. 1. c. 887=Conyza pinnatilobata.
leucolepis, Sch. Bip. in Linnaea, xxii. (1849) 570 = helichrysoides.
leucopappa, DC. Prod. v. 416=helichrysoides.
ligustrina, *DC. I. c.* 421.—Bras.
limnophila, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. in. 60=ligustrina.
linearifolia, Pers. Syn. ii. 425=Psiadia trinervia.
linearis, *Pers. I. c*—Chili.
linearis, Poepp. ex Baker, in Mart. FL Bias. vi. m. 69=serrulata.
lingulata, Kunze, in Linnaea, vi. (1831) 147—rosmarinifolia.
linifolia, *DC. Prod.* v. 420.—Mexic.
linifolia, Meyen, Reise, i. 811=rosmarinifolia.
linifolia, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 145.—Chili.
longifolia, *DC. Prod.* v. 402.—Mexic
longipes, *Kunie, ex DC. I. c.* 401.—Chili,
loxensis, *Benth. PI. Hartw.* 135.—Perav.
lucida, Meyen, Reise, i. 460=Vemonia phylicaeformis.
Lundii, *DC. Prod.* v. 404.—Bras.
Lychnophora, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 85.—Bras.
lycioides, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 99.—Chili.
lycopodioides,Pen. Syn. ii. 425 = Eriotrix juniperifolia.
Macraei, *Hook. &" Am. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 82.—Chili,
macrantha, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 54.—Ecuador.
macrodonta, *DC. Prod.* v. 416.—Bras.
madagascariensis, Pen. Syn. ii. 423=Psiadia madagascariensis.
magellanica, *Pers. I. c.* 425.—Reg. Magell.
Mandonii, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 533, nomen.—Bolivia.
marcetiaefolia, *Benth. PI. Hartw.* 202.—Reg. Granat.
marginalis, *DC. Prod.* v. 402.—Peruv.; Chili,
maritima, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 72.—Bras,
maxima, *Baker, I. c.* 80.—Bras.
medullosa, DC. Prod. v. 405-serrulata.
megacephala, D. Don, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 79-triplinenris.
megapolamica, Hook. & Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841)38=rufescens.
megapotamica, *Spreng. Syst.* iii. 461.—Bras.
melastomaefolia, Hook. & Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841)25=oxyodonta.
mesoneura, DC. Prod. v. 412—rctusa.
Meyeniana, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Sutil i.* (1843) 295.—Peruv. FP
micrantha, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 61.—Mexic.
microcephala, *DC. Prod.* v. 426.—Bras,
microdonta, *DC. 1. c.* 416.—Bras.

BACCHABIS:—
microphylla, DC. Prod. v. 406~Candolleana.
microphylla, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 53.—N. Gnnat.
micropoda, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 88.—Bras,
microptera, *Baker, I. c.* 42.—Bras.
milleflora, DC. Prod. v. 426=genistelloides.
minutiflora, *Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 69.—Bras,
mollis, *H. B.* to[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 58.—Ecnador.
monantha, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. III. 69=minutiflora.
montana, DC. Prod. v. 404=macrodonta.
montana, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. m. 78=Schultzii.
montevidensis, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 57 «=coridifolia.
montevidensis, Spreng. Syst. iii. 160 = Vernonia nitidula.
mucronata, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 80 = Aplopappns Hookerianms.
mucronata, *H. B. b[1] K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 60.—Mexic.
Muelleri, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. in. 61.—Bras,
mnltiflora, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 59.—Mexic.
multisulcata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 45.—Bras.
myricaefolia, DC. Prod. v. 4O5=semiserrata.
myriocephala, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 93.—Bras.
myriocephala, DC. Prod. v. 426=genistelloides,
myrsinites, *Pers. Syn.* ii. 424. n. 25.—Ins. S. Doming.
myrsinoides, Hook. & Am. in Hook. Jonm. Bot. iii. (1841) 32 = brevifolia.
myrtilloides, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 176.—Keg. Argent,
nana, *D. Don, ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 56.—Patagon.
Neaei, *DC. Prod.* v. 411.—Am. merid.
neriifolia. Linn. Sp. PI. 860 = Brachylaena nereifolia.
nervosa, *DC. Prod.* v. 899.—Ind. occ.
nitida, *Pers. Syn.* ii. 425.—Peruv.
nitida, Wall. Cat. n. 3043 = Blumea chinensis.
nivalis, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 55, nomen.—Chili,
notosergila, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 183.—Reg. Argent.
nuda, DC. Prod. v. 424 = aphylla.
oblongifolia, *Pers. Syn.* ii. 424; *Spreng. Syst.* iii. 460.—Chili.
obovata, *DC. Prod.* v. 408.—Peruv.
obovata, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. SO-nmbelliformis.
obtusifolia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 51.—Peruv.
ochracea, *Spreng. Syst.* iii. 460.—Reg. Argent,
odorata, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 52.—N. Granat.
odorata, Spreng. in Ersch & Grab. Allgem. Encyc. vii. (1821) 27=cassinefolia.
oUifolia, Gardn. in Hook. Lond. Jonm. Bot vii. (1848) 86=calvescens.
oligantha, DC. ex Thorns, in Jonm. Linn. Soc ix. (1867) 343 = Catamixis baccharoides.
oligophylla, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 23=Pohlii.
opuntioides, *Mart, ex Baker, 1. c.* 39.—Bras.
Orbignyana, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 327.—Chiqnitos.
organensis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 74.—Bras,
orgyalis, *DC. Prod.* v. 416.—Bras,
onzabaënsis, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. ISO.—Mexic.
oritabaensis, Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 91 = resinosa.
oronocensis, *DC. Prod.* v. 422.—Peruv.
ovalis, Pers. Syn. ii. 424-Pluchea ovalis.
ovata, *Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 22.-Chili.
ovata, Sieba, ex DC. Prod. v. 450=Plnchea ovalis.
oxyodonta, *DC. 1. c.* 404.—Bras,
oxyphylla, *DC. I. c.* 400.—Peruv.
paniculata, *DC. 1. c.* 420.—Chill
parviflora, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 146.—Mexic.
parviflora, Pen. Syn. ii. 425 = marginalis.
parviflora, Poir. Encyc Snppl. i. 556-bracteolata.
parvifolia, *DC. Prod.* v. 424.—Peruv.

BACCHABIS:—
patagonica, *Hook,* b* *Am. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 29.—Reg. Magellan.
patens, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 52.—Bras.
pauddentata, DC. Prod. v. 420=rufescens.
pauddentata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. in. 71 = dracunculifolia.
paucifloscnlosa, *DC. Prod.* v. 413.—Bras.
pedalis, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. in. 64=rufescens.
pedicellata, *DC. Prod.* v. 407.—Chili,
pentaptera, *DC. 1. c.* 426.—Bras.
Pentlandii, *DC. I. c.* 416.—Bolivia,
pentziaefolia, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 96.—Bras.
petiolata, *DC. Prod.* v. 418.—Chili.
phagnaloides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 59=microdonta.
philippensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 55.—Ecuador.
phlogopappa, *DC. Prod.* v. 402.—Am. austr.
phylicaefolia, *DC. I. c.* 415.—Bras.
phylicaeformis, Meyen, Reise, ii. 31 = Vemonia phylicaeformis.
phylicoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 49.—Peruv.
phyteumoides, *DC. Prod.* v. 425.—Bras,
pilnlaris, *DC. 1. c.* 407.—Am. bor. occ.
Pingraea, *DC. Prod.* v. 420.—Chili.
Pingraea, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. vii. (1841) 387-glutinosa.
pinnatifida, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 327.—Patagon.
platensis, *Spreng. Syst.* iii. 465.—Reg. Argent,
platypoda, *DC. Prod.* v. 409.—Bras.
Plummerae, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 48.—Calif.
Poeppigiana, *DC. Prod.* v. 410.—Chili,
polifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 176.—Reg. Argent,
polyantha, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 64.—Peruv.?; Mont. Vid.?
polyantha, Spreng. Syst. ii. 464^helichrysoides.
polycephala, *Wedd. Chlor. And.* i. 173.—Bolivia.
polycephala, Sch. Bip. in Linnaea, xxx. (1859-60) 181 =vernonioides.
polygalaefolia, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 49.—Peruv.
polygona, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ni. 46.—Bras.
polylepis, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 98 = snbcapitata.
polyneura, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 100 = reticularia.
polyphylla, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 87.—Bras.
polyphylla, Sch. Bip. ex Baker, in -Mart. Fl. Bras. vi. m. 69=minutiflora.
polyptera, *DC. Prod.* v. 426.—Bras,
potosina, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 33.—Mexic.
prenanthoides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 84.—Bras,
prinoides, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 56.—Reg. Amazon.
prostrata, Baldw. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 28 = Baldwinii.
prostrata, *Pers. Syn.* ii. 424.—Peruv.
prnnifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 63.—Peruv.
psilocalyx, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. in. 48 = erioclada.
ptarmicaefolia, DC. Prod. v. 419=Bigelovii?
Pterocaulon, Boj. ex DC. *I* c 465 = Pterocaulon Bojeri.
pteronioides, *DC. 1. c.* 410.—N. Mexic.
puberula, *DC. I. c.* 401.—Bras,
pnlchella, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 532, nomen.—Bolivia,
pulverulenta, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 327.—Peruv.
punctigera, DC. Prod. v. 404-Lundii.
punctulata, DC. 1. c. 405=oxyodonta.
pyramidalis, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 120.—Bras.
quadrangularis, Meyen, Reise, i. 460=Lepidophyllum Meyeni.
qnadrinervia, *Pers. Syn.* ii. 423.—Am. austr.
quinquenervis, *DC. Prod.* v. 399.—Bras,
qnitensii, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 57.—Ecuador.

BACCHABIS:—
racemosa, *DC. Prod.* v. 401.—Chili.
radicans, DC. 1. c. 416=gnaphalioides.
Radin, *Phil, in Linnaeas* xxxiii. (1864-65) 146.—Chili,
ramiflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) S3-—Mexic.
ramosissima, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi (1848) 84=retusa.
ramulosa, A. Gray, PI. Thnrb. 301 = pteronioides.
rapunculoid.es, E. Mey. ex DC. Prod. v. 328=Nidorell» resedifolia.
recurvata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v»-(1848) 86.—Bras,
refracta, *Burch. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. !"• 64.—Bras.
Regnellii, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxii. (1849) 571—Bras.
resediflora, Less, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. H>-58 = erigeroides.
resiniflua, *Steud. & Hochst. ex DC. Prod.* vii. 282.^ Arab.
resinosa, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 81 = concave
resinosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 52.—Am. austr.
rctamoides, *Phil. Serf. Mend. Alt.* 22.—Chili,
reticularia, *DC. Prod.* v. 409.—Bras.
reticulata, Pers. Syn. ii. 425=genistelloides.
retusa, *DC. Prod.* v. 412.—Bras,
revoluta, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 50.—Peniv.
rhetinodes, *Meyen V Walp. in Nov. Act. Nat. Cur-* xix. *Suppl.* i. (1848) 265.—Chili,
rhexioides, *H. B. &*[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 66.-Peruv.; Bras,
rhomboidalis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 99.—Chili.
Riedelii, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. I"-82 = cassinefolia.
rigida, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 57 = oblongifolia.
riparia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 65.—Ecuador.
riparia, Poepp. ex DC. Prod. v. 418=sessilifolia.
rivularis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii-(1848) 83=macrodonta.
Rohriana, Spreng. in Ersch *8c* Grub. Allgem. Encyc vii. (1821) 27=dioica.
Roraimae, *Schomb. Fauna et Fl. Guy.* 1078, nomen.—Guiana,
rosmarinifolia, *Hook.* &• *Am. Bot. Beech. Voy.* 30.—Chili.
rotundifolia, *Spreng. Syst.* iii. 465.—Reg. Argent,
rufescens, *Spreng. 1. c.* iii. 464.—Reg. Argent.
rufidula, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras, vi I"-81 = vernonioides.
rugosa, Willd. ex DC. Prod. v. 39-Veraonia patens,
rupicola, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 52.—»• Granat.
sagittalis, *DC. Prod.* v. 425.—Chili.
salicifolia, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. Ser. II. (1841) 337 -salicina.
salicifolia, *Pers. Syn.* ii. 425.—Pemv.
salicina, Rothr. in Wheeler, Rep. vi. 156=Emoryi.
salicina, *Torr.* &• *Gray, Fl. N. Am.* ii. 258.—Am. bor. occ
saligna, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. Ill-[6o] = ligustrina.
saltensis, *Baker, I. c.* 93.—Bras.
Salvia, Lour. Fl. Cochinch. ii. 494 = Blumea balsim[1]fera.
Salzmannii, *DC. Prod.* v. 409.—Bras.
sarophora, Phil, in Anal. Univ. Chil. i. (1861) 52; « in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 147»Heterothalanm[9] spartioides.
sarothroides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881' 82) 211.—Calif.
scabra, *Pers. Syn.* ii. 424.—Ecuador,
scandens, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 146.—Mexic.
scandens, *Pers. Syn.* ii. 424.—Pemv.
Schiedeana, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (ltfV 83.—Bras.
Schlechtendalii, Mart, ex Baker, In Mart. Fl. Bras. III. 50 = tarchonanthoides.
Schomburgkii, *Baker, I. c.* 89.—Guiana.
Schultzii, *Baker, 1. c.* 78.—Bras,
scolopendra, *Hook. Ic. PI.* i. t. 68.—Ecuador,
scoparia, *S-m. Fl. Ind. Occ.* iii. 1339.—Jamaica,
scoparioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 160.—Cuba.
Kufpta, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 175.—R* Argent

BACCHAEIS:—
sebastianopoUtana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ill. 65.—Bras.
Seemanni, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 88.—Mexic.
Mloi, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 68.—Bias.
semiserrata, DC. Prod. v. 404. n. 88=hemiprionodes.
semiserrata, DC. 1. c. 419. n. 149 = Sternbergiana.
senegalensis, Pers. Syn. ii. 424 = Veraonia senegalensis.
sentcula, Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 61 = caainefolia.
swgiloides, *A. Gray, in Pad/. Rail. Sep.* iv. 101.— Am. bor. occ.
*"raefolia, *DC. Prod.* v. 408.—Mexic.
asjatifolia, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 59.—Menc.; Ind. oca
senulata, *Pers. Syn.* ii. 423.—Bras.
*siltftora, Miehx. Fl. Bor. Am. ii. 186 -glomeraliflora.
«ssjhflora, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 97—Bras.
*ilifoha, *DC. Prod.* v. 418.—Chili,
nensis, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 604.—Cochinch.
•muata, *H. B. &• g. Nov. Gen. et Sp.* iv. 58.—Perov.
aolie.ni, *Remy, in C. Gay, Fl. Ckil.* iv. 98.—Chili.
PM- in Anal, Univ. Ckil. (1865) ii. **380.—**ChUi.
v. 405.-Mexic.
sparta, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 114.—Am. centr.
*partiolde,, C. Gay, Fl. Chil. iv. 102 -Heterothalamus
sparticides.

Linnaea, xix (1847) 12i

Naturf. Ges. Halle, xv. U»82) 826.—Peruv.
DC. Prod. v. 399—Ins. Guadalnp. (W41) 25—Chili.
sfrropoda, F. Muell. Fragm. i 34 = Pluchea baccharoides.
arrosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 50.—Bras,
rrosa, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 67.-Mexic.
P- Oarnes Veg. 177.—Ins.
tenopiera, Sch. Kp. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 538 =subalata.
otembergiana, *Steud. Norn.* ed. n. L 179.—Peruv.
Prop. *(1S7S)*
Fl. Bras. vi. III. 39.—
(1845)
ata. *Wedd. Chlor. And.* i. 174.—Bolivia.
(1848) 85.—B
subdenUte, *DC.'prod.* v. 4O8.-Bras.
wboppoata, *DC. I. c.* 418—Bras.
sttbpennmervis, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 232, nomen.—Bolivia.
*Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 76 = conjzol es.
(1848) 87 -rufescens.
(1841) 89. —Patago
Dc!p,od. v. 419.-Mexic.
a, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 54; et *torX* 1 ta Mart. Fl. ^"S- «• «"• 99=platypod«-tS anthoides *Prod.* v. 414,-Bras.
Gen. et Sp. iv. 417.-N.
42.—Pata
sso.Afr.
=rufescens.
Am. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.
Mexic.
Arizona.
(1882)
—Mexic.
Hook. Journ. Bot. iii.
-Re Argent.
c. (1863) 349 =
Toft.f S *«• H.425.Peruv.
8O.-Chili.
Steud. Nom. ed. II. i. 179 = Moqninia

BACCHARIB:—
tomentosa, *Pers. Syn.* ii. 424.—Pernv.
trichoclada, Z)C. *Prod.* v. 400.—Mexic.
trichotoma, X2ott, *in Leopoldina,* xx. (1884) 91.—Mexic.
Mcuneata, Pers. Syn. ii. 424=cnneata.
tridentata, Gandich. Fl. Mai. 15 = magellanica.
tridentata, Poepp. ex DC. Prod. v. 411=concava.
tridentata, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 98.—Bras.
trifurcata, Trevir. in Nov. Act Nat. Cur. xdii. (1826) 201 =Conyza stricta.
trimera, DC. Prod. v. 425=genistelloides.
trinervis, *Pers. Syn.* ii. 423.—Bras.
triplinenria, DC. Prod. v. 404 = oxyodonta.
triplinervis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 79.—Bras.
triptera, Mart. Mat. Med. Bras. 43=genistelloides.
tripterix, Poepp. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 42=sagittalis.
tmncata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 82.—Bras.
truncate, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864) 148.—Chili,
tucumanensis, *Hook, b" Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 34.—Reg. Argent.
***Tweediei, Hook. V Arn. I. c.* 83=subopposita.**
nlicina, *Hook. V Arn. I. c.* 88.—Patagon.
nlmifolia, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 26=Conyza incisa.
umbelliformis, *DC. Prod.* v. 410.—Chili,
nncinella, *DC. 1. c.* 415.—Bras,
uniflora, *Pers. Syn.* ii. 425.—Pernv.
***Vrrilleima., Brongn. Bot. Voy. Coo. t.* 61.—Reg. Magell.**
ustulata, *Benth. Pl. Hartw.* 135.—N. Granat.
vaccinioides, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 121.—Bras,
vaccinoides, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 50.—Mexic.
Vahlii, DC. Prod. v. 411=dioica.
valdiviana, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 738.—Chili.
varians, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot vii. (1848) 84 = rufescens.
Vauthieri, *DC. Prod.* v. 409.—Bras.
velutina, DC. 1. c. 415=ochracea.
veneta, H. B. & K. Nov. Gen. etSp. iv. 68 = Bigelovia veneta.
venosa, *Pers. Syn.* ii. 425.—Pernv.
venulosa, DC. Prod. v. 421=brachylaenoides.
vennsta, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 66.—N. Granat.
verbenae/olia, Hook. *Sc* Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 26=hirta.
vemicosa, *Hook,* b* *Arn. in Hook. 1. e.* 28.—.Umgnay.
vemonioides, *DC. Prod.* v. 422.—Bras,
villosa, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 98.—Arabia,
viminea, *DC. Prod.* v. 400.—Calif,
vincaefolia, *Baker, in Mart. Fl.. Bras.* vi. III. 88.—Reg. Argent.
virgata, Boj. ex DC. Prod. v. 885 •= Conyza virgata.
viscosa, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 352=Douglasii.
viscosa, Lam. Encyc. i. 345-Psiadia integerrima.
•viscosa, Walt Fl. Carol. 202-PInchea bifrons.
vismioides, DC. Prod. v. 412=vemonioides.
Volckmanni, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-45) 147.—Chili
vulubilis, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. etSp.* iv. 417.—Pernv.
vnlneraria, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. Hi. 75.—Bras.
Walpersiana, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1447=brachylaenoides.
Weddellii, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. in. 68 •»rufescens.
Weirii, *Baker, I. c* 67.—Bras.
Wendlandii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 179.—Afr. anstr.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* i. 101.—Am. bor. occ.
Wrightii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 303 = Seemanni.
xalapensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 56-conferta.
xerophila, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 11 = sessiliflora.
xiphophylla, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. III. 68.—fins.

BACCHAROIDES, Moench, Meth. 578 (1794) = **Vernonia,** Schreb. (Compos.).
anthelmintiea, Moench, 1. c = V. anthelmintica.

BACKHOTTSIA, Hook. *Sc* Harv. in Bot. Mag. t. 4133 (1845). *MYRTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 711.
angustifolia, *F. Muell. Fragm.* i. 70.—Austral.

BACKHOUBIA:—
dtriodora, *F. Muell. Fragm.* i. 78.—Austral,
myrtifolia, *Hook, tf Harv. in Bot. Mag.* t. 4133.— Austral.
riparia, Hook. *Sc* Harv. 1. c. sub t. 4138 = myrtifolia.
sciadophora, *F. Muell. Fragm.* ii. 26, 171.—Austral.

BACONIA, DC. in Ann. Mus. Far. ix. (1807) 219.
Pavetta, Linn. (Rubiac).
corymbosa, DC. 1. c = P. Baconia.
montana. Hook. f. in Joum. Linn. Soc. vii. (1864) 198 = P. Hookeriana.

BACOFA, Aubl. PI. Gui. i. 128. t. 49 (1775). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 952.
aquatica, *Aubl. I. c.* 129. t. 49.—Guiana.
grandiflora, Mart, ex Benth. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 448-aquatica.

BACTBIS, Jacq. Stirp. Am. 271. t 256 (1763). *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 941.
AUGUSTINEA, Karst. in Linnara, xxvii. (1856) 395.
GUILIELMA, Mart. Palm. Fam. 21 (1824); Hist. Nat. Palm. ii. 81. tt. 66, 67 (1824).
PYRENOGLYFHIS, Karst. Fl. Columb. ii. 141. t. 174 (1869).
acanthocarpa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 92. t. 70, 71. f. 2.—Bras.
acanthocarpoid.es, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 31 - acanthocarpa.
acanthocnemis, Mart, in Palmet. Orb. 67 - simplicifrons.
acanthophylla, *Mart. 1. c.* 70.—Ins. Porto Rico,
acanthospatha, *Trail, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 354.—Bras,
actinonenra, *Drude* b* *Trail, ex Drude, in Mart. I. c.* 344.—Bras.
aculeifera, *Drude, I. c.* 352 in obs.—Bras,
acuminata, *Liebm. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 321. Mexic.
arenaria, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 29=simplicifrons.
aristata, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 97. t. 73 ft. f. 5.—Bras.
armata, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 27 = chaetospatha.
amndinacea, *Trail, in Journ. Bat.* xv. (1&77) 10.—Reg. Amazon.
Aubletiana, *Trail, 1. c.* xiv. (1876) 872.—Guiana,
baculifera, A-ora. *ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 322.—Mexic.
balanoides, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 288.—Costa Rica,
balanophora, *Spruce, in Joum. Linn. Soc.* xi. (1871) 146,153.—Am. trop.
bicuspidata, *Spruce, I. c.* 146,152.—Am. trop.
bidentula, *Spruce, I. c.* 146, 151.—Am. trop.
binda, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 105. t. 73 c.—Bras.
bifida. Oast in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1858) 44 = Oerstediana.
brevi/olia, Spruce, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 144, 147=simplicifrons.
Brongniartii, *Mart, in Palmet. Orb.* 69. t. 7. £ 2.—Bolivia,
campestris, *Poepp. in Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 146.—Bras.
capillacea, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 5.—Bras,
caracasana, *Lodd. ex Linden, Illustr. Horiic.* xxviii (1881) 16.—Venezuela.
Caravallana, *Linden, Illustr. Horde,* xxviii. (1881) 16.—Bras,
caribaea, *Karst. in Linnaea,* xxviii. (1856) 403.—Ind. occ.
carolensis, Spruce, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 145, 149= simplicifrons.
caryotaefolia, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 106. t. 74. f. 3, 4.—Bras.
caryotifolia, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 337.—Bras.
Catel, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Venezuela.
chaetophylla, *Mart, in Palmet. Orb.* 71.—Bra*.
chaetorhachis, Mart. 1. c. 61 =• major,
chaetospatha, *Mart. Hist. NatPalm.* ii. 147.—Bras,
chloracantha, *Poepp. in Mart. 1. c.* 145.—**Bras,**
ciliata, *Mart. 1. c.* 95. t. 71. f. 8.—Peruv.
concinna, *Mart. I. c.* 99. t. 72. f. 4, 5, 6__Bias.
confiuens, Linden *Sc* H. Wendl. in Linnaea xxviii. (1856) 847-tcanthospatha.

BACTBIS:—
Constanciae, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 87.—Bras.
Corossilla, *Karst. in linnaea,* xxviii. (1856) 407.—Venezuela.
CoraBillo, Hort. ex H. Wendl. Cycl. Pand. Cycad. 5 = praec. ?
Cruegeriana, *Griset. If Wendl. ex Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 520.—Ind. occ.
cucullata, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 233, nomen.—Hab.?
Cuesco, *Crueg. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 520.—Ind. occ.
Coesco, *Engl. in Linnaea,* xxxiii. (1861-65) 666.—N. Granat.
Curuena, Trail, in Joum. Bot. xv. (1877) 48=socialis.
cuspidata, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 101. t. 78 B.—Bras.
Cuvaro, *Karst, in Linnaea,* xxviii. (1856) 406.—Venezuela.
cyagroides, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 33 •= syagroides.
elatior, *Wallace, Palm Trees Amat.* 81. t. xxx.—Bras,
elegans, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 233.—Hab.]
elegans, *Trail, in Joum. Bot.* xv. (1877) S.—Bras.
ericetina, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 26 = bifida.
erosa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 281.—Ind. occ.
eumorpha, *Trail, in Joum. Bot.* xv. (1877) 9.1.184.—Bras.
exaltata, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 32=major?
faucium. *Mart, in Palmet. Orb.* 60. t. 6. f. 2.—Bolivia,
fissifrons, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 103. t. 73. b. f. 8, 4.—Bras.
flavispina, Hort. Belg. ex Heynh. Norn. ii. 57 = pallidispina.
floccosa, Spruce, in Jonrn. Linn. Soc. xi. (1871) 146, 151 •= cuspidata.
fusca, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 48.—Costa Rica.
Gasipaës, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 802.—N. Granat.
Gaviona, Trail, in Journ. Bot. xv. (1877) 48 = major,
geonomoides, *Prude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 325.—Bras,
glandulosa, *Oerst. L'Amér. Centr.* 15. t. 8. f. 1-15.—Bras,
glaucescens, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 345.—Bras.
Glazioviana, *Drude, 1. c.* 348.—Bras.
globosa, Gaertn. Frnct. i. 22 — Acrocomia sclerocarpa.
gracilis, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 27=simplicifrons.
granariuscarpa, *Barb.-Rodr. 1. c.* 37.—Bras,
granatensis, *H- Wendl. ex Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—N. Granat.
guineensis, Steud. Nom. ed. I. 98, 99=minor,
hirta, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 105. t. 73. C. f. 3.—Bras,
horrida, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 41.—Nicaragua.
hylofhila, Spruce, in Joum. linn. Soc xi. (1871) 146, 152—pectinata.
incommoda, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 42.—**Bras,**
inermis, *Trail, ex Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 80.—Bras,
infesta, *Mart, in Palmet. Orb.* 54. t. 7. f. 1.—Bolivia.
integrifolia, Wallace, Palm Trees Amaz. 91. t. xxiv= fissifrons.
interruptepinnata, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 37.—Bras.
inundata, *Mart, in Palmet. Orb.* 58. t 7. f. 8.—Bras,
jurue'nsis, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 40.—Bras,
leucamha, *H. Wendl. in Linnaea,* xxviii. (1856) 345.—N. Granat.
Liboniana, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Bras.
linearifolia, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 31 = pectinata.
littoralis, *Barb.-Rodr. I. c.* 36.—Bias,
longifrons, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 106.—Reg. Amazon.
longipes, *Poepp. in Mart. 1. c.* 145. t. 73.—Bras.
Micanilla, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16 — Venezuela.

BACTHIS:—
macracantha, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 96.173.—Bras.
macroacantha. *Mart. 1. c.*—Bras,
macrocarpa, *Wallace, Palm Trees Amaa.* 85. L xxxii.—Bras.
major, *Jacq. Stirp. Am.* 280. t 171. f. 2.—N. Granat.
Maraja, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 93. t 71. f. 1.—Bras.
Maraja-açu, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 36—Bras.
Maraja-y, Barb.-Rodr. 1. c ed. I. 29-cuspidata.
martinenaefolia, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 234 = Martinezia corallina.
mexicana, *Mart, in Palmet. Orb.* 65.—Mexic
microcarpa, Spruce, in Joum. linn. Soc.xi. (1871) 146, 153-hylophila.
microspatha, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 26 = cuspidata.
minax, *Miq. in Verh. Nat. Wet. Haarl.* vii. (1861) 207.—Guiana.
minima, Gaertn. Fruct. ii. 269. t.l39i f. 5=Martinezia corallina.
minor, Gaertn. 1. c. i. 19. f. 1=Acrocomia lasiospatha!
minor, *Jacq. Stirp. Am.* 279. t. 171. £ 1.— Bras.; N. Granat.
mittš, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 102 = cuspidata.
monticola, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 34.—Bras.
negrensis, Spruce, in Journ. linn. Soc. xi (1871) 145, 147 = simplicifrons.
nemorosa, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 32.—Bras.
Neromanni, *Voigt, in Syll. Ratisb.* it (1828) 51.—Hab. ?
obovata. *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 234.—Hab. ?
Oerstediana, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 48.—Costa Rica,
oligocarpa, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 28.—Bras.
ovata, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 234.—Nicaragua.
ovata, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 394^ major,
pallidispina, *Mart, in Palmet. Orb.* 62.—Guiana.
palustris, Barb.-Rodr. Enum. Palm.Nov. 86 = bidentula.
paraënsis, *Splitg. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 284.—Surinam.
paucijuga, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 84.—Bras.
Pavoniana, *Mart, in Palmet. Orb.* 70.—Porto Rica
pectinata, *Mart. Hist. Nat. Palm,* ii 98. t. 60, 73. A. f. 1, 2.—Bras,
pilosa, *Karst. in Linnaea,* xxviii. (1856) 405.—N. Granat.
Piritu, *Wendl. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 284.—N. Granat.
Piranga, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 41.—Bras,
piscatorum, *Wedd. ex Drude, in Matt. Fl. Bras.* iii. II. 864.—Bras.
Plumeriana, *Mart, in Palmet. Orb.* 64.—Ind. occ
praemorsa, *Poepp. ex Mart. I. c.* 66.—Peruv.
pulchra, *Trail.in Journ.Bot.* xv. (1877) 4. t. 184. f.2.—Bras.
Puyamo, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii (1881) 16.—Reg. Granat.
riparia, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 97. t. 71. f. 4.—Bras.
rivularis, *Barb-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 36.—Bras.
rotunda, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 394=minor.
Sanctae-Paulae, *Engl. in Linnaea* (1864-65), 667.—N. Granat.
sciophila, *Miq. in. Verh. Nat. Wet. Haarl.* vii. (1861) 208.—Guiana.
setipinnata, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 82 = bylophila.
setosa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 94. t. 72. f. 1-3.—Bras,
setulosa, *Karst. in Linnaea,* xxviii (1856) 408.—Venezuela,
simplicifrons, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 103. t. 73. C. f. 1-2.—Bras.
simplicifrons, Spruce, in Jonrn. Linn. Soc. xi. (1869) 148—geonomoides.
socialis, Mart, in Palmet. Orb. 56.1.14. f. 2=major,
speciosa, *Karst. in Linnaea,* xxviii. (1856) 402.—N. Granat.
sphaerocarpa, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 8.—Amazon.
subglobosa.tf. *Wendl. in Kerch. Palm.* 234.—Salvador,
syagroides, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 76.—Bras,
sylvatica, *Barb.-Rodr.* ***Enum.*** *Palm. Nov.* 90.—Bras.

BACTBIS:—
tenera, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 234.—Hab.?
tenerrima, *Mart, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. >• 328.—Bras.
tenuis, Wallace, Palm Trees Amaz. 87. t. xxxiii. •= cuspidata.
tomentosa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 100. t. 73. A. £8. 4.-Bras.
Trailiana, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 27.—Bras,
trichospatha, *Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 41, 42.—Bras.
turbinata. Spruce, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 146, 152=pectinata.
turbinocarpa, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 83.—Bras.
uaupensis, Sprnce, in Journ. Linn. Soc xi. (1871) 145, ISO - cuspidata.
umbraticola, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 84.—Bras.
umbrosa, Barb.-Rodr. 1. c 29 = trichospatha.
utilis, *Benth. V Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 413.—Costa Rica,
varinensis, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* **284.—** Hab.)
villosa, *H. Wendl. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 413.—Costa Rica,
vulgaris, *Barb-Rodr. Enum. Palm. Nov.* (1879) *Apt-*42.—Bras.
xanthocarpa, Barb.-Rodr. 1. c. 30-simplicifrons?

BACTYRILOBIUM, Willd. Enum. Hort. Berol. 439 (1809) = Cassia, linn. (Legumin.).
biflorum, Willd. ex Stead. Nom. ed. II. i. 179 -C biflora.
ferrugineum, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) I. 713 = C. ferruginea.
Fistula, Willd. Enum. Hort. Berol. 440 = C. Fistula.
grande, Hornem. Hort. Hafn. i 135 = C. grandis.
lati/olium, Steud. Nom. ed. I. 41 = Anagyris latifolia.
molle, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) I. 718 = C grandis.

BACTJIiABIA, F. Muell. Fragm. vii. 103 (1870).
PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 903.
LINOSFADIX, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1874) 177.
minor, *F. Muell. 1. c.* xi. 68.—Austral,
monostachya, *F. Muell. I. c.* vii. 103 ; xi. 58.—Austral-

BADAMIA, Gaertn. Fnict. ii. 90. t. 97 (1791)" Terminalia, Linn. (Combret.).
Commersoni, Gaertn. 1. c. = T. Catappa.

BADAROA,Bert. ex Steud. Nom. ed. II. i. 170 (1840)' seq.

BADEROA, Bert, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 324 = Sicyos, linn. (Cucurb.).
arenaria, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 179=seq.
bryoniaefolia, Bert, ex Hook. 1. c = S. bryoniaefolius.

BABIERA, DC. Prod. i. 334 (1824). *POLYGALEAE,* Benth. & Hook. f. i. 137.
acuminata, *DC. 1. c.* 336.—Mexic
Berteriana, *Spreng. Syst.* iii. 172.—Ins. S. Doming,
divaricata, *DC. Prod. i.* 335.—Bras,
diversifolia, *DC. 1. c.* 834.—Jamaica,
domingensis, *DC. 1. c.*—Ins. S. Doming.
Penaea, *DC. I. c.* 335.—Am. trop.

BADIERA, Hassk. Cat. PI. Hort. Bogor. Alt 227 (1844) = Polygala, linn.
pulchra, Hassk. 1. c.=P. venenosa.
venenosa, Hassk. 1. c = P. venenosa.

BADULA, Juss. Gen. 420 (1789) = **Ardteia,** S#-(Myrsin.).
angustifolia, A. DC. in Trans. Linn. Soc xvii. (1837) 114 = Embelia angustifolia.
arborea, Thou, ex A. DC.in DC. Prod, viii.84 = Embeli* arborea.
Barthesia, A. DC. in Trans. linn. Soc xvii. (1837) 113 = A. Barthesia.
Barthesia, Boj. Hort. Maurit. 196-A. insularis.
borbonica, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 90.—Ins. Borbon.
caribaea, A. DC. 1. c. 89 = A. caribaea.

BADULA:—
crassa, A. DC. in Trans. Linn. Soc xvii (1887) 114 = Ardisia insnlaris.
eybianthoides, A. DC. in DC. Prod, viii. 107-Cybianthus philippinensis.
divaricata, Them, ex A. DC. 1. c. 89 = Oncostemnm divaricatum.
excelsa, Thou, ex A. DC. 1. c. 118 = *{Monoporus paludosus)*.—Madag.
insularis, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 118 =A. insularis.
iteoides, Benth. Pl. Hartw. 217.—N. Granat
Lamarkiana, A. DC. in DC. Prod. viii. 110=A. Uurifolia.
lanceolata, Boj. ex A. DC. 1. c. 90=Oncostemum Bojeranum.
lateriflora, Griseb. in Goett Abh. vii. (1857) 287-A. laurifolia.
laurifolia, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 108.—Madag.
Lhotskyana, A. DC. 1. c. 111-A. Lhotskyana.
"ameidllo, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1888-65) 671.—N. Granat.
micrantha, Boj. Hort. Maurit. 186-A. insularis.
micrantha, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 112.—Ins. Maurit.
nultiflora, A. DC. in Ann. Sc Nat Sér. IL xvi. (1841) 89 = A. insularis.
nyrtifolia, Thou, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 90-Oncostemum myrtifolium.
***nurosa*, Thou, ex A. DC. 1. c.=Oncostemum nemorosum.
nigricans, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 89.—Bras.
omtlifolia, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 114.—Ins. Maurit.
paludosa, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 113 *K"=Monosporus paludosus)*.—Madag.
Paudflora, Boj. ex A. DC. L c. 90=Oncostemum pauciflorum.
Ptrmnana, A. DC. 1. c. 112 = A. nigricans.
Pnhppinensis.A. DC. 1. c. 108 = A. subeuneata.
"eticulata, A. DC. in Ann. Sc. Nat Sér. II. xvL (1841) 89-A. insnlaris.
***ndens*, Boj. Hort Maurit. 196=Embelia micrantha.
tohomburglnatia, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. 'm (1841) 89.-Guiana.
Sveberi, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) US. * ^ A. go&dalupensis.

RAJ>U8A, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. 308 (1860). *RUBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 42.
eorymbiflora, *A. Gray, I. c*—Ins. Paci£

BAPUSA Barthesia, Steud. Nom. ed. IL 1. 98, in syn. ^40), sphalm. = BADULA, Juss.=Ardisia Bar.

BAEA, Comm. ex Juss. Gen. 121 (1788)-Boea, Comm. ^Vjesner).

BAECKEA, Bunn. f. Prod. FL Cap. 12 (1768) = Bnmia, Linn.
Vncana, Burm. f. 1. c. = Br. pinifolia.
tordata, Bunn. f. 1. c. = Br. racemosa.
fncifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 140=Br. racemosa.
burifolia, Sond. in Harv. & Sond. FL Cap. U. 815, in syn.=Br. racemosa.
r.suemosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 140 = Br. racemosa.
'Vpiflora, Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 604-=Br. pinifolia.
Hyrsopkora, Eckl. & Zeyh. Enum. 140-Br. pinifolia.

BAECKEA, Linn. Sp. PI. 858 (1758). *MYRTACEAE*, Benth. & Hook. f.i. 701.
ALLOSTIS, Rafin. Sylva TeUnr. 104 (1838).
BABINGTONIA, Lindl. in Bot. Reg. (1842) 1.10.
^-AMPHOROMYETUS, Schan. in Linnaea, xvii. (1843) 240.
CYATHOSTEMON, Turcz. in Bnll. Pbys.-Math. Acad. Petersb. x. (1852) 331.
EMCOMYHTUS, Turcz. in Bnll. Soc. Nat. Mosc xx. _. (1847) 1.154.
EORYOMYRTUS, Schau. in Linnaea, xvii. (1848) 239.
HARMOGIA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238.
iMBnicARiA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 257.

BAECKEA:—
JUNGIA, Gaertn. Fruct. i. 175. t. 85 (1788).
MOLLIA, J. F. Gmel. Syst. 420 (1791).
MUKRINEA, Rafin. Sylva Tellur. 104 (1838).
NEUHOFIA, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 439 (1812).
OXYMYKRHINE, Schan. in Linnaea, xvii. (1843) 240.
RINZIA, Schau. 1. c. xvii. 239 (1843).
SCHIDIOMYRTUS, Schau. 1. c. 237 (1848).
TETRAPORA, Schan. 1. c. 238 (1843).
TKTRASPORA, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch iv. (1859) 150.
TJONGINA, Adans. Fam. ii. 234 (1763).
TRIPLARINA, Rafin. Sylva Tellur. 104 (1838).
affinis, Endl. in Enum. PL Hueg. 51=Astartea fascicnlarls.
affinis, Hook. Ic. PI. t. 284 c= diffusa.
alpina, LindL in Mitch. Three Exped. ii. 178=diffusa.
arbuscula, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral*, iii. 79.—Austral.
astartioides, *Smth. I. c.* 80.—Austral.
Behrii, *F. Muell. Fragm.* iv. 68.—Austral.
Blacketii, *F. Muell. I. e.* viii. 181.—Austral,
brevifolia, *DC. Prod.* iii. 230.—Austral.
calycina, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 190 = Thryptomene Mitchelliana.
camphorata, *R. Br. in Bot. Mag.* t. 2694.—Austral.
Camphorosmae, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 51.—Austral.
capitata, *F. Muell. Census*, 54.—AustraL
carnulosa, Sieber, in Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 149 = brevifolia.
chinensis, Gaertn. Fruct. i. 157=frutescens.
dliata, *F. Muell. Census*, 54.—Austral,
cochinchinensis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 69.—Cochinch.
corymbulosa, *Benth. Fl. Austral*, iii. 87.—Austral,
corynophylla, *F. Muell. Fragm.* iv. 72.—Austral,
crassifolia, *Lindl. in Mitch. Three Exped.* ii. 116.—Austral.
crenatifolia, *F. Muell. Fragm.* iv. 70.—Austral,
crenulata, *DC. Prod.* iii. 230.—Austral,
crispiflora, *F. Muell. Fragm.* iv. 72.—Austral,
cryptandroides, *F. Muell. I. c.* x. 29.—Austral.
Cumingeana, Schau. in Walp. Rep. ii. 920=frntescens.
Cunninghamii, *Benth. Fl. Austral*, ii. 82.—Austral,
densifolia, *Sm. in Trans, linn. Soc.* iii. (1797) 260.—Austral.
diffusa, *Sieber, ex DC. Prod.* iii. 280.—Austral,
dimorphandra, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austrrl.* iii. 74.—AustraL
diosmifolia, *Rudge, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 298.t.13.—Austral.
diosmoides, *Sitber*, ex DC. Prod. iii. 230=crenulata.
Drummondii, *Benth. Fl. Austral*, iii. 75.—Austral,
ericaea, *F. Muell. Fragm.* i. 81.—Austral,
ericoides, *Brongn. WGris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 184.—N. Caled.
ericoides, *Seklecht. in Bot. Zeit.* iv. (1846) 724.—Austral.
fasciculata, Sieber,. in Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 149 = densifolia.
floribunda, *Benth. Fl. Austral*, iii. 87.—Austral,
frutescens, *Linn. Sp. PI.* 858.—Malaya; China,
fumana, *F. Muell. Fragm.* iv. 68.—Austral,
gracilis, *A. Cunn. in Field, Net, South Wales*, 349.—Austral.
grandiflora, *Benth. Fl. Austral*, iii 89.—Austral.
Gunniana, *Schau. ex Walp. Rep.* ii. 920.—Austral.
involucrata, *Endl.* in Enum. PL Hueg. 170=Scholtzia obovata.
laxiflora, *F. Muell. Census*, 54.—Austral,
leptocaulis, *Hook. f. in Hook. Ic. PI.* t. 298.—Tasmania,
leptantha, *F. Muell. Census*, 54.—Austral..
leptocalyx, F. Muell. Fragm. i. 30=Micromyrtus leptocalyx.
linifolia, *Rudge, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 297. Austral.
micrantha, DC. Prod. iii. 230=Thryptomene baeckeacea.
micrantha, Hook. f. in Hook. It PL t. 309 = Gunniana.
microphylla, A. Cunn. ex Schan. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = Harmogia Cunninghami.
microphylla, Sieber, ex Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 149 = Micromyrtus microphylla.
nelitrioides, *Seem, in Journ. Bot.* ii. (1864) 74.—N. Caled.

BAECKEA:—
nova-anglica, F. Muell. Fragm. iv. 71 = densifolia.
obovata, DC. Prod. iii. 280 = Scholtria obovata.
obtusifolia, *Brongn. <T Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 185.—N. Caled.
ochropetala, *F. Muell. Fragm.* x. 29.—Austral,
oligandra, *F. Muell. Census*, 64.—Austral,
oligomera, *Radlk. in Ber.Dev.tsch. Bot. Ges.* ii. (1884) 264.—AustraL
ovalifolia, *F. Muell. Fragm.* iv. 72.—Austral,
oxycoccoides, *Benth. Fl. Austral*, iii. 75.—Austral,
pachyphylla, *Benth. I. c.* 85.—Austral,
parviflora, *F. Muell. Census*, .54.—Austral.
parvula, DC. Prod. iii. 229=virgata.
pentagonantha, *F. Muell. Fragm.* iv. 73.—Austral,
pentandra, *F. Muell. l,c.ii.* 31; iv. 72.—Austral.
phylicoides, A. Cunn. ex Schau. in Walp. Rep. ii. 921 •= Kunzea peduncularis.
pinifolia, *DC. Prod.* iii. 229.—N. Caled.
platystemona, *Benth. Fl. Austral*, iii. 74.—Austral.
plicata, F. Muell. Fragm. i. 30»Micromyrtn» microphylla.
polyandra, *F. Muell. 1. c.* iv- 72.—Austral,
polystemonea, *F. Muell. 1. c.* ii. 124.—Austral.
prostrata, Hook. f. Ic. PI. t. 284 b = diffusa.
pulchella, *DC. Prod.* iii. 230.—Austral.,
pygmaea, *R. Br. ex Benth. fl. Austral*, iii. 86.—Austral,
ramosissima, *A. Cunn. in Field, New South Wales*, 249.—Austral.
robusta, *F. Muell. Fragm.* iv. 72,—Austral,
saxicola, *A. Cunn. ex Hook. Bot. Mag.* t. 3160.—Austral.
scholleraefolia, *Lehm. PI. Preiss.* ii. 369.—Austral,
serpillifolia, *F. Muell. Fragm.* x..80.—Austral.
sinensis, Gaertn. Fruct. i. t. 31 = frutescens.
speciosa, A. Cunn. ex Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 241 = Hypocalymma strictum.
spathulata, *F. Muell. Census*, 54.—Austral,
spinosa, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 149.—Austral.
stenophylla, *F. Muell. Fragm.* i. IS.—Austral,
subcuneata, *F. Muell. 1. c.* iv. 73.—Austral,
sumatrana, *Blume, Mus. Bot., Lugd. Bat.* 69.—Sumatra.
teretifolia, *F. Muell. Census*, 54.—Austral,
tetragona, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iii. 77.—Austral.
thymifolia. Hook. f. Ic. PL t. 284 a=diffusa.
trichophylla, Sieber, ex Spreng. Syst iv. Cur. Post. 149=linifolia.
uberiflora, *F. Muell. Census*, 58.—Austral.
umbellata, F. Muell. Fragm. iv. 69 = virgala.
nmbellifera, *F. Muell. Census*, 54.—Austral,
unicinella, *Benth. Fl. Austral*, iii. 84.—Austral.
utilis, F. Muell. ex Miq. in Neder. Kruidk. Arch. iv. (1859) 150=Gunniana.
virgata, *Andr. Bot. Rep.* 698.—N. Caled.

BAEICA, C. B. Clarke, in DC. Monoe. Phan. v. 134 (1888)=Boeioa, C. B. Clarke (Gesner.).

BAEOBOTRYS, Forst. Char. Gen. 21. t. 11 (1776) = Kaesa, Forsk. (Myrsin.).
acuminata, Spreng. Syst. in Ind. v. 89 = M. ramentacea.
acuminata, Wall. Cat. n. 2821=Gymnosporia acuminata.
argentea. Wall. 1. c. n. 2816 = Maesa argentca.
Bogota, Buch.-Ham. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 61 a M. macrophylla.
dubia, Wall. Cat. n. 2317=M. dubia.
fragrans, Wall. 1. c n. 2322=M. ramentacea.
fulvinervis, Kollm. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 82 •. M. mollis.
glabra, Roxb. Hort. Beng. 16; Fl. Ind. i. 560=M. ramentacea.
indica, Roxb. 11. cc. 16, 557=M. indica.
indica, Wall. Cat. n. 2318. A & B = M. ChisU,
lanceolata, Blume, Bijdr. 865 = M. Blnmii.
lanceolata, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 88 = M. ramentacea.
lanceolata, Vahl, Symb. Bot. i. 19 =M. lanceolata.
latifolia, Blume, Bijdr. 865 = M. indica.
lucida, Wall. Cat. n. 2323.—Ind. or.
lutea, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 180 = M. lntea.
macrophylla, Wall. Cat. n. 2325 = M. macrophylla.
missionis, Wall. 1. c. n. 6623 = M. ramentacea 1

BAEOBOTRYS:—
mollis, Blume, Bijdr. 865 = Maesa mollis.
mollissima, Blume, 1. c. 868 = M. mollissiina.
Morsha, Buch.-Ham. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 80 =M. indica.
muscosa, Reinw. ex Blume, Bijdr. 866 = M. membran acea.
nemoralis, Forst. Char. Gen. 22=M. nemoralia.
nemoralis, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 559 = M. indica.
ovata, Wall. Cat. n. 2824 = M. ramentacea.
paniculata. Wall. 1. c. n. 2320 = M. paniculata.
picta, Hochst. ex Walp. Ann. Hi. 964 = M. lanceolata.
pubescens, Lodd. ex Loud. Hort. Brit 71.—M. pubescens.
ramentacea, Roxb. Hort Beng. 16; Fl. Ind. i. 558 = M. ramentacea.
rufescens, E. Mey.ex A. DC. in DC. Prod. viii. 81 = M. lanceolata.
tetrandra, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 560 = M. tetrandra.
tomentosa, Buch.-Ham. ex Spreng. Syst iv. Cur. Post. 88 = M. macrophylla.
virgata, Blume, Bijdr. 866 = M. indica.

BAEOMETRA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 330. *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 828.
JANIA, Sennit. Syst. vii. n. p. xcviii. 1528 (1830).
KOLBEA, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 80.
columellaris, *Salisb. I. c.*—Afr. austr.

ISAEOTERPE, Salisb. Gen. PL Fragm. 17 (1866) = Syftcintlius, Linn. (Liliac).
brevifolia, Salisb. 1. c. 18 = H. brevifolins.
corymbosa, Salisb. 1. c. = H. corymbosus.

BAEOTHRYON, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789) = Sdrpus, Linn. (Cyperac.).
caespitosum, A. Dietr. Sp. PL ii. 89 = S. caespitosus.
confervoides, A. Dietr. Lc. 94=S. confervoides.
crinitum, A. Dietr. 1. c. = Ficinia filiformis.
festucoides, A. Dietr. 1. c. = Bulbostylis festucoides.
fistulosum, A. Dietr. 1. c. = Eleocharis fistulosa.
flavescens, A. Dietr. 1. c 91 = Eleocharis ocreata.
Halleri, T. Nees, Gen. Germ. Ic. ii. 17=S. pauciflorus.
Hystrix, A. Dietr. Sp. PI. ii. 92 = Hypodiscns aristatus.
nanum, A. Dietr. 1. c. 91 = S. nanns.
pauciflorum, A. Dietr. 1. c 90 = S. pauciflorns.
pusillum, A. Dietr. 1. c. 92 = S. pusillus.
pygmaeum, A. Dietr. 1. c. - Eleocharis Chaetaria.
retroflexum, A. Dietr. 1. c. 93 = Eleocharis Chaetaria.
tenuiculum, A. Dietr. 1. c. = Eleocharis Rothiana.
trichodes, A. Dietr. 1. c. = Eleocharis trichodes.
variegatum, A. Dietr. 1. c 92=Eleocharis variegata.

BAERIA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. ii. 29 (1835). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. if. 899.
DICHAETA, NntL in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. VII. (1841) 383.
PTILOMKRIS, Nntt. in Am. Phil. Trans. N. S. vii. (1841) 381.
affinis, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* xix. (1883) 23.—Calif.
anthemoides, *A. Gray, I. c.* 23.—Calif,
carnosa, *Greene, in Bull. Torrey Club,* x. (1883) 86.—Calif,
chrysostoma, *Fisch. &" Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. (1835) 29.—Calif.
Clevelandi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 22.—Calif.
coronaria, *A. Gray, I. c* 23.—Calif,
curta, *A. Gray, 1. c.* 21.—Calif,
debilis, *Greene, ex A. Gray, Syn. fl. N. Am. i.* II. 325.—Calif.
Fremontii, *A. Gray, in Proc Am. Acad.* vii. (1868) 858; ix. (1874) 196.—Calif.
gracilis, *A. Gray, I. c.* ix. (1874) 196.—Calif.; Arizon.
leptalea, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i.* II. 325.—Calif,
macrantha, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 21.—Calif,
maritime, *A. Gray, I. c.* ix. (1874) 196; *Bot. Calif,* i. 376.—Calif,
mutica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 23. —Calif.
Palmeri, *A. Gray, in Bot. Calif.* L 376.—Calif.

BAERIA:—
platycarpha, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 196.—Calif.
tenella, *A. Gray, I. c.* xir. (1883) 23.—Calif,
tenerrima, *A. Gray, 1. c.* ix. (1874) 196.—Calif.
nliginosa, *A. Gray, I. c*—Calif.

BAEUMERTA, Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. Fl. Wett. ii. 419 (1800)=Nasturttum, R. Br. (Crucif.).
Nasturtium, Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. 1. c. 467 = N. officinale.

BAGALATTA, Roxb. ex Reichb. Consp. 86 (1828) = Tiliacora, Colebr. (Menisperm.) (T. racemosa).

BAOA88A, Anbl. PI. Gui. Suppl. 15. t 376 (1775). *URTICACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 362.
LAUREA, Gaudich. Voy. Bonite, t. 88 (1826).
LOUREA, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 562.
guianensis, *Aubl. 1. c.*—Guiana.
Sagotiana, *Bur. ex Benth. (f Hook.f. Gen.* iii. 362.—Guiana.

BAGtOTSIA, Becc. Malesia, i. 249.112 (1878). *BUSMANNIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 459.
SARCOSIPHON, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. i. 65. t. 18 (1849).
crocea, *Becc. I. c.*—Malaya.

BAHEL, Adans. Fam. ii. 210 (176S)=Hygrophilft, R. Br. (Acanta.) (H. spinosa).

BAHIA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 30 (1816). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 402.
STYLESIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 877.
TRICHOPHYLLUM, Nutt. Gen. Am. ii. 166 (1818).
VIRLETIA, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 402 (1878).
absinthifolia, *Benth. PI. Hartw.* 18.—Texas; Mexic.
achilleoides, DC. Prod. v. 657=Eriophyllum caespitosam.
ambigua, A. Gray, in Bot. Calif, i. 382=Eriophyllum ambiguum.
ambrosioides, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 28, 80.—Chili.
angustifolia, DC. Prod. v. 656 = Calea angustifolia.
anthemoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 40.—Mexic.
arachnoidea, Fisch. & Av^-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 63-= Eriophyllum caespitosum.
artemisiaefolia, Less, in Linnaea, iv. (1829) 160 = Eriophyllum staechadifolium.
Bigelovii, *A. Gray, in Torr. Bot. Hex. Bound.* 96.—Texas.
bitemata, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 95.—Texas,
chrysanthemoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 28.—Am. bor. occ.
confertiflora, DC. Prod. v. 657=Eriophyllum confertiflorum.
cuneata, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1878) 49 = Eriophyllum caespitosum.
dealbata, A. Gray, PI. Fendl. 99= absinthifolia.
Gilliesii, *A. Gray, in Proc Am. Acad.* xix. (1883) 28. —Reg. Argent
gracilis, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 353 = Eriophyllum gracile.
integrifolia, DC. Prod. v. 656«Eriophyllum caespitosttm.
lanata, DC. 1. c 667=Eriophyllum caespitosum.
latifolia, Benth. Bot. Voy. Sulph. SO=Eriophyllum caespitosum.
latifolia. *Lindl. in fount. Hort. Soc.* viii. (1853) 319. -Calif.
leucopkylla, DC. Prod. v. 657= Eriophyllum caespitosum.
leucophylla, Eaton, Bot. King, Exped. 17, pro parte = Eriophyllum Watsoni.
muliiflora, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 373 = Eriophyllum caespitosum.
neo-mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 27.—N. Mexic.
nepetaefolia, A. Gray, 1. c. v. (1861) 184=sinuata.
nudicaulis, *A. Gray, I. c.* xix. (1883) 27.—Am. bor. occ.
oblongifolia, *A. Gray, 1. c.*—Colorado,
oppositifolia, *DC. Prod.* v. 656.—Am. bor. occ.
Palmeri, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 452.—Calif.

BAHIA:—
paniflora, A. Gray, in Bot. Calif, i. 382 = Eriophyllum ambiguum.
pedata, *A. Gray, PI. Wright,* i. 128.—Texas.
resinosa, DC. Prod. vi. 678=Galinsoga resinosa.
rubella, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 95 = Eriophyllum Wallacei.
schkuhrioides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 27.—Mexic.
sinuata, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 160.—Mexic.
staechadifolia, DC. Prod. v. 656 = Eriophyllum stftechftdifolium.
tennifolia, *DC. 1. c.* 657.—Calif.
trifida, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 874 = Eriophyllum confertiflorom.
trolliifolia, *DC. Prod.v.* 657.-Mexic.
Wallacei, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 105" Eriospennum Wallacei.
Wallacei, A. Gray, in Proc. Nat. Hist Bost. vii. (1859-61) 145=Eriospermum ambiguum.
Woodhousii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) • 28.—N. Mexic.

BAHIOPSIS, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. Nat. Soc. ii. (1863) 85=Viguiera, H. B. *Sc* K. (Compos.).
lanata, Kellogg, 1. c. = V. nivea!

BAIKA33A, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i-581 (1865). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c
insignis, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 314. t. 4L—Afr. trop.
minor, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 809.—Afr. trop.

BAHiETA, Harv. & Gray, ex Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 144 (1848). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 428.
multiradiata, *Harv. V Gray, ex Torr. 1. c.*—Am. bor. occ.
pauciradiata, *Harv. V Gray, ex A. Gray, PL Fendl.* 105.—Calif.
pleniradiata, Harv. *Sc* Gray, ex A. Gray, 1. c. = multiradiata.

BAILLIERIA, Anbl. PI. Gui. ii. 804. t. 317 (1775)-Clibadium, Linn. (Compos.).
aspera, Aubl. 1. c.=C. surinamense.
Barbasco, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 289=C. Barbasco.
caroliniana, Spreng. Syst. iii. 625 »Iva imbricate.
commelinoides, Less. Syn. Comp. 216 = Ichthyotbere Cunabi.
erosa, Poir. Encyc. Suppl. i. 568 = C. erosum.
nereifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 289 = C. nereifolium.
pedunculosa, Poir. Encyc Suppl. i. 568 = C. pednnculosum.
sylvestris, Aubl. PL Gui. ii. 807=C. surinamense.
terebinthacea, Poir. Encyc. Snppl. i. 663 = C. terebinthaceum.

BAUiIiOHTA, Bocq. ex Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 251. t. 7. *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. £ i«-1143.
DIOSTEA, Miers, in Trans. Linn. Soc xxviL (1870) 108. t. 28.
amabilis, *Bocq. ex Baill. 1. c.* 252.—Paraguay.
juncea,.£*ntt. *if Hook.f. Gen.* ii. 1144.—Chili.

BAIMO, Rafin. Fl. Tellur. iv. 27 (18S6)=PritillarIa. Toum. (liliac).
cirrhosa, Rafin. 1. c. = F. japonica.

BAISSEA, A. DC. Prod. viii. 424 (1844). *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 719.
CLEGHORNIA, Wight, Ic. 1.1310,1312 (1850).
acuminata, *Benth. ex Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 663.—Zeylan.
leoiiensis, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 452.—Afr. trop.
malaccensis, *Hook.f. Fl.Brit. Ind.* iii. 668.—Malacca,
multiflora, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 424.—Afr-trop.

BAITARIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 63. t 36 (1797)* Calandrinia, H. B. *Sc* K. (Portulac).
acaulis, *Ruia* b* *POT. Fl. Per.* iv. t. 403; *Syst. Veg-* 111.—Peruv.

BAJAN, Adans. Fam. ii. 506 (1763)=AmarantbuB, Linn.

BAKER £ £ £ , $ & # "•C1864) 248 - Ple-
ranc
vitions
is, Seem. 1. C.-P. viriensis.

BALAKA, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 91 in obs. *PALMAE.*
perbrev.
Seeman *is Becc. I.* r.-Ins. Fiji,
m, *Becc. I.* c—Ins. Fiji.

BALANAULAX, Rafin. Alsog. 28 (i888) = Am_
Quercus, Tourn. (Cupul.).
molucca, Rafin. 1. c. = Q. molucca.
Rumphi, Rafin. 1. c. = Q. molucca?

BALANGHAS, [Burm.] Rafin. Sylva Tellur. 72 (1838) = Sterculia, Linn. •
rubiginosa, Rafin. 1. c. = S. rubiginosa.
Telabo, Rafin. 1. c. = S. Balanghas.

B NGUE, Gaertn. Hrud. 6 > fcl8o f 3 (1791).
MINEAI
Gaertneri, *DC* ? t
. />,«*. viii. S16.-Madag.

BA ffi1V.1 N«« S J Vah Btv - - ^T - (1790> ed -

BALANITES, Delile< Fl Egypte, 221_ '• 28_ f_ 1. (1813) *SIMA E,* Ben* & Hook_ f_ '• 814_
AGIALID, Adans. Fam. ii. 508 (1768).
aegyptiaca, *Delile, l. c.*—Afr. bor. .; Palaestin.
aegyptiaca, Kurz, in
A- TT"'' ,, """'- »-at. n. 6855=Roxburghii.
Roxbi,»i, i;
(ftV^iin'Lr- * ^-*- IV i v_

BALANOCARPUS, Bedd. Forest. Man. [bis] (1873). *DIPTEROCARPEAE.* Bot236
erosa, *Bedd. l. c.* 287.—Ind. or.
utilis, *Bedd. l. c.*—Ind. or.

BALANOPHORA, Forst. Char. Gen. t 50 (1776).
"^"OPHOREAE, Benth. & Hook. f. iii. 235.
W SOLE> E"'"II_ Gen_ ?< (1838).
SARCOCORDYLIS, Wall. Cat. n. 7249 (1831 ?).
(CTI«IKo" 1 Reichb. Handb. 164 (1837).
abbreviat^*Blume, Enum. PI. Jan.* i. 87.—Java,
affnis, Grn. in Proc. Linn. Soc. I (1849) 220; Trans. Linn. Soc. x«. (1851) 94. t. 4=dioica.
alutacea, Jungh. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. Suppl. i. (1841) 208.—abbreviata.
ah «w»/ata, Griff. m p r0C- r j ^ g^. ;. (1849) 220; Trans. Linn. Soc. xx.(1851)94=dioica.
Burmanni ana, Griff. 11. ce. 219 et 93=dioica.
capensis, Eckl. & Zeyh. ex Eichl. in DC. Prod. xvii. 125 = Mystropetaloi Thomii.
dioica, *R.* *"' **' *WaU" Cat,* n- 7246 Ind_ 0I_'<
Burina.
* «m, Unger, in Ann. Wien. Mus. ii. (1S38) t. 2. f. 1, *=elongata.
elongata, Blume, Enum. PI. Jan. i. 87.—Java.
elongata, Schott & Endl. Melet 13, partim=dioica.
fungosa, Font. Char. Gen. 99. t. 60.—Austral.; N. Hebrid.
gigantea, Wall. Cat. n. 7249 = globosa.
globosa, Jungh. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. *Suppl.* i. 208*| 210.—Burma; Java.
H L .andii, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxii. (1859) 426- Hongkong.
Hildebrandtii, Reichb. f. in Journ. BotMy. (1876) 46. —Ins. Comoro.
indica, Wall. Cat. n. 7247.—Ind. or.
involucrata, Hook. /. (f Thorns, in Trans. Linn. Soc. xxii. (1859) 30.—Reg. HimaL
Lowii, *Hook. f. 1. c.* 426. t 75 C—Borneo.
maxima, Jungh. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. Suppl. i. (1841) 209. L 1-elongata.
picta, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1849) 220 ; Trans. Linn. Soc. xx. (1851)94=dioica.
picta, Miq. ex Eichl. in DC. Prod. xvii. 146=indica.
polyandra, Griff. in Trans. Linn.:..ftw.xx.(1861)94,- Reg. Himal.
reflexa, Becc. '* AH, SoCt IM_ Scm Na
(1868)197.—Borne
Thwai EichL >DC_ Prod_xvii_ li6> fa nota_
—Z^ an.
typhina, Wall. Cat. n. 7248-dioica.

BALANOPLIS, Rafin. Alsog. Amer. 29 (1888) = Quercus, Tonm. (Cupul.).
serrata, Rafin. 1. c. 30 = Q. cuspidata.
tribuloides, Rafin. 1. c. 29 = Castanopsis tribuloides.

BALANOPB, Baill. Adansonia, x. (1871) 117. 887.
BALANOPSEAE, Benth. & Hook. f. iii. 841, 1228.
australiana, *F. Muell. Fragm.* x. 114.—Austral.
Balansae, *Baill. Adansonia,* x. (1872) 388.—N. Caled.
microstachya, *Baill. 1. c.* 840.—N. Caled.
oliviformis, *Baill. I. c.* 837.—N. Caled.
Pancheri, *Baill. 1. c.* 118.—N. Caled.
Theophrasta, *Baill. 1. c.* 838.—N. Caled.
VieiUardi, *Baill. 1. c.* 118.—N. Caled.

BALANOPSIS, Rafin. Sylva Tellur. 184 (1838) - Qcotea, Aubl. (Laurin.).
acuta, Rafin. 1. c. (•= *Mespilodaphne cupularis).*
Cassia, Rafin. 1. c = Litsaea zeylanica?
cupulata, Rafin. I. c. (=*Mespilodaphne cupularis).*
elliptica, Rafin. I. c—Hab. ?

BALANOPTERIS, Gaertn. Fruct. ii. 94. t. 98 (1791) = Heritiera, Ait. (Sterculiac).
minor, Gaertn. 1. c t. 98. f. 2 = H. Fomes.
Tothila, Gaertn. 1. c. p. 94. t. 99 = H. liltoralis.

BAIiANOSTBEBLTJS, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 247. t. 19. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 377.
ilicifolia, *KurM, I. c.* 248.—Chittagong; Burma; Penang.

BALANSAEA, Boiss. & Reut. Pngill. PI. Nov. 49 (1852) = Chaerophyllum, Linn. (Umbellif.).
Fontanesii, Boiss. & Reut 1. c. 50.—Hispan.
^•/afcrn'ma, Lange, PogilI. iv. 238 = Daucusglaberrimus.

BALANTIUM, Desv. ex Ham. Prod. FI. Ind. Occ. 81 (1825) = Parinarium, Juss. (Rutac).
cordifolium, Desv. 1. c.—Ind. occ. ?

BALARDIA. Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 180. t 111 (1829) = Spergularia, Presl (Caryophyll.).
•*platensis,* Cambess. 1. c. = S. platensis.

BAIiATTSTIOM", Hook. Ic. PI. t. 852 (1852). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 702.
CHEYNIA, J. Drumm. in Hook. Kew Jonm. vii. (1855) 56.
PUNICELLA, Turcz. in Bull. Acad. P&ersb. x. (1852) 333.
pulcherrimum, *Hook. Ic. PI.* t. 852.—Austral.

BALBISIA, Cav. in Anal. Cienc. Nat. vii. (1804) 62. t. 46. *GERANIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 276.
CRUKSHANKSIA, Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc., ii. (1881) 211. t. 90.
LBDOCARPON, Desv. in Me'm. Mus. Par. vi. (1818) 250.
Meyeniana, KM» seh, in Linnaea, x. (1836) 482.—Pernv.
peduncularis, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* xi. (1881) 277.—Chill
verticillata, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* vii. (1804) 62. t. 46.—Chill

BALBISIA, DC. in Guill. Archiv. Bot. ii. (1888) 388- Bhetinodendron, Meissn. (Compos.).
Berterii, DC. 1. c. = R- Berteroi.

BALBISIA, Willd. Sp. PI. iii. 2214 (1803) = Tridax, Linn. (Compos.).
Caledoniae, Spreng. Fl. Hal. ManL 62 = Olearia viscosa.
canescens, Rich, ex Pers. Syn. ii. 470 = T. procumbens.
divaricata, Cass. Opusc. iii. 91; ex DC. Prod. v. 679 = T. procumbens.
elongata, Willd. Sp. PI. iii. 2214—T. procumbens.
pedunculata, Hoffmgg. Verz. Pfl. (1824) 228 = T. procumbens.
suffruticosa, Dietr. ex DC. Prod. v. 267 = Olearia viscosa.

BALBOA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 106 - Tephrosia. Pers. (Legumin.).
diversifolia, Liebm. 1. c 107 = T. madrensis.

BAIiBOA, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Se*r. IV. xiv. (1860) 262. *GUTTIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 372.
membranacea, *Planch, b[1] Triana, I. c.*—*N.* GranaL

BALDELLIA, Parl. Nuov. Gen. e Spec. 57 (1854) Aliama, Linn.
ranunculoides, Parl. 1. c. 58 = A. rannnculoides.

BALDINGERA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 81 (1818) = Fremna, Linn. (Verben.).
glandulosa, Dennst. 1. c. = P. longifolia.

BALDINGERA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. i. 48 (1799) = Phalarifl, Linn. (Gramin.).
arundinacea, Dum. Obs. Gram. Belg. 130 = P. arnndinacea.
colorata, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. i. 96 - P. arundinacea.

BALDINGERIA, Neck. Elem. i. 88? (1790) = Cotula Linn. (Compos.).

BALDINGERIA, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. 277 (1795) - Leontodon, Linn. (Compos.\
pygmaea, F. W. Schmidt, 1. c. = L. hirtum ?
urens, F. W. Schmidt, 1. c. = Hypochoeris cretensis

BALDWINTA, Nutt. Gen. Am. ii. 175 (1818) (Balduina). *COMPOS/TAE,* Benth. & Hook, f. ii. 891.
ACTINOSPERMUM, Ell. Sketch, ii. 448 (1817).
ACTISPERMUM, Rafin. New Fl. Am. i. 61 (1836).
ENDORIMA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 19S.
MNESITEON, Rafin. Fl. Ludov. 67 (1817).
bicolor, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 73.—Am. bor.
lutea, *Rafin. 1. c.*—Am. bor.
multiflora, *Nutt. Gen. Am.* ii. 175.—Am. bor
uniflora, *Nutt. I. c.*—Am. bor.

BALDWINIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 = Paasiflora, Linn.
peltata, Rafin. 1. c. = P. peltata.

BALENDASIA, Rafin. FI. Tellur. iv. 105 (1836) = Pasaerina, Linn. (Thymel.).
ericoides, Rafin. 1. c. = P. ericoides.

BALENERDIA, Comm. ex Steud. Norn. ed. I. 99 (1821) = Nanodea, Banks (Santal.).

BALESSAM, Bruce, Trav. v. t. 25 (1790) = Balsamodendron, Kunth, sec. Endl. Gen. 136 (Burserac).

BALFOURIA, R. Br. in Mem. Wern. Soc i. (1810) 70. = Wrightia, R. Br. (Apocyn.).
saligna, R. Br. Prod. 467 = W. saligna.

BALPOTTBODENDBON. Mello, ex Oliver, in Hook. Ic. PI. xiil 8. tt. 1203-04 (1877). *RUTACEAE.*
eburneum, *Mello, 1. c.*—Bras.

BALFURIA, Reicbb. Consp. 184 (1828) = BALFOURIA, R. Br. = Wrightia, R. Br. (Apocyn.).

BALINGAYUM, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.187 (1837) = Erythropalum, Blume (Olacin.).
decumbens, Blanco, 1. c—Ins. Phikpp.

BAXIOSPEHJffTJM:, Blnme, Bijdr. 603 (1825).
EUPHORBIACEAE, Benth. &c Hook. f. iii. 324.
angulare, Decne. ex Baill. Etud. Gen. Euph. 895 - axillare.
axillare, *Blume, Bijdr.* 604.—Ind. or.; Malaya,
calycinum, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 470.—Reg. Himal.
indicum, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 154. t. 156 = axillare.
micranthum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-661 215.—Reg. Himal.
montanum, Mnell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1125 = axillare.
Moritrianum, Baill. Etud. Gen. Euph. S95 = axillare
polyandrum, Wight, Ic. t. 1885 = axillare.
reidioides, *Kurt, in Flora,* lviii. (1875) 32.—Siam.
sinuatum, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 470.—Reg. Himal.

BALLARDIA, Montr, in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 204-Clo8zia, Brongn. (Myrtac.).
elegant, Montr. 1. c 205.—N. Caled.

BALLARION, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 2«<>. -Stellaria, Linn, (Caryophyll.). * ^

BALLELA, Rafin. FI. Tellnr. iv. 70 (1836)-Campanula?. Linn.
repens, Rafin. L c. — C. repens.

BALLEXERDA, Comm. ex A. DC. Prod. xiv. 675 (1857)-Nanodea, Banks (Santal.).

BALLIERIA, Juss. Gen. 188 (1789)=BAILLIERIA, Aubl.-Clibadium, Linn. (Compos.).

BALLIMON, Rafin. New Fl. Am. iv. 28 (1836) = Daucus, Tourn. (Umbellif.).
maritimum, Rafin. 1. c.—D. maritimus.
muricatulum, Rafin. 1. c.=D. mnricatus.

BAIO.OCHIA, Balf. £ in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884)86. *ACANTHACEAE.*
amoena, *Balf.f. 1. c.* 87.—Ins. Socotr.
atro-virgata, *Balf.f. I.* c— Ins. Socotr.
rotundifolia, *Balf.f. 1.* c—Ins. Socotr.

BALLOSPORUM, Salitb. Gen. Fl. Fiagm. 142 (1866) = Gladiolus, Linn. (Irid.).
segetum, Salisb. 1. c. = G. segetum.

BAXIiOTA, Linn. Gen. ed. I. 176 (1737). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1212.
ACANTHOFRASIUM, Spenn, in T. Nees, Gen. FL Germ. Gamop. i. (.1843).
BERINGERIA, Neck. Elem. i.'312 (1790).
PSEUDODICTAMNUS, Toam. ex Adans. Fam. ii. 191 (1763).
acetabulosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 695.—Giuecia; As. Min.
africana, *Benth. I. c.* 694.—Aft. austr.
africana, Colm. Apnntes, 121—hirsuta.
alba, *Linn. Fl. Suec.* ed. II. 206. n. 630.—Enrop.
ampliata, Willd. ex Steud. .Nom. ed. II. i. 181 = nigra.
araiiVa,Hochst & Steud. ex SteudU. c.—Lencas urticaefolia.
aristata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 325—nigra.
armena, Boisi. Diagn. Ser. II. iv. 54—rotundifolia.
Aacheri, *Boiss. I. c.* Ser. I. v. 39.—Knrdist.; Persia.
borealis, Schweig.in Koenigsb. Arch. Naturw. i. (1812) 214-alba.
bracteosa, Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 629 = nigra.
bullata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 116.—Algeria.
cinerea, D. Don, Prod. Fl. Nep. 111-Roylea elegans.
damascene, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 87.—Syria; Aegypt
dictamnifnlia, St. Lag. in Am. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 120-pseudodictamnus.
disticha, linn. Mant. 83=Anisomele» ovata.
disticha, Rodsch. Obs. 35 - Hyptis pectinata.
foetida, Lam. Fl. Fr. ii. 381 = nigra.
Forskahlei, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 599.—Arabia.
frutescens, Coss. ex Nym. Consp. 581=spinosa.
glandulifera, Trautv. in Act Hort. Petrop. iii. II. (1875) 270=-rotnndifolia.
Hildebrandtii, *Vatke V Kurt; in Oestr. Bat. Zeitschr.* xxv. (1875) 95.—Afr. or.
hirsnta, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 695.—Hispan.; Afr. bor.
hirsuta, Sehnit ex Steud. Nona. ed. II. i. 181-nigra.
hirta, Hort Berol. ex Steud. L c—nigra.
bispanica, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 597.—Europ. anstr.
hispanica, Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. ii. 446, in syn.=hirsuta.
integrifolia, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 599.—Ins. Cyprus.
italiea, Benth. in DC. Prod. xii. 519 = rupestris.
lanata. Linn. Sp. PI. 582 = Leonnrns lanatus.
lanata, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 439 - Eremostachys laciniata.
larendana, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. I. xii. 88.—As. Min.
limbata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 743 = Otostegia limbata.
macrodonta, *Boiss. V Bat. Diagn.* Ser. IL iv. 54.—Cappadoc
mauritaniea, Stead. Nom. ed. II. L 181 -seq.
mauritiana, Pers. Syn. ii. 126 = Anisomeles ovata.
microphylla, Benth. Lab. Gen. et Sp. 596 = Otostegia Schimperi.
moUissima, *Benth. 1. c.* 596.—Hispan.
nigra, *Linn. Sp. PI.* 582.—Europ.; Oriens; Afr. bor.
obliqua, Benth. Lab. Gen. et Sp. 596-saxatilis.
orbicularis. Lag. ex Willk. & Luge, Prod. Fl. Hisp. ii.446-hirsuta.

BALLOTA:—
orientalis, C. & J. Presl, Delic. Prag. 80 (Sp. dnbia negligenda, Boiss.).—As. Min.
persica, Benth. Lab. Gen. et Sp. 598 = Otostegia macrophylla.
pilosa, Lour. Fl. Cochinch. 364-Leucas Benthamiana.
pseudodictamnus, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 594.—Graecia; Creta.
rotundifolia, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. (1848) 697.—Armenia.
royleoides, *Benth. in DC. Prod.* xii. 520.—Arab.
rubra, Schrad. ex Steud. Nom. ed. II. i. 182-nigra.
ruderalis, Sw. in Palmstr. Sv. Bot. t. 389 (1809) -nigra.
rugosa, Benth. Lab. Gen. et Sp. 596-saxatilis.
rupestris. *Vis. Fl. Dalm.* ii. 216.—Dalmat
Russeliana, Benth. Lab. Gen. et Sp. 597 = saxatilis.
saxatilis, Guss. FI. Sic. Syn. ii. 82=rupestris.
saxatilis, *Sieber, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 596.—Syria; As. Min.
Schimperi, Benth. in DC. Prod. xii. 519-Otostegia Schimperi.
septum, Paulet, in Pers. Syn. ii. 125-nigra.
silvestris, Hoflmgg. & link, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 446=alba.
sordida, Salisb. Prod. 83=nigra.
spinosa, *Lint, Handb.* 475.—Gallia.
stachydifoimis, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 100.—Abyss.
suamolens, Linn. Syst. ed. X. 1100; PL Jam. Pugill. 15 = Hyptis suaveolens.
suaveolens, Rodsch. Obs. 35 = Hyptis pectinata.
undulata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 596.—Syria; Arab.
urticaefolia, Ortim. ex Reichb. Ic. Bot viii. 30. t. 774—nigra.
verticillata, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 8.—Malaya.
vulgaris, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. 1115=nigra.

BALMEDA, Nocca, Hort. Ticin. 21 (1804)-Crrewia, linn. (Tiliac.).
corylifolia, Nocca, 1. c. = G. corylifolia.

BAIiOOHIA, Endl. Prod. Fl. Norf. 84 (1833). *EUPHORBIACEAE*, Benth. *b* Hook. f. iii. 300.
STEIGERIA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865) 215.
altemifolia, *Baill. Adansonia*, it (1861-62) 216.—N. Caled.
canmculaU, *Baill. I. c.* 215.—N. Caled.
lucida, *Endl. Prod. Fl. Norf.* 84.—Ins. Norfolc
Pancheri, *Baill. Adansonia*, ii. (1861-62) 214.—Austral.; N. Caled.

BALOSKION, Rafin. Fl.TeUnr. iv. 32 (1836)=Hoetio, linn.
dichotomum, Rafin. 1. c —R. quadrifarius.

BALSAMARIA, Lonr. Fl. Cochinch. ii. 469 (1790) = Calophyllum, Linn. (Guttif.).
Inophyllum, Lour. 1. c. 470=C. Inophyllum.

BALSAMEA, Gled. in Berl. Ges. Natnrf. Fr. Schr. iii. (1782) 127-BALSAMODENDRUM, Kunth = Commlphora, Jacq. (sec. Engler) (Burser.).
abyssinica, Engl. in bot. Jahrb. i. (1881) 41=C. abyssinica.
africana, Baill. Hist. PI. v. 295=C. africana.
AgaUocha, Baill. 1. c. = C. Agallocha.
Berryi, Engl. in Bot. Jahrb. 1. (1881) 41 =C. Berryi.
capensis, Engl. 1. c. 42 =C. capensis.
caudata, Engl. 1. c - C . caudata.
edulis, Baill. in BulL Soc. linn. Par. i. (1877) 122-C. edulis-.
Harveyi, Engl. in Bot. Jahrb. i. (1881) 42=C. Harveyi.
Hildebrandtii, Engl. L C.-C. Hildebrandtii.
Kotschyi, Engl. 1. c 41=C. africana.
madagascariensis, Engl. 1. c. 42 = C. grandifolia.
meccanensis, Gled. in Berl. Ges. Naturl Fr. Schr. iii. (1762) 127 = C. Opobalsamum.
mollis, Engl. in Bot. Jahrb. i. (1881) 42=C. mollis.
Uukul. Bail!. Hist. PI. v. 295 = C. Mukul.
Myrrha, Baill. I. c. 294 =C. Myrrha.^
pedunculata, Engl. in Bot. Jahrb. i. (1881) 42 - C . pedunculata.
pilosa, Engl. L c. 41 = C. pilosa.

BALSAMEA:—
Roxburghii, Engl. in Bot Jahrb. i. (1881) 41-C. AgaUocha.
Schimperi, Engl.l. c. = C. Schimperi.
Stocksiana, Engl. 1. c.=C. Stocksiana.
eaneibarica, BailL in Adansonia, xi. (1874) 180-C. zanzibarica.

BALSAMIFLTJA, Griff*. Notul. iv. 382 (1854)-Fopulus, linn. (Salicin.).
deltoides, Griff. L c. =P. euphratica.

BALSAMINA, Tourn. ex Scop. FL Cam. ed. II. il. 183 (1772); Gaertn. Fruct ii. 151. t 118 (1791) - ImpatieDB, linn. (Geraniac).
angustifolia, Blume, BKdr. 239 - I. Balsamina.
bifida, DC. Prod. i. 686^1. flacada.
capensis, DC. 1. c—I. capensis.
cornea, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 7.—Malaya.
chinensis, DC. Prod. i. 686-L chinensu.
coccinea, DC. L c 685 = 1. Balsamina.
cochleata, DC. 1. c. 686=1. cochleata.
communis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 7.—Malaya.
comorensis, Boj. ex Baker, in Joum. linn. Soc. xx. (1884) 114=L comorensis.
cornuta, DC. Prod. i. 686 = 1. Balsamina.
cristata, Ser. Cat Gr. Jard. Lyon, (1853) = I. scabrida ?
fasciculata, DC. Prod. i. 686-1. chinensis.
foeminea, Gaertn. Fruct. ii. 113 = 1. Balsamina.
fruticosa, Leschen. ex Steud. Nom. ed. II. i. 182—1. fruticosa.
fulva, Ser. Fl. Jard. iii. 453-1. rnlva.
glandulifera, Ser. Cat Gr. Jard. Lyon, (1863)=I. glandulifera.
glandulifera, Lyall, ex Baker, in Joum. linn. Soc. xx. (1884) 113=1. Lyallii.
heterophylla, G. Don, Gen. Syst. i. 749-1. chinensis.
hirsuta, Blume, Bijdr. 240 = 1. hirsuta.
hortensis, Desp. in Diet. Sc. Nat. iii. 485 =L Balsamina.
javensis, Blume, Bijdr. 240-1. javensis.
lacca, Medic. Malv. 71 = 1. Balsamina.
laHfolia, DC. Prod. i. 686-1. latifolia.
Leschenaultii, DC. 1. c.-I. LeschenaulrJi.
longicornis, Ser. Fl. Jard. iii. 452-1. leptoceras?
lutea, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 504=1. NoU-tangere.
macrochila, Ser. Fl. Jard. iii. 454-1. Roylei.
madagascariensis, DC. Prod. i. 686—1. madagascariensis.
Mastersiana, Paxt. Bot. Mag. vi. 75=1. Mastersiana.
micrantha, Blume, Bijdr. 240 = 1. leptoceras.
minor, DC. Prod. i. 686 = 1. Kleinii.
minutiflora, Span, in linnaea, xv. (1841) 186=1-Balsamina.
mollis, G. Don, Gen. Syst. i. 749-1. Balsamina.
mutila, DC. Prod. i. 686 = 1. mntila.
mysorensis, DC. 1. c. — I. mysorensis.
Noli-tangere, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 184-1. NoU-tangere.
odorata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 203 - I. Balsamina.
oppositifolia, DC. Prod. i. 686-1. oppositifolia.
^am/Jora,Ser.CatGr.Jard.Lyon,(1858) = I.parvirlora!
puberula, G. Don, Gen. Syst i. 749-1. puberula.
racemosa, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 203 = 1. Balsamina.
repens, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art IV. 8.—Malaya.
rosmarinifolia, DC. Prod. i. 686 — 1. oppositifolia.
Roylei, Ser. Fl. Jard. iii. 455. t. 7 = 1. Roylei.
salicifolia, Boj. ex Baker, in Joum. linn. Soc. xx. (1884) 115 = 1. salicifolia.
scabriuscula, G. Don, Gen. Syst *i*, 748 - 1 . scabrinscula.
setacea, Coleb. ex Hook. Exot. FL ii. t 137-L chinensis.
Tilo, DC. Prod. i. 686-1. tripetalat
tricornis, Ser. Fl. Jard. iii. 452-1. scabrida.

BALSAMITA, Desf. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 11 = Chrysanthemum, Linn. (Compos.).
ageratifolia, Desf. 1. c. 2 — C. floscnlosum.
annua, DC. Fl. Fr. iv. 187 -Tanacetum annuum.
Audibertii, Req. in Ann. Sc. Nat Sér. L v. (1825) 382 -Tanacetum Audiberti.
corymbosa, Salzm. in Flora, iv. (1821) 112 «C. flosculosum.
dentata, WalL Cat. a 326-Myriactis WaUichii.

BALSAMITA:—
fiabelliformis, Pers. Syn. ii. 408=BentnÀ flabelliformU.
grandiflora, Desf. in Act. Soc. Hist. Nat Par. i. (1792) 1 *{."Plagiusgrandiflorus).—kh.* bor.
major, Desf. 1. c. 8*C. Balsamita.
"tullifida, Roxas Clem. Ensay. Vid, 292=Tanacetum annaum.
suaveolens, Pers. Syn. ii. 408 = C. Balsamita.
tridentata, Delile, Fl. Egypte, 273-Cotulatridentata.
nrgata, Desf. in Act. Soc. Hist. Nat Par. i. (1792) 2 =C. discoidenm.
-dgaris, Willd. Sp. PI. Hi. 1802-Chrysanthemum Balsamita.

BALSAMOCARPON, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 226. t- 20 (1846) = Caesalpinia, Linn. (Legumin.).
irevi/olium, Clos, 1. c—Chili.

BALSAMODENDRON, DC. Prod. ii. 76 (1825)=seq.

BAL,SAMODENDRUM, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sir. I. «. (1824) 348 = Commiphora, Jacq. (Burser.).
abyssinicum, Engl. in Bot. Jahrb. i. (1881) 41 - C. abyssinica.
africanum, Am. in Ann. Nat. Hist. Hi. (1889) 87=C. africana.
Agallocha, Wight & Am. 1. c. 86-C. Agallocha.
Arnottianum, March, in Adansonia, vii. (1866-87) 266 • C. pubescens.
Berryanum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 149 - C. Berryi.
Berryi, Am. in Ann. Nat. Hist Hi. (1889) 86-C. Berryi.
capense, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 526=C. capense.
caudatum, March, in Adansonia, vii. (1866-67) 266-C. caudata.
Ekrenbergianum, 0. Berg, in Bot. Zeit. xx. (1862) 168 . "=C. Opohalsamum.
etleadense, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sir. I. ii. (1824) 849 = C. Opobalsamum.
habessinica, O. Berg, in Bot. Zeit. xx. (1862) 161 = C. abyssinica.
K«fal, Kunth. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* I. ii. (1824) 349-C. abyssinieV
fataf, Kunth, 1. c - C . Kataf.
Kotschyi, 0. Berg, in Bot Zeit. xx. (1862) 162=C. africanum.
""fdagascariense, March, in Adansonia, viii. (1867-68) 71. t. 6=C. grandifolU.
"file, Oliver, *VI.* Trap. Afr. i. 326=C. mollis.
Muiul, Hook, ex Stocks, in Hook. Kew Joum. i. (18491 259 = C. Mukul.
Myrrha, T. Nees, PI. Officin. 1.182-C. Myrrha.
opobalsamum, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sir. I. n. (1824J 848=C. Opobalsamum.
P'rvifolium, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 506.—Ins. Socotra.
Peaunculatum, Kotschy & Peyr. PI. Tinn. 11. t. 5; et Schweinf. Beitr. Fl. Aeth. 284-C. pedunculaU.
planifrons, Balf. f. in Proc. Roy. Soc Edinb. xi. (1882) 506.—Ins. Socotra.
*Pl*yfairii.* Hook. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 326 = \-- Myrrha.
P"bescens, Stocks, in Joum. As. Soc. Bomb. H. (1848) 395.t25-C.Stocksiana.
™>Aurghianum, March, ex Bull. Adansonia, TII. (1866-67) 266=C. caudata.
Rox rg ii. "a Ann- Nat HUL iU> ^1889^88=>c A^ Hocha.*
Roxburghii, Stocks, in Journ. As. Soc. Bomb. ii. (1848) 391=C.Mukul.
Schimptri.O. Berg, in Bot. Zeit xx. (1862) 162=C. achimperi.
socotranum, Bait. C in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 605—Ins. Socotr.
*Wight Am- in Annu Natu HiStu ffiu (1889) 86*C>* Mukul.
"ylonicum, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sir. I. ii. (1824) 349=Canarinm zeylanicum.

BALSAMONA, Vand. Fasc. PI. 15 (1771)=Cuphea, P-Br. (Lythrar.).
Pinto, Vand. 1. c. = C. Balsamona.

BA*-SAMOPHLEOS, O. Berg, in Bot. Zdt. xx. (1862) *R!f;9??aiiPho'a. Jcq- (Bn«»)·* , O. Berg, 1. c.-C. Kataf.

BALSAMOBHIZA, Hook. Fl. Bor. Am. i. 310 (1838). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 866.
ESPELETIA, Nutt. in Joum. Acad. Fhilad. vii. (1834) 87. t. *i.*
Bolanderi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 356.—Calif.
Careyana, *A. Gray, PI. Fendl.* 81.—Am. bor. occ.
deltoidea, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 351.—Am. bor. occ.
glabrescms, Benth. PI. Hartw. 817 •= deltoidea.
helianthoides, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 351 =sagittata.
hirsuta, *Nutt. 1. c.* 849.—Am. bor. occ.
Hookeri, *Nutt. I. c*—Am. DOT. OCC.
incana, Nutt. 1. c. 850=Hookeri.
macrophylla, *Nutt. I. c*—Am. bor. occ.
sagittata, *Nutt. I. c*—Am. bor. occ.
silphioides, Geyer, ex Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 244-Silphium laeve.
terebinthacea, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 349.—Am. bor. occ.

BALSAMUS, Stackh. De Liban. 11 (1814)-Conuniphora, Jacq. (Burser.).
Kafal, Stackh. 1. c. 12-C. abyssinica.
libanotus, Stackh. 1. c 11 = C. Opobalsamum?
meccanensis, Stackh. 1. c. 12 = C. Opobalsamum.
Theophrasti, Stackh. 1. c. 11=C. Opobalsamum.

BALTIMOBA, Linn. Mant. 158 (1771). *COMPOSITAE,* Bentii. & Hook, *t* ii. 348.
FOUGERIA, Moench, Meth. Suppl. 248 (1802).
FOUGEROUXIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. liv. 461 (1829).
NIEBUHRIA, Scop.Introd. 184 (1777).
SCOLOSPERMUM, Less, in Linnaea, v. (1830) 152.
TIMANTHEA, Salisb. Prod. 208 (1796).
alata, Meerb. Afb. t. 23=recta ?
alba, Pers. Syn. ii. 489=recta,
recta, *Linn. Mant.* 288.—Mexic.
scabra, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. m. 256 = Calea hymenolepis.
scolospermum, *Steeti, in Seem. Bot. Voy. Herald,* 154. —Panama.
trinervata, Moench, Meth. 592-recta.

BAMBOS, Retz. Obs. v. 24 (1789)=Bambusa, Schreb. (Gramin.).
arundinacea, Retz. Obs. v. 24 = Bambusa arandinacea.
Arundo, Soland. Fl. Ins. Ocean. Padf. 21/=Schizostachyum glaucifolium.
quinquefiora, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 286=Bambusa arandinacea.
stricta, Roxb. PI. Corom. i. 58.180 (non text.) -Oxytenanthera Thwaitesii, et Dendrocalamus strictns.
verticillata, Poir. Encyc. viii. 703 = Gigantochloa verticillata.

BAMBUS, J. F. Gmel. Syst 579 (1791)=seq.

BAMBUSA, Schreb. Gen. PI. 236 (1789). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. Hi. 1210.
BAMBOS, Retz. Obs. v. 24 (1789).
BAMBUS, I. F. GmcL Syst. 679 (1791).
BEESHA, Kunth, Syn. i. 253 (1822).
ISCHUROCHLOA, Buese, in Miq. PL Jungh. 889 (1854).
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 439 = Oxytenanthera abyssinica.
affinis, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 93.—Burma.
agrestis, *Poir. Encyc.* viii. 704.—Ind. or. j Cochinch.
alpina, Bory, Voy. i. 310. t 12 -.Nastus borboniens.
amahussana, *Lindl. in Penny Cyclop,* iii. 857 (1835). —Amboina.
ampUxifolia, Schnlt f. Syst. vii. 1348 = Guadua amplexifolia.
andamanica, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870)11. 88.—Ins. Andam.
angnlata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 94.-China.
Apus, *SchulUf. Syst.* vii. n. 1353.—Java,
argentea-striata, *Regel, Gartenfi.* (1865) 868.—Japon.
arutata, *Lodd. tf Lindl. in Penny Cyc.* lit (1885) 857. —Ind. or.
arundinacea, Humb. & BonpL PI. Aequin. i. 71 - Nastus borbonicus.

BAMBUSA :-
arundinacea, Ait. Hort Kew. ed. II. ii. 316 - Thouarsif.
arundinacea, Wight, ex Steud. Norn. ed. II. i. 183 - orientalis.
arandinacea, *Willd. Sp. PI.* ii. 245.—Ind. or.
Arundo, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 471 — arundinacea.
Arundo, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 183 ~ orientalis.
aspera, *Schult.f. Syst.* vii. II. 1352.—Amboina.
atra, *Lindl. in Penny Cyc.m.* (1885) 357.—Amboina.
attenuata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 375=Teinostachyum attenuatum.
aurea, Hort. ex A. & C. Riviere, in Bull. Soc. Acdim. *Six.* III. v. (1878) 716="Phyllostachys aurea.
aurea, *Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 285.—Japon.
aureo-striata, *Regel, Gartenfi.* (1865) 862.—Japon.
auriculata, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) II. 86=vulgaris.
baccifera, Roxb. Hort. Beng. 25; Fl. Ind. ii. 197" Melocanna bambusoides.
Balcooa, *Roxb. II. cc.* 25,196.—Ind. or.
barbata, *Trin. in Mtm. Acad. Pitersb.* Sir. VI. *Sc. Nat.* i. (1885) 627-Nastns barbatus.
Beecheyana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 108.—China.
bifolia, Siebold, ex Munro, 1. c 36 - Phyllostachys bambusoides.
Bitung, *Schult.f. Syst.* vii. II. 1354.—Java.
Blancoi, *Steud. Syn. PI. Gram.* 331.—Ins. Philipp.
Blumeana, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 254-tuldoides.
Blumeana, *Schult.f. Syst.* vii. II. 1848.—Java.
Brandisii, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 109.—Burma.
breviflora, *Munro, I. c.* 96.—China.
caesia, Sieb. *8c* Zucc. ex Munro, 1. c. 89-nana.
calostachya, *Kurt, in Journ, As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 250.—Burma.
Cantori, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 111. —China,
capensis, *Rupr. in Mtm. Acad. Pitersb.* Sir. VI. v. (1839) 144.—Afr. austr.
capitata, Trin. 1. c. Sc. Nat. i. (1885) 626 = Guadua capitate.
capitata. Wall. & Griff, in Wall. Cat.n. 8913-Cephalostachyum capitatum.
capitata, *Willd. ex Rupr. in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. v. (1839) 43.—Madag.
China, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 607.—Japon,.
Chusqui, Poir. Encyc. Suppl. v. 494 — Chusquea scandens.
cornuta, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 118. -JavaT
crinita, Thorns, ex Munro, 1. c. 157=nutans.
critica, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xlii. (1878) II. 250.—Pegu.
dichotoma, Donn, Hort Cantab, ed. IV. 78-Phyllostachys nigra.
diffusi, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 269 = Guadua distort*,
distorta, *Nees, in Linnaea,* ix. (1884) 470.—Bras.
diversistachya, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 126 = Gigantochloa heterostachya.
dumetorum, Hance, ex Walp. Ann. iii. 781-Schisostachyum dumetorum.
Duquilioi, Hort. ex Carr. in Rev. Horde. (1889)292-Phyllostachys QuilioL
edulis, *Carr. I. c.* (1866) 880.—China.
elegantissima, Hassk. PI. Jav. 42=Beesha elegantissima.
excelsa, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 418=maxima.
falcata, Hort. ex Vilm. Fl. PL Terre, ed. II. 98 = Arundinaria falcata.
Falconeri, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 95.-Reg. Himal.
Fax, Poir. Encyc. viii. 704 = Melocanna humilis.
fera, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 418.—Amboina.
fistulosa, Royle, ex Munro, in Trans. Linn. Soc, xxvi, (1868)95=Falconeri.
Jlagellifefa, Griff, ex Munro, 1. c 150 =Dendrocalamns flagellifer.
flexuosa, *Munro, I. c.* 101.—China,
fiexuosq, Hort. ex A. & C. Riviere, in Bull. Soc. Acclim. Sir. III. v. (1878) 758 - Phyllostachys flexaosa.

B AMBUS A:—
floribunda, *Zoll.* &* *Mor. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 830. —Java.
floribunda, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 34 = Tharanocalamus Kalconeri.
Fortnnei, *Van Houtte, Fl. des Serres,* xv. (1863) t. 1585.—Japon.
fragilis. Spruce, ex Mnnro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 78 = Guadua latifolia.
gigantea. Wall. Cat. Bot. Gard. Calc 79-Dendrocalamus giganteus.
glauea, Blame, ex Rnpr. in Mém. Acad. Pe"tersb. *Sir.* VI. v. (1889) 162 = Arundinaria glaucescens.
glauea, Lodd. ex Lindl. in Fenny Cyclop, iii. 357 (1835) =nana.
glaucescens, Siebold, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868)89=Ihana.
glaucifolia, Rnpr. inf Mém. Acad. P&enb. Sir. VI. v. (1839) 147 = Schizostachyum glaucifolium.
globifera, *Griseb. in Goett. Nackr.* (1868) 72.—Ind. or.
glomerata, Royle, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 147-Dendrocalamus strictus.
gracilis, *Hort. ex A.* &" *C. Riviire, in Bull. Soc. Acclim.* Sér. III. v. (1878) 682.—Hab. ?
gracilis, Wall. Cat. n. 6033=Oxytenan there nigro-ciliata.
Griffithiana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 99.—Burma.
Guadua, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. 168. t. 20 = Guadua angustifolia.
Helferi, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 111. —Burma.
heterocycla, *Carr. in Rev. Hortic.* (1878) 354.—Hab. ?
hexandra, Koxb. ex Munro, in Trans. Linn. Soc xxvi. (1868) 147 =Dendrocalamus strictus.
Hookeri, *A. V C. Riviire, in Bull. Soc. Acclim.* Sér. III. v. (1878) 642.—Hab. ?
Horsfieldii, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 115.—Java.
humilis, Reichb. ex Rupr. in Mém. Acad. Pe'tersb. Sér. VI. v. (1839) 140 = vulgaris.
khasiana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 97. —Reg. Himal.
tumasasa, Zoll. ex Steud. Syn. PI. Gram. 381 = Phyllostachys knmasaca.
latiflora, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 250.—Ind. or.
latjfolia, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. i. 68. t. 21 = Guadua latifolia.
levis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 272.—Ins. Philipp.
Lima, *Blanco, 1. c.* 271.—Ins. Philipp.
lineata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 118. —Ins. Temate.
longinodis, *Miq.&l. Ind. Bat.* iii. 418.—Malaya,
longispatha, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873)11.250.—Burma.
Luconiae, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 115.—Ins. Philipp.
Lumampao, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 272.—Ins. Philipp.
Mac-Clellandi, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 114.—Burma.
macra, Wall, ex Munro, 1. c. 84=Thamnocalamn» spathiflorus.
macrocnlmis, *A. Riviire, in Bull. Soc. Acclim.* Se>. III. v. (1878)624.—Hab. T
Macala, Buch.-Ham. ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 9 1 - Tulda.
madagascoriensis, Hort. ex A. *8c* C. Rivière, in Bull. Soc. Acclim. Sér. III. v. (1878) 631=vulgaris.
marginata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 114.—Burma.
Mastersii, *Munro, 1. e.* 113.—Ind. or.
maxima, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5089=Dendrocalamus Hamiltonii.
maxima, *Pair. Encyc.* viii. 704.—Araboin.; China.
Maximomiczii, Hort. ex Munro, in Gard. Chron. (1876) II. 774 = Arundinaria Fortnnei.
Metake, Siebold, ex Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. ii. 284 => Arnndinaria japonica.
microphylla, Griff. Journ. i. 242, 259 (1847)=Amndinaria microphylla.
mitti, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 271 =Blancoi.
mitti, Hort. Paris, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 18-Amndinaria japonica.
mitis, *Poif. Encyc.* viii. 704.—China.
mitis, Hort. ex Carr. in. Rev. Hortic (1866) 880-edulis.

BAMBUSA :-
monogyna, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 268.—Ins. Philipp.
monogynia, Griff. Notul. ul. 63 •= Dendrocalamus Hamiltoni.
multiplex, *Raeusch. Norn.* ed. in. **103;** *Schult. f. Syst.* vii. II. 1350.—Cochinch.
nana, *Roxb. Hort. Beng.* 25; *Fl. Ind.* ii. 199.—Japon.
Neesiana, Am. ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 103 = arundinacea.
nigra, Lodd. Cat. (1823) ex Loud. Hort. Brit. 124 = Phyllostachys nigra.
nigricans, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 183 = Phyllostachys nigra.
nigro-ciliata, Buese, in Miq. PI. Jungh. 889=Oxytenanthera nigro-ciliata.
nutans, *Wall, ex Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 92.—Reg. Himal.
Oldhami, *Munro, 1. c.* 109.—China,
orientalis, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 475.—Ind. or.
pallida, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 97. —Ind. or.
paniculata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 183 = Nastus borbonicus ? '
parviflora, Schult. f. Syst. vii. II. 1860 = Arthrostylidium maculatum.
picta, *Lindl. in Penny Cyclop,* iii. 357 (1835).—Ins. Ceram.
picta, Sieb. *8c* Zucc ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 111-Fortunei.
polymorpha, *Munro, 1. c.* 98.—Burma,
prava, *Lindl. in Penny Cyclop,* iii. 857 (1835).—Amboina.
pseudoarundinacea, Steud. Syn. PI. Gram. 830= Gigantocliloa verticillata.
puberula, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 285 = Phyllostachys nigra.
pubescens,.D<w//, *in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 189.—Bras.
pubescens, Lodd. ex Lindl. Penny Cyclop, iii. 357 (1835) = Dendrocalamus strictus.
pungens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 270 - arundinacea.
pygmaea, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 286.— **Japon.**
quadrangularis, *Fenti, in Bull. Soc. Tosc. Ort.* v. (1880)401.—Japon.
Quilioi, Hort. ex A. *8c* C. Rivière, in Bull. Soc. Acclim. Se>. III. v. (1878) 697-Phyllostachys Quilioi.
Ragammslni, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1876) II. 847 =tessellata.
regia, *Thorns. Cat. Hort. Bot. Calc.* 79; *ex Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1888) 116.—Ind. or.
reticulata, Rupr. in Mém. Acad. Pe'tersb. Sir. VI. v. (1889) 148=Phyllostachys bambusoides.
Ritcheyi, *ifunro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 118.—Ind. or.
Rumphiana, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 86.—Ind. or.
rusci/olia, Siebold, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 157-Phyllostachys kumasaca.
scandens, Blume, ex Nees, in Flora, vii. (1824) 291 = Dendrocalamus Tjankorreh.
Sckimperiana, Steud. Syn. PI. Gram. 330=Oxytenanthera abyssinica.
sckitostachyoides, Kurz, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 134=Melocanna Kurzii.
scriptoria, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31=Melocanna bambusoides.
senamensis, *Franch. (f Sam. Enum. PI. Jap.* ii. 606.— Japon.
siamensis, Knrz, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 116-regia.
Sieberi, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 528=>vulgaris.
Simoni, Carr. in Rev. Hortic (1866) 380 = Amndinaria Simoni.
spinosa, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 475=arundinacea.
spinosa, Blume, ex Nees, in Flora, viii. (1825) 580 = Blnmeana.
spinosa, *Roxb. Hort. Beng.* 25; *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 480.—Ind. or.
sterilis, Kurz, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 285—nana.
striata, *Lodd. ex Lindl. Penny Cyclop,* iii. 367 (1835). —China.
stricta, Roxb. Hort Beng. 25; Fl. Ind. ii. 198-Oxytenanthera Thwaitesii et Dendrocalamus strictus.
stridula. *Moon. Cat.* 26.—Zeylan.
sulfurea, Carr. in Rev. Hortic (1878) 37»=Phyllcstachys sulphurea.

BA1EBUSA :—
surinamensis, Rup» in Me'm. Acad. Pe'tersb. Sér. VI. v. (1889) 49=vulgaris.
tabacaria, *Pair. Encyc.* viii. 705.—Amboina; Java.
Tagoara, Nees, Agrost. Bras. 532=Guadua Tagoara.
Teba, *Miq. Fl. Ind. Bat.* Ui. 418.—Malaya; China,
tennis, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 119. —Ins. Macass.
teres, *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* n. 5026 B.—Ind. or.
tessellata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 110.—China.
textoria, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 270.—Ins. Philipp.
Thouarsii, Kunth, Not. Gen. Bambusa, 3=vulgaris.
trigyna, Roxb. ex Mnnro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 91 = Tulda.
Trinii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 469 = Guadua • Trinii.
Tulda, Benth. Fl. Hongk. 484 = tuldoldes.
Tulda, *Roxb. Hort. Beng.* 25; *Fl. Ind.* it 193.—Ind. or.; Burma,
tuldoides, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi (1868) 98. •—£hina.
variegata, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 285 = Fortnnei.
vasaria, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5025 - Balcooa.
vasatia, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 122. —Malaya.
verticillata, Benth. FL Hongkong. 434 = Dendro• calamus latiflorus.
verticillata, Rottler, ex Munro, in Trans. Linn. Soc xxvi. (1868) 147 = Dendrocalamus strictus.
verticillata, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 254 = Beecheyana.
verticillata, Willd. Sp. PI. ii. 245 = Gigantochloa verticillata.
villosola, *Kura, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 553.— Burma.
violascens. Carr. in Rev. Hortic. (1869) 292-Phyllostachys violascens.
virgata, *Trin. in Mint. Acad. Petersb.* Sér. VI. i. (1835) 624 = Guadua virgata.
viridi-glaucescens, Carr. in Rev. Hortic (1869) 292 = nana.
viridi-striata, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 77 = striata.
vulgaris, Nees, Fl. Afr. Anstr. 462 = Balcooa.
vulgaris, *Schrad. in Wendl. Coll. PI.* ii. 26. t 47. —Mexic
Wightii, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 111.—Ind. or.

BAMIA, [Linn.] R. Br. ex Wall. PI. Asiat Rar. i. 89 (1880) = Hibiscus, Toura. (Malvac).
Abelmoschus, R. Br. ex Wall. Cat. n. 1915 = H. Abelmoschus.
angulosa. Wall. Cat. n. 1927 = H. angulosus.
betulifolia, Wall. 1. c. 1918 = H. Abelmoschus.
cancellata, Wall. 1. c. 1920 = H. cancellatus.
chinensis, Wall. I.e. 1916 = H. Abelmoschus?
crinita, Wall. 1. c. 1922 = H. canceUatus.
fusiformis. Wall. 1. c. 1921=H. cancellatus.
magnifica, Wall. 1. c. 1919 = H. hostilis.
Manihot, Wall. I. c. 1926 = H. Manihot
multiformis. Wall. 1. c. 1917 = H. Abelmoschus.
pungens, Wall. 1. c. 1924 = H. pungens.
rugosa, Wall. 1. c. 1928 = H. rugosus.
tetraphylla, Wall. 1. c 1925-H. tetraphyllus.

BAMMIA, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 89 .(1745) =praec.

BANAIiIA, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 278 (1849). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 27.
brasiliana, Moq. 1. c (=Chamissoae sp.?).—Bras.
ocddentalis, Moq. 1. c. 279=Nitrophila occidentalis.
thyrsiflora, *Moq. I. c.* 278.—Ind. or.

BANARA, Aubl. PI. Gui. i. 547. t. 217 (1775). *SAMYDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 798.
ASCRA, Schott, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 407 **(1827).**
BOCA, Veil. Fl. Flum. 282 (1825); v. t 113 (1827).
CHRISTANNIA, Presl, Rel. Haenk. il. 91. t. 67 (1830).
PINEDA, Ruiz *8c* Pav. Prod. 76.1.14 (1794).
XYLADENIUS, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 41 (1825).
brasiliensis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* **v. (1861)-***Suppl.* ii. 83.—Bras.

BANARA:—

bevifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 426=Scolopia dasyanthera.
dioica, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 94—Mexic.
domingensis, *Benth, I. c*—Ins. S. Doming.
fagifolia, Vahl, Symb. Bot iii. 65=guianensis.
gUberrima, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 8.—Cnba.
glauca, Benth. in Joum. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 92-Kuhlia glauca.
grandiflora, *Spruce, ex Benth. I. c.* 98.—Peruv.
guiaaensis, *Aubl. PI. Gui.* i. 548. t. 217.—Guiana; Bras,
ibagaensis, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. vii. (1847) 291.—N. Granat.
incana, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 94.-Peruv.
laxiflora, *Benth. I. c.* 91.—Peruv.
mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 174.—Mexic.
mollis, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. vii. (1847) 290.—N. Granat.
mtida, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) *Suppl.* ii. 98.—Peniv.
parviftora, *Benth.I.e.* 91.—Bras,
pubescens, *Spruce, ex Benth. 1. c.* 92.—Ecuador,
racemosa, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 425.—Ins. Philipp.
reticulata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 8.—Cuba.
Roxburghii, *Spreng. Syst.* ii. 479 (omnino dubia).—Ind. or.
tomentosa, *Clos, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1857) 240__Bras.
ulmifolia, Benth. in Joum. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 91 = Kuhlia ulmifolia.
Velloai, *Gardn. in Hook. Lend. Joum. Bot.* ii. (1843) 831.-Bras.

HANCROFFTIA, Steud. Nom. ed. II. i. 183 (1840), = seq.

BANCROFTIA, Billb. in Linneska Samfund. Handl. i. 1832 (1833) 39=Arracaeia, Bancr. (Umbell.).
moschata, Billb. 1. c. = A. moschata.
**anthorrhiia,* Billb. 1. c - A. xanthorrhka.

BANCROFTIA, Macfad. Fl. Jamaic. i. 112 (1837) =Tovaria, Ruiz & Pav. (Capparid.).
diffusa, Macfad. 1. c.=T. pendula.

BANDEIRAEA, Welw. ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 577 (1865). *LEGVMINOSAE,* Benth. & Hook. t.1. c.
. GRiFFONiA,Baill.in Adansonia, vi. (1865) 188. t. 2.
simplicifolia, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* XXT. (1866) 306, in nota.—Afr. trop.
speciosa, *Welv. ex Benth. 1. c.* 806. t. 40.—Afr. trop.
tenuiflora, *Benth. 1. c.* 807.—Afr. trop.

HANDEREIA, Bull. Hist PI. ii. 120 (1870)-Bandelraea, Welw. (Legum.).

BANDURA, Bum. Thes. ZeyL 42. t 17 (1787)-Ne-Penthes, Linn.

BANFFYA, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 885 (1816) = Oypsophlla, Linn. (Caryopbyll.).
petraea, Baumg. I. C.-G. transsylvanica.

BANGUUM, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. snb n. 6579 (18S2)=Alpinia, Linn. (Scitam.).
**ulphureum,* Buch.-Ham. l.c.=A. Hamiltoniana.

BANIA, Becc. Malaria, L (1877) 162. *UEN1SPERMACEAE.*
thyrsiflora, *Becc. I. c*—N. Guinea.

BASI8TERIA, Unn.Syst. ed. H. 28 (1740). *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 257.
ANOMALOPTEMS, G. Don, Gen. Syst i. 647 (1831).
HOLOPETALON, Reichb. Nom. 207 (1841).
•canthocarpa, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (18*3) 394.—Am. austr.
«=uleata, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6—Mexic. ...
"oamantium, *Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par.* m. (1848) 4O6.-Bras.
adenopoda, *A. Juss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* Hi. 40.—Bras.

BANISTERIA :-

albicana, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 181.—Bras.
albida, Willd. ex Steud. Nom. ec* II. i. 188 = Gaudichaudia albida.
allophila, Sieber, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 356 = Brachypterys borealis.
amoena, Mart, ex A. Juss. 1. c. 571=Hiraea Gaudichaudiana.
angulata, Veil. Fl. Flum. 191; ir. t. 160-Stigmaphyllon affine.
angulosa, Linn. Sp. PI. 427-Stigmaphyllon angnlosum.
angustifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 38.—Bras.
anisandra, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 190=Clausseniana.
anisandra, *A. Juss. in St. Nil. Fl. Bras. Mer.* iii. 47.—Bras,
antifebrilis, *Suit, ex Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 15.—Peruv.
appendiculata, *A. Juss. in Arch. Mus. Par. Hi.* (1843) 418.—Ins. S. Vincent.
appendiculata, Lamb, ex DC. Prod. i. 592-Heteropteris appendiculata.
argentea, *Spreng. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 398.—Am. austr.
argyrophylla, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 45.—Bras,
atrosanguinea, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 389.—Bolivia.
aurea, Veil. Fl. Flum. 192; iv. 1.167 = Gardneriana.
auriculata, Cav. Diss. ix. 428. t. 255-Stigmaphyllon auriculatum.
benghalensis. Linn. Sp. PI. 427=Hiptage Madablota.
Benthamiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 890.—Peruv.
bicolor, *Poepp. ex A. Juss. 1. c.* 898.—N. Granat
Billbergiana, *Beurling, in Vet. Aiad. Handl. Stocih.* (1854) 118.—Panama.
Blanchetiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 420.—Am. austr.
bogotensis, Btihpl. ex Triana & Planch. Prod. FL N. Granat. i. 318=Stigmaphyllon bogotense.
bonariensis, *Hooi..V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 157.—Reg. Argent.
brachiata, Linn. Sp. PI. 428-Heteropteris brachiata.
brachiata, Spreng. Syst. ii. 387 = Heteropteris platyptera.
brachiata, Willd. ex A. Juss. in Arch. 1'us. Par. iii. (1843) 356 = Brachypterys borealis.
brachyptera, DC. Prod. i. 691=Brachypterys borealis.
bracteata, DC. 1. c. 590=Tetrapteris inaequalis.
brempes, Sesse, ex DC. Prod. i. 591 - Gaudichaudia brevipes.
Caapi, *Spruce, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. m. 43.—Bras.
caerulea, Lam. Encyc. i. 867 = Heteropteris caerulea.
Caldtrapa, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 40=Brachypterys borealis.
calocarpa, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 58.—Guiana,
campestris, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 86.—Bras.
chrysophylla. Lam. Encyc. i. 368 = Heteropteris chrysophylla.
ciliata, Lam. 1. c. 869=Stign>aphyllon ciliatum.
cinerascens, *Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 18.—Guiana.
Clausseniana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii; (1843) 422.—Bras.
coccinea, *Veil. Fl. Flum.* 191. iv. 1.161.—Bras.
comans, Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (184S) 406=stellaris.
constricta, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. ill. 46.—Bras.
convolvulifolia, Cav. Diss. ix. 428. t. 256 -Stigmaphyllon convolvurifolium.
cordata, Veil. Fl. Flum. 191; iv. t. 163-rotundifolia.
cordistipula, *Mart. Herb. Ft. Bras.* 566=-=Peixotoa cordistipula.
coriacea, *C.Dan, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. in. 94.—Bras.
comifolia, *Spreng. Syst.* ii. 388.—N. Granat.
corymbosa, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. 42, in nota.—Bras.
corymbosa, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 18=cinerascens.
crisUta, *Griseb. I. e.* 16.—Guiana.

BAWIBTEBIA:—

crotonifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 36.—Bras.
cujabensis, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 194 = Hiraea cujabensis.
deformis, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 40 = Stigmaphyllon angulosnm.
dichotoma, Linn. Sp. PI. 427=Stigmaphyllon rotundifolium.
dichotoma, DC. Prod. i. 588 •= Stigmaphyllon convolvulifolium.
divaricate, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 412.—Guiana.
diversifolia, Bert, ex DC Prod. i. 588=variifolia.
diversifolia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 159.—Cuba.
eglandulata,Ve\\. FLFlum. 190; iv. 1156 - Tetrapteris crebriflora.
eglandulosa, DC. Prod. i. 590—Heteropteris snberosa.
eglandulosa, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 410.—Bras,
elegans, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 822.—N. Granat.
elliptica, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 161 = Stigmaphyllon ellipticum.
emarginata, *Cav. Diss.* ix. 425. t. 249.—Am. austr.
eriantbera, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 411.—Bras.
fagifolia, DC Prod. i. 690=Hiraea fagifolia.
ferruginea, *Cm. Diss.* ix. 424. t. 248.—Bras.; Guian.
ferruginea, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 partim= Tetrapteris Seemanni.
fimbriata, Veil. Fl. Flum. 192 ; iv. 1.166.—Bras.
fimbriata, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 191-nigrescens.
Fischeriana, *Regel V Koern. Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1858) 48.—Cuba,
floribunda, *DC. Prod.* i. 689.—Bras.
fruticosa, Veil. Fl. Flum. 192; iv. 1.164 = Heteropteris umbellata.
fulgens, DC. Prod. i. 590 = Stigmaphyllon puberum.
fulgens, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 181=ferruginea.
fulgens, *Linn. Sp. PI.* 427.—Ins. Guadalup.
fulgens, Lam. Encyc. i. 368=Stigmaphyllon fulgens.
Gardneriana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 420.—Bras.
glandulosa, Pav. ex A. Juss. L c. 478 = Heteropteris rubiginosa.
glauca, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 408=Stigmaphyllon ciliatum.
glaucophylla. Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1848) 319 = Verrucularia glaucophylla.
grata, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. m. 49.—Bras.
heterophylla, Willd. Sp. PI. ii. 742-Stigmaphyllon fulgens.
heterostyla, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 408.—N. Granat.
hexandra, Veil. Fl. Flum. 188; iv. t. H9=Schwannia elegans.
Humboldtiana, DC. Prod. i. 688=Stigmaphyllon Humboldtianum.
hypericifolia, *A. Juss. in St. Hil; Fl. Bras. Mer.* iii. 42.—Bras.
intermedia, A. Juss. in Arch. Mns. Par. iii. (18481 404-stellaris.
jasminellum, *A. Juss. I. c.* 409.—N. Granat.
Kraussiana, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) I. 296.__Afr. austr.
laevifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii 88.—Bras.
lancifolia, West, ex Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 81—Heteropteris laurifolia.
latifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 40.—Bras.
laurifolia. Linn. Sp. PI. ed. II. 611-Heteropteris laurifolia.
laurifolia, Rich, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par, iii, (1843) 880-Stigmaphyllon periplotifoljum.
laurifolia, Sieber, ex A. Juss. 1. c. 294= Byrsonima spicata.
ledifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ,. 169.-Cuba.
leiocarpa, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* lii. (1848) 395.—Peruv.
leona, *Cav. Diss.* ix. 424 (sp. dubia).-Afr. tiop.

BANISTEBIA:—
lobulata, *E. Aley. in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. II. (1825) 813.—Guiana.
longifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 75 = Heteropteris platyptera.
lncida, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 109.—Guiana.
lupuloides, Linn. Sp. PI. 427 = Gouania. domingensis.
lutea, *Ruit, ex Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 15.—Peruv.
macradena, *DC. Prod.* i. 590.—Guiana.
nuurocarpa, Pen. Syn. i 507 = Heteropteris platyptera.
macrophylla, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 418.—Bras.
macrostachia ,Vell. Fl. Flam. 189 ; iv. 1.152 - Claasseniana.
magnoliaefolia, Desv. ex Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 40 = Heteropteris platyptera.
maracabensis, A. juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 418 =comifolia.
maritima, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109 = Brachypterys borealis.
Maitiniana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 413.—Guiana.
mediterranea. Veil. Fl. Flum. 191; iv. t. 162=Janusia muricata.
megacarpos, Veil. 1. c. 189; iv. t 189 - Stigmaphyllon tomentosum.
megaphylla, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 3'J9.—Bras,
membranifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 39.—Bras.
metallicolor, *A. Juss. I. c.* 46.—Bras,
microphylla, *Jacq. Obs.* iii. *T.* t. 56.—Carolin.
Minarum, Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 403-schizoptera.
monoptera, Veil. Fl. Hum. 189; iv. L153 = Heteropteris chrysopbylla.
montana, A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 37 = campestris.
mucronata, DC. Prod. i. 589= Stigmaphyllon ellipticum.
multialata, Veil. Fl. Flum. 189; iv. t. 154=Tetrapteris punctulata.
multiflora, Boj. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 424 =Sphedamnocarpus mudagascariensis.
multiflora, DC. Prod. i 589 = Heteropteris platyptera.
multifoliolata, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 402.—Bras.
muricata, *Cav. Diss.* ix. 423. t. 243. f. 2.—Peruv.
mutabilis. Veil. FL Flum. 193; iv. t. 168=Thryallis brachystachys.
nigrescens, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 44.—Bras.
nitens, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 198=argyrophylla.
nitida, Veil. Fl. Flam. 188; iv. 1.148=Stigmaphyllon ciliatum.
nitida, Lam. Encyc i. 369 = Heteropteris nitida.
nitrosiodora, *Griseb. in Coett. Abh.* xxiv. (1879) 65.—Reg. Argent,
nummifera, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 391.—Bras.
ochnaefolia. Mart, ex A. Juss. 1. c. 464-Heteropteris byrsonimaefolia.
orinoccensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 162.—Venezuela.
ovata, Cav. Diss. ix. 429. t. 257. f. 1»Brachypterys borealis.
oxyclada, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 396.—Bras.
Pagua, Stead. Norn. cd. II. i. 184=Heteropteris syringaefolia.
palmata, *Cav. Diss.* ix. 430. t 257-£ 2.—Am. austr.
paniculata, DC. Prod. i. 591 = Heteropteris Beecheyana.
parviflora, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii (1843) 416.—Bras.
parvifolia, Vent. Choix, 51 = Heteropteris parvifolia.
patens, Griseb. in linnaea, xiii. (1889) 200'Heteropteris patens,
pauciflora, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 159.—Cuba,
periplocaefolia, *Desf. Tail.* ed.II. 160 =»Stigmaphyllon retnsum.
picta, H. B. &K. Nov. Gen. et Sp. v. 160-Brachypterys borealis.

BAHTBTEBIA:—
platyptera, *Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 17.—Venezuela,
podadena, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) I. 392.—Cuba,
polita, *Miq. in Verh. Nat. Wet. Haarl.* vii. (1851) 80. t. 21.—Guiana,
praecox, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 133.—Bras.
Pragua, Veil. Fl. Flam. 190; iv. t. 138=Heteropteris syringaefolia.
pminosa, *Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 392.—Bras.
pubera. Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109=Stigmaphyllon puberum.
pubiflora, DC. Prod. i. 591=Heteropteris laurifolia.
pubipetala, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 41. t. 169.—Bras.
purpurea. Linn. Sp. PI. 427 = Heteropteris pnipurea.
Quapara, *Aubl. PL Gui.* i. 464. t. 186.—Guiana.
Riedeliana, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1855) 17.—Cuba,
rigida, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 416.—Bras.
sagittate, *Cav. Diss.* ix. 430. t. 257__Ins. S. Doming.
salicifolia, *DC. Prod.* i. 590.—Bras.
schizoptera, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 43.—Bras.
Schlimii, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc.xa.vi.* (1863) I. 584.—N. Granat.
Schombargkiana, *Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* vii. (1848) 129.—Guiana,
schwannioides, *Griseb. in Mart. Fl. Bras,* xii III. 54.—Bras,
scntellata, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 181.—Bras.
Sellowiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 419.—Bras.
sepinm, *Mart, ex A. Juss. 1. c.* 414.—Bras.
sericea, Cav. Diss. ix. 429. t. 258 = Heteropteris sericea.
sericea, Dombey, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 394=acanthocarpa.
sinemariensis, Aubl. PI. Gui. i. 462. t. 185=Stigraaphyllon puberum.
sinnata, *DC. Prod.* i. 588.—Guiana.
solitaria, Veil. Fl. Flum. 189; iv. t. 151 = Hiraea Salzmanniana.
Spixiana, Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 561 = Heteropteris saberosa.
splendens, DC. Prod. i. 588"Stigmaphyllon fulgens.
Spruceana, *Griseb. in Mart. Fl. Bras,* xii III. 45.—Bras.
stellaris, *Griseb. in Linnaea,* xiii. (1839) 192.—Bras.
subcordata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 336=adenopoda.
suberosa, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 184 = Heteropteris iuberosa.
tenuis, Lindl. in Bot. Reg. (1838) Misc. 72 = Heteropteris nmbellata.
terminalis, *Veil. Fl. Flum.* 192 ; iv. t 166.—Bras.
ternata, Veil. 1. c. 190; iv. t. 159=trifoliata.
ternata, Sesse, ex DC. Prod. i. 691'Stigmaphyllon ellipticum.
tetraptera, Sooner. Voy. Indes, iii. 270=Hiptage Madablota.
thyrsoidea, Griseb. in Linnaea, xiii (1839) 199 = Heteropteris thyrsoidea.
tiliaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.v. 162 =Stigmaphyllon Hnmboldtianum.
tiliaefolia, *Vent. Choix,* 50. t 50.—Java,
timoriensis, *DC. Prod,* i 588.—Ins. Timor.
tomentosa, Desf. TabL ed. II. 160=emarginata.
tomentosa, Salzm. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 888=Stigmaphyllon rotundifolium.
tomentosa, Schlecht. in Linnaea, x. (1833) 244= Heteropteris Beecheyana.
triflora, Veil. Fl. Flam. 190; iv. t. 156-crotonifolia.
trifoliate, *Steud. Norn.* ed. II. i 184.—Bras.
tristellocarpa, Boj. ex A. Joss, in Arch. Mas. Par. iii. (1843) 498 = Tristellateia Bojeriana.
umbellata, Sieber, ex A. Juss. 1. c. 356=Brachypterys borealis.
nmbellnlata, *DC. Prod.* i. 688.—Ins. S. Doming.
umbellulata, Sieber, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii (1843) 42 = Byrsonima trinitensis.
unialata, Veil. H. Flum. 190; iv. 1.167=B. ferruginea.
unicapsularis, Lam. Encyc. i. 867 = Hiptage Madablota.

BANISTEBIA:—
varia, Spreng. Syst. ii. 886=variifolia.
variifolia, *DC. Prod.* i. 588.—N. Granat.
velutina, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 401" crotonifolia.
vemoniaefblia, *Mart, ex A. Juss. 1. c.* 398.—Bras,
verruculosa, *Sw. Ann. Bot. Posth.* 31.—Ind. occ.
virgultosa, Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 414 «= pubipetala.
mitifolia, Sesse, ex DC. Prod. i. 588=variifolia.
volubilis, Endl. ex Heynh. Norn. ii. 69=Hiraea Simsiana.
taneibarica, Boj. ex Steud. Nom. ed. II. i. 184 = Acridocarpus zanzibaricus.

BANIUM, Ces. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 882 (1872) = Carum, Linn. (Umbell.).
ligusticifolium, Ces. ex Boiss. L c.=C. multiflorum.

BANJOLEA, Bowdich, Madeira, 258 (1825). *ACANTHACEAE* ? (Genus omnino dub.),
violacea, *Bowdich, I. c*—Madera.

BANKESIA, Bruce, Trav. ed. II. vii. 181 (1805;-Brayera, Kunth (Rosac).

BANKSEA, Koen. in Retz. Obs. iii. 75 (1783) = CostUfl. Linn. (Scitamin.).
speciosa, Koen. 1. c.=C. speciosus.

BANKSIA, Bruee, Trav. ed. II. vii. tt. 22,23=Brayera. Kunth (Rosac).
abyssinica, 'Bruce', ex Steud. Nom. ed. II. i. 184 = Brayera anthelmintica.

BANKSIA, Domb. ex DC. Prod. iii. 83 (1828) - Cuphea, P. Br. (Lythror.).
ciliata, Domb. ex DC. 1. c. 88 = C. microphylla.
glutinosa, Domb. ex DC. 1. c. =C. cordata.

BANKSIA, Forst. Char. Gen. 7.t. 4 (1776) -Pimelea. Banks (Thymel.).
Gnidia, Forst. 1. c. 8-P. Gnidia.
pilosa, Forst. f. in Nov. Act. Upsal. iii. (1780) 174 = P-pilosa.
prostrata, Font. Char. Gen. 8 = P. prostrata.
tomentosa, Foist. 1. c.=P. pilosa.

BANKSIA, Linn. f. Stippl. 15, 126(1781). *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 184.
ISOSTYLIS, R. Br. ex Steud. Nom. ed. II. i. 829 (1840).
aemula, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 209.—Austral.
aemula, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 461 =• serrata.
aquifolia, Lindl. Swan Riv. App. 34 = ilicifolia.
asplenifolia, Salisb. Prod. 51=integrifolia.
asplenifolia. Knight, Prot. 113 = marcescens.
attenuata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 209.—Austral.
australis, R. Br. 1. c. 205=marginata.
barbigera, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 264-Goodii-
Baueri, *R. Br. Prot. Nov.* 85.—Austral.
Baxteri, *R. Br. I. c.* 86.—Austral.
blechnifolia, F. Muell. Fragm. iv. 108=repens.
Brownii, *Baxter, ex R. Br. Prot. Nov.* 37.—Austral.
Caleyi, *R. Br. I. c.* 35.—Austral.
Candolleana, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 118.—Austral,
coccinea, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 207--' Austral.
collina, *R. Br. I. c.* 204.—Anstral.
compar, R. Br. 1. c. 207 = integrifolia.
conchifera, Gaertn. Frnct. i. 221. t. 48=serrata.
cuneifolia, Hoffm. in Roem. & Schult Syst iii Mant. 879=integrifolia.
cuneifolia, *Wendl.f. ex Hoffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* »• 64.—Austral
Cunninghamii, Sieber, hi Spreng. Syst iv. Cur. Post-47 = collina.
cylindrosiachya,IAaAl.Sinn Riv.App. 34=attenuata.
dactyloides, Gaertn. Fruct. i. 221. t. 47. f. 2 - Hakea dactyloides.
dentata, *Linn./. Suppl.* 127.—Austral.
dentata, Wendl. Hort Herrenh. t. 8=serrata.
denticulata, Dam-Coun. Bot. Colt ed. II. vii. 108 - spinalosa.

BANKSIA:—

depressa, R. Br. in Trans. Linn. Sot x. (1811) 205 - marginata.
dilleniae/olia, Knight, Prot. 113=latifolia.
•lryandroides, *Baxter, in Sweet, Fl. Austral-* t. 56.—Austral
'lotior, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 209 = acmula.
elegans, *Meissn. in Hoot. Kew Journ.* vii. (185B) 119.—Austral.
ericaefolia, *Linn./. Suppl.* 127.—Anstral.
/'gtfolia, Hoffm. ex Roem. &. Schnlt. Syst Hi. Mant. 378-latifolia.
ferrea, Vent, ex Spreng. Syst. i. 485=marginata.
gtbbosa, Sm. in White, Voy. 224. t. 22. f. 2 = Hakea gibbosa.
glauca, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1789) 230-integrifoliii.
Goodii, *R. Br. Prot. Nov.* 36.—Austral.
grandidentata, Dnm.-Coors. Bot. Cult, ed, II. mi. 108 -speciosa.
Brandis, *mild. Sp. PI.* i. 535.—Anstral.
Guentheri, *Rtgri, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 37; *Gartenfi.* (1858) 5O.-Austral.
Gunnii, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 210 = marginata.
hetnophylla, Hort ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 466= Hakea snaveolens.
Hmktri, Drumm. in Comp. Bot Mag. (1848) 1 = Solandri.
Hookeriana, *Meissn. in Hook. Kew Joum.* vii. (1855) 119.—Austral.
Hoegelii, *R. Br. ex Endl. Gen. Suppl.* iv. n. 89.—Austral.
hpoleuca,HoBmgg. Verz. Pfl.Nachtr. ii. 66 = marginata.
•licifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 211.-Austral.?
insularis, R. Br. I. c. 206-marginata.
uHegetrima, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. II. ii. 421; vii. 108.—Austral.?
integrifolia, Labill. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 456 = marginata.
•ntegrifolia, *Linn.f. Suppl.* 127.—Austral.
'Htegrifolia, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847; 584-australis.
laevigata, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 21O.-Austral.
latifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 208.—Austral.
ledifolia, A.Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. «4 = (-unninghamii.
Lemanniana, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 210.—Austral.
^Wdleyana, *Meissn. I. c.* vii. (1855) 120.—Austral.
Mtoralis, Lindl. in Bot. Reg. t. 1868=collina.
>«torali5(*R. Br.in Trans. Linn. Soc. x.* (1811) 204.-Austral.
bngifolia, D. Dietr. Syn. i. 538-latifolia.
bngifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 184 = oblongifolia.
*lo*gifolia,* Don, ex F. G. Dietr. Vollst. Gaertn. Lexik. a. 150 = serrata.
*"uurop*AyWo.Iink, Enum. Hort. Berol. i. 116-integrifolia.
""•rceseens, Bonpl. Jard. Malm. 116. t. 48-marginata.
narcescens, Hook. Bot. Mag. t. 2803-australis.
•"areescens, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 208,-Austral.
""fginata, COT. *in Anal. Hist. Wat.* i. (1799) 227.—Austral,
""arginata, if. *Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 204.—Austral.
"•**«• Hook. f. Fl. Tasm. i. 329-serrata.
"Mia, *R. Br. Prot. Nov.* 35.—Austral.
{Jassneri, *Lehm. PI. Preiss.* i. 582.—Anstral.
Mmziesii, *R. Br. Prot. Nov.* 36.—Austral.
-ucrostachya, Cav. in Anal. Hist. Nat i. (1799) 224-
"Wmesoides, *Hort. Cantabr. ex F. G. Dietr. Vollst. Gaertn. Lexik.* ii. 15O.-AustraL
,"« Knight, Prot. 112=senate.
""Mculifonnis, *Gaertn. Fruct.* i. 221.-Austral.
"«wa, Labill. Voy. i. 411. t. 24-Dryandra nivea.
"Wans, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 203.-Austral.
oblongif$_{olia>}$ COT. *Anal. Hist. Nat.* i. (1799) 225.-Aostal.
OHSi/olia, Lodd. Bot Cab. t 241-marginata.

BANXSIA:—

occidentalis, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 204.—Austral.
oteaefolia, Cav. in Anal. Hist. Nat i. (1799) 228. t. 14=integrifolia.
oleaefolia, Salisb. Prod. 51-Hakea dactyloidei.
omata, *F. Muell. ex Meissn. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 852.—Auftral.
paludosa, R. Br. in Trans, linn. Soc. x. (1811) 207 = integrifolia.
patula, R. Br. 1. c. 205-marginata.
petiolaris, *F. Muell. Fragm.* iv. 109.—Austral.
phylieaefdia, Salisb. Prod. 61-ericaefolia.
pinifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. (1855; 118—sphaerocarpa.
pinifolia, Salisb. Prod. 51=Hakea gibbosa.
pinnata, Hort. Cels, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 444 - Hakea pinnata.
pinnatisecta, F. Muell. Fragm. vii. 58=repens.
polypodiifolia, Knight, ProL 113 = repens.
praemorsa, Andr. Bot. Rep. t. 258-marcescens.
praemorsa, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult vii. ed. II. 107-marginata.
prionophylla, F. Muell. 1st Gen. Rep. 17 = collina.
prionotes, *Lindl. Swan River App.* 34.—Austral.
procumbens, Hort ex Dum.-Conre. Bot Cult. ed. II. vii. 107=dentata.
prostrata, *R. Br. Prot. Nov.* 36.—Austral,
pubescens, *Donn, ex Roem. V Schult. Syst.* iii. 444.—Austral,
pulchella, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 202.—Austral.
pyriformis, Gaertn. Fruct. i. 220. t. 47-Xylomelum pyriforme.
quercifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 210.—Austral.
repens, *Labill. Voy.* i. 412. t. 23.—Austral.
reticulata, Hoffm. in Roem. & Schult. Syst. Mant. iii. 379=integrifolia.
reticulata, *Wendl. f. ex Hoffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* ii. 67.—Austral.
Robur, Cav. in Anal. Hist Nat. i. (1799) 226 -latifolia.
salicifolia, Cav.I.e. 230-integrifolia.
Sceptrum, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 120.—Austral
serrae/olia, Knight, Prot. 112=aemula.
serrata, *Linn.f. Suppl.* 126.—Austral.
serrata, Cav. Ic. vi. 27. t. 540-aemula.
serratifolia, Salisb. Prod. 51->aemula.
Solandri, *R. Br. Prot. Nov.* 36.—Austral.
speciosa, Lindl. in Bot. Reg. 1.1728 = Victoriae.
speciosa, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 210.—Austral.
sphaerocarpa, *R. Br. 1. c.* 203.—Austral.
spicata, Gaertn. Fruct. i. 221. t. 48=integrifolia.
spinulosa, 5M. *New Holl. PI.* i. 13. t. 4.—Austral.
tenuifolia, Salisb. Prod. 50 = Hakea aricularis.
teretifolia, Salisb. 1. c. 51-Hakea pugionifoimis.
tomentosa, *F. Muell. in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 327.—Austral.
tomentosa, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 454 - littoralis.
tricuspis, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 118.—Austral.
tridentata, *Meissn. 1. c.* 120.—Austral.
uncigera, Knight, Prot. 112=latifolia.
undulata, Lindl. in Bot. Reg. 1.1316-serrata.
verticillata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 207.—Austral.
Victoriae, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 119.—Austral.

BANNISTERIA, Linn. Gen. ed. 1.377 (1737)-Banisteria, Linn. (Malpig.).

BANNISTERIOIDES, Linn. FL ZeyL 192 (1747) = Fella, Gaertn. (Inc. sed.).

BAOBAB, Mill. Gard. Diet ed. VI. 175 (1762)=Adansonia, Linn. (Maivac).

BAFHIA, Afzel. ex Lodd. Bot. Cab. t. 367 (1825)-*LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 563.
BRACTEOLARIA. Hochst. in Flora, xxiv. (1841) II. 688.
CARFOLOBIA, G. Don, Gen. Syst. i. 370 (1831).
DELARIA, Desv. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* I. ix. (1826) 406.

BAPHIA:—

angolensis, *Wrlw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. A/r.* ii. 249.—Afr. trop.
haematoxylon, Hochst. ex Hook. Niger Fl. 321= nitida.
Heudelotiana, *Baill. Adansonia,* vi. (1866) 216.—Afr. trop.
Kirkii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. A/r.* ii. 250.—Afr. trop.
lauri/olia, Baill. Adansonia, vi. (1866) 218=pubescens.
leptostemma, Baill. 1. c. 214-nitida.
maxima, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. A/r.* ii. 250.—Afr. trop.
nitida, *Lodd. Bot. Cab.* t 367.—Afr. trop.
pilosa, *Baill. Adansonia,* vi. (1866) 216.—Afr. trop.
polygalacea. *Baker, in Oliver, Fl. Trop. A/r.* ii. 248.—Afr. trop.
pubescens, *Hook./, in Hook. Niger Fl.* 820.—Afr. trop.
pyri/olia, Baill. in BulL Sot. Linn. Par. i. (1885) 445-polygalacea.
racemosa, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) II. 638.—Afr. trop.
spathacea, *Hook./, in Hook. Niger Fl.* 820.—Afr. trop.

BAFHIOPSI8, Bentb. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 256 (1871). *LEGUMINOSAE.*
parviflora, *Benth. ex Baker, 1. c.*—Afr. trop.

BAPHORHIZA, Link, Handb. i. 678 (1829) - **Alkanna,** Tausch (Borag.).
tinctoria. Link, 1. c - A . tinctoria.

BAPTISIA, Vent. Dec. Gen. Nov. 9 (1808)., *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 466.
CROTALOPSIS, Michx. ex DC. Prod. ii. 100, in syn. (1825).
EAPLOSIA, LASINIA, PERICAULON, RIPASIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 48-51 (1836).
alba, Hook. Bot. Mag. t. 1177=leucantha.
alba, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 6.—Am. bor.
albiflora, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 47.—Am. bor.
auriculata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 123.-Am. bor.
australis, Hort. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xiv. (1829) 808-minor,
australis, *R. Br. in Ait. Hort. Km.* ed. II. iii. 6.—Am. bor.
bractfata, Muhl. ex Ell. Sketch, i. 469 - leucophaea.
caerulea, Eaton & Wright, Man. N. Am. Bot. 154—australis.
calycosa, *Engelm. in Coult. Bot.* Ga*. iii. (1878) 66.—Florida.
con/usa, Sweet, ex G. Don, Gen. Syst. it 113-australis?
exaltata, Sweet, Brit. Flow. Gard. i. t. 97=australis.
/raxini/olia, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 387, in obs. = Thermopsis fraxinifolia.
lanceolata, *Ell. Sketch,* i. 467.—Am. bor.
Lecontii, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 386.—Florida,
leucantha, *Torr. tf Gray, 1. c.* 885.—Am. bor.
leucophaea, *Nutt. Gen. Am.* i. 282.—Am. bor.
lupinoides, *Burbidge, in Gard. Chron.* (1884) 1.837.—Am. bor. t
megacarpa, *Chapm* ex Torr. V Gray, Fl. N. Am. i.* 386.—Florida,
microphylla, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1884) 97.—Florida.
minor, Lehm. in Nov. Act Nat. Cur. xiv. (1829) 808-australis.
mollis, DC. Prod. ii. lOOt, Thermopsis mollis.
mollis, Nutt. Gen. Am. i. 281 - Thermopsis fraxinifolia.
nepalensis. Hook. Exot. Fl. t 181-Piptauthus nepalensis.
perfoliata, *R. Br. in Ait. Hort. Kim.* ed. II. iii. 5._ Am. bor.
retusa, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 47.—Am. bor.
Serenae, *M. Curt, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. vii, (1849) 406.-Am. bor.
simplicifolia, *Croom, in Am. Journ. Sc.* xxv. (1834) 74.—florida.
sphaerocarpa, *Nutt. in Journ. Acad. Klad.* TB. (1834) 97.—Texas.
stipulacea, Ravenel, in Elliot Soc. Nat. Hut. i. (1856) t. 2-microphylla.

BAPTI3IA:—
sulphuiea, *Engelm. in Coult. Bot. Gaz.* **iii. (1878) 65.—Am. bor.**
texana, **Bockl. in Proc. Acad. Sc. Philad.' 1861' (1863) 452=anstralis?**
tinctoria, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* **ed. II. iii. 6.—Am. bor.**
uniflora, **Sprang. Syst. ii. 847=lanceolata.**
uniflora, *Nutt. Gen. Am.* **i. 281, nomen=praec.?**
versicolor, **Lodd. Bot. Cab. 1.1144=australis?**
versicolor, *Rafin. New Fl. Am.* **iv. 107, nomen.—Am. bor.**
villosa, *Nutt. Gen. Am.* **i. 281.—Carolina.**

BAPTISTONIA, Barb.-Rodr. Orch. Nov. i. 95 (1877). *ORCHIDEAE.*
echinata, *Barb.-Rodr. I. c*—Bras.

BARANDA, Llanos, in Mem. Acad. Gene. Madr. ii. (1859) 502 = Barrlngtonia, Forst. (Myrtac).
angatensis, **Llanos, 1. c. =• B. macrostachya.**

BARATRANTHUS, Miq. Fl. Ind. Bat. i. *I.* 884 (1855) = Hioranthus, Linn.
axanthus, **Miq. 1. c.—Sumatra.**

BARATTIA, A. Gray *Sc* Engelm. in Proc Am. Acad. i. (1848) 48=Encelia, Adans. (Compos.).
calva, **A. Gray & Engelm. 1. c.=E. calva.**

BARAULTIA.Spreng. Syst. ii. 318 (1825)=Barraldeia, ThoD.

BARBACENTA, Vand. Fl. Lusit. & Bros. Spec. 21. t. 1 (1796). *AMARYLLIDEAE,* Berth. & Hook. f. iii. 740.
CAMPDERIA, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. vii. 155 (1825).
PLEUROSTIMA, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 97 (1836).
RADIA, A. Ricb. in Kunth, Syn. PI. Aeqnin. i. (1822).
VISNEA, Stend. ex Endl. Gen. 173 (1836).
Alexandrinae, *Schtmsb. -ex Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 13.—Guiana.
bicolor, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* **i. 19. t. 13.—Bras.**
brasiliensis, **AVilld. Sp. PI. ii. 227=Vandellii.**
coccinea, *Mart, in Schult.f. Syst.* **vii. 286.—Bras,**
ensifolia, *Mart. I. c*—Bras,
exscapa, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* **i. 21. t. 14.—Bias,**
flava, *Mart, ex Steud. Norn.* **ed. II. i. 185.—Bras.**
Gardneri, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* **iii. I. 70. t. 8. f. 5.—Bras.**
glauca, *Mart, in Schult.f. Syst.* **vii. 238.—Bras.**
graeilis, **Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc xviii. (1881) 239=Dasylirion acrotrichnm.**
ignea, *Mart, in Schult.f. Syst.* vii. 285.—Bras,
longiflora, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* **i. 19. t. 12.—Bras,**
lnzulaefolia, *Mart, in Schult. f. Syst.* **vii. 285.—Bras.**
macrantha, *Lent. Jard. Fl.* **iv. (1854) t 390.—Bras,**
purpurea, *Hook. Bot. Mag.* **t. 2777.—Bras.**
Jtogierii x, **Hort. ex Moore & Ayres, Mag. Bot. ii. (1850) 209.—Bras,**
rubro-virens, *Mart. Nm. Gen. etSp.* **i. 20. t. 14. f. 1.—Bras.**
schidigera, *Lem. Jard. Fl.* **ii. (1852) 1.198.—Bras,**
squamata, *Lindl. in Bot. Reg.* **(1843)** *Misc.* **64.—Bras,**
tomentosa, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* **i. 18. t. 11.—Bras,**
tricolor, *Mart. It c.* **18. t. 10.—Bras.**
Vandelli, **Schnlt. f. Syst vii. 289-glauca.**
Vandellii, *Pohl, ex Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 72.—Bras.

BARBA-JOVIS, Adans. Fam. it 321 (1763) - Anthyllis, Linn. (Legnmin.).
argyrophylla, **Moench, Meth. 110=A Barba-Jovis.**
linearifolia, **Moench, Meth. Suppl. 38=A. Hermanniae.**
montana, **Moench, 1. c. 37=A. montana.**
tragacanthoides, **Medic, in Vorles. Churpf. Phyi. Ges. ii. (1787) 347 - Astragalus armatus?**

BARBAREA, Scop. Fl. Cam. ed. I. 622 (1760)=Dentarla, Linn. (Crucif.).

BARBAREA, R. Br. in Ait Hort. Kew. ed. II. iv. 109 (1812). *CRUCIFERAE.* Benth. & Hook. £ i. 68.
CAMPE, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 199 (1867).

BABBABEA:—
alpina, *C. Koch, in Linnaea,* **xix. (1847) 319.—As. Min.**
altaica, **Andn. ex Stend. Nom. ed. II. i. 185=arcuata.**
arcuata, **Andrz. ex DC. Prod. i. 141=taurica.**
arcuata, *Reichb. in Flora,* **v. (1822) 296.—Europ.; As. Min.; As. bor.**
augustana, **Boiss. Diagn. Ser. I.' i. 69-vulgaris.**
australis, **Hook. f. Fl. N. Zel. i. 14=vulgaris.**
australis, **Jord. Diagn. i. 103 = praecox.**
brachycarpa, *Boiss. Diagn.* **Ser. I. v. 80.—As. Min.**
bracteosa, *Guss. Fl. Sic. Prod.* **ii. 257.—Sicilia.**
brevicaulis, **Jord. Diagn. i. 104=rupicola.**
brevistyla, **Jord. 1. c. 102 = praecox.**
cilicica, **Schott** *Sc* **Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i. 185—minor.**
ciliifera, *Steud. Nom.* **ed. II. i. 185, nomen.—Graecia..**
elata, *Hook. f. b" Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 140.—Reg. Himal.
erysimoides, **Schur, Enum. PI. Transs. 41 = praecox.**
heterophylU, *Willk. in Bot. Zeit.* **v. (1847) 217.—Hispan.**
hirsuta, **Weibe, in Flora, xiii. (1830) 257 = vnlgaris.**
humilis, *Presl, Fl. Sic.* **i. 45.—Sicilia.**
iberica, **DC. Syst. ii. 208-arcuata.**
integrifolia, *DC. I.* **c—As. Min.**
intermedia, **Bor. FL Centr. Fr. ed. L ii. 48 (1840)-vnlgaris.**
Kayserii, **Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 57=vnlgaris.**
Linnaei, **Spenn. Fl. Fribnrg. iii. 929=praecox, vnlgaris, tanrica, &c.**
longisiliqua, **Jord. Diagn. i. 103=praecox.**
lyrata, **Aschers. in Fl. Prov. Brandenb. L 85=vulgaris.**
minor, *C. Koch, in Linnaea,* **xix. (1847) 55.—As. Min.; Syria.**
oligosperma, *C. Koch, 1.* **c.319.—Armenia,**
.orthoceras, *Ledeb. Hort. Dorp.* **(1824).—Sibir. altaic.**
palustris, **Hegetschw. Fl. Schw. 654-stricU.**
parviflora, **Fries, Novit. ed. II. 207= stricta.**
patula, **Fries, Nov. Mant. iii. 76 = praecox.**
peiennis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **375.—Algeria,**
planisiliqna, *C. A. Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot.* 14).—Sibir.
plantaginea, *DC. Syst.* **ii. 208.—As. Min.; Persia,**
praecox, *R. Br. in Ait. Hort. Kern.* **ed. II. iv. 109.—Europ.**
prostrata, **J. Gay, jn Ann. Sc. Nat Sér. U. vj. (1836) S48=sicula.**
pyrenaica, **Jord. Diagn. i. 349=v.ulgaris.**
rivularis, **Martr. Fl. Tarn, 44=vulgaris.**
rivularis, *Panl. Elem.* **14.—Servia.**
rupestris, **Steud. Nom. ed. II. i. 185-vulgaris.**
rnpicola, *Moris, Stirp. Sard. Elenc.h.A.* 55.—Sardinia.,
sicula, **Gren.& Godr. Fl. Fr. i. 92 = vnlgaris.**
sicnla, *C. V J. Presl, Delic. Prag.* **17.—Ital.**; As. Min.
stolonifera, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **375.—Algeria.**
stricta, **Fellm. PI. Vase. Lapp. 6 = orthoceras.**
stActa^Andrt. in Bess. Enum. PI. Volh. 72.—Ross. med.
stricta, **Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 583-= vnlgaris.**
sylvestris, **Jord. Diagn. i. 100=vnlgaris.**
taurica, **DC. Syst. ii. 207 - arcuata.**
verna, **Aschers. Fl. Prov. Brandenb. i. 36=praecox.**
vicina, **Martr. Fl. Tarn, 45, in obs.=vulgaris.**
vnlgaris, *R. Br. m Ait..Hort. Kew.* **ed. II. iv. 109.—Europ.; As. temp.**

BARBELLINA, Cass. in Diet Sc. Nat. 1. 440 (1827) = Staohelina, Linn. (Compos.).
sericea, **Cass. 1. c =S. arborescens.**

BARBERTiTTA, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 877 (1868). *HAEMODORACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 674.
anrea, *Harv. I. c.*—Afr. austr.

BARBERINA, Veil. Fl. Flnm. 235 (1825); Ic. v. t 117 (1827) = 8jrmploco8, Linn. (Styrac).
antillana, **Miers, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1880) 294.—Ind. occ**
celastrinea. **Mien, 1. c.=S. celastrinea.**
crenata, **Mien, 1. c.—Bras.**
cubensis, **Miers, 1. c = S. cubensis.**
estrellensis, **Mien,** *I* **c. 298 =S. estrellensis.**
hirsuta, **Veil. Fl. Flnm. 235; v. 1.117-S. hirsuta.**
lanceolata, **Mart Herb. Fl. Bras.n. 723 - S. lanceolata.**
phaeoclados, **Mart. 1. c 724=S. phaeoclados.**

BARBERINA:—
ramentacea,Wiers, **in Journ. Linn. Soc. xvii. (1880) 294-S. ramentacea.**
revoluta, **Mart. Herb. Fl. Bras. n. 832-S. revoluta.**
rhamnifolia, **Miers, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1880) 293=S. rhamnifolia.**
Spruceana, **Miers, 1. c. 295.—Peruv.**
tetrandra. **Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 49 =S. tetrandra.**

BAKBETJIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 6 (1806). *PHYTOLACCACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 85.
madagascariensis, *Steud. Nom.* **ed. II. i. 186.—Madag.**

BARBIERA, Sprang. Gen. it 687 (1831)-seq.

BAK.BIEBIA, DC. Mém. Lég. 241. t. 89 (1825J. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 49S.
maynensis, *Poepp. (f Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 58.—Peruv.
pinnata, **Baill. Hist. PI. ii. 263=polyphylla.**
polyphylla, *DC. Mém. Lég.* **vi. 249. r. 39.—Porto Rico.**

BARBILUS, P. Br. Hist Jrffcaic. 216 (1756) = Trichilia, Linn. (Meliac).

BARBULA, Lour. Fl. Cochinch. 366 (1790)« Caryopteria, Bunge (Verben.).
sinensis, **Lour. 1. c.=C. incana.**

BARBYLUS, Juss. Gen. 430 (1789)=TriohilU, Lin"- (Meliac).
Brownii, J. **F. Gmel. Syst. 611=T. hirtat**
jamaie'ensis, **DC. Prod. ii. 91=T. hirtat**

BARCELLA, Drude, in Mart. Fl. Bras. iii. 459. t. 106-(1881)=ElaeiB, Jacq. (Palm.).
odora, **Drude, 1. c.-JK. odora.**

BABCENA, Dugès, in Rev. Cienc. Mexic. Dec. (1879) 8, cum tab.; et in La Naturaleza, iv. (1879) 281. *RHAMNEAE.*
guanajuatensis, *Dugis, II. cc.*—Mexic.

BARCENIA, Dugès, in La Naturaleza, iv. (1879). 288* praec.

BARCKHAUSENIA, Menke, in Flora, xxvii. (1860 723 = seq.

BARCKHAUSIA.DC. Fl. Fr. vi. 449 (1815) = BARK" HAUSIA, Moench = Crepis, Linn. (Compos.).

BARCLAY A, Wall, in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 442.1.18. *NYMPHAEACEAE,* Benth. & Hook. «• i. 47.
longifolia, *Wall. 1. c.*—Burma.
Mottleyi, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (186* 157. t. 21. f. 1-5.—Borneo.
oblonga, **Wall. Cat n. 699=longifolia.**

BARpANA, Hill, Veg. Syst iv. 28 (1762) - Aretium. Linn. (Compos.).
Arctium, **Hill, Hort. Kew.,64 = A. majus.**
Lappa, **Hill, Herb. Brit. i. 79-A. majus.**
minor, **Hill, Hort. Kew. 64-A. minus.**

BARERIA, Jnss. in Diet Sc. Nat. iv. 64 (1804),- BARRERIA,Scop,=Poraqueiba, AubL (Olaciiw-

BABGEMONTIA, Gandich. Voy. Bonite, t. f-('1889-46'). *CONVOLVULACEAE,* Benth. * Hook. f. ii. 880.
peruviana, *Gaudich. L c.*—Pernv.

BARHAMIA, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 1°* (1852 ?) = Croton, Linn. (Euphorb.).
essequibolnsis, **Klotzsch, 1. c. = C. populifolins.**
hispida, **Klotzsch, 1. c.=C. populifolius.**
macrostachya, **Klotzsch, 1. c.-C. populifolius.**
multispicata, **Klotzsch, 1. c—C. urticaefolius.**
ovalifolia, **Klotzsch, 1. c = C. ovalifolius.**
panamensis, **Klotzsch, 1. c = C. populifolius.**
urticaefolia, **Klotzsch, L c. »C. urticaefolius.**

BABJONIA, Daae. in DC. Prod. via. 812 (1844). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 771.
chloraefelia, *Dane. 1. c*—Bras,
cymosa, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 206.- Bras.
deltoidea, Decne. ex Fonrn. 1. c. 205=racemosa.
lineans, *Decne. in DC.Prod.* viiL 512,—Bras,
obtusifolia, *Fount, in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 206.—Bras.
"oanosa, *Decne. in DC. Prod.* viii. 612.—Bras.
Waraungii, *Fount, in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 206.—Bras.

BARKANIA, Ehrenb. [ex Reichb. Consp. 43 (1828)] in Abh.Acad. Bert. (1882) 429 = Halophila, Thou. (Hydroch.).
bullata, Efirenb. ii Abh. Acad. Berl. (1832) 429=H. bullata.
punctata, Ehrenb. Symb. 5, ex Pritz. Ic Ind. Snppl. 42 = H. ovata.
stipulacea, Zanard. in Mem. 1st. Venet. vii. (1857) 226=H. stipulacea.

BARKERIA, Knowles & Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 7. t. 49=Epidendrum, Linn. (Orchid.).
Barkeriola, Reichb. f. in Gard. Chron. (1884) H. 616 = E. Barkeriola.
VdoMla, Reichb. f. 1. c (1880) I. 72-E. cycle tellnm.
tlegans, Knowles & Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 7 = &. elegant.
Lindleyana, Batem. ex LindL in Bot. Reg. (1842) Misc. 2=E. Lindleyanom.
melanocaulon, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. Hi. (1845) 22~E. melanocaulon.
Sktnneri, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 1=E. Skinneri.
spectabilis, Batem. in Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 43-E.spectabile.
Vanneriana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1885) H. 678 =E. Vannerianum.

BARKHAUSENIA. Schnr, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, *!• "• (1877) 69 = BORCKHAUSENIA, Gaert. Mey. & Scherb.=Coiydalis, Vent. (Papav.).

BARKHAUSIA, Moench, Meth. 537 (1794) = Crepis, "nn. (Compos.).
oculeata, DC. Prod. vii. 159 = C. aculeata.
"aenothrix, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 465=C.Rueppel&i.
albida, Cass. in Diet Sc. Nat xxvi. 62-C. albida.
<upina, DC. Fl. Fr. ed. III. iv. 41-C. alpina.
"inplexicaulis, Coss. & Dur. ex Coss. in Ann. Sc Nat. Ser. IV. L (1854) 232.—Algeria.
* *amplexifolui,* Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Méd.) «. (1858) 437 = C. amplexifolia.
amygdalina, Lag. ex Stend. Nom. ed. II. i. 186 = C. foetida.
"pargioides, Spreng. Syst. iii. 652 - Chondrilla eltidium.
arenaria, Pomel, Nonv. Mat. Fl. Atl. 4-C. arenaria?
"sptra, Reichb. in Moessl. Handb. ed. ft it 1405=C. aspera.
'friculi/ ilia, Reichb. 1. c. 1410, in note = C. incaraatal
fftO'M, DC. Prod. vii. 156 = C. bursifolia.
""earica, Costa, Barcin. (1861) 6 = C. balearica.
M'idi/olia, DC. Fl. Fr. v. 449 = C. bellidiiblia.
otvoniana, Reichb. in Moessl, Handb. ed. II. ii 1408. —Europ.
wsifolia, Spreng. Syst. iii. 688-C. bnrsifolia.
Oyantina, DC. Prod. vii. 158=C. foetida.
c&spitosa, Moris. Fl. Sard. 92=C. caespitosa.
f-andollei, Spreng. Syst. iii. 657 = C. foetida.
" ^ M , Spreng. 1. c. 653, snb n. 16=C. bursi—
carbonaria, Sch. Bip. in Mas. Senck. iii. 64 = C. carbonaria.
"tnliniano, Nntt. Gen. Am. it 126-Pyrrhopappus carolinianns.
"•"*«. Reichb. in MoessL Handb. ed. II. ii. M0B-C neglecta.
"•ondrilloides. Bluff & Finegrh. Comp. ii. 804=C. /oeniculacea:
cluutocephala, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. vii. - (18515 384; (Lefrm. Reliq. Bot. 208).-Turkest.
Uausonis, Pomel, Nouv. Mat. FL Atl. 4.—Algeria.

BARKHAUSIA:—
comata, Lowe, in Trans. Camb. PhiL Soc iv. (1831) 27 = C. comata.
cretica, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 68-C. cretica.
decumbent, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 332=C. decumbens.
divaricata, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 26 = C. divaricata, *Love,*
divaricata, Schur, Ennm. PI. Transs. 378 =»C. foetida.
dubia, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 27. —Ins. Madera.
echioides, Schur, Ennm. PI. Transs. 373=C. foetida.
elata, Koch, in Linnaea, xxiii. (I860) 684 = C. alpina.
tlegans, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 438=C. elegans.
erucaefolia, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 331-C. erucaefolia.
fiexuosa, DC. Prod. vii. 156 = C. nana.
floribunda, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 260=C. floribnnda.
foetida, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Auk i. (1795) 288 = C. foetida.
glandulosa, Presl, Fl. Sic. p. xxxi=C. foetida.
gracilis, Dum. Fl. Belg. 61.—Belgium.
graveolens, Link, Enum. Hort. BeroL ii. 290 = C. foetida.
Haensleri, Boiss. ex DC. Prod. vii. 158=C. taraxacifolia.
heterocarpa, Boiss. Voy. Espagne, ii. 742=C. taraxacifolia.
hiemalis, Spreng. Syst. iii. 652=C. taraxacifolia.
kieracioides, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 27=C. hieracioides.
hirsuta, Pomel, Nouv. Mat. Fl. AtL 260=C. hirsuta.
hirta, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 688 = C. foetida.
kispida, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 290=C. srtosa.
hyemalis, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. i. [17] t 2 = C. taraxacifolia.
interrupta, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1407, innota=C. Sieberi.
intybacea, Spreng. Syst. iii. 658=C. taraxacifolia.
juvenalis, Delile, Ind. Sens. Hort Monsp. (1856) 23-G. juvenalis.
Kotschyana,Boiss. Diagn. Ser. I. vii. IS - C. Kotschyana.
Ifralikii, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 5 = C. Kralikii.
laciniata, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. ^1831) 25 = C. laciniata.
Uontodon, DC. Fl. Fr. ed. III. n. 2950« C. IeontodoDtoides.
leontodontoides, Spreng. Syst. iii. 653 = C. leontodontoides.
Lessingii, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. i. 145^ Troximon apargioides.
leucocepkala, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1861) 865; (Lehm. Reliq. Bot 209).—As. centr.
leucorhodia, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1409 = C. bicolor.
macrocephala, Willk. in Bot Zeit v. (1847) 860=C. albida.
macrophylla, Spreng. Syst. iii. 652=C. macrophylla.
Marschallii, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc 57=C. Marschallii.
melanocephala, Bunge, in M£m. Sav. Etr. Petersb. vii. (1851) 885; (Lehm. Reliq. Bot 209).—As. centr.
mucronata, Bertol. Fl. Ital. viii. 615=C. alpestris.
tnuricata, Spreng. Syst iii. 651 = C. aspera.
nana, DC. Prod. vii. 156=C. nana.
nicaeensis, Link, ex Spreng. Syst iii. 668=C. taraxacifolia.
nigricans, Viv. ex Coss. in BulL Soc. Bot Fr. xii. (1865) 278 = C.nigricans.
nuda, Presl, ex Spreng. Syst. iii. 653 = *C.* leontodontoides.
nudiflora, Viv. ex Coss. in Bull. Soc Bot Fr. xii. (1865) 278 = C. aspera.
numidica, Pomel, Nonv. Mat. FL Atl. 261 = C. numidica.
paludosa, Baumg. ex DC. Prod. vii. 170 = C. palndosa.
pinguis, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1411 = C. foetida.
pomfolia, DC. Prod. vii. 157=Pterotheca bifida.
praeeox, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. it 1409 = C. taraxacifolia.
prostrata, Dum. Fl. Belg. Prod. 61-C. foetida.
purpurea, Bivona, Stirp. Rar. Man. iv. 22 = Lagosens purpnrea.

BARKHAUSIA :-
radicata, Godr. in Mem. Acad. Montp. (Sect. Méd.). i. (1858) 436 = Hypochoeris radicata.
raphanifolia, Chev. ex Steud. Nom. ed. II. i. 187 = C. taraxacifolia.
raphanifolia, Spreng. Syst. iii. 658=C. raphanifolia.
recognita, DC. Prod. vii. 154=C. recognita.
reftexa, C. & J. Presl, Delic. Prag. Ill =C. Uraxacifolia.
repens, Spreng. Syst iii. 652.—China.
rhoeadifolia, Bieb. Fl. Taur. Cane. iii. 538 - C. foetida.
rodigioides, Sch. Bip. ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 374 = C. foetida.
Roylei, DC. Prod. vii. 157=C. bifida.
rubra, Moench, Meth. 637=C. rubra.
sardoa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 304.—Sardin.
scapigera, Kunze, ex DC. Prod. vii. 152 (= *Macrorhynchus Poeppigii*).—Chili.
scariosa, Moench, Meth. 537=C. alpina.
scariosa, Reichb. FL Germ. Exc. i. 256=C. vesicaria.
Schimperi, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 466 =C. Schimperi.
Sckultmi, Hochst. ex A. Rich. L c. 464-C. Schultzii.
senedoides, Spreng. Syst. iii. 652=C. senecioides.
setosa, DC. Fl. Fr. ed. III. v. 44=C. setosa.
spathulata, Spreng. Syst. iii. 651=C. spathulata.
Sprengelii, Steud. Nom. ed. IL i. 187 = Troximon apargioides.
stricta, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1406-C. neglecta.
Suffreniana, DC. Cat. Hort. Monsp. 88*=C. Suffreniana.
taraxacifolia, DC. Fl. Fr. iv. 43=C. taraxacifolia.
taraxacifolia, Spreng. Syst. iii. 658 = C. taraxacoides.
taraxacoides, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1408; DC. Prod. vii. 155 = C. taraxacoides.
tenella, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 488=Lactuca versicolor.
tenerrima, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 464 =C. carbonaria.
tenerrima, Tenore, in Ann. St. Nat. Bolog. iv. 252=C. leontodontoides.
tenuifolia, DC. Prod. vii. 156 - C. tenuifolia.
triangularis, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 687-C. foetida.
versicolor, Spreng. Syst. iii. 651»Lactuca versicolor.
vesicaria, Spreng. 1. c. 652=C. vesicaria.
icuinthia, Margot. & Rent. Fl. Zanth. 62=C. foetida

BARKHUSENIA, Hoppe, in Flora, xii. (1829) 512-BARKHAUSIA, Moench = Crepis, Linn. (Compos.).

BABKLTA, F. Muell. in Jonrn. Linn. Soc. iii. (1859) 158 j Fragm. i. 109 (1859). *LBGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 559.
syringifolia, *F. Muell. II. cc.*- Austral.

BARLAEA, Reichb. f. in Linnaea, xii. (1877) 54-Habenaria, Willd. (Orchid.).
calcarata, Reichb. f. I. c.=H. calcarata.

BABIiEBIA, Linn. Gen. ed. I. 869 (1737). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1091.
BARLERIACANTHUS, BARLERIANTHUS, BARLERIOFSIS, BARLERIOSIPHON, BARLERITES, DICRANACANTHUS, PRIONITIS et PSEUDOBARLERIA, Oetst, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 133-187.
BARRELIERA, J. F. Gmel. Syst. 959 (1791),
CRABBEA, Harv. Gen. PL Cap. ed. I. 276 (1838).
SOUBEYRANIA, Neck. Elem. i. 365 (1790).
WAHABIA, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312.
acanthoides, *Vahl, Symb. Bot.* i. 47.—Arab.; Aegypt.; Ind. bor. occ.
acanthophora, *Nees, in DC. Prod.* xi. 726.—Afr. trop.
acnleata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 85.—Ins. Socotr.
acuminata, Wight, Ic t 450=tomentosa.
adelensis, *Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa,* 341.—Afr. trop.
alata,5. *Moore.in Journ. Bot.* xviii. (1880) 266.—Afr. trop.
alba, Lodd. Bot. Cab. iv. t. 860=cristata.
anomala, Spreng. Syst ii. 828 = Bravaisia floribunda'
arabica, *Belong, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 725.—
argentea, *Balf* *cc. Edinb.* xii. (1884) 86.—Ins. So*C.n Proe,Roy,S*
£1

BABLEBIA:—
Amottiana, *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 811.—Zeylan.; Burma.
Aucheriana, Nees, in DC. Prod. xi. 284 = Hochstetteri.
auriculata, Schum. Beskr Guin. PI. 285 = Hygrophila spinosa.
axillaris. Stend. Norn. ed. II. i. 187 - Lepidagathis trinervis?
barbata, £. Mey. Zwei Pfl. Docum. 152 = Gneinzii.
Beddomri, T. Anders, ex Bedd. Ic. Ind. Or. i. 62 = Lawii.
bispinosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 144 = B. Prionitis.
bispinosa, *Vahl, Symb. Bot.* i. 46.—Arab.
bispinosa, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 94 = mysorensis.
bituminosa, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 8.—Malaya.
Boivinii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 31.—Madag.
bracteata, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 490=nitida.
brasiliensis, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 26.—Bras.
brevispina, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = B. Prionitis.
Burchelliana, Nees, in DC. Prod. xi. 235 = macrostegia.
Burkeana, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) U2-» macrostegia.
bnxifolia, *Linn. Sp. PI.* 636.—Ind. or.
buxifolia, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 37 = obovata.
buxifolia, Wall. Cat. n. 2504 = mysorensis.
caerulea. Herb. Lamb, ex Nees, in DC. Prod. xi. 228 = cristata.
caerulea, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 39 - strigosa.
caerulea, Wall. Cat. n. 2509, partim-polytricha.
Candida, *Nees, in DC. Prod.* xi. 240.—Oriens.
capitata, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 210.—Afr. trop.
cardiocalyx,.?0l»M, *ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 105. —Afr. trop.
Carruthersiana, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 270.—Afr. trop.
chegosa, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2506=cristata.
ciliata, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 230= Meyeriana.
ciliata, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 38 = cristata.
cocdnea, Linn. Sp. PI. 637 = Ruellia coccinea.
consanguinea, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 206.—Afr. trop.
conspicua, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 92.—Ins. Penang.
cordifolia, Hochst. ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 29 •= parviflora.
cornigera, Véry, ex Nees, in DC. Prod. xi. 248 = Hygrophila spinosa.
courtallica, *Nees, in Wight, Ic.* iv. t. 1529.—Ind. or.
cristata, Lam. Encyc. i. 880 = noctiflora,
cristata, *Linn. Sp. PI.* 636.—Ind. or.; Burma,
cuspidata, *Heyne, ex Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 98.—Ind. or.
cyanea, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 265.—Angola,
damarensis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 29.—Afr. austr. trop.
Decaisneana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 230.—Madag.
diacantha, Hochst. ex Nees, 1. c. 238 = B. Prionitis.
diandra, Heyne, ex Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 92 = polytricha?
diandra, Hochst. & Steud. ex Nees, in DC. Prod. xi. 281 = Hochstetteri.
diandra, Schlecht. ex Nees, 1. c. = obtusa.
dianthera. Herb. Madr. ex Wall Cat. n. 2391 = Peristrophe montana.
dichotoma, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 39 = cristata.
diffusa, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 518 = Lepidagathis diffusa.
discolor, *Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph.* 146.—Mexic.
eehinata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 120 = B. Prionitis.
elata, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 227 = involncrata.
eranthemoides, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = acanthoides.
fasciculata, Russ. ex Wall. Cat. n. 2509=polytricha I

BAJUiERIA:—
nssiflora, *Boj. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 288.—Madag.
flava, *Jacq. Bel.* 67. t 46.—Arab.
gentianoides, Desf. ex Nees, in DC. Prod. xi. 224 = flava. a
Gibsoni, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 839.—Ind. or.
glabra, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art IV. 8.—Malaya.
glabrata, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 248 = Hygrophila spinosa.
glandulosa, Hochst ex Nees, 1. c 243 = Lepidagathis glandulosa.
glauca, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 493 = Gibsoni.
grandiflora, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 339. —Ind. or.
grandiflora, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64.—Abyssin.
grandifolia, R. Br. ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc vii. (1864) 30, sphalra.- grandiflora.
grandis, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 233 = grandiflora.
Grantii, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 127. —Afr. trop.
Gueinzii, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 91.—Afr. austr.
halimoides.Nees, in DC. Prod. xi. 231 = Petalidium halimoides.
Hamierii, *Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 106. —Afr. trop.
hexacantha, Bertol. in Ann. Stor. Nat. Bolog. fasc. ix. 445; Disq. PI. Nov. 3 (1882) = longifolia.
hexacantha, Moris, in Mem. Ace. Torin. xxxvi. (1838) 200. t. 7 = Hygrophila spinosa.
Hildebrandtii, S. *Moore, in Journ. Bot.* xv. (1877) 69. —Afr. trop.
hirsuta, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2508 = tomentosa.
hirsuta, Jacq. Obs. Bot. ii. 7 = Gonzalea spicata.
hirsuta, Nees, Wall. Fl. As. Rar. iii. 91; Cat. n. 7142 =polytricha.
Hochstetteri, *Nees, ex DC. Prod.* xi. 231.—Afr. bor.; Arab.; Scind.
hypocrateriformis, Hochst. ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii.(1863) 28 = B. Prionitis.
Hystrix, Linn. Mant i. 89 = B. Prionitis.
ilicina, *E. Mey. ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 28.—Afr. austr.
inaequalis, Benth. in Flora, xxxii. (1849) 557 = courtallica.
inaequalis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 149 = Phaylopsis longifolia.
indica. Linn, ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 115 = cristata.
involucrata.Mw, in *Wall.PI. As. Rar. iii.* 92.—Ind. or.
irritans, *Nees, in Linnaea,* xv. (1841) 859.—Afr. austr.
Kirkii, *T. Anders.in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 30. —Afr. trop.
laciniata, Wall. PI. As. Rar. iii. 91; Cat. n. 7144 = cristata.
lactea, Desf. ex Steud. Norn. ed. II. i. 187=cristata.
lancifolia, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 28.—Afr. austr. trop.
Lawii, *T. Anders. 1. c.* ix. (1867) 492.—Ind. or.
Lichtensteiniana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 235.—Afr. anstr.
limnogeton, 5\ *Moore, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 95.—Ins. Celebes.
longiflora, *Linn./. Suppl.* 290.—Ind. or.
longifolia, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 491-longiflora.
longifolia, Linn. Cent PI. ii. 22 ; Amoen. Acad. iv. 320 = Hygrophila spinosa.
lupulina, *Lindl. in Bot. Reg.* t 1483.—Ind. or.; Ins. Maurit.
Mackenii, *Hook./. Bot. Mag.* t. 5866.—Afr. austn
Macraei, *Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 811.—Ind. or.
macracantha, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64— Hygrophila spinosa!
macrolemma, *Peyr. in Sittb. Acad. Wien. Math.-Nat.* xxxviii. (1860) 574.—Afr. trop.
macrophylla, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 489 = strigosa.
macrostachya, Boj. Hort Maurit. 260 «lupulina.
macrostegia, *Nees, in DC. Prod,* xi 285.—Afr. anstr.

BABLBBIA:—
marginata, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1879) 127.—Afr. trop.
Meyeriana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 230.—Afr. austr.
micans, *Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph.* 146.—N. Granat.
mitis, *Ker.Garni, in Bot. Reg.* t. 191.—Ind. or.
mollis, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64.—Abyssin.
monostachya, *Boj. in Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 356. —Ins. Maurit.
montana, *Herb. Madr. ex Nees, in Wall. PI. As. Rar-* iii. 92.—Ind. or.
montana, Wight & Nees, ex C. B. Clarke, in Hook. f- Fl. Brit. Ind. iii. 487, pro parte=Gibsoni.
multifloia, *Hassk. Cat. Fl. Bogor. Alt.* 149.—Hab.?
mysorensis, *Heyne, in Roth, Nov. Sp. PI.* 313.—Ind. or.
napalensis, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 91=" cristata.
nitida, *Jacq. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 187.—A»-austr.
nitida, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 91.—Ind. or.
noctiflora, Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss. ≫• 145=- acanthoides.
noctiflora, *Linn.f. Suppl.* 290.—Ind. or.; Arab.
nuda, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 92 = cristata.
nutans, *Nees, in DC. Prod.* xi. 227.—Zeylan.
obovata, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) 293=mysorensis.
obtusa, *Nees, in Linnaea,* xv. (1841) 858.—Afr. austr.
oenotheroides, Dum.-Cours. Bot Cult Cat. vii. 7=fl»[w]
opaca, *Nees, in DC. Prod.* xi. 230.—Afr. occ.
orbicularis. *Hochst. ex Anders, in Journ. Linn. Soc-* vii. (1864) 29.—Abyssin.
ovata, *E. Mey. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 230.—Afr. austr.
paniculata, Herb. Madr. ex Nees, in Wall. PI. As-Rar. iii. 92=tomentosa.
papillosa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 31.—Afr. austr.
parviflora, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 65.—Abyssin.
pentandra, Am. ex Nees, in DC. Prod. xi. 232= involucrata et Amottiana.
pilosa, *Heyne, ex Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 93.— Ind. or.
polyneura, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 2'"-—Afr. trop.
polystachya, Hook, ex Nees, in DC. Prod. xi. 226 •> strigosa.
polytricha, Boj. ex Nees, 1. c. 286 *(-Polytkrixstenaf drium).*—Madag.
polytricha, *Wall. PI. As. Rar.* i. 72. t. 82.—Ind. or.
prinoides, Hort. Monsp. ex Nees, in DC. Prod. xi. 2Z[9] =cristata.
Prionitis, *Linn. Sp. PI.* 636.—As. et Afr. trop.
procumbens, *Lour. Fl. Cochinch.* 377.—China.
pubiflora, Benth. in Flora, xxxii. (1849) 568-*[1] Prionitis.
pumila, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 872* Justicia simplex.
pungens, Heyne, ex Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii-[91] =polytricha ?
pungens, *Linn./. Suppl.* 290.—Afr. austr.
pungens, Thunb. Prod. PI. Cap. 98=irritans.
pungens, Wall. Cat. n. 2498 = Lepidagathis pungens-
purpurea, Lodd. Bot. Cab. iv. t. 344 = montana.
pyramidalis, Lam. ex Nees, in DC. Prod. 2« " Blechum Brownei.
quadrispinosa, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 411 = [2]- Prionitis.
querimbensis, *Klottsch, in Peters, Reise Mossa*"' Bot.* 205.—Afr. trop.
racemosa, Herb. Madr. ex Wall. Cat n. 2503=tome"" tosa.
ramosa, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) 295=noctiflora.
repens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 230.—Afr. austr.
rhynchocarpa, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 205.—Afr. trop.
Richardiana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 225.—Madag.
rigida, Spreng. in Zeyh. ex Schlecht in Linnaea, *'• (1840) 304 = Pachypodium toinentosum.
rigida, *Willd. ex Nees, in DC. Prod.* xi. S**— Afr. austr.
nibra, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 296 (sp. dub.).-Ind. or.
ruellioides, Rottl. ex Nees, in DC. Prod. xi. 240 — nodiflora.

BAHLEKIA:-
ruellioides, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* **vii. (1864)** SO.—Afr. trop.
sahcifolia, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 268.—Afr. trop.
satureioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 195.—Cuba.
tenegalensis, Nees, in DC. Prod. xi. 224=flava.
senensis, *Klotzsch, in Peters, Seise Mossami. Bot.* 2O9.-Afr. trop.
sepalosa, *C. B. Clarke, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* **iv.** 487.—Ind. or.
sericea, T. Anders, in Jonra. Linn. Soc. vii. (1864) 115 =longiflora.
solani/olia, Linn. Sp. PL 687 = Barleriola solanifolia.
somalensis, *Franch. in Rivoil, Comali,* **51.—Afr. or.**
spicata, Roxb. Hort. Beng. 45 = B. Prionitis.
Spina^eyUnica, Nees, in DC. Prod. xi. 242 = mysorensis.
spinicyma, *Nees, I. c.* 240.—Arabia.
spinosa, Hook, ex Nees, 1. c. 247 = Hygrophila spinosa.
tpinosa, Wall. Cat. n. 2497=Lepidagathis spinosa.
spwulosa, *Hlottsch, in Peters, Seise Mossami. Bot.* 208.—Afr. trop.
squarrosa, *Klotasch, I. c.* 207.—Afr. trop.
stellato-tomentosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 268.—Afr. trop.
stenophylla, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* **xlii.** (1878) II. 95.-Burma.
stimulans, *E. Mey. ex Nees, in DC. Prod.* **xi. 241.—** Afr. austr.
Stocksii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* **ix. (1867)** 493.—Ind. or.
"ngo&a, *Willd. Sp. PI.* iii. 379.—Ind. or.
tertninalis, Nees, in DC. Prod. xi. 226=strigosa.
tetracantha, *Balk f. in Proc. Soy. Soc. Edinb.* **xii.** (1884) 85.-Ins.Socotr.
tomentosa, *Soth, Nov. Sp. PI.* 314.—Ind. or.
tomentosa, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2503 - acuminata.
triacantha, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 240 = aeanthoides.
trinerms, Herb. Ham. ex Nees, 1. c. 248=Lepidagathis trinervis.
tnspinosa, *Vahl, Symb. Bot.* i. 46.—Arab.
"ttenagensis, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 281 = obtusa.
unilateralis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2509 = polytricha.
ventricosa, *Hochst. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 280.—Abyss.
venulosa, Nees, 1. c. 228=cristata.
veshta, *T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl.* **280.—** Zeylan.
villosa, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 267.- Afr. trop.
Sp'asgens, s. *Moore, 1. c.* 265.—Afr. trop.
Welwitschii, 5. *Moore, 1. c.* 267.—Afr. trop.

BARLERIACANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Videnslc. Meddel. (1854) 136 = **Barleria,** Linn. (Acanth.).
aeanthoides, Oerst. 1. c. = Barleria acanthoides.
"octiflora, Oerst. 1. c. = Barleria noctiflora.

^ARLERIANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 136=Barleria, Linn. (Acanth.).
gracilis, Oerst. 1. c.=BaTleria giandiflora.

BARLERIOLA, Oeist. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 186. *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. n. 1093.
solanifolia, *Oerst. I. c*—Ins. S. Doming.

BARLERIOPSIS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 183 = **Barleria,** linn. (Acanth.).
discolor, Oerst. 1. c. 134 = Barleria discolor.
glandulosa, Oerst. 1. c.=Barleria micans.
micans, Oerst. 1. c.«=Baileria micans.

BARLERIOSIPHON, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 136=Barleria, Linn. (Acanth.).
Longiflora, Oerst. 1. c-Barleria longiflora.

BAULERITES, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 137=Barleria. Linn. (Acanth.).
Hochstetteri, Oerst 1. c.=Barleria Hochstetten.

BARLIA, Parl. Nonv. Gen. Piant. Monocot. 5 (1858); / '• Ital. iii. 445 (1858)=Orchis, Linn.
'ongibracteata, Parl. 1. c. 6; Fl. Ital. Hi. 447-0. longibracteata.

BABNADE8IA, Mutis, in Linn. f. Suppl. 55 (1781). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 484.
BACAZIA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 105. t. 22 (1794).
DIACANTHA, Less, in Iinnaea, v. (1830) 243.
DOLICHOSTYLIS, Cass. in Diet Sc. Nat. lvi. 139 (1828\
FULCALDEA, Poir. Encyc, Suppl. v. 875 (1817).
PENTHEA, Spach, Hist. Veg. Phan. x. 9 (1841).
RHODACTINIA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. vi. (1847) 449.
TUSPINIA, Humb. & Bonpl. PI. Aeqnin. i. 113. t. 33 (1808).
VOIGTIA, Spreng. Syst. iii. 367 (1826).
XENOPHONTA, Veil. Fl. Flnm. 846 (1825).
arborea, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* **iv. 16.—** Ecuador.
arborea, Sch. Bip. in Iinnaea, xxii. (1849) 569 =rosea.
berberoides, *Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr.* **57.** —Peruv.
corymbosa, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* **xvi. (1833)** 278.—Peruv.
dianthiflora, Mart, ex Baker, in Mart. FL Bras. vi. III. 865°°rosea.
divaricata, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 209.—Reg. Argent.
Dombeyana, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 246.—Peruv.
flavescens, *Mey en. Seise,* i 307.—Chili.
glochidiata, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ill. 361=synacantha.
hirsuta, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 527, nomen.—Bolivia.
lanata, *Meyen, Seise,* i. 847.—Chili,
lanceolata, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* **xvi. (1833)** 277.—Peruv.
laxa, D. Don, 1. c. 280=rosea.
media, *D. Don, I. c.* 276.—Peruv.
odorata, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 210.—Reg. Argent,
parviflora, *Spruce, ex Benth. (f Hook. /. Gen.* **ii. 485.** —Ecuador.
polyacantha, *Wedd. Chlor. And.* i. 13.—Bolivia,
reticulata, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* **xvi. (1833)** 277.—Peruv.
rosea, *Lindl. in Bot. Seg.* (1848) t. 29—Am. austr.
spinosa, *Linn.f. Suppl.* 848.—Peruv.; N. Granat.
spinosa, Willd. ex DC. Prod. vii. 8=arborea.
ulicina, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 29=Chuquiraga ulicina.

BARNARDIA, Lindl. in Bot Reg. t. 102a (1826)- Bcilla, Linn. (Liliac.1.
indica, Wight, Ic. t. 2041=S. indica.
japonica, Schult. f. Syst. vii. 555=S. japonica.
scilloides, Lindl. in Bot. Reg. t. 1029=S. chinensis.

BARNEOUDIA, C. Gay, Fl. Chil. i. 29. t. 1 (1846) = Anemone, Linn. (Ranunc.;.
chilensis, C. Gay, 1. c.—Chili.
Domeykoana, Leybold, in Anal. Univ. Chil. (1868) 159; et in Flora, xlii. (1859) 242.—Chili.
major, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 609.—Chili.

BAROLA, A'dansJ'Vam. ii. 344 (1768) = Trichilia, Linn. (Meliae.).

BAROLLAEA, Nëck. Elem. ii. 822 (1790) = **Caryocar,** Linn. (Temstroem.).

BABONIA, Baker, in Journ. Bot xx. (1882) 67. ***ANACASDIACEAE.***
Taratana, *Baker, I. c*—Madag.

BABOSMA, Willd. Enum. Hort. Berol. 257 (1809). *SUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 290.
BAKVOSMA, Roem. & Schult. Syst. v. 448 (1819).
Bucco, Wendl. Collect i. 13 (1808).
PARAPETALIFERA, Wendl. Collect, t. 15, 34 (1808).
acuUta, *Sond. in Han. &" Send. Fl. Cap. i.* **395.—Air.** austr.
alpina, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 102.—Afr. austr.
angustifolU, *Bartl. (f Wendl. f. Diosm.* **116.—Afr.** austr.
apiculaU, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 104.—Afr. austr.
bctulina, *Bartl. & Wendl. f. Diosm.* 102.—Afr. austr.
bruniades, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 128 = Agathosma cuspidata.
crenata, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 102.—Afr. austr.

BABOSMA :—
crenata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 89.—Afr. austr.
crenulata, *Hook. Bot. Mag.* t. 3418.—Afr. austr.
dioica, *Bartl. &• Wendl. f. Diosm.* 114.—Afr. austr.
Eckloniana, *Bartl. in Linnaea,* xvii. (1843) 863.—Afr. austr.
foetidissima, *Bartl. (f Wendl. f. Diosm.* 118.—Afr. austr.
gnidioides, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 104.—Afr. anslr.
graveolens, *G. Don, Gen. Syst.* i. 786.—Afr. austr.
Kraussiana, *Meissn. in Flora,* xxvii. (1844) I. 803.—Afr. austr.
lauceolata, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* **i. 397.—** Afr. austr.
latifolia, *Roem. V Schult. Syst.* v. 449.—Afr. austr.
microcarpa, *Sond. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* **i. 898.—** Afr. austr.
mucronata, *Meissn. in Flora,* xxvii. (1844) I. 803.—Afr. austr.
Niveni, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap. i.* **398.—Afr.** anstr.
oblonga, *Bartl. V Wendl./. Diosm.* 112.—Afr. austr.
odorata, Willd. Enum. Hoit Berol. 257 = serratifolia.
orbicularis, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 89 - betulina.
ovata, *Bartl. V Wendl. f. Diosm.* 109.—Afr. austr.
pauciflora, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 103.—Afr. austr.
pulchella, *Bartl. if Wendl. f. Diosm.* 107.—Afr. austr.
pulchra, *Cham, in Linnaea,* v. (1830) 53.—Afr. austr.
pungens, *E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i.* **397.—** Afr. austr.
scoparia, *Eckl. b" Zeyh. Enum.* 103.—Afr. austr.
serratifolia, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 257.—Afr. austr.
sertuliflora, *Delponte, in Mem. Ace. Torino, Set.* **II.** xiv. (1854) 408. t. 9.—Hab. ?
teraata, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 103.—Afr. austr.
trichopodis, *Bartl. & Wendl./.ex Juss. in Mim.Mus. Par.* xii. (1825) 474.—Afr. austr.
venusta, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 102.—Afr. austr.

BARRALDEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 24 (1809) •= Carallia, Roxb. (Rhizoph.).
madagascariensis, Spreng. Syst. ii. 813 (Baraultia).—Madag.

BARRATTIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. i. (1848) 48 = BARATTIA, A. Gray & Engelm.=Enoelia, Adans. (Compos.).

BARRELIERA, J. F. Gmel. Syst 959 (1791) = **Barleria,** Linn. (Acanth.).

BABBEBIA, Linn. Gen. ed. II. 131 (1742); (et BARRERA, linn. Sp. PI. ed. II. 393 (1762)).
capensis, Linn. Sp. Pit 274.—Afr. austr.

BARRERIA, Willd. Sp. PI. i. 1145 (1798)=Foraqueiba, Aubl. (Olacineae).
gujanensis, Raeusch. Nom. ed. III. 259, nomen = r. guianensis.
theobromae/olia, Willd. Sp. PI. i. 1145 = P. guianensis.

BABBINGTONIA, Forst. Char. Gen. 75.t. 28 (1776). *MYSTACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 720.
AGASTA, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. Bot. i. 59 (1875).
BARANDA, Llanos, in Mem. Acad. Cienc. Madr. ii. (1859) 502.
BOTRYOROFIS, Presl, Epim. Bot. 220 (1849).
BUTONICA, Juss. Gen. 326 (1789).
DOXOMMA, Miers, in Trans. linn. Soc. Ser. II. Bot. i. (1875) 98.
MEGADENDRON, Miers, I. c. 109 (1875).
MENICHEA, Sonner. Voy. N. Guin. 183 (1776).
METEORUS, Lour. Fl. Cochinch. 410 (1790).
MITRARIA, J. F. Gmel. Syst. 799 (1791).
STRAVADIUM, JUSS. Gen. 326 (1789).
acuminata, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* **i. (1848)** 206.—Borneo.
acutangula, *Gaertn. Fruet.u.* 97. t. 101.—Ins. Molucc.
alata,\\M. Cat n. 3633=conoidea.
alba, *Blume, in Fl. des Serres,* Pèr. I. vii. (1851-62) 23.—Ins. Molucc.
alba, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iv. 1536=racemosa.
asiatica, Kurz, in Joum. As. Soc. Bene. xlv. (1876) u. 131; xlvL (1877) II. 70-spedosT.
angusta, *Kurt, 1. c.* xlii. (1873) H. 233.—Burma.
Butonica, *Forst. Char. Gen.* t. 38.—Ins. Pacif.

BABBINGTONIA -.-
calyptrata, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, iii. 288, in nota=speciosa?
Careya, *F. Muell. Fragm.* v. 183.—Austral,
ceylanica, *Gardn. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* ii. 508.—Zeylan.
coccinea, KosteL Allg. Med.-Pharm. Fl. iy. 1536 = excelsa.
conoidea, *Griff. Notul.* iv. 656 ; *Ic. PI. As.* t. 635, 636. f. 1.—Burma; Malacca.
costata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 489.—Aichip. Sunda.
cylindrostachya, Griff. Notul. iv. 655=macrostachya.
edulis, *Seem. Fl. Vit.* 82.—Ins. Fiji,
elongala, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* **L (1848) 206.** —Java.
excelsa, *Blume, Bijdr.* 1097.—Malaya.
Helferi, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* **ii. 509.** —Burma.
Horsfieldii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 489.—Java.
inclyta, Miers, in Trans. Linn. Soc Ser. II. Bot. i. (1876)71. t. 14=racemosa.
insignU, *Miq. Fl. Ind. Bat.* L **488.—**Malaya,
intermedia, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* **x.** (1866) 98.—N. Caled.
Iuzoniensis, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* **13, 18,113. —Ins.** Philipp.
macrocarpa, *Hassk. Cat. Hort. Bogor.Alt.* **263.—Java.**
macrofikylla, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 491 = speciosa.
macrostachya, *Kurg, For. Fl. Brit. Burma,* **i. 198 ;** *et in Journ. As. Soc. Beng.* xlvi. (1877) II. 71.—Burma.
Montronzieri, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* x. (1866) 100.—N. Caled.
neocaledonica, *Vieill. 1. c.* 99.—N. Caled.
nitida, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 490.—Java,
pendula, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* **xlvi. (.1877)** II. 71.—Burma.
pterocarpa, *Kurt, I. c.* xlii. (1873) II. 234.—Burma.
pubescent, Miers, in Trans. Linn. Soc Ser. II. Dot. i. (1876)83=acutengula.
racemosa, *Roxb. Hort. Beng.* **62;** *Fl. Ind.* **ii. 6«4.—** Ind. or.; Malaya; I'olynes.
Reinwardtii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 488.—Java,
reticulata, *Miq. I. c.* 490.—Borneo.
rigida. C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. ii. 510 =Symplocos rigida.
rubra, Blume, in Fl. des Serres, Sér. I. vii. (1851-52) 23 ^ r&ccinosft*
samoënsis, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* **i. 50B.—** Ins. Fiji.
sareostachys, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 490=macrostachya.
Senequli, *Jardin, in Bull. Soc. Linn. Normand.* **Sér.** II. ix. (1875) 305.—N. Caled.
serrate, *Miq. Fl. Ind. Sat.* i. 488.—Java.
speciosa. Linn. f. Snppl. 312 = B. Butonica.
spedosa, Wall. Cat. n. 3632 B=racemosa.
spicata, *Blume, Bijdr.* 1097.—Java.
Stravadium, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.588-racemosa.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 315.—Sumatra,
timorensis, *Blume, in Van Houtte, Fl. des Serres,* Sér. I. vii. (1851-52) 23.—Ins. Timor.
Vriesei, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Netrl. Ind.* **ii.** (1851) 308.—Java.

BABBOËTIA, A. Gray, in Proc Am. Acad. xv. **(1880) 29.** *COMPOSITAE.*
Pavonii, *A. Gray, I. c.* xvii. (1881-82) 206 Mexic.
setosa, *A. Gray, 1. c.* xv. (1880) 29.—Mexic.
subuligera, *A. Gray, I. c*—Mexic.

BARROTIA, Gaudieh. Bot. Voy. Bonite, t. 18 (1852 ?) **=-Pandamis,** Linn.
altissima, Brongn. in Ann. Sc Nat. Sér. VI. i. (1875) 277 = P. Minda.
aragoinsis, Brongn. 1. c. 278=P. aragoënsis.
Balansae, Brongn. 1. c. 281=P. Balansae.
decumbent, Brongn. 1. c. 286 = P. decumbens.
diodon, Gandich. Bot. Voy. Bonite, 1.18. £ 9-14 = P. farcatus.
Gaudichaudii, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. VL i. (1875) 264 = P. tetrodon.
macrocarpa, Brongn. 1. c 279 = P. macrocarpus.
monodon, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 13. f. 15-24 «= P. monodon.
Pancheri, Brongn. in Ann. Sc Nat. Sér. VI. i. (1875) 283-P. Pancheri.
spkaerocephala, Brongn. 1. c. 284 = P. sphaerocephalus.
tetrodon, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t 13. £ 1-8=P. tetrodon.

BABBOWIA, Decnci in DC. Prod. viii. 629 (1844). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. I. ii. 779.
jasminiflora, *Decne. I. c.* 680.—Aft. austr.

BABTEBIA, Hook. f. in Joum. Linn. Soc. v. (1861) 14. t 2. *PASSIFLOREAE,* Benth. *Sc* Hook. £ i. 812.
fistulosa, *Mast, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* **ii. 511.—Afr.** txop.
nigritana, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* **v. (1861) 16.** t. 2.—Afr. trop.

BABTHEA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 761 (1867). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. £ I.e.
chinensis, *Hook./. I.e.*—Hongkong.

BARTHESIA, Comm. ex A. DC. in Trans. Linn Soc. xvii. (1837) 112 = Ardlcda, Sw. (Myrsin.),

BABTHOIiINA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 194 (1813). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 623.
LATHRISIA, SW. Annot. Bot. 48 (1829).
Burmanniana, Ker-Gawl. in Brand. Journ. Sc. iv. (1818) 204. t. 5 -pectinata.
Ethelae, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* **xx. (1884) 472.—** Afr. austr.
Lindleyana, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 119=pectinata.
pectinata, *R. Br. in Ait. Hort. Kern.* ed. II. v. 194.— Afr. austr.

BARTHOLLESIA, Manso, Ennm. 45 (1836) -Bertholletia, Humb. & Bonpl. (Myrtac).

BARTHRATHERUM, Anderss. in Walp. Ann. iii. 799 (1853.) = BATHRATHERUM, Hochst=Arthraxon, Beauv. (Gramin.).

BABTLETTIA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. Ser. II. v. (1855) (PI. Nov. Thurb.) 823. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. £ ii. 441.
scaposa, *A. Gray, 1. c.*—Mexic

BARTLINGIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 373=Pultenaea, Sm. (Legumin.).
obovata, Brongn. 1. c = P. obovata.

BARTLINGIA, F. Muell. ex Benth. Fl. Anstral. vii 63 (1878) =110X1110111118, R. Br. (Liliac).
brachyphylla, F. Muell. Census, 119 =-L. brachyphylla.
gracilis, F. Muell. Fragm. vii. 88 = L. gracilis.
grandiftora, F. Muell. Census, 118 = L. grandiflora.
minor, F. Muell. 1. c. = L. ramosa.
ramosa, F. Muell. Fragm. vii. 88 = L. ramosa.
sessilifiora, F. Muell. in Papers Roy..Soc. Tasm. (1877) 116=L. sessiliflora.
sessilis, F. Muell. Census, 119=L. sessilis.
squarrosa, F. Muell. 1. c. 118 — L. squarrosa.

BARTLINGIA, Reichb. in Flora, vii. (1824) 241 = Flooama, Ait. (Rnbiac).
scoparia, Reichb. 1. c.=P. pendula.

BARTOLINA, Adans. Fam. ii. 124 (1768)=Tridax, Linn. (Compos.).

BABTOMXA, Muhl. ex Willd. in Ges. Naturf. Freunde, Neue Schr. iiL (1801) 444. *GENTIANEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 818.
ANBREWSIA, Spreng. Syst. i. 428 (1825).
CENTAURELLA.Michx.FI. Bor. Am. i.97.112 (1808).
CENTAURIUM, Pers. Syn. i. 187 (1805).
NUTTALLA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175.
pubescens, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 852=veraa?
tenella, *Muhl. ex Willd. in Ges. Naturf. Freunde, Neue Schr.* iii. (1801) 445.—Am. bor.
uniflora, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 352 = veraa?
vema, *Muhl. ex A. Gray, in Chapm. Fl. S. U. St.* **357.** —Am. bor.

BARTONIA, Sims, Bot. Mag. t. 1487 (1804)=Mantselia, Linn. (Loaseae).
albescens, Gill. *Sc* Am. in Edinb. Geog. Journ. ii. (1831) 27S.-Chili.
albicaulis, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i 222 -M. albicaulis.
aurea, Lindl. in Bot. Reg. 11881=M. Lindleyi.

BARTONIA :—
decapetala, Sims, Bot. Mag.t. 1487 = Mentzelia omata.
laevicaulis, Dougl. ex Hook. FL Bor. Am. i. 221- 69-M. laevicaulis.
micrantha, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 843 -M-micrwithuL
micrantha, Hook, in Lond. Journ. Bot vi. (1847) 327 = M. dispersa.
multiflora, Nutt. in Journ. Acad. Sc. Phil. N. S. > (1847) 180 - M. multiflora.
nuda, Pursh, Fl. Am. Sept 828, 749 = M. nuda.
ornata, Hook. Lond. Joum. Bot vi. (1847) 226 « laevicaulis.
ornata, Pursh, Fl. Am. Sept. 827 =»M. omata,
parmfiora, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 221-M. laevicaulis.
pumila, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 536-M' pumila.
sinuata,* Presl, Rel. Haenk. ii.** ***Si = albescens.
Wrightii, Walp. Ann. ii. 656 = M. Wrightii.

BAJRTRAMIA, Linn. Diss. Dass. 17 (1747); Fl. ZeJ[1]-77 (1747); Gaertn. Fruct. ii. 187. t 111 (1791)* Trlumfetta, Linn. (Tiliac).
angulata, Lam. 111. t 480. f. 2=T. rhomboidea.
crispifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 14 - T. rhomboidea.
glandulosa, Lam. 111. t. 400. f. 1 = T. rhomboidea.
indica, Linn. Sp. PI. 889 =T. rhomboidea.
Lappago, Gaertn. Fruct. ii. 137 t. 111=T. rhomboides-
rhombifolia, Stokes, Bot. Mat Med. tfi. 16=T. rhomboidea.

BARTRAMIA, Salisb. Prod. 99 (1796)=Fensten»©[D]> Mitch. (Scrophular.).
concinna, Salisb. 1. c = P. pubescens.
pulchella, Salisb. 1. c = P. laevigata.

BARTSCHIA, Linn. Syst. ed. II. 26 (1740) -seq.

BABTSIA, Linn. Hort. Cliff. 325 (1737). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 977.
ALICOSTA, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 381 (1867).
BELLARDIA, All. Fl. Pedem. i. 61 (1785).
EUFRAGIA, Griseb. SpiciL Fl. RumeL ii. 18 (18**).
LASIOPERA, Hoffmgg. *Sc* Link, FL Port. i. 298 (18<W:
ODONTITES, [Riv.THall. Enum. Stirp. Helv. ii •*' (1742).
PARENTUCELLIA, Viv. Fl. Lib. Spec 81. t. 21. (1824).
STAEHELINIA, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 624 (17.W-
TRIXAGO, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. vi. (1828) *•
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss. *<• 134=B. Trixago.
acuminata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 429 =Castillej» pallida.
alpina, *Linn. Sp. PI.* 602.—Europ.; Am. bor.
aspera,WH*. *VLange, Fl. Hisp.* ii. 614, obs.—Hispo"- Marocc.
bicolor, DC. Ic Rar. t. 10 = B. Trixago.
biloba, *Wedd. Chlor. And.* ii. 128.—Peruv.
breviflora, *Benth. in DC. Prod.* x. 545.—Cali£
canescens, *Wedd. Chlor. And.* ii. 128.—Peruv.
capensis, Spreng. Syst. ii. 778=B. Trixago.
caraea, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* **ii. 12.—Macedon***
chilensis, *Benth. in DC. Prod.* x. 547.—ChiU.
ciliolata, *Wedd. Chlor. And.* ii. 128.—Bolivia.
coccinea, Linn. Sp. PI. 602 = Castilleja coccinea.
crenoloba, *Wedd. Chlor. And.* iL 124.—Bolivia,
decurva, *Hochst. ex Benth. in DC. Prod.* **x. 6*»** Abyssin.
densiflora, *Benth. 1. c.* 548.—Peruv.
diffusa, *Benth. I. c.* 546.—Pernv.
elongata, *Wedd. Chlor. And.* ii. 127.—Am. merid-
euphrasioides, *Wedd. I. r.* 180.—Ecuador.
Fagonii, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 345=aspers.
filiformis, *Wedd. Chlor. And.* ii. 126.—Peruv.
Garideli, Ball, in Joum. Linn. Soc xvi. (1878) « purpurea.
glauca, Poir. ex Steud. Norn. ed. IL i. 189 Lagotis glauca.
gracilU, *Benth. in DC. Prod.* x. 648.—N. Granat.
granatensis, Ball, in Joum. Linn. Soc xvi. (1878) =purpurea.
grandiflora, Spreng. in Ersch *Sc* Grub. Allgem. Eaw** vii. (1821) 461 = Castilleja sessiliflora.
Gymnandra, Linn. f. Suppl. 278 = Lagotis glauca.
Gymnandra, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 430 = Syn W rubra!

BARTSIA:—

heterophylla, Wedd. Chlor. And. ii. 129.—N. Granat
awplda, Benth. in DC. Prod. x. 547.—Perav.
humilis, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 844-Enphiaria minima.
imbricata, Lapeyr. 1. c=Enphrasia of Scinalis.
naequalU, Bentk. in DC. Prod. x. 547.—Perav.; N. Granat
integrifolia, Wedd. Chlor. And. ii. 131.—Perav.
lanceolaU, Reickb. f. 1c. FL Germ. xx. 67. t 107.—Europ.
laniflora, Bentk. in DC. Prod. x. 646.—N. Granat.
laticrenata, Benlh. 1. c. 547=santolinaefolia.
lahfolia, Sibtk. V Sm. Fl. Graec. vi. 69. t 686.—Reg. Mediterr.; Reg. Cauc.; Persia,
laxiflora, Benth. in DC. Prod. x. 547.—N. Granat.
longiflora, Hochst. ex Bentk. I. c 545.—Abyss,
"tea, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xx. 56.—Europ.; As. Mia.
maxima, Gran, & Godr. Fl. Fr. iL 611, in syn.= viscosa.
maxima, Pen. Syn. iL 151=B. Trixago.
melampyroides, Benth. in DC. Prod. x. 648.—Ecuador.
Meyeniana, Bentk. 1. c. 546.—Perav.
nollis, Turcz. ex Herd, in Bull. Soc. Nat Mosc lvlii. (1888). i. 397-Veronica ciliaU.
nwtica, Benth. 1. c. 548.—Perav.
Odontites, Huds. Fl. Angl. 268.—Europ.; Reg. Mediterr.
orthocarpiflora, Benth. in DC. Prod. x. 545.—Perav.
Palhda, Linn. Sp. PI. 802 = Castilleja pallida.
paniflora, Charpent *ex* Benth. in DC. Prod. x. 644 = alpina.
Paniflora, Thorn. Cat. PI. Suisses (1887) 6=alpina.
Parvifolia, Benth in DC. Prod. x. 645.—N. Granat.
P»tens, Benth. 1. c. 546.—Perav.
pedicularoides, Bentk. I. c—Ecuador.
Peruviana, Walp. in Not. Act. Nat. Cur. xix. *Suppl.* i. (1843) 400.—Perav.
Pnmila, Benth. in DC. Prod. x. 546.—Perov.
Pwpuiea, Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 602. —Hispan.;Afr.6or.
tprpurea, Duby, Bot GaU. 854-latifolia.
rhtnanthoides, Hochst ex Benth. in DC. Prod. x. 543 =B. Trixago.
rutricoma, Pall. Reise, iii. 84=Castilleja pallida.
Mntohnaefolia, Bentk. in DC. Prod. x. 547.—Mexic
MWwa, Spreng. Syst. ii. 778.-Afr. austr.
Mordrfolia, Steud. Norn. ed. n. L 189.—Ins. Mader.
stfo. s>a, Bertol. Amoen. IUl. 83-B. Odontites.
«*''•»«!, Pall. Reise, ii. 123-Castilleja pallida.
**P*cata,* Ramond, in BuU. Soc. Philom. ii. (1799-1801) =aspera.
^jqa, *Benth. in DC. Prod.* x. 547.—Ecuador,
snbiiiclusa, Benth. I. c—Perav.
^»*fluqsa,* Griseb. ex Wedd. Chlor., And. ii. 126-nliformii.
tenuifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 429 = Orthocarpus tenuifolius.
tnchophyll,, Wedd. Chlor. And. ii. 122.—Perav.
KV&ki Spreng. Syst. iL 778=Bungea trifida.
'nxago, *Linn. Sp. PI.* 602.—Europ.; Afr. bor.
'"'"a. *Reichb.f. Ic. Fl. Germ. xx.* 57.1.107.—Europ.
nrsicolor, Pen. Syn. iL 151=B. Trixago.
VB«>M, *Linn. Sp. PI.* 602.-Enrop.; Reg. Mediterr.

BAKYA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 122; et in Abh. Akad. Berl. (1854) 22. t. 2, B =Begonia, Linn.
""nadelpka, Klotzsch, 11. cc 122, 28=Begonia monaaelpha.

BARYOSMA, Gaertn. Fract ii. 78. t. 98 (1791) - Di-Pteryx, Schreb. (Legumin.).
'tPotitifolium, Pers. Syn. ii. 278 = D. oppositifolia.
*io*go,* Gaertn. Frnct. ii. t. 98 = D. odorata.

BARYOSMA, Roem. & Schnlt Syst. v. 448 (1819) = Barosma, Willd. (Rntac.).

BARYSOMA, Bunge, Del. Sen,. Hort. Dorpat. (1889) 7 i « iniinnaea, xiv. (1840) Litt. 117 - Heraoleum, JJ.n. (Umbellif.).
""'Mum, Bunge, 11. cc. = H. villosmn.

BAXTIUM, Loar. Fl. Cochinch. 266 (1790). *JEGUMWOSAE1-a.* Benth. ft Hook. f. i. 464.
our. l. c.—China.

BASALTOGETON, Salisb. Gen. PI. Fragm. 27 (1866)- Sclila, Linn. (Liliac.).
permianum, Salisb: 1. c. =S. peraviana.

BASANACANTHA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 82 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook, f. L c.
armata, *Hoot./. I. c.* 83,—Am. trop.
dioica. *Hook./. I. c*—N. Granat
hebecarpa, *Hook.f. I.* (.—Am. trop.
Hnmboldtiana, *Hook.f. I. c*—Am. trop.
monantha, *Hook.f. I. c*—Guatemala,
reticulata, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 98.—Mexic.
tetracantha, *Hook.f. in Benth.* b* *Hook.f. Gen.* ii. 88. —Am. trop.

BA8AHANTHE, Peyr. in Bot. Zeit xvii. (1859) 101; et in Siub. Acad. Wien. Math. Nat. xxxviii. (1860) 669. *PASSIFLOREAE,* Benth. & Hook. f. i. 812.
littoralis, Peyr. 11. cc—Afr. trop.
Nummularia, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 28. t. 9.—Angola.

BASELA,linn. Gen. ed. VI. (Vindob. rdmpT.) 161 (1767) -seq.

BA8ELLA, [Rheede] Linn. Diss. Dass. 12 (1747); Amoea. Acad. i. 396. *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 76.
GANDOLA, Rumph. ex Linn. Sp. PI. ed. II. 890 (1762).
alba, Linn. Sp. PI. 272-rabra.
cananifblia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 6961=rubra.
cordifolia, Lam. Encyc. i. 382 = rabra.
crassifotia, Salisb. Prod. 158-rabra.
diffusa, Rniz & Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 226 *(=Tandonia diffusa).—Perm.*
jMformis, Ruiz & Pav. ex Moq; 1. c 227 *(-Tandonia filiformis).—?tna.*
Hookeriana, Moq. ex Moq. 1. c. 225—Touraonia Hookeriana.
japonica, Borm. f. Fl. Ind. 76. t. 39. f. 4-rubra.
lucida, Linn. Syst. ed. X. 966. n. S43=rnbra.
marginata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 189 (- *Tandonia marginata).*—Ecuador.
nigra. Lour. Fl. Cochinch. i. 183-rubra.
obmata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 189 (= *Tandonia obovata).*—N. Granat.
obtusifolia, Willd. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 227 *{= Tandonia obovata).*—N. Granat.
ramosa, Jacq. f. in Spreng. Sysf. i. 960,—rubra.
rubra, *Linn. Sp. PI.* 272.—Reg. trop.
trifida, Willd. in Roem. & Schnlt. Syst. vi. 695 (= *Tandonia marginata).*—Ecuador.
tuberosa, H. B. & K. Nov. Gen.etSp. ii. 189 = UUucus tuberosus.
vesicaria, Lam, Illustr. t. 215. f. 1 = Anredera spieata.
volubilis, Salisb. Prod. 158-rabra.

BASILAEA, Jnss. ex Lam. Encyc, i. 882 (1788); et Gen. 52 (1789)=Eucomis, L'Hérit (1788) (Liliac).
bifolia, Mirb. Hist. Nat. PI. viii. (1804) 339 = Whiteheadia bifolia.
coronata, Lam. Encyc. i. 882=E. regia.
nana, Mirb. HUt. Nat PL viii. (1804) 889=E. nana.
punctata, Mirb. 1. c.; Lam. Illustr. t 289=E. punctata.
regia, Mirb. 1. c. 838=E. regia.
undulata, Mirb. 1. c. = E. undulata.

BASILEOPHYTA, F. Mnell. First Gen. Rep. 16 (1868) =Pieldia, A. Cunn. (Gesnerac).
Friderici-Augusti, ¥. Muell. 1. c.=F. anstralis.

BASILICUM, Moench, Meth. Suppl. 143 (1802) = Odffium, Toura. (Labiat.).
polystachion, Moench, L c=O. Basilicum.

BASILLAEA.R. Hedw. Gen. 289 (1809) = BASiLAEA, Juss.-Eiucomis, L'Hérit. (LiUac).

BASILIMA, Rahn. New Fl. Am. iii. 75 (1886) = Spiraea, Linn. (Rosac).
pygmea, Ra6n. 1. c 76.—Am. bor.
sortifolia, Rafin. 1. c 75-S. sorbifolia?

BASI8TEUON, Turci. in Bull. Soc. Nat Mosc (1868) 214. *SCROPHULA RINEAE,* Benth. *8c* Hook, f. ii. 1244.
bogotensis, *Turct. I. c.*—N. Granat
peruviana, *Benth. (f Hook.f. Gen.* ii. 1246.—Peruv.

BA8KERVTLLA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 505 (1840). *ORCHWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 697.
assurgens, *Lindl. I. c.*—Perav.

BASONCA, Ra6n. Fl. Tellur. iv. 68 (1836) - Martynla, Linn. (Pedalin.).
longiflora, Rafin. 1. c. = M. longiflora.

BA8SELIHXA, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. Sér. II. vi. 1872 (1873) 230. *PALMAE.*
Deplanchei, *Brongn.* 6* *Gris, I. c.* 232, nomen.—N. Caled.
gracilis, *Brongn. (f Gris, I. c.* 231, nomen.—N. Caled.
kanaliensis, *Vieill. I. c.* 232, nomen.—N. Caled.
Lenormandii, *Vieill. 1. c.* nomen.—N. Caled.
Pancheri, *Brongn. (f Gris, 1. c.* nomen.—N. Caled.

BASSIA. All. Misc. Taut. iii. 177. t 4 (1766) = Chenolea, Thunb. (1781) (Chenopod.).
astracantha, F. Muell. Census, 140=C. astrocarpa.
astrocarpa, F. Muell. Fragm. xii. 12 - C. astrocarpa.
bicornis, F. Muell. Census, 80 =Sderolaena bicomis.
bicuspis, F. Muell. 1. c = Anisacantha bicuspis.
biflora, F. Mnell. 1. c=Sclerolaena biflora.
Birchii, F. MueU. 1. c« Anisacantha Birchii.
brevicuspis, F. Muell. 1. c-Anisacantha brevicuspis.
carnosa, F. Muell. 1. c = C. camosa.
Cornishiana, F. MueU. in Melb. Chem. *8c* Drag. (1885). —Austral.
Dallachyana, F. Muell. Census, 30=C. Dallacbyana.
diacantha, F. Muell. 1. c.-Sclerochlaena diacantha.
divaricata, F. Muell. 1. c=Anisacantha divaricata.
Drummondii, F. Muell. 1. c. = Anisacantha Dram. mondii.
echinopsila, F. MueU. 1. c.=Anisacantha echinopsila.
enchylaenoides, F. Mnell. 1. c.=C. enchylaenoides.
Erskineana, F. MueU. in Melb. Chem. & Drug. (Apr. 1885).—N. Guinea.
eurotioides, F. Muell. Census, 80 = C. eurotioides.
Forrestiana, F. Mnell. Fragm. xii. 12 - C. Forrestiana.
glabra, F. MueU. Census, 30 = Anisacantha glabra.
hirsuta, Aschers. ex Nym. Consp. 626 = C. hirsuta.
lanicuspis, F. MueU. Census, 30=Sclerochlaena lanicuspis.
micrantha, F. Muell. 1. c.=Enchylaena micrantha.
Muelleri, F. MueU. L c.=C. Muelleri.
muricata, All. Misc. Taur. iii. t. 4=C. hirsute.
paradoxa, F. MueU. Census, 30—Sclerolaena paradoxa.
quinquecuspis, F. Muell. I.e. — Anisacantha muricata.
salsuginosa, F. Muell. 1. c. =Threlkeldia salsuginosa.
sclerolaenoides, F. Muell. 1. c. = C. sclerolaenoides.
tricornis, F. Muell. 1. c. = C. tricomis.
tridens, F. Muell. Fragm. xii. 12=C. tridens.
uniflora, F. Muell. Census, 80=Sclerolaena uniflora.

BASSIA, Koenig, ex Linn. Mant. ii. App. 655 (1771). *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook. f. it 658.
DASYAULUS, Thvr. Enum. PL Zeyl. 175 (1860).
ILLIPE, F. MuelL Extra-trop. PI. Am. ed. [5] (1884) 181.
MADHUCA, J. F. GmeL Syst. 799 (1791).
atbescens, Griseb. Cat. PI. Cub. 164 (=Labourdonnaisiae sp.).—Cuba occ.
amicorum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) 327.—Ins. Pacif
argentea, *De Vriese, PI. Reinw.* 62.—Malacca.
Balem, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 582.—Sumatra.
Blancoi, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 199.—Ins. Pbilipp,
butyracea, *Roxb. in As. Res.* viii. (1805) 477.—IndT or.
caloneura, *Kurt, Andaman. Rep.* 141.—Ins. Andaman'
canaliculata, Bedd. Forest. Man. Bot 141 = Dichopsis canaliculata.
Cocco, *Scheff. in Ann. Jard. Buiten*. i.* (1876) 84.—N. Guinea.
cuneata, *Blume, Bijdr.* 676—Malaya.
dubia, *Gaertn. Fruct.* ii. 104. t. 104.—Amboin,
elliptica, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 86 - Dichopsis elliptica.
elongate, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 582.—Sumatra,
fulva, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 140,-Ind. or.

BASSIA :—
galactexyla, F. Muell. Kragm. vi. 27 = Lucama galactoxylon.
grandis, Bedd. Fl. Sylv. ii. t. 254 = Dichopsis grandR
hypoleuca, Miq. Fl. Ind. Bat. SuppL 582=Dichopsis obovata.
insignis, *Radii, in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* xii. (1882) 309.—Ind. or.
Jussaei, Griseb. Fl. Brit. W. Ii.d. 402 (sphalm.—Cf. Achras mammosa).—Ind. occ.
Kortbalsii, *Pierre, ex Bunk, in Ann. Jard. Buitena.* v. (1885) 45.—Sumatra.
Krantzii, *fiance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 260.—Cambodia.
laevi/olia, Bedd. Forest. Man. Bot. 141 = Dichopsis laevifolia.
lanceolata, Bedd. 1. c. = Dichopsis lanceolata.
lanceolata, *A. DC. in DC.Prod.* viii. l'J9.—Ins. Philipp.
latifolia, *Roxb. PI. Carom,* i. 20. t. 19.—Ind. or.
Lobbii, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl.Brit. Ind.* UL 546.—Burma.
lorgifolia, *Linn. Mant.* ii. *App.* 563.—Ind. or.
malabarica, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 140.—Ind. or.
microphylla, *Hook. Ic. PI. i.* t. 74.—Zeylan.
Moonii, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 140.—Ind. or.
Mottleyana, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 546.—Malaya.
neriifolia, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 140.—lad. or.
obovata, *Forst./. Prod.* n. 200.—Ins. Tanna.
oleifera, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 199.—Ins. Philipp.
pallkla, *Burck, in Ann. Jard. Buitent.* v. (1885) 44.—Sumatra.
Parkii, G. Don, Gen. Syst. iv. 36 •= Butyrospermum Parkii.
parvi/olia, A. DC. in DC. Prod. viii. 198=microphylla.
Pauciflora, Bedd. Forest Man. Bot. 141 = Dichopsis pauciflora.
petiolaris, *Bedd. 1. c.* 140.—Ind. or.
polyantha, Wall. Cat. n. 4166=Dichopsis polyantha.
rubiginosa, Bedd. Forest. Man. Bot. 141 = Dichopsis rubiginosa.
sericea, *Blume, Bijdr.* 674.—Malaya.
villosa, WalL Cat n. 4165 = latifolia.
Wightiana, .Bedd. Forest. Man. Bot. 141 = Isonandra Wightiana.

BASSOVIA, Aubl. PI. Gui. i. 217. t 85 (1775). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 892.
AORELIANA, Sendt in Mart. Fl. Bras. x. 138. t 19 (1846).
WITHERINGIA, L'Herit Sett. Angl. i. f. 1 (1788).
brachypoda, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 411.—Peruv.
cornuta, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 59.—Bras.
crassiflora, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 409.—Bras,
fasciculata, *Dun. I. c.* 408.—Bras.
Gardneri, *Dun. 1. c.* 409,—Bras,
glomnliflora, *Dun. I. e.* 405.—Bras,
hebepoda, *Dun. 1. c.* 407 = lucida ?
laevis, *Dun. I. c.* 408.—Java,
leptopoda, *Dun. 1. c.* 411.—Bras,
lucida, *Dun. 1. c.* 406.—Guatemala,
pyraster. *Dun. 1. c.* 408.—Bras.
Richardi, *Dun. I. c.* 406.—Guiana.
silvatica, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 95 = Maesa indica.
solanacea, *Benth. V Hook./. Gen.* ii 891.—Hab. ?
Spina-alba, *Griseb. in Goett. Abhandl.* xxiv. (1879) 248.—Am. hor.
sylvatica, *Aubl. PI. Gui.* i. 217.—Guiana,
tomentosa, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 409.—Bras,
velutina, *Dun. 1. c.* 410.—Bras.
Wallichii, Don. 1. c. 409-Solanum crassipetalum.

BASTABDIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 254. t. 472 (1821). *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 203.
BOGENHARDIA, Keichb. Nom. 200 (1841).
angulata, Guill. & Perr. Tent. Fl. Seneg. i 65 = Abutilon intermedium.
aristata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 200-bivalvis.
bivalvis, *H. B. if K. Nov. Gen. etSp.* v. 255, in nota.—Jamaica.
crispa, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 194, in nota-Abutilon crispnm.
/oetida. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 64 = Abutilon foetidum.
guayquilensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 200=viscosa.
hirsuti'flora, Presl, Reliq. Haenk. ii. 112=viscosa.

BA8TAEDIA :—
hirsutissima, Walp. Rep. i. S27 = praec.
nemoralis, St Hil. Fl. Bras. Mer. i. 195-Abutilon crispum.
parvi/olia, H. B. & K. Nov. Gen. & Sp. v. 255 = viscosa.
spini/ex, Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 186=bivalvis.
viscosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 256.—Mexic.

BASTERA, J. F. Gmel. Syst. 1271 (1791) = BASTERIA, Houtt.-Berkheya, Ehrh. (Compos.).

BASTERIA, Mill. Card. Diet. ed. VII (1759)-Calycanthus, Linn.
Calycanthus, Mill. 1. c. ed. VIII=C. floridus.

BASTERIA, Houtt. Nat. Hist. PI. vi. 158 (1776) = Berkheya, Ehrh. (Compos.).
aculeata, Houtt. 1. c = Berkheya obovata.

BASTIA, Steud. Nomi. ed. II. i. 238, in syn. (1840), sphalm. =• BUSTIA, Adans. = Buphthalmum, linn. (Compos.).

BATANTHES, Rafin. Atl. Joum. 145 (1832) = Gilia, Ruiz & Pav. (Polemon.).
aggregata, Rafin. 1. c = G. aggregata.
longiflora, Rafin. 1. c.=Collomia longiflora.
pungens, Rafin. 1. c. = G. pungens.

BATATAS, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 434 ; (Conv. Or. 52) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 64 — I. abyssinica.
acetosaefolia, Choisy, Conv. Rar. 124-1. carnosa.
auriculata, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 850 = I. cordofana.
betacea, Lindl. in Bot. Reg. (1839) Misc. 93 ; (1840) t 56.—Guiana.
bignonioides, G. Don, Gen. Syst. iv. 261-1. bignonioides.
bombycina, Choisy, in DC. Prod. ix. 340-1. bombycina.
bonariensis, Lindl. in Bot Reg. (1838) Misc. 55 = 1. ficifolia.
Cavanillesii, G. Don, Gen. Syst. iv. 262=1. Cavanillesii.
Choisyana, Wight, Ic t. 491-Argyreia Choisyana.
cissoides, Choisy, Conv. Or. 55-L cissoides.
crassicaulis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 134.—Guayaquil.
edulis, Choisy, Conv. Or. 58 = 1. Batatas.
glaberrima, Hassk. Retzia, i. 65.—Hab. ?
glabra, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot v. (1846) 352-I. glabra.
glauci/olia, G. Don, Gen. Syst iv. 262-1. glaucifolia.
heterophylla, G. Don, 1. c. 261 = 1. heterophylla.
incurva, Benth. in Hook. Niger Fl. 464 = I. incurvai
insignis, G. Don, in Sweet, Hort Brit. ed. III. 482 = 1. insignis.
Jalapa, Choisy, Conv. Rar. 125-1. Jalapa.
littoralis, Choisy, 1. c 124=1. carnosa.
Lmrriri, G. Don, Gen. Syst iv. 262-1. tuberosa.
macrorhizos, G. Don, 1. c. 261 =1. macrorhizos.
maritima, Boj. Hort Maurit 225 = 1. biloba.
multiflora, Boj. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 371=1. staphylina.
paniculate, Choisy, Conv. Or. 54-1. digitata.
Papirin, G. Don, Gen. Syst. iv. 261 = 1. pubescens.
pareiraefolia, Choisy, Conv. Rar. 123=1. pareiraefolia.
pentaphylla, Choisy, Conv. Or. 54 - I. pentaphylla.
pulchella, Boj. Hort Maurit 226-1. pnlchella.
quinquefolia, Choisy, Conv. Rar. 127 = I. quinquefolia.
senegalensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 261 = I. palmata.
sinuatus, Guss. Enum. PL Ins. Inar. (1854) 210=1. stolonifera.
subtriloba, G. Don, Gen. Syst iv. 261 = 1. pubescens.
ternata, G. Don, 1. c. 262=1. temata.
tomentosa, Choisy, in DC. Prod. ix. 337--1. tomentosa.
triloba, Choisy, Conv. Rar. 127^1. triloba.
tuberosa, Boj. Hort. Maurit 226-1. tuberosa.
venosa, Boj. 1. c =1. cairica.
vtnosa, G. Don, Gen. Syst. iv. 261=L venosa.
villosa, Choisy, in DC. Prod. ix. 337 - I. villosa.
viscida, Voigt, Hort Suburb. Calc. 354.—Ind. or. *1 Wallii,* Morr. in Ann. Gand. ii. (1846) 285-1. WaUit
WUldenowii, G. Don, Gen. Syst. iv. 261-1. heterophylla.
xanthorhita, Boj. Hort Maurit. 225-1. Batatas.

BATEMANIA, Endl. Gen. 197 (1837)=seq.

BATEMANNIA, Lindl. in Bot. Reg. 1.1714 (1834). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 546.
apiculata, *Reichi. /. in Linnaea,* xli. (1877) 109.—N. Granat
armillata, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1878) I. 780.—Hab.?
Beaumontii, *Reichb. /. in Walp. Ann.* iii. 844.—Bras.
Burtii, Endr. & Reichb. f. in Gard. Chron. (1872) 10" = Zygopetalum Burtii.
Colleyi, *Lindl. Bot. Reg.* xx. (1835) t 171* •—Guiana,
ñmbriata, *Linden (f Reichb./. in Bonplandia,ii.(lS5i)* 280.—N. Granat.
grandiflora, Reichb. f. 1. c. iv. (1856) 323-Zygopetalum grandiflorum.
Gnstavi, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 108.—N-Granat.
Lalindei, *Linden, Cat.* (1873) n. 90.—N. Granat
lepida, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1878) I. 688.—Bras.
Meleagris, *Reichb./. in Bonplandia, iii.* (1855) 217 •—Bras.
Wallisii, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1880) I. 776.—N. Granat.

BATERIUM, Miers, in Ann. & Mag. Nat Hist. Ser. HI-xiii. (1864) 124 - Haematocarpus, Miers (1867) (Mcnisp.V
validum, Miers, 1. c. = H. Thomsoni.

BATESIA, Spruce, in Benth. & Hook. f. Gen. i. *i6i* (18B6). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. L «• floribunda, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* » Ti (1866) 303. t 37.—Bras. bor.

BATHYSA, Presl, in Abh. Boehm. Ges. Folge V. {£• (1845) 514; (Bot Bemerk. 84). *RUBIACEAE* Beatn-& Hook. f. ii. 49.
ScHOENtEiNiA, Klotzsch, in Hayne, Arzneigew. *"• in nota ad t. 15 (1846).
VOIGTIA, Klotzsch, 1. c. (li)46).
stipulate, *Presl, I. c*—Bras.

BATINDUM, Rafin. Sylva Tellur. 81 (1838)=Oftto, Adans. (Myopor.).
jasmineum, Rafin. 1. c. 82 = O. africana.

BATIS, Linn. Syst. ed. X. 1380. n. 1172 (1759). *BATIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 88.
americana, *Linn. Mant.* ii. 499.—Am. bor.
aurantiaca. Wall, ex Thw. Enum. PL Zeyl. 2*8 Plecospermum spinosum.
cali/ornica, Torr. in Smithson. Contrib. vi. (1854) 8 * maritima.
/ruticosa, Roxb. Hort. Beng. [71] ; Fl. Ind. iii. 768* Cudraniajavanensis et C. fruticosa.
hermaphrodite, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 791.—I"*-Philipp.
maritima, *Linn. Syst.* ed. X. 1380.—Jamaica.
spinosa, Roxb. Hort. Beng. [71]; Fl. Ind. iii. 762" Plecospermum spinosum.
vermiculaia. Hook. Fl. Bor. Am. ii. 128-Sarcobato* vermiculatus.

BATOCABPTTB, Kant. Fl. Colamb. ii. 67. t. 1«* (1862?). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. *I* *• 876.
orinocensis, *Karst. I. c.*—Venezuela.

BATOCYDIA, Mart, ex DC. Prod. ix. 148 (1846)* Bignonia, Linn.
capreolata. Mart. 1. c. 146 — Bignonia capreolata.
cunei/olia, Mart. 1. c. 157 =Big»onia cnneifolia.
exoleta. Mart. 1. c. 148 -Bignonia exolete.
Unguis, Mart. 1. c. 146—Bignonia Ungnis-cati.

BATODENDRON, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Set. II. viii. (1843) 261-Vaccinium, Linn.
arboreum, Nutt. 1. c. — V. arboreum.

BATRACHIUM, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PL" »• ^ (1821) = Ranunculus, Tourn.
admixtum, Nyl. in Nyl. *Sc* Sad. Herb. Mus. Fenn. »6 —R. confervioides.
aquatUe, Wimro. FL Schles. (1841) 8 - R. aqnatilis-..
aspergiUi/olium, Dum. in Bull. Soc. Dot Belg. "• (1863) 218 - R, trichophyllus.

BATRACHIUM:—
Baehii, Wirtg. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. i. (1844) 292 = Ranunculus fluitans.
Baudotii, F. Schultz, 1. c. 71 »R. Bandotii.
bipmtinum, F. Schultz, ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 24 *= R. trichophyllns.
biternatum, Bercht. & Presl, Rostl. i. Rannnc. 49-R. bitematus.
caespitosum, S. F. Gray, Nat. Are. Brit. PI. it 722 =>R. circinatus.
caespitosum, F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. i. (1844) 71-R. trichophyllus.
eapillaceum, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunc. 49 = R. trichophyllus.
carinatum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Braenn, xv. II. (1877) 28-R. Baudotii.
nrcinatoides, Arv. in Soc. Ech. Dauph. iv. (1877) 105 =• R. aqnatilis ?
nrcinatum, Spach, Hist Ve"g. Phan. vii. 201 =-R. circinatns.
coenosum, Nym. in Bot Notiser (1852), 100 = R. coenosus.
con/ervoides. Fries, in Bot. Notiser (1845), 121 = R. coenosus.
ronfusum, Garcke, Fl. Deutschl. ed. V. 8 - R. Petiveri.
confusum, Le Jolis, in Me'm Soc. Sc. Nat. Cherb. vii. (1860) 257 = R. confusus.
dtchotomum, Schmalh. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. «. (1884) 868=R. aquatiils.
dtvaricatum, Wimm. 11. Schles. (1841) 10=R.divaricatus.
Mversifolium, Nym. Consp. 15=R. diversifolius.
Drouetii, Nym. in Bot Notiser (1852) 98 = R. Drouetii.
elongatum, F. Schultz, in Billotia, i. 118=R. peltatus.
<*adicatum,* Laest. ex Nym. Consp. 15 = R. confervoides.
Mceidum, Rupr. Fl. Cauc. 15 = R. aquatilis.
fiorihindum, Dum. in Bull. Soc. Bot Belg. ii. (1863) 216=R. Aoribundus.
fluitans, Wimm. Fl. Schles. (1841) 9 = R. flnitans.
fluMtile, S. F. Gray, Nat. Arr. ii. 722 = R. fluviatilis.
Fnesii, Nym. Consp. 15 = R. heterophyllus.
Godronii, Nym. 1. c 16=R. diversifolius.
'deraceum, S. F. Gray, Nat. Arr. ii. 721 = R. hederaceus.
rterophyllum, S. F. Gray, 1. t-R. heterophyllus.
eterophyllum, Lange, Pugill. 251=R. peltatus.
kololeucum, Garclce, Fl? Deutschl. ed. IV. 7 = R-hololeucus.
intermedium, Nym. Syll. 175=R. intermedius.
Langei, F. Schultz, ex Nym. Consp. 16 = R. tnpartitus.
Inqspermum, Hartm. f. Skand. FL ed. XIII. 165=R. nederaceus.
Lenormandii, F. Schultz, Arch. Fl. Fi. et Allem. i. (1844)70-R.Lenormandi.
longirostre, F. Schultz, 1. c. 71 = R. longirostris.
lutarium, Revel, in Act Linn. Soc. Bord. xxv. (1864) 418. t. 4=R. Lenormandi.
luteolum, Revel.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xiL (1865) Kbliog. 258=R. heterophyllus.
lutulentum, Nym. Syll. Suppl. 29 = R. trichophyllus.
•"> »««, Fries, Nov. Mant. iii. 51 = R. Baudotii.
nnimum, Schnr, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. n. (1877) 28 = R. trichophjllus.
ottyiflomm, S. F. Gray, Nat Arr. ii. 721-R. tnpartitus.
ololeucos, [Bossch] Prod. Fl. Bat. 7 = R. hololeucus.
omoiophyllum, Nym. Consp. 16 = R. hederaceus.
P-ntothrix, S. F: Gray, Nat. Arr. ii. 722 = R. tnchoPhyllus.
Paucistamineum, F. Schnltx, Arch. Fl. Fr. et Allem. (1844) 71 = R. trichophyllus.
pectinatum, Nym. Consp. 15 = R. trichophyllus.
Pe'tatum, Bercht. *Sc* Presl, Rostl. i. Ranunc. 49=R. peltatum.
Penicillatum, Dum. in Bull. Soc. Bot Belg. ii. (1868) 216=R.pelUtns.
Petiveri, F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. i. (1844) 71-R.Petiveri.
Pfwdanifolium, Dum. Fl. Belg. 127 = R- mu""*-
Ptotdofluitans, Nym. Consp. 16 = R. peltatus.
pHfilum, Nym/in Bot. Notiser (1862), 98=R. fluitans.
radians, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iL (1868) 815-•K. trichophyllus.

BATRACHIUM :—
radians, Revel, in Act. Linn. Soc. Bord. xix. (1858) 120 = Ranunculus radians.
rhipiphyllum, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. ii. (1868) 215 •= R. diversifolius.
rigidum, Dum. Fl. Belg. 127 = R. trichophyllus.
Rionii, Nym. in Bot. Notiser (1850) ^R. sceleratus.
tenellum, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. ii. (1868) 211 = R. tenellus.
trickophyllum, fBossch] Prod. Fl. Bat 7; Des Moul. in Act. Soc. Linn. Bord. xx. (1859) 456-R. trichophyllus.
trinacrium, Nym. Consp. 16=R. tripartite.
tripartitum, S. F. Gray, Nat. Air. ii. 721 = R. tripartite.
triphyllos, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. ii. (1868) 214 =R. tripartitus.
truncatum, Dum. 1. c. 215=R. peltatus.
villosum, F. Schultz, ex Gren. & Godr. Fl. Fi. i. 24-R. trichophyllus.

BATRATHERUM, Nees, in Edinb. N. Phil. Jonrn. xviii. (1835) 180=Arthraxon, Beauv. (Gram.).
cuspidatum, Hochst. in Flora, xxxix. (1856) 178-A. cuspidatns.
echinatum, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xviii. (1835) 181-A. lanceolatus.
lanceolatum, Nees, 1. c.=A. lanceolatus.
micans, Nees, 1. c. 182=A. cuspidatns.
molle, Nees, 1. c. 181 = A. microphyllus.
nudum, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 388—= A. ciliaris.
plumbeum, [Mtmro, ex] Duthie, in Atkinson, Gazetteer, 640-A. ciliaris.
rude, Nees, ex Steud. Syn. Fl. Gram. 383 = A. rudis.
Schimperi, Nees, ex Hochst. in Flora, xxxix. (1856) 179=A. microphyllus.
serrulatum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 458=A. lanceolatns.
submuticum, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 882=A. ciliaris.

BATSCHIA, J. F. Gmel. Syst. iL 815 (1791)=Lithospermum, Linn. (Boragin.).
albiflora, Rafin. New Fl. Am. iv. 19.—Am. bor.
canescens, Michx. Fl. Am. Bor. i. 180. t 14 = L. canescens.
caroliniana, Roem. & Schult. Syst. iv. 52 = L. hirtum.
caroliniensis, J. F. Gmel. Syst. i. 315 - L. hirtum.
conspicua, R. Br. in Richards. App. Frank]. Joum. 782 = L. canescens.
decumbens, Nutt. Gen. Am. i. 114 = L. angustifolium.
disticha, G. Don, Gen. Syst iv. 826 = L. distichum.
Gmelini, Michx. Ft. Am. Bor. i. 180=L. hirtum.
longiflora. Push, Fl. Am. Sept L 183=L. angustifolium.
pilasa, G. Don, Gen. Syst. iv. 872 = L. pilosum.
sericea, Roem. & Schult. Syst. iv. 743 = L. canescens.
Torreyi, G. Don, Gen. Syst. iv. 372=L. pilosum.

BA.TSCHIA,Moench,Meth.6«7(1794) = Eupatorium, Linn. (Compos.).
nivea, Moench, 1. c.=E. ageratoides.

BATSCHIA, Mutis, ex Thnnb. in Nov. Act. Ups. v. (1792) 120. t 2=Abuta, Anbl. (Menisp.).
conferta, Miers, in Seem. Bot. Voy. Herald, i. 76 = A. šeemanni.
conferta, DC. Prod. i. 108=A. spicata.
racemosa, Thunb. in Nov. Act. Ups. v. (1792) 122 = A. racemosa.
spicata, Thunb, 1. c. = A. spicata.

BATSCHIA, Vahl, Symb. Bot iii. 89. t 56 (1794) = Humboldtia, Vahl (Legum.).
laurifolia, Vahl.l. c.=H. laurifolia.

BATTATA, Hill, Hort Kew. 148 (176S)=Solanum, Linn.
tuberosa. Hill, I. c.=S. tuberosum,

BAUCHEA, Foum. ex Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 88. -*GRAMJNEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1149.
Karwinskii, *Fount. Afex. PI. En. Gram.* 87 ; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 550.—Mexic

BAUDINIA, Lesch. ex DC. Prod. iii. 211 (1828)-Calothamnus, Labill. (Myrtac).

BAUDINIA, Lesch. ex DC. Prod. vii. 511(183!)) = Soaevola, Linn. (Goodenov.).
humilis, Lesch. ex DC. 1. c. 511=S. striata.

BATJDOTTINIA, Baill. Adansonia, vi. (1866) 193. t. 5. *LEGUM1N0SAE,* Hcnth. & Hook. f. i. 1003.
fluggeiformis, *Baill. 1. c.* viii. (1868) 201.—Madag.
sollyaeformis, *Baill. 1. c.* vi. ^1866) 194.—Madag.

BATJSBA, Banks, ex Andr. Bot. Rep. t. 198 (1793). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 655.
Billardieri, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. ix. (1880) 96=rubioides.
capitata, *Ser. in DC. Prod.* iv. 13.—Austral.
galioides, Sieber, in Reichb. Ic. Exot. t. 77 = rubioides.
humilis, Sweet, Hort. Snburb. 124= rubioides.
juncea, Walp. Rep. ii. 375=Tetratheca juncea.
microphylla, Sieber, ex DC. Prod. iv. 13=rubioides.
rubiaefolia, Salisb. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 514. t. 10=rubioides.
rnbioides, *Andr. Bot. Rep.* t. 198.—Austral,
sessiliflora, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 41.—Austral.

BAUHINIA, Linn. Gen. ed. 1.126 (17S7). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 575.
ALVESIA, Welw. Apont. 587. n. 47 (1858).
AMARIA, Mutis, ex Caldas, in Seman. Nuev. Gran. II. (1810) 25.
BINARIA, Rafin. Sylva Tellur. 122 (1838).
CANSENIA, Rafin. 1. c. (1838).
CASPAREA, H. B. *SC* K. NOV. Gen. et Sp. vi. 317 (1U2S).
CAULOTRETUS, Rich, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 406 (1827).
ELAYUNA, Rafin. Sylva Tellur. 145 (1838).
LACARA, Spreng. Neue Entdeck. iii. 56 (1822).
LASIOCEMA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 71 (1855).
LOCELLARIA, Welw. Apont. 588 (1858).
MANDARUS, Rafin. Sylva Tellur. 122 (1838).
MONOTELES, Rafin. 1. c. (1838).
PAULETIA, Cav. Ic. v. 5. t. 409, 410 (1799).
PERLEBIA, Mart. Reise, i. 555 (1828).
PHANEKA, Lcur. Fl. Cochinch. 37 (1790).
PILEOSTICMA, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 598.
SCHNELLA, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820', 411.
TELESTRIA, Rafin. Sylva Tellur. 122 (1838).
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 25S = reticulata.
aeida, Reinw. in Flora, xxxi. 11848) 578-malabarica.
aculeata, *Linn. Sp. PI.* 374.—Am. austr.
aculeata, Veil. Fl. Flum. 171; iv. t. 83 = forficata.
acuminata, Bruce, Trav. Abyss. App. 167. t. 18 — B. Farec.
acuminata, *Linn. Sp. PI.* 876.—Ind. or.; Malaya; China.
acuminata, Veil. Fl. Flum. 171; iv. t. 85.—Bras.
Ayuruana, *Moric. PI. JVouv. Rar. Am.* 77. t. 51.—Bras.
Adansoniana, *Guill. V Perr. Tent. Fl. Seneg.* i. 265.—Afr. trap.
aegopoda, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 60,120 = B. res-caprae.
affinis, *Vog. in Linnaea,* x. (1836) 594.—Bras.
Aimouta, Steud. Nom. ed. II. i. 191 (err. typ. 291), vide *Outimouti.*
alba, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 5796-variegata.
albicans, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1839) 304.—Bras.
americana, *Delaun. Herb. Amat.* t. 315.—Am. austr.
ampla, *Span. Ic.* 29; *in Linnaea,* xv. (1841) 202.—Timor,
anatomica, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 405.—Am. austr.
Andrieuxii, *Hemsl. LHag. PI. Nov.* 48.—Mexie.
anguina, *Roxb. Hort. Beng.* 81; *Fl. Ind.* ii. 328.—Ind. or.; Malaya.
angulosa, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1889) 312.—Bras•
armata, *Otto, PI. Bras.* 25.—Bras.
articulata, Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 290, err• tVD• = reticulata!
aurantiaca, *Boj. in Ann. Sc. Nat. Set.* II. iv. (1885) 264.—Madag.
aurita, *Ait. Hort. Kew.* ii. 48.—Jamaica.

BAUHHTIA:-
Bacuria, Buch.-Ham. ex Wall. Cat sab n. 5798 = malabarica.
bahiensis, Bong, in *Uim.* Acad. Petersb. Sér. VI. iv. (1886) 114=Langsdorfiana.
Baueriana, Stend. Norn. ed. II. i. 191 (err. typ. 291) = malabarica.
Benthami, Bedd. Forest Man. Bot. 98; Ic. PI. Ind. Or. i. 22=phoenicea.
Benzoin, *Kotscky, ex Schweinf. Reliq. Kotsch.* (1868) 12. t. 11.—Afr. trop.
bicolor, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1476.—Bras,
bicuspidata, *Bentk. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 183.—Am. trop.
bidentata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VH. p. 76.—Malaya.
binata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 831 = Blancoi.
binata, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Phil. ed. III. Nov. App. 72=tomentosa.
Blancoi, *Benth. Fl. Austral,* ii. 296, in nota; *Baker., in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 278.—Siam; Ins. PhUipp.
Bongardi, *Steud. Norn.* ed. II. i. 191 (err. typ. 291).—Bras.
Bowkeri, *Han. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 696.—Afr. austr.
brachycarpa, *Wall. Cat.* n. 5786.—Burma.
brachystachya, Walp. Rep. i. 852 = cumanensis.
bracteata, *R. Grak. in Wall. Cat.* n. 6802.—Banna; Siam.
brasiliensis. *Vog. in Linnaea,* xiii. (1839) 302.—Bras.
Bredemeyeri, *Vog. 1. c.*—Venezuela,
breviloba, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 197.—Bras.
brevipes, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 307-Bongardi.
Buchanani, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sir. I. ix. (1829) 430=diphylla.
Burchellii, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 186.—Bras.
Burkeuna, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 275 » escnlenta.
Cancara, Bnch^Ham. ex Stend. Nora. ed. IL i. 191 (err. typ. 291)=variegata.
candicans, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 201.—Bras.
Candida, Ait. Hort Kew. ii. (1789) 49 = aenminata.
Candida, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. ii. 318 = variegata.
Carronii, *F. MuelL in Trans. Phil. Inst. Victoria,* iii. (1858) 49.—Austral.
castrata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. L 881.—Ins. Philipp.
castrata, *Hassk. in Flora,* xxv. (1842) *Beibl.* II. 54.—Java.
Championi, *Benth. Fl. Hongkong.* 99.—Hongkong,
cheilantha, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1476.—Bras.
chinensis, Vog. in Nov. Act. Nat Cue xix. Soppl. i. (1843) 42 = variegata.
choriophylla, Vog. in Liunaea, xiii. (1889) S07=rufa.
chrysophyUa, Vahl, ex DC. Prod. ii. 517=macrophylla.
chrysophyUa, Vog. in Linnaea, xiii. (1889) 313 = splendens.
cinnamomea, *DC. Prod.* H. 617.—Guiana,
cissoides, *Welw. ex Oliver,Fl. Trop. Afr.* ii. 287.—Afr. trop.
coccinea, *DC. Prod.* ii. 516.—Cochinch.
columbiensis, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 313= cumanensis.
compacta, *Hort. ex Segel, Cat. PI. Aksakm.* 15.—Hab.?
confertiflora, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. Jl. 206.—Bras.
cordata, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 308=rob.
cordifolia, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 832 - emarginata.
comiculata, *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. II. 198.—Bras,
comifolia. *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 278.—Ins. Penang.
coromandeliana, DC. Mém. Leg. xiii. 488; Prod. ii. 615-purpurea.
coronata, *Benth. in Mart. Fl. Brat.* xv. II. 209.—Bras.
— corymbosa, *Roxb. Hort. Beng.* [31] ; *Fl.Ind.ti.* 829.—China.
cucuUata./kw. *Journ.BotX* (1814) 74(= variegata f).—Ind. or.
cumanensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vL 321.—Venezuela.

BAUHINIA:—
Cumingiana, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App* 73.—Ins. Philipp.
Cunninghamii, *Benth. Fl. Austral,* ii. 295.—Austral,
cupulata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 188.—Bras.
curvula, *Benth. I. c.* 194.—Bras,
cuyabensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 191 (err. typ. 291).—Bras,
debilis, *Hassk. in Hon. V De Vriese, Tijdschr.* x. (1843) 149.—Java.
dipetala, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 48.—Mexfc.
diphylU, *Buch.-Ham. in Symes, Embassy,* ed. II. iii. 311.—Burma; Malaya,
dipten, *Blume, ex Miq. in Verh. Nederl. Inst.* III. iii (1850) 12.—Malaya.
divaricata, Hort. ex Steud. Nom. ed. IL L 191 (err. typ. 291)=forficaU.
divaricata, Lam. Encyc. i. 889 = Lamarckiana.
divaricata, *Linn. Sp. PI.* 374.—Am. austr.
divergens, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 282.—Burma.
dodecandra, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1475.—Bras,
dubia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 463.—Bras.
dubia, Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 314=coronata.
dumosa, *Benth. in Mart Fl. Bras.* xv. H. 194.—Bras,
elongata, *Korth. Verh. Nut. Gesch. Bot.* (1839-42) 89.—Borneo,
emarginata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. p. 75.—Sumatra.
*marginata, *Mill Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.—Mexic.
emarginata, Wall. Cat n. 5792-retusa.
eriophora, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1842) 12.—Hab.?
excelsa, Blume, ex Korth. Verb. Nat Gesch. Bot. 90= femiginea.
esculenta, *Burch. Trav.* ii. 589.—Afr. anstr.
exdsa, *Hemsl. Biol Centr. Am. Bot.* i. 337.—Panama.
eximia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 75.—Java.
Farec, *Desv. Journ. Bot.* i. (1814) 74.—Abyssin.
fessoglenais, *Kotschy, ex Schmeinf. Reliq. Kotsch.* (1868) 14. t 12.—Afr. trop.
ferruginea, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1476 = Bongardi.
ferrugroea, *Roxb. Hort. Beng.* 90; *Fl. Ind.* ii. SSL-Malaya.
Finlaysoniana, *R. Grak. in Wall. Cat.* n. 6801.—Malaya.
flexuosa, *Moric. PI. Nouv. Am.* 80. t 53.—Bras.
Boribunda, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sét.* I. ix. (1826) 480.—Bras.
forficata, *Lint, Enum. Hort. BeroLX* -404.—Bras.
foveolata, Dalz. in Journ. Linn. Sod. xiii. (1878) 188 = Lawii?
folva, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* (1839-42) 91.—Java,
furcata, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sir.* I. ix. (1826) 429.—Am. bor.
fusconervis, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1476.—Bras.
Gardneri, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 186.—Bras,
garipensis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 162.—Afr. austr.
geminata, *Vog. in Linnaea,* xiii (1839) 80S.—Bras.
Gilesii, *F. Muell.* &• *Bailey, in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 151.—Austral,
glabra, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 20.—N. Granat.
glabrifolia, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 28L—Burma.
glandulosa, *DC. Prod,* it 518.—N. Barcel.
glauca. *Wall. Cat.* n. 5785 ; *Benth. Fl. Hongkong.* 99. 7—Burma; Malaya; China,
glaucescens, *DC. Prod,* ii 515.—Venezuela.
Grahami, Steud. Nom. ed. IL i 191 (err. typ. 291) = rufa.
Grandidieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 378.—Madag.
grandiflora, *Juss. in Poir. Encyc. Suppl.* i. 600.—Peruv.
grandiflora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 382-variegata.
granditolia, *D. Dietr. Syn. PL* ii. 1475.—Bras,
guianensis, *Aubl. PI. Gut.* i. 377.1.145.—Guiana,
heterandra, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. H. 196.—Bras.
heterophylla, *Kunth, Mim.* t. 46.—Venezuela.
Hildebrandtii, *IVatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 107.—Afr. trop.

BAUHTDTA:—
hirsuta, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1839) 800.—Bras.
hirsuta, Weinm. in Ratisb. Syll. ii (1828) 9 = acuminata.
hirta, *Steud. Nom.* ed. II. i. 191 (err. typ. 291).—Bras,
holophylla, *Steud. I. c.; D. Dietr. Syn. PI.* ed. II. 1476.—Bras.
Hookeri, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* i«-(1859) 51.—Austral.
Hostmanniana, *Miq. in Verh. Nat. Wet. Haarl.* vii. (1851) 10.—Guiana.
Humblotiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1883) 365.—Madag.
hymenaeaefolia, *Triana, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 337.—Panama.
indica, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 165.—Ind. or.
inermis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 85-reticulata, tomentosa.
inermis, *Pers. Syn.* i. 465.—Am. austr.
integerrima, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 197.—Bras,
integrifolia, *Roxb. Hort. Beng.* [90]; *Fl. Ind.* ii. 881.—Malaya.
intermedia, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 309-Tab.
involucellata, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiii-(1873) II. 72.—Burma,
isopetala, *Griff. Notul.* iv. 451.—Burma,
japonica, *Maxim, in Bull. Acad. Pittrsb.* xviU. (1878) 40L—Japon.
Kappleri, *Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. xiii (1882) 317.—Guiana,
khasiana, *Baker, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* ii. 281.—Ind. or.
Kirkii, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 288.—Afr. trop.
Kockiana, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* (1839-42)87.—Sumatra.
Krugii, *Urban, in Berl. Deutsch. Bot. Ges.* iii. (1885) 83.—Porto-Rico.
Knnthiana, *Vog. in Linnaea,* xiii (1839) 312.—Am. austr.
Lamarckiana, *DC. Prod.* ii. 512.—Am. austr.
Langsdorffiana, *Bong, in Mtm. Acad. Pttersb.* iv. (18S6) 109.—Bras.
latifolia, *Cm. Ic.* v. 4. t. 405.—Mexic.
latisiliqua, *Cav. 1. c.* 5.—Ins. Philipp.
Lawii, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii 277.—Ind. or.
Leichhardtii, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Victoria,* iii. (1859) 50.—Austral,
leiopetala, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 209.—Bras,
leptopetala, *Mof. & Sessi, ex DC. Prod.* ii. 513.—Mexic.
Lingua, *DC. I. c.* 516.—Malaya,
longicuspis, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 185.—Bras.
longiflora, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1475=forficata.
longifolia, *D. Dietr. 1. c.* 1476.—Bras,
longipetala, *Walp. Rep.* i. 852.—Guiana.
longistyla, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. II. 186 •holophylla.
lucida, Wall. Cat. n. 6779 A-emarginata.
lunaria, *Cav. Ic.* v. 4. t. 407.—Mexic.
lunaroides, *A. Gray, in S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* i. 205.—N. Mexic.
macrantha, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 289.—Afr. trop.
macranthera, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 888.—Mexic.
macrophylla, *Poir. Encyc. Suppl.* 1-600.—Am. austr.
macrostacbya, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 96.—Guiana.
macrostachya, *Wall. Cat.* n. 5774.—Ind. or.
maculata, *Tenore, Cat. Hort. Neap.* (1845) 79.—Hab. 1
madagascariensis, *Desv. Journ. Bot.* i. (1814) 74.—Madag.
malabarica, *Roxb. Hort. Beng.* [31]; *Fl. Ind.* ii. 321.—Ind. or.; Banna.
marginata, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1476.—Bras.
Maximiliani, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 203.—Am. trop.
megalandra, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 213.—Ind. occ.
membranacea, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 187.—Bras.
mexicana, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1839) 299.—Mexic
microphylla, *Vog. I. c.* 80L—Am. austr.

BATJHIN1A:-
"nqllia, *D. Dietr. Syn. PI.* ii 1475.—Bias.
«e«iMima, WalL Cat. n. 6782=elongata.
Mombassae, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxz. (1880) 279.—Afr. trop.
aonandra, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1878) II. 78—Burma.
""?"*> C Bolle, in Peters, Reise Mossamb. BoL i. 22 = tomentosa.
multinervia, *DC. Prod.* ii. 615.—Venezuela,
nttalensis, *Oliver, in Hook. Bot. Mag.* t. 6086.—Afr. trop.
[illegible]a, *Wall. Cat.* n. 6777.—Ind. or.
"«Ma, *Benth. in Mart. FL Bras. xv.* II. 184.—Bras,
aotophila, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 116.—Reg. Argent.
ootusata, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1839) 305.—Bras,
oaoratissima, *Moric. PI. Nouv. Am.* 78. t. 52.—Bras,
odoratissima, *Newm. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 461.—15ns.
Olfcrsiana, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1839) 306.—Bras.
°TM*ata, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1878) II. •*•—Burma.
°*timouta, AubL PI. Gui. i 375. t 144 - guiaoensis, macrophylla.
<*ata, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1889) 300.—Bras.
fvnamensis, Spreng. Syst. ii. 384 = B. Paulelia.
Ptrnflora, Vahl, Symb. Bot. iii. 65-racemosa.
Porvifolia, Hochst ex Field. & Gardn. Sert. t. 10 = rufescens.
Aarvifo«a, Seem. Bot. Voy. Herald, 113-B. Pauletia.
parvifoha, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* . *»x. (1867) 257.-China.
^""letia, *Pen. Syn.* i. 456.—Panama.
Pentandra, *Vog. ex D. Dietr. Syn. PL* ii. 1475.—Bras.
Perrich, *South Sc. Record* (Feb. p "85), a5. Austral.
*-ejnlleana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1883) p «4.—Madag.
ifs-caprae, *Cav. Ic.* v. 8. t 404.—Mexic.
»na, C. *Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* i. —Afr. trop.
Petiolata, *Triana, ex Hook. Bot. Mag.* t 6277.—N. Granat.
Pttoenicea, *Heyne, in Wall. Cat. a.* 5800.—Ind. or.
P!«a. *DC. Prod.* ii. 515.—N. Granat.
Pjnnata, *Blanco, Fl. Filip.* 334.—Ins. Philipp.
Vterifolia, Roxb. Fl. Ind. ii. 827.
PMisaliqua, Steud. Norn. ed. II. i. 192=reticulata.
Platycalyx, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 207.—Bras.
Pktypetala, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* .>.339.-Mexic.
PWyphylU, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 185.—Bras.
PlatyphyUa, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 201 = purpurea.
Wotynliqua, Pen. ex DC. Prod. ii.*15=reticulata.
*"piteauana, *Vog. in Linnaea,* xiii (1839) 309.—vniana.
Polyantha, *Vog. 1. c.* 810.—Bras.
PMyacantha, Steud. Norn. ed. II. i 192 = polyantha.
PWycarpa, *Wall. Cat.* n. 5787.—Burma.
Po fH4, •ffoiw». *ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1888) 873.—Madag.
P°necta, *Sn. Prod. Veg. Ind. Occ.* 66.—Ind. occ.
f»«nt, G. Don, Gen. Syst ii. 462 - fenuginea.
PJMnosa, *Voy. in Linnaea,* xiii. (1839) 301.—Bras,
{•"fescnw, DC. Leg. Mem. xiii. 483 = aculeata.
PWchella, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 190,-Bras.
Pnnctata, *Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot. i.* 23.—Air- trop.
P"?ctata, *Burch. ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 211—Bras.
P^Pvrea, DC. ex Walp. Ann. ii. 448=malabarica.
P^Tirea, *Linn. Sp. PI.* 875.—Ind. or.; Burma; China.
?££"*«, Wall. Cat. n. 5797 = acuminata, variegata.
Pyrrhaneura, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* (1839-42) »8—Sumatra.
*racemifera, *Desf. Journ. Bot.* Ui. (1814) 74.—Am. austr.
racemosa, *Urn. Encyc.* i 890.—Ind. or.; Malaya; China.
racemosa, Rad Vahl>STmb- Bot iii 56. t 62-VahUi. (W36) 111,-Bras.

BATTHIEfIA :—
radiata, *Veil. Fl. Flum.* 170; iv. t. 81.—Bras,
ramosissima, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i.* 839.—Mexic.
reniformis, Royle, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit Ind. ii. 277=malabarica.
reticulaU, *DC. Ug. Mim.* xiii. 484.—Senegal.; Aegypt.
retusa, Poir. Encyc. Snppl. i. 699 - Lamarckiana, purpurea.
retosa, *Roxb. Hort. Beng.* [31]; *Fl. Ind.* ii 822.—Reg. Himal.
rhodacantha, *Den. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. ix. (1826) 429.—Bras.
Ricbardiana, *DC. Prod.* ii. 517—Guiana.
Riedeliana, *Bong, in Mim. Acad. Pltersb.* S&. VI. iv. (1886) 113.—Bras.
Riedelii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 98.—Celebes.
riparia, Mart, ex Benth. in Mart FL Bras. xv. II. 190 =pulchella.
rosea, *Kurm, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 72.—Burma.
rosea, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 588.—Surinam,
rotundata. *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 7.—N. Granat.
rotundifolia, Pers. Syn. i. 455=subrotundifolia.
Roxburghiana, Voigt, Hort. Suburb. Calc 284=retusa.
rubescens, Pers. Syn. i. 465 » rufescens.
rnbiginosa, *Bong, in Mim. Acad. Pltersb.* Sér. VI. iv. (1886) 112.—Bras.
rufa, *R. Grah. in Wall. Cat.* a 6798.—Ind. or.
rufa, *Steud. Nom.* ed. II. i. 192; *et D. Dietr. Syn. PI.* ii 1476.—Bras.
rufescens. *Lam. Encyc.* i. 891.—Afr. austr. et trap.
ruficarpa, Desv. in Ann. Sc,Nat Sér. I. ix. (1826) 430 =phoeniccft.
Rntenbergiana, *Vatke, in Bremen Abh.* vii. (1882) 249.—Afr. trop.
ratilans, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 206.—Bras.
scandens, Blanco, Fl. Filip. ed. L 8S2»Cnmingiana.
scandens, Bnrm. f. Fl. Ind. 94**corymbosa.
scandens, Linn. Sp. PI. 874=angnina.
scandens, Roxb. Hort Beng. [81]; FL Ind. ii. 826 = macrostachya, racemosa.
Schlechtendaliana, *Mart. & Gal. in Bull Brux.* x. (18*3) II. 808.—Mexic.
Sellowiana, Vog. in Tinnnea, xiii (1839) 806—cujabensis.
semibifida, *Roxb. Hort. Beng.* [S1]; *Fl. Ind.* ii. 830.—Burma; Malaya.
Serpae, *Ficalho (f Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1881) 20.—Afr. trop.
smilacifolia, *Burch. ex Benth. in Ma'rt. Fl. Bras.* xv. II. 183.—Bras.
smilacina, *Steud. Nom.* ed. II. i. 192.—Bras,
spathacea, *Sesse, ex DC. Prod.* ii. 512.—Mexic.
spedosa, Roxb. in Wall. Cat. n. 5791=tomentosa.
speciosa, Vog. in Linnaea, xiii (1889) 314-superba.
zpicata, Koen. ex Wall. Cat n. 5789 = racemosa.
spicata, RottL ex Spreng. Fl. Hal. Mint. 39 ; Syst ii 333=racemosa.
spicata, *Vog. in Linnaea,* xiii. (1839) 310.—Hab. t
spinosa, Poir. Encyc Suppl. i. 599 = B. Pauletia.
splendens, *H. B. V K. Nov. Gen. etSp.* vi 319.—Am. aostr.
Sprucei, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 205.—Bras,
stipularis, *Korth. ex Verh. Nat. Gesch. Bot.* (1839-42) 92.—Sumatra,
suaveolens, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* vi 321.—Am. austr.
subclavata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 188.—Bras.
subrotundifolia, *Cav. Ic.* v. 4. t. 406.—Mexic.
superba, *Steud. Nom.* ed. II. i. 192.—Guiana.
tamarindacea, Delile, Voy. Me'roe, 84 = reticulata.
Teysmanniana, *Scheff. in Ann. Jard. Buitenm.* i (1876) 19.—N. Guinea.
Thonningii, Schum. Beskr. Guin. PI. 203=reticulata.
tenella, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 196.—Bras.
tenuis, Span. Ic. 36; et in Linnaea, xv. (1841) 202 = racemosa.
timoriana, Stead. Nom. ed. IL i 192=seq.
Hmorensis, Decne. in Nouv. Ann. Mas. Par. Iii. (1884) 466=racemosa.
tomentosa, *Linn. Sp. PI.* 375.—As. et Afr. trop.
tomentosa. Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. 11L Nov. App. 72=acuminat*.

BATTHHTIA :—
tomentosa, Veil. Fl. Flum. 171; iv. t 84 = Langsdorffiana.
tomentosa, Wall. Cat. n. 5790. F & G^malabarica.
triandra, Roxb. Hort. Beng. [31]; Fl. Ind. ii 820-purpurea.
unguicnlaris, *Benth. ex Hemsl. BioL Centr. Am. Bot.* i. 540.—Mexic.
ungoiculata, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 277.—Siafn.
Ungula, jacq. Fragm.22. t. 15 = aculeata.
Vngula, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 192' Bredemeyeri.
ungulata, *Linn. Sp. PI.* 874.—' Amer.'
nruguayensis, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 209.—Bras.
Vahlii, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 72 = Cumingiana.
Vahlii, *Wight V Am. Prod,* i 297.—Ind. or.
variegata, *Linn. Sp. PI.* 875.—Ind. or.; Banna; China.
velutina, *Wall. Cat.* n. 5781.—Burma,
verrncosa, *Vog. in Linnaea,* xiii (1889) 811.—Bra*,
versicolor, *Bertol. Hort. Bonon. PI. Nov.* i 7.—Mexic.
viridescens, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Sér. L ix. (1826) 429.—Ind. or.
Vogeliana, Stead. Nom. ed. IL i. 192-spicata.
Welwitschii, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* it. 287.—Afr. trop.
Williamsii, *F. Muell. Descr. PI. Papuan,* iv. 61.—N.Guinea.
xanthoneura, Korth. ex Miq. Fl. Ind. Bat i. 68 = pyrrhaneura.

BATTKEA, Vatke, in Linnaea, xliii (1880-82) 104. *LEGVMINOSAE.*
insignis, *Vatke, 1. c.*—Madag.
maxima, Baill. in Bull. Soc Linn. Par. i. (1883) 388-insignis.

BAUMANNIA, DC. in Mém. Soc. Phys. Genèv. it. (1888) 583 (Not. PI. Rar. Jard. Genèv. vi. 1.1 1, 85) -Damnacantb.ua, Gaertn. (Robiac).
geminiflora, DC. 11. cc. = D. indicus,

BAUMANNIA, Spach, Hist. *Vig.* Phan. iv. 351 (1885) -Oenothera, Linn. (Onagrar.).
Douglasiana, Spach, 1. c. 852 = 0. albicaulis.
Nuttalliana, Spach, 1. c.=O. albicaulis.
pinnatifida, Spach, 1. c 853=0. pinnnfifiria.

BAUMEA, Gaodich. in Freyc Voy. Bot. 416. t 39 (1886) = Cladium, P. Br. (Cyperac).
acuminata, Regel, Cat PI. Hort. Aksakov. 15.—Hab.?
arthrophylla, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 842 = C. arthrophyllam.
Brownii, Boeck. 1. c—C. glomeratnm.
crassa, Thw. Enam. PL Zey L 353=C. riparium.
Deplanchei, Boeck. in Flora, lxi. (1878) 148.—N. Caled.
falcata, Nees, in Hook. Kew Joum. vi. (1854) 29.—Ins. Philipp.
fiexuosa, Boeck. in Bremen Abh. vii. (1880) 89.—Madag.
glomerata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 416. t 39.—Ins. Molucc
iridifolia, Boeck. in Linnaea, xxxviii (1874) 244.—Madag.
laxa, Boeck. 1. c 245 = C. laxam.
loculata, Boeck. 1. c 243=C.articulatam.
longifolia, Boeck. 1. c. 244 = C. Filum.
mariscoides, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 417=C. mariscoides.
Meyenii, Kunth, Enum. PL ii. 814.—Ins. Sandvic
Preissii, Nees, in Lehm. PL Prdss. ii 76 =» C. lit» mum.
riparia, Boeck. in linnaea, xxxviii (1874) 346 « C. riparium.
rubiginosa, Boeck. L c 241 - C. glomeratam.
schoenoides, Boeck. 1. c 246 = C. schoenoides.

BAUMGARTENIA, Spreng. Anleit ii I. 228 (1817); Syst ii. 91 (1825)-Borya, Labill. (Liliuc).
lucent, Stead. Nom. ed. II. i 192-Borya nirjda.
nitida, Spreng. Syst ii. 91 = Borya nitida.
sphaerocephala, Spreng. L c.-Borya nitida.

BAUMGARTIA, Moench, Meth. 650 (1794) = Cocculus, DC. (Menisp.).
scandens, Moench, 1. c.=C. carolinus.

BAURSEA, Hort. ex Hoffmgg. Verz. Pfl. 42 (1824) = Philodendron, Scbott (Aroid.).
glauea, Hoffmgg. 1. c—Hab.!
nervosa, Hort. Angl. ex Hoffmgg. 1. c = P. Karstenianam ?

BAURSIA, Schott, Syn. Aroid. i. 73 (1856) - Philodendron, Schott (Aroid.).

BAUSCHIA, *Stab,* ex Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1872) 123=AneUema, R. Br. (Commel.).
bracteolata, Seab. ex Warm. 1. c. 124 = A. ovato-oblongum.

BAUXIA, Neck. Elem. iii. 160 (1790) -= Harica, Ker-Gawl. (Irid.).

BAVERA, Foir. in Diet. Sc. Nat. iv. Sappl. 62 (1816) = Bauera, Banks (Saxif.).

BAXTERA, Reichb. Consp. 181 (1828) = Marodenia, R. Br. (Asclep.).
loniceroides, Steud. Norn. ed. II. i. 192 = M. loniceroides.

BAXTEBIA, R. Br. ex Hook. Lond. Joorn. Bot. ii. (1848) 494. t. 13-16. *JUNCACEAE,* Bentb. & Hook. f. iii. 866.
australis, *R. Br. I. c*—Austral.

BAZIASA, Steud. Norn. ed. II. i. 192 (1840)=8abaaia, Cass. (Compos.).
humilis, Steud. 1. c.-=S. humilis.
microglossa, Steud. 1. c. = S. microglossa.
sarmentosa, Steud. 1. c = S. sarmentosa.
urticaefolia, Steud. 1. c.-S. unicaefolia.

BDALLOPHYTON, Eichl. in Bot. Zeit. xxx. (1872) 709. t 8 = Cytinufl, Linn.
Andrieuxii, Eichl. 1. c. 715. t. 8 = C. Andrieuxii.
ceratantherum, Eichl. 1. c «C. americanus.

BEATONIA, Herb, in Bot. Mag. sub t 3779 (1889) = Tlgridla, Ker-Gawl. (Irid.).
atrata, Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 72=T. atrata.
bracteolata, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 783.—Bolivia.
coelestina, Klatt, 1. c. XXXL (1861-62) 567.—Mexic.
curvaia, Herb, in Lindl. Bot Reg. (1843) Misc. 74 = T. curvata.
gratidiflora, Klatt, in Abb.. Naturf. Ges. HaUe, xii. (1882) 869=T. lutea.
Houttei, Klatt, L c.=T. Honttei.
lutea, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 566=T. lutea.
purpurea, Herb, in Bot Mag. snb t. 3799 - T. violacea.

BEATSONIA.Roxb. in Beats. St HeL App. 300 (1816) =Frankenla, Linn.
portulacifolia, Roxb. 1. c—F. portulacaefolia.

BEAUCARNEA, Lem. Jllustr. Hortic. viii (1861) Misc. 59=Holina, Michx. (Liliac.).
Bigelovii, Baker, in Joum. Bot x. (1872) 326 = N. Bigelovii.
erumpens, Baker, 1. & = N. erumpens.
gracilis, Lem. Illustr. Hortic. viii. (1861) Misc. 61 - N. Hartwegiana.
Hartwegiana, Baker, in Jonrn. Bot. x. (1872) 827 = N. Hartwegiana.
Hookeri, Baker, 1. c.=Dasylirion Hookeri.
humilis, Baker, in Joum. Linn. Soc xviii. (1881) 237 - N. humilis.
Lindheimeriana, Baker, in Joum. Bot x. (1872) 328 = N. Lindheimeriana.
longifolia, Baker, 1. c. 824=N. longifolia.
microcarpa, Baker, in Joum. Linn. Soc xviii. (1881) 236 = N. microcarpa.
Palmeri, Baker, 1. c. 285-N. PalmerL
parviflora, Baker, in Jonra. Bot. x. (1872) 328 = N. parvi flora.
recurvata, Lem. Illustr. Hortic. (1861) Misc. 59 = N. recurvata.
stricta, Lem. L c = N. recurvata.

BEAUCARNEA :—
texana, Baker, in Joum. Linn. Soc. xviii. (1881) 286 = Nolina texana.
Watsoni, Baker, 1. c.=N. Watsoni.

BEAUFOBTIA, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 418 (1812). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 706.
SCHIZOPLEURA, Endl. Gen. 1228 (1840).
anisandra, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi. (1844) 13. t. 1.—Austral.
carinata, *A. Cunn. ex Loud. Hort. Brit.* 819.—Austral,
cyrtodonta, *Benth. Fl. Austral,* iii. 167.—Austral.
Dampieri, *A. Cunn. in Hook. Bot. Mag.* t. 8272.—Austral,
decussata, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 418.—Austral,
elegans, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi. (1844) 16.—Austral.
empetrifolia, Schau. 1. c. 17 =micrantha.
heterophylla, *Turcm. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 345.—Austral.
inops, Schau. in Nov. Act Nat. Cur. xxi. (1844) 17 = Regelia inops.
interstans, *F. tfuell. Fragm.* x. 80.—Austral,
macrostemon, *Lindl. Swan Riv. Bot.* 10. n. 31.—Austral,
micrantha, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi. (1844) 18.—Austral,
microphylla, *Turca. in Bull. Soc. Nat. ifosc.* xxii. (1849) II. 24.—Austral
orbifolia, *F. Muell. Fragm.* iii. 110.—Austral.
pinifo!ia,Ceh, Cut. (1817) 8=Calothamnusquadrifida.
puberula, *Turc: in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 345.—Austral.
purpurea, *Lindl. Swan Riv. Bot.* 10. n. 30.—Austral.
Schaueri, *Preiss, ex Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi. (1844) 14.—Austral,
smrsa, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 418.—Austral.
splendens, Baxter, in Loud. Hort. Brit SuppL i. 582 - sparsa.
squarrosa, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi. (1844) 11.—Austral,
velutina, *Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 345.—Austral.

BEAUHARNOISIA, Ruiz & Pav. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 71. t. 9 = Tovomita, Aubl. (Guttif.).
fructipendula, Rniz *Sc* Pav. 1. c = T. fructipendnla.

BEAUMARIA, Deless. ex Stend. Norn. ed. II. i. 192 (1840)=AriBtoteUa, L'He'rit. (Tjliac.).
Macqui, Deless. ex Steud. L c.-A. Macqui.

BEAUMONTIA, Wall. Tent. Fl. Nep. 14. t. 7 (1824). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 721.
grandiflora, *Wall. I. c.* 15. t. 7.—Ind. or.
Jerdoniana, *Wight, Ic.* iv. t. 1814.—Ind. or.
khasiana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 661.—Reg. Himal.
longiflora, Hook. f. 1. c. 660, in syn. •= grandiflora.
longifolia, Lodd. ex Lond. Hort. Brit. 07 ; Hook. Bot Mag. sub t. 8213=grandiflora.
multiflora, Teijsm. & Binn. in NederL Krnidk. Arch. iii. (1855) 393=khasiana.
Wallichii, Walp. Ann. iii. 39=Wrightia tomentosa.

BEAUMULIX, Willd. ex Poir. in Diet. Sc. Nat iv. Suppl. 54 (1816)=Beaumuria, Linn. iTamariscin.).

BEATJPBEA, Brongn. *Sc* Gris, in Bull. Soc. Bot Fr. xviii. (1871) 243. *PROTEACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 175.
Balansae, *Brongn.* b* *Gris, I. c.* 245.—N. Caled.
diversifolia, *Brongn. V Gris, I. c.* 244.—N.'Caled.
gracilis, *Brongn. V Gris, 1. c.* 243.—N. Caled.
Pancheri, *Brongn. V Gris, I. c.* 246:—N. Caled.
spathulaefolia, *Brongn. V Gris, 1. c.* 244.—N. Caled.

BEAUTEMPSIA, Gaudich. Voy. Bonite, t 56 (1844 ?) = Capparis, linn.
amcenniaefolia, Gaudich. 1. c.—Hab. i

BEBBIA, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 179. *COM POSITAE.*
atripliciflora, *Greene, I. c.* 181.—Calif,
juncea, *Greene, 1. e.* 179.—Calif.

BECCABUNGA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 128 = Veronica, Toum. (Scrophul.).
Anagallis, Fourr. 1. c. = V. Anagallis.
vulgaris, Fourr. 1. c. = V. Beccabunga.

BECHIUM, DC. Prod. v. 70 (1836) = Vernonia, Schreb. (Compos.).
foliosum, Klatt, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 508.—Madag.
rubricaule, DC. Prod. v. 70=V. Candollei.
scapiforme, DC. 1. c. 71.—Madag.

BECHONNERIA, Hort. ex Carr. in Rev. Hortic. (1867) 820 = Besohornerla, Kunth (Amaryll.).

BKCKEA,Pers. Syn. i. 284 (1805)-BAECKEA, Burm. f^Brunla, Linn.

BECKEA, St. Hil. in Diet. Sc. Nat iv. 208 (1804)-Baeckea, Linn. (Myrtac.).

BECIUM, Lindl. Bot Reg. (1842) Misc. 42 = Oeiinum, Toura. (UbUt).
bicolor, Lindl. 1. c. = O. filamentosum.

BECKEKA, Fresen. in Mns. Senckenb. ii. (18S7) 132. t. 8. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1117.
dioica, Heynh. Nom. ii. 68=Panicum adoënse.
glabrescens, *Steud. Syn. PI. Gram.* 117.—Abyssin.
gracilis, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 1»9.—Abyssin.
mutica, *Hochst. 1. c.* xxvii. (1844) 514.—Abyssin.
nubica, *Hochst. I. c.* 512.—Abyssin.
petiolaris, *Hochst. 1. c.*—Abyssin.
Petitiana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 358.—Abyssin.
polystachia, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 132.—Abyssin.
Schimperi, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1814) 512.—Abyssin.
uniseta, Steud. Syn. PI. Gram. 118 = Pennisctnm unisetum.

BECKERIA, Bernh. Syst Verz. Erf. 20 (1800) = Melica, Linn. (Gramin.).
ciliata, Bernh. 1. c. 40=M. ciliata.

BECKERIA, Heynh. Nom. ii. 63 (1846)=Beokera, Fresen. (Gramin.).

BECKEROPSIS, Fig. & De Not. in Mem. Ace. Torin. Ser. II. xiv. (1854) 365 = Pennisetum, 1'ers. (Gramin.).
nubica, Fig. & De Not. 1. c. 866.—Nubia.
petiolaris, Fig. *Sc* De Not 1. c. 368.—Abyssin.

BECKIA, Rafin. Sylva Tellur. 103 (1838) = Osbeckia, Linn. (Melast).

BECKMANHXA, Host, Gram. Austr. iii. C. t. 6 (1805;. *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1099.
BRUCKMANNIA, Nutt Gen. Am. i. 48 (1818).
JOACHIMIA, Tenore, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 695 (1817).
erucaeformis, *Host, I. c.*—Europ.; As. temp.; Am. bor.
erucoides, Beauv. Agrost. t. 19. f. 6=erucaeformis.

BECLARDIA, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat Par. iv. (1826) 69-Cryptopnfl, Lindl. (Orchid.).
brachystachya, A. Rich. 1. c 71 =• Aeonia brachystachya.
elata, A. Rich. 1. c. 69 = C. elatus.
macrostachya, A. Rich. 1. c 70=Aeonia macrostachya.

BECQUERELA, Nees, in Unnaea, ix. (1834) 304=seq.

BECQUEBELIA, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. Phaner. 161. t. 27 (1829). *CYPERACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1069.
cymosa, *Brongn. I.* c—Bras.
cymosa, Kunth, Enum. PI. ii. 361 = Merkdiana.
discolor, *Kunth, 1. c.* 362.—Bras,
gigantea, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 180.—Guiana.
glomerata, Knnth, Enum, PI. ü. 364 = seq.

BECQTTEEEIiIA :—
glomerulata, **Brongn. in Dnperr. Voy. Coq. Bot. Phan. 163 = Calyptrocarya Palmetto.**
Merkeliana, */fees, in Mart. Fl: Bras.* **ii. I. 191.—Bras,**
nwricata, *Nets, I. e.* **192.—Bras,**
venucnlosa, *Nees, I. c.* **191.—Bras.**

BEDDOMEA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. . 336 (1862). *MELIACEAE,* **Benth. & Hook. f. 1. c.**
iṇdica, *Hoot./. I. c*—**Ind. or.**
amplicifolia, *Bedd. Fl. Sylv.* **i. t. 136.—Ind. or.**

BEDFOBDIA, DC. in Gufflem. Arch. Bot ii. 332 (1888). *COMPOSITAE,* **Benth. & Hook. f. ii. 450.**
linearis, *DC. I. c.* **333;** *et Prod.* **vi. 441.—Tasmania,**
salicina, *DC. II. cc*—**Austral.**

BEDOUSIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) = Casearia, Jacq. (Samyd.).
aromatica, **Rafin. Sylva Tellur. 11 = C. tomentosa.**
"udabarica, **Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 - C. tomentosa.**

BEDUSIA, Rafin. Sylva Tellur. 11 (1838) •= praec.

BEEHSA, Endl. Gen. 1854 (1841) = BEESHA, Kunth =Bambusa, Linn. (Gram.).

BEERA, Beauv. in Lestlb. Essai Fam. Cyp. 43 (1819) = •Hypolytrum, Rich. (Cyperac).
taespitosa, **Schrad. ex Kunth, Enum. PI. ii. 270 = H. strictum.**
laxa, **Schrad. ex Kunth, 1. c. = H. laxum.**
"tvatica, **Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. l. 67 •= H. fuscum.**

BEESHA, Kunth, Syn. i. 253 (1822) = Bambusa, Linn. (Gram.).
baccifera, **Kunth, 1. c =Melocanna bambusoides.**
Pax, **Schult. f. in Roem. & Schult. Syst. vii. 1386 = Melocanna humilis.**
"umilis, **Kunth, Enum. PI. i. 484=Melocanna humilis.**
Rheedii, **Kunth, Rev. Gram. i. 141 = Melocanna wunbusoides.**
"avancorica, **Bedd. Forest. Man. Bot. 234 = Melocanna travancorica.**

BEESHA, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 144 (1868) = Ochlandra, Thw. (Gram.).
c»pitata, **Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 145. —Madag.**
'kgantissima, **Knrz, ex Munro, 1. c. 146.—Java.**
'Mdula, **Munro, 1. c. 145-O. stridula.**

BEETHOVENIA, Engl. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) w7 = Ceroxylon, Humb. (Palm.).
con/era, **Engl. 1. c.=C. andicola.**

BEFABIA, Mutis, ex Linn. Mant. ii. 152 (1771).
ERICACEAE, **Benth. & Hook. f. ii. 599.**
ACUNNA, Ruiz & Pav. Prod. 69. t. 12 (1794).
BEJARIA, Zea, in Anal. Ciena Nat iii. (1801) 151, in nota; Vent. Jard. Cels, 1800), sub t 51.
JURGENSENIA, Turcz. in Bull. Soc Nat Mosc *xx.* **(1847) I. 151.**
»estoans, *Linn. Mant.* **ii. 242.—N. Granat.**
caxamarcensis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* **iii. 294.- Peruv.**
cinnamomea, *Lindl. in Gard. Chron.* **(1848) 175.— Peruv.**
coarctata, **Hook. Bot. Mag. t. 4483 - Lindeniana.**
couctata, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* **ii. 125. t. 121. —Peruv.**
«ibensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* **52.—Cuba.**
°ea*a, *Planck, ex Hirincq, in Rev. Hortic.* Se>. III. **iv. (I860) 185.—Hab.!**
denticulate, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* **Sér. III. viii. ., (1847) 230.—Bolivia,**
discolor, *Benth. PI. Hart*.* **65.—Mexic.**
"ymifolia, *Linden, ex Herincq, in Rev. Hortic.* Sér. **III. iv. (I860) 185.—N. Granat.**
floribunda, **Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. (1842) 543-discolor.**
glabra, **Mart & Gal. 1. c =laevis.**
8'anca, *Humb. V Bonpl. PI.* ***Aequin.*** ii. 118. t. 117.— **N. Granat.**

BEFABIA:—
grandiflora, *Humb. & Bonpl. PI. Aequin.* ii. 222. t. **119.—Ecuador,**
guyanensis, *Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Guy.* **1088.—Guiana,**
hispida, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* i. 24. t. 39. **—Chili.**
laevis, *Benth. PI. Hartw.* **66.—Mexic.**
lanceolata, *Ruia* **b[1]** *Pav. Fl. Per.* **iv. t. 418. f. b.—Peruv.**
ledifolia, *Humb. V Bonpl. PL Aequin.* **ii. 124. t 120. —N. Granat.**
Lindeniana, *Hirincq, in Rev. Hortic.* **Sér. III. iv. (1850) 181.—Venezuela.**
mexicana, *Benth. PI. Hartw.* **15. n. 92.—Mexic.**
Mathewsii, *Field. V Gardn. in Bot. Mag.* t. 4981.— **Peruv.**
microphylla, **Paxt** *Sc* **Lindl. Flow. Gard. i. 86- densa.**
myrtifolia, *Hirincq, in Rev. Hortic.* **Sér. III. iv. (1850) 184.—N. Granat.**
oblonga, *Ruit* b" *Pav. Fl. Per.* iv. t. 413; *Pers. Syn.* **ii. 3.—Venezuela,**
pallens, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* **Sér. III. viii. (1847) 229.—Peruv.**
paniculata, **Michx. Fl. Am. Bor. I 280=racemosa.**
parviflora, *Benth. PI. Hartw.* **143.—Peruv.**
phyllireaefolia, *Benth. I. c.* **225.—N. Granat.**
racemosa, *Vent. Jard. Cels,* **t. 51.—Am. bor.**
resinosa, *Linn.f. Suppl.* **246.—N. Granat**
Schomburgkiana, *Klotssch, in Schomb. Fauna et Fl. Guy.* **1088.—Guiana.**
Sprucei, *Meissn. in Mart. Fl. Bras,* **vii 171.—Peruv.**
subsessilis, *Benth. PL Hartw.* **143.—Peruv.**
tricolor, *Linden, ex Hirincq, in Rev. Hortic.* Sér. III. **iv. (1850) 186.-N. Granat.**

BEGONIA, [Toum.] Linn. Gen. ed. II. 516 (1742).
BEGONIACEAE, **Beuth. & Hook. f. i. 841.**
AUGVSTIA, BARYA, CASPARYA, CYATHOCNEMIS, DONALDIA,DORATOMETRA,EWALDIA,GAERDTIA, GIREOUDIA, GURLTIA, HAAGEA, HUSZIA, ISOPTERIX, 1SOPTERYX, KNESEBECKIA, LAUCHEA, LEPSIA, MAGNUSIA, MITSCHERLICHIA, MOSCHKOWITZIA, NEPHROMISCHUS, PETERMANNIA, PLLDERIA, PLATYCENTRUM, PRITZELIA, PUTZEYSIA, RACHIA, REICHENHEIMIA, REISSIA, ROSSMANMTA, SASSEA, SAUERIA, SCHEIDWE1LER1A, STEINERIA, STIBADUTHECA, TITTELBACHIA, TRACHELANTHUS, TRENDELENBURGIA, WACENERIA, et WEILBACHIA, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1854) 17-134. tt. 1-12.
CLADOMISCHUS, Klotzsch, ex DC. 1. c. 278 (1864).
DIFLOCLINIUM, Lindl. Veg. Kingd. 319 (1847).
EUPETALUM, Lindl. Introd. Nat. 6yst ed. II. 440 (1836).
FALKEA, Koen. ex Steud. Nom. ed. II. i. 194, 625 (1840).
IRMA, Bout, ex A. DC. Prod. xv. I. 406 (1864).
MITCHERLICHIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 124.
MEZIEREA, Gaudich. Voy. Bonite, t. 32 (1839).
PLATVCLINIUM, T. Moore, in Moore *Sc* **Ayres,Gard. Mag. Bot. ii. (1850) 153.**
SPHKNDANTHERA, Hassk. in Versl. Kon. Akad. Wetensch.iv. (1855) 139.
STIRADOTHECA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 127.
TRACHELOCARPUS, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 909 (1867).
TRITOMISA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 91 (1886).
WAGNERiA.Klotzsch, in Monatsb. BerL Acad. (Maerz 1854) 126.
acerifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **vii. 186.— Ecuador.**
acetosa, *Veil. Fl. Hum.* **x. t. 50.—Bras,**
acida, *A. DC. Prod.* **xv. I. 364.—Bras.**
acida, **Veil. Fl. Flum. x. t. 49=praec. I**
aconitifolia, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xi. (1859) 127.—Bras.**
aculeata, **Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 409=maculata.**
acuminata, *Dryand. in Trans. Linn. Soc.* i. (1791) **166. t 14.—Jamaica.**
acutifolia, **Balb. ex A. DC. Prod. xv. I. 295'portoricensis.**
acutifolia, **Jacq. Coll. i. 122=acuminata.**
acutifolia, **Herb. Vindob. ex A. DC. Prod. xv. I. 378 -dentatiloba.**

BEOOHTA:—
acutiloba, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) **14.—Mexic.**
adenopoda, **Lem. Jard. Fleur. ii. Misc. 17—verticillata.**
aequata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 668.— **Ins. Luzon,**
alaecida, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. **687.—Burma,**
albida-setulosa, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 813.— **Hab.?**
albiflora, *Hort. ex Klotesch, in Monatsb. Berl. Acad.* **(Maerz 1854) 126, nomen.—Hab. 1**
albo-coccinea, *Hook. Bot. Mag.X.* **4172.—Ind. or.**
alchemilloides, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xi. (1859) 125.—Bras.**
alnifolia, *A. DC. 1. c.* **132.—N. Granat.**
alto-peruviana, *A. DC. I. c.* **128.—Peruv.**
amabilis, *Linden, Hort. Linden.* **(1859) 1.—Assam,**
amoena, *Wall. Cat.* **n. 8682.—Reg. Himal.**
ampla, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 574.—Afr. **trop.**
anaimalaiensis, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* **Ser. III. i. (1864) 48.—Ind. or.**
anamalayana, **Bedd. in Trans. Linn. Soc. xxv. (1866) 217=praec.**
andamensis, *Parish, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.* ***Brit. Ind.*** **ii. 650.—Ind. or.**
anemonoides, *Atara, ex Steud. Nom.* **ed. II. L 198.— Hab.?**
angularis, *Rkddi, in Mem. Mod.* **xviii.** *Fis.* **(.1820) 407- —Bras.**
angulata, *Veil. Fl. Flum.* **x. t. 52.—Bras,**
angustifolia, *Blume, Enum. PI. Jav.* **97.—Java,**
angustiloba, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xi. (1859) 126.—Mexic.**
anisosepala, *Hook.f. in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 676. **—Afr. trop.**
annobonensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* **Sir. IV. xi. (1859) 127.—Afr. trop.**
annulata, *C. Koch, in Berl. Garten*, i. (1837) 76.— **Reg. Himal.**
anodaefolia, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xi. (1859) 126.—Mexic.**
aptera, *Blume, Enum. PI. Jav.* **97.—Ins. Celebes,**
aptera, *Roxb. Hort. Beng.* **104;** *Fl. Ind.* **iii. 650.—Ins. Mascar.; Timor.; Ins. Philip,**
arborescens, *Raddi, in Mem. Mod.* **xviii.** *Fis.* **(1820) 408.—Bras.**
areolata, *Miq. PI. Jungh.* **417.—Java.**
argentea, **Van Houtte, ex A. DC. Prod. xv. I. 818 *> maculata.**
argyrocoelis, *Hirincq, in Rev. Hortic.* **Sér. III. i. (1847)111, 165.—Hab.?**
argyrostigma, **Fisch. ex Link** *Sc* **Otto, Ic Sel. i. 28. t. 10=maculata.**
Arnottiana, **A. DC. Prod. xv. I. 322 = cordifolia.**
asarifolia, **liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1862 (1853) 8-hydrocotilifolia.**
ascotiensis, *J. B. Weber, in Rev. Hortic.* (1874) 17.— **Hab. ?**
aspleniifolia, *Hook.f. ex A. DC. Prod.* **xv. 1.892.—Afr. occ.**
atricha, *Miq. ex A. DC. I. c.* **821.—Sumatra,**
attenuate, *A. DC. I. c.* **388.—Bras.**
attenuata, **Klotzsch, ex Regel, Ind. Sem. Hort.Petrop. (1866) 101 = hederacea.**
aucubaefolia, **Hort. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 122 = incarnata.**
aurantiaca, **Hort ex Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. v. (1849) 530=cinnabarina.**
auriculata, *Hook.f. in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 677.— **Afr. trop.**
auriformis, **Hort. Berol. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 38 -incana.**
baccata, *Hook. Bot. Mag.* **t. 5554.—Afr. trop.**
bahiensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xi (1869) 187.—Bras.**
Balmisiana, *Ruit, ex Klottsch, in Abh.* ***Akad. Berl.*** **(1855) 38.—Mexic.**
barbata, *Wall. Cat.* **n. 3679, A.** *Sc* **B. partim.—Ind. or.; Burma.**
barbata, **Wall. I. c. = rubro-venia.**
Barkeri, *Knowl.* **6*** *Westc. Flor. Cab.* **iii. 179. t. 185.— Mexic.**
Beddomei, *Hook.f. Bot. Mag.* **t. 6767.—Assam.**
Bernierii, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* **IV. xi. (1859) ISO.—Madag.**

BEGONIA :-
besleriaefolia, *Sekott, in Spreng. Syst.* iv. 408.—Bras,
bidentata, *Raddi, in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 408. —Bras,
bipetala, *Lodd. ex Otto V Dietr. Allg. Gartens, ix.* (1841) 68.—Ind. or.
biserrata, *Lindl. in fount. Hort. Sot.* ii. (1847) 318.—Guatemala.
Boissieri, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. zL (1859) 126.—Mexic
Boiviniana, *A. DC. I. c.* 180.—Madag.
boliviensis, *A. DC. I. e.* 122.—Bolivia.
bombydna, Blame, Enum. PI. Jav. i. 97=isoptera.
bomeensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xi. (1859) 128.—Borneo.
Boucheana, *A. DC. Prod.* xv. I. 873.—Venezuela.
Bomringiana, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 120=laciniata.
bracteau, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. IS.—Sumatra,
bracteosa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sii.* IV. xi. (1859) 132.—Peruv.
Brandisiana, *Kurz, in Journ. As. Soc. Seng.* xl. (1871) II. 68 ; *et in Flora,Xw.* (1871) 295.—Burma.
brasila, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Genèv. vii. (1838) 295=hirtella.
brasiliana, Schrank, ex Stead. Norn. ed. II. i. 193 = praec.
brasiliensis, *Klotzsch, in Monaisb. Bert. Acad.* (Maerz 1854) 122, nomen.—Bras,
brevicaulis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 134.—Reg. Himal.
Bridgesii, *A. DC. I. c.* 132.—Bolivia.
Brongniartiana, *Lent. Hort. Univ.* v. 355.—Hab. ?
broussonetiaefolia, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 188.—Guatemala.
buddleiaefolU, *A. DC. I. c.* 141.—Peruv.
bulbifera, Hort. ex Vilm. Fl. PL Terre, ed. III. 155 = discolor.
bulbifera, Lodd. ex Otto & Dietr. AUg. Gartenz. ix. (1841)58 = bulbillifera.
bulbilUfera, *Link* to" *Otto, Ic. PI. Rar.* 89. t. 46.—Mexic.
bulbilUfera, Moric. ex A. DC. Prod. xv. I. 810 = gracüis.
caespitosa, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 8.—Sumatra.
caffra, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 501 = Dregei.
canarana, *Miq. Anal. Sot. Ind.* iii. 18.—Ind. or.
candicans, A. DC. Prod. xv. I. 400, lapsu, *vide* Bignonia candicans.
capensis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 724=rhombicarpa.
capensis, Linn. f. Suppl. 502=diptera-
cardiocarpa, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 13.—Nicaragua.
carminata x, *Hort. Fl. Mag.* t. 651 (err. typ. 451).
camosa, *Teijsm. V Binn. Epim. Lugd. Bat.* (1868) 4. —Malaya,
caroliniaefolia, *Regel, Gartenfl.* i. (1852) 259. t. 25.—Mexic.
carpinifolia, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 20.—Costa Rica,
castaneaefolia, *Otto tf Dietr. Allg. Garten:* iv. (1886) 356.—Bras.
castaneaefolia, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 407 = fruticosa.
Cathcartii, *Hook. f.* b* *Thorns. Illustr. PL Himal.* 1.13. —Reg. Himal.
ciliata, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 193, 194 = insignis.
ciliata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 186 = hirtella.
ciliata, Pav. ex A. DC. Prod. xv. I. 381 =subdliata.
dnnabarina, *Hook. Bot. Mag.* t. 4488.—Bolivia.
circumlobaU, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 203. —China,
cladocarpa, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 113 Madag.
Clarkei, *Hook.f. Bot. Mag.* sub t. 5663 et t. 5676.—Bolivia,
clypeifolia, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 576.—Afr. trop.
coccinea, *Hook. Bot. Mag.* t 3990.—Bras,
coccinea, *Ru.it, ex Klottsch, in Mnnatsb. Berl. Acad.* (Maen 1854) 127; *A. DC. Prod.* xv. I. 273.—Peruv.
columnaris, *Benth. PI. Hartw.* 131.—Pernv.

BEGONIA:—
columnaris, Ruiz, ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Aoad. (Maerz 1854) 127=cordifolia.
complicata, *A. DC. Prod.* xv. I. 399.—Hab. ?
concanensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 126.—Ind. or.
conchaefolia, *A. Dietr. AUg. Gartens,* xix. (1851) 258. —Costa Rica.
concinna, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 408 = peltata?
confertifiora, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 184=arborescens.
convolvulacea, *A. DC. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 367.—Bras.
corallina, *Carr. in Rev. Hortic.* (1875) 89.—Bras,
cordata, *Veil. Fl. Flum.* x. t 84.—Bras,
cordifolia, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 129.—Ind. or.
coriacea, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xi. (1859) 122.—Bolivia.
coriacea, Hassle. Cat. Hort. Bogor. Alt. 311 = peltata.
crassicaulis, *Lindl. in Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 22.—Guatemala,
crenata, *Dryand. in Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 162. t 14. f. 8.—Ind. or.
crenata, Herb. Finlays. ex A. DC. Prod. xv. I. 401 = prolifera ?
crenatiflora, *A. DC. Prod.* xv. I. 306.—Mexic.
crenatifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 494= crenatiflora.
crenulata, Schott, ex A. DC. in DC. Prod. xv. 1.368 = angularis.
crinita, *Oliver, in Hook. Bot. Mag.* t. 5897.—Pernv.
cruenta, *R. Grah. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 193.—Bras.
cubensis, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 322 = Wrightiana.
cubincola, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xi. (1869) 124.—Cuba.
cucullata, Ruiz, ex A. DC. Prod. xv. I. 274 = columnaris.
cucnllata, *Willd. Sp. PI.* iv. 414.—Bra..
cucullifolia, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt 311 = semperflorens.
Cumingii, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 668 =
Cummingiana, *A. DC. Prod.* xv. I. 820.—Ins. Fiji.
cuneata, Walp. Rep. ii. 214=spathulata.
cyathophora, *Poepp. (f Endl. Gen. et Sp.* i. 7-1. 14.—Peruv.
daedalea, Lem. Illustr. Hortic. vii. (1860) 64. t. 269 = strigillosa.
dasycarpa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 127.-Bras.
dasypoda, Meissn. ex A. DC. Prod. xv. I. 299 = hirtella.
Daveauiana, Godefr. in Rev. Hortic. (1880) 290 = Pellionia Daveauiana.
Davisii, *Veitch, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 6252.—Peruv.
dealbata, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 5.—Mexic.
decandra, *Pav. ex A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xi. (1859) 122.—Mexic.
declinata, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 44.—Bras,
delicatula, *Parish, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 652.—Burma.
dentata,Viv. ex A. DC. Prod. xv. I. 307=angustiloba.
dentatiloba, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 140.—Bras,
denticulata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 182.—Venezuela.
depauperata, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 408 = rhizocarpa.
derycxiana, Lem. Hort. Univ. (1843-44) Misc. 355, fide A. DC. Prod. xv. I. 343=nelumbifolia.
Diadema, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxix. (1882) t. 446.—Borneo.
dichotoma, *Jacq. Coll.* iii. 250.—Venezuela,
digitata, *Raddi, in Mem. Mod.* xvii. *Fis.* (1820) 406.—Bras.
Digwilliana, *Carr. in Rev. Hortic.* (1875) 420.—Hab. ?
dimidiata, Veil. Fl. Flum. x. t. 46=arborescens.
dioica, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. FL Nep. 228 = scuta tat
dipetala, R. Grah. in Bot. Mag. t. 2849 = malabarica.
diptera, *Dryand. in Trans. Linn. Soc. I.* (1791) 170.—Bras.

BEGONIA:—
discolor, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. 1L v. 184 = Evansiana.
disticha, Hort Berol. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 122=suaveolens.
disticha, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 896 = stipulacea.
diversifolia, *Knowl. V Westc. Flor. Cab,* 1.14. i. (1837) 27.—Hab.?
diversifolia, R. Grah. in Edinb. N. PhiL Joum. (Jan.-Apr. 1830) 183=gracilis.
domingensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xi. (1859) 124.—Ins. S. Doming.
dominicalis, *A. DC. Prod.* xv. I. 866.—Ins. Dominica.
Donkelaariana, *Lem. Jard. Fleur.* i. (1861) *Misc.* 34. —Mexic.
Dregei, *Otto &• Dietr. AUg. Garten:* iv. (1836) 357.—Bras.
dnbia, *Veil. Fl. Flum,* x. t. 42.—Bras.
Dux, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 637.—Burma.
echinata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 313. t 80. fig. 1 =pácts,
echinosepala, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* i. (1871) 91.—Bras,
elaeagnifolia, *Hookf. in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 579. —Afr. trop.
e\aXa.,Khtisch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 122.—Bras.
elatior, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 193 = Dregei.
elatostemmoides. *Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 576.—Afr. trop.
elegans, *H. B.* to' *K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 182.—N. Granat.
elliptica, H. B. & K. 1. c. 138=scandens.
elongata. Wall. Cat. n. 6291=sinuata.
Epibaterium, *Mart, ex A. DC. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 363.—Bras,
epiphytica, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 580.—Afr. trop.
episcopalis, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 644.—Reg. Himal.
erecta, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 43.—Bras.
eriocaulis, Vis. Orto Padov. (1842) 135=tomentosa.
eriocaulon, Neumann, in Rev. Horlic. Sir. III. i. (1847) 166-=tomentosa?
Ermani, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1865) 85 - uliginosa.
erminea, *L'Hirit. Stirp. Nov.* 97. t. 47.—Madag.
erosa, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 96.—Java.
erosa. Wall. Cat. n. 3688, partim=picta, amoena.
erythrocarpa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 121.—Bras,
erythrophylla, *Neuman, in Rev. Hortic.* Sér. III. i. (1847)166.—Hab.?
Evansiana, *Andr. Bot. Rep.* t. 627.—Malaya; China; Japon.
excelsa, *Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii 671.—Afr. trop.
eximia, *Hort. ex Lem. Illustr. Hortic.* vii. (1860) t. 238.—Hab. ?
fagifolia, *Fisch. in Otto & Dietr. Allg. Garten*,* iv. (1886) 356.—Bras,
fagopyroides, *Kunth* fa" *Bouchi, Ind. PI. Hort. Berol.* (1848).—Venezuela.
falcifolia, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5707.—Afr. trop.
falciloba, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 15—Mexic.
fallax, *A. DC. Prod.* xv. *i.* 829.—Ind. or.
fasciculata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. *Vt.* —Sumatra.
ferruginea, *Linn.f. Suppl.* 419.—N. Granat
fibrosa, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 652. —Burma.
filipes, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 101.—Panama,
fimbriata, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1862 (1S53) 18.—Mexic.
fimbristipula, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 202.—China.
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 3684=prolifera?
Fiscberi, *Otto V Dietr. Allg. Gartens,* iv. (1836) 364. —Bras.
Fischeri, Schrank, PI. Rar. t. 69=macroptera.
flaccidissima, *Kurz, in Joum. As. Soc. Beng.* xl. (1872) H. 808.—Burma,
flexuosa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xi. (1869) 142.—Panama.
floccifera, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 28.—Ind. or.
floribunda, *Carr. in Rev. Hortic.* (1875) 420.—Hab. t

BEGONIA:—
foliosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 183. t. 642—N. Granat.
foliosa, Poepp. ex A. DC. Prod. xv. I. 876-Poeppigiana.
Franconis, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1858) 21.—Mexic.
Mgida, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sén IV. xi. (1859) 148—Hab.?
Froebelii, *A. DC. in Card. Citron.* (1874) II. 562.—Ecuador.
fruticosa, *A. DC. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 377.—.Bras,
faca, *Liebm. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.* (1855) 39.—Bras.
fuchsioides. *Hook. Bot. Mag.* t 4281.—Mexic.
forfuracea, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 571.—Air. trop.
fasca, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 7.—Mexic.
Galeotti, Hort. Berol. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855)89=lobata.
Galeottiana, *Lem. Jard. Fleur.* i. (1851) *Misc.* 14.—Bras.
Gardneri, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Séi. IV. xi. (1859) 138.—Bras.
Gaudichaudii, *Walp. Rep.* v. 769.—Perav.
gemmipara, *Hook.f. V Thorns. Illustr.Him. PI.* 1.14.—Reg. Himal.
geniculata, Veil. Fl. Flum. x. t. 51—convolvulacea.
geniculata, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) VII. 15 = isoptera.
geraniifolia. *Hook. Bot. Mag. t.* 8387.—Perav.
geranioides, *Hook.f. 1. c.* t 5588.—Afr. austr.
gigantea, *Wall. Cat.* n. 3677.—Reg. Himal.
gigantea, Wall. 1. c. n. 3677 B=silhetensis.
glabra, Anbl. PI. Gui. ii. 916-scandens.
glataa, *Ruin, ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz 1854) 128.—Peruv.
glandulifera, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 304.—Ind. occ.
glandulosa, *A. DC. Prod.* xv. I. 339.—Am. centr.
glauca, *Ruiz (f Pom. ex A. DC. 1. c.* 380.—Peruv.
goëgoënsis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1882) H. 71.—Sumatra,
goniotis, C. *B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 648.—Burma.
Goudotii, *A. DC. in Ann Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 130.—Madag.
giacilis, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 184.—Mexico,
gmcillima, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Mr. IV. xi. (1859) 120.—Perav.
Grahamiana, Wight, Ic. 1.1811 =albo-coccinea.
grandiflora, Jacq. Coll. i. 128=-diptera.
grandifiora, KnowL & West. Flor. Cab. i. (1837) 51 = octopetala.
grandis, Dryand. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 163 =Evansiana.
grandis, Otto, ex A. DC. in Mart FL Bras. iv. 1.369 = vitifolia,
Griifithii, *Hook. Bot. Mag.* t. 4984.—Reg. Himal.
grisea, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1869) 138.—Bras,
guaduensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 178.—N. Granat
gunneraefolia, *Linden* b* *Andri, Must. Hortic.* xxii. (1875) 106. t 212.—N. Granat
guttata, *Wall. Cat.* n. 3671 A.—Malaya.
guttata, Wall. 1. c. n. 8671 B-sinuate,
guyanensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 142.—Guiuua.
haematotrichà, Bniss. ex A. DC. Prod. xv. I. 298-humilis.
Hamiltoniana, Lehm. in E. Otto, Hamb. Allgem. Gartenz. vi. (1850) 456=acuminate.
Hasskarli, *Zdl.* &* *Mor. Syst. Vert. Zoll.* 31.—Java.
Hasskarliana, *Miq. ex A. DC. Prod.* xv. I. 829.—Sumatra.
hastata, Veil. Fl. Flum x. t 54=angnlaris.
Hatacoa, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 223.—Nepal,
hederacea, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 120.—N. Granat.
hederaefolia, *Linden, ex A. DC. Prod.* xv. I. 401.—Mexic.
heradeifolia, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 603.—Mexic.
herbacea, *Veil. Fl. Flum.* x. t 68.—Bras.

BEGONIA. :—
hernandiaefolia, Hort. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz 1854) 125-nelumbiifolia.
hernandiaefolia, Hook. Bot. Mag. t. 4676-peltate.
hernandiaefolia, Seem, ex A. DC. Prod. xv. I. 889 = glandulosa.
heterophylla, *Hort. Schoenb. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz 1854) 122.—Mexic.
beteropoda, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 347.—Madag.
Hilariana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 125.—Bras.
hirsute, *Aubl. PI. Gui.* ii. 913. t. 348.—Guiana.
hirsuta, Hort. ex A. DC. Prod. xv. I. 298=hnmilis.
hirsuta, Ruiz, ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 127=cordifolia
hirsntula, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 575.—Afr. trop.
hirtella, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 296.—Bras,
hispida, *Schott, ex A. DC. Prod.* xv. I. 363.—Bras,
holosericea, *Teijsm. V Binn. in Epim. Lugd. Bat.* (1863) 5.—Ins. Temate.-
Holtonis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. xi. (1859) 141.—N. Granat.
homonyma, Steud. Nom. ed. II. i. 194-Dregei.
Hookeri, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 487-nitida.
Hookeriana, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1846) 185.—Bras.
Horsfieldii, *Miq. ex A. DC. Prod.* xv. 1.897.—Sumatra.
Hugelii, *Hort. Berol. ex A. DC. I. c.* 364.—Bras,
humilis, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kev>.* ed. I. iii. 358.—Mexic.
humilis, Bonpl. ex Sprang. Syst ii. 626—hirsuta.
humilis, Dryand. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 166=flexuosa.
humilis, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 284-diptera.
hydrocotylifolia. *Otto, ex Hook. Bot. Mag.* t. 3968.—Mexic.
hydrophila, Miq. AnaL Bot. Ind. iii. 18-malabarica.
ignea, *Worse, in A. DC. Prod.* xv. 1.306.—Guatemala,
imperialis, *Lem. Illustr. Hortic.* vii. (1860) 68.—Mexic.
incana, *Lindl. in Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 39.—Mexic
incarnate, *Link (f Otto, Ic. PL Sel.* 87. t. 19.—Mexic.
incarnata, Pav. ex A. DC. Prod. xv. I. 273 = cordifolia.
incarnata, Seem. Bot Voy. Herald, 128=Seemanoiana.
incisa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xi. (1859) 129.—Ins. Philipp.
inciso-serrata, *A. DC. Prod.* xv. I. 371.—Bras,
inflate, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 636.—Reg. Himal.
insignis, R. Grah. in Bot. Mag. t 2960=incarnate,
integerrima, *Spreng. Neue Entdeci.* ii 174.—Bras.
integrifolia,£a2*. *in Hook. Kern Journ.* iii. (1851) 230.—Ind. or.
involucrata, *Liebm. in Kjòeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 16.—Costa-Rica,
isoptera, *Dryand. in Sm. Ic.* t 43; *et Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 160.—Java.
jamaicensis, A. DC. in Ann. Sc. Nat Se>. IV. xi. (1859) 124-acutifolia.
Jamesoniana, *A. DC. I. c.* 139.—Ecuador.
jatrophaefolia, Hort. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 39-heradeifolia.
Josephi, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 126.—Reg. Himal.
Junghuhniana, *Miq. PI. Jungh.* 418.—Java.
Karwinskyana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. xi. (1869) 134.—Mexic
khasiana, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 656.—Reg. Himal.
Kunthiana, *Walp. Ann.* ii. 650.—Bras,
laciniate, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 649.—Reg. Himal.; Burma; China,
laciniosa, *A. DC. Prod.* xv. I. 840.—Am. centr.
laetevirens, *Van Houtte, ex A. DC. 1. c.* 400.—Hab.?
lanceolate, *Veil. Fl. Flum.* x. t 83.—Bras.
Langsdorffii, A. DC. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. xi. (1859) 140 = bidentata.
lantaniaefolia, *A. DC. 1. c.* 141.—N. Granat
lannginosa, *A. DC. 1. c.* 181.—N. Granat.
laurina, Hort. ex A. DC. Prod. xv. I. 292-Ottonis.
Latuli, Linden, in Belg. Hortic •iii. (1868) 166-xanthina.
lepida, *Blume, Enum. PI. Jav.* 98.—Java.

BEGONIA :-
lepidota, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1862 (1863)17=manicata.
leprosa, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 202.—China.
Uebmannii, *A. DC. Prod.* xv. I. 345.—Mexic
Lindeniana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xL (1869) 123.—Cuba.
Lindleyana, *Walp. Rep.* ii. 209.—Guatemala.
Lindleyana, *Ware, ex Klotasch, in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz 1854) 122.—Am. calid.
liñeate, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1882) II. 199.—Java.
lobata, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 408-multinervia.
Lobbiana, A. DC. Prod. xv. I. 355-parviflora.
Lobbii, *A. DC. I. c.* 890.—Java,
lobulate, *A. DC. I. c.* 339.—Mexic.
locellate, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1869) 187.—Mexic.
loDgiiolia, *Blume, Cat. Cew. Buitent.* 102.—Java,
longipes, *Hook. Bot. Mag.* t. 3001.—Mexic
longipila, Lem. Illustr. Hortic. vii. (1860) 307=heracleifolia.
longirostris, *Benth. PI Hartm.* 185.—Ecuador,
longovillosa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) ISO.—Ins. Philip,
loranthoides, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 680.—Afr. trop.
Lubbersii, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxxiii. (1883) 156. 1.13.—Bras.
lucida, Haw. Saxifr. Enum 197-humilis.
lucida, Kuath & Bouche*, Ind.Sem. Hort. Berol. (1848) 16-Kunthiana.
lucida. Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848) 162-scandens.
lucida, *Parodi, in Anal. Soc. Gent. Argent,* v. (1878) 298; *Contrib.* 57.—Paraguay,
lndicra, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV.* xi. (1869) 13S.-Mexic.
luxurians, *Scheidw. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* xvi. (1848) 131.—Bras.
Lyallii, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 144.—Madag.
Lyncheana, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6758.—N. Granat.
macra, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit. TV.* xi. (1859) 121.—N. Granat.
macropbylla, *Dryand. in Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 164.—Jamaica.
macrophylla, Lam. Encyc. i. 894-diptera.
macroptera, *Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz 1854) 122.—Bras,
macrotis, *Vis. in Act. 1st. Ven. Sc. Set.* III. iv. (1858-69) 188.-Hab.?
maculate, *Saddi, in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 406.—Bras,
magnifica, *Linden, in Belg. Hortic.* vi. (1856) 6.—N. Granat.
magnifica, Warsc ex A. DC. Prod. xv. I. 269-ferruginea.
magnifolia, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 8.—Malaya,
malabarica, *Lam. Encyc.* i. 398.—Ind. or.
malabarica, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 648-Roxburghii.
malabarica, Buch.-Ham. in WalL Cat. n. 3676 D-megaptera.
malvacea, *Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.* (1855) 83.—Bras,
manicate, *Cels, ex Vis. Orto Padov.* (1842) 186.—Mexic.
maniUensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1869) 129.—Ins. Philipp.
Mannii, *Hook.f. Bot. Meg.* t. 5434.—Afr. trop.
maracayuensis, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent.* v. (1878) 209; *Contrib.* 58.--Paraguay.
marmorata, Van Houtte, ex Planch, in Fl. des Serres, ix. (1858-54) 243. t. 952-58=xanthina.
martabanica, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xi (1869) 13b.—Burma. .
Martiana, *Link tf Otto, Ic. PI. Select. Hort. Berol.* 49.—Mexic
Martiana, Schlecht in Linnaea, v. (1830) 604 = incarnate,
martinicensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* SO. IV. xi. (1859) 128.—Ins. Martinic.
mascariensil, *Boj. Hort. Maurit.* 271.—Ins. Mascar.
Manrandiae, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1869) 119.—N. Granat.

BEGONIA:—

maxima, ***Hort. Rerol. ex Klottsch, in Abh. Akad. Berl.*** (1855) 39.—Mexic.
maynensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 126.—Peruv.
megaphylla, *A. DC. I. c.* 188.—Bras,
megaptera, *A. DC. I. c.* 134.—Reg. Himal. j Burma.
Meissneri, *Wall. Cat.* n. 6294.—Ind. or.
membranacea, ***A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.*** **IV. xi.** 11859) 13».—Bras.
meridensis, *A. DC. 1. c.* 123.—Venezuela.
metalliea, L. Sm. in Floral Mag. (1876) t. 197=-incamata.
Meyeniana, ***Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.*** **xix.** ***Suppl.*** L (1843) 409.—Bras.
Meyeri, *Hoot. Bot. Mag.* t. 4100.—Mexic
Meyeri, Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. iv. (1886) 849-tomentosa.
micrantha, Steud. Nom. ed. II. i. 194=parviflora.
micranthera, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 148.—Reg. Argent.
microcarpa, *A. DC. Prod.* xv. I. 811.—Ecuador,
microphylla, *A. DC. 1. c.* 875.—Keg. Granat.
microphvlla, Willd. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 62 = foliosa.
microptera, *Hook./. Bot. Mag.* t. 4974.—Borneo.
miniata, Planch. *Sc* Linden, in Fl. des Serres, Sér. I. viii. (1852-53) 105 = fuchsioides.
minima, Bedd.inMadr. Journ. Sc. Ser. HI. i. (1864) 48 = crenata.
minor, Jacq. Coll. i. 126=nitida.
modesta, ***liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **1862** (1853) 20.—Mexic.
modestiflora, *Kurs, in Flora,* liv. (1871) 296.—Reg. Himal.; Burma.
mollis, *A. DC. Prod.* xv. I. 89L—Java,
monadelpha, *Rui* (f Pav. ex A. DC. I. c.* 286.—Peruv.
monophylla, ***Pav. ex A. DC. in Ann. Sc. Nat.*** **Sér.** IV. xi. (1859) 121.—Mexic. 1
monophylla, Pourr. ex A. DC Prod. xv. I. 408 (est Orchidea).
monoptera. *Link If Otto, 1c. PI. Rar.* t. 14.—Mexic.
Moritnana, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1854) 31 =tovarensis.
Moritaiana, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 16 = scandens.
moulmeinensis, ***C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.*** ii. 643.—Burma.
mnltangula, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 96.—Java,
multibulbillosa. *Mart, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 194.—Bras.
multiflora, *Benth. PI. Hartn.* 185.—N. Granat.
multinervia, ***Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **1852** (1853) 18.—Costa Rica.
muricata, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 103 = tuberosa.
muricata, ***Scheidw. in Otto (f Dietr. Allg. Gartent.*** **ix.** (1841) 156.—Bras.
nana, *L'Hirit. Stirp. Nov.* 99. t. 48.—Madag.
natalensis, *Hook. Bot. Mag.* t. 4841.—Afr. austr.
neglecta, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 139.—Bras,
nelumbiifolia, ***Cham, b" Schlecht. in Linnaea,*** **v. (1830'** 604.—Mexic.
nemophila, Kurz, in Journ. As. Soc Beng. xlvi. (1877) II. 106, 108 = Cathcartii.
neocomensium, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1850) 138.—Bras.
nervosa, [Desf.] Hort. Par. ex H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vii. 177 = cucullata.
nigrescens, ***Van Hmtte.—C/. Hamb. Gartent.*** **viii.** (Ib52j 9.—Hab. ?
nigritarum, Steud. Nom. ed. I. 104 ; ed. II. i. 1I>4 •=• malabarica ?
nigro-venia, Regel, Gartenfl. (1867) 163 = glandulosa.
nitida, ***[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.*** **ed. I. iii. 352.—** Jamaica,
nossibea, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 130.—Ins. NossiW.
Novo-Granatae, A. DC. Prod. xv. I. 517-rosacca.
nivea, ***Parish, ex /Curs, in Journ. As. Soc. Beng.*** **xlii.** (1873) ii. 81.—Tenasserim.
nnmmulariaefolia, *Putteys.—Cf. Bot. Zeit.* xi. (1853) 716—Hab. ?
oaxacana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 127—Mexic.
obliqua, L'Hérit. Stirp. Nov. ii. 46 = nitida.
obliqua, Jacq. Obs. ex Steud. Nom. ed. II. i. 194 - macrophylla.

BEGONIA:—

obliqua, Linn. Sp. PI. 1056=acuminate.
obliqua, Ruiz, ex A. DC. Prod. xv. I. 833 •= cyathophora.
obliqua, Thnnb. Fl. Jap. 231=Evansiana.
obliqua, *Veil- Fl. Flum.* x. t 48.—Bras,
octopetala. *L'Hérit. Stirp. Nov.* 101.—Peruv.
odorata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 64-diptera.
olbia, ***Kerchove, in Rev. Hortic. Beige*** **(1888), 241—** Bras,
oligophylla, ***Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.*** **i. 692.—** Java,
opuliflora, *PuU. in Fl. des Serres,* Sér. I. x. (1854-55) 71. t. 995—N. Granat.
opuli/olia, Loud. Kncyc. PI. 1540 = praec?
orbiculata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1812) VII. 9.—Sumatra,
oregana, ***hort. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad.*** (Maerz Is64) 126.—Bras.
Ottoniana x, *A. DC. Prod.* xv. I. 899.
Ottonis, *Walp. Rep.* ii. 212.—N. Granat.
ovatifolia, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xi. (1859) 132.— Reg. Himal.
oxyloba, ***Welw. ex Hook. /. in Oliver, Fl. Trop. A/r.*** **ii.** 578.—Afr. trop.
oxyphylla, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 140.—Bras.
oxyspcrma, *A. DC. 1. c.* 122.—As. trop.
paleacea, *Kurz, in Flora,* liv. (1871) 297.—Burma,
paleata, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 137.—Bras.
palmaris, *A. DC. 1. c.* 126.—Mexic.
palmata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 223 = laciniata ?
palmata, Pav. ex A. DC. Prod. xv. I. 307 = palmoris.
palustris, *Benth. PI. Hart*.* 184. n. 1022.—N. Granat.
paniculata, ***Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,*** **v.** (1878) 209 ; *Contrib.* 59.—Paraguay,
pantherina, *Putz. ex Linden, Cat.* n. 17 (1862) 2.—Mexic.
papillosa, R. Grab, in Hook. BoL Mag. t. 2846 = incamata.
papillosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 39.—Hab. ?
paraguayensis, ***Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,*** **v.** (1b78, 207 ; *Contrib.* 66.—Paraguay.
Parishii, ***C. B. Clarke, in Hook./. Ft. Brit. Ind.*** **ii.** 651.—Burma.
parviflora, Liebm. ex A. DC. Prod. xv. I. 383 = Franconis.
parviflora, ***Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.*** **i. 7. t. 12.** —Chili.
parviflora, Steud. Nom. ed. II. i. 194 =• parvifolia.
parviflora, Wall. Cat. n. 3674 = modestiflora.
parvifolia, R. Grah. in Bot. Mag. t. 3720 = Dregei.
parvifolia, ***Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.*** **(1855) 33.—** Bras,
parvifolia, ***Schott, in Spreng. Syst.*** **iv.** ***App.*** **408.—** Bras,
parvipeltata, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 139.—Bras.
parvuliflora, *A. DC. I. c.* 136.—Burma,
pastoe'nsis, *A. DC. 1. c.* 121.—N. Granat.
patens, Griseb. ex A. DC. Prod. xv. I. 377-arborescens.
patula. Haw. PI. Succ. Suppl. 100=macroptera.
pauciflora, Lindl. Bot. Keg. t. 471=macroptera.
paulensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1869, liS.—Bras.
l'avoniana, *A. DC. 1. c.* 142.—Peruv.
l'earcei, *Hook./. Bot. Mag.* t. 5545.—Bolivia,
pedatsi, ***Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **1852 (1853)** 1U.—Mexic.
pedunculosa, *Wall. PL As. Rar.* i. 82. I 97.—Keg. Himal.
pedunculosa, Wall. Cat. n. 8672 U = khasiana.
peltata. Hassle, in Hoev. & De Vricse, Tijdschr. x. (1843) 133 = Hasskarlii.
peltata, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 188.—Bras.
peltata, Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 58 = incana.
pelti/olia, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 4U8 « parvipeltata.
pentaphylla, Walp. Rep. ii. 20U - muricata.
peperomioides, ***Hook. f. in Oliver, Fl. Trop A/r.*** **ii.** 575.—Afr. trop.

BEGONIA :—

peponifolia, ***Vis. Ind. Sem. Hort. Patav.*** **(1847).—C/.** *Linnaea,* xxiv. (1851) 180.—Jamaica,
perpusilla, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (185V) 143.—Ins. Nossibé.
peruviana, *A. DC. I. c.* 138.—Peruv.
pctalodes, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1757.—Bras,
philippinensis, *A. DC. in DC. Prod.* xv. I. 820.—Ins. Philipp.
phyllomaniaca, *Mart, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. xix. (1853) 866.—Bras.
physalifolia, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1852 (1853) 19 = scandens.
picta, Hort. Henders. ex A. DC. Prod. xv. i. 350 = Griffithii.
picta, *Sm. Exot. Bot.* ii. 81. t. 101.—Reg. Himal.
Pilderia, *A. DC. Prod.* xv. I. 380.—Venezuela,
pilifera, *A. DC. I. c.* 337.—Am. centr.
pilosa, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 18.—Sumatra,
pinetorum, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xi. (1859) 131.—Mexic.
plagiata, Linden, ex A. DC. Prod. xv. I. 812-oaxacana.
plantanifolia, ***Schott, in Spreng. Syst.*** **iv.** ***App.*** **407.—** Bras,
plebeja, ***Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **1852** (1853) 8.—Nicaragua,
pleiopetala, ***A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.*** **IV. xi.** (1859) 121.—Bras.
Plumieri, *Kunth, in DC. Prod.* xv. I. 295.—Ins. S. Doming,
pocnlifera, ***Hook./, in Oliver, Fl. Trop. A/r.*** **ii. 67*.—** Afr. trop.
poecila, ***C. Koch, in C. Koch & Pint. Wochenschr.*** (1858) 338.—Hab. ?
Poeppigiana, *A. DC. Prod.* xv. I. 376.—Bras.
Pohliana, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 33" macroptera.
polygonata. ***Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **1852** (1853) 12.—Mexic.
polygonifolia, *A. DC. »» Mart. Fl. Bras.* iv. I. 362.—Bras,
polygonoides, ***Hook./, in Oliver, Fl. Trop. A/r.*** **ii. 571-** —Afr. trop.
polypetala, *A. DC. — C/. 'Garden'* (1878) 531.—Peruv.
populi/olia, H. B. *if* K. Nov. Gen. et Sp. vii. 142 - Balmisiana.
populi/dlia, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 30 = tovarensis.
populi/olia, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 408 = scandens.
populnea, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 128.—Bras.
Porteriana, Fisch. Mey. & Ave'-Lall, Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 51=humilis.
portoricensis, *A. DC. Prod.* xv. I. 295.—Porto Rico.
Prieurei, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xi. (18511) 142.—Guiana.
Princeps, ***Hort. Berol. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.*** (1855) 39.—Bras.
prismatocorpa, *Hook. Bot. Mag.* t. 5307.—Afr. trop.
procridifolia, *Wall. Cat.* n. 62H2.—Burma,
procumbens, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 36.—Bras,
prolifera, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 135.—Burma; Malaya.
pruinata, *A. DC. Prod.* xv. I. 338.—Costa Rica,
pulchella, *Raddi, in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (.1820) 407.—Bras.
pulchra, Herb. Schreb. ex A. DC. Prod. xv. I. 293 -- nitida.
punctata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 194=macolata.
punctata, Klotzsch, in Link, Klotzsch *Sc* Otto, Ic. PI-Berol. i. 16 = heracleifolia.
Purdieana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859; 124.—Jamaica.
purpurea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 85 = nitida.
pusilla, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859; 120.—Bolivia,
pustulata, ***Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **185:2** (1853) 6.—Mexic.
Putzcysiana, ***A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.*** **IV. xi.** (1859) 189.—Venezuela,
quercifolia, *A. DC. I. c.* 129.—Ins. Philipp.
racemosa, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822} vii. U—Sumatra.

BEGONIA:—
radiata, R. Grah. in Ediab. N. Phil. Jonm. (July 1833) 182=beracleifolia.
radicans, *Veil. Fl. Flum.* x t 89.—Bras,
ramentacea, *Paxt. Mag. Bot.* x. 78.—Bras.
rtniformis, Betid, in Madr. Journ. Sc. xxii. (1861) 72 = anaimalaiensis.
reniformis, Dryand. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 161. 1.14. f. 1-2-loDgipes.
reniformis, Hook. Bot Mag. t. 3225 - vitifolia.
reniformis, Hort. Berol. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 24 = Dregei.
reniformis, Pav. ex A. DC. Prod. xv. I. 308 •= Balmisiana.
Teniformis, *Veil. Ft. Flum.* x. t. 40.—Bras,
repanda, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 97.—Sumatra.
repens, Blume, 1. c. 96-mollis.
"pens, Lam. Encyc. i. 394 = rotundifolia.
repens, Hems! Biol. Centr. Am. Bot. i. 497 = Liebmanni.
repens, Ruiz & Pav. ex A. DC. Prod. xv. I. 333 - Rossmanuiae.
repent, Schott, ex A. DC. 1. c. 365 - convolvulacea.
repens, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 85.—Bras,
reptans, *Benth. PI. Hariw.* 62.—Mexic.
reptans, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1852 (1858)5 = Liebmanni.
rcticulata, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 134.—Bras.
Rex, *Putt, in Fl. des Serves,* ii. (1857) 141. 1.1255.—Reg. Himal.
rhizocarpa. *Fitch, ex A. DC. Prod.* xv. I. 888.—Bras.
**h\zoca.u\is, Hort. Berol. ex A. DC. I. c. SiO.*—Am. centr
rhombicarpa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (185B) 129.-Ins. Luzon.
Kichardii x, *[C.Moore'] Cat. Bot. Gard. Sydney* (1857), 9—Hab.?
Richardsiana, *T. Moore, in Gard. Chron.* (1871) 1065. —Afr. austr.
Richardsoniana, *Houll. in Rev. Hortic.* (1872) 333.—Hab.f
ricinifolia x, A. Dietr. Allg. Gartenz. xv. (1847) 2S2.
Riedelii, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 137—Bras.
rigid*, *Hegel, ex A. DC. Prod.* xv. I. 378.—Bras,
robusta, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 96.—Java.
robusta, Zoll. ex A. DC. Prod. xv. I. 275 = maltangula.
Rodwelli, *Hort.*—*Cf. Gard. Chron.* (1867) II. 481.—Hab.?
Roesli, Regel, Gartenfl. (1876) 194; et in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 834 - Lynchiana.
roiacea, *Put*, in Belg. Hortic.* vii. (1857) 196; *et in Fl. des Serres,* Sér. II. ii. (1857) 25. t. 1194. —N. Granat.
rosaeflora, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5680.—Pernv.
rosea, *A. DC. Prod.* xv. I. 2fl9.—Am. centr.
rosea, Pav. ex A. DC. 1. c. 273=cordifolia.
Rossmanniae, *A. DC. I. c.* 833.—Peruv.
rostrata, *Welv. ex Hook./, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 578.—Afr. trop.
rotata, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1852 (1858) 11 = caroliniaefolia.
rotunda, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 88.—Bras,
•otundifolia, *Lam. Encyc.* i. 394.—Ind. occ.
Roxburghii, *A. DC. Prod.* xv. I. 398.—Reg. Himal.; Burma.
Roylei, *Linden, in Belg. Hortic.* vii. (1857) 197.—Ind. or.
mbella, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep* 228.—Nepal.
'ubella, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 18 = canarana.
rubella, Wall. Cat. n. 3687 -= scutata.
rubicunda, Hort. Turic ex A. DC. Prod. xv. I. 384 = Dregei.
*ubra, *Blume, Enum. PI. Jav. i.* 96.—Java,
mbricaulis, *Hook. Bot. Mag.* t. 4131.—Peruv.
rubro-nervia, *Hort. ex Klottsch, in Abh. Akad. Berl.* (1855) 40.—Ind. or.
mbro-pilosa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 125.—Bras.
'ubro-setulosa, *A. DC. Prod.* xv. I. 890.—Hab.J
rubro-venia, *Hook. Bot. Mag.* t. 4689.—Reg. Himal.
mfa, *Thunb. in Flora,* iv. (1821) 330.—Bras,
ngosa, *Hort. Schoenb. ex Klottsch, in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz 1854) 126.—Hab.?
rupestris, *Baxt. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 498. —Bras.

BEGONIA :—
rupicola, *Miq. PI. Jungh.* 418.—Java.
rutilans, *Hort. Van-Houtte, ex A. DC. Prod.* xv. I. 378.—Hab.»
sagittate x, HoTt.—*Cf.* Gard. Chron. (1868) I. 1317.
salicifolia, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. —(1869) 128.—Bras,
sandalifolia, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 649.—Burma.
Sandersii, *Hort. Kew. ex A. DC. Prod.* xv. I. 400, nomen.—Hab. ?
sanguinea, *Raddi, in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 409. —Bras,
sarcophylla, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 12.—Mexic.
Sartorii, Liebm. I. c. 14-praec.
Satrapis, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 638. —Reg. Himal.
saxatilis, *Blume, Enum. Fl. Jav.* 95.—Ins. Philipp.
saxicola, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. 1,1859) 144.<«-Bras.
Saxifraga, *A. DC. 1. c.* 138.—Bras,
scabrida, *A. DC. Prod.* xv. I. 367.—Venezuela,
scandens, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 41.—Bras.
scandens, Hort. Schoenb. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 126 - convolvulacea.
scandens, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 8b.—Am. austr.
scapigera, *Hook./, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 672.—Afr. trop.
schitolepis, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1852 (1853) 17 = manicata.
Schlumbergeriana, *Lent. Illustr. Hortic.* (185S) *Misc.* 61.—Bras.
Schmidti, Hort. ex Wien. Illustr. Gart. Zeit. (1880) 250-Schmidtiana.
Schmidtiana, *Regel, Gartenfl.* (1879) 821.—Bras.
Schottiana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 140.—Bras.
scutata, *Wall. Cat.* n. 3686. partim.—Reg. Himal.
scutata, Wall. 1. c. A=Josephi.
scutellata, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1852 (1858)9 = conchaefolia.
scutifolia, *Hook./, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 572.—Afr. trop.
Scutulum, *Hook./. 1. c.* 575.—Afr. trop.
Sedenix.HorL—Cf. Gard. Chron. (1870) 88.
Seemanniana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 133.—Am. centr.
Selloi, *Lodd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 194—Bras.
Sellowii, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 28 = semptrflorens.
semiovata, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 22.—Am. centr.
semperflorens, Hook. Bot. Mag. t. 2920 ~ Hookeri.
semperflorens, *Link V Otto, Ic. PI. Rar.* t. 9.—Bras,
sericoneura, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852 (1853) 13.—Am. centr.
sericoneura, Seem. Bot. Voy. Herald, 128 =• pilifera.
serotina, *A. DC. in Ann.Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 121.—Guayaquil,
sessilifolia, *Hook./, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 577. —Afr. trap.
setaria, Hort. Angl. ex A. DC. Prod. xv. I. 293 = semperflorens.
setifera, *A. DC. I. c.* 338.—Am. centr.
setosa, *Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.* (1855) 31.—Bras,
setulosa, *Bertol. in Nov. Comm. Bon.* iv. (1840) 437.—Guatemala,
sikkimcnsis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xi. (1859) 134.—Reg. Himal.
silhetensis, *C. B Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* ii. 636.—Reg. Himal.
sinensis, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xi. (1859) 125 = Evansiana.
sinuata.K Grah. in Edinb.N. Phil. Joum. (Jan. 1838) 192 = Dregei.
sinuata, *E. Mey. in Otto if Dietr. Allg. Gartenz.* iv. (1836) 357.—Afr. austr.
sinuata, *Wall. Cat.* n. 3680.—Burma ; Malaya,
smilacina, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 187.—Bras,
socotrana, *Hook./, in Gard. Chron.* (1881) I. 8.—Ins. Socotr.
solaiianthera, *A. DC. in Ann. Sc Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 128.—Bras,
sparsipila, *Baker, in Sound. Re/. Bot.* t. 340.—Am. centr. ?
spathulata, Lodd. Bot. Cab. t. 107 -cncullata.

BEGONIA :—
speciosa, Hort. Van Houtte, ex A. DC. Prod. xv. i. 293-nitida.
spilotophylla, *F. Muell. Not. Papuan PI.* iv. 67.—N. Guinea.
splendens, Hort. Tnric ex A. DC. Prod. xv. I. 375 = Putzeysiana.
splendida, Hort. Rollison, ex A. DC. 1. c. 275 = robusta.
Spruceana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1869) 142.-Peruv.
squamulosa, *Hook./, in Oliver, Fl. Trop. A/r.* ii. 579. —Afr. trop.
squarrosa, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1852, (1858) 7.—Mexic.
squarrosa, Seem. Bot. Voy. Herald, 128 = stigmosa.
Stella, *Regel, Gartenfl.* (1875) 88.—Hab.?
stenophylla.-d.ZJC. *in Ann.Sc.Nat.* Sér.IV.xi. (1859) 187.—Bras.
stictopoda, *Miq. ex A. DC. Prod.* xv. I. 391.—Sumatra,
stigmosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 32.—Mexic.
stipulaeea, Willd. Sp. PI. iv. 414 = angularis.
strigillosa, *A. Dietr. Allg. Garten:* xix. (1851) 830.—Am. centr.
strigulosa, *A. DC. Prod.* xv. I. 899.—Hab.?
suaveolens, Haw. in Lodd. Bot. Cab. t. t>9=diptera.
suaveolens, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 26 - nitida.
subciliata. *A. DC. in Ann. Sc..Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 182.—Peruv.
subhumilis, *A. DC. I. c.* 124.—Guayaquil,
sublobata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 10. —Sumatra.
subovata, Wall. Cat. n. 868S = ovatifolia.
subpeltata, Regel, Ind. Sem. Hort. l'ctrop. (1866) 102=incarnata.
subpeltata, *Wight, Ic.* 1.1812.—Ind. or.
subperfoliata, *Parish, ex Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) it. 81.-Burma.
subrotunda, Wall. Cat. n. 6293 «sinuata.
subvillosa, *Klotssch, in Abh. Akad. Berl.* (1856) 32.—Bras,
suffruticosa, *Meissn. in Linnaea,* xiv. (1840) 602.—Afr. austr.
suffruticosa, Pav. ex A. DC. Prod.' xv. I. 311 = Boissieri.
snlcata, *Scheidw. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* xvi. (1848) 180.—N. Granat
surculigera, *Kurt, in Flora,* liv. (1871) 296.—Burma.
Sutherland^ *Hook./. Bot. Mag.* t. 5689.—Afr. austr.
sylvatica, *A. DC. Prod.* xv. I. 365.—Bras,
sylvestris, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 140.—Bras.
tanacetifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 194 = heracleifolia.
Telfariae, Steud. 1. c. sphalm. vide Bignonia Telfairiae.
tenella, D. Don, Prod. Fl. Nep. 223 = amoena.
tenera, *Dryand. in Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 169. 1.16.—Zeylan.
tenuicaulis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (lb59U20.-Bolivia.
tenm(o\a, Dryand. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) *Mi.* t. 14.—Java,
tessaricarpa, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 636.—Assam.
Teuscheri, *Linden, ex André, in Illustr. Hortic.* (1879) 137. t. 358.—Malaya.
Thomsonii, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (.1*59) 134.—Reg. Himal.
Thwaitesii, Hook. Bot. Mag. t. 4692 = tenera.
tomentosa, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *App.* 408.—Bras,
tovarensis, *Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz 1854) 122.—Mexic.
trachyptera, *Benth. PI. Hartw.* 184.—N. Granat.
trichocarpa, *Dais, in Hook. Ken Journ.* iii. (1851) 280. —Ind. or.
trichopoda, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 1098.—Sumatra,
tricuspidata, *C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* ii. 637.—Burma.
triradiata, *C. B. Clarke, I. c*—Burma,
tropaeolifolia, *A DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 120.—N. Granat.
truncata, Veil. H. Flum. x. t. 47 =• tomentosa vitifolia.
tuberosa, Herb. Wight, ex Wall. Cat. n. 3675 = malabarica.

BEGONIA:-
tuberosa, Heyne, ex A. DC. Prod. XT. i. 891-dipetala.
tuberosa, *Lam. Encyc.* i. 893.—Ins. Molucc.
tuberosa. Par. ex A. DC. Prod. xv. I. 311-bulbillifera.
tuberose, Ruiz, ex A. DC. 1. c 281=geraniifolia.
uliginosa, *Klotesch, in Abh. Akad. Berl.* (1856) 85.—Bras.
ulmnolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 418.—Venezuela.
umbelUta, *H. B.* 6" *K. Nov. Gen. et Sp.* vii 143.—N. Granat.
umbilicata, Hort. ex Planch, is FL 4es Series, Sér. I. viii. (1852-58) sub t. 810-hemandiaefolia.
nmbrata, *Hort. ex A. DC. Prod.* xv. I. 896.—Hab.1
uncinata, Hort. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 124=Dregei.
undulata, *Schott, in Spreng.'Syst.* iv. *App.* 408.—Bras,
nrophylla, *Hook. Bat. Mag.* t. 4855.—Mexic.
Urticae, *Linn./. Suppl.* 420.—N. Granat
urticaefolia, Sin. Ic. Fasc. ii. 45 = tuberosa.
urticaefolia, Hort. ex Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 127 = B. Pilderia.
urticifolia, F. G. Dietr. Vollst. Gartenlex. ii. 177 = Urticae.
vaginans, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 87.—Bras,
valdensium, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xL (1859) 188.—Bras,
variana, *A. DC. I. e.* 135.—Java.
Veitchii, *Hook. f. in Gard. Chron.* (1867) 734.—Peruv.
vellerea, *KlotMsch, in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz 1854) 122.—Bras.
VelUniana, Walp. Rep. ii. 216-jepens.
velutina, Hort. Vindob. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 41=lobata.
velutina, Parish, ex Kurz, in Joum. *As.* Soc. Beng. xlii. (1873) H. 61 =parvuliflora.
vernicosa, Hort. Berol. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.'(1855) 40 -lobata.
Verschaffeltiana x, Lem. Illustr. Hortic. ii. (1855) t 68 = Verschaffeltii.
Veischafieltii x, *Regel, Gartenfi.* (1855) 248. t. 132.
vertidllata, Veil. Fl. Flum. x. t. 45=digitata.
verticillata, *Hook. Ic. PI.* t 811.—Burma.
villosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. i. (1842) 186 = macroptera.
villosa, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 122=subvillosa.
villosa, Lindl. Bot. Reg. t. 1252=hirtella.
violaefoUa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 134.—Mexic
viridiflora, *A. DC. I. c.* 132.—Pernv.
viti/olia, Lindl. Bot Reg. (1862) Misc. 21 = Lindleyana.
vitifolia, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 407.—Bras.
Wageneriana, *Hoot. Bot Mag.* t. 4988.—Bras.
Waflichiana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 194; *Lehm. in Linnaea,* xxiv. (1851) 213 (sp. dubia).—Ind. or.
Walpersii, *Heynh. Nom.* ii. 68.—Venezuela.
Warscewiczii, Neuman, in Rev. Hortic. Sér. III. i. (1847) 166=conchaefolU.
Weddeliana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 122.—Bolivia,
weltoniensis X, *Hort.—Cf. J. B. Weber,* in, *Rev. Hortic.* (1875) 106.
Wightiana, Wall. Cat. n. 8678-albo-coccinea.
Wrightiana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 12S.-Cuba.
xanthina, *Hook. Bot. Mag.* t. 4688 et t 5107.—Reg. Himal.
zebrina, Hort. Angl. ex Lond. Encyc PI. Suppl. ii. 1506-angularis.
Zollingeriana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 185.—Java.

BEGOMTELIiA, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1873)518. *BEGONJACEAE.*
angustifolia, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t 1487.—N. Granat.
Kalbreyeri, *Oliver, 1. c.* t 1352.—N. Granat.
Whitei, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1873) 618.—N. Granat.

HKHATMIA. Griseb. Cat PI. Cub. 77 (1869). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 1002.
cubensu, *Griseb. I. c.* 78.—Cuba.

BEHEN, Hill, Veg. Syst. iv. 41 (1762) - Vernonla, Schreb. ("Compos.).
Jacea, Hill, Hort. Kew. 68 =Centaurea Jacea.
noveborascense, Hill, 1. c—V. noveboracensis.
praealium, Hill, L c. = V. noveboracensis et altissima.

BEHEN, Moench, Meth. 709 (1794)-Silene, Linn. (Caryoph.).
angusti/olius, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. i. 194 = S. Cucubalns.
glareosus, Fourr. in Ann. Soc, Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 348=S. Cncubarost
puberulus, Fourr. 1. c = S. Cucubalus.
trachiatus, Fourr. 1. c.=S. Cucubalus.
vesiearius, Fourr. 1. c = S. Cucubalus.
vulgaris, Moench, Meth. 709— S. Cucubalus.

BEHENANTHA, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Braenn, xv. H. (1877) 130-Silene, Linn. (Caryoph.).
Cserei, Schur, 1. c 132=S. Cucubalus.
glaucescens, Schur, i c-S. Cucubalus.
inflata, Schur, 1. c 181=S. Cucubalus.
saponariaefolia, Schur, 1. c. 183-S. Cucubalus.

BEHNIA, F. Didrichs. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 182. *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 766.
DlCTYdPSIs, Harv. in Bot. Mąe. t 5638 (1867).
HYLONOMK, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 561.
reticulata, *F. Didrichs. I. c.* 183.—Afr. austr.

BEHRINIA, Sieber, ex Steud. Nom. ed. I. 105 (1821)-BERINIA, Brign. = Crepis, Linn. (Compos.).

BEHTTBIA, Cham, in Linnaea, ix. (1884) 376. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 748.
insignis, *Cham. I. c.* 877.—Bras.

BEILIA, Eckl. Vera. 48 (1827)=Wataonla, Mill. (Irid.).
spicata, Eckl. 1. c.=W. spicata.
triticea, Eckl. 1. c = W. plantaginea.

BEHJSCHUIEBIA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 69 (1831). *LAURINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 152.
BIELSCHMEIDIA, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 176 (1874).
HUFELAKDIA, Nees, Prod. Laurin. ii. (1838); et Laurin. Expos. (1886) 187, 674.
NESODAPHNE, Hook. f. Fl. N. Zel. *1217* (1853).
assamica, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 64.—Assam; Burma.
Baillonii, *Panch. tf Sebert, Not. Bois Nouv. Caled.* 176.—N. Caled.
calonenra, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent.* i. (1876) 47.—N. Gain,
chinensis, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 79.—China.
fagifolia, *Nees, in Wolf. PL As. Rar.* H. 69.—Ind. or.
globularia, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 294.—Burma.
javanica, *Miq. PI. Jungh.* i. 176.—Java,
lanceolata, *Panch. If Sebert, Not. Bois Nouv. Caled.* 177.—Caled.
landfolia, *Miq. PI Jungh.* 177.—Java:
macrophylla, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 68.—Burm
Madang, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 832.—Java,
oppositifolia, *Benth. tf Hook./. Gen.* iii. 152. -Zeylan.
pendula, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 70.—Mexic.
Roxiurghiana, Dalz. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. 222=fagifolia.
Roxburghiana, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 61.—Assam; Burma.
Thomaea, *Benth. V Hook.f. Gen.* Hi. 162.—Ind. oc.-.
undulata, *Miq. Fl: Ind. Bat.* i. I. 920.—Java.
Wightii, *Benth. & Hook./. Gen.* iii. 162.—Ind. or.

BEJARIA, Zea, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 151, in nota; Vent. Jard. Cels, sub t. 51=Befluria, Mutis (Ericac).

BEJUCO, Loefl. Itin. 314 (1758) = Hlppocratea, Linn.
pendulus, Loefl. 1. c.-H. scandens.

BELAIBIA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 511. t. 40 (1846). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 558.
mucronata, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 179.—Cuba.
spinosa, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 518.—Cuba,
teraata, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 81.—Cuba.

BELAMCANDA, Adans. Fam. ii. 60 (1763) (Belam-Canda). *IRIDIAE,* Benth. & Hook. f. iii. 697.
PARDANTHUS, Ker-GawL in Kon. *8c* Sims, Ann. Bot. i. (1806) 246.
aristata, Moench, Meth. Suppl. 214—Sparaxis grandiflora.
bulbifera, Moench, I. c—Sparaxis bulbifen.
chinensis, [DC. in] Red. Lil. iiL t 121-punctata.
finestrata, Moench, Meth. 529=Tritonia crocata.
punctata, *Moench, 1. c.*—China.
semiflexuosa, Moench, Meth. Suppl. 214=Sparaxis grandiflora.
tripedalis, *Fisch. ex Room. V Schult. Syst. i. Mont-* 806 (sp. dub.).
villosa, Moench, Meth. Suppl. 214=Babiana villosa.

BELANGEBA, Cambess. Cunon. Syn. Bras. Mer. 3 (1829). *SAXIFRAGEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i-660.
LAMANONIA, Veil. Fl. Flnm. v. 1.104 (1827).
POLYSTEMON, D. Don, in Edinb. N. PhiL Joum. «• 95 (1830).
cuneata, *Cambess. I. c.*—Bras,
denticulata, *Moric. PI. Nouv. Am.* 153. t. 90.—Bras,
glabra, *Cambess. Cunon.^Syn. Bras. Mer.* (1829)8." Bras,
intermedia, *Mart, in Flora,* xx. (1887) It. *Beibl.* 96." Bras.
Lamanonia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 196.—Bras.
Riedeliana, Casar. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II-155—speciosa.
speciosa, *Cambess. Cunon. Syn. Bras. Mer.* (1829) 4.—Bras,
tomentosa, *Cambess. I.* c—Bras.

BELANTHERIA, Nees, in DC. Prod. xi. 96 (1847)-BrillantaiBia, Beauv. (Gramin.).
Belvisiana, Nees, 1. c. 97 = Brillantaisia owariensis.

BELENCITA, Karst. in C. Koch, Allg. Gartenz. (1867) 25. *CAPPAR1DEAE.*
Hagenii, *Karst. 1. c.* 24.—N. Granat.

BELENIA, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 113. t 12° (1844)-Fhy8ocfalaina, D. Don (Solanac.).
praealta, Decne. 1. c. 114, t 120-P. praealta.

BELENIDIUM, Am. ex DC. Prod. vii. 292, in syn. (1838) = Hymenatherum, Cass. (Compos.).
Candolleanum, Am. ex DC. 1. c = H. Belenidium.

BELEROPONE, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 624 (1885), sphalm. - Beloperone, Nees (Acanth.).

BELHARNOSIA, Adans. Fam. it 482 (1763)-Basguinaria, Linn. (Papav.).

BELIA, Steller, ex S. G. Gmel. Fl. Sibir. iv. 88 (1769) -daytonia, Gron. (Portulac).

BELILLA, Adans. Fam. ii. 169 (1768)-Uuaaaends> Burm. (Rubiac).

BELIS, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) ***> nomen prius — OiiniilTigliMirt^ R. Br. (1828/ (Conifer.).
jaculi/olia, Salisb. 1. c. =C. linensis.
lanceolata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 476-C. sinensu-

BELLADONA, Adans. Fam. ii. 319 (1768)-AtroP»-Linn. (Solanac).

BELLADONNA, Sweet, Hort. Brit. ed. IL 506 (1830) - Amaryllis, Linn.
blanda, pallida, pudica, purpurascens, Sweet, 1. c." A. Belladonna.

BELLADONNA, [Toum.] Rupp. Fl. Jen. ed. HaU. 362 (1745) = Atropa, Lion. (Solanac.).
iaccifera, Lam. Fl. Fr. ii. 255 - A. Belladonna.
peruviana, Hort Par. ex Adans. Fam. ii. 219**Nolana Prostrata.
Wfhotoma, Scop. FL Cam. ed. IL i. 160-A. Belladonna.

BELLARDIA, AIL Fl. Pedem. i. 61 (1786)-Bartala, Linn. (Scrophul.).
Trixago, All. 1. c.=BartsU Trixago.
•mscosa, Fisch. ft Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 4-Bartsia viscosa.

BELLARDIA, Colla, in Mem. Aoc. Torin. xxxviii. (1885) 40. t. 34=Microseris, D. Don (Compos.).
Pusilla, Colla, 1. c. 42. t. 84.—Chili.

BELLARDIA. Schreb. Gen. i. 790 (1789)-Coooool-Pselum, R. Br. (Rnbiac).
xullis, Willd. ex DC. Prod. iv. 397-C. canescens.
"pens, Willd. Sp. PI. i. 626-C. Tontanea.
Tontanea, Roem. ft Schult. Syst iii. 306 - C. Tontanea.

B®ttiEin>EirA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 166. *PROTEACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii 176.
Montana, *R. Br. I. e.* 48,166.—Tasmania.

BELLENDENIA, Rafin. ex Endl. Gen. 169 (1837), in *ro-=Tritonla. Ker-GawL (Irid.).

BELLENDENIA, End!. Gen. 340 (1838) - Bellendena, R- Br. (Proteac.).

BELLEVALIA, Delile, ex Endl. Gen. 231 (1836) = Atthenia, Petit (Naiad.).
"ustralis, Delile, ex Pail. Fl. Ital. iii. 648=A. filiformis.

BELLEVALIA, Lapeyr. in Journ. Phys. lxvii. (1808) *«5 =s Syaointlius, Toum. (Liliac.).
riortiva, Gren. in Gren. ft Godr. Fl. Fr. iii. 217-H. trifoliatus.
"'eppica, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 111-H. nervosus.
"PPendieulata, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 186 = H. roman .
[a]*roviolacea,* Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1884) 664.—As. centr.
^*rea,* Boiss. Fl. Orient, v. 307 = H. ciliatns.
[B]«ttandieri, Freyn, in Flora, lxviii. (1885) 26.—Afr. bor.
Boissieri, Freyn, 1. c. 95.—Graeda.
Bouviana, Heldr. ex Nym. Consp. 733.—Graeda.
[ca]*landriniana,* Nym. Consp. 732-Muscari comosnm.
[c]«ucasica, Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. ii. 387 = Mnscari · caacasienm.
tl'ata, T. Nees, Gen. 4. t. 8; Kunth, Ennm. PI. iv. 308-H. ciliatus.
C'ruiana, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 387 = H. dubius.
[co]»tasa, Kunth, Enum. PI. iv. 806 = Mnscari comosnm.
[c]*paniana, Nym. Consp. 7S8 = Muscari Cnpaniannm.
«"»"«, Nym. 1. c=Mnscari Holzmanni.
tyanfl[illegible]*a,* St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 121 = H. romanns.
densiflora, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 109 = H. densiflorus.
.« , Reichb. Fl. Germ. Excurs. 105 = H. dnbius.
•Wfa*. Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 254.—Algeria.
texuosa, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 36=H. flexnosns.
*°ntanesii, Nym. Consp. 733.—Creta.
e'auea, Kunth, Ennm. PI. iv. 309 = H. ciliatns.
Graeca, Heldr. in Atti Congr. Bot Firenze, 1874 (1876) *28 = Muscari graecum.
Graffiti , Nym. Consp. 733.—Ins. Graec,
Gussoniana, Griseb. Spicil. FL Rumel. H. 387.—Sidl.
Hackrf», Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 289._Europ.
%>ynri, Boiss. Fl. Orient, v. 808 = H. Haynei.
"'Uretêhii, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. Ill - H. , . Warns.
*" M , J. Gay, in Bull. Soc. Bot Fr. iii. (1856) 240 = H. hispidns.
"'bntanni, Heldr. in Atti Congr. Bot Firenze, 1874 (1876). 228 = Muscari Holzmanni.
•**cophaea,* Boiss. Fl. Orient, v. 305 - H . leucophaeus.
*l**ata,* Kunth, Enum. PI. iv. 309 = H. lineatns.

BELLEVALIA:—
macrobotrys, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 85—Hyadnthus macrobotrys.
maritima, Kunth, Ennm. PI. iv. 307-Mnscari maritinitun.
mauritanica, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 255.—Algeria.
micrantha, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 63=H. micranthus.
monopkylla, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient, v. 294 = Muscari latifolium.
montana, Boiss. 1. c. 804 = Muscari montanum.
muscarioides, Mast, in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 113 =Muscari latifolium.
nervosa, Boiss. Fl. Orient, v. 306 - H . nervosus.
nivalis, Boiss. ft Kotschy, Diagn. Ser. II. iv. 110 = H. nlvalis.
operculata, Lapeyr. in Jonrn. Phys. lxvii. (1808) 426, cum. tab. = H. romanns.
fallens, Vis. in Mem. 1st. Venet. xvi. (1871) 67 = H. dalmaticus.
paradoxa, Boiss. Fl. Orient v. 308 = H. paradoxus.
persica, Boiss. L c. = H. persicus.
pharmacusana, Nym. Consp. 738=Mnscari Sartorianum.
Pinardi, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 62=Mnscari Pinardi.
pseudo-muscari, Boiss. ft Bnhse, Diagn. Ser. IL iv. 110 = H. paradoxus.
romana, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 419; Reichb. Fl. Germ. Excurs. 105 = H. romanus.
Sartoriana, Nym. Consp. 733-= Muscari Sartoriannm.
sessiliflora, Kunth, Ennm. PI. iv. 309 = H. sessiliflores.
spicata, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 110 = H. spicatus.
syriaea. Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 88 = H. trifoliatus.
tenuiflora, Nym. Consp. 732 = Muscari cancasicum.
theraea, Nym. 1. c. 733 = Muscari thereum.
trifoliata, Kunth, Enum. PI. iv. 308 = H. trifoliatus.
turiestanica, Franch. in Ann. Sc Nat. Sér. VI. xviii. (1884) 156.—Turkest
variabilis, Freyn, in Flora, lxviii. (1885) 29.—Alger.
Webbiana, Vtu\. Nouv. Gen. e Spec. 19 = Hyacinthus dubins.
Weissii, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 87 •= Mnscari Weissii.

BELLIDASTRUM, Mich, ex Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 723 (1742) = Aster, Toum. (Compos.).
Michelii, Plan. Ensayo Fl. GalL 259=Bellis sylvestris.
Michelii, Cass. in Diet. Sc. Nat iv. 70=A. Bellidiastnim.
montanum, Hoppe, ex DC. Prod. v. 226 = A. Bellidiastrum.
subalpinum, Schrank, Fl. Mon. iii. 251 = A. Bellidiastro 03.

BELLIDIASTER, Dum. Fl. Belg. 66 (1827)-Aster, Tourn. (Compos.).
montanus, Dum. 1. C.=A. Bellidiastrum.

BELLIDIASTRUM, [Vaill.] Less. Syn. Comp. 383 (1882)-Oemites, linn. (Compos.).
osmitoides, Less. 1. c 384=0. Bellidiastrum.

BELLIDIASTRUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 199 = BELLIDASTKUM, Mich.=Aster, Tourn. (Compos.).

BELLIDISTRUM, Reichb. Consp. 109 (1828)~praec.

BELLIDIOPSIS, Spach, Hist Vég. Phan. x. 25 (1841) = Osmltes, Linn. (Compos.)

BELLIDIUM, Bertol. Fl. Ital. ix. 816 (1858)=BelliB, Toum. (Compos.).
pappulosum, Bertol. 1. c =Bellis sylvestris.
rotundifolium, Bertol. 1. c. - Bellis rotundifolia.

BELLILLA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vL (1820) 82 = BELILLA, Rheede=Mussaenda, Bum. (Rnbiac).

BELLINIA, Roem. ft Schnlt. Syst. iv. 56 (1819) = Baraoba, Ruiz ft Pav. (Solanac.).
bifiora, Roem. ft Schnlt 1. c. 689-S. procumbens.
contorta, Roem. ft Schult. 1. c = S . contorta.
dentata, Roem. ft Schult. 1. c - S . dentata.
micrantha, Roem. ft Schult 1. c. 690=S. micrantha.

BELLINIA :—
peruviana, Steud. Nom. ed. I. 105 = *Saracha peruviana* (nomen delendum).
procumbens, Roem. ft Schnlt. Syst iv. 687=S. procumbens.
pubescens, Roem. ft Schult. 1. c. 689=S. pubescens.
punctata, Roem. ft Schult. 1. c. 688=S. pnnctata.
umbellata, Roem. ft Schnlt. 1. c.=S. umbellata.

BELLIOPSIS, Pomel, Mat. Fl. Atl. 7 (1860) - Bellium, Linn. (Compos.).
cordifolia, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 286.—Algeria,
rotundifolia, Pomel, Mat Fl. Atl. 7 = Bellium rotundifolium.

BBLLI8, [Toum.] Linn. Gen. ed. I. 256 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 265.
ASTRANTHIUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 312.
KYBERIA, Neck. Elem. i. 42 (1790).
SEUBERTIA, H. Wats, in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1840) 602.
aculeata, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 65. t. 206 = Brachycome Billardieri.
alpina, Hegetschw. Fl. Schw. 821 - perennis.
americana, Mirb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 195 <= integrifolia.
annna, *Linn. Sp. PI.* 887.—Reg. Mediterr.
arabica, *Raeusch. Nom.* ed. III. 246, nomen.—Arabia,
annena, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 174.—Armenia,
atlantica, *Boiss. (f Rent. Pugill.* 54.—Hispan.
azorica, *Hochst. in Seub. Fl. Ator.* 31. t. 9. fig. 1-8.—Ins. Azores.
Bemardi, *Boiss. V Reut. Pugill.* 56.—Hispan.
caenilescens, *Coss. tf Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 60, nomen..—Marocco.
campestris, *Veil. Fl. Flum.* viii. t 124.—Bras.
ciliaris, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 56. t. 209-Brachycome ciliaris.
ciliata, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 24.—Am. bor.
cordifolia, *Willk. lllustr. Fl. HUp.* 47.—Hispan.
dentata, DC. Prod. v. 304 = annua.
droseraefolia, Gouan, lllustr. 69 = Bellium bellidioide*.
dubia, *Spreng. Syst.* iii. 682.—Hab. *t*
geifolia, Banks ft Soland. ex Hook. Fl. N. Zel. i. 125 =Lagenophora Forsteri.
glandulosa, Klatt, in Leopoldina, xix. (1883) 32 = Brachycome glandnlosa.
graminea, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 54. t 204-Brachycome graminea.
hirta, Host, Fl. Austr. ii. 501=sylvestris?
hortensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8-perennis.
hybrida, Tenore, Fl. Nap. v. 233.1.194 = perennis.
integrifolia, DC. in Lam. Encyc. v. 7 = perennis.
integrifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 181.—Am. bor.
javanica, Hume, Bijdr. 917 - Myriactis Wightii.
longifolia, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. I.—Ins. Creta.
longifolia, Orph. ex Nym. Consp. 890 = sylvestris.
magellanica, DC. in Lam. Encyc. v. 7=Lagenophon Commersonii.
mexicana, *A. Gray, PI. Wright,* i. 93.—Mexic.
microcephala, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861) 66-annum
mossambicensis, Klatt, in Leopoldina, xix. (1883) 32 - Brachycome mossambicensis.
nutans, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 28.—Am. bor.
pappulosa, Boiss. ex DC. Prod. vii. 276-sylvestris.
parviflora, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 23.—Am. bor.
peduncnlata, *Veil. Fl. Flum.* viii. 1.125.—Bras,
perennis, *Linn. Sp. PI.* 886.—Europ. occ.
pilosa, Banks ft Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 126 = Lagenophora lanata.
pilosa, Blume, Bijdr. 917=Myriactis pilosa.
prostrata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 287.—Algeria.
racemosa, Steud. Nom. ed. 1.105, sphalm.-seq.
ramosa, Tacq. Enum. PI. Carib. 28 = Eclipta punctata.
ramosa, Lam. Fl. Fr. ii. 122=annna.
repens, Lam. 1. c. = annua.
rotundifolia, *Boiss. V Reut. Pugill.* 55.—Algeria,
scandens, *Veil. Fl. Flum.* viii. 1126.—Bras.
scaposa, Gilib. Fl. Lituan. i. 213-perennis.
stipitata, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 56. t. 106 = Lagenophora Billardieri.
sylvestris, *Cyrill. PI. Rar.* ii. 22. t. 4.—Reg. Mediterr.
velntina, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 35.—Algeria,
xantaocomoides, *A. Cray, tx Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 118.—Mexic.

U

BEIiLIXJM, Linn. Mant. 167 (1771). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 265.
BELLIOFSIS, Pomel, Mat. Fl. Atl. 7 (1860).
bellidioides, Desf. Fl. Atlant. ii. 279 = Bellis dentata.
bellidioides, *Linn. Mant.* 285.—Reg. Mediterr.
bellidioides, Urv. in M6n. Soc Linn. Far. i. (1822) 368=minutum.
bellioides, G. Don, in Sweet, Flow. Gard. ii. 175 = bellidioides.
cordifolium, Knnze, in Flora, xxix. (1816) 703 = Bellis rotundifolia.
crassifolium, *Moris, PL Sard. Elench.* i 26.—Sardinia.
dentatum, Viviani, Fragm. 8. t. 10 = Bellis annua.
droseraefolium, Labill. ex Stend. Nom. ed. I. 105 = bellidioides.
giganteum, Cass. in Diet Sc. Nat. xxxvii. 156=rotundifolium.
minntum, *Linn. Mant.* 286.—Archip. Graec.
nivale, Req. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 383 = bellidioides.
pappulosum, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 703 - Bellis sylvestris.
pumilum, Salisb. Prod. 202=bellidioides.
rotundifolium, *DC. Prod.* v. 303.—Algeria.

BELLOA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 336. t. 38 (1849) = Gnaphalium, Linn. (Compos.).
ekilensis, Remy, 1. c. 337. t. 88. f. 2.—Chili.
subspicata, Wedd. Chlor. And. i. 159.—Bolivia.

BEUiONIA, [Plnm.] Linn. Gen. ed. I. 50 (1737). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 996.
BELONIA, Adans. Fam. ii. 158 (1763).
aspera, *Linn. Sp. Pl.172.-lad.* occ.
spinosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 41.—Ins. S. Doming.

BELLOTA, C. Gay, Fl. Chil. T. 297. t. 59 (1849) = Cryptoearya, R. Br. (Lauriq.).
Miersii, C. Gay, 1. c. 298.—Chili.
nitida, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 39 - C. nitida.
pauciflora, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1865) I. 649.—Chili.

BELLOTA, A. Rich, ex Phil, in Linnaea, xxix. (1857-68) 40-Boldu, Nees (Laurin.).

BELLUCCIA, Adans. Fam. ii. 344 (1768)=Ptelea, Linn. (Rntac).

BELLUCIA, Meissn. Gen. Comm. 48, in syn.=praec.

BELIiUCIA, Neck. Elem. ii 142 (1790). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 768.
APATITIA, Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 42 (1825).
AXINANTHERA, Karst in Linnaea, xxx. (1859-60) 167.
ISCHYRANTHERA, Steud. ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 102.
WEBERA, J. F. GmeL Syst. 820 (1790).
arboreseens, Baill. Hist PI. vii. 34 = Loreya arborescens.
Aubletii, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. xvi. (1851) 102.—Guiana.
Aubletii, Seem. Bot Voy. Herald, 122=superba.
Axinanthera, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 142.—N. Granat.
brasiiiensis, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xvi. (1851) 104.—Bras.
Cacatin, *Sagot, I. c.* Sér. VI. xv. (1888) 832.—Guiana.
grossularioides, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 141 = Aubletii.
Hostmannii, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xvi. (1851) 103.—Guiana.
macrophylla, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 142 = snperba.
multiflora, Karet in Linnaea, xxx. (1869-60) 158 = Aubletii.
nervosa, Rafin. Sylva Tellur. 9S=Blakea trinervia.
pentamera, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xvi. (1861) 105.—Peruv.
pluricaulis. Spruce, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 142=Hostmannii.
riparia, Spruce, 1. c.- Hostmannii
superba, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. xvi. (1861) 104.—Mexic

BELLYNKXIA, Muell. Arg. in Flora, Iviii. (1875) 466 = Appunia, Hook. f. (Rubiac).
angulata, Muell. Arg. 1. c.=A. angulata.

BELMOHTCA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 183 (1837). *GENTIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 804.
EXOCHAENIUM, Griseb. in DC. Prod. ix. 56 (1845).
PARASIA, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 78 (1836).
cordata, *E. Mey. 1. c.*—Afr. austr.
gracilis, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 47.—Afr. trop.
grandis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 183.—Afr. austr.
Ohlendorffii, *Griseb. in DC. Prod.* Ix. 54.—Afr. austr.
spathulata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 183.—Afr. austr.

BELOAKON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 87 (1836) = Phlomis, Linn. (Labiat.).
luteum, Rafin. 1. c.=P. fruticosa.
tomentosum, *Rafin. I.* c.—P. Samia.

BELOAITTHEBA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) Beibl. ii. 55. *'GENUS DUBIUM.'*
oppositifolià, *Hassk. 1. c.*—Java.

BELOËRE, Shuttlew. ex A. Gray, PI. Wright i. 21 (1862) = Abutilon, Gaertn. (Malvac).
cistiflora, Shuttlew. ex A. Gray, 1. c = A. indicum.
crispa, Shuttlew. ex A. Gray, 1. c. in noU-A. crispum.

BELONIA, Adans. Fam. ii. 158 (1768) = Bellonia, Plum. (Gesner.).

BELONITES, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 187 (1887) _Pachypodium, Lindl. (Asclep.).
bispinosa, K. Mey. 1. c. 188 = P. bispinosum.
succulenta, E. Mey. 1. c. 187 = P. succulentnm.

BELONOPHOBA, Hook. f. Ic. PI. t. 1127 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 109.
coffeoides, *Hook.f. I. c.—Afr.* trop.

BELOPEBONE, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 76, 102 (1832). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. 1110.
BELOFERONIDES, Oerst. in Kjoeb. Videnslc Meddel. (1854) 162.
KUESTERA, Regel, Gartenfl. vi. (1857) 845.
SIMOMISIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 144. t. 23 (1847).
Amherstiae, Nees, 1. c. 102 =Diaata'era nodosa.
appendiculata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 423.—Perav.
atropurpurea, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 188.—Bras,
aurantiaca, *Benth. <f Hook. f. Gen.* ii. 1111.—Am. merid.t
auriculata, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 138.—Bras,
bullata, *Nees, 1. c.* 141.—Bras,
californica, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 88.—Am. bor. occ.
calycina, Nees, in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 637 = Dianthera calycina.
caracasana, *Penml, in Jacq. Eclog.* ii. 2, in obs.—Venezuela.
carthaginensis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1111 = violacea.
ciliata. Hook. Bot Mag. t. 6888 = Dianthera ciliata.
ciliata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 422.—Peruv.
comosa, *Nees, 1. c.* 416.—Mexic.
cordata, Mart, ex Nees, 1. c 361 *{-Sericographis cordata).*—Bras.
cristata, Mart, ex Nees, 1. c. 419 - Dianthera nodosa.
denudata, *Nees, 1. c.* 428.—Perav.
diclipteroides, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 136.—Bras.
Enstachyana, *Benth. (f Hook. f. Gen.* ii 1111.—Ind. occ.
fimbriata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 416.—Mexic.
formosa, *Fenzl,in Jacq. Eclog.* ii. *in Ind. (JFusticia,* t 102).—Venezuela,
fragilis, *Mart, ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 140.—Bras.
fulgida, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 160-Clinacan thus Burmanni.
glandulosa, *Nees, in DC. Prod,* xi 414.-r-Bras.

BELOPBBONE:—
glomerata, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 187.—Bras,
hirsuta, *Nees, 1. c.* 143.—Bras,
involucrata, *Nees, I. c*—Bras.
Lamarckiana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 415.—Ind. occ.
lanceolata, *Mart, ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 1*1-—Bras.
longipetiolata, *Nees, I. c.* 137.—Bras,
macrantha, Amtf. 6* .//»*./. *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 616.—Mexic.
Mathewsiana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 781.—Peruv.
Meyeniana, *Nees, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *SuPPl-*i. (1843) 381.—Bras,
microstachya, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 137 .—Bras.
mollis, *Nees, I. c.* 142.—Bras,
monticola, *Nees, 1. c.*—Bras.
nemorosa, Nees, in DC. Prod. xi. 415-Adhatoda tetramera.
nodicaulis, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 140.—Bras,
oblongata, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1657.—Bras.
oblongata, Nees, in Wall. PI. As. Rai. iii. 102" plumbaginifolia.
obtusifolia, Nees, 1. c 839=ovata.
plumbaginifolia, JVV«,»» *Wall. PI. As. Rar.* iii. 102.—Bras,
portoricensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 414.—Porto Rico.
pulchella, Linden, Cat. n. 17 (1862) 2; ex Regel, Gartenfl. xiv. (1865) 289 = violacea.
Riedeliana, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1111.—Bras.
Rohrii, *Nees, in DC. Prod.* xi. 415.—Am. austr.
rosea, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1111.—Bras.
Schomburgkiana, *Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot-*iv. (1846) 636.—Guiana.
scorpioides, *Nees, in DC. Prod.* xi. 422.—Bras.
Selloviana, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 136.—Bras.
spathulata, *Nees, I. c.*—Bras,
sphaerosperma, *Benth. V Hook. f. Gen.* ih 1111.—Ind. occ.
strobilacea, Mart ex Nees, in DC. Prod, xi 368 *{=Amphiscopia strobilacea).*—Bras,
surinamensis, *Miq. Stirp. Sunh. Sel.* ISO.—Guiana,
trifoliata, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 141.—Bras.
villosa, Mart ex Nees, in DC. Prod. xi. 417 = hirsuta.
violacea, *Planch, b" Linden, Hort. Linden,* i. 5. t. *3.*—Mexic.

BELOPERONIDES, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1864) 162=Beloperone, Nees (Acaath.).
macrantha, Oerst L c.->Beloperone macrantha.

BELOSPIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 90 (1836)=8al*i»< Toum. (Labiat).
lenigata, Rafin. L c. 91=S. involucrata.

BELOSTEMMA, Wall, ex Wight, Contrib. Bot. Ind. *Or.* 52 (1834)=Tylophora, R. Br. (Asclepiad.).
hirsutum, Wall, ex Wight, 1. c.=T. Belostemma.

BELOSYNAPSIS, Hassk. in Flora, Uv. (1871) 269 = Cyanotls, D. Don (Commelin.).
kewensis, Hassk. 1. c—C. kewensu.

BELOTIA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 207. t 21 (1846)-*TIUACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. 238.
ADENODISCUS, Torcz. in Bull. Soc Nat Mosc. xix-(1846) II. 604.
Galleottii, *Turcz. I. c*—Mexic.
greviaefolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 209. t. 22.—Cuba,
insignis, *Baill. Adansonia, x.* (1872) 182.—Mexic.

BELOU, Adans. Fam. ii. 408 (1768)=Aegle, Correi (Rntac).

BELOVIA, Bunge, in Mém. Sav. Etr. P&ersb. vii. (1862) 462=Suaeda, Forsk. (Chenopod.).
baedfera, Moq. in DC. Prod, xiii II. 168 =S. setigera.
paradoxa, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1853) 462=S. setigera.

BELTOKON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 86 (1886)-Origanum, Toum. (Labiat.).
Tourneforti, Safin. 1. «.-O.Toumefortii.

BELUTTA, Rafin. Fl. TeUur. HL 89 (1880) = Alttnania, «• Br. (Amarant.).
*t***ncularis,* Rafin. 1. c = A. nodiflora.
'-alts, Rafin, 1. c.=. A. albida, pyramidalis.

&ELVALA, Adans. Fam. ii. 285 (176S)=Struthiola, "nn. (Thymel.).
sfaat, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 105=S. virgata?

BE^AUA, Delile, sec. Flora, xiii. (1880) H. 455 = Althenia, Petit (Naiad.).
[a]*>trati,,* Delile, L c.=A. filUbrmis.

BELVEDERE, d a y t ex Gronov. FL Virgin. 25 (1789) =• "•M*. Linn. (Diapens.).

BELVISIA, Desv. Jonm. Bot. iv. (1814) 130=N'apo-^ona, Beauv. (Myrtac).
[c]«*rulea,* Desv. 1. t - N . imperialis.

BEMfECODIUM. Lindl. Veg. Kingd. 712 (1847) = BEMBYCODIUM, Kunze = Athanasia, linn. (Compos.).

BEMBICIA, Oliyer, in Hook. Ic. PI. 1.1404. *SAMYDACEAE.*
»*illaris, *Oliver, I.* r.-Malaya.

BEM-BICIUM, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. •41 (1876)=Eupatorium, Toura. (Compos.).
facile, Mart, ex Baker, 1. c 848-E. kleinioides.

BEMBIX, Lour. Fl. Cochinch. 846 (1790). *MAWI-. <*HIACEAE* ?—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. i. 251.
«*tona, *Lour. I. c*—Cochinch.

HEMBYCODIUM, Kunze, in Iinnaea, xvi. (184S) 816 = Athanasia, linn. (Compos.).
"tnanasiae, Knnze, 1. c—Afr. anstr.

BEMSETIA, Rafin. Sylva Tellur. 12 (1888) = Ixora. Linn. (Rubiac).
*T**iculata,* Rafin. 1. c.=I. stricta.

BENAUREA, Rafin.FL Tellnr. ii. 77 (1886) =Musschia, Dum. (Campan.).
wmpervirens, Rafin. 1. c. 78=M. arnea.

BENCOMIA, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 10. t. 39 (1846). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 624.
caudata, *Weib V Berth. I. e.* 11.—Ins. Canar.
«oquiniana, *Webb V Berth. I. c*—Ins. Canar.

BENEDICTA, Bemh. Syst. Vert Erf. 108 (1800) = Carbenia, Adans. (Compos.).
*officinal***, Bemh. 1. c. 159=C. benedicta.

BENINCASA, Savi, in Bibl. Ital. ix. 158 (1818); (Mem. sopra Piant. Cucnrb. i. (1818) 6). *CUCURBITACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 824.
cerifera, *Savi, II. cc.*—As. et Afr. trop. (cult).
hispida, Cogn. in DC. Monog. Phan. Ui. 518=cerifera.

BENTZIA, Kant, in Iinnaea, xxviii. (1866) 420 = Synmo8iphon, Blume (Burman.).
[b]<*Ppigiana, *Karst. 1. c. 421.—Bras.
[s]*meolens, *Karst. 1. c. 420.—Venezuela.

BE?i[AMINA, Vdl *\- ^n™- 93 (M26); it t 189 = fMotyoloma, DC. (Simarab.).
**«<«, Veil. 1L cc.=D. incanescens.

BENJAMINIA, Mart, ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 255 (1847) = QUINQUELOBUS, Benj. (=TJtri-«uUrlai).
[eU]*r* Benj. in Linnaea, xx. (1847) 761-LimnophiU Griffithii
" W , Beiij. 1. c. (-O. *minor).-A**, trop.
*#*ndens, *Benj. 1. c (=)?. *splendent).*—As. trop.
[uiv]*j«riaeft>rmis. *Mart, ex Benj. in Mart FL Bras. x. ««(>=&. *utricularioides).—Bna.*

BENKARA, Adans. Fam. ii. 85 (1763) = Melastoma, Bnrm.
galia, Rafin. Sylva Tellnr. 98.—Hab. ?

BENNETIA, DC. Prod. vi. 581, in syn. (1887) = BENNETTIA, S. F. Gray = Bamnurea, DC. (Compos.).

BENNETIA, Rafin. in Ser. Boll. Bot i. (1880) 220-Sporobolus, R. Br. (Gramin.).
juneea, Rafin. 1. c.=S. juncens.

BENNETTIA, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 249. t. 50 (18S8) = G-alearia, Zoll. (Enphorb.).
affinis, R. Br. 1. c. 251 = G. affinis.
aristifera, Mnell. Arg. in DC. Prod. XT. H. 1089=G. aristifera.
filiformis, MnelL Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 204.—Ind. or.
Finlaysoniana, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 251 = G. Finlaysoni.
fulva, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 206 = G. fhlva.
Jackiana, R. Br. in Benn. PL Jav. Rar. 251=G. Jackiana.
javanica, R. Br. 1. c. 249=G. pedicellata.
Lindleyana, MuelL Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 206.—Ind. or.
pedicellata, R. Br.' in Benn. PL Jav. Rar. 261 «=G. pedicellata.
phlebocarpa, R. Br. 1. c. =G. phlebocarpa.
splendens, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 205=G. splendens.
subulata, Mnell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1089.—Ins. Penang.
Watlichii, R. Br. in Benn. PL Jav. Rar. 251=G. Wallichii.

BENNETTIA, S. F. Gray, Nat Arr. Brit PI. ii. 440 (1821)=Baussurett, DC. (Compos.).
alpina, S. F. Gray, 1. c =S. alpina.

BENNETTIA, Miq. Fl. Ind. Bat i. II. 108 (1859). *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 128.
Horsfieldii, *Miq. I. c*—Java.

BENTECA, Adans. Fam. ii. 166 (1763)= Ambelanla, Aubl. (Apocyn.).
odorata, Rafin. Sylva Tellur. 13=A. acida.

BENTEKA, Adans. Fam. ii. 525 (1768).—Cf. praec = Ambelanla, Aubl. (Apocyn.).
Rheedi, Roem. & Schnlt. Syst. iv. 706 =' Malabaria.'

BENTHAMIA, Lindl. Bot Reg. t 1579 (1888) = Cornus, Tourn.
fragifera, Lindl. 1. c.«C. capitata.
ya^mi»,Sieb.&Zncc FL Jap. i. 38. t. 16=C. Konsa.

BENTHAMIA, LindL Nat. Syst. ed. I. 241 (1880) = Amsinokia, Lehm. (1831) (Boragin.).
lycopsoides, Lindl. ex A. DC. Prod. x. 118=A. lycopsioides.

BENTHAMIA, A. Rich, in Mém. Soc Hist. Nat Par. iv. (1828) 87. t. 7=Habenaria, Willd. (Orchid.).
lati/olia, A. Rich. L c. 88-H. chlorantha.
spiralis, A. Rich. 1. c. 39=Spiranthes africana.

BENTHAMANTHA, Alef. in Bonplandia, x. (1862) 264 =Cracca, Benth. (Legnm.).
glabrescens, Alef. 1. c = C. glabrescens.
glandulifera, Alef. 1. c = C. glanduli&ra.
Grayi, Alef. 1. c = C. sericea.
mollis, Alef. I. c.=C. mollis.
ochroleuca, Alef. 1. c.=C. ochrolenca.

BENTHAMIDIA, Spach, Hist. Vég. Phan. viii. 106 (1839) = Cornus, Toum.
florida, Spach, 1. c 107 - C. florida.

BENTHAMEELLA, Speg. in Anal. Soc Cient Argent, xv. (1888) 109. *SOLANACEAB.*
patagonica, *Speg. 1. c.* 110.—Reg. Argent.

BENTHECA, Neck. Elem. ii. 64 (1790)-BENTECA, Adans. I=Ambelanla, Aubl. (Apocyn.).

BENTHEKA, Neck, ex A. DC. Prod. viii. 321, in syn. (1844) = Willughbeia, Roxb. (Apocyn.).

BEHTINCKIA, Berry, ex Roxb. [Hort. Beng. 68 (1814) et] Fl. Ind. iii. 621 (1832). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 916.
KEPPLERIA, Mart, ex Endl. Gen. 251 (1838).
ceramensis, Miq. in Verb. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 8 = Cyrtostachys ceramica.
ceramica, H. Wendl. in Kerch. Palm. 235=praec.
Condapanna, *Berry, ex Roxb. [Hort. Beng.* 68 *ef\ Fl. Ind.* Hi. 621.—Ind. or.
nicobarica, *Becc. in Ann. Jard. Buitenz.* ii. (1885) 165.—Ins. Nicob.
Renda, Mart Hist. Nat. Palm. iii. 316=Cyrtostachys Renda.

BENZOIN, Hayne, Araneigew. xi. t. 24 (1829) = Btyraz, Linn.
officinale, Hayne, 1. c. =S. Benzoin.

BENZOIN, Nees, in Wall. PL As. Rar. ii. 68 (1881)-Iiindera, Thunb. (Laurin.).
aestivale, Nees, Syst. Laurin. 495 -L. Benzoin.
citriodorum, Sieb. & Zncc. in. Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 206, 78 *(=Aperula dtriodora).*—Japon.
Diosprus, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 681 «=L. melissaefolia.
geniculatum, G. Don, in Sweet, I. c. = L. genicnlata.
glaucescens, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. 1.193 = Litsea glaucescens.
glaucum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 205 = L. glanca.
melissaefolium, Nees, Syst Laurin. 494 «=L. melissaefolia.
Needanum, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 63 = 1.. Neesiana.
odori/erum, Nees, 1. c.»L. Benzoin.
praecox, Sieb. *It.* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 205=L. praecox.
sericeum, Hook. f. & Thorns, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 246=L. heterophylla.
sericeum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 204=L. sericea.
Thttnbergii, Sieb. ft Zucc. l c . « L nmbellata.
trilobum, Sieb. & Zucc. 1. c. 202=L. triloba.

BENZOINA, Rafin. Sylva Tellur. 183 (1838)-8tyrax, Linn.
vera, Rafin. 1. c = S. Benzob.

BENZOXTIA, Schum. in Schum. ft Thonn. Beskr. Guin. PL 113 (1827). *RUBIACEAE* Benth. & Hook. f. ii. 29.
corymbosa, *Schum. 1. c.* 114.—Afr. trop.

BERARDIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat Ser. I. viii. (18S6) 380. t. 37 = Nebelia,Neck. (Bruniac).
affinis, Brongn. 1. c. 881=N. affinis.
affinis, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 820.—Afr. austr.
angulata, Sond. 1. c.—Afr. austr.
aspera, Sond. 1. c. 321.—Afr. austr.
Dregeana, Sond. 1. c.—Afr. austr.
fragarioides, Schlecht in Linnaea, vi. (1881) 190.—Afr. austr.
globosa, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 320.—Afr. austr.
laevis, E. Mey. ex Sond. 1. c. 819.—Afr. anstr.
microphylla, Sond. 1. c. 320.—Afr. austr.
paleacea, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 381-N. paleacea.
phylicoides, Brongn. 1. c«=N. phylicoides.
sphaerocephala, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 819.—Afr. austr.

BERARDIA, VilLProsp. 27(1778). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 474.
ARCTIO, Lam. Eneyc. I 285 (1788).
ARCTIUM, Lam. Fl. Fr. ii. 70 (1778).
VILARIA, Guett M6m. Mineral. Dauph. i. 108. ii. t. 19 (1779).
snbacanlis, *Vilt. 1. c.* 28.—Gallia.

KBRBEBTDOPBIS, Hook. f. Bot. Mag. t 6343 (1862). *BERBER1DEAE,* Benth. & Hook. f. 1. 964.
corallina, *Hooh.f. I.* c—Chili.

BERBERIS, [Tourn.] Linn. Gen. ed. I. 94 (1737).
BERBERIDEAE, tenth. & Hook. f. i. 43.
MAHONIA, Nutt. Gen. Am. i. 211 (1818).
ODOSTEMON, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1817) 192.
abortiva, Renault, Fl. Dép. Ome, 179=vulgaris.
acanthifolia, Wall, ex Walp. Rep. i. 103=nepalensis.
acida, Gilib. Exercit. i. 284=vulgaris.
actinacantha, *Mart, ex Sckult. f. Syst.* vii. 12.—Chili,
acutifolia, *Prantl, Ind. Sen. Wirceburg.* (1878) 7.—Hab.!
aethnensis, liourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 901 = vulgaris.
aetnensis, *Presl, Fl. Sic.* i. 28.—Core.; Sardin. j Sicil.
affinis, G. Don, Gen. Syst. i. 115=aristata.
afiicana, *Hebenstr. V Ludw. ex Schv.lt. f. Syst.vli.* 11.—Afr. austr.
agapatensis, *Leckl. Serb. Am. Austr.* 44.—Peruv.
altaica, Pall. Fl. Ross. ii. 41. t. 67 = sibirica.
amurensis, *Rupr. in Bull. Phys.-Math. Aead. Pltersb.* xv. (1857) 260.—Manchuria.
Andrieuxii, *Hook. V Am. in Bot. Beech. Voy.* 318, adnot.—Mexic.
angulosa, *Wall. Cat.* n. 1475.—Ind. or.
angustifolia, *Benth. PL Hart*.* 34, 270.—Mexic.
angustifolia, Roxb. Hort. Beng. [87]; Fl. Ind. ii. 183 -=B. Lycium.
apyrena, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 396=vulgaris.
Aquifolium, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 219. t. 4.—Am. bor.
arborescens, Hort. ex C. Koch, DcndroL i. 393 = vulgaris.
aristata, Sims, Bot. Mag. t. 2549 = umbellata.
aristata, *DC. Syst.* ii. 8.—Ind. or.
articulata, *Loisel. in Diet. Sc. Nat.* lxviii. 218.—Gallia.
asiatica, Griff. Ic. PI. Ind. Or. iv. t. 648 = Wallichiana.
asiatica, *Roxb. ex DC. Syst.* ii. 13.—Keg. Himal.
asperma, Ppit *Sc* Turp. in Duham. ed. Nov. iv. 12 = vulgaris.
atrovirens, Wall, ex G. Don, Gen. Syst. i. 117 = Wallichiana.
atroviridis, Steud. Norn. ed. II. i. 196 = Wallichiana.
aurahuacensis, *Lem. in Fl. des Serres*, Sér. I. iv. (1848) 334.—N. Granat.
aurea, Taasch, in Flora, xvii. (1834) 495 = vulgaris.
Bealei, *Fortune, in Gard. Chron.* (1850) 212.—Japon.
bidentata, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 11.—Chili.
Bigelovit, Schrad. in linnaea, xii. (1838) 862-vulgaris.
boliviana, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 21.—Bolivia.
brachybotrys, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1861) 29 = vulgaris.
brachybotrys, *C. Gay, Fl. Ckil.* i. 81.—Chili,
brachypoda, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxiii. (1877; 308.—China.
brevifolia, Hort. ex C. Koch, DendroL i. 398 = canadensis.
Bussmul, C. Kuch, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 253-aristaia.
buxifolia, *Lam. Jllustr.* t. 253. f. 3; *Pair. Encyc.* viii. 613.—Reg. Magell.
calliobotrys, Bienert, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc xix. (1882) 151 = vulgaris.
canadensis, Guimp. Abbild. Fremd. Hoi*. 79. t 63 = Guimpeli.
canadensis, Hayne, ex Steud. Norn. cd. II. i. 196 = spathulata.
canadensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=vulgaris.
canadensis, *Pursh, Fl. Am. Sept.* 219.—Am. bor.
caraganaefolia, Banks, ex DC. Syst. ii. 18 = Caragana Chamlagu.
carinata, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 41.—Peruv.
caroliniana, Sweet, Hort. Brit. cd. III. 19 = canadensis.
cerasina, *Schrad. in Linnaea*, xii. (1838) 379.—Am. bor.
ceratophylla, G. Don, Gen. Syst. i. 115=aristata.
chilensis, *GUI. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 135.—Chili

BERBERIS:—
chinensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 403=Guimpeli.
chinensis, Poir. Encyc. viii. 617=sinensis.
Chitria, D. Don, Prod. FI. Nep. 204=aristata.
Chococa, *Schlecht. in Bot. Zeit.* xii. (1854) 652.—Mexic.
ciliaris, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* v. (1850) 5, in adnot.—Bolivia.
coccinea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 406 = aristata.
coletioides, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 38.—Chili,
oncinna, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 4744.—Reg. Himal.
conferta, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 69. t. **480.**—Ecuador.
congestiflora, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 75. t. 3.—Chili.
consanguinea, *Fortune, in Jour.i. Hort.Soc.* vii. (1852) 226.—China.
coriacea, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 46.—Bras.
coriaria, Royle, ex lindl. Bot. Reg. xxvii (1841) t. 46—aristata.
corymbosa, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 135.—Ins. Juan. Fernand.
crataegina, DC. Syst. ii. 9=vulgaris.
crenulata, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 362 = vulgaris.
cretica, Falk, Beitr. ii. 164 = sibirica.
cretica. Linn. Sp. PI. 331 = vulgaris.
cretica, Thunb. Fl. Jap. 146 = sinensit.
cretica, Viv. Fl. Core. 5 = aetnensis.
crispa, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 86.—Chili,
cuneata, *DC. Syst.* ii. 16.—Am. austr.
cuneata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 415=empetrifolia.
Darwinii, *Hook. Ic. PI.* t. 672.—Chili,
dasystachya, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxiii. (1877) 308.—China.
daurica, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 189.—Davuria.
dealbata, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1750.—Mexic.
declinata, *Schrad. in Linnaea*, xii. (1838) 368.—China?
densa, Planch. *Sc* Linden, ex Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 54 =rigidifolia.
densiflora, Boiss. *Sc* Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 9= vulgaris.
densiflora, *Rafin. Sylva Tellur.* 68.—Hab. ?
dentata, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 729 = vulgaris.
diaphana, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxiii. (1877) 309.—China.
diffusa, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 80.—Chili,
discolor, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 287.—Venezuela.
discolor, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 197 =rigidifolia.
diversifolia, *Steud. I. c*—Reg. Argent
dulcis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 895=vulgaris.
dulcis, Sweet, Brit. Flbw. Gard. Ser. I. ii. t 100 = buxifolia.
dumetorum, Gouan, Fl. Monsp. 312 = vulgaris.
edulis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 896 = vulgaris.
Ehrenbergii, *Kunie, in Linnaea*, xx. (1847) 45.—Mexic.
elegans, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 409 = aristata.
emarginata, Willd. Emira. Hort. Berol. 395=vulgaris.
empetrifolia, *Lam. Illustr.* t. 253. f. 4.—Reg. Magellan.
fascicularis, Sims, Bot. Mag. t. 2396 = pinnata.
fasdculata, Schult. f. Syst. vii. 17= pinnata.
Fendleri, *A. Gray, PL Fendl.* 6.—Am. bor: occ
ferox, *C. Gay. Fl. Chil.* i. 80.—Chili,
ferruginea, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 9.—Bolivia.
Fischeri, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 399 = canadensis.
flexuosa, *Ruiz & Pav. FL Per.* iii. 62. t. 281. f. A.—Peruv.
floribunda, Wall. Cat n. 1474; et G. Don, Gen. Syst. i. 116 = aristata.
floribunda, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1869) 612 = B. Aquifolium.
florida, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-66) 6.—Chili.
Fortunei, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* i. (1846) 231, 300.—China.
fraxinifolia, *Hook. Ic. PL* t. 329.—Mexic.
Fremontii, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 30.—Am. bor. occ
glauca, Benth. PI. Hartw. 125. n. 710-Jamesoni.
glauca, *DC. Syst.* ii. 10; *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 71.—N. Granat.

BERBERIS:—
glauca, Hort. ex C. Koch, DendroL i. 399 = canadensis.
glaucescens, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 46.—Bras.
globosa, *Benth. PI. Hartw.* 158.—N. Granat.
glomerata, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 5.—Chili.
glumacea, Spring. Syst. ii. 120=nervosa.
Goudotii, *Triana* &" *Planch, in Ann. Sc. Nat.* *»« IV. xvii. (1862) 52.—N. Granat.
gracilis, Hort. ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 12-aristata.
gracilis, *Hartw. ex Benth. PI. Hartw.* 84. n. 271.—Mexic
gracillima, C. Koch, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugo-Bat i. 2SS=aristata.
grandiflora, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* »ᵛ»-• (1854) II. 287.—Ecuador.
gratissima, *Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem.* £**> 130.—Himal.
Grevilleana, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 136.-Chili.
Grisebachil, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 34.—Chili.
Guilache, *Triana & Planch. inAnn.Sc. Nat.Stt.Vl-*xvii (1862) 64.—N. Granat.
Guimpeli, *C. Koch & Bouchi, in App. Ind. Hort-Berol.* (1854) 13.—Am. bor.
Haenkeana, *Presl, ex Schult. f. Syst.* vii. 1616--Chili.
Hartwegi, *Benth. PI. Hartw.* 34. n. 272.—Mexic.
heterophylla, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 895= vulgaris.
heterophylla, *Juss. in Poir. Encyc.* viii. 622.—R«6-**Magellan.**
heteropoda, Schrenk, Enum. PI. Nov. 102 = vulgaris.
hispanica, Boiss. *Sc* Reut. Pugill. PI. Nov. (1862) *i"* vulgaris.
Hookeri, Hort. ex Lem. Illustr. Hortic. vi. (1859) t. 207 = Wallichiana.
horrida, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 84.—Chili.
korrida, Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêri. Indie, ii. (1846) 42 = Wallichiana.
hypoleuca, Lindl. in Joum. Hort. Soc. ii. (1847) 246 = asiatica.
iberica, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.18= vulgaris.
ilicifolia, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 197 »g»⁰, merata, stipulacea.
ilicifolia, Booth, ex Steud. 1. c.=vulgaris.
ilicifolia, *Forst. in Comm. Gott.* ix. (1789) 28.—Reg-Magellan.
ilicifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 402 = aetnensis.
ilicifolia, Roxb. in As. Res. vi. (1799) 367=asiatica.
ilicifolia, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 6M-trifoliolata.
ilicina, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 23.—Mexic.
inermis, *Pers. Syn.* i. 887.—Reg. Magell.
innominata, Kielm. Dec. Rar. PI. Tueb. 18=vulgaris.
insighis, *Hook. f. V Thorns. Fl. Ind. i.* 226.—R*«-Himal.
integerrima, Bunge, in Linnaea, xviii. (1844) *U9"* vulgaris.
integerrima, Hort. ex C. Koch, Dendrol. L 899* canadensis.
intermedia, Hort. ex C. Koch, 1. c. 404 = Guimpeli.
intermedia,Hoit. Angl.—Cf. Gard. Chron. (1869) 6» =nepalensis.
irritabilis, Salisb. Prod. 213-vulgaris.
Jacquini, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 394-vnl-garis.
Jamesoni, *Tires, in Butt. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (185*) II. 286.—Ecuador.
Jamesonii, *Lindl. in Joum. Hort. Soc.* v. **(1860)** «5 *Lem. Illustr. Hortic.* vi. (1859) t. 201.—Ecuador,
japonica, *R. Br. in Tuckey, Congo Exped. App.* 22." Japon.
japonica, Lindl. ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard. >• (1850-61) lloBealii.
kasgarica, *Rupr. Sert. Tiansch.* 38.—As. temp.
Klotzschiana, *Warcz. in Otto V Dietr. Allg. Garten*-*xx. (1852) 292, nomen.—Bolivia.
kunawurensis, Royle, IUuftr. Bot. Himal. 64sval-garis.
Knightii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 413-Beale'-
Lagenaria, Poir. Encyc. viii. 819 = ilicifolia.
lanceolata, *Benth. PL Hartw.* 34.—Mexic
latifolia, *Ruis V Pav. Fl. Per.* iii. 52. t. 282.—Peruv.
laurina, *Thunb. PI. Bras.* i. 8.—Bras.

BERBERIS;—
laxa, *Rafin, Sylva Tellur.* 68.—Hab.!
laxiflara, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 367 = vulgaris.
Leschenaultiana, Wall. Cat. n. 1479-nepalensis.
Ligonii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. li. 411-conanna.
Imearifolia, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1866) 668.—Chili.
jijtoralis, *Phil. Ft. Atac.* 7.—Chili,
jittoralis, *Rupr. Fl Cauc.* 49, in textu.—Reg. Cancas.
Joxensis, *Benth. PI. Hartw.* 125.—Peniv.
Jidda, *Schrad. in Linnaea*, xii. (1888) 363.—Iberia,
intea, *Ruiz V Pav. Fl. Per.* iii. 51. t. 280.—Ecuador.
hdum, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 393=vulgari..
Lycrom, *Style, Illustr. Bot. Himal.* 64.—Reg. Himal.
"uuracantha, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 400 = canadensis.
"acracantha, Schrad. in Linnaea, xii. (1888) 366 = vulgaris.
macrocarpa, Schrad. 1. c. 870-canadensis.
mcrophylla, Hort. ex Lindl. in Joum. Hort. Soc. v. (1850)4 = Wallichiana.
**crophyiia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 408 = asiatica.
macrosepala, *Hook./, (f Thorns. Fl. Jnd. i.* 228.—Reg. Himal.
wcntkeca, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 400-canadensis.
nwderensis, *Lowe, in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) "89.—Ins. Madera.
gellanica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 414 = nealei.
marginata, *C. Gay, Fl. Chil.*!. 88.—Chili.
norginata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 394=vulgans.
**imm,icri*, Regel, Gartenfl. (1872) 238 = vulgaris.
ttelanocarpa, *Schau. Jahrb. Ges. Vat. Cult,* xxviii. 180.—Am. bor.
Mucia, Bnch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 205 = nepalensis.
"ncrocarpa, *Warn, in Otto &• Dietr. Allg. Gartens.* x. (1852) 292.—Bolivia.
"tcrophylla, F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn. ii. 184 - vulgaris.
buxifolia, Forst. in Comm. Gott. ix. (1789) 29 = *nicrophyli'a*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 399=canadensis.
nipor, Forst, ex DC. Syst. ii. 15=buxifolia.
nitis, Schrad. in Linnaea, xii. (1888) 871=vnlgaris.
osperma, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 405 = sinensis.
monosperma, *Ruiz V Pav.fl. Per.* iii. 52.—Peruv.
ntana, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 90.—Chili.
moranensis, *Schult. f. Syst.* vii. 17.—Mexic.
multiflora, *Benth. PI. Hartw.* 124.—Peruv.
•"utabilis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 665.—Chili.
"eglecta, *Hort. ex Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **vii. U854) II. 284.—Hab. J
"epalensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 893 = vnlgaris.
Palensis, *Spreng. Syst.* ii. 120.—Reg. Himal.
nervosa, *Pursh, Fl. Am. Sept.* 219. t. 5.—Am. bor. occ.
Neuberti x, Hort ex Lem. Illustr. Hortic. i. (1854) Misc. 111. t. c.
gra, *Rafin. Sylva Tellur.* 67.—Am. bor.
"ttens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 399=canadensis.
"{tens, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 382=vulgaris.
nitida, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 197=quinduensU.
Wummularia, Bunge, in linnaea, xviii. (1844) 149- u gnis.
obovata, Schrad. 1. c. xii. (1838) 385-vulgaris.*
OMhobotrys, *Bienert, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc.* «x. (1882) 150.—Persia.
Pallida, *Hartw. ex Benth. PI. Hartw.* 34.—Mexic.
Paniculata, H. B. & K. ex DC. Syst. ii. 10=glauca,
Paniculate, *fuss, ex DC. I. c.* 12.—Peruv.
Paniculata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 24.— Costa-Rica.
Paniculata, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 664.—Chili.

BERBERIS:—
parviflora, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* ii. (1847) 243.—Am. anstr.
pauciflora, Salisb. Prod. 218=vulgaris.
Pearcei, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 4.—Chili.
petiolaris, Wall, ex G. Don, Gen. Syst. i. 116 = aristnta.
pichinchensis, *Tung, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 286.—Ecuador,
pichinchensis, *Wedd. Chlor. And.* ii. 296 (=praec. ?).—Ecuador.
pinnata, Banks, ex DC. Syst. ii. 20=B. Aquifolium.
pinnata, Buch, ex DC. 1. c. 21 = nervosa.
pinnata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 484 = moranensis.
pinnata, *Lag. Elenck. Hort. Madr.* (1803) 6.— Mexic.
pinnata, Roxb. Fl. Ind. ii. 184=nepalensis.
pisifera, Rafin. Sylva Tellur. 68 = canadensis.
polymorpha, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1856) 664.—Chili,
polypetala, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 666.—Chili.
provincialis, Audib. ex Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 881=vulgaris.
psilopoda, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 285.—N. Granat.
purpnrea, *Rafin. Sylva Tellur.* 67.—Hab. ?
quinduensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 70. 1432.—Ecuador.
racemosa, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 296 = vulgaris.
rariflora, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 88.—Bolivia.
repens, Lindl. Bot. Reg. 1.1176 = B. Aquifolium.
reticulata, *Steud. Nom.* ed. II. i. 197.—Chili,
retinervis, *Triana b" Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. *xvii. (1862) 52.—N. Granat.
revoluta, Sm. ex DC. Syst. ii. 16 = empetrifolia.
rigida, WUld. ex Steud. Nom. ed. II. i. 197 = conferta.
rigidifolia, *H. B. V K. Nov. Gen, et Sp.* v. 70. t. 431.—Am. austr.
Roemeriana, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 852-trifoliata.
rotundifolia, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 68.— Chili.
rotundifolia, Hort. ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. v. (1850)2 = buxifolia.
rubra, Poit & Turp. in Duham. ed. Nov. iv. 12 = vulgaris*
ruscifolia, *Lam. Illustr.* t. 253. f. 2.—Reg. Argent.
sanguinea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 394 = vulgaris.
sanguinolenta, Hort. ex C. Koch, 1. c—vulgaris.
sanguinolenta, *Schrad. in Linnaea*, xii. (1838) 378.—Hab.!
saxicola, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 42.—Peruv.
Schiedeana, *Schlecht. in Bot. Zeit.* xii. (1854) 654.—Mexic.
serotina, *Lange, Ind. Sem. Haun.* (1872) 5, adnot—Hab.?
serratifoliay Hort. ex C. Koch, Dendiol. i. 406 = aristata.
serrato-dentata, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 16.—Chili.
serrulata, Rafin. Sylva Tellur. 68=canadensis.
sibirica, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 2 = vulgaris.
sibirica, *Pall. Fl. Ross*, it 42. t 67.—Sibir. altaic.
sicula, Jan, Elench. ex Schult. f. Syst. vii. 3 = aetnensis.
Sieboldii, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 61).— Japon.
sinensis, *Desf. Tabl.* ed. I. (1804) 150.—China.
sinensis, DC. Syst. ii. 6 =. Guitnpeli.
spathulata, *Schrad. in Linnaea*, xii. (1838) 376.—Am. bor.
sphaerocarpa, Kar. & Kir. in Bull. Soc. N.it. Mosc. (1841) 876-vulgaris.
spinosa, Comm. ex Decne. in Bot. Voy. Astral. & Zel. 65-buxifolia.
spinulosa, *St. Hit. Fl. Bras. Mer.* i. 45.—Bras,
stenophylla, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 257.—China.
*stenophylla**, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1864) 460; (1869)11. 612; (1882) II. 466; C. Koch, Dendrol. i. 412-Darwinii.
stipulacea, *Steud. Nom.* ed. II. i. 197.—Chili.

BEBBERIS:—
sulcata, *C. Koch V Bouchi, in App. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1864) 18.—Hab. ?
Swaseyi, *Buckley, in Young, Fl. Texas.* 162.— Texas.
tenuifolia, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 64.—Mexic.
Thunbergii, DC. Syst. ii. 9 = vulgaris.
tinctoria, Leschen. in Mém. Mus. Par. ix. (1822) 806 = aristata.
toluacensis,/forf.—*Cf. Gard. Chron.* (1868) 435.—Am. austr.
toltmensis, *Planch. & Linden, ex Triana if Planch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvii. (1862) 52.—N. Granat.
tomentosa, *Ruim V Pav. Fl. Per.* iii. 52. t. 282 b.—Chili.
tortuosa, Domb,. ex DC. Syst. ii. ll = flexuosa.
tragacanthoides, *DC. Syst.* ii. 18.—Armenia.
tricuspidata, Sm. ex DC. 1. c. 17=heterophylla.
trifolia, *Schult. f. Syst.* vii. 1616.—Mexic.
trifoliata, Hartw. ex Lindl. Bot. Reg. xxvii. (1841) Misc. 68 = seq.
trifoliolata, *Moric. PI. Nouv. Am.* 113. t. 69.—Texas,
trifurca, *Lindl. in Paxt. Flow. Gard.* iii. 57 (18S2-53).—China,
trigona, *Kunze, in Poepp. tf Endl. Nov. Gen. ct Sp.* ii. 63. t. 187.—Chili,
truxillensis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 266.—Venezuela.
Tschonoskyana, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 421.—Japon.
turcomannica, Kar. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 79 = vulgaris.
ulicina, *Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i.* 227.—Tibet. occ.
umbellata, Lindl. Bot. Reg. xxx. (1844) t. 44 - aristata.
umbellata, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 663.— Chili,
umbellata, *Wall. Cat.* n. 1475; *et ex G. Don, Gen. Syst.* i. 116.—Reg. Himal.
undulata, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 408 = asiatica.
undulata, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* v. (.1850) 7.— Peruv.
valdiviana, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1856) 609.—Chili,
verticillata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. MOST,* xxvii. (1854) H. 288.—N. Granat
violacea, Poit. *Sc* Turp. in Duham, ed. Nov. iv. 12; Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 394 = vnlgaris.
virgata, Hort. ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 6=parviflora.
virgata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 413 = actinacantha.
virgata, ***Suit** V Pav. Fl. Per.* iii. 51. t 281. f. B.—Pcruv.
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 380.—Europ.; As. temp.
vulgaris, Veil. Fl. Flum. iii. t. 149 = glaucescens.
Wallichiana, *DC. Prod.* i. 107.—Reg. Himal.
Weddelli, *Lechl. Berb. Am. Austr.* 21.—Bolivia.
xanthoxyton, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 180 = Wallichiana I

BERCHEMIA, Neck. Elem. ii. 122 (1790). *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. i. 377.
OENOPLEA, Hedw. f. Gen. i. 151 (1806).
OENOPLIA, Schult. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 332 (1819).
amnis, *Hassk. Hort. Bog. Desc.* 117.—Malaya.
Burmanniana, *DC. Prod.* ii. 23.—Zeylan.
calophylla, G. Don, Gen. Syst. ii. 28 = Zizyphus calophylla.
congesta, S. Moore, in Journ. Bot xiii. (1875) 2H6- Michrorhamnus franguloides.
corollata, F. Muell. Census, 60=ecorollata.
discolor, *Hemsl. in Oliver, Fl. Trap. Afr.* i. 381.—Afr. trap.
Edgeworthii, *Lawson, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. i.* 638.—Reg. Himal.
ecorollata, *F. Muell. Fragm.* ix. 141.— Austral,
flavescens, *Wall. Cat.* n. 4255; *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sir. I. x. (1827) 357.—Reg. Himal.
floribnnda, *Wall. Cat.* n. 425d; *Brongn. I- c*—Reg. Himal.
Fonrnieri, *Punch,* b* *Sebert, Not Boil. Nuuv. Calid.* 236.—N. Calcd.

BERCHEMIA:—
hamosa. Wall. Cat. n. 4253=Sageretia hamosa.
laxa, Wall. 1. c. n. 4257 = floribunda.
lineata, Benth. in Hook. Kew Joura. iv. (1852) 42 = racemosa.
lineata, *DC. Prod.* ii. 28.—China.
Loureiriana, *DC. I. c.*—China.
oppositifolia, Wall. Cat. n. 4254 = Sageretia oppositifolia.
parvijtora, WalL 1. c. n. 4258 ; Wight, Ic.i. 19 = Sageretia oppositifolia.
Poiretiana, DC. Prod. ii. 28=lineata.
polyphylla. *Wall. Cat.* n. 4258.—Burma.
pubiflora, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 645.—Malaya.
racemosa, *Sieb. tf Zucc. in Abh. Atad. Muench.* iv. II. (1843) 147.—Japon.
repanda, *Rafin. Sylva Tellur.* 88.—Hab. ?
sessiliflora, *Benth. Fl. Hongk.* 68.—China.
trichantha, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 831.—Malaya.
undulata, *Rafin. Sylva Tellur.* 83.—Hab. 1
volubilis, *DC. Prod.* ii. 23.—Am. tor.

BERCHTOLDIA, Presl, Rel. Haenk. 328. t. 43 (1830) "Chaetium, Nees (Gramin.).
bromoides., Presl, 1. c 824 = C. bromoides.
holciformis, Fourn. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 46 = Oplismenus holciformis.
junciformis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 501, lapsu=Oplismenus holciformis.
oplismenoides, Fonra. ex Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 46 - Echinochloae sp.!

BERCKHEYA, Pen. Syn. ii. 480 (1807) = Berkheya, Ehrh. (Compos.).

BEREBERA, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 131 (1871), sphalm = BERREBERA, Hochst-Millottla, Wight & Am. (Legumin.).

BERENDTIA, A Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868)379. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 942.
Conlteri, *A. Cray, I. c.* 380.—Mexic.
Ghiesbrechtii, A. Gray, 1. c.-rugosa.
rngosa, *A. Gray, I. c.*—Mexic.

BERENICE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 89 (1866) = Allimn, Linn. (Liliac).
Victorious, Salisb. 490 = A. Victorialis.

BERENICE, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1867) 156. *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 646.
arguta, *Tul. I. c.*—Ins. Borbon.

BERGEN A, Adans. Fam. ii. 845 (1763) =Lecythis, Linn. (Myrtac).

BERGENIA, Moench, Meth. 664 (1794) = Saxiffago, Toarn.
biflora, Moench, 1. c. = S. crassifolia.
cordifolia, Sterab. Rev. Sax. Suppl. ii. 2=S. crassifolia.
purpurascens, Engl. in Verh. Zool. Bot Ges. Wien, xix. (1869) 549=S. purpurascens.

BERGENIA, Neck. Elem. ii. 108 (1790) =Lythrum, Linn.

BERGENIA. Rafin. Sylva Tellur. 102 (1838) - Cuphea, P. Br. (Lythrar.).
siphilitica, Rafin. 1. c.—Hab.?

BERGERA, Koen. ex Linn. Mant iL 563 (1771) =Mur. raya, Linn. (Rutac).
compressa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 860.—Ins. Philipp.
inodmra, Blanco, 1. c. 361.—Ins. Philipp.
integerrima, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 32; Fl. Ind. ii. 876 = Micromelum pubescens.
intermedia, Zoll. & Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 24.—Java.
Koenigii, Linn. Mant. 565 = Murraya Koenigii.
nitida, Thw. Enum. PI. Zeyl. 46 = Clausena indica.
ternata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 860= Glycosmis bilocularis.
villosa. Wall. Cat n. 6372 = Micromelnm pubescens.
Wallichii, A. DC. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc v. Suppl. U. (1861) 85 = Clausena Wallichii.

BERGERETIA, Desv. Journ. Bot. iiL (1818) 161 = Clypeola, Linn. (Crudf.).
echinata, Desv. 1. c - C . lasiocarpa.

BERGERIA, Koen. ex Steud. Norn. ed. II. i. 849, in syn. (1840) = Koenigia, Linn. (Polygon.).

BERGERONIA, Micheli, in Mém. Soc. Phys. Genèv. xxviii. (1883) n. 7 (Contr. Fl. Parag. 38). *LEGUMINOSAE.*
sericea, *Micheli, II. cc.* 89.—Paraguay.

BERGHAUSIA, Endl. Gen. Snppl. iii. 57 (1843) = Garnotia, Brongn. (Gramin.).
barbulata, Endl. ex Miq. Anal. Bot. Ind. 32.—Malaya.
courtallensis, Nees, ex Miq. 1. c = G. conrtallensis.
elata, Arn. ex Miq. 1. c.—Malaya.
Emodi, Endl. ex Miq. 1. c.—Malaya.
mutica, Munro, in Proc. Am. Acad. iv. (1864) 862.—Hongkong.
pollens. Am. ex Miq. Anal. Bot. Ind. 38.
patula, Munro, in Proc. Am. Acad.iv. (1864) 862 = G. patula.
tenella, Arn. ex Miq. Anal. Bot. Ind. 34.—Malaya.

BERGHESIA, Nees, in Linnaea, xx. (1847) 701. *RVBIACEAE\,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 29.
coccinea, *Nees, I. c.* 702.—Mexic.

BERGHIAS, Juss. in M6n. Mus. Par. vi. (1820) 899 = BERGKIAS, Sonn. = Gardenia, Ellis (Rubiac.).

BERGIA, Linn. Mant. ii. 152. n. 1309 (1771). *ELA TINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 163.
BERGIERIA, Neck. Elem. ii. 287 (1790).
LANCRETIA, Del. Fl. Egypte, 218. t. 26. f. 1 (1818).
MERIMEA, Cambess. in St. Hil. FL Bras. Mer. ii. 160. t 107 (1829).
SPHONDYLOCOCCA, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. •vi. p. lxx. 799(1820).
abyssinica, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.* 49.—Abyss,
aestivosa, *Steud. Norn.* ed. II. i. 198.—Ind. bor. occ.
ammannioides, *Roxb. Hort. Beng.* 34 ; *Fl. Ind.* ii. 456.—As. Afr. et Austral, trop.
anagalloides, *Walp. Rep.* ii. 286.—Afr. austr.
aquatica, Roxb. PI. Corom. ii. 22. t. 142=verticillata.
arenaroides, *Fentl, in Denkschr. Baier. Bot. Ges.* iii. (1841) 183.—Bras.
capensis, *Linn. Mant.* 241.—Afr. austr.
decumbens, *Planck, ex Ham. Thes. Cap.* L 15. t 24.—Afr. austr.
erecta, *Guill. (3! Perr. Tent. Fl. Seneg.* 44.—Afr. trop.
glandnlosa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 871.—Ins. Luzon,
glomerata, *Linn./. Suppl.* 248.—Afr. austr.
odorata, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* vii. (1838) 765.—Afr. trop.; Persia; Ind. bor. occ.
oryzetorum, *Fentl, ex Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 62.—Malaya.
pedicellaris, *F. Muell. Fragm.* ii. 145.—Austral.
pentandra, Cambess. ex Guill. *Sc* Perr. Tent. Fl. Seneg. 42. t. 12-amroanoides.
peploides, *Guill. V Perr. 1. c.* 44.—Afr. trop.
perennis, *F. Muell. Fragm.* ii 146.—Austral
polyantha, *Sond. in Linnaea,* xziii. (1850) 16.—Afr. austr.
pusilla, *Benth. Fl. Austral,* i. 180.—Austral,
repens, *Blume, Bijdr.* 62.—Java,
serrata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 387.—Ins. Philipp.
sessiliflora, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 40.—Cuba.
suffruticosa, Fenzl, in Denkschr. Baier. Bot Ges. iii. (1841) 183=odorata.
texana, *Seub. ex Walp. Rep.* i. 285.—Texas.
trimera, Fisch. *Sc* Mey. in Linnaea, x. (1886) 74 = ammannioides.
tripetala, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet,* it (1858) 66.—Austral.
vertidllata, Willd. Sp. PI. ii. 770-capensis.

BERGIERA, Neck. Elem. ii. 237 (1790)=praec.

BERGINIA, Harv. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1096 (1876). *ACANTHACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c.
virgata, *Harv. ex Benth. (f Hook. f. I. c.* 1097.—Calit

BERGKIAS, Sonner. Voy. 48.1.17 (1776)=Gardenia, Ellis (Rubiac).

BERGSMIA, Blame, Rumphia, iv. 23. t. 178 C. f. 2 (1848). *BIXINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. L 129.
acuminata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 889.—Sumatra,
javanica, *Blume, Rumphia,* iv. 23.—Java,
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 889.—Sumatra.

BERHARDIA, C. Muell. in Walp. Ann. v. 39 (1845), sphalm. = Berardia, Vill. (Compos.).

BERIESA, Steud. Nom. ed. II. i. 199 (1840)=SIEBERA, Presl=Anredera, Juss. (Chenop.).
baselloides, Steud. 1. c.=A. spicata.

BERINGERIA, Neck. Elem. i. 812 (1790)-Ballota, Linn. (Labiat.).
acetabulosa, Neck. 1. c. = Ballota acetabulosa.
africana, Neck. 1. c. = Ballota africana.
cinerea, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 646' Ballota hicsuta.
crispa, G. Don, 1. c-Ballota africana.
frutescens, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 825 = Ballot* spinosa.
hirsuta, Neck. Elem. 312-Ballota hirsuta.
hispanica. Neck. 1. c. = BalloU hispanica.
mollissima, Heynh. Nom. iL 66 = Ballota mollissima.
orientalis, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 648--Ballota orientalis (sp. dubia).
pseudodictamnus, Neck. Elem. i. 312; Link, Handb. 478 = Ballota pseudodictamnus.
rugosa, Heynb. Nom. ii. 66-Ballota saxatilis.

BERINIA, Brignol. PI. Forojnl. 50 (1810) - Crepis, Vaill. (Compos.).
abyssinica, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 81$ = C. abyssinica.
acuminata, Sch. Bip. 1. c.=C. acuminata.
alpestris, Sch. Bip. 1. c.=C. alpestris.
andryaloides, Brignol. PI. forojnl. 50=C. chondrilloides.
aurea, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 318-C. aurea.
ouriculaefolia, Sch. Bip. 1. c. 315=C. auriculaefolia-
biennis, Sch. Bip. 1. c. 818=C. biennis.
chondrilloides, Sieb. ex Sch. Bip. 1. c 815 = C. chondriUoides.
chrysantha, Sch. Bip. 1. c 318 = C. chrysantha.
ciliata, Sch. Bip. 1. c. 817 = C. ciliata.
crocea, Sch. Bip. 1. c.=C. crocea.
foetida, Sch. Bip. 1. c. 815 - C . foetida.
grandifiora, Sch. Bip. 1. c. 817 = C. grandiflora.
heterantha, Sch. Bip. 1. c. = Lactuca Dubyaea.
heterotricha, Sch. Bip. 1. c = C. heterotricha.
Jacquinii, Sch. Bip.l. c. 318 = C. Froelichiit
jubata, Sch. Bip. 1. c.=C. jubata.
lacera, Sch. Bip. 1. c. 315 = C. lacera.
nicaednsis, Sch. Bip 1. c. 318 - C . nicaeensis.
occidentalis, Sch. Bip. L c. 315 = C. occidentalis.
oporinioides, Sch. Bip. 1. c. = C. oporinioides.
pannonica, Sch. Bip. 1. c = C. rigida.
pinnatifida, Sch. Bip. 1. c. = C. pinnatifida.
polytricha, Sch. Bip. 1. c. 317 = C. polytricha.
runcinata, Sch. Bip. 1. c. 315=C. runcinata.
Sibthorpiana, Sch. Bip. 1. c.=C. Sibthorpiana.
stricta, Sch. Bip. 1. c. 317 = C. virens? vcl tectorum.
tenuifolia, Sch. Bip. 1. c. 316 = C. tenuifolia.

BERKHEYA, Ehrh. Beitr. iii. 187 (1788). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iL 460.
AGBIPHYLLUM, JUSS. Gen. 190 (1789).
APULEIA, Gaertn. Fruct. ii. 439. t. 171 (1791).
ARELINA, Neck. Elem. i. 83 (1790).
ASPIDALIS, Gaertn. Fruct. ii. 1171 (1791).
BASTERIA, Houtt. Nat. Hist. PI. iv. 168 (1776).
BASTERA, J. F. Gmel. Syst. 1271 (1791).
BERCKHEYA, Schreb. Gen. ii. 677 (1791).
CROCODILOIDES, Adans. Fam. ii. 127 (1763).
COSPIDIA, Gaertn. Fruct. ii. 454.1.171 (1791).
EVOPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. *{Fivr.* 1818) 32 ; et in Diet. Sc Nat. xvi. 65 (1820).
GORTERIA, Linn. Sp. PL ed. II. 1282 (1768), P'0 parte ; Lam; Illustr. t. 702 (1789 ?).
HETERORACHis, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 775-
ROHRIA, Vahl, in Skr. Naturh.-Selsk. Kjoeb. iii-(1798) 97.
STOBAEA, Thunb. Prod. PI. Cap. 141 (1800).
ZARABELLIA, Neck. Elem. i. 10 (1790).

BERKHEYA:—

albida, Lichtst. ex DC. Prod. vii. 86-Dicoma capensis.
annectens, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 509.—Afr. austr.
bisulca, Pers. Syn. ii. 480=Cullumia bisulca.
CM>ecens, *DC. Prod.* vi. 607.—Afr. austr.
<arduiformis, *DC. I. c*—Afr. anstr.
earlinoides, *Willd. Sp. PI.* iii. 2275.—Afr. austr.
ttrthamoides, *Willd. I. c.* 2274.—Afr. austr.
cernua, R. Br. in Ait. Hott. Kew. ed. II. v. 139= Didelta cerooa.
aliaris, Willd. Sp. PI. iii. 2278 = CullumU dliaris.
wwiacea, *Harv. in Hare. V Sond. Fl. Cap.* Hi. 608.—Afr. austr.
awjmbosa, *DC. Prod.* vi. 507.—Afr. austr.
cruaata, *Willd. Sp. PI.* 2276.—Afr. austr.
cuneata, *Willd. I. e.* 2270.—Afr. austr.
eynaroides, *Willd. I. c.* 2275.—Afr. austr.
lecumns, Willd. 1. c. 2276=Stephanocoma berkheyoides.
Dregei, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* iii. 507.—Afr. austr.
Ecklonis, *jjarv. I. c.* 504.—Afr. austr.
eryngiifolia, *Less. Syn. Comp.* 70S.—Afr. austr.
Tuhcosa, *Ehrh. Beitr.* iii. 138.—Afr. austr.
eawnioides, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 508. Afr. austr.
gorterioides, *Oliver (f Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* m. 429.—Afr. trop.
pndiflora, *Willd. Sp. PI.* iii. 2271.—Afr. austr.
""picioides, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 509. ~Afr, austr.
Kspida, Willd. Sp. PI. iii. 2274=Cullumia hispida.
'ncana, Willd. U c. 2269=frnticosa.
Kraussii, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 774 = cynaroides.
lanceolate, *Willd. Sp. PI.* iii. 2270.—Afr. austr.
obovata, *Willd. 1. c.* 2269.—Afr. austr.
palmata, *Willd. I. c.* 2271.—Afr. austr.
Patula, WUld. 1. c. 2272-Cullumia patula.
Pftinata, Willd. 1. c. = Cullumia pectinate.
Pnnata, *Lest. Syn. Comp.* 75.—Afr. austr.
PMgens, *WUld. Sp. PI.* iii. 2276.—Afr. austr.
Purpurea, *Benth. V Hook./, ex Mast, in Gard. Chron.*, (1872) 1262.—Afr. austr.
^olymoides, *DC. Prod.* vi. 604.—Afr. austr.
sanmivea, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 507.—Afr. anstr.
serifera, *DC. Prod.* vi. 507.—Afr. austr.
ffiosa, Willd. Sp. PI. iii. 2278=CuUumia setosa.
°Pekeana, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) .U0._Afr. trop.
SPmosissima, *Willd. Sp. PI.* iii. 2270.—Afr. austr.
marrosa, Willd. 1. c. 2272 = Cullumia bisulea.
Mobaeoides, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 505. C~;Afr austr
•obulata, *Harv. 1. c.* 607.—Afr. anstr.
*ulcata, Willd. Sp. PI. 2271=Cnllnmia solcata.
"•WUta, *DC. Prod.* vi. 607,-Afr. austr.
™»flora, *Willd. Sp. PI.* iii. 2274.—Afr. austr.
'eyneri, *Harv. (T Sond. Fl. Cap.* iii. 496.—Afr. •Mtr.

BERLANDIERA, DC. Prod. v. 617 (1836). *COMfOSITAB,* Benth. & Hook. f. it 860.
Tmsa, Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. 282=lyrata.
'"Wfolia, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. («41)842=texana.
'yata, *Benth. PI. Hartm.* 18.—Am. bor. occ.
P*™''«. Nutt. in Trans. Am. PhU. Soc. Ser. II. vii. A«8i)842=tomentosa.
»«oacanle. *Nutt. 1. c.* 343.—Florida.
|«ana, *DC. in Deless. Ic. Sel.* iv. L 26.—Am. bor.
""nentosa, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. « •(W*l) S43.-Am. bor.

^IERA, Buch..Ham. ex Wall. Cat sub n. 6225 (1882?)=M:yrian«ir<m, R. Br. (Rubiac.).
««tant, Buch.-Ham. L c=M. nntani.

M. -JJTA, Soland. ex Hook. f. & Benth. in Hook. Hod! ^32S (1849^ *LEGUMINOSAE,* Berth. & 1. 1. 579.
^wninata, *Soland. ex Hoot. f. V Benth. I. c*—Afr. trop.
•"golensis, *Welw. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. U866) 310.—Afr. trop.
•nncuUta, *Benth. 1. c.* 809.—Afr. trop.

BEELIKXA.:—
bracteosa, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 809.—Afr. trop.
Heudelotiana, *Baill. Adansonia,* vi. (1865) 185.—Afr. trop.
paniculate, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 811.—Afr. trop.
stipulacea, *Benth. I. c.* 810.—Afr. trop.

BERMUDIANA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735) = Siflyrinchium, Linn. (Irid.).
graminea, Gaertn. Fruct. i. 32 = S. Bermndiana.
graminifolia, Medic Malv. 77=S. anceps.
guttata. Stokes, Bot. Mat. Med. i. 109=Moraea chinensis.
iridifolia, Medic Malv. 77=S. Bermndiana.
striata, Moench, Meth. Suppl. 118=S. striatum.

BERNARDIA, Endl. Gen. 469, in syn. (1888) = Berardia, VilL (Compos.).

BEBNARDIA, Honst. ex P. Br. Nat. Hist. Jamaic. 361 (1756). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 308.
ALEVIA, Baill. Etud. *Gin.* Enph. 608 (1858).
BIVONIA, Sprang. Neue Entdeck. ii. 116 (1821).
PASSAEA, Baill. Etud. Gen. Enph. 607. t. 18 (1858).
PHAEDKA, Klotzsch, in Endl. Gen. Suppl. iv. in. 88 (1847).
POLYBAEA, Klotzsch, 1. c. (1847).
TRAGANTHUS, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 188. t. 9.
TYKIA, Klotzsch, in Endl. Gen. Snppl. iv. iii. 88 (1847).
axillaris, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 174.—Bras.
brevipcs, *Muell. Arg. 1. c.* 176.—Bras,
caperoniaefolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 920.—Reg. Argent.
capitellata, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 176=celastrinea.
carpinifolia, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 45.—Ind. occ
celastrinea, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 921.—Bras.
caa(eA(oVa.,MueU.Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 175.—Bras.
corensis, *Muell. Arg. 1. e.* 178.—Ind. occ.
crassifolia, *Muell Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 894.—Bras,
dichotoma, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 172.—Ind. occ
fasciculata, & *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 153.—Am. bor. occ.
gambosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 391.—Bras.
Gardneri, *Muell. Arg. 1. e.* 894.—Bras,
grandifolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 178.—Guiana,
hirsutissima, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 922.—Bras.
intermedia, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 160=meacana.
interrupta, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 171.—Mexic.
Jacquiniana, *Muell. Arg. 1. c.* 173.—Venezuela,
leprosa, *Muell. Arg. 1. c.* 172.—Ins. S. Doming.
Lorentzii, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 229.—Reg. Argent.
megalophylla, Muell. Arg. ?r Linnaea, xxxiv. (1865-66) 173=Adenophaedra megalophylla.
mexicana, *Muell. Arg. 1. c.* 172.—Mexic.
microphylla, *Muell. Arg. I. c*—Cuba,
multicaulis, *Muell. Arg. 1. c.* 177.—Bras,
myricaefolia, *Benth. &• Hook./. Gen.* iii. 308.—Am. bor.
oligandra, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 173=tamanduana.
peduncularis, *Muell. Arg. I. c.* 176.—Bras,
pulchella, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 392.—Bras.
scabra, *Muell. Arg. I. c.* 396.—Bras.
Sellowii, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 177.-Bras.
sidoides, *Muell. Arg. I. c*—Guiana,
upartioides, *Muell. Arg. I. c*—Bras,
tamanduana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 920.—Bras,
venosa, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 169.—Ind. occ

BERNARDINIA, Planch, in Linnaea, xxiii. (1850) 412. *CONNARACEAE,* Benth. &. Hook. f. i. 431.
fluminensis, *Planch. 1. c.*—Bras.

BERNETJXIA, Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1878) 159. *DIAPENSIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 621.
thibetica, *Decne. I. c*—Tibet

BERNIERA, DC. Prod. vii. 18 (1838) = Oerbera, Gronov. (Compos.).
nepalensis, DC. 1. c.=G. macrophylla.

BEKNTBKIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1884) 484. *LAURINEAE.*
madagascariensis, *Baill. 1. c.*—Madag.

BEBNOUIJIIIA, Oliver, in Hook. Ic. PI. t. 1169 (1873). *STERCULIACEAE.*
flammea, *Oliver, I. c.* 1.1169-70.—Guatemala.

BERREBERA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 100; xxix. (1846) 697 = MUlettia, Wight & Am. (Legum.).
caffra, Hochst. 11. cc 100 et 598 = M. caffra.
ferruginea, Hochst. U. cc. 100 et 597=M. ferruginea.

BEEB.IA, Roxb. Hort. Beng. 42 (1814); PI. Corom. iii. 60. t. 264 (1819). *TILJACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 232.
ESPERA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Neue Schr. iii. (1801) 449, nomen prius.
HEXAGONOTHECA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1846) II. 606.
Ammonilla, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 639.—Zeylan.; Ind. or.
mollis, Wall. Cat. n. 1186=B. AmmoniUa.
Vescoana, *Baill. Adansonia, x.* (1872) 240.—Ins. Tahiti.

BERRYA, DC. Prod. i. 517 (1824)=pracc

BERRYA, Klein, ex Willd. Sp. PI. ii. 840, in syn. (1800) =Iiitsea, Lam. (Laurin!).
chinensis, Klein, ex Willd. 1. c = L. sebifera.

BEE8AMA, Fresen. in Mus.Senckenb. ii. (1837) 280. t 17. *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 412.
NATALIA, Hochst. in Flora, xxw. (1841) 663.
RHAGANUS, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 216 (1848).
abyssinica, *Fresen. 1. c.* 281.—Abyss,
integrifolia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 107.—Abyss,
maxima, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 434.—Afr. trop.
paullinioides, *Baker, 1. c.* 435.—Afr. trop.
senate, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 107.—Abyss.

BERTERA, Steud. Norn. ed. II. i. 199 (1840) = Gladiolus, Town. (Irid.).

BERTEROA, DC. in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 232; et Syst. ii. 290 (1821) - Alyssum, Tourn. (Crucif.).
ascendens, Koch, in Linnaea, xv. (1841) 257-A. mutabile.
graeca, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 35 = A. mutabile.
incana, DC. Syst. ii. 291 = A. incanum.
mutabilis, DC. 1. c. 292 = A. mutabile.
obliqua, DC. 1. c.=A. mutabile.
orbiculata, DC. 1. c 293=A. orbiculatum.
peruviana, DC. 1. c.—Peruv.
Potanini, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. xxvi. (1880) 422.—Mongolia.
procumbent, Portenschl. Enum. PI. Dalm. 15 -- A. mutabile.
spathulata, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 48 = A. spathulatum.
ttricta, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 35 = A. orbiculatum.
thessala, Heldr. ex Nym. Consp. 51 = A. orbiculatum.
viridis, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. 1.1828) 245-A. incutum.

BERTHELOTIA, DC. Prod. v. 375 (USej-Pluohea, Cass. (Compos.).
lanceolata, DC. 1. c 376 = P. lanceolate.

BERTHIERA, Vent. Tabl. ii 572 (1799) = Bertiora, Aubl. (Rubiac).

BERTHOLETIA, Reichb. Norn. 91 (1841)=BERTHELOTIA, DC.=PlU0b.ea, Cass. (Compos.).

BERTHOLETIA, Brongn. Enum. Gen. 123 (1843) = Bertholletia, Hnmb. & Bonpl. (Myrtac).

BEBTBCOLLETIA, Hnmb. & Bonpl. PI. Aequin. i. 122. t. 36 (1808). *MYRTACEAE*, Benth. ft Hook. f. 1723.
TONCA, Rich. Anal. Fruit. 84 (1811).
excelsa, Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. I. 478. t. 60, 61 = nobilis.
excelsa, *Humb. & Bonpl. PI. Aequin.* L 122. t. 86.—Bras.
nobilis, *Miers.in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 197.—Guiana.

BEBTIEBA, Anbl. PI. Gui i. 180. t. 69 (177S). *RUBIACEAE*, Benth. *8c* Hook. £ ii. 77.
POMATIUM, Gaertn. f. Fnict. iii. 252. t. 225 (1805).
ZALUZANIA, Comm. ex Gaertn. f. Fruct. iù. 74. t. 192 (1805).
aethiopica, *Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 83.—Afr. trop.
africana, *Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1830) 255.—Afr. trop.
angustifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 103.—Ins. Cocos.
bistipulata, Boj. Hort. Manrit 166 = B. Zaluzania.
borbonica. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1830) 254 = B. Zaluzania.
bracteolata, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 84.—Afr. trop.
breviflora, *Hiern, I. c.* 85.—Afr. trop.
chrysantha, *Hassk. Retria*, i. 30.—Java.
coccinea, G. Don, Gen. Svst. iii. 506 = Mussaenda elegans.
ferruginea, Willd. ex Roem. & Schult Syst. v. 227 = Psychotria rnfescens.
gonzaleoides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 124.—Cuba,
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* i. 180. t. 69.—Guiana,
lateriflora, *Blume, Bijdr.* 987.—Java,
laxa, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 394.—Afr. trop.
macrocalyx, *Hassi. in Nederl. Kruidk. Arch.* iv. (1859) 7.—Malaya,
macrocarpa, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 394.—Afr. trop.
montana, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 88.—Afr. trop.
mucronata, *Comm. ex Gaertn. f. Fruct.* iii. 74. t. 192.—Hab.?
palustris, *Rich, in Mlm. Soc. Hist. Nat. Par.v.* (1830) 254.—Guiana.
Pomatium, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 894.—Afr. trop.
rufa. Rich, in Mlm. Soc. Hist Nat. Par. v. (1830) 254 = B. Zaluzania.
snbsessilis, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* Iii. 88.—Afr. trop.
Zaluzania, *Comm. ex Gaertn. f. Fruct.* iii. 74. t. 192.—Ins. Mascar.

BERTIERA, Blume, Bijdr. 987 (1826)=Adenoaaome, Wall. (Rubiac).
fasdculata, Blume, 1. c. = A. longifolia.
javanica, Blnme, Lc.«A. longifolia.
lateriflora, Blume, 1. c—Java.

BERTOLONIA, DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) t 5 (14)=-Leucheria, Lag. (Compos.).
purpurea, DC. 1. c = L. purpurea.

. BEBTOLONIA, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. 384 (1820). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 755.
TRIBLEMMA, R. Br. ex DC. Prod. iii. US (1828).
acaulis, Cham, in Linnaea, ix. (1884) 388 = Eriocnema Hilariana.
acuminata, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1S43) 344,-r-Bras.
aenea, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. Ill xv. (1851) 318 =marmorata.
guttata. Hook. f. Bot. Mag. t. 5524 - Gravesia guttata,,
hirsuta, Benth. Bot Voy. Sulph. 94 = Triolaena hirsuta.
Hontteana, *Van Houttt, in FL des Serres*, Sér. II. x. (1874) 109.—Hab.)
leuzeana, *DC. Prod.* iii. 113.—Bras,
longifolia, *Cham, in Linnaea*, ix. (1834) 384 =Salpinga longifolia.

BEBTOLONIA :-
maculata, *DC. Prod.* iii. 114.—Bras.
margaritacea, Hort Bull, er Naud. in FL des Serres, xvi. (1865-67) 165 = Salpinga margaritacea.
marmorata, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IIL xv. (1851) 318.—Bras.
Mirandaei x, *Van Houtte.in Fl. des Serres*, xxi. (1875) 135.
nymphaeaefolia, *Raddi, in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 384.—Bras.
ovata, *DC. Prod.* iii. 113.—Bras.
primulaeflora, Hort. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 80 = Monolena primulaeflora.
scabra, Rafin. ex J. C. Schau. in DC. Prod. xi. 584 = Lippia lanceolata.
scorpioides, Baill. Hist PI. vii. ll=Triolena scorpioides.
superbissima, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1878) 5.—Bab.)

BERTOLONIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267=Lippia, linn. (Verben.).

BERTOLONIA, Moç. & *Stssi*, ex DC. Prod. ii. 689 (1825) = Ceroocarpus, H. B. & K. (Rosac).
guieroides, Moç. & Sessi, 1. c.=C.fothergilloides.

BERTOLONIA, Spinola, Cat. Jard. St Sebast. (1809) 24 =Hyoporum, Banks.
glandulosa, Spinola, 1. C.-M. viscosum.

BERTOLONIA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 110.1.1. f. 1 (1821)=ChryaoohlamyB, Poepp. (Guttif.).
paniculata, Spreng. 1. c—Bras.

BERTUCHIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818) =Gardenia, Ellis (Rubiac).
speciosa, Dennst. 1. c—Ind. or.

BEBTYA, Planch, in Hook. Lond. Joum. iv. (1845) 472. t. 16. *EUPHORBIACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 264.
Conninghamii, *Planch. 1. c.* 473.—Austral,
dimerostigma, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record*, ii. (1882) 98.—Austral.
Findlayi, *F. Muell. Fragm.* viii. 141.—Austral,
gummifera, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 473. t 16.—Austral.
Mitchellii, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 63.—Austral.
oblongifolia, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 471 = pomaderrioides.
oleaefolia, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 478.—Austral,
oppositifolia, *F. Muell.* b* *O'Shanesy, in Wing, South Sc. Record*, ii. (1882) 98.—Austral,
pedicellate, *F. Muell. Fragm.* iv. 143.—Austral,
pinifolia, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 473.—Austral,
polymorpha, *Baill. Adansonia*, vi (1865-66) 298.—N.Zel.
pomaderrioides, *F. Muell. Fragm.* iv. 34.—Austral.
psiloclada, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 471 = Ricinocarpus psilocladus.
quadrisertala, *F. Muell. Fragm.* x. 52.—Austral,
rosmarinifolia, *Planck, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 473.—Austral.
rotundifolia, *F. Muell. Fragm.* iv. 34.—Austral.
tasmanica, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 63=rosmarinifolia.

BERULA, Hoffm. ex Bess. Enum. PI. Volh. 44 (1822) - Slum, Toum. (Umbellif.).
angustifolia, Mert. & Koch, i Roehl. Deutschl. Fl. ii. 433=S. erectum.
lancifolia, Bess. Enum. PI. Volh. 44 »S. lancifolium.

BERYLLIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 33 (1866)- Ornithogalum, Toum. (Liliac.).
pyrenaica, Salisb. 1. c.=O. pyrenaicum.
stachyoides, Salisb. 1. c.=O. narbonense ?

BJEBZELIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii (1826) 370. t. 35. *BRUNIACEAE*, Benth. & Hook. £ i.671.
HETEBODON, Meissn. Gen. 72 (1837).
RABENHORSTU, Reichb. Nom. 169 (1841).
abrotanoides, *Brongn. I. c.* 371.-<-Afr. austr.

BEHZELIA':—
alopecurioides, *Sond. in Ham. V Sond. Fl. Cap.* ii-310.—Afr. austr.
arachnoidea, *Eckl. if Zeyh. Enum.* 138.—Afr. austr.
brevifolia, Eckl. & Zeyh. 1. c.=abrotanoides.
callunoides, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 338.—Afr. austr.
commutata, *Sond. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 310.—Afr. austr.
comosa, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 137=commutata.
cordifolia, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 189.—Afr. austr.
ericoides, Eckl. & Zeyh. Enum. 137-intermedia.
formosa, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c 138=abrotanoides.
globosa, G. Don, Gen. Syst ii.*i6(=Berardiaglobosa*, Sond.).—Afr. austr.
intermedia, *Schlecht. in Linnaea*, vi. (1831) 188.—Afr. austr.
lanuginosa, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sel. I. V"-(1826) 872. t. 35.-Afr. austr.
rubra, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 189 = squarrosa-squarrosa, *Sond. in Harv.* 6* *Sond. Fl. Cap.* ii. 312.—Afr. austr.
superba, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 138.—Afr. austr.
Wendlandiana, Eckl. & Zeyh. 1. c. 137 = intermedia.

BERZELIA, Mart, in Nov. Act Nat Cur. xiii. (1826; 292 = Hennbetaedtia, Reichb. (Amarant).
glauca, Mart 1. c = H. glauca.

BESCHOBNEBIA, Kunth, Enum. PI. v. 844 (1850)- *AMARYLUDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 738.
bracteata,y«roW, *Index*, 12; *Baker, in Bot. Mag.* L 6641.—Mexic.
Decosteriana, Baker, in Bot Mag. t. 6768 = seq.
Dekosteriana, C. *Koch, Wockensckr.* vii. (1864) 187.—Mexic.
dubia, *Carr. in Rev. Horde.* (1877) 155.—Texas,
floribunda, *Hort. ex C. Koch, Wochenschr.* v. (1862) 199.—Hab. ?
Galleottii, *Jacobi, Index*, 12, nomen.—Mexic. t
multiflora, *Hort. ex C. Koch, Wochenschr.* iii. (1860; 63.—Hab, 1
Parmentieri, *Jacobi, in Hamb. Garten**, xx. (1864) 503.—Hab.?
pumila, *Jacobi, Index*, 12, nomen.—Hab. ?
Toneliana, Jacobi, 1. c. = seq.
Tonelii, *Jacobi, in Hamb. Gartenz.* xx. (1864) 503. nomen.—Mexic.
Schlechtendalii, *Jacobi, Index*, 12, nomen.—Hab. t
tubiflora, *Kunth, Enum. PI.* v. 844.—Mexic.
Verlindeniana, *Jacobi, Index*, 12, nomen.—Hab. ?
yuccoides, Hort. ex Hook. Bot Mag. t 5203=seq.
yuccoides, *C. Koch, Wochenschr.* ii. (1859) 387; (186) 63; vi. (1864) 186.—Mexic.

BESENNA, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 263 (1847)' Albiazia, Durr. (Legumin.).
anthelmintica, A. Rich. 1. c = A. anthelmintica.

BESHA, D. Dietr. Syn. i. 139 (1839)-Ochlandr». Thw. (Gramin.).

BESLEBIA, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 181 (1737)- *GESNERACEAE*, Benth *8c* Hook. f. ii. 1016.
CRANTZIA, Neck. Elem. i. 366 (1790).
CRBMOSPERMA, Benth. PI. Hartw. 234 (1846).
CYRTANTHEMUM, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 130.
DRUPINA, Linn. PL Surin. 11 (1775); Amoen. Acad. vUi. 259 (1785).
ERIPHIA, P. Br. Hist Jamaic 270 (1756).
FRIMBROLINA, Rafin. Sylva Tellur. 71 (1838).
GASTERANTHOPSIS, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 129.
GASTERANTHUS, Benth. PI. Hartw. 233 (1846).
HEMATOPHYLA, Rafin. Sylva Tellur. 71 (1838).
PARABESLERIA, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 126.
PSEUDOBESLERIA, Oerst. 1. c. 128 (1861).
acutifolia, *Benth. PI. Hartv.* 287.—N. Granat
aggregata, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 400.—Bras.
ampla, *Veil. Fl. Flum.* 262; vi t. 84.—Bras,
arborea, *Veil. II. cc.* 261; vi. t. 82.—Bras,
arclens, *Decne. ex Linden, Cat.* n. 5 (1850) 1.—Venezuela.

BESLERIA :—
barbata, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 827.—Peruv.
barbensis, *Hanst. 1. c.* 319.—Costa Rica.
Jferteriana, *DC. Prod.* vii. 638.—Jamaica,
bicolor, *H. B. b- K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 898.—N. Granat.
bic In^r Scho «. in Oestr. Med. Jahrb. vi. II. 66 = AUoplectus bicolor.
<»*flora,* Forst. f. Kl. Ins. Anstr. 48. n. 286-Cyrtandia biflora.
livalvis, Linn, f. Suppl. 280 *(=Picria surinamensis).* —Guiana.
oonodora, Veil. FL Flnm. 261J vi. t. 80 = Branfelsia latifolia.
raerulea, Aubl. PI. Gui. ii. 631=violacea.
cajcarata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 399.—N. Granat.
rampanulata, *Linden, Cat.* n. 5. (1860) 2.—Venezuela,
capitata, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii 2.—Peruv.
coccinea, Aubl. PI. Gui. ii. 632=AUoplectus coceineus.
colnmneoides, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 822—Costa Rica.
wwtaricensis, *Hanst. 1. c.* 830.—Costa Rica,
"assifolia, *Schott, Neu. Bras. Pfl.* i. 7.—Bras.
<*'stata, Linn. Sp. PI. 619 = AUoplectus cristatus.
mstata, Moc. & Sesse, ex DC. Prod vii. 546, 640 = AUoplectus glaber.
cuneata, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 548.—Bras.
Vmosa, Font f. Fl. Ins. Austr. 44. n. 237 = Cyrtandra cymosa.
MTtanthemum, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 821._Mexic.
«exa, *Hanst. 1. c*—Mexie.
tickrus, Spreng. Syst. ii. 840=AUoplectus dichrous.
aivaricata, *Poepp. &" Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 2.—*ertti.
rymonia, Steud. Nom. ed. II. i. 200=Diymonia Mlcarata.
egans, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 397.—N. Granat.
a&ciculata, *IVawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1863) 142.-Bras.
iayovirens, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1828) 49—Bras,
geminiflora, *Gardn. in Hoot. Land. Journ. Bot.* i. (1842)543.—Bras,
glabrosa, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 421.—Bras.
x. *Hanllt* »» *Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 325.—Mexic,
e^diflora, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 401.—N. Granadat.
Schott, Neu. Bras. Pfl. i. 5. n. 5.—Bras,
guadalupensis, *DC. Prod.* vii. 538.—Guadalup.
birsuta, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 826.—Mexic.
*»W/n, Schott, in Oestr. Med. Jahrb. vi. II. 66 = AUoplectus sparsiflorus.
*ht*pida,n.* B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 39 = AUoplectus hiipidus.
fmray, *Hoot. Bot. Mag.* t 6341.—Ind. occ.
incarnata, *Aubl. PI. Gui.* ii. 685.—Guiana.
tnodora. Veil. Fl. Flum. 261; vi. t 81=Brunfelsia pauciflora.
"tsigni, Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. (1842) II. 37 = Solenophora insignis.
'abiosa, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 824.—N. Granat.
'Wiflora, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 861.—Guiana.
kucostoma, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-661 826. ~N. Granat.
eueida, *Poepp. b- Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 2.—Perav.
'Mea, *Linn. Sp. PI.* 619.—Ind. occ.
*j*tea,* Spreng. Syst. ii. 841 = Berteriana.
uteo-virens. Mart. Nov. Gen. iii. 45 = flavovirens.
"Hlittifolia, Linn. Sp. PI. 61» = Episcia melittifolia.
mo'lis, Hook, ex Steud. Nom. ed. IL i. 200.—Am. austr.
mollissima, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 107 = Praec.?
wncronata, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-68) 381.—N. Granat.
oncogastra, *Hanst. I. c.* 336.—Ecuador.
ttUriaii, *DC. Prod.* vii. 588.—Guiana.
Pwdula, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-«6) 888.—N- Granat.

BESIiEEIA:—
pentaphylla, *Veil. Fl. Flum.* 262; vi. t. 83.—Bras.
Princeps, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 817.—Costa Rica.
pulcheUa, Donn, Hort. Cantab. 140, ex Sims, Bot Mag. t. 1146 = Tussacia pulcheUa.
quitensis, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 384.—Ecuador.
Rhytidophyllum, *Hanst. 1. c.* 334.—N. Grannt
Riedeliana, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 399.—Bras.
sanguinea, Pers. Syn. ii. 165 = AUoplectus sanguineus.
scandens, Moc. & Sesse, ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 349 = Maurandiaerubescens?
Selloana, *Klotesch V Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 398.—Bras.
serrulate, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 21.—Ind. occ.
solanoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 898.—Am. austr.
spectabilis, H. B. & K. 1. c. 400 = Drymonia spectabilis.
splendens, Hort ex Steud. Nom. ed. IL i. 200 = Drymonia spectabilis.
surinamensis, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 471.—Guiana.
Symphytum, *Klotisch if Hanst. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 899.—Bras,
tetrangularis, *Ruit, ex Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 831.—Peruv.
triflora, *Hanst. I. c.* 829.—Costa Rica.
umbellata, Herb. Banks, ex Sims, Bot. Mag. t. 1146 = Episcia pulcheUa.
umbrosa, *Mart. Nov. Gen.* iii. 44. t. 218.—Bras,
violacea, *Aubl. PI. Gui.* ii. 630. t. 254.—Guiana.
Wendlandiana, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 318.—Costa Rica.

BESSEBA., Schult. f. in Linnaea, iv. (1829) 121. *LIU ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 8U1.
PHARIUM, Herb, in Bot. Reg. t. 1646 (1832).
elegans, *Schult. f. I. c*—Mexic.
fistulosa, Pritz. Ic. Ind. 147=elegans.
Herberti, G. Don, in Sweet, Hort Brit. ed. III. 694 = elegans.
miniata, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iv. (1848) t 424 - elegans.
multiflora, Mart & Gal. in Bull. Acad. Bras. ix. (1842) (reimpr. 14) •= elegans.

BESSERA, Schult Obs. Bot 27 (1809) = Pulmonaria, Toura. (Borag.).
OBurea, Schult. I. c.=P. azurea.

BESSERA, Spreng. Pugill. U. 90 (1815) = Xylosma, Forst (Bixin.).
inermis, Spreng. 1. c. = Flueggia microcarpa.
spinosa, Spreng. 1. c 91=X. nitidum.

BESSERA, Veil. Fl. Flum. 147 (1826); iv. t. 2=Pisonia, Linn. (Nyctagin.).
calycantka, VelL 11. cc. = P. Olfersiana.

BESSIA, Rafin. Sylva Tellur. 13 (1888) = Corypha, linn. (Palm.).
sanguinolenta, Rafin. I. c.=C. umbraculifera.

BESTRAM, Adans. Fam. ii. 864 (1763)=Antldesma, Linn. (Euphorb.).

BETA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1785). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. L 52.
alba, DC. Fl. Fr. iii. 883=vulgaris.
altissima, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 200 = vulgaris.
bengalensis, Roxb. He rt. Beng. 21; Fl. Ind. ii. 69 = vulgaris.
Bourgaei, *Coss. Notes Crit.* 44.—Hispan.
campanulata, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 66.—Marocco.
carnulosa. *Gren. in Gren. V Godr. Fl. Fr.* iii. 16.—Gallia.
chilensis, *Hort.-Cf. Gard. Chron.* (1870) I. 449.—Chili.
Cicla, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. iv. 848 = trigyna.
Cicla, Linn. Syst.ed. XII. 196=vulgaris.
crispa, Tratt. Arch. vii. 117=vulgaris.
Cycla, Pall. Tabl. Taur. 48=trigyna.
decumbens, Moeach, Meth. 332=vulgaris.

BETA:—
diffusa, *Coss. Notes Crit.* 178.—Hispan.
esculenta, Salisb. Prod. 152-vulgaris.
foliosa, Ehrenb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 200-vulgaris.
hastata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. (1829) 889= procumbens.
hortensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-vulgaris.
hybrida, *Andr: ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 124, nomen.—Rossia.
incarnata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. L 200= vulgaris.
intermedia, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 900.—Anatolia,
lomatogona, *Fisch. V Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 860.—As. Min.; Syria.
longespicata, Moq. Chenop. Enum. 13 «- lomatogona.
lutea, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 200=Tulgaris.
macrocarpa, Guss. Fl. Sical. Prod. i. 802=vulgaris.
macrorhiza, *Stev. in Mim. Soc. Nat. Most.* iii. (1812) 257.—Reg. Caucus.; Persia.
marina, Crantz, Inst i. 120=vnlgaris.
maritima, Linn. Sp. PI. ed. IL 322=vulgaris.
nana, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. vii. 82.—Graecia.
No/ana, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient.iv. 899-vulgaris.
orientalis, Roth, Nov. PI. Sp. 181 = vulgaris.
patellaris, *Moq. in DC. Prod.* iii. II. 67.—Ins. Tenerif.
patula, *[Soland.* in] *Ait. Hort. Kev>.* ed. I. i. 815.—Ins. Madera.
Procumbens, Lange, in Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. i. 274=diffusa.
procumbens, *Chr. Sm. in Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 81.—Ins. Canar.
pumila. Link, in Bach, Beschr. Canar. Ins. 141 = Webbiana.
purpurea, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. TL i. 200 = vulgaris.
Rapa, Dum. Fl. Belg. 21-vulgaris.
rapacea. Hegetschw. Fl. Schw. 256-vulgaris.
rosea, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 200=vulgaris.
rubra, *Delile, Fl. Aeg. Illustr.* 57.—Aegypt
rubra, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (.1780) ed. I. Art IV. 8.—Malaya.
saliva, Bemh. Syst Verz. Erf. 162=vulgaris.
stricta, C. Koch, in Linnaea, zxii. (1849) 180 - vulgaris.
sulcata, Gasp, in Guss. Fl. SicuL Syn. ii. 800 - vulgaris.
sylvestris, Hort. Panonn. ex Webb *8c* Berth. Phyt. Canar. iii. 197 = procumbens.
triflora, Salisb. Prod. 152-vulgaris.
trigyna, *Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung.* 34. t 85.—Hnngar.; As. Min.
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 222.—Enrop.; Afr. bor.; Oriens.
Webbiana, *Moq. Chenop. Enum.* 16.—Ins. Canar.

BETCKEA, DC. Mém. Valer. 18; et Prod. iv. 642 (1829)=Pleatritis, DC. (Rubiac).
caucasica, Boiss. Fl. Orient iii. 94.—Reg. Cancas.
Gilliesii, Hook. & Am. in Hook. Bot Misc. iii. (1883) 366.—Reg. Argent.
heterophylla, Phil, in Linnaea, xxviiL (1866) 704.—Chili.
major, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 30 - P. samolifolia.
samoli/olia, DC. Prod. iv. 642-P. samolifolia.
samolifolia, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii, (1833) 866=Gilliesii.

BETELA, Rafin. Sylva Tellur. 85 (1888) = Piper, Linn.
mastica, Rafin. 1. c. =P. Betle.

BETENCOURTIA, St. Hil. Voy. i. 376 (1888) = OtalactU, P. Br. (Legumin.).
rhynchosioides, St. Hil. L c.=G. angustifolia.

BETHENCOURTIA, Choisy, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 148 (1825). = Senedo, Toura. (Compos.).
paltnensis, Choisy, 1. c in obs.=S. palmensis.

BETONICA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735) = Btachya, Toum. (Labiat).
affinis, Wender. in Flora, ix. (1826) 358-S. Betonica.
algeriensis, Noé, in BulL Soc. Bot. Fr. iu (1856) 582 »S. Betonica.
Alopecuros, Linn. Sp. PI. 678 = S. Alopecuros.

BETONICA:—
alpestris, Jord. & Four. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 93 — Stachys densiflora.
alpigena, Schur, Ennm. PI. Transs. 540.—Hungaria.
alpina, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3=S. Alopecnros.
angustifolia, Jord. & Fonrr. Brev. PL Nov. fasc ii. 97 = &, Betonica.
annua, linn. Sp. PI. 573; Moench, Meth. 895=S. anting.
brackystackya, Jord. *3c* Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 98=S. Betonica.
Brantii, Boiss. Fl. Orient, iv. 750=S. BrantiL
capensis, Burm. f. FL Cap. Prod. 18.—Afr. anstr.
Clementei, Perez-Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xL (1882) 400.—Hispan.
danica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-S. densirlora.
decumbens, Moench, Meth. 396-S. recta.
densiflora, Schur, Ennm. PI. Transs. 890, Index = S. densiilora.
divulsa, Tenore, Syll. Fl. NeapoL App. 614 = S. Betonica.
drymophila, Jord. & Fonrr. Brev. PL Nov. fasc; ii. 100=S. Betonica.
elongata, Willd. ex Stead. Nom. ed. IL i. 200 = S. Betonica.
flava, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 120 = S. Alopecuros.
foliosa, Presl, Fl. Sicul. 37=S. Betonica.
foliosa, Rupr. Sert. Tiansch. 66.—As. centr.
frutescens, Bontekoe, Jav. 146=Justicia Betonica.
glabrata, C. Koch, in Iinnaea, xxi. (,1848) 684 = S. Betonica.
graeca, Boiss. *8c* Sprnn. Diagn. Ser. I. v. 27—Giaecia.
grandiflora, Thuill. Fl. Par. ed. II. 293-S. longifolia.
grandiflora, Steph. ex Willd. Sp. PI. iii. 96 = S. grandiflora.
grandifolia, Jord. *8c* Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 101 =S. Betonica.
heradea, Linn. Mant. i. 88 =S. integrifolia.
hirsuta, Linn. 1. c ii. 248 = S. densiflora.
kirsuta, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 95=S.longi/olia.
kirta, Leyss. Fl. Halens. 109=S. Betonica.
hirta, Linn. Cent. ii. 20; Gouan, Hort Monsp. 276 = S. recta.
hylebium, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 101 = S. Betonica.
incana, MiU. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 - S. densiflora.
Jacquini, Gren. *8c* Godr. Fl. Kr. ii. 694= S. Alopecnros.
laevigata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 110=Nepeta spicata.
laxata, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 96=S. Betonica.
legitima, Link, Handb. 476 = S. Betonica.
leiocalyx, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 95 = S. Betonica.
lutea, Lam. Fl. Fr. ii. 404 = S. Alopecoros.
macrantha, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 683 =S. grandiflora.
macrostackys, Wender. in Flora, ix. (1826) 363 = S. densiflora.
Monnieri, Gouan, Illustr. 36 —S. densiflora.
numtana, Lej. Fl. Spa, it 24=S. Betonica.
monticola, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii 96 = S. Betonica.
nemorosa, Jord. *8c* Fonrr. 1. c. 98=S. Betonica.
nivea, Stev. in Mém. Soc Nat. Mosc Ui. (1812) 266 = S. nivea.
nutans. Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. it 146 =S. Betonica.
occitana, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 97=S. Betonica.
officinalis, Linn. Sp. PI. 673=S. Betonica.
orientalis, linn. 1. c.-S. longifolia.
orientalis, Thuill. Fl. Par. 298 = S. grandiflora.
Orphanidea, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient iv. 750=S. Alopecuros.
parvula, Jord. *8c* Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 94 = S. Betonica.
polyclada, Jord. *8c* Fourr. 1. c. 102 =S. Betonica.
pradica, Zanted. ex Nym. Consp. 577=S. densiflora.
pratensis, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 96 = S. Betoniea.
psilostachys, Jord. *8c* Fourr. 1. c. 97 = S. Betonica.
purpurea, Gilib. Fl. Lituan. i. 82 = S. Betonica.
pyrenaica, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 94 > S. Betonica.

BETONICA:—
recurva, Jord. *8c* Four. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 102= Stachys Betonica.
recurvidens, Peterm. Fl. Lips. Excurs. 444 = S. Betonica.
rigida, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 108 = S. Betonica.
rosea, Hort. ex Heynh. Nom. ii. 67 =S. grandiflora.
rubicunda, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. ex Benth. in DC. Prod. xii. 460=S. densiflora.
rusticana, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fasc ii. 96 = S. Betonica.
sabauda, Jord. & Fourr. 1. c. 93=S. Betonica.
scardica, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 186=S. graeca.
serotina, Host, Fl. Anstr. ii. 165=S. Betonica.
stricta, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed. I. ii. 299- S. Betonica.
strictícaulis, Jord. *8c* Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 99 = S. Betonica.
subcarnea, Jord. & Fourr. 1. c 98=S. Betonica.
sylvulicola, Jord. *8c* Fourr. 1. c 100=S. Betonica
valdepubens, Jord. *8c* Fourr. 1. c. 108=S. Betonica.
validula, Jord. *8c* Fonrr. 1. c. = S. Betonica.
virescens, Jord. *8c* Fourr. 1. c. 99 =S. Betonica.
virgultorum, Jord. *8c* Fourr. 1. c. 100 = S. Betonica.
vulgaris, Rota, Prosp. Piant. Pav. 272=S. Betonica.

BETUL4, [Tourn.] linn. Syst. ed. I (1785). *CUPULIFERAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 404.
BETULASTER, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 198.
acuminata, Ehrh. Beitr. vi. 98 = alba.
acuminata, Wall. PL As. Rar. ii. 7. t. 109-alnoides.
aetnensis, Rafin. Giorn. i. 17 J J. *8c* C. Presl, Delic. Prag. 144=alba.
affinis, Endl. Gen. Suppl. iv. 20=alnoides.
alba, *Linn. Sp. PI.* 982.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
Alnobetula, Ehrh. Beitr. ii. 72 = Alnus viridis.
alnoides, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 58. —Reg. Himal.
Alnus, Linn. Sp. PL 983=Alnus glutinosa.
Alnus, Thnnb. Fl. Jap. 76—Alnus maritime.
Alnus-crispa, Stead. Nom. ed. II. i. 201 = Alnus crispa.
Alnus-incana, Du Roi, Obs. Bot. 81 -Alnus incana.
Alnus-rugosa, Du Roi, 1. c. 82 = Alnus serrulata.
alpestris, *Fries, Summ. Veg. Scand.* i. 212.—Europ. bor.; Greenland.
alpina, Borckh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 174 = Alnus viridis.
ambigua, Hampe, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xii. 2 = alba.
angulata, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. L 201.—Am. bor.
antarctica, Font, in Comm. Gott. ix. (1789) 46 - Fagus betnloides.
arguta, Schlecht in Iinnaea, vii. (1832) 139 = Alnus acuminata.
asplenifolia, Hort. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 167 = alba.
aurata, Borkh. Forstb. i. 878 = albs.
aurea, Steud. Nom. ed. II. i. 201=alba.
Bhojpattra, Wall. PL As. Rar. ii. 7=utilis.
borealis, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 196=pnmila.
broccembergensis, Bechst. Forstb. 297=alba.
carpatica, Waldst. & Kit. ex Willd. Sp. PI. iv. 464 = alba.
canadensis, Hort ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 656 = alba.
carpinifolia, Ehrh. Beitr. vi. 99=lenta.
carpinifolia, *Sieb. (f Zucc. in Abk. Acad. Muenck.* iv. *Abth.* in. (1846) 228.—Japon.
duntaaa, Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) 1.47.—China.
dliata, Steud. Nom. ed. II. i. 201 = Populus ciliata.
cordata, Loisel. Notul. 139 = Alnus cordifolia.
cordifolia, Regel, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xiii. (Ib61) 86=alba.
coriifolia,-Taxach, ex Regel, In DC. Prod. xvi. H. 168 -alba,
corylifolia, *Regel V Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxviii. (1865) II. 417.—Japon.
costata, Trautv. in Maxim. Prim. Fl. Amur. 258 = ulmifolia.
crispa, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 339 = Alnus viridis.
cryptocarpa, Laestad. in Bot. Notiser, 1856 (1867) 109 -alba.

BETTTLA.:—
cuspidata, Schrad. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 16* -alba.
cyeoviensis, Stead. Nom. ed. I. 107, sphalm. = oycoviensis.
cylindrostachya, Wall. PL As. Rar. ii. 7 = alnoides.
dalecarlica, Linn. f. Suppl. 416 =alba,
davurica, *Pall. Fl. Ross.* i. 60. t. 39. fig. A.—Sibir.; Am. bor.
dioica, *Pall. Reise,* iii. 821.—Sibir. transbaical.
divaricata, Ledeb. in Denkschr. Baier. Bot. Ges. iii-(1841) 69-fruticosa.
emarginata, Ehrh. Beitr, iv. 168 = Alnus glutinosa.
Ermani, *Cham, in Linnaea,* vi. (1881) 537. t. 6. fig. D—As. bor. or.
ethnensis, Rafin. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 163--alba,
exaltata, 5. *Moore, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 886. t. 16.—China.
excelsa, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 337 papyracea!
excelsa, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 156=lenta.
excelsa, Pursh, FL Am. Sept. ii. 621 = lutea.
Friesii, Lares. FL Verml. ed. II. ex Hartm. Scand. Fl. ed. XIII. 876=alba.
fruticans, Pall. Reise, iii. t. kk—fruticosa.
fruticosa, Fries, in Flora, xxxiii. (1850) 152 = alpestris.
fruticosa, *Pall. FL Ross.* i. I. 62. t. 40. f. A. B. *C*—Europ.; As. bor.; Sibir.; Manchur.
fruticosa, Willd. Sp. PL iv. 467= humilis.
fusca, Pall. Reise, iii. 173=fruticosa.
glabra, *Dum. Fl. Belg.* 11.—Belgia.
glandulosa, *Michx. Fl. Am. Bor.* ii. 180.—Am. bor.
glauca, Wender. in Bot. Zeit iv. (1816) 291=alba.
glutinosa, Lam. Encyc i. 454-Alnus glutinosa.
glutinosa, Wallr. Sched. Crit. 497 = alba.
Gmelini, Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 118=fruticosa.
grandis, Schrad. in Ind. Sem. Hort. Gott. (1833) 2 ** alba.
Grayii, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc xxxviii. (1806) II. 406 = pumila.
grosaa, *Sieb.* 6" *Zucc. in Abk. Acad. Muenck.* iv. *Abth-*III. (1846) 228.—Japon.
gummifera, Bertol. Fl. Ital. x. 229=alba.
Hachelii, Opiz, ex Steud. Nom. ed. II. i. 201 = alba.
karcynica, Wender. ex Steud. 1. c.=alba.
kumilis, Fries, ex Regel, in DC. Prod. xvi. n. 172 « alpestris.
humilis, *Schrank, Bayer. Fl.* i. 420.—Europ. bor.; As-bor.; Am. bor.
kybrida, Blom, in Vet. Acad. Nya Handl. vii. (1786) 186. t. 6. f. 13 = alba,
hybrida, *Regel, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* *'" (1861) 94.—Rossia.
incana, Roth, Tent. Fl. Germ. iii. 477-Alnus incana.
intermedia, *Tkomas, ex Reichb. Ic. Fl. Germ.* xii. *• 624. fig. 1283.—Europ.
Jacquemontii, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. *v-(1841) 189=ntilis.
japonica, SieboU, m Verh. Batav. Gen.xii. ,1830)26 = alba.
kamtschatica, Buek, in DC. Prod. Ind. iv. 52 -• humilis.
ladniata, Blom, in Vet. Acad. Nya Handl. vii. (178«) 156. t. 6. f. 13 = alba.
ladniata, Ehrh. Beitr. iii. 21= Alnus glntinosa.
ladniata, Thunb. Diss. Bet. 10=alba.
lagopina, Hartm. ex Regel, in DC. Prod. xvi. n 178 •» alpestris.
lanulosa, Michx. FL Bor. Am. ii. 181=nigra.
latifolia, Tausch, in Flora,xxi. (1888) 751-alba.
lenta, Duroi, Harbk. Baumz. i. 92=alba.
lenta. *Linn. Sp. PI.* 983.—Am. bor.
lenta, Regel, in Nouv. Mém. Soc. Nat Mosc. xi»-(1861) 125 = carpinifolia.
leptopkylla, Regel, in DC. Prod. xvi. II. 181=AlnOS nepalensis.
leplostachya, Wall. Cat. n. 2799-Alnus nepalensis.
Littelliana, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. xlv. (1843) 30 =glandulosa.
lobulata, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 861.—Europ.
longifolia, Bové, ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. H-xv. (1841) 208 = Alnus orientalis.
lutea, *Michx. Hist. Arb.* ii. 153. t. 6.—Am. bor.
Maackii, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. I'étersb. xv. (1857) 880=davurica.
major, Gilib. Exercit. ii. 400-alba.

BETUL —

*H*rostachya, Schrad. ex Regel, in DC. Prod. xvi. W; Spach, in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xv. (1841) 7 =alba.

Maximoaicriana, Regel, in DC. Prod. xvi. 180 = Maximowiczii.

Maximowiczii, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mote,* xxxviii. (1865) ii. 418.-Japon.

Maxtmomcmi, Rupr. in BnlL Phys-Math. Acad. Pftersb. xr. (1868) 189=davurica.

Maximomtschii, Rnpr. in Bull. Phys.-Math. Acad. P&ereb. XT. (1856) 435=dahnrica.

««#«, Laeitad. in Bot. Notiser, 1866 (1867) 107 = flibd.

gabcarpa, Laestad.[1] 1. c 106-alba.

Michanxii, *Spach,* in *Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xv. (1841) 1»5.—Am. bor.

microphylla, *Bunge, Vert. Suppl. ft. Alt.* 112; *in* MSS. *Acad. Pétersb.* (1885) 506.—Sibir. altaic

Uiddendorffii, *Trautv. &• Mey. in Middend. Reise Aft. Ochot.* 84).—Manchuria.

Murithii, Gandin, ex Regel, in DC. Prod. xvi. IL 168 -alba.

Yrsinmdes, Tausch, in Flora, xi. (1828) 758-nnmilis.

««»a, Hook. Fl. Bor. Am. iL 156=glandulosa.

«na, *Linn. Sp. PL* 988.—Reg. bor.

««««, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 180 = Michauxii.

**gra, Dnham. Arb. ed. NOT. iii. 203. t. 51=alba.

;gra, Duroi, Harbk. Baumz. i. 98=lenta.

»gi», *Linn. Sp. PI.* 982.—Am. bor.

\gra, Murith, Guide Bot. Valais, 56 = intermedia.

*tgrićans, Wender. in Bot. Zeit. iv. (1846) 291 = alba.

*itida, D. Don, Prod. Fl. Nep. 58=alnoides.

*Mongata, [Dryand. in] Ait Hort. Kew. ed. I. iii. 888 =Alnus glntinosa.

occidentalis, *Hook. ft. Bor. Am.* ii. 166.-Am. bor. OCC

<*°rata, Bechst. Forstb. 294=alba.

ovalifolia, Rnpr. in Bull. Phys.-Math. Acad. P&ersb. XT. (1857) 878 -humilis.

nata, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 838=alba.

«ta, Schrank, Baier. Fl. i. 419=Alnus viridis.

Vcoviensis, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 289-alba.

Vcowiensis, Laestad. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 171=intermedia.

Vcmiensis, Reichb. Ic Fl. Germ. xii. t. 822. f. 1281 = humilis.

P<*naeformis, Laestad. in Bot. Notiser, 1856 (1857) 105=alba.

Palmata, Borkh. Handb. L 500 = alba.

Palustris, Rupf. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pe'tersb. *•• (1857) 876=humilis.

Palustris, Salisb. Prod. 395=Alnns glntinosa.

Papyracea, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 837.—Am. bor.

Papyri/era, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 180 = papyracea.

Pendida, Roth, Tent. FL Germ. i. 405=alba.

Persici/oUa, Hort. ex C. Koch, Dendiol. ii. H. 641 = lutea.

Pinnata, Landmark, in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. (1790) 181. f. 6 = Alnus incana.

Ptri/olia, Hort. ex C. Koch, Deudrol. ii. II. 646 = papyracea.

Pontica, *Desf. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 201,-As. Min.

Pontica, Hort. ex Loud. Encyc. PI. 720=alba.

Populifolia, [Dryand. in] Ait Hort. Kew. ed. I. iii. 836 =alba.

Pubescens, Ehrh. Beitr. iv. 160; et vi. 98 =alba.

Pnmila, *Linn. Mant.* i. 124.—Am. bor.

Pumila, J. Vahl, ex Lange, Consp. Fl. Groenl. i. 114 =alpestris?

*uebeccensis. Burg, in Ges. Naturf. Fr. Berl. Schr. T. (1784) 196 = humilU.

*ticulata, Laestad. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 169 = alba.

*ticulata, Rupr. in Bull. Phys-Math. Acad. Pétersb. **. (1857) 378=humilis.

*hombiflia, Tausch, in Flora, xxxriil. (1888) 752 = alba.

rotundifolia, Regel & Tiling, Fl. Ajan. 118 = Middendorffii.

*°tundifolia, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. II. xv. (1841) 194 -glandnlosa.

*t^a, Hort. ex Regel, in DC. Prod. xvi. II. 167 •alba.

BETUTiA:—

rubra, Michx. Hist. Arb. ii; 143. t. 3=nigra.

rugosa, Ehrh. Beitr. iii. 21=Alnns serrulata.

rustica, Laestad. in Bot. Notiser, 1856 (1857) 104 = alba.

Schmidtii, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxviii. (1865) II. 412.-Manchuria.

serrulata, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 338 = Alnns serrulata.

sibirica, Lodd. ex Regel, in DC. Prod. xvi. n. 173 = humilis*

silvatica, Laestad. in Bot. Notiser, 1856 (1657) 108 = alba.

silvestris, Laestad. 1. c. 107= alba.

Soeolowii, Jacq. f. ex Regel, in DC. Prod. xvi. il. 178 = humilis.

Sokolowii, Hort Petrop.ex Regel, 1. c. 163=alba.

subaequalis, Laestad. in Bot. Notiser, 1856 (1857) 109 =alba.

subalpina, Laestad. 1. c. 110=alba,

tianschanica, *Rupr. Serf. Tiansch.* 72.—As. centr.

tiliaefolia.LaesbuA. in Bot Notiser, 1856 (1857) 106 = alba.

tomentosa, Retz. & Abel, Bescfar. Holzarten, i. 17. t. 15=alba.

torfacea, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 9=alba.

tortuosa, Ledeb. Fl. Ross. iii. 662=alba,

transsilvanica, *Schur, in Verk. Siebenb. Ver. Naturm.* iv. (1858) 68.-Hungar.

triphylla, *Tkunb. Diss. Betul.* 12.—Hab.!

tristis, *Wormsk. ex Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 401. —Kamtschat.

turfosa, WeigeL ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 174 = outicosa.

ulmifolla, *Sieb. &• Zucc. in Abh. Akad. Muenck.* iv. in. (1846) 228.—Japon.

urticaefolia, Curtois, ex Steud. Nom. ed. II. i. 201 = alba?

urticifolU, *Regel, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xiii. (1861) 116.—Suecia (cult.),

ntilis, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 58.—Reg. Himal. ; Japon.

verrucosa, Ehrh. Beitr. T. 161; vi. 98=alba.

mrgata, Salisb. Prod. 896= alba.

mrgultosa, Fries, ex Regel, in Nonv. Mém. Soc. Nat Mosc. xiii. (1861) 115=urticifolia.

viridis, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 789 = Alnns viridis.

BETULASTER, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. II. xv. (1841) 198-Betula, Tourn. (Cupulif.).

acuminata, Spach, 1. c. = Betula alnoides.

affinis, Spach, 1. c. 199 = Betula alnoides.

cylindrostachya, Spach, 1. c. 198=Betula alnoides.

nitida, Spach, 1. c. 200 = Betula alnoides.

BEURERIA, Ehret, PI. & Pap. Rar. t. 13 (1765) = Calyoanthus, Linn.

BEURRERIA, Jacq. Enum. PI. Carib. 2 (1760) = Bourreria, P. Br. (Borag.).

BEVERNA, Adans. Fam. ii. 20 (1768)=Irie, Tourn.?

BEYERIA, Miq. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. i. (1844) 350. t. 16. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 268.

BEYERIOPSIS, Muell. Arg. in Linnaea, xxxir. (1865) 56.

CALVFTROSTIGMA, Klobsch, in Lehm. PI. Preiss. i. 175 (1844).

Backkousii, Hook. f. Fl. Tasm. i. 339=opaca.

brevifolia, *Baill. Adansonia,* vi. (1865-66) 809.—Austral.

cinerea, *Baill. I. c*— Austral,

cyanescens, *Benth. Fl. Austral,* vi. 66.—Austral,

cygnorum, *Baill. Adansonia,* vi. (1866-66) 809.—Austral.

Drummondi, *F. Muell. Census,* 18.—Austral,

lasiocarpa, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 69.—Austral.

latifolia, *Baill. Adansonia,* vi. (1866-66) 304.—" Austral.

ledi/olia, Sond. in Linnaea, xxviii. (1856) 566-opaca.

lepidopetala, *F. Muell, Fragm.* i. 280.—Austral.

Leschenaultii, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 307 = opaca.

BETEBIA:—

loranthoides, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 408.—Austral.

oblongifolia, Sond. in Linnaea, xxviii. (1856) 564 = viscosa.

opaca, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1865) 16.—Austral.

similis, *Baill. Adansonia,* vi. (1865-66) 809.—Austral,

trbtigma, *F. Muell. Fragm.* vi. 181.—Austral,

nncinata,/-. *Muell. ex Baill. Adansonia,* vi. (1866-66) 806.—Austral,

viscosa, *Miq. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. i. (1844) 360. 115.—Austral.

BEYERIOPSIS, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865) 66=Beyerla, Miq. (Euphorb.).

brevifolia, Mnell. Arg. 1. c. 68.- Beyeria brevifolia.

cinerea, Mnell. Arg. 1. c. 57 = Beyeria cinerea.

cyanescens, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 200 = Beyeria cyanescens.

cygnorum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866) 66 = Beyeria cygnorum.

Drummondi, Muell. Arg. 1. c 58-Beyeria Drummondi.

lasiocarpa, Mnell. Arg. 1. c. 59-Beyeria lasiocarpa.

latifolia, Muell. Arg. 1. c. 57 = Beyeria latifolia.

lepidopetala, Mnell. Arg. 1. c. = Beyeria lepidopetala.

similis, Muell. Arg. 1. c. 58-Beyeria similis.

KEYBICHIA, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 21. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 949.

ACKETARIA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, it (1827) 566, nomen prius.

ajugoides, Benth. Scroph. Ind. 9, in nota=ocymoides.

noribunda, *Benth. in DC. Prod.* x. 879.—Bras,

ocymoides, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 21.—Bras,

scutellnrioides, *Benth. Scroph. Ind.* 9, in nota—Bras,

villosa, *Benth. I.* c.-Bras.

BEYTHEA, Endl Gen. 1011 (1840)-Elaeooarpus, Linn. (Tiliac).

bifida, Endl. 1. c.=E. bifidus.

BEZANILLA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 109. t. 46 (1849)=FBilooarphua, Nutt. (Compos.).

chilensis, Remy, 1. c. 110.—Chili.

BHESA, Buch.-Ham. ex Am. in Edinb. Phil. Journ. xvi. (1884) 315=KurrlmU, Wall. (Celastr.).

Moja, Buch.-Ham. 1. c. = K. pnlcherriana.

paniculata, Am. 1. c. = K. paniculata.

BIA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 189-Tragia, Linn. (Euphorb.).

alienata, F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Mcddel. (1867) 131=T. Sellowiana.

Lessertiana, Baill. Etud. Gén. Euph. 502 - T. Lessertiana.

Lhotzkyana, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 190=T. Sellowiana.

Sellowiana, Klotzsch, 1. c = T. Sellowiana.

BIANCAEA, Todaro, Nuov. Gen. 21 (1858) = Caesalpinla, Linn. (Legum.).

mimosoides, Todaro, Hort. Bot. Panorm. 3 = C. mimosoides.

Sappan, Todaro, 1. c. = C. Sappan.

scandens, Todaro, Nuov. Gen. 22; et 1. c. 4. t. 1 = C. sepiaria.

BIABTJM, Schott, Melet. i. 17 (1832). *AROIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 966.

CYLLENIUM, Schott, Gen. Aroid. t. 9 (1858).

HOMAID, Adans. Fam. ii. 470 (1763), nomen prius.

ISCHARUM, Blume, Rumphia, i. 144. t. 29 (1835).

LEPTOPETION, Schott, Gen. Aroid. t 8 (1858).

STENURUS, Salisb. Gen. PI. Fragm. t 6 (1866).

abbreviatum, Schott, Prod. Aroid. 62-tenuifolium.

alexandrinum, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 6-OUvieri.

Anguillarae, Schott, Prod. Aroid. 62 = tenuifolium.

angustatum, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 256.—Oriens; Syria.

arundanum, Boiss. & Rent Pugill. 110 = tenuifolinm.

BIABTTM:—
Bovei, *Blume, Rumphia,* i. 114. t. 29.—Syria; As. Min.
carduchorum, *Engl. in DC. Monog. Pkan.* ii. £75.—As. Min.; Syria.
constrictum, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 12 •= tenuifolium.
eximium, *Engl. in DC. Monog. Pkan.* ii. 576.—Cilicia.
Fraasianam, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* zviii. (1880) 254.—Orient.
gramineum, Schott, Melet i. 17=tenuifolium.
Haenseleri, *Willk. in Bot. Zeit.* v. (1847) 49. t. 2.—Hispan.
Homeid, *Blume, Rumphia,* i. 115.—Oriens.
Lehmanni, Bunge, in Me'm. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 827 = Helicophyllum Lehmanni
longifolium, *Panel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 891.—Algeria.
macroglossnm, *Pomel, 1. c.* 890.—Algeria,
numidicum, *Part. Fl. Ital.* ii. 248.—Numidia.
Olivieri, *Blume, Rumphia,* i. 115.—Aegypt.
Pyrami, *Engl. in DC. Monog. Phari.* ii. 576.—Cilicia; Syria.
rhopalospadix, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 12-* Spruneri.
rnpestre, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 891.-Algeria.
Russellianum, *Schott, Prod. Aroid.* 68.—Syria.
Sewerzowi, *Refel, in Act. Hart. Petrop.vi.* (1879) 489.—Caucasus.
Spruneri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 5.—Graecia.
Spruneri, Schott, in Gen. Aroid. t 7=abbreviatum.
tenuifolium, Heldr. ex Nym. Consp. 755-abbreviatum.
tenuifolium, *Schott, Melet.* i. 17.—Hispan.
ZeUborii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1867) 245 = tenuifolium.

BIASLIA, Vand. Fl. Lnsit. et Bras. Spec. 4. t 1. f. 2 11788)=Mayaca, Aubl.

BIASOLETTIA, Koch, in Flora, xix. (1836) I. 168; Bertol. Fl. Ital. iii. 191 (1887) - Ohaterophyllum, Linn. (Umbellif.).
congesta, Nym. Syll. Suppl. 28.—Graecia.
cretica, Nym. Consp. 803-C. creticum.
divaricata, Nym. Syll. Snppl. 28.—Graecia.
macrocarpa, Nym. Consp. 802.—Graecia.
nodosa, Bertol. Fl. Ital. iii. 191 = C. nodosum.
parnassica, Nym. Syll. Suppl. 27—Graecia.
pumila, Nym. Consp. 802.—Graecia.
tuberosa, Koch, in Flora, (1886) I. 168~Carnm cylindricum ?

BIASOLETTIA, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 311=Eupatoriuin, Linn. (Compos.).
elliptica, Pohl, ex Baker, 1. c. = E. trixoides.

BIASOLETTIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 141 (1840?) = Hernandia, Linn. ? (Lanrin.).
nymphaeaefolia, Presl, 1. c—Ins. Marian.

BIASSOLETTIA. Endl. Gen. 1004 (1840) = BIASOLETTIA, Presl (=Hernandia, Linn, t Laurin.).

BIATHERIUM, Desv. Oposc. 72 (18Sl)=Gymnopogon, Beauv. (Gramin.).
foliosum, Desv, 1. c = G. foliosum.

BICCHIA, Parl. FL Ital. iii. 896 (1858) = Habenarfa, Willd. (Orchid.).
albida, Parl. 1. c. 897 - H. albida.

BICHEA, Stokes, Bot Mat. Med. ii. 564 (1812) = Cola, Schott (Stercul.).
solitaria, Stokes, 1. c. 566=C. acuminate.

BICHENIA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1880) 236=Trichocline, Cass. (Compos.).
aurea, D. Don, 1. c. 237.—Chili.
aurieulata, Wedd. Chlor. And. i. 26.—Bolivia.
Berteriana, Stend. Nom. ed. II. i. 202- *aurea.*
Cineraria, D. Don, in Phil. Mag. (1882) 891 = T. Cineraria.
crenata, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. 802.—Chili.
dealbata, D. Don, ex Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 104 = T.dealbata.

BICHENIA:—
plicata, D. Don, ex Wedd. Chlor. And. i. 26 = Trichocline plicata.
reptans, Wedd. 1. c. 25.—Bolivia.
sinuata, D. Don, Phil. Mag. (.1832) 391 =T. incana.

BICORNELLA, Lindl. Bot. Reg. sub t 1701 (1735). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. Geu. iii. 684.
gracilis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 834.—Madag.
fongifolia, *Lindl. 1. c.* 835.—Madag.
parviflora, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 500.—Madag.

BICORONA, A. DC. Prod. viii. 380 (1844)=Melodlnua, Forst. (Apocyn.).
phyllireoides, A. DC. 1. c. = M. phillyraeoides.

BICUCULLA,Borckh. in Roem. Arch. i. n.46 (1797)° Adlumla, Rafin. (1808) (Papav.).
fumarioides, Borckh. 1. c » A. cirrhosa.

BICUCULLARIA, Joss, ex Steud. Nom. ed. II. i. 202 (1840)=Dieentra, Bemh. (Papav.).
canadensis, Juss. ex Steud. 1. c 201 = D. Cucullaria.

BIDARIA, Decne. in DC. Prod. viii. 628 (1844) = Gymnema, K. Br. (Asclep.).
elegans, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 151 - G. montanum.
elegans, Decne. in DC. Prod. viii. 623 = G. elegans.
erecta, F. Muell. in Trans. Phil. lust. Viet. iii. (1859) 59 = G. stenophyllum.
inodora, Decne. in DC. Prod. viii. 624 (Sp. dub.).—Ind. or.
leptophylla, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. iii. (1859) 60=Marsdenia leptophylla.
pergularioidès, Thw. Enum. PI. Zeyl. 198 = G. pergularioides.
pubifiora, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 497.—Java.
syringaefolia, Decne. in DC. Prod. viii. 628 = Marsdenia syringaefolia.
tingens, Decne. 1. c.-G. montannm.
trinervis, Decne. 1. c 624 = G. trinerve.

BIDENS, [Toum.] Linn. Gen. ed. I. 248 (1737) = *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 387.
CERATOCEPHALUS, Vaill. ex Cass. in Diet. Sc. Nat vii. 432 (1817).
DELUCIA, DC. Prod. v. 638 (1886).
EDWARSIA, Neck. Elem. i. 87 (1790).
KERNERIA, Moench, Meth. 595 (1794).
PLURIDENS, Neck. Elem. i. 86 (1790).
Abadiae, *DC. Prod.* v. 601.—Peruv.,
abortiva, Schnm. *8c* Thonn. Beskf. Gnin. PL 881 = pilosa.
abyssinica, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 167 = pilosa, quadriseta.
acaulis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 247.—Paraguay.
Acmella, Lam. Encyc. i. 415=Spilanthes Acmella.
acmelloides, Berg, in Vet Acad. Handl. xxix. II. (1768) 245=Spilanthes Acmella.
adhaerescens, *Veil. Ft. Flum.* 848; viii. t 88.—Bras,
alausensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 235.—Ecuador.
alba, DC. Prod. v. 605=pilosa.
andicola, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 237.—Ecuador.
angustifdlia, Lam. Encyc. i. 416—Spilanthes urens.
angustifolia, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Str. II. vii. (1841) 369.—Ins. Sandvic.
angustissima, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 288.—Mexic.
angustissima, Spreng. Syst. iii. 453=andicola.
anthriscoides, *DC. Prod.* v. 600.—Mexic.
apiifolia, Linn. Syst ed. X. 1203; PI. Jam. Pugill. 22 =Chrysanthellum procumbens.
arborea, Roxb. in Beats. App. 301, 325=Petrobium arboreum.
arguta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 281=heterophylla.
atemmàefolit^Poepp.tyEndl. Nov. Gen. etSp.Vn'. 49.—Peruv.
otriplicifolia, Linn. Cent. ii. 80; Amoen. Acad. iv. 329 «=Isocarpha atriplicifolia.
atrosanguinea, Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed. II. 269 = Dahlia Zimapani.

BIDEN8:—
atrosanguinea, Ortg. ex Regel, Gartcnfl. x. (1861) 40b. t. 847 = Cosmos diversifolius.
australis, Spreng. Syst. iii. 458=Coreopsis micrantha.
Bardanna, Wall. Cat. n. 8291 = Chrysanthellum indicum.
Beckii, *Torr. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 185.—Am. bor.
Berteriana, Spreng. Syst. iii. 454 = Cosmos caudatus.
Bigelovii, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 91.—Am. bor. occ.
bimncronata, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1861) 1.184.—Ins. S. Doming.
bipinnata, Baill. Hist PI. viii. 60 = Cosmos bipinnatos.
bipinnata, Hook. & Am. in Bot. Beech. Voy. i. 80 = chilensia.
bipinnata, *Linn. Sp. PI.* 832.—Reg. trap.
Bonplandii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 308 —Cosmos tenellus.
brachycarpa, *DC. Prod.* v. 600.—Mexic.
Buchingeri, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 142=Schimperi.
bullata, *Linn. Sp. PI.* 883.—Am. bor.; Europ.
calif arnica, DC. Prod. v. 599= pilosa.
calva, C. B. Clarke, Comp. Ind. 141 = Cosmos sulphureus.
canescens, *Bertol. Fl. Guatimal.* 31.—Guatemala.
cannabina, Lam. Fl. Fr. ii. 44 = tripartita.
caracasana, *DC. Prod.* v. 600.—Venezuela,
camea, *Heer, Ind. Sem. Hort. Turic.* (1842).—Guiana.
carvifolia, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 308 = Cosmos carvifolius.
cancalidea, *DC. Prod.* v. 604.—Mexic.
caudata, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 808 = Cosmos caudatus.
cernua, *Linn. Sp. PI.* 832.—Reg. bor. temp.
Cervantesii, Baill. Hist. PI. viii. 305 - Dahlia coccinea.
chilensis, *DC. Prod.* v. 603.—Chill
chinensis, Willd. Sp. PL iii. 1719-pilosa.
chrysantha, *DC. Prod.* v. 60S.—Ind. occ.
chrysanthemoides, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 186.—Am. bor.
cicntaefolia, *Tausch, in Flora,* xix. (1886) 396.—Hab.l
ciliata, *Hoffmgg. ex Fisch.* b" *Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* vi. 46.-Hab.?
coccinea, Baill. Hist PI. viii. 49 = Dahlia coccinea.
connata, *Mukl. in Willd. Sp. PI.* iii. 1718.—Am. bor.
consolidaefolia, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 1.185.—Peruv.
cordifolia, *Sch. Bip. in Flora,* xxxix. (1856) 861.—Ins. Pacif.
coreopsidis, DC. Prod. v. 599 = rubifolia.
coronata, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. i. 202 = Coreopsis coronata.
Cosmanthus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 185.—Reg. Argent,
costaricensis, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 94.—Costa Rica,
crithmifolia, *H. B.* tr *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 234.—Cuba.
crocata, Cav. Ic. i. 66. t 99 = Verbesina crocata.
cynapifolia, *H. B.* fa* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 235.—Cuba.
daucifolia, *DC. Prod.* v. 601.—Mexic.
decolorata, *H. B. & K. Nov. Gtn. et Sp.* iv. 238.—Mexic.
decomposita. Wall. Cat. n. 298=pilosa.
decussata, Pav. ex Steud. Nom. ed. II. i. 202 = hispida.
delphinifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 284.—Mexic.
denudata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 183 = Glossogynetenuifolia.
dichotoma, *Desf. Tabl.* ed. I. (1804) 104.—Bras.
Dilleniana, *Hill, Veg. Syst.* iii. 128.-Hab.?
diversifolia, *Ortg. in Regel, Gartenfl.* (1861) 408.—Mexic.
diversifolia, Hort. ex DC. Prod. v. 602 = grandiflora.
diversifolia, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 308 —Cosmos diversifolius.
diversifolia, Willd. ex DC. Prod. v. 602 = alausensis.
dondiaefolia, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 155.—Mexic.

BIDEITS:—
elongata, *Tausck, in Mora,* xix. (1886) 395.-Hab. ?
exaristate, *DC. Prod.* v. 600.—Mexic.
fastigiata, Michalet, in Mem. Soc. Emul. Doubs, Sir. H.v. (1854) 29-tripartite,
feralaefolia, *DC. Prod.* v. 60S.—Mexic.
ferulaefolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 202, partim=procera.
fgruida, Lam. Encyc. i. 416=Spilanthes Acmella.
nstulosa, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. Hi. 250.—Bras.
fixa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 807, sphalm. - fnsca.
nagellaris, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 248.—**Bras.**
floribunda, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 238.—Ecuador.
foeniculifolia, DC. Prod. v. 603=procera *1*
foliosa, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 66, nomen. —Hab. ?
frondosa, Bnch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 809 = tripartite.
frondosa, *Linn. Sp. PI.* 882.—Am. bor.
frutescens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=-SaImea grandiceps.
fruticosa, *DC. Prod.* v. 596.—Hab. 1
fruticosa, Linn. Sp. PI. 838 = Wulffia stenoglossa.
•ruticulosa, *Meyen V Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* »x. *Suppl.* i. (1848) 271.—Peruv.
Asm, Lam. Encyc. i. 416=Spilanthes Acmella.
Gardneri, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 246.—Bras.
glaberriroa, *DC. Prod.* v. 601.—Am. austr.
glycinaefolia, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. "I. 247.—Bras.
Sfacilis, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 868.—Ins. Sandvic
gracilis, Ton. in Ann. Lye. N. York, it (1828) 215 = Thelesperma gracile.
pandiflora, *Balb. Cat. Hort. Taur.* (1812) 19.—Am. austr.
paveolens, *Mart, in Isis,* (1824) 690.—Bras.
*h*awaiensis,i4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 128. —Ins. Hawai.
**elianthoides,* H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 280 = chrysanthemoides.
neterophylla, *Orteg. Hort. Matr.* 99. t. 12.—Am. bor. , occ.; Mexic.
"eterosperma, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 90.—Arizona.
hirsuta, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 369 = pilosa.
Mrsuta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 110=Salmea hirsuta.
A"fa, Jord. in Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 168=bnllata.
Wrtella, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 232.—Mexic.
nispida, *H. B. V K. 1. c.* 237.-Venezuela.
Humboldtii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 307 =- Cosmos parviflorus.
nnmilis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* Iv. 234.— Ecuador.
hbrida, Thnill. Fl. Par. ed. II. 422 ^tripartite.
tncisx, G. Don, in Sweet, Hort Brit. ed. III. 360 = rubifolia.
\nsipida. Lam. Encyc. i. 416=Spilanthes insipida.
'ntermedia, Opiz, ex Nym. Consp. 848 = tripartite.
Jardinii, *Sch. Bip. in Flora,* xxxix. ^1856; 360.—Ins. Pacif.
Kotschyi, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 168 = bipinnata.
•aciniata, *Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Ft. Aethiop.* 283, nomen.—Afr. trop.
lantanoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 128.-Ins. Pacif.
J-emmoni, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 297.—**Arizona.**
'fucantka, Poepp. ex DC. Prod. v. 604=chiIen»is.
« « » « « , Willd. Sp. PI. iii. 1719=pilosa.
leucorrhiza, *DC. Prod.* v. 605.—China.
Leyboldii, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* ii. (1865) 388.—**Chili.**
Lindleyi, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 807 = Cosmos tennifolins.
hnearifolia, Sch. Bip. 1. c - Cosmos linearifolins.
linearifloba, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. ;1873) , 99. t. 60.—Afr. trop.
\ongifolia, DC. Prod. v. 697-heterophylla.
'-xurians, Willd. Ennm. Hort. Berol. 847-heterophylla.
macranthu, *Griseb. in -Goett. Abh.* xix. (1874) 186.—Keg. Argent.

BIDENS:—
macrosperma, Fisch. Hort. Gorenk. (1808) 59; ed. II. (1812) 87 - parviflora.
marginata, Perr. ex DC. Prod. v. 681 -Chiysanthellum indicum.
megapotamica, *Spreng. Syst.* iii. 454.—Am. anstr.
Messerschmidii, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 618 = parviflora.
Meyeniana, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1848) 271.—China.
micrantha, Gaudich. Voy. Freyc. Bot. 464, 85 = Coreopsis micrantha.
minima, Hnds. Fl. Angl. 310=ceraua.
mollis, *Poepp. (f Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 49.— Ecuador.
monticola, Poepp. & Endl. 1. c 49. t. 255=rubifolia.
multifida, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 186 = parviflora.
mutica, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1834) 368 = Coreopsis macrocarpa.
***myrrh\di(olin,Tausch,inFlora,* xix. (1886) 894.—Hab.!**
nivea, Linn. Sp. PI. 883 = Melanthera hastate.
nivea, Sw. ex Stead. Norn. ed. IL i. 203 = Melanthera deltoidea.
nodiflora, *Linn. Sp. PI.* 832.—Ind. or.
Novae-Caledoniae, *Forst. ex Schlecht. in Linnaea,* x. (1835-36) 480 (Cf. Glossogyne pinnatifida).—N. Hebrid.
nudiflora, Stend. Nom. ed. II. i. 203 sphalm. = nodiflora.
ocymifolia, Lam. Encyc. i. 416; Illustr. t. 668. f. 8 = Spilanthes alba.
odorata, *Can. Ic.* i. 9.1.18.—Mexic.
odorata, Dum.-Cours. Bot. Cult. iv. 241; G. Don, in Loud. Hort. Brit. 236 = grandiflora.
oleracea, Cav. ex Steud. Nom. ed. II. i. 203 = Spilanthes Acmella.
ostruthioides, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 808.—Mexic.
oxyodonta, *DC. Prod.* v. 600.—Ins. S. Doming,
paleacea, *Vis. in Nuov. Saggi Ace. Padov.* v. (1840) 266.—Nubia.
paniculata, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 66.—Ins. Tahiti,
paradoxa, *D. Don, ex Hook. V Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1840) 319.-Chili,
parviflora, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 840.—Sibiria; China.
patula, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. vii. (1848) 405=rubifolia.
pauciflora, Poir. Encyc. Suppl. i. 630=parviflora.
pectinate, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 528, nomen. —Bolivia,
peduncularis, *Gaudich. Voy. Freyc. Bot.* 464.—Ins. Sandvic.
perianthomega, Steud. Nom. ed. II. *i.* 208, sphalm. = Bignonia perianthomega.
petiolata, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1884) 99 -connate.
pilosa, *Linn. Sp. PI.* 832.—Ind. occ.; Am. austr.
pinnate, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. L Art. iv. 8.—Malaya.
pinnatifida, Forst. ex DC. Prod. v. 693 = Coreopsis micrantha.
pinnatifida, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 8190= Glossogyne pinnatifida.
platycephala, Oerst. Ind. Sem. Haun. (1859) 27 ; et in Linnaea, xxx. (1859-60) 758 = tripartite,
polycephala, *Sch. Bip. in Flora,* xxxix. (1866) 860.—Ins. Pacif.
portorlcensis, *Spreng. in DC. Prod.* v. 601.—Porto Rico,
procera, *D. Don, in Bot. Reg.* t. 684.—Mexic.; **Arizona,**
procumbens, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 232.— Mexic.
pnlcherrima, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 528, nomen.—Bolivia.
pumila, Steud. Nom. ed. I. 108 = tripartite.
purpurea, DC.Prod. v. 604=Cosmos purpureus.
quadrangularis, DC. 1. c. 600=pilosa.
qvadriaristata, DC. 1. c 695 »chrysanthemoides.
qnadriseta, *Hochst. ex Oliver* b[1] *Hiern, in Oliver, Fl.* *Trop. Afr.* iii. 393.—Afr. trop.
quinqueradiaia, Zea, ex Steud. Nom. ed. I. 108 = grandiflora.
radiata, Thuill. Fl. Par. ed. II. 432=tripartite.
Ramtilla, Wall. Cat. n. 3191 = Heliopsis platyglossa.
refiexa, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 806.—Mexic
repens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 180 = tripartite.

BIDENS:—
reptans, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 360 =- tripartite.
reptans, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 808 = Cosmos divcrsifolius.
rhombifolia, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 54.—Peruv.
Riedelii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. lit. 246.—Bras.
rigida, Hort. Calc. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 141 = Glossogyne pinnatifida.
riparia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 236.— Venezuela.
rosea, Sch. Bip. in Seem. Bot Voy. Herald, 308 = Cosmos pilosus.
rubifolia, *H. B. & K. Nov. Gen.et Sp.* iv. 237. t. 881. —Ecuador,
rugulosa, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 184.—Peruv.
sambucifolia, *Cav. Ic.* iil 15. t 219.—Peruv.; Mexic.
sandwicensis. Less, in Linnaea, vi. (1831) 508 = peduncularis.
Sartorii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 807.— Mexic.
scabiosoides, *Ortg. in Regel, Gartenfl.* (1861) 408.—Mexic.
scabiosoides, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 808 = Cosmos scabiosoides.
scandens, Linn. Sp. PI. 838 = Salmea grandiceps.
scandicina, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 235.—Ecuador.
Schimperi, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* vi. 168.—Abyss,
scorzoneraefolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 247. —Bras.
Seemannii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 307. —Mexic.
serrate, *Pav. ex DC. Prod.* v. 597.—Peruv.
serrulata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. (1829) 186 = Coreopsis anrea.
serrulate, *Sch. Bip. in Flora,* xxxix. (1856) 361.—Ins. Pacif.
silvaticus, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. III. 245=rubifolia.
speciosa, *Gardn. in Hoot. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 126.—Bras,
squarrosa, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 238.— Venezuela.
squarrosa, Less, in Linnaea, v. (1830) 156 = rubifolia.
striata, Schott, ex Sweet, Brit. Flow. Gard. t 237 » pilosa.
subalternans, DC. Prod. v. 600 = pilosa.
sulphurea, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 808 = Cosmos sulphureus.
sundiaca, Blume, Bijdr. 913=pilosa.
tenella, *Linn. PI. Rar. Afr.* 17; *Amoen. Acad.* vi. 96. —Afr. austr.
tenuifolia, Labill. Sert. Anstr. Caled. 44. t. 45=Glossogyne tenuifolia.
tenuifolia, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 395.—Hab. ?
tenuisecta, *A. Gray, PI. Fendl.* 86.—Am. bor. occ.
tereticaulis, DC. Prod. v. 598= rubifolia.
tetragona, *DC. I. c.* 596.—Mexic.
Hnctoria, Baill. Hist. PI. viii. 805-Coreopsis tinctoria.
tridentata, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxiv. (1851) I. 183=Glossogyne tridentata.
trifida, Roxb. Fl. Ind. iiL 411 = tripartite.
tri/oliata, Gueldenst. ex Ledeb. FL Ross ii. 516 = tripartite.
tripartita, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 294-connate.
tripartita, Boj. Hort. Maurit. 183 = pilosa.
tripartita, *Linn. Sp. PI.* 881.—Europ.; Sibir.
triplinervia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 231.—Mexic.
toberosa, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 528, nomen.—Bolivia.
valladolidensis, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. **Herald,** 808 = Cosmos crithmifolius.
valparadisiaca, Colla, in Mem. Ace; Torin. xxviii. (1836)12. t. 24-= chilensis.
mriabilis, Baill. Hist PI. viii. 805 = Dahlia variabilis.
venosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 406 = graveolens.
verticillata, Baill. Hist. PI. viii. 305 = Coreopsis verticillata,
verticillata, *Linn. Sp. PI.* 833.—Mexic.
Wallichii, DC. Prod. v. 698 = bipinnata.
Warszewicziana, *Regel, in Flora,* xxxii. (1849) 183.—Guatemala.

BIDWILLIA, Herbv ex Lindl. Veg. **Kingd.** SOS (1847) nomen. (Liliac). Benth. & Hook. f. **Gen.** iii. 7oS.

BIEBERSTEINIA Steph. ex [Fisch.l Hort. Goicnk. ed. 1.88 (1808); et in Mém. Soc. Nat. Mwc i. (1811) 89. t. 9. *GERANIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 271.
DAYKNIA, Michx. ex Jaub. *Sc* Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 187.
ambigua, Jaub. *Sc* Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 141 = multifida.
Aueheri, Janb. *Sc* Spach, Illnstr. ii. 110 = multifida.
brachypetala, Janb. *Sc* Spach, I. c. 113. t 192 - multi-Ada.
Emodii, *Jaub. V Spach, I. c.* 109.—Tibet oec
leiosepala. *Jaub. V Spach, I. c.* 114. t 198.—Persia.
multifida, *DC. Prod.* i. 708—Syria; Persia; Soongaria.
odora, Royle, lllnstr. Bot. Himal. i. 168. t. 80 = Emodii.
odora, *Steph. ex* [J U] *Hort. Gorenk.* ed. I. (1808) 88; ***et ex Him. Soc. Nat. Mosc.* i. (1811) 89.—Persia.**
Orphanidis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 118.—Graecia; Cilicia.
Rucheri, Walp. Ann. i. 163-mnltifida.

BIELSCHMEIDIA, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Calécl. 176 (1874)~BeilBohmiedia,Nees (Lanrin.).

BIELZIA, Schnr, Enum. PI. Transs. 409 (1866) = Contaurea, Linn. (Compos.).
Schwarmenbergiana, Schnr, 1. c. — C. ruthenica.

BIENERIA, Reichb. f. in Bot. Zeit xi. (1868) 8. t. 1 = Ghloraea, Lindl. (Orchid.).
boliviano, Reichb. f. 1. c—Bolivia.

BIJSTIAHTIA, Bnnge, in Act. Hort. Petrop. Ti. (1879) II. 425; et in Boiss. Fl. Orient, iv. 945 (1879). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 68.
cyeloptera, *Bunge, II. cc.*—Persia.

BIFOLIUM, G. Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. Fl. Wett. i. 176 (1799)-Maianthamum, Wiggers (Liliac).
cordatum, G. Gaertn. Mey. & Scherb. 1. c 209-M. Bifoliom.

BIFOBA, Hoffm. Umb. Gen. ed. II. 191 (1816). *UMBELLIFERAE*, Benth. & H< ok. f. L 927.
ATREMA, DC. Prod. iv. 260 (1880).
BIFORIS, Spreng. Anleit. ii. 1.685 (1817); etitfRoem. *Sc* Schnlt. Syst. vi. 448 (1820).
CORION, Link & Hoffmgg. Fl. Port. ii. 467 (1820).
americana, *Benth. V Hook.f., ex S. Wats. Bibl. Index,* 415—Am. box.
benghalensis. Wall. [Cat. n, 688] ex DC. Prod. iv. 140 sOenanthe benghalensis.
dicocca^otffM. *Umb.Gen.* ed. II. 192.—Europ.; Oriens.
/loaculosa.Bieb. Fl. Taor. Cane iii. 284-dicocca.
glauta, Wall. Cat. n. 587-Oenanthe bengalensis.
Lonreiri, *Kostel. Ailg. Mtd.-Pharm. Fl.* iv. 1188.— Cochinch.
radians, *Bieb. Fl. Tour. Cauc. Suppl.* 238.—Europ. austr.; Orient,
testiculata, DC. Prod. iv. 249-dieocca.
tesliculata. *Roth, Enum. PI. Phan. Germ.* i. 888.— Reg. Mediterr.

BIFORIS, Sprang. Anleit. ii. 1.6S5 (1817) ; et in Rnem. *Sc* Schult Syst. vi. 448 (1820)=Bifora, Hoffm. (Umbellif.).

BIPUBNABIA, IindL Gen. et Sp. Orchid. 152 (1883). *ORCHWEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. **546.**
ADIPK, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 101 (1838).
STENOCORVNE, Lindl. Bot. Reg. xxix. (1843) Misc. **68.**
albiflora, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 212, nomen.—Bras,
atropurpurea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 162.—Bras,
anrantiaca, *Lindl. Bot. Reg.* (1836) t1876.—Ind. occ
anrea, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 212.—Bras,
aureoralva, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 62.—Bras.
bella, Lem. Jard. Fleor. iii. (1852-68) t. 326-Coeliabella.
bicomaria. *Reichb. f. in /iamb. Garten*,* xix. (1863) 12.—Bras.

BIFKEN'ARIA:—
chlorolenca, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 212, nomen.—Bras.
calcaraU, *Rodrig. I. c.* 213.—Bras.
clavigera, *Reichb. f. in Hamb. Gartena.* xxi. (1865) 296.—Bras.
fragrans, Rodrig. Orch. Nov. ii. 213-inodora.
Hadmmii, Lindl. in Paxt FL Gard. ii. 67 (1851-52) = ScnUcaria HadweniL
Harrisoniae, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1865) 217. **—Hab.†**
inodora, *Lindl. Bot. Reg.* xxix. (1848) *Misc.* 48.—Bras.
leucopetala, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 212, nomen.—Bras,
leucorrhoda, *Reichb. f. in Otto, Hamb. Garten*, xv. (1869) 64.—Hab.!
longicornis, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 98.—Guiana,
melanopoda, *Klottseh, in Otto VDietr.Allg. Garten*.* xxiii. (1855) 105.—Bras,
mellicolor, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) I. 622.—Bras.?
parvnla, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 547.—Bras,
racemosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1848) *Misc.* 62.—Bras,
sabulosa, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 111.—Bras,
vinosa, *Rodrig. I. c.* ii. 212, nomen.—Bras,
vitellina, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 62.—Bras,
tyrianthina, *Reichb. f. Xenia*, i. 61, 223.—Bras.
Wageneri, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 17.—Veneznela.

BIGAMEA, Koen. ex Endl. Gen. 1183 (1840)=Anoi-Btroolactus, Wall. (Dipterocarp.).

BIGELONIA, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 389, sphalm.-BIGELOWIA, Rafin. = Arenaria, Rnpp. (Caryoph.).
elongata, Rafin. 1. c. = A. lanuginosa.
montana, Rafin. 1. c- = A. montana.

BIGELOVIA, Spreng. Syst. i. 366,404 (1827)-Sper-macooe, Linn. (Rubiac).
alata, Bartl. ex Steud. Nom. ed. II. L 208-S. latifolia, longifolia.
angustifolia, Span, in Linnaea, xv. (1841) 820 = S. strictal
commutata, Spreng. Syst. L 404—Diodia maritima.
cornifolia, Heynh. Nom. i. 121-S. capitata.
corymbosa, Bartl. ex DC. Prod. iv. 660—S. corymbose.
***discolor*, Bartl. ex DC. L c. 546 (-.Borreria discolor).**
distans. Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 295 >S. distans.
elata. Bard, ex DC. Prod. iv. 544 =S. latifolia, longifolia.
eryngimdes. Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 360 = S. diffnsa.
gracilis, Spreng. Syst. i. 404—S. ocymoides.
gracilis, Miq. in Verh. Nederl. Inst. Recks III. v. (1852) 13 —Malaya.
Kleinii, Wight *Sc* Am. Prod. 437 = S. stricta.
laevicaulis.Miq. FL Ind. Bat ii. 836=S. ocymoides.
lasiocarpa, Wight *Sc* Am. Prod. 487 - S . stricta.
linearis, Spreng. Syst i. 406-Diodia hyssopifolia.
linifalia, Spreng. L c. 404=S. laevis.
mUracarpoides, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 334 - S . stricta.
myriantha, Miq. 1. c.=S. stricta.
ocymoides, Miq. 1. c 886 =S. ocymoides.
parvifiora, Sieber, ex DC. Prod. iv. 642-S. ocymoides.
parviflora, Spreng. Syst. i. 405 = S. ocymoides.
psylloides, -Bartl. ex DC. Prod. iv. 547-S. tenella.
pumila. Span, in Linnaea, xv. (1841) 320=S. pumila.
pusilla, Spreng. Syst. i. 406-S. pusilla.
Roxburghiana, Wight & Am. Prod. 437 - S . stricta.
Roxburghiana, Wight, 'Cat. n. 1360'^S. ocymoides.
setidens, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 836 = S. stricta.
sociata, Span, in Linnaea, xv. (1841) 320.—Ins. Timor.
striata, Span. 1. c. 821 - S . stricta.
stricta, Blume, Bijdr. 946-S. stricta.
suaveolens, Spreng. Syst i. 404-S. tenella.
tenera, Heynh. Nom. i. 122=S. tenera.
tenuis, Heynh. 1. c. =S. tennis.
umbellata, Spreng. Syst i. 406.—Bras.
vaginata, Spreng. 1. c.=S. laevis.
verticiUata, Spreng. 1. c 404 = S. verticillata.
Zollingeriana, Miq. FL Ind. Bat ii. 886.—Malaya.

BIGELOVIA, Spreng. Neue Entdeck. it 160 (1821) = **SamycUt,** Linn.
brasiliensis. Sprang. L c. «S. Selld.

BIGELOVIA, Sm. in Rees, Cyclop, xxxix. (1819)' ForeBUera, Poir. (Oleac).
acuminata, Sm. 1. c. — F. acuminata.
cassinoides, Sm. L c. = F. cassinoides.
ligustrina, Sm. 1. c—F. ligustrina.
porulosa, Sm. 1. c = F. porulosa.

BIGELOWIA, DC. ex Ging. in DC. Prod. i. 390 (1824) -Noiaettla, H. B. & K. (Viol.).

BIGELOWIA, DC. Prod. iv. 540 (1830) = BIGELOVIA, Spreng. = Bpormaoooo, Linn. (Rubiac).

BIGELOWIA, DC Prod. v. 329 (1886). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1232.
CHRVSOTHAMNUS, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. - Ser. II. vii. (18411 828.
ISOCOMA, Nutt. 1. c. 820 (1841).
LINOSYRIS, Ton. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 232 (1841).
acradenia, *Greene, in Bull. Torrey Club,* x. (1888) 126.—Am. bor. occ.
albida, *Af. E. Jones, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 209.—Am. bor. occ.
arborescens, *A. Gray, I. c.* viii. (1873) 640.—Calif.
Bigelovii, *A. Gray, I. c.* xvii. (1881-82) 209.-N. Mexic; Colorado.
Bolanderi, *A. Gray, I. c.* viii. (1873) 641.—Calif,
brachylepis, *A. Gray, in Bot. Calif*, i. 614.—Calif.
carnosa, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1282, 265-Aster camosus.
cernminosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vUL (1873) 643.—Calif.
Coopcri, *A. Gray, 1. c.* 640.—Calif,
coronopifolia, *A. Gray, 1. c.* 688.—Texas,
depressa, *A. Gray, I. c.* 648.—Am. bor. occ.
diHusa, *A. Gray, I. c.* **640.**—Calif.
Dougtasii, A. Gray, I. c. 644 = visddiflora.
dracinculoides, *DC. Prod.* v. 329.—Am. bor.
Drummondii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 689.—Texas.
Engelmanni, *A. Gray, I. c.* xi. (1876) 75 Am. bor. occ.
fnliginea, *A. Gray, 1. e.* viii. (1873) 638.—Ecuador.
fnrfuracea, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i n . 3 (1885) 87.—Calif.
graveolens, A. Gray, in Proc. Am. Acad.' viii. (1878) 644=dracnnculoides.
Greenei, *A. Gray, 1. c.* xi. (1876) 75.—Colorado.
Hartwegi, *A. Gray, ex HemsL Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 116.—Mexic.
Howardi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1878) 641.—Colorado.
hypoleuca, *A. Gray, I. c.* 688.—Ecuador.
intricata, A. Gray, 1. c xviL (1881-82) 208-Aster carnosns.
jnncea, *Greene, in Coult. Bot. Gazette,* vi. (1881) 184. —Arizona.
lanceolata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 689-viscidiflora.
leiosperma, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. **189.—** Am. bor. occ
Mandonii, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 1232, 366.—Bolivia!
Menziesii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 688.—Am. bor. occ.
missouriensis, DC. Prod. v. 329—dracunculoides.
mobavensis, *Greene, ex A. Gray, Syn.Fl. N. Am.* i. "• 138.—Am. bor. occ.
nevadensis, *A. Gray, 1. c.* 136.—Calif,
nudata, *DC. Coll. Mem.* ix. t. 6.—Am. bor. or.
oppositifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) **827—Mexic.**
panicnlata,^. *Gray, I. c.* viii. (1873) 644.—Am. bor. occ.
Parishii, *Greene, in Bull. Torrey Club,* Ix. (1882) 62. —Calif.
Parryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1878) 642. —Colorado.
plmiflora, *A. Gray, 1. c.* 689_Colorado I
pnlchella, *A. Gray, I. c.* 643.—Texas; N. Mexic.
ranralosa, *Benth. tf Hook./. Gen.* ii. 1232, 256.—Am. bor.
rupestris, Greene, in Conlt Bot Gazette, vi. (1881) 188 —Aplopappos enneatus.
spathulata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 74 =Aplopappus coneatua.
teretifolia, *A. Gray, 1. c.* viii. (1878) 644.—Calif.: Arizona.
tridentata, Greene, in Bull Torrey Club, x. (1888) 12« **—venesta.**

BIGELOWIA:—
"niligulata, DC. Prod. v. 329=Solidago neglecta.
v«eyi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 68.—Colorado.
v«eta, *A. Gray, I. c.* viii. (1878) 688.-Calif.; Mexic.
mrgata, DC. Prod. v. S29=nudata.
^adiflora, *DC. I. c.* vii. 279.—Am. bor.
Wnghtii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viiL (1878) 689.—Am. bor. occ

WGGINA, Rafin. Alsog. Am. 14 (1888) = Salix, Tonra.
"tgustata, Rafin. 1. c = S. cordata?
argentea, Rafin. 1. c. = S. argentea.
conifera, Rafin. 1. c. - S. humilis.

BIGLAMDTJIiABIA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 416. *GENTIANEAE.*
"urea, *Karst. I. c.* 417.—N. Granat.

WGLANDULARIA, Seem, in Card. Chron. (1868) 788 = 8innlngia, Nees (Gesnerac).
conspicua, Seem. L c—Bras,

BIQWONIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1785) *B1GNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1088.
ANISOSTICHUS, Bur. Monog. Bign. 48. t 6 (1864).
CLEMATITARIA, Bur. 1. c. 44 (1864).
CREMASTUS, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. „ (1868) 187.
CWPULISSA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 67 (J886)\
t-VDJSTA> MierSj J,, p,,^ Roy, Hort, g^ ij i, (1868) 191.
DOXANTHA, Miers, 1. c. 188 (1868).
ENDOLOMA, Rafin. Sylva Tellur. 79 (1888).
HIERANTHES, Rafin. 1. c. (1838).
OOISCA, Rafin. 1. c. 80 (188a).
ftWTERPA, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1868) 165.
PARAGONIA, BUT. in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) 17.
PENTELESIA, Rafin. Sylva Tellur. 146 (1838).
«TASTOMA, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. „ (1863) 193.
PHAEDRANTHUS, Miers, 1. c. 182 (1868).
PLEONOTOMA, Miers, 1. c. 184 (1888).
™NGELIA, Rafin. Sylva Tellur. 78 (1888).
PROTERMA, Rafin. 1. c. 80 (1888).
PVROSTECIA, Presl, in Abh. Boehm. Ges. V. iii. „ (1845) 52S (Bot. Bemerk. 93).
JBKEREA, Rafin. Sylva Tellur. 107 (1838).
fcTiisoPHYLLUM, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1868)197.
TEMNOCYDIA, Mart, ex DC. Prod. ix. 148 (1845).
^c*ttflora,* Mart, ex DC. Prod. ix. 181-Lundia utidula.
»cotissima, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 691 Bras.
actwtiflora, *Schlecht. I. c.* xxvi. (1853-66) 376.—Mexic.
adenophylla, Wall. Cat. n. 6602 = Heterophragma aueniophyHum.
adhaiiodaeUlia, *Jacq. Fragm.* 61.—Venezuela,
"equmoctialis, *Linn. Sp. PI.* 648.—Am. trap.
ae°tionoctialis, Sieber, ex DC. Prod. ix. 146 - B. Unguiscatl
ae^uli/olia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 140 = Tabebuia aesculifolia.
A"culu,, Desf. Cat Hort Par. ed. III. 89.7=Tecoma Aesculus.
•">?», *G. Dan, Gen. Syst.* iv. 217.—Bras,
wicana, *Urn. Encyc.* L 424.—Afr. trop.
*Aenus*astus,* Cham, in Linnaea, vii. (1832) 673 = Arrabidaea Agnus-castus.
alata, Pav. ex DC. Prod. ix. 224-Tecoma Guarume.
alba, Aubl. PI. Gui. ii 658=Spathodea bracteosa.
albida, Blume, in Verb. Bat Gen. ix. (1825) 195= Aeschynanthus purpurascens.
"Undo, Steud. Norn. ed. II. i. 204 = Aeschynanthus "B»$«foli$.
alb:iflora, *Saltm. ex DC. Prod.* ix. 167.—Una.
a'tamandaeflora, *Benth. ex Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 186, nomen.—Bras.
MUacea, *Lam. Encyc.* i. 421.—Guiana,
"wara, Loud. Hort. Brit. 488; ex G. Don, Gen. Syst. 'v. 222=Stereospermum hypostictum.
*anP*na,* Wall. Cat. n. 6512; et PI. As. Rai. ii. 78. t. 18"Stereospennum hypostictom.
"nastomosans, *DC. Prod.* ix. 144.—Madag.

BIGNONIA:—
Andrienxii, *DC. Prod.* ix. 166.—Mexic.
angrensis, *Veil. Ft. Flum.* 246; vi. t 23.—Bras.
angustifolia, Blume, Cat. Hort. Buitenz. 82=Aeschynanthus angustifolia.
antisyphilitica. Mart. Reise Bras. i. 283-Cybistox ADtisyphiliticfl.
apurensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 188.—Venezuela.
aquatUis, E. Mey. in Nov. Act. Nat Cur. xii. (1826) 780-Tabebuia fluviatilis.
araliacea, Cham, in Linnaea, viL (1882) 683-=Tecoma araliacea.
argyrea, *Andri, in Rev. Hortic.* (1866) 261.—Hab. I
argyreo-violascens, *Hort. ex Lem. lllustr. Hortic.* (1866) t 469.—Hab.)
Arrabidae, *Steud. Norn.* ed. II. i. 204.—Bras.
Arthrerion, Mart. Herb.Fl. Bras. 287=Distictis Arthrerion.
articulata, Desf. in Poir. Encyc Suppl. i. 636 = Pnyllarthron Noronhianum.
arvensis, Veil. Fl. Flum. 260; vi t. 40 - Anemopaegnui mirandum.
atrovirens, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 171=Tecoma atroviiens.
atrovirens, Roth, Nov. Sp. 284 = Dolicbandrone falcata.
aurea, Manso, Enum. 40=Tecoma aurea.
auriculigera, Mart, ex DC. Prod. ix. 194=Pithecoctenium stipulacea.
australis. Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 34=Tecoma australis.
Atedarachia, Kon.& Sims, Ann. Bot. i. (1805) 678 = Millingtonia hortensis.
Baclei, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 171-Pithecoctenium cynanchoides.
Balbisiana, *DC. Prod.* ix. 163.—Bras.
Banaibanai, Callery, ex Bur. in Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 195=-Sterospermum Banaibanai.
barbata, E. Mey. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1826) 782=Tecoma barbata.
Bellas, *Sellow, ex Steud. Norn.* ed. II. i.«04.—Bras.
bibracteata, Bert, ex DC. Prod. Ix. 240 = Bravaisia ñoribundft,
Biriwilliana, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 19.—Hab.?
bijuga, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 68.—Madag.
binata, Thunb. Diss. PI. Bras. iii. 86. n. S!7=Anemopaegma racemosum.
bipinnata, Salzm. ex DC. Prod. ix. 230=Jacaranda nitida.
BlanchetU, *DC. 1. c.* 164.—Bros.
Bojeri, *DC. 1. c.* 165.—Madag.
botryoides, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 100 = Pithecoctenium botryoides.
brachycalyx, *Klotzsch, in Schomb. Fauna* b* *Fl. Guy.* 1086.—Guian.
brachypoda, *DC. Prod.* ix. 145.—Bras.
bracteata, Cham, in Linnaea, vii (1882) 692=Adenocalymna bracteatum.
bracteolata, *DC. Prod.* ix. 157.—Bras,
bracteosa, *DC. I. c.* 165.—Madag.
brasiliana, Lam. Encyc. i. 425 = Jacaranda brasiliana.
buccinatoria, *Mairet, ex DC. Prod.* ix. 195.—Mexic.
caerulea, Linn. Sp. PI. 626= Jacaranda caroliniana.
caUistegioides, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 712= Cuspidaria callistegioides.
calycina, *DC. Prod.* ix. 160.—Bras.
campanulata, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 711-Cuspidaria campanulata.
candicans, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat Par, i. (1792) 110=Arrabidaea candicans.
capensis, Thunb. Prod. PL Cap. 106 =• Tecoma capensis.
capreolata, *Linn. Sp. PL* 624.—Am. bor.
carichanensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 187.—Venezuela.
Caroba, Veil. FL Flum. 260; vL t 48=Jacaranda Caroba.
Carolinae, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) sub t 46.—Hab. ?
caryophyllea, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 293.—Porto Rica
cassinoides, Lam. Encyc. L 418-Tabebuia cassinoides.
castaneaefolia, *DC. Prod.* Ix. 146.—Peruv.
Catalpa, Linn.Sp. PL 622 = Catalpa bignonioides.
Catkarinae, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 172=Pithecoctenium Catharinae*

BIGNONIA :-
caudata, DC. Prod. ix. 166-Stereospermum caudatum.
caudata, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 382-Stereospermum chelonoides.
caulifiora, Sieber, ex DC. Prod. ix. 241-Colea floribnnda.
Chamberlaynii, *Sims, Bot. Mag.* t 2148.—Bras.
chelonoides, Linn. £ Suppl, 282 = Stereospermum chelonoides.
Cherere, Lindl. Bot. Reg. 11801 = buccinatoria.
Chica, *Humb. tf Bonpl. PI. Aequin.* i. 107. t 81.—Venezuela.
chinensis. Lam. Encyc. i. 428=Tecoma grandiflora.
chondrogona, *Miq. in Linnàea,* xviii. (1844) 611.—Guiana.
chrysanthat Jacq. Hort Schoenb. ii. 46 •> Tecoma chrysantha.
chrysoleuca, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 1S4.—Venezuela.
Cicutaria, Koen. ex Mart, in Denkschr. Akad.Muench. vi. (1820) 153 = Millingtonia hortensis.
dliata, *Wamra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xii. (1862) 237.-Bras.
cinerea, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 172 = Pithecoctenium cinereum.
cinnamomea, *DC. Prod.* ix. 164.—Bras,
citrifolia, *Vitm. Summa Veg.* iii. 511.—Hab. 1
Clematis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 141.—Venezuela.
coccinea, Steud. Nom. ed. I. 109=Tecoma radicans.
coccinea, *Veil. Fl. Flum.* 260; vi. t. 42.—Bras,
cognata, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 70S.—Bras.
Coito, Veil. Fl. Flum,. 243; vi. t. 19 -Spathodea Coito.
Calais, Buch.-Ham. ex Wall. Cat sub n. 6501 = Stereospermum chelonoides.
Colei, Boj. ex Hook. Bot. Mag. t. 2817=Colea mauritiana.
colorata, Poir. Encyc. Suppl. i. 684 = Arrabidaea candicans.
cotnosa, Cham, in Linnaea, vii. (1882) 698=Adenocalymna comosum.
comosa, *Roxb. Hort. Beng.* [96]; *Fl. Ind.* iii. 108.—Ins. Molucc.
compressa, Lam. Encyc. i. 424 = Colea decora.
canjugata, Veil. FL Flum. 243 ; vi.t. 18 = Arrabidaea conjugata.
conspicua, Rich, ex DC. Prod. ix. 221 = Tecoma conspicua.
convoluta, Veil. Fl. Flum. 248; vi. t. 81=Cuspidaria puberula.
Copaia, Aubl. PI. Gui. ii. 650. t. 262=Jacaranda Copaia.
corallina, *Jacq. Fragm.* 37.—Venezuela.
corchoroides, Cham, in Linnaea, vii. (1882) 706 — Arrabidaea corchoroides.
cordata, Veil. Fl. Flum. 247; vi. t. 29-Lnndia cordata.
cordifolia, *DC. Prod.* ix. 162.—Bras.
coriacea, Sellow, ex Steud. Nom. ed. II. i. 204, 205 = SeUoi.
corymbifera, *Vahl, Eel. Am.* ii. 46. t. 17.—Am. austr.
craterophora, *DC. Prod.* ix. 147.—Bras,
crenata, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 242.—Ind. or.
crispa, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort Beng. 47 ; Kl. Ind. iii. 103=Dolicbandrone crispa.
crucifera, Bert ex DC. Prod. ix. 218-Tabebuia rufinervis.
erucigera. Linn. Sp. PL 624-capreolata.
cujabana, *DC. Prod.* ix. 164.—Bras,
cuneifolia, *DC.* A *c.* 167.—Bahia.
cuprea, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 666.—Bras,
cupulata, *Splitg. in Hoev. V De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 6.—Bras.
curialis, Veil. FL Flum. 268; vi. t 65-Jacaranda curialis.
cuspidata, Boj. ex DC. Prod. ix. 248-Periblema cuspidata.
Cymbalum, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 716.—Bras,
cymosa, *Veil. Fl. Flum.* 249 ; vi. t 36.—Bras.
dasyantha, DC. Rev. Bign. ex A. DC. Prod. ix. 172 *{^Pachyptera dasyantha).*—Bras,
decipiens, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.2i2.-Am.* austr.
decomposita, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 260.—Guiana.
densifiora, Mart, ex DC. Prod. ix. 181-Lundia densiflora.
dentata, *DC. I. c.* 162.—Bras.

BIGNONIA:—
dichotoma, *Jacq. Enum. PL Carib.* 25.—Am. anstr.
dichotoma, *Veil. Fl. Flum.* 248 ; vi. t. 32.—Bras,
difficilis, *Cham, in Liunaea,* vii. (1832) 714.—Bras.
digitalis, VelL FL Flum. 261; vi. t. 47 = Zeyheria montana.
digitata, £. Mey. in Nor. Act Nat. Cur. xii. (1825) 782 = Tecoma Meyeriana.
discolor, Boj. ex DC. Prod. ix. 165=Bojeri.
discolor, *R. Br. in Salt, Voy. Abyss. App.* 64, nomen.—Abyss.
discolor, Rich. Sert Astrol. p. xxix=moluccana.
diversifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 133.—Mexic.
dolichoides, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 696.—Bras.
Dombeyana, DC. Rev. Bign. ex A. DC. Prod. ix. 172 - Delostoma nervosum t
Doniana, *DC. Prod.* ix. 145.—Bras,
dubia, *Linn. PI. Surin.* n. 77 ; *Amoen. Acad.* viii. 258.—Guiana.
echinata, Aubl. PI. Gui. ii. 648-Pithecoctenium Aubletii.
echinata, Jacq. Enum. PI. Carib. 25-Pithecoctenium muricatum.
ehretioides, *Cham, in Linnaea,* vii.(1882) 704.—Bras,
elegans, *Cham. 1. c.* 702.—Bras.
elegans, Veil. Fl. Flum. 247 ; vi. t. 27 -exserta.
elliptica, Cham, in Liunaea, vii. (1882) 686 = Tecoma elliptica.
elliptica, *Thunb. Diss. PI. Bras.* iii. 84.—Bras.
elliptica, VelL 1. c. 250; vi. t. 44 = Jacaranda elliptica.
elongata, *Vahl. Eel.* ii. 45. t. 16.—Am. austr.
erubescens, *DC. Prod.* ix. 167.—Bras.
euphorioides, Boj. Hort. Manrit. 219=Stcreospermum euphorioides.
exoleta, *Veil. Fl. Flum.* 248; vL t. 30.—Bras,
exserta, *DC. Prod.* ix. 158.—Bras,
extensa, *Soland. ex Miers, in Proc. Roy. Hort.Soc.* iii. (1863) 196, nomen.—Bras.
fagoides, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 680.—Bras.
falcata, Koen. ex DC. Prod. ix. 20€> = Dolichandrone falcata.
falcata, *VelL FL Flum.* 245 ; vi. t. 17.—Bras,
fallax, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 717.—Bras.
farinosa, Salzm. ex DC. Prod. ix. 185 = Airabidaea virescDS.
fasciculata, Veil. FL Flum. 247 ; u. t. 25 = Arrabidaea fasciculata.
Ferdinandi, *WeVw. Apont.* 584.—Afr. trap,
ferruginea, *Tveedie, ex Miers, in Froc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 190, nomen.—Reg. Argent. ≥
ficifolia, Sleud. Norn. ed. II. i. 204, sphal. = filicifolia.
filicifolia, Anders, in Trans. Soc. Arts. xxv. (1807) 200 =Jacaranda filicifolia.
filiformis, A. Cunn. ex DC. Prod. is. 209-Spathodea filiformis.
fimbriata. Wall. Cat. n. 6500 = Stereospermum fimbriatnm.
flava, *DC. Prod.ix.* 168.—Bras.
ftavescens, Veil. FL Flum. 252; vi. t. 61= Tecoma flavescens.
flavida, *DC. Prod.* ix. 168.—Bras.
floribunda, G. Don, Gen. Syst. iv. 21« = Donlana.
floribunda, *H. B. Cf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 184.—Mexic
florida, Salisb. Prod. 106=Tecoma radicans.
fluminensis, *Veil. Fl. Flum.* 246 ; vi. t 24.—Bras.
fiuviatilis, Aubl. PI. Gui. ii. 655 = Tabebuia fluviatilis.
fiuviatilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 189-Tecoraa barbata.
fiuviatilis, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 212-Tecoma Meyeriana.
Fockeana, *Mia. in Liunaea,* xviii. (1844) 609.—Guiana.
fraxinea, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 398.—Hab.?
fraxinifolia, Spreng. Syst. ii. 833—Spathodea fraxinifolia.
fraxinoides, *Pen. in Mefn. Soc. Linn. Par.* Hi. (1824) 102.—Java.
fruUscens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3=Tecoma stans.
fulva, Cav. Ic iii. 58=Tecoma fulva.
Gaudichaudi, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 172-Lundia pubescens.
Ghorta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8610«Stereoinermum Ghorta.

BIGNONIA :—
Giesbreghtii, *Heller, ex Peyr. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 45.—Mexic.
gigantea, *Noronka, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 8.—Malaya,
glaberrima, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 677.—Bras,
glabrata, *H. B. ff K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 185.—Am. austr.
glandulosa, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 14!).—Bras.
glandulosa, Schum. Beskr. Gain. PL 274-Spathodea adenantha.
glauca, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 137. t. 142 = Tecoma undulata.
glauca, *Wall. Cat.* n. 6506.—Burma,
glntinosa, *DC. Prod.* ix. 162.—Bras,
gnaphalantha, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 105.—Cuba.
gracilis, Lodd. Bot. Cab.t. 1705 = B. Unguis-cati.
grandiflora, Sprang. Syst. ii. 880=grandifolia.
grandiflora, Thunb. Fl. Jap. 253 = Tecoma grandiflora.
grandifolia, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 19. t 287.—Am. anstr.
grandifolia, Veil. Fl. Flum. 247 ; vi. t. 28=Adenocalymna grandifolium et subsessilifolinm.
gratissima, Koen. ex Wall. Cat. sub n. 6499; et DC. Prod. ix. 211=Stereospermum snaveolens.
Guarumt, Domb. ex A. DC. 1. c. 226=Tecoma Guarumé.
guayaqnilensis, *DC. 1. c.* 166.—Ecuador.
haemantha, Bert ex Spreng. Syst. ii. 882-Tabebuia haemantha.
hebantha, Mart, ex DC. Prod. ix. 181 = Lundia hebantha.
heptaphylla, Veil. Fl. Flum. 251; vi. t. 48=Tecoma heptaphylla.
heterophylla, Willd. Sp. PL iii. 298 = B. Kerere.
heteropoda, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 178=Tecoma heteropoda.
heterotricha, DC. 1. c. = Tabebuia heterotricha.
hexagona, DC. 1. c. = Pithecoctenium hexagonum.
hibiscifolia, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 705.—Bras.
hirsuta. Lam. Encyc. i. 222 = Tecoma hirsuta.
hirta, *Veil. Fl. Flum.* 249 ; vi. t. 35.—Bras,
hispida, *DC. Prod.* ix. 152.—Bras,
hondensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 185.—N. Granat.
Hostmanni, *E. Mey. in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1825)11, 779.—Guiana.
Hymenaeo, *DC. Prod.* ix. 158.—Bras,
ignea, *Veil. Fl. Flum.* 244; iv. 1.15^—Bras.
ilicifolia, Pens. Syn. ii. 170=Tabebúia ilicifoUa.
inaequalis, *DC. Prod.* ix. 170.—Guiana.
Imperatoris-Maximiliana, *Wawra, Bot. Ergeb. Maxim. Bras.* 73.—Bras.
incamata, *Aubl. PI. Gui.* ii. 845. t 261.—Guiana.
incisa, Hort. ex DC. Prod. ix. 224 = Tecoma stans.
indica, Linn. Sp. PL 625 = Oroxylum indicum.
indica, Lour. FL Cochinch. 460=Pajanelia multijuga.
inflate, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879; 256.—Keg. Argent,
jasminifolia, *H. B.tfK. Nov. Gen. et Sp.* iii. 141.—Venezuela.
jasminoides, A. Conn, ex DC. Prod. ix. 226=Tecoma jasminoides.
jasminoides, *Thunb. PI. Bras.* iii. 36. n. 28.—Bras.
Kerere, *Aubl. PI. Gui.* ii. 644.—Guiana,
labiata, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 701.—Bras.
lactiflora, Vahl, Symb. Bot. iii. 80. t. 66 = Distictis lacti-flora.
laeta, *Wall. Cat.* n. 6505.—Burma.
lanata, Steud. Norn. ed. II. i. 205=discolor,
lanceolata, *DC. Prod.* ix. 163.—Bras,
lanuginosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* li. 491.—Mexic.
laserpitiifolia, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 168.—Bras.
latifolia, Rich, in Act. Soc Hist Nat. Par. i. (1792) 110 -= Callichlamys riparia.
latisiliqna, *Pair. Encyc. Suppl. I* 632.—Guiana,
lanrifolia, *Vahl. Eel. Am.* ii. 44.—Guiana.
lexiflora, DC. Rev. Bign. 21; Prod. ix. 173=Pithecoctenium laxiflorum.
lenta, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 159.—Bras,
lepidophylla, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 104.—Ins. Pinet. (Ind. occ).
lepidota, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 139 = Tecoma lepidota.

BIGNONIA :-
lepidota, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 197.—Mexic.
leucantha, Veil.. FL Flum. 251; vi. t. 49=Sparatto-spcrma lithontripticum.
leucopogona, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 121 =seq.
Leucopogon, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 7O7—Bras.
leucoxylla, Veil. Fl. Flum. 252; vi. t. 54-Tabebuia leucoxyla.
Leucoxylon, DC. Cat. Bign. ex Prod. ix. 173-Tecoma Salzmanni.
Leucoxylon, Linn. Sp. PL 624 = Tecoma Leucoxylon.
Lindleyi, *DC. Prod.* ix. 147.—Reg. Argent.
linearis, Cav. Ic. iii. 35. t 269 = Chilopsis saligna.
liltoralis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 139.—. Mexic.
longa, Veil. FL Flum. 249 ; vi. t. 87 = Lundia longa.
longifiora, DC. Prod. ix. 206, sphalm. « Pajanelia . Rheedii.
longifiora, Veil. Fl. Flum. 252; vi. t. 52=Tecon» speciosa.
longiflora, *Cav. Ic.* vi. 58. t. 581.—Guayaqnil.
longifolia, Willd. Sp. PI. iii. 306 = Pajanelia Rheedii.
longisiliqua, VelL Fl. Flum. 247; vi. t. 26[s] Arrabidae.
longisiliqua, *Bert, ex Spreng. Syst.* ii. 830.—Venezuela-
longissima, Jacq. Enum. PL Carib. 25 = Catalpa longissima.
longissima, Lour. Fl. Cochinch. ii. 380 = Dolichandrone Rheedii.
Iucida, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 242.—Am. austr.
lugubris, Salisb. Prod. 106-Oroxylum indicum.
Lundii, DC. Rev. Bign. 21, ex Prod. ix. 173 - Pithecoctenium Lundii.
macrophylla, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 689= Adenocalymna mocrophyllum.
macrostachya, *Wall. Cat.* n. 6504.—Burma,
magnifica, *Bull, in Gard. Chron.* (1879) II. 73.—N. Granat.
magnoliaefolu, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 136.—Venezuela.
Mansoana, *DC. Prod.* ix. 157.—Bras,
maranhamensis, *DC. 1. c.* 165.—Bras.
marginata, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 695' Adenocalymna marginatum.
marmoratum, *Hort. ex Andre", in Rev. Hortic.* (1866) 253.—Hab. i
Martini, *DC. Prod.* ix. 152.—Guiana.
Martiusiana, *DC. I. c.* 156.—Bras,
megapotamica, *Spreng. Syst.* iv. 237.—Bras.
meonantha, Link, Enum. ii. 130 = Tecoma australis-
meridionalis, Salisb. Prod. 106 = Tecoma Leucoxylon-
Meyeniana, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *SuPP'-* i. (1843) 366.—Peruv.
microcalyx, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 211.—Guiana.
microphylla, *Lam. Encyc.* i. 418.—Ins, S. Doming.
Mina, *Robin, Voy. Louis,* iii. 408.—Am. bor.
miranda, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 687=Anem°-paegma mirandum.
mollis, *Vahl, Eel. Am.* ii. 46.—Guiana,
mollissima, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 138.—Venezuela.
moluccana, *DC. Prod.* ix. 144.—Ins. Amboina.
moringaefolia, *DC. I. c.* 170.—Guiana,
multifida, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 242.—Ind. or.
multiflora, *Salem, ex DC. Prod. ix.* 160.—Bras.
multijuga. Wall. Cat n. 6503; PL Rar. As. i. 81- *• 95, 96 = Pajanelia Rheedii.
muricata, DC. Rev. Bign. 22, ex Prod. ix. 173-Pithecoctenium muricatum.
muricata, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6511-Stereospermnm xylocarpum.
myriantha, Cham, ex Steud. Nom. ed. IL i. 205[0] Tecoma myriantha.
nematocarpa, Boj. Hort Maurit 219=StereosperniuO> nematocarpum.
nervosa, Domb. ex DC. Prod. ix. 198 = Delostom" nervosum.
nigricans, *Regel, Cat. PL Hort. Aksakov.* 19.—Hab.?
nitidissima, *DC. Prod.* ix. 160.—Venezuela.
nitidula, Mart, ex DC. 1. c. 181 = Lundia nitidula.
noctifiora, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6491* = Stereospermum suaveolens.
nodosa, *Manso, Enum. Cat. Bras.* 40.—Bras,
noterophila, *DC. Prod.* ix. 148.—Bras.

BIGNONIA:—

obliqua, H. B. b- K. Nov. Gen. et Sp. iii. 185.— Venezuela.

oppositifolia, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 439 = atemraadenia pnbescens.

«nata, Spreng. Syst ii. 880-Spathodea obovata.

obovata, Veil. FL Flum. 281; vi. t. 46=Jacaranda subrhombea.

oNusifolia, Lam. Encyc. *I* 418-Spathodea obtusifolia ** Tabebuia uliginosa.

Wicidentalis, *Saltm. ex DC. Prod.* ix. 160.—Bias.

Oc...ta> Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) *«—Porto Rico,

oputhalmica, Chisholm, ex Steud. Norn. ed. II. i. 205. —Uniana.

orbicularis, Jacq. Enum. Pl. Cllrib. 26-Anemopaegma orbiculatum.

otn»ta, Linden, Cat. n. 21 (1887) 1; *E. Morr. Belg.* "S**- xvii. (1867) 102. -Bras.

oxypus, Pnd 169 (c/ *FL Briu Ind* iv 376).

pachyptera, DC. Rev. Bign. 21; ex Prod. ix. 174 (-*^hypterapuoerula^—Bns.*

P«Uda, Ltndl. Bot. Reg. t. 965.—Ind. occ.

pagaorana, Andr. Bot. Rep. t 86=Tecoma australis.

paniculata, Linn. Sp. P1.628-Amphilophnm paniculatum.

pannosa, DC. Prod. ix. 148.-PeniT.

Parkeri, DC. c 167.-Guiana.

parviflora, Rottl. ex Wall. Cat. sub n. 6601-Stereospermum c ..onoides.

parviflora, Salzm. ex DC. Prod. ix. 183 = Amibldae» Salzmanni

patellifera, chleeht. in Linnaea, viii. (1838) 616.— Mexic.

Uiir"h DC. Prod. ix. 174-Tecoma Patrisiana.

P«»ncnlata, ^eH. «. «Mm. 250; vi. t 41.—Bras.

pentaphylla, Linn. Sp. PL ed. II. 870 = Tabebuia pentaphyllg.

P>'yUa, Salzm. ex DC. Prod. ix. 219=Tecoma iMlzmanni.

perr...ChafH- »» Linnaea, vii. (1832) 667.—Bras, ^nauthomega, Frf/. «. /7»m. 248; vi. t 84.—Bras.

petiolaris, Linn. Sp. PI. 626.—Perav.

*petiolata, Dcc» t - Bign. 22; ex Prod. ix. 174=Tecoma Leucoxylon.

phaseoloides, CAo»-»« Linnaea,* vi. (1832) 698.—Bras.

*physaloides> C*a«. A e. 668.-Bras.

*picta, B ' ^ * VV<TO- c «« - rf * "• 136.—Guiana.

picta, Lod- Bot. Reg. (1842) t. 46=Lindleyi.

pilosa, Cu. M Stend- Norn. ed. II. i. 205-villosa.

pilulifera, Act. Soc. Hist. Nat. Par. t. (1792) 111—Guiana.

platyloba, Kna, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 679 = tecliypoda.

P<»Ppigii, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 174=Anemopaegma

P... Wall. Cat. n. 6609 = Stereospermum glandulosum.

Prieurei, &. Prod- "• 16-G«ian»-

procera, Wnid. Sp. PI. W. 307-Jacaranda Copaia.

pseudoun... occ. guis' *Dj. Cat. Hort. Par.* ed. III. 3977—Ind.

pterocarpa, Cham. in Linnaea, ..(1838) 675 = Cuspidaria trifoliata.

pubescens, Lin. A «• « «• 870.-Mexic.

pubescens, Pav> ex C. Prod. ix. 148-pannosa.

pulchella, c «- •» Linnaea,* vii. (1832) 663.—Bras.

pulchra, «<"- /• c 708.—Bras.

*punctata, DC Rev- Bi-«^od- «• 160 - occidentalis.

punicea, Mar- Herb- Pl- Bra- 8S6.—Bras.

purpurea, Lodd- e Sveet, Hort. Brit.* 288, nomen; *Bot. %"*• *• M00—Am. austr.

pyramidata, Rich in Act- So- Hist. Nat. Par. i. (1792) ? > TM...

quadrangularis, Wall. ex Griff. Not. Pl. As. 2, *Locliart, ex Steud. Norn.* ed. II. 1. 206. -ns.

quadrangularis Roxb. PI. Corom. ii. 24. t. 145-heterophragma Roxburghii.

*quadripinnata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 499 = Oroxylum indicum.

BIONOKIA:-

quadrivalvis, yocy. Fragm. 87.—Venezuela.

Quereus, Lam. Encyc. i. 417=Catalpa longissima.

quinquefolia, Veil. FL Flam. 262; vi. t. 50=Cybistax antisyphilitica.

racemosa, *Lam. Encyc.* i. 424.—Madag.

radiata, Linn. Sp. PI. 624=Argylia Feuillei.

radicans, Linn. 1. c.=Tecoma radicans.

ramiflora, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 381=Colea mauritiana.

Regnelliana, *Sond. in Linnaea,* xxii. (1849) 558.—Bras.

Rego, Veil. Fl. Flum. 249-ArrabidaeaSego.

reticulata, Hb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6511 = Stero-spermum xylocarpum ?

Reveili, *Hamon, in Bull. Soc. Hortie. Prat. Rhine,* (1851) 149. t. 8—Hab.?

rhodosantha, *Zipp. ex Blume, Rumphia,* iv. 35.—N. Gain.

rigescens, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 44. t. 210 = Distiotis rige&cens.

riparia,jy. *B.&K.Nov. Gen. etSp.* iii. 188.—N. Granat.

rivularh, Hort. Kew. (1830) ex DC. Prod. ix. 199-Cybistax antisyphilitica.

rosea, DC. Rev. Bign. ex Prod. Ix. 174=Arrabidaea rosea.

rosea, Pav. ex DC. Prod. ix. 198 •= Delostoma dentatum.

rotundata, *DC. 1. c.* 168.—Bras.

rufescens, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 174 = Pithecoctenium rufescens.

rufinervis, Hoffmgg. ex DC. Prod. ix. 213 - Callichlamys riparia.

rugosa, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1858-65) 656.— N. Granat

rupestris, *Gardn. in Hoot. Lond.Journ. Bot.* i. (1842) 179.—Bras.

Sagraeana, *DC. Prod.* ix. 148.—Cnba.

salicifolia, Boch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6498 = Tecoma nndulata,

salicifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 133.— Venezuela*

Salmmanni, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 174-Adenocalymna Salzmanni.

samydoides, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 669.—Bras,

sambucifolia, *Hort. ex Carr. Rev. Hortie.* (1878) 50.— Hab.?

sartrientosa, Bertol. f. Fl. Guatim. 25 = aequinoctialis.

scandens. Veil. Fl. Flum. 246; vi. t. 22 - Anemopaegma racemosnm.

Sceptrum, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 710.—Bras.

Sego, Veil. Fl. Flum. vi. t. 39=Arrabidaea Agnuscast as.

Selloi, *Spreng. Syst.* ii. 831.—Bras.

sempenirens, Linn. Sp. PI. 623=Gelsemium sempervirens.

serrata, Pav. ex G. Don, Gen. Syst iv. 228 =>castaneaefolia.

serratifolia, Vahl, Eel. Am. ii. 46=Tecoma serratifolia.

Serratula, Wall, ex DC. Prod. ix. 206=Stereospermum serrulatum.

serrulata, Steud. Nom. ed. II. i. 206, sphalm.= praec.

Sieieri, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 176=Arrabidaea Sieberi.

simplex, *A. Rich. fl. Cub. Fanerog.* ii. 104.—Cuba.

simplid/olia, Pav. ex DC. Prod. ix. 198-Delostoma integrüolium.

Sinclairii, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 129 =Unrifolia.

sorbifolia, Salisb. Prod. 106-Tecoma stans.

sordida, *JClotisch, in Schomb. Fauna V Fl. Guy.* 1158.—Guiana.

spathacea, Linn. f.Suppl. 283 = Dolichandrone Rheedii.

spathacea, Roxb. PI. Corom. ii. 24. t 144=Dolichandrone falcata.

spedosa, *R. Grah. in Bot. Mag.* t. 3888.—Bras.

spectabilis, Salisb. Prod. 106=Catalpa bignonioides.

spectabilis, Vahl, Symb. Bot. iii. 80 = aequinoctialis.

spicata, *Locihart, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 205.—Ins. Trinitat.

Splendor-sylvae, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 164.—Bras.

squaius, Veil. Fl. Flum. 244 j vi. t. 13 = Pithecoctenium squalum.

squameUulosa, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 174 = Tecoma squamellulosa.

staminea, *Lam. Encyc.* i. 421.—Ins. S. Doming.

stans, Linn. Sp. PI. ed. II. 871-Tecoma stans.

stipulata, Roxb. Hort. Beng. 47; Fl. Ind. iii. 108 = Dolichttndroiic stipulate*

BIGNONIA :—

striata, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 174 *(= Pachyptera striata).*—Bras.

suaveolens, Roxb. Hort Beng. 47; Fl. Ind. iii. 104 - Stereospermum suaveolens.

suierosa.Roxb. 11. cc. 47, 111 -MillingtonU hortensis.

subincana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 491.— Panama.

subvernicosa, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 220-Tecoma subvernicosa.

Tababuya, Veil. Fl. Flum. 251; vi. t 53-Tabebuia uliginosa.

Tagada, Roxb. ex Wall. Cat n. 6501 -Stereospernum chelonoides.

tecomoides, DC. Prod. ix. 166-Tecoma mollis.

tenuiflora, *DC. 1. c.*—Bolivia.

Telfairiae, *Boj. ex Hook. Bot. Mag.* t 2976.—Madag.

tenuisiliqua, *Vahl, Eel. Am.* ii. 43.—Am. austr.

ternata, G. Don, Gen. Syst. iv. 221 =maranhamens's.

ternata, *Veil. Fl. flum.* 246; vi. t. 21.—Bras.

tefragona, Wall, ex DC. Prod. U. 211-Stereospermum tetragonum.

tetragonocaulos, *DC. Prod.* ix. 169.—Bras,

tetragonoloba, *Jacq. Fragm.* 36.—Venezuela,

tetraquetra, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 675.—Bras,

thyrsoidea, *DC. Prod.* ix. 158.—Bras,

tiliaefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. etSp.* iii. 136.—Am. austr.

tinctoria, *Arruda, in Koster, Trav. Brat.* 497.— Bras.

tomentosa, Pav. ex DC. Prod. ix. 219-Tecoma heteropoda.

tomentosa, Rich, in Act Soc Hist. Nat Par. L (1792) 110-mollis.

tomentosa, Thunb. Fl. Jap. 252 = Panlownla imperialis.

triantha, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 148-exoleta.

trichoclada, *DC. I. c.* 168.—Bras.

triflora, Pav. ex DC. 1. c. 148 (est Rnbiacea).

triflora, *Veil. Fl. flum.* 249 ; vi. t. 38.—Bras.

trifoliata, Veil. 1. c. 245; vi. t. 16-Adenocalymna longeracemosum.

triphylla. Veil. 1. c. 244; vi. 114-tritemata.

triphylla. Linn. Sp. PI. ed. II. 870 - Tabebuia triphylla.

triphylla, Willd. ex DC. Prod. ix. 161 = B. Chica.

tripinnata, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art iv. 8.—Malaya,

triplinervia, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 163.—Bras,

triternata, *Steud. Nom.* ed. II. i. 206.—Bras.

Tropaeolum, Jacquem. ex DC. Prod. ix. 223, in nota = Tecoma nndulata.

tuberculata, Roxb. ex DC. Prod. ix. 177=»Oroxylura indicum.

tuierculosa, Veil. Fl. Flum. 251 ; vi. t. 46-Zeyheria montana.

tulipifera, Schum. Beskr. Guin. PL 278=Spathodea tulipiièra.

Tweediana, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) t. 46.—Bras.

uliginosa, Gomez, Obs. ii. 7. t. 2; Mem. Ac. Lisbon, iB. (1812) Mem.dosCorresp. 57-Tabebuiauliginosa.

umbellnlaU, *DC. Prod.* ix. 148.—Bras,

umbrosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 188.—N. Granat

uncata, Andr. Bot Rep. t 630-Macfadyena uncinata.

uncata, Sims, Bot. Mag. t. 1511 =- Spathodea uncata.

uncinata, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esaeq. 210 = Macfadyena uncinata.

undulata, Sm. Exot. Bot i. 85=Tecoma undulata.

unguiculata, *Veil. fl. Flum.* 248; vi. t 83.—Bras.

unguieulata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 121 = B. Unguis-cati.

Unguis, Linn. Syst. ed. X. xiii. n. S~B. Unguis-cati.

Unguis-cati, *Linn. Sp. PI.* 623.—Am. trop.

Vargasiana, DC. Rev. Bign. ex Prod. ix. 175 ^ Anemopaegma Vargasianum.

variabilis, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 45. t 212.—Veneznela.

variabilis, Mart. Herb. Fl. Bras. 256 = varians.

variabilis, Sieber, ex E. Mey. in Nov. Act Nat. Cur. xil. (1825) 779 -Hostmanni.

varians, *DC. Prod.* ix. 149.—Bras,

velutina, *DC. I. c.* 162—Bras,

venusta, *Ker-Gaml. in Bot. Reg. t.* 249.—Bras,

verrudfera, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-56) 655. N. Granat.

verrucosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 187.— Venezuela.

villosa, Bert, ex Spreng. Syst. ii. 8S0=Balbisiana.

villosa, *Vahl, Eel. Am.* ii. 43.—Venezuela.

BIGNONIA:-

viminalis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 132 = Tecoma viminalis.
violacea, *DC. Prod.* ix. 156.—Bolivia.
virginalis, Mart, ex DC. 1. c. 181 = Lundia virginalis.
viridiflora, Lodd. Bot. Cab. xi. (1825) t. 1026= Cybistax antisyphilitica.
Vitalba, Cham, in Linnaea, vii. (18S2) 699-Pithecoctenium Vitalbae.
xylocarpa, Roxb. Hort. Beng. 47; Fl. Ind. iii. 108 = Slereospermnm xylocarpum.

B1KAI, Adans. Fam. ii. 67 (1763)=Heliconia, Linn. (Scitam.).

VIHANIA, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 06 (1861)-XSuaideroxylon, Teijsm. (Laurin.).
borneensis, Meissn. 1. c.—Borneo.

BIKERA, Adans. Fam. ii. 130 (1768) =Tetragonotheoa, Dill. (Compos.).

BIKKIA, Keinw. ex Blame, Bijdr. 1017, in syn. (1826) ; et in Syll. Katisb. ii. (1828) 8. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 46.
BIKKIOPSIS, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 404.
CORMIGONUS, Kafin. in Ann. *Gin.* Sc. Phys. vi. (1820) 83.
GRISIA, Brongn. in Bull. Soc. Bot Fr. xii (1866) 405.
TATEA, Seem. Fl. Vit. 125 (1866).
australis, DC. Prod. iv. 405 = grandiflora.
Fonteriana, *Brongn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 42.—Ins. Fiji.
Gaudichaudiana, *Brongn. I. e.* 48.—N. Guinea,
grandiflora, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 1017, *in syn.; et in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 8.—Java; Ins. Amic.
GuiUoviana, *Brongn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 42.—N. Guinea.
Hombroniana, *Brongn. I. c.* 48.—Int. Pacif.
mariannensis, *Brongn. I. c.* 42.—Ins. Marian.

BIKKIOPSIS, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 404=BikJda, Reinw. (Rublac).
Pancheria, Brongn. 1. c—N. Caled.

BIKUKULLA, Adans. Fam. ii. 28 (1763)-Dielytra, Borckh. (Papav.).

BUJABIUM, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 730 (1856). *D1DYMOCARPEAE.* Benth. & Hook. f. Gen. ii. 996.
limans, *Miq. I. c.*—Malaya.

B1LABRELLA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 (1835) = Habenoria, Willd. (Orchid.).
falcicornis, Lindl. 1. c. = H. tetrapetala.
falciformis, Bolus, in Joorn. Linn. Soc. xix. (1882) 340 = praec.
salsicornis, Stead. Nom. ed. II. i. 205, sphalm.=praec.

BILAMISTA, Rafin. New Fl. Am. iv. 92 (1836) = Oentiana, Tonrn.
grandiflora, Kafin. 1. c. 93«=G. grandiflora t

B1LDERDYKIA, Dum. Floral. Belg. 18 (1827) = Polygonum, Toum.
Convulvulus, Dum. 1. c.=P. Convulvulus.
dumetorum, Dum. 1. c. = P. dumetorum.

BILITALIUM, Buch.-Ham. Journ. Mysore, 185 (1807), nomen.
farinosum, Buch.-Ham. 1. c. (Quid I).—Ind. or.

BILLARDIERA, Moench, Meth. 369 (1794) • Verbena, Linn.
explanata, Moench, 1. c. = V. Anbletia.

BHiLABDIEBA, Sm. Bot. Nov. HolL i. 1.1 (1793). *PITTOSPOREAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 132.
LABILLARDIERA, Roem. *Sc* Schult SysL v. p. xxvi. 330 (1819).
angustifolia, DC. Prod. L 345 =scandena.
brachyantha, F. Muell. ex Klatt, in Linnaea, xxviii. (1856) 571 = scandens.
eanariensis, Wendl. Beobacht. 43=scandens.
coriacea, *Benth. Fl. Austral,* i. 124.—Austral,
cymosa, *F. ifutil. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 29.—Austral

BILLABDIEBA:—

cymosa, Klatt, in Linnaea, xxviii. (18S6) 571 = cymosa.
daphnoides, *Knowles tf Westc. Flor. Cab.* ii. (1838) 60.—Austral, t
elegans, *F. Muell. PI. Viet.* i. 78.—Austral,
floribunda, *F. Muell. in Wing, South Se. Record,* ii. (1882) 1.—Austral.
fusiformis, LabilL Nov. Holl. PI. t. 90=Sollya heterophylla.
grandiflora, Putterl. Stirp. Nov. Decad. 48=scandens.
Hambruchiana, Seem. & Schmidt, in Flora, xxvii. (1844) II. 496 = Sollya heterophylla.
latifolia, PnttcrL. Stirp. Nov. Decad. 47=scandens.
Lehmanniana, *F. Muell. PI. Viet.* i. 78.—Austral,
longiflora, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 64. t. 89.—Tasmania.
macrantha, Hook. f. Fl. Tasm. i. 37 = longiflora.
melocarpa, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 206.—Austral.
mutabilis, *Salisb. Parad. Land.* t. 48.—Austral.
ovalis, Lindl. Bot. Reg. t. 1719 = longiflora.
paroiflora, DC. Prod. i. 846 = Marianthus tennis.
pseudocymosa, Klatt, in Linnaea, xxviii. (1856) 571° cymosa.
rosmarinifolia, *DC. Prod.* i. 845.—Austral,
scandens, *Sm. Exot. Bot.* i. 1.1.—Austral.
sericophora, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 371 = cymosa.
variifolia, *DC. Prod.* i. 346.—Austral.
versicolor, F. Muell. ex Klatt, in Linnaea, xxviii. (1856) 751 = cymosa.

BILLARDIERA, Vahl, Eclog. Am. i. 13.1.10 (1796) = Coussaria, Aubl. (Kubiac).
paniculata, Vahl, 1. c.=C. Froelichia.

BILLBERGIA, Thonb. Dec. PI. Bras. SO (1823). *BROMELIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 664.
CREMOBOTRYS, Beer, in Flora, xxxvii. (1864) 348.
EUCALLIAS, Kafin. Fl. Tellnr. iv. 25 (1886).
HELICODEA, Lem. Illustr. Hortic. xi. (1864) t. 421.
ToNGHBA, Lem. Jard. Fleur. ii. sub 1.180-181 (1852).
LIBONIA, Lem. Illustr. Hortic. ii. (1855) t. 48.
acaulis, Hort. ex Vis.—Cf. Otto & Dielr. Allgem. Gartenz. xvi. (1848) 29=Cryptanthns zonatus.
amabilis, Beer, Bromel. 118 = vittata.
amoena, Lindl. Bot Reg. sub t. 1068=speciosa.
angustifolia, *C. Koch, Wochenschr.* ix. (1866) 181.—Hab.1
atro-rosea, *Drapiei, Encyc. et Fl. des* **Serr.** *Angl.* (1834) f. 1.—Bras.
Bakeri, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxx. (1880) 166. t 8.—Bras.
Baraquiniana,Lem. Illustr. Hortic. (1864) 421 = decora.
bicolor, Lodd. Bot. Cab. t. 1819 -= pyramidalis.
bicolor, Schult. f. Syst. vii. 1255 - Rhodostachys bicolor.
bifrons, Lindl. in Joum. Hort Soc. viii. (1853) 54 = Pitcaimea bracteata?
bivittata, Hook. Bot. Mag. t. 5270 = Cryptanthus bivittatus.
Breauteana X, Andrć, in Rev. Hortic. (1884) 117.
Brongniarti, Regel, Gartenfl. (1875) 166; et in Act. Hort Petrop. iii. II. (1875) 283 = Portea kermesina.
Chantini, *Carr. in Rev. Hortic.* (1878) 112.—Bras.
chlorocyanea, De Vriese, Hort. Acad. Lugd. Bat. PI. Rar. (1864).—Cf. Linnaea, xxvi. (1853-65) 755 = speciosa.
chlorostica, Hort. Saunders; ex Gard. Chron. (1871) 1425=Saundersii.
clavata, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1068-Aechmea bromeliaefolia.
coelestis, Hort ex Morr. in Fl. des Series, xxi. (1875) 1 = Aecbmea coelestis.
Collevix, A. Van Geert, Cat n. 81. p. 91; Belg. Hortic. xxxii. (1882) 334.
commixta, C. Koch, Wochenschr. iii. (1860) 146 = zebrinat
contracta, Mart, ex Schult. f. Syst. vii. II. 1263 = Aechmea contracta.
corymbosa, *Mart, ex Schult. f. i. e.* 1268.—Bras.
Croyiana, De Jongh, ex Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) t. 413=pyramidalis.
cruenta, *Hook. Bot. Mag.* lvi. t. 2892.—Bras,
decora, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen.* 42.—Peruv.
discolor, Beer, Bromel. 121=speciosa.
distichostachya, Lem. Jard. Fleur. it (1852) Misc. 96 s Aechmea distichantha.

BILLBERGIA :—

elegans, Mart, ex Schult. f. Syst. vii. II. 1265 - speciosa.
Euphemiae, *E. Morr. Belg. Hortic.* xxii. (1872) 1- »• 1.—Bras,
excellent *Miq. in Joum. Bot. Nierl.* i. (1861) 34.—Gi ana.
fasciata, Lindl. Bot. Reg. xiii. t. 1180-Aecbmea fasciata.
fastuosa, Beer, Bromel. 110—thyrsoidea,
filicaulis, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1864) 13.—Venezuela.
Glarioviana, Regel, Gartenfl. (1885) 260 = Qnesnelia strobilispica.
Glymiana, De Vriese, Jaarb. der Kon. Ned. Maatsch. Tuinb. (1853)87 = Morelii.
Glymiana, Beer, Bromel. 119 » Morelii.
gracilis, Poepp. ex Beer, 1. c 254 = Aechmea tillandsioides.
granulosa, Brongn. in C. Koch, Wochenschr. iii. (I860) 145 = decora,
horrida, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 17: *Gartenfl.* (1857) 148.—Bras.
ianthina, Hort. ex E. Morr. Belg. Hortic. (1871) 2 ~ Leopoldi.
incamata, *Schult. f. Syst.* vii. II. 1261.—Peruv.
iridifolia, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1068.—Bras.
Joinvillei, Van Houtte, ex E. Morr. in Belg. Hortic. (1876) 161 = Rhodostachys pitcairniaefolia.
Joliboisix, A. Van Geert, Cat. n. 81. p. 81; Belg. Hortic. xxxii. (1882) 334.
lanuginosa, Hort. Hamb. ex C. Koch, Ind. Sem-Hort Berol. (1856) App. 7=Aechmea nndicaulis.
latifolia, Hort. Belg. ex Heynh. Nom. ii. 69 = Aechmeae sp. ?
Legrelliana, Hort. ex Baker, in Saund. Ref. Bot. t. 28» = Ortgiesiaesp.
Leopoldi, *Linden, in Rev. Hortic.* (1869) 87 i *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxi. (1871) 1.1.1.—N. Granat; Bras.
Leopoldii, Hort. Belg. ex C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1856) 6 = vittata.
Liboniana, *De jongh. Journ. Hort. Prat.* (Mars. 1851)! *et Lem. Jard. Fleur.* ii. (1852) t 197.—Bras.
Lietzei, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxxi. (1881) 87- t 5-7,—Bras.
Loddigesii, Steud. Nom. ed. II. i. 206=pyramidalis.
longifolia, C. Koch *St.* Bouchć, Ind. Sem. Hort. Berol. (1856) 5 = thyrsoidea.
lutea, Schult. f. Syst. vii. 1258 = Aechmea nudicaulis.
macrocalyx, *Hook. Bot. Mag.* t 5114.—Bras,
marmorata, *Lem. Illustr. Hortic.* ii. (1855) t. 48.—Bras.
Mertensii, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 876 ~ Aechmea Mertensii.
Meyendorfii, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1857) 27 = Karatas Carolinae.
miniata-rosea, Lem. Illustr. Hortic. ii. (1856) Misc. 9* =thyrsoidea.
mitis, *Mart, ex Schult. f. Syst.* vii. 1267.—Bras.
Moreliana, Brongn. ex Rev. Hortic. Sér. III. iii. (1849) 82 = Morelii.
Moreliana, Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) t. 138-vittata.
Morelii, *Brongn. in Portef. Hort.* ii. (1848) 97; " *E. Morr. Belg. Hortic.* x. (1860) 161.—Bras.
nudicaulis, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1068 = Aechmea nudicaulis.
nuptialis, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hortic (1870 " = Leopoldi.
nulans, *H. Wendl. in Regel, Gartenfl.* (1869) 162.—Bras.
Oberthurix, A. Van Geert. Cat n. 81. p. 92; Belg-Hortic. xxxii. (1882) 884.
oblonga, Mart, ex Schult f. Syst vii. 1256 (=Aechme«e sp.)—Bras.
odora, Miq. in Linnaea, xviii. U844) 377 = Aechme» odora.
olens, Hook. f. Bot. Mag. t. 5502 = Karatas Carolina*
pallescens, Baker, in Hook. f. 1. c. t. 6342 = Bakeri.
pallescens, C. Koch & Bouchć, Ind. Sem. Hort. Berol-(1856) App. 5-= speciosa,
pallida, Beer, Bromel. 121=speciosa.
pallidiflora, *Liebm. Ind. Sem. Hort. Hafn.* (1854) 26.—Nicaragua.
paniculata, Mart, ex Schult. f. Syst vii. II. 12*8* Aechmea coelestis t
parviflora, Mart, ex Schult. f. 1. c. 1270 =• Aechme* parviflora.

BILLBERGHA:—

*P**ntissima,* Mart, ex Schnlt f. Syst vii. II. 1270 = Aechmea patentissima.
?»*<«««, Beer, Bromel. 118 = thyrsoidea.
Poiystachya, Lindl. & Paxt. in Paxt. Flow. Gard. iii. p (J8B2-58) 38. t 80 = Aechmea distlchantha.
r«te«na, *Brongn. ex Beer, Bromel.* 115.—Bras.
meherrima, C. Koch & Bonche, Ind. Sem. Hort. Betol. (1856)App.6--vittata.
P»Mcea, *Beer, Bromel.* I12.-Hab. J
Purpurea, *Beer, I. e.* 126 (-Pitcaimiae sp. !).—Am. "Op•
P"rpureo-roseai Hook. Bot Mag. t. 8804 = Aechmea "aveolens.
*y^>*idalis,* Forbes, Hort. Woburn. 64-Aechmea nndicaulis.
Pyramidalis, *Lindl. Bot. Reg.* snb t. 1068.—Bras.
Qui*idata,* Beer, Bromel. 123=Aechmea nudicaulis.
MS?]!*1*' A- *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. xv. (1841) 371.—Guiana.
"'ncougnei x, Andrf, in Rev. Hortic. (1884) 524.
KMchardtii, *Wama, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 116.—Bras.
IS* A- v»n Geert, Cat. n. 81. p. 92 j
** Hortic. xxxii. (1882) 384.
^SS^med> Lem- in Fl des Serres, *Sir.* I. iii. (1847) W = Aechmea fasciata.
7 »». De Vriese, in Linnaea, xxvi. (1863-55) 'O6=vittata.
Beer, Bromel. 128 = Porteana.
rosco-marginata, Hort. ex C. Koch, Wochenschr. (1867) 141 -QuesneUarufa.
rubra-^gmata, Hort. ex Can. in Rev. Hortic. (1880) <J°=puesneliarufa.
*Mndenana,£. *Morr. in Belg. Hortic.* xxxiv. (1884) 17. —Bras.
Saundersii, ***Hort. Bull, ex Floral Mag.* N. S. t. 106.—Bras.**
«*Mffls, *Beer, Bromel.* 127—Bras.
Si f?ne«. Hort. ex Carr. in Rev. Hortic. (1880) 70* »pecies Quesnelia rnfa.
S*iae sata, a> I* «"*- *Dee. PI. Bras.* iii. 30.—Bras. lata* So hult> f* SyStu *"' 1269=Grei8i» »phace-
'Pendida, Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) t. 180-181 = te«. TMy»soidea.
tiV*".'*«« Beer, Bromel. 127-TiUandsiatetrantha, Bi *art. ex Schult. f. Syst.* vii. II. 1260.—
tillandsioides» Mart, ex Schnlt. f. 1. c. 1269 -Aechmea tillandsioides.
tin h! oria , Mar, ex Schult. f. L c- 1256-Aechmea womeliaefolia.
vari%ta aschult f -1- <= 1282 -speciosa.
vari%ata, (1881) 78.—Bras.
violacea, *Beer, Bromel•* 116.—Guiana.
viridiflora, H. Wendl- »« *Otto W Dietr. Allg. Gar tent.* xxii. (1854) 154—H.b.1
vittata, *n. ex Morel, Portef. Hortic.* ii. (1848) 353 ~-Bras.
S^wl L » . «»*. *Bot. Mag.* t. 4835.-Bras.
«o. *"' £'"*• *<"• *«•• s»I> *• 1068.—Bras.
"»»«««, Linden, Cat. n. 6 (1851) 20=vittata.

BILLIA, Peyr. In *hot. Zdt.* xvi. (1858) 1M ! xvti- (18B9) ^ 7. aculu Linn. (Sapind.)/ A. Mo«e> Pllu2>ch. & Linden, ex Triana & Planch, in Nat< ^^ IV- XV... (18M) 867-~*Nm* Graliat.
H'PPoeastanum, Peyr. in Bot. Zeit. xvi. (1868) 153 = Aesculns mexicana.

BILLIOTIA, G. Don, Gen. Sys = Billiottia, DC. (Rubiac.).

BILLIOTTIA» Reichb. Nom. 176 (184iy-BILLOTTIA, «• Br.^AgoniB, Lindl. (Myrtac.).

BILLOTTIA> Endl. Gen. 1229 (1840) = BILLOTTIA, «• Br. - Agonla, Lindl. (Myrtac.).

B ... *RUBIA* - **Mcuuia,** G. Don, Gen. Syst. iii. 560 (1834).
U824) PSIDIUM> CoHa> Hort- Ripal< 88, L 8S

BDCLIOTTIA:-

VIVIANIA, ColU, in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 25. t. 2.
polytrichoidts, Steud. Nom. ed. II. ii. 114, sphalm.= seq.
psychotrioides, *DC. Prod.* iv. 618.—Bias.

BILLOTIA, G. Don, Gen. Syst. ii. 810, 827 (1882) = BILLOTTIA, R. Br.=AgonlB, Lindl. (Myrtac.).

BILLOTIA, Sch. Bip. in Herb. & Winck. Jabxb. Pharmac. iv. (1841) in nota 156 = Crepis, Linn. (Compos.).
alpina, Sch. Bip. 1. c.=C. alpina.

BILLOTTIA, R. Br. in Jonm. Roy. Geogr. Soc. i. (1882) 19-Agonis, DC. (Myrtac.).
elliptiea, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 249 - Leptospermnm ellipticum.
flexuosa, R. Br. in. Journ. Roy. Geogr. Soc. 1. (1882) 19 = A. flexnosa.
hypericifolia, Heynh. Nom. ii. 69 = A. hypericifolia.
linearifolia, R. Br. in Journ. Roy. Geogr. Soc. i. (1882) 19 = A. linearifolia.
marginata, R. Br. 1. c. 19-A. marginata.
matifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 249.—Austral.
saligna. Sweet, 1. c—Austral
theaeformis, G. Don, ex Lond. Encyc PI. Suppl. ii. 1880-A. hypericifolia.

BILLOTTIA, Colla, Hort. Ripul. 20. t. 23 (1824) = Oalothamnus, Labill. (Myrtac.).
acerosa, Colla, 1. c. = C. quadri&da.

BIMA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Artiv. 1 (Quid)).

BIN ARIA, RaHn. Sylva Tellur. 122 (1838) -Bauhlnia, Linn. (Legumin.).
cumanenris, Rafin. I.e. — Bauhinia cumanensis.

BINDERA, Rafin. New Fl. Am. iv. 71 (1836)-Aster, Tourn. (Compos.).
ciliata, Rafin. 1. c.-A. ciliatus.

BINECTARIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 82 (1775) = Imbriearia, Comm. (Sapot)

BINNENDIJKIA, Knrz, in Tijdschr. Nederl. Ind. xxviii. (1865) 164=Iieptonychia, Tnrcz. (Sterculiac).
trichostylis, Kurz, 1. c. =L. glabra.

BIONDEA, Usteri, Ann. Bot. x. (Neue Ann. iv.) 90 (1794) - BLONDEA, Rich. = Bloaneo, linn. (Tiliac.).

BIONIA, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mas. ii. (1838) 130 = Camptosema, Hook. & Am. (Legumin.).
acuminata, Benth. I. c. — C. acuminatnm.
bella, Mart, in Walp. Rep. i. 764 = C. bellum.
coccinea, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 880=C. coccinenm.
coriacea, Benth. 1. c. ISO—C. coriacenm.
marginata, Mart, ex Benth. 1. c. = C. coriacenm.
nitens, Benth. 1. c.— C. coccineum.
rigida, Benth. 1. c = C. coriacenm.

BIOPHYOTJM, DC. Prod. i. 689 (1824). *GERANIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ i. 276.
abyssinicum, *Steud. ex A Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 122. —Abyss,
adiantoides, *Wight, ex Edgew. V Hook./, in Fl. Brit. Ind.* i. 487—Ind. or.
Apodiscias, *Edgem.* b* *Hook./. I. c*—Ind. or.
Candolleanum, Wight, 111. i. 161. t. 82^sensitivum.
castum, G. Don, Gen. Syst. i. 753 = Oxalis casta.
Cumingianum, Edgew. *Sc* Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 487 = sensitivum.
Cumingii, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 85-sensitivnm.
dendroides, *DC. Prod.* i. 690.—N. Granat
dormiens, G. Don, Gen. Syst. L 758-Oxalis donniens.
fruticosnm, *Blume, Bijdr.* 242.—Java,
intermedium, *Wight, Illustr.* i. 162.—Zeylan.
mimosoides, G. Don, Gen. Syst. i. 753 = Oxalu mimosoides.

BIOPHYTUM:—

nerm/olium, Thw. Enum. PI. Zeyl. 64 -sensitivnm.
nudum, *Edgew. V Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 438.—Zeylan.
Petersianum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 81. t. 16 - sensitivnm.
polyphyllum, *Munro, in Wight, Illustr.* i. 162.—Ind. or.
poterioides, Edgew. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 437 = sensitivnm.
proliferum, *Edgew. V Hook./. I. e.* 488.—Zeylan.
Reinwardtii, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 85.—As. trop.
sensitivum, *DC. Prod.* i. 690.—Cosmopol. trop.
sesbanioides, Edgew. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 437 —sensitivum.
sessile. Wall. Cat. n. 4344 = B. Apodiscias.
somnians, G. Don, Gen. Syst. i. 753-Oxalis somnians.
Umbraculom, *Welw. Apont.* 590.—Afr. trop.
•verticillatum, Wight, Illustr. i. 162=intermedium.

BIOTA, D. Don, in Lamb. Pinet. ed. II. ii. 129 (1828) ; Endl. Conif. 46 (1847)-Thuya, Linn. (Conif.).
coraeana, Sieb. ex Gord. Pinet. Suppl. 17»T. orientalis.
dumosa, Hort. ex Can. Conif. ed. II. 96-T. orientalis.
ericoides, Hort ex Carr. 1. c. 141 =T. occidentalis.
excelsa, Hort. ex Gord. Pinet. Suppl. 17 = T. orientalis.
/alcata, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 96 -T. orientalis.
Fortunei, Hort. ex Carr. 1. c. 94-T. orientalis.
/reneloides, Hort. Belg. ex Gord. Pinet. 85-T. orientalis.
/uniculata, Hort. ex Gord. 1. c. ed. II. 62-T. orientalis.
glauea, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 100=T. orientalis.
gracili/olia, Knight, Syn. Conif. 16=T. orientalis.
intermedia, Hort. ex Gord. Pinet. 35 = T. orientalU.
japonica, Sieb. ex Gord. 1. c. 83-T. orientalis.
macrocarpa, Hort. ex Gord. 1. c. ed. II. 422 = T. orientalis.
meldensis, Laws, ex Gord. 1. c 87=T. meldensis.
nepalensis, Endl. ex Gord. 1. c 35-T. orientalii.
orientalis, Endl. Conif. 47 = T. orientalis.
pendula, Endl. 1. c. 49 = T. orientalis.
prostrata, Hort. ex Gord. Pinet. ed. IL 401-T. orientalis.
pyramidalis, Carr. Conif. ed. I. 96=T. orientalis.
semperaurea, Hort—Cf. Gard. Chron. (1874) 60 = T. orientalis.
stricta, Lindl. *Sc* Gord. in Joum. Hort. Soc. v. (18(0) 205 = T. orientalis.
tatarica.Undl Sc Gnrd. 1. c.=T. orientalis.
variegata, Hort. ex Gord. Pinet. 84 «T. orientalis.
Wareana, Hort. ex Gord. 1. c. Snppl. 104 -T. orientalis.
Zuccarini, Siebold, ex Carr. Conif. ed. II. 94-T. orientalis.

BIOTIA, Cas». in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 308 (1825)-Madia, Molina ;Compos.).
viscosa, Cass. 1. c. 309 -M. viscosa.

BIOTIA, DC. Prod. v. 264 (1856)= Aster, Tourn. (Compos.).
commixta, DC. Prod. v. 266 = A. Herveyi.
corymbosa, DC. L c. = A. corymbosus.
crenata, Steud. Nom. ed. II. i. 154, in syn.-Mairia crenata.
discolor, Maxim. Prim. Fl. Amur. 146-A. scabcr, *Thunb.*
glomerata, DC. Prod. v. 266-A. macrophyllus.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. it 170.—Japon.
lati/olia, DC. Prod. v. 264=A. macrophyllus.
macrophylta, DC. 1. c. 265 - A. macrophyllus.
Schreberi,VC. I c 264-A. macrophyllus.

BTPINNTJIJA, Comm. ex Juss. Gen. 65 (1789,. *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 618.
bonariensis, *Spreng. Syst.* iii. 745.—Reg. Argent.
Commersonii, Lindl. in Quart. Journ. Roy. Inst. N. S. i.(1827)52 = bonariensis.

BiPO. INULA :—

Giberti, *Reickb.f. in Linnata,* xli. (1877) 51.—Reg. Argent,
mystadna, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* i. (1884) 6.—Chili,
plumosa, *Lindl. in Quart. Journ. Roy. Inst.* N. S. i. (1827) SL-Chili.

BIP0NTIN1A, Alef. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 121 -Paoralea, Linn. (Legumin.).
bituminosa, Alef. 1. c. 128 = P. bitnninosa.
corylifolia, Alef. 1. c 12*-P. corylifolia.

BIPOREIA, Thou. Gen. Nov. Midag. 14. (1806)-Samadera, Gaertn. (Simarnb.).

BIRAMIA, Neraud, in Freyc. Voy. Bot. 28 (1828), nomen-Maoleania, Hook. (Vacdn.)..[1]
tuberosa, Auct. ex Walp. Ann. i. 478-M. inrignis.

BIRCHEA, A. Rich, in Ann. Sc Nat. Ser. II. xv. (1841) 66. t. 10-Luisia, Gandich. (Orchid.).
teretifolia, A. Rich. 1. c. 67.1.10 = L. tenuifolia,

BIRIS, Medic, in Staatnr. Vorles. Churpt Phyi-Oek. Get. i. (1791) 257; et Phil. Bot ii. 97 (1791)-Iria, Tonm.
sibirica, Medic. 11. c c-I. sibirica.

BIRNBAUMIA, Kostel. Ind. PI. Hort. Png. (1844) 21 = Anisaeanthus, Nees (Acanth.).
quadrifida, Kostel. 1. c. = A. virgularia.

BIROL1A, Bell, in M<m. Acad. Turin, Ser. I. xviii. (1808) 408. t. 11-Elatine, Linn.
palludosa, Bell. 1. c.=E. triandra.

BIROLIA, Rafin. Sylva Tellur. 163 (1888)-Cluflia, linn. (Guttif).
alba, Rafin. 1. c =C. alba.

BIBCHOFIA, Blume, Bijdr. 1168 (1825). *EUPHORBIACEAE,* Bench. & Hook. f. iii. 281.
MICROELUS, Wight *Sc* Am. in Edinb. N. Phil. Jonrn. riv. (1883) 298.
STVLODISCUS, Renn. PI. Jav. Rar. 188. t. 29 (1838).
Cummingiana, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 158—javanica.
javanica, *Blume, Bijdr.* 1168.—Ind. or.; Malaya; Ins. Pacif.
leptopoda, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 479.—Ins. Pacif.
oblongifolia, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 152. t. 154—javanica.
Roperiana, Decne. 1. c. 163 =• javanica.
Toul, Decne. 1. c -javanica.
trifoliata, Hook. Ic PI. t. 844 = javanica.

BI8CTJTELLA, Lion. Syst ed. I (1736). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. L 91.
DITHYEEA, Harv. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. iv. (1845) 77. t 5.
TONDRABA, Medic. Pflanzeng. 27 (1792).
THLASPIDIUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 422 (1763).
algeriensis, Jord. Diagn. i. 318-didyma.
alpestris, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hong. iii. 253 = laevigata.
alpicola, Jord. Diagn. i. 292-laevigata.
alsatica, Jord. 1. c. 800-= laevigata.
ambigua, DC. Mon. Bisc 9.1.11. f. 1; Syst ii. 415 = laevigata.
anchusaefolia, Man. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 660 =laevigata.
anchusaefolia, Tenore, ex Steud. Norn. ed. II. i. 206 =sempervircns.
angulata, Steud. I. c = Megacarpaea angulata.
angnstifolia, *Schkuhr, Handb.* ii. 238.—Europ.
apetala, Walt Fl. Carol. 174-Senebiera didyma.
apricorum, Jord. Diagn. i. 807 =laevigala.
apula, Gaertn. Fruct. ii. 279-leiocarpa.
apula, Lam. Encyc. iii. 617-dliata.
apula, Linn. Mant 264 = didyma.
apula, Webb, ex Wllk. & Lange, Prod. Fl. Hiip. Ui. 761-scutulata.

BIBUUTKIITIA·:—
areernensis, Jord. Diagn. i. 298=laevigata.
auriculata, Herb. Un. ex Steud. Norn. ed. II. i. 207 - cichoriifolia.
auriculata, *Linn. Sp. PI.* 652.—Reg. Mediterr.
austriaca, *Bonnet, in Bull. Soc. Dauph.* fasc. vi. 222.—Europ.
balearia, L'Hérit. ex DC. Syst. ii. 648-Succowia balearia.
balearica, Jord. Diagn. i. 325, 828-auriculata?
boetica, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. i. 42-laevigata.
Bourgaei, Jord. Diagn. i. 820-lyrata.
brevicaulis, Jord. 1. c. 303=laevigata.
Burseri, Jord. 1. c. 326-auriculata.
califomica, *Benth. tf Hook./, ex S. Wats. Bot. Calif.* i. 48.-Calif.
Candollii, lord. Diagn. i. 326-auricnlata.
chilensis, Lag. ex DC. Mon. Bisc. 6—Cremolobus chilensis.
Chouletti, Jord. Diagn. i. 319-didyma.
cichoriifolia, *Loisel. Aid. FL Gall.* 167—• Mont. Pyren.
ciliata, *DC. Mon. Bisc.* 6; *Syst.* ii. 410.—ItaL; Hispan.
collina, Jord. Diagn. i. 299=laevigata.
Columnae, Tenore, Prod. Fl. Nap. 88-didyma.
conrasa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 231.—Afr. bor.
controversa, Bor. Fl. Centr. Fr.ed. III. 56 - laevigata.
coronaria, *Ehrenb. ex Willk. in Ind. Sent. Dorpat. Adn.* (1868).—Hab.!
coronopifolia, Willd. Sp. PI. iii. 474= ciliata.
coTonopifolia, linn. Mant. ii. 256; All. Fl. Pedem. i. 247-laevigata.
cuneata, Lag. Cat. Hort. Madr. (1815) 20=Cremolobus chilensis.
depressa. Thorn, ex DC. Syst ii. 415 = laevigata.
depressa, Willd. Enum. Hort BeroL 673=didyma.
didyma. *Linn. Sp. PI.* 653.—Reg. Mediterr.; Persia.
didyma, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 14-laevigata.
didyma, Willd. Enum. Hort. Berol. 673=ciliata.
dilatata.Vis. Stirp. Dalm. 14=cichoriifolia.
divionensis, Jord. Diagn. i. 305 = laevigata.
dubia, Steud. Nom. ed. II. i. 207 - Cremolobus linearifolius.
erigerifolia, DC. Mon. Bisc 4; Syst. ii. 408=auriculata.
eriocarpa, DC. Mon. Bisc. 7. t. 9. f. 2; Syst. ii. 411 = didyma.
erucifolia, *Reichb. Jc. Fl. Germ.* vii. 5.—Europ.
fiexuosa, Jord. Diagn. i. 800—laevigata.
frutescens, *Coss. Notes Crit.* ii. 27.—Hispan.
glabra, [Clairv.] Man. Herb. 216=laevigata.
glacialis, Jord. Diagn. i. 310=laevigata.
glareosa, Jord. L c. 304 - laevigata.
granitica, Bor. ex Perar. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 352-laevigata.
Guilloni, Jord. Diagn. i. 302 - laevigata.
hispida, DC. Mon. Bisc. 4. t. i. f. 1; Syst. ii. 408 = cichoriifolia.
incana, *Tenore, Fl. Neap. Prod. App.* 5*. (1826).—IUlu.
intermedia, Gouan, Illnstr. 42 - laevigata.
intricata, Jord. Diagn. i. 808-laevigata.
laeiniata, Willd. ex DC. Syst. ii. 417 = Megacarpaea laciniata.
laevigata, *Linn. Mant.* 225.—Reg. Medit
laevigata, Sibth. & Sm. FL Graec. Prod. ii. 16 - didyma.
Lamarckii, Jord. Diagn. L 828=auriculata.
Lamottii, Jord. 1. c 302 = laevigata.
laxa, *Boiss. V Reut. Diagn.* Ser. II. i. 43.—Hispan.
laxifiora, Presl, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 239 - didyma.
leiocarpa, *DC. Mon. Bisc.* 8; *Syst.* ii. 418.—Oriens.
Lima, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 661, sub n. 4206-laevigata.
longa, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 190=cichoriifolia.
longifolia, Vill. Prosp. 88 - laevigata.
lucida, Balb. ex DC. Mon. Bisc. 9. t. 7 ; Syst ii. 414 = laevigata.
lusitanica, Jord. Diagn. i. 816 - laevigata.
lyrata. Linn. Mant 854—didyma.
macrocarpa, Hort. ex DC. Syst ii. 409 = cichoriifolia.
macrocarpa, *Bieb. ex Tauscher, in Mim. Soe. Nat. Most.* iv. (1812) 232.—Transural.
major, Schkuhr, Handb. ii. 238. n. 1822 = auriculata.
marginata, Tenore, Prod. Fl. Nap. 88-didyma.
maritima, Tenore, 1. c.=didyma.
mauritanica, Jord. Diagn. i. 826 = auriculata.

BISCTTTELIiA :—
maxima, Pall, ex DC. Syst ii 417 - Megacarpaea laciniata.
mediterrannea, Jord.Diagn. i. 313-laevigata?
Megacarpaea, Boiss. & Reut Diagn. Ser. II. i. 44-laevigata.
megalocarpa, Fisch. ex DC. Mon. Bisc. 6. t. 8* Megacarpaea laciniata.
microcarpa, DC. 1. c. 7; Syst ii. 411 - didyma.
minor, Jord. Diagn. i. 297 = laevigata.
mollis, Loisel. Not. 168-laevigata.
montana, Cav. Ic. ii. 59.1.177 — laevigata.
neustriaca, Ed. Bontrel, in Act. Soc. Dauph. (187!)) 198-laevigata.
nicaeensis, Jord. Diagn. i. 814 = laevigata t
obcordata, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 8. £ 615-laevi-•gata.
obovata, *Hort. Par. ex DC. Mon. Bisc.* 8; *Syst.ti.* 413.—Hab.J
orcelitana, Lag. ex DC. Syst. ii. 408=auriculata.
oreites, Jord. Diagn. i. 294 = laevigata.
orientalis, [DesfJ ex DC. Mon. Bisc. 8= leiocarpa.
patulipes, Jord. Diagn. i. 320-didyma.
perennis, Spach, Hist Veg. Phan. vi. 571=cili»t»-laevigata, sempervirens.
peruviana, Lam. Encyc. iii. 620-Cremolobus peruvianus.
petraea, Jord. Diagn. i. 306 = laevigata.
picridifolia, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 376 = cichoriifolia.
pinnatifida, Hort ex Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvii. (1864) II. 302 - laevigata ?
pinnatifida, Jord. Diagn. i. 811-praec. ?
polyclada, Jord. 1. c. 312 = laevigata.
pratensis, *Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Tout.* >i'• (1869) 114.—Gallia.
pumila, Balb. ex DC. Moa Bisc. 6; et Syst. ii. 411" didyma.
pyrenaica, *Huet, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. xix. (1863) 252.—Hispan.
radicata, *Coss.* 6- *Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ***• (1872) 224.—Afr. bor.; Hispan.
radicosa, Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 778-radicata.
raphanifolia, Poir. Voy. Barb. ii. 198=didyma.
rosularis, *Boiss.* b[1] *Reut. Diagn.* Ser. II. i. 46.—Hispan.
rupestris, *Ehrh. Beitr.* v. 177, nomen.—German.
saxatilis, Schleich. ex DC. Prod. i. 188-laevigata.
saxatilis, Endr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. FL Hisp. iii. 765 = pyrenaica.
scabra, Salisb. Prod. 268 = didyma.
sderocarpa, *Revel, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxv. (187*' *Bibl.* 78.—Gallia.
scutulata, *Boiss. & Reut. Diagn.* Ser. II. i. 41.—Hispaii-
secunda, Jord. Diagn. i. 310 = laevigata.
sempervirens, DC. Syst. ii. 416=laxa.
sempervirens, *Linn. Mant.* 255.—Hispan.; Lnsitan.
sinuata, Jord. Diagn. i. 801-laevigata.
spathulata, DC. Prod. i. 183, in syn.=laevigata.
stenophylla, Dufour, in Ann. Gen. Sc. Phys. vii. (1820) 299 = laevigata.
stricta, Jord. Diagn. i. 812-laevigata.
subspathulata, Lam. Encyc. iii. 620 - laevigata.
suffrutescens, *Coss. Notes Crit.* 27.—Hispan.
suffruticosa, DC. Mon. Bisc. 5. t. 6-Cremolobus ««"" frnticosus.
tergestina, Jord. Diagn. i. 295=laevigata.
tenuicaulis, Jord. 1. c. 310 = laevigata.
tomentosa, Lag. ex DC. Syst ii. 416-laevigata.
tumidula, Lag. ex DC. 1. c. 411-didyma.
varia, Dum. >l. Belg. Prod. 118 = laevigata.
variabilis, Loisel. Fl. Gall. ii. 56-laevigata.
variegata, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. i. 44-laevigata.
verna, Matth. ex Nym. Consp. 69 - laevigata.
virgata, Jord. Diagn. i. 809—laevigata.
Wislizeni, *Benth. (? Hook. f. ex S. Wats. Bot. Calif-* i. 482.—Am. bor. occ.

BISEKBTTIiA, Linn. Syst. ed. I (1735). *LEGUtfl-NOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 607.
PELECINUS, Toura. ex Medic in Vorles. Churpf-Phys. Ges. ii. (1787) 878.
leiocarpa. Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abysi. i. &* - a Pelecinns.
pelecina, Lam. Fl. Fr. ii. 634 - B. Pelecinus.
Pelecinus, *Linn. Sp. PI.* 762.—Reg. Mediterr.

BISMALVA, Media MaW. 89 (1787)=Malva, Toum.
fcea, Medic. 1. c. = M. Alcea.
fastigiata, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 350=M. Alcea.
laciniata, Fourr. 1. c.=M. moschata.
moschata, Medic. Malv. 39=M. moscbata.
lournefortiana, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. w». (1889) 196 = M. Tournefortiana.

BI8MABCKIA, Hildebr. & H. Wendl. in Bot. Zeit. ««*. (1881) 89, 90, 98. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. Gen. iii. 882.
nobUis, *Hildebr. & H. Wendl. 1. c.* 94.—Madag.

B1SP.H AERIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) «"• I. Art. iv. 1 (Gen. dub.).

Bis.7^N1A> Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. *- Art. JV. 64 (1827) (Gen. dnb.).

MSTELLA, Adans. Fam.ii. 226 (176S) (an Rnbiacea!).

BISTELLA, Delile, in Caill. Voy. Méroé (Cent. Pl. Aft.) 97. t. 63 (1826) = Vahlia, Thunb. (Saxifr.).
gemi mflara, Caill. & Delile, Voy. Méroé, 97. t. 2. f. 2 -V.viscosa.

B1Si'r?,'V'rA> tToum.] Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. i-115 (1787) = Polygonum, Tonm.
"*mencana,* Rafin. Fl. Tellar. iii. 12=P. viviparum?
maJ°r, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 267-P. Bistorta.
'*fficinalis,* Rafin. Fl. Tellur. in. 12=B. Bistorta.
"»<>wdS. F. Gray, Nat. Are. Brit PI. ii. 268-P. viviparu

BI^?fO SON. Anct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 207. U«40)«Bysteropogon, L'Hérit. (Labiat.).

BISWARE* itmnft^EStirZ^**- BoL Bdg_ W B Cl n ke,injMnn. Linn. Soc. xv. tMp)i C2V. -
«°»glen,is, *Cogn. I.* c.-Reg. Himal.

BIVIN JATul in A'"'l- Se- N»»»- Ser_lv- *»"• (1857) -g ,»: *SAMYDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 800.
J«»bertia, 7W. /. c.—Madag.

B1VONAEAc- sy'- '»* M* (1821). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f.i. 68.
lutea, *DC.* 5yst.i ... 565.—Slcil
praeco x, *Bertol. Fl. Hal.* x. 62O.-Slcil.
Sa viana. *Camel, Prod. Fl. Tosc.* 47.—Ital.

BIVONAEA, MOC. & Sesse. ex DC. Prod. iii. 872 (1828) = Pont aoaena_3a (Hlb)
«•"I'"'1'" M09. & Sesse, ex DC. 1. c. 378=P. Polycnemoidea.

BUIS!E4' Rafin_F1_Lndov- l»8(1817)=Jatropha, «nn.(Euphorb.).
*'«»'<»«, Rafin/l.c.=J.urens.

BIVONIA, sPreng. Nene Entdeck. ii. 116 (1821) = Bernard U, P Br (Euphorb).
axillar«, Spreng. 1. t =fi ^aria.

BIWALDIA, Scop. Introd. 282 (1777) = Garcinia, Linn. (Guttif.).

BIXA, Bent h^HoSt!. m D. Gen 8 (1737) BIXINBAE>
acU*nco, Adans. Fam. ii. 881 (1768).
amlrrrana, Po ort. Murit. 20=Orellana.
odorata, Ruiz ye- »» 229=Orell«na.
Orsu, r :- 296 =0 «» »»
trie* PL O «—Am. austr.
ana, Noronha, *in* Verh. Batav. Gen. v. (1790} ed. Art. iv. 8 = Orellana.
Plat, <&C"C" RuU * Pav_n_Per_v_ «• *69. « G- D""- A«r*? ^ 8M - Orellana.

carpa, Triana, in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 369.—N. Granat.
tinctoria, Salisb. Prod. 369 = Orellana.
Urucura no, Willd. Enum. Hort.Berol. 586=Orellana.

BIXAGREWIA, Kurt, in Journ. Bot xiii. (18751 325 = Triohoapermum, Blume (Tiliac.).
nicobarica, Knra, 1. c—Ins. Nicobar.

BLABEROPUS, A. DC. Prod. viii. 410 (1844) = Alatonia, R. Br. (Apocyn.).
lucidus, A. DC. 1. c. 411=Trachelo»pennnm fragrans.
neriifolius, A. DC. 1. c - A . neriifolia.
Sebusi, Heurck *8c* Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. ii. 188=A. neriifolia.
serieeus, A. DC. Prod. viii. 411 = A. sericea.
venenatus, A. DC. 1. c.=A. venenata.
•*villosus,* Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 440=A. villosa.

BLACHIA, Baill. Etnd. *Gia.* Enph. 388.1.19 (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 801.
calycina, *Benth. in journ. Linn. Soc.* xvii. (1880) 226.—Ind. or.
denndata, *Benth. I. c*—Ind. or.
Pentzii, *Benth. I. c*—China,
reflexa, *Benth. I. c*—Ind. or.
umbelUta, *Baill. Etud. Gen. Euph.* 387.1.19. f. 18-20. —Ind. or.

BLACKBOURNEA, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ii. (1824) 356-seq.

BLACKBURNIA, Foret. Char. Gen. t. 6 (1776)=. Zanthoxylum, Linn. (Rutac.).
monadelpha, Roxb. Hort. Beng. [83]; Fl. Ind. i. 415 = Dobera Roxburgbii.
oppositifolia. Planch, in Ann. Sc Nat Sir. III. x. (1848) 191-Dobera Roxbnrghii.
pinnata, Font. Char. Gen. t. 6=Z. Blackbumia.

BLACKIA, Schrank, ex DC. Prod. iii. 165 (1828) = Myriaspora, DC. (Melastom.).
egensis, Schrank, ex DC. 1. c.=M. egensis.

BLACKSTONIA, Huds. Fl. Angl. ed. *I* 146 (1762), nomen prius = Chlora, Ren. ex Adass. Fam. ii. 503 (1763).
per/oliata, Huds. 1. c = C . perfoliata.

BLACKSTONIA, A. Joss, in Orbign. Diet. vi. 482 (1849) = BLAKSTONIA, Scop. = Moronobea, Anbl. (Guttif.).

BLACKWELLIA, Gaertn. Fruct ii. t 117 (1791) (Blakwellia, p. 169) (Genus dubium).
antaretica, Gaertn. 1. c.—Hab.1

BLACKWELLIA, Comm. ex TUBS. Gen. 848 (1789) (Blakwellia) = Homalium, Jacq. (Samyd.).
acuminata, Wall, ex C. & Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 596 = H. nepalense.
africana, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 361 = H. africanuni.
austro-caledonica,ViaXL in Bull. Soc. Linn.Nonnand. x. (1866) 107 - H . anstro-caledonicnm ?
axillaris, Lam. Encyc. i. 428=H. axillare.
iraehybottya, F. Muell. in Trans. PhiL Inst Viet. iii. (1859) 48=H. bracbybotrys.
*rof*vrfy/w,Tul.in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 69.-Madag.
caryophyllacea, ZoU. & Mor. Syst. Veri.Zoll. 33=H. caryophyllaceum.
cerosifolia, Vent. Choix, 56. t. 56.—Madag.
ceylanica, Gardn. in Calc. Jours. Nat Hist. vii. (1847) 452-H. leylanicum.
chinensis, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. L 208 = H. fagifolium.
cochinchinensis, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat ii. 27.—Cochinchina.
dasyantha, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxxvi. (1863) I. 610=H. Grifiithianum.
decurrens, Vieill. in Bull, Soc. Linn. Normand. x. (1866) 105.—N. Caled.
dentata, Harv. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 585.—Afr. austr.
Deplanchei, Vieill. in Bull. Soc Linn. Normand. x. (1866) 110.-N. Caled,
eriantha, TuI. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 62.—Madag.
fagifolia, Lindl. in Trans. Hort. Soc. Lond. vi. (1826) 269 = H. fagifolium.
foetida, WalL Cat. n. 4899 = H. foetidum.

BLACKWELLIA :-
Jussieua, J. F. Gmel. Syst 768»Homalium poniculatuml
glauca, Vent. Choix, 65. t. 65 = H. paniculatum.
gracili, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 28 = H. axillare.
grandiflora, Lindl. ex Loud. Hort. Brit 183-H. fagifolium.
Guillaini, Vieill. in Bull. Soc Linn. Nonnand. x. (1866) 106.—N. Caled.
integri/olia, Lam. Encyc. i. 428=H. paniculatum.
intermedia, Vieill. in Bull Soc linn. Normand. x. (1866) 109.—N. Caled.
ianaliensis, Vieill. *I* c. 112.—N. Caled.
longiflora, Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 715-H. cordylanthus.
Loureiri, Benth. in Hook. Lond. Joura. Bot. i. (1842) 482-H. fagifolium.
macrostachyo. Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1863) 610 = H. longifolium.
micrantha, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 63 = H. mkranthum.
Mathieuana, VieilL in Bull. Soc Linn. Normand. x. (1866) 108.—N. Caled.
nuluccana, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 27.—Ins. Molucc.
monostachya, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc xxxvi. (1863) 610.—Penang.
Montana, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. s. (1866) 110.—N. Caled.
nepatdensis, DC. Prod. ii. R4 = seq.
nepalensis, Wall. PI. As. Rar. t 179 = H. nepalense.
padifiora, Lindl. Bot. Reg. 1.1308 = H. fagifolium.
padifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 208 = H. fagifolium.
paniculata, Lam. Encyc. i. 428 » H. paniculatum.
planiflera, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 64.—Madag.
polystachya, Vieill. in Bull. Soc Linn. Normand. x. (1866) 107.—N. Caled.
propinqua, Wall. Cat. n. 4898 = H. propinquum.
pubiftora, Walp. Rep. i. 546-H. fagifolium.
purpurea, Steud. Nom. ed. II. i. 208, sphalm.=M. propinquum.
rivularis, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. x. (1866) 111.—N. Caled.
rubiginosa, Vieill. 1. c. 108.—N. Caled.
rufescens, Presl, Bot. Beraerk. 42=H. rufescens.
spiralis, Wall, in As. Res. xiii. (1820) 400 = H. tomentuum.
spiralis, Wai!. Cat n. 4897., partim = H. propinquum.
tetrandra, Wight, Ic. v. 1.1851 = H. zeylanicum.
Thouarsiana, Tul. in Ann. Sc Nat Sér. IV. viii. (1857) 60.—Madag.
tomentosa, Vent Cboix, 57.. t. 57 = H. tomentosum.

BLADHIA, Thunb. Nov. Gen. 6 (1781), nomen print* Ardisia, Sw. (1788) (Myrsin.).
crispa, Thunb. Fl. Jap. 97=A. crenata, *Roxb.*
glaira, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 331 = A. japonica.
japonica, Blanco, Fl. Filip. ed. L 126=A. pyramidalis.
japonica, Thunb. Nov. Gen. 7 = A. japonica.
villosa, Thunb. Fl. Jap. 96-A. pusilfa.

BTiATTRTA, Linn. Coroll. Gen. S (1737). *ERICACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 592.
KOLBIA, Adans. Fam. ii. 164 (1763).
aggregata, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 208; ii. 589=Simocheilus mnltiflonis.
articulata, Linn. Mant. ii 198 (= *Syndesmanthus articu'.aius).—Mz.* austr.
articulata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 208 = Sympieza capitellata.
barbigera, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 805.—Afr. austr.
bicolor, Klotzsch, in Linnaea, viii. (1833) 660 (err. typ. 606)=Simocheilns bicolor.
braeteata, Wendl. Collect ii. 1. t. 87=Sympieza capitellata.
bruniaefolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 80S - Erica bmniaffolia.
caduca, *Thunb. Diss. Blatria,* 10.—Afr. austr.
campanulata, *Benth. in DC. Prod.* vii. 698.—Afr. austr.
carnea, Klotzsch, in Linnaea, viii. (18S3) 661 ~ Simocheilus cameus.
ciliaris, Una. f. Suppl. 122 - Grisebachia ciliarii.

BLAEKIA:—
dliciiflora, G. Don, Gen. Syst. iii. 805= Grisebachia velleri flora,
ooccinea, Klotesch, in Linnaea, viii. (18SS) 657.—Afr. anstr.
condensate, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 13—spicata.
depressa, Drège, ex Benth. in DC. Prod, vii. 705 = Sympieza Kunthii.
depressa, Lichst. ex Roem. & Schnlt. Syst. iii. 168 - Simocheilug depressns.
dumosa, Wendl. Collect, ii. 8. t. 38 = purpurea.
equisetifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 805 = purpurea.
eriantha, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 208 (= *Syndesmanthus articulalus).*—Afr. austr.
encoides, *Linn. Sp. PI.* 162.—Afr. anstr.
fasciculata, Willd. Sp. PI. i. 629 - Simocheilus glabellns.
fastigiata, *Benth. in DC. Prod.* vii. 697.—Afr. austr.
flexuosa, *Benth. I. c.* 698.—Afr. austr.
flosculosa, G. Don, Gen. Syst. iii. 805 *(=Syndesmanthus paucifolius).*—Afr. austr.
rascesuens, *Klotisch, in Linnaea,* viii. (1838) 657.—Afr. anstr.
glabella, Drège, ex Benth. in DC. Prod. vii. 698 = campanulata.
glabella, Willd. Sp. PI. i. 631 = Simocheilus glabellns.
glabra, *Thunb. Diss. Blaeria,* 10.—Afr. austr.
gracilis, BartL in Linnaea, vii. (1832) 650-Sympieza Knnthii.
hirsuta, Lichtst. in Roem. & Scholt. Syst. iii. 170 (= *Syndesmanthus paucifolius).*—Afr. austr.
hirsuta, *Thunb. Diss. Blaeria,* 8.—Afr. austr.
incana, Bartl. in Linnaea, vii. (1882) 650 = Grisebachia incana.
jueunda, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 208=purpurea.
Kranssiana, *Klotisch, in Walp. Rep.* ii. 728.—Afr. austr.
leucocephala, *Bory, Voy.* iii. 172.—Ins. Borbon.
multiflora, Klotzsch. in Linnaea, viii. (1833) 661 = Simocheilus multiflorus.
muscosa. Ait. Hort. Kew. i. 150=Scyphogyne inconspicua.
nodiflora, G. Don, Gen. Syst. iii. 805 = Grisebachia plumosa.
nudiflora, *Thunb. Diss. Blaeria,* 6.—Afr. austr.
paniculata, *Thunb. I. c.* 10.—Afr. austr.
parviflora, Klotzsch, in Linnaea, v<ii. (1838) 665 (= *Codonanthemum parviflorum).*—Afr. austr.
pauciflora, G. Don, Gen. Syst. iii. 804, sphalm.= *paucifolia.*
paucifolia, Wendl. Collect, ii. 17. t. 43 (=*Syndesmanthus paucifolius).*—Afr. austr.
ptilota, E. Mey. in Drège, ex Benth. in DC. Prod. vii. 701 = Grisebachia hispida.
puberula, Klotzsch. in Linnaea, viii. (1833) 661 (= *Codonanthemum puberulum).*—Afr. austr.
purpurea, Berg. Desc. PL Cap. 34 = Simocheilus glabellus.
purpurea, *Linn./. Suppl.* 122.—Afr. austr.
pusilla, *KlotBsch, in Linnaea,* viii. (1833) 659.—Afr. austr.
pusilla, *Linn. Want.* 139 ('sp. dubia').—Afr. austr.
revoluta, Bartl. in Linnaea, Vii. (1832) 650-barbigera.
rubra, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 208=ericoides.
scabra, Drège, ex Benth. in DC. Prod. vii. 698 = ericoides.
scabra, Willd. Sp. PI. i. 629 (=*Syndesmanthus scaber).*—Afr. austr.
serrata, *Thunb. Diss. Blaeria,* 6.—Afr. austr.
sessiliflora, Wendl. ex Steud. Nom, ed. II. i. 208 = Simocheilus multiflorus.
spicata, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 13.—Abyss.
Thunbergii, G. Don, Gen. Syst. iii. 805-Grisebachia dliaris.
trigona, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 208 = fascescens.
twrmalis, G. Don, Gen. Syst. iii. 805=Erica tunnalis.
xeranthemifolia, G. Don, 1. c. = Eremia lanata.

BLAINVUiIiEA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxix. 493 (1823). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 369.
CALYPTOCAKPUS, Less. Syn. Comp. 221 (1833).
EISENMANNIA, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) II. 418.

TT.A1N.IHTVA.
GALOPHTHALMUM, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 7. t. 2.
OLIGOGYNE, DC. Prod. v. 629 (1887).
UCACEA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxvii. 9 (1823).
alba, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1861) 70 = rhomboidea.
amazonica, *Benth. (f Hook. f. Gen.* ii. 370.—Reg. Amazon,
bahiensis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 177.—Bras.
biaristata, *DC. Prod.* v. 492.—Bras.
Gayana, Benth. in Hook. Niger Fl. 434, in syn.= Aspilia Gayana.
Gayana, *Cass. in Did. Sc. Nat.* xlvii. 90.—Afr. trop.
hispida, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 70 = rhomboidea.
lanceolata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 176.—Bras.
latifolia, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. Or. 71 - rhomboidea.
polycephala, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. {1848) 89= rhomboidea.
Prieureana, Benth. in Hook. Niger Fl. 433, in syn. - Aspilia Prieureana.
Prieureana, *DC. Prod.* v. 492.—Afr. trop.
racemosa, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. vii. (1848) 89= rhomboidea.
rhomboidea, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxix. 498.—Cosmop. trop.; Ind. or.
synedrelloides, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 370.—Hab. >.
tampicana, *Benth. (f Hook. I. c.—Cf. Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 169.—Mexic.
tenuicaulis, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 870.—Ins. Galap.

BLAIRIA, Houst. ex Linn. Gen. ed. I. 834, in syn. (1737) = Priva, Adans. (Verben.).
cordifolia, Moench, Meth. 428 = P. hispida.
javanica, Gaertn. Frnct. i. t. 56 = Lippia javanica.
lappulacea, Steud. Nom. ed. II. i. 208 = P. echinata.
mexicana, Gaertn. Fruct. i. 265. t. 56. f. 1 =P. hispida.
nodiflora, Gaertn. 1, c. 266. t. 56=Lippia nodiflora.

BLAIRIA, Gled. in Mém. Acad. Berl. (1751) 125-Blaeria, Linn. (Ericac).

BLAKBURNIA, J. F.Gmel.Syst. 258 (1791) - BLACKBURNIA, Forst.=Zanthoxylum, Linn. (Rutac).

BLAKEA, P. Br. Hist. Jamaic. 823 (1766). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 770.
PYXIDANTHUS, Naud. in Ann. Sc. Nat Sir. III. xviii. (1862) 160. t. 6.
VALDESIA, Ruiz & Pav. Prod. 67 (1794).
brevipes, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 144=>repens.
Cacatin, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 324.—Guiana,
caudata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 148.—N. Granat.
glabrescens, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 94.—Perav.
gracilis, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 18.—Costa Rica,
granatensis, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xviii. (1852) 143.—N. Granat.
grandiflora, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 18.—Costa Rica,
hirsuta, *O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 148.—Bras.
laevigata, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 827 = Topobea laevigata.
latifolia, *D. Don, I.* A 325.—Peruv.
lauri/olia, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xviii. (1862) 143—pulverulenta.
Lindeniana, *Triana in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 149.—Venezuela.
macrophylla, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1828) 326 = Bellucia superba.
mexicana, D. Don, 1. c. 825=repens.
multiflora, D. Don,'l. c. 326=Topobea multiflora.
ovalis, *D. Don, I. c.* 825.—Peruv.
ovalis, Griseb. ex Triana, in Trans. Linn. Soc xxviii. (1871) 148 -repens.
parasitica, D. Don, in Mem. Wem. Soc iv. (1823) 327 = Topobea parasitica.
podagrica, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 149.—N. Granat.
pulverulenta, DC. Prod. iii. 196 = Conostegia subhirsuta.

•RT.ATTTBA.
pulverulenta, *Vahl, Symi. Bot.* iii. 61.—Am. austr.
pyxidanthus, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 149.—N. Granat.
quadrangularis, *Triana, 1. c.*—N. Granat.
quinqucnervia, Aubl. PL Gui. i. 626. t. 210-Bellucia Aubletii.
repens, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* Iv. (1823) 325.—Peruv.
repens, Griseb. ex Triana, ID Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 149=ovalis.
rosea, *D. Don, in Mem. Went. Soc.* iv. (1823) 325.—Peruv.
TOStrata, *O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 148.—Peruv.
rotundifolia, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 326.-Peruv.
Schlimii, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 149.—Venezuela,
sessiliflora, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xviii. (1852) 144.—Peruv.
sessiliflora, Poepp. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 148=hirsuta.
subconnata, *O. Berg, ex Triana, I. c*—Ecuador,
trinervia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 635.—Jamaica.
trinervia, Pav. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 149 - Topobea laevigata.
trinemis, Pav. ex D. Don, in Mem. Wem. Soc. >- (1823) 327 = Topobea laevigata.
triplinervia, Linn. Amoen. Acad. viii. 257; Surinam, n. 59 = Bellucia Aubletii.

BLAKSTONIA, Scop. Introd. 276 (1777) = Moronobea, Aubl. (Guttif.).

BLAKWELLIA, Comm. ex Jus. Gen. 348 (1789) (Blackwellia, ex J. F. Gmel. Syst. 768 (1791)) Homalium, Jacq. (Samyd.).

BLAKWELLIA, Gaertn. Fruct. ii. 170 (1791) (Blackwellia, 1.117) (Genus dubium).

BLAKWELLIA, 6cop. Introd. 326 (1777)«AraU»-Toum.

BLANCHEA, Boiss. Fl. Orient iii. 212, in syn. (1875)-Iphiona, Cass. (Compos.).
iphionioides, Boiss. 1. c—Syria.

BLAITCHETIA, DC. Prod. v. 75 (1886). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 226.
heterosticha, *DC. I. c*—Bras.

BLANCKIA, Neck. Elem. i. 847 (17»0)=>Conobea, Aubl. (Scrophul.).

BLANCOA, Blume, Rumphia, ii. 128 (1836)- Didymoaperma, H. Wendl. (Palm.).

BLANCOA, Blume, Rumphia, iii. 181 (1847) = Harpullia, Roxb. (Sapind.).
arborea, Blume, 1. c.=H. cupanioides.

BLANCOA, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839)-*HAEMODORACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 676.
canescens, *Lindl. I. c*—Austral.

BLANDFORDIA, Andr. Bot. Rep. t. 843 (1804)* Ctalax, Linn. (Diapens.).
caudata, Steud. Nom. ed. II. i. 209, sphalm.=seq.
cordata, Andr. Bot. Rep. t 843=G. aphylla.

BLANDFORDIA, Sm. Exot. Bot. i. 6. t. 4 (1804)-*LILIACEAE,* Benth. *Sc.* Hook. f. iii. 774.
aurea, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6809.—Austral.
Backhousii, Lindl. Bot. Reg. (1845) sub t. *18"* grandiflora.
Cunninghamii, Lindl. 1. c. = grandiflora.
Cunninghamii, Van Houtte, Fl. des Series, 1.1829 ~ flammea.
flammea, *Lindl. in Joum. Hort. Soc.* v. (1860) S2--~ Austral.
grandiflora, *R. Br. Prod.* 296.—Tasmania.
grandiflora, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 49=marginato.
grandiflora, Lindl. Bot. Reg. t 924=nobilis?
intermedia, *Herb, in Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* *>*• —Tasmania,
raarginata, *Herb. 1. c.* (1842) *Misc.* 84.—Austral.

BLANDFORDIA:—
nobilis, Sm. Exot. Bot. i. 5. t. 4.—Austral.
Prttttcefis, W. G. Smith, in Flor. Mag. N. S. (1875) t. 1/O=flammea.
puniçea, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 517=grandiflora.
speaosa, Hort. AngL ex Link, Ennm. Hort. Berol. i. 3S0=grandiflora!
"niftora, WiUd. ex Kunth, Enum. PI. iv. 478=Milla biflora.

BLANDFORTIA, Poir. Encyc. Suppl. iv. 116 (1814) = Blandfordia, Sm. (Liliac.).

ULANDINA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 83 (1886)=Leucas, Bunn. (Labiat.).
nflora, Kafin. 1. c.=L. biflora.
chinensis, kafin. 1. t - L . chinensis.

BLANDOWIA> wmd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. '"•.(1809) io. t. 4. f. 2 = Apinagia, Tul. (Podo»t).
Prętspi, Wedd. in DC. Prod. xvii. 85=A. Preissii.
«nata, Corda, in Sturm, Deutschl. Fl. Abth. ii. Heft vi. p. 107. t. 83=A. Preissii.
tnata, Lehm. ex Wedd. in DC. Prod. xvii. 71 - Dicraea Wallichii.
striat "'WiUd in Ges Naturf Fr jnn - OO.t.4-A.Willdenowii. - Berl. Mag. iii. (1808)

BLANISIA, Prftz. fed. Ic. 154 C1855), sphalm.-POLANISIA, Rafin.=deome, Linn./Cappar.).

BLASTANIA, Kotschy & Peyr. PI. Tinn. 15. t. 7 (1865-66). *CUCURBITACEAE.*
CTENOLEHS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 832(1867).
CTENOPSIS, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. V. vl. (1866) 12.
fimbnstipula, *Kotschy V Peyr. I. c.—Mt.* trop.
•nani, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 629.—Ind. or.

BLESTEMABrTHUS, pi^. in Hook. L^. journ. Bot v. (1846) 644. *OCHNACEAE*, Benth. * Hook. £ i. 820.
gemmiflorui, *Planch. I. c.* 645.—Bras,
gracilis, % •»«» '* *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. "• soo.—Bras.

BLAMSJ?TROPHE .. F- Mdrichs. in Kjoeb. Vidensk. sS t^tt) ""2 Alfalfa, Thou. (Apocyn.). *" "*«, F. Didrichs. 1. c. 193.-Afr. ttop/^

BLASTUS, Lma F1- Cochinch. 526 (1790). *MELASTOMACEAE*> Benth & Hook f - • 752.
cochwchinensis, *Lour. 1. c.* 527.—Cochinch.
Hindsii, Hance ta Journ *SOC *"• C18") 103 = Ail AHomorphia panciflora.
patmfl°rvs, Triana, in Trans. Unn. Soc. xxviii. (1871) **=cochinchincnsis.

BLATTARIA
i t5)=VerbaBcum, Unn. (Scrophul.).
«dic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. iv. I. (1789)
«u = v. Lychnitis.
Bast Lyon, N- s- xvii-
("69) 125=V. Bastardi.
f a ° . Fourr. 1. c. = V. virgatum.
ris Fourr. 1. c - V . Blattaria.

BLATTI, Adans, Fam. ii. 88 (1763) = Bonneratia, Linn. f. (Lythrar.).

BLAX
TMS™ Cass fa D5ef Sc- N « - » « • 828 (1824) = «M»PhothBoa, Vaill. (Compos.).
* « " » * » « «, Cass. 1. c. - D. ufriVi.

BLEASDALEA, F. MnelL Fragm. v. 90 (1865)=Grevillea, R. Br. (Proteac.).
cupanoides, F. Muell. 1. c.=G. Bleasdalea.

BLECHUM, P. Br. Hist. Jamaic. 261 (1756). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1082.
ALVA tZIA, Pav " " Nta> ^ DC< Prod " " " *6fi).
"npistifolium, *S. Br. Prod. i.* 478.—Ind. occ.
»eustrus, Nees in DC Prod ^ 4g7._N. Granat.
anisophyllum, Juss. in An"- Mn «- Par- ix. (1807) 270 = Phaylopsis longifolia.

BLECHtIM:—
brasiliense, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 284- Stenandrium mandioccanum.
brasiliense, *Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 245.—Bras.
Brownei, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 270.—Ind. occ.
Brownei, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 238 = Ljnnaei.
costaricense, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 168.—Costa Rica.
grandiflorum, *Oerst. 1. c*—Am. centr.
Haenkei,iVw, *in DC. Prod.* xi. 467.—Mexic.
hamatum, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 220.—Aft. trop.
laxiflorum, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 270.—Jamaica.
Linnaei, *Nees, in DC. Prod.* xi. 465.—Mexic.
lutonium, Nees, 1. c. 466-Brownei.
mexicannm, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 169.—Mexic.
Sternbergii, Nees, in DC. Prod. xi. 468 = Tetramerium nervosum.
trinitense, *Nees, I. e.* 466.—Ins. Trinit.
Tweedii, *Nees, 1. e.*—Mexic.

BLEEKERIA, Hassk. Retzia, i. 88 (1855) = Ochrosia, Juss. (Apocyn.).
catocarpa, C. Muell. in Walp. Ann. v. 492 = seq.
kalocarpa, Hassk. Retzia, i. 40-O. elliptica.
salubris, Hassk. 1. c. 41-0. borbonica.

BLEEKERIA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 407 (1859)-Alchornea, Sw. (Euphorb.).
Zollingerii, Miq. 1. c.=A. villosa.

BLEEKRODEA, Blume, Mus. Bot. tugd. Bat. ii. 87. t. 28 (1852) [16561. *URTICACEAE.Benth.* & Hook. f. iii. S58.
insignis, *Blume, 1. c.* 88.—Borneo,
madagascariensis, *Blume, 1. c.*—Madag.

BLENCOCOËS, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 75 (1836) =. Nierembergia, Ruiz & Pav. (Solanac.)-
filicaulis, Rafin. 1. c. 76=N. linearifolU.
longiflora, Rafin. 1. c—Hab.}

BLENNODERMA, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 406 = Oenothera, Linn. (Onagrar.).
Drummondii, Spach, 1. c. 407 = Oe. Spachiana.

BLENITOSIA, R. Br. in Sturt, Exped. ii. App. 67 (1849). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. *I* 82.
alpestris,i?.^Krf/.i» *Trans. Phil. Soc. Vict.i.* (1855) 100.—Austral.
blennodes, F. Muell. 1. c.=Usiocarpa.
brevipes, *F. Muell. I. c*—Austral,
canescens, *R. Br. in Sturt, Exped.* ii. *App.* 67.—Austial.
cardaminoides, *Benth. Fl. Austral*, i. 75.—Austral.
Cunninghamii, *Benth. I. c.* 76.—Austral.
airvipes,F.MueILin Trans. Phil. Soc. Viet. I (1855) 100.—Austral.
eremigera, *Benth. /7. Austral.* L 74.—Austral,
filifolia, *Benth. I. e.* 78.—Austral,
lasiocarpa, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i.* (1855) 100.—Austral.
nasturtioides, *Benth. Fl. Austral*, i. 74.—Austral,
trisecta, *Benth. I. c*—Austral.

BIiENNOSPEKMA, Less. Syn. Comp. 267 (1882). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 404.
APALUS, DC. Prod. v. 607 (1836).
CONIOTHELE, DC. Prod. v. 531 (1886\
UNXIA, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1835) 37. t. 32.
califomicum, *Ton. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 272.—Calif,
chilense, *Less. Syn. Comp.* 267—Chili.

BLENNOSPORA, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 172-CalocephaluB, R. Br. (Compos.).
Drummondii, A. Gray, 1. c. 178=C. Drummondii.

BLEPETALON, Rafin. Sylva Tellur. 30 (1838) = Scutla, Comm. (Rhamn.).
aculeatum, Rafin. 1. c.»S. Commersoni.

BLEPHANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 59 (1836) - Bulbine, Linn. (Liliac.).
depressa, Rafin. 1. c. = Bulbine bnlbosa.
Hookeri, Kafin. 1. c (- *Anthericum Hooteri).*—N.Zel.

BLEPHARACANTHUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 444 (1886) -Blepharia, Juss. (Acanth.).
capensis, Nees, 1. c. = Blepharis capensis.
carduifolius, Nees, ex Steud. Norn. ed. II. i. 209 = Blepharis carduifolia.
furcatus, Nees, ex Steud. 1. c. = Blepharis furcata.
integrifolius, Nees, ex Steud. 1. c.=Blepharis saturejaefolia.
procumbens, Nees, in Lindl. Introd. Nat Syst. ed. II. 444 = Blepharis glomerata.
verticillata, Steud. Norn. ed. II. i. 209 = Cardanthera veitidllata.

BLEPHARADEN, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 449 (1867)-Swertia, Linn. (Gentianac).
perennis, Dulac, 1. c.=S. perennis.

BLEFHARANDBA, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 7. *MALPIGHIACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 254.
hypoleuca, *Griseb. I. c.*—Guiana.

BLEPHARANTHEMUM, Klotzsch, in Link, Klotzsch & Otto, Ic. PI. 20 (1841) = Flagiaathus, Forst. (Malvac.)-
sidoides, Klotzsch, 1. c.=P. sidoides.

BLEPHARANTHES, Sm. Gramm. Bot. 188 (1821) = Modecoa, Lam. (Passif.). <

BLEPHARIGLOTIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 38 (1836) -Habenaria, Willd. (Orchid.).
albiflora, Rafin. 1. c.-H. albida ?
bicolor, Rafin. 1. c. 39.—Hab. ?
cristata, Rafin. 1. c.-H. cristata.
fiaviflora, Rafin. 1. c.—Hab. ?
longicornis, Rafin. 1. c. 88 = H. longicornis.

BXiKPHABIFAFFUB, Hook. Fl. Bor. Am. i. 316 (1833). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 382.
FTILONELLA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 385.
glandulosus. Hook. 1. c. = Layia glandulosa.
scaber, *Hook. 1. c.*—Am. bor. occ.

BLEPHARIS, Juss. Gen. 103 (1789). *ACANTHACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1089.
ACANTHODIUM, Delile, R Egypte, 241. t. 38 (1813).
BLEPHARACANTHUS, Nets, in Lindl. Introd. Nat SysUed. II. 444(1886).
ablephara, *Nees, in DC. Prod.* xi. 267.—Java.
abyssinica, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 150-boerhaviaefolia.
acanthodioides, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 212.—Afr. trop.
angusta, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 35.—Air. austr.
arborea, *Spreng. Syst.* ii. 819.—Arabia,
asperrima, *Nees, in DC. Prod.* xi. 267—Ind. or.
boerhaavifolia, Roth, Nov. Sp. 820-seq.
boerhaviaefolia, *Pers. Syn.* ii. 180.—Ind. or.
calaminthaefolia, *Pers. I. c*—Hab. t
capensis, *Pers. I. c.*—Afr. austr.
earduifolia, *T.AndersAn Journ. Linn. Soc. vii.* (1864) 86.—Afr. austr.
cuanzensis, *Welw. ex S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 280.—Afr. trop.
edulis, *Pers. Syn.* ii. 180.—Arab.; Persia; Ind. bor. occ
furcata, *Pers. I. c.; T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 35.—Afr. austr.
fureata, Eckl. ex Nees, in DC. Prod. xi. 276; et Zeyh. ex Nees, 1. c. 277-capensis.
glauca, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 86.—Afr. austr.
glomerata, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 89.—Afr. austr.
glumacea, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 282.—Afr. trop.
grossa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 36.—Afr. austr.
Guiinzii, *T. Anders. I. c.* 34.—Afr. austr.
hirtinervia, *T. Anders. I. c.* 36.—Afr. austr.

BLEPHABI8 :—
integrifolia, E. Mey. in Drtge, Zwei Pfl. Docnm. 168 —saturejaefolia.
involucrata, *Solms, ex Schneinf. Ba'.tr. Fl. Aethiop.* 107.—Air. trop.
llnariaefolia, *Pers. Syn.* ii. 180.-Afr. trop.
naderaspatensis, Heyne, ex Roth, NOT. Sp. 820-boerhaviaefolia.
mollnginifolia, *Pers. Syn.* ii. 180.—Ind. or.
Noli-me-tangere, £. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 281.—Afr. trop.
pratensis, *S. Moore, I. c.* xv. (1877) 204.—Afr. trop.
procumbent, Heyne, ex Roth, Nov. Sp. 820--boerhaviaefolia.
procumbent, Pers. Syn. ii. 18'0=glomerata.
procurrens, Nees.in DC Prod. xi. 267=boerhaviaefolia.
pungens, *Klottsch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 211.—Afr. trop.
repens, Roth, Nov. Sp. 321 = mollnginifolia.
rubiaefolia, Schnm. in Dansk. Vidensk. Selsk. Afh. iv. (1828) 66= boerhaviaefolia.
saturejaefolia, *Pers. Syn.* ii. 180.—Afr. austr.
scindica, Stocks, ex f. Anders, in Joum. Linn. Soc vij. (1864)36 = linariaefolia.
•eirnlata, *Ficalho V Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1881) 24.—Afr. trop.
setosa, *Nees, in DC. Prod.* xi. 265.— Afr. austr.
sindiea. Stocks, ex T. Anders, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 500-linariaefolia.
•pathularis, *T. Anders. I. c.* vii. (1864) 36.—Afr. anstr.
•piculifolia, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 86.—Ins. Socotr.
squarrosa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 86.—Afr. anstr.
Togodelia, *Solms, ex Schveinf. Beitr. Fl. Aetkiop.* 108.—Abyss.
verticillata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2409 = Cardanthera verticillata.
Wclwitschii, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 231.—Afr. trop.

BLEPHARISPERMUM, Benth. in DC. Prod. vii. 709 (1839)-BLEPHAROPHYLLUM, Klotisch =B«jyphogyae, Brongn. (Ericac.).

BliEPHAHISPERMUM, Wight, ex DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 11 (1834). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 296.
LIUCOBLEPHARIS, Am. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 422.
petiolare, *DC. in Wight, I. c.* 12.—Ind. or.
spinnlosum, *Oliver* to* *Hiern, in Oliver. Fl. Trop. Afr.* iii. 336.—Afr. trop.
subsessile, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 12.—Ind. or.
zangnebaricum, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Tro*. Afr.* iii. 336.—Afr. Irop.

BLEPHABI8TEMMA, Benth. in Wall. Cat. n. 6320 (1832). *RHIZOPHOREAE,* Benth. & Hook. f. i. 682.
corymbosum, *Benth. I. c.*—Ind. or.

BLEPHAROCALYX, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 412 -Hyrtus, Toum.
acuminatissimus. Berg, 1. c. 413; et in Mart. FL Bras. xiv. I. 421.—Reg. Argent
acuminatus, Berg, 11. cc. 414, 426 (—Myrcia acuminaia?).—Bras.
affinis. Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 606.—Bras.
amarus. Berg, 1. c. 422.—Reg. Argent.
angustifolius, Berg, 1. c 421.—Bras.
angustissimus, Berg, I. c—Bras.
apiculatus, Berg, 1. c 425.—Bras.
brunneus, Berg, 1. c 427.—Bras.
canescens, Berg, 1. c. 426.—Bras.
dsplatensis, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 126. —Reg. Argent.
cuspidatus, Berg, in Mart FL Bras. xiv. I. 424.—Bras.
depauperatus. Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 416; et in Mart 1. c. 428.—Bras.
ellipticus, Berg, II. cc. 416 et 429.—Bras.
lanceolatus, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 422.—Bras.
longipes. Berg, 1. c. 423.—Bras.
parvifolius, Berg, 1. c. 606.—Bras.
picrocarpus, Berg, 1. c. 427.—Bras.
pilosus, Berg, 1. c. 422.—N. Granat.
ramosissimus, Berg, 1. c 424.—Bra*.

BLEPHAROCALYX:—
salicifolia, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 413 - Myrtns salicifolia.
Serra, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 605.—Bras.
sessilifolius, Berg, 1. c. 428.—Bras.
strictus, Berg, 1. c. 423.—Bras.
Tweediei, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 416; et in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 429.—Bras.
villosus, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 425.—Bras.
Widgreni, Berg, 1. c. 427.—Bras.

BliEPHABOCAHYA, F. Mnell. Fragm. ix. 15 (1878). *SAPINDACEAE.*
involncrigera, *F. Muell. 1. c.* 16.—Austral.

BLEPHAROCHLAMYS, Presl, Epim. Bot. 246 (1849) -MystropetaJon, Harv. (Balanoph.).
capensis, Presl, 1. c 246 = M. Thomii.

BLEPHAROCHLOA, Endl. Gen. 1352 (1841) = Iieersia, Sw. (Gramin.).
ciliata, Endl. 1. c. = L. ciliata!

BLEPHARODON, Decne. in DC. Prod. viii. 603 (1844). *ASCLEPIADBAE,* Benth. & Hook. f. ii. 766.
PTYCHOLEPIS, Griseb. in LechL Berb. Am. Anstr. 68 (1857).
ampli6oms, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 304.—Bras.
asparagoides, *Decne. in DC. Prod.* viii. 604.—Bras,
asterion, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 307.—Bras.
bicolor, *Decne. in DC. Prod.* viii. 604.—Bras,
bicuspidatus, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 306.—Bras.
bracteatus, *Fourn. I. c.* 307.—Bras,
Decaisnei, *Fourn. I. c.* 306.—Bras,
diffusum, *Decne. in DC. Prod.* viii. 606.—Bras,
grandifloram, *Benth. PI. Hartm.* 216.—N. Granat.
laurifolium, Decne. in DC. Prod. viii. 608 = Nephradenia lanrifolia.
lineare, Decne. 1. c.=Nephradenia linearis.
linearifolium, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 756,sphalm. = laurifolium.
longipedicellatum, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 306.—Bras.
mucronatum, *Decne. in DC. Prod.* viii. 603.—Mexic.
neriifolium, Decne. 1. c = Nephradenla neriifolia.
pallidum, *Decne. I. c.*—Bras,
salicinura, *Decne. 1. c.* 604.—Bras. ?
Spruceanom, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 807.—Bras,
triplinenre, *Tun: in Bull. Soc. Nat.Mosc.* xxv. (1852) II. 319.—Venezuela.

BLEPHAROLEPIS, Nees, in Llndl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 442 (1836) -Polpoda, Presl (Ficoid.).
Zeyheriana, Nees, 1. c. = P. capensis.

BLEPHAROLEPIS, Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 91 (1843)=8cirpus, Linn. (Cyperac).
leueoblepkaris, Nees, 1. c.—Bras.

BLEPHAROPHYLLUM, Klotzscb, in Linnaea, xii. (1838) 216-Scyphogyne, Brongn. (Ericac).
divarieatum, Klotzsch, 1. c 216=S. divaricata.

BLEPHAROSTEMMA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 898 = Asperula, Linn. (Rubiac).
taurinum, Fourr. 1. c. = A. taurina.

BIiEPHXLIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 190; et Joum. Phys. lxxxix. (1819) 98. *LABI A TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1198.
Becki, *Rafin. in Ail. Joum.* 146.—Am. bor.
brevifolia, Rafin. New Fl. Am. iv. 96=ciliata.
brevipes, *Rafin. I. c.*—Am. bor.
ciliata, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1819) 190.—Am. bor.
heterophyla, Rafin. New Fl. Am. iv. 66=ciliata ?
hirsuta, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 320.—Am. bor.
lanceolata, Rafin. New Fl. Am. iv. 96-hirsuta?
nepetoides, Rafin. 1. c. = hirsuta.
pratensis, Rafin. 1. c. = ciliata.

BLEPHILOMA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 95 (1836)-Phlomia, Toum. (Labiat.).
amplifolia, Rafin. 1. c—Hab.»

BLEPHISTELMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 103 (1836) - **Passiflora,,** Linn.
aurantia, Rafin. 1. c—P. aurantia.

BIiETIA, Ruiz & Pav. Prod. 119. t. 26 (1794). *ORCHIDEAE,* Benth. 8c Hook. iii. 513.
BLETIANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
BLETILLA, Reichb. f. in Fl. des Serres, viii. (1863 246.
DILOMILIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 43 (1836).
GYAS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 299.
HECABE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 44 (1836).
JlMENSiA, Rafin. 1. c. 38 (1836).
THIEBAUTIA, Colla, Hort Ripul. 139 (1824).
acaulis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 485=Brassavola acaulis.
àcuminata, Reichb. f. 1. c. 427-Laelia acuminata.
acutipetala, Hook. Bot. Mag. t. 8217=verecunda.
adenocarpa, *Reichb. f. in Bonplandia,* iv. (1856) 216-—Mexic.
albida, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 428=Laelia albid*.
dmaonica, Reichb. 1. c. 434 = Brassavola amazonica.
amboinensis, Zipp. ex Blame, Mas. Bot. Lugd. Bat. 180 =Phaius amboinensis.
anceps, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 418 = Laelia anceps.
angustata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 421 = Spathoglottis plicata.
angustata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 434-Brassavola angustata.
anomala, *Rich. If Gal. in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. » (1845) 23.—Mexic.
aphylla, Nutt. Gen. Am. ii. 194 = Hexalectris aphyll*-
attenuaU, *Reichb./. Xenia Orchid,* ii. 64.—Ind. occ.
autumnalis, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. &* il. (Orch. Opusc.) 19-Laelia autumnalis.
bicallosa, D. Don, Prod. Fl. Nep. 80=Lip«i5 bitnberculata ?
Boothiana, Reichb. f. Xenia Orchid, it 61=Lae^* Boothiana.
bracteosa, *Griff. Notul.* iii. 826.—Ind. or.
campanulata, *La Llave* b* *Lex. Nov. Veg. Desc.* fr*0-ii. *(Orch. Opusc.)* 17.—Mexic.
capitata, [R. Br. in] Ait. Hort Kew. ed. II. v. «0» -Elleanthus capitatus.
Casperiana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 428=Laeli* purpurata.
catenulata, *Ruit V Pav. Syst.* 2.29.—Peruv.
caulescens, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 431 -Lad* caulescens.
Cebolelta, Reichb. f. 1. c. 435 - Brassavola Ceboletta.
ciliaU, *Presl, Rel. Haenk.* 99.—Peruv.
cinnabarina, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 480=Lae1r* cinnabarina.
cinnamomea, Reichb. f. 1. *c* 418=Laelia cinnamonM*.
cocdnea, *La Llave* b* *Lex. Nov. Veg. Desc.* fasc » *{Orch. Opusc.)* 16.—Mexic.
cordata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 486 = Brassavola nodosa.
crispa, Reichb. f. 1. c. 428-Laelia crispa.
crispina, Reichb. f. 1. c. 419 = Schomburgkia crispa.
cucullata, Reichb. f. 1. c. 433 = Brassavola cucnllata. .
Dabia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 30 - Eulopbi* campestris ?
densiflora, *Griff. Notul.* iii. 828.—Ind. or.
Digbyana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 422«Laeli» Digbyana.
domingensis, Reichb. t 1. c 432 = Broughloni* lilacina.
elegans, Reichb. f. 1. c. 427=Laelia elegans.
ensiformis, *Ruia tf Pav. Syst.* 230.—Peruv.
Eulophiae, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 439 = Tetr»-micra tenera.
euspatha, Reichb. f. 1. c. 424 = Laelia euspatha.
fiabellata, Reichb. f. 1. c. 422 = Laelia xanthina.
flava, Reichb. f. 1. c. 431 -Laelia flava.
flava, Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 127-Pbaiu* maculatus.
florida, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 206.—I»d-occ.
folgens, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii (1855) 221-" Mexic
furfurea, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 428=L»eli» nirfuracea.
gebina, Lindl. in Joum. Hort. Soc il. (1847) 307* hyacinthina.
glauca, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 423-Lae1< * glauea.

BLETIA:—

glonosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 419-Schomburgkia crispa.

gndlu, Laid. Bot. Cab. t. 1977.—Mexic.

?»»»M«, D. Don, Prod. Fl. Nep. 29-Amndina bambusifolia.

grandijlora, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. (V*: P) 17 = LaeUa grandiflora.

gnmdu, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 424-Laelia grandis.

gumeensis, *G. Don, ex Sweet, Hart. Brit.* ed. I. 492, nomen.—Guinea.

Savannensis, *lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 28.-Cuba.

HwHtoldtli, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 480-Schomburgkia Humboldtii.

Maxulana gracilis.

hyaduthina, *[R. BT. «»] Ait. Hort. Kern.* ed. II. v. 206. —i-nina; Japon.

irrorata.

jucunda, *Lin* (1855) 221 *Reichb. f. in Bonplandia,* iii.

Landsbergii (1859) *Nederl. Kruidk. Arch.* iv. l.t-1 817 «n. trop.

laUoUa, Gaudich.Bot.Freyc. Voy. 421.—Ins. Moluccillac

(1845) 28.—Mexic.

Lindeni, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 431-Laelia Lindenii.

Lindleyana, Reichb. f. Xenia Orchid. U. 65-Laelia Lindleyana.

linearis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 426 = BrMsavola lineata.

obata, Reichb. f. 1. c. 424-Laelia Boothiana.

R«chb. f. Xenia Orchid, ii. 69-Laelia longipes.

Lundii, Reichb. f. & Warm, in Otia Bot Hamb. 92 = Laelia Lundii.

Lyonsi Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 418-Schomburgkia Lyonsia.

marginata, Reichb. f. l. c. 419 Schonlbnl BltU marginata.

Martiana, Rei^b- f-1- c. 484-Brassavola Martiana.

Masuca, D. Don, Prod. Fl. Nep. 80-Calanthe Masuca.

montana, Re'chb. f in Walp. Ann. vi 446 -Octadesmia serrat lia.

nipponica, Franeh_ V Sav_ Enum_ pu Japon.

nodosa, Reichb. f. Walp Ann 487 Brassavola nodosa.

obcordata, Lindl. Gen. et Sp. Orc- 12S.-Ind. or.

Ortgi an *Reichb. in Otto Hamb. Gartens.* xvi. (wTonV-Hab.^ pal)

Part? Lod< Cab. t. 629=florida.

t 3736.-Meric.

in Walp. Ann. vL 489 - P^viflora.

pa flora, Ruiz Hwnia, *Hook. Bot.* j/ 3518,-Ins. S. Doming.

Pauli ae, F. Mu Patilinae. 98

peduncularis, Reichb. f pedunTOlagi Walp> Ann 26 = LaeUa

Perrini \Reichb. f. 1. c. 421 -LaeliaPerrinii.

1S^^"".Reichb. *f. ex* Griseb. CaL PI. Cub. 264-

praetans, Rchb. f. in Walp. Ann. vi. 426 LaeUa praestans

pratensis, ichf *39=Tetramicra rigida.

pulchella, ort verecunda. Cf, Garf- ChTOn> (1850) 68 =

pumila, Reichb. f. taWlJp Ann 2 1 = Laelia pumila.

Pumilio, Reichb. «8-Brassavola Pumilio.

punctata, La Llave & Lex. Nov. Ve (Orch. O* 15—Mexic.

purpurata, A Rich & GiL in Ann. Sc Nat. Ser. III. iii. (1845) 128-Arethusa rosea.

purpurata, Reich vi. 423 = Laelia

ar. Jard. Genèv. 23

reflexa, Lindl. Peruv. 1760.—

repanda, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 229.—Peruv.

retusa, Reichb. in Walp. Ann. vi. 485 = Brassavola retusa.

BLETIA:—

rhofalorrhachis, Reichb. f. 1. c. 437 = Brassavola rhopalorrhachis.

rigida, Reichb. f. 1. c 438-Tetramicra rigida.

Roeilii, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 7.—Merit

rosea, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 420 -Schombnrgkia rosea.

rubescens, Reichb. f. 1. c. 426 -Laelia rubescens.

rupestris, Reichb. £ 1. c. 431 -Laelia rupestris.

sanguinea, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 56. t. 95 -catennlata.

aareophylla, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 278.—Ind. occ.

Schilleriana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi 424-Laelta Schilleriana.

schoenina, Reichb. f. 1. c. 439-Tetramicra schoenina.

Schomburgkii, Reichb. f. 1. c.=Tetramicra rigida.

secunda, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 67.—Mexic.

Sktpherdii, Hook. Bot. Mag. t 3319=verecunda.

Sherrattiana, *Batem. in Hook. I. c.* t. 5646.—N. Granat

speciosa, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 842-Laelia grandiñoxa.

aplendens, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 64, nomen.—Bras.

stricta, *C. Presl, Rel. Haenk.* 98.—Ins. Luzon.

atperòiens, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 418=Laelia snperbiens.

sylvotica, Boj. Hort. Maurit. 818-Calanthe sylvatica.

Tankervilleae, R. Br. in Bot Mag. t. 1924-Phaius grandiflorus.

tetura, A. Rich. FL Cub. Fanerog. ii. 242-Tetramicra tenera.

tibidnis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 429-Schomburgkia tibicina.

tuberculata, Reichb. f. 1. c. 434—Brassavola tuberculata.

tuberculosa, Spteng. Syst. iii. 744 -Phaius tnbercnlosns.

undulata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 420-Schomburgkia undulata.

uniflora, *Rui* V Pav. Syst. Veg.* 280.—Peruv.

venosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 438-Brassavola venosa.

verecnnda, *[R. Br. in] Ait. Hort. Km.* ed. II. v. 206. —Florida; Ind. occ.

•*villosa,* Spreng. Syst. iii. 748 -- Phaius villosns.

violacea, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 426=Laelia violacea.

Wagenerii, *Reichb. f. in Bonplandia,* il. (1864) 22.—Venezuela.

Wallisii, *Reichb. f. in Linnaea,* xli (1877) 115.—N. Granat.

Wendlandi, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 431-Laelia Wendlandi.

Woodfordii, Hook. Bot. Mag. t. 2719 •= Phaius macolatus.

xanthina, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 425-Laelia

BLETIANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 - BlatU, Ruiz *Sc* Pav. (Orchid.).

BLETILLA, Reichb. f. in Fl. des Serres, Sèr. I. viii. (1861-53) 246=Bletia, Ruiz & Pav. (Orchid.).

fiorida, Reichb. f. 1. c.-Bletia ñorida.

Gebinae, Rdchb. f. 1. c. -Bletia hyacinthina.

BLETTI, Stend. Nom. ed. II. i. 210 (1840)-BLATTL Adam.=8oaneratia, Linn. f. (Lythrar.).

BlilG-HIA, Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1806). 671.1.16,17. *SAPINDACBAB.* [Benth. *Sc* Hook. f. i. 399].

AKEA, Stokes, Bot. Mat. Med. ii 353 (1812).

AKEESIA, Tussac, Fl. Ant. i. 66 (1808).

sapida, *Kon. in Kon. VSims, Ann. Sot.* ii (1806) 671. —Air.; Ind. occ.

unijugata, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 427.—Afr. trop.

zambesiaca, *Baler, 1. c.*—Afr. trop.

BLTJTKWOBTHIA, Choisy, in *Him.* Soc. Phys. Genèv. vi. (1838) 480. t. 4. *CONVOLVULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 869.

lydoides, *Choisy, 1. c.*—Burma.

BLITANTHUS, Reichb. Cat. Hort. Dresd. (1824); Handb. 238 (1837) - Acrogloohin, Schrad. (Chenopod).

nepalensis, Reichb. 11. c c - A. chenopodioides.

BLITUM, [Tourn.] Linn. Gen. ed. 1.20 (1737) - Chenopodiuin, Linn.

acuminatum, Schur, Enum. PI. Transs. 671-C. rnbrum.

antarcticum, Hook. f. Fl. Anlarct ii. 549-C. antarcticum.

atriplicinum, F. Muell. in. Trans. Viet Inst. (1855) 183-C. atriplicinum.

Bonus-Henricus, C. A. Mey. FL Alt. i. 11, nota=C. Bonus-Henricns.

botryoides, Drej. in Fl. Dan. t. 2894-C. rubrum.

californicum, S. Wats, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 101-C. californicum.

capitatum. Linn. Sp. PI. 4 = C. capitatum.

carinatum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt i. 11 adnot. - C. carinatum.

chenopodioides, Bemh. ex Steud. Nom. ed. IL i. 210 -= petiolare.

chenopodioides, Lam. Eneyc. ii. 11=C. capitatum.

chenopodioides, Nutt Gen. Am. i. 4 =Monolepis chenopodioides.

crassi/olium, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 682 - C. rubrum.

cristatum, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. ii. (1858) 73-C. cristatum.

gangeticum, Moench, Meth, 859-Amaranthns gangetiens.

genuinum, Koch, ex Buek, Ind. DC. Prod. iii. 61 (est sectio generis).

glandulosum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 82 - C. carinatum.

glaucum, Koch, in Sturm, Dentschl. Fl. Heft 75 - C. glaucum.

qraecitans, Moench, Meth. 859-Amaranthus Blitum.

lividum, Moench, 1. c.—Amaranthns lividus.

maritimum, Nutt. Gen. Am. ii. Add. post Ind. [12] = C. rubrum.

mains, Scop. Fl. Cam. ed. IL ii. 287-Amaranthus Blitum.

melancholicum, Moench, Meth. 859-Amaranthus gangeticus.

Nuttallianum, Roem. & Schult. Mant. L 65-Monolepis chenopodioides.

oleraceum, Moencb, Meth. 369=Amaranthus oleraceus.

petiolare, Link, Enum. Hort. Berol. i. 8.—Tataria!

polymorphum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 18 - C. rubrum.

Pumilio, C. A. Mey. 1. c. 11, adnot.=C. Pumilio.

rubrum, C. A. Mey. 1. c.=C. rubrum.

Sanguisorba, Pritz. Ic. Ind. 155, sphalm. - Poterium Sanguisorba.

tataricum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 3-C. capitatum.

tenue, Moq. in DC. Prod, xiii II. 81 -Roubieva multifida.

terminate, Stokes, Bot. Comment, i. 11-C. capitatum.

virgatum. Linn. Sp. PI. 4-C. capitatum.

viride, Moench, Meth. 359-C. album.

BLOCHMANNIA, Reichb. Consp. 168 (1828)-Triplarls, Linn. (Polygon.).

peruviana, Poepp. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 173-T. Poeppigiana.

Weigeltiana, Reichb. Consp. 163-T. surinamensis.

BLONDEA, Rich, in Act. Soc Hist. Nat. Par. i. (1792) 110-Sloanea, Linn. (Tiliac).

lati/olia, Rich. 1. c.—Guiana.

BLONDIA, Neck. Elem. ii. 115 (1790)=Tiarella, Linn. (Saxifr.).

biternata, Rafin. Fl. Tellur. ii. 76=Astilbe decandra.

trifoliata, Rafin. 1. c - T. trifoluta.

BLOOMEBIA, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii 11 (1868). *UUACEAE,* Benth. Ac Hook, t Gen. iii. 801.

aurea, *Kellogg, I. c*—Calif.

Clevelandi, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 876.—Calif.

BLUFFIA, Delile, Sem. Hort. Hamb. (1885) (Cf. Linnaea, x. (1836) 114); Nees, Fl. Afr. Austr. Gram. (1836)-Panicum, Linn. (Gramin.).

Eckloniana, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 447.—Afr. austr.

BLUMEA, G. Don, Gen. Syst i. 573 (18SD-BLUMIA, Spreng.-Saurai^ja, Willd. (Temstrocm.).

BLUMEA, Reichb. Consp. 209 (1828) - Neesia, Blume (Malvac).
altissima, Reichb. ex Stend. Norn. ed. II. i. 211 = N. altissima.

BLTJMEA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1883) 514.
COMPOS1TAE, Bentb. & Hook. f. ii. 289.
DOELLIA, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 958 (1848).
PLACUS, Lonr. Fl. Cochinch. 196 (1790).
abyssinica, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.* 392.—Abyss.
««<*«*«, DC. in Nouv. Ann. Mus. Par.iii. (1834) 409-laciniata.
alata, DC. Prod. v. 448-Laggera alata.
amethystina, Hance, in Jonrn. Bot. vi. (1868) 173 = glomerata.
amplectens, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 13.—Ind. ot.
amplectens, Thw. Enum. PI. Zeyl. 163-bifoliata.
anagallidi/olia, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 13 - amplectens.
angustifolia, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* 164.—Zeylan.
appendicalata, *DC. Prod.* v. 447.—Java.
arenaria, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 18 = amplectens.
arfakiana, *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot.* xv. (1888) 292.—N. Guin.
Arnottiana, Stend. Norn. ed. II. i. 210=Inula Cappa.
aromatica, *DC. Prod.* v. 446.—Reg. Himal.; Burma.
aurita, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 16-Laggera anrita.
axillaris, DC. Prod. v. 434-lacera.
baccharoides, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. L 391-PlucheaDioscoridis.
balsamifera, *DC. Prod.* v. 447.—Ind. or.; Burma; Malaya,
barbata, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 14.—Ind. or.
Belangeriana, *DC. Prod.* v. 444.—Ind. or.
bifoliata, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 14.—Ind. or.; Burma; Malaya.
Bovei, Vatke, in Linnaea, xxxix. (1875) 485-abyssinica.
bovina, Edgew. in Jonrn. As. Soc. Beng. xxi. (1858) 178—oxyodonta.
cernua, DC. Prod. v. 436 = hieracifolia.
Chamissoniana, DC. 1. c. 434 = Wightiana.
chinensis, *DC. 1. c.* 444.—Ind. or.; China; Java.
chinensis, Hook., ft Am. Bot. Beech. Voy. 195-Inula Cappa.
chinensis, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 294-hieracifolia.
cichoriifolia, DC. ex Decne. in Nonv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 410=laciniata.
dnerascens, DC. Prod. v. 439 = lacera.
Clarkri, Hook. f. FL Brit. Ind. iii. 267=elongate.
Commersonii, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 38.—Ind. or.
crasiifolia, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 394.—Abyss.
crepidi/olia, DC. Prod. v. 487-laciniata.
crinita, *Am. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836) 348.—Zeylan.
crinita, Steetz, in Seem. Bot. Voy. Herald, 887 = hieracifolia.
cuneifolia, DC. Prod. v. 441-lacera.
Cunninghami, *DC. I. c.* 435.—Austral,
densiflora, *DC. I. c.* 446.—Ind. or.; Malaya; Ins. Pacif.
diffuse, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 525.—Austral,
diffnsa, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlvi. (1877) II. 187.—Burma.
Dregeana, *DC. Prod.* v. 486.—Afr. anstr.
dregeanoides, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent FL Abyss. i. 392-lacera.
elongata, *DC. Prod.* v. 445.—Reg. Himal.; Burma; Penang.
eriantha, *DC. in Wight, Contra. Bot. Ind.* 15.—Ind. or.
excisa, DC. Prod. v. 446-densiflora.
fasciculata, DC. 1. c. 442-glomerata.
fistulosa, Kara, in Jonrn. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) II. 187-glomerata.
flava, DC. Prod. v. 489=Laggera flava.
flexnosa, *C. B. Clarke, Compos. Ind.* 86.—Ind. or.
fontinalis, Edgew. in Joura. As. Soc. Beng. xxi. (1863) 178-lacera.

BLUMEA:—
gariepina, *DC. Prod.* v. 448.—Afr. anstr.
glandulosa, Benth. Fl. Hongk. 177 - laciniata.
glandulosa, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 14-lacera.
glandulosa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 163 -membranacea.
glomerata, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 15.—Ind. or.; Malaya; China,
glntinosa, *DC. Prod.* v. 484.—Madag.
gracilis, DC. 1. c. 443-lacera.
grandiflora, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 165—Capparis spinosa.
grandis, DC. Prod. v. 447=densiflora.
guineensis, DC. 1. c. 449—Laggera aurita.
Hamiltoni, DC. 1. c. 439-hieracifolia.
Heyneana, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 15-lacera.
hieracifolia, *DC. I. c.* 15.—Ind. or.; Burma ; Malaya.
hieracifolia, Hook. f. & Thorns, ex Fl. Brit. Ind. iii. 267-elongata.
hispidula, DC. ex C. B. Clarke, in Fl. Brit. Ind. iii. 672—membranacea.
holosericea, Dalz. *8c* Gibs. Bomb. Fl. 126=glomerata.
holosericea, DC. Prod. v. 442-lacera.
Hookeri, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 269.—Reg. Himal.
hymenophylla, DC. Prod. v. 440-membranacea.
integrifolia, *DC. Prod.* v. 433.—Austral.
Jacquemontii, *Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iii. 265.—Ind. or.
javanica, *Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Netrl. Indie,* ii. (1848) 239.—Java.
Kingii, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 265.—Ind. or.
lacera, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 14.—Ind. or.; Malaya; Ins. Mascar.
laciniata, *DC. Prod.* v. 436.—Ind. or.; Malaya; China.
lactucaefolia, DC.L c. 435-lacera.
lapsanoides, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 15-virens.
leptoclada, DC. Prod. v. 443-glomerata.
leptoclada, Dalz. *8c* Gibs. Bomb. Fl. 125-lacera.
Leschenaultiana, DC. Prod.v. 485-Wightiana.
lencanthema, *DC. 1. c.* 436 (sp. dnbia).—Nepal.
longifolia, DC. 1. c. 446 = myriocephala ?
macrophylla, *DC. I. c.* 446.—Java.
macrostachya, DC. 1. c. 442-hieracifolia.
malabarica, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 267.—Ind. or.
Malcolmii, *Hook./. 1. c.* 266.—Ind. or.
manillensis, *DC. Prod.* v. 435.—Ins. Luzon,
membranacea, *DC. 1. c.* 440.—Ind. or.; Malaya.
Metnana, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 266 - Belangeriana.
Milnei, Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 257; Fl. Vit. 141-densiflora,
muralis, DC. Prod. v. 440 - membranacea.
Musra, DC. 1. c. 485-lacera.
myriocephala, *DC. I. c.* 446.—Reg. Himal.; Burma.
myriocephala, Thw. Enum. PI. Zeyl. 168 = spectabilis.
napifolia, DC. 1. c. 440 = lacera.
natalensis, *Sch. Bip. in Walp. Rep.* it 971.—Afr. austr.
neilgherrensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 261.—Ind. or.
nitida, Wall, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 86 = chinensis.
nitida, *Zoll.* to" *Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Netrl. Indie,* ii. (1845) 244.—Java,
nodiflora, *Hoot./. Fl. Brit. Ind.* iii. 262.—Burma.
obovata, C. B. Clarke, Comp. Ind. 77-Jacquemontii.
obovata. DC. Prod. v. 446.—Nepal.
oligocephala, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 13 - bifoliata.
oloptera, *DC. Prod.* v. 448.—Afr. trop.
oxyodonta, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 15.—Ind. or.; Burma; Malaya; China.
parvi/olia, DC. Prod. v. 487 - Wightiana.
paud/olia, DC. 1. c. 440—membranacea.
Perrottetiana, DC. 1. c. 443-lacera.
Petitiana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 395.—Abyss.
phagnaloides, A. Rich. 1. c. 393-Phagnalon sco-parium.
phyllostachya, DC. Prod. v. 438 = Wightiana.
procera, *DC. 1. c.* 445.—Ind. or.; Burma.
pterodonta, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 16-Laggera pterodonta.
pubiflora, DC. Prod. v. 434 = amplectens.

BLUMEA:—
purpurascens, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 395-Laggera pterodonta.
purpurea, DC. Prod. v. 443-glomerata.
racemosa, DC. I. c. 442-glomerata.
riparia, DC. 1. c 444 -chinensis.
runcinata, DC. 1. c. 438 •= laciniata.
runcinata, Wall. Cat. n. 3087-lacera.
salvifolia, *DC. Prod.* v. 448.—Ins. Borbon.
salviodora, *Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Netrl. Indie,* ii. (1845) 246.—Java,
saxatilis, *Zoll. V Mor. I. c.* 243.—Java.
semivostita, DC. Prod. v. 445-procera.
senecioides, DC. 1. c. 489=membranacea.
senecioides, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 88 = Pulicariafoliolosa.
senegalensis, DC. Prod. v. 449-Conyza senegalensis.
sericans, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 262.—Burma,
sessiliflora, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 410.—Ins. Timor.
sessili/olia, DC. Prod.v. 447-myriocephala.
sikkimensis, *Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iii. 268.—Reg. Himal.
solidaginoides, *DC. Prod.* v. 448.—Afr. trop.
sonchi/olia, DC. 1. c. 438= laciniata.
spectabilis, *DC. 1. c.* 445.—Ind. or.
spinellosa, DC. 1. c. 443 - hieracifolia ?
squarrosa, C. B. Clarke, Comp. Ind. 87-myriocephala.
subeapitata, *DC. Prod.* v. 439.—Reg. Himal.
subsimplex, DC. 1. c. 441 - membranacea.
sylvatica, *DC. I. c.* 447.—Java.
tenella, DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 18-bifoliata?
tetraptera, *Rol/e, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 813.—Ins. Philipp.
thyrsoidea, Sch. Bip. in Bot. Zeit. xxiv. (1866) 166 = lacera.
timorensis, *DC. ex Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1884) 411.—Ins. Timor.
tomentosa, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 894.—Abyss.
trichopkora, DC. Prod. v. 436 = Wightiana.
trigona, DC. 1. c. 437-lacera.
trisulca, DC. L c. 440-Conyza stricta.
vernonioides, DC. 1. c. 447 = Laggera alata.
villosa, Sch. Bip. ex Hook. f. FL Brit. Ind. iii. 268 - lacera.
viminea, *DC. Prod.* v. 442.—Ins. Timor,
virens, *DC. in Wight, Contrib. Ind. Bot.* 14.—Ind. or.
m'scosula, DC. Prod. v. 441-membranacea.
Wallichii, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 87.—Assam.
Wightiana, *DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind.* 14.—Geront. trop.
Zollingeriana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 90 - balsamifera.

BLUMENBACHIA, Koel. Gram. Gall, et Germ. 28 (1802)-Sorghum, Moench (Gramin.).
haleppensis, Koel. 1. c. 29-S. halepense.

BLTJMENBACHIA, Schrad. in Goett. Gel. An*. (1825) 1705; Blumenb. (1827) 6. t. 1. *LOASEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 805.
CAJOFHORA, Endl. Gen. 931 (1839).
GRIPIDEA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxv. (1866) 227. t. 28.
RAPHISANTHE, Lilja, in Linnaea, xv. (1841) 263.
carduifolia, *Ball, in journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 39.—Peruv.
cernua, *Griseb. in Goett. Abh.* xlx. (1874) 152.—Reg. Argent.
chuquitensis, *Hook./. Bot. Mag.* t 6143.—Peruv.
contorta. Hook. f. 1. c. t. 6134—grandiflora.
coronata, *Haage (? Schmidt, in Rev. Hortic.* (1874) 68.—Chili.
Doineykoana, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 76—Chili.
Espigneera, *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 434.—Chili,
grandiflora, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 62.—Peruv.
Hieronymi, *Urb. in Eichl. Jahrb. Berl.* iii. (1884) 849.—Reg. Argent,
insiguis. *Sckrad. in Goett. Gel. An:* (1826) 1706V-Reg. Argent,
latifolia, *Cambtss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 209.—Paraguay.
micrantha, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 62.—Peruv.
multifida, Griteb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 189-Hieronymi.

BLUMENBACHIA:—
multifida, *Hook. Bot. Mag.* t 3599.—Reg. Argent,
palmata, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. tier.* ii. 208.—Paraguay.
parviflora, Gill, ex G. Don, Gen. Syst. iii. 62 = insignis.
Prietea, *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 485.—Chili,
pterosperma, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 62.—Pernv.
pnnicea, *G. Don, I. c*—Perav.
scandens, *Meyen, Reise,* i. 810.—Chili,
sepiaria, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 62.—Peruv.
sylvestris, *Poepp. Fragm. Syn. Fl. Chil.* 25.—Chili.

BLUMEODENDRON, Kurz, in Jonro. As. Soc Beng. xlii. (1878) II. 245-Jtallotus, Lour. (Euphorb.).
ttuelleri, Kurz, 1. c. = Paracroton pendulus.
Tokbrai, Knrz, 1. c—Ins. Andaman.

BLUMIA, Nees, ex Blnme, in Verh. Bat. Gen. ix. (1823) 147-Talauma, Juss. (Magnol.).
Candollii, Nees, 1. c.; et in Flora, viii. (1825) 152=T. Candollii.

BLUMIA, Spreng. Syst. iii. 126 (1826) = Baurauja, Willd. (Temstr.).
japonica, Stead. Nom. ed. II. i. 212, sphalm. = seq.
javanica, Spreng. Syst. iii. 126=S. Blumia.

BLUTAPARON, Rafin. New Fl. Am. iv. 45 (1836) Philoxerus, R. Br. (Amarant.).
brevifolium, Rafin. 1. c.=P. vermicnlaris.
repens, Rafin. I. c 46 = P. vermicnlaris.

BLYSMUS, Panz. ex Roem. *8c* Schnlt. Syst. ii. Mant. 41 (1824) = Soirpus, Tourn. (Cyperac).
Bonanni, Stend. Nom. ed. II. i. 212=Schoenus Bonanni.
brevifolius, Decne. in Jacqnem. Voy. Bot. 173. t. 178 - S. Caricis.
compressus, Panz. in Link, Hort BeroL i. 278 - S. Caricis.
rufus, Link, 1. c.=-S. rofos.

BLYTTIA, Am. in Mag. Zool. et Bot. ii. 420 (1838)-= Vineetorioum, Moench (Asclep.).
arabica, Am. 1. c. = V. fruticalosnm.

BLYTTIA, Fries, Novit. FL Snec. Mant. ii. 2 (1839) = Cinna, Linn. (Gramin.).
suaveolens, Fries, 1. c = C. pendula.

BLYXA, Noronha, ex Thou. Gen. NOT. Madag. 4 (1806). *HYDROCHARIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 451.
DIPLOSIPHON, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 166. t. 167 (1844).
SAIVALA, Jones, in As. Res. iv. (1799) 275.
Aubertii, *Rich, in Mem. Inst. Fr. yl%l)* 4.—Madag.
graminea, *Thou, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 212.—Madag.
javaniea, *Hassi. in Hon. if De Vriese, Tijdschr.* x. (1848) 121.—Java,
octandra, *Planch, ex Thw. Enum. PI. Zey.* 332.—Zeylan.
Roxburghii, *Rich, in Mim. Inst. Fr.* (1811) 77. t. 6.—As. trop.; Austral.
Saivala, *Steud. Nom.* ed. II. i. 212.—Ind. or.

BOADSCHIA.All. Fl. Pedem.i.248 = BOHADSCHIA, Crantz=Peltaria, Linn. (Crucit).

BOARIA, DC. Prod. viii. 299 (1844)=Maytenus, Molina (Celastr.).
Molinae, DC. 1. c. =M. Boaria.

BOBAEA, A. Rich, in Mém. Soc. Hist Nat. Par. v. (1830) 215-Bobea, Gaudich. (Rubiac.).

BOBARTIA, Linn. Diss. Dass. 3 (1747); Fl. Zeyl. 17 (1747); Salisb.in Trans. Hoit. Soc. i. (1812) 313.
IR1DEAE, Benth. & Hook. f. iii. 698.
HECASTA, Soland. ex Schum. in Skr. Natnrk-Selsk. iii. (1798) 10.
aphylla, *Ker-Gawl. Gen. Irid.* 30.—Afr. austr.
aurantiaca, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 662-Homeria aurantiaca.
filiformis, *Ker-Gawl. Gen. Irid.* 30.—Afr. austr.

BOBARTIA:—
gladiata, *Ker-Gawl. Gen. Irid.* 30; *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 395.—Afr. austr.
indica, *Linn. Sp. PI.* 54.—Afr. austr.
juncea, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 818-indica.
Linnaei, Pritz. Ind. Ic. ii. 47 perperam,=indica.
spathacea, Ker-Gawl. Gen. Irid. 80=indica.
umbellata, *Ker-Gawl. I. c.* 81.—Afr. anstr.

BOBEA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 473. t 93 (1826).
RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 101.
BOBAEA, A. Rich, in Mem. Soc. Hist Nat. Par. v. (1830) 215.
BURNEYA, Cham. &Schlecht. inlinnaea, iv. (1829) 190.
brevipes,i4. *Gray, in Prtc. Am. Acad.* iv. (1860) 36.—Ins. Sandvic.
elatior, Gaudich. in Bot. Freyc. Voy. 478. t 98 = Timonius Gaudichaudi.
glabra, Korth. in Nederl. Kruidlc. Arch. ii. (1861) II. 211 -Timonius Jambosella.
hirsutiuseula, Teijsm & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxix. (1867) 247 = Polyphragmon sericenm.
inaequisepala, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 645.—Ins. Banca.
mutabilis, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) II. 212=Polyphragmon mntabile.
putaminosa, F. Muell. Fragm. iv. 92 = Guettardella putaminosa.
sericantha, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 355—Malaya.
Wallichiana, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) II. 211=Timonius Rumphii.

BOBU, Adans. Fam. ii. 88 (1768) = Symplooos, Linn. (Styrac).

BOBUA, DC. Prod. iii. 23 (1828)=8ymploeos, Linn. (Styrac).
arborea, Miers, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1879) 805 = S. arborea.
atrmiridis, Miers, 1. c. 304=S. spicata.
haptiea, Miers, 1. c. 805 = S. baptica.
eaerulescens, Miers, 1. c. = S. caerulescens.
cerasifolia, Miers, 1. c. 804 = S. cerasifolia.
glaucescens, Miers, 1. c. 306 = S. glaucescens.
gracilis, Miers, 1. c.=S. gracilis.
japonica, Miers, 1. c. 806=S. japonica.
lancifolia, Miers, 1. c. = S. lancifolia.
laurina, DC. Prod. iii. 24 = S. spicata.
Lenormandiana, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 804=S. Lenormandiana.
leptostachya, Miers, 1. c. 306-S. lancifolia.
lucida, Miers, 1. c. 805=S. lucida.
montana, Miers, 1. c. = S. montana.
myrtacea, Miers, 1. c 306=S. myrtacea.
neriifolia, Miers, 1. c.=S. neriifolia.
nitida, Miers, 1. c. 305=S. nitida.
oligostachya, Miers, 1. c. 304=S. spicata.
prunifolia, Miers, 1. c. 306 = S. caudata.
rotundifolia, Mien, 1. c 306=S. rotundifolia.
stravadioides, Miers, L c. 804=S. stravadioides.
theophrastaefolia, Mien, 1. c. 306=S. theophrastaefolia.
Vieillardi, Miers, 1. c. 305=S. Vidllardi.

BOCA, Veil. Fl. Flum. 232; v. 1.113 (1825) - Baaara, Aubl. (Samyd.).
serrata, Veil. 11. cc.-Banara Vellozii.

BOCAGEA, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 41. t. 9 (1825).
ANONACEAE, Benth. *8c* Hook. f. i. 29.
OXANDRA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 45. t. 8 (1842).
SAGBRABA, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 207.
acuminata, Stead. Nom. ed. II. i. 212=Orophea acuminata.
alba, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 42.—Bras,
aromatica, *Triana tf Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xvii. (1862) 36.—N. Granat.
canescens, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 70.—Am. austr.
celebica, *Blume, Fl. Jav. Anon.* 88.—Ins. Celebes,
coriacea, *Hook./,* b* *Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 93—Zeylan.
corymbosa, *Blume, Fl. Jav. Anon.* 85.—Java.

BOCAGEA:—
Datzellii, *Hoot./, (f Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 92.—Ind. or.
elliptica, *Hoot./. & Thorns. I. c*—Burma; Malaya,
enneandra, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 144.—Java,
espintana, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 71.—Perav.
Gaudichaudiana, *Baill. Adansonia,* viii. (1867-68) 188.—Cochinch.
heterantha, *Baill. I. c.* 178.—Madag.
hexandra, Blnme, Fl. Jav. Anon. 83=javensis.
javensis, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 144.—Java,
latifolia, *Blume, Fl. Jav. Anon.* 89.—Java,
leucodermis, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Sot.* v. (1861) 71.—Bras.
Iongipeduncnlata, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 45.—Bras.
lutea, Baill. Hist. PI. i. 215=Alphonsea lutea.
multiflora, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 46.—Bras.
nervosa, Pierre, Fl. For. Cochin, snb t. 16 = Kingstonia nervosa.
obliqna, *Hook. /. V Thorns, in Fl. Brit. Ind. i.* 93.—Zeylan.
philastreana, *Pierre, Fl. For. Cochin.* 1.16.—Cochinch.
pisocarpa, *Blume, Fl. Jav. Anon.* 90. t. 45.—Java,
polyandra, *C. Presl, Rel. Haent.* ii. 77.—Ins. Luzon.
polycarpa, Steud. Nom. ed. II. i. 212=Orophea polycarpa.
Thwaitesii, *Hoot./, (f Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 92.—Zeylan.
ventricosa, Baill. Hist. PI. i. 216-Alphonaea ventricosa.
verrucosa, Baill. 1. c. sphalm. — praee.
viridis, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 42. t. 9.—Bras.
Weddelliana, *Baill. Adansonia,* viii. (1867-68) 170.—Bras.

BOCCO, Stead. Nom. ed. 1.112 (1821) sphalm.=Bocoa, Aubl.

BOCCONIA, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 32 (1737).
PAPAVERACEAE, Benth. *8c* Hook. f. i. 63.
MACLEAYA, R. Br. App. Denh. *8c* Clapp. Trav. 218, in adnot. (1826).
cordata, *Willd. Sp. PI.* ii. 841.—China; Japon.
ferruginea, *Roetl, in Belg. Hortic.* xxiv. (1874) 39.—Peruv.
frutescens, *Linn. Sp. PI.* 506.—Mexico; Perav.
glauca, Salisb. Prod. 877=frutescens.
integrifolia, *Humb. & Bonpl. PI. Aequin.* i. 119. t 35.—Mexico; Peruv.
japonica, Hort ex Andre", in Rev. Hortic (1866) 369 - cordata.
jedoinsis, Carr. 1. c. 340=cordata.
querci/olia, Moench, Meth. Suppl. 122-frutescens.
sinuati/olia. Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 8=frutescens.
subtomentosa, L'Hèrit. ex Stahl, Estnd. Fl. Pnertorico, Foil. ii. 34 = frutescens.

BOCKIA, Scop. Introd. 106 (1777)-Mouriria, Juss. (Melast).

BOCOA, Aubl. PI. Gui. Suppl. 88. t. 891 (1775)-Inooarpua, Forst. (Legum.).
edulis, Baill. Adansonia, Tx. (1868-70) 237=1. edulis.
guianensis, Steud. Nom. ed. I. 112 = seq.
prouacensis, Aubl. PI. Gui. Suppl. 88.—Guiana.

BOCQUHiLONTA, Baill. Adansonia, ii. 225 (1861-62). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 313.
brachypoda, *Baill. Adansonia,* xi. (1873) 127.—N. Caled.
brevipes, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 166.—N. Caled.
grandidens, *Baill. Adansonia,* xi. (1873) 128—N. Caled.
sessiliflora, *Baill. 1. c.* ii. (1861-62) 226.-N. Caled.
spicata, *Baill. 1. c.* 227.—N. Caled.

BODWICHIA, Walp. Rep. i. 808 (1842), sphalm.-Bowdlchia, H. B. *8c* K. (Legum.).

BOEA, Comm. ex Urn. Encyc i. 401 (1783). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f.ii. 1023.
BAEA, Comm. ex Juss. Gen. 121 (1789).
CHLRTERUS, Rafin. Prim. Somiol. 25 (1814).

BOEA:-
DORCOCERAS, Bunge, Ennm. PI. Chin. Bor. 64 (1832).
alata, Pen. Syn. i. 15 =* Calceolaria petiolaris.
amplexicaulis, Parish, ex C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t. 84 = Phylloboea amplexicaulis.
borneensis, Scheff. ex H. O. Forbes, in Jonrn. lion. Soc. xix. (1882) 298 = Didymocarpns Schefferi.
Cardwellia, F. MueIL ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. y. 145-Commersonii.
cochinchinensis, *C. B. Clarke, I. c.* 148.—Cochinch.
Commersonli, *R. Br. in Benn. PI. Jav.* 120.—China,
dictyonenra, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1888) 169.—China.
flosculosa, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t 83 = multiflora,
Hancei, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 144-dictyoneura.
herbacea, *C. B. Clarke, I. c.* 142.—Ins. Formosa,
hygrometrica, *R. Br. in Benn. PI. Jar.* 120.—China,
hygroscopica, *F. Muell. Fragm.* iv. 146.—Austral.
magellanica, Lam. Illustr. i. 53. t. 15 = Commersonii.
Minahassae, *Teij'sm. &* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1868) 415.—Ins. Celebes,
multiflora, *R. Br. in Benn. PI. Jav.* 120.—Ind. or.
philippensis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 146.—Ins. Philipp.
plantaginea, Fers. Syn. i. 15 = Calceolaria plantaginea.
praliniana, J. St. Hil. Expos, i. 279 = magellanica. .
primuloides, Miq. in Ann. Mus. Lngd. Bat. iii. 190 = Oreocharis primuloides.
prolixa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 148.—Burma.
punctata, Pers. Syn. i. 16 = Calceolaria pnnctata.
rufescens, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1885) 449.—China.
Swinhoii, *Nance, in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. v. (1866) 281.—China.
Treubii, *H. O. Forbes, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 297.—Sumatra.
triandra, Pers. Syn. i. 15 — Calceolaria triandra.
Urvillei, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 147.-Ins. Waigiou.
violacea, Pers. Syn. i. 16•Calceolaria violacea.
Wallichii, *R. Br. in Benn. PI. Jav.* 120.—Burma.

BOEBERA, Willd. Sp. PI. iii. 2125 (1808)=Dyssodia, Cav. (Compos.).
alternifolia, Moç. *Sc* Ses?é, ex DC. Prod. v. 630 = Adenophyllum Porophyllum.
Cavanillesii, Spreng. Syst. iii. 644 = Adenophyllum cocclneum.
chrysanthemoides, Willd. Sp. PI. iii. 2125.—D. chrysanthemoides.
fastigiata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 198-D. chrysanthemoides.
glandulosa, Pers. Syn. ii. 459=D. chrysanthemoides, glandnlosa.
incana, Lindl. Bot. Reg. 1.1602 = D. pubescens.
Porophyllum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 198 = Adenophyllum Porophyllum.
pubescens, Spreng. Syst. iii. 544 = D. pubescens.
subintegerrima, Spreng. 1. c. = D. subintegerrima.
tagetifiora, Spreng. 1. c. = D. chrysanthemoides.

BOECKHIA, Kunth, Enum. PI. iii. 448 (1841) = HypodiBcus, Nees (Restiac).
laevigata, Knnth, 1. c. 450 = H. albo-aristatus.
striata, Kunth, 1. c. 449 = H. sttiatus.

BOEHMEKIA, Jacq. Ennm. PI. Carib. 9 (1760).
VRTICACEAB, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 387.
GVMNOCYNE, F. Didr. Ind. Sem. Haun. (1850).—Cf. Linnaea, xxix. (1857-58) 737.
DURETIA, Gaudich. in Bot. Freyc. Voy. 500 (1826).
SPLITGERBERA, Miq. Comm. Phytogr. 133. t. 14 (1840).
acalyphoides, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 225 = Pouzolzia acalyphoides.
acuminata, Hook. *Sc* Am. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 235=Pipturus albidus.
acuminata, Pen. Syn. ii. 556—Elatostema acuminatum.
acuminata, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 209.—N. Caled.
albida, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 96=Pipturus albidus.
alienata, Willd. Sp. PI. iv. 841-Poozola'a indies.

BOEHMERIA:—
amplissima, Blume, Mns. Bot Lugd. Bat ii. 219 = stipularis.
ampullacea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 36 = candata.
angustata, Hassk. Cat. Hort Bog. Alt 79=Debregeasia velutina.
angustifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 34 = Phenax angustifolius.
arachnoidea, Walp. in Nov. Act Nat. Cnr. xix. Suppl. i. (1848) 423=Pouzolzia macrura.
arborea, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 348 = Gesnouinia arborea.
arborescent, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot i. (1842) 641-caudate.
argentea, Guill. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 235" = Pipturus argenteus.
argentea, *Linden, in Belg. Hortic.* viii. (1858) 166.—Mexic.
arguta, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 186.—Am. trop.
aspera, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 206, in note—Pouzolzia aspera.
aspera, *Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* viii. (1855-56) 849. t 11.—N. Granat
australis, *Endl. Prod. Fl. Norfolk.* 38.—Ins. Norfolk.
ballotaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 85 = Phenax ballotaefolius.
bifida, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat ii. 222=biloba, Wedd.
biloba, *Miq. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 100.—Java,
biloba, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 199.—Japon.
Blumei, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 204.—Ins. Philipp.
Boiviniana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 227-Pouzolzia Boiviniana.
boliviano, Blume, I.e. 206, in note=Pouzolzia Boiviniana.
brevirostris, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 201.—Pernv.
bullata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 36.—Ecuador.
caerulea, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 209 = Cypholophus coeruleus.
calophleba, *C. Moore V F. Muell. in F. Muell. Fragm.* viii. 11.—Austral.
candicans, Hassk. PI. Jav. Rar. 203; Cat Hort. Bog. Alt. 79=nivea.
candidissima, Hassk. Cat Hort. Bog. Alt. 79 = Leucosyke javanica.
Candolleana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 499 = Piprurus argenteus.
canescens, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 200 = platyphylla.
capensis, *Spreng. Syst.* iii. 844.—Afr. austr.
castaneaefolia, A. Cunn. ex Bureau, in DC. Prod. xvii. 250—Pseudomorus Brunoniana.
caudata, Poir. in Bonpl. Jard. Malm. t. 15=platyphylla.
candata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 34.—Am. trop.
caudigera, Wedd. in Ann. Sc Nat. *Sir.* IV. i. (1864) 199 = platyphylla.
celebica, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 217.—Ins. Celebes,
celtidifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 34.—Ecuador.
cephalida, Pers. Syn. ii. 556=Procris cephalida.
chinensis, Pers. 1. c. 557 = Procris cantonensis.
cinerascens, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 203 = Pouzolzia cinerascens.
cinerascens, Hassk. Cat Hort. Bog. Alt. 79=Pipturus argenteus.
clidemioides, Miq. PI. Jungh. 34 = platyphylla.
cochinchinensis, Pen. Syn. ii. 657-Procris cochinchinensis.
cochinchinensis, Spreng. Syst iii. 844=Pouzolzia indica.
comosa, Wedd. in DC. Prod. xvi. 1.205=sidaeiblia.
compacta, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 210.—Java.
conglobata, Blume, 1. c. 204—Pouzolzia conglobata.
crenata, Blume, 1. c. 208=- Cypholophus macrocephalus?
Cummingiana, Blume, 1. c. ii. 199=heterophylla.
cuspidata, *Blume, 1. c.* 216 (sp. dubia).—Nepal.
cuspidata, Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1856-56) 345 -ramiflora.
cylindriea, Hb. ex Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 218=elongate.

BOEHMEKIA:—
cylindriea, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 84.—Am. bor. et austr.
dasypoda, Miq. in Mart Fl. Bras. iv. 1.188=cylindriea.
densiflora, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 271.—China.
depauperata, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (18541 202=malabarica.
dichotoma, Hassk. Cat Hort. Bog. Alt 79 = Debregeasia velutina.
didymogyne, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 204.—Burma.
diffusa, Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Pax. viii. (1S65-66) 356 = sidaefolia.
discolor, Poepp. ex Blume, Mus. Bot Lugd. Bat ii. 206 = Pouzolzia discolor.
diversiflora, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 101, 104 = Zollingeriana.
diversifolia, Miq. PI. Jungh. S4 = Maoutia diversifolia.
diversifolia, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1864) 202 = Pavonii.
Drummondiana, Wedd. 1. c. 201 = cylindriea.
elliptica, Wedd. 1. c. 200=platyphylla.
elongata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 218.—Hab. t
elongata, Hort. ex Stend. Norn. ed. II. i. 212 - platyphylla.
elongata, Fisch. ex Jacq. Eclog. t. 135 - Phenax vulgaris.
erythropoda, *Miq. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 101, 104.—Malaya,
excelsa, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 202.—Ins. Juan Femand.
fagifolia, Pers. Syn. ii. 656 - Elatostema fagifolium.
fallax, *Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* viii. (1855-56) 346.—Peruv.
Fernandesiana, C. Gay, Fl. Chil. v. 360 - Urtica glomerulaeflora.
fiagelliformis, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 810=caudata.
florida, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.187.—Am. trop.
formicaria, Poepp. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 201-Pouzolzia formicaria.
frondosa, D. Don, Prod. Fl. Nep. 59 = Pouzolzia viminea.
frutescens, D. Don, 1. c —Maoutia Puya.
frutescens, Thunb. Fl. Jap. 367. n. 98 = Villebrunea frutescens.
glabra, Steud. Nom. ed. II. i. 192 = Neraudia melastomaefolia.
glochidiata, Hassk. PI. Jav. Rar. 206 = Pouzolzia indica.
glomerulifera, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 101, 104 = malabarica.
grandifolia, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1864) 199 = platyphylla.
greviaefolia, *Presl, Bot. Bemerk.* 110.—Hab.?
guatemalana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 206 = Pouzolzia guatemalana.
Hamiltoniana, Wedd. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. i. (1854) 199=platyphylla.
Harveyi, Seem. Fl. Vit. t. 62 - Cypholophus heterophylla.
Helferii, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 201.—Burma.
heteroidea, *Blume, 1. c.* 316 (sp. dubia).—Ind. or.
heterophylla, Blume, 1. c. 204 = Blumei.
heterophylla, *Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* viii. (1855-56) 351.—Ins. Philipp.
hirta, Roth, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 231-Pouzolzia Rothiana.
hirta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 34=Phenax urticifolius.
hirta, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 202.—Peruv.
hispidula, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 223.—Sumatra.
holosericea, *Blume, I. c.* 221.—Japon.
Huegeliana, *Blume, 1. c.* 218 (sp. dubia).—Ind. or.
humilis, Miq. PI. Jungh. 33 - ptatyphylla.
hypoleuca, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 264 = Debregeasia hypoleuca.
incana, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt 79 = Pipturus velutinus.
interrupta, Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1867) 182 = platyphylla.
interrupta, Willd. Sp. PI. iv. 340 = Fleurya interrupta.
Jacquiniana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 219.—Hab.?
Janatsi-itsigo, Siebold, in Verh. Bat Gen. xii. (1830) 70 = Debregeasia ednlit.

BOEHMERIA :—
japonica, *Miq. in Ann. Mus. Bat. Lugd. Bat.* iii. 131. —Japon.
javanica, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 79 = Fleurya interrnpta.
laevis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 206 in note = Pouzolzia virgata.
laterifiora, Muhl. ex Willd. Sp. PI. IT. 842-cyttndrica.
latifolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 207 = Cypholophus latifolius.
Lindeniana, *Blume, I. c.* 226.—N. Granat.
Httoralis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 84 - cylindrica.
longispica, Stead, in Flora, xxxiii. (1850) 260 = japonica.
lutescens, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 209 - Cypholophus lutescens.
"facrocephala, Blume, 1. c. 208, in obs. = Cypaolophus macrocephalus.
macrophylla, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 890.—Hab.?
macrophylla, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 60.-Reg. Himal.; Burma.
macrophylla, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. Ki. (1846) 215= japonica.
nacrostachya, Wedd. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. i. (1854) 199-platyphylla.
macrothyrsa, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 100,103 = Laportia decnmana.
"taculata, Pers. Syn. ii. 556 =Elatostema maculatnm.
malabarica, *Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* viii. (1855-56) 365.—Ind. or.; Malaya.
massuriensis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 216 = platyphylla.
nauritiana, Wedd. in Ann. Sc. Nat Sir. IV. i. (1854) 200 = platyphylla.
"felanocarpa, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 210= Cypholophus melanocarpus.
"»lastomaefolia, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 96 = Neraudia melastomaefolia.
melastomoidea, Griff. Notul. iv. 386-Pouzolzia pentandra.
nicrocarpa, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 201 -platyphylla.
**'cfoceltis,* Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 100, 104—Pouzolzia viminea.
mollicoma, *Miq. in Zoll. I. c*—Java.
««««'s, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 208 =Cypholophus macrocephalus.
noluccana, Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 208-Cypholophus macrocephalus.
itoluccana, Wedd. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. i. (1854) 201 = Cypholophus macrocarpus.
monticoU, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 227.—Sumatra.
"ana, D. Don, Prod. FI. Nep. 60=Pouzolzia indica.
oeglecta, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 200.—Java,
*n*palensis,* Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1856-56) 883 = VMebrunea frutescens.
**ervosa,* Madden, in Joum. As. Soc. Beng. zvii. (1848) . I. 403 = rugulosa.
nivea, *Gaudich. in Bot. Freyc. Voy.* 499.—As. trap. (cult.).
npdiflora, *Willd. Sp. PI.* iv. 843.—Venezuela.
"oliqua, Poepp. ex Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 206, adnot—Pouzolzia obliqua.
odontophylla, Miq. PI. Jungh. 35 = Maoutia odontophylla.
ourantha. Miq.l. c. S3 = platyphylla.
Talis, Miq. in Zoll. Syst Verz. Ind. Archip. 100 = Pouzolzia viminea,
°**ata,* Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 206, adnot-Pouzolzia ovata.
<**ata,* Steud. Norn. ed. II. i. 212 - Ueraudia melastomaefolia.
Palmata, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 79.—Hab.»
Parvifolia, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sén IV. i. (1864) 208 = Droguetia diffusa.
P-ueiflora, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 201 = Droguetia diffusa.
Pavonii, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 202.—Pcruv.
Ptnduliflora, Wedd. 1. c. 199 - macrophylla.
Ptruviana, Blume, Mus. Lugd. Bat. ii. 224-caudata.
*P*tiolaris,* H. B. Sc K. Nov. Gen. et Sp. ii. 36 = caudata.
PhUostachya, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 187-<7lindrica.
Wosiuscula, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 79 - platy-Phylla.

BOEHMERIA:—
platanifolia, *Franch. &,Sav. Enum. PI. Jap.* i. 440.—Japon.
platyphylla, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 60.—As. et Afr. trop.; Ins. Pacif.
polystachya, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. i. (1854) 200.—Reg. Himal.; Burma.
Procridioides, Blume, Mas. Bot Lngd. Bat ii. 204-Pouzolzia procridioides.
propinqua, Decne. Herb. Timos. 168 = Pipturus argenteus.
prostrata, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 209 = Cypholophus prostrates.
Puya, Hook, in Hook. Kewr Joum. iU. (1851) 816 = Maoutia Puya.
racemiflora, Forst. ex Blume, Rumphia, iv. 87 = Phytocrene hirsuta.
radicans, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act. Nat. Car. xi. (1823) 85 = Pilearhizobola.
ramiflora, Bedd. Forest. Man. Bot. t. 27. f. 2 = malabarica.
ramiflora, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 81.—Ind. occ; Mexic.
repanda, Hassk. Cat Hort. Bog. Alt. 79= Pipturus repandus.
repens, Nees & Mart in Nov. Act Acad. Nat. Cur. xi. (1828)36 = Pileahirtella.
repens, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 201.—Cuba,
rhynchophylla, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 202.—Am. anstr.
rigida, *Btntk. in Hook. Niger Ft.* 619.—Afr. trop.
rotundifolia, D. Don, Prod. FL Nep. 60=platyphylla.
rubescens, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 79 = Villebrunea robescens.
rubescens, Jacq. Fragm. 8 = Gesnouinia arborea.
rugosa, Pers. Syn. ii. 556 = Phenax ballotaefolius.
rugosissima, Miq. PI. Jungh. i. 32 = platyphylla.
jugosissima, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 200.—Java.
rugnlosa, *Wedd. 1. c.* 200.—Reg. Himal.
salici/olia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 60 - Debregeasia hypoleuca.
sanguinea, Hassk. Cat Hort. Bog. Alt. 79 - Pouzolzia viminea.
scabra, *Hassk. I. c*—As. trop. T
scabrella, Gaudich. Bot Freyc. Voy. 499-platyphylla.
scabrella, Hort. ex Blame, Mas. Bot. Lagd. Bat ii. 216 =caudata.
sericea, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 208 - Cypholophus moluccanus.
sidaefolia, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. i. (1854) 208.—Reg. Himal.; Burma; Java.
Sieboldiana, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 220 = platyphylla.
spicata, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 830 - platyphylla.
spiciflora, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* il. 217 (sp. dubia).—Ind. or.
spidgera, *Spreng. Syst.* iii. 846.—Venezuela.
squamigera, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1864) 208 = Chamabainia cuspidata.
stipnlaris, *Wedd. 1. c.* 200.—Ins. Mascar.
strigosa, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat, ii. 220 = Pavonii.
strigosula, Blume, 1. c. 203—Pouzolzia viminea,
subperforaU, *Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Par.* viii. (1855-56) 383 (sp. dubia).—Ind. or.
sumatrana, Miq. PI. Jungh. 82=platyphylla.
sylvatica, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 79 - ViUebrunea sylvatica.
taitensis, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. L (1854) 200=platyphylla.
tenacissima, Gaudich. Dot. Freyc. Voy. 500—nivea.
ternifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 69-platyphylla.
tomentosa, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1864) 200-platyphylla.
travancorica, Bedd. Forest. Man. Bot. 225-malabarica.
trinervata, Pers. Syn. il. 556 = Gyrotaenia trinervata.
trinervis, Miq. PI. Jungh. 86=Pipturus repandus.
uliginosa, Mor. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 236" —Phenaz uliginosus.
ulmifolia, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1864) 202=fallax.
urantha, Blume, Mus. Bot Lagd. Bat. Ii. 221 - platyphylla.

BOEHMERIA :—
urticaefolia, Pers. Syn. it 656-Phenax urticaefolius.
urticae/olia, Spreng. Syst. iii. 844 = Pilea rupipendia.
velutina, Decne. Herb. Timor. 163 = Pipturus velutinus.
vestita, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 209 - Cypholophus vestitus.
vialis, Casar. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 285" - Phenax SonneratiL
viminea, Blume, Mus. Bot Lngd. Bat il. 202 = Ponzolzia viminea.
virgata, Guillem. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 182-platyphylla.
Waittiana, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 208-Pouzolzia viminea.
Wightiana, Blume, 1. c 217 = platyphylla.
Zollingeriana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. *I* (1854) 201.—Java.

BOEICA, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. 118. tt. 85 ad 87 (1874). *GESNERACEAE,* Bentb. & Hook, f. ii. 1028.
BAEICA, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 134 (1883).
filiformis, *C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.* 118. t 87.—Reg. Himal.
fulva, C. *B. Clarke, 1. c.* t. 86.—Reg. Himal.
Griffitbii, *C. B. Clarke, 1. c.* t. 86.—Assam,
hirsute, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 136.—Assam?
porosa, C. *B. Clarke, I. c*—Burma.

BOELIA, Webb, Otia Hisp. 20. t. 15, 16 (1853)-GtenistA, Linn. (Legumin.).
sphaerocarpa, Webb, 1. c. = G. sphaerocarpa.

BOEJTNTNXJHAtrSEiriA, Reichb. Consp. 197 (1828). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 287.
PODOSTAURUS, Jangh. in Nat. en Geneesk. Arch. Ne£rl. Indie ii. (1845) 45.
albiflora, *Reich. I. c*—Reg. Himal.; Japon.
japonica, Sieb. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 21=albiflora.

BOENNINGHAUSIA, Spreng. Syst. iii. 153, 245 (1826) = Chaetocalyx, DC. (Legumin.).
vincentina, Spreng. 1. c. 245 = C. vincentinus.

BOERHAVIA, Linn. Fl. Zeyl. 4 (1747) - Boerhaavia, Vaill. (Nyctag.).

BOERHAAVIA, Vaill. ex Linn. Syst. ed. I (1785); Linn. Gen. ed. I. 8 (1737). *NYCTAGINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 6.
adscendens, Willd. Sp. PI. i. 19-repens.
africana, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 16.—Afr. trop.
aggregata, Pav. ex Choisy, in DC. Prod. xiii. n. 429 =Nyctaginia capitata.
angustifolia, *Linn. Syst.* ed. XII. 62 (sp. dnbia).—Hab.?
angustifolia, Span, in Linnaea, xv. (1841) 342 = repens.
anisophylla, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 171.—Texas.
arborea, Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 66=Pisonia hirtella.
arborescens, Lag. *Sc* Rodr. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 257 = Pisouia hiitella.
ascendens, Schum. Beskr. Guin. PI. 17—repens.
bastica, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6769 - repanda.
bicolor, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 168, 169=repens.
bracteosa, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 370. —Texas.
Bnrchellii, *Choisy, in DC. Prod.* xiii. II. 455.— Afr. austr.
caribaea, Jacq. Obs. Bot. iv. 5= repens.
chaerophylloides, Willd. Sp. PI. i. 22 - Astrephia chaerophylloides.
coccinea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1-repens.
Commersoni, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 484.—Madag.
cortensis, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 168-repens.
crispa, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 6771.—Ind. or.
decumbens, Vahl, Enum. i. 284-panicnUta.

BOEBHAAVIA:—
depressa, C. *Sm. in Tuciey, Congo,* 249, nomen.—Ins. Cap. Verd.
diandra, Anbl. PI. Gui. i. 4 - paniculata 1
diandra, Bonn. f. Fl. Ind. S. t. 1=erecta.
diandra, Linn. Sp. PI. 1194 = hirsuta, panicalata.
dichotoma,'//V><:Âs<. *ex Waif. Ann.* iii. 298.—Abyss.
dichotoma, Schimp. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 142-grandiflora.
dichotoma, Vahl, Enum. i. 290 = plnmbaginea.
diffusa, Engelm. & A. Gray, in Boston, Journ. Nat. Hist. v. (1847) 269-viscosa.
diffusa. Linn. Sp. PI. 3 — repens.
diffusa, Sw. Obi. 10-paniculata.
discolor, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. ei Sp.* ii. 215.—Ecuador.
eglandulosa, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 169 = repens.
elegans, *Choisy, in DC. Prod.* xiii. n. 453.—Nubia; Arabia; Ind. bor. occ.
elongata, Salisb. Prod. 56= erecta.
erecta, Barm. f. Fl. Ind. t. S. f. 2=glutinosa.
erecta, Ell. Sketch, L 41 = repens.
erecta, *Linn. Sp. PI.* 3.—Am. bor.; Ind. occ.
eriosolena, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xv. (1853) 322.—Mexic.
excelsa, Willd. Phyt. 1. n. 5; Sp. PI. i. 21 - Oxybaphus micranthus ?
frnticosa, *Dal: in Dal*. & Gibs. Fl. Bomb.* 213.—Ind. or.
fruticosa, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 167 = plumbaginea.
gibbosa, Pav. ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 328-Senkenbergia annulata.
gibbosa, Pav. ex Choisy, in DC. Prod. xiii. II. 457 = Tinantia gypsopbiloides.
glabrata, Blume, Bijdr. 733-repens.
glandulosa, *Anderss. Om Oarn. Galapagos.* 64.—Ins. Galap.
glomerata, *Klottsch, in Schomb. Fauna et Fl. Guy.* 1131, nomen.—Guiana.
glutinosa, Miens, ex Bert, in Merc Chil. (1829) 596-discolor.
glutinosa, Vahl, Enum. i. 287 = diffusa I
Grahamii, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 828-scandens.
grandiflora, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 209 = plumbaginea.
Helenae, Roem. & Schult. Syst. Mnot. i. 78 = verticillata.
hirsuta, *Linn, if ant.* 1170.—Ind. occ.; Am. bor.
hirsuta, Willd. Phyt. 1 = repens.
insularis, Boj. Hort. Maurit. 264=repens.
laxa. Pen. Syn. i. 36 = paniculata.
leiosolena, *Torr. Bot. Hex. Bound.* 172.—Texas,
libyca, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 336.—Algeria,
linearifolia, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xv. (1853) 322.—N. Mexic.
litoralis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 216.—Peruv.
maroccana. Ball, in Jonm. Bot. xiii. 1.1875) 176 = repens.
microphylla, Bory, ex Steud. Norn. ed. II. i. 213 fordo ignot.).—Ins. Maurit.
minutiflora, Span, in Linnaea, xv. (1841) 342 = repens.
mutabilis, R. Br. Prod. 422=repens.
nantocana, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 403=viscosa.
nudicaulis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 37.—Chili.
obtusi/olia, Lam. Illustr. i. 10 = patula.
obtusi/olia, Steud. Norn. ed. II. i. 213- paniculata.
Palmeri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 142.—Texas.
paniculata, Lam. Illustr. i. 10-= hirsuta, erecta.
panicalata, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792) 105.—Texas; Mexic.
patula, *Domb. ex Vahl, Enum.* i. 287.—Peruv.
pedunculosa, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 210.—Abyss.
pentandra, Burch. Trav. i. 482 = Burchellii.
periplocaefolia, *Comm. ex Vahl, Enum.* i. 290.—Madag.
periploci/olia, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. xiii. n. 453 = repens.
plicata, *Bot. 2me Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurit.* 43 (sp. dub.).—Maurit.?

BOEBHAAVIA :-
plumbaginea, *Cay. Ic.* ii. 7.1112.—Hispan.; Afr. trop. et austr.; Syria.
polymorpha, Rich, in Act. Soc Hist. Nat. Par. i. (1792) 105 = caribaea, hirsuta, repens.
procumbens, Banks, ex Roxb. FL Ind. i. 146-repens.
pterocarpa, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 376.-Am. bor.
pubescens, R. Br. Prod. i. 422= repens.
pulchella, *Griseb. in Goe'tt. Abh.* xix. (1874) 88.—Reg. Argent.
puherulenta, Dupuia, in Vahl, Enum. i. 291«dichotoma.
pnrpurascens, *A. Gray, in Am. Journ. Se.* Ser. II. xv. (1858) 321.—N. Mexic.
Reboudiana, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 885.—Algeria.
repanda, Kotschy, ex Choisy, in DC. Prod. xiii. II. 454 = verticillata.
repanda, Roxb. Hort. Beng. 2; in Beatson, St. Helena Tracts, 302-verticillata.
repanda, *Willd. Sp. PI.* i. 22.—As. trop.; Austral,
repens, *Linn. Sp. PI.* 8.—Cosmop. trop.
repens, Sieber.—Cf. Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 168 = plumbaginea.
rhomboidea, Humb.in Spreng. Jahrb. Gew. i. III. 66*= Cryptocarpus globosus.
Rottleri, Steud. Nom. ed. II. i. 213-crispa?
rubicunda, Stead. 1. c = elegans.
rugosa, Rottl. ex Wall. Cat. sub n. 6771-crisp*.
rupestris, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 169 =repens.
sarmentosa, Willd. Sp. PI. i. 21=scandens.
scabrida, Steud. *Sc* Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. i. 213=discolor.
scandens, Drège, ex Choisy, in DC. Prod. xiii. II. 455 -Burchellii.
scandens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 3-plumbaginea.
scandens, Gibs. Cat. Bomb. PI. 187=verticillata.
scandens, *Linn. Sp. PI.* 3.—Am. bor.; Ind. occ.
Schomburgkiana, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1226.—Austral.
sessiliflora, Steud. Nom. ed. II. i. 218-repens.
spicata.CAoisjy, *in DC. Prod.* xiii. II. 456.—Am. bor. occ.
stellata, *Boj. Ime Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurit.* 48.—Ins. Maurit. J
stellata, Wight, Ic t. 875=verticillata.
suberosa, C. Sm. in Tuckey, Congo, 249 = repens.
sumata, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 342 = repens.
surinamensis, Miq. 1. c. xviii. (1844) 244-repens.
tetrandra, *Forst.f. Prod.* 2. n. 5.—Ins. Societ.
tomentosa, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 168 = repens.
tnberosa, *Lam. Illustr.* i. 10.—Peruv.
umbellata, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 709 = repanda.
undulata, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 168 = repens.
verticillata, Boiss. Fl. Orient, iv. 1044-plumbaginea.
verticillata, *Pair. Encyc.* v. 56.—Afr. trop.; Syria; Ind. or.
verticillata, Rottl. in Wall. Cat. n. 6772=crispa.
virgata, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 215.—N. Mexic.
viscosa, Fresen. in Mns. Senckenb. i. (1834) 75=repens.
viscosa, *Lag. V Rodr. in Anal. Cienc. Nat.* iv. (1801) 256. n. 12.—Peruv.
viscosa, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 167 — plumbaginea.
vulvariaefolia, Poir. Encyc. v. 56 — repens.
Wrightii, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xv. (1853) 822.—N. Mexic.

BOGENHARDIA, Reichb. Nom. 200 (1841)-Abutilon, Toum. (Maivac).
crispa, Reichb. 1. c. in nota=A. crispum.

BOHADSCHIA, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 2 (1762); ed. II. 5 (1769)=Peltaria, linn. (Crucif.).
alliacea, Crantz, 1. c - P. alliacea.

BOHADSCHIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 98. t. 68 (1831) = Turnera, Linn.
humifusa, Presl, 1. c.-T. diffusa.
microphylla, Griseb. Cat. PI. Cub. 114-T. diffusa.

BOHADSCHIA, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Auf«. i. 279 (1795)-HyoseriB, Linn. &c. (Compos.).
hirta, F. W. Schmidt, 1. c. 280 = Leontodon hirtus.
lucida, F. W. Schmidt, 1. c. 279 = H. lncida.

BOHERAVIA, Parodi, in Anal. Soc Cient. Argent, v. 210 (1878); Contrib. 59 - Boerhaavia, Vaill. (Nyctag.).

BOISDUVALIA, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 383 (1885) -Oenothera, Linn. (Onagrar.).
andina, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-66) 70 (-O. andinal).—Chili.
cleistogama. Outran, in Bull. Calif. Acad. (1884) 12.—Calif.
concinna, Spach, Hist. *Vig.* Phan. iv. 884 = 0. concinna.
densiflora, S. Wats. Bot. Calif, i. 233 = 0. densiflora.
Douglasii, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 385-0. densiflora.
glabella, Walp. Rep. ii. 89 = O. glabella.
Tocornalii, C. Gay, Fl. Chil. ii. 344.—Chili.
Torreyi, S. Wats. Bot. Calif. 233 = 0. Torreyi.
Volckmanni, Phil, in Linnaea, xxx. (1859-60) 187.—Chili.

BOISSIAEA, Lem. in Orb. Diet. ii. 638 (1842) = Bossiaea, Vent (Legumin.).

BOISSIERA, Domb. ex DC. Svst. i. 612, in syn. (1818) -Lardizabala, Ruiz *Sc* Pav. (Berberid.).
trifoliata, Domb. ex DC. 1. c. 613 = L. trifoliolata.
triternata, Domb. ex DC. 1. c. 512 = L. biternata.

BOISSIERA, Haenseler, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 218 (1861) = Gagea, Salisb. (Liliac).
baetica, Haenseler, 1. c. = G. polymorpha.

BOISSIERA, Hochst. & Steud. in Flora, xxi. (1838) I. Intell. 25. *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1176.
SCHNIZLBINIA, Steud. Nom. ed. IL i. 218, in syn. (1840).
WIESTIA, Boiss. Fl. Orient, v. 559 (1884).
bromoides, *Hochst. br Steud. I. c.; Syn. PI. Gram.* 200.—Arab.; Syria; Persia; Affghan.
Danthoniae, A. Braun, Ind. Sem. Hort. Berol. (1857) 3 = Bromus macrostachyus.
Pumilio, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 9.—Persia.

BOJEBIA, DC. Coll. Mém. ix. 18; et Prod. v. 94 (1886). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 831.
glabra, *Klatt, in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. xviii. (1873) 364.—Afr. trop.
speciosa, *DC. Coll. Mlm.* ix. 18. t. 3.—Madag.

BOJERIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 50 (1836) - Amomum, linn. (Scitam.).
magnifica, Rafin. 1. c. — A. magnificum.

BOLANDRA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 341. *SAXIFRAGEAE.*
califomica, *A. Gray, I. c*—Calif,
oregana, 5. *Wats. 1. c.* xiv. (1879) 292.—Am. bor. occ.

BOLANOSA, A. Gray, PI. Wright, i. 82 (1862). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 232.
Coulteri, *A. Gray, I. c*—Mexic.

BOLAX, Comm. ex Juss. Gen. 226 (1789) = Azorella, Lam. (Umbell.).
angulatus, Presl, ex DC. Prod. iv. 80—Mulinumangulatum.
aretioides, Spreng. Umb. Sp. 11 = A. aretioides.
caespitosus, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Ze'l. 62=A. caespitosa.
caespitosus, Spreng. in Roem. *8c* Schult. Syst. vi. 858 — A. aretioides.
cladorrhizus, Spreng. 1. c. 362-A. cladorrhiza.
complicatus, Spreng. Umb. Sp. 9,10 - A. caespitosa.
crenatus, Spreng. Syst. i. 880—A. crenata.
Echinus, Presl, ex DC. Prod. vi. 79 = Mulinum Echinus.

BOLAX:—
filamentosus, Sprang, in Roan. & Schult Syst. vi. 359 =A. filamentosa.
fioccipes, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, iii. 880 = Astrotricha floccosa.
geraniifolius, Presl, ex DC. Prod. iv. 81 = Huanaca geraniifolia.
Gilliesii, Hook. Bot. Misc. i. (1880) 325 = A. Gilliesii.
Oleiaria, Comm. ex Lam. Encyc. iii. 156-A. caespitosa.
gHmmifer, Spierj. Syst. i. 879 = A. caespitosa.
integrifolius, Spreng. ex Steud. Norn. ed. II. i. 214 = A. filamentosa.
tedi/oHus, Sieber, ex DC. Prod. v. 74 = Astrotricha ledifolia.
lycopodioides, Spreng. in Roem.& Scbult. Syst vi. 361 -=A. corymbosa.
nultifidus, Spreng. Syst. i. 880=A. multifida.
pedunculatus, Spreng. Umb. Sp. 10-A. mnltifida.
PUifera, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xxii. (1849) H. 82.-Peruv.
Prolifer, Spreng. in Roem. & Schnlt Syst. vi. 861 = Mulinum proTifernm.
spinosus, Spreng. 1. c. 362 = Mulinum spinosum.
t'identatus, Spreng. Umb. Prod. 34= Hydrocotyle tridentata.
trifurcatus, Spreng. ex Stead. Norn. ed. II. i. 214 = A. caespitosa.
trilobus, Spreng. Umb. Prod. 84 = Hydrocotyle triloba.

BOLBIDIUM, Lindl. Veg. Kingd. 181 (1847), nomen (Orchid.). In Herb. Lindl. indudit species Dendrobii (D. snbacaule *8c* prasinum).

^OLBOPHYLLARIA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 934 = BulbophyUum, Thon. (Orchid.).
"ristata, Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am. 60 = Balbophyllum aristatum.
*»rta, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 242 = Bulbophyllum Wsetum.
tracteolata, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1862) 934 = Bulbophyllum bracteolatnm.
davata, S. Moore in Baker, FI. Maurit. S46 = Bulbophyllum clavatum.
Oerstedii, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1856) 228 = Bulbophyllum Oerstedii.
Poehyrhachis, Reichb. £ in Walp. Ann. vi. 241 = Bulbophyllum pachyrhachis.
*w*Vfe, Reichb. f. 1. c 242 = Bulbophyllum bracteolatum.

BOLBOPHYLLOPSIS, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) »33 = Cirrhopetalum, Lindl. (Orchid.).
naculosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 243 = C. maculosum.
norphologorum, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 933 - C. maculosum.

BOLBOPHYLLUM, Spreng. Syst. iii. 681, 782 (1826)= Bulbophyllum, Thou. (Orchid.).

BOLBORCHIS, Zoll. *8c* Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 89 (1845-46)-Coelogyne, Lindl. (Orchid.).
"odformis, Zoll. *8c* Moritzi, 1. c.=C. javanica.

^LBOSTYLIS, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 467=Eupatorium, Tonm. (Compos.).

BOLDEA, JUSS. in Ann. Mus. Par. xiv. (1809) 134 = PeumuB, Molina (Monim.).
«grans, C. Gay, Fl. Chil. v. 353; et Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1855) 412. t. 81 =P. Boldua.

BOLDOA, Endl. Gen. Suppl. i. 1378 (1841) = BOLDEA, Juss. = Peumus, Molina (Monim.).

BOLDOA, Cav. Cat Hort. Madr. (1803) t. 7; Lag. Gen. et Sp. Nov. 10 (1816). *NYCTAGINEAE,* «nth. & Hook. £ iii. 8.
SALPIANTHUS, Humb. *8c* Bonpl. PI. Aequin. i. 154. t. 44 (1808).
"neolata, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 10.—Mexic.
"tifolia, Lag. 1. c. = Cryptocarpus globosus.
toniculata, Mart *8c* Gal. in BnlL Acad. Brnx. x. (1843) 856 = Cryptocarpus globosus.
*P*rpurascens,* Cav. Hort. Madr. t 7=Cryptocarpus globosus.
^PSM, *Spreng. Syst.* i. 179.—Bras.

BOLDU, FeuiU. ex Adans. Fam. ii. 446 (1763) = Peumufl, Molina (Monim.).

BOLDU, Nees, Progr. 11 (1883); Syst. Laurin. 177 (1886) = Cryptocarya, R. Br. (Laurin.).
ehilanum, Nees, Syst. Laurin. 178=Peumus Boldus.
chilense, Poepp. ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 67 = praec.
nitidum, Meissn. 1. c. 506=C. nitida.

BOLDUCIA, Neck. Elem. iii. 32 (1790)=Dipteryx, Schreb. (Legumin.).

BOLDUS, Schnlt. f. in Roem. *8c* Schult. Syst. vii. p. x. 56 (1829)-=Feumus, Molina (Monim.).
chilensis, *Schult. f. I. c.* 66.—P. Boldus.

BOLELIA, Rafin. Atl. Journ. 120 (1832)=Downingia, Torr. (Campan.).

BOLETJH, Desv. Jonm. Bot. iii. (1814) 168. t. 26. *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 98.
asperum, *Desv. 1. c.* 168, 175.—Hispan.

BOLINA, Rafin. SylvaTellur. 101 (1838) (Melastomac).
conferta, Rafin. 1. c. = Brachyotum confertum.
divaricata, Rafin. 1. c. = Pterogastra divaricata.
excelsa, Rafin. 1. c. •= Centronia excelsa.

BOLIVARIA, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, i. (1826). 207-1. 4 =Menodora, Humb. *8c* Bonpl. (Oleaceae).
chlorargantha, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. viii. (1847) 225.—Bolivia.
decemfida, Gill, ex Hook. Joum. Bot i. (1834) 284. —Chili.
Grisebachii, A. Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 254 = M. heterophylla.
integrifolia, Cham. & Schlecht. 1. c. i. (1826) 208=M. integrifolia.
mexicana, A. DC. Prod. viii. 315 = M. mexicana.
pinnatifida, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 474 =M. pinnatifida.
robusta, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 190. t. 6 = M. robusta.
trifida, Cham. & Schlecht in Linnaea, i. (1826) 209 = M.trifida.

BOLLAEA, Part, in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 509 = Pancratium, Linn. (Amaryll.).
canariensis, Parl. 1. c = P. canarieme.

BOLLEA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 667 = Zygopetalum, Hook. (Orchid.).
coelesiii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) I. 756 = Z. coeleste.
guianensis, Klotzsch, in Schomb. Fauna & Fl. Guy. 1206, nomen.—Guiana.
Lalindri, Reichb. f. in Gard. Chron. (1874) II. 38 = Z. Lalindei.
Lawrenceana, Reichb. f. 1. c. (1878) II. 266-=Z. Lawrenceana.
pollens, Reichb. f. L c. (1881) I. 462.—Hab.?
Patini, Reichb. f. L c (1874) II. 34=Z. Patini.
pulvinaris, Reichb. £ in Linnaea, xli. (1877) 107 = Z. pulvinare.
violacea, Reichb. f. in Bot Zeit. x. (1852) 668 = Z. violaceum.

BOLOPHYTA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) S47=Farthenlum, Linn. (Compos.).
alpina, Nutt. 1. c. 348=P. alpinum.

BOLOSIA, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 211 (1870)=Hispidella, Baraad. (Compos.).
piloselloides, Pourr. ex Willk. 1. c = H. hispanica.

BOLTONIA, L'Herit. Sert. Angl. 27 (1788). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 269.
ASTEROMOEA, Blume, Bijdr. 901 (1827).
DICHAETOPHORA, A. Gray, PI. Fendl. 78 (1849).
HISUTSUA, DC. Prod. vi. 44 (1837).
MADEA, L'Herit. ex DC. Prod. v. 301 (1836).
asteroides, Simg, Bot. Mag. t. 2554 = diffusa.
asteroides, *VHhit. Serf. Angl.* 27.—Am. bor.
campestris, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* ii. 120.—Texas,
cantoniensis, *Franch.* b* *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 898.—Japon.
diffusa, *Ell. Sketch,* ii. 400.—Am. bor.

BOLTONIA:-
glastifolia, L'Heiit. Sert. Angl. 27 = asteroides.
incisa, *Benth. Fl. Hongk.* 178 = Aster incisus.
indica, *Benth. I. c.* 174 = Aster indicus.
integrifolia, Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 269-pekinensis.
japonica, *Benth. V Hook.f. I. c*—Japon.
latisquama, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xxxiii. (1862) 288.—Am. bor.
lautureana, Debeaux, in Act. linn. Soc. Bord. xxxi. (1877) 215 = Aster lautureanus.
pekinensis, *Hance, in Journ. Bot.* v. (1867) 370.—China.
Seemannii, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 269 = Achaetogeron Seemannii.

BOIiUBIA, Benth. in Hook. Ic PI. xii. 57. t. 1163 (1878). *LEGUMINOSAE.*
capensis, *Benth. I. c.*—*Afr.* austr.

BOMAREA, Mirb. in Hist Nat. PI. ix. (1804) 71. *AAfARYLUDEAE,* Benth. *8c* Hook. £ iii. 736.
COLLANIA, Herb. Amaryll. 108. t. 8 (1837).
DANBYA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 67 (1866).
DODECASPERMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 35 (1836).
SPHAERINE, Herb. Amaryll. 106. t. 12, 13, 16, 18 (1887).
VANDESIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 382.
WICHURAEA, M. Roem. Syn. Ensat. 277 (1847).
acutifolia, *Herb. Amaryll.* 112.—Mexic.
affinis, Kunth, Enum. PI. v. 796=edulis.
amoena, *M. Roem. Syn. Ensat* 274.—Peruv.
anceps, Herb. Amaryll. 116 = fimbriata.
andimarcana, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 201.—Peruv.
Andreana, *Baker, I. c.* 205.—N. Granat.
angulata, *Benth. PI. Hartw.* 156.—Peruv.
angustifolia, *Benth. I. c.*—Peruv.
angustipetala, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—N. Granat.
aurantiaca, *Herb. Amaryll.* 899. t. 46. f. 1.—Peruv.
brachyscpala, *Benth. PI. Hartw.* 167.—Peruv.
bracteata. Herb. Amaryll. 112. t. 3. f. 3 = edulis.
Brauniana, Schenk, in Mart. Fl. Bras. iii. I. 168-edulis.
Bredemeyerana, Herb. Amaryll. 118 = multiflora.
brevis. *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—Peruv.
Caldasiana, *Herb. Amaryll.* 119.—Guatemala ; Peruv.
caraccensis, Herb. 1. c. 111. 1.16. £ 2=eduli$.
Carderi, *Mast, in Gard. Chron.* (1876) I. 793, 795. —N. Granat.
chontalensis, Seem, in Gard. Chron. (1871) 479 ~ edulis.
cocdnea, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—Peruv.
conferta, Benth. PI. Hartw. 259 = patacocensis.
cordifolia, *Herb. Amaryll.* 113.—Peruv.
comigera, *Herb. I. c.* 116.1.17. f. 2.—Peruv.
cornuta, Herb. I. c 114. t 17. f. 4 = edulis.
crinita, *Herb. 1. c.* 119. t. 15. f. 4.—Peruv.
crocea, *Herb. I. c.* 119.—Peruv.
cumbrensis, Herb. 1. c. 115. t. 18. f. 2-torta.
declinata, Klotzsch, ex Kunth, Enum. PI. v. 803 •-dispar.
densiflora, Herb. Amaryll. 399. t. 46. £ 4 »• tomentosa.
diffracta, *Baker, in Joum. Bot.* xx. (1882) 206.—N. Granat.
denticulata, *Herb. Amaryll.* 118.—Peruv.
dispar, *Herb. 1. c.* 115. t. 17. £ 1.—Peruv.
dissitifolia, *Baker, in Joum. Bot.* xx. (.1882) 208.—Ecuador.
distichophylla, *Baker, 1. c.* 202.—Peruv.
edulis, *Herb. Amaryll.* 111.—Am. trop.
Fanningiana, Herb. 1. c. 116.1.16. f. 3=multiflon.
fimbriata, *Herb. 1. c.* 116.—Peruv.
fioribunda, Herb. 1. c. = fimbriata.
formosissima, *Herb. I. c.* 111. 1.14. £ 4.—Peruv.
frondea, *Mast, in Gard. Chron.* (1882) I. 668.—N. Granat.
furcata, Klotzsch, ex Kunth, Enum. PI. v. 792-edulis.
fuscata, *Klottsch, in Schomb. Fauna (f Fl. Guy.* 1120, nomen.—Guiana,
glaucescens, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 201.—Ecuador.
glomerata, *Herb. Amaryll.* 115.1.15. f. 1.—Peruv.
goniocaulon, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 204.—Ecuador.

BOMABEA:—
gloriosa, M. Roem. Syn. Ensat. 269=edulis.
granatensis, M. Roem. 1. c. 264 = B. Salsilla.
grandifolia, Herb. Amaryll. 118-= edulis.
Halliana, *Herb. Amaryll.* 117. t. 10. f. 8.—N. Granat.
Hartwegii, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 203.—Ecuador.
hirsuta, *Herb. Amaryll.* 114.—N. Granat.
hirta, *Schenk, in Mart. Ft. Bras.* iii. I. 169.—Bras.
hirtella, Herb. Amaryll. 112 = edulis.
bispida, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—N. Granat.
Hookeriana, *Herb. Amaryll.* 398. t. 46. f. 3.—Perav.
involucrosa, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 201.—Peruv.
Jacqnesiana, *Kunth, Enum. PI.* v. 800.—Bras.
janeirensis, M. Roem. Syn. Ensat. 267-edulis.
Kalbreyeri, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 204.—N. Granat.
lancifolia, *Baker, I. c.* 202.—Ecuador.
latifolia, Herb. Amaryll. 118 = edulis.
Lehmanni, *Baker, in Journ. Bot.* xxi. (1888) 873.—Am. austr.
linifofiä, *Baker, I. c.* xx. (1882) 201.—N. Granat.
longipes, *Baker, I. c.* 204.—Ecuador,
lutea, *Herb. Amaryll.* 120. t. 5.—Peruv.
lyncina, *Herb. 1. c.* 398. t. 46. f. 8.—Peruv.
Maakiana, *Klottsch, in Otto V Dietr. Allg. Garten*. xx. (1852) 837.—Venezuela.
Macleanica, Herb, in Lindl. Bot Reg. (1842) Misc. 66 = aurantiaca.
macrocarpa, Herb. Amaryll. 14=edulis.
maranensis, *Herb. I. c.* 17.—Bras.
Uartiana, Schenk, in Matt. Fl. Bras. iii. I. 170 = edulis.
miniata, Kuntb, Enom. PI. v. 792=edulis.
minima, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—N. Granat.
Morittiana, Klotzsch, ex Kunth, Enum. PI. v. 797 = edulis.
multiflora, *Mirb. Hist. Nat. PI.* ix. (1804) 72.—N. Granat.
multipes, *Benth. PI. Hartm.* 166.—Peruv.
nervosa, *Batter, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—Peruv.
nobilis. Herb. Amaryll. 422-ovata.
ebovata, Herb. 1. c. 112. t. 14. f. 2-edulis.
oculata, M. Roem. Syn. Ensat. 268 = B. Salsilla.
oligantha, *Baker, in Gard. Ckron.* (1877) IL 648.—Peruv.
ovata, *Mirb. Hist. Nat. PI.* ix. (1804) 72.—Am. austr.
pachyphlebia, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 204.—Ecuador.
pardina, *Herb. Amaryll.* 120. t. 14. f. 1.—N. Granat.
paltarumensis, Herb. 1. c 422 -- fimbriata.
patacocensis, *Herb. I. c.* 120.1.14. f. 3.—Ecuador; N. Granat.
pauciflora, Herb. 1. c. 112 =• edulis.
platypetala, Benth. PI. Hartw. 156=undfolia.
podopetala, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—Ecuador.
polygonatoides, *Baker, I. e.*—Ecuador.
praedpua, Herb. Amaryll. 422 - B. Salsilla.
pudibunda, *Planch. V Linden, Cat.* n. 10. (1855) 4—N. Granat.
pumila, *Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 66,* nomen. —Peruv.
punctata, *Herb, in Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 66.— Peruv.
purpurea, *Herb. Amaryll.* 118, 899.—Peruv.
tosea, *Herb. 1. c.* 118.—Peruv.
Salsilla, *Mirb. in Hist. Nat. PI.* ix. (1804) 71.—Chili.
Salsilla, Veil. Fl. Flum. iii. 120-edulis.
salsilloides. M. Roem. Syn. Ensat. 264-edulis.
aecundifolia, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 202.—Peruv.
setacea, Herb. Amaryll. 117 - tomentosa.
Shuttleworthii, *Mast, in Gard. Chron.* (1882) 1.76.—N. Granat.
simplex, Benth. PI. Hartw. 156 - Hartwegii.
simplex, Herb. Amaryll. t. 15 ; et in Bot. Mag. t. 3863 -rosea.
spectabilis, Schenk, in Mart Fl. Bras. iii. 1.169 = edulis.
iubfalcata, Herb. Amaryll. 422; Pritz. It Ind. 158 - B. Salsilla.
subglobosa. Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1842) Mite. 66 ss fimbriata.

BOMABEA:—
superba, *Herb. Amaryll.* 117. t. 6. f. 1.—Perav.
Tatiana, Herb. 1. c. 423 = ovata.
tomentosa, *Herb. I. e.* 117.— Peruv.
torta, *Herb. 1. c.* US.—Ecuador.
Turneriana, Herb, in Lindl. Bot Reg. (1842) Misc. 66 — formosissima.
uncifblia, *Herb. I.* c—Peruv. vel Bolivia.
variabilis, Herb. 1. c. = rosea.
villosa, M. Roem. Syn. Ensat. 268 = ovatą.
vitellina, *Mast, in Gard. Chron.* (1882) I. 143.—N. Granat.
Williamsiae, *Mast. I. c.* (1882) II. **568.—**N. Granat.

BOMARIA, Kunth, Ennm. PL v. 787 (1860) = Bomarea, Mirb. (Amaryll.).

BOMBAX, Linn. Sp. PL ed. I. 511 (1753). *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 210.
ERIOTHECA, Schott & Endl. Meletem. 35 (1882).
SALMALIA, Schott & Endl. 1. c. (1862).
aculeatum, *Veil. Fl. Flum.* 289 ; vii. t. 66.—Bras.
aesculifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 298 = Eriodendron aesculifolium.
axillare, Moç. & *Sessi,* ex DC. Prod. i. 479 = Eriodendron aesculifolium.
Barrigon, *Decne. in Fl. des Serres, Sir.* II. xUi. (1880) 44.—Panama.
buonopozense, *Beauv. Fl. Owar.* ii. 42.188.—Afr. hop.
carolinoides, Donn, Cat. Hort. Cant. ed. IV. 156 = Pachira minor.
carolinum, *Veil. Fl. Flum.* 289 ; vii. t. 67.—Bras.
Ceiba, Burm. f. Fl. Ind. 146 = malabaricnm.
Ceiba, *Linn. Sp. PI.* 511.—Am. austr.
Congo, Burm. f. Fl. Ind. 145 = Cochtospermum Gossypium.
coriaceum, *Mart. Nov. Gen. et Sp. i.* 93, in obs.—Bras,
cumanense, *H. B. V K. Nov.- Gen. et Sp.* v. 300.— Venezuela.
decaphyllum, Decne. in Fl. des Serres, Sér. II. xiii. (1880) 44 = endecaphyllum.
discolor, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 299.—N. Granat.
ellipticum, *H. B.* b" *K. I. c*—Mexic.
emarginatum, *Decne. in Fl. des Serres,* Sér. II. xiii. (1880) 44.—Bras.
endecaphyllnm, *Veil. Fl. Flum.* 288 ; vii. t 60.—Bras.
ErianthuSyCax. Diss. v. 294 «= Eriodendron leiantherum.
Fendleri, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 108. —Panama.
festivum, Wall. Cat. n. 1841 = insigne.
glabrescens, *St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. xviii. (1842) 211.—Bras.
globiferum, Raeusch. Nom. ed. III. X96=globosum.
globosnm, *Aubl. PI. Gui.* ii. 701. t. 281.—Guiana.
Gossypium, Linn. Syst. ed. XII. 517 = Cochlospermum Gossypium.
grandiflorum, Cav. Diss. v. 295=insigne.
grandifiorum, Sonner. Voy. Ind. ii. 235. t 133 = Cochlospermum Gossypium.
guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 302 = Eriodendron anfractuosum.
heptaphyllum, Cav. Diss. v. 296; Roxb. PI. Corom. iii. 43. t 247 -malabaricum.
heptaphyllum, linn. Sp. I'l. 960=septenatum.
hexaphyllum, *Veil. Fl. Flum.* 288; vii. t 52,-Bras.
hibiscifolium, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 215-Cochlospermum hibiscoides.
Hilarianum, *Decne. in Fl. des Serres,* Sér. II. xiii. (1880) 44.—Bras,
hnmile, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 108.— Bras.
insigne, *Wall. PI. As. Rar.* i. 74. t 79 et 80.—Ind. or.
jasminodorum, Baill. Hist. PI. iv. 119 = Eriodendron jasminodorum.
malabaricnm, *DC. Prod.* i. 479.—Ind. or.; Malaya; China,
mediterraneum, *Arruda, in Koster, Trav. Brat.* 489.— Bras.
mexicamim, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 4.—Mexic.
mompoxense, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* v. 300.— Venezuela.
Munguba, *Mart. Nov. Gen. etSp.i.* 98.—Bras.
occidentale, Spreng. Syst. iii. 124—mompoxense; Eriodendron caribaenm.
octophyllnm, *Veil. Fl. Flum.* 288 ; vii. t. 51.—Bras.
orientate, Spreng. Syst. iii. 124 <• Eriodendron anfractuosum.

BOMBAX:—
orinoccense, H. B. *Sc* K. Nor. Gen. et Sp. v. 800 = Cochlospermum orinoccense.
parviflorum, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 91. t. 57.—Bras.
pentandrum, Jacq. Stirp. Am. 191 = Eriodendron caribaeum.
pentandrum, Linn. Sp. PI. 511-Eriodendron anfractuosum.
pentaphyllum, *Veil. Fl. Flum.* 289; vii. t. 55.—Bras.
plumosum, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 8 = Eriodendron anfractuosum ?
pubescens, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 91. t. 68.—Bras.
pyrdmidale, Cav. Diss. v. 294. t. 158 = Ochroma lagopus.
pyramidatum, Steud. Nom. ed. I. 114-praec.
quinatum, Jacq. Stirp. Am. 192 - B. Ceiba.
religiosum, Linn. Sp. PI. 612 — Cochlospermum Gossypium.
retusum, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* L 92. t. 59.—Bras.
rubrinervis, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 69.— 'Bras.
Samauma, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 269-Eriodendron Samauma.
septenatnm, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 26.—N. Granat.
serrata, *Des/. Cat. Hort. Par.* ed. III. 407.—Hab. I
sexdigitatum, *Veil. Fl. Flum.* 289 ; vii. t. 54.—Bras.
tomentosum, *A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 263.—Bras.
ventricosum, Arruda, in Koster, Trav. Braz. 489 = Chorisia crispiflora.
villosum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 3.—Am. austr.
vitifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. 720-Cochlospermum vitifolium.

BOMBIX, Medic Malv. 44 (1787) = Hibiscus, linn. (Malvac).
phoenicea, Medic. L c. = H. phoeniceus.

BOMBYCELLA, Lindl. Veg. Kingd. 870 (1847) = Hibiscus, linn. (Malvac).
betulina, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. *x.* (1881) 241 O H. betulinus?).—Porto Rico.
bicolor, Welw. Apont. 589.—Afr. trop.
phoenicea, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat x. (1881) 241 = H. phoeniceus.

BOMBYCIDENDRON, ZolL & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. NeW. Indie, ii. (1845) 14 = Hibiscus, linn. (Malvac).
grewiaefolium, Zoll. *Sc* Mor. 1. c = H. grewiaefolins.

BOMBYCOSPERMUM, Presl, Rel. Haenk. ii. 137. t. 71 (1831)-=Ipomoea, linn. (Convolv.).
mexicanum, Presl, 1. c — I. bombycina.

BOMBYNIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. L Art. iv. 1; ed. II. 64 (1827) (Quid t).

BOMBYX, Moench, Meth. 616 (1794)-**Hibiscus,** Linn. (Malvac).
phoenicea, Moench, 1. c — H. phoeniceus.

BONA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 360; et Phil. Bot. i. 205 (1789) = Viola, Linn. (Legumin.).
narbonensis, Medic 1. c. 860—V. narbonensis.
speciosa, Medic. 1. c 361 = V. narbonensis.

BONAFIDIA, Neck. Elem. iii. 46 **(1790)-Amorpha.** Linn. (Legnmin.).

BONAFOUSIA, A. DC. Prod. viij. 859 (1844)* Tabernaemontana, linn. (Apocyn.).
attenuata, Miers, Apocyn. S. Am. 51.—Am. austr.
guyanensis, Miers, 1. c. = T. guyanensis.
latiflora, Miers, 1. c. 50 = T. flavicans.
obliqua, Miers, 1. c. 49.—Am. austr.
oblongifolia, Miers, 1. c. 50 = T. oblongifolia.
olivacea, Miers, 1. c. 52 ^ T. olivacea.
Perrottetii, Miers, 1. c. 61 = T. Perrottetii.
polyneura, Miers, 1. c 63.—Am. austr.
rariflora, Miers, 1. c. —Am. austr.
rupicola, Miers, 1. c. 52 = T. rupicola.
undulata, A. DC. Prod. viii. 359-T. undulata.

BONAGA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 845; Phil. Bot. 206 (1789) - Ononis, Linn (Legumin.).
antiquorum, Medic. 1. c 846-0. antiquorum.
arvensis, Medic. Phil. Bot. 206=0. arvensis.
Columnae, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 846 = O.Columnae.
hircina, Medic. 1. c.=O. hircina.
minutissima, Medic. 1. c = O. minntusinuu
mitU, Medic. 1. c - O. arvensis.
spinosa, Medic. 1. c.»O. spinosa.

BONAMIA, A. Gray, in Proc. Am. Aead. v. (1862) 887 -= Breweria, R. Br. (Convolv.).
aouatica, A. Gray, Man. Bot N. U. St ed. V. 876 = Breweria aquaticu.
humistrata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 887 •= Breweria humistrata.
Mentiesii, A. Gray, 1. c—Ins. Sandvic.
Pideringii, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 876 "Breweria Pickeringii.

BONAHIA, Thou, in Diet. Sc Nat. v. 145 (1804) ; et H»st. Veg. Isl. Afr. 17. t. 8 (1808). *CONVOLVV-LACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 877.
madagascariensis, *Poir. Eneyc. Suppl. i.* 677.—Madag.

BONAMICA, Veil. FI. Flmn. 21 (1825) ; i. t 50= Wnociera, Sw. (Oleac).
Mformis, Veil. 1. c—Bras.

BONAWIA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. n. 201. t. 68 (1858). *EVPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 080.
•denodon, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 885.—Cuba.
Wbana, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 201.—Cuba.
'«*«««!, A. Rich. 1. c. t. 68=cubana.
emarginata, *Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 78.-Cuba.
erythrosperma, *Benth. tf Hook. f. Gen.* iii. 835.—t-uba.
"tyricifolia, *Benth. V Hook.f. I. a*—Cuba.

BOWANinA, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 855 (1842). *"MBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 910.
'wuufera, *Guss. 1. c*—Sicilia.
"stnosa, Strobl, in Oestr. Bot Zeitschr. xxxiv. (1884) 174-resinifera.

BONANNIA, Presl, F' Sic. t. 99 (1826)=»Brawioa, Unn. (Crudf.).
"'"wria, Presl, 1. c. 100=Bmssica dissecta.
Wnnalis, Presl, L c. 99 - Branica alba.

BONANNIA, Rafin. Specchio, xv. 115 (1814) = Blighia, Kon. (Sapind.).
»'«««, Rafin. i/c H6=.BHghia sapida.

BONANOX, Rafin. Fl. Tellur. 77 (1836)-Ipomoea, . Linn. (Convolv.).
"'"*•«, Rafin. 1. c—Ind. or.
wancato, Rafin. 1. c - I. Bona-nox.
"*«cu/o/«, Rafin. 1. c. = I. orbiculata.
"Parta, Rafin. 1. c. = I. riparia.

BONAPARTEA, Haw. Syn. PI. Sacc. 68 (1812) = Agave, Linn. (Amaryll.).
flax. ...010, *Boacea* m Rev Hortic C[1868] 65,,A- fil1Tera.
Ragelli, Hms, Henck. in Flora, iii. (1820) 45=A. SenunUlora.
f'cilis, Sweet, Hort Brit ed. II. 597-Dasylirion acrotichum.
Hyst striata. Hott M *asq* CllL Orto Bot *Nap< 111=Ai
/«»«a, Haw. Syn. PI. Succ. 68=A. geminiflora.
'tricta, Hort. ex Vukot. in Rad. logos. Akad. Zagrab, *<vii.(1874)21S=A.striata.

BO^]ARTEA Rnn" * P«- Fl. Per. iii. 38 (1802) = 'TUlandsia, Unn. (Bromel.).
^»»«a, Ruiz &c *Tax,* 1. c. =T. setacea.
-'^ *Pavonina* < Ruiz * Pav - L c- 39 - T. strobilantha.
"««<o, Mart, ex Schult. f. Syst rii.u.1198^ T. vittata.

BONAROTA, Adans. Fam.iL 209 (1768)-Paederota, Linn. (Scrophul.).
chamaedrifolia. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 22=P. Ageria.
ntundifolia, Camel, in ParL Fl. Ital. vi. 582=P. Bonarota.

BONATEA, Willd. Sp. PI. iv. 48 (1806)=Habenaria, Willd. (Orchid.).
Bilabrella, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 828 = H. tetrapetala.
Boltoni, Harv. Thes. Cap. i. 55. t. 88 = H. Boltoni.
omia'ra.Sond.inLinnaea, xix. (1847) 81 = H. cassidea.
cirrhata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 327 = H. cirrhata.
cltmata, Lindt. in Hook. Comp. Bot Mag. ii (1836) 208 = H. clavata.
Darvinii, Weale.in Journ. Linn. Soc x. (1869) 470= H. cassidea.
densifiora, Sona. in Linnaea, xix. (1847) 80 = H. densiflora.
flexuosa, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 328=H. flexnosa.
foliosa, Lindl. 1. c. 829 = H.' foliosa.
gracilis, Lindl. 1. c. = H. gracilU.
herbacea. Wall, ex Lindl. 1. c. 807'H. digitata.
incarnata, Lindl. 1. c. 827=Disa incamata.
macilenta, Lindl ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 673 = H. macilenta.
micrantha, LindL Gen. et Sp. Orch. 829 = H. arenaria.
panduana, Lindl. in Wall. Cat n. 7063 = H. digitata.
pauciflora, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 329 = H. pauciflora.
pratensis, Lindl. 1. c. 328 = H. pratensis.
speciosa, Willd. Sp. PI. iv. 43 = H. Bonatea.
tetrapetala, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 208 = H. tetrapetala.

BONAVERIA, Scop. Introd. 810 (1777)=8ecurigera, DC. (1805) (Legum.).
Securidaea, Desv. Journ. Bot. i. (1818) 120=S. Coronilla.
Securigera, Endl. ex Heynh. Norn. ii. 78=S. Coronilla.

BONDUC, Adans. Fam. it 318 (1768) = Caesalplnia, Linn. (Legum.).
canadense, Medic. Theod. 113 = C. Bonduc
ma jus, Medic 1. c. 43=C. Bonduc.
minus, Medic. 1. c. 41 = C. Bonducella.

BONELLIA, Bert, ex Colla, Hort. Ripul. 21 (1826) = Jaoqulnia, Jacq. (Myrsin.).
Cavanillesii, Bert. 1. c. =J. mactocarpa.

BOXTQABDIA, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 174 (1831). *BERBERIDEAE,* Benth.,& Hook. f. i. 48.
chrysogonum, Boiss. Fl. Orient, i. 99=Rauwolfii.
Olivieri, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 175=Rauwolfii.
Ranwolfii, *C. A. Mey. I. c.* 174.—Graecia; Oriens; Afghan.

BONIFACIA, Manso, ex Steud. Norn. ed. II. i. 216 (1840) = Augusta, VoH (Rubiac.).
riparia, Manso, ex Steud. 1. c.=A. lanceolata.

BONJEANEA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 507 (1832) = Doryonlum, Linn. (Legum.).
cinerascens, Jord. 8c Four. Brev. PI. Nov. fasc. i. 12 - D. hirsutum.
graeca, Griseb. Spidl Fl.Rumel. i. 43-D. latifolium.
hirsuta, Reichb. Ic Fl. Germ. x. 32 -= D. hirsutum.
kirta, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc i. 11-D. hirsutum.
italica, Jord. *Sc* Fourr. I.e. 12 = D. hirsutum.
Kotschyi, Boiss. & Kent ex Boiss. Fl. Orient, ii. 161 = D. Kotschyi.
microphyUa, Reichb. Fl, Germ. Excurs. 507, in nota= Indigofera gracilis.
prostrata, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PL Nov. fasc. i. 11 [emend, fasc. ii. 133]-D. hirsutum.
recta, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 507 — D. rectum.
sericea, Jord. & Fourr. Ic Fl. Ear. i. 24. t. 61 = D. hirsutum.
syriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 31 - D . hirsotum.
venusta, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc i. 12 = D. lUrsutum*

BOITNAYA, Link *Sc* Otto, Ic PI. Sel. 25.1.11 (1820). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 966.
alata, *Spreng. Syst.* i. 41.—Ins. Molucc.

BONUATA:-
alterniflora. *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 101.—Cuba.
bifolia, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 15=Chirita bifolia.
- brachiata, *Link if Otto, Ic. PI. Sel.* ii. 25. t. 11.—Ind. or.; Malaya.
brachycarpa, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 568 = Ilysanthes capensis.
bracteata, Griff. Notul. iv. 107 = veronicaefolia.
ciliata, Spreng. Syst. i. 41 = reptans.
dausa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 499.—Austral.
cerdifolia, Spieng. Syst. i. 42=Vandellia pedunculata.
cyanea, Grin. Notul. iv. 107 = veronicaefolia.
grandiflora, Spreng. Syst. i. 41 -veronicaefolia.
hispidula, G. Don, Gen. Syst. iv. 538 (Gen. dubium).—Ind. or.
humilis, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 15=Chirita pumila. *
hyssopioides, Benth. in Wall. Cat. n. 8S66 = Ilysanthes hyssopioides.
integrifolia, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 893 = Vandellia erccta.
marginata, Spreng. Syst. i. 41 * veronicaefolia.
minima, G. Don, Gen. Syst. iv. 538=oppositifolla.
minima, Wight, Ic. iii. t. 858 = Ilysanthes minima.
ocymifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 538(~VandeMae sp.).—Ind. or.
oppositifolia, *Spreng. Syst.* i. 41.—Ind. or.
origanifolia, Spreng. 1. c. 42=Vandellia diffusa.
parviflora, Benth. in Wall. Cat. n. 3867»Ilysanthes parviflora.
pednncularis, *Benth. in Wall. I. c.* n. 3865; *et Scroph. Ind.* 34.—Ind. or.
penioillata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 161.—Japon.
personata, Hassk. in Flora, xlvii. (1864) 56 - brachiata.
procumbens, Benth. in Wall. Cat. n. 3b59-=veronicaefolia.
pulegiifolia, Spreng. Syst. i. 41=veronicaefolia.
pumila, Spreng. Sy»t. iv. Cur. Post. 16-Chirita pumila.
punctata, G. Don, Gen. Syst iv. 588=Limnophila conferta.
pusilla, Benth. in Wall. Cat. n. 8861; Scroph. Ind. 88 = brachiata.
pusilla, Griff. Notul. iv. 107 = tenuifolia,
pusilla, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 121. —Afr. trop.
re/tens, G. Don, Gen. Syst iv. 537 =seq.
reptans, *Spreng. Syst.* i. 41.—Ind. or.; Malaya; Ins. Maurit
rigida, Benth. in Wall. Cat. n. 3860 = veronicaefolia.
Rothii. A. Dietr. Sp. PI. i. 556 = veronicaefolia.
rotundifolia, Benth. Scroph. Ind. 34 «= Ilysanthes rotundifolia.
Roxburghiana, A. Dietr. Sp. PI. i. 559 •= veronicaefolia.
rutllioides, Spreng. Syst. i. 41 - reptans.
serrata, A. Dietr. Sp. PI. i. 556; Griff. Notul. iv. 108 =brachiata.
tenuifolia, *Spreng. Syst.* i. 42.—Ind. or.; China,
trichotoma, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 121.—Afr. trop.
Vahlii, G. Don, Gen. Syst. iy. 538 = Vandellia scabra.
verbenae/olia, Spreng. Syst. i. 42 = veronicaefolia.
veronicaefolia, *Spreng. 1. c.* 41.—Ind. or.; Malaya; China.
Wightii, Benth. in Wall. Cat. n. 3864 = veronicaefolia.

BONNETIA, Mart *Sc* Zucc. Nov. Gen. et Sp. i. 114. t. 100 (1824). *TERNSTROEMIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 187.
KIESERIA, Nees, in Neuwied, Reise nach Brasil. ii. 338 (1821).
anccps, *Mart, tf Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 115.—Bras.
babiensis, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 246.—Bras.
coriacea, Spreng. byst iv. Cur. Post. 207 ➠ Kielmeyeta coriacea.
corymbosa, Spreng. 1. c.-= Kielmeyera corymbosa.
meridionalis, *Sw. Fl. Ind. Occ.* ii. 967.—Am. trop.
palustris, Vahl, Eclog. Am. ii. 42 = meridionalis.
paniculata. *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 63.—Peruv.
parvifloia. *Spruce, ex Benth. I. c*—Peruv.
petiolaris, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 207 - Kielmeyera petiolaris.
rosea, Spreng. 1. c = Kielmeyera rosea.

BOXDXIJSTIA :—
Bessilis, *Benth. in Hook. Lend. Journ. Bet.* il. <184S) S63.—Guiana.
stricta, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1825) 87.—Bras.
trifoliata, Auct ex Walp. Rep. i. 499-Galipea officinalis.
variabilis, Sprang. Syst iv. Cur. Post. 207=Kielmeyeia variabilis.
vennlosa, *Mart. & Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 115.—Bru.

BONNETIA, Neck. Elem. L 868 (1790)«Buehnera, linn. (Scrophular.).

BONNETIA, Schreb. Gen. S63 (1789) - Hahurea, Aubl. (Temstroem.).
palustris, J. F. Gmel. Syst. 81* = M. palustris.
racemosa, Sw. Fl. lad. Occ. ii. 965 = M. speciosa.

BONPLANDIA, Cav. in Anal. Hist. Nat. ii. (1800) 131. t. 20. *POLEMONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 824.
CALDASIA, Willd. Hort. Berol. t 71 (1807).
geminiflora, *Cav. 1. c.* 132.—Mexic

BOKPLANDIA, Willd. in Mém. Acad. BerL (1802) 24-Oallpea, Anbl. (Rotac).
Angostura, Rich, in Mém. Math.-Phys. In*. Par. (1811) 82.1.10 = G. Cusparia.
Candolleana, Spreng. Syst. i. 781 - G. Candolleana.
cuneifolia, Spreng. T. c - G. cuneifolia.
Erythrochiton, Sprang. 1. c. 780 » G. pentandra.
Fontanesiana, Spreng. 1. c. = G. Fontanesiana.
heterophyUa, Spreng. 1. c. = G. heteropbylla.
Lasiostemon, Spreng. 1. c. =• G. Lasiostemon.
pentagyna, Spreng. 1. e. = G. pentagyna.
resinosa, Spreng. I. c. = G. resinosa.
trifoliata, Willd. in Mem. Acad. Berl. (1802) 85 = G. Cusparia.

BONTIA, Linn, in Loefl. Iter, 19S (1768) = Ayleennia, Linn. (Verbenac).
germinans, Linn. Sp. PI. ed. IL 891=A. officinalis.

BONTIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *MYOPORINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1126.
dapknifolia, Salisb. Prod. 109=seq.
daphnoides, *Linn. St. PI.* 688.—Ind. occ
minor, Gaertn. f. Fmct iii 169. t 212. £ 8 = daphnoides.

BONYT7N1A, Schomb. Reise, iii. 1082, nomen; Prog, in Mart FI. Bras. vi. I. 267. t. 72 (1868). *LOGANIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 796.
antoniaefolia, *Prog, in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 288.—Bras,
snperba, *Schomb. Reise,* iii 1082.—Guiana.

BOOPHONE, Herb. App. 18 (1821) - Buphane, Herb. (Amaryll.).

BOOPI8, Joss, in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 350. t. 58. *CALYCEREAE,* Benth. & Hook. f. ii. 161.
ACARPHA, Griseb. in Goett. Abh. vi. (1858-65) 126.
CHIONOPHILA, Mien, ex Iindl. Veg. Kingd. 701 (1847).
GAMOCARPHA, DC. Prod. v. 2 (1886).
NASTANTHUS, Mien, ex Lindi Vee. Kingd. 701 (1847), nomen; et in Ann. & Mag. Nat. Hist Ser. III. vi. (1860) 185.
acaulis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1861) 49.—Chili
alpina, *Poepp. ex Less, in Linnaea,* vi (1831) 258.—Chili,
anthemoides, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ii. (1803) 360.—Reg. Argent,
arancana, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 786.—Chili,
australis, *Decne. Voy. PSleSud Bot.* ii. 87.1.18, B.—Reg. Magell.
balsamitaefolia, Jnss. in Ann. Mas. Par. ii (1803) 360-Calycera balsamitaefolia.
bellidifolia, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 786.—Chili.
bnplenroides, C. *A. Muell. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 366.—Bras.

BOOPI8 :-
caespitosa, *Phil. Fl. Atac,* 26.—Chili.
compacta, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 709.—Chili,
crassifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 321.—Patagon.
Diad, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 106.—Chili.
Gayana, *Phil. I. c.* xxviii. (1856) 709.—Chili.
gracilis, Phil. 1. c 707-leucanthema.
graminea, *Phil. I. c*—Chili,
laciniata, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxt. (1884) 220.—Patagon.
leucanthema, *Poepp. ex Less, in Linnaea,* vi. (1831) 259.—Chili,
molticaolis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 706.—Chili,
pozoaeformis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 736.—Chili,
pusilla, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 105.—Chili,
rigidula, *Miers, in An*. V Mag. Nat. Hist.* Ser. III. vi. (I860) 284.—Patag.
sanjuanina, *Hieron. in Bol. Acad. Not. Cordova,* iv. (1881) 31.—Reg. Argent
scajpigera, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 250.—Chili.
spathulata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 708.—Chili.
squarrosa, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat Hist. Ser. IIL vi. (1860) 286=australis.
tribuloides, Spreng. Syst iii. 674-Acicarpha tribuloides.

BOOTHIA, Dougl. ex Benth. in Trans. Hort. Soc. Ser. II. i. (1835) 405 = Flatystemon, Benth. (Papaverac).
californica, Dougl. ex Load. Encyc PI. Suppl. i. 1214 =P. californicas.

BOOTIA, Adans. Fam. ii. 820 (1763) = Borbonia, Linn. (TiCguTniii-V

BOOTIA, Bigel. Fl. Boston, ed. II. 206 (1824)=Potentilla, linn. (Rosac).
sylvestris, Bigel. 1. c. = P. arguta.

BOOTIA, Neck. Delic Gallo-Belg. i 193 (1768) - Saponarla, linn. (CaryophylL).
glutinosa, Neck, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 41 - S. glntinosa.
ocymoides, Neck, ex Reichb. 1. c. = S. ocymoides.
Saponaria, Neck, in Act. Acad. Theod. Pal. ii. (1770) 484=S. officinalis.
vulgaris, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 193 «=S. officinalis.

BOOTROPHIS, Steud. Norn. ed. II. i. 22 (1840) - BOTROPHIS, Rafin. = ClmldfUga, Linn. (Rannnc).

BOOTTIA, Ayres, ex Baker, Fl. Manrit. 49 (1877) = PleuroBtylia, Wight *8c* Am. (Celastrac).
obovata, Ayres, ex Baker, 1. c.=P. lencocarpa.

BOOTTIA, Wall. PI. As. Rar. i 61. t 66 (1829). *HYDROCHARIDEAE,* Benth. *8c* Hook. £ iii 453.
cordata, *Wall. I. eg*—Burma.

BOPUSIA, PresI, Bot. Bemerk. 91 (1844)-QraeU»ria, Benth. (1846) (ScrophuO.
scabra, Presl, 1. c. - G. scabra.

BOQUHiA, Decne. in Comptes Rend. (1837) 394 ; et in Arch. Mas. Par. i. (1839) 188. t. 11 B. *BERBERIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 42.
discolor, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Six.* II. xii. (1889) 108.—Chili,
trifoliata, *Decne. I.* c—Chili.

BORABORA, Stead. Syn. PI. Cyp. 71 (1865)-MarlSOUS, Gaertn. (Cyperac).
cyperoidea, Stead. 1. c •= M. nwcrophyllas.

BORAEVA, Boiss. in Ann. Sc Nat Sir. H. xvii. (1842) 382-Boreava, Jaub. & Spach (Crocif.).

BORAQO, Linn. Sp. PI. i. 137 (1758). *BORAGINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 854.
BORRAGO, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
BUGLOSSITES, Moris, in Enum. Sem. Hort. Tanr. (1845).—Cf. Ann. Sc. Nat. Se>.III. v. (1846) 365.
advena, Gilib. Fl. Iithnan. Suppl. 272=officinalis.
africana. Linn. Sp. PI. 138=Trichodesma africannm.
arabica, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 281-Trichodesma Ehrenbergii.
aspera, Gilib. Fl. Lithuan. i. 25 = officinalis.
constantinopolitana, *Hill, Veg. Syst.* vii. 45.—Oriens.
cordifolia, Moench, Meth. Suppl. 275=orientalis.
crassifolia, Vent. Jaid. Cels, 100. t. 100»Caccinia glauca.
cretica, *Willd. Sp. PI. i.* 778.—Graecia.
grnina, *C. Sm. in Tuciey, Congo,* 250, nomen.—Ins. Cap. Verd.
indica, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 81=Trichodesma zeylanicum.
indica, linn. Sp. PI. 187 - Trichodesma indicnm.
inflata, Salisb. Prod. 116=orientalis.
laxiflora, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 9.—Corsica.
longifolia, *Pair. Voy. Barb.* ii. 119.—Afr. bor.
macranthera, [Soland. ipl Russell, Aleppo, ed. II. ii. 246=CacciniuRassellii
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 187.—Europ.; Afr. bor.; As. Min.
orientalis, *Linn. I. c.* 188.—As. Min.; Reg. Caucas.
spinulosa, Roxb. Hort. Beng. [13]; Fl. Ind. i. 459 = Trichodesma indicum.
verrucosa,-FoTsk. Fl. Aegypt. Arab. 41 =Tricbodesroa africanum.
Beylanica, Burm. f. Fl. Ind. 41 = Trichodesma zeylanicum.

BORA8SUS, linn. Mus. Cliff. 18 (1786). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 939.
LONTARUS, Adans. Fam. ii. 26 (1763).
aethiopium, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 221-=flabellifer
caudatum.Lom. Fl. Cochinch.760-=Wallichiacaudata.
dichotomus, *White, in J. Grah. Cat. Bomb. PI.* (1839) 226.—Ind. or.
flabellifer, *Linn. Sp. PI.* 1187.—Ind. or.
flabelliformis, Murr. Syst ed. XIII. 827 « flabellifer.
Gomutus, Lour. Fl. Cochinch. ii. 618 = Arenga saccharifera.
Ihur, Giseke, Linn. Prael. 87 = Pholidocarpus Ihur.
madagascariensis, *Boj. Hort. Maurit.* 308.—Madag.
pinnatifrons,]a.a\. Hort.Schoenb. ii. 85 — Chamaedorea gracilis.
secundiflorus, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm-*285, nomen.—Hab. t
Sonnerati, Giseke, Linn. Prael. 86 = Lodoicea sechellarum.
tunicata, Lour. FI. Cochinch. 618=Pholidocarj>us tunicalus.

BOBBO1TIA, Linn. Coroll. Gen. 12. n. 971 (1737)-*LEGUMINOSAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 475.
BOOTIA, Adans. Fam. ii. 820 (1763).
alata, Willd. Hort. Berol. i. 48=parviflora.
alpestris, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843': 461.—Afr. austr.
angustifolia, *Lam. Encyc.* i. 436.—Afr. austr.
axillaris, Lam. 1. c. 438 - Amphithalea densa.
barbata, *Lam. I. c.* 436.—Afr. austr.
Candolleana, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 168.—Afr. austr.
capitata, Poir. Encyc. Suppl. i. 680 = Priestleya capitata.
dliata, DC. Prod. ii. 120-Candolleana.
ciliata, *Willd. Sp. PI.* iii. 928.—Afr. austr.
complicata, *Benth. in Hoot. Load. Journ. Bot.* »• (1843) 462.—Afr. austr.
cordata, Andr. Bot. Rep. t 81 - Rafnia triflora.
cordata, *Linn. Sp. PI.* 707.—Afr. austr.
cordifolia, Lam. Encyc i. 486=cordata.
crenata, *Linn. Sp. PI.* 708.—Afr. austr.
crenata, Willd. ex Stead. Norn. ed. II. i. 217=" parviflora.
dedpiens, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. 16" laneeolata.
ericifolia, Linn. PI. Rar. Afr. 14 ; Amoen. Acad. vi. 1* = Amphithalea ericaefolia.
graminifolia, Lam. Encyc. i. 437 - Priestleya graminifolia.
hirsnta, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 680 = Priestleya hirsuta-*laevigata,* Linn. Mant. 100=Priestleya Thunbergii

BOBBON1A:-
Janceolata, *Linn. Sp. PI.* 707.—Afr. austr.
latifolia, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 462.—Afr. austr.
monosperma, *DC. Prod.* ii. 120.—Afr. austr.
myrtifolia, Poir. Encyc. SuppL i. 680 - Priestleya myrtifolia.
obcordata, Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 267-Tephrosia obcordata.
ovata, Andr. Bot Rep. t. 31=Rafnia triflora.
Parviflora, *Lam. Encyc.* i. 437.—Afr. anstr.
perfoliata, Lam. 1. c. = ciliata.
perfoliata, Thnnb. Prod. PI. Cap. 122 = Rafnia perfbliata.
Perforata, *EcU. (f Zeyh. Enum.* 168.—Afr. anstr.
perforata, Thunb. Prod. PI. Cap. 122=ciliata.
twigens, Mnndt, ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. u.(1848) 461 = trinervia.
ruscifolia, Sims, Bot. Mag. t. 2128=pamflora.
sencea. Lam. Encyc. i. 488-Priestleya sericea.
serrulata, Thnnb. Diss. Borbonia, 6= parviflora.
sphaerica. Lam. Encyc. i. 437 = Liparia sphaerica.
sphaerosperma, Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 267 = Keqoienia sphaerosperma.
tecta, Poir. Encyc. Snppl. i. 680=Priestleya tecta.
w « , Poir. 1. c. = Priestleya tens.
tomentosa, Linn. Sp. PI. 707= Priestleya villosa.
'"flora, And. ex Steud. Norn. ed. II. i. 217 = Rafnia triflora.
trinervia, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. 15 = lancoolata.
trinervia, Linn. Sp. PI. 707=Cliffortia ruscifolia.
tnnervia, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 122.—Afr. austr.
ttmbeUif*era*> *Pair. Encyc. Suppl.* i. 680.—Afr. austr.
"ndnlata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 122.—Afr. austr.
vesMa, Poir. Encyc. Suppl. i. 680 = Priestleya vestita.
Wlosa, *Harv. in Han. V Send. Fl. Cap.* ii. 28.—Afr. austr.
villosa, Thunb. FL Cap. 660 -Priestleya angustifolia.

BORBONIA, Plum, ex Adans. Fam. ii. 841 (1768) (Laurin.).
""olinentis, J. S. Presl, Rostl. ii. 57 = Persea carolinensis.
"tpularis, Gaertn. f. Fruct. Hi. 225. t. 222 *(~Mespilodaphne cupularis).*—**Maurit.**
'faitata, J. S. PresL Rostl. ii. 67-Nectandra exaltata.
foetens, J. S. Presl, 1. e.=Ocotea foetens.
gtobosa, Gaertn. f. Fruct. iii. 224. L 222 = Nectandra . sanguinea.
'"*<*, J. S. Presl, Rostl. ii. 57 = Persea indica.
""irttnicensis, **J. S. Presl, 1. c. (=*Oreodaphne Jacqui-*** "'«»«)—Ind. occ.
""""oranacea, J. S. Presl, 1. c-Nectandra membranacea.
P<"M>jana, Juss. ex Steud. Norn. ed. II. i. 217 (-***Mespilodaphne pretiosa).—Vetm.***

BORBOYA, Rafin. Fl. TeUur. UL 52 **(18S6).-Hyadnthus**, Toum. (Liliac.).
**PKat*a, Raft,. £ C, , H , $picatug-

^ORCKHAUSENIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. '"• * (ISOlJ-CorydaUB, Vent. (1803) (Papav.).
c,,,,0m*** Fuss, Fl. Transs. 42=C. cappoides. EM
cd.a ? Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 17=C. bulbosa.
2** Gaertn. Mey. & Scherb. 1. c. 19=C. lutea.
wh.f leuc Fuss - Fl. Transs. 42=C. ochioleuca.
solida, Gaertn. M ey. & Scherb. Fl. Wett. i. 1 8 C.
Halleri.

^RCKHAUSENIA, Roth, Catalecta, fast ii. 56 (1800)

BORDEREA, Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (.1866) a74=Diosoorea, Linn.
Pyrenaica, Miégev. 1. c - D . pyrenaica.

BORE A, Zipp. ex Mackl. in Bijdr. Nat. Wet. v. (1830) * « , nomen (absque descr.).

BOREA
BovV-1?653811- Gen- Comm- 221 (1886-42), sphalm.=
Decne. L n en b org n, u h m. (S cro phul.).

BOHEAVA, Jaub. *tc* Spach, Illnstr. i. 3. t. 2 (1841).
CRUCIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 95.
MARTINSIA, Godr. in Mem. Acad. Stanislas, Sér. III. [xvii.]'1858 (1854) 378.
aptera, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. L viii. 49.—As. Min.
orientalis, *Jaub. V Spach, Illustr.* i. 8.—As. Min.; Syria.

BORELLIA, Neck. Elem. i. 275, 276 (1790) = **Cordla,** Linn. (Boragin.).
aspera, Rafin. Sylva TeUur. 41=C. aspera.

BORETTA, Neck. Elem. i. 212 (1790)=Dabo&sia, D. Don (Ericac).

BORISSA, Rafin. ex Steud. Norn. ed. II. i. 217 (1840) - Xiysimachia, Linn. (Pximulac).
Linumstellatum, Rafin. ex Steud. 1. c.=L. Linumstellatum.

BORITH, Adans. Fam. ii. 262 **(1768)=Anabaalfl,** Linn. (Chenopod.).

BORKHAUSIA, Nntt. Gen. Am. ii. 125 (1818) = BARKHAUSIA, Moench=Crepi8, Linn. (Compos.).

BOBONELIiA, Baill. Adansonia, x. (1872) 802. ***RUTACEAE.***
Pancheri, *Baill. I. c.* 80S.—N. Caled.

BOBONIA, Sm. Tracts, 288 (1798) ; et in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 285. t 5-7. *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 291.
CYANOTHAMNUS, Lindl. Swan River Bot 18 (1839).
affinis, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 311.—Austral,
alata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 288.— Austral,
albiflora, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 817.— Austral,
algida, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 100.—Austral,
alulata, *Soland. ex Benth. Fl. Austral,* i 313.— Austral,
anemonifolia, *A. Cunn. in Field, New South Wales,* 880.—Austral.
anemonifolia, Pant. Mag. Bot. ix. 128 = Fra5eri.
anethifolia, A. Cunn. ex Endl. in Enum. PI. Hueg. 16 = anemonifolia.
arborescens, F. Muell. Fragm. i. 100=Zieria Smithii.
artemisiaefolia, *F. Muell. 1. c.* 66.—Austral.
artemisioides, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 196 = praec.
baeckeacea, *F. Muell. Fragm.* iv. 28.—Austral.
Barkeriana, *F. Muell. I. c.* xi. 96.—Anstral.
bicolor, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 168=tetrandra.
bipinnata, Lindl. in Mitch. Joum. Trop. Austr. 225 = anemonifolia.
Bowmani, *F. Muell. Fragm.* iv. 135.—Austral.
brachyphylla, F. Muell. I. c. i. 99 =oxyantha.
Bussellíana, *F. Muell. 1. c.* ix. 113.—Austral,
caerulescens, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i.* (1856) 11.—Austral,
calophylla, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 160.—Austral.
Candollii, G. Don, Gen. Syst. i. 798=alata.
capitata, *Benth. Fl. Austral,* i. 323.—Austral.
chironiifolia, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 1*7 = denticnlata.
citriodora, Gunn, ex Hook. f. Fl. Tasm. i. 68 = pinnata.
clavellifolia, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 12=inomata.
colorata, Lehm. PI. Preiss. ii. 226=viminea.
crasafolia, *Bartl. in Lehm. I. c.* i. 169.—Austral,
crassipes, *Bartl. I. c.* 168.—Austral,
crenulata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 284.—Austral.
cymosa, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 16.—Austral,
defoliata, *F. Muell. Fragm.* ix. 113.-Austral,
denticulata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 284.—Austral.
dentigera, F. MuelL in Trans. **Inst.** Viet. i. (1855) 82 •= anemonifolia.
dichotoma, lindl. Bot. Reg. **(1841)** sub t 47-spathulata.

BOBOM1A:-
Drummondii, Planch, in Fl. des Series, Sir. L ix. (1858-64) 65. t. 881 = pulchella.
Edwardsii, *Benth. Fl. Austral,* i. 312.—Austral,
elatior, *Bartl. in Lehm. PI. Preiss.* i. 170.—Austral,
eriantha, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austr.* 298.— Austral.
ericifolia, *Benth. Fl. Austral,* i. 813.—Austral,
falcifolia, *A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.* (1841) sub t. 47.—Austral.
fasciculi/olio, F. Muell. Fragm. i. 99=thymifolia.
fastigiata, *Bartl. in Lehm. PL PreissA.* 168.—Austral,
filicifolia, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* i. 311.— Austral.
filifolia, *F. Muell. Fragm.* i. 8.—Austral.
flexuosa, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 166=spathulata.
fioribunda, Sieber, ex Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 148 =pinnata.
Fraseri, *Hook. Bot. Mag.* t. 4052.—Austral,
gracilipes, *F. Muell. Fragm.* ii. 99.—Austral,
grandisepala, *F. Muell. 1. c.* i. 66.—Austral.
granulate, F. Muell. 1. c. 101 = Zieria granulata.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. i. 68. t. 10 = pinnata.
heterophylla, *F. Muell. Fragm.* ii. 98.—Austral.
hirsuta, F. Muell. 1. c. i. 101=Zieria pilosa.
humilis, Turcz. in BuU. Soc. Nat Mosc. xxv. (1852) II. 160=crassifolia.
hyperici/olia, Regel, Gartenfl. (1857) 152=fastigiata.
hyssopifolia, Sieber, in Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 148 = polygalifolia.
inconspicua, *Benth. Fl. Austral,* i. 313.—Austral,
inoinata, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 164.—Austral.
juncea, *Bartl. in Lehm. PI. Preiss.* i. 166.—Austral.
laevigata, F. Muell. Fragm. i. 101-Zieria laevigata.
Ianceolata, *F. Muell. I. c.* 66.—Austral.
lanifiora, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 165-juncea.
lanuginosa, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 16.—Austral,
ledifolia, *J. Gay, in Mem. Mus. Par.* vii. (1821) 460, in nota.—Austral.
ledophylla, F. Muell. Fragm. i. 67 = ledifolia.
lepidota, *Turcz. in Bull. Soc. Nai. Mosc.* xxxvl (1863) I. 596.—Austral.
leptophylla, Turcz. 1. c. xxv. (1852) II. 164 = inornata.
Machardiana, *F. Muell. Fragm.* ix. 115.—Austral.
macro, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 167=spathulata.
megastigma, *Nees, ex Bartl. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 227.—Austral,
microphylla, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 148.—Austral.
minutiflora, ¥. Muell. Fragm. i. 100=Zieria obcordata.
mollis, *A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.* (1841) sub t. 47. —Austral.
multicaulis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 161 = crassifolia1
nana. Hook. Ic. PI. t. 270=polygalifolia.
nematophylla, *F. Muell. Fragm.* ii. 100.—Austral,
ovata, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) snb t. 47.—Austral,
oxyantha, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 165.—Austral.
paleifMa, A. Cunn. in Enum. PI. Hueg. 16 - falcifolia.
paradoxa, DC. Prod. i. 722 = ledifolia.
parviflora, 5m. *Tracts,* 295. t. 6. —Austral,
penicillata, *Benth. Fl. Austral,* i. 322.—Austral.
pilonema, Labill. Nov. Holl. PI. i. 98.1.126 = parviflora.
pilosa, *Labill. 1. c.* 97.1.124.—Austral,
pinnata, *Sm. Tracts',* 290.—Austral,
platyrrhachis, *F. Muell. Fragm.* vii. 87.—Austral,
polygalifolia, *Sm. Tracts,* 297. t. 7.—Austral.
psoraleoides, DC. Prod. i. 721= elatior.
pteropoda, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 595.—Austral.
pubescens, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 227•lanuginosa I
pulchella, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 162.—Austral.
ramosa, *Benth. Fl. Austral,* i. 320.—Austral,
rhomboidea, *Hook. Ic. PI.* t 722.—Austral.
Rinzii, *Hueg. ex Heynh. Nom.* ii. 73, nomen.—Austral.
rosmarinifolia, A. Cunn. ex Endl. in Enum. PI. Huec 16=ledifolia.
rubiginosa, A. Cunn. ex Endl. 1. c.« ledifolia.
salicifolia, *A. Cunn.'ex Heynh. Nom.* ii. 73, nomen.—Austral
scabra, *Lindl. Swan River App.* 76.—Austral.
semifertilis, F. Muell. Fragm. ii. 98 = elatior.
serrulata, *Sm. Tracts,* 292. t. 5.—Austral.

BOHONIA:—
spathulata, *Lindl. Swan River App.* 73.—Austral,
spinescens, *Benth. Fl. Austral,* i. 819.-Austral.
stricta, Bartl. in Lchm. PI. Preiss. i. 169 - lanuginosa.
subcaerulea, F. Muell. Fragm. ii. 100=raraosa.
subsessilis, *Benth. Fl. Austral,* i. 322.—Austral.
tenuifolia, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 168 = viminea.
tenuis, *Benth. Ft. Austral,* i. 220.—Austral.
teretifolia, Lindl. Swan River App. 76=cymota.
ternata, *Endl. Nov. Stirp. Dec.* 6.—Austral.
tttrandra, Hook. Joom. Bot. ii. (1840) 419 ^pinnata.
tetrandra, *Labill. Nov. Holl. PL i.* 98.1125.—Austral.
tetrandra, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-61) 35. t. 8 = pulchella.
tetrathecoides, DC. Prod. i. 723=polygalifolia.
thymifolia, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 166.—Austral.
triphylla, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 148 = ledifolia.
tristis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. zxv. (1852) 11. 162 = megastigma.
variatilis, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 256 = anemonifolia.
veronicea, F. Muell. in Trans. Phil. Soc Viet i. (1855) 11 = Zieria veronicea.
viminea, *Lindl. Swan River App.* 74.—Austral.

BORRAG1NOIDES, Moench, Meth. 516 (1794) = Trichodeama, K. Br. (Boragin.).
aculeata, Moench, 1. c. 516 = T. africanum.
sagittata, Moench, 1. c. = T. indicum.

BORRAGO, Tonm. ex Linn. Syst. ed. I (1736) = Borago, Linn.

BORRERA, Spreng. Gen. i. 93 (1830) = BORRERIA, G. F. W. Mey. = Spermacoce, Linn. (Rubiac.).

BORRERIA, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 79. t. 1 (1818) = 8permaeoce, Linn. (Rubiac).
adscendens, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 340=S. adscendens.
advena, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 46 = Diodia verticillata i
affinis, DC. Prod. iv. 646 = S. diffusa.
alata, DC. 1. c. 544 = S. alata.
alternans, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist Nat. x. (1881) 283.—Porto Rico.
angustifolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 330.—Bras.
anthospermoides, DC. Prod. iv. 550.—Am. anstr.
aralioides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) *339-*umbellata*.*
aretioides, Griseb. Cat PI. Cub. 286.—Cuba.
argentea, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 216.—Bras.
arida, DC. Prod. iv. 549.—Porto-Rico.
asclepiadea. Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 320=S. Poaya.
atpera, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 180-S. aspera.
asperula, DC. Prod. iv. 643=Diodia rigidal
assurgens, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 156 = Diodia dasycephala.
aturensis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 345 = S. aturensis.
Bartlingiana, DC. Prod. iv. 644=S. latifolia.
basalis, Anderss. Om Galap.-Oarnes Vegetat. 191.—Ins. Galapag.
brachystemonoides, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 314.—Bras.
capitata, DC. Prod. iv. 645 = S. capitata.
capitellata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 819 = S. laevis.
centranthoides, Cham. & Schlecht. 1. c. 327.—Bras.
commutata, Spreng. Syst. i. 404 =S. verticillata.
toriacea, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 339 = S. teneUa.
comi/olia, DC. Prod. iv. 646 - S. capitata.
corymbosa, DC. 1. c. 650 = S. corymbosa.
crassifolia, C. A. Mey. ex Heynh. Nom. ii. 74, nomen. —Am. austr.
cupularis, DC. Prod. iv. 543 - S. pusilla.
cymosa, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 323 »S. cymosa.
densifiora, DC. Prod. iv. 642 =S. longifolia, *L'Hrrit.*
dichotoma, Cham. & Schlecht in Linnaea, iii. (1828) 340 = Diodia glabra.
diffusa, DC. Prod. iv. 546-S. diffusa.

BORRERIA:—
discolor, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 199 = Spermacoce semierecta.
discolor, DC. Prod. iv. 646.—Ins. Philipp.
dispersa, Hook. f. in Trans, Linn. Soc. xx. (1869) 217. —Ins. Galapag.
distans, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 340 - S. distans.
dmaricata. Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1859) 219.—Ins. Galapag.
domingensis, Griseb. Cat PI. Cub. 141 = S. ocymoides.
dubia, Cham, in Linnaea, ix. (1834) *216=Valerianoides.*
elongata, DC. Prod. iv. 547 «S. capitata.
equisetoides, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 338.—Bras.
ericae/olia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1859) 218.—Ins. Galapag.
ericoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 326 - S. corymbosa.
eritrichoides, Griseb. Cat. PI. Cub. 142.—Cuba.
eryngioides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 316-S. diffusa.
eupatorioides, Cham. & Schlecht. 1. c. 327.—Bras.
falcifolia. Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1869) 219. —Ins. Galapag.
ferruginea, DC. Prod. iv. 547 - S. ctpitata.
ferruginea, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. *Sir.* I. xi. I. (1844) 128-Mitracarpum villosum.
flavescetts, DC. Prod. iv. 548=S. Poaya.
Fockeana, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 299 = S. latifolia.
globularioides, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 312=S. verticillata.
gradlis, Miq. ex Hook. f. Fl. Biit. Ind. iii. 200 . S. stricta.
gradlis, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 840=S. tenella.
gracillima, DC. Prod. iv. 643 = S. gracillima.
graminifolia, Mart *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 129 = S. verticillata.
gymnocephala, DC. Prod. iv. 549.—Bras.
Haenkeana, DC. 1. c 547 - S. teneUa.
hebecarpa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 847-S. stricta.
humifusa, Mart, in Flora, xxiv. (1641) Beibl. II. 68.—Bras.
Kleinii, Walp. Rep. ii. 464 - S. stricta.
kohautiana, Cham. *Sc* Schlecht in Linnaea, iii. (1828) 311=S. verticillata.
laevigata, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 130=S. laevigata.
laevis, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 231=S. laevis.
lasiocarpa, Walp. Rep. ii. 464 - S. stricta.
laxa, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 337— Bras.
linearifolia, Hook. £ in Trans. Linn. Soc xx. (1859) 217.—Ins. Galapag.
linifolia, DC. Prod. iv. 651 - S. laevis.
linoides, DC. 1. c. 548 - S. tenella.
longiseta. Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 128=S. longiseta.
lutescens, DC. Prod. iv. 547 = S. tenella.
micrantha, Ton. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 28 = S. ocymoides.
microphylla, DC. Prod. iv. 546=S. ocymoides.
minima, DC. 1. c. 642 =S. verticillata.
Neesiana, DC. 1. c. 542 - S. Neesiana.
neglecta, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 177.—Abyssin.
nervosa, DC. Prod. iv. 648 =S. Poaya.
oaxacana, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 1SO=S. verticillata.
ocymoides, DC. Prod. iv. 644=S. ocymoides.
organensis, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 111.—Bras.
malifdia, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 129 - S. ocymoides.
ovalis, Anderss. Om Galap.-Oames Vegetat. 192.—Ins. Galapag.
parvifiora, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 83. t 1 = S. ocymoides.
parvifolia, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1859) 218.—Ins. Galapag.
patula, Mart.& Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 128 >S. parvifiora.
penicillata, Miq. in Verh. Nat Wet. Haul. vii. (1851) 176-S. latifolia.

BORRERIA :—
perpusilta, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1869) 218.—Ins. Galapag.
Perrottetii, DC. Prod. iv. 548 = Spermacoce latifolia.
platyphylla, DC. 1. c. 549=S. Poaya.
Poaya, DC. L c - S. Poiya.
podocephala, DC. I. c. 642 = S. verticillata.
Pohliana, DC. 1. c. 550=*eupatorioides.*
pratensis, DC. 1. c. 648=S. Poaya.
procera, Cham, in Linnaea, ix. (1884) 593=S. tenella.
prostrata, Miq. in Verh. Nat. Wet. Haarl. vii. (1851) 177 - S. ocymoides.
psylHoides, DC. Prod. iv. 648 - S. tenella.
pterophora, Presl, Bot. Bemerk. 86.—Bras.
pumila, DC. Prod. iv. 543-S. pumila.
pusilla, DC. 1. c.=S. stricta.
radiata, DC. 1. c. 642 =S. radiata.
radicans, Griseb. Cat. PI. Cub. 142=Nodocarpaea radicans.
ramisparsa, DC. Prod. iv. 644=S. ocymoides.
remotifolia, DC. 1. c. = Mitracarpum villosum.
ripens, DC. 1. c 542 =S. ocymoides.
Roxiurghiana, Walp. Rep. ii. 284-S. stricta.
rubrostipulata, DC. Prod. iv. 546 = S. tenella.
saponariaefolia, Cham. *Sc* Schlecht. in T im»qf, iii. (1828) 825.—Bras.
saturejaefolia, Cham. *8c* Schlecht. 1. c 318 =& tenella.
scabiosoides, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c. 318.—Bras.
scabrida, DC. Prod. iv. 548 - S. latifolia.
scandens, DC. 1. c. 646 = S. scandens.
setosa. Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 131=& setosa.
Sideritis, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 201 = S. latifolia.
simplex, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 350.—Jamaica.
sphaerica, DC. Prod. iv. 547 = S. laevis.
spinosa, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 340 —S. spinosa.
squamosa, Griseb. Cat. PI. Cub. 142.—Cuba.
stricta, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 83. t 1. f-1-8 -=S. verticillata.
strictissima, DC. Prod. iv. 647 =S. tenella.
strumpfioides, Griseb. Cat. PI. Cub. 142.—Cuba.
suaveolens, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 81. t. 1=S. tenella.
suberecta, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1869) 217- —Ins. Galapag.
subulata, DC. Prod. iv. 543=Crusea subulata.
tampicana, DC. 1. c. 544, pro parte = S. laevis.
tenella, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 317 = S. tenella.
tenera, DC. Prod. iv. 543=S. tenera.
tenuis, DC. 1. c. = S. tenuis.
tenuissima, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 234 =S. tenuis&ima.
tetracocca, Thw. Enum. PI. Zeyl. 442 = Fergnsonia zeylanica.
tetraptera, Miq. in Linnaea, xvii. (1843) 70 = S. latifolia.
thymifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 860.—Ind. occ
thymocephala, Griseb. Cat PI. Cub. 142-S. verticillata.
trichantha, Miq. in Verh. Nat. Wet. Haarl. vii. (1851) 178.—Guiana.
umbellata, Spreng. Neue Entdeck. ii. 144.—Bras.
vaginata, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 340=S. laevis.
valerianoides, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c. 885.—Bras.
verbenoides, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c 831; iv. (1829) 550.-Bras.
verticillata, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 83-S. verticillata.
virgata, Cham. *8c* Schlecht in Linnaea, iii. (1828) 324 =Jj. virgata.
Wydleriana, DC. Prod. iv. 645.—Porto Rico.

BOBBJCHIA, Adans. Fam. ii. 180 (1763). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. *t.* ii. 868.
AUELMANNIA, Reichb. Consp. 110 (1828).
DIOMEDEA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1815) 17&
HEUCTA, Cass. 1. c. (1818) 167.
TRIMETRA, MOC. ex DC. Prod. vii. 262 (1838).
arborescens, *DC. Prod.* v. 489.—Am. trop. •
argentea, *DC. I. c.*—Am. trop.
demissa, *DC. I. c.*—N. Granat.
frutescens, *DC. I. c*—Am. bur.
peruviana, *DC. I.* c—Peruv.

BOBSCZOWIA, Bnnge, in Act. Hort. Petrop. v. (18/71 643. *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 68.
aralo-caspica, *Bunge, I. c*—Reg. Casp.

BORSZCZOWIA, Bnnge, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 424=praec.

BOHYA, Labill. Nov. Holl. PL i. 81. t. 107 (1804). *ULIACEAE,* Benth. & Hook.f.iii. 797.
BADMGARTENIA, Spreng. Syst. ii. 91 (1825).
DAVIESIA, Poir. Encyc. Suppl. v. 480 (1817).
Cataractae, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 48 = nitida.
graeilis, Endl. 1. c.=nitida.
lucens, Poir. Encyc. viii. 615=nitida.
niens, Stend. Nom. ed. II. i. 192-seq. mtida, *Ubill. Nov. Holl. PI.* i. 81.1.107.—Austral.
onrpoidea, Lindl. Swan River App. 67. t. 9 -nitida.
scptentrionalis, *F. Muell. Fragm.* v. 41.—Austral.
Vhaerocephala, R. Br. Prod. 286=nitida.
sublanosa, F. Muell. ex Benth. FL Austral, vii. 71 - nitida.

BORYA, Willd. Sp. PI. iv. 711 (1805)-Poreatiepa, roir. (Oleac.l.
"cuminata, Willd. 1. c.=F. acuminate.
eqssinoides, Willd. 1. c. = F. cassinoides.
dtstichophylla, Nutt. Gen. Am. ii. 232-Buckleya distichophylla.
"gustrina, Willd. 1. c. = F. ligustrina.
tutida, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. [66] nomen = F. acuminata.
otovana, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 88 - F. prinoideB.
porulosa, Willd. Sp. PI. iv. 711-F. porulosa.
pnnoides, Willd. fcnum. Hort. Berol. SuppL [66]; ex Spreng. Syst. iii. 900-¥. prinoides.
"etusa, Willd. L c. |66] = F. retusa.

BOSCA, Veil. Fl. Flum. 150-. (1826); iv. t. 11=Puni-«l*,Leandr.!(Thymel.).
upacea Veil. 1L cc-Bras.

BOSCHERIA, Carr. in Rev. Hortic. (1872) 199 = pSSCHERIA, De Vriese & Teijsm. = Ficua, Toum. (Urtic).

BOSPHIA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 257. t. 69 (1812)- *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 21S.
HETEROPYXIS, Griff. Notul. iv. 524. t 694 (1854).
•««olia, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1876) 60S. —Borneo,
"celsa, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* 268. t. 69.—onmatra.
^iflora, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 0U2—Borneo,
^nffithii, *Mast. 1. c.* 608.—Malaya.

BOSCHNIAKIA, C. A. Mey. (Bong. Veg. Sitka, 41) '".Mem. Acad. P&ersb. *Sit.* VI. ii. (1888) 167. °*KOBANCHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 985.
.^ELLARA, Finch. St. Keut. in DC. Prod. xi. 39 (1847).
S'abra, *C. A. Mey. ex Bong, in Mem. Acad. Pitersb.*
,.5er. VI. ii. (igJ3) i57._Sibir.; Japon.; Am. bor.
mmalaica, *Hook./. V Thorns, in Fl. Brit. Ind.* iv. 827.
p-Reg. Himal.
«ookeri, *Walp. Rep.* iii. 479.—Am. bor. occ
Strobila
Calif. 08»1 A, Gray»» p<uif, Rail, Kef iv» 118-~

BOSCIA, Lam. Illustr. t. 895 (1804?). *CAPPARLDAE,* Benth. & Hook. f. i. 108.
JODORIA, Pers. Syn. ii. 5 (1807).
angust f ol, Han. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. Add. 19 =Niebnhria angustifolia.
"gotfifolia, *A. Kick, in Guilt. V Perr. Tent. Fl.* J>"i<y. i. 26.—Afr. trop.
ca^ *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 8.—Afr.
•"?.••*?***• *in SitMb. Math-Phys. Acad. Muenclh* xiv. „ i 188*] 62, in nota.—Afr. trop.
Wegnfolia, Brunn. in Flora, xxiii. (1840) II. Beibl.82
aiiguslifo|ia.
"tarmedia, HochsL ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. *7«anustifolia.
crophyHsi, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* L 98.—Afr. auitr.
^ th bicensil, *W«c4, in Peters, Reise Mossamb. Bet,* 1J4.—Afr. trop.

BO8CIA:-
octandra, Fenzl, ex Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Maench. xiv. [1884] 62-firma.
octandra, *Hochst. ex Radlk. I. e.*—Afr. trop.
reticulata, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 28. —Abyss.
salicifolia, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 98.—Afr. trop.
senegalensis, Hochst. ex Walp. Ann. iii. 824=angustifolia.
senegalensis, *Lam. Illustr.* t. 395.—Afr. trop.
nrens, *Welw.in Oliver, Fl. Trop.Afr.* i. 98.—Afr. trop.

BOSCIA, Thanh. Prod. PI. Cap. 82 (1794)=Toddalia, Juss. (Rutac).
undulata, Thunb. 1. C.-T. lanceolata.

BOSEA, Linn. Coroll. 5 (1737); [Bosia, Hort. Cliff. 84 (1737).] *AMARANTACEAE,* Benth. *8c* Hook. *t.* iii. 26.
RODKTIA, Moq. in DC. Prod. xiii. n. 323 (1849).
Amherstiana, *Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 716.—Reg. Himal.
cannabina, *Lour. Fl. Cochinch. i.* 176.—Cochinch.
cypria, *Boiss. ex Hook.f.Fl. Brit. Ind.* iv. 716, in nota. —Cyprus.
humilis, Salisb. Prod. 154=B. Yervamora.
trinervia, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. ii. 87 - Celtis Wightii.
Yervamora, *Linn. Sp-Pl.* 225.—Ins. Canar.

BOSISTOA, F. Mnell. ex Benth. Fl. Austral, i. 358 (1863). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 990.
euodifonnis, *F. Muell. Fragm.* ix. 174.—Austral.
pentacocca, Baill.Hist. PI. iv. 470-sapindiformis.
sapindiformis, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 859. —Austral.

BO8QTJTBA, Thon. ex Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 388.1.10. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 370.
Boiviniana, *Cord, ex Baill. I. c.* iii. (1862-63) 340. —Madag.
gymnandra, *Baker, Fl. Maurit.* 288.—Ins. Mascar.
Phoberos, *Baill. Adansonia,* viii. (1867) 72.—Afr. trop.
Thonarsiana, *Cord, ex Baill. I. c.* iii. (1862-63) 889.— Madag.

BOSSCHERIA, De Vriese & Teijsm. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxiii. (1861) 213 = Fioufl, Toum. (Urtic.).
Minahassae, De Vriese & Teijsm. 1. c. 214 = F. Minahassae.

BO88IAEA, Vent. Jard. Ceb, i. 7.17 (1800). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 47.8.
LALAGE, Lindl. Bot. Reg. 1.1722 (1884).
SCOTTEA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. IL iv. 269 (1812).
aculeate, *F. Muell. Fragm.* ii. 120.—Austral.
Aquifolium, *Benth. Fl. Austral,* ii 157.—Austral.
Armitii, *F~ Muell. Fragm.* ix. 44.—Anstral.
biloba, *Benth. in Enum. PL Hueg.* 86.—Austral,
bracteosa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 166.— Austral.
Brownei, *Benth. 1. c.* 168.—Austral,
buxifolia, *A. Cunn. in field, N. S. Wales,* 848.— Austral.
calycina, *Benth. Fl. Austral,* ii. 159.—Austral,
carinalis, *Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austr.* 290. —Austral,
cinerea, *R. Br. in Ait. Hort. Xew.* ed. II. iv. 266.— Anstral.
cocdnea, Bonpl. Jard. Malm. 128^t.52-cinerea.
concinna, *Benth. FL Austral.ii.* 161.—Austral.
cordifolia. Sweet, Fl. Austral.t. 20-cinerea.
cordigera, *Benth. ex Hook.f. Fl. Tasm.* i. 95.1.16.— Austral.
decumbens, F. Muell. Fragm. i. 9-buxifolia.
dentata, *Benth. Fl. AustralA\.* 156.—Austral,
disticha, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 38.—Austral.
distichoclada, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (l»55)39=foliosa.
divaricata, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 285.—Austral,
egena, *F. Muell. in Hook. Kern Journ. vtii.* (185C) 43. —Austral.
Endlicheri, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 83.— Austral.
ensata, Hook. *I* Fl. Tasman. 1. 94=riparia.

BOSSIAEA-
ensata, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 81—rufa.
ensaU, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 117.—Austral,
eriocarpa, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* SO.—Austral,
foliosa, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 347.— Austral.
Gilbertii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 286=eriocarpa.
Hendersoni, *Hort. ex Regel, Gartenft.* (1866) 322. —Austral.
hcterophylla, *Vent. ford. Cels,* t. 7.—Austral.
humilis, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 85 = prostrata.
kiamensis, *Benth. Fl. Austral,* ii. 158.—Austral.
lalagoides, F. Muell. Fragm. iv. 12—divaricata.
lanceolata, Sims, Bot. Mag. t. 1144=hetwophylla.
lenticularis, Lodd. Bot. Cab. t. 1238=rhombifolia.
lenticularis, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 117.—Austral.
linnaeoides, G. Don, Gen. Syst. ii. 129-prostrata.
linophylla, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 268.— Austral,
microphylla, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ix. (180B> 808. —Anstral.
neo-anglica, *F. Muell. Fragm.* v. 106.—Austral.
nervosa, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 31 = eriocarpa.
Nummularia, Endl. Nov. Stirp. Dec. 27.-piostrata.
oniata, *Benth. Fl. Austral,* ii. 158.—Austral.
ovalifolia, Endl. Nov. Stirp. Dec. 26—eriocarpa.
ovata, G. Don, Gen. Syst. ii. 128=heierophylla.
ovata, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 303 - prostrata.
oxyclada, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 284 = rufa.
paucifolia, Benth. ex Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 53 =rufa.
peduncularis, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 287.—Austral,
phylloclada, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. 1.1869) 52.—Austral.
Ereisiii, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 82.—Anstral.
prostrate, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 268.— Austral,
pulchella, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i.* 84.— Austral.
rhombifolia, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 117.—AnstraL
rigida, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 285=Preissii.
riparia, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 166.— Austral,
rosmarinifolia, *Lindl. in Mitch. Three Exped.* ii. 178. —Austral.
Rossii, F. Muell. Fragm. UL 94, 168 - Templetonia snlcata.
rotundifolia, DC. Prod. ii. 117-rhombifolia.
rufa, *R. Br. in Ait. Hort. Ken.* ed. II. iv. 268.— Austral.
rufa, Maund, Botanist, t. 81-ensata.
rupicola, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 162.— Austral,
acolopendria, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ix. (1808) SOS. —Austral.
Scortechinii, *F. Muell. Census,* 140, nomen.—Austral.
spinescens, Meissn. in Lehm. PK.Preiss. i. 82=rufa.
stenophylla, *F. Muell. Fragm.* i. 9.—Austral,
strigftlosa, *Benth. Fl. Austral,* ii. 157.—AustraL
snlcata, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 8L—Austral.
tenuicaulis, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Jonrn. xxix. (July 1840) 171-cinerea.
virgata, Hook. Bot. Mag. t< 8986*. rufa.
Walkeri, *F. Muell. Fragm.* ii. 120.—Austral.
Webbii, *F. Muell. in Melb. Chem. et Drug.* (Dec. 1882).—Austral.

BOSSIENA, Pen. Syn. U. 286 (1807) = Bouiaea, Vent. (Legum.).

BOSTB.YCHA1TTHEBA, Benth. in Brath. ft Hook. f. Gen. ii. 1216 (1876). *LABI ATAE,* Benth. & Hook. f. 1. c
deflexa, *Benth. t. c*—China.

BOBWXIiLIA,R(»b.exColebr.in As. Res. ix. (1807) 879; PI. Corom. iii. 4. t. 207 (181'J). *BURSERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 822.
LIBANUS, Colebr. in As. Res. ix. 382, in note (1807), t. 5. f. 1.
PLOESSLIA, Endl. Nov. Stirp. Dec. 39 (1839).

BOSWELLIA :—
Ameero, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 505.—Ins. Socotra.
balsavtifera, Spreng. Syst. ii. 318-gIabra.
Bhaw-Dajiana, *Birdw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1870) 144. t. 31.—Afr. trap.
Carterii, *Birdw. I. c.* 143.—Arabia,
elongata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 506.—Ins. Socotra.
Frereana, *Birdw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1870) 146. t 81.- Afr. trop.
glabra, Roxb. Hort. Beng. 90; Fl. Ind. ii 384 = semta.
hirsuta, Sm. in Rees, Cycle, xxxix. n. 2=Canarium hirsntum.
iniegra, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 242=Bnrsera javanica.
javanica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 612.—Java,
neglecta, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xv. (1877) 67. t. 185.—Afr. trop.
papyrifera, *Hochst. in Flora,* xxvi. (1843) 81.—Abyss.
sacra, Flueck. Lehrb. Pbarmak. (1867) 81»Carterii.
serrate, *Roxb. ex Colebr. in As. Pes.* ix. (1807) 379. t 6.—Ind. or.
socotrana, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 605.—Ins. Socotra.
thurifera, Roxb. ex Flem. \a As. Res. xi. (1810) 168 = serrata.

BOTELUA, Lag. in Varied. Cienc ii. IV. (1805) 184 = Bouteloua, Lag. (Gramin.).

BOTHERBE, Steud. ex Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 662 = Calydorea, Herb. (Irid.).
bulbosa, Steud. ex Klatt, 1. c - C . speciosa.
campestris, Klatt, 1. c. 563 - C . campestris.
gradlis, Klatt, 1. c. 665=C. nuda.
longispatha, Klatt, 1. c. 664 = Sphenostigma longi-spatha.
luteola, Klatt, 1. c. 563=C. luteola.

BOTHRIOCHILUS, Lem. Jard. Flenr. iii. (1852-53) t. 325; Illustr. Hortic. iii. (1866) Misc. 30, 81 = Coelia, Undl. (Orchid.).
bellus, Lem. II. cc=C. bella.

BOTHB.IOCLINE, Oliver, ex Benth. in Hook. Ic. PL xii. 80. t. 1133 (.1873). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 226.
Schimperi, *Oliver b" Hiern, ex Benth. 1. c.*—Abyssin.

BOTHHIO8FERMUM, Bnnge, Enum^ PI. Chin. Bor. 47 (1832). *BORAGINEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 858.
asperugoides, Sieb. & Zucc in Abh. Akad. Muench. iv. in. (1846) 150~tenellom.
bicarinatum, Bunge, ex Steud. Norn. ed. IL L 219-seq.
bicaruneulatum, Fisch. ft Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. i. (1835) 28-chinense.
chinense, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 47.—China bor.
chinense, Fisch. ft Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. i. 23—Kusnetzowii.
Knsnetzowii, *Bunge, ex DC. Prod.* x. 116, com tit. falsa.—Mongolia.
marifolium, A. DC. Prod. x. 116 - Heliotropiam marifolium.
perenne, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. ii. 95 = tenellum.
fecundum, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 202.—China,
tenellnm, *Fisch. &" Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* L (1835) 24.—China bor.

BOTHB.IO8POBA, Hook. f. in Hook. Ic PL xi. 66. 1.1069 (1870). *RUBIACEAE,* Benth. ft Hook. *I.* ii. 76.
corymbosa, *Hooh.f. I. c.*—Am. anstr.

BOTOR, Adans. Fam. «. 326 (1768)-PBophocarpus, Neck. (Legumin.).

BOTRIA, LOOT. Fl. Cochlnch. 153 (1790) - Vitle, Toum. (AmpeL).
africana, Lour. L c. 154 - V. africana.

BOTROPHIS, Rafin. Med. Fl. i. 85 (1828) = Cimieifuga, Linn. (Ranunc).
actaeoides, Rafin. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 21 = C. raceraosa.
pumila, Rafin. Med. Fl. i. 86=C. racemosa?
serpentaria, Rafin. 1. c. 85==C. racemosa.

BOTRYA, Juss. in Mém. Mas. Par. iii. (1817) 444-
BOTRIA, Lour.=Vitifl, Toum. (Ampelid.).

BOTRYADENIA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 80 (18S5)-MyriaetiB, Less. (Compos.).
Cmelini, Fisch. ft Mey. 1. c - M . Gmelini.

BOTRYANTHE, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, ii. (1841) 190. t. 9-PlukeneUa, Linn. (Euphorb.).
concolor, Klotzsch, L c. 191.—Bras.
discolor, Klotzsch, 1. c.—Bras.

BOTRYANTHUS, Kunth, Enum. PI. iv. 310(1843)-Muflcari, Mill. (Liliac.).
albovirens, Tod. Nuovi Gen. 76—M. commutatum.
alpestris, Jord. ft Fourr. Ic PI. Eur. ii. 23 = M. botryoides.
atlanticus, Nym. Consp. 734 = M. racemosum.
Aucheri, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 63 = M. Aucheri.
autumnalis, Heynh. Norn. ii. 75 - M. parviflorum.
Boraeanus, Jord. ft Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 22-M. botryoides.
breviscapus, Tod. Hort. Panorm. t. 5.—Hab. ?
candidus, Jord. ft Fourr. Ic. PI. Eur. ii. 23=M. botryoides.
cemmutatus, Kunth, Enum. PI. iv. 811 = M. racexnosum.
compactus, Jord. ft Fourr. Ic PI. Eur. ii. 24 = M. botryoides.
conicus, Jord. ft Fourr. 1. c.=M. botryoides.
dilutus, Elves, ex Baker, in Card. Chron. (1878) I. 708 = M. dilutum.
festinus, Jord. ft Fourr. Ic. PI. Eur. ii. 23 = M. botryoides.
Cussonei, Tod. Ind. Sem. Panorm. (1872) 38 ; Nuov. Giom. Bot. v. (1873) 167 = M. Gussonii.
Heldreichii, Jord. ft Fourr. Ic PI. Eur. ii. 24= M. Heldreichii.
Kerneri, Marches.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 389-M. botryoides.
Lelievrii, Jord. & Fourr. Ic PI. Eur. ii. 23-M. botryoides.
micranthus, Hort. Berol. ex Baker, in Gard. Chron. (1878) I. 799=M. micranthum.
Mordoanus, Nym. Consp. 784 = M. Mordoanum.
neglectus, Jord. ft Fourr. Ic. PL Eur. ii. 24=M. neglectum.
neglectus, Kunth, Enum. PI. iv. 679-M. neglectum.
odorus, Kunth, L c 811—M. racemosum.
pollens, Kunth, Enum. PL iv. 312 = M. pallens.
paradoxus, Kunth, 1. c — Hyacinthus paradoxus.
panifiorus, Kunth, 1. c. — M. parviflorum.
pulchellus, Jord. ft Fourr. Ic PL Eur. ii. 23-M. botryoides.
racemosus. Four, in Ann. Soc linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160-M. racemosum.
Sortorii, Tod. Hort. Panorm. t. 5 — M. racemosum.
Sauli, Jaub. ft Spach, Illustr. iv. 44-M. moschatum.
speciosus, Marches.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 339 - M. neglectum.
stereophyllus, Herbich, Stirp. Rar. Bucov. 30 (1865) 182 * Hyacinthus leucophaeus.
Strangwaysii, Kunth, Enum. PL iv. 679 - M. racemosum.
Smom'tsianus, Hort. Bonn, ex Baker, in Gard. Chron. (1878) I. 799-M. Szovitsianum.
vulgaris, Kunth, Enum. PL iv. 811 = M. botryoides.

BOTRYCARPUM, A. Rich. Bot. MM. ii. 487 (1828), in adnot. = Bibes, Linn. (Saxifrag.).
nigrum, A. Rich. 1. c. 490=R. nigrum.

BOTBYCEBAS, Willd. in Ges.Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 396. *ANACARDIACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 426.
DAPHNITIS, Spreng. Syst. i. 870 (1826).
LAUROPHILLUS, Roem. & Sennit. Syst. iii. 80(1818).
LAUROPHYLLUS, Thunb. Nov. Gen. vi. 104 (1792), nomen prius.
Unrinnm, *Willd. 1. c.* 397.—Afr. anstr.

BOTRYCOMUS, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160 = Musoari, MilL (Liliac).
vulgaris, Fourr. 1. c. = M. comosum.

BOTRYDIUM, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 298 (1886) «• Chenopodium, Linn.
aromaticum, Spach, 1. c. 299 - C . Botrys.
Sckraderi, Spach, 1. c—C. foetidnm.

BOTB.YUORTJ8, Miq. Fl. Ind. Bat. i. n. 282 (1859). *ARTOCARPEAE.*
paniculate, *Miq. I. c.* 283.—Malaya.

BOTRYODENDRUM, Endl. Prod. FL Norf. 62 (1883) =Moryto, Font. (Araluc).
angustifolium, Endl. 1. c - M . angustifolia.
capitatum, Endl. ex Heynh. Norn. ii. 75—Oreopanax capitatum.
coriaceum, Panch. ex Baill. Adansonia, xii. (1878) 158—M. coriacea.
latifolium, Endl. Prod. Fl. Norf. 62 - M . latifolia.
macrophyllum, Rich, ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 782. t. 97 = M. macrophyUa.
Sinclairii, Hook. f. Fl. N. Zel. 97 - M . Sinclairii.
taitense, GuilL in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 349.—Ins. Tahiti.

BOTRYOLOTUS, Jaub. ft Spach, Illustr. i. 124. t. 63 - Trigonella, Linn. (Legumin.).
cachemyrianus, Jaub. ft Spach, 1. c. 125=T. Emodi.
persiciis, Jaub. ft Spach, 1. c. 124. t. 63 - T . elliptica.

BOTRYOPANAX, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 5 (1863-64) - Polysclaa, Forst. (Araliac).
borbonica, Miq. 1. c.—Ins. Borbon.

BOTRYOPSIS, Miers, in Ann. Nat. ft Mag. Hist. Ser. II. vii. 48 (1851) = Chondodendron, Ruiz & Pav. (Menisperm.).
platyphylla, Miers, 1. c.=C. platyphyllum.
Spruceana, Eichl. in Flora, xlvii. (1864) 894 «=C. cretosum.

BOTRYOROPIS, Presl, Epim. Bot. 220 (1849) - Barllngtonla, Forst. (Myrtac).
luBonensis, Presl, 1. c.=B. luzonensis.

BOTRYOSICYOS, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 3=Dioscorea, Linn.
pentaphyllum, Hochst. 1. c - D . pentaphylla.

BOTRYPHILE, Salisb. Gen. PL Fragm. 25 (1866) = Kusoari, MilL (Liliac).
botryoides, Salisb. L c.=M. botryoides.
pamiflorus, Salisb. 1. c = M. parviflorum.
racemosus, Salisb. 1. c — M. racemosum.

BOTRYS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 138=Teuerium, Linn. iLabiat.).
chamaedryoides, Fourr. 1. c =T. Botrys.

BOTTIONEA, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxvii. (1884) 43.11. *ULIACEAE,Beath.* ft HookX iii. 78a.
ENDOCOMA, Rafin. FL Tellur. ii. 67 (1836).
TRICHOPETALUM, Lindl. Bot. Keg. 1.1585 (1882).
thysanthoides, *Colla, 1. c.* 46.1.1.—Chili.

BOTJCEBOBIA, Wight ft Am. Contrib. Bot. Ind. 34 (1834). *ASCLEP1ADEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 78s).
APTERANTHES, Mikan, in Nov. Act. Nat Cur. xvii. (1885) 693. t. 41.
DESMIDOCHUS, Reichb. Consp. 130 (1828).
DESMIDORCHIS, Ehrenb. in Linnara, iv. (1829) 94.
HUTCHINIA, Wight ft An. Contrib. Bot Ind. 84 (1834).
HUTSCMINIA, D. Dietr. Syn. L 579 (1889).
Aaronis, *Hart, in Trans. Roy. Irish Acad.* xxviii-(1885) 486.—Palaestin.
acutangnla, *Decne. in DC. Prod.* viii. 648.—Afr-trop.
adscendens, WolL Cat. n. 8146, partim-Caralluina edulis.
Aucheriana, *Decne. in DC. Prod.* viii. 649.—Arabia; Persia; Ind. bor. occ.
campanulata, Wight, Ic. vi. t. 1287-umbellate,
crenulata, *Wight ff Am. Contrib. Bot. Ind.* 34.—Ind. or.

BOTJCEROSIA:—
cylindrica, *Brongn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* vii. (1860) 900.—Abyss.
Decaisniana, *Lem. Herb. Gin. Amat.* Sir. II. iv. t. 21 j ., *Decne. in DC. Prod.* viii. 648.—Afr. trop.
oiffusa, *Wight, Ic.* vi. t. 1287.—Ind. or.
**dulis*, Edgew.in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 205 = Caralluma-edulis.
Forskalii, *Decne. in DC. Prod.* viä. 648.—Arabia.
Gussoniana, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6187 in textu.—Algeria.
Hitchinia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 78, Upsn = B. HutchinU.
Hutchinia, *Deene. in DC. Prod.* viii. 649.—Ind. or.
mcamata, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) . 166.—Afr. anstr.
(oiiantha, Wight, Ic. vi. t. 1286 - crenulata.
•nammillaris, AT. £. *Br. in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1«8) 166—Afr. austr.
»aroecana, *Hoot./. Bot. Mag.* t 6187.—Marocco.
Munbyana, *Decne. ex Munby, Fl. Algir.* 28.—Algeria,
pauaflora, *Wight, in Madras Journ. Sc.* vi. (1887) t. ad p. 478—Ind. or.
9**adrangula,* Decne. in DC. Prod. viii. 664, in syn.- - Forskalii.
Russeliana, *Court, ex Brongn. in Bull. Sec. Bot. Fr.* . vu. (1860) 900.-Oriens.
^>ca, *Decne. in DC. Prod.* viii. 649.—Arabia,
socotrana, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. - (1884) 7 9 . - W Socotr.
Stocinana, Boiss. Fl. Orient, iv. 68 = Caralluma edulis.
«mbeUata, *Wight & Am. Contrib. Bot. Ind.* 84.—Ind. or.

Bo2:«HARDATIA> B^M- Adansonia, vii. (1867) 850 = JteUeope, Forst (Rutac.).
australis, BaUl. 1. c. 851.110=M. neurococca.
neurococca, Baill. 1. c. ix. (1868) 110=M. neurococca.

BOTJCHEA, Cham, in Linnaea, vii. (1882) 252. *VBRBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1144.
CHASCAHUM, E. Mey. Comm. PI. Afr. Aiatr. 275 (1885).
PLEOROSTIGMA, Hochst ex Schnid. in Flora, (1842) I. Beib. 144.
PLEXIPUS, Rafin. Fl. Tellor. ii. 104 (1886).
Mfnostachya, *Schau. in DC. Prod. xi.* 660.—Afr. trop.
a rest
glis, *Schau. 1. c.* 558.—Bras.
cerina, *Schau. I. c.* 659.—Afr. aostr.
copiapensis, C. Gu/ Fl# ChiL Vl 26> t 681=Priva laevis.
coneifolia, *Schau. in DC. Prod.* xi. 659.—Afr. anstr.
tue!jbergii, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 258.—In». s> Doming.
gare peM, *Schau. in DC. Prod.* xi. 560.—Afr. austr.
Hannington*ii, Oliver, in Hoot. Ic. PI.* t. 1446.—Afr.
nederacea, *Sand, in Linnaea,* xxiii. (1850) 86.—Afr. austr.
nyderabadensU, *Walp. Rep.* iv. 12.—Ind. or.
•ncrassata, *Lange, Ind. Sem. Haun.* (1870) 31.- Hab.
If^rens, *Schau. in DC. Prod.* xi. 657.—Bras,
tatifoha, *Han. Thes. Cap.* ii. 57.—Afr. anstr.
'taifoha, *Ai* & *sy, iH Am, Jo urn. Sc, sa, jr.* ^ (1853) 98.-N. Mexic.
•nairnbiifolia, *Schau. in DC. Prod. A* 558.—Afr. trop. j .Arab.; Scind.
Pwnattfida, *Schau. 1. c.* 560.—Afr. anstr.
P ^ ogeria *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 252.—Bras.
pterygocarpa, *Schau. in DC. Prod.* xi. 668.—Nubia.
pubescens, Schau. 1. c. 560 = pumila.
pumila, *Sehau. I.* c—Afr. austr.
"essihfolia, *Volte, in Linnaea,* xlitt. (1880-82) 529.—Afr. trop.
•Pathulata, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 126.—Am. bor. occ.

BOUCHETIA DC. ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 689 (1862). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 908.
**OCANTHBA, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 258.
r^a, *DC. ex Dun. I. c*—Texas; Mexic.
P'ocumbeiM, *DC. ex Dun. I.* c-Mexic.

BOTTEA, Meissn. Gen. 75 ; Comm. 65 (1887). *ANACARDIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 420.
CAMBESSEDEA, Wight & Am. Prod. i. 170 (1884).
angnstifolia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 204.—Borneo.
Brandisiana, Kurz, in Jonm. As. Soc. Beng. xL (1871) u. 60=burmanica.
burmanica, *Griff. PI. Cantor,* 14.—Burma; Malaya.
diversi/olia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 622=microphylla.
Gandaria, Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat i. 204 = macrophylla?
macrophylU, *Griff. PI. Cantor,* 15; *Notul.* iv. 420.—Malaya.
microphylla, *Griff. II. cc.* 16, 428.—Malaya.
myrsinoides, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 204 = microphylla ?
oppositifolia, Meissn. Gen. 75; Walp. Rep. i. 656 = burmanica.

BOTTGAINVIIiIiAEA, Comm. ex Jnss. Gen. 91 (1789) (Buginvillaea); Choisy, in DC. Prod. xiii. n. 437 (1849). *NYCTAGINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 7.
JOSEPHA, Veil. Fl. Flum. 154 (1825); iv. 1.16.
bracteata, Pers. Syn. i. 418-spectabilis.
brasiliensU, Lund, ex ChoUy, in DC. Prod. xiii. It. 487-virescens.
braaliensis, Raensch. Norn. ed. III. 112; [Nees, in] Princ. Neuw. Reise, i. 44-spectabilis.
frondosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 89.—Reg. Argent.
glabta, *Choisy, in DC. Prod.* xiii. II. 437.—Bras,
infesta, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1079) 4a—Reg. Argent.
patagonica, *Decne. in Orbign. Voy.* t. 8.—Patagon.
pemviana, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* i. 178. t. 49. —Peruv.
pemviana, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xi. (1823)89=spectabilis.
pomacea, *Choisy, in DC. Prod.* xiii. II. 488.—Bras,
praecox, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 40.—Reg. Argent.
racemosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 807 =* Pisonia excelsa.
rubicunda, Schott, ex Rohrb. in Mart. FL Bras. xiv. II. 351=glabra.
speciosa, Sdinizl. Ic. Fam. Nat t. 104-spectabilis.
spectabilis. *Willd. Sp. PI.* ii. 348.—Bras,
stipitata, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 88.—Reg. Argent,
virescens, *Choisy, in DC. Prod.* xiii. II. 437.—Bras.

BOUGAINVILLEA, Spach, Hist. *Vie.* Phan. x. 516 (1841) = Bougainvillaea, Jnss. (Nyctag.).

BOUGTTEEIA, Decne. in Ann. Sc. Nat Se>. II. v. (1886) 132. *PLANTAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1224.
nnbicola, *Decne. 1. c*—Peruv.; Boliv.

BOULARDIA, F. Schulto, Arch. Fl. Fr. et Allem. 103 (1847) = Orobanohe, Toum.
latisquama, F. Schult. 1. c 104.—Algeria.

BOUPHON, Lem. in Orb. Did ii. 686 (1842)- seq.

BOUPHONE. Lem. in Orb. Diet. ii. 778 (1842) = Buphane, Herb. (Amaryll.).

BOURGAEA, Coss. Notes Crit 89 (1849) = Cynara, Vaill. (Compos.).
humilis, Coss. 1. c. = C. humilii.
Tournefertii, Wjllk. in Linnaea, xxv. (1852) 39=C. Toumefortii.

BOUEGIA, Scop. Introd. 168 (1777). *BORAGIN.* I

BOURTOTIA, Pomel, Nonv. Mat. FL AtL 89 (1874) = Hellotroplum, Linn. (Boragin.).
Kralitii, Pomel. 1. c = H. Kialiltii.
pterocarpa, Pomel, 1. c. 90 = H. pterocarpum.

BO0BKEEIA, P. Br. Hist Jamaic 168 (1766). *BORAGINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. il. 840.
BEURRERIA, Jacq. Enum. PI. Carib. 2 (1760).
CREMATOMIA, Mien, in Ann. *Sc* Mag. Nat Hist. Ser. IV. iii. (1869) 800.

BOTJRBEHIA :—
HVMENBSTHES, Mien, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 26. t 6.
MORELOSIA, La Llav. *Sc* Lex. Nov. Veg. Descr. i. 1 (1824).
Andrieuxii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 869.—Mexic.
aspera, G. Don, Gen. Syst iv. 390=Ehretia laevis.
baccata, *Rafin. Sylva Tellur.* 42.—Hab.t
calophylla, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. & viii. (1863) 528.—Cuba,
cassinifolia, *Griseb. 1. c.*—Cuba,
cestroides, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 66.—Am. austr.
clariuscula, *Mien, in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. iii. (1869) 204.—Am. austr.
dichotoma, Rottl. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 390-= Ehretia laevis?
divaricata, *G. Don, 1. c.* 887.—Cuba,
domingensis, *Griseb. in Mem. Am. Acad:* N. S. viii, (1868) 528.—Ind. occ.
exsucca, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 14.—Am. austr.
formosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 369.—Mexic.
glabra, G. Don, Gen. Syst.iv. 390-CordU Myxa.
grandiflora, *Bertol. Fl. Guatim.* 10.—Guatemala,
havanensis, *Miers, in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. iii. (1869) 207.—Cuba.
Huanita, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* U. 370.—Mexic.
laevis, G. Don, Gen. Syst. iv. 890=Ehretia laevis.
laxa, *G. Don, I. c.*—Ins. Mascar.
linearis, *Miers, in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. iii. (1869) 210,—Ind. occ.
microphylla, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 210.—Cuba,
ovata, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. iii. (1869) 203.—Ind-occ.
punctata, G. Don, Gen. Syst iv. 890=Ehretia laevis.
Radula, *G.Don, 1. c*—Ins. S. Doming.
recurva, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. iii. (1869) 203.—Ind. occ.
reticulata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 210.—Cuba.
retusa, G. Don, Gen. Syst iv. 890=Ehretia retusa.
revoluta, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 67.—Mexic.
rigida, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. iii. (1869) 204.—Ind. occ.
setosa, G. Don, Gen. Syst. i». 390-Ehretia setosa.
spathnlata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 370.—Mexic.
spinifex, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1883) 628—Cuba.
succnlenta, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 14.—Ind. occ.
tomentosa, *G. Don, Gen.Syst.is.* 390.—Ind. occ
unifiora, G. Don, 1. c-Ehretia oniflora.
virgata, *G. Don, l.^.* 889.—Ind. occ.

BOTTSBrNGATJIiTIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 194. t. 646 (1825). *CHSNOPOD/ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 77.
TANDONIA, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 226 (1849).
baselloides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 196. t 646.—Ecuador,
cordifolia, *Tenere, Ind. Sent. Neap.* (1852) *ex Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xix. (18581 855.—Hab. I
floribunda, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 229.—N. Granat
gracilis, *Miers, in Journ. Bot.* ii. (1864) 161. t. 18.—Bras.
Lachaumei, *Carr. in Rev. Hortic.* (1872) 279.—Cuba.
leptostachys, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 229-baselloides.
ramosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 27.—Guatemala.

BOUTELOUA, Lag. in Varied. Cienc. Ii. iv. (1805) 184 (Botelua). *GRAMINEAB,* Benth. & Hook. f. iii. 1168.
ACTINOCHLOA, Willd. ex Roem. *Sc* Schult Syst. ii. 22, 417 (1818).
ARISTIDIUM, EndL Gen. 94 (1886).
ATHEROPOGON, Muhl. in Willd. Sp. PL iv. 9S7 (1806).
CHONDROSIUM, Desv. Joum. Bot. iii. (1818) 68.
CORETHRUM, Vahl, in Skr. Natnrk. Selsk. Kiobenh. vi. (1810) 85.
DINEBRA, DC. Cat. Hort. Mont. 104 (1818), pro parte.
EOTMAKA, Trin. Fund. Agrost. 161 (1820).

BOUTELOUA:—
HETEROSTECA, Detv. in Nov. Bnll. Soc. Philom. ii. (1810; 188; Desv. Jonm. Bot. iii. (1818) 68.
HETERO&TEGA, Kunth, in Mem. Mus. Par. ii. (1815) 75.
NESTLERA, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. ii. 192 (1841).
POLVODON, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 174. t. 55 (1816).
TRIAENA, H. B. *SC* K. 1. c. 178. t. 61 (1815).
TKIATHERA, Desv. ia Nov. Bull. Soc Philom. ii. (1810) 188.
TRIPLATHERA, Endl. Gen. 94 (1836).
uistidoides, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 587, in obs.—Mexk.
baibata, *Lag. Varied. Cienc.* ii. IV. (1805) 141; *Gen. et Sp. Nov.* 5.—Mexic.; Ins. Philipp.
brevifolia, Buckl. in Proa As. Sc. Philad. '1662' (1863)93 = eriopoda.
bromoides, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 5.—Mexic.
Burkei, *Scribn. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 179.-Teutf.
chrondrosurides, Benth. ex S. Wats. 1. c =ovata.
ciliata, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 302.—Reg. Argent.
curtipendula, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 153 = racemosa.
disticha, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 105. —Am. trop.
elatior, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 537.—Ind. occ.
eriopoda, *Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv.Bot.* 155.—Am. bor.
foena, Bigelow, in Whipple Exped. Add. p. ii-hirsuta.
gnuilis, Steud. Nom. ed. II. i. 219-oligostachya.
gracilis, Vasey, in Wheeler, Exped. 287=aristidoides.
Havardi, *Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 179.—Texas,
hirsuta, *Lag. Varied. Cienc.* ii. IV. (1805) 141; *Gen. et Sp. Nov.* 5.—Mexic.
hirta, Hort. Madr. ex Lag. 1. c 141=hirsnta.
Humboldtiana, Griteb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1883) 532=bromoides.
hnmilis, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iv. (1881) 495.—Reg. Argent.
juncifolia, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 5.—Mexic.; Ind. occ.
juncifolia, Vasey, Cat Gr. Un. St 62=bromoides.
litigosa, Lag. Gen. et Sp. Nov. 5-juncifolia.
lophostachya, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 302. —Reg. Argent.
melicaeformis, Hornem. ex Stend. Nom. ed. I. 91, in syn.-racemosa.
melicoides, Steud. 1. c 116 = racemosa.
multiseta, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 808.—Bias.; Reg. Argent,
nana, *Griseb. I. c.*—Reg. Argent
oligostachya, *Torr. ex A. Gray, Man.* ed. II. 653; *et in Pact/. Rail. Rep.* iv. *Bot.* 155.—Am. bor.
ovata, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 5.—Mexic.
pendula, Hort. Madr. ex Lag. in Varied. Cienc. ii. IV. (1805) 141 = racemoqa.
pilosa, *Benth. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 179.—Ins. Galap.
polystachya, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* v. 366. t 10.—Am. bor.
porphyrantha, Wright, in Sanv. Fl. Cub. 192-juncifolia.
prostrata, *Lag. in Varied. Cienc.* ii. IV. (1805) 14-1; *Gen. et Sp. Nov.* 5.—Mexic.
pumila, Bsckl. in Proc. Ac Sc Philad. < 1862* (1863) 93 = polystachya.
pnsilla, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club,* xi. (1884) 6.—N. Mexic.
racemosa, *Lag. in Varied. Cienc.* ii. IV. (1805) 141; *Gen. et Sp. Nov.* 6.—Mexic
Rothrockii, *Vasey, Grasses U. St.* 38, nomen.—Am. bor.
scorpioides, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 5; £. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 176.—Mexic.
simplex, *Lag. in Varied. Cienc.* ii. IV. (1805) 141. —Peruv.; Ins. Philipp.
tenuis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 303.—Mexic.; Reg. Argent,
texana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 196.—Texas.
Trialhera, *Benth. in Journ. Linu. Soc.* xix. (1882) 104.-Mexic.
trifida, *Thurb. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 177.—Mexic

BOUTONIA, Boj. Hort. Maurit. 282 (1837) - Mallotus, Lour. (Enphorb.).
acuminata, BailL Etud. Gén. Enphorb. 401-M. Baillonianns.
mascarensis, Boj. Hort. Manrit 282 «M. integrifolios.

BOUTONIA, DC. Rev. Bign. 18 (1838)=Poribloma, DC. (Bignon.).
cuspidata, DC. L c = P. cuspidatum.

BOUTONIA, Hort. Erfurt, ex Steud. Nom. ed. II. i. 219 (1840)=Ooodento,Sm.
pomifera, Hort. Erfurt, ex Steud. I. c=G. paniculata.

BOTTVABDIA, Sallsb. Parad. Load. t. 88 (1806).
RUBIACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 86.
AEGINETIA, Cav. Ic. vi. 51. t. 572 (1801).
BOWVARDIA, Polak. in Linnaea, xli. (1877) 666.
angustifolia, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 884.—Mexic.
bicolor, *Kun»e, in Linnaea,* xx. (1847) 24.—Mexic.
candidissimax, Hort.—Cf. Card. Chron. (1873) 714.
Cavanillesii, *DC. Prod.* iv. 366.—Mexic.
cblorantha, *Bert, ex Roem. (f Schult. Syst.* iii. *Mant.* 116.—Am. austr.
chrysantha, *Mart. Del. Sem. Hort. Monac.* (1848) 4.—Mexic
coccinea, Link, Enum. Hort. Berol. i. 139-triphylla.
coccinea, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 272.—Guiana,
cordifolia, *DC. Prod.* iv. 366.—Mexic
corymbosa, *Oerst in Kjoeb. Vidensh. Meddel.* (1862) 46.—Nicarag.
crocata, *Van Houtte, Cat.* (1846).—Hab. 1
Davisoni,*Hort.—Cf.Gard. Chron.* (1872) 7.—Hab.?
discolor, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 428-Rondeletia dubia.
ferruginea, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 273.—Madag.
flava, *Decne. in Van Houtte, Fl. des Serres,* Sér. I. i. (1845) 90. t. 38.—Mexic
glaberrima, *Engelm. in Wislit. Tour N. Mexico,* 106. —Mexic.
glabra, *Polak. in Linnaea,* xlL (1877) 565.—Costa Rica,
havanensis, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1884) 272.—Ind. occ
hirsuta, *A. Rich. I. c*—Ind. occ
hirtella, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 384.—Mexic.
Houtteana, *Schlecht. in Fl. des Serres,* Sir. I. x. (1854-55) 149.—Mexic
Humboldti, Hort.—Cf.Gard. Chron. (1873)714, 716. —Hab. I
hypoleuca, *Benth. PL Hartw.* 288.—Mexic.
Jacquini, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 385 = triphylla.
jasminiflora, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1872) 215.—Hab.)
laevis, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1844) 236.—Mexic.
leiantha, *Benth. PI. Hartw.* 85; *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. III. v. (1851) 81.—Guatemala; Mexic.
linearis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp,* iii. 388.—Mexic.
longifiora, H. B. *Sc* K. 1. c 388-Houstonia longiflora.
microphylla, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-55)112. —Mexic
mollis, *Linden, Cat.* (1848).—*Cf. Schlecht. 1. c.* 65.—Mexic
multifiora, Schult in Roem. *Sc* Schult. Syst. iii 118 = Cavanillesii.
mutabilis, Hort. Berol. ex Walp. Ann. v. 127-TCrsicolor.
myrtifolia, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1858-66) 121. —Mexic.
obovata, Benth. PI. Hartw. 16 = scabra.
obovata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 385.—Mexic
Orianax, *Pars, ex Van Houtte, Fl. des Serres,* xii. (1857) 159. t 1265.
ovata, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 67.—N. Mexic
suberula, Decne. in Fl. des Serres, Sér. I. i. (1845) 90, in descr.-flava.
quaternifiora, Steud. Nom. ed. II. i. 300, in syn.-seq.
quatemifolia, *DC. Prod.* iv. 365.—Mexic
quinqueflora, *Dehnh. RevUta Napol.* i. III. 167—Mexic.

BOUVAHDIA:—
racemosa, *A. Rick, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834).—Peruv.
rosea, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1863-65) 116.—Calif.
scabra, *Hoot. V Am. Bot. Beech. Voy.* 427.—Mexic.
scabrida, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1844) 237.—Mexic
scandens, *A. Rich, in Mim. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1884)272.—Hab. t
Schiediana, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-56) 123. —Mexic.
spUndens, R. Grab, in Bot Mag. t. 8781=triphylla.
strigillosa, [Baxt. in] Loud. Hort Brit. Suppl. iii. 502 -seq.l
strigosa, Benth. PI. Hartw. 75 -Rondeletia strigosa.
tenoiflora, *Hort. Berol. ex Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1868-56)97.—Mexic
ternifolia, Schlecht. 1. e. 98-triphylla.
tolucana, *Hoot, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 427.—Mexic.
triflora, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 386. t 288 - Houstonia triflora.
triphylla, *Salisb. Farad. Land.* t. 88.—Mexic
nmbeUata/rorfc—*Cf. Gard.Chron.* (1873)714.—Hab.?
uniflora, *Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1884) 272.—Am. trop.
versicolor, *Ker-Gawl. Bot Reg.* t. 245.—Am. austr.
viminalis, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 120. —Mexic
viperalis, *Schlecht. 1. e.* 114,-Mcxic.
Vreelandi, Hort. ex Fl. et Pomol. (1872) 174=Davisoni.
xylosteoidea, *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 428.—Mexic

BOTTZETIA, Montrous. in Mém. Acad. Lyon, x. (I860) 192. *RUTACEAE1,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 989.
maritima, *Montrous. I. c.—N.* Caled.

BOVEA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sèr. II. ii. (1834) 253 = Iiindenbergia, Lehm. (Scrophulac).
sinaica, Decne. L c > L. sinaica.

BOWDICHIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 376 (1823). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 667.
SEBIPIRA, Mart. Reise, 787 (1828).
brevipes, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 89.= virgilioides.
densiflora, Benth. 1. c.-= virgilioides.
ferruginea, Walp. Rep. i. 808=virgilioides.
floribunda, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 89 - virgilioides.
major. Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 63 - virgilioides.
nitida. *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 313. —Bras.
pubescens, Benth. in Ann. Wien. Mas. ii. (1888) 89 - virgilioides.
Sebipira, Steud. Nom. ed. II. i. 220-virgilioides.
virgilioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 876.—Am. austr.

BOWENIA, Hook. Bot. Mag. t. 5898 (1863) et 6008. *CYCADACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 446.
spectabilis, *Hook. 1. c.* 5398.—Austral.

BOWEEA, Harv. ex Hook. f. in Bot Mag. t. 5619 (1867). *LJUACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 786.
volubilis, *Harv. I. c.—Afr.* austr.

BOWIEA, Haw. in Phil. Mag. lxiv. (1824) 299-Alo«, Tourn. (Lilioc).
africana, Haw. 1. c = A. Bourea.
myriacantha, Haw. 1. c.; et N. S. i. (1827) 122 - A. myriacantha.

BOWKERIA, Harv. Thes. Cap. i. 24. t. 37 (1859). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 987.
triphylla, *Harv. I.* c.—Afr. austr.

BOWIiESIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. Fl. Per. 44. t. 34 (1794). *UMBELUFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i-876.
DRUSA, DC. in Ann. Mus. Par. x. (1807) 466. t. 88.
ELSNERIA, Walp. Nov. Act Nat Cur. xix. Suppl. L (1848) 346. t 8.

BOWIJGBIA >-
HOMALOCARPUS, Hook. ft Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 848.
acutangula, Btnth. PI. Hartw. 186.—Peniv.
crenata, Desv. ex DC. Ptod. iv. 70 •= Dysopis Gayana.
aichotoma, Poepp. ex DC. I. c 76.—Chili.
diversifolio, Meyen, ex Walp. Rep. v. 842=lobata.
data, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 74.—Chili,
dedans, Clos, I. c. 74. t. 80.—Chili,
flexilis. Meyen, Reise, i. 848.—Chill
geniculata. Sprang. Umbellif. 14. t. 6 - Angelica geniculata.
geraniifolia, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 882.—Chili.
jncana, Rui tr Pav. Ft. Per.* iii. 28.—Peruv.
•ntegerrima. Turn, in Bull. Soc. Nat. Uosc. xx. (1847) 1.170.—Chili. *
lobau, Rui, V Pav. Prod. 44. t. 84; *Fl. Per.* iii. 28.—Peruv.
multiradiata, Colla, in Mem. Ace. Torino, xxxvil (1885) 81.-Chili.
Mgripetala, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 71.—Chili.
**odifiora,* Presl, ex DC. Prod. iv. 76 = tenera.
oppositifolia, Buck, in Abh. Acad. Berl. 1816-17. (1819) S70.-In8. Canar.
Pa meta, Rui, (f Pav. Fl. Per. Hi. 28.—PeruT.
Chili, i Phil, in Linnaea,* xxviii. (1886) 651.—
J', Meyen, Reise, i. 466.—Perav.
jenera, Spreng. Syst. i. 880.—Bras.
'"Partita, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 76.—Chili.
"opaeolifolia, Gill. V Hook, in Hook. Bot. Misc. i. (1880) B25.-Chili.
nncmata, Colla,in Mem.Ace. Torino, xxxviL (1885) 81.—Chill

BOWMANIA, Gardn. in Hook. Ic. PL 619 (1848); et in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (U«) 9 = Trfads, »*. Br. (Compos.).
•"rbasci/olia, Gardn. 11. cc. 519; 10 •= T. Bowmanii.

BOWRING^ *Acham P. a* Benth> m Hook, Kew Journ. iv. (1862) 75. *LEGUMINOSAE,* Benth. ft Hook. f. i. 553.
•Mhcaipa, Champ. ex Benth. I. c—Hongkong.

BOYKtNIA, Nutt. in Jonrn. Aead. Phil ad. vii. (1884) "?• *SAXIFRAGEAS,* Benth. ft Hook. f. i. 686.
THEROFON, Rafin. New Fl. Am. iv. 66 (1886).
"omtifolia, Nutt. I. c.-Am. bor.
*«"»«», Rafin. Aut. Bot. 9 ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. BOL I 860 = Ammannia humilis.
major, Calif.^ *Grn31in s, Wais, Botm C(Uif, * 196,~*
occidentalis, Torr. V Gray, Fl. N. Am. L 577.-Am. bor. occ.
r<">uneulifolia, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xhi. (1842) 21=Saxifraga ranunculifolia.
J|a>ardsoni, A. Gray, I. e.—Am. bor. occ.
*'otundifolU, Parry, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. >i- (1878) 371.-Calif.
inspora, Nutt. ex Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1840) 276 - Cayaponia Boykinii.

*Bo*TiS*IU*A- >»• "> Mem. Mus. Par. xii. (1825) 507 (Mem. Rut. I24) = £vodia,, Forst. (Rutac).
etrinfolia, Champ, in Hook. Kew Joum. iii. (1861) 880=E.melUefolU.
"rttnicensis, G. Don, Gen. Sy»t. L 805.—Ins. Martinic.
Mem. Mus. Par. xii. (1826) 5W-E. rutaecarpa.

BRAB? J*ARIA *a m* - f- Fl. Cap. Prod. 30, *err. fyp.* 26 (17 «8) (Gen. dub.).
Uata, Burm. f. 1. c-Afr. austr.

BRABEJUM, Linn. Gen. ed. I. 81 (1737). *PROTEACEAE,* Benth. ft Hook, f.iii. 177.
M.?? V L A , Linn_ Mant_ 187 (W87)-
m atum> B1«nco, Fl. Filip. ed. II. 39 = Loranthus Wancoanui.
«enatum, Blanco, 1. c. 40-Alyxia laurina.
Blanco •• c-Alyxia stellate.
Blanco '• c-Alyxiaodorata.
«aufolinm, *Linn. Sp. PI.* I21.-Afr. austr.
tfllare, Knight, ProL 98=stelktifolium.

BRAKE JTJM:—
stellatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 31 = stellatifolium.
stellulifolium, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 764 - stelktifoUnm.

BRABYLA.Linn. Mant. 187 (1767) - Brab^Jum, Linn. (Proteac).
capensis, Linn. 1. c.=Brabejum stellatifolium.

BRACERA, Engelm. in Buchner, Rep. Pharm. lxviii. (1839) 369=Brayera, Kunth (Uosac.).

BRACHANTHEMUM, DC. Prod. vi. 44 (1887) - Chry. santhemum, Toum. (Compos.).
fruticulosum, DC. 1. c. 45 - C. fruticulosum.

BRACHATERA, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 189 = 0Modla, R. Br. (Gramin.).
decumbens, Desv. 1. c = T. decumbens.

BRACHEILEMA, R. Br.in Salt, Abyss. App. 65 (1814) sVernonia, Schreb. (Compos.).
paniculatum, R. Br. 1. c = V. amygdalina.

BRACHIARIA, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 469 (1853)=Panicum, Iiun. (Gramin.).
eruciformis, Griseb. 1. C.=P. cruciforme.
prostrata, Griseb. in Goelt. Abh. vii. (1857) 263 - P. prostratum.

BRACHILOBOS et BRACHILOBUS, Desv. Journ. Bot. iii. 170 (1814) «seq.

BRACHIOLOBOS, All. Fl. Pedem. i. 278 (1785) = Nasturtium, R. Br. (Crucif.).
amphibius, All. 1. c.=N. amphibium.
anceps. Link, Handb. ii. 311=N. anceps.
armoraeioides, Schur, Enam. PI. Transs. 40=N. annoracioides.
austriacus, Schur, L c 41—N. austriacum.
karbaraefolius, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 170-N. paluBtre.
brevistylus, Schur, Enum. PI. Transs. 89 = N. brevistylon.
domingensis, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 188=N. pyrenaicum.
hispidus, Desv. 1. c.=N. palustre.
hybridus, Schur, Enum. PI. Transs. 40=N. austriacum.
lippitensis, Link, Handb. ii. 811 = N. lippizense.
palustris, [Clairv.] Man. Herb. 218; Schur, Enum. PI. Transs. 39=N. palustre.
pyrenaicus, AIL Fl. Pedem. i. 278-N. pyrenaicum.
riparius, Schur, Enum. PI. Transs. 40 = N. amphibium.
sylvestris, All. Fl. Pedem. i. 278 = N. sylvestre.
tanacetifolius, Link, Handb. ii. 811=N. tanacetifolium.

BRACHIOLOBUS, Berah. Syst Vera. Erf. 181 (1800) = praec.

BBACHIOMIDITJM, Lindl. Fol. Orch. (1859). *ORCHIDEAE,* Benth. 8c. Hook. f. iii. 491.
concolor, *Lindl. I. c.*—Bolivia,
parvifolium, *Lindl. I. c.—H.* Granat.
tnberculatum, *Lindl. I. c.—N.* Granat.

BBAOHISTU8, Miers, in Ann. ft Mag. Nat. Hist. Ser. IL iii. (1649) 264. *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 892.
FREGIRARDIA, Dun. Ind. Sem. Monsp. (1849). Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 366.
SICKLERA, Sendtn. in Flora, xxix. (1846) 194 (err. typ. 178), nomen prius.
ciliatus, *Miers, 1. c.* 263.-N. Granat.
dimorphus, *Miers, I. c.* 267.—N. Granat.
diversifolius, *Miers, I. c.* 268.—Mexic.
dumetoram, *Miers, 1. c.* 265.—N. Granat.
hebephyllus, *Miers, 1. c.* 266.—N. Granat.
Hookerianus, *Miers, 1. c.* 268.—Ecuador,
lanceaefolius, *Miers, 1. c.* 267.—Perav.
Linnaeanus, Miers, 1. c. 269 •• Physalis arborescens.
macrophyllus, *Miers, I. c.* 268.—N. Granat.
mollis, *Miers, I. c.* 264.—Peruv.
Neesianus, Miers, 1. c. 268 = Physalis arborescens.
oblongifolius, *Miers, 1. c.* 266.—N. Granat.
rhomboideus, *Miers, 1. c.* 264.—N. Granat.
riparius, *Miers, 1. c.* 265.—N. Granat.
solanaceus, *Benth. (f Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.W.* 424.—Nicaragua,
stramonifolius, *Miers, ttlustr. S. Am. PI.* ii. 7.—Mexic.

BBACHTIA, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 853 *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii, 561.
ONCODIA, Lindl. Fol. Orch. (1853).'
andina, *Reichb. f. in Bonplandia,* iv. (1856) 822.—N. Granat.
glnmacea, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 863.—N. Granat.
sulphurea, *Reichb. f. in Bonplandia,* u. (1854) 14.—N. Granat.

BRACHYACHYRIS, Spreng. Syst. iii. 574 (1826)- BRACHYRIS, Nntt. - GutierreBia, Lag. (Compos).
Euthamiae, Spreng. L c. = G. Euthamiae.

BEACHYAOTIS, Ledeb. Fl. Ross. il. 495 (1846). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 279.
ciliata, Ledeb. 1. c=Aster angustus.
frondosa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 647-Aster frondosus.
eymnocephala, *Rupr. Serf. Tiansch.* 51.—As. centr.
fliensis, *Rupr. I.* c—As. centr.
indica, C. B. Clarke, Compos. Ind. 49-menthodora.
menthodora, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t 1106.—Reg. Himal.
obovata, *Benth. I. c.* sub 1.1108.—Oriens.
pubescens, *Aitch. (f Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 68.—Ind. or.
robusta, *Benth. in Hook. Ic. Pi.* sub t. 1106.—Reg. Himal.
umbrosa, *Benth. I. c*—Reg. Himal.; As. centr.
mtngtuensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 253 = umbrosa.

BRACHYANDRA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. 148 (1844)=Pterolepis, Miq. (Melastom.).
perpusilla, Naud. 1. c.-P. perpusilla.
pusilla, Naud. 1. c. xiii.(1844) 860 = P. perpusilla.

BBACHYANBKA, Phil. Fl. Atac 34. t 4 (1860). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. *I.* u. 244.
macrogyne, *Phil. I. c*—Chili.

BRACHYANTHES, Cham, ex Dunal. in DC. Prod. xiii. i. 576 (1852) - Petunia, Juss. (Solanac.).
nierembergiensis, Cham, ex Dunal, 1. c.=P. parviflora.

BHACHYBOTBY8, Maxim, ex Oliver, in Hook. Ic PI. xiii. 43. t. 1254 (1878). *BORAGINEAE.*
paridiformis, *Maxim, ex Oliver, 1. c.*—China.

BBACHYCABPAEA, DC. in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 247; et Syst. Veg. ii. 698 (1821). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 87.
laxa, *Sond. in Han. tf Send. Fl. Cap.* L 88.—Afr. austr.
linifolia, *EM. V Zeyh. Enum.* 8.—Afr. austr.
polygaloides, *EM.* b* *Zeyh. I. c. l.—tdc.* austr.
varians, *DC. Syst.* ii. 699.—Afr. austr.

BRACHYCENTRUM, Meissn. Gen. 114 (1837)- Centronla, D. Don (Melastom.).
excelsum, Meissn. Gen. Comm. 81 = C. excelsa.

BBACHYCHAETA, Torr. & Gray, Fl. N. Am. iL 194 (1841). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 256.
cordata, *Torr. tf Gray, I. c.* 195.—Am. bor.

BRACHYCHEILA, Harv. ex Eckl. & Zeyh. in Linnaea, xx. (1847) 192-Euolea, Linn. (Ebenac.;.
pubescens, Harv. 1. c = £. polyandra.

BRACHYCHITON, Schott ft Endl. Meletem. 34 (1882) =Bteroulia, Linn.
acerifolium, F. Muell. Fragm. i. 1=S. acerifolia.
Bidmlli, Hook. Bot. Mag. t. 5138-S. Bidwilli.
Delabechei, F. Muell. PI. Viet. i. 157 = S. rupestris.
discolor, F. Muell. Fragm. i. 1=S. discolor.
diversifolium, R. Br. in Bean. PI. Jav. Kar. 234 - S. caudata.
Gregorii, F. Muell. in Hook. Kew Joum. ix. (1867) 199=S. diversifolia.
incanum, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 234 = 8. incana.
luridum, C. Moore, ex F. Muell. Fragm. i. 1-S. lurida.
paradoxum, Schott, Meletem. 34 - S. ramiflora.

BRACHYCHITON s-
platanoides, **R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 284-Sterculia trichosiphon.**
populneum, **R. Br. 1. c = S. diversifolia.**
ramiflorum, **R. Br. 1. c.=S. ramiflora.**

BRACHYCIiADOS, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 391. *COMPOSITAE,* **Benth. ft Hook. f. ii. 496.**
lycioides, *D. Don, I. c*—**Chili.**

BRACHYCODON, Prog, in Mart. Fl. Bras. vi. I. 229. t. 42 (1865)=Fagaea, Griseb. (Gentian.).
pumilus, **Prog. 1. c. 230.—Bras.**
ramosissimus, **Prog. 1. c.—Bras.**

BBACHYCOME, Cass. in Diet. Sc Nat. xxxvii. 491 (1825). *COMPOSITAE,* **Benth. ft Hook. f. ii. 264.**
BRACHYSCOME, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 199.
BRACHYSTEPHIUM, Less. Syn. Comp. 388 (1832).
CTENOSPERMA, F. Muell. ex Pfeiff. Norn. i. 936 (1874).
PAQUERiNA,Cass.inDict.Sc. Nat. xxxvii. 492(1825).
SILPHIOSPERMA, Steetz, in Lehtn. PI. Preiss. i. 433 (1844).
STEIROGLOSSA, DC. Prod. vi. 38 (1838).
aculeata. **Less. Syn. Comp. 192 = SieberL**
angustifolia, *A. Cunn. in DC. Prod.* **v. (1834) 306.—Austral.**
assamica, *C. B. Clarke, Compos, lnd.* 40.—Assam,
basaltica, *F. Muell. Fragm.* **i. 60.—Austral.**
bellidioides, **Steetz, in Lehtn. PI. Preiss. i. 426 = pusilla.**
Biilardieri, *Benth. Fl. Austral,* **iii. 518.—Austral,**
calocarpa, *F. Muell. in Linnaea,* **xxv. (1852) 399.—Austral.**
capillacea, **Walp. Rep. ii. 584=iberidifolia.**
cardiocarpa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. **517.—Austral,**
cheilocarpa, *F. Muell. in Wing, South Se. Record,* ii. **(1882) 172.—Austral.**
ehrysoglossa, **F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 44=marginata.**
ciliaris, *Less. Syn. Comp.* **192.—Austral,**
collina, *Benth. Fl. Austral,* **iii. 521.—Austral,**
debilis, *Sond. in Linnaea,* **xxv. (1852) 477.—Austral,**
decipiens, *Hook. f. in Hook. Land, fourn. Bot.* vi. **(1847) 114.—Austral,**
discolor, *C. Stuart, ex Benth. Fl. Austral,* iii. 520.—**Austral,**
diversifolia, *Fisch. V Mey. lnd. Sent. Hart. Petrop.* ii. **31.—Austral.**
Drummondii, **Walp. Rep. ii. 684 = ciliaris.**
exilis, *Sond. in Linnaea,* **xxv. (1852) 473.—Austral.**
glabra, **Benth. in Enum.Tl. Hueg. 59 = multifida.**
glandulosa, *Benth. Fl. Austral,* **iii. 520.—Austral.**
glauca, **Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 315=stricta.**
goniocarpa, *Sond. b" F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) **474.—Austral.**
graminea, *F. Muell. Fragm.* **i. 49.—Austral,**
heterodonta, *DC. Prod.* **v. 305.—Austral,**
heterophylla, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* i. 60.—**Austral.**
iberidifolia. *Benth. 1. c.* **59.—Austral.**
lanuginosa, **Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 427 = ciliaris.**
latinquamea, *F. Muell. Fragm.* **xi. 16.—Austral.**
leptocarpa, **F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet i. (1856) 43-exilis.**
leucanthemi/olia, **Benth. in Enum. PI. Hueg. 60 = stricta.**
linearifolia, *DC. Prod.* **v. 306.—Austral.**
linearifolia, **Hook, £ Fl. Tasm. i. 185=cardiocarpa.**
marginata, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* **60.—Austral,**
melanocarpa, *F. Muell. V Sond. in Linnaea,* **xxv. (1E52) 476.—Austral.**
mexicana, **Klatt, in Leopoldina, xix. (1883) 32=BelIis mexicana.**
microcarpa, *F. Muell. Fragm.* **i. 50.—Austral,**
mossambicensis, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* **iii. 305.—Afr. trop.**
Muelleri, *Sond. in Linnaea,* **xxv. (1882) 475.—Austral.**
multicaulis, **F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 43 = ciliaris.**
multifida, *DC. Prod. v.* **306.—Austral.**

BBACHYCOME:—
nivalis, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1865) **43.—Austral.**
oblongifolia, **Benth. in Enum. PI. Hueg. 80-stricta.**
odorata, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 188.—N. **Zel.**
pachyptera, *Turcn. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. **(1851) 1.176.—Austral,**
parvula, *Hook.f. Fl. Tasm.* **i. 185.—Austral,**
pinnata, *Hook. /. Handb. N. Zeal. Fl.* 1381.—N. **Zel.**
ptychocarpa, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. **(1855) 43.—Austral.**
pumila, **Walp. Rep. ii. 584=Biilardieri.**
pusilla, *Steett, in Lehm. PI. Preiss.* i. 427.—Austral,
radicans, *Steett, I. c.* **429.—Austral,**
radicata, *Hook.f. Fl. N. Zel.* **i. 127.-N. Zel.**
scapiformis, *DC. Prod.* **v. 806.—Austral.**
Ecapigera, *DC. 1. c.* **viii. 277.—Austral,**
segmentosa, *F. Muell. Fragm.* **viii. 66; 144.—Ins. Dom. Howe.**
Sieberi, *DC. Prod.* **v. 306.—Austral,**
simplicifolia, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* **xiii. (1881) 888.—N. Zel.**
Sinclaitii, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 187.—N. Zel.
squalida, **Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 116=ciliaris.**
stricta, *DC. Prod.* **v. 805.—Austral.**
strongylospermoides, **Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 805-ciliaris.**
Stuartii, *Benth. Fl. Austral,* **iii. 613.—Austral.**
sylvestris, **Klatt, in Leopoldina, xix. (1883) 82 = Bellis sytaestris!**
tenella, **Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 176 = collina.**
tenera, **Benth. in Enum. PI. Hueg. 59 = multifida.**
tenuiscapa. **Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot vi. (1847) 114=scapiformis.**
Thomsonii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) **372.—N. Zel.**
trachycarpa, *F. Muell. in Linnaea,* **xxv. (1852) 339.—Austral.**
xanthocomoides, **Less, in Linnaea, ix. (1884) 265 = Bellis xanthocomoides.**
xeranthemoid.es. **Less, ex Steud. Nom. ed. II. i. 220= Xanthocepbalnm Alaraani.**

BRACHYCOME, Gaudich. Freyc. Voy. Bot. 467 (1826) =Vittadinia, Rich. (Compos.).
dentata, **Gaudich. 1. c. 468 = V. australis t**
spathulata, **Gaudich. 1. c.=V. australis.**
triloba, **Gaudich. 1. c. 467 - V. australis.**

BRACHYCORYS, Schrad. Cat HortXoetting. (1880).—Cf. Linnaea, vi. (1831) Iitt. 72-Idndenbergia, Linn. (Scrophular.).
parvifiora, **Schrad. 1. c.=L. urttcaefolia.**

BBACHYCOBYTHI8, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 363 (1888). *ORCHIDEAE,* **Benth. ft Hook. f. iii. 632.**
Bulbinella, *Reichb. f. in Flora,* **1. (1867) 116 (sphalm. 161).—Afr. austr.**
Gerardi, *Reichb. f. 1. c*—**Afr. austr.**
Kalbreyeri, *Reichb. f. 1. c.* **lxi. (1878) 77.—Afr. trop.**
Mac-Owaniana, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* **104.—Afr. austr.**
pleistophylla, *Reichb. f. I. c*—**Afr. trop.**
ovata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **363.—Afr. austr.**
pubescens, *Han. Thes. Cap.* **i. 35.—Afr. austr.**
Pumilio, *Reichb. f. in Flora,* **lxv. (1882) 531.—Afr. trop.**
SJiwaiirurthii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* **59.—Afr. trop.**
tennior, *Reichb. f. in Flora,* **xlviii. (1865) 183.—Afr. trop.**
Tysoni, *Bolus, in fourn. Linn. Soc.* xx. (1884) 485.—**Afr. austr.**
Welwitschii, *Reichb. f. in Flora, X.* **(1867) 99.—Afr. trop.**
Zeyheri, **Reichb. f. 1. c 117-Schizochilus Zeyheri.**

BRACHYDEREA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlviii. 429 (1827) = Crapia, Linn. (Compos.).
alpestris, **Sch. Bip. ex Nym. Comp. 455=C. alpestris.**
aurea, **Sch. Bip. in Pollichia, xxiWv. (1866) 318-C. aurea.**
biennis, **Sch. Bip. 1. c.=C. biennis.**

BRACHYDEREA:—
chondrilloides, **Sch. Bip. ex Nym. Consp. 46«-= Crepis chondriUoides.**
grandiflora, **Sch. Bip. ex Nym. 1. c. 455 = C. grandiflora.**
heterantha, **Sch. Bip. in Pollichia, xxii-iv. (1866) 818 =Lactuca Dubyaea.**
Jacquinii, **Sch. Bip. 1. c. = C. Jacquinii.**
jubata, **Sch. Bip. 1. c. = C. jubata.**
nicaelnsis, **Sch. Bip. 1. c.=C. nicaeënsis.**
rigida, **Cass. in Diet. Sc Nat. xlviii. 480 = C. rigida-**
Rueppellii, **Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aetbiop. 283 ^C. Rueppellii.**
Schulttii, **Sch. Bip. 1. c = C. Schultzii.**
tenerrima, **Sch. Bip. 1. c = C. carbonaria.**
tenuifolia, **Sch. Bip. in Bonplandia, x. (1862) 881-C. tenuifolia.**
xylorrhita, **Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 284.—Afr. trop.**

BBACHYELYTBTJM, Beauv. Agrost. 39. t. 9. f. 3 (1812). *GRAMINEAE,* **Benth. & Hook, f Gen. iii. 1144.**
aristatum, **Roem. ft Schult. Syst. ii. 413=erectum.**
erectum, *Beauv. Agrost.* **39, 165.—Am. bor.**

BBACHYQIiOTTIS, Font. Char. Gen. 91. t. 4« (1776). *COMPOSITAE,* **Benth. ft Hook. f. ii. 444.**
Bidwillii, **Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 342-Seneck) Bidwillii.**
Caledoniae, *DC. Prod.* **v. 211.—N. Caled.**
elaeagnifolia, **Hook. f. Fl. N. Zel. t. 41 = Senecio elaeagnifolius.**
Forsteri, *DC. Prod.* **v. 211.—N. Hebrid.**
Forsteri, **Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 842=repanda.**
perdicioides, **Hook. f. 1. c.-Senecio perdicioides.**
Rani, **A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 1S2-· Olearia Cunninghami.**
Rangiora, 7. *Buch. in Trans.* **AT.** *Z. Inst.* **xiv. (1882) 357.—NT Zel.**
repanda, *Forst. Char. Gen.* **92.—N. Zel.**
rotundifolia, **Forst. 1. c—Senecio rotundifolius.**

BRACHYGYNE, Cass. in Diet. Sc. Nat. 1. (1827) 498 - Erioocphalus, Linn. (Compos.).

BBACHYXAENA, R. Br. in Trans. Linn. Soc xii. (1816) 115. *COMPOSITAE,* **Benth. ft Hook. f. ii-289.**
OuGOCARPHA,Cass. in Bull.Sot Philom.(1817) 161-
dentata, *DC. Prod.* **v. 430.—Afr. austr.**
discolor, *DC. 1. c.*—**Afr. austr.**
elliptica, *Less. Syn. Comp.* **208.—Afr. austr.**
grandifolia, *DC. Prod.* **v. 430.—Afr. austr.**
natalensis, **Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii.972-discolor,**
nereifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* **xii. (181«) 11*-—Afr. austr.**
racemosa, *Less. Syn. Comp.* **208.—Afr. austr.**
trinervia, *Sond. in Linnaea,* **xxiii. (1850) 63.—Afr. austr.**
uniflora, *Han. in Han.* b* *Sond. Ft. Cap.* iii. 117.—**Afr. austr.**

BBACHYLEFIS, Wight ft Am. Contrib. Bot. lnd. 63 (1834). *ASCLEPIADEAE,* **Benth. ft Hook. f. »• 742.**
nervosa, *Wight V Am. I. c*—**lnd. or.**

BRACHYLEPIS, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 870 (1829)= Anabasis, Linn. (Chenopod.).
elatior, C. **A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. viii. (1840) 841 - A. phyllophora.**
eriopoda, **Schrenk, in Bull. Phys-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 860 = A. phyllophora.**
hispidula, **Bunge, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 444.—Turkestan.**
humilis. **Less, in Linnaea, ix. (1834) 198 = salsa.**
intermedia, **Kar. ft Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc »»• (1842) 432-A. phyllophora.**
jaxartica, **Bunge, in Act. Hort. Petrop. vi. (187») •*•• —Reg. Casp.**
salsa, C. **A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 372.—Reg-Casp.**
truncata, **Schrenk, in Bull. Pbys.-Math. Acad. Pétertb. ii.(1814) 193 = A. truncata.**

BRACHYLEPIS. Hook, ft Am. in Hook. Journ. Bot. (1834) 290-Helinia, Deene. (Asclep.).
CandoUeana, **Hook, ft Am. 1. c 291 = M. Candolleana.**

BRACHYLOBOS, Desv. Jonrn. Bot. iii. (1814) 170= seq.

BRACHYLOBUS, Link, Handb. vii. 811 (1881) = BRACHIOLOBOS, All. - Nasturtium, R. Br. (Crucif.).

BRACHYLOBUS, Dulac, Kl. Hautes-Pyr. 279 (1867)- Jttelilotus, Tourn. (Legumin.).
officinalis, Dulac, 1. c. = M. officinalis.

BRACHYLOMA, Hanst in Linnaea, xxvi. (1888) 203- Isoloma, Decne. (1848) (Gesnerac.).
tlongatum, Hanst. 1. c. xxix. (1867-68) 632.—Ecuador?
•nanthum, Hanst. 1. c. 580 = 1. erianthum.
nrsutum, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 203; MIX. (1857-68) 626 = 1. hirsutum.
hon.-tense, Hanst 1. c. xxvi. (1858) 203, 218. t. f. 17 = I. hondense.
incurvum, Oerst. in Vidensk. Selak. Skr. V. v. (1861) 106=1. incurvum.
"orstenianum, Hanst. in Karst. Fl. Colomb. i. 101. t 60.—N. Granat.
'mcomallon, Hanst. in Linnaea, xxix. (1867-68) 528. —N. Granat.
*lo*giflorum,* Hanst. 1. c 5S0-I. longipes.
'ongifolium, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 104-1. longifoliura.
'"Vipes, HansL in Linnaea, xxix. (1867-68) 680-1. longipes.
™°He, Hanst. 1. c. 628-1. molle.
"orjtzianum, BoucM *Sc* HansL 1. c. 524.—N. Granat.
pmolare, Hanst. L c. 534 = 1. petiolare.
frctum, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 104 .•=!• pictum.
PUosum, Oerst. 1. c. 103 = 1. pilosum.
'«k««Hon, Hanst. in Linnaea, mix. (1857-58) 526. —Venezuela.
""ynchocarpum, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. US81) 103.1. rhynchocarpuin.
'ubncaule, Hanst. in Linnaea, xxix. (1857-68) 526 = »• nibricaule.
" 7^", Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (18«1) 1«8-I. strictum.
Tria S"> Hanst- in Linnaea, xxix. (1857-58) 582= JTrianaei.
tu Oerst in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) went I.tubin'orum.
ncomm, Hanst. in Linnaea, xxix. (1857-68) 528.—Hab. 1
v'stitum, HansL 1. c. 580-1. vestitum.

^f CHYLOMA, Sond. in Lehm. PL Prei«. i. 304 J.1845). *EPACRWEAE,* Benth. & Hook. *i.* ii. 613.
aiiatum, *Benth. Fl. Austral,* iv. 173.-Austral.
">ncolor, *F. Muell. Fragm.* vi. 89.—Austral.
»»pnnoides, *Smth. Fl. Austral,* iv. 173.—Austral,
aepressun,, *Benth. I. c*—Austral.
ericoides, *Hmd, in Linnaea,* xx vi. (1853-55) 247.—Adstra.
Preisii. *Sand, in Lehm. PI. Preiss. i.* 805.—Austral,
Scortechinii, *F. Muell. Fragm.* xi. 121.—Austral.

BRA5HYMERIS, DC. Prod. vi. 76 (1837)=Marasmode*, DC. (Compos.).
**oparia,* DC. 1. c-Afr. austr.

BRACHYNEMA, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1859) 125. t. 22. *EBENACEAE,* Benth. ft Hook. f. •«. 666.
'•miflorsin, *Benfa* j ,126.—Bras.

BRA«2?YNEMA< Griff. Notul. iv. 176 (1864)-Sphe-^ B « Jack (Verben.).
Griff. L c.=S. microstylis.

BR1KHYNEMA-F- Muell. Fragm. iii. 90 (1862)-AbrophyUmo, Hook. f. (Saxifrag.).
• ^•w»F. Muell. 1. c. - A. oraans.

BRACHYOGLOTIS, Lam. Encyc. i. 459 (1788) = Brachyglottis, Forst. (Compos.).

B^HYOLOBOS, DC. Fl. Fr. v. 661 (1805) = BRA-^HIOLOBOS, All.-HasturUum.R. Br. (Crucit).

BBACHTOTUM, Triana, in Benth. ft Hook. f. Gen. i. 743 (1867). *MELASTOMACEAE,* Benth. ft Hook. f. 1. c.
ALIFANA, Rafin. Sylva Tellur. 101 (1888).
Benthamianum, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 49.—Peruv.
campanulare, *Triana, 1. c.* 48.—Peruv.
campylanthum, *Triana, I. e.* 49.—Peruv.
canescens, *Triana, 1. c.* 48.—N. Granat.
cerauum, *Triana, 1. c.*—N. Granat.
confertum, *Triana, 1. c.* 49.—Peruv.
floribundum, *Triana, 1. c.*—Peruv.
gracilescens, *Triana, I. c*—Peruv.
hermannioides, *Triana, I, e.*—Bolivia.
Jamesonii, *Triana, 1. c.*—Ecuador,
ledifolium, *Triana, I. c.* 48.—Peruv.
lutescens, *Triana, I. c*—Peruv.
lycopodioides, *Triana, 1. c.* 49.—Peruv.
Microdon, *Triana, I.* c—Bolivia,
microphyllum, *Triana, 1. c.*—Peruv.
Naudini, *Triana, I. c.* 48.—Ecuador.
Pentlandi, *Triana, 1. c.* 49.—Bolivia,
quinquenerve, *Triana, 1. c.* 48.—Peruv.
Radula, *Triana, 1. c.*—Peruv.
rosmarinifolium, *Triana, I. c.* 49.—Peruv.
rostratum, *Triana, 1. c.* 48.—Peruv.
sanguinolentum, *Triana, I. c.* 49.—Bolivia,
strigosum, *Triana, I. c.*—N. Granat.
trichocalyx, *Triana, I. c.* 48.—Ecuador.

BRACHYPAPPUS, Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1865) 119 = 8enecio, Tourn. (Compos.).
candicans, Sch. Bip. 1. c. 120 = S. candicans.
Smithii, Sch. Bip. 1. C.-.S. SmithiL

BRACHYPODIUM, Beauv. Agrost. 100 partim (1812). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. *I.* iii. 1201.
DISTICHEIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
HEMIBROMUS, Steud. Syn. PI. Gram. 317 (1854).
TRACHYNIA, Link, Hort Berol. i. 42 (1827).
abbreviatum, *Dum. Obs. Gram. Belg.99.*—Belgium.
Allionii, Presl, Fl. Sic. p. xlv, in nota=ramosum.
asperum, Roem. & Schult. Syst. ii. 742 - distachyon.
Barrelieri, Roem. & Schult. 1. c. 741=pinnatum.
biflorum, Kunth, Enum. PL i. 648 (Ind.) »Agropyron biflorum.
biundale, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 746-Festuca Poa.
Boissieri, Nym. Syll. 425=ramosa.
brevisetum, Roem. & Schult. Syst. ii. 742-Triticum brevisetum.
caespitosum, Presl, Fl. Sic. p. xlv, nomen—ramosum.
caespitosum, Roem. & Schult. Syst. ii. 737 - pinnatum.
cenisium, Beauv. Agrost. 155, nomen-Poa cenisia.
chinense. S. *L. Moore, in Journ. Bot.* xiii. (1876) 230. —China.
ciliatum, Beauv. Agrost. 101» distachynm.
commutatum, Beanv. 1. c. — Bromus racemosus.
contractual, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 40=pinnatum.
corniculatum, Lam. Fl. Fr. v. 608—pinnatum.
dalmalicum, *Vis. Fl. Dalm. Suppl.* 23.1.1.—Europ. austr.
distachynm, *Beauv. Agrost.* 101.—Reg. Mediterr.; Oriens.
distachym, Roem. & Schult. Syst. ii. 741-praec.
divaricatum, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 40-Festuca divaricata.
Festuca, *Beauv. Agrost.* 101.—Hab. I
fistueoides, Beauv. 1. c. 165, nomen - Festuca Poa.
festucoides, Link, Enum. Hort. BeroL i. 96-Fattuca tenella.
flexum, *Nets, Fl. Afr. Gram.* 456.—Afr. austr.
Fontanesianum, Nees, 1. c. 457=ramosum.
fragile, Beauv. Agrost. 156, nomen-Triticum fragile.
geniculatum, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 422-distachyum.
genuense, Roem. & Schult. SyaL ii. 742»Triticum genuense.
gracile, Beauv. Agrost. 101-sylvaticum.
Halleri, Beauv. I.e.- Festuca Poa.
hispanicum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140-Festuca Poa.
Hostii, Link, Hort Berol. i. 40-ramosum.
intermedium, *Schur, in Verh. Siebenb. Vtr. Naturm.* Iv. (1863) 89.—Transsylv.
interruptum, Roem. ft Schult. Syst. ii. 747-Apera in terra pta.
involutum, *Buese, in Miq. PL Jungh.* 347.—Malaya,
japonicum, *Mtq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 286.—Japon.

BBACHYPODIUM.
Kotschyi, *Boiss. Fl. Orient,* v. 659.—Cilicia.
latifolinm, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 126; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 584.—Mexic.
littorale, Roem. & Schult. Syst. ii. 740=ramosum.
loliaceum, Fries, ManL iii. 16 = Glyceria fluitans.
loliaceum, Link, Hort. Berol. i. 42-Festuca elatior.
loliaceum, Roem. *Si* Schult. Syst. ii. 740=Demaieria loliacea.
longearistatum, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 127=Agropyron longeaiistatum.
longifolium, Beauv. Agrost. 101 - Bromus longifolioa.
macropodum, *Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvii. (1877) 48.—Europ. austr.
macrostachyum, Bess, ex Roem. & Schult. Syst. Mant. iii. 651=distachyum.
maritimum, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 748= Cutandia maritima.
megastachyum, Bess, ex Roem. & Schult. Syst. Mant. iii. 651 — distachyum.
mexicanum, *Link, Hort. Berol.* i. 41.—Mexic.
monostachyum, Nym. Consp. 843-distachyum.
montanum, Nym. Syll. 426 = Festuca montana.
mucronatum, *Willk. in WiUk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* i. 111.—Hispan.
Nardus, Beauv. Agrost 155, nomen = Festuca tenuiflora.
Nardus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 95-Festuca Poa.
nepalense, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 316.- Ind. or.
nigricans, Roem. & Schult Syst. ii. 743 - Triticum nigricans.
obtusifolium, Link, Enum. Hort. BeroL i. 96 - ramosum.
patens, Nym. Syll. 425-Festuca loliacea.
pentastachyum, Nym. Consp. 843 = distachyum.
peruvianum, Kunth, Enum. PI. 543 (Ind.)»Agiopyron pemvian um.
phleoides, Beauv. Agrost. 165, nomen « Koeleria phleoides.
phoenicoides, Roem. & Schult. Syst. ii. 740•ramosum.
pinnatum, *Beauv. Agrost.* 101.—Europ.; Reg. Mediterr.
Plukenetii, Beauv. 1. c; Link, Hort. Berol. i. 40-ramosum.
Poa, Beauv. 1. c.; Roem. & Schult. Syst. ii. 746-Festuca Poa.
psilanthum, Link, Gram. Europ. Austr. Obs. Bot. 398 =Festuca tenuiflora.
ramosum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 118 = Glyceria maritima I
ramosum, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 787.—Reg. Mediterr.
retusum, Beauv. Agrost. 101-ramosum.
rigidulum, *Opit V Bercht. Oek. Fl. Boehm.* i. 392.—Bohem.
rigidum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 86=Triticum asperum.
Rottbollla, Beauv. Agrost. 155, nomen=ramosum.
rupestre, Roem. & Schult. Syst ii. 736 = pinnatum.
sanctum, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 181.—Maccdon.
scaberrimum, Wight & Am. ex Steud. Norn. ed. II. i. 221 = Triticum scaberrimum.
Schrenkianum, *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 846.—Sibiria.
selifolium, *Schur, Enum. PI. Transs.* 800.—Hungar.
strigosum, Schult. in Roem. *Sc* Schult. Syst Mant. ii. 404-Triticum strigosum.
subtile, De Not. Prosp. FL Ligust. 49-distachyum.
snbulatum, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 125; *rx Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 684.—Mexic.
sylvaticum, *Beauv. Agrost.* 101.—Europ.; Oriens.
tataricum, Munro, ex Aitch. in Joum. Linn. Soc. (1880) 109-Agropyron longearistatum.
tenellum, Beauv. Agrost. 101 = Festuca tenuiflora.
tenellum, Roem. & Schult. Syst. ii. 745 -Festuca montana?
Tenorianum, Schult. in Roem. & Schult. Syst. Mant. ii. 406'Triticum Barrelieri.
tenue, Beauv. Agrost. 155, nomen-Lolium perenne.
tenue, Tineo, Cat. Hort. Panorm. (1827) 48 = Festuca incrassata.
tenuiculum, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 744-Festuca Poa.
tenuifiorum, Roem. *Sc* Schult 1. c. 746 - Festuca tenuiflora.
unilaterale, Beauv. Agrost. 155; Roem. *Sc* Schult. 1. c. 747 = Triticum tenuiflorum.
unioloides. Link, Enum. Hort. Berol. L 196 « Demazeria sicula.

BRACHYPTERUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 101=Derria, Lour. (Legumin.).
Benthamii, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 93=D. panicnlata.
canarense, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 76 = D. canarensis.
elegans, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 98 - D . parviflon.
floribundum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 189 = D. floribunda.
microphyllum, Miq. Fl. Ind. Bat. SnppL 296 = D. microphylla.
ptHyphyllum, Miq. Fl. Ind. Bat i. 189 = D. poly phylla.
robustum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 77 = D. robusta.
seandens, Benth. in Ann. Wien. Mas. ii. (1888) 101 = D. seandens.
timorense, Benth. in Miq. PI. Jnngh. i. 255 = D. timorensis.

BBACHYPTEBY8, A. Jnss. in Deless. Ic. Sel. iii. 20 (1887). *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 256.
anstralis, *A. Juss. I. c*—Bras.
borealis, *A. fuss, in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 856. t. 2. f. 16.—Am. centr.

BRACHYPUS, Ledeb. Fl. Ross. i. 188 (1842) - Lunaria, Tonrn. (Crncif.).
asper, Ledeb. 1. c. *(=Fibigia suffruticosa).*—Rossia.

BRACHYRAMPHUS, DC. Prod. vii. 176 (1888) = Xiaotuoa, Tonrn. (Compos.).
caribaeus, DC. 1. c 177 = L. intybacea.
goraelnsis, DC. 1. c.=L. goraeënsis.
ffeyneanus, Wight, Ic. 1.1146=L. Heyneana.
intybaceus, DC. Prod. vii. 177 = L. intybacea.
lactucoides, T. Anders, in Joan. Linn. Soc. Bot. v. Suppl. i. (1860) 23—Heterachaena massaviensis.
nudicaulis, Klatt, in Ann. Sc. Nat. Se>. V. xviii. (1873) 877 - Lannaea nudicaulis.
otiusus, DC. in Deless. Ic. Sel. iv. t. 96-Lannaea nudicaulis.
ramosissimus, Benth. in Hook. Jonm. Bot. i. (1834) 489 = L. denticulata.
sinicus, Miq. in Jonm. Bot. Nëerl. i. (1861) 105 - L. denticulate,
sonchifolius, DC. Prod. vii. 177 = L. remotiflora.
sonchifolius, Thw. Ennm. PI. ZeyL 168=L. Heyneana.
taraxacoides, DC. Prod. vii. 177 " L. Heyneana.

BRACHYRHYNCHOS, Less. Syn. Comp. 392 (1832) = Benecio, Tonrn. (Compos.).
albicaulis, DC. Prod. vi. 488 - S. diversifolius, *Hani,*
cymbalari/olius, DC. 1. c.=S. cymbalarifolius.
diversifolius, DC. 1. c 439 - S. diversifolins, *Harv.*
ilongatus, Less. Syn. Comp. 898= S. diversifolius, *Haro.*
eupatorioides, DC. Prod. iv. 439 (non seq.).—Afr. anstr.
eupatorioides, Lett. Syn. Comp. 893 «= S. othonnae-floros.
jünceus, Less. L c.=S. junceus.
trachycarpus, DC Prod. vi. 438 = S. incertus.
tuberosus, DC. 1. c.-=S. incertus.

BRACHYRIS, Nutt. Gen. Am. ii. 163 (1818)-Qutier-reida, Lag. (Compos.).
californica, DC. Prod. v. 818 = G. californica.
divaricata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 313=G. Enthamiae.
draeunculoides, DC. in Mém. Soc. Phys. Genèv. vii. (1836) II. 265. t. l=Amphiachyris draeunculoides.
Euthamiae, Nutt. Gen. Am. ii. 163 = G. Euthamiae.
floribunda, Phil, in Linnaea, zxxiii. (1864-66) 137.—Chili.
Guyana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 34.—Chili.
Iserni, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1865) II. 335.—Chili.
Mandtmii, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 634.—Bolivia.
microcephala, DC. Prod. v. 318-G. Euthamiae.
micToctphala, Hook. Ic. PI. t. 147=G. texana.
Neaeana, DC. Prod. v. 813.—Mode.
motifolia, DC. 1. c. - Brachychaeta cordata.
paniculata, DC. 1. c. = G. paniculata.
ramosissima, Hook. Ic. PI. t. 142 = Amphiochyris draeunculoides.
sectifolia, Ces. in Atti Soc. Ace. Sc. Nap. v. (1871) VII. 11.—Chili.
spathulata, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1865) II. 886.—Chili.

BRACHYSCOME, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 199.—Cf. Diet. Sc. Nat. v. Snppl. 63 (1817) = Brachyoome, Cass. (Compos.).
Billardieri, Cass. in Diet. Sc. Nat. v. Suppl. 63 - Brachycome heterodonta.

BRACHYSCYPHA, Baker, in Jonm. Linn. Soc. xi. (1071) 893=LaehenaUa, Jacq. (Liliac.).
undulata, Baker, 1. c. 894=L. pnsilla.

BEACHYSEMA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 10 (1811). *LEGUMMOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 467.
BURGESIA, F. Muell. Fragm. i. 222 (I860?).
KALENICZENKIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1858) I. 252.
LEPTOSEMA, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 84.
acuminatum, *Truff. in Rev. Hortic.* (1866) 418.—Hab.l
aphyllnm, *Hook. Bot. Mag.* t 4481.—Austral,
bossiaeoides, *Benth. Fl. Austral,* ii. 12.—Austral,
bracteolosum, *F. Muell. Fragm.* iv. 10.—Austral
Celsianum, Lem. Hortic. Univ. v. n. 2. 83, ex Walp. Rep. v. 423=lanceolatum.
Chambersii,/'. *Muell. ex Benth. fl. Austral,* ii. 13.—Austral.
daviesoides, *Benth. I. c*—Austral,
lanceolatnm, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 24.—AustraL
latifolium, *S. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 10.—Austral.
macrocarpum, *Benth. Ft. Austral,* ii. 13.—Austral.
melanopetalum, F. Muell. Fragm. iv. 11 = undulatum.
oxyloboides, *Benth. Fl. Austral,* ii. 12.—Austral,
praemorsum, *Meissn. in lehm. PI. Preiss.* i. 25.—Austral.
subcordatum, *Benth. Fl. Austral,* ii. 11.—Austral,
tomentosnm, *Benth. I. c.* 13.—Austral,
nndnlatnm, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 642.—Austral.
vmftomm,R.Br.exBenth.Fl. Australii. 12.—Austral.

BRACHYSIPHON, A. Juss. in Ann. Sc Nat. Sér. in. vi. (1846) 24. t. 2 = 8arcocolla, Linn. (Penaeac).
acutus, A. Juss. 1. c. 25=S. acuta.
ericaefolius, A. Juss. 1. c. 24.—Afr. austx.
imbricatus, A. Juss. 1. c. 25 «=S. imbricata.
Mundii, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 102.—Afr. austr.
rupestris, Sond. 1. c. 101=S. rupestris.
speeiosus, Sond. 1. c. 103-S. speciosa.

BRACHYSPATHA, Schott, Syn. Aroid. 85 (1856) = AmorphophalluB, Blume (Aroid).
consimilis, Schott, Prod. Aroid. 127 — Hydrosme consimilis.
Konjac, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1858) ; Gait. Nachr. n. 4. p. 18= A. Rivieri.
Muelleri, Schott, Syn. Aroid. 36 = A. Mullen.
sylvatica, Schott, L c. 85 = Synantherias sylvatica.
variaiilis, Schott, 1. c.=A. variabilis.
teylanica, Schott, 1. c. 86=A. zeylanicus.

BRACHYSTACHYS, Klotzsch. in Hook. Lond. Jonm. Bot. ii. (1843) 47 = Croton, Linn. (Euphorb.).
hirta, Klotzsch, L c.=C. glandulosus.

BBACHYSTEGIA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 582 (1865). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
appendiculata, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 318. t. 42.—Afr. trop.
floribunda, *Benth. in Hook. Ic. PI.* snb t. 1859.—Afr. trop.
globiflora, *Benth. 1. c.*—Afr. trop.
longifolin, *Benth. 1. c.* t 1369.—Afr. trop.
spicaeformis, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 312.—Afr. trop.
tamarindoides, *Welw. ex Benth. I. c*—Afr. trop.

BHACHYSTELMA, R. Br. in Bot. Mag. t 2343 (1822). *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 781.
ERIOPETALUM, Wight, Contrib. Bot. Ind. 36 (1884).
MICXASTER, Harv. Gen. PI. Afr. Austr. ed. II. 242 (1868).
Amottii, *Baker, in Sound. Ref. Bot.* t 9.—Afr. austr.

BBACHYSTELHA:
attenuatum, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 65.—Ind. or.
Barberne, *Harv. ex Hook./. Bot. Mag.* t. 6607.—Afr. Rustr.
Beddomei, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 66.—Ind. or.
caudatum, N. E. Br. in Joura. Linn. Soc. xvii. (1860) 169=crispum.
circinnatum, £. *Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 196.—Afr. austr.
Comarn, *E. Mey. 1. c.* 195.—Afr. anstr.
crispnm, *R. Grah. in Edinb. Phil. Journ.* (1830) 170.—Afr. austr.
ellipticnm, *A. Rich. Tent. Ft. Abyss,* ii 49.—Abyssin.
filifonne, *Harv. Thes. Cap.* i. 68. t. 93.—Afr. austr.
Gerrardi, *Harv. 1. c.* ii. 61. t. 196.—Afr. austr.
glabrum, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 65.—Ind. or.
hirsutum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 197.—Afr. austr.
laevigatum, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 65.—Ind. or.
lineare, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 49.—Abyssin.
macrorrhizum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 197.—Afr. austr.
maculatum, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 65.—Ind. or.
micranthum, £. *Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 196.—Afr. anstr.
ovatum, *Oliver, in Sound. Ref. Bot.* t. 228.—Afr. austr.
parviflorum, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 65.—Ind. or.
plocamoides, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 112.—Afr. trop.
spathulatum, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1113.—Afr. austr.
tnberosum, *R. Br. in Bot. Mag.* t. 2343.—Afr. austr.
volnbile, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 65.—Ind. or.

BRACHYSTEMMA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 216 (1288) =Arenaria, Rnpp. (Caryopbyll.).
calycinum, D. Don, 1. c.=A. nepalensis.

BRACHYSTEMUM, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 5. t. 31, 32 (1803)-Pycnanthemum, Michx. (Labiat.).
lanceolatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 623 = P-lanceolatum.
lini/olium, Willd. 1. c. = P. linifolinm.
muticum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 6. t. 32«*V.* muticum.
verticillatum, Michx. 1. c. 6. t. 81-P. lanceolatnm.
virginicum, Michx. 1. c. 6 = P. lanceolatum.

BBACHYSTEPHANU8, Nees, in DC. Prod. xi. 511 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1105.
Lyallii, *Nees, I. c*—Madag.

BRACHYSTEPHIUM, Less. Syn. Comp. 388 (1882)-Brachycomo, Cass. (Compos.).
leucanthemoides, Less. 1. c. 38!) = B. diversifolia.
scapigerum, DC. Prod. vi. 304-B. scapigera.

BRACHYSTEPIS, Pritz. Ind. Ic. 162 (1855) => Aeonla, Lindl. (Orchid.).

BRACHYSTYLIS, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 76 (1837) = Marasmodes, DC. (Compos.).
scoparia, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 76 (=*Brachymeris scoparid).*—Afr. austr.

BRACHYSTYLUS, DuUc, Fl. Hautes-Pyr. 85 (1867)-Sloeleria, Pers. (Gramin.).
cristatus, Dulac, I. c = K. cristata.
setaceus, Dulac, 1. c. = K. setacea.

BRACHYTOME, Hook. f. Ic. PI. xi. 70. t. 1088 (1871). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 87.
Wallichii, *Hook./. II.*«.—Reg. Himal.

BRACHYTROPIS, Reichb. Consp. 120 (1828)-Polygala, Toum.
microphylla, Willk. in Oestr. Bot Zeitschr. xxix. (1879) 288 = P. microphylla.

BBACKENSIDOEA, A. Gray, Bot. U. St. Exp>-Exped. i. 361. t. 42 (1854). *OCHNACEAE,* Benth. & Hook. f.i. 318.
australiana, *F. Muell. Fragm. v.* 29.—Austral,
fascicularis, *Villar, in Blanco, ft, Phil.* ed. III. *N<n-App.* 40.—Ins. Philipp.

BRACKEWKEDOBA:—
Hookeri, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* iii. (1867) 51.—Ins. Fiji,
nwda, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 862.—Ins. Fiji,
ungnebaiica, *Oliver, in Hoot. Ic. PI.* t. 1096.—Afr. trop.

BRACONOTIA, Godr. Fl. Loir. ed. I. iii. 191 (1844) lEd. li. (1861) Braconnotia.] •> Affropyron, J.Gaeitn. (Giamin.).
-cuta, Godr. 1. c. 192 = A. acntnm.
'fymoides, Godr. 1. c. 198= A. caninum.
f.'auca, Godr. 1. c 192 = A. glancnm.
juncea, Godr. 1. c = A. jnncenm.
offidnarum, Godr. 1. c. = A. repen*.
fiutgens, Godr. 1. c.=A. pnngens.
rtgtda, Godr. 1. c. - A. glaucam et rigidum.
tncta, Godr. 1. c. = A. strictom.

BRACTEARIA, DC. ex Stead. Nom. ed. II. i. 222 (1840) =TibouohIna, Anbl. (Melast.).
KappUri, Steud. ex Cogn. in Mart. Fl. Bra., xiv. ill. 875 = T.aspera.

BRACTEOLARIA, Hochst. fa Flora, xxiv. (1841) II. 6B8=Baphia, Afzel. (Legum.).
polygalacea. Hook. f. in Hook. Niger Fl. 821 = Baphia Polygalacea.
racemosa, Hochst. in Flora, xxiv. II. (1841) 658 = Uaphia racemosa.

BRADBXTBIA, Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. ii. 260 J[18]f,1). *COMPOSITAB,* Benth. & Hook. f. ii. 261. Mrtella, *Torr. t? Gray, I. c*—Texas.

BRADBURIA, Spreng. Syst. iii. 256 (1828) -seq.

BRADBURYA, Rafin. Fl. Ludov. 104 (1817) - Wistaria, Natt (LegmninO.
«*wfa, Rafin. 1. c. 105 - W. speciosa.
scanden!, Rafin. 1. c 104-W. speciosa.

BRADDLKYA, Veil. Fl. Flnm. 98 (1825); ii. t. 140 . "Amphirpliojc, Spreng. (Violar.).
I'ealis, Veil. 1. c. 94; ii. t. 140 = A. longifolia.

BRA.t≥LAEIA, Neck. EUm. i. 169 (1790)-Siler, Scop, ^umbellif.)\,

BRADLEA, Adans. Fam. ii. 824 (1768) - Apios, lourn. (Legumfa.).

BRA D LEIA, Banks, ex Gaertn. Fract. ii. 127. t. 109 ÙKl^Gloehidfam, Fonlt. (Enphorb.).
<*ɯminata, Wall. Cat. sab n. 7856 = G. lanceo»num.
"lorescens, Steud. Nom. ed. II. i. 222 = G. arborescens.
««m«, Steud. 1. c. = G. molle.
"cnnea, Wall. Cat. n. 7868 =G. coccinenm.
" " "w, Wall. 1. c. 7872 = Cbaetocarpus castanocarpus.
»>-«ia/a, Wall. 1. c 7867-G. leiostylum.
dein"l Gaertn - e* Vahl, fide Baill. AdansonU, i. (1860) 80 = Flueggia microcarpa.
"'.l"ysoniaHa, Wall. Cat. n. 7860 - G. snperbum.
Wuca, LabUl. Sert. Austr. Caled. 76. t. 77 = G. glaucum.
Slvucophylla, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 242 = ."• glaucum.
"lochidion, Gaertn. Fract. ii. 128. t. 109 = G. ramiiorum.
torsuta, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 699 = . G. hirsutum.
'TM<"*ber, Roxb. 11. cc. 104, 698 = G. Lambertiannm.
«*P*reh, Stend. Nom. ed. II. i. 222 = G. gUmcun..
"uvtgata, Wall. Cat. n. 7858.—Ind. or.
la»?olaria, Roxb. Hort. Beng. 69 ; Fl. Ind. Hi. 697 = . G. lanceolariom.
'anceolaria, Wall. Cat. n. 7855-G. Hohenackeri et sphaerocyntm.
'•«owo, Stend. Nom. ed. II. i. 222 = G. littorale.
|*o*i, Steud. 1. c. = G. lncidnm.
'«»«««», Steud. 1. o G . lntescens.
"HKrocarpa, Steod. 1. c.=G. macrocarpnm.
•**crophyUa, Labill. Sert. Anstr. Caled. 77. t. 78-v», rnacrophyllum.
«««««, Steud. Nom. ed. II. i. 322 - G. molle.

BRADLEIA :—
mollis. Wall. Cat. n. 7868 = Glochidion hirsntnm.
meluccana, Stend. Nom. ed. II. i. 222 = G. molnccannm.
multilocularis, Spreng. Syst Ui. 18 = G. mnltilocnUre.
Nebhroia, Steud. Nom. ed. I. 116 = Cocculus Nephroia.
nitida, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 699 = G. zeylanicum.
nitida,'WM. Cat. n. 7867 = G. multiloculare.
abliqua, Spreng. Syst. iii. 19 = G. zeylanicum.
oblimia, Wight, ex Wall. Cat n. 7947 = Phyllanthus Wightianus.
obtusa. Wall. 1. c. 7869 = G. littorale.
mata, Wall. 1. c. 7052 = G. velntinum.
philippettsis, Bnch.-Ham. in Wall. I. c. 7871 - G. mntiloculare.
philippensis, Willd. Sp. PI. iv. 692-G. philippinense.
philippics, Xav. Ic. IT. 48. t. 871 = G. philippinense.
pinnata, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 700 = G. obscurant.
pubera, Roxb. 11. cc 104; 698 - G. multiloculare.
rutra, Steud. Nom. ed. II. i. 222-G. rubrum.
sinensis, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd, Bat. iii. 128 = G. obovatum.
sinica, Gaertn. Frnct. ii. 127-1. 109. f. 1-G. sinicnm.
sinica, Hort. ex Muell. Arg. in DC. Prod. IT. II.- 414 = Phyllanthns nobilis.
timorimsis, Steud. Nom. ed. II. i. 222 = G. zeylanicum.
Wightiana, Wall. Cat n. 7862 =>G. ellipticum.
teylanica, Gaertn. Fract. ii. 128. t. 109 =G. zeylanicum.
zeylanica, Labill. Sert. Austr. Caled. 76. t. 76 - G. philippinense.
zeylanica, Wall. Cat. n. 7866 G.-G. lanceolarinm.

BBAQABTIA, Lour. Fl. Cochinch. 628 (1790). *ARISTOLOCHIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 122.
APAMA, Lam. Encyc. i. 91 (1788).
ASIPHONIA, Griff, in Trans. linn. Soc. xix. (1845) 338. t. 87.
CERAHIDM, Blnme, Bijdr. 1134 (1826).
CVCLODISCUS, Klotzsch, fa Monatsb. Acad. Berl. (1859) 591.
MUNNICKIA, Reichb. Consp. 85 (18281.
STRAXAEA, Presl, Epim. Bot. 221 (1850).
TRIMERIZA, Lindl. Bot. Reg. anb 1.1543 (1882).
VANHALLIA, Schult. f. Syst. vii. 18 (1829).
corymbosa. *Griff, in Trans.Linn.Sac.xix.* (1845) 835.—Malaya.
hispida, Thw. ex Dnch. in DC. Prod. xv. i. 430 - Wallichii.
khasiyana. Griff, fa Trans. Linn. Soc. xix. (1846) 836 • tomentosa.
latifolia, Lindl. Bot. Reg. sab t 1648-Wallichii.
tnelastomaefolia, Duch. in DC. Prod. xv. I. 429 = corymbosa.
racemosa, *Lour. Fl. Cochinch.* 528.—China,
tomentosa, *Blume, Enum. PI. fav.* 82.—Ind. or.; Malaya.
Wallichii, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 7416.—Ind. or.

BRAGANTIA, Vand. Fast PI. Nov. (1771) 6 - Oomphrena, Linn. (Amarant.).
Vandelli, Stend. Nom. ed. II. i. 222-G. officinalis.

BRAKEA, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 248, 819. t. 187, 162 (18301). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 926.
armata, S. Wats, in Proc Am. Acad. xi. (1878) 146 - Erythea armata.
calcarata, Liebm. ex Linden, Cat. n. 87 (1871), sphalm. = seq. t
calcarea, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 319.—Mexic.
couduplicata, *Linden, lUustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Mexic.
dulds, J. Cooper, fa Smithson. Rep. (1860) 442 = Waihingtonia filifera.
dnlcis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 244. t. 187. 162.—Peruv.
eduUs, H. Weadl. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 120, 146-Erythea edulis.
filammtasa, Hort. ex S. Wats. 1. c 147 = Washingtonia filifera.
minima, H. Wendl. fa Kerch. Palm. 286-Sabal Adansoni?
Roezli, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 88.—Arizona,
serrulata, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 235.—Georgia.

BRAMI, Adans. Fam. ii. 208 (1768) = Herpeetie, Gaertn. f. (1805) (Scrophnl.).

BRAMIA, Lam. Encyc. i. 459 (1788), nomen pitas-Hsrpeatls, Gaertn. f. (1806) (Scrophul.).
floribunda, F. Muell. Fragm. ix. 167-H. florlbnnda.
indica. Lam. Encyc. i. 459 = H. Monniera.
lanigera, G. Don, Gen. Syst. iv. 646 = H. lanigera.
zemiserrata. Mart. Amoen. Monac. t. 8 — H. gratioloides.

BRANCIONA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 86 (1866)-Albuoa, Linn. (Liliac).
setosa, Salisb. 1. c. = A. setoa.

BRANDESIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 25.1.125 (1826) =Telanthera, R. Br. (Amarant.).
alba, Mart, ex Moq. fa DC. Prod. xiii. II. 311«Achyranthes alba.
echinocephala, Hook. f. fa Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 189 —T. echinocepbala.
elongata. Mart. Beitr. Amarant. 105. n. 4 - T. elongata.
lanceolata, Benth. PI. Hartw. 247 = T. Ianoeolata.
Martiana, Gill, ex Moq. fa DC. Prod. xiii. n. 363 - T. philoxeroides.
•*mtxica.no,* Schlecht. fa Linnaea, vii. (1832) 892-T. mexicana.
porrigens, Mart. Beitr. Amarant. 106-=T. porrigens.
puberula. Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 27 = puberuhv
pubifiora, Benth. fa Bot. Voy. Sulph. 157 = T. pobiflora.
pycnantha, Benth. 1. c. = T. pycnantha.
rufa. Mart. Nov. Gen. ii. 26.1.125 - T. rufa.
sertyllifolia. Mart. Beitr. Amarant. 106 ^ T. serpyllifolia.
villosa, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 28.1.128 = T. Martii.

BBANDISIA, Hook. f. & Thorns, fa Joura. Linn. Soc. viii. (1866) 11. t. 4. *SCROPHULARINEAE,* Benth. *ic* Hook. f. ii. 938.
discolor, Hance, fa Joura. Bot. xviii. (1880) 299 = Hancei.
discolor, *Hooi.f.* to" *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 11.—Burma.
Hancei, *Hoot./. Ft. Brit. Ind.* iv. 267.—China.

BRANDONIA, Reichb. Consp. 127 (1828) = Pinguioula, Linn. (Lentibul.).

BRANDTIA, Knnth, Rev. Gram. ii. 611. t 170 (1830) = Arundinella, Raddi (Gramfa.).
holcoides, Knnth, 1. c —A. holcoides.

BRANICA. Endl. Ench. 839 (1841), sphalm. = BRAMIA, Lam. = Herpeatis, Gaertn. f. (Scrophol.).

BRANICIA, Andrz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 476 = Beneclo, Toura. (Compos.).
insignis, Andrz. 1. c = S. racemosus.

BBAXTDZEIA, Baill. Adansonia, ix. (1869) 217. *LEGUM1NOSAE.*
fiUdfolia, *Baill. 1.* A—Ins. Mascar.

BBA8ENX4., Schreb. Gen. 872 (1789). *NYMPHAEACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 46.
HYDROPELTIS, Michx. Fl. Bor. Am. i. 328. t. 29 (1808).
IXODIA, Soland. ex DC. Syst ii. 37 (1821).
RONDACHINE, Bosc; Encyc Agric vi. (1816) 180 (nomen gallicum, tamen citatur ab DC. Syst. et Steud.).
Hydropeltis, Mnhl. Cat 65; Rafin. Med. Fl. i. 90. f. 17 = Schreberi.
nymphoides, Baill. Hist. PI. iii. 82-Scbxeberi.
peltata, Pursh, FL Bor. Am. ii. 889 - Schreberi.
purpurea, Casp. fa Join. Sc Acad. Lisb. iv. (1873-74) 312 = Schreberi.
Schreberi, *J. F. Gmel. Syst.* 853.—Ind. or.; Japon ; Austral.; Afr. trop.; Am. bor.

BRASILIASTRUM, Lam. Encyc. i. 462 (178S).
americanum. Lam. 1. c. — Comocladia Brasiliastnun et Picramnia Antidesma.

BRASILIUM, J. F. Gmel. Sytt. 417 (1791).
glabrum, J. F. Gmel. 1. c. = Picramnia Antidesma.
hirsutum, J. F. Gmel. 1. c = Comocladia Brasiliastruni.

BBASSAIA, Endl. Nov. Stirp. Dec. i. 89 (1889). *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 943.
actinophora, *Endl. I. c.*—Austral,
actinophylla, *F. Muell. Fragm.* iv. 121.—Austral,
capitata, *C.B. Clarke,in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 782.—Keg. Himal.; Burma.
Httorea, *Seem, in Journ. Bat.* ii. (1864) 244.-Amboina.
macrostachya, *Seem. 1. e.*—N. Guinea.
palmata, Decne. *8c* Planch, in Rev. Hortic. Sér. IV. iii. (1854) 10tS-Trevesia sundaica.
KSiilis, Seem, in Journ. Bot. ii. (1864) 244.—Sumatra.

BBASBAIOPBIS, Decne. & Planch, in Rev. Hortic. Sér. IV. iii. (1854) 106. *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. I i. 945.
AKALIOPSIS, Knrz, in Andam. Rep. 39 (1870).
aculeata, *Seem, in fount. Bot.* ii. (1864) 293.—Reg. Himal.
alpina, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 736.—Reg. Himal.
confluens, Seem, in Journ. Bot. ii. (1864) 292 - B. Hainla et Trevesia palmata.
cyrtostyla, *Seem. I. e.* 298.—Sumatra.
floribunda, Seem. 1. c. 262=speeiosa.
glomerulata, Regel, Gartenfl. (1863) 275. t 411 = speciosa.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* ii. 736,-Reg. Himal.
Hainla, *Seem, in Journ. Bot.* ii. (1864) 291.—Reg. HimaL
hispida, *Seem. I. c.* 292.—Reg. Himal.
Hookeri, *C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit Ind.* ii. 737.—Reg. Himal.
mitis, *C. B. Clarke, 1. c.* 736.—Reg. Himal.
palmata, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) ii. 77.—Reg. HimaL; Burma.
ricinifolia, Seem, in Journ. Bot. ii. (1864) 291 = Acanthopanax ricinifolium.
simplicifolia, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 735.—Reg. Himal.
ipeciosa, *Decne. V Planeh.in Rev. Hortic.* Sér. IV..iii. (1854) 106—Reg. Himal.

BRASSAVOLA,Adans. Fun. H.127(1708)=HSlenium, Linn. (Compos.).

BBASBAVOI.A, R. Br. in Alt. Hort. Kew. ed. II. r. 216 (1813). *ORCHIDEAE,* £:nth. & 'Hook. f. iii. 533.
LYSIMNIA, Rafin. Fl. Tellur. L 43 (1836).
TULEXIS, Rafin. 1. c. 42 (1836).
acanlis, *Lindl. V Paxt. Flow. Gar*,* ii. (1851-52) 152. f. 216.—Am. centr.
amazonica, *Poepp.* to" *Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 3.—Bras.
angu>tata, *Lindl. Bet. Reg.* (1838) *Misc.* 41.—Guiana.
appendiculata, A. Rich. *8c* Gal. in Ann. ScUat. Sér. III. iii. (1846) 23-cucullala.
Ceboletta, *Reichb.f. in Bonplandia,* iii. (1855) 821.—Hab.?
conlata, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1913.—Bras,
cncullata, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 216.—Ind. occ.
cuspidata, Hook. Bot. Mag. t. 3722-cucullata.
Digbyana, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 58 = Laelia Digbyana.
elegant, Hook. Bot. Mag. t 3098 =Tetramicra rigida.
filifolii, *Linden, Illustr. Hortic.* xiviiL (1881) 64.—N. Grariat.
flagellaris, *Rodrig. Orch. Nov.* ii 161.—Bras.
fragrans. Urn. và Jard. Fleur. iii. (1853) Misc. 78 = tubercnlata.
fragans, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 65.—Bras.
Gibbsiana, Hort. ex Nichols. Diet. Card. i. 209 = tuberculata.
glauca, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 47= Laelia glauca.
grandiflora, Lindl. L. c 16-nodosa.
Yineata, *Hook. Bot. Mag.* t. 4734.—Am. centr.
Martian*, *Lindl. Bot. Reg.* (1836) sub t. 1914.—Bras.
Mathieuana, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853; 290 = lineata.
ntdosa. Hook. Bot. Mag. (1838) t. 3229=aubulifolia.

BHASSAVOLA:—
oodosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 114.—Ind. occ.
odoratissima, Regel, Gartenfl. (1852) 325. t. 33 = cucullata.
Peninii, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1561.—Bras.
Pumilio, *Reichb. /. in Linnaea,* xviii. (1844) 402 — Mexic.
retusa, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t. 20.—Venezuela,
revoluta, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 161.—Bras,
rhopalorrhachis, *Reichb./. in Bot. Zeit.* x. (1852) 856.—Guatemala.
Sloanei, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 620 = subulifolia.
Sloanei, Lindl. ex Heynh. Nom. ii. 76, nomen (= nodosa ?).—Jamaica.
suaveolens, Gal. ex HemsL in Gard. Chron. (1879) I. 235, 236 = Epidendri sp. ?
subulifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 115.—Ins. Nevis.
surinamensis, Focke, in Tijdschr. Nat. Wetens. iv. (1851) 17 = anguslata.
tuberculaU, *Hook. Bot. Mag.* t. 2878.—Bras,
venosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 20. t. 89.—N. Granat.
vomeriformis, *Reichb. /. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 621.—Ind. occ.

BRASSAVOLAEA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii.3(1888) = praec.

BRASSAVOLEA, Sprang. Syst. iii. 744 (1826)=praec.

BRASSENIA, Heynh. Nom. i. ISO (1840) - Brasenla, Schreb. (Nymphaeac).

BBA8SIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 216 (1813). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 664.
angusta, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 5 = Lawrenceana.
antherotes, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1879) II. 782.—Ecuador.
arachnoidea, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 97.—Bras,
arcuigera, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 388.—Peruv.
aristata, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 7 = verrucosa.
bidena, *Lindl. 1. c.* 6.—Hab. ?
brachiata, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* 94.—Guatemala,
brachypus, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1875) 1.136.—Ecuador.
candata, *Lindl. Bot. Reg.* t. 832.—Ind. occ.
chloroleuca, *Rodrig. Orch. Nov. i. 07.*—Bras,
chlorops, *Endr. V Reichb. /. in Gard. Chron.* (1873) 542.—Costa Rica,
cinnabarina, *Linden, ex Lindl. Fol. Orchid. Brassia,* 6.—N. Granat.
cinnamomea. Linden, ex Lindl. L c. 6 = Keiliana.
Clowesii, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 7.—Bras.
cochleata, Knowl. *8c* Wotc. Flor. Cab. ii. (1838) 23. t. 63 = Lawnnceana.
coryandra, Morr. in Ann. Gand, iv. (1848) 295. t. 212—verrucosa.
Cowani, Hort. ex Lindl. Fol. Orchid. Brassia, 4 = verrucosa.
cryptophthalma, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1879) II. 554—Eeruv.
elegantula, *Reichb./. 1. c.* (1885) II. 616.—Mexic.
euodes, *Reichb./. I. c.* (1880) I. 680.—N. Granat.
farinifera, *Linden* b* *Reichb. /. I. c.* (1870) 923.—Ecuador.
Gireoudiana, *Reichb. /.* to" *Warsc. in Otto V Dietr. Allg. Garten:* xxii. (1854) 273.—Bras,
glumacea, *Lindl. Orch. Linden.* 17.—Venezuela.
Sttata, Lindl. in Benth. PI. Hartw. 94 = maculata.
Selenae, *Reichb. ex Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 64.—Ecuador,
hexodonta, *Reichb./. in Bonplandia,* ii. (1854) 98.—Peruv.
imbrieata, *Lindl. Fol. Orchid. Brassia,* 6.—N. Granat.
Josstiana, *Reichb. /. in Regel, Gartenfl.* iii. (1864) 309.—Bras.
KeiUana, *Reichb. /. ex Lindl.* b* *Paxt. Flow. Gard.* iii. (1852-53) 114.—N. Granat.
Lanceana, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1764.—Guiana.
Lawrcnceana, *Lindl. I. c.* (1841) *Misc.* 2. t. 18.—Bras.
longicuspis, *Reichb. /. Otia. Bot. Hamb.* 23.—Ecuador.

BBASSIA:—
longiloba, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. xi. (1848) II. 427. t. 1 = verrucosa.
macrostachya, Lindl. Sert. Orch. 16 = Lanceana.
maculata, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 215.—Jamaica,
neglecta, *Reichb. /. in Otto V Dietr. Allg. Garten:* xxiv. (1856) 822.—Am. centr.
ocanensis, *Lindl. Fol. Orch. Brassia,* 5.—N. Granat.
odontoglossoides, Klotzsch *8c* Karst. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xv. (1847) 330=verrucosa.
peruviana, *Poepp. b" Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. t, 117.—Peruv.
pumila, *Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 60 = Lanceana.
signata, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1881) II. 6.--· Hab. 1
spathacea, *Linden tf Reichb. /. in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 64, nomen.—N. Granat.
thyrsodes, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1868) 843.—Peruv.
verrucosa, *Batem. Orch.* t. 22.—Mexic.
villosa, *Lindl. Fol. Orchid. Brassia,* 4.—Peruv.
Wageneri, *Reichb./. in Bonplandia,* ii. (1854) 14.—N. Granat.
Warszewiczii, *Reichb./. in Bot. Zeit.* x. (1852) 698.—Ecuador.
Wrayae, Skinner, ex Hook. Bot. Mag. t. 4003^ maculata.

BHASSICA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1736) *CRUCIFERAE,* Benth. 8c Hook. f. i. 84.
AGROSINAPIS, Four, in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 329.
BRASSICASTRUM, Link, Handb. ii. 818 (1831).
BRASSICKLLA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 330.
BONANNIA, Presl, Fl. Sic. i. 99 (1626).
CORYNELOBUS, R. Roem. in Linnaea, xxv. (1862) 7-
ERUCASTRUM, Presl, Fl. Sic. i. 92 (1826).
GUENTHERA, Andrz. ex Bess. Enum. PL Volh. 83 (1822).
HETEROCRAMBE, COSS. *8C* Dur. Ind. Sem. Hort. Burdig. (1867) 25.
HIRSCHFELDIA, Moench, Meth. 264 (1794\
MELANOSINAPIS, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Frih. iii. 944 (1829).
MICROPODIUM, Reichb. Consp. 185 (1828).
MUTARDA, Bemh. Syst. Verz. Erf. 184 (1800).
NAPUS, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Frib. iii. 939 (1829).
RAMPHOSFERMUM, Andrz. ex Reichb. Moessl. Handb. ed. II. i. p. lvii (1827).
RAPA, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
RHAMPIIOSPERMUM, Andrz. ex Bess. Enum. PI-Volh. S3 (1822).
SINAPI, Dulac. Fl. Hautes-Pyr. 194 (1867).
SINAPIDENDRON, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. 36 (1831).
SINAPIS, Linn. Syst. ed. I (1735).
SINAPISTRUM, Spach, Hist Veg. Phan. vi. 34» (1838).
STRANGALIS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 196 (1867).
adpressa, *Boiss. Voy. Espagne,* ii. 38 J *Vis. Fl. Dal*-* iii. 859.—Europ.; Reg. Mediterr.
agrestis, Steud. Nom. ed. I. 116, 117 = Conringi* orientalis.
alba, *Boiss. Voy. Espagne,* ii. 39.—Europ.; Oriens; Ind. or. (cult.).
alba, Gilib. Fl. Lituan. ii. 63 = Conringia orientalis.
Allionii, Morrtti, Ind. Sem. Hon. Taur. (1829) (fide DC. sohed.) = oleracea.
alpina, Linn. Mant. 95 = Conringia alpina.
amplexicaulis, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Ft. Abyss,* i-28.—Abyssin.
amplexicaulis, *Janka, in Termlsi. Fütetek,* vi. (1882) 177.—Europ.
amplexicaulis, *Pomel, Mat. Fl. Alt.* 16.—Algeria.
antarctica, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 252 - magellanica.
andcaria, *Rouy tf Janka, in Termis: Fütetek,* *·' (1882) 177.—Europ.
apula, *Janka, 1. c.* 180.—Europ.
arborea, Steud. Nom. ed. 1.116, 117=campestris.
arenosa, Jord. Diag. i. 181 = B. Cheiranthos.
armoracioides, *Ctern. ex Turct. in Bull. Soc. N*i-Mosc.* xxvii. (1854) II. 311.—Ucrania.
arvensis, Habl. Taur. 146 = campestria.

BRASSICA :—
arvensis, Linn. Mant. 95 = Moricandia arvensis.
asperifolia, Lam. Encyc. i. 746 = campestris.
atlantica, Coss. & Dur. ex Munby, Cat. Pl. Algér. 2 = Gravinae.
Aucheri, Boiss. in Ann. Nat. (1842) 88 = Raphanus Aucheri.
austriaca, Jacq. Fl. Austr. iii. 45 = Conringia austriaca.
azurea, *Uspensky*, *in Bull. Soc. Nat. Mosc.* vii. (1834) 376, nomen.—Rossia.
balearica, Loisel. Fl. Gall. ii. 69 = Robertiana.
balearica, *Pers. Syn.* ii. 206.—Ins. Balear.
barbareaefolia, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 328.—Marocco.
Barrelieri, *Janka, in Termész. Füzetek*, (1882) 179. —Europ.
Besseriana, *Andrz. ex Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxiii. (1860) 1. 134.—Rossia; As. temp.
Blancoana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 29.—Hispan.
boeti *Boiss. Voy. Espagne*, ii. 38. t. 9.—Hispan.
Boissieri, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 288—Afr. bor.
Mill. Gard. Di
Vis. Fl. Dalm. »L 135—Dalmat.
brachyloma, *Boiss. & Reut. Diagn.* Ser. II. i. 30.—Marocco.
bracteata, *Janka, in Termész. Füzetek*, vi. (1882) 178. —Europ.
bracteolata, *Fisch. & Mey.* *Sem. Hort. Petrop.* iv. 33.—Aegypt.
brevipes
mura[Zi^ l. Bot. ed. III. i. 140 = Diplotaxi.
Briggsi, Varenne, in Jonm. Bot. xix. (1881) 360-B.
Rapa
asq. Cat. Ort. Bot. Nap. 17 = oleracea.
C. Syst. ii. 606.—Oriens.
Linn. Sp. «• 868--Orb. Vet. (Cosmop. cnlT).
campestris, Oed. in Fl. Dan. 650 = Thlaspi campestris.
capitata, Hort. ex Pers. oleracea.
carinata, *A. Braun* *Flora*, xxiv. (1841) 267.—Abyss.
catholica, Brot. ex Willk. & Lange, Prod. iii. 867 = Diplotaxis catholica.
caulorapa, Pasq. Cat. Ort Bot. Nap. 17 = oleracea.
cespitosa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 861.—Afr. bor.
cheiranthiflora, DC. Syst. ii. 601-B. Cheiranthos
Cheiranthos, *Vill. Prosp.* 40; *Hist. Pl. Dauph.* iii. 382. t. 36.—Europ. occ.; Afr. bor.
chinensis, Linn. Cent. 19; in Amoen. Acad. iv. 280 = campestris.
coryneloba, *Nym. Consp.* 47.—Hispan.
Cosconeana, *Boiss. & Reut. Diagn.* Ser. II. i. 31.—Hispan.
crassifolia, Forsk. Crassifolia.
cretica, Guss. Cat Hort. Boc. dit ("21) 11-rupestris.
cretica, *Lam. Encyc*
cretica, Moris, Stir. Elench. i. 3-insularis.
crispa, *Rafin. Specc* . 69.—Sicilia.
cyrenaica, *Spreng. Syst.* 911.—Cyrenaic.
deflexa, *Boiss. in Ann.* xvii. (1842) 87.—Syria; Persia.
densiflora, Jord. Diag. "6 = B. Cheirantho..
dimorpha, *Coss. & Dur.* Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 306.—Algeria.
dissecta, *Boiss.* 40.-Hispan.
elata, *Ball*, (1878) 298.—Marocco.
elongata, Caucas.; Reg.
ensifera, *Dum.* Bel. Pro. 122—Belginm.
erosa, *Turcz.* Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 11.—Afr. austr.
Erucoides Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 41 = Eruca longirostris.
Eruca, Linn. Sp. 667. Eruca(*atW)-
Erucastrum, Poll. Cheiranthos.
Erucastrum, *Linn. Pl.* 667.—Europ.
erucoides, Boiss. Voy. Bot. Espagne, i. 33 = Diplotaxis erucoides.
erucoides, Roxb. Hort. Beng. [48]; Fl. Ind. W Eruca sativa.
erysimoides, Pourr. in Mém. Acad. Tonl. fi78) 308 = B. Cheiranthos.
erysimoides, *Sieber, ex Spreng. Syst.* U. »12.-Aegypt

BBASSICA:-
fimbriata, Hort. ex Steod. Norn. ed. II. L 223-oleracea.
floridana, *Rafin. Atl. Journ.* 147.—Am. bor.
foetida, *janka, in Termes*. Fiitetek*, vi. (1882) 177. —Europ.
foliosa, Willd. Ennm. Hort. Berol. 688=alba.
Forakahli, *Schult. Ots.* 131. n. 1012.—Oriens.
fragilis, Sieber, ex Sprang. Syst. ii. 912 = Diplotaxis acris.
frotescens, *Soland. ex DC. Syst.* ii. 624.—Ins. Madera.
frntinulosa, *Cyril. Pl. Rar.* ii. 7. t. 1.—Reg. Mediterr.
geniculata, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 327 =adpressa.
glabemma, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 364.—Algeria.
glareosa, Jord. Diagn. i. 183 - B. Cheiranthos.
gongylodes, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 8-oleracea.
gracilis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 225.—Algeria.
grandiflora, Balansa, ex Coss. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. i. (1864) 221-sabularia.
Gravinae, *Tenon, Prod. Ft. Nap.* 89. t. 62.—Ital.; Afr. bor.
Griffithii, Hook. f. *Sc* Thorns, in Jonm. Linn. Soc. v. (1861) 171=Diplotaxis Griffithii.
Havardi, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 863.—Algeria,
heleniana, *Butch, ex Loud. Hort. Brit.* 264.—Ins. S. Helen.
keterophylla, Boiss. ex Nym. Syll. 197-adpressa.
hirta, *Moench, Metk. Suppl.* 84.—Hab.?
hispida, *Boiss. Voy. Espagne*, ii. 40.—Hispan. j Afr. bor.
hispida, Tenore, Prod. Fl. Nap. 89 = Ernca sativa.
humilis, Boiss. Voy. Espagne, 36=IatisUiqna.
homilis, *DC. Syst.* ii. 698.—Gallia.
hybrida, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* 69.—Italia.
incana, Maly, Ennm. Stirp. Austr. 272 = Botteri.
incana, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* 39.—Italia,
insolaris, *Moris, Fl. Sard.* i. 168.- Sardinia,
intricata, *Janka, in Termisz. Futetei*, vi. (1882) 179. —Europ.
japonica, Siebold, ex Miq. Ann. Mm. Bot. Lngd. Bat. ii. 74-anriculata>
juncea, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* vi. (1859) 609.—As. temp, et trop. (cnlt.).
laciniata, Steud. Norn. ed. I. 116, 117-oIeracea.
laevigata, *Lag. in Varied. Cienc.* ii. IV. (1806) 40.—Hispan.
lanceolata, *Lange, in FL Dan.* t 2658.—Dania.
lanceolata, *Sauv. Jt. Cut.* 2.—Cuba
latisiliqua, *Boiss. V Reut. Diagn.* Ser. II. i. 30.—Hispan.
lativahis, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 72=Eruca lativalvis.
leptocarpa, *Boiss. Fl. Orient*, i. 392.—Persia,
leptopetala, *Sond. in Harv. If Sand. Fl. Cap.* i. 31.—Afr. austr.
leucantha, Boiss. ex Nym. Consp. 46 = nivea.
loncholoma, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 360—Algeria.
longirostra, *Boiss. Voy. Espagne*, ii. 40.—Hispan.
lutea, Gilib. Fl. Litnan. ii. 62 =Conringia austriaca.
lyrata, *Desf. Fl. Atlant. U.* 96. t 166.—Afr. bor.
macloviana, Urv. in M^m. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 616=Arabis macloviana.
macrocarpa, *Guss. in Presl, Fl. Sic. i.* 92.—Sicilia.
macrorkiia, S. F. Gray, Nat AIT. Brit PI. ii. 682 = campestris.
magellanica, Gandich. Freyc. Voy. Bot. i. 136 in nota = Arabis macloviana.
magellnnica, *Pers. Syn.* ii. 207.—Reg. Magellan.
maritima, Tardent, Ess. Hist. Nat. Bcssar. 79 = oleracea.
maurorum, *Dur. in Duck. Rev. Bot.* ii. (1847) 433. —Algeria.
mesopotamica, Bernh. ex Stead. Nom. ed. II. i. 223 = B. Sinapis.
mollis, *Vis. Fl. Dalm.* iii. 859—Europ. austr.
monensii, *Huds. Fl. Angl.* etl. II. 2H1.—Europ. occ.
montana, DC. Fl. Fr. iv. 661 - B. Cheiranthos.
montana, Rafin. Speech, ii. 60 = rupestris.
Morieandia, Boiss. Voy. Espagne, ii. 841 = Moricandia arvensis.
moricandoides, Boiss. Elench. 10 = Moricandia Ramburei.
muralis, Hnds. Fl. Angl. ed. II. 291»DiploUxis tennifolia, muralis.
muscovita, Steud. Nom. ed. 1.117-oleracea.

BBA8SICA:—
Napella, Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 884-campestris.
napoirassica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-campestris.
Napus, Linn. Sp. Pl. 666=campestris.
nerrosa, *Ball, in Journ. Bet.* xi. (1873) 299 (sp. dubia). —Marocco.
nigra, *Koch, in Roehl. Deutschl. Fl.* ed. III. iv. 718.—Orb. vet; (Cosmop. cult.).
niralis, *Boiss. tf Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 32. - Graecia.
nivea, *Boiss. V Sprun. 1. c.* Ser. I. i. 72.—Graecia.
nudicaulis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 861.—Algeria.
obtusangula, *Reichb. in Moessl. Handi.* ed. IL ii. 1186. —Europ.
obtusangulata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 121 = B. Erucastrnm.
ochroleuca, Soyer-Willem. in Ann. Sc. Nat. ii. (1824) 116 = B Cheiranthos.
odorata, *Schrank, ex Steud. Nom.* ed. 1.117.—Europ. ?
oleifera, Moench, Meth. 268 = campestris.
oleracea. *Linn. Sp. PI.* 667.—Europ. occ. (Cosmop. cult).
oleracea. Lour. Fl. Cochinch. 396 - campestris.
oleronensis, *A. Savat, exFoucaud, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 74.-Gallia.
orientalis, Linn. Sp. PI. 666=Conringia orientalis.
ovalis, *Viv. Fl. Libyc. Spec.* 35. 1.16. f. 3.—Libya,
oxyrrhina, *Coss. Notes Crit.* ii. 26.—Hispan.
oxyrrhyncha, Coss. ex Kegel, Ind. Sem. Hort Petrop. (1868) 84 = oxyrrhina.
paiustris, Bivona, Fl. Forojuliensis Syllab. (1865) 18 =elongata.
papillaris, Boiss. Elench. 10=sabularia.
pendula, *Boiss. Voy. Espagne*, ii. 35.—Hispan.
peregrina, Steud. Nom. ed. 1.117 = oleracea.
per/oliata, Crantz, Slirp. Austr. ed. II. 37; Lam. Kl. IT. ii. 487 =Xonringia orientalis.
persica, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. L. viii. 26 = elongata.
petrosa, Jord. Diagn. i. 185 - B. Cbeiranthos.
pinnata, *Spreng. Syst.* ii. 911.—Afr. bor.
pinnatinda, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 95. t. 165.—Hispan. Afr. bor.
Pollickii, Shuttl. in Mag. Zool. Bot. ii. (1838) 581 = R Cheirantbos.
polymorpha, Murr. in Nov. Comm. Gott vii. (1777) 36. t. 6= juncea.
polymorpha, Syme, Engl. Bot. ed. III. L 138=campestris.
prdecox, Watdst & Kit. ex DC. Syst. ii. 698=campestris.
Preslii, *Janka, in Termisi. Füutek,yi.* (1882) 181—Europ.
Prolongi, *Boiss. Voy. Espagne*, ii. S3.—Hispan.
propera, Jord. Diagn. i. 183 = B. Cheiranthos.
pseudoerucastrum, *Brot. Fl. Lusit. i.* 681.—Lusitan.
psammophila, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 363.—Algeria.
purpurascens, *[Soland. in] Russell, Aleppo*, ed. II. ii. 258.—Syria.
purpurea, Milliard. Diet. ed. VIII. n. 6=Moricandia arvensis.
pyrenaea, Jord. Diagn. i. 187 = B. Cheiranthos.
quadrivalvis. *Hook./. V Thorns, in Journ. Linn. Sue.* v. (1861) 170.—Ind. or. (cult.).
racemiflora, Jord. Diagn. i. 184=B. Cheiranthos.
Rapa, Linn. Sp. PI. 666 «= campestris.
rectangularis, *Viv. in Linnaea, i.* (1826) 602.—Corsica.
recunata, Jord. Diagn. i. lb2 = B. Cheiranthos.
repanda, *DC. Syst.* iL 698.—Gallia.
rerayensis, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1878) 299.—Marocco.
Richerii, Lange, in Fl. Dan. xlv. t. 2658=lanceolata, *Lange*.
Richerii, *Vill. Prosp.* 40.—Gallia.
Roberliana, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sit. I.* vii. (1826) 416.—Europ.
ro-trata, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (18»2) 600.—Ins. Socotr.
Rouyano, *Janka, in Termism. Futetek*, vi. (1882) 181. —Europ.
rutra, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 224 = oleracea.
rnpestris, *Rafin. Caratteri*, n. 191.—Sicil.
rnpicola, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 362.—Algeria.
sabellica, Hort. ex Pers. Syn. ii 206, in syn.=oleracea.
sabularia, *Brot. Fl. Lusit.* i. 582.—Lusitan.; Afr. bur.

BBA88ICA :—
sabularia, Willk. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 854-oxyrrhina.
Saruna, Siebold, in Verh. Bat. Gen. xii. (18S0) 52 = campestris i
Schimperi, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1812) 86.—Arabia,
scoposa, *Janka, in Tennis: Fužetek,* **vi. (1882) 179.—** Europ.
sempervirens, *Tenure, ex Schrant, Hort. Monac.* **t. 10.** —Europ. austr.
setigera, *Willk. in Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 867.—Hispan.
sinaica, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 85 = Moricandia sinaica.
Sinapistrnm, *Boiss. Voy. Espagne,* ii. 39.—Europ.
Sinapis, *Vis. Fl. Dalm.* iii. 136.—Europ. (Cosmop. cult).
sisymbrioides, Fisch. ex DC. Prod. i. 217 =Tournefortii.
sphaerorhiaa, S. F. Gray, Nat Arc. Brit. PI. ii. 683 = campestris.
spinescens, *Pomel, Nouv. Mai. Fl. AH.* **364.—** Algeria.
Stocksii, Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc. v. (1861) 171=Tournefortii.
stricta, Nestl. ex DC. Syst. ii. 593-campestris.
strigosa, *DC. I. c.* 608.—Afr. austr.
suihastata, Willd. Sp. PI. iii. 660 = Sisymbrium orientate.
subspinescens, Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1839) II. 145 = Sisymbrium subspinescens.
subularia, Pers. Syn. ii. 207 (sphalm.)=sabularia.
suffruticosa, Desf. Fl. Atlant. ii. 94=Moricandia arvensis.
sylvestris, Mill. Gard. Diet, ed. VIII. n. 4. = oleracea.
taraxacifolia, Boiss. Elench. 11=Sisymbrium crassifolium.
tenuifolia, Baill. Hist. PI. iii. 227 = Diplotaxis tenuifolu.
teretifolia, Desf. Fl. Atlant U. »4=Moricandia teretifolia
Tigrid'is, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviL (1842) 87 = deflexa.
timoriana, *F. Mutll. Papuan PI.* ii. 4.—Ins. Timor.
Tinei, *Tod. Ind. Sent. Panorm.* (1861) 82.—Hab.1
torulosa, Dor. in Dnch. Rev. Bot. iL (1847) 434 = Diplotaxis siifolia.
Toumefortii, *Gouan, Illustr.* 44. t. 20. f. A.—Reg. Mediterr.; Oriens; Ind. or.
trilocularis, *Hook.f. V Thorns, in Jojtrn. Linn. Soc.* **v.** (1861) 169.—Reg. Himal.
trimestris, Boenn. Prod. Fl. Monast. 201= campestris.
tuberosa, Salisb. Prod. 272 = campestris.
turgida, Pers. Syn. ii. 207 = Eruca sativa.
Turrita, Weig. Obs. 32-Conringia orientalis.
Uechtritziana, *Janka, in TermisM. Ftitetek,* **vi. (1882)** 182.—Europ.
•alentina, *DC Syst.* ii. **60S.—**Hispan.
varia, *Dur. in Duck. Rev. Bot.* ii. (1847) 484.—Afr. bor.
vesicaria, Linn. Sp. PI. 668 = Eruca vesicaria.
villosa, Bivon. ex Spreng. Syst iv. Cnr. Post. 243 = inpana.
viminea, Boiss. Voy. Espagne, ii. 83 = Diplotaxis viminea.
violacea, Burm. f. Fl. Ind. 140=campestris.
violacea, *Linn. Sp. PI.* 667 (sp. dub.).—China.
virgata, Boiss. Voy. Espagne, ii. 35 = Diplotaxis virgata.
Washitana, Muhl. Cat. 63 - Streptanthus macnlatus.
Willdenovii, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842)88=juncea.

BRASSICARIA, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 (I860)=**Bra*. Bioa,** Tourn. (Crucifer.).
Jiumilis, Lamotte, Prod. L 87 = B. humilis.

BRASSICASTRUM, Link, Handb. ii 318 (1831) - Brassica, Tourn. (Crucifer.).
elongatum, Link, 1. c.-B. elongaU.

BRASSICELLA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 330 = Brassiea, Toum. (Crucifer.).
arenosa, Fourr. 1. c. = B. Cheiranthos.
Chtiranthos, Fourr. L c.-B. Cheiranthos.

BRATHYDIUM, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 442 (1836); et in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 366 = Hypericum, Toum.
canadense, Spach, 1. c 446-H. pyramidatum?
Chamaerinum, Steud. Norn. ed. II. i. 224, sphalm.=
Cha^aenerium, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 445 = H. sphaerocarpum.
grandiflorutn, Spach, 1. c. 443 = H. dolabriforme.
hyssopifolium, Spach, 1. c. 445 = H. cistifolium.
sphaerocarpum, Spach, 1. c. 444 = H. sphaerocarpum.

BRATHYS, Mutis, ex Linn. f. Suppl. 43 (1781) - Hyperlcum, Toum.
acerosa, Spach, in Ann. Sc Nat Sér. II. v. (1886) 866 = H. laridlolium.
acicularis, Spach, 1. c. = H. aciculare.
Billardieri, Spach, 1. c. 367 - H. graminenm.
caespitosa, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 20 « H. japonicum.
canadensis, Spach, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. v. (1886) 367 = H. canadense.
caracasana, Spach, 1. c. 366 = H. caracasanum.
connata, Spach, 1. c. = H. connatum.
debilis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 20 - H. japonicum.
denticulata, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1886) 367 = H. denticulatum.
Drummondii, Spach, 1. c. = H. Drummondii.
Erythraea, Spach, 1. c. 367-- H. angulosum.
euphorbioides, Spach, 1. c.=H. mutilum?
Forsteri, Spach, 1. c. = H. gramineum.
gentianoides, Spach, 1. c. = H. Sarothra.
humifusa, Spach, 1. c. = H. japonicum.
indecora, Spach, 1. c. = H. thesiifolium.
japonica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 19 - H. japonicum.
juniperina, linn. f. Suppl. 268 = H. Brathys.
lanceolata, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. II. v. (1836) 387 = H. angulosum.
laridfolia, Spach, 1. c. 366 = H. laricifolium.
laxa, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 19 = H. japonicum.
linoides, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. IL v. (1836) 367 «= H. angulosum.
moranensis, Spach, 1. c. = H. moranense.
Mutisiana, Spach, 1. c. 366 = H. mexicanum.
nepalensis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 19 = H. japonicum.
oryetum, Blume, 1. c. 20 = H. japonicum.
paniculata, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1886) 367=H. paniculatum.
pauciflora, Spach, 1. c. = H. panciflornm.
prolifica, Payer, Organ. 8. t. [1] = H. densiflorum.
quinquenervia, Spach, 1. c. = ri. mutilum.
radicans, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 20 = H. japonicum.
struthiolaefolia, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 866 = H. struthiaefolinm.
tarquensis, Spach, 1. c. 867 = H. thesiifolium.
thesiifolia, Spach, 1. c. = H. thesiifolium.
thuyoides, Spach, 1. c. 366 = H. thuyoides.
thymifolia, Spach, 1. c. = H. Humboldtianum.
tomentosa, Spach, 1. c. 367 = H. setosum.

BRAUNEA, Willd. Sp. PL iv. 797 (1805), *ex parte*= Tiliacora, Colebr. (Menisperm.).
menispermoides, Willd. 1. c. = T. racemose.

BRAUNERIA, Neck. Elem. i. 17 (1790)=Echinacea, Moench (Compoa.).

BRAUNLOWIA, A. DC. Prod. xvii. 290 (1873) = Brownlowia, Roxb. (Tiliac.).

BRAVAI8IA, DC. in Bibl. Univ. xvii. (1838) 124 (Rev. Bign. 16). *ACANTHACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. ii. 1084.
ONYCHACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 217 (1847).
floribunda, *DC. Prod.* ix. 240.—Mexic

BBAVOA, Lex. in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc fasc. i. 6 (1824). *AMARYLLIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 737.
COETOCAPNIA, Link & Otto, It PI. Rar. 85 (1828).
ZKTOCAPNIA, Link & Otto, 1. c. i. 1.18 (sphalm.) (1828).

BBAVOA:—
Bulliana, *Baker, in Gard. Chron.* (1884) H. 328.- Am. austr.
Coetocapnia, M. Roem. Syn. Ensat 245=geminiflora.
geminiflora, *Lex. in La Llave V Lex. Nov. Veg. Desc.* fasc. i. 6.—Mexic.
sessiliflora, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 54.—Mexic.

BRAXIPIS, Rafin. Sylva Tellur. 72 (1838) = Bteroulia, Linn.
grandifiora, Rafin. 1. c. = S. grandiflora.
nitida, Rafin. 1. c. 78 = Cola acnminata.

BRAXIREON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 (1836) -Tapeinanthus, Herb. *(1»W)* (AmaryU.).
humile, Rafin. 1. c. = T. humile.

BRAXYLIS, Rafin. Sylva Tellur. 51 (1838) = **Hex,** Tourn.
obcordata, Rafin. I. c. = I. obcordata.

BBAYA, Stemb. *Sc* Hoppe, in Denkichr. Regensb. i. •• (1815) 65. *CRVCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 82.
APHKAGMUS, Andrz. ex DC. Prod. i. 209 (1824).
EUDEMA, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aequin. ii. 138. t. 135 (1809), nomen prius.
ORBAS, Cham. *Sc* Schlecht. in-Linnaea, i. (1826) 29. 1.1.
OROBIUM, Reichb. Consp. 186 (1828).
PLATYPETALUM, R. Br. in Parry, Voy. App. 866 (1824).
aenea, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp. (1841) 8" alpina.
alpina, *Sternb. tf Hoppe, in Denkschr. Regensb.* **i. ••** (1815) 66.—Alp. Europ.; Reg. arct; Tibet.
arctica, Hook, in Parry, Voy. App. 887 = alpina.
calycina, *Wedd. Chlor. And.* t 86.—Reg. Andin.
dubia, R. Br. ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii- (1861; 819=alpina.
Eschscholtziana, *Benth. &• Hook. f. ex S. Wats. BiU- Ind. N. Am. Bot.* **51.—Am. arct.**
falcata, Hochtst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 17 ~- Sisymbrium falcatum.
glabella, Richards, in Frankl. 1st Joum. 743 <* alpina.
imbricatifolia, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i- 68=Sisymbrium imbricatifolinm.
involucrata, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 194.—Sibir. altaic.
Limosella, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp. (1841) *i"* Sisymbrium Limosella.
limoselloides, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. 1. 194 = Sisymbrium Limosella.
Meyeri, Bunge, ex Walp. Rep. ii. 766 (= Parryae sp.)- —Sibir. altaic.
nana, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp.* **(1841) 8.—Sibir.** baical.
Novae-Zelandiae, *Hook.f. Handb. New Zeal. Ft.* **18•—** N. Zel.
oregonensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881- 82) 199.—Am. bor. occ.
oxycarpa, Hook. f. *Sc* Thorns, in Tourn. Linn. Soc. v. (1861) 169=alpina.
pilosa. *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 65. t 17.—As. et Am- arct.
pinnatifida, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 60 = Sisymbrium pinnatifidum".
purpurascens, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 195 -" alpina.
pusilla, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* **i. 57.—** Chili,
rosea, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp.* **(1841) 8.—As.** arct.; Reg. altaic. et Himal.
Schamhorsti, *Regel &• Schmalh. in Act. Hort. Petrop-* v. (1877) 241.—Turkestan,
siliquosa, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp.* **(1839)** *T.—Cf- Linnaea,* xiv. 118.—Sibir. altaic.
supina, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 50 = Sisymbrium supinum.
Thomsoni, Hook. f. in Joum. Linn. Soc. v. (1861) I*[8] = alpina.
tibetka, *Hook.f. tf Thorns. I. c—***Tibet, occ.**
Tilingii, *Regel V Tiling, in Nouv. Him. Soc. Nat- Mosc.* xi. U859) 61.—Ross. bor.
uniflora, *Hook. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* [T]- (1861) 168.—Tibet, occ.
versicolor, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xv. (1«*[3]>** 281.—Sibir. baical.

BHATEBA, Kunth, in Bayer, Not. Vermif. (1824). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 622.
BANKESIA, Bruce, Travels, v. 22, 28 (1790); Ed. II. vii. 181 (1805).
BRACEKA, Engelm. in Buchner, Rep. Pharm. lxviii. T (1839) 869.
HAGEA, Poir. 1B Diet. Sc. Nat. xii. 253 (1818).
HAGENIA, J. F. Gmel. Syst. 618 (1791).
anthelmintica, *Kunth, I. c*—Abyssin.

BRAZOHIA, Engelm. & Gray, in Bost Joum. Nat. Hist v. (PI. Lindh.) 255 (1845). *LABIATAE,* Benth. * Hook. f. ii. 1204.
Roemeriana, *Scheele, in Linnaea,* ndi. (1849) 690.—Texas,
scutellarioides, *Engelm. tf Gray, in Bast. Joum. Nat. Hist.* v. (1845) 257.—Texas,
truncata, *Engelm. V Gray, 1. c.* 256.—Texas.

BREBISSONIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Se>. II. IT. (1886) 175=Fuchsia, Linn. (Onagrar.).
lucropkylla, Spach, 1. c-K. microphylla.
thymifolia, Steud. Norn. ed. II. i. 225 = F. thymifolia.

BREDEMEYERA, Willd. in Ges. Natnrf. Freunde Neue Schr. iii. (1801) 412. t. 6. *POLYGALEAE,* Benth. & Hook. f. i. 188.
CATOCOMA, Benth. in Hook. Joum. Bot iv. (1842) 101.
HUALANIA, Phil, in Linnaea, xxxiii (1864-65) 18.
acuminata, Klotzsch, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. B«s. xiii. III. 51-myrtifolia.
acuminata, *Poepp. ex Klottseh, in Peters, Reise Mqssamb. Bot.* 117.—Afr. trop.
altissima, *A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xuii. HI. 50. "—Am. austr.
"acteata, *Klottseh, ex Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i 187.—Guiana,
orevifolia, *Klottseh, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* »»• III. 49.—Bras,
euneata, *Klottseh, ex Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 187.—Guiana.
62—Bras.
Honbunda, *Willd. in Ges. Naturf. Freunde Neue Schr.* iii. (1801) 412.—Am. austr.
H'laireana, Klotzsch, ex A. W. Benn. in Mart Fl. Bras. xiii. m. 52=.laurifolia.
Kunthiana, *Klottseh, ex A. W. Benn. 1. c.* 53.—Bras.
UMifolia, *Klottseh, ex A. W. Benn. 1. c.* 52.—Bras.
'-"ottkyana, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 117=floribunda.
lucida, *A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 51.—Bras.
lucida, *Klotzsch, ex Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. «gd. Bat.* i. 189.—Guiana.
Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 117=lucida.
"atiana, *A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.* xffi. in, 49. Bras.
Roca, Exped. Rio-Negro, ii. ag«nia.
"lontaana, *Klotzsch, ex Hassk. in Miq. Ann. Mus. of-Lugd. Sat.* i. 188.—Guiana.
50.—Bras.
parviflora, *A. W. Benn. 1. e.* 6L-Am. trop.
revoluta, *A. W. Benn. 1. c.* 49. Bras.
Sellowii, *Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* 9.—Bras,
velutina, *A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras,* xiii III. 58. —Bras.

BREDIA (1849) 758.
MELASTOMACEAE, Benth. & Hook. f. i.
irsuta, Blume, I. c. 26.—Japon.
Oldhami, Hook./. IcPl. 1.1085.—Ins. Formosa.

BRACONNOTIA, Less. Comp. 9 (1832) = Cnicus, Linn.
arboica, Less. L c. 10 = C-arTensis.

BRACTEOLANTHUS, f ? * " *. Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 25-BtryohnoB, Lmn. (Lopu..).
*#i*ota,* Hanr. 1. c. 26=S. spmon.

BREHMIA, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 85 = Favonia, Cav. (Malvac).
arborescens, Schrank, 1. c.=P. velutina.

BREHNIA, Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 561 sphalm.-Behnia, Didiichs. (Liliac).

BHEMONTrEHA, DC. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* I. iv. (1825) 93. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 464.
Ammoxylon, *DC. 1. c*—Ins. Mascar.

BBEONIA, A. Rich, in Mint. Soc. Hist. Nat Par. v. (1830) 290. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 32.
madagascariensis, *A. Rich. I. c.*—Madag.

BREPHOCTON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 49 (1886) = Bochonia, DC. (Compos.).
cuneatum, Rafin. 1: c.=K. cuneata.

BRETEUILLIA, Bnchoz, ex DC. Prod. vi. 503, in syn. (1837)-Didelta, Less. (Compos.).

BREVIGLANDIUM, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 423 (1867) -Hottonla, Linn. (Primul.).
palustre, Dulac, 1. c.=H. palustris.

BBEVOOKTIA, Wood, in Proc. Acad. Sc. Philad. (1867) 81. *UUACEAE,* Benth.*Sc* Hook. f. iii. 800.
coccinea, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1878) 289 = Ida-Maia.
Ida-Maia, *Wood, in Proc. Acad. Sc. Philad.* (1867) 82.—Calif.

BREWERIA, R. Br. Prod. 487 (1810). *CONVOLVVLACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 876.
BONAMIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 837.
CALYCOBOLUS, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 2 (1819).
CODONANTHUS, G. Don, Gen. Syst. iv. 166 (1856).
DETHARDINGIA, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 80.
DUFOUREA, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 118. t. 214 (1818).
PREVOSTEA, Choisy, in Aon. Sc Nat *Sir. I.* iv. (1825) 497.
REINWARDTIA, Spreng. Syst i. 527 (1825).
SEDDERA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 7.t6.
STYLISHA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
TRICHANTHA, Karst & Triana, in Linnaea, xxviii (1856) 437.
W'ILBERFORCIA, Hook. f. ex Planch, in Hook. Ic. PI. t. 796 (1848).
abscissa, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 438.—Madag.
afiicana, *Benth. if Hook./. Gen.* iii. 877.—Afr. trop.
aquatica, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 217.—Am. bor.
brevifolia, *Benth. Fl. Austral,* iv. 436.—Austral.
Burchellii, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. GenH.* vi. (1883) 493.—Bras.
Choisyana, *Steud. Norn.* ed. II. i 224.—Ind. or.
cordata, *Blume, Bijdr.* 722.—Ind. or.; Malaya,
elegans, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1883) 494.—Burma.
evotvuloides, Choisy, 1. c.=Choisyana.
evolvuloides, *K. Br. in Salt, Abyss. App.* 65.—Abyss,
nstigiata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 83.—Ins.Socotr.
ferruginea, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 877.—Bras,
glomerata, *Balf.f. 1. c.*—Ins. Socotr.
grandiflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 51. —Florida.
Hildebrandtii, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 528. —Afr. trop.
hispida, *Franch, in Rfaoil.Comali,* 43.—Afr. trop.
inunistrata, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii I. 217.—Am. bor.
Lugsdorffii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 825.—Bras,
latifolia, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 224.—Afr. bor.; Arab.; Ind. bor. occ
linearis, *R. Br. Prod.* 488.—Austral.
linifolia, Spieug. Syst i 614 = Wahlenbergia Unanoides.
madagascariensis, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1888) 493.—Madag.

BBEW3SBIA :—
malvacea, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 245=Convolvulus malvaceus.
media, *R. Br. Prod.* 488.—Austral.
Menziesii, *Benth. V Hook. f. Gen.* iii. 877.—Ins. Sandvic.
mexicana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 400.—Mexic.
minima, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 228.—CaliC
ovalifolia, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 217.—Am. bor. occ
oxycarpa, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 76 => evolvuloides.
pannosa, *R. Br. Prod.* 488.—Austral.
panifiora, Arn. ex Steud. Norn. ed. II. i 224= Convolvulus parviflorus.
pedunculate, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 88.—Ins. Socotr.
Pickeringii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. 1.217.—Am. bor.
rosea, *F. Muell. Fragm.* i. 233.—Austral.
Roxburghii, Choisy, in Mem. Soc Phys. Genev. vi. (1883) 493=cordata.
scoparia, *Lindl. Fl. Med.* 400.—Hab. ?
secunda, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 470 (err. typ. 70). —Afr. trop.
sericea, *Griseb.in Goett.Abh.* xu. (1874) 229.—Reg. Argent,
somalensis, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 523.— Afr. trop.
spectabilis, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1833) 493.—Madag.
valerianoldes, *Villar, in Blanco, Fl. Phil.* ed. III. *Nov. App.* 143.—Ins. Philipp.
vennlosa, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 326.—Bras,
virgata, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 523.— Afr. austr.

BREWERINA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 620=Arenaria, Rupp. (Caryophyll.).
suffrutescens, A. Gray, 1. c. =A. congesta.

BREWSTERA, M. Roem. Syn. i. Hesp. 132, 141 (1846)-Ixonanthes, Jack (Lineae).
crenata, M. Roem. 1. c. 141 = L icosandn.

BBEXIA, Noronha, ex Thou. Gen. Nov. Madag. 20 (1806). *SAXIFRAGEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 645.
VENANA, Lam. Illustr. ii. 09. 1.131 (1800), nomen prim.
acanthifolia, Noronha, ex Tul. in Ann. Sc Nat *Sir.* IV. viii. (1857) 159=madagascariensis.
amplifolia, Noronha, 1. c.=madagascariensis.
cauliflora, *Tul. I. c.* 161.—Madag.
chrysophylla, Sweet, Hort Brit ed. I. 492=madagascariensis.
digyna, Noronha, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. viii. (1857) 159—madagascariensis.
heterophylla, Boj. Hort. Maurit 5 2 - madagascariensis.
Lucanana, *Lubbers, Cat. PI. Rar.* 6.—Hab.!
madagascariensis, *Thau, ex Ker-Gavl. in Bot. Reg.* t. 730.—Madag.
microcarpa, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1867} 160.—Ins. Seychell.
ovatifolia, Noronha, ex Tul. 1. c. 159 — madagascariensis.
serrata, Presl, Rep. Bot. Syst. i. 190=madagascariensis.
spinosa, Lindl. in Bot. Reg. t. 872 = madagascariensis.

BBETN1A, Forst Char. Gen. 145. t. 73 (1776). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 276.
FOERSTERIA, Scop. Introd. 98 (1777).
MELANTKESA, Blume, Bijdr. 590 (1825).
MELANTHESIOPSIS, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 74.
acuminata, *Muell. Are. in DC. Prod.* xv. II. 442.— Ins. Philipp.
axillaris, Spreng. Pngill. ii. 92 =disticha.
cernua, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 439.— Austral.; Ins. Timor.
cinerascens, Baill. Adansonia, vi. (1866) 844 * oblongifblia.
discigera, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. H. 440.— Malaya,
disticha, Araf. *Char. Gen.* 146. t. 73.—N. Caied.

BREYMTA:—
microphylla, *Muell. Arg. in DC. Prod.* **xv. II. 442.—Java.**
Muelleriana, **Baill. Adansonia, vi. (1866) 344 = stipitata.**
oblongifolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* **xv. II. 440.—Austral.**
paniculata, **Spreng. Pugill. ii. 93 (gen. dub.).—Ind. or.**
racemosa, *Muell. Arg. in DC. Prod.* **xv. II. 441.—Java.**
rhamnoides, *Muell. Arg. 1. c.* **440.—As. trop.**
rhynchocarpa, *Benth. Fl. Austral,* **vi. 114.—Austral,**
rubra, *Muell. Arg. in DC. Prod.* **xv. II. 438.—Java,**
stipitata, *Muell. Arg. I. e.* **442.—Austral,**
virgata, *Muell. Arg. 1. c.* **441.—Java.**

BREYNIA, [Plum.] linn. Gen. ed. I. 118 (1737) = Capparis, Tourn.
indica, **Linn. Sp. PI. 508=C. Breyniana.**

BREZIA, Moq. in DC. Prod. xiii. n. 167 (1849)-Suaeda, Forsk. (Chenop.).
heterophylla, **Moq. 1. c.=5. heterophylla.**

BRICKELLIA, EtL Sketch, ii. 290 (1824). ***COMPOS IT AE,*** **Benth. & Hook. f. ii. 247.**
BULBOSTYLE, DC. Prod. v. 138 (1836).
CLAVIGERA, DC. 1. c. 127 (1836).
COLEOSANTHUS, Cass. in Bull. Soe. Philom. (1817) 67.
ISMARIA, Rafin. Sylva Tellur. 117 (1888).
KOSALESIA, La Llav. & Lex. Nov. Veg. Desc. i. 9 (1824).
atractyloides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **viii. (1870) 290.—Am. bor. occ.**
baccharidea, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 87.—Texas; Arizona,**
betonicaefolia, *A. Gray, I. c.* **ii. 72.—N. Mexic; Arizona.**
brachyphylla, *A. Gray, 1. c.* **i. 84.—Am. bor. occ**
californica, *A. Gray, PI. Fendl.* **64.—Am. bor. occ.**
Cavanillesii, *A. Gray, PI. Wright, i.* **85.—Mexic**
cedrosensis, *Greene, in Bull. Torrey Club,* x. (1883) **86.—Ins. Cedros.**
cordifolia, *Ell. Sketch,* **ii. 290.—Am. bor.**
corymbosa, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 84.—Mexic**
Coulteri, *A. Gray, 1. c.* **86.—Am. bor. occ**
Cumingii, **Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 325 = Chrysopsis oregana.**
cylindracea, *A. Gray, ex Engelm. in Proc. Am. Acad.* **i. (1846) 46,-Texas.**
dentata, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 301.—**Texas; Arizona.**
difiusa, *A. Gray, PL Wright,* **i. 86.—Am. trop.**
Fendleri, *A. Gray, PI. Fendl.* **68.—N. Mexic**
floribunda, *A. Gray, PI. Wright,* **ii. 73.—Arizona,**
frutescens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xviL (1881-82) 207—Calif.**
Galeottii, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 85.—Mexic.**
grandiflora, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. **vii. (1841) 287.—Am. bor. occ**
Greenei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xii. (1877) 58.—Calif.**
Hartwegi, *A. Gray, PI. Wright.* **L 85.—Mexic.**
hastata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 21.—Calif,
hebecarpa, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 85.—Mexic.**
hymenochlaena, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xv. (1880) 29.—Mexic.**
incana, *A. Gray, 1. c.* **vii. (1868) 350.—Calif.**
laciniata, **A. Gray, PI. Wright i. 87=dentata.**
lanata, *A. Gray. I. c.* **84.—Mexic.**
Lemmoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xvii. (1881-82) 2O6.-Calif.**
lineari/olia, **Klatt, in Abh. Naturf, Ges. Halle, xv. (1882) 325-Bigelowia Douglasii.**
linifolia, *Eaton, in Bot. King, Exp.* **187. t 15. f. 1-6.—Am. bor. occ.**
longifolia, *S. Wats, in Am.Natural.™.* **(1873)301 Am. bor. occ.**
microphylla, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 85.—Am. bor. occ.**
mohavensis, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* **i. II. 104.—Calif,**
mnltiflora, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* vii. (1877) **49.—Calif.**
Nevinii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1886) 297. **—Calit**

BBICKBLIiIA:
oblongifolia, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. **vii. (1841) 288.—Am. bor. occ.**
odontophylla, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. **(1881-82) 206.—Mexic.**
oliganthes, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 84.—Arizona; Mexic.**
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 80.—**Mexic.**
Parryi, *A. Gray, I. c.* **31.—Mexic.**
parvula, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 84.—Texas,**
paucidentata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. **(1882) 326.—Ins. S. Croc**
pendula, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 85 N. Mexic.**
pinifolia, *A. Gray, 1. c.* **84.—Bras.**
Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xvii. (1881-82) 206.—Arizona.**
reni/ormis, **A. Gray, PI. Wright i. 86-Wrightii.**
Riddellii, *A. Gray, I. c.* **83.—Texas.**
Rosalesia, *Benth. V Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **ii. 106.—Mexic.**
Rusbyi, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 106.—**N. Mexic.**
scoparia, *A. Gray, PI. Wright,* **i. 84.—Mexic**
secundiflora, *A. Gray, 1. c.* **86.—Mexic**
Seemanni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 30. **—N. Mexic.**
simplex, *A. Gray, PI. Wright,* **ii. 73.—Arizona,**
spinulosa, *A. Gray, I. c.* **i. 84.—Mexic.**
squamulosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) **30.—Mexic.**
tenera, **A. Gray, PI. Wright, ii. 72 = Wrightii.**
thyrsiflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xv. (.1880) 30. —Mexic.**
tomentella, *A. Gray, PI. Wright.* **i. 85.—Mexic.**
veronicaefolia, *A. Gray, 1. c.*—**Mexic**
Wislizeni, *A. Gray, PI. Fendl.* **64.—Arizona; Mexic.**
Wrightii, **Dnrand & Hilg. in Pacif. Rail. Rep. v. 8 = califomica.**
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* **ii 72.—Am. bor. occ.**

BRICKELLIA, Rafin. in Med. Repoa. New York, v. (1808) 358»Oilia, Ruiz & Pav. (Polemon.).

BRICOUR, Adans. Fam. ii. 428 (1763)-Myagrum, Tonrn. (Crucifer.).

B B I D E I J I A , Willd. Sp. PI. iv. 978 (1806) (Briedelia).
EUPHORBIACEAE, **Benth. & Hook. f. iii. 267.**
CANDELABRIA, Hochst. in Flora, xxvii. (1843) 79.
CLUYTIA, Roxb: ex Steud. Nomr. ed. II. i. 225 (1840).
PENTAMERIA, Klotzsch, ex BailL Etud. Gen. Euph. 684 (1858).
ZARCOA, Llanos, in Bot. Zeit. xv. (1857) 423.
acuminata, **Wall. Cat. n. 7885-Phyllanthus bicolor.**
alnifolia, *Griff. Notul.* **iv. 481.—Burma.**
amoena, **Wall, ex Baill. Etud. Gen. Euph. 584 = retuaa.**
angoUnds, Muell. Arg. in Seem.Journ. Bot. ii. (1864) **827.—Afr". trop.**
atroviridis, *Muell. Arg. I. c.*—**Afr. trop.**
attenuata, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 166.—**Ind. or.**
Bemeriana, *Baill. Adansonia,* **ii. (1861-62) 89.—Madag.**
Berry ana. **Wall. Cat. n. 7876, 7960-=Phyllanthus indicus.**
tmxifolia, *Baill. Adansonia,* **ii. (1861-62) 230.—N. Caled.**
cathartica, *Bertol.f. in Mem. Ace. Sc. Bolog.* v. (1854) **476.—Afr. trop.**
chartacea, **Wall. Cat n. 7881 = Cleistanthus chartaceus.**
coccolobaefolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. **(1885) 441.—Madag.**
collina, **Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 811- Cleistanthus collinus.**
crenulata, **Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 734 = retusa.**
dasycalyx, *Kurt, in Journ. As. Soe. Beng.* xlii. (1873) **II. 241.—Banna,**
divenifolia, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 211.—**Malaya,**
elegans, *Muell. Arg. in Seem. Journ. Bot.* ii. (1864) **327.—Afr. occ.**

BBLDEIiIA:—
exaltata, *F. Muell. Fragm.* **iii. 82.—Austral.**
faginea, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 120.—**Austral.**
ferruginea, *Benth. in Hook. Niger Fl.* **511.—Afr. trop.**
gambecola, *Baill. Adansonia,* **i. (1860-61) 79.—Afr. trop.**
glauca, *Blume, Bijdr.* **597.—Java.**
glauca, **Wall. Cat. n. 7876=praec I (Glochidionis sp.).—Penang.**
Hamikoniana, *Wall. I. c.* **7882.—Ind. or.**
heterantha, **Wall. 1. c. 7873 = Glochidion Wallichianum.**
horrida, **Dillw. Review Hort. Malab. 15=Scleropyron Wallichianum.**
insulana, *Hance, in Journ. Bot.* **xv. (1877) 887.—China.**
lancaefolia, **Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 737 *> tomentosa.**
lanceolata, *Kurm, ex Teijsm. If Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* **xxvii. (1864) 46.—Malaya.**
lancifolia, **Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 7884-tomentosa.**
lamina, *Baill. Adansonia,* **ii. (1861-62) 229.—N. Caled.**
Leichardtii, **Baill. Etud. Gen. Euph. 584=faginea.**
Loureirii, **Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 211-tomentosa.**
melanthesoides, *Klottsch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* **103.—Afr. trap,**
micrantha, *Baill. Adansonia,* **iii. (1862-63) 164.—Afr. trop.**
montana, **Wall. Cat. n. 7879-retusa.**
montana, *Willd. Sp. PI.* **iv. 978.—Ind. or.**
Moonii, *Thru. Ertum. PI. Zeyl.* **279.—Zeylan.**
multiflora, *Zipp. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iv. 119.—Amboina.**
oblongifolia, **Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 212 = Cleistanthus chartaceus.**
ovata, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1835) **484.—Austral.; Burma; Malaya; Ins. Timor.**
patula, **Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 212 - Cleistanthus patulus.**
Pervilleana, *Baill. Adansonia,* **ii. (1861-62) 88.—Madag.**
polystachya, **Baill. Etud. Gen. Euph. 584=Cleistanthus polystachyus.**
pubescens, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) **II. 241.—Reg. Himal.; Burma.**
retusa, **Baill. Etud. Gen. Euph. 584, nomen=Moonii.**
retusa, **A. Juss. Tent. Enphorb. 27. t. 7=stipularis.**
retusa, *Spreng. Syst.* **iii. 48.—Ind. or.; Malaya.**
rhamnoides, **Griff. Notul. iv. 480 = tomentosa.**
rhomboidalis, *Baill. Adansonia,* **ii. (1861-62) 87.—Ins. Borbon.**
rugosa, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 446.—Sumatra.
scandens, **Willd. Sp. PI. iv. 979 = stipularia,**
scleroneura, *Muell. Arg. in Flora,* **xlvii. (1864) 616.—Afr. trop.**
sinica, **J. Grah. Cat. Bomb. PI. 179-Cleiitanthus malabaricust**
speciosa, *Muell. Arg. in Seem. Journ. Bot.* ii. (1864) **327.—Afr. trop.**
spinosa, **Hort. ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 563-Damnacanthus indicus.**
spinosa, **Willd. Sp. PL iv. 979-retusa.**
stenocarpa, *Muell. Arg. in Flora,* **xlvii. (1864) 616.—Afr. trop.**
stipitata, *Baill. Adansonia,* **ii. (1861-63) 229.—N. Caled.**
stipularis, *Blume, Bijdr.* **597.—Ind. or.; Malaya; Afr. trop.**
stipularis, **Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. *U» Cleistanthus stipularis.**
tenuifolia, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* **ii. (1864) 828.—Afr. trop.**
tomentosa, *Blume, Bijdr.* **697.—Ind. or.; Malaya! Austral.**
Tulasneana, *Baill. Adansonia,* **ii. (1861-62) 40.—Madag.**
urticoides, **Griff. Notul. iv. 481-tomentosaI**
Zollingeri, **Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 364=stipularis.**

BBTDGESIA, Bert, ex Cambess. in Nouv. Ann. Mui. Par. iii. (1834) 234. t 18. ***SAPINDACEAB,*** **Benth. & Hook. f. i. 393.**
TRIPTEROCARPUS, Meissn. Gen. 52 (1837).
inciaifolia, *Bert, ex Cambess. 1. c.* **285.—Chili.**

BRIDGESIA, Hook. Bot. Misc. il. (1881) 222. t.92« PolyaohyruB, Lag. (Compoa.).
nhinopsoides, Hook. 1. c - P. sphaerocephalus.

BRIDGESIA, Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 168. t. 102=ErcUla, A. Juss. (Phytolacc.).
spicata, Hook. & Am. 1. c. 169 = E. volubilis.

BRIEDELIA, Willd. Sp. PI. iv. 978 (1805)=Bridelia, 'WiUd.^Eaphorb.).

BBIQHAMIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 185. *CAMPANULACEAE,* Benth. & Hook. .tii.546.
"wignis, *A. Gray, 1. c.* —Ins. Hawaii

BRIGNOUA, Bertol. in Desv. Joura. Bot ii. (iv.) (1815) 76i-Kundmannia, Scop. (Umbellif.).
Panacifolia, Heynh. Nom. i. 181, sphalm.-seq.
/Htstinacifolia, Bertol. in Desv. Joum. ii. (iv.) (1815) 76-=K. sicula.

BRIGNOUA, DC. Prod. iv. 444 (1830)=I«ertia, Schreb. (Rubiac).
-cuminata, DC. 1. c-Ins. Trtoit.
fiubigera, Benth. in Hook. Jonm. Bot. iii. (18*0) 219. —Guiana.

BRIMANTAISIA, Beanv. Fl. Owar. ii. 67. t. 100 (1805). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1076.
BELANTHERIA, Nees, in DC. Prod. xi. 96 (1847).
. LEDCORHAPHIS, Nees, 1. c. 97 (1847).
"Ma, *T. Anders, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. - (1875) 125.-Afr. trap,
lusuta, *T. Anders, in Joum. Agri-Hart. Soc. Ind.* - N-.S.i. (1868)287.—Afr. trap,
^"nium, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 477.—Afr. trap.
°wariensis,fln,»rtr. *Fl. Owar.* ii. 68.1.100. f. 2.—Afr. trop.
PMula, *T. Anders, in Joum. Linn. Soc.* vii. (1864) 21. —Afr. trop.
Pibescens, *T. Anders, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* - MIX. (1875) 125—Afr. trop.
Kutenbergiana, *Vttke<'« Bremen Abk.* ix. (1885) 181. —Afr. trop.
Vogeliana, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 477.—Afr. trop.

BRIMEURA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 26 (1866) = Hyaeinthus, Tonm. (Liliac.).
""uthystina, Salisb. 1. c. = H. amethystinus.

BRIMYS, Scop. Introd. 252 (1777) err. typ. = Drimys, *°rst. (Magnol.).

BRINDONIA, Thou, in Dict Sc. Nat. v. 839 (1804) = Qarotoia'Li (G. . tola, Linn. (Guttit).
"Ubtea, Thoo. I. c. 841=G. cornea ?
'"nackinensis, Thou. 1. c. - G. cochlnchinensis.
'ndica, Thon. 1. c. 840 = G. indica.

BRISEGNOA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 291 (1849) =Oi
"Meiinj, Remy, 1.c. 292=O. dendroides.

BRISEIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 92 (1866) - Allium,
"•J«rtra, Salisb. 1. c 93 = A. triqnetrnm.

BRISSONIA, Neck. Elem. iii. 36 (1790); Desv. [Journ. i. (1814) 78]; in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 411 = Indigofera, Linn. et Tephrosia, Pers. (Lewnin.).
cor°Hillaefolia, Desv. Journ. i. (1814) 7 8 ^ T. coronillaefoha,
f'pularis, Desv. 1. c.=T. stipularis.
""Pesicarpa, Desv. 1. c. = seq.»
*«ne*icarpa,* Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 41 1 = 1. senegalensis.

BRITOA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 485 = Campomanesia, Ruiz & Pav. (Myrtac).
Berg, 1. c. 436 ; et in Mart. Fl. Bras. xiv. 1.461. —Bras.
dichotoma Berg, 11. cc. 436, 463.—Bras.
eriantha, Berg, 11. cc.=C. eriantha.
peidioides Berg, 11. cc. 486. 462.—Bras.
rugosa Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 618.—Bras.
Sellowiana. Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 487; et in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 468.—Bras.
"wyfora, Berg, 11. cc. 436, 461.—Bras.
'"flora, Berg, 11. cc. 436, 462=C. triflora.

BRIZA, Linn. Syst. ed. I (1785). *GRAM/NEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1194.
CALOTHECA et CHASCOLYTRUM, Desv. in Nov. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 190.
POA, Adans. Fam. ii. 34 (1763).
TREMUIARIA, Heist. Syst. 12 (1748).
anceps, Linn, ex Munro, in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 44-media.
aspera, Knapp, Gram. Brit. t. 61-minor.
auriculata, Trev. ex Steud. Syn. PI. Gram. 288=triloba.
barbata, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. i. (1881) 863.—Bras.
Berteroniana, *Steud. Syn. PL Gram:* 283.—Chili.
bipinnata, Linn. Syst. Nat. x. 875-Eragrostis cynosorioides.
canadensis, *Michx. Ft. Bor. Am.* i. 71.—Am. bor.
canadensis, Nntt Gen. Am. i. 69 pro parte-Glyceria nervata.
capensis, Schrank, Hort. Monac. t. 43=maxima.
capensis, Thunb. Prod. Fl. Cap. 21=Eragiostis brizoides.
caroliniana, Lam. Encyc. i. 465; Dlustr. i. 187. t. 46. f. 3=Uniola paniculata.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 79=Eragrostis major.
Clusii, Schnlt. in Roem. & Schnlt. Mant ii. 294 = media.
cynosuroides, Scop. Delic Insub. ii. 21=Demazeria sicula,
deltoidea, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 8.—Afr. anstr.
disticha, Moench, Meth. 185 = Demazeria sicula.
dnra, *Desv. Opusc.* 105.—Am. anstr.
elatior, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec i. t 75=media,
elegans, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 186.—Bras.
Eragrostis, Desf. Fl. Atlant. i. 78 = Eragrostis minor.
Eragrostis, Linn. Sp. PI. 70='Eragrostis major,
erecta, *Lam. Jllustr. Gen. i.* 187.—Reg. Argent,
flava, *Desv. Opusc.* 106.—Am. anstr.
genicnlata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 21.—Afr. anstr.
grandis, Salisb. Prod. 21-maxima.
humilis, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. i. 66=spicata.
imbricata, Steud. in Flora, xii. (1829) 489 = Poa Uniolae.
Lamarkiana, Cham. *Sc* Schlecht in Linnaea, vi. (1831) 39=rotnndata.
Lamarckiana, *Nees, Agrost. Bras.* 481.—Am. austr.
lutescens, [Foncault, in] Desv. Joum. iii. (1814) t. 24. f. 2=media.
macrostachya, *Steud. Nom.* ed. II. i. 225.—Pernv.
major, Desv. ex Knnth, Enum. PL i. 371-pnlchella.
major, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 42=maxima,
maxima, *Linn. Sp. PI.* 70.—Reg. Mediterr.; Afr. anstr.
media, *Linn. 1. c.*—Europ.; Oriens; As. bor. (Amphig. advent).
megastachya, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. i. 225 = Eragrostis major,
microstachya, *Steud. I. c*—Pernv.
minima, Hort. ex Nichols. Diet. Gard. i. 212 = minor,
minor, *Linn. Sp. PI.* 70.—Europ.; Oriens; As. bor. (Amphig. advent).
monspessulana, Gouan, Hort Monsp. 45'maxima,
montana, *Brouss. Cat. Monsp.* (1804); *Roem. V Schult. Syst.* ii. 521.—TenerifTa 1
mucronata, Lam. Encyc. i. 465=Lamarckiana.
mnltiflora, *Forst. ex Beauv. Agrost.* 156, nomen.—Oriens.
Neesii, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 132.—Bras,
nigra, *Bunk, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 225.—Afr. austr.
oblonga, Moench, Meth. 185=Eragrostis major,
paudflora, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1858) 86.—Europ.
pilosa, *Schur, Enum. PI. Transs.* 766.—Hungaria.
Poa, Nees, ex Stend. Syn. PI. Gram. 283-Neesii.
pulchella, *Kunth, Rev. Gram.* i. 120.—Ins. TenerifT.
pnrpurascens, *Muhl. Descr. Uber.* 154.—Carolina,
reniformis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 225.—Peruv.
rotundata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 284.—Mexic.
rubella, *Steud. I. c.* 282.—Afr. trop.
rubens, Poir. SuppL i. 699=maxima.
rubra. Lam. Illustr. i. 187; Pen. Syn. i. 98-maxima.
rufa, Steud. Nom. ed. II. i. 226.—Pernv.
scabra, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 276. n. 191 = Neesii.
Sellowii, *Nees, ex Steud. 1. c.* 284. n. 26.—Bras.
serotina, Dnm. Obs. Gram. Belg. 110-media,
spicata, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 8.—Afr. anstr.

BRIZA:—
spicata, Lam. Encyc. i. 465 = Poa Michanxii.
spicata, *Sibth. V Sm. Fl. Graec.* i. t. 77.—Graecia: As. Min.
spicigera, *Steud. Nom.* ed. II. i. 225.—Peruv.; Chili.
stricta, *Steud. I. c*—Chili.
subaristata, *Lam. Illustr.* i. 187.—Reg. Argent.
toluccensis, *H. B.* b* *K. Nov.' Gen. et Sp.* i. 148.—Mexic.
tremula, Lam. Fl. Fr. iii. 687 = media.
trichotoma, *Steud. in Flora,* xxix. (1840) 20.—Japon.
triloba, *Nees, Agrost. Bras.* 482.—Reg. Argent.
Uniolae, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 283 = Eragrostis Uniolae.
violascens, Stend. 1. c.-snbaristata.
virens, Una. Sp. PI. ed. II. 103=minor.
virens, Walt Fl. Carol. 79 -Poa obtnsa.
virens, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VL i. (1831) S62=media.
viridis, Pall, ex Steud. Nom. ed. II. I 226=minor.

BRIZOPHILE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 34 (1866) = Ornlthogalum, Toura. (liliac).
nutans, Salisb. 1. c. = O. nntans.

BRIZOPYRUM, Link, Hort. Berol. i. 159 (1847)=-Demaseria, Dum. (Gramin.).
siculum, Link, 1. c - D. sicula.

BRIZOPYRUM, J. Presl, in ReL Haenk. 280 (1830) = Distichlis, Rafin. (Gramin.).
acutifiorum, Nees, Fl. Afr. Austr. 371 = Eragrostis aculiflora.
alternans, Nees, 1. c 369 = Poa altemans.
americanum. Link, Hort Berol. i. 160 = Distichlis maritima.
boreaie, Presl, Rel. Haenk. 28=Disticblis maritima.
bromoides, Presl, 1. c. = Poa bromoides.
calydnum, Presl, 1. c. 281=Poa calycina.
capense, Nees, Fl. Afr. Anstr. 371 -Poa Uniolae.
condensatum, Fourn. Mex. PI. Enum. Gram. 121; ex HemsL Biol. Centr. Am. Bot. iii. 578 = Distichlis condensate.
cyperoides, Nees, Fl. Afr. Austr. S74 = Eragroslis cyperoides.
Douglasii. Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 404 = Poa Douglasii.
obtusifiorum, Fonrn. Mex. PI. Enum. Gram. 120; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 579 = Distichlis thalassica.
ovatum, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 282.—Peruv.
pilosum, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 280=Distichlis thalassica.
prostratum, Benth. ex Fourn. Mex. PL Ennm. Gram. 120; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot iii. 678 = Distichlis prostrata.
scirpoideum, Steud. Syn. PI. Gram. 282 = Schedonorus scirpoideua.
spicatum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 403 = Distichlis maritima.
subspicatum, J. Presl, in Rel. Haenk. 281 - Poa subspicata.

BRIZULA, Hieron. in Bot Zeit xxx. (1872) S06 « Aphella, R. Br. (Centrolepid.).
Drummondii, Hieron. in Abh. Natnrf. Ges. Halle, xii. (1873) 206=A. Drummondii.
gracilis, Hieron. 1. C.=A. gracilis.
Muelleri, Hieron. 1. c. 207 = A. Briiula.
Pumilio, Hieron. 1. c.-A. Pumilio.

BROCCHIA, Mauri, ex Tenore, Cat Ort. Napoli, 80 (1845)->8immondsia, Nntt. (Euphorb.).
dichotoma, Mauri, 1. c. =S. califomica.

BROCCHIA, Vis. PL Aeg. et Nnb. 35 (1886) = Cotula, Linn. (Compos.).
cinerea. Vis. 1. c.=C. cinereum.
Kotschyi, Schnlt. ex Schweinf. *St.* Aschere. Ennm. 288-C. Kotschyi.

BBOOCHimA, Schult. f. Syst. vii. 1250 (18S0). *BROMELIACEAE,* Benth. & Hook. f. Gen. iii. 665.
cordylinoides, *Baker, in Joum. Bot.* xx. (1882) 380.—Gniana.
paniculata, *Schult. f. Syst.* vii. 1250.—Bras.
Plumierii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 598.—Ind. occ.
redncta. *Baker, in Joum. Bot.* xx. (1882) 381.—Gniana.

BROCHOSIPHON, Nees, in DC. Prod. xi. 492 (1847) -Diclip tera, Juss. (Acanthac).
australis, Nees, 1. c.=D. glabra.

BBODIAEA, Sm. in Trans. Lhm. Soc. x. (1811) 2.1.1. *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 800.
CALLIPRORA, Lindl. Bot. Reg. 1.1590 (18SS).
DICHELOSTEMMA, Kunth, Enum. PI. iv. 469 (1843).
GARDINIA,Bertero, 'in Merc. Chil. i. (1829)'.—Cf. Férussac, Ball. xx. (1830) 111.
HESPEROSCORDUM, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1293 (1829).
HOOKERA, Salisb. Parad. Lon<L t. 98 (1808), nomen prius.
SCADUAKINTOS, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 23 (1836).
SEUBERTIA, Kunth, Enum. PI. iv. 475 (1843).
THEMIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 85 (1866).
TRITELEIA, Dougl. ex Lindl. Bot Reg. sub 1.1293 (1829).
VEATCHIA, Kellogg, in Pioc Calif. Acad. ii. (18691) 11.
alliacea, Miers, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 875 = Leucocoryne alliacea.
Bridgesii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 237.—Calif.
cali/ornica, Lindl. ex Lem. in Fl. des Series, Sir. I. v. (1849) 428 b=giandiflora.
capitata, *Benth. PI. Hartw.* 889.—Am. bor. occ.
cocdnea, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 389. —Calif,
congou, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 3.1.1.—Am. bor. occ.
crocea, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 288. -Calif.
Dooglasii, *S. Wats. I. c.* 237.—Am. bor. occ.
ñlifolia, *S. Wats. 1. c.* xvii. (1881-62) 381.—Calif,
gracilis, *S. Wats. I. c.* xiv. (1879) 288.—Calif.
grandiflora, Pursh, Fl. Am. Sept i. 223=lactea.
grandiflora, 5m. *in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 2.—Am. bor. occ.
grandiflora, Torr. in Stansb. Rep. 397 - Douglasii.
Howellii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 301.—Am. bor.
ixioides, Sims, Bot. Mag. t. 2S82 = Leucocoryne ixioides.
ixioides, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 238. —Am. bor. occ.
lactea, *S. Wats. I. c*—Am. bor. occ.
laxa, 5. *Wats. 1. c.* 237.—Calif.
Lemmonae, 5. *Wats. 1. c.* xx. (1885) 376.—Arizona,
minor, *S. Wats. I. c.* xiv. (1879) 236.—Am. bor. occ.
mnltiflora, *Benth. PI. Hartw.* 889.—Am. bor. occ.
parviflora, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. (1854) 125=multiflora.
pedtmcularis, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 237.—Calif.
stellaris, 5. *Wats. 1. c.* xvii. (1881-82) 380.—Calif,
terrainis, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1868) 8. —Calif.
Torreyi, Wood, in Proc Acad. Sc. Philad. (1868) 172=terrestris.
volubilis, Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xi. (1871) 377 = Stropholirion californicnm.

BROGNIARTIA, Walp. Rep. ii. 994 (1843) - Brongniartia, H. B. & K. (Legumin.).

BBOMBYA, F. Mnell. Fragm. v. 4 (1865). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 991.
platynema, *F. Muell. I. c*—Austral.

BBOMELIA, [Plum.] ex linn. Syst. ed. I (1735). *BROMELIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 660.
AGALLOSTACHYS, Beer, Bromel. 35 (1857).
ANANAS, Gaertn. Fruct. i. 30.1.11 (1788).
PINGDIN, [Dill.] Adans. Fam. ii. 67 (1768).
PSBDOMELIA, Neck. Elem. iii. 150 (1790).
Acanga, Linn. Syst ed. XII. 232 = B. Pinguin et Karatas Plumieri.
Acanga, Schnlt. f. Syst. vii. II. 1281 = Aneococcus micranthus.
Acarna, Thunb. ex Schnlt. f. 1. c. 1283, nomen.—Hab. ?
acaulis, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 204 = Karatas Plumieri.
agavaefolia, Brongn. in Rev. Hortic. (1875) 247 = Karatas agavaefolia.
agavoides, *Carr.l. c.* (1881) 31.—Hab.?

BBOMELIA :—
albo-bracteata, *Steud. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 53, nomen.—Chili.
albo-rosea, Lem. IUustr. Hortic. ii. (1855) Misc. 64 = Aechmea suaveolens.
Ananas, Linn. Sp. PI. 285 = Ananas sativus.
antiacantka, Bertol. in Virid. Bonon. Veg. (1824) 4; Colla, Hort. Ripnl. App. ii. 342 - fastuosa.
aquilega, Salisb. Pared. Lend. t. 40 = Aechmea aquilega.
anensis, Veil. FL Flum. 130; iii. t. 114 - Quesnelia rufa.
bicolor, Ruiz & Pav. FL Peruv. Chil. iii. 33 = Rhodostachys bicolor.
Binoti, Hort. Jacob-Makoy.—Cf. Gard. Chron. (1880) II. 151 = B. Pinguin.
bracteata, Schult f. Syst. vii. II. 1280, ex parte-Aechmea laxiflora.
bracteata, Sw. Prod. Vcg. Ind. Occ. 56 •= Aechmea bracteata.
Caratas, Hill, Veg. Syst vii. 19 = Karatas Plumieri.
cornea, Beer, Bromel. 31 = Rhodostachys andina.
Carolinae, Beer, 1. c. 29; Ortg. ex Regel, Gartenfl. vi. (1857) 361 = Karatas Carolinae.
chrysantha, *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 28.—Am. anstr.
clandestina, Hort. ex Carr. in Rev. Hortic. (1880) 256 = Greigia sphacelata.
comata, *Beer, Bromel.* 34.—Bras.
Commeliniana, De Vriese, Del. Sem. Hort. Amst 1844; ex Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xii. (1845) 49-fastuosa.
cotnosa, Hill, Veg. Syst. vii. 18 — Ananas sativus.
concentrica, Beer, Bromel. 29 = Karatas Laurentii?
crassa, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 53 —Greigia Landbecki.
cruenta, K. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. (Oct-Dec. 1828) 174-Billbergia cruenta.
denticnlata, *C. Koch, Wochenschr.* ii. (1859) 151.—Bras,
discolor, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 48.—Am. austr.
edulis, Salisb. Prod. 247 = Ananas sativus.
elegans, *Hort. Hamb. ex Schult. f. Syst.ni.* II. 1283. -Hab. I
exsudans, Lodd. Bot. Cab. t 801 ^ Aechmea exsudans.
fastuosa, *Lindl. Collect.* 1.—N. Granat.
Femandae, *Morr. in IUustr. Hortic.* xviii. (1871) 114. t. 65.—Bras,
gigantea, *Hort. Vindob. ex Schult. /. Syst.* vii. II. 1283.—Hab. ?
glabra, Schult. f. 1. c 1286 = Ananas sativus.
hemispherica, Lam. Encyc i. 145 = Karatas humilis.
Hookeri, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 425=Aechmea nudicaulis.
humilis, Linn. Syst. ed. XII. 232; Jacq. Enum. Vindob. App. 306-Karatas humilis.
ignea, Beer, Bromel. 35 = B. Pinguin.
incarnata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 32 = Billbergia incarnata.
inermis, Steud. Nom. ed. II. i. 226=Ananas sativus.
iridifolia, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 16 = Billbergia iridifolia.
Itatiaiae, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 114.—Bras.
Joinmllei, E. Morr. ex C. H. Morr. in Belg. Horlic. xxvi. (1876) 161. t. 10, 11 - Rhodostachys pitcairniaefolia.
Karatas, Linn. Sp. PL 285 = Karatas Plumieri.
laciniosa, *Mart, ex Schult. /. Syst.* vii. H. 1278.—Bras.
laevis.tforr. *Carlsruh.ex Schult. f. 1. c.* 1288.—Hab.?
Landbecki, Lechl. ex Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 246-Greigia Landbecki.
lanuginosa, Beer, Bromel. 82 — Puya lanuginosa.
lasiantha, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. II. 1233 = Puya lanata.
latifolia, *Willd. ex Schult/. 1. c.* 1288.—Ins. Antigua.
Lindleyana, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852-53) t 228, in obs.=Araeococcus micranthus.
lingulata, Linn. Sp. PI. 285 = Aechmea lingulata.
longifolia, Lindl. in Paxt Flow. Gard. ii. t. 65 - Rhodostachys andina.
longifolia, *Rudge, Gui.* i. 31. t. 49.—Guiana,
longifolia, *KlotBsch, in Schomb. Reise,* iii. 908, nomen. —Guiana,
lucida, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 345-Ananas sativus.

BBOMELIA :—
lutea, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Easeq. 146-Aechmea nudicaulis.
melanantha, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 766-Aechmea bromeliaefolia.
Mertensii, G. F. VV. Mey. Prim. Fl. Esseq. 144-Aechmea Mertensii.
mexicana, *Nois. ex Schult. /, Syst.* vii. II. 1283, nomen.—Mexic.
Moensi, *Linden, Cat.* (1873) n. I. 6.—Bras.
muricata, Arruda, Diss. PI. Bras. 21'Ananas bracteatus?
nudicaulis, Linn. Sp. PI. 286 = Aechmea nudicaulis.
nudicaulis, Reichb. Ic. Exot. 185 = Billbergia pyramidalis.
pallida, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 344 = Billbergia speciosa.
paniculata, J. F. Gmel. Syst. 529 = Aechmea paniculigera.
paniculigera, Reichb. Ic. Exot. t. 239, 240=Aechmea exsudans.
paniculigera, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 56 = Aechmea paniculigera.
paudflora, *C. Koch, Wochenschr.* ix. (1866) 183.—Hab.)
Pinguin, *Linn. Sp. PI.* 285.—Am. trop.
pitcaimi/olia, C. Koch, Wochenschr. xi. (1868) 325= Rhodostachys pitcaimiaefolia.
pumila, *Hort. ex Schult. f. Syst.* vii. II. 1288.—Hab.?
pyramidalis, Sims, Bot Mag. t. 1732 - Billbergia pyramidalis.
pyramidata. Beer, Bromel. 34=Puya pyramidata.
Rohaniana, Walp. Ann. vi. 71 = Billbergia vittata.
rubra, Hort ex Schult. f. Syst. vii. II. 1285-Ananas sativus.
Sagenaria, Arruda, Diss. PI. Bros. 14-Ananas bracteatus.
scarlatina, Hort. ex Herincq, Hortic. Franç. (1869) 246 = Distiacanthus scarlatinus.
scarlatina, *E. Morr. ex C. H. Morr. in Belg. Hortic* xxxi. (1881) 164.—Bras.
Sceptrum, Hueg. Parad. Vind. fasc. viii. (sic) - fastuosa.
semiserrata, Willd. Enum. Hort. Berol. 345 = Ananas sativus.
sepiaria, *Hort. ex Schult./. Syst.* vii. II. 1283.—Hab.?
Serra, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 328.—Reg-Argent
sessiliflora, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 118.—Am. austr.
silvestris, Veil. Fl. Flum. 129; iii. t. 113-Ananas sativus.
sphacelata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 32. t. 474 Greigia sphacelata.
spicata, *Lam. Encyc. i.* 146.—Ins. Martinic.
subspinosa, Wendl. ex Schult. f. Syst. vii. n. 1286-Ananas sativus.
surinamensis, *Miq. in Linnaea,* xviii. (18441 878.—Guiana,
sylvestris, *Willd. ex Sims, Bot. Mag.* t. 2392.—Am. trop.
thyrsi/olia, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. II. 1282« Aechmea spicata.
tinctoria, Mart. Reise Bras. ii. 554 -Aechmea bromeliaefolia.
tristis. *Beer, Bromel.* 30.—Bras.
variegata, Arruda, Diss. PL Bras. 7 - Billbergi" speciosa.
violacea, Hort ex Schult. f. Syst. vii. II. 1286* Ananas sativus.
viridis, Hort ex Schult. f. 1. c.—Ananas sativus.
lebrina, Herb, in Bot Mag. t. 2686 - BiUbergl* zebrina.

BROMFELDIA, Neck. Elem. ii. 847 (1790) = J*~ tropha 1, Linn. (Enphorb.).

BBOMHEABIA, Lindl. Bot. Reg. (1841) App. 9°- *ORCHIDEAE,* Benth.. & Hook. f. iii. 540.
aporoides, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 44.—Burma.
Finlaysoniana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 630, 882 -palustris.
palustris, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 89-" Malaya.

BROMIDIUM, Nees ft Meyen, in Nov. Act. Nat-Cur. xix. Suppl. i.; (PL Meyen.) 154 (1843) " Seyeuada, Clar. (Gramin.).

BROMIDIUM:-
anomalum, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. m. 108.—Bras.
trmifolium, Nees & Meyen, in NOT. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. 155-D. brevifolia.
taespitosum, Nees & Meyen, 1. c. = Agrostis Preslii.
Vgrometricum, Nees & Meyen, 1. c. 154.—Bras.
loiatum, Nees, in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848) 415 =*D. quadriseta.
Vuodriseta, Nees, 1. c. 416-D. qnadriseta.
ngescens, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. 155-Agrostis rigescens.
spectabile, Nees & Meyen, 1. c. 156.—Perav.

BROMOPSIS, Fourr. in Ann. Sot Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 187 = Bromua, Dill. (Gramin.;.
aspera, Fourr. 1. c. = Bromus asper.
erecta, Fourr. 1. c. = Bromus erectos.

BROMTJ8, Dill, ex Linn. Syst. ed. I (1735). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1200.
ANISANTHA, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 394.
BROMOPSIS, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 187.
CERATOCHLOA, Beauv. Agrost. 75. t. 15. f. 7 (1812).
LASIOPOA, Ettrh. Beitr. iv. 147 (1789).
LIBERTIA, Lej. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1825) m 755. t. 65.
MICHELARIA, Dum. Obs. Gram. Belg. 77. t. 16 (1823).
OCHEDONORUS, Beauv. Agrost. 99. t. 19. f. 2 (1812), partim.
SERRAFALCUS, Parl. PI. Nov. 75 (1842).
TRINIUSA, Steud. Syn. PI. Gram. 328 (1854\
ZERNA, Panz. in Denkschr. Acad. Muench. 1813 (1814) 296, partim.
aootiflorus, St. Amans, Fl. Agen. 44=tectorum.
Moensis, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cram.* 326.—Abyss.
"'gyptiacus, Tausch, in Flora, xx. (1887) 124 = brachystachys.
affinis, Dum. Obs. Gram. Belg. 118 = mollis»
agrarius, Dum. 1. c-diflusus.
"grarius, Homung, ex Steud. Nom. ed. II. i. 226 = racemosus.
"grestis, All. Fl. Pedem. ii. 249=erectns.
wwdus, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* iii. 79.—Reg. Caucas.
aleuten$_{sis>}$ *Trin. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 361.—Unalaska.
olopecuroides, Lag. Gen. et Sp. Nov. 4=Koeleria Phleoides.
"lopecuroides, Mori», ex Steud. Nom. ed. II. i. 226, 228 = intermedius.
"lopeeurmdes, Poir. Encyc. Suppl. i. 703=seq.
Alppecnros, *Poir. Voy. Barb.* ii. 100; *Vakl, Symb. Bot.* ..»-24-Reg. Mediteir.
Alopecurus, Pers. Syn. i. 95=praec.
alpestris, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 52, nomen. —Chili.
««Miw«j, Gilib. Exercit. ii. 587-arvensis.
Mtisumus, *Pursh, Fl.Am. Sept.* ii. 728.—Am. bor.
««»«imuj, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Hols. 9-a^per.
"mbigtns, Jord. ex Nym. Consp. 821=rigidus.
ambiguus, Cyrill. PI. Rar. fasc. i. 10 = Festuca bromoides.
amphibolis, C Koch> fa Linnaeap xri (1848) 418 = sterilis.
onatolicus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xiii. 63 = Patulus.
*a*gustifolius,* Schrank, Baier. Fl. i. 366 = erectus.
""eostifolius, *Homem. Hort. Hafn. Suppl.* 13.—Hab. ?
"ngustissimus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 421 = Uiebersteinii.
anomalus, *Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix.* H. (1842) «6—Mexic.
ontarcticus, Hook. f. Fl. Antarct. 97 - Danthonia oromoides.
«?»«««««, Schrank, Baier. Fl. i. 367 = Festnca Ipgantea.
»Muennensis, *Dum. Obs. Gram. Belg.* 77.—Belgium.
"renaeeus, Pourr. in Mem. Acad. TouL **iii.** (1788) 308 =tectorum.
"^"""s, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 23. t. 28.—Austral.; •N. Zel.
arenarius, Thomine Desm. in Mem. Soc. Linn. Calv. (1824) 40-mollis.
•nstahu, *Steud. Syn. PI. Gram.* 820.—Persia.

BBOUTTS:-
armenus, *Boiss. Fl. Orient,* v. 642.—Armenia,
arrhenatheroides, *Baier, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 301.—Madag.
arundinaceus, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 141 = Festuca elatior.
arvensis, Knapp, Gram. Brit. t. 82 - racemosus.
arvensis, Lam. Fl. Fr. iii. 607 -erectus.
arvensis, *Linn. Sp.Pl.* 77.—Enrop.; Oriens; As. bor.
arvensis, Oed. in Fl. Dan. t. 293=secalinus.
asper,*Murr. Prod. Getting.* 42.—Europ.; Oriens; As. bor.
os^r, Pall. Ind. Taur. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 73 - erectus.
asperipes, Jord. ex Nym. Consp. 821=rigidus.
asperrimus, *Tenore, Fl. Nap.* 1.105.—Italia.
atticus, Stead, ex Nym. Consp. 823 = mollis.
auleticus, *Trin. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. 468.—Reg. Argent.
auriculatus, Rasp, in Ann. Sc. Nat Sér. I. v. (1825) 439 - arduennensis.
australis, R. Br. Prod. i. 178 = arenarius.
avenaceus, Lam. Illustr. i. 194=tectorum.
avenaeformis, Steud. Syn. PI. Gram. 326 = Trisetum flavescens.
avenoides, *Baiter, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 302.—Madag.
badensis, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 75. t. 5 = secalinus.
barbatus, Savi, Bot. Etrusc ii. 61 = Festnca Alopecuros.
Baumgartenii, Steud. Syn. PI. Gram. 320=rigidus.
Berterianus, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxix. (1835) 25.—Chili.
bicuspis, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 322.—Chili.
Biebersteinii, Roem. & Schult. Syst. ii. 638=albidus.
bifidus, Thunb. Fl. Jap. 53=Trisetum cernuum.
Billotii, Sch. Bip. in Flora, xxxii. (1849) 233 = secalinus.
bohemicus, F. W. Schmidt, ex Mert. & Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. ed. HI. i. 688 = Festuca Myurus.
Boraei, Jord. ex Nym. Consp. 821=rigidus.
brachyantheca, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 110.—Bras,
brachystaohys, *Homung, in Flora,* xvi. (1833) II. 417.—Oriens; Aegypt.
breviaristatus, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.'* 1862' (1863) 98.—Am. bor. occ.
brevil, *Steud. Syn. PI. Gram.* 826.—Mendoza.
brevisetus, *Dum. Fl. Belg.* 155.—Belgium,
brizaeformis, *Fisch. & May. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iii 30.—Reg. Caucas.; Persia.
brimaeformis, Willk. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 101=squarrosus.
brinoides, Lam. Illustr. i. 198. n. 1060«Briza Lamarckiana.
brizoides, Willd. ex Steud. Nom. ed. IL i. 227»Briza rotundata.
Brongniartii, *Kunth, Enum. PI.* i. 421.—Bras.
Buxbaumii, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. i. 227 = Brachypodium distachyum.
caerulescens, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 9.—Hab.!
caespitosus, Host, Gram. Austr. iv. t. 18 - Brachypodium pinnatum.
caespitosus, Steud. Nom. ed. I. 119=Brachypodium nunosum.
Caldasii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 151 = Festuca Caldasii.
canadensis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 65=ciliatus.
canariensis, Zuceagni, Cent. n. 27 i in. Roem. Coll 126—lanceolatus.
canescens, Viv. Fl. Lyb. Spec. 5=rubens.
canus, Willd. ex Steud. Nom. ed. IL i. 227 = Festuca mollis.
capensis, Steud. in Flora, xii. (1829) 491=vestitns.
capillaris, Moench, Meth. 194»Leptochloa doningensis.
capillaris, *Vahl, ex Hornem. Hort. Hafn.* i. 101.—Hab.?
capillifolia, *Dufour, ex Roem. & Schult. Syst.* ii. 735.—Hispan.
cappadocicus, *Boiss. V Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857)306.—As. Min.
caprearum, Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 209=caprinns.
caprinus, *Kcrner, ex Hack. I. c*—Italia,
carinatus, *Hook. (X Am. Bot. Beech. Voy. Suppl.* 408.—Am. bor. occ.

BHOMU8:—
catharticus, Vahl, Symb. Bot. ii. 22 = unioloides.
caucasicus, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 227.—Reg. Caucas.
caudatus, *Brot. Phyt. Lusit.* t. 99.—Lusitan.
Cavanillesii, *Willk. ex Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp. i.* 101.—Hispan.
Cebadilla, *Steud. Syn. PI. Gram.* 821.—Chili.
Chiapporianus, De Not. ex Nym. Consp. 824 — patulus.
chilensis, *Trin. in Linnaea,* x. (1836) 804.—Chili.
chloroticus, Bieb. ex Kunth, Enum. PI. i. 420-albidus.
Ckrysopogon, Viv. Fl. Lyb. Spec. 4. t. 2 =scoparius.
ciliatuSfiluds. Fl. Angl. ed. I. 40 = madritensis.
dliatus, Lam. Fl. Fr. iii. 609 = Brachypodium distachyum.
ciliatus, *Linn. Sp. PL* 76.—Am. bor.
dliatus. Murii. Desc. Gram. 169 = Kalmii.
cinereus, S. G. Gmel. ex Trin. in Bull. Sc. Acad. Petersb. i. (1836) 66=Trisetum Gmelini.
cincinnatus, Tenore, Lez. Bot iv. I. 52; Fl. Nap. iii. 85 — A vena bromoides.
cireinnatus, Kunth, Enum. PI. i. 423 = praec
coarctatus, Homem. ex Kunth, 1. c. 303 = Gaudinia geminiflora.
cognatus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 321.—Abyssin.
collinus, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 101.—Chili.
coloratus, Baumg. ex Nym. Consp. 824=squarrosus.
coloratus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 429.— Reg. Magellan.
commutatus, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. iii. 77 = patulus.
commutatus, Guss. ex Steud. Syn. PI. Gram. 325= scabratus.
commutatus, Schrad. Fl. Germ. i. 353=racemosus.
compactus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 227 = mollis.
eompressus, Lag. Elench. 4 =ciliatns.
condensate, *Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 20».—Europ.
confertus, Bieb. Fl. Taur. Cauc L 71«=scoparius.
confertus, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. 586=mollitormis.
confinis, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 320.—Ind. or.
conformis, *Steud. I. c.* 323.—Japon.
contort us, Desf. Fl. Atlant. i. 95 = B. Alopecuros.
corniculatus, Lam. Fl. Fr. iii. 608=Brachypodium pinnatum.
crinitus, *Boiss. V Hohen. Diagn.* Ser. I. xiii. 64.—Pers.; Afghan.; Turkest.
cristatus, Linn. Sp. PI. 78 = Agropyron cristatum.
cristatus, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart Halle, 15 = Koeleria phleoides.
cnltus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 823.—Europ.
cylindracens, *Brot. Phyt. Lusit.* 98.—Lusitan.
Cyri, Trin. in C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 24-patulus.
dactyloides, Roth, Nov. Sp. 60=Koeleria phleoides.
Danthoniae, Trin. in C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 24 = macTOStachys.
decipiens, Hort. Madr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 227 = madritensis.
decolorans, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 44= Festuca elatior.
decumbens, Koel. Gram. 242=decumbens.
denseciliatus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 422.—'Terra nova.'
depauperatus, J. *Presl, in ReL Haenk.* i. 263.—Am. bor. occ.
dertonensis, All. FL Pedem. ii. 249=Festuca bromoides.
diandrus, Curt. Fl. Lond. fasc. vi. t 5=madritensis.
diandrus, Roth, Bot. Abh. 44 = pilosus.
diffusus, *Dum. Obs. Gram. Belg.* 118.—Belgium.
digitatus, Poir. ex Beauv. Agrost. 156 — madritensis.
dilatatus. Lam. Encyc. i. 468=madritensis.
dissitiflorus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 301.—Madag.
distachyos, Linn. Cent. ii. 8; Amoen. Acad. iv. 304 = Brachypodium distachyum.
distichus, Georgi, Bemerk. Reise Russ. Reich, i. 197 - Agropyron cristatum.
distichus, Moench, Meth. 192-sterilis.
divaricatus, Rhode, ex Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 214=macrostachys.

BROMT7S:—
dortonensis, Kunth, Enum. PI. i. 397, in syn. = Festuca bromoides.
dumetorum. Lam. Fl. Fr. iii. 605 = asper.
dumosus, Vill. Hist. PI. Daupb. ii. 119 = Brachypodium sylvaticnm.
Ehrharti, Gaud, in Roem. Collect. 19—secalinus.
elatior, Koel. Gram. 214 = Festuca elatior.
elatior, Spreng. Syit. i. 359 = Festnca arundinacea.
elatus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 358 = Festnca elatior.
el'ongatus. Gaud. Agrost. i. 305 = racemosus.
erectus, *Huds. Fl. Angl.* ed. I. 89.— Enrop.; As. Min.
erectus, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 50—scoparius.
erectus, Ledeb. Fl. Ross. iv. 358 = inermis.
exaltatus, *Bernh. in Linnaea,* xv. (1841) *Litt.* 90.—Mexic.
fascicularis, Tenore, Fl. Nap. iv. 17,161=fasciculatus.
fasciculatus, *Presl, Cyp. et Cram. Sic.* 39.—Reg. Mediterr. or.
Ferronii, Mabelli, in Act. Soc. Linn. Bord. xxv. (1864) 618.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xiv. (1867) Bibl. 188 = mollis.
festucoides, *Link, in Schrad. Journ.* ii. (1799) 815.—Lusitan.
fibrosus, *Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 209.—Europ. or.
flabellatus, *Hack, ex Boiss. Fl. Orient,* v. 648.— Palaestin.
flavescens, *Tausch, in Flora,* xx. (1837) I. 124.—Sicilia.
Fonki, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 102.—Chili.
fragilis, Schrank, Baier. Fl. i. 370 = Brachypodinm pinnatum.
fragilis, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natura.* iv. (1853) 90.—Europ.
frigidus, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 63.—Peruv.
frigidus, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 645. —Persia.
Caudini, Roem. & Schult. Syst. ii. 682 = racemosus.
geniculatus, Linn. Mant. i. 33=Festuca geniculata.
yeniculatus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 318.—Oriens.
giganteus, Leers, Fl. Herborn. 38 - Festuca elatior.
giganteus. *Linn. Sp. PI.* 77.—Enrop.; Sibir.
giganteus, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 118 = asper.
Gilliesii, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 328.— Chili.
glaber, Reich. Fl. Franco-Moen. i. 19 = Festuca gigantea..
glaber, Scop. H.Cam. ed. II. i. 84 = Agropyron repens.
glaber, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 227 = pitensis.
glaberrintus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 420» erectus.
glaucus, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 38 = Fesluca ovina.
glaucus, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. t. 58=erectus.
glaucus, Spreng. in Link, Hort. Berol. i. 170=Festuca rubra.
glomeratus. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 76-Dactylis glomerata.
glomeratus, Tausch, in Flora, xx. (1837) 124 = mollis.
gracilis, Leyss. Fl. Hal. 26. n. 116 = Brachypodium pinnatum.
gracilis, Weigel, Obs. 15=Brachypodium sylvaticum.
gracillimus, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) £2; = crinitus.
grandiflorus, *C. Koch, in Linnaea,* xxi. (1848) 419 (sp. dub.).—Pontus.
grandiflorus, Weigel, Obs. 9 =sterilis, tectorum.
grossus, DC. Fl. Fr. iii. 68 = secalinus.
grossus, Desf. in C.C.Gmel. Fl. Bad. iv. t. 2, S-wlutinus.
Gussoni, Parl. PI. Nov. 66 = rigidus.
gyganteus, Crantz, Inst. i. 890 = giganteus.
gynandrus, Roth, in Roem. & Ust. Mag. iv. 10[M] St. (17M) 20 = madritcnsis.
Haenkeanus, Kunth, Enum. PI. L 416 = unioloides.
Hausknechtii, *Boiss. Fl. Orient,* v. 648,—Mesopotam.
hirsutissimus, Cyrill. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 643 = asper.
hirsutus, Curt. Fl. Lond. fasc. ii. t. 8-asper.
hirsutus, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. (1818) 161=squarrosus.
hirtus, Lichtst. in Roem. & Schult. Syst. ii. 654.—Afr. austr.

BBOHUS:—
hispidus, Savi, Bot. Etrusc. ii. 62«Koeleria hispida.
Hohenackeri, Hochst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 416= Ventenata macra.
holciformis, *Steud. V Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 324.—Chili.
Hooieri, Foum. Me*. PI. En. Gram. 127 ; ex Hemsl. BioL Centr. Am. Bot. iii. 583=ciliatus.
Hookerianus, Thurber, in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 493 = virens.
hordeaceus, C. *C.* Gmel. Fl. Bad. iv. 68= secalinus.
hordeaceus, Linn. Sp. PI. 77 = racemosus, mollis.
hordei/ormis, Lam. Illustr. i. 195 = Festuca bromoides.
Hughi, Tod. ex Nym. Consp. 823 = intermedius.
humilis, Cav. Ic. vi. 65 = scoparius.
hyalinus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 90 = arvensis.
hybridus, *Schur, Enum, PI. Transs.* 801.—Transsylv.
imperialis, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 227 = ciliatus.
incrassatus, Lam. Encyc. i. 468 = rigidus, Festuca geniculata.
indicus, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 227=rigidus.
inermis, *Leyss. Fl. Hal.* 16; *Linn. Mant.* ii. 186.— Europ.; Reg. Caucas.; As. bor.
inermis, Stev. in Mem. Soc. Nat Mosc. iii. (1812) 252 = albidus.
insignis, *Buese, in Miq. PI. Jungh.* 347.—Java,
intermedius, *Guss. Fl. Sic. Prod. i.* 114.—Reg. Mediterr.
intermedius; *Zumag. Fl. Pedem.* i. 166.—Pedemont.
japonicus, *Thunb. Fl. Jap.* 51. 1.11.—Japon.
jubatus, Tenore, Fl. Nap. 10 = sterilis.
jubatus, *Vill. Hist. PI. Dauph.* ii. 118.—Gallia.
Kalmii, *A. Gray, Man.* 600.—Am. bor.
Kochii, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 76. t. 6=patulus.
Krausei, *Regel, in Ad. Hort. Petrop.* vii. (1880) 600. —As. centr.
lanatus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 150 = Festuca mollis.
lanceolatus, Roth, Catalect. i. 18 - macrostachys.
lanuginosus, Poir. Encyc. Muppl. i. 703 = macrostachys.
lateripronus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 121=tectorum.
latifolius, *Kar.* b[1] *Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 865.—Sibir.
laxiflorus, *Spreng. in Zey'n. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 228.—Afr. austr.
laxus, Hornem. Hort. Hafn. ii. 954=erectus.
laxus, Reichb. Ic. Fl. Germ. i. 32. t 77. *i.* 1605-inermis.
lenis, *7. Presl, in Rel. Haenk.* i. 262.—Peruv.
leptoclados, *Nees, Fl. Afr. Austr. Gram.* i. 453.—Afr. austr.
leptostachys, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 654 = brachystachys.
leptostachys, [Pieri,] in Ionios Anthol. iii. (1834) 680 =squarrosus.
leptostachyus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 324.—Gallia.
ligusticus, All. Fl. Pedem. ii. 249=rubens, scoparius, Festuca geniculata.
lithobius, *Trin. in Linnaea,* x. C1836) 303.—Chili.
littoralis,5f>u<*. *Syn. PI. Gram.* 325.—' Austr. littoralis.'
littoreus, Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr. 257 = inermis.
littoreus, Retz. Fl. Scand. Prod. ed. I. 19-Festuca elatior.
lividus, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 150 = Festuca livida.
loliaceus, Tenore, Fl. Nap. iii. 91 = Triticum Barrelieri.
longe-aristatus, Gilib. Exercit. ii. 536=sterilis.
longiflorus, Spreng. Pugill. ii. 28=tectorum.
longifolius, *Schousb. Vextr. Marokko,* 44.—Marocco.
longipilus, Kummer & Send, in Flora, xxxii. (1849) 757= tectorum.
lummensis, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 262=Triticum luzonense.
macranthes, Meyen, Reise, i. 311, nomen—setifolius.
macranthos, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 443 = praec.
macrocladus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 64=arvensis.
macrostachys, *Desf. Fl. Atlant.* i. 96. t. 19.—**Reg.** Mediterr.
macrostachyus, Guss. Fl. Sic. Prod. 115 = lanceolatus.
madritensis, Cav. ex Kunth, Enum. PI. i. 419* maximus.
madritensis, *Linn. Cent. PI.* i. 5; *Amoen. Acad.* iv. 265.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
malacanthus, Trin. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 361 •» ciliatus.

BBOHUS:—
Mango, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 440.—Chili.
marginatus, Steud. Syn. PI. Gram. 322 = ciliatus.
massiliensis, *For sit. Fl. Aegypt. Arab.* 203.—Massilia.
matritensis, 'Linn.'ex Roem. & Schult. Syst. ii. 651 = madritensis.
matritensis, Cav. Ic. vi. 67-rigidus.
Matthewsii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 823.—Peruv.
maximus, Desf. Fl. Atlant. i. 95. t. 26-rigidus.
maximus, Gilib. Exercit. ii. 535=secalinus.
maximus. Roth, N. Beitr. i. 114-pilosus.
megapotamicus, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 36.—Bras.
mexicanus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 228 = Triticum mexicanum.
Micheli, Savi, Bot. Etrusc. i. 78-festucoides, Avellinia Micheli.
modensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 324.—**Graeda.**
molliformis, *Lloyd, Fl. Loire-Inf.* 315.—Gallia.
mollis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 112.—Europ.; Afr. et As. bor.
mollis, Thunb. Prod. PI. Cap. 22=vestitus.
mollissimus, *Hornem. hort. Hafn. Suppl.* IS.— Hab. 1
monostachyus, Steud. Nom. ed. II. i. 228 = Brachypodinm dUtachyum.
montanus, Gaertn. Mey. *8c* Scherb. Fl. Wett. ex Kunth, Enum. PI. i. 418=erectus.
montanus, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 82rasper,
montanus, *Retz. Prod. Scand.* 124.—Europ. bor.
mucronatus, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 228 = unioloides.
multiflorus, Host, Gram. Austr. 1.1. ll=patulus.
multiflorus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 865=macrostachys.
multiflorus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 47= racemosus.
multiflorus, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 283 = secalinus.
multiflorus, Weigel, Obs. 2. t. 1. f. l = arvensis.
multiflorus, Willd. Sp. PI. i. 428-commutatus.
multispicatus, Roem. *8c* Schult. Syst. ii. 650=madritensis.
Munroi, *Boiss. Fl. Orient,* v. 643.—Afghanist.
muralis, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 50 = madritensis.
murorum, Bernh. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 651 = pilosus, tectorum.
mutabilis, *F. Schultt, in Flora,* xxxii. (1849) 234.—Europ.
nanus, Weigel, Obs. 8=mollis.
neglectus, Nym. Syll. **419** •> racemosus.
nemoralis, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 51=asper.
nemorosus, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 117 = asper.
nitidus, Clarke, Trav. ii. 260=rigidus.
nitidus, Dum. Obs. Gram. Belg. 119 = secalinus.
NoHanus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 141 =squarrosus.
nototropus, *Rupr. Serf. Tiansch.* 73.—As. centr.
odoraius, Gouan, Herbor. 11 =erectus.
oranensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 319.—Afr. bor.
Orcuttianus, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* x. (1885) 223' —Am. bor.
ovatus, Cav. Ic. vi. 67 =Trisetum ovatum.
ovatus, J. Gaertn. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xiv. (1770) 537. t. 19. f. 1 = scoparius.
minus, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 77—Festuca ovina.
oxyodon, Schrenk, Enum. PI. Nov. ii. 1 = macrostachys.
oxyphloeus, Payne, Palest. Expl. Rep. **(1874)** 128" macrostachys.
pallens, *Cav. Ic.* vi. 66. t. 591. f. 1.—Ins. Philipp.
pannonicus, *Kummer tf Sendt. in Flora,* xxxii. (1849) 757.—Hungar.
paradoxus, Presl, Fl. Sicul. i. p. xiv, in nota=pentastachyns.
parviflorus, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 887—Hab.?
patagonicus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 577—Chili.
patentissimus, Weigel, Obs. 12 = Festuca sylvatica.
patulus, *Mert. V Koch, in Roehl. Deutschl. Fl.* i. 685. —Europ.; Oriens; Afghanist.
paucifloras, *Schum. in Fl. Dan.* t. 1883.—Island.
pauciflorus, V/i\\d. a Steud. Nom. ed. II. i. 228 = Festuca mollis.
pauper, J. F. Gmel. Syst. 191 = Brachypodinm d>-stachyum.
pauper, Schrank, Baier. Fl. i. 370 - Brachypodium sylvaticum.
pectinatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* i. 22.—Afr. austr.

BROMTTB:—
pendulinus, Desf. ex Steud. Norn. ed. I. 119, 120 = commntatus.
pendulinus, Hort. ex Schrad. N. Journ. iv. (1810) 70 = ciliatus.
pendulus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853)90 = patulus.
pentastachyus, Tineo, PL Rar. Sic. PugUl. i. 4 = Brachypodium distachynm.
Perennis, Vill. Hist PI. Dauph. ii. 122-erectus.
peracus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 66; Ledeb. Fl. Ross. iv. 357-tomentosus.
Petitianus, *A. Rich. lint. Fl. Abyss*, ii. 488.—Abyss.
phleoides, J. F. Gmel. Syst. 190-Koeleria phleoides.
phoenicoides, Steud. Nom. ed. I. 120 = Brachypodium pinnatum.
Phoenix, *J. p. Gmel. Syst.* 190.—Hab. t
phrygius, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 140-patulus.
Pictus, *Hook.f. Fl. Antarct.* 387.—Chili.
Pllosus, *F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn.* i. 558. —Europ. austr.
pilosus, Willd. in Spreng. Syst. i. 858 - trichodes.
pinnatus, Linn. Sp. PI. 78 = Brachypodium pinnatum.
Pinnatus, Oed. in Fl. Dan. t. 164 = Brachypodium sylvaticum.
Pitensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 152.— Ecuador.
platystachys, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 387-arduennensig.
Plafystachyus, Lam. Illustr. i. 195 = Brachypodium distachyum.
Plucienetii, All. Fl. Pedem. ii. 250 - Brachypodium ramosum.
Poarformis, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* 28.—Aegypt.
Poaeformis, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 15 J Fl. Hal. Mant. 84 = Diplachne fascicularis.
Poaefornjis, *Vahl, ex Hornem. Hort. Hafn.* i. 102.— nab.!
Polynurphus, Hohen. Enum. Taluesch. 19 = patulus.
Polymorphus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 228-arvensis.
Polymorphus, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 79 ; Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 48-=mollis, racemosus, secalinus.
[illegible] Fk Fl„ At!Byl>tl Arabl 28 = Diplachne
Pdystachyus, DC. Fl. Fr. vi. 276=madritensis.
Polystachyus, Kunth, Enum. PI. i. 447 = Brachypodium aistachyum, Triticum ciliatum.
Polystachyus, Steud. Nom. ed. II. i. 228-arduennensis.
Pratensis, Ehrh. Beitr. vi. 84, nomen = racemosos.
pratensis. Lam. Encyc. i. 468 = erectus.
gotensis, Spreng. Syst. i. 359-Festuca elatior.
"•an, *Kunth, Enum. PI. i.* 416.-Peruv.
procerus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 150-Festuca eminens.
Procerus, Spreng. Syst. i. 857 - quitensis.
Propendens, Jord. ex Nym. Consp. 821 -rigidus.
Pseudoanensis, Koel. Gram. 241 = erectus.
Pseudoasper, Schur, Enum. PI. Transs. 804=asper.
Psendoinennis, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* v. (1853) 90.—Transsylv.
Puoescens, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 420 = variegatus.
Pubescens, Muhl. in Willd. Enum. Hort. Berol. 120-ciliatus.
Pubescens, [Pieri,] in Ionios Anthol. iii. (1884) 680 = squarrosus.,
PBlchellus, *•«.. b* *De Not.Agr. Fragm.* 16 (sp. dub.). —Arabia.
Purgans, Linn. Sp. PI. 76-ciliatus.
Purgans, Torr. Fl. N. York. ii. 468 = Kalmii.
Purpurascens, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 62=mbens.
*P*rpurascens*, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 867 = inennis.
qmteniU, *Willd. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 228.-radicatus, Fourdor. *Steud. Syn. PI. Gram.* 828.—Japon.
racemosus. *Linn. Sp. PI.* ed. II. 114.—Europ.
ramosus –, Linn. Mant. i. 34 = Brachypodium ramosum.
ramosus, Huds. Fl. Angl. 40=asper.
ramosus, SchouA. Vextr. Marok. 44 = Brachypodium pumatum.
repens, Borb. ex Nym. Consp. 822 = vernalis.
TMO>'teni, Loud. FL Gall.i. 90 = intennedius.
»• If j * *>ers- " j "1 - ' • 96 = Brachypodium ramosum.
«:nardsoni, *Link, Hort. Berol.* ii. 281.—Am. bor.
"fens, Linn. Mant. 33 = rigidus.

BBOMTJB:—
rigens, Vandelli, in Roem. Script. PI. Hisp. 49" Koeleria phleoides.
rigidus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 23-rigidus.
rigidus, Reichb. Ic. Fl. Germ. i. 31. n. 1586=rubens.
rigidus. *Roth, in Roem. V Ust. Mag. Bot.* iv. (1790) 21.—Europ.; Reg. Mediterr. et Caucas.
riparius, *Rehm. Noti: Veg. Gest. Schwarz. Meet.* «.— Rossia.
Rochelianus, Opiz, Natural, n. 9 (1825) 119 = madritensis.
rotundatus, H. B. & K. Nov. Gen. el Sp. i. 152 = Briza rotundata.
rubens, Cav. Ic. i. t. 46=scoparius.
rubens, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 52 = fasciculatus.
rubens, Desv. ex Willk. ic Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 98 =madritensis.
rubens, Host. Gram. Austriac. i. t. 18=rigidus.
rubens, *Linn. Cent.* i. 5.—Reg. Mediterr.
rupestris. Host, Gram. Austriac. iv. t. 17 = Brachypodium pinnatum.
sabulosus, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 120.—Sicilia.
sardous, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 36.—Sardin.
scaberrimus, Tenore, Fl. Nap. iii. 89 = madritensis.
scabratus, *Link, in Linnaea,* xvii. (1848) 402.—Italia,
scabridus, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 281.—Afr. trap.
scabrifiorus, Opiz, Natural, n. 9 (1825) 119 = tectorum.
Scheuchteri, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 79. t. 7 = Festuca gigantea.
Schraderi, Kunth, Enum. PI. i. 416-unioloides.
sclerophyllus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 65.—Lydia.
scoparius, Guss. Fl. Sic. Prod. 10=alopecuroides.
scoparius, *Linn. Cent. PI* i. 6 j *Amoen. Acad.* iv. 266. —Reg. Mediterr.; As. Min.; Persia.
secalinus, Bicb. Fl. Taur. Cauc. i. 71=patulus.
secalinus, *Linn. Sp. PI.* 76.—Europ.; Reg. Mediterr.; As. bor.
secalinus, Savi,'Fl. Pis. i. 120 = arvensis.
secundus, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 263.—Sinus Nootka.
segetalis, A. Braun, ex Nym. Consp. 822-secalinus.
segetum, Cham. & Schlecnt. in Linnaea, vi. (1831) 38 -ciliatus.
segetum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 152.—Am. austr.
sericeus, Tenore, Fl. Nap. Prod. 10=alopecuroides.
serotinus, Beneken, in Bot. Zeit. iii. (1845) 724=asper.
setareus, Buckl. in Proc. Acad. Sc Philad. ' 1863' (1863)98=sterilis.
setifblius, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 261.—Chili; Mexic.
Sewerzowi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 601.—As. centr.
silvaticus, J. F. Gmel. Syst. 190 = sylvaticus.
simplex, Gaud. Agrost. Helv. i. 296-racemosus.
simplex, *Pers. Syn.* i. 96.—Hab. ?
simplicissimus, Cesati, ex Nym. Consp. 823=mollis.
sipylens, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 65.—As. Min.
sitchensis, *Bongard, Veget. Ins. Sitcha,* 173.—Ins. Sitcha.
speciosus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* i. 454.—Afr. austr.
spicatus, *Nets*, in Mart. Fl. Bras. ii. 471 = Diplachne simplex.
spiculitenuata, Knapp, Brit. Gram. t. 81=arvensis.
squarrosus, Brot. Fl. I.usit i. 112 — macrostachys.
squarrosus, *Linn. Sp. PI.* 76.—Europ. austr.; Oriens; As. bor.
squarrosus-muticus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 24 - briziformis.
stachyoides, *Link, Hort. Berol.* ii. 285.—Hab. ?
stamineus, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 440 = unioloides.
stenophyllus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 94-erectus.
stenostachyus, *Boiss. Fl. Orient*, v. 643.—Afghanist.
sterilis, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 118 = madritensis.
sterilis, Lang, ex Kumm. *It* Sendt in Flora, xxxiii. (1849) 758-tectorum.
sterilis, *Linn. Sp. PI.* 77.—Europ.; Oriens; As. bor.
Steudelii, Frank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 229-ciliatus.
stipoides, Linn. Mant. ii. 557 = Festuca geniculata.
strictus, Brongn. in Duperr. Voy. 46 - Brongniartii.
strictus, *Kunth, Rev. Gram. i.* 134.—Ins. Borbon.
strictus, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 7» = Diplachne serotina.
strictus, Hall. f. in Roem. Arch. i. II. 10 = Brachy• podium pinnatum ?

BBOMUS:—
strigosus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 81 -Triticum strigosum.
strigosus, Lam. Illustr. 191. n. 1068 - Feitttca gigantea.
subalpinus, Rupr. in Ball. Acad. Brux. ix. (1842) 2, 2S6 = exaltatus.
snbmuticus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 321.—Missouri.
subulatus, Griseb. in Ledeb. FL Ross. iv. 858-Melica acuminata.
Suksdorfii, *Vasey, in Coult. Bot. GOB.* X. (1885) 223.— Am. bor.
sylvaticus, Pollich, Hist. PI. Palat. i. 118=Brachypodium sylvaticum.
sylvaticus, Vogler, Schediasma, 13=asper.
syriacus, Boiss. *8c* Blanche, Diagn. Ser. II. iv. 139 = erectus.
Tacna, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 56.— Peruv.
subrectus, Fries, Mant. iii. 181-erectus*.
tectorius, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 96-tectorum.
tectorum, *Linn. Sp. PI.* 77.—Europ.; Oriens; As. bor.
temulentus, Bernh. Syst. Verz. Erf. 47 = Loliuni temulentum.
Tenorianus, Roem. & Schult. Syst. Mant ii. 860, obs. — sterilis.
tenuiflorus, Viv. Fl. Lyb. Spec. 5. t 1. f. l = fasciculatus. '
tenuis, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 262.—Peruv.
tenuis, Tineo, Rar. PI. Sic. Pngill. i. 8-Festuca incrassata.
Thominii, Ard. ex Nym. Consp. 823=mollis.
Tigridis, Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II. iv. 141 = brachystachys.
tigurinus, Suter, Fl. Helv. i. 65 — Brachypodium pinnatum.
tomentellus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 126.—Graecia; As. Min.; Persia.
tomentosus, Rohde, in Schrad. N. Joum. iii. (1809) 42 = macrostachys!
tomentosus, *Trin. in Mtm. Acad. Pitersb.* (1818-14) t. 9.—Persia,
tortilis, *Presl, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 229.—Europ. austr.
transsihanicus, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ». (I860) 227 -fibrosus.
transyhanicus, Steud. Syn. PI. Gram. 320 = praec.
Maristatus, Loisel. Fl. Gall. L 89=arduennensis.
trichodes, *Kunth, Rev. Gram.* i. 135.—Ins. Mascar.
trichopodus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 437.— Abyss.
trifiorus, Ehrh. Beitr. i 90 = Festuca sylvatica.
triflorus, Linn. Sp. PI. ed. II. 115-Festuca gigantea.
triflorus, Pollich, Hist. PI. Palat. i. 119=Ventenata avenacea.
Trinianus, *Schult. Mant.* ii. 254.—Persia.
Trinii, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 441.— Chili,
trisetoides, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 229, nomen. —Hab. ?
triticeus, *Raeusch. Nom.* ed. III. 27.—Helvet
trivialis, Savi, Fl. Pis. i. 124 = Koeleria phleoides.
truncatus. Scop. FL Cam. ed. II. i. 85 = Agropyron junceum.
tunicatus, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 298.— Chili.
turgidus, Pers. Syn. i. 95 = macrostachys.
unilateralism Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 90=patulus.
unioloides, *H. B.* &[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 151.— Am. calid.
valdivianus, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 101.— Chili.
variegatus, Fl. Danub. ex Boiss. Fl. Orient, v. 645 = fibrosus.
variegatus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 79.—Reg. Caucas.; Persia.
varius, Brot. Fl. I.usit. i. 113=rigidus.
velutinus, Schrad. Fl. Germ. i. 349. t. 6. f. 3-secalinus.
Ventolana, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 229-racemosus.
Ventolana, Schleich. ex Steud. 1. c—arvensis.
vernalis, *Panl. ex Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 206.—Europ.
versicolor, Pollich, Hist. PI. Palat. i. 190-arvensis.
vertidlUtui, *Cav. Ic.* vi. 66. t. 690.—Hispan.

BROMUS:—
vestitus, *Schrad. in Goett. Gel. Ann.* (1821) III. 2074.—Afr. anstr.
milliferus. Stend Syn. PI. Gram. 326 = japonicus.
villosulus, *Steud. I. c.* 327.—Graecia.
villosus, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 23=madritensis, rigidus.
villosus. C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 229=squarrosus.
villosus, Scop. Fl. Cam. ed. IL i. 83=Agropyron repens.
virens, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* ' 1862' (1863) 98.—Am. bor. occ.
virgalus, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 263.—Peruv.; Mexic
vitiosus, WeigeL, Obs. 4=secalinus. /
Willdenowii, Knnth, Rev. Gram. i. 134=nnioloides.
•*moljensis,* Willd. Enum. Hoit. Berol. SnppL 9; Jacq. Eel. Gram. 20. t. 15 = squairosus.

BROMUS, Scop. Inlrod. 74 (1777) = Triticum, Linn. (Gramin.).

BRONGNIARTIA, Blnme, Bijdr. 435 (1825) =Kibara, Endl. (Monim.).
coriacea, Blnme, 1. c. = K. coriacea.

BBONONIARTIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 46S. t. S87 (1823). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 495.
MEGASTEGIA., G. Don, Gen. Syst ii. 468 (1832).
PERALTEA, H. B. & K. NOV. Gen. et Sp. vi. 469. t. 589 (1823;.
Bentbamiana, *Hemsl. Biol. Cenir. Am. Bot.* i. 252.—Mexic.
foliolosa, *Benth. ex Hemsl. Diag. PI. Nov.* 7.—Mexic
galegoideg, *Presl, Symb. Bat.* ii. 21. t. 67.—Am. trop.
glabrata, *Hook, tf Am. Bot. Beech. Voy.* 288.—Mexic.
gracilis, *Hemsl. Biol. Cenir. Am. Bot.* i. 253.—Mexic.
intermedia, *Moric. in Mem. Sec. Phys. Geniv.* vii. (1836) 253.—Mexic.
magnibracteata, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 838.—Mexic.
minutifolia, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 360.—Texas,
mollis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 465. t. 587.—Mexic.
obliqna, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 339.—Mexic
oligosperma, *Baill. Adansonia,* ix. (1868-70) 240.—Mexic.
oxyphylla, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 264.—Mexic.
Panyi, *Hemsl. I. c*—Mexic.
podalyrioides, *H. B.* to[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 465. t. 588.—Mexic.
retosa, *Benth. in Hemsl. Diag. PI. Nov.* 8.—Mexic.
robinioides, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) 12.—Chili,
sericea, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1888) 338.—Mexic
stipitata, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 8.—Mexic
thermoides, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 287.—Mexic.
vicioides, *Mart. b" Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1843) 49.—Mexic

BRONNIA. H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 83. t. £28 (1823)-Fouquieria, H. B. & K. (Tamarisc.).
spinosa, H. B. & K. 1. c - F . spinosa.

BROOKEA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 939 (1876). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook, f. 1. c
dasyantha, *Benth. in Hook. Ic. PI.* xii. 84. t 1197.—Borneo,
tomentosa, *Benth. I. c.*—Borneo.

BBOSIMUM, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 12 (1788). *URTICACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 869.
GALACTODENDRUM, Humb. Relat. Hist, it 108 (1819).
PIRATINERA, Aobl. PI. Gni. ii. 888. t. 340 (1775), nomen prius.
Alicastrum, *Sw. I. c*—Am. trop.

BROSHkUTM :—
Anbletii, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 34. t. 148. f. a.—Am. trop.
costaricannm, *Liebm. in Vidensh. Selsk. Sir.* V. ii. (1851) 884.—Costa Rica,
discolor, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 403.—Bras,
echinocarpnm, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 34. 1.148.—Perav.
Galactodendron, *D. Don, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. IL 462.—Guiana.
Gandichandii, *Trécul, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. (1847) 139.—Bras.
Humboldtii, Carr. in Rev. Hortic (1874) 314. f. 42, 48=B. Galactodendron.
microcarpum, Schott, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 403 = B. Alicastrum.
refractum, Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 108 = Gaudichaudii.
spurium, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 12.—Jamaica,
turbinatum. *Spruce, ex Baill. Adansonia,* xi. (1875) 299.—Bras.

BROSSAEA, [Plnm.] Linn. Gen. ed. I. 866 (1737) = Gaultheria, Kalm. (Ericac).
anastomosans. Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 142 = G. anastomosans.
cocdnea. Linn. Sp. PI. 1190=G. cordifolia.

BBO88ABDIA, Boiss. in Ann. Sc Nat. *Sit.* II. xvii. (1842) 183. *CRVCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 91.
papyracea, *Boiss. I. c.* 184.—Persia,
retnsa, *Boiss. Fl. Orient.* i. 386.—Persia.

BROTERA, Cav. in Anal. Cienc Nat i. (1800) 33; Ic. v. 19. t. 438. (1799) -Melhania, Forsk. (Stercnliac).
bracteosa, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 86 = M. Denhami
Leprieurii, Guill. *Sc* Perr. 1. c. =Pentapete» LeprieuriL
ovata, Cav. Ic. v. 20=M. abyssinica.

BROTERA, Spreng. in Schrad. Joura. Bot. iv. (1800) t. 6=Flaveria, Juss. (Compos.).
Contrayerba, Spreng. 1. C = F. repanda.
Sprengelii, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 806-F. repanda.
trinervata, Pen. Syn. ii. 498 - F . repanda.

BROTERA, Spreng. Nachr. i. Bot Gart. Halle, (1801) 15; et in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 151. t. 12-Hyptis, Jacq. (Labiat).
persica, Spreng. 11. cc. = H. pectinata.

BROTERA, Veil. Fl. Flum. 822 (1825); vii. t. 163 (1827)=Iiuhea, Willd. (Tiliac).
maritima, Veil. 11. cc 323; t. 163=L. speciosa.
mediterranea, Veil. 11. cc 828 ; 1.164=L divaricate.

BROTERA, Willd. Sp. PI. iii. 2399 (1803) = Cardopatium, Jnss. (Compos.).
corymbosa, Willd. 1. c.=C. corymbosmm.

BROTEROA, DC. Prod. v. 685 (18S6)=Flaveria, Juss. (Compos.).
trinervata, DC. 1. c. 636=F. repanda.

BBOtTOHTOMTA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 217 (1813). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 581.
alba, Spreng. Syst iii. 735 = Maxillaria alba.
murea, LindL Bot/Reg. (1840) Misc. 19 - Epidendrum aurantiacum.
chinensis, LindL in Hook. Lond. Jonra. Bot. i. (1842) 492=Epidendrum nonchinense.
cocdnea, Hook. Bot Mag. t. 3536*>sanguinea.
grandiflora, Spreng. Syst. iii. 785=Maxillaria grandiflora.
lilacina, *Henfr. in Moore b[1] Ayres, Gard. Mag. Bot.* iii. (1851)201.—Ind. occ.?
maculata, Spreng. Syst. iii. 735 = Maxillaria maculata.
sangninea, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 217.—Ind. occ.
tetragona, Spreng. Syst. iii. 734=Phajns tetragonus.
violacea, Hort. ex Moore *Sc* Ayres, Gard. Mag. Bot iii. (1851) 201 = lilacina.

BROUGHTONIA, Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 36 (1830) = OtochilUS, Lindl. (Orchid.).
amoena, Wall. 1. c. = O. fusca.
nitida, Herb, ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 641, nomen (=Coelogynes sp. ?).—Hab. ?
linearis, Wall. 1. c. 42-Coelogyne ovalis.
pendula. Wall. 1. c. 35=O. alba.
pilosa, Hook, ex Steud. Norn. ed. II. i. 230.—Ind. or.

BROTTSSAIBIA, Gaudich. Freyc. Voy. Bot. 479. t. 69. (1826). *SAXIFRAGEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 641.
argnta, *Gaudich. I. c,*—Ins. Sandvic.
peUncida, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* t. 9.—Ins. Sandvic

BROUSSONETIA, Orteg. Hort. Matr. 61. t. 7 (1798) = Bophora, Linn. (Legumin.).
secundiflora, Orteg. 1. c.-S. secundiflora.
speciosa, Orteg. 1. c. t. 7 = S. secundiflora.

BBOUSSONETIA, L'Herit. ex Vent. Tabl. Regn. Veget. iii. 547 (1799). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 361.
PAFYRIUS, Lam. Ulustr. t. 762 (1798).
STENOCHASMA, Miq. PI. Jungh. i. 46 (1850).
Billardii, Carr. in Rev. Hortic. (1878) 375 = papyrifera.
brasiliensis, Mart in Flora, xxiv. (1841) Beibl. 10 = Madura brasiliensis.
cordate, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 87.—China.
cordata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 440 = papyrifera.
cucullata, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 230 = papyrifera.
dissecta, Hort ex Bar. in DC. Prod. xvii. 226 - papyrifera.
elegans, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 440" papyrifera.
integrifolia, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 195.—Ind. or.
Kaempferi, *Siebold, in Verh. Bat. Gen.* xii. (1830) 28.—Japon.
Kan, Siebold, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.ii. 86-= papyrifera.
Kazinoki, *Siebold, in Verh. Bat. Gen.* xii. (1830) 28.—Japon.
luzonica, *Bur. in DC. Pfod.* xvii. 224.—Ins. Philipp.
luBoniensis, Blanco, FL Filip. ed. II. 488 = Allaeanthns luzoniens.
maculata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 230 - papyrifera.
monoica, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 294.—China.
navicularis, Lodd. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 440 = papyrifera.
nana, Hort. ex Bur. in DC. Prod. xvii. 225 = papyrifera.
navicularis, Lodd. ex Bur. 1. c = papyrifera.
navifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 230 - papyrifera.
papyrifera, *Vent. Tabl. Regn. Veget.* iii 647.—Malaya; Ins. Pacific.
Plumerii, Spreng. Syst iii. 901=Chlorophora tinctoria.
Sieboldii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 86=B. Kazinoki.
spathulata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 230 = papyrifera.
tinctoria, Blanco, Fl. Filip. ed. IL 488 - Cudrania javanensis.
tinctoria, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 32 = Chlorophora tinctoria.
tinctoria, Spreng. Syst. ii. 901 = Madura tinctoria.
tricolor, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 440 = papyrifera.
xanthoxylon, Mart, in Flora, xxiv. (1841) Beibl. 10 = Madura xanthoxylon.

BROUVALEA, Adans. Fam. ii. 211 (1763)-seq.

BROVALLIA, Linn. Orb. Nat. (1764)=seq.

BBOWALIiIA, Linn. Gen. ed. 1.848 (1787). *SOLANACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 910.
abbreviate, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 144.—Perav.
alienata, Linn. Syst. ed. X. 1118=Rnellia panicuUta.
atnericana. Linn. Sp. PI. 6Sl=demissa.
cordate, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 478.—Peruv.

BBOWAIilA:—
demissa, *Linn. Syst.* ed. X. 1118.—Am. austr.
elata, Linn. 1. c. =demissa.
grandiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 372-demissa.
grandiflora, Grah. in Edin. N.Phil. Journ. >*Jan.-Apl.* 1880' [182»].—Peruv.
grandifiora, Lindl. Bot. Reg. 11884=cordata.
Jamesonii, Benth. in DC. Prod. x. 197.-Pernv.; N. Granat.
lactea, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 508 = demissa.
Linnaeana, Spreng. Syst. ii. 808=demissa.
nervosa, Hist. Ser (1850) 206 =
peduncularis Ben«. Bot. Voy. Sulph. 14S.-Pernv.
pulchella, Hort. viscosa.
pulchella, Lehm. in Hamb, Garien, x. (1854) 575.—Hab.?
speciosa, Hook. Bot. Mag. t. 4339.—N. Granat.
tenella, Mier & Mag. Nat. Hist. Se v. (1850) 205
tex TOT- Bot. Mex. Bound. 156=Nierembergia
»scoja, #. *WK.Nov. Gen. et Sp.* ii. 873.—Am. austr.

BROWNEA, Jacq. Emun. PL Carib. 6 (1760) (Brownaea). *LEGV MMOSAE,* Benth. & Hook. *f.* 1677.
HUMESIAS, Loefl. her, 278 (1758).
antioqwnas, Linden, Cat. (1869) 3 = macrophylla.
*«», Lindl. & PaxL Flow. Gaid. ii. 107. t. 59 = grandiceps.
coccinea, Vacy. £»«m. *pi Qarib.* 26—Venezuela.
*«n M Loefl. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.212=B. *«>sa.de-nionte.
"VSJ??- ex Pknch in Fl des Senes, vi.* (1850-51) 154 (=Theophrasta pinnata).
grandiceps, Jacq. Collect, iii. 287. t. 22.-Am. austr.
in Schomb. Faun. V Ft. Guy. 1209, nomen—Gulana,
macrophylla, Linden, Cat. n. 18 (1868) 11; *Mast, in Gard. Chron.* (1878) 809—Venezuela,
negrensis, Benth. 9--N- Granat.
pauciflora Mart. Fl. Bras. xv. II. 212.—Bras.
Princeps, Willd. Sp. PI. iii. 716 = Palovea guianensis.
racemosa, Jacq. Fragm. 25. t. 16.—Venezuela.
Rosa, ers. Sy . ii. 237 - B. Rosa^e-monte.
PUl- Trans. (1771) 171. t 8, ••—Am. austr.
in Otto & Dietr. Allg. Garten*, xxiii. (1855) B.Rosa-de-monte. Rosa-de-monte.
Jacq. Fragm. 25. t. 16.—Venezuela.

BROWNETERA, Rich, in Ann. Mus. Hist. Nat. Par. xvi. (1810) 299=PhyUoclftdU8, Rich. (Conifer.), *asplenifolia,* Rich. lTcUph. rhomboidali

BROWNLEEA, Harv. ex Lindl. in Hook. Lend, Journ. Bot. i. (1842) 16. *ORCHWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 681.
caerulea, Harv. ex £.„«;/. /. f._Afr. austr.
macroceras, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 106 = caerulea.
parviflora, Harv. Lindl. Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 16.-Afr. austr.
recurvata, Sond in Unnaea, ix. (1847) 107.—Afr. austr.

BROWNLOWIA Roxb. Corom. iii. 61. t. 265 (1819). *LUEAE,* Benth. & Hook. f. L 281.
HUMEA £oxb. Fl. Ind. «• M0 (1832).
Tiiifeindir'' As. Soc. Bene *
Un *f"*«• Coro OT.iii. 61. t. 265.—Ind.or.; Burma.
Th f-j» Joum. Linn. Soc. V. *S«ppl.* In4 or.; Burma.
peltata, Benth. 56.—Borneo.

BROWNLOWIA:—
Riedelii, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. III. 128.—Ins. Molucc

BBTTCEA, T. S. Mill. Fasc. t. 25 (1780). *SMARUBEAE,* Benth. & Hook. f. i. 311.
GONUS, Lour. Fl. Cochinch. ii. 658 (1790).
NIMA, Buch..Ham. ex A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. 516 (1825).
abyssinica, Spreng. Pugill. ii. 90, in obs.-femiginea.
antidysenterica. Lam. m Mem. Acad. Par. (1784) 342; Encyc i. 471=ferruginea,
dubia, Steud. Nom. ed. II. i. 230 - Piorasma nepalensis.
ferraginea, L'Hirit. Stirp. Nov. 19.1.10.—Abyss,
glabrata, Decne. in Nmn. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 447. —Ins. Timor.
gracilis, DC. Prod. ii. 88=sumatrana.
guineensis, G. Don, Gen. Syst. i. 801=paniculata.
macrophylla, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 310.—Afr. trop.
mollis, Wall. Cat. n. 8488.—Reg. Himal.
paniculata, Lam. Encyc. i. 472.—Afr. trop.
qnercifolia. Seem. Fl. Vit. 33.—Ins, Fiji,
sumatrana, Roxb. Hort. Beng. 12; *Fl. Ind.* i. 449.—As. trop.; Austral.
sumatrensis, Spreng. Pugill. ii. 90 = sumatrana.
trichotoma, Spreng. Syst. i. 441.—Cochinch.
trifoliata, Spreng. 1. *c* iv. Cur. Post. 48=Evodia drupacea.
virginica, Hornem. ex Steud. Nom. ed. I. 122, nomen. —Virginia.

BRUCHMANNIA, Nutt. Gen. Am. i. 48 (1818) = Beokmannia, Host (Gramin.).
erucaeformis, Nutt. 1. c. = Beckmannia emcaefonnis.

BKTJCKENTHAIiIA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 414 (1831). *ERICACEAE,* Benth. *6c* Hook. f. ii. 591.
spiculifolia, *Reichb. I. c.*—Europ. austr. or.; As. Min.

BBXTEA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 511 (1826). *URTICACEAEi* (Gen. dubium) Benth. ft Hook. f. iii. 851.
bengalensis, *Gaudich. I. c.* (-Laportea tenninalis ?). —Ind. or.

BRUECKEA, Klotxsch & Karst in Karst. Ausw. Gew. Venez. 31. t. 10 (1848) - Aegiphila, Jacq. (Verbenac.).
grandifolia, Klotzsch *b* Kant. 1. c. 82=A. verrpcoBa.

BRUENNICHIA, WilliSp. PI. iL 751 (1800)=Brnnniohla, Banks (Polygon.).

BRUOMANSIA, Blume, in Van Hall, Bijdr. Nat Wet. ii. (1828) 422. *CYTINAC&AE,* Benth. *8c* Hook: f. iii. 119.
MYCETANTHR, Reichb. Nom. 61 (1841).
ZIPPELIA, Reichb. ex EndL Gen.Suppl. ii. 6 (1842).
Lorh, Becc. in Atti Soc. Ital. Sc. Nat xi. (1868) 198 = Zippelii.
Zippefii, *Blume, in Van Hall, Bijdr. Nat. Wet.* ii. (1828) 422.—Java.

BRUGMANSIA, Pers. Syn. i. 216 (1805) = Datura, Linn. (Solanac).
arborea, Steud. Nom. ed. II. i. 230 = D. arborea.
aurantiaca, Hort. ex Walp. Rep. iii. 931=Juanulloa parasitica.
bicolor, Pen. Syn. i. 216=D. sanguinea.
Candida, Pers. 1. c. = D. arborea.
floribunda, Paxt. Mag. Bot. ix. 3=Juanulloa aurantiaca.
Knightii, Hort. ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 690=D. comigera.
parvifiora, Hort. ex Walp. Rep. iii. 984 = Juanulloa parasitica.
sanguinea, D. Don, in Sweet, Brit. Fl. Gaid. Ser. II. t.272=D. sanguinea.
suaveolens, Bercht. ft Presl, Rostl. L Solaneac. 45-D. suaveolens.
Waymanni, Paxt. Mag. Bot iv. 241=D. fastuosa.

BRUGUIERA, Lam. Encyc. iv. 696 (1796). *RHIZOPHOREAE,* Benth. & Hook. f. i. 679.
KANILIA, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 140 (1849).
PALETUVIBRA, Thou, ex DC. Prod. iii. 82 (1828).
Arnottiana, Wight, ex Am. in Ann. Nat Hist. i. (1888) 364 = Ceriops Candolleana.
australis, A. Cunn. ex Am. 1. c 868 = Rheedii.
Candel, Steud. Nom. ed. II. i. 231-Kandelia Rheedii.

BBUOUTEiBA:—
capensis, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat i. 137 =gymnorrhiza.
caryopbyllaeoides, *Blume, Enum. PI. Jan.* i. 93.—Ind. or.; Malaya.
cylindrica, Blume, 1. c. i. 91—caryophyllaeoides, malabarica.
decangulata, Grift. Notul.iv. 669 =Rhizophora Mangle,
eriopetala, *Wight W Am. in Ann. Nat. Hist* i. (1838) 368.—As. trop.
gymnorrhiza, *Lam. Illustr.* t. 397 i *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 136.—Geront trop.
malabarica, *Arn. in Ann. Nat. Hist.* i. (1888) 369.—Ind. or.
nemorosa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 276=Carallia integerrima.
nubicola, Pritz. Ic. Ind. ii. 51, sphalm. » Bougueria nubicola.
obtusa, Steud. Nom. ed. II. i. 281 *(=Problastes cuneifolia).*—Java.
oxyphylla, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suipl.* i. 824.—Sumatra.
parietosa, Griff. NoraL iv. 670; Ic. PI. Asiat. t. 641 = eriopetala.
parviflora, *Wight (fArn. Prod.* 311.—Ind. or.; Malaya.
Rheedii, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 92.—Geront. trop.
Rumphii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 138 = Rheedii.
sexangula, Poir. Encyc Suppl. iv. 262 = Rhizophora sexangula.
sexangularis, Spreng. Syst. ii. 602— Rhizophora sexangula.
timoriensis, Wight & Am. Prod. 811=Ceriops Candolleana.
Wightii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i 138 = jjymnorrhiza.
Zippelii, Blume, 1. c. 189 = Rheedii.

BRUGUIERA, Thou. Gen. Nov. Madag. 21 (1806) = Iiiunnitzera, Willd. (Combret.).
littorea, Steud. Nom. ed. II. i. 231-=L. coccinea.
madagascariensis, DC. Prod. iii. 23-L. racemosa.

BRUGUIERA, Rich, ex DC. Prod. iii. 173, in syn. (1828) = Conostegia, D. Don (Melastom.).

BRUINSMANIA, Miq. in Linnaea, xvii. (1843) 72 - Isertia, Schreb. (Rubiac.).
isertioides, Miq. L c 7*.—Guiana.

BRUNELLA, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = Prunella, Linn. (Labiat).

BRUNELLIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. Fl. Per. 71. t. 12 (1794). *SIMARUBEAE,* Benth. & Hook. f. i. 313.
aculeata, *Suit & Pav. Fl. Per.* iv. 71. t 115; *Syst.* 127.—Peruv.
acutangula, *Numb. V Bonpl. PI. Aequin.* i. 216. t. 62. —N. Granat.
comocladifolia, *Numb, (f Bonpl. I. c.* i. 211. t. 59.—Peruv.
Funkiana, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vii. (1847) 267.—N. Granat
Goudotii, *Tul. I. c.* 270.—N. Granat.
inermis, *Ruiu V Pav. Fl. Per.* iv. 71. t 414; *Syst.* 197. —Peruv.
ovalifolia, *Numb, (f Bonpl. PI. Aequin.* i. 216. t. 61. —Peruv.
propinqua, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 45.—Am. austr.
quadrilocubuis, *Hoot. V Arn. Bot. Beech. Voy.* 282.—Mexic.
racemifera, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vii. (1847) 269.—N. Granat.
rugosa, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxii. (1859) I 274.—Bras.
sandvicensis, Gaudich. Freyc. Voy. Bot 93; ex Hook, *ic* Am. Bot. Beech. Voy. 80=Pelea sandwicensis.
tomentosa, *Numb. V Bonpl. PI. Aequin.* 214. t. 60.—Am. austr.

BBUNTELSIA, Plum, ex Linn. Hort. Cliff. 5 (1787) (BrunsfelsU); Gen. ed. I. 832. *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 911.
FRANCISCEA, Pohl, PL Bras. Ic. iU 1—7 (1827).
acuminata, Benth. in DC. Prod. x. 199—ramosissima.
americana, *Linn. Sp. PI.* 191.—Am. trop.

BBTTHTEIiSIA :—
- *australis,* Benth. in DC. Prod. x. 200=Hopeana.
bahiensis, *A. DC. Prod.* x. 590.—Am. austr.
calycina, Berth, in DC. Prod. x. 199=paudflora.
capitata, *Benth. I. c.* 198.—Bras,
cestroides, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 151.—Cuba.
con/ertiflora, Benth. in DC. Prod. x. 199 = ramosissima.
cuneifolia, *J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras.* viii. 259. —Bras.
eximia, Bosse, Handb. Blnmeng. 524 — macrophylla.
falcata, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisakov.* 21.—Hab. ?
fallax, *Duchass. ex Griseb. in Goett. Abk.* vii. (1857) 242.—Ind. occ.
gradlis, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 21.—Hab. ?
grandiflora, *D. Don, in N. Edin. Phil. Journ.* (Apr.-Oct. 1829) 86.—Peruv.[1]
guianensis, *Benth. in DC. Prod.* x. 200.—Guiana.
Hopeana, *Benth. 1. c.*—Bras,
hydrangeaeformis, *Benth. I. c.* 198.—Bras,
inodora, *Mart. Del. Sem. Hort. Monac.* (1847).—*Cf. Linnaea,* xxiv. (1851) 180.—Bras,
jamaicensis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 432.—Ind. occ.
latifolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 199.—Bras.
latifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 231 = americana.
Lockharti, *Hort. Belg. ex Heynh. Nom.* ii. 79, nomen. — Ins. Trinitat. ?
longiflora, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisaiov.* 21.—Hab. ?
longitnba, *Lem. Jard. Fleur.* iv. (1854) *Misc.* 61.—Cuba.
macrophylla, *Benth. in DC. Prod.* x. 198.—Bras.
maritima, *Benth. I. c.* 200.—Bras.
montana, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 253, nomen.—Ind. occ.
multiflora, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisaiov.* 21.—Hab. ?
mutabilis, *Poit. in Rev. Hortic.* Sir. II. i. (1842) 261. —Hab.t
nitida, *Benth. in DC. Prod.* x. 201.—Am. trop.
obovata, *Benth. 1. c.* 199.—Bras.
parviflora, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 827 -seq.
parvifolio, A. Rich. 1. c. 151-nitida.
pauciflora, *Benth. in DC. Prod.* x. 199.—Bras,
pnrpurea, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 523.—Ind. occ.
ramosissima, *Benth. in DC. Prod.* x. 199.—Bras.
Schomburgkiana, *Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Guy.* 1155, nomen.—Guiana.
Sieberi, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisakov.* 21.—Hab. ?
sinuata, *A. Rick. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 151.—Am. trop.
spinosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 14.—Ind. occ.
Spruceana, Mart ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 258 = maritima.
terminalis, Salisb. Prod. 109 = americana.
undulata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 90.—Jamaica,
nniflora, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-Oct. 1829) 85—Hab. ?
vindflora, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 523.—Ind. occ.
violacea, *Lodd. Bot. Cab.* t. 792.—Am. anstr.

BBUNIA, Linn. Syst. ed. I (1375). *BRVNIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 671.
BAECKIA, Bnrm. f. Prod. Fl. Cap. 12 (1768).
abrotani/olia, F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn. ii. 820 -Berzelia abrotanoides.
abrotanoides, Linn. Sp. PI. 199=Berzelia abrotanoides.
alopecuroides, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. viii. (1826) 376.—Afr. austr.
alopecuroides, Thunb. Prod. PI. Cap. 187 = Berzelia alopecuroides.
arachnoidea, Wendl. Coll. ii. 62-Berzelia squarrosa.
brevi/olia, D. Dietr. Syn. PI. i. 848-Berzelia abrotanoides.
candicans, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 231.—Afr. austr.
capitata, Desf. Tabl. Hort Par. ed. II. 232=Staavia capitella.
capitella, Thunb. Diss. Bran. 5= Staavia capitella.
capitellata, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 316 -staavioides.
dliata, *Linn. Sp. PI.* 199.—Afr. austr.
comosa, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i. (1803) 17 = Berzelia lannginosa.
cordata, Walp. Rep. i. 544=racemosa.
cordifolia, D. Dietr. Syn. PI. i. 848 = Berzelia cordifolia.
coronata. Linn. Mant ii. 210, in syn. = Staavia glutinosa.
cupressina. Linn. 1. c. ii. 343<=Diosma cupressina.

BBTTNTA.:—
deusta, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 187.—Afr. austr.
deusta, Willd. in Denkschr. Acad. Muench. (1808) 127. t. 7. f. 2=Nebelia phylicoides.
Dregeana, *Presl, Bot. Bemerk.* 39.—Afr. austr.
elegans, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. I. iii. 616.—Afr. austr.
ericoides, Wendl. Coll. ii. 57 = Berzelia sqnarrosa.
flagelliformis, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 231 (quid?).—Hab.!
formosa, D. Dietr. Syn. PI. i. 848 = Berzelia abrotanoides.
formosa, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. I. iii. 616.—Afr. anstr.
fragarindes. WiWA. Sp. PI. i. 1148 *(^Berardiaglobosa).* —Afr. anstr.
glabrata, *Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter,* i. (1808) 18.—Afr. austr.
globosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 139 =laevis.
globosa, Tbunb. Diss. Brun. 4 *{=Berardiaglobosa).*—Afr. austr.
glutinosa. Berg. Desc PI. Cap. 57=Staavia glutinosa.
hirsuta, *Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter,* i. (1803) 19.—Afr. austr.
imbricata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 115=raceinosa.
imbricata, *Wendl. /. ex Hoffm. Ver: Pfl. Nacktr.* i. 228, ii. *Sc* iii. 26, 71.—Afr. austr.
intermedia, D. Dietr. Syn. PI. i. 848= Berzelia intermedia.
laevis, *Thunb. Prod. Fl. Cap.* 187.—Afr. austr.
lancifolia, *Walp. Rep.* i. 544.—Afr. anstr.
lanuginosa, Linn. Sp. PI. 199 = Berzelia lanuginosa.
lanuginosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 41 = Berzelia squarrosa.
lauri/olia, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 315 = lancifolia.
laxa, Thunb. Prod. PI. Cap. 187=Tittmannia laxa.
Levisanus, Linn. Sp. PI. 199—Leucadendron Levisanns.
macrocephala, *Willd. in Denkschr. Acad. Muench.* i. (1809) 152.—Afr. austr.
microcephala, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 820 *(=*Berardia sphaerocephala).*—Afr. austr.
microphylla, Thunb. Prod. PI. Cap. 187 *(=Berardia micropkylla).*—Afr. austr.
nodiflora, *Linn. Sp. PI.* 199.—Afr. austr.
paleacea, Berg. Desc. PI. Cap. 56 = Nebelia paleacea.
paleacea, Wendl. Coll. t. 2-Berzelia intermedia,
passerinoides, *Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) 190.—Afr. austr.
phylicoides, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 321 *(=Berardia Dregeana).*—Afr. austr.
phylicoides, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i. (1803) 18=Nebelia phylicoides.
pinifolia, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. viii. (1826) 374.—Afr. austr.
plumosa, Lam. Encyc. i. 475 = Berzelia squarrosa.
pragarioides, DC. Prod. ii. 45, err. typ. =*fragarioides.*
Protea, Crantz, Inst. i. 357 = Berzelia abrotanoides.
racemosa, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sir. I. viii. (1826) 874.—Afr. anstr.
racemosa, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 315 = landfolia.
radiata, Berg. Desc. PI. Cap. 58= Staavia glutinosa.
radiata, Linn. Mant. ii. 209-Staavia radiata.
rubra, Willd. in Denkschr. Acad. Muench. i. (1809) 131. t. 7 = Berzelia squarrosa.
sericea, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vii. 329 = Berzelia superba.
spedosa, Hort. ex Dum.-Cours. 1. c. vi. 279; vii. 329 = Berzelia superba.
squalida, *Sond. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 315.—Afr. austr.
squarrosa, Sw. ex Harv. *Sc* Sond. 1. c. 311 = Berzelia abrotanoides.
squarrosa, Thunb. Diss. Bran. 5-Berzelia squarrosa.
staavioides, *Sond. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 316. —Afr. anstr.
superba, Donn, Ind. Hort. Cantab. 25 = Benelia lann. ginosa.
superba, Krauss, ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 314 = laevis.
tenuifolia, Willd. in Denkschr. Acad. Muench. i. (1809) 129 = Berzelia lanuginosa.
teres, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 388.—Afr. austr.
Thunbergiana, D. Dietr. Syn. PI. 1. 849-Nebelia paleacea.
thyrsophora, *Walp. Rep.* i. 544.—Afr. austr.

BBUNIA :—
uniflora, Linn. Sp. PI. 199=Diosma cupressina.
verticillata, E. Mey. ex Harv. & Sond. FL Cap. ii. 322 = Staavia nuda.
verticillata, *Linn./. Suppl.* 156.—Afr. anstr.
verticillata, Thunb. Prod. PI. Cap. 41-virgata.
villosa, *E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 815.—Afr. austr.
virgata, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. viii. (1826) 376.—Afr. austr.

BRUNIERA, Franch. in Billotia, (1864) 25=Wolffla, Horkel. (Lemnac.).
vivipqra, Franch. 1. c.=W. Miehelii.

BRUNNERA, Stev. in BulL Soc. Nat. Most (1851) i. 582=Anchuaa, Linn. (Boragin.).
myosotidiflora, Stev. 1. c.=A. myosotidiflora.
sibirica, Stev. 1. c—Sibir.

BBTTNTSICHIA, Banks, ex Gaertn. Frnct i. 218. t. 45 (1788). *POLYGONACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 103.
FALLOPIA, Adans. Fam. ii. 274, 277 (1763).
RAJANIA, Walt. Fl. Carol. 247 (1788).
africana, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1872) 61. —Afr. trop.
cirrhosa, *Gaertn. Fruct.* i. 214. t. 45.—Am. bor.

BBUNONIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 866. t 28, 29. *GOODENOVIEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 641.
australis, *Sm. 1. c.* 367. t. 28.—Austral.
sericea, Sm. 1. c. 367. t. 29= australis.
simplex, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 82=australis.

BRUNSFELSIA, Plnm. ex Linn. Hort. Cliff. 5 (1787) = Bnmfelaia, Linn. (Solanac.).

BRUNSVIA, Neck. Elem. iii. 337 (1790) = Croton, Linn. (Euphorb.).

BBTJTT8VTGIA, Heist. Beschr. Brunsv. Braunschweig (1755), 3, cum ic. *AMARYLUDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 728.
albiflora, *Eckl. Topogr. Verz.* 7, nomen.—Afr. anstr.
Burchelliana, Herb. Amaryll. t. 22. f. 2=radulosa.
ciliaris, [Ker.Gawl. in] Bot. Reg. sub t. 192, 193" Buphane disticha.
Cooperi, *Baker, in Sound. Ref. Bot.* t. 330.—Afr. austr.
coranica, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 404.—Am. austr.
disticha, Sweet, 1. c. = Buphane disticha.
falcata, *[Ker-Gaxol. in] Bot. Mag.* 1.1443.— Afr. anstr.
fulva, Steud. Nom. ed. II. i. 231 = Stenomesson incarnatutn.
gigantea, *Heist. Beschr. Brunsv. Braunschweig,* 3, *cum ic. fide Schult. f. Syst.* vii. 844 (nobis latet).—Afr. anstr.
glauca, Salisb. Gen. PI. Fragm. 117=Josephinae.
grandiflora, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1835.—Afr. austr.
Josephinae, *[Ker-Gawl. in\ Bot. Reg.* t. 192, 193.—Air. anstr.
laticoma, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 404=Nerine lucida-
lucida, Herb. App. 16 = Nerine lncida.
magnifica, Linden *Sc* Rodigas, in Illustr. Hortic. xxxii-(1885) t. 552 = Crinum Forbesiannm.
marginata, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 230 = Nerine marginata.
minor, *Lindl. Bot. Reg.* t. 954.—Afr. austr.
multiflora, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 280-gigantea.
orientalis, Ait ex Eckl. Topog. Verz. 7=gigantea.
Radula, *Ait. Hort. Kew.* ed. II. ii. 230.—Afr. anstr.
radulosa, *Herb. Amaryll.* 281. t. 22. f. 2.—Afr. austr.
rubricaulis, M. Roera. Syn. Ensat. 57=gigantea.
Slateriana, *Benth. V Hook./. Gen.*iii. 727.—Afr. austr.
striata, *Ait. Hort. Kew.* ed. II. ii. 231.—Afr. austr.
toxicaria, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. t 567 - Buphane disticha.
vaginata, Schult f. Syst. vii. 852 = Hessea vaginata.

BRUSCHIA, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. viii-(1857) 238 (Misc. Bot. xviii. 16. t. 2) = Nyotanthee, Linn. (Oleac.).
macrocarpa, Bertol. 11. cc. 238 ; 17 = N. Arbor-tristis.

BBUXAUELIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. S[1] (1818). *RUBIACEAE* (Gen. dub.),
indica, *Dennst. I.* f.—Ind. or.

BRY$_{\Lambda}$ VeU_ F1- Flum. 146 (1825); iv. t. 1 (1827) = HlPteUa, Linn. (Rosac.).
racemosa, VelL 1L cc. 147 J iv. 1.1.—Bras.

BETA, P. Br. Hist. Jamaic. 299. t. 81 (1756). *LE-OUMINOSAE,* Benth. & Hook. £ i. 514.
Ebenus, *DC. Prod.* ii. 421.—Ind. occ.
leonensis, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 286, nomen.—Aft. trop.
nicareguensis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddtl.* (1858) 18.-Nicaragua.
Pamflora, *DC. Prod.a.* 421.—Bias.

BRYANTEA, Rafin. Sylva Tellur. 165 (1838)«Iitaea, Lam. (Laurin.).
dealbata, *Rafin. 1.* c. = L. dealbata.

BRYAKTHT7S, S. G. Gmel. Fl. Siblr. iv. 188. t. 67. 18 (1769). *ERICA CEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 595.
aleuticus, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* vii. (1868) 868—As. bor. or.; Am. bor. occ.
Bieweri, *A. Gray, 1. c.* 867.—Calif,
onpetrifonnis, *A. Gray, I. c*—Am. bor. occ.
«wtwx, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1860-51) 97.
glanduliflorus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 368.—Am. bor. occ.
Gmelinhi, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* xvii. . (July 1884) 160.—Sibir.; Kamtsch.
'"towiiuj, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 367-empetriformis.
StelUri, D. Don, in Edinb. N. Phil. Jonrn. xvii. (July 1884) 160=CassiopeStelleriana.
ttxtfolins, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 368.—Reg. bor. frigid.

BRYANTIA, Webb, ex Gandich. Bot. Voy. Bonite, t. 20 (1844?); Brongn. in Ann. Sc. Nat Sér. VI. i. (1876) 87. t. 15=Pandanus, Linn.
Wyrophora, Webb, 1. c.=P. butyrophoras.
oblonga, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. i. (1875) 288; in Comptes-Rendus, lxxx. (1875) 1196=P. oblongus.
•>>*scida,* Brongn. 11. cc. 287; 1196=P. viscidus.

BRYLKINIA, F. Schmidt, Reisen Amnrl. 199. t. JJ 1868). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook, f[1] iii. 2.
ewdata, *F. Schmidt, I.* «.—Japon; Ins. Sachal.

BRYOBIUM, Lindl. Introd. Nat Syst. ed. II. 446 (1886) =Eria, LindL (Orchid.).
pubesasns, Lindl. Bot. Reg. (1888) Misc. 79 = E. retusa.

B»"S*OCABPTJJI, Hook. f. & Thorns, in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 200.15. *PRIMULACBAE,* Benth. & Hook. f. ii. 684.
nunalaiciim, *Hook.f.* &• *Thorns. I. c.—Rtg.* Himal.

BRYOCLES, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 885 = *™Wa, Spreng. (Liliac.).
•*"entricosa,* Salisb. 1. c = F. ovata.

BRYODES, Benth. in DC. Prod. x. 438 (1846). *JCROPHULAR/NEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 957.
Wicrantha, *Benth. I.* r.—Ins. Manrit.

•WYOMORPHA, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. *•• (1842) 172 = Thylacospermum, Fenri kCaryophylt).
T"pifrago, Kar. & Kir. 1. c.=T. rnpifiagnm.

B$_{\Lambda}$K?MOBPHB H«*- To*5- CiP- "• 88 - l- 151 -11868). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 824.
«yneri, *Harv. I. c.*—Afr. austr.

BR$_{\Lambda}$OKIA, Linn. Syst. ed. I (1786). *CUCURf'TACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 829.
<f"IVa> Goualt, in Rev. Hortic. (1858) 61 = -Maximowiciia Lindheimeri.
"tysfinica, Lam. Encyc. i. 497-Coccinia abyssinica.
'X'nfolia, D. Dietr. Syn. PI. v. 367=Coccinia indica.
""", Desf. Fl. Atlant. ii. 360=dioica.
"<*ta.ngula, Thnnb. Prod. PI. Cap. 18-(Senecionis sp.).
"finis, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 125 = Bryonopsis

BBYON1A:-
africana, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 169-Kedrostis grossulariaefolia.
africana, Linn. Sp. PI. 1018-Kedrostis africana.
africana, Thnnb. Prod. PL Cap. 13=Kedrostis nana.
agrestis, Raeusch. Nom. Bot. ed. II. 28S=Blastania Garcini.
alba, Bull. Herb. t. 55-dioica.
alba, *Linn. Sp. PI.* 1012.—Europ.; Reg. Caucas.; Persia.
alceaefolia, Willd. in Ges. Natnrf. Freuude, Nene Schr. iv. (1808) 223=Coccinia indica.
althaeoides, Ser. in DC. Prod. iii. 306 = Melothria maderaspatana.
americana, Desconrt FL Antill. ii 281. t 186 = Melothria pervaga.
americana, Lam. Encyc. i. 498 = Cayaponia americana.
amplexicaulis, Lam. 1. c. 496 = Melothria amplexicaulis.
angulata, Thnnb. Prod. PI. Cap. 13 = Melothria punctata.
arguta, *Zipp. ex Span, in Linnaea, XV.* (1841) 206.—Malaya.
aspera, Stev. in Cat. Hort. Gorenk. (1812) 32=alba.
asperifolia, Presl, Bot. Bemerk. 72 - Cayaponia americana.
attenuata. Hook. & Am. Bot Beech. Voy. Suppl. 424 =Cayaponia attenuata.
barbata, Buch.-Ham. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 580=Cocdnia indica.
biflora, Buoh.-Ham. in Wall. Cat. n. 6707=MelothrU odorata.
Blumei, Ser. in DC. Prod. iii. 305 = Melothria Rumphiana.
bonariensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 6 = Cayaponia ficifolia.
Boyiinii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 640=Cayaponia Boykinii.
Cabocla, Veil. Fl. Flum. x. t. 88=Cayaponia globosa.
callosa, Heyne, ex Wall. Cat. snbn. 6708=Melothria maderaspatana.
callosa, Rottl. in Ges. Naturf. Frennde, Nene Schr. iv. (1803) 210; Wall. Cat n. 6710=Cocnmis trigonus.
capillacea, Schpm. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 480 = Melothria triangnlaris.
cheirophylla, Wall. Cat. n. 6715 A^Lnffa aegyptiaca.
ciliata, Moench, Meth. 653=Kedrostis africana.
cissoides, Wall. Cat. n. 6698=Melothria perpusilla.
cochinchinensis, Low. Fl. Cochinch. 695=Gymnopetalum cochinchinense.
collosa, Rottl. in Ges. Natnrf. Freunde, Nene Schr. iv. (1603) *210=sphalm. vide* callosa.
conwlvulifolia, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (185S-S5) 640=Melothria guadalnpensis.
conwlmiloides, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 288 = Coccinia adoënsis.
cordata, Thunb. Fl. Cap. 149 - Melothria cordata.
cordatifolia, Goday Torres, in Patriots, iii. n. 87 (1814) 71=Cayaponia Taynya.
cordifolia, Walp. Rep. ii. 199 = praec.
cordifolia. Linn. Sp. PI. 1012=Coccinia indica.
cordifolia, Rnss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 282= Melothria maderaspatana.
cretica, *Linn. Sp. PL* 1013.—Graecia et Ins. Creta.
cucumeroides, Ser. in DC. Prod. iii. 308~ Trichosanthes cucumeroides.
deltoidea, Am. Pngill. 19; in Nov. Act. Nat Cur. xviii. (1836) 337 = Melothria zeylanica.
deltoidea, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 429- Melothria deltoidea.
dentata, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 169=Melothria punctata.
digitata, Thunb. Prod. PI. Cap. 13=Kedrostis digitate.
digyna, Pomel, Nonv. Mat Fl. Atl. 155=dioica.
dioica, Bieb. Fl. Taur. Cane. iii. 625= alba.
dioica, Boj. Hort. Maurit 148 = Bryonopsis laciniosa.
dioica, *Jacq. Fl. Austr.* ii. 59.1.199 (err. typ. disica).—Lurop.; Reg. Mediterr.
dissecta, Thnnb. Prod. PL Cap. 13 = Kedrostis africana.
divisa, *Willd. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 282, nomen.—Hab.t
epigaea, Blume, Bijdr. 925=Melothria Rumphiana.
epigaea, Rottl. in Ges. Natnrf. Freunde, Neue Schr. iv. (1808) 223=Corallocarpus epigaeus.

BKYONIA :-
ficifolia, Descourt. Fl. Antill. vi. 89. t. 891=Cayaponia americana.
ficifolia, Lam. Encyc. i. 498=Cayaponia ficifolia.
filicaulis, Wall. Cat. n. 6713 = Kedrostis rostrata.
filifolia, Spreng. Syst. iii. 16=Cayaponia ficifolia.
filiformis, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 727 = Melothria heterophylla ?
fimbristipula, Fenzl, ex Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 558 = Blastania fimbristipula.
fluminensis, Veil. Fl. Flum. x. t. 87=Cayaponia fluminensis.
foetidissima, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 428 = Kedrostis foetidissima.
Garcini, Willd. Sp. Fl. iv. 628 = Blastania Garcini.
geminata, Blume, Bijdr. 924-Melothria indica.
glabra, Roxb. Hort Beng. 104 = Corallocarpus epigaeus.
glandulosa, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 824.—Chili.
glandulosa, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 56. t. 176=Cayaponia glandulosa.
gracilis, Wall. Cat n. 6714 = Melothria maderaspatana.
grandis, Linn. Mant i. 126=Coccinia indica.
grandis. Wall. Cat. n. 6700 K = Gymnopetalnm cochinchinense.
grandis, Wall. 1. c. L=Momordica dioica.
grossttlarifolia, E. Mey. Zwei Pfl. Docnm. 169 = Kedrostis grossulariaefolia.
guadalupensis, Spreng. Syst. iii. 15=Melothria pervaga.
guineensis, G. Don, Gen. Syst. iii. 32 (sp. dub.).—Afr. trop.
hastata. Lour. Fl. Cocbinch. ii. - 594 = Melothria heterophylla.
hederaefolia, Jacq. Fragm. 73. n. 230. t. 113 = verrncosa.
heterophylla, Blume, Bijdr. 925 = Melothria Rumphiana.
heterophylla, Raeusch. Nom. ed. III. 282; Steud. Nom. ed. I. 128=Melothria heterophylla.
heterophylla. Wall. Cat. n. 6704 = Melothria marginatat
hispida, Salisb. Prod. 158 = Melothria maderaspatana.
Hookeriana, Wight & Am. Prod. 345 = Melothria perpusilla.
japonica, Thnnb. Fl. Jap. 825 = Melothria japonica.
jatrophaefolia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 289 = Coccinia jatrophaefolia.
Johnstoni, Cuzent, ex Seem, in Jonm. Bot. ii. (1864) 47=Melothria Grayana.
laciniosa, linn. Sp. PI. 1018=Bryonopsis laciniosa.
laevis, Thunb. Prod. PI. Cap. 13=Melothria velutina.
lagenaria, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 169-Coccinia sessilifolia.
latebrosa, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 884 = Cayaponia latebrosa.
Uiosperma, Wight *Sc* Arn. Prod. 845 = Melothria leiosperma.
leucocarpa, Blume, Bijdr. 924-Melothria odorata.
LhotMkyana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 83 = Cayaponia Lhotzkyana.
lutea, Bast, ex Ser. in DC. Prod. iii. 807 = dioica.
macrophylla, *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 761.—Armenia,
macrophylla, *Sir. in DC. Prod.* iii. 808 (sp. dub.).—Hab.)
maderaspatana, Berg. Deac PI. Cap. 361-Melothria punctata.
maderaspatana, Lam. Encyc. i. 496 = Melothria maderaspatana.
marginata, Blume, Bijdr. 924 = Melothria Rumphiana.
maysorensis, Wall. Cat. n. 6702 = Melothria mucronata.
maysorensis, Wight, Ic. iii. t. 7581-Melothria perpusilla.
Melothria, Crantz, Inst L 178 »Melothria pendula.
micrantha, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 7 -syriaca.
micrantha, Hochst. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 623—Melothria maderaspatana.
micropoda, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 169-Melothria maderaspatana.
Uoimoi, Ser. in DC. Prod. iii. 306=Coccinca Moghadd.
mucronata, Blume, Bijdr. 928=Melothria mucronata.
multifida, E. Mey. Zwei Pfl. Docnm. 169 = Kedrostis africana.
multiflora, *Boiss. If Heldr. Diagn.* Ser. L x. 8.—Oriens; Ind. bor. occ.

BBTO1TCA.:—
mysorensis, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. ii. 628 = Melothria leiosperma.
mysorensis, Walp. Rep. ii. 198 = Melothria mucro-oata.
mysorensis, Wight & Am. Prod. i. 845- Melothria perpnrilla.
nana, Lam. Enoyc. i. 497= Kedrostis nana.
nepaulensis, Ser. in DC. Prod. iii. 807 - Melothria heterophylla.
nigra, Gilib. Fl. Lituan. i. 80 = alba.
nitida, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 404-dioica.
obtusa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 288 = Mukia scabrella.
obtusiloba, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 169 = Melothria obtusiloba.
odorata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6706 B, C = Melothria odorata.
odorata, Wall. Cst. n. 6706 D-Melothria Wallichii.
oxyphylla. Wall. Cat n. 6698 = Melothria perpusilla.
palmata. Linn. Sp. PI. 1012 = Bryonopsis faciniosa.
palmata. Wall. Cat. n. 6711 A, B, C-Coccinia indica.
palmata. Wall. 1. c. D = Corallocarpns epigaens.
Pancheri, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. be. (1858) 898 — Bryonopsis affinis.
pectinata, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 169 = Trochomeria pectinata.
pedata, Hassk. in Flora, xxv. (1812) BeibL 42 = Bryonopsis laciniosa.
pedunculosa, Ser. in DC. Prod. iii. 306 = Herpetospermnm caudigerom.
perpusilla, Blume, Bijdr. 926 = Melothria perpnsilla.
Perrottetiana, Ser. in DC. Prod. iii. 304 = Kedrostis foetidissima.
pilosa, Veil. Fl. Flnm. x. t 86 = Cayaponia difinsa.
pilosa, Koxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 726 = Kedrostis rostrata.
pinnatifida, VelL Fl. Flnm. x. t. 90-Cayaponia diversifolia.
pinnatifida, Bnrch. Trav. i. 547 = Kedrostis africana.
pinnatiloba, M. Roem. Syn. fasc. ii. Fepon. 40 = Cayaponia diversifolia.
prostrata, D. Dietr. Syn. PI. v. 868 = Kedrostis rostrata.
polymorpha, *Jensch. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1888) 852, nomen.—Hab. *1*
pubescens, *Pair. Encyc. Suppl.* i. 781 (sp. dub.).—Oriens.
punctata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6708 = Melothria maderaspatana.
punctata, Thonb. Prod. PL Cap. 18 = Melothria punctata.
quinquefolia, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art IV. 48 = Bryonopsis laciniosa.
quinqueloba, Thunb. Prod. PI. Cap. 13 = Coccinia quinqueloba.
racemosa, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4.—Ind. occ.
racemosa, Poepp. *Sc* Endl. NOT. Gen. et Sp. ii. 56 = Cayaponia Poeppigii.
racemosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. = Cayaponia racemosa.
reni/ormis, Koxb. ex Wight & Am. Prod. 341 = Blastania Garcini.
repanda, Blume, Bijdr. 928 = Melothria punctata.
Rheedei, Blume, 1. c. 925 = Melothria heterophylla.
rostrata, Rottl. in Ges. Naturf. Freande Neue Schr. iv. (1803)212-Kedrostisrostrata.
Rottleri, Spreng. Syst iiL 16 = Melothria maderaspatana.
ruderalis, Salisb. Prod. 168-dioica.
ruderalii, *Zi;*p, ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 206, nomen.—Malaya.
sagittata, Blnme, Bijdr. 925-= Melothria heterophylla.
scabra, Rottl. ex Wight & Am. Prod. i. 345 - Melothria maderaspatana.
scabra, Thunb. Prod. PI. Cap. 13 = Melothria punctata.
scabrata, Blame, Bijdr. 928 = Melothria perpusilla.
scabrella, Linn. f. Suppl. 424 — Melothria maderaspatana.
scabrella, Sieber, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iiL 786 = Cayaponia americana.
scabrella, Wall. Cat. n. 6708 = Melothria leiosperma.
scarlatina, Dum. FL Belg. 54=dioica.
scrobiculata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 287 - Melothria scrobiculata.
septemlobata. *Veil. Fl. Flum.* x. t 85.—Bras.
sicula, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 621-dioica.
tinuata. Wall. Cat n. 6711 D = Corallocarpus epigaens.
sinuoia, WalL Cat. n. 6716 = Coccinia indica et Melothria heterophylla.

BRYONIA :—
Solena, Mirb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 288 = Melothria heterophylla.
stipulacea, Willd. Sp. PI. iv. 620 - Blastania GardnL
subpinnata, Steud. Nom. ed. II. i. 282 = Cayaponia diversifolU.
syriaca, *Boiss. Diagn.* Ser. IL ii. 59.—Syria; Palaestin.
Tayuya, Mart, in Linnaea, xU. (1888) Litt 86 = Cayaponia Martiana.
Tayuya, Veil. Fl. Flum. x. t. 89 = Cayaponia Taynya.
Teedonda, Roib. ex Willd. Sp. PI. iv. 618-Melothria heterophylla.
tenella, Koxb. Hort. Beng. 70; FL Ind. iii. 725 = Melothria indica.
tenuifolia. Gill, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 823 = Abobra tenuifolia.
tenuifolia, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 56.—**Chili.**
tenuis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 150 = Bryonopsis ladniosa.
ternata. Veil. Fl. Flum. x. t 91 = Cayaponia temata.
Thunbergiana, Dietr. ex Steud. Nom. ed. I. 123 = Melothria cordata.
Tinei, Huet, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 471 -dioica.
tomentosa, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 8.—Malaya.
tricuspidata, Leschen. ex Steud. Nom. ed. II. i. 275 = Passiflora Leschenaultii.
triflora, Wall. Cat. n. 6707 = Melothria leucocarpa.
triloba, Lour. Fl. Cochinch. ii. 5M6 = Blastania Garcini.
triloba, Thunb. Prod. PL Cap. 18 = Kedrostis nana.
trilobata, Ser. in DC. Prod. iii. 307 = Kedrostis nana.
tubiflora, Wight *Be* Am. Prod. 847 = Gymnopetalum **W' btii.**
umbellate, Klein, ex Willd. Sp. PL iv. 618 = Melothria heterophylla.
umbellata, Wall. Cat n. 6705 D=Trichosantb.es eucumerina.
umbellata, Wall. 1. c. K, L=Melothria amptaricaulis.
variegata, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = Bryonopsis laciniosa.
verrucosa, *\Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. **iii.** 885.—Ins. Canar.
vitifolia, *Hort. Belg. ex Heynh. Nom.* ii. 79, nomen.—Hab.«
vittata, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 206, nomen.—Malaya.
vulgaris, Gueldenst. ex Ledeb. FL Ross. ii. 1401 = alba.
Wallichiana, Ser. ex DC. Prod. iii. 809 = Melothria heterophylla.
Wightiana, WalL Cat. n. 6703 = Melothria leiosperma.

BBYONOPSIS, Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 274. *CUCURBITACEAE,* [Beiith. *Sc* Hook. f. i. 274].
affinis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 479.—Ins. Norfolk.
Bonnettii, Miq. FL Ind. Bat i. I. 657 = Cerasiocarpnm zcyldxtucun).
courtallensis, Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 274-laciniosa.
erythrocarpa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 194-laciniosa.
laciniosa, *Naud. 1. c.* Sér. V. vi. (1866) 30.—As. Afr. et Austral, trop.
leucocarpa, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 657-Melothria odorata.
Pancheri, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. V. vi. (1866) 30 — affinis.
pedata, Hassk. Cat PL Hort Bog. Alt. 189 = laciniosa.

BRYOPHTHALMUM, E. Mey. Preuss. Pflanzeng. 101 (1889)=.Moaeses, Salisb. (Ericac).
unifiorum, £. Mey. 1. c = M. uniflora.

BETOPHYLLUM, Salisb. Parad. Lond. t. 3 (1805). *CRASSULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 658.
FHYSOCALYCIUM, Vest, in Flora, iii. (1820) 409.
CRASSUVIA, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 141 (1786).
calytinnm, *Salisb. I. c.*—Mexic.
cochleatum, Lem. Illustr. Hortic. vi. (1859) Misc. 100 = Kalanchoe' cochleatum.
crenatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) **189.** —Madag.
germinans, Blanco, FL Filip. ed. TI. 220 —calydnum.
pinnatum, Kara, in Joum. As. Soc. Beng. xl. (1871) II. 62 = calycimun.
proliferam. *Bowie, ex Hook. Bot. Mag.* t. 5147.—Afr. austr.

BHYOPHYLXiTTM:—
serratum, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 280 - Kalanchoe laciniata.
triangulare, Blanco, 1. c. 221 = Kalanchoe spathulata.
tubiflorum, *Han. in Han.* to* *Sond. Fl. Cap.* U. 380. —Air. austr.

BUBALINA, Rafin. in Ann. Gen. Sc. Phys. vi. (1820) 86-Burohelllft, R. Br. (Rubiac).

BUBANIA, Girard, in Mém. Acad. Montp. (Sect Sc.) i. (1848) 182 -**Idxnonlastram,** Moench (Plumbagin.).
Feei, Girard', 1. c. 185-L. Guyonianum.
monopetala, Girard, 1. c. 183=L. articnlatnm.

BUBON, Linn. Gen. ed. I. 389 (17S7)-8oseli, Linn. (Umbellif.).
aphyllus, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 389 *(*=Deverra tortuosa).*—Aegypt
buchtormensis, Spreng. Pugill. ii. 55 —S. buchtormense.
capensis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 661.—Afr. austr.
cuneifolius, Spreng. Syst. i. 900 — S. cuneifolium.
dichotomus, link, Enum. Hort. Berol. i. (1821) 278 = S. dichotomum.
eriocephalus, Pall, ex Spreng. Syst. i. 900-S. Lessingtanum.
Galbanum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. 1.283 *(= Melanoselinum dedpiens).*—Madera.
Galbanum, Linn. Sp. PL 253 = Peucedanum Galbanum.
garganicus, Tenore, FL Nap. i. 123 = Athamanta sicula.
glaucus, Spreng. Umb. Spec. 186 = S. petraeum.
globosus, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 274=S. rigidum.
gummifer. Linn. Sp. PL 254 = S. gummiferum.
humilis, Salisb. Prod. Stirp. 165-Athamanta macedonica.
hypoleucus, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1840) 636.—Air. austr.
laevigatus, Ait. Hort. Kew. ed. II. v. i. 352.—Afr. austr.
latifolius, Salisb. Prod. 165 = *laevigatus.*
Libanotis, Dum. FL Belg. 79 - S. Libanotis.
macedonicus. Linn. Sp. PL 253 —Athamanta macedonica.
montanus, Sond. in Hair. & Sond. FL Cap. iii. 560.—Afr. austr.
multifloTus, Moench, Meth. 95 —Athamanta macedonica.
persicus, Pall, ex Ledeb. FL Ross. ii. 829 = Zosima orientalis.
peucedanifolius, Spreng. Syst. i. 900 = S. rigidum.
pimpineUifolius, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 353.—Afr. austr.
prolifer, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 7 = Lichtensteinia pyrethrifolia.
pyrenaicus, Dum. Fl. Belg. 79 = S. vnlgare.
rigidior, Linn. Sp. PL 254 — Ferula communis.
rigidus, Spreng. Fugill. ii. 63 = S. gummiferum.
rigidus, Spreng. Syst. i. 900 —S. rigidum.
siculus, Spreng. in Roem. & Schnlt Syst vi. 499 = S. Bocconi.
tenuifolius, Salisb. Prod. 165 — S. gummiferum.
tenuifolius, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 560.—Afr. austr.
tortuosus, Desf. Fl. Atlant. i. 257 *{-Deverra tortuosa).* —Afr. bor.

BUBONIUM, Hill, Veg. Syst ii. 74 (1761) j Hort. Kew. 13 (1769) (Compos.).
aquaticum, Hill, 11. cc. — Odontosperaram aquaticum.
arborescens. Hill, Hort. Kew. 13 = Borrichia arborescens.
frutescens, Hill, Veg. Syst. ii. 74; Hort. Kew. 18 •» Borrichia frntescens.
maritimum, Hill, Hort. Kew. 13=Odontospermum *spinosum,* Hill, Veg. Syst. ii. 74 — Pallenis spinosa.

BUBROMA, Schreb. Gen. 518 (1791)=Ooasuma, Plum. (Sterculiac).
crinitum, Steud. Nom. ed. II. i. 233 = G. crinita.
grandiflorum, Wilid. ex Steud. 1. c. — G. grandiflora.
Guamuma, Willd. Sp. PL iU. 1*23 = G. ulmifolia
Jnvira, Willd. Enum. Hort. Berol. 806 = G. ulmifolia-
polybotryum, Willd. 1. c = G. polybotrya.
tomentosum, Spreng. Syst. iii. 832 = G. ulmifolia.

BUCAFER, Adaqs. Fam. ii. 469 (1763) -**Buppia,** Linn. (Naiad.).

BUCANION. Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1851) I. 068^Heliotropium, Tonrn. (Boragin.).
Stovitsii, Stev. 1. e.=H. Szovitsii

BUCCAFERKEA, Bnbani, in Nuovo Giom. Bot. Ital. (1873) 316=Potamogeton, Town. (Naiad.).
Omemanni, Bnbani, 1. c = P. Homemanni.
etoffi Bnbani, 1. c. 817-P. obtusifolius.

BUCCAFERREA, Mich, ex Petagna, Inst. Bot. v. 1826 (1787) = Huppia, Linn. (Naiad.).
ctrrhosa, Petagna, 1. c = R. maritima.

BUCCO, Wendl. Coll. IS, tt 2, 8, 18, 28, 77 (1808) = Agethosma, Willd. (Rntac.).
oeuminata, Wendl. Coll. i. t. 28=A. imbricata.
torbata, Roem. ft Schult. Syat. v. 446=Macrostylis lanceolata.
betulina, Roem. & Scbult. 1. c. 448=Barosma betulina.
T"ifolia, Roem. ft Schnlt. 1. c 446-A. erecta.
f'Tefolium, Roem. & Schnlt. 1. c. 489 = A. Cerefolinm.
"vnata, Roem. & Schnlt. 1. c. 444-Barosma crenata.
""pidata, WendL Coll. iii. 17. t. 81=A. cuspidate.
fecta, Wendl. 1. c. i. 17. t. 8 = A. erecta.
hamata, Wendl. ex Bartl. *8c* Wendl. f. Diosmeae, 114 . . = Barosma dioica.
**trta,* Roem. *8c* Schult. Syst v. 446 = A. hirta.
wpida, Roem. ft Schult. 1. c = A. hispida.
inbricata, Wendl. Coll. i. 38. t 9=A. imbricate.
wmarckiana, Roem. *8c* Schnlt. Syst v. 447*=A. TOgata
linifolia Lichtet< in Roera< * Schnlt . " 4*8 " A_ linifolia
<*iusa, WendL Coll. i. 46-A. obtusa.
ovtusata, Wendl. 1. c. iii. 7. t 76=A. imbricate.
m"ta, Roem. ft Schnlt Syst. v. 442-Barosma ovate.
frdifera, Wendl. Coll. iii. t. 77 = A. prolifera.
Pulehrlla, Roem. ft Schult. Syst v. 442-Barosma pulchella.
"*>»<,, Roem. & Schult. 1. c. 441=Diosma vulgaris.
scabra, Wendl. ex Bartl. ft Wendl. f. Diosmeae, 156 - A. ciliata.
serpyllacea, Roem. ft Schnlt. Syst. v. 447 = A. serpyllacea.
ficata, Roem. ft Schnlt 1. c. 448-A. spicate.
tetragona, Roem. & Schult. 1. c. 444-Acmadenia tetragona.
*"*tenatiana,'RoenL* & Schnlt 1. c. 442=A. Ventenatiana.
w.s«a, Roem. & Schnlt 1. c. 447=A. imbricate.
»«««*«, Wendl. Coll. i. 14. t 2=A. villosa.

BUC C.ULINA, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) 209 = Holothrix, Rich. (Orchid.).
«*pera, Lindl. 1. c. - H. aspera.

BU 9^*ELALAXn*^*A.*, Schott, Gen. Aroid. t. 66 (1858). *AROIDEAE*, Benth. ft Hook. f. iii. 984.
"wttleyana, *Schott, I. c*—Borneo.

BUc E?HALON, [Plum.] Linn. Gen. ed. 1.875 (1787)-Trophie, Linn. (Uitic).
T<xtmosum, Linn. Sp. PI. 1190=T. americana.

B[illegible]
'JfK^AS. Hall, ex All. Fl. Pedem. i. 813 (1785) = •"Igonella, Linn. (Legumin.).
f?T"»«/<ifa, All. Fl. Pedem. i. 813=T. comlculate.
J&*a* Moench» Meth. 143 = T.monspelUca.
°°™"-*graecum,* All. Fl. Pedem. i. 818=T. Foenum-graecum.
*&*ndiflora,* Moench, Meth. 143 »T. comiculate.
""•KMUKO, All. Fl. Pedem. i. 318=T. monspeliaca.
^«« o, Moench, Meth. 142 = T. polycerate.
atis.nma, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 1 883 —T. Foenum-graecum.
Piatycarpos, Moench, Meth. Suppl. 51-Medicago platycarpos.
*P J??cera*i°n>* AH. Fl. Pedem. i. 818 = M. polycerate.
*»«osa, Moench, Meth. 148=T. spinosa.
Prasa. Moench, Meth. Suppl. 51 = T. striata.
tortuosa Sm. Norn. ed. II. i. 283-T. striata.

BUCERAS, P. Br HisL Jamaic. * 25 < 1756) = Terminalia, Linn. (Combretec).
Bucida, Crantz, Inst. i. 188-T.Cateppa.

BUCER OSJA, Endl. Gen. 698 (1838)=Bouceroria, »«ht&Am. (Asclep.).

BUCETUM, Pamell, Grasses of Scotl. 104-109 (1842)-Featuca, Tonrn. (Gramin.).
Oatius, Pamell, 1. c. 107 = F. elatior.
giganteum, Pamell, 1. c. 108 = F. gigantea.
lotiaceum, Pamell, 1. c. 104 = F. loliacea.
pratense, Pamell, 1. c 106 = F. elatior.

BUCHANANIA, Sm. Exot. Bot. ii. tab. solnm, 116 (1805)-Colebrookea, Sm. (Labiat).
oppodtifolia, Sm. 1. c.=C. oppositifolia.

BtTCHAWANIA, Sprang, in Schrad. Joum. (1800) II. 234; Roxb. PI. Corom. iii. 79. t. 282 (1819).
ANACARDIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 421.
CAMBESSEDEA, Knnth, in Ann. Sc. Nat. ii. (1824) 866.
CONIOGETON, Blume, Bijdr. 1156 (1826).
LANZANA, Stokes, Bot Mat. Med. ii. 543 (1812).
LAUNZAN, Buch.-Ham. in As. Res. v. (1799) 123.
LAUNZEA, Endl. Ench. 599 (1841).
LUNDIA, Puer. ex DC. Prod. ii. 64, in syn. (1825).
acuminate, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) i. 472.—Burma; Malaya.
acuminata, Wall. Cat n. 981=lanceolate,
amboinensis, *Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat.* iv. 117. —Amboina.
angustifolia, Benth. Fl. Austral, i. 490=Mnelleri.
angustifolia, Roxb. Hort Beng. 32; Fl. Ind. ii. 886 = B. Lanzan.
arborescent, Blume, Mns. Bot Lugd. Bat i. 188 — florida.
arborescens, F. Moell. Fragm. vii. 23 = Muelleri.
auriculata, Blume, I.e. 185=Campnosperma auriculate.
bancana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 623=florida.
ferruginea, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 194.—Ind. or.
florida, A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped. i. 366 = vitiensis.
florida, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 481.—As. trop.; Malaya,
glabra, *Wall. Cat.* n. 984.—Burma.
Halmaheirae, *Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat.* iv. 117. —Malaya,
insignis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 184 Borneo.
intermedia, Wight, Ic. Lt 81=florida.
lanceaefolia, Roxb. Hort. Beng. 82-landfolia.
lanceolata, *Wight, Ic.* i. t. 287.—Ind. or.
lancifolia, *Roxb. Fl. Ind.* ii. 386.—Ind. or.; Burma.
Lanzan, *Spreng. in Schrad. Joum.* (1800) II. 284.—Ind. or.
latifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 32; *Fl. Ind.* ii. 886.—Ind. or.; Burma,
lariflora, *Kurt, in Journ. As. Sec. Beng.* xli. (1872) H. 804.—Burma.
longifolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 184=florida.
longifolia, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 188.—Ins. Timor.
lucida, Blume, Mus. Bot Lngd. Bat. i. 184=florida.
macrophylla, Blume, L c 185=Campnosperma macrophylla.
mangoides, *F. Muell. Fragm.* viL 23.—Ins. Pacif.
microphylla, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 185.—Ins. Philipp.
Mnelleri, *Engl. 1. c.* 190.—AustraL
nitida, *Engl. I. c.* 198.—Ins. Philipp.
obovata, *EngU 1. c.* 187.—AustraL
oxyphylla, *Miq. Fl. Ind. Bot. Suppl. i.* 522.—Sumatra,
oxyrhachis, Mrq. 1. c. 524=Campnosperma oxyrhachis.
palembanica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 188= florida.
paniculata, Roxb. ex Steud. Norn. ed. IL L 288 = Amoora cncullata.
petiolaris, Miq. Fl. Ind. Bat. L II. 637-florida.
platyneura, *Run, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) II. 125.—Ins. Nicobar.
polybotrya, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 638 = florida.
racemiflora, Miq. Fl. Ind. Suppl. i. 523=Campnosperma macrophylla.
reticulate, *Hanee, in Journ. Bot.* xv. (1877) 832.—Cochinch.
sessilifolia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 184.—Malaya,
siamensis, *Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat.* iv. 118.—Siam.
spicata, Roxb. ex Wall. Cat n. 4896-Amoora cncnllate.
splendens, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 624.—Sumatra.
subobovata, Griff. Notul. iv. 418=florida.

BUCHANANIA :-
vitiensis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 186.—Ins. FijL
aeylanica, Blume, Musi Bot. Lugd. Bat. i. 185-Mangifera zeylanica.

BUCHAREA, Rafin. FL Tellur. iv. 84 (1836)-Convolvulus, Toum.
atlantica, Rafin. 1. c—Afr. bor.
maderensis, Rafin. 1. c.—Ins. Madera.

BUCHENAVIA, Eichl. in Flora, xlix. (1866) 164 = Terminalia, Linn. (Combret).
capitata, Eichl. 1. c. 165 = T. Hilariana.
macrophylla, Eichl. 1. c. 166=T. macrophylla.
megalophylla, Heurck *8c* Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot 211.—Am. trop.
ochroprumna, Eichl. in Flora, xlix. (1866) 165.—Am. trop.
oxycarpa, Eichl. I. c. 166—T. oxycarpa.
punctata, Eichl. I. c.=T. punctate, *Spruce,*
reticulata, EichL 1. c—Am. trop.
suaveolens, Eichl. 1. c.=T. snaveolens.
tomentosa, Eichl. 1. c— T. tomentosa. *Mart.*

BTTCHENBOEDKBA, Eckl. & Zeyh. Enum. 194 (1836). *LEGUMINOSAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 478.
COLOBOTUS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 166. (1836).
alpina, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 195.—Afr. austr.
caernlescens, *Presl, Bet- Bemerk.* 47.—Afr. austr.
gracilis, *Eckl.* tr *Zeyh. Enum.* 195.—Afr. austr.
holosericea, *Benth. in Hook, Land. Journ. Bot* vii. (1848) 681.—Afr. austr.
lanceolate, *Presl, Bot. Bemerk.* 47.—Afr. austr.
Meyeri, *Presl, 1. c.*—Afr. austr.
multiflora, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 195.—Afr. austr.
spicata, *Han. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* ii 93.—Afr. austr.
tenuifolia, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 196.—Afr. austr.
teretifolia, Eckl. & Zeyh. 1. c. = Aspalathus annate,
trichodes, *Presl, Bot. Bemerk.* 47—Afr. austr.
umbellate, *Han. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 98.—Afr. austr.
viminea, *Presl, Bot. Bemerk.* 47.—Afr. austr.

BUCHERIA, Heynh. Norn. iL 80 (1846)=Thryptomene, Endl. (Myrtac.).
saxicola, Heynh. 1. c.=T. saxicola.

BUCHIA, D. Dietr. Syn. PI. iii. 870 (1843)-Bouchea, Cham. (Verbenac).

BUCHIA, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. ii. 269. 1.132 <1817)=Peram&, Aubl. (Rubiac).
plantaginta, H. B. ft K. L c. 27U t 182-P. dichotoma.

BTJCHINGEBA, Boiss. ft Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 29 (1849). *CRUCIFERAE*, Benth. ft Hook. f. i. 72.
axillaris, *Boiss. tf Hohen. I. c*—Persia.

BUCHINGERA, F. Schultz, in Jahrb. Pharm. (Mar. 1847).—Cf. Bot Zeit vi (1848) 760=Cuscuta, Linn. (Convolv.).
suaveolens, F. Schultz, 1. c - C . racemosa.

BTJCHLO£, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis (1859), 432. t. 12, 14. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1178.
BULBILIS, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 262.
CALANTHERA, Nntt. ex Hook. Kew Joum. viii. (1856) 18.
SESLBRIA, Nntt Gen. Am. L 64 (1818).
dactyloides, *Engelm. I.* c—Texas; Mexic.

BUCHNEBA, Linn. Hort. Cliff. 501 (1787). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 968.
BONNETIA, Neck. Elem. i. 368 (1790;.
CHYTRA, Gaertn. f. Fruct iii. 184. t. 214 (1806).
MICALIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 104 (1836).
PIKIPEA, AubL PI. Gui. ii. 627. t 258 (1775).
aethiopica, Linn. Mant. ii. 251=Chaenostoma aethiopiciun.
afnéana, Linn. PI. Afr. Rar. 18; in Amoen. Acad. vi. 89 = Trixago Apnla.
americana, *Linn. Sp. PI.* 630.—Am. bor.
amethystine, Cham, & Schlecht in Linnaea, ii. (1827) 588=lobelioides.

BXTCHITERA:—
angustifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 91=Striga euphrasioides.
angustifolia, *Rafin. Nev Fl. Am.* ii. 82.—Am. bor.
aquatica, Wight, ex Stead. Norn. ed. II. i. 234=Striga lutea.
arguta, Decne. in Nouv. Ann. Mas. Par. iii. (1884) 374 =ramosissima.
asiatica, Linn. Sp. PI. 630; Vahl, Symb. Bot. iii. 81 = Striga densifloia.
aspera, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PI. 280=Striga aspera.
asperata, R. Br. Prod. 438-linearis.
aurantica, Burch. Trav. i. 388 = Lyperia mnltifida.
aurea. Banks, ex Bentb. in Hook. Comp. Bot Mag. i. (1836) 372^PoIycerena aurea.
bifida, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3872=Striga euphrasioides.
bilabiata, Thunb. Prod. PI. Cap. 100-Striga Thunbergii.
canadensis, Linn. Mant 88=- Verbena Aubletia.
capensis, Linn. 1. c. = Polycarena capensis.
Capillaris, *Den. in Ham. Prcdr. Fl. Ind. Occ.* 46.—Guiana.
capiuta, *Bentk. in DC. Prod.* x. 495.—Madag.
eapitata, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 17.—Aft. anstr.
cernua. Houtt. Handleid. ix. 642 = Bonchea coneifolia.
cernua, Linn. Mant ii. 251 = Bouchea cernua.
coccinea, Benth. Scroph. Ind. 40= Striga lutea.
eoccinea, Scop. Delic Insnb. ii. 10 •= Achimenes coccinea.
cordi/olia, Linn. f. Snppl. 287=Streptium asperum.
craciata, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 91.—As. trop.; Malaya.
cuneifolia, Thunb. Prod. PI. Cap. 100 = Bouchea cuneifolia.
curmflora, R. Br. Prod. 488=Striga curviflora.
densiflora, Benth. Scroph. Ind. 41 = Striga densiflora.
densiflora, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 203 = cruciata.
denticulata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8872 = Striga enphrasioides.
disticha, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 340.—N. Granat.
divaricata, Linn, ex Walp. Rep. iii. 308 = Zaluzianskya pusilla.
dura, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 866.—Afr. austr.
elegans, D. Dietr. Syn. PI. iii. 526=Striga elegans.
elongata, [Benth.] ex Griseb. FL Brit. W. Ind. 428 = longifolia.
elongata, *Sv. Prod. Veg. Ind. Occ.* 92.—Am. calid.
erinoides, *Jarosz, PI. Nov. Cap.* 19.—Air. austr.
euphrasioides, Vahl, Symb. Bot. ŭi. 81=Striga enphrasioides.
exserta, *Fame, in H. O. Forbes, Nat. Wand. East. Archip.* 512.—Ins. Timor.
foetida, Andr. Bot. Rep. t. 80=Chaenostoma bispidnm.
foetida, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 23. t. 448 = Chaenostoma foetidum.
foetida, *Schrad. Journ.* 1800. n. (1801) 196.—Hab. t
Forbesii, D. Dietr. Syn. PI. iii. 626 = Striga Forbesii.
gesnerioides, Willd. Sp. PI. iii. 838-Striga orobanchoides.
glabrata, *Benth. in Hoot. Comp. Bot. Mag.* i (1835) 866.—Afr. austr.
gracilis, *R. Br. Prod.* 437.—Austral.
grandiflora, Linn. f. Suppl.287 -Escobedia scabrifolia.
Hermonthica, Delile, Fl. Egypte, 245. t. 34-Striga Hermonthica.
Heyneana, D. Dietr. Syn. PL iii. 625 - Striga densiflora.
hirsuta, Wall. Cat n. 3869=Striga euphrasioides.
hispida, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 9L—Ind. or.; Afr. trop.
humifusa, Vabl, Symb. Bot. iii. 81-Striga humifosa.
hydrabadensis. Roth, Nor. Sp. PI. 292=Striga orobanchoides.
jnncea, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* ii (1827) 690.—Bras.
lavandulacea, Cham. & Schlecht 1. c 689=rosea.
leptostachya, *Benth. in DC. Prod.* x. 497.—Afr. trop.
levicaulis, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 39.—Am. bor.
lilacina, Zipp. ex Span, in Linnaea, XT. (1841) 331 = ramosissima.
linearifolia, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 279.—Air. trop.
linearis, *R. Br. Prod.* 437.—Austral.

BTJCHNEBA :—
lithospermifolia, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. ii. 841 =elongata.
lobelioides, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 689.—Bras.
longifiora, Am. in Nov. Act. Nat. Car. xviii. (1836) 356 = Khamphicarpa longiflora.
longifolia, H. B. & K. Nov. Gen.et Sp. PI. ii. 340 = elongata.
longifolia, *Klotisch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 225.—Afr. trop.
macrantha, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 366.—Afr. trop.
macrocarpa, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 128.—Abyssin.
macrocarpa, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 342.—N. Granat.
major, *Polak. in Linnaea,* xli. (1877) 688.—Costa Rica.
Masuria, Buch.-Ham. ex Benth. Scroph. Ind. 41 = Striga Masuria.
mexicana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 457.—Mexic
missurica, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 32.—Am. bor.
montevidensis, Spreng. ex Walp. Rep. iv. 27-Verbena venosa.
Moouria, Steud. Norn. ed. II. i. 284=Striga Masnrea.
mossambicensis, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 224.—Afr. trop.
multiflora, D. Dietr. Syn. PI. iii. 525; F. MuelL Census, 98=Striga multiflora.
nigrescens, Span. Ic. 69; et in Linnaea, XT. (1841) 331=argnta.
obliqna, *Benth. in DC. Prod.* x. 498.—Mexic.
oppositifolia, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 234-Chacnostoma hispidum.
orobanchoides, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64-Striga orobanchoides.
palustris, *Spreng. Syst.* ii. 805.—Gniana.
parviflora, R. Br. Prod. 488=Striga parviflora.
pedunculata, Andr. Bot Rep. t. 84=Lyperia pednnculata.
Peripea, Steud. Nom. ed. I. 124-palustris.
phoenicea, Wall, in Benth. Scroph. Ind. 41-Striga lutea.
pilosa, Benth. Bot. Voy. Snlph. 144=elongata.
pinnatifida, Linn. f. Suppl. 288=Bouchea pinnatifida.
Piripea, Raeusch. Nom. ed. III. 179=palustris.
pubescens, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 365 = ramosissima.
pusilla, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 340.—N. Granat.
ramosissima, *R. Br. Prod.* 488.—AuspaL
rosea, *H. B. V K. Nov. Gen. et-Sp.* ii. 842.—Venezuela.
rupestris, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 1063 = Rachicallis rupestris.
Schimperiana, Hochst.ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 128=hispida.
stricta, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 867 =cruciata.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 702 = cruciata.
tenella, *R. Br. Prod.* 487.—Austral,
temifolia, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 340.—Am. austr.
tetragona, *R. Br. Prod.* 437.—Austral,
tetrasticha, *Wall. Cat.* n. 3878 ; *et in Benth. Seraph. Ind.* 41.—Assam; Banna.
Thunbergii, D. Dietr. Syn. PI. iii. 625=Striga Thunbergii.
timorensis, *Fowc. in H. O. Forbes, Not. Wand. East. Archip.* 512.—Ins. Timor,
tinctoria, *Bertol. Fl. Guatim.* 26.—Guatemala,
tomentosa, *Blume, Bijdr.* 741.—Jam
urticifolia, *R. Br. Prod.* 437.—Austral,
usuiensis, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1876) 121.—Afr. trop.
Terbenoides, *Klottsch, in Peters, Reist'Mossamb. Bot.* 226.—Afr. trop.
virgata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 842.—N. Granat.
viscosa, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 357° Sphenandra viscosa.
Wallichii, Benth. in Wall. Cat. n. 8876=Striga Masuria.

BUCHOLTZIA, Meissn. Gen. 818,; Comm. 230 (1841) =BUCHOLZIA, Mart. = Telanthera, P. Br. (Amaranth.).

BUCHOLZIA, Mart. NOT. Gen. et Sp.ii. 49.1.147 (1826) =Telanthera, R. Br. (Amaranth.).
brachiata, Schrad. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. 1.173 -T.ficoidea.
diffusa, Mart. NOT. Gen. et Sp. ii. tt. 149, 151 -T. polygonoides.
ficoidea, Mart. 1. c. 62=T. ficoidea.
filifolia. Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 192 =T.filifolia.
frutescens, Mart. NOT. Gen. et Sp. ii. 62, in obs.=T. frutescens.
glaucescens, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 191=T. glaucescens.
lupulina. Mart. Beitr. Amarant. 108-T. lupulina.
maritima, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 60. t. 147[s] T. maritima.
nudiraulis, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 19i-T. nudicaulis.
obovata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (1843) 348 = T. obovata.
philoxeroides, Mart. Beitr. Amarant. 107. n. 5-T.philoxeroides.
Polygonoides, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 61=T. polygonoides.
spinescens, Gill, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 369 = Alternanthera Achyrantha.

BUCHOLZIA, Stadtm. ex Willem. in Ust. Ann. Bot. xviii. (1796) 54=Combretum, vel Terminalia, Linn.

BUCHOZIA, L'Hérit. ex Juss. in Diet. Sc. Nat. v. (1804) 409 ; et in Mém. Mus. Par. vi. (1820) 396 = 8eriflsa, Comm. (Rubiac).
coprosmoides, L'Hérit. ex DC. Prod. ir. 575=S. foetida.

BUCHOZIA, Veil. Fl. Flum. 83 (1825) = Heteranthera, Ruiz & Pav. (Ponteder.).
aquatica, Veil. 1. c. 33; i. t. 80«=H. reniformis.

BUCIDA, Linn. Syst. ed. X. 1025 (1759) -Terminalia, Linn. (Combret).
angustifolia, DC. Prod. ii. 10=T. Bnceras.
angustifolia, Spruce, ex Eichl. in Mart Fl. Bras. xiv. H. 96=T. Hilariana.
Buceras, Linn. Syst. ed. X. 1025=T. Buceras.
£u<*r<u,Sieber,ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828)272 = T. Catappa.
Buceras, Veil. Fl. Flam. 172; iv. t. 87=Lagancalaria Tacemosa.
eapitata, Vahl, Eclog. Am. i. 50. t. 8 = T. Hilariana.
Comintana, Blanco, Fl. Filip. ed.I. 856 = T. Chebnla.
megapotamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 177.—Bras
nitida, Hassk. in Flora, xxvii. (1844) 605.—Ins. Sandvic.

BUCKINOHAUIA, F. Mnell. Fragm. TL 248 (1868). *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 182.
celsissima, *F. Muell. 1. c.*—Austral.

BTJCKLAUDIA, R. Br. in Wall. Cat. n. 7414 (1832). *HAMAMELIDEAE,* Benth. ft Hook. *I* i. 668.
populifolia, Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc. ii-(1858) 86=populnea.
populnea, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 7414.—Reg. Himal.

BUCKUEYA, Ton. in Am. Journ. Sc. xlv. (1843) 170. *SANTALACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 226.
DARBYA, A. Gray, in Am. Joum. Sc Ser. IL >• (1846) 388.
NESTKONIA, Rafin. New Fl. Am. iii. 12 (1836).
QUADRIALA, Sieb. & Zucc in Abh. Akad. Muench-iv. II. (1845) 194 ; (Fam. Nat Fl. Jap. i. 86. t 2)-
distichophylla, *Torr. I. c*—Am. bor.

BUCKNERA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 18 (1804) •= Buohnera, Linn. (ScrophnL).

BTTCQXTETIA, DC. Prod. iii. 110 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. *I.* i. 736.
glutinosa, *DC. 1. c.*—N. Granat.
nigritella, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871} 23.—Ecuador.

BUDA, Adans. Fam. ii. 607 (1768); Dum. Fl. Belg. 110 (1827) = Spergularia, C. & J. Presl (1817) (Caryoph.).
marina, Dum. Fl. Belg. 110=S. manna.
media, Dam. I. c.=S. marina.
rubra, Dum. 1. c.=S. nibra.

BUDDLBIA, Houst ex linn. Gen. ed. I. 26 (1787).
LOGANIACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 798.
ADENOPLEA, Radlk. in Bremen Abh. vin. (1888; 406.
ROMANA, Veil. Fl. Flum. 54, pro parte (1825).
abbreviata, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* u. 853.—Mexic.
ao.rn.naro, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62 =polystachya.
acuminate, H. B. & K. 1. c. 849 = Humboldtiana.
acuminata, *Poir. Encyc. Suppl.* i. 745.—Ind. or.
acuminatissima, Blume, Bijdr. 748=asiatica.
alpina, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1868) 25.-Costa Rica,
mlternifolia, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 494.—China.
americana, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. u. 8S1 = •mericana, *Linn. Sp. PI.* 112.—Am. austr.
"ngustata, Benth. in DC. Prod. x. 448=vetula.
vmaaa.Phil.inAnal. Univ. Chil. (1873) 525.-Ch.li.
arborea, Meyen, Reise, i. 478=pichinchensis.
aromatica, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. v.n. (1847) 227.-Bolivia.
asiatica, *Lour. Fl. Coehinch.* 72.—As. trap.; Malaya,.
auriculata, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* u. (1886) 60.—Afr. austr.
australis, VelL Fl. Flum. 41; i. 1104=brasiliensis.
axiUaris, Willd. in Roem. *Sc* Schult Syst. iti. 97 = Adenoplusia Willdenowii.
barbate, #„„<* b- *Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* . (1847) 12.—Mexic.
betonicaefolia, law. TOwsrr. i. 291.—Perav. .. ,,.„„
brachiata, *Cham.* &" *Schiecht. in Linnaea,* n. (1827) ` 598,-Bras.
nfasiliensis,yo<:j./.£rio^.t. 158.—Bras.
kevifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. m. Mant. 97-abbreviata.
bullata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* n. 84».—Ecuador.
'allicarpoides, H. B. & K. 1. c. 350=americana.
"^ycina, *Benth. in DC. Prod.* x. 440.-Ecuador.
eampestris, *Walp. Rep.* iii. 880.—Bras.
tana, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. ni. Mant. 94 = verbascifolia
capitata, Jacq. Ic. Rar. ii. 9; Coll. ii. 882=globosa.
camea, Can. in Rev. Hortic. (1879) 90-cumflora.
«"trinora, *Cham, in Linnaea,* viii. (1888) 20--Bras.
°°lvilei, *Hook. f. Illustr. Himal. PI.* t 18.-Reg. Himal.
coniorensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 208.—Ins. Comor.
connata, Mart, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii..283 = brasiliensis.
Mttnata, *Ruiz* &• *Pav. Fl. Per.* i. 52.1.18.—£«™ᵛ-eo[illegible]. *B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 848. 1.185.
wrdobensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 213.-« n'S a , *'RMJ, i» Ann. Sc. Nat.* Ser. HI. viii. (1847) 226.—Bolivia.
'rispa, Benth. in Wall. Cat. n. 6404; et Scroph. nd. 48=panicnlata.
crotonoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 165.—Calif.
«•"•*, *Cham, in Linnaea,* viii. (1888) »<-**
wrviflora, *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 267•—China,
Ottvifolia, *Sort, ex Carr. in Rev. Hortic.* (1866) 889•—Hab t
tteurrenl', Cham. *Sc* Schiecht. in Linnaea, v. (1880) 105 = americana.
5«»iflora, *Blume, Bijdr.* 743.—Java.
deotata, *a. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* u. 362.—Venezuela.
*«Wa, *Sui, V Pav. Fl. Per.* i. 58. t. 8O.-Pernv.
discolor, Roth, Nov. PL Sp. 83=asiatica.
<*»«•»/•««, Vahl, SymS. Bot. iii. 15-Nicodemia /iversifolia.
^ns, *Cham. V Schiecht. in Linnaea, u.* (1827) ®*-Bras.

BUDDIiEIA :—
elliptica, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 24.—Mexic.
ferruginosa, Pohl, ex J. A. Schmidt, in Mart. FL Bru. 284=*elegans.
floccosa, *Kunth, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1844). —*Cf. Linnaea,* xviii. (1844) 501.—Mexic.
floribunda, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 852.—Mexic.
foliata, R. Br. ex Benth. in DC. Prod. x. 446 = polystachya.
fusca, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 205.—Madag.
Gayana, *Benth. in DC. Prod.* x. 442.—Chili.
glaberrima, Hort. Amat. Cat. Hort. Taurin. 18 = Freylinia cestroides.
glabra, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. H. 296 = curviflora.
glabrata, Spreng. Syst. i. 431=Cephalanthus Sarandi.
globifera, Mirb. in Duham. Arb. ed. Nov. i. 125 «= globosa.
globosa, *Hope, in Verh. Harlem,* xx. II. (.1782) 417. t. 11.—Chili; Perav.
glomerata, *Wendl. ex Benth. in DC, Prod.* x. 447, nomen.—Afr. austr.
gracilh, *Kunth, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1844). —*Cf. Linnaea,* xviii. (1844) 500.—Mexic.
grandiflora, *Cham. V Schiecht. in Linnaea,* ii. (1827) 596,-Bras.
gujanensis, *Roxb. Hort. Beng.* [10], nomen.—Am. anstr.
heterophylla, Lindl. Bot. Reg. t. 1259 = madagascariensis.
Humboldtiana, *Roem. if Schult. Syst.* iiL 93.—Texas; Mexic.
incana, *Ruiz & Pav. Ft. Per.* i. 52. t. 80.—Peruv.
incompta, *Linn.f. Suppl.* 123.—Afr. austr.
indica, Lam. Encyc. i. 513 =Nicodemia diversifolia.
insignis, *A. Van Geert, Cat.* n. 78 (1879-80), 8; *Carr. in Rev. Hortic.* (1878) 880.—Hab. ?
inUgrifolia, Willd. ex Roem. *8c* Schnlt. Syst. iii. Mant. 96 = abbreviata.
intermedia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iL 850.—Mexic
intermedia, *Lorent, in Roca, Exped. Rio-Negro,* ii. 255, nota.—Patagon.
interrupts Buch.-Hara. ex Wall. Cat. snb n. 6401 = asiatica.
interrapta, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 348.—Ecuador.
Jamesonii, *Benth. in DC. Prod.* x. 441.—Ecuador,
japonica, *Linden, Cat.* n. 19 (1865).—Japon.
lanata, *Benth. in DC. Prod.* x. 441.—Peruv.
lanceolata, *Benth. PI. Hartn.* 48.—Am. centr.
lanceolata, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 6401 = asiatica.
Lindenii, *Benth. in DC. Prod.* x. 488.—N. Granat.
Lindleyana, *Fortune, in Lindl. Bot. Reg.* (1844) Jlf.sc. 25.—China,
longifolia, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 849.—Peniv.
Lucae, *Niederl. in Roca, Exped. Rio-Negro,* ii. 254.—Patagon.
macrantha, Mart ex J. A. Schmidt, in Mart Fl. Bras. viii. 285 = grandiflora.
macrophylla, *Kunth, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1844).—*Cf. Linnaea,* xviii. (1844) 500.—Hab. I
macrostachya, *Benth. in Wall. Cat.* n. 6407 ; *et Scroph. Ind.* 42.—Reg. Himal.
madagascariensis, *Lam. Encyc.* i. 518.—Ins. Mascar.; Madag.
marrubiifolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 441.—Texas; Mexic.
Martii, J. A. Schmidt, in Joum. Bot. vi. (1868) 228, 245-macrostachya.
melUodora, *Kunth* b* *Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) 10.—Mexic.
mendozinensis, *Gill, ex Benth. in DC. Prod, x.* 443.—Chili,
microphylla, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 853.—Mexic.
Missionis, *Benth. in Wall. Cat.* n. 6405; *et Scroph. Ind.* 48.—Ind. or.
mollis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* it 349.—Ecuador.
Nappii, *Latent, in Roca, Exped. Rio-Negro,* ii. 264.—Patagon.
Neemda, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6401 = asiatica.
Neemda, Hort. ex Link, Enum. Hort Berol. i. 125 - bnsiliensis.

BTJDDLEIA:—
nepalensis, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxv. (1835) 182=paniculata.
niuda, *Benth. in DC. Prod. x.* 437.—Mexic.
oblonga, *Benth. 1. c.* 442.—Bras.
obtusifolia. Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1846) 25>microphylla.
occidentalis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 162.—Jamaic.; Perav.
occidentalis, Ruiz 8c Pav. Fl. Per. i. 53. t 82. f. a » americana.
officinalis, *Maxim, in Bull. Acad. Ptiersb.* xxvi. (1880) 496.—China,
otophylla, *Hassk. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch.* v. (1857) 97.—Malaya,
ovalifolia, *Kunth, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1844). —*Cf. Linnaea,* xviii. (1844) 500.—Mexic.
paniculata, *Wall. Cat.* n. 6403; *etin Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* i. 412.—Reg. Himal.; Burma,
parviflora, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 853.—Mexic.
parvifolia, Willd. ex Roem. & Schnlt. Syst. iii. Mant. 96=microphylla.
perfoliata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 346.—Mexic.
pichinchensis, *H. B. V K. I. c*—Ecuador.
Poiretii, *Spreng. Syst.* i. 430.—Ind. or.
polycephala, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 346.—Peruv.
polystachya, *Fresen. in Flora, xa.* (1838) 605.—Abyssin.
Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 86. —Arizona,
propinqua, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1844). —*Cf. Linnaea,* xviii. (1844) 501.—Mexic.
pseudoverticillata, Mart. *Be* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 24=sesailiflora.
racemosa, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 121—Texas.
rondeletiaeflora, *Benth. in DC. Prod.* x. 445.—Ins. Comor.
rufa, *Fresen. in Flora,* xxi. (1838) 606.—Abyss.
rufescens, Willd. ex Roem. & Schalt. Syst. iii. Mant. 97« americana.
rugosa, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 347.—N. Granat.
salicifolia, Jacq. Hort. Schoenb. i. 12=Chilianthus arboreus.
salicifolia, Vahl, Symb. Bot. iii. 14-thyrsoidea.
salicina, Lam. IHnstr. i. 291=asiatica.
saligna, Willd. Enum. Hort Berol. 159= Chilianthus arboreus.
Saltiana, Stead. Nom. ed. II. i. 235=polysUchya.
salvifolia, *Lam. Encyc. i.* 513.—Afr. austr.
scordioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 345. 1.183.—Texas; Mexic.
serrulata, Roth, Nov. PI. Sp. 82=asiatica.
sessiliflora, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 345.1.182. —Mexic.
sinnata, *Willd. ex Roem. tf Schult. Syst. Mant.* iii. 97.—Madag.
spectabilis, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) 11.—Mexic.
sphaerantha, Cham. *Sc* Schiecht. in Linnaea, v. (1880) 104 = perfoliata.
sphaerocephala, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 425.—Madag.
spicata, *Rut* (f Pav. Fl. Per.* i. 58. t 81.—Peruv.
stachyoides, *Cham, (f Schiecht. in Linnaea,* iL (1827) 597—Bras.
snaveolens, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) 11.-CWU.
subserrata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 92=asiatica.
sundaica, *Blume, Bijdr.* 743.—Java,
tenuifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 213.—Am. austr.
temata, *Lour. Fl. Coehinch.* 72.—Coehinch.
thapsoides, Deaf. Cat. Hort. Par. ed. *VI.* 106=bmailiensis.
thyrsoides, *Lam. Illustr.* i. 291.—Reg. Argent,
tubiflora, *Benth. in DC. Prod.* x. 448.—Bras,
tucumanensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 218.—Tucuman.
venusta, *Kunth, in Ind. Sem. Hort. Berol.* (1844).—*Cf. Linnaea,* xviii. (1844) 500.—Mexic.
Verbasci, Pers. Syn. i. 135 - americana.
verbascifolia, //. *B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 351.—N. Granat

BUDDLEIA:—
verticillata, *H.B & K. Nov. Gen. et Sp.* 346. t 184.—Mezic.
vetula, *Cham, in Linnaea,* viii. (1838) 18.—Bras.
virgata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 57 =asiatica.
virgata, Linn, f. Suppl. 123=Gomphostigma scoparioides.
volubilis, *Lam. fllustr. i.* 291.—Ins. Mascar.

BUECHNERIA, Roth, Nov. PI. Sp. 292 (1821) = Buchnera, Unn. (Scrophnl.).

BUECKIA, A. Rich, in Orb. Diet. ii. 759 (1842) = BUEKIA, Nees=Elynanthu8, Linn. (Cyperac.).

BUEKIA, Giseke, Frael. Linn. 199, 204 (1792) = Alpinia, Linn. (Scitamin.).
malaeeensis, Raeuscb. Nom. ed. III. 1>A. malaccensis.

BUEKIA, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 300-Elynanthus, Linn. (Cyperac.).
punctoria, Nees, 1. c.=E. punctorius.

BUELOWIA, Schum. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 246 (1827) = Smeathmaniiia, Soland. (Passiflor.).
illustris, Schum. & Thonn. 1. c. 247 =S. pubescens.

BUENA, Cav. in Anal. Hist. Nat. ii. (1800) 278 ; Ic. vi. 49 -GONZALAGUNIA, Ruiz & Pav.-Oonsalea, Pen. (Rubiac).
panamensis, Cav. 11. cc. 279; 50=G. panamensis.

BUENA, Pohl, PI. Bras. Ic. i. 8 (1827); Wedd. in Joan. Linn. Soc. xi. (1869) 185 = CoBmibuena, Ruiz & Pay. et Camarilla, Wedd. (Rubiac.).
acuminata, DC. Prod. iv. 356=Cosmibuena acuminata.
acutifolia, Wedd. in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 186 = Cascvilla acutifolia.
bullata, Wedd. 1. c. 187 = Cascarilla bullata.
ealycina, Wedd. 1. c. = Cascarilla calycina.
Carua, Wedd. 1. c. = Cascarilla Carua.
dtrifolia, Wedd. 1. c. - Cascarilla citrifolia.
crassifolia, Wedd. L c. = Cascarilla calyptrata.
Gaudichaudiana, Wedd. 1. a=Cascarilla Gaudichaudiana.
heterophylla, Wedd. L c 186 = Cascarilla heterophylla.
hexandra, Pohl, PI. Bras. Ic i. 10. t. 8=Cascarilla hexandra.
Hookeriana, Wedd. in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 187 = Cascarilla Hookeriana.
Lambertiana, Wedd. 1. c. = Cascarilla Lambertiana.
latifolia, Benth. PI. Hartw. 191 =Cosmibuena latifolia.
macrocarpa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 104. t. 38 = Cosmibnena macrocarpa.
macrocarpa, Wedd. in Joum. Linn. Soc. xi. (1869) 187 =Cascarilla macrocarpa.
magnifolia, Wedd. 1. c. 186=Cascarilla magnifolia.
muBonensis, Wedd. 1. c. 187=Cascarilla muzonensis.
nitida, Wedd. 1. c 186=Cascarilla nitida.
obtusifolia, DC. Prod. iv. 856 = Cosmibuena obtnsifolia.,
Pavonii, Wedd. in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 186 = Cascarilla Pavonii.
Riedeliana, Wedd. L c. = Cascarilla Riedeliana.
Riveroana, Wedd. 1.' c. =Cascarilla magnifolia.
Roraimae, Wedd. 1. c. 187=Cascarilla Roraimae.
SHnneri, OersL in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1852) 48 =Cosmibuena Skinneri.
stenocarpa, Wedd. In Joum. Linn. Soc. xi. (1869) 186 « Cascarilla stenocarpa.
triflora, Benth. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 316 = Cosmibuena triflora.
undata, Wedd. in Joum. Linn. Soc. xi. (1869) 187 = Cascarilla widatBi

BUERGERIA, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 63 (1867) = Cladrastis, Rafin. (Legumin.).
fioribunda, Miq. 1. c = C. amurensis.

BUERGERIA, Sieb. & Zncc. in Abh. Akad. Mnench. iv. II. (1845) 186. t 2 (Fl. Jap. Fam. i. 78. t. 2) = Talkuma, Juss. (MagnoL).
obovata, Sieb. *Sc* Zucc. 11. cc. 187'Magnolia obovata.
salicifolia, Sieb. & Zucc. 1. c.=T. salicifolia.
stellata, Sieb. & Zucc. L c. 186-T. stellata.

BUETTNERA, J. F. Gmel. Syst. ii. 404 (1791)=seq.

BUETTNERIA, Loefl. Iter Hisp. 813 (17S8) (Byttneria); Linn. Syst. ed. X. ii. 939 (1759). *STERCULIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 225.
BYTTNERIA, Loefl. Iter Hisp. 313 (1758).
CHAETAEA, Jacq. Enum. PI. Carib. 2 (1760).
HETEROPHYLLUM, Boj. ex Hook. Bot. Misc. i. (1830) 291.
PEKTACEROS, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 136 (1818).
TELFAIRIA, Newm. ex Hook. Bot. Misc. i. (1830) 291.
abutiloides, St. Hil. & Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xviii. (1842)31=hirsuta.
aculeata, Domb. ex Lam. Encyc. i. 528 = cordata.
aculeata, Jacq. Stirp. Am. 76=carthagenensis.
acuminata, *Bred, ex Roem. V Schult. Syst.* v. 470.—Venezuela.
affinis, Pohl, PI. Bras. ii. 73 = melastomaefolia.
afiicana, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 239.—Afr. trop.
andamanensis, *Kurt, in Journ. As. Soc.* Beng. ii. (1871) 47 ; *et Flora,* liv. (1871) 277.—Burma,
angulata, *Hassk. Cat. PI. Hort. Bog.* 204.—Java,
aspera, *Colebr. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 383.—Reg. HimaL ; China.
australis, Sieber, ex Stead. Nom. ed. II. i. 241 = pannosa.
australis, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 145=tereticaulis.
biloba, *Baill. Adansonia,* x. (1872) 178.—Madag.
brasiliensis, *Spreng. Syst.* i. 790.—Bras,
brevipes, *Benth. PI. Hartw.* 115.—Am. trop.
caledonica, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1863) I. 668.—N. Caled.
carthagenensis, *Jacq. Stirp. Am. Piot.* 41.—N. Granat
catalpaefolia, *Jacq. Hort. Schoenbr.* i. 21.—Am. trop.
catalpifolia, Wall. Cat n. 1152-crenulata?
celtoides, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 141.—Bras,
corchorifolia, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 152.—Am. austr.
cordifolia, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xi. (1881) 155.—Guiana.
cordata, *Lam. Encyc.* i. 523.—Peruv.
corylifolia, *Humb. V Bonpl. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 470.—Am. austr.
crenulata, *Wall.. Cat.* n. 1150.—Reg. Himal.; Burma.
dasyphylla, J. Gay, in DC. Prod. i. 486=Rulingia pannosa.
dentata, *Pohl, PI. Bras.* ii. 79.—Bras,
discolor, *Benth. in Hook. Kern Journ.* iii. (1851) 185.—Bras,
divaricate, *Benth. in Hoot. Journ. Bot.* iv. (1842) 124.—Guiana.
echinata, Wall. Cat. n. 1149=crenulata?
elliptica, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 377.—Malacca.
elliptica, Pohl, PI. Bras. ii. 71=melastomaefolia.
flaccida, *Span. Ic.* n. 18; *in Linnaea,* xv. (1841) 174.—Ins. Timor.
fulva, *Poepp. tfEndl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 37.—Bras.
Gayana, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 146.—Bras,
geminifolia, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 158.—Ecuador,
genistellã, *Triana tf Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 838.—N. Granat.
glabrescens, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 71.—Am. trop.
Grandidieri, *Baill. in Bull. Soc. Unn. Par.* i. (1885) 502.—Madag.
grandifolia, DC. Prod. i. 486=aspera.
herbacea, *Roxb. PI. Corom.* i. 28. t. 29.—Ind. or.
hermanniaefolia, J. Gay, in DC. Prod. i. 486 = RulingiA hcnn&imi&cdoliCL.
heterophylla, *Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 291.—Madag.
hiranta, *Ruit V Pav. Fl. Per.* iii. 10.—Peruv.
hypoleuca, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc xxxi. (1858) 1.207 =Commersonia platyphylla.
inodora, J. Gay, ex DC. Prod. i. 486 = Rulingia pannosa.
Jackiana, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 386.—Ins. Penang.
jaculifolia, *Pohl, PI. Bras.* ii. 77.—Bras.
javanica, Spreng. ex Miq. Illustr. Fl. Ind. Arch. 91 = angulata.
laevigata, Schott, in Spreng. Syst Veg. iv. App. 404 = Gayana.
UnceolaU, *Sesse, ex DC. Prod.* i. 487.—Mexic.

BTJETTNEEIA:—
lancifolia, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 158.—Borneo,
lancifolia, *St. Ha. (f Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xviii. (1842) 82.—Bras,
lateralis, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 145.—Mexic.
lobata, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 60S.—Madag.
longicuspis, *Baill. I. c.* 502.—Madag.
longifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 164.—Venezuela,
macrophylla, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 315.—N. Granat.
Maingayi, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 877.—Malacca.
melastomaefolia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 144.—Bras.
melastomoides, G. Don, Gen. Syst. i. 624=praec.
microphylla, *Jacq. Hort. Vindob.* i. 10. t. 29; *Linn. Mant.* 209.—Ind. occ.
mollis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 314. t 481 a et b.—N. Granat.
morifolia, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 332.—N. Granat.
nepalensis, Turcz. in BulL Soc. Nat Mosc. (1858) I. 207= aspera.
obliqua, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 124.—Guiana.
oblongata, *Pohl, PI. Bras.* ii. 73.—Bras,
ovata, *Lam. Encyc.* i. 522.—Peruv.
pannosa, Bauer, ex Steetz, in Lehm. PI. Prdss. ii. 860 =Keraudrenia Hookeriana.
pannosa, DC. Prod. i. 486 » Rulingia pannosa.
parviflora, *Benth. PI. Hartw.* 114.—Ecuador,
peruviana, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi: (1868) I. 207.—Peruv.
pilosa, *Roxb. Hort. Beng.* 18; *Fl. Ind.* i. 618.—Ind. or.; Burma.
Pohliana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 242.—Bras.
polyacantha, Wall. Cat. n. 1151=crenulata?
ramosissima, Pohl, PI. Bras, ii 75=scabra.
Reinwardtii, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* (1848) >• 310.—Borneo.
reticaulis, Cav. Diss. 292, sphalm. =tereticanlis.
rhamnifolia, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1861) 164.—Bras,
rivularis, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii-(1843) 333.—Bras.
rubricaulis, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 145.—Mexic.
sagittaefolia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 142. t 27.—Bras,
salicifotia, *Humb. & Bonpl. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 470.—Venezuela.
salicifolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 144.—Mexic.
scabra, *Linn. Syst.* ed. X. 197.—Am. austr.
scabra, Pohl, PI. Bras. ii. 81 = Pohliana.
scalpellata, Pohl, 1. c. 78 = scabra.
scorpiura, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 29.—Cuba.
sidaefolia, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 146=catalpaefolia.
sulcata, *Ruiz b" Pav. Fl. Per.* iii. 10.—Peruv.
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 68.—Ins-Tahiti.
tereticaulis, *Lam. Encyc.* i. 523.—Peruv.
tiliaefolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 144.—Mexic.
uncinata, *Mast, in Hook./. Fl. Ind. i.* 377.—Malacca.
•*oelutina,* Wall. Cat nn. 1148, 1926=pilosa.
virgata, Pohl, PI. Bras. ii. 80=scabra.
vitflblia, *Baill. Adansonia,* x. (1872) 177.—Madag.
Voulily, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 502.—Madag.

BUFFONEA, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 1.108 (1886) = Bufonla, Linn. (Caryophyll.).

BTJFONIA, Sauv. ex Linn. Diss. Dass. 2 (1747): Amoen. Acad. i. 886 (1749). *CARYOPHYLLEAB,* Benth. & Hook. f. i. 151.
alsinoides, Hill, Veg. Syst. xi. 27 =annna t
angustifolia, Cav. ex Wfflk. *Sc* Lange, Prod. FL Hisp-iii. 605 = tenuifolia.
annua, DC. FL Fr. iv. 768 = tenuifolia et macrospenna.
brachyphylla, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. »*• —Graecia et Ins.
calyculata, *Beits.* 6* *Bat. 1. c.* Ser. II. v. 68.—Cilicia.
Duvaljouvii, *Bait. & Trab.in Bull. Soc. Bot.Fr.* xxvi. (1879) 56.—Afr. bor.
elata, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 44 = macrocarpa.
encrvis, *Boiss. I. c.*—Persia.

BUFONIA.—
t^^y*. *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 46—Persia.
Kotschyana, *Bain. I. c.* Ser. II. i. 84.—Persia,
macroearpa, *Ser. in DC. Prod.* i. 388.—Pereia; Afghan,
macropetaia, *Willk. in Flora,* xxxiv. (1851) 604; *et Ic. PI- Hisp.* 112.—Hispan.
macrMperma, *J. Gay, in Mutel, Fl. Dauph.* ed. II. 88.
multifida, Europ.; As. Min.; Syria.
9KQ[illegible] (1836) —Arabia.
uijvenana, *Ser. in DC. Prod.* i. 888.—Mesopot.; Persia : Afghan.
panic[illegible] 300 ^ten[illegible]ulifolia Auvergne, ed. II.
parvif?™. Griseb. Spidl. Fl. Rumel. i. 197 = tenuifolia.
perennis, *Pour* GaUia *-Acad. Toul.* iii. (1788) 809.—
'%*"*>««, Buch.-Ham. ex Stend. Nom. ed. II. i. 285=Drymariacordata.
"puata, Delarb. Fl. Auvergne, ed. II. 299-macro-Fnna.
'enuifolia, *Linn. Sp. PI.* 123. - Enrop. anstr.; Marocco; Reg. Caucas.
t'nuifolia, Moc: & SesaS, ex DC. Prod. i. 390 = Hynwneiia mochringioides.
t'nuifoha, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 650=macro-virperma.
W T)?' ***"• *Orient,* i. 665.—As. Min.; Syria.
Mkommiana, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 88=perennis.

BUFORREST IA, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 233.
* H -S[illegible] I (1881)- *COMMEUNACEAE.-tenlh.*
c*„"<**• f- Gen. iii. 850.
Caudolleana, *C. B. Clarke, I. e.* 233.-Guiana.
S S * ^ * C B ClaTk, < '• c 28*—Aft. trop.
[illegible] C B -•O-*. *I- c* 2SS.-Afr. trop.
tenuis . *C B. Clarke, I. c.* 234.—Afr. tropf

BUGENVILLEA, Endl. Gen. 812 (1887)-«q.

BUGINVILLAEA, Bougainvillaea, Juss. (NyctagO-

BUGLOSSA, S. F. Gra[illegible] 351 (1821)
- Lycopsis, Linn.
arvensis, S. F. Gray, S?Stt[illegible]rvensis.
sempervirens, S. F. Gmel. L c. 252=Anchusa sempervirens.

BUGLOSSITES, Moris, in Enum. Sem. Hort. Taur. (18[illegible] Ann. Sc. Nat. Sir. III. v. (1846) 866 = B
*la*iMa,* Moris', L c-Borago laxiflora.

B GLOSSOIDES, [illegible] Moench Meth *18 (1794) = Lithoeperm um, Linn. (Borag.).
ramosissima, Moench, 1. c.=L. tenuiflorum.

BUGLOSSUM, [Toun>-]- Adans. Fam. ii. 178 (1763); Gaertn. Fruct. [illegible] (Boragin.).
amoenum, Gaertn. l. c. = A. italica.
an [illegible] Sur [illegible] Moench. Meth. 418 = A. angustifolia.
aspermum, Gilib. -1-81-= Anchusa officinalis.
Barrellieri A". Fl. Pedem. i. 48=A. Barrelieri.
caerulcum, [illegible] 169 = A. italica.
echinatum, Tausch [illegible] 230 = A. strigosa.
elatu oench, Meth. 418 = A itaUca
ita Tausch, Flora, Tii. (1824) 230 = A. italic'
officinale, Lam. Fl. Fr. 278 = A. officinalis.
paniculatum, Tansch> Flora, vii. (1824) 228 A. italica.
sempervire AU- «• Pedem. i. 48=A. sempervirens.
syriacum, Tausch, Flora vil- (H>2*) 281-A. strigosa.
tinct[illegible]r: Fl. Fr. ii. 278 - Alkanna tinctoria.
vulgare, Ta in Flora ^ C[illegible] 229 =A- italic,

BUGRA, Ol [illegible] Mails, Linn. (Lecumin.).
alopecuro, [illegible] 1. c. 172 = O. alopeccroides.
cephalantha, Pomel, 1. c. = O. cephalontha.

BUGRANOPSIS :—
crinita, Fomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 171 = O. crinita.
euphrasiaefolia, Pomel, 1. c. 172-O. eaphrasiaefolia.
megalostachys, Pomel, 1. c. 171 = O. megalostachys.
mitissima, Pomel, 1. c. 172-0. mitissima.
rosea, Pomel, 1. c. 171 = 0. rosea.
Saltmaniana, Pomel, 1. c. 172-=O. Salxmanniana.
stricta, Pomel, 1. c. = O. stricta.
Tournefortii, Pomel, 1. c = O. Tonrnefortii.
variegata, Pomel, 1. c = O. variegata.

BUGULA, Toura. ex MilL Gard. Diet. ed. VI. (1752) = Ajuga, Linn. (Labiat.).
alpina, All. Fl. Pedem. i. 45=A. genevensis.
arvensis, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI. ii. 368 - A. Chamaepitys.
Chamaepithys, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 416 = A. Chamaepitys.
decumbens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = A. reptans.
densifiora, Benth. in DC. Prod. xii. 695, in syn. - A. reptans.
genevensis, Crantz, Inst. i. 618 = A. genevensis.
nana, Gilib. Fl. Lituan. i. 94 = A. pyramidalis.
obliqua, Moench, Meth. 881=A. orientalis.
orientalis, Crantz, Inst. i. 518 = A. orientalis.
pyramidalis, Crantz, I. c. = A. pyramidalis.
reptans, Crantz, 1. c. = A. reptans.
tomentosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 94=A. genevensis.
villosa, Steud. Nom. ed. II. i. 235 = A. pyramidalis.

BUHSIA, Bunge, Del. Sem. Hort Dorpat. (1859) 41.—Cf. Linnaea, xxx. (1859-60) 752 = Cleome, Linn. (Capparid.).
coluteoides, Bunge, 11. cc.=C. coluteoides.

BUINALIS, Kafin. New Fl. Am. iv. 40 (1836) = Paronyehia, Linn. (Illecebrac.).
fioridana, Kafin. 1. c. = P. Baldwinii.

BUJACIA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 127 (1835) = Glycine, Linn. (Legumin.).
anonychia, E. Mey. L c. »G. javanica.
gampsonychia, E. Mey. 1. c. = Teramnus labialis.

BULBEDULIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 26 (1836) = Camassia, LindL (Liliac).

BULBILIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 190, nomen prius; et in Jouro. Phys. lxxxix. (1819) 262 = Buehloe, Engelm. (Gramin.).
dactyloides, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 190 = Bnchloë dactyloides.

BULBILLARIA, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1848) 229. t. 2 = Gagea, Salisb. (Liliac).
gageoides, Zucc 1. c. = G. persica.

BULBOTB, Linn. Hort. Cliff. 122 (1737); Gen. PI. ed. I. 95 (1737). *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 784.
BLEPHANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 69 (1836).
NEMOPOGON, Rafin. 1. c. 27 (1836).
abyssinica, A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii 834 •= asphodeloides.
acaulis, linn. Sp. PI. ed. II. 446=alooides.
alooides, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 372.—Afr. austr.
annua, *Willd. 1. c.*—Air. anstr.
asiaiica, Gaertn. Fruct. i. 42. t. 13=Crinum asiaticom.
asphodeloides, *Spring. Syst.* ii. 85.—Afr. austr.
australis, Spreng. Syst ii. 86 = bulbosa.
bisulcata, *Haw. in Phil. Mag.* (Feb. 1827) 121.—Afr. austr.
brevifolia, Schult. f. Syst vii. 450 = Anthericum brevu folium.
bulbosa, *Haw. Rev. PI. Succ.* 33.—Austral.
eanaliculata, Spreng. Syst ii. 86 = Anthericum canaliculatum.
Cauda-felis, Schult f. Syst. vii. 450 - Bulbinella cftndata.
caudata, Spreng. Syst. ii. 86 = Bulbinella caudata.
caulescens, Linn, ex Steud. Nom. ed. I. 125; ed. II. i. 236=frutescens.
ciliata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 329 = Anthericum ciliatum.
erispa, Spreng. Syst. ii. 86 = Cblorophytum crispum.
densiflora, *Baker, in Jmrn. Linn. See.* xv. (1876) 347.—Afr. austr.

BUIiBINE —
dubia, *Schult. f. Syst.* vii. 450.—Afr. austr.
falcata, Schult. f. 1. c. 451 "Anthericum falcatum,
favosa, *Schult. f. 1. c.* 444.—Afr. austr.
filifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1S76) 344.—Afr. austr.
floribunda, Schrad. ex Benth. Fl. Austral, vii. 35 = semibarbata.
Fraseri, Kunth, Enum. PL Iv. 565=bulbosa.
frutescens, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 372.—Afr. anstr.
graminea. Haw. Revis. PI. Succ. 88=asphodeloides.
hispida, Sweet, Hort. Brit ed. I. 416 - Anthericum hispidum.
Hookeri, Kunth, Enum. PI. iv. 566 = bulbosa.
incurva, Spreng. Syst. ii. £6=rostrata.
latifolia, *Spreng. I. c*—Afr. austr.
laxiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 347.—Afr. aa.tr.
longiscapa, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 372.—Afr. austr.
Mackenii, Hook. f. Bot. Mag. t. 5955 = Eriospermum Mackenii.
macrophylla, Salm-Dyck, Hort Dyck. 338 = latifolia.
mesembryaathemoides, *Haw. in Phil. Mag.* (July 1825) 81.—Afr. austr.
Mettinghii, Tenore, Syll. 563 = longiscapa.
minima, *Baker, in journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 344.—Afr. austr.
narcissifolia, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 334.—Afr. austr.
nutans, *Spreng. Syst.* ii. 86.—Afr. austr.
nutans, Zeyh. ex Baker, in Joura. Linn. Soc. xv. (1876) 347 -Zeyheri.
pallida, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 164.—Afr. austr.
planifolia, Spreng. Syst ii. 86 = Simethis bicolor.
praemorsa, *Spreng. 1. c.*—Afr. austr.
pugioniformis, *Lint, Enum. Hort. Berol.* i. 38!).—Afr. austr.
rostrata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 372.—Afr. austr.
scabra, Spreng. Syst ii. 86 = Anthericum scabrum.
semibarbata, *Haw. Sevis. PI. Succ.* 33.—Austral.
semibarbata, Hook. Bot. Mag. t. 3129 = bulbosa.
suavis, Lindl. Bot. Keg. (1838) Misc. 45 = bulbosa.
subbarbata, Steud. Nom. ed. IL i. 74, sphalm. - bulbosa.
triquetra, Spreng. Syst ii. 86 = Bulbinella triquetra.
uncinata, Moench, Meth. 641 = Crinum americannm.
undulata, *Spreng. Syst.* ii. 86 = Anthericum undulatum.
unifolia, Schult. f. ex Baker, in Journ. Linn. Soc xv. (1876) 263 = Eriospermum abyssinicum.
urgineoides, *Baker, I. c.* 848.—Afr. austr.
Zeyheri, *Baker, I. c.* 347.—Afr. austr.

BUIiBINELLA, Kunth, Enum. PI. iv. 669 (1843). *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 784.
CHKYSOBACTRON, Hook. £ Fl. Antarct. i. 72. t. 44 (1845).
brevifolia, Kunth, 1. c. 678 = Anthericum brevifolium.
Burkei, *Benth. V Hook./. Gen.* iii. 784.—Afr. austr.
capillaris, Kunth, Enum. PI. iv. 672=triquetra.
caudata, *Kunth, I. c*—Afr. austr.
ciliolata, *Kunth, 1. c.* 570.—Afr. austr.
filiformis, Kunth, 1. c. 572-triquetra.
gracilis, *Kunth, I. c.* 571.—Afr. austr.
latifolia, *Kunth, 1. c.* 572.—Afr. austr.
ornithogaloides, *Kunth, I. c.* 698.—Afr. austr.
peronata, *Kunth, I. c.* 670.—Afr. austr.
robusta, *Kunth, 1. c.* 571.—Afr. austr.
setifolia, Kunth, 1. c 569=triquetra.
squamea, Kunth, 1. c 573=Anthericum hispidum.
triquetra, *Kunth, 1. c.*—Afr. austr.

BULBISPERMA, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 59 [1823]=Felio8anthea, Andr. (Haemod.).
ovigera, Reinw. 1. c.=P. javanica.

BULBOCAPNOS, Bonn, in Linnaea, viii. (1888) 469 = Corydalis, Vent. (Papaverac).
bracteatus, Bernh. 1. c.=-C. bracteata.
cavus, Bernh. 1. c = C. cava.
digitatus, Bernh. 1. c.=C. Halleri.
fabaceus, Bernh. 1. c - C. fabacea.
Halleri, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 77=-C. Halleri.
longiflorus, Bernh. in Linnaea, viii. (1888) 489=C. longiflora.

BULBOCAPNOS:—
Afarschallianus, Bemh. in Linnaea, viii. (1888) 469 = C. Marschalliana.
nobilis, Bernh. 1. c. = C. nobilis.
tuberosus, Spach, Hist. Vėg. Phan. vii. 78=C. cava.

BULBOCASTANUM, Lag. Amen. Acad. Madr. 99 (1821) = Conopodium, Koch (Umbellit).
maius. Lag. 1. c.=C. denudatum.

BULBOCASTANUM, Schur, Ennm. PI. Transs. 249 (1866)-Carum, Rupp. (Umbellif.).
daucoides, Nym. Consp. 304 = C. dancoldes.
/erulaceum, Nym. 1. c. 803.—Europ.
incrassatum, Lange, in Willk. & Lange, Prod. FI. Hisp. iii. 88 = C. incrassatnm.
Linnaei, Schur, Ennm. PI. Transs. 219 = C. Bulbocastanum.
mauritanicum, Willk. in Linnaea, xl. (1876) 84 = C. mauritanicam.

BULBOCODrtJM, Linn. Coroll. Gen. 6 (1737).
ULIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 821.
ABANDIUM, Adans. Fam. ii S4 (1768).
alpinum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. l = Lloydia alpina.
atticum, Nyin. SylL 379 - Merendera attica.
antumnale, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 202 - Merendera Bulbocodium.
balearicum, Nym. SylL 879 = Merendera filifolia.
Broteri, Welw. ex Halter, in Journ. Linn. Soc xvii. (1880) 441 = Merendera Bulbocodium.
caucasicum, Endl. ex Heynh. Nom. ii. 81 = Merendera caucasica.
colckicoides, Nym. SylL 379 = Merendera Bulboeodinm.
dentatum, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturv.* ii. (1851) 166.—Transsylv.
edentatum, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 355 = rnthenicum.
Eichleri, Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 688 = Merendera Eichleri.
Fontanesii, *Heynh. Nom.* ii. 81.—Ins. Majorc.; Algeria.
hastulatum, Friwald. in Flora, xix. (1836) 434 = Merendera sobolifera.
lusitanicum, *Heynh. Nom.* ii. 81.—Lusitania.
montanum, Fisch. Ind. PI. Hort. Gorenk. (1812) 10 =ruthenicum.
persicum, *Regel, Gartenfl.* xxx. (1881) 294. t 1058.—Persia,
robustnm, *Bunge, ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 491.—Turkestan,
ruthenicnm, *Bunge, in Del. Sem. Hort. Dor pat.* (1887) 11.—Transylv.; Reg. Caucus.
serotinum, Linn. Sp. PL 294=Lloydia alpina.
soboliferum, Heynh. Nom.ii.81<= Merendera sobolifera.
trigynum, Nym. Syll. 879 = Merendera sobolifera.
trigynum, Adam, in Weber & Mohr, Cat. i. 49; ex Schult. f. Syst. vii. 1524=Merendera caucasica.
trigynum, Griseb. Spicil. Fl. RumeL ii. 380 = Merendera sobolifera.
vernum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 261 = rnthenicum.
vernum, Desf. Fl. Atlant. i. 284 = Merendera filifolia.
vernum, linn. Sp. PL 294-rutb.enicum.
versicolor, *Spreng. Syst.* ii. 40.—Rossia austr.

BULBOPHYLLARIA, S. Moore, in Baker, FL Maurit. 844 (1877), sphalm. - BOLBOPHYLLARIA, Reichb. f. = Bulbophyllum, Thou. (Orchid.).

BUIIBOFHTIIZIUM, Thon. Orch. lies Afr. Tab. Esp. 8 et Ic. t. 93-97 (1822). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. S01.
ANISOPETALUM, Hook. Exot. Fl. 1.149 (1825).
BOLBOPHYLLARIA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 934.
BOLBOPHYLLUM, Spreng. Syst. iii. 681 (1826).
COCHLIA, BInme, Bijdr. 320. t. 59 (1825).
DIDACTYLE, Lindl. Fol. Orch. (1852).
DIPHYES, Blume, Bijdr. 310. t. 66 (1825).
EPICRANTHES, Blume, 1. c. 306. t. 9 (1825).
EPICRIANTHES, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vii (1828).
GERSINIA, Neraud, in Gaudich. Bot. Freyc. Voy. 27 (1826).
IONE, Lindl. Fol. Orch. (1853).
LYRAEA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 46 (1830).
MACROLEPIS, A. Rich. Sert. AstroL 25. t 19 (1883).
MALACHADKNIA, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 67.

BULBOPHTIJ.UM:—
ODONTOSTYLES, Breda, Orch. Kuhl et Hass. t. sine n. (1827).
OXYSEPALA, Wight, Ic. v. 17.1.1786 (1852).
SARCOBODIUM, Beer, Prakt. Orch. 306 (1854).
SESTOCHILOS, Breda, Orch. Kuhl et Hass. t. sine n. (1827).
TAUROSTALIX, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 933.
TRIBRACHIA, Lindl. Bot. Reg. snb t 832 (1824).
XIPHIZUSA, Reichb. f. in Bot. Zeit x. (1852) 919.
abbreviatum, Reichb. f. in Card. Chron. (1881) II. 70 =Cirrhopetalum abbreviatum.
acuHflorum, A. Rich, in Ann. Sc Nat. Sér. II. xv. (1841) 18 (Cirrhopetali sp.).-Ind. or.
adenopetalum, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 85.—Malaya.
affine, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1982.—Reg. Himal.
alcicome, *Par.* &" *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 151.—Burma,
alopecurum, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1880) II. 70.—Burma,
amplebracteatum, *Teijsm. b" Binn. in Tijdsckr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 307.—Malaya.
amplum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi.244- Dendrobium amplum.
Andersonii, *Kurt, Rep. Andam.* 51, nomen.—Ins. Andam.
anriongense, *Reichb. /. in Flora,* xlviii. (1865) 184.—Afr. occ.
angustifolium, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 57.—Java,
antenniferum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 250.—Ins. Philipp.
antenniferum, Reichb. f. 1. c. 248=geraënse.
apetalnm, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 127.—Afr. trop.
apiferum, *Batem. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 241.—Afr. trop.
argyropus, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 42.—Ins. Norfolc.
aristatum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 213.—Am. centr.
atropurpureum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 41.—Bras,
aurantiacum, *F. Muell. Fragm.* iii. 39.—Austral,
aurantiacum, *Hoot./, in Jour*. Linn. Soc.* vii. (1864) 219.—Afr. trap.
auratum, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 261.—Manilla,
auricomum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1985.—Burma.
Bailcyi, *F. Muell. Fragm.* ix. 5.—Austral.
balaenicepi, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xix. (1868) 208=Napelli.
barbatnm, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 119.—Bras,
barbigerum, *Lindl. Bot. Reg.* xxiii. (1887) t. 1942.—Afr. trop.
Baronii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 463.—Madag.
Beccarii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1879) I. 41.—Borneo.
Berenicis, *Reichb./. 1. c.* xiv. (1880) II. 588.—Hab. 1
Betchei, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* i. (1881) 173.—Ins. Samoa,
bicolor, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 49.—China,
bifarium, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 219.—Afr. trop.
biflorum, *Teijsm.* &* *Binn. in Nederl. Kruidi. Arch.* iii. (1855) 397.—Java,
bisetum, *Lindl. in Ann.* &* *Mag. Nat. Hist.* x. (1842) 186.—Reg. Himal.
Blepharistes, *Reichb. /. in Flora,* lv. (1872) 278 (Cirrhopetali sp.).—Burma.
Boukettae, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* i. (1884) 89.—Austral.
bootanense, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 158 = Cirrhopetalum bootanense.
Bowringianum, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1881) I. 814.—Assam,
braccatum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 117.—Ins. Philipp.
bracteolatum, *Lindl. Bot. Reg.* xxiv. (1838) 57.—Guiana.
Bufo, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 258 - Megaclinium Bufo.
caespitosum, *Thou. Orch. A/r.* t. 103.—Ins. Borbon.
calamarium, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 70.—Afr. trop.
capillipes, *Par.* b" *Reichb. /. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 150.—Burma,
capitatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 56.—Malaya.

BULBOPHYLLtTM:—
Careyanum, *Spreng. Syst.* iii. 732__Reg. Himal.
cariniflorum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 253 = bisetum.
caudatnm, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1983.—Reg. Himal.
cemuum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 48.—Java.
Cheiri, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 44.—Manilla,
chinense, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 260.—China,
chloroglossum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1871) 1195.—Bras,
chloropternm, *Reichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 835.—Bras.
ciliatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 48.—Java.
cirrhopetaloides, Griff. Notul. iii. 290=bisetum.
clandestinum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 77.—Ind. or.; Malaya.
Clausseni, *Reichb. /. in Linnaea,* xix. (1847) 371.—Bras.
davatum, *Thou. Orch. A/r.* t. 99.—Ins. Mascar.
clavigerum, *F. Muell. Census, Suppl.* i. 8.—Austral,
cochleatum. *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 125.—Afr. trop.
cocoinnm, *Batem. ex Lindl. Bot. Reg.* xxiii. (1837) 1-1964.—Afr. trop.
colubrinum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 257 - Megaclinium colubrinum.
comatum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 128.—Afr. trop.
Commersonii, *Thou. Orch. A/r.* t. 97.—Ins. Borbon.
compressum, *Teijsm.* &* *Binn. in Tijdsckr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 807.—Sumatra,
conchiferum, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 268.—Reg. HimaL
conicum, Thon. Orch. Afr. Tab. Esp. 3 = clavatum.
conitum, Thou. 1. c. t. 100 = davatum.
cornutum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 247 = Cirrhopetalum cornutum.
coriscense, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 118.—Afr. trop.
crassifolium, *Thw. ex Trimen, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 244.—Zeylan.
crocenm, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 57.—Java.
Cumingii, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 261.—Ins. Philipp.
cupreum, Hook. Bot. Mag. t. 6316 = Careyanum.
cupreum, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 95.—Burma,
cuspidilingua, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 264.—&» Philipp.
cylindraceim, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 53.—Reg. Himal.
Dayanum, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1865) 434.—Burma.
delitescens, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 44-Cirrhopetalum delitescens.
densum, *Thou. Orch. A/r.* t. 108.—Ins. Mascar.; Madag.
distans, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 125.—Afr. trop.
Drallei, *Reichb. /. in Regel, Gartenfl.* (1886) 20.-Afr. trop.
elaidium, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 127-—Afr. trop.
elegans, *Gardn. ex Thw. Enum. PI. Zeyl.* 298.—Zeylan.
Elisae, *F. Muell. Fragm.* vi. 120.—Austral.
Elliae, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 268=CirrhopeUlnm Wightii.
elongatum, *Hassi. Cat. Hort. Bog. Alt.* 89.—Malaya,
epiphytum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 40.—Bras,
erectum, *Thou. Orch. A/r.* t. 96.—Madag.
eublephamm, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 252.—Reg-Himal.
exaltatum, *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist.* x. (1842) 186.—Guiana.
exiguum, *F. Muell. Fragm.* ii. 72.—Austral.
/alcatum, Reichb. f..in Walp. Ann. vi. 258 = Megaclinium falcatum.
faldpctalnm, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 128.—Afr. trop.
fimbriatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 260=Cirrbopetalum fimbriatum.
Havescens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 64.—Java,
flavidum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 83.—Afr. trop.
/oenisecii. Par. ex Reichb. f. in Bot. Zeit. xxiii. (1865) 99 = auricomum.
/uscescens, Reichb. f. Walp. Ann. vi. 244=Dendroblnrn fuscescens.
fusco-purpurcum, *Wight, Ic.* v. t. 1651.—Ind. or.
fuscum, *Lindl. Bot. Reg.* (1889) *Misc.* 8.—Afr. trop-

BULBOPHYLLUM:—

Gabonis, *Linden V Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 185.—Afr. occ.
galeatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 57.—Afr. trop.
geraense, *Reichb. f. ex Rodrig. Orch. Nov.* ii. 125.—Bras.
gibbosum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 64.—Java,
gladiatum, *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist.* x. U842) 185.-Bras.
gracile, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 50.—Java.
gradle, Thou. Orch. Afr. 1.101 = Thouarsii.
graale, *Par. &• Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 152.—Burma.
grandiflorum, *Blume, Rumphia,* iv. 42.—N. Guinea.
grandiflomm, Griff. Notul. iii. 293 =reptans.
granulosum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 41.—Bras,
gravidum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 126.—Afr. trop.
Griffithianum, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 153=Cirrhopetalum gamosepalum.
kniffithii, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 247.—Reg. rlimal.
Henshallii, Hort. ex Gard. Chron. (1852) 422=Lobbii.
uermimostachys, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 254.—Afr. trop.
Hlldebrandtii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 74; *et in Bot. Zeit.* xxxix. (1881) 449.—Madag.
nirsutum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 49.—Java,
nirtum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1989.—Reg. Himal.
\mbricatum, Griff. Notnl. iii. 289 = cylindraceum.
>nbncatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 87.—Afr. trop.
inaequale, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 49.-Java.
incur [illegible] *Thou. Orch. Afr.* 1.110 95—Ins. Mascar.;
inera, *Reichb. /• in Gard. Chron.* (1880) i. 776.—Assam?
!no Ps, *Reichb. f. 1. c.* (1880) II. 620.—Hab.?
wsectiferum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 120.—Bras.
mt? J[illegible]«"«n, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) fc *i*—Afr. trop.
javanicum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 650.—Java.
**aitiense,* Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 262 Cirrhopetalum nilghe-ense.
**hasyanum,* Griff. Notul. iii. 284=cylindraceum.
***asyanum,* Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 138=repens.
lasianthum, *Lindl. in Gard. Chron.* (1855) 63.—Sumatra.
«siochilum, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 153.—Burma,
jaxiflorum, *Lindl. Gen.etSp. Orch.* 67.—Java,
"amiscatum, *Par. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 5961.—surma,
"sop'ardinnm, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1981.—Reg. Himal.
lichenastrum, *F- Muell. Fragm.* vii. 60.—Austral,
limbatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 74.—Singapora.
umbatum, *Par. (f Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 152 (non Lindl.).—Burma,
j^evih n m *Griff. Notul.* iii. 287.—Burma.
[illegible] *Lindl. Bot. Reg.* (1847) t. 29.—Burma; Malaya.
Vfiorun, Thou. Orch. Afr. t. 98 = Cirrhopetalum inouarsii.
[illegible] *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 258.—Burma.
Lucktaft"1 A". *Muell. in Wing, South. Sc. Record,* ii. (1882) 71.—Ins. Solomon.
undianum, *Rnchb. /. &• Worn, in Otia Bot. Hamb.* 8*.—Bras,
'npulinum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 126.—Afr. trop.
Macraei, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 268=Cirrhopetalum Wightii.
nacranthum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) 1.18.—Singapora.
Mrdgera> *Rodrig. Orch. Nov.* ii. I18.-Bras7
J? T^™1 *Boxall>* " *Waves, in Blanco, Fl. Philipp.*
M~- "I. *Nov. App.* 285.—Ins. Philipp.
«ko,anum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1879) I. 284 in nota.—Bras.
mandibulare, *Reichb. f. 1. c.* (1882) I. 366.—Borneo.
Mal «m *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1884) 218.—Aft. trop.
"""»». Reichb.f. in Flora, lv. (1872) 275 (-Cirrhc-Batah sp.)._Rtg. Himal.
[illegible] Philipp.' ***** /• •" *Wal t- Ann_ *• 248; Ins-

BTTLBOPHYILUM:—

maximum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 259=Mcgaclinium maximum.
Medusae, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 262.—Malaya,
megalanthum, *Griff. Notul.* iii. 286.—Malaya,
megalonyx, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 74; *et in Bot. Zeit.* xxxix. (1881) 449.—Ins. Comor.
melanorrhachis. Reichb. f. in Gard. Chron. (1875) 11. 162 = Megaclinium melanorrhachis.
Melleri, Reichb. f. in Flora, lxi. (1878) 78=Megaclinium Melleri.
membranaceum, *Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidi. Arch.* iii. (1855) 397.—Java,
mentosum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 42.—Bras.
merguense, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 154 (-Cirrhopetalisp.).—Burma,
meridense, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 836.—Venezuela.
micranthum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 89.—Bras,
micropetalum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1861) 127.—Afr. trop.
micropetalum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 121.—Bras,
microtepalum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 253.—Burma.
minutum, *Thou. Orch. Afr.* 1.110.—Madag.
minutissimum, *F. Muell. Fragm.* xi 53.—Austral.
moniUforme, *F. Muell. in Gard. Chron.* (1878) II. 818.—Austral.
moniUforme, R. King, in Gard. Chron. (1879) I. 55, 149 = minutissimum.
moniUforme, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx, (1874) 151 —Burma,
monosepalum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 121.—Bras,
monticolum, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 219.—Afr. trop.
moulmeinense, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 249 = Trias picta.
mucronatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 50.—Java,
mucronifolium, *Reichb. f. (f Warm, in Otia Bot. Hamb.* 94.—Bras,
multiflorum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 463.—Madag.
musdcolum, Reichb. f. in Flora, lv. (1872) 275 = Cirrhopetalum Wallichii.
mutabile, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 48.—Java.
Napelli, *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist.* x. (1842) 185.—Bras,
nasutum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1871) 148.—Burma.
neilgherrense, *Wight, Ic.* v. 1, 1.1680.—Ind. or.
nematopodnm, *F. Muell. Fragm.* viii. 30.—Austral,
nutans, *Thou. Orch. Afr.* t. 107.—Ins. Mascar.; Madag.
nutans, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 260.—Ins. Philipp.
nutans, Thou. Orch. Afr. 63. t. 8. n. 2 = variegatum.
oblongum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 249=Trisa oblonga.
obtusum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 56.—Java.
occidentale, Spreng. Syst. iii. 732 = Epidendrum polybulbon.
occlusum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc* xxi. (1885) 464.—Madag.
occultum, *Thou. Orch. lies Afr.* t. 93.—Ins. Mascar.
oculatnm, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 809.—Malaya,
odoratissimum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1987.—Reg. Himal.; Burma.
odoratum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 54.—Java.
Oerstedii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 213.—Nicaragua,
oligoglossum, *Reichb. f. in Hamb. Garten:* xxi. (1865) 297.—Burma.
oreonastes, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 118.—Afr. trop.
ovalifolium, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 49.—Java.
oxypterum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 258 = Megaclinium oxypterum.
pachyrrhachis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 613.—Ind. occ.
Pahudi, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 264.—Malaya,
paleaceum, *Benth. V Hook. f. Gen.* iii. 603.—Reg. Himal.
Pangerangi, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 57.—Malaya,
parviflorum, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 152.—Burma,
parvulum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 49.—Java.

BULBOPHYIiUJM:—

pavimentatum, *Lindl. in Journ Linn. Soc.* vi. (1861) 128.—Afr. trop.
pendulum, *Thou. Orch. Afr.* t. 104.—Ins. Mascar.
Fenicillium, *Par. b" Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 151.—Burma,
petiolare, *Thw. Enum. PI. Ziyi.* 298.—Zeylan.
pictum, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 150=Drymoda picta.
picturatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 262 — Cirrhopetalum picturatum.
pileatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 73.—Malaya.
Pipio, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 92.—Afr. trop.
polyrrhizum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 53.—Reg. Himal.
Prenticei, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* i. (1881) 173.—Austral.
prismatiuum, *Thou. Orch. Afr.* t. 102.—Ins. Mascar.
psittacoglossum, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxi. (1863) 236.—Burma.
Psychoon, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) II. 170.—Assam.
Pumilio, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 158 = Cirrhopetalum Pumilio.
pumilum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 54.—Afr. trop.
punctatuxn, *Fitzgerald, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 205.—Austral.
punctatum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 40.—Bras,
purpurascens, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* i. (1884) 88.—Austral,
purpurascens, *Teijsm. (f Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 80S.—Java,
purpureum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 298.—Zeylan.
pusillum, *Thou. Orch. Afr.* 1.102.—Ins. Maurit
pygmaeum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 58.—N. Zeland.
quadrisetum, *Lindl. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 670.—Guiana.
radiatum, *Lindl.in Wall. Cat.n.* 1986.—Banna; China,
recurvum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 58.—Afr. trop.
refractum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 259 > Cirrhopetalum refractum.
Regnelli, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 885,—Bras.
Reinwardtii, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 246.—Malaya.
repens, *Griff. Notul.* iii. 293.—Reg. Himal.
reptans, *Lindl. in Wall Cat.* n. 1988.—Reg. Himal.
reticulatum, *Batem. in Hook. f. Bot. Mag.* t. 5605.—Borneo.
retusiusculum, Reichb f. in Gard. Chron. (1869) 1182 » Cirrhopetalum retusiusculum.
Rhizophorae, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1861) 125.—Afr. trop.
rigens, *Reichb. f. in Hamb. Garten*, xxi. (1865) 296.—Burma,
rostriceps, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 55.—Ins. Fiji.
rotundatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 244 = Dendrobium rotundatum.
Roxburghii, Reichb. f. 1. c. 263 = Cirrhopetalum Roxburghii.
rnfinum, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 46.—Burma,
rupicola, *Rodrig. Orch. Nov. i.* 89.—Bras,
rupincola, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 184.—Afr. trop.
salaccense, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 67.—Java,
saltatorium, *Lindl. Bot. Reg.* xxiii. (1837) t. 1970.—Afr. trop.
Sandersoni, Reichb. in Flora, lxi. (1878) 78 = Megaclinium Sandersoni.
sarcoscapum, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 242.—Java.
scabratum, Reichb. f. in Walp. Ann.vi. 259=Cirrhopetalnm caespitosum.
Sceptrum, *Reichb. f. 1. c.* 254.—Ins. Sunda.
Schillerianum, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 423=Shepherdi.
Schmidtianum, *Reichb. f. I. c.* xxii. (1866) 857.—Ind. or.
sciadanthum, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* ii. (1882) 95.—Ins. Samoa.
serpens, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 57"nutans.
setigerum, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 21.—Guiana.
Seychellarum, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 93.—Ins. Mascar.
Shepherdi, *F. Muell. Fragm.* iii. 40 —Austral.

BUIIBOPHYIIIITTM :—
siamense,Reiehb. f.inGard.Chron. (1867) 572 = Lobbii.
sicyobulbon, *Par. b" Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 152.—Burma.
Sillemianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) II. 166.—Burma.
simillinum, Par. & Reichb. C Otia Bot. Hamb. 49 = Cirrhopetalum simillinum.
sordidum, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 89 = bracteolatum.
stenobulbon, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 153.—Burma,
striatum, *Reichb. f. in Waif. Ann.* vi. 257.—Reg. Himal.
suave, Griff. Notul. iii. 292=birtum.
sulcatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 67.—Java.
taeniophyllum, Par. & Reichb. f. in Joum. Bot. xii. (1874) 198 (= Cirrhopetali sp).—Moulmein.
tahitense, *Nadeaud, Enum. PL Tahiti,* 36.—IDS. Pacif.
Taylori, *F. Muell. Fragm.* viii. 150.—Austral,
tenellnm, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 49.—Java.
tentaculigerum, Reichb. f. in Flora, lxi. (1878) 77 = Megaclinium tentaculigerum.
tenuicaule, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1861) 126.—Air. trop.
tenuifolium, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* SO.—Java,
tetragonum, *Lindl. I. c.* 53.—Afr. trop.
Thompsonii, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 464.—Madag.
Thonarsii, *Steud. Norn.* ed. II. i. 214.—Ins. Maurit.
Thwaitesii, Par. & Reichb. f. in Jonm. Bot. xii. (1874) 199 (= Cirrhopetali sp.).—Zeylan.
tigridum, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 232.—China,
tortuosum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 50.—Java,
tremulum, *Wight, Ic.* v. t. 1749.—Ind. or.
triadenium, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 257.—Java.
trigonopus, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) II. 71 = Cirrhopetalum abbreviatum.
tripetalum, *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist. x.* (1842) 185.—Bras.
tripudians. Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 154 = Cirrhopetalum refractum.
trisetosum. Griff. Notul. iii. 288 = clandestinum.
tristc, *Reichb./. in Walp. Ann.vi.* 258.—Burma,
tuberculatum, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 836.—N. Zel.
umbellatum, Lindl. in Wall. Cat. n. 1984-Cirrhopetalum maculosum.
unguiculatnm, *Reichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 886.—Java.
uniflorum, *Griff. Notul.* iii. 293.—Reg. Himal.
uniflorum, *Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt.* 39.—Malaya.
vaginatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 261 — Cirrhopetalum vaginatum.
variegatum, *Thou. Orch. Afr.* 1.105,106.—Ins. Borbon.
velutinum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 258 = Megaclinium velutinum.
violaceum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 50.—Java.
vitUtum, *Reichb. f. & Warm, in Otia Bot. Hamb.* 95.—Bras,
vittatum, *Teijsm. &" Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 808.—Java.
Wallichii, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 259 = Cirrhopetalum Wallichii.
Weddelii, *Reichb./. 1. e.* 251.—Bias.
Wightii, Reichb. f. 1. c. 262 - Cirrhopetalum grandiñcrnin.
xylophyllum, Air. *tf Reichb./. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 161.—Burma.

BULBOSPERMUM, Blume, Enum. PI. Jav. 15 (1828) = Peliosanthes, Andr. (Haemodor.).
javanicum, Blume, 1. c.=P. javanica.

BULBOSTYLIS, DC. Prod. v. 188 (1886)-BrlokeUU, Ell. (Compos.).
annua, Nntt. in Journ. Acad. Fhilad. Ser. II. i. (1847) 179 = Psathyrotes annua.
ealifornica, Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. ii. 79=Brickellia ealifornica
Cavanillesii, DC. Prod. v. 138 = Brickellia ealifornica.
diffusa, DC. 1. c. vii. 268 - Brickellia diffusa.
glabra, DC. 1. c v. 139=Eupatorium Vauthierianum.
glabriuscula, C. Koch, in App. Sem. Hort. Berol. (1855) 13.—Am. trop.
hastata, Walp. Rep. Ind. p. 279 = Brickellia hastata.
hebecarpa, DC. Prod. v. 188 = Brickellia hebecarpa.

BULBOSTYLIS :—
lanata, DC. Prod. vii. 268 = Brickellia lanata.
microphylla, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 286 = Brickellia microphylla.
nepetaefolia, DC. Prod. v. 139 = Brickellia ealifornica.
oliganthes, DC. 1. c. = Brickellia oliganthes.
pauciflora, DC. 1. c. = Eupatorium pauciflorum.
pedunculosa, DC. in Deless. Ic Sel. iv. t. 17 = Eupatorinm longipes.
pendula, DC. Prod. v. 138=Brickellia pendula.
reticulata, DC. 1. c. vii. 268 = Brickellia reticulata.
rigida. Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 297 = Brickellia lanata.
scorodoniaefolia, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 12 = Brickellia ealifornica ?
secundiflora, DC. Prod. v. 138=Brickellia secundiflora.
spinaciaefolia, DC. L c. 139 - Eupatorium spinaciaefolium.
subuligera, S. Schau. in Linnaea, xix. (1847) 718 = Barroetia subuligera.
triangularis, DC. Prod. vii. 268=Carphephorus triangularis.
veronicae/olia, DC. 1. c. v. 139 ☙ Brickellia veronicaefolia.

BULBOSTYLIS, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 467= Eupatorium, Toum. (Compos.).
Cassiniana, Gardn. 1. c. 471 = E. Vauthierianum.
deltoides, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 456 = E. ageratifolium.
elcgans, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 467 = E. elegans?
glandulosa, Gardn. 1. c. 469 = E. amygdalinum.
micrantha, Gardn. 1. c. 449 •= E. amygdalinum.
microcephala, Gardn. 1. c. 468 = E. amygdalinum.
oblongifolia, Gardn. 1. c. 469 = E. trixoicles.
pumila, Gardn. 1. c. 470 = E. amphidictyum.
ramosissima, Gardn. 1. c. = K. ramostssimum.
scandens, Gardn. 1. c. = E. Vitalbae.
tomentosa, Gardn. 1. c. 468 = E. amygdalinum.

BULBOSTYLIS, Kunth, Enum. PI. ii. 205 (1837) = FimbristyliB, Vahl (Cyperac.).
capillaris, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 84, in obs.= F. capillaris.
ciliata, Presl, ex Nees, 1. c. 84, in obs.—Hab. ?
consanguinea, Nees, 1. c.—Bras.
hirteUa, Nees, 1. c. 85.—Bras.
paradoxa, Nees, 1. c. 82.—Bras.
tenui/olia, Nees, 1. c. 83.—Bras.
trifida, Nees, L c. 84, in obs. = F. capillaris.

BULBOSTYLIS, Stev. in Mém. Soc Nat. Mosc. v. (1814) 355=Eleochari8, R. Br. (Cyperac.).
capitatus, Stev. 1. c. = E. capitata.
geniculatus, Stev. L c. = E. genicnlata.
maculosus, Stev. 1. c. - E. maculoaa.
ovatus, Stev. 1. c. = E. ovata.
palustris, Stev. 1. c. = E. palustris.
tuberculatus, Stev. 1. c.-E. tuberculosa.

BULLIARDA, DC. in Bull. Soc. Philom. iii. (1801) n. 49. p. l=Tillaea, Mich. (Crassul.).
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 306 = T. aquatica.
alpina, Harv. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. ii. 330.—Afr. anstr.
aquatica, DC. in Bnll. Soc. Philom. (1801) n. 49. p. 2=T. aquatica.
bonariensis, DC. 1. c.=T. peduncularis.
brevi/olia, Kckl. & Zeyh. Enum. 290.—Afr. austr.
capensis, DC. in Bull. Soc. Philom. (1801) n. 49. p. 2 = T. capensis.
decutnbens, DC. 1. c. = T. decumbens.
Dregei, Harv. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. ii. 330 = Crassula prostrata, *E. Mey.*
elatinoides, Eckl. *3c* Zeyh. Enum. 290.—Afr. austr.
filiformis, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c.-T. filiformis.
Linnaei, Spreng. Syst. i. 497 = T. aquatica.
magellanica, Comm. ex DC. in Bull. Soc. Philom. (.1801) n. 49. p. 2=T. moschata.
moschata, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 618 = T. moschata.
pedunculata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144 = T. Vaillantii.
per/oliata, DC. in Bull. Soc. Philom. (1801) n. 49. p. 2 = T. capensis.
prostrata, fiC. 1. C.-T. prottrata.

BULLIARDA :—
prostrata, Weinm. Fl. Petrop. 21 = T. aquatica.
recurva, Hook. £ in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 472 [bis]=T. recurva.
Schkuhrii, Spreng. Syst. i. 498=T. prostrata.
Sieberi, Spreng. Syst iv. Cur. Post 48=T. verticillata.
trichotoma, Eckl. *8c* Zeyh. Enum.'290=T. decumbens.
Vaillantii, DC. in Bull. Soc. Philom. (1801) n. 49. p. 1=T. Vaillantii.
Vaillantii, Schimp. ex Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 388 = T. aquatica.

BULUARDA, Neck. Elem. ii. 321 (1790) = Unona, Linn. f. et Xylopia, Linn. (Anonac).

BTTLWESIA, C. Gay, Fl. Chil. i. 474. t. 15 (1846). *ZYGOPHYLLEAE,* Benth. & Hook. f. i. 268.
GONOFTERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. x*-(1847) I. 160.
bonariensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 105.—Reg. Argent
chilensis, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 475.—Chili,
foliosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 106.—Reg-Argent.
macrocarpa, *Phil. Sert. Mend. Alt.* 9.—Chili.
Retamo, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 106.—Reg. Argent.
Sarmienti, *Lorentz, ex Griseb. 1. c.* xxiv. (1879) 75.—Reg. Argent.
Schickendanzii, *Hieron. ex Griseb. 1. c.*—Reg. Argent.

BULOWIA, Hook. Bot. Mag. sub t. 4364 (1848) = BUELOWIA, Schur = Smeathmannia, Soland. (Passifl.).

BULWERIA, F. Muell. Fragm. iv. 147 (1861) = Siplaathera, R. Br. (Bignon.).
nobilissima, F. Muell. 1. c = D. tetraphylla.

BUMALDA, Thunb. Nov. Gen. 62 (1783) = Staphylea, Linn. (Sapind.).
tri/olia, Thunb. 1. c. 63 = S. Bnmalda.

BTTM3JLIA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 49 (1788). *SAPOTACEAE,* Benth. *8c* Hook. *i.* ii. 660.
SCLEROCLADOS et SPONDOGONA, Rafin. Sylva Tellur. 35 (1888).
ambigua, Tenore, ex A DC. in DC. Prod. v. 189 = lycioides.
angustifolia, *Nutt. Sylv. Am.* iii. 88. t. 98.—Am. bur.; Mexic
arachnoidea, Rafin. New Fl. Am. iii. 28-lanninosa.
arbarea, Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad. 1861 (1862) 461 = lanuginosa.
argentea, Roem. *8c* Schult. in Ges. Naturf. Fr. Berl-Mag. iii. (1809) 57 J Syst. iv. 499 = Heeria argentea.
Auzuba, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 499.—Ins. S-Doming,
borbonica, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 69.—I"* Borbon.
buxi/olia, Roem. & Schult. Syst. iv. 802 = obtusifolia-
buxifolia, *Willd. ex H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* vi-t. 147.—Am. austr.
celastrina, *H. B. & K. 1. c.* 212.—Mexic.
chrysophylloides, Wats. Dendrol. i. 10=tenax.
crenulata, *Spreng. Syst.* i. 665.—Porto Rico.
Cruegerii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 401.—Ind. occ.
cubensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 164.—Cuba.
cuneata, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 496-Sideroxylon obovatum, *Lam.*
cunei/olia, Rudge, PI. Guian. i. SO. t. 47=Chrys«-phyllum cuneifolium.
denticulata, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 29.—Am. bor.
dulcifica, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 130-Sideroxylon dulcificum.
Dunantii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 191.—Am. anstr.
egensis, Poepp. ex A. DC. 1. c 182=Sideroxylon ragosum.
excelsa, A. DC. 1. c 192 = obtusifolia.
ferox, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) S9S-—Mexic.
ferruginea, Nutt. Sylv. Am. 33=lanuginosa.
/oetidissima, Willd. Sp. PI. i. 1086=Siderox)'o'> foetidissimum.
glomerata, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (18<3) 518.—Ind. occ.
Hayesii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 297." Guatemala.

BUKEMA:-
norrida, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 165.-Cuba.
laete-virens, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 298.—Mexic.
lanuginosa, *Pen. Syn.* i. 237.—Am. bor.
'undo, Roem. & Schult. Syst. iv. 499 = Sideroxylon lucidum.
oides, *Willd. Enum. Hart. Berol.* 249.—Am. bor.
nacrocarpa, Nutt. Sylva Am. iii. 37 - lanuginosa ?
Manglillo, WUld. Sp. PL i. 1087=Myrsine Manglilla.
Mastichodendrum, Roem. & Schalt. Syst. iv. 498 = Mderoxylon Mastichodendron.
""crantha, WiUd. ex Roem. & Schult. 1. c. 802 = ArdisU micrantha.
microphylla, *Griseb Cat. PI. Cub.* 165.—Cuba.
nontana, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 49 = Dipholis montana.
monticola, *Buckl. in Bull. Torrey Club,* x. (1883) 91.—lexas.
<*ultiflora*, Roem. & Schult. Syst. iv. 498 (non Sapotacea).-Afr. anstr.
myrsinifolia, A. DC. in DC. Prod. viii.lS2 - Sideroxylon obovatum, *Lam.*
«««™»a, Vahl, Eclog. Am. i. 28=Lncnma Rivicoa.
"'gra, Bert, ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 400 = Dipholis salicifolia.
*[gra, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 49=Dipholis nigra.
"u^gifolia, Nutt Gen. Am. i. 135=lanuginosa.
ooovata, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 191.—Am. austr.
obtusifolia, *Roem. V Schult. Syst.* vi. 802—Bras.
"Wan/oKo, WiUd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 237 = rotnndifolia.
occidentalis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 298.—Mexic.
Pallida, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 49 =< Sideroxylon Mastichodendron.
Pa^lida, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 190.—Ind. occ.
Pamfolia, Chapm. Fl. S. U. St. 275 = angustifolia.
fwiflora, Engelm. ex A. Gray, Syn. Fl. ii. n. 68 = lanuginosa.
P'uciflora, Roem. & Schult. Syst. iv. 498=Sideroxylon pauciflorum.
pentagona, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 50-Dipholis salicifolia.
persicifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 298.—Mexic.
Pubescent, Tenore, Sem. Hort. Neap. (1827) = lycroides.
P«nctata, Roe$_m$. & gchnlL Syst. iv. 495 = Myr»ine Rapaneal
. nata, Torr. Bot. Mex. Bound. 109=angustifolia.
reclinata, *Vent.Choix*, 22.-Am. bor.
retusa, Balbis, ex A. DC. Prod. viii. 194 = Ilicis sp.
*™»«, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* **49.—Ind. occ.**
rh«mnoides, Casar. Stirp. Bras. Dec. 64=obtusifolia.
'otondifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 237 = obtnsifolia.
rotundifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 50.-Ind. occ.
^ *Rafin. NewFl. Am.* iii. 29.—Am. bor.
"Itnfolia, Bert, ex A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. U88?) 108 ^Myrsine salicifolia.
*<"*nfolia*, Sw. Prod. Veg. Ind. Oce. 80=Dipholis •alicifolia.
»rtoroin, *Mart. Herb. Fl. Bras.* 288.—Bras.
rata, Pursh, Fl. Am. Sept i. 165=Prunus caroliniana.
*??«ta. *Rafin. New Fl. Am.* iii 29.—Am. bor.
•Pnuflora, *A. DC. Prod.* viii. 181.—Mexic.
«P>nosa, *A. DC. I.* f.-Mexic.
spinosa, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xviii. (1888) 112 =Tanguinosa.
JH'S
bsessiflora, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 299.—Mexic.
texax, *Willi, sp. Pi. i.* 1085.-Am. bor.
texana, S. W. in Bot. Torrey Cl., x. (1883) 90.—Texas.
tomentos«, A. DC. Prod. viii. 190 «= lanuginosa.
tortuosa. *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 87—Cuba.
undulata, *Safin. New Fl. Am.* iii. 28.-Am. bor.

BUNBURIA, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. I. 416 (1888)-
,,;.*"*«toxieuni, Moench (Asclep.).
""Pttca, Harv. 1.c 417.-Afr. austr.

BUNBURYA, Meissn. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 653 =^ **a l y ^ f t ,** A. Rich. (Rubiac.).
capens.». Meissn. ex Hochst. 1. c—Afr. austr.

BT72TCHOSIA, Rich, ex Joss, in Ann. Mas. Par. xviii. (1811) 481. *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. *I* i. 252.
MALACMAEA, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 248.
acuUfolia, *A. ?uss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1818) 386. —Mexic.
angustifolia, *A. Juss. I. c.* 831.—Peruv.
argentea, *DC. Prod.* i. 582.—Venezuela,
armeniaca, *DC. I- c.*—Peruv.
bilocellata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 147' seq.
Biocellata, *Schlecht. in Linnaea,* x. (1886) 241.—Mexic.
Bonplandiana, *A. ?uss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 332.—Am. trap.
bracteosa, Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 79 = Dicella bracteosa.
canescens, *DC. Prod.* i. 582.—Ind. occ
cornifolia, *H. B. V K. Nm. Gen. et Sp.* v. 161.—N. Granat.
cumanensis, C. *Don, in Loud. Hort. Brit.* 170.—Venezuela,
deflexa, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 310.—N. Granat.
discolor, Tnrcz. in BuU. Soc. Nat. Most xxxii. (1859) I. 266 = biocellata.
eglandulosa, *A. 7uss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 336.—Hab.?
elliptica, *Tod. Ind. Sem. Hort. Panorm.* (1877) 88.—Hab. J
emarginata, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 35. —Cuba.
fluminensis, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 31.—Bras.
Gaudichaudiana, A. Juss. in Arch. Mns. Par. iii. (1843) 384 = fluminensis.
glandulifera, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 154.—Venezuela.
glandulosa, *DC. Prod. i.* 581.—Am. trop.
glauca, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 155.—N. Granat.
glauca. Seem, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 147 =cornifolia.
grandifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 341.—Ins. Martinic.
Hartwegiana, *Benth. PI. Hartw.* 164.—N. Granat.
holoserícea, Mart, ex A.Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 844=Dicella holosericea.
Hookeriana, *A. Juss. 1. c.* 337.—Peruv.
hypoleuca, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 77.—Guiana.
lanceolata, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859)1. 266-discolor.
laxiflora, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1812) 168=Tetrapteris Guilleminiana.
Lindeniana, *A. fuss, in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 835.—Am. trop.
Martiana, A. Toss. 1. c 384 = fluminensis.
media, *DC. P 1.* i. 581.—Ind. occ.
mollis, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 127.—Guiana.
mollis, Seem, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 148 -- pilosa.
montann, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 340. —Mexic.
multiflora, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 157.—Am. anstr.
nitida, *Juss. in Ann. Mus. Par.* xviii. (1811) 481. —Mexic.; Peruv.; Ind. occ.
odorata, *Juss. I. c*— N. Granat.
palustris, Poepp. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1848) 311 = Bnrdachia prismatocarpa.
panieulota, DC. Prod. i. 582 = Triopteris ova'a.
pilosa, *H. B. b- K. Nm. Gen. et Sp.* v. 154.—N. Granat.
polystachya, *DC. Prod.* i. 581.—Ind. occ.
retusa, *Triana b" Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 311.—N. Granat.
rhombifolia, *Turn, in BuU. Soc. Nat. Mosc* xxxvi. (1863) I. 582.—Venezuela,
sessilifolia, *DC. Prod.* i. 582.—Mexic.
sphaerocarpa, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 313.—Bras.
squarrosa, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 11 - Tetrapterys squarrosa.
strigosa, *Schlecht. in Linnaea,* x. (1836) 242.—Mexic.
Swartziana, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 115.—Jaroaic.
tubercnlata, *DC. Prod.* i. 581.—Venezuela.

BT7NOEA, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 108 (1831). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 976.
Shearei, J. *Moore, in Joum. Bot.* xiii. (1875) 229.—China,
trifida, C. *A. Mey. Yen. Pfl. Cauc.* 108.—As. Min. j Persia.
turkestanica, *Maxim, in Mem. Acad. Pitersb.* Se>. VII. xxix. No. III. 61.—Turkestan.

BTTNIA8, [Toum.] Linn. Syst ed. I. (1735). *CRVCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 97.
ERUCAGO, Toum. ex Adans. Fam. ii. 423 (1763).
LAELIA, Adans. Fam. ii. 423 (1763); Desv. Joum. Bot iii. (1813) 160.
aegyptiaca, Linn. Syst. **Nat.** ed. XII. 281 = Ochthodium aegyptiacnm.
altaica, Schang. ex DC. Syst. ii. 388 = Hutchinsia calycina.
americana, Rafin. Med. Fl. ii. 202=Cakile maritima.
arvensis, *Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon* (1848) 18.—Gallia.
aspera, Retz. Obs. ii. 21-B. Erucago.
balearica. Linn. Syst. Nat. ed. XII. 446 = Succowia balearica.
Cakile, Linn. Sp. PI. 670 = Cakile maritima.
cochlearioides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 87"Calepin.i Corvini.
cochlearioides, *Murr. in Comm. Gott.* viii. (1777) 42. t. 3.—Sibir. altaic.
cornuta. Linn. Sp. PI. 669 = Pugionium comutum.
cristata, Desv. Joum. Bot iii. (1813) 168 - B. Erucago.
edentula, Bigel. Fl. Bost. ed. III. 267 - Cakile maritima.
Erucago, *Linn. Sp. PI.* 670.—Europ. austr.; As. Min.; **Syria.**
glomerata, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 362=Senebiera Coronopus.
littoralis, Salisb. Prod. 278=Cakile maritima.
macroptera, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 654 - B. Erucago.
myagroides, Linn. Mant. i. 96 = Eruearia aleppica.
orientalis, *Linn. Sp. PI.* 670.—Europ. or.; As. Min.
ovalis, Viv. FL Lib. Spec. t. 16 = Cakile cyrenalca.
paniculata, L'Herit. ex DC. Syst. ii. 620-Neslia paniculata.
paradoxa, Banks, ex DC. 1. c. 677 = Chamira corauta.
perennis, Moench, Meth. Suppl. 91=orientalis.
perennis, Sibth. & Sm. Fl. Grace. Prod. ii. 2 = Rapistrum perenne.
prostrata, Desf. Fl. Atlant. ii. 76 - Muricaria prostrata,
pyramidata, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. (1612) *i'* nomen.—Hab. ?
raphanifolia, Sibth. & Sm. Fl. Grace, t. 612 = Rapistrum orientate,
rostrata, L'Hirit. ex DC. Syst. ii. 422"Eudidium syriacum.
sibirica, *Linn. Amoen. Acad.* viii. 8.—Sibir.
spinosa, Linn. Mant. 96 - Zilla myagroides.
syriaca, Gaertn. Fruct. ii. 290=Euclidium syriacum.
tatarica, WiUd. Sp. PI. iii. 413-Euclidium tataricum.
tcheliensis, *Debeaux, in Actes Linn. Soc. Bord.* xxxiii. (1879) 85.—China.
tenuifolia, Sibth. & Sm. Fl. Grace Prod. ii. 3 (=*Didesmus tenuifolius).*—**Graecia.**
Toumfortii, Sibth. ex DC. Syst. ii. 659 *{-Didesmus tenui/olius).—GntCM.*
tricorais, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. MeddeU* (1865) 82. —Hispan.
verrucosa, Moench, Meth. 277 = Rapistrum orientate.
virgata, Sibtb. & Sm. Fl. Graec. t. 613=Oehthodium aegyptiacum.
vulgaris, Andre, ex Steud. Nom. ed. II. i. 237, 238 = B. Erucago.
Winterli, Schult Obs. 121 = orientalis.

BUNION, St. Lag. in Ann. Soc Lyon, vii 86 (1880) = seq.

BUNIUM, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. **S16 (1843)** = **Pimpinella,** Riv. (.Umbellif.).
montanum, Koch, 1. c—Enrop.

BUNIUM, Linn. Gen. ed. I. 72 (1787) = O«vrum, linn. (Umbellif.).
acaule, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. i. 212 - Chamaesciadium acaule.

BUN1UM :—
alpinum, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hung. ii. 199.1.182 =C. alpinum.
ammoides, Cesati, in Linnaea, xi. (1887) 323=C. ammoides.
ammoides, Link, ex Sprang. Syst. i. 903=Conopodium denudatum.
aphyllum, Jan, ex DC. Prod. iv. 117.—Sicilia.
arcuatum, Griseb. ex PantoC. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 267.—Europ.
aromaticum, Linn. Mant. 218=C. copticum.
brevifolium, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1888) Repr. 21.—Ins. Mader.
Bulbocastanum, Bert, ex DC. Prod. iv. 668 = Diposis Bulbocastanum.
Bulbocastanum, Huds. Fl. Angl. 122 = Conopodium denudatum.
Bulbocastanum, Linn. Sp. Fl. 243 = C. Bulbocastanum.
bulbosum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 351 = C. Bulbocastanum.
butinioides, Boiss. & Reut. ex Boiss. Voy. Bot. App. 736.—Hispan.
capillifolium, Bertol. Fl. Ital. iii. 219.—Italia.
capillifolium, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1811) 428-Caram setaceum.
Carvi, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 211 = C. Carvi.
carvifolium, DC. Prod. iv. 116 = C. flexuosum.
cassium, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 24 = C. elegans.
cilicicum, Fenzl, in Tcbihat. Asie Min. Bot. i. 411=C. Pestalozzae.
collinum, Albert, in Bull. Soc. Sc. Draguign. (1884) repr. 23.—Europ.
copticum, Spreng. Prod. Umb. 28 = C. copticum.
corydalinum, DC. Prod. iv. 117.—Ins. Corsic.
creticum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=C. ferulaefolinm.
creticum, Urv. in Bull. Soc. Linn. Par. 1. (1822) 287 (=Conopodiisp.).—Graecia; As. Min.; Syria.
cynapioides, Bertol. Fl. Ital. iii. 217=C. cylindricum ?
denudatum, DC. Fl. Fr. iv. S25 - Conopodium denudatum.
divaricatum, Bertol. Fl. Ital. iii. 222 (=Pimpinellae sp.).—Ital.
divaricatum, Cesati, in Linnaea, xi. (1887) 314 = C. ferulaefolium.
Falcaria, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 211 = Falcaria Rivini.
ferulaceum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 186 = C. ferulaefolium.
ferulaefolium, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 275; Cboix, 55. t. 43 = C. ferulaefolium.
flexuosum, Brot. Fl. Lusit. i. 487 = Conopodium capillifolium.
flexuosum. With. Bot. Air. Brit. PI. ed. II. 276 = Conopodium denudatum.
glaberrimum, DC. Prod. iv. 118.—Algeria.
glaucescens, DC. 1. c. 117 *(=Scaligeria glaucescens).*—Armenia; Persia.
glaucocarpum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 25 » C. Pestalozzae.
junceum, Margot *Sc* Reut. in Mém. Soc. Phys. Genèv. viii. (1839) 800 = C. creticum.
ligusticifolium, Cesati, ex Boiss. Fl. Orient, it. 882 » C. multiflorum.
luteum, Hoffm. Gen. Umb. 108 = Muretia tanaicensis.
Macuca, Boiss. Elench. 44; Voy. Espagne, il 239. t. 66 = C. Macuca.
ntajus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 210 - C. ferulaefolium.
majus, Gouan, IHustr. 10 = Conopodium denudatum.
majus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 514 =C. Bulbocastanum.
minus, Gouan, Illustr. 10=C. Bulbocastanum.
minus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 514 « Conopodium denudatum.
minutifolium, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 177-Pencedanum vittijugum.
napiforme, Willd. ex Roem. *Sc* Sennit. Syst. vi. 539 = C. creticum.
nepalense, Jacquem. ex Walp. Rep. it 422 = Cbaerophyllum capnoides.
nivale, Boiss. Elench. 45; Voy. Espagne, ii. 240. t 67 = C. nivale.
paucifolium, DC. Prod. iv. 117=C. elegant.
Pestalonae, Boiss. Diagn. Ser. I. x. *U* = C. Pestalozzae.

BUNIUM :—
petraeum, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 195 = *corydalinum.*
petraeum, Tenore, Prod. Fl. Neap. p. lix = Carum alpinum.
peucedanoides, Bieb. Fl. Taur. Cauc i. 211 = Silaus carvifolius.
peucedanoides, DC. Prod. iv. 116.—Reg. Caucas.
pilosum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. vi. 500 = Conopodium denudatum.
pityranthon, Spreng. Syst. i. 901=Pituranthus denudatus.
pumilum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 67. t 274 (= *Biasolettia pumila).*—Graecia.
pyrenaeum, Loisel, Fl. Gall. 161. t. 5=Conopodium denudatum.
rigens, Spreng. in Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 500.—Afr. austr.
rigidulum, Caruel.Prod. Fl. Tosc. 272 = C.rigiduIum.
saxatile. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = C. alpinum.
strictum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 344 = C. strictum.
subcameum, Boiss. *Sc* Reut. Diagn. PI. Nov. Hisp. 14 =Conopodium subcameum.
tenuifolium, Salzm. ex DC. Prod. iv. 118 = Conopodium capillifolium.
tenuisectum, Griseb. ex Pantod. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 267.—Europ.
ternatum, Pers. Syn. i. 308=Conopodium denudatum.
thalictrifolium, Boiss. Elench. 45.—Hispan.
verticillatum, Gren. & Godr. 1-1. Fr. i. 729 = C. verticillatum.
virescens, DC. in Mém. Soc. Phys. Genèv. iv. (1828) 197=Silaus carvifolius.

BUNNYA, F. Muell. Fragm. v. 36. t. 89 (1865) = Cyanostegia, Turcz. (Verbenac).
cyanocalyx, F. Muell. 1. c.=C. Bunnyana.

BUNOPHILA, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. Mant. 128, et Ind. (1827) (Ord. Nat ?).
PUNOPHILA, Willd. 1. c 8 (1827).
lydoides, Willd. 1. c. 128.—Am. austr.

BUONAPARTEA, G. Don, in Sweet, Hort Brit. ed. III. 706 (1889) = BONAPARTEA, Ruiz *Sc* Pav. = Tillandsia, Linn. (Bromel.).

BUPHANE, Herb, in Bot. Mag. subt.2578 (1825); et Amaryll. 289. t 22, 36. f. 7, 8 (1825); prius Boophane, ejusd. App. 18 (1821); serius Buphone in Bot. Mag. sub t. 2593 in nota (1825) *AMARYLLIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 730.
CROSSYNE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 116 (1866).
amaryllidea, M. Roem. Syn. Ensat. 61=ciliaris.
angolensis, Baker, in Joura. Bot. xvi. (1878) 197 = Crinum angolense.
ciliaris, *Herb. App.* 18 (Boophane).—Afr. austr.
disticha, *Herb, in Bot. Mag.* sub t. 2578.—Afr. austr.
guttata, Herb. Amaryll. 240. t. 22. f. 1=ciliaris.
intermedia, M. Roem. Syn. Ensat. 59=disticha.
toxicaria, Herb. App. 18 (Boophane) = disticha,

BUPHTHALMUM, Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 338.
ATHALMUM, Neck. Elem. i. 20 (1790).
BUSTIA, Adans. Fam. ii. 127 (1763).
MOLPADIA, Cass. Diet. Sc. Nat. xxiii. 565 (1822).
TELEKIA, Baumg. Fl. Transsylv. iii. 149 (1816).
angustifolium, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 564 = Marshalha angustifolia.
aquaticum. Linn. Sp. PI. 903 = Odontospermum aquaticum.
arabicum, Delile, in Laborde, Voy. Arab. *Pitc.* 84 = Anvillea Garcini.
arborescens, Linn. Syst ed. X. 1227 = Borrichia arborescens.
arvense, *Veil. Fl. Flum.* viii. 1.133.—Bras.
asperrimum, Spreng. Neue Entdeck. ii. 140 *(=Anomostephium buphthalmoides).*—Guadelup.
asperum, Homem. Hort. Hafn. Suppl. 102 = Wedelia hispida.
asteriscoides, Baill. Hist. PI. viii. 301-Osmites asteriscoidea.
asteroideum, Viv. Fl. Lib. Spec. 67. t 26. t 2•=Pallenis spinosa.
australe, Spreng. Fl. HaL Mant. 52=Wedelia aristata.

BUPHTHALMUM :—
aureum, Salzm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 288 =• Pallenis spinosa.
bipinnatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 213 ** Anthemis tinctoria.
bonariense, Pers. Syn. ii. 474=Acicarpha spathulata?
canum, L'He"rit. ex DC. Prod. v. 489 = Borrichia argentea.
capense. Linn. Syst. ed. X. 1227-Oedera prolifera.
chrysanthemoides, Poir. Encyc. Suppl. i. 747 = Odontospermum imbricatum.
cordifolium, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hung. ii. 117 = speciosum.
coriaceum, Hort. ex Loud. Hort. Brit. 357 = Jasonia laevigata.
crassifolium, Rafin. Speech. 191 = Odontospermum maritimum.
dentatum, Baill. Hist. PI. viii. 301 = Osmites dentata.
diffusum, Vahl, ex DC. Prod. v. 491 = Eclipta erecta.
durum, Linn. Sp. PI. ed. II. 1275=Osteospermum spinosum.
elegans, Brouss. ex Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 138 = Odontospermum imbricatum.
equinum, Veil. Fl. Flum. viii. t. 131.—Bras,
flexile, *Bertol. Fl. Ital.* ix. 413.—Ital.
flosculosum, Vent. Jard. Cels, 25 = Anvillea Garcini.
frutescens, Linn. Sp. PI. 908=Borrichia frutescens.
Garcini, Burm. f. Fl. Ind. t. 60=Anvillea Garcini.
grandiflorum, Linn. Sp. PI. 904-salicifolium.
graveolens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 151=Odontospermum graveolens.
graveolens, Schimp. ex Boiss. Fl. Orient, iii. ISO *(=Asteriscus Schimperi).*—Arab.
Gussoni, *Pasquale, Notizie,* (1878) 2.—Sicil. ?
helianthoides, Forst. f. Prod. 57=Wedelia aristata.
helianthoides, Linn. Sp. PI. 904 = Heliopsis laevis.
heterophyllum, Willd. ex DC. Prod. v. 484 = Wedelia pedunculosa.
imbricatum, Cav. in Anal. Cienc. Nat iv. (1801) 94.= Odontospermum imbricatum.
incanum, Mill. Gard. Diet ed VIII. n. 10=Borrichia frutescens.
inuloides, *Moris, Sard. App.* (1828).—Sardinia.
laevigatum, Brouss. ex Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 188 = Jasonia laevigata.
leucoifolium, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 27.—Afr. austr.
lineare, Willd. Sp. PI. iii. 2280 = Borrichia frutescens.
littorale, *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 184.— Bras,
longipes, *Comm. ex Cass. in Bull. Soc. Philom-* (1822) 144.—Madag.
maritimum. Linn. Sp. PI. 903 = Odontospermom maritimum.
mediterraneum, *Veil. Fl. Flum.* viii. t 135.—Bras.
melissoides, Poir. Encyc. Suppl. i. 747=Heliopsis scabra.
melitense, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 218, nomen.—Ins. Melita.
nutans, Vitm. Summa Veg. v. 123=Bidens cemna.
odorum, Schousb. Vextr. Marokko, 199 = Odontospermum odorum.
oleraceum, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 606.—China.
Ortegae, *Spreng. Nachr.* i. *Bot. Gart. Halle,* 16, nomen.—Hab.?
peruvianum, Lam. Encyc. i. 615=Borrichia peruviana-
pratense, Vahl, Symb. Bot. i. 75-Ceruana pratensis.
procumbens, Desf. ex Steud. Nom. ed. 1.127 = WedeU* caraosa.
ramosum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 151.—Arab.
Ramtilla, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 8191* Guizotia oleifera.
repens, Lam. Encyc. i. 515 = Wedelia caraosa.
sagittatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 564 = Balsam"' rhiza sagittata.
salicifolium, *Linn. Sp. PI.* 904.—Europ. austr.
scabrum, Cav. Ic ii. 53 = Wedelia hispida.
scandens, *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 132.—Bras.
scandens, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PI. 392=Melanthera Brownei.
sericeum, Linn. f. Suppl. 379=Odontospermum •«"' ceum.
sessile, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 6 = Odontospennum m&ritiniutD.
silphioides, *Homem. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 289.-' Hab.?
speciosissimum, *Ard. Spec.* 1. 26; *Linn. Mant.* I *"' —~Europ.
speciosum, *Schreb. Dec.* 11. t. 6.—Oriens.
spinosum, Linn. Sp. PI. 904=Pallenis spinosa.

BUPHTHAIiMUM :—
stenophyllum, Link, in Buch, Beschr. Conor. Ins. 150= Odontospermum sericeum.
tfrigosum, Spreng. Neue Entdeck. ii. 140=Wedelia pedunculosa.
"Kcisaefolium, Britting. in Flora, xxiv. (1841) I. 188 --Cicifolium.
tenmfolium, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 28.—Afr. anstr.
tnfoHum, Poepp. ex DC. Prod. v. 577 = Oyedaea baphthalmoides.
uniflorum, Forst. f. Prod. 641 = Wedelia Forsteriana.

BUPLEUROIDES, [Boerh.] Moench, Meth. 294 (1794) = Phyllis, Linn. (Rubiac).
Nobla, Moench, 1. c. = P. Nobla.

BUPLEUHUM, [Toum.] linn. Syst. ed. I (1735).
UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 886.
AGROSTANA, Hill, Veg. Syst. v. 32 (1772).
BUPRESTIS, Spreng. PI. Umb. Prod. 27 (1K13).
DIAPHYLLUM, Hoffm. Gen. Umb. 116 (1814).
DIATROPA, Dum. H. Belg. 76 (1827).
ISOPHYLLUM, Hoffm. Gen. Umb. 115 (1814).
ODONTEA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 891.
ODONTITES, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 258.
PERFOLIATA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 890.
TENORIA, Spreng. PI. Umb. Prod. 32 (1813).
TRACHYPLEURUM, Reichb. Consp. 143 (1828).
acerosum, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 170, nomen.—Afr. austr.
aaphyllutn, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* ii. 154. t. 77.—Ins. Conor.
"cutifolium, Boiss. Elench. 47=paniculatum.
"gypHacum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 239 = Protractum.
aeneum, *Boiss.* &• *Huet, Diagn.* Ser. II. ii. 85.—Armenia.
affine, *Sadl. Fl. Pesth.* 204.—Enrop. austr.; Tauria.
a'eppicum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sef. III. i. (1844) U8.-Syria.
"ipigenum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 85 = •alcatum.
ripinum, Nym. Consp. 311=falcatnm.
"itaicum, Pall, ex Roem. & Schult. Syst. vi. 367, 368-tnradiatum.
"mplexicaule, [Clairv.] Man. Herb. 87=pyrenaicum.
*a*gulosum,* Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 883=ransnculoides.
aagolosnm, *Linn. Sp. PI.* 286.—Reg. arct.
•ngustifolium, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 265.—Sibir. altaic.
"ngnstifolium, *Pall. Reise Statth. Russ. Reich,* i. 345.—Reg. Caucas.
ip'culatum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. i. (1844) 147 « semidiaphanum.
apjculatnm, *Friwatd. in Flora,* xviii. (1836) 335.—Oriens.
"rborescens, Jacq. Coll. ii. 843-gibraltaricum.
'roorescens, Thunb. Prod. PI. Cap. 50 = Heteromorpha arborescehs.
"istatum, *Bartl. in Reichb. Ic. Fl. Germ.* ii. 70.1.178.—Europ.; Reg. Caucas.
""nenum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 845=kurdicum.
aspemloides, *Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 76.—Graecia.
A-ejuri, Boiss. in Ann. Sc Nat Sfr. III. i. (1844) I48«brevicaule.
aoreum, *Fisck. in Hoffm. Gen. Umb.* 118.—Sibir.
fstrale, Jord. Pngill. 72=Gerardi.
«««m, Rochel & Lang, ex Saut. in Flora, ix. (1826) 1-77= junceum.
"•wnsae, *Boiss.* &• *Rent. Diagn.* Ser. II. ii. 83.—Afr. bor.
ha Host, Syn. 141.—Europ. j Oriens.
baldense, Turr. in Giorn. ItaL i. (1765) 120=aristatum.
baldense, Waldst. & Kit. Ic. PI. Hung. Rar. iii. 285. t 257 = junceum.
"floi, Coss. ex Willk. in Linnaea, xl. (1876) 83.—Afr. bor.
Baumgartenianum, Schur, Enum. PI. Transs. 252 = petraeum.
"to'yculatLm, Bell. Stirp. Nov. 4. t. 2=stellatum.
bicum in/*, Helm. in Mim. Soc. Nat. Mosc. U. (1809) ^Wo. t. 8—baldense.

BUPIiBUBTTM :-
Bourgaei, *Boiss.* &• *Rent. Diagn.* Ser. II. ii. 84.—Hispan.
brachiatum, *C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 844.—As. Min.
Brasiannm, *Timb. in Mem. Acad. Toulouse,* Ser. VIII. iv. (1882) 128.—Gallia.
brevicaule, *Schlecht. in Linnaea,* xvii. (1843) 124.—Syria.
Burserianum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 14 = angulosum.
canalense, Wulf. ex Spreng. in Roem. & Schult. Syst. vi. 371 = ranunculoides.
canariense, Spreng. Syst. i. 882 = Astydamia canariensis.
Candollii, *Wall Cat.* n. 552.—Reg. Himal.
canescens, *Schousb. Vextr. Marokkko,* 127.—Marocco.
capillare, *Boiss.* &" *Heldr. Diagn.* Ser. II. ii. &2-—Graecia.
capitatum, Thnnb. Prod. PI. Cap. 50 •= Hermas capita ta.
cappadocicum, *Boiss. in. Ann. Sc. Nat. Sir.* III. i. (1844) 146.—As. Min.; Syria.
caricifolium, Willd. Sp. PI. i. 1378=ranunculoides.
caricinum, Reichb. Ic. Crit. ix. f. 1109, 1110 = ranunculoides.
cernuum, Tenore, App. i. Cat Hort Neap.; DC. Prod. iv. 131 = baldense.
chinense, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Sir. II. vi. (1883) 18.—China.
chinense, DC. Prod. iv. 128=falcatum.
chlorocaipum, *Timb.* &* *Jeanb. in Mim. Acad. Toulouse,* Ser. VI. v. (1837) 471, nomen.—Gallia.
Choulettii, *Pomel, Nom. Mat. Fl. Atl.* 140.—Algeria.
dliatum, Thnnb. Prod. PI. Cap. 50^Hennas ciliata.
citrinum, *Hochst. in Lorent, Wanderungen,* 337.—Armenia.
collinum, D. Dietr. Syn. PI. ii. 951=Heteromorpha arborescens.
coloratura, Schur, Enum. PI. Transs. 254=anreum.
Columnae, Guss. Fl. Sic. Prod. 70 = tenuissimum.
commutatum, *Boiss.* &* *Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 75.—Macedon.; As. Min.
compositum, *Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* vi. (1812) 258.—Hob. ?
corbariense, *Timb. in Mim. Acad. Toulouse,* Ser. VIII. v. II. (1883) 189.—Mont. Pyren.
coriaceum, L'He'rit. Stirp. Nov. 139. t. 67 - gibraltaricum.
corsicum, *Coss.* b* *Krai. Notes Crit.* 56.—Corsica,
croceum, *Fennl, Pugill. PI. Nov. Syr.* 16.—As. Min. j Syria.
cuspidatum, Buoge, in M^m. Acad. Pe'tersb. vii. (1854) 299; (Lehm. Rel. 128) = linearifolium.
dahuricum, *Fisch.* &* *Mey. ex Tuns, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 720, 721.—Dahuria.
densiflorum, *Rupr. Sert. Tiansch.* 47-—As. centr.
denticulatum, Bellard, ex Spreng. in Roem. & Schult. Syst. vi. S96=petraenm.
dianthifolium, *Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* i. 71.—Sicilia.
dichotomuin, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 28.—Syria.
dichotomum, Stev. in BuU. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 342, in textu = Gerardi.
dinorme, *Linn. Sp. PI.* 238.—Afr. austr.
dilatatum, Schur, Enum. PI. Transs. 253=falcatum.
distichophyllum, *Wight W Arn. Prod.* i. 870.—Ind. or.
divaricatum, Lam. Fl. Fr. iii. 410=B. Odontites.
divaricatum, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 262= gracile.
diversifolium, Rochel, Bonat. 68. t. 28=baldense.
dumosum, *Coss.* &* *Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 249 ; xxii. (1875) 59.—Marocco.
elatnm, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 316.—Sicil.
erubescens, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 841.—Lycia.
exaltatum, Bieb. Beschr. Casp. 156-baldense.
exaltatum, Schur, Enum. PI. Transs. 258 - subttcatum.
falcatum, Berg. Desc. PI. Cop. 76, partim-Mundtii.
falcatum, Dak & Gibs. Bomb. Fl. 108 - mucronatum.
falcatum, *Linn. Sp. PI.* 237.—Enrop.; Oriens; As. bor.; Reg. Himal.
falcatum, Torcz. in Bull. Soc Nat Mosc xvii. (1844) 721=-dahuricum.
filicoule, *Brot. Fl. Lusit.* >. 452.—Lusitan.

BTJPLETJBtntt :—
flavicans, *Boiss. b" Heldr. Diagn.* Ser. II. vi. 74.—Aetolia.
flavum, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* 205 (sp. dub.)= glumaceum ?
flexuosum, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 267.—Dahuria.
flexuosum, Moench, Meth. 88-falcatum.
flexuosum, Wall. Cat. n. 554=tenue.
foliosum, *Salzm. ex DC. Prod-* iv. 133.—Marocco.
Fontanesii, Guss. Ind. Sem. Hort Boca (1825) = B. Odontites.
frutescens, Hill, Veg. Syst. vi. 21—fruticosum.
fruticans, Stend. Nom. ed. I. 128=difforme.
fruticescens, Bourg. ex Nym. Consp. 810—foliosum
frnticescens, *Linn. Cent. PI.* i. 9.—Keg. Mediterr. occ.
fruticosum, *Linn. Sp. PI.* 238.—Reg. Mediterr.
Gerardi, Colm. ex Nym. Consp. 812 = junceum.
Gerardi, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett i. 403-tecuissimuin.
Gerardi, *Jacq. Fl. Austr.* iii. 31. t. 256.—Europ. anstr.; Oriens.
Gerardi, Pollini, Viag. Lag. Gard. 15,81=B. Odontites.
Gerardi, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 262-trichopodum.
Gerhardi, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. iv. 828 = Gerardi.
gibraltaricum, *Lam. Encyc.* i. 520.—Lusitan.; Marocco.
giganteum, Thunb. Prod. PI. Cap. 50 - Hennas gigantea.
glaucum, *Robill. V Cast, ex DC. Fl. Fr. Suppl.* 515.—Reg. Mediterr.
glumaceum, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 177—Graecia; As. Min.
gracile, DC. Prod. iv. 128=Marschallianum.
gracile, Urv. in Mem. Soc Linn. Par. i. (1822) 28 = glumaceum.
gracillimum, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 148=falcatum.
gramineum, Vill. Prosp. 28 = baldense.
graminifolium, Favre, in BuU. Soc. Murith. v. (1875) 85, 250-stellatum.
graminifolium., Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. IV. 828=exaltatum.
graminifolium, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 139 = ranunculoides.
graminifolium, Salisb. Prod. 160 = B. Odontites.
graminifolium, Vahl, Symb. Bot. iii. 48-petracnm.
Haussknechtii, *Boiss. Fl. Orient,* il 843.—Kurdistan.
Heldreichii, *Boiss. (f Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 76.—As. Min.
heterophyllum, Jacquem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 675 = jucundum.
heterophyllum, Link, Ennm. Hort. Berol. i. 282-protractnm.
heterophyllum, Rochel, Banat t. 28=baldense.
himalayense, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 146-longicaule.
hispanicum, Pers. Syn. i. 305=fruticescens.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 147=falcatum.
humile, Vest, ex Reichb. Ic Fl. Germ. ii. 71-aristatum.
imaicolum, Kern, in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, i. (1870) 115 (Nov. PI. Sp. Dec. ii. 19)-falcatum.
incurvum, Bell. App. Fl. Pedem. 77- t. ll=petraeum.
intermedium, Steud. Nom. ed. I. 128=protractum.
irregulare, *Boiss. V Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 850.—Syria.
Jacquinianum, Jord. Pugill. 71=Gerardi.
jucundum, *Kun, in Journ. Bot.* v. (1867) 240.—Himal. bor. occ.; Reg. Amur.
junceum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 204=affine.
junceum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 343.—Europ. austr.
junceum, PalL Ind. Taur. ex Bieb. Beschr. Casp. 168 =exaltatum.
junceum, Pollich, Fl. Palat. i. 264=tenuissimum.
Kargli, *Vis. Fl. Dalm.* iii. 35.—Dalmat.
Koechelii, *Fennl, Pugill. PI. Nov. Syr.* 17.—As. Min.
kokanicum, *Regel V Schmalh. ex Regel, PI. Not. Fedsch.* 29.—As. centr.
Kotschyanum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 29—linearifolium.
kurdicum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir. ILL I.* (1844) 148.—As. Min.; Syria; Persia,
lanceolatum, *Wall. Cat.* n. 661.—Reg. Himal.
lancifolium, Horaem. Cat. Hort. Hafa. i. 267 = protractum.

BUPIiEUBUM:—
laricense, *Gaut. If Timb. in Mém. Acad. Toulouse,* Sér. VIII. iv. (1882) 180.—Gallia.
lateriflorum, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 59.—Marocco.
leucocladum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 144.—Assyria,
libanoticnm, *Boiss. (f Blanche, Diagn.* Ser. II. ii. 82. —Syria,
linearifolium, *DC. Prod.* iv. 131. —Persia; Arab.; Turkest.
longepetiolatum, Weiss, in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, xvi. (1866) 581 = Kargli.
longeradiatum, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 719.—Sibir. baical.
longicaule, *Wall. Cat.* n. 557.—Reg. Himal.
longifolium, Falk, Beitr. ii. 144=aureum.
longifolium, *Linn. Sp. PI.* 2S7.—Euiop.
lophocarpum, *Boiss. (f Bal. Diagn.* Ser. II. v. 97.—Cilicia.
Maddeni, *C. B. Clarke, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* ii. 678.—Reg. Himal.
mareoticum, Delile, ex DC. Prod. iv. 129=nodiflorum.
marginatum, Wall. Cat. n. 566 = falcatum.
Marschallianum, *C. A. Mey. VerB. Pfl. Cauc.* 123 — Graecia; As. Min.; Persia.
mínimum.CIarke, Trav. ii. 644 ; Spreng. Neue Entdeck. Hi. 163-nodiflorum.
montanum, *Coss. (f Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1856) 706.—Algeria.
mucronatum, Brouss. ex Sprang, in Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 877=fruticescens.
mucronatnm, *Wight V Am. Prod.* 870.—Ind. or.
multinerve, *DC. in Mlm. Phys. Soc. Geniv.* iv. (1828) 500.—Sibir. altaic.
Mundtii, *Cham. (fSchlecht. in Linnaea,* v. (1826)384. —Afr. austr.
nanum, Poir. Encyc. Suppl. i. 750 = nodiflorum.
nebulosum, Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 847= cappadocicum.
neglectum, Cesati, in Linnaea, xi. (1837) 314 = baldense.
nervosum, Boiss. *Sc* Buhse, in Nonv. Mlm. Soc. Nat. Most xii. (1860) 97 = polyphyllum.
nervosum, Moon, Cat. 22 = mucronatum.
nervosum, Schousb. ex Ball, in Journ. linn. Soc. xvi. (1878) 464 = paniculatum.
nervosum, Trev. Symb. Phytol. i. 22,— multinerve.
nigrocarpa, Jacqnem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 676=falcatum.
nodiflornm, *Sibth. V Sm. Fl. Graec.* t. 260.—Graecia; Syria; Aegypt.
Nordmannianum, Bal. ex Boiss. FL Orient, ii. 851 = polyphyllum.
Nordmannianum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 265 = baldense.
nudum, *[Soland. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I. i. 881.—Afr. austr.
obliquatum, Schousb. ex Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 466=>foliosum.
obliquum, Vahl, Symb. Bot. i. 24»gibraltaricum.
oblongifolium, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 466.—Marocco.
obtusatum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. Suppl. ii. 42—angulosum.
obtusifolium, Tcnore, Prod. Fl. Nap. p. xviii = baldense.
octoradiatum, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pitersb.* ii. (18S0) 106.—China bor.
Odontites, *Linn. Sp. PI.* 237.—Europ.; Reg. Mediterr.
Odontites, Sm. Engl. Bot. t.. **2468** (1812); Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 141 (1813)=aristatum.
odontitum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 67, 121 = B. Odontites.
oligactis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 84.—Hispan.; Marocco.
olympicum, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. III. i. (1844) 149 = baldense.
opacum, Lange, in Willie. *8c* Luge, Prod. Fl. Hisp. iii. 71=aristatum.
oppositifolium,£oto'r. *Hist. Abr. PI. Pyr.* 141.—Mont. Pyren.
pachnospermum, *Panl. Fl. Princ. Serbiae* (1874) 329. —Banat.
panacifolium, Horaem. ex Steud. Nom. ed. II. i. 240 =heterophyllum.
paniculatum, Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 74 =Bourgaei.

BUPIiEUBUM:—
paniculatum, *Brot. Fl. Lusit.* i. 455.—Lusit.; Marocco.
paniculatum, Willie, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 74 = rigidum.
papillosum, *DC. Prod.* iv. 127.—Meaopotam.
pauciradiatum, *Fenal, in Tchihat. Asie Min. Bot.* i. 418.—Cilicia.
perfoliatum. Lam. Fl. Fr. iii. 405 = rotundifolium.
persicum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 150 =baldense.
petiolare, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 141 = falcatum.
petraeum, Genera, ex DC. Prod.iv. 181=angulosum.
petraeum, Georgi, It. i. 204=exaltatum.
petraeum, *Linn. Sp. PI.* 286.—Europ.
petraeum, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 209=graminifolium.
petrogenes, Jord. ex Nym. Consp. 311=falcatum.
petroselinoides, Sprang. PI. Umb. Prod. 39 = Carum peregrinum.
plantagineum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 233. t. 57.—Marocco.
plantaginifolium, *Wight, Ic.* i. t. 281.—Ind. or.
Pollichii, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 613 = tenuissimum.
polyphyllum, *Ledeb. in Mém. Acad. Pitersb.* v. (1815) 528.—Reg. Caucas.
procumbens, Desf. Fl. Atlant. i. 280. t. 56 = tenuissimum.
proliferum, Delile, Fl. Egypte, 205. t. 22=nodiflorum.
prostratum, *Ledeb. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 615. —Sibir. altaic.
protractnm, *Hoffmgg. tf Link, Fl. Port.* ii. 887.—Reg. Mediterr. or.
provinciale, *Huet, ex Timb. in Mém. Acad. Toulouse,* Sér. VIII. iv. (1882) 131.—Gallia.
pruinosum, Cesati, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 849 = baldense.
pulchellum, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 27.—Pamphylia.
pyrenaeicum, Willd. Sp. PI. i. 1871 = angulosum.
pyrenaeum, Gouan, Illustr. 8. L 4 = angulosum.
quinqueden\ta\tum, Thunb. Prod. PI. Cap. 50 = Hennas quinquedentata.
quinqueradiatum, Steud. Nom. ed. II. i. 240, sphalm. = praec.
ramosissimum, Wight &Ara. Prod. 870 = mucronatum.
ramosum, *Gaut. ex Timb. in Mém. Acad. Toulouse,* Sér. VIII. iv. (1882) 136.—Gallia.
ranunculiformis, St. Lag. in, Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)67=seq.
rannnculoides, *Linn. Sp. PI.* 237.—Reg. bor. temp.
ranunculoides, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 178 = baldense.
repens, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 140 = ranunculoides.
rigidum, Frey. ex Reichb. Ic Fl. Germ. xxi. 21 = baldense.
rigidum, Georgi, Beschr. Russ. Reiehb. iii. iv. 828 = Gerardi.
rigidum, *Linn. Sp. PI.* 288.—Gall, austr.
Rissoni, Rich, ex DC. Prod. iv. 128 =affine.
rotundifolium, *Linn. Sp. PI.* 236.—Europ.; Reg. Caucas.; Persia.
rotundifolium, Schousb. Vext. Marokko, 126 — protractum.
rupestre, Edgew. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 52 = longicaule.
rupestre, *Rafin. in Med. Repos. N. York*, v. (1808) 352, nomen.—Hab. t
sachalinense, F. Schmidt, Reisen Amurl. 185 = jucoodiQti \
salicifolium, *Soland. ex Lome, in Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1838) repr. 21.—Ins. Madera.
Savignonii, *De Not. in Mem. Ace. Tor.* ix. (1848) 208. —Italia.
saxatile, Pall. Reise, ii. 676 = baldense.
scabrum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 348 = brevicaule.
Scheffleri, Hampe, ex Nym. Consp. 313=nlicaule.
Schimperi, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 151 = linearifolium.
scorzoneraefolium, Willd. Enum. Hort. Bcrol. Suppl. 30=falcatum.
semicompositum, Hochst *8c* Steud. ex Steud. Nom. ed. II. i. 240 = aristatum.
semicompositum, *Linn. Amoen. Acad.* iii. 405.—Europ. austr.
semicompositum, Pall. Ind. Taur. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 205=junceum.
semicompositum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 176 = glancum.
semidiaphanum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vL 73.—Graecia et Ins.

BUPLEURUM:—
semiper/oliatum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 350« croceum.
setaceum, *Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot.* i. **418.**— Bithynia; Himal. bor. occ.
sibiricum, Vest, ex Roem. & Schult. Syst. vi. 368 = angulosum.
Sibihorpianum, DC. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 849 = linearifolium.
Sibthorpianum, Sibth. & Sm. Fl. Grace Prod. i. 179 = baldense.
spinosum, *Gouan, Illustr.* 8.—Hispan.; Afr. bor. occ
Sprunerianum, Hampe, in Flora, xxv. (1842) I. 63 - B. Odontites.
stellatum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 139 • angulosum.
stellatum, *Linn. Sp. PI.* 236.—Europ. austr.
striatum, Steph. ex Roem. & Schult. Syst. vi. 367 = multinerve.
subfalcatum, *Schur, Enum. PI. Transs.* **268.** — Transsylv.
subovatum, Link, ex Sprang. Sp. Umb. 19 • protractum.
subpinnatum, Ledeb. in Eichw. PI. Nov. Casp. Cane. 18.1.11 = Carom segetum.
subrubeum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 346 = ranunculoides.
subuniflorum, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 28. —Pamphylia.
sulcatum, Steud. Nom. ed. II. i. 240 = Mundtii.
sulphureum, *Boiss. tf Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 74.—As. Min.
telonense, Gren. ex Nym. Consp. 811=ranunculoides.
tenue, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 182.—Reg. Himal.
tenue, Salisb. Prod. 160 = tenuissimum.
tenuifolium, Pourr. ex Nym. Consp. 311 = baldense.
tenuissimum, *Linn. Sp. PI.* 238.—Europ.; Afr. bor.
terminate, Salisb. Prod. 160 = fruticosum.
Thomsoni, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 675.—Reg. Himal.
tortuosum, *Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 466.—Marocco.
transsilvanicum, Schur, Enum. PL Transs. 253 •» baldense. /
trichopodum, *Boiss. tf Sprun./n Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 145.—Graecia/As. Min.
trifidum, Tenore, Prod. Fl. Nap. 18=junceum.
tri/oliatum, Wendl. & Bartl. Beitr. ii. 13 = Heteromorpha trifoliata.
triradiatum, *Adams, ex Hoffm. Umb.* 115.—Sibir.
vapincense, Vill. Prosp. 23=longifolium.
Vanheurckii, *Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 207.—China.
veronense, Tuna, Fl. Ital. Prod. 64 = B. Odontites.
verticale, Orteg. Fl. Esp. ex DC. Prod. iv. 138 = gibraltaricnm.
villosum, Linn. Sp. PL 288 = Hermas villosa.
virgatum, Brot. ex Steud. Nom. ed. II. i. 240 = fruticescens.
virgatum, Cav. Desc. i. 121 = Gerardi.
virgatum, Wall. Cat. n. 555 - falcatum.
virgatum, Wight *Sc* Am. Prod. 870 = mucronatum.
Wittmanni, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 342 • rotundifolium.

BUPRESTIS, Sprang, in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 258 = Bupleumm, Tourn. (UmbelL).
arborescens, Sprang. I. c. 259 = Heteromorpha arborescens.
coriacea, Spreng. 1. c. = B. gibraltaricum.
difformis, Spreng. 1. c. = B. difforme.
exaltata, Spreng. 1. c. «= B. baldense.
frutescens, Spreng. 1. c. = B. fruticescens.
fruticosa, Spreng. 1. c = B. fruticosum.
Gerardi, Spreng. 1. c. = B. Gerardi.
gigantea, Spreng. 1. c = Hermas gigantea.
j'uncea, Spreng. 1. c.» B. junceum.
latifolia, Spreng. 1. c = Astydamia canariensis.

BUBAEA.VIA, Baill. Adansonia, xi. (1873) 83. *EUPHORBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 280.
carunculata, *Baill. I. c.* 84.—N. Caled.
clusiacea, *Baill. 1. c*—N. Caled.

BURASAIA, Thou. Gen. Madag. 18 (1806); et in Roem. Collect. 209 (1809); DC. Syst. Veg. i. 61* (1818). *MENISPERMACEAE*, Benth.& Hook, f >• 89, 960.

BURASAIA :—
«wgesta, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xii. (1889) 108.—Madag.
gracilis, *Decne. I. c*—Madag.
TMdagascariensis, *DC. Syst. I* 514.—Madag.
v"hs, *Mello, in Joum. Linn. Sac.* xiv. (1875) 4.—Bras.

BD» BIDOEA, Hook. f. Bot. Mag. t. 6403 (1870). *SCJTAMINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 647.
"«ida, *Hoot./. I. c-Ttomeo.*

WRCARDA, J. F. Gmel. Syst. 614 (1791) =seq.

BU*cARDIA,Schreb. Gen. i. 530 (1789) - Piriqiwta, Aubl. (Turoerac).
aromatic, Ranh. Sylva Tellnr. 106.—Hab. I
*gra*di/lora,* Rafin. 1. c—Hab. ?
*»«wa, J. F. Gmel. Syst. ii. 514=P. villosa.

BU^ HA RDIA, [Heist.] Dnham. Arb. 1. Ill, t. 44 (1755)=Oalliearpa, Linn. (Verbenac).
amencana, Dnham. L c = C. americana.
<-«*Uicarpa,* Crantz, Inst. ii. 360=C. americana.

BURCHABDIA, R. Br. Prod. 272 (1810). *LILIA-C*AE*, Benth. & Hook. f. iii. 822.
"ners a, Lindl. Swan River App. 58=umbellata.
¥ » « . Lindl. 1. e.=umbellate,
nmbeilata, *R. Br. Prod.* 273—Austral.

BTJ|"5HBIJ1IA, R. Br. in Bot. Reg. t 466 (1820). *RUBIACBAE*, Benth. & Hook. f. ii785.
BUBAUNA, Rafin. ia Ann. Gen. Sc. Phys. vi. - . (1820)86.
"*uoahna,* Sims, Bot. Mag. t. 28S9=capensis.
Pensis, *R. Br. in Bot. Rtg.* t. 466.—Afr. austr.
*"»«ini, Hochst in Flora, xxv. (1842) 237 =capensis.
»•, Hort. ex Heynh. Nom. ii. 83=eapensis.
wrnflora, Luidl. Bot. Reg. t. 891-capensis.
fcuta, Hort. ex Heynh. Nom. ii. 88=capensis.

Bt^>ACHIA, Mart, ex A. Juss. in Ann. Sc. Nat. I ir ti, xiii. ^184o) SM- *MALPIGHIACEAE*, Benth. * nook. f. i. 252.
ocarpa. Ben*. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 28 = Glandoilli* TM«crocarpa.
Pnmatocarpa, *Mart, ex A. Juss. in Ann. Sc. Nat.* i*t- II. xiii. (1840) 330.—Bras.
tyxanidata, Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. .JTM=Pnsmatocarpa.
*SS5?»^LJTM- *in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xiii. \•••••••) 330.—Bras.

BUREAVA, Baill. Adansonia, i. 71 (1860-61) « Combretum, Linn.
crotonoides, Baffl. 1.a 72=c. atom.

BUR Muell. Fragm. i. 222 (1859)=Brachy- * Br.
hTM*alodlada,* F. Muell. L c = Brachysema aphyllum.

BURGHART , Scop. Introd. 229 (1777) = Piriqueta, Aub
»>%sa, J.Tcmei. Syst. 514-P. villosa.

BURGLAR^ WendU « Stead. Nom. ed. 1.129 (1821) = Ela-
'«««*«, Wendl. 1. CL. L salicifolia.

BURGRDORnA,Moer.ch,Meth. 392(1794) = Sideri- «« Toum. (Ubiat.).
monstaw «» Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 327-S. mon. tana.
rigida, M^ Me*_ S92=S. romana.
romana' Hoffmgg. *it* Link(Fl, Port, L 97 - S. romana.

BURKHA, Benth. in Hook_ Ic_ R '• S9S (1843). *LEGUMINOSAE* Ben *- * Hodt. f. i. 587.
africana, Hook. '• • «• 69». 594.—Afr. austr.
Caperangau, Bai. «• Mrf. *PI.* u. 167—Afr. trop.

BURKHARDIA, Bra*- * Hook. f. Gen. i. 1007 (1867) = BURGHARTIA, ^ p. = « rqu.a, A W. (Turnerac.).

BURLINGTONIA, Lindl. Bot. Reg. t 1927 (1837) = Bodrigueaia, Ruiz & Par. (Orchid.).
Batetnani, Linden, Illustr. Hortic. xxviii. (1881) 64 = R. Batemanni.
Candida, Lindl. Bot. Reg. xxiii. (1837) sub t. 1927-R, Candida.
cornea, Lindl. ex Linden, Illnstr. Hortic. xxviii. (1881) 80=R. camea.
decora, Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) Misc. 86-R. decora.
fragr°ans, Lindl. Bot Reg. wdfl. (1837) sub t 1927 = R. fragrans.
granadensis, Lindl. Orchid. Linden. 24 =R. granadensis.
maculata, Lindl. Bot. Reg. xxv. (1839) 44-R. macnlata.
obtusifolia, Lindl. Sert. Orch. (1840) sub t. 86=R. obtosifolia.
pubescent, Lindl. & Paxt Flow. Gard. 1. (1851) 158 =R. pubescens.
refracta, Lindl. ex Linden, Illustr. Hortic. xxviii. (1881) 80-R.refracta.
gida, Lindk ex Lem. in Fl. des Serres, i. (1846) 11. t. 2 = R.rigida.
ruiescens, Lindl. Bot. Reg. xxiii. (1837) sub t. 1927.—Peruv.
srintillulans, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852-68) Misc. 66. —Bras.
venusla, Lindl. ex Lem. Illnstr. Hortic. v. (1858) t 188=R. vennsta.

BTTRMANW1A, Linn. Syst. ed. I (1735). JBTO-*MANN1ACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 457.
CYANANTHUS,Mier5,in Wall. Cat. nn. 9007-8(1849).
CYANOTIS, Miers, 1. c. n. 9006 (1849).
CRYPTONEMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 590.
GONIANTHES, Blume, Cat. Gew. Bnitent. (1823) 19.
MABURNIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 4 (1806).
NEPHROO)EUUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1853) I. 287.
TETRAPTERA, Miers, in Lindl. Veg. Kingd. 172 (1847).
TRIPTERANTHUS, Wall, ex Miers, 1. c. (1847).
TRIPTERELLA, Michx. Fl. BOT. Am. i. 19. t. 3(1803).
VOGELIA, J. F. Gmel. Syst. 107 (1791).
alba, *Mart. Nov. Gen. et Sj>. 112.*—Bras.
azurea. Griff. Notul. iii. 286=codestis.
bancana, *Mia. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 617.—Ins. Banca.
bicolor, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 10. t. 5.—Bras,
biflora, *Linn. Sp. PI.* 287.—Am. bor.
brachyphyUa, *Willd. ex Schult.f. Syst.* vii. II. p. lxxv. —Venezuela,
brachystachya, *Mij. in Linnaea,* xix. (1847) 141.—Guiana.
capensis, *Mart. Nov. Gen. et Sp. i.* 12.—Afr. austr.
capitata, *Mart. 1. c.*—Am. bor.
Championii, *Tkw. Enum. PI. Zeyl.* 325.—Zeylan.
coelestis, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 44.—As. trop.; Austral.
dasyantha, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 11.—Bras.
distachya, R. Br. Prod. 265 = disticha.
disticha. *Linn. Sp. PI.* 287.—As. trop.; Austral,
flava, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* L 11. t. 5. f. 2.—Bras,
flavnla, *Wright, in Sam. Fl. Cub.* 165.—Cuba.
Geelvinkuna, *Becc. Malesia, i.* (1678) 244.—Malaya,
javanica, *Blume, Enum. PI. Jav.* fasc i. 28.—Java,
jvmcea, *Soland. ex R. Br. Prod.* 265.—Austral.
Kalbreyeri,O««w, *in Hoot. Ic. PI.* 11857.—N. Granat.
longifolia, *Becc. Malesia,* i. (1878) 244.—Malaya,
lutescens, *Becc. 1. c.* 246.—Malaya,
madagascariensis, *Baler, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1884)268.—Madag.
madagascariensis, *Mart. V Zucc. Nov. Gen. et Sp.* i. 12.—Madag.
paniculate, *Willd. ex Schult.f. Syst.* vii. II. p. lxxiv. —Madag.
pusilla, *Thw. Enum. PI. Ziyi.* 325.—Zeylan.
quadriAora, *Willd. ex Sckult. f. Syst.* vii. 72. p. lxxiv.—Guiana.
selebica, *Becc. Malesia,* i. (1878) 243.—Ins. Celebes.
Sellowiana, *Seub. in Mart. Ft. Bras.* iii. 67. t.'7. f. 2. —Bras.
sphagnoides, *Becc. Malesia,i.* (1878) 246.—Malaya.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 6] 7=disticha.
tenella, *Benth. in Hoot. Km Joum.* vii. (1855) 12. —Bras,
tridentata, *Becc. Malesia,* i. (1878) 246.—Malaya.

BTrRMANOTA :—
triflora, Roxb. Hort. Beng. [87]; Fl. Ind. ii. 117 = coelestis.
tuberosa, *Becc. Malesia,* i. (1878) 245.—Malaya.
uniflora, Rottl. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 23= coelestis.

BtTEMEIBTBKA, Kant. & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 444. *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 547.
aenminata, *Kant. 1. c.* 445.—N. Granat.
glabrata, *Benth. If Hoot./. Gen.* ii. 547.—N. Granat.
ibaguensis, *Karst. in Linnaea,* xxviii. (.1856) 444.—N. Granat.
lacerate, *Karst. 1. c.* 445.—N. Granat.
Matthiaei, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 547.—Peruv.
marginata, *Karst. in Linnaea,* xxviii. (1856) 446.—N. Granat.
pomifera, *Karst. I. c*—N. Granat.
succulenta, *Karst. 1. c.*—N. Granat.
tomentosula, *Karst. I. c*—N. Granat.
virescens, *Benth. If Hook./. Gen.* ii. 647.—Guatemala.

BtTENATIA, Micheli, in DC. Monog. Phan. iii. 81 (1881). *ALISMACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1007.
enneandra, *Micheli, I. c*—Nubia.

BURKBTTIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 517 (1840). *ORCMDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 612.
cuneata, *Lindl. I. c.* 618.—Tasmania.

BURNEYA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 189<°Timonius, Rumph. et Bobea, Gaudich. (Rubiac.).
Forsteri, Cham. & Schlecht. 1. c.=T. Forsteri.
Gaudichaudii, Cham. & Schlecht. 1: c. 190 = B.Gaudichandi.

BTTRBXELIA, DC. Prod. v. 663 (1836). *COMPO. SITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 398.
anthemoides, *A. Gray, in Torr. Bot. Me*. Bound.* 97. —Am. bor.
chrysostoma, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 379 ^ Baeria chrysostoma.
Fremonti, Benth. PI. Harttr. 317-Baeria Fremontii.
gracilis, DC. Prod. v. 664 = Baeria gracilis.
hirsuta, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 381=Baeria gracilis.
lanosa, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 107=Eriophyllura lanosum.
leptalea, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 546=Baeria leptalea.
longifolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. IL vii. (1841) 380~Baeria gracilis.
maritima, A. Gray, in Proc Am. Acad. vii. (1868) 358—Baeria maritima.
microglossa, *DC. Prod.* v. 664.—Calif.
nivea, D. Eaton, in Bot. King, Exp. 174=Eatonella nivea.
parviftora, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 881 = Baeria gracilis.
platycarpha, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bcnnd. 97 = Baeria platycarpha.
tenerrima, DC. Prod. v. 664 «• Baeria gracilis t

BURSA, [Weber, in] Wigg.Prim. Fl. Hols. 47 (1780) = CapseUa, Medic. (17»2) (Crucif.).
astoris, [Weber,] 1. c—C. Bursa-pastoris.

BURSA-PASTORIS, [Toum.] Rupp. Fl. Jen. 77. ed. Hall. (1745) 87=CapseUa, Medic. (1792) (Crucif.).

BURSAIA, Steud. Nom. ed. II. i. 241 (1840) sphalm. = Bura8aia, Thou. (Menisp.).

BtTBSARIA, Cav. Ic. iv. 80. t. SSO (1797). *PITTO-SPOREAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 132.
diosmoides, Putterl.Syn. Pittosp. 20 -Marianthus procum bens.
incana, Lindl. in Mitch. Joum. Trop. Austral. 224 - spinosa.
inennis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 124.—Ins. Philipp.
procumbens, Putterl. Syn. Pittosp. 20 = Marianthus procutnbens.
tpinosa, *Cav. Ic.* iv. 30. t. 350.—Austral.
Stuartiana, F. Muell. ex Klatt, in Linnaea, xxviii. (1856) 686-Marianthus procumbens.

BTTRSERA,' Jacq. 'ex Linn.Sp. Fl.ed. II. 471 (1762).
BURSERACEAE, Benth. & Hook. f. i. 824.
BUSSERIA, Cramer, Disp. Syst. 144 (1803).
DAMMARA, Gaertn. Fruct. ii. 100.1.108 (1791).
ELAPHRIUM, Jacq. Enum. PI. Carib. 8 (1760;; Stirp. Am. i. 10S. t. 71 (1763), nomen prius.
ICICA, Anbl. PI. Gui. i. 337. t. 130 ad 135 (1776).
MARIGNIA, Comm. ex Kunth, in Ann. Sc Nat. Ser. I. ii. (1824) 351.
acuminata, Willd. Sp. PI. iv. 1120 = Dacryodes hexandra.
acuti/olia, Sieber, ex Stend. Norn. ed. II. i. 241 = Sorindeia madagascariensis.
Aloëxylon, *Engl. in DC. Monog. Phan.* IT. 52.—Mexic.
altissima, *Baill. Hist. PI.* v. 297.—Guiana,
angustata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 65.—Cuba.
bahiensis, Salzm. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv, 277, 637 = Tapiria guianensis.
balsami/era, Pen. Syn. i. 413 = Hedwigia balsamifera.
bicolor, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 53.—Mexic.
bipinnata, *Engl. I. c.* 49.—Mexic.
caudata, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Moac xxxvi. (1863) I. 614=Protium Sagotiannm.
cinerea, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 48.—Mexic
cnneata, *Engl. 1. c.* 56.—Mexic.
decandra, *Baill. Hist. PI.* v. 262, 297.—Guiana.
Delpechiana, *Poiss. ex Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 63.—Mexic.
excelsa, *Engl. I. c.* 67.—Mexic
fagaroides, *Engl. I. c.* 48.—Mexic.
Galeottiana, *Engl. 1. c.* 47.—Mexic.
glabra, *Triana V Planch. inAnn.Sc. Nat.Sir.V.* xiv. 11872) 304.—N. Granat.
glauca, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 66.—Cuba,
gncilis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 60.—Mexic.
grandifolia, *Engl. I. c.* 45.—Mexic.
graveolens, *Triana &" Planch, in Ann. Sc. If at.* Sér. V. xiv. (1872) 303.—Peruv.
guianensis, *Baill. Hist. PI.* v. 297.—Guiana,
gummifera, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 471.—Am. trop.
heptaphylla, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 20.—Cuba,
heterophylla, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 46.—Mexic.
Hindsiana, *Engl. 1. c.* 68.—N. Granat.
Icicariba, *Baill. Hist. PI.* v. 297.—Bras,
integerrima, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xiv. (1872) 303.—N. Granat.
javanica, *Baill. Hist. PI.* v. 297.—Java,
jorullensis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 57.—Mexic.
Karsteniana, *Engl .1. c.* 41.—Venezuela.
Karwinskii, *Engl. I. c*—Mexic.
Kerberi, *Engl. I. c*—Mexic.
lancifolia, *Engl. I. c.* 42.—Mexic.
lanuginosa, *Engl. 1. c.* 58.—Mexic.
leptophloeos, *Mart, in Flora,* xi. (1828) II. 898.—Bras,
macrostachya, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 618.—Guiana.
Martiana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 253.—Bras,
mexicana, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 61.—Mexic
microphylla, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 155.—Mexic
multijuga, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 42.—Mexic.
obovata, *Tung, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 614.—Mexic.
obtusifolia, Lam. Encyc. ii. 768 = Protium obtnsifolium.
orinocensis, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 254.—Bras,
ovalifolia, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 40.—Mexic
paniculata. Lam. Encyc ii. 768=Canarium mauritianum.
pannosa, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 64.—Mexic.
penicillata, *Engl. I. c.* 52.—Mexic.
Scbiedeana, *Engl. 1. c.* 57.—Mexic.
Schlechtendalii, *Engl. I. c.* 41.—Mexic
Sellowii, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 613.—Bras.
serrata. Wall, ex Coleb. in Trans. Linn. Soc xv. (1827 361. t. 4=Protium (erratum.

BTJHSERA:—
sessiliflora, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 55.—Mexic.
simplicifolia, *DC. Prod.* ii. 78.—Jamaic.
submoniliformis, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 55.—Mexic
Tacahamaca, Baill. Hist PI. v. 297 = Protium heptaphyllum.
Tatamaco, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xiv. (1872) 808.—N. Granat.
tomentosa, *Triana V Planch. 1. c.* 804.—N. Granat.

BURSERIA, Loefl. It. Hisp. 194 (1758) = Verbena, linn.

BURSERIA, Jacq. Stirp. Am. 94. L 65 (1763)=Bursera, Linn.

BURSHIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 857 =Myriophyllum, Linn. (Halorag.).
humilis, Rafin. 1. c. et vi. (1808) 422 = M. ambiguum.

BURSINOPETALUM, Wight, Ic t. 956 (1847) = M astixia, Blume (Comae).
arboreum, Wight, 1. c = M. arborea.
tetrandrum, Wight, ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 42 = M. tetrandra.

BTJRTONIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 12 (1811). *LEGUM1NOSAE,* Benth. & Hook. *i.* i. 468.
WEIHEA, Reichb. Consp. 212[b] (1828).
conferta, *DC. Prod.* ii. 106.— Austral.
diosmae/olia, Benth. Enum. PI. Hneg. 82-Latrobea diosmifolia.
foliolosa, *Benth. Fl. Austral,* ii. 50.—Austral,
gompholobioides, *F. Muell. Fragm.* x. 34.—Austral.
Hendersonii, *Benth. Fl. Austral,* ii. 51.—Austral.
minor, DC. Prod. ii. 106—Gompholobium minus,
polyzyga, *Benth. Fl. Austral,* ii. 51.—Austral.
pulchella, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 41=scabra.
scabra, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 12.—Austral.
sessili/olia, DC. Prod. ii. 106=scabra.
solanacea, *Hort. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 241.—Austral.
subalpina, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Victoria, i. (1855) 39-Pultenaea rosea.
subulata, *Benth. Fl. Austral,* ii. 60.—Austral.
tenella, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 42=Latrobea tenella.
villosa, *Meissn. I. c.* 41.—Austral.

BURTONIA, Salisb. Parad. Lond. t. 78 (1807) = Hibbertia, Andr. (Dillen.).
grossulariaefolia, Salisb. 1. c = H. grossulariaefolia.

BUSBECKEA, Endl. Prod. Fl. Ins. Norf. 64 (1838) = Capparis, Tourn.
arborea, F. Muell. Fragm. i. 168 = C. nobilis.
canescens, F. Muell. 1. c v. 104=C. canescens.
corymbifiora, F. Muell. 1. c vii. 163 = C. lucida.
humistrata, F. Muell. 1. c v. 156—C. humistrata.
lorantifolia, F. Muell. 1. c. i. 164—C. loranthifolia.
Mitchellii, F. MueU. 1. c; et Viet. PI. i. 53 = C. Mitchellii.
nobilis, Endl. Prod. Fl. Ins. Norf. 64 =C. oraans.
ornans, F. Muell. Fragm. v. 104=C. ornans.
Shanesiana, F. Muell. I. c x. 94=C. Shanesiana.
Tkotetiana, F. Muell. 1. c. V. 104=C. Thozetiana.
umbonata, F. Muell. 1. c i. 164; v. 104=C. umbonata.

BUSBECKEA, Mart. Cat. Hort. Monac. (1829) 69 = Balpichroa, Miers (Solanac).
radicans, Mart. 1. c.=S. rhomboidea.

BUSBEQUIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 25 (1866)-Hyacinthus, Toum. (Liliac.).
ciliaris, Salisb. 1. c = H. ciUatus.

BUSEA, Miq. Fl. Ind. Bat. it 782 (1856)-Cyrtandromoea, Zoll. (Gesnerac).
acuminata, Miq. 1. c 783-C. Miqueliana.
angustifolia, Miq. 1. c. 784=C. angustifolia.
aspen/olio, Miq. 1. c. 783 = Dichrotrichum asperifolium.

BUSEA:—
decurrens, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 733 = C. decurrens.
subsessilis, Miq. 1. c. = C. acuminata.

BUSIPHO, Salisb. Gen. PI. Fragm. 76 (1866)= Aloë, Toum. (Liliac).
ferox, Salisb. 1. c. = A. ferox.

BUSSERIA, Cramer, Disp. Syst. 144 (1803)-Bursera, Jacq.

BUSTAMENTA, Alam. ex DC. Prod. v. 166 (1886) = Eupatorium, Toum. (Compos.).
cordata, Alam. ex DC. 1. c. = E. petiolare.
ovata, Mairet, ex DC. 1. c. 168-E. Bustamenta.

BTTSTELINA, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 288 (1885). *ASCLEPIADEAE.*
Warmingii, *Fourn. 1. c.*—Bras.

BUSTIA, Adans. Fam. ii. 127 (1763)=Buphthalmum. Linn. (Compos.).

BUSTILLOSIA, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 106. t. 32 (1847)=Asteriscium, Cham. (Umbellif.).
chilensis, Clos, 1. c. 1U8 = A. chilense.

BUTEA, Koen. ex Roxb. PI. Corom. i. 22. t. 21 (1795).
LEGUM1NOSAE, Benth. & Hook. f. i. 533.
MECAI.OTROPIS, Griff. Notul. iv. 441 (1854).
MEIZOTROPIS, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 239 (1845).
PLASO, Adans. Fam. ii. 825 (1763).
acuminata. Wall. Cat. n. 5443=Spatholobus acuminatus.
Braamiana, *DC. Prod.* ii. 415.—China,
frondosa, *Roxb. PI. Corom.* i. 21.—Ind. or.; Burma.
frondosa, Wall. Cat. n. 5569, partim = superba.
gyrocarpa, R. Gran, in Wall. 1. c. n. 5442 = SpatholobW gyrocarpns.
Loureirii, *Spreng. Syst.* iii. 186.—Cochinch.
minor, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat.* n. 5439.—Reg-Himal.
parnflora, Roxb. Hort. Beng. 58 = Spatholobus R°*' burghii.
peltata. Vets. Syn. ii 279 = Rudolphia peltata.
sericophylla, Wall. Cat. n. 5441=Spatholobus Koxburghii.
superba, *Roxb. PI. Corom.* i. t 22.—Ind. or.
volubilis. Vets. Syn. ii. 279 = Rudolphia volubilis.

BUTERAEA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75, I*[6] (1832) = 8trobilanthes, Blume (Acanthac).
rhamni/olia, Nees, in DC. Prod. xi. 725=S. rhanunfolius.
ulmifolia, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 84-* rufescens.

BUTINIA, Boiss. Elench. 53 (1838) = Conopodln*' Koch (Umbellif.).
bunioides, Boiss. 1. c. 54—Conopodium butinioides.
capnoides, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 70* Chaerophyllum capnoides.
cretica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 50=Carom creticum.
glaucescens, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 61 (=*Elaeosticta glaucescens).*—Persia.
libanotica, Boiss. 1. c. 62 (=*Elaeosticta mrifolia)-"* Syria.
maerocarpa, Boiss. & Sprnn. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* »*• ii. (1844) 62 = Carum macrocarpum.
nodosa, Boiss. 1. c. 61 (=*Elaeosticta nodosa)-"* p ers a.
pamassica, Heldr. ex Nym. Consp. 802 *(= Biasolettia parnassica).*—Graecia.
stylosa, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) *(—Freyera stylosa).*—Graecia.

BUTNERIA, Dnham. Arb. i. 113. t. 45 (1755) = C»iy canthus, Linn.

BUTOMISSA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 91 (1866)* AWlim, Tourn. (Liliac).
tatarica, Salisb. 1. c.=A. tataricum.

BUTOMOPSIS, Kunth, Enum. PI. iii. 164 (1841).
AUSMACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1008.
TENAGOCHARIS, HochsL in Hora, xxiv. (1841) »"
cordofana, Kunth, ex Walp. Ann. i. 769 = lanceoUM-

BTTTOMOPSIS :—
lanceolata, *Kuntk, Enum. PI.* iii. 165.—Austral.
Wifolia, Kunth, 1. c. -lanceolata.

BTTTOMTrS, Linn. Syst ed. 1 (17S5). *ALISMACEAE,* Benth.& Hook. f. iii. 1008.
Caesalpini, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 189 - umbellatus.
fioridus, Gaertn. Frnct. i. 74.1.19. f. 3=wnbellatus.
junceus, Turct in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1887) n. VII. "7; (1888) 101, nomen; et xxvil. (1854) II. 60-umbellatus.
lanceolatus. Roxb. Hort. Beng. 89; Fl. Ind. ii. 815 •= Butomopsis lanceolata.
'ait/olius, D. Don, Prod. FI. Nep. 22 = Butomopsis lanceolata.
Wnbellatus, *Linn. Sp. PI.* S72.—Europ.; As. temp.
wlgaris, Gneldenst. Iter, ii. 22-umbellatus.

BUTQNICA, Lam. Encyc. i. 515 (1783); Jnss. Gen. 826 (l(89) = Barringtonfe,, Forst. (Myrtac).
"ftangula, Lain. 1. c. 591-Barringt acutangula.
««to„ Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 70 ."wnngt. conoidea.
™*φ Miers, 1. c. 65 = Barringt. racemosa.
"P'rulata, Miers, 1. c. 78.—Madag.
c«*fr„* Miers, 1. c. 77 = Barringt. racemosa.
"lyptrata, Miers, 1. c. 76-Barringt. speciosa!
^-'««iVa, Miers, 1. c. 77-Barringt. ceylanica.
««/«, Miers, 1. c. 76-Barringt. edulis.
tnclyta, Miers, 1. c. 71-Barringt. racemosa.
'"termedia, Miers, 1. c. 78=Barringt. intermedia.
Procera, Miers, 1. c. 74.—Ins. Padf.
racemosa, Juss. Gen. 326; Miers, L c. 65 = Barringt. racemosa.
'"/*". Miera, 1. c. 72.—Ins. Philipp.
"»™, Miers, I. c. 70=Barringt. racemosa.
"umphiana, Miers. 1. c. 88-Barringt. Bntonica.
wnofnsii, Miers, 1. c. 75=Barringt. samoënsis.
spinosa, Lam. Encyc. i. 521 - Barringt. speciosa.
terre S<1 £ Miers_ ta Trans_ Linn_ Soc_&r_n_ •• C1875) «=Barringtelongata.

BUTTNERIA, Duham. Arb.ed. II. 217. t. 47 (1801) = lalycaathua, Linn.

BU^ERIA.Schreb. Gen. i. 146 (1789) . Buettneria,

BXTJPTONIA, MacKen, ex Benth. in Hook. Ic. PI. *• 63. ,. 1080 (1871). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 970.
natal C.* MacKm tx Bmth_ ,,, Hook_ ,• C__ A{r_ Sr. natalis, MacKen, ex Benth. in Hook. 1. c.-natal ensis.

BUTYROSPE Haitni, Kotschy, in Sitab. Acad. Wien, Math. Nat. 1. Abth. I. (1865) 857. *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 661.
MICADANIA, R. Br. in Denh. et Clapp. Voy. App. If-1 23 (1826).
™ *Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 504.—Afr. trop.
"'{•*<*». Kotschy, fa Sitzb. Acad. Wien, Math. Nat V Ab "!-(1865) 858. t.l.=seq.
Kotschy, I. c. 369. t, 2.—Afr. trop.

BUXUS ... Benth_ * Hook_ £ » 26«- (1755)- *EUPHORBIACEAE,* Sw_ Prod_ *6- *«»• Occ. 88 (1788).
lMcE*A,Schreb. Gen. 630 (1791) ; Sw. Fl. Ind. ?cc. 331. t. 7 (1797).
™»>nata, *Mrull. Arg. in DC. Prod.* xvi. 1.15.-Cuba.
angust folia MU> C rrd r DdL ^ VHL n_ 2=sempervirens, *aquartiana,* Rich, ex Baill. Monog. Bnx. 69 = dtrifolia.
ar W J.C « «, Mill Gard. Diet. ed. Vin. n. 1; Urn. Fl. 'f-J'-^S-sempervirens.
argen.ea, Hort , „ Steud_ Nom_ **• U„ L M2 „ sempervirens.
aurea, Hort. ex Stend. 1. c.-semper»iren..
australis, A. Cunn. ex Steud. I. c.-Austral.
bal--ica ff f- Et "yc-1 611.—Ins. Balear.
c..2b 1 f- - Hort. ex BaiiL Monog. Bux. 66=Sim-"ondsiacalifornicaJ

BUTUS :—
caucasica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 476= semperrirens.
chinensis, Link, Enqm. Hort. Berol. ii. 886 - Simmondsia californica.
citrifolia, *Spreng. Syst.* iii. 847.—Am. anstr.
cordifolia, Spreng. Syst. iii. 847=Tricera cordifolia.
coriacea, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 814**Sarcococca pruniformis.
crispa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 476 = sempervirens.
cruciata, Rich, ex Baill. Monog. Bux. e7=Vahlii.
cnbana, *Baill. I.* c. 71.—Cuba.
cucullata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 476 = sempervirens.
dioica, Forsk. FI. Aegypt. Arab. 159 - Myrsine bottensis.
elegantissima, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 477 = sempervirens.
Fortnnei, *Carr. in Sev. Hortic.* (1870-71) 519.—China,
glomerata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. I. 17.—Cuba.
gonoclada, *Muell. Arg. 1. c.* 16.—Cuba.
haleppiea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 477 — longifolia.
Handstuorthii, Hort ex C. Koch, I. c 176 = sempervirens.
Harlandi, *Hance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 128.—China.
Hildebrandtii, *Baill. Adansonia,* xi. (1873-76) 268.—Afr. trop.
japonica, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. I. 20.—Japon.
laevigata, *Spreng. Syst.* iii. 847.—Jamaic.
longifolia, *Boigs. Diagn.* Ser. I. xii. 107.—Syria,
madagascarica. *Baill. Monog. Bux.* 65.—Madag.
marginata, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. i. 242 = sempervirens.
microphylla, Sieb. & Zucc in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1846) 142-japonica.
mucronata, Hort. ex Baill. Monog. Bux. 62=sempervirens.
myrtifolia, Lam. Encyc. i. 511= sempervirens.
obcordata-variegata, Fortune, in Gard. Chron. (1861) 785 = microphylla.
ovalifolia, Siebold, ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 479 = microphylla.
pulchella, *Baill. Monog. Bux.* 68.—Jamaic.
Purdieana, *Baill. I. e.* 70 (1859).—Jamaic.
retusa, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. 1.16.—Cuba.
rosmarinifolia, Hort ex Baill. Monog. Bux. 62 = sempervirens.
rotuniifalia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 479 = microphylla.
salicifolia, Hort. ex C. Koch, 1. c. 476 = sempervirens.
saligna, D.Don, Prod. Fl. Nep. 63=Sarcococca pruniformis.
sempervirens, *Linn. Sp. PL* 983.—Europ.; Oriens; As. temp.
sempervirens, Thunb. Fl. Jap. 77 —japonica.
stenophyUa, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 331.—China.
snbcolumnaris, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. I. 14.—Ind. occ.
suffruticosa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3-sempervirens.
tenuifolia, Hort ex Baill. Monog. Bux. 61 = sempervirens.
Vahlii, *Baill. Monog. Bux.* 67.—Ind. occ
variegata, Hort ex Steud. Nom. ed. IL i. 242 = sempervirens.
virens, Thunb. Fl. Jap. 77-microphylla.
Wallichiana, Baill. Monog. Bux. 63-= sempervirens.
Wrightii, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. I. 17.—Cuba.

BYBLIS, Salisb. Pared. Lond. t. 95 (1808). *DROSSRACEAE,* Benth. & Hook. f. L 664.
caerulea, R. Br. ex Planch. In Ann. Sc. Nat. Sir. III. ix. (1848) 808=linifolia.
flifolia, Planch. 1. c. 305-linifolia.
gigantea, *Lindl. Stum River App.* 92.—Austral.
Lindleyana, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 307 =gigantea.
liniflora, *Salisb. Parad. Lond.* t 95.—Austral.

BYGNONIA, Barcena, in La Natunleu, ii. (1873) 178 «B gnon a, Linn.

BYRONIA, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 184. *JLIC1NEAE,* Benth. & Hook. f. i. 857.
POLYSTIGMA, Meissn. Gen. 252; Comm. 161 (1889).
arahemensis, *F. Muell. Fragm.* ii. 119.—Austral.
Hooieri, Steud. Nom. ed. II. 1. 242=seq.
sandwicensis, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* i. (1836) 184.—Ins. Sandvic
taitensis, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 297.125.—Ins. Tahiti.

BYRSA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. i. (Gen. ignot.).

BYRSANTHES, Presl, Prod. Monog. Lobel. 41 (1836) =SiphocampylUB, Pohl (Campanul.).
HaUiana, Presl, 1. c. 42 = S. Hallianus.
Humboldtiana, Presl, 1. c.=S. niveus.
nivea, A. DC. in DC. Prod. vii. 408=S. niveus.

BYBSAHTHUS, Guillem. in Deless. Ic Sel. iii. 30. t 52 (1837). *SAMYDACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 800.
ANETIA, Endl. Gen. 923 (1839).
Brownii, *Guillem. 1. c.*—Afr. trop.
epigynus, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 499.—Afr. trop.

BYRSOCABPTT8, Schum. & Thonn. Beslcr. Guin. PI. 226 (1827). *CONNARACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 431.
Boivinianus, BaiIL Adansonia, vii. (1666) 231 - Rourea Boiviniana.
coccineus, *Schum. V Thonn. Beshr. Guin. PI.* 226.—Afr. trop.
maximus, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 458,—Afr. trop.
orientalis, *Baill. Adansonia,* vii. (1866) 280.—Afr. trop.
ovatifolius, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 452.—Aft. trop.
parviftorus, Baill. Adansonia, vii. (1866) 229=coccineus.
parvifolius, Planch, in Linnaea, xxiii. (1850) 412=-coccinens.
Pervilleanus, Baill. Adansonia, vii. (1866) 232 - Rourea Pervilleana.
puniceus, Schum. & Thonn. Beslcr. Guin. PI. 227 — coccineos.

BTKBONIMA, Rich, ex Juss. in Ann. Mus. Par. xviii. (18111 481. *MALP1GHIACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 251.
adenophylla, *Triana V Planch, in Ann. Sc. If at. Set.* IV. xviii. (1862) 314.—N. Granat.
Aerugo, *Sagot, 1. c.* Sér. VI. xii. (1881) 178.—Guiana,
altissima, *DC. Prod.* i. 579.—Guiana,
amazonica, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 14.—Bras,
angustifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 163. t. 449.—Venezuela,
arbutifolia, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 14.—Bras.
arthropoda, A. Jnss. in Arch. Mus. Par. iii. (1848) S07 =laxiflora.
basiloba, *A. Juss. 1. c.* 279.—Bras.
Berteroana, A. Juss. 1. c 293-spicata.
bicorniculata, *A. Juss. 1. c.* 284.—Bras,
biflora, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 167.—Cuba.
Blanchetiana, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 799-bicomiculata.
brachystachya, *DC. Prod. i.* 681.—Bras.
brachystachya, Poepp. ex Griseb. in Mart. FI. Bras. xii. I. 10=crispa.
bracteolaris, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 123.—Guiana.
brasiliensis, Griseb. in Linnaea, xili. (1839) 256 = sericea.
bumeliaefolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 79.—Bras,
ceranthera, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 121.—Guiana,
chrysophylla, *H. B.* (r *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 150.—Venezuela.
chrysophylla, A. Juss. in St. HiL Fl. Bras. Mer. Hi. 81-sericea.
cinerea, *DC. Prod.* i. 580.—Am. trop.
Clausseniana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 281.—Bras.

BYRSONIMA:—
coccolobaefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 148.—Am. anstr.
coleostachya, *Grisei. in Linnaea,* zxii. (1849) 3.—Guiana,
concinna, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1818) 122.—Guiana,
coniophylla, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 810.—Bras.
coriacea, DC. Prod. i. 580=spicata.
coneaefolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 78.—Bras.
cotinifoiia, Benth. PI. Hartw. 277=oaxacana.
cotinifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 152. t. 447.—Mexic
crassifolia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp. PI.* v. 149.—Guiana.
crassifolia, Lnnan, ex Griseb. FI. Brit. W. Ind. 114 = cinerea.
crassifolia, Stend. Nom. ed. IT. i. 242=verbascifolia.
aisp,A.Juss.inArch.Mus.Par.iii.* (1848)806.—Bras,
cnjabensis, *A. Juss. ex Mart. Herb. Fl. Bras.* 344. n. 667, nomen.—Bras,
cubensis, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 292.—Cuba.
Cumingiana, A. Juss. L c. 282 = crassifolia.
cuprea, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 19.—Bras,
cydoniaefolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 77.-Bras.
cydoniaefolia, Mart, in Flora, xxiv. (1841) Beibl. ii. 104=Clausseniana.
dealbata, *Griseb. in Linnaea,* xiii. (1839) 253.—Bras,
densa, *DC. Prod.* i. 580.—Guiana,
diphylla, *DC. 1. c.* 581.—N. Granat.
dispar, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.10.—Bras.
eglandulosa, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1848) 273=sericea.
elegans, *DC. Prod.* i. 580.—Guiana,
eriopoda, *DC. 1. c.* 579.—Am. austr.
fastigiata, Mart, in Flora, xxiv. (1841) n. Beibl. 61 = kevigata.
Fendleri, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 582.—Panama.
ferruginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 151-crassifolia.
frondosa, *Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 303.—Guiana.
Gardnerana, *A. Juss. 1. c.* 296.—Bras,
guadalupensis, *G. Don, Gen. Syst. i.* 687.—Ind. occ.
Guilleminiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 276.—Bras.
gymnocalyrina, *A. Juss. 1. c.* 804.—Guiana.
Hostmanni, *Benth. in Hook. Land. Jowrn. Bot.* vii. (1848) 120.—Guiana,
hypargyrea, *Planch, ex Linden, Cat.* n. 8 (1853) 2.—N. Granat.
hypoleuca, *Tuna, in Bull. Soc. Not. Mosc.* xxxi. (1858) I. 891.—N. Granat.
intermedia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bros. Mer.* iii. 82.—Bras,
inundate, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 122.—Bras,
japurensis, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 805.—Bras.
Karwinskiana, *A. Juss. 1. c.* 288.—Mexic.
laevtgata, *DC. Prod.* i. 580.—Guiana.
lanceolata, DC. 1. c.=crassifolia.
lancifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 275.—Bras,
laurifolia, *H. B.* 6* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 147.—Venezuela.
laxiflora, *Griseb. in Linnaea,* xiii. (1839) 256.—Bras,
leucophlebia, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 15.—Bras,
ligustrifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 82.—Bras.
ligustrifolia, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1176=intermedia,
linearifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 279.—Bras.
lengibracteata, A. Juss. ex Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 61 = stipulacea.
lucida, *DC. Prod.* i. 580.—Am. bor.; Ind. occ.
Martian*, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 286.—Bras.
microphylla, *A. Juss. 1. c.* 298.—Bras,
mollis, *DC. Prod.* i. 581.—Guiana.
montana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 149-crassifolia.

BYKSONIMA:—
monticola, A. Juss. & Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 17= coccolobaefolia.
Moritziana, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) 391.—Venezuela.
Moureila, Loud. Hort. Brit. 182= crassifolia.
myricifolia, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 125.—Bras.
nervosa, *DC. Prod.* i. 579.—Bras,
nitida, *D. Don, Gen. Syst.* i. 686.—Perav.
nitidifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 296.—Bras,
nitidissima, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* v. 162.—Venezuela,
oaxacana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 283.—Mexic.
oblongifolia, *A. Juss. 1. c.* 800.—Bras,
obversa, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 76.—Guiana.
Orbignyana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 284.—Bolivia,
oxyphylla, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 84.—Bras.
pachyphylla, Griseb. in Linnaea, xiii. (1889) 250 = verbascifolia.
pachyphylla, *A. Juss. in St. Hil. Ft. Bras. Mer.* iii. 77.—Bras.
pallida, *DC. Prod.* i. 581.—Guiana.
panamensis, *Beurling, in Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1854) 117.—Panama.
Paulista, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 85.—Bras,
perseaefolia, *Griseb. in Linnaea,* xiii. (1839) 257.—Bras,
peruviana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 289.—Peruv.
phlomoides, *G. Don, Gen. Syst.* i. 686.—Bras.
piauhensis, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1848) 274 =sericea.
pinetorum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 42.—Cuba.
Poeppigiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 308.—Bras,
propinqua, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 120.—Guiana.
psilandra, *Griseb. in Linnaea,* xiii. (1839) 251.—Bras,
pulchra, *DC. Prod.* i. 680.—Mexic.
punctulata, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 309.—Bras.
reticulata, DC. Prod. i. 681 = Heteropteris platyptera.
reticulata, *Klotesch b" Karst. ex Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 6.—N. Granat.
rhombifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 290.—Bras.
rhopalaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 148 = crassifolia.
rigida, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 298.—Bras.
rotunda, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 20.—Bras,
rufescens, *Bertol. Fl. Guatim.* 18.—Guatemala,
rugosa, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 118.—Guiana.
Salzmanniana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 277.—Bras.
Schomburgkiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 123.—Guiana,
sericea, *DC. Prod.* i. 580.—Bras,
sessilifolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 124.—Guiana,
sparsibilis, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) I. 391.—Bras,
spicata, *Rich, ex Juss. in Ann. Mus. Par.* xviii. (1811) 481; *DC. Prod.* i. 580.—Am. trap.
spicata, Foepp. ex Spreng. Syst. ii. 383 = Heteropteris platyptera.
stigmatophora, *Schlecht. in Linnaea,* x. (1836) 241.—Mexic.
stipulacea, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 287.—Bras.
trinitensis, *A. Juss. 1. c.* 296.—Ind. occ.
triopterifolia, *A. Juss. 1. c.* 298.—Am. austr.
umbellata, *Mart, ex A. Juss. I. c.* 801.—Bras,
vacciniaefolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 84.—Bras.
variabilis, *A. Juss. 1. c.* 78.—Bras,
verbascifolia, *Rich, ex Juss. in Ann. Mus. Par.* xviii. (1811) 481; *DC. Prod.* i. 579.—Am. trop.
viminifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 83.—Bras.
volubilis, DC. Prod. i. 581 = Hiraea Simsiana.

BYBSOPHYLIiTJJt, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 83 (1873). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook, f. 1. c.
ellipticum, *Hoohf. 1. c*—Zeylan.
tetrandrum, *Hook. f. I. c.; Bedd. Forest. Man.* 184/2.—Ind. or.

BYSTBOPOGON, L'Herit. Sert. Angl. 19. t. 22, 23 (1788). *LABIATAB*, Benth. & Hook. f. ii. 1184.
ASTEMON, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 30.
MINTOSTACHYS, Spach, Hist. Veg. i'han. ix. 164 (1840). *
bipinnatus, Roth, Nov. PI. Sp. 225 - Lavandula Burnuuini.
canariensis, *L'Htrit. Sert. Angl.* 20.—Ins. Canar.
canus, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 326.—Peruv.
coarctatus, *Thonn. If Schum. in Vidensk. Selsk. Skr.* iv. (1828) 34 = Hyptis pectinata.
confertus, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 248 =• Mentha mollis.
dentatus, *Pair. Encyc. Suppl.* i. 755.—Peruv.
erianthus, Benth. Lab. Gen. et Sp. 727 = CuminU eriantha.
glabrescens, *Benth. PI. Hartrs.* 145.—Peruv.
graveolens, Blume, Bijdr. 824 = Hyptis suaveolens.
maderensis, *Webb tf Berth. Phyt. Canar.* iii. 66.—Ins. Madera.
marifolius, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 243, 521 = Micromena marifolia.
Meridiani, C. *Bolle, in Bonplandia,* viii. (1860) 281.—Ins. Canar.
mollis, *H. B. &• AL Nov. Gen. et Sp.* ii. 817.—N-Granat.
mollis, Salisb. Prod. 80 = canariensis.
odoratissimus, *C. Bolle, in Bonplandia,* viii. (1860) 281.—Ins. Canar.
origanifolius, *L'Hérit. Sert. Angl.* 20.—Ins. Canar.
pectinatus, L'Herit. 1. c. 19 = Hyptis pectinata.
piperitus, *Lowe, in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 299.—Ins. Madera.
plumosus, *L'Hérit. Sert. Angl.* 20. t. 22.—Ins. Canar.
punctatus, *L'HMt. 1. c.* 20. t. 28.—Ins. Madera.
reticulatus, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 248 =» Mentha mollis.
serrulatus. *Webb V Berth. Phyt. Canar.* iii. 65. t. 151.—Ins. Canar.
sidaefolius, L'H&it. Sert. Angl. 19 = Hyptis poly antha.
Smithii, Webb *8c* Berth. Phyt. Canar. iii. 281-punctata.
spicata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 326.—Peruv.
suaveolens, L'Hérit. Sert. Angl. 19 = Hyptis suaveolens.
tomentosus, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 826.—Peruv.

BYTHOPHYTOir, Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 288 (1884). *SCROPHULARINEAE.*
indicum, *Hooi.f. I. c*—Reg. Himal.

BYTNERIA, Jacq. Hort. Vindob. L 10 (1770) =seq.

BYTTNERIA, Loefl. Iter Hisp. 313 (1758)=Buettneria, Loefl. (Sterculiac).

BYTTNERIA, Steud. Nom. ed. II. i. 243 (1840)-Calyoanthus, Linn.

C

CAAPEBA, Plum, ex Adans. Fam. ii. 357 (1763)* CissampelOB, Linn. (Menisp.).

CABALLERIA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. et Chil-141. t 80 (1794)-=Myrsine, Linn.
coriacea, *G.* F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 118-»• floribunda.
dentata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 281 = M. dentata.
dependens, Ruiz *8c* Pav. U c. ^ M. dependens.
ferruginea, Ruiz & Pav. 1. c. 250 = M. ferruginea.
latifolia, Ruiz *8c* Pav. 1. c. 279 = M. latifolia.
myrtifolia, Ruiz Ac Pav. ex DC. Prod. viiL 102=»• dependens.
oblonga, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 280=M. Manglilla.
pellucida, Ruiz & Pav. 1. c.-M. pellncida.
venosissima, Ruiz & Pav. 1. c. 282=M. venosisiima.

CABANISIA, Klotzsch, ex Schlecht. in Abh. Natnrf. Ges. Halle, vi. (1862) 176-Eiohlionua, Knnth (Posted.).
graauana, Schlecht. 1. a = E. paradoxa.
Martiana, *Schlecht. l.c.-E.* paniculate.

CA JMBA, Aubl. PL Gni. i. 821. t. 124 (1775).
MMPHAEACBAE, Benth. & Hook. f. i. 46.
NECTRIS, Schreb. Gen. i. 237 (1789).
VILLARSIA, Neck. Elem. ii. 110 (1790).
aquata, Mea.
Jaffa, DC. Syst. ii. 36=caroliniana.
A'rnletii, Michx. Fl. Bor. Am. L 206-caroliniana.
pg. in Anal. Soc. Cient. Argent..* (1880)
caroilmana(A Gmyt v Ann Lye N Ytrit iy lg48^ *».—Am. bor.
™e»ta, *Sckult.f. Syst.* vii. 1879—Bras.
peltata, F. Muell. Native Pl. Viet. 15 = Brasenia peltata.
piauhiensis, *Gardn. in Hook. Ic. Pl.* vii. t. 641.—Bras.
Schult. f. Syst. vii. 1879-caroliniana.
Bras. 142.—

CABRALEA, Al Juss Miln Mus Par xix (1830)
1.16. *MELIACEAE,* Benth. & Hook. f. i 3 3.
A. Juss. 1. c. 230=polytricha.
Dc in Mart Fl Bras wi—
Bras.
8er"ia. *Saldanha, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xix. (1874) 21O.-Bras.
<-lausseniana, C. Z)C. tn Jfart. *Fl. Bras.* xi. I. 173.—Bras.
eoreovadensis, *C. DC. 1. c.* 177.—Bras.
rellensis, *C DC l.* 171.—Bras.
^™m»na, C. *DC. 1. c.* 174,-Bras.
«adichaudiii C. *bc'l. c.* 172.—Bras.
Glazoviia, *A. Juss. in Mini. Mus* Par.* xix. (1880) Bras.—Bras.
C DC. in Mart. Fl. Bras, xi I.•172.—Bras.
Utera, *Casar. Decad. Nov. SHrp.Bras.* u. 22.—
Jussia canai c. Z)C. *in Mart. Fl. Bras.* xL I. 171.—Bras.
lacvis, C. *DC. I. c.* 176. t 58.—Bras.
lagc jnsU, C. DC. /. *c.* 178.—Bras.
Lanai, *C. C. l. c.* 180.—Bras.
macroph iu, *C. DC. I. c.* 174—Bras.
montana, *C. DC. I.* c.-Bras.
"'•lHjuga, *C. DC. 1. c.* 175,-Bras.
"Wongiflora, *C. DC. I. c.* 180.—Bras.
oligotricha A J088 m Mem Mua Pllr xix. (1830) 230=polyt|ichra.
pallescens, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 175. t. 52.—Bras.
^ culata C. *DC. I. c.* 172.-Bras.
:ODC.l.c.m.-&ra.
*PPigu, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 471.—Am. trop.
polytr ia, *A. Juss. in Mém.* Mus Par x. (1830) 230.—Bras.
Richardiana, C. Z>C. >» *Mart. Fl. Bras.* xi. 1.176.—Bras. (vel Cuba).
Riedelii, *C. L* C./.,.180.-BrM.
rubiginosa, C. *DC. 1. c.* 179,-Bras.
Selloi, *C. DC. l. c.* 176.—Bras.
silvatica, *C. DC. l.* f. 1 3.—Bras.
sulcata, C
tomentosa, Z)C. /. ,. 171.-Bras.
polytricha Casar. Decad. Nov. Stirp. Bras. ii. 22a
Warmingiana i c> *DC. in Mart_m_Bras_xi* *. 178 ~
Bras.

CABRERA, Ls Gen rt Sp Nov 5 (1816)= Paspalum, Lin n. (Gramin)·
chrysoblephar is, Lag. 1. c.-P. exasperatum.

CACABUS, Bemh >" Linnaea, xiii (1889) 860.
SOLANACEAE, Benth. & Hook. *i.* ii 896.
DICTY CALYX, Hook„ f„ „ Trani Linn. s. oc. xx. (184?) 202.
STREPTOSTIGMA, Regel, Gartenll. (1858) 822. t. 68.
'HIHOGETON, Benth. Bot. Voy. Sulph. 142 (1844).

CACABT78:—
inflatus, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. II. iv. (1849) 255.—Peruv.
maritimus, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 887.—N". Granat
mexicanns, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-88) 127.—Mexic.
nolanoides, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. II. iv. (1849) 255.—Peruv.
piostratus, *Bernh. in Linnaea,* xiii. (1839) 860.—Peruv.

CACALIA, Linn. Sp. PL 884 (1758)-8eneeio, Toum. (Compos.).
abyssinica, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 - S. abyssinicus.
abyssinica, Walp. Ann. ii. 908—S. tuberosus.
acaulis. Linn. f. Suppl. 364 - S. acaulis, *Sch. Bip.*
acerifolia, Siebold, ex Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. xix. (1874) 487, nomen.—Japon.
acetosellaefolia, Jacq. ex Steud. Norn. ed. II. ii. 248 = S. articulatus.
aconitifolia, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 87-S. acomtifolius.
aconitifolia, Miq. ex Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. xix. (1874) 487 = S. adenostyloides.
acuminata, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) I. 215 *(= Mulg*dium hast at urn)* ^
adenostyloides, French. & Sav. ex Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 486 - S. adenostyloides.
albida, Cass. ex Schur, Enum. Pl. Transs. 801 » Aden.ostyles alba.
albifront. Linn. f. Suppl. 368=Adenostyles alba.
Alliariae, Gouan, lllustr. 65=Adenostyles alba.
alliariaefolia, Lam. Encyc. i. 582 - Adenostyles viridis.
alliariaefolia, Poir. Voy. Barb, ii 235 = Petasites fragrans.
alpina, Linn. Sp. Pl. 886= Adenostyles viridis.
alpina, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = Adenostyles alba.
amplifolia, DC. Prod. vi. 328=S. amplifolius.
angulata, Vahl, Symb. Bot. iii. 92 = Emilia angulata.
angulata. Veil. Fl. Flnm. 836; viii. t. 56-Mikania. cordifolia.
angulosa, Wall. Cat. n. 3152-Gynura angolosa.
angustifolia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 159=S. Humboldtianus.
angustifolia, Wall. Cat. n. 8163 = Emilia prenanthoidea.
Anteupkoroium, Lion. Sp. Pl. 834=S. Antenphorbinm.
appendiculata, Linn. f. Suppl. 352 a S. popnlifoliua.
arborea, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 163 O *Psacaliutn arboreum).*—Am. austr.
arbuscula, Thnnb. Prod. Pl. Cap. 142 - Othonna arbuscula.
arenaria, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 165=S. sabulosus.
articularis, Salisb. Prod. 187=seq.
articulata, linn. f. Suppl. 364 = S. articulatus.
asarifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 243 = Fanjasia reticulata.
asclepiadea. Linn. f. SnppL 852-S. asclepiadens.
atriplicifolia. Linn. Sp. Pl. 885=S. atriplicifolius.
aurantiaca, Blume, Bijdr. 908=Gynura aurantiaca.
aurantiaca. Wall. Cat. n. 3146 = Gynura nepaleniis.
auriculaia, DC. Prod. vi. 329 = S. dahuricus.
baccharidifolia, Poepp. ex Phil. f. Cat. PL Vase. Chil. 156=S. baccharidifolifls.
Berlandieri, DC. Prod. vi. 328 - S. desertorum.
bicolor, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 412-Gynura bicolor.
bipinnata, Linn. f. Suppl. 353=S. bipinnatns.
bulbosa, Lour. FL Cochinch. 485 = Gynura ovalis.
cancellata, Rudolphi, in Ledeb. Diss. Pl. Doming. (1805) «S. cancellatus.
candicans, Poepp. ex DC. Prod. vi. 325=Culcitium Poeppigii
candicans, Vahl, Symb. Bot. iii. 91 - S. candicans.
canescens, Poepp. ex DC. Prod. vi. 414=S. Neaei.
canescens, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 427 *= S. Haworthii.
Calliariae, Gonan, lllustr. 66=Adenostyles alpina.
carnosa, Ait. Hort. Kew. iii. 16ft=S. elegans.
caucasica, Hoffm. Hort. Mosq. (1808) n. 598=S. platyphyllus.
cervariaefolia, DC. Prod. vi. 328-S. cervariaefolius.

CACALIA;—
chiapensis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 63 "Senecio cbiapensis.
anerarioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 166-S. Bonplandianus.
eirsiifolia, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 486=S. drsiifolius.
cissampelina, DC. Prod. vi. 381=S. dssampelinus.
citrina, Boj. ex DC. 1. c. 302-Emilia citrina.
Clematites, Poir. Encyc. Suppl. ii. 4 - Fanjasia flexuosa.
coccinea, Sims, Bot. Mag. t. 664 = Emilia flaminea.
cordata, Veil. Fl. Flum. 336; viii. t 68=Mikania cordifolia.
Cor-Jesu, VelL 1. c 340; viii. t. 71 = Mikania officinalis.
cordifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 168. t. 360 ^ S. cardiopbyllus.
cordifolia, Linn. f. Suppl. 351=Mikania cordifolia.
cordiformis. Lam. Fl. Fr. ii 75«Adenostyles alpina.
crassissima, Wall. Cat. n. 3155=Notonia crassissima.
crenata. Veil. Fl. Flum. 885; viii. t. 61.—Bras.
cuneifolia, Linn. Moot L 110=S. cuneifolius.
Cusimbua, D. Don, Prod. Fl. Nep. 179 = Gynura angulosa.
cuspidata, Bertol. Fl. Guatimal. 32=S. guatimalensii.
cuspidata, Klatt, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xviii. (1873) 374.—Ins. Borbon.
cylindrica, Lam. Encyc. i. 629-Othonna cylindrica.
cylindriflora, Wall. Cat n. 8150—Gynura sarmentosa.
decomposita, A. Gray, Pl. Wright, ii. 99=S. Grayanus.
decurrens, Veil. Fl. Flum. 340; viii. t. 72 = Baccharis genistelloides.
delphiniifolia, Sieb. & Zucc. in Abh. Acad. Muench. iv. III. (1846) 190-S. Zuccarinii.
denticulata, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 29-S. denticulatus.
dichroa, Boug. Nov. Comp. Bras. 40. t. *J* = S. dichrous.
discolor, Griseb. Cat. Pl. Cub. 157=S. discolor.
disticha, Heyne, ex DC. Prod. v. 384 = Conyza Wallichii.
diversifolia, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii 436-S. floridanus.
dukis, Salisb. Prod. 187=S. ficoides.
echinata, Linn. f. SuppL 853=S. echinatus.
elata, Spreng.ex DC. Prod, vi 314 - S. Ligularia.
emarginata, Veil. Fl. Flum. 336; viii. t 52.—Bras.
farfaraefolia, Sieb. & Zucc. in Abh. Acad. Muench. iv. in. (1846) 190=S. farfanefolius.
ficoides, Linn. Sp. Pl. 884 - S. ficoides.
fimbrillifera, Cass. in Diet. Sc Nat. xlviii. 460=S. deltoideus.
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 3162=Gynura sarmentosa.
flexuosa, Wall. Cat. n. 3160=Fanjasia flexuosa.
flexuosa, Willd. ex DC. Prod. vii. 6» > Trixis divaricata.
floridana, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1888) 52 =S.floridanus.
foetens, Wall. Cat. n. 3156 = Gynura nepalensis.
frutescens, Veil. Fl. Flum.. 838; viii t. 64.—Bras.
gigantea, Nees, Del. Sem. Hort Vrat. (1841) 8-=S. atriplicifolius.
glabra, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1620) 16=S. Sflgittatus.
glabra, Heyne, in Wall. Cat n. 3145-Emilia soncbifolia.
glabra. Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 2 = Adenostyles alpina.
glabra, Vill. Prosp. 30=Adenostyles viridis.
glabrata, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 161 (-*Psacaliutn glabratum).*—Am. trop.
glandulosa, Salisb. Prod. 187 = Poropbyllum rude. rale.
glauca, Salisb. 1. c = S. succnlentus, *Sch. Bip.*
gradliflora. Wall. Cat. n. 8149=S. graciliflorus.
gradlis, Boj. ex DC. Prod. vi. 302-Emilia gracilis.
grandiflora. Wall. Cat. n. 8147 -= Notonia grandiflora.
hastata. Linn. Sp. PI. 835=S. aagittatus.
Haworthii, Sweet, in Loud. Hort Brit. 336 = S. Haworthii
heterogama, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (185?) 107=S. heterogamus.
heterophylla, Poepp. ex DC. Prod, vi 414-S. pilquensis.

CACALIA:—
hieraeioides, Willd. Sp. PI. iil. 1781 » Gynura auriculata.
kirsuta, Vill. Prosp. 31 = Adenortyles alba.
humifusa, Boj. ex DC. Prod. vi. 302 - Emilia hnmifbsa.
humilis, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 166 = Senecio humilis.
hybrida, Steud. Norn. ed. II. i. 244 = Adenostyles alpina, etc.
iatrophoides, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 169=S jatrophoides.
ilicifolia, H. B. ft K. 1. c. 168=S. screbicnrius.
incana, Bosc, ex DC. Prod. vi. 380= S. Boseianius.
ineana, Linn. Sp. PI. ed. II. 1169 = Gynura nitida.
indica. Lam. Encyc. i. 680.—Ind. or.
involucrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 166=S. involucratus.
Kleinia,]. Grah. Cat. Bomb. PI. 88 =Notoniabalsamica.
Kleinia, Herb. Madr. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 176 =Notonia grandiflora.
Kleinia, Linn. Sp. PI. 834=S. Kleinia.
Kleiniana, Hill, Veg. Syst. iii. 144=praec.
Urinioides, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 164 (=» *Psacalium kleinioides).*—Am. trop.
laciniata, Jacq. Ic. Rar. 1.1 68—S. articulatus.
laciniata, Wall. Cat. n. 8163 = Gynura lycopersicifolia.
laeta. Veil. Fl. Flum. 341; viii. t. 76.—Bras.
lanata, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. 162=S. lanatus.
lanceolata, Nutt. Gen. Am. ii. 138=S. Boscianus.
laurifolia, Linn. f. Suppl. 351 —Mikania laurifolia.
ledifolia, H. & ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 162=S. ledifolius.
leucopappa, DC. Prod. vi. 330 «=S. leucopappua.
leucophylla, Willd. Sp. PI. iii. 1736 = Adenostyles candidissima.
Linaria, Cav. Ic. iii. 29. t. 257 = Porophyllum Linaria.
linearis, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 86.1.178-= Bedfordia linearis.
linifolia, Heyne, ex DC. Prod. v. 25 = Vemonia anerea.
linifolia, Linn. Mant. 109 = Porophyllum linifolium.
lobaia, Moris, in Flora, xv. (1832) Lit. ii. 79.—Chili.
longifolia, Haw. R«v. PI. Succ. 183=S. pugioniformis.
lutea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 10.—Ins. S. Helena.
Lyeopersicum, Heyne, ex DC. Prod. vi. 801 = Gynura Iycopersicifolia.
macrobhylla, Bieb. FL Taur. Cane ii. 286 •= S. platyphyllus.
macrophylla, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 351, nomen.—Hab. t
maculata, Buch.-Ham. ex Steud. Nom. ed. II. i. 244 — Gynura sinnata.
Itentrasto, Veil. Fl. Flum. 839; viii. t. 69-Ageratum conyzoides.
mikaniaefolia, DC. Prod. vi. 828=S. mikaniaefolia.
mucronata, Heyne, in Wall. Cat. n. 3161 = Emilia flammea.
multiflora, AucL ex Walp. Rep. vi. 266-S. multifloras.
napeatfolia, DC. Prod. vi. 828 - S . napeaefolius.
napMifolia, S. Schau. in Linnaea, xix. (1847) 782=S. napellifolius.
Nardosmia, A. Gray, in Proc Am. Acad. vii. (1868) 361 = Cacaliopsis Nardosmia.
nepalensis, Spreng. ex DC. Prod. vi. 800 = Gynura nepalensis.
nipponica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 181.—Japon.
nitida, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 162 = S. nitidus.
nitida, Veil. Fl. Flum. 337; viii. t. 59.—Bras.
nivea, Kunze, ex DC. Prod. vi. 825 - Cnlcitinm Poepj ' ii.
*obsoleta^* 'ell. Fl. flum. 887; viii. t. 57 - Mikania biformis.
odora, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 146 *=S. odorus.
odorata, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 165, 400 = S. odoratus.
oligocephala, Scheele, in Linnaea, xviii. (1844) 480.—Hab. ?
oppositifolia, Pair. Encyc SnppL ii. 7 = Porophyllum oppositifolium.
ovalifolia, Salisb. Prod. 186 «=S. Anteuphoibium.

CACALIA :—
ovalis, Ker-Gawl. in Bot. Reg. 1.101 - Gynura pseudochina.
ovata, Walt Fl. Carol. 196-Senecio Walterit
packyphylla, Sch. Bip. ex Seem. Bot. Voy. Herald, 810 =S. sclerophyllus.
paniculata, Rafin. Ann. Nat (1820) 14=S. Nuttallii.
papillaris, Linn. Sp. PI. 834 = S. papillaris.
parasitica, Sch. Bip. ex HemsL Biol. Centr. Am. Bot. ii. 244 = S. parasiticus.
patens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 164=S. patens.
pedunculata, VelL FL Flum. 839; viii. t. 68.—Bras.
peltata, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 170. t. 361 = S. peltiferus.
pendula, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 145=S. pendulus.
penduliflora, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 53 - S. subpeltatus, *Srh. Bip.*
psnicillata, Cass. in Diet Sc. Nat. xlvïù 460=S. penicillatus.
Petasites, Lam. Encyc. i. 681 = Adenostyles alba.
peucedanifolia, Jacq. Coll. Suppl. 149 = S. panicnlatus.
pilosa, Veil. Fl. Flum. 838; viii. t 61 = Mikania cordifolia.
pinnata, Willd. Enum. Hort Berol. 850 = S. Othonnae.
pinnatifida, Berg. Desc. PI. Cap. 230 - S. pinnatifidus.
pinnatifida, Linn. Mant. ii. 281=S. bipinnatus.
pinnatifida, Lour. Fl. Cochinch. ii. 486 •= Gynura pinnatifida.
pinnatifida, Wight, ex DC. Prod. vi. 301-Gynura lycopersidfolia.
Porophyllum, Linn. Sp. PI. 884=Porophyllum ru. derale.
praestans, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 384, sphalm. = Trixis mollissiraa.
prenanthoides, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 167 - S. albiflorus.
prenanthoides, Sieber, ex DC. Prod. vi. 302 - Emilia sonchifolia.
procumbent, Lour. Fl. Cochinch. ii. 485—Gynura sarmentosa.
Pteranthus, Rafin. Ann. Nat (1820) 14 = S. Nuttallii.
pubescens, Rafin. Fl. Ludov. 01= Eupatorium ludovicianum.
pugioniformis, Salzm. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 510 = S. pugioniformis.
pulchella, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 160 = S. pnlchellus.
pumila, Boj. ex DC. Prod. vi. 302 = Emilia pumila.
punctulata, Veil. Fl. Flum. 389 ; viii. t. 66.—Bras.
pungens, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 160=S. pungens.
purpuraseens, Wall. Cat. n. 3157 = Gynura purpurascens.
quinqueloba, Thunb. Prod. PI. Cap. 142 — S. qninquelobus.
raeemosa, DC. Prod. vi. 330=S. exsertus.
racemosa, Sch. Bip. ex HemsL BioL Centr. Am. Bot. ii. 241=S. helodes.
radicans, Linn. f. Suppl. 354=S. radicans.
radulaefolia, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 169=S. iadulaefolins.
ramosa, Spreng. ex DC. Prod. vi. 868 = S. trilignlatus.
reclinata, Roxb. Hort Beng. 101; Fl. Ind. iii. 412.—Ins. Molucc.
reclinata. Wall. Cat. n. 3151= Gynura sarmentosa.
regia, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. HI. 384, sphalm. = Trixis divaricata.
reniformis. Lam. Fl. Fr. ii. 75—Adenostyles viridis.
reniformis, MuhL in Willd. Sp. PL iii. 1736 - S. Muehlenbergii.
repens, Linn. Mant 110»S. lucculenrus.
reticulata, Vahl, Symb. Bot iii. 91 = Faujasia reticulata.
reticulata, Veil. Fl. Flum. 837 ; viii. t. 60.—Bras.
rhombifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 850 - S. platyphyllus.
rigida, Thunb. Prod. PI. Cap. 142=& spinescens.
Ros-marinus, Veil. FL Flum. 839; viii. t 67.—Bras.
rotundifolia, Willd. Phyt. 11. t. 6. f. 1 = Vemonia cinerea.
ruderalis, Sw. Prod. Veg.Ind. Occ. 110 •• Porophyllum roderale.

CACALIA :—
runcinata, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 168« Senecio roseus.
runcinata, Lam. Encyc. i. 529-S. articulatus.
sagittaria, Heyne, in Wall. Cat. n. 8169 = Gynura pseudochina.
sagittata, Vahl, Symb. Bot. iii. 91 = Emilia flammea.
sagittifolia, Mertens, in Linnaea, v. (1830) 63, nomen. —Ins. Koragin.
salicina, Labill. Nov. Holl. PL ii. 37.1.179=Bedfordia salicina.
sarmentosa, Blume, Bijdr. 907 = Gynura sarmentosa.
sarmentosa, Lesch. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 352' S. candicans.
Sarracenia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 618 - Gynura angulosa.
sarracenica, Linn. Sp. PI. ed. II. 1169 = S. Cacaliaster.
scabra, Vahl, Symb. Bot. iii. 92 = Trixis brasiliensis.
scandens, Ait. Hort Kew. iii. 157.—Afr. austr.
.scandens, Thunb. Prod. PI. Cap. 142 = S. deltoideus.
scandens, Zeyh. ex DC. Prod. vi. 404 = S. volubilis.
Schaffneri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 53.—Mexic.
sempervirens, Spreng. ex DC. Prod. vi. 442 - Notonia grandiflora.
sempervirens, Vahl, Symb. Bot. iii. 92 = S. sempervivus.
semperviva, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 146-S. sempervivu.<.
senedoides, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 168 -* S. assuayensis.
septemnata, Veil. Fl. Flum. 838; viii. t. 63.—Bras.
sessili/olia. Hook, ft Arn. Bot Beech. Voy. 436 •= 5. sessilifolius.
sessilis, Veil. Fl. Flum. 341; viii. t. 73 - Baccharis articulate.
sinuata, Cerv. in La Llave ft Lex. Nov. Veg. Desc fasc. i. 25 = S. albo-lulesccns.
sonchifolia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxix = Emili* angulata.
sonchifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 244" Emilia sagittata.
sonchifolia, Linn. Sp. PI. 885 = Emilia sonchifolia.
sonchifolia, Wall. Cat. n. 3144 D - Lactuca remoriflora.
spathulata, Moc. & Sesse, ex D. Don, in Trans. Linn-Soc. xvi. (1830) 250 = Chaptalia spathulata.
suaveolens, Linn. Sp. PL 835 = S. suaveolens.
suffruticosa, Linn. Mant. i. 109 = Porophyllnm li»>* folium.
tabularis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 82 = S. tabularis.
tenuissima, Boj. in Rapp. Soc. Maur. vi. 27 = Emili* gracilis.
tares, Wall. Cat. n. 3164 = Emilia prenanthoidea.
teretifolia, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 169 * S. teretifolius.
terminalis, Salisb. Prod. 187 = S. Kleinia.
ternata, Veil. Fl. Flum. 336; viii. t. 66=Mikania apiifolia.
thyrsoidea, Spreng. ex DC. Prod. vi. 368-S. alatus.
toluccana, DC. Prod. vi. 328=a callosus.
tomentosa, Eckl. ex DC. 1. c. 403 = S. scaposus.
tomentosa, Haw. Misc. 189=S. Haworthii.
tomentosa, Jacq. Fl. Austr. iii. 20 = Adenostyles alba.
tomentosa, Linn. f. Suppl. 853—S. oliganthus.
tomentosa. Veil. Fl. Hum. 341; viii. t. 75.—Bras.
tomentosa, Vill. Prosp. 31 = Adenostyles candidissima.
triangularis, Veil. Fl. Flum. 388 ; viii. t. 62 = Mikania cordifolia.
trilobata, VelL 1. c. 836; viii. t. 64 = Mikania gl°-merata.
trinervia, Veil. 1. c. 338; viii. t. 65.—Bras.
triphylla, Veil. 1. c. 341; viii. t. 74.—Bras.
tuberosa, Bosc, ex DC. Prod. vii. 89 -= Krigia Dandelion.
tuberosa, Delile, in Ferr. ft Gall. Voy. Abyss, iii. I*[2] = S. tuberosus.
tuberosa, Nutt. Gen. Am. ii. 188 =S. Nuttallii!
tussilaginoides, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. I[68] =S. farfarus.
uniflora, Schum. ft Thoan. Beskr. Gain. PI. 882-Gynura cernua.
vacdnoides, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. »* *{=Psacalium vacdnoides).*—Am. trop.

CACALIA:-
nrbascifolia, Sibtb. Sc Sm. Fl. Graec ix. 36=Senecio thapsoides.
villosa, Jacq. Coll. ii. 847 = S. pmpureus.
mlhsa, Veil. Fl. Flnm. 337; viii. t. 68.—Bias.
nolubilis, Blume, Bijdr. 903 - S. araneosus.
voluhilis, Buch.-Ham. ex DC. Prod. vi. 870 - S. Bmmalia.
Wightiana, Wall, ex DC. Prod. vi. 870-S. scandeus.

CA /?^I[IOPSI8, A. Grav> m-Pro«, An>. Acad. *«• (1883)50. *COMPOSITAE.*
Nardosmia, *A. Gray, I. c*—Am. bor. occ
CACAO. Tonm. ex Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1752) = Theobroma, Linn. (SterculiacA
Ineolor, Poir. Encyc Suppl. ii. 7=T. bicolor.
gutanensis, Aubl. PI. Gui. ii. 683=T. Cacao.
"»»<w, Gaertn. Fruct. ii. 190 = T. Cacao.
«*na, Aubl. PI. Gni. ii. 689=T. Cacao.
W r, sAnbl. 1. c. 687 = Genipa Merianae.
Theobroma, Tussac, Fl. Med. Ant t. 18-T. Cacao.

CACAO MA? A> Ruln Pl>- ex Thou, in Diet. Sc. Nat. vi. 35 11805) = Pachyrhizua, Rich. (Legumin.).

CACATALT, Adans. Fam. ii. 213 (l7"68)=Pedalium, R«yen (Pedalin.).

CACCINIA, Savi, Cose Bot 1. t. 1 (1832). *BORAGINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 846.
ANiSANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1836).
Actinobole, *Bunge, Helioc.* 8.-Persia.
Celsii, Boiss. Diagi. Ser. I. xi. 133=glauca.
dubia, Bunge, Lehm. Rel. (1847) 242.—As. centr.
S'auca, *Savi, Cose Bet.* 1. t. 1. f. 1-6 (1882).—Persia; Beluchist
£°tschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. Si—Persia.
peluwolfii, A. DC. in DC. Prod. x. 167 = Russellii.
Ka M.ol \C-Koch»» *Linnaea,* xvii. (1843) 803.—As.
Kusc llu, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi 134.—Syria.
strigos., Boiss.J. f.-Persia.

CACHRIS, D. Dietr. Syn. Pl. i. 586 (1839) = Cachrys, Tourn. (Umbellif.).

CACHRYDIUM, Link, Handb. 83[9] (1829) = Hippomarathrum, Link (Umbellif.).
Libanotis, Link, Handb. i. 339 = H. Libanotis.

CACH (1737), *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 904.
ab wm.fa, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. S33 "iplolophium africanum.
««/«*, DC. Prod. iv. 238 = Prangos Szovitzii.
ala offm Vmi >- >• 17«; Bwb- *l Taur. Cane. i.
alni 17 = Pran g°s ferelacea.
SP*1 A>A Tauria.
amygua, Salsm. ex DC. Prod, iv. 241-Magydaris panacina.
anat ntz. Ind. Ic. 179 = ?
anisa Ledeb. m Ei011*- Cas P- 6. t. 9 - Hippomarathrum crispum.
ath oma'"*<M<fes, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 217 = ua athamanthoides.
calliosperma, Pall. Reise, iii. 663=odontalgica.
cheilanth Holia, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 936.—Persia,
cretica, Lam. Encyc. i. 259 = Lecokia cretica.
crispa, rtm. Syn. i. 811 = Hippomarathrum crispum.
crispata, mei, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 151.—Algeria.
cristata, C. Prod. iv. 238 = Hippomarathrum cristatum.
cylindracea, GuMp DC L c. 289 = Prangos cylindracea, Hmm Hot Hm .i. 98o Adi
decursiva, Siler caucasicum.
di Oma> Spreng- PL Umb. Prod. 21 = Capnophyllum uicnotomum.
didyma, Regel, Act. Hort. *Petrop.* v. (1877) 601.—Turkestan.
echinophora, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 347 = Hippomarathrum cristatum.
eriantha, DC. Prod. iy. 288-Persi..
goniocarp S' *"'«• Ofa^n. Ser. I. x. 53.—Syria.
Herderi, Act. HoTt. *Petrop-* v (1877) 601.—
TW t
* "Nicest.
"». ««•<»;. *Disouisit. de PI. Nov.* 6.—Hab. I

CACHRYS:—
humilis, Schousb. Vextr. Marokko, 133.—Marocco.
hungarica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = Magydaris panacina.
involucrata, Pall, ex Willd. fide Roem. *Sc* Schnlt. Syst. vi. 447 = Polylophinm orientale.
Korolkowi, *Regel tf Sehtnalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 6O2.-Turkestan.
laevigata, Bronss. ex Ball, in Journ. Lina Soc xvi. (1878) 468-= Hippomarathrum cristatum.
laevigata. *Lam. Encyc.* i. 256.—Lusitan.
lanata, Hort. ex Stend. Norn. ed. II. L 246 =. Magydaris panacina, tomentosa.
latifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 219=Siler caucasienm.
Libanotis, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. iv. 845 = odontalgica.
Libanotis, Gouan, Illustr. 12 = laevigata.
Libanotis, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 358=Prangos fernlacea.
Libanotis, Linn. Sp. PI. 346 » Hippomarathmm Libanotis.
Libanotis, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 463=Hippomarathrnm cristatum.
Linearia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4«Hippomarathrum Libanotis.
littoralis, Spreng. Umbell. Prod. iv. 20= Daucus bessarabicus.
langiloba, DC. Prod. iv. 237 - Hippomarathrum crispum.
macrocarpa, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 364.—Sibir. altaic.
maritima, Spreng. in Ges. Naturf. FT. BerL Mag. vi. (1812) 259 = Crithmnm maritimum.
microcarpa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 218 = Hippomarathrum crispum.
Morisoni, All. Auctuar. Fl. Pedem. 23=laevigata.
nudicaulis, Godet, ex DC. Prod. iv. 237-Hippomarathrum crispum.
odontalgica, *Pall. Reise,* iii 720.—Reg. Cancas.; Sibir.
pdnacifolia, Vahl, Symb. Bot. i, 26 = Magydaris panacina.
panax-siculum, Ucria, in Roem. Arch. i. 68 = Magydaris tomentosa.
papillaris, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ii. (1844) 75.—Mesopotam.
pastinacea, Lam. Encyc. i. 260=Magydaris panacina.
peregrina, Spreng. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 259 = Capnophyllum dichotomum.
pencedanoWes,Z>«/. *Fl. Atlant.* i. 250.—Afr. bor.
prangoides, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. ii, (1844) 76.—Persia.
pterochlaena, DC. Prod. iv. 237 = Hippomarathrnm ptetochlaennm.
pungens, Jan, ex Guss. Fl. Sic. Prod. i. App. 7 = Hippomarathrum cristatum.
seseloides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 217 = Rumia seseloides.
sibirica, Steph. ex Fisch. in Cat. Sem. Hort. Petrop. (1823) =Phloidicarpos dahuricus.
sibirica, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 331 = Phloidicarpos villosus,
sicula, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 357-Hippomarathrum crispum.
sicula, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 359 -Hippomarathrum crislatum.
sicula, Linn. Sp. PI. ed. II. 355= Hippomarathrum pterochlaenum.
sicula, Urv. in Mém. Soc Linn. Par. i. (1822) 287 - Hippomarathrum Bocconi.
sphaerocarpa, Tenon, ?tod. Fl.Nap. xix.; Syn. 120= Hippomarathrum Libanotis.
taurica, Willd. Sp. PI. i. 1410=Rumia taurica.
tomentosa, Desf. Fl. Atlant i. 249=Magydaris tomentosa.
tortuosa, Webb & Berth. Phyt Canar. iii. 281 = Ferula tomentosa.
trifida. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1=laevigata.
triquetra, Spreng, in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 2SS» = Prangos triquetra.
vaginata, Ledeb. Fl. Alt. i. 866 - Hippomarathrum vaginatum.

CACHYRIS, Zumag. Fl. Pedem. i. 89, 425 (1849) = praec.

CACONAPEA, Cham, in Linnaea, viii. (18SS) 28 = Herpestis, Gaertn. (Serophularin.).
gratioloides, Cham. 1. c. 29 - H. gratioloides.

CACONOBEA, Warp. Rep. iii. 281 (1845)=praec

CACOSMANTHUS ,Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 1040 (1856)-KAKOSMANTHUS, Hassk. = Payena, Linn. (Sapotac).

CACOSMIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 289. t. 404 (1820). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 396.
CLAISVILLEA, DC. Prod. v. 636 (1836).
XANTHOLEPIS, Willd. ex Less, in Linnaea, iv. (1829) 338.
quinquenervia, Steud. Nom. ed. II. i. 377, in syn.=ieq.
rugosa, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 289.—Peruv.

CACOTANIS, Rafin. New Fl. Am. ii. 43 (1886)-EoUpta, Linn.! (Compos.).
ciliata, Rafin. 1. c 44.—Am. bor.

CACOtXCIA, Aubl. PI. Gui. i. 450. t. 179 (1775). *COMBRETACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 688.
HAMBERGERA, Scop. Introd. 106 (.1777).
SCHOUSBOBA, Willd. Sp. PL ii. 578 (1799).
bracteata, *Laws, in Oliver, Ft. Trap. Afr.* ii. 434.—Afr. trop.
chinensis, *A. Juss. ex DC. Prod.* iii. 22.—China,
coccinea, *Aubl. PI. Gui.* i. 450. t. 179.—Guiana,
cordifolia, *Walp. Rep.* ii. 68.—Afr. trop.
exannulata, *O. Hofftn. in Linnaea,* xliii. (1880-82) 182.—Afr. trop.
lucida, Hassk. in Flora, xxvii. (1844) II. 607 = Combretum trifoliatum.
paoiculata, *Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 484.—Afr. trop.
platyptera, *Welw. in Trans. Linn. Soe.* xxvii. (1869) 24.—Afr. trap.
trifoliata, DC. Prod. iii. 22=Combretnm trifoliatum.
velutina, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 2.—Afr. trop.
villosa, *Lams, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 438.—Afr. trop.

CACTUS, Linn. Syst. ed. I (1735) - *CACTEAE,* Benth. & Hook. f. Gen. i. 1008.
abnormis, Willd. Enum. Hort BeroL Suppl. 31 = Cereus peruvianus.
Actermanni, Haw. in Bot. Reg. t. 1881=Phyllocactus Ackermanni.
aculeatissimus, Zeyh. ex Steud. Nom. ed. I. 181 (quid ?).
alatus, Hook. Bot. Mag. t. 2820=Rhipsalis pachyptera.
alatus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 77 = Rhipsalis Swartziana.
alatus, Willd. Enum. Hort. Berol. SuppL 86 = Phyllocactus phyllanthoides.
albisetosus, Haw. ex Spreng. Syst. ii. 496=Cereus albisetosus.
albisetus, Steud. Nom. ed. II. i, 245=praec.
ambiguus, Bonpl. Jard. Malm, t 36=Cereus ambiguus.
ambiguus. Gill. exLoud. Hort. Brit. 194 - Mammillaria ambigua.
americanus, Vitm. Summa PI. iii. 209 (quid *V).*
aniiogonus, Hort. Angl. ex Foerst. Handb. Cact ed. II. i. 764=Cereus triangnlaris.
arboreus, VelL Fl. Flum. 207; v. t. 28-Opnntia arborea.
aurantiaca, Gill, ex I^ond. Hort. Brit. Suppl. ii. 652-Opuntia aurantiaca.
aurantiiformis, Thiery, ex Steud. Nom. ed. 1.131; ed. II. i. 245 (quid?).
aureus, Meyen, Reise. i. 447 = Echinocactus anreus.
bicolor, Berland. ex Engelm. Cact. Mex. Bound. 21 = Echinocactus uncinatus.
Bleo, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 69 = Pereskia Blco.
Bleo, Ton. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 202-Opuntia arborescens.
bolitrianus, Lem. Cact. 88.—Bolivia.
Banplandii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 69 - Opuntia Tuna.
bradypus, Lehm. Ind. Sent. Hort Harab. (1826) 17-Ccreus senilis.
brasiliensis, Willd. Enum. Hort. Berol. SuppL 38-Opuntia brasiliensis.
bulbispinus, Lem. Cact. 88.—Hab. ?
californicus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. L 555 = Opuntia serpentina?

CACTUS :—
campechianus, Thiery, ex Steud. Nom. ed. I. 131; ed. II. i. 248 (quid I).
canescens, Moç. *8c* Sesse, ex DC. Prod. iii. 459 = Mammillaria lanifera.
caripensis, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. vi. 66 =Cereus caripensis.
cassythoides, Moc. *8c* Sesae, ex DC. Prod. iii. 478 = Rhipsalis Cassytha.
caudata, Gill, ex Loud. Hort. Brit. 194=Mammillaria caudata.
ekiloënsis, Colla, ex Steud. Nom. ed. II. i. 245 = Cereus chiloënsis.
chinensis, Roxb. Hort. Beng. [37] ; Fl. Ind. ii. 476 = Opuntia Dillenii.
chlorocarpus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 67 = Cereus chlorocarpus.
clavatus, Lem. Cact. 88 = Opuntia clavata, *Engelm.*
coccinellifer, Steud. Nom. ed. 1.131, vide cochenillifer.
coccineus, Gill, ex Loud. Hort. Brit. 194=Mammillaria coccinea.
cochenillifer, Linn. Sp. 71.468 = Nopalea coccinellifera.
cochenillifer, Moç. *8c Sesse, ex* DC. Prod. iii. 474 = Opnntia Hemandesii.
columnaris, Moç. *8c* Ses.se, ex DC. Prod. iii. 459 = Mammillaria acanthophlegma.
communis, Steud. Nom. ed. II. i. 245 — Melocactus communis.
compressus, Salisb. Prod. 348 = Opuntia vulgaris.
coquimbanus, Molina, Saggio Chile, 170 = Cereus eburneus.
cornigerus, Moç. *8c* Sesse, ex DC. Prod. iii. 461 = Echinocactus comigerus.
coronarius, Cav. Desc 490=Cerens cylindricue.
coronatus, Lam. Encyc. i. 537 = Melocactus communis.
coronatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Snppl. 30 = Mammillaria coronaria.
corrugatus, Gill, ex Loud. Hort. Brit. 194=Echinocactus corrugatns.
crispatus, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 462 = Echinocactus arrigens.
cruciformis, Veil. Fl. Flum. 207; v. t. 29 = Cereus cruciformis.
eurassavicus, Linn. Sp. PI. 469 — Opuntia curassavica.
curvispinus, Bert, in 'Merc. Chil. 1829.'—Cf. Bull. Férussac, xx. (1830) 108.—Chili.
cylindricus, James, Cat. 182=Opuntia arhorescens.
cylindricus, Lam. Encyc. i. 539 = Opuntia cylindriua.
cylindricus, Orteg. Hort Matr. 128. t. 16 = Mammillaria coronaria.
cylindricus, VelL Fl. Flum. 207; v. t. 31=Rhipsalis cylindrical.
decumanus, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 34 = Opuntia decumana.
depressus, DC. Cat. Hort. Monsp. 84 = Mammillaria discolor.
depressus, Haw. Syn. PI. Succ 173=Echinocactus depressus.
Dillenii, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 255 = Opuntia Dillenii.
divaricatus, Lam. Encyc. i. 540=Cereus divaricatns.
eburneus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 22-Cereus ebumeus.
eburneus, Salm. ex Spreng. Syst. ii. 494 = Cereus eburneus.
echinocarpus, Lem. Cact. 88.—Hab. ?
elatior, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 34 = Opuntia elatior.
elegans. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 25 = Phyllocactus phyllanthoides.
elongatus, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 84 = Opuntia decumana ≤
Emoryi, Lem. Cact. 88-Cereus Emoryi.
ensiformis, *Biden, in Card. Chron.* xx. (1883) 53.—Hab.?
Epidendrum, Linn. Amoen. Acad. viii. 257 = Rhipsalis undulata?
erinaceus, Haw. Suppl. 74 => Cerens erinaceus.
euphorbioides, Spreng. Syst ii. 496=Cereus euphorbioides.
fascicularis, Meyen, Reise, L 447 = Echinocactus fascicularis.
fasciculatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 33 = Rhipsalis fasciculate.
/wo,* Nutt. Gen. Am. i. 296—Opuntia missouriensis.
ferox, Willd. Enum. Hort. Berol. Snppl. 85 - Opuntia ferox.

CACTUS *x*—
Ficus, Thunb. Fl. Jap. 198-=seq.
Ficus-indica, Linn. Sp. PI. 468—Opuntia Ficus-indica, decumana.
fimbriatus, Desc. Fl. Antill. vi. 160=Cereus Swartzii.
fimbriatus, Lam. Encyc. i. 539 = Cereus fimbriatus.
fimbriatus, Moç, & Sesse, ex DC. Prod. iii. 475 = Pereskia lychnidiflora.
flagelliformis, Linn. Sp. PI. 467=Cereus flagelliformis.
fiavescens, DC. Cat. Hort. Monsp. 83 = Mammillaria jlavescens.
flavispinus, Colla, Hort. Rip. 24 —=Cereus flavispinus.
foliosus, Gill, ex Loud. Hort. Brit. 194-Echinocactus foliosus.
foliosus, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 35 = Opnntia foliosa.
fragilis, Nutt. Gen. Am. i. 296 = Opuntia fragilis.
frutescens, Moç. & Sesse, ex Pfeiff. Enum. Diag. Cact 178 = Pereskia rotundifolia.
fulvispinosus, Spreng. Syst. ii. 497 = Cereus Royeni.
funalis, Spreng. 1. c. 479 = Rhipsalis funalis.
garipensis, Knnth, Syn. PI. Aeq. iii 370 —Cerens caripensis.
gibbosus, Haw. in Bot. Reg. t 137 = Echinocactus gibbosus.
glomeratus. Lam. Encyc. i. 257 — Mammillaria glomerata.
grandiflorus, Linn. Sp. PI. 467 = Cereus grandiflorns.
grandifolius. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 25 = Pereskia grandifolia.
Haworthii, Spreng. Syst. ii. 495 = Cereus Haworthii.
Helicteres, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 460 = Mammillaria Helicteres.
heptagonus, Linn. Sp. PI. 466=Cereus heptagonus.
heptagonus, Veil. Fl. Flnm. 205 ; v. t. 19.—Bras.
heterogonus, DC. Prod. iii. 470, sphalm.=praec
hexagonus, Lam. Encyc. i. 538 •= Melocactus monc-clonos.
hexagonus. Linn. Sp. PI. 466=Cereus hexagonus.
hexagonus,\e\\. Y\. Flum. 205 ; v. t 18.—Bras.
Histrix, Salm-Dyek, Obs. Bot. (1822) = Cereus Hystrix.
korridus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 70=Pereskia horrida.
horridus, Salisb. Prod. 348 = Opuntia Tuna.
Humboldtii, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 66 = Cereus Humboldtii.
humifusus, Rafin. Ann. Nat. (1820) 15 = Opuntia vulgaris.
humilis, Desf. ex Steud. Nom. ed. IL i. 246 = Opnntia vulgaris.
humilis. Haw. Misc. 187=Opuntia Tuna.
humilis. Lag. Gen. et Sp. Nov. 16 = Opnntia foliosa.
hybridus, Hort. Angl. ex P. C. Van Geel, Sert. Bot. iv. (1832) t 118.— Hab.?
hyptiacanthus, Lem. ex Steud. Nom. ed. II. L 246 = Echinocactus hyptiacanthus.
icosagonus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 67 = Cereus icosagonus.
imbricatus, Lem. Cact. 88.—Hab. 1
indicus, Roxb. Hort. Beng. [37] ; FL Ind. ii. [475] = Opuntia Dillenii.
intortus, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 2-Echinocactus intortus.
italicus, Tenore, ex Steud. Nom. ed. IL ii. 246 (quid ?).
Jamacaru, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iv. 1393 = Cereus Jamacaru.
Kageneckii, Gmel. ex Salm-Dyck, fide DC. Prod. iii. 463 = Cereus multangularis.
laetus, H. B. *8c* K. Nov. Genet Sp. vi. 68 = Cereus laetus.
Lamarkii, Colla, Hort. Ripul. App. iii. 15. t. 7 = Melocactus communis.
lanatus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 68-Cereus lanatus.
lanceolatus. Haw. Misc. 188 = Opuntia lanceolata.
Langsdorfii, Lehm. Ind. Sem. Hort Hamb. (1826) = Echinocactus Langsdorfii.
lanuginosus, Linn. Sp. PI. 467—Cereus repandus.
latispinus, Haw. in Phil. Mag. lxiii. (1824) 41 = Echinocactus latispinus.
Lecchii, Colla, Hort Ripul. App. iv. 6. t. 2=Cereus Lecchii.
Lemarii, Monvill: ex' Lem. Cact. Gen. 105' -Echinocactus Lemarii.
Linkii, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1827) 16 = Cereus Linkii.
lucidus, Salisb. Prod. 349 = Pereskia acnleata.
luteus, Thiery, ex Steud. Nom. ed. I. 132; ed. II. i. 246 (quid?).

CACTUS *s*—
lyratus, Veil. Fl. Flum. 205; v. t. 21 = Rhipsalis salicornoides.
macracantkus, Salm-Dyek, Obs. (1820) 1-Melocactus macracanthus.
magnimamma, Salm-Dyck, ex Steud. Nom. ed. II- 246 = Mammillaria magnimamma.
Mallisoni, Hort. ex Loud. Encyc PI. Suppl. i. 1202 = Cereus Smithii.
mammillaris, Linn. Sp. PI. 466 = Mammillaria simplex.
mammillaris, Nutt. Gen. Am. i. 295 = Mammillaria missourensis.
meiocactoides, Hoffmgg. Vera. Pfl. Nacb.tr. iii. 24 - Melocactus melocactoides.
Melocactus, Linn. Sp. PI. 466=Melocactus communis.
mensarum, Thiery, ex Steud. Nom. ed. 1.182; ed. II-i.246 (quid)).
meonacanthus, Lem. ex Steud. Nom. ed. II. i. 246» Echinocactus meonacanthus.
micranthus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 65 = Khipsalis micrantha.
microdasys, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1827) 1 =Opuntia microdasys.
microthete, Spreng. Syst. ii. 494 = Mammillaria parrl-mamma.
monacanthos, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 3S =» Opuntia monacantha.
moniliformis, Lam. Encyc i. 541=Cereus moniu-formis.
moniliformis, Linn. Sp. PI. 468=Opuntia monili-formis.
multangularis, M09. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 462= Echinocactus melocactiformis.
multangularis, Voigt, ex Steud. Nom. ed. I. 132=* Echinocactus recurvus.
multangularis, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 83 Cereus multangularis.
nanus, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 68-Cereus nanus.
nanus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 246=Opunti» vulgaris.
Napoleonis, Hort. ex Loud. Encyc. PI. Suppl. i. W —Cereus Napoleonis.
neglectus, Dehnhardt, Revist. Napol.i. III. 166 (=P«" reskiae sp.).
niger, Spreng. Syst. ii. 495 = Cereus niger.
nigricans, Haw. Misc. 187= Opuntia nigricans.
nobilis, Haw. Syn. PI. Succ. 174-Cereus reductus.
nobilis. Lam. Encyc i. 587 = Echinocactus intortus.
nobilis, Linn. Mant. 248 = Echinocactus recurvus.
nudus, M09. *8c* Sesse, ex DC. Prod. iii. 460 = Mammillaria nuda.
obvallatus, Moç. *8c* Sesse, ex DC. 1. c. 462-Echinocactus obvallatus.
octogonus, Page, ex Steud. Nom. ed. II. i. 246-Cereus hexagonus.
Opuntia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 414 = Nopals coccinellifera.
Opuntia, Guss. Fl. Sicul. Prod. 559 - Opuntia Fid*-indica.
Opuntia, Linn. Sp. PI. 468=Opuntia vulgaris.
opuntiaeflorus, Moç. *8c* Sesse, ex Pfeiff. Enum. Dis£-Cact. 178 = Pereskia opuntiaeflora.
Ottonis, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1827) 1 Echinocactus Ottonis.
ovatus, Gill, ex Loud. Hort. Brit. 195-Cereus ovatos.
ovoides, Lem. Cact. 88.—Hab. ?
oxypetalus, Moç. *8c* Sesse, ex DC. Prod. HI. 470* Phyllocactus latifrons.
paniculatus, 1 am. Encyc. i. 540 —Cereus pnniculatu!;-
paradoxus, Hornem. Hort. Hafn. ii. 448-Opunt" brasiliensis.
parasiticus, Lam. Encyc. i. 541 = Rhipsalis culata.
parasiticus, Unn. Syst. ed. X. 1054 -=Rhipsalis undnlata-
Parryi, Lem. Cact. 88—Hab. ?
parvifolius, Ehrh. ex F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn-ii. 416.—Hab. ?
parvispinus, Haw. Suppl. 73=Echinocactus par spinus.
pendulinus, Sieber, ex DC. Prod. iii. 476-Rhip Cassyta.
pendulus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 77=RMp Cassutha.
pentagonus, Linn. Sp. PI. 467 = Cereus pentagons.
pentagonus. Veil. Fl. Flum. 205; v. t. 22.—Bras.
Pentlaudi, Lem. Cact. 88.—Hab. ?

CACTUS:—
Peresiia, Linn. Sp. PI. 469 = PereskU acnleata.
pertvianus, DC. PI. Grasses, t. 58-Cereus haxagonus.
feruvianus, Linn. Sp. PI. 467 = Cereus peruvianus.
Peruvians, Willd. Jinum. Hort. Berol. Suppl. 32 = Kerens eburneus.
Phyllanthoides, DC. Hort. Monsp. 84=Phyllocactus phyllanthoides.
P...anthus, Linn. Sp. Pl. ... Fny...
Phllqnthus, Veil. Fl. Flnm. 208; v. t. 33.—Bra..
ntajaya, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 289 = Cereus tnangularis.
Pitajaya, Jacq. Emiro. PI. Carib. 23-Cereus variabilis.
r...utifarnvs, Lehm. Ind. Sen). Hort Hamb. (1826) 17— Melocactus placentiformis.
polyan... Sims, Bot. Mag. t. 2691-Opuntia polyantha.
Polygonus, Lam. Encyc. i. 539-Cereus polygonus.
Polymorphus, Gill, ex Loud. Hort. Brit. 195-Cereus Polymorphus.
Portulacaefolius, Linn. Sp. PL 469-Pereskia portulacaefolia.
Prisnatieus, Desf. Tabl. Hort Par. 165-Ceteus tnqueter.
Prismaticus, Willd. Enum Hort. Berol. Suppl. 82 = Kerens pentagonus, prismaticus.
Prefer, Willd. ex. Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 9 = Mammillaria parvimamma.
prolifer...ferus, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 6=Mammiltana prolifera.
pr...rtiformis, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. II. 192 = ^ereus proteiformis.
T??«*» Monvill. ex Steud. Norn. ed. II. i. 246- tchinocactus prninoBns.
P?dococcinillifer,* Bertol. 'Exc. 11 virid. (1824) 4'i ... Prod. ...» 473-Opuntia nigricans.
Ptovdomammillaris, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. IL 191 P...Mammillaria discolor.
7?...do;...»o, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 246- «udotuna.
£ ?...cer... Lem. Cact. 87—Hab. ?
p...ius, DC. Cat Hort,, Monsp,, 1M = Mlunmillaria pusilla.
p... Haw. Misc. 188=Opuntia fragilis.
pyr...midal... Salm-Dyck, Obs. (1820) 4-Melocactos Pyramidalis.
q...adrangularis, Haw. Syn-PL SuCC. 181=CereUSCa... pensis.
qu...glr...»». GUI. ex Loud. Hort. Brit. 184-Mammillana quadtata.
£TM...> MilL Gard. Diet. ed. VIIL n. 8 =Ecliinocactus reductus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 21 = Echinocactus gibbosus.
regali rrta J S... 8- Syst- ii. 496 = Cereus regalis.
nU... ...L lnn. S... F- PL 487 = Cereus gracilis.
Pelagonu... ?... DC, Prod. ... 8.= Cereus *reptans,* Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 38 =Cereus radicans.
RJs?...lat... De... n. Antnl. ... 68—Ind. occ.
fo... Fl. Flum> 206; v. ... W-Pereskia grandi-
rotundifolius, Moc. & Sesse> TM DC... 75=Pereskia rotundifolia.
Royeni, Linn. Sp. Pl. 467 -Cerem Royeni.
Royeni, Willd. Enum. Hort. Berol. SP... 82=Cerens crenulatus.
salicornoides, Steud. Nom. ed. II. i. 246 = Rhipsalis salicornoi...
Salmianus ... Cact. 87.—Ha...
Scop... Cereus Scopa.
...ienil...is... PhiL Ma... lxi ii. (1824) 41 = Cereus *sepium,* ...R 4 K. Nov. Gen. ... Sp. vi. M. Cereus sepium.
sericeus, GiUg ... LoBd. Hort. Brit. 196-Opuntia sericea.
serpens, H. B. & K. Not. Gen. et Sp. vi. 68 = Cereus serpens.
serpentinus, Lag. & Rodr. in ATM... Cienc. Nat. iT. (1801) 261 = Cereus serpentinus.
serpentinus, Pers. Syn. is... = Cereus flagellifonnis.
solitarius, Gill. ex Lood. Hort. Brit. 194 = MammiUaria solitaria.
speciosissim... Desf. in M*»- M«. Par. UL (1817) 195. t. 9 = Cereus speciosissiniM.

CACTUS :—
speciosus, Car. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1803) 339 = Cereus speciosiasimns.
speciosus, Desf. TabL Hort. Par. 191-Phyllocactus phyllanthoides.
speciosus. Gill- ex Sweet, Hort. Brit. ed. IL 23S =Mammillaria speciosa.
speciosus, Hook. Bot. Mag. t. 2820 = Rhipsalis Swartziana.
Spinii, Colla, Antol. vi. 601=Mammillaria discolor.
spinosissimus, Martyn, Cat. Hort. Cant. 88-Opuntia spinosissima*
spinosus. Gill, ex Loud. Hort Brit 194 = Mammillaria spinosa.
stellaris, Salm-Dyck, Hort. Dyck. ed. II. 7=Mammillaria pusilla.
stellatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 30 = Mammillsxifl pusilla.
siramineus, Spreng. Syst. ii. 494-MammillarU flavescens.
strictus, Haw. Misc. 188 = Opuntia stricta.
strictus, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 32 = Cereus strictus.
subinermis, Link, ex Steud. Nom. ed. II. i. 246 = Opuntia coccinellifera.
subquadriflorus, Mo;. & Sesse, ex DC. Prod. ill. 471 Opuntia rosea.
subrepandus, Spreng. Syst ii. 495=Cereus subrepandns.
sulphureus, Gill, ex Loud. Hort. Brit. 196 = Opuntia sulphurea.
sylvestris, Thiery, ex Steud. Nom. ed. 1.132; ed. II. i. 246 (quid?).
tennis, Schott, ex DC. Prod. iii. 469=Cereus tennis.
teres. Veil. HI. Flnm. 207 i v. t. 30=Rhipsalis fasciculata.
tetragonus, Linn. Sp. PL 466—Cerens tetragonus.
tomentosus. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 24=Opuntia tomentosa.
tozjuatus, Hort Lugd. ex Walp. Rep. ii. 342 = Rhipsalis rhombea.
triacanthos, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 34- Opuntia triacantha.
tnàngularis, Linn. Sp. PI. 468=Cereus compressus, trigonus.
tnàngularis, VelL Fl. Flnm. 206; v. t. 24=Cereua triangnlaris.
trichotomus, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. L 246 (quid?).
triqueter, Haw. Misc. 189-Cereus triqueter.
triqueter, Veil. Fl. Flnm. 206; v. t. 25-Cereus Arrabidae.
triqueter, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 83 = Cerens trigonus.
truncatus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 24 = Epiphyllum Altensteinii *1*
tuberculatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 34 = Opnntia tuberculata.
Tuna, Linn. Sp. PI. 468-Opuntia Tnna.
Tuna-elatioY, Roxb. Hort. Beng. [37] nomen.—Am. austr.
Tuna-major, Roxb. 1. c.—Am. austr.
tunicatus, Lehm. Ind Sem. Hort Hamb. (1827) 17 = Opuntia tunicate.
undulosus, Kostel. AUg. Med.-Pharm. Flora, iv. 1393 —Cereus variabilis.
Urumbeta, VelL FL Flum. 207; v. t 82=Opuntia triacantha.
Urumbella, Steud. Nom. ed. II. i. 246«oraec
verticillatus, Brat, ex Heynh. Nom. ii. 103, nomen (quid?).
viviparus, Nutt. Gen. Am. i. 295-= Mammillaria vivipara.
nhniaefiorus, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 475- Pereskia zinniaeflora.

CACUCIA, J. F. Gmel. Syst. 693 (1791) = Cacoucia, Aubl. (Combret).

CACUVALLUM, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 399 = Muouna, Adans. (Legum.).
altissimus. Medic. 1. c. 400=M. urens.

CADABA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 67 (1775). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 108.
DESMOCARPUS, WalL Cat. n. 6278 (1832).
MACROMERUM, Burch. Trav. i. 388 (1822); ii. 615.
SCHEPPERIA, Neck. Elem. UL 67 (1790).
STROEMERIA, Roxb. Fl. Ind. ii. 78 (1832).
STROEMIA, Vahl, Symb. Bot. i. 19 (1790).

CADABA :—
capparoides, *DC. Prod. i.* 244.—Ins. Molncc.
dubia, DC. 1. c-farinosa.
farinosa, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 68.—Ind. bor. occ.; Arab.; Afr. trop.
glandulosa, *Forsk. I. c.*—Arabia.
glandulosa, Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. v. (1852) 2=Miqueliana.
heterotricha. *Stocks, in Hoot. Ic. PI.* t 839.—Sindh.
indica, *Lam. Encyc.* L 544.—Ind. or.
juncea, *Han. Gen. S. Afr. PI.* ed. II. 13.—Afr. austr.
Kirkii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 90.—Afr. trop.
longifolia, *DC. Prod.* i. 244.—Abyss,
madagnscariensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 464.—Madag.
Miqueliana, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 321.—Malaya.
monopetala, Edgew. in Jooro. As. Soc. Beng. xvi. (1847) 1212=glandulosa.
natalensis, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 8.—Natal,
rotundifolia, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 68.—Arab.; Abyss.
somalensis, *Franch. in Revoil, Çomali,* 12.—Afr. trop.
trifoliate, *Wight V Am. Prod.* 24.—Ind. or.
trinervia, DC. Prod. i. 244=Cleome colnteoides.
triphylla, Wight, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 296 -trifoliate,
virgata, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sef. II. xx. (1843) 58.— Madag.

CADALVENA, Fenzl, in Sitz. Akad. Wien, Math. Nat. Ii. Abth. II. (1865) 139 = Kaempferia, linn. (Scitamin.).
spectabilis, Fenzl, 1. c. 140.—Afr. trop.

CADAMBA, Sonner. Voy. ii. 228. t. 128 (1782)- auettarda, Linn. (Rubiac).
jasminiflora, Sonner. L c. ii. t 128; iii. 253-G. speciosa.

CADELARI, Adans. Fam. ii. 268 (1763) = Fupalla, Juss. (Amarantac.).
lappacea, Medic. Malv. 92 = P. atropurpurea.

CADELARIA, Rafin. Fl. Teller, iii. 39 (1886) - Aohyranthes, Linn. (Amarantac.).
indica, Rafin. 1. e. = A. aspera.
punctata, Rafin. 1. c - A. aspera!
sicula, Rafin. 1. c.=A. aspera.

CADELIUM, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 352; Phil. Bot. L 206 (178U)-Phaaeolufl, Toura. (Legumin.).
nigrum, Media 1. c. 852=P. Max.
mride. Medic 1. c.=P. Max.

CADELLIA, F. Muell. Fragm. ii. 25 (1860). *SIMARUBEAE,* Benth. & Hook. f. i. 813.
GUILFOVLIA, F. Muell. Fragm. viil. 83 (1873).
monostylis, *Benth. Fl. Austral,* i. 875.—Austral,
pentastylis, *F. Muell. Fragm.* ii. 26.112.—Austral.

CADETIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 422. t 33 (1826) = Dendrobium, Sw. (Orchid.).
angustifolia, Blume, Rumphia, iv. 39 — D. angustifolium !
biloba, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. (1849) 30 = D. bilobum.
recurvata, Blume, 1. c.—N. Guinea.
similis, Blume, Rumphia, iv. 29, in obs.—N. Guinea.
umbellata, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 422. t 33 = D. umbellatnm.

CADIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 90 (1775). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 560.
PANCIATICA, Pieciv. Hort. Panciat 9 (1783).
SPAENDONCEA, Desf. Dec. PhiL vii. 259; et in Usteri, N. Ann. xiii. (1796) 15.
anomala, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 887.— Madag.
arabica, Kaeuscb. Nom. ed. III. 117-purpnrea.
Commersoniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 370.—Madag.
EUisiana, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 185. —Madag.
pedicellate, *Baker, 1. c.* 338.—Madag.
pubescens, *Boj. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 266.—Madag.
purpurea, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 90.—Arab, felix.
varia, L'tUrit Dias. in Mag. Enc. v. 29-purpurea.

CADI8CU8, E. Mey. ex DC. Prod. vii. 354 (1838). *COMPOSITAE,* Bentb. & Hook. f. ii. 108.
aquaticus, *E. Mey. I. c.* 255.—Afr. austr.

CADSUKA, Spreng. Syst ii. 642 (1827)°Kad8ura, Juss. (Magnoliac).

CAELESTINA, Cass. in Diet. Sc. Nat. vi. Suppl. 8. t. 93 (1817) = Ageratum, Linn. (Compos.).
ageratoides, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 151 = A. corymbosum.
albida, DC. Prod. v. 107=A. albidum.
caerulea, Cass. in Diet. Sc Nat. vi. Suppl. 8 = A. corymbosum.
cordata, Pohl, ex Baker, in Mart. FI. Bros. vi. II. 345 — Eupatorium macrophyllnm.
corymbose, Henth. BoL Voy. Sulph. 111 = A. salicifolium.
coryvibosa, DC. Prod. v. 108-A. corymbosum.
Hartwegi, Walp. Rep. ii. 645-Eupatorium Hartwegi.
hastata, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 863 -Eupatorinm betonicaeforme.
isocarphoides, DC. Prod. v. 107 = A. isocarphoides.
latifolia, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852)71 = A.latifolium.
Lessingiana, Klotzsch, ex Walp. Rep. ii. 545 = A. corymbosum.
linearifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 191=Alomia polyphylla.
longifolia, Pohl, ex Baker, 1. c. 8S1 = Eupatorium organense.
maritima, Ton. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 64 = A. littorale.
micrantha, Spreng. Syst. iii. 446 = A. coelestinum.
microcarpa, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 72 = A. microcarpum.
paleacea, J. Gay, ex DC. Prod. v. 107-A. paleacenm.
parvifolia, DC. 1. c. 108.—Am. austr.
petiolata, Hook. *Sc* Am. BoL Beech. Voy. 433 = A. pctiolatum.
Poklii, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. II. 190-Alomia Pohl ii.
repanda, Pohl, ex Baker, 1. c 309 = Eupatorium viridiflorum.
repent, Sch. Bip. in Schomb. Fauna et Flora Guy. 1138.—Guiana.
scabritiscula, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 72-A. scabriusculum.
suffruticosa, Sweet. Hort. Brit. ed. I. 229 = A. corymbosum.
tomentosa, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 71 = A. tomentosum.
urticaefolia, Pohl, ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. II. 862 = Eupatorium betonicaeforme.
nscosa, Pohl, ex Baker, 1. c.=Eupatorium apiculatum.

CAELIA, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 637 (1889) = Coelia,Lindl.

CAELOCLINE, Auct ex Steud. Norn. ed. II. i. 247 tt840)=COELOCLINE. A. DC. = Xylopift, Linn. (Anonac).

CAELODEPAS, Benth. *Sc* Hook.f. Gen. iii. 318 (1880) = Coelodepas, Hassk. (Euphorb.).

CAELOGLOSSUM, Steud. Norn. ed. II. i. 247 (1840) - COF.LOGLOSSUM, Iindl. = Habenaria, Willd. (Orchid.).

CAELOGYNE, Wall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 247 (1840)=Coelogyne, LindL (Orchid.).

CAELOSPERMUM, Blnme, Bijdr. 991 (1826), vide Coelospermum, Blume.

CAENOTUS, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 50 (1836)=Erlgeron, Linn. (Compos.).
canadensis, Kafin. 1. c.-E. canadensis.
longifolius, Kafin. 1. c.=E. longifolius I
pusillus, Rafin. 1. c—E. canadensis.

CAESALPINA, Plum, ex Linn. Gen. ed. 1.363 (1758) » leq.

CAESALPINIA, Linn. Sp. PI. 380 (1753). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 665.
BALSAMOCARPON, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 226. t. 20 (1846).
BIANCAEA, Todaro, Nuov. Gen. 21 (1858).
BONDUC, Adans. Fam. ii. 318 (1763).
CAMFECIA, Adans. 1. c. (1763).
CINCLIDOCARFITS, Zoll. in Nat en Gencesk. Arch. Neêrl, Indie, iii. (1846) 81.
CLADOTEICHIUM, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 401.
COULTERIA, H. B. *Sc* X. Nov. Gen. et Sp. vi. 328. t. 668 (1823).
ERYTHROSTEMON, Klotzsch, in Link, Klotzsch & Otto, Ic. PI. i. 97. t. 39 (1841).
GUILANDIA, P. Br. Hist. Jamoic. 228 (1756).
GUILANDINA, Linn. Gen. ed. 1.124 (1787).
LIBIDIBIA, Schlecht. in Linnaea, v. (1880) 192.
FOMARIA, Cav. Ic. v. 1.1. 402 (1799).
TARA, Molina, Saggio Chile, ed. II. 163 (1810).
TICANTO, Adans. Fam. ii. 319 (1763).
acanthobotrya, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 292.—Sumatra.
acinaciformU, *Mart, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 247.—Bras.
afiinis, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 8.—Guatemala,
angulicaulis, *Clos, in C. Cay, Fl. Chil.* ii. 223.—Chili.
angustifolia, Salisb. Prod. 326-C. Sappan.
arborea, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. L 112 -Peltophorum ferrugincum.
Arista, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2, sphalm. = Crista.
armata, R. Grab, in Wall. Cat n. 6840=mimosoides.
axillaris, DC. Prod. ii. 481=C. sepiariat et Mezoneurum cucullatum.
bakamensis, Lam. Encyc. i. 461-Crista.
Barbon, *Bert, in 'Merc. Chil.* (1829)'; *et in Bull. F/russac,* xx. (1830) 109.—Chili.
Berterii, Spreng. ex DC. Prod. ii. 482=bijuga.
bijuga, *Sv. Ots.* 166.—Ind. occ.
bijuga. Wall. Cat n. 6838=C. Nuga.
Bonduc, *Roxb. Hort. Beng.* 32; *Fl. Ind.* ii. 362.—Cosmop. trop.
Bonduc, Wight *Sc* Am. Prod. 280 = C. Bonducella.
Bonducella, *Fleming, in As. Res.* xi. (1810) 159.—Cosmop. trop,
bracteosa, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 141.—Bras.
brasiliensis, *Linn. Sp. PI.* 880.—Am. trop.
Brea, Gill, ex Steud. Norn. ed. II. i. 247 =praecox.
brevifolia, *Baill. Hist. PI.* ii. 168.—Chili.
Cacalaco, *Humb. (f Bonpl. PL Aeq.* ii. 178. t. 137.—Mexic.
calycina, *Benth. in Mart. Fl. Bras,* xv. II. 71.—Am. trop.
cassioides, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 444.—Am. austr.
Cavanillesii, Spreng. Syst. v. Ind. 123-bijuga.
chinensis, Roxb. Hort. Beng. 32 ; Fl. Ind. ii. 861=C. Nuga.
Cinclidocarpus, *Miq. FL Ind. Bat.* i. 110.—Ind. or.; Malaya,
coluteifolia, *Griseb. in Coett. Abh.* xxiv. (1879) 111.—Reg. Argent,
compressa, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1494.—Mexic; Pernv.
coriacea, Poit. in Rev. Hortic *Sir.* II. ii. (1843-44) 269 =cfcriaria.
^córiaria, *Willd. Sp. PI.* Ii. 682.—Am. austr.
corymbose, *Benth. PI. Hartm.* 117.—Guayaquil,
coulterioidcs, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 113.—Reg. Argent.
Courboniana, *Baill. Adansonia,* x. (1871) 103.—Mare rubnim.
Crista, *Linn. Sp. PL* 380.—Ind. occ
Crista, Thnnb. Fl. Jap. 179=sepiaria.
cucullata, Roxb. Hort. Beng. 32 ; Fl. Ind. ii. 368 = Mezoneurum cucullatum.
dasyrachis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 292-Peltophorum dasyrachis.
desertorum, Mart, ex G. Don, Gen. Syst. ii. 431-bracteosa.
digyna, *Rottl. in Ges. Naturf. Freunde Neue Schr.* iv. (1803) 200.—Ind. or.; Malaya.
dubia, Spreng. Syst. ii. 348—Peltophorum Vogelianum.
Ebano, *Karst. Fl. Cdumb.* ii. 57.1129.—N. Granat.
echinata, *Lam. Encyc.* i. 461.—Bras.
elata, Sw. Obi. 168-Poinciana data.

CAESALPINTA:—
enneaphylla, Roxb. Hort. Beng. 32; Fl. Ind. ii. 883-Mezoneurum enneaphyllum.
eriostachys, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 88.—Am. centr.
exilifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. 11874) 128.—Keg. Argent
exostemma, *Moç.* b* *Sesse, ex DC. Prod.* ii. 488.«—Nicaragua.
ferox, Hassk. Ind. Sem. Hort. Amst. (1841) ; PI. Jar. Rar. 400-sepiaria.
ferox, Hohen. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii-261 = Wagatca spicata.
ferrea, *Mart. Reise Bras.* ii. 611.—Bras.
ferruginea, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 462 = Peltophorum fcrrugineum.
fimbriata, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 145.—Bolivia.
Finlaysoniana, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5971" Peltophorum dasyrachis.
Fischeri, *Kegel V Koern. in Gartenfl.* (1858) 251.' Ind. or. ?
flávicans, R. Grah. in Wall. Cat n. 5825«digyna.
floribnnda, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 140.—Bras.
furfuracea. Wall. Cat. n. 5835 —Mezoneurum glabrum.
Gardncriana, *Benth. in Mart. FL Bras.* xv. II. 68.—Bras.
Gilliesii, *Wall, ex Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 129.—Am. austr.
glabrata, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 326.—Peruv.
glandulosa, Bert, ex DC. Prod. ii. 482 = bijuga.
Glcnieii, *Thw. Enum. PL Zeyl.* 414 = Peltophorum fexTugineum.
gracilis, *Benth. ex Hemsl. Diag. PL Nov.* 9.—Mexic.
gracilis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 110 = digyna.
grandis, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 5880.—Ind. or.
Heyneana, Steud. Norn. cd. II. i. 247 - Wagatea spicata.
Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc.Linn. Par.* i. (1883) 871.—Afr. trop.
hispida, *D. Dietr. Syn. PL* ii. 1496.—Mexic
horrida, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 5836-mimosoides.
horrida, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 411=sepiaria.
horrida, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 169.—N. Granat.
hymenocarpa, Wall. Cat. n. 6832 = Mezoneurum pube*-cens.
ignota, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 336 = Mezoneurum pubescens.
inermis, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 367* Peltophorum ferrugineum.
insignis, *Steud. Norn.* ed.I. 133; *D. Dietr. Syn. PL* "• 1494.—Reg. Amazon.
japonica, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ••• (1845?) 117-sepiaria.
kavaiensis, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 164.—Ins. Hawaii.
Kilaroe, Span, in Linnaea, xv. (1841) 200 - Peltophorum ferrugineum.
lacerans, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. 11.367* Pterolobium indicum.
languida, *Hoffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* ii. 72.—Ind. or.
latifolia, Salisb. Prod. 826 = vesicaria.
laxa, *Benth. PI. Hartw.* 60.—Mexic
laxiflora, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 143.—Bras.
lebbeikioides, DC. Prod. ii. 483-Albizzia Millettii.
ligulata, Heyne, ex DC. Prod. ii. 484-PteroIobfon[1] lacerans.
Macklottii, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 112 = Pe'[t0]-phorum ferrugineum.
macrantha, *Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp.* (1838) »• —Chili,
marginata, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 147.-Bras.
melanocarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) l[a8>] —Reg. Argent.
Melanosticta, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 16[9] * Melanosticta Burchcllii.
mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) "'• —Mexic.
microphylla, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5826-^ Cinclidocarpa.
microphylla. *Mart. Reise Bras.* ii. 611.—Bras.
Milleltii, *Hook, tt Am. Bot. Beech. Voy.* 18*" China. »
mimosifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) *[28>] —Reg. Argent.

CAESALPIWIA:-

mmosoides, Heyne. in Wall. Cat. n. 5887-Wagatea spicata.
mimosoides, *Lam. Encyc.* i. 452.—Ind. or.: Burma.
Minax, *Hance, in Journ. Bot.* xxii. (1884) 865.—Ioiina.
nollis, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 169.—Am. trop.
Mezoneurum cucullatum.
monosperma, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 148.—Ind. occ.
"ucronata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 444.—Bras.
Malaccensis, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 285.—Malaya.
»ga, *Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 32.—As. trop.; Austral.; Polynes.
*«*iqua*, Vog. in Liunaea, xi. (1887) 407=echinata.
rtnsperma, Roxb. Hort. Beng. 32; Fl. Ind. ii. 857 = ?
' aipae, *Ruiz &• p*m*. Fl. Per.* iv. t. 875.—Peruv.
Pantcutata, Dest Tabl. Hort. Par. ed. II. 210=C. ?
Porahyba, Allem. in Trab. Soc. Veil. 66=Schizolobium excelsum.
tenifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 247=C Cinclidocarpa.
Parciflora, *Benth. V Hook. f. ex Chapm. Fl. S. V. J>t. Suppl.* 18.-Am. bor.; Ind. occ.
#«"«nr«, Cav. Desc. 467=tinctoria.
Pettuada, *Vog. in Linnaea*, x. (1886) 601.—Ins. S.
Pet Uophoroides, *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. II. 72.—Bras.
pilosa, *Benth. l. c*
pluviosa, *DC. Prod.* ii. 483.-Bnis.
polyphyUa, *Roxb. Hort. Beng.* 82, nomen.—Pegu.
porcina, *Mart ex steud Nom* **• n *• 2i7 •— Bras.
Praecox, *R U u & Pav. FL* fffi iv t. 876.—Chili,
procera, *Potpp. ex Spreng. Syst.* ii. 843.—Cuba.
Presents, Buch.-Ham. ex Wall. Cat sub n. 6834 = sepiana.
Pulcherrima, *Sw. Obs.* 166.—Cosmop. trop.
R Argent- « " *Goett Aih* - » iY - C ?
Cta t Hm7W E »rm Hort. Berol. 445—Bras.
Tul,m AnhMus Par lv (1844) 1S9,—Bras,
regia, *D.* Dietr Svn - Pl. ii. 1495 = Poinciana regia.
resupina Hort> Beng. 32; Fl. M i. 882 = mimosoides.
Roxburghii, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1494 = Peltophorum ferrugineum.
rubicunda, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 73.—Bras.
%!'Noroi*a. in Verh. Batav. Gen. v. (1790) cd. I. " Art. iv. 12=C.Sappan.
^*PPan, *Linn. Sp. Pl.* 881.—As. trop.
*, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 209.—Ind. or.
scandens, Koen - « Baker > fa Hook f n Brit Ind " a 5 5 > iuga.
Sel,ot, G. Don, Gen. Syst. ii. 431 = Peltophorum v ogc ianum.
sepiaria, *Rox* trop.
sepiaria i- Hort Bmg j 2 • f/ /B(/ u 360.—As.
phyllum, Wall. Cat. n. 5884 H.=Mesopeiinim ennea- Ind. ii. 359 = m m05oides.
Simora, *Buch.-Ham. e* Beng. 32; Fl. Roitb Hort
smilacea, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. 1. 248 = Coccul ns carolinus.
Vi, t in Hook Eatea spicata.
sti *in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 72.—Bras.
suberosa, *Loud. Hort. Brit.* 167.—Ind. or.
sumatrana, Roxb. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. ii. 366 = Mezoneurum cucullatum.
C ? " ' ' Wall Cat. n. 6881 B, C-Nnga.
'kom *I* Pav m Per* " • 374.—Pemv.
Cpne , Spreng. Syst. iL 343-coriaria.
tora *DC Prod* il 481.—N. Granat
tortuosa, W U Cat n eb 27 D=C. Cinclidocarpus.
tricw tldlocarpus.

OAESAXPINIA:-

nlosperma, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 248.—**Hab.?**
ventricosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 306-bijuga.
vemalis, *Champ, ex Berth, in Hook. Kea Journ.* iv. (1862) 77.—China.
vesicaria, Lam. Encyc. i. 461=bijuga.
vesicaria, *Linn. Sp. PI.* 881.—**Bras.**
vesicaria, Veil. Fl. Flnm. 172; iv. t. 89 =echinata.
vynaadensis, Heyne, ex Wall. Cat sub n. 5880 = grandis.

CAESAREA, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 878. t. 18=**Viviania,** Cav. (Geraniac).
albifiora, Cambess. 1. c 874.—Bras.
grandiflora, St. Hil. ex Steud. Nom. ed. II. i. 248.—Bras.
hypoleuea, Mart, ex Steud. 1. c—Bras,
/annotate, Klotzsch, in Linnaea, x. (1836) 437.—**Bras.**
montevidensis, Klotzsrh, 1. c 486.—Reg. Argent.
mala, Klotzsch, 1. c—Bras.
petiolata, Klotzsch, 1. c. 487.—Bras.
rubriflora, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 374.—Bras.

CASSIA, R. Br. Prod. 277 (1810). *UL1ACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 792.
acanthoclada, F. Muell. Fragm. i. 215 - Corynotheca acanthoclada.
africana, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1876) 160.—Afr. trop.
alpina, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 373=Chlorophytum alpinum.
asparagoides, *Eckl. ex Steud. Nom.* ed. II. i. **248.**—Afr. austr.
ehlorantha, F. Muell. Fragm. i. 63=vittata.
coarctata, Spreng. Syst. ii. 88=Eccremia coarctata.
comosa, Spreng. 1. c. = Chlorophytum comosum.
corymbosa, R. Br. Prod. 277=Chamaescilla corymbosa.
eyanea, A. Cunn. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xv. (1876) 858 -vittata.
dichotoma, F. Muell. Fragm. L 215 = Corynotheca **dicho oma.**
Dregeana, Kunth, Enum. PL iv. 611=Anthericum Dregeanum.
Eekloniana, Schult. *I.* Syst vii. 1691 - Anthericum scilliflorum.
Helleri, *Hueg. ex Heynh. Nom.* ii. 108, nomen.—Austral.
hirsuta, Lindl. Swan Riv. App. 67. n. 278 = Agrostocrinum stypandroides.
lateriflora, K. Br. Prod. 277 = Corynotheca lateriflon.
micrantha, Lindl. Swan Riv. App. 57 =*parviflora.
ocddentalis, R. Br. Prod. 277=parviflora.
paradoxa, EndL in Lehm. PI. Preiss. ii. 34 - Chamaesilla spiralis?
parviAora, *R. Br. Prod.* 277.—Austral.
physodes, Spreng. Syst. iL 88 = Urginea physodes.
pusilla, Spreng. L c.*=Urginea pusilla.
rigidifolia, *F. Muell. Fragm.* x. 48.—Austral.
seabra, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 859 •= Agrostocrinum stypandroides.
setitera, *Baker, I. c*—Austral.
spiralis, Endl. in Lehm, PI. Preiss. ii. 84 - Chaemaescilla spiralis.
Thunbergii. Schult. *t* Syst. vii 1692-Anthericum -contortum.
versicolor, Lindl. Swan Riv. App. 67=ChamaesdUa corymbosa.
vittata, *R. Br. Prod.* 277.—Austral.

CAESIA, Veil. Fl. Flnm. 107 (1825); iii t 23 (1827) = **Cormonema,** Reissek (Rhamneae).
spinosa, Veil. 1. c^C. spinosum.

CAESTTLIA, Roxb. PL Corom. i. 64. t 83 (1769). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook, t ii. 318.
axillaris, *Roxb. I. c*—Ind. or.
lancifolia, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 288 (quid?).—Ind. or.
radicans, Willd. Sp. PL iiL 1797 -= Cryphiospermum repens.
scandens, Pocpp. ex DC. Prod. v. 664 =• Wulffia scandens.

CAETA, Steud. Nom. ed. II. i. 248 (1840) = **Torenla,** Linn. (Scrophular.).

CAETOCAPNIA, EndL Gen. 180 (1887) - COETOCAPNIA, Link & Otto~Bravoa, Lex.

CAFFEA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. L Art. IV. 12, an **Coffea,** Linn.

CAHOTA, Kant, in Linnaea, xxviii. (1856) 448 = Clusia, Linn. (Guttifer.).
earaehensis, Karst 1. c.—Venezuela.

CAIDBEJA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 82 (1775) - **Forsfcohlea,** Linn. (Urticac.).
adhaerens, Forsk. 1. c, »F. tenacissima.

CAILLIEA, Guillem. & Perr. Tent. Fl. Seneg. 28» (1888)=Dichro8taehys, DC. (Legumin.).
dichrostachys, Guillem. *&c* Perr. 1. c. 240 = D. nutans.
tnacrostachya, Steud. in Flora, xxvl (1843) 75J = Pentaclethra filamentosa.

CAINA, Panch. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1880) 264=Couth<rvia, A. Gray (Loganiac).
erratica, Panch. ex Baill. 1. c.=C. corynocarpa.

CAINITO, Plum, ex Adans. Fam. ii. 166 (1768); Tuss. Fl. Antill. iii. 41. t. 9 (1824) = ChryeophyUum, linn. (Sapotac).
Pomiferum, Tuss. Fl. Antill. iiL 41. t 9-Chrysophyllum Cainito.

CAIOPHORA, Presl, Rel. Haenk. ii. 41. t. 56 (1831) = Blumenbachia, Schrad. (Loas.).
absinthiifolia, Presl, 1. c. 42 = B. coronata.
carduifolia, Presl, I. c. = B. carduifolia.
cirsiifolia, Presl, 1. c. t. 66.—Peruv.
contorta, Presl, 1. c. 42=Loasa compressa.
coronata. Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1*88) 827 - B . coronata.
Herbertix, G. Don, ex Lour. Encyc. PI. Suppl. ii. 1438.—Hab. ?
lateritia, Benth. in Maund. & Hensl. Botanist, 111. t. 119.—ChilL
Pentlandii, G. Don, ex Load. Encyc. PL Suppl. ii. 1438.—Peruv.
scandens, Mey. *Sc* Klotzsch, in Nov. Act. Nat Cur. xix. Suppl. i. (1848) 839 = B. scandens.

CAJAN, Adans. Fam. ii. 826 (1763)=CaJanus, DC. (Legumin.).
inodorum, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 363=Cajanus indicus.
scarabaeoides, Thou, in Diet. Sc. Nat. vi. 167 = Atylosia scarabaeoides.

CAJANUM, Rafin. Sylva Tellnr. 25 (1888)=seq.
Thora, Rafin. 1. c.=Cajanus indicus.

CAJAHTJS, DC. Cat. Hort. Monsp. 85 (1813). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 541.
albicans, R. Grah. in Wall. Cat n. 65S2=Atylosia albicans.
argenteus, Spreng. Syst. iii. 248 = Argyrolobium Linnaeanum.
bicolor, DC. Cat Hort. Monsp. 85=indieus.
candicans, WalL Cat. n. 657G=Khyncbosia avensis.
cinereus, *F. Muell. Census*, 41.—Austral,
confertiflorus, *F. Muell. PI. Fittalan*, 9.—Austral.
fiavus, DC. Cat. Hort. Monsp. 86=indicus.
glandulosus, Dalz. & Gibs. Bomb. FL 73 = Atylosia mollis.
golnsis, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 264 - Atylosia barbata.
grandifolius, *F. Muell. PI. Fitzalan*, 9.—Anstral.
helvolus, Spreng. Syst. iii. 248=Glycine helvola.
indicus, *Spreng. 1. c.*—Ind. or.
kulnensis, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 264 - Atylosia kulnensis.
lineatus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6578=Atylosia lineata.
luteus, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist Nat x. **(1881)** 260=indicus I
marmoratus, *F. MuelL Census*, 41.—Austral.
megalantkus, Spreng. ex DC. Prod. ii. 218-Astragalus megalanthus.
niveus, R. Grah. in Wall. Cat n. 5581 = Atylosia nivea.
quinquepetalus, Blanco, FL Filip. ed. II. 417 - Desmodium Cephalotes.

CAJANTTS .—
reticulatus, *F. Muell. Census,* **41—Austral.**
scarabaeoides, **Thou, ex R. Grah. in Wall. Cat. n. 6580 = Atylosia scarabaeoides.**
striatus, **Boj. Hort. Manrit. 109-indicus.**
suaveolens, **K. Grah. in Wall. Cat. n. 5679 » Rhynchosia suaveolens.**
volubilis, **Blanco, Fl. Filip. ed. II. 417= Atylosia mollis.**
Wightianus, **R. Grah. in Wall. Cat. n. 6583 = Atylosia albicans.**
wolgaricus, **Spreng. ex Steud. Norn. ed. II. i. 248 = Calophaca wolgarica.**

CAJU-PUTI, Adans. Fam. ii. 84 (176S)-Melaleuea, Linn. (Myrtac.).

CAKTLE, Linn. Syst. ed. I (1735). ***CRUCIFERAE,*** **Benth. & Hook. f. i. 99.**
aegyptia, **Spreng. Syst. ii. 852 = Didesmus aegyptiacus.**
aegyptiaca, **Willd. Sp. PI. iii. 417 = maritima.**
aequalis, **L'Hérit. ez DC. Syst. ii. 430 = maritima.**
americana, **Nutt. Gen. Am. ii. 62 = maritima.**
bipinnata, **Spreng. Syst. ii. 8S2 - Didesmus bipinnatus.**
clavata, **Spreng. T. c = Rapistmm clavatum.**
crenata, **Jord. Diagn. i. 346 = maritima.**
cubensis, **H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 75 = maritima.**
cyrenaica, ***Spreng. Syst.*** **ii. 852.—Cyrenia.**
domingensis, **Tuss. Fl. Ant. i. 119 - maritima.**
edentula. **Hook. Fl. Bor. Am. i. 59 = maritima.**
hispanica, **L'Herit. ex DC. Syst. ii. 619 = Brassica incana.**
hispanica, **Jord. Diagn. i. 345 = maritima.**
laiifolia, **Poir. Encyc. Suppl. ii. 88 -= maritima.**
lit tor alts, **Jord. Diagn. i. 345= maritima.**
maritima, ***Scop. Fl. Cam.*** **ed. II. ii. 35.—Europ.; Afr. bor.; Am. bor.**
monosperma, ***Lange, PI. Nov. Hisp.*** **fasc. i. 5. t. 7.—Hispan.**
myagroides, **Poir. Encyc. Suppl. it 88 = Erncaria aleppiLa.**
perennis, **L'Hérit. ex DC. Syst. ii. 431 - Rapistmm perenne.**
perfoliata, **L'Herit. ex DC. 1. c 575 = Conringia orientalis.**
pinnatifida, **Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 484 -maritima.**
rugosa, **L'Hérit. ex DC. Syst. ii. 432= Rapistnun rugosum.**
Serapionis, **Gaertn. Frnct. ii. 287 = maritima.**
sinuatifolia, **Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 486 - maritima.**
striata, **L'Herit. ex DC. Syst. ii. 659 = Didesmus tenuifolins.**

CAIiACANTHA, T. Anders, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1088 (1876). ***ACANTHACEAE,*** **Benth. & Hook. f. 1. c**
Dalzellianns, *T. Anders, ex Benth. V Hook. f. I. c.*—**Ind. or**
grandiflorus, **Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xiii. < 1884' (1883) 279 = praec**

CALACINUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 83 (1836) = Muehlenbeckia, Meissn. (Polygon.).
adpressum, **Rafin. 1. c. 84 = M. adpressa.**
australis, **Rafin. 1. c. =• M. australis.**

CALADENIA, R. Br. Prod. 323 (1810). ***ORCH1-DEAE,*** **Benth. & Hook. f. iii. 612.**
LEFTOCERAS, Liodl. Gen. et Sp. Orch. 415 (1840).
alata, **R. Br. 1. c. 324-=carnea.**
alba, **R. Br. 1. c. 323 = camea.**
angustata, **Hook. f. Fl. Tasm. ii. 30. t. 125=camea.**
angustata, **Lindl. Gen. et Sp. Orch. 420=testacea.**
antarctica, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67-Lyperanthus antarcticus.**
aphylla, ***Benth. Fl. Austral,*** **vi. 387.—Austral,**
arenaria, ***Fiteg. Austral. Orch.*** **i. VII. t 1.—Austral.**
Barbarossa, *Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl.* 64.—Austral.
barbata, **Lindl. Gen. et Sp. Orch. 418 = deformis.**
Behrii, **Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 569 = Patersoni.**
bifolia, ***Hook./. Fl. Nov. Zel.*** **i. 247.—N. Zel.**
Brunonis, **Reichb. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Glossodia Brunonis.**
caerulea, ***R. Br. Prod.*** **324.—Austral.**
Cairnsiana, ***F. Muell. Fragm.*** **vii. 31.—Anstral.**
camea, ***R. Br. Prod.*** **324.—Anstral.**

CAIiADENIA:—
clavigera, *A. Cunn. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 422. ^—**Austral.**
concolor, ***Fiteg. Austral. Orch.*** **i. VII. 1.1.—Austral,**
congests, ***R. Br. Prod.*** **324.—Austral.**
cornuta, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Chiloglottis cornuta.**
cucullata, ***Fiteg. Austral. Orch.*** **i. il. t. 4.—Austral.**
cuneata, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67'Burnettia cuneata.**
deformis, ***R. Br. Prod.*** **324.—Austral.**
denticulata, **Lindl. Swan Riv. App. 52 = filamentosa.**
dilatata, **R. Br. Prod. 825=Patersoni.**
dimorpha, ***Fiteg. Austral. Orch.*** **i. 1.1. 3.—Austral.**
diphylla, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Chiloglottis diphylla.**
discoidea, ***Lindl. Swan Riv. App.*** **52.—Austral.**
Drummondii, ***Benth. Fl. Austral,*** **vi. 383.—Austral.**
elliptica, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Lyperanthus ellipticus.**
elongata, **Lindl. Swan Riv. App. 62=laiifolia.**
emarginata, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. «7~ Glossodia emarginata.**
filamentosa, **Lindl. Gen. et Sp. Orch. 421 = Patersoni.**
filamentosa, ***R. Br. Prod.*** **324.—Austral.**
filifera, **Lindl. Swan Riv. App. 52= filamentosa.**
fimbriata, *Reichb. f. Beitr. Syst. PJl.* 65.—Austral,
flava, ***R. Br. Prod.*** **824.—Austral,**
gemmata, ***Lindl. Swan Riv. App.*** **62.—Austral.**
Gigas, ***Reichb. f. in Linnaea,*** **xli. (1877) 56.—N. Caled.**
gracilis, **R. Br. Prod. S24*-testacea.**
Gunnii, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Chiloglottis Gunnii.**
hirta, ***Lindl. Swan Riv. App.*** **52.—Austral,**
ixioides, ***Lindl. 1. c.*—Austral,**
javanica, *Bentt. ex Ridl. in H. O. Forbes, Nat. Wand. East. Archip.* 518.—Timor,
latifolia, ***R. Br. Prod.*** **324.-Austral.**
leptochila, ***Fiteg. in Gard. Chron.*** **(1882) I. 462.—Austral.**
lobata, ***FitMg. I. c.*** **461.—Austral**
longicauda, **Lindl. Swan Riv. App. 52. t. 8 = Patersoni.**
Lyallii, ***Hook./. Fl. Nov. Zel.*** **i. 247.—N. Zel.**
macrophylla, **R. Br. Prod. 325 = Menziesii.**
macrostylis, ***Fitzg. in Gard. Chron.*** **(1882) I. 462.—Austral.**
major, **Reichb. f. Beitr. Syst Pfl. 67 = Glossodia major.**
marginata, **Lindl. Swan Riv. App. 61= latifolia.**
Menziesii, ***R. Br. Prod.*** **325.—Austral,**
minor, ***Hook./. Fl. Nov. Zel.*** **i. 247.—N. Zel.**
minor, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Glossodia minor.**
mollis, **Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. &= hirta.**
mollis, **Lindl. Swan Riv. App. 51 = latifolia.**
multiclavia, ***Reichb./. Beitr. Syst. Pfl.*** **64.—Austral.**
nana, **Endl. in Lehm. PI. Preiss ii. 7=reptans.**
nigricans, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67=Lyperanthus nigricans.**
Nortoni, ***F. Muell. Census,*** **113.—Austral.**
oblonga, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 »Cyrtostylis oblonga.**
ochreata, **Lindl. Swan Riv. App. 61= latifolia.**
pallida, **Lindl. Gen. et Sp. Orch. 421 = Patersoni.**
paniculata, ***Fitzg. in Gard. Chron.*** **(1882) I. 461.—Austral.**
Patersoni, ***R. Br. Prod.*** **824.—Austral.**
pellita, **Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 8=gemmata.**
plicata, ***Fiteg. in Gard. Chron.*** **(1882) I. 461.—Austral.**
Preissii, **Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 7=reptans.**
pulcherrima, **F. Muell. Fragm. v. 93 - Patersoni.**
reni/ormis, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Cyrtostylis reniformis.**
reptans, ***Lindl. Swan Riv. App.*** **52.—Austral,**
reticulate. ***Fitzg. in Gard. Chron.*** **(1882) I. 462.—Austral.**
Roei, ***Benth. Fl. Austral,*** **vi. 383.—Austral.**
rotundi/olia, **Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 67 = Cyrtostylis rotundifolia.**
saccharata, ***Reichb./. I. c.*** **63.—Austral,**
sericea, ***Lindl. Swan Riv. App.*** **62.—Austral,**
senata, *Reichb./. Beitr. Syst. Pfl.* 67.—Austral,
suaveolens, ***Reichb./. 1. c.*—Austral.**
sulphurea, **A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 361° suaveolens.**

CALADEMTA:—
tentaculata, **Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 571-Pateisoni.**
tennis, ***Fiteg. in Gard. Chron.*** **(1882) I. 462.—Austral.**
tessellata, ***Fiteg. Austral. Orch.*** **i. II. t 3.—Austral,**
testacea, ***R. Br. Prod.*** **324.—Austral.**
unguiculata, **Lindl. Swan Riv. App. 51=deformis.**
unita, ***Fiteg. in Gard. Chron.*** **(1882) I. 461.—Austral,**
variegata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* **xvii. (1885) 248.-N. Zel.**

CAIiADIUM, Vent, in Roem. Arch. ii. (1800) 347-*AROIDEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 976.**
AROSMA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (1836).
CYRTOSPADIX, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853).
acre, **R. Br. Prod. 338 = Colocasia antiquoram.**
aculeatum, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 274.—**Guiana.**
tcuminatum, **F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. i-616 = Xanthosoma belophyllum.**
albo-punctatissimum, **J. Makoy, ex Karst. in C. Koch & .Fint. Wochenschr. (1858) 331 = bicolor J**
amab'ile, ***Versch. Cat.*** **n. 70 (1862) 2.—Bras.**
amoenum, **Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. i>-461 = tricolor.**
appendiculatum, **Hort. ex Engl. 1. c. 476 = Xanthosonw atrovirens.**
Appunianum, **Hort. ex Engl. 1. c. 466 = picturatum.**
arborescens, *Vent. Jard. Cels,* sub t. 30; *Willd. Sp. PI.* **iv. 490.—Ind. or.**
arboreum, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp. i.* 80.—**N. Granat**
argyrites, **Lem. in Illustr. Hortic. (1858) t. 185. f. 3-Misc. 57-Humboldtii.**
argyrospilum, **Lem. 1. c. 59=bicolor.**
argyrostigma, ***Schott, Melet.*** **i. 18, nomen.—Amtrop.**
asperulum, **Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1853) 313 =smaragdinnm.**
auritum, **Vent. Jard. Cels, sub t. 30; Willd. Sp. K-iv. 491 = Syngonium auritum.**
Baraquini, **Herincq, in * 1. des Serres, Sér. II. iii. (1858) 163 = bicolor.**
Barilletii, ***Hort.—C/. Gard. Chron.*** **(1867) 461.—Hab.?**
Bauersii, ***Reichb. Hort. Bot.*** **t. 160.—Bras.**
Belleyenei, **Hort. Chantin, ex Lem. in Illustr. Hortic. (1860) t. 252 = picturatum.**
belophyllum, **Willd. Enum. Hort. Berol. 987 = Xanthosoma belophyllum.**
bicolor, ***Vent. jard. Cels,*** **t. 30.—Am. austr.**
Bongniartii, **C. Koch** ***Be.*** **Fint. Wochenschr. (1858) 287, sphalm. = bicolor.**
Bowei, **Steud. Nom. ed. II. i. 249 = Biarum Bovei.**
brasiliense, **Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 7, 386 - Xanthosoma hastifolium.**
Brongniartii, **Lem. in Illustr. Hortic. (1858) Misc. 58 = bicolor.**
caracasanum, **Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 666, Index = Xanthosoma belophyllum.**
Chantinii, **Lem. in Illustr. Hortic. (1858) Misc. 58 " bicolor.**
Colocasia, **Schott, ex Wight, Ic. t. 787 = Alocasw cucullata.**
colocasioides, **Brongn. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. [156] = Colocasia antiquorum.**
concolor, *C. Koch, in Berl. Allg. Gartene.* (1857) [135]—**Venezuela.**
Connaertii, **Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. «• 461 = bicolor.**
cordatum, **Hort Versch. ex Engl. 1. c 456 = Schomburgkii.**
crassipes, **Hort. ex Engl. 1. c. 369 - Philodendron cannaefolmm.**
cucullatum, **Pers. Syn. ii. 575 = Alocasia cucullata.**
cupreum, **C. Koch & Bouche, Ind. Sem. Hort. Ber[ol.] (1854) 8 •= Alocasia cuprea.**
Curwadlii, **Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii-=bicolor.**
Devosianum.hem. **in Illustr. Hortic. (1862) 1322. f-= bicolor.**
digitatum, ***Blanco, Fl. Filip.*** **ed. 11.459.—Ins. PW'P&**
discolor, **Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. [161] -= bicolor.**
Duchartrei, **Hort. ex Engl. 1. c. = bicolor.**

CALADIUM:—
Eckhartii, Lem. ex Engl. in DC. Monog. Phan. it 463 =bicolor.
**dule,* G. F. W. Mey. Prim. FL Esseq. 272 = Xanthosoma edule.
Endlicheri C. Koch V Fint. Wochenschr. (1858) 288—Venezuela.
Engleri, Mart< a ^B1_ in Mart_ Fl_ Bras_ 2=Adelonema erythropus.
esculentum, Vent. Jard. Cels, sub t. 80; et in Roem. Arch. ii. in. 851-Colocasia antiqnorum.
firmulum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1864) 417 =bicolor.
fragrantissimum, Hook. Bot. Mag. t. 3814 = Philodendron fragrantissimum.
gaganteum, Koch & Fint. Wochenschr. (1858) 288 = Wendlandii.
giganteum, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 103 = Colocasia indica.
Gymnaeum in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 259 = Alocasia macrorrhiza.
grandifolium, Sims, Bot. Mag. t. 2648=Philodendron aimsii.
grandifolium, Willd. Sp. PI. iv. 400 = Philodendron grandifolium. p. PI. iv. 400 = Philodendron
Hoargenteum, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. 463=bicolor.
gutti/erumi Poepp. ex Knnth, Enum. PI. iii. 52 = Mulodendron guttiferum.
Hoffmnum, C. Koch, Wochenschr. (1862) 136 = bicolor.
hmatostigma, Kunth, Enum. PI. iii. 42 = bicolor.
"astatum, Lem. in Illustr. Hortic (1858) Misc. 61 = Pkturatum.
Ixutatum, Willd. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. *9 = UrospathaPoeppigiana.
"astyfolium, Steud. Norn. ed. II. i. 249 = Xanthosoma hastifolium.
"lel">ri/olium. Vent. Jard. Cels, sub t. 30; et in *°em. Arch. ii. m. 351 = Xanthosoma helleborifolium.
H&rsoni, Hort ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 461= bicolor.
neterophyllom, *Presl, Reliq. Hamk.* ii. 148.—Ins. Luzon.
Hmbyanum, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. *« = bicolor.
Houlletii, Em ,, ,m IU,,Str- HoltiC, ^1858) M = b,,, c or
Hboldtii, &*»«,« 0«<r. &rf. *Wochenbl.* (1864) «7—Bras.
Imbe. Ho*t. ex Kunth, Enum. PL iii. 60 - Philodendron
«dica, Hort. ex C. Koch, Berl. AUg. Garten*. (1867) 188=Alocasia indica.
"nteleri, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 461 bicolor.
*«rti»,Hort. Versch. ex C. Koch, Wochenschr. v. (1862) 1S6-bicolor.
S??«»«», Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. a. 459=bicolor.
"Hfrun, Willd. Sp. PI. iv. 491 - Philodendron
Lauchenium C„ Koch> Wochenschr_ C1861) 286 = bicolor.
Lindenii Lem. in Illustr. Hortic. (1863) t. 860-Alocasia lucidum.
Linden Kunth, Enum. PI. iii. 80 - Staurostigma concinnum.
Lindl , Hort Petro P-« Knnth, Enum. PI. iii. *7 = ^'lodendron cannaefolium.
macrorrhizum Br. Prod. 336=Alocasia macrorrhiza.
maculatum, Lodd. Bot. Cab. t. 608-Dieffenbachia Seguine.
Mafaffa, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 471 •= Xanthosoma Mafaffa.
marantaefolium, Zipp. ex Kunth, Enum. PI. iii. 65 = Aglaonema marantifolium.
marginatum, C. Koch & Bouche', Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) 6=bicolor.
marmoratum, *L. Math, ex C. Koch, I. c.*—Ecuador.
Martersteigianum, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 461 = bicolor.
metallicum, Hamburg. Gait. Blumenzeit. (1853) 517 = Alocasia cuprea.
metallicum, Hort. ex Engl. 1. c. 602=Alocasia indica.
mirabile, Lem. Illustr. Hortic. (1863) t. 354=bicolor.
Mooreanum, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 462 = bicolor.
myriostigma, C. Koch, Wochenschr. v. (1862) 135 = Humboldtii.
Neumanni, Lem. in Illustr. Hortic. (1858) 58 = bicolor.
nymphaeaefolium, Vent. Jard. Cels, sub t. 30; Willd. Sp. PI. iv. 4e'8 = Colocasia anliquorum.
odoratissimum, Hort. ex C. Koch, Berl. AUg. Gartenz. (1857) 20 = Alocasia odora.
odoratum, Lodd. Bot. Cab. t. 4] 6 - Alocasia macrorrhiza.
odorum, Lindl. Bot. Reg. t. 641 = Alocasia macrorrhiza.
Ottonis, Hort ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 464-bicolor.
matum, Vent. Jard. Cels, sub t. 80; et in Roem. Arch, ii. III. 351=Lagenandra toxicaria.
pallidinervium, Hort ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 463=bicolor.
pallidum, C. Koch & Bouche', Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 18=smaragdinum.
pedatum, Hook. Exot. Fl. t. 206 = Philodendron laciniatnm.
pellucidum, DC. in PL Jard. Geniv. (1826) 38 = bicolor.
pendulinum, *Manso, Enum.* 21.—Bras,
pendulum, *Blume, Cat. Gew. Buitenz.* 103.—Malaya.
Perrieri, Lem. in Illustr. Hortic. (1858) 59=bicolor.
petiolatum, Hook. Bot. Mag. t. 8428=Anchomanes difformis.
pictum, DC. *i"'* Note, PL Jard. Genèv. 88=bicolor.
pictum, Lodd. Bot. Cab. t 608 = Dieffcnbachia picta.
picturatum, *C. Koch V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) 6.—Am. austr.
pinnatifidum, Willd. Sp. PL iv. 487 = Philodendron pinnatifidum.
platynervium, Hort. ex Kunth, Enum. PI. iii. 47 = Philodendron crassinervium.
platynevron, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* (1834) 384.—Bras.
plumbeum,C. Koch, Berl. AUg. Gartenz. (1857) 186-Alocasia cuprea.
poedle, Schott, Melet. i. 18 = bicolor.
porphyroneuron, C. Koch, Wochenschr. v. (1862) 135 = picturatum.
Princeps, Hort. ex Kunth, Enum. PL iii. 65=Aglaonema simplex.
pumilum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 21 = Gonatanthus sarmentosus.
punctatissimum, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 461=bicolor.
pnnctatum, *Desf. Tail. Hort. Par.* ed. II. 6, nomen.—Hab. ?
Purdieanum, Schott, in Oestr. Bot. Zdtschr. (1859) 38 --bicolor.
pusillum, C. Koch, in Fl. des Serrea, Sèr. II. iii. (1858) 110=bicolor.
regale, Lem. in Illustr. Hortic. (1862) t. 316 = ticolor.
Rtichtnbachianum, Stange, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. iii. II. 182=bicolor.
reticulatum, *Desf. Tail. Hort. Par.* ed. II. 6, nomen. -Hab.?
Rougieri, *[Versch.1.—Cf.Gard. Chron.* (1864) 414.—Bras.
rubellum, C. Koch & Fint. Wochenschr. (1858) 288-bicolor.
rubricate, Hort. ex Lem. in FL des Series, Sèr. II. iii. (1858) 109=bicolor.
rubrovenium, Hort. ex EngL in DC. Monog. Phan. ii. 460-bicolor.
rugosum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 886=Alocasia cucnllata.
sagittaefolium, Sieber, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 464 = bicolor.
CAliADITTM :—
sagittaefolium, Vent. Jard. Cels, sub t. 30; etin Roem. Arch. ii. III. 351-= Xanthosoma sagittifollum.
sarmentosum, Hort. ex Kunth, Enum. PL iii. 36= Gonatanthus sarmentosus.
scandens, Willd. Sp. PI. iv. 489 = Culcasia scandens.
Schmittii, Lem. Illustr. Hortic. (1861) t. 297. f. 3=. Schpmburgkii.
Schoelleri, Lem. 1. c. f. 2-Schomburgkii.
Schomburgkii, *Sckoti, in Oestr. Bot. Wochenschr* (1858) 122.—Guiana.
seguinum, Vent. Jard. Cels, sub t 30; Willd. Sp. PI. iv. 490»Dieflenbachia Seguine.
Sieboldii, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 461 —bicolor.
simplex, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 108 = Aglaonema simplex.
Simsii, Hook. Bot. Mag. t. 3345 - Philodendron Simsii.
smaragdinum, *C. Koch* b* *Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1863) 13.—Am. trap,
sororium, *Schott, in Oestr. Sot. Zeitschr.* ix. (1859) 38.—Bras.
splendens, C. Koch & Fint. Wochenschr. (1858) 288 = bicolor.
splendidum, *Versch. Cat.* n. 70 (1862) 4.—Bras.
Spruceanum, Schott, in Oestr. Bot Zeitschr. ix. (1859) 38-bicolor.
Stangeanum, C. Koch, Wochenschr. (1861) 1S6 = bicolor.
steudneriaefolium, *Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 284.—N. Granat
striatipes, *Schott, Syn. Aroid.* 61.—Bras.
subrotundum, Lem. in Illustr. Hortic. (1868) Misc. 60 =Schomburgkii.
surinamense, Miq. Hort. Amstelod. (1853) = bicolor.
Thelemanni, *Versch. Cat.* n. 72 (1863) 2.—Hab. J
thripedestum, Lem. in Illustr. Hortic. v. (1858) Misc. 59 =marmoratum.
trifoliatum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 886=seq,
tripartitum, Willd. Sp. PL iv. 491=Philodendron tripartitum.
Troubettioyi, Herincq, in Fl. des Series, Sèr. II. iii. (1858) 164=picturatum.
undulatum, Steud. Norn. ed. II. ii. 219=Peltandra undulata.
utile, Hort ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 469 = Xanthosoma sagittifolium.
variegatum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 7, 385- Xanthosoma helleborifolium.
Veitchii, Henders. ex Hook. f. Bot. Mag. t 5376= Alocasia Lowii.
Veitchii, Lindl. in Card. Chron. (1869) 740 «Alocasia cuprea.
Vellonànum, Schott, in Bonplandia, vii. (1869) 168 •= bicolor.
Verschaffeltii, Lem. in Illusti. Hortic. (1858) 69.1.185 =bicolor.
miolaceum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 7 =seq. ?
violaceum, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 492=Colocasia antiquorum.
mrginicum, Hook. Exot. Fl. t. 182 - Peltandra nndnlata.
mmparum, Nees, in Schott, Melet. i. 18; Lodd. Bot. Cab. t. 281=Remusatia vivipara.
Wagneri, Hort ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 464 =bicolor.
Wightii, Lem. Illustr. Horde. (1861) 294=bicolor.
xanthorrhiton, Boos, Cat 348 = Xanthosoma Jacquini.
xanthorrhimm, Willd. Sp. PI. iv. 490=Xanthosoma sagittifolium.
lamiaefolium, Lodd. Bot. Cab. 1.1408 = Zamioculcas LoddigesiL

CALAENA, SchlechL in Linnaea, ii. (1827) 528, sphalm. -Caleana, R. Br. (Orchid.).

CALAIS, DC. Prod. vii. 85 (1839)=MioroBeria, D. Don (Compos.).
aphantocarpha, A. Gray, in Proc Am. Acad. vi. (1864-65) 652 = M. aphantocarpha.
Bigelomi, A. Gray, Pacif. Rail. Rep. iv. 113=M. Bigelovii.
Bolandm, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 866 =M. Bolanderi.
cyclocarpha, A. Gray, in Padf. Rail. Rep. iv. 113-M. Douglasii.

CALAIS:—
Douglasii, DC. Prod. vii. 85 = Microseris Douglarii.
eriocarpha, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 552 = M. Douglasii.
glauca, A. Gray, 1. c. vii. (1868) 864 = M. procera.
gracililoba, Kellogg, is Proc. Calif. Acad. v. (1878) 48 — M. major.
laciniata, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 118-M. laciniata.
Lindleyi, DC. Prod. vii. 85 = M. Lindleyi.
linearifolia, DC. 1. c. = M. linearifolia.
macTochaeta, A. Gray, PI. Fendl. 112 = M. macrocliaeta.
major, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 118-M. major.
nutans, A. Gray, 1. c =M. nutans.
Parryi, A. Gray, 1. c. 112 - M. Parryi.
platyearpha, A. Gray, 1. c. 118=M. platycarpha.
sylvatica, A. Gray, 1. c. 114 = M. tylvatica.
tenslla, A. Gray, 1. c. = M. apbantocarpha.

CATiABTAQROSTIS, Adans. Fam. it 81 (1768). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1150.
AMAGRIS, Rafin. Piinc Somiol. 27 (1814); et in Am. Monthly Mag. (1819) 190.
ATHERNOTUS, Dulac, Fl. Hautes-fyr. 74 (1867).
LECHLERA, Steud. Syn. PI. Gram. 101, in nota (1855).
PTEROPODIUM, Willd. ex Steud. Norn. ed. IL ii. 414. (1841).
aiietina, Schur, in Oeitr. Bot Zeitschr. ix. (1859) 155 — Deyeuxia acutiflora.
acratbera, *Peterm. in Flora,* xxvii. (1844) 225.—Saxonia.
acutiflora, DC. Fl. Fr. v. 255 = Deyeuxia acutiflora.
aemula, Stend. Nom. ed. II. i. 249; Syn. PI. Gram. 192 — Deyenxia Forsteri.
tgapatea, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 66.—Peruv.
agrostoides, *Boiss. Fl. Orient,* v. 522.—Reg. Caucas.
agrostoides, Spreng. Syst. i. 252 = Deyeuxia canadensis.
airoides. Stead. Nom. ed. II. i. 249—Arundo airoides.
alba, *Steud. I. c*—Pernv.
albicans, Buclcl. in Proc Acad. Sc. Philad. <1862' (1868) 92=Deyeuxia aleutica.
aleutica. Bong. Veg. Ins. Sitcha, 171 = Deyeuxia aleutica.
alpina, Host, Gram. iv. t. 61—tenella.
altissima, Host, Fl. Austr. i. 101=Arundo mauritanica.
ambigua, *Hartm. Stand. Fl.* ed. V.—Scandin.
andina, *Nutt. in Journ. Acad. Se. Philad.* N. S. 1. (1847) 187.—Cali/.
anomala, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 56.—Peruv.
antboxanthoides, *Regel, in Act. Hart. Petrop.* vii. (1880) 640.—Turkestan.
Antoniana, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 56.—Peruv.
arenaria. Roth, Tent. Fl. Germ. i. 84=Ammophila arundinacea.
argentea, DC. Fl. Fr. iii. 25=Stipa Calamagrostis.
arundinacea, Rotb, Tent. Fl. Germ. i. 33 - Deyeuxia sylvatica.
arundinacea, Wibel, Prim. Fl. Werth. 122=Deyeuxia j-cntinoi-L
Arundo, T. F. Gmel. Syst. 171 = Stipa Calamagrostis.
Arundo, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 33-Aira caespitosa.
austnlis, *Buese, in Mia. PI. Jungh.* 843.—Malaya.
aaorica, Steud. Syn. PI. Gram. 18!J=Agrostis pallida.
Balansae, *Boiss. Fl. Orient,* v. 522.—Pontus.
baltica, Trin. Gram. Unifl. 227 ; Hartm. Skand. Fl. ed. IL 20 = Ammophila baltica.
Beyrichiana, *Nees, ex Doell, in Mart. Fl. Bras.* ij. III. 63.—Bras.
bicolor, J. F. Gmel. Syst. i. 172=Ampelodesma bicolor.
Billardieri, Stend. Nom. ed. II. i. 249=Deyeuxia Billardieri.
Bolanderi, Thurb. in S. Wats. Bot Calif, ii. 280 = Deyeuxia Bolanderi.
borealis, Laest. Bidr. Vaextl. Torn. Lappm. Up*. 44-Deyeuxia neglecta.
brachytricha, *Steud. Syn. PI. Gram.* 189.—Japon.
brevifolia, Stend. Nom. ed. II. i. 249=Deyeuxia brevifolia.
breripilis, Beck, Bot. N. & Mid. St. 401=Ammophila brcvipilis.

CALAMAGROSTIS:—
Breaeri, Thurb. ex Boland. in Trans. Calif. Agr. Soc. (1864-65) 136-Deyenxia Brewed
bromoides, Nutt. Gen. Am. i. 44-Stipa Aristella.
caespitosa, Stend. Syn. PI. Gram. 189 = Agrostis pallida.
canadensis, Beanv. Agrost. 157, nomen — Deyeuxia canadensis.
canadensis, Nutt. Gen. Am. i. 46-Deyenxia Nuttalliana.
canescens, Beauv. ex Stend. Nom. ed. II. i. 249, 250 = Epigeios.
capillaris, *Nees, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 219; *Syn. PI. Gram.* 188.—Bras.
caucasica, Trin. in C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 15 = Deyeuxia acntiflora.
chalybaea, *Fries, Summa PI.* 341.—Norveg.
Chamissonis, Steud. Nom. ed. IL i. 260=Deyenxia Chamissonis.
chilensis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 89.—Chili.
chrysantha, Stend. Nom. ed. II. i. 250 = Deyenxia chrysantha.
ciliata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 193.—Nepal.
dnnoides, Spreng. Syst. i. 252 = Deyenxia Nnttalliana.
Clarionis, Loisel. Fl. Gall. 719=Deyeuxia Halleriana.
coarctata, Steud. Nom. ed. II. 1. 250=Deyeuxia coarctata.
coarctata, Torr. Fl. N. York, ii. 444=Deyeuxia Nuttalliana.
colorata, Nutt. Gen. Am. i. 46-Phalaris intermedia.
colorata, Sibth. Fl. Oxon. 87 -Phalaris arundinacea.
columbiensis, Nutt. ex A. Gray, in Proc Acad. Sc Philad. '1862' (1868) 384 = Deyeuxia LangsdorfiL
compressa, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 66.—Bras,
confinis, *Nutt. Gen. Am.* i. 47.—Am. bor.
conspicua, Bergeret, FL Pyr. i. 60-Stipa Calamagrostis.
conspicua, J. F. Gmel. Syst 172=Arundo conspicua.
crassiglumis, Thurb. ex S. Wats, in Bot. Calif, ii. 281 —Deyeuxia crassiglumis.
contracta, Dum. Obs. Gram. Belg. 126-strictat
cuspidata, *Spreng. Syst.* i. 258.—Mexic
densiflora, C. Mnell. in Walp. Ann. vi. 986-phragmitoides.
densiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 250-Deyeuxia densiflora.
deschampsioides, Trin. Ic Gram. iii. t 354= Deyeuxia deschampsioides.
dioica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 193.—Cochinch.
donaciformis, LoiseL Fl. Gall. i. 53 = Arundo Pliniana.
dubia, *Bunge, Lehm. Rel.* (1647) 348.->-As. centr.
effusa, Steud. Nom. ed. II. i. 250=Deyeuxia effuga.
elata, Blytt, Norges Fl. i. 92=phragmitoides.
eminens, *Steud. Nom.* ed. IL i. 250 = Deyeuxia eminens.
emodensis, *Griseb. in Goett. Naehr.* (1868) 30.—Reg. Himal.
epigeios, Huds. Fl. Angl. 48 ; ed. II. 54 -lanceolata.
epigeios, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1842) 529 = laxa.
epigeios, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 84.—Europ.; As. temp.
epigeios, Steud. Nom. ed. IL i. 250, sphalm. = Saccharum cylindricum.
eriantha, Stend. Syn. PI. Gram. 190 - Deyeuxia eriantha.
Falklandiae, *Steud. I. c.* 192.—Ins. Falkland,
farcta, *J. F. Gmel. Syst.* 172.—Guiana,
filiformis, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 79.—Ind. or.
fiexuosa, Rupr. Beitr. Pfl. Rnssl. iv. 34'phragmitoides.
Forsteri, Stend. Nom. ed. II. i. 250 = Deyeuxia Forsteri.
Funckii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 192.—Venezuela.
fuscata, Steud. Nom. ed. II. i. 250 = Deyeuxia fuscata.
Gaudiniana, Reichb. FL Germ. Exc 27-laneeolata.
georgica, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 887 = epigeios.
glauca, Hohen. Ennm. Taluesch. 14 = laxa.
glauca, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 27-epigeios.
glauca, Steud. Nom. ed. II. L 250-Deyeuxia Nuttalliana.
glauca, Stend. Syn. PL Gram. 187-littorea.
glaucescens, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 986 = phragmitoides.
glomerata, Boiss. & Buhse, in Mem-Soc. Nat Mosc xii. (1860) 229-epigeios.

CALAMAOHOSTIS:—
gracilescens, *Blytt, Norges Fl.* i. 88.—Norveg.
gracilis, Seenus, Reisc Istr. 73=Stipa Aristella.
gracilis, Schumach. ex Nym. Consp. 800-lanceolata.
groenlandica, *Kunth, Rev. Gram. i.* 76.—Groenl.; Labrad.
hakonensis, *Franch. V Sav. Enum. PL Jap.* ii. 599.—Japon.
Halleriana, DC. FL Fr. Suppl. 256= Deyeuxia Halleriana.
Halleriana, Fries, Summa Veg. 240-gracilescens.
Hartmaniana, Fries, 1. c. 241-ambigua.
hirtigluma, *Steud. Syn. PI. Gram.* 188.—Am. bor.
holciformis, *Jaub. V Spach, Illustr.* iv. 61.—Tibet.
Hookeriona, *Steud. Syn. PI. Gram.* 102.—Zeylan.
Howelli, Vasey, iu Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 271-Deyeuxia Howellii.
Huebneriana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 27-epigeios.
Humboldtiana, *Steud. Nom.* ed. II. L 250.—N-Granat.
hyperborea, *Lange, in Fl. Dan.* t 2942.—GroenL
inexpansa, A. Gray, ex Torr. FL N. York, ii. 445. = 152 = Deyeuxia confinis.
intermedia, Lindeb. ex Nym. Consp. 799—Hartmaniana.
intermedia, Stend. Nom. ed. II. i. 250-Deyenxia intermedia.
Jamesoni, *Steud. Syn. PI. Gram.* 191.—Ecu dor.
javana, *Steud. 1. c* 193—Java.
junciformis, Steud. Nom. ed. IL i. 250=Deyeu«» juncifonnis.
Karka, J. F. Gmel. Syst. 172=Arundo Karka.
laguroides, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 641—Turkestan.
Ldgurus, Koel. Desc Gram. 112 = Imperata arundinacea.
lanceolata, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 34.—Europ.; Astemp.
lanceolata, Stokes, in With. An. Brit PL ed. IIL 122 -epigeios.
lanceolata, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 250-purpurea.
Langsdorffii, Auct ex Nym. Consp. 799 = phragBitoides.
Langsdorffii, Trin. Gram. Unifl. 225. t. 4. *I* -Deyeuxia Langsdorffii.
lapponica, Hartm. Scand. Fl. ed. I. 46; Trin. Gram-Unifl. 226 = Deyeuxia lapponica.
lapponica, Hook. Brit Fl. ed. IV. 34=Deyen«i» neglecta.
latifolia, Blytt, Norges Fl. i. 90-phragmitoides.
laxa, *Hegetschw. Fl. Sckw.* 65.—Helvet.
laxa, Host, Gram. iv. 25=littorea.
laxior, C. MuelL in Walp. Ann. vi. 1116=Deyeiai» Hartmanniana.
Leersii, Koel. Desc. Gram. 107 - Deschampsia junce»-
Leersii, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 850, ii. 6*3 - Stipa Calamagrostis.
lenkoranensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 188.—R* Caucas.
leucantha, *Delile, ex Steud. Nom.* ed. IL i. 250=SOp» Calamagrostis.
lithuanica, Bess, in Roem. *Sc* Schnlt Add. ad M*-* ii. 602-phragmitoides.
littorea, *DC. Fl. Fr.* vi. 256.—Europ.; As. temp,
longearistata, *Fisch. exLedeb. Fl. Ross.u.* 483, nomen--Habut
longifolia, Hook. FL Bor. Am. IL 241-Ammopb>i* longifolU.
macloviana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 192.—Ins. Falkl-
maritima, *Kunth, Rev. Gram.* i. 76.—Scania.
mauritanica, Spreng. Syst. i. 252-Arundo mauritanica.
megapotamica, Steud. Syn. PL Gram. 192-And'0' pogon laguroides.
•nexicana, Kunth, Syn. iv. 478 - Muehlenbergia cabm** grostidea.
mexicana, Nntt. Gen. Am. i. 46 (excL syn.) -Deyeox"1 csn&dcnsis*
Michauxii, Trin. ex Stend. Nom. ed. II. i- 2B0* Deyeuxia canadensis.
montana, *DC. Fl. Fr.* vi. 254.—Germ, j Austr.; *G*»-
montana, Host, Gram, t 146-Deyeuxia sylvatica.
montevidensis, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. 401.—Ket, Argent
Munroana, *Boiss. Fl. Orient,* v. 523.—Afghan.
Munroi, *Boiss. 1. c.* 626.—Afghan.
rautica, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 56.—F«in,

CALAMAGROSTIS :-

Neesil•*Steud. Norn.* ed. II. i. 250; *Syn. PI. Gram.* 193. —Ind. or.

neglecta, *Gaertn. Mey. V Scherb. Fl. Wett.* L 94 = Deyeuxia neglecta.

nepalensis, */fees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 198.—Nepal.

nigricans, Mérat, Fl. Paris, ed. II. «. 33=Phragmites communis.

nipponica, *Frank.* &• *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 699.—Japon.

nuïatu, Sant. ex Reichb. Fl. Germ. Exc. 26=Deyeuxia Halleriana.

nutiainsis, Steud. Syn. PL Gram. 190-Deyeuxia nutkaensis.

"fUalliana, Steud. Nom. ed. II. i. 251=Deyeuxia uttalliana.

otecura, *Dovmar, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (18S2) I. 605.-Podol.

OMusata, *Trin. Gram. Unifl.* 225. t. 4. f. 11.—Sibir.

obtusata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 104; xxix. (1856) i. 26 = Deyeuxia deschampsioides.

ou[illegible]ia, *Bess, ex Andre. Rys Botan.* ii. (1880) 26.—

otympica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 70.—Reg. Caucas.; rersia.

Omei, *Franch.* &• *Sav. Enum. PI. Jap.* ii 598.—Japon.

"ogonensis, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad. ' 1862" (1863) 92 = Deyeuxia Langsdorffii.

(Jziaabae, Steud. Syn. PI. Gram. 198 - DeyeuxU Unzabae.

fata, Stend. Nom. ed. II. i. 261=Deyeuxia ovata.

A»«fs, Steud. 1. c. = Deyeuxia pallens.

Pallia [illegible] *P*Uidifl'ora,* C. Muell. 1. c. = phragmitoides.

Parviflora, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, iv. 36 = fycuxia sylvatica.

Witula, *Steud. Syn. PI. Gram.* 422.—Chili.

P»nro, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 120 - littorea.

ptialaroides, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) •*?[illegible]t"—Turkestan.

P[illegible]leoides, *Steud. Nom.* cd. II. i. 251. Am. austr. ?

[illegible] *Harm - Scand - Fl - et - IV - 2»*—Reg. bc.

Pl dteringii, *A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. I. 647 = Deyeuxia Pickeringii.

Pjscatoria, *Steud. Syn. PI. Gram.* 193.—Cochinch.

P'onifolia, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 251-Deyeuxia planifolia.

V/»»", J. F. Gmel. Syst 172-Arundo mauritanica.

P'wnosa, Spreng. Syst i. 253 = Stipa papposa.

Poaeoides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 423.—Reg. Magell.

Poaeoides, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 251 = Poa subuniflora.

rorteri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1862) 79 = Deyeuxia Porteri.

fudopkragmites, Aschers. Fl. Brandenb. 821 - uttorea.

P**«*dophragmites,* Blytt, Norges Fl. i. 89-phragmitoides.

rse-dophragmites, Link, ex Reichb. Fl. Germ. Exc. 26 -Deyeuxia Halleriana.

*V***phragmitis,* Koel. Desc. Gram. 106 = littorea.

•"Tvo.ri,"• Blytt, Norges Fl. i. 93 = phragmitoides.

P"jchella, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1068) 78.—d. or.

pulchella, Saut. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 26 = Deyeuxia Halleriana.

Wmla, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 176. -Ins. Galap.

*pus*S*f?Z?scens!*R- Br. in Richards. App. Frankl. Joum. a-Deyeuxia sylvatica.

P»rPnrea, *Trin. Gram. Unifl.* 219.-Sibir. baical.

ryramidalis, Host, Gram. iv. t. 49 = Deyeuxia sylvatica.

wadriseta, Spreng. Syst. i. 253 = Deyeuxia quadriseta.

*"j«MM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 133 = "luehlenbergia calamagrostidea.

*I**?™, Host, Gram. iv. t 44 = lanceolata.

ty?™' C Muell. in Walp. Ann. vi. 986=DeyeuxU "alleriana.

Tarifiora, Schur, in Oestr. Bot Zeitschr. ix. (1859) 166 » T^"1"11 sylvatica.

*r«*a,* Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 251= Deyeuxia •cctа.

fractа, Link, ex Steud. I. c.=Deyeuxia ForsterL *V-u,* Fries, Summa Veg. 240-epigeios.

CAIiAMAC*BOSTIS :—

rigida, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 251=Deyeuxia rigida.

robusta, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 986 = Deyeuxia Halleriana.

robusta, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 600.—Japon.

Royleana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 251.—Ind. or.

Roylei, Steud. Syn. PI. Gram. 193=praec.

rubella, Boiss. Fl. Orient, v, 525=littorea.

rubescens, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad. ' 1862' (1863) 92 = Deyeuxia rubescens.

rubicunda, Blytt, Norges Fl. i. 91 = phragmitoides.

rubra, Bosc, ex Kunth, Enum. PI. 478 = Erianthus saccharoides.

rudis, Steud. Syn. PI. Gram. 192=Deyeuxia scabra.

rupestris, *Trin. ex Steud. Nom.* cd. II. i. 251, *nomen ; Doell. in Mart. Fl. Bras.* ii. HI. 53.—Bras,

wchalinensis, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 202.—Terr. Amur.

scabra, *Presl, Ret. Haent.* i. 234.—Sinus Nootka.

scabrescens, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 79.—Ind. or.

Schiedeana, Steud. Syn. PI. Gram. 198 = Deyeuxia Schiedeana.

Schimperiana, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 202. —Afr. trop.

Schleicheri, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 69 -lanceolata.

Schwabii, Spreng. Syst. i. 253 = Gasttidium australe.

sciuroides, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 600.—Japon.

sedenensis, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 54=varia.

sesquitriflora, Steud. Syn. PI. Gram. 190 = Deyeuxia tolucensis.

simplex, *Boiss. Fl. Orient,* v. 523.—Reg. Caucas.

sitchensis, *Trin. ex Ledeb.. Fl. Ross.* iv. 433.—Ins. Sitcha.

spedosa, Host, Gram. iv. t. 45=Stipa Calamagrostis.

spicigera, Steud. Nom. ed. II. i. 251 = Deyeuxia spicigera.

splendens, *Steud. I. c.*—Ins. Catharin.

stricta, Koel. Desc. Gram. 105 = Deyenxia neglecta ?

stricta, *Trin. Gram. Unifl.* 226.—Enrop.; Am. bor.

strigosa, Hartm. Skand. Fl. ed. I. 46 = Deyeuxia strigosa.

subalpina, Schur, Enum. PI. Transs. 740 = Deyeuxia sylvatica.

subspicata, Desv. Opusc. 60=Trisetum subspicatum *1*

subulata, Dum. Agr. Belg. t. 9. f. 36 = montana.

subulata, Steud. Nom. ed. II. i. 251 = vaiia.

sylvatica, *Bess. Prim. Fl. Galic. i.* 70.—Europ.

sylvatica, DC. Fl. Fr. v. 253 = Deyeuxia arundinacea.

sylvatica, Host, Gram. iv. t. 48-varia.

sylvaticostricta, Kuehlew. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 429 —Deyeuxia neglecta.

tenella, *Host, Gram.* iv. t. 50.—Eur. med.; As. bor.

tenuifolia, K. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 134 = Muehlenbergia tenuifolia.

thrysoidea, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 388 = epigeios.

tianschanica, *Rupr. Sert. Tiansch.* 34.—Turkestan.

toluccensis, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 250 = Deyeuxia tolucensis.

transsylvanica, Schur, in Oestr. Bot Zeitschr. xx. (1859) 154=laxa.

Trinii, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reicb. iv. 86 - Deyeuxia acntiflora.

varia, *Beauv. Agrost.* 157.—Europ.; As. bor.

varia, Boland. ex Bot Calif, ii 280 •= Deyeuxia Bolanderi.

varia, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. iii. 477=montana.

varia, Host, Gram. iv. t. 47 = Deyeuxia Halleriana.

variegata, With. Bot. Arr. Brit. PI. ed. III. ii. 124-Phalaris arundinacea.

variflora, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 1116 = Deyeuxia Halleriana.

velutina, *Steud. Nom.* ed. II. i. 251.—Chili.

villosa, J. F. Gmel. Syst. 172 = Deyeuxia sylvatica.

villosa, Mutel, Fl. Fr. iv. 41 = Deyeuxia Halleriana.

vilnensis, Bess, ex Roem. & Schult. Add. ad Mant. Ii. 602=phragmitoides.

vinealis, *Baumg. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 188.—Transsylv.

viridescens, Steud. I. c. 192=seq.

viridiflavescens, Steud. Nom. ed. II. *I* 251=Deyeuxia viriäiflavescens.

Villdenowii, Steud. Syn. PL Gram. i. 192-Deyeuxia ForsterL

CALAMINA, Beauv. Agrost. 128. t. 28. f. 1. (1812) = Apluda, Linn. (Gramin.).

gigantea, Beauv. 1. c. 129= Apluda mutica.

gigantea, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 810=Anthistiria gigantea.

humilis, Presl, Rel. Haenk. i. 844 = AplucU mutica.

imberbis, Beauv. Agrost. 129=Anthistiria imberbis.

mutica, Beauv. 1. c = Aplnda mutica.

Sehima, Beauv. 1. c. 157 = Ischaemum laxum.

Themeda, Beauv. 1. c. = Anthistiria imberbis.

CALAMINTHA, Adans. Fam. ii. 192 (1763)-2fepeta, Linn. (Labiat.).

CALAMINTHA, [Toum.] Urn. Fl. Fr. ii. 3»3 (1778). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1190.

ACINOS, Mocnch, Mcth. 407 (1794).

CLINOPODIUM, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 170 (1737), nomen prius.

FAUCIUARDA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 402 (1867).

abyssinica, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 191.—Abyssin.

acinoides, Nym. Consp. 589 = suaveolens.

Acinos, *[Claim.] Man. Herb.* 1»7 *{err. typ.* 917).—Europ.; Reg. Caucas.

acuminata, Frivald. in Flora(xviii. (1835) 832-suaveolens.

adscendens, Willie. & Lange, Prod. Fl. Hispan. ii. 413 = officinalis.

aegyptiaca, Lam. ex Schur, Enum. PI. Transs. 531 = C. Clinopodium.

aetnensis, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 29 = alpina.

alba, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. i. 251 = Melissa alpina.

alba, Reichb. Fl. Germ. Exc. 328 = Micromeria rupestris.

alpina, *Lam. Fl. Fr.* ii. 394.—Europ. austr.; Reg. Mediterr.

annna, *Schrenck, in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* x. (1842 353.—Rossia.

arandana, *Benth. in DC. Prod.* xii. 233.—Hispan.

arvensis, Lam. Fl. Fr. ii. 3»4 = C. Acinos.

aseendens, Jord. Obs. PI. Critiv. (1846) 8 = officinal is.

athonica, Reichb. Fl. Germ. Exc 329 = C. Ncpeta.

atlantica, Ball, in Joum. Bot. xiii. (1875) 175 = C. Clinopodium.

atlantica, Cosa. in Bull. Soc. Bot. FT. ix. (1862) 176 = grandiflora.

baetica, Boiss. & Rent. Pugill. PI. Nov. (1852) 92-officinalis.

betulifolia, *Boiss. (f Bat. Diagn.* Ser. II. iv. 14.—Cilicia.

Biebersteinii, C. Koch, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 3S5--umbrosa.

bytantina, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 072 = C. Nepeta.

caerulescens, *Wedd. Chlor. And.* ii. 149. t 62—N. Granat.

cana, Anct. ex Heynh. Nom. ii. 104=graveolens.

candidissima, *Munby,ex Benth. in DC. Prod.* xii. *-2U>*.—Algeria.

canescens, Presl, Fl. Sicul. 87-C. Nepeta.

canescens, Torr. *Sc* Gray, ex Benth. in DC. Prod. xii. 229 = Conradina canescens.

caroliniana, *Sweet, Hort. Brit.* 409.—Am. bor.

chinensis, *Benth. in DC. Prod.* xii. 238.—China.

Clinopodium, *Benth. 1. c.*—Reg. bor. temp,

coccinea, *Benth. 1. c.* 229.—Am. bor.

confinis, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) SSL-China.

Corsica, *Benth. in DC. Prod.* xii. 231.—Ins. Corsica,

cretica, *Benth. 1. c.* 227.—Ins. Creti.

cretica, Lam. Fl. Fr. ii. 395 = Micromeria marifolia.

croatfea, Host, Fl. Austr. ii. 132 = Micromeria Piperclla.

cryptantha, *Vatic, in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 328. —Abyss.

debilis, *Benth. in DC. Prod.\il* 232.—Sibiria.

dentata, *Chapm. Fl. S. U. St.* 818.—Florida,

depauperata, *Bunge, Lab. Pers.* 38.—Persia.

dilatata, Schrad. Ind. Sem. Hort. Goetting. (1835) = C. Nepeta.

Einseleana, *F. Schults, Arch. Fl. Fr. et Allem.* 178.—Europ.

exigua, Nym. Consp. 589 = graveolens.

Fendii, Vis. Revis. l'l. Min. Cogn. (1855) 7 = submida.

florida, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 59.—Cilicia.

foliosa, *Opiz, Natural.* Ui. (18231 [20].—Europ.

CALAMINTHA:—
fruticosa, Stead. Nom. ed. II. i. 251 = Micromeria marifolia.
glabella, *Benth. in DC. Prod.* xii. 230.—Am. bor.
glabella, A. Gray, Man. ed. II. 307 - Nuttallii.
glabrescens, Boiss. Fl. Orient, iv. 680=staminea.
glandnlosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* S87.—Corsica.
glomerulosa, Boiss. *Sc* Heldr. ex Benth. in DC. Prod. xii. 234=origanifolia.
gracilis, *Benth. 1. c.* 282.—Java.
granatensis, Boils. *Sc* Rent. Pugill. PI. Nov. 94 =alpina.
giandiflora, *Moench, Meth.* 408.—Europ.
grandiflora, Pursb, Fl. Am. Sept. ii. 414 = carolinianagraveolens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 231.—Reg-Mediterr.; As. Min.
graveolens, Coss. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hispan. ii. 415=umbrosa.
Gussonei, Tod. ex Nym. Consp. 688-C. Nepeta.
Hanssknechti, *Bunge, Lab. Pen.* 86.—Persia.
hederacea. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 423=Nepeta Glechoma.
Herba-barona, Heynh. Nom. i. 144 - Thymus Herba-barona.
heterophylla, Heynh. 1. C.-=C. Adnos.
heterotricha, *Boiss. tf Reut. PugilL PI. Nov.* 98.—Hispan.
hispidula, *Boiss.* b* *Reut. I. e.*—Hispan.
ilicifolia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (187S) 868=Acanthomentha ilicifolia.
incana, *Boiss. ex Benth. in DC. Prod.* xii. 226.—Graecia et Ins.; Syria.
Jahniana, *Simk. in Termisz. Fűaetek,* ix. (1885) 25.—Europ.
Langei, Nym. Consp. 589=suaveolens.
longicaulis, *Benth. in DC. Prod.* xii. 234.—Reg. Himal.
macrostema, *Benth. I. c.* 229.—Mexic.
marifolia. Stead. Nom. ed. II. i. 251 = Micromeria marifolia.
maritima, *Benth. in DC. Prod.* xii. 231.—Thracia.
menthatfolia, Host, Fl. Anstr. ii. 129=officinalis.
nteridionalis, Nym. Consp. 589 = alpina.
mlmnloides, *Benth. PI. Hartw.* 881.—Calif.
mollis, Jord. ex Lamotte, Prod. ii. 599 = C. Nepeta.
moluccana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 968.—Ins. Molucc.; Timor.
montana, Lam. Fl. Fr. ii. 896=officinalis.
mnlticanlis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xx. (1875) 466.—Japon.
nebrodensis, Kern. & Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 171=alpina.
neglecta, *Opin, Natural,* iii. (1823) [20].—Enrop.
nepalensis, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. jci. 63=umbrosa.
Nepeta, *Savi, Fl. Pis.* (1798) 197.—Europ. j Afr. bor.; Oriens.
Nepeta, Willie, in Flora, xxxv. (1852) 277-officinalis.
nepetoides, Jord.Obs. PI. Crit.iv. (1846) 16 = C. Nepeta.
nervosa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 807.—Afr. bor.
nivea, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. IV. ii. (1854) 253.—As. Min.
Nuttallii, *Benth. in DC. Prod.* xii. 230.—Am. bor.
obliqua, Host, Fl. Austr. ii. 131 = C. Nepeta.
officinalis, *Moench, Meth.* 409.—Enrop.; Oriens.
origanifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. L xii. 50.—As. Min.; Syria.
origanifolia, Host, Fl. Anstr. ii. ISO = Micromeria Pulegium.
origanifolia, Vis. Fl. Dalm. ii. 190 = Micromeria origanifolia.
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 100.—Calif,
pamphylica, *Boiss.* &• *Heldr. Diagn.* Ser. I. xii. 62.—Pamphylia.
paradoxa, *Vatke, in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 327.—Abyssin.
parviflora, Lam. Fl. Fr. ii. 896 -=C. Nepeta.
patavina, Heldr. ex Nym. Consp. 688 = suaveolens.
patavina, *Host, FL Austr.* ii. 133.—Oriens; Enrop. anstr. or.
Piperella, Reichb. Ft Germ. Eicon. 828 - Thymus Piperella.
Piperella, Scbloss. & Vnkot. SyH. FL Croat. 80 = Micromeria croatica.
piperelloides, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* L (1885)96—Lycm.
Pulegium, Reichb. f. Ic. Fl. Germ, xviii. 45. *t* 1278 = Micromeria Pulegium.
pnrpurascens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 231.—Hispan.
repens, Benth. 1. c. 233=umbrosa.
rotundifolia, Benth. 1. c. 232 = umbrosa.
rotundifolia, Ces. Pass. *Sc* Gib. Comp. FL Ital. 803-alpina.
rotundifolia. Host, Fl. Aoitr. ii. 131 = C. Nepeta.
rotundifolia, Lose. & Pard. Ser. Inconf. 82 = Zizyphora acinoides.
rotundifolia, Reichb. Ic. Fl. Germ, xviii. 43=patavina.
rupestris, Host, Fl. Austr. ii. 131 = Micromeria rupestris.
simensis, *Benth. in DC. Prod.* xii. 230.—Abyssin.
spicigera, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 671 = Micromeria serpyllifolia.
Spruneri, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 68-C. Nepeta.
staminea, *Boiss. 1. c.* 51.—Kurdistan,
stenostoma, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1886) 95.—Lycia.
stricta, Reichb. Ic Fl. Germ, xviii. 44 = officinalis.
suaveolens, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 54.—Graecia.
subnuda, Host, Fl. Austr. ii. 130 = Micromeria Pulegium.
subnuda, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 329=thymifolia.
syhatica, Bromf. in Engl. Bot. Suppl. t. 2897 = officinalis.
thymifolia, *Host, Fl. Austr.* ii. 132.—Camiola.
thymifolia, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 328 = Micromeria rupestris.
trichotoma, Moench, Meth. 409 = C. Nepeta.
umbrasa, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* vi 6; ix. *Suppl.* 8.—Oriens; Ind. or.
umbrosa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 329=officinalis.
ussuriensis, *Regel VMaack, in Regel, Tent. Fl. Ussur.* 116.—Reg. Amur.
vulgaris, [Claire.] Man. Herb. 197 (err. typ. 917)=C. Nepeta.

CALAMOCHLOA, Foum. in Ball. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 178. *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1178.
filifolia, *Fount. I. c*—Mexic.

CALAMOCHLOE, Reichb. Consp. 52 (1828)- Arundlnella, Raddi (Gramin.).

CALAMOSAGUS, Griff, in Calc Journ. Nat. Hist v. (1846) 22=KorthalBia, Blnme (Palm.).
harinaefolius. Griff. Palms Brit E. Ind. 29. t 184 = K. wallichiaefolia.
laciniosus, Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 23 = K.laciniosa,
ochriger. Griff. Palms Brit. E. Ind. 31. t. 216 = K. polystachys.
polystachys, H. Wendl. in Kerch. Palm. 235, sphalm. = K. polystachys.
seaphiger, Griff. Palms Brit. E. Ind. 30. t. 148 a-K. scapnigera.
wallichiaefolius, Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist v. (1845) 24 = K. wallichiaefolia.

CALAMPELIS, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. vii. (1829) 89=EcoremocarpuB, Ruiz & Pav. (Bignoniac).
scaber, D. Don, 1. c = E. scaber.

CALAMUS, Auct. ex Linn. Gen. ed. I. 104 (1787) = Acorus, Linn. (Aroid.).
aromaticus, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ron. iv. 13 = Acorus Calamus.

CALAMUS, Linn. Sp. PI. 325 (1758). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 931.
ROTANG, Adans. Fam. ii. 24 (1763).
ROTANGA, Boerh. ex Crantz, Inst i. 127 (1766).
acanthopis, Griff. Palms Brit. E. Ind. t 216 = Daeroonorops malaccensis.
acanthospathus, *Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist.* v. (1845) 39.—Reg. Himal.
accedens, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 28= Daemonorops Draco.
adspersus, Blume, Rumphia, iii. 40-Daemonorops adspersus.
albus, *Pers. Syn.* i. 883.—Amboina.
amarus, Lour. Fl. Cochinch. 210=tennis?
amboinensis, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 20 = Daemonorops calapparius.
americanus, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 262 = Desmoncas americanas.

CALAMUS:—
amplectens, *Becc. Malesia,* ii. (1884) 78.—Borneo.
anceps, Blume, Rumphia, iii. 65. t. 149=melanolom».
andamanicus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii-(1874) 11.211.—Ins. Andaman,
angustifolius, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* •• (1845) 89—Daemonorops angustifolius.
arborescens, *Griff. I. c.* 38.—Burma,
asperrimus, *Blume, in Schult.f. Syst.* vii. 1827.—Java,
assamicus, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) !<• nomen.—Assam.
aureus, Reinw. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 341* ornatus.
australis, *Mart. I. c.* 342.—Austral.
barbatus. Macklot, in Bijdr. Nat. Wetensch, v. (1830) 178, nomen ; Blume, Rumphia, iii. 42 = Daemonorops barbatus.
Blancoi, *Kunth, Enum. PI.* iii. 595.—Ins. Philipp.
borneensis, Miq. Anal. Bot. Ind. 4-javensis.
brevifrons, Mart. Hist. Nat Palm. iii. 338 - Blancoi.
buroënsis, *Mart. 1. c.* 836.—Ins. Buro.
caesius, *Blume, Rumphia,* iii. 57.—Malaya.
calapparius, Mart Hist. Nat. Palm. ed. prior, 209 (iii. 331) •= Daemonorops calapparius.
calicarpus, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (1846) 92 = Daemonorops calicarpus.
calolepis, Miq. PL Jungh. 159 = melanoloma.
caryotoides, *A. Cunn. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* &• 838.—Austral,
castaneus, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1816) 28.-Malaya.
Cawa, *Blume, Rumphia,* iii. 31.—Amboina.
ciliaris, *Blume, in Schult.f. Syst.* vii. 1880.—Malays-
cochleatus, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 29=Daemonorops cochleatus.
collinus, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 81.—Ind. or.
concinnus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 832. t. 116.—Burma.
crinitus, Miq. Anal. Bot. Ind. 6=Daemonorops crinitus.
cuspidatus, Mann & H. Wendl. in Trans. Linn. Soc xxiv. (1864) 434. t 41 = Eremospatha cuspidata.
dealbatus, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 288 " Acanthophoenix rnbra.
deerratus, *Mann* b* *H. Wendl. in Trans. Linn. Soc.* xxiv. (1864) 429.—Afr. tropl
delicatulus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 830.—Zeylan.
depressiusculus, *Teijsm. If Sinn. Cat. Hort. Bog. 1*—Sumatra.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 594.—Malaya.
dioicus, *Lour. Fl. Cochinch.* 211.—Cochinch.
discolor, Mart Hist Nat Palm. iii. 841 - siphonospathus T
Draco, Willd. Sp. PI. ii. 203-Daemonorops Drtfco.
clcgans, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 236.—Hab. 1
elongatus, Miq. Anal. Bot Ind. 6 = Daemonorop' elongatus.
epetiolaris, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 336.—Java.
equestris, Blnme, in Schult. f. Syst. vii. 1330 = javensis.
equestris, *Willd. Sp. PL* ii. 204.—Ins. Molncc.
erectus, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 774.—R«-Himal.
exilis. *Griff, ex Mart. Hist. Nat. Palm.* ill. 338.—Malaya.
extensus, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 200, partim, 111& f. 4.=viminalis.
extensus, Roxb. Hort. Beng. 78; Fl. Ind. fti. 777[s] palustris 1
farinosus, *Linden, in Illustr. Hortic.* xix. (1872) t. 109—Sumatra.
fasciculatus, Roxb. Hort. Beng. 72; Fl. Ind. iii. 779 = viminalis.
Fernandeni, H. Wendl. in Kerch. Palm. 286[s] Oxleyanus.
fissus, Miq. Anal. Bot. Ind. 6 = Daemonorops fissos.
Flagellum, Griff, ex Mart. Hist Nat. Palm. iii. 333[s] polygamus.
rloribundus, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (184*) 66.—Reg. Himal.
Gaudichaudii, H. Wendl. in Kerch. Palm. 236 <* Daemonorops Gaudichaudii.
geminifiorus, Griff, ex Mart. Hist. Nat. Palm, iii »[38] = Plectocomia geminiflora.
geniculatus, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 67 « Daemonorops geniculatus.

CAXAHTJS:—
glaucescens, Blume, Rumphia, iii. 66=cnesius.
glaucescens, D. Dietr. Syn. PI. iL 1064 = Ceratolobus glaucescens.
gracilipes, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensck xi. (1868) n. v. 28 ^ Daemonorops longipes, *Miq.*
gracilis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 267 = Blancoi.
Pacffls, *Roxb. Hort. Beng.* 78; *Fl. Ind.* iii. 781.—Reg. Himal.
gracilis, Thwaites, Ennm. PI. Zeyl. 380 = pachystemonus.
graminosus, *Blume, Rumphia*, iii. 81.—Amboina.
grandiflorus, Steud. Norn. ed. II. i. 262, sphalm.-Ancistrophyllum aecundiflorum.
grandis, Griff, in Calc Journ. Nat. Hist. v. (1845) 84 = Daemonorops grandis.
Imffithianus, *Mart. Hist. Nat. Palm*, iii 882.—Malaya.
Guruba, *Buch-Ham. ex Kunth, Enum. PI.* iii. 210.—Reg. Himal.; Burma.
Haenkeanus, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 387 = mollis.
Helfcrianui, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) n. 218.—Burma.
liotropium, Buch.-Ham. ex Kunth, Enum. PI. iii. 210=tennis.
eferacanthus, *MacUot, in Bijdr. Nat. Wetensch.* v. (1880) 178.-N. Guinea.
Meroideus, Blume, Rnmphia, iii. 46 = ReinwardtiL
tutus, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 28=Daemonorops Hystrix.
token, Mann & H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 434 = Eremospatha Hookeri.
norrens, *Blume, Rumphia*, iii. 48.—Java.
ilis, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 689; Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 113, nomen = arborescens.
Mgelianus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 838.—Malabar.
tfw, Roxb. Hort. Beng. 72 j Fl. Ind. iii. 778 = latifolins!
Vgrophilus, Griff. Palms Brit. Ind. t. 218 C = Daemonorops hygrophilns.
ypleucus, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. d874) n. 208.—Burma.
ystrix, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 70 = Daemonorops Hystrix.
fruits, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 11 =latifoliu§.
wipus, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* y. (1845) 59. —Malaya.
termedius, Griff. 1. c. 86 » Daemonorops intermedius.
Javensis, *Blume, Rumphia*, iii. 62.—Malaya.
tf insianus, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 81 = Daemonorops Jenkinsianus.
J^tinsianus, Griff. Palms Brit Ind. 40. £ 186 A.f. 8 Won p. 89) =polygamus.
Korfhalsii, Miq. Anal. Bot. Ind. i. 6 - Daemonorops Korthalsii.
^gatus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 889.—Malaya.
«, Mann & H. Wendl. in Trans. Lfan. Soc xxiv. (1864) 480. t. 38 (Ancistrophylli sp.).—Afr. trap.
tofolius, Kurz, in Jonm. As. Soc. Beng. xliii. (W H. 20. t 31. A.=palustris.
latifoUus, *Roxb. Hort. Beng.* 78; *Fl. Ind.* iii. 776.-Burma.
hpinus, *Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch.* xi. (1868) n. v. 29.—Sumatra.
s, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. y. (1845) 73 aemonorops leptopus.
^spadix, *Griff. I.e.* 49.-Reg. Himal.
tT*!«antw, Griff. 1. c. 87=Daemonorops Lewisianus.
?i,llodigas,inIllustr.Hortic. xxx. (1888) t.499. —Malaya.
oralis, Blume, Rnmphia, iti. 4S=viminalis.
VM, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist v. (1845) 68 aemonorops longipes, *Mart.*
psetus, *Griff. 1. c.* 86.—Burma.
~EaeanttM, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. xi. (W71) 10-latifolius.
Griff, ex Mart. Hist Nat Palm. iii. 383 crns.
trocarpus, Mann & H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. *xiv. (1864) 435-Eremospatha macrocarpa.
gopterus, Miq. in Verh. Kon. Acad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 19.—Ins. Celebes.
M, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 695.—Sumatra.

CALAMTTS:—
manicatus, Teijsm. & Binn. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 185-Daemonorops crinitus.
manillensis, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 237.—Ins. Philipp.
Mannii, H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 436 = Oneocalamus Mannii.
Margaritae, *Hance, in Joum. Bot.* xii. (1874) 266.—China,
marginatus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 342.—Borneo,
maritimus, *Blume, Rumphia*, iii. 81, in adnot.—Java.
Mastersianus, Griff. In Cala Joum. Nat. Hist v. (1845) 76=C. Guruba.
maximus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 266 = manillensis f
maximus, Reinw. ex Schult. f. Syst. vii. 1383 = Plectocomia elongata.
melanacanthus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 383. t. 116. *f.* 18.—Burma.
melanochaetes, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868; n. v. 28-Daemonorops melanochaetes.
melanolepis, H. Wendl. in Kerch. Palm. 287 = Huegelianus.
melanoloma, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 209, 839. t. 116. f. 8.—Java.
Metzianus, *Schlecht. in linnaea*, xxvi. (1858-66) 727. —Ind. or.
Meyenianus, *Schau. in Nm. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl. i.* (1848) 425.—Ins. Philipp.
micracanthus, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 62.—Malacca.
micranthus, *Blume, Rumphia*, iii. 58.—Malaya.
mirabilis, Mart, ex Kunth, Enum. PI. iii. 213 = Daemonorops mirabilis.
mishmeensis. Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (3845) 55 = floribundus.
mollis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 264.—Ins. Philipp.
monoecus, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 783 = C. Rotang.
montanus, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 9 =acanthospathus.
monticolus, Griff, in Calc. Joum. Nat Hist. v. (1845) 90 =Daemonoiogs monticolus.
Muelleri, *H. Wendl. & Drude, in Linnaea*, xxxix. (1875) 193.—Austral.
niger, Willd. Sp. PI. ii. 208=Daemonorops niger.
nitidns, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 884.—Burma; Ind. or.
nivalis, Thw. ex Trimen, in Joum. Bot. xjdii. (1885) 268, sphalm.-rivalis.
nutantiflorus, Griff, in Calc. Joum. Nat Hist v. (1845) 79'Daemonorops Jenkinsianus.
oblongus, *Reinw. in Schult. f. Syst.* vii. 1823.—Java.
obstruens, F. Mnell. Fragm. v. 48-anstralis.
ochreatus, *Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch.* xi. (1868) n. v. 29.—Sumatra,
opacus, *Blume, Rumphia*, iii. 60.—Sumatra.
opacus, Mann & H. Wendl. in Trans. Linn. Soe. xxiv. (1864) 431. t. 41 = Laccosperma opaca.
omatus, *Blume, ex Schult. f. Syst.* vii. 1326.—Malaya.
ovatus, Reinw. ex- Kunth, Enum. PI. iii. 205 = omatus.
ovoidens, *Thw. ex Trimen, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 269.—Zeylan.
Oxleyanus, *Teijsm. tS Binn. Cat. Hort. Bog.* 75, nomen.—Malaya.
pachystemonus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 431.—Zeylan.
palembanicus,Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. V. 29 = Daemonorops palembanicus.
pollens, Blume, Rumphia, iii. 51 = Reinwardtii.
palustris, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1846) 60.—Burma,
paniculate, *Roxb. Hort. Beng.* [105], nomen.—Penang.
paradoxus, *KUTB, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 218. t 29, SO.—Burma.
penidllatus, Roxb. Fl. Ind. iii. 781-javensiai
periacanthus, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetenscb. xi. (1868) n. v. 28-Daemonorops periacanthus.
petiolaris. Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist v. (1846) 88=Daemonorops petiolaris.
petraeus, *Lour. Ft. Cochinch.* 209.—Cochinch.
philippensis, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16, nomen.—Ins. Philipp.

CALAMUS:—
pisicarpus, *Blume, Rumphia*, iii. 39.—Ins. Molucc.
platyacanthos, Mart, ex Kunth, Enum. PI. iii. 206 = oblongus.
platyspathus, *Mart, ex Kunth, 1. c.* 209.—Burma,
plicatus, *Blume, Rumphia*, iii. 67.—Ins. Celebes,
polygamus, *Roxb. Hort. Beng.* 73 ; *Fl. Ind.* iii. 780.—Reg. Himal.
Pseudo-Rotang, Mart ex Kunth, Enum. PI. iii. 207 - viminalis.
pulcher, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 3.—Borneo,
quinquenervius, *Roxb. Hort. Beng.* 73; *Fl. Ind.* iii. 777.—Reg. Himal.
radiatus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 431.—Zeylan.
radicalis, *H. Wendl. V Drude, in Linnaea*, xxxix. (1875) 195.—Austral,
ramosissimus, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 78.—Malaya.
ReinwaTdtii,J!/ar<. *Hist. Nat. Palm.* iii. 208. t 112.—Malaya.
Rheedei, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1845^ 73, nota.—Malabar,
rhomboideus, *Blume, in Schult. f. Syst.* vii. 133.—Malaya.
Riedelianus, *Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch.* xi. (1868) n. V. 18.—Ins. Celebes,
rivalis, *Thw. ex Trimen, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 386, 268.—Zeylan.
Rotang, *Linn. Sp. PI.* 325.—Ind. or.
Roxburghii, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 48 = C. Rotang.
Royleanus, Griff. 1. c. 40=tenuis.
ruber, Reinw. ex Kunth, Enum. PI. iii. 208 = Daemonorops Draco.
rudentum, *Lour. Fl. Cochinch.* 209.—Cochinch.
rudentum, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 340 - rivalis.
rudentum, Roxb. Hort. Beng. 72; Fl. Ind. iii. 776 = albus.
Rumphii, Blume, Rnmphia, iii. 38=Daemonorops Rumphii.
Salaita, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 252 = Zalacca edulis.
schistocanthos, *Blume, Rumphia*, iii. 49.—Sumatra.
schiaospathus, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist v. (1845) 82=erectus.
Scipionum, Lam. Encyc. vi. 304=C. Rotang.
Scipionum, *Lour. Fl. Cochinch.* 210.—Malaya.
secundiflorus, Beauv. Fl. Owar. i. 16. t. 9, 10 = Ancistrophyllum secundiflorum.
siphonospathus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 342.—IDS. Philipp.
spectabilis, *Blume, Rumphia*, iii. 55.—Sumatra.
stoloniferus, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 76 = horrens.
strictus, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 28 = Daemonorops longipes.
subangnlatus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 694.—Sumatra,
symphysipus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 836 Ins. Celebes,
tenuis, *Roxb. Hort. Beng.* 73 ; *Fl. Ind.* iii. 780.—Reg. Himal.; Burma; Cochinch.
tetradactylus, *Hance, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 289. —China.
tetrastichus, Blume, Rumphia, iii. 62 = javensis.
thysanolepis, *Hance, in Journ. Bot.* xii. (1874) 266.—China.
tigrinus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 211. t. 25-longisetus.
trichrous, Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 28-Daemonorops trichrous.
unifarius, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xvii. (1859) 158.—Ins. Nicobar. ; Java.
usitatus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 266 = Daemonorops Gaudichaudii.
usitatus, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 840 = Blancoi.
Verschaffelti, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 238 =Acanthophoenix crinita.
verticillaris, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. v. (1846) 68 -Daemonorops verticillaris.
verus, Lour. Fl. Cochinch. 210 = pisicarpus.
viminalis, *Reinw. ox Mart. Nat. Hist. Palm.* iii. S35. t.U. 111.—Celebes; Java?
viminalis, *Willd. Sp. PI.* ii. 203.—Ind. or.; Malaya.
Walkeri, *Hance, in Journ. Bot.* xii. (1874) 266.—China.
Wightii, Griff. Palms Brit Ind. 102.1216 G=Huegelianus.

CALAMUS :—
Zalacca, Gaertn. Fract. ii. 267. t. 139 - Zalacca ednlis.
Zalacca, Roxb. Hort. Beng. 72; Fl. Ind. iii. 773 = Zalacca Wallichiana.

CALANCHOE, Pere. Syn. i. 445 (1805)=Kalanchoë, Adans. (Crassulac).

CALANDARIUM, Juss. ex Stead. Nom. ed. II. i. 262 (1840) = seq.

CALANDKINIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 77. t. 626 (1823). *PORTULA CEAE,* Benth. & Hook, f. i. 168.
BAITAKIA, Ruiz & Pav. Prod. 63. t 36 (1794).
CISTANTHE, Spach, Hist. *Vig.* Phan. v. 229 (1833).
COSMIA, Domb. ex JDSS. Gen. 312 (1789).
DIAZIA, Phil. Fl. Atac. 22. t. 1 £ (1830).
GEUNSIA, MO;. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 858 (1828).
PHACOSPERMA, Haw. in Phil. Mag. i. (1827) 124.
RHODOPSIS, Lilia, Fl. Sverig. Suppl. i. 42 (1840).
TEGNERIA, Lilja, Fl. Sverig. odl. Vext. 76 (1839).
acaulis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **vi. 78—** Ecuador.
acuta, Meyen, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Snppl. i. (1843) 340=biflora.
adscendens, Hort. ex Phil. f. PI. **Vase.** Chil. 85 = pilosiuscnla.
affinis, *Gill, ex Am. in Cheek, Edinb. Journ.* **iii. (1831)** 355.—Chili.
alba, *DC. Prod.* iii. 359.—Perav.
amoena, *Vis. in Num. Sagę. Padov.* **vi. (1847) 94—** Hab.?
andicola, *Gill, in Hook. Bet. Misc.* iU. (1883) 332.—Chili.
Andrewsii, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 219.—Ind. occ.
Andreaski, Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed. 1.865 = Talinum patens.
angulata, Hort. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 53-procumbens.
arenaria, *Cham, in Linnaea,* vi. (1831) 563.—Chili,
aurea, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* **ii. 510.—Chili,**
axilliflora, *Barn. 1. c.* 486.—Chili,
balonensis, *Lindl. in Mitch. Journ. Trap. Austral.* 148.—Austral.
Berteroana, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 643—Chili.
biflora, *Meyen, Reise,* 1. 349.—Chili
brevipedata, *F. Ituell. Fragm.* x. 69.—Austral.
Breweri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* **xi. (1876) 124.** —Am. bor. occ.
Buridgii, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* **(1865) 4.—Am.** austr.
cachinalensis, *Phil. Fl. Atac.* 20.—Chili,
caespitosa. *Gill, rx Am. in Cheek, Edinb. Journ.* **iii.** (1881) 856.—Chili.
ealycina, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 75.—Chili.
calycotricha, *Phil. 1. c.* xxx. (1859-60) 188.—Chili,
calyptrata, *Hook./, in Ic. PI.* t. 296.—Austral,
capitate, *Hook, b" Am. in Hook. Bot. Misc.* **iii. (1838)** 334.—Chili,
caulescens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 78. t 526. —Ecuador; Peruv.
Chamissoi, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 497.—Chili,
chromantha, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) SO—Reg. Argent.
eiliata, *DC. Prod.* iii. 359.—Peruv.
cistiflora, *Gill, ex Am. in Cheek, Edinb. Journ.* **iii.** (1881) 865.—Chili,
colchaguensis, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* iL 483.—Chili.
compacta, *Bam. I. c.* 481.—Chili,
composita, *Benth. Fl. Austral,* i. 175.—Austral,
compressa, *Schrad. ex DC. Prod.* iii. 869.—Chili,
conferta, *Gill, ex Am. in Cheek, Edinb. Journ.* **iii.** (1831) 866—Chili,
coquimbensis, *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. **483.—** Chili,
corrigioloides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **i. 175—** Austral,
corymbosa, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* **xix.** *Suppl.* i. (1848) 341.—Chili.
Cotyledon, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* **xx. (1885)** 366.-Calif.
Cumingii, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Mix.* **iii. (1833) 884.—**Chili.

CALANDRINIA :—
curvifolia, Hort. ex Heyoh. Nom. ii. 106 » procurabens.
demissa, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 644.—Chili,
densiflora, *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 503.—Chili,
densiflora, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 642—Chili,
denticulate, *Gill, in Hook. Bot. Misc. iii.* **(1833) 333.—** Chili,
dianthoides, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 717. —Chili,
diffusa, *Gill, ex Am. in Cheek, Edinb. Journ.* **iii.** (1831) 855.—Chili.
discolor, Lindl. Bot. Reg. (1889) t. 4-Lindleyana.
discolor, *Schrad. in Linnaea,* viii. (1833) Lit 22.—Chili.
elegans, Hort. ex Vilm. Fl. PL Terre, ed. I. 149-discolor.
elegans, Spach, Hist. Ve"g. Phan. v. 232 = Menriesii.
erythrocoma, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 76—Chili.
fasciculate. *Phil. 1. c.* xxviii. (1856) 645.-Chili.
Fenzlii, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 493.—Chili,
femiginea, *Barn. I. c.* 518.—Chili,
floribunda, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 78.—Chili.
frigida, *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 495.—Chili.
fruticulosa, Kunze, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 840=trifida.
Gaudichaudii, *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 490—Chili.
Guyana, Bam. I. c. 603-biflora.
Gilliesii, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* **iii. (1833)** 338.—Chili.
glandulosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 253 = procumbens.
glauca, Schrad. ex DC. Prod. iii. 869=grandiflora.
glomerata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 644—Chili.
gracilis, *Benth. Fl. Austral,* i. 178.—Austral,
graminifolia, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 690—Chili.
grandiflora, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1194.—Chili,
granulifera, *Benth. Fl. Austral,* i. 176.—Austral,
hirtella, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 691.—Chili.
Landbeckii, *Phil. 1. c.* xxxiii. (1864-66) 77.—Chili.
Leana, *Porter, in Coult. Bot. Bull.* **i. (1876) 49—** Calif.
Lehmanni, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* **ii. 235.—** Austral.
leucocephala, *Phil. Fl. Atac.* 21.—Chili,
leucotricha, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* **(1861) 91—** Chili.
Lindleyana, Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed. II. 162 -discolor.
Lindleyana, *Walp. Rep.* ii. 235—Hab. I
linearifolia, *DC. Prod.* iii. 359.—Mexic.t
lingulata, *DC. I. c.* 858.—Perav.
lingulata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 258 •= procumbens.
liniflora, *Fenssl, in Enum. PI. Hueg.* 52.—Austral,
litoralis, *Phil. Fl. Atac.* 20.—Chili.
Llavea, Loud. Hort. Brit Suppl. i. 616, sphalm.-Cuphea Llavea.
Lockharti, *Sweet, Hort. Brit,* ed/ II. 219.—Ins. Trinit.
longiscapa, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.ii.* **492.—Chili,**
macilenta, *Barn. I. c.* 488.—Chili,
maritima, *Nutt. ex Ton.* **b" Gray, Fl. N. Am. i. 197—** Calif.
megarhiza, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 23.—Guatemala.
Menziesii, *Torr. (f Gray, Fl. N.Am.* i. 197.—Am. bor. occ.
Meyeniana, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* **xix.** *Suppl.* i. (1843) 341.—Chili,
micrantha, *Schlecht. in Linnaea,* xUi. (1839) Lit. 97. —Mexic
minima, *Bert, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 253.—Chili,
minutissima, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* **ii. 504.—** Chili.
modesta, *Phil. Fl. Atac.* 20.—Chili.
monandra, DC. Prod. iii. 859 = Monocosmia corrigioloides.
mucronulata, *Meyen, Reise,* i. 814.—Chili,
multicaulis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 641—Chili,
nevadensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1878) 623.—Am. bor. occ.
nitida, *DC. Prod.* iii. 859.—Chili.

CALANDBIHTA :—
oblongifolia, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. **482.-** Chfli.
occulta, *Phil. Fl. Atac.* 20.—Chili,
oppositifolia, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 855.—Calif.
paniculate, *DC. Prod.* iii. 868.—Peruv.
parviftora, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 263" procumbens.
Phacosperma, *DC. Prod.* iii. 359.—Peruv.
Pickeringii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* **i. U*-—Chili**
picta, Gili. ex Arn. in Cheek, Edinb. Journ. iii. (1831) 856= arenaria.
pilosiuscula, *DC. Prod.* iii. 359.—Chili,
pleiopetala, *F. Muell. Fragm.* x. 70.—Austral.
Poeppigiana, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* **xix.** *Suff'-i.* (1843) 340.—Chili.
pogonophora, *F. Muell. Fragm.* x. 69.—Austral,
polyandra, *Benth. Fl. Austral,* i. 172.—Austral,
polycarpoides, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 644.—Chili.
polyclados, *Phil. I. c.* xxxiii. (1864-65) 77.—Chili,
polypetala, *Fenel, in Enum. PI. Hueg.* 51.—Austral,
potentilloides, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 512.—Chili,
procumbens, *Moris, in Mem. Ace. Tor.* xxxvii. (1834) 100.—Chili,
prostrate, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 76 •—Chili.
ptychosperma, *F. Muell. Fragm.* iv. 187.—Austral.
pulchella, Lilja, in Linnaea, xvii. (1848) 109" Menziesii.
pomila, *F. Muell. Fragm.* x. 68.—Anstral.
pusilla, *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 485.—Chili-
pusilla, *Lindl. in Mitch. Trop. Austral.* **360—Austral.**
pygmaea, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **viii. (187»)** 623.—Am. bor. occ.
pygmaea, *F. Muell. Fragm.* i. 175.—Austral,
quadrivalvis, *F. Muell. I. c.* 176.—Austral.
racemosa, Steud. Nom. ed. II. i. 253—arenaria.
ramosissima, *Hook, (f Am. in Hook. Bot. Misc.* (1833) 834.—Chili.
rupestris. *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 485—Chili-
salsoloides, *Barn. 1. e.* 502.—Chili.
Saxifraga, *Barn. 1. c.* 506—Chili.
sericea, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* **Hi. (18»J** 834—Chili.
sericea, Poepp. ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. »»• Suppl. i. (1848) 840=Poeppigiana.
setosa, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 690.—Chili-
speciosa, Lehm. in Linnaea, vi. (1831) Litt 74 = discolor-
spedosa, Lindl. Bot. Reg. 11698-Menziesii.
spectebilis, *Otto (f Dietr. Allg. Garten:* i. (1833) I —Chili.
spergularina, *F. Muell. Fragm.* i. 175.—Austral,
spicata, *Phil. Fl. Atac.* 21—Chili,
splendens, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 499.—Chil-
strophiolata, *F. Muell. Fragm.* xi. 82.—Austral.
tenella, Hook. Bot Beech. Voy. 24-pilosiuscula.
tenuifolia, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 691.—Cl»
tricolor, *Phil. I. c.* 642.—Chili.
trifida, *Hook.* &• *Arn. in Hook. Bot. Misc.* **iii. (1** 383.—Chili.
tuberosa, *Benth. PI. Hartw.* 9.—Mexic
umbellate, *DC. Prod.* iii. 858.—Chili.
umbellata, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Ml*' iii. (1833) 834-Gilliesii.
uniflora, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* »•• (1859) 41—Austral.
venulosa, Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. C 836=arenaria.
•*venusta,* Steud. Nom. ed. II. i. 258=arenaria.
vinulosa, Walp. Rep. iii. 236—arenaria.
virgata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 642.—Cn»>-
volubilis, *Benth. Fl. Austral,* i. 174.—Austral.

CALiAMTHE, R. Br. in Bot. Reg. sub t. 673 (1821).
ORCHIDEAE, Benth. & Hook. *I* iii. 520.
AMBLYGLOTTIS, Blume, Bijdr. 369. t 64 (1825)-
CENTROSIS, Thou. Orch. lies Afr. t 85, 36 (1822).
GHIESBREGHTIA, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Ser. W iii. (1845) 28.
PREPTANTHE, Reichb. f. in Fl. des Serres, Ser. viii. (1858) 245.
STYLOGLOSSUM, Breda, Orch. Kuhl et Hass. (1827).
ZEDUBA, Buch.-Ham. ex Meissn. Gen. Comm- (1842). 280

CALANTHE:—
abbreviau, *Lindl. Gen. et Sp. Orek.* 251.—Java,
alismaefolia, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 8.—Reg. Him&l.
»Jpina, *Hook/, ex Lindl. I. c.* 4.—Reg. Hirnal.
alto, *Reichb.f. Otia Bot. Hamb.* 58.—Ins. Fiji,
ancnorifera, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1888) II. 166.—Polynesia,
"gaeciflora, *Reichb.f. in Linnaea,* xU. (1877) 76.—N. Caled.
angusta, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 7.—Reg. Himal.
angustifolia, *Lindl. Gen. el Sp.* 0«A."26O.—Malaya,
anrtulifcra, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* xxxvi. (1878) 74.—Japon.
australis, Ait. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 615 = Spiranthes australis.
Barberiana x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) 1.186.
Weilx, Reichb. f. 1.c.234.
illo r, Lindl. Sert. Orch. sub t. 9=striata.
Pba, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 8.—Reg. Himal.
wacteosa, *Reichb. f. in Flora,* lxv. (1882) 588.—Ins. Samoa,
towitoran, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7888.—Reg. Himal.
eadmigera, *Reichb.f. in Bonplandia,* v. (1867) 87.—Java.
Cefjjjae, *Hort. Low.—Cf. Gard. Chron.* (1888) I. *82—Malaya.
cMorolenca, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 10.—Reg. Hunal.
•atrina, *Scheidw. in L'Hortic. Beige,* v. (1888) 185. t. 104.—Hab.?
""ata, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7343.—Reg. Himal.; Burma,
"otorans, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) II. 860.—nab.?
co»»sa, Reichb. f. in Linnaea, xix. (1847) 874 = veratrifolia.
««spicua, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 4.—Malaya,
•^yrnbosa, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 129.—Afr. trop.
eweuligoides, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7840.—Malaya.
^Brtisu, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) II. 262.—Ins. Sondaic.
aensiflora, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7844.—Reg. Himal.
mptenrx, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) II. 894.—Ins. Sondaic.
«scolor *Lindl. Sert. Orch.* sub t. 9.—Japon.
enne*niix, Lindl. in Gard. Chron. (1858) 4.
tia gnata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 249.—Java. 48.—
orr,,* L,Hortic Bl U (183*> 238
^oerstermanni, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) I. 814.—Burma.
Mgens, Lindl. Fol. Orchid. Calanth. 10=C. Masuca.
"«cata, *Batem. ex Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 28.—Ins. Luzon.
galeata. Lindl. Fol. Orchid. Calanth. 5=chloroleuca.
••"*»«. Lodd. Cat. ex Lindl. 1. c. ll=Bletia hyacin-
gracilis, *Lindl.* in *Wall.Cat.* n. 7841.—Reg. Himal.; China.
gtacfflirna, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 8.—Ins. Carolin.
^ i tens, *Reichb.f. in Bonplandia,* IT. (1866) 822.—Granat.
grandiflora, *Nadtaudb Enum. PI. Tahiti,* 87.—Ins. r*dr.
Griffithii, *Lindl. in Paxt. Ft. Gard.* iii. (1852-68) 87. TReg. Himal.
hernacea, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 10.—Reg. Himal.
hololeuca, *Reichb.f. in Seem. Fl. Vit.* 298.—Ins. Fiji.
japon, R*j ?"' Bl***. *in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* u. au5.—Japon.
Jurwerii, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Filip.* ed. "I. *Nov. App.* 247.—Ins. Philipp.
labrosa, Burma*"'**" f, *" Gurd, ohr<m, (1M3> ,, "' ~
Langei, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* N. S. i. (1885).—N. Caled.
lentigi*nosa x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) I. 44.
lyrogloss», *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 68.—Afr. trop.
Masuca, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7837.—Ind. or.; Malaya>.
me.*u*?* Meiic, *Reuhb.f. in Linnaea,* xviii. (1844) 406.—

CALANTHE:—
natalensis, *Reichb.f. in Bonplandia,* iv. (1856) 822.—Afr. austr.
nivalis, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Filip.* ed. III. *Nov. App.* 247.—Ins. Philipp.
occidentalis, Lindl. Fol. Orchid. Calanth. 8=tricarinata.
odora, *Griff. Notul.* iii. 865.—Reg. Himal.
parviflora, *Lindl. in Paxt. Fl. Gard.* iii. (1862-63) 37, sub t. 61.—Java.
Perrottetii, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sér. IL xv. (1841) 68-veratrifolia.
Petri, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1880) II. 826.—Polynesia.
phajoQes, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1867) 37 = angustifolia.
pilosa, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 11.—Sumatra.
plantaginea, Griff. Notul. iii. 868 = Griffithii.
plantaginea, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7846.—Reg. Himal.
pleiochroma, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1871) 938.—Japon.
porphyreax, Reichb. f. 1. c. (1884) I. 76.
proboscidea, *Reichb.f. I. c.* 476.—Ins. Sondaic.
pnberula, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7342.—Reg. Himal.
pulchra, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 250.—Java,
pnrpurea, *Lindl. 1. c.* 249.—Zeylan.
reflexa, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii (1873) 68.—Japon.
Regnieri, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1888) I. 274.—Cochinch.
rosea, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 309.—Bnrma.
Sandhurstiana x, Gosse, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) I. 895.
Sedeni x, Reichb. f. 1. c. (1878) I. 168.
Sieboldi, *Decne. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1868) 80.—Japon.
speciosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 250.—Java,
speciosa, *Vieill. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvi. (1861) 44.—N. Caled.
Stevensiana, *Rignier, ex Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) I. 274, in nota.—Java?
strlata, *R. Br. in Bot. Reg.* 573, in nota.—China; Japon.
sulphnrea, *Hort. Hueg. exHeynh.Nom.ii.* 106,nomen.—Ind. or.
sumatrana, *Blanco, ex Boerl. in Hasselt V Boerl. Bijdr. Midd. Sum.* 83.—Sumatra,
sylvatica, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 250.—Madag.
sylvestrif, Lindl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 263« sylvatica.
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 87.—Ins. Tahiti.
Textori, *Miq. Ann. Mm. Bot. Lugd. Bat.* ii. 204.—Japon.
triantherifera, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 38.—Ins. Tahiti.
tricarinata, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7339.—Reg. Himal.
Turaeri, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) I. 274.—Java?
nncata, *Lindl. Fol. Orchid. Calanth.* 6.—Reg. Himal.
vaginata, *Lindl. I. c.* 7.—Assam,
variegata, *Scheidw. in L'Hortic. Beige,* v. (1838) 185. 1.105.—Hab. I
Veiiehiix, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1859) 1016.
Ventilabrum, *Reichb.f. in Seem. Fl. Vit.* 298.—Ins. Fiji,
veratrifolia, *R. Br. in Bot. Reg.* sub t. 578.—Ind. or.; Malaya; Austral.
veratrifolia, Hook. Bot. Beech. Voy.71**gracillima.
versicolor, Lindl. Sert. Orch. 42 = C. Masuca.
vestita, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7845.—Burma; Malaya.
viridi-fusca. Hook. Bot. Mag. L 4669-Tainia viridifusca.
Wightii, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 932=C. Masuca.
Zollingeri, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 711.—Java.
Zollingeri, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 38.—Java.

CALANTHERA, Kunth (1), ex Hook. Kew Journ. viii. (1856) 18=Buohloë, Engelm. (Gramin.).
dactyloides, Kunth, 1. c = Buchloë dactyloides.

CALANTHUS, Oerst in Vidensk. Selsk. Ser. V. v. (1861) 121; (Gem. Centr. Am. 47. t. 4)=AUoplectus, Mart. (Gesnerac).
multiflorus, Oerst. L c=A. multiflorus.

CAIiAXTICA, Jaub. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1867) 74. *SAMYDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 799.
cerasifolia, *Tul. I. c.* 76.—Madag.
grandiflora, *Jaub. ex Tul. 1. c.* 75.—Madag.
JalberU, Baill. Hist PI. iv. 277=Bivinia Janbertia.

CALASIAS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 64 (1836) (nom. prius)—Anisotes, Nees (Acanthac).
bracteata, Rafin. Lc.=A. trisulcus.

CATiATHTlA, G. F. W. Mey. Prim. FL Esseq. 6 (1818). *SC1TAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 658.
ENDOCODON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1836).
GOEPPERTIA, Nees, in Linnaea, vi. (1831) 837.
MONOSTICHE, Kocrn. in Regel, Gartenfl. (1858) 88.
PSYDARANTA ?, Neck. Elem. iii. 145 (1790).
ZELMIRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 50 (1836).
Ackermanni, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) 1.138.—Bras,
aemula, *Koern. 1. c.* 131.—Bras,
albicans, *A. Brongn. ex Gris, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV.xii. (1859)198.—Hab.?
affinis, *Fenil, ex Regel, Gartenfl.* (1879) 294.—Bras.?
Allouga, Steud. Nom. ed. II. i. 263=C. AUouia.
Allouia, *Lindl. Bot. Reg.* snb t. 1210.—Guiana,
altissima, *Horan. Prod. Scitam.* 13 i *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) 1.141.—Am. trop.
angustifolia, *Koern. in Regel, Gartenfl.* (1858) 87.—Am. trop.
applicata, *7. Maioy, ex E. Morr. in Belg. Hortic.* xxiv. (1874) 228.-Bras.
argyraea, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) I. 142.—Bras.
Arrabida, *Koern. 1. c.* 144.—Bras,
arrecta, *Lindl. VAndri, inllustr. Hortic.* (1871) 174. t. 77.—Ecuador.
Backemiana, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxv. (1875) 271. f. 4.—Bras.
bambusacea, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 28=Ischnosiphon bambusacea.
bella, *Regel, Gartenfl.* (1879) 297.—Hab. ?
bellula, *Linden, Cat.* n. 89 (1872) 2.—Reg. Amazon.
bicolor, Steud. Nom. ed. II. i. 253-Maranta bicolor.
blanda, *Steud. I.* c—Bras,
brasiliensis, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) 1.118.—Bras,
brevipes, *Koern. I. c.* 140.—Bras.
Cachibou, Lindl. ex Horan. Prod. Scitam. 12 = lutea.
capitata, *Lindl. Bot. Reg.* 11210.—Peruv.
Cassupito, *G. F. W. Mey. Prod. Fl. Esseq.* 10.—Venezuela.
chrysantha, *Horan. Prod. Scitam.* 18.—Bras,
chimboracensis, *Linden, lllustr. Hortic.* (1870) L 8.—Ecuador.
chlorosticta, Hort. Vind. ex Regel, Gartenfl. (1879) 294-angustifolia.
chrysoleuca, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) 1.142.—Peruv.
cinerea, *Regel, Gartenfl.* (1876) 2.—Reg. Amazon,
colorata, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 654.—Bras,
comosa, *Lindl. Bot. Reg.* sub 1.1210.—Ind. occ
composita, Klotzsch, in Schomb. Brit. Guian. iii. 918-Ischnosiphon Parkeri.
conferta, *Benth. in Benth. VHook.f. Gen.* iii. 663.—Afr. trop.
crocata, *E. Morr. & Joriss. in Belg. Hortic.* xxv. (1875) 141. t. 8.—Bras,
densa, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 83-Bras.
dicephala, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) 1.127.—Peruv.
discolor, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 7.—Guiana.
dubia, Lindl. Bot. Reg. sub t 1210=Ischnosiphon spicatus.
eximia, *Koern. ex Regel, in Gartenfl.* (1858) 87.—Am. trop.
exscapa, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) 1.122.—Peruv.
fasciata, *Regel & Koern. in Gartenfl.* (1858) 348.—Bras*
fasciculata, Presl, Reliq. Haenk. i. 108. t. 16-Phryninm fascicnlatum.
flavescens, *Lindl. Bot. Reg.* t 982.—Bras.

CALATHEA :—
Glaziovi, *Benth. in Bentk. (f Hoot.f. Gen.* iii. 654.—
Bras.
grandifolia, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1210.—Bras,
hieroglyphics, *Linden If Andre', Illustr. Hortic.* (1873)
68.1.123.—N. Granat.
Jagoriana, *Regel, Gartenft.* (1879) 297.—Bras.
juncea, Spreng. Syst. i. 8 = Ischnosiphon Arouma.
Kappleriana, *Koern. ex Horan. Prod. Scitam.* 12.—
Bras.
Koernickeana, Horan. 1. c. — brasiliensis.
Koeraickiana, *Regel, Gartenfl.* (1874) 83.—Bras.
Knmmeriana, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxv. (187S)
270. t. 15-17. f. 1.—Bras.
lanceolata, Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv.
(1862) I. 134-lonRifolia.
lateralis, *Lindl. Bot. Reg.* sub 1.1210.—Peruv.
latifolia, *Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guian.*
918.—Guiana.
laxa, Poepp. *8c* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 22.1.130 =
Ischnosiphon plurispicatus.
Legrelliana, *Regel, Gartenfl.* (1879) 801.—Ecuador,
leopardina, *Regel, 1. c.* (1877) 35. t. 898.—Bras.
leucocephala, D. Dietr. Syn. PI. i. 7 = Ischnosiphon
leucophaeus.
leuconeura, Hort. ex Nichols. Diet. Gard. i. 287-
Maranta leuconeura.
leucophaea, Poepp. *8c* Endl. Nor. Gen. et Sp. ii. 21. t.
12J = Ischnosiphon leucophaeus.
leucostachys, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6205.—Costa Rica.
Lietzei, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxv. (1875) 273. f.
8.—Bras.
Lindeni, Wallis *8c* Andre[1], Illustr. Hortic. (1871)
211. t. 82=seq.
Lindeniana, *Wallis, in Belg. Hortic.* xvi. (1866) 200
Peruv.
littoralis, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
I. 144.—Bras.
longibracteata, *Lindl. Bot. Reg. t.* 1020.—Bras,
longifolia, *Klotzsch, ex Koern. in Bull. Soc. If at. Mosc.*
xxxv. (1862) I.134.—Bras.
lutea, *G. F. W. Mey. Prod. Fl. Esseq.* 10.—Venezuela,
macilenta, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1210.—Bras,
macrostachya, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 335.
—Reg. Argent.
macrostachya, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl.
Brit. Guian. 918 = Ischnosiphon obliquus.
Makoyana, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxii. (1872) 321.
t. 24 & 25.—Bras.
Mandioccae, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) 1.138.—Bras.
Mannii, *Benth. in Bentk. (f Hook. f. Gen.* iii. 653.—
Afr. trop.
Mansonis, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) 1.119.—Bras.
marantina, C. Koch, Allg. Gartenz. (1857) 163 = C.
Casupito.
medio-picta, *Makoy, ex E. Morr. in Belg. Hortic.* xxiv.
(1874) 228.—Bras,
metallica, *Koern. ex Regel, Gartenfl.* (1868) 88.—
Hab.?
micans, *Koern. 1. c.* 87.—Peruv.
microcephala, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) I. 125.—Peruv.
miiabilis, *Makoy, ex E. Morr. in Belg. Hortic.* xxiv.
(1874) 228.—Bras,
modesta, *A. Brongn. ex Gris, in Ann. Sc. Nat.* Sir.
IV. xii. (1859) 198.—Hab. ?
monophylla, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) I. 144.—Bras.
Mytosma, *Koern. in Regel, Gartenfl.* (1858) 87.—
Guiana,
nigro-costata, *Linden (f Andre', Illustr. Hortic.* xx.
(1873) t. 144.—N. Granat.
nobilis, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
1.144.—Hab. ?
oblonga, *Koern. 1. c.* 138.—Bras.
olivaris, Hort. ex Nichols. Diet. Gard. i. 238-
Makoyana.
Oppenheimiana, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxv. (1875)
271. f. 3.—Bras.
orbiculata, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1879.—Ind. oca
ornata, *Koern. in Regel, Gartenfl.* (1858) 87.—Am. trop.
ovata, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1210.—Bras,
pachystachya, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) I. 142.—Peruv.
pacifica, *Linden (f Andre, Illustr. Hortic.* xix. (1872)
1.101.—Pernv.

CALATHEA :—
pardina. Planch. *8c* Linden, in FL des Serres, Se'x. II. i.
(1856) 53-villosa.
Parkeri, Poepp. *8c* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 22-
Ischnosiphon Parkeri.
Pavonii, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
I. 116.—Peruv.
pavonina, *C. Koch (f Linden, Belg. Hortic.* xv. (1865)
99.—Bras,
peruviana, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) 1.128.—Peruv.
picturata, *C. Koch (f Linden, ex C. Koch, Wochenschr.*
vi. (1863) 346.—Bras.
polyphylla,Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 28. t.
131—Ischnosiphon polyphyllus.
Princeps, *Regel, Gartenfl.* (1879) 802.—Reg. Amazon,
propinqua, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) I. 122.—Peruv.
pulchella, *Koern. in Regel, Gartenfl.* (1858) 87.—
Bras,
pumila, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
I. 138.—Bras.
Riedeliana, Paull, ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii.
(1875) n. 284 = Koemickiana.
rosea-picta, *Regel, Ind.Sen,.Hort. Petrop.(im)* 12.—
Am. trop.
Rossii, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) I.
144.—Bras.
rotundifolia, *Koern. 1. c.* 125.—Hab. ?
rotundifolia, Poepp. *8c* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 23
= Ischnosiphon rotundifolius.
rufibarba, *Fennl, in Regel, Gartenfl.* (1879) 294.—
Bras.!
Sellowii, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
I. 120.—Bras,
smaragdina, *Linden (f Andri, Illustr. Hortic.* (1870)
78.—Ecuador *1*
spicata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 263.—Guiana; Bras,
strobilifera, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 79.—
Surinam,
taeniosa, *G. Joriss. in Belg. Hortic.* xxvi. (1876) 83. t.
6.—Bras,
trifasdata, *Koern. in Regel, Gartenfl.* (1858) 86.—
Guiana,
tuberosa, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
1.124.—Bras.
tubispatha, *Hook. Bot. Mag.* t. 5542.—Bolivia,
umbrosa, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
I. 137.—Bras,
undulata, *Regel, Illustr. Hortic.* xix. (1872) t. 98.—
Ecuador.
Vandenheckei, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1869)
14.—Hab.?
varians, *C. Koch If Math, in App. Cat. Sem. Hort.*
Berol. (1855) 12.—Am. trop.
variegata, *Koern. in Regel, Gartenfl.* (1858) 88.—Am.
trop.
Veitchiana, *Veitch, ex Hook.f. Bot. Mag.* t. 6585.—
Bolivia?
velutina, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862)
1.127.—Peruv.
vestita, *Baker, in Sound. Ref. Bot.* v. t. 311.—Bras,
villosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1834) *Misc.* 61.—Guiana,
violacea, *Lindl. I. c.* sub t. 932; t. 962.—Bras,
virginalis, *Linden, ex Regel, Gartenfl.* (1879) 299.—
Bras.
vittata, *Koern. 1. c.* (1858) 88.—Hab. ?
Wallisi, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1869) 14.—
Reg. Amazon.
Warscewiczii, *Koern. in Regel, Gartenfl.* (1858) 87.—
Am. trop.
Widgrenl, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) 1.117.—Bras.
Wiotiana, *Makoy, ex E. Morr. in Belg. Hortic.* xxiv.
(1874) 228.—Bras.
zebrina, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1210.—Bras,
zingiberina, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.
(1862) I. 122.—Bras.

CALATHIANA, Delarb. Fl. Auv. ed. II. i. 28 (1800)-
Oentlana, Toura.
nivalis, Delarb. 1. c. = G. nivalis.

CALATHINUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 21 (1836)-
Narcissus, Town. (Amaryllid.).
cernuus, Rafin. 1. c. = N. calathinus.
multiflorus, Rafin. 1. c. = N. Tazetta?
serotinus, Rafin. 1. c. = N. serotinus.

CALATHODES, Hook. f. *8c* Thorns. Fl. Ind. i. 40
(1855). *RANUNCULACEAE,* Benth. *8c* Hook. f-
i. 7.
palmata, *Hook.f. & Thorns. 1. c.* 41.—Reg. Hirnal.

CAIJATHOSTELMA, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi.
IV. 219 (1885). *ASCLEPIADEAE.*
ditassoides, *Foum. 1. c.*—Bras.

CALBOA, Cav. Ic. v. 51. t. 476 (179»)=Ipomoea,
Linn. (Convolvul.).
globosa, Lindl. in Joum. Hort. Soc. v. (1850) 82=* I-
Llaveana.
viiifolia, Cav. Ic. v. 51. t. 476-1. peduncularis.

CALCALIA, Krock. Fl. Siles. ii. II. 381-CACALIA,
Linn.=Adenostyles, Cass. (Compos.).
alpina, Krock. 1. c. = A. glabra.

CALCARUNIA, Rafin. Med. Fl. ii. 106 (1880)-
Pontederia, Linn.
Airfare, Rafin. 1. c. = P. cordata.

CALCATRIPPA, Heist. Syst. 8 (1748)-Delphinium,
Linn. (Ranunculac).

CALCEARIA, Blume, Bijdr. 417. t. 33 (1825) - Cory-
santhes, R. Br. (Orchid.).
fornicata, Blume, 1. c.—Cor. fornicata.
picta, Blume, 1. c.=Cor. picta.

CALCEOLARIA, Deist. Syst. 5 (1748) = Cypripe-
dium, Linn. (Orchid.).

CALCEOLABIA, Linn. Mant. ii. 148 (1771)-
SCROPHULARINEAE, Benth. & Hook. *f.* ii. 929.
FXGELIA, Schwencke, in Verh. Bat. Gen. Roterd. i-
(1774) 474. t. 18.
JOVELLANA, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. i. 12 (1798).
adscendens, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1215.—Chili,
alba, *Ruit (f Pav. Fl. Per.* i. 19. t. 27.—Chili,
alternifolia, *Cav. Ic.* v. 28. t. 445. f. 2.—Peruv.
ambigua, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 32.—
Chili,
amplexicaulis, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 384.'
Ecuador.
andina, *Benth. in DC. Prod.* x. 219.—Chili.
angustiflora, Hook. Bot. Mag. t. 8094 = verticillata.
angustiflora, *Ruit* to* *Pav. Fl. Per.* i. 17, 28. t. 28.—
Ecuador.
angustifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 896 - integri-
folia.
anomala, Pers. Syn. i. 16 •= crenatiflora.
aquatica, *A. Br. tf Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol-*
(1852)2.—Hab.?
arachnoidea, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Vourfl-*
(Sept. 1828) 871; *et Bot. Mag.* t. 2874.—Chili,
araucana, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 33.--
Chili,
argentea, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 387. t. 170-
—Peruv.
Atkinsiana, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 168.
bartsiaefolia, *Wedd. Chlor. And.* ii. 134.—Bolivia,
bellidifolia, *Gill, ex Benth. in DC. Prod. x.* 207—
Chili.
bellidifolia, Salisb. Prod. 89 - Fothergillii.
Benthami, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 633.—
Chili.
Bergii, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iii. (1879)
363.—Reg. Argent.
Berterii, *Colla, in Mem. Ace. Tor.* xxxix. (1836) 138-
—Chili.
bicolor, *Ruit* b* *Pav. Fl. Per.* i. 16. t. 25.—Peruv.
bicrenata, *Ruit If Pav. 1. c.* 15. t 23.—Peruv.
bifida, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820)
63 graminifolia.
biflora, Lam. HI. i. 52; Encyc. L 556 = plantaginea.
biflora, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. i. 16. t. 20-ovata.
bipinnatifida, *Phil. Fl. Atac.* 46.—Chill.
brachiata, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i- •-•
(1820) 62-flexuosa.
brevistyla, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 175.—Chili-
Bridgesii, *Kunse, in Linnaea,* xx. (1847) 35.—Chili-
calycina, *Benth. in DC. Prod.* x. 211.—Peruv.
cana, *Cav. Ic.* v. 27. t. 443. f. 2.—Chili.
candicans, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i- >•-
(1820) 63-argentea.
canescens, Humb. ex Link, 1. c. 54=hys3opifolia.

OALCBOLAKIA.-
onescens, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst. Mant.* i. l«5.—Am. austr.
C»aw«MM,Peis. ex Steud. Nom. ed. 1.185=Fothergillii.
^"Sl[1]!??"' '*»*• »» *Awl- Univ. Chit.* (1873) 832.—Lnui.
cerasifolU, *Bentk. in DC. Prod.* x. 218.—Peruv.
ebelidonloides. *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 878—Ecuador.
chilo*buis*, LiBdl. Bot. Reg. t. 1476-dentate.
*eHi'"*oracensis*, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820) 52-saxatilis.
collina, *Phil. i[n] Linnaea*, xxix. (1857-88) 3O.-Chili.
[c]o*nanna*, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820) 51=chelidonioides.
"*nnata*, Hook, ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. (Sept. 1828) 872 = petiolaris.
coryajbosa, *Ruiz (f Pav. Fl. Per.* i. 14. t. 20.—Chili.
crass'i lia, *Phil,in Anal, Uni**_ail_ (1878>6S2
crmata, Bot. Reg. t. 790 = adscendens.
«-renata, *Lam. Encyc.* i. 556.-Ecnador.
o*natiflora, COT. *Ic.* v. 28, t 446.—Ins. Chiloe.
raneifonnis, *Ruiz (f Pav. Ft. Per.* i. 19. *t.* 27.—Ecuador.
Cunnin chm, *8hamiil Vatie,in Linnata*> A_ C[1876]) m_~
D[r]Wini i> *Benth*_ «« *DC. Prod.* x. 2O7.-Reg. Magellan.
deHexa, *Ruiz (i-Pav. ft. Per.* i. 18. t. 80.—Ecuador,
deflexa. WIUd_ « [Link]' "> Spreng. Jahrb. i. ill. (1820) w = padifolia.
densifolia, />*tf,, '* *Linnaea*> xxxiii_ (MM-M) 216.-ChUi.
dentata, if«;z &• />„„. W- /,»; s> 1 g - 1 2 9.—Chili.
•*untuulata*, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820)53 = 8 t Ft.
dicatom a, Lam. Illustr. i. 32=ovata.
df f , Lindl. Bot. Reg. 1.1374 = bicolor.
d»«ata, *Benth. in DC. Prod.* x. 214.—Ecuador.
divaricata, H. B. If K. Nov. Gen. et Sp. ii. 881.—Peruv.
eUtior, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 237.—Reg. Argent.
elliptica, *Wedd. Chlor. And.* ii. 137.—Peruv.; Boliv.
[e]r£°}des' ?"" *ex VaM*> *Enum*_ "• 130.—Ecuador.
«>oclada, *Benth. in DC. Prod.* x. 215.—Ecuador.
ex«l«a, *Hort. ex Court, in Mag. Horiic.* i. (1838) 64.—nab.?
*e*0»i*nsh*x, Hort. Angl. ex Stead. Nom. ed. II. i. 254.
fxtensa, Benth. in DC. Prod. x. 214.-Peruv.
fasciculata, *WUd' '* Link' '* Spreng*_ ?*tikr6_ lm* '"• (1820) 58—Peru.
ferruginea, *Cav.* [TM] v. 27. t. 445. f. l.-Chili.
ferruginea, Colla, in Mem. Ace. Tor. xxxviii. (1885) [18]-t. 46-integrifolia.
Jtrruginosa, Kunze, ex Walp. *8c* Schau. in Nov. Act. fill Nat. Cur. xix_ [Sn]PP[L] »• I[1843]) 397=integrifolia.
JHCauhs, *Clos, in C. Gay, Ft. Chil.* v. 181.—Chili.
S °[S] » . *Ruiz & Pav. Fl. Per.* i. 17, 26.-Peruv.
nojjbunda, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 886.-*cuad-
floribunda, Hook. Bot Mag. t. 4154-crenata.
ffiibunda, Lindl. Bot. Reg. t. 1214 = petioUris.
[io]«osa, *Griseb.in Goett. Abh.* xix. (1874) 210.—Reg. Argent
Jiusq, Meyen, ex Walp. *8c* Schau. in Nov. Act Nat. foli Cur. xix_ ^PP[L]_ >• (18*3) 395-cuneifonnis.
2™*^ *PM. in Anal. Univ. Chil.* (1878) 681.—Chili.
lotherpUii, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 30.
[l]-l—InB. Falkl.
[BC™]Jtfolia, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1881) I. 269.—**ab. ?
^*andana*, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 254 - seq.
"'*Humana*, Penny, in Loud. Hort. Brit. Snppl.i. 588-PUrpurea.
22[ell]flora, COT. *IC.* T. 80. t. 450. f. 1.—Peruv.
ChilT' *PhU, in LinHaea*> xxiJI_ (1857"58) [31]—
[ill]Wedd_ *Chlor*- A"*- «« 148.-Bolivia.
[pseudoglan-]Benth> ^DC_Prod_x>%21o "
glandulosa, Poepp. ex Benth. l.c.—Chili.
glauca, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 17- *• 27.— Peruv.
fi?J2f' *H rr* ** *Rf e[tl]> Ind_ Sem_ HoTt_ Turie_*
mala.' *~C- linna rl*> ***»'- (1851) 196.—Guate-

CAIiCEOLABIA.—
gnidiifolia, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820) 64=lavandulaefolia.
gossypina, *Benth. in DC. Prod.* x. 228.—N. Granat.
gracilis, *H. B.* &• *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 879.—Ecuador.
gracilis, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820) 62=ovata.
graminifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 886.—Ecuador,
guttata, *Willmore, exKnowles V Westc. Flor. Cab.* i. (1837)21.—Hab.?
Hartwegii, *Benth. PI. Hartw.* 147.—Peruv.
helianthemoides, *H. B. b- K. Nov. Gen.* W *Sp.* ii. 887 (err. typ. helianthoides).—Peruv.
Henrici, *Hook./. Bot. Mag.* t. 5772.—Ecuador.
Herbertiana, Lindl. Bot. Reg.-1 1813 = racemosa.
heterophylla, *Ruts V Pav. Ft. Per.* i. 16. t 21.—Peruv.
heterophylla, Willd. Enum. Hort. Berol. 29 = scabiosaefolia.
hians. Penny, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 603 •= corymbosa?
hispida, *Benth. in DC. Prod.* x. 212.—Peruv.
Hopeana, Morrison, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 606 —= corymbosa ?
Hoppeana, Morrison, ex Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 583—plantaginea.
hypericina, *Poepp. ex Benth. in DC. Prod. x.* 222.—Chili.
hypoleuca, *Benth. I. c.*—Ecuador.
hypoleuca, *Meyen, Reise*, i. 224 ; *Walp. (f Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.* i. (1843) 396.—Chili,
hyssopifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 886.—Ecuador.
inflexa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i, 16. t. 25=serrata.
integrifolia, Linn. f. Suppl. 86=ovata.
integrifolia, *Murr. Syst.* ed. XIII. 61.—Chili,
involute, *Ruit V Pav. Fl. Per.* i. 16. t. 23.—Ecuador.
Kellyana, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1888) II. 12.—Hab.?
knypersliensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 254 = crenatiflora.
lamiifolia, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 888.—Ecuador.
lanata, *H. B: if K. I. c*—Ecuador.
lanceolaU, *Cav. Ic.* v. 27.1.144. f. 2.—Patagon.
landfolia. Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820) 6-lamiifolia.
Landbeckii, *Phil, in Linnaea, xxxiii.* (1864-65) 215.—Chili.
Unigera, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1884) reimpr. 9.-Chili.
latifolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 212.—Chili,
lavandulaefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 886.—Ecuador.
laxa, *Benth. in DC. Prod.* x. 228.—Peruv.
lineaiis, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* i. 19.—Peruv.
linifolia, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. III. (1820) 64 = hyssopifolia.
lobata, *Cav. Ic.* v. 26. t. 448. f. 1.—Peruv.
Lorentzii, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 210.
Martineauaex, Low, ex Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. II. 1162:
Matthewsii, *Benth. in DC. Prod.* x. 207.—Peruv.
melissaefolia, *Benth. 1. c.* 214.—Peruv.
mendocina, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) H. 404.—Chili.
mexicana, *Benth. PI. Hartw.* 47.—Mexic.
Meyeniana, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1867-58) 82.—Chili.
mimuloides, *Clos, in C. Gay, Ft. Chil.* v. 174.—Chili.
mirabilis, Knowl. *8c* Westc. Flbr. Cab', i. (1837) 26 =crenatiflora.
mollissima, Walp. in Nov. Act. Nat Cur. xix. Snpph i. (1843) 896 ^integrifolia.
monanthos, Poir. Encyc. Suppl. ii. 24 = oniflora.
montana, Cav. *Ic.* v. 27. t. 444. f. 1.—Chili.
Morisii, *Walp. Rep.* iii. 157.—Chili.
Morrisoni, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 521 = plantaginea.
multiflora, *Cav. Ic.* v. 29. t. 449.—Peruv.
Nahuelbutae, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 581.—Chili.
nana, 5m. *Ic. Ined.* 1. 1.1. 1.—Reg. Magellan.
Neeana, Spreng. Syst. i. 44»Fothergillii.

CAIiGEOLABIA :—
nitida, Colla, in Mem. Ace Tor. xxxix. (1886) 138 = adscendens.
nivalis, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 881.—Chili.
nivalis, Steud. *8c* Hochst. ex Benth. in DC. Prod. x. 219-adscendens.
nudicaulis, *Benth. 1. c.* 208.—Chili.
nudicaulis, Meyen, ex Walp. *8c* Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 397 = plantaginea.
obovata, Stokes, Bot. Comment, i. 119 = Fothergillii.
oblonga, *Ruit V Pav. fl. Per.* i. 16. t. 24.—Peruv.
obtusifolia, Kunze, ex Walp. & Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 397 - plantaginea.
oligontha, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 216.—Chili.
ovata, *Sm. Ic. Ined.* i. S. t. 3.—Peruv.
padifolia, *H. B. if K. Nm. Gen. et Sp.* ii. 380.—Peruv.
Palpe, Steud. & Hochst ex Benth. in DC. Prod. x. 219=thyrsiflora.
panicea, Roem. *8c* Schult. Syst. i. 181, sphalm. = punicea.
paniculata, Herb, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 606-petiolaris.
paniculata, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. i. ill. (1820) 63 = floribunda.
pannosa, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 219.—Chili.
paposana, *Phil. Fl. Atac.* 46.—Chili.
paralensis, Spreng. Syst. i. 45=seq.
paralia, *Cav. Ic.* v. 2H. t. 447.—Chili.
paralia, Hook. Exot Fl. t. 75=corymbosa.
pardanthera x, W. Baxt. ex Loud. Hort. Brit Suppi. ii. 616.
parviflora, *Gill, ex Benth. in DC. Prod.* x. 207.—Chili,
parvifolia, *Wedd. Chlor. And.* ii. 134.—Boliv.
Pavonii, *Benth. in DC. Prod.* x. 211.—Peruv.
pendula, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. 155 - crenatiflora.
perfoliata, *Linn. f. Suppl.* 86.—N. Granat
perfoliata, Ruiz & Pav. H. Per. i. 15. t. 21. f. a = Pavonii.
petioalaris. *Cav. Ic.* v. 30, 451.—Ecuador.
petiolaris, Vahl, Enum. i. 186-praec.
picta, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 34.—Chili,
pinifolia, *Cav. Ic.* v. 26. t. 442. f. 2.—Chili,
pinnata, *Linn. Mant.* 171.—Peruv.
pinnata, Ruiz& Pav. Fl. Per. i. 14. t. 19=scabiosaefolia.
pisacomensis, *Meyen, Reise*, i. 469.—Peruv.
plantaginea, *Sm. Ic. Ined.* i. 2. t. 2.—Reg. Magellan,
plectranthifolia, *Walp. in Nov. Ad. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 394.—Peruv.
polifolia, *Hook. Bot. Mag.* t. 2697.—Chili.
polyantha. Penny, ex Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 583 =petioalaris.
polyrrhiza, *Cav. Ic.* v. 26. t 441.—Patagon.
pratensis, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) S3.—Chili,
pseudoglandulosa, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 176.—Chili.
pulchella, Salisb. Prod. 89-pinnata.
pulvenilenta, *Ruit (f Pav. Fl. Per. i.* 19.—Peruv.
punctata, *Vahl, Enum.* i. 177.—Peruv.
puncticulata, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1867-58) 36.—Chili.
punicea, *Ruii & Pav. Fl. Per. i.* 15. t. 24.—Peruv.
purparea, *R. Grah. in Bot. Mag. t.* 2776.—Peruv.
quadriradiata, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-68) 31.—Chili.
racemosa, *Cav. Ic.* v. 29. t. 448.—Patagon.
refugens, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 227 = arachnoidea.
repens. *Hoot./. Fl. Nov. Zel.* i. 187.—N. Zel.
robusta, A. Dietr. in Otto *8c* Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 73 = integrifolia.
rosmarinifolia, *Lam. Encyc.* i. 656.—Ecuador,
rotundifolia, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* il. 882.—Peruv.
rugosa, Hook. Exot. Fl. t. 99 - adscendens.
rugosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 19. t. 28; Lodd. Bot. Cab. t. 942 = integrifolia.
saticifolia, Colla, in Mem. Ace. Tor. xxxix. (1886) 189--sessilU?
salicifolia, *Ruiz if Pav. Fl. Per.* i. 18. t. 19.—Peruv.
salviaefolia, Pers. Syn. i. 17-integrifolia.
saxatilis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 883.—Ecuador.
scabiosaefolia, Nees, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 606 = rugosa.
scabiosaefolia, Roem. *8c* Schult. Syst i. 187=chelidonioides.

CALCEOLABIA :—
scabiosaefolia, *Sims, Bot. Mag.* t 2405.—Peniv.
scabra, *Ruit V Pav. Ft. Chil.* i. 19. t. 29.—Peruv.
scapiflora, *Benth. in DC. Prod.* x. 206.—Peruv.
Segethi, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 29.—Chili,
serrata, *Lam. Encyc.* i. 555.—Ecuador,
sessilis, *Ruit V Pav. Ft. Per.* i. 18.—Chili,
sibthoipioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 882.—Peruv.
Sinclairii, *Hook. Ic. PI.* t. 661.—N. Zel.
sparsiflora, *Kunte. in Linnaea,* xxiv. (1861) 228.—Boliv.
spectabilis, Kunze, ex Walp. & Schau. in NOT. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 896-dentata.
Standishi x, Paxt. Mag. ix. t. 75.
stricta, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 880.—N. Granat.
tenella, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 76. t. 287.-Chili.
tenera, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 34.—Chili,
tennis, *Benth. in DC. Prod.* x. 205.—Chili,
tcrniflora, *Cos. Ic.* v. 30. t. 450. f. 2.—Peruv.
tetragona, *Benth. in DC. Prod.* x. 218.—Peruv.
tctraphylla, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 35.—Chili,
teucrioides, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 212.—Am. austr.
thyrsiflora, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Sept. 1828) 372 (err. typ. 272).—Chili.
tinctoria, GilL ex G. Don, Gen. Syst. iv. 606 = arachnoidea.
tomentosa, *Ruis & Pav. Ft. Per.* i. 15. t. 22.—Peruv.
tracheliifolia, Mart. *Be* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. (1845) reimpr. 2 = meiticana.
triandra, *Vahl, Enum.* i. 181.—Peruv.
trifida, *Rui» V Pav. Ft. Per.* i. 17. t. 26.—Peruv.
trilobata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 439.—Guatemala.
tripartita, *Rut* V Pav. Ft. Per.* i. 14. t. 20.—Peruv.
umbellata, *Wedd. Chlor. And.* ii. 142.—Boliv.
undulata, *Benth. in DC. Prod.* x. 212.—Chili.
uniflora, Lam. Tabl. Meth. i. 52—nana.
uniflora, *Ruit* b* *Pav. Ft. Per.* i. 16. t. 20.—Peruv.
ntricularioides, *Hook, ex Benth. in DC. Prod.* x. 213.—Peruv.
valdiviana, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 85.—Chili.
verbascifolia, *Phil. 1. c.* SO.—Chili,
verbascifolia, *Bert, in ' Merc. Chil,* 1829' *in Bull. Fèrussac,* xx. (1830) 109, nomen.—Chili,
vernicosa, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 29.—Chili,
verticillata, *Ruiz V Pav. Ft. Per.* i. 17.—Ecuador,
violacca, *Cav. Ic.* v. 31. t. 452.—Chili,
virgata, *Ruiz V Pav. Ft. Per.* i. 20. t. 81.—Peruv.
viscosa, *RuiB b" Pav. I. c.* 18. t. 30.—Peruv.
viscosissima, *Lindl. Bot. Reg. U* 1611.—Chili.
Volckmanni, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 218.-Chili.
Wheeleri, Sweet, Brit. Flow. Card. Ser. II. t. 130 = corymbosa.
Youngii x, Lindl. Bot. Reg. t. 1448.

CALCEOLUS, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 70 (1763) = Cypripedium, Linn. (Orchid.).
alternifolius, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 62, 124 = C. Calceolus.
Marianus, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 454 = C. Calceolus.

CALCITRAPA, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 689 (1742) =• Centaurea, Linn. (Compos.).
Adami, Schur, Enum. PI. Transs. 409=Cent, solstitialis.
aegyptiaca. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218, nomen = Cent, aegyptiaca.
attissima, Lam. Fl. Fr. ii. 31 — Microlonchus Salmanticus.
aspera, Cass. in Diet. Sc. Nat. viii. 252 = Cent, aspera.
Balsamita, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 - Cent. Balsamita.
benedicta, Sweet, 1. c. = Carbenia benedicta.
breyispina, Moench, Meth. 563 - Microlonchus salmanticus.
Calcitrapa, Hill, Hort. Kew. 62 = Cent. Caldtrapa.
calcitrapoides. Hill. 1. c. = Cent. calcitrapoides.
centauroides, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218-Cent. centaurioides.
cichoracea, Lam. Fl. Fr. ii. 82-Cent. Seridii.

CALCITRAPA :—
collina, Lam. Fl. Fr. ii. 88 = Centaurea collina.
conferta, Moench, Meth. 564 = Cent, melitensis.
cucullata, Moench, 1. c. 568'Cent. Crocodylium.
elongata, Moench, 1. c. = Volutarella muricata.
eriophora, Moench, 1. c. 564—Cent, eriophora.
ferox, Moench, Meth. Suppl. 229 = Cent ferox.
fusca, Moench, Meth. 664 '•Cent, sicula.
Galactites, Lam. Fl. Fr. ii. 30=Galactites tomentosa.
heterophylla, Moench, Meth.Suppl.230-Cent.aspera.
Hippophaestrum, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 178 = Cent. Calcitrapa.
hybrida, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218-Cent. Calcitrapa.
Hypophaestum, Gaertn. Fruct. ii. 1.163=Cent. Calcitrapa.
iberica, Trev. ex Spreng. Syst. iii. 406-Cent, iberica.
laneeolata, Lam. Fl. Fr. ii.' 34-Cent, calcitrapoides.
lanuginosa,Stead. Nam. ed. II. i. 845-Kentropbyllum lanatum.
lanuginosa, Lam. Fl. Fr. ii. 35 = Carbenia benedicta.
longifolia, Willie. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 141, sphalm. = Cent, sonchifolia.
lutea, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 199-Cent, solstitialis.
myacantha, Cass. in Diet. Sc. Nat. viii. 251 - Cent. Calcitrapa.
napi/olia, Moench, Meth. 564-Cent, napifoli.i.
nudicaulis, Lam. Fl. Fr. ii. 80 = Serratula nudicaulis.
parviflora, Lam. 1. c. 32=Cent, aspera.
patibilcensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 23 = Cent, americana.
phoenicea, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.218-Cent.calcitrapoides.
pubescens, Sweet, 1. c. = Cent. incana.
reflexa, Sweet, 1. c.-Cent, reflexa.
rigida, Sweet, 1. c. —• Cent, rigida.
rupestris, Sweet, 1. c. = Cent rupestris.
sessiliflora, Lam. Fl. Fr. ii. 85-Cent, melitensis.
solstitialis. Lam. 1. c. 34-Cent, solstitialis.
sonchifolia. Lam. 1. c. 32 ; Moench, Meth. 564-Cent, sonchifolia.
sordida, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218-Cent, sordida.
stellaris, Hill, Herb. Brit. i. 76-Cent. Calcitrapa.
stellata, Lam. Fl. Fr. ii. 34-Cent. Calcitrapa.
subspinosa, Moench, Meth. Suppl. 228-Cent, diluta.
Verutum, Moench, Meth. 568-Cent. Verutum.
vulgaris, Bernh. Syst. Veri. Erf. 158-Cent. Calcitrapn.

CALCOA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 67 (1866) = Geitonoplesium, A. Cunn. (Liliac).

CALDASIA, Lag. Amen. Nat. ii. 98 (1821) - Oreomyrrhls, Endl. (Urubellif.).
andicola, Lag. ex DC. Coll. Mém. v. 12 = O. andicola.
argentea, Hook. f. in Hook. Ic. PI. iii. t 300-O. andicola.
brachycarpa, Hook. f. 1. c. nota*»O. andicola.
chaeropkyllaea, DC. Prod. iv. 229 = 0. andicola.
chaerophylloides, Lag. Amen. Nat. ii. 99 = O. andicola.
daucoides, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 1.101 - O. andicola.
eriopoda, DC. Coll. Mem. v. 60 1 2 ; et Prod. iv. 229 = O. andicola.
eriopus, DC. Coll. Mém. v. 75=0. andicola.
lasiopetala, Lag. ex DC. Prod. iv. 229-0. andicola.

CALDASIA, Mutis, ex Caldas, in Seman. Nuov. Gran. II. 26 (lBlO)-Helosis, Rich. (Balanoph.).
cayennensis, Mutis, ex Stcud. Nom. ed. II. i. 265 — H. guyanensis.
fungiformis, Mutis, ex Eichl. in DC. Prod. xvii. 136 = H. guyanensis.

CALDASIA, Willd. Hort. Berol. t. 71 (1807) = Bonplandia, Cav. (Acanthac).
heterophylla, Willd. 1. c.=B. geminiflora.

CAIiDCLUVIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. ix. (1830) 92. *SAXIFRAGEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 653.
DIETKRICA, Ser. in DC. Prod. iv. 8 (1830).
paniculata, *D. Don, I. c*—Chili.

CALDENBACHIA, Pohl, ex Nces, in DC. Prod. xi. 281 (1847) = Stenandrium, Nees (Acanthac.).
elegans, Pohl, ex Nees, 1. c. 283-S. Pohlii.
macrogranum, Nees, 1. c. 282-S. dulce.

CALDESIA, Parl. FL Ital. iii. 598 (1858) - Alisma, Linn.
parnassifolia, Parl. 1. c. 599 = A. pamassifolium.

CAUSA, Linn. Sp. PI. cd. II. 1179 (1763). *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 390.
ALLOCARPUS, H. B. *SC* K. NOV. Gen. et Sp. iv. 291, t. 405 (1820).
ALLOISFERMUM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 139.
AMPHICALEA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 411.
CALEACTE, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1818) ' 109.
CALBBRACHYS, Cass. in Diet Sc. Nat. Iv. 277 (1828).
CALYDERMOS, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 (1816).
LEMMATIUM, DC. Prod. v. 669 (1836).
LEONTOPHTHALMUM, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140.
MEYERIA, DC. Prod. v. 670 (1886).
MOCINNA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 31 (1816).
OTEIZA, La Llave, Reg. Trim. Mex. (1832) 41.
STENOPHYLLUM, Sch. Bip. ex Benth. *Sc* Hook. Gen. ii. 391 (1873).
TETRACHYRON, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 744.
acanlis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 266.—Brai-
aculeata, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 41. t 1S6 = Cassinia aculeata.
albida, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 88.—Mexic.
Amellus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1179-Salmea scandens.
angusti/olia, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 417 = multiplinervia.
angustifolia, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi-III. 256.—Bras.
aspera, Jacq. Collect, ii. 290 - Melananthera deltoidea.
axillaris, *DC. Prod.* v. 673.—Mexic.
Berteriana, *DC. 1. c.* 672.—N. Granat.
brachiata, *DC. 1. c.* 673 —Panama,
cacosmoides, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 167—Mexic.
Candolleana, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. HI. 268.-' Bras.
caroliniana, *Walt. Fl. Carol.* 200.—Am. bor.
Clausseniana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 265.—Bras.
clematidea, *Baker, I. c.* 262.—Bras,
collina, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 96.—N. Granat.
cordata, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 488.—China.
cordifolia, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1326 = jamaicensis.
coriacea, *DC. Prod.* v. 675.—Peruv.
crenata, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. "'• 256 — Candolleana.
cuneifolia, *DC. Prod.* v. 674.—Bras,
cymosa. *Less, in Linnaea, r.* (1830) 158.—Bras,
densiflora, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 96.—Peruv.
discolor, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 38.—Mexic.
divaricata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) «•—Guiana,
divergens, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi-III. 262.— Bras.
elegans, *DC. Prod.* v. 674.—Mexic.
elongata, *Baker, in Mart. Fl.Bras.* vi. HI. 255.—Bras.
eupatorioides, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii, (1848) 417-serrata.
ferruginea, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. III. 261.—Bras.
fruticosa, Benth. *8c* Hook.f. Gen. ii. 890 - rotundifol*
Gardneriana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 255.—Bras.
gentianoides, DC. Prod. v. 672 - Geissopappus go[1]tianoides.
glabra, *DC. 1. c.* 674.—Bras.
Grayii, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 96.—Peruv-
hispida, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ill. 261.—»«•*•
hymenolepis, *Baker, I. c.* 258.—Bras,
hypericifolia, *Baker, I.* c—Bras,
integrifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 206.—Mexic.
jamaicensis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1170.—Jamaica,
lantanoides, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v»-(1848) 416.—Bras.
Iemmatioides, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Br«s-*vi. III. 252.—Bras.

CALEA :—
Leontophthalmnm, *Less. Syn. Comp.* 241.—Perav.
fptophylla, Font. f. Prod. 65 = Cassinia leptophylla.
lohata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 118 = Nenrolaena lobata.
loonifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 260.—Bras.
ngifolia, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 418 = multiplinervia.
mcata, *Benth. &• Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr.*
Mtiana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 256.—Bras.
«rtinicensis, *Hort. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 255.—M. Martinic.
wlissaefolia, *Baker, in Mart. fl. Bras.* vi. HI. 257.—Brag.
microphylU, *Baker, I. c.* 259.—Bras,
ontana, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 96.—Pernv.
hplinervia, *Less, in Linnaea,* v. (1880) 159.—Bras.
Wifolia, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 891; *Baker, in Fl. Bras.* vj. HI. 259.—Bras.
», *Less, in Linnaea,* v. (1880) 168.—Bras,
jigocephala, *DC. Prodlv.* 676.-Bras.
PPositifolia, Linn. Sp. PI. ed. II. 1179=Isocarpha oppositifolia.
Bras.
parvifolia, *Baker, I. c.* 259.—Bras.
paucidentata, Sch. Bip. ex Baker, *I. c.* 266.—Bras.
891=myrBfolia.
PMnncnlaris, *//. B. b-* AT. ATOT. C««. *et Sp.* iv. 295. t. —Mexic.
*C*f*culosa,* DC. Prod. v. 678-uniflora.
Grin?.
Phyllolepis *Baher <in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 260.—Bras.
257—Bras.
-Ozothamnns piuifoUus.
pinnatifida, *Banks, ex Steud. Norn.* ed. 1.136.—Bras,
platylepis, Sch. Bip. ex Baker, *I. c.* 266.—Bras.
Promfoha, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 294. t. 406.—W. Granat.
ramosissima, Bras.
reticulata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ.* (1848) 416.—Bras.
rotundifolia, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 390; *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 258.—Bras.
rugosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* 206.—Mexic.
sabazioides, *Hemsl.* f.-Mexic.
salmaefolia, *Hemsl.* f.-Mexic.
Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 255.
Benth. b- Hook.f. Gen. ii. 391.—Mexic.
*Griseb. in Goett. Abk. xxiv. (1879) 199.—Reg.-Argent.
scoparia. Linn. Syst. Nat. ed. XII. 234»Baccharis scoparia.
senecioides, Bras.
*Senecio, Benth. & Hook. f. Gen. »391-praec.
serrata, G. Dletr. Vollst. Lex. Gaertn. i. 642 = cordifolia.
serrata, v. (1830) 158.—Bras.
sessilis, e.-M«ic
*liflora, Sto keS> Bot> Mat-Med iv- 172 p conrina nUs.
B. b- K. Nov. Gen. et Sp. iv. 295.
f«auela; Ind. occ.
Holl. PI. i. 42. t. 186 = Apaensiam.s spectabilis.
stenophylla, Bras.
subrotunda (1848 = lantanoides.
». Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. vii.
». Cass. in Diet. Sc. Nat. vi. Suppl. 82 = «enroieana intermedia.
A. V K. Nov. Gen. et Sp. iv. 294.-
tenuifolia, *Baker* Bras. vi. III.
tomentosa, *Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 418.—Bras.

CAIiEA:—
tomentosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 88.—Mexic.
trifida, Moench, Meth. 681 -jamaicensis.
uniflora, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 159.—Bras,
urticaefolia, *DC. Prod.* v. 674.—Mexic.
verbenaefolia, *DC. I. c.* 678.—Am. trop.
villosa, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 262.—Bras.
Zacatechichi, *Schlecht. in Linnaea,* ix. (1884) 589.—Mexic.

CALEA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 113 (1788) - Neurolaena, R. Br. (Compos.).
lobata, Sw. 1. c.=N. lobata.

CALEACTE, R. Br. in Trans. Unn. Soc. xii. (1818) 109 = Calea, Linn. (Compos.).
pinnatifida, R. Br. I. c.=Calea pinnatifida.
rotundifolia, Less, in Linnaea, v. (1830) 158-Calea rotnndilblia.
urticifolia, R. Br. in Trans. Linn. Soc xii. (1818) 109 = Calea urticaefolia.

CAIiEAXTA, R. Br. Prod. 329 (1810). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 610.
CALEYA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 204 (1813).
major, *R. Br. Prod.* 829.—Austral,
minor, *R. Br. I. c*—Austral,
nigrita, *Lindl. Swan Riv. App.* 54.—Austral.

CALEBRACHYS, Cass. in Diet. Sc. Nat. lv. 277 (1828) = Calea, Linn. (Compos.).
peduncularis, Cass. 1. c. = Calea peduncularis.

CAIiECTASIA, R. Br. Prod. i. 263 (1810); et in Flind. Voy. ii. 609. t. 9 (1814). *JVNCACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 866.
HuiTiA.Preiss, ex Hook. Bot Mag. t. 3834 (1840).
cyanea, *R. Br. Prod.* 264.—Austral.
grandiflora, Preiss, in Lehm. PI. Preiss. ii. 68 = cyanea.
intermedia, Sond. in Linnaea, xxviii. (1856) 222 = cyanea.

CALENDULA, Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 454.
CALTKA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 126 (1763).
aegyptiaca, *Desf. Tail. Hort. Par.* ed. I. 100.—Reg. Mediterr. or.; Mesopot.
algarbiensis, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 106=suffrnticosa.
algeriensis, *Boiss. V Reut. in Boiss. 1. c.* 109.—Algeria.
americana, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 10.—Mexic.
amplexieaulis, Thunb. Prod. PI. Cap. 164 = Tripteris amplexicaulis.
amplexifolia, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 382-arvensis.
anemoneflora, *Breit. ex DC. Prod.* vi. 454, nomen.—Hab.l
arborescens, Jacq. Collect. Iii. 167 =» Tripteris arborescens.
arragonica, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 256.—Hispan.
arvensis, Bieb. Fl. Taur. Cauc.iii. 596-persica.
arvensis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 838=aegyptiaca.
arvensis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1308.—Europ.; Orient.
aspera, Thunb. Prod. PI. Cap. 164 = Osteospermum asperum.
Asterias, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 81 = stellata.
aurantiaca, Kotschy, ex Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 96 = sinuata.
aurea, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 266.—Afr. austr.
Balansae, *Boiss. tf Reut. Diagn.* Ser. II. vi. 107.—Hispan.
bicolor, Rafin. CaratL 82. n. 199-arvensis.
brachyglossa, Rupr. in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1852); ex Bull. Phys.-Math. Acad. Pitereb. xiv. (1866) 230 = arvensis.
byzantina, DC. Prod. vi. 458=arvensis.
cariensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 82.—As. Min.
ceratosperma, Viv. Fl. Lib. Spec. 59. t. 20=palestina.
chrysanthemifolia. Vent. Jard. Malm. 66 = Dimorphotheca chrysanthemifolia.
cornuta, Poir. Encyc. vii. 277-stellata.

CALENDULA:—
Cnstagalli, Viv. Fl. Lib. Spec. 59. t. 26. f. 2 = sicula, stellata.
cuneata, Thunb. Prod. PI. Cap. 164 = Dimorphotheca cuneata.
Dalgesirum, Hort. ex DC. Prod. vi. 452 -marginata.
decumbens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Mexic.
decurrens, Thunb. Prod. PI. Cap. 163 = Dimorphotheca pluvialis.
dentata, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 136=denticulata.
denticulata, *Schousb. in Willd. Enum. Hort. Berol.* 936.—Maurit.
diffusa, Salisb. Prod. 209 =. Dimorphotheca fruticosa.
echinata, DC. Prod. vi. 453=arvensis.
eriocarpa, *DC. 1. c.*—Hab. 1
flaccida. Vent. Jard. Malm. 20 = Dimorphotheca aurantiaca.
Forskohleana, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 256 = stellata.
fruticosa, Hort. ex DC. Prod. vi. 452-suffrutlcosa.
fruticosa, Linn. PI. Afr. Rar. 25 (Amoen. Acad. v. 25; = Dimorphotheca fruticosa.
fulgida, Rafin. Caratt. 83. n. 200=suffrnticosa.
glabrata, Thunb. Prod. PI. Cap. 163=Osteospermum glabratum.
glauca, *Salisb. Prod.* 209.—Hab. *1*
gracilis, DC. Prod. vi. 463^-penica.
graminifolia, Linn. Sp. PI. 922 «Dimorphotheca graminifolia.
grandiflora, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 256.—Afr. austr.
hispanica, Hort. ex DC. Prod. vi. 452 = suffrnticosa.
hispida, Thunb. Prod. PI. Cap. 164 = Aster hispidus.
hybrida, Linn. Sp. PI. 921 = Dimorphotheca hybrida.
hybrida, Sweet, Brit. Flow. Gard. i. t 39 = Dimorphotheca pluvialis.
incana, Willd. Sp. PI. iii. 2841=suffruticosa.
incanescens, *Schrad. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 256.—Hab.?
linifolia, *Wendl. ex DC. Prod.* vi. 454, nomen.—Hab. |
lusitanica, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 83=su(Truticosa.
maderensis, *DC. Prod.* vi. 454.—Ins. Madera.
magellanica, Willd. Sp. PI. iii/ 2844 = Lagenophora Commersonii.
maladtana, Boiss. & .Reut. Pugill. (1852) 61 = aegyptiaca.
malvaecarpa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 38.—Algeria.
marginata, Willd. Enum. Hort. Berol. 9S5 = «uffruticosa.
maritime, *Guss. Ind. Sem. Hort. Bocc.* (1825).—Sicilia.
maritima, Lowe, ex DC. Prod. vi. 454 = maderensis.
maroccana, *Ball, in fount. Bot.* xi. (1873) 365.—Marocco.
micrantha, Boiss. & Noe, Diagn. Ser. II. vi. 111 = aegyptiaca.
micrantha, Tineo *Sc* Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 874-arvensis.
microcephala, Krai, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xv. 99. t. 891= aegyptiaca.
microcephala, Lanee, ex Ficalho, in Bol. Soc. Broter. i. (1883)51=suffruticosa?
microphyla, *Lange, ex Ficalho, 1. c.*—Hispan.
Monardi, *Boiss. V Reut. Diagn.* Ser. II. vi. 108.—HUpan.
monstrosa, Bnrm. f. Fl. Cap. Prod. 28 = Tripteris scariosa.
muricata, Thunb. Prod. PI. Cap. 164= Tripteris arborescens.
Nolana, Boiss. Fl. Orient iii. 416-suffrnticosa.
nudicaulis, Linn. Sp. PI. 922 — Dimorphotheca nudicaulis.
offidnalis, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mote. (1833) 256 =persica.
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 921.—Europ. austr.
oppositifolia. Ait Hort. Kcw. iii. 272 = Dimorphotheca oppositifolia.
palestiua, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 83.— Palestin.; Mesopotam.
parviflora, DC. partim, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 419 - aegyptiaca.
parviflora, Rafin. Caratt. 83. n. 201 = stellata.
parviflora, Thunb. Trod. PI. Cap. 163=Oligocarpus calendalaceus.

CALENDULA:—
persica, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Caue.* 72.—Reg. Caucas.; Persia; Afghan.
pinnata, Thunb. Prod. PI. Cap. 164-Chrysanthemum lidbeckioides.
platycarpa, Coss. in Bull. Soc. Bot Fr. iiL (1856) 655 -stellata.
pluvialis, Linn. Sp. PI. 921 = Dimorphotheca pluvialis.
pluvialis, Thnnb. FL Cap. 704 - Dimorphotheca clandestina.
prolifera, Hort. ex Stend. Norn. ed. II. i. 256 =• officinalis.
pumila, Font. f. Prod. 57 •= Lagenophota Commersonii.
pusilla, Thou. FI. Trist. Acun. 40=Lagenqpbora Commersonii.
repanda, Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II. id. 110-palettina.
rigida, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 271 = Tripteris arborescms.
rosmarinifolia, Hontt. Handl. xi. 84 = Osteospermum potygaloides.
sancta, Linn. Sp. PI. ed. II. 1304«-aegyptiaca ?
scabra, Berg. Desc. PL Cap. 310-Dimorphotheca pluvialis.'
sicula, DC. Prod. vi. 452 (pi. aegypt.)-aegyptiaca.
sicula, Cyrill. ex Balb. Hort. Taur. (1800) = stellata.
sicula, Poir. Encyc. vii. 277 —praec!
sinuate, *Boiss.* b* *Gaill. Diagn.* Ser. II. vi. 109.—Syria; Persia.
spatulata, .Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. .iii. 24 = stellata.
stellata. *Cav. Ic.* i. 3. L 6.—Reg. Mediterr.
stellata, Lowe, ex DC Prod. vi. 454 —maderensis.
stipitata, Spreng. Syst. iii. 624 = Lagenopbora Billardieri.
subinermis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 84.—Algeria.
sublanata, Reichb. f. Ie. Fl. Germ. xv. 99. t 891 = arvensis.
suffruticosa, *Vakl, Symb. Bot.* ii. 94.—Reg. Mediterr. occ.
thapsiaecarpa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 34.—Algeria.
tomentosa, Desf. Fl. Atlant. ii. 805. t 245 = suffruticosa.
tomentosa, Thunb. Prod. Fl. Cap. 163=Tripteris tomentosa.
Tragus, Ait. Hort. Kew. iii. 271; Jacq. Hort. Schoenb. ii. 14.1.153-Dimorphotheca Tragns.
Tragus, Curt. Bot. Mag. t. 408 = Dimorphotheca aurantiaca.
tripterocarpa, *Rupr. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1853); *ex Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* xiv. (1856) 231.—Mesopot.
undulata, J. Gay, ex Gaud. Fl. Helv. y. 417 = arvensis.
undulata, Rafin. Caratt. 81. n. 198=stellata.
versicolor, Salisb. Prod. 209 = Dimorphotheca hybrida.
viscosa, Andr. Bot. Rep. t. 412 = Dimorphotheca cuneata.

CALEPINA, Adans. Fam. ii. 428 (1763); DC. Syst. Veg. ii. 648. *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 96.
cachlearioides, Dum. Fl. Belg. 121 = Bunias cochlea. rioides.
Corvini, *Desv. Joum. Bot.* iii. (1814) 158.—Europ. med.; Reg. Caucas.; Persia.
prostrata, Spreng. Syst. ii. 850—Maricaria prostrata.

CALESIA, Rafin. Princ. Somiol. 29 (1814) -seq.

CALESIAM, Adans. Fam. ii. 446 (1763) = Odina, Roxb. (Anacard.).

CALETIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 553. t. 26 (1858) = Miorantheum, Desf. (Euphorbiac).
divaricatissima, Muell. Arg. in Linnaea, xxxti. (1863) 79 = Pseudanthns divaricatissimus.
hexandra, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 194-M. hexandrum.
linearis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 70 = Pseudanthus orientalis.
micrantheoides, Baill. Etud. Gén. Euph. 554. t. 26. f. 1 = M. hexandrum.
orientalis, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 827-Pseudanthus orientalis.

CALETIA •_
otwfcYoKa, Muell. Arg. in Linnaea, xxriv. (1866-66)65 -Psendanthns ovalifolins.
Wilhelmi, F. Muell. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 194=Pseudanthus ovalifolius.

CALEYA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 204 (1813)=Caleana, R. Br. (Orchid.).
major, R. Br. 1. c.=Caleana major.
minor. Sweet, Hort. Brit. ed. I. S85 = Caleana minor.
Sullivani, F. Muell. in Melb. Chemist (1882) 44.—Austral.

CALIBRACHOA, Cerv. in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. (1826) 8 = Petunia, Juss. (Solanac).
mexicana, Lex. 1. c.-P. parviflora.
procumbens, Cerv. 1. c—P. viscidula?

CALICERA, Cav. Ic. iv. 84. t. 858 (1797)-Calyeera, Cav.

CAIiICOXEMA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 34 (1880). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook, f. 1. c.
capitata, *Hook.f. I. c.* 85.—Afr. austr.

CALICOTOME, link, in Schrad. Neues Joum. ii.(1808) n. 60=Calycotome, Link (Legumin.).

CALIGULA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 28 = Agapetes, G. Don (Vacciniac).
odontocera, Klotzsch, 1. c. = A. variegata.
pulekerrima, Klotzsch, 1. c. = A. variegata.

CALIMERIS, Nees, Gen. et Sp. Ast. 225 (1883)-Aster, Tourn. (Compos.).
Alberti, Regel, Gortcnfl. (1884) ISO.—Turkestan.
altaica, Nees, ex Fisch. Mey. & Ave-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 52 = A. altaicus.
alyssoides, DC. Prod. v. 259 = A. alyssoides.
amplexifolia, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. m. (1846) 182 = A. trinervius.
biennis, Ledeb. Fl. Ross. ii. 483 =. Heteropappus hispidus.
biennis, Nees, Gen. et Sp. Ast 231.*-A. altaicus.
canescens, Nees, 1. c. 229 = A. altaicns.
cassiarabica, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. HI. 343=Aster cassiarabicus.
chinensis, Sch. Bip. in Flora, xxxv. (1852) 48 = A. altaicus.
ciliata, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-69) 894=A. altaicus.
ciliosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 61-A. altaicus.
cordata, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 126, nomen.—Malaya.
eoronata, Sch. Bip. in Flora, xxxv. (1852) 48-A. altaicus.
distortus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xix. (1846) II. 152 = A. altaious.
exilis, Lindl. ex DC. Prod. v. 259=A. altaicus.
fastigiata, Sch. Bip. in Zoll. Syst Verz. Ind. Archip. 126 = A. fastigiatus.
flexuosa, Royle, «x Lindl. in DC. Prod. v. 258-A. Thomsoni.
hispida, Lindl. 1. c. 259 =» A. altaicus.
hispida, Nees, Gen. et Sp. Ast. 227=Heteropappus hispidus.
indsa, DC. Prod. v. 258 = A. indsus.
indiea, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 125 = Boltonia indiea.
integrifolia, Turcz. in DC. Prod. v. 259.—Reg. Amur.
japonica, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 126=A. fastigiatus.
microeephala, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 169. —Japon.
platycephala, Nees, Gen. et Sp. Ast. 226=A. indsus.
rosea, DC. Prod. v. 269 = A. roseus.
tatarica, Lindl. ex DC. Prod. v. 259 •= Heteropappus hispidus.

CALINEA, Aubl. PI. Gni. i. 556. t. 221 (1776)-Doliocarpua, Boland. (Dilleniac).
scandens, Anbl. 1. c.=D. Calinea.

CALINUX, Rafin. in Med. Repot. New York, v. (1808) 862-Pyrularia, Micbx. (Santalac.).

OAIiIFHHTJBTA, Herb, in Bot. Reg. (1844) Misc. 87- *AMARYLUDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 731' Hartwegiana, *Herb. I. c.*—N. Granat.
subedentata, Baker, in Bot Mag. t. 6289-Euchans subedentata.

CALIPOGON. Rafin. Atl. Joum. 148 (1832)-Calopogon, R. Br. (Orchid.).

CALISAYA, Hort. ex Pav. Nnev. Quinol. sub t. 6.p- < (1862); Howard, Quinol. E. Ind. 86 (1869) = Cinchona, Linn. (Rubiac.).
anglicax, Hort. ex Howard, 1. c. 87.
javanica, Hort. ex Howard, 1. c. 86-Cinch. Calisaya.

CALISPERMUM, Lour. Fl. Cochinch. 157 (1790) -Embella, Juss. (Myrsin.).
scandens, Lam. 1. c = E. Ribes.

CALISTA, Ritg. in Marb. Ges. Schrift. ii. 128 (1881) * CALLISTA, Lour.=Dendrobium, Sw. (Orchid.)-

CALISTACHYA, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 852 = Veronioa, Tourn. (Scrophular.).
alba, Rafiir. 1. c.=V. virginica.

CALIUS, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.698 (1837)=StreblU8, Lour._(Urticac).
lactescens, Blanco, L c. — S. asper.

CALIXNOS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 82 (1686) (qnidi).
trinervius, Rafin. 1. c. = Convolvulus trinervis; 'non Convolvulacea,'sec. Choisy.

CALLA, Linn. Syst. ed. I (1735). *AROIDEAE,* Benth. 8c Hook. f. iii. 989.
CALLARIA,Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 26'-HOUTTINIA, Neck. Elem. iii. 291 (1790).
PROVENZALIA, Adans. Fam. ii. 469 (1763).
aethiopica, Gaertn. Fruct. ii. 20. t. 84=palustris-
aethiopica, Linn. Sp. PI. 968 = Zantedeachia aethiopic*-
ambigua, Salisb. Prod. 262 = Zantedeschia aetbiopica-
angustifolia, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. 1- P-24 -Chamaecladon angustifolium.
aromatica, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 619« Homalomena aromatica.
Badian, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.658=Alocasia '^V»-
calyptrata, Roxb. Hort Beng. 66; Fl. Ind. iii. 614 °* Schismatoglottis calyptrata.
cordifolia. Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 826=palustris.
Dracontium, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 197 " Monstera pertusa.
Gaby, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 659.—Ins. Philipp-
humilis, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. I. p. 23 -Chamaecladon humile.
maxima, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 658.—Ins. PhilipP-
montana, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 62 = Anadendm* montanum *vel* Rhaphidophora montana.
moschata, Moench, Meth. 346 = Richardia elliptica.
nitida, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. I. p. *M** Aglaonema nitidum.
oblongifolia, Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 516 -Aglaonema marantifolium.
occulta, Lodd. Bot.Cab. t. xii. = Homalomena aromaticf-
occulta, Lour. Fl. Cochinch. ii. 632-Zantedeschi* occulta.
oculata, Undl. in Gard. Chron. (1859) 788 = Richa«H» melanoleuca.
orientalis, Linn. Sp. PI. ed. II. 1373=Biarum Bovei-
ovatofolia, Gilib. Exercit. ii. 452 = palustris.
palustris, *Linn. Sp. PI.* 968.—Europ.; As. bor.; *»• bor.
pertusa, Kunth, Syn. i. 129-Monstera pertusa.
picta, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 616-Aglaonema pictum.
polyphylla, *Blanco, Fl. Filip.* ed. 1.659.—Ins. PhilipP'
radicans, Ruiz & Pav. ex Engl. in DC. Monog-Phan. ii. 877 = Philodendron deltoideum.
rubescens, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl Ind. iii. 5[16=>] Homalonema rubescens.
sagittifolia, Michx. Fl. Bor. Am. u. 187 >= Peltano«» alba.
sylvestris, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 62 - Rhaph[0]* phora angustifolia.
virginica, Michx. Fl. Bor. Am. «. 187 =Peltan* virginica.
virosa, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii- *" Colocasia virosa.

CALLAEOCARPUS, Mia, PI. Jungh. 18 (1861-68) - pMtanopeis, Spach (Cupulif.).

s*matrana, Miq. PL Jungh. 14 = Cast, sumatrana.

CALLAEOLEPIUM, Karst Fl. Colomb. ii. 128. t. 166 (1869?) = Fimbristemina, Tnrez. (Asclepiad.).

Warsce wicz ii, Karat. I. c. - F. WarsceWiczii.

CALLANTHUS, Reichb. Watsonia, Mill. (Irid.).

CALLARIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 - Calla, Linn. (Aroid.).

Kflletla, Wight & Am. (Lepimin.).

t'mentosa, End!. 1. c = M. nitiSa.

CALL

Wat Hist v. (1844) 110=Laŷia, Hook. (Compos.).

*'^f«.Toir.&Gray,l.c.=L.Fremonfii.

CALLIANASSA, Webb * Bert"- ^Tt- Canar. UL 148 (1836-50) = IsoplexIB, Lindl. (Scrophularin.).

*f7, ensis, Webb & Berth. 1. c. 144=1. canariensis.

'*»>elhana, Webb & Berth. 1. c. 146.—Ins. Canar.

CALLIANDRA Benth. in Hook. Jonm. Bot ii. (1840) 128.

LEGUMINOSAE, Benth. ft Hook. f. i.

ANNESLIA, Salisb. Pared. Lond. t 64 (1807), nomen Pnns.

J;1-ELIA, Casar. Nov. Stirp. Dec. 88 (1842).

•-ODONANDXA, Kant FL Colomb. iL 48. t. 122 (1862?).

abbr n^'JSf' **"'*• »» Hook, Lond. 7T*™. Bot. iii. (1844) 108—Bras.

acu (1875) 641.—Ecuador. xxx.

a "Oiynomenoides, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. II. -*13—Am. trop.

""«. Benth. in ftook. Lond. Joura. Bot. i. (1842) 627 -•-Portoricensis.

a«eiaans, Bentk. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 648.

amar Madag.

(1844; 94—Bras.

an Eel"*, Benth. I. c. 100—Mexic.

•ogustifolia, Spruce, ex Bentk. in Trans. Linn. Soc. *"'".(1«S) 6S9.-Am. trop.

^ S * « , Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. ,I"*2)527-mertensioides.

bel Hails, Benth. in Mart. Fl. Bras. XY. II. 416.—Bras.

*• Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1844) ixu—Am. trop.

bicolor Bentk, in Hook, 7<Mrn, Batt ii- (1840) 139.—

W Blanchet „<,,. Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. •. U844) 102.-Bras.

"""oycina, Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soe. (1875) 538.-Am. trop.

bracteata, Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot. v. (1846) 104.—Bras.

brevicaulis H«**li, in Mhn. Soc. Phys. Geniv. xxviii. (1883) n. VII. 61.—Paraguay.

brevipes, Bras. Benth. in Hook. Joum. Bot. a (1840) 140—

californica, Btntkm Bvt Voy Sulph, ". t. 11.— Calif.

Callistemon, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 527-Mexic.

calothyrsus, Guiana. Meissn. in Linnaea, xxi. (1848) 251.—

calycina, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. II. 419.—Am. trop.

canescens, Benth »» ^"0*- £»»<l 7°UTn Bot m (1844) 96.—Mexic.

capillata, Btnth. I. c. 98.—Mexic.

?.'*'*»». Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 018—Am. trop.

carbo Lond. Journ. Bot. iii. c«("44) 95.-N. Granat

Engelm- « A. Gray, PI. Fendl. 39 = chilensis, Benth. in Hook. Lend. Joum. Bet. iii. (1844) 108.—Chili.

CAI1I1IAKDBA:—

clavellina, Karst. Fl. Colomb. i. 169. t. 79 = Purdiaei.

Codonandra, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1876) 647.—Am. trop.

colletioides, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 180.—Cnba.

comosa, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bet. v. (1846) 104.—Am. trap,

conferta, Benth. in A. Cray, PI. Wright, i. 68.—Am. bor. occ.

coriacea, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1844) 96 = emarginata.

corocnsis, Karat. Fl. Colomb. ii. 41=pnrpurea.

Coulteri, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 852.—Am. bor. occ.

crassipes, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1876) 665. —Am. trop.

Crugerii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 224.—Ind. occ.

Cnmingii, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 140. —N. Granat.

cylindrocarpa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot iii. (1844) 96-Harrisii.

cynometroides, Bedd. Fl. Sylv. t. 317=Inga cynometroides.

dasyantha, Walp. Rep. i. 926, sphalm.=-dysantha.

depanperaU, Benth. in Trans. Linn. Sec. xxx. (1875) 646.—Am. trop.

diademata, Lem. Jard. Flenr. iii. (1852-53) t 306 = bicolor.

dysantha, Bentk. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 138. —Bras,

emarginata, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 95.—Mexic

eriophylla, Benth. 1. c. 106.—N. Mexic.

expansa, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 649. —Am. trop.

falcate, Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot. iii. (1844) 97.—Am. cent

fasciculate, Benth. in Hook, fourn. Bot. ii. (1840) 140. —Bras.

filipes, Benth. I. c. 189.—Am. trop.

foliolosa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 110.—Am. trop.

foliosa, Benth. I. c—Bras,

formosa, Benth. I. c. 98.—Am. trop.

Gardneri, Benth. I. c. 108.—Bras.

geminata, Benth. in Trans. Lbn. Soc. xxx. (1876) 648 Pithecolobium geminatum.

glomerulata, Karst. Fl. Colomb. ii. 6. t. 108.—N. Granat.

glyphoxylon, Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1876) 539.—Ecuador.

gracilis, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 180 = formosa.

gracilis, Klotasch, ex Baker, in Sound. Refug. Bot. t. 294.—Am. trop.

grandiflora,5«.M.«n Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 139. —Am. trop.

Griffithii, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 537. —Reg. Himal.

Guildingii, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1844) 96.—Bras.

haematocephala, Hassk. Retnt, 216.—Hab. f

haematomma, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1844) 108.—Am. trop.

Harrisii, Benth. I. c. 95.—Mexic.

herbacea, Engelm. ex A. Gray, PI. Fendl. 89 = humilis.

Hildebrandtii, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880-82) 110. —Ins. Mascar.

hirsnta, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1876) 554. -Mexic.

hirtiflora, Benth. 1. c. 550.—Am. trop.

Hookeriana, Schomb. in Linnaea, xx. (1847) 764 = rigida.

Houstoni, Benth. in Hook. Joum. Bot. Ii. (1840) 139. —Mexic.

humilis, Benth. in Hook. Lend. Joum. Bot. v. (1846) 108.-N. Mexic.

hymenaeoides, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 637.—Am. trop.

Hystrix, Griseb. Cat. PI. Cab. 83 •= Pithecolobium Hystrix.

Kunthii, Benth. in Hook. Joum. Bot. it. (1840) 189-grandiflora.

Lambertiana, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 100.—Mexic.

CALIiIAHDBA:—

lanate, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 653.—Am. trop.

lashpus, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 711=Pithecolobinm cauliflorum.

latifolium, Griseb. 1. c 225 - Pithecolobium latifolium.

laxa, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 661.—Am. trop.

leptopoda, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 101.—Bras.

linearis, Benth. 1. c. v. (1846) 103.—Bras,

longipes, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 588. —Bras.

longipinna, Benth. 1. c. 546.—Am. trop.

macrocephala, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 140.—Bras.

Magdalenae, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bet. v. (1846) 102.—Am. trop.

malacophylla, Benth. I. c. Hl. (1844) 100.—Mexic.

marginata, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1876) 686—Pithecolobium marginatum.

marginata, Griseb. Fl. Brit. Vv. Ind. 710=formosa.

mertensioides, Benth. in Hook. Lend. Joum. Bet. iii. (1844) 106.—Am. trop.

metrosideriflora, Benth. I. c. i. (1842) 627.—Mexic.

micropbylla, Bentk. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 189.-Bras.

mollissima, Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot. iii. (1844)97.—Bras.

myriophylla, Benth. 1. c. 111.—Bras.

obovata, Benth. 1. c. 101-Pithecolobium lusorinm.

obtusifolia, Karst. Fl. Colomb. ii. 41. t. 121= pur. purea.

Pacara, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 123.—Reg. Argent

pollens, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 102=Pithecolobium albicans.

parviflora, Benth. 1. c. iii. (1844) 112.—Bras.

Patrisii, Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xiii. (1882) 324.—Guiana.

pauciflora, Griseb. Cat. PI. Cub. 284.—Cuba.

Peckoltii, Benth. in Trans. Linn. Sec. xxx. (1876) 565. —Bras.

pedicellate, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 102.—Ins. S. Doming,

portoricensis, Benth. 1. c. 99.—Am. bor.; Ind. occ

prehensilis, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 85 = Pithecolobium prehensile,

prostrate, Benth. in Trans. Linn. Sec. xxx. (1875) 654.—Peruv.

Purdiaei, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 104.—N. Granat

purpurea, Benth. 1. c. iii. (1844) 104.—Am. trop.

quadrangularis, Walp. Rep. i. 927—tetragona.

reticulate, A. Gray, PI. Wright, ii. 53.— N. Mexic.

revoluta, Griseb. Cat. PI. Cub. 83 •= Pithecolobium obovale.

rigida, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 108.—Guiana.

Rutenbergiana, Vatke, in Bremen Abh. vii. (1882) 250.—Madag.

Saman, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 225-Pithecolobium Saman.

Sancti-Pauli, Hassk. RetzU, i. 214-Tweedii.

Schottii, Torr. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xx. (1886) 364.—Arizona,

scutellifera, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 189.—Am. trop.

Seemanni, Benth. in Seem. Bot. Voy. Herald, 116. t. 22.—Venezuela,

sessilis, Benth. in Hook. Journ. Bet. ii. (1840) 141.—Bras.

Spruceana, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 593 « Pithecolobium parvifolium.

sqnarrosa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bet. iii. (1844) 104.—Am. trop.

stenophylla, Wavra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxtx. (1879) 215.—Bras,

ttipulacea, Benth. in Hook. Joum. Bot. 0. (1840) 137. —Guiana,

subnervosa, Benth. in Trans. Linn. Soe. xxx. (1875) 640.—Am. trop.

subspicata, Benth. I. c. 656.—Am. trop.

surinaniensis, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 105.—Guiana,

taxifolia, Benth. I. e. 104.—N. Granat.

CAI1I1IANDBA :—
tenniflora, *Benth. in Trans. Linn. See.* **xxx.** (1875) **547.—Am. trap,**
tergemina, *Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* iii. **(1844) 96.—Am. trap,**
tetragona, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 189. —Am. trop.
tetraphylla, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* **xxx.** (1875) **544.—Mexic.**
Thouarsiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1888) **365.—Madag.**
trinervia, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* iii. **(1844) 94,-Bras.**
***tubulosa,* Benth. 1. c. 101-Pithecolobinm Saman.**
tarbinata, *Benth. L c.* 109.—Bras.
Tweedii, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. **(1840)** 140.—**Bras.**
umbellifera, *Benth. I. e.* 141.—Bras,
mnbrosa, *Benth. in Benth.* to" *Hook./. GenA.* 697.—**Ind. or.; Penang.**
***ungulata,* Benth. in Hook. Lond. Jonra. Bot. i. (1842) 527—portoricensis.**
***vespertina,* Benth. 1. c.=portoricensis.**
virgata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 140.—**Bras,**
viridiflora, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. **(1844) 98.—liras.**
viscidula, *Benth. I. c.* 109.—Bras.
Wendlandi, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) **556.—Guatemala.**
***xalapensis,* Benth. in Hook. Lond. Town. Bot. iii. (1844) 105-laxa.**

CALLIANIRA, Miq. Syst. Pip. S44 (1843) - Piper, Linn.
***melastomeides,* Miq. 1. c. 346'P. melastomoides.**

CAIiLIANTHEMUM, C. A. Mey. in Ledeb. FI. Alt. ii. 386 (1830). *RANUNCULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 5.
***anemonoides,* Endl. ex Heynh. Nom. ii. 106 = rutaefolium.**
***bipinnatum,* Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 216-rataefolium,**
cachemirianum, *Cambess. in Jacquem. Voy. Bot.* 5. **—Reg. Himal.**
***coriandrifolium,* Reichb. Fl. Germ. Excurs. 727 = rutaefolium.**
***Endlicheri,* Walp. Rep. i. S3 = Oxygraphis polypetala.**
***pimpinelloides,* Royle, Illustr. Bot. Himal. 45 (Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. 26) = cachemirianum.**
rutaefolium, C. *A. Mey. in Ledeb. FL Alt.* ii. 386.—Sibir.
***rutaefolium,* Reichb. Fl. Germ. Excurs. 727"Ranunculus anemonoides.**
semivcrticillatum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65; 3.—Chili.

CALLIAS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxiv. 327 (1822) = KALLIAS, Cass. = HeliopBis, Pers. (Compos.).

CAI/LICARPA, Linn, in Act. Soc. Ups. (1741) 80. *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1150.
ACANON, Rafin. Sylva Tellur. 161 (1888).
AMICTONIS, Rafin. 1. c. (1838).
BUKCHARIJIA, [Heist.] Duham. Arb. i. 111. t. 44 (1765).
ILLA, Adans. Fam. ii. 446 (1763).
JOHNSUNIA, T. Dale, ex Mill. Gard. Did. ed. VI. App. 75 (1752).
PORPHVRA, Lour. Fl. Cochinch. 69 (1790).
SPONDVLOCOCCA, Mitch, in Act. Phys.-Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 218.
TOMEA, linn. Diss. Dass. 5 (1747) (Amoen. Acad. i. 389).
aculeolata, *Schau. in DC. Prod.* xi. 642.—Ins. S. Doming,
acuminata, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 252.—N. **Granat.**
acuminata, *Roxb. Hort. Beng.* [10] ; *Fl. Ind.* i. 894.—Ind. or.
***acuminatissima,* Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 409 = Geunsia farinosa.**
tcutidens, *Schau. in DC. Prod.* xi. 645.—Cochinch.
***adenanthera,* R. Br. Prod. 513=cana.**
albida, *Blume, Bijdr.* 818.—Java.
***americana,* Blanco, Fl. Filip. ed I. 517=Blancoi.**
americana, *Linn. Sp. PL* 111.—Am. bor.
***americana,* Lour. Fl. Cochinch. 70 = cans.**

CALIiICABFA :—
ampla, *Schau. in DC. Prod.* xi. 642.—Jamaica,
angusta, *Schau. I. c.*—Ins. Philipp.
***arborea,* Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 567-Ianata.**
arborea, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 890.—**As. trop.**
***arborea,* Wall. Cat. n. 1826, partim=vestita.**
***attenuata,* Wall. 1. c n. 1835-longifolia.**
***bicolor,* Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 77 = cana.**
***bicolor,* F. Vill. in Blanco, FL Philipp. ed. III. Nov. App. 168 = Blancoi.**
Blancoi, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 316. **—Ins. Philipp.**
Blumei, *Zoll. V Moritti, Syst. Verz. Zoll.* 53.—**Malaya.**
***Bonplandiana,* Schult. Mant. iii. 60=acuminata.**
***breviceps,* Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 116 =bievipes.**
brevipes, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sit.* V. v. (1866) **233.—China.**
***cana,* Dalz. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. 20p = lanata.**
***cana,* Gamble, Darjeeling List, 60; Ind. Timbers, 283-macrophylla.**
cana. *Linn. Mant.* ii. 198.—As. trop.; Austral.
***cana,* Wall. Cat. n. 1834=pedunculaf* et longifolia.**
cinerea, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 146.—**Cuba.**
***cordifolia,* Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 60. t. 67. f.a = Aegiphila Mutisii.**
***Cumingiana,* Schau. in DC. Prod. xi. 644»Geunsia Cumingiana.**
***cuspidata,* Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 394 = pedunculata.**
***dentata,* Roth, Nov. PI. Sp. 81; Wall. Cat. n. 6319 = pedunculata.**
***dentata,* Roxb. ex Wall. 1. c p. 87. n. 1834 = cana.**
***dentata,* Wall. 1. c. n. 6319, partim=longifolia.**
***dichotoma,* Raeusch. Nom. ed. III. 37=purpurea.**
***discolor,* Willd. ex Steud. Nom. cd. II. L 257-Aegiphila arborescens.**
***erioclona,* Schau. in DC. Prod. xi. 643-cana.**
***farinosa,* Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 567=lanata.**
ferruginea, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 31.—Jamaica,
formosana, *Rolfe, in Journ. Bot.* xx. (1882) 358.—Ins. Formosa.
fnlva, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 145.—Ins. Cuba,
globiflora, *Ruis V Pav. Fl. Per.* i. 49. t. 57. f. b.—Am. austr.
gracilis, *Sieb. b" Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. **III. (1846) 164.—Japon..**
***hexandra,* Teijsm. & Binn. in Tijdaihr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 410 = Geunsia farinosa?**
***Heynii,* Roth, Nov. PI. Sp. 82 = cana.**
Horsfieldii, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. **(1868) II. 217.—Java.**
***incana,* Roxb. Hort, Beng. [10]; Fl. Ind. i. 398 = macrophylla.**
integerrima, *Champ, ex Benth. in Hook. Kn> Journ.* **v. (1858) 185.—China.**
***integrifolia,* Jacq. Enum. PI. Carib. 12=Aegiphila arborescens.**
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 60.—Japon.
***lanata,* Gamble, Darjeeling List, 60 = vestita.**
***lanata.* Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 187 = Premna lanata (sp. ignot.).**
lanata, *Linn. Mant.* ii. 831.—Ind. or.
***lanata,* Schau. in DC. Prod. xi. 644-pedunculata.**
***lanceolaria,* Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind.i. 895-longifolia.**
latifblia, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 830, nomen.—Ins. Timor,
lobata, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. **666.—Reg. Himal.**
longifolia, *Lam. Enryc.* i. 563.—Malaya; Austral.
***macrocarpa,* Raeusch. Nom. ed. III.37=cana?**
macrophylla, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 13. t. 53.—Ind. or.
magna, *Schau. in DC. Prod.* xi. 641.—Ins. Philipp.
micrantha, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 187.—Ins. **Philipp.**
***Mimurataki,* Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 186 = japonica.**
mollis, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. **III. (1846) 155.—Japon.**
mollis,* Willd. ex Schau. in DC. Prod. xi. 644 = acuminata, *H. B.* &[1] *K.

CALLICARPA:—
***nudiflora,* Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 206 * Reevesii.**
***oblongifolia,* Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 136-longifolia.**
***paniculata,* Lam. Encyc. i. 563 = Chiliaathus arboreus.**
parvifolia, *Hook. V Am. Sot. Beech. Voy.* 306.—**Mexic.**
pedunculata, *R. Br. Prod.* 613,—Malaya ; Austral.
***pentandra,* Roxb. Hort. Beng. S3; Fl. Ind. i. 895 = Geunsia farinosa.**
psilocalyx, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. **569.—Reg. Himal.**
purpurea, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 67—China.
Reevesii, *Wall. Cat.* n. 1830.—China.
***reticulata,* Poepp. ex Walp. Rep. iv. 72-Petil'» Poeppigii.**
reticulata, *Sra. Prod. Veg. Ind. Occ.* 81.—Jamaica.
***Rheedii,* Kostel. Allg. Med-Pharm. Fl. iii. »*» = cana.**
raynchophylla, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 888.—Malaya.
***Roxburghiana,* Schult. Mant. iii. 54-longifolia.**
***Roxburghii,* Wall. Cat. n. 1833 = macrophylla.**
rubella, *Lindl. Bot. Reg.* t. 888.—Reg. Him"[1]-! China. '
Schlimii, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (18«) **l. 217.—N. Granat.**
***serrata,* Moench, Meth. 468 = americana.**
***sessilifolia,* Wall. Cat. n. 1837 = rubella.**
***sinensis,* Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 257-cana.**
subintegerrima,* H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 25* -acuminata, *H. B.* &* *K.
subpubescens, *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 305.—**Mexic.**
***sumatrana,* Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 888= cana.**
***tectonaefolia,* Wall. Cat. n. 1827 = arborea.**
***tenuiflora,* Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ- ». (1853) 136 = rubella.**
***tiliaefolia,* Teijsm. *Sc* Binn. ex C. B. Clarke, in Hook-f. Fl. Brit. Ind. iv. 569 = pedunculata.**
***tomentosa,* Koen. ex Vahl, Symb. Bot. iii. *i>"* macrophylla.**
***tomentosa,* Lam. Encyc. i. 562 = cana.**
***tomentosa,* Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 158-lanata.**
tomentosa, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 158; *Hook-f. Am. Bot. Beech. Voy.* 805.—China.
***Tomex,* Poir. Encyc. Suppl. ii. 32-lanata.**
triloba, *Lour. Fl. Cochinch.* 70.—Cochinch.
umbellata, *Lour. 1. c.*—Cochinch.
velutina, *Presl, Bot. Bemerk.* 98.—Bras,
vestita, *Wall, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. B"'- Ind.* iv. 567.—Reg. Himal.
***viburnifolia,* Salisb. Prod. 53—americana.**
***villosa,* Roxb. Hort. Beng. [10] - arborea.**
villosa, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 14.—Ind. or.!
***Wallichiana,* Walp. Rep. iv. 125-lanata.**
***Zollingeriana,* Schau. in DC. Prod. xi. 640=rooll>»-**

CALLICEPHALUS, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. «« (1831) = Centaurea, Linn. (Compos.).
***nit ens,* C. A. Mey. 1. c. = Cent, nitens.**

CAIiLICHLAMYS, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 254. *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. I[68]* riparia, *Miq. 1. c.*—Panama.
***rubiginosa,* Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1[8]6[2]) 201-riparia.**
***rufinervis,* Miers, 1. c. 201 — riparia.**
***splendida,* Miers, 1. c.—riparia.**

CALLICHLOË, Pfeiff. Nom. i. 586 (1871)-seq.

CALLICHLOEA, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. (1840)=Elionurus, Humb. *St.* Bonpl. (Granun-)-
***elegans,* Spreng. 1. c. = E. elegans.**

CALLICHROA, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. *VtXI°f-* ii. 81 (1835) = Iiayia, Hook. *Sc* Am. (Compos.).
***angustifolia,* Walp. Rep. ii. 632 = L. platyglossa.**
***angustifolia,* Walp. 1. c. iii. 396 = Castilleja ang«- folia.**
***Bradburii,* Walp. 1. c. = Castilleja Bradburii.**
***Douglasii,* Torn *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. »9o Douglasii.**
***hirsuta,* Walp. Rep. ii. 632 =L. platyglossa. jj,**
***platyglossa,* Kisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. *Tetrop-* 31 — L. platyglossa.**

CALLICOCCA, Schreb. Gen. i. 126 (1789) = Cephaëlis, Aw. (Rnbiac.).
«»«, J. F. Gmel. Syst. 871-Ceph. alba.
««/«, J. F. Gmel. 1. c. 872 = Ceph. data.
glabra, J. F. Gmel. 1. c.-Ceph. glabra.
guianensis, J. F. Gmel. 1. c. = Ceph. involuciata.
Ipecacuanha, Brot. in Roem. Arch. iii. ill. 455 = Psychotria Ipecacnanha.
nuscosa, Steud. Nom.ed. II. i. 267-Ceph. mnscosa.
P«rpurea, J. F. Gmel. Syst. 871 = Ceph. purpnrea.
'omentosa, J. F. Gmel. 1. c=Psychotria tomentosa.

CA[illegible]£ C O M A , Andr. Bot. Rep. t. 566 (1809). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 649.
ÇALYCOMIS, R. Br. in Flind. Voy, App. 549 (1814).
J>TUTZE»I[AI] F. Mnell. Fragm. v. 81 (1866).
mllardieri, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-June 1880) 94.-Austral.
fe Tuig nea, D. Don, 1. c. = serratifolia.
serratifolia, *Andr. Bot. Rep.* t. 566.—Austral.
Stutzeri, *F. Uuel1* - *Fragm.* v. 84.—Austral,
ten ata, *M onir, in Mim - Acad - L y on>* *- (W60) 21L — jj. . iled.

CALLICORE, Link, Handb. i. 198 (1829) - **Amaryllis,** Mnn.
"oçata, Link, 1. c. = Hippeastrum rutilum.
"tticulata, Link, 1. c = Hippeastrum reticulatum.
'««, Link, 1. c. = A. Belladonna.
"Wo, Link, l. c. 194 = Hippeastrum rutilum.

CALLICORNIA, Bu.m. f. Prod. Fl. Cap. 24 (1768) = •wiysBera, Linn. (Compos.).
fnphaloides, Burm. f. 1. c = L. gnaphaloides.
'««i/o«a, Burm. f. 1. c-Afr. austr.
'"*flora,* Burm. f. 1. c—Afr. austr.

CALLICYSTHUS, Endl. Prod. Fl. Norf. 90 (M33) = VJKn«. Savi (Legumin.).
volu Ww, Endl. 1. c-Ins. Norfolk.

CALLIDRYNOS, Neraud> *m* Freyt Voy- BoL M (1829)> nomen (Sapind.).

CA^, GLOSSA Hook. Hook.Ass.Am.Bot. Beech. Voy. 856 -U840)«, La y i a| Hook & &AArn - (Compos.), *uoHglasii,* Hook. & Am. 1. e.=L. Calliglossa.

CA^,IOOirXTM, Linn. Gen. cd. I. 345 (1787).
yoLYGONACEAE, Benth. *8c* Hook. f. iii. 95.
^ALUPHYSA, Fisch. & Mey. Ind.Sem. Hort. Petrop. 2* (1835).
^"BSONIA, Stocks, in Proc. Linn. Soc i. (1846) 867.
£AU.ASIA, Linn.f. Suppl. 37 (1781).
"ERQCOCCUS, Pall. Rdse, i. App. 788. t. 6 (1776); Reuse, ii. App. 43 (1777).
»-1SA, Rafin. SylvaTellur. 161 (1838).
a"Wopterum, *Borszcz. Aralo-Casp. Callig.* 34.—Reg. jyal. Casp.
an.ractu, *811m, Bun ee, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* "vii. arif- en (61) 487 (£ *«- Ro - «").-As. centr.
CM*' *Borszn* - *Aralo-Casp. Callig.* 31.—Reg. Aral. p.
asperum, Lour. Fl. Cochinch - 342-=Tetracera sarmentosa.
bucocladum' *B**g*> »» *Mint. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 485 *(Lehm. Rtl.* 809).—As. centr.
Bun ?e;, *Boiss Fl* C»n - *Orient,* iv. 999.—Persia.
CM ysa, T*"***' *DeL Sem Dor P at* - ^889) 8.—Reg. P. ; urkest.
canescens Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 870=Atriplex *"escens.
C edusae, *Schreni, Enum. PI. Nov.* i. 9.-Soongaria
colubrinum, *BttTSKZ* - *Aralo-Casp. Callig.* 38.—Reg. Aral. asp.
CWIU »um, *L'Mrit, in Trans, linn. Soc.* i. (1791) 180.
- L'AraD . Pella
cri Lum *Boiss* - *dgn* - *Set-* • w- 77.—Beluchist.
crispum, Bunge, Ori & m> *Dor* P- C1839) 8.-Hab.T
cristatum, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 185 (*Lehm. Rel* 809) -A» - =entr.
densum, *Borszcs. Aralo-Casp. Callig.* 86.—Reg. Aral. Casp.
deaticulatum, *Bunge* "*Boiss. Ft. Orient,* iv. 999.—Persia.
erinaceum, *Bo rtMct. Aralo-Casp. Callig.* 87.—Reg. Aral. Casp.

CALLIGONtTM:—
eriopodum, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 485, 486 *{Lehm. Rel.* 809, 310).—Turkest.
flavidum, *Bunge, Del. Sem. Dorp.* (1839) 8.—Hab. ?
gobicum, Bunge, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 29 = mongolicum.
horridum, *Borstc*. Aralo-Casp. Callig.* 82.—Reg. Aral. Casp.
leucociadum, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* (1851) 485 *(Lehm. Rel.* 309).—As. centr.
macrocarpnm, *Borszcz. Aralo-Casp. Callig.* 35.—Reg. Aral. Casp.
medusecephalum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 69.—C. Caput-Medusae.
microcarpum, *Borszcz. I. c.* 41.—Reg. Aral. Casp.
mongolicum, *Turd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. r.* (1832) 204.—Mongolia.
Murex, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 485, 486 *{Lehm. Rel* 309, 310).—As. centr.
Pallasia, *VHirit. in Trans. Linn. Soc.* i. (17«1) 180. —Reg. Casp.; Turkest.
Panderi, *Fisch. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 440, nomen. —Reg. Casp.
paniculatum, *Borszcz. Aralo-Casp. Callig.* 42.—Reg Aral. Casp.
persicum, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 999.—Persia,
platyacanthum, *Borszcz. Aralo-Casp. Callig.* 87.—Reg. Aral. Casp.
polygonoides, *Linn. Sp. PI.* 580.—Armenia; Persia; Ind. bor. occ
polygonoides, Pall. Reise, iii. 580 = C. Pallasia.
Rotula, *Boszcz. Aralo-Casp. Callig.* 85.—Reg. Aral. Casp.
rabicundum, *Bunge, Del. Sem. Dorp.* (1839) 8.—Hab. ?
songaricum, *Endl. Gen, Suppl.* iv. II. 50.—Soongaria.
stenopterum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 999.—Persia; Afghan,
tetrapterum, *Jaub. V Spach, Illustr.* v. 80. t. 471.—Mesopotam.
tripterum, Bunge, ex Boiss. FL Orient, iv. 999 = Bungei.

CALLIGONUM, Lour. Fl. Cochinch. 342 (1790) = Tetracera, Linn. (Dilleniac).
asperum, Lour. 1. c. = T. sarmentosa.

CAIiLIIiEPIB, DC. Prod. v. 671 (1886). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 339.
glabra, *DC. I. c*—Afr. austr.
hispida, *Da I. c*—Afr. austr.
Laureola, *DC. L c*—Afr. austr.
leptophylla, *Harv. in Harv. V Sand. Fl. Cap.* iii. 136. —Afr. austr.
salicifolia, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1482.—Afr. austr.

CALLIOPEA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (1828-29) 309 = Crepia, Linn. ^Compos.).
aurea, D. Don, L c.=Crepis aurea.

CALLIOPSIS, Reichb. Ic. et Desc. PI. t. 70 (1824) = Coreopsis, Linn. (Compos.).
Attinsoniana, Hook. Fl. Bor. Am. i. 310 = Cor. Atkinsoniana.
atropurpurea, Hort. ex Steud. Nora. ed. II. i. 258= Cor. tinctoria.
basalts, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allgem. Gartenz. iii. (1835) 830.—Am. bor.
bicolor, Reichb. Ic et Desc. PI. t. 70 = Cor. tinctoria.
cardaminefolia, DC. Prod. v. 568 = Cor. cardaminefolia.
Drummondi, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Card. Ser. II. t. 815 = Cor. Drummondii.
fimbriata, Lange, Sem. Hort. Haun. Adn. (1866) 5.—Hab.?
ntidata, Sprang. Syst. iii. 611 = Cor. nudata.
palmata, Spreng. 1. c. = Cor. palmaU.
rosea, Spreng. 1. c. = Cor. rosea.
tinctoria, DC. Prod. v. 568=Cor. tinctoria.

CALLIPELTIS, Stev. in Mém. Soc Nat. Mosc. vii. (1829) 275 (Obs. PI. Ross. 69). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 148.
aperta, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 110.—Aegypt.; Persia.
Cuciillaria, *Stev. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* vii. (1829) 275.—Oriens ; Reg. Mediterr.
microstegia, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 84.—Persia.

CALLIPHYSA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 24 (1835) = Calligonum, Linn. (Polygonac).
juncea, Fisch. & Mey. 1. c. = Calligonum Calliphysa.
polygonea, C. A. Mey. ex Borszcz. Aralo-Casp. Callig. 48=Calligonum Calliphysa.

CALLIPRENA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 89 (1869) » Allium, Toutn. (Liliac).
cernua, Salisb. 1. c. == A. cernuum.

CALLIPRORA, Lindl. Bot. Reg. t. 1590 (1833) = Brodiaea, Sm. (Liliac).
aurantea, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 20 = B. ixioides.
flaya, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 258 = B. ixioides.
lutea, Lindl. Bot. Reg. t. 1590 = B. ixioides.

CAU.IPSYCHE, Herb in Bot. Reg. (1842) Misc. 49. *AMARYLLIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 731.
aurantiaca, *Baker, in Saund. Ref. Bot.* t. 167.—Ecuador.
auratum, Hort ex Card. Chron. (1871) 6=praec.
eucrosioides, *Herb, in Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 50.—Ecuador.
mexicana, M. Roem. Syn. Ensat. 155=eucrosioides.
mirabilis, *Baker, in Saund. Ref. Bot.* t. 168.—Peruv.

CALIiIBHOfl, Nutt. in Joum. Acad. Philad. ii. (1821) 181. *MALVACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 201.
MONOLIX, Rafin. Cat. 14 (1824).
NOTTALLIA, Bart. FL N. Am. ii. 74. t. 62 (1822).
alcaeoides, *A. Gray, PI. Fendl.* 18.—Am. bor.
digitata, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* ii. (1821) 181. —Am. bor. occ
involucrata, *A. Gray, PI. Fendl.* 16.—Am. bor. occ.
linearilobа, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 74.—Am. bor.
macrorrhiza, A. Gray, PI. Fendl. 18 = alcaeoides.
palmata, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. ' 1861' (1862) 449= involucrata.
Papaver, *A. Gray, PI. Fendl.* 17.—Am. bor. occ.
pedata, *A. Gray, I.* f.-Am. bor. occ.
spicata, Regel, Gartenfl. (1872) 291. t. 737=Sidalcea malvaeflora.
triangulata, *A. Gray, PI. Fendl.* 16.—Am. bor.
verticillata, Groenl. in Rev. Hortic. (1862) 171 = involucrata.

CALLIRRHOË, A. Gray, PI. Fendl. 16 (1849) = praec.

CALLISACE, Fisch. in Hoffin. Gen. Umb. ed. II. 170-Angelica, Linn. (Umbellif.).
cantabrigiensis, Hoffin. ex Steud. Nom. ed. I. 762, 138 = Peucedanum palustre.
dahurica, Fisch. in Hoffm. Gen. Umb. ed. II. 170= A. dahurica.
ruthenica, Fisch. 1. c = Peucedanum ruthenicum *1*
Schiefereckii, Hoffm. 1. c. = Peucedanum palustre.

CALLISEMA, Steud. Nom. ed. II. i. 258 (1840)-seq.

CALLISEMAEA, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 105=Flatypodium, Vog. (Legumin.).
elegans, Walp. Kep. i. 802 = P. elegans.
grandiflora, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 105 = P. grandiflorum.
pubescens, Benth. 1. c.=P. elegans.
sericea, Benth. 1. c. = P. elegans.
viridis, Walp. Rep. i. 802-P. viride.

CAIiLISIA, Linn, in Loefl. It. Hisp. 305 (1758). *COMMELINACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 854.
HAPALANTHUS, Jacq. Stirp. Am. 11. t. 11 (1768).
ciliata, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 261 - Tradcscantia elongata.
ciliata, Pers. Syn. i. 56 = repcns.
delicatula, Kunth, Enum. PI. iv. 63 = umbellulata.
diffusa, Pohl, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 251 = Tradescantia effusa.
glandulosa, Pohl, ex Seub. 1. c 255 = Dithyrocarpas glandulosus.
insignis, *C. B. Clarke, in Hemsl. Diagn. PL Mex.* 66. —Mcxic.

CAIiLISIA:—
Martensiana, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 812.—Mexic.
meiandra, Wright, in Sauv. Fl. Cob. 159 - Tradescantia cordifolia.
monandra, Schnlt. f. Syst. vii. 1179-umbellulata.
orientalis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5222 = Aneilema Hamiltonianum.
repens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 62.—Am. auto.
rosea, Pohl, ex Senb. in Mart. Fl. Bias. iii. I. 252' Tradescantia Gaudichandiana.
umbellulata, *Lam. IUustr.* i. 130. t. 35. f. 2.—Ins. Martinic.

CALLISTA,Lonr. Fl. Cochinch. 619 (1790)-Dendrobium, Sw. (Orchid.).
amabilis. Lour. 1. c—Cochinch.

CALLISTA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Town. xvii. (1831) 154=Brica, Tonm.
aeuminaia, G. Don, Gen. Syst. iii. 818-E. Matsonl.
armata, G. Don, 1. c—E. Sparmanni.
Randonia, G. Don, I. c. = E. Irbyana.
Bedfordiana, G. Don, 1. c 814=E. Massoni.
Uanda, G. Don, L c. 815 - E . blanda.
Broadleyana, G. Don, 1. c. 81S = E. Broadleyana.
buccintuflora, G. Don, 1. c. — E. Massoni.
calostoma, G. Don, I. c. 816 - E . Massoni.
Celsiana, G. Don, 1. c 818=E. Thunbergii.
Clifortiana, G. Don, 1. c. 815 = E. tenuiflora.
comosa, D. Don, in Edinb. N. Phil. Jonrn. xvii. (1834) 155 = E. comosa.
Comptoniana, G. Don, Gen. Syst. iii. 818 •» E. curvifolia.
Coventryana, G. Don, 1. c. 816 = E. pavettaeflora.
daphniflora, G. Don, 1. c. =E. daphniflora.
daphnoides, G. Don, 1. c.-E. praestans.
denticulata, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 155 - E . denticulata.
fastigiata, G. Don, Gen. Syst iii. 814 = E. fastigiata.
ferruginea, G. Don, 1. c. 813 = E. squarrosa.
fragrans, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 165=E. fragrans.
Humeana, G. Don, Gen. Syst. iii. 813 - Erica fastigiata.
hyacinthoides, G. Don.l. c. 814 = E. praestans.
infiata, G. Don, 1. c - E . inflata.
infundibuliformis, G. Don, 1. c. 813=E. pavettaeflora.
Juliana, G. Don, l.c. = E. Walkeriana.
Lavsoniana, G.Don, 1.c. = E. Lawsoniana.
magnified, G. Don, 1. c 818 = E. Massoni.
metulaeflora, G. Don, 1. c. = E. Massoni.
moschata, G. Don, I. c. 816 = E. Muscari.
mundula, G. Don, 1. c.=E. fastigiata.
Muscari, G. Don, 1. c. 814=E. Mnscari.
nidiftora, G. Don, 1. c. 816=£. Muscari.
Parmentieri, G. Don, 1. c.=E. praestans.
pavettaeflora, G. Don, 1. c. = E. pavettaeflora.
pellucida, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 155 = E. Walkeriana.
pellucida, G. Don, Gen. Syst. iii. 814 = E. venusta.
praegnans, G. Don, I.e. 818 = E. ventricosa.
praestans, G. Don, 1. c. 815 = E. praestans.
primuloides, G. Don, 1. c. 816 = E. fastigiata.
quadrangularis, G. Don, 1. c = E. Massoni.
rigida, G. Don, 1. c. 815=E. Massoni.
Russeliana, G. Don, 1. c. =E. Russeliana.
Sainsburiana, G. Don, 1. c. 818 = E. inflata.
stellifera, G. Don, 1. c 816 - E . Massoni.
struthiolaeflora, G. Don, 1. c = E. teretiuscula.
Swainsoniana, G. Don, 1. c. 816 = E. Massoni.
Tetnpleana, G. Don, L c. 814 = E. Massoni.
tenuiflora, G. Don, 1. c. 812-E. tenuiflora.
tetragona, G.Don, 1. c. = E. tetragona.
thymifolia, Steud. Norn. ed. II. i. 258 = E. thymifolia.
trossula, G. Don, Gen. Syst. iii. 81,6 = E. Muscari.
undulata, G. Don, 1. c. 813 = E. Massoni.
varia, G. Don, 1. c. = E. varia.
ventricosa, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 155 - E . ventricosa.
venusta, G. Don, Gen. Syst iii. 815-=E. venusta.
verecunda, G. Don, 1. c. =E. Meuroni.
Walkeria, G. Don, 1. c. 814=E. Walkeriana.

CALLISTACHYA, Rafin. in Med. Repos. New York v. (1808) 60=Veronica, Tours. (Scrophnlar.).
sibirica, Rafin. 1. c.-V. sibirica.
virginica, Rafin. 1. c.-V. virginica.

CALLISTACHYA, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 267-CALLISTACHYS, Vent.

CALLISTACHYS, Henffel, in Flora, xxvii. (1844) 628 = Corez, Linn. (Cyperac.).
pyrenaica, Heuffel, 1. c.=C. pyreaaica.

CALLISTACHYS, Vent Jard. Malm. 115.1.115 (1803) = Oxyloblum, Andr. (Legumin.).
carinata, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 27=O. carinatum.
cuneata, Heron. Nom. i. 148 - Isotropis stricta.
cuneifolia, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 266= Isotropis striata.
elliptica. Vent Jard. Malm. 115 = 0. ellipticum.
lanceolata, Vent. 1. c. = 0. Callistachys.
linariifolia, Hort. Mackay, ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 474, nomen—O. lineare.
linariaefolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 117 = O. lineare.
linearis, Benth. in Enum. PI. Hueg. 27=0. lineare.
longifolia, Faxt. Mag. viii. 81 = O. Callistachys.
ovata, Sims, Bot. Mag. t. 1925=O. Callistachys.
oxylobioides, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 27-0. capitalnm.
parviflora, Benth. in Enum. PI. Hueg. 27 = O. lineare.
purpurea, Van Houtte, ex Heynh. Nom. ii. 107 = 0. ellipticum.
retusa, Lodd. Bot. Cab. t. 1983 = O. Callistachys.
sparsa, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 69 = 0. Pultenaea.
spathulata, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 208 = 0. spathulatum.
tetragona, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) 1. 249=O. retnsnm.

CALLISTEMMA, Boiss. Fl. Orient, iii. 146 (1875) = Scabiosa, Toum. (Dipsac).
brachiata, Boiss. 1. c. = S. brachiata.
Sibthorpianum, Nym. Consp. 841=S. brachiata.

CALLISTEMMA, Cass. in Diet. Sc. Nat vi. Suppl. 45 (1817), nomen prius-CalHatephus, Cass. (Compos.).
capitatum, Reichb. Hort. Bot i. t. 84, sphalm.= *Callistemon capitatus.*
hortense, Cass. in Diet. Sc. Nat. vi. Suppl. 45; et Bull. Soc. Philom. (1817) 32 ~ Callistephus chinensis.
indicum, G. Don, in Loud. Hort. Brit. S48»Boltonia indica.

CALU8TEMON, R. Br. in App. Flind. Voy. it 547 (1814). *MYRTACEAE,* Benth.' & Hook. f. i. 704.
acerosus, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 141 =brachyandrus.
acerosus, Tausch, in Flora, xix. (1836) 411=pinifolius.
amoenus. *Lent, in IUustr. Hortic.* vii. t. 247.—Hab. *1*
arborescens, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 888-brachyandrus.
brachyandrus, *Lindl. in Joum. Hort. Soc.* iv. (1849) 112.—Austral.
capitatus, Reichb. Ic. Exot. i. 59. t. 84-Kunzea capitata.
coccineus, *F. Muell. Fragm.* i. 13.—Austral.
Cunninghami, *Hart. Berol. ex* C. *Koch, Wochenschr.* vi. (1863) 294.—Austral.
flavescens, *Regel, Gartenfl.* (1861) 51.—Austral.
glaucus, Sweet, Fl. Austral, sub t 29 = speciosus.
Hainesii, F. Muell. 1. c. iii. 163 = Kunzea Baxteri.
hybridus, *DC. Prod.iH.* 224.—Austral,
intermedius, *Hort. Berol. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 259. —Austral.
juniperinus, *Heynh. Nom.* i. 148.—Austral.
Ianceolatus, *Sweet, Fl. Austral,* sub t 29; *DC. Prod.* iii. 228.—Austral.
leptostachyus, Sweet, 1. c.-salignus.
linearis, *DC. Prod.* iii. 223.—Austral.
lineari/olius, DC. 1. c-rigidus.
lophanthus, Sweet, Fl. Austral, t. 29 = salignus.
macrostachyus, Lindl. Bot. Reg. (1838) t. 7-Kuuzea Baxteri.
marginatus, Sweet, Hort. Brit ed. 1.165 ; DC. Prod. iii. 224 = Ianceolatus.
macrostachyus, Lindl. Bot. Reg. (1838) t. 7-Kunzea Baxteri.

CAXLISTEMON:—
nervosus, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 285-Melaleuca Leucadendran.
pallidus, DC. Prod. iii. 223 = salignus.
paludosus, F. Muell. Fragm. i. 14 = salignus.
Pancheri, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* (1864) 188 j *in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. ii. (1864) 188. —N. Caled.
pendulus, *Regel, Gartenfl.* (1859) 288.—Austral,
phoeniceus, *Lindl. Swan River App.* 10.—Austral,
pinifolius, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 155; *DC. Prod-* iii. 223.—Austral.
pithyoides, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) "142 (sp. dub.).—Austral.
pungens, *G. Don, ex Loud. Hort. Brit.* 197.—Australrigidus, *R. Br. in Bot. Reg.* t 393.—Austral.
rugulosus, DC. Prod. iii. 223 = rigidus.
rugulosus, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (185[9]) 141=coccineus.
salignus, *Sweet, Fl. Austral,* sub t 29 ; *DC. Prod.* 223.—Austral.
scaber, Lodd. Bot. Cab. t 1288 •= Ianceolatus.
semperflorens, *Lodd. I. c.* t 623.—Austral.
Sieberi, DC. Prod. iii. 223=salignus.
speciosus, *DC. I. c.* 224.—Austral,
suberosus, *Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* (1864) 183.—N. Caled.
teretifolius, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 387.—Austral.
viminalis, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 197 -° rigidus.
viridiflorus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 155=salignus.

CALLISTEPHANA, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 387 = CoronUla, Linn. (Legnmin.)-
varia, Fourr. 1. c.=C. varia.

CAXXI8TEPHU8, Cass. in Diet Sc. Nat. xxvii. 491(1825). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 270"
CALLISTEMMA, Cass. 1. c. vi. Suppl. 46 (1817)i nomen prius.
biennis, Lindl. ex DC. Prod. v. 275 = HeteropapP"* hispidus.
chinensis, Nees, Gen. et Sp. Ast. 222=hortensis.
concolor, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 344 = Pulicaria angustifolia.
Heyneanus, DC. Prod. v. 275 = Pulicaria V/ightian*-
hortensis, *Cass. in Did. Sc. Nat.* xxxvii. 491.-" Sibiria; China.
indicus, DC. Prod. v. 275 = Boltonia indica.
Wightianus, DC. 1. c. = Pulicaria Wightiana.

CALLIBTHENE, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 123-'' 75, 76 (1824). *VOCHYSIACEAE,* Benth. & Hook-f. i. 976.
Blanchetii, *Warm, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 26.—A"[1]' trop.
erythroclada, *Warm. I. c.* 28.—Am. trop.
fasciculate, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 126.—Bras,
major, *Mart. I. c.* 124. t 75.—Bras,
microphylla, *Warm, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 28-" Am. trop.
minor, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 126. t. 76.—Bras,
mollissima, *Warm, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 2°~~ Am. trop.

CALLISTHENIA, Spreng. Gen. i. 8 (1830) = pr»ec.

CALLISTROMA, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) *M• Endl. Gen. Suppl. iii. 82 (1848) = Ollveiia, V«»-(Umbell.).
erubescens, Fenzl, 1. c. = 0. orientalis.

CALLITHAMNA, Herb. Amaryll. 225 (1837) -StenOrnesson, Herb. (Amaryllid.).
angustifolium, Herb, in Bot Mag. t 3866. f. S. viridiflorum.
Hartwegianum, Van Houtte, ex Heynh. Nom. nomen = S. aurantiacum 1
spathulatum, Herb. Amaryll. 225—'Truxillo.'
viridiflorum, Herb. 1. c.=S. viridiflorum.

CA1I.ITBICHE, Linn. Syst. ed. VI. 82 (17*[8])-*HALORAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 676. ....
STELLARIA, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 198 («**>•
STBLLINA, Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. It* (1873) 318.
aestivalis, Thuil. Fl. Par. 2-stagnalii.

CAIJMTBICHE:—
"Ipina, Schur,in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 403 - veraa.
"mblyocarpa, Scheidw. ex Hegelm. Monog. Callit. 61 = truncata.
"tdrogyna, Linn. Cent. PI. Rar. i. 31=venm.
'ngustifalia, Gilib. Exercit. ii. 421-autumnalis.
""gustifolia, Hoppe, Taschenb. (1792) 160=vema.
antarctica, *Engelm. ex Hegelm. in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* ix. (1887) 20.—Reg. Antarot.
"Viatica, Huds. Fl. Angl. ed. II. 439-vema ?
A! agraei, *Hegelm. Monog. Callit.* 54. t. 3. f. 9.—Am. bor.
attennau, *Delastre, Fl. Dip. Vienne,* 144.—Gallia.
"ututnnalis, A. Gray, ex Hegelm. Monog. Callit. 65 =Asagraei.
"i, mna is, Kuetz. in Lfamaea, ". (1882) 188 " i mulata.
«"§«««oK$, Bertol. ex Steud. Nom. ed. II. i. 259 - «rteroniana.
«tumnalis, Brot. ex Stend. 1. c.=latifolia.
Autumnalis, n , Fl, SueC, ed- IL B" *__Euro P_ '.Am_ W .
'"tumnalU, Michx. Fl. Bor. Am. i.2=Peplis diandra.
*"t*mnalis,* Pollich, Fl. Palat. 3-vema.
eeneroniana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 259.—Chili.
Bolan?n» *Hegelm. in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* X. (1868) 116.~Am. bor. occ.
?"chycarpa, *Hegelm. 1. c.* 116.—AnstraL
"evifola, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 3.—Am. bos.
£"?J«t Petegna, Inst. Bot. ii. 10=hamulata.
"PilUns, *Part. Fl. Hal.* iv. 42S.-Italia.
"ifrro des, Thnil. ex Link, in Spreng. Jahrb. Gew. iii. SO-autumnalis.
'Shultz, Prod. Fl. Stargard. 2 = vema.
con ;?£f> Rafin. in Med. Rep. New York, Ser. III. ii. (Mil) 408-hamulata.
** carpa,* Sendtn> e* He e eUn_ Mono e- Callit. 55 - u.
*cn%ia*a,* Lebel, ex Hegelm. in Verh. Bot. Ver. Bran- ^ n b w . (1867) 88 = truncata.
--Ita, (18 tf/Sn. *in Med. Rep. New York,* Ser. III. ii. 8 A b
c"»«//<rfia, A. Br. ex Hegelm. in Verh. Bot. Ver. orandenb. ix. (1867) 21-vema.
i~°car I». Hegelm. 1. c. x. (1868) 116.—Australal.
--russat Link ' ^ Spre„g, Jahrb„ Gew„ W- 80= antumnalis.
d d^"'"' Schnr> Enum. Pl. Transs. 217 = hamulata. *gelm. Monog.* Co//tt. 58. t. 3.—
dirici, am bor_ et •«*»•• f"rfa^_ '"rf- ** • «• 10.—ItalU.
dia; »«. Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1869) 98 = stagnalis.
Drummondi, *Hegelm. Monog. Callit.* 60.—Austral.
dubia, *Hoffm.* Ob *Bot.* n. 1 i ** *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 389 = vema
ruautumnalis, Syme, Engl. Bot. ed. III. viii. 122 = autumnalis.
eu £"•% Syme, 1. c. 119«verna.
fo»sa, fin, in Med„Rep0S<NeWYork,V> (1808) 354 « autumnali,
fonta"°. Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 251-vema.
genuina, Ducommun, Taschenb. 248=hamulata.
glomerata, Thul . ex Link, in Spreng. Jahrb. Gew. iii. an autumnalis.
graminea k p l. c. = truncate.
hamulata, Kuet ex Koch —Europ.
hermaphrodita. Linn. Cent. PI. Rar. i Sl=vema.
heterophylla, Pnrsh> J"l Am- SeP4-!- S = «ma.
heteropoda, £/nge mi ew. I» *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* ix. (18«7) *».—Am. anstr.
intermedia, Hoffm- FI- Genn- (I?91) 2 = hamulata.
intermedia, Hoppe, Taschenb. (1792) 169=vema.
japonica, Engelm. ex He 'n . . . r. Brandenb. x. (1868) U8.-Japon.
Kustsingi, Rupr FI- Ingric 878-stagnaUs.
latifolia, Gilib- E)ler<:it- H. 421=hamnlata w/ verna.
latifolia, &"'*• •* ^"'"*-N«m. ed. II. i. 269.—Lnsitan.
linearis, Puish » Fl- Am. Sept. i. 3=autumnalis.
macropte yx, ^ r f w . J|f,,»w. *Callit.* 59.—Austral.
marginata, Torr. >» *Pad/. Rail. Rep.* iv. 136.-Calif. ; Chili.
Mandonis, *Hi2rck v Muell. Arg. in Heurct, Obs. Bot.* 136—Ecuador.
microcarpa, *ngelm. ex Hegelm. in Verh. Bet. Ver. Brandenb.* x. (1868) 113.A:nba.
minima, Hoppe, Taschenb. (1792) 157-verna.

CAUiITRICKB:—
minor, Itellynck, Fl. Namnr (1856), 232=stagnalis!
Muelleri,5o«<i. *in Linnaea,xxnä.* (1856) 229.—Austral.
Nuttallii, *Torr. in Pad/. Rail. Rep.* iv. 135.—Am. bor.
obtusangnla, *Le Call, ex Hegelm. Monog. Callit.* 54. —Europ.
occidentalism *Hegelm. 1. c.* 57. t. iv. 6.—Cuba,
ovata, *Rafin. in Med. Rep. New York,* Ser. III. ii. (1811) 408.—Am. bor.
pattern, Bieb. Fl. Tanr. Cane iii. 6-hamulata.
pollens, Goldb. in Mint. Soc. Nat. Mosc v. (1617) 118 =vema.
palustris, Linn. Sp. PI. 969 = autumnalis.
pedunculata, DC. Fl. Fr. iv. 415 = hamuUta.
pedunculata,K. Gray, Man. ex Hegelm. Monog. Callit. 68 = deflexa.
pendunculata^.t/huil. ex Hegelm. I.e. 61—truncata.
pedunculosa, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. v. (1«37) 140.—Am. bor.
peploides, *Nutt. 1. c.* 141.—Am. bor.
platycarpa, Kuetz. in Linnaea, vii (1832) 174=stagnalis.
plena, *Rafin. in Med. Rep. New York,* Ser. HI. ii. (1811) 408.—Am. bor.
polymorpha, *Loennroth, Obs. Crit. PI. Suec.* 19 (1854). —Scania.
reflexa, Lange, in Cutanda, Fl. Matrit 292=hamulata.
sepulU, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 298. —Am. bor. occ
sessilis, DC. Fl. Fr. iv. 414= autumnalis, verna.
Sonderi, *Hegelm. in Verh. Bot. Verh. Brandenb.* ix. (1867) 18.—Austral.
spuria, *Rafin. in Med. Refios. New York,* v. (1808) 354.—Am. bor.
stagnalis, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. ii. 251.—Europ.; Ind. or.
Stellaria, Rafin. in Med. Rep. New York, Ser. III. ii. (1811) 408-autumnalis.
stenocarpa, *Hegelm. in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* x. (1868) 114.-Calif.
stellata, Hoppe, Taschenb. (1792) 168 -verna.
tenuifolia. Fries, Novit. Fl. Suec 280-hamulata.
tenuifolia, Gennari, ex Parl. Fl. Ital. iv. 424 - capillaris.
tenuifolia, Thnil. ex Pen. Syn. i. 6-versa.
terrestris, DC. Prod. iii. 71-deflexa.
terrestris, *Muhl. ex Rafin. 1. c.* Ser. IIL ii. (1811) 408. —Am. bor.
terrestris, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 358=brevifolia.
transsilvanica, Schur^Ennm. PI. Transs. 216 —stagnalis.
trnncata, *Cuss. PI. Rar.* 4.—Italia,
turfosa, *Bert, in Am. Journ. Sc.* xix. (1831) 308, nomen; *Hegelm. Monog. Callit.* 59.—Chili,
turfosa, *Schur, Enum. PI. Transs.* 316.—Transsylv.
umbonata, *Hegelm. in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* ix. (1867) 19.—Tasmania.
verna, Hook. f. Fl. Antarct. i. 11 = antarctica.
verna, *Linn. Fl. Suec.* ed. II. ii. n. 3.—Europ.; Am. bor.
verna, Linn. 1. c. partim — polymorpha.
verna, Savi, Fl.Pis. i. 4-stagnalis.
vernalis, Knetz. in Linnaea, vii. (1832) 175= verna.
virens, Goldb. in Mem. Soc. Nat.Mosc. v. (1817) 119 — autumnalis.
Wightiana, Wall. Cat n. 7008-stagnalis.

CALLITKIS, Vent. Decad. (1808) 10. *CON1FERAE,* Benth. & Hook. f. iii. 424.
FRENELA, Mirb. in Mem. Mns. Par. xiii. (1826) 80.
FRESNELIA, Steud. Nom. ed. II. i. 648 (1840).
LEICHHARDTI A, Sheph. Cat. PI. Cult. Sydn. (1851)15
PACHYLEPIS, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. L xxx. (1833) 189.
OCTOCLINIS, E. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet ii. (1858) 21.
PAROLINIA, Endl. Gen. Suppl. i. 1372 (1841).
WIDDRINGTONIA, Endl. 1. c. ii. 25 (1842).
Actinostrobus, F. Mnell. Rep. Burdek. Exp. 19- Actinostrobus pyramidalis.
acuminata, *F-Muell. Census,* 109.—Austral,
arborea, *Schrad. ex E. Mey. Zwei Pfl. Docum.* 73, nomen.—Afr. auslr.
arenosa, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 478, nomen -rhomboidea.
articulata, Hort ex Gord. Pinet. ed. II. 117=ihomboidea.
australis, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 474-rhomboidea.
calcarata, *R. Br. ex Mirb. in Mint. Mus. Par.* xiii. (1825) 74.—Austral.
capensis, Schrad. ex Gord. Pinet. 383 -cupressoides.

CAXLITBIS:—
columellaris, F. Muell. Fragm. v. 198 = robusta.
conglobata, *Sieber, ex Heynh. Nom.* i. 148.—Austral.
cupressiformis, Vent. Decad. 10-= rhomboidea.
cupressoides, *Schrad. ex E. Mey. Zwei Pfl. Docum.* 126.—Afr. austr.
Drummondii, *Benth. V Hook./, ex F. Muell. Census,* 109.—Austral.
elegans, *Sieber, ex Heynh. Nom. i.* 149.—Austral.
Fothergillii, Loud. Encycl. Trees, 1072-australis.
fruticosa, R. Br. ex Rich. Conif. 49=calcarata.
glauca, R. Br. ex Mirb. in M&n. Mus. Par. xiii. (1825) 74-robusta.
Gunnii, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. iv. (1845) 147=australis.
Hngelii, *Knight, Syn. Conif.* 14.—Austral.
Macleayana, *F. Muell. in Rep. Burdek. Exped.* 17 i *Extra-Trop. PI.* Am. ed. (1884) 65.—Austral.
macrostachya, Hort. ex Steud. Nom. ed. IL i. 260- quadrivalvis.
montana, *Sieber, ex Heynh. Nom.* i. 140.—Austral.
MaeUeri, *Benth. & Hook./, ex F. Muell. Census,* 109. —Austral.
oblonga, *Rich. Conif.* 49.1.18. f. 2.—Austral.
Parlatorei, *F. Muell. Fragm.* v. 186.—Austral.
Preissii, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 643 — robnsta.
Propinqua, R. Br. ex Endl. Syn. Conif. 88-robusta.
Pyramidalis, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 473-calcaraU.
quadrivalvis, *Vent. Decad.* 10.—Afr. bor.
rhomboidea, *R. Br. in Rich. Conif.* 47.1.18.—Austral,
robnsta, *R. Br. ex Mirb. in Mim. Mus. Par.* xiii. (1825) 74.—Austral.
Roei, *Benth. tf Hook,/, ex F. Muell. Census,* 109.— Austral.
stricta, Schrad. ex Carr. Conif. ed. 1.66 -copressoides.
triquetra, Hort ex Lond. Encyc. Trees, 1072 - quadrivalvis ?
tuberculata, R. Br. ex Endl. Syn. Conif. 38 - robusta.
Ventenatii, R. Br. ex Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74 = rhomboidea.
verrucosa, R. Br. ex Mirb. 1. c = robusta.

CALLIXENE, Comm. ex Juss. Gen. 41 (1789)=Luauriaga, Ruiz *8c* Pav. (Liliac.).
magellanica, Raeusch. Nom. ed. III. 98-L. marginata.
marginata, Lam. Illustr. t. 248=L. marginata.
melantha, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 250.—N. Zel.
paruifiora. Hook. f. in Hook. Ic. PI. t. 632 =L. parviflora.
polyphylla, Hook. 1. c. t. 674-L. erecta.

CALLOPISMA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 107. t. 183, 184 (1827) = Deianira, Cham. *Sc* Schlecht. (Gentian.).
amplexifolium, Mart. 1. c. 109-D. nervosa.
cordifolium, Lhotsky, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 48 = D. erubescens.
perfoliatum. Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 108 »D. erubescens.

CALLOSMIA, Presl, Bot Bemerk. 103 (1844)-Anneslea, Wall. (Temstroem.).
fragrans, Presl, 1. c = A. fragrans.

CALLOSTYLIS, Blume, Bijdr. 840. t. 74 (1825) - Erie, Lindl. (Orchid.).
rigida, Blume, 1. c. - E. pulcheUa.

CALLOTROPIS, G. Don, Gen. Syst. ii. 228 (1832)- Qalega, Linn. (Legumin.).
tricolor, G. Don, 1. c.-G. offidnalis.

CALZiTTNA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 317. *ERICACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 589.
atlantica, Seem, in Joum. Bot. iv. (1866) 306 - vulgaris.
ciliaris, Schur, Enum. PL Transs. 447 = vulgaris.
Erica, DC. Fl. Fr. iii. 680-vulgaris.
genuine, Ducommun, Taschenb. 491-vulgaris.
sagittaefolia, S. F. Gray, Nat. Arr. ii. 399-vulgaris.
vulgaris, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 817.— Europ.; Am. bor.

CALOBOTA, Eckl. ft Zeyh. Ennm. 192 (1836) = Iiebeckia, Thunb. (Legurain.).
cytisoides, Eckl. & Zeyh. 1. c. 191 = L. cytisoides.
decipiens, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (18S8) 142- L. decipiens.
decutiens, Benth. 1. c.=L. decutiens.
flexuosa, Benth. 1. c. =L. flexuosa.
multiflora, Benth. 1. c = L. multiflora.
pulchella, Eckl. & Zeyh. Ennm. 191 - L . cytisoides.

OALOBOTRYA, Spach, in Ann. Sc Nat. Sét. II. iv. (1835) 21=Kibes, Linn. (Saxifr.).
sanguinea, Spach, 1. c = R . sanguinenm.

CALOCEDRUS, Kurz, in Joum. Bot. xi. (187S) 196. t. 133 = LibocedrUB, Endl. (Conifer.).
macrolepis, Kurz, 1. c.=L. macrolepis.

CALOCEPHALTTS, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. ,1817) 106. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 520.
ACHRYSUM, A. Gray, in Hook. Kew Jonm. iv. (1852) 228.
BLENNOSPORA, A. Gray, 1. c. iii. (1851) 172.
LEUCOPHYTA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 106.
PACHYSURUS, Steetz, in Lehm. PL Preiss. i. 441 (1845).
aernoides, *Benth. Fl. Austral,* iii. 576.—Austral,
angianthoides, *Benth. I. c.* 575.—Austral.
Brownii, *F. Muell. Rep. Babb. Exp.* 13.—Austral.
chrysanthus, Schlecht. in linnaea, xx. (1847) 592 = Craspedta chrysantha.
citreus, *Less. Syn. Comp.* 271.—Austral.
Drummondii, *Benth. Fl. Austral,* iii. 574.—Austral.
Francisii, *Benth. 1. c.* 576.—Austral.
gnaphalioides. Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral. 878 = Helipterum moscbatum.
lacteus, *less. Syn. Comp.* 271.—Austral,
multiflorus, *Benth. Fl. Austral,* iii. 576.—Austral,
platycephalus, *Benth. I. c.*—Austral.
Sonderi, *F. Muell. 2nd Gen. Rep.* (1854); *et Rep. Babb. Exp.* 13.—Austral.

CALOCHILUB, R. Br. Prod. 820 (1S10). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iU. 614.
campestris, *R. Br. 1. c.*—Austral.
licrbaceus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 459 = campestris.
paludosus, *R. Br. Prod.* 320.—Austral.
Koberlsoni, *Benth. Fl. Austral,* vi. 315.—Austral.

CALOCHLAMYS, Presl, Bot. Bemerk. 148 (1844) = Congea, Roxb. (Verbenac).
capitata, Presl,!. c. 149 = Congeatomentosa.

CAIiOCHOSTTTS, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 240 (1814). *LIL1ACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 820.
CVCLOBOTHKA, G. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. t 273 (1829).
albus, *Dougl. ex Benth. in Mound V Hensl. Botanist,* t. 98.—Calif,
apiculatus, *Baker, in Joum. Linn. Soe.* xiv. (1875) 305.—Am. bor. occ.
aureus, *S. Wats, in Am. Natural,* vii. (1873) 803.—Calif.
Bamardi, *Dougl. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 260.—Am. bor. occ.
Benthami, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xiv. (1876) 304.-Calif.
Bonplandianus, *Schult.f. Syst.* vii. 1«S2.—Mexic.
caeruleus, *S. Wats, in Proc. Am. Aead.* xiv. (1879) 268.—Calif.
Catalinae, *S. Wats. I. c.* 268.-Calif,
citrinus, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6200.—Calif,
clavatus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879)265. —Calif.
Douglasianus, *Schult.f. in Van Hall, Bijdr.* iv. 127. —Am. bor. occ.
elegans, Baker, in Joum. Linn. Soe. xit. (187S) 305 = Ulacinus, nudus et Tolmiei.
elegans, Hook. f. Bot. Mag. t. 5976=Maweanus.
elegans, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 240.—Am. bor. occ.
eurycarpus, S. Wats, in Bot King, Exp. 848=nitidus.
flavus, *Schult.f. Syst.* vii. 1535.—Mexic.
flexuosus, *S. Wats, in Am. Natural* vii. (1873) 803.—Am. bor. occ.
fesciu, *Schult.f. Syst.* vii. **1634.**—Mexic

CALOCHOBTUS. -
Ghiesbreghtianus, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1B79; 268.—Mexic.
glautus, Regel, Gartenfl. (187S).260 ; et in Act. Hort. Petrop iii. II. (1876) 285 = caeruleus.
Greenei, 5 *Wats, in Proc Am. Acad.* xiv. (1879) 264. —Am. hor. occ.
Gunnisoni, 5 *Wats, in Bot. King, Exp.* 348.—Am. bor. occ.
Hartwegii, *Benth. PL Hartw.* 26.—Mexic.
Kennedyi, *Porter In Coult. Bot. Gat.* ii. (1877) 79.— **Calif.**
Leichtlinii, Hook. *f.* Bot. Mag. t. 5862=Nuttallii.
lilacinus, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 5.— Calif,
longebarbatus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 381.—Am. bor. occ.
luteus, *Dougl. ex Kunth, Enum. PI.* iv. 233.—Calif.
luteus, Nutt. in Joum. Acad. Phil. vii. (1834) 53 = Nuttallii.
Lyallii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 305- elegans.
macrocarpus, *Dougl. in Trans. Hort. Soc.* vii. (1630) 276. t. 8.—Am. bor. occ.
Maweanus, *Leichtl. ex Baker, in Joum. Linn. Soc.* xiv. (1876) 305.—Am. bor. occ.
monophyllus, *Lem. in Fl. des Serres,* Sér. T. v. (1849) 430 b.—Calif,
nitidus, *Dougl. in Trans. Hort Soc.* vii. (1830) 277. t. 9.-Calif.
nitidus, Ton-. Pacif. Rail. Rep. iv. 146 = Benthami.
nudus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 268.— Calif.
Nuttallii, *Torr. V Gray, in Pacif. Rail. Rep.* ii. 124. —Am. bor. occ.
Palmeri.S. *Wats, in Proc. Am. Acad. xiv.* (1879) 2<6. -Calif.
pallidus, Schult. f. Syst. vii. 1588=flavus.
parviflorus, Nntt. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 306 =Nuttallii.
pulchellus, *Dougl. ex Benth. in Trans. Hort. Soc* Ser. II. i. (1835) 412.—Calif.
purpureus, Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1876) 308, pro parte = Bonplandianus.
pusillus, *Dougl. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 260.—Am. bor. occ.
spatulatus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 267.—Mexic.
splendens, *Dougl. ex Benth. in Trans. Hort. Soc.* Ser. II. i. (1835) 411. t 15.—Calif.
***To\mki,Hoot. V Am. Bot. Beech. Voy.* 398.—Calif.**
umbellatus, Wood, in Proc. Nat. Sc. Philad. (1868) 168 = lilacinus.
.uniflorus, *Hook. If Am. Bot. Beech/ Voy. Suppl.* 398. —Calif.
uniflorus, Hook. f. Bot. Mag. t. 5804-lilacinus.
venustus, *Dougl. ex Benth. in Trans. Hort. Soc.* Ser. II. i. (1835) 412 t. 15. f. 3.—Calif,
vestitus, *Benth. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 260.—Calif.
Weedii, Wood, in Proc. Nat. Sc. Philad. (1868) 169 = luteus.

CALOCOCCUS, Kurz, ex Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. xxvi. (1864) 48=Phyllanthus, Linn. (Euphorbiac).
sundaicus, Kurz, 1. a«=P. sundaicus.

CALODENDEUM, Thunb. Nov. Gen. ii. 41 (1782). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 288.
PALLASiA.Houtt. Handleid. ii. 382 (1776).
cápensis, *Thunb. I. c.* 43; *et Prod. PL Cap.* 44.— Afr. austr.

CALODIUM, Lour. Fl. Cochinch. 247 (1790) =Caasytha, Linn. ^Laurin.).
cochinchinensis. Lour. 1. c. = Cas. filiformis.

CALODONTA, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. Ser. II. vii. (1841) 448=Tolpis, Adans. (Compos.).
atorica, Nutt. 1. c. = T. virgata.

CALODRACON, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1850-61) 132, 137 = Cordyline, Comm. (LUiac).
helUoniaefolia, Planch. 1. c.=Cord. heliconiaefolia.
Jacquini, Planch. 1. c. =Cord. Jacquinii.
nobilis, Planch. 1. c. vii. (1851-62) 106. t. 882, 683.— Japon.
Sieberi, Planch. 1. c. vi. (1850-61) 132=Cord. Sieberi.

CALODRACON:—
Sieboldii, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. 137- Dracaena Sieboldii.
termittalis, Planch. 1. c.=Cord. terminalis.
venusta, Planch. 1. c. 182=Dracaena venusta.

CALODRYUM, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 401. t. 51 = Quiviflia, Comm. (Meliac.).
tubiflorum, Desv. 1. c. = Q. lanceolata.

CAIiOQYNE, R. Br. Prod. 579 (1810). *GOODENOVIEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 539.
DISTYLIS, Gaudich. in Freyc Voy. Bot. 460. t. 80 • (1826).
Berardiana, *F. Muell. Fragm.* vi. 7.—Austral,
chinensis.&wt*. *in Journ. Linn. Soc.* V. (1861) 78.— China.
distylis, F. Muell. Fragm. vi. 6 = Berardiana.
heteroptera, *F. Muell. Fragm.* x. 43.—Austral,
pilosa, *R. Br. Prod.* 579.—Austral,
purpurea, *F. Muell. Fragm.* viii. 57.—Austral.

CALOMECON, Spach, Hist V<Sg Phan. vii. 7 (188» **=-Papaver, Toum.**
bracteatum, Spach, 1. c. 9 = P. bracteatum.
orientate, Spach, 1. c - P . orientale.

CALOMERIA, Vent. Jard. Malm. 73. t. 73 (1804)- Humea, Sm. (Compos.).
amaranthoides, Vent. 1. c = H. elegans.

CALOMORPHE, Kunze, ex Walp. Rep.i. 680 (1840) = Lennea, Klotzsch (Legumin.).
Ehrenbergiana, Kunze, ex Walp. 1. c. = L. robinioides.

CALOMYRTUS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 76,'» obs. (1849)=Myrtus, Toum.
excelsa, Blume, 1. c. = M. excelsa.
ovalifolia, Blume, 1. c. = M. ovalifolia.

CALONNEA,Buchoz, Icon. (1786) t126 - Qaillardift. Fouger. (Compos.).
pulcherrima, Buchoz, 1. c.=G. pulchella.

CALONYCTION, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genév. vi. 441 (1883) (Conv. Or. 59) = Ipomoea, Linn. (Convolvul.).
acanthocarpum, Choisy, in DC. Prod. ix. 346 - I. acanthocarpa.
asperum, Choisy, Conv. Or. 60=1. grandiflora.
Bona-nox, Boj. Hort Maurit. 228=1. Bona-nox.
capillatum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 598 = 1. capillata.
chenopodifolium. Mart & Gal. in Bull. Acad. Bruxxii. II. (1845) 269 = 1. chenopodifolia.
clavatum, G. Don, Gen. Syst. iv. 264.—Ecuador.
comorensis, Boj. Hort. Maurit 228 •= I. grandiflora.
comespermum, Boj. 1. c.=1. grandiflora.
diversifolium, Hassk. PI. Jav. Rar. 523 = I. trichosperma.
dubium, Mart. & GaL in Bull. Acad. Brux. xii. "• (1845) 268 = 1. dubia.
Galeottii, Martens, ex Mart. *8c* Gal. 1. c—Mexic.
grandiflorum, Choisy, Conv. Or. 60 = 1. grandiflora.
Jacquinii, G. Don, Gen. Syst. iv. 264 = 1. grandiflott-
longiflorum, Hassk. PI. Jav. Rar. 623 = 1. grandiflora-
macrantholeucum.Cottz, N.Sp.Calon. 15 = I. Bona-DQ*-
macranthum, Van Houtte, ex Poit. in Rev. Hortic Sir. II. iv. (1845-46) 409.—Hab. ?
megalocarpum, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 129 - I. Bona-nox.
mollissimum, Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 128, »fm —Java.
muricatum, G. Don, Gen. Syst. iv. 264 = 1. Bona-nox.
muticum, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. *(loS*l* 390-I. grandiflora.
noctolucum, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. Ill- *"* = 1. latiflora.
proximum, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. >• (1845) 268 = I. proximum.
pseudomuricatum, G. Don, Gen. Syst. iv. 264 * I. grandiflora.
pteripes, G. Don, 1. c—Ecuador.
pterodes, Choisy, in DC. Prod. ix. 346=praec.
pulcherrimum, Parodi, Contrib. 12.—Paraguay.
Rheedi, Colla, N. Sp. Calon. 15-1. Bona-nox.
Roxburghii, G. Don, Gen. Syst. iv. 263-1. Bona-no*-
sanguineum, Hort.-Cf. Gard. Chron. (1866) »S4- Lettsomia Kurzii.
sanguinolentum, Guillon, in Rev. Hortic. (1880) *»• -Hab. J

CALONYCTION:—
'teetotum, **Choisy, Conv. Or. 69-1. Bona-nox.**
™hospermum, **Choisy, 1. c. 60 = 1. trichosperma.**
uba,* **Colla, Nov. Sp. Calon. 15=-1. grandiflora?
*™*ustum,* **Mart. & GaL in Bull. Acad. Brux. xii. n. (1845) 269 = 1. venostnm.**

CAL OPAPPUS, Meyen, Reise, i. 316 (1834)-Mas8aTi-
****»' Juss. (Compos.).**
acanthifoli ul> Rcm y> in c - G »7. F1 - **Chil. iii. 298.—Chili.**
acerosus, Meyen, Reise. i. 315 - N. accrosa.

CALOPETALON, J. Dram, ex Harv. in Hook. Kew Journ. *"" (1855) M " Mftrianthus, Hueg. (Wttapor.).
ringens, J. Dram. 1. c. 63 = M. ringens.

CALOPHACA, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. 67 (1812) ; et in DC. Prod. iL 2?° (1825). *LEGUMINOSAE,* Benth. * Hook. f. i. 605.
CHESKEVA, Lindl. in Endl. Gen. 1275 (1840).
Hovenii, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 74.—Soongaria.
juncea, Steud. Nom. ed. II. i. 240, sphalm. = Caligonum Calliphysa.
soongorica Kar. & Kiz in Bull Soc Nat-Mosc (1841) 401 = Hovenu.
"Olgarica, *Finch. Hort. Gorenk.* **ed. II. (1812) 68.—Ross. austr.**

CALO £ Hra!8 . D - **Don, in Sweet, Brit. Flow. Gaid. Ser. *******W1 (188S)- *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. u. 1077.**
CHAETACANTHUs.Nees, in IJndl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 44* (1886).
"^CHORISTK, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 76 L 11882), nomen prius.
adscendens, IN STYLKS F <»«1. Linnaea, xxiii. (1850) 94.
Abyi.
»oenus, AT«s ^/"or^ *Fl. Bros,* ix. 27.—Bras.
anS!"" 8»A Gray- *Syn. Fl. N. Am.* ii. 1.456.—Florida.
£? olius > *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 602.—
bifarm, Sh »ttlew. ex Nees, in DC. Prod. xi. 107 = hi oblongifoliu..
Wbiatus, *Seem. Bat. Voy. Herald,* 824. t. 65.—
li ubnia.
"M j ^ *Vatke, in Bremen Abh.* ix. (1885) 131.—
B Btk ^ 7 - *«ders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 24. **~~^fr. austr.**
^Pltatus, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 1»"•—Mexic.
***"*«. *Vatke, in Bremen Abh.* ix. (1886) 132.—Ins. Mascar.**
us, *Nees, in DC. Prod.* xi. 110.—Perov.
c. tatus 29 . *T. Anden. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) cri .—Afr. austr.
pnros, *Nees, in Mart. Fl.Bras.* ix. 26.—Bras.
ciben S?' A Rich - *PI- Cub. Fanerog.* ii. 160.—Cuba.
Dalzelii, T - *Anders, ex Bedd. Ic. lnd. Or.* i. 60.—Ind or.
decumbens, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* .ii. I. 825.—^ w n . ; Mexic. *
"*P?'ssus, T. Anders, in Thw. Enum. PL Zeyl. 225 =- N «gchana.
g«cilis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 111.—Madag.
Hiiiiaus' Ar . ««» *I-* '• 112.—Afr. trop.
? * " « 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) hi 197 —Afr trop-
hit.. us mus, Ne "> »» *DC. Prod.* xi. 109.—Mexic.
—u TM> *Oerst. ex Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (la "-78) 71—Mexic.
"" Stmins, *Shuttlew. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 108.
hy * ? • DOT.
hygroph yloides, *Nees,* in *Mart. Fl. Bras.* ix. 26!—Bras.
hysso rifolius, *Nees, in DC. Prod. xi.* 111.—Abyss.
Jasmi Mim-mexicanum, *Nees, I. c.* 110.—Mexic.
lava- duucu Utalir ». *Nm, in Mart. Fl. Bras.* ix. 27.—Bras.
^^7-» » ^- *Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 824.__Texas ; Mexic.
littoralis, *T. Anders. in Thw. Enum. PI. Zeyl.* 225.—Ind. or.
madagascari iensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 112.—Madag.
Maranhonis, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 25.—Bras.

CALOFHAMTEB :—
***mauritianus,* T. Anders, in Journ. Linn. Soc. v£L(1864) 23, nomen = Hypoëstes serpens.**
microphyllus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 113.—Mexic.
mnlticaulis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. **(1864) 23.—Abyss.**
Nagchana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 109.—Ind. or.
natalensis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) **23.—Afi. austr.**
oblongifolius, *D. Don, in Sweet, Flow. Gard.* t. 181. **—Am. bor.**
***oblongifolius,* Torr. Bot. Mex. Bound. 122 = decumbens.**
***tniatus,* Benth. Fl. Hartw. 89 = linearis.**
Pcrrottetii, *Nees, in DC. Prod.* xi. 111.—Afr. trop.
l'ersoonii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) **23.—Air. austr.**
Pulegium, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 25.—Bras,
quadrangularis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* **(1854) 1-20.—Mexic.**
quitensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 110.—Ecuador,
radicans, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) **23.—Afr. trop.**
repens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 109.—Peruv.
***rigidus,* Dalz. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. lnd. iv. 411-DalzeIlii.**
Schiedeanus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 111.—Mexic.
Serpyllum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 26.—Bras,
setosus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 112.—Afr. austr.
siphonanthus, *Nees, 1. c.*—Madag.
thunbcrgiaeflora, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 8, 197.—Afr. trop.
trichocalyx, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) **126.—Afr. trop.**
Tweedianus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 108.—Reg. Argent,
vagans, *Wight, Ic.* xi. t. 1526.—lnd. or.
verticillaris, *T. Anders, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* **xxix. (1874) 126, iu nota.--Afr. trop.**

CALOPHTHALMUM, Reichb. Norn. 82 (1841) - GALOPHTHALMUM, Nees & Mart.

EALOPHYLICA, Presl, Bot. Bemerk. 89 (1844) = Phylica, Linn. (Rhamn.).
***gnidioides,* Presl, 1. c. = P. gnidioides.**
***juniperifolia,* Presl, 1. c. = P. gnidioides.**

CALOPHYLLOIDES, Smeathm. ex DC. Prod. iii. 272 (1828)=Eugenia, Mich. (Myrtac).
***lucida,* Smeathm. 1. c —E. Calophylloides.**

CALOPHYLLUM:, linn. Gen. ed. I. 154 (1737',.
***GUTTIFERAE,* Benth. *Be* Hook. f. i. 176.**
APOTEMUM, Blume, Bijdr. 218 (1825).
AUCIA, Lour. Fl. Cochinch. 337 (1790).
***acuminatum,* Lam. Encyc. i. 553 = spectabile.**
***acuminatum,* Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 80-Rheediaacuminata.**
***Akara,* Burm. f. Fl. lnd. 121 = Tetracera laevis.**
***amoenum.* Wall. Cat. n. 4849 — retnsum.**
amplexicaule, *Choisy, ex Planch,* b* *Triana, in Ann. Sc. Nat. Sir.* **IV. xv. (1861) 281.—Ins. Philipp.**
angnstifolium, *Roxb. Hort. Beng.* 41 j *Fl. lnd.* ii. 608. —Penang.
apetalum, *Blanco, Fl. Filip.ed.* II. 429.—Ins. Philipp.
***afetalum,* Willd. in Ges. Natorf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 79 = C. Inophyllumt**
Augia, *Steud. Norn.* ed. II. i. 260.—China.
***bancanum,* Miq. Fl. lnd. Bat. Snppl. i. 499 = pulcherrimum.**
***Bingator,* Roxb. Hort. Beng. 41; Fl. lnd. ii. 607 = C. Inophyllum.**
Blancoi. *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. **xv. (1861) 272.—Ins. Philipp.**
Blumei, *Wight, lllustr.* i. 128.—Java,
bracteatum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 51.—Zeylan.
brasiliense, *Camb. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* i. 321. t. **67.—Bras.**
Burmanni,* Wight, lllustr. i. 129 = C. Calaba, *Linn.
Calaba, *Jacq. Am.* 269. t. 165.—Ins. Carib.
Calaba, *Linn. Sp. PI.* 514.—Zeylan.
calaboides, G. *Don, Gen. Syst.* i. 622.—lnd. or.
caledonicum, *Vieill. ex Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xv. (1861) 291.—N. Caled.**
canum. *Hook./. Fl. Brit. lnd.* i. 271.—Malacca.
***chinense,* T. Anders, in Hook. f. Fl. Brit. lnd. i. 270- Ochrocarpus longifolius.**
cordato-oblongum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 407.—Zeylan.

CALOPHTILUH :—
Cumingii, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. **IV. xv. (1861) 259.—Ins. Philipp.**
cuneifolium, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 51, 407.—Zeylan.
***Cupi,* H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 203 = Rheedia Cnpi.**
***Cussi,* G. Don, Gen. Syst. i. 628 = praec**
***cymosum,* Miq. Fl. lnd. Bat. Suppl. i. 497 = spectacle.**
dasypodium, *Miq. Ft. lnd. Bat.* i. II. 611.—Java.
***decipiens,* Thw. Enum. PI. Zeyl. 61«Thwaitesii.**
***dedpiens,* Wight, lllustr. 128 ; Ic. i. 106 = Wightianura.**
Diepenhorstii, *Miq. Fl. lnd. Bat. Suppl.* i. 497.—Sumatra,
dongnaiense, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 108.— **Cochinch.**
dryobalanoides, *Pierre, 1. c.* t. 106.—Cochinch.
***dubium,* Steud. Norn. ed. II. i. 261 = Ochrocarpus longifolius.**
***edule,* Seem. Bot. Voy. Herald, 89-Rheedia edulis.**
***datum,* Bedd. Fl. Sylv. i. t. 2 = tomentosum.**
***excelsum,* Zoll. & Morr. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie, ii. (1845) 582 = Ochrocarpus ovalifolius.**
floribundum, *Hook./. Fl. Brit. lnd.* i. 272.—Malacca.
***gracile,* Miq. Fl. lnd. Bat. Suppl.. i. 498-pulcherrimum.**
Griffithii, *T. Anders, in Hook./. Fl. Brit. lnd.* i. 273. **—Malacca.**
Hasskarlii, *Teijsm. If Binn. ex Planch, (f Triana. in Ann. Sc. Nat.* **Sef. IV. xv. (1861) 278.—Java,**
hmapetalum, *Hook. /. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. **(1862) 163.—Borneo,**
hirtellum, *Miq. PI. Jungh.* 291.—Java.
***Inophyllum,* Lam. Encyc. i. 552 = C. Tacamahaca.**
Inophyllum, *Linn. Sp. PI.* 513.—Geront. trop.
Inophyllum,* Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 27 4-C. Calaba, *Jacq.
javanicum, *Miq. PI. Jungh.* 292.—Java.
***lanceolarium,* Roxb. Hort. Beng. 41; Fl. lnd. ii. 608 = C. Tacamahaca.**
***lanceolatum,* Blume, Bijdr. 217. = C. Tacamahaca.**
lanceolatum, *Teijsm.* b* *Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* **iii. (1865) 395.—Java,**
lanigentm, *Miq. Fl. lnd. Bat. Suppl.* i. 498.—Ins. Banca.
***longi/olium,* Wall. Cat n. 4851 - Ochrocarpus longifolius**
longifol'ium, *Willd. Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* v. **(1811) 80.—N. Granat.**
Lowei, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Set. IV. **xv. (1861) 271.—Borneo,**
lucidnm, *Benth. in Hook. Land. Journ, Bot.* ii. (1848) **370.—Guiana.**
macrocarpum, *Hook./. Fl. Brit.Ind.W273.*—Malacca,
macrophyllum, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. lnd.* xxxii. **(1871) 405.—Malaya.**
***MadruHo,* H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 202 - Rheedia Madruno.**
marginatum, *Wall. Cat.* n. 4845 (sp. t).—Ins. Penang.
Mariae, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. **xv. (1861) 261.—Am. austr.**
membranaceum, *Gardn. W Champ, in Hook. Kew Journ. i.* **(1849) 309.—China.**
***mesuaefolium.* Wall. Cat. n. 4850—pulcherrimum.**
microphyllum, 7°. *Anders, in Hook./. Fl. Brit. lnd.* i. **272.—Malaya.**
***microphyllum,* Planch. & Triana, in Ann. Sc Nat. *Sit.* IV. xv. (1861) 282 = parvifolium.**
microphyllum, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. lnd.* xxxii. **(1871) 406.—Ins. Gebeh.**
montanum, *Vieill. ex Planch,* b* *Triana, in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xv. (1861) 292.—N. Caled.**
***Moonii,* Wight, lllustr. i. 129 •= spectabile.**
***Nagassarium,* Burm. f. Fl. lnd. 121 — Mesua ferrea.**
obovale, *Miq. Fl. lnd. Bat. Suppl.* i. 498.—Sumatra.
***odoratissimum,* Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 12 = spectabile.**
***ovati/olium,* Noronha, I. c. 13 — C. Inophyllum.**
pachyphyllum, *Planch,* b* *Triana, in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV. xv. (1861) 256.—Bras.**
*paTYiRonim,Boj.ex Baker, Fl.Mauri1.*16.—Ins.Maurit.
parvifolium, *Choisy, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* i. **(1823) 229.—Ins. Molucc.**
***pisi/erum,* Planch. 3c Triana, in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. xv. (1861) 294 = retusum.**
***plicipes,* Miq. Fl. lnd. Bat. Suppl.i. 499 = pulcherrimun).**

CAI.OPHYLI.t7M :—
polyanthum, *Wall. Cat.* n. 4844; *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. IV. xv. (1861) 278.—Ind. or.
pseudotacamacha, *Planch.* to" *Triana, I. c.* 270.—Ind. or.
pulcherrimum, *Wall. Cat.* n. 4848 ; *Planch, (f Triana, I. c.* 274.—Malaya,
retnsnm, *Wall. Cat.* n. 4846; *Planch. V Triana, I. c.* 265.—Malaya.
rigidum, *Miq. FL Ind. Bat. Suppl.* i. 497.—Sumatra,
saigonense, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* 1.105.—Cochinch.
Soualatti, Burm. f. Fl. Ind. 121 =spectabile.
spectabile, Hook. & An. Bot. Beech. Voy. 174 = membranacenm.
spectabile. *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* v. (1811) 80.—Malaya; Polynes.
spurium, Boj. Hort. Maurit. 52 = parvifloram.
spurium, Choisy, in M£m. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1823) 229 - C . Inophyllum.
Snriga, *Buch-Ham. ex Roxb. Hort. Beng.* [93] ; *Fl. Ind.* ii. 608.—Ind. or.
Suringa, Bach-Ham, ex Stead. Norn. ed. II. i. 261 - praec.
Tacamahaca, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* v. (1811) 79.—Borbon.; Madag.
tetrapetalum, Roxb. Hort. Beng. [98]; FL Ind. ii. 608 = spectabile.
tetrapetalum, Wall. Cat. n. 4848 - Wallichianum.
tetrapterum, *Miq. PI. Jungh.* 291.—Sumatra.
Teysmanni, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 499.—Sumatra.
Teysmannii, Zoll. ex Planch. *Sc* Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 275=lanceolatum.
thurifemm, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 16.—Pernv.
Thorelii, *Pierre, Fl. For. Cochinch. t.* 103.—Cochinch.
Thwaitesii, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xv. (1861) 260.—Zeylan.
tomentosum, *Wight, Illustr. i.* 128.—Ind. or.
trapezifolium, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 51.—Zeylan.
venulosum, *Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 149,150.—Java.
Walkeri, *Wight, Illustr.* i. 128.—Ind. or.
Wallichiana, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xv. (1861) 277.—Malaya.
Wightianum, *Wall. Cat.* n. 4847 ; *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. IV. xv. (1861) 256.—Ind. or.

CALOPHYSA, DC. Prod. iii. 166 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 766.
ciliata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 140.—Am. trop.
dentata, *Triana, 1. c.*—Perov.
diipar, *Triana, 1. c.* 141.—Pernv.
flexuosa, *Triana, 1. c.*—Venezuela,
heterophylla, *Triana, 1. c.* 140.—Pernv.
pilosa, *Triana, I. c*—Am. trop.
setosa, *Triana, in Journ. Bot.* v. (1867) 209.—Nicaragua,
testiculata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 140.—N. Granat
tococoidea, *DC. Prod.* iii. 166.—Bras,
vesiculosa, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 140.—Mexic.

CALOPLECTUS, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 119=Allopleetus, Mart. (Melastom.).
macrophyllusi Oerst. 1. c. = A. macrophyllns.

CALOPOOON, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 204 (1813). *ORCHWEAB,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 615.
CATHEA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 300, nomcn prius.
Lessonii, Brongn. Bot. Voy. Coquille, 188. t. 37 «> Pogonia tetraphyUa.
multifiorus, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 425.—Am. bor..
pallidus, *Chapman, Fl. S. V. St.* 457.—Am. bor.
parviflorus, *Lindl. Gen. et Sp. Orch,* 424.—Am. bor.
parviflorus, *Rafin. Atl.Joum.* 148 (-praec?).—Am. bor.
pulchellus, *R. Br. in Ait. Hort. Kern.* ed. IL v. 204.—Am. bor.

CAIiOPOOONIUM, Desv. in Ann. Sc. Nat Sér. I. ix. (1826) 423. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook, f. 1. 534.
CVANOSTREMMA, Benth. ex Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 116 (1841).

CALOPOGONIUM :—
STENOLOBIUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 125.
brachycarpum, Benth. ex Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot. i. 800=mucunoides.
caerulenm, *Hemsl. 1. c.* 301.—Mexic
galactoides, *Benth. ex Hemsl. I. c*—Mexic.
mucunoides, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. ix. (1826) 423.—Guiana.

CALOPSIS, Beanv. ex Joss, in Diet. Sc Nat xlv. 272 (1827) i et ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828) 44. t. 3=LeptooarpuB, R. Br. (RestUc).
chilensis, Steud. Syn. PI. Cyp. 258-L. chilensis.
festucacea, Kunth, Enum. PI. iii. 425 - L. incurvatus.
hirtella, Kunth, 1. c. 426=L» peronatu.
incurvata, Kunth, 1. c. 427 = L. incurvatus.
neglecta, Hochst. in Flora, xxviii (1846) 388 - L. neglectus.
oxylepis, Kunth, Enum. PI. iii. 427 - L . oxylepis.
paniculata, Desv. in Ann. Sc. Nat. Se>. I. xiii. (1828) 44. t. 3. f. 2 = L. paniculaus.
peronata, Kunth, Enum. PI. iii. 426—Restio ocreatus et L. peronatus.
ramiflora, Kunth, 1. c. 423 ↔ L. paniculatus.
triticea, Kunth, 1. c 424 = Restio triticeus.

CALOPTILIUM, Lag. Amen. Nat. i. 84 (1811) = XTassauvia, Juss. (Compos.).
Lagascae, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835)36=N.Lagascae.

CALOPYXIS, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1868) 86 = Combretum, Linn.
alata, Tnl. 1. c. 89.—Madag.
eriantha, Tul. 1. c. 90.—Madag.
oxygonia, Tul. I. c. 88.—Madag.
sphaeroides, Tul. 1. c 86.—Madag.
velutina, Tul. 1. c. 87.—Madag.

CALOH.CHIS, Rodrig. Orch. Nov. L 195 (1877). *ORCHIDEAE.*
phaenoleuca, *Rodrig. I. c.* 196.—Bras.

CALOBHABDOB, Benth. Scropb. Ind. 44 (1836). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 963. .
Brunoniana, *Benth. I. c*—Reg. Himal.
cauloptera, *Hance, in Journ. Bot.* xv. (1877) 298.—China.

CALOROPHUS, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 78. t 228 (1806)-Hypolaena, R. Br. (Restiac.).
asper, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 67-Restio Loxocarya.
crispatus, Nees, 1. c. = Restio crispatos.
densus, Nees, 1. c - H . densa.
dentatus, Nees, 1. c—Austral.
elongatus, Labill. Nov. Holl. PL ii. 78. t. 228 - H . elongata.
elongatus, F. Muell. Fragm. viii. 86 = H. elongata.
elongatus, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. 68 - II. gracillima.
flexuosus, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 68=H. flexuosa.
minor, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 267 - H . elongata.
Sieberianus, Steud. Syn. PI. Cyp. 265 = Restio fastigiatus.

CALOSACME, Wall. Cat nn. 800-806 (1829) = Chlrita, Buch.-Ham. (Gesnerac).
acuminata, Wall. 1. c n. 802 =Ch. acuminafa «t Didymocarpus acuminata.
amplectens, Wall. 1. c n. 806 - Ch . bifolia.
dimidiata, Wall. 1. c. n. 808-Ch. dimidiata.
flava, Wall. L c. n. 801 = Ch. pumila.
grandifiora, Wall. 1. c. n. 800 = Ch. urticaefolia.
macrophylla. Wall. 1. c. n. 805-Ch. macrophylla.
polycarpa, Wall. L c n. 804 - Lysionotns serrata.

CALOSANTHES, Blume, Bijdr. 760 (1826)-Owwylum, Vent (Bignoniac).
indica, Blume, 1. c.=O. indicum.

CALOSANTHOS, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. 1. 50 (1827) •= KALOSANTHES, Haw. - Boehea, DC. (Crassnl.).

CALOSCIADIUM, Eudl. Gen. Suppl. iv. m. 7 (1850)-Aciphylla, Font. (Umbellif.).
anHpodum, Endl. ex Walp. Ann. ii. 702.—N. Zel.
latifolium, Endl. ex Walp. 1. c—N. Zel.

CALOSCILLA, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 14. t. 246 (1889) = 8oilla, Linn. (Liliac).
Clusii, Jord. & Fourr. 1. c—S. peruviana.
elegans, Jord. 8c Fourr. I. c 16. t- 250«a. peruviana.
Jlaveola, Jord. *8c* Fourr. I. c. 17. t. 254-S. peruviana.
grandifiora, Jord. & Fourr. 1. c 16. t 252=S. peruviana.
hipponensis, Jord. · & Fourr. L c. 17. t 256-S- peruviana.
Hughii, Jord. *8c* Fourr. 1. c. 16. t. 246 - S . peruviana-
lim'da, Jord. *Sc* Fourr. 1. *c* - S. peruviana.
pallidifiora, Jord. & Fourr. 1. c. t 248=S. peruviana.
suiaUnda, Jord. & Fourr. 1. c 16. t. 263-»S. peruviana.
subcamea, Jord. & Fourr. 1. c t. 260=S. peruviana.
venusta, Jord. *8c* Fourr. 1. c 15. t. 347 - & peruviana.

CALOSCORDUM, Herb, in Lindl. Bot. Reg. (18") Misc. ee-NbthOBCordum, Kunth (Liliac.).
nerinifiorum, Herb. 1. c. 07 = N. nerinifloram.

CALOSERIS, Benth. PI. Hartw. 88 (1841)-Onoseri», DC. (Compos.).
rupestris, Benth. L c.-O. isotypns.

CALOSMON, J. S. Presl, RostL ü. 71 (1828) = Under*. Thnnb. (Laurin.).
aestivale, KosteL AUg. Med^Pharm. Fl. U. 478-*I** Benzoin.
Benaoin, J. S. Presl, Rostl. ii. 71 - L . Benzoin.
Neesianum, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 478 - L. Neesiana.

CALOSPHACE, Rafin. Fl. Tellur. iiL 91=Balvi* Tourn. (Labiat).

CALOSTELMA, D. Don, in Sweet. Brit. Fl. Gard. Ser. IL sub 1184 (183S)-Iiiatris, Schreb. (Compos.).
elegans, D. Don, 1. c.-=L. elegans.

CALO8TEMMA, R. Br. Prod. 297 (1810)-*AMARYLLIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 735.
albnra, *R. Br. I. c.* 298.—Austral.
aureum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 312=lutenro.
candidum, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. 64-lutenm.
carneum, Lindl. 1. *c* ii. 39= purpureum.
Cunninghami, *Ait. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. H-*[616], —Austral.
luteum, *Sims, Bot. Mag.* t. 2101.—Austral,
purpureum, *R. Br. Prod.* 298:—Austral.

CALOSTEPHANE, Benth. in Hook. Ic. PI. t. U" (1872). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 835.
divaricata, *Benth. I. c.—Afi.* trop.

CALO8TIGMA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. IL U; (1888) 848. t 12. *ASCLEPIADEAE,* Benth. * Hook. f. ii. 752.
Burcbellii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 286.—Bras.
glabrnm, *Decne. in DC. Prod.* viii. 581.—Bras.
Glaziorii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. M'-" Bras.
Guilleminianum, *Decne. in DC. Prod.* viti. 581*" Bns.
insigne, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 343.—Bras.

CALOSTIGMA, Schott, Melet. Bot. 19 (1882) - Philodendron, Schott (Aroid.).
Imbe, Schott, 1. c - P . Imbe.

CALOSTIMA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836) = Urera, Gandich. (Urtic).
aculeata, Rafin. 1. c 48 = U. baccifera.

CALOSTROPHUS, F. Muell. Fragm. viii. 86 (1873) •* Hypolaena, R. Br. (Restiac).
elongatus, F. Muell. 1. c. = H. lonrissima.
elongatus, Mast, in DC. Monog. Phan. *i.* 378 - lateriflon.

CALOSTROPHUS :—
txsuletu, F. Muell. Census, 124 = H. exsulca.
fastigiatus, F. Muell. in Papers Roy. Soe. Tasm. (W8) 117 _H.fastigiata.
grarillimus, F. Muell. Fragm. viii. 88 = H. gracillima.
ktriflorus, F. Muell. 1. c. 87=H. lateriflora.
Sieberianus, Mast, in DC. Monog. Phan. i. 378-H. lateiiflora.

G&LOTHAMMTJB, Labill. Nov. Holl. PL ii. 25. t 184 (1806). *MYRTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ i. 7U0.
BADDINIA, Leschen. ex DC. Prod. iii. 211 (1828).
BIJLLOTTIA, Colla, Hort. Ripul. 20. t. 28 (1824).
affinu, Turcz. in Bull. Phyi.-Math. Acad. Pe"tersb. »• (1852) 346=microcarpusj
"Per, *TWCM. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii (1849) II. .*».—Austral.
"fieri, Hort. Angl. ex Klotzsch, in Otto *Sc* Dietr. •1 AUg. Gartenz. iv. (1836) 115-Kunzea Baxter!,
v•epharanthereus, *F. Muell. Fragm.* iii. 112.—Austral,
•"epharospermus, *F. Muell. 1. c.* 111.—Austral,
wrysanthereus, *F. Muell. 1. c.* 112.—Austral.
"matus. Mackay, ex Lodd. Bot. Cab. t. 1447 = quadrifidus.
S. *carpus,* Lindl. Swan River App. 9-sanguineus.
Gnobosus B Gilesii , *enth' m' Ausiralm* iii. 176._AustraL
gracilis, *F. Muell. Fragm.* x. 81.—Austral.
Austra!*. *Br. in] Ait. Hort. Km.* ed. II. iv. 418.—
homalophyllus, *F. Muell. Fragm.* iii. 111.—Austral.
"vgelii, Sehau. in Nov. Act Nat. Cur. xxi (1846) 30 =lateralis.
f'ghtii,* Hort. ex Schau. 1. c. 23-robusta.
•~f*'i'?'««i Schau. L c 26=quadrifidus.
wterahs, *Lindl. Swan River App.* 9.—Anstral.
j«*iu, Kunze, in Lionaea, xx. (1847) 68=Preissii.
**bmanni, *Sehau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi. (1846) , 27—Austral.
""fgjfolius, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1842) 7 = 'ateralis.
™>eis«imus, *F. Muell. Fragm.* iii. 112.—Austral.
""Mocupus, *F. Muell. I. c.* 113.—Austral.
""*»««. Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) I. loo «a lateralis
OldfieWu, *F. Muell. Fragm.* iii I13.-Austral.
{™»ystachyus, *Benth. Fl. Austral,* iii 173.—Austral.
PULfolius, *F. Muell. Fragm.* iii. 158.—Austral.
Austra?' ***'" D'l'5"""" "'"*' **"**' (1M8) *~ *'*"?««, Turcz. in BulL Soc. Nat Mosc. xx. (1847) I. P loB.^ Lehmanni
"**«» *Sehau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi (1845)27. —Austral.
T^"'as, En<^-m' En"m- PI- Hueg. 48=quadrifidus.
Muaonfidus, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kern.* ed. II. iv. 418.—Austral.
robustus, Schau. in Nov. Act Nat Cur. xxi. (1845) 22 =villosns.
">Pestris, *Schau. I.* t.-Austral.
•wpuneus, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 25. t 164.— Austral.
°««"eri, *Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb.* (1842) 7.— /mistral.
""fffoPWlus, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi ^(1845)29»Schaueri
is, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 261 = Kunzea Baxteri
erosus, Schau. in Lehm. PI. Preiss. L 156 = Mela. »«uca exarata.
"nuosus, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxi (1845) ustral. *BT' ' } Ait, Hort% Ktm,* ed. II. iv. 418.—Austra[.

CALOTHECA, Spreng. Anldt ii. I. 167 (1817); Syst. i. 347 (1825)=AeluPopUB, Trin. (Gramin.).
Jjr£°> ^J"^R- Sjit i. 348=A. arabicus.
Tit ata> ^Preng. 1. c-.Poa rufescens.
"wo/«, Spreng. 1. c. 847 = A. littoralis.
i ff 7 «BSJ.* Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed.IL »-261=A. littolalis,
onaia> Spreng. Syst i. 348-Poa mucronulata.
•eftoca, Spreng. L c. -A. niliacus.
™'/<»'«i>1 Spreng. 1. c^Briza Lamarckiana.
Z"as' Spreng. I c.=Sesleria echbate.
*T^ens' ^*P«ng-1 c. -Bria purpuraseou.
*•»** S>preng. f. c. 347-A. villosus.

CALOTHECA, Desv. in Nov. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 190=Briza, Lino. (Gramin.).
barbata, Nees, Agrost. Bras. 477 = B. barbata.
briioidea, Beauv. Agrost. 86.117. f. 6=B. erecta.
briMoidea, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 71 - B. Lamarckiana.
bromoidea, Lejeune, Messager des Sciences (1828) ; et in Nov. Act. Nat Cur. xii. (1826) 757 = Bromus arduennensls.
dilatata, link, Hort. Berol. i. 157=B. erecU.
elegans, Beauv. Agrost 167.1.17=B. elegans.
macrostachya, Presl, Rel. Haenk. i. 268 = B. macrostachya.
microstachya, Presl, 1. c.=B. microstachya.
montevidensis, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 261, 225 = B. subaristata.
reniformis, Presl, Rel. Haenk. i. 268 =»B. renifonnis.
rotundata, Roem. & Schult. Syst. ii. 632 = B. rotunda ta.
sabulosa, Stand, in Flora, xii. (1829) II. 488=Sporobolus virginicus.
stricta. Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 50 «=B. stricta.
triloba, Kunth, Enum. PI. i. 874=B. triloba.

CALOTHYRSUS, Spach, in Ann. Sc Nat *Six.* H. ii. (1884) 62=AesouluB, Linn. (Sapindac).
calif arnica, Spach, 1. c = A. californiea.

CAIiOTIS, R. Br. in Bot Reg. t 604 (1820). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. £ ii. 267.
CHEIROLOMA, F. Muell. In Iinnaea, xxv. (1852) 401.
GONIOPOGON, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxiv. (1861) I. 173.
HUENEFELDIA, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 307.
anthemoides, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i.* (1856) 44.-Austral.
breviseta, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 60.—Austral,
cuneifolia, *R. Br. in Bot. Reg.* t. 604.—Austral,
cymbacantha, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 400. —Austral.
dentex, *R. Br. in Bot. Reg.* t. 504.—Austral.
dilatata, A. Cunn. in DC. Prod. v. 302-cuneifolia.
erinacea, *Steetz, in Lehm. PI. Preiss.* i. 424.— Austral,
glandulosa, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* (1855) 129. —Austral.
hispidula, *F. Muell. 1. c.* 130.—Austral.
Kempei, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral,* iv. (1881) 112.—Austral,
lappulacea, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 60.— Austral.
microcephala, *Benth. Fl. Austral,* iii. 504.—Austral,
microphylla, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 60.— Austral.
Muelleri, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 470 = scabiosifolia.
palmata, *A. Gray, in Proe. Am. Aead.* v. (1861) 121. —Austral,
plumulifera, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. (1859) 57.—Austral.
polyseta, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 470-lappulacea.
porphyroglossa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 605.—Austral.
pterosperma, *R. Br. ex Benth. I. c.*—Austral,
scabiosifolia, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 471.— Austral,
scapigera, *Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 75. —Austral.
tropica, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet iii. (1869) 68-breviseta.

CALOTBOFIB, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 89. *ASCLEP/ADEAE,* Benth. & Hook. *t.* ii. 754.
Ada, *Bitch-Ham, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 247.—Ind. or.
gigantea, *[Dryand. in] Ait. Hort. Km.* ed. IL ii. 78. —Ind. or.
Hamiltoni, Wight, Contrib. Ind. Bot. 58=procera.
herbacea, Wight, 1. c. 54=C. Ada.
heterophylla,Yall Cat n. 8217=procera.
procera, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kev.ed.* II. ii. 78.— Peruv.; Afr. trop.; Ind. or.
Sussuela, G. Don, Gen. Syst iv. 147=Hoya imperialist
Walliehii, Wight, Contrib. Ind. Bot. 53-procera.

CALPANDRIA, Blume, Bijdr. 178 (1825)=Camellia, Linn. (Ternstroem.).
laneeolata, Blume, 1. c.=Cam. Janceolata.
Quiscosaura, Korth. in Verh. Nat. Gesch. Bot 149 = Cam. Quinosaura.

CALPICARPUM, G. Don, Gen. Syst iv. 100 (1837) = Kopsla, Blume (Apocyn.).
albiflorum, Teijsm. & Binn. in Tiidschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 402.—Malaya.
Lamarkii, G. Don, Gen. Syst iv. 100=K. fruticosa.
Roxburghii, G. Don, 1. a = K. fruticosa.

CALPIDIA, Thou. Hist. Veg. Isles Afr. Austr. (1805) 37. t. 10=Pi8onia, Linn. (Nyctagin.).
costata, Boj. Hort. Maurit. 265=P. costata.
laneeolata, Thou. Hist. Veg. Isles Afr. Austr. 37. t 10 = P. Calpidia.
macrophylla, Boj. Hort. Maurit. 266 = P. macrophylla.
malifolia, Boj. 1. c.=P. Calpidia.

CAIPIGYITE, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 193 (1856). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 323.
frutescens, *Blume, 1. c.*—Borneo.

CAWUBNIA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 2 (1835). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 664.
aurea, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 252.—Afr. trop.
aurea, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1840) 90 = lasiogync.
capensis, Steud, Nom. ed. II. i.262=Virgilia capensis.
floribunda, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 267. —Afr. austr.
intrusa, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* 2.—Afr. austr.
lasiogyne, *E. Mey. 1. c.* 3.—Afr. austr.
robinioides, *E. Mey. I. c.*—Afr. austr.
sericea, *Harv. in Harv.* b" *Sond. Fl. Cap.* ii. 267.— Afr. austr.
sylvatica, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 2.—Afr. austr.
villosa, *Harv. in Harv. tfSond. Fl. Cap.* ii 268.—Afr. austr.

CALSIAMA, Rafin. Sylva Tellur. 12 (1838) = Odina, Roxb. (Anacard.).
malabarica, Rafin. 1. c.=O. Wodier.

CALTHA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 126 (1763) = Calendula, Linn. (Compos.).
arvensis, Moench, Meth. 685=CaIend. arvensis.
dentata, Moench, Meth. Suppl. 238=Calend. stellata.
graveolens, Gilib. Fl. Lituan. i. 212-Calend. arvensis.
offidnalis, Moench, Meth. 686=CaIend. oflkinalis.
officinalis. Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 147 = Calend. arvensis.
stellata, Moench, Meth. Suppl. 238=Calend. stellata.

OAIiTHA, [Rupp.] Linn. Syst eil. I (1736). *RANUNCULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 6.
PSVCHROFHILA, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunc. 80 (1823).
PSYCROPHILA, Rafin. Atl. Joum. 144 (1832).
THACLA, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 296 (1889).
alba, Jacquem. Voy. Bot. 6 = palustris.
alpestris, Schott, Nym. *Sc* Kotschy, Analect Bot 38= palustris.
alpina, Schur, Enum. PI. Transs. 25 = palustris.
andicola, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 49. t 2.—Chili.
appendiculata, Lechl. ex C. Muell. in Walp. Ann. vii. 26-limbata.
appendiculata, *Pers. Syn.* ii. 107.—Reg. Magell.
arctica, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 265 = palustris.
asarifolia, DC. Syst. i. 309=palustrib.
baicalensis, Demid. ex Steud. Nom. ed. II. i. 262 = natans.
biflora, DC. Syst. i. 810-palustris.
Bisma, Buch.-Ham. in Brewst Edinb. Journ. Sc. i. (1824) 261 = Aconitum palmatum.
camtschatica, Spreng. Syst. ii. 660 - Oxygraphis glacialis.
Codua, Buch.-Ham. in Brewst. Edinb. Joum. Sc. i. (1824) 251=Aconitiumferox,

CALTHA:-
cornuta, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot 31 = palustris.
coronata, *Schur, Enum. PI. Transs.* 25.—Transsylvan.
.dentata, Muhl. Cat. ed. II. 56-palustris.
De-Ranco, *Steud. in Flora,* xxiix. (1856) 407.—Chili,
dioneaefolia, *Hoot. /. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 306.—Reg. Magell.
emodorum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 220 = palustris.
ficarioides. Push, Fl. Am. Sept. ii. 289-palustris.
flabellifolia, Pursh, 1. c. 390.117=palustris.
glabra, Gilib. Fl. Lituan. ii. 279= palustris.
glacialis, Spreng. Syst. ii. 660=Oxygraphis glacialis.
Govaniana, Wall. Cat. n. 4710 ^palustris.
grosse-serrata, Pantoii. in Verh. Ver. Naturw. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 86=palustris.
Guerangerii, Bor. in Billot, Annot. 11—palustris.
himalensis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 195 = palustris.
holophylla, *Leyb. in Anal. Univ. Chil.* (1859) 678.—Chili.
integerrima, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 390-palustris.
intermedia, .Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 32-palustris.
introloba, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1865) 98.—Austral.
kamtschatica, Spreng. Syst. ii. *666=camtschatica.*
laeta, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 82 - palustris.
lasopetala, Steud. Norn. ed. II. i. 139, sphalm. = leptosepala.
latifolia, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 82 = palustris.
leptosepala, *DC. Syst. i.* 310.—Am. bor. occ.
leptostachya, G. Don, Gen. Syst. i. 44—praec.
limbata, *Schlecht. in Linnaea,* zxviii. (1854) 556.—Chili.
major, Mill. Gard. Diet. ed. VIIT. n. 1-palustris.
minor, Mill. 1. c n. 2 = palustris.
multicapsularis, Sond. ex DC. Prod. i. 44=sagittata.
natans, *Pall. Seise,* iii. 248.—Reg. bor.
Nirbisia, Buch.-Ham. in Brewst. Edinb. Joorn. Sc. i. (1824) 251 = Aconitum ferox.
Novae-Zelandiae, *Hook. /. Fl. Nov. Zeal.* i. 12. t. 6.—N. Zel.
orthorhyncha, *Rupr. Fl. Caucus.* 28.—Reg. Caucas.
pallidiftora, Martr. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1862) 180 = palustris.
palustris, *Linn. Sp. PI.* 558.—Reg. bor. temp, et arct.
panicutata. Wall. Cat. n. 4711 = palustris.
paradoxa, T. F. Forst. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 824 = appendiculata.
parnassi/olia, Rafin. in Med. Rep. New York v. (1808) 361 = palustris.
polypetala, *Hochst. in Lerent, Wanderungen,* 339.—As. Min.: Persia.
Populago, Goiian, Hort. Monsp. 268 - palustris.
pumila, Schur, Enum. PI. Transs. 26-palustris.
radicans, *T. F. Forst. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 324. t. 17.—Scotia.
ranunculoides, Schur, Enum. PI. Transs. 26 — palustris.
riparia, G. Don, Gen. Syst. i. 44-palustris.
sagittata, *Cav. Ic.* v. 8, 456. t. 414.—Reg. Magell..
scaposa, *Hook. f. V Thorns. Fl. Ind.* i. 40.—Reg. Himal.
vulgaris, Pall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 262 - palustris.
vulgaris, Schott, Nym. & Kotschy, Analect Bot. 33 = palustris.

CALTHOIDES, B. Jnss. ex DC. Prod. vi. 473 (1887) = Othonna, Linn. (Compos.).

CALUCECHINUS, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 19 (1853) = Fagua, Tourn. (Cnpulif.).
antarctica, Hombr. & Jacquinot, 1. c.=»F. antarctica.
Montagnei, Hombr. & Jacquinot, 1. c.-F. antarctica.

CALUSIA, Bert, ex Steud. Norn. ed. II. i. 262 (1840)-MyroBpermum, Jacq. (Legumin.).
emarginata, Bert ex Steud. 1. c. ii. 175 = M. frutescens.

CALUSPARASSUS, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 20 (1853)=FagUS, Tourn. (Cupulif.).

CALUSPARASSUS:—
betuloides, Hombr. *Sc* Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et ZeX 20 = F. betuloides.
Forsteri, Hombr. *Sc* Jacquinot, 1. c. = F. betuloides.
Pumilio, Hombr. & Jacquinot, 1. c. 21 = F. betuloides.

CALVARIA, Comm. ex Gaertn. f. Fruct Suppl. 116. t. 200, 201 (1805) (Gen. dub.).
cerebellina, Comm. ex Gaertn. f. 1. c—Hab. ?
globosa, Gaertn. f. L c. 117.—Hab. ?
hexangularis, Gaertn. f. 1. c.—Hab.!
major, Gaertn. f. 1. c. 116—*cerebellina*^

CALVELIA, Moq. in DC. Prod. xiii. H. 167 (1849) = Suaeda, Forsk. (Chenopod.).
pterantha, Moq. 1. c. 168.—Soongar.

CAIiVOA, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 755 (1867). *MELASTOMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c.
crassinoda, *Hook. f. ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 78.—Afr. trop.
hirsuta, *Hook./, ex Triana, I. c.*—Aiṙ. trop.
sinuata. *Hook./, ex Triana, I. c*—Afr. trop.

CALYCADENIA, DC. Prod. v. 695 (1836) = Hemizemia, DC. (Compos.).
Cephalotes, DC. 1. c. = H. mnltiglandulosa.
Fremontii, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 101, in nota=H. multiglandulosa.
Harrisii, Lem. Illustr. Hortic. (1855) Misc. 9 = Odontadenia speciosa.
mollis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 360 = H. mollis.
multiglandulosa, DC. Prod. v. 695—H. multiglandulosa.
pauciflora, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 101, in nota=H. pauciflora.
plumosa, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1878) 49 = H. plumosa.
tenella, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 402 = H. tenella.
truncata, DC. Prod. v. 695 = H. truncata.
villosa, DC. 1. c = H. Douglasii.

CALYCAMPE, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 129-Myrcia, DC. (Myrtac).
angusti/olia, Berg, 1. c 131 -M. hebepetala.
latifolia, Berg, 1. c. 180.—Guiana.

CALYCANDRA, Lepr. ex A. Rich, in Guill. *Sc Ten.* Fl. Seneg. Tent. 30 et 232. t. 9 (1832) = Cordyla, Lour. (Legumin.).
pinnata, A. Rich. 1. c. SI. t. 9-Cord, africana.

CALYCANTHEMUM, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 243, t. 40 (1861) = Ipomoea, Linn. (Convolvul.).
leucanthemum, Klotzsch, 1. c. 244.—Afr. trop.

CAIiYCACTFHTTS, Linn. Syst. ed. X. 1066 (1759).
CALYCANTHACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 16.
BASTERIA, Mill, ex Adans. Fam. ii. 294 (1763).
BEDRERIA, Ehret, PI. et Pap. Rar. 1.13 (1755).
BUTNERIA, Duham. Arb. i. 113. t. 45 (1765).
POMPADOUR A, Buchoz, ex DC. Prod. iii. 2 (1828).
acuminatus, Hort. ex C. Koch, Hort. Dendrol. 183 = floridus.
asplenifolius, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 365 = floridus.
bullatus, Hort. ex C. Koch, 1. c- floridus.
ferax, Michx. Fl. Bor. Am. i. 306= laevigatus.
/ertilis, Andr. Rep. viii. t. 639 = laevigatus.
fertilis, Walt. Fl. Carol. 161=glaucus.
floridus, *Linn. Syst.* ed. X. 1066.—Am. bor.
glaucus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 659.—Am. bor.
inodorus, Ell. Sketch, i. 576=laevigatus.
laevigatus, *Willd. Hort. Berol.* t. 80; *Enum. Hort. Berol.* 559.—Am. bor.
macrophyllus, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 364 = occidentals.
mollis, *Rafin. Alsog. Am.* 7.—Am. bor.
nanus, Loisel. in Duham. ed. Nov. i. 219—laevigatus.
oblongifolius, *Loud. Hort. Brit.* 214.—Am. bor.
occidentalis, *Hook. V Arn. Bot. Beech. Voy.* 340. t. 84.—Calif,
pensylvanicus, *Lodd. in Loud. Hort. Brit.* 214.—Am. bor.

CAIiYCAUTTHTTS .—
philadelphicus, *Nois. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 262.—Am. bor.
praecox, Linn. Sp. PI. ed. II. 718 =• Chimonanthus fragrans.
prunifolius. *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 195, nomen.—Carolina.
reticulatus, *Rafin. Alsog. Am.* 7.—Am, bor.
sterilis, Walt. Fl. Carol. 151 = floridus.
suaveolens, Salisb. Prod. 378 = Chimonanthus fragrans.
tomentosus, *Rafin. Alsog. Am.* 7.—Am. bor.
verrucosus, *Rafin. I. c.* 8.—Am. bor.
versicolor, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 25.—Am-bor.

CAIiYCERA, Cav. Ic. iv. 34. t. 358 (1797) (Calicera)-*CALYCEREAE,* Benth. & Hook. f. ii. 162.
ANOMOCARPUS, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist-Ser. III. vi. (1860) 351; Contrib. Bot. ii. 28.
DISCOPHYTUM, Miers, ex Lindl. Veg. Kingd. 701 (1847).
GYMNOCAULUS, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 70».
LEUCOCERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx). (1848) I. 682.
balsamitaefolia, *Rich, in Mem. Mus. Par.* vi. (18201 77.—Chili.
Calcitrapa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 168.—Reg. Argent.
Cavanillesii, Rich, in Mem. Mus. Par. vi. (1820) 77 » herbacea.
eryngioides, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 254.—Chili.
herbacea, Cav. Ic. iv. 34. t. 858.—Chili,
intermedia, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1870) »• 174.—Chili.
involucrata, *Phil. Sert. Mend. Alt.* 16.—Chili.
nudicaulis, Phil, ex Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist Ser. Ill.'vi. (1860) 899 = viridiflora.
pulvinata, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vi. (1848; 352.—Bolivia,
sessiliflora, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 706.—Chili,
sinuata, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IH-vi. (I860) 398.—Chili,
spinulosa, *Gill, ex Miers, 1. c.* 399.—Chili,
squarrosa, *Miers, I. c,* 398.—Chili,
tenuifolia, *Phil, ex Miers, 1. c.* 356.—Chili,
ventosa, *Meyen, Reise,* i. 356.—Chili,
viridiflora, *Miers, in Ann.* to" *Mag. Nat. Hist.* =»• III. vi. (I860) 399.—Chili.

CALYCIUM.E11. Sketch, ii. 339 (1824)=Heterothecft, Cass. (Compos.).
divaricatum, Ell. 1. c. 339, 338 = H. Lamarckii.
scabrum, Ell. L c. 339 = H. Lamarckii.

CALYCOBOLUS, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. *i* (1819) = Breworia, R. Br. (Convolvul.).
emarginatus, Willd. 1. c. 4.—N. Granat.
pulchellus, Willd. 1. c—N. Granat.

CAIiYCOCABFUU, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. £. Am. i. 48 (1838). *MENISPERMACEAE,* Bentn. & Hook. f. i. 35.
Lyonii, *Nutt. ex A. Gray, Gen. Am. Bor.* i. 76.—Amber.

CALYCOCORSUS, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. 271 (1796) = Chondrilla, Linn. (Compos.).
hieradoides, F. W. Schmidt, 1. c.-Ch. Peltidium.

CALYCODAPHNE, Boj. Hort. Maurit. 273 (1887) " Ocotea, Aubl. (Laurin.).
cupularis, Boj. 1. c.=O. floribunda.
dysoxylon, Boj. 1. c = O. floribunda.
floribunda, Boj. 1. c = O. floribunda.

CALYCODON, Nutt. in Journ. Acad. Phil. Ser. II- •• 186 (1847)=Muehlenbergla, Schreb. (GraminO-
montanum, Nutt. 1. c. = M. gracilis.

CALYCOGONIUM, DC. Prod. iii. 168 (1828).
MELASTOMACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 761.
CALYCOPTERIS, Rich, ex DC Prod. iii. 168 (18"2<>
angulatum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 93.—Cuba,
clidemioides, *Griseb. I. c.* 94.—Cuba.
cùbense, Griseb. 1. c. 93 » stellatnm.

CALYCOGOMTUM *s*—
cubense, *A.* Rich. Ess. Fl. Cub. 565 = Pachyanthus Poiretii.
«*|natum, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 184._Cuba.
el.'. Pticum, *Sauvalle, Fl. Cut.* 60.—Cuba.
giabratum, *DC. Prod.* Hi. 168__Jamaic.
'"s™aehii, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 97._Cuba.
teerophyllum, */fauu\ in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. . "i (1851) 85.-Cuba.
neterotnchum, *Triana, in Trans. Linn Soc.* xxviii. . (1871) 96.—Cuba,
nypoglancum, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 94.—Cuba.
involucratum, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 184=Ossaea involucrata.
lanceolatum, Griseb. Cat. PI. Cub. 93 = glabratum.
Lima, Griseb. 1. c. 95=Oxymeris asperifolia. III. xvi.
"Menianum, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir.* (1851) 84.-Cuba.
"ncrophylltim, Sauvalle. Fl. Cub. 50=giabratum.
*n*rtcatum*, Griseb. Cat. PI. Cub. 95= Oetopleura muricata.
Pciflorum, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. .(1871) 96=echinatum.
Pueatum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 94.—Cuba.
wductum, Sauvalle, Fl. Cub. 49=heterophyllum.
"Immnoideum, Griseb. Cat PL Cub. 93 - glabfatum.
'lamnoideum, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. xvi. (1851) 86.—Jamaic.
'osnarinifolium, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 98.—Cuba.
«eHatum, *DC. Prod.* iii. 168.—Ins. S. Doming.
*"«l«tu*m*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. - (1861) 18S = Grisebachii.
jf'Oosum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 95.—Cuba.
w>ghtianum*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 184-glabratum.

CAL.yCOLPTTS, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 378.
*™TACEAE, Benth. *tt* Hook. f. i. 713.
caiophyllus, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 412.—Bras.
FVT.. 'Ber S> '• '• *H.—Peruv.
^oethganus, *Berg, I. c.* 412.—Bras.
*eg«ianus, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 381.—"fiana.
ojalifolins, *Berg, I. c.* 379.—Ind. occ.
P«wflonis, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xx. (1886) mi.—Guiana.
revolu.us, *Berg,* in Linnaea> *xvii. (1854) 888.—GUiana.
Schomburgkianus, *Berg, I. c:* 88O.-Guiana.
"arscewiczianus, *Berg, 1. c.* 382.—N. Granat.

CALYCOME.UA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. *¥1.* iii. 10 03 (1834)=Prarinus. Linn. (Oleac).
"•"•«a/«, Kostel. 1. c. 1004 = F. americana.
"«», Kostel. Ind. Hort. Prag. 26-F. alba.
"*«••<*«„, Kostel. Allg. Med-Pharm. Fl. iii. 1004 = '• americana.
<"-oliniana, Kostel. Ind. Hort. Prag. 26 - F. platycarpa.
eH^'", Kostel - 1 - c. =F. elliptica.
.«'•• Kostel '• C =F - epiptera.
V*fua, Kostel. 1. c - F. pubescens.
3*V*nd V°lia, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. la*v04 =F -americana.
"•""a, Kostel. Ind. Hort. Prag. 28 = F. lancea.
2£«, Kostel. l.c. = F.nigra.
ZVrJ K° sW.L c - F. ovata.
™«fe, Kostel. 1. c - F. pallida.
£3?car'" Kostel - V: platycarpa.
£?n* Kostel - »• C - =F - P»bes
1004 "**1»1»», Kostel> A1 8- Med..Pharm. Fl. iii.
Richar ~F - quadrangulata.
tomentos, Kostel. Ind. Hort. Prag. 26 = F. Richardi.
pubescens. Kostel. Allg. Med-Pb.arm. Fl. iii. 1004 = F.
"«*, Kostel. Ind. Hort. Prag. 26=F. viridis.

CALYCOMIS R_Br_in Flind_voy_App. 549 (1814) = Callicoma, Andr. (Saxifrag.).

CA MIS D_D<». ™ Edinb. N. Phil. Joum. ix. yetf: '^-AorophyUum, Benth. (Saxifr.).
Vert K>Uat«m, D. Don. 1. c - A. venosum.

CALYCOMORPHUM, Presl, Symb. Bot. i. 60 (1830) -Trifbllum, Tourn. (Legnmin.).
globosum, Presl, 1. c. = T. globosum.
subterraneum, Presl, 1. c. =- T. subtemneum.

CAIiTCOPEPIiTTS, Planch, in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 30. *EUPHORBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. *I* iii. 261.
ephedroides, *Planch. I. c.* 31.—Austral,
marginatus, *Benth. Fl. Austral*, vi. 63.—Austral.
paucifolius, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 819-= ephedroides.

CALTCOPHYXLITM, DC Prod. iv. 367 (exd. sp. 2 & 3) (1880). *RUBIACEAE*, Benth. ft Hook. f. ii. 38.
EUKYLISTA, Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1863) 230.
candidiasimum, *DC. Prod.* iv. 367.—Am. austr.
cocdneum, DC. 1. c. = Warscewiczia coccinea.
grandiflorum, Meyen, Reise, ii. 234-Mussaenda grandiflora.
mnltiflorum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 155.—Reg. Argent
Stanleyanum, *Schomi. in Hook. Lend. Joum. Bot.* iii. (1844) 622.—Guiana.
tubulosum, DC. Prod. iv. 367 (Pogonopi sp.).—Bras.
tubulosum, Seem. Bot. Voy. Herald, 135=Pogonopus exsertus.

CAXJTCOPHTSUM:, Kant. & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 427. *CVCUSBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 838.
gracile, *Cogn. in Bull. Acad. Belg.* Sér. II. xlix. (1880) 191.—N. Granat.
pedunculatum, *Karst.* 6" *Triana, in Linnaea,* xxviii. (1866) 428.—N. Granat

CALYCOPLECTUS, Oerst. in Vidensk. Selsk.Skr. V. v. (1861) 120=Alloplectus, Mart. (Gesner.).
concolor, Oerst. 1. c.»A. dichrous.
dichrous, Oerst. 1. c.=A. dichrous.
Pinelianus, Oerst. I. c. =A. Pinelianus.

OAIiYCOPTEBIS, Lam. IUustr. t. 857 (1794!). *COMBRETACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 686.
GETONIA, Roxb. PI. Corom. i. 61. t. 87 (1796).
floribunda, *Urn. Tail. Encyc.* ii. 486.—Ind. or.; Malaya.
nutans, Knra, in Joum. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) II. 69 = floribunda.

CALYCOPTERIS, Rich, ex DC. Prod. Hi. 168 (1828)-Calycogonlum, DC. (Melastom.).

CALTCOBECTES, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 317. *MYRTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 720.
SCHIZOCALYX, Berg, 1. c. 319 (1864).
cubensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 90.—Cuba,
grendifolius, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 317.—Guiana.
Langsdorffi, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.597.—Bras,
latifolius, *Berg, in Linnaea,* xxx. (1869-60) 701.—Guiana.
Martianus, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 596.—Bras,
mexicanus, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 318.—Mexic.
protractus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 284.—Cuba.
Riedelianus, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I: 596.—Bras.
Schottianus, *Berg, 1. c.* 857.—Bras.
Sellowianus, *Berg, 1. c.* 856.— Bras.

CALYCOSERI8, A. Gray, PI. Wright, ii. 104. t. 14 (1853). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook, *t* ii. 523.
Parryi, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 106.—Califom.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 104. t 14.—N. Mexic.

CALYCOSORUS, Endl. Gen. 499, in syn. (1888) = CALYCOCORSUS, F. W. Schmidt= Chondrilla, Linn. (Compos.).

CAIiYCOSIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 47. *RUBIACEAE*, Benth. *8c* Hook. *I* ii. 122.
Hunteri, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 364.—Ins. Fiji.

CAIiTOOSIA:—
Milnd, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 307.—Ins. Fiji.
petiolata, *A. Gray, I. c.* 48.—Ins. Fiji,
pubiflora, *A. Gray, 1. c.* 306.—Ins. Fiji,
sessilis, *A. Gray, 1. c.* 48.—Ins. Samoa.

CALYCOSTEGIA, Lem. in Orb. Diet. iii. 86 (1849)-Calystegia, R. Br. (Convolv.).

CALYCOSTEMMA, Hanst. in Linnaea, xxix. (1857-68) 506=Isoloma, Decne. (Gesnerac).
Lindenii, Hanst. 1. c. 616.—N. Granat.

CALYCOTHRIX, Meissn. Gen. 107 (1837) -= Calythrix, Labill. (Myrtac.).

CALYCOTOME, E. Mey. Comm. PI. Afr. austr. 113 (1885)-Diohllus, DC. (Legumin.).
pusilla, E. Mey. 1. c. 114 = D. gracilis.

CALTCOTOME, Link, in Schrad. Neues Joum. ii. (1808) II. 60 (Calicotome). *LEGUMINOSAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 481.
eretica, Presl, ex Nym. Consp. 168=villosa.
infesta, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 247.—Dalmatia.
intermedia, Boiss. ex Keichb. f. Ic. Fl. Germ. xxii. 33. t. 2094=villosa.
spinosa, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 228.—Lusitan.
villosa, *Link, in Schrad. Neues Joum.* ii. (1808) II. 51. —As. Min.

CALYCOTOMON, Hoffmgg. Vera. Pfl. 166 (1824)-Calicotome, Link (Legumin.).

CALYCOTOMUS, Rich, ex DC. Prod. iii. 178 (1828)-Conostegia, D. Don (Melastom.).

CALYCOTBOPIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) II. 327. *PARONYCHIEAE* vel *BLATINEAE1* Benth. ft Hook, *t* Gen. i. 978.
minnartioides, *Turcz. 1. c.* 328.—Mexic.

CALYDERMOS, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 (1816) ~ Calea, Linn. (Compos.).
atriplict/olius, Spreng. Syst. iii. 457 = Isocarpha atriplicifolia.
jamaicensis, Spreng. Syst iii. 467 = Eupatorium Dalea.
longifolius, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 - Calea peduncnlaris.
peduncularis, DC. Prod. v. 669-Calea pednncularis.
repetis, Spreng. Neue Entdeck. i. 278 •= Oiospennum involucratum.
rugosus, DC. Prod. v. 670'Calea rugosa.
salmeaefolius, DC. 1. c. - Calea salmiaefolia.
scaber, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 = Calea peduncularis.
spilanthoides, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 614.—Cuba.

CALYDERMOS, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 43 (1799)-mcandra, Adans. (Solanac.).
erosus, Ruiz & Pav. 1. c. - N. physalodes.

CALYDOREA, Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 85. *IRIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 695.
BOTHERBE, Steud. ex Klatt, in Linnaea, xxxi. (1860 61) 562.
ROTERBE, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. I. 543. t. 71 (1871).
azurea, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 387.—Hab.?
campestris, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 188.—Am. trop.
cipuroides, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 387.—Hab. ?
furcata, *Baker, in Joum. Bot.* xix. (1876) 189.—Reg. Argent.
Gardneri, *Baker, I. c*—Bras.
longispatha, Baker, 1. c. = Sphenostigma longispatba.
luteola, *Baker, I. c*—Bras,
nuda, *Baker, 1. c.*—Reg. Argent,
pallens, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 824.—Reg. Argent.
punctata, Baker, in Joum. Bot xiv. (1876) 189 - Nemastylis punctata.
speciosa, *Herb, in Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 85.—Chili,
texaiia, *Baker, in Joum. Bot.* xiv. (1876) 189.—Tens.

CALYGOGONIUM, G. Don, Gen. Syst. ii. 781 (1832)° Calycogonium, DC. (Melastom.).

CALYGONIUM, D. Dietr. Syn. ii. 1876 (1840) - praec.

CALYLOPHIS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Se>. II. iv. (1835) 272-Oenothera, Linn. (Onagrar.).
Berlandieri, Spach, 1. c. 278 - Oe. serrulata t
Drummondiana, Spach, 1. c » Oe. serrulata.
Drunumdii, Spach, ex Steud. Norn. ed. IL i. 262= praec.
Nuttallii, Spach, Hist. Veg. Phan. iv. 350 = Oe. serrulata.

CALYLOPHUS, Spach, Hist Vég. Phan. iv. 351 = praec.

CALYMENIA, Pen. Syn. i. 36 (1805) = Oxybaphus, Vahl (Nyctagin.).
aggregata, Pen. Syn. i. 87=O. aggregatus.
albida, Nutt Gen. Am. i. 26 = O. aggregatus.
angustifolia, Nutt. in Fras. Cat (1813); Gen. Am. i. 26 - 0. angustifolius.
Cervanferii, Heynh. Norn. ii. 110-O. Cervantesii.
ehilensis, Heynh. 1. c = 0. chilensis.
corymbosa, Pers. Syn. i. 87=0. glabrifolius.
decumbent, Nutt. Gen. Am. i. 26 = 0. decumbens.
expansa, Pers. Syn. i. 86=O. expansus.
hirsuta, Nntt. Gen. Am. L 26--O. hirsutus.
lintaris, Nutt. 1. c. = O. angustifolius.
nyctaginea, Nutt. 1. c - O. nyctaginens.
ovata, Pers. Syn. i. 36 = O. ovatus.
paniculata, Heynh. Nom. ii. 110 = 0. glabrifolius.
pilosa, Nutt. Gen. Am. i. 26 = O. ovatus.
prostrata, Pers. Syn. i. 86 =O. prostratus.
viscosa, Pers. 1. c. — O. viscosus.

CALYMMANDRA, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 262 (1841)=Evax, Gaertn. (Compos.).
Candida, Torr. & Gray, 1. c. = E. Candida.

CALYMNANDRA, Undl. Veg. Kingd. 710 (1847) - praec.

CALYNUX, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. 257 (1819)- Fyrularla, Rich. (Santalac).

CALYPLECTUS, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 73. t. 18 (1794)- Ziafoensla, Vand. (Lythrar.).
acuminates, Rniz *Sc* Pav. Fl. Per. iv. t. 423 = L. acuminata.
adenophyllus, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. i. 263 = L. replicata.
dependens, Ruiz, ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. iii. (1882) 155 = L. acuminata.
punicaefolius, Bert ex Koehne, 1. c. 154 - L. punicaefolia.
speeiosus, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 183. t 648 =L. speciosa.

CALYPSO, Salisb. Parad. Lond. t. 89 (1806).
ORCHIDEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 496.
CYTHEREA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 801.
NORNA, Wahlenb. Fl. Suec. 661 (1826).
ORCHIDIUM, SW. in Svensk Bot. t. 618 (1819).
americana, R. Br. in Ait Hort. Kevr. ed. II. v. 208 = borealis.
borealis, *Salisb. Parad. Lond.* t. 89.—Reg. bor. temp.
bulbosa, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xiii. 158. t. 187- borealis!

CALYPSO, Thou. Hist. Vég. Aft. Austr. i. 88. t. 6 (1805) = Balaoia, Linn. (Celastr.).
africana, G. Don, Gen. Syst. *I* 629 - S. africana.
campestris, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. it 111. t. 104=S. campestris.
debilis, G. Don, Gen. Syst. i. 629=S. debilis.
trecta, G. Don, 1. c = S. erecta.
madagascariensis, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 111. *t.* 104 = S. madagascariensis.
Pyriformis.G. Don, Gen. Syst. I. 629=S. pyriformis.
salacioides, Thou, ex Cambess. in St. HiL Fl. Bras. Mer. ii 111. t. 104 = S. Calypso.
senegalensis, Cambess. 1. c - S. senegalensis.
sylvestris, Mart, in Flora, zx. (1837) H. Beibl. 96 = S. sylvestris.

CALYPSODIUM, Link, Handb. L 252 (1829) - Calypso, SalUb. (Orchid.).
boreale, Link, 1. c = Calypso borealis.

CALYPSOGYNE, Neraud, in Freyc. Voy. Bot. 25,26 (1826), nomen.

CALYPTERIOPETALON, Hassk. in Flora, zL (1867) 631 = Croton, Linn. (Euphorbiac).
brasiliensis, Hassk. 1. c—Croton urticaefolius.

CAIiTPTEBIS, Zipp. ex Mackl. in Alg. Konst. en Letter-bode, i. (1829) 298 (Ord. Nat t).
miniate, *Zipp. ex Mackl. I. c.* nomen.—Hab. t

CALYPTHRANTES, Raeusch. Nom. ed. III. 144 (1797) = Calyptrantheu, Sw. (Myrtac).

CALYPTOCARPUS, Less. Syn. Comp. 221 (1882) = Blalnvillea, Cans. (Compos.).
bahiensis, Sch. Bip. in Bot Zdt. xxiv. (1866) 166 » B. bahiensis.
Burchellii, Sch. Bip. 1. e. = R rhomboidea.
megapotamica, Sch. Bip. 1. c - B. biaristata.
vialis, Less. Syn. Comp. 221 = B. tampicana.
Wendlandii, Sch. Bip. in Bot. Zeit. xxiv. (1866) 166. —Costa Rica.

CAXYPTRANTHES, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 79 (1788). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 717.
CHYTRALIA, Adans. Fam. ii. 80 (1768).
MITRANTHES, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 316.
SUZYGIUM, P. Br. ex Adans. Fam. ii. 244 (1763).
affinis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 43.—Bras,
anceps, *Berg, I. c.* 40.—Bras.
aromatica, Blume, Bijdr. 1092 *{"Caryophyllus antisepticus).*
aromatica, *St. Hil. PI. Us. Bras.* fasc. iii. t. 14.—Bras.
axillaris, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 63.—Bras,
bimarginata. *Berg, 1. c.* 543.—Bras,
bipennis. *Berg, in Linnaea,* xxxi. (1861-62) 248.—Peruv.
Blanchetlana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 40.—Bras.
brasiliensis, *Spreng. Syst.* ii. 499.—Bras,
bullata, *DC. Prod.* iii. 258.—Honduras,
calyptrata, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 181.—Cuba.
capitellata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8560 B = Eugenia Jambolana.
caryophyllata, Pers. Syn. 82-Eugenia caryophyllaea.
caryophyllifolia, Willd. in Usteri, Ann. xvii. (1796) 22 —Eugenia Jambolana.
caudata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 102.—Bras.; N. Granat.
cephalantha, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 46.—Bras.
Chytraculia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 79.—Jamaica,
clnsiaefolia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 39.—Bras.
concinna, *DC. Prod.* iii. 258.—Bras,
cordata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 48.—Bras.
cordifolia, Moon, Cat. PI. Ceyl. 39 = Eugenia Neesiana *vel* cordifolia.
corymbosa, Blume, Bijdr. 1091 *{-SyMygium corymbosum).*
costaricensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 20.—Costa Rica.
costata, Buch.-Ham. in WalL Cat. n. 3556-Eugenia operculata.
cubensis, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1867--58) 216.—Ind. occ.
Cumini, Pen. Syn. ii. 32-Eugenia Jambolana.
cuminodora, Stokes, Bot. Mat Med. iii. 67 — Eugenia caryophyllifolia.
cuneata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8557 -Eugenia operculata.
cuprea, *Berg, in Linnaea,* xxx. (1869-60) 663.—Cuba.
cuspidata, *Mart, ex DC. Prod.* iii. 258.—Bras.
Danca, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3560 = Eugenia Heyneana.
decandra, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. & viii. (1861) 181.—Cuba,
densa, *DC. Prod.* iii. 257.—Bras,
densiflora, *Poepp. ex Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 80.—Peruv.

CAXTPTOANTHES:—
dichotoma, *Casar. Decad. Nov. Stirp. Bras.* v. 47.—Bras.
enneantha, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 40.—Cuba,
eriopoda, *DC. Prod.* iii. 257.—Bras,
eugenioides, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* »• 370.—Bras.
eugenioides, *Seem. Fl. Vit.* 81.—Ins. Fiji,
fasciculata, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) SL—Guiana.
fastigiata. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 60.—Bras.
fastigiata, Blume, Bijdr. 1090 *(= Caryophyllus fasttgiatus).*
floribunda, Blume, I. c. 1091 —Eugenia floribunda.
Forsteri, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 23.—Ins. S-Lucia.
fragrans, Ruiz, ex Berg, 1. c 20-paniculata.
glomerata, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* it 371-—Bras.
gracilipes, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 89.—Cuba,
grandiflora. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 542.—Bras.
grandifolla, *Berg, 1. e.* 48.—Bras.
grandU, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3564-Eugenia operculata.
guineensis, *Willd. Sp. PI.* ii. 974.—Afr. trop.
Jambolana, Moon, Cat. PI. Ceyl. 89-Lugenia sylvestris.
Jambolana, Willd. in Usteri, Ann. xvii. (1796) 23 = Eugenia Jambolana.
jambolifera, Stokes, Bot. Mat. Med. Iii. 68 = Eugenia Jambolana.
Karwinskyana, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1867-58) 214-—Mexic.
lanceolata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 51.—Bras.
Langsdorffi, *Berg, 1. c.* 639.—Bras.
lateriflora, DC. Prod. iii. 258 *(=Rubachia lateriflera).*—Bras.
latifolia, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 43.—Ins. Maurit.
laxiflora, *Blume, Bijdr.* 1090.—Java.
Lindeniana, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1867-58) 218.- Mexic.
longifolia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 46.—Bras,
loranthifolia, *DC. Prod.* iii. 258.—Bras,
lucida, *Mart, ex DC. I. c.*—Bras,
macrophylla, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 45.—Bras.
Makal, Raeusch. Nom. ed. III. 144 (=- *Syvygii"* *Makut).*
Makul, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 419-Eugenia operculata.
malabarica, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 * Eugenia zeylanica.
mangiferifolia, Hance, ex Walp. Ann. ii. 629 • Eugenia operculata.
Martiusiana, *DC. Prod.* iii. 257.—Bras,
maschalantha, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 58.—Bras.
melanoclada, *Berg, 1. c.* 50.—Bras.
micrantha, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 85.—Cuba,
multiflora, *Poepp. ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. '• 42.—Bras.
musciflora, *Berg, I. c.* 54.—Bras,
mutabilis, *Berg, I. c.* 540.—Bras,
myrtoides, *Seem. Fl. Vit.* 81.—Ins. Fiji
nigricans, *DC. Prod.* iii. 258.—Bras.
nitida, Raeusch. Nom. ed. III. 144 - *Sy*yg*"m lucidum.*
Nummularla, *Berg, in Linnaea,* xxx. (1869-60) 662-—Ins. S. Doming,
obscura, *DC. Prod.* iii. 257.—Bras.
obscura, Mart, in Flora, xx. (1837) Beibl. ii 87* tuberculata.
obtusa, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* it (1840) 819.—Guiana.
obtusa, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 172-Marliere* suffruticosa.
obtusifolia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3600 B •* Eugenia inophylla.
obversa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 51.—Bras.
oleina, Wight, Illustr. ii. 15-Eugenia myrtifolia.
Ottonis, *Wright, in Sauv. PI. Cub.* 40.—Cuba,
ovalifolia, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 871-—Bras.
ovata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 50.—Bras,
pallens, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) *W-"* Ind. occ.

CA1TPTBANTHBB :—
Poniculata, Raeusch. Norn. ed. HI. 144-Eugenia paniculatum.
Paniculate, *Ruia tf Pav. Fl. Per.* iv. t. 424; *Sytt.* 181.—Perev.
paniculata, Spreng. Nene Entdeck. ii. 170 - brasiliensis.
Panciflora, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 643.—
pendula, Berg, ID L mnaea > x a a - (18M)21 „ C. Chytraculia.
platyphylla, *Berg, i* „ *Mart, m, Bra*, „ V< I. 589.—Bras.
Poeppigiana, *Berg, I. c.* 45.—Bias.
PohWa, *Berg, I. c.* 42—Bras.
Polhnna, Willem. in Usteri, Ann. xviii. (1796) 89 = Eugcma obovata.
Pplyantha, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 641.—Bras.
Pulchella, *D C - Prod ia* - 267.-BT»S.
punc
(1861) 181._Cuba.
»"/<>'»«, Blnme, Bijdr. "1090=Eugenia pyrifolU.
race o S n , Blnme> 1089 (°* syye*t"" race_ m[ ].
"flora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 420 = Eugenia oracteata.
J2£ "Ji BtT*> Mart_ m_ Bras_xiv_ «• «*2--Bras.
Syzygium. Macf. ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 233 = C.
ri g .
???• *•• /"»«*. Key. *Ind. Occ.* 80.—Jamaic.; Cuba.
r/I da, Tnssac > F l - Antill. iii. t. 26=Tussaceana.
nSl" ta ,Blume> Bi dr - 1092 {"Syygium rostratum).
(1861) l.—Cuba.
rotundata, *Griseb. l. c.*—Cuba.
rufa, *Berg* i *in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 541.—Bras.
Ruiziana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 22.—Pernv.
Schlechtendaliana, *Ber*, /. c.* 29.—Mexic.
scoparia, *Ber* r, /. c.* xxxi. (1861-62) 247.—Bras.
Seemanni, S«IM. *Fl. Vit.* 81.—Ins. Fiji.
sericea, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 233.—Ind. occ.
speciosa, *Sag<>t, in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xx. (1885) 187 —Uiana.
Brac , *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 45.—Bras.
stigipes, *Berg, l. c.* 540.—Bras.
Syzygium, ». *Fl. Ind. Occ.* ii. 919.—Ind. occ.
Tatna, Buch-Ham. <: Wall. Cat. n. 8555 = Eugenia operculata.
tenuis, Buch.-Ham. ex Wall. 1. c. sub n. 8570 = EugenU tenuia.
tetrapter *, *Ber*, in Mart_ m_ Bras_ **»• >• 68.—Bras.
Thomasi , *Berg, i* „ *Linnaea* > xxvii. (1854) 26.—Ind. o^ "
tuberculata, *Berg* Bras.
Tussaceana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 26.—Ind. occ.
uniflora, *Spreng*-»» ^<w<». xx. (1837) *Beibl.* iL 87.—Bras.
variabilia, *Berg, i* ^w*- "• *Brat.* xiv. I. 48.—Bras.
Widgreniana, *Be*
Wilsonii, *Griseb.* «. SnY. *W. Ind.* 238.—Ind. occ.
Zuzygium, Blanco, Fl. Filip. ed. Il. 293 = Eugenia operculat a.
Zui ygium, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 79-C. Sysygium.

CALYPTRANTHUS, T h ou.Obs. PI. Isles Afr.26 (1811) = Capparis, Tourn.

CALYPTRANTHUS, Blume Eugenia, Mich. (Myrtac.): ffijdr_10M (1826) =

CALYPTRANTHUS, JUSS. in Diet. Sc. Nat. vi. 274 (1817) = Calyptranthes, Sw. (Myrtac.).

CALYI A, Nand_in Ann - Sc. Nat. *Sit.* IIL xviU. (U5?I.? *fricana* r A C e ? t I O n U t . D , Dm e astom. syn. = Varronia
brac
life" N l u d - in Ann - Se. Nat. Sir. III. wiii. (1852)
eximia, Cent. eximia.
haenian Serres, Sér. I.
ix. (1853-6
insignis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sèr. III. xviii. (1854) 133 = Cent. in
Mutisii, Nand. 1 2 = Cent. Mutisii.

CAIiTPTKELLA, Naud, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. xviii. (1852) 116. *MELASTOMACBAE,* Berth. & Hook. *I. i.* 750.
cucnllata, *Triana, in Trans. Linn. Sec.* xxviii. (1871) 72.—Perav.
Galeotti, *Naud. in Ann. Sc. Nat.Sit.* III.xviii. (1852) 115.—Mexic.
gracilis, *Triana, in Trans. Linn.* Soe. xxviii. (1871) 72.—Peruv.
tristis, *Triana, I. c*—Pernv.

CAIiYPTBIDrOM, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, R N. Am. i. 198 (1888). *PORTULACEAE,* Benth. *it* Hook. £ i. 159.
monandnim, *Nutt. 1. c.*—Calif,
quadripetalum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 356.—Calif.
roseum, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 44. t 6.—Calif.

CALYPTRION. Ging. in DC. Prod. i. 288 (1824) = Corynostylis, Mart. (Violac.).
Aubletii, Ging. 1. *c* 289-Cor. Hybenthus.
Berterii, Ging. 1. c=Cor. Berterii.
citrifolium, Ging. 1. c.=Cor. Loeffingtt.
diandrum, Ging. 1. c.=Cor. diandra.
frangulaefolium, Ging. 1. c—Pernv.
nitidum, Benth. in Hook. Jonm. Bot. Iv. (1842) 106 = Cor. Hybanthus.
orinocense, H. B. *&* K. Nov. Gen. et Sp. v. 384.—Venezuela.
pyrifolium, Sweet, ex Steud. Norn. ed. II. i. 263 = Anchietea pyrifolia.

CALYPTRIOPETALUM, Hassk. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. H. 518 (1866) - Croton, Linn. (Euphorb.).

CAITPTKOCALYX, Blame, Rumphia, ii. 103. t. 102 D, 118, 161 (1836). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. Gen. iii. 902.
LACCOSFADIX, H. Wendl. & Drnde, in Linnaea, xxxix. (1875) 205.
australasicus, *Scheff. in Ann. Jard. Bot. Buitena.* i. (1876) 132, 140.—Austral,
spicatus, *Blume, Rumphia,* ii. 103.—Amboina.

CALYPTROCARPUS, Reichb. Nom. 82 (1841) = CALYPTOCARPUS, Less. = BlainvUlea, Cass. (Compos.).

CAIiTPTBOCARTA, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 804. *CYPERACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 1069.
angustifoUa, *Nees, 1. c.*—Guiana.
tricolor, Nees, 1. c. = Poeppigiana.
brevicaulis, *Nees, 1. c.* 365.—Guiana,
fragifera, *Nees, 1. c.* 804.—Am. trap.
longifolia, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 431 - C. Palmetto.
longifolia, *Kuntk, Enum. PI.* ři. 365.—Guiana.
Martii, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 196.—Bras.
Palmetto, *Nees, I. c.*—Am. trop.
Poeppigiana, *Kunth, Enum. PI.* ii. 864.—N. Granat.
Schottmuelleriana, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 509.—Bras.

CALYPTROCORYNE, Schott, in Oestr. Bot. Wochenschr. (1867) 262 = Theriophonum, Blnme (Aroid.).
cochinchinensis, Schott, Prod. Aroid. 105 = T. Wightiiv
minuta, Schott, 1. c.=T. Wightii.
Wightii, Schott, in Oestr. Bot Wochenschr. (1857) 262 - T. Wightii.

CAIiYPTKOGYITE, H. Wendl. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 72. *PALMAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 914.
CALYPTRONOMA, Griseb. FL Brit. W. Ind. 618 (1864).
Gbiesbrechtiana, *H. Wendl. I. c*—Mexic.
Ghiesbreghti, H. Wendl. in Kerch. Palm. 288-Ghiesbrechtiana.
glanca, *H. Wendl. I.* c—Nicaragua,
sarapiquensis, *H. Wendl. 1.* c—Costa Rica,
spicigera, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xvii. (1859) 72.—Guatemala.

CALYPTROLEPIS, Steud. Syn. PI. Cyp. 151 (1866) - Bynohospora, Vahl (Cyperac),
junciformis, Steud. 1. c.=R. oligantha.

CALYPTROMYRCIA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 34=Hyrcia, DC. (Myrtac.).
cor data, Berg, in Mart. FL Bias. xiv. 1.56 = M. cordata.
costata, Berg, 1. c. = M. costata.
cymosa, Berg, 1. c. 58.—Bras.
elegans, Berg, 1. c. = M. elegans.
eugenioides, Berg, 1. c. 66 = M. eugenioides.
paniculata. Berg, L c. 67.—Bras.
puberula, Berg, 1. c.«=M. puberula.
Spixiana, Berg, 1. c. 59 =»M. Spixiana.
venosa, Berg, 1. c 67.—Bras.

CALYPTRONOMA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 618 (1864) =Calyptrogyne, H. Wendl. (Palm.).
dulcis, H. Wendl. in Kerch. Palm. 238 *(=Geonoma dulcis).*
intermedia, H. Wendl. L c. nomen.—Hab.1
robusta, TraUl, in Journ. Bot. xiv. (1876) 880.—Bras.
Schwartni, H. Wendl. in Kerch. Palm. 238=seq.
Svartzii, Griseb. H. Brit. W. Ind. 518 *(= Geonoma Svartrii).*

CALYPTROON, Miq. FL Ind. Bat. Suppl. 471 U860)» Baooaurea, Lour. (Euphorbiac).
sumatranum, Miq. 1. c. 472 — B. sumatrana.

CALYPTROPSIDIUM, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 849-Psidium, Linn. (Myrtac).
Friedrichsthalianum, Berg, 1. c 350.—Guatemala.

CALYPTROSPATHA, Klotrach, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 440 (1858); et in Peters, Reise Mossamb. Bot. t. 18 (1861)=Aoalypha, Linn. (Euphorb.).
pubifiora, Klotzsch, 1. c. 97. t 18-A. pubiflora.

CALYPTROSPERMUM, A. Dietr. Sp. PL i. 226 (1831) =Menodora, Humb. *8c* Bonpl. (Oleac.).
integrifolium, A. Dietr. 1. c. 227 =M. integrifolia.
trifidum, A. Dietr. 1. c.-M. tritida,

CALYPTROSTEGIA, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iv. (1845) 72 pro parte = Pimelea, Banks (Thymel.).
angustifoUa, C. A. Mey. 1. c. 74 = P. angustifolia.
argentea, C. A. Mey. L c. = P. argentea.
brevifolia, C. A. Mey. 1. c. = P. brevifolia.
cernua, C. A. Mey. 1. c. = P. spathulata.
cluytioides, Walp. Ann. iii. 324-P. serpyllifolia.
Cornucopiae, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 60 = P. Cornucopiae.
curviflora, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iv. (1846) 74 - P. curviflora.
Drummondii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxv. (1852) II. 178 = P. suaveolens.
flava, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 60 = P. flava.
glauca, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Ptorsb. iv. (1845) 74 - P. glauca.
graciliflora, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 61=P. sylvestris.
gracilis, Endl. 1. c. = P. curviflora.
hypericina, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. P&ersb. iv. (1845) 74=P. ligostrina.
intermedia, C. A. Mey. 1. c. =P. glauca.
lanata, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 61 = P. hispid*.
latifolia, Endl. 1. c. = P. latifolia.
Lehmanniana, Endl. 1. c. = P. Lehmanniana.
ligustrina, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. P<ftenb. iv. (1846) 74-P. ligustrina.
linifolia, C. A. Mey. 1. c = P.linifolia.
linoides, EndL Gen. Suppl. iv. II. 61 - P. linifolia.
longiflora, Endl. 1. c = P. longiftora.
macrocephala, Walp. Ann. iii. 325 = P. suaveolens.
Menkeana, Endl. Gen. Suppl. iv. H. 61 = P. suaveolens.
microcephala, EndL 1. c. = P. microcephala.
myriantha, Endl. 1. c.-P. argentea,
nana, Endl. 1. c. = P. imbricata.
nervosa, Walp. Ann. iii. 824= P. nervosa.
phylicoides, Walp. 1. c. = P. phylicoides.
punicea, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 60 = P. punicea.
Schlechtendaliana, Walp. Ann. iii. 324-P. glauca.
spathulata, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iv. (1846) 74 = P. spathulata.
spicata, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 81=P. spicata.

CALYPTROSTEGIA:—
suaveolens, Endl. Gen. SuppL iv. II. 61 = Pimelea snaveolens.
sulphured, Walp. Ann. iii. 325= P. sulphurea.
sylvestris, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iv. (1845) 74 -»P. sylvestris.
tinctoria, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 61 = P. suaveolens.
trichostachya, Walp. Ann. iii. 825 = P. trichostaehya.
villifera, Walp. 1. c. 324 = P. villifera.
villosa, Turcz. in Bull. Soc Nat Mosc xxv. (1852) II. 178 = P. longiflora.

CALYPTROSTIGMA, Klotzsch, in Lelim. PI. Preiss. i. 175 (1844) = Beyeria, Miq. (Euphorbiac.).
ledifolium, Klotzsch, 1. c. 176 = B. Drnmmondii.
oblongifolium, Klotzsch, L c. = B. viscosa.
viscosum, Klotzsch, L c = B. viscosa.

CALYPTROSTIGMA, Traut*. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 46) (1847)=DiervUla, Toum. (Caprifol.).
Middendorffianum, Trantv. & Mey. 1. c = D. Middendoiffiana.

CALYPTROSTYLIS, Nees, in Unnaea, ix. (1884) 285 = Kynohospora, Vahl (Cyperac).
articulata, Nees, in Hook. Jonni. Bot. ii. (1840) 394, in obs. = R. anrea.
asperula, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 189 = R. aurea.
capitata, Nees, 1. c. 140 = R. minarum.
divergent, Nees, 1. c. 189 = R. aurea.
fasricularis, Nees, 1. c. 189 = R. aurea.
florida, Nees, 1. c. 188 = R. aurea.
Gaudichaudii, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 295 = R. aurea.
gigantea, Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 137-K. gigantea.
longirostris, Nees, in Hook. Joura. Bot. ii. (1840) 394 = R. amazonica.
paniculata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 252 = R. Schiedeana.
Rudgei, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 295 = R. gigantea.
Schiedeana, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 252 = R. Schiedeana.
terminalis, Nees, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 143 = R. minarum.
teylanica, Nees, in Hook. Journ. Bot it (1840) 3U4, in obs.-R. triflora.

CALYSACCION, Wight, Illustr. i. 180 (1840) = Ochrocarpua, Thou. (Guttifer.).
chinense, Walp. in Bot. Zeit. ix. (1851) 368 = O. longifolius.
Horstii, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 205.—Borneo.
longifolium, Wight, Illustr. i. 180 = O. longifólius.
obovale, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 500=O. ovalifoiius.
ovalifolium, Choisy, Guttif. Ind. 45 = O. ovalifolia.
siamense, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 7, 209 = 0. siamensis.
tinctorium, Seem. Fl. Vit. 13.—Ins. Fiji.

CALYSERICOS, EckL & Zeyh.ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 573 (1866-57) = Cryptadenia, Meissn. (Thymelaeac.).
argentea, Eckl. & Zeyl. L c. 582 = Gnidia Cephalotes.
ranaliculata, Eckl. & Zeyh. 1. c. 673 = Cr. grandiflora.
grandifiora, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c. = Cr. grandiflora.
linari/olia, Eckl. & Zeyh. 1. c. 588 = Gnidia liuoides.
parviflora, Eckl. & Zeyh. 1. c. 574=Cr. breviflora.
subulata, Eckl. & Zeyh. 1. c. = Cr. breviflora.
tabularis, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c. = Cr. breviflora.
typica, Eckl. & Zeyl. 1. c. 5Sl = Gnidia pubescens.
uniflora, Eckl. & Zeyh. 1. c. 578-Gnidia uniflora.

CALYSPHYRUM, Bunge, in Mim. Sav. Etr. Acad. Pétersh. ii. (1835) 107; Enum. PI. Chin. Bor. 33 « Diervilla, Toum. (Caprifol.).
floridum, Bunge, 1. c. = D. florida.
pauciflorum, Bunge, in Walp. Kep. ii. 450-D. florida.
roseum, C. A. Mey. in Ball. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xiii. (1855) 220 = D. rosea.

CALY8TEGIA, R. Br. Prod. 483 (1810). *CONVOLVVLACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 874.
MILHANIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 71 (1836).
VOLVULUS, Medic, in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys. Oek. Ges. i. (1791) 202.

CALYSTEOIA :—
acetosifolia, Turcz. Fl. Baic. Dahur. ii. II. 289 « hederacea.
affinis, *Endl. Prod. Fl. Narf.* 51.—Ins. Norfolk.
ttsarifolia, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 844 = C. Soldanella.
barbara, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 83.—Afr. bor.
Basniniana, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 95-pellita.
Catesbeiana, *Pursh, Fl. Am. Sept. Suppl.il* 729.—Am. bor.
chinensis, *Baill. in Bull Soc. Linn. Par.* i. (1881) 284. —China.
dahurica, Choisy, in DC. Prod. ix. 433=pellita.
dahurica, *Fisch. ex Planch, in Fl. des Serres,* x. (1854-65) 245. t. 1076.—Sibir.
grandiflora, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 297.—Ind. or.
Hamelraanni, *Phil in Linnaea,* xxx. (1859-60) 196.—Chili,
hederacea, *Wall. Cat.* n. 1328.—Ind. or.; China; Afghan.
inflata, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 486 - sepiuni.
japonica, *Choisy, in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 180, 182.—Japon.
Keriana, Sweet, Hort Brit. ed. I. 287 = HewittU bicolor.
Krauseana, *PhiL in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 184.—Chili.
lucana, G. Don, Gen. Syst. iv. 296'Sylvestris.
marginata, *R. Br. Prod.* 484.—Australas.
Maximiliana, *Nees, in Neuwied, Reise fford. Am.* ii. 443.—Am. austr.?
mucronata, Spreng. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 430 = Ipomoea martinicensis.
mutabilis, Rafin. Fl. Ludov. 46 = sepium?
obtnsa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 295.—Afr. bor.
ochroleuca, *Boj. Hort. Maurit.* 231.—Afr. trop.
palmato-partita, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 874 = seq.
palmato-pinnata, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 317 - Ipomoea palmato-pinnata.
paradoxa, Pursh, Fl. Am. Sept. Snppl. ii. 729 = Convolvulus hirsutus.
pellita, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 296.—Sibir. baical.
physoides, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 294.—Afr. bor.
pubescens, Lindl. in Joum. Hort. Soc. i. (1846) 70= hederacea.
reni/ormis, R. Br. Prod. 483 « C. Soldanella.
riparia, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 29.—Am. bor.
rosea, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 15.—Chili,
rugosa, *Ledeb. Ind. Hort. Dorp.* (1821) 4.—Hab. ?
sagittate, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 356.—Am. bor.
Scammonia, Pritz. Ind. Ic. ii. 58 = Convolvulus Scammonia.
sepium, *R. Br. Prod.* 488.—Cosmop. temp.
setifera, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 816 *» Ipomoea setifera.
silvatica, *Choisy, in DC. Prod.* ix. **483.—**Europ. austr. or.; Reg. Caucas.; Afr. bor.
Soldanella, *R. Br. Prod.* 483.—Cosmop. temp,
spithamaea, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 143.—Am. bor.
stans, Steud. Nom. ed. II. i. 264 = spithamaea ?
subacaulis, *Hock. &• Am. Bot. Beech. Voy.* 363.—Calif.
subvolttbilis, G. Don, Gen. Syst. iv. 296 = pellita.
sylvestris, *Roem. &* Schult. Syst.* iv. 183.—Oriens.
tomentosa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 143=spithamaea.
tuguriorum, *R. Br. ex Hook. Fl. Nov. Zel.* i. 183. t. 47.-N. Zeland.; Chili.
valdiviana, *Miq. in Leckl. Serb. Am. Austr.*54.—Chili,
villosa, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* v. (1878) 17.— Calif,
villosa, *Rafin. Fl. Ludov.* 45.—Am. bor.

CALYTHKIX, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 8. t. 146 (18061 (Calytrix). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 699.
CALYCOTHRIX, Meissn. Gen. 107 (1837).
TRICHOCALYX, Scbau. Myrt. Xeroc 86, adnot. (1840).
achaeta, *F. Muell. in Trans. Phil. Viet. Inst.* iii. (185a) 43.—Austral.
angulata, *Lindl. Swan River App.* 6.—Austral,
arborescens, *F. Muell. in Trans. Phil. Viet. Inst.* iii. (1859) 42.—Austral.
asperula, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 104.—Austral,
aurea, *Lindl. Swan River App.* 5. t. 3.—Austral.
Baueri, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1841) 261 = tetragona.

CALYTHBIX:
Behriana, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 850 = tetragona.
Billardieri, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl-ii. (1841) 245 = tetragona.
Birdii, *F. Muell. Fragm.* x. 26.—Austral,
brachychaeta,/?. *Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. (1869) 43.—Austral,
brachyphylla, *A. Cunn. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 264. —Austral.
brachyphylla,7Wcs. *inBulL SocNat. Mosc.* xx. (1847) I. 161.—Austral.
brevifolia, *Meissn. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 46. —Austral.
breviseta, *Lindl. Swan River App.* 5.—Austral.
Brownii, Schau. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl-ii. (1841) 260- tetragona.
brunioides, A. Cunn. in Bot. Mag. sub t 3323 = tetragona.
Candolleana, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Supp'-ii. (1841) 260=C. decandra.
tiliata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) I. 161-empetroides.
conanthera, F. Muell. Fragm. i. 146 = decandra.
conferta, *A. Cunn. in Bot. Mag.* sub t. 3823.—Austral.
Creswelli, *F. Muell. Fragm.* x. 27.—Austral.
cupressi/olia, A. Rich. Sert. Astral. 41. t. 16 = microphylla.
cupressoides, A. Rich. 1. c. 48=microphylla.
curtophylla, A. Cunn. in Bot. Mag. sub t. 3323-flavescens.
curtophylla, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl-ii. (1841) 242=Leschenaultii.
cuspidata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) >• 162 = breviseta.
decandra, *DC. Prod.* iii. 208.—Austral,
depressa. *Turcg. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) •• 162.—Austral,
diversifolia, *Turct. in Bull. Phys. Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 3-28.-Austral.
Drummondii, Meissn. in Joum. Linn. Soc. i. (1857) 4' =flavescens.
empetroidcs,5cAa«. *in Nov. Act. Nat. Cur.* xix.Supp'-ii. (1841) 254.—Austral.
ericoides, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 850-tetragona.
exstipulata, DC. Prod. iii. 208 = microphylla.
flavescens, *A. Cunn. in Bot. Mag.* sub t. Austral.
Fraseri, *A. Cunn. 1. c.*—Austral.
glabra, R. Br. in Bot. Reg. t. 409 = tetragona.
glutinosa, *Lindl. Swan River App.* 5.—Austral,
gracilis, *Benth. Fl. Austral,* iii. 45.—Austral,
granulosa, *Benth. 1. c.* 49.—Austral,
laricina, *R. fir. ex Benth. I. c.* 52.—Austial.
lasiantha, Meissn. in Joum. Linn. Soc. i. (1857) 46** strigosa.
lasiostachya, F. Muell. Fragm. i. 224 = sapphirina.
leptophylla, *Benth. Fl. Austral,* iii. 50.—Austral.
Leschenaultii, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 104.— Austral.
leucantha, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 1" -tetragona.
longiflora, *F. Muell. Fragm.* i. 12.—Austral.
luteola, Schau. in Lehm. PI. Preiss. i. 106 = flavescens.
megaphylla, *F. Muell. Fragm.* i. 14«.—Austral,
microphylla, *A. Cunn. in Bot. Mag.* sub t. 3323-^ Austral.
monticola, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) U» -tetragona.
Muelleri, Miq. I. c. 119 = tetragona.
muricata, *F. Muell. Fragm.* i. 224.—Austral.
Oldfcklii, *Benth. Fl. Austral,* iii. 46.—Austral,
plumulosa, *F. Muell. Fragm.* x. 27.—Austral.
propinqua, A. Cunn. ex Walp. Rep. ii. 158 = tetragon*-
puberula, *Meissn. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) <*•'' Austral.
pubescens. Sweet, ex Loud. Hort. Brit. 199 = tetragona.
pulchella, *Turcz. in Suit. Phys.-Math. Acad. Piters'-* x. (1852) 828.-Austral.
rosea, Meissn. in Joum. Linn. Soc. i. (1847) 46^ tenuifolia.
rosea, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (185S) lW - tetragona.
sapphirina, *Lindl. Swan River App.* 5.—Austral.
scabra, DC. Prod. iii. 208-tetragona.

CALYTHRIX:—
SMechtendahlii, Miq. in NederL Krnidk. Arch. iv. . a859) 116=tetragona.
simplex, *Lindl. Swan River App.* 5.—Austral.
spana, A. Cunn. ex Walp. Rep. ii. 160 = strigosa.
uarrosa, Miq. in Nedeil. Kruidk. Arch. iv. (1859) 118 = tetragona.
ngosa, *A. Cunn. in Bot. Mag.* sub t. 3323.—Austral,
i-ullivani, *F. Muell. Fragm.* ix. 1.-Austral.
totuUa, Meism. in Joura. Linn. Soc. i. (18B7) 47 = flavescens.
jenuifolia, *Meissn. 1. c.* 46.—Austral,
tenuiramea, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) ii. 2O.-AustraL
tetragona, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 8. t 146.—Austral.
tragonophylla, Meissn. in Joura. Linn. Soc. i. (1857) 47 = flavescens.
Mrapttra, DC. Prod. iii. 208 = tetragona.
vwiabihs, *Lindl. Swan River App.* 5.—Austral.
gata, A. Cunn. in Bot Mag. rob t. 8823=tetragona.

CALYTRIPLEX, Ruiz & Pav. Prod. 96 (1794) = Herpestis, Gaertn. (Scrophular.).
xnata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 165 = H. Monniera.

CALYXHYMENIA, Orteg. Hort. Matr. Dec. 5. t. 1 (1798) = Oxybaphus, Vahl (Nyctagin.).
ggregata, Orteg. 1. c. 81.1.11 = 0. aggregatus.
ervantesii, Desf. Cat Hort Par. ed. In. 390=0. VerTantesii.
«»«s, Desf. ex Steud. Norn. ed. IL i. 264=O.
«Ansa, Ruiz & Pav. FL Per. i. 45=O. expansus.
fiUia, Ortee- HorL Matr> 6„ t- 1 = 0_ glabri„ 153 is.
«. Ruiz& Pav. Fl. Per. i. 45=0. ovatus.
fntculata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 890 = Ovatos.
oisy, in DC. Prod. xiii. II. 488=O. angusti-
trata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 46 = O. piostratus.
«. Orteg. Hort. Matr. Dec. i. 6, in obs. = O. viscosus.

AJJACUM, < Adans.[1] ex Steud. Nom. ed. II. ii. 174, in > (1841)=Myrioica, Linn.

CAMAION, Rafin. Sylva Tellur. 76 (1888)=Helicteres, Linn. (Sterculinc.).
hirsuta, Rafin. l. c H . hirsuta.
undulata, Rafin. 1. c.-SterculU lanceolate.

CAMARA, pium, *ex* Linn, Sys, ed, i (1785). Adans. Fam. 2, 19» (1768)=I.antana, Linn. (Verbenac).
oefolia, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 58 = .til,aefolia.
vulgar". Benth. Bot. Voy. Sulph. 154=L. Camara.

CA
JAKEA, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1828) 188.
flV *HLP,GH1ACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 261.
Su *PLRem*-S7-Bras.
Bras, *St. MHm in BulL Soc_ Philom_* (1828) 188.
disco Braf, *Griseb_ in Mart_ m_ Bras_* 106.
ico Brat *St, HiL in BulL Soc, Philom* (1828) 18
St. Hil. l. c.—Bras.
linea *Mart_ Fl_ Bras_* 105.—Bras.
Sellla, St. m» *Bull. Soc. Philom.* (1823.) 188.
phylicoides, Mart_ ex Wal P- Re P- v- 851-axillaris.
pulchella, *Gr,Seb. iM Mari_ FL Bras_* u 105.
Bras.
sericea, *St. Hil, in BuU_ SoCm PhUom* (1828) 188.
Bras.
trilla *Auss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 601.
-ras.

CAMARIDIUM. Lindl. Bot. Reg. sub t. 844 (1824).
ORCHIDE
Au *AE* lienth_ & Hook_ f_ Gen_ 666.
"MAMniUM, Hort ex Lubbers, Cat. PI. Rar. San
alatum, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* 153.—Ecuador.
Arbuscula, *Lindl. l. c.*—Ecuador.
brevifolium, Lindl. l. c 154.—N. Granat.

CAMAKIDITJM:—
graminifolium, *Reichb.f. in Linnaea,* xxii. (1849) 857.—Peruv.
inflexum, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* v. (1840) 116.—Ins. Dominica,
lancifolium, *Reichb.f. in Linnaea,* xxii. (1849) 857.—Peruv.
longibracteatum, *Lindl. in Benth. PI. Harttc.* 154.—Peruv.
lnteo-rubrum, *Lindl. Orch. Linden.* 22.—Venezuela,
lutescens, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 541.—Bras.
ockrolrucum, Lindl. Bot. Reg. x. (1824) 844=Maxillaria Camardii.
pendulum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 123.—Bras,
purpuratum, *Lindl. Orch. Linden.* 22.—Venezuela.
purpureum, Spreng. Syst. iii. 785 = Cymbidium vestitum.
robustum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 210.—Bras.
vestitum, Lindl. in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist. Ser. III. i. (1858) SS8 = Omithidium vestitum.

CAMARILLA, Salisb. Gen. PL Fragm. 91 (1866) = AlHnm, Toum. (Liliac).
obliqua, Salisb. 1. c = A . obliquum.

CAMAROTIS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 219 (1883) = Sarcochilus, R. Br. (Orchid.).
apiculata, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1867) 89.—Malaya.
cochinchinensis, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) II. 740.—Cochinch.
obtusa, Lindl. Bot. Reg. xxx. (1844) Misc. 71 - S. obtusus.
pallida, Lindl. in Joum. Linn. Soc iii. (1859) 87 = S. pallidus.
philippinensis, Lindl. 1. c = S . philippinensis.
purpurea, Lindl. in Wall. Cat. n. 7829 = S. purpureus.
rostrata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 881 ^S. purpureus.

CA3CA8SIA, Lindl. Bot Reg. 1.1486 (1832). *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 816.
BULBEDULIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 26 (1836).
CYANOTRIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 856; (1819) 192, nomen prius.
LEMOTRIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 26 (1836).
QUAMASIA, Rafin. Cat. 15 (1824); QUAMASSIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 25 (1836).
SITOCODIUM, Salisb. Gen. PI. Fragm. 27 (1866).
alba, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1875) 1.662 = Leichtlinii.
esculenta, *Lindl. Bot. Reg.* t 1486.—Am. bor. occ.
Fraseri, *Torr. in Rep. Pad/. Rail.* iv. 91.—Am. bor. occ.
Leichtlinii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 876.—Calif.

CAMAX, Schreb. Gen. i. 144 (1789) = Ropourea, Anbl. (Verbenac. ?).
fraxinea, Willd. Sp. PL i. 1117 = R. guianensis.
guianensis, J. F. Gmel. Syst. 403=R. guianensis.

CAMBANIA, Comm. ex M. Roem. Syn. Hesper. 88,102 (1846) = DyBoxylum, Blume (Meliac.).
Fraseriana, M. Roem. 1. c. 102=D. Fraseranum.

CAMBDERIA, Steud. Nom. ed. II. i. 264 (1840) = CAMPDERIA, Rich.=Vellozia, Vand. (Amaryll.).

CAMBEA, Endl. Gen. 1234, in Syn. (1840) sphalm. = CUMBIA, Buch.-Ham. = Careya, Roxb. (Myrtac).

CAMBESSEDEA, Wight & Am. Prod. i. 170 (1834) - Bouea, Meissn. (Anacard.).
oppositifolia, Wight *Sc* Am. 1. c.=B. burmanica.

CAMBESSEDEA, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ii. 336 (1824)=Buchanania, Roxb. (Anacard.).
axillaris, Kunth, 1. c. = B. angustifolia.

CAMBESSEDESIA, DC. Prod. iii. 110 (1828).
MELASTOMACEAE, Benth. & Hook. f. i. 787.
ACIPETALUM, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 577, pro parte.
adamantium, *DC. Prod.* iii. 111.—Bras.
adamantium, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 587 = ilicifolia.
arenaria, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 16.—Bras.

CAMBESSEDESIA:—
balsami/era, DC. Prod. iii. 110 = Microlicia balsamifera.
bidentata, DC. 1. c 111 - Hiloriana.
corymbose, *DC. 1. c.* 110.—Bras.
corymbosa, Naud. in Ann. Sc Nat. Sir. III. xv. (1851) 61=rugosa.
crenulata, DC. Prod. iii. 111=Microlicia crenulata.
Eichleri, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 11.—Bras.
Espora, *DC. Prod.* iii. 111.—Bras.
Espora, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. III. xv. (1851) 62 = ilicifolia.
Hilariana, *DC. Prod.* iii. 111.—Bras.
ilicifolia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 24.—Bras.
intermedia, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 940=rugc«a.
latevenosa, *DC. Prod-* iii. 110.—Bras.
membranacea, *Gardn. in Field. Serf. PI.* t. 64.—Bras.
paragnayensis, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6604.—Paraguay.
purpurata, *DC. Prod.* iii. 110.—Bras.
Regnelliana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. m. 19.—Bras.
rugosa, *Cogn. 1. c.* 14.—Bras.
setacea, *Cogn. 1. c.* 23.—Bras.
sincorensis, DC. Prod, iii. 111 = Microlicia sincorensis.
terminalis, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xv. (1851) 61 = Hilariana,
Weddelii, *Naud. 1.* <:.—Bras.

CAMBOGIA, Linn. PL Mart. Burser. (1745) ; Diss. Dass. 18 (1747) (Amoen. Acad. i. 171, 402) - Oaroinia, Linn. (Guttifer.).
Binucao, Blanco, FL Filip. ed. I. 434 - G . Cambogia.
crassifolia, Blanco, 1. c. ed. II. 804 = G. Cowa.
Gutta, Linn. Gen. ed. V. Add. Fin. = G. Cambogia.
solitaria, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 176 = G. Cambogia.
venulosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 436 = G . vennlosa.

CAMDENIA, Scop. Introd. 190 (1777) = Evolvulus, Linn. (Convolvul.).

CAMDERIA, Dum. AnaL Fain. 80 (1829)-Laohnanth.es, Ell. (Haemod.).

CAMEIiINA, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. L 18 (1762) ; ed. II. 18 (1769). *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 83.
CHAMAELINUM, Host, Fl. Austr. ii. 224 (1831).
LINOSTROPHUM, Schrank, Fl. Prim. Salisb. 163 (1792).
SINISTROPHOKUM, Schrank, ex Endl. Gen. 882 (1840).
albiflora, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient i. 312 = sylvestris.
ambigua, Bess, ex Steud. Nom. ed. II. i. 264 = sativa.
anomala, *Boiss. tf Hausst. ex Boiss, Fl. Orient,* i. 818. -Syria.
aquatica, Brot. Fl. Lusit. i. 660 = Nasturtium amphibium.
armeniaca, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 182 = sylvestris.
austriaca, Pen. Syn. ii. 191 = Nasturtium austriacum.
barbaraefolia, DC. Syst.ii. 517 (= *Tetrapoma barbaraefolium.).*
Caisir, Wall. Cat. n. 4802-Cochlearia flava.
Camisir, Buch.-Ham. ex Steud. Nom. ed. II. i. 264, sphalm. = praec
campestris, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 959=sylvestris.
dentata. Pens. Syn. ii. 191=sativa.
edentula, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 170 = Alyssum edentulum.
foetida, *Fries, Nov. Mant.* iii. 70.—Europ.
grandiflora, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 82.—As. Min.
hirsuta, Bernh. Syst Verz. Erf. 190 = sativa 1
hispida, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. 11. xvii. (1842) 176.—Armenia ; Persia,
lasiocarpa, *Boiss. Cf Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* i. 812.—Syria,
laxa, *C. A. Mey. Verm. Pfi. Cauc.* 193.—As. Min.; Persia,
linicola, *Schimp. tf Spenn. in Spenn. Fl. Friburg.* iii. 968.—Europ.

CAMELINA :-
tnacrocarpa, Wierzb. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 10 = sativa.
microcarpa, Andre, ex DC. Syst. ii. 517 =sylvestris.
myagrodes, Moretti, in Giorn. Fis. Pav. (1820) 279 - Cochlearia saxatilis.
pinnatifida, Hornem. Hort. Hafn. ii. 598=foetida.
sagittata, Moench, Meth. 265=sativa.
sativa, Boiss. Voy. Bot Espagne, 19=sylvestris.
sativa, *CranU, Stirp. Austr.* ed. I. fasc i. 11; ed. II. 18.—Europ.; As. temp.
saxatilis. Yen. Syn. ii. 191 = Cochlearia saxatilis.
sylvestris, *Wallr. Sched. Crit.* 847.—Enrop.; As. Min.

CAMELLIA, Linn. Syst. ed. I (17S5). *TERNSTROEMIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 187.
CALFANDRIA, Blume, Bijdr. 178 (1825).
DESMITUS, Rafin. Sylva Tellur. 189 (1888).
DRUPIFERA, Rafin. 1. c. 140 (1888).
KEMELIA, Rafin. 1. c. 138,189 (1888).
SAI.CEDA, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 871 (1851).
SASANQUA, Nees, in Flora, iv. (1881) Lit 111.
THEA, Linn. Gen. ed. I. 151 (1787).
THEAPHYIXA, Rafin. in Loud. Gaid. Mag. vii. (1882) 216.
TSIA, Adans. Fam. ii. 150 (1768).
TSUBAKI, Adans. 1. c. 399 (1768).
assimilis, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Jowrn.* iii. (1851) 809.—Hongkong.
axillaris, Roxb. ex Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 819; et Sims, Bot. Mag. t. 2047-- Gordonia anomala.
axillaris, Wall. Cat. n. 158=Adinaudra acnminata.
Bohea, Lindl. in Loud. Encycl. Fl. 592; Griff. Notul. iv. 658=C. Thea.
caudata, Griff. Notul. iv. 659 = drnpifera.
caudata, *Wall. Cat.* n. 878.—Reg. Himal.
Chamgota, Buch.-Ham. ex Wall, in As. Res. xiiL (1820) 129—C. Sasanqua.
drnpifera, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 111.—Reg. Himal.; Burma; China.
Ediihae, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. xv. (1861) 221.—China.
euryoides, *Lindl. Bot. Reg.* t. 988 —China.
florida, Salisb. Prod. 870 = japonic*,
fraterna, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 218.—China.
grandiAora, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 126.—Arab.
Grijsii, *Hance, in Jaurn. Bot.* xvii. (187H) 9.—China,
hongkongensis, *Seem, in Trans. Linn. Soc.* xxii. (1859) 342. t. 60.—China.
integri/olia, Choisy, in Mém. Soc Phys. Genève. xiv. (1855) 150 = Actinodaphne chinensis.
japonica. Champ, in Hook. Kew Jonrn. ill. (1851) 809 = hongkongensis.
japonica, *Linn. Sp. PI.* 698.—Japon.
japonica, Wall. Cat. n. 8667 - Adinandra integerrima.
Kacmpferia, *Reboul, in Atti* 8* *Reun. Sc.Ital.* (1841) 191.—Hab.t
Keina, Buch.-Ham. iu'D. Don, Prod. Fl. Nep. 221 = drupifera.
Kissi, Wall, in As. Res. ïil (1820) 129-drupifera.
lanceolata, *Seem, in Trans. Linn. Soc.* xxii. (1859) 815. —Malaya,
lutescens, *Dyer, in Hooi.f.Fl. Brit. Ind.* i. 293.—Reg. Himal.
maliflora, Lindl. Bot. Reg. t. 1078-rosaeflora.
Mastersia, Griff. Notul. iv. 559=drupifera.
mutabilis, Paxt. Mag. Bot. ii. t. 122-japonica.
olei/era, Abel, Joura. in China, 174=C. Sasanqua.
oleifera, Wall. Cat. n. 976=drupifera.
oleosa, Lour. Fl. Cochinch. 339=C. Sasanqua.
planipetala, Lem. Illustr. Hortic. (1865) t. 126 = japonica.
Quinosaura, *Seem, in Trans. Linn. Soc.* xxii. (1859) 845.—Java.
reticulata, *Lindl. Bot. Reg.* t 1078.—China,
rosaeflora, *Hoot. Bot. Mag.* t. 6041.—China,
salicifolia, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 309.—Hongkong.
Sasanq.ua, Blanco, H. Filip. ed. I. 580=drnpifera.
Sasanqua, *Thunb. Fl. Jap.* 278. t. 80.—Japon.; China.
Srottiana, Choisy, M<5m. Temstr. 90=Adinandra dumosa.
Scottiana, Wall. Cat n. 3868 = C. Thea.
simplicifolia, Griff. Notul. iv. 560. t. 601. f. 2 = drupifera.

CAMELLIA:—
spectabilis, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 810=reticulata.
symplocifolia, Griff. Itin. Notes, 10. n. 652= drupifera.
Thea, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 78.—China.
theifera, Griff. Notul. iv. 658. t 601. f. 1, 3=C. Thea.
theiformis, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 221=euryoides.
Tsubakki, Crantz, Inst ii. 172-japonica.
viridis, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 73 = C. Thea.

CAMERARIA, Dill. ex. Moench, Meth. 620 (1791) = Montia, Linn. (Portulac).
fontana, Moench, 1. c. = M. fontana.

CAMERARIA, fPlnm.l Linn. Syst. ed. I (1785). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 701.
angustifolia, *Linn. Sp. PI.* 210.—Am. austr.
dubia, Sims, Bot Mag. 1.1646 = Wrightia dubia.
guianensis, Aubl. PL Gui. i. 262 = Malouetia Tamaquarina.
latifolia, *Linn. Sp. PI.* 210.—Ind. occ.
lutea, Lam. Encyc. i. 573 = Malouetia Tamaquarina.
obesa, Spreng. Syst. i. 611 = Adcnium obesum.
retusa, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 110.—Ind. occ
Tamaquarina. Aubl. PI. Gui. i. 256=Malouetia Tamaquarina.
teylanica, Retz. Obs. Iv. Sl-Hunteria corymbosa.
teylanica, Wight, ex Wall. Cat. n. 1159=Strophanthus Wightianus.

CAMERIDIUM, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1819) 857, sphalm. = Camaridium, Lindl. (Orchid.).

CAMFOROSMA, Spreng. Syst. i. 163 (1825) = Camphorosma, Linn. (Cbenop.).

CAMIRIUM, Gaertn. Fruct. ii. 191. t. 126 (1791)- Aleurites, Forst. (Euphorbiac).
cordifolium, Gaertn. 1. c. 195 = A. moluccana.
oleosum, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 101 = A. moluccana.

CAMISSONIA, Link, in Jahrb. Gew. i. (1818) I. 186 = Oenothera, Ljnn. (Onagrar).
/lava, Link, l, c. = O- dentata.

CAMMARUM, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 327 = Aconitum, Tonrn. (Ranuncul.).
paniculatum, Fourr. 1. c.=A. panicnlatum.

CAMOCLADIA, Linn. Syst. ed. X. 861 (1756) = Comocladia, P. Br. (Anacard.).

CAMOENSIA, Welw.ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 657 (1866). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
brevicalyx, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 302.—Afr. trop.
maxima, *Welw. ex Benth. 1. c.* 302. t 36.—Afir. trop.

CAMOMILLA, Gilib. Exerdt. i. 178 (1792)=Matricaxia, Toura. (Compos.).
deflexa, Gilib. L c 179=M. suaveolens.
inodora, Gilib. 1. c. = M. inodora.
patens, Gilib. 1. c 178 -.M. Chamomilla.

CAMONEA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 81 (1886) - Ipomoea, Linn. (Convolvul.).
bifida, Rafin. 1. & =1. cymosa.

CAMPANEA, Decne. in Rev. Hortic. (1819) 211. t. 13. *GESNERACEAB,* Benth. & Hook. f. iL 1003.
grandiflora, *Decne. 1. c.*—N. Granat
Humboldtii, *Hanst. in Linnaea,* xxvi. (1853) 214. t. 1. f. 21.—Costa Rica.
Oerstedii, *Oerst. in Vidensi. Selsi. Sir.* V. v. (1861) 108.—Costa Rica.

CAMPANULA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1736); Gen. ed. I. 46 (1737). *CAMPANULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 561.
AFENULA, Neck. Elem. i. 231 (1790).
BALLELA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70 (1836).
ČENEKIA, Opiz, Seznam, 27 (1852).
DECAPRISMA, Rafin. 1. c. it 78 (1836).
DEFIERKEA, Anon, ex Schlecht. in linnaea, xvi. (1812) 371.

CAMPANULA :—
DRYMOCODON, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyoo, N. S. xvii. (1869) 111.
ERINIA, Noulet, Fl. Sous-Pyr. 407.
HRCALE, Rafin. Fl. Tellur. ii. 79 (1836).
HETEROCODON, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. viii. (1843) 255.
LACARA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70 (1836).
LOREIA, Rafin. 1. c. iii. 82 (18361.
MARIANTHEMUM, Schrank, in Denkschr. Regensb. Ges. ii. (1822) 34.
MEDIUM, [Tourn.] Fisch. ex A. DC. Monog. Camp- 218 (1830).
NENNINOIA, Opiz, Seznam, 68 (1852).
PENTROPIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 80 (1836).
QUINQUELOCULARIA, C. Koch, in Linnaea, Win- (1850) 630.
RAPUNCULUS, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. » xvii. ri869) 111.
RONCELIA, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 289 (1870).
ROUCELIA, Dum. Comm. Bot. 11 (1822).
SVKORAEA, Opiz, Seznam, 94 (1852).
SYNCODON, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. » xvii. (1869) 111.
TALANELIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70 (1836).
TRACHELIOFSIS, Opiz, Seznam, 98 (1852).
WEITENWEBERA, Opiz, 1. c. 101 (1852).
abietina, *Griseb. if Schenk, in Wiegm. Archil,* ** (1852) I. 383.—Europ.
acuminata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 108 = americana.
acutangula, *Leresche tf Levier, in Journ. Bot.* *»* (1879) 198.—Hispan.
acutiloba, *Vatke, in Linnaea,* xxxviii. (1871) 709.- Kurdistan.
Adami, Bieb. Fl. Taur. Cauc i. 153=bellidifolia.
Adami, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. S[6]** lasiocarpa.
adhaerens, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 913 = retrorsa.
adpressa, Linn. f. Suppl. 110=Wahlenbergiaadpres»-
adscendens, *Vest, ex Roem.* to[1] *Schult. Syst.* v. 90.— Sibir.
adsurgens, *Leresche V Levier, in Journ. Bot.* x[VJI>] (1879) 199.—Hispan.
affinis, Fisch. ex Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. »• (1867) 205 = Ancheri.
affinis, Reichb. ex Nym. Consp. 480 = Portenschlagiu*-
affinis, *Roem. V Schult. Syst.* v. 110.—Hispan.
afganica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 257.—Afr. bor.
afra, Cav. in Anal. Cienc. Nat iii. (1801) &•* dichotoma.
aggregata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 1°" glomerata.
agrestis, Wall. Cat. n. 1292=Wahlenbergia racílis.
Aizoon,5<n». *tfSprun. Diagn.* Ser. I. iv. 84.—Grsecfa-
ajngaefolia, *Sestini, ex Spreng. Syst.* i. 732 (sp. dub.;' —As. Min.
alata, *Desf. Fl. Atlant.* i. 178. t. 5O.-r-Afr. bor.
Alberti, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 83.— Turkestan.
albiflora, ,C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 63*" sarmatica.
alburnica, Brigant. Pempt. i. 8. t 2=PhyteuO>[11] amplexicaule.
algida, Fisch. ex A. DC. Monog. Camp. 338 = lasiocarpa
alliariaefolia, Reichb. PI. Crit. Cent. iii. 345** Symphyandra pendula.
alliariaefolia, *Willd. Sp. PI.* i. 910.—Reg. Cauca*-' As. Min.
Allionii, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 107 = speciosa-
Allionii. *Vill. Fl. Delph.* 18 ; *Prosp.* 22.—Europ.
allophylla, Rafin. ex A. DC. Monog. Camp. 282" rotundifolia.
alopecuroides, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i- 2«[5]* Phyteuma Sibthorpianum.
alpestris. All. Fl. Pedem. 113. t. 6. f. 3 = Allionii.
Alphonsii, *Wall. Cat.* n. 12H6.—Ind. or.
alpigena, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) «»* Aucheri.
alpina, *Jacq. Enum. Vind.* 36 ; 210.—Europ.
Alpini, Linn. Sp. PI. ed. II. 166'J = Adenopbo«» lilifolia.
Alpini, Piohl. ex Vis. Fl. Dalm. Suppl. 71 = Pby[teuin] amplexicaule.
alsinoides, *Hook.f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc-* (1868) 21.—Reg. Himal.
altaica, A. DC. Monog. Camp. 229. t. 10=pilo"-

CAMPANULA:—

altaica, edeb. **Ind. Sem.** Hort< Dor Pat_ **(1824) 2 =** Stevraf

"""flora, Pers. Syn. i. 192 = Prismatocarpus altiflorus.

•"amcana, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 266-

am Phyteuma **omejceiM.**

»mencana, *Linn. Sp. PI.* 164.-Am. bor.

americ """ **Mill.** Gard_ Dictl ed> VIIL n_ ls_ Planl_ flora.

amplexicaulis, Bo isSl Diagn_Ser_l "• " **= Phyteuma amplexicaule.**

amplexicaulis, **Michx. Fl.** Am_ *X01* ->• 108=Specularia perfoliata

amygdal /\lia> Sali,b_ Prod_ **126 = pers**icaefolia.

anagallo rfe>rle,Illustr_ **Bot. Himal.** 253=Cephalostigma hirsu tum.

anchusifl —Ar ora, J(AM. &• fl». *Fl. Grace. Prod. i.* 141.

andina, chl Pl Gl **tCUrtW# WtSb _ ". (1887) 216 = gumbe** a A. DC.

Andrewsii, **Di** Mono B Cam P- 220 = tomentosa.

androsacea, androsacea, et, Syn PL '• W3 ~ Wahlenbergia

angulat /^ FL Ludov_ 65 = Specularia perfoliata.

angus /\1 11 11 *1 ex A DC ™ DC Prod - *• •< = Specularia perfo li ata.

anticen ca<m»— Cat. PL Helv. ed. III. 10 = caespitosa, rotundifolia.

antirrhin Schleich_

apa ides *utbZS* Pursh> Fl_ Am_ Sep!_ >• **159.—Am. bor.**

« A_ Dc Prod_ TM" 462=tomentosa.

i 2fi«i"S P# B T- (err_ R_ Br 0 ex Steu d. Nom. ed. TI. *arc'u* ~ """nelia ventricosa.

(WnH Schur in Verh_ Siebenb. Ver. Naturw. x.

^onensis, |r TOtU?difOlia, **Pr. in Bull. Acad. Pétersb.** ": (1867) 21"2 J~?6- Caucas.

a **Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 119.— Cappadoc.**

argentea, f a w. fi,,^. i. 584,-Armenia.

argus s R Pr" ^ BuU- Acad> Ktersb< **xi. (1867)** 209^ 0 ' b eri.

argyrotricha, Wa W. *Cat.* n. 71S8.-Reg. Hiroal.

arida, H. B. * K. Nov. Gen. et Sp. iii. 301 = Wahlenbergi a 9 i cs.

aristata, Wall. Cat. n. Himal. ***n Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 98.—Reg**

armena, **Stev. in Mém** Soc_ Nat_ Mosc_ »>• (1812) 286 **= Symphyandra armena.**

arvatica, **La** 6. **in** Varied_ CienC_ ". IV_ (1805) **40 =** Wahlenbe gia hederacea.

arvensis, **Pers.** Syn. i. 193 = Specnlaria Specnlum **Phyteuma asperum.** Diae„ &r_ L xi> 77 Pht

aspera, **Doun, ex A. DC. Monog. Camp. 290 = aparinoides.**

asp ra Jf<* »'*, il/rf*. 5 « ^ . **188.—Hab.** *1*

«sperrima Zncc «8111. '» Roem. Collect 128-ajugaefolia.

.sterOides TaM_ Eneye- ": 55=americana.

athoa, **Boiss.** & Heldr. Dia Rn. Ser. II. iii. 110 = C. **Trachelium.**

attenu Ledeb„ ex Spreng. Syst. i. 729=pcrsicifolia.

attica, oi & Heldr Dio Rn Scr_ L ": «7=drabaefolia. Dio Rn

A cheri, *A. DC. in DC* Prod_ vi**i. 46**0 Re 6- Cancas_ **Au. Min.**

aurea, **Linn. f. Suppl.** 141 = Musschia aurea.

axillaris, Bois & Ba Dia **Cilicia.**

aurea, **Soland. & Banks, ex Sims, Bot. Mag. t. 551 = rhomboidea.**

baicalensis, **Pall. ex** A„ DC_ Prod_ **vii. 479 = silenifolia.**

B insae, **Boiss. & Haussk. Fl. Orient. iii.** 931 **appadoc.**

baldensis, **Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) 20 = ramosissima.**

Ba na, **D. Dietr. Syn. Pl. i. 754 = Wahlenbergia** iana.

barbata, **Lapeyr.** Hist_ Abr_ PI. Pyr. 107=spedosa.

barbata, Linn. Sysi X »27.-Europ.

barbata, **Spreng. Fl.** Halens_ 77 = glomerata.

Barrelieri, Marnock, WV **or. Mag. (1836)** 161. t. 12. —Italia.

Barrelieri, Pt Sy mb Bcoke **Bot. 30** *. 18 **= fragilis.**

Baumgarten **Fl. Francof. i.** 264=rotnndifolia.

CAMPANtJLA:—

Bayemiana, *Rupr. in Bull. Aead. Pitersb.* xi. (1867) 214.—Reg. Caueas.

bellardi. All. Fl. Pedem. i. 108 = caespitosa.

bellidifolia, *Adam, in Web. V Mohr, Beiir.* i. (1805) 47.—Reg. Caucas.

bellidifolia, Frivald. ex Nym. Consp. 476 = Orpòanidea.

bellidifolia, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. Suppl. 36 = patula.

Bentkamii, Wall. Cat. n. 1290=canescens.

Bergiana, D. Dietr. Syn. PI. i. 767 = Prismatocarpus subulatus.

betonicaefolia, Biehl. PI. Nov. Hort. Spreng. 14 = sarmatica.

betonicaefolia, Gilib. Fl. Lituan. i. 53-glomerata.

betonicaefolia, *Sibth. V Sm.Fl. Graec. Prod.* i. 141.— As. Mln.

betulaefolia, *C. Koch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 685.—Armenia.

bicaulis, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 107. t. 7 = speciosa.

bicolor, Boiss. Fl. Orient, iii. 931=camptoclada.

Biebersteiniana, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc 83, pro parte » Aucheri.

Biebersteiniana, Roem. & Scbalt. Syst. v. 147 = tridentata.

Bielsii, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1863) 47= rotundifolia.

biflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 55=Specularia biflora.

Billardieri, A. DC. Monog. Camp. 303.113 = C. Cymbalaria.

biserrata, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 29 = lactitiora.

bithynica, A. DC in DC. Prod. vii. 460=tridentata.

Bocconi,]. F. Gmel. Syst. 348=rhomboidea.

Bocconi, Vill. Hist PI. Dauph. ii. 502=pusilla.

Boissieri, Sprun. ex Boiss. FL Orient, iii. 915 = radicosa.

Boissieri, Vatke, in Linnaea, xxxriU. (1874) 708 = Phyteuma asperum.

Bolosli, *Vayr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* viii. (1879) 461.—Hispan.

bononiensis, *Linn. Sp. PI.* 165.—Europ. austr.; Reg. Caucas.; Sibir.

brachiata, Salzm. ex A. DC. Prod. vii. 462 = dichotoma.

brachiata, Seidl, ex Opiz, Boeheims Gew. 168; Natural, ii. (1823) [6] = patula.

brachysepala, Vukot in Linnaea, xxvi. (1853-55) 325 = cenisia.

bracteata, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaett i. (1803) 20 = Roella bracteata.

brevibracteata, D. Dietr. Syn. PI. i. 757 = Microcodon glomeratum.

Broussonetiana, Roem. *8c* Schult. Syst. v. 104-= Loeflingii.

Brunonis, Wall. Cat. n. 1285=latifolia.

Buchii, D. Dietr. Syn. PI. i. 753 - Wahlenbergia pilosa.

caespitosa, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 143. t. 4.—Europ.

calamenthifolia, Auchcr, ex A. DC. Prod. vii. *Vii* = tomentosa.

calamenthifolia, *Lam. Encyc.* i. 586.—Ins. Naxos.

calaminthifolia, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 286 = orphanidea.

calycantha, Tnrcz. ex Herd, in Act. Hort. Petrop. i. (1873) 288, 296 = pilosa, silenifolia.

calycina, Boeber, ex Roem. &. Schult. Syst. v. 101 = C. Rapunculus.

camptoclada, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 63.—Syria,

camtschatica, *Pall, ex Roem. & Schult. Syst.* v. 152.— Kamtschat.

cana, *Wall. Cat. n.* 1284; *et in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 101.—Reg. Himal.

canaria, *Schranlt, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 266.—Ins. Canar.

canariensis, Linn. Sp. PL 168 = Canarina campanulata.

Candida, *A. DC. Monog. Camp.* 234.—Kurdistan.

Candolleana, D. Dietr. Syn. PI. i. 756=Prismatocarpus Candolleanus.

canescens. Roth, Enum. PL Phan. Germ. i. 716- Phyteuma canescens.

canescens, *Wall. Cat. a.* 1289.—Ind. or.; Afghan.

capensis, Linn. Sp. PK 169 = Wahlenbergia capensis.

caperonoides, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 7S=sylvatica.

CAMPANULA:—

capillacea, Thunb. Prod. PI. Cap. 88 - Wahlenbergia capillacea.

capillaris, Lodd. Bot. Cab. t. 1406 = Wahlenbergia gracilis.

capitata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 88 - C. Cervicaria.

capitata, Sims, Bot. Mag. t 811=lingulata.

cappadocica, Bciss. Diagn. Ser. I. xi. 78 •= Phyteuma cappadocica t

cariensis, A. DC. in DC. Prod. vii. 459 = betonicaefolia.

***camica,Schiede,exMert.(f Koch, Deutschl.Fl.* ii. 158.** —Carniola.

carnosa, Wall. Cat. n. 12S2 ; et in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 102 = Pcracarpa carnosa.

carpatica, *Jacq. Hort. Vind.* i. 22. t. 57.—Hungar.

cashmiriana, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* i. 254. t. 62.— Reg. Himal.

caucasica, Bieb. Casp. 140; App. n. 14-sibirica ?

caudata, *Vis. Fl. Dalm.* ii. 136. t. 33.—Dalmat.

Cavolini, Tenore, Fl. Nap. t. 213=frngilis.

celebica, D. Dietr. Syn. PL i. 768=Campanumoea celebica.

Celsii, A. DC. Monog. Camp. 217 = tomentosa.

celtidifolia, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 111 = lactiflora.

cenisia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. Suppl. 1669.—Europ.

cephalantha, Fisch. ex A. DC. Monog. Camp. 254- glomerata.

Cephalaria, *Vukot. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 333.— Hungar.

Cephalotes, Fisch. ex A. DC. Monog. Camp. 254 = glomerata.

cernua, Hort ex Hornem. Hort. Hafn. 201 = sibirica.

cernua, Thunb. Prod. PL Cap. 39 = Wahlenbergia cernua.

cerviana, Pall. Reise, iii. 687 - C. Cervicaria.

Cervicaria, *Linn. Sp. PI.* 167.—Europ.

cervicarioides, Roem. & Schult. Syst. v. 128••glomerata.

Cervidna, D. Dietr. Syn. PL i. 754"Wahlenbergia Cervicina.

chilensis, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 266 = Wahlenbergia birsuta, rcflexa.

chilensis, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 281 = Wahlenbergia linarioides.

chondrophylla, D. Dietr. Syn. PI. i. 753 •= Wahlenbergia chondrophylla.

cichoracea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 209-lingulata.

dchoriformis, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 77 = Phyteuma cichoriforme.

ciliaris, Salisb. Prod. 127-=Roella ciliata.

ciliata, Patr. ex A. DC. Prod. vii. 479=silenifolia.

ciliata, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 266. —Reg. Caucas.

ciliata, Thunb. Fl. Cap. ii. 24 --Lighlfootia tenella.

cilicia, Boiss. Diagn. Ser. L xi. 77 = Phyteuma amplexicaule.

cinerea, Linn. f. Suppl. 139 = Lightfnotia griscn.

circaeoides, *F. Schmidt, Reisen Amur 1.* 164.—Japon.

cissophylla, *Boiss.* b* *Haussi. ex Boiss. PI. Or. Nov.* *Dec.* 1, 2.—Kurdistan,

clisophylla, *Moretti, ex Reichb. Ic. Fl. Germ.* xix. t. 1611—Hab. ?

clivosa. Banks, ex A. DC. Monog. Camp. 161 = Wahlenbergia clivosa.

clivosa, Herb. Koxb. ex A. DC. Prod. vii. 486 = Wahlenbergia linifolia.

coa, D. Dietr. Syn. 1*1. i. 758—Specularia pentagonia.

coarctata, Gilib. Fl. Lillian, i. 48=C. Rapunculus.

coccinea, *Sieber, ex A. DC. Prod.* vii. 466 (quid?).— Ins. Maurit.

cochlearifolia, I Jim. Encyc. i. 578 = caespitosa.

cochlearifolia, Vahl, Symb. Hot. 18^fragilis.

collina, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 152.—Reg. Caucas.

coloradoinse, lluckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. ' 1861' (1862) 460^Specularia Lindheimeri.

colorata, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 101.— Ind. or.; Afghan.

commutata, Ruem. *Sc* Schult. Syst. v. 143 = sarmatica.

compacta, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Scr. I. xi. 71.— Pisidia.

conferta, *A. DC. Prod.* vii. 468.—Cappadoc.

confertifolia, Reut. ex Nym. Consp. 479= rotundifolia.

congesta, Roem. & Schult. Syst. v. 125=glomerata.

conglomerata, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross, it 880 •= glomerata.

CAMPANULA:—

consanguinca, *Schott, Nym.* to* *Kotschy, Analeet. Bot.* 8.—Europ.
contract a, Mutis, ex Nym. Consp. 478 = rapunculoides.
controversa, Boiss. Diagii. Sei. II. iii. 115-Phyteuma rigidum.
cordata, *Peterm. Fl. Lips. Excurs.* 187.—Saxonia.
cordata, Tausch, in Flora, xxr. (1842) I. 288 = Adenophora cordata.
cordata, Vis. Stirp. Dalm. 5 = Spccularia Speculum.
cordifolia, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 29 -rapunculoides.
cordifolia, *Vukot. in Linnaea,* xxvi. (1853) 328.—Europ.
coriacea, Boiss. & Kotschy, ex Fl. Orient, iii. 910=C. Radula.
coronata, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 149 = Adenophom marsupiiflora.
coronopifolia, Fisch. ex Roem. & Schult. Syst. v. 157 = Adenophora coronopifolia.
corymbifera, Poir. Kncyc. Suppl. ii. 64 = seq.
corymbosa, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 139-pelviformis.
corymbosa, Tenorc, Prod. Fl. Nap. 15 =versicolor.
Costae, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 294 = patula.
crassifolia, Nees, in Syll. Ratisb. i, (1824) 6 = fragilis.
crassipes, *Heuff. in Otstr. Bot. Zeitschr.* viii. (1858) 27.—Europ.
crenata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 214-rapunculoides.
cretica, *D. Dietr. Syn. PI. i.* 758.—Ins. Creta.
crispa, Banks, ex A. DC.Prod. vii. 444= Prismatocarpus crispus.
crispa, *Lam. Enryc.* i. 581.—Armenia.
Cymbalaria, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 139.—As. Min.; Syria.
dalmatica, D. Dietr. Syn. i. 752 = Wahlenbergia dalmatica.
dalmatica, Tausch, in Flora, x. (1827) 246=C. Ceivicaria.
damascena, *Labill. lc. PI. Syr. Dee.* v. 7. t. 5.—Syria.
dasyantha, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 147-pilosa.
dasycarpa. Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. 404 = persicifolia.
dasycarpa, Schur, Enum. PI. Transs. 440 » carpatica.
davurica, *Sin. in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 218.—Sibir.
debilis, D. Dietr. Syn. PI. i. 752 = Wahlenbergia debilis.
decipiens, Roem. & Schult. Syst. v. 142 = dichotoma.
dedinata, Moench, Meth. Suppl. 187 = americana.
Decloetiana, Ortni. in Weitenw. Beitr. iii. (1838) 220-rotundifolia.
decumbens, A. DC. Monog. Camp. 334. t. 11 = Loeflingii.
decurrens, I.inn. Sp. PI. 164=patula, persicaefolia.
decurrens, Tnore, Ess. Chlor. 64 = C. Kapunculus.
decurrens, Zuccagni, in Koem. Collect. 128 = peregrina.
dehiscens, Koxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 505 = Wahlenbergia gracilis.
delicatula, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 67.—As. Min.
delicatula, Jord. ex Nym. Consp. 479 = caespitosa.
denticulata, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 107 = betulaefolia.
denticulata, Burch. Trav. i. 538 = Lightfootia capillaris.
denticulata, Spreng. Syst. i. 735= Adenophora tricuspidata.
denudata, D. Dietr. Syn. PI. i. 753 = Wahlenbergia denudatii.
desertorum, *Weinm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. vn. 58.—Ruthenia.
dichotoma, *Linn. Cent. PI.* ii. 10; *(Amoen.Acad.iv.* 306).—Keg. Mediterr. occ.
diffusa, Banks, ex A. DC. Prod. vii. 436=Wahlenbergia nudicaulis.
diffusa, D. Dietr. Syn. i. 752, 756 = Microcodon lincare.
diffusa, Vahl, Symb. Bot. i. 48—fragilis.
dilecta, Schott, Nym. & Kotschy, Analeet. Bot. 8 = rotundifolia.
dimorphantha, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 140.—Aegypt.
dissoluta, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 943 = retrorsa.

CAMPANULA:—

divaricata. *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 109.—Am. bor
divergens, Willd. Enum. Hort. Berol. i. 212 - sibirica.
diversifolia, D. Dietr. Syn. PI. i. 752 - Wahlenbergia diversifolia.
diversifolia, Dum. Fl. Belg. 58—rotundifolia.
Draba, *Burm. f. tl. Cap. Prod.* 5.—Afr. austr.
drabaefolia, Frivald. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 932 = scutellata.
drabacfolU, *Sibth. (f Sm. Fl. Graec.* iii. 11. t. 215.—Graecia.
drabaefolia, Steud. Norn. ed. II, i. 267 = fastigiata.
dracunculifolia, Boiss. *Sc* Kotschy, Fl. Orient, iii. 952 = Phyteuma rigidum.
dubia, A. DC. Monog. Camp. 286—rotundifolia.
dulcis, *Decne. in Ann.Sc. Nat.* Se>. II. ii. (1834) 258.—Arab.
dumetorum, Boiss. Fl. Orient, iii. 922 = rapunculoides.
Dunantii, D. Dietr. Syn. PI. i. 764-Wahlenbergia Dunantii.
Duriaei, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 401 = Loeflingii.
echiifolia, Gilib. Fl. Lituan. i. 56 = C. Cervicaria.
Ecklonii, D. Dietr. Syn. PI. i. 763 = Wahlenbergia Ecklonii.
edulis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 106.—Arab.
elatina, Hill, Veg. Syst. viii. 13 = C. Elatines.
Elatines, Bout, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 295 = specularioides.
Elatines, *Linn. Syst.* ed. X. 927.—Europ. anstr.
Elatines, Petag. Inst. Bot. ii. S67=garganica.
Elatines, Pollini, Fl. Veron. i. 278=elatinoides.
elatinoides, *Moretti, in Brugnat. Giom. Fis.* II. v. (1822) 110.—Italia.
elatior, Link & Hoffmgg. Fl. Port. ii. 11. t. 80 = C. Rapunculus.
elegans, *Roem. &• Schult. Syst.* v. 105.—Sibir.
elliptica, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. 410 = glomerata.
elongata, Banks, ex A. DC. Prod. vii. 436 = Wahlenbergia nudicaulis.
elongata, Portensch. ex A. DC. Monog. Camp. 277 — rapunculoides.
elongata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 10 = Wahlenbergia capensis.
ensifolia, Lam. Encyc. i. 582 = Heterochaenia ensifolia.
ephesia, *Beits. Fl. Orient,* iii. 898.—Lydia.
eriantha, Hampe, in Flora, xxv. (1842) I. 76 - tomentosa.
ericoides, Lam. Tabl. Encyc. ii. 63 - Prismatocarpus paniculatus.
erinoides, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1800) 20 - Loeflingii.
erinoides, *Linn. Mont.* i. 44.—Hisp.; Afr. bor.
erinoides, Muhl. Cat. n. 22 = aparinoides.
Erinus, *Linn. Sp. PI.* 16!!.—Reg. Mediterr.
eriocarpa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 149-=latifolia.
erysimoides, Vest, ex Roem. & Schult. Syst. v. 102 — Adenophora Gmeliiii.
esculenta, *A. Pick. Tent. Fl. Abyss,* ii. 4.—Abyssin.
esculent a, Salisb. Prod. 126=C. Rapunculus.
euclasta, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 70.—Syria.
evolvulacea, Royle, Illustr. Bot. Himal. i. 254 = cachemiriana.
excisa, *Schleich. ex Murith, Guide Vol.* 33, 35.—Helvet.
exilis, D. Dietr. Syn. PI. i. 754=Wahlenbergia exilis.
expansa, *Frivald. in Flora,* xix. (1836) II. 434.—Thessalia; Macedon.
expansa, Rudolph, in Mem. Acid. Pctersb. iv. (1809) 340. t. 2. f. 1 = Wahlenbergia homallanthina.
Exul, *Schott, Nym. (T Kotschy, Analeet. Bot.* 9.—Austria.
falcata, Roem. & Schult. Syst. v. 154=Specularia falcata.
fallax, Rupr. in Bull. Acad. Pctersb. xi. (1867) 205, in textu—Aucheri.
farinosa, Andrz. ex Bess. Enum. Fl. Volh. 10 = glomerata.
fasciculata, Linn. f. Suppl. 139 = Lightfootia fasciculata.
fastigiata, *Dufour, ex A. DC. Monog. Camp.* 340.1.12.—Hispan.; Afr. bor.; Reg. Caucas.
fastigiata, S. G. Gmel. Iter, i. 153. t. 83 = C. Rapunculus.
Fedlschenkiana, *Trautv. in Act Hort. Petrop.* vi. (1879) 77.-As. temp.

CAMPANULA:—

fernandeziana, D. Dietr. Syn. PI. i. 744 = Wahlenbergia fersandeziana.
ficarioides, Timb. in Mem. Acad. Toulouse, Ser. V. vi. (1862) 33=linifolia.
filicaulis, *Dur. Expl. Algh.* t 62.—Algeria.
filiflora, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 5 = prenanthoides.
filiformis, Gilib. Fl. Lituan. i. 53= rotundifolia.
filiformis, Moretti, in Brugnat. Giom. Fis. II. ix. (1826) 155-Morettiana.
filiformis, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 55 = Wahlenbergia linarioides.
firma, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 77 = Phyteuma Aucheri.
Firmiana, Vand. Fasc. PI. 9 = barbata.
Fischeri, Roem. & Schult. Syst. v. 116 - Adenophora communis.
Fischeriana, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 77 = Adenophora coronopifolia.
flaccida, D. Dietr. Syn. PI. i. 752 = Wahlenbergi* flaccida.
flaccidula, *Vatke, in Linnaea,* xxxviii. (1874) 712 — Mesopot.
fiagellaris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. t. 265 = Specularia perfoliata.
flexuosa, Michx. Fl. Bor. Am. i. 109=divaricata.
fiexuosa, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 145 = Waldsteiniana.
fioribunda, Viv. Fl. Lib. Spec. 67=isophylla.
fiorida, Salisb. Prod. 127 = C. Medium,
floridana, 5. *Wats, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii- '• 13.—Florida.
foliosa, *Tenore, Fl. Nap.* i. 71.1.18.—Italia.
Fontanesiana, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 76 =Phyteum» lanceolatum.
Foudrasi, Jord. Pugill. PI. Nov. (1852) 124 - caespitosa.
fragilis, *Cyrill. PI. Fasc.* i. 82. t. 11. f. 2.—Italia.
frigida, Pall, ex A. DC. Prod. vii. 461 = pilosa.
Frivaldskyi, Steud. Norn. ed. II. i. 667-expansa.
fruticosa. Banks, ex A. DC. Prod. vii. 444 = Prismatocarpus fruticosus.
fruticosa, Hill, Syst Veg. viii. t. 8 = Prismatocarp* paniculatus.
fruticosa, Linn. Sp. PI. 16S = Lightfootia subulata.
fulgens. *Wall. Cat.* n. 1283; *et in Roxb. Fl. Ind.* ** • *Carey,* ii. !)9.—Ind. or.
garganica, *Tenore, Cat. Sem. Hort. Nap.* (1827) 3 i **** *Fl. Nap.* iii. 203.—Italia ; Graecia.
Gautieri, Jeanb. & Timb. in Hull. Soc. Sc Phys. et N»'-Toul. iii. (1875-78) 621 = Scheuchzeri.
gentianoides, Lam. Encyc. i. 181 = Platycodon grand" flornm.
ghilanensis, Pall, ex Roem. & Schult. Syst. v. 154" Specularia ghilanensis.
ghilanensis, *Schlecht. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 943.—Persia.
Gieseckiana, Vest, ex Roem. & Schult. Syst. v. 89 uniflora.
gilanica, Rupr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 905 = Ruprechti.
Gibleri x, *Bruegg, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* I*- xxiii-xxiv. (18S0) 104.—Europ.
glabrata, Hanks, ex A. DC. Prod. vii. 435 = Wahlenbergia undulata.
glabricarpa, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 10-rapunculoidcs.
glacialis, *Shuttl. in Mag. Zool. &• Bot.* ii. (1838) 188.—Helvetia.
glandulosa, Banks, ex A. DC. Monog. Camp. SW* C. Kapunculus.
glareosa, Huet, ex Nym. Consp. 480 — caespitosa.
glauca, *Thunb. Fl. Jap.* 88.—Japon.
glaucophylla, Schloss. *Sc* Vukot. in Rad Jugos. Ak»«-Zagreb, xxxi. (1875) 111—glomerata.
glomerata, *Linn. Sp. PI.* 166.—Europ.; As. temp.
Gmelini, Roem. & Schult. Syst. v. 103 = Adenophof* marsupiiflora.
Gmelini, Spreng. FL Hal. Mant. 36 - Adenophor" Gmelini.
gracilis, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 77 = Phytcurt" lobelioidcs.
gracilis, Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Tor. xxxviii. (1835) llil-Wahlenbergia Bertcroi.
gracilis, Forst. f. I'rod. 15 = Wahlenbergia gracilis.
gracilis, Jord. Pugill. PI. Nov. (1852) 122=caesp>' tosa.
graminifolia, Host, Fl. Austr. i. 268 = Wahlenberg<» tcnuifolia.

CAMPANULA:—
graminifolia, Linn. Sp. Pl. 166 = Wahlenbergia graminifolia.
*g*r^M'L*ia, Waldst_ & Kit_ pl_ »"• Hung. ii. 166 = "anlenbergiaKitaibelii.
^t^^Willerm. ex A. DC. Monog. Camp. 254
grammosepala, Vnkot. in Linnaea, xxvi. (1858-S5) 323 = spp. plurimi.
grandiflora, Jacq Hort„Vindob> iiL4 • platycodon grandiflorus.
grandiflora, Lam. Fl. Fr. iii. 334 = C. Medium.
grandiflo«. I.W. ex Nym. Consp. 476 = speciosa.
grandis, Fisch. & Mey- Ind< Scm_ Hort_ P(*TMp •v _84 =latiloba.
Griffithii, *Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 22.—Afghan.
Grossekii, *Heuff. in Flora,* xL (1838) 1. 858.—Hungar.
gumbetica *S?*•_W_ Ol*»*-_"> **914.—Reg. Caucas.**
gummiV„ ,,Roem_ *Schult_s>*_v_*lil*= **arm**{ti£
Gundelia, sibirica. ^ K0O> h Lmnaea asfll_(1860) 684 =
hagiclia, *Boiss.* \d- *Orient.*®. 899,-Ins. Rhodes.
hastae-li 7«V all tb_Prod_127 = Canaiina campannlata.
Haury rotu S S ? 1 ym& KotschyiAnalect **10=
Hausmanni haylodgensis *\Reichb_f_in Flo™. !*• (W77) 31.
Hab. *Hort* *.-Cf. Card. Chron.* **(1885) II. 147.-**
hederacea Li 12-_SP' PL "9-Wahlenbergia hederacea.
hederaefolia, SalUb> Prod_127 " Wahlenbergia hederacea.
hemschinica, C. Koc k>„„ *Linnaea*> xxiiL (1860) 844_—As. Min.
Hende HabT1, *Hort*—*Cf- G*«*d. Chron.* **(1882) II. 602.—**
^ermin 937.2' B0Ty & Chanb_ex Boiss_Fl_Orient_«'• \U, Pnmeri.
manii, *Hoffmgg. & Li*"*. «• Art. ii. 9. t 79.-
Lusitan.
hesperidifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 76 = Phyteuma lobelioides
het ^ « oxa, ^ ong. Ve Sitcha est ocm_ * Schult_ Svst_ v.98 = linifolia «4-rotundifolia.
h ophyll , 1 aumg. Fl_Transs_ **Suppl. iii. 342 =**
^ anneri.
hetrophylla, S. *• **Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 408 = rotundifolia.**
heterophylla, Linn. Sp. Pl. ed. I. errata, „ 169 <sine nom. triv. v. Arehip- Graec.
hierosol v itan a> *Boiss_ Dia«n_* Ser_ **L xi. 62.—**
Palaestli2
Hilsenbergi Boj> ex A_DC_Prod_vii_429 = Wahlenbergia Hlscn«ergii.
himalaye 7s-co*' Klolzsch>in Bot_ Ergeb.Waldem.Reise,
hirsuta, Gusa. Sy„„F1-S1o_'• 250 m ^__ **Specularia Speculum.**
hirsuta, *Pantoc. in* ^r*_J„r_ *Natur-u. Heilk. Presi.* ii. (_ 71-72, 54.-Europ.
kirsu 0 , Guss_ **ex A. DC. Monog. Camp. 316 =**
pers S
kirta, Roem. & Schalt Syst_v, « **3 = Specularia Speculum**
hispanic ii. 291.? Span
hi*pida, ckl. **ex A. DC. Prod. vii. 421 = Microcodon** omeratum.
his n^a, Fisch_ « Hornem. Hort. Hafn. 199 - lacti-
hispida *ispida, Jeune Fl- Spa, Suppl. ii. 298=persicifolia.
Morettiana.
hispid S, JenR> ex Steud_Nonl_ ed- n. i. 268=ciliata.
hi Wrf?«- *Prop'Sa Hochst_in L0,011, **Wanderungen, 831**
hispidula, \ck I. ex A. DC. **Monog. Camp. 127 =**
hispi «ocodo flomeratum.
cod ons pusi lorum.
hispidula, Lin?. f_ ^PP1- **«2 -Microcodon depressum.**
Hockstett IS, fcshott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot.
Hoff P«osa.
'^colo rata.

CAMPANULA:—
Hohenackeri, Fisch. Mey. & Ave^Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. Suppl. 9 = sibirica.
komallanthina, Ledeb. in Mem. Acad. Petersb. iv. (1811) 340= Wahlenbergia homallanthina.
Homungiana, *Schur, Enum. .PL Transs.* 442.—Transsylv.
hortensis, Meerb. PI. Sel. 10 = rapunculoides.
Hostii, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 342=rotnndifolia.
humilis, D. Dietr. Syn. PI. i. 753-Wahlenbergia humilis.
humilis, Schur, Enum. PI. Transs. 438»persicifolia.
humillima, *A. DC. Prod.* vii. 474.—Persia.
hungarica, Pers. Syn. i. 191 = lingulata.
hybrida, Bout, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 295=Loeflingii.
hybrida, Linn. Sp. PI. 168=Specularia hybrida.
hybrida, Rodigas.—Cf. Illustr. Hortic. xxx. (1888) 118. t. 499 = Van-HoutteL
hygrophila, Rnpr. in Bull. Acad. Petersb. xi. (1867) 209=Aucheri.
hypopolia, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iv. (1876) 389.—As. temp,
hyrcania, *Wettstein, ex Slap/, in Denkschr. Acad. Wien*, 1. (1885) 69.—Persia.
illinotnsis, Fresen. Ind. Sem. Hort. Franc. (1836) = americana.
imbricata, Hayne, ex A. DC. Monog. Camp. 284 = caespitosa.
imeretina, *Rupr. in Bull. Acad. Petersb.* xi. (1867) 217.—Reg. Caucas.
incanescens, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 16.—Persia.
inconcessa, Schott, Nym. *8c* Kotscby, Analect Bot. 10= Scheuchzeri.
inconspicua. Banks, ex A. DC. Monog. Camp. 157 = Wahlenbergia lobelioides.
incurva, Aucher, ex A. DC. Prod. viL 464 = Leutweinii.
indica, D. Dietr. Syn. PI. i. 753 = Wahlenbergia indica.
infu.ndibu.liform.is, Sims, Bot. Mag. t. 2632=rapunculoides.
Infundibulum, Reichb. Ic. PI. Crit. i t. 75. f. 158 = silenifolia.
Infundibulum, Vest, ex Roem. & Schult Syst. v. 106 =Steveni.
intrgerrima, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 155 = sylvatica.
intermedia, Engelm. ex Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 256 = biflora.
intermedia, Roem. & Schult. Syst. v. 110=Adenophora communis.
interrupta, Pers. Syn. i. 192=Priamatocarpus interruptus.
Intybus, Schott ft Kotschy, ex Tchihat- Asie Min. Bot. ii. 402=trachyphylla.
invulucrata, *Aucher, ex A. DC. Prod.* vii. 467.—As. Min.; Persia,
isophylla, *Moretti, in Brugnat. Giorn. Fis.* II. vii. (1824) 44, 98 {*App. Schomb. Fl. Hal.* 22).—Italia.
Jacobaea, *C. Sm. ex Hook. Niger Fl.* 148. t. 12.—Ins. Cap. Verd.
Jacquini, A. DC. Monog. Camp. 251 — Trachelium Jacquini.
japonica, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 705 = Phyteuma japonicum.
jasionefolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 463 = stricta.
Jaubertiana, *Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xv. (1868) p. xlviii.—Gallia.
javanica, D. Dietr. Syn. PI. i. 759=Campanumoea javanica.
juncea, D. Dietr. 1. c. 757=Lightfootia juncea.
juncea, *Hill, Veg. Syst.* viii. 14.—German.
juncea, Hort. ex A. DC. Monog. Camp. 157 = Wahlenbergia lobelioides.
juncea, *Wettstein, in Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 117.—Lycia.
juncifolia, Hort. ex A. DC. Monog. Camp. 157 = Wahlenbergia lobelioides.
jurjurensis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 257.—Afr. bor.
kamtschatica, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 889 = camtschatica.
kashmiriana, Royle, ex Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc. ii. (1858) 24 = cashmiriana.
khasiana, *Hook.f. & Thorns. 1. c.* 25.—Reg. Hirnal.
Kitaibeliana, *Roem. (f Schult. Syst.* v. 90.—Banatus.
kolcnatiana, C. *A. Mey. ex Rupr. in Bull. Acad. Pitersb.xi.* U867) 216.—Reg. Cancas.
Kotschyana, *A. DC. Prod.* vii. 481.—CilicU.

CAMPANULA:—
Krebsii, D. Dietr. Syn. PI. i. 753=Wahlenbergia Zeyheri.
Kremeri, Boiss. & Reut. Pugill. PI. Nov. 75 = dichotoma.
kryophila, Rupr. in Bull. Acad. Petersb. xi. (1867) 211 = anlonensis.
laciniata, Andr. Bot. Rep. t. 885 = tomentosa.
laciniata, *Linn. Sp. PI.* 165.—Archip. Graec.
lactiflora, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 153__Reg. Caucas.
Lamarckii, D. Dietr. Syn. PI. i. 755 = Adenophora Lamarkii.
Lambertiana, A. DC. Monog. Camp. 327 = C. Rapnnculus.
lamiifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 154 = alliariaefolia.
lanata, *Frivald. in Flora*, xix. (1836) 434.—Thracia.
lanceolata, Boiss. & Reut. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 291=hispanica.
lanceolata, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 105.—Mont. Pyren.
lanceolata, Pall, ex A. DC. Monog. Camp. 321 = Steveni.
lanceolata, J. & C. Presi, Fl. Čech. 49 = persicifolia.
lanceolata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 47 = rotundifolia.
lancifolia, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 96-Campanumoea celebica.
lancifolia, Schur, Enum. PI. Transs. 445 = rotundifolia.
Langsdorffiana, Kisch. ex A. DC. Monog. Camp. 279 =linifolia.
Langsdorffiana, A. Gray, in Am. Joum. Sc. Ser. II. xxxiv. (1862) 254=Parryi.
laniflora, *Hornem. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 268.—Hab.1
lanuginosa, Hort. ex Steud. 1. c. = divergens.
lanuginosa, Lam. Kncyc. i. 584 = peregrina.
lanuginosa, Willd. Enum. Hort. lierol. 213 = rupettris.
Larreinii, Bert, ex Culla, in Mem. Ace. Tor. xxxviii. (1835) 118. t. 35 = Wahlenbergia fernandeziana.
lasiocarpa, *Cham, in Linnaea*, iv. (1623) 39.—Am. bor. occ.
latifolia, *Linn. Sp. PI.* 165.—Europ.; Oriens; As. temp,
latiloba, *A. DC. Prod.* vii. 478.—Bithynia.
lavandulaefolia, Keinw. ex Blume, Uijdr. 726 = Wahlenbergia gracilis.
Ledebouriana, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 477.—Armenia.
Ledebourii, Boiss. Fl. Orient, iii. 905 = pracc.
Lehmanniana, *Bunge, in Lehm. Reliq. Bot.* 211.— Turkestan.
leptocarpa, Engelm. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 82 = Specularia leptocarpa.
leptopetala, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 952 = Phyteuma rigidum.
leucanthemifolia, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 309-caespitosa.
leucoclada, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 109.—Afghan,
leucosiphon, *Boiss, V Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 64.—As. Min.
Leutweinii, *Heldr. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 379.—Graecia.
libanotica, *A. DC. Prod.* vii. **463.—**Syria,
ligularis, *Lam. Encyc.* i. 585.—Europ.
ligulata.l'as. Syn. i. 191-lingulata.
ligulata, Steud. Norn. cd. II. i. -26S=C. Cervicaria.
lilijiora,Roth, Knum. PI. Phan. Germ. i. 715-Adenophora communis.
lilifolia, Lam. Encyc. i. 681 = Adenophora Lamarkii.
lilifolia, Linn. Sp. PI. 165 = Adenophora communis.
limonia, Murr. Syst. Vcg. ed. XIII. 175 = seq.
limonifolia. Linn. Sp. Fl. cd. II. 239-Phyteuma limonifolium.
linarioides, Lam. Encyc. i. 680 = Wahlenbergia Unarioides.
linearifolia, D. Dietr. Syn. PI. i. 756 =-Prismatocarpus campanuloides.
linear is, Linn. f. Suppl. 140-=Microcodon lineare.
lingulata, Reichb. lc. PI. Crit. vi. 12 = C. Cervicaria.
lingulata, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* i. 65. t. 64. —Europ. austr. or.
linifolia, *Scop. Ann.* ii. *Hist. Nat.* 47.—Europ.
linifolia, Schrank, I'rim. Fl. Sal. 70 = rotundifolia.
liniphylla, Pall, ex A. 1)C. Monog. Camp. 368 = Adenophora marsupiifolia.
linnaeifolia, *A. Gray, tn Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 866.—Calif.
linoides, Presi, ex A. DC. Monog. Camp. 168-Wahlenbergia linarioides.

CAMPANULA:—
sarmentosa, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 4. —Abyssin.
sarmentosa, Fenzl *Sc* Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1875) 105 =lobata.
Sartorii, *Boiss. V Heldr. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 919. —Archip. Grace.
saxatilis, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. IV. 776 (sp. dub.).—Kossia.
saxatilis, *Linn. Sp. PI.* 167.—Ins. Creta.
saxicola, R. Br. Prod. 561 = Wahlenbergia saxicola.
Saxifraga, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 155.—Reg. Caucas.
scabrella, *Engelm. in Coult. Bot. Gaeette,* vi. (1881) 237.—Am. bor. occ
scabrida, *Hochst. in lorent, Wanderungen,* 331.— Mesopotam.
scandens, *Pall, ex Roem. If Schult. Syst.* v. 120.— Sibir.
Scheuchzeri, A. Gray, Syn. (1. N. Am. ii. I. 12- Parryi.
Scheuchheeri, Lodd. Bot. Cab. t. 485=rotundifolia.
Scheuchzeri, *Vill. Prosp.* 22.—Mont. Pyien.
Schimperi, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 712 = rigidipila.
Schleicheri, Snter, Fl. Helv. i. 124-=linifolia.
Schotti, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1885) II. 147.— Hab.?
sclerotricha, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 66.—Persia.
Sconleri, *Hook, ex A. DC. Monog. Camp.* 312.—Am. bor. occ.
scutellata, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 282.—Macedon.
secunda, Schmidt, Fl. Boëm. ii. 74—rapuncnloides.
secundiflora. Vis. & PanS. in Mem. 1st. Venet. x. (1861) 442 = rapnnculoides.
seminuda. Vest, in Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 91 = Stcveni.
serpyllifolia, *Vis. Fl. Dalm.* ii. 136. t. 15.—Dalmatia.
serratifolia, Vukot. in Linnaea, xxvi. (1853-56) 335 = C. Trachelium, latifolium.
sessiliflora, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 947.—Armenia.
sessiliflora, D. Dietr. Syn. PI. i. 756 = Prismatocarpns campanuloides.
sessiliflora, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 30 = latiloba.
sessiliflora, Linn. f. Suppl. 139 «= Lightfootia longifolia., subulata.
sessiliflora, Vukot. in Linnaea, xxvi. (1858-55) 327 =• Rainerii.
sessilis, D. Dietr. Syn. PI. i. 756=Prismatocarpns sessilis.
setacea, D. Dietr. 1. c. 754 = Wahlenbergia capillacea.
setosa, Fisch. ex DC. Monog. Camp. 269 = rapnnculoides.
setosa, *Wendl. Beobacht.* 42.—Hab. ?
Sewerzowi, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 188.—As. temp.
sibirica, *Linn. Sp. PI.* 167.—Europ.; As. temp.
Sibtkorpiana, Boiss. Diagn. Ser. L xi. 77=Phytenma Sibthorpianum.
sidoniensis, *Boiss. & Blanche, Diagn.* Ser. II. iii. 114. —Syria.
Sieberi, D. Dietr. Syn. PI. i. 753 = Wahlenbergia gracilis.
silenifolia, *Fisch. ex A. DC. Monog. Camp.* 320.— As. bor.
silenifolia, Host, Fl. Austr. i. 268 = Wahlenbergia Pumilio.
simplex, Lam. ex DC. Fl. Fr. iii. 730 =bononiensis.
simplex, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 265 => Stcveni.
Sinai, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 76 = Phyteuma lanceolatum.
sinensis, D. Dietr. Syn. PI. i. 755= Adenophora sinensis.
singarensis, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. PI. Or. Nov. Dec.* i. 2.—Mesopotam.
sparsiflora, D. Dietr. Syn. PI. i. 757 — Microcodon sparsi riorum.
spathulaefolia, Sprun. ex Nym. Consp. 483-ramosissima.
spathulata, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient iii. 918 = trichopoda.
spathulata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 137 = Sprunerіana.
spathulata, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 286. t. 258 = sibirica.
speciosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 50-persicifolia.

CAMPANULA:—
speciosa, Homem. Hort. Hafn. ii. 967, Add.=-glomerata.
speciosa, *Pourr. in Mém. Acad. Sc. Tout.* iii. (1788) 309.—Mont. Pyren.
speciosa, Willd. ex Spreng. Syst. i. 729=elegans.
specularioides, *Coss. Notes Crif.* 41.—Hispan.
Speculum, Linn. Sp. PI. 168=Specnlaria Speculum.
sphaerothrix, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 280 = expansa.
spicata, *Linn. Sp. PI.* 166.—Europ.
spicata, Geners. Elench. Scepus. n. 192 ; ex Wahlenb. Fl. Carp. 62 = C. Cervicaria.
spinulosa, D. Dietr. Syn. PI. i. 754-Wahlenbergia spinulosa.
spreta, Roem. *Sc* Schult. Syst v. 123 = Adenophora' communis.
Spruneri, Boiss. Fl. Orient, iii. 937 «seq.
Sprunerіana, *Hampe, in Flora,* xxv. (1842) I. 76.— Graecia et Ins.
spuria, Pall, ex Roem. & Schult Syst v. 154 = Specularia hybrida.
St.-Helenae, D. Dietr. Syn. PI. i. 755 = Wahlenbergia liaifolia.
stellarioides, D. Dietr. 1. c. 753 = Wahlenbergia stellarioides.
stellaris, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 63.—Syria; Palestin.
stellata, *Thunb.in Hoffm. Phyt. Blaett.* i. (1803) 20.— Afr. austr.
Stelleri, Stepb. ex Herd, in Act. Hort Petrop. i. (1873) 299 = lasiocarpa.
stenanthina, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1814) 525 = Adenophora marsupiiflora.
stenocarpa, *Trautv. &* Mey. in Middend. Reise {Fl. Ochot.* 61).—As. temp.
stenocodon, Boiss. *Sc* Reut. Diagn. Ser. IL iii. 112 = rotundifolia.
stenophylla, Boiss. & Heldr. 1. c. Ser. I. xt 77 = Pbyteuma linifolium.
stenosiphon, Boiss. & Heldr. 1. c. vii. 18 = glomerata.
stenosiphon, Reichb. t ex Nym. Consp. 479 = rotundifolia.
Steveni, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 138.—Reg. Caucas.; Persia.
Steveniana, Roem. *8c* Schult. Syst. v. 91=praec.
stolonifera, *Mign. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 842.—Hispan.
stricta, Labill. Ic PI. Syr. Dec. v. 6 = libanotica.
stricta, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 238.—As. Min.
stricta, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 140 = lyrata.
stricta, Wall, in As. Research, xiii. (1820) 374 = sylvatica.
strigillosa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. ii. (1854) 251.—Cappadocia.
strigosa, *[Soland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. ii. 246.— Cilicia; Syria.
strigosa, *Vahl, Symb-. Bot.* iii. 34.—As. Min.
stylidioides, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 77=Phyteuma lobelioides.
stylosa, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816)-Adenophora communis.
stylosa, Lam. Encyc. i. 880 = Adenophora stylosa.
styriaca, Schott, Nym. *Sc* Kotschy, Analect. Bot 9 = Scheuchzeri.
suanetica, *Rupr. in Bull. Acad. Pitersb.* xl (1867) 215. —Reg. Caucas.
suaveolens, Gilib. Fl. Lituan. i. 50 = Adenophora communis.
suaveolens, *Wender. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 270.— Hab.?
subalpina, *Delponte & Gras, Ind. Sent. Hort. Taurin.* (1873)35.—Hab. i
subpyrenaica, *Timb. in Mém. Acad. Tout.* Sér. IV. v. (1855) 387.—Hispan.
subramulosa, Jord. in Gren. *Sc* GodT. Fl. Fr. ii. 418 = caespitosa.
subulata, Beauv. ex A. DC. Prod. vii. 478=americana.
subulata, Spreng. Syst. i. 809 - Lightfootia subulata.
subulata, Thunb. Prod. PI. Cap. 38 = Prismatocarpns subulatus.
subuniflora, Lam. Tabl. Encyc. ii. 53=liniflora.
sulphurea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 64.—Syria.
swellendamensis, D. Dietr. Syn. PI. i. 753' - Wahlenbergia swellendamensis.
sylvatica, *Wall. Cat.* n. 1298; *et in Roxb. Fl. Ind.* ii. 97.—Reg. Himal.

CAMPANULA:—
syngenesiflora, Pall, ex A. DC. Monog. Camp. 363 " Adenophora marsupiiflora.
syriaca, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 828 * stellaris.
syriaca, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 133- Specularia falcata.
syspirensis, *C. Koch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 639.— Armenia.
tauricola, Boiss. *Sc* Bal. Diagn. Ser. II. iii. 116 = Phyteuma rigidum.
telephioides, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. PI. Or. Nov. Dec.* i. 1.—Cataonia.
tenella, Jord. Pugill. PI. Nov. (1852) 125=caespitosa.
tenella, Lange, ex Nym. Consp. 479 = hispanica.
tenella, Linn. f. Suppl. 141 = Lightfootia tenella. Tbunbergiana.
tenerrima, D. Dietr. Syn. PI. i. 757 = Prismatocarp"' tenerrimus.
Tenorii, Moretti, Prosp. Geogr.^Bot. Ital. Schouw, I" =versicolor.
tenuiflora, Schor, Enum. PI. Transs. 438 = bononiensis.
tenuiflora, Tenoie, Fl. Nap. iii. 207. t. 210=lingH" lata.
tenuifolia, Hoffm. Fl. Germ. i. 100=rotundifolia.
tenuifolia, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 1«8°= Wahlenbergia tenuifolia.
tetraphylla, Thunb. PI. Jap. 87= Adenophora verticillata.
teucrioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 33.—Lydia.
Teymonsii, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1885) II. I*7, 182—Hab. i
Thaliana, Wallr. Sched. Crit. 86=bononiensis.
thalictriflora, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 77 = Codonopsis thalictrifolia.
Thomasii, Tenore, ex A. DC. Monog. Camp. 309 * versicolor.
Thomsonii, Hook. f. in Jonrn. Linn. Soc. ii. (1858) 9d • Phyteuma Thomsoni.
Thunbergii, Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 185=Lightfooti» ciliata.
thyrsoidea, Upeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 107-sspedo*
thyrsoides, *Linn. Sp. PI.* 167.—Europ.
tomentosa, *Lam. Encyc. i.* 684.—As. Min.
tomentosa, *Vent. Hort. Cels,* 18.—Graecia et Ins.
Tommasiniana, Koch, ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. e, AUem. 229; Keut. in Cat. Genev. (1865) 4 * Waldsteiniana.
trachelioides, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 150 = rapuncoloides.
trachelioides, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 285.—Afr. bor.
Trachelium, Brot Fl. Lnsit. i. 287-primulaefolia-
Trachelium, Bull. Herb. Fr. t. 319 -rapunculoides.
Trachelium, *Linn. Sp. PI.* 166.—Europ.; As. temp' Afr. bor.
Trachelium, Thunb. Fl. Jap. 88 =punctata.
trachyphylla, *Schott (T Kotschy, ex Boiss. Fl. One**- iii. 926.—Cilicia.
transsilvanica, *Schur, ex Andrae, in Bot. Zeit-* (1855) 328.—Transsylv.
trichocalycina, Tenore, Fl. Nap. L 67. t 1«=Phyteu** amplexicaule.
.trichopoda, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 68.—Syria.
tricuspidata, Fisch. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. ISO Adenophora denticulata.
tridens, Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. xi. (1867) 20** tridentata.
tridentata, *Sckreb. Ic.* 3. t. 2; *Linn. Mant.* i. 44.— As-Min.
trigona, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 9*9 * Specularia Speculum.
trilocularis, Turra, Prod. Fl. itaL 64 = Allionii.
triphylla, Thunb. Fl. Jap. 87 = Adenophora triphjr"'
truncata, D. Dietr. Syn. PI. i. 757 = Campanumw celebica.
tubiflora, Tausch, ex Ledeb. Fl. Ross. ü. » glomerata.
tubulosa, *Lam. Encyc. I* 583.—Ins. Creta.
turbinata, Schott, Nym. *Sc* Kotschy, Analect. Bot. * = carpatica.
tyrolensis, Schott, Nym. *Sc* Kotschy, I.e. 12=ca" pitosa.
ucranica, Bess. Cat. Hort. Cremen. (1816) 28--r»P"" culoides.
umbellifera, Vukot. in Linnaea, xxvi. (1853-55) **> pyramidalis.

CAMPANULA:—

unirosa, F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn. i. 675 = Adenophora communis.

*"»»'«'«, Linn. f. Suppl. 142 = Wahlenbergia unduUta.

vndulata, Moench, Meth. Suppl. 189 = sibirica.

vnidenta,a, Linn, *fm* Snppl„ i89_1^111,001,,1 uniden_ ta .

"ni/loro Georgi, Beschr. Russ. Reich. Hi. IV. 772 = silemfolia.

"niflora, Gorter, Fl. Ingr. SS=rotundifolia.

«ni« ,, Honck_ Svn_ PI_ GeTM- »• 251 = cenisia.

*»o1??r»t £••»«. ty. «. 183.-Reg. Arctic.

""flora, Schult. Ocstr. Fl. ed. II. 400=caespitosa.

*mflora, Vill. p_r0sp. 22 = linifblia.

"Jticaefolia, All. Fl. Pedem. i. UO=latifoUa.

*«(«c/<,/„> Gilib. Fl. Lithuan. i. 52 = bononiensis.

*Zlr^!'"' Turra> Prod. Fl. Ital. 64=rapunculoides.

*ZiTJ y«, Schmid «. Fl- Boem. iL 78=C. Trachelium.

Van-H"' A11_ F1_ Pedem_ ''• 109-linifolia.

V^j ^outei> c«'r. in Rev. Hortic. (1878) 420.—Hab. ».

V^y. G- Don, ex Loud. Hort. Brit. 77.-Hab.?

*var "ld Salisb. Prod. 126=rotundifolia.

Vi re.„e, Leresche & Levier, in Journ. Bot. xvii. 9) 199.—H' ,.

velata, />«„fr1 H'^Mat. Fl. Atl. 2—Algeria.

veW ca. Boro —Cf- in Oestr_ Bot_ Zeitschr. xxxiii. M»s« £*?"> ^.-Austria.

*ve_fin „ f. Fl. Atlant. i. 180. t. 51 = mollis.

*venosa, num. Hort. Berol. Suppl. 10 = rhombo X E

£?"%"• Enum_ pl_ Transs_ 442=caespitosa.

=Ll Cavolia Hah!* Sitber, in Ann_ FL Pom_ (18S8> 87S ~

*veronic olia, Hance> in Joura_ £ot_iXl (1871^ 13S>~ Chir

ver"„culosa, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 12. t. 81 = «. Kapunculns.

versicolor, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 188.- „ uaiia; Graecia.

*V^i'"//"0, Guss_ P1_ Rar_ 92=versicolor.

Verticillata, Hill, Veg. Syst. viii. 10.-Am. bor.

*ert ilata, Pall> RdSe> "'• 719=Adenophora verti- dlSt a.

*vesula, A U_ Fl Pedem_*• 108 = persicifolia.

VM.r- idalu, H. C. Wats, in Hook.Ic. PI. t. 684.-Ins. Azores.

vincaeflora, Vent. Jard. Malm. 12 „ WaWenber_B ia gracilis.

Violae, Pers. Syn. i. 192 = sq.

*violaefolia, Lam. Enc_y_c_ '• 687-Sibiria.

*virga.a A- DC_ Prod>vii_488=c_ Rapuncolus.

*virga.„ 1 1 * Ic_ PL S^. Decii. 11. t. 6-Phytenma limonifolium,

*"'"'"' Rafin. ex Roem. & Schult. Syst. v. 100 = divarlca,ai linifolu

*viridis, Spreng- Sy*L iv_ Cur_ Post_ 78 = Codonopsis viridis,

*Vitinghofiana> Roem.& Schult, Syst. v- 102=Steveni persicifolia.

Vlachovae, Orphan. ex Bois Fl_ Orient_ "i„ 927 = glomerata.

volubilis, Willd. ex Roem. & Schult, SySt> V- 98o lactiflora.

vulgaris, i uejdenik. . ii. 10, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 891.

Wald. Kit. Cat. Roem. & Schult. Syst. v. 99.—Cro[

*^"'"l' Rochel_ Pl_ Banat. Rar. 41. t. 5. f. 12 = Whymphyandra Wanneri.

«««<f(i, Heuff. in Oestr. Bot. Wochonschr. (1857) 29.

Willdenowiana, Roem. & Schult. Syst. v. 107 = versicolor.

Willdenowii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 117 = Phyteulna lobelioides.

Zeyh., ZeJhiri D. Dietr. Syn. Pl. i. 758-Wahlenbergia

Zoysiil ^"V in Jacq. Colled. U. 122.—Europ. anstr.

MP CA Cam AN V I.01DES_ Hort_ K«w_ « A. DC. Monog. ^ P ^ 107' (1880)=Lightfootia, Client, (tarn- *subulata,* Hort Kew. ex A. DC. 1. c. = L. snbnlata.

CAMPANULOPSIS, Zoll. & Mor. in Nat en Geneesk. Arch. Neer_l_ Indie_. >• US**) «4, nomen. *CAMPANULACEAE cyanea, Zoll. & Mor. l. c.*—Malaya.

CAJttPANUMOEA, Blame, Bijdr. 726 (1825). *CAMPANULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 557.

CYCLOCODON, Griff. Notul. iv. 277 (1854).

celebica, *Blume, I. c.* 727.—Ind. or.; Malaya; China.

cordata, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xii. (1868) 68 =javanica.

inflata, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii: 436. —Reg. Himal.

japonica, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xii. (1868) 67.—Japon.

japonica, Siebold, ex Morr. Belg. Hortic. (1868) 337 = lanceolata ?

javanica, *Blume, Bijdr.* 726.—Reg. Himal.; Java.

lanceolata, Sieb. & Zucc. Fl. Japon. i. 174. t « L - Codonopsis lanceolata.

leucacarpa, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 436 = celebica.

parviflora, *Benth.* b* *Hook. f. Gen.* ii. 658.—Reg. Himal.

pilosnla, *Franch. PI. Davidian.* i. (1884) 192.— Mantchnr.

truncata, Endl. Gen. Plant, i. 515; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 436=celebica.

CAMPBELLIA, Wight, Ic. iv. 5. t 1424, 1425 (1850) = Christisonia, Gardn. (Orobanch.).

albida, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 967 = Christisonia albida.

aurantiaeat, Wight, Ic. iv. 1.1424=Chr. neilgherrica.

cytinoides, Wight, 1. c. 1425=Chr. neilgherrica.

Lawii, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 967 = Chr. Lawii.

subacaulis, Benth. & Hook. f. 1. c =Chr. subacaulis.

CAMPDEEIA, Benth. Bot. Voy. Sulph. 159. t. 52. (1844). *POLYGONACEAE,* Benth. & Hook.f. iii. 102.

floribunda, *Benth. 1. c.* 160.—Guatemala,

gracilis, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 28.—Bras.

Lindeniana, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 103.—Mexic.

mexicana, Meissn. in DC. Prod. xiv. 171=floribunda.

nematostachya, *Griseb. in Bonplandia,* vi. (1858) 4.— Panama.

CAMPDERIA, Lag. Amen. Nat. ii. 99 (1821) = Kundmannia, Scop. (Umbellif.).

sicula, Lag. 1. c.=K. sicnla.

CAMPDERIA, A. Rich, in Bull. Soc Philom. (1822) 79 ^Barbacenia, Vand. (Amaryllid.).

CAMPE,Dulac, Fl.Hautes-P>r. 199 (1867)=Barbarea, R. Br. (Crncifer.).

praecox, Dulac, 1. c. = B. praecox.

vulgaris, Dulac, 1. c »B. vulgaris.

CAMPECARPUS, H. Wendl.ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 893 (1883) = Cyphophoeniz, H. Wendl.(Palm.).

fulcitus, H. Wendl. 1. c.=Cyph. ralcita.

CAMPECIA, Adans. Fam. ii. 567 (1768)=Caesalpinia, Linn. (Legumin.).

CAMPELEPIS, Falcin Trans. Linn. Soc. xix. (1845) 101 =Feriploca, Linn. (Asclepiad.).

viminea, Falc. 1. c.=P. aphylla.

CAMPELIA, Knnth, Ennm. PI. i. 286, 287 (1813) = CAMPELLA, Link.

CAMPELIA, Rich. Anal. Fmit. 46 (1808). *COMMELINACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 855.

GONATANDRA, Schlecht.in Linnaea, xxiv. (1851) 659.

SARCOPERIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 16 (1836).

ZANONIA, [Plum.] Cram. Diss. Syst. 75 (1803).

bibracteata, Wied-Neuwied, Beitr. Bras. 15. t. 2. f. 4 = C. Zanonia.

Boucheana, Schult. f. Syst. vii. 1180=C. Zanonia.

fastigiata, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 188 = C. Zanonia.

Fendleri, Hassk. in Flora, xlviii. (1865) 102 = C. Zanonia.

glabrata, Hassk. in Miq. PL Jnngh. 154 - Forrestia glabrata.

glabrata, Kunth, Enum. PI. iv. 109=C. Zanonia.

Hoffmanni, Hassk. in Flora, xlviii. (1865) 105 = C. Zanonia.

marginata, Blame, Ennm. PI. Jav. i. 7 = Forrestia marginata.

marginata, Wall. Cat. n. 8977 = Forrestia Hookeri.

CAMPELIA:—

mexicana. Mart, ex Kunth, Enum. PI. iv. 109 = C. Zanonia.

mollissima, Blume, Enum. PI. Jav. i. 7 = Forrestia mollis.

Pseudo-Zanonia, Kunth, Ennm. PI. iv. 108 = C. Zanonia.

scandens, *Hassk. in Flora,* xlviii. (1865) 103.—Peruv.

Zanonia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp. i.* 264.—Am. austr.

CAMPELLA, Link, Hort. Berol. i. 122 (1827) = Deschampeia, Beauv. (Gramin.X

caespitosa, Link, 1. c 122 = D. caespitosa.

media, Link, 1. c. 128 = D. juncea.

CAMPHORA, [Bauh.1 Linn. Syst. cd. I (1735) ; Nee*, Syst. Laarin. 87.- Clnnamomum, Tourn. (Laurin.).

angustifolia, Rafin. Sylva Tellur. 136.—Hab. 1

chinensis, Nets, in Otto, Gartenz. (1833) 91; Syst. Laurin. 92=Cinn. Parthenoxylon.

glandulifera, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 72 = Cinn. glanduliferum.

glauca, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 582 = Litsea glauca.

inodora, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. 904.—Arch. Sunda.

inuncta, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 32 = Cinn. inunctum.

japonica, Rafin. Sylva Teller. 136=Cinn. pednnculatum t

offidnalis, Steud. Nom. ed. II. i. 271 = Cinn. Camphora.

offidnarum, Nees, ex Wall. PI. As. Rar. ii. 72 = Cinn. Camphora.

Parthenoxylon, Nees, 1. c. =Cinn. Parthenoxylon.

porrecta, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 308 = Cinn. Parthenoxylon.

Pseudo-Sassafras, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 113, 114 = Cinn. Parthenoxylon.

sumatrana, Miq. PI. Jungh. 174.—Sumatra.

vera, Rafin. Sylva Tellur. 136 = Cinn. Camphora.

CAMPHORATA, Tourn. ex Crania, Inst. i. 113 (1766) = Camphoro8ma, Linn. (Chenopod.).

acuta, Crantz, 1. c. 114 = Halimocnemis juniperina.

glabra, Crantz, 1. c.=Camphorosma glabrum.

hirsuta, Moench, Meth. 700=Camphorosma monspeliacum.

monspeliensium, Crantz, Inst. i. 114—Camphorosma monspeliacum.

CAMPHORINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 1 = Clanamomum, Tourn. ? (Laurin.).

CAMPHOROMOEA, Nees, Laurin. Expo.. 16 (1883) = Ocotea, Aubl. (Laurin.).

divaricata, Nees, Syst. Laurin. 467.— Bras,

laxa, Nees, 1. c. 468.—Bras.

litsaeifolia, Meissn. in DC. Prod, xv. 1.145.—Bras.

ovalifolia, Meissn. 1. c. 144.—Bras.

rhamnoides, Meissn. L c. 145.—Bra*.

subtriplinervia, Nees, Syst. Laurin. 466.—Bras.

surinamensis, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 145.— Guinea.

tenuiflora, Meissn. 1. c. 144 —Bras.

venulosa, Nees, Syst. Laurin. 469.—Bras,

tiByphoides, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 145.—Bras.

CAMPHOROMYRTUS, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 240-Baeokia, Linn. (Myrtac).

Behrii, Schlecht. 1. c. xx. (1847) 651 = B. Behrii.

Brownii, Schau. 1. c. xvii. (1848) 240 = E camphorata.

crenulata, F. Muell. in Trans. Vkt. Inst i. (1855) 123 = B. virgata.

pluriflora,¥. Mncll. 1. c.=B. virgata.

CAMPHOBOSMA, Linn. Diss. Dass. 8 (1747) (Amoen. Acad. i. 392). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 56.

CAMFHORATA, Tourn. ex Crantz, Inst. i. 113 (1766).

acutum, Falk, Beitr. ii. 120=Nanophyton caspicum.

acutum, Linn. Sp. PI. 122 = Halimocnemis juniperina.

acutum, Pollich, Fl. Palat. iii. 317-Kochia arenaiia.

annua, *Pall, lllustr. PI.* 67. t. 58.—Rossia.

glabrum, Anct ex DC. Prod. iii. 368 = Siphonychia americana.

glabrum, *Linn. Sp. PI.* 122.—Helvetia.

hirsutum, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 232 = monspeliacum.

monandrum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 922.— Afghan.

CAMPHOBOSMA:—
monspeliacum, *Linn. Sp. PI.* 122.—Reg. Mediterr.
monspeliacum, Pall. Reise, ii. 471=ruthenicum.
monspeliacum, Pollich, Fl. Palat. i. 165»Kochia arenaria.
monspeliense, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 139 = monspeliacum.
ovatum, Kiasol. ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 126 = monspeliacum.
ovatum, *Waldst. &• Kit. PI. Rar. Hung.* i. 64. t. 63.—Europ. austr. or.
ovatum, Bong. & Mey. Suppl. ii. Fl. Alt. 68. n. 274 = annuum.
paleaceum. Linn. f. Suppl. 128 = Monetia paleacea.
perennis, *Pall. Illustr. PI.* iii. 66. t. 57.—Reg. Caucas.; Persia,
polygamum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 921.— Afghan.
Pteranthus, Linn. Mant. i. 41 = Fteranthus echinatus.
ruthenicura, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. *Suppl.* 112.— Euiop. austr. or.; As. bor.
sabulosa, *Kit. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. H. 126.—Hungar.
songoricum, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 415.—Sihir.
vingintimilleis, *Tinea, Cat. Hort. Panorm.* 277.— Sicil.

CAMPHUSIA, De Viiese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1850) 148 = Scaevola, Linn. (Goodeniac).
glabra, De Vriesc, 1. c. 149.—Malaya.

CAMPHYLEIA, Spreng. Gen. ii. 486 (1881) - Striga, Lour. (Scrophulac.).

CAMPIA, 'Domb.' ex Endl. Ench. 91, in syn. (1841) = CAPIA, Juss.-Iiapageria, Ruiz *Sc* Pav. (Liliac.).

TAMPILOSTACHYS, A. Tuss. in Orb. Diet. xii. 38 (1849) = Campylostachys, Kunth (Verbenac.).

CAMPNOSPEBMA, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 65. t. 1. *ANACARDIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 425.
auriculata, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 41.—Ind. or.
Griffithii, *March. Rev. Anac.* 174.—Penang.
gummifera, *March. 1. c.* 173.—Bras,
macrophylla, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 41.—Malacca.
Micranteia, *March. Rev. Anac* 178.—Madag.
oxyrhachis, *Engl. in A. DC. Monog. Phan.* iv. 819.— Sumatra.
seychellarum, *March. Rev. Anac.* 173.—Ins. Mascar.
zeylanica, *Thw. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 65.—Zeylan.

CAMPOMANESIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 72. t. 13 (1797). *MYRTACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 712.
ARBEVILLEA, ACRANDRA, BRITOA, LACERDAEA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 425-437.
iidamantium, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 73.— Bras.
affinis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 446.—Bras,
aprica, *Berg, 1. c.* 459.—Bras,
arenaria, *Berg, I. c.* 448.—Reg. Argent,
aromatica, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 242.—Ind. occ
aurea, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 454.—Bras,
nustralis, *Berg, 1. c.* 445.—Bras,
caerulea, *Berg, 1. c.* 455.—Bras,
caerulesccns, *Berg, 1. c.* 612.—Bras.
Cambessedeana, *Berg, 1. c.* 457.—Bras,
campestris, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 72.— Bras,
cerasoides, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 549.— Bras.
ciliata, *Berg, in Mart- Fl. Bras.* xiv. I. 453.—Bras,
coaetanea, *Berg, I. c.* 444.—Am. trop.
comifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 150. t. 147.—N. Granat.
corymbosa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 72.— Bras,
crassifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 97. t. 87.—N. Granat.
crenata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 456.—Bras,
cuneata. *Berg, I. c.* 446.—Bras,
cyanea, *Berg, I. c.* 454.—Bias,
dentata, *Berg, I. c.* 457.—Bras,
desertorum, *Berg, 1. c.* 450.—Bras,
dimorpha, *Berg, I. c.* 609.—Bras,
discolor, *Berg, 1. c.* 439.—Bras.

CAMPOM ANESIA:—
eriantha, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 72.— Bras.
eugenioides, *Blume, I.* c—Bras,
fruticosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 458.—Bras,
fusca, *Berg, I. c.* 447.—Bras.
Gardneriana, *Berg, 1. c.* 455.—Bras.
glabra, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1843) 319 = Calycolpus glaber.
glabra, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 450.—Bras.
Goetheana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 407 = Calycolpus glaber.
grandiflora, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sir. VI. xx. **(1885)** 182.—Guiana.
Guaviroba, *Benth. tf Hook./. Gen.* i. 712.—Bras.
guazumaefolU, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 72.— Bras,
heterophylla, *Berg, in Mart. FL Bras.* xiv. I. 440.—Bras,
hirsuta, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 353.—Bras.
Houlletii, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 449.—Bras.
lanceolata, *Berg, 1. c.* 612.—Bras.
Langsdorffii, *Berg, I. c.* 610.—Bras,
lanrifolia, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1848) 353.—Bras,
lineatifolia, *Rut* b* Pav. Fl. Per.* iv. t. 422; *Syst.* 128.—Peruv.
malifolia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 452.—Bras.
Martiana, *Berg, 1. c.* 610.—Bras,
mediterranea, *Berg, 1. c.* 458.—Bras,
microcarpa, *Berg, I. c.* 455.—Bras,
multiflora, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 72.— Bras.
obscura. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 451.—Bras,
obversa, *Berg, I. c.* 445.—Bras,
ovalifolia. *Berg, 1. c.* 452.—Bras.
Pohliana, *Berg, I. c.* 441.—Bras.
Poiteaui, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 432.—Bras,
pubescens, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 443.—Bras,
racemosa, *Berg, 1. c.* 458.—Bras,
repanda, *Berg, I. c.* 456.—Bras,
reticulata. *Berg, 1. c.* 439.—Bras,
rhombea, *Berg, I. c.* 453.—Bras,
rhytidophylla, *Berg, I. c.* 608.—Bras.
Riedeliana. *Berg, 1. c.* 610.—Bras,
rugosa, *Berg, 1. c.* 439.—Bras,
salviaefolia, *Berg, 1. c.* 442.—Bras,
suavcolens, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 72.—Bras,
suffruticosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 448.—Bras.
synchrona, *Berg, I. c.* 444.—Bras,
tenuifolia, *Berg, 1. c.* 452.—Bras,
tomentosa, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 151. t. 147.—N. Granat.
transalpina, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 459.—Bras.
triflora, *Baill. Hist. PI.* vi. 342.—Bras,
vaccinioides, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 450.—Bras.
velutina, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 72.—Bras,
virescens. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 611.—Bras.
Widgreniana, *Berg, I. c.* 447.—Bras,
xanthocarpa, *Berg, I. c.* 451.—Bras.

CAMPSANTHUS, Steud. Nom. cd. II. i. 272 (1840), sphalm.=COMPSANTHUS, Spreng. = TricyrtiB, Wall. (Liliac).

CAMPSIANDKA, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 93. *LEGUMINOSAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 563.
angustifolia, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 55.—Am. trop.
comosa, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 98.— Guiana.
laurifolia, *Benth. I. c.* 94.—Bras,
rosea, *Poepp. if Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 62.—Bras.

CAMPSIDIUM, Seem, in Bonplandia, x. (1862) 147; in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. III. x. '1862) 32 = **Tecoma,** Juss. (Bignon.).
chilense, Rciss. & Seem, in Bonplandia, x. (1862) 147.—Chili.
filicifolium, A. Van Geert. Cat. n. 71 (1874); Fl. et Pom. (1874) 280.—Ins. Fiji.

CAMPSIS, Lour. Fl. Cochinch. 877 (1790) = **Tecomft** Juss. (liignon.).
adrepens, Lour. 1. c. = Incarvillea sinensis.
amboinensis, Seem, in Journ. Bot v. (1867) 374 = T. amboinensis.
Curtisii, Seem. 1. c. 871 = T. radicans?
dendrophila, Seem. 1. c. 878=T. dendrophila.
Fortunei, Seem. 1. c.—China.
Haussmannii, F. Muell. Fragm.iv. 148 = Haussmannia jucunda.
radicans, Seem, in Journ. Bot. v. (1867) 872 = T. radicans.

CAMPTEDERIA, Steud. Nom. ed. II. i. 272 (1840), sphalm. = CAMPDEKIA, A. Rich.

CAMPTOCABPUS, Decne. in DC. Prod. viii. **(1844;** 493. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 744.
Bojerianus, *Decne. 1. c.* 494.—Madag.
crassifolius, *Decne. 1. c.*—Madag.
linearis, *Decne. I. c*—Madag.
mauritianus, *Decne. I. c.* 498.—Ins. Borbon.

CAMPTOCARPUS, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1842) 304=Alkanna, Tausch (Boragin.).
orientalis, C. Koch, 1. c.=A. orientalis.

CAMPTOLOMA, Benth. in DC. Prod. x. 430 (184«)-*SCROPHULARINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 960.
rotundifolia, *Benth. I. c.* 431.—Afr. austr.
villosa, *Balf. /. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 84.—Ins. Socotra.

CAMPTOPUS, Hook. f. Bot. Mag. t. 5755 (1869)=* Cephaelis, Sw. (Rubiac).
Mannii, Hook. f. 1. c.=Cephaelis Mannii.

CAMFTOSEMA, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc iii. (1883) 200. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. 1. 536.
BIONIA, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus- (1838) 180.
acuminatum, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 155.—Am. austr.
bellum, *Benth. I. c.* 156.—Am. austr.
coccineum, *Benth. I. c.* 154.—Am. austr.
coriaceum, *Benth. I. c.* 155.—Am. anstr.
erythrinoides, *Benth. 1. c.* 156.—Am. austr.
grandiflorum, *Benth. in Linnaea*, xxii. (1849) 518-Bras,
pedicellatum, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 60.—Guiana.
pinnatum, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. 1.325.—Bras.
rubicundum, *Hook. V Arn. in Hook. Bot. Misc.* !"• (1838) 201.—Reg. Argent,
tomentosum, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 155." Am. austr.

CAMPTOSTEMON, Mast, in Hook. Ic. PI. xii. «• t. 1119 (1872). *MALVACEAE.*
Schultzii, *Mast. I. c*—Austral.

CAMPTOTHECA, Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx-(1873) 157. *CORNACEAE.*
acuminata, *Decne. I. c*—Tibet.

CAMPULEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 7 (1806)* Striga, Lour. (Scrophularin.).
coccinea, Hook. Exot. Fl. 3. t. 203 = S. lutea.
coerulea, bo), ex Benth. in DC. Prod. x. 501 •-orobanchioides.
rosea, Boj. ex Benth. 1. c.«S. orobanchioides.

CAMPULOA, Desv. Journ. Bot, i. (1813) 69 - **Ctenium**-Panz. (Gramin.).
brachystachya, Nees, ex Doell, in Mart. Fl. Bras. »• III. 73 = Ct. brachystachyum.
chapadensis, Trin. ex Doell, 1. c. 74 = Ct. chapadense.
elegans, J. Gay, ex Kunth, Rev. Gram. i. 'J3=»-elegans.
gracilis, Desv. Joum. Bot. i. (1813) 69 = Ct. carolinianum.
hirsuta*, Desv. 1. c. (= *Campulosus falcatus).*— dustr,
monostachya, Roem. & Schult Syst. ü. 516-Ct. carolinianum.

CAMPULOCLINIUM, DC. Prod. v. 136 (1836) = Eupatorium, Toum. (Compos.).
alte
ar
axen
ro
dec
rutesc
hir
subpaniculatus, DC. Prod. v. 137 = E. sordescens.
urn
vi
ziegesbeckioides, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 854 = E. megacephalum.
strigosum, Sch. Bip. ex Baker l. c. 858 = E. macrocephalum.
palustre, DC. in Deless. Ic. Sel. iv. t. 16 = E. palwtre.
Pohlianum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 358 = E. macrocephalum.
polyphyllum, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 854 = E. megacephalum.
hirsutum.
sordescens.
Jr. 'blorolepis.
urticaefolium.
florum.

CAMPULOSUS Nouv. Boll. Soe. Philom. ii. (1810) 189 = Ctenium, Pan*. (1814) (Gramin.).
aciculatus, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 272 = Ct. elegans.
aromaticus, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 272 = Ct. caroliniannm.
brachystachyus, Nees, Agrost. Bras. 41 = Ct. blachvustachyum.
chapadensis, Trin. 803=Ct. chapadense.
cirrhosus, Nees, Agrost. Bras. 4W-Ct. cirrhosuin.
concinnus, Steud. Nom. ed. II. i. 272 ~Ct. concinnum.
dolichostachyus, Trin. ex Steud. c-Hab.».
gracilis, Agrost. 64.-Afr. austr.
linianum.
macrostachys, Steud. Nom
linianum.
monostachyos, Beauv. Agrost. 64. t.
linianum.
planifolius, Presl,
folium.
tricorys, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 272—Hab.?

CAMPYDORUM, Salisb. Ge». PI. Ftttfn. « (1866) = Polygonatu
verticillatum. Salisb. L c.=P. verticUlatnm.

CAMPYLANDRA, Baker, in Linn. Soc. xiv. (1875) 582. t. 20=TuPUrtxa, Ker-Gawl. (Liliac.).
aurantiaca, Baker, c582=T. aurantUca.'
dasystachys, Welw. ex Baker, Li". S. Soc. Ser. II. i. (1878) 256=Dasystachys campanulaUu

CAMPYLANTHERA, Hook. Ic. P
ericoides, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 277 « Marianthus procumbens.
Fraseri, Hook. Ic. Pl. t. 82 = P. elegans.

CAMPYLA dendro C. Melet. 3 5 **(183₂)=Brio.**
Sam.

CAMPYLANTHUS, Nov. PI. Sp. 4 (1821). *SCROPHULARINEAE*, Benth. Hook. f. 96U
Benthamii, *Webb*. Hook. *Niger Fl.* 163.—Ins. Cap. Verd.

CAMPYXANTHUS:—
gUbra, *Benth. in DC. Prod.* x. 508.—Ins. Cap. Verd.
junccus, *Edgev. in Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1847) 1217.—Ind. or.
ramosissimns, *Wight, Ic.* iv. t. 1416.—Ind. or.; Beluchist.
salsoloides. *Rath, Nov. PI. Sp.* 4.—Ins. Teneriff.
salsoloides, Stocks, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 433 = ramosissimus.
salsoloides, Webb, Phyt. Canar. iii. 126 = Benthamii.
spinosus, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 84.—Ins. Socotia.

CAMPYLEIA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 222 (1831) = CAMPULEIA, Thon. = Striga, Lour. (Scrophular.).

CAMPYLIA, Lindl. ex Sweet, Geran. sub t 43 (1820) = Pelargonium, L'Hérit. (Geraniac).
blattatia, Sweet, Geran. t. 88 = P. ovale.
cana, Coir, ex Sweet, 1. c. t. 114=P. ovale.
capillaris, Eckl. & Zeyh. Enum. 74 = P. capillare.
carinata, Lindl. ex Sweet, Geran. sub t 43 – P. carinatum.
cartilaginea, Eckl. & Zeyh. Enum. 74 = P. cartiUgineum.
coronopifolia, Sweet, Hort. Brit ed. 1.75=P. coronopifolium.
elata, Eckl. & Zeyb. Enum. 74'P. datum.
elegans, Colv. ex Sweet, Geran. t. 222 «P. elegans.
eriostenum, Eckl. & Zeyh. Enum. 73 = P. ovale.
holosericea, Sweet, Geran. t. 75=»P. ovale.
laciniata. Sweet, I.e. t. [401] = P. laciniatnm.
Oenotherae, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 75-P. Oenotherae.
staticephylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 74 = P. staticaefolium.
tricolor, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c.=P. violaceum.
variegata, Sweet, Geran. t. 266 = P. marginatum.
verbasciflora. Sweet, 1. c. ii. t. 157 = P. ovale.
veronicaefolia, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 73=P. veronicaefolium.

CAMPYLOBOTRVS, Lem. in Fl. des Series, Sér. I. iii. (1847) sub t. 260 = Hoffmannia, Sw. (Rubiac).
argyroneura. Linden, in Belg. Hortic viii. (1858) 166.—Mexic.
discolor. Hook. Bot. Mag. t. 4580 = seq.?
discolor, Lem. in Fl. des Serres, Sir. 1. iii. (1847) subt. 260 = H. discolor.
Ghirsbreghtii, Lem. Illustr. Hortic viii. (1861) t. 279 = H. Ghiesbreghtii.
pyrophylla, Linden, Cat. n. 16 (1861) 2.—Mexic.
regalis, Linden, 1. c. n. 16 (1860) ^H. regalis.

CAMPYLOCARYUM, DC. ex A. DC. in Prod. x. 97, in syn. (1846)=Alkanna, Tausch (Boragin.).
smyrnaeum, Boiss. ex A. DC. Prod. x. 98 = A. Pinardi.
syriacum, Boiss. Fl. Orient, iv. 226—A. syriaca.
syriacum, Boiss. & Hohen. ex A. DC. Prod. x. 101 = A. strigosa.
verrucosum, Boiss. ex A. DC. 1. c. 102= A. incana.

CAMPYliOCE-N'TKON, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 837. *ORCMDEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 585.
TODAROA, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 28.
Schiedei, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 292.—Mexic.

CAMPYLOCERA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. viii. (1848) 257 = Specularia, Heist. (Campanul.).
leptocarpa, Nutt. 1. c = S. leptocarpa.

CAMPYLOCHINIUM, Endl. Gen. 869 (1838) = CAMPULOCHINIUM, DC. = Eupatorium, Tourn. (Compos.).

CAMPYLONEMA, Poir. Illustr. 598 (1823); Schult. f. Syst. vii. 96,1507 (1830) = **Campynema,** Ubill. (Amaryllid.).
lineare, Schult. f. 1. c. = Campynema lineare.

CAMPYLOPTERA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1841) 34=Aethionema, R. Br. (Crudf.).
heterocarpa, Baill. Hist. PI. iii. 291 •= Ae. campylopterum.
syriaca, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xvii. (1841) 194=Ae. campylopterum.

CAMPYLOPUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. «r. II. v. (1836) 360 = Hypericum, Tourn.
cerastioides, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 412 = H. rhodopeum.

CAMPYliOSIPHON, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1384 (1882). *BURMANNIACEAE*, Benth. & Hook, f. iii. 458.
pnrpurascens, *Benth. 1. c.*—Am. austr.

CAMPYLOSIPHON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 135 = Siphooampylus, Pohl (Campanul.).
lycioideus, St. Lag. 1. c.=S. lycioides.

CAMPYLOSPORUS, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. II. v. (1836) 363 = Hypericum, Toum.
angustifolius, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 425 = H. lanceolatum.
madagascariensh, Spach, 1. c. 426 = H. madagascariense.
reticulatus, Spach, 1. c. 424 = H. lanceolatum.

CAMPYliOSTACHYS, Kunth, in Abh. Akad. Berl. (1831) 206. *VERBENACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1137.
CAMPILOSTACHYS, A. JUSS. in Orb. Diet. xii. 38 (1849).
abbreviata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 279.—Afr. austr.
cernua, *Kunth, in Abh. Akad. Berl.* (1831) 201.—Afr. austr.
cernua, Zeyh. ex DC. Prod. xii. 607 = Stilbe pinastra.
phylicoides, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 202=Stilbe phylicoides.

CAMPYLOSTACHYS, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 83 (1843) = Fimbriatylis, Vahl (Cyperac).
abbreviata, E. Mey. 1. c. = F. ferruginca.

CAMPYLOSTEMON, E-Mey. inDrège.ZweiPfl.Docum. 170 (1843), nomen=Justlcia, Linn. (Acanthac).
campanulatus, E. Mey. 1. c. (= *Leptostachya Cant' pylostemon).*—Afr. austr.
paniculatus, Nees, in DC. Prod. ix. 878=praec.

CAMPTLOSTEMON, Welw. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 998 (1862). *CELASTR/NEAE*, Benth. & Hook. f. 1. c.
angolense, *Welw. ex Oliver, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 44.—Afr. trop.

CAMPYLOTHECA, Cass. in Diet. Sc. Nat. Ii. 476 (1827) = Coreopsis, Linn. (Compos.).
angustifolia, Walp. Rep. ii. 618 = Bidens angustifolia.
australis, Less, in Linnaea, vi. (1881) 6U» = Cor. micrantha.
gracilis, Walp. Rep. ii. 618 = Bidens gradlis.
grandiflora, DC. Prod. v. 593.—Ins. Sandvic.
micrantha, Cass. in Diet. Sc Nat. lix. 321 = Cor. micrantha.
mutica, Walp. Rep. ii. 618 = Bidens mutica.

CAMPYLOTROPIS, Bunge, PI. Mongholico-Chin. 6 (1835)=Lespedeza, Michx. (Legumin.).
chinensis, Bunge, 1. c. 7 = L. macrouarpa.
cytisoides, Benth. in PI. Jungh. i. 230.—Java.
macrostyla, Lindl. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 280-L. eriocarpa.
virgata, Miq. 1. c. 230=L. virgata.

CAMPYIitTS, Lour. Fl. Cochinch. 113 (1790) (Genus dub.),
sinensis, *Lour. I. c.*—China.

CAMPYUEMA, Labill. Nov. Holl. PI. i. 93. t. 121 (1804). *AMARYLLIDEAE*, Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 716.
CAMPYLONEMA, Poir. Illustr. 598 (1823); Schult. f. Syst. vii. 96,1507 (1830).
lineare, *Labill. I. c*—Ins. Tasman.
pygmaeum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, vi. 415.—Ins. Tasman.; Austral.

CAMUNIUM, Adans. Fam. ii. 166 (1763) - **Aglala,** Lour. (Mcliac).
bengalense, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 1279 = A. **edulis.**
chinense, Roxb. Hort. Beng. 18; Fl. Ind. i. 636 = A. odorata.

CAMUTIA, Bonat. ex Steud. Nom. ed. II. i. 273 (1840) =Melampodium, Linn. (Compos.).
perfoliata, Bonat. ex Stead. 1. c. = M. perfoliatnm.

CANABIS, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 422 (1788), sphalm. »Cannabis, Tonm. (Urtic).

CANAHIA, Steud. Nom. ed. 1.146 (1821) =Kanahia, R. Br. (Asclepiad.).
laniflora, Steud. I. c.~K. laniflora.

CANALA, Pohl, PI. Bras. It ii. 62. t. 142 (1831) = Spigelia, Linn. (Loganiac).
heliotropioides, Pohl, 1. c. 63. t. 142 = S. Olfersiana.
macrophylla, Pohl, 1. c. 64 = S. macrophylla.
rubiaefolia, Pohl, 1. c. 66 = S. Schlechtendaliana.

CANALIA, F. W. Schmidt, Nene n. Selt. Pfl. 30 (17931 = Gnidia, Linn. (Thymel.).
daphnoides, F. W. Schmidt, 1. c. = G. pinifolia.

CANANGA, Anbl. PI. Gui. i. 607. t. 244 (1775) = Ouatteria, Kuiz & Fav. (1794) (Anonac).
Candolleana, Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1873) 145 - G. Candolleana.
Klottschiana, Warm. 1. c = G. Klotzschiana.
lancea, Poit. ex DC. Syst. i. 506 = G. virgata.
Ourtgon, Aubl. PI. Gni. i. 608 - G. Ouregon.
pseudolancen, Poit. ex DC. Syst. i. 507 - G. laurifolia.
Sckomburgiiana, Baill. Hist. PI. i. 204 = G. Schomburgkiana.
Sellowiana, Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1873) 144-G. Sellowiana.
villosissima. Warm. 1. c~G. villosissima.

CANANGA, Ramph. ex Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i. 129 (1855). *ANONACEAE.Bcnth.* & Hook. f. i. 24.
monosperma, *Hook. f. V Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 57.—Malacca,
odorata, *Hooi.f.* f *Thorns. Fl. Ind.* i. 180.—Burma ; Malaya.
virgata, *Hook. f. V Thorns, in Ft. Brit. Ind.* i. 67.—Malaya.

CANARIA. Linn. Mant. ii. 148 (1767) - Canarina, Linn. (Campamil.).
campanulata, Linn. 1. c. = Canarina campanulata.

CANARINA, Linn. Mant. 688 (1767). *CAMFANULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 668.
CANARIA, Linn. Mant. ii. 148 (1767).
PERNETYA, Scop. Introd. 150 (1777).
Campanula, Lam. Encyc. i. 598 -seq.
campanulata, *Linn. Mant.* ii. 225.—Ins. Canar.
laevigata, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 139 = campanulata.
moluccana, *Roxb. Hort. Beng.* 87, nomen.— Ins. Molucc.
Zanguebar, *Lour. Fl. Cochinch.* 195.—Afr. trop.

CANAR1ON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. 121 (1880)-Canarium, Rumph. (Burserac).
pimelum, St. Lag. 1. c. = Canarium Pimela.

CANARIOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. i. H. 651 (1869) = Canarium, Rumph. (Burserac).
altissima, Miq. 1. c.=Canarium altissimum.
angustifolia, Miq. 1. c. 653 = Canarium angustifolium.
aspera, Miq. 1. c. 658 = Canarium asperum.
decumana, Miq. 1. c.= Canarium decumanum.
denticulata, Miq. 1. c. 654 = Canarium denticulatum.
glabra, Miq. 1. c. 652 = Canarium balsamiferum.
hirsuta, Miq. 1. c. 653 = Canarium hirsutum.
hispida, Miq. 1. c.=Canarium hispidum.
paucijuga, Miq. 1. c.—Ins. Molucc.
villosa, Miq. 1. c. 652 = Canarium villosum.

CANARIUM, [Rumph.] Linn. Herb. Amboin. 9 (1754) (Amoen. Acad. iv. 121); Mant. 127 (1767). *BURSERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 324.
CANARIOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 651 (1859).
CENARIUM, Linn. Amoen. Acad. iv. 121, in nota (1759).
COLUPHONIA, Comm. ex Knnth, in Ann.'Sc. Nat Sêr. I. ii. (1824) 352.
MEHENBKTHENE, Besl. ex Gaertn. Frnct. ii. 98 (1788); Walp. Ann. ii. 291 (1851).

CANARIUM:—
PACHVLOBUS, G. Don, Gen. Syst. ii. 89 (1832).
PIMELA, Lour. Fl. Cochinch. 407 (1790).
SCUTINANTHE, Thwaites, in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 267. t. 8.
acutum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 113.—Borneo.
album, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 793=lnzonicum.
album, *Raeusch. Nom.* ed. III. 287; *DC. Prod.* ii. 80.—Cochinch.
altissimum, *Blume, Bijdr.* 1163.—Java.
altissimum, Koith. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 211 = Santiria laevigata.
angustifolium, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 117.—N. Guin.
asperum, *Benth. in Hook.~Zond. Journ. Bot.* ii. (1843) 215.—N. Guin.
australiamim, *F. Muell. Fragm.* iii. 16.—Austral.
Balansae, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 117.—N. Caled.
balsamiferum, Moon, Cat. 68=zeylanicum.
balsamifernm, *Willd. Sp. PI.* iv. 760.—Ins. Molucc.
Beccarii, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 107.—Borneo,
bengalense, *Roxb. Hort. Beng.* 49; *Fl. Ind.* iii. 136.—Ind. or.
Bennettii, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 119.—Burma; Malacca.
Boivini, *Engl. I. c.* 110.—Madag.
brunneum, *Bedd. Fl. Sylv.* t. 127.—Zeylan.
coccineo-bracteatum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) n. 296.—Ins. Andaman.
Colophania, Baker, Fl. Maurit. 44-mauritianum.
commune, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 791=Cumingii.
commune, *Linn. Mant.* i. 127.—Ins. Molucc.
commune, Wight & Arn. Prod. 175=zeylanicum.
Cumingii, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 182.—Ins. Philipp.
decumanum, *Gaertn. Fruct.* ii. 99.1.102.—Ins. Molucc.
denlicnlatum, *Blume, Bijdr.* 1162.—Java,
dichotomum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 648.—Sumatra,
divergens, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 143.—Borneo.
edule, *Hook.f. in Hook. Niger Fl.* 286.—Afr. trap,
euphyllum *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 295.—Ins. Andaman,
eupteron, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 648.—Sumatra,
fissistipulum, *Miq. I. c. Suppl.* 625.—Sumatra,
fragile, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 188.—Borneo,
fuscum, *Engl. I. c.* 116.—Java,
giganteum, *Engl. I. c.* 106.—Borneo.
gilvescens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 650 = Santiria rostrata.
glaucum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 219.—Sumatra,
gracile, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 140.—Ins. Philipp.
grandiflorum, *A. W. Benn. in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 583.—Malacca.
Harami, *Boj. Hort. Maurit.* 83.—Madag.
Harveyi, *Seem. Fl. Vit.* 35.—Ins. Tonga,
hirsutum, *Willd. Sp. PI.* iv. 760.—Ins. Molucc.
hirtellum, *A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 534.—Penang.
hispidum, *Blume, Bijdr.* 1163.—Java.
Horami, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 150 = Harami.
incurvatum, *Engl. 1. c.* 138.—Borneo.
Kadondon, *A. W. Benn. in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* i. 535.—Malacca.
Kipella, *Miq. Fl. Ind. Bat. i.* II. 646.—Java.
Kitenga, *Miq. 1. c.* 647.—Java.
Korthalsii, Miq. 1. c. 645 = Santiria tomentosa.
laevigatum, Miq. 1. c. 648=Santiria laevigata.
laxiflorum, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 477 = microcarpum.
laxiflorum, *Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 221.—Ins. Molucc.
laxum, *A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 635.—Malacca,
legitimum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 647.—Ins. Amboina.
littorale, *Blume, Bijdr.* 1164.—Java,
longiflorum, *Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i.* II. 647.—Ins. Molucc.
luxurians, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 146.—Ins. Philipp.
luzonicum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 651.—Ins. Philipp.

CANABITJM:—
macrophyllum, *Oliver, Fl. Trop. Afr.'i.* 827.—Afr. trop.
madagascariense, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. U1--Madag.
Mahassan, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 626.—Sumatra,
mauritianum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 217-Ins. Maurit.
Mehenbethene, *Gaertn. Fruct.* ii. 98. t. 102.—1"*-Molucc.
microcarpum, *Willd. Sp. PI.* iv. 760.—Ins. Molncc.
minutiflorum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 123.—Ins. Philipp.
molle, *Engl. 1. c.* 109.—Ins. Borbon.
moluccanum, Ulume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 216 --t-Mehenbethene.
montanum, Korth. ex Blume, 1. c. 212 = Santm« montana.
Motleyanum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 133.—^Borneo.
mnltiflorum, *Engl. 1. c.* 128.—Madag.
multipinnatum, *Llanos, Fragm.* 107.—Ins. Philipp-
nigrum, *Roxb. Hort. Beng.* 49 ; *Fl. Ind.* iii. 138.—I"5-Amboina.
nitidum, *A. W. Benn. in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i- »-Malaya.
oblongifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 646 = Sant>"» oblongifolia.
odontophyllum, *Miq. I. c. Suppl.* 525.—Sumatra,
oleiferum, *Baill. Adansonia,* x. (1871-72) 341.—Caled.
ovatum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 110.—J»Sl Philipp.
paniculatum, Benth. ex Engl. 1. c. 124 = mauritianum;
parvifolium, *A. W. Benn. in Hook./. Fl. Brit. !*«•'" 586.—Malacca,
patentinervium, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* IW-~ Sumatra.
pilosum, *A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 5"-—Malacca.
Pimela, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 545= villosum.
Pimela, Blume, Bijdr. 1162 = C. Kipella.
Pimela, *Kon. in Kon. b" Sims, Ann. Bot.* i. (I*'05, 361.—China.
Pimela, Zoll. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 12" * Zollingeri.
pruinosum, *Engl. 1. c.* 106.—Borneo.
purpurascens, *A. W.Benn. in Hook.f. Fl. Brit.* /*»•'• 532.—Malacca.
Riedelianum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 130-Ins. Celebes.
rigidum, *Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat.* i. n. 648.-Jv< Guinea.
rostratum, *Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Sat-* >• 221.—Ins. Molucc.
rostriferum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* W°" Sumatra.
rnbiginosum, *A. W. Benn. in Hooi.f. Fl. Brit.* l«d-'" 535.—Malacca.
rubiginosum, Miq. Fl. Ind. Bal. i. II. 651 = Switir* rubiginosa.
rufescens, Miq. 1. c. 650=Santiria rufescens.
rufum, *A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ••69"'' —Malacca.
rugosum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 649 - Santiria rugo*
Sajiga, Bnch.-Ham. ex Wight & Arn. Prod. «» Turpinia pomifera.
samoense, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 134.—Jns-Samoa.
Schweinfurtii, *Engl. I. c.* 145.—Afr. trop.
secundum, *A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit.* /•«•'' 582.—Malaya.
serricuspe. *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 649.—Sumatra,
serrulatum, *Miq. I.* r. 646.—Java.
simplicifolium, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. l41)-Ins. Amboina.
spectabile, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. »«• Sumatra.
strictum, *Roxb. Hort. Beng.* 49; *Ft. Ind.* iii. 138. or.
subrcpandum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* WS--" Sumatra,
subtruncatnm, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. Java.
sylvestre, *Gaertn. Fruct.* ii. 99. t. 102.—Ins. Amboina.
tomentosum, *Blume, Mus. Bot. Lugd.- Bat.* i. 219.—Malaya.
triandrum, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. «•'• Malaya.

CANARIUM :—
trifoliolatum. *Engl. in DC. Monog.*

villosum, *Benth. &• Hook.f. ex Naves, in Blanco, Fl. Philpp.* cd. III. *App.* 4d!-Ins. Phillpp.
"rgatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 650 - Santiria virgata.
vitiense, ^1. *Grayi BoL y SK Expl. Exped* j. 375.— ins. *iji.
Vriesear CddbT' *Engl., oC, M0n08, Phttn,,,* 142___Ins_
•'/*vri»Km, March, in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 58 = commune?
zeyl cum, *B* Z an.
Zollinge,'' *«««*• >» DC. MMU^. />*«,,. iv. 127.—Java.

CANAVALI, Adans. Fam. «• 325 O''v3); Thou, in Desv. Journ. Bot. (1818) 77=Caaairalia DC. (Legumin.).

CANAVALIA, DC. Mém. Lég. ix. 875; Prod. ii. 409 U825). *LEGUMINOSAE.Btnth.* & Hook. f. i. 537.
CANAVALIA, Adans. Fam. ii. 825 (1768) j Thou, in Ci.- ENTBA, Gav- ta AML Cienc„Nat_Tli_ (1804) 63. i, ^/.
ALO M113. CCHIA>Savil fa Nn0T, Giom_ Pisa, vii 1. (1824)
WENDEROTHIA, Schlecht_ in Linnaea, xii. (1888) 330.
altissima, *Macfad. Fl.Jamaie.* i. 292.-Jamaica.
Bauerii «« Endl- Prod. Fl. Norf. 91=obtusifolia.
bonariensis, i_im_ Bot_ Rg- «• "99.-Bras.
Bonquete, *Montr. in ^ m. Acad. Lyon,* x. (1860) 197. —N. Caled.
brasiliensis, Mart. ex Benth_ in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 135 = ensiformis.
cathart' *Thou. in Desv. Journ. Bot.* i. (1813) 81.— Madig.
crypto m A Meissn_ in Hook_ Lond. Journ. ... ii. (184.) 3^6 h onariensis.
cubensis, *Griseb. in Mem Am. Acad.* N. S. vlii. (1861) 178.—Cuba.
do ''«*<»«i« Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xliii. (1874) "• 185 = Vigiudolichoides.
emarg »»a/a. Ci. Don, Gen. Syst. ii. 862 = obtusifolia.
ensifo ,iis W *DC.* 4i. 404.-Cosmop. trop.
Finlaysoniana, *R.* Siam. Grak. in Wall. Cat. ... 8535.
galeata, *Gaudich. Freyc. V*°y-Bot-486.—Ins. Sandvic.
Gaudichaudii, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1886) 186 = galeata.
gladiata, DC_ Prod_ "• *04=ensiformis.
grandiflora, *Ben* ,,,,,, Attn_ Wien_ *Mus.* ii. (1838) 135. —Bras.
grandi \ ?urzin J°urn- A8- Soc- Ben&- xliii. (1874) II. 185 Poaseolusvelutinus.
incurv ^n- Prod_ U- 404=ensiformis.
incurva, Thon- "» Desv. Journ. Bot. i. (1818) 80 = lenta, Bras*''''** ,,, Ann_ Wien_ Uus_ "• (1838) 1S5.
lineata, ?*Z Prod_iL 404_= obtusifolia.
Loureiri, G•Don_Gen_sy_st_ "• 863=ensiformis.
lucens, Kurz, in / o U m -A& SoC- Bcne- xliii- C1874) ,, 185 = Vigna lucens.
machaeroides, Steud. Nom. ed. II. i. 27S=cathartica.
maritima, Thou. In Desv. Journ. Bot. i. (1813) 80 = obtusifolia.
maxima, Thou. l. c.—Ind. or.
miniata, DC. Prod- «• 404 = obtusifoHa.
mollis, Wall Cat. n. 558S=ensiformis.
moneta, Weiw. ^.0888. n. 62.—Afr. trop.
monodon, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 149 = bonariensis.
multiflora 1 Hool!_ & ATM_ Bot_Beech_v<* 418= o
ofcf-? 'Vigt. Hort. Suburb. Calc. 285 - obtusifolia.
£*°Ua, ^C- *Prod.* ii. 404.-Cosmop. trop.
=n nens.£ &nth_in A""- Wien. Mus. ii. (1888) 135
paraens, Hook_ & Am_ in Hook_ Bot_ Misc_ '"• flavfoJ. ^2 «0 = bonariensis.
parviflora, Benth_'» 'll/fl'-'- «• *Brat.* xv. I. 177.-Am. trop.

CANAVALIA :—
picta, i/ar/. «* 5««rt. in i4»«. WJ>». ^/«J. ii. (1888) 135.—Bras.
polystachya, Scbweinf. Rel. Kotsch. 25. t. 20 = ensiformis.
pubescent, Hook. «c Am. Bot. Beech. Voy. 81 = galeata.
rosea, DC. Prod. ii. 404 = obtusifolia.
rostrata, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (18)8) 185 = villosa.
mtilans, DC. Prod. ii. 404=obtusifolia.
sericea, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 440.—Ins. Fiji.
Stocksii, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 69«=ensiformis.
turgida, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5534=ensiformis.
Tillosa, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 135.—Mexic.
virosa, *Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 64.—Ins. Philipp.
virosa, Wight & Am. Prod. 253=ensiformis.

CANBTA, Parry, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 61. *PAPAVERACEAE.*
Candida, *Parry, ex A. Gray, I. c*—Calif.

CANCELLARIA, Sch. Bip. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 821 (1877)=Adelostigma, Steetz (Compos.).
senegalensis, Sch. Bip. ex Oliver, 1. c. = A. senegalensis.

CANCBXNTA, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat. Most xv. 11842) 124. *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 434.
chrysocepbala, *Kar.* b* *Kir. I. c.* 125.—As. centr.

CANDARUM, Schott, Melet. i. 17 (1832)=Amorphophollua, Blume (Aroid.).
Hooieri, Schott, 1. c. = A. campanulatus.
Roxburghii, Schott, 1. c. = A. campanulatus.
Rumphii, Schott, 1. c. = A. campanulatus.

CANDELABRIA, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 79— Bridelia, Willd. (Euphorbiac.).
micrantka, Hochst. 1. c. = B. micrantha.
polystachya, Planch, in Ann. Sc. Nat. *Sit.* IV. ii. (1854) 264 = Cleistanthus polystnchyus.

CANDIDEA, Tenore, in Atti Ace. Nap. iv. (1839) 104. t. 1, 2-Vernonia, Schreb. (Compos.).
senegalensis, Tenore, 1. c. = V. Tenoreana.

CANDJERA, Decne.in Ann. Sc.Nat. Sir. II. xix. (1843) 37, sphalm.eConqera, Juss. (Olacin.).

CANDOLLEA, Baumg. Cat. Hort. Bollw. (1810) - Menzieeia, Sm. (Ericac).
aialeoides, Baumg. 1. c. = M. globularis.

CANDOLLEA, Labill. in Ann. Mns. Par. vi. (1805) 453. t. 63 = Stylidium, Sw.
adnata, ¥. Muell. Census, 86 = S. adnata.
adpressa, F. Muell. 1. C.--S! adpressa.
alsinoides, F. Muell. 1. c. = S. alsinoides.
amoena, F. Muell. 1. c. = S. amoena.
Armeria, Labill. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 455 = S. graminifolium.
articulata, F. Muell. Census, 86=S. articulata.
assimilis, F. Muell. 1. c. = S. assimilis.
Barleei, F. Muell. 1. c.-S. Barleei.
brachyphylla, F. Muell. I. c.-=S. brachyphylla.
breviscapa, F. Muell. 1. c. = S. breviscapa.
Brunoniana, F. Muell. 1. c. = S. Brunoniana.
bulbi/era, F. Muell. 1. c. = S. bulbifera.
caespitosa, F. Muell. 1. c. = S. caespitosa.
calcarata, F. Muell. 1. c. = S. calcarata.
canaliculata, Steud. Nom. ed. II. i. 273=S. canaliculata.
capillaris, F. Muell. Census, 86 - S. capillaris.
carnosa, F. Muell. 1. c. 85*=S. camosa.
ciliata, F. Muell. 1. c. 86-S. ciliata.
corymbosa, F. Muell. 1. c.=S. corymbosa.
crassi/olia, F. Muell. 1. c.=»S. crassiCalia.
crossocephala, ¥. Muell. 1. c. 85»S. crossocephala.
debilis, F. Muell. 1. c. 86=S.debilis.
despecta, F. Muell. I. c. = S. despectà.
dichotoma, F. Muell. 1. c. = S. dichotoma.
diffusa, F. Muell. 1. a. = S. diffusa.
dispertna, F. Muell. 1. c.=S. disperma.

CANDOLLEA :—
diuroides, ¥. Muell. Census, 86 ^ Stylidium diuroides.
diversifolia, F. Muell. 1. c. = S. divcrsifolia.
eglandulosa, F. Muell. 1. c.-S. eglandulosa.
elongata, ¥. Muell. 1. c. 85=S. elongata.
emarginata, F. Muell. 1. c. 86=S. emarginata,
eriorrhiza, ¥. Muell. 1. c. = S. eriorrhiza.
falcata, ¥. Muell. 1. c. = S. falcata.
fasciculata, F. Muell. 1. c.=S. fasciculata.
filifera, ¥. Muell. 1. c. = S. filifera.
fissiloba, ¥. Muell. 1. c. = S. fissiloba.
Floodii, F. Muell. 1. c. - S. Floodii.
floribunda, ¥. Muell. 1. c. = S. floribunda.
glandulosa, ¥. Muell. 1. c. = S. glandulosa.
glauca, Labill. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 454 = S. glaucum.
graminifolia, F. Muell. Census, 85 = S. graminifolia.
guttata, F. Muell. 1. c.-S. guttata.
hirsuta, ¥. Muell. 1. c.=S. hirsuta.
imbricata, F. Muell. 1. c. 86 = S. imbricata.
juncea, F. Muell. 1. c. 85 = S. juncea.
laricifolia, F. Muell. 1. c. 86=S. laricifolia.
lepida, ¥. Muell. 1. c. = S. lepida.
leptophylla, F. Muell. 1. c.=S. leptophylla.
leptorrhiia, ¥. Muell. 1. c - S. leptorrhiza.
limbata, ¥. Muell. 1. c. = S. limbata.
linearis, F. Muell. 1. c. 85=S. linearis.
lineata, ¥. Muell. 1. c. 86 = S. lineata.
lobuliflora, ¥. Muell. 1. c.-S. lobuhflora.
longituba, F. Muell. 1. c.=S. longituba.
lutea, ¥. Muell. 1. c. = S. lutea.
musicola, ¥. Muell. L c.—S. mnsicola.
pachyrrhita, F. Muell. 1. c = S. pachyrrhiza.
pedunculata, F. Muell. 1. c. = S. pedunculate.
perpusilla, F. Muell. 1. c. = S. perpusilla.
petiolaris, ¥. Muell. 1. c.-S. petiolaris.
pilosa, Labill. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 453 =S. pilosum.
Preissii, F. MuelL Census, 86 - S. Preissii.
pubigera, ¥. Muell. 1. c. = S. pubigera.
pulchella, ¥. Muell. 1. c. =S. pulchella.
pychnostachya, ¥. Muell. 1. c.=S. pychnostachya.
pygmaea, F. Muell. 1. c. =S. pygmaea.
reduplicata, F. Muell. 1. c. 85 - S. reduplicata.
repens, F. Muell. 1. c. — S. repens.
rhyncbocarpa, F. Muell. 1. c. 8S=S. rhyncliocarpa.
rotundifolia, F. Muell. 1. c.-S. rotundifolia.
rupestris, F. Muell. 1. c.=S. rupestris.
scabrida, F. Muell. 85-S. scabrida.
scandens, F. Muell. 1. c. 86 =S. scandens.
schizantha, F. Muell. 1. c. = S. schizantha.
serrulate, Labill. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 454-S. graminifolium.
setacea, Labill. 1. c. 455 = S. spinulosum ?
sobolifera, F. Muell. Census, 86 = S. sobolifera.
spathulata, F. Muell. 1. c. = S. spathulata.
spinulosa, ¥. Muell. 1. c. 85-S. spinulosa.
squamellosa, ¥. Muell.-1. c. 86 = S. sqnamellosa.
streptocarpa, F. Muell. 1. c. = S. streptocarpa.
striata, ¥. Muell. 1. c.=S. striata.
tenerrima, ¥. Muell. 1. c. = S. tenerrima.
trichopoda, F. Muell. 1. c. = S. trichopoda.
uliginosa, F. Muell. 1. c. = S. uliginosa.
umbellata, Labill. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 456 = S. graminifolium.
uniflora, F. Muell. Census, 86-S. uniflora.
utricularioides, F. Muell. 1. c. =S. utricularioides.
verticillata, ¥. Muell. 1. c. = S. verticillata.
vialacea, ¥. Muell. 1. c.=S. violacea.

CAJSDOIIIIEA, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 38 t. 176 (1806). *D1U.ENIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 14.
assimilis, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 273 — pedunculata.
calycina, Steud. 1. c. 274=tetrandra.
cuneiformis, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 34. t. 176.—Austral.
Cunninghami, Benth. in Maund, Bot. ii. t. 85 — Hibbertia Cunninghamii.
cygnorum, *Steud. in Uhm. PI. Prriss.* i. 275.—Austral.
desmophylla, *Benth. Fl. Austral,* i. 43.—Austral.
exasperate, *Steud. in Lehm. PI. Preiss. i.* 276.—Austral.
fasciculata, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 424.—Austral.
glaberrima, *Steud. in Lehm. PI. Preiss. i.* 274.—Austral.

CANDOLLEA :—
glomerosa, *Benth. Fl. Austral,* i. 43.—Austral,
helianthemoides, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Most.* xxii. (1849) II. 8.—Austral.
Huegelii, *Benth. in Enum. PI. Hutg.* 4.—Austral.
iochioides, Turcz. in Boll. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 7 = fasciculata.
latifolia, Stend. in Lehm. PI. Preiss. i. 273-tetrandra.
pachyrrhiza, *Benth. Fl. Austral,* i. 44.—Austral.
parviflora, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 276=pedunculata.
pedunculata, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 424.—Austral.
Preissiana, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 274.—Austral.
racemosa, Endl. in Enum. PI. Hueg. 5 = pedunculata.
rupestris, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 275 = glaberrima.
striata, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 274 - Huegelii.
subvaginata, Steud. 1. c. 275-glaberrima.
teretifolia, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 6.—Austral.
tetrandra, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 40.—Austral.
tridentata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 140-pedunculata.
uncinata, *Benth. Fl. Austral,* i. 46.—Austral,
vaginata, *Benth. 1. c.* 45.—Austral.

CANDOLLEA, Steud. Nom. ed. IL i. 273 (1840) = DECANDOLIA, Bast-Agrostis, Linn. (Gramin.).

CANEIiLA, P. Br. Hist. Jamaic. 27S 127. f. 3 (1756); Sw. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 96. t 8. *CANELLACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 121.
WINTERANIA, Linn. Hort. Cliff. 488 (1737); et Syst. ed. X. (1759) 1045 (Wintirania).
alba, *Murr. Syst.* ed. XIV. 448.—Ind. occ
alba, Nees, PI. Officin. t 418 = Cinnamodendron corticosum.
axillaris, Nees & Mart, in Neuwied,' Reise nach Brasil. ii. 336 = Cinnamodendron axillare.
laurifolia, Lodd. Cat. ex Sweet, Hort. Brit. 65=alba,
obtusifolia, *Miers, in Ann.tf Mag. Nat. Hist.* Ser. III. i. (1858) 348.—Venezuela.
Winterana, Gaertn. Fruct. i. t. 77 - alba.

CANEPHOKA, Juss. Gen. 208 (1789). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 74.
axillaris, Willd. Sp. PI. i. 976-madagascariensis.
capitata, Willd. 1. c. = Burchellia capensis.
modagascariensis, *J. F. Gmel. Syst.* 372.—Madag.

CANICIDIA, Veil. Fl. Flum. 184 (1025); iv. t. 189 (1827)°Connarus, Linn.
rostrata, Veil. 11. cc. = Connaras cymosa.

CANIDIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 92 (1866) . AUiuxn, Toum. (Liliac.).
magiea, Salisb. 1. c—A. magicum.

CANIRAM, Thou, ex Steud. Nom. ed. II. i. 274 (1840) =8trychnos, linn. (Loganiac).

CANISTRUM, E. Morr. Belg. Hortic. (1878) 257. t. 15 =Aechmea, Ruiz & Pav. (Bromeliac.).
aurantiacum, E. Morr. 1. c. = A. aurantiaca.
eburneum. E. Morr. 1. c. xxix. (1879) 168. t. IS, 14.—Bras.
fuscum, E. Morr. 1. c. xxxiii. (1888) 195.—Bras.
purpureum, E. Morr. 1. c—Bras.
roseum, E. Morr. 1. c. xxix. (1879) 301.—Bras.
viride, E. Morr. ex Ch. Morr. 1. c. xxiv. (1874) 376. t 16-A.viridis.

CANKRIENIA, De Vriese, in Jaarb. Nederl. Maatsch. Tuinb. (1850) = Primula, Toum.
chrysantha, De Vriese, 1. c 30—P. imperialis.
farinosa, Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 59.—Java.

CANNA, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 1 (1737). *SCITAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 654.
ACHIRIDA, Horan. Prod. Scitam. 18. t. 2 (1862).
CANNACORUS, Toum. ex Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 378.
DISTEMON, Bouche, in Linnaea, xviii. (1844) 494.
EURYSTYLUS, Bouche, 1. c. (1844) 486.

CANNA:—
KATUBALA, Adans. Fam. ii. 67 (1763).
XYPHOSTYLIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 52 (1886).
Achiras, *Gill, in Bot. Reg.* t 1358.—Chili.
Altensteinii, *Bouchl, in Linnaea,* xi. (1837) 326.—Am. austr.
angustifolia, *Linn. Sp. PI.* 1.—Bras.
angustifolia, Walt. Fl. Carol. 59-flaccida.
aurantiaca. Rose. Scit. t. 21-lutea.
aurantiaca x, *Tineo, ex Tod. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xi. (1859)377.—Hab.?
aurea, *Hort. ex Horan. Prod. Scitam.* 18, nomen.—Hab.?
aurewittata, Lodd. Bot. Cab. t. 449-limbata.
barbadica, Hort. ex Bouché, in Linnaea, viii. (1833) 146 = occidentalis.
bidentata, *Bertol. in Mem. Ace. Sc. Bolog.* x. (1859) 88.—Afr. trop.
bifida, Herb, ex Roem. & Schult. Syst. i. Add. I. 69 = speciosa.
brasiliensis, Hort. Vind. ex Bouché, in Linnaea, xii. (1838) 148 = Jacquini.
brasiliensis, *Rose, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 6.—Bras.
Buekii, Weinm. in Syll. Ratisb. i. (1824) 119 ; Flora, yii. (1824) 10=pedunculate,
caripensis, *Hort. ex Horan. Prod. Scitam.* 18, nomen.—Hab.?
carnea, *Rose. Scit.* 1.15.—Bras.
chinensis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 170-orientalis.
cinnabarina, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 490.—Mexic.
coccinea, Link, Enum. Hort. Berol. i. 1=patens,
coccinea, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 3.—Ind. or.
commutata, Bouchi, in Linnaea, viii. (1833) 147 — lutea.
compacta, Hort ex Bouchi, 1. c. 145=occidentals,
compacta, *Rose. Scit.* t. 22.—Hab. ?
concinna, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 491.—Am. trop.
crocea, *Lag. ex Reichb. Hort. Bot.* t. 148.—Hab. t
crocea, Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 11 = patens,
enrviflora, *Hort. ex Horan. Prod. Scitam.* 18.—Am. centr.
deniifolia, *Bouché, in Linnaea,* xviii. (1844) 489.—China.
denudata, *Rose. Scit.* t. 23.—Bras,
discolor, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1231.—Ins. Trinitat.
edulis, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* ix. t. 775.—Am. trop.
Ehrenbergii, *Bouchi, in Linnaea,* viii. (1833) 150.—Ins. S. Thomas.
elegans, Rafin. Fl. Ludov. 143 = flaocida?
ellipticifolia. Stokes, Bot Mat Med. i. 2-indica.
esculenta, Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit. 1=edulis.
excelsa, *Lodd. Bot. Cab.* n. 748*.—Bras,
exigua, *Bouché, in Linnaea,* xviii. (1844) 490.—Nepal.
eximia, *Hort. ex Horan. Prod. Scitam.* 18.—Bras.
Fintelmanni, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 487.—Hab.?
flaccida, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 339.—Am. bor.
flava, Michx. ex Lam. in Joum. Nat. Hist. Par. i. (1792) 416 = flaccida.
flavescens, *Link, Handb.* i. 226.—Ind. or.
floribunda, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 489.—Hab.?
fonnosa, *Bouchi, 1. c.* 491.—Bras,
fulgida, *Bouché, I. c.* 490.—Ins. S. Barthol.
gemella, Nees & Mart, in Nov. Act Nat Cur. xi. (1823) 22=gigantea.
gigantea, *Desf. Tabl. Hort. Par.* ed. I. 82.—Bras,
glauca, *Linn. Sp. PL* 1.—Ind. occ.; Mexic
glauca,; Walt. Fl. Carol. 59 = flaccida.
heliconiaefolia, *Hort. Berol. ex Bouchi, in Linnaea,* viii. (1838) 164.—Mexic.
humilis, *Bouchi, 1. c.* 153.—China.
indiea, Curt. Bot. Mag. t. 454-patens.
indica, [DC. in] Red. Liliac. t. 201 - speciosa.
indiea, *Linn. Sp. PI.* 1.—Cosmop. trop.
indica, Rose, in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 338-oricntalis.
indica, Ruiz & Pav. Fl. Per. (1820) i. 1-edulis.
iridiflora, *RUTB (f Pav. 1. c.*—Perov.
iridiflora, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 1= gigantea.

CANNA:—
Jacquini, *Bouchi, in Linnaea,* xii. (1838) 148.—Bras.
juncea, *Retz. Obs.* fasc. i. 9.—China,
laeta, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 489.—Hab. ?
lagunensis, Lindl. Bot. Reg. t. 1311 = lutea.
Lamberti, *Lindl. 1. c.* t 470.—Ind. occ.; Guiana,
lanceolata, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 1.—Bras,
lanuginosa, *Rose. Scit.* 1.16.—Am. trop.
latifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—Am. bor.
latifolia, Rose. Scit. t. 4 = gigantea.
leptochila, *Bouchi, in Linnaea,* viii. (1833) 152.—Hab.?
leucocarpa, *Bouchi, I. c.* xviii. (1844) 498.—Am. austr.
liliiflora, *Warscew. ex Planch, in Fl. des Serres, Sit.* I. x. (1854-55) 211.—Am. centr.
limbata, *Rose. Scit.* t. 9.—Bras.
Linkii, *Bouchè, in Linnaea,* viii. (1838) 166.—Bras.
liturata. Link, ex A. Dietr. Sp. PI. i. 12 = glauca.
longifolia, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 386.—Mexic.
lutea, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 4.—Am. trop.
macrocarpa, *Hort. ex Horan. Prod. Scitam.* nomen.—Am. trop.
macrophylla, *Hort. ex Horan. 1. c.*—Am. trop.
maculata, *Link, Handb.* i. 227.—Am. trop.
maxima, Lodd. ex Kosc. Scit. t. 2-Lamberti.
mexicana, A. Dietr. Sp. PI. i. 11 =glauca.
miniata, *Bouchi, in Linnaea,* viii. (1833) 165—Bras.
montana, *Blume, Enum. PI. Jav.* 35.—Java.
Moritziana, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 492.—Venezuela.
napalensis. Wall. Cat. n. 6622 = indica.
neglecta, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 274* lanuginosa.
neglecta, Weinm. in Flora, iii. (1820) 607 = gigantea.
nepalensis, Hort PaT. ex D. Dietr. Syn. PI. i. 4=indica.
nudata, *Lodd. Cat. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 274.-Hab.?
occidentals, *Rose, in Bot. Reg.* t. 772.—Ind. occ.
orientalis, Bouchi, in Linnaea, viii. (1833) 152 pulchra.
orientalis, *Rose. Scit.* t. 12.—Ind. or.
Ottonis, *Bouchi, ex Heynh. Nom.* ii. 116, nomen.—Venezuela,
ovata, *Hort. ex Horan. Prod. Scitam.* 18, nomen.—Hab.?
pallida, Rose. Scit. t. 19 = lutea.
paniculata, *Ruia (f Pav. /Z. Per.* i. 1.—Peruv.
patens, Hook. Exot. Fl. t. 228 = limbata.
patens, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 333.—Hab.?
pedicellata, *Presl, Reliq. Haeni.* 106.—Chili,
pedunculata, *Sims, Bot. Mag.* t. 2328.—Am. trop.
pentaphylla, D. Dietr. Syn. PI. i. 5=platyphylla.
petiolata, *Wall, ex Horan. Prod. Scitam.* 17, noDien--Hab.?
platyphylla, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 22.—Bias.
Poeppigii, *Bouchi, in Linnaea,* xii. (1838) 143.—Bras,
polyclada, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1863) 7.—Bras,
polymorpha, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 1; *Bouchi, in Linnaea,* viii. (1833) 151.—Am. austr.
portoricensis,;ffoKrW, *I.e.* xii. (1838) 147.—Porto Ric°-
pruinosa, *Hoffmgg. Vert. Pft. Nachtr.* ii. 79.—Bras,
pulchra, *Bouchi, ex Horan. Prod. Scitam.* 16.—Ind. *OT.*
pulchra, *Hassk. Cat. Bogor. Alt.* 62; *et PI. J*>-Rar.* i. 140.—Java,
recurvata, *Bouchi, in Linnaea,* xviii. (1844) 488.—Hab. ?
reflexa, Nees, ex D. Dietr. Syn. PI. i. 4-pedunculata.
Reevesii, *Lindl. Bot. Reg.* t. 2004.—China.
Roscoeana, *Hort. Berol. ex Bouchi, in Linnaea,* (1888) 146.—Am. trop.
rotundifoliax, E. Andre, in Rev. Hortic. (1862) 371-
rubra, Willd. in Gcs. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 169 = coccinea.
rubricaulis, Link, Enum. Hort. Berol. i. 1= edulis.
sanguinea, Hort. Angl. ex Bouchi, in Linnaea, (1833) 154= speciosa.
sanguinea, Warsz. ex Otto & Dietr. Allg. Gartenzxix. (1851) 290-Warszewiczii.
saturate-rubra, *Bouchi, ex C. Koch, Allg. Garten'-* (1858)386.—Hab.?

CANNA:—
indica, Linn. Sp. PL 1.—W.-AM. centr.; Himal. bor.
iridiflora, Hook. f. Bot. Mag. t. 7266.—Peru.
lutea, Ruiz & Pav. Fl. Peruv. iii. 69, t. 307, f. 1 (1802).—Peru.
orientalis, Roscoe, Mon. Scit. 18.—Venemela.
pallida, Lodd. Bot. Cab. t. 1222.—Bras.
speciosa, Herb, ex Sims, Bot. Mag. t. 2817=coccinea.
speciosa, Rose. Scit. t. 17-indica.
spectabilis, Hab.?
tolonifera, [Hort. Berol. «] A. Dietr. Syn. PI. i. 11.
triste, Reg-Argent.
umbrosa, Bouchi, in Linnaea, viii. (1838) 150.—Ind. occ.
variegata, Bouché, Hab.?
ventricosa, Bouché, Hab.?
violacea, Bouché, l. c. xii. (1838) 146.—Hab.»
vitellina, Hort. ex Horan. Prod. Scitam. 18.
Warscewiczii, Dietr. Allg. Gartens.
xalapensis, Moench, Meth. 863 = D. Cannabina.

CANNABINA:—
sativa, Linn. Sp. PL 1027.—W.-AM. centr.; Himal. bor.

CANNACORUM, Palat. ex Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 378 = Canna, Linn. (Seitamin.).
indicus, Medic.
ovatus, Moench, Metb. 526=Canna indica.

CANNELLA, Schott, ex Meisn. in DC. Prodr. XV. 108, in syn. (1864) = Ocotea Aubl. (Lauin.).
Sassafras, Schott, 1. c. = O. indecora.

CANNOMOIS, Beauv. Desv. in Ann. Sc. Nat. Sir. iii. (1828) 42. t. = RESTIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1040.
CUCULLIFERA, W.
Introd. Nat. Sel. ed. IE 451 (1836).
Cephalotes, Beauv. = MESANTHUS, Nees, in Lindl. Flora, (1845) 340 = C. robustus, Hochst. in f.-Afr. austr.
Cephalotes, scirpoides, Hochst. l. c.; in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 236.—Afr. austr.
simplex, A. Rich. Enum. PI. iii. 448—Afr. amtr.
strictus, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 340 = simplex?
Hochst. l. c. = C. Cephalotes.

CANONANTHUS, G. Don, Gm. S. Hi. 718 (1834) = Siphocampylus, Pohl (Campiutac).
campanulatus, G. Don, 1. c. 719 = S. campanulatus.

CANOLIS, Gl. Don, Gen. Syst. iv. (1887), = Conopholis, Wallr. (Orobanch.).

CANOPUS. Presl, Epim. Bot 248 (1849)=Exocarpus, Labill. (Santalac.).
lunnenns, Presl, 1. c. = E. latifolius.

CANSCHI, Adans. Fam. ii. 443 (1768) = Trewia, Linn. (lHuphorb.).

CANOTHUS, Rafin. in Med. Repos. New York, v. (1808) 860 = CeanothuB, Linn. (Khamn.).

CANOTIA, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 68 (1856). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 164, 616.
holacantha, *Torr. I. e.*—Galif.

CANSCORA, Lam. Encyc. i. 601 (1783). *GENTIANEAE*, Bcnth. & Hook. f. ii. 811.
COMBAMBA, Blanco, Fl. Filip. 610 (1837).
FLEMINGiA, Roxb. ex Stead. Nom. ed. II. 1. 643 (1840).
HETEROCANSCORA, C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 431.
ORTHOSTEMON, R. Br. Prod. 451 (M10).
PHVLLOCYCLUS, Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xlii. (1878) II. 235.
PLADERA, Soland. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 400 (1832).
POOTIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 37 (1818).
alata, Wall. Cat. n. 4368 = perfoliata.
andrographioides, *Griff, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (18-75) 431.—Reg. Himal.; Burma,
concanensis, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 104.—Ind. or.
decurrens, *Dalz. in Hook. Ken Journ.* ii. (1850) 136.—Ind. or.
decussata, *Schult. Mant.* iii. 229.—Ind. or.; Afr. trap,
diflusa, *K. Br. Prod.* 451.—Geront. trop.
diffusa, Wall. Cat. n. 4361 K = andrographioides.
divaricata, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 108 = decurrens.
foliosa, D. Don, in G. Don, Gen. Syst. iv. 199 = diffusa!
grandiflora, Wight, Ic. iv. t. 1326=perfoliata.
Helferiana, *Wall, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 432.—Burma,
justicioides, *Griff, ex Voigi, Hort. Suburb. Calc.* 620.—Ind. or.
lancifolia, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. *f.* Fl. Brit Ind. iv. 103 = pauciflora.
Lauri, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 430 = pauciflora.
Lavii, Wight, Ic. iv. t. 1327=diffusa.
macrocalyx, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 104=perfoliata.
macrocalyx, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 558.—Java.
Parishii, *Hook./. Bot. Mag.* t. 5429.—Burma,
pauciflora, *Dal*, in Hook. Kern Journ.* ii. (1860) 136.—Ind. or.
perfoliata, *Lam. Encyc.* i. 601.—Ind. or.
perfoliata, Wall. Cat. n. 4865 = Wallichii.
pusilla, Roem. & Schult. Syst. iii. 301 => Hoppea dichotoma.
Roxburghii, *Am. ex Miq. Anal. Bot. Ind.* iii. 11.—Ind. or.
Schultesii, *Wall. Cat.* n. 4368.—Burma,
sessiliflora, *Schult. Mant.* iii. 230.—Ind. or.
tenella, Wall. Cat. n. 4362; Wight, Ic. t. 1327 = diffusa.
ventricosa, J. F. Gmel. Syst. 262=perfoliata.
Wallichii, C. *B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 105.—Ind. or.

CANSENIA, Rafin. Sylva Tellur. 122 (1838) = Bauhlnia, Linn. (Legumin).
angulosa, Rafin. 1. c.-B. angulosa.
tomentosa, Rafin. 1. c = B. tomentosa.

CANBJERA, Joss. Gen. 448 (1789). *OLACWEAE*, Benth. & Hook. f. i. 349.
OCTOPUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836).
grossularioides, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 73.—Ins. Philipp.
lanceolata, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 491 = Rheedii.
leptostachya, *Benth. 1. c.* ii. (1843) 231.—Austral.
madagascariensis, Spreng. Syst. i. 453 = Potameia Thouarsii.
malabarica, Lam. Encyc. iii. 433—Rheedii.
manillana, *Blume, Afus. Bot. Lugd. Bat.* i. 246.—Ins. Philipp.

CAN&TERA:—
martabanica, Wall. Cat. n. 7266 = Rheedii.
monostackya, M. Rocm. Syn. Hcsper. 16 = Rheedii.
parvifolia, *Kuru, in Journ. As. Soc. Beng.* xii. (1872) ii. 298.—Burma.
pentandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 73 = Antidesma Cumingii.
pentandra. Naves, ex Villar,. in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 190 = Antidesma Ghesaembilla.
polystackya, M. Roem. Syn. Hesper. 144 = Rheedii.
Rheedii, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 73 = Antidesma Ghaesetnbilla.
Rheedii, *J. F. Gmel. Syst. i.* 280.—As. et Austral. trop.
Rheedii, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 190 = Antidesma Cumingiana.
scandens, Roxb. PI. Corom. ii. [2]. t. 103 =- Kheedii.
timorensis, *Oecne. Bot. Vinus*, 12. t. 4.—Ins. Timor.
aiayphifolia, Griff, in. Calc. Joum. Nat. Hist. iv. (1844) 236 = Rheedii.

CANTALEA, Rafin. Sylva Tellur. 54 (1838)=Lycium, Linn. (Solanac).

CANTHAROSPERMUM, Wight & Am. Prod. 255 (1834)=Atylosia, Wight & Am. (Legumin.).
albicans, Wight & Am. 1. c. 256 = A. albicans.
calycinum, Miq. Anal. Bot. Ind. i. 8.—Borneo.
distans, Royle, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 216=A. platycarpa.
nervosum, Royle, ex Baker, 1. c. = A. scarabaeuides.
pauciflorum, Wight & Am. Prod. 255 = A. scarabaeoides.
scarabeoideum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 38 4 = A. scarabaeoides.

CANTHIOPSIS, Seem. Fl. Vit. 166. t. 46 (1865-73)* Bandia, Linn. (Kubiac).
odorata. Seem. 1. c.—Ins. Fiji.

CANTHIUM, Lam. Encyc. i. 602 (1783) - Flectronia, Linn. (Rubiac.).
acuminatum, D. Dietr. Syn. PI. i. 779=P. acuminata.
acutiflorum, Hiero, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 136.—Afr. trop.
Afaelianum, Hiem, 1. c. 142.—Afr. trop.
angulosum, Wall. Cat. n. 8285 = Randia longiflora.
angustifolium, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 533 = P. angustifolia.
anomocarpum, DC. Prod. iv. 475.—Guiana.
anonaefolium, Webb, in Hook. Kew Joum. ii. (1850; 370.—Ins. Cap. Verd.
approximatum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 234.—Borneo.
arboreum, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 181.—Ins. Philipp.
attenuatum, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, iii. 421.—Austral.
Balansae, Baill. Adansonia, xii. (1878) 184.—X. Caled.
harbatum, Seem. Fl. Vit. 132.—Ins. Societ
Barteri, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 143.-Afr. trop.
Beecheyi, Steud. Nom. ed. II. i. 275.—Ins. Societ.
Benthamianum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 190 = Vangueria canthoides.
bibracteatum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 145 = P. bibracteatum.
Billardieri, 1). Dietr. Syn. PI. i. 779 = Coprosma Billardieri.
Breoni, Baill. Adansonia, xii. (1878) 221.—Madag.
buxifolium, Benth. Fl. Austral iii. 422 = *V.* buxifolia.
campanulatum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 152 = P. campanulatum,
cardiocarpum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 185.-N. Caled.
caudatiflorum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 137.—Afr. trop.
celastroides, Baill. Adansonia, xii. (1878) 190 >. P. celastroides.
chinense, Pers. Syn. i. 200 ~ Randia dumetorum.
con/rrtum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 285.—Borneo.
congense, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 141.—Afr. trop.
coprosmoides, F. Muell. Fragm. ii. \Zi = *vaccinifolium*.

CANTH1UM :—
Cornelia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 14.—Afr. trop.
cornelianum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 121=praec.
corona turn, Lam. Encyc. i. 602 = Randia dumetomm.
corymbosum, D. Dietr. Syn. Ft. i. 779"P. ventosa, Celastrus Plectronia.
corymbosum, Pers. Syn. i. 200 = Webera corymbosa.
crassum, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 146.—Afr. trop.
eymosum, Pers. Syn. i. 200 = P. didyma.
Deplanchei, Baill. Adansonia, xii. (1878) 183,186-Cyclophyl'tum Deplanchei.
didymum, Gaertn. f. Fruct. iii. 94. t. 196-P. didyma.
discolor, Baill. Adansonia, xii. (1878) 191=Vangueria lasiantha.
discolor, Benth. in Hook. Niger Fl. 409.—Afr. trop.
dubium, Lindl. Bot. Reg. t. 1026 - Diplospora viridiflora.
rdule, Baill. Adansonia, xii. (1878) 191=Vangueria edulis.
ellipticum, Hochst. ex Delile, in Fen. & Galin. Voy. Abyss, iii. 136 - Feretia apodanthera.
erythroxyloides, Baill. Adansonia, xii. (1878) 220.—Madag.
nonymoides, Baill. I. c. 189=Vangneria euonymoides.
fasciculatum, Blume, Bijdr. 967—Java.
ficiforme, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 183.—Ind. or.
flavidum, Seem. Fl. Vit. 132.—Ins. Fiji.
Jloribundum, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 389, nomen.—Hab. *1*
foetidum, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 142.—Afr. trop.
fraternum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 253.—Malaya.
furcatum, Miq. 1. c. 252.—Malaya.
Gaertneri, Steud. Nom. ed. II. i. 275 = Damnacanthns indicus.
glabriflorum, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 140.—Afr. trop.
glabrum, Blume, Bijdr. 967 = P. glabra.
glaucum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 184.—Afr. trop.
gtomeratum, C.B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 565 (sphalm. *glomerulatum)* = seq.
glomerulatum, Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl. 545 = *confertum.*
gracile, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 139.—Afr. trop.
gracilipes, Kurz, injourn. As. Soc. Beng. xii. (1872) II. 314 = P. gracilipes.
Guenzii, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 54.—Natal.
Gvnochthodes, Baill. Adansonia, xii. (1878) 199.—Ins. 'Philipp.
hebecladum, DC. Prod. iv. 474.—Ins. Luzon.
Henrietta,* Baill. Adansonia, xii. (1878) 186.—N. Caled.
Heudelotii, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 139.—Afr. trop.
hispidum, Benth. in Hook. Niger Fl. i. 409.—Afr. trop.
horizontale, Benth. 1. c. 408 =*AfzeIianum.*
horiaontale, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 137.—Afr. trop.
horridum, Benth. Fl. Hongk. 159 = P. parvifolia.
horridum, Blume, Bijdr. 966 = P. horrida.
indicum, D. Dietr. Syn. PI. i. 779 = Damnacanthns indicus.
infaustum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 191 = Vangueria infausta.
Korthalsianum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 252.—Sumatra.
laeve, Tcijsm. *8c* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 32.—Ins. Banca.
lagoSnsc, Baill. Adansonia, xii. (1878) 190—Vangueria euonymoides ?
lamprophyllum, F. Muell. Fragm. ii. *I33=lucidum.*
lanceolatum, Am. in Nov. Act. Nat. Car. xviii. (183B) 842 = P. didyma.
lanciflorum, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 146.—Afr. trop.
lasianthoides, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 253.—Java.
lati/olium, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, iii. 421.—Austral.
Leschenaultii, Wight & Am. Prod. 426 = P. angustifoliä.
leucophloeum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 191-Kadogia leucophloea.

CANTHIUM :—
lividum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 144.—Afr. trop.
lucidulum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 254 = Plectronia didyma.
lucidum, R. Br. in Salt, Abyss. App. lxii.—Abyssin.
lucidum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 65 = Beecheyi.
lucidum, Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 132 = P. umbellata t
lycioides, A. Rich, in Me'm. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 188.—Ins. Philipp.
macrocalyx, Baill. Adansonia, xii. (1878) 191-Vangueria macrocalyx.
macrocarpum, Boiv. ex Baill. 1. c. 226 =*pallens.*
macrocarpum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 152 = P. macrocarpa.
Mannii, Hiera, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 143.—Afr. trop.
micropkyllum,¥. Muell.Fragm. ii. 134=*vaccinifolium.*
mite, Bartl. in DC. Prod. iv. 474.—Ins. Luzon.
moluccanum, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 586.—Ins. Molucc.
mombtuense, Baill. Adansonia, xii. (1878) 188.—Afr. trop.
monoflorum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 166 = *pedunculare.*
montanum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 152.—Zeylan.
multiflorum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 144.—Afr. trop.
Mundtianum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (182!)) 131 = P. Mundtiana.
neglectum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 135.—Afr. trop.
neilgherrense, Wight, Ic. 1.1064 Ais=»P. neilgherrensis.
nervosum, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 143.—Afr. trop.
nit ens, DC. Prod. iv. 474.—Ind. or.
nitens, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 185.—Afr. trop.
obovatum, Klotzsch, in Eckl. & Zeyh. Enum. 861.—Afr. austr.
odoratum, Seem. Fl. Vit. 132.—Ins. Fiji.
oleifolium. Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austr. 397.—Austral.
oligocarpum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 138.—Afr. trop.
pollens, Baill. Adansonia, xii. (1878) 226.—Ins. Nossibe.
Pancheri, Baill. 1. c. 186.—N. Caled.
parviflorum, Bartl. ex DC. Prod. iv. 474 =*hebecladum.*
parviflorum, Lam. Encyc. i. 602 = P. parviSora.
parviflorum, Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 111-Randia malabarica.
parvi/olium, Baill. Adansonia, xii. (1878) 191 = Vangueria parvifolia.
parvi/olium, Roxb. Hort. Beng. 15 ; Fl. Ind. i. 534 = P. parvifolia.
pauciflorum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 189 = P. pauci flora.
pauciflorum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 165=P. horrida.
pedunculare, Cav. Ic. v. 21. t. 486.—Ins. Philipp.
Pervilleanum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 197.—Madag.
phyllanthoideum, Baill. 1. c. 220.—Afr. trop.
polyanthum, Miq. Fl.Ind. Bat. Suppl. 545.—Sumatra.
polycarpum, Schweinf. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 139.—Afr. trop.
puberulum, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 134.—Zeylan.
pyrifolium, Klotzsch, ex Eckl. & Zeyh. Enum. 861.—Afr. austr.
quadrifidum, Labill. Nov. Holl. PI. i. 69 = Coprosma Billardieri.
recurvum, Wall. Cat. n. 8284 = Randia malabarica.
Rheedii, DC. Prod. iv. 474 = P. Rheedii.
rubens, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 142.—Afr. trop.
ruminatum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 200.—Afr. trop.
sagittatum, Baill. 1. c. 184.—N. Caled.
scandens, Blume, Bijdr. 966.—Java.
Schimperianum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 850-P. Schimperi.
senegalense, A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat Par. v. (1834) 188 = P. hirsnta.
sessilifolium, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 39.—Ins. Fiji.

CANTHIUM:—
setiflorum, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 184.-Afr. trop.
setosum, Hiem, 1. c. 141.—Afr. trop.
spirostylum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 251—Sumatra.
subcordatum, DC. Prod. iv. 473.—Afr. trop.
sumatranum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 254.—Sumatra.
tetraphyllum, Baill. Adansonia, xii. (1878) 192' Vangueria tetraphylla.
Xkonningii, Benth. in Hook. Niger Fl. 410.—Afr. trop.
Thunbergianum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv-(1829) 130 - Wendlandia thyrsoidca.
thyrsoideum, Roem. *8c* Schult Syst. vi. 207 = Wendlandia Notoniana.
tomentosum, D. Dietr. Syn. PI. i. 779 (= *Gynopach.it tomentosd).*—Malaya.
travancoricum, Bedd. Ic. PI. Iud. Or. t. 239 -? • travancorica.
triacanthum, Webb, in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 871.—Ins. Cap.Verd.
umbellatum, Wight, Ic. t. 1034; Spicil. Neilgh. L 81. t. 97 = P. umbellata.
umbelligerum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat iv. 262.—Borneo.
umbellulatum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. "• (1851) 235.—Borneo.
undulatum. Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 198-P. didyma.
vaccinii/olium, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. »>• (1859) 47.—Austral.
vanguerioides, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 1*'-—Afr. trop.
Vatkeanum, Hiern, 1. c. 136.—Afr. trop.
venosum, Hiern, 1. c. 144.—Afr. trop.
venulosum, Boiv. ex Baill. Adansonia, xii. (1878) 221.—Ins. Comor.
Vieillardi, Baill. 1. c. 185.—N. Caled.
Villarii, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 182.—to* Philipp.
violaceum, Zoll. *8c* Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 64.—Java.
viridiflorum, D. Dietr. Syn. PI. i. 7S0 = Diplospora virr diflora.
laneibaricum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 291-P. zanzibarica.
einypliinum, Wall. Cat. n. 8288 A, C-P. horrida.

CANTHOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 256 (1866). *RUBIACEAE,* Benth. *Be* Hook. f. ii. 118.
pubiflora, *Miq. 1. c.* 257.—Ins. Timor.

CANTT7A, Juss. Gen. 136 (1789). *POLEMONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 824.
PERIPHRAGMOS, Ruiz & Pav. Prod. 26. t. 24 (1794)-
aggregata, Pursli, Fl. Am. Sept. i. 147-Cilia aggregate.
bicolor, *Lem.in Fl. des Serres,* Ser. I. iii. (1847) 2*[2], verso.—Bolivia.
breviflora, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) 119 = Gilia laciniata.
brevifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 275 =praec.
buxil'olia, *Lam. Encyc.* i. 603.—Peruv.
caerulea, Poir. Encyc. Suppl. ii. 80 = Loeselia caeru»e»-
cocdnea, Poir. 1. c. = Loeselia coccinea.
cordata, *fuss, in Ann. Mus. Par.* iii. (1804) 119.-Peruv.
coronopifolia, Willl Sp. PI. i. 879-Gilia coronopifol"i-
cuneifolin, *Juss. ex Roem. (f Schult. Syst.* iv. 869.—Hab.?
dependent, Pers. Syn. i. 187=buxifolia.
elegans, Poir. Encyc. Suppl.ii. 80-Gilia coronopifo"J'
fasciculata, Humb. ex Kocm. & Schult. Syst. iv. S*[9] = Fouquiera spiaosa.
flexuosa, Pers. Syn. i. 187 = pyrifulia.
floridana, Nutt. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I- !•• -Gilia coronopifolia.
foetida, l'ers. Syn. i. 187--Vestia lycioides.
glandulosa, Poir. Encyc. Suppl. il. 80«=Loese»» glandulosa.
glomcriflora, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) H[9] *° Collomia Cavanillesiana.
glutinosa, *Presl, Epim. Bot.* 213.—Chili.
Hoitaia, Willd. Sp. PI. i. 878 = Loeselia coccinea.
laciniata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 81 = Gilia laciniata.
ligustrifolia, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) I"** Vestia lycioides.

CANTUA :~
lo»giflora, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1828) 221
loxensis, V.lld' ex Roem- * Schult Systg iv> 369= pyrifolia.
megapotamica, *Spreng. Syst.* **iv.** *Cur. Post.* **64 (quid?).** —Bras.
ovata, Co«. /f. iv. 43.—Peruv,
pa™flora, Pursh, Fl. Am.Sept. ii. 780 - GilU parviflora.
*£??& J. F_ Gmcl_ Svst_ 3 « -pyrifolia.
^tfida, L'am. Illustr. i. 473 = Gilia coronopifolia.
Gilia pnngens.
pyrifol *uss. in Ann. Mus. Par.* **iii. (1804) 117.—** Peru.
quercifolia, *Fuss. l. c.* **118.—Peruv.**
theaefolia, *D. Don Edinb. Phil. Journ.* **(Apl.-Oct. 1823) 289.—P.**
thyrsoidea, Jnss- in Ann. Mus. Par. iii. (1804) 119 = Gilia coronopifolia.
tomentosa, Ic iv. 43=buxifolia.
tuberosa, Roem. & Sdlult Syst_ iv- 793=Ipomoeil muricata.
uniflora, Pers. Syn. i. 187 = ovata.

CANTUFFA, J. F. Gmel. Syst. 677 (1791)=Pterolobium, R. Br. (Legumin.).
exosa, J. F. Gmel. l. c. = P. lacerans.

CAOUTCHOUA, J. F. Gmel. Syst. 1007 (1791) = Hevea, Aubl. (Euphorbiac.).
elastica, J. F. Gmel. l. c. = H. guianensis.

CAPANEA, Decne in Van Houtte, Fl. des Serres, t. 499 (1850) = Campanea, Decne. (Gesnerac.).

CAPANEMIA, Rodrig. Orch. No V_ i- 1 W **(1877).**
ORCHIDEAE.
carinata, Rodrig. l. c. **ii. 248.—Bras.**
mi omera, Rod, ?. '•f-'• "S-"!".
Th Saiae, Rodr, '• '• ". 244.-Bras.
osa, Rodrig. I. c. i. 187._Bras.
«Hgin

CAPASSA, Klotzsch in Peters Reise Mossamb. Bot. 27. t. 5 (1861) = Zornia ch0carpUs> Humb_ & Bonpl. (Legumin.).
violacea, Klotzsch, l. c. 28 = L. violaceus.

CAPELLENIA, iff ssk> Cit Hort Bo e- - Alt 17 « (1844) -
CAPELL U Mume=**Wormia,** Rottb. (Dilleniac).
CAPELLE ^IAV Te,jsni_ & Binn_ in Tijdschr., Nederl. Ind. xxi. (1666J 239 = End08permum, Benth. (Enpliorb). p
Wo/ «««»a, Teijsm. & Binn. 1. c-Ins. Molncc.
CA LLIA, Blum idr_ 6 (1825)='Wron«»*».. Rottb- illeniac.).
biflora, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 15. t. 1 = W. biflora.
membranifolia, A- Gray, 1. c. 17 - W. membranifolia.
multiflora, Blume, Bijdr. 5.—Java.
pauciflora, Zoll. & Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 35.—Java.

CAPERONIA, St. **24).**
EUPHORBIACEA
ANDROPHo MW«w, Karst. in C. Koch & Fint. Wochenschr. (18505 s.
CAVANILLA, V *k* rt Flum. 226 (1825).
LEPIDOCOCCA, Zurc- BUII. SC N **st. Mosc. xxi. (1848) 1. 588.**
METERAN
acalyphif c i u, * 1 ^- Sylva T **65 1838** C)
—Reg. A- *G0eit, Abh* **(1879) 68-**
aculeolata, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) **152.—Bras.**
angustissima, *Mot*sc>, *in Hoot. Lend. Journ. Bot.* **ii. (1848) 5** J. Cmat a.
brtieW Bras. " Ar & *in Uart* - &• *Bras,* **xl ii. 325.—**
c riacea, *Muell. Ar*•.- '• 82O.-Bras.
c aefolia, Miq. in Linnae (1848) **478 = corchoroides.**
castaneaefolia, *St. Hil. Pl. Rem. Bras.* **245.—Java.**
corcho 15 **(1865-66)**
co,d &, *St. mi. PI. Rem. BraSt* **245.—Bras.**

CAPBBONIA .—
Gardneri, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **xi. II. 821.** —Bras,
heteropetala, *F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857) 148.—Bras,
heteropetaloides, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 162.—Bras.
Langsdorffii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **xi. II.** 819.—Bras.
linearifolia, *St. Hil. PI. Rem. Bras.* 246.—Bras,
rqnlticostata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **xi. II.** 328.—Bras.
neroosa, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 218 - castaneaefolia.
paludosa, *Klotzsch, in Hook. Land. Journ. Bot.* **ii.** (1848) 61.—Mexic.
palustris, *St. Hil. PI. Hem- Bras.* 245.—Ind. occ; Mexic.
palustris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. it. 71 = castaneaefolia.
panamensis, Klotzsch, in Seem. Bot Voy. Herald, 108 <= paludosa.
Refinellii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **xi. II. 321.—** Bras.
Rntenbergii, *Muell. Arg. in Bremen Abh.* vii. (1880) 25.—Madag.
senegalensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 153.—Afr. trop.
serrata, Baill. in Adansonia, i. (1860-61) 66=senegalensis.
serrata, *Presl, Epim. Bot.* 213.—Afr. trop.
stenophylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* **xi. li. 326.** —Bras.
Velloziana, *Muell. Arg. 1. c.* 828.—Bras.

CAPIA, Domb. ex Juss.in Diet. Sc. Nat vi. 500 (1805) = **Iiapageria,** Ruiz & Pav. (Liliac).

CAPIHONA, Spruce, in Joum. Linn. Soc iii. (1859) 200. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 39.
Boiviniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1880)** 270.—Madag.
decorticans, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* **iii. (1859)** 200.—Peruv.

CAPITELLARIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xviii. (1852) 103 = **Sagraea,** DC. (Melastom.).
Benthami, Nand. 1. c.=S. capitata.

CAPNITES, Dum. Fl. Belg. 117 (1827) (err. typ. 177) = **Corydalis,** Vent. (Papaverac).
alpestris, Rupr. Fl. Caucas. 69- Cor.-pauciflora.
angustifolia, Rupr. 1. c. 57= Cor. angustifolia.
araratica, Rupr. 1. c. 61.—Armenia.
Bayerniana, Rupr. 1. c. 59. t. 4 = Cor. pallida.
caucasica, Rupr. 1. c. 56=Cor. caucasica.
cava, Dnm. Fl. Belg. 117 (err. typ. 177) = Cor. tuberosa, bulbosa.
conorhioa, 'Ledeb.' ex Rupr. Fl. Caucas. 61-Cor. conorhiza.
digitata, Dum. Fl. Belg. 117 (err. typ. 177) = Cor. solida.
Emanueli, Rupr. Fl. Caucas. 58=Cor. pauciflora.
fabacea, Dum. Fl. Belg. 117 (err. typ. 177)=Cor. fabacea.
macrosepala, Rupr. Fl. Caucas. 61.—Reg. Caucas.
Marschalliana, Kupr. I. c. 65=Cor. Marschalliana.
ochroleuca, Rupr. 1. c. 61 = Cor. lutea.
pallidiflora, Rupr. 1. c. 58 = Cor. pallida.
roseo-purpurea, Rupr. 1. c. 288.—Reg. Caucas.
solida, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 329 =Cor. solida.

CAPNITIS, E. Mey. Comm. 1>1. Afr. Austr. 81 (1835)-Lotononis, Eckl. & Zeyh. (Lcgumin.).
clandestine, £. Mey. 1. c.=L. clandestine.
porrecta, K. Mey. 1. c. = L. porrecta.

CAPNOCYSTIS, Juss. in Ann. Mus. Par. xviii. (1811) 473=CYSTICAPNOS, Boerh.-CorydaliB, Vent. (Papaverac).

CAPNOGONIUM, Bemh. Ind. Sem. Hort. Erfurt. (1844) ex Kndl. Gen. Suppl. ii. 107 - **Corydalis,** Vent. (Papaverac).
nobile, Bcmh. 1. c. = Cor. nobilis.

CAPNOIDES, Touro. ex Adans. Fam. ii. 431 (1763)-Corydolis. Vent. (Papaverac).
albida, Bemh. ex Steud. Nom. ed. II. i. 276=Cor. lutea.
cava, Moench, Meth. 52 = Cor. tuberosa,
glauca, Moench, 1. c.=Cor. glauca.
lutea, Gaertn. Fruct. ii. 163=Cor. lutea.
minor, Schum. ex DC. Syst. ii. 119 = Cor. fabacea.
nobilis, Moench, Meth. 52 = Cor. nobilis.
rigidula, Bemh. ex Steud. Nom. ed. II. i. 276=Cor. ochroleuca.
scandens, Moench, Meth. Suppl. 215 = Adluroia cirrhosa.
sempervirens, Borckh. in Roem. Arch. i. II. 44 = Cor. glauca.
solida, Moench, Meth. 52 = Cor. tulierosa.

CAPNOPHYLLUM, Gaertn. Fruct. ii. 32. t. 85 (1791). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 908.
ACTINOCLADUS, E. Mey. Ind. Sem. Hort. Region). (1846).
KRUBERA, Hoffm. Gen. Umb. 103 (1814).
SCLEROSCIADIUM, Koch, in DC. Coll. Mem. v. 48 (1829); Prod. iv. 140 (1836).
ULOSPERMUM, Link, Eiium. Hort. Berol. i. 267 (1822).
africanum, *Gaertn. Fruct.* ii. 82. t. 85.—Afr. austr.
dichotomum, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 13.—Reg. Mediterr.
Jacquini, *DC. Prod.* iv. 187.—Afr. austr.
peregrinum, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 33=dichotomum.
simplex, Lag. Gen. et Sp. Nov. 13••africanum.

CAPNORCHIS, Borck. in Roem. Arch. i. II. 46 (1797) = Dioentra, Bernh. (Papaverac).
chrysantha, Planch, in Fl. des Serres, Sêr. I. viii. (1852-53) 193. t. 820 = D. chrysantha.
Cucullaria, Planch. 1. c. 193 = D. Cucullaria.
eximia, Planch. 1. c. = D. exiinia.
formosa. Planch. 1. c. = D. formosa.
spectabilis, Borck. in Roem. Arch. i. II. 46 = D. spectabilis.

CAPNOREA, Rafin. Fl. Tcllur. iii. 74 (1836) =. Niootiana, Linn. (Solanac).
nana, Rafin. 1. c. 75 = N. nana.

CAPPARIS, [Toum.] Linn. Syst ed. I (1785). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 108.
BEAUTEMPSIA, Gaudich. Bot. Voy. Bouite, t. 56 (1844 ?).
BUSBRCKIA, Endl. Prod. Fl. Ins. Norf. 61 (1838).
CALYPTRANTHUS, Thou. Obs. PI. Isles Afr. 26 (1811).
COHCODENDRON, Mart. Herb. Fl. Bras. 201 (1837).
DESTKUGUEZIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 57 (1844 ?).
HOMRAK, Adans. Fam. ii. 408 (1763).
INIUTIS, MARSESINA, OCTANEMA, OUGLORON, OLOFI/TON, PLEUTERON, TRICLANTHERA, Rafin. Sylva Tellur. 108-112 (1838).
LINDACKERA, Sieber, ex Endl. Gen. 898, in *tyn.* (1841).
PETERSIA, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 168. t. 80 (1861).
QUADRELLA, Meissn. Gen. 15 (1867).
SODADA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 81 (1775).
UTERVERIA, Bertol. PI. Nov. Hort. Bonon. ii. 8 (1889).
aculeata, Steud. Nom. ed. I. 147=spinosa.
acuminata, Iindl. Bot. Reg. t 1320=acutifolia.
acuminata, Roxb. Hort. Beng. 41; Fl. Ind. ii. 566 -- zeylanica.
acuminata, *Willd. Sp. PI.* ii. 1131.—Ind. or.
acuminata, Willd. ex Wall. Cat. n. 6990 C =horrida.
acutifolia, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 585.—China.
aegyptia, Lam. Encyc. i. 605 = spinosa.
aegyptia, Sieber, ex Presl. in Oken, Isis, xxi. (1828) 274 = Kontanesii.
/Ifeelii, DC. Prod. i.246=erythrocarpos.
Aguba, Banks, ex DC. Prod. i. 248-Koxburghii.
albitrunca, *Burch. Trav.* i. 343.—Afr. austr.
ambigua, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* **i. 65—Ins.** Andam.
amplissima, *Lam. Encyc.* i. 607.—Ind. occ.; **Mexic.**
amygdalifolia, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 24.—Ind. occ.
amygdalina, Griseb. in M«m. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 155 = Grisebachii.

CAPPABIS :—
amygdalina. Lam. Encyc. i. 608 =Capparis Breynia.
angulata, *Ruia (f Pav. Fl. Per.* **t. 431** *ex DC. Prod.* **i.** 253.—Ecuador,
angustifolia, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. el Sp.* v. 96. t. 438. —Mexic.
antanossarnm, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885)** 462.—Madag.
apetala, Roth, Sp. PI. Nov. 238=Niebuhria linearis.
aphylla, *Roth, I. c.*—Afr. bor.; Arab.; Ind. or.
arborescens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = pulcherrima.
Arrabidae, *Steud. Norn.* ed. II. i. 276.—Bras,
artensis, *Montr, in Mem. Acad. Lyon,* x. (1860) 177.—N. Caled.
aspcrifolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 86.—Mexic.
assamica, *Hook. f. V Thorns, in Ft. Brit. Ind.* **i. 177.** —Assam.
aurantioidea, *Presl, Rel. fiaeni.* ii. 86.—Ins. Luzon,
avicennifolia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* **v. 94.—** Am. austr.
Iiaducca, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 438 = spinosa.
Baducca, Linn. Sp. PI. 504=zeylanica?
barcellonensis, H. B. *Be* K. Nov. (Jen. et Sp. v. 92 = Breynia.
Billardieri, *DC. Prod. i.* 247.—Ins. Molucc.
bisperma, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 568 = grandis.
bisperma, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 176 = Roxburghii.
brachyscias, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii.** (1854) II. 823.—Java,
brasiliana, *DC. Prod. i.* 249.—Bras.
Brassii, *DC. 1. c.* 248.—Am. austr.
brevipes, Benth. Bot. Voy. Sulph. 65=verrncosa.
brevis, Spreng. Fl. Hal. Mant. 43=eustachiana.
brevisiliqua, *Mof. & Sessi, ex DC. Prod.* i. 251.—Mexic.
brevispina, DC. Prod. i. 246 = zeylanica.
brevispina, Wight *8c* Am. Prod. 24 = divaricata.
Breynia, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 97 = odoratissima.
Breynia, *Linn. Syst.* **ed. X. 1071;** *Jacq. Am. Select.* 161. t. 103.—Am. austr.
caerulea, Heyne, ex Wall. Cat. n. 6986 = diversifolia.
callophylla, *Bin me, Bijdr.* 53.—Java.
callosa, Blume, I.e. — micracantha.
canescens, *Banks, ex DC. Prod.* i. 246.—Austral.
eanescens, G. Don, Gen. Syst. i. 2Sl = Doniana.
cantoniensis, *Lour. Fl. Corhinch.* 330.—China.
capensis, Thunb. Prod. PI. Cap. 82 = citrifolia.
Carandas, *Burnt, f. Fl. Ind.* 118.—Ind. or.
cardiophylla, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii.** (1854) II. 325.—Venezuela.
cartilaginea, Decne. in Ann. Sc. Nat Sér. II. iii. (1835) 273 = galeata.
celebica, *Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind.* 26.—Ins. Celebes,
cerasifolia, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* **i. 71.—** Archip. Sulu.
chinensis, G. Don, Gen. Syst. i. 278 = acutifolia.
chrysomeia, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xx. (1843) 59.—Madag.
citrifolia, *Lam. Encyc. i.* 606.—Afr. austr.
clutiaefolia, *Burch. ex DC. Prod.* i. 248.—Afr. austr.
voccolobifolia. *Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* **xiii.** c. 281.—Am. trop.
coluteoides, BoiBS. Diagn. Ser. I. xiii. 83 = Cleome coluteoides.
rommutata, Spreng. Neue Entdeck. iii. 57 = frondosa.
comosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 23.—Ins. S. Doming.
conferta. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = laurifolia.
conspicua. Wall. Cat. n. 6991 = micracantha.
cordata, Ruiz & Pav. Fl. Per. t. 432; ex DC. Prod, i.251 « crotonoides.
cordifolia, Lam. Encyc. i. 609 =• spinosa.
coriacea, *Burch. ex DC. Prod.* i. 248.—Afr. austr.
corymbifera, *E. Mey. ex Ham.* **&" Sond. Fl. Cap. i. 62.** —Afr. austr.
corymbosa, *Lam. Encyc.* i. 605.—Afr. trop.
corymbosa, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 569 - Roxburghii.
crassifolia, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* **i. 71.—** Archip. Sulu.
crassifolia, *fCurz, in Journ. As. Soc. Beng.* **xiii. (1873)** II. 227.—Burma,
crotonoides, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* v. 95. t. 487. —N. Granat.
cuneata, DC. Prod. i. 249 = frondosa.
Cynophallophora, Linn. Sp. PI. ed. I. 504 =jamaicensis.

CAPPARIS :—
Cynophallophora, *Linn. Sp.PI.* ed. II. 721; *Jacq. Am. Select,* t. 98.—Am. austr.
Dahi, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 212 (Zygophylli s.p.»). —Arab,
dasypetala, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii.** (1864) u. 322.—Java,
dealbata, *DC. Prod.* i. 246.—Ins. Timor.
decidua, Edgew. in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 184 = aphylla.
declinata, Veil. Fl. Flam. 230; v. t. 111-C. Cynophallophora.
detonsa, *Triana* **6*** *Planch, in Ann. Sc. Nat.* **Sér. IV.** xvii. (186-2) 80.—N. Granat.
didymobotrys, *Ruit* b* *Pav. Fl. Per.* t. 423; *ex DC. Prod.* i. 253.—Ecuador.
disperma, Walp. Rep. i. 199= grandis.
disticha, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* **xliii. (1874)** II. 70.—Burma.
divaricata, Lam. Encyc. i. 606.; Klein, ex Wall. Cat. n. 6988 A=diversifolia.
diversifolia. *Wight if Am. Prod.* 27.—Ind. or.
domingensis, *Spreng. ex DC. Prod.* i. 253.—Ins. S. Doming.
Doniana, *D. Dietr. Syn. PI.* iii. 227.—Afr. trop.
Eichleriana, *Urban, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 265. —Bras.
elaeagnifolia, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 23.—Ind. occ.
elegans, *Mart, in Flora,* xxii (1889) I. *Beibl.* 24.—Bras
elliptica. Span, in Linnaea, xv. (1841) 166 = Roxburghii 1
emarginata, *Presl, Reliq. Haenk.* ii. 85.—Ins. Luzon.
emarginata, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 78 = jamaicensis.
emarginata, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 166 = sepiaria.
erythrocarpos, *Isert, in Ges. Naturf. Fr. Berl. Schrift.* ix. (1789) 334. t. 9.—Guiana.
erythrodasys, Miq. PI. Jungh. 397 = horrida.
eustachiana, *Jacq..Enum. PI. Carib. 23.***—Ins. S. Eustach.**
exstipulata, J. F. Gmel. Syst. 807=inermis?
falcata, Lour. Fl. Cochinch. 330 = Crataeva falcata.
fasdcularis, DC. Prod. i. 248 = corymbosa.
ferruginea, *Linn. Syst.* ed. X. 1071.—Ind. occ.
ferruginea, Siebcr, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 271 = C. Breynia.
ferruginea, Willd. ex Eichl. 1. c. = odoratissima.
Finlaysoniana, *Wall. Cat.* n. 6992 B.—Malaya.
Finlaysoniana, Wall. 1. c. A = micracantha.
flavicans, *Wall. I. c.* n. 7003.—Burma,
flexicaulis, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1878) 225.— China.
flexuosa, *Blume, ex Hassk. PI. Jav..Rar.* **179.—Java.**
flexuosa, Linn. Sp. PI. cd. II. 722 = C. Cynophallophora.
flexuosa, Veil. Fl. Flum. 230; v. t. 108 = Arrabidae.
fioribunda, Lepr. ex Walp. Rep. i. 197 = tomentosa.
floribunda, *Wight, Illustr. Ind. Bot.* i. 35. t. 14.—Ind. or.; Ins. Pliilipp.
foetida, *Blume, Bijdr.* 52.—Java.
Fontanesii, *DC. Prod.* i. 245.—Ins. Maurit.
formosa, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1S50) 40= Heyneana.
formosa, Wall. Cat. n. 6982A=horrida.
Forsteniana, *Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind.* **82.—Malaya,**
frondosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* **24;** *Linn. Sp. PI.* ed. II. *App.* 1674.—Am. austr.
fruticosa, *Mill. Gard. Diet.* cd. VIII. n. 7.—Am. austr.
furfuracea, *Ruin tf Pav. ex DC. Prod. i.* 252.—Mexic.
galeata, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 111.— Aegypt.
Gaudichaudiana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 273. —Peruv.
glandulosa,/7«s/. *Cat. Hort. Par.* ed. III. 405.—Hab. ?
glauca, *Wall. Cat.* n. 7005.—Burma,
globifera, *Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa,* **340.—Afr.** trop.
Gomeaiana, Steud. Nom. ed. II. i. 277 = pumila.
Grandidiera, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885)** 463.—Madag.
grandiflora, *Wall. Cat.* n. 6984.—Ind. or.
grandis, *Linn.f. Suppl.* 263.—Ind. or.; Burma.
grandis, Russ. ex Wall. Cat. n. 7001 = Russeliana.
Grisebachii, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 275.— Cuba.
guayaquilensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 89 = C. Cynophallophora.
Guenezii, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap.* **i. 62.—** Afr. austr.

CAPPARIS:—
Hasseltiana, *Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind.* **24. t. 13.—** Java.
hastata, Jacq. Enum. PI. Carib. 23 - C. Cynophallophora.
hastigera, Hance, in Joum. Bot. vi. (1868) 296= Swinhoii.
herbacea, Willd. Enum. Hort. Bcrol. 560 = spinosa.
heteracantha, *DC. Prod.* i. 246.—Mcsopotam.
heteroclita, Roxb. Hort. Beng. 41 j Fl. Ind. ii. 570 = Maerua arenaria.
heterogenea, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 277[5] Maerua oblongifolia.
heterophylla, *Ruit* b" *Pav. ex DC. Prod.* i. 250.— Ecuador.
Heyneana, *Wall. Cat.* n. 6985.—Ind. or.
horrida, Banks, ex Wight *Sc* Am. Prod. 25-stylos*-
horrida, *Linn.f. Suppl.* 264.—As. trop.; Malaya.
Humbloti, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (18S5) 46S-** —Madag.
humistrata, *F. Muell. Fragm.* v. 166.—Austral,
hypericoides, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) i. 290.— Afr. occ.
hypoleuca, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 87.—Peruv.
incana, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 94.—An>- austr.
incanescens, DC. Prod. i. 247 = sepiaria.
inermis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* **100.—Arab.**
intermedia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 98-"- odoratissima.
isthmensis, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 269.—Am- trop.
Jacobinae, *Moric. ex Eichl. l. c.* **277.—Bras.**
jamaicensis, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* **23.—Jamaica.**
Karwinskiana, *Schlecht. in Linnaea,* **x. (1836) 237.—** Mexic.
Kirkii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 98.—Afr. trop.
Korthalsiana, *Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind.* 31.—Borneo.
laeta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 88 = vcrrucosa.
laetevirens, Mart, in Flora (1839) I. Beibl. 23=t" Cynophallophora.
laevigata. Mart. 1. c. 21 = C. Cynophallophora.
lanceolaris, *Lesch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 277.—J[aV]5"
lanceolata, Ruiz & Pav. Fl. Per. t. 423; ex DC. *Prod.* i. 249 = C. Cynophallophora.
lasiantha, *A. Br. ex DC. Prod.* i. 247.—Austral,
lasiopodia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii.** (1854) II. 322.—Ins. Luzon,
laurifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. errat.—N. Gran**-
lanrina, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* **v. 93.—AO-** austr.
leucophylla, DC. Prod. i. 246 = spinosa.
linearifolia, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 217=Thonniugii.
linearifolia, *Linden, ex Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc-* xxvii. (1854) II. 324.—Venezuela.
linearis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 438 = viminea.
linearis, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 24.—Am. austr.
lincata, *Pers. Syn.* ii. CO.—Bras.
linifolia, Roxb. Hort. Beng. 41 = Niebuhria linearis.
Lobbiana, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most,* **xxvii. (1»[5]** II. 323.—Singapore.
Loddigesii, *Steud. Nom.* cd. II. i. 277.—Hab. ?
longifolia, 5». *Prod. Veg. Ind. Occ.* 81.—Ind. occ.
longispina, *Hook. f. & Thorns, in Fl. Brit. Ind.* **i.** —Burma,
loranthifolia, *Lindl. in Mitch. Trop. Austral.* **220.—** Austral.
lucida, *Banks, ex DC. Prod.* i. 254.—Austral.
luzonensis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **x*[vii].** (1854) II. 324.—Ins. Luzon.
macrocarpa, Ruiz *8c* Pav. ex DC. Prod. i. 250* petiolaris.
macrophylla, *//. B.* b" A". AW *Gen. et Sp.* v. 91.—* Granat.
macrosiwrma, *Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa,* **3**'** —Afr. trop.
magna. Lour. Fl. Cochinch. 330 -= Crataeva magna.
malabaria, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 277[5]* Heyneana.
malabarica. Wall. Cat. n. 7000 = floribunda.
mariana, Jacq. Hort. Schoenbr. i. 57. t. 10'J « spino»»'
maxima. Roth, Sp. PI. Nov. 237 = grandis.
membranacca, *Gardn. V Champ, in Hook. Kew Jo*[rn-]* i. (1849) 241.—China.
memhranifolia, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* [x]" (1874) II. 70.—Burma,
micracantha, *DC. Prod. i.* 247.—Burma; Malaya.

CAPPARIS:—

micracantha, ijsm. ex Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 38 =Forstenia .
micrantha,
Mitchelli', Lmas. in Mic*_ Three ^i**. ut 815 .— Austral.
mithridatica, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 99,-Arabia.
mollis, H. B. & [illegible] *Nov. Gen* ▾- 88.—Perav.
mo [illegible] *Cat. n.* 7006 ("Canajerae sp.).— IndUrf
Moonii, Wight [illegible] -Ob8. 272-Morisoni. americana.
Morisonia, Sw
mucronifolia, [illegible] 3=spinosa.
multiflora, Hoon. /- & 7 W . *in Fl. Brit. Ind.* i. 178. —Reg. Him
Murrayana, [illegible]
Murrayi, Stew. [illegible] (1878) 74 = spinosa
nectaria, Vell. Fl. Flum. [illegible] 107 Bras
nemorosa, Blanco, Fl. F [illegible] Philipp.
nemorosa, Jacq. Enum. [illegible] 24.—N. Granat.
nepaulensis, DC. Prod. Wall. Cat. n. 6979 = spinosa.
neriifolia, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xiv. (1884) 180.—Hab. ?
nigricans, Span. [illegible] xv. (1841) 165.—Ins. Timor.
nitida, Ruiz & Pav. ex DC. Prod. i. 252.—Peruv.
nobilis, F. [illegible] Austral."
"Isfe:5?"*11* « E<*'- » Mart. Fl. Bras. xiii. i.
nummularia, DC. Prod. [illegible] -Au.tral.
oblongifolia, Forsk. Fl. [illegible] ^o*. i. 248=grandis.
obovata, Buch.-H,r [illegible]
obovata, Royle, [illegible] -
obovatifolia, H. [illegible] Sp. v. 92 = tenuisiliqua.
obtusa, Rafin. [illegible] 109-C. Cjmophallophora.
octandra, Jacq. [illegible] 100-fcrruginea.
odorata, Blanco, Fl. Filii [illegible] «9.-Ins. Philipp.
odoratissima, Jacq. Hort. [illegible] 1.110.—Venezuela.
olacifolia, Hook. f. [illegible] —Reg. Himal.
oleoides, Burch. ex DC.
oligandra, Griff. Notul. [illegible] =fl«ibunda.
orbiculata, Wall. ex Hook. Ind. i. 176.—Burma.
ornans, F. Muell. Austral.
ovalis, Risso, Fl. [illegible] -pinosa.
ovata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 1 = spinosa.
ovata, Desf. Fl. Atlant. i. 404 = Fontanesii.
oxyphylla, Miq.
[illegible] 6997=tenera.
AcZlii [illegible] *Ra&lk. in Sitit. Math.-Phys.* P [illegible] *Sp.* v. 98.—Venezuela.
panduriformis, Lam. Encyc. i. 609 = Thylachium panduriforme.
panduriformis, Thou. chium heterophyllum.
paradoxa, Jacq. Hort. [illegible] 58=Steriphoma paradoxum.
parviflora, Boiss. Diagn. Ser. I «• *=spinosa.
parvifolora, Hook. f. & Thoms. in [illegible] —Ind. or. i. 176.
pauciflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 89 = C. Cynophallophora.
pauciflora, Presl, Rel. Haenk. ii. 86-incana.
pedunculares, C. & S. [illegible] Sicilia.
[illegible] Well*. n . «999.-Ind. or.
Pendul, [illegible] 285.—Ins. Trinitat.
[illegible] Fl. Abyss. i. 31 = tomentosa
petiolaris, Banks, [illegible] 249-frondosa.
petiolaris, H. B. [illegible] 91.— Guayaquil.
platyacantha, Turcz. in Bull. [illegible] *Mosc.* xxvii. (1854) II. 328.—Java.
plurialis, Mart. in Flora, xxii [illegible] Beibl. 22 = C. Cynophallophora.

CAPPABI8:—

polyantha, *Triana (f Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit. Vf.* xvii. (1862) 76.—N. Granat.
polymorpha, Kurt, in Jaunt. As. See. Beng. xlii. (1878) n. 227.—Burma.
polymorpha, Rich, in Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 24=tomentosa.
populifolia, Willd. ex Eichl. in Mart Fl. Bras. xiii. I. 274=crotonoides.
prminosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 18.—Reg. Argent.
puberula, DC. Prod. i. 2J8=tomentosa.
pubiflora, *DC. 1. c.* 246.—Malaya,
pulcherrima, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 24.—N. Granat.
pumila, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1861) 260.—China; Ind. or.
punctata, *Burch. Trav,* i. 492.—Afr. anstr.
punetata, Wall. Cat. n. 7002=pumila.
pyracantha, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xx. (1848) 59.—Madag.
pyrifolia, *Lam. Encyc.* i. 606.—Ind. or.
pyrifolia, Wight & Am. Prod. 25=grandiflora.
quadriflora, DC. Prod. i. 247=homda.
quiniflora, *DC. I. c*—Austral.
quinqueflora, Steud. Norn. ed. II. i.=quiniflora.
racemi/era, DC. Prod. i. 248=grandis.
racemosa. *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. o. 5.—Mexic.
racemulosa, *DC. Prod.* i. 248.—Afr. austr.
radiatiflura, Ruiz & Pav. Fl. Per. v. t. 188 = Crataeva radiatiflora.
reflexa, *Thonn. V Schum. in Dan. Vid. Sel. Afh.* iv. (1828) 11.—Guinea.
reticulata, Klein, ex Wall. Cat. n. 6986-diversifolia.
retnsa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 18.—Am. austr.
retusella, Thw. Enum. PI. Zeyl. 16, 400=sepiaria.
Rheedii, DC. Prod. i. 246-zeylanica.
Richardi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 468. —Madag.
Ricbii, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 69.— Ins. Fiji.
rosea, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* i. 99.—Afr. tiop.
Rothii, *Oliver, 1. c.* 97.—Afr. trop.
rotundifolia, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 185 = zeylanica.
Roxburghii, *DC. Prod.* i. 247.—Ind. or.
roydsiaefolia, *Kure, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 62.—Bnrma.
rufescens, *Turci. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 821.—Ins. Sumbawa.
rugulosa, *Turce. 1. c.* 326.—Venezuela.
rupestris, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. t. 487=spinoia.
Russeliana, *Wall. Cat.* n. 7001.—Ind. or.
sabiaefolia, *Hook.f. (f Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 179. —Reg. Himal.
salaccenais, *Blume, Bijdr.* 54.—Java,
salidfolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 17.— Reg. Argent.
saligna, Vahl, Symb. Bot. iii. 66 = C. Cynophallophora.
sandmcensis, Walp. Rep. v. 64=seq.
sandwichiana, DC. Prod. i. 246=spinosa.
sarmentosa, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* i. 96.— Austral.
satha, Pers. Syn. ii. 69=spinosa.
saxatilis, *H. B.* &• *K. ex DC. Prod.* i. 250.—Venezuela,
scabrida, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 95.—Am. Eustr.
scandens.VtW. Fl, Flum. 280; v.t. 109=lineata.
Schimperi, *Steud. Norn.* ed. II. i. 278.—Arab.
sciaphila, Hance, in Ann. Sc Nat. Sér. V. v. (1866) 206 a pumila.
securidacea, *Triana V Planch. 1. c.* Sér. IV. xvii. (1862) 77.—N. Granat.
sepiaria, *Linn.Syst.* ed. X. 1071.—Ind. or.; Malaya.
sepiaria. Wall. Cat. n. 6993G=pednncnlosa.
sessilis, *Banks, ex DC. Prod. i.* 249.—N. Granat.
Shanesiana, *F. Muell. Fragm. x.* 94.—Austral,
siamensia, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* i. 63.— Burma.
sicula, Duham. Arbr. i. 159-=spinosa.
sidarfolia, Ruiz & Pav. ex DC. Prod. i. 262= erotonoides.
sikkimensis, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 181.—Reg. Himal.
siliquosa, Linn. Syst. ed. X. 1071=jamaicensis.
Sindairii, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 65. t. 27.—Am. anstr.

CAPPARIS:—

singalensis, Korth. ex Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 28 - pubiflora.
Sodada, R. Br. in Denb. Clapp. *Sc* Oudn. Trav. 225= aphylla.
solanoides, Boj. in Ann. Sc. Nat. Sir. II. xx. (1848) 59 =• chrysomeift.
spedosa. *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 18.—Reg. Argent.
spedosa, Moric. ex Eichl. in Mart. FL Bras. xiii. 1.272 = C. Vco.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 60S.—Reg. Mediterr.; Ind. or.; Oriens.
Sprucei, *Eichl. in Mart. Ft. Bras.* xiii. I. 281.— Perav.
stylosa, DC. Prod. i. 246-divaricata.
snbacuta, *Miq. Ft. Ind. Bat.* i. I. 101.—Borneo.
subbiloba, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 90=C. Cynophallophora.
subcordata, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 166.—Ins. Timor,
subspinosa, *Roxb. Hort. Beng.* [98]; *FL Ind.* U. 568.— Ins. Molucc
Swinhoü, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 296.— China,
tarapotensis, *Eichl. in Mart. Ft. Bras.* 'xiii. I. 284.— Perav.
tenera, *Dais, in Hook. Ken Journ.* ii. (1850) 41.— Ind. or.
tenuiflora, Fl. Brit. Ind. i. 178, sphalm. =temiflora.
tenuifolia, J. F. Gmel. Syst. 1519, sphalm.'=seq.
tenuisiliqna, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 24.—N. Granat.
terniflora, DC. Prod. i. 247-horrida.
tetrasperma, Thw. Enum. PI. Zeyl. 15-tenera.
Thonningii, *Schum. in Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 288.—Afr. trop.
Thozetiana, *F. Muell. Fragm.* v. 104.—Anstral.
tomentosa, *Lam. Encyc.* i. 606.—Afr. trop.
torulosa, Griseb. ex Hemsl. BioL Centr. Am. Bot. i. 44 oodoratissima.
torulosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 81 = jamaicensis.
trapeziflora, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 165.—Ins. Timor.
trifiora. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 10=frondosa.
trifoliata, Roxb. Hort. Beng. 41; Fl. Ind. ii. 571 - Crataeva religiose.
trifoliata, Spreng. ex DC. Prod. i. 248=Crataeva tapioides.
trinervia, *Hook.f. V Thorns, in Ft. Brit. Ind.* i. 175. —Burma.
triphylla, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 92.—Afr. austr.
Tweediana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 278.— Reg. Argent.
tylophylla, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 204.—Java,
nberiflora, *F. Muell. Fragm.* ix. 172.—Austral,
umbellata, *ft. Br. in DC. Prod. i.* 247.—Austral.
umbellata, Willd. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 273=angnstifolia.
umbonata, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 257.—Austral.
uncinaia, Edgevr. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) II. 1213=spmosa.
uncinaia, Lodd. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1.270 •jamaicensis.
uncinata, Wall. Cat. n. 6998 = tenera.
undulata, Lodd. ex Loud. Hort Brit 216 - Loddigesii.
undulata, *Zeyh. ex EcU. V Zeyh. Enum.* 14.—Afr. anstr.
variabilis, Wall. Cat. n. 7004 (non Capparid.).— Ind. or.
Vellotiana, Mart, in Flora, xiii. (1839) I. Beibl. 23 »C. Cynophallophora.
verrucosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 23.—Ind. occ.; N. Granat.
verrucosa, Wight, ex Wall. Cat. n. 6980 •> stylosa.
versicolor. *Griff. Notul.* iv. 677.—Burma,
vertidllaris, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1863) i. 552.—Bras,
viminea, *Hook.f.* b* *Thorns in Fl. Brit. Ind.* i. 179.— Reg. Himal.; Burma.
viridiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v, 82 - tennisiliqua.
Volkameria, *DC. Prod.* i. 247.—Afr. austr.
Wallichianaf Wight ft Am. Prod. 25-zeylanica.
Wightiana, Wall. Cat. n. 6987=zeylanica.
Yco, *Mart. Reise,* ii. 599; *Mart, tf Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 272.—Bias.

CAPPAHIS:—
Zeyheri, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. **(1851)** II. 321.—Afr. aostr.
zeylanica, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 720.—Ind. or.
aeylanica, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl, Ind. ii. 667 = horrida.
aeylanica, Wight *Sc* Am. Prod. 25—acnminata.
Zippeliana, *Miq. Ittustr. Fl. Arch. Ind.* 25. 1.11.—N. Guinea.

CAPRAEA, Opiz, Seznam, 25 (1852) = **Salir,** Toom.
acuminata, Opiz, 1. c. = S. acuminata.
aurita, Opiz, I. c = S. aurita.
cinerea, Opiz, 1. c. = S. cinerea.
grandifolia, Opii, I.e. - S . grandifolia.
vulgaris, Opiz, 1. c = S. Caprca.

CAPHARIA, [Tourn.] Linn. Gen. ed. I. 28, 75 (1737). *SCROPHVLARINEAE,* Benth. & Hook. *(.* ii. 959.
POGOSTOMA, Schrad. Ind. Sem. Hort. Goett (1831).
XUAREZIA, Rniz & Pav. Prod. 21.1.1 (1791).
aegyptiaca, Stend. & Hochst. ex Endl. Nov. Dec. 23 = Anticharis arabica.
arabica, Steud. & Hochst. ex Stead. Nom. ed. II. i. 278 = Anticharis arabica.
biflora, *Linn. Sp. PI.* 628.—Am. trop.
calycina, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1862) 19 - Myoporum debile.
Crustacea, Linn. Mant. 87 = Vandellia Crustacea.
cuneata, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 15 = saxifragaefolia.
diffusa, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. iii. 98 - Ebermaiera thysoidea.
dissecta, Delile, Fl. Egypte, 289. t 32. f. 2=Sutera glandulosa.
duranti/olia, Linn. Syst. ed. X. 1116-Stemodia durantaefolia.
gratioloides, Linn. 1. c. 1117-=Ilysanthes gratioloides.
gratissima, Roxb. Hort. Beng. 47; Fl. Ind. iii. 92 = Limnophila Roxburghii.
hirsuta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. S55=saxifra. gaefolia.
humifusa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8883- Centranthera humifusa,
humilis, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 351= Stemodia parviflora.
integerrima, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1819) 176.— Gniana.
integrifolia, *Mart. &• Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 20.—Mexic.
lanceolata, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. i. 278 = salicifolia.
lanceolata, Linn. f. Suppl. 281 = Freylinia lanceolata.
lanceolata, *Vahl, Eel. Am.* ii. 17.—N. Granat.
lucida, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 353= Teedia lucida.
mexicana, Moric. ex Benth. in DC. Prod. x. 429- biflora.
Monnieria, Roxb. Hort. Beng. 47«Herpestis Monnieria.
multifida, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 22. t. 35=Conobea multifida.
multiflora, Steud. Nom.ed I. 148 = Conobea multifida.
peruviana, Benth. in DC. Prod. x. 430 = biflora.
pusilla, Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1821) 86= Mimulus floribundus.
***rigida,* Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 801 =** Ccntranthera hispida.
rigida, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 103.—Afr. anstr.
salicifolia, Link *Sc* Otto, Ic PI. Rar. Hort. Berol. 11. t. 1 - Freylinia cestroides.
salicifolia, Salisb. Prod. 91-Freylinia lanceolata.
saxifragaefolia, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 105.—Mexic.
semiserrata, *Vahl, Eel. Am.* ii. 47.—Am. mer.
undulata, *Linn.f. Suppl.* 281.—Afr. austr.
oniflora, *Burm.f. Fl. Ind.* 133.—Ind. or.

CAPRIFICUS, Gasp. Nov. Gen. Fie. 6 (1844)=FICUB, Tonm. (Urticac).
gigantea. Gasp. Ric Caprif. 80-F. fulva.
insectifera, Gasp. Nov. Gen. Fie. 6 = F. Carica.
leucocarpa, Gasp. Ric Caprif. 80. t. 2, 3 - F. albescens.
oblongata. Gasp. 1. c. = F. neapolitana.
pedunculata. Gasp. 1. c. = F. pedunculate, *Miq.*
rugoso. Gasp. 1. c. = F. rugosa, *Miq.*
sphaerocarpa, Gasp. 1. c. = F. globosa, *Miq.*

CAPRIFOLIUM, Tonm. ex Linn. Syst. ed. I (1736)- Iionicera, Linn. (Caprifol.).
alpigenum, Gaertn. Fruct. i. 186 = L. alpigena.
alpinum, Lam. Fl. Fr. iii. 867 — L. alpigena.
arboreum, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 9.—Malaya.
atropurpureum, Hort. exC. Koch, Dendrol. ii. II. 8- L. Caprifolium.
balearicum, Dum.-Coun. Bot Cnlt. ed. II. iv. 368-L. implexa.
bracteosum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 105=1* glanca.
caeruleum, Lam. Fl. Fr. iii. 866- L. caerulea.
chinense, Wats, ex Loud. Hort. Brit. 79 = L. japonica.
dliosum, Pursh, FL Am. Sept. i. 160 = L. ciUosa.
cristatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 9.—Malaya.
dentatum, Rafin. Atl. Journ. 151.—Am. bor.
dioicum, Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 260 = L. glauca.
distinctum, Moench, Meth. 601 = L. Periclymenum.
Douglasii, Lindl. in Trans. Hort. Soc. Lond. vii. (1880) 211 - L . hirsuta.
dumetorum, Lam. Fl. Fr. iii. 867 = L. Xylosteum.
etruscum, Roem. & Schult. Syst. v. 261=L. etrusca.
ftavum, Ell. Sketch, i. 271 = L. flava.
flexuosum, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. i. 278=L. japonica.
Fraseri, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 160=L. flava.
germanicum, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 128 ^L. Caprifolium.
germanicum, Quer, Fl. Esp. t. 79 =»L. etrusca.
germanicum, Roehl. Dentschl. Fl. i. 175=L. Periclymenum.
glaucum, Moench, Meth. 502=L. glauca.
gratum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 161=L. grata.
hirsutum, Denson, ex Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 609 - L . hirsuta.
hispidulum, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1761 = L. hispidula.
hortense, Lam. Fl. Fr. iii. 365-L. Caprifolium.
implexum, Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 261 = L. implexa.
italicum, Medic. Pfl. Anat. 97 = L. Caprifolium.
japonicum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 140 = L. macrantha.
japonicum, Roem. & Schult. ex Steud. Nom. ed. Ill i. 278 = L. longiflora.
javanicum, Blume, Bijdr. 653 = L. javanica.
longiflorum, Sabine, in Bot. Reg. 1.1232 •=• L. longiflora.
Loureiri, Blume, Bijdr. 653=L. confusa.
macranthum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 140 = L. macrantha.
nepalense, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 79 - L . macrantha.
oblongifolium, Sweet, Hort. Brit ed. II. 259-L. oblongifolia.
occidentale, Lindl. Bot. Reg. t. *U5T=L.* ciliosa.
ovatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 9=Clerodendron serratum.
pallidum, Schur, Enum. PI. Transs. 213 = L. Caprifolium.
paniculatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 9.—Malaya.
parviflorum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 161=L. glanca.
perfoliatum,Roeh\. Deutschl. Fl. i. 175 - L.Caprifolium.
Periclymenum, Delarb. Fl. Anv. ed. II. 129-L. Periclymenum.
pilosum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. **127.** t 298 **-= L. pitas*.**
pubescens, Goldie, in Edinb. Phil. Journ. (Apr. 1822) 323 = L. hirsnta.
pyrenaicum. Lam. Fl. Fr. iii. 866=L. pyrenaica.
quercifolium, Meigen, Syst. Verz. 85 = L. Periclymenum.
reclinatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 9.—Malaya.
roseum, Lam. Fl. Fr. iii. 368=L. japonica.
rotundifolium, Moench, Meth. 501 = L. Caprifolium.
rubrum, Rafin. Fl. Ludov. 78.—Am. bor.
rupestris, Rafin. New Fl. Am. iii. 17.—Am. bor.
scarlatinum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 9.—Malaya.
sempemirens, Moench, Meth. Snppl. 191 »L. sempervirens.
sericeum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 9.—Malaya.
syhaticum, Lam. Fl. Fr. iii. 365-L. Caprifolium.
mticifolium, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv; 9.—Malaya.
vulgare, Medic. Pfl. Anat. 387 = L. Caprifolium.
Xylosteum, Gaertn. Fruct. i. 135=L. Xylosteum.

CAPRIOLA, Adans. Fam. 1L 31 (i763)=Cynodon, Pers. (Gramin.).

CAPROXYLON, Tnssac, Fl. Antill. iv. t 30 (1827)- Hedwigia, Sw. (Burserac.).
Hedwigii, Tussac, 1. c = H. balsamifera.

CAPSEIiLA, Medic. Pflanzeng. i. 85 (1792).
CRUCIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 86.
BURSA, [Web. in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 47 (1780).
BURSA-PASTORIS, [Toum.] Rupp. JKL Jen. ed. Hall- 87 (1745), nomen prius.
HYMENOLOBUS, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 117 (1838).
MARSYPOCARPUS, Neck. Elem. iii. 91 (1790).
MICROLEPIDIUM, F. MuelL in Linnaea, xxv. (1852) 371.
acutifolia, Rafin. New FL Am. ii. 27-C. Bnrsa-pastoris?
agrestis, Jord. Diagn. i. 889 -C . Bursa-pastoris.
agrestis-rubella, Paill. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. vi. (1872) 80=C. Bursa-pastoris.
amblodes, Rafin. New Fl. Am. ii. 28=C. Bursa-pastoru.
Andraeana, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Recor** (March, 1886).—Austral,
antipoda, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* (1855) 31.—Austral.
antipoda, F. Muell. PL Viet. i. ll=anstralis.
apetala, Opiz, in Flora, v. fl822) 269=C. Bursa-pastoris.
australis, *Hook. f. ex Benth. Fl. Austral.*- i. 81.- Austral.
Berengeriana, Hort. Petrop. ex BulL Phys.-Matn- Acad. Pétersb. xiv. (1856) 231 = procumbens.
bifida, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 28 = C. Bursa-pastoris?
blennodina, F. Muell. PL Viet. i. 12 = Blennodi* alpebtris.
Bursa, Rafin. New Fl. Am. ii. 28 = C. Bnrsa-pastoris.
Bursa-pastoris, *Medic. Pflaneeng.* 85.—Reg. temp.
ceratocarpa, Moench, Meth. 271=Thlaspi ceratocarpon.
cochlearina. *F. Muell. PI. Viet.* i. 51.—Austral.
cornigera, Medic. PAanzeng. 86=Thlaspi ceratocarpon-
dentata, Rafin. New Fl. Am. ii. 28-C. Bursa-pastoriB t
divaricata, *Walp. Rep. i.* 175.—Am. bor. occ
Drummondii, *F. Muell. Fragm.* xi. 26.—Austral*
elliptica, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt i«. 1" * procumbens.
erecta, Walp. Rep. i. 176-divaricata.
furcata, Rafin. New Fl. Am. ii. 28=C. Ba1*8" pastoris?
gracilis, Gren. in Mém. Soc. Emnl. Doubs, Sér. 111. "• (1858) 108 = C. Bnna-pastoris.
grandiflora, *Botss. Diagn.* Ser. I. i. 76.—ArcWp- Graec.
humistrata, *F. Muell. Fragm.* xi. 25.—Austral.
hybrida, *Albert, in Bull. Soc. Sc. Draguignan* (1»8*; [reimpr. 9].—Gallia.
integrifolia, Rafin. New Fl. Am. ii. 27=C. Bursa-pastoris.
mexicana, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 19.—Mexic
pastoris, Rupr. Fl. Caucas. 128 »C. Bursa-pastoris.
pauciflora, Koch, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft *• " 66 = Hutchinsia pauciflora.
pastoralis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 189-C. **Bnr»'** pastoris.
pilosula, *F. Muell. Vict.J>l. i.* 41.—Austral.
polymorpha, Cav. Desc. Ill = C . Bursa-pastoris.
poimenobalantion, St. Lag. in Ann. Soc Bot. **Lyon,** vii. (1880) 71 = C. Bursa-pastoris.
praecox, Jord. Diagn. i. 312-C. Bursa-pastoris,
proenmbens, *Fries, Novit. Fl. Suec. Mant.* »• **• Reg. temp.
pubens, *Benth. (f Hook. f. ex S. Wats. Bibliog- N. Am.* 52.—Am. bor. occ.
puberula, *Rupr. Fl. Caucas.* 129.—**Reg.** Caucas.
rubella,ttf»*. *in Comptes-Rend. Soc. Holler.* (185S-»^ 18.—Europ.
rubello^grestis, Paill. in Mém. Soc. Emnl. **Doubs,** Sér. IV. vi. (1872) 80=C. Bursa-pastoris.
rubescens, Personnat, in Bull. Soc Bot. Fr. vii. **(1860)** 511 = rubella.
ruderalis, Jord. Diagn. i. 340-C. Bursa-pastoris.
sabulosa, Jord. I.e. 311- C. Bursa-pastoris?
Schaffneri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviL (I 82) 322.—Mexic.
spinosa, Moench, Meth. Snppl. 89 - Lepidium i**pinosum.**

CAP8EI1LA.—

smanica, *p. Muell. Fragm.* xi. 26.—Ins. Tasman.
«T3iihJ1S/"*Journ. Lina. Soc.* v. t881)
angularis (1880) e9-C.Bor!Lpastoris.
virgata, Jord. Diagn. i. 839-C. Bursa-pastoris.

CAPSICUM, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1785). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f.ii. 892.
abyss At^ S'T *Rich. Tnt. m. Abyss.* "• 98.
•Sgregatum, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 809. —Am. bor.
?S*«.^*' MiU. Gani. Dict. .* VIII.n.4=annum»? fnd. ol,"" Z^<. *in DC. Prod.* xiii. 1. 420.—
annuum, Linn. Sp. Pl. W8.-Reg. trop.
anomalum, Franch. ^ 5. *ev. enum. Pl. Jap.* ii. 452.—Japon.
Axi, Vell. F. Fl«n. 61; ii. t. 6-anmium.
baccatum, Hort Genev. e* Dun. »> DC. Prod. xiii. 1. 420 =angustifolium.
baccatum, Buc'hanex Wall. Cat. n. 2644 = minimum.
baccatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. cumanense.
baccatum, Linn. Mant. i. 46.-Reg. trop.
baccatum, Rodsch. Obs. 38-globSenim.
baccatum, Vell. Fl. Flnin. 6 o ! "• l - 3 = frutescens.
Banhini, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 428.-Hab. ?
bicolor, Jacq. Fragm. 66, t. 99, f. l=nigrum.
caerulescens, Bess. Cat. Hort. Crem. 27.-Hab. t
camplylopodium, Sendt. w Jf«* «. *Bras.* x. 144.-Bra.
cerasiflorum, Link, Enum. Hort. Bero1. 1, 1, 9. Hab. ?
cerasiforme, Hort. M. Dun. DC. Prod. xiii. I. 420 baccatum.
cerasiforme, Mill. Gard. Dict. VHI. 6 = annuum ?
cerasiforme, Willd. Enum. grossum.
ceratocarpum, Fingerh. Monog. 22.—Hab. ?
cereolum, Bertol. Hort. Bonon. Pl. Nov. i. 6. t 2 = frutescens.
chamaecrasus, Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 65 = grossum.
chinense, Jacq. Hort. Vindob. 88. 4 - «7.-Hab. ?
chlorocladum, Dun. DC. Prod. "» • 415.— Mexic.
ciliare, Willd. Enum. Hort. Berol. 243 = microcarpum.
Comarim, V escens.
conicum, La »/•* ? Str> n. 8390-conoidenm.
conicum, G. Guiana. *Mey. Prim. Fl. Esseq.* 112.—
conicu. Jell. Fl. Flnm. ii. t. 9 = baccatum.
conoid 7 ^ n * Sc. ult. S 7<" ^ 662=frulescens.
conoid Gard. Dict. *d- VIII. n. l=anmmm!
cordiforme M L L =• "• 2 = annnnm1
crispum, Dun Maurit.
cuman Fin trh. Mon » • 17.-Venezuela.
cun i n 2 A. i, 1" ^ c - ^"xtf- »«• '• 423—Guiana,
O-rfoBf/1, Ort* ex Roem. & S011,1* S^ i5 6 1
tetrag^^ -.
dichot 1 VeU «• « »« • 61; ii. t. 9-Bras.
dulce, ^? 0"" - "« ^C. *Prod.* xiii. i. 428.-Reg. trop.
fasti tum, Blume Bl dr. 705=minim nm.
flexu m, *Sendt.* Mart. Fl. Br <". *• "3.-Bnu.
frutescens, Linn. Sp. w. 189.—Reg. trop.
frutescens, Rodsch. Obs. 38 = conoidenm.
glandulosum, D *DC. Prod.* xiii. 1. 417.—Bras.
globiferu G. ^ ^ 9 " *Prim. Fl. Esseo.* 113.—Guaana?
globosum K'aciW']£"• Cat Hort. Crem. 27-grMsnm.
gross S?"/]"" flc ,^<. i« . 418-Bras.
Fl. Ind. i. 574.—Reg. trop.
grossum, Willd. Enum. Hort. Berol. 241 = annnnni.
Hamiltonii, G. Don, Gen. Syst. iv. 447-nigrum.
havanense, H. B. & K. Nov. Gen. rt^ iii. 49._Am. austr.
hispidum, Dun. DC. Prod. xiii. I. 419.-Texas.
Hornemanni, Dun. l. c. 489.—Hab. ?

CAPSICTTM::-
inaeqnale, *Veil. Fl. Hum.* 61; ii. t. 6.—Bras,
laurifolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 1.418.—Ind. occ.; Bras.
lencocarpon, *Mill, ex Fingerh. Monog.* 32.—Hab. *1*
longum, Bouton, ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 414 •= conoides.
longum, DC. Cat Hort. Monsp. (1813) 86=annanm.
lutenm, *Lam. Hlustr.* n. 2392.—Ind. or.
Maxitnowiczii, *Regel V Sach, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1858)40.—Hab.!
micranthum, *Lint, Enum. Hort. Berol.* i 190.—Bras,
microcarpam, *Cav. Desc.* 371; *DC. Cat. Hort. Monsp.* 86.—Ind. occ.
microphyllum, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 421 = baccatum.
Milleri, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 563=annuum 1
minimum, *Blanco, Fl. Filip.* ed. 1.188.—Ins. Philipp.
minimum, Mill. Gard. Diet. ed. VHI. n. 10-baccatum, microcarpum.
minimum, *Roxb. Hort. Beng.* 17; *Fl. Ind.* i. 574.—Reg. trop.
mirabile, *Mart. Fl. Bras.* x. 144.—Bras.
Narunea, Hort. Matr. ex Dun. in DC. Prod. xiii. i. 414«nigrum.
nigrura, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 242.—Hab.»
odoratum, Steud. Nom. ed. II. i. 279 - frutescens.
odoriferum, VeU. Fl. Flnm. 61; ii. t. 8=frutescens.
olimaeforme, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = annuum %
ovatum, *DC. Cat. Hort. Monsp.* (1813) 86.—Hab. ?
oxycarpnm, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 426.—Bras,
parvifolinm, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 145.—Bras,
pendnlum, *Willd. Enum. Hort. Berol.* i. 242.—Cuba.
pomiferum, Mart, ex Steud. Nom. ed. II. i. 279 = grossum.
pubescens, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 415 = chlorocladum.
pubescens, *Ruis* 6* *Pan. Fl. Per.* ii. 80.—Peruv.
pulchellum, Salisb. Prod. 184 =-baccatum.
purpureum, Vahl, ex Homem. Hort. Hafn. i. 224 = grossum.
pyramidale, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Aegypt.
quitense, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 809 = violaceum.
Rabenii, *Sendt. in Mart. fl. Bras. x.* 145.—Bras,
salicifolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 418.—Bras.
Scbottianum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 143.—Bras.
silvestre, Veil. Fl. Flum. 60; ii. 1.1=annuum.
sinense, Murr. Syst. ed. XIV. 226=chinense.
sphaerium, Willd. Enum. Hort. Berol. i. 241 = annuum 1
strictura, *Fingerh. Monog.* 21.—Am. austr.
testiculatum, *Vis. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 424.—Hab. 1
tetragmum, MiU. Gard. Dict ed. VIII. n. 3 = annuum ?
tomatiforme, Fingerh. ex Steud. Nom. ed. II. t 279 - dulce.
torulosum, Hort. Matr. ex Hornem. Hort Ham.Snppl. 27-pyramidale.
torulosnm, *VeU. Fl. Flum.* 60; ii. t 4.—Brai.
Tournefortii, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) 27 « annuum.
toxiearium, Poepp. ex Fingerh. Monog. 82 = frutescens.
umbilieatum, Veil. Fl. Flum. 61; ii. t. 7 • annuum.
ustulatum, *Paxt. Mag. Hot.* v. 197.—Chili,
villosnm, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 144.—Bras.
violaceum, Desf. Tabl. Hort. Par. ed. I. 70; Desv. in Ham. Prod. 25=nigrum.
violaceum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 49.—Ecuador.

CAPTTKA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 264 **(err.** typ. **644).** *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 405.
OTOLEPIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 572.
OTOPHORA, Blume, Rumphia, iii. 142 (1850).
nigrescens, Vidal, Sinops. t. 34. f. E=pinnata.
pinnata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 264.—Ins. Philipp.

CAPURA, Linn. Mant. U. 149 (1771)=Wikstroemia, Endl. (Thymelac.).
purpurata, lion. 1. c. 225-W. indica.

CAQUEPIRIA, J. F. Gmel. Syst. 661 (1791) - Oardenia, Ellis (Rubiac.).
Bergiia, J. F. GmeL L c. = G. Thunbergia.

CARACALLA, Tod. Ind. Sem. Hort. Fanorm. (1861) 32; et in Lem. Illustr. Hortic. ix. (1662) Misc. 13.
FhaseoluB, Tourn. (Legumin.).
pulcherrima, Tod. 11. cc.-P. Caracalla.

CARACHERA, Juss. in Dict. Sc. Nat. vii. 11 (1817) - Charaohera, Forslc. (Inc. sed.).

CARADESIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 80
Eupatorium, Toum. (Compos.).
pauciflora, Rafin. 1. c.=E. pauciflorum, *Rafin.*

CAHAGANA, Lam. Encyc i. 615 (1783). *LEGVMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 505.
acaulis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 44. —Afghanist.
Altagana, Poir. Encyc. Snppl. ii 89=microphylla,
ambigua, *Stocks, in Hook. Kern Journ.* iv. (1852) 145. —Beluchist.
arborescens, *Lam. Encyc.* i. 615.—Sibir.
arenaria, *Donn, ex Sims, Bot. Mag.* t. 1886.—Sibir.
argentea, Lam. Encyc. i. 616 = Halimodendron argenteum.
brevispina, *Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal.* **198.** —Reg. Himal.; Afghani
Bungei, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 264.—Sibir. alt.
Chamlagu, *Lam. Encyc* i. 616.—China.
chinensis, Turcz. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 470 — C. Chamlagu.
conferta, *Benth. ex Baker, in Hook./. FL Brit. Ind.* ii. 116.—Tibet, occ.
crassicaulis, *Benth. ex Baker, 1. c.* 117.—Reg. Himal.
cuneata, *Baker, I. c.*—Reg. Himal.
cuneata, Moench, Meth. 135 = frutescens.
digitata. Lam. Encyc. i. 616-frutescens.
ferox, Lam. 1. c 315=spinosa.
flava, Poir. Encyc. Suppl. ii. 90 = Robinia flava.
frutescens, *Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 366.—Reg. Caucas.; Soongaria.
frutex, C. Koch, Dendrol. i. 48-seq.?
fruiicosa, Bess. Cat. Hort. Crem. 116=arborescens.
Gerardiana, *Benth. in Royk, Illustr. Bot. Himal.* 198.—Reg. Himal.
glomerata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 48=microphylla.
gracilis, *Hort. ex C. Koch, 1. c.* 52.—Hab. ?
grandiflora, *DC. Prod.* ii. 268.—As. Min.; **Reg.** Casp.
Halodendrum, Hoftmgg. Verz. Pfl.46 = Halimodendron argenteum.
inermis, Moench, Meth. 185=arborescens.
jubata, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 89.—Sibir.
microphylla, *Lam. Encyc.* i. 616.—Sibir. alt.
mollis, Bess. Enum. PI. Volh. 29 - frutescens.
mongolica, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 270.—Mongolia.
mongolica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 47 = arborescens.
Moorcroftiana, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. l»8=Sophora Moorcroftiana.
nubigena, Bnnge, Monog. Astrag. 240=crassicaulis.
parvifolia, *Hoffmgg. Preisv. Pfl.* viii. *Anh.* 39; *ex Walp. Rep.* i. 6»1.—Hab. J
polyacantha, *Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 198.—Reg. Himal.
pygmaea, *DC. Prod.* ii. 268.—Reg.' Himal.; As. bor.
quadrifolia, Medic. Pfl.-Anat. 62=frutescens.
Redowskii, *DC. Mim. Ug.* 94. t. 11. f. 45.—Sibir.
rosea, Turcz. ex Maxim, in Prim. Fl. Amur. 470 = frute&cens.
sibirica, *Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 365.—Sibir.
sophoraefolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 47 = arborescens.
sophoraefolia, *Tausch, in Flora,* xxi. (1838) I. *Beibl.* **?7.-Hab.l**
splnosa, *DC. Prod.* ii. 269.—Sibir.
spinosa, Rich, ex DC. 1. c. 314=Pictctia squamata.
spinosissima, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 198 = Gerardiana.
tenuis, *Hoffmgg. Preisv. Pfl.* viii. *Anh.* 40; *ex Walp.* ft*, i. 881.—Hab. t
tortomensis, *Boiss. ex Tchihat. Asie* ***Min. Bot.*** i. 49, aomen.—As. Min.

CAKAGANA :—
tragacanthoides, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 90.—Sibir.
triflora, Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 41 - brevispina ?
nlicina. *Stocks, in Hook. Km Journ.* iv. (1852) 145.—Belnchist.
versicolor, Benth. in Royle, Ulustr. Bot Himal. 198. t. 84=pygmaea

CABAGUATA, [Plum.] Lindl. Bot. Reg. sab t1068 (1827). *BROMELIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 868.
DEVILLEA, Bert, ex Schnlt. f. Syst. vii. p. Izvii. 1229 (1830).
MASSANGIA, E. Morr. in Belg. Hortic. (1877) 59, 199. t. 8.
Andreana, *E. Morr. in Rev. Hortic.* (1884) 247.—N. Gnnat
angustifolia, *Baker, in Gard. Chron.* (1884) II. 616.—N. Granat
Angnstae, *Benth. V Hook./. Gen.* iii. 868.—Guiana.
Berteroniana, *Schult. f. Syst.* vii. II. 1229.—Porto Rico.
cardinality E. Andre, in Iliustr. Hortic. xxvii. (1880) t. S74; Rev. Hortic. (1883) 12=lingulata.
coriostachya, *Griseb. in Goett. Nadir.* (1864) 21.—Venezuela.
fulgens, *Griseb. 1. c.*—Venezuela.
Fuerstenbergiana, *Kirch, tf Wiitm. in Berl. Gartenteit.* (1883) 299.—Ecuador.
latifolia, Beer, Bromel. 78 = lingnlata.
lingulata, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1068.—Am. trop.
macrostachya, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xii. (1883) 122.—Porto Rico,
musaica, *E. Andre, in Ulustr. Hortic.* xxiv. (1877) t. 268.—N. Granat.
nitida, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1864) 21.—Venezuela.
Osyana, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxxv. (1885) 254.—Ecuador.
Peacockii, *E. Morr. 1. c.* 82.—Reg. Andin. ?
sanguinea, *E. Andre, in Rev, Hortic.* (1883) 468.—N. Granat.
serrata, Hort. Petrop. ex Antoine, Bromel. 46 » Karatas Scheremetiewii.
serrata, Schult. f. Syst. vii. II. 1231 = Tillandsia serrata.
sphaerocephala, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* t. 61.—Hab.?
splendens, Hort. ex Planch, in Fl. des Serres, (1856) 31.1.1091=lingulata.
Van-Volxemi, *E. Andre, in Ulustr. Hortic.* xxv. (1878) t. 326.—N. Granat.
Zahnii, *Hook./. Bot. Mag. t.* 6059.—Am. centr.

CABAIFA, Aubl. PI. Gui. i. 561 (1775), ex parte. *TERNSTROEMJACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 188.
africana, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 172.—Afr. trop.
angustifolia, *Aubl. PI. Gui.* i. 561.—Guiana,
calophylla, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1860) 61.—Bras.
calophylla. Sprang, ex Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. xiv. (1855) 166=glabrata.
costata, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1860) 61.—Am. austr.
densiflora, *Mart. Nov. Gen. et Sp. i.* 105.—Bras,
fasciculata, *Cambess. in Mlm. Mus. Par.* xvi. (1828) 416.—Guiana.
glabrata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 105.—Bras,
grandiflora, *Mart. I. c*—Bras,
latifolia, *Aubl. PI. Gui.* i. 661.—Guiana,
lanrifolia, *Spruce, ex Choisy, in Mem. Soc. Phys. Geniv.* xiv. (1855) 166.—Bras,
laxiflora, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 864.—Gniana.
leiantha, *Benth. I. c*—Guiana,
longifolia, *Aubl. PI. Gui.* i. 561.—Guiana.
•*myrciaefolia,* Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. v. (1860) 81=fasciculata.
paniculata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 104.—Bras,
parvifolia, *Aubl. PI. Gui.* i. 561.—Guiana,
ncemosa, *Cambess. in Mim. Mus. Par.* xvi. (1828) 415. t. 3.—Bras.
Rkhardiana, *Cambess. I. c.* 414.—Guiana.
Sellowii, *Turcw. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 678.—Bras,
maveolens, *Planch, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. (1860) 61.—Guiana.
surinamensis, *Mia. Stirp. Surin. Set.* 76.—Gniana.

CABAIFA :—
tereticaulis, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. in. viii. (1847) 841.—Guiana,
variabilis, *Cambess. in Mem. Mus. Par.* xvi. (1828) 416.—Guiana.

CARAJAEA, Wedd. in DC. Prod. xvii. 84 (1878) = Castelnavia, Tul. (Podostemac).
orthocarpa, Wedd. L c. 85 «• Castelnavia orthocarpa,

CABAIiZiIA, Roxb. ex R. Br. in Flind. Voy. ii. 549 (1814). *RHIZOPHOREAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 680.
BARRALDEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 24 (1809).
BARAULTIA, Spreng. Syst. ii. 813 (1825).
CATALIUM, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4880 (18S1?).
DKMIDOFIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818).
DIATOMA, Lour. Fl. Cochinch. 296 (1790), nomen prius.
KARE-KANDEL, Adans. Fara. ii. 88 (1763),
PETALOTOMA, DC. Prod. iii. 294 (1828).
SYMMETRIA, Blume, Bijdr. 1130 (1826).
Baraldeia, *Am. in Ann. Nat. Hist.* i. (1838) 371.—Madag.
calycina, *Benth, in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 76.—Zeylan.
celebica, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 131.—Ins. Celebes.
cerisopsifolia, Miq. Anal. Bot. Ind. iii, 8=integerrima.
ceylanica, Am. in Ann. Nat. Hist. i. (1838) 371 = integerrima.
confinis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 129=lanceaefolia.
corymbosa, Am. in Ann. Nat Hist. i. (1838) 371 = integenima.
cuspidata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 129.—Borneo.
densiflora. *Griff. Notul.* iv. 668.—Burma,
integerrima, *DC. Prod.* iii. 33.—As. et Austral, trop.
laqceaefolia, *Roxb. Hort. Beng.* [37]; *Fl. Ind.* ii. 481.—Burma; Malaya.
lanceolaria, Wall. Cat. n. 4881»lanceaefolia.
lucida, Roxb. ex Kurz, For. Fl. Brit. Bum. i. 451 - integerrima.
lucida, Roxb. Hort. Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 481 = lanceaefolia.
madagascariensis, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. iv. (1856) 117. t. 6.—Madag.
multiflora, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 131.—Borneo.
multiflora, Miq. Fl. Ind. Bat i. I, 594=floribunda.
obcordata, Wight, ex. Walp. Rep. ii. '71=integerrima.
octopetala, F. Muell. PI. Austr. Trap. Occid. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 74 = integerrima.
sinensis, Am. in Ann. Nat. Hist. i. (1838) 371 - integerrima.
symmetria, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 130= integerrima.
timorensis, Blume, 1. c 128=integerrima.
Tulasnei, *Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 20.—Ins. Marian.
aeylanica, Am. in Wight, Ulustr, Ind. Bot. t. 90= integerrima.

CABALIiTJHA.R. Br. inMem.Wem.Soc i. (1809) 25. *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 782.
adscendens, *R. Br. 1. c.*—Ind. or.
attenuate, *Wight, Ic.* iv. 15.1.1268.—Ind. or.
crenulata, Wall. PI. As. Rar. i. 6. t 7=Boucerosia crenulata.
edulis, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 76.—Ind. or.
fimbriata, *Wall. PI. As. Rar.* i. 7. t. 8.—Ind. or.; Burma,
subulata, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sit. U.* ix. (18S8) 267.—Arabia.
umbellata. Haw. Syn. PI. Succ 47 •= Boucerosia umbellata.

CARAMANICA, Tineo. PI. Rar. Sic. 8 (18471) = Taraxacum, linn. (Compos.).
taraxacoides, Tineo, 1. c. 4 = T. minimum.

CARAMBOLA, Adans. Fam. it 508 (1763)=Averrhoa, Linn. (Oxalid.).

CARANDA, Gaertn. Fruct.ii. 17. t. 88. f. 5 (1791) (Gen. dub. fructu deformato).
pedunculata, Gaertn. 1. c.—Zeylan.

CARANDAS, Rumph. ex Adans. Fam. ii. 171 (1763) = Carissa, Linn. (Apocyn.).

CARANGA, Vahl, Enum. i. 100 (1805) - Curanga, Jnss. (Scrophular.).
amara, Vahl, 1. c» Curanga amara.

CABAFA, Aubl. PI. Gui. ii. Suppl. 82. t. 387 (1775)-*MELIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 338.
• PERSOONIA, Willd. Sp. PI. it 331 (1800).
RACAPA, M. Roem. Syn. Hesper. 123 (1846).
TOULOVCOUNA, M. Roem. 1. c. (1846).
XYLOCARPUS, Koen. ex A. Juss. in Mem. Mus. Par. xix. (1830) 243.
ZELBA, Hort. ex Tenore, in Atti 3* Reun. Sc. Ital. (1841) 504.
ZURLOA, Tenore, I. c. 503 (1841).
cauliflora, Poepp. *8c* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 88= Gaurea Poeppigii.
guianensis, *Aubl. PI. Gui. Suppl.* 82.1387.—Guiana; Afr. trbp.
guineensis, Sweet, Hort Brit. ed. I. 72 ; Juss.in Mem. Mus. Par. xix. (1830) 242 = procera.
guyanensis, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 336=procera.
indica, A. Juss. in Diet. Sc. Nat vii. 81-moluccensis.
latifolia, Willd. ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i-718 = guiauensis.
moluccensis, *Lam. Encyc.* i. 621.—Geront. trop.
nicaraguensis, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 717--" Am. centr.
obovata, Blume, Bijdr. i. 179=moluccensis.
procera, *DC. Prod.* i. 626.—As. et Afr. trop.
Rumphii, Kostel. Allg. Med.-Pharm. FL v. 1988" moluccensis]
sericea, Poepp. 8c Endl: Nov. Gen. et Sp. iii. 39. t. 245 =Guarea trunciflora.
surinamensis, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 75.1.19.—Guiana-
Touloucouna, Guill. *Be* Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 128 [s] procera.
trijuga, Willd. ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i. *tt** —Guareahumilis.

CARAPICHEA, Anbl. PI. Gni. 167. t 64 (1776) * Cephaëlls, Sw. (Rubiac.).
Aubletii, DC. Prod. iv. 536=Ceph. involucrata.
guianensis, Aubl. PI. Gni. i. 168 = Ceph. involucrata.
Kappleri, Miq. Stirp. Surin. Sel. 181.—Guiana.
Patrisii, DC. Prod. *iv.* 536 = Ceph. Patristi.

CARARA, Medic. Pflanzeng. 34 (1792) = Senobierft, DC. (1799) (Crucifer.).
Coronopus, Medic. 1. c. 35=S. Coronopus.

CARAXERON, Vaill. ex Rafin. Fl. Tellar. iii. 38 (183«) -PhlloxoruB, R. Br. (Amarantac.).
brasiliense, Rafin. L c. = Telanthera dentata.
conicus, Rafin. 1. c.=P. conicus.
diffusus, Rafin. 1. c.-Gomphrena diffnsa.
vermicularis, Rafin. 1. c. =P. vermicularis.

CABHBNIA, Adans. Fam. ii. 116 (1763) (Carbeni)-*COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. *I* ii. 482.
BENEDICTA, Bernh. Syst. Verz. Erf. 108 (1800).
benedicta, *Adans. 1. c.* 116.—Reg. Mediterr. etCaucas-

CARCIA, Raeusch. Norn. ed. III. 275 (1797)=Qarei*' Rohr. (Euphorb.).

CARDA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. *• Art iv. 2 (Quid!).

CARDAMINDUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 388 (17[6S]) =Tropaeolum, Linn. (Geraniac.).
majus, Moench, Meth. Suppl. 20 = T. majus.
minus, Moench, 1. c. 21=T. minus.

CABDAMHO!, [Toum.] Linn. Syst ed. I (17**); Gen. ed. I. 176 (1737). *CRUCIFERAE,* Benth. * Hook. f. i. 69.
DENTARIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
HETEROCARPUS, Phil, in Bot. Zeit. xiv. (1856) *8*}:.
KARDANOGLYPHOS, Schlecht. in Linnaea, (1856) 472.
PTERONEURON, DC. Prod. i. 150 (1824).

CARDAMINE:—
ucaulis
acri
Armm
affinis,
137.
africana, *Linn. Sp. Pl.* 655.—Ind. or.
allevia, Comm. ex DC. Syst. ii. 252=af
alpina, *Willd. Sp. Pl.* iii. 481.—Europ.
amara, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 109=uliginosa.
amara, Lam. Encyc. ii. 186=pratensis.
amara, *Linn. Sp. Pl.* 656,-Europ.; As. bor.
amplexicaulis, *Haenss*
Hispan.
angulata, *Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 343. t. 89—Am. bor. occ.
a lata
angulata, Torr in Pacif. Rail. Rep. iv. 65, 77=pauciseeta.
angustifolia, *Rafin. Fl. Ludov.* 84-Lo.isiana.
anteniquana, Burch. ex DC. Syst. ii. 252=africana.
antiscorbutica, Banks, ex Griseb. in Goett. Abh. vi. (1854) 115=glacialis.
apetala, Gilib. Fl. Lituan. ii. 67=impatiens.
aprtala, Moench, Meth. 259=hirsuta.
appendiculata, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* ii. 281.—Japon.
arenosa, Roth,
armoracioides, *7* (1854) II. 298.
articulata, Pursh.
nudicaulis.
asarifolia, *Linn.* *Pl.* 654.—Europ.
auriculata, *S* *Nats. in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 319.—Calif.
axillaris, *in Ann. Sc. Nat. Sér. V. t.* (1864) 290.—]
ballidifoli
belgaumens
(1852) 29
bellidifolia, Al
bellidifolia, *Lin*
Bergeriana, An
Berro, *Steud. Nom*
bicolor, Opiz, ex J.
Bieizii, Schau. in Verh.
(1853) 64=ama
Bocconi, Vis. Prod
bonariensis, J
borbonica, Bo
borbonica, Pe
borealis, Andrz. ex
borealis, Laest. ex N
Boryi, Boiss.
brachycarpa,
(1879) 88.—Japon.
brachycarpa, Opiz, Natural, xi. (1826) 411 - impatiens.
S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 130.—
brasiliensis, *D. Dietr. Sp. Pl.* iii. 698.—Bras.
Breweri, *S. Wats.* *in Proc. Am. Acad.* x. (1876) 889—Am. bor. occ.
buchtormensis, Willd. ex DC. Syst.
bulbifera, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 101.—Europ.
Burchellii, Spreng. Syst.
calabrica, *Archang. in Nuov*
168.—Italia.
calbucana, *Phi*
Chili.
caldeirarum, *Guthn. in Seub. Fl. Azor.*
Azores.
camosa, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.*
—Thessalia.
caucasica, Willd
uliginosa.
chelidonia, S.
chelidonia, Lam. Encyc.
chelidonia, *Linn. Sp. Pl.* 656.—Italia; Hangar.
chelidonia, Pall. Reise, iii. 84=macropetala.
chelidonioides, *S. Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 130.—Japon.
chenopodifolia, *Pers. Syn.* ii. 195.—Am. austr.
chilensis, *DC. Syst.* iL 254.—ChiU.
circaeoides, *Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. v.* (1861) 144.—Reg. Himal.

CAKDAMINB:—
Ckmttitis, Shuttl. ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. S3.—Am. bor.
cognate, *Steud. in Flora*, xxxix. (1856) 409.—Chili,
colchagnensis, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* i. 115.—Chili,
cordata, *Barn. 1. c.* 109.—Chili,
cordifolia, *A. Gray, PI. Fendl.* 8.—N. Mexic.
Corsica, Jord. ex Nym. Consp. 38-graeca.
Corsica, *Sieber, ex Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 298.—Ins. Corsica.
corydaloides, Gnss. ex Spreng. Syst. ii. 888-glasca.
corymbosa, Hook. f. in Ic Fl. t. 686=hirsnta.
crassifolia, Opiz, Natural, xi. (1826) 412=amara.
cretica, Nym. Consp. 88-graeca.
croatica, Schott, Nym. *8c* Kotschy, Analect. Bot. 46 = camosa.
cuneata, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* n. 3 (1885) 74.—Calif.
Cupani, Jord. ex Nym. Consp. 38 =graeca.
currisiliqna, *Shuttl. ex, Chapm. Fl.* 5. *V. St. Suppl.* 206.—Florida.
dalmatica, Nym. Consp. 88 = maritima.
dasycarpa, tyeb. Fl. Taur. Cauc. iii. 487 = C. impatiens.
dasyloba, Bemh. ex Stend. Norn. ed. II. i. 280 = macrophylla.
debilis, Banks, ex DC. Syst. ii. 265 =hirsuta.
debilis, D. Don, Piod. Fl. Nep. 201=hirsnta.
decnmbens, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* i. 109.—Chili,
decnrrens, *Zoll. tfMoritn,' Syst. Verz.Zoll.36.* -Java,
demissa, *Triana V Planck, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvii. (1862) 60.—N. Granat.
dentariaefolia, Royle, ex Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 145 =» macrophylla.
dentata, Schult. Obs. 126=pratensis.
depressa, *Hook.f.Fl. Antarct.* 6.—N. Zel.
dictyosperma, *Hook. Journ. Bot.* i. (1884) 246.—Austral.
digitata, Richards, in FrarJtl. Nan. 1st Journ. 748 = pratensis 1
diphylla, *Wood, Bot. tf Fl.* 87.—Am. bor.
divaricata, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 13=stylosa.
diversifolia, Sterab. *Sc* Hoppe, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 156. t. 2 = Arabis Halleri.
drymeja, Schnr, Ennm. PI. Transs. 47-hirsuta.
duraniensis, *Revel, ex Des Moul. in Actes Linn. Soc. Bord.* xx. (1865) 466.—Gallia.
elegantnla, *Hook.f.* b* *Thorns, in Jturn. Linn. Soc.* v. (1861) 146.—Reg. Himal.
Engelmanniana, Ind. Sem. Hort. Berol. (1840); ex Heynh. Nom. ii. 118 = Arabis ludoviciana.
enneaphylla, *[R. Br. in] Ait. Hort. Ken.* ed. II. iv. 101.—Lurop.
Eschscholtndna, Andrz. ex Ledeb. El. Ross. L 128 = purporaa.
eustylis, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1854) 114.—Austral.
faeŕoeńsis, Hornem. in Fl. Dan. t. 1892 = Arabis petraea.
fagetina, Schnr, Enum. PI. Transs. 47=umbrosa.
fastigiata, *Hook. f. Handb. Nea . Zeal. Fl.* 13.—N/Zel.
flaccida, Bert, ex C. Muell. in Walp. Ann. vii.. 100 = macrorrhiza.
flaccida, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 21.—Chili,
flavescens, *Phil, in Anal. Vniv. Chil.* (1872) 667.—Chili.
ftexuosa, With. Bot. Arr. Brit. PI. ed. III. iii. 578 - sylvatica.
flnminensU, *Eichl. in Kjoeb. Vidmst.. Meddel.* (1870) 185. t. 8.—Bras.
foliosa, Wall. Cat n. 4779=macrophylla.
fontana, Lam. Fl. Fr. ii. 499=Nasturtium officinale.
fontinalis, Schor, Ennm. Fl. Transs. 48 = pratensis.
fossicola, Godet, Suppl. Fl. Jura, 18=pratensis.
Gambellii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 147.—Calif,
gelida, *Schott, in Oestr.Bot. Wochentl.* (1855) 145.—Tyrol.
geraniifolia, *DC. Syst.* ii. 26.8.—Reg. Magellan.
gilanensis, Willd. ex DC. 1. c 262-impatiens.
glacinlis, *DC. 1. c.* 264.—Reg. Magellan,
glandnlosa, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 521.—Ins. Pbilipp.
glauca, *Spreng. ex DC. Syst.* ii. 266.—Calabria.
glaucescens, Reichb. Ic PI. Crit. v. Index, 4 (Quid!).—Europ.

CAKDAICLWE:—
Gmelini, Tausch, in Flora, xix. (1836) 402 » macrophylla.
gongylodes, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1856) 664.—Chili.
graeca, Janka, ex Nym. Consp. 38=longirostris.
graeca, *Linn. Sp. PI.* 655.—Reg. Mediterr. or.
grandiftora, Hallier, in Bot. Zeit. xxiv. (1866) 209 <* pratensis.
grandiflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xv. (1842) 238=tenuifolia, *Turct.*
grandis, Schur, Enum. PI. Transs. 49= amara.
granulata, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 8 Chili.
granulosa, AH. Anct. Fl. Pedem. 16-pratensis.
Griffithii, *Hook. f.* &" *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 146.—Keg. Himal.
Hamiltonii, G. Don, Gen. Syst. i. 167=hirsnta.
hamulosa, Bertol. Mant. Fl. Alp. Apuan. 43 « resedifolia.
hastata, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 125-uliginosa.
hastulata, Sm. Engl. Bot. t. 469 = Arabis petraea.
hastulata, Steud. Nom. ed. II. i. 280=resedifolla.
hederacea, DC. Syst. ii. 264=thalictroides.
herbivaga, Jord. Diagn. L 129=pratensis.
heterophylla, Bory, in Ann. Sc. Gen. Phys. iii. (1820) 6-= Sisymbrium pinnatifidnm.
heterophylla, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1836) 278 = hirsuta ?
heterophylla. Host, Syn. PI. Austr. 366=resedifolia.
heterophylla, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 877^-Mont. Pyren.
heterophylla, *Wood, Bot. tf Flor.* 38.—Am. bor.
Heyneana, Welw. ex Reichh. Fl. Germ. Excurs. 676 - pratensis.
Hilariana, *Walp. Rep.* i. 137.—Bras,
hirsuta, *Linn. Sp. PI.* 655.—Reg. temp, et snbtrop.
hirsuta, Oed. in Fl. Dan. 1.148-amara.
hirsuta, Pall, ex DC. Syst. ii. 256=prorepens.
Huetii, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 18 = Sisymbrimn Huetii.
hnmilis, *Kit. in Linnaea*, zxxii. (1863) 496.—Hungar.
ibaguense, *Triana V Planch. inAnn.Se. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 60.—N. Granat.
impatiens, *Linn. Sp. PI.* 655.—Europ.; As. bor.; Keg. Himal.
impatiens, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 785=hirsuta.
indicn, *Burm./. Fl. Ind.* 140.—Java.
integrifolia, Gilib. Fl. Lituan. ii. 68=pratensis.
intermedia, Hook. Ic. PI. t. 258-tenuifoliai
intermedia, *Steud. in Flora*, xxxix. (1856) 410.—Chili.
Jamesoni, *Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 298.—Ecuador.
javanica, *Miq. Illustr. Fl. Archip.* t. 10.—Java.
Keckii x, A. Kern, in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xv. (1870) 280.-Europ.
kopaoniiensis, FanC. ex Nym. Consp. 37= glauca.
laciniata, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i.* (1855) 84.—Austral.
laciniata, Stead. Nom. ed. II. i. 281 = Thelypodium laciniatum.
laciniata, *Wood, Bot. (f Flor.* 38.—Am. bar.
Lamontii, *Nance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 863.—China,
latesiliqua, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 298.-N. Zel.
lati/olia, Lej. Fl. Spa, ii. 348=pratensis.
latifolia, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 77.—Europ. austr.
laxa, *Benth. PI. Hartv.* 158.—N. Granat.
Lechleriana, *Steud. in Flora*, xxxix. (1856) 409.—Chili.
legionensis, *Reut. Ind. Sem. Hort. Genev.* (1861) 4.—Hispan.
lenensis, Andrz. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 33 = bellidifolia.
Libertiana, Lej. Rev. Fl. Spa, 185 = amara.
liladna, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1886) 273 = tenuifolia.
litoralis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1865) Ii. 314.—Chili;
lobata, Moench, Meth. 260=P. graeca.
longirostris, *Janka, • Adat. Magyar. lU.'-Cf. Just, Sot. Jahresb.* (1876) 1061.—Banat.
lucorum, Boiss. & Huet, ex Boiss. Fl. Orient. L 161 = pectinata.
ludoviciana. Hook. Jonm. Bot. i. (1834) 191-Arabis Indoviciuift•

CAKDAMINB :—
Lunaria, Linn. Sp. PI. 656 = Ricotia Lunaria.
lyrata, *Bunge, in Mem. Sam. Etr. Pitersb.* ii. (1835) 578.—China.
macrophylla, Schnr, Ennm. PI. Transs. 49 = atnara.
macrophylla, *Willd. Sp. PL* iii. 484.—Reg. Himal.; Sibir.; Japon.
macrorrhiza, *Bert, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 281.—Chili,
magellanica, *Phil, in Anal. Univ. Chit.* (187S) 666.—Chili.
marginata, *Phil. 1. c.* (1865) ii. 324.-Chili.
maritima, *Portenschl. Enum. PI. Dalm.* 15.— Dalmat.
Matthioli, Moretti, ex Comol. Fl. Com. v. 187 - pratensis.
maxima, *Wood, Sot. V Flor.* S8.—Am. bor.
melananthera, Steud. Nom. ed. II. i. 280, 281=seq.
melanthera, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 445 samara.
Menziesii, DC. Syst. ii. 267 = Sisymbrinm canescens.
micrantha, Spenn. Fl. Frib. iii. 922=hirsuta.
microphylla, *Adams, in Mlm. Soc. Nat. Mosc.* v. (1817) 111.—Sibir. or.
microphylla, J. & C. Presl, Delic Prag. 15 = thalictroides.
minima, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 410.—Peniv.
minuta, Willd. ex DC. Prod. i. 150=microphylla.
monticola, *Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse,* iii. (1869) 112.—Gallia.
multicaulis, Hoppe, ex Schnr, Ennm. PL Transs. 47 = hirsuta.
multifida, Parsh, Fl. Am. Sept. ii. 440 = Sisymbrinm canescens.
multifida, *Wood, Bot. & Flor.* 38.—Am. bor.
muscosa, Vahl, ex DC. Syst. ii. 260 = hirsuta.
nana. *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* i. 108.—Chili,
nana, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 106.—Peruv.
nasturtiana, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 830=amara.
Nasturtii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 241 = nasturtiodes, *D. Don.*
nasturtiifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 281—nastur. tioides, *Bert.;* C. Berro.
nasturtioides, *Bert, in •Merc. Chil.* (1829)'; *Bull. J-trussac,* xx. (1SS0) 109; *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* i. 118.—Chill
nasturtioides, Camb. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 89 = Hilariana.
nasturtioides, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 201.—Nepal.
nasturtioides, Schur, Enum. PI. Transs. 48=pratensis.
Nasturtium, Wa'llr. Beitr. Fl. Hercyn. 235=amara?
nemopbila, *Phil, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 186.—Chili.
nemorosa, *Lej. Fl. Spa,* ii. 62.—Belgium,
nevadensis, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) n. 295.—Hispan.
nilagirica, SchlechL ex Hook. f. & T. Anders, in Fl. Brit. Ind. i. 188=subumbellata.
nipponica, *Franch. V Sat. Enum. PI. Jap.* i. 281.— Japon.
nivalis, *Gill, ex Hooh. Bot. Misc.* iii. (1883) 186 Chili.
nivalis Pall. Reise, ii. 740=Macropodium nivale.
nivalis, Schur, Enum. PI. Transs. 46 = resedifolia.
nivea, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 273 = dictyosperma.
nudicaulis, Linn. Sp. PL 654=Parrya macrocarpa.
nudicaulis, Pall, ex DC Syst. ii. 454 = Macropodium nivale.
nudicaulis, S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot. 54 = Parrya nudicanlis.
obliqua, *Hochst. ex A. Rick. Tent. FL Abyss, i.* 19.— Abyssin.
occnlta, *Homem. Hort. Hafn. Suppl.* 71.—China.
oligosperma, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 876 = Bieweri.
oligosperma, *Nutt. in Torr. &• Gray, FL N. Am.* 185. —Am. bor. occ.
olympica, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 19-uliginosa.
Opitii, C. & J. 1'resl, Fl. €ech. 136=amara.
orophila, *Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse,* iii. (1869) 112.—Gallia.
ovata, *Benth. PI. Hartw.* 158.—N. Granat.
oxycarpa, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xvii. (1842) 66-pectinate.
oxyphylla, Andre, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 128-pratensis?
paludosa, Knaf, in Flora, xxix. (1846) 293 = pratensis.
palustris, Peterm. in Kabenh. Bot. Centralbl. i. (1846) 47= pratensis.

CABDAMINE: —
paradoxa, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 111.—China.
parviflora. Linn. Syst. ed. X. 1131=hirsuta.
parvifiora, Snter, Fl. Helv. ii. 59=tetrandra.
paucijuga, Turcz. in Boll. Soc Nat Mosc. xxvii. (1854) It. 296=hirsuta.
paucisecta, *Benth. PI. Hartv.* 297.—Calif.
pectinata, Pall, ex DC. Syst. ii. 264 -impatiens.
pedata, *Regel V Tiling, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc.* xi. (1859) 47.—SibTr.
pensylvanica, Muhl. Cat. 60, ex Willd. Sp. PL iii. 486 =hirsuta.
pentaphylla, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 101 = pratensis.
pentaphylla, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 6.—Chili.
petiolaris, DC. Syst. ii. 264=graeca.
petraea, Linn. Sp. PI. 654 = Arabis petraea.
petraea, Townson, Trav. Hung. 490, 348 = Arabis arenosa.
picta. Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 292. t 12 = Porphyrocodon picture.
pilosa, Willd. ex DC. Syst. ii. 256 = prorepens.
pinnata, *[R. Br. in} Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 101. —Europ.
Plumieri, Vill. Prosp. 88-thalictroides.
polyphylla, D. Don, Prod. Fl. Nep. 201=macrophylla.
praecox, PalL ex Ledeb. Fl. Ross. i. 127= hirsuta.
pratensis, Hook. f. Fl. Tasm. i. 19=tennifblia.
pratensis. *Linn. Sp. PI.* 656.—Reg. temp.
praticola, Jord. Diagn. i. 128= pratensis.
propinqua, Cann. in Trans, linn. Soc. xii. (1819) 507 =hirsuta.
prorepcns, *Fisch. ex DC. Syst.* ii. 256.—Sibir.
pseudopratensis, Schur, ex Nichols, in Journ. Bot. xviii. (1880) 200 = pratensis.
pubescens, Stev. ex DC. Syst. ii. 256 = prorepens.
punicea, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 295.—Venezuela,
pnrpnrea, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 20.—Am. bor. occ.
purpurea, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 667 = pauci-secta.
pusilla, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 18.— Abyssin.
pusilla, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 665.—Chili.
pusilla, Schur, Enum. PI. Transs. 47 = hirsuta.
radicata. *Hook./, in Ic. PI.* t. 882.—Tasman.
ramosissima, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 409.—Chili.
raphanifolia, Pourr. in *Him.* Acad. TouL iii. (1788) 810=latifolia.
reflexa, *Rafin. Fl. Ludov.* 84.—Am, bor,
Regeliana, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat ii. 73 - hirsuta.
reniformis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1866) ii. 313. -^Chili.
repanda, Sm. ex DC. Syst. ii. 251; Prod. L 150= flaccida.
resedifolia, *Linn. Sp. PI.* 656.—Europ.
rhomboidea, *DC- Syst.* ii. 246.—Am. bor.
rhomboidea, Durand, Fl. Utah, 159=cordiiblia.
rigida, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 439.—Reg. Cancas.
rivularis, Schur, in Verb.. Siebenb. Ver. Naturur. iv. (1853) 61-pratensis.
rostrata, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1864) 115.—Chili.
rotundifolia, Bigel. FL Bost. ed. IL 252 = bellidifolia.
rotundifolia, Torr. & Gray, FL N. Am. L 88, pro parte =rhomboidea.
rubifolia, Sm. ex DC. Syst. ii. 252; Prod. i 160= flaccida.
runcinata, Pourr. in M<£m. Acad. Tonl. iii. (1788) 810 —latifolia, Sisymbrium pinnatifidum.
sarmentosa, *Forst. f. Prod. App.* 92, nomen.—Ins. Pacif.
saxatilis, Salisb. Prod. 269= impatiens.
scaposa, *Franch. PI. Davidian.* i. (1884) 33.—MongoL
scaiuriginosa, Wahlenb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 281 —pratensis.
Schaffneri, Hook. f. in Hemsl. Diagn. PL Nov. 2 = Gambelii.
scutata, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 839.—Japon.
senanensis, *Franch. V Sav. Enum. PL Jap.* ii. 280.—Japon.

CABDAMZNTE :—
serbica. Pang, ex Aschers. & Kan. Cat. Conn. Serb. 7« = carnosa.
setigera, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 404.—Hab.1
silvatica,* Auct. ride *sylvatica.
simensis, *Hochst. ex Oliver, Fl. Trap. Afr.* i. •!•— Abyssin.
Solisi, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1856) 410.—Chili,
spathulata, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 29.—Carolina.
stellata, Hook. f. Fl. Antarct. 7. t. 4 A=depress*.
stolonifera, Scop. FL Cam. ed. II. ii. 22 - Arabw stolonifera.
stolonifera, Tausch,Cat. 5-pratensis.
strietula, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 410.—Reg-Magell.
stylosa, *DC. Syst.* ii. 248.—Austral.; N. Zel.
sublyrata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 73 Nasturtium sublyratum.
subumbellata, *Hook, ex Hook. f. V T. Anders, in Fl-Brit. Ind.* i. 138.—Ind. or.
sylvatica, Bess. Primit. Fl. Galic. ii. 76=pratensis.
sylvatica, Link, in Hoffm. Phyt. Blaett i. (1803) 60~ hirsuta.
Tanakae, *Franch.* 6" *Sav. Enum. PI. Jap.* i. 36.— Japon.
tenella, Clark, Trav. ii. 117 = hirsute.
tenera, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) = pectinata.
tenera, S. C. *Gmel. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc* 179.—Reg. Caucas.; Persia.
tenuifolia, *Hook. Journ. Bot. i.* (1884) 247.—Austral,
teuuifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 288.—Sibir.
tenuirostris, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 6.—Chili-
teres, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 29=Nasturtium tanaceU folium.
ternata, Bory, ex DC. Syst. ii. 252=africana.
tetrandra, *Hegetschw. Fl. Schv.* 641.—Helvet.
thalictroides, *All. Fl. Pedem.* i. 261.—Europ. anstr.
tolimensis, *Planch,* to" *Linden, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvii. (1862) 59.—N. Granat.
trichocarpa, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. I =graeca.
trifolia, *Linn. Sp. PL* 654.—Europ. austr.
trifolia, PalL Reise, iii. 316-amara.
trifolia, Thunb. Fl. Jap. 260 = scutata.
trifolia, Wahlenb. Fl. Lapp. 179=amara.
trifoliolata, *Hook.f. &• Thorns, in Journ. Linn.Soc.* *• (1861) 145.—Reg. Himal.
triphylla, Pall. Reise, ii. 35=amara.
tuberosa, Bert, ex Steud. in Flora, xxxix. (1856) 409 *» cognata.
tuberosa, *DC. Syst.* ii. 254.—Chili.
udicola, Jord. Diagn. i. 130 = pratensis.
uliginosa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 438.—Ross, austr. i Oriens.
nmbrosa, *Andrz. in DC. Syst.* ii. 260.—Volhynia.
umbrosa, Lej. Fl. Spa, ii. 63 — amara.
unalaschcensis, Andrz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 127" hirsute,
undulata, *Laramb. &• Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr.* »*'• (1867) 62.—Gallia.
uniflora, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 29=LeavenwortnJ» Michauxii.
valdiviana, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1865) II. »"•—Chili.
variabUis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 6.—ChiU.
violacea. *Wall. Cat.* n. 4782.—Reg. Himal.
virginica, Linn,Sp. PI. 656=Arabisludoviciana.
virginica, Michx. FL Bor. Am. ii. 29-hirsuta.
viscosa, S. G. Gmel. ex DC. Syst. ii. 216=Att°K albida.
Volckmanni, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 7—Chili.
vulgaris, Phil. 1. c. xxviii. (1856) 665=pratensis.
Wtedmanniana, *Boiss. Fl. Orient, i.* 162.—Anatoli*.
Wightiana, Wall. Cat. n. 4780-africana.
Willdenouii, Tausch, in Flora, xix. (1836) 408' macrophylla.
yezoensis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xv»>- (1873) 277—Japon.
Zollingeri, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (18°* II. 294.-Java?

CARDAMINUM, Moench, Meth. 262 (1794) - &*' StUrtium, R. Br. (Crucifer.).
Nasturtium, Moench, 1. c.=N. oracinale.

CARDAMOMUM, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. *Ill.* I. Art. iv. 2; Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. U812) 282-Elettaria, Maton (Scitamin.).
abancum, Pritz. Ic. Ind. 207 - E. Cardamomum.
Schiult. Mant. i. 24 = Amomum costatum.
anale. Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 282 = Cardamomum.

CARDAMON, F. 8=Lepidium, Linn. (Crucif.).
tativum, Fourr. 1. c. - L. Mtivum.

CARDANTHEBA, Buch-Ham. ex Nees, in DC. Prod. xi. 8 (1847)- *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1074.
SVNNEMA, Benth. in DC. Prod. x. B88 (18"), nomenprius.
Hook. f. Gen U. 1076 - Afr. trop.
Ind. iv. 405.—Burma.
balsamica, Buch. Ham. ex Net DC- Prod. 68 = triflora.
Griffithii, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 4O4.-Assam; Burma.
longifolia, Buch.-Ham.ex Nees, in DC. Piod. xi. 90 = Hygrophila phlomoides.
pinnatifida, C. if. Cterfc, /to./. f7. TWaites, *Fl. Brit. Ind.* iv. 405.—Ind. or.
triflora, *Benih. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 68.-ina. or.; Malaya.
uliginosa, *I. c.* 69,-Ind. or.
verticillata, C. A aarfc.fn *Hook.f.Fl. Brit. Ind.* iv. 4O5.-Ind. or.

CARDARIA, Desv. Bot. iii. (1818) Lepidium, Linn. (Crucif.).
amplexicaulis, Spach, H.L. Vég. Phan. vi. 544 = L. amplexicaule.
brachypetala, Opiz, Seznam, 26-L. Draba.
cochlea, PaCh> Hist< V<Sfr Phan. M2=L. Draba.
crassifolia, Spach, 1. c. 545=L. crassifolium.
Draba, Spach, 1. c. (1813) 163-L. Draba L. latifolium.

CARDAMINA, Cass. in Dict. Sc- Nat. xxxv. 272 (1825) (Compos).
rZr. Cass. 1. c. xlviii. 447 ≡ S. reclfaatus.

CARDIA, Dulac, Fl. Veronica, Tourn. (Stellaria-).
agrestis, Dulac, 1. c. 388 - V. agrestis.
alpina, Dulac, l. c. 891 = V. alpina.
amplexicaulis, Dulac, l. c. 390 = V. Anagalli?.
aphylla, Dulac, l. c. = V. aphylla.
arvensis, Dulac, l. c. 888 = V. arvensis.
Beccabunga, Dulac, l. c. 390 = V. bunga.
ciliata, Dulac, l. c. = V. Chamaed
didyma, Dulac, l. c. 388 = V. didyma.
elliptica, Dulac, l. c. 890 = V. analoides.
filiformis, Dulac 389 = V. Tournefortii.
fruticulosa, Dulac, l. c. 891 = V. fruticulosa.
latifolia, Dulac, l. c. 390 = V. latifolia.
montana, Dulac, 1. c. 389 = V. montana.
multiflora, Dulac, l. c. 891 = V. serpyllifolia.
Nummularia, Dulac, l. c. 892 - V. Nummularia.
obtusifolia, Dulac, c. 391 = V. bellidioides.
officinalis, Dulac, l. c. 890 = V. officinalis.
orbicularis, Dulac, l. c. 888-V. acinifolia.
plana, Dulac, l. c. 391 = V. Teucrium.
praecox, Dulac, l. c. 389 = V. praecox.
prostrata, Dulac, l. c. 3 = V. Pona.
quadriloba, Dulac, l. c. 889-V. hederaefolia.
scutellata, Dulac, l. c. = V. scutellata.
serrata, Dulac, l. c. 91 = V. Ponae.
spicata, Dulac, l. c. 892 = V. spicata.
verna, Dulac, l. c. 888 = V. verna.

CARDIACA, [Tourn.] Linn. Syst. ed I (1735) = Leonurus, Linn. (Labiat.).
arvensis, Lam. Fl. Fr. ii. 383 = Stachys arvensis.

CARDIACA :—
crispa, Moerich, Meth. 401 = Leonurus Cardiaca.
glabra, Gilib. Fl. Lituan. i. 86=L. tatoricns.
Marrubiastrum, Medic. Beobacht. (1783) 127 - L. Marrnbiastrnm.
quinquelobaia, Gilib. FL lituan. i. 84 = L. Marrubiastrum.
Stachys, Medic. Beobacht. (1788) 126-L. Cardiaca.
sylvatica, Lam. Fl. Fr. ii. 384 = Lamium Galeobdolon.
trilobata, Lam. 1. c. 388 = L. Cardiaca.
vulgaris, Moench, Meth. 401=L. Cardiaca.

CARDIACANTHUS, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 714; et in DC. Prod. xi. 881 (1847)=Jaoobinia, Moric. (Acanthac,).
Neesianus, Schau. 1. c. 715=J. Neeiiana.

CABDIAUDBA, Sieb. & Zuca Fl. Jap. 119. t. 66, 66 (1835). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 643.
alternifolia, *Sieb. & Zucc. I. c.* 121.—Japon.

CARDIANTHERA, Hanee, in Joum. Linn. Soc. xiii. (1878) 114, sphalm.=Cordanthera, Buch.-Ham.

CARDINALIS, Rupp. Fl. Jen. id. HalL 248 (1746) = Lobelia, Linn.

CARDIOCARPUS, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 14 =8oulamea, Lam. (Simarub.).
amarus, Reinw. 1. c. =S. amara.

CAKDIOCHLAMTS, Oliver, in Hook. Ic. PI. t. 1403 (1888). *CONVOLVULACEAE*.
madagascariensis, *Oliver, I. c.*—Madag.

CARDIOCRINUM, Ijndl. Veg. Kingd. 205 (1847) = L. Lilin Toum.

CARDIOGYNE, Bur. in DC. Prod. xvii. 282 (1873)-Flecoepenniun, Tr^c. (Urtieac).
africana, Bur. L c. 238.—Afr. trop.

CARDIOLEPIS, Rafin. Neogen. 1 (1825)-BhaminiB, Toura.
nigra, Rafin. 1. c l = R-lanceolata.
obtusa, Rafin. Sylva Tellur. 28 - R. Purshiana.
rubra, Rafin. Neogen. I = R. lanceolata.
spinosa, Rafin. 1. c.—Am. bor.

CARDIOLEPIS, Wallr. Sched. Crit. 348 (1822) = Lepidium, Linn. (Crucif.).
dentata, Wallr. 1. c.=L. Draba.

CARDIOLOCHIA, Rafin. ex Reichb. Consp. 86 (1828) =Ariatoloeliia, Toum.

CARDIOLOPHUS, Griff, in Madr. Joum. Sc. iv. (1836) 376=Herpesti8, Gaertn. (Scrophular.).
decussata, Griff. 1. c.=»H. Hamiltoniana.

CARDIONEMA, DC. Prod. üi. 372- (1828)-Pentaoaena, BartL (lllecebrac).
multicaule, DC. 1. c. = P. polycnemoides.

CARDIOPETALUM, Schlecht. in Linnaea, ix. (1134) 828=Ihiguetia, St. Hil. (Anonac.)
calophyllum, Schlecht. I. c—Bus.

CARDIOPHORA, Benth. in Hook. Lond. Jonm. Bot. ii. (1843) 21ff = Boulamea, Lam. (Simarub.).
Hindsii, Benth. 1. c. = S. amara.

CAKDIOPTEHI8, Wall. Cat n. 8083 (18861). *OLACINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 35G.
PERIPTEXYGIUM, Hassk. in Hoev. *It* De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 142.
SIOJA, Buch.-Ham. ex LindL Introd. Nat. Syst. Bot. ed. II. 82 (1836).
kamulosa, Griff. Notul. iv. 542; Ic. PI. Asiat t. 598 = lobata.
jmaniea, Blume, Rumphia, iii. 206= lobata.
lobata, *Wall. Cat.* n. 8083.—Ind. or.
moluccana. Blame, Rnmphia, iii. 207=lobata.
quinqueloba, Hassk. Retzia, i. 64=lobata.
Rumphii, Baill. Adansonia, x. (1871-72) 280-lobaU.
subhamata, WaU. ex Baill. in DC. Prod. xvii. 26 = lobata.

CAHDIOSPEBMTTM, Linn. Syst. ed. I (1785). *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 393.
acuminatum, Miq. in Linnaea, xvii. (1848) 579 = microcarpum.
altissimum, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 38.—Bras,
anomalum, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 351.—Bras,
barbicaule, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 418.—Afr. trop.
canescens, *Wall. PI. As. Rar.* i. 14.—As. et Afr. trop.
clematideum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. 100.—Abyss,
coluteoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 100.—Am. austr.
Corindum, Linn.Sp. PI. 526 - C. Halicacabum.
corycodes, *Kunze, in Linnaea*, xviii. (1844) 359.—Cuba.
Duarteanum, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 3(9.—Bras,
elegans, *H. B.* 6" *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 99.—Petuv.
ferrugineum, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 276—Cuba.
glabrum, Schnm. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 197 = C. Halicacabum.
qrandiflorum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 64.—Jamaica.
Halicacabum, *Linn. Sp. PI.* 366.—Reg. trop.
hirsutnm, *Willd. Sp. PI.* iij. 467.—Afr. occ.
hispidum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 100.—Am. anstr.
inflatum, Salisb. Prod. 279 = C. Halicacabum.
iDflatnm, *Veil. Fl. Flum.* 158 ; iv. t. 22.—Bras,
integerrimum, *Radii, in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 260.—Bras.
Leuarthianum, G. Don, Gen. Syst. i. 657, sphalm. = Duarteanum.
loxense, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 104.—Pernv.
macrolophum, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 261.—Venezuela,
macrophyllum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 100.—Venezuela.
microcarpum, H. B. *Sc* K. 1. u. 104 = C. Halicacabum.
microspermum, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 170=C. Halicacabum.
molle, Hochst. ex A. Rich. Tent FI. Abyss, i. 100= clematideum.
molle, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 104.—Mexia
moniliferum, *Sv. ex Steud. Nam.* ed. II. i. 160.—Ind. occ.
oblongum; A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 101 = canescens.
ovatum, Wall. Cat. n. 8081 = canescens.
panriflorum, *Cambess. in St. Nil. Fl. Bras. Mer. i.* 851.—Bras.
pilosum, *Veil. Fl. Flum.* 169; Iv. t 26.—Bras,
pilosum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) 1.895.—Bras,
procumbens, *Radlk. in Sitmb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 262.—Bras.
pubescens, Griff. Joum. 108 = canescens.
pubescetts, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14-molle.
Schmiedelia,Dalz.Sc Gibs. Bomb. Fl. 34=Sehmiedelia villosa.
strictum, *Radlk. in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 262.—Bras,
tortuosum, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 9.—Calif,
triphyllum, *Veil. Fl. Flum.169;* iv. t 25.—Bras.
truncatum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 101 «=C. Halicacabum.
velutinum, *Hook. V Arn. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 158.—Bras.
vesicarum, Humb. Rel. Hist. i. 39 «= coluteoides.
mllosum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 84=Schmiedclia villosa.
villosum, *Mac/ad. Fl. Jamaic.* i. 154.—Ind. occ.
villosum, Mill, ex DC. Prod. i. 602=C. Halicacabum.

CARDIOSTEGIA, Presl, Epim. Bot. 249 (1849) = Helhania, Forsk. (Sterculiac).
Kotschyi, Presl, 1. c. 249-M. Denhami.

CARDIOSTIGMA, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 102 = 8phenostigma, Baker (Irid.).
longispatha, Baker, 1. c. =- S. longispatha.
nuda, KUtt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 388»Calydorea nuda.

CARDIOTHECA, Ehrenb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 282 (1840)=Anarrhinum, Desf. (Scrophularin.).
pubescens, Ehrenb. ex Steud. 1. c. = A. pubescens.
virgaia, Ehienb. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 862=A. orientale.

CABDOFATIT7K, Jots, in Ann. Mus. Far. vi. (1806) 324 in adn. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. £ ii. 46S.
BROTERA, Willd. Sp. PI. iii. 2399 (180S).
amethystinum, *Spach, in Ann. Sc. Nat. S6i.* III. v. (1840) 242.—Afr. bor.
apulum, Spach, 1. e. 240-corymbosum.
Billardieri, Spach, 1. c. 247=corymbosnm.
Boryi, *Spach, 1. c.* 245.—As. Min.
corymbosum, *Pers. Syn.* ii. 600.—Reg. Mediterr, or.; As. Min.
Fontanesii, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. v. (1846) 244.—Reg. Tunetan.
orientate, Jaub. & Spach, Illnstr. t. 426—corymbosum.
orientate, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IIL v. (1846) 237.—Graecia.
Vrionis, Heldr. in Boiss. FI. Orient, iii. 443'-corymbosum.

CABDUNCEIiIiTJS, Adans. Fam. ii. 116 (1763). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 488.
LAMOTTEA, Pomel, Mat Fl. Atl. 3 (18601).
ONOBROHA, Gaertn. Fruct. ii. 380. t. 160 (1791).
acaulis, Presl, Fl. Sic. i. p. xxx=pinnatus.
araneosus, *Boiss.V Sent. PI. Nov. Hisp. Diagn.* 18.—Hispan.
arborescens. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 216=Carthamus arborescens.
atlanticus, *Coss. & Dur. ex Coss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i. (1854) 240.—Algeria,
atractyloides, *Coss. (f Dur. ex Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* -278.—Algeria.
caernleus, *Less. Syn. Comp.* 6.—Reg. Mediterr.
calvus, *Boiss. V Reut. Pugill.* 64.—Afr. bor.
dianius, Webb, Iter Hisp. 83=caernleus.
eriocephalus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 100.—Afr. bor.
Hispanicus, Boiss. ex DC. Prod. vii. 804=caernleus.
iliafolius, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 277.—Afr. bor.
lucens, *Ball, in Journ. Bat.* xi. (1873) 370.—Morocco,
mitissimqs, *DC. Fl. Fr.* iv. 78.—Gallia.
monspeliensis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 121= seq.
monspeliensium, *All. Fl. Pedem.* i. 154.—Gall, austr.
pectinatas, *DC. Prod.* vi. 615.—Afr. bor.
pinnatus, *DC. I. c.* 614.—Oriens.
plumosus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 277.—Afr. bor.
rhaponticoides, *Coss.* fa" *Dur. ex Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 278.—Algeria.
tingitanus, DC. ex Duby, Bot. GalL i.281=caeruleus.
vulgaris, Loud. Hort. Brit. 332-monspeliensium.

CARDTJTJS, [Tonrn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 467.
ALFREDIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1815) 175.
CLAVENA, DC. Prod. vi. 633 (1887).
ONOPYXUS, Bubani, in NUOT. Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 319.
POLYACANTHA, Hill, Herb. Brit L 69 (17 9).
PTERNIX, Hill, Veg. Syst. iv. 16 (1762):
abyssinicus, *Sch. Bip. in Linnaea,* xix. (1847) 382.—Abyssin.
acanthifolius, Lam. Encyc. i. 708 = Cnicus oleracens.
Acanthium, BailL Hist PI. viii. 289 - ,Onopordon Acanthium.
acanthocephalns, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 71.—Reg. Caucas.
acanthoides, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 231, sec Nym. Consp. 411 = nutans.
acanthoides, Hornem. in FL Dan. t 1341 - Cnicus palustris.
acanthoides, Huds. FL Angl. ed. II. ii. 361 = pycnocephalus.
acanthoides, *Linn. Sp. PI.* 821.—Europ.; Reg. Caucas.
acanthoides, PalL ex Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 268 = hamulosus.
acanthoides, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 361 =nutans.
acantholepis, *Benth. in Benth. If Hook.f. Gen.* ii. 468.—As.centr.
Acarna, Linn. Sp. PI. 820 = Cnicus Acaraa.
acaulis, Linn. 1. c. 1199—Cnicus acaulis.
acaulis, Thunb. Fl. Jap. 806 - Cnicus japonicus.
acicularis, *Bertol. in Ann. Sc. Nat. Sir.* I. i. (1829) 274.—Italia.
acuminatus, Gand. ex Reichb. Ic. FL Germ. xv. 90. t 872-acanthoides.
adpressns, *C. A. Mey. Verx. Pfl. Cauc.* 71.—Reg. Caucas.

CABDTJTTS :—
afer, Jacq. Hort. Schoenb. iL 10-Cnicus afer.
affinis, *Guss. PI. Rar.* 834. t. 67.—Neapol.
aggregates, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 11-nutans?
agrestis, Presl, Fl. Sicul. p. xxx, in nota-corymbosus.
Aitonii, Raeusch. Norn. ed. III. 229 (Quid!).
alatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 167 - Jnrinea alata.
albidus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 269-pycnocephalus.
albidus, Lam. Fl. Fr. ii. 18=praec. ?
algeriensis.Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. iL (186S) 285.—Algeria.
alpestris, Waldst. & Kit PL Rar. Hung. iii. 296. t 267—arctioides.
attaints, Patrin, ex S. G. Gmel. Fl. Sib. t. 89. f. 2 = Serratula glauca.
altissimus, Gilib. Fl. Lituan. iii. 186 = Cnicus palustris.
altissimus, Linn. Sp. PL 824=Cnicus altissimus.
ambiguus, Pers. Syn. ii. 389—Cnicus heterophyllus.
ammophilos, *Hoffmgg. V Link, Fl. Port.* iL 187.—Lusitan.
amplexicaulis, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 11.—Malaya.
Amsteinii x, Broegg. in Jahresb. Naturf. Get Graub. II. xxiii.-xxiv. (1880) 106.—Helvet.
anglicus. Lam. Encyc i. 705-Cnicus pratensis.
angustifolius, *Lam. I. c.* 703.—Hab. 1
antarcticus, Auct ex Steud. Nom. ed. I. 152—autareticus.
appeninus, Jan, ex DC. Prod. vi. 622=nutans.
arabicus, Jacq. ColL i. 56=pycnocephalus.
arachnoideus, Bieb. ex Steud. Nom. ed. IL i. 283 = Cnicus arachnoideus.
araneosus, Steud. Nom. ed. I. 151 = Cnicus araneosus.
arctioides, VilL Hist. PI. Danph. ii. 22-Personata.
arctioides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1656.—Europ.
arenarius, DC. FI. Fr. vi. 457 •= Candollei.
arenarius, *Desf. Fl. Atlant.* iL 99.—Afr. bor.
Argemone, Pourr. in Lam. Eneyc. i. 700=carlinaefolius.
argentatus, *Linn. Mant.* ii. 280.—Reg. Mediterr. or.; Mesopot
argentatus, Willd. ex Steud. Nom. ed. IL i. 283 = pycnocephalus.
argiroa, Nym. Consp. 418=argyroa.
argutus, Sweet, Hort. Brit ed. I. 213 = Serratula tinctoria.
argyracanthus, Wall. Cat. n. 2903=Cnicus Wallichii.
argyroa, *Bivona, Stirp. Rar. Stuit.* i. [7J.—Sicilia.
argyroa, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 760 ~ malacitanus.
armatus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 104 = croniua.
armatus, Steud. Nom. ed. L 151=Cnicus armatus.
armenus, Boiss. Fl. Orient, iii. 616-nutans.
arvensis, Robs. Brit. Fl. 168 =Cnicus arvensis.
Aschersonianus x, *Ruhm. in Eichl. Jahrb. Berl.* i. (1881) 289.—German.
astracanicus, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 49.—Astracan.
atlanticus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 28.—Afr. bor.
atriplidfolius, Trevir. Hort. Wratisl. 1820-Serratula atriphcifolia.
auriculatus, Wall. Cat. n. 2899 - Saussurea hypoleuca.
auroficus, Chaix, ex ViU. Fl. Delph. 90 sphalm.=seq.
aurosicus, *ViU. Hist. PI. Dauph.* iii. 7.—Gallia.
australis, Jord. Gr. Rec. Bot. Gren. (1849) 14-vivariensis.
australis, Linn. f. SnppL 848—pycnocephalus.
autareticus, ViU. Hist. PL Dauph. iii. 12 = Cnicus heterophyllus.
axillaris, Gaud. Fl. Helv. ii. 169-acanthoides.
baeocephalus, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* ii. 873.—Ins. Cflimr.
baeticus, *Boiss. (f Reut. Pugill. PI. Nov.* (1852) 63.—Hispan.
Balansae, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii 44.—Algeria.
Ballii, *Hook. f. in Journ. Bot.* xi. (1873) 368.—Marocco.
Barrelieri, *Bertol. ex Nym. Consp.* 411.—Liguria.
benedictus, Auct ex Steud. Nom. ed. 1.161 -Carbenia benedicta.
bicolor, Visiani, Fl. Dalm. iL 48. t. 49. fig. 2 = argyroa.
bihariensis x, Simk. in Termész. Füietek, v. (1681) 51.—Transsylv.

CABDUUB :—
Boujarti, Pill. *Sc* Mitterp. Iter Poseq. i. 143. t IS - Cnicus arachnoideus.
Boujarti, Savi, Fl. Pis. ii. 243-Cnicus ferox.
Bourgaeanus, Boiss. *Sc* Reut. Pugill. PL Nov. (1852) 62-Reuterianus.
Bourgeaenus, *Sch. Bip. ex Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 44.—Ins. Canar.
brachycephalus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859)68=collinus.
bulbosus. Lam. Encyc. i. 705—Cnicus tuberosus.
caernleus, *Brot. Fl. Lusit.* i. 342.—Lusitan.
caesius, *Andre, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1888) 498, nomen.—Rossia.
Caflischii x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii.-xxiv. (188U) 106.—Helvet.
callosus, *Steud. Nom.* ed. II. i. 283.—Hab. ?
camporum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 45.—Rumel.
canaliculatus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 522 — carlinaefoUus.
candicans, Waldst. *Sc* Kit. PL Rar. Hung. L t 83 = collinus.
Candollei, *Moretti, PI. Ital. Dec.* ii. 10.—Gallia; Ital.
canus, Linn. Mant. 105—Cnicus canus.
Canduelis, Gren. in Billotia, L (1864) 14= arctioides.
carlinaefolius, *Lam. Encyc*, L 700.—Europ.
carlinae/olius, Nym. Consp. 412 = defloratus.
carlinaefolius, Tenore, Prod. Fl. Neap. 48 — chrysacanthus.
carlinoides, Dur. ex DC. Prod. vi. 625=confertus.
carlinoides, *Gouan, lllustr.* 62. t. 23.—Mont Pyren.
carlinoides, Steud. Nom. ed. II. i. 288 = Cnicus carlinoides.
carlinoides, Tenore, Prod. Fl. Neap. 48 » chrysacanthns.
carniolicus, Pers. Syn. ii. 888-Cnicus rnfescens.
carolinianus, Walt. Fl. Carol. 195 = Cnicus muticus.
Carolorumx, Howie *Sc* Jenner, in Trans. Bot. Soc. Edinb. ix. (1868) 260.—Scotia.
carpetanus, Boiss. *Sc* Rent. Diagn. PI. Hisp. 19. n. 35 = Gayanus.
carthamoides, Steud. Nom. ed. I. 151=Leuzea carthamoides.
Casabonae, linn. Sp. PI. 823 = Cnicus Casabonae.
caucasicus, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 64 = Cnicus horridus.
caulescens, Pers. ex Steud. Nom. ed. I. 161 — Cnicus acaulis.
ceutauroides, Bucb.-Ham. ex DC. Prod. vi. 663 = Volutarella divaricate.
centauroides, D. Don, Prod. Fl. Nep. 167 - Serratula centauroides.
centauroides, Hoppe, ex DC. Prod. vi. 628=arctioides.
centauroides, Linn. Sp. PL ed. II. 1148 *(-Cnicus cynaroides).*
cephalanthus, *Viv. fl. Con. Sp. Nov.* 14.—Sardin.
cerinthifolius, ViU. Prosp. SO-Serratula nudicaulis.
cerinthoides, Willd. Sp. PI. iii. 1660 = Serratula nudicaulis.
cemuus, *Bertol. FL Guatimal.* 31.—Guatemal.
cernuus, *Steud. Nom.* ed. I. 161.—Sibir.
Chailleti, Godr. Fl. Lorr. ii. 42=Cnicus palustris.
chamaecephalus, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 434.—Abyssin.
chinensis, DC. Prod. vi. 629—Cnicus chinensis.
chius, *Jacq. Hort. Vindob.* iii. 7.—Ins. Chios,
chrysacanthus, *Tenore, Sem. Hort. Neap.* (1825) 12.—Hispan.; Italia.
cichoraceus, Cyr. PL Rar. Neap. Fasc. iL 17. t. 7 = Serratula cichoracea.
ciliatus, Murr. in Comm. Gott (1784) 35. t. 6=Cnicus ciliatus.
ciliatus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 198 = Gayanus.
ciliatus, ViU. Prec. Voy. 45 = Cnicus spathulatus.
cinerascens, *Hort. Huber, in Rev. Hortic.* (1872) 60—Am. bor. I
cinereus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iL 270 = pycnocephalus.
cirsdformis, *Vuiot. in Rod Jugos. Akad. Zagreb*, xxxix. (1877) 206.—Europ.
cirsioides, ViU. Prosp. 80—defloratus.
Cirsium, MiU. Gard. Diet ed. VIII. n. 6-Cnicus dissectus.
cUvuUtus, *Link, in Buck, Beschr. Canar. Ins.* 147.—Ins. Canar.
collinus, *Waldst. V Kit. PI. Rat. Hung.* iii. 267. t. 232.—Europ. austr. or.

CAKDTJTJ8 :—
comosus, Lam. Encyc. i. 70S=Cnicns spinosissimus.
cmfertus, Bourg. ex Willk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 194-baeticus.
con/ertus, Moris, Elench. PI. Sard. ii. S - myriacanthus.
congestus, Gun. in Tenon, SylL 412—cephalanthus.
corbariensis, *Timb. V Tktśven. in Mini. Acad. Toulouse,* Sér. VII. vi. (1874) 647.—Europ.
coronaia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 167=Serratula coronata.
corsicus, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt Canar. ii. 375-clavulatus.
corymbosus, *Ignore, Prod. Fl. Neap.* 48.—Italia.
Cosmelii, Adam, ex DC. Prod. vi. 637, 638-Cnicus lappaceus.
crassifolius, Willd. Enum. Hort Berol. 8S8 - defloratus.
creticus, Lam. Encyc. i. 701—Cnicus pungens.
crispus, Gouan, Fl. Monsp. 827 = tenuiflorus.
crispus, Guir. ex Nym. Consp. 413 = Renterianns.
crispus, Hnds. Fl. Angl. ed. II. ii. 860=acanthoides.
crispus, *Linn. Sp. PI.* 821.—Europ.; As. bor.
cronius, *Botut. V Heldr. Diagn.* Ser. I. vi. 105.—Graecia; As. Min.
cyanoides, Linn. Sp. PI. 822-Jurinea cyanoides.
cyanoides. Pall. Reise, iii. 594-Jurinea polyclonos.
Cynara, Lam. ex Stead. Norn. ed. II. i. 288 = Cnicus cynaroides.
cynaroides, Lam. Encyc. i. 702 = Cnicos cynaroides.
Deamdollei, Anct. ex Steud. Norn. ed. II. i. 283 = Candollei.
defloratus, *Linn. Syst.* ed. X. 1200.—Enrop.
demidecurrensx, Franch. Fl. Cher-et-Loire, 817.—Gallia.
dentatus, Pen. Syn. ii. 889-Kentrophyllumdentatum.
desertorum, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. 283 (cf. *Cirsium desertorum).*—Sibir.
diacantha, Labill. Ic PI. Syr. dec. i. 7 = Cnicus diacanthus.
discolor, Hook. Fl. Bor. Am. i. 802 = Cnicus Hookerianus et nndulatus.
discolor, Nutt. Gen. Am. ii. 180-Cnicus altissimus.
dissectus, Linn. Sp. PI. 822 = Cnicus dissectus.
dissectus, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 15 = Cnicus pratensis.
divaricates, Gilib. FL Lituan. i. 187 = Cnicus lanceolatus.
dlversifolins, *Wall. Beitt- Fl. Hercyn.* 267.—Europ.
dubiusx, Balb. Cat Hort. Taur. (1813)=crispns.
Duriaei, *Beits. V Rent. Pugill. PI. Nov.* (1852) 64.—Algeria.
tckinatus, Desf. Fl. Atlant. ii. 247 = Cnicus echinatus.
echinocephalus, Pers. ex Steud. Norn. ed. I. 152 = Cnicus echinocephalus.
elegans, *Pall, ex Georgi, Beschr. Russ. Reich,* iii. IV. 1224—Rossia.
elegans, Salisb. Prod. 185=Cnicns Casabonae.
elegans, Stephan, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 678 = Cousinia wolgensis.
elegans, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 283 = Cnicus igniarius.
elongatus, Wall. Cat. n. 2900 = Tricholepis elongate.
'riophorus, linn. Sp. PI. 823=Cnicus eriophorus.
**riophorus,Pall* ex Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 276 = Cnicus fimbriatus.
Tiophoms, Thunb. Fl. Jap. 805 = Cnicns japonicos.
Erisithales, Jacq. Enum. Vindob. 146, 279 = Cnicus ochroleucus.
Erisitkales, Vffl. Hût. PI. Dauph. it 20=Cnicus rivularis.
"vcagineus, Lam. Encyc. i. 764 = Cnicus ochroleucus J
ćsdraelonicus, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 90 = argentatus.
wsciculiflorus, *Viv. App. Alt. Fl. Cars.* 8. t. 1.—Corsic; Sardin.
fastigiatus, Moris, Elench. PI. Sard. ii. 5-argyroa.
Mox, Vill. Prosp. 30; Lam. Encyc. i. 703=Cnicus ferox.
fimbriatus, Steud. Norn. ed. II. i. 284= Cnicus. fimbriatus.
firmus, Steud. 1. c. ed. I. 152 = Cnicus firmus.
"•vescens, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 894.—•'ontus.
fiayescens, Linn. Sp. PI. 826-Senatula flavescens.
Jniosus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 803-Cnicus foliosus.
Forsteri x, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 173.—Anglia.
fatićosus, Desf. Tabl. Hort Par. ed. I. 81-Cnicus uuticosus.

CAKDITUS:—
fruticosus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 199=Carlina xeranthemoides.
Galactites, Bory ft Cnaub. Fl. Pèlop. 56 - Galactites tomentosa.
Galactites, Lam. Encyc. i. 701-pycnocephalus.
Gayanus, *Dur. ex DC. Prod.* vi. 625.—Hispan.
getulus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 275.—Afr. bor.
giganteus, Desf. Fl. Atlant. ii. 26. t. 221-Cnicus gigantens.
Gigas, Ucria, in Roem. Arch. i. 70=Cnicus giganteus.
glaber, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2907 - Tricholepis radicans.
glaber, Nutt. Gen. Am. ii. 129=Cnicns muticus?
glaber, Steud. Nom. ed. I. 152-Cn. spinosissimus?
glaucophyllus, Desf. ex DC. Prod. vi. 628 = defloratus.
glaucus, Baumg. Transs. iii. 58-defloratus.
glaucus, Cav. Ic. iii. 13. t 223=Serratula nudicaulis.
glaucus, *Ledeb. Hort. Dorp. Suppl.* i. 2.—Rossia.
glomeratus, Lam. FL Fr. ii. 20-Cnicns pratensis.
glutinosus, Beck, Bot. N. ft Mid. St. 173=Cnicus muticus.
glycacanthus, Sibth. ft Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 150 = Jurinea glycacantha.
Gmelini, Steud. Nom. ed. 1.152-Cnicus acaulis.
gnaphalodes, Cyr. PL Rar. Neap. Fasc i. 27-Cnicus gnaphalodes.
Gouani, Steud. Nom. ed. I. 152-Cnicus tuberosns.
granatensis, Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 118 = platypus.
Grenieri, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 412=C. Personate.
haemorrhoidalis, Auct. ex DC. Prod. vi. 643 = Cnicus arvensis.
hamulosus, *Ehrh. Beitr.* vii. 166.—Europ. austr. or.; Reg. Caucas.
hamulosus, Tenore, Prod. Fl. Neap. 48=nutans.
hastatus, Lam. Encyc. i. 704-Cnicus heterophyllus.
helenifolius, Salisb. Prod. 185-Cnicus heterophyllus.
helenioides, Linn. Sp. PI. 825 = Cnicus heterophyllus.
heteromallus, D. Don, Prod. FL Nep. 166=Sanssurea candicans.
heterophyllus, Linn. Sp. PL 824 = Cnicus heterophyllus.
Hippolyti, Bory ft Chaub. Exp. Mor. 241. t. 29 = Cnicus pungens.
hispanicus, Bory, ex DC. Prod. vii. 304 = carlinoides.
hispanicus. Lam. Encyc. i. 701=Cnicus hispanicus.
horridulus, Pers. Syn. ii. 390-Cnicus horridulus.
horridus, Adam, in Weber ft Mohr, Beitr. i. 66 = Cnicus munitus.
hybridus, Steud. Nom. ed. 1.152=Cnicus ochroleucus.
hymenolepis, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 272.—Daghestan.
hyssopifolius, Schur, Enum. PL Transs. 895, Index= Serratula heterophylla.
Hystrix, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Caucas.* 71.—Persia.
igniarius. Pall, ex DC. Prod. vi. 657-Cnicus igniarius.
illyricus, Baill. Hist PL vili. 289 - Onopordon illyricum.
inclinans. Stokes, in With. Bot. An. Brit PL ed. II. ii. 870-crispus.
inclinatus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 522-medius.
indicus, Klein, ex Wall, in DC. Prod. vi. 664 = Tricholepis angustifolia.
inermis, Pen. Syn. ii. 888-Cnicus centauroides.
intermedius, Heller, ex Steud. Nom. ed. I. 162 = Cnicns intermedius.
intricatus, Reichb. f. Ic FL Germ. xv. 91. t. 866 = Candollei.
intricatus, *Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xv. (1868) p. lxxxvi.—Mont. Pyren.
involucratus, WalL Cat. n. 2902-Cnicus involucratus.
italicus, Savi, Bot. Etrnr. iii. 140=Cnicus italicus.
Jacquini, Steud. Nom. ed. L 152-Cnicus pyrenaicus.
japonicus, Franch. PL Davidian. i. 178 - Cnicus japonicus.
Kahenoe, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 275.—Afr. bor.
Killiasii x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii.-xxiv. (1880) 106.—Europ.
Kosmelii, Adam, in Weber *V* Mobr, Beitr. i. 66 = Cnicus lappaceus.
laciniatus. Lam. Encyc. i. 706 — Cnicus palustris.
laciniatus, Ledeb. Fl. Ross. ii. 722=odpressus.
lach/olius, Stokes, Bot. Mat Med. iv. 141-Silybum Marianum.
lanatus, *Brat. Ft. Lusit.* 842.—Lusitan.

CABDTJTTS :—
lanatus, tRoxb. ex Poir. Encyc. vi. 665 - Cnicus arvensis.
lanceatus, Hill, Veg. Syst iv. 14=Cnicus lanceolatus.
lanceolatus, Linn. Sp. PL 821 = Cnicns lanceolatus.
lanceolatus, Lour. Fl. Cochinch. ii. 638 = chinensis.
laniflorus, Steud. Nom. ed. 1.152-Cnicus lanifloras.
lanuginosus, *Willd. Sp. PI.* HI 1648.—As. Min.
lappaceus, Bieb. Casp. 198-Cnicuslappaceus.
lappoides, Less, in Linnaea, v. (1880) 129-Cnicus lappoides.
latifolius. Banks, ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soe. iv. (1831) 28 (= *Cirsium latifolium).*—Ins. Madera.
laxiflorus, *Tausch, in Flora,* xü. (1829) Erg. 41.—Austria,
leptacanthus, *Fresen. in Mus. Sencienb.* iii. (1845) 70. ^Abyssin.
leptocladus, *Dur. in Duch. Rev. Bot.* L (1846-46) 862.—Algeria.
leptophyllus, Gaud. FL Helv. v. 171-defloratns.
leucantkemos, Schur, Enum. PL Transs. 417 - C . Personata.
leucanthus, Cav. Ic ii. 52. t. 165 - Serratula flavescens.
leucocephalus, Pen. Syn. ii. 887 - Cnicns leucocephalus.
leucographus, Linn. Sp. PI. 820 = Tyrimnus leucographus.
leucopbyllus, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Most.* v. (1832) 194.—Mongolia.
linearis, Thunb. Fl. Jap. 805-Cnicus Unearis.
litigiosus, Moris, Llench. PL Sard. i. 26 - pycnocephalus.
litigiosus, Nocca ft Balb. Fl. Ticin. ii. 99. t. 12 - Candollei.
littoralisx, *Borb. in Magyar Nbvent. Lapok,* ix. (1885)69.—Enrop.
Lomonossowii, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* i. (1871-72) 1B3.—Mongolia.
lucidus, Moench, Meth. 654-pycnocephaha.
lucidus, Wall. Cat n. 2895=nutans.
lycopi/olius, Vill. Prosp. 30-Serratula heterophylla.
macranthus, Habl. ex Boiss. Fl. Orient iii. 496-Cousinia Habliztii.
macrocephalus, Coss. in Bourg. ex Willk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 198=chrysacanthus.
macrocephalus, Desf. Fl. Atlant ii. 246-nutans.
macrocephalus, Wall. Cat n. 2904-Jurinea macrocephala.
macrolepis, Peterm. in Flora, xxvil. (1844) 492 - nutansi
macropterus, Fisch. ex Spreng. PugilL L 64 - Jurinea polyclonos.
malacitanus, *Boiss. V Rent. Pugill. PI. Nov.* (1852) 62.—Hispan.
Mariae, Crantz, Inst. i. 248 =Silybum Mariannm.
Marianus, Linn. Sp. PL 823=Silybum Marianum.
marmoratus, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. II. iii. 43.—Peloponnes.
Martrinii, Timb. in Martr. Fl. Tarn, 877 = nigrescens.
medius, *Gouan, lllustr.* 62. t. 24.—Mont Pyren.
m«iius,'Steud. Nom. ed. I. 152-Cnicus tuberosus.
meonanthus, *Hoffmgg. V Link, fl. Port.* ii. 186.—Hispan.
mexicanus, Moric. ex DC. Prod. vi. 68/ - Cnicni mexicanus.
microcephalus, Gaud. FL Helv. v. 168-tenuiflorus.
microcephalns, *Tenore, Syll. App.* iv. *ex Fl. Nap.* v. 206.—Italia.
mitts, Steud. Nom. ed. 1.158-Cnicus mitis.
molds, Bieb, Fl. Taur. Cauc ii. 272 — Jurinea arachnoidea.
mollis, Gouan, lllustr. 63-Jurinea humilis.
mollis, Linn. Cent. Pi. Rar. ii. 30-Jurinea mollis.
mollis, Pollich, Fl. Palat. ii. 421 = Jurinea cyanoides.
mollis, Vill. Hist. PL Dauph. ii. 17 = Cnicus acaulis.
monocephalus, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturm.* iii. (1852) 87.—Europ.
monspessulanus, Linn. Sp. PL 822 — Cnicns monspessulanus.
montanus, Pers. Syn. ii. 388-Cnicus montanus.
montanus, Snffr. ex DC. Prod. vi. 625 = Candollei.
montosus, Pollini, Viag. Lag. Gard. 115 - defloratns.
Morisii, Balb. in Moris, Elench. PL Sard. 26 -fasdculifloras.
Morittii x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii.-xxiv. (1880) 106.—Enrop.

CABDUUS:—
mosehatus, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccadif. (1825) - Jurinea mollis.
multiflorus, Gaud. Fl. Helv. v. 166 = acanthoides.
multiflorus, PanS. ex Nym. Conip. 414 = Pancicii.
multijugus, C. Koch, ia Linnaea, xxiv. (1851) 392 •= adpressus.
muticus, Pen. Syn. ii. 386 = Cnicus mutiens.
myriacanthus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 861 = Reuterianus.
myriacanthus, *Salmtn. in DC. Prod.* vi. 624.—Reg. Mediterr. occ.
Naegelix, Bniegg. in Jahresb. Nat Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 107.—Enrop.
negleetus, Stend. Nom. ed. I. 158=Cnicnsuli|;inosus.
neglectus, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1880) 14 = acicularis.
nepalensis, Spreng. ex DC. Prod. vi. 642=Jurinea macrocephata.
nervosus, *C. Koch, in Linnaea,* xvii. (1848) 42.—Armenia.
nidulans, *Rupr. Serf. Tiansch.* 56.—As. centr.
nigrescent, Mutel, ex Nym. Consp. 412 = vivariensis.
nigrescens, *Vill. Prosp.* 80.—Europ.
nitidus, Waldst &• Kit. PI. Rar. Hung. i. 62 -SerratuU heterophylla.
nitidus, Wall. Cat. n. 2908 = Tricholepis angnstifolia.
niveus, *Benth. in Benth. (f Hook./. Gen.* ii. 468.—As. centr.
nudicaulis, Pers. Syn. ii. 386= Serratula nudicaulis.
numidicus, *Coss. V Dur. Explor. PL Algir.* t. 49.—Algeria.
nutans, Boiss. ex Nym. Consp. 411 —platypus,
nutans, *Linn. Sp. PI.* 821.—Europ. ; As. temp,
obvallatus, *Bieb. ex Willd. Enum. Hort.Berol.* 842.—Reg. Caucas.
obvallatus, Steud. Nom. ed. 1.153-Cnicus obvallatus.
obvallatus, Wall. Cat n. 2095=Saussurea obvallata.
ocddentalis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 418 = Cnicus occidentalii.
ochroleucus, Pers. Syn. it 389 = Cnicus ochrolencus.
odoratus, Muhl. Cat. Darl. Fl. Cestr. 85 = Cnicus pumilus.
oleraceus, VULHist. PI. Dauph. iii. 21 = Cnicus oleraceus.
olympicus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 43.—As. Min.
onopordoides, *Fisck. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 552; —Reg. Caucas.
Onopyxos, *Hill, Veg. Syst.* iv. 13.—German.
orgyalis, Steud. Nom. ed. I. 163 - Cnicus orgyalis.
orientalis, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 63 = Cousinia carduiformis.
orientalis, Pers. Syn. ii. 387 = Galactites tomentosa.
orthocephalusx, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 268; et in Linnaea, xiv. (1840) 86.=acanthoides.
osseticus, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 65 = Cnicus fimhriatus.
palatinusx, Sen. Bip. ex Nym. Consp. 413 = acanthoides.
palustris. Linn. Sp. PI. 822 = Cnicus palustris.
palustris, Savi, Bot. Etrusc. iii. 141 - Cnicus polyanthenuiS'.
Pancicii, *Sch. Bip. ex Nym. Consp.* 414.—Serbia,
paniculatns, *Ait. Hort. Kent.* ed. I. iii. 143.—Europ.
paniculatus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 522=carlinoides.
paniculatus, Vahl, Symb. Bot. i. 68=Cnicus flavispinus.
pannonicus, Linn. f. Suppl. 848 = Cnicus pannonicus.
pannonicus, Schleich. ex DC. Prod. vi. 628=tenuifolius.
pannosus, *Trauty. in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 271.—Armenia.
parvifiorus, Bnch, Beschr. Ins. Canar. 147 = pycnocephalus.
parvifiorus, Linn. Mant 279-Cnicus parviRorus.
pauciftorus, Pers. Syn. ii. 888=Cnicus pauciflorus.
pectinatus. Linn. Mant. 279-defloratus.
pedemontanus, Pers. Syn. ii. 389 = Cnicus tuberosus.
peregrinus, Retz. Obs. i. 27 = pycnocephalus.
Personata, *Jaeq. Fl. Austr.* iv. 25. t. 348.—hurop.
personatus, Gaertn. Fruct. ii. 878 = praec.
petronhilus, *Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xv. (1868) p. ixxxvii.—Mont. Pyren.
pinnatifidus, Cav.Ic. i. 58. t. 83 = Serratula pinnatifida.
Pitcheri, Stend. Nom. ed. II. i. 284 = Cnicus Pitcheri.
platylepis, Sauter, in Flora, xiii. (1830) 410=nutans.
platypus, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.* (1857) 26.—**Hispan.**
podecanthus, DC. Fl. Fr. iii. 80-aurosicus.

CABDTJU8:—
poliochrus, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iii II. (1876) 272.—Reg. Caucas.
polyacanthos. Curt. Fl. Lond. fasc. vi. t. 54=acanthoides.
polyacantkus, Lam. Fl. Fr. ii. 20=Cnicus Casabonae.
polyanthemos, *Hegel, ex Heer, Fl. Schw.* 801.—Helvet.
polfanthemos, Schur, Enum. PI. Transs. 417—collinus.
polyanthemus, Boeber, in Pall. N. Nurd. Beitr. vi. 261; Bieb. Casp. App. 210 *(= Cirsium elodes).*—Reg. Caucas.
polyanthemus, Linn. Mant. i. 109 = Cnicus polyanthemus.
polyanthemus x, Schleich. Spicfl. 16 - nutans.
polyanthos, Boiss. Fl. Orient, iii. 648, 988.=Cnicus pungens.
polyanthos, Schreb. SpiciL 16=acanthoides.
polyclonos, Willd. Sp. PI. iii. 1665=Jurinea polyclonos.
polymcrphus, Lapeyr. in Mem. Acad. Toulouse, i. (1782) 217. t. 19, 20 = Cnicus heterophyllus.
Pontederae, Steud. Nom. ed. 1.153 = Cnicus rivularis.
Poolii x, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 107.—Europ.
pratensis, Huds. Fl. Angl. ed. II. 358; Lam. Encyc i. 700-Cnicus pratensis.
pseudosyriacus, *Lojac. in Natural. Sicil.* iv. (1885) 109.—Sicil.
ptarmicae/olius, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = Cnicus stellatus.
pteracanthus, Dur. in Duch. Rev. Bot i. (1846-46) 362 = Reuterianus.
pterocaulos, Steph. ex DC. Prod. vi. 553 = Cousinia arachnoidea.
pulcher, *Clark, Trav.* i. 739, nomen.—Tauria.
pumilus, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 167.—Nepal.
pumilus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 802 = Cnicus Drummondii.
pumilus, Nutt. Gen. Am. ii. 130 = Cnicus pumilus.
pumilus, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 17 = Cnicus hetero-' phyllus.
punctatus, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2907 = Tricholepis radicans.
pungens, Pers. ex DC. Prod. vi. 643 - Cnicus pungens.
purpureus, *Vill. Fl. Delpkin.* 90.—Gallia.
pycnocephalus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1151; *Jacq. Hort. Vind.* i. 17. t. 44.—Europ.; Reg. Mediterr.; Oriens.
pycnocephalus, Spreng. Syst. iii. 886 = cephalanthus.
pycnocephalus-alatus, Stev. ex DC. Prod. vi. 563 = Couiinia arachnoidea.
pygmaeus, Jacq. Enum. Vindob. 147, 282-Saussurea pygmaca.
pyrenaicus, Gouan, Illustr. 63=Cnicus pyrenaicus.
pyrenaicus, *Jacq.O6s. Bot.* iv. 11. t. 95 Mont. Pyren.
pyrochros, Less, in Linnaea, v. (1830) 180=Cnicus conspicuus.
quinquefolius, D. Don, Prod. Fl. Nep. 167 = Serratula quinquefolia.
radiatus, Waldst. *8c* Kit. PI. Rar. Hung. i. 9=Serratula radiata.
radicans, Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 408 = Tricholepis radicans.
ramosus, Roxb. 11. cc. 101,407=Volutarella divaricate,
ramosissimus, *Pan!. Elench. Crna-Gora,* 51.—Monteneg.
recurvatus, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 359, in obs.-nigrescens.
recurvatus, WUlk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 11&= granatensia
remotifolius. Hook. Fl. Bor. Am. i. 302=Cnicus remotifolius.
repandus, Pers Syn. ii. 386 = Cnicus repandus.
Reuterianus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 44.—Hispan.
rhaeticus, *Dalla Torre, Atl. Alpenfl.* 188.—Europ.
rheginus, Steud. Nom. ed. I. 163 = Cnicus strictus.
rigens, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 144 = Cnicus rigens.
rigens x, *Godr. Fl. Lorr.* ii. 40.—Gallia.
rivularis, Jacq. Fl. Austr. i. 67 = Cnicus rivularis.
Rosenii, Vill. FL Delphin. 91 = Cnicns acaulis.
ruderalis, Tausch, ex Nym. Consp. 412 =acanthoides.
ru/escens, Pers. Syn. ii. 389 = Cnicus rufescens.
salinus, Bieb. ex Stend. Nom. ed. II. i. 853=Centaurea serratuloides.
salisburgensis, Pers. Syn. ii. 388=Cnicus rivularis.
samniticus, Tenore, Sem. Hort. Neap. (1826) 12 Cnicus italicus.
Sanctae-Balmae, Loisel. Nouv. Not. 34=Candollei.
sardous, DC. Prod. vi. 626 = pycnocephalus.
scaber, Poir. Voy. Barb. ii. 231 =Cnicus giganteus.

CABDUUS:—
Schimperi, *Sch. Bip. in Linnaea,* xix. (1847) 884.—Abyssin.
Schulteanus x, Ruhm. in Eichl. Jahrb. i. (1881) 240,—Europ.
Scolymus, BaiU.Hist. PI. viii. 7, 289-Cynara Cardunculus.
Scordium, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 142-Serratula Scordium.
segetum, Frauch. PI. Davidian. i. 178 =• Cnicus segetum.
seminudus, *Sieb.Fl. Taur. Cauc.* ii.,271.—Keg. Caucas. et Casp.
semipectinatus, Lam. Encyc. i. 705 = Cnicus semipectinatus.
semipinnatus, Desf. ex Steud. Nom. ed. 1.168 -Cnicus pratensis.
serratuloides, Jacq. Fl. Austr. 127 = Cnicus pannonicus.
serratuloides, Linn. Sp. PI. 825=Cnicus serratuloides.
serratuloides, Neck. Delic. Gallo-Belg. 888=Cnicns arvensis.
serrulatus, Steud. Nom. ed. I. 154; ed. II. i. 265-Cnicus serrulatus.
setosus, Bab. in Gard. Chron. (1844) 718=Cnicus arvensis?
simplicifolius, *Sang, in Atti Ace. Pont. Lincei,* Ser, I. xviii. (1865) t. 2.—Italia.
sinuatus, Gilib. Fl. Lituan. i. 187 = acanthoides.
Spachianus, *Dur. in Duch. Rev. Bot.* i. (1845-46) 861. —Afr. bor.
spinigerus, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 215 = hamulosus.
spinosissimus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 743 = Cnicus acaulis.
spinosissimus, C. A. Mey. in Beitr. PH. Russ. Reich, iv. 48 -Cnicus esculentus.
spinosissimus, Steud. Nom. ed. II. i. 285-Cnicus echinocephalus.
spinosissimus, Vill. Hist. PL Dauph. iii. 11= Cnicus spinosissimus.
spinosissimus, Walt. Fl. Carol. 194 •= Cnicus horridulus.
spinulosus, Bertol. Amoen. Ital. 41 = defloratus.
spinosus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 748-Cnicus acaulis.
spuriuSyLinn. Hort. Ups. 249=Cnicuseriophorus.
squarrosus, *DC. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Sov.* vi. (1838) reimpr. 18.—Madcra.
Stangii, Buek, ex Nym. Consp. 411 = nutan<:.
stellatus, Linn. Sp. PI. 823 = Cnicus stellatus.
stenolcpis, *Benth. in Benth. VHook.f. Gen.* ii. 468.—As. centr.
strictus, Steud. Nom.ed. I. 154-Cnicus strictus.
strigosus, Bieb. Tabl. Casp. 194-Cnicus strigosus.
suaveolens, *Benth. in Benth* to* Hook. f. Gen.* ii. 468. —As. centr.
subcoriaceus, Less, in Linnaea, v. (1880) 180=Cnicus subcoriaceus.
snbdecurrens, *Bertol. Fl. Ital.* viii. 628.—Lignria.
sumanus, Pollini, in Brugnat. Giom. Fis. ix. (1816) 96=defloratus.
syncephalus, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 87. t. 864 = pycnocephalus.
syriacus, Linn. Sp. PI. 823 = Notabasis syriaca.
tataricus, Lam. Encyc. i. 708=Cnicus rigens.
tataricus, Linn. Sp. PI. 825 = Cnicus oleraceus)
tauricus, Boeber, ex Georgi, Beschr. Russ. Reich. iii. iv. 1224 = Cnicus echinocephalus.
taygeteus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 42 « nutans.
tectus. Wall. Cat. n. 2906 = Saussurea obvallata.
tenuiflorus. Curt. Fl. Lond. fasc. vi. t. 66=pycn°" cephalus.
tenuifolius, Gaud. Fl. Helv. v. 174-defloratus.
thessalus, Boiss. *8c* Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 4< ** acanthoides.
Tkoermeri, Weinm. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (IBS?) n. VII. 69=nutans.
Thomsoni, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 861.—Tibet occ
Timbali, Martr. Fl. Tarn, 377'nigrescens.
tinctorius, Falk, Beitr. ii. 237=Carthamus tinctorius-
tinctorius, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 132=Serratul» tinctoria.
tmoleus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 21.—As. Min.
tomentosus, Gilib. Fl. Litnan. i. 188 = Cnicus eriopborw-
transalpine, Suter, Fl. Helv. 172 =defloratus.
tricephaloides, Lam. Encyc. i. 704 = Cnicus rivulaM-
trichocephalus, Wall. Cat n. 2901=Tricholepis furç»*
trilobatus, Buch.-Ham. ex DC. Prod. vi. 639-Cnicu* involucratus.

CABDTTT7S:-
tuberosus, Georgi, It. i. 228 *(=Cirsium setiger urn),*
tuberosus, Jacq. FI. Austr. 280=Cnicus eanus.
tubtrosus, Linn. Sp. PI. 824 -Cnicus pratensis.
tuberosus, VilL Hist. Fl. Dauph. iii. 15 = Cnicus tuberosus.
uliginosus, Hort. ex Stead. Nom. ed. I. 154=Cnicus Willdenowii.
uliginosus, Stead. 1. c = Cnicas nliginosus.
unaMtus,Bieb. Fl. Tour. Cauc. iii. 663.—Reg. Caucus.; Tauria.
undulatus, Nntt Gen. Am. ii. 130=Cnicus nndulatns.
uniflorus, Turcz. ex Ledeb. Fl.Ross. ü. 768-Serratula glauca.
valentinas, *Boiss. & Rent. Diagn.* Ser. II. iii. 45.—Hiapui.
Verdii, *Cart, in Rev. Hortic.* (1870-71) 520.—Hispan.
versicolor, Salisb. Prod. 185-Silybum Marianum.
virginianus, Bosc, ex DC. Prod. vi. 651 - Cnicns Nuttallii.
virginianus, Linn. Sp. PI. 824 = Cnicns virginianua.
virginianus, Walt. FI. Carol. 195=Cnicus repandos.
viridis, *A. Kern. Scked. Fl. Exsice.* i. 74.—Europ.
vivariensis, *Jord. Obs.* iii. 212.—Gallia.
vulgaris, Savi, Fl. Pis. ii. 241 = Cnicus italicns.
WinUerianus x, Dalla Torre, in Lotus, xxvii. 1877 (1878) 45.—Europ.
wolgensis, Bieb. ex Willd. Eoum. Hort. Berol. 836-Cousinia wolgen?is.
xantharanthus, *Freyn, in Flora,* lxiv. (1881) 211.—Lusitan.
xeranthemoides, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.213=Serratula xeranthemoides.

CAKDWELLIA, F. Muell. Fragm. v. 23 (1885). *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 182.
sublimis, *F. MueU. 1. c.* 24, 38, 73.—Austral.

CARELIA, Adans. Fam. ii. 123 (1763) = Ageratum, linn. (Compos.).

CARELIA, Less. Syn. Comp. 156 (1832). *COMPOSITAE,* Bentb. & Hook. f. ii. 241.
cistifolia, *Less. I.* c—Bras.

CAHEX, [Dill.] Linn. Syst. ed. I (1785). *CYPERACEAE,* Berth. & Hook. f. iii. 1078.
CALLISTACHYS et CRYPTOGLOCHIN, Heuff. in Flora, xxvii. (1844) 528.
CARICELLA, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).
DISTINAX, Rafin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 521 (1840).
DORNERA, Heuff. ex Schur, Enum. PI. Tranas. 697 (1866).
DRVMEIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
GENERSICHIA, Heuff. in Flora, xxvii. (1844) 528.
HELEONASTES, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).
LEPTOSTACHYS, Ehrh. 1. c. (1789).
LEUCOGLOCHIN, Heuff. in Flora, xxvii. (1844) 528.
LIMONAETES, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
MAUKSCHIA, Heuff. in Flora, xxvii. (1844) 627.
MONDO, Adans. Fam. ii. 496 (1763).
NEILREICHIA, Kotule, in Spraw. Kom. Fis. Krakow, xvii. (1883) 136.
PHYLLOSTACHYS, Torr. ex Stead. Nom. ed. II. i. 297, insyn. U840); ii. 328.
PHYSIGLOCHIS, Neck. Elem. iii. 245 (1790).
POLYGLOCHIN, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).
PSBUOOCAREX, Miq. in Ann. Mug. Lugd. Bat. ii. 146 (1866).
PSYLLOPHORA, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).
PTACOSEIA, Ehrh. 1. c. 147 (1789).
SCHELIIAMMERIA, Moench, Meth. Suppl. 119 (1802).
SCURIA, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 106.
TRASUS, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 58 (1821).
TRIODUS, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 106.
TRIPUMA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195.
ULVA, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 242 (1742).
UvA, Steud. Nom. ed. II. i. 285 (1840).
VIGNANTHA, Schur, Enum. PI. Transs. 705 (1866).
VIGNEA, Beanv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 22 (1819).
-ibreviata, Presc. ex Boott, in Ann. Nat Hist. xvii. (1846)57=Torreyi.
i'Djiciens, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 208.—Missouri.
Kaulis, *Urv. in Mim. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 699.—Ins. Falkl.

CAREX:—
acicularis, *Boott, in Hook. Fl. N. Zel.* 280. t 63.—Austral.; N. Zel.
acicularis, *TUTCB. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 285.—Sibir.; Reg. Caucas.
acroandra, *Schur, Enum. PI. Transs.* 699.—Transsylv.
acrolepis, Ledeb. in Denkschr. Baier. Bot. Ges. iii. (1841)56 = Gmelini.
acrolepis, *Liebm. in Vidensk. Selst. Skr.* V. ii. (1851) 271.—Costa-Rica.
acuminata, Reichb. Ic. Fl. Germ. viii. 28. t. 267 = nutans.
acuminata, Willd. Sp. PI. iv. 800=glauca.
acuta, All. Fl. Pedem. ii. 247 = riparia.
acuta, Curt. Fl. Lond. t. 281 = paludosa.
acuta, Darling. Floral. Cestric. 98=virginiana.
acuta, Dewey, ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 218 » angustata.
acuta, *Linn. Sp. PI.* 978.—Reg. bor. temp.; Austral.
acuta, Muhl. Cat. 84; ed. (1818) 86, nomen = commutata.
acuta, Suter, Fl. Helv. ii. 261=glauca.
acutaeformis, Brot. Fl. Lusit. i. 66=echinata.
acutata, *Boott, in Proc. Linn. Soc. i.* (1846) 287.—Am. austr.
acutiformis, Ehrh. Beitr. iv. 48 = paludosa.
acutissima, D&égl. in Loisel. Fl. Gall. ed. I. 628 = pyrenaica.
Aederi, Desv. Fl. Anj. 74, sphaIm.=Oederl
adusta, *Boott, in Hoot. Fl. Bor. Am.* ii. 215.—Am. bor.
adusta, Carey, ex Boott, Illustr. Carex, iii. 118 = foenea.
aematorhyncha, Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 224 = filiform is.
aemulans, *Liebm.* to" *Drej. in Flora,* xxii. (1839) 142 =stricta.
aequabilis, *Boott, Illustr. Carex,* i. 66.1.178.—Ins. S. Helena.
aequata, Nees, ex Boott, L c. ii. 83-unyosurns.
aestivalis, *M. A. Curt, ex A. Gray, in Am. Joum. Sc.* xlii. (1842) 28.—Am. bor.
aethiopica, *Schkuhr.Riedgr.* i.107. t. Z. f. 88.—Afr. bor.
aethostachya, Schkuhr, 1. c. it 53 = atrata.
affinis, R. Br. in Richards,.in Frankl. Narr. 1st Joum. 750-obtusata.
agastackys, Linn. f. Suppl. 414=pendula.
Aitchisoni, Boeck. In Flora, fxiii. (1880) 456 = fissirostris.
alascana, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1885) 277.—Am. bor. occ.
alata, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 396-straminea.
alba, Bast. Ess. Fl. Maine-et-Loire, 838 = Bastardiana.
alba, Dewey, in Am. Journ. Sc. vii. (1824) 266 = ebumea.
alba, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. ii. 216.—Europ.; Am. bor.
albata, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 193, nomen.—Japon.
albescens, F. Nyland. Spicil. Fl. Fenn. ii. n. 90 = gracilis.
albicans, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 818.—Am. bor.
albo-atra, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 432, in obs. =fusca.
albo-lutescens, Schwein. in Ann. Lye. N. York, i. (1828) 66 -> straminea.
algida, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1888) 104; xxviii. (1856) 1. 841.—Sibir. baical.
alligata, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 129.—Ins. Sandvic.
allomacros, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 189.—Chili,
alopecoidea, *Tuckerm. Enum. Caric.* 18.—Am. bor.
alopeenroides, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 832; *Prod. Fl. Nefi.* 43.—Rrg. Himal.
Alopecurus, Lapeyr. Hist. Abr. Fl. Pyr. Suppl. 141 = Eriophorum lalifolium.
alpestris, All. Fl. Pedem. ii. 270 = Halleriana.
alpestris, Dewey, in Am. Joum. Sc. vii. (1824) 268 = varia.
alpestris, Gaud. Etrennes Fl. 173-sempervirens,
alpestris, Lam. Encyc. iii. 889-caespitosa.
alpigena, Kern, ex Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 224 = x̃cxTuginea.
alpina, Honck. Syn. FL Germ. i. 374 = vulgaris.
alpina, Hoppe, ex Kunth, Enum. Fl. it 466 = ferruginea.
alpina, Schrank, Baier. Fl. i. 298=sempervirens.
alpina, Sw. ex Wahlenb. Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1808) 160 = Vahlii.

CABJ5X:—
alsophila, *F. Muell. Fragm.* viii. 257.—Austral.
alta, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1849) 254; *et in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 130.—Java,
alveata, *Boott, Illustr. Carex,* i. 21. t. 56.—Texas,
ambigna. *Link, in Schrad. Journ.* il. (1799) 808.—Lusitan.; Marocc
ambigua, Moench, Meth. 824 = acuta.
ambleocarpa, Willd. Sp. PI. iv. 307= glauca.
amblyolepis, *Trautv. V Mty. in Middend. Reise {Fl. Ochot.* 99).—Sibir.
ambusta, *Boott, Illustr. Carex,* i. 64. t. 172.—Alaska,
amgunensis, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 69.—Reg. Amur.
amicta, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 131.—N. Granat.
ammophila, Willd. Sp. PI. iv. 226=divisa.
amoena, *Boott, Illustr. Carex,* iii. 106.—Ind. or.
amphibola, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 234.—Am. bor.
amphilogos, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 616=-incurva.
amphora, *Franch. V San. Enum. PI. Jap.* ii. 666.—Japon.
amplifolia, *Boott, in Hoot. Fl. Bor. Am.* ii. 228.—Am. bor.
ampullacea, *Good, in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 207. Keg. bor. temp.
ampullacea, Wulf. ex Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Storkh. (1808) 155 = Michellii.
anceps, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 66. t. F. ff. fig. 128.—Am. bor.
anceps, Willd. ex Kunth, Enum. Fl. ii. 457-grisea.
Andersoni, Boott, in Hook. f. Fl. Antarct. 864» decidua.
Andoiniana, *De Not. Sem. Hort. Genov.* (1847); *ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 233.—Europ.
androgyna, Balb. Elencho, 97 = bicolor.
Angarae, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 190.—Sibir.
anguillata, Drej. in Fl. Dan. t. 2846; Revis. Carle. 86 = aquatilis.
angustata, Boott, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 218 = stricta.
angustifolia, Linn, ex Steud. Nom. ed. I. 166 =-filiformis.
angustifolia, Seguier, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 199 =Schreberi.
angustifolia, Sm. Engl. Fl. iv. 127=vulgaris.
anisostachys, *Liebm. in Vidensi. Selsk. Sir. V.* ii. (1861) 266.—Mexic.
anomala, Boott, ex Perry, Jap. Exp. ii. 327 -gibba.
anomala, *Jania, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 609.—Europ. austr.
anomala, Pall, ex Kunth, Enum. PI. ii. 479 -Halleriana.
anomala, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 280.—Abysiin.
anthericoides, *Presl, Rel. Haeni.* iii. 204.—Am. bor. occ.
anthoxanthera, *Presl, 1. e.* 208.—Alaska.
antucensis, Kunze, ex Kunth, Enum. Fl. ii. 412-vulgaris.
aperta, Boott, in Hook. Fl Bor. Am. ii. 218-stricta.
aphanandra, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 564.—Japon.
aphanolepis, *Franch. V Sav. I. c.* 680.—Japon.
aphylla, *Kunth, Enum. PI.* ii. 421.—Chili.
aporandra, Kunze, ex Boott, Illustr. Carex, ii. 92-Shortiana.
appressa, R. Br. Prod. 242=paniculata.
approximata. All. FI. Pedem. il. 267=ericetorom.
approximata, Hoppe, ex DC. Fl. Fr. Suppl. 290-lagopina.
approximata, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 411 » caespitosa.
aprica, *Turcz. ex Bess, in Flora,* xvii. (1834) I. *Beibl.* 27.—Sibir. baical.
aquatilis, Tenore, Fl. Nap. iv. 183 = microcarpa.
aquatilis, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stocih.* (1803) 186.—Reg. bor.
Archeri, Boott, in Hook. f. Fl. Tasm. ii. 98.1.150=. acicularis.
arcta, Boott, Illustr. Carex, iv. 165 •= canescens.
arctata, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* U. 227.—Am. bor.
arctica, Deinb. in Fl. Dan. t. 101; Fries, Summ. Scand. L 222 = stenophylla.
arctica, Dewey, in Am. Journ. Sc xxvii. (1885) 289 ^ Parry ana.

CABBX:-
arctophila, Nyland. ex Fries, Snmm. Scand. 661 = aquatilis.
Ardoiniana, De Not. in Ann. Sc Nat *Sit.* III. ix. (1848) 324 = olbiensis.
arenaria, Dubois, ex Stead. Norn. ed. II. L 286 = pnecox.
arenaria, Lipeyr. ex Kunth, Enum. PL ii. 889-paniculata.
arenaria, Leers, Fl. Herbom. 196. t. 14. f. 2 = disticha.
arenaria, *Linn. Sp. PI.* 978.—Reg. bor. temp.
arenaria, Mohr, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 210= incurva.
arenicola, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 195.—Ins. Sachalin.
argentea, J. F. Gmel. Syst. 148« alba.
argentea, ViU. Fl. Hist. PI. Dauph. ii. 206 = hnmilis.
argunensis, *TurcM. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 267.—Dahuria.
argyrantha, Tnckerm. ex Boott, Illustr. Carex, iii. 119—adusta.
argyroglochin, Horaem. in Fl. Dan. x. 7. t. 1710-= leporina.
argyrolepis, Maxim, in Franco. & Sav. Ennm. PI. Jap. i. 126-albata.
arida, Schleich. ex Kunth, Enum. PI. ii. 464-sempervirens.
arida, Schwein. & Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 312. t. 24 = muskingumensis.
aristata, R. Br. in Richards, in Frankl. Narr. 1st Jonrn. 761=trichocarpa.
aristata, Clairv. ex Steud. Norn. ed. II. i. 286—Undnia microglocbin.
aristata, Dewey, in Am. Joum. Sc.vii. (1824) 277. t. A. f. l = Davisii.
aristata, Honck. Syn. PI. Germ. 361-praecox.
aristata, Siegert, ex Wimm. FL Scales, ed. III. (1857) 72-hirta.
aristata, Urv. in M6n. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 599-trifida.
armena, Boiss. Fl. Orient v. 426-fulva.
Arnottiana, *Boott, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* xvii. (1846) 66.—Ind. or.; Malaya.
aspera, Willd. Prod. Fl. Berl. 82=glauca.
asperifolia, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 195.--Ins. Borbon.
asperula, *Nees, in Wight, Contrib.* 124.—Reg. Himal.
asperula, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 104; xxviii. (1865) I. 347 - Meyeriana.
assimilis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 195.—Ins. Maurit
assiniboinensis, *Boott, in Coult. Bot. Gat.* ix. (1884) 91.—Am. bor.
astracanica, Willd. ex Kunth, Ennm. PI. ii. 885 = muricata.
asturica, *Boiss. Pugill. PI. Nov.* 117.—Hispan.
aterrima, *Hopbe, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* (1815) t. 3.X o, p, a—Alp. Europ.
aterrima, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 874-atrata.
atherodes, Frank, ex Kunth, Enum. PL ii. 498-stenolepis.
atherodes, Spreng. Syst. iii. 828- aristata.
athrostachya, *Olney, in Proc. Am. Acad.* viii. (1868) 393.—Am. bor. occ
atrata, Banks, ex Boott, in Proc Linn. Soc. i. (1849) 257-Banksii.
atrata, *Linn. Sp. PI.* 976.—Reg. bor. et arct.
atrofusca, Schkuhr, Riedgr. 106-ustulata.
atrofusca, Sieber, ex Kunth, Enum. PI. ii. 436-fuliginosa.
atrofusca, Stev. in Me'm. Soc Nat Mosc. iv. (1813) 67 -atrata.
atrofusca, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 286-pichinchensis.
atropicta, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 204.—Reg. Magell.
atropurpurea, *Boeck. in Linnaea,* xxxix. (1876) 150.—Am. austr.
atropurpurea, Fisch. ex Trevir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868) I. 638-atrata.
atrorufa, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 892-pichinchensis.
aitenuata, R. Br. in Richards, in Frankl. Narr. 1st Joum. 750-rupestris.
aurea, *Nutt. Gen. Am.* ii. 205.—Am. bor.
aureolensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 228.—Am. bor.
austriaca, Schkuhr, Riedgr. ii. 10. I 2 qq. f. 167-divisa.

CAKEX:—
axillaris, *Good, in Trans, Linn. Soc.* ii. (1794) 161. t. 19. f. 1.—Europ.
axillaris, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 329—dilnta.
axillaris, Linn. Sp. PI. ed. II. 1382-remota.
axillaris, Schrank, ex Steud. Nom. ed. I. 155 = loliacea.
azorica, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xL (1839) 186.—Ins. Azoric.
baazasana, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 236.—Texas,
baccans, *Nees, in Wight, Contrib.* 122.—Ind. or.
Bachiana, Dewey, in Am. Journ. Sc xxix. (1836) 250 = obtusata.
Backii, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 210.—Am. bor.
badia, Pen. Syn. ii. 641 = canescens.
baetica, Auersw. ex Willk. in Bot Zeit. vi. (1848) 414—distans.
Balbisii, Schkuhr, ex Spreng. Pugill. ii. 86-extensa, punctata.
baldensis, *Linn. Cent. PI.* ii. 82.—Europ.
baldensis, VilL Hist. PL Dauph. ii. 196 = foetid*.
Baldwinia, Dewey, in Am. Joum. Sc xxvi. (1884) 107. t. T. f. 61 = Elliottii.
Baldwiniana, Steud. Nom. ed. II. i. 286-praec.
Baltzellii, *Chapm. List of Florida PI.* (1845).—Am. bor.
banata, Sin. in Rees, Cyclop, xxxix. = incurva.
banatica, *Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* viii. (1858) 222.—Banat
Banksii, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 119; *ex Hook.f. Fl. Antarct.* 465. 1.142.—Reg. Magell.
Barbarae, Dewey, ex Torr. in Bot. Mex. Bound. 281 - Prescottiana.
barbata, Boott, Illustr. Carex, i. 68-Gunniana.
Baroni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 451.—Madag.
Barratti, Torr. ex Schwein. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 861-,littoralis.
basiantha, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 232.—Am. bor.
basilaris, *Jord. Obs. PI. Crit.* iii. (1846) 246.—Europ. austr. occ.; Marocco.
Bastardiana, DC. FL Fr. vi. 293 - pilulifera.
Beckeri, *C. A. Mey. ex Clous, in Beitr. Pfl. Russ. Reich,* viii. 66.—Rossia.
Beechyana, Boott, Illustr. Carex, i. 67 = Hookeri.
BeUardi, All. Fl. Pedem. ii. 264 = Elyna spicata.
Bella-Villa, *Dewey, in Am. Journ. Sc* Ser. II. xli. (1866) 229.—Am. bor.
bengalensis, *Roxb. Hort. Beng.* 108; *Fl. Ind.* iii. 572.—Ind. or.
Benthamiana, Boott, in Royle, Illustr. Bot Himal. (Pref.) ex Boott, Illustr. Carex, 8=notha.
beringiana, *Cham, ex Steud. Syn. -Pi. Cyp.* 229.—Alaska,
bermudiana, *Hemsl. in Joum. Bot.* xxi. (1883) 260.—Ins. Bermuda.
Berteroana, Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 198-aphylla?
Berteroana, Hohen. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 149-setifolia.
Berteroniana, *Steud. in Flora,* xxv. (1842) 604.—Ins. Juan. Femand.
Bertolonii, Schkuhr, Riedgr. ii. 5. t D. £ 18 = divisa.
Beyrichiana, *Boeck. in Linnaea,* xli. (1877) 239.—Am. bor.
Bichenoviana, *Boott, in Hook. f. Fl. Tasm.* ii. 101.—Tasmania.
tricolor. *All. Fl. Pedem.* ii. 267.—Europ.; Am. bor.
bicolor, Nylantl. ex Nym. Consp. 776-salina.
bicostata, *Olney, Car. Bor. Am. 9.*—Am. bor.
bifida, *Boott, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 894.—Am. bor. occ.
bifida, *Roth, ex Steud. Nom.* ed. 1.166.—Hab.?
bifurca, Moench, Meth. 326-riparia.
bifurca, Schrank, Baier. Fl. i. 804-ampullacea.
Bigelowii, Torr. & Schwein. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 167=vulgaris.
biligularis, DC. Fl. Fr. v. 296-Iaevigata.
Una, Schkuhr, Riedgr. i. S6-distachya.
binata, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 257.—Afr. bor.
binervis, Dewey, in Am. Joum. Sc. xxx. (1836) 61 - Uevigata.
binervis, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* v. (1800) 268.—Europ.
binervis, Wahlenb. ex Kunth, Enum. PL ii. 451 = fulva.
binervis, Willd. ex Kunth, L c. 447 -extensa.

CABBX:—
bipartita, All. Fl. Pedem. ii. 266. t. 89. f. 8-Kobresia caricina.
bipartita, F. G. Dietr. VolUt. Lex. Gaertn. Nachtr. ii. 16-bifida, *Roth,*
bispicata, Hook. & Am. in Bot. Beech. Voy. 118. t. 28—longerostrata.
blanda, Dewey, in Am. Journ. Sc. x. (1826) 45 = laxiflora.
blepharophora, A. Gray, in Ann. Lye. N. York, iii. (1835) 285 -flexilis.
Blyttii, F. Nyland. Spicil. PI. Fenn. ii. 85-tenella.
Boenninghauseniana, Kunth, Enum. PL ii. 404 = axillaris.
Boenninghausiana, Weihe, in Flora, ix. (1826) 759-axillaris.
bohemica, Schreb. Beachr. Graes. ii. 52=cyperoides.
Boissieri, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 215.—Afr. bor.
Bolanderi, *Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 393.—Calif.
bolina, Lang, in Linnaea, xxiv. (1851) 651-vulgaris.
boliviensis, *Heurck tf Murll. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 82.—Bolivia.
Bolliana, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 40.—Am. bor.
bonariensis, *Desf. in Pair. Encyc. Suppl.* iii. 250.—Reg. Argent.
bonariensis, Schlecht. in Linnaea, x. (1836) 116-involucrata.
Bongardi, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 260.—Ins. Loo-choo.
BongardUna, *C. A. Mey. in Middend. Reise {Fl. Ochot.* 101).—Sibir.or.
Bonplandii, *Kunth, Enum. PI.* ii. 380.—Am. bor. occ. et austr.
Boottiana, Benth. ex Boott, in Bost. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 112 = picta.
Boottiana, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 273" Bongardi.
borbonica, *Lam. Encyc.* iii. 387.—Ins. Mascar.
borealis, Lang, in Flora, xxvi. (1643) 142=aquatilis.
borotalicola, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 666.—As. centr.
Boryana, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 43.—Ins. Mascar.
Boscii, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 812.—Am. bor.
brachycalama, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 316.—Keg. Argent.
brachycephala, Poepp. ex Boott, Illustr. Carex, i. 67 = indecora.
brachylepis, Turcz. ex Steud. Nom. ed. IL i. 286; et ex Boott, 1. c. iii. 113=alpina.
brachyphylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc (1838) 104; xxviii. (1855) I. 346-ericetorum.
brachyrhyncha, *Gsaller, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xx. (1870) 199, 292.—Europ.
brachystachys, Schrank, Baier. Fl. i. 294-tenuis.
bracteata, Giesecke, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 160-salina.
bracteata, Suter, Fl. Helv. ii. 250-mucronata.
bracteosa, *Kuntc, in Schkuhr, Riedgr. Suppl.* 12.—Chili.
bracteosa, Schwein. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 66 svulpinoidea.
brasiliensis, St. Hil. Voy. Bras. L 369-procera.
bratatana, Boeck. in Flora, xxxix. 1,1858} 321-baazasana.
Breutelii, SchnizL ex Lange, Consp. Fl. Groenl. i. 18*-canescens.
brevicaulis, *Thou, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 287.—I"[5]-Trist. d'Acunna.
brevicollis, *DC. Fl. Fr.* vi. 295.—Europ. austr. j As. Min.
breviculmis, *R. Br. Prod.* 242.—Reg. Himal.; Japon.; Australas.
breviculmis, Thw. Enum. PL Zeyl. 866-Thwaitesii.
brevifolia, Host, Gram. iv. 50. t. 89-ferruginea.
breviglumis, *Le Gall, Fl. Morb.* 658.—Gallia.
brevipes, 5. *Wats, in Bot. Calif,* ii 246.—Calif.
brevirostrata, Poir. Encyc. Suppl. iii. 278-obesa.
brevirostris, *Blytt, in Bot. Notiser,* (1857) 188.' Europ.
brevirostris, Cederstr. in Vet. Akad. Oefv. Stockh. »•• (1867) 199-incurva.
Breweri, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 142. t. 456.—Am. bor. occ
briMoides, Geners. Elench. n. 867 = leporina.
britoides, Huds. Fl. AngL 349; ed. IL 406 * canescens.

CABJ3X:—
britoides, tarn. Encyc. iii. 382=praecox.
brizoides, *Linn. Cent. PI. I* 31.—Euiop.
brisoides, Pall, ex Boott, Illustr. Cues, iv. 199-Schreberi.
Brixopyrum, Kunze, in Schkuhr, Riedgr. Suppl. i. 189. t. 43= aha.
bromoides, Dubois, ex Boott, Illnstr. Carex, iv. 199 = Schreberi.
bromoides, *Sckkukr, Riedgr.* ii. 8.—Am. bor.
Brongniartii, *Kunth, Enum. PI.* ii. 380.—Chili.
Brownei, Steud. Syn. PI. Cyp. 209-longifolia.
Brownii, Tuckerm. Enum. Car. 21=Iatistoma.
brunnea, *Thunb. Fl. Jap.* 88.—Reg. bor. et austr.
brunnescens, Poir. Encyc. Suppl. iii. 286 « Gebhardi.
Buchanani, *Berggr. in journ. Sot.* xviii. (1880) 104.—**N. Zel.**
Buddeyi, Dewey, in Am. Journ. Sc. xMiL (1816) 113 =canescens.
Buekii, Wimm. FL Scales, ed. III. (1867) 81-stricta.
bufonia, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 320.—Ross. austr.
bnlboaa, *Boeck. in Flora,* xxxviiL (1855) 697.—Am. bor.
bullata, Ell. Sketch, ii. 656 = striata.
bullata, Dewey, in Am. Journ. Sc. ix. (1825) 71-Tnckermani.
bullata, *Rudolph, ex Georgi, Besch. Jtuss. Reich,* iii. V. 1286.-Tauria.
bullata, *Schtuhr, Riedgr.* ii. 86.—Am. bor.
Bungeana, *Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord.* xxxiii. (1879) 68.—China.
Burchelliana, *Boeck. in Linnaea.xlu* (1877) 284.—Afr. austr.
Buxbaumii, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1808) 168-fusca.
caduca, *Boott, lllustr. Carex,* iv. 157.—Am. austr.
caesia, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 412 = tomentosa.
caespititia, *Nees, in Wight, Contrib.* 127.—Reg. Himal.
caespitosa, Good, in Trans. linn. Soc.ii. (1794) 195. t. 21—vulgaris.
caespitosa, Hook. Fl. Scot. 286=saxatilis.
caespitosa, Huds. Fl. Angl. ed. II. 412-stricta.
caespitosa, Ledeb. Fl. Ross. iv. 310=eleusinoides.
caespitosa, *Linn. Sp. PI.* 978.—Reg. bor. et austr.
caespitosa, Soland. ex Boott, lllustr. Carex, i. 68-decidua.
caespitosa, Tenore, Viaggio In Calab. 129 = frigid*.
caespitosa, Thunb. Fl. Jap. 39 - Thunbergii ?
Caflischiix, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 119.—Europ.
catnpestris, Hort. ex Boott, lllustr. Carex, i. 161-obesa.
campestris, Host, Gram. iv. t. S8=supina.
Camposii, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 117.—Hispan.
Campyloxys, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 213.—Reg. Magell.
camtschatcensis, Kunth, Enum. PI. ii. 477 = longerostrata.
canadensis, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xli. (1866) 229.—Am. bor.
canescens, Host, Gram. i. t 57 = paradoia.
canescens, Huds. Fl. Angl. ed. II. 405 = divulsa.
canescens, Leers, Fl. Herborn. 712. t. 14. £ 3 = muricata.
canescens, *Linn. Sp. PI.* 974.—Reg. temp. bor. et austr.
canescens, Poll. Palat. Hist. Pl.ii. 571 =elongata.
capensis, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 89.—Afr. austr.
capensis, Thunb. Prod. PL Cap. 14 - Schoenoxyphiom Thunbergii.
capillacea, *Boott, lllustr. Carex,* I. 14. 1.110.—Reg. Himal.; Austral.
capillaris, Leers, Fl. Herborn. t. 16. f. 2=sylvatica.
capillaris, *Linn. Sp. PI.* 977.—Reg. bor. temp, et arct.
capillaris, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii 464-firma.
opillota, Schkuhr, ex Kunth, 1. c. 480=hirsuta.
eapillipes, *Drej. in Fl. Dan.* t. 2844; *Revis. Caric.* 50.—Ins. Island.
'apitata, AIL Fl. Pedem. ii. 264=Davalliana.
«pitata, *Linn. Syst.* ed. X. 1261.—Europ.; Am. bor.
tapitata, F. Muell. Fragm. viii. 251-Cephalotes.
capitata, Oed. in Fl. Dan. t. 872 - Eleocharidis sp.
*c*pitata,* Suter, ex Boott, lllustr. Carex, iv. 148-dioica.
cnpitelUu, *Boiss.* b* *Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 399.—As. Min.

CABEX:-
cardiolepis, *Nees, in Wight, Contrib.* 127.—Reg. Himal.
Careyana, *Torr. ex Dewey, in Am. Journ. Sc.* Ser. I. xxx. (1886) 60.—Am. bor.
Carlantoniana, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Ser. II x. (1838) 293~enervis.
carltoniana, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* Ser. I. xxviii. (1835) 238.—Am. bor.
caroliniana, *Buckley, I. c.* xlv. (1843) 173.—Am. bor.
caryophyUaea, J. F. GmeL Syst. 142 = seq.
caryophyllata, Kunth, Enum. PI. ii. 437=emarginata.
caryophyllea, Latour. Chlor. 27-praecoi.
Castanea, Ell. Sketch, ii. 546 = Elliottii.
Castanea, Mielich. in Flora, xxxiu (1849) 665 =• capillaris.
Casteriana, Heer, ex Boott, lllustr. Carex, *iv.* 143 = dioica.
cataractae, R. Br. Prod. 242-flava.
caucasica, *Stev. in if em. Soc. Nat. Mosc.* iv. (1813) 68.—Reg. Caucas.
celsa, *Boott, lllustr^ Carex,* iii. 108.—Reg. Himal.
cenisia, Balb. in Roem. Arch. iii. 187-bicolor.
cephaloidea, *Dewey, ex Boott, lllustr. Carex,* iii. 123.—Am. bor.
cephalophora, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 4.—Am. bor.
Cephalotes, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 110.—AustraL
cerina, Dum. Fl. Belg. 147; Boott, lllustr. Carex, iv. 170=vulgaris.
cemua, *Boott, I. c.* 171.—Reg. Himal.; Japon.
cernua, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-8) 83.—Chill
cemua, *Raeusch. Norn.* ed. III. 270.—' Helvet.'
ceylanica, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 341.—Ind. or.
Chaberti, F. Schult. in Flora, liv. (1871) 21-divulsa.
chaetophylla, Steud. Syn. PL Cyp. 187 = divisa.
chaetorhiza, *Franch. tfSav. Enum. PI. Jap.* ii. 552.—Japon.
chalaros, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 231.—Am. bor.
Chamissoi, *Boeck. in Linnaea,* xli. (1877) 145.—Hab. t
Chapmani, Torr. ex Boott, lllustr. Carex, i. 16 = Baltzellii.
Chapmanni, Sartwell, ex Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xix. (1855) 254-tenax.
Chapmanni, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 222.—Florida.
Cheesemanii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 358.—N. ZeL
cherokeensis, *Schwein, V Torr. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 369. L 25. f. 1.—Am. bor.
chilensiSySitmga. in Duperr. Voy. Bot. 156 = riparia.
chillanensis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* II. (1862) 384.—Chili.
chinensis, *Ret*. Obs.* ill 42.—China,
chlorantha, *R. Br. Prod.* 242.—Austral.
eUorocarpa, Wimm. in Flora, xxxiii. (1849) 620 = vulgaris.
chlorocarpos, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 265 -Liebmanni.
chlorocystU, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884; 620.—Hongkong.
chlorolepis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 204.—Chili.
chlorostachys, D. Don, in Till. Mag. (Dec. 1823) 456 =japonica.
chlorostachys, Stev. in Mem. Soc Nat. Mosc. iv. (1813) 68 —sempervirens.
chordalis, *Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1851) 269.—Mexic.
chordonhiza, *Linn.f. Suppl.* 414.—Europ.; Am. bor.
Chrisfyana, Boott, in Bost. Joum. Nat. Hist. v. (1847) 114-cherokeensis.
chrysolepis, *Franch. If Son. Enum. PI. Jap.* ii. 671.—Japon.
ciliata, WUld. in Mem. Acad. Ben*, 1791 (1797) 17. t. 8. f. 2-ericetorum.
cilicica, *Boiss. Diagn.Sez.* II. iv. 124.—Cilicia.
cinerea, Poll. Hist. PI. Palat. ii. 671=canescens.
cinnamomea, Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1846) 257 ; Trans. Linn. Soc xx. (1851) 136-nivalis.
cinnamomea, *Cheesm. in Trans. N. Z. Inst.* xiv. (1882) 301.—N. ZeL
cinnamomea, *Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 896.-Calif.
tirehuMta, *C. A. Mey. in Mem. Sav. Etr. Pitersb.* i. (1881) 209. t. 6.—Unalaschka.
drrhosa, *Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallks. Lund* (1877) n. viii. 29.-N. Zel.

CAREX:—
cirrhulosa, *Nees, in Hook. Xew Joum.* vi. (1854) 29.—Ins. Philipp.
cladostachya, Wahlenb. in Vet Akad. Nya Handl. Stockh. (1808) 149=.jolystachya.
clandestina, Good, in Trans. Linn. Soc. ii. (1791) 107 =humilis.
clavaeformis, *Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft* 61 (1833).—Carinthia.
clavata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 14.—Afr. austr.
coacta, Boott, in Proc Linn. Soc. i. (1846) 285; et Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 133=curaica.
conrctata, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 319.—Hungar.
cognata, *Kunth, Enum. PI.* ii. 602.—Afr. austr.
coichica, }. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. x. (1838) 803 =arenaria.
Colensoi, *Boott, in Hook./. Fl. N. Zeal.* 281. t. 63.—N. Zel.
collata, Boott, in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844; 417 = virgata.
collecta, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xi. (1826) 314. tab. N. fig. 44.—Am. bor.
collina, Willd. Sp. PI. iv. 260=montana.
Collinsii, Nutt. Gen. Am. ii. 205 =subulata.
columbiana, Dewey, ex Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 406 = Mertensii.
comans, *Bergg. in Minneskr. Fisiog. SalU. Lund* (1877) n. vm. p. 28.—N. Zel.
Commersoniana, Sieber, ex Kunth, Enum. Fl. ii. 391-brunnea.
commixta, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 207.—Java,
commutata, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xi. (1839) 198.—Am. bor..
commutata, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1864) I. 205.—Soongaria.
comosa, Boott, in Trans. Linn. Soc. xx. (1816) 117 = C. Pseudo-cyperns.
compacta, *R. Br. in Afp. Ross, Voy.* 163.—Am. arct.
compacta, Krock. ex Hoppe, Caric. 37 -vulgaris.
compacta, Lam. Fl. Fr. ii. 172 - vnlpina.
compacta, Poir. Kncyc. Suppl. iii. 282 = Uncinia compacta.
compacta, *Wimm. in Flora,* xxxiii. (1850) 618.-Enrop.
complanata, Ton. in Ann. Lye N. York, iii. (1836) 408-triceps.
composite, *Boott, lllustr. Carex, i.* 3.—Reg. Himal.
compressa. Gaud. Etiennes Fl. 111 = stricta.
compressa, *Hose, in Usteri, Ann. Bot.* xxi. (1797) 83.—Europ.
compressa, Kit ex Willd. Sp. PI. iv. 276-brechystachys.
compressa, Vahl, ox Kunth, Enum. PL ii. 378 = bonariensis.
concinna, *R. Br. in Richards. Frankl. Narr. 1st Journ.* 751—Am. arct.
concolor, *R. Br. in Parry, Voy. App.* 283.—Am. arct.
coneolor, Nees, in Wight, Contrib. 125=spedosa.
condensate, *Nees, in Wight, Contrib.* 123.—Reg. Himal.
conferta, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 512.—Abyssin.
confertiflom, *Boott; in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-59) 418.—Japon.
congesta, C. A. Mey. ex Boott, lllustr. Carex, I. 17-Hoodii.
congiobata, All. Fl. Pedem. ii. 288=montena.
conglobata, Kit. in Willd. Sp. Pi. iv. 281-obesa.
conica, *Boott, ex Perry, Jap. Exped.* ii. 325.—Japon.
conjugata, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 391. Commersoniana.
conjuncta, *Boott, lllustr. Carts,* iii. 122.—Am. bor.
conoidea, Muhl. Desc. Gram. Uber. 248=laxiflonu
conoidea, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 67.—Am. bor.
consanguinea, Kunth, Enum. PI. ii. 374-divisa.
consocialis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 222.—Japon.
contigua, Hoppe, in Sturm, Deutscbl. FL Heft 61 (1833) = muricata.
contracta, *F. Muell. Fragm.* viii. 258.—Austral,
convexa, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 317.—Hungaria.
Cooleyi, Dewey, in Ann. Jonm. Sc Ser. I. xlviii. (1846) 144-hystericina.
coriophora, Fisch. *Sc* Mey. ex Kunth, Ennm. PL iL 463-ustulata.
combensis, *Phil, in Linnaea,* xxxiiL (1861-65) 278.—Chili.

a.Atttrr.—

Corsica, Degl. ex Loisel. Fl. Gall. ii. 307 - microcarpa.
corsicana, Link, Enum. Hort. Berol. i. 858 - pnnetata.
CortesiL.. £ieim. in *Vidensk. Selsh. Sir.* V. ii. (1851) 268.—Mexic.
corynophora, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 886 = acnta.
costata, *J. V C. Presl, Fl. tech.* 191.—Bohemia.
costata, Schwein. in Ann. Lye N. York, i. (1824) 67 = virescens.
costata, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ron iv. S06=obesa.
Conlteri, *Boott, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Sot.* iii. 478.—Mexic.
conrtallensis, *Nees, ex Boott, Illustr. Carex,* i. 62.—Ind. or.
crassa, Ebrh. Beitr. iv. 43 = riparia.
crassipes, *Boeci. in Linnaea,* xl. (1876) 329.—Ind. or.
Crawei, *Demy, ex Torr. Fl. N. York,* ii. 408.—Am. bor.
crinalis, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 256.—N. Granat.
crinigera, *Boott, Illustr. Carex,* ii. 102.—Ins. Borbon.
crinita, *Lam. Encyc.* iii. 398__Am. bor.
eristata, [Clairv.] Man. Herb. 291 = ferruginea.
cristata, Schwein. in Aon. Lye. N. York, i. (1824) ·66 =tribuloides.
crudata, *Nets, ex Wight, Contrib.* 123.—Ind. or.
cruciata, Wablenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 149=ramosa.
crnenta, *Nees, in Wight, Contrib.* 128.—Reg. Himal.
Crus-corvi, *Shuttl. ex Kunze, in Schkuhr, Riedgr. Suppl.* 128. L 32.—Am. bor.
cryptandra, Franch. *Sc* Sav. Enum. PI. Jap. it 148 - macroglossa.
cryptocarpa, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 412.—N. Zel.
cryptocarpa, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pe'tersb. i. (1881) 226 ^halophila.
cryptostachys, *Brongn. in Duperr. Voy. Bot.* 162.—N. Guinea.
Csettii, Nym. Consp. 778 = Czetzii.
Cumingiana, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 206.—Ins. Pbilipp.
Cunninghamii, Boott, Illustr. Carex, iv. 171. t 679 = acuta.
curaica, Franch. & Sav. Ennm. PL Jap. ii. 262 = chaetorhiza.
curaica, Knnth, Enum. PI. ii. 375=vulpinarii.
curta, Good, in Trans. Linn. Soc. .ii. (1794) 145 = canescens.
enrvata, *Boott, Illustr. Care*,* i. 2.—Reg. Himal.
curoata, Knaf, in flora, xxx. (1847) 184=Schreberi.
curvicollis, *Franch. b" Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 579.—Japon.
curvirostra, Hartm. Skand. Fl. ed. II. 221*>vaginata.
curvirostris, Kunze, in Schknhr, Riedgr. Snppl. 79. t. 20 ^baccans.
cumila. *All. Fl. Pedem.* ii. 264. t. 92. f. 3.—Europ.
curvula, Lam. Encyc. iii. 380=>Schreberi.
cunmla, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. vL (1823) 67 - Elyna schoenoides.
curvula, Willd. ex Kunth, Enmm. PL ii. 269 = Davalliana.
cuspidata, Bertol. in Mem. Soc Med. Emnl. Gen. ii. (1803)145-di visa.
cuspidata, Degl. in Loisel. Fl Gall. 294 = echinata.
cuspidata, Host, Gram. i. 71. t. 97=glauca.
cuspidata, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 164'salina.
Custoriana, Heer, ex Hegetschw. Fl. Schw. 906 = dioica.
cylindrica, Mielich. ex Kunth, Ennm. PI. U. 484 = atraU.
cylindrica, Schwein. in Ann. Lye N. York, i. (1824) 71-bullata.
cylindrica, Tuckenn. ex Boott, in Hook. Lond. Joura. Bot. v. (1846) 74 = Tuckennani.
eyperoides, Dewey, in Am. Jonrn. Sc. Ser. II. iii. (1847) 171 = sychnocephala.
eyperoides, *Murr. in Linn. Syst.* ed. XIII. 70S.—Europ.; As. temp.
Czetzii, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. (1858) 98.—Europ.
daciea, Heuff. in Flora, xviii. (1885) 247 = caespitosa.
Daltonii, *Boott, Illustr. Carex,* i. 6.—Ind. or.

CAREX:—

Darlingtonii, Schwein. ex M. A. Curt, in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 410=aestivalis.
Darwinii, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 261.—Reg. Magell.
dasycarpa, *Muhl. Desc. Gram. Vber.* 286.—Am. bor.
Davalliana, Dewey, ex Steud. Norn. ed. II. i. 288 = pyrenaica.
Davalliana, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* v. (1800) 266.—Reg. bor. temp.
Davalliana, Willd. ax Kunth, Ennm. PL ii. 868 = dioica.
Davidi, *Franch. PI. Davidian. I* (1884) 819.—China.
Davisii, Dewey, in Am. Journ. Sc. x. (1826) 279 = varia.
Davisii, *Schvein. V Ton. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 326.—Am. bor.
debilis, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient, v. 410 = transylvanica.
debilis, Forst. f. Prod. 82 - Forsteri.
debilis, *Michx. Fl. Bor. Am. ä.* 172.—Am. bor.
debilis, Soland. ex Boott, Illustr. Carex, i. 65 = Solandri.
decidua, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 265.—Calif.; Reg. Magell.
dedpiens, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sir. I. xxvi. (1882) 209-=macrostyla.
dedpiens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 102; xxviii. (1856) I. 823 = obtusata.
declinata, *Beott, Illustr. Carex,* iv. 171. t. 580.—Austral.
decolorans, Wimm. in Flora, xxxiii. (1850) 623 = vnlgaris.
decomposita, *Muhl. Descr. Gram. Uber.* 264.—Am. bor.
decora, *Boott, Illustr. Carex,* i. 6. t 15.—Reg. Himal.
decumbens, Ehrh. Beitr. vi. 82-pilulifera.
daflexa, *Horncm. in Fl. Dan.* L 3051.—Am. bor.; Groenl.
Deinbolliana, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Sér. II. xi. (1839) 18S=stenophylla.
Dematranea, *Logger, in Flora,* xxxviiL (1855) 207.—Europ.
demissa, *Hornem. in Ft. Dan.* t. 1842.—Europ.
densiflora, *Presl, Rel. Haenk.* iii. 204.—Ins. Marian.
denudata, Lapeyr. ex Steud. Norn. ed. I. 160 = pyrenaica.
depauperata, *Good, in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 181.—Europ.; As. bor.
depauperata, Hornem. Plantelaere, ii. 829=vaginata.
depressa, Link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 309 = Halleriana.
depressa, Willd. ex Kunth, Enum. El. ii. 479 = alpestris.
desponsa, *Boott, Illustr. Carex,* ii. 82.—Reg. Himal.
Despreauxii, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 287.—'Terra nova.'
devia, *Cheesem. in Trans. If. Z. Inst.* iv. (1888) 301. - N . Zel.
Deweyana, *Schwein. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 65, 810.—Am. bor.
Dianae, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 238.—Ins. S. Helena.
diandra, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. II. 487 = paniculata.
diandra, Schrank, in Act. Acad. Mogunt. (1782) 49 (en. typ. 57) =teretiuscula.
diaphana, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 156.—AustraL
Dickinsii, *Franch, V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 681.—Japon.
didina, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-45) 271.—Chili.
Dietrichiae, Boeck. in Flora, Iviii. (1875) 122 = fissilis T
digitalis, Schwein. & Torr. in Ann. Lye N. York, i. (1824) 324. t. 27=gracillima.
digitalis, *Willd. Sp. PI.* iv. 298.—Am. bor.
digitata, *Linn. Sp. PI.* 976.—Enrop.; As. temp.
dilatata, Hohen. ex Boiss. Fl. Orient, v. 425, sphalm. =seq.
dilnta, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii. 388.—Europ. anstr.; As. temp.
dimorpha, Brot. FL Lusit i. 84»Linkii.
dimorpholepis, Steud. Syn. PI. Cyp. 214-pruinosa.
dimorphotheca, *Stschigl. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1854) 206.—Sibir. altaic
dioica, Carey, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 143-chordorrhiza.

CABEX:—

dioica, Host, ex Steud. Norn. ed. II. i. 288 = Davalliana.
dioica, Lam. ex Stead. 1. c.=Elyna spicata.
dioica, *Linn. Sp. PI.* 972.—Reg. bor.
dioicotrigona, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 121-Davalliana.
dioiscostrongyla, St Lag. 1. c—dioica.
dipsacea, *Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallks. Lund* (1877) n. VIII. p. 28.—N. Zel.
discoidea, Boott, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1868-59) 419 = breviculmis.
discolor, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 519.—Japon.
discolor, F. Nyland. Spicil PL Fenn. iii. n. 12 - salina.
discolor, Reinw. ex De Vriese, PL Ind. Bat. Reinw. 143, partim=virgata.
dispalatha, *Boott, in Perry, Jap. Exp.* ii. 825.—Japon.
disperma, Dewey, in Am. Joum. Sc. viii. (1820) 266. t. A. f. 3=tenella.
disperma. Herb. Un. It. *en* Knnth, Enum. PL ii. 480 = Steudelii.
dissimilis, *J. F. Gmel. Syst.* 144.—Helvet.
dissita, *Soland. ex Hook./. Fl. N. Zel.* 284.—N. Zel.
distachya, Desf. Fl. Atlant ii. 336-Linkii.
distachya, Willd. Sp. PL iv. 220 = atrata.
distans, Bert, ex Steud. Norn. ed. II. i. 288=indecora.
distans, Host, Gram. i. 67.177-fulva.
distans, Lightf. Fl. Scot. ii. 66l=binervi«,
distans, *Linn. Syst.* ed. X. 1263.—Enrop.; As. occ.; Am. bor.
distans, Willd. ex Kunth, Ennm. PI. ii. 488 = nutans.
distenta, Kunze, ex Kunth, 1. c. 449—indecom.
disticha, A. Gray, Man. N. U. St ed. V. 574 » Sartwellii.
disticha, *Huds. Fl. Angl.* ed. I. 847.—Europ.
divergens, Thuill. Fl. Par. ii. 481-elongata.
diversicolor, *Crantm, Inst.* i. 405.—Italia ?
diversiflora, Host, Gram. i. 53. t. 70 = Halleriana.
divisa, *Huds. Fl. Angl.* ed. I. 848; ed. II. 405.—Reg. bor. temp.
divisa, Oed. in Fl. Dan. t. 871=flava.
divulsa, Gaud. Fl. Helv. vi. 47 -muricata.
divulsa, *Good, in Trans. Linn. Soc.* il. (1794) 160.—Reg. bor. temp.
Doenitzii, *Boeck. in Flora,* lrr. (1882) 61.—Japon.
Doniana, Sprang. Syst. iii. 825 •» japonica.
Douglasii, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 213.—Am. bor. occ.
Dregeana, *Kunth, Enum. PI.* ii. 511.—Aft. anstr.
Drejeri, Lange, in Flora, xxv. (184*2) 648=caespitosa.
Drejeriana, *Lange, in FL Dan.* t. 2975.—Groenl.
Drummondiana, Dewey, in Am. Journ. Sc. xxix. (1886) 251. t. Y. £82 = mpestris.
Drymeia, Linn. f. Suppl. 414=sylvatica.
drymophila, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1888) 104.—Sibir.
dubia, Gaud. EtrennesFl. 178-atrata.
dubia, *Hose, in Usteri, Ann. Bot.* xxi. (1797) 34.—Europ.
dubia, Sibth. in Sibth. & Sm. Fl. Graec Prod. i. 53 Sesleria alba.
dubitata, Dewey, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 167 = vnlgaris.
Dufourei, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. Suppl. 140 = rupestris.
dura, Boott, in Proc Linn. Soc. i. (1845) 255 = pichinchensis.
Durieui, *Steud. Norn.* ed. II. i. 289.—Hispan.
duriuscula, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. (1881) 214. t. 8=stenophylla.
Duvaliana, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* » 668.—Japon.
ebracteau, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 271.—Chili,
ebracteata, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) I25—Sibir.
ebumea, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 226.—An>-bor.
echinata, Lam. Fl. Fr. ii. 177-flava.
echinata, *Murr. Proi. Stirp. Getting.* 78.—Reg. nor-temp.; AustraL
echinata, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 395=stellulata.
echinochloe, *Kunze, in Schkuhr, Riedgr. Suppl.* *'• 1.12.—Abyssin.
Ecklonei, *Nees, in Linnaea,* x. (1836) 203.—Air. anstr.

CAHBX:—
efflata, Laestad. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 291-panicea.
eggytera, Steud. Syn. PI. Cyp. 220 = brevicnlmis.
Ehrenbergiana, *Boeck. in Linnata,* xli. (1877) 175.—Mexic.
Ekrhartiana, Hoppe, ex Boott,. Illnstr. Carex, iv. 146 -teretiuscula.
elata, All. Fl. Pedem. ii. 272=stricta.
elata, *Lowe, in Trans. Comb. Phil. Soc.* iv. (1831) 11.—Ins. Madera.
elata, Turner, ex Boott, Illustr. Garex, i. 66->praelata.
elatior, *Boeck. in Bremen Abh.* vii. (1880) 41.—Madag.
elegans, Willd. Prod. Fl. Berl. 34=limosa,
eleopsammodes, Steud. Syn. PI. Cyp. 213 = Daiwinii.
eleusinoides, *Turcz. ex Kunth,. Enum. PI.* ii. 407.—Sibir. baical.
Elliottii, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 357.—Am. bor.
elongata, Leers, FL Herborn. 197. t. 14. f. 7 = canescens.
elongata, *Linn. Sp. PI.* 974.—Europ.; Sibir.
elytroides, Fries, in Bot. Notiser, (1846) 106 = saxatilis.
emarcida, Suter, Fl. Helvet. ii. 268=sylvatica.
emarginata, Willd. Sp. PI. iv. 262=mon tana,
eminens, *Nets, in Wight* Contrib.* 122.—Keg. HimaL
emirnensis, *Baker, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 129.—Madag.
Emmmsii, Dewey, in Ann. Lye. N. York, iii. (1886) <ll=varia.
emodorum, Spreng. Syst. iii. 818-=alopecuroides.
Emoryi, *Dewey, ex Torr. Bot. Ilex. Bound.* 230.—Am. bor. occ.
enervis, Dulac, Fl. Hantes-PyT. 53-brizoides.
enervis, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 209.—Sibir. altaic.
ensifolia, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. *is.* 309 = saxa* tilis.
epigejos. Fries, Summa, 228=salina.
erecta, DC. Fl. Fr. iii. 120-sempervirens.
erecta, Gilib. Exercit. ii. 649-caespitosa.
ericetorum, *Poll. Hist. PI. Palat.* ii. 680.—Europ.; As. temp.
erinaeea, Cav. Ic. v. 40-Uncinia erinacea.
erinaeea, Mubl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 288=hysterieina.
eriophora, *Fisck. ex Steud. I. c.* 289.—Dahuria.
erythraea, *Schrad. in Linnaea,* xi. (1837) 67.—Reg. Himal.
erythrorrhiza, *Boeck^in Linnaea,* xxxix. (1876) 103^-Abyss.
erythrorrhiia, Steud. Syn. PI. Cyp. 194 = Koestlini.
erythrostachys, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 69 (1835)=glauca.
erythrostachys, Krai, ex Nym. Consp. 774 ^serrulata.
Esenbeckiana, *Boeck. in Linnaea,* xL (1876) 372.—Afr. austr.
Eaenbeckii, *Kunth, Enum. PI.* ii. 622.—Keg. Himal.
Esseneckii, Boott, Illustr. Carex, i. 52 = linearis.
evolnta, *Hartm. in Vet. Akad. Handl.. Stockh.* (1818) 166.—Europ.
exaltata, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 822.—Hungaria.
exaltata, Peterm. in Flora, xxviL (1844) 340 -riparia.
excelsa, Poepp. ex Kunth, Enum. PI. ii. 502 - C. Eseudocyperus.
excisa, *Boott, ex Perry, Jap. Exp.* ii. 326.—Japon.
excurrens, Cham, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 228=-podocarpa.
excurva, *Boott, Illustr. Carex,* i. 67.—Reg. Himal.
exigua, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 614.—Zeylan.
exilis, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xiv. (1828) 851.—Am. bor.
extensa, *Good, in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 17S. t 21. f. 7.—Reg. temp. bor.; Am. austr.
extensa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 31=diluta.
Fabri, *Hance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 90.—China.
falcata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 104; xxviii. (1855) I. 888 = saxatilis.
Max, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 189.—Java,
familiaris, *Steud. I. c.* 226.—Texas.
fascicularis, Sieven, exTrevir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868) I. 648-caespitosa.

CAHEX:—
fascicularis, Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 288 - C. Pseudocyperus.
fasciculata, Link, in Schkuhr, Riedgr. i. 119=echinata.
fasciculata, *Willd. Sp. PI.* iv. 248.—Lusitan.
Fauriae, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 89.—Japon.
fecunda, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 194.—Am. trop.
Fedia, Nees, ex Wight, Contrib. 129 = Wallichiana.
feminea, Steud. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 138 = acutata.
Fendleriana, *Boeck. in Linnaea,* xxxix. (1875) 185.—Am. bor.
ferax, Raeusch. Nom. ed. III. 270=erecta.
ferruginea, Schkuhr, Riedgr. i. 92 = sempervirens.
ferruginea, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. ii. 225.—Europ.
ferruginea, Stev. in Mem. Soc. Mat. Mosc. iv. (1818) 68=sempervirens.
festiva, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xxix. (1835) 246.—Reg. bor.; Ins. Sandvic.
festucacea, Schkuhr, Riedgr. ii. 28=straminea.
fibrillosa, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 564.—Japon.
fiUcina, *Nees, in Wight, Contrib.* 123.—Ind. or.; Malaya.
filiculrais, *Franch.* b[1] *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 568.—Japon.
filifolia, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Ser. II. vi. (1836) 125 = Durieui.
filifolia, Nutt. Gen. Am. ii. 204=Uncinii breviseta.
filiformis, Leers, Fl. Herbom. t. 16. f. 5 = praecox..
filiformis. *Linn. Sp. PI.* 976.—Europ.; Am. bor. et austr.; As. bor.
filiformis, Thuill. Fl. Par. 440 = tomentosa.
filiformis, Vahl, in Fl. Dan. t. 1048-pilulifera.
filipendula, Drej. 1. c. t. 2S70=halophila.
filipes, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 578.—Japon.
fimbriata, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 61.—Europ.
finitima, *Boott, Illustr. Carex,* i. 44.—Reg. Himal.
firma, *Host, Syn.* 509.—Europ.
Fischeriana, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Ser. II. x. (1888) 286=chordorrhiza.
fissilis, *Boott, Illustr. Carex,* ii. 86. t 245.—Austral.; N. Caled.
fissirostris, *Ball, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 206.—Marocco; Afghanist.
flacca, Carey, ex Boott, Illustr. Carex, i. 69 = Barrattii.
flacca, Schreb. Spicil. 669 =glauca.
flaedda, Sw. ex Kunth, Knnm. PI. ii. 160 = cladostacbya.
flaccidula, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 199.—Am. bor.
flacciformis, Hoffmgg. ex Kunth, Enum. PI. ii. 498 = laevigata.
flaccosperma, *Demy, in Am. Journ. Sc.* Ser. IL ii. (1846) 245.—Am. bor.
flagellifera, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 842.—N. Zel.
Flagellum, J. F. Gmel. Syst. 13&=Scleria Flagellum.
flava, Boiss. Voy. Espagne, il. 681 =Oederi.
flava, *Linn. Sp. PI.* 975.—Reg. bor. temp.; Tasman.
flaveseens, Host, Gram. iv. 63. t/96-fulva.
flavicans, F. Nyland. Spicil. PI. Fenn. iii. 15-salina.
flavocuspis, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 574.—Japon.
ftavo-fulva, Beurl. in Bot. Notiser (1853) 87'flava.
flectens, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 171.—Japon.
flexilis, D. Don, in Till. Mag. (Dec. 1823) 456-gracilis.
flexilis, Kudge, in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 98. t. 10-castanea.
flexuosa, Muhl. ex Schkuhr, Riedgr. ii. 74° details.
floresiana, Hochst. ex Seub. Fl. Azor. 22. t 8. f. 1 = Vulcani.
floribunda, *Boeck. in Linnaea,* xi. (1S76) 835.—Reg. Himal.
floridana,&A«win. in *Arm. Lyc.N. York,* i. (1824) 66.—Florida.
fluviatilii, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 172.—Burma.
foeminea, Steud. Syn. PI. Cyp. 203-acutata.
foenea, *Muhl. ex Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 315.—Am. bor.
foenea, Willd. Enum. Hort. Berol. ii. 957=straminea.
foetida, *All. Fl. Pedem.* ii. 265.—Kurop.
foliosa, AH. 1. c. 270-flava, caespitosa.
foliosa, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 42.—Reg. Himal.
foliosissima, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 196.—Reg. Amur.

CAREX:—
ialticnlftcea, *front*, Inst.* i. 405.—Hab. 1
folliculata, Fl. Sketch, ii. 545-turgescens.
folliculata, *Hf <•?• PI.* 978.—Am. bor.
/e/Hra/ato, Wahienb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. . (18Q8) 152^-jntutnescens.
Fonki, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 88.—Chili.
Fontanesiana,f>C. FL Fr. iii. 102=pyren»ica.
Fmdanesii, JPoir-Encyc. Suppl. iii. 257 =divisa.
Forficula, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 657.—Japon.
formosa, *Demy. >" Am. Journ. Sc.* viii. (1824) 98. t. B.fig.6.—Am. bor.
Forsteri, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (18O3.Ufi4,=£, Pseudo-cyperus.
fragilis, *Boott, Illustr. Carex,* i. 7.—Reg. Himal.
Frankp, Kuflth, Enum. PL ii. 498 =stenolepii.
Frankii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 290.—Am. bor.
FrankliBB, *Bqoft, -in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 217.—Am. bor.
Fraseri, *4ff4r.Bot. Rep.* t. 639.—Am.-bor.
Fraserianal Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1391 = Fraseri.
fratema, *gupr..Symb. PI. Ross.* 208.—Rossia.
Fridrichsthaliana, Steud. Syn. PL Cyp. 2U=caespitosa.
frigida, *All, Fl. Pedem.* ii. 270.—Reg. bor.
frigida, Vill. Hist. PL Dauph. ii. 215'ferruginea.
frigida, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 164-fuliginosa.
frigida, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 464, 466-firma, fimbriata.
frisica, H. Koch, in Flora, xxix. (1846) 273-trinervis.
fnirenioides, *Gaudich. Freyc. Voy. Bot.* 412.—Ins. Marian.
fuliginosa, Host, Gram. iv. 62. t. 93"fimbriata.
fuliginosa, *Schkuhr, Riedgr.* i. 91.—Lappon.
fulva, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 631 - Homschuchiana.
fulva, Gaerta. Mey. ft Scherb. FL Wett iii. 830-distans.
fulva, *Good, in Trans. Linn. Soc.* il. (1794) 177. t. 20. f.6.—Europ.; Am. bor..
fulva, Hornem. in Fl. Dan. t. 1768=binervia1
fulva, Host, Gram. iv. 68. t. 96=varia.
fulva, Muhl. Desc. Gram. Uber. 246-EUiotii.
fulva, ThuilLFl. Par. 483-teretiuscula, paradoxa.
fulvicoma, Dewey, in Am. Journ. Sc. xxix. (1886) 249 - chordorrhiza.
funiformis, [Clairv.] Man. Herb. 287-chordorrhiza.
furtata, Ell. Sketch, ii. 562=comosa.
furcate, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 668.—Mont. Pyren.
furculata, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 829 « muricata.
fun/a, Webb, It. Hisp. 6-lagopina.
fusca, All. FL Pedem. il. 269-caespitosa,
fusca, Schkuhr, Riedgr. i. 64 = pulla.
fusca, Soland. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 217 - pumila.
fuscescens, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 517.—Japon.
fuscescens, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 378-divisa.
fuscoatia, *Boeck. in Linnaea,* xL (1876) 378.—Peruv.
fuscula, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 699 - indecora.
fusiformis, Chapm. ex Boott, Illustr. Carex, i. 37-laxiflora.
fusiformis, *Nees, in Wight, Contrib.* 128.—Reg. Himal.
gaimardioides, *Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vL 202.—Chili.
Galeottiana, C A. Mey. in BuU. Acad. Brnx. ix. (1842) II. 248=Jamesoni.
Gasparrinii, *Part. Fl. Hal.* ii. 149.—Italia.
Gaudichaudiana, Kunth, Enum. PL ii. 417=vulgaris.
Gaudiniana, *Guthnick, in Flora,* xv. (1882) 211.—Helvet
Gayana, *Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 206.—Chili.
Gayiana, Steud. Nom. ed. II. i. 290=asturica.
Gebhardi, Willd. Sp. PL iv. 240 ; Schkuhr, Riedgr. ii. 22 = elongata.
Gebhardii, Hoppe, Carie. t. 80 = canescens.
Gebleri, Prescott, ex Boott, in Proc. Linn. Soc i. (1846) 285=songarica.

CABEX-.—
gemella, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 214 Ind. or.
geminata, Schkuhr, Riedgr. i. 66 = ternaria.
geniculata, Hott, Gram. iv. 62. t. 94 = frigida.
geniculata, Schleich. ex Knnth, Enum. Pi. ii. 466 = ferruginea.
genurnsis, DC. Cat. Hort. Monsp. 87-glauca.
georgiana, *Deary, ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 225.—Am. tor.
germana, *Boott, in Hook.f. Fl. Antarct.* 466.—Chili.
Gersneri, Snter, Fl. Helv. ii. 248-humilis.
Geyerii, *Boott, in Trans. Linn. See.* xx. (1846) 118.—Am. bor. occ.
gibba, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 148.—Japon.
Gibsoni, Bab. in Jard. Ann. Nat Hist. xi. (1843) 168. t. 5=vulgaris.
gigantea, *Rudge, in Trans. Linn. SocMi.* (1804) 99. t. 10. f. 2.—Am. bor.
Gilliesii, *Phil, in Anal. Univ. Chit.* (1878) 556.—Chili.
Girandiana, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 209.—Ins. Borbon.
glabra, Boott, Ulnstr. Carex, ii. 93-venusta.
glandulosa, £11. ex Boott, 1. e. 89=glaucescens.
glareosa, *Schkuhr, ex Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 146.—Scandinav.
glauca, Bosc, ex Boott, Illustr. Carex, ii. 89 = glaucescens.
glauca, *Scop. Fl. Corn.* ed. II. ii. 223.—Europ.; Afr. bor.; Am. bor.
glaucescens, *Ell. Sketch,* ii. 653.—Am. bor.
glancina, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 353.—Ind. or.
glaucodea, *Tuckerm. ex Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 395.—Am. bor.
Glazioviana, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 59.—Bras.
Glehni, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 194.—Reg. Amnr.
globosa, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 259.—Calif.
globularis, Leys*, ex Kunth, Enum. PI. ii. 439 = praecox.
globularis, *Linn. Sp. PI.* 976.—Scandinav.
globularis, Oed. in Fl. Dan. t. 443 = panicea.
globularis. Roth, Tent. Fl. Germ. i. 897 = obesa.
globularis, Suter, Fl. Helv. ii. 249-ericetarum.
globularis, Vah\, inSkr. Naturh. Selsk. ii. I. (17.92) 46 = rotundata.
globularis, Vill. Hist. PI. Danph. ii. 211=canescens.
globularis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Nene Schr. i. (1794) 46. t. 2. f. l=montana.
glomerata, Gilib. Exercrt ii. 54B=vulpina.
glomerata, Host, Gram. 1.1. 44=stenophylla.
glomerata, Schknhr, Riedgr. i. 79. t. 1. f. 41 = obesa.
glomerata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 14.—Afr. austr.; Am. bor. et anitr.
Gmelini, *Hook. V Arn. in Bot. Beech. Voy.* 118. t. 27.—Kamtschatka.
Codefrini, Willem. Phyt. iii. 1114 = laevjgata.
Goodenovni, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Sér. II. xi. (1839) 191—vulgaris.
Goyeni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xiv. (1882) 863.—N. Zel.
gracilescens, Hartm. ex Anderss. Cyp. Scand. 16 = riparia.
gracilescens, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 226.—Am. bor.
gracilipes, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* U. 151.—Japon.
gracilis, *R. Br. Prod.* 242.—Austral.
gracilis, Curt. Fl. Lond. fasc. iv. t. 60 = acuta.
gracilis, Ehrh. Beitr. vi. 83, nomen; Schkuhr, Riedgr. i. 48-lollacea,
gracilis, A. Gray, in Am. Jonrn. Sc. Ser. II. iv. (1847) 19 = tenella.
gracilis, Honclc. Syn. PL Germ. i. 868—mucronata.
gracilis, Moench, Meth. 323=montana.
gracilis, Wimm. in Jahresb. Schles. Ges. (1849) 79 ; et in Flora, xxxiii. (1860) 620=stricta.
gracillima, Hoppe, ex Nym. Consp. 775 = panicea.
graeillima, *Schwein. in Ann. Lye. N. York, i.* (1824) 66.—An), bor.
gracillima, Steud. & Hochst. ex Steud. Norn. ed. II. i. 290 = ferruginea.
Graeffeana, *Boeck. in Flora,* lviii. (1875) 123.—Ins. Fiji.
Grahami, Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1843) 180; et Trans. Linn. Soc. xix. (1846) 216 -saxatilis.
granularioides, Schwein. in Ann. Lye N. York, i. (1824) 69-conoidea.

CABBX:—
granularis, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 67.—Am. bor.
Grasmanniana, Rabenh. Fl. Lusat.; ex Steud. Syn. PI. Cyp. 218 — tomentosa.
Grayana, Dewey, in Am. Journ. Sc xxv. (1834) 141 - Uvida.
Grayii, *Carey, in A. Gray, Man. Bot. U. St.* ed. I. 663.—Am. bor.
Greeniana, Dewey, in *A* m. Journ. Sc. xxx. (1886) 61 = fulva.
Greenii, *Boeck. in Flora,* xli. (1858) 649.—Am. bor.
Griffithii, *Boott, in Proc. Linn. Soc* i. (1846) 286.—Afghan.
Grioletti, Roem. in Schkuhr, Riedgr. ii. 76-grisea.
grisea, *Viv. Ann. Bot.* i. 186.—Reg. Caucas.; Persia,
grisea, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 154.—Am. bar.
Grosseckii, Heuff. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 148 = pyrenaica.
Grypos, Schknhr, Riedgr. ii. 18-echinata.
guestphalica, Boenn. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 867 = muricatn.
Gunniana, *Boott, in Proc. Linn. Soc. i.* (1846) 258.—Austral.
Guthmickiana, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. x. (1838) 289-decipiens.
gynandra, *Schwein. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 70.—Am. bor.
gynandra, Sieber, ex Knnth, Enum. PI. ii. 478 = Iinkii.
gynobasis, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 306 <= Halleriana.
gynocraies, Wormsk. in Drej. Rev. Caric. 16 = chordorrhiza.
gynodynama, *Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 394.—Calif.
Gynomane, Bertel. PI. Rar. Ital. Dec. ii. 48=Linkii.
Haastiana, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 168. - N. Zel.
haematolepis, Drej. in Fl. Dan. t. 2370=salina.
haematostoma, *Nees, in Wight, Contrib.* 126.—Nepal.; Reg. Himal.
Haenkenna, Presl, Rel. Haenk. iii. 203 - C . Pseudo-cyperus.
Hailstoni, Gibs, in Phytol. i. (1841) 870 = axillaris.
hakonensis, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 660.—Japon.
Haleana, *Olney, Car. Bor. Am.* 6.—Am. bor.
Halei, Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. ii. (1846) 248=C. Crus-corvi.
Halei, *Carey, in Chapm. Fl. S. U. St.* 543.—Am. *bot.*
Halleri, Vest, ex Steud. Norn. ed. IL i. 290.—Cf. Suteri.
Halleriana, *Asso, ex Honck. Syn.* i. 372.—Europ.; Reg. Casp.; Marocco.
Halliana, *L. Bailey, in Coult. Bot. Gat.* Ix. (1884) 117.—Am. bor. occ.
Hallii, *Olney, in Hoyden, Rep.* (1871) 496.—Am. bor. occ.
halmaturina, Boeck. in Linnaea, xxxix. (1875) 100 = paniculata, tereticaulis.
halopkila, Heuff. in linnaea, xxxi. (1861-62) 695 = fulva.
halophila, *F. Nyland. Spicil. PL Fenn.* ii. n. 6<L—Xappon.
Halseyana, Dewey, in Am. Journ. Sc. xi. (1826) 313 = polymorpha.
hamata, Font, ex Steud. Norn. ed. II. i. 290 = Forsteri.
hamata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18-Uncinia jamaicensis.
Hancockiana, *Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* liv. (1878) I. 66.—China.
Harlandi, *Boott, Illustr. Carex,* ii. 87. t. 255.—Hongkong.
Hartii, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* Sei. II. xli. (1866) 226.—Am. bor.
Hartwegii, *Boott, in Benth. PI. Hartm.* 96.—N. Granat.
Haydeniana, *Olney, in Bot. King, Exp.* 866.—Am. bor. occ.
Haydenii, Dewey, in Am. Jonrn. Sc Set. II. xviii. (1854) 103-aperta.
hebecarpa, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 50 = Hookeri.
hebecarpa, *C. A. Mey. in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* i. (1831) 223. 1.12.—Reg. Himal.
hebetata, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 172.—Am. austr.
Heleonastes, *Ehrh. ex Linn.f. Suppl.* 414.—Europ.
Heleonastes, Liljcbl. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1793) 73-glareosa.

CAREX:—
Helferi, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 366.—Burma.
helodes, link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 309-laevigata.
helvola, *Blytt, in Fries, Bot. Notiser* (1849), 68.—Norveg.
helvetica, Honck. Syn. PI. Germ. i. 375-°rrigida.
helvetica, Schleich. ex Kunth, Enam. PI. ii. 448= punctata.
Hepburnii, Boott, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 209. t. 207=nardina.
heptastachys, *Boeck. in Linnaea,* xxxix. (1876) 114.—Am. trop.
hermaphrodita, T. F. Gmel. Syst. 188=Elyna spicata.
hermaphrodita, Jacq. Coll. iv. 174 = Mariscus Jacquini.
heterolepis, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 69.—China,
heteroneura, *S. Wats, in Bot. Calif,* ii. 240.—Calif,
heterophylla, *Krock. ex Steud. Norn.* ed. IL L 290.—Silesia.
heterosperma, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 161-anceps.
heterostachya, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 69 = nutans.
heterostachya, Torr. in Am. Jonrn. Sc Ser. II. ii. (1816) 248=Crawei.
, hians, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 236.—Hab. t
Hilairei, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 146.—Bras.
Hildebrandtiana, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 616.—Madag.
Hilgendorfiana, *Boeck. I. c.* 518.—Japon.
hirsuta, Suter, Fl. Helv. ed. II. ii. 324-Halleri.
hirsuta, Willd. Sp. PI. iv. 252 = triceps,
hirta, *Linn. Sp. PI.* 975.—Europ.; As. temp.
hirta, Oed. in Fl. Dan. t. 379 = filiformis.
hirtae/ormis, Pers. Syn. ii. 547-hirta.
hirtella, *Drej. Symb.* 21.—Afghan.; Reg. Himal.
hirtella,]. ¥. Gmel. Syst 138 = Scleria hirtella.
hirtissima, 5. *Wats, in Bot. Calif,* ii. 247.-Calif,
hispida, *Gaud. Agrost. Helv.* ii. 138.—Helvet.
hispida. Link, Hort. Berol. ii. 331 = lasiochlaen».
hispida, Willd. ex Schkuhr, Riedgr. i. 83 = echinata.
hispidula, Gaud. Agrost. Helv. 186 = fimbriata.
Hitchcockiana, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* x. (1826) 274.—Am. bor.
Hochstetteri, Frank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 291-polytrichoides.
Hochstetteriana, *J. Gay, ex Seub. Fl. ABOT. ii.* t. 2. f. 2.—Ins. Azoric.
holostoma, *Drej. in Fl. Dan.* t 2428.—Groenl.
homalocarpa, Peterm. in Flora, xxvil (1844) 333-vulgaris.
homololepis, *Franch.* b* *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 567.—Japon.
Hoodii, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 211.—Am. arct.
Hookerana, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xzix. (1836) 248.—Am. arct.
Hookeri, *Kunth, Enum. PI.* ii. 490.—Chili.
Hoppneri, Boott, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 219 = salina.
hordeiformis, Wahlenb. in Vet Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 162=hordeistichos.
hordeistichos, *Vill. Prosp.* 18.—Europ.; As. temp.
Homschuchiana, *Hoppe, in Flora,* vii. (1824) 699.—Europ.
Horsfieldii, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 257.—Java.
Hosteana, DC. Cat. Hort. Monsp. 88-fulva.
Hostii, Hoppe, ex Kunth, Enum. PI. ii. 372=divisa.
Hostii, Schkuhr, Riedgr. Nachtr. 7-stenophylla.
Houghtonii, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1886) 413.—Am. bor. occ.
Hnetiana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 123.—Reg. Caucas.
huitensis, Steud. Syn. PI. Cyp. 228=indecora.
Humboldtiana, *Steud. 1. c.* 208.—N. Granat.
humilis, *Leyss. Fl. Hal.* 175.—Europ.; Reg. Caucas.
humilis, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 411=caespitosa.
hyalina, Boott, in Bost. Journ. Nat. Hist v. (1847) 112—straminea.
hyalinolepis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 235.—Am. bor.
hybrida, Belev. ex Lam. Encyc. iii. 382 - divisa.
hybrida, Schkuhr, ex Kunth, Enum. PI. ii. 583-Kobresia caricina.
hydrophila, Dura. Fl. Belg. 146-echinata.
hymelayensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 204.—Reg. Himal.
hymenina, *Nees, ex Boott, Illustr, Carex, i.* 67.' Chili.

CABEX:—
hymenocarpa, Drej. in Fl. Don. t. 2849=ampnllacea.
hymenolepis, Nees, in Wight, Contrib. 126=setigera.
hypandra, *F. Muell. Fragm.* viii. 259.—Austral.
hyperborea, Drej. Kevis. Caric. 43=salina.
hypoxanthos, Stend. Syn. PI. Cyp. 193-Brongniaitil.
hyprophila, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 854.—Malaya,
hysterıcina, *Muhl. ex Schiuhr, Riedgr.* ii. 69.—Am. bor.
Hystrix, A. Gray, ex Boott, IUnstr. Carex, i. 26 = Cruscorvi.
Idznroei, *Franck. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 588.—Japon.
ignota, Dewey, is Am. Jonm. Sc. Ser. II. viii. (1849) 348=laxiflora.
illegitima, *Cesati, in Frieder. Seise,* 27L—Dalmat.; Graecia.
illinoensis, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. iv. (1847) 245.—Am. bor.
iltustranda, Stend. Syn. PI. Cyp. 190=bracteosa.
llseanax, Ruhm. In Eichl. Jahrb. i. (1881) 268.—Europ.
impunctata, *Boott, lllustr. Carex,* iii. 107.—Java.
inaequalis, Raeusch. Nom. ed. III. 270=cacspitosa?
inanis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 622.—Reg. Himal.
incerta, Steud. Syn. PI. Cyp. 210 = saxatilis.
incisa, *Boott, in Perry, Jap. Ext.* ii. 827.—Japon.
incisodentata, Lechl. ex Boott, Illnstr. Carex, i. 26 = festiva.
Incisodentata, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 189.—Reg. Magellan.
inclusa, Turcz. ex Boott, Illnstr. Carex, iv. 177= alba.
inconspicua, Steud. Syn. PL Cyp. 221 —indecora.
incrassata, Schlecht. in Linnaea, x. (1886) 119 = liparia.
incrassata, Soland. ex Boott, Illnstr. Carex, iv. 138 -trifida.
incnrva, *Light/. Fl. Scot.* ii. B44. t. 24.—Reg. bor. temp, et arct.
incurva, Sibth. & Sm. FL Graec. Prod. i. 227=divisa.
indwora, *Kunth, Enum. PI.* ii. 448.—Ins. Falk.
indica, Koen. ex Willd. Sp. PI. iv. 316=Scleria tessellata.
indica, *Linn. Mant.* ii. 674.—Ind. or.; Malaya.
indica, F. Muell. ex Berth. Fl. Austral, vii. 441 = fissilis.
indica, Schkuhr, Kiedgr. i. 37 = Uncinia spartea.
indica, Wahlenb. in Vet. Alt ad. Nya Handl. Stockh. (1808) 149=Wahlenl>crgiana.
infiata, Huds. Fl. Angl. ed. I. 354=vesicaria.
infiata, Suter, Fl. Helvet. ii. 265-ampullacea.
infuscata, Nees, in Wight, Contrib. 125 = alpina.
innocua, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 29a.—Europ.
inops, Knnie, in Schkuhr, Riedgr. Suppl. 131=tenella.
inornata, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 803, nomen =ericetorum.
insignia, *Boott, lllustr. Carex,* i. 5.—Reg. Himal.
•nsularis, *Carmich. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 508.—Ins. Trist. d'Aconha.
intermedia, Good, in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 154 =disticha.
intermedia, Miegev. in Boll. Soc Bot. Fr. x. (1863) 83 -vulgaris.
intermedia, Retz.Fl. Scand. 178 = muricata.
intermedia, Suter, Fl. Helvet. ii. 261, 262 = p»lndosa.
intermedia, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1S22) 378=arenaria.
interrupta, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 432.—Am. bor.
intricata, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 574 - vnlgaris.
inturnescens, *Fudge, in Trans. Linn. Soc.* vii. (1804) 97. f. 3.-Am. bor.
tnundata, Willd. ex Kunth. Ennm. PI. ii. 492-glaneescens.
"versa, *R. Br. Prod.* 242.—Austral.; N. Zeland,
•nvolucrata, *Botch, in Flora,* xxxviii. (1855) 594.—Texas.
tnyolucrata, *Boott, lllustr. Carex,* ii. 76.—Am. austr.
**ridifoHa,* Kunth, Enum. PI. ii. 492 = aethiopica.
"gularis, Schwein. ill Ann. Lye. N. York, i. (1824) ?6 = flava.
»mgna, *Sm. in Hoppe, Caric.* t. 92.—Reg. bor. temp. °< arct.
*!*rhnantka,* Steud. Syn. PI. Cyp. 204=brunnea.
"chnostachya, *Steud. 1. c.* 222.—Japon.
iJ"^\tmn,Boott,inProc.Linn.Soc.\. (1846) 260.—Java.
i'ltoicensis, Poir. Encyc. iii. 246-Unciniajamaicenisis.
frwMu," Schwein. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 67 -Steudelii.

CABBX:—
Jamesii, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 398. —Am. bor.
Jamesoni, *Boott, in Proc. Linn. Soc. i.* (1845) 258.—Ecuador.
japonica, Fisch. ex Boott, 1. c. 289 = breviculmis.
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 38.—Japon.
juncea, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 227=fulva.
juncea, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 63.—Am. bor
junce'lla, T. M. Fries, in Bot. Notiser, (1857) 207-vulgaris.
juncifolia, All. Fl. Pedem. ii. 264-incurva.
juncifolia, J. F. Gmel. Syst 142=mucronata.
juncifolia, Host, Syn. 504=stenophylla.
juncoides, *J. tf C. Presl, Fl. deck.* 190.—Bohemia.
jungenda, Steud. Syn. PI. Cyp. 210=saxatilis.
lcaloides, *Peirie, in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 832.—N. Zel.
Kanitzii, *Floriano, in Magyar Novent. Lapoi,* ix. (1885) 181.—Europ.
kattegatensis, Fries, Ind. Sem. Hort. Upsal. (1857).—Cf. Hartm. Skand. Fl. ed. XIII. 466-salina.
Keiskei, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. ,148—Japon.
Kelloggii, *S. Wats. Bot. Calif,* ii. 24O.-Calif.
Kelvingtoniana, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 215.—Am. bor.
Kerneri, *Kohts, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xx. (1870) 164. —Enrop.
kiotensis, *Franch.* b* *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 556.—Japon.
Kirilowii, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xnviii. (1855) I. 340.—As. centr.
Kneiskernii x, Dewey, in Am. Jonrn. Sc xxxii. (1846) 247.—Am. bor.
Kochiana, DC. Cat Hort. Monsp. 8-paludosa.
Kochiana, Schueb. Fl. Wuerttb. 601~evoluta.
Koestlini, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 193.—Abyssin.
Kotschyana, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. xiii. 38 = vulgaris.
Krameri, *Franch.* b" *Sav. Enum. PI. Jap.* i. 661.—Japon.
Kruliii, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 69.—N. Zel.
Kunzei, *Olney, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 406.-Am. bor.
Lachenalii, Schkuhr, Riedgr. i. 51-lagopina.
lachnosperma, Wall. Cat. n. 3379 - gracilis.
laciniata, *Boott, lllustr. Carex,* iv. 176.—Calif,
lacistoma, *R. Br. Prod.* 243.—Austral.
lacustris, Ba\b. ex Kunth, Enum. PL ii. 533=Elyna candna.
lacustris, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 84. t 670. f. 152.—Europ.
lacustris, Willd. Sp. PL iv. 306=riparia.
laeta, *Boott, lllustr. Carex,* i. 69.—Reg. Himal.
laevicaulis, Hochst. in Seub. Fl. Azor. 21=punctate.
laevi.conica, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xxiv. (1867) 47. —Am. bor.
laevigata, Boiss, Voy. Bot Espagne, ii. 631=Camposii.
laevigata, Sm. *in Trans. Linn. Soc.* v. '1799) 272.—Europ.
laevigata, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 163 = aethiopica.
laevirostris, Anderss. Cyp. Scand. 17-rhynchophysa.
laevis, I. F. Gmel. Syst. 138 = Selena laevis.
laevis, Hoppe, Taschenb. (1800) 243=dioica.
laevis, *Kit. ex Willf. Sp. PI.* iv. 292.—Europ. austr. or.
Laggeri, Wimm. in Flora, xxxvii. (1854) 161=repens.
lagopina, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 145.—Reg. bor.
lagopodioides, Schkuhr, Riedgr. ii. 20 = tribuloides.
Lag-opus, Muhl. Desc. Gram. Uber. 265 = Kraseri.
Lamarckii, [W. Wood] in Rees, Cycl. vi. n. 103= obesa.
Lambertiana, *Boott, ex Hook. f. Fl. N. Zel.* 284.—N. Zel.
lanceata, Dewey, in Am. Journ. Sc.xxix. (1886) 249 « salina.
lanceolata, *Boott, in Perry, Jap. Exp.* ii. 326.—Japon.
lanescens, *Fellm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* viii. (1835) 283.—Lappon.
Langii, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 227.—Norveg.
Langsdnrffii, Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 25!)-leucochlora.
lanosa, *Gueldenst. It.* i. 107; *ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 320.—Ross, austr.
lanuginosa, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 176.—Am. bor.

CAHEX:—
lapponica, Lang, in Linnaea, xxiv. (1851) 539 = canescens.
lasiocarpa, Ehrh. in Harm. Mag. 9<» Stück (1784), 132 •snliformis.
lasiochlaena, *Kunth, Enum. PI.* ii. 485.—Sardinia,
latifolia, *Boiss. VBal. in Boiss, Fl. Orient,* v. 421.—Pontus.
latifolia, J. F. Gmel. Syst. 138=Selena latifolia.
latifolia, Moench, Meth. 324=plantaginea.
latifolia, Soland. ex Boott, lllustr. Carex, L 62-C. rseudo-cyperus.
laxa, Dewey, in Am. Jonrn. Sc xxvi. (1834) 376 = limosa.
laxa, Sw. ex Kunth, Enum. PI. ii. 513-scabrella.
laxa, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 156.—Lappon.
laxiculmis, *Schwein. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 70.—Am. bor.
laxiftora, Ell. sketch, ii. 549-grisea.
laxiflora, *Lam. Encyc.* iii. 378.—Am. bor.
laxula, Tineo, ex Boott, lllustr. Carex, iv. 202-sylvatica.
lanca, Boiss. & Bal. in Boiss. Fl. Orient, v. 424 = sempervirens.
Leavenworthii, Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. ii. (1846) 246 =cephalophora.
Lechleri, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 83.—Reg. Magellan.
Lechleri, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 234.—Chili.
Ledebouriana, C. A. Mey. ex Trevir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868) 1.540=capillaris.
Ledebourii, Boiss. & Buhse, in Nonv. Mem. Soc. Nat. Mosc xii. (1860) 222-nutans.
Leersii, F. Schult. in Flora, liii. (1870) 465, ft liv. (1871) 25 = muricata.
Leersii, Willd. Prod. Fl. Berl. 28 =stellulata.
Lehmanniana, Boott, ex Walp. Ann. i. 910«=Lemanniana.
Lehmannii, *Drej. Symb.* IS. t.2.—Ind. or.
leiocarpa, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sei. II. vi. (1836) 851-*asturica.
leiocarpa, *C. A. Mey. in Mim. Sav. Etr. Petersb.* i. (1831) 208. t. 5.—Unalask.
leiorhyncha, C. *A. Mey. in Mim. Sav. Etr. Pltersb.* i. (1831) 217. t. 9.—Dahuria.
Lemanniana, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 256 —Am. austr.
Lemmoni, *W. Boott, in Coult. Bot. Gat.* ix. (1884) 93. —Am. bor. oca
lenta, D. Don, ex Spreng. Syst iii. 811, sphalm.-gracilis.
lenticularis, Dewey, in Am. Journ. Sc vii. (1824) 263; ix. (1825) 263 - magellanica.
lenticularis, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) 331=phacota.
lenticularis, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 172.—Am. bor.
leonura, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 161-crinita, hystericina.
lepida, *Boott, lllustr. Carex,* iv. 211.—Pernv.
lepidocarpa, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 179=flava.
leporina, *Linn. Sp. PI.* 973.—Reg. boi. temp.
leporina, Michx. Fl. Bor. Am. ii. I70=scoparia.
leporina, Oed. in Fl. Dan. t. 294 = lagopina.
leporina, Pall, ex Kunth, Enum. PI. ii. 3U3=divisa.
leporina, Schkuhr, ex Ledeb. Fl.Ross. iv. 279-C. Helconastes.
leptalea, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) lSO^polytrichoides.
leptophylla, *Heuff. in Linnaea,* xxxi. (1861-62) 728. t. 5.—Europ.
leptostochya, Boiss. Fl. Orient, v. 418=seq.
leptostachys, Ehrh. ex Linn. f. Suppl. 414 = strigosa.
Lerchenfeldiana, Schur, Enum. PI. Transs. 711 = hordcistichos.
Lessoniana, *Steud. Nom.* cd. II. i. 292.—N. Zel.
leucanlha, *Am. ex Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 257.—Ind. or.
leucantha. *Sclmr, Enum. PI. Transs.* 714.—Europ.
leucocarpa, *Boeck. in Flora,* xxxix. (1856) 227.—Am. bor.
leucocarpa, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-66) 82.—Chili.
leucochlora, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. ii. (1835) 142-breviculmis.
leucoglorhin, Ehrh. ex Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 139, 140=obtusata.
leucoglockin, Linn. f. Snnnl. 413—pauciflora.

CAREX:—
leucolepis, Turcz. ex Stend. Nom. ed. II. i. 292 = tenniflora.
Uucorhiiia, Vulac, Fl. Hautes-Pyr. 452 = Davalliana.
Lhotzkiana, Nees, ex Stead. Nom. ed. II. i. 292 = Fintelmannia restioides.
Liddoni, *Boott, in Hook. Fl. Bar. Am.* iL 214.— Am. bor.
Liddoni, Carey, in A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. I. 645 -pallida.
Liebmanni, *Walp. Ann.* iii. 705.—Mexic.
ligata, *Boott, ex Benth. Fl. Hongk.* 402.—China.
ligerica, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. x. (18S8) 360 —arenaria.
ligerina, Guep. ex Bor. in Mlm. Soc. Acad. Maine-et-Loire, vi. (1859) 171 = praec.
ligulata, *Nees, in Wight, Contrib.* 127.—Ind. or.
limosa, Engelm. ex Stend. Syn. PI. Cyp. 208 = abjiciens.
limosa, *Linn. Sp. PI.* 977.—Europ.; Am. bor.
limosa, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 222 - ustulata.
limula, Fries, Sumraa Veg. 229=vulgaris.
Lindleyana, *Nees, in Wight, Contrib.* 121.—Ind. or.
linearis, *Boott, Illustr. Carex*, i. 51.—Keg. Himal.
linearis, Clairv. ex Boott, 1. c. iv. 204 = tenuis.
lineola, *Fries, in Bot. Notiser* (1844), 53.—Lappon.
Linkii, *Willd. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 39.—Reg. Mediterr.
Linnaeana, Host, Gram. iii. 77 —dioica.
Linnaei, De"gl. in Loisel. Fl. Gall. 627 = dioica.
liparocarpus, Gaud. Etrennes Fl. 158=obesa.
lipsiensis, Peterm. Fl. Lips. Excnrs. 58 = flava.
lithophila, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1888) 104; xxviii. (1855) I. 328.—Sibir.
lithosperma, Forst f. Prod. 65 - Selena margaritifera.
litkosperma, Linn. Syst. ed. XII. 706 - Selena Flagellum.
lithosperma, Walt. Fl. Carol. 227-Selena reticularis.
littoralis, Krock. ex Steud. Nom. ed. II. i. 292 = stricta,
littoralis, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 358. - N . Zel.
littoralis, *Schwein. in Ann. Lye. N. York*, i. (1824) 70. —Am. bor.
littorea, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 60. t. 219-pumila.
livida, *Willd. Sp. PI.* iv. 285.—Reg. bor. temp.
lobata, Bell. App. Fl. Pedem. 42 = curvula.
lobata, Lam. Encyc. iii. 879; Schkubr, Kiedgr. i: 28 = divisa.
lobata, Schleich. ex Stend. Nom. ed. II. i. 293 = microstyla.
lobata, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 197 = foetida.
lobata, Wahlenb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 292 = curvula.
lobata, Willd. ex Knnth, Enum. PI. ii. 533-Elyna caricina.
lobolepis, *F. Muell. Fragm.* viii. 258.—Austral,
lobulirostris, *Drej. Sytnb.* 27. t. 14.—Zeylan.
loliacea, *Linn. Sp. PI.* 974.—Reg. bor. et arct.
loliacea, Schkuhr, Riedgr. i. 22 =tenella.
loliacea, Scbreb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 292-divulsu.
loliacea, Steph. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 187-elongata.
loliacea, Thuill. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 192 = muricata.
lonchicarpa, Willd. ex Knnth, Enum. PI. ii. 500 = folliculata.
longearistata, Bivona, in Sicil. Sponte Prov. Desc. iv. 8. t. 2 =ecbinata.
longebrachiata, *Boeck. in Linnaea*, xli. (1877) 282.—Austral.
longebracteata, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 205.—Java,
longerostrata, *C. A. Mey. in Mint. Sav. Etr. Pitersb.* i. (1831) 220.—Kamtschatka.
longibracteata,T>u\a.c, Fl. Hautes-Pyr. 57 = C. Pseudocyperus.
longibrocteata, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 11 = intermedia.
longicaulis, *Boeck. in Flora*, lxv. (1882) 62.—Mexic.
longicruris, *Nees, in Wight, Contrib.* 124.—Ind. or.
longiculmis, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xiv. (1882) S63.-N. Zel.
longifolia, *R. Br. Prod.* 242.—Austral.
longifolia, Burch. ex Hemsl. Bot. Challeng. Exped. i. H. 87-aequabilii.

C.ABEX:—
longifolia. Host, Gram. iv. t. 85 = praecox.
longifolia, Thuill. Fl. Par. i. 490 = ampullacea.
longipes, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 329. —Ind. or.
longirostris, Krock. ex Knnth, Enum. PI. ii. 493 = laevigata.
longirostris, *Torr. ex Schvein. in Ann. Lye. N. York*, i. (1824) 71.—Am. bor.
longiseta, *Brot. Fl. Lusit.* i. 63.—Lusitan.
Lorentziana, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 271.—Reg. Argent.
Loscosii, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Ueddel.* (1877-78) 223.—Hispan.
Iucida, *Boott, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 377— N. Zel.
lucida, Dicks, ex Steud. Nom. ed. II. i. 292 = Elyna spicata.
lucorum, Sartw. ex Boott, Illustr. Carex, ii. 99=.nigro-marginata.
lucorum, *Willd. Enum. Hart. Berol. Suppl.* 63.—Am. bor.
ludibunda, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat.* Sel. II. x. (1838) 857.—Gallia.
lupuliformis, Sartw. ex Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. ix. (1850) 29 = lupulina.
lupulina, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 54.—Am. bor.
lurida, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 153 = lupulina.
lusitanica, Schkuhr, Kiedgr. ii. 23 = paniculata.
lutensis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 487.—Afr. austr.
luteola, Nees, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 181-bracteosa.
luzulaefolia, *S. Wats, in Bot. Calif*, ii. 250.—Calif,
luzulina, *Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 395.—Calif.
Lyallii, *Boott, Illustr. Carex*, iv. 150.—Am. bor. occ.
Lyngbyei, Hornem. in Fl. Dan. t. 1888—maritima.
Lyoni, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 209.—Am. bor.
Maackii, *Maxim. Prim. Fl. Amur*. 808.—Reg. Amur,
mncella, *Kunth, Enum. PI.* ii. 482.—Reg. Argent.
macilenta, Fries, Summa Veg. 224 =• gracilis.
macloviana, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. v. (1826) 599-leporina.
Macounii, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xli. (1866) 228.—Am. bor.
macra, Steud. Syn. PI. Cyp. 212 = vulgaris.
macrocarpa, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 86.—Chili.
macTocephala, *Willd. ex Kunth, Enum. PI.* ii. 428.— Sibir.; Japon.
macrochaeta, C. A. Mey. in *Uim.* Sav. Etr. Pétersb. i. (1831) 224. t. 18 = podocarpa.
macroglossa, *Franch.* b* *Sav. Enum, PI. Jap.* ii. 576. —Japon.
macrogyna, Turcz. in BnlL Soc. Nat. Mosc. (1838) 104 = ferruginea.
macrokolea, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 223.—Am. bor.
macrolepis, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 89.—Italia; Graecia.
macrolepis, D. Don, in Till. Mag. (Dec. 1823) 456 = longipes.
macrophylla, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 207.— Ind. or.
macrorhyncha, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. xv. (1842) 621 = parva.
macrosolen, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 210.—Reg. Magell.
macrostachyos, *Link, in Schrad. Journ.* ii. (1799) 811. —Lusitan.
macrostachys, Bertol. Amoen. Ital. 421—ferruginea.
macrostyla, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 562 - decipiens.
macrothrysa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 351.—Malaya,
maculata, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 128. —Zeylan ; As. or.; Austral.
maculata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 268-spilocarpa.
maculata, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 295 = ustulata.
maculata, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 292 - coriophora.
madagascariensis, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 517.—Madag.
magellanica, Banks, ex Boott, in Proc. linn. Soc. i. (1884) 257 = Banksii.
magellanica, *Lam. Encyc.* iii. 385.—**Reg.** bor. et austr.

CAREX:—
Mairii, *Coss. V Germ. Obs. PI. Crit.* 18.—Mont. Pyren.
malaena, Stend. Syn. PI. Cyp. 211-vulgaris.
manca, *Boott, ex Benth. Fl. Hongk.* 402.—Hongkong.
manostachys, Spreng. Syst. iii. 824, sphalm. = macrostachys.
Marchandiana, Lapeyr. ex Spreng. 1. c. 806 — pyrenaica.
mardda, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 212.—Am. bor. occ.
marcida, *Raeusch. Nom.* ed. III. 270 (qnid?).—Helvet.
margaritifera, Steud. Nom. ed. II. i. 292=Selena Flagellum.
marginata, Gort. Fl. Belg. 247-divisa, intermedia.
marginata, Muhl. ex Schkuhr, Riedgr. ii. 49-pensylvanica.
marina, Dewey, in Am. Joum. Sc. xxix. (1836) 247 — C. Heleonastes.
maritima, *O. F. Muell. in Fl. Van.* t. 70S.—Reg. bor. et arct.
Marssoni, Anersw. in Bot Zeit. x. (1852) 409 = flava.
Maubertiana, *Boott, Illustr. Carex*, i. 45.—Cochinch.
mauritanica, *Boiss. (f Rent. Pugill. PI. Nov.* 116.— Afr. bor.
mauritanica, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 204.—Ins. Manrit.
maxima, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 229—pendula.
Maximowiczii, *Boeck. in Linnaea*, xli. (1877) 287.—Reg. Amur.
Maximumiczii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 180 — picta.
Maximowiczii, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 71.—As. temp.
Meadii, Dewey, in Am. Journ. Sc. xliii. (1842) 90 = tetanica.
media, R. Br. in Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. 750 = alpina.
meiogyna, Nees, in Wight, Contrib. 128 = filicina.
melaena. Wimm. in Flora, xxxiii. (1850) 619 = vulgaris.
melanantha, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Ross.* iv. 216.— As. centr.
melanocarpa, *Cham, in Middend. Sibir. Reise*, i. II. 21. —Sibiria.
melanocephala, Turcz. ex Kunth, Enum. PI. iL 487 — alpina.
melanochloros, Thuill. Fl. Par. i. 488-stricta.
melanocystis, Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 203 = incurva.
melanosperma, *Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1851) 270.—Mexic.
melanostachya, Willd. Sp. PI. iv. 299-nutons.
melanostylis, *Desv. in. C. Gay, Fl. Chil.* vi. t. 73.—Chili.
melastoma, Fisch. ex Boott, Illustr. Carex, ii. 100 = Tolmiei.
membranacea, Hook, in Parry, 2 Voy. App. 406 s vesicaria.
membranacea, Hoppe, Ic. t. 71 = ericetonim.
mendocinensis, *Olney, in S. Wats. Bot. Calif,* ii. 249. -Calif.
Menriesiana, Sm. ex Boott, Illustr. Carex, i. 27" macrocephala.
mercarensis, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 194.— Ind. or.
Mertensii, *Presc. ex Bong. Veg. Sitcha*, 51.—Alaska.
***mertensis*, Wahlbe, ex** Kuth, Enum. PI. iii. 383 = vulgina.
Metteriana, Lehm. ex Schur, Enum. PL Transs. 697 *• dioica.
mexicana, PresI, Rel. Haenk. 1. 204—polystachya.
Meyeni, Nees, in Nov. Act Nat. Cur. xix. (1843) Suppl. i. 128-brunnea.
Meyeriansi, *Kunth, Enum. PI.* ii. **438.—**Sibir. alt.
micans, *Boott. in Mem. Am.Acad.* N. S. vi. (1858-59) 419—maculata.
Michauxiana, *Boeck. in Linnaea*, xli. (1877) 336.—Am. bor.
Michauxii, Dewey in Am. Joum. Sc. x. (1826) 273 —subulata.
Michauxii, Schwein. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 64-scirpoidea.
Micheliana, Sm. in Trans. Linn. Soc. v. (1800) 270 =• glauca.
Michelii, *Host, Syn. PL Austr*. 507.—Europ. austr. i As. temp.

CAKEX:-
microcarpa, *Bertol. ex Moris, Stirp. Sard. Blench.* 48. —Sardinia.
microcephala, C. A. Mey. in Lcdeb. Fl. AH. iv. 206 = obtusata.
microdontos, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1886) 428. —Texas.
microglochin, *Wahlenb. in Vet. A tad. Nya Handl. Stochh.* (1803) 140.—Reg. bor. et arct.
microlepis, *Boeck. in Linnata,* nit (.1877) 269.—Hab. ?
micropoda, *C. A. Mey. in Mint. Sav. Etr. Pitersb. i.* (1831) 210.—Unalaschk.
microsperma, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 281.—Texas.
micmsperma, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 144~vulpinoidea.
microstachya, *Ehrh. in Hannov. Mag.* 9»» Sttick (1784), 132.—Europ. bor.
microstachya, Michx. FI. Bor. Am. ii. 169 -polytrichoides.
microstyla, *J. Gay, in Gaud. Fl. Helv.* vi. 87.—Alp. Helv.
Middendorffii, *F. Schmidt, Reisen Amuri.* 70.—Reg. Amur.
Mielichhoferi, Schkuht, Riedgr. ii. 66 «= ferruginca.
Mielichhoferi, Sm. Engl. Bot. t. 2293 = vaginata.
Mielichhoferi, Willd. ex Kunth, Ennm. PI. ii. 465 = brachystachys, fimbriata.
miliacea, Muhl. ex Schkuhr, Riedgr. ii. 77-=prasina.
miliacea, Schrank, Baier. Fl. i. 300 — distans.
miliaris, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 174.—Am. bor.
minima, *Boullu, in Ann. Soc. Bot. Lyon,* v. (1878) 88.—Gallia.
miraiilis, Dewey, in Ain. Joum. Sc. xxx. (1836) 63 = straminea.
miraiilis, Host, Gram. iv. t. 78 — Elyna caricina.
mirabilis, Scbleich. Cat. (1821) ex Gaud. Fl. Helv. vi. 68 = curvula.
mirata, *Dewey, in Am. Joum. Sc.* Ser. II. xxxix. (1865) 71.—Am. bor.
misandra, *R. Br. in Parry, Voy. App.* 283.—Am. arct.
miser, Buckl. in Am. Joum. Sc xlv. (1843) 173 = juncea.
misera, *Phil. Fl. Atac.* 63.—Chili.
Mitchelliana, *M. A. Curt, in Am. Joum. Sc.* xliv. (1843) 84.—Am. bor.
mitis, J. F. Grael. Syst. 138 = Selen'a mitis.
mixta, J. F. Gmel. I. c. 146 = stricta, paludosa.
mixta, *Mi/gn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 343.—Gallia.
modesta, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. x. (1838) 304-disticha.
Moenchiana, Wender. in Flora, vi. (1823) 718 = acuta.
moesta, *Kunth, Enum. PI.* ii. 482.—Reg. Argent,
mollicula, *Boott, fllustr. Carex,* iv. 192.—Ins. Loocboo.
mollis, Gilib. Exercit ii. 546-leporina.
mollis. Host, Gram. iv. 46. t. 8'2=praecox.
monadelpha, Boott, in *Vexrj,* Jap. Exped. ii. 323 — tristachya.
Moniezi, *Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 164.—Gallii
monile, *Tuckerm. ex Boott, in Hook. Land. Joum. Bot.* v. (1846) 69.—Am. bor.
monili/era, Thnill. Fl. Par. i. 490 = depauperata.
Moniziana, *Lame, ex Boott, IUustr. Carex,* iv. 174.—Ins. Mader.
monostachya, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 512.—Abyssin.
montana, Leers, Fl. Herbom. 716. t 16. f. 6-ericetorum.
Montana, Linn. Sp. PI. 975 - pilulifera.
montana. *Linn. Fl. Suec.* ed. II. 328.—Europ.; Reg. Caucas.; Japon.
nontana, Poll, ex Lightf. Fl. Scot. ii. 561 = praecox.
montana, Scop. FI. Carn. ed. II. ii. 219 = tomentosa.
nonticola, Dewey, ex Torr. Bot. Mex. Bound. 229 = triquetra.
Moorcroftii, *Falc. in Proc. Linn. Soc. i.* (1846) 288.—Reg. Himal.
Morrowii, *Boott, in Perry, Jap. Exp.* ii. 326.—Japon.
Motoskei, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 148.—Japon.
mucronata, *All. Fl. Pedem.* ii. 268.—Europ. med.; Reg. Cancas.
Muehlenbergii, Brongn. Voy. Duperr. Bot. 161 = Brongniartii.
Muehlcnberjjii, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 12.—Am. bor.

CAREX:—
Muelleri, Steud. Syn. PI. Cyp. 204 = Linkii.
Muhlenbergii, Kunth, ex Boott, Illustr. Carex, iii. 125 =. vulpinoidea.
multicaulis, *L. Bailey, in Coult. Bot. Gat.* ix. (1884) 118.—Calif.
multiceps, Gaud. Etrennes Fl. 78 = elongata.
multiculmis, Ehrb. Beitr. vi. 83 = elongata.
multifiora, Muhl. ex Schkuhr, Riedgr. ii. 14 - vulpinoidea.
multiformis, Thuill. Fl. Par. i. 479 = disticha.
multinervis, *Boeck. in Flora,* xxxviii. (1855) 696.—Texas.
multinervis, Krock. ex Steud. Nom. ed. II. i. 293 = binervis.
multispicata, *Kunme, in Schkuhr, Riedgr. Suppl.* 42. t. 10.—Chili.
mnnda, *Boott, IUustr. Carex,* i. 7.—Reg. Himal.
muricata, Desf. Fl. Atlant. ii. 335 <= divulsa.
muricata, Huds. Fl. Angl. 406 = echinata,
muricata, Jungh. in Liunaea, vi. (1831) 29 = glomerata.
muricata, Leers, Fl. Herbom. t. 13. f. 8 = stellulata.
muricata. *Linn. Sp. PI.* 974.—Reg. bor. temp.
muricata, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 29 -= Brongniartii.
musei, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 205.—las. Borbon.
mnskingumensis, *Schwein. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 66.—Am. bor.
mutabilis, Willd. Prod. Fl. Berl. 37 = pendula.
mutatis, Boott, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xx. (1883) 383 = Hemicarex Hookeri.
mutica, R. Br. in Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. 751 = anrea.
myosuroides, *Lome, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1838) 10.—Ins. Azoric.
myosuroides, Vill. Frosp. 17 = Elyna spicata.
myosurus, *Nees, in Wight, Contrib.* 122.—Ind. or.
nana, *Boott, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1868-69) 418.—Japon.
nana, *Cham, ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 228.—Alaska.
nana. Lam. Encyc. iii. 389 — ferruginea.
nardifolia, Wahlenb. in Vet Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 165 = aquatilis.
nardina. *Fries, Nov. Mont.* ii. 56.—Europ. et Am. bor. et arct.
Naufragii, Hochst. & Stend. Nom. ed. II. i. 293; Syn. PI. Cyp. 206-illegitima.
Naumanniana, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 618.—Japon.
nebrascensis, Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xviii. (1854) 102 = Jamesii.
Neesiana, Arn. ex Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 260 = lobulirostris.
Neesiana, *Endl. Prod. Fl. Nor/.* 24.—Ins. Norfolk.
neglecta, Degl. in Loisel. Fl. Gall. ii. 298-distans.
neglecta, Petenn. in Flora, xxvii. (1844) 831-vulgaris.
neglecta, Tuckerm. Enum. 19 ; et in Am. Jonra. Sc. xlv. (1843) 40--rosea.
nematosperma, Willd. ex Kunth, Enum. Fl. ii. 456 = anceps.
nemorensis, J. F. GmeL Syst 143 —pilosa.
nemorosa, J. F. Gmel. L c. 1520 = pilosa.
nemorosa, Hort Berol. ex Kunth, Enum. PI. ii. 388 — leiorhyncha.
nemorosa, Lumnitz. ex Honck. Syn. i. 355 — muricata.
nemorosa, Rebent. ex Boott, Illustr. Carex, iii. 122 = vulpina.
nemorosa, Schrank, Baier. Fl. i. 291 = alba,
nemostachys, *Steud. in Flora,* xxix. (1816) 23.—Japon.
nepalensis, Spreng. Syst. iii. 811=longipes.
nervata, *Franch. b* Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 5(56.—Japon.
nervina, *L. Bailey, in Coult. Bot. Got.* x. (1885) 203.—Calif.
nervosa, Desf. Fl. Atlant. ii. S37 = extensa.
nervosa, Willd. ex Konth, Enum. PI. it 449 =- distans.
neurocarpa, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 306.—Keg. Amur.
neurochlamys, F. Muell. Fragxn. viii. 258 — maculata.
nevadensis, Boiss. & Rent. Pugill. PI. Nov. 118-Oederi.
nexa, *Boott, ex Benth. Fl. Hongk.* 402.—China,
nigella, *Boott, ex Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 225.—Am. bor.
nigra. All. Fl. Pedem. ii. 267 - atrata.
nigra, Reich. Fl. Moeno-Franc. ii. U6 = acuta.
nigra, Schkuhr, Riedgr. ii. 88-alcrrima.

CAEBX:
nigra, Schwein. ex Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 336=vulgaris.
nigra, *Siev. in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 198.—Sibir. baical.
nigricans, Dewey, in Am. Joum. Sc xxix. (1836) 249 = dioica.
nigricans, Hombr. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 156 = Darwinii.
nigricans, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 320.—Europ.
nigricans, *C. A. Mey. in Mim. Sav. Etr. PJtersb.* i. (1831) 210. t. 7.—Unalaschk.
nigritella, Drej. in Fl. Dan. t. 2368 - itylosa.
nigrolutea. Gaud. Agrost. Helv. ii. 196 - glauca.
nigro-marginata, *Schwein. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 68.—Am. bor.
nikoënsis, *Franch.* to" *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 558.—Japon.
nilagirica, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 207.—Ind. or.
nipponica, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvl. (187»J B9.—Japon.
nitens, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 657.—Chili.
nitida, Hoppe, Taschenb. (1800) 198 = mucronata.
nitida, *Host, Gram. i.* 71.—Europ.
nitida, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 411 - caespitosa.
nivalis, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 256.—Reg. Himal.
nivalis, Chum, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 184 = micropoda.
nivicola, G. Don, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 149 = vaginata.
nobilis, *Boott, I. c.* i. 4.—Reg. Himal.
nodiAora, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 516.—Ins. Fhilipp.
norvegica, *Willd. ex Schkuhr, Riedgr.* i. 50.—Europ. et Am. bor.
notha, *Kunth, Enum. PI.* ii. 421.—Reg. Himal.
notoleia, Necs, in Wight, Contrib. 121 — foliosa.
Novae-Angliae, *Srhmein. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 67.—Am. bor.
Novae-Selandiae, *Boeck. in Flora,* Ixi. (1878) 169.—N. Zel.
nubigena, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1826) 326.—Ind. or.
nuda. Lam. Fl. Fr. ii. 172 -leporina.
nudata, *S. Wats. Bot. Calif,* ii. 241.—Calif,
nuptialis, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 175.—Ins. Sandvic.
nutans, *Host, Gram.* i. 61. t. 83.—Europ.; Japon.
nutans, Raeusch. Nom. ed. III. 270~erecta.
Nuttallii, *Dewey, in Am. Journ.* Sr.xliii. (1842) 92.—Am. bor. occ.
Oakesiana, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1886) 421 = oligosperma.
obesa, *All. Fl. Pedem.* ii. 270.—Europ.; Tauria.
obesa, Schleich. ex Kuntb, Enum. PI. ii. 411 = caespitosa.
obliqua, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. (1838) 104-pediformis.
oblita, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 231.—Am. bor.
oblonga, *J. F. Gruel. Syst.* 146.—German.
obovata, Goldb. ex Lcdeb. Fl. Ross. iv. 290 = pediformis.
obscura, *Nees, in Wight, Contrib.* 126.—Reg. Himal.
obtusa, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 319.—Hungar.
obtusangula, Ehrh. Beitr. vl. 82 — ampullacea.
obtusangula, Hort. Uerol. ex Kunth, Enum. PI. ii. 459= glauca.
obtusangula, Salzm. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 206 = echinata.
obtusangula, Salzm. ex Nym. Consp. 774 — hispida.
obtusata, *Liljeb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (17'J3) 69. t. 4.—Reg. bor. et arct.
ochroleuca, *Cham, ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 216.—Alaska,
odontolepis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 82.—Chili.
Oedcri, *Reta. ex Ehrh. Beitr.* vi. (17'J1) 83.—Reg. bor. temp.
Oederi, Willk. in Flora, xxxv. (1852) 521-nevadensis.
oedipnstyla, *Duval-Jimve, in Mem. Acad. Montp. ISect. Sc.)* vii. (181)9) 442.—Gallia.
oedocarpa, Anderss. Cyp. Scand. 26 = Oederi.
Oersterlii, *Liebm. in Vidensk. Sclsk. Skr.* V. U. (1851) 272.—Costa Rica,
ohiotica, *Hochst. V Steud. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 293.—Am. bor.

CABEX:—
Ohmuelleriana, Lang, in Flora, xxvi. (1848) 240= arenaria.
Okestana, Dewey, in Am. Joum. Sc. xiv.T.1828) 851- oligosperma ?
olbiensis, *Jord. 06s. PI. Crit.* iii. (1846) 241.—Europ.
Olgae, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 83.—As. centr.
oligandra, F. MnelL ex Boott, Illustr. Carex, iv. 186 = Buxbaumii.
oligantha, *Boott, I. c.* 174. t. 689.—Am. anstr.
oligantha, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 208.—Reg. Caucas.
oligocarpa, Horaem. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 161 = obeso.
oligocarpa, Mnhl. Descr. Gram. Uber. 242; ex Boott, I. ci. 40=digitalis.
oligocarpa, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 58.—Am. bor.
oligogyna, **Lex.** ex Kunth, Enum. PI. ii. 442 =globularis.
oligospenna, *Mickx. Fl. Bor. Am.* it 174.—Am. bor.
oligostachya, *Nees, in Hook. Kern Joum.* vi. (1854) 29.—Ins. Philipp.
olivacea, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 286.—Reg. Himal.
olivacea, *Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1851) 267.—Mexic.
Oliver!, Sow*, *in Flora,* lxiii. (1880) 465.—Afghanist.
Oliveriana, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient, v. 408=illegitima.
Olneyix, Boott, Illnstr. Carex, i. 15.—Am. bor.
olyssiponensis, Steud. Syn. PI. Cyp. 204 =• Linkii.
omiana, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 564.—Japon.
Onoei, *Franch. V Sav. I. c.* i. 651.—Japon.
ontakensis, *Franch. V Sav. 1. c.* 650.—Japon.
orbicularis, Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1846) 254 - vulgaris.
oreades, C. A. Mey. in Bull. Acad. Brox. ix. II. (1842) 248 = festiva.
oregonensis, *Olney, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 407.—Am. bor. occ.
oreophila, *C. A. Mey. Verz. Pfl, Cauc.* 29.—Reg. Caucas.; As. Min.
Oritabae, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 263 = festiva.
omithopoda, *Willd. Sp. PI.* iv. 255.—Europ.; As. bor.
ornithopodioides, Hausm. in Flora, xxxvi. (1853) 225 = omithopoda.
ornithorhyncha, Boott, Illustr. Carex, i. 26 = C. Crus-**corvi.**
Orsiniana, Tenore, Fl. Nap. v. 244 = muricata.
orthostachys, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iv. 231 - aristata.
orthostachys, Trev. ex Nym. Consp. 769 =hirta.
ovalis, Good, in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 148 = leporina.
ovalis, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 897 = scoparia.
ovata, *Burrn./. fl. Ind.* 194 rerr. typ. 294).—Java.
mata, Honck. Syn. i. 341 = Hallcri.
ovata, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iv. 207 = curaica.
ovata, Kudge, in Tram. Linn. Soc. vii. (1804) 96. t. 9. f. l = atrata.
oxylepis, *Torr.* b" *Hook, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 409.—Texas,
pachygyna, *Franch. tf Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 560.— Jnpon.
pachystachya, *Cham, ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 197.— Alaska.
pachystylis, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. x. (1838) 801=stenophylla.
pacifiea,T>tt). Kevis. Car.292=caespitosa.
Pairaei, F. Schultz, in Flora, Ii. (1668) 303-divulsa.
paleacea, W'ahlenb. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. (1803) 164«=maritima.
paleata, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 127.— Ins. Juan Fernandez.
pallescens, *Linn. Sp. PI.* 977.—Reg. bor. temp.
pallida.C. A. Mey. in Mem. Sav. fctr. Petersb. I. (1831) 215-siccata.
pallida, Salisb. Prod. 29 = pallescens.
pallidior, Degl. in Loisel. Fl. Gall. ii. 299=punctata.
paludosa, *Good, in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 202.—Reg. bor. temp.
palustris, Suter, Fl. Helvet. ii. 261=paludosa.
fanicea.Cmy, in A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. I. 521 -Muadii.
panicea, Bunge, ex Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 288 = tenuissima ?

CABEX:—
panicea, *Linn. Sp. PI.* 977.—Reg. bor. temp,
paniculate, *Linn. Cent. PI.* i. 81 *{Amoen. Acad.* iv. 294).—Reg. temp. bor. et austr.
paniculata, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 143-paradoxa.
paniculata, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 390 = teretiuscula.
panormitana, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 675=acuta.
papillosa, *Nets, in Hook. Joum. Bot.* ii. (1640) 898.— Guiana.
***V&pu\osa, Boott, in Mem. Am. Acad.ti.* S.vi. (1858-69)** 418.—Japon.
paradoxa, Benth. Cat. PI. Pyr. 67=divisa.
paradoxa, J. F. Gmel. Syst. 145-seq.t
paradoxa, *Willd. in Schri/t. Naturf. Fr. Berl.* (1794) 30. t. 1.—Europ.; As. bor.
parallela, Laest. in Vet Akad. Nya Handl. Stockh. (1822) 838-dioica.
parciflora, *Boott, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-69) 418.—Japon.
Parkeri, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 882. - N . Zel.
Parryana, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xxvii. (1885) 239.—Am. bor.
parva, *Nees, in Wight, Contrib.* 120.—Reg. Himal.
parvibracteata, *Nees, I. c.* 125.—Reg. Himal.
parviflora, Gaud. Etrennes Fl. 84 —lagopina.
parviflora, Host, Gram. i. 2, 221 = atrata.
parviflora, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 80=alpina.
patula, Host, Gram. i. 2, 221. t. 64 = flava.
patula, Huds. Fl. Angl. ed. II. ii. 402=pauciflora.
patula, Schkuhr, Riedgr. i. 115. t. B. bb. f. 16 = laevigata.
patula, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 226-sylvatica.
pauciflora, Balb. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 174 = microglochin.
pauciflora, *Light/. Fl. Scot.* ii. 643. t. 6. f. 2.—Reg. bor. temp.
pauciflora, Usteri, ex Schkuhr, Riedgr. i. 88 = firma.
paupercula, Michx. Fl. Am. Bor. it 172=magellanica.
pedata, All. Fl. Pedem. ii. 168=omithopoda.
pedata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1884.—Europ. arct.
pediformis, *C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb.* i. (1831) 219. t. 10.—As. bor.
peduncularis. Wall, ex Boott, Illustr. Carex, i. 58 - speciosa.
pedunculata, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 39.—Am. bor.
Pedunculata, Willd. ex Roxb. in Beats. St Helena Tracts, 802 = praealta.
pelia, Lang, in Linnaea, xxiv. (1851) 576=panicea.
pellita, Muhl. ex Schkuhr, Riedgr. ii. 84 = lanuginosa.
pellucida, Turcz. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 196 = peiliformis.
pendula, Geners. Elench. n. 871—capillaris.
pendula, *Huds. Fl. Angl.* ed. I. 852; ed. II. **411.—** Europ.; As. bor.
pendula, Moench, Meth. 324 = vesicaria.
Pennsylvania, Torr. in Am. Lye. N. York, iii. (1836) 410=varia.
pensylvanica, *Lam. Encyc.* iii. 888.—Am. bor.
pentacarpa, *Boeck. in Flora,* lviii. (1875) 265.—Java,
pentastachys, *Fisch. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 294.—Kamtschatka.
peregrina, *Link, Hort. Berol.* i. 334.—Afr. trop.
perennis, Krock. ex Steud. Nom. ed. II. i. 294 = marginata.
Perraudieriana, *J. Gay, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1856) 685, nomen.—IDS. Teneriff.
Personii, Schkuhr, ex Kunth, Enum. PI. ii. 609 = Wahlenbergiana.
Persoonii, Lang, in Flora, xxv. (1842) 748, 767 = canescens.
Persoonii, Sieber, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 871 =elongata, Gebhardi.
peruviana, Domb. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 138 - acutata.
peruviana, Presl, Rel. Haenk. i. 205—extensa.
petasata, Dewey, in Am. Joum. Sc xxix. (1886) 246 = leporina.
Petersii, C. A. Mey. ex F. Schmidt, Reisen Amurl. 194 ^falcata.
Petitiana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 618.—Abyssin.
petraea, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 189 = nipestris.

CABEX:—
petricosa, *Dewey, in Am. Joum. Sc.* xxix. (1886) 246. —Am. bor.
Petriei, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 418. —N. Zel.
phacota, *Spreng. Syst.* iii. 826.—Ind. or.; Malaya.
phaecostachya, Sm. Engl. Bot Suppl. t. 2781 = vaginata.
phalaroides, *Kunth, Enum. PI.* ii. 482.—Bras.
pharensis, Vis. Fl. Dalm. iii. 346=illegitima.
phleoides, Cav. Ic v. 40 = Uncinia phleoides.
phyllomanica, ^. *Wats. Bot. Calif,* ii. 233.—Calif.
phyllophora, Kunth, Enum. PI. il. 424=pauciflora.
phyllostachys, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 30.—Reg. Cauc.; Persia,
physema, *Dewey, in Am. Journ. Sc. Set.* II. xxix. (1860) 847.—Am. bor.
physocarpa, Nees, ex Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1846) 287=acutala.
physocarpa, *Presl, Rel. Haenk.* iii. 202.—Am. arct.
physodes, *Bieb. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* ii. (1809) 104. t. 7.—Reg. Caucas.; As. bor.
physorhyncha, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 719.—Mexic.
pichinchensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 238.—Ecuador,
picta, *Boott, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-69) 418.—Japon.
picta, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 184.—Am. bor.
Pierotii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 148.— Japon.
pilosa Sm. *Fl. Cam.* ed. II. ii. 226.—Italia,
pilosiuscula, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 61.—Am. bor.
pilosiuscula x, *Gobi, in Just.Jahresb.* iv. (1876) 1078.—Rossia.
pilulifera, Geners. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 216 = praecox.
pilulifera, *Linn. Sp. PI.* 976.—Europ.; Japon.
pilulifera, *Willd. ex Kunth, Enum. PI.* ii. 439.—Reg. bor. et arct. ?
pinetorum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 268-festiva.
pinetorum, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 881» Muehlenbergii.
piniaria, Bosc, ex Boott, Illustr. Carex, iii. 124 = Muehlenbergii.
pinnata, Moench, ex Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 59 =• elongata.
piptolepis, Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 201 = setifolia.
pisiformis, *Boott, in Perry, Jap. Exped.* ii. 324.— Japon.
Pissisi, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 272.—Chili,
planata, *Franch.* b* *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 566.— Japon.
planifolia, *Kohts, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xx. (1870) 141.—Europ.
planostachys, Kunze, in Schkuhr, Riedgr. Suppl. 138. t.35 = HaUeriaiia.
plantaginea, *Lam. Encyc.* iii. 892.—Am. bor..
plantaginea, Muhl. Descr. Gram. Uber. 235 = laxiflora.
platycarpa, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 214 *> phacota.
platyphylla, *Carey, in Am. Joum. Sc.* II. iv. **(1847)** 23.—Am. bor.
platyrhyncha, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 582. —Japon.
platystachys, Tenore, Fl. Nap. iv. 138=macrolepis.
plumbea, Willd. Sp. PI. iv. 308 =riparia.
poaeformis, J. F. Gmel. Syst. 138 = Selena poaeformis.
pocilliformis, *Boott, Illustr. Carex,* iv. 175.—Japon.
podocarpa, *R. Br. in Richards, in Frankl. Narr. 1st *Journ.* 751.—Am. arct.
podogyna, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 557.— Japon.
podostacbys, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 282.—Am. bor.
Poireti, J. F. Gmel. Syst. 140 = Fuirena pubescens.
polyandra, Schkuhr, Kiedgr. i. 59=caespitosa.
polyantha, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 656.— Japon.
polyantha, F. Muell. In Trans. Phil. Soc. Viet i. (1855) 110 = acuta.
polycephala, *Boott, Illustr. Carex, i.* 4.—Reg. Himal.
polygama, Schkuhr, Riedgr. i. 84 = Buxbaumii.

CAEBX:—
polymorpha, *Muhl. ex Boott, Illustr. Carex,* i. 21. t. 57.—Am. bor.
polymorpha,Sehviein. ex Boott, 1. c iii. 125=vulpinoidea.
Polymorpha, Torr. in Ann. Lye N. York, iii. (1886) 413-striata.
polyphylla, *Kar.* b" *Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose.* (1841) 859.—As. centr.
polyrrhisa, Wallr. Scbed. Crit. 492=praecox.
polystachya. Lesson & A. Rich. Voy. Astrol. 118 = Lessoniana.
polystachya, A. Rich. Voy. Astrol. 111. t. 21-teraaria.
polystachya, *Sw. ex Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockk.* (1808) 149.—Am. trop.
polysticha, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 157.—Bras,
polytrichoides, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 34.—Am. bor.
Porteri, *Olney, Car. Bor. Am.* 12.—Am. bor.
potamostauros, *Steud. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 52.—Chili,
potosina, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 474.—Mexic.
praealta, *Boott, Illustr. Carex,* i. 66.—Ins. S. Helen.
praeceps, Boick. ex Keichb. Fl. Germ. Excurs. 64-praecox,
praecox, *Jacq. Fl. Austr.* v. 28.—Reg. bor. temp.
praeeox, Jundz. Fl. Lithuan. n. 889 = brizoides.
praecox, Poll, ex Steud. Nom. ed. II. i. 294 = emarginata.
praecox, Schreb. Spicil. 63=Schreberi.
praegiacilis, *W. Boott, in Coult. Bot. Gat.* ix. (1884) 87.—Am. bor.
Praetutiana, Parl. Fl. Ital. ii. 182=glanca.
prairea, Dewey, ex Woods, Bot 750—teretiuscula.
prasina, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 161=miliacea.
pratensis, Drej. Revis. Caric. 24 = adusta.
pratensis, *Hose, in Usteri.Ann. Sot.* xxi. (1797) 36.—Europ.
pratensis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 81.—Chili.
Preissii, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 94.—Austral.
Prescottiaaa, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 286.—Calif.; Ins. Hawaii.
Preslii, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 242.—Sinus Nntka.
Princeps, Knnth, Enum. PI. ii. 439=praecox.
proceia, *Kunth, I. c.* 491.—Bras,
prolifera, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 320.—Hungar.
prolixa, Fries, Nov. Mant. iii. 228 = acuta.
prolixa, Schur, Enum. PI. Transs. 707-stricta.
propinqua, Nees & Meyen [Reise, i. 116], ex Kunth, Enum. PI. ii.S96 = festiva.
prostrata, All. Fl. Pedem. ii. 267 = humilis.
prostrata, J. F. Gmel. Syst, 142 = pilosa.
protracta, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 234.—Am. bor.
provindalis, Degl. in Loisel. Fl. Gall. ii. 307-echinata.
pruinosa, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1846) 266.—Java.
psammogaea, Steud. Syn. PI. Cyp. 187-incurva.
psammophila, Schur, Enum. Pi. Transs. 700 = brizoides.
pseudo-arenaria, Pers. Syn. ii. 636-disticha.
pseudo-arenaria, Reichb. Ic FL Germ. viii. 8. t 208 = arenaria.
pseudo-brizoides, *Chavaud, in Bull. Soc.Pkarm. Bord.* xiii. (1873) 156.—Gallia.
pseudo-Buxbaumii, *Winkler, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xviii. (1868) 72.—Europ.
pseudo-conica, *Franch. V Son. Enum. PI. Jap.* ii. 570.-Japon.
pseudo-curaica, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 67.—Reg. Amur.
Pseudo-cyperus, R. Br. Prod. 248-fascicularis.
Pseudo-cyperus, *Linn. Sp. PI.* 978.—Reg. temp. bor. et austr.
pseudo-flava, *Schur, Enum. PI. Transs.* 712.—Transsylv.
pseudo-loliacca, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 193.—Ins. Sachalin.
pseudo-nutans, *Bor. ex Martin, Cat. Romor.* 309.—Gallia.
pseudo.paradoxa,S. Gibson, in Phytol. i. (1844) 778 = teretiuscula.
pseudo-praecox, Schur, Enum. PI. Transs. 716 = praecox.

CAREX:—
psilostachya, Kit. ex Willd. Sp. PI. iv. 289-sylvatica.
psilostachys, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 215.—Chili,
psychrophila, *Nees, in Wight, Contrib.* 127.—Reg. Himal.
psyllophora, Hartm. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 61 •= pauciflora.
psyllophora, Linn. f. Suppl. 413-pulicaris.
pteroloma, Kunze, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 242-gibba.
pterygocarpa, *Steud. I. c.* 222.—Chili.
ptychocarpa, Link, in Schrad. Joum. ii. (1799) 809-alpestris.
ptychocarpa, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 234.—Am. bor.
puberula, Boott, in Perry, Jap. Exp. ii. 324 = breviculmis.
pubescens, Gilib. Exeicit. ii. 547—montana.
pubescens, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 60. t. Eee. fig. 126. —Am. bor.
pubescens, Poir. Voy. Barb. ii. 264 = Fuirena pubescens.
pulchella, *Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallks. Lund* (1877) n. VIII. 29.—N. Zel.
pulchella, Nyland. ex Trevir, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868) I. 637-gracilis.
pulchra, *Boott, Illustr. Carex,* i. 4.—Reg. Himal.
pulicarioides, Raraond, ex DC. Fl. Fr. iii. 101-pyrenaica.
pulicaris, All. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 174-microglochin.
pulicaris, *Linn. Sp. PI.* 972.—Europ.; As. bor.
pulicaris, Linn. f. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 196 = pauciflora.
pulla, Good, in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 78.1.14-saxatilis.
pulla, Soland, ex Boott, Illustr. Carex, L 64 = lucida.
pullulans, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 57 = Oederi.
pumila, Honck. Syn. PI. Germ i. 873=montana I
pumila, *Thunb. Fl. Jap.* 89.—China; Japon; Reg. austr. temp,
punctata, *Gaud. Agrost. Heh.* U. 152.—Europ.; Afr. bor.
punctata, Nees, ex Wight, Contrib. 127-notha.
punctulata, Leers, Fl. Herbom. 718. t. 14. f. 4 = paniculate.
punctulata, Lesson, ex A. Rich. Voy. Astrol Bot. 119. t. 21 -C. Pseudo-cyperus.
pungens, *Boeck. in Linnaea,* xxxix. (1875) 46.—Chili.
Purdiei, Boott, Illustr. Carex, i. 26=Bonplandii.
purpurea, *Boott, 1. c.* iv. 157. t. 514.—Hab. I
purpureovaginata, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1879-80) 30.—Bras.
pusilla, Pers. Syn. ii. 536-bicolor.
pyenostachya, *Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 204.—Chili.
Pyenostachya, Kar. & Kir. in BolL Soc Nat. Mosc xv. (1842) 522-C. Curaica.
pygmaea, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 879.—N. Granat.
pyrenaica, F. Muell. Fragm. viii. 251-adcularis.
pyrenaica, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 139.—Europ.; Reg. Caucas.; Am. bor.; N. Zel.
pyriformis, F. Schnltz, in Pollichia, xv. (1865) 122 = aurea.
pyriformis, Tausch, in Schultz, Arch. Fl. ii. 285 = flava.
quadrangulata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 254.—N. Zel.
quaternaria, Spreng. Syst. iii. 809=loliacea.
quinata, Raeusch. Nom. ed. III. 270 = caespitosat
radicalis, *Boott, Illustr. Carex,* i. 66.—Reg. Himal.
Raeana, *Boott, in Richardson, Arctic Exp.* ii. 844.—Am. bor.
Rafflesiana, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 286.—Java.
Ramondiana, DC. Fl. Fr. iii. 101=pyrenaica.
ramosa, Eckl. ex Kunth, Enum. PL ii. 631=Schoenoxiphium Sickmannianum.
ramosa, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 40.—Ind. or.; China.
Rasulii, *Boott, in Hook.f. Fl. N. Zeal.* 283.—N. Zel.
rapbidocarpa, *Nees, ex Wight, Contrib.* 122.—Ind. or.
rara, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1848) 13!).—Zeylan.
rariflora, *Sm. Engl. Fl.* iv. 100.—Reg. bor. et arct.
Kaynoldsii, *Dewey, in Am. Joum. Sc.* Ser. II. xxxii. (1861) 89.—Am. bor.
reclinata Facch. in Ambr. Fir. Mcr. i. (1854) 333, 828 = omithopoda.
recta, Boott, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 220-salina.

GABEX:—
recurva, Huds. Fl. Angl. ed. II. 413-glauca.
recurva, Muhl. Desc. Gram. Uber. n. 56 = cherokensis.
recurva, Schkuhr, Riedgr. i. 120=C. Pseudo-cyperus.
recurva, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 413 = acuta.
recurvirostra, Hall. f. ex Steud. Nom. ed. I. 166-Davalliana.
recurvirostra, *Kunse, in Schkuhr, Riedgr. Suppl.* 79. i. 20.—Java.
Redvmskiana, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. P&enb. i. (1831) 207. t 4-chordorrhiza.
reducta, Drej. Revis. Caric 36-salina.
reflexa, Dietr. ex Kunth, Enum. PI. ii. 384-glomerate.
reftexa. Gaud. Etrennes Fl. 53 =Davalliana.
reflexa, Hoppe, Caric. 65 = praecox.
refracta, Roth,Tent. Fl. Germ. ii. I!. 451-praecox.
refracta, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 62.—Mons Cenis.
Reinii, *Franch. b* Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 559.—Japon.
remota, £* *tin. Cent. PI.* i. 81.—Reg. bor. temp, et arct.
remota, Richards, in Frankl. Narr. lit Joum. 750 —Deweyana.
remota, Thunb. Fl. Jap. 87 =gibba.
remotiuscula, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 147 = cristata.
Renschiana, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 516.—Madag.
Remyi, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 264-brunnea.
repens, *Bell. App. Fl. Pedem.* 42.—Italia.
repens, Schleich. ex Kunth, Enum. PI. ii. 376-disticha.
reticulosa, *Peterm. in flora,* xxvii. (1844) 838.—Saxonia.
retrocurva, Dewey, in Am. Journ. Sc. Scr. II. xlii. (lt>6rt) 243-laxiculmis.
retroflexa, Muhl. ex Schkuhr, Riedgr. ii. ll^rosea.
retrorsa, Nees, in Linnaea, x. (1885-86) 204 =• cognata.
retrorsa, *Schwein. in Ann. Lye. .V. York,* i. (1824) 71.—Am. bor.
retusa, Degl. in Loisel. Fl. GalL 807. t. 80-echinata.
Retiii, Nees, in Wight, Contiib. 128 = chinensis
Reuteriana, Poiss. *Sc.* Reut. in Fl. Orient, v. 411 = Huetiaua.
Reuteriana, *Boiss. Pugill. PI. Nov.* 116.—Hispan.
reversa, Gilib. Exercit. ii. 549— C. Pseudo-cyperus.
reversa, Spreng. Syst. iii. 827= retrorsa.
rhaphidocarpa, Kunth, Enum. PI. ii. 512-raphidocarpa.
rhisantha, J. F. GmeL Syst. 144=alpestris.
rhitodes, Blytt, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 196-pediformis.
rhitomatosa, Steud. Syn. PI. Cyp. 206 = Cumingiana.
rhynchocarpa, Heuff. in Flora, xvi. (1833) 866-brevicollis.
rhynchophysa, *Fitch. Mey. & Avi-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. *Suppl.* 9.—Europ. et As. bor.
rhynchophysa, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 264=physorhyncha.
Thynchosporoides, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 196.—Ins. Borbon.
Richardi, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 170-tribuloides.
Richardi, Tliuill. Fl. Par. i. 482~canesceng.
Richardsonii, *R. Br. in Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ.* 751,85.—Am. arct.
rigens, *L. Bailey, in Coult. Bot. Gat.* ix. (1884) 117.—Am. bor.
rigens, Boott, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 41» = Brownii.
rigens, Thuill. Fl. Par. i. 488-paludosa, stricta.
rigida, Clairv. ex Steud. Nom. ed. II. i. 205-caespitosa.
rigida, Good, in Trans. Linn. Soc ii. (1794) 198. t. 22 = vulgaris.
rigida, Schrank, Baier. Fl. i. 290 = firma.
rigida, Tuckerm. Enum. Caric. ll = stylosa.
rigidi/olia, Hochst. ex Scub. Fl. Azor. 21-punctata.
Ringgoldiana, *Boott, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-69) 419.—Japon.
rlparia. *Curt. Fl. Land. Fasc.* iv. t. 60.—Reg. bor. et austr.
riparia, Gcners. Elench. n. 874 = paludosa.
riparia, Moench, ex Steud. Nom. ed. II. i. 295-acuta.
riparia, Muhl. Desc Gram. Uber. 269 = lacustris.
riparia, Poir. Encyc Suppl. iii. 282-Uncinia riparia.

CABEX:—
rivalis, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 130 = divisa.
rivularis, Koch, ex Kunth, Enum. PI. ii. 487-paludosa.
rivularis, Schkuhr, Riedgr. i. 80=divisa.
robusta, F. Nyland, Spicil. Fenn. sub n. 83=rhynchophysa.
Rochebruni, *Franch. (? Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 655.—Japon.
Roemeriana, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 846.—Texas.
Romanzowiana, *Cham, ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 216.—Alaska.
rosea, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 15.—Am. bor.
Rossii, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 222.—Am. bor. occ.
rostellata, Gay, ex Boott, Ulnstr. Carex, i. 8-notha.
rostrata, Hoppe, ex Schkuhr, Riedgr. i. 99 = Michelii.
rostrata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 173 = Michauxiana.
rostrata, Muhl. ex Schkuhr, 1. c. ii. 54 = tentaculata.
rostrata, Stokes, in With. Bot. An. Brit. PI. ed. II. ii. 1059 = ampullacea.
Rotae, De Not. Ind. Sem. Hort. Gen. (1848) 24-paniculata.
rotondata, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 153.— Lappon.
Royleana, Nees, in Wight, Contrib. 127=breviculmis.
rubella, *Boott, lllustr. Carex,* iv. 176.—Zeylan.
rnbescens, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 60.—Japon.
rudis, *Wimm. in Flora,* xxxiii. (1850) 619.—Silesia.
ru/a, Lam. Fl. Fr. ii. 184 = paludosa.
rufa, Schrank, Baier. Fl. i. 305 -= paludosa.
rnfidula, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 220.—Am. bor.
rufina, *Drej. Rents. Crit. Car.* 28.—Norveg.
Rugeliana, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 8=juncea.
Kuiziana, *Boeck. in Linnaea,* xxxix. (1875) 30.—I'eruv.
rupestris, *All. Fl. Pedem.* ii. 264. t. 92. f. 1.—Europ.
rupestris, Torcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 267-argunensis.
Rutenbergiana, *Boeck. in Bremen Abh.* vii. (1880) 40.—Abyssin.
sabuletorum, Bieb. ex Boott, lllustr. Carex, iv. 178 = arenaria.
sabulosa, *Turcn. ex Kunth, Enum. PI.* ii. 432.—Sibir. baical.
sabynensis, Less, ex Kunth, 1. c. 440 = praecox.
sachalinensis, *F. Schmidt, Reisen Arnurl.* 194.—IDS. Sachalin.
Sachapata, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 56.—Peruv.
sagittifera, Lowe, in Camb. Phil. Soc. Trans, vi. (1838) 531 = macrostyla.
salina, Boott, in Hook. Fl. Bor. Am. 219 = cryptocarpa.
salina, Bongard, ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 281 = canescens.
salina, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 165.—Norveg.
salinoides, Beurl. in Bot. Notiser, (1853) 35-salina.
Salisiana x, Bruegg. in Jahresb. Nat Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 120.—Europ.
Sampsoni, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 89.—China,
sandwicensis, *Boeck. in Flora,* lviii. (1875) 265.—Ins. Pacif.
sangninea, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 137.—Afghanist.
sarda. Link, Hort. Berol. ii. 828-LinkiJ.
Sartwelliana, Dewey, in Am. Journ. Sc. xliii. (1842) 90-disticha.
Sartwelliana, *Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 396.—Calif.
Sartwellii, Dewey, ex J. Carey, in A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. I. 589=Sartwelliana.
saskatschawana, *Boeck. in Linnaea,* xli. (1877) 159.—Am. bor.
satsumensis, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 558.—Japon.
saxatilis, Huds. Fl. Angl. 408=praecox.
saxatilis, *Linn. Sp. PI.* 976.—Europ.
saxatilis, Matusch. ex Kunth, Enum. PI. ii. 450=fulva.
saxatilis, Oed. in Fl. Dan. t 159 = vulgaris.
saxatilis, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 221 = atrata.
saxatilis, Snter, ex Boot' lllustr. Carex, iv. 218°* semperrirens.

CABEX:—
scaberrima, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 345.—Texas.
scabra, Hoppe, Taschenb. (1800) 242=DavaIliana.
scabrata, *Schnein. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 69.—Am. bor.
scabrella, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 149.—Ind. occ.
scabrifolia, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 287.—Java.
scabrior, Sartwell, ex Boott, lllustr. Carex, iii. 125 = vulpinoidea.
scariosa, Lam. Encyc. iii. 888 = humilis.
Schaffneri, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 89.—Mexic.
Schaffneri, W. Boott, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xviii. (1882-83) 172 = potosina.
schedonautos, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 189.—Reg. Magell.
Scheuehteri, Gaud, ex Boott, lllustr. Carex, iv. 204 = tennis.
Scheuchuri, J. F. Gxnel. Syst 144-paludosa?
Schiedeana, *Kunze, in Schkuhr, Riedgr. Suppl.* 119. t. 30.—Mexic.
Schimperiana, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 373.—Abyssin.
Schkuhrii, Willd. Sp. PI. iv. 264=obesa.
Schmidtii, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 63.—Ins. Sachalin.
Schmidtii, *Meinshaus. Nachr. Wilni-Geb.* 224.—Manchuria.
schoenoides, DC. Fl. Fr. iii. 104=intermedia.
schoenoides, DesC Fl. Atlant ii. 836=divisa.
schoenoides, *Schrank, Baier. Fl.* i. 274.—Europ.
schoenoides, *Thuill. Fl. Par.* 480.—Gallia.
Schottii, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 123=sempervirens.
Scbottii, *Dewey, ex Torr. Bot. Mex. Bound.* 281.—Calif.
Schraderi, Schkuhr, Riedgr. ii. 81=laevigata.
Schreberi, Desv. Fl. Auv. 73 (Scherberi)=arenaria.
Schreberi, *Schrank, Baier. Ft. i.* 278.—Europ.; As. bor.
Schreberi, Tenore, ex Boott, Ulustr. Carex, iv. 186-divisa.
Schreberi, Willd. in Mem. Acad. Berl. 1794 (1797) 38—praecox.
Schrenkiana, C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 317 = vesicaria.
Schummelii, *Siegert, in Verh. Bot. Brandenb.* (1860) 112.—Europ.
Schweinitzii, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* ix. (1825) 68.—Am. bor.
scirpina, Tuckerm. ex Boott, lllustr. Carex, iv. 160 = scirpoidea.
scirpoidea, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 171.—Am. bor.
scirpoides, Schkuhr, Riedgr. ii. 19=«fchinata.
scitula, *Boott, lllustr. Carex,* iv. 177.—Reg. Himal.
scoparia, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 20.—Am. bor.
scoparia, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 394-arida.
Scopoliana, Willd. Sp. PI. Iv. 292=ferrnginea.
Scopolii, Gaud. Agrost. Helv. ii. 168 = ferruginea.
scotica, Spreng. Syst. iii. 819=vaginata.
Scouleri, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 398 = cryptocarpa.
secale, Ledeb. Fl. Ross. iv. 300-hordeistichos.
secalina, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. ii. 576-^riparia.
secalina, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 151-hordeistichos.
secta, *Boott, in Hook./. Fl. N. Zel.* i. 281.—N. Zel.
seditiosa, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 56.—Peruv.
Sellowiana, *Schlecht. in Linnaea,* x. (1886) 117.—Bras.
scmicylindrica, *Kit. I. c.* xxxii. (1863) 819.—Hungar.
sempervirens, EIL ex Kunth, Enum. PI. it 460-commutata *1*
sempervirens, Schwein. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 70 = glaucescens.
sempervirens, *Vill. Hist. PI. Dauph.* ii. 214.—Europ.
Sendtneriana x, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 119.—Europ.
senta, *Boott, lllustr. Carex,* iv. 174, in nota.—Calif.
serotina, Tenore, Fl. Nap. iv. 138=muricata.
semtodens, *S. Wats. Bot. Calif,* ii. 246.—Calif.
serrulata, Bivona, ex Spreng. Syst. iii. 827=glauca.
serrulata, Mutel, Fl. Fr. 895 - echinata.
setacea, Dewey, in Am. Journ. Sc. ix. (1825) 61. t. B. f. 5—vulpinoidea.
setacea, Frank, ex Kunth, Enum. PL ii. 382-stipata.

CABEX:—
setacea, Froel. ex Kunth, Enum. PI. ii. 409 = mucronata.
setariaeformis, Turcz. ex Boott, lllustr. Carex, iv. 189—leiorhyncha.
setfculmis, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 156.—Bras.
setifolia, Godr. in Me'm. Soc. Emul. Doubs, Se''r. IL v. (1854) 14-divisa.
setifolia, *Kunte, Syn. PI. Am. Austr.* 26.—Chili,
setigera, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 43.—Reg. Himal.
setosa, *Boott, lllustr. Carex,* iii. 108.—Reg. Himal.
setosa, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. 142-homoiolepis.
sexspicata, *Colenso, in Trans. N. Z. Jnst.* xvi. (1884) 842.—N. ZeL
Shortiana, *Dewey V Torr. in Am. Journ. Sc.* xxx. (1836) 60.—Calif.
Shortii, Steud. Syn. PI. Cyp. 202=stenolepis.
Shortii, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 407—Shortiana.
sibirica, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 406 = loliacea.
sicaeformis, *Boott, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 118.—Am. bor.
siccata, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* x. (1826) 27.—Am. bor.; As. bor. or.
sicula, Presl, ex Boott, lllustr. Carex, iv. 185 = distans.
sicula, *Tineo, PL Rar. Sicil.* 30.—Sicilia.
sicyocarpa, Lebel, Obs. PI. Manche (1848) 18 - praecox.
siderosticha, *Hance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) 88.—China.
Sieberi, Nees, ex Kunth, Enum. PI. ii. 118 = Mariscus flavus.
Sieberiana, Opiz, Natural, xi. (1826) 413-Davalliana.
Sieboldi, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 150.—Japon.
Siegertiana, Uechtritz, ex Garcke, Fl. Deutschl. ed. VIII. 435 = hirta.
sikokiana, *Franch. b[1] Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 573.—Japon.
gihcea, *Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1878) 393.—Am. bor.
simensis, Hochst ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 514 = aethiopica.
similis, Urv. in *Kim.* Soc. Linn. Par. iv. (1826) 599-curta.
simplicissima, F. Muell. Fragm. ix. 191=capillacea.
simpliciuscnla, *Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 141 (Quid ?).—Anglia.
Sinai, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 146.—Arab.
sinaica, Nees, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 228-distans.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 144=chinensis.
sitchensis, *Presc. ex Bong. Veg. Sitcha,* 61.—Alaska; Am. bor. occ.
Smithii, Tausch, in Flora, iv. (1821) 559=vaginata.
soda, Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 264-Arnottiana.
sociata, *Boott, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-59) 420.—China.
Solandri, *Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel.* 284.—N-Zel.
Soleirolii, DC. & Duby, Bot. Gall. ii. 498-echinata.
songorica, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 525.—Afghanist.; Sooner,
sordlda, *Heurck (f Muell. Arg. tn Heurck, Obs. Bot.* 33.—Kamtschatka.
sororia, *Kunth, Enum. PI.* ii. 379.—Reg. Argent.
sororia, Meinsh. Fl. Ingr. 404—aperta.
Spachiana, *Boott, lllustr. Carex,* i. 43.—China.
spadicea, Gilib. Exercit. ii. 546=arenaria.
spadicea, J. F. Gmel. Syst. 144-firma.
spadicea, Host, Gram. iv. 51. t. 91; DC. Fl. Fr. iii-120-ferruginea.
spadicea, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. II. 461-paludosa.
spadicea, Schkuhr, Riedgr. i. 90 = frigida.
spaniocarpa, Steud. Syn. PI. Cyp. 225 = obesa.
sparganioides, Le Conte, ex Kunth, Enum. PI. ii. 382 * stipata.
sparganioides, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 14.—Ambor.
sparsiflora, Steud. Norn. ed. II. i. 296 = vaginata.
spartea, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 149 = Uncinia spartea.
spatiosa, *Boott, lllustr. Carex,* ii. 86.—Cochinch.

CAKEX:—
speciosa, *Kuntk, Enum. PI.* ii. 504.—Ind. or.
spectabilis, Dewey, in Am. Journ. Sc. xxix. (1836) 248. t. X. f. 76 = podocarpa.
speirostachya, Sw. ex Sm. Engl. Fl. iv. 98 = fulva.
sphaerica, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 670.—Mont. Pyren.
sphaerocarpa, Ehrh. Beitr. vi. 83=tomentosa.
sphaerocarpa, Willd. Sp. PI. iv. 265 = obesa.
sphaerogyne, *Baker, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 129.—Madag.
sphaerostachya, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xlix. (1845) 44. t. Ee. f. 110.—Am. bor.
spicata, Brot. ex Kunth, Enum. PI. ii. 373=divisa.
spicata, Huds. FI. Angl. ed. I. 853 = muricata.
spicata, Lam. Encyc. iii. 381; Pollich, Palat. ii. 562 = disticha.
spicata, Schkuhr, Riedgr. i. ll = obtusata.
spicata, Thuill. Fl. Par. 480=vulpina.
spicigera, *Nees, in Wight, Contrib.* 121.—Zeylan.
spicnlata, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1861) 139.—Reg. Himal.
spiculosa, F. Nyland. Spicil. PI. Fenn. ii. n. 49 = salina.
spilocarpa, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 195.—Mexic.
spinirostris, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 385.—N. Zel.
splendens, Thuill. ex Pers. Syn. iii. 636-Hivisa.
splendida, Willd. Prod. Fl. Berl. 33-filiformis.
Sprengelii, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 371.—Afr. austr.
Sprengelii, Dewey, ex Spreng. Syst. iii. 837 = longirostris.
spreta, Steud. Syn. PI. Cyp. 212-caespitosa.
squarrosa, *Linn. Sp. PI.* 973.—Am. bor.
stans, Drej. Revis. Caric. 40=aquatilis.
Steenstrupii, *Liebm. in Forhand. Scand. Naturf.* (1840) 321.—Islandia.
stellulata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 383-muricata.
stellulata, Good, in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 144-echinata.
stenantha, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 673.—Japon.
stenocarpa, Turcz. ex Stead. Norn. ed. II. i. 296"= frigida.
stenolepis, *Less, ex Steud. 1. c.*—Norveg.
stenolepis, *Torr. in Am. Journ. Sc.* xxx. (1836) 59.—Am. bor.
stenophylla, Thien. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 210 - incurva.
stenophylla, *Wahlenb. in Vet. Aiad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 142.—Reg. bor. temp,
stenostachys, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 669.—Japon.
sterilis, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 3.—Am. bor.
Steudelii, Kunth, Enum. PI. ii. 480 = Jamesii.
Steudneri, *Boeck. in Linnaea,* xl. (1876) 364.—Abyssin.
stictocarpa, Sm. Engl. Bot. t. 2772>*glauca.
stipata, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 12.—Am. bor.
stipitata, Boeck. in Linnaea, xxxix. (1875) 85-stipata.
stolonifera, Ehrh. Beitr. vi. 83=praecox.
stolonifera, Hoppe, Ic. n. 41 = vulgaris.
straminea, *Willd. ex Schkuhr, Riedgr.* i. 49.—Am. bor.
striata, R. Br. Prod. 243 = lacistoma.
striata, Gilib. Exercit. ii. 550=riparia.
striata, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 174.—Am. bor.
striata, Torr. ex Boott, Illustr. Carex, i. 22 = polymorpha.
striatula, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 178=laxiflora.
stricta, *Good, in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 196. t. 21. f. 9.—Europ.; Am. bor.
stricta, Lam. Encyc. iii. 387 = angustata.
sirictifolia, Opiz, ex Nym. Consp. 777 = acuta.
strictior, Dewey, ex Wood, Cl. Book. 755=stricta.
strigosa, All. Fl. Pedem. ii. 270=tennis,
strigosa, *Huds. Fl. Angl.* 411.—Europ.; Reg. Caucas.
strigosa, Suter, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 208 = firma.
strigosa, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 470 -sylvatica.
stygia, Fries, Mant. iii. 141 —- rariflora.
styloflexa, Buckl. in Am. Journ. Sc xlv. (1843) 174 = laxiflora.
stylosa, *C. A. Mey. in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* i. (1881) 222. t. 12.—Unalaschka.
tubanceps, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 520.—Japon.

CAREX:—
subbiflora, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 234.—Am. bor.
subcompressa, *Steud. 1. c.* 221.—Am. bor.
subdola, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 265.—N.Zel.
suberea, Boott, Illustr. Carex, iv. 165 = Pierotii.
subfusca, 5. *Wats, in Bot. Calif,* ii. 234.—Calif.
subglobosa, Mielich. in Flora, xxii. (1839) 256 = Oederi.
sublivida, *Norrl. in Notts. Saellsk. Fauna et Fl. Fenn.* II. *Haeft* x. 51.—Europ. bor.
subramosa, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 385 = echinata.
subrotunda, *Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1867) 440.—Gallia.
subsalsa, Nym. Syll. Suppl. 69 = fulva.
subspathacea, Wormsk. in Fl. Dan. ix. 4. t. 1580-salina.
subulata, J. F. Gmel. Syst. 138=Seleria subulata.
subnlata, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 173.—Am. bor.
lubulata, Schum. ex Steud. Nom. ed. II. i. 296-Buxbaumii.
subulata, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 162 = Boryana.
subuniflora, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 284.—Am. bor.
subvillosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 386 = tomentosa.
sudetica, Opiz, Natural, xi. (1826) 413 = atrata.
sudetica, Presl, ex Kunth, Enum. PI. ii. 461-vaginata.
suilla, J. Fellm. in Bull. Soc. Nat. Mosc. viii. (1835) 285 = pulla?
sulcata, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 8O.-Transsylv.
Sullivantii x, Boott, in Am. Joura. Sc. xlii. (1842) 29.—Am. bor.
supina, *Wahlenb. in Akad. Vet. Nya Handl. Stockh.* (1803) 158.—Reg. bor. temp.
Suteri, *Kunth, Enum. PI.* ii. 523.—Europ.
sychnocephala, *Carey, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. x. (1847) 24.—Am. bor.
sylvatica, Dewey, 1. c. Ser. I. x. (1826) 40 = arctata.
sylvatica, *Huds. Fl. Angl.* ed. I. 353.—Europ.; As. temp.
sylvatica, Maxim, ex Boeck. in Linnaea, xli. (1877) 238 -Maximowiczii.
tabina, *Steud. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 56.—Am. anstr.
tabularia, M. A. Curt, ex Boott, Illustr. Carex, i. 54 - aeslivalis.
tartarea, *Ridl. in Journ. Bot.* xxi. (1883) 262.—Sumatra.
tauricola, Boiss. Fl. Orient, v. 415=atrata.
teinogyna, *Boott, Illustr. Carex,* i. 60.—Reg. Himal.
tenebrosa, *Boott, I. c.* 88. t. 256.—China,
tenax, *Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallks. Lund* (1877), n. VIII. p. 27.—N. Zel.
tenax, *Ckapm. ex Dewey, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xix. (1855) 254.—Am. bor.
tenax, *Reut. in Comptes-Rend. Soc. Hallir.* (1854-56) 130.—Europ.
tenella, Ehrh. Beitr. vi. 83=canescens.
tenella, Frocl. ex Kunth, Enum. PI. ii. 445=supina.
tenella, Poir. Encyc. Suppl. iii. 282=Uncinia tenella.
tenella, *Schkuhr, Riedgr.* i. 23.—Am. bor.
tenella, Thuill. Fl. Par. i. 429-praecox.
tenera, Dewey, in Am. Journ. Sc. viii. (1824) 97 = straminea.
Tenor ii, Kunth, Enum. PI. ii. 437^macrolepis.
tentaculata, *Muhl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 266.—Am. bor.
tenuiflora, Hartm. ex Kunth, Enum. PI. ii. 405 = loliacea.
tenuiflora, *Wahlenb. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* (1803) 147.—Europ.; Am. bor.
tenui/olia, Poir. Voy. Barb. ii. 254—Scirpuspubescens.
tenuiiostris, *Olney, in Am. Natural,* viii. (1874) 214.—Am. bor.
tenuis, Gmel. ex Steud. Nom. ed. IL i. 296 - Scleria tenuis.
tenuis, *Host, Gram. Austr.* iv. 51. t. 92.—Europ. austr.
tenuis, Nees, in Wight, Contrib. 128 - hirtella.
tenuis, Rudge, in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) 97. t. 9. f. 2=debilis.
tenuis, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 296-leporina.
tenuispica, Boeck. in Flora, xxxix. (1856) 225 - tristicha, *Boeck.*

CAREX:—
tenuispica, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 819.—Ins. Borbon.
tennissima, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 288.—Japon.
teres, *Boott, Illustr. Carex,* i. 62.—Reg. Himal.
tereticaulis, *F. Muell. Fragm.* viii. 256.—Austral,
teretiuscula, *Good, in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 163.—Europ.; Am. bor.
teretiuscula, Willd. ex Kunth,, Enum. PI. ii. 889 = paniculata.
teretiuscula, Willk. in Bot. Zeit. vi. (1848) 414-chordorrhiza.
tergestina, Hoppe, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 193 = muricata.
temaria, *Forst.f. Prod.* 92.—N. Zel.
testacea, *Soland. ex Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 282.—N. Zel.
tetanica, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 63= vaginata.
tetanica, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 63.—Groenl.; Am. bor.
tetanica, Schwein. & Ton. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 347 = conoidea.
tetrastachya, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 347 = straminea.
tetrastachya, *Traunst. in Flora,* xxxiii. (1860) 866.—Europ.
Textori, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 151= incisa.
thecata, Boott, in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 143 = PreUsii.
thermarum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* xxi. (1862) II. 385.—Chili.
Thomsonii, *Boott, Illustr. Carex,* i. 1.—Reg. Himal.
Thouarsii, *Carmich. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 508.—Ins. Tristan. D'Acunha.
Thunbergii, *Steud. in Flora,* xxix. (1846) 23.—Japon.
Thurbcri, *Dewey, ex Torr. Bot. Mex. Bound.* 232.—Am. bor. occ.
thuringiaca, Willd. Sp. PI. iv. 250 -glauca.
Thwaitesii, *Hance, in Journ. Bot.* v. (1867) 235.—Zeylan.
thyrsiflora, *Boott, Illustr. Carex,* i. 12. L 84.—Ind. or.
tokioensis, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 68.—Japon.
Tolmiei, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 224.—Am. bor. occ.
tomentosa, Hornem. in Fl. Dan. t. 1404=globularis.
tomentosa, Lightf. Fl. Scot. 563 = filiformis.
tomentosa, *Linn. Mant.* 123.—Europ.; Reg. Caucas.
tomentosa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 192-grisea.
torfacea, J. F. Gmel. Syst. 145-ampullaceo.
Torreyana, Dewey, in Am. Joum. Sc. x. (1826) 47 » Davisii.
Torreyi, *Tuckerm. Enum. Caric.* 21.—Am. bor.
torta, *Boott, ex Tuckerm. 1. c.* 11.—Am. bor.
Touranginiana, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. II. 632 - acuta.
trachyantha, Domer, ex Heuff. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 219 = praecox.
trachycarpos, Link, in Schrad. Joum. ii. (1799) 310 = glauca.
trachycystis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 314.—Reg. Argent,
traiziscana, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 192.—Ins. Sachalin.
transversa, *Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.* il. 215. t. 216.—Japon.
transversa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 148 = rigens.
transsilvanica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 80 = Halleriana?
triandra, *Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix.* (1884) 311, nomen.—Rossia.
triangularis, *Boeck. in Flora,* xxxix. (1856) 226.—Texas.
tribuloides, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 145=lagopodioides.
tricephala, *Boeck. in Flora,* lviii. (1875) 263.—Malaya.
triceps, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 170.—Am. bor.
triceps, *Schrank, Baier. Fl.* i. 287.—Europ.
trichocarpa, *Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 47, 81.—Am. bor.
trichocarpa, Schur, Enum. PI. Transs. 709=sempervirens.
trichodes, *Steud. in Linnaea,* xxxix. (1875) 29.—Peruv.

CAREX:—
trickostachya, Fisch. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 198= podocarpa.
trichostyles, ***Franch. If Sav. Enum. PI. Jap.*** **ii. 681.** —Japon.
tricostata. Fries, Novit. Mant iii. 152 = vulgaris.
trifida, *Cav. Ic-* v. 41. t. 465.—Reg. Magell.
trifiora, Schkuhr, Riedgr. i. 94, ii. 66 =- depauperata.
triflora, Vahl, ex Kunth, Ennm. PI. il. 460 - vaginata.
trigona, All. Fl. Pedem. ii. 269 = ralva.
trinervis, *Degl. in Loisel. Ft. Gall.* ii. 781.—Gallia.
trinervis, Nee», in Wight, Contrib. 120 = Esenbeckii.
tripartita, All. FI. Pedem. ii. 265 = curvula.
tripartita, Lam. Encyc. iii. 339 «di visa.
tripartita, Suter, Fl. Helv. ii. 241 = lagopina.
triqnetra, *Boott, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 126. —Calif,
trisperma, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* ix. (1825) 68.—Am. bor.
trisperma, A. Gray, ex Boott, Illustr. Carex, ii. 81-- rosea.
tristachya, *Thanh. Fl. Jap.* 38.—Japon.
tristicha, *Boeck. in Flora,* xli. (1858) 651.—Am. bor.
tristicha, ***Spruce, ex Boott, Illustr. Carex,*** **iv. 163.—** Ecuador.
tristis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 615=semp«virens.
triticea, Wahlenb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 299- clavata.
trnncata, *Boeck. in Flora,* xli. (1858) 649.—Am. bor.
truncata, ***Fensl, in Friederichstkal, Reise Griechenl.*** 278.—Graecia.
truncation, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 318.— Hungar.
tnberculata, ***Liebm. in Videnst. Selsk. Sir.*** **V. ii.** (1851) 270.—Mexic.
tuberculata, Nees, ex Boott, Illustr. Carex, ii. 76« bonariensis.
tuberosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 85 - Eleocharis tuberosa.
tuberosa, Degl. in Loisel. Fl. GalL ii. 629=Linkii.
tubulata, Schum. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 186 = Buxbaumii.
Tuckermanni, ***Boott, in Hook. Land. Journ. Bot.*** **v.** (1846) 78.—Am. bor.
tumida, Beilschmid, in Hornsch. Archiv Skand. ii. 214 -vulgaris.
tnmida, *Boott, Illustr. Carex,* i. 66.—Reg. Himal.
tumidicarpa, ***Anderss. in Bot. Notiser*** **(1849);** ***et Flora,*** xxxiii. (I860) 297.—Scandinav.
tnrbinata, ***Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.*** **V. ii. (1861)** 265.—Mexic.
Turctaninofii, Stead, ex Boott, Illustr. Carex, iv. 161 = obesa.
turfacea, **Auct. vide** ***torfacea.***
turfosa, Fries, Bot. Noliser (1846), 104,107 = caespitosa.
turfosa, Fries, Summa, 228 = vulgaris.
turgescens, Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. iii. (1847) 856 = Halei.
turgescens, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii (1836) 419. —Am. bor.
turkestanica, ***Regel, in Act. Hort. Petrop.*** **vii. (1880)** 670.—Turkestan.
Tweediana, *Nees, in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 898. —Reg. Argent.
typhina, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 169 = squarrosa.
typhinoides, Schwein. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 66 — squarrosa.
fyphoides, Bory, Voy. iii. 24 = Boryana.
nda, ***Maxim. Prim. Fl. Amur.*** **303.—Reg. Amur.**
uetliaca, Suter, Fl. Helv. i. 251=flava.
utiginosa. Linn. Sp. PI. 97S=_Scirpus Caricis.
nmbellata, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 75.—Am. bor.
umbrosa, Host, Gram. i. 52. t. 69—praecox.
nncifolia, ***Cheesem. in Trans. If. Z. Inst.*** **xvi. (1884)** 412.—N. Zcl.
uncinata, Linn. f. Suppl. 418 = Uncinia australis.
uncinata, Schkuhr, ex Steud. Norn. ed. II. i. 297 = Uncinia jamaicensis.
uncinioides, *Boott, Illustr. Carex,* i. 8.—Keg. Himal.
undulata, Kunze, in Schkuhr, Riedgr. Snppl. 28. n. 8. t. 4. f. 2 = pallescens.
undulata, Schur, Enum. PI. Transs. 714 = Ieucantha.
Urbani, ***Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.*** **vii. (1885) 280.—** Alaska,
ursina, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xxvii. (1835) 240.— Am. arct.

CABEX:—
Urvillei, Brongn. in Dnperr. Voy. Bot 157 = pumila.
ustulata, ***Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh.*** (1803) 166.—Europ.
utriculata, ***Boott, in Hook. Fl. Bor. Am.*** **ii. 221.—Am.** bor.
vacillans, ***Soland. ex Boott, in Hook. f. Fl. N. Zel.*** **i.** 285.—N. Zel.
vacillans, Steud. Syn. PI. Cyp. 235=riparia.
vaginata. *Tausch, in Flora,* iv. (1821) 657.—Europ.
Vahlii, *Schkuhr, Riedgr.* i. 87.—Reg. bor. et arct.
valdiviana, *Phil, in Linnaea,* zxix. (1857-58) 84.— Chili.
valesiaca, Suter, Fl. Helv. 259=tennis.
valesiaca, Wahlenb. in Vet Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 155= ambigua.
valida, ***Nees, in Wight, Contrib.*** **123.—China;** Zeylan.
vallicola, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xxxii. (1861) 40.—Calif.
Vanheurckij, ***Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.*** **80.—** Kamtschatka.
varia, Host, Gram. i. 59. t. 80=sempervirens.
varia, ***Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.*** **ii. 48.—Am. bor.**
variegata, Lam. Encyc iii. 889=sempervirens.
variegota, *Scheele, in Linnaea,* xxiii. (1850) 566.—Am. bor.
Vaseyi, Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxix. (1860) 847=monile.
ventricosa, Curt FL Lond. fasc. vi. t. 68 = depauperata.
venusta, *Dewey, in Am. Journ. Sc.* xxvi. (1834) 107.— Am. bor.
verna, Chaix & Vill. Hist. PI. Dauph. i. 812, ii. 204 = praccox.
verna. Lam. Fl. Fr. ii. 185, partim=glauca.
verna, Schkuhr, Riedgr. i. 89 = obesa.
verna, Torr. ex Kunth, Enum. PI. ii. 439=praecox.
verrucosa, Muhl. Desc. Gram. Uber. 261=glaucescens.
verrucosa, Schwein. ex Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1636) 400=commutata.
versicolor, *Dum. Fl. Belg.* 148.—Belgium,
verticillata, *Boott, Illustr. Carex,* i. 67.—Am. bor.
verticillata, ***Zoll.*** **b* *Moritri, Syst. Vert. Zoll.*** **98.—** Java.
vesicaria, Bunge, ex Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 261 = songorica.
vesicaria, Dewey, ex Stead. Nom. ed. II. i. 297» bnllata.
vesicaria, Leers, Fl. Herbom. t. 16. f. 2. l=riparia.
vesicaria, Lightf. Fl. Scot. ii. 666=ampullacea.
vesicaria, *Linn. Sp. PI.* 979.—Reg. bor. temp.
vesicaria, Thnnb. Prod. PI. Cap. l-4=clavata.
vesiciformis, *Peterm. in Flora,* xxvii. (1844) 889.— Saxonia.
vesiculosa, *Boott, Illustr. Carex,* iii. 107.—Ind. or.
vestita, *Willd. Sp. PI.* iv. **268.—**Am. bor.
vexilis, Wonnsk. ex Boott, Illustr. Carex, iv. 191 = Michelii.
vicinalis, *Boott, 1. c.* 188.—Ind. or.
victorialis, Nees, in Wight, Contrib. 126-notha.
Villarsii, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 5.—Gallia.
villosa, ***Boott, in Perry, Jap. Exped.*** **ii. 327.—Japon.**
villosa, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 142 = Davaliana.
villosa. Stokes, Bot. Mat. Med. Iv. S46=hirta.
virens, Lam. Encyc. iii. 384 — muricata.
virens, Thuill. FL Par. i. 489=acuta.
virescens, ***Muhl. ex Schkuhr, Riedgr.*** **ii. 46.—Am.** bor.
virescens, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 430=triceps,
trirgata, *Mig. Fl. Ind. Bat.* iii. 851.—Java.
virgata, Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 282=paniculata.
virginiana, Woods, in Rees, Cycl. vi. n. 100-acuta.
virginica, Steud. Syn. PL Cyp. 217=praec
viridis, Honck. Syn. PI. Germ. L 872 = flava.
viridis, ***Petrie, in Trans. N. Z. Inst.*** **xiii. (1881) 832.** —N. Zel.
viridis, ***Schlecht. tf Cham, in Linnaea,*** **vi. (1831) 80.** -Mexic.
viridis, *Spenn. Fl. Friburg.* i. 48.—Europ.
viridula, ***Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.*** **ii. 679.—** Japon.
viridula, *Michx. Fl. Bor. Am.* 11. 170.—Am. bor.
viridula, Schwein. & Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 320=triceps.

CABEX:—
vitilis, Fries, Novit. Mant iii. 187-canescens.
Vleckii, Schwein. in Ann. Lye. N. **York,** i. **(1824)** 69 = oligocarpa.
Vulcani, ***Hochst. ex Seub. Fl. Aior.*** **22. t. 8. f. 2.—** Ins. Azoric
vulgaris, *Fries, Nov. Mant.* iii. 163.—Reg. temp. bor. et austr.
vulpina, Carey, ex Dewey, in Am. Joum. Sc. Ser. II. viii. (1849) 348 -conjuncta.
vulpina, Hohen. in Bull. Soc Nat. Mosc. (1838) 259 =muricata.
vulpina, *Linn. Sp. PI.* 973.—Europ.; As. temp.
vulpina, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 898 = bonariensis.
vulpinae/ormis, Tuckerm. Enum. 9=vulpinoidea.
vulpinaris, Nees, in Wight, Contrib. 121.—Reg. Himal.; As.bor.
vnlpinoidea, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 169.—Reg. Cauc.; Am. bor.
vulpinoidea, Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 390-stipata.
Wahlenbergiana, *Boott, Illustr. Carex,* ii. 101. t 801. —Ins. Maurit.
wahuensis, ***C. A. Mey. in Mim. Sav. Etr. Pltersb.*** **i.** (1881) 218. t. 10.—Ins. Oahn ; Japon.
Wakatipu, ***Petrie, in Trans, tf. Z. Inst.*** **xiv. (1882)** 363.-N. Zel.
^*aOxti, Am. ex Boott, in Proc. Linn. Soc.* **i. (1846)** 257.—Zeylan.
Wallichiana, *Presc. in Wall. Cat.* n. 3380.—Reg. Himal.
Wallichiana, Spreng. Syst. iii. 812=foliosa.
Washingtoniana, Dewey, in Am. Joum. Sc. x. (1826) 272 = vulgaris.
Watsoni, Boott, Illustr. Carex, iv. 208=Vulcani.
Watsoni¡O/no'> '"> *Bot. King, Exp.* 370.—Am. bor. occ.
Wataoniana, *Steud. Syn. PL Cyp.* 215.—Am. bor.
Wazmanni, *Schrank, Baier. Fl.* i. 297.—Europ.
Weiheana, Boeng. ex Kunth, Enum. PL ii. 489= praecox?
Welwitschi, ***Boiss. ex Steud. Syn. PI. Cyp.*** **280.—** Lusitan.
Whitneyi, *Olney, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) **894.** —Calif.
Wichurai, ***Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.*** **v. (1884) 619.** —China.
Wightiana, *Nees, in Wight, Contrib.* 122.—Ind. or.
Wifkesii, ***Olney, in Bot. V. St. Expl. Exped.*** **ii. 477.** t.17.-Hab.t
Willdenowii, *Schkuhr, Riedgr.* ii. 83.—Am. bor.
wiluica, ***Meinsh. exMaack, Vilyuisk. Okruge Yakutsk.*** *Obi.* II. 808.—Sibir.
Wimmeri, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 216.—Silesia.
Winkleri, ***Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **(1877-**78) 224.—Hispan.
Witheringii, S. F. Gray, Nat Air. Brit. PI. ii. 48= **arenaria.**
Wormskioldiana, Hornem. in Fl. Dan. t 1628' scirpoidea.
Wormskioldii, Drej. Revis. Caric. 18=scirpoidea.
Woodii, Dewey, in Am. Journ. Sc. Ser. II. ii. (1846) 249 = tetanica.
Wrightii, ***Dewey, ex Torr. Bot. Mex. Bound.*** **282.—** Am. bor. occ.
xalapensis, Kunth, Enum. PI. ii. 880=Brongniartii.
xanthophysa, Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 162 = folliculata.
xerocarpa, 5. ***H. Wright, in Am. Journ. Sc.*** **Ser. II.** xlii. 1.1866) 334, in nota.—Am. bor.
yodoensis, ***Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.*** **v. (1884) 615. —Japon.**
Zollingeri, Kunze, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 221- nemostachys.
Monata, F. Nyland. Spidl. PI. Fenn. ii. 19 -vulgaris ?

CARET A, Roxb. Hort. Beng. 62. (1814); Fl. Ind. Ii. 686 (1832). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 721.
CUMREA, Wight & Am. Prod. i. 384 (1834).
CUMBIA, Bnch.-Ham. Mysore, iii. 187 (1807).
arborea, *Roxb. II. cc.*—Ind. or.
australis, F. Muell. Fragm. v. 188 = Barringtonto Careya.
herbacea, ***Roxb. Hort. Beng.*** **52;** ***Fl. Ind.*** **ii. 688.—** Ind. or.
macrostachya, Jack, in Malay Misc. i. n. v. 47 •" Barringtonia macrostachya.

CABEYA :—
orbiculata, Mien, in Trans, linn. Sac. Ser. IL i. (1875) 98 - arborea.
pendula, Griff. Notul. iv. 661 = Barringtonia macrostachya.
sphaerica, *Roxb. Hart. Btng.* 52; *Fl. Ind.* ii. 636.—Ind. or.
valida, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlvi. (1877) II. 72.—Ins. Andam.

CARGILLA, Adans. Fam. ii. 180 (1768) - Chrysogonum, Linn. (Compos.).

CARUILLIA, R. Br. Prod. S26 (1810)=Diospyros, Lam. (Ebenac).
arborea, A. Cunn. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc xii. (1873) 239-D. penUmera.
australis, R. Br. Prod. 528=D. Corgillia.
laxa, R. Br. 1. c. - D. maritima.
matacea, F. Muell. Fragm. v. 162=D. mabacea.
maritima. Hassle. Cat. Hort. Bog. Alt. 169=D. maritima.
megalocarpa, F. Mnell. Fragm. v. 168 = D. maritima.
pentamera, F. Mnell. 1. c. iv. 82 = D. pentamera.

CARICA, Linn. Gen. ed. I. 809 (1787). *PASSIFLOREAE,* Berth. & Hook. f. i. 815.
MociNNA, Cerv. ex La Llave, in La Naturaleza, vil. (1885) Ape"nd. 70.
PAPAYA, Toura. ex Linn. Syst. ed. I (1786).
VASCONCELLEA, A. St. Hil. Mlm. Resed. ii. 13 (1887).
Boissieri, *Hemsl. Biol. Centr.-Am. Bot.i.* 481.—Mexic.
candamarcensis. *Hook.f. Bot. Mag.t.* 6198.—Ecnador.
candicans, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Bxped.* i. 640.—Peruv.
cauliflora, *Jacq. Hort. Sckoenb.* Iii. 38.—Venezuela,
dtriformis, *Jacq. /. ex Spreng. Syst.* iii. 905.—Afr. trop.
cundinamarcensis, J. Linden, Cat. n. 87 (1871)» candamarcensis.
digitata, Spreng. Syst. iii. 906 = spinosa.
dodecaphylta, *Veil. Fl. Flum.* x. 1.182.—Bras,
erythrocarpa, *Linden V Andri, Illustr. Hortie.* xviii. (1871) t. 51.-£cuador.
glandulosa, *Pav.ex A. DC. in DC. Prod.* xr. I. 417.—Peruv.
gossypifolia, *Criseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 137.—Reg. Argent.
heptaphylla. Veil. Fl. Flnm. x. t. 138-spinosa.
hermaphrodita, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 205=C. Papaya
heteropnyila, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 60.—N. Granat.
Mamaya, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 181.—Bras,
microcarpa, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 82.—Am. austr.
monoica. *Desf. in Ann. Mus. Par.* i. (1802) 278. t. 18.—Perriv.
nana, *Benth. PI. Hartw.* 288.—Mexic.
Papaya, *Linn. Sp. PI.* 1036.—Am. trop.
peltata, *Hook,* ft* *Am. Bot. Beech. Voy.* 425. t. 98.—Nicaragua.
Posopora, *Linn. Sp. PI.* 1036.—Pernv.
pubescens, *Lennl If C. Koch, in Ind. Sent. Hort. Bot. Berol.* (1854) 12.—Guatemala.
toriformis, Willd. Sp. PI. iv. 815 =-C. Posopora.
scandens, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped. I* 640.—Peruv.
spinosa, *Aubl. PI. Gui.* ii. 908.—Guian.; Bras.

CARICELLA, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789)«=Carex,

CARICTERIA, Scop. Introd. 104 (1777) = Corohorus, Tonm. (Tiliac.).

CARIGOLA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 10 (1836) - Monoohoria, Presl (Pontederac).
lastata, Rafin. 1. C.-M. hastaefolu.

CARIMA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 62 (1836) - Adhatoda, Nees (Acanthac).
flcata, Rafin. 1. c. = A. sulcaU.

CARINIANA, Casar. Nov. Stirp. Brat. 35 (1842) = Couratari, Anbl. (Myrtac.).
***Uienn's,* Casar. 1. c.-Couratari legalis.

CARINIANA :—
domestica, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 286 = Couratari domestica.
excelsa, Casar. Nov. Stirp. Bras. 46 = Couratari estrellensis.
exigua, Mien, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 289.—Ind. occ.
pyriformis, Miers, 1. c. 290.—Bolivia.
rubra, Miers, 1. c. 288=Couratari rubra.
uahupensis, Miers, 1. c.=Couratari uaupensis.

CABION1A, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xv. (1851) 311. t. 15. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 759.
elegans, *Naud. 1. c.* 312.—Ins. Philipp.
triplinervia, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 310.—Ins. Philipp.

CABIBSA, Linn. Mant. i. 7 (1767). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 695.
ANTURA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 68 (1775).
ARDUINA, MiU. Ic. t. 800 (1759); Linn. Mant. 7 (1787).
abyssinica, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. lxiv, nomen.—Abyss.
acumioata, *A. DC. Prod.* viii. 335.—Afr. austr.
africana, *A. DC. 1. c.* 382—Afr. trop.-
Arduina, *Lam. Encyc.* i. 565.—Afr. anstr.
axilla™, *Roxb. Hort. Beng.* 84; *Fl. Ind.* i. 691.—Ins. Molucc
bispinosa, Desf. Tabl. ed. I. 78 = C. Arduina.
Brovnii, F. Muell. Fragm. iv. 46 = lanceolate, ovata.et scabra.
Candolleaiia, *Jaub. tf Spach, Illustr.* v. 107. t. 497.—Abyssin.
S Carandas, *Linn. Mant.* 62.—Infl. or.; Malaya.
Carandas, Lodd. Bot. Cab. t. 663 = paucinervia.
Carandas, Lonr. Fl. Cochinch. 155 = africana.
congesta, Wight, Ic. iv. t. 1289 = C. Carandas.
eoriacea, *Wall. Cat.* n. 1680.—Ind. or.
comlfolla, *Jaub. (f Spach, Illustr.* v. 108. i. 498.—Abyssin.
cryptophlebia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 204.—Madag.
Daliellii, Bedd. Forest. Fl. Anal. Gen. 156; Man. Bot. 157 = macrophylla.
densiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 204.—Madag.
,diffusa, Roxb. Hort. Beng. 19; Fl. Ind. i. 689 = spinarum.
diffusa, Wall. Cat. n. 1678, partim=paucinervia.
dulcis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin.Pl. 146-edulis.
edulis, *Vahl.Symb. Bot. i.* 22.—Aegypt.
erythrocarpa, *A. DC. Prod.* viii. 835.—Afr. anstr.
ferox, *A. DC. I. c*—Afr. austr.
/grandiflora, *A. DC. I. c*—Afr. austr.
- giandis, *Bert, ex A. DC. I. c.* 336.—Ins. Tahiti,
haematocarpa, *A. DC. I. c.*—Afr. austr.
hirsuta. Roth, Nov. PI. Sp. 128 = spinarum.
inermis, Vahl, Symb. Bot. iii. 43 - macrophylla.
lanceolate, *R. Br. Prod.* 468.—Austral.
laneeolata, Dak. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 143-macrophylla.
laxiflora, *Benth. Fl. Austral,* iv. 805.—Austral,
/macrocarpa, *A. DC. Prod.* viii. 336.—Afr. austr.
^macrophylla, *Wall. Cat.* n. 1679.—Ind. or.
madagascarienais, *Thou. Obs. PL lies Afr. Austr.* 80.—Madag.
mitis, Hcynh. ex A. DC. Prod. viii. 332 = macrophylla.
mitis, Vahl, Symb. Bot. iii. 44 - Holarrhena mitis.
myrtoides, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 898.—Hab. 1
oblongifolia, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) ii. 827.—Afr. austr.
ovata, *R. Br. Prod.* 468.—Austral,
paucinervia, *A. DC. Prod.* viii. 333.—Ind. or.
pubescens, *A. DC. 1. c.* 834.—Afr. trop.
Richardiana, Jaub. *Be* Spach, Illustr. v. 106 t. 496 - edulis.
salicina. Lam. Encyc i. 554=spinarumJ
scabra, *R. Br. Prod.* 468__Anstral.
Schimperi, *A. DC. Prod.* viii. 675.—Abyssin.
sechellensis, *Baker, Fl. Maurit.* 222.—Ins. Seychell.
spinarum, *Linn. Mant.* t. 559.—Ins. Molucc.
spiñarum, Lodd. ex A. DC. Prod.' viii. 336'- Damnacanthus indiens.
snavissima,.*Bedd. ex Hook.f. Fl. Brit. Ind.* in'. 632.—Ind. or.

CAKI8SA:—
tomentosa, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 30.—Abyssin.
villosa, Roxb. Hort. Beng. 19; Fl. Ind. i. 690-spinarum.
Xyfopicron, *Thou. Obs. PI. lies Afr. Austr.* 80. t. 2.—Ins. Mascar.

CAP.LEA, Presl, Epim. Bot 216 (1849) = Symplooo8, Linn. (Styrac).
oblongifolia, Presl, 1. c. 217 = S. oblpngifolia.

CABLEMAW1TIA, Benth. in Hook. Kew Ioom. v. (1853) 308. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 63.
congesta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 85.—Reg. HimaL
Griffithii, *Benth. in Hook. Kern Journ.* v. (1853) 808.—Reg. Himal.
tetragona. *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 85.—Reg. Himal.

CAKLINA, Linn. Syst ed. I (1736). *COMPOSITAE.* Benth. & Hook. f. ii. 465.
ATKAMUS, Neck. Elem. L 85 (1790).
CARLOWIZIA, Moench, Meth. Snppl. 226 (1802).
CHROMATOLEPIS, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 52U (1867).
MITINA, Adans. Fam. ii. 116 (1763).
acanthifolia.^W. *Fl.Pedem.* L156.t.51.—Reg.Mediterr.
Acarna, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 282 = Cnicus Acama.
acaulis, Lam. Encyc. i. 623=acanthifolia.
acaulis, *Linn. Sp. PI.* 828.—Europ.
acaulis. Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 156^Cnicus acaulis.
aeuleata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 28 (= *Stobaea rigida).*—Afr. austr.
aggregata, Willd. Sp. PI. iii. 1694 - acaulis.
alpina, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 274 - acaulis.
atlantica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 19.— Algeria.
atractyloides, Linn. Sp. PI. 1161 (=*Stobaea atractyloides).*—Afr. austr.
Bieberstrinii, Berah. ex Homem. Hort. Hafn. Suppl. 94—vulgaris.
bracteata, J. & C. Presl, Delie. Prag. 108 = sicula.
caulescens, Gilib. FL Lituan. iii. 196 =• vulgaris.
caulescens, Lam. Fl. Fr. ii. 7 = acaulis.
Chamaeleon, Vill. Hist PI. Dauph. iii. 80=acaulis.
Chardousse, Vill. Prosp. 27-acanthifolia.
complanata, Schur, Enum. PI. Transs. 413=vnlgaris.
corymbosa, *Linn. Sp. PI.* 828.—Reg. Mediterr.
corymbosa, Scop, ex Stend. Nora. ed. II. i. 299 — vulgaris.
Curetum, Heldr. in Boiss. Fl. Orient, iii 449 - corymbosa.
Cynara, Ponrr. ex DC. Fl. Fr. iv. 123=acanthlfolia.
discolor, Soleir. ex Nym. Consp. 400 - macrocephala.
Echinus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 283.—Reg. Cauc. (= *Cirsium scleranthum).*
elatior, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 686 ; et Beitr. Fl. Hercyn. 266=acaulis.
foliosa, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient, ill. 450 = oligocephala.
Fontanesii, DC. Prod, vi 648-Atractylls macrocephala.
frigida, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. vi. 109.—Graecia.
gorterioides. Lam. Encyc. i. 625 (-Berkheyae sp.).—Afr. austr.
graeca, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 449-corymbosa.
grandiflora, Moench, Meth. 668=>acanlis.
gummifera. Less. Syn. Comp.· 12~ Atractylis gummifera.
hispanica, Lam. Encyc. i. 624~ corymbosa.
intermedia, Schur, Enum. PI. Transs. 418-vulgaris.
involucrata, *Pair. Voy. Barb.* ii. 234.—Reg. Mediterr.
lanata, Habl. Taur. 160 = vnlgaris.
lanata, *Linn. Sp. PI.* 828.—Reg. Mediterr.
lanata, Pall, ex DC. Prod. vi. 546=vulgaris.
libanotica, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 95 = corymbosa.
Lobeliana, Tausch, in Flora, xii. (1829) Erg. 41-corymbosa.
longifolio, Reichb. Ic. Fl. Germ. viii. 26-vulgaris.
longifolia, Viv. Fl. Lib. Spec. 68 = con mbosa.
lyrata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 141.—Afr. austr.
macrocephala, Less. Syn. Comp. 12 = Atractylis macrocephala.

CAELUJA :—
macrocephala, *Moris, Blench. Sard.* ii. 5.—Reg. Mediterr.
macrophylla, DC. Prod. vi. 648 = Atractylis macrophylla.
nebrodensis, *Guss. in DC. Prod.* vi. 846.—Sicilia.
nebrodensis, Koch, ex Nym. Contp. 401«=vulf;aris.
' oligocephala, *Boiss. V Kotschy, Diagn.* Ser. II. iii. 61. —As. Min.; Syria.
onopordifolia, Bess, ex DC. Prod. vi. 645 = acanthifolia.
orophila, Lamotte, Prod. ii. 443—vulgaris.
patula, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 23 *{=Stobaeae sp.).*— Afr. austr.
Pola, Hacq. PI. Alp. Cam. 29. t. 4. f. 3 = lanata.
pyrenaica, Linn. Sp. PI. 829 = Carduus carlinoides.
racemosa, Gilib. Ctilor. Grodn. 34 — vulgaris.
racemosa, Gouan, Illustr. 64=corymbosa.
racemosa, *Linn. Sp. PI.* 829.—Reg. Mediterr. occ.
radiata, Viv. Fl. Lib. Spec. 68 = corymbosa.
Reboudiana, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Atl.* 278.—Algeria.
Rothii, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 449 - corymbosa.
salicifolia, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* iv. (1801) 81; *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 88.—Ins. Madera.
scabra, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 23 = Tripteris arborescens.
sicula, *Tenore, Cat. Hort. Neap. App.* (1819).—Sicilia.
simplex, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 164. t. 152 — acaulis.
subacaulis, DC. Fl. Fr. iv. 122 = acaulis.
sulphurea, Desf. Fl. Atlant. it. 251 = racemosa.
tragacanthifolia, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 94.— Ins. Rhodus.
transsihanica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Nat. iv. (1868) 84-acanthifolia.
tristis, Salisb. Prod. 185 = vulgaris.
Utika, Hacq. Fl. Alp. Cam. 7.1.1 = acanthifolia.
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 828.—Europ.; As. bor.
xeranthemoides, *Linn./. Suppl.* 349.—Ins. Tenerif.

CARLOTEA, Arruda, ex Koster, Trav. 493 (1816) (Gen. ignot.).
/ormosissimum, Arruda, 1. c.—Pernambuc.
speciosa, Arruda, 1. c.—Pernambuc.

CARLOWIZIA, Moench, Meth. Suppl. 225 (1802) = Carlina, Linn. (Compos.).
corymbosa, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 53 — Carlina salicifolia.
salicifolia, Moench, Meth. Suppl. 226 - Carlina salicifolia.

CABLOWB.IGHTIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xiii. (1878) 364. *ACANTHACEAE.*
arizonica, *A. Gray, I. c*—Arizona,
linearifolia, *A. Gray, I. c*—Texas.

CAKLTJDOVICA, Ruiz & Pav. Prod. 146. t. 81 (1794). *CYCLANTHA CEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 953.
EVODIANTHUS, Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1876) 194.
LUDOVIA, Pers. Syn. ii. 676 (1807).
SALMIA, Willd. in Gcs. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 399.
SARCINANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1875) 196.
acuminata, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 87 = divergens.
acuminata, *Ruiz (X Pav. Syst.* 293.—Am. austr.
angusti/olia, Ruiz *Sc* Pav. 1. c. 292- Cyclanthus Pltimerii.
atrovirens, *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 67.—N. Granat.
btacbypis,Dmde.in Mart. Fl. Bras.iii.ll. 237.—Bras,
chelidonura, *Drude, I. c.* 238.—Bras,
disticha, *Pott, in Rev. Hortic.* Sir. III. i. (1847) 86.— Guiana.
divergens, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 241.—Bras.
Drudei, *Mast, in Gard. Chron.* (1877) II. 714.—Bras,
ensiformis, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6418.—Costa Rica,
funifera, *Kunth, Enum. PI.* iii. 106.—Guiana.
Gardneri, *Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 29. t. 8, 4.— Bras.
heterophylla, *Marl, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 242.—Bras.

CARLUDOVICA :—
humilis, *Poepp. b" Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 37.— Peruv.
imperialis, *Linden V Andri, Illustr. Hortic.* xxi. (1874) t. 165.—Ecuador.
incisa, *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 67.—Am. centr.
insignis, *Duchass. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 518.— Ind. occ.
Kegeliana, *Lem. Illustr. Hortic.* ii. (1856) *Misc.* 28.— Guiana.
latifolia, *Ruiz* b> *Pan. Syst.* 292.—Ind. occ.
latifrons, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 287.—Bras,
longicrura, *Drude, 1. c.* 240.—Bras,
macropoda, *KlotMsch, in Linnaea,* xx. (1847) 469.— N. Granat.
microphylla, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1867) 187.—Costa Rica.
Moritziana, *Klotnsch, in Linnaea,* xx. (1847) 488.—N. Granat.
Oerstedii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 416.— Costa Rica.
palmata, Griseb. in Goett. Abb. vii. (1857) 259 — insignis.
palmata, *Ruiz V Pav. Syst.* 291.—Am. austr.
plicata, *Klotmsch, in Linnaea,* xx. (1847) 468.— N. Granat.
plicata. Linden, ex H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 67 = atrovirens.
Plumerii, *Kunth, Enum. PI.* iii. 106.—Ins. Martinic.
Plumieri, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 513=gracilis.
purpurascens, J. Linden, Illustr. Hortic. xxviii. (1881) 64.—N. Granat.
inpestris, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 469.—N. Granat.
sarmentosa, *Sagot, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 289.—Guiana.
Sartoni, *Teijsm. b" Binn. Cat. Hort. Bog.* 381, nomen. —Hab.)
schizophylla, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 235.— Bras.
speciosa, Linden.—Cf. Gard. Chron. (1877) II. 753 = Drudei.
subacaulis, *Kunth, Enum. PI.* iii. 107.—Guiana,
tetragona, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 79.—N. Granat.
tetragonopus, *Mart, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 238.—Bras.
Trailiana, *Drude, I. c.* 241.—Bras,
trigona, *Ruia &" Pav. Syst.* 293.—Am. austr.
utilis, *Benth. If Hook. /. ex Hemsl. Biol. Am. Centr. Bot.* iii. 416.—Costa Rica.
Wallisi, *Regel, Gartenfl.* (1879) 325.—N. Granat.

CARMELITA, C. Gay, ex DC. Prod. vii. 14 (1888) = Chaetanthera, Ruiz & Pav. (Compos.).
/ormosa, C. Gay, 1. c. 15~Chaet. villosa.

CARMENTA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 2 (Quidt).

CARMICHAELA, Reichb. Nom. 147 (1841) =seq.

CARMICHAEIiIA, R. Br. in Bot. Reg. *xiu* t. 912 (1825;. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. £ i. 502.
australis, *R. Br. I.* c—N. Zel.
compacta, *Petrie, in Trans. N. Z. Jnst.* xvii. (1885) 272.—N. Zel.
corrugata, *Colenso, 1. c.* xv. (1883) 320.—N. Zel.
crassicaulis, *Hook. /. Handb. New Zeal. Fl.* 48.—N. Zel.
Cunningiiamii, *Raoul, Choix,* 29.—N. Zel.
Enysii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 379. —N. Zel.
Exsul, *F. Muell. Fragm.* vii. 126.—Ins. Dom. Howe.
flagelliformis, *Colenso, in Hook./. Ft. N. Zel.* i. 51.— N. Zel.
gracilis, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 336. —N. Zel.
grandiflora, *Hook. /. Handb. New Zeal. Fl.* 49.—N. Zel.
juncea, *Colenso, ex Hook. /. Fl. N. Zel.* i. 51.—N. Zel.
Kirkii, *Hook./. Ic. PI.* t. 1332.—N. Zel.
Munroi, *Hook./. Handb. New Zeal. Fl.* 49.—N. Zel.
nana, *Colenso, ex Hook./. 1. c.* — N. Zel.
odorata, *Colenso, ex Hook./. Fl. N. Zel.* i. 50.—N. Zel.
pilosa, *Colenso, ex Hook./. I. c*—N. Zel.
stricta; *Lehm. in Ind. Hort. Bot. Hamb.* (1852) 8. —*Cf. Hamb. Garten:* viii. (1852) 372.—Hab.)

CAKMICHAEIiIA :—
uniflora, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884; 894.—N. Zel.
uniflora, *T. Kirk, in Gard. Chron.* (1884) I. 512; *Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 379.—N. Zel.
WillUmsi, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xii. (1880) 394.—N. Zel.

OABMINATIA, Moç. ex DC. Prod. vii. 267 (1838). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 243.
tenuiflora, *DC. 1. c.; et in Deless. Ic. Sel.* iv. t 98.— Mexic.
tenui/olia, Steud. Nom. ed. II. i. 299, sphalm. =- praec.

CARMONA, Cav. Ic. v. 22. t. 488 (1799)=Ehretia, Linn. (Borag.).
heterophylla, Cav. 1. c 23 = E. buxifolia.
lycioides, G. Don, Gen. Syst. iv. 391 - E . lycioides.
microphylla, G. Don, 1. c. = E. buxifolia.
viminea, G. Don, 1. c-Rhabdia lycioides.

CARMONEA, Pen. Syn. i. 290 (1805)=»praec,

CARMOREA, Steud. Nom. ed. II. i. 299 (1840) sphalm. —praec.

CABITABVONIA, F. Muell. Fragm. vi. 80. t. 55, 56 (1867). *PROTEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 182.
araliaefolia, *F. Muell. I. c.* 81.—Austral.

CAROLI-GMELINA, Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. Fl. Wett. ii. 419 (1800)=Nasturtiuin, R. Br. (Crucif.).
lanci/olia, Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. 1. c. 468- N. amphibium.
palustris, Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. 1. c. 470 -=N. amphibium.
sylvestris, Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. 1. c. 470 - N . sylvestre.

CAROLINEA, Linn. f. Suppl. 51 (1781) = Faohira, Aubl. (Malvac).
affinis. Mart. Nov. Gen. et Sp. L 85=P. affinis.
alba, Lodd. Bot. Cab. t. 752 = P. alba.
arenaria, G. Don, Gen. Syst. i. 510 = P. arenaria.
campestris, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 86=P. campestris.
emarginata, D. Dietr. Syn. PI. iv. 861 = P. emarginata.
/astuosa, Sesse, ex*DC. Prod. i. 478 = P. fastuosa.
grandiflora, Spach, Hist. Veg. Phan. iii. 426; xiv. 206-P. grandiflora.
insignis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 101 = P. insignis.
longiflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 86= P. longiflora.
macrantha, G. Don, Gen. Syst. i. 510=P. macrantha.
macrocarpa, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 423 = P. macrocarpa.
marginata, G. Don, Gen. Syst. i. 511-P. margiaata.
minor, Sims, Bot. Mag. t. 1412=P. minor.
pompalis, Mo;. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. i. 478-P. minor-*Princeps,* Linn. f. Suppl. 314 = P. aquatica.
robusta, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 299.—Am. austr.
tomentosa, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 84 = P. tomentosa.
villosa, Mart, ex Steud. Nom. ed. II. i. 800 = P. tomentosa.

CAROMBA, Steud. Nom. ed. II. L 300 (1840) sphalm." Cabomba, Aubl. (Nymph.).

CAROPYXIS, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 688 (1865) sphalm. = CALOPVXIS, TuL = Combretum, Linn.

CAROSELINUM, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 374 (1848) = Peuoedanum, Linn. (Umbellif.).
Chabraei, Griseb. 1. c.-P. carvifoliumT
distans, Griseb. 1. c.=Johrenia graeca.

CAROTA, Rupr. Scrt. Tiansch. 49; in Me-m. Acad. Pétersb. *Sir.* VII. xiv. (1869) - Daueus, Touro- (Umbellif.).
sativa, Rupr. Fl. Ingric 468 — D. Carota.
sylvestris, Rupr. Sert. Tiansch. 49 = D. Carota.

CAROXYLON, Thunb. Nov. Gen. ii. 37 (1782) = 8«J- sola, Linn. (Chenopod.).
acutifolium, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 178-S. Auricula.

CAROXYLON :—
articulatum, Moq.in DC. Prod.xiii. II. 175 = Haloxylon atticulatnm.
Auricula, Moq. 1. c. 172 = S. Auricula.
Bottae, Moq. in DC. 1. c. 178.—Afr. austr.
brevifolium, St. Lag. in Ann. Soc. BoL Lyon, vii. (1880) 121 = S. aphylla.
divaricatum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 177=S. loigifolia.
foetidum, Moq. 1. c. 178 = S. foetida.
glaueum, Moq. 1. c. 173 = S. glauca.
Griffithii, Moq. 1. c. 175 = Haloxylon Griffithii.
hispidulum, Bnnge, Lehm. Reliq. Bot. 298=S. hispidula.
imbricatum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 177 = S. gemmascens.
indicum, Wight, Ic. 1.1794 = Haloxylon recnrram.
lancifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 98 •= S. lancifolU.
nodulosum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 177 = S. gemmascens.
recurvum, Moq. 1. c. 175 — Haloxylon recnmim.
salicornicum, Moq. 1. c. 174 = Haloxylon salicornicum.
Sahola, Thunb. Diss. Med. Afric. 8 = S. aphylla.
subaphyllum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 17S=S. subaphylla.
tamariscifolium, Moq. 1. c. 174 = S. genistoides.
tamariscinum, Moq. 1. c -=S. tamariscina.
tetragonum, Moq. 1. c. 176 = S. tetragona.
tuberculatum, Moq. I. c. 178=S. tubercnlata.
verrucosum, Moq. 1. c.«=S. tuberculata.
Zeyheri, Moq. 1. c. 176.—Afr. auslr.

CARPACOCE. Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 32 (1864-65). *RUBIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 141.
LAGOTIS, £. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 197 (1843).
scabra, *Sond. 1. c.* 33.—Afr. anstr.
Spennacoce, *Sond. 1. c.*—Afr. austr.

CARPENTARIA, Becc. in Aon. Jard. Buitenz. ii. (1885)128. *PALMAE.*
acuminata, *Becc. I. e.*—Austral.

CARPENTERIA, Torr. in Smithson. Contrib. vi. 12. t. 7 (1854). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 643.
califomica, *Torr. I. c*—Calif.

CARPENTIERA, Stend. Norn. ed. II. i. 844 in syn. (1840) sphalm. = Charpentiera, Gaudich. (Amarant.).

CAHPE8IUM, Linn, in Act. Soc. Upsal. (1741) 80. *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 886.
CONVZOIDKS, Tourn. ex DC. Prod, vi 281 (1837).
abrotanoides. *Linn. Sp. PL* 860.—Europ.; As. temp,
cemuum, *Linn. I. c.* 859.—Europ.; As. temp.
ciliatum, Wall. Cat. n. 3214=cerauum.
divaricatum, *Sieb. V Zucc. in Abh. Aiad. Muench.* iv. m. (1846) 187.—Japon.
glossophyllum, *Maxim, in Bull. Acad. Pttersb.* xix. (1874) 476.—Japon.
macrocepbalum, *Franch.* b* *Sav. Enum. PL Jap.* ii. 408.—Japon.
nepalense, Less, in Linnaea, vi. (1881) 234 = cernuum
pedunculosum, Wall. Cat. n. 8200—cernunm.
pubescens, Wall. 1. c. n. 8199 = cemuum.
racemosum, Wall. 1. c. n. 3201-abrotanoides.
rosulatum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* it 179.—Japon.
scandens, SchnlL f. ex Miq. 1. c. 172 = Rhynchospermnm verticillatum.
Thunbergianum, *Sieb. tfZucc. in Abh. Aiad. Muench.* iv. HI. (1845) 187.—Japon.
tracheUfolium, *Less, in Linnaea,* vi. (1881) 238.—Reg. Himal.
tniste, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 479.—Japon.
Wulfenianum, Schreb. ex DC. Prod. vi. 282 = abrotanoides.

CARPEZIUM, Gouan, Fl. Monsp. 465 (1765)=praec

CARFHA, Banks *8c* Soland. ex R. Br. Prod. 280 (1810), pro parte. *CYPERACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 1061.
alpina, *R. Br. Prod.* 280.—Austral.; N. Zel.; Patag.
andina, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1878) 665 - paniculata.
arundinacea, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. 189. t. 30 = Schoenus arundinaceus.
Aubertii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 300=Cyclocampe Aubertei.
menaced, R. Br. Prod. 230 = Cyathochaete avenocea.
capensis, Martens, ex Steud. Nom. ed. II. i. 800 = Ecklonea capensis.
capitellata, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 266.—Afr. austr.
clandestine, R. Br. Prod. 231 = Cyathochaete clandestina.
deusta, R. Br. 1. c 230 = Mesomolaena drusta.
diandra, R. Br. 1. c. 281 = Cyathochaete diandra.
eUmgata, Boeck. 1. c. xxxviii. (1874) 273 = Asterochaeta elongata.
glomerata, Nees, 1. c. vii. (1882) 629=Asterochaete glomerata.
hexandra, Nees, I. c. ix. (1834) 300; x. (1835-86) 193 = Macrochaetium Dregei.
junciformis, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 267 = Cladium undnlatnm.
nivicola, F. Muell. in Trans. Phil. Soc Viet. i. (1866) 111= alpina.
paniculata, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1867-68) 80.—Chili.
schoenoides, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antaret. 382.1.148=alpina.
Schweinfurthiana, *Boeck. in Flora,* lxii. (1878) 669.—Afr. trap.
Urvilleana, Gaudich. ex Nees, in Linnaea, ix. (1884) 300 = Asterochaete arundinacea.

CARPHALEA, Juss. Gen. 198 (1789). *RUBIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 52.
angulata, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1878) 188.—Madag.
corymbosa, *Willd. Sp. PL* i. 588.—Madag.
Kirondron, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1878) 188.—Madag.
madagascariensis, Lam. Illustr. i. 258. t. 59 - corymbosa.
Pervilleana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1878) 188.—Madag.
pubiflora, Moc. *8c* Sesse, ex DC. Prod. iv. 365 - Bouvardia quatemifolia,

CARPHEPHORU8, Cass. in BulL Soc. Philom. (1816) 198. *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 249.
atriplicifolios, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 159.—Calif.
baicalensis, DC. Prod. v. 182 = Saussurea pyenecephala.
bellidifolius, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* ii. 66.—Am. bor.
coridifolius, DC. Prod. vii. 267=Brickellia pinifolia.
corymbosus, *Torr. If Gray, Fl. N. Am.* ii. 67.—Am. bor.
junceus, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 21.—Calif.
junceus, Durand, in Pacif. Rail. Rep. v. 8 = Linosyris squamata,
Pseudo-liatris, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1816)149.—Am. bor.
revolutifolins, *DC. Prod.* v. 183.—Mexic.
tomentosns, *Torr.* b* *Gray, Fl. N. Am.* ii. 66.—Am. bor.
triangularis, *A. Gray, PI. Wright,* i. 86.—Mexic.

CARPHOBOLUS, Schott, in Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 409 (1827) = Plptooarpha, R. Br. (Compos.).
asterotrichius, Sch. Bip. in Pollichia, xx.-xxi. (1863) 426 = P. Vauthieriana.
axillaris, Sch. Bip. 1. c. 417 = P. axillaris.
Blanchetianus, Sch. Bip. 1, c. 423=P. Lnndfona.
cinereus, Sch. Bip. 1. c. 419 = P. cinerea.
cuneifolius, Sch. Bip. 1. c. 413 = P. oblonga.
latifolius, Sch. Bip. 1. c. 426 = P. opaca.
Lechleri, Sc)i. Bip. 1. c. 428 » P. Lechleri.
lepidotus, Sch. Bip. 1. c. 414-P. oblonga.
leprosus, Sch. Bip. 1. c. 419-^ P. leprosa.
lucidus, Sch. Bip. 1. c 413-P. lucida.

CARPHOBOLUS :—
Lundianus, Sch. Bip. in Pollichia, xx.-xxi. (1863) 421 = Piptocarpha Lundiana.
macropodus, Sch. Bip. 1. c. 418 = P. macropoda.
neurophyllus, Sch. Bip. 1. c. 414-P. pyrifolia.
notatus, Sch. Bip. 1. c. 420-P. notata.
oblongus, Sch. Bip. 1. c. 416-P. oblonga.
opacus, Sch. Bip. 1. c. 427 = P. polycephala.
oxyphyllus, Sch. Bip. 1. c. 415=P. oxyphylla.
pelluddus, Sch. Bip. 1. c. 420=P. pellucida.
Poeppigianus, Sch. Bip. 1. c. 422 = P. Poeppigiana.
pyrifolius, Sch. Bip. 1. c. 415=P. pyrifolia.
ramiflorus, Sch. Bip. 1. c. 429 = P. ramiflora.
Regnellii, Sch. Bip. 1. c. 417 = P. axillaris.
Riedelii, Sch. Bip. 1. c. 426-P. Riedelii.
rotundifolius, Sch. Bip. L c. 424-P. rotundifolia.
Sellmii, Sch. Bip. 1. c. 421 - P. Sellowii.
semiserrulatus, Sch. Bip. I. c. 416 = P. axillaris,
sessiliflorus, Schott, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 409 = P. lucida.
tereticaulis, Sch. Bip. in Pollichia, xx.-xxi. (1863) 422 = P. tereticaulis.
umiellulatus, Schott, in Spreng. Syst, iv. Cur. Post. 409-P.umbellulata.

CAHPHOCHAETE, A. Gray, PI, Fendl. 65; in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849). *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 247.
Bigelovii, *A. Gray, PI. Wright,* i. 89.—N. Mexic,
Grahami, *A. Gray, I. c.*—Mexic.
Wislizeni, *A. Gray, PL Fendl.* 65.—Mexic.

CARPHOLOMA, D. Don, in Mem. Wem. Soc. v. (1826) 555=LaohnoBpermum, Willd. (Compos.).
rigidum, D. Don, 1. c. = L. ericaefolium.

CARPHOPAPPUS, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 954, 973 (1843) = Iphiona, Can. (Compos.).
baccharidi/olius, Sch. Bip. 1. c. 974 *• I. baccharidifolia.

CARPHOSTEPHIUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 62 (1826) = Trldax, Linn, (Compos.),
trifidum, Cass. 1. c. = T. trifida.

CARPIDOPTERIX, Kant. Fl. Colnmb. ii. 45. t. 198 (1862?)-ThOUlnla, Poit. (Sapindac).
macroptera, Karst. 1. c.-T. macroptera.

CABPIMXTS, Linn. Gen. ed. I. 292 (1787). *CUPULIFERAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 406.
CARFINUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
DISTEGOCARPUS, Sieb. *8c* Zncc. Fam. Nat, Fl. Jap. ii. 102. t. 3 (1846).
americana, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 201.—Am. bor.
Betulus, *Linn. Sp. PL* 998.—Europ.; Reg. Cauc. ; Persia.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 236 = americana.
CarpinitBa, Kit in Host, Fl. Austr. ii. 626-C. Betulus.
compressus, Gilib. Exercit. ii. 399=C. Betulus.
cordata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 309.—Japon.
duinensis, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 243. t. 60-orientalis.
edentulus, *Kit. in Rachel, PL Banat, Rar.* nomen.—Banat.
erosa, *Blume, Mus. Bot. Lugd, Bat.* 1. 308,—Japon.
faginea, *Lindl. in Wall. PL As. Rar.* ii. 5.—Reg. Himal.
intermedia, Wierzb. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xii. 4. t. 633 = C. Betulus.
italica, Scop, ex Steud. Nom. ed. II. i. 300-Ostrya carpinifolia.
japonica, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 308.—Japon.
laxinora, *Blume, 1. c.* 809.—Japon.
minor, *Pall. Reise,* ii. 95.—Tauria,
nervata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 141 = C. Betulus.
nigra, Moench, Verz. Ausl. Baeume, 19 = orientalis.
orientalis, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 8.—Europ. austr.
Ostrya, Linn. Sp. PI. 998 =Ostrya virginica.
ostryoides, Rafin. in Med. Repos. N. York, Ser. III. ii. (1811) 838-americana?
querci/olia, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. i. 300=C. Betulus.

CABPINTTS:—
sepium, Lam. Fl. Fr. ii. 212-C. Bénins.
triflora, Mocnch, Meth. 694 =Ostrya virginica.
Tscbonoskii, *Maxim. An Bull. Aead. Pttersb.* xxvii. (1881) 584.—Japon.
Tnrcuninovii, *Hance, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 203.—China.
ulmifolia, Salisb. Prod. 392 = C. Betnlus.
ulmoides, S. F. Gray, Nat. AIT. Brit PI. ii. 245=C. Bctulus.
viminea, *Wall, ex Lindl. in Wall. PI. As. Rar.* ii. 4. t. 106.—Keg. Himal.
virginiana, Michx. Hist. Arb. For. iii. 67- t. 8 = americana.
virginiana. Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 4; Lam. Encyc. i. 708 = Ostrya virginiana.
vulgaris, Mill. 1. c n. 1=»C. Betulns.
yedoënsis, *Maxim, in Bull. Acad. Pittrsb.* xxvii. (1881) 585.-Japon.

CARPIPHEA, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1888)~Cordia, Tourn. (Boragin.).
dentata, Rafin. 1. c.=Cordia dentata.

CARPOCALYMNA, Zipp. iu Alg. Konst en Letterbode, i.(182») 297=Epithema, Bliime (Gesnerac).
monophylla, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 831 = E. difformis.

CARPOCɆRAS,Link,Handb.ii. 289 (1881)=Thla»pi, Tourn. (Crucif.).
cappadocicum, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 19.—Cappadoc.
eilicieum, Boiss. & Kurz, ex Boiss. Fl. Orient, i. 332.—Cilicia.
Griffitkianum, Boiss. Diagn.Ser. II. i. 40=T. alpestre.
hastulatum, Boiss. 1. c. Ser. I. viii. 38 = T. hastulatum
oxyceras, Boiss. 1. c. 37 = T. oxyceras.
sibiricum, Link, Handb. ii. 289 =T. ceratocarpon.
stenocarpum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 88=T. stenocarpnm.

CARPOCERAS, A. Rich. Elem. Bot. (1846) 706 = Hartynia, Linn. (Pedalin.).
longiflora, A. Rich. 1. c. = M. diandra.

CARPODETɆS,Herb.App. 41 (1821)=Stenomesson, Herb. (Amaryllid.).
recurvata, Herb. 1. c.«S, recurvatnm.

CABPODETUS, Font. Char. Gen. S3. t. 17 (1776). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 646.
dentatus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 120-serratus.
Forsteri, Roem. & Schult. Syst. v. 604-serratus.
serratus, *Forst. Char. Gen.* 34.1.17 A.—N. Zel.

CAHPODINUS, R. Br. ex Sabine, in Trans. Hort. Soc. v. (1823) 455. *APOCYNACEAE*, Benth. *8c* Hook, f ii. 693.
acida, *Sabine, I. c.* 466.—Afr. trop.
dulcis, *Sabine, 1. c.* 465.—Afr. trop.

CABPODIPTEBA, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 163. *TIUACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 232.
africana, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 241.—Afr. trop.
Boivini, *Baill. Adansonia,* x. (1872) 180. —Ins. Comor.
cnbensis, *Griseb. in Mem. Am. Aead.* N. S. viii. (1861) 184.—Cuba.
Schomburgkii, *Baill. Adansonia,* x. (1872) 181.—Guiana.

CARPODON, Spreng. Syst. ii. 634 (1823)=«q.

CARPODONTOS, Labill. Voy. ii. 16. t 18 (1798) = Euoryphia, Cav. (Rosac).
lueida, Labill. 1. c.-E. Billardieri.

CABPOLOBIA, G. Don, Gen. Syst. i. 370 (1831), partim. *POLYGALEAE*, Benth. *8c* Hook. f. L 139, 553.
Afzcliana, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 136.—Afr. trop.
alba, *G. Don, Gen. Syst.* i. 370.—Afr. trop.
dubia, G. Don, 1. c. - Baphia polygalacea.
Intea, *G. Don, I. c*—Afr. trop.
versicolor, G. Don, 1. c. = Baphia niŕJda.

CARPOLIZA, Stend. Nom. ed. II. i. 300 (1840) = seq.

CABPOZiTZA, Salisb. Parad. Lond. t 68 (1807). *AMARYLUDEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 721.
HESSEA, Berg, « Schlecht in Linnaea, i. (1826) 252, non Herb.
spiralis, *Salisb. Parad. Land.* t. 68.—Afr. anstr.
stellar is, Heynh. Nom. ii. 122 = Hessea stellaris. *Herb.*

CARPONEMA, Eckl. & Zeyh. Enum. 8 (1885). *CRUCIFERAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 102.
aggregata, Eckl. *8c* Zeyh. I. c. = Heliophila gracilis.
filifonnis, *Eckl. If Zeyh. 1. c*—Afr. austr.

CARPOPHILLUS, Neck. Elem. ii. 84 (1790) = Pereskla, Plum.? (Cacteae).

CARPOPHORA, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 139. t. 32 (1862) - Bllene, Linn. (Caryophyll.).
Hoffmeisierii, Klotzsch, 1. c = S. GriffithiL

CARPOPHVLLUM, Miq. Fl. Ind. BaL Suppl. i. 401 (I860) =• Stereulla, Linn.
maeropodum, Miq. 1. c—Sumatra.

CARPOPHYLLUM, Neck. Elem. iii. 402, 411 (1790) = CAKPOPHILLUS, Neck.

CARPOPODIUM, Eckl. *8c* Zeyh. Ennm. 1.13 (1836) = Heliophila, Linn. (Crucif.).
carnosum, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c. = H. carnosa.
cleomoides, Eckl. & Zeyh. 1. c = H. glauca.
Thunbergii, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c - H . Thnnbergii.

CARPOPOGON, Roxb. Hort. Beng. 54 (1814); Fl. Ind. iii. 268 (1832)-Mucuna, Adans. (Legumin.).
anguineum, Roxb. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit Ind. ii. 185 ^M. monosperma.
alropurpureum, Roxb. Hort. Beng. 64; Fl. Ind. iii. 287 "M. atropurpurea.
bracteatum, Roxb. Hort. Beng. 64 -M. bincteata.
capitatum, Roxb. 1. c. [98]; Fl. Ind. iii. 284 -.M. capitata.
giganteum, Roxb. 11. cc. 54, 287=M. gigantea.
imbrieatum, Roxb. Hort. Beng. 64 = M. imbricate.
monospermum, Roxb. 1. c.; Fl. Ind. iii. 283 =M. monosperma.
niveum, Roxb. 11. cc. 54, 285=M. nivea.
pruriens, Roxb. 11. cc. 64, 283 = M. prurient.
volubilis, Roxb. ex Stend. Nom. ed. II. i. 300 = M. volubilis.

CARPOTHALIS, E. Mey. In Drige, Zwei Pfl. Docnm. 170 (1848)=Xraussia, Harv. (Rubiac).
lanceolata, E. Mcy. 1. c. = K. lanceolata.

CARPOTRICHE, Reichb. Nom. 189 (1841) -seq.

CARPOTROCHE, Endl. Gen. 918 (1839). *B1XINEAE*, Benth. *8c*. Hook. f. i. 126.
brasiliensis, *Endl. I. e.*—Bras,
denticulata, *Benth. in Hoot. Journ. Bot.* Iv. (1842) 115.—Guiana,
grandiflora, *Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 487.—Bras,
laxiflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 114. —Guiana.
longifolia, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* Ii. (1861) 82.—Bras.; Peruv.
paludosa. *Benth. in Hook. Journ. Bot.iv.* (1842) 114. —Guiana.

CARPOXIS, Rafin. New Fl. Am. iii. 89 (1836) = Forestiera, Poir. (Oleac).
inermis, Rafin. 1. c. 92.—Am. bor.
nitida, Rafin. 1. c. 91-F. acuminata.
prinoidfs, Rafin. 1. c. 92-F. prinoides.
retusa, Rafin. 1. c. - F. rrtusa.
spinosa, Rafin. 1. c.—Am. bor.

CARPOXYLON, H. Wendl. *8c* Dnide, in Kerch. Palm. 238 (1878), nomen. *PAUtAE*.
uiacrospermum, *H. Wendl. V Drude, I. c*—Hab. ?

CARPUNYA, PresL, Epim. Bot. 228 (1849) = Piper, Linn.
Lessertiana, Presl, 1. c 229 = P. Carpunya.
oblongata, Presl, 1. c.=P. oblongatum.
peruviana, Presl, 1. c = P . Carpunya.

CARPUPICA, Rafin. Sylva Tellur. 85 (1838) - Piper. Linn.
odorata, Rafin. 1. c. = P. Carpunya.

CARRADORIA, A. DC. Prod. xii. 610 (1848) = GrlobUl&ria, Linn. (Selagin.).
incanescens, A. DC. 1. c. = G. incanescens.

CARREGNOA, Boiss. Voy. Bot Espagne, ii. 605 (1843) = TapeinanthuB, Herb. (AmaryUid.).
dubia, Perez-Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist Nat. xi. (U82) 399 - Narcissus serotinus ?
humilis, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Ser. IV. x. (1868) 98 = T. humihs.
lutea, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 605=T. humilis.

CARRIA, Gardn. in Calc. Jonm. Nat. Hist. vii. (1847) 6 = Gordonia, Ellis (Ternstroem.).
speeiosa, Gardn. 1. c. 7=G. speciosa.

CABBICHTERA, Adans. Fam. U. 421 (1763); DC. Syst Veg. ii. 641. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook, f. i. 86.
Vella, *DC. I. c.* 642.-Hitpan.

CARROA, Presl, Symb. Bot. ii. 26 (1868) =Daloa, Linn. (Legumin.).
diffusa, Presl, 1. c =D. diffusa.
grandulosa, Presl, 1. c. = D. diflusa.

CABBONIA, F. Muell. Fragm. ix. 171 (1875). *MENISPERMACEAE*.
multisepalea, *F. Muell. I. c.*—Austral.

CARRUTHER8IA, Seem. Fl. Vit. 155. t. SO (1865-73). *APOCYNACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 718.
pilosa, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 132.—Ins. Philipp.
scandens, *Seem. Fl. Vit.* 156. t. 30.—Ins. Fiji.

CARTALINIA, Szov.ex Kunth, Enum. PI. v. 119 (1850) -Paris, Rupp. (Liliac.).

CARTERETIA, A. Rich. Sert. Astrol. 10. t. 4 (1884) •* Doritis, Lindl. (Orchid.).
paniculata, A. Rich. 1. c.-=D. panicnlata.

CARTESIA, Cass. in Bull. Soc. PhUom. (1816) 198 =• Stokesia, L'Hirit. (Compos.).
centauroides, Cass. 1. c. = S. cyanea.

CABTHAMUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 488.
DURANDOA, Pomel, Mat. Fl. Atl. 2 (1860).
HERACANTHA, [Hoffmgg. 8c] Link, Fl. Port. ii. 206 (182(1).
HETERACANTHA, Steud. Nom. ed. II. i. 756 (1840).
HOHENWARTHA, Vest, in Flora, iii. (1820) 1.
KENTROPHYLLUM, Neck. Elem. i. 86 (1790).
ONOBROMA, DC. Prod. vi. 613 (1837).
PHONUS, Hill. Veg. Syst. iv. 6 (1762).
acaulis, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 800=Cardoocellus pectinatus.
africanus, Lam. Encyc. i. 640 = Berckheya grandiflora.
albus, *Desf. Tabl.* ed. I. 92.—Oriens.
araneosus, Sch. Bip. in Webb *8c* Berth. Phyt. Canar. »• 863 = Carduncellus araneosus.
arborescens, *Linn. Sp. PI.* 831.—Hi'pan.
armenus, Willd. Enum. Hort. Berol. 845 - flavescens-
baeticus, Nym. Consp. 419 = lanalus.
brasiliensis, *Veil. Fl. Flum.* 342; viii. t 77.—Bros.
caeruleus, Linn. Sp. PI. 830 = Carduncellus caenileH*-
cancellatus. Lam. H Fr. ii. 10~Atractylis.cancellaU.
canescens, Lam. 1. c. = Cnicus Acarna.
canefcens, *[Soland. in] Russell, Aleppo*, ed. II. ii. 2[ez] —Aleppo.
Carduncellus, Linn. Sp. PI. 831 = Carduncellus monspeliensium.
carolinianus, Walt. Fl. Carol. 194 = ElephantopW caroliDtanuft

CABTHAMUS:—
corymbosus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1164 •> Cardopatium corymbosum.
creticus, Linn. 1. c. 1163 =lanatus.
cretims, Nym. Consp. 410 = glutens.
cyaneus, Banks, ex Steud. Norn. ed. II. i. 800=Stokesia cyanea.
cynaroides, Bieb. Tabl. Casp. 195 = Consinia cynaroidea.
dentatns, *Vahl, Symb. Bot.* i. 69.—As. Min.
dianius, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 363 >= Carduncellus caeraleus.
elatus, *Nym. Consp.* 419.—Italia.
ferox, Lam. Fl. Fr. ii. 11 =Cnicu» ferox.
flavescens, *Willd. Sp. PI.* iii. 1706.—As. Min.; Syria.
fluminensis, *Veil. Fl. Flum.* 842; viii. t. 78.—Bras,
glaber, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 23.—Afr. austr.
glaucus, *Bieb. Fl. Taur. Caw.* ii. 284.—Aegypt; As. Min.; Persia.
gummiferus, Lam. Encyc. i. 639—Atractylis gummifera.
helenioides, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 258. t. 230.—Algeria.
hircinus. Lag: ex Spreng. Syst. iii. 891 = arborescens.
hispanicus, Sch. Bip. in Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. ii. 363=Carduncellus caeruleus.
humilis, Lam. Encyc. i. 688 = Cardnncellns pinnatns.
integrifolius, Hort. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 844 = Carlinasalicifolia.
involueratus, Lam. Fl. Fr. ii. 12 = Cnicus spinosis* simus.
laevis, Hill, Hort. Kew. 57 = Stokesia cyanea.
lanatus, *Linn. Sp. PI.* 880.—Europ.; Oriens.
leucocaulos, *Sibth. b" Sm. Fl. Grace,* t. 842.—Archip. Grace
linearifolius, *Molina, Sagg. Chile,* ed. II. **294.—** Chill
maculatus. Lam. Encyc. i. 6S8=Silybum Marianum.
magellaiiicus, *Lam. 1. c.* 640.—Reg. Magellan,
mareoticus, *Delile, Fl. Egypte,* 276.—Aegypt.
mitissimus, Linn. Sp. PI. 831—Cardunceilus mitissimus.
multifidus, Desf. Fl. Atlant. ii. 256=Cardnncellns caeruleus.
nitulus, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 708.—Syria.
Oxyacantha, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 283.—Reg. Caucas.; As. occ.
Pectinatus. Desf. Fl. AtlanL ii. 257 = Carduncellus pectinatus.
persicus, Desf. ex Willd. Sp. PI. iii. 1707 = flavescens.
persicus, Willd. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 708 «= leucocaulos.
pinnatus, Cutand. Fl. Madrit. 412 «= Cardnncellns monspeliensium.
pinnatus, Desf. Fl. Atlant. ii. 258 - Carduncellus pimialus.
polyacantha, *Bieb. Tabl. Casp.* 68.—Transcauc
pterocaulos, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 67-Cousinia Hystrix.
ngidus, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 28.—Afr. austr.
rigidus, Willd. Enum. Hort. Berol. 845 = arborescens.
salicifolius, Linn. f. Snppl. 350 = Carlina salidfolia.
taurieus, Bieb. M. Taur. Cauc. ii. 285=lanatus.
Teneriffae, ***J. F. Gmel. ex Steud. Norn.*** **ed. I. 164.** —Ins. Teneriffn.
tinctorius, *Linn. Sp. PI.* 880.—Geront. cult.
tingitanus, Linn. 1. c. ed. II. 1163=Carduncellus caeruleus.
tomentosus, J. F. Gmel. Syst. 1621. Index (quid?;,
turbinatus, *Nym. Consp.* 419.—Sicilia.

<-"ARTODIUM, Soland. ex R. Br. in Trans. Linn. Sot "ii. (1817) 106 = Craspedia, Forst. f. (Compos.).

CARTONEMA, R. Br. Prod. 271 (1810). *COMMELINACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 852.
brachyantherum, *Benth. Fl. Austral,* vii. 92.—Austral.
Parviflorum, *Hassk. in Flora,* Iii. (186'J) 865.—Austial.
PMydroides, F. Muell. Fragm. i. 62-spicatum.
sP»catum, *R. Br. Prod.* 271.—Austral.
sptcatum, F. Muell. Fragm. i. 62=parviflorum.
wnue, ***Cornel, in Nuov. Giorn. Bot. xi.*** **(1879) 216.—** Austral.
trigonospermum, ***C. 3. Clarke, in DC. Monog. Pkan. iii.*** 264.-Austral.

CARTREMA. Kafin. Sylva Tellur. 184 (1838) - Os. **manthus,** Lour. (Oleac).
amerieana, Rafin. 1. c = O. americanus.

CARUELIA, Parl. Nuov. Gen. e Spec. 21 (1854) = Ornithogalum, Tourn. (Uliac).
arabica, Parl. 1. c. 22 «- O. arabicum.

CARTTM, Rup. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *VMBELLI FERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 890.
ANISACTIS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 847 (1867).
ATAENIA, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 849 (1840).
BuLBOCASTANim, Schur, Enum. PI. Trans*. 249 (1866).
BUNIUM, Linn. Gen. ed. I. 72 (1737).
CHAMAREA, Eckl. & Zeyh. Enum. iii. 846 (1837).
EDOSMIA, Nutt. in Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 612 (1840).
ELWENDIA, Boiss. in Aon. Sc Nat ***Sir.*** III. i. (1844) 140.
FRORIEPIA, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 362.
GEOCARVUM, COSS. *SC* Dur. PI. Nouv. et Crit Esp. 112(185U
HLASNIKIA, Reichb. Ic. PI. Crit ix. 9 (1831); et Fl. Germ. Excurs. 476 (1882).
HuETIA, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 103 (1856).
PKTROSELINUM, Hoffm. Umb. i. 78 (ISM).
PHVMATIS, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 211 (1843).
PTYCHOTIS, Koch, in Nov. Act Nat Cur. xii. I. (1824) 124.
RIDOLFIA, Moris, Ind. Sem. Hort Taur. (1841); Fl. Sard. ii. 212 (1842).
SBLINOPSIS, COSS. AC Dur. ex Munby, Cat. PI. Alg. ed. II. 13 (,1859), nomen.
SVMPODIUM, C. Koch, in Linnnea, xvi. (1842) 356.
TKACHYSPERMUM, Link, Knum. Hort. Berol. i. 267 (U21).
TRACIIYSSIADIUM, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum.341 (1837).
WYDLERIA, DC. Coll. Mem. v. 36 (182!)).
ZIZIA, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (1824) 128.
Ajowan, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 891 = coptienm.
allioides, *Franeh. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xvi. (1883) 294.—Turkest.
alpinum, *Benth. & Hook. f. Gen.* i. 891.—Europ.; Persia. *
ventnoiies, Benth. **b[1]** ***Hook. f.1. c.*** **892.—Reg. Mediterr.**
ancthifolium, *Benth. V Hook. f. 1. c.* 891.—Keg. Hirnal.
Anisum, Baill. Hist. PI. vii. 119, 178 = Pimpinella Anisum.
apiculatum, ***Kar.*** **b*** ***Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xv.** (1842) 358.—As. centr.
armenum, ***Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.*** **III. i. (1844)** 137.—Reg. Caucas.
aromaticum, Salisb. Prod. 168 - C. Carvi.
atrosanguineum, ***Kar.*** **b*** ***Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** xv. (184-2) 359.—As. centr.
avromanum, ***Boiss.*** **b*** ***Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,*** **ii.** 888.—Persia.
aureum, Benth. *Sc* Hook, £ Gen. i. 891 = Thaspium aureum.
Bourgaei, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 885.—As. Min.
brachycarpum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 23«ferulaefolium.
Bulbocastanum, ***Koch, in Nov. Act. Nat. Cur.*** **xii. I.** (1824) 121.—Europ.; As. bor.
Bunius, *Linn. Syst. Nat.* ed. XII. 733.—Europ.
bupleuroides, ***Schrenk, ex Fisch. V Mry. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.*** **iii (1845) 305.—Soongar.**
buriactlcum, ***Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xvii.** (1844) 713.—Sibir. baical.
calcicolum, ***Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.*** **xi.** (1882) 514.—Ins. Socotra.
capense, ***Sand, in Han. V Sond. Fl. Cap.*** **ii. 538.—** Afr. austr.
Capusi, *Franeh. in Ann. Sc. Nat.* Sir. VI. xvi. (1E83) 293.—Turkestan.
Carvi, *Linn. Sp. PI.* 263,-Europ.; Oriens; As hor.
carvifolium, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 8921—Afr. austr.
caucasicnm, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 880.—Reg. Caucas.
chacrophylloides, ***Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.*** v. (1877) 5h5.—Turkest.
copticum, *Benth. if Hook. f. Gen. i.* 891.—Europ.; Afr. bor.; As. bor.
cordatum, Benlh. *Sc* Hook. f. 1. c. 891, 913 = Thaspium trifoliatum.

CARUM:—
cornigerum, ***Beits. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,*** **li** 887.—Kurdistan.
creticum, ***Benth. br Hook./. Gen. i.*** **891.-Creta.**
cylindricum, *Boiss. &• Haussk. Diagn.* Ser. I. x. 23.—Persia; Belucbist.
daucoides, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. i. (1844) 139.—Macedon.j Lydia.
decussatum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 37 = C. Carvi
dichotomum, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 891.—Reg. Mediterr. occ.
didymum, *Benth. V Hook./. I. c*—Afr. austr.
dissectum, Baill. Hist. PI. vii. 179 = Pimpinella magna.
divaricatum, Koch, Syn. Fl. Germ. 815= ferulaefolium,
divergens, *Boiss. <f Huet, Diagn.* Ser. IL ii. 80.—Armenia,
diversifolium, ***C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.*** ii. 681.—Reg. Himal.
elegans, ***Fentl, Pugill. PI. Nov. Syr.*** **16.—Orient.**
Elvendia, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 888.—Persia.
Faicaria, ***Lange, in Willk.*** **b"** ***Lange, Prod. Fl. Hisp.*** iii. 92.—Hispan.
falcarioides, Boiss. *Sc* Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 96=elegans.
Falconeri, ***C. B. Clarke, in Hook. Fl. Brit. Ind.*** **ii. 683.** —Reg. Himal.
ferulaefolium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 22.—Reg. Mediterr. or.
flexuosum, Fries, Summa Vcg. Scand. 24,180-Conopodium denudatum.
flexuosum, *Nym. Consp.* 807.—Italia.
Gairdneri, ***A. Gray, in Proc. Am. Acad.*** **vii. (1868)** 344.—Am. bor. occ.
gracile, ***Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal.*** **232.—** Ind. or.
graecum, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. I. vi. 68.—Graecia; Serbia.
Hallii, 5. ***Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.*** **416.—** Calif.
Hcldreichii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 78.—Graecia.
heterophyllum, ***Regel <S Schmalh. in Act. Hort. Petrop.*** v. (1877) 586.—As. temp,
hispanicum, *Mill. Card. Did.* ed. VIII. n. 2.—Hispan.
hispidum, *Benth. V Hook./. Gen. i.* 891.—Afr. austr.
Huetii, Boiss. Dia^n. Ser. II. ii. HI -Bourgaei.
humile, Boiss. *Sc* Bal. ex Boiss. Fl. Orient, il. 881-caucasicum.
incrassatum, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 2S9, 731,—Hispan.
indicum, ***Regel*** **b*** ***Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** xxxix. (1666) II. 72.—Soongaria.
inodonim, ***Sin. in Pall. N. Nord. Beitr.*** **vii. 229.—** Rossia.
intermedium, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 892 -• inundatum.
iniindatum, *Lespin. in Act. Soc. Bord.* xiv. (1845) 270. —Kurop.
involueratum, Baill. Hist. PI. vii. 179 - Roxburghianum.
Kelloggii, ***A. Gray, in Proc. Am. Acad.*** **vii. (1868)** 344.—Calif,
khasiantim, ***C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.*** ii. 682— *Reg.* Himal.
latifolium, *Benth.* b* *Hook. f. Grn.* i. 892. - Europ.
leiicocoh·on, *Boiss.* b[1] *Huet, Diagn.* Ser. II. ii. 80.—Armenia.
Iomatocarum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 879.—Reg. Caucas.
lutescens, Turcz. ex Walp. Rep. v. 866 (= *Cnidium* ***multicaule).*** **—Sibir.**
macrouarpum, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 891.—Graecia.
Mncuci, ***Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*** **(1865) 81.** —Hispan.
magnum, Baill. Hist. PI. vii. 178 -= Pimpinella magna.
mauritanicum, *Boiss. V Rent. Pugill.* (Ib52) 49.—Afr. bor. oec
meifolium, Boiss. Fl. Orient, ii. 880-armenum.
Meum, Stokes, Bot. Mat Med. ii. 138 = Meum athamanticum.
microcarpum, ***Boiss. in Ann. Sc Nat. Sir.*** **III. i.** (1844) 137.-Lydia.
multiflorum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 882,—Graecia; As. Min.
neurophyllum, ***French, (f Sav. Enum. PI. Jap.*** **i. 180. —Japon.**
nigrum, **Baill. Hist PI. vii. 178-Pimpinella Saxifraga.**

CABUM:—
nivale, ***Lange, in Kjoeb. Vidensi. Meddel.*** **(1865) 34.**—Hispan.
Noeanum, Boiss. Dingn. Ser. II. ii. 77-elcgans.
nothnm, ***C. B. Clarke, in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.*** **ii.** 681.—Zeylan.?
offidnale, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 515 = C. Carvi.
oregannm, ***5. Wats, in Proc. Am. Acad.*** **xx. (1885)** 868.—Am. bor. occ.
Panatjan, Baill. Hist. Fl. vii. 178 •= Pimpinella Panatjan.
Pansil, *Griseb. in Goett. Abh* xxiv. (1879) 146.—Reg. Argent.
paudfolium, DC. Prod. iv. U7=elegans.
peregrinum, ***Linn. Diss. Dem. PI. in Antoen. Acad.*** iii. 406.—Perav. ?
persicum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. i. (1844) 138.—Persia.
Pestalozzae, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 886.—Persia; Beluchist.
Petroselinum, *Benth. tf Hook.f. Gen.* i. 891.—Ceront. cult
pimpinelloides, ***Balf. f. in Proc. Soy. Soc. Edinb.*** **xi.** (1882) 514.—Ins. Socotra.
Podagraria, Roth, Enum. PI. Phan. Germ. i. 946 = Aegopodium Podagraria.
polyphyllum, ***Boiss. tf Bal. ex Boiss. Fl. Orient,*** **ii.** 881.—Syria.
purpurascens, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 411 = elegans.
rectangulum, ***Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,*** **ii.** 884.—Persia.
Ridolfia, *Benth. tf Hook. f. Gen.* i. 891.—Reg. Mediterr.; Oriens.
rigidulum, *Koch, in DC. Prod.* iv. 115.—Italia.
rigidum, Stcud. Nom. ed. II. i. 801 = rigidulum.
Roxburghianum, *Benth. tf Hook.f. Gen.* i. 891.—Ind. or.; Malaya,
rupestre, *Beits, tf Heldr. Diagn.* Ser. II. ii. 79.—Graecia.
Saxifrage, Baill. Hist. PI. vii. 178 = Pimpinella Saxifraga.
Saxifraga, Benth. & Hook. f. Gen. i. 892 - C. Bunios.
Kgetum, ***Benth. tf Hook.f. 1. c*—Europ.**
setaccum, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 61.—Soongaria.
Sewerzowi, ***Regel, in Act. Hort. Petrop.*** **v. (1877) 587,** 588.—Turkestan.
simplex, Steph. ex Willd. Sp. PI. i. 1470 = Seseli annuum.
Sisarum, Baill. Hist. PI. vii. 179-Sl'um Sisarum.
stictocarpum, ***C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.*** ii. 681.—Ind. or.
strictum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 887.—Macedon.
sulcatum, Steud. Nom. ed. I. 164, 49 -Selinum Carvifolia.
sylvestre, *Baill. Hist. PI.* vii. 179.—Ind. or.
Tanakae, ***Franch. tf Sav. Enum. PI. Jap.*** **ii. 371.—**Japon.
tenuifolium, *Benth. tf Hook.f. Gen-* i. 891.—Hispan.; Marocco.
Thorei, Benth. *k* Hook. f. 1. c. 888, in obs. ^inundatnm.
trichophyllum,.ScAnrB*>£'nw»t./7../V0D.61.—Soongaria.
verticillatum, ***Koch, in Nov. Act. Nat. Cur.*** **xii. I.** (1824) 122.—Europ.

CARUMBIUM, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 411 (1877) - Sapium, P. Br. (Kuphorb.).
baccatum, Kurz, 1. c. 412-S. baccatum.
insigne, Kurz, 1. c.—Burma.
sebiferum, Kurz, 1. c. = S. sebiferum.

CARUMBIUM, Reinw. Elench. Sem. Hort. Leid. ex Isis (1828) 319; et in Syll. Katisb. ii. (1828) 6 - Homalanthus, A. Juss. (Euphorb.).
acuminatum, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1144.—Ins. Pacif.
amboinicum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 418.—Malaya.
fastuosum, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1144 = H. fastnosus.
giganteum, Muell. Arg. ex Miq. Fl. Ind. Bat i. II. 687 — H. giganteus.
Moerenhoutianum, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1146.—Ins. Pacif.
nutans, Muell. Arg. 1. c. = H. nutans.
pallidum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 85 =- H. Leschenaultianus.
pedicellatum, Miq. Kl. Ind. Bat. i. II. 414 "H. pedicellatus.

CARUMBIUM :—
platyneuron, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1145 = Hoinalanthus Leschenaultianus.
polyandrum, Hook. f. Handb. New Zeal. Fl. 248.—N.Zel.
populifolium, Reinw. in Blame, Cat. Hort. Buitenz. 105 = H. Leschenaultianus.
populneum, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. H. 1144° praec.
Sieberi, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 86 = H. Leschenaultianus.
stillingiaefolium, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 325 = H. stillingiaefolius.

CARUNCULARIA, Haw. Syn. PI. Succ 883 (1812) = Stapelia, Linn. (Asclepiad.).
aperta, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 859 ^ S. aperta.
Jacquini, Sweet, 1. c. = S. pedunculata.
Massoni, Sweet, I. c = S. pedunculata.
pedunculata, Haw. Syn. PI. Succ. 384 = S. pedunculata.
penduliflora, Sweet, Hort. Brit. cd. II. 359 = S. penduliflora.
serrata. Decne. in DC. Prod. viii. 658, sphalm.=seq.
serrulata, G. Don, Gen. Syst. iv. 122 - Piaranthus serrulatus.
Simsii, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 368=S. pedunculata.

CARVI, [Toum.] Bemh. Syst. Vera. Erf. 114 (1800)- Selinum, Tonrn. (Umbellif.).
sulcatum, Bernh. 1. c. 169 ~ 8. Carvifolia.

CARVIFOLIA, C. Bauh. ex Vill. Hist PI. Dauph. ii. 629 (1787) = Selinum, Tourn. (Umbellif.).

CAHTA, Nntt, Gen. Am. ii. 220 (1818). *JUGLANDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 398.
HICOKIUS, Rafin. Fl. Ludov. 109 (1817).
SCORIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 852, nomen prius.
alba, *Nutt. 1. c.* 221.—Am. bor.
amara, *Nutt. 1. c.* 222.—Am. bor.
angustifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.97 - olivaeformis.
aquatica, *Nutt. Gen. Am.* ii. 222.—Am. bor.
compressa, G. Don, in Loud. Hort. Brit 884- alba.
cordiformis, C. Koch, Dendrol. i. 597 -sulcata.
glabra, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 97 =porcina.
illinofnsis, C. Koch, Dendrol. i. 598 •= olivaeformis.
integrifolia, *Spreng. Syst.* iii. 849.—Louisian.
laciniosa. Loud. Hort Brit. 884, nomen-sulcata.
mexicana, ***Engelm. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.*** iii. 162.—Mexic.
microcarpa, *Nutt. Gen. Am.* ii. 221.—Am. bor.
myristicaeformis, *Nutt. I. c.* 222.—Am. bor.
obcordata, Sweet, Hort. Brit ed. I. 97-pordna.
olivaeformis, *Nutt. Gen. Am.* ii. 221.—Am. bor.
ovata, C. Koch, Dendrol. i. 598-alba,
porcina, *Nutt. Gen. Am.* ii. 222.—Am. bor.
pubescens, Sweet, Hort. Brit ed. I. 97 = sulcata.
sulcata, *Nutt. Gen. Am.* ii. 221.—Am. bor.
tetraptera, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1850) 80—olivaeformis.
texnna, *C. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xviii. (1862) 34.—Texas,
tomentosa, *Nutt. Gen. Am.* ii. 221.—Am. bor.

CARYOCAR, Linn. Mant. ii. 247. n. 1314 (1771). *TERNSTROEMIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 180.
ACANTACARYX, Arruda, ex Koster, Trav. Braz. 491 (1816).
BAROLLAEA, Neck. Elem. ii. 822 (1790).
PEKEA, Aubl. PI. Gui. 594 (1775).
RHIZOBULUS. Gaertn. ex Schreb. Gen. 369 (1789); et Kruct. ii. 93. t. 98 (1791).
SAOUARI, Aubl. PI. Gni. 599 (1775).
amygdaliferum, *Cav. Ic.* iv. 87. tt. 361,862.—N. Granat
amygdaliforme, *Ruiz tf Pav. &. Per.* v. t. 570.—Peruv.
barbinerve, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 802.—Bras,
brasiliense, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 322.—Bras,
butyrosum, *Willd. Sp. PI.* ii. 1243.—Guiana,
edule, ***Casar. Decad. Nov. Stirp. Bras.*** **viii. 67—**Bras.
glabrum, *Pers. Syn.* ii. 84.—Guiana,
nucifemm, *Linn. Mant.* ii. 247.—Guiana,
tomentosum, *Willd. Sp. PI.* ii. 1244.—Guiana.
tuberculosum, Baill. Hist PI. iv. 251 = tomentosum.
villosum, *Pers. Syn.* ii. 84.—Guiana.

CARYOCHLOA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 22 (1827) - Oryzopeia, Michx. (Gramin.).
chilensis, Spreng. ex Trin. in Mém. Acad. Pe'tenb. Sér. VI. iii. II. (1835) 123 *(=Stipa Caryochloa).*
montevidensis, Spreng. Syst iv. Car. Post. 80 *(=Stipa setifolia).*—Reg. Argent
refracta, Spreng. ex Trin. in Mém. Acad. Petersb. Sir. VI. iii. II. (lt>35) 124 *(*-Stipa Caryochloa).*

CARYOCHLOA, Trin. Gram. Panic. Diss. ii. 54 (1826) - Luaiola, Juss. (Gramin.\
bahiensis, Steud. Syn. PI. Gram. 5.—Bras.
brasiliensis, Trin. ex Nees, Agrost. Bras. 299.—Bras.
caudata, Trin. ex Stead. Nom. ed. II. i. 301.—Bras.

CARYOCOCCA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. Mant. 131 (1827) = Gon*alea, Pers. (Kubiac).
dependens, Willd. ex Roem. & Schult. 1. c. = G. pendula.
multiflora, Willd. ex Roem. & Schult. 1. c. 132 - G. pendula.

CARYODAPHNE, Blame, ex Nees, Syst. Laurin. 225 (1886)-Cryptoearya, R. Br. (Laurin.).
australis, A. Br. Ind. Sem. Hort. BeYol. (1851) App. 18-Crypt, australis.
Browniana, Nees, Syst Laurin. 230 — Crypt, triplinervis.
costata, Miq. in Zoll. Syst Verz. Ind. Archip. 113, 115 = Crypt costata.
densifiora, Blume, ex Nees, Syst. Laurin. 228 - Crypt. densiflora.
laevigata, Blume, 1. c. 227 = Crypt, laevigata.

CARYODENDBON, Karat FL Colomb. i. 91. t. 4li (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 314.
CENTRODISCUS, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. n. 325. t. 102 (1874).
orinocense, *Karst. 1. c.*—N. Granat.

CARYOLOBIS, Gaertn. Fruct. i. 215. t. 45 (1788)- Doona, Thw. (Dipteroc).
indica, Gaertn. 1. c. - D. cordifolial

CARYOLOBIUM, Stev. in Bull. Soc. Nat Mosc. iv. (1832) 266-Astragalus, Toum. (Legumin.).
macrocarpos, Stev. 1. c. - A. macrocarpus.

CARYOLOPHA, Fisch. *Sc* Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 31 (1837)=Anohusa, Linn. (Boragin.).
sempervirens, Filch. *Sc* Trautv. 1. c. = A. sempervirens.

CARYOPHYLLATA, Tonni. ex Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 364 (1772) - Geum, Toum. (Rosac).
alba, Moench, Meth. 660 = G. album.
aquatica, Lam. Fl. Fr. iii. 123-G. rivale.
kamtchatica, Lam. Encyc. i. 400-G. anemonoides.
montana, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 365 - G. montanum.
nutans, Lam. Encyc. i. 399 = G. nutans.
nutans, Moench, Meth. 861 - G. rivale.
obliqua, Moench, 1. c. Suppl. 280 = G. obliquum.
officinalis, Moench, Meth. 600 = G. urbanum.
potentilloides, Lam. Encyc. i. 400 = Coluria geoides.
prolifera, Gilib. Fl. Lituan. 416.—Europ.
reptans. Lam. Fl. Fr. iii. 122 = G. reptans.
rivalis, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 365 = G. rivnle.
urbana. Scop. 1. c. 864 = G. urbanum.
virginiana, I Jim. Encyc. i. 899 - G. virginianum.
vulgaris, Lam. Fl. Fr. iii. 122 - G. urbanum.

CARYOPHYLLEA, Opiz, Seznam, 27 (1852)«**Airs,** Linn. (Gramin.).
airoides, Opiz, 1. c.=A. caryophyllea.
praecox, Opiz, 1. c.=A. praecox.

CARYOPHYLLUS, Linn. Syst. ed. I (1785) - Eugenia. Linn. (Myrtac).
acutangulus, Stokes, Bot Mat Mcd. iii. 75 = Barringtonia acutangula.
adenolepis, Miq. H. Ind. Bat. i. 466.—Java.
antisepticus, Blume, ex DC. Prod. iii. 262.—Java.
aromaticus, Linn. Sp. PI. 515 — E. caryophyllata.
baladensis. Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 185.—N. Caled.
corticosus. Stokes, Bot. Mat. Mcd. iii. 76 = E. Jambolana.

CARYOPHYLLUS :-
cotinifolius, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 4 = Myrcia coriacea.
elegant, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 184.—N. Caled.
elliptieus, Labill. Sert. Austr. Caled. 61. t. 63.— N. Caled.
fastigiatus, Blume, ex DC. Prod. iii. 262.—Java.
floribundus, Blume, ex DC. 1. c.—Java.
fruticosus, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 3 = E. bifloia.
Jambos, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 73=E. Jambos.
hortensis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 11 = E. caryophyllata ?
malaccensis, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 72 - K malaccensis.
Pimento, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = Pimenta officinalis.
pterocarpus, Vieill. ex Panch. & Sebert, Not. Bois. Nonv. Caléd. 256.—N. Caled.
racemosus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 «= E. acris.
racemosus, Stokes, Bot Mat. Med. iii. 76 = Barringtonia racemosa.

CARYOPHYLLUS, Toum. ex Moench, Meth. 58 (1794) =Dianthus, Linn. (Caryophyll.).
aridus, Moench, Meth. 59 = D. prolifer.
armerius, Moench, 1. c. = D. Anneria.
atrorubens, Moench, Metb. Suppl. 23 = D. atrorubens.
barbatus, Moench, Metb. 59 = D. barbatus.
Carthusianorum, Moench, 1. c. = D. Carthusinnorum.
deltoides, Moench. 1. c. = D. deltoides.
glaucus, Moench, 1. c. = D. deltoides.
plumarius, Moench, 1. c.=-D. plumariua.
superbus, Moench, 1. c. =»D. superbus.

CAKYOPTERI8, Bunge, PI. Mongholico-Chin. 27 (1835). *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. il. 1157.
BARBULA, Lour. Fl. Cochinch. 366 (1790), nomen prius.
MASTACANTHUS, Endl. Gen. 638 (1839).
divaricata, *Maxim, in Bull. Acad. Pétersb.* xxiii. (1877) 390.—Japon.
grata, *Benth. V Hooi.f. Gen.* ii. 1158.—Reg. Himal.
incana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 97.—Japon.
Mastacanthus, *Schau. in DC. Prod.* xi. 625.—China,
mongholica, *Bunge, Fl. Mongholico-Chin.* 28.—China bor.
nepetaefolia, *Maxim, in Bull. Acad. Pétersb.* xxiii. (1877) 390.—China,
ovata, *Miq. in Journ. Bot. Nierl.* i. (1861) 114.—China,
paniculata, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 597.—Reg. Himal.
tangutica, *Maxim, in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 525.—China,
terniflora, *Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* liv. (1879) l. 40.—China.
Wallichiana, *Schau. in DC. Prod.* xi. 625.—Reg. Himal.

CAHYO8PEKMUM, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 175 (1850). *CELASTR1NEAE*, Benth. *8c* Hook, f. i. 367.
aiborcscens, *F. Muell. Fragm.* viii. 279.—Austral,
moluccanum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 176.—Ins. Mollucc.
"emilatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 692.—Java.

CARYOTA, Linn. Mus. Cliff. 12 ; et Gen. ed. I. 355 (1737). *PALMAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 918.
Alberti, F. Muell. ex H. Wendl. in Linnaea, xxxix. (1875) 221 = Rumphiana.
Cumingii, *Lodd. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 815.—Ins. Philipp.
clegans, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 238, Domen.—Hab. 1
ewelsa, *Hort. ex H. Wendl. 1. c.* nomen.—Hab. ?
*fi*r/uracea*, Blume, in Mart Hist Nat. Palm. iii. 196 -milis.
Gnffithii, Becc. in Nuov. Giom. Bot. iii. (1871) 16 - mitis.
Corrida, Jacq. Fragm. 20»Bactris ciryotaefolia.

CARYOTA :-
humilis, Reinw. ex Kunth, Enum. PL iii. 193 = Didymosperma porphyrocarpa.
javanica, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 41 = mitis.
majestica, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Ins. Philipp.
maxima, *Blume, in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 196.—Java.
mitis, *Lour. Cochinch.* 697.—Malaya; Cochinch.
nana, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Ins. Philipp.
nana, Wall. Cat. n. 8595=mitis.
Nó, *Becc. in Nuov. Giorn. Bot.* iii. (1871) 12.—Borneo,
obtusa, *Griff, in Cole. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 480.—Reg. Himal.
obtusidentata, Griff. Palms Brit. Ind. t. 236 A, B= praec
ochlandra, Hauce, in Joum. Bot. xvii. (1879) 174 = obtusa ?
onusta, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 741 = Arenga saccharifera.
Palindan, Blanco, 1. c. ed. I. 714; ed. II. 513 = Orania regalis.
Princeps, *Voigt, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 51.—Hab.?
propinqua, Blume, in Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 195 = mitis.
Rumphiana, *Mart. 1. c.*—Malaya; Austral.
sobolifera. Wall, in Mart. 1. c. 194. t. 107. f. 2- mitis.
speciosa. *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Ins. Philipp.
tremula, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 744 = Didymosperma tremula.
urens, Blanco, 1. c. 740 = Cumingii.
urens, Jacq. Fragm. 20. t. 12. f. 1 = mitis.
urens, *Linn. Sp. PI.* 1189.—As. trop.

CARYOTAXUS, Zucc. ex Endl. Syn. Conif. 240 (1847) =Torreya, Am. (Conif.).
grandis, Henk. & Hochst. Nadelhoelz. 367 - T. grandis.
Myristica, Henk. & Hochst. 1. c. 368 = T. califomica.
nucifera, Zucc. ex Endl. Syn. Conif. 241—T. nucifera.
taxifolia, Henk. *8c* Hochst. Nadelhoelz. 867 =T. taxifolia.

CASALEA, St. Hil. Fl. Bias. Mer. i. 8. t. 1 (1825) = Ranunculus, Toum.
ascendens, St. Hil. 1. c. 11 = R. cordifolius.
biternata, St. Hil. 1. c. 9, in obs.«R. biteraotu*.
breviscapa, St. Hil. 1. c. = R. breviscapus.
chilensis, St. Hil. 1. c. = R. chilensis.
ficarifolia, St. Hil. 1. c. 10-=R. bonariensis.
flagelliformis, St. Hil. 1. c. 11 = R. flagelliformis.
hederacea, Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 156 = R. sessiliflorus.
phyteumae/olia, St. Hil. Bras. Mer. i.9 = R. bonariensis.
sessiliflora, St. Hil. 1. c.=R. platensis.

CASARETTOA, Walp. Rep. iv. 91 (1844)-Vitex, Linn. (Verbenac).
diversifolia, Walp. 1. c. 92 = V. triflora.
mollissima, Walp. 1. c. 91.—V. polygama.

CA8ASIA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 9. t. 49 (1853). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 84.
calophylla, *A. Rich. 1. c.*—Cuba.

CASCABELA, Rafin. Sylva Tellur. 162 (1838) = Cerbera, Linn. (Apocyn.).
peruviana, Kafin. 1. c. = Cerb. peruviana.

CASCARILLA, Adans. Fam. ii. 355 (1768) •= Croton, Linn. (Euphorbiac).
aromatica, Rafin. Sylva Tellur. 62-Crot. aromaticus.
discolor, Rafin. 1. c.=Crot. discolor.
linearis, Rafin. 1. c. = Crot linearis.
officinalis, Ratin. 1. c.=Ciot. Cascarilla.

CASCARILLA, Ruiz, ex Steud. Norn. ed. I. 165 (1821) = Cinchona, Linn. (Rubiac).
pallida, Steud. 1. c.-Cinch, cordifolia.

CA8CAKII1I1A, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. x. (1848) 10, 77. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 32.

CASCARILLA:—
BUENA, Pohl, ex Wedd. in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 185.
LADENBERGIA, Klotzsch, in Hayne, Ann. Gew. xiv. in not. ad t. 15 (1846).
acutifolia, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 11.—Peruv.
bullata, *Wedd. 1. c.* 11.—Peruv.
caduciflora, *Wedd. I. c.* 10.—Peruv.
calycina, *Wedd. 1. c.* 12.—N. Granat.
calyptrata, *Wedd. 1. c.* 18.—Peruv.
Carua. *Wedd. 1. c.* 12.—Peruv.
citrifolia, *Wedd. I. c.* 11.—Venezuela.
Gaudicbaudiana, *Wedd. I. r.* 12.—Bras,
gavanensis, *Schlecht. in Linnaea*, xxvi. (1853) 780.—Peruv.
grandiflora, *Linden, in Belg. Hortic.* vii. (1857) 197.—N. Granat.
heterophylla, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. x. (1848) 10.—N. Granat
hexandra, *Wedd. 1. c.* 12.—Bras.
Hookeriana, *Wedd. Hist. Nat. Quinq.* 91.—N. Granat.
Lambertiana, *Wedd. I. c.* 86.—Bras,
macrocarpa, *Wedd. in Ann. Se. Nat.* Ser. III. x. (1848) 13.—N. Granat.; Peruv.
magnifolia, *Wedd. 1. c.* 10.—Bolivia,
muzonensis, *Wedd. 1. c.* 11.—N. Granat.
nitida, *Wedd. 1. c.* 11.—Venezuela.
oblongifolia, Wedd. 1. c. 12=magnifolia.
officinalis, *Ruiz, Quinol.* 56.—Peruv.
Pavonii, *Wedd. in Ann. Sc.Nat.* Ser. HI. x. (1848) 11.—Peruv.
Riedeliana, *Wedd. I. c.* 12.—Bras.
Riveroana, *Wedd. 1. c.* 11.—Peruv.
Roraimae, *Wedd. I. c.* 12.—Guiana,
rostrata, *Wedd. I. c.* 10.—Boliv.; Peruv.
stenocarpa, *Wedd. Hist. Nat. Quinq.* 81.—Peruv.
undata, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 12.—Venezuela.

CASCARONTA, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 100. *LEGUMINOSAE*.
astragalina, *Griseb. 1. c.*—Reg. Argent.

CASCOELYTRUM, Beauv. Agrost. 85 (1812)=CHASCOLYTRUM, Desv. = Briza, Linn. (Gramin.).

CASEARTA, Jacq. Enum. PI. Carib. 4 (1760). *SAMYDACE AE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 796.
ANAVINGA, Lam. Encyc. i. 147 (1783).
ANTIGONA, Veil. Fl. Flum. iv. 1.145 (1827).
ATHENAEA, Schreb. Gen. i. 259 (1789).
BEDUSIA, Rafm. Sylva Tellur. 11 (1888).
CHAETOCRATER, Ruiz *8c* Pav. Prod. Fl. Per. 61. t. 36 (1794).
CHETOCRATER, Rafin. Sylva Tellur. 149 (1838).
CLASTA, Comm. ex Vent. Choix, sub t. 47 (1803).
CORIZOSPERMUM, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 255 (1850).
CRATERIA, Pers. Syn. i. 485 (1805).
GUIDONIA, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 24 (1864).
IROUCANA, Aubl. PI. Gui. i. 828. t. 127 (.1776).
LANGLEIA, Scop. Introd. 231 (1777).
LINDLEYA, Kunth, Malv. 10 (1822).
MELISTAURUM, Forst. Char. Gen. 143. t. 72 (1776}.
MOEIXKRIA, Scop. Introd. 335 (1777).
PIFAREA, Aubl. PI. Gui. ii. App. 30. t. 386 (1776).
PITUMBA, Aubl. 1. c. 29. t. 385 (1775).
THIODIA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 22 (1864).
VALENTINIA, SW. Prod. Veg. Ind. Occ. 63 (1788).
VAKECA, Gaertn. Fruct. i. 290. t 60 (17K8).
ZUELANIA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 88. t. 12 (1845).
aculeata, Jacq. Enum. PI. Carib. 21 = spinosa.
acuminata, *DC. Prod.* ii. 50.—Guiana.
acuminata, Wall. Cat. n. 7198 (non Casearia).—Ind. or.
acuminatissima, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 80.—Ins. Fiji,
adamantium, *Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 230.—Bras.
adstringens. *Mart. Mat. Med. Veg. Bras.* 51.—Bras.
affinis, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 529 = sylvestris.
alto, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 368.—Cuba,
albicans. *Wall. Cat.* n. 7197.—Malaya,
amplissima, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. ix. (1868) 827.—Madag.
Anavinga, Dalz. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. ll*tomentosa.

CA8EABIA:—
Anavinga, Pen. Syn. i. 485=ovata.
angnstata, *Teijsm. V Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1855) 409.—Java,
aquifolia, *Sauv. Fl. Cub.* 6.—Cnba.
arguta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 363 = parvifolia.
astyla, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) 608.—Ind. or.
anellana, Miq. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 463 = spinosa.
Barteri, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 404.—Afr. trop.
Benthamiana, *Miq. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 38.—Bras.
Betteriana, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) 461.—Porto Rico.
Blanchetiana, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 801.—Bras,
brasiliensis, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 477.—Bras,
brevipes, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (184*2) 110.—Gniana ; Ind. occ.
Cambessedesii, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 475. —Bras.
Camiala, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 7192 = tomentosa.
capitata, Spreng. Syst. ii. 365 - sylvestris.
capitellata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 254.—Borneo.
carpinifolia, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 112 = parvifolia.
celastroides, *Klotzsch, in Schomi. Faun, et Fl. Guy.* 1167, nomen.—Guiana,
celtidifolia, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* v. 362.—Venezuela.
Championi, Thw. Enum. PI. Zeyl. 19-esculenta.
cinerea, Turcz. in Boll. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 462 = grewiaefolia.
Clausseniana, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 441.—Bras,
dutiaefolia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 255.—N. Guinea,
combaymensis, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vii. (1847) 362.—N. Granat.
Commersoniana, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 285.—Bras.
comocladifolia, *Vent. Choix,* t. 44.—Ins. S. Doming,
congestiflora, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 608.—Bru.
contermina, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 707.—Java,
coriacca, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 20.—Zeylan.
coriacca, *Vent. Choix,* t. 45.—Java.
coriacea. Wall. Cat. n. 7196 = Chaetocarpus castanocarpus.
corymbosa, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* v. 366.—N. Granat.
cnspidata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 255.—Sumatra.
Dallachii, F. Muell. Fragm. v. 107 »=tomentosa.
decandra, Jacq. Enum. PI. Carib. 21 —parvifolia.
densiflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 113.—Gniana.
dentata, *Mof. V Sesse, in DC. Prod.* ii. 51.—Mexic.
iisticha, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 81 - C. Melistaurum.
dubia, *Mof. V Sesse, in DC. Prod.* ii. 61.—Mexic.
elliptic*, *Klottsch, in Schomb. Faun. V Fl. Guy.* 1167, nomen.—Guiana.
elliptica, Willd. Sp. PI. ii. 628 = tomentosa.
emarginata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 10.—Cuba,
eriophom, *Wright, ex Griseb. I. c.* 11.—Cuba,
esculenta, *Roxb. Hort. Beng.* [90]; *Fl. Ind.* ii. 422.—As. trop.; Austral.
fallax, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 128.—Guiana.
fasciculata. Uoj. Hort. Maurit. 71 – fragilis.
flavovirens, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 254.—Java.
Fockeana, *Miq. in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. i. (1844) 39.—Guiana.
fragilis, *Vent. Choix,* 47, verso.—Ins. Mascar.
fuliginosa, *Blanco, Fl. Filip.* etl. II. 262.—Ins. Philipp.
glabra, Kurz, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 591 = glomerata.
glabra, Koxb. Hort. Beng. S3; Fl. Ind. ii. 421 = tomentosa.
glabrata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 253.—Java.

CASEABIA :—
gladiiformU, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 493.—Afr. trop.
glomerate, *Roxb. Hort. Beng.* 83; *Fl. Ind.* ii. 419.—Ind. or.
gonocarpa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 1098.—Sumatra,
grandiflora, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 232.—Bras.
grandifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 712.—Sumatra,
gravcolens, *Dal*, in Hook. Kew Journ.* iv. (1862) 107.—Ind. or.
grewiaefolia, *Vent. Choix,* 48.—Malaya.
Guidonia, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 89 = brevipes.
guineensis, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 63.—Afr. trop.
Hamiltonii, Wall. Cat. n. 7195=gnveolens.
hexagona, *Decne. in Ann. Nouv. Mus. Par.* iii. (1834) 429.— Ins. Timor,
hirsuta, *Sw. Fl. Ind. Occ.* ii. 755.—Ind. occ.
hirta, *Sw. I. c.* 756.—Ind. occ.
Hostmanniana, Steud. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 23 = stipularis.
bypoleuca, *Mart, in Flora,* xx. (1887) *Beibl.* ii. 128.—Bras,
icosandra, *Planch. V Triana, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 469.—Panama,
ilicifolia, *Vent. Choix,* t. 44.—Ins. S. Doming,
impunctata, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 61.—Ins. Souietat.
inaequilatera, *Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 2*7.—Bras.
integrifolia, Vahl, ex DC. Prod. ii. 49 » sylvestris.
javitensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 366.—Am. anstr.
Kurzii, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 594.—Burma.
laevigata, Dalz. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 108 =esculenta.
lanceolata, Miq. in Linnaea, xviiL (1844) 758=stipularis.
lasiophylla, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1.468.—Bras,
lasiospeima, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Se'r. IV. xvii. (1882) 113.—N. Granat.
laurifolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 113. - Guiana.
laurina, *blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 253.—Malaya,
leucolepis, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) I. 463.—Malaya.
Lingua, Cambess. in St. HiL Fl. Bras. Mer. ii. 236 = sylvestris.
Lobbiana, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858: I. 463.—Burma ; Malaya,
lucida, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. ix. (1868) 325.—Madag.
lucida, Wall. Cat. n. 7199 (Euphorbiac.).—Ind. or.
macrocarpa, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 593.—Penang.
macrogyna, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1858) I. 463-graveolens.
macrophylla, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 82.—Guiana.
Mannii, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 494.—Afr. trap,
mariquitensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 883.—N. Granat.
Mathewsii, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 608.—Peruv.
Maximiliana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 487.—Bras.
mcliodora, *Eichl. 1. c.* 469.—Bras.
Melistaurum, *Spreng. Syst.* ii. 354.—Ins. Pacif.
mcmbranacea, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 113.—China.
micrantka, G. Don, Gen. Syst. ii. 62 = parviflora.
microdon, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 333.—Sumatra,
microphylla, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 474.—Bras
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 862. t. 480 = hirsuta.
moluccana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 255.—Amboina.
montana, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 335 – inaequilatera.
multiflora, *Spreng. Pugill.* ii. 61.—Ind. or.
myriantha, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) 609.—Panama.
ncgrensis, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 466.—Bras,
nigrcscens, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. ix. (1868) 32^.—Madag.

CASEABIA:—
nitida, *Jacq. Enum. PI. Canb.* 21.—N. Granat.
nitida, Sieber, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 23 = parvifolia.
obliqua, Spreng. Syst. ii. 355 -inaequilatera.
oblongifolia, *Cambess. in St. Hil. Fl.Bras. Mer.* ii. 234.—Bras.
obovalis, Poepp. ex Griseb. in Goett. Abh. ix. (1860) 37 = obovata.
obovata, *Poepp. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 472.—Peruv.
obovata, *Schlecht. in Linnaea,* xiii. (1839) 434.—Mexic.
odorata, Macfad. Fl. Jamaic i. 216=ramiflora.
odorata, *Teijsm. If Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1855) 408.—Java,
oligantha, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 476.—Bras.
ovata, Koxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 420 = tomentosa.
ovata, Wall. Cat. n. 7192 E=glomerata.
ovata, *Willd. Sp. PI.* ii. 629.—Ind. or.
paniculata, Gardn. ex Thw. Lnum. PI. Zeyl. 20 « Osmclia zeylanica.
parviflora, J. F. Gmel. Syst. 700-parvifolia.
parviflora, Willd. Sp. PI. ii. 627-sylvestris.
parviiolia, *Willd. I. c.* 628.—Ind. occ.
pauciflora, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 23*.—Bras,
petiolaris, *Poepp. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 471.—Peruv.
pctraea, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 111.—Guiana.
Pitumba, DC. Prod. ii. 50, in syn. •= macrophylla.
1'oeppigii, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 4?fi.—Bras.
PohlUna, *Eichl. I. c.* 474.—Bras,
praecox, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 1U.—Cuba,
prismalocarpa, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 494.—Af. trop.
propinqua, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 253.—Java,
prunifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* V. 362.—Am. anstr.
prunifolia, Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. vii. (1847) 368 — spinosa.
pubiflora, Benth. Bot. Voy. Snlph. 66 - parvifolia.
punctata, Spreng. Neue Kntdeck. ii. 154 - parvifolia.
punctata, *Spreng. Syst.* ii. 355.—Am. trop.
quinduensis, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. vii. (1847) 360.—Ecuador.
ramiflora, Seem. Bot. Voy. Herald, 98 = hirsuta.
ramiflora, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 50.—Am. trop.
ramosissima, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 10.—Cuba.
re»inifera, *Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. »• 466.—Bias.
Richii, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 82.—Ins-Fiji,
rubescens, *Dalz. in Hook. Ketn Journ.* iv. ',1852; 108.—Ind. or.
rufescens, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 231—Bras,
rufidula, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. I»• xvii. (1862) 107.—N. Granat.
rufinervis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (18oS) I. 462.—Cuba,
rugulosa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 256.-Malaya.
rnpestris, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 468.—Bras,
saiacioides, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 252.—N-Guinea,
salicifolia, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858; I. 460.—Mexic.
Samyda, *DC. Prod.* ii. 51.—Porto Rico.
Selloana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 483.—Bras.
serrata, Macfad. Fl. Jamaic. i. 215 = serrulata.
serrulata, Siebcr, ex Griseb. Fl. Bril. W. Ind. 23-parvifolia.
serrulata, *Sw. Fl. Ind. Occ.* ii. ;'54.—Ind. occ.
sessiliflora, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. «»*•—Bras,
singularis, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. Guiana.
spinescens, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 10.—Cuba.
spinosa, Willd. Sp. IU. ii. 626-ramiflora.
Spruceana, *Benth. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras-* x'»-486.—Bras.

CASEARIA:—
squarrosa, *Klotssch, in Schomb. Faun, et Fl. Guy.* 1167, nomen.—Guiana,
stipitata, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 493.—Afr. tiop.
stipularis, Cambess. in St. Hil. FL Bras. Mer. li. 169 -= brasiliensis.
stipularis, *Vent. Choix,* 46. t. 46.—Am. anstr.
subciliaris, *Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guy.* 984, nomen.—Guiana.
subcuneata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 706-= grewiaefolia.
subopaca, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvii. 11862) 110.—N. Granat.
subrhombea, *Hance, in Journ. Bat.* xxiii. (1885) 323.—China.
sylvestris, *Sw. Fl. Ind. Occ.* ii. 752.—Ind. occ.
tinifolia, *Vent. Choix,* 47. t 47.—Hab. 1
tomentosa, *Roxb. Hart. Beng.* [90]; *Fl. Ind.* ii. 421.—As. trop.; Austral,
truncate, *Blume, Mus. Bat. Lugd. Bat.* i. 252.—Malaya.
tuberculata, *Blume, 1. c.* 254.—Java,
tuberculata, *Blume, 1. c.* 255.—Sumatra.
ulmifolia, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 169-Cambessedesii.
ulmifolia, Vahl, ex Vent. Choix, 48, verso=serrulata.
uniflora, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1884) 428.—Ins. Timor.
Vareca, *Roxb. Hart. Beng.* 83; *Fl. Ind.* ii. 418.—Reg. Himal.; Burma.
variabilis, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. 1. 252 = grewiaefolia.
variant, Thw. Enum. Fl. Zeyl. 19-esculenta.
velutina, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 258.—Sumatra.
viridiflora, *DC. Prod.* H. 51.—Ind. or.
viridiflora, Lam. Encyc. vi. 493 = leucolepis.
wynadensis, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 84.—Ind. or.
teylanica, Thw. Enum. PI. Zeyl. 19 = esculente.
zizyphoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 362.—Am. austr.

CASEOLA, Noronha, in Verh. Batev. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2 (Quid 1).

CASIMIRA, Scop. Introd. 288 (1777) = Melieocca, Linn. (Sapind.).

OASIMIBOA, La Llave, in La Llave ft Lex. NOT. Veg. Desc. fasc. ii. 2 (1825). *RUTACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 802.
edulis, *La Llave, I. c*—Mexic.
Sapota, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. tteddel. (1867) 187.—Nicaragua.
tomentosa, Domb. ex Miers, in Joum. Linn. Soc xvii. (1880) 79-Cervantesia tomentosa.

CASINGA, Griseb. in Goett Abh. ix. (1861) 27, 29-Iiaetia, Linn. (Olacin.).
procera, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 710- L. procera.
suaveolens, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 27 = L. suaveolens.

CASIOSTEGA, Rupr. ex Galeotti, in Bnll. Acad. Brnx. ix. II. (1842) 282, nomen = Opizia, Fresl (Gramin.).
anomala, Rupr. 1. c.=O. stolonifera.
dactyloides, Foum. in Bull. Soc. Bot Belg. xv. (1876) 470-Buchloë dactyloides.
Hooken, Rupr. ex Foum. 1. c. 471=Buchloë dactyloides.
humilis, Rupr. [ex Munro] in Benth. PI. Hartw. 347 = = Buchloë dactyloides.

CASPAREA, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vt 817 (1823) = Bauhinia, Linn. (Legumin.).
acuminata, Heynh. Norn. ii. 128 - B. acuminate.
aurita, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 218 = B. aurita.
castrata, Hassk. Cat Hort Bogor. 288 = B. castrate.
divaricata, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vi. 317 = B. divaricata.
furcata, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. L ix. (1826) 429 - B. furcate.
latifolia, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vi. 317-B. latifolia.
tonaria, H. B. & K. 1. c = Bauhinia lunaria.
Pes-caprae, H. B. ft K. 1. c. 318=B. Pes-caprae.
Porreeta, H. B. ft K. 1. c. 317 = B. ţorrecta.
oubrotundifolia, H. B. ft K. 1. c. = B. subrotundifolia.

CASPARYA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 127-Begonia, Linn.
antioquensis, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xi. (1859) 116.—N. Granat.
brevipetala, A. DC. 1. c. 118.—Venezuela.
coccinea, Klotzscb, in Monatsb. Berl. Acad. (1854) 127 - B. columnaris.
columnaris, Klotzsch, 1. c. — B. columnaris.
cordifolia, A. DC. in DC. Prod. xv. I. 278=A»Vte.
crassicaulis, A. DC. in Ann. Sc. Nat Ser. IV. xi. (1859) 119.—Java.
elegant, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (1854) 127 •= B. elegans.
erosa, A. DC. in DC. Prod. xv. 1.276 =B. erosa.
ferruginea, A. DC. 1. c. 269-B. ferruginea.
fuchsiaeftora, A. DC. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. xi. (1859) 116.—Ecuador.
grewiaefolia, A. DC. 1. c. 117.—N. Granat.
hirta, Klotzsch, in Monatsb. Acad. Berl. (1854) 127.—Peruv.
longirostris, A. DC. in DC. Prod. xv. I. 272»B. longirostris.
montana, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. xi. (1859) 118.—Venezuela.
multiangula, A. DC. in DC. Prod. xv. I. 275-B. multiangula.
oligocarpa, A. DC. in Ann. Nat. Ser. IV. xi. (1859) 118-B. Roxburghii.
polycarpa, A. DC. 1. c. = B. Roxburghii.
robusta, A. DC. in DC. Prod. xv. I. 275 - B. robusta.
silhetensis, A. DC. 1. c. 277 = B. silhetensis.
Teysmanniana, Miq. ex A. DC. 1. c. 276.—Sumatra.
traehyptera, A. DC. 1. c. 274-B. trachyptera.
Trianaei, A. DC. in Ann. Sc. Nat Se>. IV. xi. (1869) 117.—N. Granat.
trispathulata, A. DC. I. c—N. Granat
trisulcata, A. DC. 1. c. 119.—Java.
umbellata, A. DC. in DC. Prod. xv. I. 270 - B. umbellate.
Urticae, A. DC. 1. c. 274=B. Urticae.

CASPIA, Pison. ex Scop. Introd. 276 (1777) = Viemia, Veil. (Hyperidn.).

CASSAITOBA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 158. *ERICACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 684.
DIPLARIA, Rafin. ex DC. Prod. vH. 610 (1839).
angustifolia, D. Don, 1. c. •= calyculata.
calyculata, *D. Don, 1. e.* 168.—Europ.; As. et Am. bor.
racemosa, Spach, Hist. Vèg. Phan. ix 478=Leucothoe racemosa.

CASSEBEERIA, Dennst. Schlness. Hort. Malab. 36 (1818) = Sonerila, Roxb. (Melast.).
maculata, Dennst. 1. c - S. Wallichii.

CASSELIA, Dnm. Comm. Bot. 21 (1822) -Mertenuia, Roth (Boragin.).
bracteata, Dum. I. c 25-M. sibirica.
davurica, Dum. 1. c. '22=M. dahurica.
denticulata, Dum. 1. c. 28 = M. sibirica.
diversifolia, Regel, Ind. Sem. Hort Petrop. (1857) 46.—Hab. ?
gracilis, Dum. Comm. Bot. 28=M. dahurica.
lanceolata, Dum. 1. c. 24 =M. lanceolata.
maritima, Dum. 1. c. 25 = M. maritima.
paniculata, Dum. 1. c. 22-M. paniculate.
parviflora, Dum. 1. c 26 = M. maritima.
sibirica, Dum. 1. c. 23 = M. sibirica.
simplidssima, Dum. 1. c. 24 =M. simplicissima.
villosula, Dum. L c 23=M. villosula.
virginica, Dnm. 1. c. 24<eM. pulmonarioides.

CASSELIA, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xi. (1823) 73. t. 6. *VERBENACEAE,* Benth. ft Hook. t. ii. 1148.
chamaedryfolia, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 865.—Bras,
integrifolia, *Nees (f Mart, in Nov. Act. Acad. Nat. Cur.* xi. (1823) 76.—Bras.
Mansoi, *Schau. in Mart. Fl. Bras.* ix. 176.—Bras,
serrate, *Nees & Mart, in Nov. Act. Acad. Nat. Cur.* xi. (1823) 75.—Bras,
veronicaefolia, *Chain, in Linnaea,* vii. (188%) 364.—Bra*.

CASSIA, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 571.
ADIPERA, DIALANTHERA, DIALLOBUS, DISTERERIPTA, DLFLOTAX, DLTREMEXA, EMELISTA, HEPTEIRECA, HERFETICA, ISANDRINA, NICTITEI.LA, OCTELISIA, OPHIOCAULON, PANISIA, PEIRANISIA, SCOLODIA, TACERA, XAMACRISTA, Rafin. Sylva Tellur. 127-129 (1888).
BACTYRILOBIUM, Willd. Enum. Hort. Berol. 489 (1809).
CASSIANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266.
CATHARTOCARPUS, Pers. Syn. i. 459 (1805).
CHAMAECRISTA, Moench, Meth. 272 (1794).
CHAMAEFISTULA, G. Don, Gen. Syst. ii. 451 (1832).
GRIMALDIA, Schiank, in Denkschr. Akad. Muench. (1808) 103. t. 3.
MACLEAYA, Montrauz. in Me'm. Acad. Lyon, x. (1860) 198.
SENNA, Toum. ex Mill. Gard. Diet ed. VIII. (1768).
abbreviate, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* li. 271.—Afr. trop.
Absus, Aubl. PI. Gui. i. 381 = hispidula.
Absus, *Linn. Sp. PI.* 376.—Cosmop. trop.
acanthoclada, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 116.—Reg. Argent.
acapulcensis, H. B. ft K. Nov. Gen. et. Sp. vi. 353 = biflora.
acclinus, F. Muell. Fragm. iv. 13-glauca.
aciphylla, Benth. ex A. Gray, Bot. U. St Expl. Exped. i. 465-australis, *Sims.*
acisperma, *Schrank, in Colla, Hart. Ripul. App.* ii. 843.—Hab. ?
acosmifolia, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 133.—Bras.
aculeate, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 128.—Bras.
acuminata, Moench, Meth. 273=marylandica.
acuminata, Willd. Sp. PI. ii. 617 - C. Apoucouita.
acuruensis, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 122.—Bras.
acuta, Meyen, Reise, i. 876 = Cnmingii.
acutifolia, *Delile, Fl. Egypte,* 219. t. 27.—Aegypt.
acutisepala, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 97.—Am. trop.
adenantha, Zoll. ft Morltz. Syst Verz. Zoll. 2=-divaricata.
adenensls, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 663.—Arab.
adenopoda, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 486-C. Apoucouita.
adiantifolia, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. H. 130.—Bras.
advena, Willd. ex Vog. Syn. Cass. 18-bicapsularis.
aegyptiaca, Willd. Enum, Hort. Berol. 442 = C. Sophera.
Aeschynomene, DC. in Collad. Hilt Cass. 127.117 = mimosoides.
aethiopica, *Guibourt, Hist. Drogues,* ed. III. iii. 219.—Aegypt.
affinis, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 98.—Am. trop.
Afteliana, Vog. in linnaea, xv. (1841) 70-podc-carpa.
alate, *Linn. Sp. PI.* 378.—Cosmop. trop.
albida, Orteg. Hort. Matr. Dec. 92"tomentosa.
Alcaparilla, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vi. 355-bicapsularis.
Alcaparra, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 61.—Chili.
amoena, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6321 = mimosoides.
ampliflora, Steud. in Flora, xxvi. (1843) ii. 760-inultijuga.
anceps, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 166.—Am. trop.
andina, Phil. In Linnaea, xxviii. (1866) 685 = Arnottiana.
Andrieuxii, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 548.—Mexic.
andromedca, *Mart, ex Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. II. 186.—Am. trop.
angulata, *Vog. Syn. Cass.* 16.—Bras,
angustifolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 29.—Afr. trop.
angustisiliqua, Lam. Encyc. i. 649 = biflora.
angustisiliqua, Torr. ft Gray, Fl. N. Am. i. 398-bahamensis.

CASSIA:—
angustissima, Lam. Encyc. i. 650«mimosoides.
annulata, *Willd. ex Klotssch, in Schomb. Faun, tf Ft.* *Gui.* 1*207, nomen.—Guiana,
aphylla, *Cav. Ic.* vi. 41. t. 561.—Reg. Argent.
apiculata, Mart. & GM. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843; 804=crotalarioides.
Apoucouita, *Aubl. PL Gui.* i. 879. t. 146.—Guiana,
appendiculata, *Vog. Syn. Cass.* 24.—Bras.
applanata, Anderss. Galap.-Oarnes Vcgetat. 254 = picta.
aprica. Veil. Fl. Flmn. 169; iv. t. 76 = cathartica.
arachoides, Hurch. Trav. i. 841= obovata.
aray at ens is, Llanos, Fragm. 71 — timoriensis.
arayatensis, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 71 = alata.
arborea, Macfad. *fl.* Jamaic. i. 843=siamea.
arborescens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 15 = emarginata.
arborescens, Vahl, Symb. Bot. iii. 56 = glauca.
arenaria, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 370 = flexuosa.
arequipensis, *Meyen, in Vog. Syn. Cass.* 43.—Peruv.
Arerch, *Delile, Cent. PI. Afr.* 29.—Aegypt.
argentea, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* 358.—Mexic.
aristata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 170.— Bras.
aristata, Willd. ex Walp. Rep. i. 836 = patellaria.
annala, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 136.— Calif.
Amottiana, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 211.—Chili.
Amottiana, Wight, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 577-nigricans.
arowana, *Schomb. Faun, b" Fl. Gui.* 1206.—Guian.
artemisioides, *Gaudich. ex DC. Prod.* ii. 495.—Austial.
Aschrek, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 86.—Arab.
aspera, Muhl. Cat. ex £11. Sketch, 474=nictitans.
astroites, Willd. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 597 = villosa.
atomaria, *Linn. Mant.* 68.—Am. austr.
atropurpurea, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 533, sphalm.=seq.
atroviridis, Span, in Linnaea, xv. (1841) 201 = C. Sophera.
aurantia, *Ruin* Cl* *Pav. ex G. Don, Syst.* ii. 442.— Peruv.
aurata, Roxb. Hort. Beng. 32, nomen = laevigata.
auricoma, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5322 = mimosoides.
auriculata, *Linn. Sp. PI.* 379.—Ind. or.
aurita, *Collad. Hist. Cass.* 131.—Bras,
aurivilla, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 152.—Am. trop.
australis, *Reinw. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 303, nomen. **—Java.**
australis, *Sims, Bot. Mag.* t. 2676.—Austral.
australis, Veil. Fl. Flum. 166; iv. t. 65=appendiculata.
aversiflora, Hook. Bot. Mag. t. 2188 = biflora.
bacillaris, *Linn./. Suppl.* 231.—Am. trop.
bacillaris, Willd. ex Sieud. Norn. ed. II. i. 303 = sclerocarpa.
Bacillus, Gaertn. Fruct ii. 813 = javanica.
bahamensis, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Am. trop.
barbata, *Mart. V Nees, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1824) 32.—Bras.
Barclayana, Sweet, Fl. Austral, t. 32 = C. Sophera.
Barrenfieldii, Colla, Hort Kipul. App. ii. 343 = australis.
basifolia, *Vog. Syn. Cass.* 56.—Bras.
batramensis, Steud. Nom. ed. II. i. 308, sphalm. =bahamensis.
tauhiniae/olia, Kunth, Mimos. 123. t. 37=rotundifolia.
banhinioides, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) ISO.—Texas; N. Mexic.
Berlandieri, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 520.—Mexic.
Berryana, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 249 = montana.
Berteriana, Balb. ex DC. Prod. ii. 496 = biflora.
Berterii, Colla, Hort. Ripul. 30. t. 24= bicapsularis.
bicapsularis, *Linn. Sp. PI.* 376.—Am. trop.
bifida, Zoll. & Mor. in Nat. en Genesk. Arch. Neerl. Ind. iii. C1846) 68, 80~divaricata.
biflora, Griseb. Cat. PL Cub. 79 = robiniaefolia.
biflora, *Linn. Sp. PI.* 378.—Am. trop.

CASSIA:—
biflora, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 14(= Aeschynomenes sp.).—Ind. occ. ?
bifoliolata, DC. in Collad. Hist. Cass. 120. t. 9 = rotundifolia.
biglandulosa, Bertol. in Bologn. Opusc. Sc. iii. (1819) 40'J = patellaria.
bijuga, Vog. Syn. Cass. 17 = speciosa.
bimarginala, *Griseb. in Bonplandia*, vi. (1858) 5.—Panama.
birostris, *Domb. ex Vog. Syn. Cass.* 48.—Chili.
Blanched, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 78. —Bolivia.
bonariensis, Hort. ex Colla, Hort. Ripul. 88 = corymbosa.
Bonplandiana, DC. Prod. ii. 490 = C. Fistula.
borbonioides, Vog. Syn. Cass. 58 = Langsdorffii.
bomeensis, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 9.—Borneo.
Bottcriana, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 641.—Mexic.
brachypoda, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 172.—Am. trop.
brachystachya, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 78.—Bras.
brachystachya, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 500 = pauciflora.
bracteata, Linn. f. Snppl. 232=alata.
bracteolata, *Vog. Syn. Cass.* 52.—Bras.
bractcosa, Wclw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 277 - didymobotrya.
brasiliana, Lam. Encyc. i. 649 = grandis.
brasiliana, Saldanha, Descr. Rio Madeiras Jan. 43 = fcrruginea.
brevicalyx, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 134.—Bras.
brevifolia, *Lam. Eneyc.* i. 651.—Madag.
brcvipes, *DC. in Collad. Hist. Cass.* 119. t. 9.—Panama.
Brcwstcrii, *F. Muell. 4th Ann. Rep.* 17.—Austral.
Brongniartii, *Gaudich. Bot. Voy.Bonite*, t. 10.—Hab. ?
Brovmiana, Kunth, Mimos. 135. t. 41 = polyantha.
Buchanani, Kostel. Allg. Med.-Phann. Fl. iv. 1383 = obovata.
Burchcllii, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 165.—Bras.
Burmanni, DC. Prod. ii. 502 = capensis t
Burmanni, Wight, in Madras Journ. Sc. vi. (1S37) t. 5 = obovata.
caespitosa, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 136.—Bras.
callianthа, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Kssc.q. 169 = multijuga.
calycioides, *DC. in Collad. Hist. Cass.* 125. t. 20 B.—Am. trop.
camporum, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 79 = pauciflora.
cana, *Nees if Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1824) 34.—Bras.
cana, Schrank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 304 = tomentosa.
cana, Wender. in Linnaea, xii. (1838) 22=holosericea.
canaliculata, R. Br. in Sturt, Centr. Austral, ii. 611 = eremophila.
Canca, Cav. Desc. 182 ^C. Sophera.
candenatensis, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 82=C. Torn.
Candolleana, Vog. Syn. Cass. 42 = bicapsularis.
canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 357 = emarginata.
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 79.—Afr. austr.
caracasana, Jacq. Hort. Schocnb. iii. 11-hirsuta.
cardiosperma, *F. Muell. Fragm.* x. 60.—Austral.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 185 = occidentalis.
carthaginensis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. 304 = bacillaris.
Castiglionia, Collad. Hist. Cass. 121 » C. Chamaecrista.
cathartica. *Mart. Reise, Bras.* i. 648.—Bras.
centijuga, Wawra, in Flora, xlvii. (1864) 248-verrucosa.
cernua, Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) 22-sulcata.
Chamaecrista, Boj. Hort. Maur. 122 glandulosa.
Chamaecrista, *Linn. Sp. PI.* 379.—Am. bor. et austr.
Chamaecrista, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 17 = procumbens.
Chamaecrista, Mill, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 576=virgata.
chamaecristaides, Collad. Hist. Cass. 134 - procumbens. ***Linn. Herb.***
Chatelainiana, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 485. t. 111.—Austral.

CASSIA:—
chinensis, Jacq. Coll. i. 64 = C. Sophera.
chinensis, Lam. Encyc. i. 644 = bicapsularis.
choriophylla, *Vog. Syn. Cass.* 56.—Bras,
chrysocarpa, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 72.—Bras.
chrysogyne, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 579 — chrysocarpa.
chrysoloma, De Not. Ind. Sem. Hort. Gen. (1840) = bicapsularis.
chrysophylla, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 500 = emarginata.
chrysotricha, Collad. Hist. Cass. 99. t. 13 = chrysocarpa.
chrysotricha, Mart. Herb. Fl. Bras. 108 « angulata.
dliaris, Collad. Hist. Cass. 98 = C. Tagera.
ciliata, Hofhngg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 208=sericea.
ciliata, Rafin. Fl. Ludov. 100 = occidentalis.
ciliolata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 146.—Bras,
cinerascens, *Vog. Syn. Cass.* 60.—Bras,
cinerea, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 599. —Mexic.
circinnata. *Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 384.—Austral.
Clausseni, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 79. —Bras.
coccinea. Wall. Cat. n. 5315 = C. Absus.
Collae, G. Don, Gen. Syst. ii. 442=bicapsularis.
coluteoides, Collad. Hist. Cass. 102. t. 12 = bicapsularis.
comosa, *Vug. Syn. Cass.* 05.—Afr. austr.
concinna, *Benth. Fl. Austral*, ii. 291.—Austral,
conferta, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 142.— Bras,
conjugata, *Ruit* b* *Pav. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 540.—Am. trop.
conspicua, Vog. Syn. Cass. 47 = Sieberiana.
contorta, Vog. 1. c. 17 = C. Tora.
coquimbensis, *Vog. 1. c.* 27.—Chili,
cordistipula, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 164.—Bras,
coriacca, *Bong, ex Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 78.—Bras,
corifolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 120.—Am. trap,
corneliana, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 79.—Afr. trop.
coromandeliana, Jacq. Fragm. 67. t. 100 = C. Sophera.
coronilloides, A. Cunn. ex Benth. in Mitch, joum. Trop. Austral. 384 = australis.
corymbosa, *Lam. Encyc.* i. 644.—Am. calid.
corymbosa, Orteg. Hort. Matr. Dec. 124 = laevigata.
cotinifolia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 445.—Bras.
Covesii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 399. —Calif.
crassi/olia, Orteg. Hort. Matr. Dec. 122 = corymbosa.
crassiramea, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 1063.—Bolivia.
crassisepitla, Benth. in Linnaea, xxii. (1849) 527 = bicapsularis.
crenulata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 80. —Bias.
Crista, Jacq. Coll. i. 82 = biflora.
crotalarioides, *Kunth, Mimos.* 132. t. 40.—Am. austr.
Cruikshanksii, *Hook, b" Am. in Hook. Bot. Misc.* xii. (1833) 210.—Chili.
cubensis, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 209 = corymbosa.
cultrifolia, *H. B. I? K Nov. Gen. et Sp.* vi. 363.—Venezuela.
Cumingii, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 211.—Chili.
cuneata, *DC. in Collad. Hist. Cass.* 121.—Am. austr.
cuneata, Griseb. Cat. PI. Cub. 80-lineata.
cuneifolia, Vog. Syn. Cass. 49 = viscosa.
curvifolia, *Vog. 1. c.* 55.—Bras.
cuspidata, Willd. Emm,. Hort. Bcrol. 443 = pislaciaefolia,
cytisoides, *DC. in Collad. Hist. Cass.* 116. t. 14.— Bras,
dalbergiaefolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. H. 149. —Am. trop.
debilis, *Vog. Syn. Cass.* 53.—Bras.
dedpiens, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 72 - angustifolia.
dedpiens, Griseb. Cat. PI. Cub. 79=stenophylla.
decrescens, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 80. —Bras.
decumbens, *Benth. I. c.* 79.—Am. trop.
delagoënsis, *Harv. in Fl. Cap.* ii. 272.—Afr. austr.
densiflora, *Mart. If Gal. in Bull. Acad. Brux.* »»• II. (1845) 3O4.-Mexic.

CASSIA:—
densifolia, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* ii. (1840) 80.—Bras.
dentata, *Vog. Syn. Cass.* 49.—Bras.
Deplanchei, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 664.—N. Caled.
desertorum, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. n.** 133.—Bras
desolata, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 889.—Austral.
Desvauxii, *Collad. Hist. Cass.* 131.—Am. trap,
didymobotrya, *Fresen. in Flora,* xxii. (1839) 58.—Abys 'a.
diffusa DC. in Soc. Phys. Genev.ii. (1824) 180; Prod. ii. 504-=nictitans.
dimidiata, Klein, ex Wall. Cat. n. 6828 = Kleinii.
dimidiata, Koxb. Hort. Beng. 32, nomen=mimosoides.
diphylla, *Linn. Sp. PI.* 376.—Am. trop.
disadena, Steud. in Flora, xxvi. (1843) II. 760 = glandulosa.
discolor, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 73 = glauca.
dispar, *Willd. Enum. Hort. Berol.* **441.—Am. anstr.**
disperma, Veil. Fl. Flum. 167; iv. t. 69 = Peltophonim Vogelianum.
distichoclada, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv.** II. 168.—Am. trop.
divaricata, *Nees, in Syll. Ratisb.* i. (1824) 94.—As. trop.; Malaya.
Dombeyana, Vog. Syn. Cass. 28= aurantia.
domingensis, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 55.—Ind. occ.
dormiens, Veil. Fl. Flum. 167 i iv. t. 67 = bicapsularis.
drepanophylla, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 170.—Bras.
dumetorum, Bert, ex DC. Prod. ii. 499 = reticulata.
dysophylla, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 117.—Am. trop.
echinocarpa, *Benth. 1. c.* 136.—Am. trop.
edulis, *Posada, in Baill. Adansonia,* **x. (1872) 187.—** N. Granat.
eglandulosa, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ii. VI. 34.—Hab. *1*
Ehrenbergii, Bisch. in Bot. Zeit. ii. (1844) 61 -angustifolia.
elegans, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 342 <= laevigata.
elegans, *Voigt, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 55.—Hab. ?
elliptica, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 356 = emarginata.
elongata, Lemaire-Lis. in Joum. Phann. vii. (1821) 345 =angnstifolia.
emarginata, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 304, 305 = atomaria.
emarginata, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 237 = bicapsularis.
emarginata, *Linn. Sp. PI.* 376.—Am. trap.
emarginata, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 13 = pilosa.
enneaphylla, Koen. ex Wight & Am. Prod. 28S = glauca.
ensiformis, Veil. Fl. Flum. 170; iv. t. 79 = C. Apoucouita.
erecta, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 303 eglandulosa.
cremophila, *A. Cunn. ex Vog. Syn. Cass.* **47.—** Austral,
ericifolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 145.—Am. trop.
'sculenta, Roxb. Hort. Beng. [31], nomen - C. Sophera.
exaltata, *Reinw. in Blume, Cat. Gen. Buitenz.* **68;** *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 201.—Ins. Timor.
excelsa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 339 = C. Fistula,
excelsa, *Schrad. in Goett. Gel. Ant. i.* **(1821) 717.—** Bras.
*e*igua,* Roxb. Hort. Beng. [31], nomen=C. Absus.
exsndans, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* ii. (1840) 80.—Bras.
fabaginifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 363 = rotundifolia.
Jfeifolia, Bertol. Fl. Gnatlm. 14 = oxyphylla.
ffgonioides, Vog. Syn. Cass. 50 = hispidula.
Talcata, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. VL 35=corymbosa.
falcata. Linn. Sp. PI. 377 = ocddentalis.
'Wcinella, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 281.—Afr. trop.
faseieulata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 262 = C. Chamaecrista.

CASSIA:—
fastigiata, Nees, in Flora, iv. (1821) 803=excelsa.
fastigiata, Vahl, Symb. Bot. iii. 67= glauca.
fastuosa, *Willd. ex Vog. in Linnaea,* xi. (1887) 654.—Am. trop.
felipensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 368 = C. Chamaecrista.
ferruginea, *Schrad. ex DC. Prod.* ii. 489.—Am. trop.
Fieldii, Colla, Hort. Ripnl. App. iv. 23. t 11 = australis.
filicifolia, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. II.** 148.—Bras.
filipendula, Boj. Hort. Maurit. 122 ^mimosoides.
filipes, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 81 = rotundifolia.
fimbriata, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* **v. (1790)** ed. I. Art. iv. 9.—Malaya.
Fistula, Herbb. tx Oliver, Fl. Trop. Afr. 271 = C. Arereh.
Fistula, *Linn. Sp. PI.* 377.—As. trop.
fistuloides, Collad. Hist. Cass. 87. t. 1 = C. Fistula.
flaccida, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 238 = coquimbensis.
flavicoma, Benth. PI. Hartw. I71=iristicula.
flavicoma, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 366.—Venezuela.
flexuosa, A. DC. Not. 7m* PI. Rar. Jard. Genèv. 34. t. 4 = bicapsularis.
flexuosa, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 12 = capensis.
flexuosa, *Linn. Sp. PI.* 379.—Bras.
flexuosa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 16=serpens.
floribunda, Cav. Desc. 132 = laevigata.
floribunda, Collad. Hist. Cass. 88. t. 11 = corymbosa.
floribunda, Griseb. ex Benth. in Trans.' Linn. Soc. xxvii. (1871) 549 = racemosa.
florida, Vahl, Symb. Bot. iii.-67=siamea.
fluminensis, Veil. Fl. Flum. 168; iv. t. 72 = Dimorphandra exaltata.
Fockeana, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 579 = bacillaris.
foetida, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 443 = stipulacea.
foetida, Salisb. Prod. 325 = C. Tora.
foetida, Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1796) 82 - ocddentalis.
foetidissima, Ruiz *8c* Pav. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 441 = mexicana.
foliolosa, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* **xxvii. (1871)** 644.—Guatemala.
foliolosa, Steud. Nom. ed. II. i. S05=seq.
foliosa, G. Don. Gen. Syst. ii. 746 = tenella?
foliosa, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 379.—Chili.
Fraseri, A. Cunn. ex Vog. Syn. Cass. 48= australis.
fraxinifolia, **H. B. &** os. Syn. (K. Nov. Gen. et Sp. vi. 349 = pistaciaefolia.
frondosa, Hook. *8c* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 210 ^bicapsularis.
frondosa, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 53 = biflora.
frutescens. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = C. Sophera.
fruticescens, Bert, ex Spreng. Syst. ii. 336-viminea.
fruticosa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 10 = bacillaris.
fulgens, Macfad. Fl. Jamaic. i. 342=biflora.
fulgens, Wall. Cat. n. 5310 = multijuga.
fuscescens, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 153.—Am. trop.
galegaefolia. Linn. Syst. Nat. ed. X. 1017-biflora.
Galeottiana, *Martens.in Bull. Acad. Brux.x.U.* **(1843)** 806.—Mexic.
gallinaria, Collad. Hist. Cass. 96=C. Tora.
Gardneri, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 120.—Bras.
Gaudichaudii, *Hook, if Am. Bot. Beech. Voy.* **81.—Ins.** Sandvic.
gemina, Veil. Fl. Flum. 169; iv. t. 74 = C. Chamaecrista.
geminata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. II. 135.—** Bras.
geminata, Vahl, ex DC. Prod. ii. 505 = mimosoides.
geminiflora, *Collad. Hist. Cass.* t. 8.—Mexic
geminiflora, Moç. *8c* Sesse, in Collad. Hist. Cass. 103. t 3 = biflora.
geminiflora, Schronk, Hort. Monac. t. 26 - ocddentalis.
geniculata, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 440 -villosa.

CASSIA:—
gigantea, Bert, ex DC. Prod. ii. 492-siamea.
glabra, Collad. Hist. Cass. 131 = cytisoides.
glandulifera, Reinw. ex Steud. Nom. ed. II. i. 305 = seq.
glanduliflora, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Buitenz. 68 •= bicapsularis.
glandulosa, Hook. Bot. Mag. t. 3435=>virgat.i.
glandulosa, *Linn. Syst. Nat.* ed. X. 1017.—Am. trop.
glauca, *Lam. Encyc.* i. 647.—As. trop.; Austral.; Polyncs.
glauccscens, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 539.—Chili,
glaucescens, *Hoffmgg. Vere. Pfl. Nachtr.* **i. 209.—** Cuba.
glutinosa, *DC. Prod.* ii. 495.—Austral,
goënsis, *Dala. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 112.—Ind. or.
gonioides, *A. Cunn. ex Benth. in Hook. Ic. PI.* **xi. 48.** t. 1061.—Austral,
gonoclada, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 169.—Bras.
gonoclada, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 572 = choriophylla.
goratensis, *Fresen. in Flora,* xxii. (1889) 53.—Abyssin.
gracilis, *Kunth, Mimos.* 120. t. 36.—Am. trop.
gracillima, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 143.—Bras.
gracillima, Welw. Apont. 590 = mimosoides.
grammica, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 55.—Am. trop.
grandiflora, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 302 = laevigata.
grandiflora, Pers. Syn. i. 457 = bicapsularis.
grandis, *Linn.f. Suppl.* 230.—Panama.
grandistipula, Vog. Syn. Cass. 58 = rotundata.
Grantii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 279.—Afr. trop.
graveolens, Colla, Hort Ripul. App. ii. 343 = atomaria.
Greggii, *A. Gray, PI. Wright.* I. 59.—Mexic.
grisea, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 483= emarginata.
guineensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 44U>mimosoides.
Hartwegi, Benth. PI. Hartw. 117 = oxyphylla.
hecatophylla, DC. in Collad. Hist. Cass. TJ4. t. 18 = mimosoides.
hedysaroides, *Vog. Syn. Cass.* 62.—Bras,
heptanthera, *F. Muell. Fragm.* x. 8.—Austral.
Herbertiana, Lindl. Bot. Reg. t. 1422 = laevigata.
herpctica, Jacq. Ubs. Bot. ii. 24. t. 45. f. 2^alata.
heteroloba, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral, ed. II. ii. (183!)) 122=eremophila.
heterophylla, Walp. Rep. i.838, sphalm.-mimosoides.
Hibbertiana, Steud. Nom. ed. II. i. 305, sphalm. = Herbertiana.
Hilariana, *Benth. in Mart. Fl. Bras. xv.* **II. 108.—Am.** trop.
Hildebrandtii, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxx.** (1880) 80.—Afr. trop.
hirsuta, *Linn. Sp. PI.* 378.—Am. trop.
hirsuta, Veil. Fl. Flum. 170; iv. t. 80 = catliartica.
hirta, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* **23.—Hab. ?**
hispidn, Collad. Hist. Cass. 118 * hispidula.
hispidula, *Vahl, Eclog. Am.* iii. 10.—Mexic.
Hoffmanscggii, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 104.—Bras,
holosericea, *Fresen. in Flora,* xxii. (1839) I. 54.—Abyssin.
homophylla, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* **i. 209.—** Hab. i
Hookeriana, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 210.—Chili.
Hornemanni, DC. Prod. ii. 607—C. Chamaecrista.
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Hat. i. 99 »glauca.
Houstoniana, Collad. Hist. Cass. 182 = *biflora.* Mill.
Humboldtiana, DC. Prod. ii. 489=spectabilis.
humilis, Collad. Hist. Cass. 96 =C. Tora.
humilis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 305 = C. Tagera.
hybrida, Tcnore, Cat. Hort. Neap. 80=laevigata.
hymeneacfolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 130.—Am. trop.
hypnotica. Veil. Fl. Flum. 169; iv. t. 75 = C. Chamaecrista.
hypoleuca, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. II.** 117.—Bros.
inaequilatera, *Balb. ex DC. Prod.* ii. 490.—N. Granat.
incana, *Vog. Syn. Cats.* 62.—Bras.

CASSIA:-
incamata, *Pav. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 645.—Pernv.
incnrvata, *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. II. 187.—Am. trop.
indecora, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. vi. 818-bicap-Solaris.
indica, Poir. Encyc Suppl. ii. 126-C. Sopheri
inflata, Spreng. Syst. ii. 336 = bicapsularis.
Isidorea, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 154.— Bras.
italica, Lam. ex Stead. Nom. ed. I. 166, 167 = C. Senna,
itambana, *Mart, ex Benth. in Mart. Ft. Bras.* Xv. II. 151.—Am. trop.
Jacobinea, *Benth. in Mart. 1. c.* 182.—Am. trop.
javanica, Aubl. PI. Gui. i. 382 = grandis.
javanica, *Linn. Sp. PI.* 879.—Malaya.
javanica, Sieber, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 517 = Sieberiana.
javanica. Veil. Fl. Flum. 168; iv. t. 73 = ferruginea.
Johannae, *Vatke, in Oestr. Bet Zeitschr.* xxx. (1880) 77.—Afr. trop.
Ketschta, *Hasselq. It. Palaest.* 469.—Palaest.
Kirkii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 281.—Afr. trop.
kituiensis, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 81.—Afr. trop.
Kleinii, *Wight tf Am. Prod.* 298.—Ind. or.; Malaya.
Kotschyana, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 271.—Afr. trop.
Kunthiana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 598 = C. Tagera.
lactca, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 78. —Madag.
laeta, *H. B.* tr *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 840.—N. Granat.
laevigata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 441.—Cosmop. trop.
lamprosperma, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 146.—Am. trop.
lanceolata, Gollad. Hist. Cass. 93. t. 15=acutifolia.
lanceolata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 85=C. Sophera.
lanceolata, Pers. Syn. i. 456 = uniflora.
lanceolata, Wight & Arn. Prod. 288-angustifolia.
Langsdorflii, *Kunth, ex Vog. Syn. Cass.* 55.—Bras,
latifolia, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 166.— Guiana,
latistipula, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 156.—Bras.
latopetiolata, *Domb. ex Vog. Syn. Cass.* 70.—Peruv.
Iavradioides, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 137.—Am. trop.
laxiflora, *Benth. Fl. Austral*, ii. 288.—Austral.
Ieiandra, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 94.— Bras.
leiantha, Benth. in Hook. Jonra. Bot. Ii. (1840) 78 = hispidula.
leiophylla, *Vog. Syn. Cass.* 25.—Bras.
Unitiva, Bisch. in Bot. Zeit. viii. (1850) 885 = acutifolia.
lentiscifolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 144.—Am. trop.
leptocarpa, *Benth. in Linnaea*, xxii. (1849) 628.—N. Mexic.
leptoclada, *Benth. Fl. Austral*, ii. 290.—Austral,
leptophylla, *Vog. Syn. Cass.* IS.—Bras.
Leschenaultiana, DC. in Me'm. Soc. Phys. Genèv. ii. (1824) 182-mimosoides.
Leschenaultii, Wall. Cat. n. 5325 = mimosoides.
lencoxylon, *Klotzsch, in Schomb. Faun. V Fl. Gui.* 1207, nomen.—Guiana.
Liebmannii, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 549.—Mexic.
ligustrina, Forsk. ex Benth. 1. c. 533 = C. Sophera.
ligustrina. *Linn. Sp. PI.* 878.—Am. trop.
ligustrina, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 12 = obovata.
ligustrinoides, Schrank, in Denkschr. Akad.Mnench. vi. (1816-17) 179 = angustifolia.
limensis. Lam. Encyc. i. 648-bicapsularis.
lindheimeriana, *Schlecht. in Linnaea*, xxi. (1848) 457.—Texas.
Lindleyana, Gardn. in Hook. Load. Joum. Bot ii. (1843) 341-multijuga.
linearifolia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. **446.—**Bras.
linearis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 281—occidentalis.
lineata, *Sw. Prod. Vtg. Ind. Occ.* 66.—Am. trop.

CASSIA:—
lomatopoda, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 146.—Bras.
longeglandulosa, *Benth. 1. e.* 119.—Am. trop.
longicuspis, *Benth. 1. c.* 150.—Am. trop.
longifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 804, in syn. = angustifolia.
longiracemosa, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 80.—Afr. trop.
longisiliqua, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 338=birsuta.
longisiliqua, Linn. f. Suppl. 230=occidentals.
Lorentzii, *Niederl. in Roca, Exped. Rio Negro,* ii. 210. —Patagon.
loioides, H. B. & K. Nov. **Gen.,** et Sp. vi. 861 = hispidula.
lucens, Vog. Syn. Cass. 46=racemosa.
lucida, *Dehnh. Cat. PI. Hort. Camald.* ed. IL 18.— Hab.J
Lundii, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 143.— Am. trop.
lutescens, G. Don, Gen. Syst. ii. 442=tomentosa.
machaeriifolia, *Benth.in Mart. Fl. Bras.xv.* II. 151.— Am. trop.
macradenia, *Collad. Hist. Cass.* 132.- Bras,
macranthera, *DC. in Collad. 1. c.* 99. t. 8.—Bras,
macrocarpa, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Geniv.* xxviii. (1883) n. vii. 43.—Paraguay,
macrophylla, *Kunth, Mimes.* 126. t 38.—N. Granat.
macrophylla, Ruiz & Pav. ex Benth. in Trans. linn. Soc. xxvii. (1871) 6'20=Ruiziana.
madagascariensis, *Boj. Hort. Maurit.* 120.—Madag.
madagascariensis, Poir. ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sir. I. ix. (1826) 424 "Swartzia madagascariensis.
magnifica. Mart. Herb. Fl. Bras. 106-multijuga.
magnifolia, *F. Muell. Fragm.* i. 166.—Austral,
malacophylla, *Vog. Syn. Cass.* 65.—Bras.
Mandoni, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 540.—Peruv.
Mannii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 272.—Afr. trop.
marginata, *Roxb. Hort. Beng.* [81] ; *Fl. Ind.* ii. 838.—Ind. or.
marginata, Willd. Enum. Hort. Berol. 448=polyphylla.
Marimari, Aubl. PI. Gui. 382 = biflora.
maritima, Willd. ex Vog. Syn. Cass. 23=pilifera.
Martiana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 127.—Am. trop.
marylandica, *Linn. Sp. PI.* 378.—Am. bor.
medellinensis, *Posado, in Baill. Adansonia,* x. (1872) 187.—N. Granat.
medica, Forsk. Fl. Aegypt Arab. p. cxl = angustifolia.
medica, Veil. Fl. Hum. 166; iv. t. 62-qoioquangulata.
medicinalis, Bisch. in Bot Zeit viii. (1860) 887 = angustifolia.
megalantha, *Decne. Herb. Tim. Descr.* 136.—Ins. Timor.
melanocarpa, Bert, ex DC. Prod, it 491-viminea.
mexicana, *Jacq. Hort. Schoenbr.* ii. t. 203.—Am. trop.
micans, Nees, in Flora, iv. (1821) 308 = speciosa.
micrantka, Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 262 = nigricans.
microphylla, Willd. Sp. PI. ii. 529 = mimosoides.
Milleri, Collad. Hist. Cass. 132 = pilosa.
Mimosa, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* V. (1790) ed. I. Art. IV. 9.—Malaya.
mimosoides, DC. Prod. ii. 503 = Kleinii.
mimosoides, *Linn. Sp. PI.* 379.—Cosmop. trop.
misera, *Phil. Fl. Atac.* 17.—Chili.
mollis, Vahl, Symb. Bot. iii. 57=grandis.
mollissima, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 440=atomaria.
monaden, Veil. Fl. Flum. 166; iv. t. 63-splendida.
monantha, DC. Prod. ii. 506 = sericea.
monophylla, Veil. Fl. Flum. 166; iv. t 61=rotundifolia.
montana, *Heyne, in Roth, Nov. Sp. PI.* 214.— Ind. or.
montana, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 71 = timoriensis.
montana, *Veil. Fl. Flum.* 169 ; iv. t. 77.—Bras,
monticola, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 134.—Am. trop.
mosckata, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 75 = Ieiandra.
moschata, *H. B. br K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 858.—Am. austr.

CASSIA:-
mucronata, *Spreng. Syst.* ii. 841.—Bras.
mucronifera, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* XT. II. 116.—Bras,
multiflora, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 307.—Am. trop.
multiflora, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 387 = excelsa.
multiflora, Vog. Syn. Cass. 89 = macranthera.
multiglandulosa, Jacq. Ic. Rar. i. t. 72-tomentosa.
mnltijuja, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 108.—Guiana,
multinervia, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 166.—Am. trop.
multiseta, *Benth. 1. c.* 141.—Am. trop.
multisiliqua, J. F. Gmel. Syst. 1521 (quidt).
Mutisiana, *Kunth, Mimos.* 142. t. 43.—Am. trop.
myriophylla, Wall. Cat. n. 6326 = mimosoides.
Dana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 110.—Am, trop.
Neesiana, *Mart, ex Benth. I. c.* 148.—Bras,
neglecta, *Vog. in Linnaea*, x. (1836) 394.—Bras.
nemophila, Walp. Rep. i. 827, sphalm. = eremophila.
nemorosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 358 = biflora.
nervosa, Vog. Syn. Cass. 39=speciosa.
nicaraguensis, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 552.—Am. trop.
nictitans, *Linn. Sp. PI.* 380.—Am. bor. et austr.
nictitans, Wydl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 80S, **806-** mimosoides.
nigricans, *Vahl, Symb. Bot.* i. 30.—Geront. trop.
nitida, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 108 = viminea.
nodosa, *Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng* [81]; *Fl.* *Ind.* ii. 336.—As. trop.
notabilis, *F. Muell. Fragm.* iii. 28.—Austral.
nummularia, Vahl, ex DC. Prod. ii. 501=rotundifolia.
nummnlariaefolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 143.—Bras.
nutans, Collad. Hist. Cass. 113. t. 4 = atorruria.
obemdata, Sw. ex Wickstr. in Vet. Acad. HandL (1825) 429 = lineata.
obliqua, *Ruin V Pav. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 46L —Peruv.
obliguifolia, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 40 = occidentalis.
oblongifolia, *Vog. Syn. Cass.* 23-Bras,
obovata, *Collad. Hist. Cass.* 92. t. 16.—Geront. trop.
obtecta, *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. II. 136.—Am. trop.
oiruso, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 235-bicapsularls.
obtusa, Roxb. Hort. Beng. [31] ; Wight, Ic. t. 757 = obovata.
obtusata, Hayne, Arzneig. ix. t. 48 = obovata.
obtusata, Hochst. & Steud. Nom. ed. II. i. 306 = holosericea.
obtusifolia, Linn. Sp. PI. 377-C. Tora.
ocddentalis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 306-homophylla.
occidental, *Linn. Sp. PI.* 377.—Cosmop. trop.
ocddentalis, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. t. 78-C. Sophera.
ochnacea, *Vog. Syn. Cass.* 51.—Bras,
odorata, *Morris, Fl. Conspic.* t. 57.--Austral.
oresiphylla, *Vog. Syn. Cass.* 68.—Bras,
oligoclada, *F. Muell. Fragm.* iii. 49.—Austral,
oligophylla, *F. Muell. I. c*—Austral,
oligosperma, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 147.—Bras.
opaca, R. Grah. ex Vog. Syn. Cass. 42-stipulacea.
orbiculata, *Benth. in Hook. Journ. Bot. A.* (1840) 79 —Bras,
orinocensis, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* X*- II. 150.—Bras.
orientalis, Pers. Syn. i. 457 = acutifolia.
ornata, Bemh. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 622-latifolia.
oraata, *Klotzsch, in Schomb. Faun. V Fl. Gui.* 1104, nomen.—Guiana.
ornithopodioides, Steud. Nom. ed. I. 166 — seq.
ornithopoides. Lam. Encyc. i. 644= sericea.
Otterbeynii, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 169* glandulosa.
ovalifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Erux. *• »• (1843) 305 = bicapsnlaris.

CASSIA :-
ovata, *Mirat* b" *Lens, ex Geiger, Pharm. Bot.* ed. II. ii. 1125.—Arab.
oxyadena, DC. Prod. ii. 496 = biflora.
oxyphylla, *Kunth, Mimas.* 129. t. 89.—N. Granat.
pachy calyx, Vog. Syn. Cass. 52 = cathartica.
pachyphylla, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 166.—Bras.
pallida, Vahl, Eclog. Am. iii. 12=biflora.
palmata. Wall. Cat. n. 5306 = timoriensis.
panicnlata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 158.—Am. trop.
paposana, *Phil. Fl. Atac.* 17.—Chili,
papulosa, *Hoffmgg. Vera. Pfl. Nachtr.* ii. 81.—Bras,
paradyction, *Vog. Syn. Cass.* 45.—Bras,
paraguensis, *Micheli, in Mem. Soc. Phys. Genhf.* xxviii. (1883) n. vii. 44.—Paraguay.
Parahyba, Veil. FL Flum. 168 ; iv. 171=Schizolobium excelsnm.
paremariboënsis, *Miq. in Bot. Zeit.* i. (1843) 461.—Guiaa.
paratyensis, *Veil. Fl. Flum.* 168; iv. t 70.—Bras.
Parkeriana, DC. Prod. ii. 504-riparia.
parvifolia, Wender. in Syll. Ratisb. i. (1824) 65 = glandulosa.
parvistipula, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 170.—Am. trop.
pascuorum, *Mart, ex Benth. 1. c.* 165.—Am. trop.
patellaria, *DC. in Collad. Hist. Cass.* 125. t. 16.—Am. trop.
patula, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 51 = C. Sophera.
pauciflora, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 860.—Am. trop.
Pavoniana, G. Don, Gen. Syst. ii. 447 = glandulosa.
Peardi, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 552.—Bolivia.
pedicellaris, *DC. Prod.* ii. 504.—Ins. S. Doming.
pendula, Willd. Enum. Hort. Berol. 440 = bicapsularis.
pentagoriia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 18.—Am. trop.
pentandra, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 399 = rotundifolia.
peralteana, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 366.—Mexic.
Persoonii, Collad. Hist. Cass. 119 = uniflora.
peruviana, Vog. Syn. Cass. 39 —obliqua.
Petersiana, Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 18 = delagoënsis.
phyllodinea, *R. Br. App. Sturt, Centr. Austral.* 15.—Austral,
phyllostachya, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 150.—Am. trop.
picta, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 444.—Ecuador; IDS. Galap.
pilidens, Steud. Nom. ed. II. i. 307=nictitans.
pilifera, *Vog. Syn. Cass.* 23.—Bras,
pilosa, *Linn. Syst. Nat.* ed. X. 1017.—Am. trop.
pinnata, Hort. ex Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 65 = elegans.
pistaciaefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 349.—N. Granat.
planisiliqua, Burm. f. Fl. Ind. 96-Albizzia Lebbelc.
planisiliqua, Linn. Sp. PI. 377—occidentals,
planisiliqua, *Lam. Encyc.* i. 645.—Ins. Guadelup.
platypoda, R. Br. in Sturt, Centr. Austr. ii. 78 = eremophila.
pleurocarpa, *F. Muell. Fragm.* i. 228.—Austral.
Plumieri, *DC. Prod.* ii. 506.—Ins. Guadelup.
plumosa, Vog. Syn. Cass. 64 = mimosoides.
podocarpa, *Guill.* b* *Pen. Fl. Seneg. Tent.* 259.—Afr. trop.
Pohliana, *Benth. in Hook.Jou.rn. Bot.* ii. (1840) 80.—Bras,
polyadena, *DC. PI. Bar. Jard. Genh.* 2« *Rapp.* 12.—Ind. occ.
polyantha, *Mof. (f Sesse, ex Collad. Hist. Cass.* 112. t. 2.-Mexic.
Polyphylla, *Jacq. Coll.* iv. 104 ; *Ic. Rar.* t. 460.—Ind. occ.
polystachya, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 77.—Guiana.
Porturegalensis, Bancroft, ex Macf. Fl. Jamaic i. 840 = obovata.
Potentilla, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. W8.—Am. frop.
PWetexta, *Vog. Syn. Cass.* 87.—Am. trop.
Procumbens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxi -nigricans.
procumbens, Linn. Sp. PI. ed. I. 3S0=nictitans.

CASSIA:—
procumbens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 648, pro parte, et Herb.—Am. bor.
procumbens, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 20 «=hispidula.
procumbens, Thunb. Fl. Jap. 179=mimosoides.
prominens, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1479 = macranthera.
propinqua, Cham. & Schlecbt in Linnaea, v. (1830) 599 = tristicula.
propinqua, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 369 = glandulosa.
prostrata, Humb. *8c* Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 441—serpens.
prostrata, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 32=pumila.
prninosa, *F. Muell. Fragm.* iii. 48.—Austral.
pseudo-nictitans, Hance, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 79-nictitans.
psammophila, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 571 = cordistipula.
psilocarpa, Welw. Apont. 587- n. 40=Sieberiana.
puberula, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 841-bacillaris.
pubescens, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64= holosericea.
pubescens, Ehrenb. & Hempr. ex Benth. in Proc. Linn. Soc. ii. (1855) 2*3 -holosericea.
pubescens, *Jacq. Fragm.* 46. t. 67.—Bras.
pubescens, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 442 - tomentosa.
pubigera, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14 — hirsuta.
pudibunda, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras,* xv. II. 102.—Bras.
pulchella, *Boj. Hort. Mourit.* 122.—Ins. Maurit.
pulchella, Salisb. Prod. 326 = C. Chamaecrista.
pulcherrima, *Dehn. RivistaNap.* i. III. 174.—Guiana.
pulchra, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 862-Desvauxii.
pumila, *Lam. Encyc.* i. 651.—Cosmop. trop.
pumila, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1848) 307=leiophylla.
pumila, F. Muell. Fragm. iii. 47 = concinna.
Pumilio, *A. Gray, PI. Lindh.* 180.—Am. bor. occ.
punctata, Scheele, in Linnaea, xvii. (1343) 386=sylvestris.
punctata, *Vog. Syn. Cass.* 51.—Bras.
punctulata, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 420-= pauciflora.
purgans, *Steud. Nom.* ed. II. i. 807.—Chili.
purpurea, Roxb. Hort. Beng. [31] =C. Sophera.
pygmaea, DC. Prod. ii. 602 = procumbens, *Linn. Herb,*
quadrangularis, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zsll. 2 = laevigata.
quadriflora, Vog. Syn. Cats. 47-glntinosa.
Quebracho, Steud. ' 1833' ex Nom. ed. II. i. 307, 804 = bicapsularis.
quinquangulata, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* (1792) 108.—Am. trop.
racemosa, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 19.—Bras.
ramiflora, Vog. Syn. Cass. 48=C. Apoucouita.
ramosa, Vog. T. c. 55 — uniflora.
ramosissima, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 366 = glandulosa.
reflexa, Salisb. Prod. 826=marylandica.
Reinwardtii, *Hassk. in Hoev. V Dt Vritse, Tijdschr.* v. (1838-89) 269.—Java,
reniformis, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 440.—Bra",
renigera, *Wall. Cat.* n. 6307.—Burma,
repens, *Vog. Syn. Cass.* 60.—Bras,
reticnlata, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 443.—Am. austr.
ictus* *Soland. ex Vog. in Linnaea,* xv. (1841) 72.—Austral.
revoluta, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. (1855) 120 - australis.
rhombifolia,Roxb. Hort.Beng. [31]; Fl. Ind. ii.384 = C. Fistula.
Richardiana, Kunth, Mimos. 189. t 142 - multijuga.
Riedelii, *Benth. iii Mart. Fl. Bras.* xv. II. 122.—Am. trop.
rigidifolia, *Benth. 1. c.* 142.—Bras,
riparia, *H. B.* 0" *K. Nov. Gen: el Sp.* vi. 369.—Am. trop.
robiniaefolia, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 545.—Am. trop.
robinioides, Willd. Enum. Hort. Berol. 448 - C. Sophera.
Roemeriana, *Scheele, in Linnaea,* xvi. (1842) 457.—Texas.

CASSIA:—
Koraimae, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 574.—Guiana.
rostrata, Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 55-biflora.
rotundata, *Vog. Syn. Cass.* 58.—Bras,
rotundifolia, *Pers. Syn. i.* 456.—Mexic.
Roxburghiana, R. Grab, in Wall. Cat n. 6823 - mimosoides.
Roxburghii, DC. Prod. ii. 489-marginata.
Roxburghii, Steud. Nom. ed. IL i. 307, sphalm. = *Roxburghiana.*
rufa, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1848) S06.-Mexic
rugosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 440.—Bras.
Ruiziana, *Vog. Syn. Cass.* 40.—Am. trop.
rupicola, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1871) 674 =olesiphylla.
rusa, Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1848) 806=tristicula.
rusci/olia, Jacq. Ic. Rar. i. t. 71-C. Sophera.
Sabak, *Delile, Cent. PI. Afr.* 28.—Aegypt.
Sagera, Lam. Encyc. i. 643-C. Tora.
Sagotiana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 93.—Guiana.
Saltiana, Steud. Nom. ed. II. i. 307=holosericea.
sapindifolia, *Vog. Syn. Cass.* 84.—Bras.
savannensis, Miq. in Bot. Zeit. i. (1843) 461 - nniflora.
scabra, *Pohl,ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 135.—Am. trop.
scabrella, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 81.—Bras,
scandens, *Ruin (f Pav. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 440.—Ecuador.
Schimperi, Steud. Nom. ed. II. i. 807 = holosericea.
schinifolia, A. DC. 7* Not. PL Rar. Hort.Genev. 86 = C. Sophera.
Schlimii, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 671.—Am. trop.
Schomburgkii, *Klottsch, ex Schomb. Faun,* b* *Fl. Gut.* 1207, nomen.—Guiana.
Schultesii, Colla, Hort. Ripul. App. ii. 343-australis.
sclerocarpa, *Vog. Syn. Cass.* 16.--Bras,
secunda, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 148.—Bras.
Selloi, G. Don, Gen. Syst. ii. 442 - multijuga.
Selloi, Spreng. ex Vog. Syn. Cass. 39=speciosa
semi/alcata, Veil. Fl. Klum. 167; iv. t. 68-multi. juga.
semperflorens, DC. Cat. Hort. Monsp. 90^biflora.
Senna, Linn. Sp. PI. 377=oboyata, acntifolia.
sennoides, Jacq. Coll. i. 74 - bicapsularis.
sensitiva, Jacq. 1. c. ii. 867—sericea.
sensitiva, Roxb. Hort. Beng. 32 - mimosoides.
septemtrionalis, *Viv. Elench. PI. Hort. Dinegro,* 14.—Hab.1
septentrionalis, Zuccagni, in Roem. Collect. 141 = laevigata.
sericea, *Sv. Fl. Ind. Occ.* 724.—Am. trop.
serpens, Griseb. Cat PI. Cub. 80=strigillosa.
serpens, *Linn. Syst. Nat.* ed. X. 1018.—Am. trop.
sessilis, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. II. 135, in syn. = andromedea.
setigera, DC. Prod. ii. 499 -montana.
setosa, *Vog. Syn. Cass.* 51.—Bras,
siamea, *Lam. Encyc.* i. 648.—Ind. or.; Malaya.
Sieberi, Presl, in Okcn, Isis, xxi. (1828) 272=glauca.
Sieberiana, *DC. Prod.* ii. 489.—Afr. trop.
silvestris, *Veil. Fl. Flum.* 169; iv. t. 78.—Bras.
simplicifolia, Desv. Journ. Bot iii. (1814) 72 (= £>e-laria ovalifolia).—Bras.
sinensis, J. F. Gmcl. Syst 669 = chinensis.
singueana, Delile, in Caill. Voy. Meroë, Bot. iv. 27 (Cent. PL Afr. 28)=goratensis.
Skinneri, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 542.—Guatemal.
smaragdina, Macfad. Fl. Jamaic i. 847 -nictitans.
Sophera, *Linn. Sp. PI.* 879.—Geront. trop.
Sophera, Wall. Cat n. 6817 = occidental^.
sopheroides, Collad. Hist Cass. 138 - C . Sophera.
Sophora, Auct.-C. Sophera.
sopboroides, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 162.—Am. trop.
speciosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 868 - spectabilis.
speciosa, Roxb. Hort Beng. [31], nomen -glauca.
speciosa, *Schrad. in Goett. Gel. Ant.* i. (1821) 718.—Bras,
spectabilis, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 90.—Am. trop.

CASSIA:—
spinescens, *Hoffmgg. ex Vog. Syn. Cass.* 27.—Bras.
splendida, *Vog. I. c.* 17.—Bras.
Spruceana, *Bent A. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 92.—Bras.
staminea, Vog. Syn. Cass. 14 = ferruginea.
stenocarpa, *Vog. 1. c.* 68.—Bras,
stenophylla, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 535.—Cuba,
stipulacea, *[Soland. in] Ait. Hart. Ken.* ed. II. ii. 52. -Chili.
stipulata, G. Don, Gen. Syst. ii. 448=flavicoma.
striata, Vog. Syn. Cass. 39 = splendida.
stricta, Schiank, Hort. Monac. t. 34 = C. Chamaecrista.
stricta, *Steud. Norn.* ed. II. i. 308.—Afr. austr.
strictifolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 145.—Bras,
slrigillosa, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 581.—Ind. occ.
strobilacea.H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 847 = reticulata.
Sturtii, *R. Br. in Sturt, Centr. Austral. App.* 14.—Austral,
subtriflora, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 176.—Bras,
subulata, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 130.—Am. austr.
succedana, Bell, ex DC. Prod. ii. 498 = marylandica.
suffruticosa, Koen. ex Roth, Nov. Sp. Fl. 213 = glauca.
sulcata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 236 = hirsuta.
sulcata, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 90.—Am. austr.
sulphurea, DC. ex Collad. Hist. Cass. 84 = glauca.
sumatrana, Roxb. Hort. Beng. [31], nomen = siamea.
Sunsub, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 86 - C . Tora.
snpplcx, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 163.—Bras.
surattensis, Burm. f. Fl. Ind. 97=glauca.
surinamensis, *Dehnh. Cat. PI. Jiort. Camald.* ed. II. 18.—Guiana.
Swainsoni, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 167.—Bras.
SwarUii, Wikst. in Vet. Akad. Handl. (1825) 430 = virgata.
sylvestris, Auct.-silvestris.
Tagera, Lam. Encyc. i. 648 " C . Tora.
Tagera, *Linn. Sp. PI.* 376.—Am. trop.
Tala, Desv. Journ. But. iii. (1814) 2a. t 73 = C. Tora.
Tarantan, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 348 = reticulata.
tarda, *Noronka, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 9.—Malaya,
tecta, *Vog. Syn. Cass.* 66.—Bras.
Telfairiana, Wall. Cat. n. 5324 = mimosoides.
tcnella, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 865.—Venezuela.
tenetla, Roxb. Hort. Beng. 32, nomen=mimosoides.
tenuifolia, *Vog. Syn. Cass.* 16.—Bras,
tenuisepala, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 164.—Am. trop.
tenuissima, linn. Sp. PI. 378-biflora.
tephrosiaefolia, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 153.—Am. trop.
teretifolia, *A. Cunn. ex Lindl. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xv. (1841) 60.—Austral.
teretifolia, Lindl. in Mitch. Three Exped. L 289 = artemisioides.
teretiuscula, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 889 = artemisioides.
tetrafoliata, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sir. I. ix. (1826) 428-Langsdorffii.
tetrapkylla, Collad. Hist. Cass. ISO = hispidula.
tetraphylla, Desv. Journ. Bot. iii. (1614) 72 = Desvauxii.
tettensis, *Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 14.—Afr. trop.
texana, *Buckl. in Proc. Acad. Se. Philad.* '1861' (1862) 452-procumbens, *Linn. Herb.*
Thonningii, DC. Prod. ii. 500 = C. Absus.
Thunbergiana, Blume, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 54=mimosoides.
timorensis, *DC. Prod.* ii. 499.—As. trop.; Austral.
tomentosa, Ehrenb. *Sc* Hempr. ex Benth. in Proc. Linn. Soc. ii. (1855) 283-holosericea.
tomentosa, *Linn. f. Suppl.* 231.—Am. trop.
tomentosa, Wall. Cat. n. 5304 = hirsuta.
Tora, *Linn. Sp. PI.* 376.—Cosmop. trop.
toroides, Roxb. Hoit. Beng. [31], nomen = C. Tora.
torosa, Cav. Desc. 181 = C. Sophera.
torulosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. I'Z7 = C. Sophera.
trachycarpa, *Vog. Syn. Cass.* 52.—Bru.

CASSIA:—
trachypus, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 122.—Bras.
tragacanthoides, *Mart, ex Benth. I. c.* 166.—Am. trop.
trichopoda, *Benth. 1. c.* 163.—Am. trop.
triflora, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 40 = C. Chamaecrista.
triflora, *Vahl, Eelog. Am.* iii. 11.—Ins. S. Cruc
trinitatis, Benth. in Hook. Joum. Bot ii. (1840) 77 = racemosa.
trinitatis, Reiehb. ex DC. Prod. ii. 489=spectabilis.
tristicula, *H. B. UK. Nov. Gen. et Sp.* vi. 867.—Am. austr.
tropica. Veil. Fl. Flum. 166 ; iv. t. 64=laevigata.
tuberculata, *Collad. Hist. Cats.* 133.—Bras.
Tula, Desv. ex Steud. Norn. ed. II. i. 308 = C. Tora.
umbellata, Reiehb. Ic. Exot. t. 206 - australis.
undulata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 76.—Am. trop.
uniflora, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6=sericea.
uniflora, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 201.—Am. trop.
Urmenetae, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 708.—Chili,
ursina, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 151.—Am. trop.
Vauthieri, *Benth. 1. c.* 138.—Am. trop.
velutina, *Vog. Syn. Cass..* 24.—Bras.
venenifera, Rodsch. in G. F. W. Mey. Prim. Fl.Esseq. 167 - hirsuta.
venosa, Castigl. ex Zuccagni, in Roem. Collect. 140 = C. Chamaecrista.
venosa, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 72 = cytisoides.
vcnulosa, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 170.—Bras,
venusta, *F. Muell. Fragm.* i. 165.—Austral.
venustula, H. B. & K. Nov. Gen.et Sp. vi. 858 = biflora.
vernicosa, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 244 = laevigata.
verrucosa, *Vog. Syn. Cass.* 38.—Bras.
versieolor, Benth. PI. Hartw. 128 = incamata.
versicolor, *Mey en, in Vog. Syn. Cass.* 29 ; *et PI. Meyen,* 89.—Peruv.
vestita, *Vog. Syn. Cass.* 60.—Bras,
viciacfolia, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1871) 544.—N. Granat.
villosa, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 4.—Mexic.
viminea, *Linn. Syst. Nat.* ed. X. 1016.—Am. trop.
virgata, Kich. in Act. Soc. Hist. Nat Par. i. (1792) 108 = chrysocarpa.
virgata, Sieber, ex Stead. Nom. ed. II. i. 308=glandulosa.
virgata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 66.—Ind. occ.
viscida, *Zoll. V Mor. in Nat. en Geneest. Arch. Neerl. Indie,* iii. (1846) 80.—Malaya,
viscosa, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 360.—N. Granat.
viscosa, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PI. 206 - C . Absas.
viscosopilosa, Steud. in Flora, xxvi. (1848) II. 760 = viscosa.
Vogcliana, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 342.—Mexic.
vulgaris, *Roxb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 308.—Ind. or.
Wallichiana, DC. in Mém. Soc. Phjs. Genèv. ii. (1824) 182=mimosoides.
Wightiana, R. Grab, in Wall. Cat. n. 5829=tomentosa.
Wislizeni, *A. Gray, PI. Wright,* i. 60.—N. Mexic.
Wrightii, *A. Gray, 1. c.* ii. 50.—Mexic.
xanthocoma, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 10.—Borneo.
xiphoidea, Bertol. Fl. Guatim. 14 = biflora.
zambesica, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 280.—Afr. trop.
zanzibarensis, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 77.—Afr. trop.
zygophylla, Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 288 =eremophila.

CASSIANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266 •= Cassia, Linn. (Legumin.).

CASSIDA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 188 (1763)-Soutelleria, Herm. (Labiat.).
alpina, Moench, Meth. Suppl. 144=S. alpina.
altissima, Moench, 1. c. 145=S. altissima.
galericulata, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 430 = S. galericulata.
hastifolia. Scop. 1. c = S. hastifolia.
lateriftora, Moench, Meth. Suppl. 145=S. lateriflora.
major, Gilib. Fl. Lituan. i. 90 - S . galericulata.
minor, Gilib. 1. c. 91=S. minor.
racemosa, Moench, Meth. 414=S. peregrina.

CASSIDOCARPUS, Presl, ex DC. Prod. iv. 82 (1830) = Asterlscium, Cham. *Sc* Schlecht. (Umbellif.).
chilensis, Presl, Lc.nA. chilense.

CASSIERA, Raensch. Nom. ed. III. 42 (1797) sphalm. = Cansjera, Juss. (Olacin.).

CASSINE, linn. Gen. ed. I. 888 (1737). *CELASTRINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 363.
MAUROCENIA, Linn. Gen. ed. I. 85 (1737).
aethiopica, Eckl. & Zeyh. Enum. 128=capensis.
aethiopica, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 227.—Afr. austr.
affinis, *Sond. in Han. V Send. Fl. Cap.* i. 465.—Afr. austr.
albanensis, *Sond. I. c.* 467.—Afr. austr.
articulata, E. Mey. ex Sond. 1. c. 457 = Celastrns procambens.
Barba, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 243, sphalm.=seq.
barbara, *Linn. Mant.* ii. 220.—Afr. austr.
capensis, *Linn. 1. c.*—Afr. austr.
caroliniana, Lam. Encyc. i. 652=Ilex Cassine.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 242~ Ilex ambigna.
Colpoon, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 128=affinis.
Colpoon, Thunb. Prod. PI. Cap. 52 = capensis.
concava, Lam. Encyc. i. 652 = Celastrus lucidus.
Congonha, St. Hil. in Guill. Arch. Bot. i. (1832) 31 = Villaresia mncronata.
corymbosa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1-Ilex Cassine.
crocea, Presl, Bot. Bemerk. 37 = Elaeodendron capense.
discolor, Wall, in Roxb. *VI* Ind. ed. Carey, ii. 378 = Microtropis discolor.
domingensis, *Spreng. Syst.* i. 939.—Ins. S. Doming.
excelsa, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 376 « Ilex excelsa.
Gongonha, Mart. Reise Bras. i. 285=Ilex Gongonha.
humilis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 308 = Celastrus lucidus.
ilicifolia, Hochst. ex Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 474 = Cassinopsis cape'nsis.
integrifolia, Salisb. Prod. 173=C. Maurocenia.
Kraussiana, Bernh. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 466 = capensis.
Kraussiana, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) I. 305.—Afr. austr.
laevigata, Lam. Encyc. i. 652 — Pterocelastrus rostratus.
latifolia, *Eckl. &• Zeyh. Enum.* 129.—Afr. austr.
magellanica, Lam. Illustr. ii. 92. n. 2690 = Maytenus magellanicus.
Maurocenia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 885.—Afr. austr.
mucronata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc (1858) I-455 = Cassinopsis capensis.
oleifolia, Pers. S)n. i. 327 = Celastrus oleoides.
oleoides, Lam. Encyc. i. 652 = Celastrus oleoides.
oppositifolia, *Mill. Gard-Dict.* ed. VIII. n. 3.—Hab.?
parvifolia, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. •• 468 = Elaeodendron croceum.
parvifolia, *Sond. 1. c.* 466.—Afr. austr.
Peragua, Linn. Mant. ii. 220=Ilex Cassine.
ramulosa, Rafin. Fl. Ludov. 110 = Ilex Cassine.
scandens, *Eckl. &• Zeyh. Enum.* 128.—Afr. austr.
serratifolia, Salisb. Prod. 173 = capensis.
sphaerocarpa, Cels, ex Stend. Nom. ed. II. i. 308 = capensis.
xylocarpa, Vent. Choix, 23 = Elaeodendron xylocarpum.

CASSINIA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 126. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 313.
ACHROMOI.AENA, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvi. 222 (1828).
APALOCHLAMYS, Cass. 1. c. 228 (1828).
CHROMOCUITON, Cass. 1. c. 220 (1828).
RHYNEA, DC. in Deless. Ic. Sel. iv. t. 52 (1837).
aculeata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) «'• —Austral.
aculeata, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 156 = Conninghami.
adunca, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 496 •* aculeata.
affinis, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 127"* aculeata.
arcuata, *R. Br. I.* c—Austral.
argophylla, DC. Prod. vi. 155 = Helichrysum few* gineum.
aurea, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 127—Austral.

CASSINIA:—
aurea, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. (1813) 185 = Angianthus tomentosus.
berberifolia, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 155 = denticulata.
cinerea, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 132=leptophylla.
compacts, *F. Muell. Fragm.* i. 18.—Anstral.
cuneifolia, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 156 helichrysum Backhousii.
Cunninghami, DC. Prod. vi. 156 = Helicbrysnm Cunninghamii.
cuprea, F. Muell. Fragm. iii. 139 - Helipterum polycephalum.
denticulata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 127.—Austral.
fulvida, *Hoot./. Handb. New Zeal. Fl.* 145.—N. Zel.
glossophylla, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* lvi. 219.—Austral.
hygrophila, A. Cunn. in DC. Prod. vi. 156 = quinquefaria.
laevis, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 127.—Austral.
laevis, Endl. ex DC. 1. c.=longifolia.
ledi/olia, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 155 - Helichrysnm ledifolium.
leptocephala, *F. Muell. Fragm.* iii. 138.—Austral,
leptophylla, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 126.—N. Zel.
longifolia, *R. Br. 1. c.* 127.—Austral.
obovata, A. Cunn. in DC. Prod. vi. 155 = Helichrysnm obcordatum.
paniculata, Behr & F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 496-arcuata.
patens, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 156 = Helichrysum Cunninghami.
pholidota, *V.* Muell. Fragm. ii. 131 = Helichrysum pholidotum.
quinquefaria, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 127.—Austral.
quinquefaria, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 496 = Humea punctulata.
retorta, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vi. 154.—N. Zel.
rosmarini/olia, A. Cunn. ex DC. L c. 156=laevis.
spathulata, Endl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 809 = spectabilis.
spectabilis, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 128.—Austral.
subtropica, *F. Muell. Fragm.* i. 17.—Austral,
tenuifolia, *Benth. Fl. Austral*, iii. 585.—Austral.
Theodori, *F. Muell. Fragm.* v. 148.—Austral.
uncata, A. Cunn. in DC. Prod. vi. 156 – aculeata.
Vauvilliersii, *Hooi./. Fl. N. Zel.* 183.—N. Zel.

CASSINIOLA, F. Muell. Fragm. iii. 139 (1863) = Helipterum, DC. (Compos.).
cuprea, F. Muell. 1. c = H. polycephalum.

CASSINOPBIS, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i 473 (1860). *OLACINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 354.
capensis, *Harv. tf Sond. I. c.* 474.—Afr. austr.
ciBata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 118.—Madag.
ttadagascariensis, *Baill. Adansonia*, xi. (1873-76) 180.—Madag.
tinifolia, *Harv. Thes. Cap.* ii. 44.—Afr. austr.

CA8SIOPE, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 167. *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 584.
ericoides, *D. Don. I. c.* 158.—Sibiria.
festigiata, *D. Don, 1. c.* 156.—Reg. Hirnal.
hypnoides, *D. Don, I. c.* 158.—Reg. arct. et subarct.
lycopodioides, *D. Don, 1. c.* 158.—Sibiria; Am. subarct. occ.
Mertensiana, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 829.—Am. bor. occ.
oxycoccoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 8OO.-Kamtschat.
"edowskii, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 829.—Sibir. or. j Ross.
selaginoides, *Hooi./. tf Thorns, in Hook. Kew Journ.* »ii. (1855) 126. t. 4.—Reg. Himal.
Stelleriana, *DC. Prod*, vii. 611.—Alaska.
tetona, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* xvii. (1834) 158.—Reg. arct. et subarct.

CASSIPOUBEA, Aubl. PI. Gui. i. 528. t.211 (1775). *RHIZOPHOREAE*, Benth. & Hook. f. i. 682.
LEGNOTIS, SW. Prod. Veg. Ind. Occ. 84 (1788).
TITA, Scop. Introd. 219 (1777).
a/ricana, Benth. in Hook. Niger Fl. S41 = Weihea africana.
alba, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 223.—Ind. occ.
congensis, *R. Br. in Tuckey, Voy. Congo*, 18.—Afr. trop.
elliptica, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 131.—Jamaica,
guianensis, *Aubl. PL Gui.* i. 529. t. 211.—Am. austr.
gummiflua, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 123 - Dactylopetalum sessiliflorum.
lanceolata, *Tul. I. c.* 121.—Ins. Mascar.
leptoclada, *Tul. I. c.* 125.—Ins. Mascar.
macrophylla, *DC. Prod.* iii. 34.—Bras,
madagascariensis, *DC. 1. c.*—Madag.
microcarpa, *Tul. in Ann.Sc. Nat.* Sér.IV. viii. (1857) 162.—Ins. Mascar.
microphylla, *Tul. I. c.* vi. (1856) 124.—Madag.
myriocarpa, *Tul. 1. c.* viii. (1857) 162.—Madag.
ovala, *Tul. I. c.* vi. (1856) 121.—Ins. Comor.
phaeotricha, *Tul. 1. c.* 122.—Madag.
quadrilocularis, Spruce, ex Benth. in Mart Fl. Bras. xii. II. 429 = guianensis.
serrata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 223.—Guiana.
Spruceana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 429.—Am. trop.

CASSITHA, Hill, Veg. Syst. ix. 17 (1765) = Caesytha, Linn. (Laurin.).

CASSUMHIUM, Benth. & Hook. f. Gen. i. 404 (1862) = CUSSAMBIUM, Rumph. = Schleichera, Willd. (Sapind.).

CASSUMUNAR, Colla, Nov. Scic. Gen. 9 (1830)-Zingiber, Adans. (Scitamin.).
Roxburgh™, Colla, 1. c. 10=Z. Cassumunar.

CASSUPA, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. i. 48. t. 12 (1808). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 65.
laevis, *Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ix. (1858) 44.—N. Granat.
verrucosa, *Humb. b" Bonpl. PI. Aequin.* i. 43.1.12.—Mexic

CASSUTHA, [J. Bauh.T Des Moul. Etud. Org. Cusc. 66 (165S) = Cu8CUta, Linn. (Convolvul).
americana, Des Moul. 1. c. 70=Cusc. americana.
arabica, Des Moul. 1. c. 72 = Cusc arabica.
chrysocoma, Des Moul. 1. c. 71 = Cusc. australis.
suaveolens, Des Moul. 1. c 66=Cusc. racemosa.

CASSUVIUM, Lam. Eneyc. i. 22 (1783) = Anaoardium, Rottb.
pomi/erum, Lam. 1. c. = A. occidentale.
reni/orme, Blanco, Fl. Filip.ed. 1.322 - A. occidentale.
solitarium, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 475 = A. occidentale.

CASSYTA, Linn. Gen. ed. VI. 291 (1764) = Cassythft, Linn. (Laurin.).

CASSYTHA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 346 (1821) = Cuacuta, Tourn. (Convolvul.).
major, S. F. Gray, 1. c 346=Cusc. europaea.

CABSTTH A, Linn. Sp. PI. ed. I. 35 (1753). *LA URL NEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 164.
CALODIUM, Lour. Fl. Cochinch. 247 (1790).
OZARTHRIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 92 (1836).
ROMBUT, Rumph. ex Adans. Fam. ii. 284 (1763).
RUMPUTRIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 92 (1836).
VOLUTELLA, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 84 (1775).
americana, Nees, Syst. Laurin. 644 = filiformis.
aphylla, Raeusch. Nom. ed. III. 116 - filiformis.
brasiliensis, Mart, ex Nees, Syst. Laurin. 648 = filiformis.
capensis, *Meissn. in DC. Prod.* xv. l. 254.—Afr. austr.
capillaris, *Meissn. I. c.* 262.—Zeylan.; Borneo.
Casuarinae, Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 619 =glabella.
ceratopoda, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 257-pomiformis.
ciliolata, *Nees, Syst. Laurin.* 646.—Afr. austr.
corniculata, *Burnt./. Fl. Ind.* 93.—Ind. or.
coronata, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* i. 620.—Austral.
digitata, Nees, 1. c.-racemosa.

CASSYTHA:—
dispar, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 578=glabella.
dissitiflora, *Meissn. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1870) 145.—Bras.
filiformis, *Linn. Sp. PI.* 35.—Cosmop. trop.
fili/ormis, Thunb. Prod. PI. Cap. 78=glabella.
flava, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* i. 620.—Austral,
glahella, *R. Br. Prod.* 404.—Austral.
glabella, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 256 = paniculata.
guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 189 = filiformis.
melantha, *R. Br. Prod.* 404.—AuMial.
micrantha, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 256.—Austral.
microcephala, Meissn. 1. c. 258 = glabella.
Muelleri, Meissn. 1. c. 257 = racemosa.
multiflora, Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 621 = pomifonnis.
nodiflora, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 252.—Austral,
pnniculata, *R. Br. Prod.* 404.—Austral,
phaeolasia, *F. Muell. Fragm.* v. 167.—Austral.
piligera, Schlecht. in Linnaea, xxi. (1848) 446 - pubescens.
pomiformis, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* i. 620.—Austral.
pubescens, *R. Br. Prod.* 404.—Austral,
racemosa, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* i. 621.—Austral.
remotiflora, F. Muell. ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 256 = paniculata.
robusta, Meissn. 1. c. 255 = melantha.
rubiginosa, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 171, nomen.—Afr. austr.
rugulosa, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 255 = pubescens.
subcapitata, Meissn. 1. c. 253 = pomiformis, racemosa.
tasmanica, Meissn. 1. c. 252 = pubescens.
triflora, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 171 = capensis.
umbellata, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 267-racemosa I
sseylanica, Gacrtn. Fruct. i. 184 = filiformis 1

CASSYTHA, Mill. Gard. Diet. ed. VIII (1768) - Rhipsalis, Gaertn. (Cactcae).
bacci/era, Mill, ex DC. l'rod. iii. 476 = seq.
fili/ormis, Mill. Gard. Diet. cd. VIII = R. Cassytha.
polysperma, Ait. ex Gaertn. Fruct. i. 137 = R. Cassytha.

CASTALIA, Salisb. Parad. Lond. i. t. 14 (1805); et in Kon. *8c* Sims, Ann. Bot ii. (1806) 71 = Nymphaea, Linn.
ampla, Salisb. 11. cc. t. 14, 73 = N. ampla.
caerulea, Tratt. in Flora, v. (1822) 604 = N. stellata.
edulis, Salisb. Parad. Lond. i. sub t. 14; et in Kon. *Sc* Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 78 = N. Lotus.
Lotus, Tratt. in Flora, v. (1822) 698-N. Lotus.
magnified, Salisb. Parad. Lond. i. t. 14 = N. Lotus.
mystica, Salisb. 1. c ; et in Kon. & Sims, Ann. Bot ii. (1806) 73 = N.Lotus.
pubescens, Blume, Bijdr. 48 = N. Lotus.
pudica, Salisb. in Kon. *Sc* Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 72-N. odorata.
pygmaea, SaUsb. Parad. Lond. (1806) i. 2. t. 68 = N. tetragona.
rubra, Tratt. in Flora, v. (1822) 596=N. Lotos.
Rudgeana, Tratt. 1. c. 6i>9-»N. tetragona.
sacra, Salisb. Parad. Lond. i. sub 1.14 = N. Lotus.
scuti/olia, Salisb. 1. c.; et in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 72 =«N. stellata.
speciosa, Salisb. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 72 = N. alba.
stellaris, Salisb. Parad. Lond. i. sub 1.14 - N. stellata.
stellata, Blume, Bijdr. 49 - N. stellata.
versicolor, Tratt. in Flora, v. (1822) 600 = N. stellata.

CASTALIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxx. 332 (1824) = Simorphotheoa, Moench (Compos.).
Ventenati, Cass. 1. c. = D. aurantiaca.

CASTANEA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *CUPULIFERAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 409.
CASTANOPHORUM, Neck. Elem. iii. 257 (1790) (Casanophorum).
acuminatissima, Blume, Mus. Bot. Lagd. Bat. i. 283 » Quercus Junghuhnii.
alni/olia, Nutt. Gen. Am. ii. 217=pumila.
americana, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 614 •sativa.
americana, Rafin. Fl. Ludov. 134; New Sylva, 82 = sativa.
argentea, Blume, Bijdr. 62fi=Castanopsis argentea.

CASTANEA :—
argyrophylla, Buek, in DC. Prod. Index, iv. 67 — Castanopsis argentea.
breyicutpis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 866-Castanopsis javanica.
Bungeana, Blame, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 284 = saliva.
turuana, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1873) 877 = Castanopsis bnruana.
castanicarpa, Oerst. 1. c = Castanopsis castanicarpa.
Chincapin, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 24 = pnmila.
chinensis, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 78-sativa.
chinensis, Spreng. Syst. iii. 856 = Castanopsis tribuloides.
chrysophylla, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 159 = Castanopsis chrysophylla.
concinna. Champ, ex Benth. in Hook. Kew Jonrn. vi. (1854) 115 =Castanopsis concinna,
cooperta, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* **V. ix. (1873)** 879.—Ins. Philipp.
costata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 284=Castanopsis javanica.
crenata, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. III. (1846) 824=sativa.
divaricata, Oeist. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1878) 879 = Castanopsis argentea.
diversifolia, *Kursi, in Journ. As. Soc Beng.* **xliv.** (1875) II. 198.—Ind. or.
echidnocarpa, Hook. f. et Thorns, ex A. DC. in Prod. xvi. II. 112 = Castanopsis tribuloides.
Fagus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 242 = Fagus sylvatica.
Falconeri, Hance, in Journ. Bot. xiil. (1875) 867-Castanopsis armata.
furfurella, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 852-Castanopsis Hystrix.
glomerata, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 283 = Castanopsis sumatrana.
Hystrix, Hook. f. & Thorns, ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 119-Castanopsis Hystrix.
indica, Koxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 643 = Castnnopsis indica.
inermis, Lindl. in Wall. PI. As. Rar.ii. 6=Castanopsis sumatrana.
japonica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 284 = sativa.
javanica, Blntne, Bijdr. 525 = Castanopsis javanica.
lanceaefolia, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 482 = Quercus lanceaefolia.
latifolia, *Blume, Bijdr.* 526.—Java.
martabanica. Wall. Cat. n. 2764; PL As. Rar. ii. 1.107 —Castanopsis argentea.
microcarpa, Lindl. ex Wall. Cat. n. 8735 = Castanopsis tribuloides.
mollissima, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **i. 286.—** China.
montana, Blume, Bijdr. 626-Castanopsis javanica.
nana, Muhl. Cat. 86=pumila.
pumila, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 73=sativa.
pnmila. *Mill. Card. Did.* ed. VIII. n. 2.—Am. bor.
pumila, Siebold, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. 1. 28K - Ca .tanopsis tribuloides.
purpurella, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 852-Castanopsis **Hystrix.**
regia, Hance, in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. xviii. (1862) 230 - Quercus fissa.
rhamnifolia, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 481 = Castanopsis rhamnifolia.
rhamnifolia, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Sir.* **V. ix.** (1873) 878.—Am. centr.
Roxburghii, Lindl. in Wall. PI. As. Rar. ii 6 = Castanopsis castanicarpa.
sativa, *Mill. Card. Diet* ed. VIII. n. 1.—Europ.; Japon.; Am. bor.
sempervirens, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. 71, ed. II. (1873) 75-Castanopsis chrysophylla.
tessi[lii]folia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 284-Quercus Junghuhnii.
Sloanea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3=Sloanea clentata.
spectabilis, Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 866 = Castanopsis suniatrana.
sphaerocarpa, Lindl. in Wall. PI. As. Rar. ii. 5-Castanopsis arma'i.
strict a, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III. (1846) 225 = sativa.
sumatrana, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1873) 878 - Castanopsis snmatrana.

CASTANEA :—
tribuloides, lindl. in Wall. PI. As. Rar. ii. 6=Castanopsis tribuloides.
tribuloides, Wall. Cat. n. 2765 B.=Quercus lanceaefolia.
Tungurrut, Blume, Bijdr. 625 = Castanopsis Tungurrut.
vesca, Gaertn. Froct i. 181. t. 37=sativa.
mdgaris, Lam. Encyc. i. 708-sativa.

CASTAXELLA, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 894 (1862). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. I.e.
granatensis, Planch. & Linden, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) S65=Paullinia granatensis.
paullinioides, *Spruce, ex Radlk. Monog. Serjan.* **75.** —Bras,
riparia, *Spruce, ex Radlk. I.* **c—Peruv.**

CASTANOCARPUS, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 589 (1830)^Castaaospermum, A. Cunn. (Legnmiu.).
australis, Sweet, 1. c = Castanosp. auslrale.

CASTANOLA, Llanos, In Mem. Acad. Cienc. Madr. it (1859) 503 = Connarufl, Linn.
trinervis, Llano*, 1. c. = Conn. monocarpus.

CASTANOPHORUM, Neck. Elem. iii. 257 (1790) = **Castanea,** Toum. (Cupulif.).

CA8TAN0MIS, Spach, Hist. Veg. Phan. xi. 185 (1842). *CUPULIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 409.
CALLAEOCARPUS, Miq. PI. JungH. i. 18 (1851).
acuminatissima, A. DC. ex Hance, in Journ. Bot. i. (1863) 182 = Quercus lanceaefolia.
argentea, *A. DC. in Journ. Bot.* i. (1863) 182.—Burma; Malaya,
armata, *Spach, Hist. Vig. Phan.* xi. 185.—Reg. Himal.; Burma.
brevicuspis, A. DC. ex Hance, in Journ. Bot. L (1863) 188— javanica.
buruana, *Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* **i. 120.—Ins.** Molucc.
castanicarpa, *Spach, Hist. Vig. Phan.* xi. 185.—Reg. Hijoal.
caudata, *Franch. PI. Davidian.* i. 277.—Mongol.
chinensis, Hance, in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 199 =tribuloides.
chrysophylla, *A. DC. in Journ. Bot.* i. (1863) 182.—Am. bor. occ.
concinna, *A. DC. I. c.*—Hongkong.
costata, A. DC. 1. c. -javanica.
discocarpn, Hance, 1. c. xvi. (1878) 201—Quercus discocarpa.
echidnoearpa, A. DC. 1. c. *i.* (1863) J«2 = tribuloides.
echinocarpa, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 119, sphalm.—praec.
Fabri, *Hance, in Journ. Bot.* xxii. (1884) 230.—China.
Falconeri, Hance, 1. c xiii. (1875) 368 = armata.
ferox, Spach, Hist. Veg. Phan. xi. 185=trihuloides.
Fordii, *Hance, in Journ. Bot.* xxii. (1884) 230.—China.
Hystrix, *A. DC. 1. c.* i. (1863) 182.—Reg. Himal.; Malaya.
indica, *A. DC. 1. c.*—Reg. Himal.
inermis, Benth. & Hook./. Gen. iii. 409-sumatrana.
javanica, *A. DC. in Jour* Bot.* i. (1868) 182.—Malaya.
jucunda, *Hance, I. c.* xxii. (1884) 230.—China.
Lamontii, *Hance, 1. c.* xiii. (1875) 369.—China.
lanceaefolia, Ran, For. Fl. Brit Burma, ii. 482 = Quercus lanceaefolia.
mitifica,. Hance, in Joum. Bot. xvi. (1878) 200 = sumatrana.
Pierrei, *Hance, I. c.* xiii. (1876) 369.—Cambodia,
rhamnifolia, *A. DC. Prod.* xvi. II. 113.—Burma; Sumatra.
Schefferlana, *Hance, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 200. —Sumatra.
sessilifolia, A. DC. 1. c. i. (1863) 182 = Quercus Junghuhnii.
spectabilis, A. DC. L c. -javanica.
sumatrana, *A. DC. I. c.*—Burma; Malaya,
tibetana, *Hance, 1. c.* xiii. (1876) 367.—Tibet; China,
tribuloides, *A. DC. 1. c.* 1. (1863) 182.—Keg. Himal.; Burma.
trisperma, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 862; in Flora, liii. (1870) 252-javanica.
Tungurrut, *A. DC. in Journ. Bot.* i. (1868) 182.—Malaya.

CASTAWOSPEBMUM, A. Cunn. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 241. t. 51. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 656.
CASTANOCARPUS, Sweet, Hort. Brit ed. II. 689 (1830).
VIELLARDIA, Montr, in Me'm. Acad. Lyon, x. (1860) x. 196.
australe, *A. Cunn. &* Fraser, in Hook. 1. c.***—Austral.**

CASTANOSPOEA, F. Muell. Fragm. ix. 92 (1875). ***SAPINDACEAE.***
Alphandi, *F. Muell. I. c*—Austral.

CASTEIiA, Turp. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 78. t. 6. *SJMARUBEAE,* Benth. & Hook. f. i. 310.
alaternifolia, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* **v.** (1846) 669.—Chili,
coccinea, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 107.—Reg. Argent,
depressa, *Turp. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 79. t. 6 A.—Ins. S. Doming,
erecta, *Turp. 1. c.* 80. t 6 B.—Ind. occ.
Galapagei, *Hook./.in Trans. Linn. Soc.* **xx. (1861)** 229.—Ins. Galap.
laevigata, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 186, nomen.—Hab. ?
lychnophoroides, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 111.—Mexic.
Nicholsoni, *Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 271. t. 66.—Ind. occ.
retusa, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* **(1853) 110.** —Mexic.
tortuosa, *Liebm. 1. c.* 108.—Mexic.
Tweediei, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* **v. (1846)** 669.—Reg. Argent.

CASTELIA, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 134 = **Priva,** Adans. (Verbenac.).
cuneato-ovata, Cav. £ c 186 -laevis.

CASTELIA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 108=Castela, Turp. (Simarub.).

CASTELLIA, Tin. PI. Rar. Sicul. 17 (1817) **-Festuoa,** Linn. (Gramin.).
tuberculaia, Tin. 1. c. 18=F. tuberculata.

CASTELNAVIA, Tul. *Sc* Wedd. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xi. (1849) 108. *PODOSTEMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 114.
CARAJAEA, Wedd. in DC. Prod. xvii. 84 (1878).
fimbriata, *Tul.* Cr *Wedd. I.* c—Bras.
fluitans, *Tul. If Wedd. 1. c.* 109.—Bras.
fruticulosa, *Tul. V Wedd. 1. c.* 110.—Bras.
monandra, *Tul. tf Wedd. I. c.* 109.—Bras.
multipartita, *Tul.* &* *Wedd. I. c*—Bras.
orthocarpa, *Tul. V Wedd. 1. c.* 110.—Bras.
Princeps, *Tul.* b" *Wedd. 1. c.* 108.—Bras.
pusillina, *Tul. & Wedd. 1. c.* 109.—Bras.
serpens, *Tul. V Wedd. I.* **c—Bras.**

CASTIGLIONIA, Ruiz & Pav. Prod. 139. t. 37 (1784) = Jatropha, Linn. (Euphorbiac).
lobata, Ruiz & Pav. 1. c.; Syst. Veg. 277 - J. Curcas.

CASTILLA, Cerv. in Supl. Gaz. Lit. Mexico (Jul. % 1794), 7 = CastUloa, ' Cerv.' (Urticac.).

CASTH.LEJA, Mulis, ex Linn. f. Suppl. 47 (1781). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 973.
EUCHROMA, Nutt. Gen. Am. ii. 64 (.1818).
acuminata, Spreng. Syst. ii. 775-pallida.
acuminata, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc xxiv. (1851) II. 821 = pallida.
affinis, Benth. PI. Hartw. 329=stenantha.
affinis, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* **164.—Calif.**
ambigua, Hook. *Si* Am. 1. c.=Orthocarpus australis-
angustifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 616 = parviflora-
angustifolia, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. H[8] = Integra,
angustifolia, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* ***»••** ii. (1845) 29.—Mexic.
anthemidifolia, Benth. in DC. Prod. x. 528 = tenuiflora-
arvensfe, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* **v. (1880)** 103.—Mexic.
Bradburii, G. Don, Gen. Syst. iv. 616 = parviflora.
breviflora, *Benth. in DC. Prod.* x. 634.—Venezuela. ,
breviflora, *A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xxxiv• (1862) 25O.-Am. bor. occ.

CABTTLLEJA:—
candens, Durand *bz* Hilg. in Pacif. Rail. Rep. T. 12-linariaefblia.
canescens, *Benth. in tiC. Prod.* x. 533.—Mexic.
cinerea, *A. Gray, in Proc.Am.Acad.* xix. (1883) 93.—Calif.
cocdnea, Dougl. in Lindl. Bot. Reg. 1.1136 = parvirlora.
coccinea, *Spreng. Syst.* ii. 775.—Am. bor.
communis, *Benth. in DC. Prod.* x. 629.—Am. trop.
coronopifolia, *Vent. Choix,* 69.—N. Granat
desertorum, Geyer, in Hook. Kew Joum. v. (1858) 258—parviflora.
divaricata, *Benth. in DC. Prod.* x. 534.—Venezuela.
Douglasii, Benth. 1. c. 530—parviilora.
fissifolia, *Linn./. Suppl.* 283.—N. Granat.
flava, i'. *Wats, in Bot. King, Exped.* 230.—Am. bor. occ.
foliolosa. *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 164.—Calif.
fulgens, Nntt. ex A Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 119 = linariaefolia!
gradlis, *Benth. in DC. Prod.* x. 628.—Mexic
grandiflora, Spreng. Syst. ii. 755 = sessiliflora.
hirsuta, *Mart.* &" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 29.—Mexic.
hispida, Benth. in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 106 = parvifloia.
hyssopi/olia, Willd. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 615 - lithospermoides.
indivisa, *Engelm. in Engelm.* to" *A. Gray, PI. Lindh.* i. 47.—Texas.
Integra, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 119.—N. Mexic.
integrifolia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii 330-canescens.
integrifolia, *Linn./. Suppl.* 298.—Am. trop.
irasuensis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 27.—Costa Rica.
laeiniata, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 60.—Chili,
lanata, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 118.—N. Mexic.
latifolia. *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 154.—Calif,
laxa, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 119.—N. Mexic
Lemmoni, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 297.—Calif,
linariaefolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 532.—Mexic.
Lindheimeri, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 298.—Texas.
linoides, *A. Gray, 1. c.* 299.—Am. bor. occ
lithospermoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 381. 1.164.—Mexic
longibracteata, *Mart.* &• *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1846) 28.—Mexic.
longiflora, *Kunme, in Linnaea,* xvi. (1842) 312.—Mexic.
matrocarpa, Benth. Scroph. Ind. 18 = latifolia.
miniata, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 106.—Am. bor. occ.
minor, *A. Gray, Bot. Calif, i.* 678.—Am. bor. occ
moraneniis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* 329.—Mexic
nnbigena, *H. B. V K. 1. c.* 380.—Ecuador,
oblongifoiu, .4. *Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 296.—Calif.
obovata, Benth. in DC. Prod. x. 528=hirsuU.
occidentalis, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 230-pallida.
Oritabae, Benth. in DC. Prod. x. 538 =» pectinata.
pallida, *Kunth, Syn. PI. Aequin.* ii. 100.—Sibir.; Am. bor.
pallida, Spreng. Syst. ii. 774-septentrionalis, ribirica.
parviflora, *Bong, in M/m. Acad. Pltersb.* Seŕ. VI. v. II. (1840) 157.—Am. bor. occ.
Pectinata, *Mart. V Gall, in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 27.—Mexic
Plagiotoma, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 93.—Calif.
pumila, Wedd. Chlor. And. t. 61 - fissifolia.
PUrpurea, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 616.—Am. bor. occ.
Schaflheri, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 462.—Mexic.
•corzoneraefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 331.—Mexic.
•eptentrionalis, *Lindl. Bot. Reg.* t. 925.—Am. bor.
senata, *Hort. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 611.—Hab.?
•essilinora, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 788.—Am. bor. occ.
**rfcB, Lindl. Bot Reg. t 926=pallida.

CASTILLE JA:—
spedosa, Mart. *8c* Gal. in Boll. Acad. Brux. xii. II. (1845) 80 = scorzoneraefolia.
stenantha, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 295.—Am. bor. occ.
stricta, *Benth. in DC. Prod. x.* 534.—Ecuador,
tenniflora, *Benth. PI. Hartw.* 22.—Mexic.
tenuifolia. *Mart. V Gal. Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1846) 30.—Mexic.
toluccensis, Cham. *8c* Schlecht in Linnaea, ii. (1827) 579 = parviflora *1*
toluccensis, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* Ii. 329.—Mexic.
tomentosa, A. Gray, in Torr. Bot Mex. Bound. 118-integra.
trifida, Willd. ex Walp. Rep. Hi. 394 = nnbigena.
viscidula, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 297.—Am. bor. occ.

CASTILIiOA, Cervant. in Supl. Gaz. Lit. Mexic. (Jul. 2,1794) 7 (Castilla). *URT1CACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 372.
costaricana, *Liebm. in Vidensk. Selsk.Skr.* V.ii. (1851) 819.—Costa Rica,
elastica, *Cert, in Supl. Gam. Lit. Mexico* (Jnl. 2, 1794), 7.—Mexic.
Markhamiana, *Collins, Rep. Caoutch. Comm.* 12. t. 3.—Am. trop.

CASTRA, Veil. Fl. Flnm. 242 (1825); viii. 79-81-TrixiB, F. Br. (Compos.).
illustris. Veil. FL Flum. 843; viii. t. 81 = T. brasiliensis.
nobilis, Vell..l. c. 344 ; viii. t. 81 - T. glaberrima.
praestans. Veil. 1. c. 343 ; viii. t. 80—T. mollissima.
regia. Veil. 1. c. 348 ; viii. t. 7» = T. divaricata.

CABTBATELTJA, Nand. in Ann. Sc. Nat Sêr. III. xiv. (1850) 139. *MELASTOMACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 736.
piloselloides, *Naud. I. c*—N. Graoat.

CASTREA, A. St. Hil. Morphol. 461 (1840)-Phor»-dendron, Nutt. (Loranthac).
/alcata, St. Hil. 1. c.—Bras. ?

CASTRONIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art iv. 2-Helioia, Lour. (Proteac).

CABTJASIKA, Linn. Amoen. Acad. iv. 143, nomen (1769); Adans. Fam. ii. 481 (1763); Forst. Char. Gen. 103. t. 62 (1776). *CASUARINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 402.
acuaria, *F. Muell. in Joum. Bot.* v. (1867) 212.—Austral.
acutivalvis, *F. Muell. Fragm.* x. 61.—Austral.
a/ricana. Lour. Fl. Cochinch. ii. 649 = equisetifolia.
angulata, *Poiss. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Seŕ. I. x. (1874) 49.—N. Caled.
Baxteriana, Miq. Rev. Crit. Casuar. 37. t. 3 C-distyla.
bicuspidata, *Benth. Fl. Austral,* vi. 202.—Austral.
Bmnoniana, *Miq. Rev. Crit. Casuar.* (1848) 21. t. 1. C.—Java.
Chamaecyparis, *Poiss. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sit.* I.x. (1874) 62.—N. Caled.
collina, Poiss. *ex Panch.* &• *Sebert, Not. Bois Nouv. Calid.* 174.—N. Caled.
corniculata, *F. Muell. Fragm.* x. 62.—Austral.
cristata, Miq. Rev. Crit. Casuar. 70. t. 10. A = stricta.
Cnnninghamiana, *Miq. I. c.* 66. t. 6 A>—Austral.
Decaisneana, *F. Muell. Fragm.* i. 61.—Austral,
decussata, *Benth. Fl. Austral,* vi. 200.—Austral.
Deplancheana, *Miq. in DC. Prod.* xvi. II. 842.—N. Caled.
distyla, *Vent. Jard. Cels,* 62. t. 62.—Austral.
Drummondiana, *Miq. Rev. Crit. Casuar.* 26. t. 1 D.—Austral.
dumosa, A. Conn, ex Miq. in DC. Prod. xvi. II. 338-distyla.
echinata, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, vi. 202 = thnyoides.
equiseti/olia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 661 = sumatrana.
equisetifolia, *Linn. Amoen. Acad.* iv. 143; *Forst. Char. Gen.* 108. f. 62.—Malaya; Ins. Pacif.

CASttARtNA:—
excelsa, Dehnhardt, ex Miq. Rev. Crit. Casuar. 23.1.1 F = equisetifolia.
excelsa, Salisb.Prod. 2 = stricta.
Fraseriana, *Miq. Rev. Crit. Casuar.* 59. t. 6. D.—Austral.
glauca, *Sieber, in Spreng. Syst.* iii. 803.—Austral.
Gunnii, Hook. f. ex Miq. in Neder. Kruidk. Arch. iv. (1859) 100 = stricta.
hexagona, *Dehnhardt, in Revista Napolitana,* i. III. 176.—Austral.
Huegeliana, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.,* i. 640.—Austral.
humilis, Otto *Sc* Dietr. All*. Gartenz. ix. (1841) 163 = Fraseriana.
incana, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, vi. 197-equisetifolia.
indica. Pen. Syn. ii. 681—equisetifolia.
inophloia, *F. Muell. V Bailey, in Melb. Chemist* (Apr. 1882).—Austral.
Junghuhniana, *Miq. PI. Jungh. 7.*—Malaya.
lateriflora, Poir. Encyc. Suppl. ii. 658—equisetifolia.
Lehmanniana, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 639 = humilis.
lepidophloia, *F. Muell. Fragm.* x. 116.—Austral.
leptoclada, Miq. Rev. Ciit Casuar. 41. t. 4. C - suberosa.
leucodon, *Poiss. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Seŕ. I. x. (1874) 52.—N. Caled.
littoralis, Salisb. Prod. 2 = equisetifolia.
lucida, *Dehnhardt, in Revista Napolitana,* i. III. 175.—Austral.
lugubris, Salisb. Prod. 2—tornlosa.
macrocarpa, A. Cunn. ex Miq. in DC. Prod. xvi. II. 335—stricta.
Mertensiana, Rnpr. ex Miq. 1. c. 339 - equisetifolia.
microstachya, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.* i. 642.—Austral.
Miquelii, Hook. f. ex Miq. in DC. Prod. xvi. II. 837-suberosa.
moesta, F. Muell. ex Miq. in Neder. Kruidk. Arch. iv. (1859) 98 = suberosa.
montana, *Leschen. ex Miq. in Zoll. Syst. Verm. Ind. Archip.* 86.—Malaya.
Muelleriana, Miq. in Neder. Kruidk. Arch. iv. (1859) 99-distyla.
muricata. Herb. Paris, ex Miq. in DC. Prod. xvi. II. 335—montana.
muricata, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 619 - equisetifolia.
nana, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, vi. 200—humilis.
nana, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 574 = Fraseriana.
nana, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iii. 804.—Austral,
nodiflora, *Forst. /. Prod. fl. Ins. Austr.* 64.—Ins. N. Hebrid.
obesa, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 648 - Huegeliana.
obtusa, Hort. ex Miq. in DC. Prod. xvi. II. 384-glauca.
oxyclada, Miq. 1. c 344 - acuaria.
paludosa, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 808-distyla.
Pauper, *F. Muell. ex Miq. in Neder. Kruidk. Arch.* iv. (1869) 100.—Austral.
Preissiana, Miq. in Lehm. Fl. Preiss. i. 640-humilis.
pumila, Otto & Dietr. in Allg. Gartenz. ix. (1841) 162-distyla.
quadridentata, Desf. Tabl. Cat. Hort Par. ed. II. 246—quadrivalvis.
quadrivalvis, LabilL Nov. Holl. PI. ii. 67. t 218 - stricta.
ramuliftora, Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 163—humilis.
repens, Hort. ex Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. 88-equisetifolia.
rigida, Miq. in DC. Prod. xvi. II. 837-distyla.
rigida, Miq. Rev. Crit Caniar. 61. t 7. D - suberosa.
rugosa, *Roxb. Hort. Beng.* 66, nomen.—Ind. or. t
Rumphiana, *Miq. in Flora,* xlviii. (1865) 23, 38.—Amboina.
selaginoides, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 648-humilist.
sparsa, Tausch, in Flora, xxiL (1839) 480-equisetifolia!
stricta, *[Dryand. in] Ait. Hort. Km.* ed. I. iii. 320.—Austral.
stricta, Miq. in DC. Prod. xvi. II. SS6-distyla.

CASTTASmA:—
suberosa, *Otto (f Dietr. Allg. Gartenz.* **(1811) 156.—** Austral,
•sumatrana, *Jungh. in Hoev.* **b"** *D* Vriese, Tijdschr.* xi. (1844) 115.—Sumatra.
:tenuissima, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 801=torulosa.
•tephrosperma, Lehm. Hort. Hamb. ex Miq. Rev. Crit. Casuar. 81 = humilis.
thuyoides, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.* i. 641.—Austral.
tortuosa, Henry, in Nov. Act. Nat. Car. xx, I. (1847) 217. t. 19 = stricta?
torulosa, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kern.* **cd. I. iii. 820.** —Austral.
torulosa, Miq. Rev. Crit. Casuar. 75. t. 11 B=glauca.
torulosa, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 639 -= Fraseriana.
trichodon, *Miq. I. c.* 641.—Austral.
truncata, W'illd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 68 = equisetifolia?
verticillata, Lam. Encyc. ii. 602=nodiflora.
Webbiana, *Miq. in Flora,* xlviii. (1865) 33.—Borneo; N. Caled. ?

CATABBOSA, Beauv. Agrost. 97. t. 19. f. 8 (1812). *GRAMINEAE,* Bcnth. & Hook. f. iii. 1186.
agrostidea, Presl, FL Sicul. p. xliv — Airopsis agrostidea.
algida. Fries, Nov. Fl. Suec. Mant. iii. 171=Phippsia algida.
altaica, Boiss. Fl.. Orient, v. 579 **-** Colpodium altaicum.
antarctica, *Hoot./. Fl. Antarct** 102.—N. Zel.
aquatica, *Beauv. Agrost.* 97.1.19. f. 8.—Reg. bor. temp.
Balansae, *Boiss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* **xxi. (1874) 15.** —As. Min.
Capusii, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sei. VI. xviii. (1884) 272.—Turkest.
concinna, T. Fries, in Ofver. Vet. Akad. xxvi. (1869) 140 = Phippsia algida ?
distant, Link, ex Hcynh. Nom. ii. 126 - Glyceria distans.
elodes, Auct.-=helodcs.
Engelmanni, Link, ex Heynh. L o. = Glyceriae sp. ? —Hab. ?
fibrosa, *Boiss. Fl. Orient,* v. 577.—Armenia.
Mgida, *Phil. Fl. Atac.* 55.—Chili.
glaucescens, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 569 = = Glyceria glaucescens.
helodes, Roem. & Schult. Syst. ii. 696-Poa nemoralis.
humilis, *Trin. Fund. Agrost.* 136.—Persia; Reg. Casp.
latifolia, Fries, Sumra. Veg. Scand. i. 245 = Arctagrostis latifolia.
magellanica, Hook. f. Fl. Antarct. 887 = Glyceria magellanica.
micrantha, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 426 = Kragrostis interrupta.
minuta, Trin. Fnnd. Agrost. 136 = Aira minuta.
ochroleuca, Dum. Obs. Gram. Belg. 108=aquatica.
parviflora, *Boiss. Fl. Orient,* v. 678.—Persia,
pontica, *Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr.* **xxi. (1874) 15.** —As. Min.
pumila, Roem. & Schult. Syst. ii. 696 = Poa annua.
scabra, *Kunth, Rev. Gram.* i. 119.—Hab. ?
stricta, *Link, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 810.—Hab. J
tenuifolia, *% Presl, in Rel. Haenk.* i. 256.—Chili.
vadllans, T. Fries, in Ofver. Vet. Akad. Stockh. xxvi. (1869) 142=Phippsia algida.
variegata, *Boiss. Diagn.* Ser. i. v. 71.—As. Min.
versicolor, Boiss. Fl. Orient, v. 679 = Colpodium Steveni.
verticillata, *Beauv. Agrost.* 157, nomen.—Hab. t
vil/oidea,Anicn. ex Malm, in Ofver.Vet. Akad. Stockh. xix. (1862) 254-Glyceria vilfoidea.
violaeea, Boiss. Diagn. *Sit.* I. vii. 126-Colpodium violaceum.
viridula, Roem. & Schult. Syst. ii. 697 = Aira viridula.

CATABROSIA, Roem. & Schult. Syst. ii. 696 (1817)-Catabrosa, Beauv. (Gramin.).

CATACHAENIA, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 61 -Miconia, Ruiz & Pav. (Melastom.).
alternifolia, Griseb. 1. c. 55—M. Grisebachii.
parvifivra, Griseb. Cat. PI. Cub. 102 = M. Grisebachii.
tufa, Griseb. 1. c.-M. tufa.

CATACHAETUM, Hoffmgg. Verz. Orch. 22 (1842); ex Linnaea, xvi. (1842) Litt. 231 - **Catasetum,** Rich. (Orchid.).

CATACLINE, Edgew. in Joum. As. Soc. Bengal, **xvi.** (1847) 1214-TephroBia, Pets. (Legumin.).
sericea, Edgew. 1. c = T. sericea.

CATACOMA, Walp.Rep.i.243 (1842)=CATOCOMA, Benth. = Bredemeyera, Willd. (Polygal.).

CATAGYNA, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 26 (1819)=Eriospora, Hochst. (Cyperac.).

CATAKIDOZAMIA, T. Hill, in Gard. Chron. (1865) 1107=Macrozamia, Miq. (Cycad.).
Hopei, T. Hill. 1. c.=M. Perowskiana.
Macleayi, Hort. ex Miq. in Verh. Akad. Wetensch. II. iii. (1869) 56 = M. Perowskiana.

CATALIUM, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4880 (18Sl?) = Carallla, Roxb. (Rhizoph.).
nitidum, Buch.-Ham. 1. c. = Carallia lanceaefolia.

CATALPA, Scop. Introd. 170 (1777). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1041.
CATALPIUM, Rafin. Princ. Somiol. 27 (1811); Fl. Ludov. 139 (1817).
CIIMBALU, Adans. Fam. ii. 199 (1763).
bignouioides, *Walt. Fl. Carol.* 64.—Am. bor.
Bungei, *C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* **ii.** (1837) 51.—China.
cassinoides, *Spreng. Syst.* i. 70.—Bras.
communis, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iii. 242 = bignonioides.
cordifolia, Jaume, in Duham. Arb. ed. Nov. ii. 13. t. 5 = bignonioides.
hirsuta, *Spreng. Syst.* i. 70.—Bras.
Kaempferi, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* **iv.** III. (1846) 142.—Japon.
longisiliqua, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 720 - longissima.
longissima, *Sims, Bot. Mag.* sub 1.1094.—Ind. occ.
microphylla, *Spreng. Syst.* i. 70.—Ins. S. Doming.
ovata, G. Don, Gen. Syst. iv. 280 = Kaempferi.
Pottsii, *Seem, in Otto* **CT** *Dietr. Allg. Gartenz.* **xix.** (1851) 821.—Mexic.
punctata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 192.—Cuba,
purpurea, *Griseb. 1. c.*—Cuba,
speciosa, *Warder, ex Engetm. in Cault. Bot. Gat.* v. (1880) 1.—Am. bor.
syringaefolia, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 45 = Bungei.
syringi/olia, Sims, Bot Mag. t. 1094 = bignonioides.
terni/olia, Cav. Desc. 26 = bignonioides.

CATALPIUM, Rafin. Princ. Somiol. 27 (1814); Fl. Ludov. 189 (1817) = **Catalpa,** Scop. (Bignoniac).
amena, Rafin. Fl. Ludov. 139 = Catalpa bignonioides.

CATAMIXIS, Thorns, in Joum. Linn. Soc. ix. (1865) 842. t. 4. *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 494.
baccharoides, *Thorns. 1. c.* 848. t. 4.—Hirnal. bor. occ.

CATANANCHE, Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 505."
FIFTOCEPHALUM, Sch. Bip. in Bonplandia (1860) 369.
arenaria, *Coss.* **b"** *Dur. in Bull, Soc. Bot. Fr.* **ii. (1855)** 253.—Algeria.
caerulea, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. iv. 1217 - Centaurea pulchella.
caerulea. *Linn, Sp. PI.* 812.—Reg. Mediterr. occ.
caespitosa, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 288.—Afr. bor.
carpholepis, Nym. Consp. 472—caerulea.
graeca, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pelop. 65 = Hymenonema laconicum.
graeca, Linn. Sp. PI. 818=Hymenonema Toumefortii.
lutea, *Linn. I. c.* 812.—Reg. Mediterr.
montana, *Coss. b" Dur. in Bull Soc. Bot. Fr.* **iii.** (1856) *Bibl.* 743.—Afr. bor.
propinqua, *Pome!, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 19.—Algeria.
Webbii, Sch. Bip. in Bonplandia, viii. (I860) 369 = montana.

CATANGA, Steud. Nom. ed. II. i. 81X (1810), sphalm. **= Cananga, AubL**

CATAPODIUM, Link, Hort. Berol. i. 380, 14 (1827)-Festuoa, Linn. (Gramin.).
aquaticum, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 77 = Catabrosa aquatica.
durum, Link, in Linnaea, xvii. (1843) 899 = Sderochloa dura.
fusiforme, Nees, ex Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 128=Tripogon bromoides.
Halleri, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140 = F. Poa.
loliaceum, Link, Hort. Berol. i. 45 — Desmazeria loliacea.
nepalensis, Link,ex Steud. Nom. ed.II.i. 311 (quid!).
pungens, Boiss. Fl. Orient, v. 635.—Afghan.
Salamanni, Boiss. 1. c. 634.—Reg. Mediterr.
siculum, Link, Hort. Berol. ii. 194 = Desmazeria sicula.
tuberculosum, Moris, in Atti 2da Riun. Sc. UaL (1841) 181 = F. tuberculosa.

CATAPPA, Gaertn. Fruct. ii. 206. t. 127 (1791) - Terminalia, Linn. (Combretac).
Benzoin, Gaertn. 1. c. 206 = T. angustifolia.
brasiliensis, Raddi, in **Mem.** Mod. xviii. Fis. (1820' 405 = T. januarensis.
guyanensis, Gaertn. f. Fruct. iii. 207=T. mauritiana.
guyanensis, Gaertn. f. 1. c. t. 217 = T. Tanibouca.
mauritiana, Gaertn. f. 1. c 207 = T. mauritiana.

CATAPUNTIA, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1020 (1866), sphalm. = seq.

CATAPUTIA, Ludw. Gen. 81 (1760) - Bicinua, Tourn. (Euphorbiac.).
major, Ludw. Ectyp. t. 7 = R. communis.
minor, Ludw. Gen. 81 = R. communis.

CAT ARIA, Adans. Fam. ii. 192 (1768) = H"epeta, Linn. (Labiat.).
canescem, Mocnch, Meth. 388 = N. orientalis.
Nepetella, Moench, 1. c. = N. NepeteUa.
nuda, Moench, 1. c. = N. nuda.
paniculata, Moench, Meth. Suppl. 184 = N. nuda.
tomentosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 78 - N . Cataria.
violaeea, Moench, Meth. 388 = N. nuda.
vulgaris, Moench, 1. c. 887 = N. Cataria.

CATAS, Domb. ex Lam. Encyc. ii. 354 (1786) = Bmbothrium, Forst. (Proteac.).
grandiflora, Juss. ex Lam. Encyc. ii. 361=E. grandiflorum.
paniifiora, Joss. 1. c. 355 = E. coccineum.

CATASETUM:, Rich, ex Kunth, Syn. PI. Aequin. i. 330 (1822). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii-651.
CATACHAETUM, Hoffmgg. Verz. Orch. 22 (1812)-Cf. Linnaea, xvi. (1842) Litt. 231.
CLOWESIA, Lindl. Bot. Reg. xxix. (1843) Misc. 25. t. 39.
CUCULINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1886).
MONACHANTHUS, Lindl. Bot. Reg. sub t 1638 (1832).
MYANTKUS, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1538 (1832).
abruptum, *Hook. Bot. Mag.* t. 3929.—Bras.
adnatum, Steud. Nom. ed. II. i. 311, sphalm.[9] atratum.
albovirens, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 129.—Bras,
atratum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 61.—Bras.
Baraquinianum, *Lem. Illustr. Hortic.* **ix. (1862)** *Misc-* 81.—Bras.
barbatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1814) *Misc.* 88.—Bras,
bicolor, *KlotBsch, in Otto V Dietr. Allg. Garten**- xxii. (1854) 387.—N. Granat.
calceolatum, *Lem. Jard. Fleur.* **i. (1851)** *Misc. i&* — Guatemala.
callosum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 77.—Venezuela,
carunculatum, *Reichb. f. V Worse, in Otto tf Dietr-Allg. Gartene.* xxii. (1854) 274.—Peruv.
cassideum, *Linden & Reichb. f. Xen. Orch.* **ii. 171—** Bras.
cernuum, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 670.—Bras.
Christyanum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1882) I. 588-—Hab. ?
ciliatum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 130.—Bias.
Claveringi, Lindl. ex Van Geel, Sert. Bot. ii. (1829) t. 3 = macrocarpum.
cornutum, *Lindl. Bot. Reg.* **(1840)** *Misc. 1t-~~* Guiana.

CATASETT7M:—
craniomorphum, *Hoffmgg. ex Heynh. Norn.* ii. 126, nomen.—Hab. ?
cristatum, *Lindl. Bot. Reg.* t. 966.—Bias,
deltoideum, *Lindl. 1. c.* xxvii. (1840) *Misc.* 157.—Guiana,
dilectum, *Reichb. f. Beitr: Orch. Centr. Am.* 78.—Costa Rica.
discolor, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 84.—Bras,
expansum, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 9.—Ecuador,
fimbriatum, *Lindl. V Paxt. flow. Gard.* i. (1860-51) 124.—Hab. ?
fimbriatum, Reichb. f. in Saund. Refug. Bot. t. 83 =discolor.
floribundum. Hook. Exot. Fl. ii. 151=macrocarpum.
fuliginosum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 78.—Hab.?
glaucoglossum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1885) II. 552.—Mexic.
globiflorum, *Hook. Bot. Mag.* t. 8942.—Bras.
Gnomus, *Linden If Reichb. f. Xen. Orch.* ii. 171.—Bras.
heteranthum, Rodrig. Orch. Nov. i. 127=C. Gnomns.
Hookeri, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 840.—Bras.
inapertum, Steud. Norn. ed. II. i. 311, sphalm. = pnrum.
incurvum, *Klotasck, in Otto if Dietr. Allg. Gartens.* xxii. (1854) 178.—Peruv.
integerrimum, Hook. Bot. Mag. t. 8823 = maculatunu
labiatum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 218.—Bras,
laminatum, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (1840) 384.—Mexic.
lanciferum, *Lindl. Bot. Reg.* xxvii. (1841) 5. f. 5.—Bras.
Landsbeigii, *Lindl. V Paxt. Flow. Gard.* i. (1850-51) 156.—Venezuela,
lituratum, *Hoffmgg. Verz. Orch.* 22; *ex Linnaea,* xvi. (1842) *Lift.* 231.—Bras,
longifolium, *Lindl. Bot. Reg.* (1889) *Misc.* 94.—Guiana.
luridum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 156.—Bras,
macrocarpum, *Rich, ex Kunth, Syn. PI. Aequin. i.* 380.—Guiana,
macroglossum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) II. 552.—Ecuador,
maculalum, *Kunth, Syn. PI. Aequin.* L 381.—N. Granat.
medium, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1885) II. 6.—Hab.?
mentosum, *Lem. Jard. Fleur.* iii. (1852-53) *Misc.* 65.—Bras.
inicranthum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 219.—Bras.
Milleri, *Lodd. ex Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 80.—Bras.
Naso, *Lindl. Bot. Reg.* (1848) *Misc.* 71.—Venezuela.
ochracenm, *Lindl. 1. c.* (1844) *Misc.* 44.—N. Granat.
Oerstedii, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 218.—Nicaragua,
ollare, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) *Misc.60.*—Bras,
pallidum, *Klotasch, in Otto* to[1] *Dietr. Allg. Gartenz.* xxiii. (1855) 217.—Bras.
Phasma, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) II. 488.—Bras.
pileatum, *Reichb./. 1. c.* (1882) I. 492.—Venezuela,
planiceps, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) t. 9.—Guiana,
poriferum, *Lindl. I. c.* (1838) *Misc.* 89.—Guiana,
proboscideum, *Lindl. 1. c.* (1839) *Misc.* 86.—Bras,
purpurascens, *Hoffmgg. ex Heynh. Nom.* ii 126, nomen.—Bras,
purum, *Nees &" Sinning, PI. Hort. Bonn. Nutrit.* i. 1.—Bras,
recurratum, *Link, Klotasch* b* *Otto, 1c. PL* ii. 106. t. 42.—Guiana.
Regnellii, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 219.—Bras,
rivularium, *Rodrig. 1. c.* i. 130.—Bras.
roseo-album, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 65 = discolor.
roseum, *Reichb. f.in Gard. Chron.* (1872) 1003.—Bras,
roseum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 128.—Bras.
Kassellianum, *Hook. Bot. Mag.* t. 3777.—Guatemala.
Mccatam, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 76.—Peruv.
unguineum, *Lindl. V Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 168.—Am. centr.
Scnrra, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1872) 1008.—Guiana.
lemiapertum, Hook. Exot. Fl. iii. 218=purum.
**erratum,* Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 24 = viridi-flavum.
spinosum, Lindl. 1. c (1840) Misc. 66 = barbatum 1

CATA8ETUM :—
sqnalidum, *Hoffmgg. Veri. Orch.* 28; *ex Linnaea,* xvi. (1842) *Litt.* 281.—Bras,
tabulare, *Lindl. Bot. Reg.* xxx. (1840) *Misc.* 40.—N. Granat.
tigrinum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) I. 40.—Hab. ?
thylaciochilum, *Lem. Illustr. Hortic.* iii. (1856) *Misc.* 90.—Mexic.
tricolor, *Reichb. f. in Hamb. Gartens,* xiii. (1857) 313.—Guatemal.
tridentatum, Hook. Exot.fl. ii.90, 91= macrocarpum.
triñdum, *Hook. Bot. Mag.* t. 3262.—Ind. occ.
trimerockilum, Lem. Illustr. Horlic. ix. (1862) t. 874—Mormodes lineatum.
triodon, *Reichb. f. in Otto, Hamb. Gartenz.* (1857) 318.—Guatemal.
triste, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 218 - Hookeri.
Trulla, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 75.—Am. trop.
turbinatum, *Hoffmgg. ex Heynh. Nom.* ii. 126, nomen.—Bras.
umbrosum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 129.—Bras.
variabile, *Rodrig. 1. c.* ii. 217.—Bras,
violascens, *Reichb. f. &" Warsc. in Bonplandia,* ii. (1854) 97.—N. Granat.
viride, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 79.—Bras,
viridi-flavum, *Hook. Bot. Mag.* t. 4017.—Am. centr.
Wailesii, Hook. 1. c. t. 3937=maculatum.
Warczewitzii, *Lindl. if Paxt. Flow. Gard.* i. (1850-51) 45. f. 29.—Panama.

CATATEROPHORA, Steud. Nom. ed. II. i. 311 (1848), sphalm. = seq.

CATATHEROPHORA, Steud.inFlora, xii. (1829) 465 =Pennisetum, Fers. (Gramin.).
hordeiformis, Steud. 1. c. = P. macrourum.

CATENARIA, Benth. in Miq. PI. Jungh. 217, 220 (1852)=Desmodium, Desv. (Legumin.).
laburnifolia, Benth. Lc. = D. laburnifolium.

CAEPHA, Lcschen. ex Reichb. Handb. 221 (1837) - Flatysace, Bunge (Umbell.).

CATESBAEA, Unn. Gen. ed. 1.336 (1787). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 78.
campanulata, *Sagra, ex DC. Prod.* iv. 401.—Cuba.
elliptica, Spreng. ex. DC. 1. c. = Exostemma Vavassoiii.
erecta, *Mac. V Sessr, ex DC. 1. c.*—Mexic.
Grayii, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viiL (1863) 508.—Cuba.
holacantha, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 122.—Cuba.
inermis, Spreng. Syst. i. 416 = Rondeletia buxifolia.
latifolia, *Lindl. Bot. Reg.* t. 868.—Ind. occ.
Lindeniana, *Baxc. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 511, nomen.—Hab.?
longiflora, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 30 = spinosa.
longispina, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 12.—Cuba.
macrantha, A. Rich. 1. c = spinosa?
macrantha, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 59.—Cuba.
parahybensis, *Veil. Fl. Flum.* 64; i. t. 145.—Bras.
parviflora, Griseb. Cat. PI. Cub. 122 = Scolosanthns parvifiorus.
parviflora, Lam. Tabl. i. 288. n. 1481 = Scolosanthus versicolor.
parviflora, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 811 = Rondeletia buxifolia.
parviflora, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* SO.—Jamaic
parvifolia, *DC. Prod.* iv. 401.—Ins. S. Doming.
phyllacantha, Griseb. Cat. PI. Cub. 122 = Phyllaeantha Grisebachiana.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 109.—Ind. occ.
strigosa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 311 = Randia tetrandra.
triacantha, Spreng. Neue Entdeck. iii. 47 = Scolosanthns triacanthns.
Vavassorii, Spreng. Syst. i. 416 = Exostemma Vavassoril.

CATEVALA, Medic. Theodora, 67 (1786) - Alo6, Linn. (Liliac).
arachnoidea, Medic. 1. c. 68 = Haworthia arachnoides.
arborescens, Medic. 1. c. 67 = A. arborescens.
atroviridis, Medic. 1. c. 69=Haworthia atrovirens.
humilis, Medic. 1. c. = A. bumilis.
retusa, Medic. 1. a 68 = Haworthia retusa.

CATHA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 63 (1775). *CELASTRINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 864
METHYSCOPHYLLUM, Eckl. & Zeyh. Enum. 158 (1836).
TRIGONOTHECA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 662.
edulis, *Forsk. I. c.*—Afr. trop.
Forskalei, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 134 = edulis.
inermis, J. F. Gmel. Syst. 411 = edulis.
spinosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 64<=Ce'astrus parviflorus.

CATHA, G. Don, Gen. Syst. ii. 11 (I832) = CelastniB, Linn.
acuminata,¥n&, Bot. Bemerk. 33 = Cel. acuminatus.
alaternifolia, Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. viii. (1857) 98.—Ins. Comor.
articulata, G. Don, Gen. Syst. ii. 10 = Cel. articnlatus.
Benthamii, Gardn. & Champ. In Hook. Kew Journ. i. (1849) 810 = Cel. Championi.
buxifolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 10 = Cel. buxifolius.
campestris, Presl, Bot. Bemerk. 34=Cel. pyracanthus.
cassinoides, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 142 = Cel. cassinoides.
crenata, A. Gray, Bot. U. St Expl. Exped. i. 288 in textu = Cel. crenatus.
Cunninghamii, Hook, in Mitch. Jonrn. Trop. Austral. 887 = Cel. Cunninghamii.
cymosa, G. Don, Gen. Syst ii-10-Cel. buxifolius.
decolor, Webb, Fragm. Fl. Aethicip. 60 = Gymnosporia montana.
Dryandri, Lowe, Man. Fl. Madeir. i. 107.—Ins. Madera.
emarginata, G. Don, Gen. Syst ii. 9 = Gymnosporia emarginata.
europaea, Boiss. Voy. Espagne, ii. 725=Gymnosporia montana.
excisa, G. Don, Gen. Syst. ii. 9 = Cel. excisa.
fasciculata, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 98.—Malaya.
flexuosa, G. Don, Gen. Syst. ii. 10= Cel. flexuosus.
frutieosa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 72 = Gymnosporia emarginata.
Grossulariae, Tul. in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. viii. (1867) 98.—Madag.
heterophylla, Presl, Bot. Bemerk. 88= Cel. heterophyllus.
Heyneana, Walp. Rep. i. 532 = Gymnosporia Heyneana.
integer, G. Don, Gen. Syst. ii. 9 = Cel. pyracanthus.
integrifolia, G. Don, 1. c. = Cel. integrifolius.
lanceolata, Presl, Bot Bemerk. 38-Cel. linearis?
leptopus, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 100.—Madag.
linearis, G. Don, Gen. Syst. ii. 9-Cel. linearis.
monosperma, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. 1. 483 =Cel. monospermus.
montana, G. Don, Gen. Syst. ii. 10 = Gymnosporia montana.
multiflora, G. Don, 1. c.=Cel. multiflorus.
ovata, Walp. Rep. i. 582 = Gymnosporia ov.ita.
paniculata, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 275 = Cel. paniculatus.
parviflora, G. Don, Gen. Syst ii. 10=Cel. parviflorus.
parvifolius, Presl, Bot. Bemerk. 84 = Cel. parvifolius.
patens, Presl, I. c. 33=Cel. patens.
Pyracantha, G. Don, Gen. Syst. ii. 10 = Cel. pyracanthus.
rigida, G. Don, 1. c. 9 = Cel. rigidus.
Rothiana, Walp. Rep. i. 632 = Gymnosporia Rothiana.
rotundifolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 10 = Dovyalis celastroides.
rufa, G. Don. 1. c.=Gymnosporia rufa.
rupestris, Presl, Bot Bemerk. 33 = Cel. acuminatus.
senegalensis, G, Don, Gen. Syst. ii. 10 = Gymnosporia montana.
senegalensis, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 61 = Cel. senegalensis.
spathulata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) i. 275.—Ind. or.
spathyphylla, Presl, Bot. Bemerk. 33 = Cel. buxifolius.
trigyna, Presl, Bot. Bemerk. 33 = Gymnosporia trigyna.
venenata, Presl, 1. c. 34--Cel. buxifolius.
vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. ExpL Exped. i. 287. t. 28.—Ins. Fiji.
Wallichii, G. Don, Gen. Syst. ii. 10=Gymnosporia Wallichiana.
teylanica, G. Don, 1. c.=Scutia Commersonii.

CATHANTHES, Rich, in Mém. Mas. Par. i. (1816) S65 -Tetroncium, Willd. (Naiad.).

CATHARANTHUS, G. Don, Gen. Syst iv. 95 (1836) -=Vinca, Linn. (Apocynac).
pusillus, G. Don, 1. c. = V. parviflora.
roseus, G. Don, 1. c. = V. rosea.

CATHARTOCARPUS, Pers. Syn. i. 489 (1805) = Cassia, Linn. (Legumin.).
Atteleh, G. Dun, Gen. Syst. ii. 453=Cassia Arereh.
bacillaris, Pers. Syn. i. 459=Cassia bacillaris.
Bacillus, Lindl. Bot. Reg. t. 881=Cassia bacillaris.
brtuilianus, Jacq. Fiagm. 59. t. 85. f. 8=Cassia grandis.
Brevsteri, F. Muell. Fiagm. i. 110 = Cassia Brewsteri.
conspicuus, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 167-Cassia Sieberiana.
txcelsus, G. Don. Gen. Syst. ii. 453-Cassia Fistula.
ferrugineus, G. Don, 1. c. = Cassia femiginea.
Fistula, Pers. Syn. i. 459 -= Cassia Fistula.
fistuloides, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 167= Cassia Fistula.
grandis, Pen. Syn. i. 459 « Cassia grandis.
Humboldtianus, Loud. Hort. Brit. 167 •= Cassia spectabilis.
javanicus, Pers. Syn. i. 459=Cassia javanica.
laetus, G. Don, Gen. Syst. ii. 454 = Cassia laeta.
marginatus, G. Don, 1. c. 453—Cassia marginata.
moschatus, G. Don, 1. c.= Cassia moschata.
nodosus, Steud. Nom. ed. II. i. 311 ^Cassia nodosa.
rhombifolius, G. Don, Gen. Syst. ii. 463 — Cassia Fistula.
Roxburghii, Loud. Hort. Brit. 167 = Cassia marginata.
Sieberianus, G. Don, Gen. Syst. ii. 453 -= Cassia Sieberiana.
speciosus, G. Don, 1. c. = Cassia spectabilis.
Trinitatis, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 167 = Cassia spectabilis.

CATHARTOLINUM, Reichb. Handb. 306 (1837) - Linum, Linn.
agrests, Reichb. 1. c. 307=L. angustifolium.
alternum, Reichb. 1. c. = L. strictum.
bicolor, Reichb. 1. c. = L. bicolor.
corymbulosum, Reichb. 1. c. = L. strlctum.
gallicum, Reichb. 1. c. = L. gallicum.
pratense, Reichb. 1. c. =L. catharticum.
salsoloides, Reichb. 1. c =L. salsoloides.
sardoum, Reichb. 1. c. -L. Muelleri.
spicatum, Reichb. Ic. Fl. Germ. xvi. 62 =L. strictum.
strietum, Reichb. 1. c. xvi. t. 327-L. strictum.
suffruticosum, Reichb. Handb. 307 = L. suffrnticosum.
tenuifolium, Reichb. 1. c.=L. tenuifolium.
virginianum, Reichb. 1. c = L. virginianum.

CATHABTRUM, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xxxi. (1858) I. 448. *CELASTRINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 362.
capense, *Turct. 1. c.*—Air. aostr.

CATHCARTIA, Hook. f. in Bot. Mag. 14596 (1851). *PAPA VERACEAE,* Benth. & Hook. f. L 52.
integrifolia, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) 310.—China,
villosa, *Hook.f. in Bet. Mag.* t. 4596.—Reg. Himal.

CATHEA, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 300 = Calopogon, R. Br. (Orchid.).
pulchella, Salisb. 1. c.«=Calop. pulchellus.

CATHEDRA., Miers, in Ann. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 452, 457. *OLACINEAE,* Benth. & Hook. *I* i. 848.
DIPLOCRATER, Benth. in Hook. Kew Joura. iii. (1851) 867.
acuminata, *Miers, 1. c.* Ser. III. iy. (1869) 861.—Bras,
cnssifolia, *Miers, 1. c.*—Bras.
Gardneriana, *Miers, 1. c.* Ser. II. vii. (1851) 469.—Bras,
rubricaulis, *Miers, I. c.* 458.—Bras.

CATHESTECUK, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 294. t. 42 (1830). *GRAM1NEAE,* Benth. & Hook. *I* iii. 1122.
ciectum, *Vasty V Hack, in Bull. Torrey Bot. Club.* XL (1884) 37. t. 45.—Mexic.
prostratum, *J. Presl, in Rel. Haenk.* i. 295. t. 42.—Mexic.

CATHETOSTEMMA, Blume, Rumphia.iv. 30 (1848) = Hoya, R. Br. (Asclepiad.).
laurifolium, Blume, 1. c. = H. laurifolia.

CATHETUS, Lour. Fl. Cochinch. 607 (1790) = Phyllanthua, Linn. (Euphorbiac).
fasciculata, Lour. 1. c. 608= P. cochinchensis.

CATHISSA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 34 (1866) « Ornithogalum, Toum. (Liliac).
concinna, Salisb. 1. c.=O. unifolium.
unifolia, Salisb. 1. c. =O. unifolium.

CATHORMION, Hassle. Retzia.i. 231 (1855)=Pithecolobium, Mart. (Legumin.).
Junghuhnianum, Hassk. 1. c. 282 = P. Junghuhnianum.
moniliferum, Hassk. 1. c. 281'P. moniliferum.

CATIMBIUM, Juss. Gen.- 62 (1789) - Alpinla, Linn. (Scitamin.).
erectum, Juss. ex Lestib. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xv. (1841) 342-A. calcarata.
exaltatum, Mirb. ex Steud. Nom. ed. II. L 311 = Renealma exaltata.
nutans, Juss. ex Lestib. in Ann. Sc Nat. *Sit.* IL xv. (1841) 342=A. nutans.

CATINGA, Aubl. PI. Gui. i. 611. t. 20S (1775) = Eugenia, Linn. (Myrtac).
aromatica, Aubl. 1. c. f. 2 = E. aromatica.
moschata, Aubl. 1. c. f. 1=E. Catinga.

CATOBLASTTTS, H. Wendl. in Bonplandia, viii. (1860) 104, 106. *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 901.
maynensis, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 544.—Peruv.
praemorsus, *H. Wendl. in Bonplandia,* viii. (1860) 104.—N. Granat.
pubescens, *H. Wendl. I. c*—Bras.

CATOCOMA, Benth. in Hook. Joum. Bot. iv. (1842) 101 = Bredemeyera, Willd. (PoIygaL).
altissima, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 65. t. 278 = B. altissima.
brevifolia, Benth. in Hook. Joum. Bot. iv. (1842) 102 = B. brevifolia.
emarginata. Spruce, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. HI. 50 = B. altissima.
floribunda, Benth. in Hook. Joura. Bot. iv. (1842) 102 = B. floribunda.
Kunthiana, Benth. 1. c. 103 = B. Knnthiana.
laurifolia, Benth. 1. c — B. laurifolia.
lucida, Benth. 1. c. 101 = B. lucida.
Mansonii, Klotzsch, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. in. 51 = B. lucida.
mollis, Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) v. 183-B. altissima.
myrtifolia, Spruce, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. in. 51 = B. myrtifolia.
parviflora. Spruce, ex A. W. Benn. I. c. 51 = B. parviflora.

CATOCOBYXTE, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 765 (1867). *MELASTOMA CEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. I. c.
linncoides, *Hook.f. I.* c—Peruv.

CATODIACRUM, Dulac, Fl. Hautei-Pyr. 369 (1867)= Orobanche, Town.
cruentum, Dulac, 1. c. 371 =O. cruenta.
foetidum, Dulac, 1. c. = O. foetida.
incurvum, Dulac, 1. c. 370 = 0. caryophyllacea.
luteum, Dulac, 1. c = O. Hederae.
pallidiftorum, Dulac, 1. c. = O. pallidiHora.
rubidum, Dulac, 1. c.=O. Teucrii.
sparsiflorum, Dulac, 1. c.=O. Epithymum.
variegatum, Dulac, 1. c.=O. varlegata.

CATONIA, P. Br. Hůt. Jamaic 148 (1756); Juss. Gen. 441 (17891. *INC. SED.*
Brownei, *Roem.* &[1] *Schult. Syst.* iii. 480.—Jamaica.
marginata, Jaume St. Hil. Expos, ii. 347=Brownei.

CATONIA, Moench, Meth. 535 (1794) = Crepla, Linn. (Compos.).
blattarioides, Cass. in Diet. Sc. Nat. v. 274; xxvi. 9 -- Crepis blattarioides.
cordifolia, Moench, Meth. 536 = Hieracium amplexicaule.
crocea, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 811 •= Crepis Columnae.
sagittata, Moench, Meth. 536=Crepis blattarioides.

CATONIA, Rafin. Kl. Tellur. ii. 36 (1836) (Quid!)..
lantanoides, Rafin. 1. c.—Hab. 1

CATONIA, Vahl, in Skrivt. Nat. Hist Selsk. Kiobenh. vi. (1810) 9B=Ery«ibe, Roxb. (Convolvulac).
elliptica, Vahl, 1. c 101-E. paniculota.
glauca, Vahl, 1. c. 98-E. paniculata.

CATONIA, VeH. n. Flum. 155 (1825); t iv. t. 18 ('Oct. Mon.'Quid?).
rustica, Veil. 1. c—Bras.

CATOFHEBIA, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 1178 (1876). *LABIATAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c.
capitata, *Benth. I. c*—Mexic.
chiapensis, *A. Gray, ex Benth. in Hook. Ic. PI.* sub t. 1215.—Mexic.
spicala, *Benth. 1. c.* t 1215.—N. Granat.

CATOPHRACTEB, D. Don, in Proc. Linn. Soc. i. 4 (1839); Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 306. t. 22. *BIGNONIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1048.
Alexandri, *D. Don, II. cc.* 4 ; 307.—Afr. austr.
Kolbeana, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* ed. II. 276.—Afr. austr.
Welwitschii, *Seem, in Joum. Bot.* iii. (1865) 331.—Afr. trop.

CATOPHYLLUM, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 222 (1876)=Mikania, Willd. (Compos.).
deltoideum, Pohl, ex Baker, 1. c. = M. officinaiis.
tropaeolifolium, Pohl, ex Baker, 1. c. = M. officinaiis.

CATOPODIUM, link. Hort. Berol. i 44 (1827), sphalm. = Catapodium, link (Gramin.).

CATOPSI8, Griseb. in Goett. Nachr. 1864 (1865) 21. *BROMELIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 670.
POGOSPEHMUM, Brongn. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* V. i- (1864) 237.
TUSSACIA, Klotzsch, ex Beer, Bromel. 99 (1856).
fulgens, *Griseb. I. c.* 21.—Am. trop.
nitida, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 599.—Ind. occ.
nutans, *Griseb. I. c*—Ind. occ.

CATOSPERMA, Benth. in Hook. Ic. PI. t 1028 (1868). *GOODENOVIEAE,* Benth. & Hook. f. «• 539.
Careyi. *F. Muell. in Melb. Chemist* (Apr. 1884).—Austral.
Muelleri, *Benth. in Hook. Ic. PI.* 1.1028.—Austral.

CATOSTEMMA, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 865. *MALVACEAE,* Benth. & Hook. *f.* >• 724.
fragrans, *Benth. I. a*—Guiana.

CATTLEYA, lindl. Collect. Bot. tt. 33, 87 (1824)- *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 531.
MAELENIA, Dum. in Mlm. Acad. Brux. ix. (1836) 13.1.10.
Acklandiae, Planch, in Fl. des Serres, *Sir.* I. vii. (1861-62;83-seq.
Aclandiae, *Lindl. Bot. Reg.* xxvi. (1840) t. 48." Bras.
acuminata, Beer, Prakt. Orch. 208 = Laeľu acumiiwts-
albida, Beer, 1. c. = Laelia albida.
alutacea, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 157.—Bras.
amethystina, Morr. in Ann. Gand. iv. (1848) 217- [L] 201=intermedia.
amethystoglossa, Linden *Sc* Reichb. f. ex Warner, Sel-Orch. Ser. I. *JL.* 2-guttata.
anceps, Beer, Prakt. Orch. 208 =Laelia anceps.
Arembergii, Scheidw. in Otto & Dietr. AUg. Garten"- xi. (1848) 109 = LoddigesiL
Aucklandiae, Heynh. Nom. ii. 126, sphalm. -Acl«»-dine.

CATTIiEYA :—
Auclandii, Beer, Prakt. Orch. 208,sphalm.=Adandiae.
aurantiaca, P. N. Don, in Florist's Joum. (1840) 185 = Epidendrum aurantiacum.
anna, *Linden, lltustr. Hortic.* xxx. (188S) t 498.—N. Granat.
autumnalis, Beer, Prakt. Orch. 208—Laelia autumnalis.
bicolor, *Lindl. Bot. Reg.* (1836) sub t. 1919.—Am. anstr.
Blnntei, *Hort. ex Gard. Chron.* (1876) 1.735.—Hab.
bogotensis, Linden, in Belg. Hortic. xv. (1865) 102-labiata.
Bowringiana, *Veitch, ex Gard. Chron.* (1885) II. 688.—Honduras.
Brabantiaex, Veitch.—Cf. Gard, Chion. (1864) 413; et Floral Mag. vi. (1867) t. 860.
Brymeriana x, Reichb. f. in Gard. Chron.(1883) II. 492.
Brysiana, Lem. in Jard. Flenr. iii. (1852-58) t 275-Laelia purpurata.
bulbosa, Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 42=WaIkeriana.
calummata x , André, in Rev. Hortic. (1888) 564.
Candida, Williams, in Gard. Chroa (1851) 453-Loddigesii.
Carrierei, Houllet, in Rev. Hortic (1876) 250=labiata.
cernua, Beer, Prakt. Orch. 209 - Sophronitis ceraua.
Chamberlainianax, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) II. 427.
chlorantha, Beer, Prakt. Orch. 209-Sobralia macrophylla.
checolnsis, Linden, in Illustr. Hortic. xvii. (1870) 87 = labiata.
cinnabarina, Beer, Prakt. Orch. 209 = Laelia cinnabarina.
citrina, *Lindl. Coll. Bot.* sub t. 87.—Mexic.
coccinea, Lindl. Bot. Reg. sab U 1919-Sophronitis grand iflora.
crispa. Beer, Prakt. Orch. 209 -Schomburgkia crispa,
crispa, Lindl. Bot. Reg. t. 1172 = Laelia crispa.
Davsoni, Warner, Sel. Orch. PI. i. 1.16 = labiata.
Deckeri, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiii. (1855) 81 = Skinneri.
decora, Beer, Prakt. Orch. 209 = Sobralia decora.
devoniensis x, Hort. ex Floral Mag. N. S. (1881) sub t. 487 *• Laelia elcgans *1*
dolosa, *Reichb. f. Xenia Orchid,* ii. 224, *in synon.*—Bras.
domingensis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 118 = Broughtonia lilacina.
Dominiana x, Lindl. in Gard. Chron. (1859) 948.
Dormaniana x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) I. 216.
Dowiana, *Batem. 1. c.* (1866) 922.—Costa Rica.
elatior, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 117-guttate.
Eldorado, Linden, in Fl. des Series, Sér. II. viii. (1869-70) 13. t. 1826 =• labiata.
elegans, Morr. in Ann. Gand. iv. (1848) 93. t 185= Laelia elegans.
elegaiiitissima, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 80.—Venezuela.
elongata, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 72.—Bras,
exixnia, *Rodrig. I. c.* 70.—Bras.
exoniensis x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1867) 1144.
faustax, Reichb. f. 1. c. (1873) 289.
*f*Uxx,* Reichb. f. 1. c. (1876)11. 68.
fiava, Beer, Prakt. Orch. 210-Laelia flava.
Jlavida, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiv. (1856) 73-luteola.
jorbesii, *Lindl. Coll. Bot.* sub t. 87.—Bras.
"»grans, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 72.—Bras.
fitrfuracea. Beer, Prakt. Orch. 210-Laelia furfuracea.
™Wa, *Beer, I. c.* 21O.-Hab. 1
Galeottiana, Beer, 1. c. •> Epidendrum Galeottianum.
Gardneriana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1870) 1373, in nota =- Walkeriana.
Gaskelliana, Hort. Sander, L c (1888) I. 248, 310= .labiata.
8'gantea, *Hort. ex P. N. Don, in Florist's Joum.* (1840)187.-Hab.?
Gigas, Linden & André, Illustr. Hortic. xx. (1873) 70 - labiata.
ftoriosa, Carr. in Rev. Hortic. (1886) 338-labiata.
Grahami, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 116 = Laelia •najalis.
trandiflora. Beer, Prakt. Orch. 209-Sophronitis grandiflora.
f«nulosa, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) t. 1.—Am. austr.
e^temaletisis, *T. Moore, in Flor. Mag.* (1861) t. 61.—Guatemala.

CATTLETA:—
gnttata, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1406.—Bras.
Hardyana, Hort. Sander.—Cf. Gard. Chron. (1888) I. 243-labiata.
Harrisoniae, Paxt. Mag. Bot. Iv. (1888) 247-Loddigesii.
Harrisoniana, Batem. ex Lindl. in Bot. Reg. snb t. 1919-Loddigesii.
Harrisonii, Hort. ex Duchartre, in Journ. Soc. Hort. Fr. iii. (1857) 725. t. 7-praec.
hybridax, Veitch, in Gard. Chron..(1863) 602.
ianthina, Hort. ex Gard. Chron. (1858) 247, nomen = intermedia *1*
imperials, J. O'Brien, in Gard. Chron. (1888) II. 404-labiata.
intermedia, J?. *G*ah. in Bot. •Mag.* t. 2851.—Bras,
intricata, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1884) II. 7.—Hab.!
iricolor, *Reichb. f. I. c.* (1874) II. 162.—Hab. I
Isabella, *Reichb. f. in C. Koch tf Pint. Wochenschr.* (1859)886.—Hab. t
isopetala, *Beer, Prakt. Orch.* 211.—Hab. ?
Karmskii, Mart. Ausw. Merkw. Pfl. 14. L 10= citrina.
labiata, *Lindl. Coll. Bot.* t. 88.—Am. trop.
laelioides, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852-53) Misc. 42, 60-Skinneri.
Lawrenceana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1885) I. 338.—Guiana.
Lawrenceana, Warsc. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) I. 248-Dowiana.
Leeana, Hort. Sander.—Cf. Gard. Chron. (1883) I. 43 -labiata.
Lemoniana, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 35=labiata.
Leopoldii, Hort. Versch. ex Illustr. Hortic. i. (1854) Misc. 68; ii. (1855) t. 69-guttata.
Liliastrum, Beer, Prakt. Orch. 212 = Sebralia Liliastrum.
Iindleyana, *Reichb. f. in C. Koch, Allg. Gartens.* (1857) 118.—Bras,
/oiara, Lindl. Gard. Chron. (1848) 403 = Laelia Boothiana.
Loddigesii, *Lindl. Coll. Bot.* t. 87.—Bras.
Ludenianax, Reichb. f. in Gard. Chron. (1885) II. 456.
Luddemanniana, Reichb. f. Xenia Orch. i. 29-labiata.
luteola, *Lindl. in Gard. Chron.* (1863) 774.—Bras.
macrantha, Beer, Prakt. Orch. 212 = Sobralia macrantha.
majalis, Beer, 1. c-Laelia majalis.
Manglesiix, Reichb. f. in Gard. Chron. (1880) n. 656.
Mardelliix, Seden, ex Reichb. £ 1. c. (1879) I. 234.
marginata, Beer, Prakt. Orch. 212-Schomburgkia marginala.
marginata, Paxt. Mag. Bot. x. (1843) 266 = Laelia pumila.
maritima, Lindl. Bot. Reg. (1886) sub t 1919-intermedia.
Marstersoniaex, Seden, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) II. 556.
Massangeana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) I. 242-labiata.
maxima, *Lindl. Gen et Sp. Orch.* 116.—Peruv.
Mendelli, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1883) II. 404.—Hab. ?
Meyeri, Regel, in Ind. Son. Hort. Petrop. (1866) 17. Cf. Linnaea, xxviii. (1856) 869-luteola.
Mitchellix, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) II. 386.
*Morgana**, Warner, Orch. Album, i. (1882) %. 6 = labiata.
Mossiae, Parker, in Hook. Bot. Mag. t. 3669-labiata.
Nalderiana, Reichb. *I.* in Gard. Chron. (1885) I. 756 -labiata.
nobilior, Reichb. f. in Illustr. Hortic. xxx. (1883) t 485-Walkeriana.
odoratissima, P. N. Don, in Florist's Joum. (1840) 185 - Sobralia violacea 1
ovata, Lindl. Bot. Reg. sub 11919-intermedia.
pallida, LindL & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 51 — labiata.
faludosa, Beer, Prakt. Orch. 216-Sobralia paludosa.
papeiansiana, Morr. in Ann. Gand. i. (1845) 57. t. 5 -Loddigesii.
peduncularis, Beer, Prakt. Orch. 218-Laelia peduncularis.
Peetersii, André, in Rev. Hortic. (1885) 271 = labiata.
Perdvaliana, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1888) U. 404—labiata.

CATTLEYA:—
Perrinii, Endl. in Halting. Parad. Vindob. t. 20-labiata.
Perrinii, Lindl. Bot. Reg. (1838) t. 2-Laelia Perrinii.
picturatax, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) II. 584.
Pinellii, Hort. ex Lindl. in Fl. des Senes, Sér. I. vii. (1851-52) 43-Laelia pumila.
piperita, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1860) 168, nomen.—Hab. ?
porphyroglossnm, *Linden (f Reichb. f. in Otto* f *Dietr. Allg. Garten**, xxiv. (1856) 98.—Bras.
porphyrophlebiax, Reichb. f. in Gard. Chron. (1885) n.552.
Princeps, *Rodrig. Orch. Nov. i.* 68.—Bras.
pterocarpa, Beer, Prakt.Orch. 20!)-Sophronitis pterocarpa.
pumila. Hook. Bot. Mag. t. 3666-Laelia pumila.
purpurata, Beer, Prakt. Orch. 218 = Laelia purpurata.
purpurina, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 158.—Bras.
quadricolor, Lindl. in Paxt. Flow. Gard. i. 6-labiata.
Quindois, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1853) 247, nomen.—Hab. J
quinquecolorx, Dombr. in Floral Mag. t 511.
reflexa, Parment. ex Walp. Ann. vi 428.= Laelia crispa.
regalis, Hort,—Cf. Gard. Chron. (1883) II. 404-labiata?
Regnellii, Warner, Sel. Orch. Ser. II. t. 22 = Schil-Feriana.
Reineckiana, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1850) 237 =labiata.
resplendensx, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1885) I. 692.
Roenlii, Reichb. f.—Cf. Gard. Chron. (1882) II. 467-labiata.
Rollissonii, T. Moore, in Floral Mag. i. (1861) t. 8-labiata.
rubescens. Beer, Prakt. Orch. 214 —Laelia rnbescens.
Ruckeri, *Linden, in Belg. Hortic.* xv. (1865) 102.—N. Granat.
Rueckerii, Beer, Prakt. Orch. 214 - Sobralia Rueckeri.
Sanderiana, Hort. Low.—Cf. Gard. Chrnn. (1882) II. 151-labiata.
Schilleriana, *Reichb. f. in C. Koch, Allg. Garteni.* (1857) 335.—Bras.
Schoñeldiana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 808.—Hab.?
Schroederiana, *Reichb. /. /. c.* (1883) n. 102.—Hab. ?
Scitax, Reichb. f. 1. c. (1885) II. 489.
sessilis. Beer, Prakt. Orch. 214-Sobralia sessilis.
Skinneri, *Batem. Orch. Mex. V Guat.* t. IS.—Guatemala.
speciosissima, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1868) 104, in nota = labiata.
spectabilis, Hort.—Cf. Florist (1850) 91 - marginata.
tphenophora, Morr. Ann. Gand. iv. (1848) 17. t. 176-guttata.
sulfurina,han. Illnstr. Hortic. i. (1854) Misc. 2-citrina.
superba, Schomb. ex Lindl. Sert. Orch. t. 22-violacea.
superbiens. Beer, Prakt Orch. 214-Laelia superbien*.
tibicinis, Beer, 1. c. 215-Schomburgkia tibicinis.
tichotoma, Beer, 1. c-Sobralia dichotoma.
tigrina, *A. Rich, ex Beer, 1. c.* 215.—Hab. 1
Trianaei, Linden Ac Reichb. £ in Bot. Zeit. xviii. (1860) 74-labiata.
Trianaei, *Linden V Reichb. f. in C. Koch, Wochenschr.* iii. (1860) 67.—N. Granat.
trichopiliochila, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 70.—Bras,
trilabiata, *Rodrig. 1. c.* 69.—Bras.
triophthalmax, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) II. 526.
tuberculata, *Hort. ex Reichb. f. in Walp. Ann.* xi. 320.—Hab.1
undulata. Beer, Prakt. Orch. 215-Schomburgkia undulata.
Veitchi, Hort. ex Plitz, Verg. Morph. Orch. 124 = seq.?
Veitchianax. Cf. Gard. Chron. (1874) 1.386, 566-Laelia Veitchiana.
velutina, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1870) 110, 1378.—Hab. ?
vestalis, Hoffmgg. Verz.—Cf. Bot. Zeit. i. (1843) 881 -Forbesii.
violacea, Beer, Prakt. Orch. 209 = Sophronitis violacea.
violacea. Beer, 1. c. 216-Sobralia violacea.
virginalis, Linden & André, Illustr. Hortic. xxiii. (1876) t. 257 -labiatt.

CATTLE YA ; -
Wageneri, Reichb. f. in Bonplandia (1854) 21 = labiata.
Walkeriana, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 662.—Bras. ?
Wallisii, Linden, in Gard. Chron. (1882) I. 557- labiata.
Warneri, T. Moore, ex Warner, Orch. SeL Ser. 1.1. 8 =labiata.
Warseewicmii, Reichb. f. in Bonplandia (1854) 112 = labiata.
Whitei, *Hart. Low.—Cf. Gard. Chron.* II. (1882) 151, 686.—Hab. ?
Wilsoniana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) II. 72.—Am. austr.

CATTLEYOFSIS, Lem. Jard. Flenr. iv. (1854J) Misc. 59. *ORCHIDEAE.*
delicatula, *Lem. I. c*—Cuba.

CATU-ADAMBOE,Adans.Fam. ii. 86 (1768)=Lagerotroemia, Linn. (Lythrar.) (L. hirsuta).

CATU-NAREGAM, Adans. Fam. ii. 85 (1763) = Bandia, Houst. (Rubiac.) (R. virosa).

CATURUS, Dnn. Mant. i. 19 (1767)=Acalypha, Linn. (Euphorbiac).
ramiflorus, Linn. 1. c. 127 = Boehmeria ramiflora.
sessilis, Thou, ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 267 - A. integrifolia.
spicifiorus, Jacq. f. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 214 = Boehmeria spiciflora.
spiciflorus, Linn. Mant. i. 127 = A. hispida.
pedunculatus, Thou, ex Baill. in Adansonia, i. (1860-61) 267= A. arborea.

CATURUS, Lour. Fl. Cochinch. 612 (1790) =Malaisia, Blanco (Urtic).
scandens, Lour. 1. c. = M. tortuosa.
acuminatus, Cunninghamii, Dcplanchei, fagifolius, oblongatus, pelagicus, torulosus, virescens, Seem. Fl. Vit. 254=M. tortuosa.

CATYONA, Lindl. Veg. Kingd. 716 (1847), sphalm.= GATYONA, Cass. = Crepis, Linn. (Compos.).

CATJCAIiTS, Linn. Syst. ed. I (17S5) ; Gen. ed. I. 71 (1737). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 928.
AGROCHARIS, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 19.
DAUCALIS, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ad. 148 (1874).
GLOCHIDOTHECA, Fenzl, in Russegg. Reise, i. li. 970, obs. (1843).
LAPFULARIA, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 149 (1874).
LISAEA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. U. 54 (1844).
TORILIS, Adans. Fam. ii. 99 (1763).
TURGENIA, HofTm. Gen. Umb. 69 (1814).
TURGENIOPSIS, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. ii. 53 (1844).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 881 - Daucns abyssinicus.
aequicolorum. All. Fl. Pedem. ii. 83 — Aothriscus vulgaris.
africana, Crantz, Cl. Umb. Emend. 109=Capnophyllum africanum.
africana, Thunb. Prod. PI. Cap. 49 - capensis.
angustifolia, *Forsk. Fl. Aegypt Arab. Suppl.* 206.—Arabia.
Anthriscus, *Huds. Fl. Angl.* 99.—Europ.
arvensis, *Huds. I. c.* 98.—Europ.; As. temp.
aspera, Lam. Fl. Fr. iii. 424=C. Anthriscus.
aspersa, Savi, Fl. Pis. i. 290=arvensis.
bifrons, *Coss.* b* *Dur. ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 478.—Algeria,
caerulescens, *Boiss. Elench.* 93. p. 53.—Hispan.; Marocco.
canadensis, Crantz, Cl. Umb. Emend. 109-Sanicula canadensis.
capensis, *Lam. Encyc.* i. 651.—Afr. austr.
capitata. Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 64-Sanieula europaea.
carnosa, Roth, Tent Fl. Germ. i. 119-Daucus Carota.
Carota, Huds. Fl. Angl. ed. II. 114 = Daucus Carota.
coniifolia, WalL ex DC. Prod. iv. 220-C. Anthriscus.

CATTCALIS:—
cretica, Salzm. ex Boiss. Fl. Orient ii. 1071-Dancus maritimus.
daucoides, *Linn. Sp. PI.* 241.—Europ.; As. temp.
Daucus, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc -iii. 125; ed. II. 227 = Daucus Carota.
divaricata. Heller, Fl. Wirceb. ed. I. 169= arvensis.
data, D. Don, Prod. Fl. Nep. 183 = C. Anthriscus.
elongata, Link, ex Stend. Norn. ed. I. 169=leptophylla.
erythrotricha, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 1085.—Cilicia.
fallax, *Boiss.* &• *Balansa, ex Boiss. I.* c. 1086.—Syria; Pereia.
Gaillardoti, *Boiss. I. c.* 1085.—Syria.
Gerardi, *Schwaegr. ex Steud. Norn.* ed. I. 169.—Europ.
Gingidium, Crantz, Cl. Umb. Emend. 113=Daucus Gingidium.
glabra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 206 = Daucus littoralis.
glochidiata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 137= Daucus brachiatus.
grandiflora, Linn. Sp. PI. 240.—Daucus grandiflorus.
helvetica, Jacq. Hort. Yindob. iii. 12. t. 16-arvensis.
heterophylla, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 326.—Reg. Mediterr.
hispanica, Crantz, Cl. Umb. Emend. 113=Daucus mauiitanicus.
hispanica, Lam. Encyc. i. 668=- Daucns Durieui.
hispida, Desf. Cat. Hort. Par. ed. HI. 205=Laserpitium hispidum.
humilis, Jacq. Hort. Yindob. ii. 92. t. 195-leptophylla.
humilis, Viv. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) '277=nodosa.
infesta, Curt. Fl. Lond. ii. fasc. vi. t. 28 = arvensis.
infesta, *Vest, Ench.* 496; ** *DC. Prod,* iv.- 219.—Europ.
japonica, *Houtt. Handleid.* viii. 42.—Japon.
lappulacea, Poepp. ex DC. Prod. iv. 219=nodosa.
latifolia, Lam. Fl. b'r. iii. 426=daucoides.
latifolia, *Linn. Syst. Nat.* ed. XII. ii. 205.—Europ.; As. temp.
leptophylla, Crantz, Stirp. AHistr. ed. I. fasc. iii.. 121; ed. II. 225—daucoides.
leptophylla, *Linn. Sp. PI.* 242.—Europ.; Reg. Mediterr.; Ind. or.
leptophylla, Viv. Fl. Lib. Spec. 16=nodosa.
linearifolia, *Requien, ex DC. Prod.* iv. 219.—Enrop. austr.
littoralis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 208-Daucus bessarabicus.
marilandica, Crantz, Cl. Umb. Emend. 110=Sanicula marilandica.
maritima, Gouan, Hort. Monsp. 135 = Daucns maritimus.
mauritanica, *Linn. Sp. PI.* 241.—Afr. bor.
melanantha, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 929.-»-Afr. trop.
microcarpa, *Hook.* &* *Am. Bot. Beech. Voy.* 348.—Calif.
muricata, Crantz, Cl. Umb. Emend. 114=daucoides.
nodiflora, Lam. l'l. Fr. iii. 424-nodosa.
nodosa, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 192.—Europ.
orientalis, Linn. Sp. PI. 241 — Daucns pulcherrimns.
orientalis, Lour. Fl. Cochinch. 177 - C . Anthriscus.
parviflora, Lam. Encyc. i. 667 = leptophylla.
platycarpos. Linn. Sp. PI. 241'daucoides.
pulcherrima, Willd. Enum. Hort. Berol. 303 = Daucus pulcherrimui.
pumila, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 206.—Arab.
pumila, Gouan, Fl. Monsp. 285 - Daucus pumilus.
pumila, Lam. Fl. Fr. iii. 425 = leptophylla.
pumila, Linn. Syst. ed. X. 955 = arvensis.
pumila, Willd. Sp. PI. i. 1385 = Daucus maritimus.
purpurea, Tenore, Fl. Nap. t. 131 = infesta.
Royeni, Crantz, Cl. Umb. Emend. 109= daucoides.
Sanicula, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 125; ed. II. 228 = Sanicula europaea.
scandidna. Roth, Tent. Fl. Germ. i. 121 - C. Anthriscus.
Scandix, Scop. Fl. Cam.ed. II. i. 191 - C . Anthriscus.
segetalis, Steud. Norn. ed. II. i. 312 = arvensis.
segetum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 136=arvensis.
sii/olia, Roehl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 312 = Heracleum austriacum.

CAUCALIS :—
Stocksiana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 89.—Persia: Beluchist.
strigosa, *\Soland.* in] *Russell, Aleppo,* ed. II. ii. 248. —Syria; Mesopotam.
tenella, *Delile, Fl. Egypt,* 202. L 21. f. 8.—Syria; Persia; Aegypt.
tenerrima, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 256 = nodosa.
tenuifolia, Salisb. Prod. 161=daucoides.
trichosperma, *Delile, in Steud. Norn.* ed. II. i. 812.—Syria.
tuberculata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 187 = Pimpinella peregrina.
virgata, Poir. Voy. Barb. ii. 133 = Daucus laserpitioides.
xanthotricha, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 353=leptophylla.

CAUCANTHTTS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 91 (1776). *MALPIGHIACEAE* »
arabicus, *Lam. Encyc.* i. 658.—Arabia.
Forskahlei, Raeusch. Nom. ed. III. 132=arabicus.
platanifolia, Rafin. Sylva Tellur. 72=Sterculia platanifolia.

CAULANTHTJS, S. Wats. Bot. King, Exped. 19, 27 (1871). *CRVC1FERAE.*
amplexicaulis,J. *Wats.inProc. Am. Acad.xm.* (1881-82) 364.-Calif.
Coulteri, *S. Wats, in Bot. King, Exped.* 27.—Calif,
crassicaulis, *S. Wats. I. c*—Calif,
glaucus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 364.-Calif.
hastatus, *S. Wats, in Bot. King, Exped.* 28. t. 8.—Am. bor. occ
inflatus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 864.—Calif.
pilosus, *S. Wats, in Bot. King, Exped.* 27.—Calif,
procerus, *S. Wats. I. c*—Calif.

CAULARTHRON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 40 (1836)- Epidendrum, Linn. (Orchid.).
bicornutum, Kafin. 1. c. 41 = Diacrinm bicornutum.
umbellatum, Rafin. 1. c. = E. umbellatum.

CAULINIA, DC. FL Fr. iii. 156 (1805)=PosidonIa Koen. (Naiad.).
antarctica, R. Br. Prod. 339 = Cymodocea antarctica.
australiana, F. Muell. Fragm. vi. 198.—Austral.
oceanica, R. Br. Prod. 339 = Posidonia australis.
oceanica, DC. Bot. Gall. iii. 156 = Posidonia Caulini.
ovalis, R. Br. 1. c. 839 = Halophila ovata.
prorepens, F. Muell. Fragm. vii. 225.—Austral.
serrulata, R. Br. Prod. 389 = Cymodocea serrulata.
spinulosa, R. Br. 1. c. = Halophila spinulosa.

CAULINIA, Moench, Meth. Suppl. 47 (1802) - Kennedya, Vent. (Legumin.).
Beckxiana, F. Muell. Fragm. xi. 98 = K. Beckxiana.
rubicunda, Moench, Meth. Suppl. 47 — K. rubicunda.

CAULINIA, Willd. in Mém. Acad. Berl. (179S) 87- NajaB, Linn.
alagnensis, follim; Fl. Yeron. iii. 4!)=N. alagnensis.
alternifolia, Willd. ex Cham, in Linnaea, iv. (1829) 501-N. indica.
composita, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5184.—Ind. or.
flexilis, Willd. in Mem. Acad. Berl. (1798) 89. t. i. >• 1 = N.flexilis.
fragilis, Willd. 1. c. 87 = N. fragilis.
quadalupensis, Spreng. Syst. i. 20 = N. tenuifolia.
indica, Willd. in Mém. Acad. Berl. (1798) 89-N- indica.
intermedia, Balb. & Nocca, Fl. Tic. 11. 163 - N. alagnensis.
microphylla, Balb. *Sc* Nocca, 1. c. — N. graminea.
minor, Coss. *Sc* Germ. Fl. Paris, 575 = N. muricata.
pectinata, Part. Fl. Ital. iii. 665.—Italia. %r
tenetla, Nees, in Neuwied, Reise Bras. ii. 345 «=N. tenera.

CAULLINIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 362 = HippuriB, Linn. (Halorag.).
hippuraides, Rafin. 1. c.=H. vulgaris.

CAULOBRYON, Klotzsch.ex C. DC. in DC. Prod. xvi. i. 240 (1869;=Piper, Linn.

CAUIIOPHYTILTTM, Michx. Fl. Bor. Am. i. 204. t. 21 (1803). *BERBERIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 43.
PHTHEIROTHECA, Maxim, ex Regel, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 223.
gracile, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 30 = Vancouveria hexandra.
robnstum, *Maxim. Prim. Fl. Amur*, 38.—Manchuria,
thalictroides, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 205.—Am. bor.
thalictroides, Regel, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 228-robustom.

CAULOPSIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi' (1868) 332-Arabia, L nn. (Crucif.).
alpina, Fourr. 1. c. = A. brassicaefonnis.

CAULOTRETUS, Rich, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post 406 (1827) = Bauhinia, Linn. (Legumin.).
cordifolius. Rich, ex DC. Prod. ii. 517 = B. Richardiana.
eriophorus, Tenorc, in Rendic. Soc. Borb. Neap. i. (1842) 410 « B. eriophora.
smilacinus, Schott, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 406 = B. smilacina.

CAULOTULIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 76 (1886)-Ipomoea, Linn. (Convolv.).

CAUSONIA, Rafin. Sylva Tellur. 87 (1838) = seq.

CAUSONIS, Rafin. Med. Fl. ii. 122 (1830)=Vitis, Linn. (Ampelid.).
japonica, Rafin. 1. c »V. japonica.
trifolia, Rafin. 1. c.=V. trifolia.

CAUSTIS, R. Br. Pro.'. 289 (1810). *CYPERACEAE* Benth. & Hook. f. iii. 1067.
EUROSTORHIZA, Stcud. Syn. PI. Cyp. 265 (1856).
dioica, *R. Br. 1. c.*—Austral,
flexuosa, *R. fir. I. c*—Austral.
hexandra, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 88=dioica.
pentandra, *R. Br. Prod.* 239.—Austral,
recurvata, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 26.—Austral,
restiacea, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, vii. 421.—Austral.
Sieberi, Kunth, Enum. PI. ii. 307 = Gahnia Sieberi.

CAUTLEA, Royle, Illustr. Bot. Himal. 361 (1889) = Boscoea, Sm. (Scitam.).
lutea, Royle, 1. c.=R. lutea.

CAVALAM, Adans. Fam. ii. 857 (1768) =• SterouUa, Unn.

CAVALLIUM, Schott, Melet. 83 (1882) - Sterculia, Unn.
comosum, Schott & Endl. 1. c. = S. comosa.
urens, Schott & Endl. 1. c. = S. urens.

CAVANALTA, Griseb. Cat. PI. Cub. 76 (1864), sphalm. =Canavalia.

CAVANILLA, J. F. Gmel. Syst. 1087 (1791) - Dombeya, Cnv. (Sterculiac.).
acerifolia, J. F. Gmel. 1. c. - Pterospermum accrifolium.
ac"tangula, J. F. Gmel. 1. c.=D. acutangula.
*<*ngulata, J.* K. Gmel. 1. c. = D. acutangula.
decanthera, J. F. Gmel. 1. c-Trochetia decanthera.
ffruginea, J. F. Gmel. 1. c. 1088 - D . ferraginea.
<>ata*, J. F. Gmel. 1. c - D . ovata.
palmata, J. F. Gmel. I.e. 1037=D. acutangula.
Phoenicea, J. F. Gmel. 1. c. 1038 - Pentapetes phoenicea.
Punctata, J. F. Gmel. 1. c. 1037 = D. punctate.
"liaefolia, J. F. Gmel. 1. c. = D. acutangula.
tomentosa, J. F. Gmel. 1. c.«=D. tomentosa.
-mbellata, J. F. Gmel. 1. c - D . umbellata.

CAVANILLA, Salisb. Prod. 885 (1796) - Stuartia, •Unn. (Tcrnstroem.).
fiorida, Salisb. 1. c. = S. Malachodendron.

CAVANILLA, Thunb. Nov. Gen. 105 (1795) - •wTenaoantha, Hook. (Olacin.).
"ondens, Thunb. 1. c. = P. scandens.

CAVANILLA, Vell. Fl. Flum. (1825); v. t. 102 (U«27)-Caperonia, St. Hil. (Euphorbiac.).
P>nosa, Veil. 11. cc.=Caper. Velloxiana.

CAVANILLEA, Desr. in Lam. Encyc. iii. 663 (1789) = DiospyroB, Linn. (Ebenac.).
philippinensis, Dcsr. 1. c. = D. Embryopteris.
Mabolo, Hiern, Ebenac. 260 - D . discolor.

CAVANILLEA, Medic. Malv. 19 (1787)=Anoda, Cav. (Mai vac).
hastata. Medic. 1. C.=A. hastata.

CAVANILIiESIA, Ruiz & Pav. Prod. »7. t. 20 (1794). *MALVACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 211.
POURRETIA, Willd. Sp. PI. iii. 844 (1801).
cordata, *Spreng. Syst.* iii. 125.—Peruv.
platanifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 306.—Panama.
tuberculata, KosteL Allg. Med. Pharm. Fl. v. 1872 = platanifolia ?
umbellate, *Rui0 if Pav. Syst. Veg.* 166.—Peruy.

CAV ARIA, Steud. Nom. ed. I. 169 (1821), sphalm. » = Tovaria, Ruiz & Pav. (Capparid.) .

CAVENDISHIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1791 (1836). *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 570.
POLYBAEA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 30.
PKOELESIA, Klotzsch, 1. c. 32.
SOCRATESIA, Klotzsch, 1. c. 22.
acuminata, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 272— Made.
complectens, *Hemsl. 1. c.*—Costa Rica,
crassifolia, *Hemsl. I. c.* 273.—Mexic
Endresii, *Hemsl. I. c*—Costa Rica,
latifolia, *Hemsl. I. c*—Mexic.
laurifolia, *Benth. (f Hook. f. Gen.* ii. 570.—Guatemala,
melastomoides, *Benth. V Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 273.—Costa Rica,
nobilis, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1791.—Am. austr.
pubescens, *Memsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 273.—Panama.
Querema, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 570.—N. Granat.
tarapotona, *Benth. V Hook./. 1. c.*—Bras,
veraguensis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 273.—Panama.
Warscewiczii, *Hemsl. I. c.* 274.—Guatemala.

CAVINIUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 11 (1806) = Vaocinium, Linn.
madagascariense, Thou, ex Poir. in Diet. Sc. Nat. vii. *310 "Agapetes madagascariensis.*

CAVOLINIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175 = CAULINIA, Willd. = Rajas, Linn.

CAYAPONIA, Silva Manso, Enum. Subst. Brazil. 31 (1886). *CUCURBITACEAE*.
ALLAGOSPERMA, M. Roem. Syn. Pepbn. 15 (1846).
ANTAGONIA, Griseb. PI. Lorentz. 144 (1874).
ALTERNASEMIN A, Silva Manso, Cathart. Bras. (1886).
CIONANDRA, Griseb. Fl. Brit. W. Tnd. 286 (1860).
DERMOPHYLLA, Silva Manso, Enum. Subst. Brazil. SO (1836).
DRUPARIA, Silva Manso, 1. c. 85 (1886).
PERIANTHUPODUS, Silva Manso, 1. c. 28 (1836)
TRIANOSPEKMA, Mart. Sysl. Mat. Med. Brazil. 70 (1843).
alata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 746.—Yucatan,
amazonica, *Cogn. 1. c.* 797.—Bras,
americana, *Cogn. I. c.* 785.—Am. cent.
Andreana, *Cogn. in Bull. Acad. Belg.* Sir. II. xlix. (1880) 195.—Ecuador,
angustiloba, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 771.—Bras.
attenuata, *Cogn. I. c.* 769.—Mexic.
Bonplandii, *Cogn. I. c.* 796.—Bras.
Boykinii, *Cogn. 1. c.* 766.—Am. bor.
Buraeavi, *Cogn. 1. c.* 790.—N. Granat.
Cabocla, Mart. Syst. Mat. Med. Veg. Bras. 81 - globosa.
calycina, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 78.—Bras,
citrullifolia, *Cogn. ex Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 135.—Reg. Argent.
coccinea, Andre, ex Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xlix. (1880) 196 = micrantha.
cordifolia, *CogH. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 77. t. 21.—Bras,
coriacea, *Cogn. I. c.* 79. t. 22.—Bras.

CAYAPONIA :—
Crugeri, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 778.—Ins. Trinit.
diflusa, *Silva Manso, Enum. Subst. Brazil.* 82.—Bras,
diversifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 787.—Bras,
elliptica, *Silva Manso, Enum. Subst. Brazil.* 82.—Bras.
Espelina, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 792.—Bras.
excisa, *Cogn. 1. c.* 747.—Cuba,
ficifolia, *Cogn. I. c.* 782.—Bras,
floribunda, *Cogn. 1. c.* 779.—Bras,
fluminensis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 76.—Bras,
glandulosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 755.—Pernv.
Glaziovii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 74.—Bras,
globosa, *Silva Manso, Enum. Subst. Brazil.* 32.—Bras,
gracillima, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 784.—Bras.
granatensis, *Cogn. I. c.* 794.—N. Granat.
grandiflora, *Cogn. 1. c. 119.*—Yucatan,
heterophylla, *Cogn. 1. c.* 758.—N. Granat.
hirsuta, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 76.—Bras,
latebiosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 776.—Ins. Canar.
latifolia, *Cogn. 1. c.* 752.—Paraguay.
Lhotzkyana, *Cogn. 1. c.* 765.—Bras,
longifolia, *Cogn. 1. c.* 796.—Bras.
Martiana, *Cogn. 1. c.* 777.—Bras.
Maximowiczii, *Cogn. I. c.* 745.—Mexic.
micrantha, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sit.* II. xlix. (1880) 196.-N. Granat
Ottoniana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 755.—Venezuela.
ovata, *Cogn. I. (•* 754.—N. Granat.
palmata, *Cogn. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xvii. (1878) 295.—Bras,
pedata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 80. t. 23.—Bras,
pentaphylla, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 760.—Bras.
peruviana, *Cogn. 1. c.* 795.—Peruv.
petiolulata, *Cogn. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xvii. (1878) 295.—Bras,
piauhiensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 770.—Bras.
pilosa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 75-diffusa.
podantha, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 753.—Paraguay.
Poeppigii, *Cogn. 1. c.* 756.—Peruv.
racemosa, *Cogn. 1. c.* 768.—Porto Rico,
rigida, *Cogn. I. c.* 790.—Guiana,
Ruizii, *Cogn. I. c.* 794.—Peruv.
Sandia, *Cogn. ex Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 135.—Reg. Argent.
setulosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 767.—Bras,
simplicifolia, *Cogn. 1. c.* 774.—N. Granat.
Tayuya, *Cogn. 1. c.* 772.—Bras,
teraata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 79.—Bras.
Tibiricae, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 784.—Bras.
tomentosa, *Cogn. 1. c.* 747 —Peruv.
triangularis, *Cogn. 1. c.* 774.—Guiana,
trifoliolata, *Cogn. 1. c.* 789.—Bras,
trilobata, *Cogn. I. e.* 780.—Bras,
tubulosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 78.—Bras,
villosissima, *Cogn. 1. c.* 81. t. 24.—Bras.
Wcddellii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 793.—Bras.

CAYLUSEA, A. St. Hil. 2"» Mém. Resed. 29 (1887). *RESEDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 111.
STYLEXIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 121 (1836).
SYNTROFHB, G. Ehrenb. ex Muell. Arg. in Neue Denks. Schw. Ges. Zuerich, xvi. (1858) 227.
abyssinica, *Fisch.* b* *Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* vii. (1840) 43.—Abyss,
canescens, *A. St. Hil.* 2™ *Mim. Resed.* 29.—Afr. bor.; Arabia.
Moqniniana, *Webb, Fragm. Fl. Aethiop.* 28.—Afr. bor.

CAYRATIA, Juss. ex Guilt, in Diet. Class. Hist. Nat. iv. 846 (1823)-Vita, Linn. (Ampelid.) (V. pedata).

CEANOTHTJS, Linn, in Act. Soc. Sc. Upsal. 77 (1741). *RHAMNEAE,* Benth. & Hook. f. i. 378.
FORRESTIA, Ra6n. in Med. Repos. N. York, II. iii. (1806) 422.
africanus, Linn. Sp. PI. 196 = Noltea africana.
Alamani, DC. Prod. ii. 81-Colubrina Alamani.
americanus, *Linn. Sp. PI.* 195.—Am. bor.
americanus, Mill. Ic. t 86 = Milleri.
arborescent, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8-Colubrina ferruginota I
asiaticus, Linn. Sp. PI. 196-Colubrina asiatica.
atropurpureus, Rafin. New Fl. Am. iii. 56=Nolteae sp. ?
axillaris, Carr. in Rev. Horde. (1876) 87-azureus?
azureus, *Desf. Tail.* ed. II. 232.—Mexic.
aaureus, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. (1855) 55 - hirsntus.
Baumannianus, Spach, Hist. *Wig.* Phan. ii. 460 = ovatus.
Bertini, Can. in Rev. Hortic. (1872) 440 = azureus!
bicolor, Willd. in Schult. f. Syst. vii. 65 = hirsntus.
Burmannianus, Steud. Norn. ed. II. i. 313, sphalm.= Banmannianus.
bnxifolius, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 62.—Mexic.
caernleus, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 11.—Mextc.
californicus, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. (1855) 65 = integerrimus.
capensis, DC. Prod. ii. 30=Scutia Commeisonii.
capsularis, Forst. f. Prod. 18 = Colubrina asiatica.
celtidifolius, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 602-Colubrina celtidifolia.
Chloroxylon, *Nees, Syst. Laurin.* 660.—Jamaica.
circumscissus, Gaertn. Frnct. ii. 110. t. 106—Scutia Commersonii.
collinus, Dougl. ex Knight *Sc* West. Fl. Cab. 1.1.13 = sorediatus ?
colubrinus, Lam. Tabl. Encyc. ii. 90 = Colubrina ferruginosa.
cordulatus, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 124. f. 39.—Calif,
crassifolius, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 75.—Calif.
cubensis, *Lam. Tabl. Encyc.* il. 90.—Ind. occ.
cuneatus, A. Gray, in Ives, Rep. Color. Riv. 9 = Greggii.
enneatus, *Nutt. in Torr. V Gray,Fl. N. Am.* i. 267.—Calif.
decumbens, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 813 = americanns.
decumbens, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 385.—Calif.
Delilianus, *Spach, Hist. Vlg. Phan.* ii. 459.—Hab.?
dentatus, *Torr.* to" *Gray, Fl. N. Am.* i. 268.—Calif,
depressus, *Benth. PI. Hartw.* 8.—Mexic.
Dillenianus, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 620 = americanus.
discolor. Vent. Jard. Malm. 58 = Pomaderris elliptica.
divaricatus, Boland. Cat. PI. Calif. 8-cordulatus.
divaricatus, *Nutt. in Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 266. -Calif.
diversifolius, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. (1856) 57 = decumbens.
elegans, Lem. Illustr. Hortic. vii. (1860) t. 268 -» thyrsiflorus.
ellipticus, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 56.—Am. bor.
elongatus, Salisb. Prod. 140-Noltea africana.
Fendleri, *A. Gray, PI. Fendl.* 29.—Am. bor. occ.
ferreus, DC. Prod. ii. 30=Scutia ferrea.
ferrugineus, Wendl. ex Steud. Norn. ed. II. L 313 = Pomaderris lanigera.
floribundui, *Hook. Bat. Mag.* t. 4806.—Calif.
Fontanesianus, Spach, Hist. Vg. Phan. ii. 460 = ovatus.
glaber, *Spach, I. c.* 459.—Am. bor.
glandulosus, Rafin. New Fl. Am. iii. 57-ovatus.
glandulosus, *Schlecht. in Linnaea,* XI. (1841) 474.—Mexic.
globulosus, UbiU. Nov. Holl.Pl. i.61. t. 85=Spyridium globulosum.
glomeratus, Rafin. New Fl. Am. iii. 55—americanus.
grandis, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 125 = velutinus.
granulosus, *Rui* to" Pav. Fl. Per.* iii. 5. t. 228.—Peruv.
Greggii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 28.—Arizona.
Guadalupae, Steud. Nom. ed. II. i. 313 = laevigatus.
guineensis, DC. Prod. ii. 30 = Chailletia toxicaria?
Hartwegii, *Hook, ex Heynh. Nom.* ii 128, nomen.—Mexic.
herbaceus, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 360 ™ uncricADUf.

CEANOTHTT8 :—
hirsutus, *Nutt. in Torr. &* Gray, Fl. N. Am.* i. 266.—Calif.
hybridus, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 620 - americanus.
hypericnides, L'HeYit. ex DC. Prod. ii. 32=microphyllus.
incanus, Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 265.—Calif.
infestus, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vii. 61 = Adolphia infesta.
integerrimus, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 329.—Am. bor. occ.
intermedius, Hook. Fl. Bor. Am. i. 124 = ovatus.
intermedius, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 167-americanus.
laevigatus, *DC. Prod.* ii. 80.—Ind. occ.
laevigatus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 125 = velutinus.
landfolius, Moench, Meth. 651=Nol(ea africana.
laniger, Andr. Bot. Rep. t. 569-Pomaderris lanigera.
latifolius, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 55.—Am. bor.
Leschenaultii, *DC. Prod.* ii. 31.—Zeylan.
levigatus, Rafin. New Fl. Am. iii. 55=americanus.
Lobbianus, Hook. Bot. Mag. t. 4810 = dentatus.
macrocarpos, *Cav. Ic.* iii. 88. t. 270__Mexic.
macrocarpus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 813 = americanus.
macrocarpus, Moc. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. ii. 82, 88 = Mocinianus.
macrocarpus, Nutt. in Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 267 = cuneatus.
macrophyllus, Desf. Tabl. ed. II. 232-americanus.
megacarpus, Nutt. Sylv. Am. ii. 46= cuneatus.
microphyllus, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 154.—Am. bor.
Milleri, *Tausch, in Flora,* xxi. (1888) I. *Beibl.* 79.—Am. bor.
Mocinianus, *DC. Prod.* ii. 82.—Mexic.
mystacinus, DC. 1. c. 31 = Helinus scandens.
napalensis, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 876 = Rhamnus nipalensis.
Neumanni, *Tausch, in Flora,* xxi. (1888) 738.—Am. bor.
nevadensis, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1868) 152=integerrimus.
nitidus, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 75-sorediatus.
officinalis, Rafin. Med. Fl. ii. 205 = americanus.
oliganthus, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 266 -hirsutus.
oreganus, Nutt. I. c. 265—sanguineus.
ovalifolius, *Wender. in Schr. Naturf. Ges. Marb.* ii. (1880) 247.—Am. bor.
ovalis, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 92-ovatns.
ovatus, *Desf. Arb.* ii. 381.—Am. bor.
ovatus, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 20-seq.
pallidus, *Lindl. I. c*—Hab.?
paniculatus, Roth, Nov. PI. Sp. 164-Celastruspanicnlata.
papillosus, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* i. 268.—Calif,
pauciflorus, *Mof. V Sesse, ex DC. Prod.* ii. 33.—Mexic
perennis, Pursh, Fl. Am. Sept i. 167 = americanus.
Pitcheri, Pickering, ex Torr. *Sc* Gray, FL N. Am. i. 264 -americanus.
procumbens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 619 = americanus.
prostratus, *Benth. PI. Hartw.* 802.—Calif,
pubescens, *Ruit If Pav. Fl. Per.* iii. 6. t. 228.—Peruv.
pubiflorus, DC. Prod. ii. 30 - Zizyphus pubiflorus.
pulchellus, Delile, ex Spach, Hist. Vg. Phan. ii. 459 = Delilianus.
reclinatus, Bosc, ex Steud. Nom. ed. II. i. 318-americanus.
reclinatus, *L'Hirit. Sert. Angl.* 6.—Ind. occ.
rigidus, *Nutt. in Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 268.—Calif,
sanguineus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 167.—Am. bor. occ.
sanguineus, Nutt. Gen. Am. i. 158—americanus.
Sarcomphalus, DC. Prod. ii. 80 = Sarcomphalus tanrinus.
scandens,!). Dietr. Syn. PI. i. 812 = NoItea africana.
serpyllifolius, *Nutt. Gen. Am.* i. 154.—Florida,
sorediatus, *Hoot. V Ant. Bot. Beech. Voy.* 828.—Calif.
spathulatus,, Labill. Nov. Holl. PI. i. 60. t. 84 = Trymalium Billardieri.
sphaerocarpus, DC. Prod. ii. 80-Rhamnus sphaerospermus.
spinosus, *Nutt. in Torr. (f Gray.Fl. If. Am.* i. 267.—Calif.

CEANOTHTJS :—
tardiflorus, Homem. Hort. Hafn. i. 230 = americanus.
thyrsiflorus, *Eschw. in Mém. Acad. Pitersb.* Se-r. VI. x. (1826) 285.—Calif.
triflorus, Steud. Nom. ed.II. i. 813-Colubrina triflora.
trinervus, Moench, Meth. 651-americanus.
triqueter. Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 376 - Khamnus triqueter.
Veitchianus, *Hook. Bot. Mag.* t. 6127.—Calif.
velutinus, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 126. t. 46. —Am. bor. occ.
verrucosus, Nutt. in Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. L 267 -cuneatus.
virgatus, Rafin. New Fl. Am. iii. 56 - americanns.
Wendlandianus, Roem. *Sc* Schult. Syst.v. 299'•Pomaderris ferruginea.
Wightianus, Wall. Cat. n. 4264 = Rhamnus Wigbtii.
seylanicus, Heyne, in Roth, Nov. PI. Sp. 153-Scutia Commersonii.

CEARIA, Dum. Comm. Bot. 65 in adnot (1822)^ Euryclea, Salisb. (Amaryllid.).
amboinensis, Dum. 1. c. = E. sylvestris.

CEBATHA, Forsk. FL Aegypt. Arab. 171 (1775) = COCOUIUB, DC. (Menisperm.) (C. Cebatha).

CECICODAPHNE, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 70 (1831)= Cinnamomum, Blume (Laurin.).
glaucescens, Nees, 1. c-Cinnam. Cecicodaphne.

CECROFIA, Linn, in Loefl. It. 272 (1758). *URTICACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 378.
AMBAIBA, Adans. Fam. ii. 377 (1768).
aculifolia, *Trée, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. (1847) 81.—Peruv.
adenopus, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 147. —Am. trop.
albiuans, *Trée, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. (1817) 82.—Peruv.
angustifolia, *Trie. I. c.* 83.—PercT.
argentea, *Visiani, Ort. Bot. Padov.* 135.—Hab. I
bicolor, *Xlottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 631.—Peruv.
carbonaria. *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 144.—Am. trop.
cinerea, *Miq. I. c.* 142.—Am. trop.
commutata, *Schott, ex Miq. I. c.* 148.—Am. trop.
concolor, Hort. Schoenbr. ex Miq. I.e. — Schiedeana.
concolor, *Willd. Sp. PI.* iv. 652.—Bras,
cyrtostachya, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.145.—Am. trop.
dentata, *Klotisch, in Linnaea,* xx. (1847) 683.—Peruv.
digitaU, *Tenore, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.149. —Bras.
digitata, Klotzsch, in Linnaea,xx. (1847) 534-angustifolia.
fiagellifera, Trie, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 81 = bicolor.
frigida, *Dufresne, in Illustr. Hortic.* xx. (1873) 70.—Hab.?
Gondotiana, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. viii. (1847) 83.—N. Granat.
hololenca, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 148.—An. trop.
Humboldtiana, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 680. —Am. trop.
insignia, *Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1861) 818.—Nicaragua.
Klotzschiana, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.151.—Amtrop.
latiloba, *Miq. 1. c.* 147.—Am. trop.
leucocoma, *Miq. 1. c.* 142.—Am. trop.
lencophaea, *Poepp. ex Miq. 1. c.* 151.—Am. trop.
lyratiloba, *Miq. 1. c.* 144.—Am. trop.
membianacea, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. •»•• (1847) S3.—Ind. occ.
mexicana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 151.—Mexic
nivea, *Poepp. ex Klotzsch, in Linnaea,* xx. (1847) &3>—Peruv.
obtusa, *Trie, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. viii. (1847) 79.—Bras.
obtusifolia, *Bertol, Fl. Guatimal.* 39.—Guatemala,
pachystachya, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. •••• (1847) 80.—Bras,
palmata, *Willd. Sp. PI.* iv. 662.—Bras.

CECBOPIA:—
panamensis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 151.—Panama,
peltata, *Linn. Pugill. PI. Jamaic.* 28 *(Amoen. Acad.* v. 410).—Am. trop.
peltata, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 260= surinamensis.
peltata, Ruiz, ex Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 532 = Ruiziana.
peltata, Schreb. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 150= Schreberiana.
peltata, Veil. Fl. Flnm. x. t. 101=adenopus.
peltata, Willd. ex Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 530-Humbold liana,
pinnatiloba, *Klotzsch, in Linnaea,* xx. (1847) 588.—Peruv.
polystachya. Trée, in Ann. Sc. Nat Sér. III. viii. (1847) 80 = pinnatiloba.
ptopinqua, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 149.—Am. trop.
Roiziana, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 632.—Peruv.
scabra, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 95.—Bras.
scabra, Ruiz, ex Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 531 =Klotzscbiana.
Schiedeana, *Klotzsch, I. c*—Mexic.
Schreberiana, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.150.—Am. trop.
sdadophylla, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 93.—Bras,
strigosa, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 82.—Peruv.
snrinamensis, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 143.—Am. trop.
tubulosa, *Ruit, ex Klotzsch, in Linnaea,* xx. (1847) 634.—Pernv.

CEDRELA, P. Br. Hist Jamaic. 158 (1756). *MELIACEAE,* Benth. & Hook. f. L 339.
CEDRUS, Mill. Gard. Diet. ed. VII (1759).
CUVERACA, Jones, in As. Res. iv. (1795) 281.
JOHNSONIA, Adans. Fam. ii. 343 (1768).
PTEROSIPHON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (18C3) I. 589.
TOONA, M. Roem. Syn. Hesper. 181 (1846).
adenophylla. Mart ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 738 = paraguaiensis.
altemifolia, *Steud. Norn.* ed. 1.170.—Honduras,
angustifolia, *Moç.* to" *Sesse, ex DC. Prod.* i. 624.—Mexic.
australis, F. Mnell. Fragm. i. 4 = C. Toona.
bogotensis, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xv. (1872) 877.—N. Granat.
orasiliensis, Juss. in St. Hil. FL Bras. Mer. ii. 86-fissilis.
Cedro, Loefl. It. 183-odorata.
Dugesii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 190.—Mexic.
febrifuga, Forsten, Diss. Cedrel. 16 = C. Toona.
fissilis, *Veil. Fl. Flum.* 75; ii. t. 68.—Bras.
glabra, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 742 = C. Toona.
Glaziovii, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 224. t. 65. f. 2.—Am. trop.
Eoianensis, *A. fuss, in Mim. Mus. Par.* xix. (1830) 255.—Guiana.
kexandra, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 426 = . C. Toona.
godora, *Has$k. Hart. Bogor.* i. 181.—Java.
Kotschyi, *Schweinf. Reliq. Kotsch.* 36. t. 35__Afr. trop.
'ongi/olia, Wall. Cat. n. 1278 = C. Toona.
Wahagoni, Linn. Syst. ed. X. 940=Swietenia Mahagoni.
"fxicana, M. Roem. Syn. Hesper. 187 = Swietenia oumilis.
"ticrocarpa, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 745-C. Toona.
Montana, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) 415.—Venezuela.
" *fijuga,* Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) H. 297 = C. Toona.
<*°*rata,* Blanco, Fl. Filip. ed. I. 184'»C. Toona.
"torata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 422 "Swietenia humilis.
odorata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 169 = Glaziovii.
odorata, *Linn. Syst.* ed. X. 940.—Am. austr.

CEDKELA:—
odorata, Rniz & Pav. Fl. Per. iii. 9 = angustifolia.
odorata, Veil. Fl. Flum. 74; ii. t. 67 - Velloziana.
paraguaiensis, *Mart, in Flora,* xx. (1837) *Beibl.* 93.—Paraguay.
Rosmarinus, Lour. Fl. Cochinch. 160 — Baeckia cocbincbinensis.
serrata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 144. t. 25 = C. Toona.
serrulata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 508.—Sumatra,
sinensis, *Juss. in Mim. Mus. Par.* xix. (1830) 265.—China.
Teysmanni, *Hassk. Hort. Bogor.* i. 131.—Java.
Toona, *Roxb. ex Rottl. in Ges. Naturf. Fr. NeueSchr.* ii. (1803) 198.—Malaya; Austral.
Velloziana, *M. Roem. Syn. Hesper.* 137.—Am. trop.
velutina, DC. Prod. i. 626 = Chickrassia tabularls.
villosa, Roxb. Hort. Beng. 18 — Chickrassia tabularis.

CEDRELLA, Scop. Introd. 324 (1777) - Cedrela, R.Br.

CEDBOlTEIiLA, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 225 (1745) ; Moench, Meth. 411 (1794). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1200.
breviflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 309.—Arizona.
cana, *Hook. BoUMag.* t. 4618.—Mexic.
canariensis, *Webb (f Berth. Phyt. Conor,* iii. 87.—Ins. Canar.
cordata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 502.—Am. bor.
hastifolia, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 86 = cana.
japonica, *Hassk. in Verh. Natuurk. Ver. Ned. Ind.* i. (1856) 36.—Japon.
mexicana, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 502.—Mexic.
micrantha, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 369.—Am. bor. occ.
pallida, *Lindl. Bot. Reg.* (1846) t. 29.—Am. bor. occ.
triphylla, *Moench, Meth.* 411.—Ins. Canar.

CEDROTA, Schreb. Gen. i. 259 (1789) = Ocotea, Aubl. (Laurin.).
guianensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 213=Pisonia umbellifera.
guianensis, Raeusch. Nom. ed. III. 111 = O. commutata.
tongifolia, Willd. Sp. PI. ii. 338-O. commutata.

CEDRUS, Mill. Gard. Diet. ed. VII (1769)- Cedrela, Linn. (Meliac).
altemifolia, Mill. 1. c. ed. VIII. n. 8 = Cedrela altemifolia.
Mahogani, Mill. 1. c. n. 2—Swietenia Mahagoni.
odorata, Mill. 1. c. n. 1 - Cedrela odorata.

CEDRUS, [Tourn.] Mill. Gard. Diet ed. Ill (1737); Loud. Arb. Brit. iv. 2402 (1838). *CONIFERAE,* Benth. & Hook. f. iii. 489.
africana, Gord. ex Knight, Syn. Conif. 42 = Iibani.
argentea, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 286 = Libani.
atlantica, Manetti, Cat. Hort Madoet Suppl. 8-Libani.
Deodara, Loud. Arbor. Brit. iv. 2428 = Libani.
elegans. Knight, Syn. Conif. 42 = Libani.
indica, Chambr. Trait. Prat. Arbr. Résin. Conif. 341 = Libani.
Libani, *Barrel. Ic.* 499.—As. Min.j Syria; Affghan.; Reg. Himal.; Alger.
patula, C. Koch, Dendrol. ii. H. 268 = Libani.

CEIBA, Medic. Malv. 15 (1787); Gaertn. Fruct. ii. 244. 1.133 (1791)-Eriodendron, DC. (Malvac).
Casearia, Medic. 1. c. 16 = E. orientale.
pentandra, Gaertn. Fruct. ii. 244. t. 183=E. anfractuosnm.

CELAENA, Wedd. Chlor. And. i. 330 (1866) - Oligandra. Less, (Compos.).
pachymorpha, Wedd. 1. c. *=O. pachymorpha.

CELASINE, Pritz. Ic. Ind. 234, sphalm. (1865)-Oelasine, Herb. (Irid.).

CELABTRUS, Linn. Gen. ed. I. 59 (1737). *CELASTRINEAE,* Benth & Hook. f. i. 864 [365].
CATHA, G. Don, Gen. Syst. ii. 11 (1832).
GUEVINIA, Hort. Par. ex Decne. in Rev. Hortic. Ser. II. iv. (1845-46) 425.
ORIXA, Thunb. Nov. Gen. 56 (1788); Fl. Jap. 3 (1784).
SEMARILLA, Rafin. Sylva Tellur. 146 (1838).
acuminatus, *Linn./. Suppl.* 164.—Afr. austr.
acuminatus, *Rafin. New. Fl. Am.* iii. 14.—Am. bor.
acuminatus, Wall. Cat. n. *842 = Chailletia gelonioides.
adenophylla, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 85 = Ilex crenata.
alatus, Thunb. Fl. Jap. 98 = Evonymus Thunbergianus.
alnifolius, D. Don, Prod. Fl. Nep. 190 = paniculatus.
alpestris, *Blume, Bijdr.* 1146.—Java,
andongensis, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 361.—Afr. trop.
angularia, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap.* i. 460.—Afr. austr.
angulata, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 455.—China,
aphyllus, *Schlecht. in Linnaea,* xv. (1841) 458.—Mexic.
aquifolius, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 36.—Hab.?
arbutifolius, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 138.—Abyss.
articulatus, *Thunb. Fl. Jap.* 97.—Japon.
Atkaio, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 132.—Abyssin.
attenuatus. Wall. Cat. n. 4319 - Gymnosporia neglecta.
auriculatus, Vitm. Summa, ii. 31, in syn.—articulatus.
australis, 77am. &• *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 41.—Austral.
barbarus, Linn. ManL ii. 211, in obs. — Cassine barbara.
bilocularis, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* lit. (1859) 31.—Austral.
bivalvis, Jack, in Malay Misc. i. (1820) n. v. 19-Microtropis bivalvis.
Boaria, Baill. Hist. PI. vi. 26 = Maytenus chilensis.
bullatus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 314 = pyracanthus.
bullatus, Linn. Sp. PI. 196 = scandens.
buxifolia, Drège, ex Walp. Ann. i. 189 = Catha patens,
buxifolius, *Linn. Sp. PI.* 197.—Afr. austr.
buxifolius, Roxb. Hort. Beng. 18, nomen = Gymnosporia Wallichiana.
campestris, Eckl. & Zeyh. Enum. 119-pyracanthus.
cantonensis, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 323.—China.
capensis, Thunb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 314-excisus.
capitatus, *E. Mey. ex Sond. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* i. 458.—Afr. austr.
eassini/olius, Salisb. Prod. 141 = lucidus.
cassinoides, L'Hérit. Sert. Angl. 6.1.10 = Gymnosporia cassinoides.
cernuus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 42.—Afr. austr.
Championi, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1861) 334.—Ins. Hongkong.
ciliidens, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 86-flagellaris.
collinus, Eckl. & Zeyh. Enum. 119 = undatus.
Colpoon, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 315 = pyracanthus.
concavus, Lam. Tabl. Encyc. ii. »S = lucidus.
confertus, *Ruia If Pav. Fl. Per.* iii. 7.—Peruv.
cordatus, *E. Mey. ex Sond. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* 454.—Afr. austr.
coriaceus, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 142-Gymnosporia montana, senegalensis.
corniculatus, *L'Hérit. Sert. Angl.* 6.—Afr. austr.
crassi/olius, Salisb. Prod. 141 -cassinoides.
crenatus, *Forst.f. Prod.* 19.—Ins. Marchion.
crenatus, Roth, Nov. PI. Sp. 156 = Gymnosporia montana.
crenulatus, *Wall. Cat.* n. 4323.—Slam,
crispulus, *Regel, Garten/I.* (1860) 407.—China.
crispus, Thunb. in Hoflm. Phytogr. Blaetter, i. (1808) 28 - Euclea ovata.
Cunninghamii, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. (1859) 30.—Austral.
cymatodes, Spreng. Syst. i. 775-nndatut.

CELASTHTTS:—

rymasus, Eckl. & Zeyh. Ennm. 121 =heterophyllus.
cymosus, Soland. in Bot. Mag. t. 2070=buxifolius.
decolor, Delile, Voy. Meroë, 100. t. 64. f. 6 = Gymnosporia montana, senegalensis.
dependent. Wall. Cat. 4302; et in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 389 = panicnlatus.
diffusus, G. Don, Gen. Syst. ii. 6 = Ventilago leiocarpa.
dilatatus, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 332. —Japon.
dispermus, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. (1859) 81.—Austral,
dubius, *Spreng. Syst.* i. 774.—Ind. occ.
dumetorum, Eckl. *Sc* Zeyh. Enam. 119 —undatus.
edulis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 131 = gerratns.
edulis, Vahl, Symb. Bot. i. 21 = Catha edulis.
ellipticus, *Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter,*\. (1803) 22.—Afr. austr.
emarginatus, Ruiz & Pav. Fl. Per. ill. 6 =retusus.
emarginatus, Willd. Sp. PI. i. 1128 — Gymnospoha emarginata.
empleurifolius, Eckl. *8c Zeyh.* Ennm. 121-=*buxirblins.
enonymifolius, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 6.—Afr. austr.
enonymoides, *Welv. ex Oliver, Fl. Trap. Afr.* i. 362.—Afr. trop.
europaeus, Boiss. Elench. 29 = Gymnosporia montana.
excisus, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 119.—Afr. austr.
filiformis, Linn. f. Suppl. 153 *(<= Mystroxylon fitiforme).*—Afr. austr.
Finlaysonianus, *Wall. Cat.* n. 4324.—Siam; China,
flagellaris, *Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb.* xv. (1857) 357.—Reg. Amur,
flexuosus, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 124.—Afr. austr.
floribundus, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 186.—Hab. ?
Fournieri, *Panch.* b" *Sebert, Not. Bois Nouv. Calid.* 284.—N. Caled.
glaucus, R. Br. in Salt, Voy. Abyss. App. 64 = Gymnosporia montana.
glaucus, Vahl, Symb. Bot. ii. 42 = Elaeodendron glancum.
glomeratus, E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 458 =heterophyllus.
glomeratus, E. Mey. ex Walp. Rep. v. 401-patens.
goniocaulis, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 120=buxifolins.
gracilipes, *Welv. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 861.—Afr. trop.
Haenkea, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 88-Schoepfia flexuosa.
Hamelii, Spreng. Syst. i. 774 = Rhamnus racemosus ?
heteropbyllus, *Eckl. &» Zeyh. Enum.* 120.—Afr. austr.
heterophyllus, E. Mey. ex Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 467-Cassine latifolia.
heterophyllus, *Savi, in Mem. Torino,* xxxviii. (1835) 173.—Hab. ?
Heyneana, Ruth, in Roem. & Schult. Syst. v. 421 = Gymnosporia Heyneana.
Hindsii, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 834 = monospermus.
hispanicus, Hort. ex DC. Prod. ii. 8 = multiflorus.
huillensis, *Welv. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 864.—Afr. trop.
humilis, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 120 - buxifoliug.
ilicifolius, Schrarl. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 716 = Maytenus truncatus.
ilicinus, *Burch. ex Loud. Hort. Brit.* 83, aomen.—Afr. austr.
ilicinus, Krauss. ex Sond. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. i. 457 = procumbens.
inflexus, Zeyh. ex Sond. 1. c. 456=polyacanthus.
integer, Thunb. Fl. Cap. ii. 123—pyracanthus.
integrifolius, *Linn.f. Suppl.* 153.—Afr. austr.
fackianus, Steud. Nom. ed. II. i. 814 ~ lucidus.
japonicus, *C. Koch, Dendrol.* i. 625.—Japon.
Jodina, Steud. Nom. ed. II. i. 314 = Iodina rhombifolia.
kiusiana, *Franch. b" Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 314.—Japon.
lanceolatus, *E. Mey. ex Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* i. 456.—Afr. austr.
lanceolatus, *Spreng. Syst.* i. 775.—Ins. Mascar.
lancifoliut, *Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Cuin. PI.* 132.—Afr. trop.
laurifolius, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 130.—Abysun.

CELASTBTJS :-

laurinus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 42.—Afr. austr.
leptopus, Bernh. ex Walp. Rep. v. 401 = buxifolius.
linearis, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 121 = polyacanthns.
linearis, *Linn.f. Suppl.* 153.—Afr. austr.
lineatus, D. Dietr. Syn. i. 815 = linearis.
lucidus, *Linn. Afant.* i. 49.—Afr. austr.
lucidus, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 400.—Ind. or.
lnteolus, *Delile, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xx. (1843) 90.—Afr. trop.
lycioides, *Brouss. ex Willd. in Roem. (f Schult. Syst.* v. 427.—Ins. Canar.
macrocarpus, *Ruiz (f Pav. Fl. Per.* iii. 8. t. 230. f. 16.—Peruv.
macrophyllus, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. L 364 = lancifolius.
magellanicus, DC. Prod. ii. 8=Maytenus magellanicus.
mauritianus, *Stadtm. ex Willem. in Ust. Ann. Bot.* xviii. (1796) 22.—Ins. Maurit.
Maytenus, Willd. Sp. PI. i. 1127 = Maytenus Boaria.
Metzianus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 448-paniculatus.
mexicanus, *Moç. (f Sesse, ex DC. Prod.* ii. 8.—Mexic
miurantha, *Roxb. Hort. Beng.* 86 J *Fl. Ind.* i. 625.—Ins. Molucc.
microcarpus, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 191.—Reg. Himal.
microphyllus, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 119 = acuminates,
microphyllus, *Linn.f. Suppl.* 154.—Afr. austr.
mollis, *Decne. in Rev. Hortic.* Sir. II. iv. (1845-46) 425.—Hab. ?
monospermus, *Roxb. Hort. Beng.* 18 ; *Fl. Ind.* i. 625.—Ind. or. ; China.
montanus, Roth, Nov. PI. Sp. 154 -Gymnosporia montana.
mossambicensis, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* i. 112.—Afr. trop.
mucronatus, Eckl. & Zeyh. Enum. 119 = acuininatus.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* i 399.—Austral.
multiflorus, Eckl. & Zeyh. Enum. 121 = buxifolius.
multiflorus, *Lam. Encyc.* i. 161.—Afr. austr.
multiflorus, Roxb. Hort. Beng. 18; Fl. Ind. 622 = paniculatus.
myrtifolius, *Linn. Sp. PL* 196.—Jamaica.
neglecta. Wall. Cat. n. 4341 = Gymnosporia neglecta.
nemorosus, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 120.—Afr. austr.
nepalensis, Steud. Nom. ed. II. i. 316 — Pittosporutn floribundum.
nossibaeus, *O. Hoffm. Serf. Madag.* 12 (-Alsodeia).—Madag.
nutans, Roxb. Hort. Beng. 18; Fl. Ind. i. 623= paniculatus.
obovatus, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 862 = Gymnosporia montana.
obscurus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 131 = serratus.
obtusatus, Presl, Bot. Bemerk. 34 = Simmondsia californica.
obtusifolius, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 625 = Gymnosporia trigyna.
obtusus, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i. (1803) 22 = pyracanthus.
octogonus, L'Herit. Sert. Angl. 6 •= Maytenus octogonus.
octogonus, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 315 = pyracanthus.
oleifolius, Pers. Syn. i. 827 - oleoides.
oleoides, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 93.—Afr. austr.
oppositus, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii 398 - Pleurostylia Wightii.
orbicularis, Humb. *8c* Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 423 — Maytenus uliginosus.
orbiculatus. Lam. Tabl. Encyc. il. 94=articulatus.
Orixa, *Sieb.* to" *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1846) 150.—Japon.
ovalifolius, Steud. Nom. ed. II. i. 315 - Gymnosporia ovata.
ovatus, *Hill, Veg. Syst.* xiii. 62; *Hort. Kew.* 437.1.16.—Ins. Bahama.
ovatus, Wall. Cat. n. 4808 - Gymnosporia ovata.
oxyphyllus, Wall. Cat. n. 4312 = Gymnosporia acuminata.
pallidus. Wall. Cat. n. 4807 = Gymnosporia montana.
paniculatus, *Willd. Sp. PI.* i. 1125.—As. trop.; Malaya,
parvifolius, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 849.—Cuba.
parvifolius, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 121 =• heterophyllus.
p.irviflorus, *Vahl, Symb. Bot.* i. 21.—Arabia,
patens, *Eckl.* b* *Zeyh. I. c.* 120.—Afr. austr.

CELA8TBU8:—

pauciflorus, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 400.—Ind. or.
pcduncularis, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 454.—Afr. austr.
penfagynus, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 186.—Malaya!
peruvianus, F. G. Dietr. Vollst Lexik. Gaertn. ii. 111 = relusus.
phyllacanthus, L'Herit. Sert. Angl. 6 = Gymnosporia montana.
Plectronia, DC. Prod. ii. 9-acuminatus.
polyacanthus, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* i. 455.—Afr. austr.
polyanthemos, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 121.—Afr. austr.
polybotrys, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 449.—Ins. Philipp.
populifolius, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 94<-acuminatus.
procumbens, *Linn.f. Suppl.* 168.—Afr. austr.
pterocarpus, DC. Prod. ii. 5 = Pterocelastrus tricuspidatus.
pubescens, *Wall. Cat.* n. 4303.—Ind. or.
punctatus, Thunb. Fl. Jap. 97 = articulates,
punctulatus, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1846) 150.—Japon.
pyracanthifolius, Salisb. Prod. 141 - pyracanthus.
pyracanthus, *Linn. Sp. PI.* 197.—Afr. austr.
pyrifolia, Herb. Franq. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 862 -serratus.
pyrius, Willem. in Ust. Ann. Bet. xviii. (1796) 21 = Gymnosporia trigyna.
quadrangulatus, *Schrad. in Goett. Gel. Ant.* i. (1821) 716.—Bras,
racemosus, *TurcB.inBull. Soc.Nat.Mosc.* xxxvi. (1868) I. 599.—Japon.
racemosus, Wall. Cat. n. 4320 = Parastemon urophyllum.
racemulosus, *Hassk. Hort. Bogor.* i. 155.—Java.
refractus, E. Mey. ex Sond. & Harv. Fl. Cap. i. 467 = Cassine scandens.
repandus, *Blume, Bijdr.* 1145.—Java,
retusus, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 146.—Peruv.
rhamnoides, *Poir. I. c.* 145.—Afr. austr.
rhombifolius, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 120.—Afr. austr.
rhombifolius, Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii-(1833) 170 = Iodina rhombifolia.
Richii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 289.—Ins. Hji.
rigidus, Eckl.dc Zeyh. Enum. 121 = capitatus.
rigidus, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 124.—Afr. austr.
rigidus. Wall, in Roxb. H. Ind. ed. Carey, ii. 396-Gymnosporia Wallichiana.
robustus, Roxb. Hort. Beng. 18; Fl. Ind. i. 026 = Kurrimia pulcherrima.
rostratus, Thnnb. l'rod. PI. Cap. 42 - Pterocelastrns rostratus.
Rothianus, Roem. *Be* Schult. Syst. v. 423 = paniculatus.
Rothianus, Wight & Am. Prod. i. 159 = Gymnosporw Kothiana.
rotundifolius, Thunb. Prod. PI. Cap. 42=Dovyalis celastroides.
Royleanus, Wall. Cat. n. 4317 - Gymnosport* Royleana.
ruber, Gerrard, ex Oliver, FL Trop. Afr. i. 863-mossambicensis.
ruber, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 592.—Air. austr.
rufus, Wall. Cat. n. 4309 = Gymnosporia rufa.
rupestris, Eckl. & Zeyh. Enum. 119=acuminatus.
saxatilis, *Burch. Trav.* ii. 264.—Afr. austr.
scandens, *Linn. Sp. PI.* 196.—Am. bor.
Schimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. »' =senatus.
semiarillatus, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1863) I. 699.—Java.
senegalensis, Lam. Encyc. i. 661 = Gyronospon* montana.
sepiarius, *Dennst. Schluess. Hort.Malab.91.—1™-* or-
serratus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. W1- Abyssin.
serrulatus, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = serratus.
serrulatus, Roth, Nov. PI. Sp. 155 = GyronospoO* Heyneana.
Sieberi, Bemh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. *<3" Ilex capensis.
sinuatodentatus, Hochst.ex A.Rich.Tent. Fl. A»y» i. 130^1uteolus.
spathephyllus, Eckl. *8t* Zeyh. Enum. 121=buxifolW*

CELASTRTJ8:—
spicatus, Veil. Fl. Flam. 92; ii. t. 138-Gouania corylifolia.
spinosus, Royle, Illastr. Bot. Himal. 187 = Gymnosporla Royleana.
stenophyllus, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 122 = linearis.
striatus, Thunb. Fl. Jap. 98 = Enonymus Thunbergianus.
stylosus, *Wall, in Raxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 401.—Reg. Himal.
subspicatus, *Hook. Ic. PI.* t. 482.—Hab. T
Tataritumii, Rnpr. in Bull. l'hys-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 357 - articulatus.
tenuispinus, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* i. 458.—Afr. austr.
tetragonus, Thnnb. Prod. PI. Cap. 42 = Cassine scandens.
tricuspidatus, Lam. Tabl. Encyc. ii. 93 — Pteiocelastrns tricuspidatus.
trigynus, Lam. 1. c. 94 — Gymnosporia trigyna.
Tsaad, *Ferr.* &• *Gal. ex Walp. Ann.* iii. 841.—Abyssin.
umbellatus, Veil. Fl. Flum. 92; ii. t. 137 ~ Keissekia cordifolia.
uncinatus, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 7 = May terras chilensis.
undatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 42.—Afr. austr.
undulatus, Lam. Encyc. i. 662 — Pittospoium Senacia.
venenatus, Eckl. & Zeyh. Enum. 121.- buxifolius.
venulosus. *Wall. Cat.* n. 4321.—Reg. Himal.
verrucosus, *E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 453.—Afr. austr.
verticillatus, Roxb. Hort. Beng. 18 ; Fl. Ind. i. 624 - Pittosporum floribundum.
verticillatus, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iii. 6-Maytenus verticillatns.
Wallichianus, Spreng. Syst. v. Index, 150 —Gymnosporia Wallichiana.
Wallichianus, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 400 = Gymnosporia Heyneana.
Wightianus, Wall. Cat. n. 432a = Pleorostylia Wightii.
Zeyheri, *Sond. in Ham.* &• *Sond. Fl. Cap.* L 456.—Afr. austr.
teylanicus. Roth, ex Roem. & Schult. Syst. v. 427 = Scntia Commersonii.

CELEBNIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 2 (Quid»).

CELMISIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. vii. 356 (1817) = Aleiope, DC. (Compos.).
rotundifolia, Cass. 1. c. 357 = A. tabularis.

CELMISIA, Cass. in Diet. Sc.Nat xxxvii. 25!) (1625). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 278.
asteliae/olia, Hook. f. Fl. Antarct. 36 = longifolia.
bellidioides, *Hook. /. Handb. New Zeal. Fl.* 186.—N. Zel.
cordatifolia, *7. Buck, in Trans, N. Z. [nut.* xi. (1879) 427. t. 18.—N. Zel.
coriacea, *Kaoul, in Ann. Sc. Nat.* Seř. III. ii. (1844) 119.—N. Zel.
Dallii, *y. Buck, in Trans. N. Z.Jnst.* xiv. (1882) 855. t. 85.—N. Zel.
densiflora. *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 130.—N. Zel.
discolor, *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 123.—N. Zel.
glandulosa, *Hook.f. 1. c.* 124.—N. Zel.
gracilenta, *Hook.f. Fl. Antarct.* 85.—N. Zel.
graminifolia, *Hook.f. I. c*—N. Zel.
Haastii, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 181.—N. Zel.
Hectori, *Hook.f. 1. c.* 135.—N. Zel.
hieracifolia, *Hook.f. Fl. N. Zel.* 124. t. 84.—N. Zel.
holosericea, *Hook.f. Fl. Antarct.* 86.—N. Zel.
•ncana, *Hook.f. Fl. N. Zel.* 128. t. 84.—N. Zel.
Jaricifolia, *Hook. f. I. c.* 881.—N. ZeL
Uteralis, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* iv. (1872) 226. —N. Zel.
Lindsayi, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 181.—N,, Zel.
linearis, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 837., —N. Zel.
longifiolia, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxxvii. 259.—Austral.
Lyallii, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 138.—N. Zel.
Mackaui, *Raoul, Choix PI. Nouv. Zil.* 19. t. 14.—N,, —-.

CELMISIA:—
Munroi, *Hook.f. Handb. New Zeal. Fl.* 133.—N. Zel.
petiolata, *Hook.f. 1. c.* 185.—N. Zel.
ramulosa, *Hook.f. I. c.* 788.—N. Zel.
rupestris, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 409.—N. Zel.
Lechleri, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 54, nomen.—Peruv.
sessiliflora, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 185.—N. Zel.
Sinclairii, *Hook./. 1. c.* 182.—N. Zel.
spathidata, A. Cunn. in DC. Prod. v. 209 = Trichocline scapigera.
spectabilis, *Hook.f. Fl. Antarct.* 85.—N. Zel.
Traversii, *Hook.f. Handb. New Zeal. Fl.* 1S4.—N. Zel.
verbascifolia, *Hook.f. Fl. N. Zel.* 121.—N. Zel.
vemicosa, *Hoók. f. Fl. Antarct.* 34. t. 26, 27.—Ins. Auckland.
viscosa, *Hook.f. Handb. New Zeal. Fl.* 183.—N. Zel.
Walkeri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (.1877) 549. —N. Zel.

CBLO8IA, Linn. Gen. ed. I. 34 (1737). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 24.
AMARANTHUS, Adans. Fam. ii. 269 (1763).
GONUFAS, Kafin. Sylva Tellur. 124 (1838).
KOKERA, Adans. Fam. ii. 269 (1763).
LAGREZIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 252 (1849).
LESTIBUDESIA, Thou. Hist. Veg. lies Afr. 63. t. 16 (1806).
LOPHOXERA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 42 (1836).
SUKANA, Adans. Fam. ii. 269 (1763).
acroporoides, *Hochst. ex Benth. O" Hoot. f. Gen.* iii. 25.—Abyss.
acroprcsoides, Hochst. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 140-trigyna.
adoensis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 211 = trigyna.
albida, Willd. Sp. PI. i. 1197 <= Allmania albida.
allmanoides, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 243.—Burma.
aJtissima, Salzm. ex Moq. 1. c. 381—Telanthera raznosissima.
amaranthoides, Medic. Malv. 92 = trigyna.
amphibia, Salzm. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 363 — Telanthera philoxeioides.
anthelminthica, *Aschers. in • Sckweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 176.—Afr. trap.
arborescens, Spreng. Syst. i. 815 — Deeringia altissima.
arenaria, Salzm. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 170 "•Telanthera maritima.
argentea, *Linn. Sp. PI.* 205.—Cosmop. trop.
aspera. Roth, Nov. Fl. Sp. 178 =» AUmania nodi flora.
aurea, T. Moore, Flor. Mag. i. (1861) t. 47-cristata.
axillaris, Mart. Hort. Erlang. 70 = Akemanthera spinosa.
baccata, Retz. Obs. fasc. v. 23 = Deeringia celosioides.
bicolor, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 191 = philippica.
Boivinii, *Hook. f. in Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 25.—Madag.
brasiliensis, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 239.—Bras.
castrensis, Linn. Sp. PI. ed. II. 297 = cristata.
caudata, *Vahl, Symb. Bot.* i. 21.—Arabia,
cernua, *Andr. Bot. Rep.* x. t. 685.—Ind. or.
cernua, Mairet, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 361 = Alternanthera canescens.
cernua, Roxb. Hort. Beng. 19; Fl. Ind. i. 680 = criatata.
coccinea, Linn. Sp. PI. ed. II. 297 = cristata.
comosa, Retz. Obs. fasc. vi. 26 — cristata.
corymbifera, *Didr. Ind. Sem. Hort. Havn.* (1849) 13. -Hab. ?
corymbosa, Retz. Obs. fasc. i. 13-Polycarpaea corymbosa.
cristata, *Linn. Sp. PI.* 205.—Cosmop. trop.
cymosa, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 246.—Bras.
decumiens, Hort. ex. Moq. in DC. Prod. xiii. 11.410 = Gomphrena decumbent.
dichotoma, Heyne, In Roth, Nov. PI. Sp. 172 = Allmania nodiflora.
diffusa, Hoffmgg. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 170 = Telanthera ramosissima.
echinata, Humb. *Sc* Bonpl. ex Roem. & Schnlt. Syst. v, 531 —Allemanthera Achyrantha.
elongata, Spreng. in Schiad. Joum. (1800) II. 196 = Telanthera poriigens.
eriantha, Vahl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 886-Gomphrena eriantha.

CELOSIA:—
exstipulata, *Hornem. ex Schrank, in Syll. Ratisb.* i. (1824) 202.—Nepal,
floribunda, *A. Gray.inProc. Am. Acad.* v. (1861) 167. —Calif.
glauca, Kottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 198-patula.
glauca, Wendl. Beobacht. 43; Hort. Herrenh. 4. t. 2 =• Hermbstaedtia glauca.
gnaphalioides, Linn. f. Suppl. 161 — Gomphrena gnaphalioides.
grandifolia, *Moq. in DC. Prod.* xiii. 11. 238.—Bras.
humifusa, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 531 = Telanthera caracasana.
Hnttoni, *Mast, in Gard. Chron.* (1872) 215.—Java.
intermedia. Hochst. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 140 = trigyna.
interrupta, Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 165 = Froelichia interrupta.
japonica, *Mart. Hort. Erlang.* 70.—Japon. *
lactea, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 300-Aerva sangninolenta.
lanata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 184 = Aerva lanata.
lanata. Linn. Sp. PI. 205 = Acrva tornentosa.
lanata, Poir. ex Staid. Nom. ed. II. i. 315-Gomphrena gnaphalioides.
lappacea, Medic. Beobacht. (1783) 147 = Pupalia atropurpurea.
latifolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 315.—Java,
laxa, *Schur if Thonn. Beskr. Guin. PI.* 141.—Afr. trop.
leptostachya, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 491.—Afr. trop.
linearis, Sweet, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 714'-argentea.
longifolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 63. t. 157, 158. f. 2.—Bras.
madagascariensis, *Poir. Encyc.* v. 89.—Madag.
major, *Grisrb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 79.—Reg. Argent.
margaritacea. Linn. Sp. PI. ed. II. 297 — argentea.
marylandica, RUz. Obs. fasc. iii. 27 = argentea.
maritima, Salzm. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 841 — Philoxerus vermicularis.
melanocarpos, Poir. Encyc. Suppl. iv. 818 •= trigyna.
missionis. Wall. Cat. n. 6915 -- Banalia thyrsiflora.
Monsonia, Retz. Obs. fasc. ii. 13 — Aerva Monionia.
Moquini, *Guill. ex DC. Prod.* xiii. 11. 239.—Mexic.
mucronata. Herb, ex Moq. in DC. 1. c. 248 = Allmania albida.
muricata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 102 — Clftdostachys muricata.
nana, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 192 — Ammania baccifera.
nitida, Vahl, Symb. Bot. iii. 44 = paniculata.
nodi flora, Linn. Sp. PI. 205 = Allmania nodiflora.
nodiflora, Salzm. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 864 » Telanthera polygnnoides.
nodiflora. Wall. Cat. n. 6890 •= Allmania albida.
nudifiora, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 841 ~ Philoxerus vermicularis.
odorata, *Burch. ex Moq. 1.* c. 244.—Afr. austr.
pallida, Hort. Vindob. ex Moq. 1. c. 248 ~ Allmania albida.
pallida, Salisb. Prod. 145-argentea.
Palme.i, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 143.—Calif.
paniculata, *Linn. Sp. PI.* 206.—Florida; Ind. occ.
parviflora, Vahl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 346' Iresine gracilis.
patula, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1808) 198.—Ind. or.
peruviana, Van Spand. ex Moq. in DC. Prod. xiii. 11. 866 — Telanthera frutescens.
peruviana, Zuccagni, in Roem. Collect. 133-Telanthera porrigens.
philippica, *Steud. Nom.* ed. II. i. 316.—Ins. Fhillpp.
phytolaccaefolia, Juss. ex Moq. in DC. Prod. xiii. 11. 253 =- madagascariensis.
piloselloides, Poit. ex Moq. 1. c. 337 - Gnilleminea lanuginosa.
polygonoides, *Retz. Obs. fasc.* ii. 12.—Ind. or.
polygonoides. Wall. Cat. n. 6913 = pulchella.
polysperma, Roxb. Hort. Beng. 84; Fl. Iud. i. 681 — Deeringia polysperma.
populifolia, *Moq. in DC. Prod.* xiii. 11. 239.—Abyss.
procumbens, Hort. ex Moq. 1. c 410 — Gomphrena decumbens.

CELOSIA:—
procumbens, Jacq. Misc. ii. 344—Froelichia interrnpta.
prostrata, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 410-Gomphrena decumbens.
pulchella, *Moq. I. c.* 238.—Ind. or.
purpurea, St. Hil. ex Stead. Nom.ed. II. i. S15, 316 = cristata.
pyramidalis, Burm. f. Fl. Ind. 62=cristata, AUmania albida.
recurva, Burch. Trav. ii. 226=-Hermbstaedtia elegans.
sanguinea, *Hoffmgg. Vert. Pfl.* ii. 85.—Ind. or.
sinuata, *Mart, ex Steud. Norn.* ed. I. 171.—Hab. ?
sparsa, Forsyth, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 250 = Chamissoa altissima.
spathulata, *Boj. Hort. Maurit.* 267.—Madag.
spathulata, Saint-Elme, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 253 = madagascariensis.
spicata, Andre', ex Moq. 1. c. 148 = Anthochlamys polygaloides.
spicata, *Spreng. Syst.* i. 815.—Madag.
spinescens, Russ. ex Wall. Cat. subn. 8982=Achyranthes aqnatica.
splehdens, *Schum. (f Thonn. Beskr. Guin. PI.* 140.—Afr. trop.
stolonifera, Leprieur, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 365 = Telanthera maritima.
stricta, Fisch. ex Fisch. Mey. & Ave^Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 65 = brasiliensis.
stricta, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 28.—Bras.
tetragyna, Roxb. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 237 = Decringia tetragyna.
texana, *Scheele, in Linnaea*, xxii. (1849) 148.—Texas.
thyrsifiora, Wall. Cat. n. 6914=Banalia thyrsiflora.
tomentosa, Willd. in Koem. & Schult. Syst. v. 531-Chamissoa macrocarpa.
trigyna, *Linn. Mant.* 212.—Afr. trop.
trigyna, Wight, ex Steud. Norn. ed. II. i. S16 = Banalia thyrsiflora.
trigyna, Willd. ex Wall. Cat. n. 6915=polygonoides.
triloba, *E. Mey. ex Meissn. in Hook. Land. Journ.* *Bot.* ii. (1843) 448.—Afr. anstr.
tumida, *Hort. Hall, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 245.—Hab.?
virgata, *Jacq. Coll.* ii. 279.—Am. trop.

CEIiSA, Veil. Fl. Flam. 173 (1825); iv. t. 93. *ZYGOPHYLLEAE.*
fratescens, *Veil. II. cc.* 174.—Bras.

CELSIA, Heist. Syst. 6, 20 (1748) = Omlthogalvun, Tourn. (Liliac).

CELSIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 928.
DITOXIA, Rafin. ex Desv. Journ. Bot. iv. (1814) 270.
TANTHE, Griseb. Spicil. Fl. Ramel. Ii. 40 (1844).
NEFFLEA, Spach, Hist. Veg. Fhan. ix. 266 (1840).
THAFSANDRA, Griseb. Spicil. Fl. Ramel. ii. 40 (1844).
acaulis, *Bory V Chaub. Expid. Mor. Bot. 111.* t. 18.—Graecia.
aflinis, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 110.—Abyssin.
agrimonifolia, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 732 = heterophylla.
alpina, *Boiss. b" Kotschy, Diagn.* Ser. II. iii. 150.—**Syria.**
arbuscula, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 110.—Abyssin.
arcturis, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 122=C.Arcturus.
Arctorus, *Jacq. Hort. Vindob.* ii. 53.1.117.—Creta.
arnuniaca, Boiss. Fl. Orient, iv. 861 = anrea.
Aucheri, *Boiss. Diagn.Set. I.* xii. 29.—Persia,
aurea, *C. Koch, in Linnaea*, xxii. (1849) 781.—Armenia.
tnutralis, Hort. Bonn, ex Flora, xvi. (1883) 125 = cretica.
Bemadesii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 499.—Hispan.; Marocco.
betonicacfolia, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 58.—Afr. bor.
Boissieri, *Heldr. (f Sort, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 353.—Graecia.
brachysepala, *Fisch. V Trautv. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 33.—As. Min.
bugulifolia, *Jaub. V Spach, Illustr.* v. 7. t. 407.—Rnmelia; As. Min.
caduca, Moench, Meth. 447 = orientalis.

CELSIA :—
Cavanillesii, Knnze, in Flora, xxix. (1846) 698 = cretica.
chrysurus, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 869= heterophylla.
cilicia, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. xii. 30.—Cilicia.
collina, Benth. in DC. Prod. x. 247 = Snwarowiana.
coromandelina, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 79.—Ind. or.; Afghanist.
coronopifolia, *Boiss. V Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 126.—Phrygia.
cretica. *Linn./. Suppl.* 281.—Reg. Mediterr.
cyllenea, *Boiss. If Heldr. Diagn.* Ser. II. iii. 161.—Graecia.
Daenzeri, *FauchlV Chaub. in Expid. Mor. Bot.* 342.—Graecia.
densiflora, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 208.—Afr. trap.
dentata, Moench, Meth. Suppl. 166=coromandelina.
Doniana, *Walp. Rep.* iii. 150.—Hab. *1*
data, *Fisch. ex Steud. Norn.* ed. 1.172.—Hab.»
erecta, ' *Fisch. Hort. Gorenk! ex Steud. Norn.* ed. II. i. 816.—Hab. ?
floccosa, *Benth. in DC. Prod.* x. 245.—Abyssin.
glabrata, *Roth, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 316.—Hab.?
glandulosa, *Bouchi, in Verh. Ges. Naturf. Fr. Berl.* i. (1829) 395.—As. Min.
grandiflora, *Hort. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 816.—Asia,
heterophylla, *Desf. ex Pers. Syn.* ii. 161.—Persia; As. Min.; Ind. or.
horizontalis, Moench, Meth. 448 = C. Arcturus.
incana, Ucnth. in DC. Prod. x. 247=lanceolata.
incarnatax, Reichb. ex Heynh. Nom. ii. 129, nomen.
interrnpta, *Fresen. in Flora*, xvi. (1838) 605.—Abyssin.
intricate, *Benth. in DC. Prod.* x. 247.—Persia.
laciniata, Coss. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 585=cretica.
laciniata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 147 = Bemadesii.
lanata, Spreng. Syst. ii. 810, err. typ. = sublanata.
lanceolata, *Vent.Jard. Cels*, t. 27.—Mesopot.; Persia.
Upturns, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1854) 186 = brachysepala.
Hnearis, Jacq. Coll. ii. 270 = Alonsoa linearis.
Luciliae, *Boiss. Diagn.* Ser, I. iv. 65.—As. Min,
lycia, *Boiss. Fl. Orient*, iv. 857.—Lycia.
lyrata, G. Don, Gen. Syst.iv. 499 = cretica.
maroccana, *Ball, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 172.—Marocco.
orientalis, *Linn. Sp. PI.* 621.—Graecia; As. Min.; Persia,
parviflora, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. v. (1836) 254.—Arabia.
parviflora, G. Don, Gen. Syst. iv. 499 = Doniana.
peduncnlosa, *Hochst. b'Steud. ex Benth. in DC. Prod.* x. 245.—Abyssin.
pcrsica, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 111.—Reg. Cane.; Persia.
pinetorum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 30.—Cilicia.
pinnatifida, Boiss. & Rent Diagn. PI. Nov. Hisp. 22 = Bemadesii.
pontica, *Boiss. in Tchihat.Asie Min. Bot.* ii. 11.—As. Min.
pnrparea, *Janka, in Termtst. Fütetek,* iv. (1880) 296.—Hungar.
pyroliformis, *Boiss. &" Heldr. Diagn.* Ser. I. xii. 28.—Lycaonia.
ramosissima, *Benth. in DC. Prod.* x. 244.—Marocco.
scrophulariaefolia, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 112.—Abyssin.
sinuata, Cay. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 68-cretica.
sinuata, *Colla, Hort. Ripul. App.* ii. 344; iii. 30.—Hab.?
speciosa, *Fentl, in Friedric. Raise,* 280.—Graecia.
striatiflora, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 316.—Hab. ?
sublanata, Jacq. Fragm. 79. t. 126 = C. Arcturus.
Suwarowiana, *C. Koch, in Linnaea*, xvii. (1844) 284.—Armenia; Persia,
tomentosa, *Hochst. ex Benth. in DC. Prod.* x. 245.—Abyssin.
tomentosa, Zucc. PI. Nov. Fasc. ii. 22-Verbascum graecum.
trapaefolia, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien,* L. (1885) 88.—Lycia.

CEIiSIA:—
urticaefolia, Sims, Bot. Mag. t. 417 = Alonsoa indsifolia.
valerianaefolia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, it. 112.—Abyssin.
viscosa, Roth, Catalect. ii. 69 = cnromandeliana.
viscosa, Wight, ex Benth. in DC. Prod. x. 229 = Verbascum virgatum.

CEIiTIS, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 387 (1737). *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 854.
MERTENSIA, H. B. *8C* K. NOV. Gen. et Sp. ii. 30 (1817).
MOMISIA, F. G. Dietr. Vollst. Lcxik. Gaertn. Nachtr. v. 122 (1819).
SAUROBROMA, Rafin. Sylva Tellur. 82 (1838).
SOLENOSTICMA, Endl. Prod. Fl. Norf. 41 (1B33).
Acata, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 211 = australis.
aculeata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 53.—Ind. occ; Am. trop.
africana, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 81.—Afr. austr.
alba, *Rafin. Fl. Ludov.* 25.—Am. bor.
albicans, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i.S16=Trema micrantha.
alnifolia,*Miq. in Mart. Fl. Bras.'n.*1.176.—Am. trop.
amblyphylla, *F. Muell. Fragm.* ix. 76.—Austral.
amboinensis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 8698 = Treraa politoria.
amboinensis, Willd. Sp. PI. iv. 997 = Trema amboinensis.
americana, Hort. ex Planch, in DC. Prod. xvii. 176 - mississipiensis.
americana, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4.—Ind. occ.
amplifolia, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. *Art.* IV. 11.—Malaya,
anfractuosa, *Liebm.in Vidensk. Selsi. Skr.* V. ii. (1861) 338.—Mexic.
angustifolia, Lindl. in Wall. Cat. n. 8691=Trema angustifolia.
angustifolia, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 186.—Sumatra.
appendiculata, E. Mey. ex I'lanch. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. x. (1848) 341 =Chaetachme aristata.
arcata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 3695 = australis.
aristata, E. Mey. ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir. **III.** x. (1848) 341 = Chaetachme aristata.
aspera, Brongn. in Duperr. Bot. Voy. Coq. 218. t. 48 = Trema aspera.
aspera, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 413 °* australis.
asperula, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.176.—Am. trojJ.
Audibertiana, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvi. (1841) 41 = occidentalis.
australis, *Linn. Sp. PI.* 1048.—Europ.; As. temp, i Ind. or.
australis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. 257 = Kraussiana.
azcurrensis, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent.* V. (1878) 152.—Reg. Argent.
Balansae, *Planck- in DC. Prod.* xvii. 188.—N. Caled.
Berlandieri, *Klotssch, in Linnaea*, xx. (1847) 541.—Mexic
biflora, Ruiz, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 182=* dichotoma.
boliviensis, *Planck, in Ann. St. Nat. Sit.* III. *• (1848) 311.—Bolivia.
Bonplandiana, *Planck, in DC. Prod*, xvii 190.—Am-austr.
brasiliensis, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Str. IIL *• (1848) 310.—Bras.
brevifolia, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.180.—Am. trop.
brevinervis, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. ii. 67" paniculata.
brevipes, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 297-—Arizona.
Bungeana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 71--" China.
Burmannii, Planch, in Ann. Sc Nat. Ser. III. *• (1848) 296 = Kraussiana.
canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 28 =Trem* micrantha.
canina, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* ii. (1817) *3-~~ Am. bor.
caucasica, Hohen. ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir. *I'i,* x. (1848) 285=australis.
caucasica, Willd. Sp. PI. iv. 994=australis.
caudata, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1868) 241 = Prunus pogonostyla.

CELTIS:—
caudata, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 294.—Mexic.
caudata. Wall, ex Planch, in DC. Prod. xvii. 199-Trema amboinensis.
Chichilea, Ruiz & Pav. ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Se"r. III. x. (1848) 335 = Trema micrantha.
Chicope, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 181 = C. Tala.
chinensis, Bunge, Enum. PI. Chin. Dor. 61 = Bungeana.
cinerea, Torr. Bot. Mex. Bound, t 50 = C. Tala.
cinnamomea, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 3696.—Ind. or.; Malaya.
Clausseniana, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.178.—Am. trop.
Commersonii, A. Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 215=Trema orientalis.
confcrta, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 183.—Madag.
cor data, Pers. Syn. i. 292 = occidentalis.
cordifolia, L'H&it. ex Duham. Arb. ed. Nov. ii. 37 = occidentalis.
crassi/olia. Lam. Encyc. iv. 138 = occidentalis.
crenata, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 181 = C. Tala.
crenata, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 191.—Bolivia.
Curiandiuba, Gomez, ex Planch. 1. c. 204=Trema micrantha.
Davidiana, *Carr. in Rev. Hortic.* (1868) 300.—China,
dichotoma, *Ruie, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 18-2.—Peruv.
diffusa, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 314.—Bras.
discolor, A. Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. i. 215. t. 47. t B=Trema discolor,
disticha, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1878) 96 *(Contrib.* 44).—Paraguay.
Djungiel, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 185.—Java.
Douglasii, Planch, in Ann. Sc Nat. Ser. III. x. (1848) 293 = reticulata.
dumosa, Casar. ex Planch, in DC. Prod, xvii 188 = femiginea.
dysodoxylon, Thw. Enum. PI. Zeyl. 267 = cinnamomea.
Ehrenbergiana, Liebm. in Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. V. ii. (1851) 389 = aculeata.
elongata, Wall. Cat. n. 3692 C = Villebrunea integrifolia.
epipkylladena, Orteg. Hort. Matr. 79=aculeata.
eriantha, *E. Mey. ex Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1846) 296.—Afr. austr.
eriocarpa, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 150 = australis.
excelsa, Salisb. Prod. 176=australis.
femiginea, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 188.—Bras.
ferruginea, Walp. in Nov. Act. Nat. Car. **xix.** Suppl. i. (1843) 424=Zizyphus exserta.
fiagellaris, Casar. ex Planch, in DC. Prod. xvii. 189 = brasiliensis.
flexuosa, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. (1852-62) 181. —Am. trop.
flexuosa, Planch, in DC. Prod. xvii. 192 = boliviensis ?
floridana, Rafin. New Fl. Am. **ill.** 37 = occidentalis ?
fuscata, Rafin. 1. c. 33 =mississipiensis ?
Gardneri, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Se"r. III. x. (1848) 81].—Bras,
glabra, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. *Art.* IV. 12.—Malaya.
glabra. Planch, in Ann. Sc. Nat. S6r. III. s. (1848) 298= tetrandra.
glabrata, Spreng. Syst v. 160 «= aculeata.
glabrata, Stev. ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. x. (1848) 285 = australis.
glomerata, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 87 (= *Sponia guineensis).*—Afr. trop.
glycycarpa, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 174.—Am. trop.
Goudotii, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 812.—N. Granat.
grandidentata, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1838) 15 =mississipiensis 1
pJineensis, *Schum. (f Thonn. Besir. Guin. PI.* 160.—Afr. trop.
namata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 72.—Malaya.
Hamiltonii, Planch, in Ann. Sc Nat. Ser. III. x. (1848) 801 = tetrandra.
Harperi, Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 371.—Ins. Fiji.
fasseltii, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 185.—Java.
gterophyla, Rafin. New Fl. Am. Hi. 37 = occidentalis ?
ilariana, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 189.—Bras.
XPoleuca, *Planch. I.e.* 183.—N. Caled.
gens, F. Muell. Fragm. iv. 88 = paniculata.

CELTIS:—
integrifolia, Lam. Encyc. iv. 140=mississipiensis.
jamaicensis, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. x. (1848) **290.**—Jamaica.
japonica, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 172.—Japon.
Kotschyana, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) I. 392 = australis.
Kraussiana, *Bernh. in Flora,* xxviii. (1845) 87.—Afr. trop. et austr.
laeta, Salisb. Prod. 175 = orientalis.
laevigata, Spreng. Syst. i. 932 = aculeata.
laevigata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 67 = mississipiensis.
Lamarckiana, Roem. & Schult. Syst. vi. 311-Trema Lamarckiana.
lanceolata, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1878) 152 *{Contrib.* 45).—Paraguay,
lancifolia, *Miq. in Mart. fl. Bras.* iv. I. 175.—Bras,
lancifolia, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 192.—Bras,
latifolia, *Planch. I. c.* 186.—N. Guinea,
laurifolia, *Planch. I. c.* 185.—Java.
Lima, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 197 = Trema Blancoi.
Lima, Lam. Encyc. iv. 40 = Trema Lamarckiana.
Lima, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 53=Trema Lima.
Lindheimeri, *Engelm. ex C. Koch, Dendrol.* ii. II. 434. —Am. bor.
littoralis, Liebm. in Vidensk. Selslc. Skr. V. ii. (1851) 387=caudata.
longifolia, Rafin. Atl. Joum. 177 = mississipiensis J
lutea, Pers. Syn. i. 292=australis.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 24 = Trema macrophylla.
madagascariensis, Boj. Hort. Maurit. 296-Trema orientalis.
maritima, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* ii. (1817) 44. —Am. bor.
mauritiana, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 307.—Ins. Maurit.
membranacea, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 175.—Bras.
micrantha, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 58 = Trema micrantha.
microcarpa, Salzm. ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 383 = Trema micrantha.
microphylla, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 59 = Trema timorensis.
mississippiensis, *Base, Encyc. Agric.* vii. 577.—Am. bor.
mollis, Hnmb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PL iv. 996 = Trema micrantha.
mollis, Wall. Cat n. 7203=tetrandra.
monoica, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. **139.**—Mexic.
montana, Jungh. ex Planch, in DC. Prod. xvii. 198 = Parasponia parviflora.
morifolia, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. x. (1848) 811.—Bras.
morifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 34 — occidentalis.
Mukii, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muenck.* iv. III. (1846) 223.—Japon.
napalensis, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. x. (1848) 298=tetrandra.
obliqua, Moench, Meth. 344 = occidentalis.
occidentalis, *Linn. Sp. PI.* 1044.—Am. bor.
opaca, C. Moore, ex Benth. Fl. Austral, vi. 157 = paniculata.
Opegrapha, Planch, in Ann. Sc. Nat. Se>. III. x. (1848) 294 = Kraussiana.
orientalis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 316 = occidentalis.
orientalis, Lam. Encyc. iv. 138 = Trema Commersonii.
orientalis. Linn. Sp. PI. 1044 = Trema orientalis.
orientalis, Mill. Uard. Diet. ed. VIII. n. 3 = australis.
orientalis, Thunb. Fl. Jap. 114 = japonica.
orthacanthos. Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 309 = aculeata.
padfica, *Planch. I. c.* 308.—Ins. Marquesas.
pallida, Torr. in Bot. Mex. Bound. 203 = C. Tala.
paniculata, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848)805.—Austral.; Ins. Pacific.
parvifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 86 = occidentalis.
parvifolia, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 219.—Cuba.
patula, Rafin. New Fl. Am. iii. 37-reticulata 1
Pavonii, Planch, in Ann. Sc. Nat Ser. III. x. (1848) 313—dichotoma.
philippinensis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 197.—Ins. Philipp.; Austral.

CEIiTIS :-
politoria. Wall. Cat. n. 8693 = Trema politoria.
procera, Salisb. I'rod. 175 - occidentalis.
pubescens, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 82.—N. Granat.
pumila, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 200 = occidentalis.
reticulata, Hook. f. & Thorns, ex 1'lanch. in DC. Prod. xvii. 209=Gironniera reticulata.
reliculata, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 247.—Am. bor. occ.
reticulosa, Miq. PI. Jungh. 69 -= cinnamomea.
rkamnoides, DC. ex Planch, in DC. Prod. xvii. 189 = brasiliensis.
rhamnoides, Willd. Sp. PI. iv. 9l>8 = aculeata.
rigescens, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 182.—Sumatra.
rigida, Blume, Bijdr. 486 = Trema rigida.
rigida, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1878) 168 *{Contrib.* 45).—Paraguay.
riparia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 28 = Trema riparia.
riparia, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 337=caudata.
rostrata, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 343 (=*Sponia rostrata).*—Hab. ?
Roxburghii, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 302 = tetrandra.
rufescens. Banks, ex Planch. 1. c. 334 = Trema micrantha.
rugosa, Willd. Sp. PI. iv. 996 = Trema rugosa.
salicifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 84 = mississipiensis ?
scabra, Casar. ex Planch, in DC. Prod. xvii. 204 = Trema carinata.
Schiedeana, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 140 = Trema micrantha.
Selloviana, *Miq. in Mart. fl. Bras* iv. 1. 170.—Bras.
serotina, Planch, in Ann. Sc. Nat Ser. III. x. (ls>48) 801 = tetrandra.
Shortii, *Planch. I. c.* 292.—Am. bor.
sinensis. Planch. 1. c. 286 = Bungeana.
sinensis, *Pers. Syn.* i. 292.—China.
sinensis, Willd. Enum. Hort. Berol. Snppl. 67 = japonica.
spinosa, Ruiz, ex Miq. in Mart Fl. Bras. iv. I. 182 = dichotoma.
spinosa, *Spreng. Syst.* i. 932 (sp. dub.).—Bras,
spinosissima, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 176.—Bras.
strychnoides, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 306=philippinensis.
subdentata, E. Mey. ex Planch. 1. c. 841 = Chaetichme aristata.
sumatrana, *Planck, in DC. Prod.* xvii. 181.—Sumatra.
Swartzii, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 304.—Ins. S. Doming.
Tala, *Gill, ex Planch. I. c.* 310.—Am. austr.
tenuifolia, Nutt. Gen. Am. i. 202=pumila 1
tenuifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 36 = occidentalis I
tetrandra, *Roxb. Hort. Beng.* 21; *Fl. Ind.* ii. 63.—Ind. or.; Malaya.
tetrandra, Wall. Cat. n. 3695 F-Villebrunea integrifolia.
texana, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 146 - Berlandieri.
timorensis, *Span. 1. c.* xv. (1841) 343.—Ins. Timor.
tomentosa, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. ii. 66 = Trema amboinensis.
Tournefortii, Lam. Encyc. iv. 188 = australis.
triflora, *Ruiz, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. **181.**—Peruv.
trinervia. Lam. Encyc. iv. **140** (—*Sponia trinervia).*—Ins. S. Doming.
trinervia, Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. ii. 65 = tetrandra.
urticifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 32-occidentalis.
velutina, *Planck, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 813.—Peruv.
vesiculosa, Hochst. ex Planch. 1. c. 295 = Kraussiana.
virgata, Roxb. in Wall. Cat. n. 3694 = Trema timorensis.
Waitaii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 71 = cinnamomea.
Wallichii, Steud. Nom. ed. II. i. 316 = tetrandra.
Wightii, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Se"r. III. x. **(1848)** 807.—Ind. or.; Malaya; Austral.
Willdenowiana, Roem. & Schult. Syst. vi. 306 = japonica.
Zippelii, *Planch, in DC. Prod.* xvii. 185.—N. Guinea,
zizyphoides, *Spreng. Syst.* i. 982.—N. Granat

CEMBRA, Opiz, Seznam, 27 (1852)=Pinus, Toura. (Conif.).
numtana, Opiz, 1. c. = P. Cembra.

CENARIUM, Linn. Amoen. Acad. iv. 121, in nota (1759) = Canariujn, Rumph. (Bnrser.).

CENAKHHENES, Labill. NOT. Holl. PI. i. 36. t. SO (180*). *PROTEACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 176.
nitida, *Labill. I. c*—Austral,
paniculata, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 41.—N. Caled.
spathulaefolia, *Brongn. V Gris, 1. c*—N. Caled.
spathulata, Panch. *8c* Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 180 — spathulaefolia.

CETJCHBUS, Linn. Coroll. Gen. 20 (1787). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1105.
ECHISACHYS, Neck. Elem. iii. 228 (1790).
RARAM, Adans. Fam. ii. 35 (17631.
aegyptius, Beauv. AgioBt. 157 = Eleusine aegyptiaca.
agrimonoides, *Trin. Diss. Gram. Panic.* 72.—Ins. Societ.
alopecuroides, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 817.—Am. austr.
alopecuroides, Thunb. Prod. PI. Cap. 24 - Pennisetnm Linnaei.
annnlaris, *Anderss. in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 558.—Afr. trop.
anomoplexis, Labill. Sert. Austr. Caled. 14.119=calyculatus.
asperi/olius, Desf. FI. Atlant. ii. 888 * Pennisetum asperifolium.
australis, *R. Br. Prod.* i. 196.—Austral,
barbatus, *Schum. in Schum.* b* *Thonn. Beshr. Guin.* *PI.* 48.—Afr. trop.
biflorus, *Roxb. Hort. Beng.* [81]; *Fl. Ind.* i. 288.— Ind. or.
brevisetus, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 50; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 506.—Mexic.
Brownei, Roem. & Schult. Syst. ii. 258-inflexus.
bulbifer, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient, v. 448 = montanus.
bulbosus, Fresen. ex Stead. Nom. ed. II. i. 317 = pennisetifonnis.
calyculatus, *Can. Ic.* v. 39. t. 463.—Polynes.
capitatus, Linn. Sp. PI. 1049 ~ Echinaria capitata.
carolinianus, Walt. Fl. Carol. 79 = tribuloides.
catharticns, *Delile, Cat. Hort. Monsp.* (1888).—*Cf.* *Linnaea,* xiii. (1839) *Litt.* 103.—As. et Afr. trop.
Cavanillesii, *Tausch, in Flora,* xx. (1887) 97.—Bras,
ciliaris, *Fig.* &• *De Not. in Hem. Ace. Torin.* (1854) 888.—Nubia?
ciliaris, Linn. Mant 302 = Pennisetum cenchroides.
dactylolepis, Steud. Syn. PI. Gram. 109 = viridis.
digynus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 449 = Pennisetnm cenchröides.
distichophyllus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 234.—Cuba.
echinatus, Cav. 1c. v. 3fl. t. 462 = Cavanillesii.
echinatus, *Linn- Sp. PI.* 1050.—Cosmop. trop.
echinatus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 389 = catharticus.
echinatus, Steud. ex Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. II. S09=viridis.
echinatus, Torr. Fl. N. Am. i. 68'tribuloides.
echinoides, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 817 = Pennisetum cenchroides.
EUiotii, *Kunth, Rev. Gram.* i. 51.—Am. bor.
elymoides, *F. Muell. Fragm.* viii. 107.—Austral,
frutescens, *Linn. Sp. PI.* 1050.—' Am.'
frutescens, *Sieber, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 317, nomen. —Armenia.
fusi/ormis, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) I70 = agrimonoides.
geniculatus, Tbunb. Prod. PI. Cap. 24 = Pennisetnm Thunbergii.
gracilis, *Beauv. Agrost.* 157, nomen.—Hab. ?
granularis, *Anderss. Enum. PI. Ins. Galap.* 140.—Ins. Galapag.
granularis, Linn. Mant. ii. App. 575 = Manisuris granularis.
heterochaetus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 110.—Hab. ?
hexafiorus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 86 = Pennisetum nigricans.
hirsutus, Spreng. Neue Entdeck. iii. 15 = Selena hirtella.
hordeiformis, Rottl. ex Stend. Syn. PI. Gram. 102 = Pennisetum Alopecuros.

OBNCHKUS:—
hordeiformis, Xhunb. Prod. PI. Cap. 24 = Pennisetnm compressum.
Hystrix, *Fig. V De Not. in Mem. Ace. Torin.* (1854) 882.—Nubia,
incertus, *M. A. Curt, in Bost. Journ. Nat. Hist.* i. (1887) 135—Am. bor.
infiexus, Poir. Encyc. vi. 50 = Echinolaena hirta.
inflexus, *R. Br. Prod.* i. 195.—Austral.
laevigatus, Trin. Fund. Agrost. 172 — Anthephora elegans.
laniflorus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 110.—Ins. Tahiti.
lappaceus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1488 = Centotheca lappacea.
lappaceus, *Tausch, in Flora,* xx. (1837) 97.—Hab. ?
Lechleri, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr:* 56.— Peruv.
limensis, *Meyen, Reise,* ii. 71.—Peruv.
linearis, Lam. Fl. Fr. iii. 631-Tragus racemosns.
longifolius, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 109.— Nubia.
macrocarpus, Ledeb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 817 = echinatus.
macrostachyus, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 109. —Abyssin.
marginalis, Radge, PI. Guian. 19. t 25 - Echinolaena hirta.
mitis, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 553.— Afr. trop.
montanus, *Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 416.— As. et Afr. trop.
mucronatus, Pers. ex Steud. Nom. ed. I. 172 = muricatus.
multiflorus, *Y. & C. Presl, Rel. Haenk.* i. 818.—Mexic.
muricatus. Linn. Mant 302=Trachys mucronata.
muricatus, *Phil. Sert. Mend. Alt.* 44.—Chili,
inyosuroides, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 115. t. 35. —Am. trop.
niloticus, Fig. *8c* De Not in Mem. Ace. Torin. (1854) 880 = catharticus.
orientalis, VVilld. ex Kunth, Enum. PI. *i.* 162 = Pennisetum orientale.
ovatus, *Lam. ex Poir. Encyc.* vi. 51.—Afr. austr.
pallidus, *Fourn. Mex. PL Enum. Gram.* 50 ; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 509.—Mexic.
parviflorus, Poir. Encyc. vi. 52 = Panicum Ventenatii.
pauciflorus, Benth. Bot. Voy. Sulph. 56=tribuloides.
pennisetiformis, *Hochst. V Steud. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 317.—Arabia,
pilosus, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 116. t. 86.— Am. austr.
platyacanthus, *Anderss. Enum. PI. Ins. Galap.* 189.— Ins. Galapag.
pnbescens, *Steud. Nom.* ed. II. i. 317.--Afr. austr.
pungens, *//. B. &" K. Nov. Gen. et Sp. i.* 115.— Mexic.
purpurascens, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 829 = Gynothrix japonica.
pyenostachyus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 109.—Afr. trop.
racemosus. Linn. Sp. PI. 1049 —Tragus racemosns.
ramosissimus, Poir. Encyc. vi. 51 -= Pennisetum dicbotomum.
rigidifolins, *Fig. V DeNot. in Mem. Ace. Torin.* (1854) 386.—Nubia,
rigidus, *Willd. ex Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. II. 810, in obs.—Bras,
roseus, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 50; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 507.—Mexic.
rufescens, Desf. Fl. Atlant. ii. 388 => Pennisetum cenchroides.
Schimperi, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. i. 317 = montanus.
setigerus, Steud. 1. c. = Pennisetum Vahlii.
setigerus, Vahl, Enum. ii. 395 = agrimonoides.
setosus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 26 = Pennisetum setosum.
spicatus, Cav. Desc. 304, 614 = Pennisetum typhoideum.
spini/ex, Cav. Ic v.. 88. t. 461=tribuloides.
strictus, Chapm. in Conlt. Bot. Gaz. iii. (1878) 20 = incertus.
taitensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 419.—Ins. Tahiti,
tomentosus, *Poir. Encyc.* vi. 51.—Afr. austr.
tribuloides, *Linn. Sp. PI.* 1050.—Am. bor.
tripsaceus, Herb. linn, ex Munro, in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 55 = Trachys mucronata.
tripsacoides, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62 = montanus.

CENCHETJ8:—
uniflorus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 448 - montanus.
vaginatus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 110.—Hab. ?
villosus, Spreng. Syst. i. 801 = Anthephora elegans.
viridis, *Spreng. 1. c.*—Am. trop.

CENEKIA, Opiz, Seznam, 36 (1852) = **Campanula,** Tourn.
rapunculoides, Opiz, 1. c -Camp, rapuncnloides.
simplex, Opiz, 1. c.-Camp. bononiensis.

CENTA, Comm. ex Juss. Gen. 183 (1789). *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 429.
LANCISIA, Gaertn. Fruct. ii. 422 (1791).
anthemoidea, DC. Prod. vi. 88 = turbinata.
barbata, *Benth. (f Hoot./. Gen.* ii. 430.—Afr. austr.
debilis, DC. Prod. vi. 83 = turbinata.
discoidea, Less. Syn.' Comp. 261=Cotula nndicaulis.
discolor, DC. Prod. vi. 82 = sericea.
flosculosa, DC. 1. c 83=microglossa.
geminata, *Kunte, Del. Sem. Hort. Lips.* (1846) 1.—Afr. anstr.
hispida, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 430.—Afr. austr.
micTficephala, *E. Mey. ex DC. Prod.* vi. 79.—Afr. austr.
microglossa, *DC. I. c.* 83.—Afr. aastr.
nudicaulis, E. Mey. ex Heynh. Nom. ii. 130 = Cotula nudicaulis.
pectinata, *DC. Prod.* vi. 88.—Afr. austr.
pruinosa, DC. 1. c. 82=turbinata.
sericea, *DC. I. c*—Afr. austr.
subheterocarpa, Less. Syn. Comp. 261 «• turbinata.
Thunbergii, *Benth. & Hook. /. Gen.* ii. 480.—Afr. austr.
turbinata, *Pers. Syn.* ii. 465.—Afr. austr.
villosa, Heynh. Nom. ii. 130 = Cotula villosa.

CENOCLINE, C. Koch, in Bot. Zeit. i. (1843) 41 = Cotula, Tourn. (ComposA
acutiloba, C. Koch, 1. c. = Matricaria acutiloba.
albida, C. Koch, 1. c. = Matricaria albida.
aurea, C. Koch, 1. c. = Matricaria aurea.
chamaemeli/olia, C. Koch, 1. c. = Cotula chamaemelifolia.
cinerea, C. Koch, 1. c. = Cotula cinerea.
globi/era, C. Koch, 1. c. = Matricaria globifera.
grandiftora, C. Koch, 1. c. = Matricaria grandifloro.
paudflora, C. Koch, 1. c. = Matricaria discoidea.

CENOLOPHIUM, Kocb, Gen. Umbell. 108 (1824) -= Selinum, Linn. (Umbellif.).
divaricatum, Bess, in Flora, xv. (1832) II. Beibl. 27 = ***Fischeri.***
Fischeri, Koch, Gen. Umbell. 103.—Rossia; **Reg.** Caucas.; As. bor.
lapponicum, Nyl. ex Nyl. *8c* Sael. Herb. Mus. Fenn. ***S3=Fischeri.***

CENOLOPHON, Blume, Enum. PL Jav. 60 (1880) = Alpinia, Linn. (Scitamin.).
rubrum, Blume, 1. c. =-A. rubra.
vitellinum, Horan. Prod. Scitam. 36 = Atnomum vitellinum.

CENOSTIOMA, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx-140. t. 3 (1848). *LEGUMINOSAE,* Benth. *8c* Hook, f. i. 6«4.
angusti/olium, Tnl. 1. c. 141 = Gardnerianum.
Gardneriannm, *Tul. 1. c.*—Bras,
macrophyllum, *Tul. 1. c.*—Bras.

CENTAXJKEA, Linn. Gen. ed. I. 263 (1737) (Centauria). *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. »•

ACROCENTRON, Cass. in Diet. Sc Nat. xliv. 9 (1826).
ACROLOPHUS, Cass. 1. c. 1.253 (1827).
ACROPTILON, Cass. 1. c. 464 (1827).
AEGIALOPHILA, Boiss. *Be* Heldr. Diagn. Ser. I- *• 105 (1849).
AETHEOPAPPUS, Cass. in Diet. Sc Nat. 1. 25° (1827).
ALOPHIUM, Cass. 1. c liv. 493 (1828).
AMBLYOPOGON, Kisch. *8c* Mey. ex DC. Prod, vi 6'i (1837L
ANTAUREA, Neck> Elem. i. 70 (1790).
BIELZIA, Schur, Enum. PI. Transs. 409 (1866).

CEKTATTREA :—
CALCITRAPA, Hall. Ennm. Stirp. Helv. ii. 689 (1742).
CALLICEPHALUS, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 66 (1831).
CENTAUWUM, Tourn. ex linn. Syst. ed. I (1785).
CESTRINUS, Cass. Bull. Soc. Philom. 83 (1817); et in Diet. Sc. Nat. viii. 24 (1817).
CHAKTOLEPIS, Cass. Diet. Sc. Nat. xliv. 86 (1826).
CHEIROLEPIS, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 106 (1849).
CHEIROLOPHUS, Cass. in Diet Sc. Nat. 1. 250 (1827).
CHRYSEIS, Cass. 1. c. ix. 154 (1817).
COLYMIIADA, Hill, Veg. Syst. iv. 31 (1762).
CREFULA, Hill. 1. c. 9 (1762).
CROCODILIUM, [Vaill.] Juss. Gen. 178 (1789).
CYANUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1736); Juss. Gen. 174 (1789).
ERIOPHA, Hill, Hort. Kew. 69 (1769).
FORNICIUM, Cass. in Bull. Soc. Pbilom. 98 (1819); et in Diet. Sc. Nat. xvii. 249 (1S20).
HALOCHARIS, Bieb. ex DC. Prod. vi. 665 (1887).
HERACLEA, Hill, Veg. Syst. iv. 87 (1762).
HETEROLOPHUS, Cass. in Diet. Sc Nat. 1. 250 (18271.
HIPPOPHAESTUM, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 443 (1821).
HOOKIA, Neck. Elem. i. 70 (1790).
HYALEA, Jaub. & Spach, Illnstr. iii. 19. t. 214, 217, 292 (1847).
HYMENOCENTRON, Cass. in Diet. Sc Nat. xliv. 37 (1826).
HYMENOCEPHALUS, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. iii. 12. t. 209 (1847).
JACEA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735); Juss. Gen. 173 (1789).
LEPTERANTHUS, Neck. Elem. i. 73 (1790).
LEUCANTHA, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 443 (1821).
LOPHOLOMA, Cass.' in Diet. Sc. Nat. xliv. 87 (1828).
MALACOCEPHALUS, Tausch, in Flora, xi. (1828) II. 481.
MANTISALCA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1818) 142.
MELANOLOMA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxix. 472 (1828).
MENOMPHALUS, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 32 (1874).
MBSOCENTRON, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 38 (1826).
MICROLONCHUS, Cass. 1. c. (1826); 1. 247 (1827).
MICROLOPHDS, Cass. 1. c. xliv. 37 (1826).
ODONTOLOPHUS, Cass. 1. c 1. 252 (1827).
PACHYCENTRON, Pomel, Nonv. Mat. Fl. Atl. 82 (1874).
PECTINASTRUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 38 (1826).
PHAEOPAPPUS, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 122 (1846).
PHALOLEPIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. 1. 248 (1827).
PHILOSTIZUS, Cass. 1. c xxxix. 498 (1826).
PHRYGIA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 441 (1821).
PIPTOCERAS, Cass. in Diet. Sc Nat. 1. 469 (1827).
PLATYLOPHUS, Cass. 1. c. xliv. 36 (1826).
PLECTOCEPHALUS, D. Don, in Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. II. t. 51 (1838).
PSORA, Hill, Veg. Syst. iv. 30 (1762).
POLYACANTHA,S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 443 (1821).
PTEROLOPHUS. Cass. in Diet. Sc. Nat xliv. 34 (1826).
PTOSIMOPAPPUS, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 739 (1839-45).
PSEPHELLUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliii. 488 (18261.
PODIA, Neck. Elem. i. 72 (1790).
PVCNOCOMITS, Hill, Syst. Veg. iv. 88 (1782).
RHAPONTICA, Hill. 1. c. 47 (1762).
RHAPONTICUM, [Vaill.] Adans. Fam. ii. 117 (1763); Juss. Gen. 174 (1789).
SERIDIA, JUSS. Gen. 173 (1789).
SETACHNA, Dulac,Fl. Hautes-Pyr. 618 (1867).
SACMEN, Hill, Veg. Syst. iv. 85 (1762).
SPILACRON, Cass. in Diet. Sc Nat. 1. 288 (1827).
SOLSTITIARIA, Hill, Veg. Syst. jv. 21 (1762).
SPHAEROCEPHALA, Hill, 1. c. 48 (1762).
STENOLOPHITS, Cass. in Diet. Sc. Nat. 1. 499 (1827).

CENTAUREA :—
STIZOLOPHUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 35 (1826), nomen; Ii. 49 (1827).
STAEBE, Hill, Veg. Syst. iv. 33 (1762).
TETRAMORPHAEA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1838) 831.
TOMANTHEA, DC. Prod, vi 664 (1887).
TRIPLOCENTRON, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 88 (1826).
VELTIS, Adans. Fam. ii. 116 (1763).
VERUTINA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 88 (1826).
XANTHOPSIS, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 422.
abrotanifolia, Lam. Encyc i. 670 = paniculata.
abyssinica, *Sch. Bip. ex Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 62. —Abyssin.
acanthodes, *Spreng. Syst.* iii. 403.—Hab. ?
acaulis, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 160 = Cavanillesiana.
acaulis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 52 = glomerata.
acaulis, Haensel. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 151-Haenseleri.
acaulis, Lag. 1. c. — Graelsii.
acaulis. *Linn. Sp. PI.* 914.—Afr. bor.
achaia, *Boiss. EJ* Heldr. Diagn.* Ser. II. iii. 79.—Graecia.
acicularis, *Sibth. tS Sm. Fl. Graec.* t. 911.—Archip. Graec.
acmophylla, Boiss. Diagn. Ser. II. iii.68=axillaris.
acrolepis, *Hoffmgg. ex Heynh. Norn.* ii. 181, nomen.—Hab. ?
acromaura, *Hoffmgg. ex Heynh. I. c.* nomen.—Hab. ?
acuta, Lam. H. Fr. ii. 49 = Crupina vulgaris.
acuta, Vahl, ex Bieb. Casp. 82 = C. Behen.
acutangula, *Boiss. b" Rent. Pugill. PI. Nov.* (1852) 68. —Hispan.
acutifolia, Jord. Pugill. 105 = pectinata.
acutifolia, Schur, Enum. PI. Transs. 899, Index = plumosa.
acutiloba, DC. Prod. vi. 581=cristata.
Adami, Willd. Sp. PI. iii. 2310=solstitialis.
adonidifolia, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1545 = rupestris.
adpressa, Ledeb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 816 = stereophylla.
adulterina, Moretti, ex DC. Prod. vi. 696 - C. Calcitrapa.
aegialophila, Boiss. & Hcldr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 704-cretica.
aegyptiaca, *Linn. Mant.* i. 118.—Aegypt.; Arab.
aegyptiaca, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 907 = iberica.
aeolica, Guss. ex DC. Prod. vi. 584 = aplolepis.
affinis, Frivald. in Flora, xjx. (1836) 485 = dissecta.
africana, *Lam. Encyc.* i. 664.—Afr.. bor.
aggregate, *Fisch. &" Mey. in DC. Prod.* vi. 585.—As. Min.; Persia.
Aichingeriana, Welw. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 848 = vanegata.
ainetensis, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 117=eryngioides.
alata, Lam. Encyc. i. 665 - C. Behen.
alba, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 858 = sterilU.
alba, Herb. Calc. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 289 = Tricholepis elongata.
alba, *Linn. Sp. PI.* 914.— Enr. anstr.; Reg. Caucas.
alba, Suter, H. Helv. ii. 204-amara.
albida, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 433 = aggregata.
albiflora, C. Koch, 1. c. 430 = carduiformis.
alexandrina, *Delile, Fl. Egypte,* 280. t. 49. f. 8.—Aegypt.
algeriensis, *Dur. V Coss. Notes PI. Crit.* 136.—Algeria.
Alophium, *DC. Prod.* vi. 601.—Hispan.
alpestris, Hegetschw. Fl. Schw. 854=C. Scabiosa.
alpina, *Linn. Sp. PI.* 910.—Europ.
altaica, Fisch. ex Spreng. Pugill. i. 59=Leuzea salina.
amaena, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. IL vi. 112 = amoena.
amara, Habl. Taur. 156-trinervia.
amara, *Linn. Sp. PL* ed. II. 1292.—Europ. anstr.; As. Min.
Amberboi, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 0 - moschata.
ambigua, *Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1826) 3 ; *ex DC. Prod.* vi. 582.—Italia.
ambigua, Thorn, ex DC. 1. c. 673=nervosa.
amblensis, *Graells, in Mem. Acad. Cienc. Madr.* ii. (1859) 462.—Hispan.
amblyolepis, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 703.—Reg. Caucas.

CENTAUB.EA :—
ambracea, Schkuhr, Handb. t. 261 = moschata.
americana, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* (1821) 117. —Am. bor.
americana, Spreng. Syst. iii. 407 ™ melitensis.
ammocyanns, *Boiss. Diagn.* Her. I. x. 109.—Arab.; Palaest.
ammopkila, Bess, ex DC. Prod. vi. 586 = diffusa.
amoena, *Boiss. &" Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 11*2.—Cappadoc.
Amoi, Campo, ex Campo *Sc* Amo, in Revista, v. (1855; 66 = Boissicri.
amourensis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl.- Atl.* 30.—Algeria.
amplexicaulis, S. G. Gmel. It. L 136. t. 24=Jurinca polyclonos.
amplifolia, *Boiss. V Heldr. Dingn.* Ser. II. iii. (58.—Graecia.
anatolica, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 234 = depressa.
arigulosa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 28.—Algeria.
angustifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7-montana.
angustifolia, Schrank, Baier. Fl. ii. 376 = amara.
antennata, *Dufour, in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. xxiii. (1831) 158.—Hi.pan.
antiochia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 115.—Syria,
aphrodisea, *Boiss. I. c.* iv. 17.—Caria
apiculata, Ledeb Ind. Hort. Dorp. Suppl. (1824) 3 = C. Scabiosa.
aplolepia, *Moretti, in Brugnat. Giorn. Fis.* II. ix. (1826) 164.—Italia.
appendicigera, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 425 = Balansae.
Apula, Lam. Encyc. i. 674=melitensis.
arachnoidea, Viv. Ann. Bot. i. II. 185 = rupestris.
arancosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 121.—Syria,
arborea, *Webb &* Berth. Phyt. Canar.* ii. 856.—Ins. Canar.
arenaria, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 847.—Europ. or.; Reg. Caucas.
arenaria, Reichb. PI. Crit. v. 26. t. 443. f. 634 = Reichenbachii.
arenaria, Urv. in Mém. Soc Linn. Par. i. (1822) 371 = polyclada.
argentea, Frivald. exNym. Consp. 429-rupe*tris.
argentea, *Linn. Sp. PI.* 912.—Ins. Creta et Istria.
argophylla, Steud. Norn. ed. I. 173=argyrophylla.
arguta, *Nees, Hor. Phys Berol.* 116. t. 25.—Ins. Canar.
argyrophylla, *Willd. Enum..Hort. Berol. Suppl.* 61.—Hab. ?
arifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 112.—Syria,
aristata, *Benth.* b* *Hook./. Gen.* ii. 480.—Cappadoc.
aristata, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 226 = caerulescens.
Armena, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 676.—As. Min.
armoracifolia, *Sibth. tf Sm. Fl. Graec. Prod.* ii. 2U5.—Graecia.
arrectispina, Bertol. Fl. Ital. ix. 487=C. Calcitrapa.
aspera, *Linn. Sp. PI.* 916.—Europ. austr.
astrachanica, Spreng. Syst. iii. 897= stereophylla.
athoa, DC. Prod. vi. 588=rupestris.
atlantica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 283.—Algeria.
atrata, Willd. Sp. PI. iii. 2290-axillaris.
atropurpurea, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 237-C. Scabiosa.
atropurpurea, Olivier, Voy. i. 818 •= Olivieriana.
atropurpurea, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 121. —Hungar.
atropurpurea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 65, 122 = C. Centaurium.
attica, Nym. Syll. 33 = graeca.
Aucheriana, *DC. Prod.* vi. 676.—Assyr.
august ana, Reichb. f. Ic Fl. Germ. xv. 37. t. 785 - maculosa.
aurea, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 265.—Europ. austr.
aurea, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 318 = nicaeensis.
auriculata, Kalb. ex Pcrs. Syn. ii. 486 = C. Seridis.
auriculata, Spreng. Pugill. i. 59 = stereophylla.
australis, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 479.—Austral.
australis, PanS. Elem. 44=sublanata.
australis, Poepp. ex DC. Prod. vi. 575»chilensii.
austriaca, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 64=trichcephala.
austriaca, Reichb. Ic. Fl. Germ. xv. 37. t. 785, 3-4 - phrygia.

CBNTAUHEA:—
austriaca, Rochel, PI. Banat. Rar. 76. t. 86. f. 5 = nervosa.
austriaca, *Willd. Sp. PI.* iii. 2283.—Enrop.; Reg. Caucas.; As. bor.
axillaris, *Willd. I. c.* 2290.—Europ.; Oriens.
babylonica, Bieb. Casp. 82 = C. Behen.
babylonica, *Linn. Want.* ii. 460.—As. Min.; Syria.
badensis, Tratt. Arch. Gew. i. 28 = C. Scabiosa.
Balansae, *Boiss.* b" *Reut. Diagn.* Ser. II. iii. 82.—Afr. bor.
baldensis, Pers. Syn. ii. 481 = alpina.
balearica, *Rodrig. in Bull. Sec; Bat. Fr.* xvi. (1869) 237.—IDS. Minorca.
Balsamita, I). Don, in Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. II. t. 355 = Fhaeopappns spectabilis.
Balsamita, *Lam. Encyc.* i. 667.—As. Min.; Persia.
banatica, Kern, ex Nym. Consp. 427 = arenaria.
barbara, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ail.* 27.—Algeria.
Barrelieri, Dufour, in Ann. Gén. Sc. Phys. vii. (1820) 301 = Serratula pinnatifida.
Barrelieri, *Spreng. Syst.* iii. 408.—Hangar.
Behen, DC. Prod. vi. 567 » Szovitsiana.
Behen, Lam. Encyc. i. 665 = cerinthifolia.
Behen, *Linn. Sp. PI.* 914.—As. Min.; Syria; Persia.
Belangeriana, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, 1. (18t>5) 66=phyllocephala.
bella, *Trautv. in Bull. Acad. St. Pitersb.* x. (1866) 394.—Reg. Caucas.
benedict a, Linn. Sp. PI. ed. II. 1296 = Carbenia benedicta.
Berini, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 819 = nervosa.
Besseriana, *DC. Prod.* vi. 585.—Europ. or.
Besseriana, Janka, ex Nym. Consp. 427 = tenuiflora.
bicolor, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 428.—Reg. Caucas.
Biebersteinii, DC. Prod. vi. 588 = maculosa.
Biebersteinii, Scàur, Vcrh. Siebenb. Ver. Naturf. (1859175-ReichenbachU.
biflora, *Kalen. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xviii. (1845) I. 237.—Astrakhan.
bimorpha, Viv. Fl. Lib. Spec. 58. t. 24=sonchifolia.
Boissieri, *DC. Prod.* vii. 803.—Hispan.
Boissieri, Walp. Rep. vi. 298=graeca.
bombycina, *Boiss. in DC. Prod.* vii. 302.—Hispan.
borealis, Salisb. Prod. 208 = C. Scabiosa.
borysthenica, *Gruner, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xli. (1868) II. 426.—Tauria.
Bourgaei, *Boiss. FL Orient,* iii. 637.—Lycia.
Bourgaei, Schult. ex Nym. Consp. 426 = Langei.
Braehtii, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 35. t. 786=maculosa.
brachyptera, DC. Prod. vi. 567 •• C. Behen.
bracteata, Balb. ex Steud. Nom. ed. II. i. S19=nigrescens.
bracteata, *Bentk.* 6* *Hook. f. Gen.* ii. 481.—Syria.
bracteata, Scop. Delic. Insub. ii. 17 = amara.
brevicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 120 = pallescens.
breoipappa, Boiss. & Reut. 1. c. Ser. II. iii. 71 =nigrescens.
Brosseanax, *Bonnet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvii. (1880) p. xi.—Gallia.
Bubanii, Timb. in Mém. Acad. Sc. Toul. Ser. VIII. i. ii. (1879) 187 = caerulescens.
budziackca, *Tardent, Ess. Hist. Nat. Bessar.* 61, Domen.—Bessarab.
bulbosa, *Hook, (f Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 111.—Chili.
busambarensis, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 873.—Sicilia.
cachinalensis, *Phil. Fl. Atac.* 34.—Chili,
cadmea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 16.—Caria.
caerulescens, *Willd. Sp. PI.* iii. 2319.—Europ. austr.
caespitosa, Cyrill. PI. Neap. Nov. Fasc. i. 24=sphaerocephala.
calalepis, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* L 31.—As. Min.
calcaria, Jord. Obs. PI. Crit vii. (1849) 82 = C. Scabiosa.
Calcitrapa, Bieb. Fl. Taur. Cauc iii. 594 = iberica.
Calcitrapa, £i'nn..S>./V. 917.—Europ.; Afr. bor.; As. temp.
caldtrapoides, DC. Prod. vi. 597=iberica.
caldtrapoides, Gouan, Fl. Monsp. 461=Ponzini.
caldtrapoides, *Linn. Cent.* i. 29; *Amoen. Acad.* iv. 291.—Reg. Caucas.; As. Min.
caldtrapoides, Thuill. Fl. Par. 446 = C. Calcitrapa.
calendulacea, Lam. Encyc. i. 668 = Zoegea leptaurea.

CENTAUKEA:—
caUiacantha, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. i. (1854) 32=patula.
calocephala, Willd. Enum. Hort. Berol. 928=atropurpurea.
calolepis, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 129=diffnsa.
calophylla, Steud. Nom. ed. I. 173=atropurpurea.
calva, *Ledeb. ex DC. Prod.* vi. 583.—Mont. Altai.
calva, Reut. ex Nym. Consp. 420=alba.
cana, C. A. Mey. ex Steud. Nom. ed. II. i. 820 = Ledebourii.
cana, Sibth. &Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 198 - axillaris.
canadensis, *Hort. Huber, ex Regel, Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1866) 90.—Am. bor.
canariensis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 928.—Ins. Teneriff.
cancellata, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. 406=aegyptiaca.
candidissima, Lam. Encyc. i. 669 = C. Cineraria.
Candolleana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 127.—Persia.
Candollei, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 424.—Reg. Caucas.
capillata, *Linn. Sp. PI.* 910 (sp. dub.).—Sibir.; Hispan.
cappadocica, *DC. Prod.* vi. 695.—As. Min.
zaprina, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 884 = ovina.
carduifolia, Salisb. Prod. 208 = C. Calcitrapa.
carduifonnis, DC. Prod. vi. 590.—As. Min.; Persia.
carduncella, DC. L c. 591=raphanina.
Cardunculus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 135.—Assyria.
Cardunculus, Pall. Reise, i. 500 - Serratula glauca.
Carduus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 152=Atractylis flava.
Carelli, *Ucria, in Roem. Arch.* i. 70,—Sicilia.
cariensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 19.—As. Min.
cameola, *Boiss. I. c.* Ser. II. iii. 88.—Cilicia.
carniolica, Host, Fl. Austr. ii. 517=montana.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 214 => americana 1
carpathica, Geners. Elem. n. 824 = montana.
carpatica, *Ftoriano, in Magyar Nihent. Lapok,* ix. (1885) 128.—Hungar.
carpetana, Boiss. *it.* Reut. Pugill. PI. Nov. (1852) 65 -nigra.
carratracensis, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1881) 94.—Hispan.
carthamoides, *Benth.* &* *Hook./. Gen.* ii. 479.—Sibir.
cassia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 108.—Syria.
Castellana, *Boiss. I. c.* vi. 12!).—Hispan.
cataonica, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 669.—Cataonia.
caucasica, Bieb. ex DC. Prod. vi. 579=montana.
Cavanillesiana, *Graells, in Mem. Acad. Cienc. Madr.* ii. (1859) 464.—Hispan.
Ceccariniana, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. IL iii. 81.—Macedon.
Centaurium, Host, ex Nym. Consp. 417"= Serratula coronata.
Centaurium, *Linn. Sp. PI.* 910.—Italia.
centauroides, Bieb. FL Taur. Cauc. ii. S69=salonitana.
centauroides, *Linn. Sp. PI.* 918.—Europ.
cephalariaefolia, *Willk. in Flora,* xxxiv. (1851) 762.—Hispan.
ceratophylla, Moris, Elench. i. 55=filiformis.
ceratophylla, Tenore, Cat. Hort. Neap. (1819) 72 = rupestris.
cerinthifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 197.—Graecia.
chamaerhaponticum, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 6-26.—Marocco.
Ckaubardi, Reicbb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 34. t. 781 = maculosa.
cheiracantha, *Fentl, ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 693.—As. Min.; Syria.
cheiranthifolia, Willd. Phytog. 12 = axillaris.
chilensis, *Bert, ex Bull. Ferussac* (1830), 109, nomen; *et ex Hook. & Am. in Bot. Beech. Voy.* i. 88.—Chili.
chlorantha, Adams, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 699 = montana.
Choulettiana, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 31.—Algeria,
chrysanthemifolia, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) I. *Erg.* 43.—Hab.?
chrysoleuca, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 21, in textu; *Fl. Orient,* iii. 678.—As. Min.
chrysolepis, Vis. in Mem. 1st. Venet. ix. (1860) 172 = orientalis.

CEMTATJREA:—
chrysolopha, Boiss. *Sc* Kotschy, Diagn. Ser. II. iii. 75 - aggregata.
chthonocephala, Boiss. Fl. Orient, iii. 677 = ustulata.
dchoracea, Linn. Syst. ed. V. 1231 = Serratula cichoracea.
dchoracea, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc iv. (1818) 66=Serratula caucasica.
cicutaefolia, Hornem. Hort. Ham. ii. 849 = collina.
dliata, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 834 = pallida.
cilicica, *Boiss. I"1 Bal. Diagn.* Ser. II. v. 118.—Cilicia.
Cineraria, Jacq. ex Nym. Consp. 425 « cinerea.
Cineraria, *Linn. Sp. PI.* 912.—Europ.; Afr. bor.
Cineraria, Pall. Tabl. Taur. 58=declinata.
Cineraria, Urv. in Mém. Soc Linn. i. (1822) 371=rutifolia.
cinerascens, *Bubani, in Num. Giorn. Bot. Ital.* v. (1873) 319.—Hispan.
dnerea, Griseb. Spicil. FL Rumel. ii. 236=dissecta.
cinerea, *Lam. Encyc.* i. 669.—Italia,
cirrata, *Reichb. M. Germ. Excurs.* 214.—Europ. austr.
Clementei, *Boiss. in DC. Prod.* vii. 303.—Hispan.
coarctata, Spreng. Syst. iii. 407 = glomerata.
cochinchinensis, *DC. Prod.* vi. 601.—Cochinch.
coelolepis, *Fisch.* b* *Mey. ex Heynh. Nom.* ii. 130, nomen.—Rossia.
collina, Asso, Syn. 127 = omata.
collina, *Linn. Sp. PI.* 918.—Reg. Mediterr.
collina, Schur, Enum. PI. Transs. 408=pseudo-collina.
collina, Scop, ex Nym. Consp. 429=rupestris.
collina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 914 = salonitana.
comata, Jord. Pugill. 106.- pectinata.
commutata, Timb. ex Nym. Consp. 421=nigra.
Comperiana, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856)n. 893 = diffusa.
concinna, *Trautv. in Act, Hort. Petrop.* ii. (1873) 653.—Armenia.
concinna, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 819 - pulchenima.
congest a, Willd. ex DC. Prod. vi. 593=melitensis.
conglomerata, *C. A. Mey. in Beitr. Pfl. Russl.* v. 44.—Rossia.
conifera, *Linn. Sp. PI.* 915.—Reg. Mediterr.
conocephala, *C. Bolle, in Bonplandia,* viii. (1860) 134.—Ins. Canar.
consanguinea, *DC. Prod.* vi. 585.—As. Min.
consimilis, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 851=C. Jacea.
contracts, Viv. Fl. Lib. Spec. 58. t. 24. f. 1, 2 - Delilei.
Cordonis, Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 663 = Ceccariniana.
coriacea, Waldst. & Kit PI. Rar. Hung. ii. 214 = C. Scabiosa.
corinthiaca, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 113 - achaia.
Conuti, Reichb. Hort. t. 146=alpina.
coronopifolia, *Lam. Encyc. i.* 667.—Iberia.
cerymbosa, Pourr. in Mém. Acad. Sc. Toul. iii. (1788) 310 = maculosa.
Cossoniana, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1878) 869.—Marocco.
Costae, *Willk. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 115.—Hispan.
crassifolia, *Bertol. in Ann. Stor. Nat.* ii. (1829) 359.—Ins. Melita.
cretica, *Nym. Syll.* 84.—Ins. Creta.
cretica, Spreng. Syst. iii. 408 = Carthamus creticus.
crinita, *Willd. ex Spreng. 1. c.* 400.—Hab.?
cristata, *Bartl. in Wendl. Beitr.* ii. 119.—Austria,
crithmifolia, *Vis. Fl. Dalmat.* ii. 40.—Dalmatia.
crocodylioides, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 118 «=C. Crocodylium.
Crocodylium, *Linn. Sp. PI.* 919.—Syria,
cruenta, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 929.—Hab. ?
Crupina, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pe'lop. 59 " Crupina pseudocrupina.
Crupina, Desf. Fl. Atlant. ii. 292 = Crupina intermedia.
Crupina, Linn. Sp. PL 909 = Crupina vulgaris.
Crupina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 900- Crupina Crupinastrum.
Crupinastrum, Moris, Ind. Sem. Hort. Taur. (1862) 12; et in Bot. Zeit. i. (1843) 168 = Crupina Crupinastrum.
crupinoides, Dest Fl. Atlant. ii. 293-Volutarell» bicolor.
Csatoi, *Borbas, in Ertek. Kori Magyar Tudom. Akad.* ix. (1879) 29.—Hungar.
cucullata, *Spreng. ex Steud. Nom.* ed. 1.174.—Hab. T'

CEXTAUREA :—
cuneifolia, Orphan, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 645 = sublanata.
cuueifolia, *Sibth. (f Sm. Fl. Graec.* t. 901.—Macedon.
cv.spidata, Aucher, ex DC. Prod. vi. 577 - Aucheriaua.
cuspidata, *Vis. in Flora,* xii. (1829) I. *Erg.* 22.—Dalmatia.
cyaneum, St. Lag. in Ann. Soc. BoL Lyon, vii. (1880) 122 = C. Cyanus.
cyanifolia, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 436.—Reg. Caucas.
cyanifolia, Poir. Encycl. SuppL ii. 168 = solstitialis.
cyanoides, *Bergg. V Wahlenb. in /sis,* V. xxi. (1828) 871—Syria.
cyanoides, DC. Prod. vi. 578=axillaris.
cyanoides, *C. Sm. in Buch, Beschr. Canar. Ins.* 147.—Ins. Canar.
Cyanus, *Linn. Sp. PI.* 911.—Europ.; Reg. Cancas.
cylindrocarpa, Reichb. f. Ic. Fl. Germ, xv 84. t. 781 =cuneifolia et sublanata.
cynaroides, C. Sm. ex Buch, in Berl. Acad. Abh. 1816-17 (1819) 869-Serratula canariensis.
cynaroides, *Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins.* 147.—Ins. Canar.
cyrtolepiB, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 709.—As. Min.
damascena, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 112.—Syria.
dealbata, Moris, ex Nym. Consp. 425 ^C. Cineraria,
dealbata, *Willd. Sp. PI.* iii. 2295.—As. Min.; Reg. Caucas.; Persia.
Debeauxii, Godr. *Sc* Gren. Fl. Fr. ii. 248^-nigra.
decipiens, Thuill. Fl. Par. ed. II. 445 = C. Jacea.
declinata, Aucher, ex DC. Prod. vi. 579 = lanigera.
declinata, Bieb. Fl. Taur. Cauc iii. 690=leucophylla.
decumbens, Boiss. ex DC. Prod. vii. 303 = Boissieri.
decumbent, DC. Prod. vi. 576 = leucophylla.
decumbens, Dubois, Fl. Orl. ex Pere. Syn. 485 = C. Jacea.
decurrens, *DC. Prod.* vi. 596.—Hab. 1
deflexa, *Tatarinov, in Beitr. Kenntn. Russ. Reich.* xx. 252.—Soongaria.
deinacantha, *Boiss. (f Haussk. in Fl. Orient,* iii. 665.—Kurdistan.
Delilei, *Godr. in Mêm. Acad. Monti. (Sect. Médic.) i.* (1853) 435.—Gallia?
denticulata, Lejeune, Rev. Fl. Spa, 188=nigrescens.
depressa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 346.—Reg. Caucas.; Iber.
dertosensis, Costa, Fl. Catal. (1864) 141 = podospermifolia.
derventana, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 287 — Kerneriana.
derventana, *Vis. (f Pane, in Mem. 1st. Venet.* xii. (1864) 472.—Oriens.
desmicephala, Fenzl, Ind. Hort Vind. (1855) = aggregata.
deusta, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. H = alba.
Devauxii, Bor. ex Nym. Consp. 431 = C. Calcitrapa.
dianthoides, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 312.—Chili,
dichroa, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 111.—Syria.
dichroantha, Kern, in Oestr. Bot Zeitschr. xxiv. (1874) 104=sordida.
diffusa, *Lam. Encyc.* i. 675.—Europ. austr. or.; As. Min.
dilute, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kern.* ed. I. iii. 261.—Afr. bor.
dimorpha, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 58. t. 24. f. 3.—Afr. bor.
diomedea, *Gasp. Descr. Trem.* 19, 23.—Ital.; Ins. Trem.
discoidea, Balb. ex DC. Prod. vi. 573=flosculosa.
djssecta, *Hill, Veg. Syst.* iv. 83.—Germ,
dissecta, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. Ii—Italia; Graecia.
divaricata. Wall. Cat. n. 2894 = Volutarella divaricata.
divergens, Lange, in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1861) 87 = Langei.
divergens. *Vis. Fl. Dalmat.* ii. 37. t. 12 b.—Europ. anstr.
diversifolia, Amo, ex Campo & Amo, in Revista, v. U855)56 = Amoi.
"versifolia, Lag. ex Boiss. Voy. Bot Espagne, it 354 =a»pera.
"omacina, Amo, Descr. PI. Nuev. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 17S = Senatula nudicaulis.

CENTAUKEA :-
dorypkora, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 665 = Urvillei.
drabaefolia, Auct. = seq.
drabifolia, *Sibth. (f Sm. Prod.* ii. 202; *Fl. Graec.* t. 910.—Bithynia.
dracunculifolia, *Dufour, in Ann. Sc. Nat.* xxiii. Se"r. I. (1831) 157.—Hispan.
druentica x, *Rouy, in Bull Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 842. 348.—Gallia.
dubia, S. G. Gmel. ex Steud. Norn. ed. I. 174 = Xeranthemum annuum.
dubia, Krock. Fl. Sil. Suppl. ii. 831-humilis?
dubia, Suter, Fl. Helv. ii. 202=nigrescens.
Duboisii, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 850 = C. Jacea.
Dumortieri, *Thys, in Bull. Soc. Bot. Belg.* viii. (1869) 464.—Belg.
dumulosa, *Boiss. Diagn,* Ser. I. x. 111.—Syria.
dutosensis, Costa, ex Nym. Consp. 429 = podospermifolia.
ebenoides, *Heldr. ex S. Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 183.—Graecia.
elata, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 150.—Mauritan.
elbrusensis, *Boiss. (f Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 131.—Persia.
elegans, All. Fl. Pedem. i. 168=Galactites tomentosa.
elegans, Salisb. Prod. 207 = C. Cineraria.
elongata, Desf. ex DC. Prod. vi. 604 (Quid ?).
elongata, Schousb. Vextr. Marokko, 199=diluta.
elongata, *Webb (f Berth. Phyt. Canar.* ii. 360.—Ins. Canar.
emigrantis, *Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* v. (1878) 313.—Hispan.
Endresii, Hocbst. & Stead, ex Steud. Norn. ed. II. i. 820=nigra.
eriocephala, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 86 = dimorpha.
eriopkora, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 74. n. 465 = aegyptiaca.
eriophora, *Linn. Sp. PI.* 916.—Gall.; Lusit.
eriophylla, Boiss. & Bal.ex Boiss. FL Orient, iii. 678 = chrysoleuca.
eriophylla, *Spreng. Syst.* iii. 404.—Hab.»
erucifolia, Linn. Sp. PI. 909 = Volutarella erucifolia.
eryngioides, *Lam. Encyc.* i. 675.—Arab.; Syria.
eryngioides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 913=achaia.
Eseobilla, Coss. ex Nym. Consp. 426 = castellana.
euphratica, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 125—polypodifolia.
exaltata, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 74 - coronopifolia.
exarata, *Boiss. ex Coss. Notes PI. Crit* 116.—Afr. bor.
exscapa, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 373 =acicularis.
Fabrei x, *Bonnet, ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 849.—Gallia.
Fenzlii, *Reichardt, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,* xiii. (1868) 1039.—As. temp.
Ferdinandi, Gren. Cat. Sem. Hort. Bot. Grat. (1847) Collect. 20=nervosa.
ferox, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 297. t. 242.—Numidia.
filiformis, Bieb. ex DC. Prod. vi. 566-pulchella.
filifonnis, *Viv. Fl. Cors. App.* 6.—Corsic.; Sardin.
Fischeri, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 61 = axillaris.
fistulosa, *Wender. ex Steud. Norn.* ed. IL i. 320.—Hab.?
fiavicans, Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lviii. (1881) 149 = C. Jacea.
floccosa, *Hook, (f Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 110.—Chili.
floccosa, Schloss. ex Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lviii. (1881) 149 =• montana.
floccosa, Schloss. & Vukot. Syll. Croat. 46=axillaris.
flosculosa, Balb. ex Nym. Consp. 422 = nervosa.
flosculosa, *Willd. Sp. PI.* iii. 2285.—Europ. austr.
foliosa, *Boiss. tf Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 672.—Syria.
Fontanesii, *Spach, ex Dur. in Duck. Rev. Bot.* ii. (1847) 429.—Algeria.
Forardi, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl. Add.* 159.—Italia.
Fraasii, Noe & Bal. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 681 = monacantha.
Fraasii, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 429=seq.
Fraatii, Sch. Bip. ex Tchihat. Asie Min. Cot. ii. 323-Spruneii.

CENTAtTREA :—
fragilis, *Dur. in Duch. Rev. Bot.* ii. (1847) 429.—Afr. sept.
fraylensis, *Sch. Bip. ex Nym. Consp.* 420.—Hispan.
Friderici, *Vis. Fl. Dalmat.* ii. 40.1.12 C—Dalmat.
fruticosa, Linn. Syst. ed. X. 1229-Staeheliaa frnticosa.
fuliginosa, Dollin. ex Nym. Consp. 424 = C. Scabiosa.
fulva, Huet, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xii. (1853) 254 =nigra.
Funkii, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 83 = macrorrhiza.
Funkii, Sch. Bip. ex Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 87 -Boissieri.
furfuracea, *Coss. tf Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 868.—Algeria.
fuscata, Desf. Fl. Atlant. ii. 302. t. 244 = nicaeënsis.
fuscata, Jord. Pugill. 105=pectinata.
fuscescens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 28.—Algeria.
Galactites, Linn. Sp. PI. 919-Galactites tomentosa.
garganica, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 425 = subtilis.
Gaudini, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 70 = amara.
Gayana, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 810.—Chili,
geluensis, *Boiss. &* Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 674.-Persia.
geocephala, Boiss. Fl. Orient, iii. 677=ustulata.
Gerberi, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1856) II. 391, in textu.—Ross, austr.
Germanidae, Haussk. ex Boiss. FL Orient, iii. 682 - C. Bchen.
gigantea, *Sch. Bip. ex Boiss. I. c.* 672.—Persia,
glaberrima, *Tausch, in Flora,* x. (1827) II. 249.—Dalmatia.
glandulifera, *Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 168.—Europ.
glastifolia, *Linn. Sp. PI.* 915.—As. Min.; Reg. Cauc.; Sibir.
glauca, Desf. ex DC. Prod. vi. 587-calocephala.
glauca, Puschk. ex Willd. Sp. PI. iii. 2278-moschata.
glaucescens, *Fisch. V Mey. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. i. (1854) 81.—Galatia.
Glehni, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iv. (1876) 382.—Rossia.
globosa, Hort ex DC. Prod. vi. 669-alba,
glomerata, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 94.—Aegypt.
glomerata, Webb *Sc* Berth. Phyt Canar. ii. 860 = melitensis.
Gmelini, *Steud. Norn.* ed. II. i. 320.—Sibir.
goniocaula, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 647.—Lydia.
gracilior, Reut. ex Nym. Consp. 421—amara.
gracilis, Bor. ex Nym. 1. c.=C. Jacea.
graeca, *Boiss. If Sprun. Diagn.* Ser. I. vi. 128.—Graecia.
graeca, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 242-Ceccariniana.
Graëlsii, *Nym. Consp.* 429.—Hispan.
Grafiana, DC. Prod. vi. 587=sordida.
graminifolia, Pourr. ex Willk. *3c* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 159 = montana.
granatensis, *Boiss. ex DC. Prod.* vii. 803.—Hispan.
grandiflora, Mo;. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. vi. 675-americana.
grandiflora, Pall. Reise, iii. 287=monanthos.
grinensis, Reut. Ind. Sem. Hort. Genev. (1857) 4—Cf. Linnaea, xxix. (1857-58) 722 = C. Scabiosa.
Grisebachii, Nym. Consp. 427=graeca.
gudrunensis, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 673.—Kurdist.
Guicciardii, *Boiss. I. c.* 661.—Baeotia.
gymnocarpa, *Moris If De Not. Fl. Insul. Caprar.* 76. t. 2.—Ins. Caprar.
gymnoclada, *Benth. (f Hook. f. Gen.* ii. 482.—Mesopot
Haenseleri, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 349.—Hispan.
Hanrii, Jord. Obs. PI. Crit. v. (1847) 70-coeruleicens, limbata.
Haussknechtii, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 670.—Syria.
Haynaldi, Borb. ex Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lviii. (1881) 149 = C. Jacea.
helenioides, *Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 688.—Pontust
hellenica, *Boiss. & Sprun. Diagn.* Ser. 1. vi. 181.—Graecia.
hemiptera x, *Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 892.—Europ. austr.

CENTAUREA:—
Herbichii, *Janka, in Flora,* xli. (1858) 441.—Transsylv.
Hermonis, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 122 = iberica.
heterocarpa, *Boiss. &" Gaill. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 680.—Syria.
heterophylla, Sprnn. ex Boiss. 1. c. 663=Sprnneri.
heterophylla,'Vli\\i. Sp. Fl. iii. 2314=aspera.
Heerffelii, keichb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 27. t 801 = Kotschyana.
hierapolitana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 16.—Caria.
hispida, DC. Prod. vi. 589=reflexa.
Hladnickiana, *Fisch. ex Heynh. Norn.* ii. 180, nomen.—Europ. anstr.
Hochstetteri, *Oliver* to[1] *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 488.—Afr. trop.
Hoefftiana, *C. A. Mey. in Mini. Acad. Pitersb.* Sér. VI. *Sc. Nat.* vii. (1855) 7.—Reg. Casp.
Hohenacieri, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (.1856) II. 395 = ovina.
Hohenackeriana, Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1888) 498 -praec.
hololeuca, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 694.—Syria,
horrida, *Badaro, in Brugnat. Giorn. Fis.* (1824) 363.—Liguria; Sardin.
horrida, Tenore, Ind. Sem. Hort Neap. (1829) 15; Syll. 449 = C. Calcitrapa.
Huetii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 69.—Armenia.
humifusa, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 696 = decumbens.
humilis, Schrank, Baier. Fl. ii. 376=pnllata1
hyalina, L'Hérit. ex DC. Prod. vi. 666=pulchella.
hyalolepis, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 133 = pallescens.
hybrida, All. Fl. Pedem. i. 161 = corymbosa.
hybrida, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 64-C. Calcitrapa.
hymenolepis, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iii. (1874) 272.—Reg. Caucas.
hyperidifolia, Brouss. ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 855=canariensis.
hypoleuca, *DC. Prod.* vi. 575.—As. Min.
hyssopifolia, Georgi, Beschr. Rnss. Reich, iii. IV. 1263 =trichocephala.
hyasopifolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 75.—Hispan.
Hystrix, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 351-polyacantha.
iberica, *Trevir. ex Spreng. Syst.* iii. 406.—Iber.; Armen.; Caucus.
idaea, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 119.—Creta.
incana, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 28 = Arctotis argentea.
incana, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 801.—Marocco.
incana, Lag. Gen. et Sp. Nov. 32 — Lagascae.
incana, Lose. *8c* Pardo, Ser. Inconf. 59=tenuifolia.
incana, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. Ii.—Italia,
incompta, *Vis. Fl. Dalmat.* 38. t 13". fig. 1.—Dalmat.
indica. Less, in Linnaea, vi. (1831) 84 — Goniocaulon glabrum.
indurata, Janka, in Flora, xli. (1858) 444-nigra.
ħ(estans,Dur.inDuch.Rev.Bot. h. (1847) 430.—Afr. bor.
intacta, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 705.—Reg. Caucas.
integrifolia, *C. A. Mey. Ven. Pfl. Cauc.* 64.—Reg. Caucas.
integrifolia, Tausch, in Flora, zi. (1828) II. 486= nigra.
integrifolia, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lviii. (1881) 153 = C. Scabiosa.
integrisquama, Vukot. 1. c. 152 » C. Scabiosa.
intermedia, Cariot, Etud. Fl. ed. V. 817 = axillaris.
intermedia, *Mutel, in Duck. Rev. Bot. I* (1846-46) 400.—Algeria,
interrupta, *Hoffmgg.* b* *Lint, Fl. Port.* ii. 227.—Lusitan.
intiicata, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 130.—Persia,
intybacea, *Lam. Encyc.* i. 671.—Gallia; Hispan.
inuloides, Fisch. ex Nym. Consp. 418=trinervia.
inusta, *Hoffmgg. ex Heynh. Norn.* ii. 131, nomen.—Hab. ?
involucrata, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 295.—Alger.
iserniana, Graells, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 162-Janerii.
Isemii, *Willk. in Willk. V Lange, 1. c.* 155.—Hispan.
Isnardi, Linn. Sp. PI. 916 - aspen,
ispahanica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 133.—Persia.
italia, Steud. Nom. ed. II. i. 820 = seq.
italica, Fen. Syn. ii. 484-C. Scabiosa.

CENTATJREA:—
ixodes, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 284.—Algeria.
Jacea, *Linn. Sp. PI.* 914.—Europ.; As. med.
jacobaeaefolia, *Lam. Encyc.* i. 675.—Hab. 1
jacobaeaefolia, Spreng. Syst. iii. 404 = argyrophylla.
Jacobi, Dufour, in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 848 -sonchifolia.
Janerii, *Graells, in Mem. Acad. Cienc. Madr.* ii. (1859) 466 *[Ramill.* 8).—Hispan.
Jankeana, *Simk. in Termisz. Fiizetek,* i. (1817) 168.—Europ. austr.
Jordaniana, *Gren. tf Godr. Fl. Fr.* ii. 245.—Gallia.
jurineaefolia, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 73 = rutifolia.
jnvenalis x, *Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. MMic.)* i. (1858) 483.—Gallia.
karduchoium, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 033.—Armenia.
iarlowensis, Frivald. ex Hampe, in Flora, xx. (1837) t. 228=napulifera.
Karschiana, Auersw. ex Nym. Consp. 426 = cristata.
Karstiana, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 240=pallida.
Kartschiana, *Scop. Cam.* ed. II. ii. 140. t. 65.—Camiol.
Kemeriana, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 178.—Thracia.
kestanica, *Franch'. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xvi. (1883) 825.—Turkest.
kilaea, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 643.—Byzant.
Kochii, F. Schultz, ex Nym. Consp. 421—nigrescens.
Kolczygini, *Kalen. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xviii. (1845) 1.236.—Reg. Caucas.
Kotschyana, Heuff. in Koch, Syn. Fl. Germ. 437 = C. Scabiosa.
Kralikii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 84=dimorpha.
kurdica, *Reichardt, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xiii. (1863) 1042.—Kurdist.
laciniata, Guss. in DC. Prod. vi. 582=ambigua.
laconica, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 660.—Laconia.
lactucaefolia, *Boiss. 1. c.* 622.—Ins. Rhodus.
Lagascae, *Nym. Syll.* 33.—Hispan.
Lagascana, Graells, in Mem. Acad. Cienc. Madr. ii. (1859) 465 (Ind. PI. Nov. 7) = Graëlsii.
lanata, DC. Prod. vi. 610 = Carthamus lanatus.
lanata, Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 444 = C. Cyanus.
lancifolia, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iii. 406.—Creta.
Langeana, Willk. in Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 167=Langei.
Langei, *Nym. Suppl. Syll.* 6.—Hispan.
lanigera, *DC. Prod.* vi. 679.—Cappadoc.
lappacea, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 16 = solstitialis.
lasiorhiza, *DC. Prod.* vi. 600.—Persia.
latifolia, Pens. Syn. ii. 487 = centanrojdes.
latisquama, DC. Prod. vi. 589 =saldnitana.
laxa, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 640.—Mesopot.
Ledebourii, Steud. Nom. ed. II. i. S20=cana.
leptocephala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 110.—Syria.
leptoloma, Pane, ex Nym. Consp. 426=maculosa.
leptophylla, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 419.—Lazistan.
leucantha, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii (1788) 810 — intybacea.
leucantha, Web. *8c* Mohr, Beirr. i. 74. n. 49=montana.
leueocephala, Schur, Enum. PI. Transs. 403=phrygia.
leucolepis, DC. Prod. vi. 568 = alba.
leucolepis, Ledeb. ex Nym. Consp. 420=sterilis.
leucolepis, Tenore, ex Nym. 1. c.=splendens.
leucophaea, *Jord. Obs. PI. Crit.* v. (1847) 64.—Gallia.
leucophylla, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* iii 691.—Reg. Caucas.
lenzeoides, *Walp. Ann.* i. 447.—Media,
ligerina x, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxriL (1880) p. xxii.—Gallia.
limbata, *Hoffmgg.* &• *Link, FL Port.* ii. 221.—Lusitan.
linarifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 821-linifolia.
linearifolia. Lam. Encyc. i. 067= linifolia.
lingulata,"Lig. Gen. et Sp. Nov. 32—variegata.
linifolia, Lam. Encyc. i. 667-hyssopifolia.
linifolia. *Linn. Mant.* i. 117 ; *Vahl, Symb. Bot. i.* 75.—Hispan.; Italia.
Linnaeana, Walp. Ann. i. 450 - Fontanesii.
Lippii, Linn. Sp. PI. 910-Volutarella Lippii.
livoniana, Weinm. ex Ledeb. Hort. Dorp. 38 - C. Jacea.
longepcdunculata, *Sch. Bip. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 668.—Persia.

CENTAUREA:—
lugdunensis, Jord. Obs. PI. Crit. v. (1847) 49 - montana.
Luschaniana, *Heimerl, ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 113.—Lycia.
lusitanica, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 85 = sphaerocephala.
lutea, *Gueldenst. It.* ii. 43, *ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 712.—Ross, austr.
lycaonica, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. II. v. 111.—As. Min.
lycia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 109.—Lycia.
lycopifolia, *Boiss. If Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 693.—Syria.
lydia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 20.—Bithynia.
lyraefolia, Salisb. Prod. 208 -salmantica.
lyrata, Bell. App. Fl. Pedem. 40=rhapontica.
lyrata, *Pers. Syn.* ii. 486.—Uruguay,
lyrata, *[Soland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. ii. 270.—Syria,
lyrophylla, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 238.—Europ. austr.
macedonica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 180.—Graecia.
macracantha, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 690 •= iberica.
macroacantha, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 518 = calcitrapoides.
macrocarpa, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 677.—Persia,
macrocephala, *Puschk. ex Willd. Sp. PI.* iii. 2299.—Armen.
macrolopha, *Fenel, ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 595.—Oriens.
macrorrhiza, *Willk. in Linnaea,* xxv. (1652) 38.—Hispan.
maculata, Andrz. Rys Botan. i. (1823) 12=maculosa.
maculosa, Eichw. Skizze, 146 = Biebersteinii.
maculasa, Guss. PI. Rar. 359=cinerea.
maculosa, *Lam. Encyc.* i. 669.—Gallia; Hispan.; Italia.
maculosa, Noe[1], ex Nym. Consp. 425=cuneifolia.
maladtana, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 85 = sonchifolia.
margaritacea, Tenore, Syll. Add. iii. A. 628 = splendens.
marginata, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. Iii = nicaeënsis.
mariana, Nym. Suppl. Syll. 6=macrorrhiza.
mariolensis, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 110.—Gallia.
maritima, Dufour, in Ann. Sc. Nat. Sén I. xxiii. (1831) 165-sonchifolia.
maroccana. *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 370.—Marocco.
Ma.tschMiana.,Sprtng.Syst. iii. 898.—Podol.; Cancas.
Massoniana, *Lowe, in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 297.—Ius. Madera.
mothiolifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 19 - axillaris.
maxima, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 152 = verbascifolia.
melitensis, *Linn. Sp. PI.* 917.—Europ.; Am. austr.
membranacea, Jacquem. Voy. Bot. 97 -Saussurea denticulata.
membranacea. Lam. Encyc. i. 666=monanthos.
menteyerica, ViU. Hist. PI. Dauph. i. 865; iii. 48=C. Scabiosa.
Meryonis, DC. Prod. vi. 598-iberica.
mexicana, DC. 1. c 575 = americana.
micracantha, *Dufour, in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. xxiii. (1831) 164.—Hispan.
micrantha, Hoffmgg. *8c* link, Fl. Port. ii. 220 = castellana.
micranthos, S. G. Gmel. It. i. t. 23. f. 1-maculosa.
microcephala, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 480.—Cappadoc.
microlepis, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 651.—Lycia.
microlonchoides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 127—Persia.
microptilon, Godr. *8c* Gren. Fl. Fr. ii. 242-nigra.
Miergkii, Jord. in Cat. Grain. Grenob. (1850) 15 ; et Pugill. llff=paniculata.
Minoa, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 662 » Guicciardii.
minor, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 403-polymorpha.
mixta, DC. Prod. vi. 594 - hellenica.
mollis, Bess. [FL Galic ii. 207 ?]-axillaris.
mollis, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 12 = C. Jacea.
mollis, Waldst. & Kit PI. Rar. Hung. iii. 243 t. _219 = montana.
monacantha, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 681.—Thracia.

CENTATJREA :—
monacantha, *Clark, Trav.* ii. 354.—Cyprus,
monantha, *Georgi, Bemerk. Seise Suss. Reich,* i. 281. —Rossia.
monocephala, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 811.—Chili.
montana, Anct. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 159 = variegata, axillaris.
montana, Burm. f. Prod. Fl. Cap. 28·- sempervirens.
montana, Costa, Fl. Catal. 139 = semidecuirens, lugdunensis.
montana, *Linn. Sp. PL* 911.—Enrop.
monticola, *Boiss. ex DC. Prod.* vii. 802.—Hispan.
MoriUiana, Hegetschw. Fl. Schw. 861-phrygia.
Moschata, *Linn. Sp. PL* 909.—Oriens.
Moschus, Habl. in S. G. Gmel. It. iv. 176 = Jurinea depressa.
Mouelli, *Blanchet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvili. (1880) 21.-Gallia.
mucronata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 151» pomila.
mucronifera, *DC. Prod.* vi. 569.—Cappadoc.
multifida, *Pers. Syn.* ii. 487.—Afr. bor.
multiflora, Pers. 1. c. 486=sicula.
Mureti, Jord. Pugill. 108 = coerulescens.
muricata, Linn. Sp. PI.- 918 = Volularella muricata.
muricata, Spreng. Syst. iii. 402 = Volntarella Lippii.
musarum, *Boiss.* &" *Orph. Diagn.* Ser. II. v. 112.—Graecia.
mutabilis, *St. Amans, in Mem. Mus. Par.* i. (1815) 477.—Mont. Pyren.
myacantha, DC. Fl. Fr. iv. 101=C. Caldtrapa.
myconia, Boiss. & Sart Diagn. Ser. II. vi. 118 = Urvillei.
myriocephala, Clark, Trav. i. 28=diffusa.
myriocephnla, *Sch. Bip. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 682. —Syria,
myriostigma, *Lent, in Illustr. Hortie.* (1856) *Misc.* 88. —Hab.?
rayriostoma, *Vis.* fa" *Pan!, in Mem. 1st. Venet.* xii. (1864) 470.-Orient.
nana, Chesn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 320, 318 = amara.
nana, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 2«6. t. 241.—Mont. Atl.
nana, Sieber, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 675=raphanina.
napifolia, *Linn. Sp. PI.* 916.—Italia; Graecia; Afr. bor.
napulifera, *Rachel, in 'Act. Hungar. Evhony.'* (1834) t. 3.—Enrop.
neapolitana, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 72 = nigrescens..
neglecta, Bess. Enum. PI. Volh. 85=centauroides.
neglecta, Martr. ex Nym. Consp. 431 = sonchifolia.
neglecta, Schott, ex Spreng. Syst. iii. 400 = orientalis.
nemophila, Jord. ex Nym. Consp. 421=C. Jacea.
nemoralis, Jord. Pugill. PI. Nov. 104=nigra.
nervosa, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 238 = Kerneriana.
nervosa, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 821 = phrygia.
nervosa, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 926.—Enrop. anstr.
nevadensis, *Boiss.* &" *Sent. Diagn.* Ser. II. iii 71.—Hispan.
nicaeensis, *All. Fl. Pedem.* i. 162. t. 74. f. 1.—Gall.; Ital.
nidulans, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 280.—Algeria.
Niederi, *Heldr. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 880.—Graecia.
nigra, Frivald. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 680-Kerneriana.
nigra, Lam. Encyc. i. 666—pratensis.
n>pa, *Linn. Sp. PI.* 911.—Europ.
nigrescens, DC. Prod. vi. 571=nigra.
nigrescens, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 241 = C. Jacea.
nigrescens, *Willd. Sp. PI.* iii. 2288.—Enron, med. austr.
nigricans, DC. ex Steud. Nom. ed. II. i. 321 = Endressii.
nigricans, Link, ex Spreng. Syst. iii. 401-nigra.
Nimrodis, *Boiss.* &" *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 664.—Mesopot.
mtens, *Bieb. ex Willd. Sp. PI.* iii. 2305.—Tauria; Reg. Cauc.
nitida, Lam. Fl. Fr. ii. 49=alba.
'tida, Naldi, ex DC. Prod. vi. 601 - crassifolia.
™°*ana,* Boiss. Diagn. Sér. II. iii. 84 = iberica.
«°veliix, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvii. (1880) p. xxi.—Gallia.
"udicautis, Linn. Syst ed. X. 1232-Serratula nndicaolis.

CENTATJREA :—
Nuttallii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 298=americana.
obscura, Jord. in F. Schnltz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 820=nigra.
ochrolepis, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. Win. (1881; 149-axillaris.
ochroleuca, Pushk. ex Willd. Sp. PI. iii. 2289 = axillaris.
ochrolopha, Costa, Fl. Catal. 140=leucophaea.
odorata, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 28.—Afr. austr.
odorata, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 417.—Reg. Caucas.
Olivieri, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 282.—Algeria.
Olivieriana, *DC. Prod.* vi. 590.—Ins. Naxos.
olympica, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 77.—Bilhynia.
omphalodes, *Coss.* &" *Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1867) 397, nomen.—Algeria,
onopordifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 114.—Syria.
orientalis, Baumg. ex Schur, Enum. PI. Transs. 408 = pseudo-collina.
orientalis, *Linn. Sp. PI.* 918.—Taur.; Sibir.
omate, *Willd. Sp. PI.* iii. 2320.—Hispan.
Orphanidea, *Heldr. V Sart. ex Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 73 —Graecia.
orthoacantha, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) I. *Erg.* 44. —Hab.?
ossica, *C. Koch, in Linnaea,* xvii. (1843) 40.—Reg. Caucas.
ovina, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. L 821 = pterolopha.
ovina, Pall, ex Steud. 1. c-difrasa.
ovina, *Pall, ex Willd. Sp. PI.* iii. 2292.—Taur.; Sibir.
pallescens, Bovi, ex DC. Prod. vi. 597 = alexandrina.
pallescens, *Delile, Fl. Egypte,* 278. t. 49.—Aegypt.
pallida, *Frivald. in Flora,* xviii. (1885) 333.—Europ.
pallida, Wall. Cat. n. 2988 = Serratnla pallida.
pamphylica, *Boiss.* b" *Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 120.—Pamphylia.
paniculata, Anct Hisp. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 157=castellana.
paniculata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 346=maculosa.
paniculata, Lag. ex DC. Prod. vi. 683 = caerulescens.
paniculata, *Linn. Sp. PI.* 912.—Lurop. anstr.
paniculata, Pett. ex Nym. Consp. 426, 427=cristata, divergens.
paniculata, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec Prod. ii. 199 = graeca.
paniculata, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 68=leucophaea.
pannosa, *DC. Prod.* vi. 582.—Mons Athos.
Parlatorii, Heldr. in Flora, xxvii. (1844) l. 68 = seq. ?
Par/atoris, Heldr. in Ann. Ace. Asp. Nat. i. (1843) 287 = dissecta.
Parolinii, *DC'. Prod.* vi. 592.—Mons Ida; As. Min.
parviflora, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 594=difrasa.
parvifiora, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 301.—Pers.; Afr. bor.
parviflora, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 450=squarrosa.
parviflora. Lam. Fl. Fr. ii. 82=aspen.
parviflora, Sm. Fl. Graec. x. 9. t. 912=diffusa.
patibilcensis, DC. Prod. vi. 593=melitensis.
patula, *DC. 1. c.* 583.—Persia; Cappadoc.
paudflora, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1951) 433 = aggregata.
pauciloba, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 474.—Daghestania.
pectinaia, Aucl. Ross, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 632 = trichocephala.
pectinata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1287.—Gall, anstr.
pectinata, Siev. in Pall. N. Nord. Reitr. vii. 823 = calva.
Pelia, *DC. Prod.* vi. 686.—Graecia.
penicillata, Delile, Fl. Aeg. Illnstr. 74=trichacantha.
peregrina, *Linn. Sp. PI.* 918.—Europ. anstr.
pergamacea, *DC. Prod.* vi. 569.—Cappadoc.
Perrottettii, *DC. I. c.* 598.—Afr. trop.
persica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 132.—Persia.
Pestalotii, De Not ex Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1838) 848 = alba.
Pestalozzae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 118.—Lycia.
petrocaula, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 652.—Armenia.
Petteri, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 86. t. 783 = divergens.
peucedanifolia, *Boiss. V Orph. in Boiss. Fl. Orient.* iii. 647.—Maceilon.
phaeolepis, Con. *Notes PI. Crit.* 138.—Mauritania,
phaocephala, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 270.—Europ.
Pharaonis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 281.—Algeria.

CENTAUREA :—
phlomoides, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 673.—Persia.
phrygia, Tacq. Hort. Vindob. 187=austriaca.
phrygia, Lapeyr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 164-nigra.
phrygia, *Linn. Sp. PI.* 910.—Europ.
phrygia, Lour. Fl. Cochinch. ii. 681=cochinchinensis.
phyllocephala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 134.—Afghan.
Pichleri, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 688.—Bithynia.
Pieris, *Pall. Tabl. Taur.* 58; *Willd. Sp. PI.* iii. 2302. —Reg. Casp.
Pinardi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 17.—Caria.
pindicola, *Griseb. Reise Rumel.* ii. 164.—Maced.
pinnatifida, Schur, Sert. Transs. 35-axillaris.
pinnatispina, *Turra, Farset. Nov. Gen.* 13.—Sicilia.
pitycephala, Brot. Fl. Lnsit. i. 869-Leuzea conifera.
platylepis, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 476 = C. Jacea.
plumosa, Hort. ex Vilm. Fl. PI. Terre, ed. III. 245 = gymnocarpa.
plumosa, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 44.—Europ. austr.
podospermifolia, *Lose. V Pard. Ser. Jnconf.* 58.—Hispan.
polyacantha, Spreng. Syst. iii. 406= sonchifolia.
polyacantha, *Willd. Sp. PI.* iii. 2312.—Hispan.
polycephala, Jord. Obs. PI. Crit. v. (1847) 67 = paniculata.
polyclada, *DC. Prod.* vi. 584.—Graecia.
polymorpha, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 82.—Hispan.
polyphylla, Ledeb. ex Nordm. in Bull. Sc. Acad. Petersb. ii. (1837) 811=ossica.
polyphylla, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 281.—Algeria,
polypodifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 126.—Persia.
Postii, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 688.—Syria.
Pottii, [Spreng.] Bot. Gart. Halle, 28=sicula. sulphurea.
Pourretiana, *Timb. V Theven. in Mem. Acad. Tout.* Ser. VII. vi. (1874) 645.—Gallia.
Poutini, DC. Cat. Hort. Monsp. 91 - C . Calcitrapa.
praealta, *Boas.'* b" *Bal. Diagn.* Ser. II. v. 112.—Cilicia.
praecox, *Oliver tf Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 438.—Afr. trop.
praetermissa, Martr. in Soc. Sc. Tarn et Gar. (1852;; PI. Crit. Tarn, 382-aspera.
praetoria, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 34. t. 886 = leucophaea.
pratensis, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 104.—Hungaria.
pratensis, Salisb. Prod. 208 = C. Jaeea.
pratensis, Thuill. Fl. Paris, ed. II. 444=nigrescens.
Preauxiana, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 850 = Atractylis Preauxiana.
princeps, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 111=alba.
procera, Heynh. Nom. ii. 131 lapsu — Cephalaria procera.
procumbens, *Balb. Misc. Alt.* 31.1.1.—Pedemont.
procumbens, Habl. in S. G. Gmel. It. iv. 167=dealbata.
procumbens, Jord. Obs. v. 57 = Jordaniana.
procurrens, DC. Prod. vi. 595 = sinaica.
procurrens, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iii. 407.—Palaestin.; Arab.
prolifera, Delile, ex Godr. in Mem. Acad. Montp. (Sect. Medic.) i. (1853) 43S = Delilei.
prolifera, Vent Jard. Cels, 16 = glomerata.
Prolong!, *Boiss. ex DC. Prod.* vii. 803.— Hispan.
prostrata, *Coss. Notes PI. Crit.* 115.—Hispan.
prostrata, Huet, ex Nym. Consp. 425-cinerea.
provincialis, Boiss. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. Iv. (1880) II. 181=jurineaefolia?
pseudo-behen, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 126.—Cappadoc.
pseudo-collina, *Schur, Enum. PI. Transs.* 408.—Transsylv.
psendo-crupina, *Mutel, in Duch. Rev. Bot.* i. (1845-46) 400.—Morea.
pseudo-philostiius, Godr. in Mim. Acad. Stanislas, Se>. III. [xvii] 1853 (1854) 405=dimorpha.
pseudo-phrygia, C. A. Mey. in Bull. Phys-Math. Acad. Petersb. vi. (1848) 134 = phrygia.
pseudo-scabiosa, Boiss. *Sc* Buhse, in Nouv. Mem. Soc, Nat. Mosc. xii. (1860) 131 = C. Scabiosa.
pseudo-uniflora, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Nalnrw. iv. (1853) 35 = nervosa.
psilacantha, *Baits. V Heldr. Diagn.* Ser. II. iii. 82.—Graecia.

CENTAtTEEA :—
pterocaula, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1878) 552.—Armenia.
pterocanlos, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 29.—Algeria.
pterocephala, Hort. ex DC. Prod. vi. 597=trichacantha.
pterodonta, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Ail.* 28.—Algeria,
pterolopha, *DC. Prod.* vi. 572.—Hab. ?
pubescens, Willd. Sp. PI. iii. 2322 = incana.
pubigera, Pers. Syn. ii. 488 = Volutarella muricata.
pulchella, *Ledeb. 7c. PI. Alt.* 1. t. 93.—Persia; Caucas.
pulcherrima, Wight, ex DC. Prod. vi. 579 = pulchra.
pnlcherrima, *Willd. Sp. PI.* iii. 2298.—Armenia; Cancas.
pnlchra, *DC. Prod.* vi. 578__Ind. or.
pnllata, *Linn. Sp. PL* 911.—Enrop. austr.
pumila, *Linn. Cent.* i. 30; *Amoen. Acad.* iv. 292.—Aegypt.; Graecia.
pumila, Sprun. ex Nym. Consp. 430 = hellenica.
pumila, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) 374 = raphanina.
Pumilio, Hill, Veg. Syst. iv. 26=pumila?
punetata, Dufour, in Ann. Sc. Nat. tiér. I. xxiii. (1831) 159 = hyssopifolia.
punetata. Vis. in Flora, xix. (1829) 28 = glaberrima.
pungens, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Atl.* 29.—Algeria,
pusilla, *Thuill. ex Pers. Syn.* ii. 482.—Aegypt.
pygmaea, *Benth. tf Hook.f. Gen.* ii. 482.—Syria.
pygmaea, Chesn. ex DC. Prod. vi. 571 = amara.
pygmaea, Hoffm. Hort. Mosc. (1808) n. 783 = aepressa.
pyracantha, *Boiss. Ft. Orient,* iii. 685.—Tauria.
pyrenaica, Spreng. Fl. Hal. Mant. 53=variegata.
pyrrhoblephara, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 66.—Armenia.
Rabenhorstiana, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 426 = cristata.
Raddeana, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1878) 475.—Armenia.
radiata, Linn. Syst. ed. XII. 656=Serratula xeranthemoides.
ragusina, Clem, ex Boiss. Voy. Bot Espagne, ii. 846 = Clementei.
ragusina, *Linn. Sp. PI.* 912.—Dalmat.; Creta.
ragusina, Sin. Fl. Graec. x. 2. t. 903 = argentea.
ramosa, *Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880) 163.—Enrop.
ramosissima, Tausch, in Flora, xii. (1829) Erg. 45 = nitens.
raphanifolia, Salrm. ex DC. Prod. vi. 591=diluta.
raphanina, *Sibtk. (f Sm. Fl. Graec.* t. 917.—Creta.
raphanina, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 322 = nana.
raphanina, Sprun. ex Nym. Consp. 430 = hellenica.
raphanina, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) 372 = Urvillei.
recta, *Krock. Fl. Sit. Suppl.* ii. 388.—Europ.
recurvata, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 428 = carduiformis.
reflexa, *Lam. Encyc.* i. 675.—Armenia; Caucas.
regia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 185.—Assyria,
Reichenbachii, *DC. Prod.* vi. 583.—Europ. ?
reichenbachioides, Schur, Enum. PI. Transs. 409 = Reichenbachii.
repens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1238.—Oriens.
resupinata, *Coss. Notes PI. Crit.* 114.—Hispan.
reticulata, Bieb. ex Willd. Sp. PI. iii. 2287=coronopifolia.
Reuteri, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 88. t. 780=paniculata.
Reuteriana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 18.—Graecia.
rhaetica, Moritz. in Denkschr. Allg. Schw. Ges. Natur. iii. (Pfl. Graub. 81. t 8) = phrygia.
rhapontica, Wulf. in Jacq. Coll. i. 223 = rhaponticum.
rhaponticoides, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 479.—Hispan.
Rhaponticum, *Linn. Sp. PI.* 915.—Europ.
rhenana, Bor. ex Nym. Consp. 426 - maculosa,
rkisantha, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc 64 = sessilis.
rhizantka, Tchlhat. Asie Min. Bot. ii. 320=annena.
rhizocalathium, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 417.—Armenia,
rhizocephala, *Oliver* b* *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 438.—Afr. trop.
rhizocephala, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 476.—Armenia.
rhutenica, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 70 •= Serratula coronata.
rigens, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 32.—Hispan.

CENTAUBEA :—
rigescens, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 852.—Hab.!
rigida, *[Soland. in] Russell, Aleppo,* ed. II. ii. 263.—Syria.
rigida, Willd. Enum. Hort, Berol. Suppl. 61 = rigescens.
rigidifolia, Bess, ex DC. Prod. vi. 587 = orientalis.
rigidula, Jord. Obs. PI. Crit. v. (1847) 69 = paniculata.
riparia, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vi. 602.—N. Cambria.
rivularis, Brot. Fl. Lusit. i. 867=nigra.
romana, *Linn. Sp. PI.* 916.—Campania.
Kopalon, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 25.—Algeria.
rosea, Steud. Nom. ed. 1.175 = trinervia.
rubescens, *Bess, ex DC. Prod.* vi. 587.—Tauria.
rufescens, Jord. Pugill. 107 = pectinata.
rufescens, NouL ex Nym. Consp. 422, partim=nigra.
rumelica, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 78.—Rumelia.
rupestris. Kit. ex Steud. Nom. ed. II. i. 822=disjecta,
rupestris, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1298.—Austr.; Ital.
rupicola, Bad. ex Nym. Consp. 426 = aplolepis.
rupicola, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 31.—Algeria.
rusdnonensis, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 70 = C. Jacea?
ruthenica, Baumg. ex Nym. Consp. 417 = *rhutenica.*
ruthenica, *Lam. Encyc.* i. 663.—Transsylv.; Caucas.; Sibir.
rutifolia, Boiss. Fl. Orient, iii. 642=pannosa.
rutifolia, *Sibth. V Sm. Prod. Fl. Graec.* ii. 205. t, 916.—Byzant.
sabulosa, Ledeb. ex Spreng. Syst. Hi. 405 =diflusa.
Sadleriana, *Janka, in Termisz. Fiizetek.ii.* (1878) 142.—Europ.
Saharae, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 30.—Afr. bor.
salicifolia, Bess, ex Nym. Consp. 422 —austriaca.
salicifolia, Bieb. ex Willd. Sp. PI. iii. 2283 = nigra.
salina, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 479.—Sibir.
Salisiana x, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 110.—Europ.
salmantica, *Linn. Sp. PI.* 918.—Europ.; Afr. bor.
salonitana, *Vis. in Flora,* xii. (1829; I. *Erg.* 23.—Europ. or.
sanguinea, *Spreng. Pugill.* i. 60.—Hab.?
saxatilis, Bertol. ex Nym. Consp. 429= rupestris.
saxatilis, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 419.—Creta.
saxicola, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 32.—Hispan.
Scabiosa, Asso, Syn. 126 =cephalariaefolia.
Scabiosa, *Linn. Sp. PI.* 918.—Europ.
Scabiosa, Sadl. Fl. Pesth. ed. II. 409 = Sadleriana.
scabiosaeformis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122=C. Scabiosa.
scabiosifolia, St. Lag. 1. c. viii. (1881) 203 = praec.
scabra, Presl, Fl. Sicul. p. xxx=sicula.
schemnittensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 322 = nigrescens.
Schimperi, *DC. Prod.* vi. 596.—Arab,
schizolepis, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1878) 553.—Armenia.
Schmidtiana, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) I. *Erg.* 44.—Hab.»
Schousboei, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 85 *{Pugill.* 135).—Hispan.
Schouwii, DC. Prod. vi. 593 = sicula.
Schwarsenbergiana, Schur, in Verb, Siebenb. Ver. Nature, vi. (1855) 4=ruthenica.
sciaphila, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lviii. (1881) 160=nigrescens.
sclerolepis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 186.—Mesopot.
scoparia, *Sieber, ex DC. Prod.* vi. 596.—Palaest.; Aegypt.
Scrpolii, Vest, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 31 = cristata.
scopulorum, *Boiss. tS Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 115.—Graecia.
scorpiurifolia, Dufour, in Ann. Sc. Nat xxiii. (1831) 168 = aspera.
segetalis, Salisb. Prod. 207=C. Cyanns.
semidecurrens, Jord. Obs. PI. Crit v. (1847) 52 = axillaris.
sempervirens, *Linn. Sp. PI.* 913.—Lnsit.; Ital.
senegalensis, *DC. Prod.* vi. 598.—Afr. trop.
Seridis, *Linn. Sp. PI.* 915.—Enrop. austr.
Seridis, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 212-aspera.
serotina, Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 850 = nigrescens.
serrata, Kitt Taschenb. ed. II. 668=montana.
serratuloides, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 479.—As. Min.

CENTAUREA :—
serratuloides, Georgi, Bemerk. Reise Rnss. Reich, i. 231-salina.
serratuloides, Krock. Fl. Sil. ii. II. 484 (delenda).—Silesia.
sessilifiora, Lam. Fl. Fr. ii. 35=melitensis.
sessiliflora, Linn. Sp. PI. 912=nigra.
sessilifolia, Hill, Veg. Syst. iv. S2 = praec ?
sessilis, *Willd. Sp. PI.* iii. 2300.—Armenia.
setifera, Lag. Gen. et Sp. Nov. 32=nitens.
setosa, *Cav. in Anal. Ciencias Nat.* iv. (1801) 96.—Marocco.
seusana, Benth. Cat PI. Pyr. 68=montana.
seusana, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 52 = variegata, axillaris.
sibirica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 348 = Marschalliana.
sibirica, *Linn. Sp. PI.* 918.—Sibiria.
sibirica, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 695 = declinata.
sicula. Lam. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 145 = nicaee'nsis.
sicula, Leyss. ex DC. Prod. vi. 594 = solstitialis.
sicula, *Linn. Sp. PI.* 918.—Sicilia.
simplex, *Cav. in Anal. Ciencias Nat.* iv. (1801) 95.—Afr. bor.
simplex, Murr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 322 = C. Jacea.
simplicicaulis, *Boiss. V Huet, Diagn.* Ser. II. iil 67.—Armenia.
sinaica, *DC. Prod.* vi. 592.—Arab,
singarensis, *Boiss. b[1] Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 654.—Assyria.
Smyrneae, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 20, in textu = Urvillei.
solstitialis, Asso, Syn. 127 = melitensis.
solstitialis, *Linn. S/>. PI.* 917.—Europ.
soinalensis, *Oliver h" Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 438.—Afr. trop.
sonchifolia, Boiss. Vtiy. Bot. Espagne, ii. 852 = malacitana.
sonchifolia. *Linn. Sp. PI.* 915.—Europ. austr.
sonchifolia, Welw. ex Nym. Consp. 482 = sphaerocephala.
sordida, Graf, ex DC. Prod, vi 587 = Grafiana.
sordida, Salisb. Prod. 207 = sempervirens.
sordida, *Willd. Sp. PI.* iii. 2323.—Austria.
Spachii, *Sch. Bip. ex Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 154.—Hispan.
Sparmanni, *DC. Prod.* vi. 598.- Africa.
spathulata, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. li = nigra ?
spathulata, Zeraph. Fl. Melit. i. ll = crassifolia.
speciosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 116.—Palaestina.
speciosa, Mor. ex Nym. Consp. 428 = filiformis.
sphaerocephala, J. Cay, ex Dur. in Dnch. Rev. Bot. ii. (1846-47) 429=-Fontanesii.
sphaerocephala, *Linn. Sp. PL* 916.—Europ. med.
sphaerocephala, Schousb. ex Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 531=fragilis.
spicata, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 113.—Syria.
Spina-badia, Bubani, ex Timb. in Mém. Acad. Toulouse, Sér. VIII. i. II. (1879) 187=coerulescens.
spinosa, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 241 = diffusa-.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 912.—Creta; Oriens.
spinulosa, Rochel, PI. Ban. Rar. 76. t. 36 = C. Scabiosa.
splendens, *Linn. Sp. PI.* 914.—Hispan.; Ital.
splendens, Tenore, Syll. Add. iii. 628= alba.
Spruneri, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. vi. 132.—Graecia.
Spruneri, Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 662 = Guicciardii.
spuriax, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 51.—Austria.
squarrosa. Roth, Catalecta, fuse. ii. 118=virgata.
stenolepis. Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 45 = austriaca.
stenophylla, Dufour, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 162=aspera.
stenophylla, *Walp. Ann.* i. 448.—Persia,
stereophylla, *Bess. Enum. PI. Volh.* 35.—Podol.
stereophylla, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 287 = C. Scabiosa.
sterilis, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1856) II. 390.—Tauria.
Steveni, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 356.—Reg. Caucas.
Steveni, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient iii. 693-cheiracantha.
Stoebe, Udeb. Fl. Alt iv. 49=calva.
Stoebe, *Linn. Sp. PI.* 913.—Austria; Gallia.

CENTATJBEA :—
Stoebe, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 42=diffnsa.
Stoebe, Tcnore, Fl. Nap. ii. 264 = subtilis.
stolensis, Pan8. ex Nym. Consp. 428 = orientalis.
straminea, Willd. Sp. PI. Hi. 2312=glomerate.
strepens, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. it. 236 = splendens?
stricta, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 194 = axillaris.
strictissima, Boiss. *Sc* Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat Mosc. xii. U86(H 130=Serratula coriacea.
strobilacea, Scop. Delic. Insub. i. 38=alba.
suaveolens, Willd. Sp. PI. iii. 2279=moschata.
subacaulis, Ledeb. t\. Ross. ii. 709 = Urvillei.
subalbida, Jord. Pugill. 109=maculosa.
subalpina, Schur, Enum. PI. Transs. 407 •= atropurpurea.
subciliaris, *Boiss.* b* *Heldr. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 627.—Cephalon.
sublanata, *Boiss. 1. c.* 645.—Graecia.
sublanuginosa, Schur, Enum. PI. Transs. 899, Index = nervosa.
subspinosa, Steud. Nom. ed. II. i. 822 = dilnta.
subtilis, *Bertol. Ft. Ital.* ix. 451.—Ital.
sulphured, Lag. Gen. et Sp. Nov. 32 = dissecta, orientalis.
sulphurea, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 930.—Sicilia.
sumensis, *Kalen. in Bull. Acad. Soc. Nat. Mosc.* xviii. (1845) I. 238.—Reg. Caucas.
supina, Jord. Pugill. 108 -• pectinata.
sylvatica, Pourr.in Mém. Acad. Tonl. iii. (1788) 310 = C. Scabiosa.
Szovitsiana, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 683.—Armenia; AnatoL
tagana, *Brot. Fl. Lusit.* i. 369.—Lusit.; Afr. bor.
taraxacifolia, Boiss. in Tchihat. Asie Mis. Bot. ii. 321 = rhizocalathium.
taraxacifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 167 = Saussurea eiiostemon.
tatarica, Linn. f. Snppl. 383 = orientalis.
tatarica, Pall. Ind. Taur. 58 =centauroides.
tauromenitana, *Guss. Fl. Sicil, Syn.* ii. 512.—Sicil.
Tauscheri, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 119=arenaria.
Tchihatcheffii, *Fisch. (f May. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. (U54) i. 81.—Lycaonia.
Teidis, Steud. Nom. ed. II. i. 323 = arguta.
tenella, Hort. ex Spreng. Syst. iii. 401 = salmantica.
Tenoreana, WiUk. ex Nym. Consp. 420—incana.
tenuiflora, *DC. Prod.* vi. 584.—Tauria.
tenuiflora, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 36 = salmantica.
tennifolia, *Dufour, in Ann. Sc. Gin. Phys.* ii. (18"20) 30S.-Hispan.
tenuifolia, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 323=salmantica.
tenuifolia, Schleich. ex Steud. 1. c. = C. Scabiosa.
tenuifolia, Salisb. Prod. 207~Crupina vulgaris.
tenuiramea, £?/</*, *ex Herd, in Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1860) 37.—Hab. ?
tenuisecta, Jord. Pugill. 110=maculosa.
Teydis, C. Sm. ex Buch, in Berl. Acad. Abh. 1816-17 (1819) 369 = arguta.
theiantka, [Spreng.] Bot. Gait. Halle, 24 =• orientalis.
Thirkei, *Sch. Bip. in Linnaea,* xix. (1847) 314.—Phrygia.
Thomasiana, *Dalla Torre, Atl. Alpenfl.* 141.—Europ.
thrinciaefolia, *DC. Prod.* vi. 590.—Cappadoc.
Timbali, Martr. PI. Crit. Tam, 382 = amara.
tinctoria, [Clairv.] Man. Herb. 253 = Serratula tinctoria.
tingitana. Linn. Sp. PI. ed. II. 1300 = Carduncellus raeruleus.
toletana, *Bolt, ff Rent. Diagn. PL Nov. Hisp.* 18.—Hispan.
"fientosa, Salisb. Prod. 207=ragusina.
Toneana, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 15 = C. Calcitrapa.
tougourensis, *Boiss. V Rent. Diagn.* Ser. II. iii. 76.—Algeria.
rournefortii, *Walp. Ann. i.* 448.—Armenia.
transalpine, Sjhleich. Cat. PI. Helv. ed. III. 11-wgrescens.
'rapezuntina, Boiss. Fl. Orient. 630-nigrescens.
"tchacantha, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 404 = C. .Calcitrapa.
tnchocephala, *Bieb. ex Willd. Sp. PI.* iii. 2286.—Tauria.

CENT ATJREA :—
trifurcata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 27.—Afr. bor.
trinervia, *Stev. ex Willd. Sp. PI.* iii. 2301.—Tauria; Cauc.
triniaefolia, HeufT. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 27=maculosa.
Triumfetti, All. Fl. Pedem. i. 158 = variegata.
tuberosa, Vis. Fl. Dalmat. ii. 33. t. 12. f. 2=napulifera.
tubulosa, Chab. ex Nym. Consp. 421 = nigrescens.
turkestanica, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. xvi. (1883) 325.—Turkestan.
Tweedieii, *Hook.* &" *Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 110.—Bonaria.
ucrainica, *Andre, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 497, nomen.—Ross, austr.
uliginosa, *Brot. Fl. Lusit.* i. 368.—Lusitan.
umbrosa, *Huet, ex Reut. Ind. Sem. Hort. Genev.* (1856) *i.—C/. Linnaea,* xxix. (1857-68) 719.—Sicilia.
uniflora, *Linn. Mant.* i. 118.—Europ. austr.
uniflora, Pall. Reise, iii. 252 = Serratula glauca.
Urvillei, *DC. Prod.* vi. 592.—Ins. Samos.
ustulata, Bess. Enum. PI. Volh. 108=Biebersteioii.
ustulata, *DC Prod.* vi. 576.—Persia.
vallesiaca, Jord. Pugill. lll=paniculata.
vallesiaca, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xv. 33. t. 788.—Europ.
variabilis, Bartl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 328=rupestris.
varians, *A. Rich. Tent. Ft. Abyss,* i. 453—Abyss,
variegata, *Lam. Encyc.* i. 668.—Europ. austr.
varitfolia, Loisel. Not 180 = C. Scabiosa.
venetum, J. F. Gmel.Syst. 1267, sphalm. = C. Verutum.
verbasdfolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 75.—Arab.
Verutum, *Linn. Cent.* i. 30; *Amoen. Acad.* iv. 292.—As. Min.
vesceritensis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 76.—Algeria.
Villarsii, *Mutel, Fl. Dauph.* ii. 254.—Gallia.
viminea, Less, in Linnaea, vi. (1831) 83=pulchella.
viretorum, Jord. ex Nym. Consp. 421 = C. Jacea.
virgata, Bess. Enum. PI. Volh. 85 = Besseriana.
virgata, Cav. Ic. iii. 16 - caerulcscens.
virgata, *Lam. Encyc.* i. 670.—Armenia.
virgata, l'ortenschl. ex Nym. Consp. 4'26-glaberrima.
vochinensis, Benm, ex Keichb. Ic. Fl. Germ. xv. 15 = nigrcscens.
vulgaris, Pers. Syn. ii. 488=Crupina vulgaris.
vulnerariaefolia, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 26.—Afr. bor.
Wallichiana, *Less, in Linnaea* vi. (1831) 84.—Ind. or.
Webbiana, *Sch. Bip. in Webb V Berth. Phyt. Canar.* ii. 353.—Ins. Canar.
Weldeniana, Reichb. Ic. Fl. Germ. xv. 12. t. 753 = amara.
Wiedemanniana, *Fisch. b" Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. (1835) 82.—Anatolia.
Willkommii, *Sch. Bip. ex Willk. in Linnaea,* xxv. (1852J 86.—Hispan.
•*aolgensis,* DC. Prod. vi. 581 = arenaria.
xanthina, Boiss. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient, iii. 650 = Pelia.
xanthina, Spreng. Syst. iii. 407 -fuscata.
xanthocephaius, *Benth.* &" *Hook. f. Gen.* ii. 480.—Armen.
Zanonii, Sebast. & Maur. Fl. Rom. 298=romana.
Zuccariniana, *DC. Prod.* vi. 574.—Graecia.

CENTAURELLA, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 28 (1800) = Brythraea, Borckh. (Gentian.).
dichotoma, Delarb. 1. c. 29— E. Centaurium.

CENTAURELLA, Michx. Fl. Bor. Am. L 97. t. 12 (1803) = Bartonia, Muhl. (Gentian.).
aestivalis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 100 = B. veroa.
autumnalis, Pursh, 1. c. =• B. tenella.
Moseri, Steud. & Hochst. in Griseb. Gen. et Sp. Gentian. 308=B. tenella.
paniculata, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 98. 1.12. f. 1 = B. tenella.
verna, Michx. 1. c. 98 = B. vema.
vernalis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 99=B. vema.

CENTAUREUM, Rupp. FL Jen. ed. Hall. 22 (1745) = Erythraea, Borckh. (Gentian.).

CENTAURIA, Linn. Gen. ed. 1. 263 (1737) = Cantaurea, Linn. (Compos.).

CENTAURIDIUM, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 246 (1841)=Xanthi8ma, DC. (Compos.).
Drummondii, Ton. Sc Gray. 1. c. = X. texanum.

CENTAURIUM, Borckh. in Roem. Arch. i. (1796) 29 = Canacora, Lam. (Gentian.).
malabaricum, Borckh. 1. c.=C. sessiliflora.

CENTAURIUM, Gilib. Fl. Lituan. i. 35 (1781); Moench, Meth. 449 (1794) = Erythraea, Borkh. (Gentian.).
Erythraea, Rafn, Danm. og Hoist. Fl. ii. 75 = E. Centaurium.
inapertum, Rafn, 1. *c* 77.—Europ.
minus, Moench, Meth. 449 = E. Centaurium.
umbellatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 85 = E. Centaurium.
vulgare, Rafn, Danm. og Hoist. Fl. ii. 73 = E. Centaurium.

CENTAURIUM, Pers. Syn. i. 187 (1805) = CENTAURELLA, Michx. = Bartonia, Muhl. (Gentian.).
autumnale, Pen. 1. c. = B. tenella.
vernum, Pers. 1. c. = B. vema.

CENTAURIUM, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = Centaurea, Linn. (Compos.).
africanum, Cass. in Dict.Sc. Nat. lviii. 10=Centaurea africana.
alpina, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 32.—Algeria.
moschatum, Cass. in Diet. Sc. Nat. vii. 378=Cenlaurea moschata.
officinale, Cass. 1. c.=Centaurea Centaurium.
ruthenicum, Cass. 1. c. lviii. 10 = Centaurea rhutenica.
suaveolens, Cass. 1. c. vii. 379-Centaurea moschata.
taganum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 32.—Algeria.
tatarica, Pomel, 1. c.—Algeria.

CENTA-tJKOPSIS, Boj. ex DC. Prod. v. 93 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 231.
fruticosa, *Boj. I. c*—Madag.
lanuginosa, *Boj. 1. c.*—Madag.
, Rutenbergiana, *Vatke, in Bremen Abh.* ix. (1885) 119.—Madag.

CENTELLA, Linn. PI. Rar. Afr. 28 (1760); Amoen. Acad. vi. 112 (1764) - Hydroootyle, Linn. (Umbellif.).
asiatica, Urban, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 287 = H. asiatica.
cuneifolia, F. Muell. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 379. t. 12-Azorella cuneifolia.
glabra, DC. Prod. iv. 69, sphalm. = seq.
glabrata. Linn. PI. Rar. Afr. 28; Amoen. Acad. vi. 112 = H. Centella.
renifolia. Urban, in Mart.FI. Bras. xi. I. 286, inobs.» Micropleura renifolia.
villosa, Linn. PI. Rar. Afr. 28; Amoen. Acad. vi. 112 » H. villosa.

CENTEMA, Hook. f. in Benth. & Hook. *I.* Gen. iii. SI (1880). *AAfARANTACEAE,* Benth. &. Hook. f. 1. c.
angolensis, *Hook./. I. c.*—Afr.trop.
Kirkii, *Hook./. I. c*—Afr. trap.

CENTHRISCUS, Spreng. ex Steud. Nom. ed. 1.176, 65 (1821) = AnthrfaoUB, Bemh. (Umbellif.).
fumarioides, Spreng. 1. c.=A. fumarioides.
nemorosa, Spreng. 1. c.=A. nemorosa.

CENTINODIA, Reichb. Handb. 236 (l8S7) = Polygomun, Tourn.
agrestina, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 146 = P. aviculare.
arenaria, Fourr. 1. c = P. arenarium.
avicularis, Fourr. 1. c.=P. aviculare.
Bellardi, Fourr. 1. c. - P. Bellardi.
humi/usa, Fourr. 1. c. =• P. aviculare.
maritima, Fourr. 1. c = P. maritimum.
microsperma, Fourr. 1. c. =P. aviculare.
rurivaga, Fourr. L c.=P. aviculare.

CENTIPEDA, Lour. Fl. Cochinch. 492 (1790). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 430.
MYHIOGYNE, Less, in Linnaea, vi. (1831) 219.
capensis, Less. Syn. Comp. 201=Diuhrocephala latifolia.
Cunningham!, *A.Br.tf Aschers. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1867) *App.* 6; *F. Muell. Fragm.* viii. 143.—Austral.
minima, A. Br. *Sc* Aschers. 1. c. = orbicularis.

CENTIPEDA :—
minuta, C. B. Clarke, Compos. Ind. 151« orbicularis.
orbicularis, C. B. Clarke, 1. c. — Sphaeromorphaea Russeliana.
orbicularis, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 193.—As. et Austral. trop.; Ins. Pacif.
racemosa, *F. Muell. Census,* 84.—Anstral.
thespidioides, *F. Muell. Fragm.* viii. US.—Austral.

CENTOPODIUM, Burch. Trav. i. 340 (1824)=Emex, Neck. (Polygon.).
spinosum, Burch. 1. c - E . spinosa.

CENTOTHECA, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 189 (Centosteca). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1190.
lappacea, *Desv. 1. c.*—Geront trop.
latifolia, Trin. Fund. Agrost. 141= lappacea.
parviflora, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 659.—Afr. trop.

CENTRACHAENA, Less. Syn. Comp. 285 (1838) = seq.

CENTRACHENA, Schott, Catlnd.Sem. Hort Vindob. (1828); ex Reichb. Ic PL Crit. iv. 47 (1827) = Chrysanthemum, Toura. (Compos.).
viscida, Schott, 1. c.; ex Reichb. 1. c. =Chrys. viscosum.

CENTBADENIA, G. Don, Gen. Syst. ii. 755 (1832). *MELASTOMACBAE,* Benth. & Hook. f. i. 739.
DONCKLAERIA, Hort. ex Loud. Encyc PI. Suppl. ii. 1350 (1855).
PLAGIOPHYIXUM, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 429.
divaricata, *Klotesch, in Otto* b* *Dietr. Allg. Gartens.* xix. (1851) 354.—Am. centr.
floribunda, *Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. v. (1849) t 453.— Mexic.
grandifolia, *End!, ex Walp. Rep.* ii. 119.—Mexic
inaequilateralis, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 765.—Mexic.
Oerstediana, *Klotzsch, in Otto V Dietr. Allg. Gartens.* xix. (1851) 354.—Am. centr.
ovata, *Klotesch, I. c.*—Am. centr.
rosea, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 20=inaequilateralis.

CENTRANDRA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 440 ; = Julocroton, Mart. (Euphorhiac).
hondensis, Karst. 1. c—J. hondensis.

CENTRANTHERA, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 293 = Pleurothallia, R. Br. (Orchid.).
punctata, Scheidw. L c.-P. Centranthera.

CEMTBANTHEBA. R. Br. Prod. 438 (1810). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 969.
GUMTEOLIS, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. El. Nep. 87 (1825).
PURSHIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 35 (1818).
RAZUMOVIA, Spreng. Syst. ii. 682 (1825).
Brunoniana, Thw. Enum. PL Zeyl. 220=procumbens.
Brunoniana, *Wall. Cat.* n. 3882 ; *Benth. Scroph. Ind.* 50.—Reg. Himal.; Burma,
grandiflora, *Benth. in Wall. Cat.* n. 3880 ; *Scroph. Ind.* 50.—Reg. HimaL
hispida, Benth. Fl. Hongk. 254 «Brunoniana.
hispida, *R. Br. Prod.* 438.—Austral.; Afghan,
humifusa, *Wall. Cat.* n. 8883.—Ind. or.
nepalensis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 88=hispida.
procumbens, *Benth. in DC. Prod.* x. 525.—Ind. or.
prostrata, Boj. Hort. Maurit. 246 = Radamaea prostrata.

CENTBANTHTTS, DC. FL Fr. iv. 238 (1805) *VALERIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 155.
HYBIDIUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 399.
KENTRANTHOS, Neck. Elem. i. 122 (1790), nomen prius.
angustifolius, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 67 - Iongiflorus.
angustifolius, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 291=nevadensis.
angustifolius, *DC. Fl. Fr.* iv. 239.—Europ. austr.
Calcitrapa, *Dufr. Hist. Valir.* 39; *DC. 1. c.* v. 492.—Europ.
Clausonis, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Atl.* 73.—Afr. bor.
dasycarpus, Kunze, Del. Sem. Hort. Lips. (1847); et Linnaea, xxiv. (1851) 176 = macrosiphon.
elatus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 78 - Iongiflorus.
junceus, *Boiss. &' Heldr. I.* c—Graecia.

CENTBANTHTTS :—
latifolius, Dufr. Hist. Valér. 88-rubei.
Lecoqii, Jord. Pugill. PI. Nov. 76 = angustifolius.
longiflorus, *Stev. Obs. PI. Ross.* 76.—As. Min.; Syria; Reg. Caucas.
macrosiphon, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 57.—Hispan.
marinus, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 479=ruber.
maritimus, DC. Prod. iv. 6S2 = ruber.
nervosus, *Moris, Elench. Sard.* ii. 4.—Corsic.; Sardin.
nevadensis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 120.—Hispan.
orbiculatus, Dufr. Hist. Valer. 39 = C. Calcitrapa.
orbiculatus, *Roem.* to" *Schult. Syst.* i. 85.—Cyprus.
pinnatifidus, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (18U0) 122=C. Calcitrapa.
ruber, *DC. Fl. Fr.* iv. 239.—Europ.; Syria.
Sibthorpii, *Heldr. V Sort. Diagn.* Ser. II. ii. · 119.—Graecia.

CENTRAPALUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. vii. 382 (1817)=Vernonia, Schreb. (Compos.).
galamensis, Cass. 1. c 383=V. pauciflora.

CENTBATHEBT7M, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 31. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. £ ii. 225.
AMPHEREPHIS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 31. t. 314, 815 (1820).
AMPHIBECIS, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 86.
CRANTZIA, Veil. Fl. Flum. Ic. viii. 1.153 (1827).
DECANEURUM, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 516.
PHYLLOCEPHALUM, Blume, Bijdr. 888 (1826).
ROLFINKIA, Zenk. PI. Ind. 13. t. 14 (1837).
SPIXIA, Schrank, PI. Rar. Hort. Monac t. 80 (1819).
WIGHTIA, Spreng. ex DC. Prod. y. 67 (1886).
aristatum, Cass. in Diet. Sc Nat. lvii. 342 = punctatum.
brachylepis, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* ri. II. 12.—Bras.
brevispinum, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvii. 846-intermedium.
chinense, Less, in Linnaea, iv. (1829) 820«=Vemonia chinensis.
courtallense, *Benth. (f Hook./. Gen.* ii. 225.—Ind. or.
courtallense, C. B. Clarke, Comp. Ind. 3-Ritchiei.
Hookeri, *C. B. Clarke, 1. c*—Ind. or.
intermedium, *Less, in Linnaea,* iv. (1829) 320.—Bras.
longispinum, Cass. in Diet. Sc Nat. lvii. 346 = punctatum.
Metzianum, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 228.—Ind. or.
molle, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 225.—Ind. or.
muticum, *Less, in Linnaea,* iv. (1829) 320.—Mexic.
phyllolaenum, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 228.—Ind. or.
pulchellum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 824.—N. Zel.
punctatum, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* vñi. 384.—Venezuela,
reliculatum, *Benth. (f Hook.f. Gen.* ii. 225.—Ind. or.
Ritchiei, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 228.—Ind. or.
scariosum, C. B. Clarke, Comp. Ind. 4->Vemonia scariosa.
tenue, *C. B. Clarke, I. c*— Ind. or.

CENTROCARPHA, D. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. II. 310 (1830) ; et in Brit. Fl. Card. Ser. II. iv. t. 87 (1831)^Budbeckia, linn. (Compos.).
acutifolia. Sweet, Hort. Brit. ed. it 310, nomen - R. Newmanni.
aristata, D. Don, in Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. II. iv. subt. 87 = R. triloba.
chrysantha, Steud. Norn. ed. II. i. 321 = R. Newmanni.
chrysomela, D. Don, in Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. II. iv. subt.87 = R. ńlgida.
discolor, D. Don, 1. c. = R. fulgida ?
fulgida, D. Don, 1. c.-K. fulgida.
gracilis, D. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. II. 810; et l.c. = R.hirta.
grandiflora, D. Don, in Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. II. iv. t. 87 = R. grandiflora.
hirta, D. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. II. 310; et 1. c. -R.hirta.
moschata, J. Cree, ex Steud. Nom. ed. II. i. 321=R. moschata.
Radula, D. Don, in Sweet, Brit. Fl Gard. Ser. II. iv. sub t. 87 •= Helianthus Radnla.
spathulata, D. Don, 1. c.«R. spathulata.
subtomentosa, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 310, nomen = R. subtomentosa.
triloba, D. Don, in Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. II. iv. sub t. 87 = R» subtomentosa.
triloba, Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 584 - R. triloba.

CENTROCHILUS, J. C. Schau. in Nov. Act. Nat. Cor. xix. Suppl. i. (PI. Meyen.) 435. t. 113 (1843) = Habenaria, Willd. (Orchid.).
gracilis, Schau. 1. c. = H. tipuloides. .

CENTROCLINIUM, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1830) 254 = Onoseris, DC. (Compos.).
adpressum, Hook. Bot. Mag. t. 8115=O. adpressa.
albicans, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1830) 254 = O. integrifolia.
altissimum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 52. t. 259.—Peruv.
hyssopifolium, D. Dietr. Syn. PL iv. 1566=O. hyssopifulia.
reflexum, Hook. Bot. Mag. t. 3115-O. reflexa.
salicifolium, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1565 = 0. salicifolia.

CENTRODISCUS, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 325. t. 102 (1874) - Caryodendron, Karst. (Euphorb.).
grandifolius, Muell. Arg. 1. c 327.—Bras.

CENTBOGLOSSA, Rodrig. Orch. Nov. ii. 234 (1881). *ORCHIDEAE.*
macroceras, *Rodrig. 1. c.* 235.—Bras,
tripollinica, *Rodrig. I. c*—Bras.

CENTBOLEPIS, Labill. Nov. Holl. PI. i. 7. t. 1 (1804). *CENTROLEPIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1026.
ALEPYRUM, R. Br. Prod. 258 (1810).
CENTROSEPIS, R. Hedw. Gen. 51 (1806).
DEVAUXIA, K. Br. Prod. 253 (1810) ed. Nees, 108 (1S27).
aemula, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 284 = strigosa.
alepyroides, *Walp. Ann. I* 897.—Austral,
aristata, *Roem. If Schult. Syst.* i. 44.—Austral.
Banksii, *Roem. (f Schult. I. c*—Austral.
brevifolia, Walp. Ann. i. 896 = Drummondii.
cambodiana, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 14.—Cambodia.
cuspidigera, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 283 = fascicularis.
Drummondii, *Walp. Ann.* i. 896.—Austral,
exserta, *Roem. & Schult. Syst.* i. 44.—Austral,
fascicularis, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 7. t. 1.—Austral,
glabra, *Hieron. in Abh. Naturf. Ges.Halle.xii.* (1873) 209.—Austral,
humillima, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 203.—Austral,
longifolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 324; *et Kunth, Enum. PI.* iii. 489.—Austral,
monogyna, *Benth. Fl. Austral,* vii. 205.—Austral,
muscoides, *Hieron. in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1873) 209.—Tasmania,
mutica, *Hieron. I. c.* 211.—Austral.
Patersoni, Roem. & Schult. Syst. i. 43-strigosa.
pilosa, *Hieron. in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1873) 216.—Austral.
polygona, Hieron. Centrolep. 96=polygyna.
polygyna, *Hieron. in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1873) 210.—Austral.
pulchra, Hieron. 1. c. 213 — Drummondi.
pulvinata, *Roem. If Schult. Syst.* i. 43.—Tasmania,
pusilla, *Roem. V Schult. 1. c.* 44.—Austral,
strigosa, *Roem. V Schult. 1. c.* 48.—Austral.
tenuior, Roem. *Sc* Schult. 1. c— strigosa.
Vrvillei, Hieron. in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1873) 214 = Drummondii.

CENTBOIiOBITJM, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 95. *LEGUMINOSAE,* Benth. * Hook. f. i. 546.
minus, Presl, Bot. Bemerk. 62 = robustum.
paraënse, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 87.—Am. austr.
robustum, *Mar', ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* (1888) 95.—Bras.
tomentosum, *Guill. ex Benth.- in Hook. Journ. Bot.* (1840) 66.—Bras.

CENTRONIA, Blume, Bijdr. 776 (1826)-Aeginetift. Linn. (Orobanchac).
mirabilis, Blume, 1. c. = A. Centronia.

CENTRONIA, D. Don, in Mem. Were. Soc. IT. (1828) 814. *MELASTOMACEAE,* Berth. & Hook. f. i. 760.
BRACHYCENTRUM, Meissn. Gen. 114 (1887).
CALYPTRARIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Set. III. xviii. (1852) 182.
STEPHANOCASTRA, Kant. & Tiiana, in Linnaea, xxviii. (1856) 425.
brachycera, *Triana,in Trans.Linn.Soc.*xxviii (1871) 72.—N. Granat.
crassiramns, *Triana, 1. c.*—Guiana,
excelsa, *Triana, I. c.*—Peruv.; Ecuador,
eximia, *Triana, I. c.*—Ecuador,
haemantha, *Triana, I.* c—N. Granat.
insignis, *Triana, 1. c.*—Ecuador,
lauiifolia, *D: Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 315. —Peruv.
Mutisii, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 72.—N. Granat.
phlomoides, *Triana, I. c.*—Costa Rica,
reticulata, *Triana, I. c.* 71.—Peruv.

CENTRONOTA, DC. in Meissn. Gen. 808 [2131 (1840); et Prod. ix. 286 (1843) = Aeginetia, Linn. (Orobanchac).
mirabilis, DC. Prod. ix. 186 = Ae-. Centronix

CENTROPAPPUS, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 124 = Senecio, Tourn. (Compos.).
Brunonis, Hook. f. 1. c. -=S. Centropappus.

CENTROPETALUM, Lindl. Sert. Orch. sub t. 21 (1839). *ORCMDEAE,* Benth. *Sc* Hook, £ iii. 570.
FERNANDEZIA, Ruiz & Pav. Prod. FL Per. 123. t. 27 (1794).
NASONIA, Lindl. in Benth. PL Hartw. 160 (1844).
distichum, *Lindl. I. c.*—Peruv.
Myrtillus, *Pfitter, Verg. Morph. Orch.* 16.—Peruv.
Warezewiczii, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 706.—Peruv.

CENTROPHORUM, Trin. Fund. Agrost 106. t. 5 (1820) = Chrysopogon, Trin. (Gramin.).
chinense, Trin. 1. c. = Chrys. acicnlatns.

CENTROPHYLLUM, Dum. Anal. Fam. 32 (1829) = KENTROPHYLLUM, Neck.=Carthamus, Linn. (Compos.).

CENTROPHYTA, Reichb. Nom. 148 (1841) = KENTROPHYTA,Nutt. =Astragalus, Tourn. (Legum.).

CENTROPODIUM, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 442 (1836), sphalm. « CENTOPODIUM, Burch. = Emex, Neck. (Polygon.).

CENTROPOGON, Presl. Prod. Monog. Lobel. 48 (1836). *CAMPANULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. *f.* H. 547.
*ffine, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. IE. (1842) 40.—Mexic.
amplifolius, *Vatke, in Linnaea,* xxxviii. (1874) 716.—Peruv.
Andropogon, *DC. Prod.* vii. 345.—Ecuador,
*-tinus, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 219.—Reg. Argent.
Berte—rianus, *DC. Prod.* vii. 845.—Ins. Guadalup.
oeslerioides, *DC. I. c.* 846.—N. Granat.
Bonplandianus, *Presl, Prod. Monog. Label.* 48.—Am. austr.
^lycinus, *Benth. PI. Hartw.* 212.—N. Granat.
<-namissonianas, *Kanit*, in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 133. —Bras.
ccoccineus, *Regel, Gartenfl.* (1858) 874, in textu.—Bras.
"ordatus, Mart. *Sc* GaL in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 40-cordifolius.
cordifolius, *Benth. PI. Hartw.* 77.—Mexico,
eostaticanus, *Planch. <f Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857) 156.-Costa Rica.
«Mpidatus, *DC. Prod.* vii. 346.—Perav.
oensiflorus, *Benth. PI. Hartw.* 138.—Peruv.
WWolor, *Kunth V Bouche, Ind. Sent. Hart. Berol.* .(1847) 13.—Venezuela.
ed»lis, Presl, Prod. Monog. Lobel. 48-surinamensis.
exasperatus, *Presl, I. c*—Peruv.
'ascjculatus, *Regel, Cat. PL Hort. Aksahn.* 29.—nab.?

CENTROPOQON:—
fastuosus, *Scheidw. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* ix. (1841) 396.—Mexico,
floccosus, *Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1850-61) 16.—N. Granat.
glandulosus, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. III. iL (1848) 421.—N. Granat.
grandis, *Presl, Prod. Monog. Lobel.* 48.—N. Granat.
granulosus, *Presl, I. c.* 49.—Peruv.
hirtus, *Presl, 1. c.* 48—Ecuador,
laevigatus, *DC. Prod.* vii. 344.—Guiana,
longipes, *Regel, Gartenfl.* iii. (1854) 3. L 75.—Am. centr.
nutans, *Planch. V Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857) 156.—Costa Rica,
oblongus, *Benth. PI. Hartw.* 214.—N. Granat.
prostratus, *Benth. I. c.* 212.—Peruv.
reflexus, *Presl, Prod. Monog. Lobel.* 49.—Peruv.
scandens, *Planch. V Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857)157.—Costa Rica,
solanifolius, *Benth. PI. Hartw.* 189.—Pernv.
speciosus, *Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1850-51) 16.—Venezuela,
surinamensis, *Presl, Prod. Monog. Lobel.* 48.—Am. austr.
tovarensis, *Planch.* 6* *Linden, in Fl. des Serres, Sir.* I. viii. (1852-63) 145.—Venezuela.
virescens, Planch. *Sc* Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 157 = Burmeistera virescens.
Warscewiczii, *Van Houtte, ex Regel, Gartenfl.* (1858) 374.—Hab.?
Warscewiczii, *Vatke, in Linnaea,* xxxviii. (1874) 716. —Costa Rica.

CENTROPSIS, Endl. Gen. Suppl. U. 33 (1842) = KENTROPSIS, Moq. = Selerolaena, R. Br. (Chenop.).

CENTROSEMA, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 117. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 627.
CRUMINIUM, Desv. in Ann. Sc. Nat Sér. I. ix. (1826) 423.
FILANTHUS, Poit. ex Endl. Gen. 1289 (1841).
PLATYSEMA, Hoflmgg. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 117.
STEGANOTROFIS, Lehm. Ind. Sem. ilort. Hamb. (1S26).
VEXILLARIA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 119 (1824); Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 117.
acutifolium, Benth. 1. c. 118 = brasilianum.
angustifolinm, *Benth. 1. c.*—Venezuela,
arenarium, *Benth. 1. c.* 119.—Bras,
bifidum, *Benth. 1. c.* 118.—Bras.
biflorum, Mart, ex Benth. 1. c 120=virginianum.
brachypodum, Benth. in Ann. Nat. Hist iii. (1839) 435 • brasilianum.
bracteosum,.ffentA. *in Ann. Wien. Mus.* ii. 119.—Bras,
brasilianum, *Benth. 1. c.* 118.—Itras.
conjugatum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 325.—Am. austr.
coriaceum, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 118. —Bras.
cuspidatum, *Hassk. in Flora,* Ii. (1868) 27.—Ind. or.
dasyanthum, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1889) 436.—Bras.
decumbens. Mart, ex Benth. In Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 120=virginianum.
dubium, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot i. 294=hastatum.
fasciculatum, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 120.—Bras.
ferrugir.eum, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 410.—Cnba.
glabrum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 119=. coriaceum.
giandiflorum, *Benth. I. c.*—Bras.
grandiflorum, Walp. Rep. v. 529—Clitoria grandiflora.
hastatum. *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 120. —Bras,
heptaphyllum, *Moric. PI. Ncuv. Rar. Am.* 96. t. 61.—Calif.
insulanum, Steud. Nom. ed. II. i. 825=brasilianum.
intermedium, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 410=pubescens.
longifolium, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 118 =angustifolium.
macrocarpum, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 486.—Guiana.
micranthum, Steud. Nom. ed. II. i. 386 in syn. sphalm. =virginianum.

CENTROSEMA:—
molle, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 119 = pubescens.
oblongum, Benth. 1. c. 118 = coriaceum.
pascuorum, *Mart, ex Benth. 1. c.* 120.—Bras,
perspicuum, *Klotzsch, in Schomb. Faun, (f Fl. Gui.* 1203, nomen.—Guiana,
platycarpum, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 126.—Peruv.
Plumieri, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 118.—Am. austr.
pubescens, *Benth. I. c.* 119.—Bras.
rigidulum, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1846) 58 * arenarium.
rotundifolium, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 119.—Bras.
Salzmanni, Benth. in Ann. Nat Hist. iii. (1839) 436 = pubescens.
scabriusculum, Hassk. PI. Jav. Rar. 877=virginianum.
sinuatum, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 120. —Bras,
sordidum, *Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Guy.* 1203, nomen.—Guiana,
venosum, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 138.—Bras,
verticillatum, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1848) 58.—Guiana,
vestitum, *Klotesch, in Schomb. Faun, tf Fl. Guy.* 1203, nomen.—Guiana,
vetulum, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 119.—Bras,
vexillatum, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 485. —Guiana,
virginianum, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* H. (1838) 120. —Am. trop.
virginianum, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 204 = pubescens.

CENTROSEPIS, R. Hedw. Gen. 51 (1806), sphalm. = Ceatroleplfl, LabiU.

CENTROSIA, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat Par. iv. (1828) 39 = Calanthe, R. Br. (Orchid.).
Auberti, A. Rich. 1. e. 40=Cal. sylvatica.

CENTROSIS, Thou. Orch. lies Afr. t. 35, 36 (1822) = Calanthe, R. Br. (Orchid.).
corymbosa, Thou. 1. c. 1" Tabl.-Cal. sylvatica 1
plantaginea, Thou. 1. c. 1" Tabl. = Cal. sylvatica?
sylvatica, Thou. 1. c. tt. 35, 36 = Cal. sylvatica..

CENTROSOLENIA, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 862=Epiacia, Mart. (Gesnerac).
aenea, Linden & Andrè, in IUustr. Hortic. xxii. (1875) t 222.—N. Granat.
bracteata, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1850-61) 822.—N. Granat.
bractescens, Hook. Bot. Mag. 14675=E. bractescens.
bullata, Lem. Illustr. Hortic. xvi. (1869) t. 607 - E. tessellata.
glabra, Benth. in Hook. Bot. Mag. t. 4552 = E. glabra.
glabra, Hook. Ic. PI. t. 873 = E. Hookeri.
hirsuta, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 362-E. hirsuta.
hirtiflora, Spruce, ex Hanst in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 450 - E. hirtiflora.
picta, Hook. Bot Mag. t 4611=E. picta.

CENTROSPERMUM, H. B. *Sc* X. Nov. Gen. et Sp. iv. 270. t. 397 (1820)-Acanthoapermum, Schrank (Compos.).
humile. Less. Syn. Comp. 217=A. humile.
xanthioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 270 = A. brasilum.

CENTROSPERMUM, Spreng. Nov. Prov. 9 (1818); et Syst. iii. 588 (1826) •> Chrysanthemum, linn. (Compos.).
Chrysanthemum, Spreng. I. c. = C. viscosum.

CENTROSTACHYS, Wall. In Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 497 (1824)=Achyranthes, Linn. (Amarant).
aquatica, Wall. Cat. n. 6932-A. aquatica.
diandra, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 504-A. diandra.
flabelligera, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 321 -A. aquatica.

CENTROSTEGIA, A. Gray, ex Berth, in DC. Prod, xiv. 27 (1866); et in Pacif. Rail. Rep. vii. 19 (1867).
POLYGONACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 83.
leptoceras, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 192.—Calif.
Thurberi, *A. Gray, ex Benth. in DC. Prod.* **xiv. 27 ;** *et in Pacif. Rail. Rep.* **vii. 20.—Calif.**

CENTROSTEMMA, Decne. in Ann. Sc. Nat Sér. II. ix. (1838) 271. t. 12-Hoya, R. Br. (Asclepiad.).
coriaceum, Meissn. Gen. Comm. 177 = H. coriacea.
Cyrtoceras, Meissn. 1. c. = H. mnltiflora.
elegans, Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. i. 46 (= ***Cyrtoceras elegans).*—Borneo.**
***laurifolium,* Blume, 1. c. (= *Cyrtoceras laurifolium).*—** Java.
Lindleyanum, Decne. in DC. Prod. viii. 634 = H. multiflora.
micranthum. Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 46 **(— *Cyrtoceras micranthum).*—Ins. Celebes.**
multiflorum, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 272 —H. multiflora.

CENTROSTYLIS, Baill. Etud. Gén. Eupb.. 469 (1858) -Adenochlaena, Baill. (Euphorb.).
leylanica, Baill. 1. c. 470. t. 2. f. 28-29 = A. zeylanica.

CENTUNCULUS, Adans. Fam. ii. 256 (1768) = Cerastium, Linn. (Caryophyll.).
alpimis, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 321=Cerast trigynum.
angustifolius, Scop. 1. c. 822 = Cerast. strictum.
arvensis, Scop. 1. c. 321 = Cerast. aryense.
rigidus, Scop. 1. c. 322 = Cerast. strictum.
semidecandrus, Scop. 1. c. 331 = Cerast. semidecandrum.

CENTOTUCVIiVB, Dill, ex Linn. Syst. cd. I (1735).
PRIMULACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 637.
ANAGALLIDASTRUM, Mich, ex Adans. Fam. ii. 230 (1763).
MICROPYXIS, Duby, in DC. Prod. viii. 71 (1844).
erectus, *Phil. Fl. Atac.* 85.—Chili.
lanceolatus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 94=minimus,
minimus. *Linn. Sp. PI.* 116.—Europ.; Am. bor. et austr.
pentandrus, *R. Br. Prod.* 427.—Am. et Austral, trop.
simplex, Horaem. in Fl. Dan. ix. t. 1567 = minimus.
tenellus, Duby, in DC. Prod. viii. 72 = pentandrus.

CEODES, Forst Char. Gen. 141. t. 71 (1776) **-Pisonia,** Linn. (Nyctagio.).
umbellifera, Font. 1. c. 142 = P. umbellifera.

CEPA, [Tourn.l Linn. Syst. ed. I (1785) ; Gen. ed. 1.103 (17S7)=Allium, Tourn. (Liliac).
alba, Renault, Fl. Dep. Orne, 38 = A. Cepa?
angulosa, Bemb. Syst. Verz. Erf. 202 = A. angulosum.
ascalonica, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 11—A. ascalonicnm.
carinata, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. U. 185= *K.* carinatum.
cernua, Moench, Meth. Suppl. 80 = A. cernuum.
esculenta, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PI. ii. 183 = A. Cepa.
fistulosa, S. F. Gray, 1. c. 184=A. fistulosura.
flora, Moench, Meth. 243 = A. fiavum.
flexuosa, Moench, Meth. Suppl. 80 = A. roseum.
Moly, Moench, Meth. 244 = A. Moly.
obliqua, Moench, 1. c. 248 = A. obliquum.
oleracea, Benn. Syst. Verz. Erf. 202 = A. oleraceum.
pollens, Renault, Fl. Dep. One, 33=A. Cepa?
paniculata, Moench, Meth. 243 — A. paniculatum.
prolifera, Moench, 1. c. 244 = A. Cepa.
mint, Renault, Fl. Dep. Ome, 33 = A. Cepa?
Schoenoprasa, Moench, Meth. 244 = A. Schoenoprasum.
senescens, Moench, 1. c.=A. senescens.
tenuifolia, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 114 = A. Schoenoprasum.
ursina, Bernh. Syst. Verz. Erf. 201—A. ursinum.
ventricosa, Moench, Meth. 244—A. fistulosum.
Victorialis, Moench, 1. c. 243 = A. Victorialis.
vulgaris, Renault, Fl. Dep. Ome, 33 = A. **Qepa.**

CEPAEA, Caesalp. ex Fourr. in Ann. Sc Linn. Lyon, N. S. xvL (1868) 384 = **Sedum,** Toum. (Crassnlac).
Caesalpini, Fourr. 1. c. = S. Cepaea.

CEPALARIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 96 (1836) = Cephalaria, Schrad. (Dipsac.).

CEPHAËLIS Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 45 (1788).
RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 127.
CALLICOCCA, Schreb. Gen. i. 126 (1789).
CARAPICHEA, Aubl. PI. Gui. 167. t. 64 (1775).
CHESNEA, Scop. Introd. 119 (1777).
EURHOTIA, Neck. Elem. i. 207 (1790).
EVEA, Aubl. PI. Gui. 103. t. 89 (1775).
IPECACUANHA, Arruda, Diss. 44 (1810), ex St. Hil. PI. Bras. t. 6 (1824).
NETTLERA, Rafin. Sylva Tellur. 14? (1888).
TAPOGOMEA, Aubl. PI. Gui. i. 857. t. 60 ad 68 (1775).
alba, *Willd. Sp. PI.* i. 978.—Guiana.
ambigua, DC. Prod. iv. 534 = Psychotria SalzmaYinlana.
attenuata, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 444.—Bras,
axillaris, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 45.—Ind. occ.
Beeri, ***Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 384, nomen.—** Hab.?
Beskeana, Schlecht in Linnaea, xxviii. (1856) 638 = Psychotria Beskeana,
bidentata,'Benth. in Hook. Niger Fl. 421=pednncularis.
bidentata, Thunb. ex Roem. *8c* Schult. Syst. v. 214 = Psychotria bidentata.
bracteocardia, DC. Prod. iv. 534=Psychotria bracteocardia.
brasiliensis, *Cham, in Linnaea,* ix. (1884) 287.—Bras.
bubalina, Pers. Syn. i. 202 = Bnrchellia capensis.
calycina, Lindl. Collect, t. 21= Psychotria Lindleyana.
Carapichea, Raeuscb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 326 = inrolucrata.
Chamissonis, Steud. 1. c. = Salzmannia nitida.
clausa, ***Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 226.—Afr.** trop.
colorata, ***Hoffmgg. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 213.—** Bras,
congensia, ***Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 226.—** Afr. trop.
coriacea, D. Dietr. Syn. PI. i. 774 = Psychotria xanthophylla.
coriacea, G. Don, Gen. Syst. iii. 606 = peduncularis.
comuta, ***Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 224.—** Afr. trop.
costaricensis, *Schlecht. in Linnaea,* xxviii. (1856) 546. —Costa Rica.
crocea, ***G. F. W. Afey. Prim. Fl. Esseq.* 107.—Guiana,**
cuneata, ***Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. (1851)** 248.—Malaya.
cyanocarpa, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. iv. 533 = tomentosa.
cymosa, Spreng. Syst. i. 749 = Psychotria maypurensis.
dichotoma, *Rudge, PI. Gui.* i. 29. t.,44.—Guiana.
dichotoma, Willd. ex Roem. & Schnit. Syst v. 214 = Psychotria Hoffmannseggiana.
disco\or,Polai. in Linnaea, xli. (1877) 572.—Costa Rica.
diversifolia, Blume, Bijdr. 1004 = Geophila reniformis.
elata, ***Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 45.—Jamaica.**
emetica, Pers. Syn. i. 208=Psychotria Ipecacuanha.
Evea, *DC. Prod.* iv. 585.—Guiana.
ferruginea, G. Don, Gen. Syst iii. 605 - Sabicea ferruginea.
fragrans, ***Hook,* tf *Am. Bot. Beech. Vqy.* 64. t. 13.** —Ins. Societ.
furcata, Bartl. ex DC. Prod. iv. 618 = Psychotria fnrcata.
fuscescens, ***Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 224.—** Afr. trop.
gemmiflora, ***Willd. ex Roem. b" Schult. Syst.* v. 218.—** Hab.?
glabra, *Willd. Sp. PI.* i. 979.—Guiana.
Griffithii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 178.—Malacca.
herbacea, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. (1877) H. 140 = Geophila reniformis.
hirsute, ***Mart, b" Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I.** (1844) 185.—Mexic.
hirta, *Miq. in Linnaea,* xvii. (1843) 7L—Guiana.
Hoffmannseggiana, Roem. & Schult Syst. v. 214 = Psychotria Hoffmannseggiana.
Humboldtiana, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 136 = Psychotria Humboldtiana.
involucrata, *Willd. Sp. PI.* i. 979.—Guiana.
Ipeeachuanha, Rich, in Bull. Fac. Mcd. iv. (1818) 92 = Psychotria Ipecacuanha.
justiciaefolia, *Rudge, PI. Gui.* i. 28. t. 43.—Guiana,
latifolia, ***Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 226.—** Afr. trop.
ligularis, *Rich, ex DC. Prod.* iv. 638.—Guiana.

CEPHAËUS:—
Mannii, ***Benth. &" Hook. f. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*** iii. 225.—Afr. trop.
maranhaensis, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 605.—Bras.
microcephala, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 214 = Psychotria microcephala.
microcephala, i&igMa Linnaea, xviii. (1844) 748- Psychotria Hoffmannseggiana.
mnscosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 46.—Ins. Martinic.
nuda, ***Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* iv. (1829) 135.** —Bras.
oblonga, *DC. Prod.* iv. 535.—Guiana,
omata, ***Spruce, ex Benth. tf Hook. f. Gen.* ii. 128,** nomen.—Bras.
Patabaea, Steud. Nom. ed. I. 177, 696 *{^Patabea cocdnea).*—**Bras.**
Patrisii, *D. Dietr. Syn. PI.* i. 773.—Guiana,
peduncularis, *Salisb. Parad. Land.* t. 99.—Afr. trop.
pedunculata, G. Don, Gen. Syst. iii. 606=peduncularis.
peruviana, Spreng. Syst. i. 749=Psychotria capitata.
polycephala, *Schlecht. in Linnaea,* xxviii. (1856) 532. —Peruv.
prunifolia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 877 •= Psychotria microcephala.
psychotriaefolia, *Seem. Bot. Voy. Herald.* 138.—Panama.
pubescens, Hoffmgg. r-x Roem. *Sc* Schult. Syst v. 213 =•Psychotria bracteocardia.
punicea, Vahl, Eclog. Am. i. 19=elatn.
purpurea, *Willd. Sp. PI.* i. 978.—Guiana.
reniformis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. **iii.** 377- Geophila reniformis.
rosea, Benth. in Hook. Joum. Bot iii. (1841) 224 = Psychotria rosea.
rubescens, ***Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 225.—** Afr. trop.
rubra, Hoffmgg. ex Roem. & Schult. Syst. V. 214 =• Psychotria rubra.
ruelliaefolia, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 134 = Psychotria ruelliaefolia.
salicifolia, *H. B. Cf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 376.—N. Granat.
sessiliflora,* Willd. Sp. Fl. i. 979 *(=Patabea cocdnea). —Bras,
spathacea, ***Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 225.—** Afr. trop.
speciosa, Spreng. Syst. i. 749 =Psyehotria speciosa.
stipulacea, *Blume, Bijdr.* 1005.—Java,
suaveolens, ***Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*** iii. 224.—Afr. trop.
subconnata, ***Sagot, ex Benth. (f Hook.f. Gen.* ii. 128.** —Guiana.
subtomentosa, Spreng. Syst. i. 749»Psychotria subtomentosa.
Swartzii, *DC. Prod.* iv. 534.—Ind. occ.
***tenuiflora,* D. Dietr. Syn. PI. i. 774 *(-Patabea tenuiflora).*—**Guiana.
tennis, D. Dietr. 1. c. = Psychotria tenerior.
tetranda, Willd. Sp. PI. i. 979 = C. Evea.
tomentosa, Vahl, Eclog. Am. i. 19 = Psychotria tomentosa.
triplocephala, ***Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x.** (1881) 282.—Porto Rico.
turbinata, *Benth. b" Hook.f. Gen.* ii. 128, nomen.—Bras.
violacea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 45-Swartzii.
violacea, *Willd. Sp. PI.* i. 977.—Ind. occ.
violaefolia, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 379 = Geophila violaefolia.

CEPHALANDRA, Schrad. ex Eckl. & Zeyh. Enum. 280 (1886)=. Coccinia, Wight & Am. (Cucurb.).
dedpiens. Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 652 - Cocc. decipiens.
diversifolia.Niud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1886) 18. t. 7 = Cocc. Hartmanniana.
grandis, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) H. 103 = Cocc. indica.
indica, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 16= Cocc. indica.
M'Kennii, Naud. 1. c. 17-Cocc. Mac-Kennii.
palmata, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. **493=** Cocc. palmata.
pubescens, Sond. 1. c. = Cocc. adoënsis.
quinqueloba, Schrad. ex Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 280[s] Cocc. quinqueloba.
Schimperi, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V.v. (1866) 1$ = Cocc. indica.

CEPHALANDRA :—
senensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot 151 =Coccinia senensis.
sessilifolia, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 493 = Cocc. sessilifolia.
Wigktiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. it. Index 757, sphalm. =Cocc. indica.

CEPHALANOPHLOS, Neck. Elem. i. 68 (1790)- Cnlcus, Tonrn. (Compos.).

CEPHAIiANTHERA, Rich, in *Mim.* Mus. Par. iv. (1818) 51. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 619.
DORVCHEILE, Reichb. Nom. 56 (1841).
acuminata, Ledeb. Fl. Ross. iv. 78 = pallens.
acuminata, Lindl. in Wall. Cat. n. 7405=ensifolia.
chloidopbylla, *Reichb. f. in Linnaea,* xxv. (1852) 228.—Japon.
comosa, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 877 =rnbra.
cucullata, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. I. xiii. 12.—Graecia; As. Min.; Persia,
ensifolia, *Rich, in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 60.—Europ.; Afr. bor.; As. temp.
epipactoides, Fisch. *8c* Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 80 = cucullata.
erecta, *Blume, Orck. Archip. Ind.* 188.—Japon.
falcata, *Blume, 1. c.* 187.—Japon.
grandiflora, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PI. ii. 210 = pallens.
japonica, A. Gray, in Perry, Exp. Jap. ii. S19 =falcata.
lancifolia, *Dum. Fl. Belg.* 134: *Tod. Oreh. Sic.* 128.—Sicilia.
lonchophylla, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xiii. et xiv. 186=pallens.
longibracteata,5/um*, *Orch. Archip. Ind.* 188.—Japon.
Maravignae, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 877° ensifolia.
ochroleuca, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140" = pallens.
oregana, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 68.—Am. bor. oca
pallens, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. .(1838) 257 = ensifolia.
pallens, *Rich, in Mim. Mus. Par.* iv. (1818) 60.—Europ.; Reg. Caucas.
palustris, Rich, ex Priti. Ic. Ind. ii. 71, iphalm.= Epipactis palustris.
platycheila, Reichb. £ in Bot Zeit. iii. (1845) 335 = falcata.
Royleana, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 490 =Epipactis Royleana.
rubra, *Rich, in Mim. Mus. Par.* iv. (1818) 60.—Europ.; As. Min.; Persia.
Thomsoni, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 54.—Reg. Himal.
xiphophylla, Reichb. £ Ic Fl. Germ. xiii. et xiv. 185 =ensifolia.

CEPHAIiAMTHUS, Linn. Gen. ed. I. 61 (1787). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 80.
ACRODRYON, AXOLUS, ERESIMUS, GILIPUS, SILAMNUS, Rafin. Sylva Tellur. 60-61 (1838).
acuminatus, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 25.—Am. bor.
ofricanus, Reichb. ex DC. Prod. iv. 845 = Mitragyna africana.
angustifolius, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 67.-China.
•"•*alioides,* Zoll. & Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 61 = naucleoides.
cMnensis, Lam. Encyc. i. 678=Nauclea purpurea.
montanus, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 67.—China,
natalensis, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* 1.1881.—Natal,
naucleoides, *DC. Prod.* iv. 639.—Reg. Himal.; Malaya; China.
obtusifolia, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 25.-Am. bor.
oecidcntalis, *Linn. Sp. PI.* 95.—Am. bor.; Mexic.; Ind. occ.
"ccidentalis, Lour. Fl. Cochinch. i. 67 =Naudea orientalis.
"Ppositi/olius, Moench, Meth. 487 = occidentals.
"rientalis, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 38 = Nanclea purpurea.
"'entalis, Linn. Sp. PI. 95 = Anthocephalus morindae•olius.
or rentelis, *Roem. V Schult. Syst.* iii. 105.--China.
Puulifer, Lam. Encyc. i. 679 = Mitragyna parvifolia.
Piluliflorus, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iii. 625.—Hab.)
Jwoccmbens, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 7.—Cochinch.
Pubescens, *Rafin. New PI. Am.* iii. 5.—Am. bor.

OEPHAIiAMTPHXTS:—
salicifolius, Humb. & Bonpl. PI. Aeqoin. ii. 63. t. 98 = occidentalis.
Sarandi, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 610.—Bras,
spathelliferus, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 187.—Madag.
stellatus, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 68.—China.

CEPHATiATUA, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814) ex Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 1 (1818). *DIPSACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 169.
CERIONANTHUS, Schott, ex Roein. & Schnlt. 1. c. 48 (1818).
LEPICEPHALUS, Lag. Gen. et Sp. Nov. 7 (1816).
LEUCOPSORA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 95 (1836).
PICNOCOMUM, DC. Prod. iv. 647 (1830) in syn.
PTEROCEPHALUS, Adans. Fam. ii. 152 (1763).
PYCNOCOMON, Wallr. Sched. Crit 46 (1822) in syn.
SUCCISA, Wallr. 1. c. (1822).
acaulis, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 868.—Abyssin.
albescens, Roem. & Schult. Syst iii. 48-leucantha.
alpina, *Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting.* (1814); *ex Roem.* b" *Schult. Syst.* iii. 43.—Europ.
ambrosioides, *Roem. 6* Schult. I. c.* 45.—Graecia.
amplexicaulis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 327.—Graecia ; Oriensl
appendiculata, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814) ; ex Roem. & Schult. Syst. iii. 42-Dipsacus pilosus.
aristata, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1861) 445.—As. Min.
attenuate, *Roem.* b* *Schult. Syst.* iii. 44.—Afr. austr.
balearica, *Coss. ex Willk. in Linnaea,* xl. (1876) 87.—Hispan.
bidens, Roem. 8c Schult. Syst. iii. 46=Scabiosa bidens.
boetica, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 788=leucantha.
Boissieri, Reut. in Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 122 = syriaca.
cachemirica, Decne. in Jacqnem. Voy. Bot 86. t. 94 = Dipsacus inennis.
calva, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 96 = aristata.
centauroides, Roem. *8c* Schult Syst. iii. 49=comiculata.
centauroides, Schur, Enum. PI. Transs. 294=laevigata.
cilicica, *Boiss.* b" *Kotschy, Diagn.* Ser. II. v. 108.—Cilicia.
coriacea, Steud. Nom. ed. II. i. 327—corniculata.
comiculata, *Roem. V Schult. Syst.* iii. 49.—Bannatus.
cretacea, Roem. *8c* Schnlt. 1. c. 61 = comiculata.
decurrens, Roem. *8c* Schult. 1. c. 60=attenuate.
diandra, Roem. *8c* Schult. 1. c. 52 = Scabiosa papposa.
dichaetophora, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 71—Persia,
dipsacoides, *Boiss.* b" *Bal. Diagn.* Ser. IL v. 107.—Cilicia; Syria.
dipsacoides, Kar. *8c* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc (1841) 434=Dipsacus azureus.
elata, Schrad. in Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814); ex Roem. & Schult Syst iii. 51 -tatarica.
Fussiana, Heuff. ex Schur, Enum. PI. Transs. 293 = radiata.
graeca, *Roem. V Schult. Syst.* iii. 43.—Graecia.
hirsute, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1886) 55.—Persia.
humilis, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 50=attenuate,
involucrata, *Roem.* b" *Schult. 1. c.* 53.—Creta; Cyprus,
joppensis, *Coult. ex DC. Prod.* iv. 648.—Italia; Cilicia; Syria.
juncea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 72.—Persia.
Kotschyi, Boiss. & Hohen. 1. c. x. 76 =procera.
laevigata, PanS. ex Nym. Consp. 346 ^ alpine.
laevigata, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814) = comiculata.
lavandulacea, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap.* iii. 41.—Afr. austr.
leucantha, Baumg. ex Nym. Consp. 346-radiata.
leucantha, Ledeb. FL Ross. ·i. 449=comiculata.
leucantha, *Schrad. in Cat. Sem. Hort. Gotting.* (1814); *ex Roem. b" Schult. Syst.* iii. 47.—Hispan.; Gall.
leucanthema, Roem. *8c* Schult. 1. c. 48=lencantha.
linearifolia, Lange, in Kjoeb. Vidcnsk. Meddel. (1877-78) 226 = leucantha.
longifolia, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 171 = attenuate.
macrophylla, GrUeb. Spicil. Fl. Rnmel. ii. 174-ambrosioides.

CEPHALABIA :—
manritanica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 66.—Afr. bor.
microcephala, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 123.—Persia,
neglecta, *Verlot, Ind. Sem. Hort. Gratianop.* (1852) 10; *et Linnaea,* xxvi. (1853-55) 764.—Hab.!
papposa, Roem. *8c* Schult Syst. iii. 52=syriaca.
pilosa, *Boiss.* b[1] *Huet, Diagn.* Ser. II. ii. 122.—Armenia.
pilosa, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 69 > Dipsacus pilosus.
plumosa, Roem. & Schult. Syst. iii. 53-Scabiow lusitanica ?
procera, *Fisch. &* Avi-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* vii. 46.—As. Min.
procera, Pen8. ex Nym. Consp. 846=alpina.
radiata, *Griseb. tf Schenk, in Wiegm. Archiv,* xviii (1852) I. 361.—Transsylv.
rigida, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 871 = rigida.
rigida, *Roem. b[1] Schult. Syst.* iii. 44.—Afr. austr.
ntpestris, Griseb. ex Nym. Consp. 848=alpina.
scabra, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 871-rigida.
scabra, *Roem. & Schult. Syst.* iii. 44.—Afr. austr.
setosa, *Boiss. (T Hohen. Diagn.* Ser. I. ii. 107.—Syria.
setulifera, Boiss. & Heldr. in. Boiss. Fl. Orient, iii. 124= graeca.
speciosa, *Boiss. tf Kotschy, in Boiss. I. c.* 121.—Armenia.
stellipilis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 76.—Syria,
syriaca, *Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting.* (1814) ; *ex Roem. V Schult. Syst.* iii. 45.—Reg. Mediterr.; Oriens.
tatarica, *Schrad. I. c. ; ex Roem. V Schult. I. c.* 51.—Rossia; As. bor.; Oriens.
Tchihatchewi, *Boiss. in Tchikat. Asie Min. Bot.* ii. 220. t. 26.—Armenia,
transylvanice, *Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting.* (1814); *ex Roem. tf Schult. Syst.* iii. 45.—Europ. austr.; As. Min.; Reg. Caucas.
uralensis, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 50 = comiculata.
ustulata, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 171 = attenuata.
ustulata, *Roem.* b* *Schult. Syst.* iii. 43.—Afr. austr.
Vaillantii, Schott, ex Roem. & Schnlt. 1. c. 46 = syriaca.
virginea, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 178=graeca.
Willichii, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 63=Scabiosa plumosa.

CEPHALEIS, Vahl, Edog i. 19 (1796), sphalm.» Cephaells, Sw. (Rubiac).

CEPHALIDIUM, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1830)- Anthocephalus, A. Rich. (Rubiac.).

CEPHALINA, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 105 (1827) = 8arcoeephalu8, Afzel. (Rubiac).
esculenta, Schum. *8c* Thonn. 1. c.=S. esculentus.
scandens, DC. Prod. iv. 368, in syn.=S. esculentus.

CEPHAilPTERTJM, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 271. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 321.
Drummondii, *A. Gray, 1. c.* 272.—Austral.

CEPHAIiOCARPTTS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 162.1.18 (1842). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 1068.
Dracaenula, *Nees, 1. c.*—Bras.

CEPHALOCEREUS, PfeifT. in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. vi. (1838) 142 = Cereus, Haw. (Cacteae).
senilis, Pfeiff. 1. c.=C. scnilis.

CEPHALOCHLOA, Coss. *8c* Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 229 = Ammochloa, Boiss. (Gramin.).
echinata, Coss. & Dnr. 1. c. = A. pungens.

CEPHALOCROTON, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 370. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 307.
albicans, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 760.—Malaya:
cordofanus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 166.—Afr. trop.
discolor, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 761.—Meleya.

CEFHALOCROTON :—
indicus, **Bedd. Fl. Sylv. ii. t. 261 - Adenochlaena indica.**
leucocephalus, *Baill. Adansonia,* **v. (1861-65) 148.—Madag.**
mollls, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 99. t. **17.—Afr. trop.**
orientalis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 120.—**Ins. Timor,**
socotranus, *Balf. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1864) **95.—Ins. Socotra.**
zeylanicus, **Baill. Adansonia, v. (1864-65) 148 = Adenochlaena zeylanica.**

CEPHALODES, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, viii. (1881) 159-Cephalaria,Schrad. (Dipsac).

CEPHALOMA, Neck. Elem. i. 314 (17°0)=Dracocephalvun, Linn. (Labiat.).

CEPHAIiOMAPPA, Baill. Adansonia, xi. 130 (1874). *EUPHORBIACEAE,* **Bentb. & Hook. f. iii.** 323.
Beccariana, *Baill. 1. c.* **131.—Borneo.**

CEPHALONOPLOS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 95 = Cnicus, Tourn. (Compos.).
arvensis, **Fourr. 1. c. = Cnicus arvensis.**

CEPHALOPAPPUS, Nees *8c* **Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 5. t. 1.** *COMPOSITAE,* **Benth. & Hook. f. ii. 904.**
sonchifolius, *Nees V Mart. 1. c.* **6.—Bras.**

CEPHALOPHORA, Cav. Ic. vl 79. t. 599 (1801). *COMPOSITAE,* **Benth. & Hook. f. ii. 418.**
ACTINFA, A. Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 425. t. 61.
ACTINELLA, Pen. Syn. ii. 469 (1807).
GRAEMIA, Hook. Exot. Fl. 1.189 (1827).
GRAHAMIA, Spreng. Syst iv. Car. Post. 297, 299 (1827).
PTILEPIDA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
acaulis, **DC. Prod. v. 663 — Actinella acaulis.**
anthemoides, **Less, in Linnaea, vi. (1831) 518 = Actinella odorata.**
aromatica, *Schrad. Ind. Sem. Hart. Catting.* (1830); *Less. Syn. Comp.* 240.—Chili.
Berteroana, *Phil, in Linnaea,* **xxix. (1857-58) 9.—Chili.**
collina, *Phil. I. c.* **8.—Chili.**
decurrens, **Less. 1. c. vi. (1831) 517 = Helenium puberulnm.**
Doniana, *Hook. V Am. in Hook. Journ. Bot.* iii. **(1841) 324.—Reg. Argent.**
elongata, **D. Don, ex DC. Prod. vii. 293, pro parte = Gaillardia megapotamica.**
elongata, **D. Don, ex Hook. Joura. Bot. iii. (1841) 324, pro parte=Doniana.**
faseiculata, **Pohl, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 89 = Hyptis caprariaefolia.**
foliosa, *Phil, in Linnaea,* **xxix. (1857-58) 7.—Chili,**
glanca, *Cav. Ic.* **vi. 80. t. 599.—Chili,**
grandiflora, *Walp. Ann.* **i. 416.—Am. bor. occ.**
heterophylla, *Less. Syn. Comp.* **240.—Reg. Argent,**
insularis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 606.—**Chili.**
integrifolia, **Steud. Norn. ed. II. i. 328=Helenium integrifolium.**
litoralis, *Phil. Fl. Atac.* **34.—Chili,**
plantaginea, *DC. Prod.* **v. 662.—Chili,**
pnnctata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ces. Halle, xv.* **(1882) 828—Chili.**
radiata, **Less, in Linnaea, vi. (1831) 616=heterophylla.**
rigida, *Phil, in Linnaea,* **xxxiii. (1864-65) 170.—Chili.**
tcabiosoides, **D. Don, ex DC. Prod. vii. 293 = Gaillardia megapotamica.**
scaposa, **DC. Prod. v. 663 = Actinella scaposa.**
setigera, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 506.—**Chili.**
suffruticosa, **D. Don, ex Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 324 = Doniana.**
tenera, **Cass. Opusc iii. 93=aromatica.**
Urmenetae, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* **(1873) 605.—Chili.**

CEPHALOPHORUS, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc p. xii (1838)-Cereus, Haw. (Cacteae).
Cotumna-Trajani, **Lem. 1. c. » Cerens Columns-Trajani.**
senilis, **Lem. 1. c.—Cereus senilis.**

CEPHALOPHYTON, Hook.f. ex Baker, in Journ. Lin». Soc. xx. (1883) 250, nomen = Thonningia, Vahl, (Balanoph.).
Parkeri, **Hook. f. ex Baker, 1. c—Madag.**

CEPHALORRHYNCHUS, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 28 (1844)=Iiactuca, Tourn. (Compos.).
Aucheri, **Boiss. 1. c. vii. 11 = L. microcephala.**
Candolleanus, **Boiss. Fl. Orient iii. 820 = L. hispida.**
glandulosus, **Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 28.—As. Min.**
hispidus, **Boiss. Fl. Orient, iii. 821=L. microcephala.**
Kotschyi, **Boiss. & Reut. ex Boiss. 1. c. 816 = L. seticuspis.**

CEPHALOSCHOENUS, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 295=BynchOBpora, Vahl (Cyperac).
Armeria, **Nees, 1. c 286 = K. globosa.**
articulatus, **Nees, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 266 - R.aurea.**
divergens, **Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = R. aurea.**
globosus, **Nees, 1. c. = R. globosa.**
longisetis, **Nees, 1. c. = R. longisetis.**
marginatus, **Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 250 = R. globosa.**
oligocephalus, **Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 759 «R. cyperoides.**
parvus, **Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = R. Wallichiana.**
Pohlianus, **Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 131=R. globosa.**
polycephalus, **Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = R. cyperoides.**
pseudomariscus, **Nees, 1. c. = R. gigantea.**
tenuirostris, **Nees, 1. c. = R. cyperoides, tenuirostris.**
teylanicus, **Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 265 = R. triflora.**

CEPHALOSCIRPUS, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxviii. (1869) II. 88=Mapanla, Aubl. (Cyperac.).
microcephalus, **Kurz, 1. c. 84.—Ins. Molucc.**

C EPHALOSERIS, Poepp. ex Reichb. Consp. 212* (1828) =Polyachyrus, Lag. (Compos.).
Poeppigii, **Kunze, ex Steud. Norn. ed. II. i. 328 = P. Poeppigii.**

CEPHALOSORUS, A. Gray, in Hook. Kew Jonrn. iii. (1851) 152=AngianthUB, Wendl. (Compos.).
brevipapposus, **F. Muell. Fragm. iii. 159 = A. phyllocephalus.**
gnepkosoides, **F. Muell. 1. c. ii. 158=Gnephosis cyathopappa.**
gymnocephalus, **A. Gray, in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 153 = Gnephosis macrocephala.**
leptocladus, **F. Muell. Fragm. iii. 168 - Gnephosis leptoclada.**
microcephalus, **F. Muell. 1. c. = A. microcephalus.**
phyllocephalus, **A. Gray, in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 152=A. phyllocephalus.**

CEPHAIiOSTACHYTJM, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 138. *GRAMINEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 1213.**
capitatum, *Munro, 1. c.* **139.—Reg. Hirnal.**
Chapelieri, *Munro, 1. c.* **140.—Madag.**
flavescens, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) **II. 252.—Burma.**
Griffithii, **Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 566 = Teinostachyum Griffithii.**
latifolium, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) **140.—Reg. Himal.**
pallidum, *Munro, 1. c.* **189.—Reg. Himal.**
pergracile, *Munro, 1. c.* **141.—Burma,**
schizostachyoides, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* **ii. 565. —Ins. Andaman,**
virgatum, *Kun, 1. c.*—**Burma.**

CEPHAIiOSTEMON, Rob. Schomb. Rap. *8c* **Saxo-Frid. 9 (1845).** *RAPATEACEAE,* **Benth. & Hook, f. iii. 858.**
affinis, *Koern. in Linnaea,* **xxxvii. (1871-73) 447.—Venezuela.**

CEPHALO8TEMON :—
gracilis, *Rob. Schomb. Rap. V Saxo-Frid.* 9.—Bras.
Riedelianus, *Koern. in Linnaea,* **xxxvii. (1871-73) 445. —Bras,**
squarrosus, *Koern. 1. c.* **450.—Venezuela.**

CEPHALOSTIOMA, A. DC. Monog. Camp. 117 (1830). *CAMPANULACEAE,* **Benth. & Hook. f. ii.** 555.
anagalloides, **Royle, Illustr. Bot. Himal. 253 = hirsutum.**
bahiense, **A. DC. Prod. vii. 421 = Perrottetii.**
erectum, **Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 699 = Schimperi.**
flexuosum, *Hook. f.* b" *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. **(1858) 9.—Ind. or.**
hirsutum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 81.—**Reg. Himal.**
hirsutum, **Hook. f.** *8c* **Thorns, in Joum. Linn. Soc ii. (1858) 9=Schimperi.**
Hookeri, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. **429.—Reg. Himal.**
paniculatum, *A. DC. Monog. Camp.* **117—Burma.**
Paniculatum, **Wall. Cat. n. 1295 C = hirsutum.**
Perrottetii, *A. DC. Monog. Camp.* **118.—Afr. trop.**
Perrottetii, **Hook. f. in Jonrn. Linn. Soc. vii. (1884) 204 = ramosissimum.**
Prienrei, *A. DC. Monog. Camp.* **118.—Afr. trop.**
ramosissimum, *Hemsl. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 472. **—Afr. trop.**
Schimperi, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 2. **—Ind. or. j Afr. trop.**
spathulatum, **Thw. Enum. FL Zeyl. 422 =• Campanula canescens.**

CEPHALOTAXUS, Sieb. & Zucc. ex Endl. Gen. Suppl. II. 27 (1842). *CONIFERAE,* **Benth.** *8c* **Hook. f.fiL430.**
Buergeri, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 169.—**Japon.**
drapacea, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Wat.* ii. 108.—**Japon.**
Fortuni, **Hook. Bot. Mag. t. 4499= drapacea.**
Harringtonia, **C. Koch, Dendrol. ii. II. 102 = pedunculate.**
pedunculata, *Sieb. &* Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat.* ii. 108. **—Japon.**
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* **ii. 1076.—Sumatra.**
tardiva, **Siebold, ex Endl. Syn. Conif. 239 - Taxus brevifolia.**
umhraculifera, **Siebold, ex Endl. 1. c. = Taxus brevifolia.**

CEPHALOTOMA1TDRA, Karst. & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 429. *NYCTAGINEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 10.**
fragrans, *Karst. & Triana, I. c.* **430.—N. Granat.**

CEPHALOTROPHIS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 75. t. 27. 1852 [1856] - Malaiaia, Blanco (Urticac).
javanica, **Blume, 1. c. 76 = M. tortuosa.**
puberula, **Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 416 = M. puberula.**

CEPHALOTTJS, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 6. t. 145 (1806). *SAXIFRAGEAE,* **Benth. & Hook. £ i. 655-**
follicularis, *Labill. I. c.* **7.—Austral.**

CEPHALOXIS, Desv. Joum. Bot. i. (1808) 1.11 -seq.

CEPHALOXYS, Desv. Joura. Bot. i. (1808) 321 - Juncus, Toum.
flabellata, **Desv. 1. c. 324=. J. repens.**
graminifolia, **Nees, ex Kunth, Enum. PI. iii. 343 = J. cyperoides.**

CERADIA, Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 12 - Othonna, Linn. (Compos.).
furcata, Lindl. 1. c. *(= Doria Ceradia).*—Afr. austr.

CERAIA, Lour. Fl. Cochinch. ii. 518 (1790)=DendrObium, Sw. (Orchid.).
simplicissima, **Lour. 1. c.=D. Ceraia.**

CERAMANTHE, Dum. Not. Scroph. 7 (1834) = Sorobulftrift, Linn.
vernalis, **Dum. 1. c. = S. vernalis.**

CERAMANTHUS, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 240 (1844)«=Phyllanthus, Linn. (Euphorbiac).
gracilis, Hassk. 1. c =P. gracilis.

CERAMIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1884) 158=Erica, Linn.
auricularis, G. Don, Gen. Syst. iii. 806 - E. urceolaris.
Henna, G. Don, I. c. 807 = E. Vernix.
ealathifiora, G. Don, 1. c. =E. bicolor.
cordata, G. Don, 1. c. = E. cordate.
helianthemifolia, G. Don, 1. c. BOS = E. marifolia.
humifusa, G. Don, 1. c. 807-E. hnmifusa.
latifolia, G. Don, 1. c = E. latifolia.
marifolia, G. Don, 1. c. 806 = E. marifolia.
obliqua, G. Don, I. c. 807 = E. obliqua.
oxycoccifolia, G. Don, 1. c.=E. oxycoccifolia.
planifolia, G. Don, 1. c. 806 = E. planifolia.
serpyllifolia, G. Don, 1. c 807 = E. hispidula.
teucriifolia, G. Don, L c •>£. teucriifolia.
thymifolia, G. Don, 1. c = E. thymifolia.
urceolaris, D. Don, in Edinb. N. Phil. Toum. xvii. (1834) 158=E. urceolaris.

CERAMICALYX, Blnme, Mus. Bot. Lngd. Bat. i. 50 (1849) = Osbeckia, Linn. (Melastomac).
calvus, Blume, 1. c. = O. rostrata ?
pulchellus, Blnme, 1. c. = O. rostrata.
stellatus, Blume, 1. c.-O. crinita.
ternifolius, Blume, 1. c. = O. rostrata.

CERAMIOCEPHALUM, Sch. Bip. in Boll. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 284 = Crepis, Linn. (Compos.).
patulus, Sch. Bip. 1. c. 285 = Crep. patula.

CERAMIUM, Blame, Bijdr. 1134 (1826) = Bragantia, Lour. (Aristolochiac).
tomentosum, Blume, 1. c. 1185 = B. tomentosa.

CERAMOCARP1UM, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I- 111 (l864) = Oeotea, Aubl. (Laurin.).
cubense, Nees, 1. c. 31 = Phoebe cubensis.
lanatum, Nees, 1. c. 102 (- *Mespilodaphne lanata).*—Bras.
marginatum, Nees, 1. c. 106 (-*Mespilodaphne marginata).*—Madag.
Maximilianum, Nees, 1. c. 108 (= *Mespilodaphne prolifera).—Bms.*
"btusatum, Nees, 1. c. 105 *{=Mespilodaphne heteromorpha).*—Ins. Maurit.
polyanthes, Nees, 1. c. 133=0. polyantha.
Psychotrioides, Nees, 1. c. 124 = O. psychotrioides.
semicompletum, Nees, 1. c. 1S3 (= *Oreodaphne semicompleta).—Bias.*
"mbrosum, Nees, 1. c. 129=0. umbrosa, *H. B. V K.*

CERAMOPHORA, Nees, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 105, 111 (1864)'=Ocotea, Aubl. (Laurin.).
rymosa, Nees, 1. e. 105 (= *Mespilodaphne cymosa).*—Madag.

CERANTHE, Opiz, Seznam, 27 (1862) = Cerinthe, Toum. (Borag.).

•-'ERANTHERA, Beauv. Fl. Ow. et Ben. ii. 10 (1805) = Alsodeia, Thou. (Violar.).
*di*tata,* Beauv. 1. c. 11. t. 65-A. guianensis.
;"ciflia, Welw. in Trans. linn. Soc. xxvii. (1869) 94. t. 2 = A. ilicifolia.
subintegrifolia, Beauv. Fl. Ow. et Ben. ii. 11. t. 66 = A. owariensis.

CERANTHERA, Ell. Sketch ii. 93 (1824). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1191.
DICERANPRA, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1300 (1880).
de..sifiora, A. Gray, Syn. Fl. ii. n. 865.—Florida,
"neanfolia, Ell. Sketch, ii. 94.-Am. bor.

CERANTHERA, Endl. Gen. Suppl. ii. 22, in syn. {iL[42]} * CERATANTHERA, Hornem. = Colebrookia, Sm (Labiat.).

CERANTHE > Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) ,«=-Solanum,Tourn.
""erandra Rafin. 1. c. = S. rostratum.

CERANTHUS, Schreb. Gen. i. 14 (1789) =Iiinooiera, Sw. (Oleac).
eomieulatus, Schreb. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 807=L. compact*.
Schreberi, J. F. Gmel. Syst. 26=L. compacta.

CERASEIDOS, Sieb. & Zncc. Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 743. t. 6=Prunus, Linn. (Rosac).
apetala, Sieb. & Zncc 1. c 744.—Japon.

CEBA8IOCARPUM, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 832 (1867). *CUCURBITACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
Bennettii, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 729 = zeylanicum.
Maingayi, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 629 = Melothria Rumphiana.
penangense, C. B. Clarke, 1. c. = Melothria Rumphiana.
zeylanicum, *Hooh.f. in Benth. V Hoot./. Gen.* i. 832.—Zeylan.; Java.

CERASITES, Steud. Norn. ed. II. i. 528 (1840) = CERASTITES, S. F. Gray = Papaver, Toum.

CERASOPHORA, Neck. Elem. ii. 71 (1790) = Prunus, Linn. (Rosac).

CERASTITES, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 703 (1821)=Papaver, Toum.
cambrica, S. F. Gray, 1. c. 704=Meconopsi» cambrica.
dubia, S. F. Gray, L C.-P. dubium.
hybrida, S. F. Gray, L c.=P. hybridum.
laciniata, S. F. Gray, 1. c.=P. dubium.
macrocephala, S. F. Gray, 1. c. 7 05=P. Argemone.

CEKASTIUM, [Dill.] Linn. Syst. ed. I (1735).
CARYOPHYLLEAE, Benth. *8c* Hook. f. i. 148.
CENTUNCULUS, Adans. Fam. ii. 256 (1763).
DICHOOON, Bartl. ex Reichb. Norn. 205 (1841).
DUFOUREA, Gren. in Act. Soc. Linn. Bord. ix. (1837) 25.
ESMARCHIA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 798 (1882).
LEUCODONIUM, Opiz, Seznam, 59 (1852).
MOENCHIA, Ehrh. Beitr. ii. 177 (1788).
MYOSOTIS, Tourn. ex Moench, Meth. 224 (1794).
PENTAPLE, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 37- t. 227 (1841).
PREVOTIA, Adans. Fam. ii. 256 (1763).
QUATERNELLA, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789).
acutifolium, Schur, Enum. PI. Transs. 122 =-ovatum.
adscendens, *Wender. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 328.—Hah.t
africanum, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 141.—Afr. trop.
aggregatum, Dur. ex Brignoli, in Flora, xxiii. (1840) 123 = siculum.
album, Presl, Fl. Sic. 167-tomentosum.
alpestre, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 151 =triviale.
alpigenum, Schur, 1. c. 149-triviale.
alpinum, All. Fl. Pedem. ii. 116=arvense.
alpinum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 861 = ovatum.
alpinum, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 180 = glome/atura.
alpinum, *Linn. Sp. PL* 438.—Reg. bor. frigid.
alsinifolium, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 243 = ovatum, arvense.
alsinoides, Pers. Syn. i. 521=glutinosum, *Fries,*
ambiguum, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 419 = arvense.
amplexicaule, Sims, Bot. Mag. t. 1789 = dahuricum.
andinum, *Benth. PI. Hart-m.* 162.—N. Granat.
andinum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 318.—Chili.
androsaeeum, Ser. in DC. Prod. i. 416=iUyricum.
angusti/olium, Vitm. Summa Fl. iii. 137 = arvense.
anomalum, *Waldst. V Kit. ex Willd. Sp. PI.* ii. 812; *et PI. Rar. Hung.* i.-21.—Europ.; Oriens.
apetalum, Dum. Comm. Bot. 47=glomeratum.
apricum, Schlecht in Linnaea, xii. (1838) 208 = nutans.
apuanum, *Part, in Num. Giorn. Bot.* vii. (1876) 69.—Italia.
aquaticum, Linn. Sp. PI. 439=Stellaria aquatics,
arabicum, *Fisch. V Mey. ex Heynh. Nom.* ii. 133, nomen.—Arab,
arabidis, *E. Mey. ex Fend, in Ann. Wien. Mus.* i. (1836) 340.—Afr. anstr.

CERASTIUM:—
araraticum, *Rupr. Fl. Cauc.* 234, in textu.—Reg. Caucas.
arcticum, *Lange, in Fl. Dan.* t. 2963.—Greenland.
arenarioides, Crantz, Inst. ii. 402 = Arenaria spathulata.
arenarium, Tenore, Fl. Nap. iv. 232 = semidecandrum.
arenosum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1663) 518 — glomeratum ?
argaeum, *Boiss. V Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 38.—Cappadoc.
argenteum, Bieb. Fl. Taur. Cauc i. S61=grandiflorum.
armeniacum, *Gren. Monog. Cerast.* 19. t 1.—Armenia.
arvense, Cham. *Be* Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 233 =orithales.
arvense, *Linn. Sp. PI.* 438.—Reg. temp. bor. et austr.
arvensiforme, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. i. (1864) 296.—Bolivia,
stlanticum, *Dur. in Duch. Rev. Bot.* ii. (1846-47) 437.—Hispan.
atratum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 265 - alpinum.
atrovirens, Bab. in Mag. ZooL & Bot. ii. (1838) 317. t. 9=tetrandrum.
atticum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 93 = brachypetalum.
azoricum, *Hochst. ex Seub. Fl. Ator.* 45.— Ins. Azoric.
banaticum, Kit. in Rochel, Banat. Rar., in ind. = grandiflorum.
barbulatum, Wahlenb. Fl. Carp. 137 - brachypetalum.
beeringianum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 62 = alpinum.
Biebersteinii, *DC. in Mim. Soc. Phys. Genev.* i. (1823) 436.—Tauria.
biflorum, Crantz, Inst. ii. 402-Stellarii biflora.
biflorum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 625.—Hungar.
blepkarostemon, Fisch. *Sc* Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 40iJ=longilolium.
Boissieri, *Gren. in Mém. Soc. Emul. Daubs,* i. (1841) 67.-Hispan.
bombycinum, Schur, Enum. PI. Transs. 123 = alpinum.
brachycarpum, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 171 = Dregeanum.
brachycarpum, Schur, Enum. PI. Transs. 124 = arvense.
brachypetalum, *Desp. in Pers. Syn.* i. 620.—Europ.; Reg. Mediterr.
brachypterum, Steud. Nom. ed. II. i. 828, sphalm.= praec.?
bracteatum, Rafin. PriSc. Découv. 36 = oblongifolium ?
breviflorum, Gilib. Fl. Iituan. ii. 158 = semidecandrum.
bulgaricum, *Uechtrit*, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvi. (1876) 221.—Bulgaria.
caeruleum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 63.—As. Min.
caespitosum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 159= glomeratum.
caespitosum, Kit. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 799 =arvense.
caespitosum, Malmgr. in Vet Akad. Oefvers. xix. (1862) 242 = alpinum.
caespitosum, *Triana (3" Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 152.—N. Granat.
calycinum, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. ad p. 56 = Arenaria calycina.
campanulatum, *Viviani, in Ann. Bot.* i. II. 171. t. 1.—Italia; Hung.; Graecia.
camphorataefolium, Steud. Nom. ed. I. 178, 179 = arvense.
candicans, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. i. (1864) 295.—Ecuador.
canescens, Hornem. ex Ser. in DC. Prod. i. 416 = brachypetalum.
capense, *Sond. in Harv. if Sond. Fl. Cap.* i. 131.—Afr. austr.
cardiopetalum, C. Gay, Fl. Chil. i. 274 = Commersonianum.
carinthiacum, Vest, in Hoppe, NeuesTaschenb. (1808) 229 « ovatum.
carnosulum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 413 = arvense.
caucasicum, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 414-nemorale.
chilense, *Bartl. in Presl, Rel. Haeni.* ii. 17.—Chili.

CEBASTIUM :—
chloraefolium, *Fisch.* to" *Mey. Ind. Sem. Hart. Petrop.* iv. 34.—As. Min.
ciliatum, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xv. (1842) 616 = glomeratum.
ciliatum, Waldst. *Sc* Kit. PL Rar. Hung. iii. 250 = arvcnse.
collinum, Hort. Dorpat. ex Flora, xvi. (1833) 122 = pnrpurascens.
collinum, Salisb. Prod. 300 = arvense.
Colsmanni, *Lehm. ex Spreng. Syst.* ii. 418.—Reg. Magell.
Columnae, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxvii — tomentosum.
Commersonianum, *Ser. in DC. Prod.* i. 417.—Reg. Argent.
Commersonii, Steud. Nom. ed. II. i. 829 = praec.
connatum, Beck, N. et M. St. Bot. 55=viscosnm.
connatum, S. G. Gmel. It. ii. 196 ; ex Ledeb. Fl. Ross. i. 401 = davuricum.
consangnineum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* V. i. (1884) 296.—Peruv.
constantinopolitanum, Nym. Consp. 109= glomeratum.
cordatum, Crantz, Inst. ii. 400 = Drymaria cordata.
cordifolium, Roxb. Hort. Brag. 85; Fl. Ind. ii. 468 = Drymaria cordata.
corniculatum, Crantz, Inst. ii. 408 = dichotomum.
coronense, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xr. II. (1877) 154 = ovatum.
corsicum, Soleir. ex Nym. Consp. 108--arvense.
crassipes, *Bartl. in Presl, Rel. Haenk.* ii. 18.—Peruv.
cuspidatum, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 21.—Mexic.
davuricum, *Fitch, ex Spreng. Pugill.* ii. 65.—As. occ. et bor.
dasyphyllum. *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 521.—Hungar.
decalvans, Schloss, ex Nym. Consp. 107-»tomentosum.
deflexum, Ser. in DC. Prod. i. 417 -Stellaria aquatica.
densiflorum, *Cuss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* 186.—Sicilia.
TAni, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1862) II. 391; *etin Linnaea,* xxxiii. (1864-65; 21.—Chili.
dichotomum, Crantz, Inst. ii. 401 = Stellaria dichotoma.
dichotomum, *Linn. Sp. PJ.* 438.—Reg. Mediterr.; As. Min.
dichotomum, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 93 = davuricum.
dicrotrichum, *Fenzl, ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras.* xiv. H. 281.—Bras.
diffusum, Pers. Syn. i. 520-tetrandrum.
dioicum, *[Soland. in] Ait. Hort: Kew.* ed. I. ii. 120.—Hispan.
divaricatum, *Herbich, in Flora,* vii. (1824) 184.—Neapol.
divaricatum, Kit. in Rochel, PI. Banat. Rar. in ind.= Kitaibelii.
Dregeanum, *Fenzl, in Ann. Wien. Mus.* i. (1836) 341.—Afr. austr.
echinulatum, *Coss. W Dur. ex Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord.* xxiii. (1860) 180, nomen.—China.
elatum, Huet, ex Nym. Consp. 107 — grandiflorum.
elatum, Tenore, Fl. Nap. iv. 236—tomentosum.
elbrusense, *Boiss. Fl. Orient,* i. 729.—Persia.
elegans, Kisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 400 = trigynum.
elongatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 816 = uemorale.
elongatum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 321 = arvense.
Endressianum, Prol. ex Willie. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 637 = pyrenaicum.
eriophorum, Kit. ex Rochel, PI. Banat Rar. in ind. = alpinum.
erectum, Coss. *Sc* Germ. Fl. Env. Paris (1845) 39 - quaternellnm.
falcatum, *Bunge, Verz. Supp. Fl. Alt.* 37.—Sibir. altaic.
fallax, Guss. Snppl. Fl. Sic. Prod. 139 = semidecandrum.
fasciculatum, *Bartl. in Presl, Rel. Haenk.* ii. 16.—Mexic.
filifolium, *Vest, in Flora,* iii. (1820) 858.—Styria.
filiforme, Schleich. ex Gaud. Fl. Helv. iii. 252, in syn. = latifohum.
filiforme, Ser. in DC. Prod. i. 420 = filifolium.
fimbriatum, Ledeb. in Mem. Acad. Petersb. v. (1815) 640 = Stellaria radians.
Fischeri, Gren. in Mem. Soc. Emnl. Doubs, i. (1841) 3 •= chloraerolium.

CEBASTIUM :—
Fisckerianum, Ser. in DC. Prod. i. 419=alpinum.
flaccidum, *Andn. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 155, nomen.—Rossia.
fiexuosutn, Hegetschw. in Suter, Fl. Helvet ed. II. App. 454=latifolium.
floccosum, *Bentk. PI. Hartw.* 162.—N. Granat.
fontanum, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 425 = triviale.
fragillimnm, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 64.—As. Min.; Syria.
frigidum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 362—purpurascens.
fulvum, Rafin. Prec. Decouv. 36=glomeratnm.
furcatum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 61 = alpinum.
Gayanum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 92.—Hispan.
gibraltaricum, Boiss. Elench. 24 = Boissieri.
glabellum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 413 = arvense.
glaberrimum, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 265 = alpinum.
glabratum, Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. I. 180 = alpinum.
glaciate, Gaud, ex Ser. in DC. Prod. i. 419=latifolium.
glandulosum, *Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (1869) 306.—Europ.
glaucum, Gren. in Mem. Soc. Emul. Doubs, i. (1841) 47 = manticum, quaternellum.
glomeratum, *Thuill. Fl. Par.* ed. II. 226.—Reg. temp. et subtrop.
glutinosum, *Fries, Novit.* ed. II. 132.—Europ.; As. bor.
glutinosum, Hegetschw. Fl. Schweiz, 433 = latifolium.
glutinosum, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 29.—N. Granat.
glutinosum, Nutt. Gen. Am. i. 291—nutans.
gnaphalodes, Fenzl, in Russegg. Reis. i. 929 = tomentosum.
gradle, Dufour, in Ann. Gen. Sc. Phys. vii. (1820) 304 = Riaei.
gradle, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 201 = brachypetalum.
gramineum, Crantz, Inst. iL 401 = Stellaria graminea.
grandiflorum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 216 = glomeratum ?
grandiflorum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 159 = arvense.
grandiflorum, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 168.—Europ. or.; Reg. Caucas.
grandiflorum, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 886 = Boissieri.
Grenieri, F. Schultz, in Arch. Fl. Fr. et Allem. 24 = glutinosum.
Haussknechlii, *Boiss.& Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvi. (1876) 411.—Mesopot.
heterophyllum, Schur, Enum. PI. Transs. 121 = ovatum.
heterophyllum, Viviani, Fl. Lib. Spec. 67 j et Fl. Cors. Sp. Nov. 17 = illyricum.
hirsutum, Crantz, Inst. ii. 400 = Holosteum hirsutum.
hirsutum, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 419 = alpinum.
hirsutum, Muhl. Cat. 46 - glomeratum.
hirsutum, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxvii = arvense.
hirtellum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl All.* 206.—Afr. bor.
Hochstetterianum, *Fenzl, Verbreit. Alsin.* tab. ad p. 56, nomtn.—Hispan.; Gall.
Holostea, Hornem. Hort. Hafn. 484 = nemorale.
holosteiforme, Schur, Enum. PI. Transs. 119=semidecandrum.
hotosteoides. Fries, Novit. ed. II. 126-glomeratum.
holosteum, Crantz, Inst. ii. 401 - Stellaria Holostea.
holosteum, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 415 = dahuricum.
humifusum, *Camb. in St. Hil.Fl. Bras. Mer.* ii. 166.—Bras.
hybridum, Schur, Enum. PI. Transs. 125=tomentosum.
iUyricum, *Ard.Animad.* iL 26.—Graecia; As. Min.
imbricatum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 28.—Am. austr.
incanum, Hoflm. Hort. Mosq. 1808. n. 805; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 320 = grandiflorum.
incanum, Ledeb. in Mem. Acad. Petersb. v. (1815) 540—arvense.
indicum, *Wight* 6" *Am. Prod.* 43.—Ind. or.
inflatum, *Link, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 57 ; Boiss. Fl. Orient, i 721.—As. Min.; Persia.
insubricum, Moietti, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 799 *-arvrnse.

CEHASTIUM :—
juvenale, *Godr. in Mem. Acad. Stanislas,* Ser. III. [xvii.] 1853 (1854) 883.—Gallia ?
Kablikianum, Wolfner, in Lotos, iv. (1854) 153 - arvense.
Kasbek, *Parrot, Reise Cauc.* ii. t. 3. f. 3.—Reg. Caucas.
Kitaibelii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 329.—Bannatns.
Kotschyi, *Boiss. Fl. Orient, i.* 715.—Syria.
Lamottei, Le Grand, ex Nym. Consp. 110 = Riaei.
Lamyi, F. Schultz, in Arch. Fl. Fr. et Allem. 24 = litigiosum.
lanatum, Lam. Encyc. i. 680-alpinum.
laniferum, Schur, Enum. PI. Transs. 128= alpinum.
lanigerum, Clem, in Atti Terza Riun. Scienz. Ital. (1841) 520=tomentosum.
lanuginosum, Willd. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 797—alpinum.
lapponicum, Crantz, Inst. ii. 402=trigynum.
laricifolium, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 644=arvense.
latifolium, Edmonst. in Phytolog. i. (1843) 498 = alpinum.
latifolium, Hartm. Skand. Fl. ed. XI. 239=arcticum.
latifolium, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 265 = pyrenaicum.
latifolium, Linn. Sp. PI. 439.—Europ.; Reg. Caucas.
laxiferum, *Schur, Enum. PI. Transs.* 125.—Transsylvan.
laxum, *Boiss. &• Heldr. Diagn.* Ser. L vi. 25.—Graecia.
Ledebourianum, Ser. in DC. Prod. i. 420=pilosum.
Lensii, F. Schultz, in Arch. Fl. Fr. et Allem. 24 = litigiosum.
Lerchenfeldianum, Schur, Enum. PI. Transs. 122 = ovatum.
ligusticum, Viv. Cat. Hort Dinegro, 15=campanulatum.
lineare, All. Fl. Pedem. ii. 365=tomentosnm.
lithospermifolium, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 179 = falcatum.
lithospermifolium, *Fisch. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 81.—Sibir.
litigiosum, *De Lens, in Loisel. Fl. Gall.* i. 828.—Gallia.
Loefflingii, Crantz, Inst. ii. 408—pentandrum.
longepedunculatum, Muhl. Cat. 47=nutans.
longifolium, S. G. Gmel. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 41-4 = grandiflorum.
longifolium, Juss. ex Poir. Encyc Suppl. ii. 164 = Commersonianum.
longifolium, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxvii = tomentosum.
longifolium, *Willd. Sp. PI.* ii. 814.—Armenia.
longirostre, Wichura, in Jahresb. Schles. Ges. (1854) 75 = triviale.
lucorum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 160=triviale.
luridum, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 510-brachypetalum.
macilentum, Aspegr. Blek. Fl. 34 = semidecandrnm.
macranthum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 85.—As. Min.
macranthum, *Link, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 829, nomen.—Hab.!
macranthum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natuiw. iv. (1863) 14-latifolium.
macrocarpum, *Boiss. V Haussk. in Boiss. Fl. Orient. i.* 716.—Mesopotam.
macrocarpum, Schur, Enum. PI. Transs. 120=triviale.
macrocarpum, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 407 s purpurascens.
magellanicum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 678.—Chili.
malachifbrme, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn. xv. II. (1877) 149 = triviale.
manticum, *Linn. Cent. PI.* ii. 18.—Europ. anstr.
matrense. Kit ex Spreng. Pugill. i. 83=arvense.
mauritanicum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 206.—Afr-bor.
mauritianum, Bouton, ex Baker Fl. Maurit. 14 s glomeratum.
maximum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 158 - Stellaria aquatica.
maximum, *Linn. Sp. PI.* 439.—Sibir.; Am. arct.
medium, Crantz, List ii. 401 = Spergularia media,
melanandrum, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxvi. (1880) 429.—China.
membranaceum, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. <• 228 = glomeratum?
Meralii, *Vullien, in Mim. St. Acad. Maine-el-Loi*',* xii. (1862) 67.—Gallia.

CERASTIUM:—
Meyerianum, *Rupr. Fl. Cauc.* 221, in textn.—Reg. Caucas.
micranthum, *C. A. Mey. exHeynh. Norn.* ii. 133, nomen. —Rossia.
microcarpum, *Kit. ex Reichb. Fl Germ. Excurs.* 799. —Croatia.
microphyllum, Schur, Enum. PI. Transs. 123 - alpinnm.
microspermum, *C. A. Mey. Vere. Pfl. Cauc.* 222.— Reg. Cancas.
minus, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 4B= triviale.
minutulum, Desmonl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 329 = glomeratum.
moesiacum, Frivald. in Flora, xix. (1836) 435-tomentosum.
molle, *Bartt. in Presl, Rel. Haenk.* ji. 17.—Mexic.
molle, Vill. Hist PI. Dauph. iii. 644-arvense, tomentosum.
mollissimum, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 164.—Feiuv.
montantim, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 275.—Chili,
montioides, *C. Gay, I. c.* 279.—Chili,
mosanum, *Cloet, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 329.— Belgium,
mucronatum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. i. (1864) 294.—Pernv.; Boliv.
mu..iflorum, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cane.* 222.—Reg. Caucas.
murale, Desp. in DC. Fl. Fr. vi. 609 = triviale.
nturale, Schur, Enutn. PI. Transs. 119=glutinosum.
murale, Salisb. Prod. 300 = Holostenm umbellatum.
mutabile, Gren. in Me'm. Soc. Emul. Doubs, i. (1841) 68—arvense.
mutabilefipenn. Fl. Friburg. iii. 847 ^triviale, glomeratum, brachypetalum, semidecandrum.
nemorale, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 317.—Reg. Cancas.
nemorum, Crantz, Inst. ii. 401=Stellaria nemoram.
nepalense, Wall. Cat. n. 628 = glomeratum I
nervosum, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 277.—Chili.
nigrescens, Edmondst. ex Syme, Engl. Bot. ed. III. ii. 87 = alpinnm.
nit ens, Stev. ex Ser. in DC. Prod. i. 415 = nemorale.
nivale, D. Don, ex Nym. Consp. 110—trigynum.
nutans, *Rafin. Pric. Dicouv.* 36.—Am. bor.
oblongifolium, Anders. Cat. Fl. Nevad. 118=nutans.
oblongifolium, Torr. Pacif. Rail. Rep. iv. 70=pilosum.
oblongifolium, *Torr. Fl. U. St.* 460.—Am. bor.
obscurum, Chaub. in St. Amans, Fl. Agen. 180 = glutinosum, *Fries.*
obtusatum, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 628.— Hungnr.
obtosifolinm, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Afosc.* (1841) 8H3.—Sibir. altaic.
obtusifolium. Lam. Fl. Fr. iii. 58= glomeratum ?
octandrum, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 45 =glomeratnm.
Opisii, Seidl, in Opiz, Seznam, 28=glutinosum.
orithales, *Schlecht. in Linnaea*, xii. (1838) 209.— Mexic.
orophyllum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. i. (1864) 295.—Peruv. j Bolivia.
ovale, Bess. Prim. Fl. Galici. 294=glutinosum.
vale, Pers. Syn. i. 521 = glomeratum ?
ovatum, *Hoppe.ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 493.— Europ.; Keg. Caucas.
Pallasii, Vest, in Flora, iii. (1820) 356 = arvense.
pollens, F. Schultz, Arch. Fl. 124 = litigiosum.
Pollidum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 146=semidecandrum.
Palustre, Moris, in Mem. Accad. Torino, xxxviii. (1835) p. xxviii = campanulatum.
Paueiflorum, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 176=lithospermifolium.
Pauciflorum, Stev. ex Ser. in DC. Prod. i. 414 = pilosum.
Pauciflorum, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 380 = »'pinum.
P*dunculare, *Bory V Chaub. Noun. Fl. Ptlop.* 29. t 13.—Graecia; As. Min.
P^fnculatum, Gaud, ex Ser. in DC. Prod. i. 419 = latifolium.
Prtttnculatum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 380 = nutans.
P^Uucidum, Chaub. in St. Amans, Fl. Agen. 181-semideviandrum.
Ptwylvanicum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 104 = oblongi-[o]lium.
[tnns]*ylvanicum*, Hornem. Hort. Hafn. i. 435-arvense.

CERABTIUM:—
pentandrum, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. i. 359=glutinosum.
pentandrum, Krock. Fl. Siles. ii. I. 81-semidecandrum.
pentandrum, *Linn. Sp. PI.* 438.—Europ.
pentandrum, Moris, Fl. Sard. i. 266-pumllum.
pentandrum, Tenore, Syll. 220-densiflorum.
peplidifolium, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i. 725--fragillimnm.
perfoliatum, Falk, Beitr. ii. 182=davnricum.
perfoliatum, *Linn. Sp. PI.* 487.—Reg. Mediterr.; As. Min.
persicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 64.—Persia.
petiolare, Hance, in Hook. Kew Joum. i. (1849) 143 -Stellaria aquatica.
petraeum, F. Schultz, Arch. Fl. 124-glutinosum.
petricola, *Panl. Elem. Fl. Bulg.* 20.—Bulgaria.
petrosum, Schur, Enum. PI. Transs. 122 = ovatum.
pilosissimum, *Kit. in Linnaea*, xxxi. (1863) 619.— Hangar.
pilosum,Fi»ch. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 409 =glomeratum.
pilosum, Hornem. Hort. Hafn. it 965=grandiflornm?
pilosum, *Ledeb. in Mim. Acad. Pitersb.* v. (1815) 589. —Sibir.; Am. bor. occ.
pilosum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod.i. 316 = illyricum.
pilosum, Tenore, Pi 'd. Fl. Nap. p. xxvii=brachypetalum.
Pohlianum, Fenzl, ex Rohrb. in Mart Fl. Bras. xiv. II. 282=dicrotrichum.
polymorphum, *Rupr. Fl. Cauc.* 237.—Reg. Caucas.
polyphyllum, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 418=arvense.
praecox, Tenore, Prod. Fl. Nap. p: xxvii=campanulatum.
procumbens, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* 211.—Afr. bor.
prostratum, Jan, Elench. 7, ex Bertol. Fl. Ital. iv. 766 <= campanulatum.
pseudo-sylvaticum, Schur, in Oestr. BoL Zeitschr. xxi. (1871) 46-triviale.
pseudo-viscosum, Schur, 1. c. 99 = glomeratum.
pubescens, Goldie, in Edinb. Phil. Journ. vi. (1822) 827 — oblongifolium.
pumilum, Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 634 = Gayanum.
pumilum, *Curt. Fl. Lond./asc.* vi. t. 80.—Europ.
pumilum.Gtiseb. Spicil. Fl. Rumel.i. 208 = glutinosum.
pumilum, Rafin. in Am. Monthly Mag. (J818) 266 = glomeratum.
purpurascens, *Adams, in Weber if Mohr, Beitr.* i. 60.— As. Min.; Reg. Caucas:
purpurascens, Fenzl, Verbreit. Alsin. tab. ad p. 56 = Arenaria purpurascens.
pusillum, Ser. in DC. Prod. i. 418 = glomeratum.
pyrenaicum, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. xxvi. (1882) 231.—Mont. Pyren.
quatemellum, *Fend, Verbreit. Alsin.* tab. ad p. 56.— Europ.; Am. bor.
racemosum, *Bartl. in Presl, Rel. Haenk.* ii. 18.—Chili.
radians, Crantz, Inst. ii 401 = Stellaria radians.
ramigerum, *Bartl. in Presl, Rel. Haenk.* ii. 16.— Mexic.
ramosissimum, Boiss. Elench. 2S=Riaei.
rectum, *Frivald. in Flora*, xix. (1836) 485.—Rumelia.
refractum. All. Fl. Pedem. ii. 117 = trigynum.
repens, Bertol. Fl. Ital. iv. 757 =sylvaticum.
repens, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 360 = Biebersteinii.
repens, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 105-Boissieri.
repens. Linn. Sp. PI. 439 =toruentosum.
revolutum, *Meinsh. in Boer* b* *Helm. Beitr. Kenntn. Russ. Reich*, xxvi. 146.—Ins. Koraginsk.
Riaei, *Des Moul. ex J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. vi. (1836) 348.-Europ.; As. Min.
rigidum, Ledeb. in Mem. Acad. Pitersb. v. (1815) 638 — alpinum.
rigidum, Vitm. Samma Veg. iii. 137-arvense.
Ripartianum, *F. Schultt, in Flora*, xlv. (1862) 458.— Mexic.
rivulare, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 166.— Bras.
Roeseri, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. IL i. 93=brachypetalum.
rotundatum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 146-semidecandrum.
rotundifolium, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 58 = glomeratum.
rotundifolium, Schur, Enum.Pl. Transs. 123 = alpinnm.
ruderale, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 367.—Ross.; Reg. Caucas.

CERASTIUM:—
rupestre, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. i. 417 = trigynum.
salatavieum, *Rupr. Fl. Cauc.* 229.—Reg. Caucas.
samnianum, Ser. in DC. Prod. i. 421—grandiflorum.
saxatile, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 616=alpinum.
saxigenum, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 100=glutinosum.
scandens, *Lejeune, Fl. Spa*, i. 211.—Belgium,
scaposum, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 104.— Ins. Creta.
Scarani, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxvii = arvense.
Selloi, *Schlecht. ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 283.-Bras.
semidecandrum, Cham. *8c* Schlecht in Linnaea, v. (1830) 233-vulcanicum.
semidecandrum, Chaub. Expe'd. Sc. Morée, 129 = brachypetalum.
semidecandrum, *Linn. Sp. PI.* 438.—Europ.; As. Min.
semidecandrum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 315 -glutinosum.
sericeum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 854. —Arizona,
sericeum, *Peurr. in Mem. Acad. Toul.* iii. (1788) 311. —Europ.
serpyllifolium, Bieb. ex Ser. in DC. Prod. i. 417 = glomeratum.
serpyllifolium, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 26=-arvense.
sibiricum, Stev. ex. Ledeb. Fl. Ross. i. 407= alpinnm.
sibiricum, Turcz. ex Ledeb. 1. c. 410=glomeratum.
siculum, *Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* 187.—Sicilia.
simense, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 45 = glomeratum.
Soleirolii, Ser. ex Duby, Bot. Gall. i. 87-arvense.
soratense, *Rohrb. in Linnaea*, xxxvii. (1871-78) 291. —Bolivia.
spathulatum, *Pers. Syn.* i. 520.—Jamaica.
speciosum, Sprun. ex Boiss. Fl. Orient i. 727 = grandiflorum.
Sprengelii, *Ser. in DC. Prod.* i. 421.—Hab.?
squalidum, Ram. in Mém. Acad. Paris, vi. (1826) 158 —alpinum.
Stellaria, *Tenore, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 380.— Neapol.
stellarioides, Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. I. 181-° trigynum.
stellarioides, Moç. ex Ser. in DC. Prod. i. 415 - pilosum.
stenopetalum, *Fenul, ex Gren. V Godr. Fl. 1.*272.—Ins. Corsica.
strictum, Linn. Sp. PI. 439 = arvense.
strigosum, Fries, Fl. Halland. 78 - brachypetalum.
subacaule, Hegetschw. in Suter, Fl. Helvet. ed. II. App. 455 = latifolium.
subspisatum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* V. i. (1864) 295.—Peruv.
succulentum, Crantz, Inst.ii. 400 = Arenaria peploides.
suffruticosum, *Lam. Encyc.* i. 681.—Gallop.; As. Min.
suffruticosum, Linn. Sp. PI. 439= arvense.
sylvaticum, Opiz, Seznam, 28 = triviale.
sylvaticum, Stev. ex Ledeb. FL Ross. i. 410=glomeratum.
sylvaticum, *Waldst.* b* *Kit. PI. Rar. Hung.* i. 100.— Austria,
szalaberense, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 524.— Hungar.
Szowitsii, *Boiss. Fl, Orient. I* 717.—Armenia.
tauricum, Spreng. ex Ser. in DC. Prod. i. 415 = brachypetalum.
Taaschianum, *Wolfner, in Lotos*, iv. (1854) 67.— Europ.
tenellum, Gaud, ex Ser. in DC. Prod. i. 416=glomeratum.
Tenoreanum, Ser. 1. c. 421 = brachypetalum.
tenue, Viviani, Fl. Cors. Sp. Nov. 7 - quatemellum.
tenuifolium, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 821-arvense.
tenuifolium, Spreng. in Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 138 = Sprengelii.
tenuifolium, Visiani, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 799 = grandiflorum.
tetragonum, Baumg. Enum. Stirp. Tranas. i. 424-Sullaiia crassifolU.
tetrandrum, *Curt. Fl. Lond.fasc.* vi. t. 81.—Europ.
Thomasii, *Tenore, Fl. Neap. Prod. App.* iv. 21.— Europ.
Thomsonii, *Hook.j. Fl. Brit. Ind.* i. 228.—Reg. Hiraal.
tmoleum, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 86 = fragillimum.

CEKASTITTM:—
tomentosum, Boj. Hort. Manrit. 24=glomeratum.
tomentosum, Georgi, Beschi. Russ. Reich, iv. 988 =• Biebersteinii.
tomentosum, Haensel. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 6S6 = Boissieri.
tomentosum, Huds. Fl. Angl. ed. 1.176—alpinum.
tomentosum, *Linn. Sp. PI.* 440.—Europ.; As. Min.
Toumefortii, *Gren. in Mem. Soc. Emul. Doubs,* i. (1841) 11. t. 7.—Armenia,
transsilvanicum, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natural.* iv. (1853) 14.—Transsylv.
trigynum, *Vill. Prosp.* 48 ; *Hist. PL Dauph.* iii. 645.—Reg. bor. temp, et arct.
triviale, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 483.—Europ.; As.; Afr. bor.
uliginosum, Hegetschw. Fl. Schweiz, 437- triviale ?
umbellatum, Crantz, lust. ii. 401 = Holosteum umbellatnm.
umbellatum, *C. Koch, in Linnaea,* xv. (1841) 708.—Armenia.
umbrosum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 615 - triviale ?
uniflorum, Thorn, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 797 = latifolium.
vagans, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1838) reimp. 26.—Ins. Madera.
valachicum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 619.—Hungar.
varians, Coss. & Germ. Obs. PI. Crit. 26=glutinosnm *Fries,* semidecandrum.
velutinum, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 859=vulgatum ?
Vidali, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 677—Chili.
villosum, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 424 = alpinum.
villosum, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) I. 322 =glomeratum.
visearium, Schur, Enum. PI. Transs. 118, in syn.= glutinosum.
viscidum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 438 = semidecandrum.
viscosissimum, Schur, Enum. Fl. Transs. 123 — alpinum.
viscosum, Linn. Sp. PI. 437=glomeratum.
viscosum, Pollich, Hist. PI. Palat. i. 448=brachypetalum.
vulcanicum, *Scklecht. in Linnaea,* xii. (1838) 208.—Mexic.
vulgare, Hartm. Handh. Skand. Fl. ed. I. 182 = triviale.
vulgatum, Lino. Fl. Snec. ii. 158=glomeratum.
Wahlenbergii, Rupr. Fl. Caucas. 287 = latifolium.
Willdenowii, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 29.—Ecuador.

CERASUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1785) j Gen. ed. I. 141 (17S7)=Prunus, Linn. (Rosac).
acida, Borck. in Roem. Arch. i. II. 38=P. Census.
acuminata, Wall. PI. As. Rar. ii. 78 = P. acuminata.
adenophylla, M. Roem. Syn. Rosifl. 81 = P. undulata.
affinis. Sweet, Hort. Brit. ed. III. 209.—Hab. ?
americana, Hook. *Sc* Arn. in Comp. Bot. Mag. i. (1835) 24 = P. americana.
aspera, Loisel. in Dnham. Arb. ed. nov. v. 33 = P. aspera.
asplenifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 106 = P. Avium.
austera, Borck. in Roem. Arch. i. II. 38 = P. Cerasos.
avicularis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 801=P. Avium.
Avium, Moench, Meth. 672-P. Avium.
beroliensis, Nym. Consp. 213 = P. Census.
bigarella, Dum. Fl. Belg. 91 = P. Census.
borealis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 286 = P. pensylvanica.
brachypetala, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 52=*incisa.*
brasiliensis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 542 = P. brasiliensis.
Bungei, Walp. Rep. ii. 9 = P. Cerasus.
campestris, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 7=P. Chamaecerasus.
canadensis, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 8—P. americana.
canadensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5-P. Chamaecerasus.
Capollin, Ser. in DC. Prod. ii. 539 = P. Capollin.
capricida, Wall. Cat. n. 718-P. undulata.
Caproniana, DC. Fl. Fr. iv. 482=P. Cerasus.

CERASUS :—
Capuli, Ser. in DC. Prod. ii. 641=Promts Capollin.
caroliniana, Michx. Fl. Bor. Am. i. 285=P. caroliniana.
cerasifera, Eaton *Sc* Wright, N. Am. Bot. 189-P. maritima.
Chamaecerasus, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 29 = P. Chamaecerasus.
Chicasa, Ser. in DC. Prod. ii. 688 = P. Chicasa.
chinensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 514-P. japonica.
collina, Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 130=P. Census.
cornuta, Wall. Cat. n. 716=P. Padus.
corymbosa, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122= P. Mahaleb.
cucullata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 111 = P. Cerasus.
decumana, Mordant, ex DC. Prod. ii. 536-P. Avium.
demissa, Nntt. in Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 411 - P. demissa.
densiflora, Spach, Hist. Vég. Phan. i. 416-P. virginiana.
depressa, Ser. in DC. Prod. ii. 588=P. pumila.
diffusa, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 647.—Persia.
domestica, Cat Perck, ex Wesmael, in Bull. Congr. Bot. Brux. (1864) 255 = P. Cerasus.
Duerinckii, Mart Bull. Acad. Belg. viii. I. (1841) 68 =P. virginiana.
dulcis, Borck. ex Steud. Norn. ed. II. i. 331=P. Avium.
dulcis, Gaertn. Mey. & Scherb. FL Wett. ii 181 = P. Cerasns.
duracina, DC. Fl. Fr. iv. 488=P. Avium.
ebroliensis, Lamotte, Prod. i. 238 • P. Cerasus.
effusa, Host, Fl. Austriac. ii. 6 = P. Cerasus.
elliptica, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 4=P. elliptica.
emarginata, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 169 = P. emarginata.
erecta, Presl, Epim. Bot. 194=P. emarginata.
ferruginea, DC. Prod, it 640 = P. ferruginea.
fimbriata, Spach, Hist. Vég. Phan. i. 416-P. virginiana.
floribunda, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 119= P. pumila.
Fontanesiana, Spach, Hist. Veg. Phan. i. 410=P. graeca.
fruticosa, Pall. Fl. Ross. t. 8[b]. = P. Chamaecerasus.
glandulosa, Kellogg, in Proc Calif. Acad. i. 1855 (1873) 59 = P. emarginata.
glandulosa, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. S3-P. japonica.
glauca, Moench, Meth. 672 = P. pumila.
glaucifolia, Wall. Cat.n. 717 = P. nepaulensis.
graeca, Hort. exC. Koch, Dendrol. i. 705, Index=P. graeca.
Griffithii, Boiss. Fl. Orient, ii. 648.—Afghanis!.
Heaumiana, M. Roem. Syn. Rosifl. 69=P. Cerasus.
heterophylla, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 106 = P. Avinm.
hirsuta, Spach, Hist. Veg. Phan. i. 417 = P. virginiana.
Hixa, C. Sm. ex Spach, Hist. Nat. Veg. i. 419 - P. Hixa.
hortensis, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 3 = P. Cerasus.
humilis, Host, Fl. Austr. ii. 7=P. Chamaecensus.
humilis, Moris, Elench. Sard. 17=P. prostrata.
kyemalis, Ser. in DC. Prod. ii. 588 = P. americana.
ilicifolius, Nutt. ex Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 340. t. 83 = P. ilicifolia.
incana, Boiss. Fl. Orient, ii. 647 = P. incana.
incana, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xix. (1843) 126=P. prostrate.
incisa, Boiss. Fl. Orient, ii. 648.—Persia.
incisa, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 33 = P. incisa.
integerrima. Wall. Cat. n. 722-P. acuminata.
integrifolia, Presl, Epim. Bot. 194.—Peruv.
intermedia. Host, Fl. Austriac ii. 7= P. Avium.
intermedia, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 30 = P. Chamaecerasus.
japonica, Ker-GawL ex Steud. Nom. ed. II. i. 331=-P. Kerii.
japonica, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 33=P. japonica.
javanica, Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855)412 = P.javanica.
Jenkinsii, Hook. f. *Sc* Thorns, ex Fl. Brit. Ind. ii. 317 = P. Jenkinsii.
Juliana, DC. Fl. Fr. iv. 482=P. Avium.

CERASUS:-
Juliana, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 331-Pninua Cerasus.
Launesiana, Carr.in Rev. Hortic. (1872) 198.—Japon.
Laurocerasus, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 6 = P. Laurocerasus.
Lindleyana, Wall. Cat. n. 1008=P. nepaulensis.
littoralis, Eaton & Wright, N. Am. Bot 189 = P. maritima.
lusitanica, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 5 — P. lusitanica.
macedonica, M. Roem. Syn. Rosifl. 64-= P. Chamaecerasus.
macrophylla, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 485 = P. Avium.
maeda, Hort. ex Lavall. Arbor. Segrez. 119= P. paniculate.
Mahaleb, MilL Gard. Diet ed. VIII. n. 4=P. Mahaleb.
Marasco, Host, Fl. Austriac ii. 6=P. Census.
martabaniea. Wall. Cat. n. 4902 = P. martabanica.
micrantha, Spach, Hist. Vég. Phan. i. 414-P. virginiana.
microcarpa, Boiss. FL Orient, ii. 646=P. microcarpa.
minutiflora, A. Gny, PL Wright, i. 68-P. minutiflora.
mollis, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 169 =P. emarginata.
multicarpa, Hort. ex Rev. Hortic. (1875) 409-P. Census.
napaulensis. Ser. in DC. Prod. ii. 540 = P. nepaulensis.
nicotianaefolia, Hort. ex DC. Prod. ii. 536=P-Cerasus.
nigra, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 32 = P. americana.
nigra, MilL Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = P. Avium.
nigricans, Borck. in Roem. Arch. i. II. 88—P-Avium.
obovata, Beck, N. et M. St. Bot. 87 = P. virginiana.
occidentalis, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 4 «= P. occidentalis.
opaca, Benth. PL Hartw. 172 = P. opaca.
orientalis, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 128=P. microcarpa.
oxypyrena, Spach, Hist. Veg. Phan. i. 413-P. Padus.
Padus, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 328; DC. Fl. Fr. iv. 480 = P. Padus.
pallida, M. Roem. Syn. Rosifl. 69 = P. Avium.
paniculata, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 7 = P. paniculata.
Pattoniana, Can. in Rev. Hortic. (1872) 136-P. mollis.
pectinata, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 127=P. pectinata.
pendula, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.485 =P. fruticosa,
pensylvanica, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 9 = P. pensylvanica.
persicifolia, Loisel. 1. c. = P. pensylvanica.
Phoshia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 239 =» P. Puddum.
polygyna, DC. ex Ser. in DC. Prod. ii. 537-P-Census.
prostrata, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 119=P-pumila.
prostrata, Ser. in DC. Prod. ii. 538 = P. prostrata.
Pseudocerasus, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 200=P-Puddum.
pubescens, Ser. In DC. Prod. ii. 538.= P. maritima.
Puddum, Wall. PL As. Rar. ii. 37. t 143=P. Puddum.
pumila, Borck. in Roem. Arch. i. II. (1797; S8-P-Chamaecensus.
pumila, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 286-P. pumila.
punctata, Hook. f. & Thorns, ex Fl. Brit. Ind. ii. 317" P. punctata.
pygmaea, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 32 •= P. maritima.
racemosa, Gilib. Exercit. i. 349-P. Padus.
reflexa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (18«) 342 = P. reflexa.
Rhexii, Hort Gall, ex Van Houtte, FL des Serres, Sir. II. vii. (1867-68) 159= P. Cerasus.
rosea, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 831 = P. Cerasus.
rubicunda, Bechst. Forstb. 160, 355-P. Avium.
rubra, Gilib. Fl. Lituan. ii. 229 =P. Crrasus.
rufa, Wall. Cat. n. 721=P. rufa.
salicifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 106-r. Avium.
salicifolia, Ser. in DC. Prod. ii. 640 = P. salicifolia.

CERASUS:—
salicina, [G. Don, in] Loud. Hort. Brit. 480=Prunus salicina.
samydoides, Walp. Rep. iv. Index, 811—P. samydoides.
semperflorens, Borckh. in Roem. Arch. i. II. 38-P. Cerasus.
serotina. Hook. Fl. Bor. Am. 1. 169 = P. virginiana.
serolina, Loisel. in Daham. Arb. ed. nov. v. 8=P. serotina.
serrulatus, [G. Don, in] Loud. Hort. Brit. 480=P. panicnlata.
sibirica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 114-P. frnticosa.
Sieboldii, Can. in Rev. Hortic. (1866) 279.; 870-P. paniculata.
sineniis, Spach, Hist. Vfo Phan. i. 425 = P. sinensis.
sphaerocarpa, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. v. 4 = P. sphaerocarpa.
Susquehannae, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 485=P. pumila.
sylvestris, S. G. Gmel. It. i. 102-P. Chamaecerasns.
tomentosa, Wall. Cat. n. 715 = P. tomentosa.
tortuosa, Boiss. *Sc* Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 647. —As. Min.; Persia.
tridentina, M. Roem. Syn. Rosifl. 76 = P. Cerasns.
triflora, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 831 = P. triflora.
umbellata, Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 409 = Prunns umbellata.
undulata, Ser. in DC. Prod. ii. 540= P. nndulata.
varia, Borck. in Roem. Arch. i. II. 38 = P. Avium.
•oirginiana, Michx. Fl. Bor. Am. i. 285 = P. serotina.
virginica, Michx. ex Stend. Nom. ed. II. i. 331 = P. virginiana.
vulgaris. Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 1 = P. Cerasns.
Wallichii, M. Roem. Syn. Rosifl. 81 = P. acuminata.
Wattererii, Hort. ex Lavall. Arbor. Segrez. 119 = P. Puddum.

CERATAMDRA, Eckl. ex Bauer, Illustr. Gen. Orch. t 16 (1837). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 684.
affinis, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 108.—Afr. austr.
auriculata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 364 = chloroleuca.
bicolor, *Sond. ex Drige, in Linnaea,* xx. (1847) 220, nomen.—Afr. austr.
chloroleuca, *Eckl. ex Bauer, Illustr. Gen. Orch.* t. 16. —Afr. austr.
globosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 864.—Afr. austr.
gandiflora, *Lindl. 1. c*—Afr. austr.
Harveyana, *Lindl. 1. c.* 866.—Afr. austr.
Harveyana, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 108 = bicolor.
ochroleuca, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 651 =chloroleuca.
parviflora, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 864.—Afr. austr.

CERATANTHERA, Homem. Hort. Hath. i. 2,5 (1818); Lestib. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xv. (1841) 835, 341-Globba, Linn. (Scitamin.).
amomoides, Hornem. 1. c. i. 5 = G. znarantina.
ptndula, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xv. (1841) 385 "G.pendula.

CERATELLA, Hook. f. Fl. Antarct. i. 25. t. 18 (1845) = Abrotanella, Cass. (Compos.).
rosulata, Hook. f. 1. c = A. rosulaU.

CERATIA, Adans. Fam. ii 819 (1763) = Ceratonia, Luw- (Legumin.).

CERATIOLA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 221 (1803). *JMPETXACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 415.
Wcoides, *Michx. I. c.* 222.—Am. bor.

CEHATIOSICYOS, NeeSi in Eew. ft u h- ^m. 281 (1836). *PASSIFLOREAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 814.
Ec
Monii, *Nees, I. c.-Ah.* austr.

CERATOSYCIOS, Walp. Rep. ii. 222 (1843) = praec.
CERATIUM, Bl e, Bijdr. 341. t. 46 (1825) = Eria, Lindl. (PeWdT
compressum, Blnme, 1. c. 342 = E. compressa.

CERATOCALYX, Coss. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. ix. (1848) 145. t 10 = Orobanche, Linn.
fimbriata, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 52.—Hispan.
macrolepis, Coss. in Ann. Sc. Nat Se>. III. ix. (1848) 146. t. 10=O. macrolepis.
Reuteri, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 62, in obs. = O. gamosepala.

CERATOCAPNOS, Dur. in Parlat. Giom. Bot Ital. i. I. (1844) 336 = CorydaliB, Vent. (Papaverac.).
heterocarpa, Dur. 1. c. = C. heterocarpa.
palaestina, Boiss. Biagn. Ser. L viii. 12.—Syria.
umbrosa, Walp. Ann. ii. 80=Cor. heterocarpa.

CERATOCARPUS, Bnxb. ex Linn. Diss. Dass. 28 (1747); Amoen. Acad. i. 412 (1749). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 55.
arenarius, *Linn. Sp. PI.* 869.—Sibir.
maritimus, Pall. Ind. Taur. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 397 = Atriplex pedunculate.
salinus, Pall. Reise Statth. Rnss. Reich, i. 268, 270-Atriplex pednnculata.

CERATOCARPUS, Dur. Qapsu) in Parlat. Giom. Bot. Ital. i. i. (1844) 336=CERATOCAPNOS, Dur.= Corydalis, Vent.

CERATOCABYTTM, Nees, in lindl. Nat. Syst. ed. II. 451 (1836). *RESTIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1037.
argenteum, *Nees, I. c.; Kunth, Enum. PI.* iii. 488.—Afr. austr.
fistulosum, *Mart, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 274. —Afr. austr.
speciosum, Nees, ex Mast. 1. c 278 = argenteum.

CERATOCAULOS, Reichb. Handb. 201 (1887) = Datura, Linn. (Solanac).
daturoides, Spach, Hist. Veg. Phan. ix. 69 = D. Ceratocaula.

CERATOCEPHALUS, Moench, Meth. 218 (1794) (Ceratocephala)= Ranunculus, Linn.
falcatus, Pens. Syn. i. 841 = R. falcatus.
furfurascens, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 248.—Afr. bor.
incurvus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. II. (1848) 269. t. 7=R. falcatus.
leiocarpus, Stev. 1. c.= R. falcatus.
orthoceras, DC. Syst. i. 231=R. falcatus.
platyceras, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. H. (1848) 269 = R. falcatus.
reflexus, Stev. 1. c. 268 = R. falcatus.
spicatus, Moench, Meth. 218=R. falcatus.
syriacus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxi. II. (1848) 268 = R. falcatus.
testiculatus, Roth, Enum. PI. Phan. Germ. i. I. 1014 = R. falcatus.

CERATOCEPHALUS, Vaill. ex Cass. in Diet. Sc. Nat. vii. 432 (1817) = Bidens, Linn. (Compos.).
pilosus, Rich, ex Cass. 1. c.=B. pilosa.

CERATOCHILUS, Blume, Bijdr. 358. t. 26 (1825) = Saccolabium, Blume (Orchid.).
biglandulosus, Blume, 1. c. 859=S. distichumt
micranthus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 232=S. micranthum.
orchideus, lindl. 1. a—Ind. or.

CERATOCHILUS, Lindl. in Lodd. Bot. Cab. t. 1414 (1828)-Stanhopea, Frost (Orchid.).
grandiflorus, Lodd. 1. c. = S. eburaea.
insignis, lindl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 381=S. insignis.
oculatus, Lodd. Bot Cab. 11764=S. oculata.

CERATOCHLOA, Beanv. Agrost 76.1.15. f. 7 (1812) - Bromus, Dill. (Gramin.).
australis, Spreng. ex Steud. Nom.ed. II. i. 382 ; 229 = B. uuioloides.
Boryana, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 597 = B. strictns.
breviaristata, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 253 = B. breviaristatus.
irevis, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 326 = B. brevis.
festucoides, Beanv. Agrost. 75 »B. nnioloides.

CERATOCHLOA ^—
grandiflora, Hook.Fl. Bor. Am. ii. 253 = Bromus virens.
HaenheanaA. Presl, in Rel. Haenk. i. 285 = B. unioloides.
marginata, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 822 — a ciliatus.
pendula, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1880); Linnaea, vi. (1831) Iitt. 72 = B. unioloides.
secunda, J. Presl, in Rel. Haenk. i. 285 - B. Preslii.
unioloides, DC. Cat. Hort. Monsp. 92 = B. unioloides.

CERATOCNEMUJff, Coss. *Sc* Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 289. *CRUCIFERAE.*
rapistroides, *Coss. &* Balansa, I. c.*—Marocco.

CERATOCOCCA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. vi. p. lxx (1820) -Miorotea, Sw. (Phytolaccac).
maypurensis, Humb. & Bonpl. ex Roem. *Sc* Sennit. 1. c. 800=M. maypurensis.

CERATOCOCCUS, Meissn. Gen. Comm. 369 (1848)-Plukenetia, Linn. (Euphorbiac).

CERATOGONON, Meissn. in Wall. PI. As. Rar. iii. 63 (1832) = Oiygonum, Burch. (Polygonac.).
atriplicifolium, Meissn. 1. c.—Afr. trop.
cordofanum, Meissn. in DC. Prod. xiv. 89 •= *atriplicifolium.*
sinuatum, Hochst. *Sc* Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 281=*atriplicifolium.*

CERATOGYNE, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 68. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook, f. ii. 431.
DIOTOSPERMA, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 275.
obionoides, *Turcz. I. c.* 69.—Austral.

CERATOGYNUM, Wight, la v. II. 26. t. 1900 (1852) = Sauropua, Blnme (Euphorbiac).
concolor, Pritz, Ic. Ind. 245, sphalm. = Ceratolobus concolor.
rhamnoides, Wight, Ic v. II. 26. t. 1900 ^S. quadrangularis.

CERATOLACI8, Wedd. in DC. Prod. xvii. 66 (1873) *PODOSTEUACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 113.
erythrolichen, *Wedd. I. c*—Bras.

CERATOLEPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 111 =Pamphalea, DC. (Compos.).

CERATOLOBTJS, Blume, in Schult. *I* Syst. vii. p. lxxx (1830). *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 983.
concolor, *Blume, ex Rumphia,* ii. 165. t. 130. f. 1.—Sumatra,
glaucescens, *Blume, in Schult. f. Syst.* vii. 1334.—Java.
glaucescens, Blume, Rumphia, ii. 1.137 - Korthalsiae sp.
plicatus, Zipp. ex Blnme, 1. c. 171 - Korthalsia Zippelii.
Zippelii, Blume, 1. c- Korthalsia Zippelii.

CERATONIA, Linn. Gen. ed. I. 35 (1735). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 574.
CERATU, Adans. Fam. ii. 319 (1763).
chilensis, Molina, Sagg. Chil. 172=Prosopis juliflora.
coriacea, Salisb. Prod. 323 = C. Siliqna.
inermis, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 487=C. Siliqna.
Siliqua, *Linn. Sp. PI.* 1026.—Europ. austr.; Oriens.

CERATONYCHIA, Edgew. in. Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) 1215 = CometeB, linn. (Amaranthac.).
Nidus, Edgew. L c.-Com. surattensis.

CERATOPETALUM:, Sm. Bot. N. Holl. 9. t, S (1793). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 661.
apetalum, *D. Don, inEdinb. N. Phil. Journ.* ix. (1830) 94.—Austral.
gummifenim, Sm. *Bot. N. Holl.* 9. t. 3.—Austral.
monopetalum, Caley, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. ix. (1830) 94 = apetalnm.
numtanum, D. Don, 1. c. = apetalum.
ovatum, Caley, ex D. Don, 1. c. 95 - Schizomeria ovata.

CERATOPHORUS.Hassk. Retzia,i. 100 (1866) (=Keratophorns)=Payena, Linn. (Sapotac).
Leerii, Hassk. 1. c. 101 = P. Leerii.
longepetiolatus, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 161 = P. longepctiolata.
Wightii, Hassk. Retzia, i. 101=P. lucida?
Wightii, Maing. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 547 = P. malaccensis.

CERATOPHORUS, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 120 - Gelonium, Roxb. (Euphorbiac).
africanus, Sond. 1. c. 121 = G. africannm.

CERATOPHYLLUM, Linn. Syst. ed. I (1735).
CERATOPHYLLEAE, Benth. & Hook. f. iii. 415.
DICHOTOPHYLLUM, Dill, ex Moench, Meth. 345 (1794).
apiculatum, Cham, in Linnaea, iv. (1829) 604 = demersum.
aquaticum, H. C. Wats. Topogr. Bot. i. 165=demersnm ?
osperum. Lam. Fl. Fr. ii. 196 = demersnm.
australe, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 14.—Reg. Argent,
chilense, *Leyb. in Anal. Univ. Chil.* (1859) 682.—Chili.
cornutum, Rich, in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 299.—demersum.
cristatum, *Guill. (f Perr. Fl. Seneg. Tent.* 295.—Air. trop.
demersum, Klein, ex Cham, in Linnaea, iv. (1829) 505 =tuberculatum.
demersnm, *Linn. Sp. PI.* 992.—Reg. temp, et trop.
demersum, Sieber, ex Cham, in Linnaea, iv. (182a) 504 =muricatum.
echinatum, *A. Gray, Man. Bot. U. St.* 401.—Am. bor.
gibbum, Laforet, ex Nym. Consp. 251 = demenum.
granulosum, Schur, Enum. PI. Transs. 218=submersum.
Haynaldianum, *Borb. in Maty. Növint. Lapoi,* viii. (1884) 20.—Hungar.
indicum, Willd. ex Cham, in Linnaea, iv. (1829) 504 —tuberculatum.
inerme, Dam. FL Belg. 165=sabmersam.
laeve, Lam. Fl. Fr. ii. 197 — submersum.
missionis, *Wall. Cat.* sab n. 7007.—Ind. or.
muricatam, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 604.—As. et Afr. trop.
mutieum, Cham. 1. c. 505 » submenum.
oxyacanthum, Cham. 1. c. 504 = tuberculatum.
oxyacanthum, Schur, Ennm. PI. Transs. 218 = muricatum.
pentacanthum, *Haynald, in Magy. Nővint. Lapok,* v. (1881) 109.—Hjmgar.
platyacanthum, Cham, in Linnaea, iv. (1829) 504 = muricatum.
polyacantkum, Schur, Enum. PI. Transs. 218=muricatum.
submersum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1409.—Europ.; As. trop.
triacanthum, Schur, Enum. PI. Transs. 218 = muricatum.
tricorne, Dum. Fl. Belg. 165=demersum.
tricuspidatum, Dum. 1. c. •= demersum.
tuberculatum, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 504.—Ind. or.
unicorne, Dum. Fl. Belg. 165 = demersum.
verrucosum, S. F. Gray, Nat. AIT. Brit. PI. ii. 664 = submersum.
verruculosum, Rich, in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 299 =submersum.
verticillatum, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 624 =demersum.
vulgare, Schleid. in Linnaea, xi. (1837) 540=muricatum, tuberculatum, submersum.

CERATOPSIS, LindL Gen. et Sp. Oroh. 888 (1840) = Epipogum, S. G. Gmel. (Orchid.).
rosea, Lindl. 1. c. 384=E. toseum.

CEBATOPYXIS, Hook. f. Ic. PI. t. 1126 (1872).
RUBIACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 106.
verbenacea, *Hook.f. 1. c.*—Cuba.

CEBATOSANTHEB, Burm. ex Adans. Fam. ii. 139 (1763); Juss. Gen. 396 (1789). *CUCURBITACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 833.

CEBATOSANTHES :—
corniculata, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 724 = tuberosa.
gracilis, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878); *Diagn. Cucurb.* fasc. ii. S3.—N. Granat.
Hilariana, *Cogn. 1. c.* 81.—Bras,
latiloba, *Cogn. I. c.* 33.—Venezuela,
multiloba, *Cogn. 1. c.* 29.—Bras,
tomentosa, *Cogn. I. c.*—Bras,
trifoliata, *Cogn. 1. c.* 34.—Bras,
tuberosa, *7. F. Gmel. Syst.* 102.—Ind. occ.
Warmingii, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878); *Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 80.—Bras.

CERATOSTANTHUS, Schur, in Verh. Sieb. Ver. Naturf. (1853) 46; et Enum. PI. Transs. 30 (1866) = Delphinium, Tourn. (Ranunculac).
Ajacis, Scbur, Enum. PI. Transs. 80 = D. Ajads.
Consolida, Schur, in Verh. Sieb. Ver. Naturf. (1858) 46 = D. Consolida.
divaricatus, Schur, 1. c. = D. divaricatum.
paniculatus, Schur, 1. c. = D. paniculatum.

CERATOSCHOENUS, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 296 = Bynohospora, Vahl (Cyperac.).
capitatus, Chapman, Fl.S. U. St. 529=R.cyperoides.
corniculatus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = R. laxa.
longirostris, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii (1836) 369=R. laxa.
macrophyllus, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vi. (1848) 282 - R. laxa.
macrostachys, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 369=R. macrostachya.

CERATOSEPALUM, OersL Rech. Fl. Am. Centr. 18. t. 17 (186S)=Paasiflora, Linn.
micranthum, Oerst. 1. c. 1.17 = P. ceratosepala.
parvifiorum, Mast, in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 665 = P. ceratosepala.

CERATOSPERMUM, Pers. Syn. ii. 651 (1807) = Eurotia, Adans. (Chenop.).
papposum, Pers. 1. c 562=E. ceiatoides.

CERATOSTACHYS, Blume, Bijdr. 644 (1825) =NyBBa, Linn. (Cornac).
arborea, Blume, 1. c. = N. sessiliflora.

CEBATOSTEMA, Juss. Gen. PI. 163 (1789). *VACCJNIACEAE,* Benth. *Be* Hook. f. ii. 570.
SIPHONANDRA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 24.
SIPHONOSTEMA, Griseb. in LechL Berb. Am. Austr. 68 (1857).
angulatum, Griff. Notul. iv. 802 = Agapetes angulata.
bifiorum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 6.110 = Eurygania biflora.
bnxifolium, *Gardn. &" Field, Sert. PI.* t. 7.—Bras,
calycinum, *Benth.* to* *Hook.f. Gen.* ii. 570.—Ecuador,
cordifolium, *Dun. in DC. Prod.* vii. 653.—Peruv.
costatum, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 670.—Peruv.
ellipticum, *Benth. &" Hook.f. 1. c.*—Am. austr.
emarginatum, *Ruit &" Pav. Fl. Per.* iv. t. 384.—Peruv.
grandiflorum, *Ruiz* to* *Pav. 1. c.* 883.—Peruv.
hirsutum, *Ruit V Pav. I.* c—Peruv.
lanceolatum, *Benth. PI. Hartw.* 142.—Peruv.
longiflorum, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 570.—Ecuador.
longiflorum, Lindl. ex Lem. in Fl. des Serret, Sér. I. iv. (1848) 846[b]=grandiflorum.
loTanthiflornm, *Benth. PI. Hartw.* 142.—Peruv.
miniatum, Griff. Notul. iv. 302 = Agapetes miniata.
myrtifolium, *Griseb. ex Benth. tf Hook.f. Gen.* ii. 570, nomen.—Am. austr.
nanum, Griff. Notul. iv. 308=Agapetes nana.
oblongifolium, *Dun. in DC. Prod.* vii. 663.—Peruv.
odoratissimum, Willd. ex Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) Sl = CavendishiaQuerema.
parvifolium, Benth. PI. Hartw. 220 = Eurygania parvifolia.
peruvianum, *Pers. Syn.* i. 480.—Peruv.
pubiflorum, *Wedd. Chlor. And.* ii. 181.—N. Granat.
rigidum, *Benth. PI. Hartw.* 220.—N. Granat.
Salapa, *Benth. I. c.* 141.—Peruv.
speciosum, *Andri, Illustr. Hortic.* xvii. (1870) t. 9.—Ecuador.

CEBATOBTEMA:
vacdnaceum, Roxb. Hort. Beng. 33; Fl. Ind. ii. 412-Vaccinium serratum.
variegatum, D. Don, ex Steud. Nom. ed. II. i. 332 = Agapetes variegata.
variegatum, Griff. Notul. iv. 802 = Agapetes grandiflora.
variegatum, Roxb. Hort. Beng. 83; PI. Ind. it 413= Agapetes macrantha.

CERATOBTIQMA, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Acad. Pétersb. ii. (1835) 129 (Enum. PI. Chin. Bor. 65).
PLUMBAGINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 628.
VALORADIA, Hochst in Flora, xxv. (1842) 239.
abyssinicum, *Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 288.—Afr. trop.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 481.—Reg. HimaL
plumbaginioides, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 55.—China.

CEBATOSTYIiIS, Blume, Bijdr. 304. t. 66 (1825;.
ORCHIDEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 617.
ACORIDIUM, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 131.
anceps, *Blume, Bijdr.* 306.—Java,
braccata, *Reichb. in Bonplandia,* v. (1857) 53.-Java.
capitate, *Zoll. (f Moritei, in Nat. en Geneesk.Arch. Nelrl. Indie,* i. (1844) 404.—Java.
Cepula, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 63.—Java.
Gigas, *Reichb. f. I. c*—Java,
gracilis, *Blume, Bijdr.* 306.—Java,
graminea, *Blume, 1. c.* 306.—Java,
latifolia, *Blume, I.* c—Java,
retisquama, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 53.—Ins. Philipp.
senilis, *Reichb. in Otia Bot. Hamb.* 64.—Ins. Philipp.
simplex, *Blume, Bijdr.* 306.—Java,
subulata, *Blume, I. c.* 806.—Java,
teres, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 89.—Reg. Himal.

CEBATOTHECA, Endl. in Linnaea, vii. (1882) 6. t. 1, 2. *PEDAUNEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1059.
SPORLEDERA, Bemh. in Linnaea, xvi. (1842) 41.
Kraussiana, *Bernh. in Linnaea,* xvi. (1842) 32.—Afr. austr.
melanosperma, *Hochst. ex Bernh. 1. c.*—Afr. trop.
sesamoides, *Endl. 1. c.* vii. (1882) 5. t. 1, 2.—Afr. trop.
triloba, *E. Mey. ex Bernh. 1. c.* xvi. (1842) 29.—Afr. austr.

CEBATOZAMIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 7.1.1, partim. *CYCADACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 446.
DIPSACOZAMIA, Lehm. in Lindl. Veg. Kingd. 225 (1847).
angustifolia, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 32, nomen.—Mexic.
boliviana, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. v. (1846) 9.—Bolivia.
brevifrons, Miq. in Tijdschr. Wis- en Nat. Wetens. i-(1848)41=mexicana.
fusco-viridis, D. Moore, in Proc. Roy. Dubl. Soc. (1878) 113=mexicana.
Ghiesbrechti, Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 299-Miqueliana.
intermedia, Miq. in Tijdschr. Wis- en Nat. Wetens. >• (1848) 40 = mexicana.
Karsteniana, Hort. Kew. ex Dyer, in Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 192=latifolia.
Katzeriana, *Regel, Gartenfi.* (1876) 261.—Hab. 1
Kuesteriana, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx-(1857) 1.187.—Mexic.
latifolia, *Hort. Belg. ex Miq. in Tijdschr. Wis- en Nat. Wetens.* i. (1848) 206.—Mexic.
longifolia, Miq. 1. c. 40 = mexicana.
mexicana, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. v. (1846; 8.—Mexic.
Miqueliana, *H. Wendl. Ind. Palm.* 68.—Mexic.
muricata, *Miq. in Linden, Illustr. Hortic.* xxviii-(1881) 32, nomen.—Mexic.
robusta, Miq. in Tijdschr. Wis- en Nat. Wetens. >• (1848) 42 = mexicana.

CERAUNIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 2 (1827) (Quid?).

CEBBEHA, Linn. Gen. ed. I. 62 (1787). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 699.
CASCABELA, Rafin. Sylva Tellur. 162 (1838).
ELCANA, Blanco, FL Filip. cd. II. 584 (1845).
MANGHAS, Burm. Thes. Zeyl. 150 (1787).
NEIOSPERMA, Rafin. Sylva Tellur. 162 (1888).
ODOLLAM, Adans. Fam. ii. 171 (1763).
ODOLLAMIA, Rafin. Sylva Tellnr. 162 (1838).
TANGHINIA, Thon. Gen. Nov. Madag. 10 (1806).
Ahouai, Linn. Sp. PI. 208-Thevetia Ahouai.
alliodora, Willd. ex Roem. & Schult Syst. iv. 798 = Thevetia cuneifolia.
batjanica, *Teijsm.* to[1] *Binn. Cat. Hort. Bog.* 385, nomen. —Malaya.
horboniea, Spreng. Syst i. 642 = Ochrosia borbonica.
chinensis, Spreng. 1. c. = Dissolaena verticillata.
runeifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 224-Thevetia cuneifolia.
dichotoma, Lodd. Bot Cab. 11516 ^Tabemaemontana dichotoma.
forsteri, Seem. Fl. Vit. 157 = C. Odollam.
fruticosa, Ker Gawl. in Bot. Reg. t. 391 -Kopsia fniticosa.
frnticosa, *Roxb. Hort. Beng.* 19{ *Fl. Ind.* i 691.—Burma.
glomerata, Zipp. *ex* Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. i. 158 — Pseudochrosia glomerata.
lactaria, Buch.-Ham. ex D. Dietr. Syn. FL i. 623 = C. Odollam.
laurifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 989 - C. Odollam.
Hnearifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 490 = Thevetia nereifolia.
Linnaei, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 233. -N. Caled.
naculata, Willd. Sp. PI. i. 1223-Ochrosia borbonica.
Manghas, Linn. Sp. PI. 208 - C. Odollam, et Tabernaemontana dichotoma.
nusculiformis, Lam. Encyc. i. 62 - Banksia musculiformis.
nereifolia, Zipp. in Bijdr. Nat. Wetensch. v. (1830) 178 -Poclocarpus Rumphia.
nitida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 225=Thevetia nitida.
obovata, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 798.—Hab. ?
obtusifblia, *Heurdt V Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 208.—N. Caled.
Odollam, *Gaertn. Fruct.* ii. 193.—Ind. or.; Malaya,
oppositifolia, *Lam. Encyc.* i. 62.—Ins. Molncc.
"ata, Cav. Ic. iii. 85. t. 270-Thevetia ovaU.
parviflora, Forst. f. Prod. 19-Ochrosia elliptica.
parviflora, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 90 = Ochrosia sandwicensis.
Parviflora, Wall. Cat. n. 1584 - Ochrosia borbonica.
Peruviana, Pers. Syn. i. 267-Thevetia nereifolia.
Platyspermos, Gaertn. Fruct. ii. 193. t. 124. f. 2-Ochrosia borbonica.
qnatemifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 19, nomen.—Sumatra.
xuutaris, Blume, Bijdr. 1033-oppositifolia.
Tanghin, *Hook. Bot. Mag.* t. 2968.—Madag.
Tanquin, Steud. Nom. ed. II. i. 382-praec.
Thevetia, Linn. Sp. PI. 209-Thevetia nereifolia.
thevetioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 223 = Thevetia Yccotli.
'nphylla, Rudge, PI. Gui. 31. t. 48 = Couma guianwisis.
tubiftora, Zipp. ex Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. i. 156 " Neuburgia tubifloia.
undulata, Andr. Bot. Rep. 1.130-Ochrosia borbonica.
•Ofnenifera, Steud. Nom. ed. II. i. 332=C. Tanghin.

CERBERA, Lour. Fl. Cochin. 186 (1790)=8oaevola, "nn. (Coodeniac.).
"ata, Sieber, ex DC. Prod. vii. 507-S. Lobelia.
"iutaris. Lour. Fl. Cochinch. 186=S. Koenigii J

CERBERIOPSIS, Vieill. ex Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caled. 187 (1874). *APOCYNACEAE.*
caducibra *Vieill. I. c*—N. Caled.

CERCESTIS, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vil. (1857) 414. *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 980.
Af «1«, *Schott, 1. c.*—Afr. trap.

CBHCIDIPHTLLiniI, Sieb. & Zucc. in Abh. Math. Acad. CISA, Mnench iv> '"• <M48) 288< *MAGNOLIA-*
i*Ponicum, *Sieb. tf Zucc. 1. c*—Japon.

CEBCIDIUM, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 183. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 570.
HOOPESIA, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.' 1861' (1862) 453, partim.
RHETINOPHLOEUM, Karst. Fl. Columb. ii. 25.1118 (1862?).
andicolum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 114.—Reg. Argent,
floridum, *Benth. ex A. Gray, PI. Wright,* i. 58.—Mexic.
floridum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. v. 860. t. 3 = Parkinsonia Torreyana.
spinosum, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 184.—Bras,
texanum, *A. Gray, PI. Wright,* i. 58.—Mexic.

CEBCIS, Linn. Sp. PI. 374, ed. I (1758). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 876.
SILIQUASTRUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 817 (1763).
californica, Torr. ex Benth. PI. Hartw. 861, nomen - occidentalis.
canadensis, *Linn. Sp. PI.* 874.—Am. bor.
chinensis, £«»*», JnJI/em. *Sav. Etr.Petersb.* ii. (1885) 95.—China.
florida, Salisb. Prod. 827-C. Siliquastrum.
Griffithii, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 688.—Afghan.
japonica, Siebold, ex Planch, in Fl. des Serres, Sir. I. viii. (1852-53) 269-chinensis.
occidentalis, *Torr. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1860) 177.—Texas.
reniformis, Engelm. ex A. Gray, 1. c. -occidentals.
siliquosa, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122 - C. Siliquastrum.
Siliquastrum, *Linn. Sp. PI.* 374.—Euiop. j Oriens.

CERCOCARPUS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 232. t. 559 (1828). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. 1.618.
betulaefolius, Nutt. ex Hook. Ic. PI. t. 322=pamfolius.
betuloides, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 427 = parvifolius.
breviflomS, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 54.—N. Mexic.
fothergilloides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 288.—Mexic.; Am. bor.
fothergilloides, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 198-parvifolius.
intricatus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 846.—Am. bor. occ.
ledifolius, *Nutt. in Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 427.—Am. bor. occ.
montanus, *Rafin. Ail. Journ.* 146.—Am. bor.
parvifolius, *Nutt. ex Hook. V Arn. Bot. Beech. Voy.* 887.—Calif.

CERCOCOMA, Wall. Cat. n. 1623 (1882) - Strophanthus, DC. (Apocynac).
macrantha, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 126.—Hab.?
singaporiana, Wall. Cat. n. 1628=S. brevicaudatus.

CERCOCOMA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 446 (1866) = Bhynohodia, Benth. (Apocynac).
Wallichii, Miq. 1. c. = R. Wallichii.

CERCODEA, Soland. ex Lam. Encyc. i. 682 (1783) - seq.

CERCODIA, Man. in Comm. Gotting. iii. (1780) 8.1.1 -HaloragiB, Forst.
alternifolia, A. Cunn. in Ann. Nat Hist. iH. (1839) 29
Fl. alata
erecta, Murr.'in Comm. Gotting. iii. (1780) 8. t. 1-H. alata.
incana, A. Cunn. in Ann. Nat Hist. iii. (1889) 30 = H. tetragyna.
racemosa, DC. Prod. iii. 67-H. racemoaa.

CEBCOPHOAA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874)801. *MYRTACEAE.*
anomala, *Miers, I. c.* 302.-Reg. Amazon.

CERCOSTYLOS, Less. Syn. Comp. 289 (1832) = CtaJIlardia, Fouger. (Compos.).
brasiliensis, Less. 1. c 240=G. megapotamica.
scabiosoides, Am. ex DC. Frod. vii. 298=G. megapotamica.
sesamoides, Steud. Nom. ed. II. i. 883, sphalm.-praec.

CERDANA, Ruiz & Pav. Prod. 37.16 (1794) = Cordia Linn. (Boragin.).
alliodora, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 47-Cordia Cerdana.
cujabensis, Manso, ex DC. Prod. ix. 473-Cordia cujabensis.

CEKDIA, Moc. & Sesse. ex DC. Prod. iii. 877 (1828). *CARYOPHYLLEAE,* Benth. & Hook. f. i. 153.
congestiflora, *Hems!. Diagn. PI. Nov.* 23.—Mexic.
glauca, *Hemsl. I. c.* 22.—Mexic.
purpurascens, *Moc. V Sesse, ex DC. Prod.* iii. 377.—Mexic.
virescens, *Moc. (f Sesse, I. c*—Mexic.

CEREFOLIUM, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 283 (1745)=Anthriscus, Hoffm. (Umbellif.).
nitidum, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iii. (1875) 686-A. nitida.
sativum, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 219 = A. Cerefolium.
sylvestre, Bess. 1. c. 218-A. Cerefolium.
trichospermum, Bess. Enum. PI. Volh. 44 = A. Cerefolium.

CEREOPSIS, Blanco, Fl. Filip. ed. II. Suppl. 591 (1845), sphalm. = Coreopsis, Linn. (Compos.).

CERESIA, Pers. Syn. i. 86 (1805)= Paspalum, Linn. (Gramin.).
aristata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 333 = Panlcum Thrasya.
elegans, Pers. Syn. i. 85-Pasp. membranaceum.
fluitans. Ell. Sketch, i. 109 = Pasp. repens.
gracilis, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 134 - Pasp. gracile.
membranacea, Beauv. Agrost. 9. t. 5. f. 4 = Pasp. membranaceum.
Wageneriana, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 133-Pasp. Wagenerianum.

CEBETTS, Mill. Gard. Diet ed. VIII (1768); Haw. Syn. PI. Succ. 178 (1812). *CACTEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 849.
CEPHALOCEREDS, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 142.
CEPHALOFHORUS, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. p. xii. (188h).
CLEISTOCACTUS, Lem. nlust. Hortic viii. (1861) Misc. 35.
ECHINOCEREUS, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 91 (1848).
ECHINONYCTANTHUS, Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp. 10 (1889).
ECHINOPSIS, Zucc in Abh. Akad. Mucnch, ii. (1837) 675.
PILOCEREUS, Lem. Cact Gen. Nov. et Sp. 6 (1839).
abnormis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 171 - peruvianus.
acifer, *Otto, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 189.—Hab. 7
acinaciformis, Steud. Nom. ed. II. i. 883 — cinerascens.
aciniformis, Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 101-cinerascens.
Ackermanni, Hort. Berol. ex Pfeiff. 1. c. 128 = Phyllocactus Ackermanni.
acromelas, Hort. Berol. Index Cact. 1883, ex PfeirT. Enum. Diagn. Cact. 84-crenulatus.
aeuleatus, *Hort. Berol. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 433, nomen.—Hab. t
acutangulus, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 107.—Mexic.
adustus, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 50.—N. Mexic.
Aethiops, Haw. in Phil. Mag. (1830) 109 - caerulescens.
affinis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 99,106 = variabilis, virens.
alacriportanus, *Hort. Monac. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 87-—Bras.
alatus, DC. Prod. iii. 470 = Rhipsalis pachyptera.
albIsetosus, *Ham. Suppl. PI. Succ.* 77.—Ins. S. Doming,
albispinns, *Salm-Dyck, Obs. Bot.* (1822) 5.—Am. austr.
ambiguus, *DC. Prod.* iii. 467.—Hab. 7
amblyogonns, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 284, nomen.—Am. austr.
amoenus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 540.—Mexic.

CEBETJS :—
anisacanthus, *DC. in Mém. Mus. Par.* xvii. (1828) 116.—Mexic
anizogonus, Hort. Angl. ex Salm-Dyck, Cact Hort. Dyck. ed. II. 52 = triangnlaris.
Antoini, Hort Vindob. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 114=nycticalus.
aquicaulensis, Hort. ex Ffeiff. 1. c. 90=geometrizans.
arequipensis, Meyen, Reise, ii. 41=peravianus.
armatus, *Otto, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 81.—Ins. S. Thorn.
Arrabidae, *Steud. Norn.* ed. II. i. 888.—Bras,
articulatus, *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 103.—Chili,
assurgens, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 116.—Cuba.
atacamensis, *Phil. Ft. Atac.* 23.—Chili,
auratus, *Labour, in Rev. Hortic.* Sir. IV. iv. (1855) 27.—Mexic.
aureus, *Salm-Dyck, ex DC. Prod.* iii. 465.—Hab. ?
azureus, *Parm. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 86.—Bras.
bacdferus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot i. 548=Rhipsalis Cassutha.
barbatus, Wendl. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 29 = floccosus.
Baumannii, *Lem. in Hortic. Univ.* (1844) 126, 315; *ex Lem. yard. Fleur.* i. (1851) t. 48.—Peruv. *1*
baxaniensis, *Karw. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 109.—Mexic.
Beneckei, *Ehrenb. in Bot. Zeit.* ii. (1844) 835.—Mexic.
Berlandieri, *Engelm. Cact. Mex. Bound.* 38. t. 58.—Texas.
Bertini, *E. Cels.ex Hirincq, L'Horticult. Franç.* (1863) 251.—Chili.
biformis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 114 •= radicans.
biformis, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 51 = Phyllocactus biformis.
bifrons, Haw. Suppl. PI. Succ. 76=coccineus.
Bigelovii, Engelm. in Padf. Rail. Rep. iv. t 4. f. 8 = mojavensis.
Blanclcii, *Poselg. in Otto bf Dietr. Allg. Gartens,* xxi. (1863) 184.—Mexic.
Boeckmanni, *Otto, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 217.—Mexic.
bonariensis, *Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 283.—Reg. Argent.
bonariensis, Hort. Berol. ex Foerst Handb. Cact. ed. I. 888 - alacriportanus.
Bonplandii, *Parm. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 108.—Bras,
bracbiatus, *Gal. ex Salm-Dyck,-Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 195.-Mexic.
bradypus, Steud. Norn. ed. II. i. 338 = senilis.
Brandii, Hort. Angl. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 49=variabilis.
brevispinulus, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 339 = nycticalus.
Bridgesii, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 208.—Bolivia.
caerulescens, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 335.—Bras,
caesius, *Salm-Dyck, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 89.—Hab. ?
caespitosus, *Engelm. (f A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 247.—Texas.
caiifornicus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 555 = Opuntia serpentina ?
callicoehe. Gal. ex Scheidw. in Bull. Acad. Brux. vi. I. (1889) 88 - Echinocactns myriostigma.
calvescens, DC. in Mém. Mus. Par. xvii. (1828) 116 = peruvianus.
candelabrius, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 109 =tenellns.
candelaris, Meyen, Reise, i. 447 = peruvianus.
candicans, *Gill, ex Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 835.—Chili.
caripensis, *DC. Prod.* iii. 467.—Mexic.
caudatus, Gill, ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 285 = Mammillaria caudata.
Cavendishii, *Monv. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 210.—Hab. ?
chalibaens, *Hort. Berol. ex Salm-Dyck, I. c.* 201.—Hab.?
chalybaeus, Otto, ex Walp. Rep. ii. 840-polychaetus.
chiloënsis. *DC. Prod.* iii. 465.—Ins. Chiloe.
chloranthus, *Engelm. Cact. Mex. Bound.* 29.—Texas.

CERETT8:—
chlorocarpus, *DC. Prod.* iii. 466.—Ecuador,
chrysomallus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 541.—Mexic.
dnerascens, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 11.—Mexic.
cirrhiferus, *Labour. Cact.* 311.—Mexic
clavarioides, Hon. Berol. ex Pfeiff. Enam. Diagn. Cact. 173 = Opuntia clavarioides.
clavatus, *Otto & Dietr. Allg. Gartens,* vi. (1838) 28.—Venezuela,
claviformis, *Regel V Klein, Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1860) 46.—Mexic.
coccineus, DC. Prod. iii. 469=setaceus.
coccineus, Engelm. in A. Gray, PI. Fendl. 51 = phoeniceus.
coccineus, *Salm-Dyck, ex Pfeiff. &* Otto, Cact.* i. t. 15.—Bras.
cognatus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 106 = variabilis.
colicochus, Booth, Cat. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 336=Echinocactus myriostigma.
colubrinus, *Otto, ex Foerst. 1. c.* 409; *ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 50, 215.—Hab. I
Columna, Walp. Rep. v. 818 = seq.
Columna-Trajani, *Karw. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 76.—Mexic.
columnaris, *Lodd. ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 61, nomen.—Hab. ?
CoMlliix., *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 236, nomen, et p. 590.
cometes," *Scheidw. in Otto (f Dietr. Allg. Gartena.* viii. (1840) 389.—Mexic.
compressus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 10.—Mexic.
concolor, Bigel. in Whipple, Exped. Add. p. ii= caespitosus.
conformis, *Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 203.—Mexic.
cooicus, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 97.—Mexic
conoideus, *Engelm.* b* *Bigel. in Padf. Rail. Rep.* iv. 36.—Am. bor. occ.
coquimbanus, Hort. ex DC. Prod. iii. 465=-chiloensis.
Coryne, *Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 205.—Hab. ?
cossyrensis. *Tin. ex Todaro, in Ind. Sen. Hort. Panorm.* (1857) 39.—Hab. ?
crenatus, Lindl. Bot. Reg. (1844) t 31 = Phyllocactus crenatus.
crenoides, *Engelm. Cact. Mex. Bound.* 31. t. 42.—Mexic.
crenulatus, *Salm-Dyck, Obs. Bot.* (1822) 6.—Am. austr.
Crimsonii, Pritz. Ic. Ind. 246, sphalm. = Smithii.
crispaius, Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 180 = Rhipsalis crispata.
crnciformis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 383.—Bras.
cubensis, Zuccar. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 94 = eriophorus.
cupulatus, Hort ex Pfeiff. 1. c. 97~marginatus.
Curtisi, *Otto, in Otto* to* *Dietr. Allg. Gartens,* i. (1833) 365.—N. Granat.
curvispinus, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 89 — peruvianus.
cylindricus, Haw. Syn. PI. Succ. 183 - Opuntia cylindrica.
dasyacanthus, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 50.—Texas.
decagonus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 85 = albispinns.
Decandollii, *Pfeiff. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 889.-Hab.?
decorus, *Lodd. ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 62, nomen.—Hab. ?
deficiens, *Otto V Dietr. Allg. Garten:* vi. (1888) 28.—Venezuela.
deflexispinus, Monv. Cat. (1846), ex Labour. Cact t 321 = dasyacanthus.
denndatus, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 73.—Bras.
Dejpei, Hort. Berol. ex Pfeiff. 1. c. 101 = dnerascens.
dichroacanthus, *Mart, ex Pfeiff. 1. c.* 76.—Mexic.
divaricatus, *DC. Prod.* iii. 466.—Ins. S. Doming,
divergens, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 95.—Ins. S. Doming.
Donkelaarii, *Salm-Dyck, in Otto V Dietr. Allg. Gartens,* xiii. (1845) 355.—Bras,
dubius, *Engelm. Cact. Mex. Bound.* 36.—Texas.

CEREUS :—
Duledevanti, *Lem. Illustr. Hortic.* v..(1858) *Misc.* 10.-Hab.?
Dumortieri, *Scheidw. in Bull. Acad. Brux.* vi. I. (1839) 88.—Reg. Argent
Dyckii, *Mart, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 87.—Mexic.
ebumeus, *Salm-Dyck, Obs. Bot.* (1822) 6.—Ins. Curaçao; Chili.
Ehrenbergii, *Pfeiff. in Otto V Dietr. Allg. Gartens.* viii. (1840) 282,-Mexic.
elegans, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 138 = Rhipsalis Mittleri.
elegans, *Lem. Illustr. Hortic.* v. (1858) *Misc.* 10.—Peruv.
Emoryi, *Engelm. in Am. Journ. Sc.* Ser. II. xiv. (1852) 338.—Calif.
Engelmanni, *Parry, ex Engelm. I. c*—Calif,
enneacanthus, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 50.—Texas,
erectus, *Karw. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 95.—Mexic.
ericomus, Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 47 = virens.
ericomus, *Reichb. f. in Terscheck. Suppl. Cact. Vers.* 3.—Bras,
erinaceus, *Haw. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 334.—Ind. oca
eriophorus, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 94.—Cuba,
euphorbioides, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 75.—Am. austr.
exerens, Link, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 99 - virens.
extensus, *Salm-Dyck, ex DC. Prod.* iii. 469.—Am. austr.
Eyriesii, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 72.—Reg. Argent.
farinosus, Haage, ex Salm-Dyck, in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xiii. (1845) 355 = Beneckei.
Fendleri, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 51.—N. Mexic.
Ferchecki, *Parm. ex Pfeiff. in Hort. Belg.* v. (1838) 66.—Reg. Argent.
fernambucensis, Lem. sphalm. vide pernambucensis.
ferox, *Haw. in Phil. Mag.* (1830) 109.—Bras.
fimbriatus, DC. Prod. iii. 464=grandispinus.
fimbriatus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 95 = divaricatus.
flagelliformis, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 12.—Am. austr.
flagriformis, *Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 111—Mexic.
flavescens, *Otto, ex Pfeiff. 1. c.* 79.—Hab. ?
flavicomus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 202.—Hab. 1
flavispinus, *Haw. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 834.—Am. austr.
flavispinus, *Salm-Dyck, Obs. Bot.* (1822) 5.—Am. calid.
floccosus, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 81.—Ins. S. Thomas,
fluminensis, *Miq. in Bull. Sc. Phys. Nat. Nierl* (1838) 48—Bras.
Forbesii, *Hort. Berol. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I-898; *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 206.—Hab.1
formosus, *Hort. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 404.—Reg. Argent
formosus, Monv. Cat. (18S4) = Schrankii.
foveolatus, *Hodge, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 77-—Hab. ?
fulgidus, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5856.—Hab.?
fulvibarbis, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 28=chiloënsis.
fulvispinosus, Haw. Syn. PI. Succ. 183 = Royeni.
fulvispinus, Salm-Dyck, Cact Hon. Dyck. ed. ft 46, sphalm. = praec.
Funkiix, *Hort. Monac. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 411.
Garambello, Haage, ex Foerst. 1. c. 488=geometrizans.
geminisetus, *Reichb. in Terscheck. Suppl. Cact. Vers.* 3.—Hab. ?
gemmatus, Otto, ex Pfeiff. in Otto *Sc* Dietr. Allg-Gartenz. iii. (1835) 314=turbinatus.
gemmatus, *Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 96-*—Mexic.
geometrizans, *Mart, ex Pfeiff. 1. c.* 90—Mexic.

CEREtJS:-
gibbosns, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1.171.—Jamaica,
giganteus, *Engelm. in Emory, Notes Mil. Reconnois.* 168.—Texas,
gilvus, *Salm-Dyck, in Otto b" Dietr. Allg. Gartent.* xiii. (1845) 855.—Hab. ?
Gladiator, Otto & Dietr. 1. c. vi. (1838) 84 = geometrizans.
gladiatus, Lem. Cact Aliq. Nov. Desc 28 = candicans.
Gladiger, Cels, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 47=resupinatus.
glaucescens, *Tweedie, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 284, nomen.—Reg. Argent.
glaucus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 89 = caesius, variabilis.
glaucus, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 835.—Bras.
gloriosus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 80 = Royeni.
gonacanthus, *Engelm. to" Bigel. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 33. t. 5. f. 2. 3.—N. Mexic.
gracilis, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 125.—Hab. ?
gracilis, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 8.—Ind. occ.
gracilis, Salm-Dyck, ex DC. Prod. iii. 468 = humilis.
grandiflorus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 11.—Ind. occ.
grandis, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 76.—Bras,
grandispinus, *Haw. in Phil. Mag.* (1830) 109.—Ind. occ.
Greggii, *Engelm. in Wislit. Rep. N. Mexico,* 102—Texas.
griseus, Haw. Syn. PI. Succ 182=ebumeus.
Haageanus, *Salm-Dyck, ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 881, nomen.—Hab. ?
hamatus, [Scheidw.] Hort. Belg. ex Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. v. (1887) 871=rostratus.
Hansii x, *Baumann, in Rev. Hortic. Sir.* II. i. (1842) •267.
Haworthii, *DC. Prod.* iii. 465.—Ind. occ.
heptagonus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6 ; *Haw. Syn. PI. Sttcc.* 178.—Am. austr.
hermentianus, *Monv. ex Lem. in Illustr. Hortic.* vi. (1859) *Misc.* 90.—Hab. ?
neteracanthus, *Tweedie, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 284.—Reg. Argent,
hexaedrus, *Engelm. b" Bigel. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 84. t. 6. f. 1.—N. Mexic.
hexagonus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 1; *Haw. Syn. PI. Succ.* 179.—Am. austr.
fexangularis, Hort, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 106 = variabilis.
Histrix, Salm-Dyck, ex DC. Prod. iii. 464.—Cf. Hystrix.
Hoffmannseggii, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed I. 292 = Echinocactus exsculptns.
Hookeri, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 125—Bras.
norizontalis, *Gill, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 286.—Chili.
norribarbis, *Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hon. Dyck.* ed. II. 205.—Hab.?
homdus, *Otto, ex Pfeiff. in Otto b" Dietr. Allg. Gartenz.* v. (1837) 370.—Venezuela.
Humboldtii, *DC. Prod.* iii. 467—Ecuador,
"umili^ *DC. 1. c.* 468.—Am. austr.
Wbridus, Otto, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1888) 72=speciosissimus.
"ypogaeus, *Weber, ex Regel, Gartenfl.* (1882) 165. t. 1086—Hab.?
"ystrix, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 171.—Ind. occ.
ttosigonus, *DC. Prod.* iii. 467.—Ecuador.
'"'tricatus, Haw. Rev. PL Succ. 70=Opuntia imbricata.
tfbricatus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 93 = "subrepandus.
\Hcrustans, Steud. Nom. ed. II. i. 334=sraj.
'icrustatus, Hort. Berol. ex Pfeiff. Euum. Diagn. <-act. 97= marginatus.
"'jurvispinus, Hort. Darmst. ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1836) 244=leucanthus.
'lermis, *Otto, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 116.—Venezuela.
'"ermis, Scheidw. in Bull. Acad. Brux. vi. (1889) 88 = Echinocactus myriostigma.
lumularis, Hems<l. Bot. Voy. Challenger, i. II. 16.—Mons S. Mich.

CEREUS:—
intricatus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 194.—Hab.?
inversus, *Hort. Berol. ex Salm-Dyck, I. c.* 219, nomen.—Hab. ?
inadians, *Lem. Must. Hortic.* xi. (1864) *Misc.* 74.—Cuba.
Jamacaru, Hort. Vindob. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 81-variabilis.
Jamacaru, *DC. Prod.* iii. 467.—Bras.
janthothele, Monv. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 41=Rhipsalis cereiformis.
jasmineus, Hort. Darmst ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 72=turbinatus.
*Jenkinsonix,*Sweet, Hort. Brit. ed. II. 287, nomen.
jubatus, Salm-Dyck, ex Foerst. Handb. Cact ed. I. 357=cometes.
Kageneckii, Gmel. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 77 = multangularis.
Karstenii, Hort. Angl. ex Salm-Dyck, Cact Hort. Dyck. ed. II. 207 = lepidotus.
Karstenii, *Salm-Dyck, Caet. Hort. Dyck.* ed. II. 218.—N. Granat
Knightii, Parment. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 189 = Rhipsalis Knightii.
Kunthianus, *Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 217.—Hab.?
laetevirens, Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 99=lividus.
laetevirens, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 386 • variabilis.
laetus, *DC. Prod.* iii. 466.—Ecuador.
laetus, Salm-Dyck, Hort Dyck. 336=formosus.
laevigatus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 204.—Hab. ?
lagenaeformis, *C. F. Foerst. in Hamb. Gartent.* xvii. (1861) 164.—Perav.
lamprochlorns, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 80.—Hab.?
lanatus, *DC. Prod.* iii. 464.—Ecuador.
Lanceanus, *Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 285, nomen.—Hab. ?
Landbecki, *Phil, ex Regel, Gartenfl.* (1876) 162. t. 832.—Reg. Argent
lanuginosus, Haw. Syn. PI. Succ. 182-repandus.
lanuginosus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 3.—Am. trop.
lateribarbatus, Hort. ex Lem. in Rev. Hortic. (1862) 427=C. Columna-Trajani.
latifrons, Zucc. in Denkschr. Akad. Muench. ii. (1837) 785 = Phylloeactus latifrons.
Lecchii, *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 78.—Hab. ?
Leeanus, *Hook. Bot. Mag.* t 4417.—Mexic.
Lekmanni, Hoit ex Foerst Handb. Cact. ed. I. 245 = Mammillaria Lehmanni.
leiocarpus, *Bello, in Anal. Soe. Esp. Hist. Nat.* x. (It 81) 276.—Porto Rico.
Lemairii, *Hook. Bot. Mag.* t. 4814.—Hab. ?
lepidotus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 207.—Venezuela.
leptacanthus, DC. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 101 = pentalophos.
leptophis, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 117—Mexic.
leucanthus, *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 71.—Chili.
limensis, Lodd. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 875 = flavescens.
limensis, *Salm-Dyck, in Otto V Dietr. Allg. Gartent.* xiii. (1846) 368.—Bolivia.
Linkii, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 48 = Echinocactus Linkii.
Linnaei, *C. F. Foerst. in Hamb. Gartent.* xvii. (1861) 165.—Mexic.
lividus, *Pfeiff. in Otto tf Dietr. Allg. Gartent.* (1885) 380.—Am. austr.
longifolius, *Kant, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 286, nomen.—Mexic.
longipedunculatus, *Hort. Berol. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 433, nomen.—Hab. ?
longisetus, *Engelm. Cact. Mex. Bound.* 82. t 46.—Texas,
longispimw, *Salm-Dyck, ex Otto V Dietr. Allg. Gartent.* xiii. (1846) 864.—Bolivia,
lumbricoides, *Lem. Caet. Gen. Nov. et Sp.* 60.—Bras,
lutescens, *Salm-Dyck, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 84.—Hab.!
MacDonaldiae, *Hook. Bot. Mag.* t. 4707.—Honduras.

CEREUS:—
macrogonus, *Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 203.—Hab. ?
Maelenii, *Pfeiff. in Ottd V Dietr. Allg. Gartent.* v. (1887) 879.-Mexic.
magnus, *Haw. in Phil. Mag.* (1830) 109.—Ins. S. Doming.
Mallisoni, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 111 = Smithii.
marginatus, *DC. in M(m. Mus. Par.* xvii. (1828) 116.—Mexic.
marginatus, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 340 = Hookeri.
Mariculi, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 116 => humilis.
Martianns, *Zucc. ex Pfeiff. I. c.* 110.—Mexic.
Mendory, Hort. ex Pfeiff. 1. c 85 = caerulescens.
meonacanthus, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. i. 834 = Echinocactus meonacanthus.
mexicanus, *Lem. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 430.—Mexic.
micracanthus, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 116.—Mexic.
militaris, *Audot, in Rev. Hortic. Sir.* II. iv. (1845-46) 807.—Mexic.
Mirbelii, Hort. Belg. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 97 =marginatus.
mohavensis, S. Wats. Bibliog. Ind. Fl. Am. Bor. 898 = seq.
mnjavensis, *Engelm. (f Bigel. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 33.—Am. bor. occ.
mollis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 83 = strictus.
moniliformis, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 60.—Ins. S. Doming.
monoclonus, DC. Prod. iii. 464 = peruvianus.
monstrosus, Steud. Nom. ed. II. i. 334 = peruvianus.
montevidensis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 65 = Echinocactus exsculptus.
Montetumae, Hort. ex Pfeiff. 1. *e.* 91=candicans.
Moritzianus, *Otto, ex Pfeiff. I. c.* 84.—Bras,
multangularis, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 75.—Am. austr.
multiplex, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 70.—Bras.
Myosurus, Salm-Dyck, in DC. Prod. iii. 469 - Rhipsalis Myosurus.
myriocaulon, Mart, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 115 ••humilis.
myriophyllus, Gill, ex Otto, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 366 = strigosus.
nanus, *DC. Prod.* iii. 470.—Ecuador.
Napoleonis, *R. Grah. in Bot. Mag.* t. 8458.—Ind. occ.
niger, *Salm-Dyck, Obs. Bot.* (1822) 4.—Am. anstr.
nigricans, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 83 =• strictus.
nigricans, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 57.—Hab. *1*
nigripilU, *Phil. Fl. Atac.* 23.—Chili.
nitens, *Salm-Dyck, ex Otto V Dietr. Allg. Garten*. xiii. (1845) 354.—Bolivia,
nitidus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 211.—Venezuela.
nobilis, Haw. Syn. PI. Succ. 179 = Haworthii.
nycticalus, *Link, in Verh. Preuss. Ver. Gartenb.* x. (1884) 373. t. 4.—Mexic.
nyriocaulon, Sweet, Hort. Brit ed. III. 285, sphalm. =. *myriocaulon.*
obtusus, Haw. Rev. PI. Succ. 70 = variabilis.
obtusus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 114 = nycticalus.
Ocamponis, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 220.—Mexic; N. Granat
ochracanthus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 78 " multangularis.
octogonus, Hort. ex Otto, ia Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1883) S65=albispinus, Curtisii.
Olfersii, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 385.—Bras,
olivaceus, *Lem. in Rev. Hortic. Sit.* IV. viii. (1859) 643.—Ind. occ.
Ottonis, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 47, sphalm. - Echinocactus Ottonis.
ovatus, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 195; *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 102.—Chili,
oxygonus, *Otto, in Otto V Dietr. Allg. Gartent.* i. (1833) 365.—Bras.
oxygonus, Salm-Dyck, ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 893 = euphorbioides.
oxypetalus, DC. Prod. iii. 470 = Phyllocactus latifrons.

CEHEUS:—

oxypetalus, Hort. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 37, nomen = Phyllocactus marginatus.
paniculatus, *DC. Prod.* iii. 466.—IDS. S. Doming.
panoplaeatus, Cels, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 44 = pycnacanthus.
paradoxus, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 385 - Opnntia brasiliensis.
parasiticus, Haw. ex Stead. 1. a = Rhipsalis fasciculata.
parvisetus, ***Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.*** 79.—Bras,
paucispinns, ***Engelm. V Bigel. in Pacif. Sail. Rep.*** iv. 34, 36; *et in Proc. Am. Acad.* iii. (1857) 285.—Texas.
Paxtonianus, ***Monv. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.*** ed. II. 211.-Hab. ?
pectinatus, Engelm. in A. Gray, PI. Fendl. 50 = caespitosns.
pectiniferus. Labour. Monog. Cact. 820 = caespitosns.
pellncidus, ***Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.*** 108.—Cuba.
pentagonus, *haw. Syn. PL Succ.* 180.—Am. austr.
pentagonus, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 389 = peruvianus.
pentalophus, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 117. —Mexic.
pentapterus, ***Otto, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.*** ed. II. 220.—N. Granat.
Pepinianus, ***Lem. ex Salm-Dyck, in Otto &" Dietr. Allg.*** *Garten*,* xiii. (1845) 354.—Bolivia.
pernambucensis, Lem. NOT. Cact. Gen. et Sp. 58 (err. typ. *fernamiucensis)* = variabilis.
Perrotteti, Hort ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 98 = lividus.
peruvianus, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 392 - ebumeus.
peruvianus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4; *Haw. Syn. PI. Succ.* 179.—Am. austr.
Pfeifferi. ***Farm, ex Pfeiff. in Otto b* Dietr. Allg.*** *Gartens,* v. (1837) 370.—Reg. Argent.
Philippi, ***Regel V Schmidt, Gartenfi.*** **(1882) 98.—** Chili,
phoeniceus, ***Engelm. & Bigel. in Pacif. Rail. Rep.*** **iv.** 34. t. 4.—Am. bor. occ.
phyllanthoides, DC. Prod. iii. 469 = Phyllocactus phyllanthoides.
Phllyanthus, DC. 4. c-Phyllocactus Phyllanthus.
Pitajaya, DC. 1. c. 466= variabilis.
platycarpus, Zucc. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 452 = Rhipsalis platycarpa.
platygonus, ***Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.*** ed. II. 199.—Hab. ?
polyacanthus, ***Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.*** **51.—** Texas,
polyachaetus, ***Reichb. in Tench. Suppl. Cact. Vert.*** **4.** —Hab. ?
polvgonatus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 91 = cburneus.
polygonus, *DC. Prod.* iii. 466.—IDS. S. Doming,
polylophus, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 115. —Mexic.
polymorphic, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 195.—Chili.
polymorphus, Hort. Monac. ex Foerst Handb. Cact. ed. I. 472 = articulatus.
polyptychus, ***Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.*** **56.— Hab. ?**
Pottsii, Salm-Dyck, Cact. Hort Dyck. ed. II. 208 = Greggii.
Princeps, ***Hort. Wuer*b. ex Pfeiff. Enum. Diagn.*** *Cact.* 108.—Am. bor. occ.
Pringlei, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 368. —Am. bor. occ
prismaticus, Haw. ex Steud. Norn. ed. II. i. 335 = pentagonus.
prismaticus, *Salm-Dyck, in DC. Prod.* iii. 469.—Am. austr.
prismatiformis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 106 = variabilis.
procumbens, ***Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.*** **50.—** Mexic.
procumbens, ***A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.*** **vi.** (1850) 203.—Texas.
propinquus, Salm-Dyck, ex Otto, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 866 = pentalophus.
proteiformis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 835.—Hab. T
pruinosus, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 47 = Echinocactus pruiosus.

CERETJS:—

pterandrus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 544, sphalm.=seq.
pteranthus, Link, ex Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ii. (1834) 209 = nycticalus.
pterocaulis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 140 = Rhipsalis paradoxa.
pterogonus, ***Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.*** **69.—N.** Granat
pugioniferus, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 30 - gcometrizans, Gladiator.
pulchellus, ***Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.*** **74.—Mexic.**
pyenacanthus, ***Salm-Dyci, in Otto tf Dietr. Allg.*** *Garten*,* xiii. (1845) 355.—Bolivia.
quadrangularis, Haw. Syn. PI. Succ. 181 = caripensis.
quadrangularis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 106 = variabilis.
quadrangulispinus, ***Lem. ex Ehrenb. in Linnaea,*** **xix.** (1847) 368.—Mexic.
quadricostatus, ***Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.*** x. (1881) 276.—Porto Rica
Quintero, Hort. Gotting. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 86 = chilensis,
Quisco, *C. Gay, Fl. Chil.* iii. 19.—Chili,
radicans, *DC. Prod.* iii. 468.—Am. austr.
ramosus, Karw. in Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 108 = baxaniensis.
ramulosus, Salm-Dyck, Hort Dyck. 840 = Rhipsalis ramulosa.
recurvus, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. i. 885 = Echinocactus recurvus.
reductus, DC. Prod. iii. 463=Echinocactus gibbosus.
reflexus, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 335 =virens.
regalis, *Haw. ex Spreng. Syst.* ii. 496.—Am. austr.
Reichenbachianus, Labour. Monog. Cact. S18=caespitosus.
repandus, Haw. Syn. PI. Succ. 183=gracilis.
repandus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Ind. occ.
reptans, Haw. ex Steud. Nom. ed. II. i. 885 — pentagonus.
reptans, Salm-Dyck, ex DC. Prod. iii. 468 - radicans.
resupinatus, ***Salm-Dyck, in Otto (f Dietr. Allg.*** *Garten*,* viii. (1840) 10.—Hab.!
retroflexus, Hort. ex Pfeiff. in Otto & Dietr. 1. c. iii. (1885) S80 = virens.
rhombeus, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 841 = Rhipsalis rhombea.
rigidUpinus, *Lem. Hort. Univ.* (1840) 228. t. 1.—Mexic.
rigidispinus, ***Muehlenp. in Otto if Dietr. Allg. Gartenz.*** xvi. (1848) 12.—Mexic.
rigidus, Lem. ex Salm-Dyck, Cat.-Hort. Dyck. ed. I. 34; ed. II. 52=humilis.
Roemeri, ***Engelm. in A. Gray, PL Fendl.*** **60.—** Texas.
Roemeri, ***Muehlenp. in Otto V Dietr. Allg. Garten*.*** xvi. (1848)19.—Hab.?
Roetteri, *Engelm. Cact. Mex. Bound.* 38. t. 41. f. 3-5. —Am. bor. occ.
roridus, Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 64. -Echinocactus pruinosus.
rosaceus, Hort. ex Pfeiff. 1. c. 114=nycticalns.
rostratus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 29.—Ins. Antigua.
Royeni, Haw. Syn. PI. Succ. 182^-lanuginosus.
Royeni, Hook. Bot. Mag. t. 3125 = Curtisi.
Royeni, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 7.—Am. austr.
rufispinus, ***Engelm. in. A. Gray, PI. Fendl.*** **60.—N.** Mexic.
Russelianus, *Forb. Hort. Tour Germ.* 154, nomen.— Guiana.
Russellianus, Gardn. ex Hook. Bot. Mag. t. 3717 = Epiphyllum Russellianum.
Russellianus, ***Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort.*** *Dyck.* ed. II. 201.—Laguayra.
Salm-Dyckianus, ***Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.*** **i. 645.** —Mexic.
Salm-Dyckianus, Hort. Vindob. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 31; ed. II. 49 = variabilis.
scandens, *Salm-Dyck, 1. c.* ed. II. 219.—Guiana.
Scheerii, *Salm-Dyck, I. c.* 190.—Mexic.
Schelhasii, ***Pfeiff. in Otto (f Dietr. Allg. Gartenz.*** **iii.** (1836)314.—Hab.?
Schomburgkii, ***Hort. Berol. ex Salm-Dyci, Cact. Hort.*** *Dyck.* ed. II. 219.—Guiana?

CEREUS:—

Schottii, *Engelm. in Proc. Am. Acad.* iii. (1857) 288. —Am. bor. occ.
Schrankii, ***Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.*** **122.—** Mexic.
Scopa, Salm-Dyck, ex DC. Prod. iii. 464 - Echinocactus Scopa.
Siedelii, ***Lehm. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.*** **ed.** II. 200.—Hab.»
senilis, *Salm-Dyci, in DC. Prod.* iii. 464.—Am. austr.
sepium, *DC. I. c.* 467.—Ecuador.
sericeus, Hort ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 173 = Opuntia clavarioides.
serpens, *DC. Prod.* iii. 470.—Ecuador,
serpentinns, *DC. I. c.* 467.—Mexic.
serruliflorus, *Haw. in Phil. Mag.* (1830) 109.—Ind. occ.
setaceus, *Salm-Dyci, in DC. Prod.* iii. 469.—Bras,
setiger, *Haw. in Phil. Mag.* (1830) 109.—Bras,
similis, ***Meinsh. in C. Koch (f Fint. Wochenschr.*** **i.** (1858) 29.—Mexic.
Smithianus x, Sweet, Hort. Brit ed. II. 287, nomen = seq.?
Smithii x, ***Hort. Angl. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.*** **111.**
Spachianus, *Lem. Hort. Univ.* i. 226.—Mexic.
speciosissimus, *DC. Prod.* iii. 468.—Mexic.
speciosus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 172 = variabilis ?
spinibarbis, ***Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.*** 88.—Chili,
spinosissimus, ***C. F. Foerst. in Hamb. Garten*,*** **xvii.** (1861) 165.—Peruv.
spinulosus; *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 117. —Mexic.
splendens, ***Hort. Angl. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. (A.*** 11.214.—Hab.?
splendidus, *Paxt. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 336 (= Epiphyllisp.?).—Mexic.
squamulosus, Salm-Dyck, in DC. Prod. iii. 469 = Rhipsalis Mittleri.
stellatus, ***Pfeiff. in Otto V Dietr. Allg. Garten*,*** **iv.** (1836) 258.—Mexic.
stramineus, ***Engelm. Cact. Mex. Bound.*** **85. t. 46.—** Texas.
strictus, *DC. Prod.* iii. 465.—Am. austr.
strigosus, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 334.—Chili,
subinermis, ***Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.*** **i. 646.—** Mexic.
sublanatus, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 837.—Hab. ?
subrepandus, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 78.—Ind. occ.
subrepandus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 86, 94-chilensis, eriophorus.
subsquamatus, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 880 = extensus.
subtortuosus, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 409 =colubrinus.
subuliferus, ***Salm-Dyck, in Otto b" Dietr. Allg-*** *Garten*,* xiii. (1845) 364.—Mexic.
superbus, *Ehrenb. in Bot. Zeit.* iv. (1846) 324.— Mexic.
Swartzii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 801.—Ind. occ.
syringacanthus, ***Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.*** **103.—** Chili.
tenellus, ***Salm-Dyci, ex Pfeiff. 1. c.*** **109.—Bras.**
tenuis, DC. Prod. iii. 469 = Rhipsalis Myosurus.
ttnuis, ***Pfeiff. in Otto b" Dietr. Allg. Garten*,*** **via-** (1840) 407.—Am. austr.
tenuispinus, Haw. in Phil. Mag. (1827) 125 = Rhipsalis Myosurus.
tenuissimus, ***G. Don, in Sweet, Hort. Brit.*** **ed. Ill-** 286, nomen.—Hab.?
tephracanthus, ***Link b[1] Otto, ex Steud. Nom.*** **«** II. i. 836.—Am. austr.
Terscheckii, ***Parm. ex Pfeiff. in Otto b" Dietr. Allg-*** *Gartenz.* v. (1887) 870.—Reg. Argent,
tetrtcanthns, *Labour, in Rev. Hortie.* Sér. IV. (1855) 25.—Bolivia,
tetragonus, *Mill. Gard. Diet.* ed. V1H. n. 2; *Horn-Syn. PL Succ.* 180.—Am. austr.
thalassinus, *Otto* b* *Dietr. Allg. Gartent.* vi. (1838) 34. —Venezuela.
Thurberi, ***Engelm. in Am. Journ. Sc.*** **Ser. II.** (1854) 234.—N. Mexic.
tihphorus, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. (1835) 380 = virens.
Tinei, ***Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm.*** **(1857)** *—Cf. in Linnaea,* xxix. (1857-58) 739.—Bras.?

CEREUS:—

Tonelianus, *Lem.Illustr. Hortic.* ii. (1855) *Misc.* 63.—Mexic.
tortuosus, *Forbes, ex Otto (f Dietr. Allg. Gartent.* vi. (1838) 85.—Reg. Argent.
triangularis. Haw. Syn. PI. Succ. 180=compressus.
triangularis, *Mill. Gard. Diet,* ed. VIII. n. 9.—Hab. J
trichacanthus, Hort. Berol. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 46 =lutescens.
triglochidiatus, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 51.—N. Mexic.
trigonus, *Haw. Syn. PI. Succ.* 181.—Ind. occ.
trigonus, Hort. ex Ffeiff. Ennm. Diagn. Cact. 106 = vaiiabilis.
trinitatensis, *Lem. tf Herm. in Rev. Hortic. Sir.* IV. viii. (1850) 642.—Ind. occ
tripteris, *Salm-Dyck, in DC. Prod.* iii. 468.—Am. austr.
triqueter, *Haw. Syn. PI. Succ.* 181.—Am. austr.
truncatus, Sweet, Hort Brit. ed. 1.172-Epiphyllom Altensteinii.
tnberosus, *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 102.—Mexic.
tuberosns, *Poselg. in Otto if Dietr. Allg. Garten*,* xxi. (1858) 135.—Texas.
tubiflorus, Kndl. in Harting. Parad. Vindob. t. 71 *(=Echinopsis Zuccarint).*—Hab. ?
tubiflorus, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 71 = Echinocactus tubifloras.
tunicatus, Pfeiff. 1. c 178 in syn.=Opnntia tunicata.
tnrbinatus, *Pfeiff. in Otto tf Dietr. Allg. Gartem.* iii. (1885)814.—Hab.?
Tweediei, *Hook. Bot. Mag.* t. 4498.—Reg. Argent.
undatus, Haw. in Phil. Mag. (1830) 110=- Napoleonis.
undatus, *Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 94._Hab.?
nndiflorns, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 59.—Cuba.
undulatus, Hort. Berol. ex D. Dietr. Syn. PI. iii. 104 =- undatus.
undulatus, Hort. Dresd. ex Pfeiff. Ennm. Diagn. Cact. 107=acutanguIus.
undulosus, DC. Prod. iii. 467 - variabilis.
nreacanthus, *C. F. f'oerst. in Hatnb. Gartem.* xvii. (1861) 166.—Peruv.
validus, *Haw. in Phil. Mag.* x. (1831) 414.—Am. austr.
variabilis, Engelm. Cact. Mex. Bound. 40=Princeps.
variabilis, *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 105.—Am. austr.
Vasmerii, Young, Fl. Texas, 276=Princeps.
violaceus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 57.—Hab. 1
virens, *DC. in Mém. Mus. Par.* xvii. (1828) 116.—Mexico,
viridiflorns, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 60.—Texas,
xanthochaetus, *Reichb. in Tersch. Suppl. Cact. Verz.* 4—Hab. ?

CERINTHE, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. (1735). *BORAGINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 864.
CERANTHE, Opis, Seznam, 27 (1852).
acuta, Moench, Meth. 520 = major.
"Ipina, *Kit. ex Schult. Oestr. Fl.* ed. II. i. 853.—Europ.; As. Min.
alpina, Vis. Fl. Dalmar. Snppl. (1872) 94; fide Nym. Consp. 513=longiflora.
"Perta, [Clairv.] Man. Herb. 63=major.
«#«•«, Roth, Catalect. i. 83 = major.
"tropurpurea, Vis. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 4 = retorta.
o-uriculata, Tenore, Ind. Sem. Hort, Neap. (1880) 10 =minor.
cilicica, Kotschy, ex Boiss. PI. Or. Nov. dec. ii. 7 - minor.
deiostoma, Boiss. *Sc* Sprun. Diagn. Ser. I. iv. 44 = minor.
connivens, [Clairv.] Man. Herb. 54 •= minor.
echioides. Linn. Sp. PI. 137=Onosma echioides.
gtabra. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2; DC. Fl. Fr. »i. 619 = alpina.
g'abra, Scop, ex Nym. Consp. 513=minor.
elauca, Moench, Meth. 520=major.
Gymnandra, Gasp, in Rendic. Ace. Sc. Nap. i. (l!>68) 72=major.
hirsuta, *Wettstein,exStapf,in Denksckr. Acad. Wien,* 1-(1885) 85.-LycJa.
*lo*neiflora, *Viv. App. Alt. ad Fl. Cors.* (1830) 3 .- italia.

CERINTHE :—

lurida, Salisb. Prod. 116 = minor.
macrophylla, Boiss. ex Bows. PI. Or. Nov. dec. ii. 7. =minor.
maculata, All. Fl. Pedem. i. 178= alpina.
maculata, Linn. Sp. PI. 137=minor,
major, *Linn. 1. c.* 136.—Europ.; As. Min.
minor, *Linn. 1. c.* 137.—Europ.; As. Min.; Persia.
orientalis, Linn. Cent. i. 7»Onosma orientals.
pseudo aspera, Schur, Enum. PI. Transs. 470 = minor.
purpurea, Vis. in Flora, xii. (1829) Erg. 8=retorta.
quinquemaculata, Wahlenb Fl. Carpat 61=alpina.
retorta, *Sibth. tf Sm. Fl. Grace,* ii. 60. t. 171—Graecia.
Smithiae, Kern, ex Nym. Consp. 618=longiflora.
strigosa, Keichb. Fl. Germ. Excurs. 840-major.
suevica, Martens, Reise Vened. i. 44; ex Keichb. Ic. Crit. v. 40. t. 658 = alpina,
tenuiflora, *Bertol. Fl. Ital.* ii. 825=longiflora.
versicolor, Hall, ex Steud. Norn. ed. II. i. i. 886 = major.

CERINTHOPSIS, Kotschy, ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 849 (1876) = 8olenanthuB, Ledeb. (Boragin.).
kurdica, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, iv. !i71 = S. cerinthioides.

CERIONANTHUS, Schott, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 43 (1818) = Cephalarla, Schrad. (Dipsac).
alpinus, Schott, ex Roem. & Schult. 1. c-Ceph. alpina.
corniculatus, Schott, ex Roem. *Sc* Schult. 1. c. 49 = Ceph. corniculata.
cretaceus, Schott, ex Roem. *Sc* Schult. 1. c. 81-Ceph. corniculata.
laevigatus, Schott, ex Roem. *Sc* Schult. 1. c 49 = Ceph. cornicnlata.
leucanthus, Schott, ex Roem. & Schult. L c. 47 = Ceph. leucantha.
syriacus, Schott, ex Roem. & Schult. 1. c. 46=Ceph. syriaca.
tataricus, Schott, ex Roem. *Sc* Schult. 1. c. 61 = Ceph. tatarica.
Vaillantii, Schott, ex Roem. *Sc* Schult. 1. c. 46-Ceph. syriaca.

CERIOPS, Arn. in Ann. Nat. Hist. i. (1838) 368. *RHIZOPHOREAE,* Benth. & Hook. f. i. 679.
Boviniana, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. vi. (1856) 112.—Madag.
Candolleana, *Arn. in Ann. Nat. Hist.* i. (1888) 864.—Reg. trop.
Candolleana, Naves, in Blanco, Fl. Filip. ed. I'l. t. 415 = Roxburghiana.
Forsteniana, *Blume, Mus. Bot. Lugd.-Bat. i.* 148,-Ins. Molucc.
globulifera, Bor. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. vi. (1856) 112 = Boviniana.
lucida, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 826.—Malaya.
mossambicensis, Klot*sch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. i. 71 = Candolleana.
pauciflora, *Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* ii. (1848) 218.—Polynes.
Roxburghiana, *Arn. in Ann. Nat. Hist.* i. ;183S) 864.—Reg. trop.
Zippeliana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 143.—N. Guinea.

CERISCUS, Gaertn. Fruct. i. t. 28 (1788) - Randia, Linn. (Rubiac.).
malabaricus, Gaertn. 1. C.=-R. dumetorum.

CERISCUS, Nees, in Flora, viii. (1825) 116-Tarenna, Gaertn. (Rubiac.).
fragrans, Nees, 1. c. (= *Webera fragrans).*—Ind. or. J Malaya.

CERIUM, Lour. Fl. Cochinch. 185. *INC. SED.*
spicatum, *Lour. I. c.* 136.—China.

CEROCARPUS, Hassk. in Flora, xxv. (1842) Bdbl. ii. 86=Eugenia, Linn. (Myrtac).
aqueus, Hassk. 1. t - E . aquea.
bifaria, Colebr. in Wall. Cat. n. 3606=E. Walhchii.

CEROCHILUS, Lindl. in Gard. Chron. (1854) 87 = Hetaeria, Blume (Orchid.).
rubens, Lindl. 1. c.- H. rebens.

CEROFEOIA, Linn. Gen. ed. I. 65 (173-7). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 779.
APEGIA, Neck. Elem. i. 251 (1790).
NlOTA, Adans. Faru. ii. 172 (1763).
SYSTEPHA, Burch. Trav. i. 546 (1822).
abyssinica, *Decne. in DC. Prod.* viii. 644—Abyss.
acuminata, Dalz. *Sc* Gibs. Bomb. Fi. 117 = tuberosa.
acumuiata, *Roxb. PI. Corom.* i. 12. t. 8.—Ind. or.
affinis, *Vatke, in Linnaea,* xl. (1876) 218—Abyss,
africana, *R. Br. in Bot. Reg.* t. 626.—Afr. anstr.
albiflora, *Hook.f. Fl. Brit: Ind. iv.* 75.-Ind. or.
ampliata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 194.—Air. austr.
angustifolia, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 259 =attenuata.
angustifolia, Vahl, ex Decne. in DC. Prod. viii. 503 ^ becamone saligna.
angustifolia, *Wight, Contrib.* 31.—Reg. Himal.
apkylla, Haw. Syn. PI. Succ. 13 = dichotoma.
arcta, *Nimmo, in J. Grah. Cat. Bomb. PI.* 118, nomen.—Ind. or.
aristolochioides, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. ix. (1838) 268.—Afr. trop.
Arnottiana, *Wight, Contrib.* 32.—Ind. or.; Burma,
attenuate, *Hook. Ic. PI.* t. 867.—Ind. or.; Burma,
australis, *Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit.* 95, nomen.—Austral.
Barklyi, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6315.—Afr. austr.
Beddomei, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 75.—Ind. or.
biflora, *Linn. Sp. PI.* 211.—Zeylan.
Bowkeri, *Ham. in Proc. Dubl. Zoo!. If Bot. Assoc. i.* (1859) 254.—Afr. austr.
brevicollis, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 74.—Ind. OF.
brevitubulata, Bcdd. Ic. PI. Ind. Or. i. 38 = Brachy. stelma Beddomei.
bulbosa, *Roxb. PI. Corom.* i. 11. t. 7.—Ind. or.
campanulas, *G. Dm, Gen. Syst.* iv. 112.—Afr. trop.
candelabriformis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122=C. Candelabrum.
Candelabrum, Heyne, ex Decne. in DC. Prod. viii. 643 = bulbosa.
Candelabrum, *Linn. Sp. PI.* 2-11.—Ind. or.
Candelabrum, Lour. Fl. Cochinch. 114=Lonreiri.
Candelabrum, Roxb. Hort. Beng. 21; Fl. Ind. ii. 27 = tuberosa.
Candelabrum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 199 = intermedia,
carnosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 193.—Afr. austr.
ciliata, *Wight, Ic.* t. 1262.—Ind. or.
convolvuloides, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 47.-Abyssk.
cordate, *Lour. Fl. Cochinch.* 114.—Cochinch.
Cumingiana, *Decne. in DC. Prod.* viii. 648.—Ins. Philipp.
curviflora, *Hassk. in Flora,* xl. (1857) 103.—Java.
Decaiweana, *Wight, Ic.* t. 1259.—Ind. or.
Decaisneana, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 42 = Tylophora tenuis.
dichotoma, *Haw. Syn. PI. Succ.* 13.—Ind. or.
edulis, Hort ex Decne. in DC. Prod. viii. 643= bulbosa.
elegans, *Wall, in Bot. Mag.* t. 3016.—Ind. or.
Elhottii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 70.—Ind. or.
ensifolia, *Bedd. in Madr. Joum. Sc.* Ser. III. i. (1864) 52.—Ind. oi.
esculenta, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 204 = bulbosa.
fimbriata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 194.—Afr. austr.
fimbiiifera, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1864) 53.—Ind. or.
fusca, *C. Bolle, in Bonplandia,* ix. (1861) 51.—In;. Canar.
Gardneri, *Hook. Bot. Mag.* t. 6306; *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 199.—Zeylan.
gracilU, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. III. L (1864) 53.—Ind. or.
hirsuta, Hochst ex Decne. in DC. Prod. viii. 644 = abyssinica.
hirsuta, *Wight V Arn. Contrib.* 80.—Ind. or.
Hookeri, *C. B. Clarke, ex Hook.f. Ft. Brit. Ind.* iv. 78.—Reg. Himal.
Horsfieldiana, *Miq. Fl. Ind.Bat.il* 528.—Java,
infundibuliformis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 194.—Afr. austr.
intermedia, *Wight, Ic.* 1.12*8.—Ind. or.

CEROPEGIA :—
Jacquemontiana, Decne. in DC. Prod. viii. 641 = hirsuta!
juncea, *Roxb. PL Corom.* i. 12.—Ind. or.
lanceolate, Wight & Am. Contrib. 31=longifolia.
Lawii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 67.—Ind. or.
linearis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 194.—Afr. anstr.
longiflora, Poir. Encyc. ii. 177 = bulbosa.
longifolia. Hook. f. & Thorns, in Fl. Brit. Ind. iv. 72 - angustifolia.
longifolia, *Wall. PI. As. Rar.* i. 56. t. 73.—Reg. Himal.
Loureirii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 112.—Cochinch.
ludda, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 33.1.139.- Reg. Himal.; Burma.
Lushii, R. Grah. in Bot. Mag. t. 3300 = bnlbosa.
macrantha, *Wight, Contrib.* 81.—Reg. Himal.
maculata, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1864) 52.—Ind. or.
madagascariensis.Zfrcn;. *in DC.Prod.* viii. 642.—Madag.
Metziana, *Miq. Anal. Bot. Ind.* iii. 11.—Ind. or.
Meyeri, *Decne. in DC. Prod.* viii. 645.—Afr. anstr.
micans, *Nimmo, in J. Grah. Cat. Bomb. PU* 118, nomen.—Ind. or.
mucronata, Roth, Nov. PI. Sp. 179=tuberosa.
multiflora, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* t. 10.—Afr. austr.
Munroi, Wight, Ic. t. 1254 - fimbriifera I
mysorensis, *Wight, I. c.* t. 846.—Ind. or.
nilotica, *Kotschy, in Siteb. Acad. Wien.Math. Nat.* Ii. (1865) 866.—Afr. trop.
nitida, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 178.—Ins. S. Doming.
obtusa, *Lour. Cochinch.* 114.—Cochinch.
obtnsiloba, *Favc. in Forbes, Nat. Wand, in East. Archip.* 511.—Ins. Timor,
oculata, *Hook. Bot. Mag.* t. 4093.—Ind. or.
odorata, *Nimmo, in J. Grah. Cat. Bomb. PI.* 118.—Ind. or.
ophiocephala, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 259 = hirsuta.
palusMs, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 184 = Vincetoxicum palustre.
peltata, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisakov.* 81.—Hab.?
parasitica, *Noronha, in Verk. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 12.—Malaya,
pubescens, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 198.—Afr. austr.
pubescens, *Wall. PL As. Rar.* ii. 81. t 187.—Reg. Himal.
pusilla, *Wight V Am. in Wight, Contrib.* 81.—Ind. or.
ringens, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 48.—Abyssin.
sagittata. Linn. Mant 215 = Microloma sagittatum.
Sandersoni, *Decne. ex Hook. Bot. Mag.* t. 5792.—Natal,
simiata, *Decne. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 47.—Abyssin.
sinuata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 179 = Microloma lineare.
Sororia, *Hare, in Hook. Bot. Mag.* t. 5578.—Afr. anstr.
sphenanantha, Wight & Am. in Wight, Contrib. 81 = elegans.
sphenantkera, Decne. in DC. Prod. viii. 643 = praec.
spiralis, Hook. f. *Sc* Thorns, in Fl. Brit. Ind. iv. 67 = attenuata.
spiralis, *Wight, Ic.* t. 1267.—Ind. or.
squamnlata, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1888) 268. t. 9.—Arabia,
stapeliaeformis, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 121.—Afr. austr.
stellata, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisakov.* 31.—Hab. ?
Stephanotis, Poir. ex Decne. in DC. Prod. viii. 621 = Stephanotis Isaura.
Stephanotis, *Roem. & Schult. Syst.* vi. 4.—Madag.
Steudneri, *Vatke, in Linnaea,* xl. (U76) 217.—Abyssin.
Stocksii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 74.—Ind. or.
tenuiflora, Willd. Sp. Fl. i. 1276 = Microloma lineare.
tenuifolia. Linn. Mant. ii. 346 = Microloma lineare.
Thwaitesii, *Hook. Bot. Mag.* t. 4758.—Zeylan.
torulosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 194.—Afr. austr.
trichantha, *Hemsl. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 286.—China.
tnberosa, *Roxb. PI. Corom.* i. 12. t. 9.—Ind. or.
tuberosa. Wall. Cat. n. 8145 A = intermedia,
variegata, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. ix. (1838) 262.—Arabia.

CEROPEOIA :—
Vignaldiana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 48.—Abyss.
vincaefolia, Hook. Bot. Mag. t. 8740=hirsuta.
Walkeriae, *Wight, Ic.* t. 1266.—Zeylan.
Wallichii, *Wight, Contrib.* 32.—Reg. Himal.
Wightii, *R. Grah. in Bot. Mag.* t. 8267.—Ind. or.

CEROPHORA, Rafin. Alsog. Am. 11 (1838) - Myrioa, Toura.
angustifolia, Rafin. 1. c.=M. cerifera.
inodora, Rafin. 1. c. = M. cerifera.
lanceolata, Rafin. 1. c. = M. cerifera.
spicans, Rafin. 1. c. 12 = M. cerifera.

CEROPHYLLUM, Spach, Hist. Vég. Phan. yi. 152 (1838)~Ribes, Linn. (Saxifrag.).
Douglasii, Spach, 1. c. 158=R. cerenm.
inebrians, Spach, 1. c. 164=R. cereum.

CEBOXYIiON, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. 1.1.1, 1 b (1807). *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 905.
BEETHOVENIA, Engelro. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 677.
KLOPSTOCKIA, Karat, in Linnaea, xxviii. (1856) 251.
alpinum, Steud. Norn. ed. II. i. 387=seq.
andicolum, *Humb. b* Bonpl. PL Aequin.* 1. t. 1.—N. Granat.
australe, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 314.—Juania australis.
coarctatum, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 238.—N. Granat.
ferrugineum, *Regel, Gartenfi.* (}879) 163. t. 977.—N. Granat.
interruptum, *H. Wendl. in Bonplandia,* viii. (1860) 70.—N. Granat.
Klopstockia, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 814.—Venezuela.'
niveum, Hort. Belg. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 289 = Diplothemium caudescens.
parvifions, *H. Wendl. I. c*—N. Granat.
pityrophyllum, Mart, ex H. Wendl. 1. cCocos pityrophylla.
quindiuense, *H. Wendl. in Bonplandia,* viii. (1860) 70.—N. Granat.
ntile, *H. Wendl. I. c*—N. Granat
Vogelianum, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 239.—N. Granat.

CERQUEIRIA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 5 = Myrcia, DC. (Myrtac).
Sellowiana, Berg, 1. c. 6.—Bras.

CERQUIERIA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 716 (1865) spnalm.=praec.

CERRARIA, Tausch, in Flora, xvii. (1834) I. 347, sphalm.=CERVARIA, Minuart = Feucedanum, Unn. (Umbellif.).

CERRIS, Rafin. Alsog. Am. 29 (1888) - Quercus, Linn.
australis, Rafin. U - Q , Cenis.
austriaca, Rafin. 1. c.-Q. Cerris.
crinita, Rafin. 1. c.=Q. Cerris.
dulcis, Rafin. 1. c—Am. bor.
macrocarpa, Rafin. 1. c. = Q. macrocarpa.
microphyla, Rafin. 1. c. = Q. microphylla.
oliveformis, Rafin. 1. c. = Q. macrocarpa.
paliphleos, Rafin. 1. c.—Am. bor.
salidfolia, Rafin. 1. c. =Q. salicifolia.

CERUANA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 158 (1775). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 261.
fruticosa, Less. Syn. Comp. 202 = pratensis.
montana, Aucher, ex DC. Prod. vii. 287 = Chrysophthalmum stemutatorium.
pratensis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. lxxiv.—Aegypt.
rotundifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat. xll 128 •= pratensis.
Schimperi, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 4 = Asteriscus Schimperi.
senegalensis, *DC. Prod.* v. 488.—Afr. trop.

CERUCHIS, Gaertn. ex Schreb. Gen. 548 (1791)- SpUanthes, Jacq. (Compos.).

CERVANTESIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 89. t. 7 (1794). *SANTALACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 222.
bicolor, *Can. Ic.* 49. t. 475.—Perav.
Kunthiana, *Baill. Adonsonia,* ii. (1861-62) 373. t. 11.—Peruv.
tomentosa, A. DC. Prod. xiv. 692=bicolor.
tomentosa, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vii. 139 = Kunthiana.
tomentosa, *Ruis tf Pav. Prod. Fl. Per.* iii. 20. t. 7.—Peruv.

CERVARIA, Minuart, ex Linn. Diss. Dass. 31 (1747) (Amoen. Acad. i. 142); Gaertn. Fruct. i. 90. t. 21 = Feucedanum, Linn. (Umbellif.).
alsatica, Gaud. Fl. Helv. ii. 327= P. alsaticum.
angustifolia, Andrz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 395 = P. angustifolium ?
glauca, Gaud. Fl. Helv. ii. 826-P. Cervaria.
laevis, Gaud. 1. c. 327, in obs. = P. Cervaria ?
latifolia, Andrz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 895 = P. latifolium.
nigra, Bemh. Syst. Verz. Erf. 171 = P. Cervaria.
Oreoselinum, Gaud. Fl. Helv. ii. 324=P. Oreoselinum.
rigida, Moench, Meth. 95 = P. Cervaria.
Rivini, Gaertn. Fruct. 91. t. 21 = P. Cervaria.

CERVIA, Rodrig. ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 7 (1816). *CONVOLVULACEAEX* (Cf. Benth. & Hook. f. ii. 868).
saturejaefolia, *Rodrig. ex Lag. I. c.* — Hispan.

CERVICINA, Delile, Fl. Egypte,150 (1813) = Wahlenbergia, Schrad. (Campanulac).
campanuloides, Delile, 1. c. t. 5. f. 2 = W. Cervicina.
tomentosa, Van. ex Stend. Nom. ed. II. i. 337 ; ii. 740. =Vahlia tomentosa.

CERVISPINA, [Dill.] Moench, Meth. 686 (1794) = Bhamnus, Toum.
cathartica, Moench, J. c. = R. cathartica.
infectoria, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 856 = R. infectoria.
saxatilis, Fourr. 1. c. = R. saxatilis.
Villarsii, Fourr. 1. c. = R. infectoria.

CESATIA, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 200 = Trachymene, Rudge (Umbellif.).
ornata, Endl. 1. c. = T. eriocarpa.
ovata, Steud. Nom. ed. II. i. 337, sphalm. = praec.

CESPEDESIA, Goudot, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 868. *OCHNACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 820.
Bonplandi, *Goudot, 1. c.* 370.—N. Granat.
macrophylla, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 97.—Panama,
spathulata, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 647.—Peruv.

CESTICHIS, Thou. Orch. Afr. t. 90 fl822)=Iiiparis, Rich. (Orchid.).

CESTRINUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. viii. 24 (1817) = Centaurea, Linn. (Compos.).
carthamoides, Cass. 1. c. - Cent. ChamaerhaponUcum.

CESTRON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 122 = seq.

CESTRUM, Linn. Hort. Cliff. 491 (1737;; Coroll. Gen. 3 (1737). *SOLANACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 904.
HABROTHAMNUS, Endl. Gen. 667 (1836\
LOMERIA, Rafin. Sylva Tellur. 56 (1838).
MEYENIA, Schlecht. in Linnaea, viii. (1838) 251.
PARQUI, Adans. Fam. ii. 219 (1763).
WADEA, Rafin. Sylva Tellur. 56 (1888).
acuminatissimum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 627.—Guiana.
acuminatnm, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 388.—Mexic.
affine, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 60.—Ecuador.
affine, Pers. Syn. i. 230 = auriculatum.
alatemoides, *Desf. Tabl.* ed. I. 70.—Ind. occ.
albo-punctatum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 635.—Peruv.
album, *Ferrero, ex Dun. 1. c.* 60S.—Cuba.
Amelanchier, *Dun. 1. c.* 662.—Hab. 1
amictum, *Schlecht. in Linnaea,* vii. (183*2) 64.—Bras,
amygdalifolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 653.—Mexic.

OESTRUM :-

anagyridium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122 =seq.
Anagyris, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 608.—Mexic.
angustifolium, *Lodd. Bot. Cab.* t. 618.—Ind. occ.
aronioideum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122 - C. Amelanchier.
arvense, *Veil. Fl. Flum.* 101; iii. t. 7.—Bras.
otrtnirens, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 648=Sessea atrovirens.
aurantiacum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 71.—Gnatimal.
"uraniiacum, Mey. ex Steud. Nom. ed. II. i. 387 = Freylinia cestroides.
auriculatum, *VHirit. Stirp. Nov.* 71. t. 85.—Am. anstr.
auriculatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 28. t. 155 f. a= hediundinum.
axillare, Veil. Fl. Flum. 101; iii. t. 6 - laevigatum.
Bella-Sombra, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 1. 682.—Ins. Canar.
Benthami, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 151.—Mexic.
Billbergianum, *Beurling, in Vet.Acad. Handl.* (1854) 140.—Panama.
bogotense, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 807= mariquitense.
bonariense, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 666.—Reg. Argent
bracteatum, *Link V Otto, Ic. PI. Rar.* i. 11. t. 6.—Bras.
bupleurifolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 1. 628.—Bras,
bnxifolium, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 57.—N. Granat.
calycinmn, *H. B. &• K. I. c.* 58.—Peruv.
clycinum, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, vii. (1882) 64=viridifloram.
'ampanulatum, Lam. Encyc. i. 688 = Acnistus aggregatus.
«ampestre, *Graeb. in Goert. Verk.* xiv. (1879) 244.—
candidum, *Seem. V Schmidt, in Flora*, xxvii. (1844) 465.—Mexic.
*caulif**lorum*, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 41. t. 825 = Acnistus arborescens.
*c<"*liflorum*, Sieber, ex Bercht. & Presl, Rostl. i. J>olaneae. 52=Acnistus Plumieri.
«Uamidatum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 645.—Bras,
cnloranthum, *Dun. 1. c.* 686.—Ins. Trinitftt.
c't"folium, RetB. in Hoffm. Phyt. Blaetter, i. (1803) − 36—Hab.?
Uausseni, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 637.—Bras.
*co*l»num, *Mien, in hook. Land. Journ. Bot.* v. (18«) 16O.-Bras.
c»nfertiflorum,5cA/«Ar. in Linnaea, xix. (1847) 263.—Mexic.
*co**nfertum*. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5=vespertinum.
confertum, *Ruiz &• Pav. Fl. Per.* ii. 29. t. 153.—
*co*5glomeratum, *Ruia If Pav. 1. c.* 29. t. 156.—Peruv.
«*covadeuse, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (184B) lBO.-Bras!
cor<>atum, *Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 224. TBras.
cordatum, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* v U46) 161,-Bras.
*""lymbosum, *Schlecht. in Linnaea*, vii. (1832) 67.—Bras.
cuspidatum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 223.—Bras.
cyaneum, Schlecht. ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 673-Iochroma Schlechtendalianum.
daphnoides, *Griseb. in Mtm. Am. Acad. N. S. yiii.* (1868) 524.— . occ.
depauperatum, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 660.—Ins. Guadalup.
discolor, Dun. 1. c. 609.—Peruv.
diurnum, Domb. ex Dun. in DC. 1. c 667=leptanthum.
<tiurnum H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 61 = Forsythi.
diurnum, Lin. Sp. PI.* 191.—Ind. occ
dubium, Steud. N<»"- «• U- <•' 837.—Hab. ?
dumetorum, *Schl<*M. in Linnaea*, vii. (1832) 61.—Bras.

CESTRUM:-

Ehrenbergi, *Schlecht. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 613.— Mexic.
elegans, *Schlecht. in Linnaea*, xix. (1847) 261.—Mexic
elongatum, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. i. S37=candidum.
Endlicheri, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 151.—Peruv.
eriochiton, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 217.—Bras,
euanthes, *Schlecht. in Linnaea*, vii. (1882) 60.—Bras,
exstipulatum, *Ledeb. in Schrad. N. Journ. Bot.* iv. (1810) 65.-Am. austr.
fasciculate, Otto, ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 673 = Toxicophlaea cestroides.
fasciculatum, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 151.—Mexic.
fastigiatum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iu. 44. t. 330.—Ind. occ.
fastigiatum, Jan, Cat. Hort. Parm. 189,10=diurnum.
Faucheri, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 640.—Hab. ?
ferrugineum, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 126.—Cuba.
fioribundum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 807 = tenuiflorum.
foetidissimum, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 43. t. 829 = noctumum.
foetidum, *Medic, in Act. Acad. Theod. Palat.* iv. *Phys.* (1780) 192.-Hab. 1
foetidum, Salisb. Prod. 111 = auriculatum.
Forsythi, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 1. 604.—Ind. occ.
frutescens, *Aubl. PI. Gui.* i. 283.—Guiana.
Gardneri, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 208.—Bras,
glaucescens, *Sendt. I. c.* 222.-Bras,
glomeratum, *Schott, ex Sendt. 1. c.* 212.—Bras,
graciliflorum, *Dun. in DC. Prod.* xii. I. 669.—Mexic
granadense, Willd. ex Roem. & Schult. Syst iv. 807 = tomentosnm.
grandiftorum, Hort. ex Stend. Nom. ed. II. i. 337 = laurifolium.
grandistipulum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 214.—Bras.
Hartwegi, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 599.—Mexic.
Hediunda, Lam. Encyc. i. 687 =» auriculatum.
Hediunda, Matr. ex Dun. in DC. Prod xiii. I. 647 = hediundinum.
hediundinum, *Dun. 1. c.*—Am. austr.
heterofractum. Buck, in DC. Proa. Index, iii. 93, sphalm. =retrofractum.
hirsutum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 41. t. 324.—Hab. 1
hiitellum, *Schlecht. in Linnaea*, vii. (1832) 62.—Mexic.
hirtum. Sieber, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 210= Pocppigii.
hirtum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 49.—Jamaic.
intermedium, *Sendt. in Mart. Fl. Bras. x.* 221.—Bras,
involucratum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 610.—Mexic.
jamaicense, Lam. Encyc. i. 687 = C. Parqui, vespertinum.
jasminiflorum, *Moric. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 660.—Hab. ?
Kohauti, Bercht. & Presl, Rostl. i. Solaneae. 52 = cauliflorum.
laevigatum, *Schlecht. in Linnaea*, vii. (1882) 59.—Bras.
Lamberti, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 624.—Hab. >
lanatum, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) (reimpr. 18).—Mexic.
lanceolatum, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 169.—Bras.
lanceolatum, *Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 214.—Bras.
lancifolium, *Schlecht. in Linnaea*, xix. (1847) 267.—Mexic.
lanuginosum, *Ruii* b* *Pav. Fl. Per.* ii. 80. t. 167.—Peruv.
lasiantbum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 649.—Peruv.
latifolium, *Lam. Illustr.* ii. 5.—Ins. Trinitat.
latifolium, Sieber, ex Dnn. in DC. Prod. xiii. I. 636» cnloran thnm.
laurifolium, *VHirit. Stirp. Nov.* 69. t. 84__Am. austr.
laxiflorum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 655.—Venezuela.
laxum, *Benth. PI. Hartw.* 33. n. 207.—Mexic.
leptanthum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 666.—Peruv.
lencocarpum, *Dun. 1. c.* 630.—Am. austr.

CESTRUM:—

Lindeni, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 611.—Venezuela,
longiflorum, *Ruit Cf Pav. Fl. Per.* ii. 28. t. 154.—Peruv.
longifoiium,Voepp.ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 657 = unibracteatum.
Lorentzianum, *Griseb. in Goett. Aih.* xix. (1874) 217.—Am. austr.
lucidum, Pav. ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 665-servatum.
Lnndianum, *Dun. 1. c.* 658.—Bras,
luridnm, *Dun. 1. c.* 659.—Braa.
lydoides, Lichtst. ex Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 558-Lycium cinereum.
lycioides, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 208.—Bras.
macrophyllum, Hort. Par. ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 626 — laurifolium.
macrophyllum, Salzm. ex Dun. 1. c.=Salzmanni.
macrophyllum. *Vent. Choix* 18—Ind. occ.
mariquitense, *H.B.VK Nov. Gen. et Sp.* iii. 67.—N. Granat.
Ma'rtii, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 221.—Bras.
Mathewsii, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 637.—Peruv.
megalophyllum. Dun. 1. c. 688=macrophyllum.
melanochloranthum, *Dun. 1. c.* 622.—N. Granat
microphyllum, *Linden, ex Dun. 1. c.* 623.—N. Granat.
Miersianum, *Wedd. Chlor. And.* ii. 97.—N. Granat.
Miersii, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 671.—Bras,
montanum, *Miers, in Hook. Lend. Journ. Bot.* v. (1846) 161.-Am. austr.
Moquinianum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 646.—Cuba.
Moritzi, *Dun. I. c.* 619__N. Granat.
mucronatum, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 160.—Bras,
multiflurum, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 553.—Am. austr.
multiflorum, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 59=—Schlechtendalii.
multiflorum, Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 216 = laevigatum.
multinervium, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 611=C. Parqui ?
Mutisii, *Willd. ex Roem. (f Schult. Syst.* iv. 807.—Am. austr.
nemanthum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 637.—Bras.
nervosum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8=Tabemaemontana amygdalaefolia.
nitidum, *Mart, bf Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) (reimpr. 19).—Mexic.
noctumum, Lam. Encyc i. 687 = leucocarpum.
noctumum, *Linn. Sp. PI.* 191.—Am. austr.
oblongifolium, *Schlecht. in Linnaea*, xix. (1847) 266.—Mexic.
obovatum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 209.—Bras,
odontospermum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 44. t. 381.—Am. austr.
oliganthum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 634.—Guiana.
oppositifolium, Lam. Illustr. ii. t 112. f. 2. n. 2279-Acokanthera Lamarkii.
organense, Miers, in Hook. Lond. Jonrn. Bot. v. (1844) 158-amictum.
ovatum, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 807 = tenuiflorum.
pallidum, *Lam. Encyc. i.* 688.—Jamaic.
paniculatum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 62.—Venezuela.
paniculatum, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 262-sylvaticum.
Parqui, Benth. PI. Hartw. 24 - terminale.
Porqni, *L'Herit. Stirp. Nov.* 78.—Am. trop.
parviAonim, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 624.—Peruv.
parvifolinm, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 808. -Hab. ?
pauciflorum, *Nees &* Mart, in Nov. Act. Acad. Caes. Leap. xi.* (1823) 79.—Bras.
pauciflorum, Willd. ex Roem. Ac Schult. Syst. iv. 808 = Willdenowii.
pedicellatum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras. x.* 224.—Bras,
pedunculare, *Pav. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 618.—Mexic.
pendulinum, Hort. Monsp. ux Dun. in DC. Prod. xiii. I. 680 = undulatum.
pendulinum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 42. t. 327.—N. Granat.
persicaefolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 608.—Mexic.
peruvianum, Hort. Roth, ex Dun. 1. c. 662 =• C. Amelanchier.

OESTRUM :—
peruvianum, Willd.ex Rocm. *8c* Schnlt. Systiv. 807 = affine.
petiolare, H. 6. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 58=Sessea petiolaris.
Plukenetii, *Tausch, in Flora,* xix. (18S6) 887.—Hab.?
Poeppigii, *Schlecht. in Linnaea,* xxvii. (1864) 510.—Ins. Martinic.
Poeppigii, *Sendt. in Mart. Fl, Bras.* x. 210.—Bras,
polyanthum, *Sendt. in Mart. 1. c.* vi. 216.—Bras.
polyanthum, Steud. Nom. ed. II. i. 387= Schlecht endalii.
porphyream, *Dun. in DC. Prod.* xii. I. 602.—Hab. ?
porphyroneuron, *Schlecht. in Linnaea,* xxv. (1852) 199.—Hab. ?
potaliaefolium, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 688.—N. Granat.
Prienrei, *Dun. 1. c.* 685.—Guiana,
propinquum, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. i. (1845; 147.—Mexic.
Pseudc-Qnina, *Mart, in Flora,* xxi. (1888) *Beibl.* 21.—Bras,
psychotrifolium, *Schlecht. in Linnaea,* xix. (1847) 265.—Mexic.
pubens, *Griscb. in Goett. Abk.* xix. (1874) 217.—Reg. Argent.
pubescens, Lichst. ex Roem. & Schnlt. S."st. iv. 5S8 - Acokanthera pubescens.
racemosum, *Ruiz tf Pav. Fl. Per.* ii. 29. t. 164.—Peruv.
racemosum, Tausch, in Flora, xix. (1836) 387 = dubium.
ramosissimum, *Nocca, ex Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 678, nomen.—Hab. i
reflexum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 218.—Bras.
Regelii, *Planch, in Fl. desSerres,* Sir. I. ix. (1853-54) 229. t 946.—Guatimal.
Requieni, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 661.—Hab. ?
reticulatum, Willd. ex Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 808 - conglomeration.
retroiractum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 656.—Bras.
roseum, Hort. ex Don. 1. c. 602-porphyreum.
rosenm, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 59. t. 197.—Mexic.
rugulosum, Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 215 =lanceoiatum.
salicifolium, Hon. Monsp. ex Don. in DC. Prod. xiii. I. 616 = ibetidissimum.
salicifolium, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 421.—Venezuela.
salicifolium, Kunth, ex Spreng. Syst. i. 673 = C. Parqui.
Salzmanni, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 626.—Bras.
scandens, Thib. ex Dun. 1. c. 681 – noctumnm.
scandens, *Vahl, Eclog. Am.* i. 24.—Am. anstr.
Schlechtendalii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 482.—Bras.
Schottii, Pohl, ex Sendt. in Mart. Fl. Bias. x. 218 •= amictum.
Schottii, *Sendt. I. c.* 213.—Bras.
Sellowianum, *Sendt. I. c.* 219.—Keg. Argent,
sémivestitum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 651.—Mexic.
Sendtneriannm, *Mart, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 215.—Bras.
servatum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 665.—Peruv.
sessiliflorum, *Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 213.—Bras.
spermacocifolium, Willd. ex Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 808 - Bouvardia triflora.
spicatum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4.—N. Granat.
spurium, Hort. Genev. ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 617=C. Parqui.
stipulatum, Veil. Fl. Flam. 10] ; iii. t. 5 = bracteatum.
strictum, *Schott, ex Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 208.—Bras,
strigillatum, *Ruit & Pav. Ft. Per.* ii. 29. t. 156.—Peruv.
suberosum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 26. t. 452.—Hab.?
subpulveruientum, *Mart, in Flora,* xxi. (18881II. *Beibl.* 65.—Bras.
subsessile, *Veil. Fl. Flum.* 102; iii. t. 8.—Bras,
suhtriflorum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 623.—Ins. Trinitat.
bubuniflorum, *Dun. I. e.* 654.—Bras,
sylvaticum, *Dun. I. c.* 603.—Mexic.
tenuiflorum, //. *B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 61.—Venezuela,
terminate, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 608.—Mexic.

OESTRUM :—
thrysoideum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 63.—Mexic.
tinctorium, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 45. t. 332.—Am. austr.
Tinus, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 614.—Bras,
tomentosum, *Linn.f. Suppl.* 150.—Am. austr.
tomentosum, Moç. & Sesse", ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 601 - Benthami.
toxicarium, J. F. Gmel. Syst. 389, 1*24 = Antiaris toxicaria.
tubulosum, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 207.—Bras.
umbellatum, E. Mey. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 628 = Peddiea Dregei.
umbellatum, *Pauq. Diss. Bellad.* 16.—Hab. ?
undulatum, *Ruis V Pav. Fl. Per.* ii. 28. 't. 155.—Peruv.
unihracteatum, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 656.—Peruv.
velutinum, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk.Meddel.(Wn-7S)* 88.—Am. trap.
venatorium, E. Mey. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1860) 79 = Acokanthera venennta.
venenatum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 5 - Acokanthera venenata.
venenatum, Lim. Encyc. i. 688=laurifolium.
venenatum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = pallidum.
venosum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 807 = Sessea petiolaris.
vespertinum, Bertero, ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 660 – depauperatum.
vespertinum, Hort. Val. ex Roem. & Schult. Syst. iv. < 366-Vestia lycioides.
vespertinum, *Linn. Mant.* ii. 206.—Ind. occ.
vespertinum, Poepp. ex Sendt. in Mart. Fl. Bras. x. 218 -Poeppigii.
vestioides, *Schlecht. in Linnaea,* vii. (1832) 65.—Bras.
vestitum, Hook. Ic. PI. t. 881 = Scssea vestita.
viminale, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 220.—Bras.
virgatum, Ruiz& Pav. Fl. Per. ii. 27 = C. Parqui.
viride, *Moric. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 606.—Mexic.
viridiflorum, *Hook. Bot. Mag.* t. 4022.—Bras.
Warscewiczii, *Klotzsch, in OttoVDietr.Allg. Gartenz.* xix. (1851) 862.—Am. austr.
Willdenowii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 388.—Hab.?

CETRA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2 ^ id ?).

CEVALLIA, Lag. in Varied. Cienc. ii. IV. (1805) 35.
LOASEAE, Benth. *8c* Hook. f. i. 808.
PETALANTHERA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 107.
sinuata, *Lag. 1. c.* 86.—N. Mexic.

CEYTOSIS, Munro, in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 54, err. typ. = **Crypsis,** Ait. (Gramin.).

CHABOISSAEA, Foum. Gram. Mex. 112 ; ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1096 (1683). Gen. dub. *GRAMIN.* Benth. *8c* Hook. f. 1. c.
ligulata, *Foum. 1. c.; ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 588.—Mexic.

CHABRAEA, Adans. Fam. ii. 237 (1763)-Peplis, Linn. (Lythiar.).

CHABRAEA, DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 65. t. 5 -Ilieuceria, Lag. (Compos.).
abbreviata, Bert.' Merc. Chil. (1829) 601.'—Cf. Bull. Férussac, xx. (1880) 109 = L. abbreviata.
Barrasiana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 399.—Chili.
Berteroniana, Steud. Nom. ed. IL i. 338.—Chili.
candidissima, DC. Prod, vii 59 = L. candidissimn.
canescens, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 716.—Chili.
dnerea, DC. Prod. vii. 60=L. cinerea.
concinna, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 128.—Chili.
coquimbana, PhiL in Anal. Univ. Chil. (1861) 50.—Chili.
daucifolia, Wedd. Chlor. And. i. 85.—Peruv.
elongata, Bert. 'Merc. Chil. (1829) 601.'—Cf. Ball. Férussnc, xx. (1830) 109 = L. senecioides.
fragrans, Phil, in Lincaea, xxix. (1857-58) 8.—Chili

CHABRAEA:—
Guyana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 400.—Chili.
glabra, DC. in Deless. Ic. Select, iv. t. 89.—Chili.
glabriuscula, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 715.—Chili.
glacialis, DC. in Deless. Ic. Select, iv. t. 91 = L. pulchella.
glandulosa, DC. Prod. vii. 59 = L. glandulosa, *D. Don.*
integrifolia, Phil, in Linnaea, xxviii. (.1856) 716.—Chili.
laciniata, Wedd. Chlor. And. i. 34. t. 10 = L. laciniata.
Landbeckii, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 122. -Chili.
lithospermifolia, DC. Prod. vii. 60.—Chili.
lyrata, Spreng. Syst. iii. 506 - Gerbera Anandria.
modesta, Phil. Fl. Atac. 28.—Chili.
multifida, DC. Prod. vii. 60.—Patagonia.
nutans, Bland. C. Gay, Fl'. Chil. viii. 897.—Chili.
nutans, Remy, in Ann. So. Nat. Sér. III. xii. (1849) 182.—Chili.
oligocephala, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 746 - L. oligocephala.
Poeppigii, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-68) 8.—Chili.
polyclados, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 30!).—Chili.
Prenanthoides, Bert, in ' Merc. Chil. 1829.'—Cf. Bull. Férussac, xx. (1830) 109.—Chili,
pulchella. Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) **744-1..** pulchella.
purpurea, DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 65, 71 = L. purpurea.
rosea, DC. in Deless. Ic. Select, iv. t. 90 = L. runcinata.
runcinata, Hook. Bot. Mag. t. 4116 = L. runcinata.
salina, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 393. t. 41.—**Chili.**
scrobiculata, DC. Prod. vii. 59 = L. scrobiculata.
suaveolens, DC. 1. c. = L. gossypina.
tenerifolia, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 715.—Chili.
tenuior, Bert, in 'Merc. Chil. 1829.'—Cf. Bull. Ferussac, xx. (1880) 109=*Berteroniana.*
tenuisecta, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Chili.
thermarum, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1862) 880.—Chili.
tomentosa, DC. Prod. vii. 60 = L. Bridgesii.
viscida, Beit, in ' Merc. Chil. (1829) 601.'—Cf. Bull. Fe'russac, xx. (1830) 109.—Chili.
viscosa, Bert, ex DC. Prod. vii. 59 = L. runcinata.

CHADARA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 105 (1775)» Grewia, Linn. (Tiliac).
arborea, Forsk. 1. c. = G. excelsa.
tenax, Foisk. 1. c. = G. popnlifolia.
velutina, Forsk. 1. c. = G. velutina.

CHADRA, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. v. Snppl. '• (1860) 11, err. typ. = praec.

CHADSIA, Boj. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 104. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 497.
andravinensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883? 891.—Madag.
coluteifolia, *Baill. 1. c.* 892.—Madag.
flammea, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xx. (1848) 106.—Madag.
Grandidieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 391.—Madag.
granitica, *Baill. I. c.* 392.—Madag.
Lantziana, *Baill. I. c.* 391.—Madag.
salicina, *Baill. I. c.* 392.—Madag.
versicolor, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xx. (1843) 106.—Madag.

CHAELANTHUS, Poir. in Diet. Sc. Nat. viii. «° (1817) sphalm. = **ChaetanthUB,** R. Br. (Restiac.)-

CHAELOTHILUS, Neck. Elem. ii. 14 (1790) - **OeB' tlaaa,** Toura.

CHAEXACTIS, DC. Prod. v. 659 (1886). *COM' POS1TAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 401.
ACARPHAEA, Harv. *8c* A. Gray, PI. Fendl. »• (1849).
AcifiARPHAEA, Walp. Ann. ii. 877 (1852).
MACROCARPHUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 376.
achilleaefolia, Hook. *8c* Arn. Bot. Beech. Vov. 354 - Douglasii.

CHAEMACTIS :—
artemisiaefolia, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* x. (1876) 74.—Calif.
attenuate, *A. Gray, 1. c.* 78.—Arizona,
biachypappa, *A. Gray, I. e.* viii. (1872) 890.—Am. bor. occ.
carphoclinia, *A. Gray, in Bot. Mex. Bound.* 94.—Am. bor. occ.
Cusickii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. II. 452.—Am. bor. occ.
denudata, Nutt. ia Jonro. Acàd. Sc. Fhilad. Ser. II. i. U847) 177=glabriuscula.
Douglasii, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 854.—Am. bor. occ.
fllifolia, Hare, in A. Gray, PI. Fendl. 98 = tenuifolia.
Fremonti, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* xlx. (1888) 80. -Calif.
glabriuscula, *DC. Prod.* v. 659.—Calif,
heterocarpha, *A. Gray, PI. Fendl.* 98.—Calif,
lanosa, *DC. Prod.* v. 659.—Calif,
macrantha, *Eaton, in Bot. King, Exp.* 171. t. 18.—Am. bor. occ.
nevadensis, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 891.—Calif.
Nevii, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* six. (1883) 30.—Am. bor. occ.
Parishii, *A. Gray, I. c.* xx. (1885) 299.—Calif,
santolinoides, *Greene, in Bull. Torrey Club,* ix. (1882) 17.—Calif,
sterioides, *Hook.* &[1] *Am. Bot. Beech. Voy.* 858.—Am. bor. occ.
snffrutescens, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* xvi. (1881) 100.-Calif.
tanacetifolia, A. Gray, L c. vi. (1864-65) 546=heterocarpha.
temiifolia, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1811) 875.—Calif,
thysanocarpha, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* xix. (1883) 30.—Calif,
xantiana, *A. Gray, 1. e.* vi. (1866) 545__Calif.

CHAENANTHE, Lindl. Bot. Reg. (1888) Misc. 88 = Diadenium, Poepp. $ Endl. (Orchid.).
Barteri, Lindl. 1. c »D. Barken.

CHAENANTHERA, Rich, ex DC. Prod. iii. 196 (1828) =Charianthufl, D. Don (Melastomac).
iiucronata, Rich. 1. c 197=Charianthus glaberrimus.

CHAENARRHINUM, Reichb. Consp. 123 (1828) = Linaria, Toum. (Scrophnl.).
"asafolium, Lange, in Willk: & Lange, Prod. Fl. Hisp.iL 579 ^L. origanifolia.
exih. Lunge, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 232=L.exilis.
fiexuosum, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 580 = L. Langei.
nacrocalyx, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 98=L. macrocalyx.
maenpodum, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 579= L. macropoda.
minus, Lange, 1. e. 577 =L. minor.
origanifolium, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. "ii. (1869) 127-L. origanifolia.
PraetermUsum, Lange, in Willk. & Lanee, Prod. FL Hisp. ii. 678=L. minor.
Tubriflorum, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. *vii. (1869) 127 = L. rnbrifolia.
^irifolium, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.ii. 578=C. rnbrifolia.
^"Pyllifolium, Lange, 1. c = L . serpyllifolium.
'fnellum, Lange, 1. c. 581=Anarrhinum tenellum.
'Vmiflorum, Lose, ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 282=L. exilis.
villosum, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. u.580-L.|fllosa.

CHAENESTHES, Mien, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. U845) 386=loohpoma, Benth. (Solanac).
cvrrnfolia, Miers, L c. 338=1. eoraifolia.
whsioid des, Miers, L c 888=11 rächsioides.
***nerioides,* Miers, 1. c 838=1. gesnerioides.
t?[eoltiia] Miers. 1- <=•=!• lanceolata.
*"M, Don. in DC. Prod. xiii. I. 489 = 1. longipes.
loxensis. Miers, in Hook. Lond. Joura. Bot iv. (1848) 888 = I. loxensis.
ambrosa, Miers, L c 887=1. omhrosa.

CHAENOCARPUS, Tuss. in Diet. Sc Nat. viii. 50 (1817) = CHENOCARPUS, Neck. = Spennaeoce, Linn. (Rubiac.).

CHAEWOCBPHAIiTTS, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 374 (1861). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 382.
heterophyllus, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 196. —Reg. Argent.
macrophyllm, *Griseb. I. c.*—Reg. Argent,
petrobioides, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 374.—Ind. occ
Suncho, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 196.—Reg. Argent.

CHAENOLOBIUM, Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl. i. 802 (1860)=OrmoBia, Jack (Legnmin.).
decemjugum, Miq. 1. c =O. microsperma.
septemjugum, Miq. 1. c. = O. microsperma.

CHAENOMELES, Lindl. Veg. Kingd. 660 (1847) = CHOENOMELES, lindl. = Pynifl, Linn. (Rosac).

CHAENOPHORA, Rich, ex Crneger, in Linnaea, xx. (1847) 112, err.typ.=seq.

CHAENOPLEURA, Rich, ex DC. Prod. iii. 197 (1828) = Hloonia, Ruiz *Sc* Pav. (Melastomac).
densiflora, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 349=M. pusilliflora.
ftrruginea, H. Crueger, in Linnaea, xx. (1847) 112 - M. hypoleuca.
fulva, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 56=M. fnlva.
hypoleuca, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 816 = M. hypoleuca.
lanceolata, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. ii. (1843) 849 = M. pusilliflora,
longifolia, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 55 = M. longifolia.
paniflora, Gardn. in Hook. Lond. Joura. Bot. ii. (1843) 348=M. pusilliflora.
quadrangularis, Macf. Fl. Jamaic. ii. 96 = M. qnadrangnlaris.
stelligera, Macf. 1. c. 97.—Jamaic
stenobotrys, DC. Prod. iii. 197=M. quadrangularis.

CHAENORRHINUM, Lange, in Willk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 577 (1870), err. typ. =• CHAENARRHINUM, Reichb. -Linaria, Toum. (Scrophul.).

CHAENOSTOMA, Benth. in Hook. Comp. Bot Mag. i. (1885) 874. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 945.
PALMSTRUCKIA, Retz. f. Obs. Bot.Pugill. 15 (1810).
SUTERA, Roth, Bot. Bemerk. 172 (1878).
aethiopicum, *Benth. 1. c.* 375.—Afr. austr.
affine, *Benth. in Flora,* xxvii. (1844) 834.-Afr. austr.
calycinum, *Benth. in Hoot. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 374.—Afr. austr.
campanulatum, *Benth. I. c.*—Afr. austr.
cordatum, *Benth. 1. c.* 877.—Afr. austr.
cuneatnm, *Benth. I. c.* 376.—Afr. austr.
denudatum, *Benth. I. e.* 375.—Afr. austr.
fastigiatum, *Benth. I. c.* 376.—Afr. austr.
floribundum, *Benth. I. c*— Afr. austr.
foetidum, *Benth. I. c.* 877.—Afr. austr.
glabratum, *Benth. 1. c.* 375.—Afr. austr.
halimifolium, *Benth. I. c*—Afr. austr.
hispidum, *Benth. I. c.* 376.—Afr. austr.
integrifolium, *Benth. 1. e.*—Afr. austr.
Kraussianum, Berah. in Flora, XXFH. (1844) 886= Lyperia Kraussiana.
laxiflorum, *Benth. in Hoot. Comp. Bot. Mag. i.* (1835) 374.—Afr. austr.
linifolium, *Benth. I. e.* 375.—Afr. austr.
marifolium, *Benth. I. e.* 376.—Afr. austr.
natalensis, *Bernh. in Flora,* xxvii. (1844) 835.—Afr. austr.
pauciflorum, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1886) 374.—Afr. austr.
pedunculosum, *Benth. I.* c. 377.—Afr. austr.
polyanthum, *Benth. I. c.* 876.—Afr. ansrr.
procumbens, *Benth. I. c.* 874.—Afr. austr.
pumilum, *Benth. I. c.* 375.—Afr. austr.
racemosum, *Benth. I. e.* 377.—Afr. austr.
revolutum, *Benth. I. e.* 876.— Afr. austr.
rotundifolium, *Benth. 1. c.* 874.—Afr. austr.
snbspicatum, *Benth. I. c.* 376.—Afr. austr.
villosum, [G. Don, in] Sweet, Hort. Brit. ed. III. 520 =Polycuena capensis.

CHAERADOPLECTRON, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 626 (1888), err. typ.=CHOERADOPLECTRON, Schau. = Habenaria, Willd. (Orchid.).

CHABHOPHTLLUM, Unn. Syst ed. I (1735). *VMBELUFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 898.
BALANSAEA, Boiss. & Reut Pugill. PI. Nor. 49 (1852).
BIASOLETTIA, Bertol. FL Ital. iU. 191 (1887).
FIEBERA, Opiz, Seznam, 44 (1862).
FREYERA, Reichb. Handb. 291 (1837).
GRAMMOSCIADIUM, DC. Prod. iv. 232 (1830).
PHYSOCAUUS, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 342.
RHYNCHOSTYLIS, Tausch, 1. c. 843 (1884 j.
acuminatum, *Lindl. in Royle, lllustr. Bot. Himal.* 232.—Reg. Himal.
affine, Steud. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 332» Anthriscus sylvestris.
alpestre, Jord. Pugill. 76=Villarsii.
alpinum, Vill. Prosp. 26=Anthriscus sylvestris.
angelicaefolium, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 130-Meyeri.
angelicaefolium, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 240.—Oriens; Iberia.
angelicaefolium, DC. Prod. iv. 227 = byzantinum.
angulatum, Kit. ex Spreng. in Comm. Gott. Rec. ii. (1813) Umbell. Animad. 7. t. 1. f. 6-Anthriscus sylvestris.
Anthriscus, Lam. Encyc. i. 685 •• Anthriscus vulgaris.
arborescens, Linn. Sp. PL 259 — Aralia spinosa I
aristatum, Thnnb. Fl. Jap. 119 - Osmorhiza Claytoni.
aromaticum, *Linn. Sp. PI.* 259.—Europ.
articulatum, Bosc.ex DC. Prod. iv. 226=procumbens.
Astrantiae, *Boiss. V Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 906. —As. Min.
anreum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 370.—Enrop.; As. Min.
aureum, Linn. Mant. ii. 350—temulum.
australe, CranU, Cl. Umb. Emend. 76 = Scandix australis.
Biebersteinii, *Lag. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 190.—Reg. Caucas.
bifidum, Willd. ex DC. Prod. Iv. 225 = procumbens.
Boscii, Steud. Nom. ed. II. i. 889=procumbens.
brachyearpum, Bieb. ex Hoffm. Gen. Umb. i. 212 = millefolium.
bnlbosum, *Linn. Sp. PI.* 258.—Europ.; As. Min.
byzantinum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 65.—Byzant.; As. Min.
cachemiricnm, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 691.—Reg. Himal.
cadonense, Schult. ex Steud. Nom. ed. II. i. 839 = Anthriscus sylvestris.
calabricum, *Guss. ex DC. Prod.* iv. 227.—Calabria.
cali/ornicum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 98 - Podosciadinm californicum.
canadense, Pers. Syn. i. 820 = Cryptotaenia canadensis.
capense, Thunb. Prod. PI. Cap. 51 = Annesorhiza capensis.
capnoides, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 898.—Reg. Himal.
Cerefolium, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 70 = Anthriscns Cerefolium.
chilense, Poir. Encyc. v. 146=Scandix chilensis.
Cicutaria, Vill. Prosp. 26 = hirsutum.
ciliatnm, *Kit. ex Kaniti, Reliq. Kitaib.* 103.—Croatia.
Claytoni, Pen. Syn. i. 820 = Osmorrhiza brevistylis.
coloratom, *Linn. Mant.* 57.—Dalmat.; Banat.
creticum, *Boiss. b*[1] *Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 51.—Ins. Creta.
crinitum, *Boiss. in Ann. Se. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 63.—Mesopot.; Persia.
Cyminum, Fisch. ex DC. Prod. iv. 280=Conopodium Cyminum.
dasycarpum,Natt. ex Tor; *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 638 -Tainturieir.
dauci/olium, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 200, 405-Anthriscus alpestris.
daucophyllum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 638=Tainturieri.
divaricatum, Poir. Encyc Suppl. iv. 34 •= Anthriscns fumarioides.
duke, Fisch. ex Stend. Nom. ed. II. i. 839=Osmorrhiza Claytoni.
elegans, *Gaud. Fl. Helv.* ii. 864.—Helvet.
Friedrichsstahlii, Cesati, in Bibl. ItaL lxxv. 388 = Anthriscus tenerrima.
geniculatum, Gilib. FL Lituan. ii. 29=temulum.

CH AEBOPHTIJIIUM :—
glaberrimum, Pere. Syn. i. 820 {=*Bunium glaberrimum*) .—Algeria.
gracile, Bess. Hort. Cremen. (1822)= Conopodinm Cyminum.
gracillimum, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 149 = Vicatia coniifolia.
grandiflorum, Ciantz, Cl. Umb. Emend. 77 ; Lam. Encyc. i. 686—Scandix grandiflora.
Heldreichii, *Orph. in Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 104.—Graecia.
hirsutam, *Linn. Sp. PI.* 258.—Europ.; As. Min.
hirsutum, Pall. Tabl. Taur. 49=temulum.
hirsutum, Vill. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. S17 = Villarsii.
hispidum, Thnnb. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 64 = Cancalis Anthriscus.
Hladnikianum, Reichb. ex Heynh. Norn. ii. 135 = Anthriscns fumarioides.
hnmile, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 240.—Reg. Caucas.
hybridum, Tenore, Fl. Neap. Prod. p. lxvi-aureum.
infest urn, Salisb. Prod. 167 = Antbriscns sylvestris.
Kotschyi, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 913= Anthriscus Kotschyi.
lactescent, Rochel, ex Stend. Norn. ed. II. i. 339 = Anthriscus sylvestris.
laevigatum, Vis. Fl. Dalm. iii. 65 = bnlbosnm.
lasiolaenum, *Boiss.* b* *Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 903.—As. Min.
lencolaenum, *Boiss. 1. c.* 905.—Armenia,
libanoticum, *Boiss. b" Kotschy, Diagn.* Ser. II. vi. 89.—Syria.
lucidum, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 200=Anthriscus nemorosa.
macropodnm, *Boiss. in Ann. Sc- Nat.* Ser. III. ii. (1844) 64.—Persia,
macrospermum, *Fisch.* b* *Mey. ex Hake*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 827.—Reg. Cancas.
maculatum, Willd. Ennui. Hort. Berol. Suppl. 16= aureum.
magellense, *Tenore, Prod. Fl. Neap. App.* iv. 15.—Neapol.
Meyeri, *Boiss.* b* *Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 103.—Persia,
millefolinm, *DC. Prod.* iv. 226.—Reg. Cancas.
millefolium, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 149 = Vicatia millefolia.
minimum, *Vand. Fasc. PI.* 11.—Italia.
monogonum, Kit. ex Link, Enntn. Hort. Berol. 1. 281 = anreum.
neglectum, *Zinger.in Bull. Soc. Nat. Mosc.* lvi. (1881) I. 818.—Rossia.
nemorosum, Hoffm. Gen. Umb. 45 = Anthriscns nemorosa.
nemorosum, Lag. ex DC. Prod. iv. 924-Anthriscus Cerefolium.
nitens, Tnrcz. ex Bemh. in Linnaea, xii. (1838) Litt. 76 = Anthriscus nitens.
nitidum, Wahlenb. Fl. Carp. 85 = Anthriscus alpestris.
nodosum, *Crantz, Cl. Umb. Emend.* 76; *Lam. Encyc.* i. 685.—Europ.; As. Min.; Afr. bor.
odoratum, Crantz, 1. c 75 ; Lam. 1. c 688; Fl. Fr. iii. 489-Myrrhis odorata,
orientate, Willd. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 908=byzantinnm.
orthostylum, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1876) 278.—Reg. Cancas.
pallescens, Presl, ex DC. Prod. iv. 227-hirsutum.
palustre, Lam. Encyc i. 688—birsntnm.
Pecten-Veneris, Crantz, Stirp. Austr. ed. L fasc. ii. 66; ed. II. 189 = Scandix Pecten-Veneris.
pinnatifidum.Voit. Encyc. v. 144=Scandix pinnatifida.
polonicnm, *Jastrtebowski, ex Rostaf. Fl. Polon. Prod.* 112.—Europ.
Prescottii, DC. Prod. iv. 225 = bnlbosnm.
procumbens, *Crantt, Cl. Umbell. Emend.* 77.—Am. bor.
reflexum, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1882) 164—villosnm.
reflexum, *Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 283.—Reg. Himal.
rigidum, Huet, ex Nym. Consp. 800-Villarsii.
roseum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* l. 234.—Reg. Cancas.
rostratum, Lam. Encyc. i. 685-Scandix Pecten-Veneris.
sativum, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 232 - Cancalis trichosperma.
sativum, Lam. Fl. Fr. iii. 438-AnthriscnsCerefolium.

CHAEBOPHTIJ.trM :-
scabrum, Thunb. Fl. Jap. 119 = Cancalis Anthriscus.
siculum, Gnss. Fl. Sic. Prod. i. 852-Anthriscns sicnla.
sphallerocarpus, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 867.—Soongaria.
sylvestre, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 281= maculatum.
sylvestre, Linn. Sp. PI. 258 = Anthriscus sylvestris.
syriacum, *Hempr.* b" *Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 904.—Syria.
Tainturieri, *Hook. & Am. in Hoot. Comp. Bot. Mag.* i. (1885) 47.—Texas.
temulentum, Linn. Fl. Suec. 94 =temnlnm.
temuloides, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Se>. IIL ii. (1844) 64.—Persia.
temulnm, *Linn.Sp. PI.* 258.—Europ.; Afr. bor:; Reg. Caucas.
tenuifolium, *Pair. Encyc. Suppl.* iv. 342.—Morocco.
tenuifolium, Stev. in Hoffm. Gen. Umbell. ed. II. 212 -millefolium.
tomentosum, *Pair, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 339.—Hab.?
torquatum, DC. Fl. Fr. Snppl. 605-Anthriscus alpestris.
trapnunHnum, Boiss. Fl. Orient, ii. 908 - temuloides.
trichosprrmum, Lam. Encyc. i. 685-Caucalis trichosperma.
tuberculosum, Poir. Encyc. Suppl. iv. 342 - Anthriscus famarioides.
tuberosum, C. A. Mey. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 587=Carum cylindricum.
tuberosum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 281.—Reg. Himal.
tumidum, Gilib. Fl. Iituan. ii. 28 = Anthriscus sylvestris.
umbrosum, Jord. Obs. PI. Crit. vii. (1849) 80 - hirsutum.
verticillatum, Pen. Syn. L 320—bulbosum, Anthriscus vulgaris.
Villarsii, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. I. 317.—Europ.
villosnm, *Wall. Cat.* n. 658.—Reg. Himal.
villosum, Wall. 1. c. partim—reflexum.

CHAETACANTHUS, Nees, in Lindl. Introd.Nat. Syst. ed. II. 444 (1836) = CalophaneB.D.Don (Acanthac).
Burchellii, Nees, in DC. Prod. xi. 462 = Cal. Burkei.
costatus, Nees, 1. c-Calophanes costatus.
glandulosus, Nees, 1. c. = Calophanes Persoonii.
Persoonii, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 857=Calophanes Persoonii.
repandus, A. Gray, in Proc Am. Acad. v. (1861-62) 349.—Ins. Fiji.
setigera, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 444—Calophanes Persoonii.

CHAETACHLAENA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 266=Onoseris, DC. (Compos.).
acerifolia, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1666 = 0. acerifolia.
annua, D. Dietr. 1. c - O . annua.
Cumingii, D. Dietr. 1. c.=O. Cnmingii.
ódorata, D. Don, in Trans. linn. Soc xvi. (1830) 256 =O. odorata.

CHAETACHME, Planch, in Ann. Sc Nat Ser. III. x. (1848) 340. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 866.
aristata, *Planch. 1. c.* 841.—Afr. austr.
madagascariensis. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 448.—Madag.
Meyeri, Harv. Thes. Cap. i. 16-aristata.
nitida, *Planch,* b" *Hart, in Han. Thes. Cap.* 16.—Afr. austr.

CHAETADEIiPHA, A. Gray, ex S. Wats, in Am. Natural, vii. (1873) 801; et in Proc Am. Acad. ix. (1874) 218. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1288.
Wheeleri, *A. Gray, U. cc-*—Arizona.

CHAETAEA, Jacq. Ennm. PI. Carib. 2 (1760) = Buettneria, Loefl. (Stercul.).
aculeata, Jacq. 1. c. 17-B. carthaginensis.

CHAETAGASTRA, Crneg. in Linnaea, xx. (1849) 101, sphalm. = CHAETOGASTRA, DC.-Tlbouehina, Aubl. (Melast.).

CHAETANTERA, Less. Syn. Comp. Ill (1882) = Chaetanthera, Ruiz & Pav. (Compos.).

CHAETANTHERA, Nntt. in Jonm. Acad. Philad. vii. (1834) 111-Chaetopappa, DC. (Compos.).
asteroides, Nutt 1. c. - Chaetopappa asteroides.

CHAETANTHERA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 106. t. 23 (1794). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 496.
ALDUNATBA, Remy, in C Gay, Fl. Chil. iii. 820. t. 38 (1849).
CARMELITA, C. Gay, in DC. Prod. vii. 14 (1888).
CHERINA, Cass. in Diet. Sc. Nat viii. 437 (1817).
CHONDROCHILUS,PM1. in Linnaea,xxviii. (1856)711.
EGANIA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 324 (1849).
ELACHIA, DC. Prod. vii. 256 (1838).
EUTHRIXIA, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1830) 257.
MINYTHODES, Phil, ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 496 (1873).
ORIASTRUM, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 50. t. 257 (1847).
PROSELIA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 234.
TVLLOMA, D. Don, 1. c. 238 (1830).
argentea, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 392 -chilensis.
argentea, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 789.—Chili.
Berteriana, *Less. Syn. Comp.* 111.—Chili.
Berteroana, Hook. & Am. in Comp. Bot Mag. i. (1886) 104=praec
Caput-Tringae, Less, ex DC. Prod. vii. 82 = limbata.
chilensis, *DC. in Ann. Mus. Par.* xix. (1812) 70.—Chili.
chilensis, Hook. & Am. in Bot. Beech. Voy. 29 =incana.
ciliaris, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 340 = spathulata.
ciliata, *Rui* (f Pav. Syst. Veg. Per. et Chil.* 190.—Chili,
crenata, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 302.—Chili,
crispa, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 789.-Chili,
dealbata, *Hoot,* b[1] *Am. in Comp. Bot. Mag.* i. (1836; 104.—Chili,
debilis, *Meyen* b[1] *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 287.—Chili.
elegans, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 712.—Chili.
eryngioides, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 391-tenuifolia.
fiabellata, D. Don, 1. c.-mnlticaulis.
glandulosa, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 311. t. 35. f-1.—Chili.
grandiflora, *Steud. Nom.* ed. II. i. 340.—Chili,
humilis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 740.—Chili,
incana, *Poepp. ex Less, in Linnaea,* v. (1880) 284.—Chili.
Kunthiana, Less. Syn. Comp. 114=tenella.
limbata, *Less. I. c.* 116.—Chili.
linearifolia, Poepp. ex Steud. Nom. ed. II. i. 840 = lfnearis.
linearis, *Poepp ex Less. Syn. Comp.* 112.—Chili,
linifolia, *Bert, ex Less. I. c*—Chili.
magellanica, Spreng. Syst. iii. 603 =Perezia lactucoides.
microphylla, Hook. & Am. in Comp. Bot. Mag. i. (1885) 104-linifolia.
moenchioides, *Less. Syn. Comp.* 118.—Chili,
multicaulis, *DC. Prod.* vi. 31.—Chili.
multiflora, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aequin. ii. 168-Perezia multiflora.
pernviana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 144.—Peruv.
pinnatifida, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. ii. 170-Perezia pinnatifida.
prostrata, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 391 -multicaulis.
pungens, Humb. *Sc* Bonpl. PL Aequin. 146. t. 127 " Perezia pungens.
pnsilla, *Hook,* b[1] *Am. in Comp. Bot. Mag.* i. (1886) 106.—Chili.
ranwsissima. Hook. & Am. 1. c 104—moenchioides, tenella.
recurvata, Spreng. Syst. iii. 608=Perezia recurvata.
scariosa, D. Don, in Phil. Mag. (1882) 391=incana.
sericea, Lag. ex DC. Prod. vii. 30-chilensis.
serrata, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. Per. et Chil. 191 = chilensis.
spathulata, *Poepp. ex Less, in Linnaea,* v. (1830) 886.—Chili.
spinulosa, Cass. Opusc. ii. 103=tennifolia.
tenella, *Less. Syn. Comp.* 114 ; *DC. in Deless. Ic. Set-* iv. t. 82.—Chili.
tenuifolia, *D. Don, in Phil. Mag.* (1882) 891.—Chili;
valdiviana, *Phil, in Linnaea.xxyiii.* (1856) 712.-Chilivillosa, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 891,—Chili.
Volkmanni, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 740--" Chili.

CHAETANTHU8, R. Br. Prod. 251 (1810). *RESTIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1034.
PRIONOSEPALUM, Steud. Syn. PI. Cyp. 266 (1855).
leptocarpoides, *R. Br. I. c*—Austral.

CHAETARIA, Beauv. Agrost. 80.18(1812)=Aristida, Linn. (Gramin.).
Adscensionis, Roem. & Schnlt. Syst ii. 390=A. Adscensionis.
affinis, Roem. & Schult. Syst. ii. Mant. 210-A. purpurascens.
Antillarum, Roem. & Schnlt. Syst. it 395 - A. Antillarum.
Ascensionis, Beauv. Agrost. 80=A. Adscensionis.
bipartita, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 187-A. bipartita.
bromoides, Roem. *Sc* Schult Syst. ii. 396=A. setifolia.
caerulescens, Beauv. Agrost. 80=A. coerulescens.
calicina, Beauv. 1. c.=A. calydna.
canariensis, Beauv. 1. c. = A. coerulescens.
capensis, Beauv. 1. c.=A. capensis.
capillacea, Beauv. 1. c = A. capillacea.
capillaris, Nees, Agrost. Bras. 388= A. capillacea.
coarctata, Roem. *Sc* Schult. Syst it 396 = A. setifolia.
congesta, Nees, Fl. Afr. Austr. 189=A. congests.
curvata, Nees, L c. 186 = A. coerulescens.
cyanantha, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 141 = A. cyanantha.
depressa, Beauv. Agrost. 80=A. Adscensionis.
divaricata, Beauv. I. c. = A. divaricata.
divaricata, Nees, Agrost. Bras. 887 = A. longifolia.
elatior, Beauv. 1. c = A. coerulescens.
tUiptica, Nees, Agrost Bras. 389 = A. elliptica.
fasciculata, Roem. & Schult. Syst. ii. Mant. 578 = A. fasciculata.
festucoides, Beauv. Agrost 80=A. Adscensionis.
Forskolii, Nees, Fl. Afr. Austr. 188 = A. paniculata.
fitrcata,Sea.m. Agrost. SO(=*Eutriana juneifolia*).—Ind. occ.
gibbosa, Nees, Agrost. Bras. 383=A. gibbosa.
gigantea, Beauv. Agrost. 80=A. Adscensionis.
glauca, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 688 = A. longiramea.
gossypina, Beauv. Agrost. SO; Roem. & Schnlt. Syst ii. 391 = A. gossypina.
Histrix, Beauv. 1. c = A. Hystrix.
wmilis, Roem. & Schult. Syst. ii. 896 = A. humilis.
Hystrix, Roem. & Schult. 1. c. 890=A. Hystrix.
'nterrupta, Beauv. Agrost. 30=A. interrupta.
laevis, Nees, Agrost. Bras. iL 884=A. laevis.
'•"marckii, Roem. & Schult Syst. ii. 393 = A. stlpiformis.
'"toniensis, Beauv. Agrost. 80=A. luzouiensis.
**"»*ritiana*, Nees, Fl. Afr. Austr. 188 = A. Adscensionis.
"Hgapotamica, Roem. 8c Schult. Syst ii. Mant. 578 = A. megapotamica.
iturina, Nees, ex Trin. *Sc* Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Mr. VI. vii. (1849) 160 = A. Royleana.
""""a, (fees, ex Steud. Norn. ed. II. i. 340=A. nana.
°fygantha, Beauv. Agrost. 30 = A. oligantha.
**"'«»«*, Beauv. 1. c.=A. oligantha.
*P*rpurascens*, Beauv. 1. c. = A. coerulescens.
*r*cemosa*, Beauv. 1. c.=A. racemosa.
T-mosa, Roem. & Schult. Syst. ii. 897 = A. ramosa.
*r{**rvata*, Roem. *Sc* Schult. 1. c. = A. recurvata.
Ko fleana, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 14S=A. Royleana.
***«cea*, Beauv. Agrost 80=A. setacea.
*St**Mia*, Roem. *Sc* Schult Syst. ii. 396 = A. setifolia.
Sti"?"'' R°"n- * Schult. Syst ii. Mant. 578 = A. Hystrix.*
*spadicea*i, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 397 = A. spadicea.
spadicea, Nees, Agrost Bras. 885=A. tincta.
*squarrosa*i, Roem. & Schult. Syst. iL Mant 577 = A. squarrosa.
stipaeformis, Beauv. Agrost. 80 = Avena stipaeformis.
stricta, Beauv. 1. c.-A. stricta.
teneriffae>> Beauv. 1. c.=Panicum Teneriflae.
torta, Nees, Agrost. Bras. 886=A. tincta.
trichodes, Nees, in Hook. Kew Jouro. ii. (1860) 101 = A. Cumingiana.
tuberculosa, Roem. & Schult. Syst. ii. Mant 211 = A. tuberculosa.
vestita, Beauv. Agrost. 80-A. veitiu.

CHAETHYMENIA, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 298. t. 62 (1841) = Jaumea, Peis. (Compos.).
pedunculatis, Hook. & Am. 1. c = J. pedunculatis.

CHAETItnil.Nees, Agrost. Bras. 269 (1829). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1104.
BBRCHTOLDIA, Presl, Rel. Haenk. 328. t. 43 (1830).
bromoides, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 46.—Mexic.
festucoides, *Nees, Agrost. Bras.* 270.—Bras.

CHAETOBROMUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. IL 449 (1886) =Danthonla, DC. (Giamin.).
Dregeanus, Nees, Fl. Afr. Austr. 843 = D. Dregeana.
fascicularis, Nees, 1. c 841 = D. fascicularis.
intercept™, Nees, 1. c. 342=D. intercepts
involucratus, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst ed. II. 449=D. involucrata.

CHAETOCAjyjTX, DC. Mém. Lég. 262 (1825). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 513.
BONNINGHAUSIA, Spreng. Syst. iii. 245 (1826).
PLANARIUM, Desv.in Ann. Sc. Nat. Sér. Lix. (1826) 416.
RHAOINOCARFDS, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 108.
acutiflora, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 75.—Am. austr.
brasiliensis, *Benth. 1. c.*—Am. austr.
hebecarpa, *Benth. I. c.* 76.—Am. austr.
latifolia, *Benth. I. c.* 75.—Am. austr.
latisiliqua, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 81. t. SO.—Panama,
longiflorus, *Benth. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 423.—Bras,
parviflora, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 74.—Am. austr.
polyphylla, *Benth. I. c.* 76.—Am. austr.
pnbescens, *DC. Prod.* ii. 248.—Ins. S. Doming.
Sehottii, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 56.—N. Mexic.
vincentina, *DC. Prod.* ii. 243.—Ins. S. Vincent
Wislizeni, *A. Gray, PL Wright. I* 51.—Am. bor. occ.

CHAETOCAPNIA, Sweet, Hort. Brit ed. III. 685 (1839) = COETOCAPNIA, Link & Otto = Bravoa, Lex. (Amaryllid.).
geminiflora, Sweet, L c. = B. geminiflora.

CHAETOCARPUS,SchTeb.Gen.75(1789)=Pouteria, Aubl. (Sapotac).
Ponteria, J. F. Gmel. Syst. 248=P. guianensis.

CHAETOCAEPU8, Thw. in Hook. Kew Jonra. vi. (1854) 300. t. 10. *EUPHORBLACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 823.
RBGNALDIA, BailL AdansonU, i. (1860-61) 187.
Blanchetii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 507.—Bras,
castanocarpus, *Thw. Erntm. PI. Zeyl.* 275.—Ind. or.; Malaya.
coriaceus, *Thw. I. c*—Zeylan.
myránites, *Baill. Adansonia,* xi. (1878) 95.—Bras.
Pohlii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 508.—Bras.
pungens, Thw. in Hook. Kew Joura. vi. (1854) 301 = castanocarpus, coriaceus.

CHAETOCEPHALA, Barb. Rodr. Orch. Nov. ii. 37 (1881)=FleurothalUa, R. Br. (Orchid.).
lonchophylla, Barb. Rodr. 1. c. 89.—Bras.
punctata, Barb. Rodr. 1. c 88.- Bras.

CHAETOCHILUS, Vahl, Enum. i. 101 (1805) = SchwenMa, Linn. (Solanac).
lateriflarus, Vahl, 1. c.=S. brasiliensis.

CHAETOCLADUS, SenilU [Nelson], Pinaceae, 161 (1866)=Ephedra, Linn. (Gnetac).
altissima, Senilis [Nelson], 1. c. 162 = E. altissima.
distachys, Senilis [Nelson], 1. c = E. volgáris.
fragilis, Carr. Conif. ed. II. 860, Index = E. fragilis.
monostachys, Senilis [Nelson], Pinac 162 = E. vulgaris.

CHAETOCRATER, Rnfc & Pav. Prod. Fl. Per. 61. t. 86 (1799) = Casearia,Jacq. (Samydac).
capitatus, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. 1896; Syst. 10b = Casearia sylvestris.
fasciculatus, Ruiz & Pav. U. cc. 896, 107»Casearia punctata.

CHAETOCYPERUS, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 289 =Eloocharis, R. Br. (Cyperac.).
acicularis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 94 -~*E.* acicnlaris.
albibracteatus, Nees & Meyen, in Act. Nov. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 95 =E. albibracteata.
arenicola, Steud. Syn. PI. Cyp. 78=E. Chaetaria.
Baldwinii, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 295=E. Baldwinii.
bonariensis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 96 = E. bonariensis.
capillaceus, Nees, 1. c 93 =E. capillacea.
costulatus, Nees & Meyen, in Act Nov. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 96=E. acicnlaris.
depauperatus, Steud. Syn. PI. Cyp. 78 = E. Chaetaria.
emarginatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. il. I. 96.—Bras.
Jamesoni, Steud. Syn. PI. Cyp. 74.—Ecuador.
Limnocharis, Nees, in Wight, Contrib. 96 = E. Chaetaria.
membranaceus, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. < 1862' (1868) 10=Scirpusnanns.
niveus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 242 = E. Chaetaria.
obtusatus, Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 94=E. Chaetaria.
polymorphic, *Nees*, in Linnaea, ix. (1834) 289=E. acicularis, ochreata, Scirpus cernuus, nanus.
punctatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 98.—Bras.
pusillus, Steud. Syn. PI. Cyp. 74 = Scirpus nanus.
pygmaeus, Torr. ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. 524 = Scirpus nanus.
radicans, Steud. Syn. PI. Cyp. 74 = E. acicularis.
reptans, Boeck. in Flora, xl. (1857) 34 = E. minima ?
rugulosus, Nees, in Bonplandia, iii. (1855) 86=E. Chaetaria.
setaceus, Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 94 = li. Chaetaria.
stoloni/erus, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 695=E. montana.
subarticulatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 96.—Bras.
tenuiculus, Nees, 1. c. = E. Rothiana.
trichoides, Steud. Syn. PI. Cyp. 73 = E. acicularis.
urceolatus,Uebm.ia Vidensk. Selsk.Skr. V. ii. (1851) 243=E. minima.
viviparus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. !. 93 = E. tenuissima.

CHAETODISCUS, Steud. Syn. PI. Cyp. 261 (1855) = Eriocaulon, Lino.
Gilberti, Steud. 1. c—Austral.

CHAETOGASTRA, DC. Prod. iii. 131 (1828); Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 127 =Tibouehlna, Aubl. (Melast).
alpestris. Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 101=Pterolepis alpestris.
asperior, Cham, in Linnaea, ix. (18S4) 435=T. asperior.
bicolor, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 128 *(=Pleroma bicolor)*.—Boliv.
Bonplandiana, Naud. *l'*. c. 137 = Brachyolum ledifolium.
Callichaeta, Benth. in Hook. Joom. Bot. ii. (1840) 291 =Pterolepis glomerata.
campanularis, Benth. PI. Hartw. 181=Brachyotum Benthamianum.
campanularis, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. IH. xiv. (1860) 130=Brachyotum campanulare.
canescens, DC. Prod. iii. 134 = Brachyotum canescens.
cardinalis, DC. 1. c.=T. cardinalis.
cataphracta, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 451 = Pterolepis cataphracta.
cernua, DC. Prod. iii. 186=Brachyotum cerauum.
Chamaecistus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 267 (=*Pleroma Chamaecistus).—lad.* occ.
chironioides, Griseb. 1. c. *(^Pleroma strigosutn, chironioides).—lt>A.* occ.
ciliaris, DC. Prod. iii. 132 *{-Pleroma ciliare).—!*.* Granat
dstoides, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 267 (=*Pleroma cistoides).—1ta.* S. Vincent
clinopodifolia, DC. Prod. iii. 183 =T. dinopodifolia.
conferta, DC. 1. e. 135 » Brachyotum confertnm.
cubensis, Griseb. Cat PI. Cob. 103=Chaetolepi» saturaeioides.

CHAETOGASTRA :—
debilis, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 499=Tibouchina debilis.
debilis, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 540=T. nrsina.
depauperata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiv. (1850) 129=T. longifolia.
divaricata, DC. Prod. iii. 132 = Pterogastra divaricata.
echinata, DC. Prod. iii. 135 *{=Pieroma echinatum).* —Peruv.
ferruginea, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 423=T. longifolia,
fioribunda, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Anstr. 59 = Brachyotum floribundom.
fraterna, DC. Prod. iii. 133=T. gracilis.
Geitneriana, Schlecht. in Linnaea, xxvii. (1864) 628.—N. Granat.
glomerata, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 290 «= Pterolepis glomerata.
Goudotii, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiT. (1850) 131 = Brachyotum strigosum.
gracilis, DC. Prod. iii. 188 = T. gracilis.
havanensis, DC. 1. c. 182 = T. longifolia.
hermannioides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiv. - (1850) 183 = Brachyotum hermannioides.
hieracioides, DC. Prod. iii. 133 = T. hieracioides.
hirsuta, DC. 1. c =T. gracilis.
hispida, DC. 1. c 132 = T. longifolia.
hypericoides, DC. 1. c —Desmoscelis villosa.
ladanoides. Mart. Herb. Fl. Bras. n. 500=Pterolepis trichotoma.
lanceolata, DC. Prod. iii. 131 = T. longifolia.
lasiophylla, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 291 = T. lasiophylla.
lepidota, DC. Prod. iii. 184-T. lepidota.
Lhotskyana, Stend. in Flora, xxvii. (1844) 720 = T. Lhotzlcyana.
Lindeniana, Planch, in Fl. des Series, Sér. I. (1854-55) 113. t. 1011-12 = T. grossa.
longifolia, DC. Prod. iii. 132 = T. longifolia.
lutescens, Griseb. ez Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 48 = Brachyotum lutescens.
lutescens, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 184 = Brachyotum Nandini.
lychnitoides, DC. Prod. iii. 132 - Desmoscelis villosa.
Afartiana, Benth. in Hook. Joorn. Bot. ii. (1840) 290 = T. herbacea.
microdon, Naud. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. xiv. (1850) 134 = Brachyotum microdon.
microphylla, Naud. 1. c. 186 = Brachyotum microphyllum.
mollis, DC. Prod. iii. 184 *(=Pleroma exappendiculatum).*—Peruv.
Moritriana, Klotzsch, ex Triana; in Trans. Linn. Soc xxviii. (1871) 46 *{~Pleroma Naudinianum).—ti.* Granat
multiflora, Benth. PI. Hartw. 181=Monochaetnm Hartwegianum.
muricata, DC. Prod. iii. 134-T. grossa.
Naudiniana, Decne. in Rev. Hortic. Sér. III. i. (1847) 86 *(=Pleroma Naudinianum).*—Mexic
nigriiella, Naud. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. xiv. (1850) 187 = Bucqnetia nigritella.
origanoides, Griseb. Cat. PI. Cab. 103=Chaetolepis cubensis.
panicularis, Naud. in Ann. Sc Nat. Ser. III. xiv. (1850) 129 *(, = Pleromapaniculare).—Bo\iviz.*
Penilandii, Naud. 1. c. 133 •= Brachyotum Pentlandi.
quinquenervis, Nand. I. c 180 = Brachyotum quinquenerve.
reparida, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 100. t. 246 = Pterolepis repanda.
reticulata, DC. Prod. iii. 131 = T. reticulata.
rhynchanthera, Benth. PI. Hartw. 180 = Monochaetum Bonplandii.
rosea, Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov. 81.—Hab. ?
Tosmarinifolia, Benth. PI. Hartw. 181 = Miconia ledifolia.
rosmarinifolia, Nand. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiv. (1850) 131 - Brachyotum rosmarinifolinm.
rostrata, Naud. 1. c. 185 = Brachyotum rostratum.
rufipilis, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 430 *{^Pleroma rufipile).*—Mexic.
sanguinolenta, Nand. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xiv. (1850) 131 = Brachyotum sanguinolentum.
sarmentosa, DC. Prod. iй. 134 *(-=Pleroma laxum).*—Peruv.
saturejoides, Griseb. Cat. PL Cnb. 108-Chaetolepis saturaeioides.

CHAETOGASTRA :—
scabriuscula, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 431 *("Pleroma scabriusculum).*—Mexic.
Sckiedeana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 566 *{ = Pleroma rufipile).*—Mexic.
sherardioides, DC. Prod. iii. 133—Pterolepis glomerata.
speciosa, DC. 1. c. 181 = Meriania speciosa.
stachyoides, DC. 1. c. 132 = Desmoscelis villosa.
stricta, Benth. PI. Hartw. 180 = Brachyotum cemuum.
stricta, DC. Prod. iii. 184= Brachyotum strigosum.
strigillosa, DC. 1. c. 188 =>T. gracilis.
strigosa, DC. 1. c. iii. 134 *{=Pleroma strigosum).*—Am. austr.
striphnocalyx. Mart. Nov. Gen.et Sp. iii. 101. t 246-Pterolepis striphnocalyx.
sulphurea, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. xiv. (1850) 185 = Brachyotum ledifolium.
tortuosa, DC. Prod. iii. 132 *(=Pleroma mexicanum).* —Mexic.
Weddelliana, Nand. in Ann. Sc Nat Sér. III. xiv. (1850) 129 *{^Pleroma paniculate).*—Bolivia.

CHAETOLEPIS, Miq. Comm. Phyt. ii. 72 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 744.
HAPLODESMIUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 154. t. 5.
TRIMERANTHUS, Karat, in Linnaea, xxx. (1859-60) 159.
alpestris, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 51.—Venezuela,
alpina, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. xiv. (1850) 140.—Bras.
anisandra, *Naud. 1. c.*—Bras,
cubensis, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 51.—Cuba.
ericoides, Triana, L c 61. t. S. f. 85^-Marcttia ericoides.
heterophylla, *Triana, 1. c.* 61.—Uruguay.
Lindeniana, *Triana, I. c.*—N. Granat
loricarella, *Triana, 1. c.*—N. Granat.
microphylla, *Miq. Comm. Phyt.* 72.—N. Granat
saturaeioides, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 61.—Cuba,
thymifolia, *Triana, 1. c.* 60.—N. Granat

CHAETONYCHIA, Sweet, Hort. Brit ed. III. 263 (1889)=Paronychia, Juss.
cymosa, Sweet, 1. c.=P. cymosa.

CHATiTOPAPPA, DC. Prod. v. 301 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 268.
CHAETANTHERA, Nutt. in Joum. Acad. Sc. Philad. vii. (1834) 111.
CHAETOPHORA, Nutt. ex DC. Prod. v. 801, in syn. (1836).
DIFLOSTELMA, Rafin. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 187 (1840).
DISTASIS, DC. Prod. v. 279 (1886).
asteroides, *DC. I. c.* 301.—Am. bor.
modesta, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 82. —Mexic.
Parryi, *A. Gray, 1. c.*—Texas.

CHAETOPHORA, Nutt. ex DC. Prod. v. 301, in syn. (1836) = Chaetopappa, DC. (Compos.).
asteroides, Nutt. ex DC. 1. c —• Chaetopappa asteroides.

CHAETOPTELEA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1850)76 = Ulmua, Linn. (Urticac).
mexicana, Liebm. 1. c. 77—U. mexicana.

CHAETOSCIADIUM, Boiss. Fl. Orient, ii. 1078 (1872) = TORILIS, DC. = Cauoalifl, Linn. (Umbellif.).
trichospermum, Boiss. 1. c—Cane trichosperma.

CHAETOSPORA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 229 (1816) =Hynchospora, Vahl (Cyperac).
aurea, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (,1831) 28 = R. aristata.
aurea, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 231 - R. aurea.
capitata, H. B. *Sc* K. 1. c 229 = R. capitata.
ferruginea, Cham. & Schlecht in Linnaea, vi (1831) 28, partim-R. eximia.
ferruginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 85 » R. glauca.
pterocarpa, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 230 - R. pterocarpa.

CHAETOSPORA :-
triceps, Cham. *Sc* Schlecht in Linnaea, vi. (1831) 29 = Rynchospora triceps.
vicoMensis, Schrad. ex Roem. & Sennit. Syst. il. Mant. 46=R-glauca.

CHAETOSPORA, R. Br. Prod. 232 (1810) = Schoenua, Linn. (Cyperac).
albeseens, French. *Sc* Sav. Enum. PI. Jap. ii. 548 = S. apogon.
alpina, F. Muell. Fragm. ix. 39=Carpha alpina.
anceps, R. Br. Prod. 238=Mesomelaena anceps.
antarctica. Hook. f. Fl. Antarct. ii. 361. t. 147.—Chili.
arundinacea, A. Dietr. Sp. PI. ii. 31=Asterochaete arundinacea.
aurata, Nees, in Ann. Nat. Hist Ser. I. vi. (1841) 49 = S. curvifolius.
avenacea, F. Muell. Fragm. ix. 40 = Cyathochaeta avenacea.
axillaris, R. Br. Prod. 288=S. axillaris.
brevisetis, R. Br. 1. c 232 = S. brevisetis.
brevisetis, F. Muell. Fragm. ix. 87=S. capltatns.
Burmanni, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 82. t. 8. f. 4.—Afr. austr.
calostachys, R. Br. Prod. 238=S. calostachyus.
capillacea, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 81. t. 141 A = Elynanthus capillaceus.
capillacea, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 299 ; x. (1836) 192=S. capillaceus.
capillaris, F. Muell. Fragm. ix. 34=Elynanthus capillaceus.
Capitellum, A. Dietr. Sp. PI. ii. 27-Ficinia setiformis.
ciliata, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 128 = Rynchospora elatior.
circinalis, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2070 - S. circinalis.
clandestina, F. Muell. Fragm. ix. 40 = Cyathochaeta clandestina.
compressa, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 71 > Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 85 = Scirpus Caricis.
concava, Nees, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 47 = Lepidospermum concavum.
concinna. Hook. f. Fl. N. ZeaL i. 274. t 62 B = S. concinnus.
cruenta, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 85=S. cruentus.
curnfolia, R. Br. Prod. 232 = S. curvifolius.
cuspidata, Nees, in Linnaea, vii. (1882) 529=Elynantnus cuspidatus.
cygnea, Nees, in Ann. Nat. Hist. Ser. L vi. (1841) 49 =S. brevisetis.
dactyloides, A. Dietr. Sp. PI. ii. 32 = Asterochaete glomerata.
deformis, R. Br. Prod. 282 = S. deformis.
deusta, F. Muell. Fragm. ix. 39 =Mesomelaena deusta.
diandra, F. Muell. 1. c = Cyathochaeta diandra.
diodon, Schrad. ex Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 148 = Rynchospora lnnata.
dispar, A. Dietr. Sp. PI. ii. S2 = Ficinia secunda.
distachya, Nees, in Linnaea, x. (1836) ,.92.—Afr. austr.
distans, F. Muell. Fragm. ix. 85=S. calostachyus.
effusa, Schrad. ex Kunth, Enum. PI. ii. 286 = Plenrostachys sparsiflora.
elongata, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 275 = Mesomelaena anceps.
ferruginea, Keichb. FL Germ. Excurs. 74=S. ferruginens.
fimbriolata, Nees, in Linnaea, x. (1836) 191.—Afraostr.
fimbristyhides, F. Muell. Fragm. ix. S4=Cladium undnlfttuin*
flexuosa, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 33. t. 3. f. S=S. flexuosus.
globosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 185 = Rynchospora globosa.
hexandra, Boeck. in Flora, lxi. (1878) 87.—Afr. austr.
imberbis, R. Br. Prod. 233=S. apogon.
japonica, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 648 " apogon.
laeta, Kunze, ex Steud. Norn. ed. II. i. 341-Fimbristylis aspera.
lanata, R. Br. Prod. 282=& lanatus.
laxa. Hook. f. Fl. AnUrct. ii. 361. t. 146-Carpb» paniculata.
lucens, Poir. in Diet Sc. Nat viii. 58=S. nitens.
madagascariensis, Stend. Syn. PL Cyp. 181-Madag.

CHAETOSPORA :—
Mauritii, Steud. Syn. PI. Cyp. 161-Rynchospora glauca.
microstachya, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 84 = Schoenns Drummondii.
microstachys, Schtad. AnaL FI. Cap. i. 33, in obs.=S. circinalis.
nana, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 86-S. nanus.
natans, F. Muell. Fragm. ix. 38=S. natans.
Neesii, Boeck. m Linnaea, xxxviii. (1874) 297- Trl-costularia Neesii.
nigricans, Kunth, Ennm. PI. ii. 323 = S. nigricans.
nitens, R. Br. Prod. 233 =S. nitens.
oligostachya, Boeck. in Flora, xlii. (1869) 101-S. nigricans.
oligostachya, F. Muell. Fragm. ix. 88 =S. bifidus.
paludosa, R. Br. Prod. 233 - Tiicostularia paludosa.
paniculate, Steud. Syn. PI. Cyp. 161.—Jns. Borbon.
pedicellata, R. Br. Prod. 232-S. pedicellatus.
pterosperma, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 230 = Haplostylis barbata.
punctoria, A. Dietr. Sp. PI. ii. 28 = Bueckia punctoria.
rhynchospermoid.es, Phil. f. PI. Vase. Chil. 306=seq.
rhynchosporoides, Stend. Syn. PI. Cyp. 162.—Chili.
robusta, Kunth, Ennm. PI. ii. 825.—Afr. austr.
rufa, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI. ii. 71 = Scirpus rnfus.
sphaerocephala, R. Br. Prod. 233-MesomeIaena sphaerocephala.
spieata, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 297 = Tricostularia compressa.
striata, A. Dietr. Sp. PI. ii. 27 = Ficinia setiformis.
stygia, R. Br. Prod. 233 -Mesomelaena stygia.
tenax, Hook. f. FI. N. Zel. i. 273=S. brevifolius.
Tendo, Hook. f. 1. c. = S. Tendo.
UneUa, Rupr. Sert. Tiansch. 34.—Turkestan.
tenera, A. Dietr. Sp. PI. ii. 82=S. tener.
tenuissima. Hook. f. FI. Tasm. ii. 81. t. 14 = Lepidospora tenuissima.
tenuissima, Steud. Syn. PI. Cyp. 319, 162=S. apogon.
tetragona, R. Br. Prod. 233 = Mesomelaena tetragona.
torbinata, R. Br. 1. c. 282=S. turbinatus.
"mbellulifera, Boeck. in Flora, lxy. (1882) 28=S. apogon.
•rillosa, Nees, ex Stend. Norn. ed. II. i. 341 = S. villosus.

CHAETOSTACHYS, Benth. in Wall. PI. As. Rar. ii. 19 (1881) = Lavandula, Tonrn. (Labiat.).
""tltiiida, Benth. L&-L. Burmanni.

CHAETOSTEMMA, Reichb. Consp. 176 (1828)-seq.

CHAETO8TOMA, DC. Prod. iii. 112 (1828). *&ELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 787.
acuminatum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 85.—Bras.
armatum, Cogn. 1. c. 81 = diosmoides.
eastratum, *Cogn. I. c.* 36.—Bras,
d'osmoides, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 180. t. 264.—Bras.
erieoides, DC. Prod. iii. 112 = Marcetia erieoides.
lastigiatnm, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. HL iii. (1845) - 131.—Bras,
^•rdneri, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) ^-26.t.l.f.8 c-Bras.
J"anovii• *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. HI. SO.—Bras.
»eiiae, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. iii. (1845) . *"I*—Bras,
'oagiflonun, *Cogn. in Mart. FI. Brat.* xiv. III. 82.—Bias.
•:•olicioides, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 882 = Microlicia Chamissois.
yfj^oum, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. <'87l)25,proparte.-Bra«.
J">nthentm, Triana, 1. c. pro parte -acuminatum, eastratum.
Pungens, DC. *Prod.* iii. 112.—Bras.
Riedelia nnm, *Cogn. in Mart. FI. Bras.* xiv. III. 33.—Bras.
ic, DC. Prod. iii. 112=Marcetia ericoides, 'etrasticha.

CHAETOSUS, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 226. *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. *(.* ii. 696.
l; "ETOsus, Benth. in Joum. Linn. Soc. i. (1857) 87.

CHAETOTHYIiAX, Nees, in Mart. FL Bras. ix. 153. t. 26 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1107.
CHAETOTHYLOKIS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 163.
HEINZELIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 153 (1847).
lythroides, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 1108.—Am. austr.
micranthns, *Benth. V Hoot./, ex Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* ii. 515.—Nicaragua,
phyllostachyus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 818.—Mexic
tocantinus, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 153.—Bras,
nmbrosus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 318.—N. Granat.

CH AETOTH YLOPSIS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 168 = Chaetothylax, Nees (Acanthac).
micrantka, Oerst. 1. c. = Chaetothylax micranthus.

CHAETOTBOPI8, Kunth, Rev. Gram. i. 72, 271. t. 47 (1880). *GRAM1NEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1151.
andina, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 68.—Peruv.
chilensis. *Kunth, Rev. Gram.* i. 72, 271. t. "47.—Chili.
latifolia, Phil, in Linnaea, xxx. (1859-60) 205 = chilensis.

CHAETOTROPSIS, D. Dietr. Syn. PI. i. 184 (1839) = praec.

CHAETTJRTJS, Link, in Schrad. Joum. ii. (1799) 313. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1149.
divaricatus, DC. Cat. Hort. Monsp. 98-fasciculatns.
fcsciculatns, *Link, in Schrad. Joum.* ii. (1799) 318.—Hispan.
prostratus, *Hack. V Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 223.—Lusitan.
spicatus, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. ex Steud. Norn. ed. II. i. 342-fascicularos.

CHAHiLETIA, DC. in Ann. Mus. Par. xvii. (1811) 153. *CHA1LLETIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 341.
DICHAPETALUM, Thou. Gen. Madag. 23 (1806).
LEUCOSIA, Thou. 1. c. (1806).
MESTOTES, Soland. ex Steud. Nom. ed. II. i. 342 (1842).
MOACURRA, Roxb. Hort. Beng. 21 (1814); Fl. Ind. ii. 69 (1832).
PATRISIA, Rohr, ex Stend. Nom. ed. II. i. 342 (1840).
PLAPPERTIA, Reichb. Consp. 146 (1828).
QUII.ESIA, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.176 (1887).
SYMPHYLLANTHUS, Vahl, in Skriv. Nat. Hist. Selsk. vi. 86 (1810).
WAHLEKBERGIA, R. Br. in Wall. Cat. p. 250, sub n. 4342 (1831).
affinis, Planch, ex Benth. in Hook. Niger Fl. 276 = toxicaria.
Bangii, *F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 195.—Afr. trap.
Benthamiana, *Turcw. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 610.—Ins. Philipp.
Benthamii, *F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 196.—Afr. trop.
Bojeri, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. viii. (1857) 86.—Malacca.
Brunoniana, Wall. Cat. n. 4038=Helferiana.
chlorina, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1857) 88.—Madag.
cnbensis, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. etSp.* iii. 41. t. 246. f. 8.—Cuba.
cymosa, *Hook. Ie. PI.* t. 6M.—Afr. anstr.
cymulosa, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 340.—Afr. trop.
deflexa, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 109.—Afr. trop.
deflexifolia, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 611.—Malaya.
Dichapetalum, *DC. Prod.* ii. 57.—Madag.
discolor, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 119.—Madag.
edulis, Kura, in Joum. As. Soc. Beng. xli. (1872) H. 298 = Sarcostigma edule.
erecta, G. Don, in Edinb. PhiL Journ. xi (1824) 348-toxicaria.
fasciculata, *Spreng. Syst.* i. 981.—Madag.
flavicans, *Klotisch, in Schemb. Fauna V Fl. Gui.* 1184, nomen.—Guiana.

CHAUIIIETIA:—
flexuosa, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 340.—Afr. trop.
floribunda, *Planch, in Hook. Ic. PI.* t. 792.—Afr. trop.
gelonioides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 670.—Ind. or.; Malaya.
Griffithii, *Hook./. 1. c.* 571.—Malacca,
hainanensis, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 822.—China.
Helferiana, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 297.—Burma.
Heudelotii, *Planch, ex Oliver, Fl. Trop. Afr. I* 344.—Afr. trop.
hirtella, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 88.—Ins. Mascar.
hispida, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 843.—Afr. trop.
lanuginosa, Maing. ex Hook. f. FL Brit. Ind. i. 572 - Griffithii.
Lanro-cerasus, *Planch, ex Hook.f. I. c.*—Ins. Penang.
Lencosia, *Spreng. Syst.* i. 931.—Madag.
longipetala, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 611.—Burma.
macrophylla, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 843.—Afr. trop.
mossambicensis, *Klotisch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 108.—Afr. trop.
nigrescens, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sh.* IV. viii. (1857} 85.—Madag.
oblonga, *Hook.f. ex Benth. in Hook. Niger Fl.* 277.—Afr. trop.
Pachypus, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. viii. (1867) ' 87—Madag.
pallida, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 848.—Afr. trop.
panicnlata, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 27».—Afr. trop.
papuana, *Becc. Malesia,* i. (1877) 176.—N. Guinea.
Parkerii, *Planch, ex Triana if Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sèr. V. xv. (1872) 379.—Venezuela,
pednnculata, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 164.—Guiana,
reflcxa, *Klotisch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 100. t. 20.—Afr. trop.
rufa, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. viii. (1857) 86.—Madag.
rufipilis, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868 I. 611.—Afr. trop.
sessilifiora, DC. in Anu. Mus. Par. xvii. (1811) 154 = Tapnra guianehsn.
snbauriculata, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 344.—Afr. trap,
subcordata, *Hook. f. ex Benth. in Hook. Niger Fl.* 277.—Afr. trop.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 328 = gelonioides.
Thomsoni, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 342.—Afr. trop.
timoriensis, *DC. Prod.* ii. 67.—Ins. Timor,
toxicaria, *G. Don, in Edinb. Phil. Journ.* xi. (1824) 348.—Afr. trop.
vestita, *Benth. in Hoot. Kew Journ.* iii. (1851) 372.—Bras.
Virchowii, *O. Hoffm.* b* *Hildeb. ex O. Hoffm. Sert. Madag.* 11.—Madag.
vitiensis, *Seem. Viti,* 434, nomen: *Fl. Vit.* 88.—Ins. Fiji.

CHAITAEA, Soland. ex Seem. Fl. *Vit.* 102 (1865) = Tacca, Font.
Tacca, Soland. ex Seem. 1. c. = T. pinnatifida.

CHAITURUS, Willd. Prod. Fl. Berl. 200 (1787) = Leonurus, Linn. (Labiat.).
leonuroides, Willd. 1. c. 201 -- L. Mairubiastrum.
Marrubiastrum, Spenn. in T. Nees, Gen. Fl. Germ, fasc. 18 t. 353 = L. Marrubiastrum

CHAIXIA, Lapeyr. Hist. PI. Pyr. Snppl. 38 (1818) = Bamondia, Rich. (Gesnerac).
Myconi, Lapeyr. 1. c 39 = R. pyrenaica.

CHAKIATELLA, DC. Prod. v. 563 (1836) = CHATIA-KELLA, Cass.-Wulffla, Neck. (Compos.).

CHALARIUM, Poit. ex DC. Prod. v. 546, in syn. (1886) -OGIERA, Cass. = Eleutheranthera, Poir. (Compos.).

CHALCANTHUS, Boiss. Fl. Orient, i. 211 (1867)» Heaperia, Linn. (Crucifer.).
renifolius, Boiss. 1. c. 212 - H. renifolius.

CHALCAS, Linn. Mant. 68 (1767)«Mun»ya, Koen. (Rutac.).
Cammuneng, Bonn. f. Fl. Ind. 104=M. exotica.
crenulata, F. Muell. Phyt. N. Hebr. 7 = M. crenulata.
intermedia, Roem. Syn. Hesper. i. 48 = M. exotica.
japanensis, Lour. Fl. Cochinch. 271 -M. exotica.
Koenigii, Knrz, in Joum. As. Soc. Beng. xliv. (1875) II. 182=M. Koenigii.
paniculata, Linn. Mant. i. 68=M. exotica.
ttumatrana, Roem. Syn. Hesper. i. 49-M. exotica.

CHALEPOA, Hook. f. Ic PI. 11082 (1871)=Tribeles, Phil. (Pittospor.).
magellanica, Hook. f. I. c.=T. australist

CHALEPOPHTLIiTTM, Hook. f. Ic. PI. t. 1148 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 50.
gnyanense, *Hook./. I.* c—Guiana.

CHALYBEA, Naud. in Ann. Sc. Nat *Sir.* III. xvi. (1851) 99=Pachyanthua, A. Rich. (Melastomac).
corymbifera, Naud. 1. c. 100 = P. coryrabosus.
corymbosa, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 97-P. corymbosus.

CHAHABAXNXA, Wight, Ic vi. 11. t. 1981 (1853). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 387.
cuspidata, *Wight, I. c.*—Ind. or.
sqttamigera, Wall. Cat. n. 4592; Wedd. in DC. Prod, xvi. I. 218 = cuspidata.

CHAMAEBATIA, Benth. PI. Hartw. 308 (1850). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 617.
foliolosa, *Benth. I. c*—Calif.
foliolosa, Newberry, in Pacif. Rail Rep. vi. 73 = Spiraea Millefolium.

CHAMAEBATIARIA, Maxim, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 225 = Spiraea, Linn. (Rosac).
Millefolium, Maxim. 1. c.=S. Millefolinm.

CHAMAEBETULA, Opiz, in Lotos, v. (1655) 258 = Betula, Tonra. (Cnpulif.).
acutifolia, Opiz, 1. c. 259.—Europ.
glandulosa, Opiz, 1. c.-B. glandulosa.
Gmelinii, Opiz, 1. c.-B. fruticosa.
Hoakeri, Opiz, 1. c.-B. glandulosa.
humilis, Opiz, 1. c. = B. humilis.
nana, Opiz, 1. c. = B. nana.
pumila, Opiz, 1. c. = B. pumila.
rotundifolia, Opiz, 1. c. = B. glandulosa.

CHAMAEBUXUS, [Toura.] Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 125 (18391 = Polygala, Linn.
alpestris, Spach, 1. c. 127 = P. Chamaebuxus.
arillata, Hassk. in Miq. Ann. Mns. Bot Lugd. Bat. i. 153-P. arillata.
eoriaeea, Opiz, Seznam, 28 = P. Chamaebuxus.
karensium, Knrz, For. Fl. Brit. Burma, L 79=P. karensium.
paniculata, Hassk. in Miq. Ann. Mm. Bot. Lugd. Bat. i. 154 = P. arillata.
polygaleoides, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 11 = P. Chamaebuxus.
pulchra, Hassk. PI. Jav. Rar. 294, in textu=P. pulchra.
Vayredae, Willk. Ulustr. PI. Hisp. 33. t. 23 = P. Vayredae.
venenosa, Hassk. PI. Jav. Rar. 294.—Java.
vulgaris, Schur, Enum. PI. Transs. 90=P. Chamaebuxus.

CHAMAECALAMUS, Meyen, Reise, i. 456 (1834) = Deyeuxia, Clar. (Gramin.).
spectabilis, Meyen, 1. c.; et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 156 *{=£romidium spectabile).*—Peruv.

CHAMAECASSIA, [Breyn] link, Handb. ii. 139 (1831) = Cassia, Toum. (Legumin.).
grandiflora, Link, 1. c. = Cassia laevigata.
laevigata, link, L c. = Cassia laevigata.

CHAMAECERASUS, [Toum.] Medic. Phil. Bot. i. 126 (1789)>Iionloera, linn. (Caprifol.).
alpigena, Medic. 1. c. =L. alpigena.
coerulea, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 181 = L. coerulea.
dumetorum, Delarb. 1. c.-L. Xylosteum.
fruticosa, Ser. in DC. Prod. ii. 587, sphalm.=Prunus

CHAMAECERASUS :—
nigra, Medic. Phil. Bot. i. 126; Pfl. Anat 390=L. nigra.
Standishii, Lescuyer, in L'Hortioult Franç. (1862) 138. t 10.—Hab.?
tatarica, Medic. Phil. Bot. i. 126; Pfl. Anat. 890-Lonicera tatarica.
Xylosteum, Medic Phil. Bot. i. 126=L. Xylosteum.

CHAMAECISTUS, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 401 (1821)-Iioiseleuria, Desv. (Ericac).
serpyllifolius, S. F. Gray, 1. c.=L. procumbens.

CHAMAECISTUS, Regel, Gartenfl. (1874) 60=Ehodododendron, Linn. (Ericac.).
austriacus, Regel, 1. c.=R. Chamaecistus. -
kamtschaticus, Regel, 1. c=R. kamtschaticum.

CHAMAECIiADON, Miq. in Bot. Zeit xiv. (1866) 564. *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 983.
angustifolium, *Schott, in Bonplandia,* vL (1858) 369.—Ins. Penang.
eonsobrinum, *Schott, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 126.—Sumatra.
Griffithii, *Schott, in Bonplandia,* vi. (1858) 369.—Malaya.
humile, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 213.—Ins. Penang.
lanceolatum, *Miq. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 564.—Java,
metallicum, *N. E. Brown, in Ulustr. Hortic.* xxxi. (1884) t. 539.—Borneo,
nigrescens, *Schott, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 126.—Sumatra,
obliquatum, *Schott, in Bonplandia,* vi. (1858) 369.—Ins. Penang.
ovalifolium, *Schott, in Ann. Mus. Bot. Lugd. bat.* i. 281.—Borneo,
ovatum, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 30.—Malaya.
purpurascens, Schott, 1. c vi. (1858) 869=lanceolatum.
pygmaeum, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 345 = lanceolatum.
nibescens, *Schott, Gen. Aroid.* sub t. 60, In ohs.—Hab.?
sanguinolentum, *Schott, Prod. Aroid.* 816.—Malaya,
saxorum, *Schott, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 280.—Borneo.
subcordatum, *Schott, I. c.* 281.—Borneo,
truncatum, *Schott, in Bonplandia,* vi. (1858) 369.—Burma.

CHAMAECLEMA, Moench, Meth. 393 (1794) = Nepeta, Toum. (Labiat.).
hederacea, Moench, 1. c = N. Glechoma.

CHAMAECNIDE, Nees & Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 203 (1853)=Pilea, Lindl. (Urticac).
microphylla, Nees, ex Miq. 1. c =P. mnscosa.

CHAMAECRISTA, Moench, Meth. 272 (1794) = CaBBia, Toum. (Legumin.).
Burmanni, Eckl. & Zeyh. Enum. 260=Cassia capensis.
capensis, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 172 = Cassia capensis.
comosa, E. Mey. Coram. PL Afr. Austr. 160 = Cassia comosa.
nictitans, Moench, Meth. 272 = Cassia nictitans.
plumosa, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 159 = Cassia mimosoides.
stricta, E. Mey. 1. c.=Cassia mimosoides.

CHAMAECYPARIS, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. (1842) 329=Thuya, Toum. (Conif.).
andelyensis, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 365 = *leptoclada.*
Boursieri, Carr. Conif. ed. II. 125 = *Lawsoniana.*
Boursieri, Decne. in Bull. Soc. Bot Fr. i. (1854) 70= Juniperus occidentalis.
breviramea, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. x. (1866) 489-T. obtusa.
decussata, Hort ex Carr. Conif. ed. II. 140 = T. orientalis.
ericoides, Carr. 1. c. = T. orientalis, occidentalis.
excelsa, Fisch. ex Carr. 1. c. 127 = T. excelsa.
glauca, Hort. ex Carr. 1. c. ed. I. 141=T. orientalis.
Keteleri, Stand, ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 466 = T. obtusa.
kewensis, Hort ex Carr. Conif. ed. L 183 - T. sphaeroidalis.

CHAMAECYPARIS :—
Lavsoniana, Parl. in Ann. Mus. Stor. Nat Fir. i. (1864) 181.—Am. bor. occ.
leptoclada, Henk. *Sc* Hocbst. Nadelhoelz. 257.—Japon.
nana, Hort. ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 464 •= Thuya sphaeroidalis.
nootkaënsis, Carr. Conif. ed. IL 127=*eq.
nutkainsis, Lindl. & Gord. in Joum. Hort Soc. v. (1850) 207 = T. excelsa.
nutkatensis, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. 833-praec.
obtusa, Sieb. *Sc* Zucc. in Endl. Conif. 63=T. obtusa.
pmdula, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. x. (1866) 489 » T. obtusa.
pisifera, Sieb. *Sc* Zucc. in Endl. Conif. 64 = T. pisifera.
pseudosquarrosa, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 467 - T. sphaeroidalis.
pumila, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 124 - T. sphaeroidalis.
sphaeroidea, Spach, Hist. *Wig.* Phan. xi. 381=T. sphaeroidalis.
squarrosa, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 65 - T. sphaeroidalis.
squarrosa, Sieb. *Sc* Zucc. in Endl. Conif. 65 = T. pisifera.
thtyäeformis, R. Smith, ex Gord. Pinet ed. IL- 429.—Hao. ?
thurifera, Endl. Synop. Conif. 62 =• Cupiessus thurifera.
variegata, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 183 - T. sphaeroidalis.

CHAMAECYTISUS, Link, Handb. ii. 154 (1881) Cytlsus, Linn. (Legumin.).
austriacus. Link, 1. c. 165»Cytisus austriacus.
bifiorus, Link, 1. c. 154=Cytisus biflorus.
capitatus, Link, 1. c. 155=Cytisus capitatus.
elongatus, link, 1. c. = Cytisus biflorus.
hirsutus, Link, I. c. 'Cytisus hirsntus.
leucanthus, Link, 1. c. 154 = Cytisus austriacus.
proliferus, Link, 1. c — Cytisus proliferus.
purpureus, Link, 1. c. = Cytisus purpureus.
supinus, Link, 1. c. 155=Cytisus biflorus.

CHAMAECYTISUS, Vis. Fl. Data. iii. 272 (1852) - Argyrolobium, Eckl. *Sc* Zeyh. (Legumin.).
dalmaticus, Vis. 1. c. •= A. Linnaeanum.

CHAMAEDACTYLIS, T. Nees, Gen. Fl. Germ. Monocot. i. n. 66 (1840 ?) <- Aeluropus, Trin. (Gramin.).
maritima, Nees, I. c.=A. littoralis.

CHAMAEDAPHNE, Mitchell, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 222, App.=Mitolielllla, linn. (Rubiac.).

CHAMAEDAPHNE, Moench, Meth. 457 (1794) * Cassandra, D. Don (Ericac.;.
calyculata, Moench, 1. c. = Cass. calyculata.
crispa, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 477 Cass. calycnlata.

CHAMAEDOHEA, Willd. Sp. PI. iv. 638 (1805); et in *M6m.* Acad. Berl. 1804 (1807) 40. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 910.
DASVSTACHYS, Oerst. in Kioeb. Vidensk. Meddel. (1858) 25.
KUNTHIA, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. ii. 128. L 122 (1809).
MORENIA, Ruiz & Pav. Prod. 160 (1794).
NUNNEZHARIA, Ruiz *Sc* Pav. 1. c. 147 (1794).
NUNNEZIA, Willd. Sp. PI. iv. 1154 (1805).
SPATHOSCAPHE, Oerst. in Kioeb. Vidensk. Meddel. (1858) 29.
STACHYOPHORBE, Liebm. in Overs. Dansk. Vidensk-Selsk. (1846) 8.
STEPHANOSTACHYS, Klotzsch, ex Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 26.
affinis, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 808.—Mexic.
altemans, *H. Wendl. in Regel, Gartenfl.* (1880) 1<*—Mexic
amazonica, *J. Linden, in Ulustr. Hortic* xxvM-(1881) 16, nomen.—Bras.
Andreana, *j. Linden, I. c,* nomen.—N. Granat.
Arenbergiana, *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 66.—Guatemala!

CHAMAEDOREA :—
atrovirens, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 289 = Martiana.
atroviiens, *Mart, in Flora,* xxxv. (1862) 721.—Mode,
aoranriaca, *A. Brongn. in Rev. Horde. Sir.* III. i. (1847) 86.—Mexic.
Bartlingian*. *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 60.—N. Granat
biloba, H. Wendl. 1. c. 11-Bartllngiana.
Mmrcata, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 13.—Costa Rica,
brachyclada, *H. Wendl. in Regel, Gartenft.* (1880) 101.—Panama,
practeata, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xvfl. (1859) 29.—Am. centr.
brevifrons, *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 61.—N. Granat.
Casperiana, *Klbttsch, in Otto* b* *Dietr. Allg. Garten*.* xx. (1852) 868.—Guatemala,
cataractaium, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 309.—Mexic.
concolor, *Mart. I. e.* 160.—Mexic.
conocarpa, *Mart. Palmet. Orb.* 6.—Bolivia,
costaricana, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 19.—Costa Rica.
Deckeriana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 404.—Guatemala.
Deppeana, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 862=elegans.
desmoneoides, *H. Wendl. in Otto V Dietr. I. c.* xxi. (1853) 177.-Mexic
elatior, *Mart, in Linnaea,* v. (1830) 205.—Mexic.
degans, *Mart. I. c.* 204.—Mexic.
elegantissima, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 239, nomen—Hab. t
Eraesti-Augnsti, *H. Wendl. in Otto* to" *Dietr. Allg. Garten*,* xx. (1852) 73.—Mexic.
fenestrata, Hort. ex H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 28 = Malortiea gracilis.
ftatAn\A,J. Linden, Illustr. Hortie. xxviii. (1881) 16, nomen.—Mexic.
fibrosa, H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 57 - Synechanthns fibrosus.
Uavo-virens, *H. Wendl. 1. c.* 60.—Hab.?
flexuosa, Hort. ex H Wendl. L c. 14 = Martiana.
formosa, *Hort.—Cf Gard. Chron.* (1876) I. 724.—Hab. ?
fragrans, *Mart. Hist. Nat. Palm.* li. 4. t. 3. f. 1, 2.—Peruv.
geonomaeformis, *H. Wendl. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* xx. (1852) 1.—Guatemala,
geonomoides, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 581.—Peruv.
Ghiesbreghtii, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 289, nomen.—Hab. ?
elauca, y. *Linden, Illustr. Hortie.* xxviii. (1881) 16, nomen.—Venezuela,
glaucifolia, *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 64.—Mexic.
Riacilis, *Willd. Sp. PI.* iv. 800.—Am. austr.
paminifolia, *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 62.—Guatemala.
HeUeriana, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 862=elegans.
•Inmilis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 308.—Mexic.
xarwinsiyana, H. Wendl. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 179=elatior.
Klotzschiana, *H. Wendl. Ind. Palm.* (1854) 63.—Mexic.
anceolata, *Kunth, Enum. PI.* iii. 172.-Peruv.
Mfrons, H. Wendl. Ind. Palm. (1854) ll-Arenbergiana.
lepidota, *H. Wendl. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* «t. (1853) 138—Mexic.
webmanni, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 808—.Mexic.
Lindeniana, *H. Wendl. in OttoV Dietr. Allg. Gartenz.* *xi. (1853) 189.-N. Granat.
Mans, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 6.—Peruv.
"nata, Liebm. in Mart. L c. iii. 807=oblongata.
"Padix, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk Meddel. (IMS)* -20.-CostaRica.
"utiana. *H. Wendl. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xxi. (1858) 187—Mexic.
•nembranacea, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) «.—Nicaragua.

CHAMAEDOKEA :—
mexicana, Hort Belg. ex Heynh. Nom. ii. 185 = Sartorii.
microphylla, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xvii. (1869) 102.—Panama,
montana, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 308.—Mexic.
oblongata, *Mart. I. c.* 160.—Bras,
obovoidea, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 239, nomen.—Hab.?
oreophila, *Mart. Hist. Nat Palm.* iii. 309.—Mexic.
Pacaya, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 12.—Costa Rica,
paradoxa, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xvii. (1859) 29.—Mexic.
pauciflora, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 6. t. 3. f. 3.—Bras,
pinnatifrons, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 14=gracilis.
pochutlensis, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 308.—Mexic.
pulchella, *Linden, Cat.* n. 117, p. 4.—Hab. ?
pygmaea, *H. Wendl. in Otto (f Dietr. Allg. Garten*.* xx. (1862) 217, 249.—N. Granat.
radicalis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 308.—Mexic
regia, H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 11 = desmoneoides.
repens, H. Wendl. 1. c.=desmoneoides.
resinifera, *H. Wendl. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* xxi. (1853) 179.—Mexic.
robusta, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 239, nomen.—Hab. 1
Sartorii, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 808.—Mexic.
scandens, Liebm. in Mart. 1. c.=elatior.
Scbiedeana, *Mart, in Linnaea,* v. (1880) 204.—Mexic.
simplidfrons, Hort. Belg. ex Heynh. Nom. ii. 185 =Ernesti-Augusti.
speciosa, H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 16 = Schiedeana.
spectabilis, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 240, nomen.—Hab. ?
tenella, *H. Wendl. in Regel, Gartenfi.* (3880) 102.—Mexic
Tepejilote, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 308.—Mexic.
velutina, Hort. ex H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 13 = lepidota.
Verschaffelti, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 240, nomen.—Hab. t
Wallisi, *J. Linden, in Illustr. Hortie.* xxviii. (1881) 16, nomen.—Ecuador.
Warscewiczii, *H. Wendl. in Bonplandia,* x. (1862) 37.—Guatemala.
Wendlandi, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 240.—Mexic.
Wendlandiana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 407 = praec
Wobstiana, *Linden, Cat.* n. 117, p. 4.—Hab. 1

CHAMAEDRYS, Moench, Meth. 888 (1794) ~ Teucrium, Toum. (Labiat).
Botrys, Moench, 1. c.-T. Chamaedrys.
capitata, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85=T. Polium.
dnerascens, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc L 47 = T. flavnm.
cretica, Rafin. Fl. Tellur. iii. 86 = T. crerjeum.
/lava, Moench, Meth. 383-T. flavum.
glauca, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i.48 = T. iktvum.
laciniata, S. F. Gray, Nat An. Brit. PI. ii. 369-T. Botrys.
latifolia, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85=T. frutican&>
lucida, Moench, Meth. 883 = T. lucidum.
Marum, Moench, 1. c. 384=T. Marum.
montana, Rafin. Fl.Tellur. iii. 85=T. montanum.
Nissoliana, Rafin. 1. c.=«T. Pseudochamaepilys.
officinalis, Moench, Meth. 383=T. Chamaedrys.
ovalifMa, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 48 - T. fTavum.
palustris, S. F. Gray, Nat An. Brit PI. ii. 369 = T. Scordium.
Polium, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85=T. Polium.
pulverulenta, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fiuc i. 47 =T.flavnm.
pumila, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 = T. pumilum.
quadrula, Rafin. 1. c - T. quadratulum ?
Scordium, Moench, Meth. 381=T. Scordium.

CHAMAEDRYS:—
tetonicifolia, Rafin. Fl. Tellur. iii. 86 = Teucrium betonicum.
virescens, jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 47 - T. fiavnxn.

CHAMAEFISTULA, G. Don, Gen. Syst. ii. 461 (1882) ^ Cassia, Tourn. (Legumin.).
astroiles, G. Don, 1. c.=Cass. villosa.
bacillaris, G. Don, 1. c. = Cass. Sophera.
chinensis, G. Don. 1. c. 462 = Cass. Sophera.
contorta, G. Don, 1. c.-Cass. Tora.
eoromandelina, G. Don, 1. c = Cass. Sophera.
corymbosa, G. Don, 1. c. 451 = Cass. corymbosa.
crotalarioides, G. Don, 1. c. 462 = Cass. crotalarioides.
elegans, G. Don, 1. c. 451 =Cass. obliqua.
excelsa, G. Don, 1. c. 452=Cass. excelsa.
ftoribunda, G. Don, 1. c. = Cass. laevigata.
gigantea, G. Don, 1. c.-Cass. siamea.
Herbertiana, G. Don, 1. c. = Cass. laevigata.
inaeqvilatera, G. Don, 1. p. 451 = Cass. inaequilatera.
indecora, G. Don, 1. c. 452-Cass. bicapsularis.
inflata, G. Don, 1. c. 461 = Cass. bicapsularis.
laevigata, G. Don, L c. 452=Cass. laevigata.
macrophylla, G. Don, 1. c. 451 = Cass. macrophylla.
melanocarpa, G. Don, 1. c. = Casa. viminea.
obliqua, G. Don, 1. c.=Cass. obliqua.
oxyphylla, G. Don, 1. c.=Cass. oxyphylla.
pendula, G. Don, 1. c. 462 = Cass. bicapsularis.
prominens, G. Don, 1. c. 461 = Cass. macranthera.
puberula, G. Don, 1. c.=Cass. bacillaris.
Ruitiana, G. Don, 1. c. = Cass. Rniziana.
Sophera, G. Don, 1. c. 452=Cass. Sophera.
speciosa, G. Don, L c. 451 = Cass. speciosa.
torosa, G. Don, 1. c. 452 = Cais. Sophera.

CHAMAEQEHON, Schrenlc. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétereb. iii. (1845) 107. *COMPOSITAE.*
oligocephalum, *Schrenk. I. c*—Soongaria.

CHAMAEIRIS, Medic, in Act Acad. Theod. Palat vi. Phys. (1790) 417 = IriB, Toum.
angustifolia. Medic. 1. c. 418 = L pumila.
desertorum, Medic 1. c.-=I. Gueldenstaedtiana.
foetida, Medic. 1. c. = I. foetida.
graminea. Medic. 1. c = I. graminea.
spuria, Medic. 1. c.-=I. spuria.

CHAMAELAUCiriM:, Desf. in Mem. Mus. Par. v. (18i9) 39. t 3. *MYRTACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 698.
DECALOPHIUM, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mose. xx. (1847) 1.168.
affine, Meissn. in Joum. Linn. Soc i. (1867) 45-uncinatum.
axUUre, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 38.—Austral.
brevifolium, *Benth. I. c.* 87.—Austral.
Brownii, Desf. in Mem. Mus. Par. v. (1819) 271. t. 19 =Verticordia Brownii.
ciliatum, *Desf. I. c.* 40.—Austral.
Drummondii, *Meissn. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 44.-Austral.
gracile, *F. Muell. Fragm.* iv. 62.—Austral,
heterandrum, *Benth. Fl. Austral,* iii. 36.—Austral,
megalopetalum, *F. Muell. ex Benth. I. c.* 88.—Austral,
pauciflorum, *Benth. I. c*—Austral.
plumosum, Desf. in Mem. Mus. Par. v. (1819) 42. t. 4 =Verlicordia Fontanesii.
Thomasii, F. Muell. Fragm. iv. 137. t SO^Danrinia Thomasii.
nncinatum, *Schau. in Lehm. PI. Preiss. i.* 97.—Austral.
verticordinum, F. Muell. Fragm. iv. 67=Darwinia verticordina.
virgatum, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1840) 198.—Austral.

CHAMAEIiB, Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat. iii. 59 (1867). *UMBELLIFERAE.*
Tanakae, Franch. *Sc.* Sav. Enum. PL Jap. i. 186 = Carum Tanakae.
tenera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 60.—Japon.

CHAMAELEA, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 346 (1768)-Cneorum, Linn. (Simarub.).
tricoccos, Lam. Fl. Fr. ii. 682-Cneorum tricoccum.

CHAMAELEDON, Link, Eonm. Hort. Berol. i. 210 (1821) =Loiseleuria, Desv. (Ericac.).
procumbens, Link, 1. c. 211=L. procnmbens.

CHAMAELEON, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlvii. 609 (.1827) =Atractylifl, Linn. (Compos.).
caulescent, Cass. 1. c. 1. 60=A. macrophylla.
gummifer, Cass. L c xlvii. 509 - A. gummifera.
megacephalus, Cass. 1. c. 1. 59=A. macrocephala.

CHAMAELINUM, Host, Fl. Austr. ii. 221 (1831) = Camelina, Crantz (Crucif.).
austriacum, Host, 1. c. 225 = Nasturtium austriacum.
paniculatum, Host, 1. c. 224=Neslia paniculate.
sativum, Host, 1. c 225 = Cam. sativa.

CHAMAELIBITJM, Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 18. *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. iii. 828.
DASURUS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 51 (1865).
DICLINOTKYS, Rafin. Neogen. 3 (1825).
OPHIOSTACHYS, [Delile] in Red. Lit. t. 464 (1816).
SIRAITOS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 (1836).
carolinianum, *Willd. 1. e.* 19.—Am. bor.
luteum, A. Gray, Man. Bot. N. U. States, ed. V. 527 = carolinianum.
luteum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 144 = Cbionographis japonica.

CHAMAELUM, Baker, in Jonm. Linn. Soc. xvi. (1877) 120, sphalm. = Chamelum, PhiL (Irid.).

[illegible] Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 104. t. 11. *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i.628.
eoriacea, *Lindl. 1. c.*—Ins. Madera.
mexicana, Baill. Adansonia, ix. (1869) 148=Photinia mexicana.

CHAMAEMELUM, Toum. ex Adans. Fam. ii. 128 (1763) ; Cass. in Diet. Sc. Nat. xxix. 179,185 (1823) =Anthemis, Linn. (Compos.).
alpinum, All. Fl. Pedem. i. 186 =Achillea oxyloba.
arvense, Schreb. Spicil. 18-=A. arvensis.
austriacum,J. Sc C.Presl, Fl.Cech.173=A.anstriaca.
Cota, All. Fl. Pedem. i. 184=A. Cote.
Cota, C. A. Mey. Verz. Ffl. Cauc. 75 = A. altissima.
Cotula, All. Fl. Pedem. i. 186 = A. Cotula.
discoideum, All. 1. c. 188=A. tinetoria.
foetidum, Banmg. Enum. Stirp. Transs. iii. 144=A. Cotula.
incrassatum, Hoffmgg. Fl. Port. ii. 348, ex DC. Prod. vi. 616 = Anacyclns clavatus.
maritimum, All. Fl. Fedem. i. 184 = A. maritima.
Marschalliattum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 75 = A. Biebersteiniana.
mixtum, All. Fl. Pedem. i. 185 = A. mixta.
montanum, All. 1. c. 187 = A. montana.
mobile, All. 1. c. 185 = A. nobilis.
orientate, Scbult. ex Steud. Norn. ed. II. i. 848 = A. montana.
pinnatifidum, Moench, Meth. 605= A. mixta.
proliferum, Moench, 1. c. Suppl. 257 = Cladanthus prolifcrus.
tinctorium, Schreb. Spicil. 145 = A. tinetoria.
tomentosum, All. Fl. Pedem. i. 184=Anacyclus clavatus.
Triumfetti, AH. I. c. 187=A. austriaca.
valentinum, All. 1. c.=Anacyclus valentinus.

CHAMAEMELUM, Vis. Osserv. Matric. 12 (1845); Fl. Dalm. ii. 84 (1847) =Uatricaria, Linn. (Compos.).
ambiguum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 20 *{=Pyrethrum ambiguum).*—Oriens.
arvense, Reichb. f. ex Willie in Bot. Zdt xxii. (1864) 251-M. glabra.
auriculatum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 23.—Arabia.
callosum, Boiss. & Heldr. I. c. 22.—As. Min.
caucasicum, Boiss. 1. c. 20 = M. grandiflora.
conoclinium, Boiss. & Bal. 1. c. Ser. II. vi. 98 = M. conoclinia.
daghestanicum, Boiss. Fl. Orient iii. 334.—Daghestan.
decipiens, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 22=M. decipiens.
disciforme, Vis. Fl. Dalm. ii. S5=M. corymbifera.
elongatum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 20 *{=Pyrethrum elongatum).*—Oriens.

CHAMAEMELUM :—
grandiflorum, Boiss. *Sc* Haussk. in Boiss. Fl. Orient iii. 331.—Mesopotam.
heterocarpum, Boiss. 1. c. 329 = Matricaria hetero. carpa.
inodorum, Vis. Osserv. Matric. 13; Fl. Dalm. ii. 85 = M. inodora.
Kochii, Boiss. Fl. Orient, iii. 329 - M. microcephala.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 27 = M. Oreades.
lamellatum,Boiss. Fl. Orient, iii. 326 = M. lamellate.
limosum, Maxim. Prim. Fl. Amur. 156 = M. inodora.
maritimum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 21 = M. maritima.
melanolepis, Boiss. *Sc* Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 118 = M. Oreades.
microcephalum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 23 - M. microcephala.
monticolum, Boiss. & Huet, 1. c. Ser. II. iiL 27.—Armenia.
nanum, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pltersb. xiv. (1856) 231.—Kurdistan.
olympicum, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 258, nomen.—As. Min.
Oreades, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 21=M. Oreades.
Pichleri, Boiss. Fl. Orient, iii. 332.—Bithynia.
praecox. Vis. Osserv. Matric. 13 ; Fl. Dalm. ii. 86 = M. praecox.
Reuterianum, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 258, nomen.—As. Min.
rosellum, Boiss. &Orph. in Boiss. Fl. Orient, iii. 334 - M. rosella.
Stovitsii, Boiss. 1. c. 332.—Reg. Caucas.
Tchihatcheai, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 256.—As. Min.
tetragonospermum, F. Schmidt, Keisen Amur. 148.—Reg. Amur.
trichophyllum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 21=M. trichophylla.
uniglandulosum, Vis. Osserv. Matric. 13; Fl. Dalm. ii. 85 - M. trichophylla.

CHAMAEMESPILUS, Medic. Phil. Bot. i. 188, 155 (1789)=Pyrus, Linn. (Rosac.).
ambigua, Gren. ex Nym. Consp. 242=P. Chamaemespilus.
Aria, M. Roem. Syn. Rosifl. 182=P. Aria.
humilis, M. Roem. 1. c. 131 —P. Chamaemespilus.
Pseudaria, M. Roem. 1. c. 132-P. Aria.
sudetica, M. Roem. 1. c. 131=P. sudetica.

CHAMAEMYRRHIS, Endl. ex Heynh. Norn. ii. 136 (1846)-CaldaeU, Lag. (Umbellif.).
triopoda, Endl. 1. c.=Cald eriopoda.

CHAMAENERION, [Toura.] Adans. Fam. ii. 85 (1763)=Epilobium, Linn. (Onagrar.).
americanum, Sweet, Hort. Brit ed. II 198 = E. palustre.
angustifolium. Schur, Enum. PI. Transs. 213 = E. angustifolium.
angustifolium, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 271 = E. Dodonaei.
denticulatum, Schur, Enum. PI. Transs. 214=E. angustifolium.
Dodonaei, Schur, ex Fuss. Fl. Transs. 214=E. Dodonaei.
grandiflorum, Moench, Meth. 677 = E. hirsutunt.
halimifolium, Salisb. Farad. Lond. t 58=E. latifolium.
Halleri, Sweet, Hort. Brit ed. II. 198 = E. Dodonaei.
hirsutum. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 270 = E. hirsutum.
latifolium, Sweet, Hort. Brit ed. II. 198 = E. latifolium.
montanum, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 270=E. montanum.
obscurum, Schreb. Spicil. 147=E. tetragonum.
palustre, Schreb. 1. c. 22 = E. palustre.
parviflorum, Schreb. 1. c. 146 - E. parviflorum.
pubescens, Moench, Meth. 677 « E. parviflorem.
ramosissimum, Moench, J. c. 678=E. tetragonum.
roseum, Schreb. Spicil. 147 — E. roseum.
rosmarinifolium, Moench, Meth. Suppl. 288 = E. Dodonaei.
speciosum, Lodd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 343 = E. angustifolium.
spicatum,S. F. Gray. Nat. Arr. Brit. PI. ii. 559 = E. angustifolinm.
tetragonum, Scop. Fl. Cam. ed. II. L 271=E. tetragonum.

CHAMAENERIUM, Spach, Hist. *Vie,* Fhan. iv. 396 (1835)=praec.

CHAMAEORCHIS, Koch, Syn. Fl. Germ. 692 (1837) = CHAMORCHIS, Rich. = Herminium, Willd. (Orchid.).

CHAMAEPEUCE, DC. Prod. vi. 657 (1887)-Cnieus, Tourn. (Compos.).
afra, DC. 1. c 659 = Cn. afer.
Alpini, Jaub. & Spach, lllustr. v. 26. t. 425=Cn. Chamaepeuce.
atropurpurea, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 47 = Cn. strictus.
Casabonae, DC. Prod. vi. 658 =Cn. Casabonae.
cynaroides, DC. 1. c. 659=Cn. cynaroides.
diacantha, DC. L c.=Cn. diacanthus.
echinocephala, DC. 1. c. 660 = Cn. echinocephalus.
firma, DC. 1. c 659 =Cn. firmus.
fruticosa, DC. 1. c. 658 = Cn. fruticosus.
gnaphalodes, DC. 1. c = Cn. gnaphalodes.
hispanica, DC. 1. c. = Cn. hispanicus.
horrida, DC. 1. c 660 = Cn. horridus.
imbricata, Rafin. Fl. Tellur. iv. 118 = Cn. Chamaepeuce.
macrantha, Schrank, in Bull. Sc. Acad. Petersb. x. (1842) 354=Cousinia Hablizii.
maerostachya, Trautv. in Bull. Phys.-Malh. Acad. Petersb. xvi. (1858) 326.—Reg. Caucas.
mutica, DC. Prod. vi. 657 =Cn. Chamaepeuce.
nivea, DC. Prod. vi. 659 = Cn. niveus.
polyacantha, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144=Cn. Casabonae.
polycephala, DC. Prod. vi. 658 = Cn. Chamaepeuce.
sinuata, Trautv. in Act. Hort.Petrop. ii. (1878) 477 = Cn. cynaroides.
stellata, DC. Prod. vi. 658 = Cn. stellatus.
stricta, DC. 1. c. 659 = Cn. strictus.

CHAMAEPEUCE, Zucc. in Endl. Enchir. 139 (1841) = Thuya, Toum. (Conif.).
obtusa, Zucc. ex Gord. Pinet. Suppl. 98=T. obtusa.

CHAMAEPHVTON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) S71=FotentUla, Linn. (Rosac).
supinum, Fourr. 1. c. = P. supina.

CHAMAEPITYS, Toum. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 220 (1745)=Ajuga, Toum. (Labiat.).
arvensis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 60 = A. Chamaepitys.
Iva, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 188=A. Iva.
pseudoiva, Fourr. 1. c.=A. Iva.
trifida, Dum. Fl. Belg. 42 = A. Chamaepitys.
vulgaris, link, Handb. i. 458=A. Chamaepitys.

CHAMAEPLIUM, Wallr. Sched. Crit. i. 376 (1822) = Sisymbrium, Tourn. (Cracifer.).
officinale, Wallr. 1. c. 377 = S. officinale.
polyceratium, Wallr. 1. c » S. polyceratium.
supinum, Wallr, 1. c. = S. supinum.

CHAMAEHANTHEMUM, Nees, in Lindl. Nat. Syst. ed. II. 445 (1836). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1095.
Beyrichii, *Nees, I. c.* 445.—Bras.
Gaudichaudii, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 165.—Bras.
igneum, *Regel, Cartenfl.* (1868) 858.—Peruv.
pictum, *Mast, in Gard. Chron.* (1878) I. 527.—Bras.

CHANLAEBAPHI8, R. Br. Prod. 193 (1810). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1107.
abortiva, Poir. Encyc. Suppl. ii. 189 = spinescens.
aspera, *Nees, in Wall. Cat.* n. 8679 = spinescens.
compressa, Poir. ex Steud. Nom. ed. 1.183 •—Pennisetuin compressum.
depauperata, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 49 = Panicum asperum, *Wight.*
gracilis, *Hack, in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 236.—Malaya.
hordeacea, *R. Br. Prod.* i. 194.—Austral,
paradoxa, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 189.—Austral,
parvigluma, *Munro, ex Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 200, nomen.—Cuba.

CHAMAEEAPHI8 :—
spinescens, *Pair. Encyc. Supp!.* ii. 189.—As. bop.; Austral.
spinosa, Beauv. ex Roem. & Schult. Mant. ii. 268= spinescens.

CHAMAEREPES, Sprang. Syst. iii. 702 (1826) = Herminium, Wifld. (Orchid.).
alpina, Spreng.]. c. = H. alpinnm.

CHAMAERHODODENDROS, Tourn. ex Hall, in Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 249 (1746) = Bhododendron, Linn. (Ericac).

CHAKAEBHODO8, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. i. 429 (1829). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. £ i. 621.
altaica, *Bunge, 1. c.*—•Sibir. alt. occ.
etecla, *Bunge, I. c.* 430.—Sibir. j Am. bor. occ.
grandiflora, *Ledeb. I. c.* 431, in nota.—Sibir.
mongholica, *Bunge, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xix. (1843) 177.—Mongolia.
Polygyna, G. Don, Gen. Syst. ii. 56S=erecta.
aabulosa, *Bunge, in Ledeb. Ft. Alt.* i. 431.—Sibir.
trifida, *Ledeb. Fl. Ross,* ii. 84.—Sibir.

CHAMAERIPHES, Ponted. ex Gaertn. Frnct. i. 25 a789) = seq.

CHAMAEBOPS, Linn. Muss. ClifT. 10; Gen. ed. I. 364 (1737). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 924.
CHAMAERIPHES, Ponted. ex Gaertn. Fruct i. 25 (1789).
acaulis, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 207-Sabal Adansoni.
Antillarum, Desc. Antill. i. t. 28 (Thiinacis sp. ?).—Ind. occ.
"rborescens, Steud. Nom. ed. I. 183 = humilis.
"rundinaeea, Sm. in Rees, Cycl. vii. n. S=Rhapidophyllum Hystrix.
Biroa, Siebold, in Mart. Hist. Nat. Palm. 263 - Liristona rotundifolia..
'ochinchinensis. Lour. FL Cochinch. ii. 657 = Rhapis coduncliinensis.
cenduplicata, Kickx, in Boll. Acad. Bnix. T. (1838) 61 =hnmilis.
'xcelsa, Thunb. Fl. Jap. 139-Trachycarpus excekus.
excelsior, *Boj. Hort. Maurit.* 807.—Ins. Maurit.
'ortunei, Hook. Bot. Mag. t 5221 = Trachycarpus Foitnnei.
Ghiesbreghti, Hort. re H. Wendl. in Kerch. Palm. 240 (-Sabal sp.).—Hah.?
glaira, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-Sabal Adansoni.
gtacilis, *Lodd. Cat.* (1823) *ex Schult. f. Syst.* vii. 1489, nomen.—Am. anstr.
Gnffithiana, Wall, ex Voigt, Hort Suburb. Calc. 641, nomen=seq.
Griffithii, Lodd. Cat. (1841) ex Verlot, in Rev. Hoitic. (1870) t. 276 = Trachycarpus khasyanus.
SWanensis, *Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit.* 413, uomen.—Guiana.
[illegible]is, Linn. Sp. PI. 1187.—Reg. Mediterr. occ.
[illegible]rix, Desf. ex Steud. Nom. ed. I. 188-Corypha Hystrix.
"ystrix, Fras. ex Pursh, Fl. Am. Sept i. 240 - Rhapido-Phyllum Hystrix.
[illegible] Phyllum Gill tin Calt Journ Nat Hist T (1845) 841 = Trachycarpus khasyanus.
»onwortsii, Siebold, ex H. Wendl. Ind. Palm. (f854)34-Rhapisflabelliformis.
•«uMa»«, Rafin. Fl. Ludov. 15» = Rhapidophyllnm Hystrix?
*«crocarpa, *Linden, Cat.* n. 87 (1871).—Hab.«
rfocarpa, Tin. in Gnss. Fl. Sic. Syn. ii. 883-humilis.
[illegible]tiana, Wall. PI. As. Rar. iii. 6. t. 211-Trachycarpus Martianus.
[illegible]Mty [illegible] Mém. Acad BerL (1769) 29.—
Mocini, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 300=Acanthorhiza Mocinni.
nepalensis Lodd Cat (1828) ex Schalt c Syst vii 1489 = Trachycarpus Martianus.
reclinata, Jacq, Michx. Fl. Bor. Am. i. 206=Sabal Palmetto.
Hab[illegible] ** *Sekult f. syst.* vii. 1489 nomen.—
Ritchiana [illegible] *GriB.* in Calc. Journ. Nat. Hfat. T. C1845) 342 = Nannorrhops Ritchieana.
serrulata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 289=Brahea «erulata.

CHAMAEBOPS :—
Sintsii, Hort. ex H. Wendl. Ind. Palm. (1854) 17 = Rhapis humilis.
stauracantha, Hort. Belg. ex Heynh. Nom. ii. 136 = Acanthorhiia aculeala.
tomentosa, *Fulckirm, ex Schult. f. Syst.* vii. 1489, nomen.—Hab.!
tomentosa, *Ch. Mm. in Ann. Gand,* i. (1845) 488.—Hab.?

CHAMAESABACHA, A. Gray, ex French, ft Sav. Enum. PI. Jap. ii. 454 (1876). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 891.
conoides, *Benth. V Hoot./. Gen.* ii. 891.—Mexic.
Coronopus, *A. Gray, in Bot. Calif, i.* 540.—Calif,
japonica, *Franch.* 6" *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 454.—Japon.
nana, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 540.—Calif.
physaloides, Greene, in Bull. Torrey Club, ix. (1882) 122-Physalis lobata.
sordida, *A. Gray, Synop. Fl. N. Am.* ii. I. 232.—Texas; Mexic.

CHAMAESARACHIA, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. iL*54(1878)-praec.

CHAMAESCIADIX7M, C. A. Mey. Vera. PH. Cauc. 122 (1831). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. 1895.
acaule, C. *A. Mey. 1. c*—As. Min.; Reg. Caucas.
albiflorum, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 360.—Sibir.
flavescens, C. A. Mey. Vera. Pfl. Cane, 122=acaule.
gracile, Boiss. & Heldr. in Boiss. Diagn. Ser. II. 1L 79 = Carumrnpestre.
Heldreichi., Boiss. 1. c. 78=Carum Heldreichii.

CHAMAESCXLLA, F. Muell. Fragm. vii. 68 (1870). *UUACEAE,* Benth. & Hook. *I* iii. 791.
corymbosa, *F. Muell. I.* c—Austral,
spiralis, *F. Muell. I. c*—Austral.

CHAMAESPARTIUM, Adans. Fam. ii. 821 (1768) = Cytisus, Linn, et Oenista, Linn. (Legumin.).

CHAMAESPARTON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N.S. xvi. (1868) 857=Genista, Linn. (Legumin.).
pilosum, Fourr. 1. c = G. pilosa.

CHAMAESFHACOS, Schrenk, Enum. PI. Nov. 1. 27 (1841). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1207.
ilicifolius, *Schrenk, I. c*—Sibir.

CHAMAESPHAERION, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 176 = Chthonocephalus, Steetz (Compos.).
pygmaeum, A. Gray, 1. c. 177 - Chthonocephalus pygmaeus.

CHAMAESPILUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 878=Pyrua, Linn. (Rosac).
sudetica, Fourr. 1. c.=P. sudetica.

CHAMAESTEPHANUM, Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140=8ehkuhria) Roth (Compos.).

CHAMAESYCE, S. F. Gray, Nat. An. Brit PL a 260 (1821)-Euphorbia, Linn.
maritima, S. K. Gray, 1. C.-E. Peplis.

CHAMAEZELUM, Link, Handb. i. 719 (1829) = Antennarla, R. Br. (Compos.).
alpinum, Link, 1. c = A. alpina.
carpaticum, Link, 1. c.=--A. carpathica.
dioicum. Link, 1. c. = A. dioica.
margaritaceum, Link. 1. c.=Anapbalis margaritacea.

CHAMAEXEBO8, Benth. Fl. Austral, vii. 110 (1878). *JUNCACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 864.
nmbriata, *Benth. 1. c.* 111.—Austral.
Serra, *Benth. 1. c.* 110.—Austral.

CHAMAEXIPHIUM, Hochst. in Flora, xviii. (1844) 102=Pioinla, Schrad. (Cyperac).
clandestinum, Hochst 1. c = F. clandestine.
Dregeanum, Steud. Syn. PI. Cyp. 69=F. laevis.

CHAMAGROSTIS, Borkh. ex Wibel, Prim. Fl. Werth. 126 (1799)=-Mibora, Adans. (Gramin.).
minima, Borkh. 1. c.=M. verna.

CHAMALIUM, Juss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 824 = Cardopatium, Juss. (Compos.).

CHAMALIUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlvii. (1827) 498, 50S-CHAMAELEON, Cass.=AtraotylIs, Linn. (Compos.).

CHAMAREA, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 846 (1837) - Carum, Linn. (Umbellif.).
caffra, Eckl. & Zeyh. 1. c.—Afr. austr.
capensis, Eckl. & Zeyh. 1. c. = Carum capense.

CHAMBETBONIA, VieiU. in Bull. Soc. Linn Normand. Sér. II. vi. 1872 (1878) 229. *PALMAE.*
Bre'bissonii, *VieiU. I. c.* 230, nomen.—N. Caled.
macrocarpa, *VieiU. I. c.* nomen.—N. Caled.
Morieri, *VieiU. I. c.* nomen.—N. Caled.

CHAMEDRYS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 (1886) = CHAMAEDRYS, Tourn. ~ Teucrium, Tourn. (Scrophul.).

CHAMELTJM, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 250. *IR1DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 700.
CHAMAELUM, Baker, in Joura. Linn. Soc. xvi. (1877) 120, sphalm.
andinum, *Benth. V Moot./. Gen.* iii. 700.—Chili,
luteum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65} 250.—Chili.

CHAJUBA, Thunb. Nov. Gen. iL 48 (1782). *CRUCIFERAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 81.
cornuta, *Thunb. 1. c.* 49.—Afr. austr.

CHAMISME, Rafin. ex Steud. Nom. ed. II. *I lit* (in syn.) (1840) = **Houfltonla,** Gron. (Rubiac).

CHAKI8SOA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 158. 1.125 (1817). *AMARANTACEAE,* Benth. *8c* Hook, f. iii. 27.
KOKERA, Adans. Fam. ii. 269 (1763).
acuminata, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiii. (1826) 286.—Bras.
albida, Mart. 1. c. 287=Allmania albida.
altissima, *H. B. V X. Nm. Gen. et Sp.* 197. t 125.—Am. austr.
altissima, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act Nat. Cur. xi. (1823) 32 = Maximilian!.
angustifolia, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 717=Allmania nodiflora.
arabica, Spreng. Syst. i. 815 = Digera arvensis.
aspera, Wight, Ic. v. t. 1772 = Allmania nodiAora.
Blanchetii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 251.—Bras.
Brownii, Steud. Nom. ed. II. i. 844 - Allmania nodiflora.
celosioides, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 79.—Reg. Argent.
ciliata, Spreng. Syst. i. 815 = Digera arvensis.
eommutata, Spreng. 1. c. = Digera arvensis.
dichotoma, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 249=- Allmania nodiflora.
esculenta, Moq. 1. c. = Allmania nodiflora.
javanica, Hassle. PI. Jav. Rar. 484=Allmania nodiflora.
macrocarpa, *H. B. ff. K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 197.—Am. austr.
Martii, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 252- altissima.
Maximiliani, *Mart, ex Moq. 1. c.* 251.—Bras.
muricata, Spreng. Syst. i. 815 •= Digera arvensis.
nodiflora, Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 287 -Allmania nodifloia.
mata, Endl. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 822 = Charpentiera ovata.
paniculata, Moq. ex Moq. 1. c. 289-Celosia Moquini.
populifolia, Hochst. ex Moq. 1. c. = Celosia populifolia.
pyramidalis, Moq. 1. c. 248 = Allmania albida.

CHAMISSONIA, Endl. Gen. 1190, in syn. (1840) = CAM1SSONIA, Link = Oenothera, Linn. (Onagrar.).

CHAMITEA, Kem. in Verh. ZooL-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 275-**Balis,** Toura.
reticulata, Kern. 1. c. 277-S. reticulata.

CHAMITIS, Banks, ex Gaertn. Frnct i. 94. t. 22 (1788) =**Azorella,** Lam. (Umbell.).
complicate Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. AnUrct. ii. 285 = A. caespitosa.
integrifolia, Gaertn. Frnct. i. 94. t. 22. f. 4 = A. filamentosa.
tricuspidata, Gaertn. 1. c t. 22-A. trifurcata.
trifurcata, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antnrct. ii. 288=A. trifnrcata.
trifurcata, Gaertn. Frnct. i. 96=A. caespitosa.

CHAMOLETTA, Adans. Fam. ii. 60 (1768) = **Iris,** Linn.

CHAMOMILLA, [Hall.] S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pi. ii. 454 (1821); C. Koch, in Iinnaea, xvii. (1843) 45-**Matricaria,** Linn. (Compos.).
brachyglossa, J. Gay, ex Bentb. *tc* Hook. f. Gen. ii. 428 = M. brachyglossa.
Courrantiana, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 838, in obs. = M. Chamomilla.
discoidea, J. Gay, ex A. Br. in Bot Zeit x. (1852) 650 = M. discoidea.
glabrata, Sch.-Bip. Ueber Tanaeet. 21 =M. glabrata.
inodora, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 45 = M. inodora.
meridionalis, C. Koch, 1. c. = M. Chamomilla.
qfficinalis, C. Koch, 1. c = M. Chamomilla.
patens, Gilib. Fl. Lituan. iii. 220-M. Chamomilla.
praecox, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 46 = M. inodora.
unilateral, C. Koch, 1. c. xxiv. (1851) 338.—Reg. Cancas.
vulgaris, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 454 = M. Chamomilla.

CHAMOMILLA, Godr. Fl. Lorr. ii. 19 (1848) = **Anthemla,** Linn. (Compos.).
aurea, J. Gay, in Bnll. Soc Bot. Fr. iv. (1857) 278 - Cotula aurea.
fuscata, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 151=A. fdscata.
mixta, Gren. & Godr. 1. c. = A. mixta.
nobilis, Godr. Fl. Lorr. ii. 19=A. nobitis.

CHAMORCH1S, Rich, in Mém. Mas. Par. IT. (1818) 49 -**Herminium,** Linn. (Orchid.).
albida, Dum. Fl. Belg. 133 = Habenaria albida.
alpina. Rich, in Mém. Mns. Par. iv. (1818) 57 = Herminium alpinnm.
viridis, Dum. Fl. Belg. 183 = Habenaria viridis.

CHAMPACA, Adans. Fam. ii. 365 (1763) -**Hiohella,** Linn. (Magnoliac.).
fasciculata, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. IS.—Malaya.
Michelia, Noronha, 1. c. 11 = M. Champaca.
turbinata, Noronha, 1. c. 12.—Malaya.

CHAMPEBEIA, Griff, in Calc. Jonrn. Nat. Hist. iv. (1843) 237. *SANTALACEAE,* Bentb. & Hook. f. iii. 231.
MALULUCBAN, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.188 (1837).
gnetocarpa, *Kurt, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 825.—**Ins. Nicobar.**
Griffithiana, *Planch, ex Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) ii. 154.—Burma; Malaya.
Perrottetiana, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 125 = Scleropyrnm Wallichianum.

CHAMPIONIA, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt Beng. 98. t. 68 (1874)>Iieptobaaa, Benth. (Gesnerac).
muUiflora, C. B. Clarke, 1. c = L mnltiflora.

CHAMPIONIA, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. ri. (1846) 485. *GESNERA CEAE,* Bentb. & Hook. f. ii. 1024.
Rticnlata, *Gardn. I. c*—Zeylan.

CHAMULA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2 (Quidt).

CHAPELIEKA, Meiisn. Gen. 162; Comm. 116(1888)-aeq.

CHAPEIiHSBIA, A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat Par. v. (1880) 252. *RUBUCEAE,* Benth. & Hook, f ii. 96.
madagascariensU, *A. Rich. I. c.* 253.—Madag.

CHAPELLIERA, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 298 = Cladium, P. Br. (Cyperac.).
orthrophylla, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii 77 = Clad. arthrophyllum.
articulata, Nees, 1. c. 76, in adnot.=Clad. articulatum.
glomerata, Nees, 1. c.=Clad. glomeratum.
iridifolia, Nees, in linnaea, ix. (1834) 298-Clad. ñexuosurn.
juncea, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 76, in adnot. = Clad. jnnceum.
laxa, Nees, 1. c. 76 -Clad, laxum.
pauciflora, Nees, 1. c. 76, in adnot. = Tricostularia pauciflora.
riparia, Nees, 1. c 76-Clad, riparinm.
teretifolia, Nees, 1. c. 76, in adnot.=Clad, teretifolium.

CHAPKAOTrcA, Ton. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 865 (1839). *LEGUMINOSAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 517.
floridana, *Torr. tf Gray, I. c.*—Florida.

CHAPTALIA, Royle, Illnstr. Bot. Himal. t 59. £ 2 (1889)-**Gerbera,** Gronov. (Compos.).
gossypina, Royle, 1. c. 251 = G. lannginosa.
maxima, D. Don, Prod. Fl. Nep. 186 = G. macrophylla.

CHAPTALIA, Vent. Jard. Cels, t. 61 (1800). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 498.
LEKIA, DC. in Ann. Mus. Par. xix. '(1812) 68.
LIEBERKUHNA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxvi. 286 (1823).
LOXODON, Cass. 1. c. xxvii. 258 (1823).
OXYDON, Less, in Linnaea, v. (1880) 857.
THYKSANTHEMA, Neck. Elem. 1. 6 (1790).
albicans, *Vent.ex Steud. Nom.* ed. II.i. 844.—Ind. occ.
Anandria, Spreng. Syst. iii. 504=Gerbera Anandria.
araneosa, *Casar. in Atti* 3> *Riun. Sc. Ital.* iii. (1841) 614.—Bras.
dentate, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxvi. 104.—Ind. occ.
denticulata, Spreng. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 310-Senecio polcher.
Ehrenbergii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 255.—Mexic.
exscapa, *Poepp. ex DC. Prod.* vii. 44, in syn.—Chili.
heterophylla, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 244 =Trichocline heterophylla.
integrifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. in. 377.—Am. trop.
integrifolia, Vent, ex Spreng. Syst. iii. 504 = tomentosa.
lyrata, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 243.—Mexic.
lyrata, Spreng. Syst iii. 504 - Gerbera Anandria.
nutans, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 256.—Mexic.
oblonga, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 240.—Peruv.
obovata, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 83.—Ins. Cuba,
ovalis, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 241.—Perav.
piloselloides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 378.—Bras,
piloselloides, *Vent, ex Steud. Nom.* ed. II. L 344; *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 378.—Reg. Argent
rotundifolia, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1880) 242,-Peruv.
runcinata, *H. B. tf K. Not. Gen. et Sp.* iv. 6.—N. Granat
sarmentosa. Vent, ex Steud. Nom. ed. II. i. 344 = Chevreulia stolonifera.
Seemannii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 255.—Mexic.
sinuata, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. til. 878.—Reg. Uruguay; Argent
sinuata, *Vent, ex Steud. Nom.* ed. IL t 344.—Ins. Jamaic.
spathulata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 265.—Mexic.
tomentosa. *Vent. Jard. Cels.t* 61.—Am. bor.

CHAQUEPIRIA, Endl. Gen. 562, in syn. (1838) sphalm. -CAQUEPIRIA, J. F. GmeL-Gardenia, Linn. (Rubiac).

CHARACHEBA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 115 (1775). *ACANTHACEAE1,* Benth. & Hook. f. ii.1071.
XERALIS, Rafin. Sylva Tellnr. 82 (1838).

CHABACHEBA:—

spicata, Lam. Encyc. i. 695=viburnoides.
viburnoides, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 116.—Arabia.

CHARACIAS, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 259 (1821) -**Euphorbia,** Linn.
amygdaloides, S. F. Gray, 1. c. 260=E. amygdaloides.
purpurea, S. F. Gray, 1. c 259 - E. Characias.

CHARADRA, Scop. Introd. 270 (1777)-CHADARA, Forsk. = **Grewia,** Linn.

CHAKDIZriA, Desf. in Mem. Mus. Par. iii. (1817) 465. t. 21. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 464.
cylindrica, *Desv. Fl. Anj.* 216-Xeranthemnm cylindraceum.
macrocarpa, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 882 - xeranthemoides.
xeranthemoides, *Desf. in Mém. Mus. Par.* SL (1817) 456.—As. Min.; Persia.

CHABIATTTHTT8, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 827. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. *I.* i. 762.
CHAENANTHERA, Rich, ex DC. Prod. iii. 196(1828).
TKTRAZYGOS, Rich, ex DC. L c 197 (1828).
Berteroanus, Ser. ex DC. 1. c. 197—glaberrimus.
brasiliensis, Cham, ex Triana, in Trans. linn. Soc. xxviii. (1871) 118=Miconiabrasiliensis.
caeruleus, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1277 - Memecylon Spathandra.
ciliatus, *DC. Prod.* iii. 197.—Ins. Trinitat.
cocdneus, *D. Don, in Mem. Went. Soc.* iv. (1823) 828.—Am. austr.
crinitus, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xviii. (1852) 112.—Ind. occ.
Fadyeni, *Griseb. in Goett. Abh.ix.* (1861) 56.—Jamaic.
glaberrimus, *DC. Prod.* iii. 196.—Ind. occ.
nodosus, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 99 -ciliatus.
obliquus, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 186-Miconiaobtusa.
obtusus, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 103 = Miconia obtusa.
purporeus, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 829.—Ins. Montserrat.
tinifolius, *D. Don, 1. c.*—Ind. occ.

CHARIDIA, Baill. Etud. Gen. Euph. 672. t 22 (1858) =**8avia,** Willd. (Euphorb.).
mimosoides, Baill. I. c. 578 - S. mimosoides.
pulchella, Baill. 1. c = S. pulchella.

CHAKIEI8, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 68 ; et in Diet. Sc. Nat. viii. 191; xxiv. 369 (1817). *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 266.
KAULFUSSIA, Nees, Hor. Phys. Berol. 58.1.11 (1820).
caerulea, Cass. in Diet. Sc. Nat xxiv. 372-heterophylla.
heterophylla, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1817) 68.—Afr. austr.
Neesii, Cass. 1. c. (1821) 13, ex eod. in Diet. Sc Nat. xxiv. 370, 872-heterophylla.
piloseUa, Baill. Hist. PI. viii. 139=heterophylla.

CHARIESSA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 794 (1866) = **Villaresia,** Ruiz *8c* Pav. (Olacin.).
Smythii, Becc. Malesia, i. (1877) 118.—Malaya.
suaveolens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 794.—Malaya.

CHARIOMMA, Miers, Apocyn. S. Am. 110 (1878)" **EchiteS,** Linn. (Apocyn.).
domingensis, Miers, 1. c. 112=Echites domingensis.
flaxa, Miers, 1. c. 118-Dipladenia flava.
mucronulata, Miers, 1. c. 112.—Ins. S. Thorn.
nobilis, Miers, 1. c 113 = Dipladenia nobilis.
scandens, Mien, 1. c. 114.—Ind. occ.
surrecta, Miers, 1. c. 111-Echites Andrewsii.
verticillata, Miers, 1. c. 113.—Jamaic.

CHARLWOODIA, Sweet, Fl. Austral, t 18 (1887)" **Cordylino,** Comm. (Liliac.).
angustifolia, Goepp. Beitr. Kenn. Dracaen. 17'Cord. Pumilio.
australis, G. Don, in Loud. Hort Brit. 130-Cord-australis.
congesta. Sweet, Fl. Austral, t. 18-Cord. Pumilio.
ensata, Goepp. Beitr. Kenn. Dracaen. 17-DianeU» ensifolia I

CHARLWOODIA :—
fragrantissima, Lera. Jard. Flenr. iv. (1851) t. S99. Misc. 57=Cordyline dracaenoides.
indivisa, G. Don, in Loud. Hort Brit 180 - Cord. indivisa.
longifolia, Goepp. Beitr. Kenn. Dracaen. 17.—Hab.t
rigidifolia, Koch & Boucbe, Ind. Sem. Hort Beiol. (1855) 11 - Cord. Pumilio.
rubra, Planch, la Fl. des Serres, vi. (1860-51) 188= Cord, rubra.
Sellowiana, Planch. 1. c. 137-Cord. Sellowiana.
spectabilis, Planch. 1. c. 186= Cord, dracaenoides.
stricta. Sweet, Fl. Austral, sob t 18 •'Cord. Pumilio.

CHABPENTIERA, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 414. t. 47, 48 (1826). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 26.
obovata, *Gaudich. I. c.* t. 48.—Ins. Sandvic.
ovata, *Gaudich. 1. c.* t 47.—Ins. Sandvic

CHARPENTIERA, Vieill. In Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1865) 346=Pavetta, Linn. (Rubiac).
bracteata, Vieill. 1. c. 847.—N. Caled.

CHARTACALYX, Maing. ex Mast in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 882 (1874). *TIUACEAE.* "
accrescens, *Mast. 1. c.*—Malacca.

CHARTOCALYX, Regel, in Act. Hort Petrop. vi. (1879) 367. *LABIATAE.*
Olgae, *Regel, 1. c.* 868.—Turkestan.

CHARTOLEPIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 8$ (1826) Centaurea, Linn. (Compos.).
Biebersteinii, Jaub. & Spach, IUnstr. iii. 11 - Cent glastifolia (ex parte).
cappadocica, Fenzl, in Tchihat Asie Min. Bot ii. 328 =Cent. cappadocica.
cappadocica, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 137. t. 291 = Cent, macrolopha.
Cassiniana, Jaub. & Spach, 1. c. 9- Cent glastifolia.
cheirolopha, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot ii. 824= Cent, cheiracaitha.
dtabaefolia, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 186 « Cent. drabifolia.
glastifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 86 = Cent. glastifolia.
intermedia, Boiss. Diagn. Ser. IL iii. 64.—Ross. mer.; Sibir.; Soongar.
Kotschyi, Fend, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 828 = Cent, macrolopha.
lancifolia, Fenzl, 1. c. 327 = Cent, lancifolia.
Hbanotica, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 136.—Syria.
lyrata, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 696. —Persia.
**ligna,* C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1861) 421 (-*Phaeopappus sdlignus).*—Armenia.
**chi*oltpis,* Boiss. ex Boiss. Fl. Orient iii. 596 (-*Phaeopappus salignus).*—Kurdist'
Tournpfortii, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 9 - Cent. glastifolia.

CHARTOLOMA, Bunge, in Bot Zeit ii. (1844) 24S = Isatis, Toum. (Crucif.).
platycarpum, Bunge, 1. c. 250 el. platycarpa.

CHASAIiIA, Comm. ex DC. Prod. iv. 531 (1830). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 126.
POLYOZOS, Blume, Bijdr. 947 (1826).
•"aicorum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 48. —Ins. Fiji.
Borboniae, Comm. ex DC. Prod. iv. 632=divaricata.
Boryana, *DC. 1. c*—Ins. Mascar.
capiUta, *DC. 1. c.* 681.—Ins. Manrit
'"ondrophylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 203.—Sumatra.
wnsiaefolia, *DC. Prod.* iv. 632.—Ins. Maurit
<*ffeoides,* DC. 1. c 681=divaricatal
Lommersonii, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 345 = wpitata.
Wrvjflora, 7*«. *Enum. PI. Zeyl.* 150.—Ind. or.; Malaya.
divaricate, *DC. Prod.* iv. 582.—Ins. Maurit.
""*pansa,* Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 280 • Psychotria malayana.
*ontanesii, *DC. Prod.* iv. 631.—Ins. Mascar.
krandifolia, *DC. 1. c.* 682.—Ins. Maurit

CHABAXIA:-
Hasseltiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 204. —Java.
laxiiora, Benth. in Hook. Niger Fl. 416 - Psychotria Ansellii.
leucocarpa, Miq. Fl. Ind. Bat it 281-Psychotria leucocarpa.
lurida, Miq. 1. c. 282=curriflora.
montana, Miq. 1. c 281=Psychotria montana.
Mooniae, *Baker, Ft. Maurit.* 155.—Ins. Mascar.
oxylepis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 283.—Java,
parviflora, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 417.-Afr. trop.
perforata, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. 646 - Psychotria angulata.
psychotrioides, DC. Prod. iv. 631-Gaertnera psychc-trioides.
pyriformis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1880) 44. —Ins. Samoa.
robusta, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 280 = Psychotria robusta.
rostrata, *Miq. I. c.* 281.—Malaya.
sangiana, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. 546=curviflora.
stipulacea, DC. Prod. iv. 582=divaricata.
tetrandra, Miq. Fl. Iud. Bat. ii. 282 - curviflora.
umbraticola, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 230.—Afr. trop.

CHASALLIA, Comm. ex Poir. in Diet. Sc. Nat. viii. 198 (1817); et Juss. in Mim. Mus. Par. vi. (1820) 379 =praec.

CHASCANUM, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 275 (1837)=Bouohea, Cham. (Verbenac).
cernuum, E. Mey. 1. e. 276=B. cernua.
cuneifolium, E. Mey. 1. c.=B. cuneifolia.
garipense, Ii. Mey. 1. c. 277=B. garepensis.
laetum, Fenzl, ex Schau. in DC. Prod. xi. 559 = B. pterygocarpa.
marrubiifolium, Fenzl, ex Schau. 1. c 668 •» B. marrubiifolia.
pinnatifidum, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 277 — B. pinnatiiida,
pumilum, E. Mey. I. c.=B. pumila.

CHASCOLYTRUM, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 190-Briaa, Linn. (Gramin.).
barbatum, Kunth, Enum. PI. i. 373 «=B. barbata.
coarctatum, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 298.— Chili.
elegans, Beanv. Agrost. 86=B. elegans.
erectum, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 190=B. erecta.
nutans, Lindl. ex Heynh. Nom. ii 137, nomen.— Chili.
rotundatum, Kunth, Rev. Gram. i. 121 = B. rotundata.
rufum, j. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 268 = B. rufa.
spicigerum, J. *Sc* C. Presl, 1. c. 282=B. spicigera.
stratum, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 884=B. stricta.
subaristatum, Desv. in Nonv. Boll. Soc. Philom. ii. (1810) 190 ^B. rotundata.
trilobum, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 884 = B. triloba.

CHABMANTHEHA, Hochst in Flora, xxvil. (1844) 21. *MENISPERMACEAE.* Benth. & Hook, f. i. 34.
RHIGIOCARYA, Miers, in Ann. Nat Hist Ser. III. xiv. (1864) 100.
dependens, *Hochst. I. c.*—Abyssln.
nervosa, *Miers, Contrib. Bot.* iii. 89.—Afr. trop.
uviformis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. I* (1885) 459.—Madag.

CHASMANTHIUM, Link, Hort Berol. i. 159 (1827) = Uniola, Linn. (Gramin.).
gracile, Link, 1. c.=U. gracilis.
omithoryncha, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 280-U. omithoryncha.

CHASME, Salisb. Parad. Lond. sub t 67 (1807); et in Knight, Prot 16 (1809) - Iieuoadendron, R. Br. (Proteac).
comosa, Salisb. 1. c. j Knight, 1. c 17 = L. comosum.
pinifolia, Knight, 1. c—Afr. austr.
ramentacea, Knight, 1. c.-L. aemulum.
spiralis, Knight, 1. c. 16.—Afr. austr.
terttifolia, Knight, 1. c. - L. abietinum.

CHASMIA, Schott, ex Sprang. Syst. iv. Cor. Post. 409 (1827)-Arrabidaea, DC. (Bignoniac.).
ochroleuca, Schott, 1. c. = A. Agaus-castns, vel A. Salzmanni.

CHASMONE, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 71 (1836) =Argyrolobium, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
Andrewsiana, E. Mey. 1. c. 74 » A. Andrewsiannm.
angustissima, E. Mey. 1. c. 75=A. filiforme.
apiculata, E. Mey. 1. c. 73=A. collinum.
argentea, E. Mey. 1. c 74=A. LJnnaeanum.
ascendens, E. Mey. 1. c. 78=A. ascendens.
baptisioidfs, E. Mey. 1. c. 71=A. baptisioides.
barbata, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot ii. (1843) 77=A. barbatum.
calycina, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 74, adnot. - A. calycinum.
crassifolia, E. Mey. 1. a 72=A. crassifolium.
crinita, E. Mey. 1. c. 71 = A. crinitum.
cuneifolia, E. Mey. 1. c.=A. polyphyllnm.
diversifolia, E. Mey. 1. c.-A. speciosum.
goodioides, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 75-A. goodioides.
holosericea, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 72 = A. sericeum.
lanceolata, E. Mey. 1. a 76 = A. lanceolatum.
longifolia, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 74-A. longifolium.
obcordata, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 72 = A. obcordatum.
petiolaris, E. Mey. 1. c. 75=A. petiolare.
pumila, Meissn. in Hook. Lond. Jouro. Bot. ii. (1843) 77 = A. pumilum.
rupestris, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 74 - A. rupestre.
sessUiflorum, E. Mey. L c. 72 = A. candicans.
splendens, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 78=A. splendens.
stricta, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 75 •> A. strictum.
tenuis, E. Mey. 1. c. 76, adnot.=A. angustifolium.
tuberosa, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 78=A. tuberosum.
venosa, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 73=A. molle.
verticillata, E. Mey. L c. 72=A. stipulaceum.

CHASMONIA, Presl, Fl. Sic. Praef. p. xxxvii (1826)-Moluccella, Linn. (Labiat).
incisa, Presl, L c.=M. spinosa.

CHASSALIA, Comm. ex Poir. in Diet Sc. Nat. viii. 198 (1817)«Chaaalia, Comm. (Rubiac).

CHASSELOUPIA, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. x. (1866) 101*8ymplooos, linn. (Styrac).
arborea, Vieill. 1. c. 102-S. arborea.
caerulescens, Vidll. 1. c 103-S. caerulescens, Vieillardi.
gracilis, VieilL ex Miers, in Journ. linn. Soc xvii. (1879) 305-S. gracilis.
lucida, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. x. (1866) 102=S. glaucescens, lucida.
microphylla, VieiU. 1. c 104.—N. Caled.
montana, Vieill. 1. c. =S. montana.
neo-caledonica, Vieill. 1. c. 108—S. stravadioides, Lenonnandiaoa.
nitida, Vieill. ex Miers, in Toum. Linn. Soc. xvii. (1879) 805=S. rotundifolia.
tinctoria, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. x. (1866) 104=S.baptica.

CHASTENAEA, DC. Prod. iii. 102 (1828) => Axlnaea, Ruiz & Pav. (MeUstomac).
affinis, Naud. in Ann. Sc Nat. Ser. III. xviii. (1852) 120 —A macrophylla.
coriacea, Naud. 1. c iv. (1845) 55 = A. lepidota.
fioribunda, Naud. 1. c xviii. (1852) 122=A. floribunda.
glandulosa, Naud. 1. c. 123-A. glandulosa.
grandifolia, Naud. 1. c. 122 = A. grandifolia.
lanceolata, Naud. 1. c. 123 = A. lanceolata.
lepidota, Benth. PI. Hartw. 182 = A, lepidota.
longifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. iv. (1845) 65=Meriania Karstenii.
macrophylla, Naud. 1. c. = A macrophylla.
Merianiae, DC. Prod. iii. 102 = A. Merianiae.
rigida, Naud. in Ann. Sc. Nat Ser. III. xviii. (1852) 123-Meriania rigida.

CHASTOLOMA, Lindl. Veg. Kingd. 855 (1847), sphalm. = CHARTOLOMA, Bunge-Iaatis, Linn.

CHATAEA, Soland. ex Seem. PI. Vit. 102 (1865) = CHAITAEA, Soland. = Tacoa, Forst.
Tacca, Soland. 1. c. = T. pinnatifida.

CHATELANIA, Neck. Elem. i. 63 (1790) = Tolpis, Adans. (Compos.).

CHATIAKELLA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxix. 491 (1823) = Wulffla, Neck. (Compos.).
platyglossa, Cass. 1. c. xlvi. 402 - W. stenoglossa.
stenoglossa, Cass. 1. c. 403 = W. stenoglossa.

CHAUBARDIA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 671 = Zygopetalum, Hook. (Orchid.).
surinamensis, Reichb. f. 1. c. 672.—Guiana.

CHAULMOOGRA, Roxb. Hort. Beng. 105 (1814); Fl. lnd. iii. 835 (18S2) = Gynoeardia, R. Br. (Bixin.).
odor at a, Roxb. II. cc. 105, 836 = G. odorata.

CHAUNOCHITOM', Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 996 (1867). *OLACINEAE,* Benth. & Hook, f. 1. c.
loranthoides, *Benth. in Hook. Ic. PI.* 1.1005.—Bras.

CHAUVINIA, Stend. Syn. PI. Gram. 862 (1855) = Spartina, Schreb. (Gramin.).
ckilensis, Stend. 1. c. = S. densiflora.

CHAVANNESIA, A. DC. in DC. Prod. viii. 444 (1844) -TJrceola, Roxb. (Apocyn.).
esculenta, A. DC. 1. c. = U. esculenta.
javanica, Miq. Fl. lnd. Bat. ii. 458__Java.
lucida, A. DC. in DC. Prod. viii. 444 - U. ludda.

CHAVICA, Miq. Syst. Pip. 222 (1843) - Piper, Linn.
amboinensis, Miq. in Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat. i. 134 -= P. amboinensis.
Arnottiana, Miq. Syst. Pip. 268-P. Hapnimn.
auriculata, Miq. 1. c. 269-P. Betle.
Benthamiana, Miq. 1. c. 233 = P. Barclayauum.
Betle, Miq. 1. c 228 = P. Betle.
Blumei, Miq. 1. c 246=P. Malamiri.
boehmeriaefolia, Miq. 1. c. 266 = P. boehmeriaefolium.
canaliculata, Presl, Epim. Bot. 224 = P. canaliculatnm.
celebica, Miq. Syst. Pip. 276=P. celebicum.
celtidiformis, Miq. 1. c. = P. parvifolinm, celtidiforme.
ceramica, Miq. in Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. i. 135 = P. ceramicum.
Chaba, Miq. Syst. Pip. 251=P Chaba, *Blume.*
chaerostachya, Pritz. Ic. lnd. ii. 75, sphalm. = *sphaerostachya.*
Chawya, C. DC. in DC. Prod. xvi. I. 851=seq.
Chuvya, Miq. Syst Pip. 267 = P. Betle.
consanguinea, Miq. 1. c. 232 = P. LabUlardieri.
corylistachya, Miq. 1. c. 281 = P. corylistachyon.
densa, Miq. 1. c 252 = P. Betle.
diffusa, Miq. inZoll. Syst. Verz. lnd. Archip. 84=P. attenuatura.
exasperata, Miq. Syst. Pip. 275-P. exasperatum.
frustrate, Miq. PI. Jungh. 16.—Java.
glandulosa, Presl, Epim. Bot. 228=P. miniatum.
grandis, Presl, 1. c. 224 = P. grande.
Guigual, Miq. Syst. Pip. 280 = P. brachystachyum, *Wall.*
Haenteana, Presl, Epim. Bot. 224-P. Haenkeannm.
Huegeliana, Miq. in Linnaea, xxvi. (1853) 218=P. Novae-Hollandiae vel P. Hugelianum.
imperialis, Miq. in Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. i. 134» P. Forstenii.
LabUlardieri, Miq. Syst Pip. 263=P. Chaba, *Hunter,*
lanceolata, Miq. 1. c. 264= P. miniatum.
leptostachya, Hance, in Joum. Bot. vi. (1868) 801.—China.
Lessertiana, Miq. Syst. Pip. 270 = P. Pseudo-chavica.
macrostachya, Miq. 1. c. 286 — P. miniatum.
maculata, Miq. 1. c. 256 =P. maculatum.
madagascariensis, Miq. 1. c. 277 = P. madagascariense.
majuscula, Miq. 1. c. 271 — P. majusculum.
maritima, Miq. 1. c. 262=P. Chaba, *Hunter.*
Melamiris, Miq. 1. c. 245 = P. Sirium.
microstigma, Miq. in Ann. Mus. Bot Lugd. Bati. 138 = P. microstigma.
'*miniaia,* Miq. Syst Pip. 284-P. miniatum.

CHAVICA:—
Mullesua, Miq. Syst. Pip.280=Piper brachystachynm, *Wall,*
multintrvia, Miq. Fl. lnd. Bat. Suppl. 473 = P. piianamense.
Neesiana, Miq. Syst. Pip. 249= P. peepuloides.
offidnarum, Miq. 1. c. 256=P. Chaba, *Hunter,*
parvifolia, Hassk. in Flora, xlvii. (1884) 69=P. parvifoliom.
peepuloides, Miq. Syst. Pip. 287 = P. peepuloides.
peepuloides, Wight, Ic. t. 1927 = P. Chaba, *Hunter,*
penangensis, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 483-P. Lonchites.
penangensis, Miq. Syst. Pip. 279 = P. penangense.
petiolata, C. DC. in DC. Prod. xvi. 1.889.—lnd. or.
populifdia, Miq. Syst. Pip. 248.—Ins. Philipp..
pothoides, Miq. 1. c. 266=P. pothoides.
pseudomelamiris, Miq. 1. c. 244 = P. Sirium.
puberula, Benth. Fl. Hongk. 385.—China.
pyrifolia, Miq. Syst Pip. 275-P. pyrifolium.
radicans, Presl, Epim. Bot. 224 = P. radicans.
Rafflesii, Miq.'Syst. Pip. 273 = P. Rafflesii.
Reinmardtiana, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. i. 136 = P. Reinwardtianum.
retrofracta, Miq. Syst Pip. 276 = P. retrofractum.
Roxburgkii, Miq. 1. c. 289 - P. longum.
rufinervis, Presl, Epim. Bot. 224 = P. rufinerve.
Rumphii, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. i. 141 = P. Rumphii.
salicina, Presl, Epim. Bot. 224=P. salicinum.
sarmentosa, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 433 = P. longum.
sarmentosa, Miq. Syst Pip. 242 =P. sarmentosnm.
sinensis, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joarn. vi. (1854) 116 = P. sinense.
Siriboa, Miq. Syst. Pip. 224 - P. Betle.
sphaerostachya, Miq. 1. c 278=P. brachystachyum, *Wall,*
subcordata, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 138 = P. subcordatum.
subseptemnervia, Miq. Fl. lnd. Bat. Snppl. 473 = P. snbseptemnervium.
Suipigua, Miq. Syst. Pip. 275=P. Suipigua.
sundaica, Miq. 1. c. 274= P. sundaicum.
sylvatica, Miq. I. c. 248 -P. sylvaticum.
syringaefolia, Miq. 1. c. 275 = P. syringaefolinm.
Teysmanni, Miq. »u Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat i. 141 >P. Teysmanii.
thermalis, Miq. Syst. Pip. 276 = P. thermale.
Thomsonii, C. DC. in DC. Prod. xvi. I. 389.—lnd. or.
vims'na/is.Miq. in Linnaea, xx. (1847) 131 = P. viminale.
WaUichii, Miq. Syst Pip. 254 = P. anrantiacum.

CHAYOTA, Jacq. Am. Select, ed. pict. t. 245 (1780) = 8echium, P. Br. (Cucurbitac.).
edulis, Jacq. 1. c. = S. edule.

CHEILANTHOS, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 56 (genus indesc. *LABIATARUAf).*

CHEILOCIiINTtlM, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 420. *HJPPOCRATEACEAE.*
anomalum, *Miers, 1. c.*—Bras.

CHEILOCOCCA, Salisb. ex Sm. Spec. Bot N. Holl. 17 (1793), cum cit. falsa •* Platylobium, Sm. (Legnmin.).
apocynifolia, Salisb. ex Sm. 1. c.«=P. formosum.

CHEILODISCUS, Triana, in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. ix. (1858) 36 = Pectls, Linn. (Compos.).
littoralis, Triana, 1. c.—N. Granat ,

CHEILOPSIS, Moq. in Ann. Sc. Nat *Sir.* L xxvii. (1832) 230=AoaathUB, Tonrn.
arborea, Nees, in DC. Prod. xi. 272=A arboreus.
montana, Nees, I. c. = A. montanus.
polystachya, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. L xxvii. (1832) 230 = A. arboreus.

CHH.OSA, Blume, Bijdr. 613 (1825). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 322.
montana, *Blume,* 1. c. 614.—Java.

CHEILOSANDRA, Griff, ex Lindl. Veg. Kingd. 672 (1847) = Bhynchotechum, Blume (Gesnerac).
leptopus. Griff, ex benth. & Hook. f. Gen. ii. 1025 - Leptobaea glabra.

CHEILOTHECA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 607 (1876). *MONOTROPEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c
khasiana, *Hook. I. c.* 608.—Reg. Himal.

CHEILYCTIS, Benth. Lab. Gen. et Sp. 726 (1836) = Honarda, Linn. (Labiat).

CHEIRADENIA.Lindl. Fol Orch. Cheirad. (1853) 1. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 644.
cuspidata, *Lindl. 1.* c.—Guiana.

CHEIRANTHER A, Endl. Enchir. 515 (1841) = Cheiro· Btemon, Humb. *Sc* Bonpl. (Sterculiac).

CHEIKANTHEBA, Brongn Voy. Coq. Bot. t. 77 (1826) ; et A.Cunn. in Bot. Reg. sub t 1719 (1834). *PITTOSPOREAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 183.
brevifolia, F. Muell. Fragm. i. 97 = filifolia.
cyanea, Brongn. Voy. Coq. Bot. t. 77 = linearis.
filifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 864.—Austral.
linearis, *A. Cunn. in Bot. Reg.* sub t 1719.—Austral,
parviflora, *Benth. Fl. Austral,* i. 128.—Austral.
Preissiana, *Putterl. in Lehm. PI. Preiss. i.* 201 (sp. dub.).—Austral.
tortilis, F. Muell. Fragm. ii. 79 = fiUfolia.
volubilis, *Benth. Fl. Austral,* i. 128.—Austral.

CHEIRANTHODENDRON, Benth. & Hook. f. Gen. i. 212 (1862) = CHIRANTHODENDRON, Cerv. =- Cheirostemon, Humb. & Bonpl. (Sterculiac).

CHEIRANTHODENDRUM, Steud. Norn. ed. I. 186 (1821)=praec.

CHEIRAXTTHTTS. Linn. Gen. ed. I. 195 (1737). *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 68.
CIIEIRI, Adans. Fam. ii. 418 (1763); [Clairv.] Man. Herb. 221 (1811).
DICHROANTHUS, Webb 8c Berth. Phytog. Canar. i. 65. t. 5, 6 (1836).
FHOEMCAULIS, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 89 (1888).
SCHELHAMERIA, Heist. Syst. 9 (1748).
acaulis, Balb. ex Spreng. Nov. Prov. 10 = Mattbiola acaulis.
africanus, Linn. PL Afr. 13 (Amoen. Acad. vi. 90) - Heliophila pilosa.
albiflonis, *T. Anders, in Hook. /. Fl. Brit. lnd. L* 138.—Tibet, occ.
albus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = Matthiola incana.
alpinus, All. Fl. Pedem. iii. t. 20 = Erysimum lanceolatum.
alpinus, Falk, Beitr. ii. 216=Erysimum altaicum.
alpinus, Jacq. Fl. Austr. 1. 48. t 76 = Erysimum canescens.
alpinus. Lam. Encyc- ii. 716 = Erysimum ochroleucum.
alpinus, *Linn. Mant.* 93 (cxcl. syn.).—Scandinav.
angulatus, Schult. Obs. 129«Syrenia sessiliflora.
angustifolius, GUib. Fl. Lituan. ii. 61 » Erysimnm hieracifolium.
angustifolius. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 = Erysimum lanceolatum.
annuus, Georgi, Reise, i. 225 = Hesperis aprica.
annuus. *Linn. Sp. PI.* 662.—Davuria.
apricus, Stcph. ex Willd. Sp. PL iii. 518 = Hesperis aprica.
aquaticus, Lejeune, Fl. Spa, ii. 68 = Erysimum cheiranthoides.
arborescens, Sieber, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 166, nomen = Matthiola arborescens.
arboicus, *Sweet, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 345.—**Aegypt.**
arbuscuia, *Lowe, in Hook. Kew Joum.* viii. (1856) 289.—Ins. Canar.
arenarius, Suffren, ex DC. Syst. ii. 171 - Matthiola varia.
armeniacus, Sims, Bot. Mag. t. 835 = Erysimum ibericum.
arvensis, Bernh. Syst. Verz. Erf. 196 » Erysimum hieracifolium.
asper, *Cham, tf Schlecht- in Linnaea, i.* (1826) 14-—Am. bor. occ.
asper, Nutt. Gen. Am. ii. 436=Erysimum asperum.
aurantiacus, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 5.—China.
aureus, Willd. ex DC. Sy*t. ii. 581=Sterigma elychrysifolium.

CHBIBAXTTHUS :—

auriculatus, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 362 - Cochleana aunculata.

«« ... Brouss. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 97 = scoparius.

b olor Hornem. fc Hort." Hafa< ii- 618 = Erysimum Wcolor."

Kcornis, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Pro4 ii. 26 . Matthiola Dicomis.

bi atus, W i n d . S p. Pl. iii. 5 1 9 = Hespe »*»•

Mhyniçus, Pers. Syn. ii. 200-Erysimum cnspidatum.

Bocconi, All. Fl. Pedem. i. 272 = Erysimnm canescens.

callosus, Linn. f. Suppl. 296 - Heliophila callosa.

conus, Wller & Mitterp. I.er Poseg. 146. t. lS^Erysimum angustifohum.

capitatus, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 38 = ca ii s, Thunb. Prod. P - Heliophila iliqua.

caspicus, Lam. in Pall. Voy. 8° App. 348 = Sterigma tomentosum.

Cheiri, *Linn. Sp. PI.* 661—Europ.

« « M , Linn. 1. c. = Malcolmia chia.

'kius, Pall. Reise, i. 497 - Chorispora tenella.

cnerens, Webb Cr *Berth. Phyt/Canar.* i. t. 5.-Ins. Canar.

coccineus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 — Matthiola inc Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 110 simum

contortuplicatus, Steph. in W'illd. Sp. PL iii. 521 = oisymbnnm contortuplicatum.

connthius, A». fl^. &,. n. i. 18.—Graecia.

^ ... *fo.ius,* Auth. • 717-Syrenia sessiliflora.

... = Matthiola tristis. 25

crassicaulis, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 45 = Erysimum crassicaule.

Cumbrae, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 152 = scoparius.

cuspidatus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. «• "0 - Erysimum cuspidatum.

decumbens, Schleich. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 680 = ochroleucus.

Delilianus, *A. Gouault, in Rev. Hortic.* Sér. IV. i. (1852) 401.—Hab. !

denticulatus, WUM. ex Steud. Norn. ed. II. i. 346 = Pallasii.

dubius, Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 73 = Erysimum dubium.

dubius, Suter, Fl. Helv. a. 85 ochroleucus.

elongatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 108 = Heliophila linearifolia.

erucaefolius, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 793 = Malcolmia lacera.

erysimoides, Gueldenst. ex Ledeb. 188 = Erysimum leptostylum.

erysimoides, Huds. Fl cheiranthoides.

erysimoides, latum. Linn. Sp. PL 661 = Erysimum lanceo-

erysimoides skianum. ... P»"- Reise, 1. 192 = Etysim»m Andieio-

erysimoides, Vill. ex WilUc & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 808 = Erysim

Farsetia, Buch.-Ham. in Wall. ... cum? n. 4801 = Farsetia Hamiltonii.

Farsetia, Linn. Mant. i. 94 = F Cat. arse t» "egyptiaca.

fenestralis, Linn. Sp. Pl. 1198 -MitthioGlfenestralis.

firmus, Schleich. ex Willd. Enum. Hort. • " • • « - Erysimum lanceolatum ?

firmus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 45 = Erysimum virgatum.

flexuosus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 684.—Ins. C Graec. Prtd a 24 ; *Fl.*

fragrans, Fisch. Hort. C& (1812) 61 = MatthioU fragrans.

frutescens, Vent. ex Pers. Syn. ii. 201 = semperflorens.

fruticosus, L'Hérit. ex DC. Prod. i. 197 = C. Cheiri.

fruticulosus, Georgi, Beschr. Russ. Reich. iii. iv. 1134 = Sterigma tomentosum.

fruticulosus, L'Hérit. ex DC. Syst. ii. 495 = Erysimum suffruticosum.

fruticulosus, Linn. Mant. 94 = C. Cheiri.

fruticulosus, Linn. Sp. Pl. 662 = Matthiola tristis.

fruticulosus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 23 = Erysimum Boryanum.

CHEIBANTHTJ8 :—

glaber, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = Matthiola glabra.

glaberrimus, CoIla, Antol. Bot. r. 861 - Matthiola glabra.

graecus, QJnss.] Pers. Syn. ii. 201—Matthiola incana.

gramineus, Thunb. Prod. PI. Cap. 108 - Heliophila graminea.

Griffithii, Hook. f. & Thorns, in Toum. Linn. Soc. v. (1861) 137=Erysimum Hooken.

heheticus, Jacq. Hort. Vindob. iii. 9 - Erysimum murale.

hesperidioides, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 72.—Am. bor.

hieracifolius. Lam. Encyc. ii. 717 = Erysimum hieracifolium,

hilaris, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 346 - Matthiola tristis.

himalaicus. Hook. f. & Thorns, in Joura. Linn. Soc. v. (1861) 187 -himalayensis.

himalayensis, *Cambess. in Jacquem. Voy. Bot.* 14.—Reg. Himal.

hirtus, Schlecht fide Stev. ex DC. Prod. i. 189 - Hesperis aprica.

hispidus, Adams, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 250 = Hesperis aprica.

hortensis, Lam. Fl. Fr. ii. 506-Matthiolaincana.

humilis, Clarke, Trav. iii. 42=Matthiola humilis.

ibericus, Adams, in Weber & Mohr, Beitr. i. 61 = Erysimum ibericum.

ibericus, Willd. Enum. Hort. Berol. 681 - Barbarea arcuata.

incanus, Linn. Sp. PL 662 •» Matthiola incana.

incrassatus, Bory, ex Steud. Nom. ed. II. i. 346 = Malcolmia flexuosa.

integrifolius. Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = Erysimum canescens.

integerritnus, Stend. Nom. ed. II. i. 346 = Erysimum canescens.

intermedius, Schleich. Cat PL Helv. ed. IV. 12 = C. Cheiri!

Jacomellii, Clem. Sert Olymp.9.14. f. 2-Erysimum Kotschyanum.

junceus, Kit. PL Rar. Hung. iii. 259 - Skymbrium junceum.

Keiri, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 283 = C. Cheiri.

Knowleanus, D. Dietr. Syn. PL iii. 683-ochroleucus.

Knowlesii, Walp. Rep. i. 125=t/chroleucus.

laeerifolius, Pall. Reise Statth. Russ. Reich, i. 124 = Matthiola tatarica.

lacerus, Gouan, Illnstr. 44 -Malcolmia parviflora.

lacerus, Linn. Sp. PI. 662=Malcolmia lacera.

ladniatus, Poir. Encyc. Suppl. it -780 - Hesperis laciniata.

laevigatus, Willd. ex DC. Prod. i. 141 = Barbarea arcuata.

lanatus, GmeL ex DC. Syst ii. 581 - Sterigma elychrysifolium.

lanceolatus, Willd: Sp. PL iii. 615-Hesperis tristis.

leptophyllus, Bieb. FL Taur. Cauc. ii. 119-Erysimum leptophyllum.

leptophyllus, Willd. ex DC. Syst ii. 464-Sisymbrium junceum.

leucanthemus, Steph. ex Willd. Sp. PL iii. 621-Erysimum versicolor.

linariaefolns, *Vis. in Nuov. Sagg. Ace. Pad.* v. (1840) 267—Afr. bor.

linearis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 119 = Farsetia aegyptiaca.

linearis, Thunb. Prod. PL Cap. 108 = Heliophila linearis.

linearis, Vent Jard. Malm. t. 83=«emperflorens.

lini/olius, Pers. Syn. ii. 201 = Erysimum linifolium.

littoreus, All. Fl. Bedem. i. 273=Malcolmia mantima.

littoreus, linn. Sp. PL ed. II. 925 = Malcolmia littorea.

littoreus, Pall. Reise, iL 741 = Sterigma tomentosnm.

lividus, Delile, FL Aeg. Illustr. 67 - Matthiola lirida.

lividus, Sieber, ex Stend. Nom. ed. II. i. 346 - Malcolmia aegyptiaca.

longifolius,VeDt. Jard. Malm. t. 83-mntabilis.

longipetalus, Vent. Jard. Cels, t. 93 - Matthiola oxyceras.

Umgisiliquus, Steud. Nom.ed. II. i. 346 - Erysimum longisiliqnosum.

luteus, Dulac, Fl. Hautes-Pyx. 199 =C. Cheiri.

CHEntAlTTHTJS:—

lyratus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 24-Malcolmia lyrata.

maritimus, Linn. Cent PI. i. 19 (Amoen. Acad. iv. 280) -Malcolmia maritima.

Marshallii, Stark, ex Moore, Gard. Mag. Bot. i. (1860) 289-ochroleucus.

Menziesii, *Benth. tf Hook. f. Gen.* i. 68.—Am. bor. occ.

mollis, Hornem. Hort. Ham. ii. 616-Arabia albida.

ntontanus, l'all. Keise, i. 496-Syrenia siliculosa.

muralis, Salisb. Prod. 271 = C. Cheiri.

muricatus, Lam. Fl. Fr. ii. 507 -= Matthiola sinuata.

muricatus, Weinm. Cat. Hort. Dorpat (1810) 41 = Dontostemon integrifolius.

mutabilis, Brouss. ex Spreng. Syst. ii 896 > semperflorens.

muUbilis, *L'Hirit. Stirp. Nov.* 92.—Ins. Mader. et Canar.

nanus, Merk. ex DC. Syst. ii. 486— Matthiola nana.

nitrarius, *Pall. Reise Statth. Russ. Reich,* i. 106, 124, 141.—Rossia.

nodosus, Lam. FL Fr. ii. 508 -/Malcolmia littorea.

ochroleucus, DC. Syst. ii. 181 = Erysimum echroleucum.

ochroleucus, *Hall.f. ex Schleich. Cat.* 16.—Enrop.

odoratissimus, Bieb. Casp. 116 - Matthiola odoratissima.

odoratus, *Pall, ex Spreng. Syst.* ii. 896.—Persia,

olympicus, *Sibth. ex DC. Syst.* ii. 494.—Graecia.

Pallasii, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 436=pygmaeus.

pollens, Hall. f. ex DC. Syst. ii. 501 «• Erysimum ochroleucum.

pallidus, Pall. Reise, iii. 230-Erysimum canescens.

paniculatus, Cav. Desc 430-Erysimum Kunzeanum.

paniculatus, Lam. Encyc. ii. 717 - Erysimum repandunv

paniculatus, Stev. ex DC. Syst. ii. 210=Arabis incamata.

Parnassii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 18—Erysimnm Boryanum.

parryoides, *Kurt, -ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 132.—Tibet.

parvifiorus, Schousb. Vextr. Marokko, 195=Matthiola parviflora.

parvifiorus, Thib. ex DC. Prod. i. 134 - Matthiola coronopifolia.

persicus, Pall, ex DC. 1. c. 132 = Anchonium Tournefortii.

persicus, WilM. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 109=Matthiola tatarica.

pinnatifidus, Willd. Sp. PL iii. 628= Dontostemon Pu pectinatus.

planiflus, Waldst. & Kit. ex Bieb. FL Taur. Cauc. iii. 448 = Erysimum cheiranthoides. ii 618 — Erysimum

pulchellus, Willd. Sp. PI. iii. 523-Erysimum rupestre.

pumilum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 26 = *Y* pygmaeus, *Adams, in Mem. Soc. Nat. Mosc.* v. (1817) 114.—Sibir.; Am. bor. occ.

quadrangularis, Steud. Nom. ed. II. i. 846=seq.

guadrangulus, L'Herit. Stirp. Nov. 91. t. 44-Syrenia sessiliflora.

ramosissimus, Lam. Encyc. ii. 717 — Erysimnm repandum.

ramosissimus, *Bory* b* *Chaub. Nouv. Fl. Pilop.* 43.—Graecia.

rhaeticus, Schleich. Cat. PL Helv. ed. III. 12 = Erysimum ochroleucum.

ruderalis, Pall, ex DC. Syst. it 580-Starigma tomentosum.

rupestris, Sibth. & Sm. FL Graec. Prod. ii. 23; Fl. Graec. t. 683 - Erysimum rupestre.

salinus, *Linn. Mant.* 93.—Sibir.; Taur.

salinus, Pall, ex DC. Syst. ii. 680 - Sterigma tomentosum.

salinus, Willd. ex DC. 1. c. 210-Arabis incamata.

scoter, Moench, Meth. 254 = Malcolmia airicana.

scaber, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* i. 68.—Ins. Canar.

scapiger, Adans, in Mem. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) m=Parrya macrocarpa.

scapigerus, Willd. Prod. Fl. Berol. 214. t. 6. f. 10 = Erysimum cheiranthoides.

scoparius, *Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 681. —Ins. Canar-

CHSIBANTHUS :—
semperflorens, Coss. & Dur. in Boll. Soe. Bot. Fr. iv. (1857) 396-Erysimum longifolium.
semperflorens, *Schousb. Vextr. Marokko,* 195. — Morocco.
Senoneri, *Heldr. V Sort. Cat. Hart. Athen.* (1862) *ex Rent. Cat. Gram. Genive* (1865), 4.—Archip. Grace.
sibiricus, Juss. ex DC. Syst. ii. 492=Erysimiun angustifolium.
silenifolius, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 45 = Erysimum murale.
riliculosus, Bieb. Fl. Tanr. Cane. ii. 121-Syrenia siliculosa.
rinuatus, linn. Sp. PI. ed. II. 926 - Matthiola sinuata.
rinuatus, Pall. Reise, ii. 329-Sterigma tomentosnm.
Stewartii, *T. Anders, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 182. —Reg. Hlmal.
Stoctsianus, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 19 = Erysimum Stocksianum.
strictus, Linn. f. Suppl. 2D6 = Heliophila callosa.
strictus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 781 - Heliophila scoparia.
strigosus, Ledeb. in *Him.* Acad. P&ersb. v. (1812) 589 = Erysimum strigosum.
subulatus, Moench, Melh. 254 -Malcolmia chia.
tulphureus, [Solaud. in] Russ. Aleppo,*ed. II. ii. 257 = Sterigma sulphureum.
sylvestris, Bemh. ex Steud. Norn. ed. II. i. 846 = Eryaimum hieracifolium.
sylvestris, Ciantz, Stirp. Austr. ed. I. L 48 j Lam. Encyc. ii. 716 = Erysimum lanceolatum.
syriaeus, DC. Syst. ii. 185 = Conringia orientalis.
syriaeus, Wffld. ex Steud. Norn.- ed. II. i. 346° Matthiola oxyceras.
taraxacifolius, Balb. Cat. Hort. Taur. App. (1814) 10 = Malcolmia taraxacifolia.
taraxacifolius, Biasol. ex Rcichb. Fl. Germ. Excurs. 687 = Erysimum strictnm.
taraxacifolius, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. iL (1818) 164-Chorispora tenella.
taraxacifolius, *Steph. ex Willd. Sp. PI.* iii. 525.—Sibir.
tatarims, Pall, ex DC. Syst ii. 170-Matthiola tatarica.
tauricus, Lepech. in Nov. Act Petrop. xiii. (1802) 836. t. 9 = Matthiola odoratissima.
tenuifolius, *L'Hirit. Stirp. Nov.* 92.—Ins. Madera.
tomentosus, Willd. Sp. PI. iii. 523=Sterigma tomentosnm.
torulosus, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 121=Sterigma torulosnm.
torulosus, Thunb. Prod. PI. Cap. 108 ~ Matthiola torulosa.
tricuspidatus, Hnds. Fl. Angl. ed. I. 250-Matthiola sinnata.
tricuspidatus, Linn. Sp. PI. 663 = Matthiola tricuspidata.
trilobus. Linn. I. c. 662 -= Malcolmia littorea.
tristis, Curt. Bot. Mag. t. 729 = Matthiola varia.
tristis, Foralc. Fl. Aegypt Arab. 118 - Matthiola livida.
tristis, Linn. Syst. Nat. ed. X. 113* = Matthiola tristis.
turritoides, Lam. Encyc. ii. 716-Erysimum cheiranthoides.
unguiculatus, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 847-Malcolmia littorea.
vallesiacus, J. Gay, ex DC. Prod. i. 134 - Matthiola •aria.
varius, Sibth. & Sm. FL Graec. Prod. ii. 95; FL Grace. t. 636 = Matthiola varia.
versicolor, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iL 119 = Erysimum versicolor.
versicolor. Pall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 347-Hesperis hyrcanica.
villosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 120-Matthiola trienspidata.
villosus, Sprang, ex DC. Prod. 1. 188 = Hesperis ladniata.
virgatus, Patr. ex DC. Syst. it 462 = Sisymbrinm juncenm.
virgatus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 781 —• Erysimum angustifblinm.
viridifolius, Steud. Nom. ed. II. i. 347=Matthiola glabra.
viridis, Ehrh. Beitr. vU. 168-Matthiola incana.

CHEIRI, Adans. Fam. it. 418 (1768) - Cheiranthus, Unn. (Crucif.).
hieracifolium, [Clairv.] Man. Herb. 221=Erysimum hieracifolium.
montanum, [Clairv.] 1. c.=Cheiranthus Cheiri.
vulgare, [Clairv.] 1. c.=Cheiranthus Cheiri.

CHEIRINIA, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 170 (1822) = EryBlmum, Tourn. (Crucif.).
altissima, Link, 1. c. 171 = E. hieracifolium.
Andrtejomskiana, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. i. 347 - E. canescens.
angustifolia, Link, Enum. Hort Berol. ii. 170-E. angustifolium.
canescens, Link, 1. c. 171=E. canescens.
cheiranthoides. Link, 1. c. 170-E. cheiranthoides.
crepidifolia, A. Dietr. Fl. Boruss. vii. 446=E. crepidifolium.
cuspidata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 170 = E. cuspidatum.
erysimcides, Dnm. Fl. Belg. 128 = E. lanceolatum.
firma, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 171 = E. virgatum.
helvetica, link, 1. c.=E. ochroleucum.
hieracifolia, link, 1. c. 170=E. hieracifolium.
juncea, Link, 1. c 172 = Sisymbrium jnnceum.
lanceolata, Link, 1. c. 171 = E. lanceolatum.
leptostyla, link, Handb. ii. 815 = E. leptostylnm.
longifolia, Link, Enum. Hort Berol. ii. 171 - E. longifolium.
longisiliqua, Link, Handb. ii. 315=E. virgatum.
longiriliquosa, link, Enum. Hort. Berol. ii. 170 = E. longisiliquosum.
odorata, Link, Handb. ii. 815=E. odoratum.
repanda, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 171 - E. repandum.
sessiliflora, Link, I. c. 170 = Syrenia sessiliflora.
stricta, Link, 1. c =E. hieracifolium.
strictissima. Link, L c. 171 = Sisymbrium strictissimom.
suffruticosa, Link, 1. c. 170=E. morale.
virgata, Link, 1. c.=E. virgatum.

CHEIRISANTHERA, Hort. ex Kegel, Gartenfl. ii. (1853) 353=Heppiella, Regel (Gesnerac).
atrosanguinea, Hort.ex Regel, I.e. = H. atrosanguinea.
cocdnea, Hort. ex Regel, 1. c. = H. atrosanguinea.

CHEIRODENDRON, Nutt. ex Seem, in Journ. Bot. v. (1867) 236=Panax, Unn. (Araliac).
Gaudichaudii, Seem. 1. c.=P. Gaudichaudii.
laetevirens. Seem. 1. c.—Chili.
platyphylla. Seem. 1. c.=P. platypbyllnm.
sanwense, Seem. L c. 287.—Samoa.
valdivienșe, Seem. 1. c. 286.—Chili.

CHSIROIiAEN'A, Benth. in Benth. *6c* Hook. f. Gen. i. 222 (1862). *STERCUUACEAE,* Benth. *8c* Hook, f. 1. c.
linearis, *Benth. c*—Madag.

CHEIROLEPIS, Boiss. Diagn. Ser. L x. 106 (1849) = Centaurea, Linn. (Compos.).
cappadocica, Boiss. 1. c. 107=Cent, cappadodca.
drabifolia, Boiss. 1. c. = Cent. drabifolia.
Kotschyi, Boiss. *8c* Heldr. 1. c—Cent macrolopha.
libanotica, Boiss. 1. c (=*Phaeopappus libanaticus).*—Syria.
persica, Boiss. 1. c. 108-Cent macrolopba.

CHEIROLOMA, F. Muell. in Iinnaea, xrv. (1863) 401 • Calotis, R. Br. (Compos.).
hispidulum, F. Muell. 1. c. = Cal. hispiduh.

CHEIROLOPHUS, Cass. in Diet Sc Nat. L 250(1827) -Centaurea, linn. (Compos.).
lanceolatus, Cass. 1. c. Ii. 66—Cent, sempervirens.
pinnatifidus, Cass. 1. c. - Cent intybacea.
sempervirens, Pomel, Nonv. Mat Fl. AtL 32-Cent sempervirens.

CHEIROPETALUM, E. Fries, Ind. Sem. Hort Upsal. (1857) ex Urban, Addit Ind. Sem. Hort. BeroL (1881) ll = 8ilene, Linn. (Caryoph.).
radians, E. Fries, 1. c = S. odoratissima.

CHEIROPSIS, Bercht. *8c* Presl, Rostl. i. Ranuncnlac. 11 (1823)=Clematis, Toum. (Ranunculac.).
balearica, Bercht. *8c* Presl, 1. c.-Clem. balearica.
drrhota, Bercht. & Presl, 1. c.-Clem, drrhoss.

CHEIROPSIS :—
elegans, Spach, Hist Vég. Phan. vii. 261-Clematis cirrhosa.
semitriloba, Bercht. *8c* Presl, Rostl. i. Ranunculac. 11 =Clem. semitriloba.

CHEIROPTEBOCEPHALUS, Rodrig. Orch. Nov. i. 28 (1877). *ORCHIDEAE.*
sertuliferus, *Rodrig. I. c.* 29.—Bras.

CHEIHOSTEMON, Humb. *8c* Bonpl. PI. Aequin. i. 81.t.24 (1808). *STERCUUACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 212, 982.
CHIRANTHODENDRON, Cerv. ex Cav.in Anal. Cienc. Nat. vi. (1803) 803, adnot.
apetalum, Cerv. in Rocm. Collect. Bot. 97-platanoides.
platanoides, *Humb. tf Bonpl. PI. Aequin.* 82. t 24.—Mexic.

CHErEOSTTI,IS, Blume, Bijdr. 413. t. 16 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 600.
cochinchinensis, *Blume, Orch. Archip. Ind.* t. 89. f. 2.—Cochinch.
flabellata, *Wight, Ic.* v. 16. (t 1727, Monochilus).—Ind. or.
gTanJiflora, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 65.—N. Guinea.
Griffithii, *Lindl. in Journ. Unn. Soc.* i. (1857) 188.—Reg. Himal.; Burma,
gymnochiloides, *Reichb.f. in Flora,* Ixviii. (1885) 637. —Madag.
heterosepala, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 110.—Afr. trop.
Humblotii, *Reichb. f. in Flora,* Ixviii. (1885) 537.—Ins. Comoro,
malleifera, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn. Sec.* xxx. (1874) 141.—Burma.
marmorata, Lindl. ex Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iv. (1848) t. 870 — Dossinia marmorata.
montana, *Blume, Bijdr.* 413.—Java,
parvifolia, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 19.—Zeylan.
pubescens, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 141.—Burma,
pusilla, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 489.—Reg. HimaL

CHEIiIDODTTTM, Toum. ex linn. Syst. ed. I (1736). *PAPAVERACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 63.
aurantiacum, Salisb. Prod. 877»- Glaucium corniculatum.
corniculatum, Donn, Hort. Cant 100 = Glaucium flavum.
corniculatum, Linn. Sp. PI. 606—Glaucium corniculatum.
dahuricum, Hort. ex DC. Prod. i. 123-majus.
diphyllum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 809=Stylophorum diphyllum.
dodecandrum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 100-Roemeria orientalis.
fulvum, Poir. Encyc. Snppl. v. 606 —• Glaucium flavum.
glabrum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = Glaucium corniculatum.
Glaucium, Linn. Sp. PL 606 «= Glaucium flavum.
glaucum, Hill, Veg. Syst. xi. 16=Glaucium flavum.
grandiflorum, DC. Prod. i. 123=majus.
haematodes, Moench, Meth. 249-majns.
hybridum, Unn. Sp. PL 506 = Roemeria hybrida.
japonicum, Thunb. Fl. Jap. 221=Stylophorum japonicum.
ladniatum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 2=majus.
littorale, Salisb. Prod. 377 = Glaucium flavum.
luteum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 211=majus.
majus, *Linn. Sp. PI.* 505.—Europ.; As. Min.
majus, Lour. Fl. Cochinch. i. 330—sinense.
multifidum, Moc. *8c* Sesse, ex DC. Prod, ill 844 = Eschscholzia californica.
murale, Ren. Fl. Orue, 180-majus.
petiolatum. Sprang, ex Steud. Nom. ed. II. i. 847 = Stylophorum diphyllum.
phoeniceum, Lam. Fl. Fr. iii. 169-Glaucium phoeniceum.
quercifolium, Willemet, Phyt. Encyc. ii. 618=majus.
rubrum, Poir. Encyc. Snppl. v. 606—Glaucium comiculatum.
ruderalt, Salisb. Prod. 377"majus.
sinense, *DC. Syst.* ii. 100 (sp. dub.).—China.
umbelliferum, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 180 = majus.

CHELIDOMIUM:—
unifiorum, Sieb. & Zucc in Abh. Akad. Munich, iv. II. (1846) 169 = Stylophorumjaponicum.
violaceum, Lam. Fl. Fr. iii. 169 = Roemeria hybrida.
vitellinum, C. Muell. inWalp. Ann vii.87=Glaucium vitellinum.

CHELIDOSPERMUM, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 162, in syn. (1850) = Pittosporum, Banks.
verticillatum, Zipp. ex Blame, 1. c.-P. Chelidospermam.

CHELIDURUS, Willd. in Cothen. Disp. Meth. 4 (1790) (Gen. ignot.).
ignotus, J. F. Gmel, Syst. 105.—Hab. J

tHELlUSIA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (18*1) I. Intell. 26, nomen; A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 880-Vernonia, Schreb. (Compos.).
abyssinica, Sch. Bip. 11. cc. = V. amygdalina.

CHELONANTHERA, Blnme, Bijdr. 384. t. 51 (1825) = Coelogyne, Lindl. (Orchid.).
gibbosa, Blume, 1. c. 383 = Pholidota gibbosa.
incrassata, Blume, 1. c. 384 = Coel. incrassata.
longifolia, Blume, 1. c. 385 = Coel. longifolia.
miniata, Blume, 1. c. = Coel. miniata.
speciosa, Blume, 1. c. 884. = Coel. speciosa.
sulphurea, Blume, 1. c. 383 = Coel. sulphurea.
ventricosa, Blnme, 1. c. = Pholidota ventricosa.

CHELONB, Linn. Syst. ed. I (1735). *SCROPHVLARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 939.
CHLONANTHUS, Rafin. Princ. Somiol. 26 (1814).
alba, Moench, Meth. 442-glabra.
albida, Spreng. Syst. ii. 813 = Pentstemon albidus.
alpitia, Spreng. 1. c. iv. Cur. Post. 235 = Pentstemon glaber.
"gustifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 365. t. 178=Pentstemon campanulatus.
"gusty\folia, Steud. Nom. ed. L 186 - Pentstemon caeruleus.
"tropurpurea, Sweet, Brit. Flow. Garf. Ser. 1.1. 236 = Pentstemon campanulatus.
barbata, Cav. Ic. iii. 22. t. 242 = Peufetemon barbahis.
aradburii, Steud. Nom. ed. I. 186 = Pentstemon grandiflorus.
«erulea, Spreng. Syst. ii. 818 = Pentstemon caeruleus.
"Hnpanulata, Cav. Ic i. 18. t. 29 = Pentstemon cam-Panulatus.
mpanuloides, Andr. Bot. Rep. t. 40 = Pentstemon campanulatus.
"Pitata, Rafin. Med. Fl. ii. 118=glabra.
»tranthifolia, Benth. in Trans. Hort. Soc. Lond. N. o.i. (1835) 481 - Pentstemon centranthifolius.
*e*lanthifolia,* Paxt. Mag. Bot. ii. t. 50 = praec.
*y^rf! Spreng. Syst. ii. 813 = Pentstemon cristatus.
taKi, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t 120 = Pentstemon laevigatus.
"attar, Rafin. Med. Fl. ii. 118=glabra.
"Vans, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 364 = fentstemon campanulatus.
«»«»«»«, Steud. Nom. ed. I. 186 - Pentstemon enstatus.
formis, Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in DC. Monog *ti* 18* = Boe>ca filifonnis.
*Ma, Wendl - Beobacht. 51 = Pentstemon barbatus.
Mtescens, Steud. Nom. ed. I. 188 - Pentstemon "Mescens.
janoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 364. t. Pentslenion gentianoides.
Sp. PI. 611.—Am. bor.
P'eng. Syst. ii. 813 = Pentstemon gtacilis.
fl°ra, Spreng. 1. c. = Pentstemon grandiflorus.
*P- 611 = Pentstemon pubescens.
H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 363 = Pentstemon imberbis.
Diet. ST. Nat. xxxviii. (1825) 385-berbii.
169= Pentstemon laevigatus.
Med. Fl. ii. 117-glabra.
« C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
127 = obliqua.
Sept. ii. 737.—Am. bor.
IW-glab ra.
Sims, Bot. Mag. t 1864-Lyoni.

CHEIiOITB:—
nemorosa, *Dougl. in Lindl. Bot. Reg.* t 1211.—Am. bor. occ.
obliqua, *Linn. Syst.* ed. XII. 408.—Am. bor. occ.
Penstemon, Linn. Mant 415=Pentstemon pubescens.
Penstemon, Linn. Sp. PI. 612, pro parte = Pentstemon laevigatus.
pubescens. Sweet, Hort. Brit ed. I. 805 = Pentstemon pubescens.
purpurea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=obliqua.
purpurea, Rafin. Med. Fl. Ii. 118=glabra.
rosea, Cerv. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. 1.1 280—Pentstemon campanulatus.
rubicunda, Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 135 = Boeica Griffithii.
ruelloides, Andr. Bot. Rep. t. 34-Pentstemon barbatus.
ruelloides, Linn. f. Suppl. 271=Oorisia xnagellanica.

CHELONOP8I8, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. ii. Ill (1865). *LABIATAE,* Benth. & Hook, *t* ii. 1204.
moschata, *Miq. I. c*—Japon.

CHELROSTYLIS, Pritx.Ic. Ind. 255 (1865), sphalm.= Cheirostylis, Blume.

CHEMNICIA, Scop. Introd. 139 (1777)=at*yohnos, Linn. (Loganiac.).

CHEMNIZIA, Steud. Nom. ed. II. i. 347 (1840)= Strychnos, Linn. (Loganiac.).

CHENOCARPUS, Neck. Elem. i. 202 (1790)=Bpermacoee, Linn. (Rubiac).

CHBIfOIiEA, Thunb. Nov. Gen. 10 (1781). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 69.
BASSIA, All. Misc. Taur. iii. (1766) 177. t. 4.
ECHINOPSILON, Moq. in Ann. Sc Nat Ser. II. ii. (1884) 127.
ERIOCHITON, F. Moell. 2nd Gen. Report, 15 (1854), nomen.
LONDESIA, Fisch. *b* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 40 (1835).
WILLEMETIA, Maerkl. in Schrad. Joum. Bot. iii. (1800) I. 329.
arabica, *Boiss. Diagn.* Ser. L xii. 67.—Syria ; Arabia
asphaltica, Boiss. 1. c. xiii. 84=Suaeda asphaltica.
astrocarpa, *F. Muell. Fragm.* xii. 12.—Austral,
biflora, *F. Muell. I. c.* x. 91.—Austral,
canariensis, *Moq. Chenop. Enum.* 96.—Marocco; Ins. Canar.
camosa, *Benth. Fl. Austral,* v. 190.—Austral.
Dallachyanat *Benth. I. c.* 191.—Austral,
diacantha* *F. Muell. Fragm.* x. 91.—Austral,
diffusa, *Thunb. Nov. Gen.* 10.—Afr. austr.
echinopsila, *F. Muell. Fragm.* x. 92.—Austral,
enchylaenoides, *F. Muell. 1. c.*—Austral,
eurotioides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 191.—Austral.
Forrestiana, *F. Muell. Fragm.* xii. 12.—Austral,
hirsute, *Archang. Comp. Fl. Ital.* 595.—Italia,
incana, *Jacq. Fragm.* 76.—Atr. austr.
lanata, Jacq. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 13B •-=• Kochia prostrate.
lanata, Moq. 1. c. 129 = canariensis.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* v. 191.—Austral,
paradoxat *F. Muell. Fragm.* x. 91.—Austral,
quinquecuspis, *F. Muell. I. e.*—Austral,
sclerolaenoides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 192.—Austral.
salsuginosa, *F. Muell. Fragm.* x. 92.—Austral,
tricornis, *Benth. Fl. Austral,* v. 191.—Austral,
tricuspis, *F. Muell. Fragm.* x. 92.—Austral,
tridens, *F. Muell. I. c.* xii. 12.—Austral.

CHENOPODINA, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 159 (1849)=Soaeda, Forsk. (Cheoopod.).
acuminata, Moq. 1. c 161=S. aenminata.
aestuaria, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 82fl=S. maritima.
altissima, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 162=S. altis sima.
anonyma, Moq. I. c 164.—Aegypt
asphaltica, Boiss. Diagn. Ser. IT xii. 98 = S. asphaltica.
australis, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 163 = S. australis.

CHENOPODINA:—
baccifera, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 160=Snaeda baccifera.
bacciformis, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 328 - S. maritima.
Biebersteiniana, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 163 =>S. microphylla.
dendroides, Moq. 1. c. 164-S. dendroides.
depressa, Moq. 1. c.-=S. plattensis.
flliformis, Moq. 1. c. = S. maritima.
fruticulosa, Moq. 1. c. 165 =S. fruticulosa.
glauca, Moq. 1. c. 162=S. glauca.
Hostii, Moq. 1. c. 166.—Dalmat.
indica, Wight, Ic. v. 1.1793 -S. maritima.
leiosperma, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 162 - S. altissima.
linearis, Moq. 1. c. 164=S. linearis.
linearis, Torr. in Stansbury, Rep. 394-S. Torreyana.
maritima, Coss. ex Willie, *ic* Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 261=S. setigera.
maritima, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 161 = S. maritima.
microphylla, Moq. 1. c«S> microphylla.
microsperma, Moq. 1. c. 165=S. microsperma.
minima, Moq. 1. c. 162 -S. minima.
Moquin.Ton. in Pacif. Rail. Rep. vii. 18=S. Torreyana.
parviflora, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 165=S. microsperma ?
physophora, Moq. 1. c 164—S. physophora.
prostrata, Moq. I. c. 162 = S. microsperma.
pyenantha, C. Koch, In Linnaea, xxiv. (1851) 90 = Seidlitzia florida.
pygmaea, Moq. In DC. Prod. xiii. II. 161 - S. microsperma?
salsa, Moq. I. c. 160 =S. salsa.
sativa, Moq. 1. c 165 = S. maritima.
setigera, Moq. 1. c. 160=S. setigera.
spicata, Moq. 1. c. 165 - S. maritima.
splendens, Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 80 - S. setigera.
tortuosa, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 162 = S. maritima'?
•sera, Moq. 1. c. 163-S. vera.

CHENOPODIUM, [Toura.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 67 (1737). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. tii. 61.
AGATHOPHYTUM, Moq. in Ann. Sc Nat Ser. II. i. (1834) 291. t. 10 c.
AMBRINA, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 296 (1886).
ANSERINA, Dam. Fl. Belg. 21 (1827).
BLITUM, [Toura.] Linn. Gen. ed. I. 20 (1737).
BOTRVDIUM, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 298 (1836).
LIPANDRA, Moq. Chenop. Enum. 19 (1840).
MOROCARPUS, Adans. Fam. ii. 261 (1768).
OLIGANOKA, Less, in Linnaea, ix. (1834) 199.
OUGANTHERA, Endl. Gen. Suppl. i. 1377 (1841).
ORTHOSPERMUM, Opiz, Seznam, 70 (1862) ; Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 63.
ORTHOSPORUM, T. Ntes, Gen. Fl. Germ. Monochl. n. 58 (1835).
OXYBASIS, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1841) 788.
TELOXYS, Moq. in Ann. Sc. Nat Ser. II. 1. (1834) 289. t. 10.
acerifolinm, *Andr*. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 124, nomen.—Rossia.
acuminatum, Schur, Enum. PI. Transs. 902 — rubrnm ?
aenminatum, *Willd. in Ges. Nat. Fr. Neue Schr.* ii. (1799) 124. t. 5. f. 2.—Soongaria.
acutifolium, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech Voy. 207 = acuminatum.
acutifolium, Kit. in Schult Oestr. Fl. ed. II. i. 458; Sin. Comp. Fl. Brit. 42 = polyspermum.
aegyptiacum, *Hasselq. It. Palaest.* 460 = Suaeda baccata.
album, Bosc, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 61 = Boscianum.
album, *Linn. Sp. PI.* 219.—Reg. temp, et trap.
alexandrinum, Desf. ex Moq. in DC. Prod. xiii. M. 155-Suaeda vermiculata.
altissimum, Linn. Sp. PI. 221 = Suaeda altissima.
ambiguum, R. Br. Prod. i. 407 —glaucum.
ambrosioides, Bert ex Steud. Nom. ed. II. i. 348 = citriodorum.
ambrosioides, Hance, in Joum. Linn. Soc. xiii. (1872) 86 = acuminatum.
ambrosioides, *Linn. Sp. PI.* 219.—Reg. temp, et trop.
americanum, Spreng. Syst i. 922=Suaeda plattensis.

CHENOPODITJM :—
angulatum, Curt, ex Stead. Nom. ed. 1.187 = hybtidum.
angulosum. Lam. Fl. Fr. iii. 249 - hybridum.
angustifolium, Gilib. ExerciLii. 437=polyspermum.
angustifolium, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 114 = Atriplex linifolia.
antarcticnm, *Benth. V Hook. f. Gen.* iii. 52.—Reg. Magellan.
anthelminticum, Bert, ex Stend. Nom. ed. II. i. 348 = chilense.
anthelminticum, Linn. Sp. PL 220 = ambrosioides.
arcticum, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 86 - Monolepis chenopodioides.
arenarium, <Jaertn. Meyer & Seherb. JL Wctt. i. 356 = Kochia arenaria.
aristatum, *Linn. Sp. PI.* 221.—Sibir.
arrectum, Desmar. Cat. PI. Belg. 60«polyspennum.
asphalticum, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 98 = Snaeda asphaltica.
astracanium, Ledeb. CaC Hort. Dorpat. (1819) - rubrum.
atriplicinum, *F. Muell. Fragm.* vii. 11.—Austral.
Atriplicis, Linn. f. Suppl. 171 = purpurascens.
augustanum, All. Fl. Pedem. ii. 108. t. 38 = Kochia prostrata.
augustanum, Hort. Par. ex Moq. in DC..Prod. xiii..II. 135 = Kochia hyssopifolia.
auricomum, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 94. —Austral.
australasicum, Moq. Cheoop. Ennm. 20 = Rhagodia linifolia.
australe, R. Br. Prod. 407=Suaeda australis.
iaccatum, Labill. Nov. Holl. PL i. 71. t. 96 = Rhagodia Billardieri.
baryosmum, Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. «69 = SaIsola foetida.
benghalense, Spielm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 348 - Atriplex hortensis?
Berlandieri, *Moq. Chenop. Enum.* 28.—Am. centr.
betaceum, *Andn. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 125, nomen.—Rossia.
bicolor, Boj. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 71=album.
Biebersteinianum, Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 267 - Suaeda microphylla.
Uforme, Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 636=album,
bipinnatifidum, *Moric. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. n. 76. —Mexic
lisaeriale, Menyh. Kalocsa Vide*. Növény. 157 = polyspennum.
blitoides, Lejeune, FL Spa, 126=rubrum.
Blitum, F. Muell. Sel. PI. IndusUCult. 49 - .capitatum.
bonariense, Hort. Par. ex Moq. in-DC. Prod. xiii. II. 67 = purpurascens.
bonariense, Tenore, Ind. Sem, Hort. Neap. (1833) 13 = hircinnm.
Bonus-Henricns, *Linn. Sp. PI.* 218.—Europ.
Boscianum, *Moq. Chenop. Enum.* 21.—Texas.
botrydium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 122 - C . Botrys.
botryoides, Rafin. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 75 = C. Botrys.
botryodes, Sin. Engl. Bot t. 2247 = rubrum.
Botrys, *Linn. Sp. PI.* 219.—Reg. bor.
Browneanum, Roem. & Schult. Syst. vi. 275 = album,
bryoniaefolium, *Bunge,Del. Sem. Hort. Petrop.* (1876) 10; *ex Trautv. in Act. Hart. Petrop.* ix. (Ia84) 398. —Sibiria.
colceoliforme, Hook. FL Bor. Am. ii. 126=Snaeda calceolifonnis.
californicum, *S. Wots, in Bot. Calif,* ii. 48.—Calif.
camphorataefolium, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 311 - Kochia prostrata.
camphorosmoides, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiiL II. 132 = praec
candicans, Lam. Fl. Fr. iii. 248-album,
cantabricum, *Lag. Hort. Matrit.* (1815) 15, nomen.— Hispan.
capitatum, *Aschers. Fl. Brandenb.* 572.—Reg. bor. et austr.
carinatum, *R. Br. Prod.* 407.—Austral.; N. Zel.
camosulum, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 64.—Calif.
Caroxylon, D'Urban, in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 272=Salsola Caroxylon.
carthagenense, Zuccagni, in Roem. Collect 133 = murale.
catenulatum, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 848 = album.

CHENOPODIUM :—
caudatum, Jacq. Coll. ii. 325; Ic PI. Rar. ii. 12. t. 344 = Amarantus viridis.
Chamrium, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 6953 = murale.
Chaudana, *Buch.-Ham. in Wall. Cat. a.* 6957.— Ind. or.
chilense, Pers. Syn. i. 294 = C. Quinoa.
chilense, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Cott.* (1832) 2.— Chili.
chysomelanospermum, Zuccagni, in Roem. Collect. 184 = nrbicum.
cinereum, Moq. Chenop. Enum. 27=Atriplex peruviana.
citriodorum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 848.—Ins. Juan Fernand.
Clemente, Spreng. Syst. i. 922 = Snaeda setigera.
concatenatum, Hort. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 291 —lanceolatum.
concatenatum, Thuill. Fl. Paris, ed. II. 125 = album.
congestum, Hook. f. in Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 280-Rhagodia Billardieri.
corispermifoUum, *Hort. Amstel.* (1814) 14, nomen.— Hab. t
cornutum, *Benth. V .Hook. f. ex S. Wats, in Bot. Calif, ü.* 482.—Mexic.
coronopodum, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122 - seq.
Coronopus, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 76.—Ins. Teneriff.
crassifolium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii 176=-Suaeda microphylla.
crassifolium, Desf. TabL ad. II. 51 = Sueda maritime.
crassifolium, Hornem. Hort. Hafn. 254—rubrum.
cristatum, *F. Muell. Fragm.* vii. 11.—Austral,
cuneifolium, *Vahl, in West, Fl. S. Cruc.* 278— Santa Crux.
cuneifolium, Vent ex Moq. in DC. Prod. xiii..l{. 73 = spathulatum.
deltoideum. Lam. Fl. Fr. iii. 249=urbicum.
detestans, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (1877) 550.—N. Zel.
divaricatum, *Fisch. Cat. Hort. Goreni.* (1808) 24, nomen.—Rossia I
effusum. Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. x. H. (1848) 346 = foetidum.
elatum, Shuttl. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 71 = album.
erosum. Bast, in Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 20 = opnlifolium.
erosum, R. Br. Prod. 407=murale.
esculentum, Salisb. Prod. 151 = C. Bonus-Henricns.
exocarpum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1679) 37.— Reg. Argent.
ficifohum, 5m. *Fl. Brit.* i. 276.—Europ.
JUifolium, Krock. Fl. Sil. Suppl. i. 302 = praec.
filiforme, Dum. Fl. Belg. 22 = Suaeda maritima.
filiforme, Moench, Meth. 330 = Snaeda altissima.
flaoescens, Roem. & Schult. Syst vi. 269 = Salsola vermiculata.
flamim, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. Suppl. 205 = murale.
foetidum, Lam. Fl. Fr. iii. 244=C. Vulvaria.
foetidum, *Schrad. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 79.—Reg. trap.
foliosum, Aschers. Fl. Brandenb. 572 = capitatum.
Fremonti, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 287.—Am. bor. oca
frigidam, *Phil. Fl. Atac.* 47.—Chili,
frutescens, *C. A. Mey. in ledeb. Fl. Alt.* i. 408.— Sibir. altaic.
fruticosum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 181=Snaeda dendroides.
fruticosum, Linn. Sp. PI. 221=Suaeda fruticosa.
furfuraceum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 64 = auricomum.
Gandhium, Buch.-Ham. in WalL Cat n. 6953 = murale.
giganteum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 75 = album.
glandulosum, F. Muell. Fragm. vii, 11 = carinatum.
glaucum, *Linn. Sp. PI.* 220.—Reg. bor. et austr.
ghchidatum, Gilt ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 6 1 - papulosum.
glomerulosum, Rejchb. Fl. Germ. Excurs. £79 - album.
graveole/ts, Lag. *6c* Rodr. in Anal. Cienc. Nat. v. (1802) 70 = foetidum.

CHENOPODrtTM :—
graveolens, *Willd. Enum. Hort. Berol.* i. 290.— Mexic.
guineense, Jacq. Coll. ii. 346; Ic. PI. Rar. ii. 12. t. 345 = murale.
Guinoa, Krock. Fl. Sil. Suppl. i. 301 = C. Quinoa.
Halimus, Thunb. Prod. PL Cap. 48 = Atriplex Halimus.
halophilum, PAH. I'n^nal. *Univ. Chil.* (1861) I. 67.— Chili.
hastatum, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iv. (1865) 339 = Atriplex hastata.
hastatum, *Phil. Fl. Atac.* 47.—Chili,
hircinum, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Gott.* (1833) 2.— Bras.
hirsutum, Linn. Sp. PI. 221-Kochia hirsuta.
Hookerianum, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 68 = murale.
hortense, Raddi, ex Moq. 1. c. 161 = Suaeda maritima.
hortense, Roem. & Schult. Syst. vL 268 = Snaeda hortensis.
Hostii, Ledeb. Fl. Ross. iii. 788 = Suaeda maritima.
humifusum, Kitt. Taschenb. ed. II. 264'.crassifolium.
humifusum, *Zuccagni, in Roem. Collect.* 134.— Europ.
humile, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 127=rubrum.
hybridum, *Linn. Sp. PI.* 219.—Reg. temp. bor.
hybridum, Lour. Fl. Cochinch. 174-Loureirei.
ilidfolium, Griff. Notul. iv. 337 = C. Bolrys.
incisum, *Pair. Encyc. Suppl.* i. 392.—Am. centr.
intermedium, Mert *Sc* Koch, in Rochl. Deutschl. Fl. ed. III. ii. 297—urbicum.
Jacquini, Tenore, Fl. Nap. iii. 258 = Suaeda maritima.
lacerum, *Krock. Fl. Sil. Suppl,* i. 804.—Silesia.
ladniatum, Roxb. Hort. Beng. 21; FL Ind. ii. 59 = album.
ladniatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 48-Atriplex Jaciniata.
lanceolatum, R. Br. Prod. 407=album.
lanceolatum, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 291=album.
lanuginosum, Moench, Meth. 830-Kochia hyssopifolia.
lateraU, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 313 = murale.
latifolium, *Pall. Reise Statth. Russ. Reich.* i. 280.— Rossia.
leiospermum, DC. Fl. Fr. iii. 390-album,
leptophyllum, *Nutt. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 71. —Am. bor.
Uucospermum, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gott (1884) 2 = purpurascens.
lineare, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 348-Kochia prostrata.
linifolium, Roem. *Sc* Schult Syst. vi. 271=Suaeda linifolia.
littorale, *Moq. Chenop. Enum.* 24.—Austral
littorale, Thunb. in Act. Soc. Sc. Upsal. vii. (1815) 143 = Atriplex littoralis.
Loureirei, *Steud. Nom.* ed. II. i. 348.—China.
lucidum, Gilib. Exercit. ii. 440 = murale.
macrocarpum, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 48=Suaeda maritima.
macrospermum, *Hook. f. Fl. Antarct.* ii. 341.—Ins-Falkland.
macrospermum, Hort. Ant. ex Moq. in DC. Prod, xiii-II. 84—rubrum.
marginatum, Spreng. ex Hornem. Hort. Hafn. i. 256 •* .polyspermum.
maritimum, Friwald. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 783 Snaeda altissima.
maritimum, Linn. Sp. PI. 221—Suaeda maritima.
maritimum, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 239 = Suaeda diffusa.
Matthioli, Bertol. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. *Si"* rubrum.
melanospermum, Wallr. Sched. Crit. 112 - nrbicum.
mexicanum, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 70.—Mexic.
micranthum, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* *»• (1668) 1.464.—Rossia.
microphyllum, Bieb. FL Taur. Cauc. iii. 176=Suaeda dendroides.
microphyllum, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet-* (1858) 74.—Austral.
microphyllum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 48.—Afr. austr.
microspermum, Wallr. Sched. Crit 112 = urbicum.

CHENOPODIUM :—

mucronatum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 48.—Afr. anstr.
multifidum, Linn. Sp. PI. 220 = Roubieva multifida.
multiflorum, Moq. in DC. Prod. xiii. 11.76 « C. Botrys.
murale, *Linn. Sp. PI.* 219.—Reg. bor. et anstr.
neglectom, *Dun. in Bull. Soc. Bot. Belg.* iv. (1865) 389.—Belgium.
nepalense, Hort. Monsp. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 74=C.Botrvs.
"gnm, *Safin. AH. Journ.* 146.—Am. bor.
nHdum, Spreng. Syst.i. 921 = Salsola nitida.
mtrariaceom, *F. Mutll. ex Benth. Fl. Austral,* v. 158.—Austral,
obovatam, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 78.—Am. anstr.
oleraceum, *Schur.Enum. PI. Transs.* 578.—Transsylv.
ol'dum, Curt. Fl. Lond. fasc v. t. 20=C. Vulvaria.
olidum, 5. *Wats, in Proe. Am. Acad.* ix. (1874) 86.—Am: bor.
Ppositifolium,lAnn. f. Suppl.172=Halogeton oppositinorns.
"Ppositi/olium, Willd. Sp. PI. 1. 1307=Girgensohnia oppositiflora.
opulaceum, Neck. Delic. Gallo-Belg. L 130=album.
pulifolimn,5<r*ra</. i« *DC. Fl. Fr.* v. 872.—Reg, bor.
Paganum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 579=album.
Pallidum, Moq. Chenop. Enum. S0=glaucum?
Paniculahim, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 237.—Peruv.
E?- = Microtea paniculata.
P*pulosnm, *Moq. 1. c.* 61.—Bras.
panifolium, Roem. & Schult. Syst. vi. 266-Suaeda "endroides.
»« M<irat, Nouv. FL Par. 96=rnbrum.
Pa'nlum, *Roth, Nov. pi. sp.* 180.—Ind. or.
florum. Herb. Vind. ex Moq. in DC. Prod. xiii. Hab. Molina, Sagg. Chile, ed. II. 118-Ronbieva Utinda.
a, Bertol. Fl. Ital. iii. 82-album.
Ecuador;
=Cryptocarpns globosus.
pkora, Moq. ex Boiss. FL Orient, iv. 939 = onaeda physophora.
Atriplex laciniata.
plm, Neck. Delia Gallo-Belg. i. 128 - Polyspermum.
ncifolium.
ulacoides.
torium, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iv. (1865) —German.
procerum, Hochst. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 75.—Abyssin.
prostratum, Moq. U 132 Kochia strata.
prostratum, ex Moq. L c. 72=glancnm?
prostratum, Roem. Sjst. vi. 272-Suaeda prostrata.
pseudo-botrys, Hcrt. ex Heynh. Nam. nomen. —Hab.?
Pumilio, *Br. Prod.* L 407,-Anstral.
punctulatum, Scop. purpurascens.
purpurascens album.
purpurascens, album?
pusillum, Hook. f. Handb. New Zeal. pl. 281.-N. Zel.
pusillum, B Vl. Com«. B«i«n. iv. (1842)
pygmaeum yh. Kalooa Vidft. Noveny. 154 = *quercifolium,* Hort. Monsp. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 74 = gray
Quinoa, *Willd. Sp. Pl.* i. 1301-Am. aTistr.
radiatum, Schrad. Neues Journ. iii Cyclolonia platyphyllum.

CHENOPODIXTM; •.—

retusum, *Juss. ex Moq. in DC. Prod. mi. V,* 73.—Bras,
rhadinostachyum, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 98.—Austral.
rhombifolium, Muhl. ex Willd. Enam. Hort. Berol. 288—urbicum.
riparium, Boeningh. ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 71 =album.
rubricaule, Schrad. ex Moq. I. c. 67=purpurascens.
rubrum, Forsk. ex Steud. Nom. ed. 1.188 = morale,
rubram, *Linn. Sp. PI.* •218.—Europ.; As. bor.
ruderale, *Kit. e» Moq. in. DC. Prod.* xiii. II. 77.—HuDgaria.
ruderale, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 69« C. Bonus-Henricus.
sagittatum. Lam. Fl. Fr. U. 244-C. Bonus- Henricus.
salsum, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 299=Suaeda maritima.
salsum, Hohen. ex Ledcb. Fl. Ross. iii. 782 = Suaeda altissima.
salsum, Linn. Sp. PI. 221 = Snaeda salsa.
Sancta-Maria, Veil. Fl. Flum. 126; iii. t. 104 = ambrosioides.
sandwicheum, *Moq. Chenop. Enum.* 28.—Ins. Sandvic.
Schraderianum, Roem. & Schult. Syst vi. 260 = foetidom.
scoparia, Linn. Sp. PI. 221=Kochia scoparia.
secundiforum, Viv. Fl. Lib. Spec. 67 = arisUtnm.
sepium, *Mey. in Abh. Boehm. Ges. Wiss.* (1787) 820. —Bohemia.
sericeum, Spreng. Syst. i. 921-Kochia sericea.
sericeum, Vitm. Summa Veg. ii. 98-Kochia prostrata.
serotinum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 205.—Arab.
serotinum, Ledeb. Fl. Alt i. 405-= album.
serotinum, linn. Cent. PL iL 12=ficifolium.
serotinum, Suter, Fl. Helv. i. 148=hybridum.
setigerum, DC. Cat Hort. Monsp. 94 - Snaeda setigera.
simplex, *Rafin. All. Journ.* 146.—Am. bor.
sinense, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 60=. aristatum.
sinense, WUlera. Ess. Med. iii. 238 -Kochia sericea.
sinuatum, Thunb. Fl. Cap. ii. 178 = Atriplex Uciniata.
spathnlatnm, *Sieber, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 73. —Bras.
spicatnm, *Lavy, Veg. Orig.* 10.—Hab.
spicatum, Roem. & Schult Syst. vi. 271=Suaeda maritima.
spinacifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 14 = C. Bonus-Henricus.
spinosum, Hook. Fl. Bor. Am. iL 127-=Grayia polygaloides.
stellatum, *S. Wats, in Proc Am. Acad.* xviii. (1882-83) 146.—Mexic.
stramoniifolium, Cheval. Fl. Par. ii. 88S=hybridvm.
strictum, *Roth, Nov. PI. Sp.* 180.—Ind. or.
subspicatum, Nutt. Gen. Am. i. 199=Atriplex hastate.
suffruticosum, Willd. Enum. Hort. BeroL 290 = ambrosioides.
tenerrimum, *Krock. Fl. Sil. Suppl.* i. 806.—German.
tenue, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxix. (1836) 9. t 50 = Roubieva multifida.
tomentosum, *Thou. Fl. Tristan.* 38.—Ins. Tristan d'Acugn.
Tournefortianum, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 158 - Suaeda altissima.
Tournefbrtii, Hort. ex Moq. 1. c.=praec
triandrum, *Font.f. Prod.* 21.—N. Zel.
triangulare, *R. Br. Prod.* 407.—Austral.
triangulare, Dulac, Fl. Hautes-Fyr. 171 = C. Bonus-Henricus.
triangulare, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. Suppl. 205 = murale.
triangularifolia, Gilib. Exercit. ii. 437-C. Bonus-Henricus.
trifidum, Trev. Ind. Sem. Vratisl. (1629)-Monolepis chenopodioides.
trigonm, Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 275=triangulare.
trigynum, Roem. & Schult. 1. c. 288 = Soaeda altissima.
trilobatum, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. it. 79 = foetidum.
trilobum, Hort. ex Moq. 1. c.=foetidum.
trilobum, Schult. ex Moq. L c. t)6=ncifolium.
tripteris, Dum. Fl. Belg. 22=Kochia tripteris.
tumidum, *Kit. Cat. Knem.* (1814) *Suppl.* 3, oomen. —Hab.1

CHENC-PODIUM :—

Tweedii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 63.—Bras,
urbicum, *Linn. Sp. PI.* 218.—Europ.; As. bor.
Vachellii, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 269 = acuminatum.
variegatum, Gouan, in Cat. Hort. Taur. (1810)- ambrosioides.
vestitum, Thunb. Prod. PI. Cap. 48 »Atriplex glauca.
villosum, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. H. 132- Kochia prostrata.
villosum, Lam. Encyc. i. 196=Kochia hyssopifolia.
villosum, Spreng. Syst. 1. 924 =- Suaeda microphylla.
virens, *Wender. Sem. Marb.* (1836), nomen.—Hab. ?
virgatum, *Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Vps.* vii. (1815) 148.—Japon.
virginicum, Linn. Sp. PL 222 = aristata.
viride, Curt Fl. Lond. fasc. ii. t. 16 = ficifolium.
viride. Linn Sp. PL 219-album.
viride, Loisel. Fl. Gall. i. 145»opulifolium.
vulgare, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 700= album.
vulpinum, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6954=album, ambrosioides.
Vulvaria, *Linn. Sp. PI.* 320.—Europ.; As. bor.
Wolffii, *Simk. in Termist. Fiiutek,* iii. (187!)) 164.—Hnngar.
Ziegleri, Perrot. ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 24 = Limenm linifolium.
nosteraefolium, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 127 = Atriplex Gmelini.

CHEOBULA, Veil. FL Flum. iv. t. 146 (1827) = Claobula, Veil. (Inc. sed.).

CHERINA, Cass. in Diet. Sc. Nat. viii. 487 (1817) = Chaetanthera, Ruiz & Pav. (Compos.).
microphylla, Cass. 1. c. 438-Chaet. linifolia.

CHERLERIA, Hall. It Helv. ii. n. 79.11 (1740) j ex Linn. Gen. ed. II. 196 (1742) => Arenaria, Rupp. (CaryophylL).
bipartita, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. i. 849, nomen. —Sibir. baical.
bisulca, Bartl in Presl, Rel. Haenk. ii. 12.—Peruv.
caespitosa. Lam. Fl. Fr. iii. 46=A. Cherleria.
dicranoides, Cham, in Linnaea, i. (1826) 63=Stellaiia dicranoides.
grandiflora, D. Don, Prod. Fl. Nep. 214 = A. globiflora.
imbricata, Ser. in DC. Prod. i. 431=A. aretioides.
jnniperina, D. Don, Prod. Fl. Nep. 214 = A. densissima.
laevis, Bartl. in Presl, Rel. Haenk. ii. 12.—Peruv.
nitida, Bartl. 1. c—Peruv.
actandra, Sieber, ex Spreng. Syst ii. 416 = A. aretioides.
peduncularis, Btinge, ex Steud. Nom. ed. II. i. 349 = *bipartita.*
sedoides, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxvi •= A. geniculata.
sedoides, Linn. Sp. PI. 425=A. Cherleria.
sedoides, Sibth. & Sm. Fl. Grace. Prod. i. 306 = A. trichocalyciaa.
sedoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 608=Stellaria petraea.
sibirica, Regel & Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 72.—Sibir. or.
stellata, Clarke, Trav. iv. 211 *(-Alsine parnassica).* —Graecia.

CHEROPHILUM, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. v. (1798) 61 = Chaerophyllum, Linn. (Umbellif.).

CHERSYDRIUM, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 72=Dracontium, Unn. (Aroid.).
Jararaca, Schott, 1. c. 73 = D. asperum.

CHESNEA, Scop. Introd. 119 (1777) -= Cephaëlls, Sw. (Rubiac).

CHESNEYA, Bertol. in Nov. Comm. Bonon. v. (1842) 427 (Misc. Bot i. 17. t. 2)=Pimpinella, Linn. (Umbellif.).
daucoides, Bertol. 1. c = P. eriocarpa.

CHESNEYA, Lindl. in EndL Gen. 1275 (1840) - Calophaca, Fisch. (Legumin.).
astragalina, Jaub. & Spach, Illustr. i. 94.—Persia.
tuphratensis, [lindl. in] Chesn. Nanat. Euph. (1868) t ad p. *iS3=rytidosperma.*

CHESNEYA:—
Kotschyii, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 34.—Persia.
microphylla, Jaub. & Spach, Illustr. i. 94 = *rytidosperma.*
mongolica, Maxim, in Bull. Acid. Petersb. xxvii. (1881) 462.—Mongolia.
Oliverii, Jaub. & Spach, Illustr. i. 94.—Mesopotam.
parviflora, Jaub. & Spach, 1. c. 95.—Persia.
rytidosperma, Jaub. *8c* Spach, 1. c. 93.—Armenia.
turkestanica, Franch. in Ann. Sc. Nat. Ser. VI. xv. (Ib83) 253.—Turkestan.
vaginalis, Jaub. & Spach, Illustr. i. 96. t. 48.—Mesopotam.
velutina, Jaub. & Spach, 1. c. 94 = *rytidosperma.*

CHESNYA, Keichb. Norn. 148 (1841) = praec.

CHETAKIA, Steud. Norn. ed. II. ii. 521 (1841) = seq.

CHETASTRUM, Neck. Elem. i. 108 (1790) = **Scabiosa,** Toum. (Dipsac).

CHETOCRATER, Rafin. Sylva Tellur. 149 (1838) = **Casearia,** Jacq. (Samydac).
hirta, Rafin. 1. c = Cas. hirta.
javitensis, Rafin. 1. c.=Cas. javitensis.
tinifoKa, Rafin. l.c. = Cas. tinifolia.

CHETROPIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1886) = **Arenaria,** Rupp. (Caryophyll.).
setacea, Rafin. 1. c. = A. rostrata.

CHEVALIERIA, Gaudich. V07. Bonite Bot. t. 61, 62 (1852 ?) = **Aechmea,** Ruiz *8c* Pav. (Bromel.).
crocophylla, E. Morr. in Belg. Hortic (1885) 81.—Bras.
Germinyana, Can. in Rev. Hortic. (1881) 230.—N. Granat.
grandiceps, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 329 = Ae. brasiliensis.
Hngulata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 591 = Ae. lingulata.
ornata, Gaudich. Voy. Bonite Bot. t. 62-Ae. ornata.
sphaerocephala, Gaudich. I. c. t. 61 = Ae. sphaerocephala.
Veitchii, E. Morr. in Belg. Hortic. xxviii. (1678) 177. t. 9-Ae. Veitchii.

CHEVALLIERA, Carr. in Rev. Hortic. <1S81) 230 = praec.

CHEVBEULIA, Cass. in Ball. Soc. Philom. (1817) 69; et Diet. Sc. Nat. viii. 516 (1817). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 303.
LEUCOPODUM, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 124.
acuminata, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 261.—Am. austr.
filiformis, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 102=acuminata.
gnaphalioides, *D. Don, ex Hook. Cf Am. in Hook. I. c.* —Chili.
lanceolata, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 333.—Chili.
longipes, Wedd. Chlor. And. i. 157—aenminata.
lycopodioides, *DC. Prod.* vii. 45.—Ins. Falkland,
nivea, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* ii. (1862) 880.—Chili.
pusilla, DC. Prod. vii. 45=stolonifera.
stolonifera, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1817) 69.—Am. austr.
Thouarsii, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 332. t. 37. f-2 = stolonifera.
xeranthemoides, *D. Don, ex Hook. Comp. Sot. Mag.* i. (1835) 102.—Chili.

CHEYNIA, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 56=**Balaustion,** Hook. (Myrtac).
pulchella, J. Drumm. 1. c.=B. pulcherrimum.

CHIAZOSPERMUM, Bernh. in Linnaea, viii. (1833) 465 =**Hypecoum,** Linn. (Fumaiiac).
erectum, Bernh. 1. c. xii. (1838) 602 = H. erectum.
lactiflorum, Kar. *8c* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 142.—Soongaria.
pendulum, Bernh. ex Edgew. in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 183 = H. procumbens.

CHIBACA, Bertol. f. in Mem. Ace. Bolog. iv. (1853) 545, nomen (=Gen. dub. LAURIN.) Benth. & Hook, f. iii. 150.
salotaiis, *Bertol. f. I. c.; et in Rosenth. Syn. PI. Diaphor.* i. 238.—Afr. austr.

CHICHAEA, Presl, Rel. Haenk. ii. 140 (1836) = 8terculia, Linn.
acerifolia, Prcsl, 1. c. 141=S. acerifolia.

CHICHARRONIA, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 529. t. 43 (1845) = **Terminalia,** Linn. (Combretac).
intermedia, A. Rich. 1. c—Ins. Cuba.

CHICKRASSIA, A. Juss. in M&n. Mus. Par. xix. (1830) 251. t. 22 (.Chukrasia). *MELIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 839.
PLAGIOTAXIS, Wall. Cat. (nomina) nn. 1269, 1270.
Nimmonii, R. Grah. in Wight, Illustr. 148 =tabularis.
tabularis, *A. Juss. in Mem. Mus. Par.* xix. (1830) 251. —Ind. or.; Malaya.
trilocularis, M. Roem. Syn. Hesper. i. 135=tabularis.
velutina, Wight & Am. Prod. 123= tabularis.

CHICO1NAEA, Comm. ex DC. Prod. iv. 462 (1830) = **Psathura,** Comm. (Rubiac.).

CHILECHIUM, Pfeiff. Nom. i.i. 713 (18731 = CHILOCHIUM, Rafin.=Eohlochiloa, Desf. (Boragin.).

CHUIEBANTHEMUM:, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (.1854) 166. *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1119.
trifidum, *Oerst I. c.* 167. t. 3. f. 30-33.—Mexic.

CHILIADENUS, Cass. in Diet Sc.Nat. xxxiv. 34 (1825) — **Jasonia,** Cass. (Compos.).
camphoratus, Cass. 1. c 85 = J. glutinosa.
glutinosus, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N.S. xvii. (1869) 93=J. glutinosa.

CHILIANDRA, Griff. Notul. iv. 150 (1854)=**Bhynchotechum,** Blume (Gesnerac).
obovata, Griff. 1. c. = R. latifolium.

CHILIANTHUS, Burch. Trav. i. 94 (1822). *LOGANIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 798.
SEMNOS, Rafin. Sylva Tellur. 161 (1838).
arboreus, Benth. in DC. Prod. x. 435 = oleaceus.
corrugatus, *Benth. 1. c.* 436.—Afr. austr.
dysophyllus, *Benth. 1. c.*—Afr. austr.
lobnlatus, *Benth. 1. c.*—Afr. austr.
oleaceus, *Burch. Truv.* i. 94.—Afr. anstr.
triphyllus, E. Mey. Zwei PfL Docum. 172-Nuxia floribunda.

CHUiIOCEPHALTTM, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1137(.1873). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook.f.ii.300.
KRALIKIA, Sch. Bip.in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 151 (1867).
myriocephalum, Baill. Hist. PI. viii. 173=Schimpcri.
Schimperi, *Benth. in Hook. Ic. PI. 1.* 1137.—Afr. trop.
Schultsii, Buching. ex Baill. Hist. PI. viii. 173 = Schimperi.

CHILIOPHYLLUM, DC. Prod. v. 554 (1836)= **Zaluzania,** Pers. (Compos.).
globosum, DC. L c.=Z. globosa.

CHIIIIOPHYIJIJITM, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 132. *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 258.
densifolium, *Phil. 1. c.* 133.—Chili.

CHUJIOTBICHUM:, Cass. in Diet. Sc. Nat. viii. 576 (1817). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 276.
TROPIDOLEPIS, Tansch, in Flora, xii. (1829) 68.
amelloides, DC. Prod. v. 216=seq.
amelloideum, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* viii. 577.—Reg. Magellan.
Darwinii, Hook. f. Fl. Antarct. 805-Nardophyllum Darwini.
Feliciae, Hombr. & Jacquin. ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 52=amelloidum.
humile. Hook. f. Fl. Antarct. 304=Nardophyllnm humile.
Kingii, *Hook.f. I. c.* 305 =Nardophyllum Kingii.
ovatifolium, *Hombr.* b* *Jacquin. ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zel. Dicot. Phan.* t. 28.—Hab. ?
TOS,axana\tolmm,Less.inLinnaea,\\. (1831) 109.—Chil.
viT&lum,Phil.in Anal. Univ. Chil. (167&) 485.—Chili

CHILMORIA, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc xiii. (1822) 500-**Oynooardia,** R. Br. (Bixin.).
dodecandra, Buch.-Ham. L c.—G. odorata.
pentandra, Bach.-Ham. 1. c 601 = Hydnocarpns inebriani.

CHILOCALYX, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 154 (1861)-Cleome, Linn. (Capparid.).
macrophyllus, Klotzsch, 1. c. 155 = Cleome Chilocalyx.
tenuifolius, Klotzsch, 1. c. = Cleome Chilocalyx.

CHILOCALYX, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 588=**Atalantia,** Correa (Rutac).
elliptica, Turcz. 1. c.=A. missionis.

CHUiOCABPUS, Blume, Cat. Gew. Buitenz. *'ii* (1823); et Bijdr. 1025 (1826). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 691.
atroviridis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* L 163.—Burma; Malaya.
australis, *F. Muell. Fragm.* ii. 90.—Austral,
ceylanicus, *Wight, Ic. I.* 1288=Willughbeia ceylanica.
compositus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 152.—Java.
costatus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 393.—Sumatra.
cuspidatus, Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 698, in note sub Hunteria = Melodinus orientalis.
decipiens, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 627.—Malacca,
densiflorus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 152.—Sumatra.
denudatus, Blume, Bijdr. 1025=atroviridis.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 562.—Sumatra.
enervis, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 626.—Malacca.
flavescens, Kew Gard. Report (1880) 47, ex Fl. Brit. Ind. iii. 625 = Willughbeia flavescens.
globuliferus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 152 — Borneo.
Maingayi, *Dyer, ex Hook.f. Fl. Brit.* /«d. iii. 827—Malacca.
malabaricus, Bedd. Ic. PI. Ind. Or. i. 33=atroviridis.
suaveolens, *Blume, Cat. Gew. Buitent.* 23; *et Bijdr.* 1025.—Java,
vemicosus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 152.—Borneo.

CHILOCHIUM, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. viii. (1821) 2ti9=Eohioohilon, Desf. (Boragin.).

CHILOCHLOA, Beauv. Agrost 37. t. 7. *I* 2 (1812) = **Fhleum,** Linn. (Gramin.).
annua, Roem. *8c* Schult Syst. ii. 410 = P. asperum.
arenaria, Beauv. Agrost. 37=P. arenarium.
aspera, Beanv. 1. c. = P. asperum.
Boćmerii, Beauv. 1. c.=P. Boehmeri.
collina, Schur, Enum. PI. Transs. 729 = P. phalaroidcs.
cuspidata, Beanv. Agrost. 37 = P. Michelii.
cuspidata, Schur, Enum. PI. Transs. 729= P. pbalaroides.
dent at a, Trin. Gram. Unifl. 168-= Phalaris dentata.
explicata, Roem. *8c* Schult. Syst. ii. 410 = Heleocbloo alopecuroides.
Gerardi, Bess, ex Schult. Mant. ii. 206=Alopecorus Gerardi.
hirsuta, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PI. ii. 189--1'-Michelii.
hispida, Beauv. Agrost. 158, "nomen - Arthraxon ciliaris.
Michelii, Trin. Gram. UniS. 167 = P. Michelii.
paniculata, Beauv. Agrost. 37 = P. asperum.
ventricosa, Beauv. ex Steud. Nom. ed. II. i. 350 = Gastridium australe?

CHILQDIA, R. Br. Prod. 607 (1810)=**Prostanthera,** Labill. (Labiat.).
australis, Loud. Hort Brit. Suppl. i. 686.—Austral.
scutellarioides, R. Br. Prod. 507=P. empetrifolia.

CHILOGLOSSA, Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel- (1854) 160=**Diantbera,** Linn. (Acanthac).
glabra, Oerst. 1. c 161 = D. glabra.
secunda, Pritz. Ic Ind. ii. 77=praec.

CHH.OOLOTTIS, R. Br. Prod. 822 (1810). *OKCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 614.
cornuta, *Hook.f. Fl. Antarct.* 69.—N. Zel.
diphylla, *R. Br. Prod.* 323.—Austral.
formicifera, *Fitagerald, Austral. Orchids,* i. III. (1877).—Austral.
Gunnii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 387.—Austral.
trapeziformis, *Fitzgerald, Austral. Orchids,* i. III-1[8*7],—Austral,
trilabra, *Fittgerald, in Joum. Bot.* xxi. (1888) &*•" Austral.
Traversa, F. Muell. Veg. Chath.-Iil. 61 = CaladeB"* bifolft.

CHILOPORUS, Naud. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. iv. (1643) 57 =Mioonla, Ruiz & Pav. (Melastomac).
ondinus, Naud. L c - M . andina.

CHTXOF8IS, D. Don, in Edinb. Phil. Joum. ix. (1823) 261. *BIGNONIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1041.
glutinosa, *Engelm. in Bot. Wisliten. Mexic. Exped.* 94.-Mexic. bor.
linearis, Sweet, Hort Brit. ed. I. 283-saligna.
salien,D.Don,in Edinb. Phil. Journ. ix. (1828) 261. —Mexic.

CHILOSCHISTA, Undl. Bot. Reg. subt. 1522 (1882) = Saroochilus, R. Br. (Orchid.).
usneoides, Lindl. 1. c.=S. usneoides.

CHILOSTIGMA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 872 = AptoBunum, Burch. (Scrophularin.).
pumilum, Hochst. 1. c = A . pumilum.

CHIMANTHUS, Rafin. FL Ludov. 26 (1817)=Prunus, Toum. (Rosac).
amygdalina, Rafin. L c. = P. caroliniana.

CHlMAPHHiA, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 279 (1814). *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 608.
CHIMAZA, R. Br. ex DC. Prod. vii. 775 (1889).
PSEVA, Rafin. in Joum. Phys. Sc. lxxxix. (1819) 261, in obs.
»styla, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xi. (1867) 434. —Japon.
corymbosa, Purah, Fl. Am. Sept. i. 800 = umbellate.
cymosa, J. & C. Presl, Fl. Cech. 89=umbellata.
Durandi, *Rafin. Atl. Journ.* 119.—Am. bor.
japonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 165.— Japon.
maculata, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 800.—Am. bor.
Menziesii, *Spreng. Syst.* ii. 817.-Am. bor. occ.
nmbeu$_{a(a)\ NuH\ \cdot Gm\ Am}$ j . 274.—Europ.; As. bor.; Am. bor.

CHIMARHIS, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 84=seq.

CHIMARHHIS, Jacq. Stirp. Am. 61 (1763). *RUBIACEAE*, Benth. & HooV f. ii. 45.
cymosa, *Jacq. 1.* c—Ins. Martinic.
<*>ndotii, *BaUl. Adansonia*, xii. (1879) 807.—N. Uranat.
Paraensis, *Baill. 1. c.* 808.—Bras,
turbinata, *DC. Prod.* iv. 4O4.-Guiana.

CH"!J^{A}ZA, R. Br. ex DC. Prod. vii. 775 (1889) = CMmaphila, Pursh (Ericac).

CH"JOCARPUS, Baill. Diet i. 784 (I879)=CHYMOCARPUS, D. Don=Tropaeolum, Linn. (Geraniac.).

CHIMJJP!KAHTHU8, Lindl. ,Bot Reg. sob t 404 U819); et t. 451 (1820). *CALYCANTHACEAE*, "enth. *Sc* Hook. f. i. 16.
MERATIA, Loisel. Herb. Gen. Amat iii. t. 178 - 11819).
"agrans, *Lindl. I. c.* t 451.—Japon.
Xrandiflorus, Steud. Nom. ed. II. i. 850=fragrans.
" * » • Hort. ex Bielawski, in Ann. Soc. Linn. Maine- - et-Loire, ix. (1867) 96=fragrans.
parviftorus, Rafin. Alsog. Acs. 6-fragrans.
Praecox, Lindl. Bot. Reg. sub t 404=fragrans.
'"nlarifolius, Stend. Nom. ed. II. i. 850, spbalm. = Myropyrnm smilacifolium,
we,,,,, Hort. ex Bielawski, in Ann. Soc. Linn. Maine-M-Loire, ix. (1867) 96=fragrans.

CHIMOPHILA, Radius, Diss. Pyrol. 7, 88 (1821)-= Chimaphlla, Pursh (Ericac).

CH J?$_{S}$ CHARRONIA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. ??? t^{668}) = CHICHARRONIA, A. Rich.=W «aUa, Linn. (Combretac.).

CHINCHONA, Howard, in Rep. Bot. Congr. London, (1866) 221 = Cinchona, LimV. (Rubiac.).

CHIOCOCCA, P. Br - « Unn - Syst. ed. X. 917 (1759). *RUBIACEAE* - ^ " ^ & Hook - f - a - 105 -
SIPHONANDRA, Ture* - » Ball. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848, U S l
alternifolia, Linn. Syst. ed > Xn - l«6=Cestmm vespertinum.

CHIOCOCCA:—
anguifuga, Mart. Reise Bras. i. 806, 654; Mat. Med. Bras. 17. t. 6-brachiata.
axillaris, Moy. ex DC. Prod. iv. 488 (=*Morgan's nudiflora*).—*Mexic.*
barbata, *Forst.f. Prod.* 16.—Ins. Pacif.
barbigera,D. Dietr. Syn. PI. i. 777 = Symphoricarpos microphyllus.
brachiata, *RuitV Pav. Fl. Per.* ii. 67.—Am. trop.
coriacea, *Mart. &" Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 281.—Mexic.
densifoHa, Mart. Reise Bras. i. 644; Spec. Mat Med. Bras. 17. t. 6=brachiata.
fioridana, Rafin. Alsog. Am. 75-racemosa.
javanica, *Blume, Bijdr.* 968.—Java.
latifolia, Rafin. Alsog. Am. 75 = racemosa.
macrocarpa, *Mart,* b" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 230.—Mexic.
malabarica, *Dennst. Schluess. Hort. Malab.* 87.—Ind. or.
nitida, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 236.— Guiana.
nocturna, Jacq. Enum. PI. Carib. 16-Cestrum nocturnum.
nudiflora, D. Dietr. Syn. PI. i. 777 (=*Morgan's nudiflora*).—Mexic.
odorata, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 65.—Ins. Societ.
opulina, Spreng. Syst. i. 756=Pavetta opulina.
paniculata, Hoffm. ex Roem. & Schult Syst. v. 202= brachiata.
paniculata. Linn. f. Snppl. 145=Psychotria panicnlata.
parviflora, Humb. *8c* BonpL ex Roem. *Sc* Schult. SysL v. 202 = brachiata.
parvifolia, Wullschl. ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 837 =racemosa.
phaenostemon, *Schlecht. in Linnaea*, ix. (1834) 594.— Mexic.
pubescens, Humb. & Bonpl. ex Roem. *Sc* Schult. Syst v. 202 = brachiata.
racemosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 352 = brachiata.
racemosa, *Linn. Syst.* ed. X. 917; *Jacq. Select. Am.* 68.—Ind. occ.
racemosa, Schlecht. *8c* Cham, in Linnaea, v. (1830) 166 = phaenostemon.
sambucina, Spreng. Syst. i. 766 =Pavetta sambucina.
spicata, Blume, Bijdr. 958=Xanthophytum spicatum.
staminea, *Mart, (f Gal. Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 231.—Mexic.
trtflora, Sprang. Syst i. 756 = Pavetta triflora.
trisperma, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 219.—Ins. Galapag.

CHIOOENE8, Salisb. in Trans. Hort. Soc. ii. (1817)94. *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 577.
GLYCIFHVLLA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192.
LASIERPA, Torr. in Geol. Rep. N. York (1839), 152.
PHALEROCARPUS, G. Don, Gen. Syst. iii. 641 (1834).
hispidula, Torr. *8c* Gray, ex Torr. Fl. N. York, i. 450. t. 68=serpyllifolia.
japonica, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 26.—Japon.
serpyllifolia, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* ii. (1817) 94. —Am. bor.; Japon.

CHIOETACHCTE, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 15 (1838). *GRAMINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1118.
barbata, *. *Br. I. c.* 18.—Ind. or.
cyathopoda, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 516. —Austral.
Koenigii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 857 •» barbata.
Wightii, *Munro, ex Benth. (f Hook. f. Gen.* iii. 1113, aomen.—Ind. or.

CHIONANTHU3, Gaertn. Fruct. i. 189. t 39 (1788) = Linociera, Sw. (Oleac.).
acuminata. Wall, ex DC. Prod. viii. 298 =L. acuminata.
acuminigera, F. Muell. Fragm. viii. 42.—Austral
albidiflora, Thw. Enum. PI. Zeyl. 189-L. albidiflora.
axillaris, R. Br. Prod. 523=L. albidiflora?
axillaris, Roxb. ex Wall. Cat sub n. 2824 - L. macrophylla.
callophylla, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 819.— Malaya.
caribaea, Jacq. Coll. ii. 110=L. compacts.
compacta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18=L. compacta.
cotinifolia, Willd. Sp. Fl. i. 47=JL cotinifolia.

CHIONANTHUS:—
courtallensis, Bedd. For. Man. Bot. 155 = Linotiem leprocarpa.
cuspidata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 819.—Ins. Celebes.
densiflora, Zoll. & Morr. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 4=L. densiflora.
dichotoma, Uoxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 108- L. purpurea.
diversifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl. 559.—Sumatra.
domingensis. Lam. Tabl. Encyc. i. 30=L. latifolia.
effusiflora, F. Muell. Fragm. iv. 83=L. macrophylla.
elliptica, Illume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 819.—Malaya.
Ghaeri, Gaertn. Fruct. i. 190 = L. cotinifolia.
glomerata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 818.— Sumatra.
quianensis. Pen. Syn. i. 9.—Guiana.
incrassata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18 j Willd. Sp. PI. i. 47 = L.tetrandra.
insignis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 659—L. insignis.
intermedia, Bedd. Fl. Sylv. t. 239 - L . intermedia.
laxiflora, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 319.—ftomeo.
leprocarpa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 189 = L. lepiucarpa.
ligustrina, Pers. Syn. i. 9=L. ligustrina.
littorea, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 559.—Sumatra.
luzonica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 819 = L. luzonica.
macrocarpa, Blume, 1. c.=L. insignis.
macrophylla, Blume, 1. c. 817; Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 139=L. macrophylla.
malabarica, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 2828 - L. malabarica.
Mayepea, Vahl, Symb. Bot ii. 1-L. tetrandra.
minutiflorus, Kurz, For. Fl. Brit. Banna, ii. 159 - L. minntiflora.
montana, Blume, Bijdr. 681=L. montana.
montana, Kurz, For. Kl. Brit. Burma, ii. 159 = L. insignis.
monticola, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 817 = L. montana.
palembanica, Miq. Fl. Ind. Bat Snppl. 668 - L . pauciflora.
picrophloia, F. Muell. Fragm. iii. 189. t. 24 = L. intermedia.
pubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 285.— N. Granat.
purpurea, Lam. Tabl. Encyc. i. 30=L. purpurea.
quadristaminea, F. Muell. Fragm. viii. 41.—Austral.
ramiflora, Roxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 107- L. macrophylla.
rostrata, Miq. Fl. Ind. Bat. it 558=L. rostrata.
rostrata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 189 =L. albidiflora. -
smilaei/olia, Wall in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 108 = Myxopyrum smilacifolium.
spicata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 318.—Malaya.
sumatrana, Blume, 1. c.—Sumatra.
tenuiflora, Wall, ex DC. Prod. viii. 298 = L. macrophylla.
terniflora, Griff. Notul. iv. 740 = L. temiflora.
tetrandra, Vahl, Enum. i. 46 = L. tetrandra.
timorensis, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. i. 818.— Timor.
seylanica, Heyne, ex Wall. Cat. snb n. 2828 - L. malabarica.
zeylanica, Lam. Tabl. Encyc. i. 30=L. cotinifolia.
teylanica, Linn. Sp. PI. 8=L. purpurea.

CHIONAKTHUS, Royen, ex Linn. Gen. ed. I. 885 (1737). *OLEACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 677.
chinensis, Maxim, in Bull. Acad. Pe'tertb. xx. (1875) 430=retusa.
angusti/olia, Rafin. New Fl. Am. iii.'88-virginica.
fraxinifolia, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1878) 18 = Fraxinus dipetala.
fragrans, Edwards, ex Steud. Nom. ed. U. i. 351- virginica.
heterophyla, Rafin. New Fl. Am. iii. 87-virginica.
latifolia. Ait. ex Steud. Nom. ed. II. i. 850 =vireinica.
longifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 88-virginica.
maritima, Sweet, Hort. Brit ed. II. 361 = virginica.
montana, Rafin. New Fl. Am. iii. 87-virginica.
obovata, Rafin. 1. c-virginica.
retusa, *Paxt. Flow. Gard.* iii. (1862-53) 88.—China.
trifida, Moench, Meth. 478= virginica.
triflora, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 19= virginica.
vernalis, Salisb. Prod. 14-virginica.
verna, Baill. Hist PI. i. 296=virginica.
virginica, *Linn. Sp. PI.* 8.—Am. bor.

CHIONE, DC. Prod. iv. 461 (1880). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 107.
CRUSEA, A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Far. v. (1880) 201. t. 19. f. 1.
SACCONIA, Endl. Gen. PI. 541 (1888).
cubensis,^. *Rick.Fl. Cub. Fanerog.* ii. 22.—Ins. Cuba,
elliptica, *Griseb. PI. Wright. Cub.* 507.—Ind. occ.
glabra, *DC. Prod.* iv. 461.—Ind. occ.
lucida, *Griseb. PI. Wright. Cub.* 507.—Ind. occ.
myrtiiblia, *Griseb. 1. c.*—Ind. occ.
vaccinifolia, Griseb. Cat. PI. Cub. 188=Erithalis vaccinii folia.

CHIONE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 100 (1866)-Narcissus, Toum. (Amaryllid.).
italica, Salisb. 1. c.=N. italicns.
papyracea, Salisb. 1. c.=N. papyracena.

CHIONICE, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 33 (1844) =-Potentilla, Toum. (Rosac).
dioica, Bunge, 1. c.=P. tetrandra.

CHIONODOXA, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 61 (1844). *L1LIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 813.
cretica, *Boiss. b" Heldr. I. c.* xiii. 24.—Ins. Creta.
cretica, Jaub. *8c* Spach, Illnstr. v. 46 t. 448=nana.
Forbesii, Baker, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 436 = Lnciliae.
Lnciliae, *Boiss. Diagn.* Ser. i. v. 61.—As. Min.
nana, *Boiss. & Heldr, 1. c.* xiii. 24.—Ins. Creta.

CHIONOGRAPHIS, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. xi. 11867) 485. *L1L1ACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 826.
japonica, *Maxim. I. c.* 486.—Japon.

CHIONOLAEKA, DC. Prod. v. 897 (1836). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 302.
arbuscula, *DC. I. c*—Bras,
corymbosa, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 82. —Mexic.
Glaziovii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ill. 130.—Bras.
glomerata, *Baker, I. c.*—Bras.
Isabellae, *Baker, 1. c.*—Bras.
latifolia, Baker, 1. c. 132 = Leucopholis latifolia.
lavandulaceum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 134 =seq.
lavandulifolium, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 802.—Mexic.
longifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 131.—Bras,
lychnophorioides, *Sck. Bip. in Pollichia*, xx-xxi. (1863) 391.—Bras.
phylicoides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 181 = Leucopholis phylicoides.
Wittigiana, *Baker, I.e.* 129.—Bras.

CHIONOPAPPtrS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 485 (1873). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. 1. c.

CHIONOPHU.A, Benth. in DC. Prod. x. 381 (1846). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 942.
Jamesii, *Benth. I. c.*—Am. bor. occ.

CHIONOPHILA, Miers, ex Lindl. Veg. Kingd. 701 (1847)=Boopis, Jnss. (Calycer.).

CHIONOFTERA, DC. Prod. vii. 14 (1838). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 495.
Gayophyta, *DC. I. c*—Chili.

CHIONOTHRIX, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 33 (1880). *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. 1. c.
somalensis, *Hook./. I. c.*—Afr. trop.

CHIONOTRIA, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) vn. 63 = 01ycoamis, Correa (Rutac).
monogyna, Walp. Rep. i. 882=seq.
rigida, Jack, in Malay Misc. ii. (1822) VII. 54 = G. pentaphylla.

CHIOPHILA, Rafin. Fl. Tellur. iii 28 (1886) -Gtentiana, Linn.
nivalis, Rafin. 1. c. =G. nivalis.

CHIRANTHODENDRON, Cerv. ex Cav. in Anal. Cienc Nat. vi. (1803) 803, adnot. = Cheirostemon, Humb. & Bonpl. (Sterculiac.).
californieum, Baill. Hist. PI. iv. 70 = Fremontia califomica.
pentadactylon, Larreat, Desc. Chiranth. ed. Lesc. 17 = Cheirostemon platanoides.

CHIRATA, G. Don, Gen. Syst iv. 659 (1887) = CMrita, Buch.-Ham.

CHIRATIA, Montr, in M<§m. Acad. Lyon, x. (1860) 202 s-Sonneratia, linn. f. (Lythrar.).
leueantha, Montr. 1. c. 203.—N. Caled.

CHIBITA, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 89 (1826). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1022.
BABACTES, DC. Prod. ix. 260 (1845).
CALOSACME, Wall. Cat. nn. 800 ad 806 (1829).
CHIRATA, G. Don, Gen. Syst. iv. 659 (1837).
GONATOSTEMON, Regel, Gartenfl. xv. (1866) 353.
HYPOPTERON, Hassle. Cat Hort. Bog. Alt. 154 (1844).
LIEBIGIA, Endl. Gen. 1407 (1841).
MORSTDORPFIA, Steud. Norn. ed. II. ii. 161 (1841).
TROMSDOKFFIA, Blume, Bijdr. 762 (1826).
acaminata, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 117.—Reg. Himal.
acuminata, A. DC. Prod. ix. 269=Didymocarpus acuminata.
amplectens, Steud. Nom. ed. II. i. 351 = bifolia.
anachoretica, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sii.* V. v. (1866) 231.—China.
bifolia, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 90.—Reg. Himal.
Bilabium, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* v. 127.—Sumatra.
Blumei, *C. B. Clarke, 1. c.* 122.—Java.
bracteosa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 728 = Horsfieldii.
brevipes, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* v. 120.—Ind. or.
caerulea, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 117.—Java,
caliginosa, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* v. 122.—Malacca.
calva, *C. B. Clarke, 1. c.* 116.—Reg. Himal.
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 35U.—Reg. Himal.
communis, Gardn. in Calc Joum. Nat. Hist iv. (1846) 481 = zeylanica.
cortusifolia, *Hance, in Joum. Bot.* xxi (1883) 324.—China.
diapkana, Royle, Illustr. Bot. Himal. 294 = pnmila.
dimidiata, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 117.—Reg. Himal.
eburnea, *Hance, in Joum. Bot.* xxi. (1888) 168.—China.
Edgeworthii, A. DC. in Prod. ix. 269=pnmila.
Fauriei, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 450.—China.
fiava, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 117 = pnmila.
fusca, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* v. 129.—Borneo.
glabra, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t. 73 = calva.
glabra, *Miq. Fl.Ind. Bat.* ii. 729.—Malaya.
grandiflora, Wall. PI. As. Rar. i. 43=urticaefolia.
Griffithii, Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan. v. 60=Loxostigma Griffithii.
hamosa, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 117.—Ind. or.
Hooked, *C. B. Clarke, Comm. If Cyrt. Beng.* t. 70.—Reg. Himal.
Horsfieldii, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 117.—Java.
Horsfieldii, De Vriese, PI. Ind. Bat. Reinw. 11 = Blumei.
hnmilis, *Miq. FL.Ind. Bat.* ii. 729.—Sumatra,
insignis, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* v. 121.—Assam.
Juliae, *Hance, in Joum. Bot.* xxi. (1883) 168.—China.
Kurzii, *C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 145.—Reg. Himal.
lachenensis, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* v. 118.—Reg. Himal.
lilacina, *Lem. Illustr. Hortic.* (1869) t. 688.—Ind. or.

CHIBITA:—
macrophylU, *Wall. PI. As. Rar.* i. 58. t. 72.—Reg. Himal.
macrosiphon, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. v. (1866) 231.—China.
mollis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 728.—Sumatra,
monophylla, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 360.—Reg. Himal.
Moonii, *Gardn. in Calc. Joum. Nat. Hist.* vi. (1846; 479.—Zeylan.
obtusa, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* V. 114.—China.
polycarpa, *Steud. Nom.* ed. II. i. 351.—Ind. or.
polyneura, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 728 = Horsfieldii.
primulacea, *C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.* t. 82.—Reg. Himal.
pumila, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 90.—Reg. Himal.
scaberrima, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 117.—Java.
scabra, Royle, ex C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan. v. 118 = bifolia.
sinensis, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) t. 59.—Hongkong,
speciosa, *Kurt, in Joum. Bot.* xi. (1878) 195.—China.
spectabilis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 564.—Sumatra.
temifolia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 121 = Lysionotus serrata.
urticaefolia, *Buch.-Ham. ex D. Don, 1. c.* 90.—Reg. Himal.
vulgaris, Hort. ex Belg. Hortic. iii. (1853) t. [36].—Cf. p. 238 = zeylanica.
Walkeri, *Gardn. in Calc. Joum. Nat. Hist.* vi. (1846) 480.—Zeylan.
Walkeriae, Hook. Bot. Mag. t. 4327 = Walkeri.
zeylanica* *Hook. I. c.* t 4182.—Zeylan.
Zollingeri, *C. B. Clarke, in A. DC. Monog. Phan.* v. 125.—Java.

CHIROCALYX, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 97-Erythrina, Linn. (Legumin.).
abyssinicus, Hochsi. in Flora, xxix. (1846) 600 = E. abyssinica.
Candolleanus, Walp. in Flora, xxxvi. (1853) 148 = E. spathacea.
divaricatus, Walp. 1. c. = E. divaricata.
indicus, Walp. 1. c. = E. indica.
lati/olius, Walp. 1. c. =E. senegalensU.
mollissimus, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 98 = E. tomentosa.
f ictus, Walp. in Flora, xxxvi. (1853) 148 = E. indica.
tubescens, Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 741 = E. fissa.
rubrinervius, Walp. in Flora, xxxvi. (1853) 148=E. nibrinervis.
tomentosus, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 600=E. tomentosa.
umbrosus, Walp. in Flora, xxxvi. (1853) 148 = K. umbrosa.
velutinus, Walp. 1. c = E. velutina.

CHIBONIA, Linn. Coroll. Gen. 5 (1787). *GENTIANEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 805.
EUPODIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 29 (1836).
EVALTHE, Rafin. 1. c. 77 (1886).
ONEFERA, Rafin. 1. e. 30 (.1836).
PLOCANDRA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 181 (1837).
ROESLINIA, Moench, Meth. Suppl. 211 (1802).
ROSLINIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 203 (1887).
amoena, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) S59 = Sabbatiagradlist
amoena, Salisb. Prod. 137-linoides.
angularis, linn. Sp. PI.]90 = Sabbatia angularis.
angustifolia, Sims, Bot. Mag. t. 818«=frntescens.
arenaria, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* ii. 180.—Aft. austr.
baccata, Hoffmgg. Verz. PH. Nachtr. i. 211 = >eq.t
baccifera, *Linn. Sp. PI.* 190.—Afr. austr.
baedfera, Zeyh. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 41" linoides.
Barclayana, Hort. Berol. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent-100=peduncularis.
brachiata, Willd. ex Griseb. L c. 145 = Erythrae* Roxburghii.
calycosa, Michx. FL Bor. Am. L 147-Sabbati» calycosa.
campanulata, Linn. Sp. PL 190-Sabbatia gracilisf

CHIBOinA:—
ca/>su/ařij,Blanco,Fl.Filip.ed.I.102«Tpomoeapeltata.
caryopkylloides, Linn. Cent. ii. 12; Amoen. Acad. iv. 308 = frateaceas.
Centaurium, Schmidt, Fl. Bohem. ii. 31-Erythraea Centaurium.
centauroides, Roxb. Hort. Beng. 16; Fl. Ind. i. 684 = Erythraea Roxburghii.
chilensis, Willd. Sp. PI. i. 1067 - Erythraea chilensis.
ehloroides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 117=Sabbatia chloroides.
cymosa, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 5.—Afr. austr.
cymosa. Lam. Encyc. i. 479-Sabbatia lanceolate.
decandra, Walt. Fl. Carol. 96=Sabbatia chloroides.
decussata, Vent. Jard. Cels, Sl=frutescens.
dickotoma, Walt. Fl. Carol. 95 = Sabbatia calycosa.
dodecandra. Linn. Sp. PI. 190=Sabbatia chloroides.
duiia, Willd. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 146 = Erythraea Muehlenbergii.
"wrginata, Jarosz, PI. Nov. Cap. Ll=lychnoides.
Erythraea, Schousb. Vextr. Marok. 95 = Erythraea ramosissima.
exigua, *Oliver, in Hook. Ic. PL* t. 1229.—Afr. anstr.
filiformis, Desf. Tabl. ed. L 77, nomen=MicrocaIa filiformis.
Piseheri, Hort. ex Paxt Mae. Bot. xi. (1844) 287 = flpribnnda.
noribunda, *Paxt. I. c.* 223.—Afr. anstr.
frutescens, *Linn. Sp, PI.* 190; *Berg. Desc. PI. Cap.* 45. —Afr. austr.
Gerardi, Schmidt, Fl. Bohem. ii. 83 •> Erythraea Pulchella.
glutinosa, *Paxt. Mag. Bot.* xv. (1849) 245.—Austral. ?
gradlis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 146=Sabbatia gracilis.
grandiflora, Salisb. Prod. 187=frutescens.
Modea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) !» - Erythraea elodes.
inaperta, Willd. Sp. PI. i. 1069 - Erythraea ramosisiama.
i'ttrnedia, Mint, Fl. Paris, 91=Erythraea ramosissima.
3'asninoides, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. t 197 = tetragona.
jasminoides, Lam. Illustr. i. 479. t 108. f. 2 = nudi- «uli
lasminoides, *Linn. PI. Rar. Afr.* 9 *{Amoen. Acad.* vi. 84), Afr. austi.
rebsii, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 98.—Afr. austr.
anceolata, Walt. FL Carol. 95=Sabbatia lanceolata.
anosanthera, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 71 = Ipomoea peltata.
trifolia, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* ii. 178.—Afr. austr.
arifolia, Loisel. Notes, 155-Erythraea linarifolia.
»«earifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 352, in syn. sphalm. =Praec.
tfolia, Steud. 1. c. 351 - Erythraea linarifolia.
«les, *Linn. Sp. p_L* 189.—Afr. austr.
'tttoralis, Turn, in Turn. & Dillw. Bot. Guide, ii. 469 = Erythraea linarifolia.
bl- * ". It- PL dec> ". S2=Er y thiaea mari„ tf a.
Jyehnoides, *Berg. Desc. PI. Cap** 45i—Afr. austr.

"antima, *Eckl. in S. Afr. Quart. Jour**, ii. (1830) ; *Gen. et Sp. Gent.* 100.—Afr. austr.
«, Georgi, Beschr. Ross. Reich, iii. iv. 791 =Aythraea ramosissima.
i*«tti»ia. Willd. Sp. PI. i. 1069 = Erythraea maritima.
»n>pyrifolia. *Lam. Illustr.* ii. 479.—Afr. austr.
"»»«*«i, Thuill. Fl. Par. ii. 118=Cicendia pusilla.
or, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 126 = Erythraea nosissima.
»««o, Bast, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 57 = Erythraea
Li»n.f. Suppl. 151,-Afr. anstr.
> « Willd. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 144 = Erythraea diffusa.
= Eiythtaea maritima.
Reichb & «* * 245=frutescens.
ex Griseb to DC> Ptod serpylli-
> *Bureh. Trav.* ii. (1821) 226.—Afr. austr.
Michx Fl Bor. Am. i. 146-SabbatU Paaiculata.
fiora, Salisb. Prod. 136 = baccifenu

CHIROXTCA :—
parvifolia, *E. Mey. Comnu PI. Afx. Austr.* 180.—Afr. austr.
peduncularis, *Lindl. Bot. Keg.* t 1803.—Afr. austr.
perfoliata, *Eckl. in S. Afr. Quart. Journ.* ii. (1830), *ex Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 104.—Afr. austr.
perfoliata, Salisb. Prod. 187 = Chlora perfoliata.
pubescens, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 172.—Madag.
pulcJulla,V!ill± Sp.Pl. i. 1067 = Erythraea ramosissima.
pusilla, Steud. Norn. ed. II. i. 351 = Microcala filiformis.
ramosissima, Ehrh. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 137 = Erythraea ramosissima.
scabrida, *Griseb. I. c.* 108.—Afr. austr.
scabriuscula, Willd. ex Griseb. 1. c. 148 = Erythraea linarifolia.
serpyllifolia, *Lehm. Ind. Sem. Hort. ffamb.* (1828).—Afr. austr.
speciosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 178.—Afr. austr.
spicata, Willd. Sp. PI. i. 1069 = Erythraea spieata.
stellata, Muhl. Cat. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I. 115 = Sabbatiastellaris.
suffruticosa, Salzm. ex Griseb. Gen. %t Sp. Gent. 141 = Erythraea Centaurium.
tabularis, *Page, ax Steud. Norn,* ed II. u 852.—Afr. austr..
tenuiflora, *Link, ex Steud. I. c.*—Hab. ?
tetragona, *Linn.f. Suppl.* 151.—Afr. austr.
trinervia, Linn. Sp. PI. 189=Exacum zeylanicum.
trinervis, Hort. ex Loud. Encyc. PI. Suppl. ii. 1306 - = peduncularis.
uliginosa, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. Suppl. 89 = Erythraea elodes.
uliginosa, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. iii. 287. t. 259 = Erythraea linarifolia.
uniflora, Eckl. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 41 = linoides.
uniflora, *Lam. Encyc.* i. 737.—Afr. austr.
Vaillantii, F. W. Schmidt, Fl. Bohem. ii. 34 - Erythraea ramosissima.
virescens, Willd. ex Steud. Nom. ed. II.' i. 352 = Erythraea maritima.
viscosa, Zeyher, ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 105 = tetragona.
vulgaris, Cham, in Linnaea, vi. (18S1) 343=linoides, lychnoides, melampyrifolia.

CHIROPETALUM, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* I. xxv. (1832) 21=Argithamnia, Sw. (Euphorbiac).
Berterianum, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 637-A. Berteroana.
canescens, Phil. Fl. Atac. 49 = A. canescens.
griseum, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 57.—Reg. Argent.
lanceolatum, C. Gay, FL Chil. v. 344-A. tricuspidata.
laneeolatum, A. Juss. in Ann. Sc Nat. Sir. I. xxv. (1832) 21=--A. Berteroana.
lineatum, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 199 =A. lineata.
molle, Klotzsch, 1. c = A. mollis.
evatum, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 42 = A. tricuspidata.
peruvianum, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Se>. I. xxv. (18*2) 22 = A. quinquecuspidata.
triandrum, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 56.—Reg. Argent.
tricuspidatum, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Se>. I. xxv. (1832) 22-= A. tricuspidata.

CHIROSTEMUM, Cerv. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1803) 303 - Cheirostemon, Humb..& Bonpl. (Sterculiac).

CHISOCHETON,Blume,Bijdr. 168(1825). *MELIACEAE,* Benth. ft Hook. f. \: 833.
SCHIZOCHITON, Spreng. Syst iv. Car. Post. 251 (1827).
amabilis, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 27 — As. or.
barbatus, C. *DC. in A. DC. Monog. Phan.* i. 536.—As. or.
canalensis, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 260 - Dysoxylum camalense.
ceramicus, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 29. —Ins. Cenun.

CHISOCHETON :—
costatus, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 552.—Ind. or.
divergens, *Blume, Bijdr.* 169.—Java,
diversifolius, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. I..* 504.—Sumatra,
dysoxylifolius, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* \\. (1871) ii. 49.—Burma,
crythrocarpus, *Hiern, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i..65O. —Malacca.
fragrans, *Hiern, I. c.* 551.—Malacca,
glomeratus, *Hiern, I. c.*—Ins. Penang.
grandiflorus, *Kurz, in Journ. As. Soc.* xli (1872) II. 296.—Burma,
holocalyx, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 551.—Malaya.
Junghuhni, *Miq. in Ann. Mus. Bot Lugd. Bat.* iv. 30. —As. or.
paniculatus, *Hiern, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 552.—Ind. or.; Burma.
patens, *Blume, Bijdr.* 169.—Java,
paucijugum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 30-v-Sumatra,
penduliflorus, *Planch, ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 550.—Malaya,
spectabilis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 29. —As. or.
spicatus, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.* 650.—Malacca,
tetrapetalus, *TurcM. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1858) I. 411,-Java.
Vrieseanus, *C. DC. in A. DC. Monog. Phan.* i. 632.—As. or.

CHITHONANTHUS, Lehm. in Ind. Sem. Hort. Hamburg. (1842) 4; et PI. Preiss. ii. 368 (1847) = Aoacia, Willd. (Legmmin.).
restiaceus, Lehm. U. cc.=A. restiacea.

CHITONIA, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 317 = Miconia, Ruiz & Pav. (Melastomac).
albicans, D. Don, ex Naiid. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* III. xv. (1851) 339=Tetrazygia albicans.
aurea, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 819 = M. aurea.
bubalina, D. Don, 1. c.-M. bubalina.
caudata, D. Don, I. c. = M. Donaeana.
Fothergilla, D. Don, 1. c. 318=M. Fothergilla.
macrophylla, D. Don, 1. c. 319=M. macrophylla.
pyramidalis, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 174 = M. laevigata.
rubiginosa, Steud. Nom. ed. II. i. 352 = M. Fothergilla.
Tamonia, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 174 =M. Fothergilla.

CHITONIA, Moc, & Sesse, ex DC. Prod. i. 707 (1824). *ZYGOPHYLLEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 268.
mexicana, *Moc. V Sesse, I. c*—Mexlc.

CHITONIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 51 (1866) = Zygftdenus, Michx. (LUiac.).

CHIZOCHETON, A. Juss. in Orb. Diet. Sc viii. 80 (1849) = Chisocheton, Blume (Meliac.).

CHLAENANDBA, Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat. iv. 83 (1868-69). *MBNISPERMACEAE.*
ovata, *Miq. I. c.* 84.—N. Guinea?

CHLAENOBOLUS, Cass. in Diet. Sc Nat. xlix. 337 (1827)=Pterooaulon, Ell. (Compos.).
alopecuroides, Cass. 1. c. 339 = P. virgatum.
pyenostachyus, Case. 1. c. 838 = P. pyenostachyum.
rugosus, Cass. 1. c. 341=P. virgatum.
spicatus, Cass. 1. c =P. virgatum.
virgatus, Cass. 1. *c* 340= P. virgatum.

CHLAMYDANTHUS, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. i. (1843) 855, 359-Thymelaea, EndL
argenteus.C. A. Mey. 1. c. 358=T. Tartonraira.
canescens, C. A. Mey. 1. c. = T. canescens.
ellipticus, C. A. Mey. 1. c. 859 = T. elliptica.
hirsutus, Griseb. Spidl. FL RumeL ii. 54 =Pasierina hirsuta.

CHLAMYDANTHUS :—
nitidus, C. A. Mey. in Bnll. Phys.-Math. Acad. Petersb. i. (1843) 358=Thymelaeanitida.
Tartonraira, C. A. Mey. 1. c. - T. Tartonraira.
thesioides, C. A. Mey. 1. c. 359 = T. thesioides.
Thymelaea, C. A. Mey. I.e. = T. Sanaraunda.
tinctorius, C. A. Mey. 1. c. 358 =T. tinctoria.
villosus, C. A. Mey. 1. c.=T. villosa.
virgatus, C. A. Mey. 1. c. 359 = T. virgata.

CHLAMVDIA, Banks, ex Gaertn. Fnict. i. 71. t. 18 (1788)=Fhonnium, Forst. iLUiac).
tenacissima, Gaertn. 1. c.=P. tenax.

CHLAMTDOCARYA, Baill. Adansonia, x. (1872) 276. *OLACINEAE.*
capitata, *Baill. 1. c.* 277.—Afr. trap.
Thomsoniana, *Baill. I. c.* 276.—Afr. trop.

CHLAMYDOPHORA, Ehrenb. ex Less. Syn. Comp. 265, 44a (1832) = Cotula, Linn. (Compos.).
pubescens, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 279=Cot. pubescens.
tridentata, Ehrenb. ex Less. Syn. Comp. 266 = Cot. tridentata.

CHLAMYDOSPERMA, A. Rich. Ess. FL Cnb. 631 (1845) = Stegnosperma, Benth. (Phytolacc).

CHLAMYDOSTYLUS, Baker, in Joum. Bot. xiv. (1876) 185=Nemastylis, Nutt. (Irid.).
bracteolatus. Baker, in Journ. Linn. Soc. rvi. (1877) 107.—Boliv.
cernuus, Baker, in Joum. Bot. xiv. (1876) 186 = N. triflora.
Medusa, Baker, 1. c—Bras.
multiflorus, Baker, 1. c.=N. mnltiflora.
spathaceus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 324 = N. spathacea.
tenuis, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 185=N. tennis.
triflorus. Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 107-N. triflora.

CHLAMYSPERMA, Less. Syn. Comp. 256 (1832)-Villanova, Lag. (Compos.;.
arenaroid.es, Hook. *V* Am. Bot. Beech. Voy. 300. t. 64 — V. pratensis.
polygama, Triana, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. ix. (1858) 40.—N. Granat.
pratense, Less. Syn. Comp. 266 = V. pratensis.

CHLAMYSPORUM, Salisb. Parad. Lond. t. 103 (1808) -Thysanotus, R. Br. (1810)'(Liliac).
dichotomum, Salisb. 1. c. in nota sub t. 103=T. dichotomus.
hispidulum, Salisb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 352 = T. hispidulns.
juncifolium, Salisb. Parad. Lond. t. 108=T. juncens.
multiflorum, Salisb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 352 «=T. multiflorus.
pauciflorum, Salisb. ex Steud. 1. c.=T. panciflorus.
triandrum, Salisb. ex Steud. 1. c.=T. triandrus.

CHLANIS, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 144 (1861) = Oncoba, Forsk. (Bixin.).
macrophylla, Klotzsch, 1. c. 145 — O. macrophylla.
tettensis, Klotzsch, 1. c.=O. tettensis.

CHLAOTRACHELUS, Hook. £ FL Brit. Ind. iii. 284 (1881), sphalm. - CLAOTRACHELUS, ZolL = Vernonia, Schreb. (Compos.).

CHLETERUS, Rafin. Princ. Somiol. 25 (1814) =Boea, Comm. (Gesnerac).

CHIiIDANTHTJS, Herb.App. 46 (1821). *AMARYLUDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 723.
COLEOPHYILUM, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. viii. (1840) 185.
Cumingii, Presl, Bot. Bemerk. 115-Hippeastrnm advenum.
Ehrenbergii, *Kunth, Enum. PI. r.* 654.—Mexic.
fragrans, *Herb. A pp.* 46.—Peruv.
luteus, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1175=Stenomesson luteum.

CHLOAMNIA, Rafin. Neogenyt 4 (1825)=.Festuea, Tonra. (Gramin.).

CHLOAHTHES, R. Br. Prod. 513 (1810). *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1140.
HEMISTEMON, F. MuelL Fragm. x. 73 (1876).
atriplicina, F. Muell. Fragm. i. 235 = Pityrodia atriplicina.
Bartlingii, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1,844), ex Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 852 - Pityrodia Bartlingii.
Bonneyana, *F. Muell. Fragm.* x. 78.—Austral.
bullata, F. Muell. 1. c. vi. 166-Pityrodia uncinata.
coccinea, *Bartl. in Lehm. PI. Preiss.* i. 852.—Austral.
cuneata, F. Muell. Census, 103 = Pityrodia cuneata.
dilatata, F. Muell. Fragm. vi. 167 = Pityrodia dilatata.
Elderi, F. Muell. L ex. 18 = Hemiphora Elderi.
glandulosa, *R. Br. Prod.* 514.—Austral,
halganiacea, *F. Muell. Fragm.* x. 14.—Austral.
hemigenioides, F. Muell. L c. vi. 156 = Pityrodia hemigenioides.
lavandulae/olia, Sieber, ex Spreng. Syst. ii. 756 = Stoechadis.
lepidota, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* iii. (1888) 8.—Austral.
Lewellini, *F. Muell. Fragm.* viii. 50.—Austral,
loricata, *F. Muell. 1. c.* x. 14.—Austral.
loxocarpa, F. Muell. 1. c. ii. 22=Pityrodia Drummondii.
Oldfieldii, F. Muell, 1. c. i. 234=Pityrodia OldfieWii.
paniculata, F. Muell. 1. c. iv. 80-Pityrodia paniculata.
parviflora, *Walp. Rep.* iv. 58.—Austral,
rosmarinifolia, *A. Cunn. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 352. —Austral.
salvifolia, F. Muell. Census, 108 = Pityrodia salvifolia.
stachyodes, F. Mnell. Fragm. v. 50; vi. 158 = Pityrodia racemosa.
Stoechadis, *R. Br. Prod.* 514.—Austral.
uncinata, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 194 = Pityrodia uncinata.
verbascina, F. Muell. Fragm. i. 238 = Pityrodia verbascina.

CHLOERUM, Willd. ex Spreng. Jahrb. i. III. 74 (1838) = Abolboda, Humb. & Bonpl. (Xyrid.).
gramineum, Willd. ex Kunth, Enum. PL iv. 27—A. Poeppigii.
imberbe, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 352= A. imberbis.

CHLOIDIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 484 (1840) - Coryirfbls, Thou. (Orchid.).
decumbens, Lindl. 1. c.—Bras.
flava, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 644 —Cor. flava.
polystachya, Reichb. £ 1. *c.^vernalis.*
vernalis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 484.—Jamaica.

CHLONANTHES, Ra6n. New FL Am. ii. 20 (1836) = Chelone, Linn. (Scrophul.).
tomentosa, Rafin. 1. c.—Am. bor.

CHLONANTHUS, Rafin. Princ. Somiol. 26 (1814) = praec.

CHLOOPSIS, Blume, Enum. PL Jav. 14 (1827)-Ophiopogon, Ker-Gawl. (Haemodorac).
acaulis, Blume, 1. c. — O. japonicus.
caulescens, Blume, 1. c.=O. japonicus.

CHLOOTHAMNUS, Buese, in Miq. PI. Jungh. 386 (1851-55) = SchizoBtachyum) Nees (Gramin.).
chilianthus, Buese, 1. c 887.—Sumatra.

CHXORA, Ren. ex Adans. Fam. ii. 508 (1763). *GENTIANEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 809.
BLACKSTONIA, Huds. FL Angl. ed. I. 146 (1762), nomen prius.
CKLOROSTIS, Rafin. Princ. Somiol. 26 (1814).
DISINSTVLIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 31 (1836).
PLEURIMARIA, Rafin. 1. c. (1836).
acuminata, Koch & Ziz, Cat. Fl. Palat. 20-serotina.
affinis, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 874 = imperfoliata.
citrina, *Boiss. &• Reut. Pugill. PI. Nov.* 77.—Hispan.
crenulata, Salzm. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent 118 =• imperfoliata.
dodecandra, Linn. Syst. ed. XII. 267 = Sabbatia chloroides.
dubia, Lam. Tabl. Encyc ii. 434= imperfoliata.
exaltata, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 118 - Enstoma silenifolium.
grandiflora, Viv. Con. App> Alt Imperfoliata.

CHLOH.A:—
hybrida, *Trait. Arch.* t. 229.—Europ.
imperfoliata, *Linn.f. Suppl.* 218.—Europ.
intermedia, Tenore, Syll. 565 = perfoliata.
lanceolata, Koch & Ziz, Cat. PL Palat. 20 = imperfoliata.
longifolia, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 434.—Hab. ?
mascariensis, Desf. ex Steud. Nom. ed. 1.190; ed. II. i. 352 = perfoliata.
perfoliata, Goiter, ex Steud. Nom. ed. II. i. 352 = Saponaria Vaccaria.
perfoliata, *Linn. Syst. ei.* XII. 267.—Europ.; As. Min.
quadrifolia, *Linn. I. c.*—Europ. austr.
quadrifoliata, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. I. IS =quadrifolia.
serotina, *Koch, in Reichb. PI. Crit.* iii. 6. t 351.—Europ.; As. Min.
sessilifolia, Desv. in Trav. Soc. Amat. i. (1807) 74. t. 8. f. 2= imperfoliata.
sessilis, Willd. Sp. PL ii. 341 (=Plantaginea?).—Reg. Argent.
sicula, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 819 =perfoliata.
triphylla, *Badaro, in Brugnat. Giorn. Fis.* II. ix. (1826) 166.—Italia.

CHLOKADEMTA, Baill. Etud. Gén. Enph. 471. t. 19 (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 812.
AUENOGYNUM, Zoll. in Linnaea, xxviii. (1856) 825.
discolor, *Baill. 1. c.* 472.—Java.

CHIiOBAEA, Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. Instit. N. S. i. (1827) 47. *ORCMDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 618.
ASARCA, lindl. in Quart. Joum. Roy. Instit. i. (1827) 52.
BIENERIA, Reichb. f. in Bot. Zeit. xi. (1853) 3.1.1.
GAVILLEA, Poepp. & Endl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 666 (1840).
ULANTHA, Hook. Bot. Mag. lvii. sub t. 2990 (1830).
affinis, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* i. (1884) 4.—Chili.
alaris, *Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. Instit.* N. S. i. (1827) 50.—Chili.
alpina, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 17.—Chili,
aurantiaca, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 403.—Chili,
aurea, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 48.—Chili.
Austinae, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 8S = Cephalanthera Oregana.
barbata, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* i. (1884) 5.—Chili.
Besseri, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 862.—Chili.
biserialis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 389.—Reg. Argent.
Bergii, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* ii> (1879) 880.—Reg. Argent.
bletioides, Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. Instit. N. S. i. (1827) 50 = ulanthoides.
calopogon, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 47.—Chili.
campestris, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 15.—Chili-
chlorosticta, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 52.—Chili.
chrysantha, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 15.—Chili,
chrysochlora, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 60.—Chili.
collina, *Phil. 1. c.* 54.—Chili.
Commersonii, *Brongn. in Duperr. Voy. Bot.* 189.—Reg. Magell.
crispa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 401.—Chili,
cristata, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 4.—Chili.
crocata, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 51.—Chili-
cuneata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 400.—Chili,
cygnaea, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 241.—Chili,
cylindrostachya, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil. i6-"* Chili,
dasypogon, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 243.—Chili.
decipiens, Poepp. Fragm. Syn. PL Chil. 17 = cristatti multiflora, Poeppigiana.
densa, *A. Rich, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 454.—Chili,
disoides, *Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy.* /in** N. S. i. (1827) 47.—Chili,
fimbriata, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 49.— Cbili.

CHLOKAEA:-
fimbriata, Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil. 15-Bipinnula mystacina.
Fonkii, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 55.—Chili,
galeata, *Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. Instit.* N. S. i. (1827) 48.—Chili.
Gandichaudii, *Brongn. in Duperr. Voy. Bot.* 189.—Reg. Magell.
Gavilo, *Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. Instit.* N. S. i. (1827) 48.—Chili.
Gayana, *A. Rich, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 439.—Chili.
grandiflora, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 11.—Chili,
gymnoglossa, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 54.—Chili.
heteroglossa, *Reichb.f. I. c.* xxii. (1849) 868.—Chili,
homopetala, *Phil. I. e.* xxix. (1857-58)48.—Chili,
incisa, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 17.—Chili,
inconspicua, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1865) II. 321.—Chili,
lamellata, *Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. Instit.* N. S. i. (1827) 49.-Chili.
Lechleii, *Lindl. in Leckl. Serb. Am. Austr.* 58.—Chili.
Lindleyi, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 18.—Chili,
litoralis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 244.—Chili,
longebracteata, *Lindl. in Brand- Quart. Journ. Roy. Instit.* N. S. i. (1827) 48.—Peruv.
longipetala, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 400.—Chili,
magellanica, *Hook. f. Fl. Antarct.* ii. 350.—Reg. Magellan,
membranacea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 401.—Reg. Argent.
multiflora, *Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. Instit.* i. (1827) 49.—Chili.
nndilabia, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 16.—Chili,
obovata, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 4».—Chili,
odontojjlossa, *A. Rich, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 455.—Chili.
papiUosa, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 50 = cylindrostachys.
PMagonica, *Phil. 1. c.* xxxiii. (1864-65) 245.—Chili.
Pavonii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 404.—Chili.
P<*rcei, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 243.-Chili.
PraicUlata, *Reichb.f. Otia Bot. Hamb.* 51.-Patagon.
PWippi, *Reichb.f. in Linnaea,* xxii. (1849) 8b3.-Chili.
Piquichen, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 400.—Chili.
Poeppigiana, *A. Rich, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 443.—Chili.
Pogonata, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 240.—Chili.
Prodigiosa, *Reichb.f. 1. c.* xxii. (1849) 868.—Chili.
«flexa, *Phil. l. c.* xxix. 11857-58) 51.—Chili,
rypaloglossa, *A. Rich, in C. Gay, fl. Chil.* v. 457.—Chili,
fc<*rcchb. *f. i* Linnaea,* xxii. (1848) 862.-Chili.
!ec»ndal *Phil. I. c.* xxix. (1857-58) 52.—Chili,
seoubaibata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 408.—Chili.
»Peaosa, *Poepp. Fragm. Syn. PI. Chil.* 14.-Chih.
«P«tabili«, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 240.-
suaveolens, *Phil. l. c.* xxix. (1857-58) 46.—Chili.
ulanthoides, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 404.—Chili.
Unguiscati, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 864.—Chili.
3*™°«. *Reichb.f. I. c*—Chili.
*wrucosa, *Phil. I. c.* xxix. (1857-58) 63.-Chili.
^scens, *Lindl. in Brand. Quart. Journ. Roy. instit.* i. (1827) 51.—Chili.
volucris, *Lindl. in Hook. Journ.* Chili.

CHljOaAKTHUS, Sw. in Phil. Trans, lxxvii. 1787. 359. *CHI-ORANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. III 84.
CREODUS, Lonr. Fl. Cochinch. 88 (1790).
CRVPHAEA, Ham. in Brewst. Ldinb. Journ. Sc. ii. XT(1825) 11.
NJGRINA, Thunb. Noy. Gen. 58 (1783).
FEPERIDIA, Reichb. Consp. 212* (1828).
SAINTLEGERIA, Cordem. in Baill. Adansoiua, m. (1862-68) 300.

CHIiORANTHTTS :—
SARCANDRA, Gardn. in Calc. Jonrn. Nat. Hist. vi. (1846) 348.
STROFHA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 4 ; ed. II. 66 (1827).
TRICERCANDRA, A. Gray, in Ferry, Jap, Exped. ii. 318 (1857).
Blumeanus, Cordem. in Baill. Adansonia, iii. (1862-63)296 = serratus.
brachystachys, *Blume, Fl. Jav. Chloranth.* 13. t. 2.—Ind. or.; Malaya; China.
ceylanicus, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 802 = brachystachyus.
denticulatus, Cordem. in Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 296 = brachystachys.
elatior, R. Br. in Bot. Mag. sub t. 2190=officinalis.
erectus, Sweet, Hort. Suburb. Lond. 28 - officinalis,
Fortunei, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 476.—China,
grandifolius, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 802.—Ind. or.
ilictfolim, Blume, ex Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. iii. 12!) = brachystachyus.
inconspicuus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 54 = officinalis.
inconspicuus, *Sw. in Phil. Trans,* lxxviii. (1787) 359. t. 15.—China; Japon.
indicus, Wight, Ic. 1.1945=inconspicuus.
insignis, *Kun,in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 108.—Burma.
integrifolius, Schult. £ ex Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. iii. 130 = Cornus suecica.
japonicus, *Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiv. II. (1829) 681.—China; Japon.
macranthera, *Schult. f. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 130.—Japon.
mandshuricus, Rupr. Dec. PI. Amur. t. 2 *°japonicus.
monander, R. Br. in Bot. Mag. sub t 2190-brachystachyus.
monostachyus, *R. Br. 1. c.* i. 2190.—China.
tnontanus, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 12!) = brachystachyus.
obtusifolius, Miq. Fl. Ind. Bat.i.I. 802 = inconspicuus 1
officinalis, *Blume, Enum. PI. Jav.* 79.—Ind. or.; Malaya.
Oldhami, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 476.—Japon.
Perayanus, *Solms, 1. c.* 474.—China.
quadrifolius, A. Gray, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 129=serratus.
salicifolius, Presl, Epim. Bot. 231=officinalis.
serratus, *Roem. V Schult. Syst.* iii. 461.—Japon.
sumatranus, Miq. Fl. Ind. Bat.Suppl. 343=officinalis.

CHLORASTER, Haw. in Phil. Mag. lxiii.103 (1824) = Narcissus, Tourn. (Amaryllid.).
fissus, Haw. Monog. Narciss. 7 = N. yjridifloras.
integer, Haw. 1. c. = N. viridiflorus.
oblitteratus, M. Roem. Syn. Ensat. 214 = N. Broussonetii.
viridiflorus, M. Roem. 1. c. 213 = N. viridiflorus.

CHLORIS, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 25 (1788).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. £ iii. 1165.
CHLOROIDES, Fisch. ex Regel, in Ind. Sem. Hort. Petiop. (1863) 28.
EUSTACHYS, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1800) 188.
HETE&OLEPIS, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 654 (1881).
MACROSTACHYA, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 408, in nota (1851).
PHACELLARIA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 853, in syn. (1840); ii. 318 (1841).
SCHUI.TESIA, Spreng. P»gill. ii. 17 (1816).
abyssinica, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 406.—Abyssin.
acicularis, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 31.—Austral.
acuminata, Trin. Sp. Gram. iii. t. 306 = distichophylla.
alba, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 289 = elegans.
Alberti./frjW, in *Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 650.—Mongolia,
amethystea, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 205.—Abjsiin.
andropogonoides, *Fourn. Mex. PI. Enum. Gram.* 148 ; *ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 668.—Mexic.
anoplia, *Fourn. I. c.; ex Hemsl. 1. c.*—Mexic
Aristida, Salzm. ex Sttud. Syn. PI. Gram. 218-Gymnopogon foliosns.
arundinacea, Nees, ex Stead. 1. c. 207 = polydactyU.

CHLOBIS :—
bahiensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 208.—Bras,
barbata, Sw. *Fl. Ind. Occ.* i. 200.—Reg. trop.
Beyreichiana, Steud. Nom. ed. II. i. 853=seq.
Beyrichana, Kunth, Rev. Gram. i. 89, 28S. t. 56 = radiata.
brachystachys, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 556.—Air. trop.
brevigluma, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 191.—las. Cuba.
breniseta, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 666.—Afr. trop.
campulodes, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 353, nomen.—Hab. ?
caribaea, Spreng. Syst. i. 295 = barbata.
caudata, *Trin. ex Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 70.—China.
ciliata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 25.—Am. troo.
compressa, *DC. Cat. PI. Hort. Monsp.* (1813) 94.—Am. austr.
confertifolia, Trin. in Spreng. NeneEntdeck. ii. 74-.distichophylla.
consanguinca, Kunth, Rev. Gram. i. 89 = polydactyla.
crinitn, *Lag. Varied. Gene.* ii. IT. (1805) 143.—Ins. Philipp.
crinita, Salzm. ex Doell, in Mart. Fl. Bras, il ill. 64 = radiata.
cruciata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 25.—Ind. occ.
cryptostachya, *Steud. ex J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd, Ins.* 148.—Ins. Cap. Verd.
ctenioides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 428.—Madag.
cucullata, *Bisch. in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. xix. (1853) 357.—Mexic.
curtipendula, Michx. Fl. Bor. Am. i. 59 = Bouteloua racemosa.
Cynodon, Trin. Gram. Unifl. 229 = Cynodon Dactylon.
cynodontoides, *Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xix. (1872) 318.—N. Caled.
decora, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 205 = barbata.
Digitaria, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 168 = Leptochloa Digitaria.
digitata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 207.—Ind. or.
distachya, Kunth, Rev. Gram. i. 291. t. 57 - monostachya.
distichophylla, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 4.—Am. austr.
divaricate, *R. Br. Prod.* i. 186.—Austral.
dolichostachya, Lag. Gen. et Sp. Nov. 5=truncata.
dubia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 169 ^ Diplachne dnbia.
Durandiana, Schult Mant. ii. 841=virgata.
elata, *Desv. Opusc.* 73.—Bras.
elegans, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 186 Mexic
eleusinoides, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 589.—Ind. occ.
elongata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 236 > trancata.
emarginata, *Beauv. Agrost.* 158, nomen.—Hab. I
equitans, *Trin. Sp. Gram.* iii. t. 809.—Hab. I
falcata, Sw. in Ges. Naturf. Frcunde, Neue Schr. iii. (1801) 160 *(=Campulosusfalcatus).~ASr.* austr.
fasciculata, Schrad. in Schult. Mant. ii. 889=- distichophylla.
filiformis, Hort. Par. ex Poir. Encyc Snppl. ii. 287, *a.* 8 = Bouteloua tennis,
filiformis, *Poir. I. c.* 288, n. 12.—Hab. ?
flocdfolia, Poir. 1. c.=Eleusine floccifolia.
floridana, *Vasey, Cat. Gram. Un. St.* 61.—Florida.
foliosa, Willd. Sp. PI. iv. 924 » Gymnopogon foliosus.
Gayana, *Kunth, Rev. Gram.* i. 89, 293. t 58.—Afr. trop.
geminata, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 205.—Abyssin.
glabiata, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 557.—Afr. trop.
glauca, *Vasey, Cat. Gram. Un. St.* 61.—Florida,
glaucescens, *Steud. Syn. PI. Gram.* 206.—Pernv.
gracilis, P. Darand, Chlor. 10=virgata.
gracilis, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 168=Leptochloa gracilis.
Gryllus, Honck. Syn. 11. Germ. i. 437 = Chrysopogon Gryllus.
guineensis, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 55.—Afr. trop.
hispida, *P. Durand, Chlor.* 17.—Ins. Philipp.
Hnmboldtiana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 205.—Int. Cuba.

CBCLORIS:—
humilis, Kunth, Rev. Grain, i. 89; ii. 5S1. t. 180 = radiate.
imberbis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 15 = submutica.
incompleta, *Roth, Nov. PI. Sp.* 60.—Ind. or.
inermis, *Trin. Gram. Unifi.* 282.—Mexic
inflate, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 105.—Calif.; Ins. Philipp.
intermedia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 407.—Abyssin.
leptostechya, *Hochst. ex A. Rich. I. c*—Abyssin.
longibarba, *Michx. ex Beauv. Agrost.* 158, nomen.—Am. bor.
longifolia, *Steud. Syn. PL Gram.* 205.—Ins. Philipp.
macrantha, *Desv. Opusc.* 78.—Arabia.
macrantha, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 42 (= Tetrapogonis sp.).—Arabia.
macrostachya, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 408 = Enteropogon macrostachya.
madagascariensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 206.—Madag.
maritima, Trin. Gram. Unifl. 236 = Cynodon Dactylon.
meccana, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 205.—Aegypt.; Arabia; Beluchist.
megastachya, Schrad. ex Schalt. Mant. ii. 340 = truncata.
mendocina, *Phil. Serf. Mend. Alt.* 50.—Chili.
monostackya, Michx. Fl. Bor. Am. i. 59 = Ctenium carolinianum.
monostachya, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 288.—Ind. or.; Ins. Mascar.
montana, *Roxb. Hort. Beng.* 82; *Fl. Ind.* i. 829.—Ind. or.
Moorei, F. Mnell. in Iinnaea, xxv. (1852) 444 = acicularis.
mucronata, Michx. Fl. Bor. Am. i. .69 - Eleusine aegyptiaca.
multiradiata, *Hochst. in Flora,* xxxviU. (1855) 204.—Abyssin.
myriostachya, *Hochst. I. c.*—Afr. trop.
notocoma, *Hochst. I. c*—Abyssin.
obtnsifolia, *Desv. Opusc.* 73.—Bras,
obtnsifolia, *Trin. Gram. Unifl.* 283.—Ins. Philipp.
orthonoton, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 64.—Bras,
pallida, *Hack. inEngl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 244.—Austral.
pallida, Willd. Sp. PI. iv. 926=radiata.
panicea, *Willd. I. c.* 923.—Ind. or.
paraguaiensis, Stead. Syn. PI. Gram. 204=barbata.
paspaloides, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 206.—Abyssin.
paytensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 207.—Peruv.
pectinate, *Benth. Fl. Austral,* vii. 612.—Austral.
pendula, Salzm. ex Stead. Syn. PI. Gram. 208 = bahiensis.
penicillata, Jan, ex Trin. Gram. Unifl. 231 = compressa.
penicillata, *Pers. Syn.* i. 87.—Ind. or.
penicillata, Willd. ex Stend. Norn. ed. II. i. 853 = elegans.
peregrins, *P. Durand, Chlor.* 11.—Ins. Philipp.
petraea, Sap. *Prod. Veg. Ind. Occ-* 25.—Reg. trop.
pilosa, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 55.—Afr. trop.
piperita, Michx. ex Stend. Norn. ed. II. i. 353 = Ctenium carolinianum.
poaeformis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 169 = Leptochloa virgata.
polydactyla, P. Durand, Chlor. 14, 22=virgata.
polydactyla, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 26.—Am. austr.
polystachya, Lag. Gen. et Sp. Nov. 4=ineimi», Leptochloa virgata.
polystachya, *Roxb. Hort. Beng.* 82 ; *Fl. Ind.* i. 880.—Ind. or.
Prienrii, *Kunth, Rev. Gram.* i. 89; ii. 441. t. 184.—Afr. trop.
procumbens, P. Durand, Chlor. 16 •= Boutelona tennis,
propinqua, *Steud. Syn. PL Gram.* 204.—Guadaloupe.
prostrata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 239 =» Eleusine aegyptiaca.
pubescens, *Lag. Varied, dene.* ii. IV. (1805) 148.—Peruv.
pubescens, *Peyr. in Sitgb. Acad. Wien, Math. Nat.* xxxviii. (1860) 585.—Am. austr.

CHLORIS:—
pulchra, *Schum. b" Thonn. Beskr. Guin. PI.* 56.—Afr. trop.
Pumilio, *R. Br. Prod.* 186.—Austral,
punctnlata, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 205.—Afr. trop.
pyenothrix, Trin. Gram. Unifl. 234 = radiata.
radiata, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 61 = incompleta.
radiata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 26.—Am. trop.
repens, Auct. ex Steud. Norn. ed. II. i. 353 = Eleusine indica.
repens, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 204.—Abyssin.
retusa, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 5.—Reg. Argent,
rhachibicha, *Steud. Syn. PI. Gram.* 205.—Ins. Philipp.
Roxburghii, Edgew. in Joom. As. Soc. Beng. xxi. (1858) 183=digitata.
Roxburghiana, Schult. Mant. ii. 289 = polystachya.
rufescens, *Lag. Varied, dene.* ii. IV. (1805) 143.—Ins. Philipp.
rufescens, *Steud. Syn. PI. Gram.* 206.—Ins. Manrit.
Sagraeana, *A. Rich. Fl. Pub. Fanerog.* ii 815.—Ins. Cuba.
Salamanni, Stead. Syn. PL Gram. 206=radiata.
scariosa, *Beauv. Agrost.* 158, nomen.—Hab.?
scariosa, *F. Muell. Fragm.* vi. 85.—Austral.
sclerantha, Iindl. in Mitch. Joum. Trop. Austral. 31 =ventricosa.
scoparia, Desf. TabL ed.J. 14-radiata.
simplex, *Schum.* b* *Thonn. Beskr. Guin. PI.* 54.—Afr. trop.
spathacea, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 204.—Abyssin.
subbiflora, *Steud. I. c.* 206.—Am. bor.
subdolichostachya, *C. Muell. in Bot. Zeit.* xix. (1861) 841.—Am. bor.
snbmutica, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 167. t. 60.—Mexic.
subtriflora, *Steud. Syn. PI. Gram.* 208.—Afr. trop.
Swartziana, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 68.—Bras.
Svartni, C. MnelL in Bot. Zeit. xix. (1861) 341 = .petraea.
tacnensis, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 86.—Perav.
tenella, *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 82; *Fl. Ind.* i. 329.—Ind. or.
tenuior, Poir. ex Schult. Mant. ii. 321 = Leptochloa cynosuroides.
tennis, Poir. Encyc. Suppl. v. 614 » Boutelona tenuis.
tetrameris, Trin. Gram. Unifl. 235 = Cynodon elongatus.
Tetrapogon, Beauv. Agrost. 158=Tetrapogon villosns.
triangulate, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 409.—Abyssin.
truncate, *R. Br. Prod.* 186.—Malaya; Austral,
unispicea, /'. *Muell. Fragm.* vii. 118.—Austral,
ventricosa, *R. Br. Prod.* 186.—Austral.
villosa, Pers. Syn. i. 87=Tetrapogon villosns.
virgata, P. Durand, Chlor. 10=radiate,
virgata, *Sw. FL Ind. Occ.* i. 203.—Am. trop.
Wightiana, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 206 = incompleta.

CHLORIZA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 21 (1866) . Laohenalia, Jacq. (Liliac).
fragrans, Salisb. 1. c. =L. verslcolor.
ludda, Salisb. 1. c = L. lucida.
mediana, Salisb. 1. c = L. mediana.
pallida, Salisb. 1. c.-L. pallida.
pustulata, Salisb. 1. c.» L. pustulate.
unicolor, Salisb. 1. c.=L. versicolor.

CHLOROCAULON, Klotzsch, in EndL Gen. Suppl. iv. in. 89 (1860)-Argithamnia, Sw. (Euphorbiac).

CHLOROCHLAMYS, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 142 (1868-69) =l£arBdenla, R. Br. (Ascfepiad.).
celebica, Miq. 1. c—Ins. Celebes.

CHLOROCODON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 113-Erica, Toum.
scoparium, Fourr. I. c. = E. scoparia.

CHLOROCODON, Hook. f. Bot. Mag. L 5898 (1&71). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 745.
Whiteii, *Hook./. I. c*—Afr.-austr.

CHLOROCREPIS, Griseb. in Goett. Abh. v. (1852; 155 = Hieracium, Linn. (Compos.).
statici/olia, Griseb. 1. c.= H. steticefolium.

CHIIOROGAIIUIC, Kunth, Enum. PI. iv. 681 (1848). *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 785.
LAOTHOB, Rafin. Fl. Tellur. iii. 63 (1836), nomen prius.
uagvstiioMum, Kellogg, inProc. Calif. Acad. ii. (1863) 104. t. 30.—Calif.
divaricatum, Kunth, Enum. PL iv. 682-pomeridianum.
Leichtlinii, *Baker, in Gard. Chron.* (1874) I. 689.—Am. bor. occ.
parviflorum, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 243.—Calif,
pomeridiannm, *Kunth, Enum. PI.* iv. 682.—Calif.

CHLOROIDES, Fisch. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 28 = Chloris, Sw. (Gramin.).
petraeum, Fisch. L cChloris petraea.

CHLOROMYRON, Pers. Syn. ii. 73 (1807)=Kheedift, Linn. (Guttifer.).
verticillatum, Pers. 1. c.=R. acuminate.

CHLOROPHORA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 608, in nota (1826). *URTICACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 363.
tinctoria, *Gaudich. 1. c.*—Mexic.

CHLOROPHYTTTM, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. t. 1071 (1808). *LILIACEAE,* Benth.& Hook. f. iii. 788.
ASPHODELOPSIS, Stend. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xv. (1876) 321.
HARTWEGIA, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xv. n. (1831) 872.
HOLLIA, Heynh. Norn. ii. 303 (1846).
SCHIDOSPERMUM, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 66 (1857).
abyssinicum, Kotschy & Peyr. PI. Tinn. 46 = laxiflorum.
acaule, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 327.—Ind. or.
affine. *Baker, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 160. t. 104.—Afr. trop.
Afzelii, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 323.—Afr. trop.
alismaefolium, *Baker, 1. c.* 824.—Afr. trop.
alpinum, *Benth. ex Baker, 1. c.* 328.—Ins. Tasrnan.
amplexicanle, *Baker, I. c.* 825.—Afr. trop.
andongense, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878; 260.—Afr. trop.
anthericoideum, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1860) 141 = tuberosum.
arundinaceum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1878) 323.—Ind. or.
attenuatum, *Baker, I. c.* 332.—Ind. or.
blepharophyllum, *Schweinf. ex Baker, I. c.* 827.—Abyssin.
Bowkeri, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* t. 352.—Afr. anstr.
bracteosum, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 260 = stenopetalnm.
Brehmeanum, *Schult. f. Syst.* vii. 454.—Afr. austr.
breviscapum, *Dale, in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 141.—Ind. or.
Burchellii, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1876) 380.—Afr. austr.
ciliatum, .Safer, *in Joum. Bot.* xvi. (1878) 825.—Afr-trop.
comosum, Baker, in Gard. Chron. (1873) 75=Sternbergiamun.
crispum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 881.—Afr. austr.
debile, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 260.—Afr. trop.
decipiens, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 275.—Madag.
dubium, Schult f. Syst. vii. 455 = Anthericum Schultesii.
elatum, *R. Br. Prod.* 277.—Afr. anstr.
falcatum. Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 338=1«florum.
filipendulum, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II- (1878) 260.—Afr. trop.
Finlaysonianum, Wall. Cat. n. 5061 (Dracaenae sp.)—Siam.

CHLOBOPHYTTTM.—
gallabatense, Schweinf. ex Baker, in Jonn. linn. Soc. xv. (1876) 325 = Orchidastnim.
glaucum, *Dolt, in Hook. Km Journ.* ii. (I860) 143.—Ind. or.
graminifolium, Kunth, Enum. PI. IT. 606—Anthericnm undulatum.
Hartmanniannm, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 294, nomen.—Afr. trop.
Heyneannm, *Wall. Cat.* n. 5060.—Ind. or.
Heynei, Baker, in Joum. Linn. Soc. xv. (1876) 822-praec
jnornatum, *KerJiawl. in Bot. Mag.* 1.1071.—Afr. trop.
jundfolium, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* x«. (1876) 383.—Bras.
Kirkii, *Baker,in Gard. Chron.* (1882) 1.108.—Afr. trop.
lancifolium, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. 11878) 260.—Afr. trop.
laxiflorum, Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xv. (1876) 928—laxum.
laxum, *R. Br. Prod.* 277.—Trop. As.; Afr.; Austral.
leucolepis, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 259=macrophyllum.
longifolium, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 294, nomen.—Abyssin.
longipes, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 325.—Afr. trop.
macrophyllum, *Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 294.—Abyssin.
"nacrosporum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 330.—Afr. austr.
toadagascariense, *Baker, in Journ. Bot.* xvL (1878) 328.—Afr. trop.
"nalabaricum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 331.—Ind. or.
nucranthnm, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 325.—Afr. trop.
nwdestum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1878) 829. ...—Afr. austr.
nepalense, *Baker, I. c.* 830.—Reg. Himal.
"tmmmii, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (I860) 142 ""Orchidastrum.
Orchidastram, *Lindl.Bot. Reg.* t813.—Ind. or.; Afr.trop.
("mflorum, Dak. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 141 = laxum.
P^Pfetum. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 826.—Afr. trop.
Polyrhizon, *Baker, in Gard. Chron.* (1878) II. 386.—A&. trop.
Polystachys, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 826.—Afr. trop.
pulch.—Afr. trop.
ellum, Kunth, Enum. PI. iv. 605=Anthericum pulchellum.
P u n f e *Sen"* «"*f- ac Baker, in Joum. Bot.* xvi. . .(W78) 826.-Afr. trop.
'"uomatosum, *Baker, in Gard. Chron.* (1885) II. 230. .—Afr.trop.
"*eidum,* Kunth, Enum. PL iv. 604=Anthericum ngidum.
^ *Vatke, in Bremen Abh.* ii. (1885) —3.—Ins. Nossi W.
Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 326.—Peruv.
spansiflorum, Baker, I. c. 826.-A&. trop.
stenopetalum, Baker, I. c. 881.—Afr. trop.
Sternbergianum, Steud. Norn. ed. II. i. 354.—Afr. austr.
suffruticosum, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 826.—Afife.
te. hylluni, Baker> >« *Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 828 Tinne.—Abyssin.
triflorum, Baker, I. c. 888.-Afr. trop.
tri orum. K™*' Enum. PI iv. 606= Anthericnm t *Oet?satD, Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 332. K« *Ind.* r- '• Abyss.
*v*ti,.um* Wali. Cat. "• 6069=nepalense.
.-Afr trop. *Baker> in y°urn. Linn. Soe.* xv. C1878) 828-
"^°**l». Kunth, Enum. PI. iv. 606 = Anthericom
xeri.osuni, F.

CHLOROPHYTUM, Muell. Fragm. i. 68-laxum.
=Spermacoce, Pohl, ex DC. Prod, iv, 540 (1830)
nervosum, Pohl, 1. c. 548 = S. Poaya.
pratense, Pohl, l.c.-S.Poaya.

CHLOROPYRON, Behr, in Proc. CaUf. Acad. i. (1855) 61=CoPdylanthu8, Nutt (Scrophul.).
palustre, Behr, L c.«Cordylanth«s maritimus.

CHLOBO8A, Blume, Bijdr. 430. t. 31 (1825). *ORCHWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 616.
gracilis, *Blume, I. c.*—Java.
Utifolia, *Blume, I.* r.—Java.

CHZiOBOBFATHA, Engl. in Regel, Gartenfl. (1878) 97. t. 933. *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 977.
Kolbii, *Engl. I. c.*—*V.* Granat

CHLOROSTEMMA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N.S. xvi. (1868) S98=Asperu!a, Linn. (RubUc).
odoratum, Fourr. 1. c - A. odorata.

CHLOROSTIS, Rafin. Princ. Somiol. 26 (1814)-Chlora, Ren. (Gentian.).

CHLOEOXTIiON, Rumph. ex Scop. Introd. 208 (1777); DC. Prod. i. 625 (1824). *MEUACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 840.
Dupada, Buch.-Ham. Joum. Mysore, i. 184-Boswellia serrata.
Swietenia, *DC. Prod.* i. 625.—Ind. or.

CHLOROXYLUM, P. Br. Hist. Jamaic. 187. t. 7. f. 1 (1756); Adans. Fam. ii. 303 (1763) (Quidt).

CHLORYLLIS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 149 (1835)-DollchOB, Linn. (Legumin.).
pratensis, E. Mey. 1. c.=D. Chloryllis.

CHNOANTHUS, Phfl. in Anal. Univ. Chili (1862) II. 406 = Gomphrena, Linn. (Amarantac.).
mendocinus, Phil. 1. c.; et in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 223.—Chili.
ovatus, Phil. Sert. Mend. Alt. 41.—Chili.

CHOCHO, Adans. Fam. U. 500 (17«3)-8«*lum, P. Br. (Cucurbit.).

CHODONDENDRON, Bosc, Encycl. Aerie, vii. 296 (1822), sphalm. = Chondodendron, Ruiz & Pav. (Menispermac.).

CHOENOMELES, Lindl. in Traus. Linn. Soc. xiii. (1822) 97-PyrilB, Linn. (Rosac.).
alba, Cm. in Rev. Hortic. (1876) 410=P. japonica.
cancellata, Pritz. Ic Ind. i. 250, sphalm. = P. sinensis, *Pair.*
japonica, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 97 = P. japonica.

CHOERADODIA, Herb. Amaryll. 87 (1837) = Strumaria, Jacq. (Amaryllid.).
chilensis, Herb. L c. = S. chilensis.

CHOERADOPLECTRON, Schau. in Nov. Act. Nat Cur. xix. Suppl. i, (1843) 436=Habenarla, WUld. (Orchid.).
Spiranthes, Schau. 1. c. = H. lacertifera.

CHOEROPHILLUM, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 147 (1768)^ChaerophyUum, Hoffm. (Umbell.).

CHOEROSERIS, Link, Haudb. L 798 (1829)=PioriB, Linn. (Compos.).
heterosperma, Link, 1. c. 799 = Crepis Dioscoridis.
rhagadioloides, Link, 1. C.-P. Sprengeriana.
Sprengeriana, Link, 1. c.=P. Sprengeriana.

CHOETOPHORA, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 648 (1879), sphaIm.-CHAETOSPORA, R. Br.» Schoenus, Linn. (Cyperac).

CHOIBYA, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vi. 4. t. 513 (1828). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 29?.
JVLIANIA, La Llave, in La Iiave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc ii. 4 (1825).
PLENCKIA, Mof. *8c* Sesse, ex DC. Prod. i. 724 (1824).
grandifiora, Regel, Gartenfl. (1876) 257; in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 336 = temata.
temata, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 6. t. 618.—Mexic.

CHOMELIA, Jacq. Enum. PI. Carib. 1 (1760). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 103.
ANISOMERIS, Presl, Symb. Bot. ii. 5. t. 64 (1833).
angustifelia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 235.—Guiana,
anisomeris, *Muell. Arg. in Flora,* lviU. (1876) 451.—Bras,
barbinervis, *Moric, ex Benth. in Linnaea,* xxiii. (1860) 446.—Bras,
brasiliana, *A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1884) 183, partim.—Bras.
brasiliana, A. Rich. 1. c partim=Vanthieri.
estreUana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 462.—Bras.
fasciculata, *Sn. Fl. Ind. Occ* i. 288.—Jamaica,
filipes, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1862) 41.—Nicaragua,
hirsuta, *Gardn. in Hook. Lend. Journ. Bot.* iv. (1846) 107.—Bras,
intercedens, *MueU.Arg. in Flora,* IviiL (1875) 461.—Bras.
malaneoides, *Muell. Arg. 1. c.* 452.—Bras.
Martiana, *Muell. Arg. 1. c.* 451.—Bras,
obtosa, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea,* iv. (1829) 186.—Bras.
obtusa, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 71 = Martiana.
occidentalis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 452.—Bras,
odoratissima, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* S84, nomeq.—Hab. t
oligantha, *Muell. Arg. in Flora,* IviiL (1876) 452.—Bras,
parviflora, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 41.—Bras,
pedunculosa, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1860) 446—Bras.
Pohliana, *Muell. Arg. in Flora,* IviiL (1876) 462.—Bras,
pubescens, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea,* iv. (1829) 187.—Bras,
ribesioides, *Benth. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 88.—Bras.
sandvicensis, *A. Gray, I. c.*—Ins. Sandvic.
sericea, *Muell. Arg. in Flora,* IviiL (1876) 461.—Bras,
sessilis, *Muell. Arg. I. c*—Bras,
spinosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 12.—Venezuela,
tenuiflora, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 285.—Guiana,
transiens, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 467.—Bras.
triacantha, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 183.—Cuba,
tristis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 452.—Bras.
Vauthieri, *Muell. Arg. I. c*—Bras.
versicolor, Spreng. Syst. i. 410-Soolosanthus venicolor.
vulpina, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 452.—Bras.

CHOMELIA, Linn. Gen. ed. I. 55 (1737); cf. Richter, Codex Linn. 183-Tarenna, Gaertn. (Rubiac.).

CHOMELIA, Veil. Fl. Flum. i. t 107 (1827)-IUX, Tourn.
amara, Veil. 1. c—Bras.

CHONA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 165=Erica, Linn.
sanguinea, D. Don, 1. c = E. Nivenia.

CHONAIS, Salisb. Gen. PI. Fraem. 136 (1866)-Hip. peastruin, Herb. (Amaryllid.).
vittata, Salisb. 1. c.—H. vitUtum.

CHONDODENDRON, Benth. ft Hook. f. Gen. i. 84 (1862), sphalm. = Odontocarya, Miers (Mcnisperm.).

CHOITDODETIDBOlf, Ruiz ft Pav. Prod. 182" (1794). *MENISPERMACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 963.
BOTRYOFSIS, Miers, in Ann. ft Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1861) 43.
aemulum, Miers, L c Ser. III. xix. (1867) 192-pUtyphyllum.
dnerascens, Miers, 1. c. = platyphyllum.
convolvulaceum, Poepp. ft Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 — tomentostun.

CHONDODE2TDRON:—
cretosum, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. III. xix. (1867) 192.—Perav.
hederifblium, Mien, 1. c. Ser. II. vik (1851) 44 = tomentosum.
nemophilnm, *Miers, Cotitrib.* Si. 819.—Bras,
obscurnm, *Miers, I. c.* 814.—Bros.
OTatnm, *Miers, in Ann. <f Mag. Nat. Hist.* Ser. III. xix. (1867) 192.—Bras,
platyphyllum, *Miers, I.* c—Bras.
scairum, Mien, 1. c. Ser. II. vii. (1851) 14=tomentosum.
tamoides, *Miers, I. e.*—Guiana,
tomentosum, *Ruii* b" *Pav. Syst. Veg.* 261.—Perav.

CHONDRACHNE, R. Br. Prod. 220 (1810)- Lepironia, Rich. (Cyperac.).
articulata, R. Br. 1. c - L. mucronata.

CHONDRACHYRUM, Nees. in Lindl. Introd. Nat Syst. ed.II. 449 (1886)=Meliea, Linn. (Gramln.).
scabrum, Nees, 1. c. 450.—Bras.

CHOXTDRXLLA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1785); Gen. ed. I. 241 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 524.
CALYCOCORSUS, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. 271 (1795).
PELTIDIUM, Zollikof. Nat. Anz. (1820); Bartl. Ord. 145 (1880).
WIBELIA, Roehl. Deatschl. Flora, ii. 426 (1818).
WILLEMETIA, Neck. Elem. i. 50 (1790).
ZOLLIKOFERIA, Nees, in Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ii. 805 (1825).
acanthifolia, Poir. Encyc. Suppl. ii. 830 -Lactuca acanthifolia.
acantkolepis, Boiss. Diagn. Ser. I. zi. 48 =juncea.
acanthophylla, Borckh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 271 =juncea.
alba, Lam. Encyc. ii. 79 » Prenanthes alba.
altissima, lam. 1. c. 78 - Prenanthes altissima.
ombigua, Fisch. ex Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 898-paudflora.
angustissima, Hegetschw. Fl. Schw. 762=juncea.
aspera, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 329.—Hab. I
asplenifolia, Poir. 1. c. 330. = Launaea aspleniifolia.
auriculata, Wall. Cat n. 3269 = Lactuca dissecta.
brevirostris, *Fisch. tf Mey. Ind. Sem. Hart. Petrop.* ili. 82.—Sibir. altaic
canescens, *Kar. W Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 897.—Soongar.
capitata, Sieber, ex DC. Prod. vii. 180 -- Launaea glomerata.
ckinensis, Poir. Encyc. Suppl: ii. 881=Lactuca versicolor.
crepidinea, Poir. 1. c. 881=Prenanthes crepidinea.
crepoides, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 462=Lactuca saligna.
crepoides, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 595.—Mont. Pyren.
crepoides, Reich. Fl. Moeno-Francof. 59 =juncea.
cyntosa, Poir. Encyc. Snppl. ii. 880 — Prenanthes cymosa,
debilis, Poir. 1. c 832=Lactaca debilis.
Deeandollei, Sprang, ex DC. Prod. vi. 158-Crepis foetida.
dentata, Poir. Encyc Suppl. ii. 328*°Lactuca denticulata.
erysimifolia, Poir. 1. c. 381-Lactuca muralis.
fontinalis, Wall. Cat. n. 8268=Lactuca polycephala.
Gaudini, Hegetschw. in Suter, Fl. Helv. ed. II. ii. 182—juncea.
glomerata, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 678-juncea.
gracilis, Wall. Cat. n. 8267=Lactuca gracilis.
graminea, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii. 244.—Reg. Caucas. et Himal.; Sibiria.
graminea, Ledeb. Fl. Alt iv. 148=piptocoma.
graminifolia, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 33 = graminea.
hastata, Poir. Encyc. Snppl. ii. 332-Lactuca denticulata.
hastata, Wall. Cat n. 3271-Lactuca hastata.
hieracioides. Roth, in Usteri, Ann. Bot. x. 50= Tolpis coronopifolia.
hispida, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 144=juncea.
hispida, Poir. Encyc Suppl. ii. 828 = Lactuca microcephala.
iUinoiinsis, Poir. 1. c. 381 = Prenanthes aspera.

CHONDHTXZtA:—
indica, Steud. Nom. ed. 1.191=Lactuca Heyneana.
intybacea, Frivald. in Flora, xviii. (1886) 335= juncea.
intybacea, Ledeb. Fl. Ross. ii. 809 = paudflora.
japonica, Lam. Encyc ii. 79= Crepis japonica.
juncea, Ledeb. Fl. Alt. iv. 147=brevirostris.
juncea, Linn. Sp. PI. 796.—Europ.; As. med.
laciniata, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 410 = juncea.
laevigata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii.497=Pyrrhopappus carolinianus.
lanceolata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 329 = Crepis integra.
latifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 244 = juncea.
lejosperma, *Kar.* b* *Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 466.—Sibir. altaic
longifolia, Bnch.-Ham. in Wall. Cat. sub n. 8274 = Lactuca polycephala.
longifolia, Wall. Cat. n. 8273=Lactuca longifolia.
lutea, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 496-juncea.
lyrata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 382=Crepis japonica.
maracandica, *Bunge, in Mint. Sao. Etr. Pitersb.* vii. (1861) 380.—Turkestan.
multiflora, Poir. Encyc. Suppl. ii. 832 = Crepis japonica.
muralis, Lam. Fl. Fr. ii. 105=Lactuca muralis,
nudicaulis, Linn. Mant. 278 = Launaea nudicaulis.
paniculata, Lam. Encyc ii. 78=prenanthoides.
paudflora, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1833) 180=Pyrrhopappus pauciflorus.
paudflora, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 148.—Rossia; Sibiria.
Peltidium, *Moritx, Fl. Schw.* 361.—Europ.
phaeocephala, *Rupr. Sert. Tiansch.* 59.—As. centr.
piestocarpa, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 793.—Persia.
pinnata, Lam. Encyc. ii. 79=Sonchus leptocephalus.
pinnatifida, Poir. Encyc. SuppL ii. 330-Prenanthes cymosa.
piptocoma, *Fisch. Mey. tf Avi-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* viii. 54.—Sibir. altaic.
Prenanthes, Steud. Nom. ed. I. 191 =seq.
prenanthoides, *Vill. Voy.* (1812) 16.—Europ.
pulchra, Lam. Fl. Fr. ii. 106=Phaecasium lampsanoides.
purpurea. Lam. 1. c. 105=Prenanthes purpurea.
pusilla, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 11.—Persia; Turkestan.
racemosa, Poir. Encyc Suppl. ii. 831= Lactuca Heyneana.
ramosissima, *Sibth.* b[1] *Sm. Fl. Grace. Prod.* ii. 128.—Graecia.
ramosissima Zeyher, ex DC. Prod, vii 176=Lactuca viminea,
Rauillieri, Walp. Rep. ii. 694, sphalm. = Rouillieri.
repens, Lam. Encyc ii. 79 = Lactuoa repens.
rhombifolia, Humb. ex Willd. Sp. PI. iii. 1535-86 = Prenanthes rhombifolia.
rigens, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 271 = juncea.
Rouillieri. *Kar.* b" *Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 456.—Sibir. altaic.
rubicunda, Poir. Encyc. Suppl. ii. 829=Prenanthes alba.
ruderalis, Gaertn. ex Steud. Nom. ed. I. 191, 655-Lactuca muralis.
runcinata, Wall. Cat. n. 8272 = Crepis japonica.
sagittata, Wall. 1. c. n. 3270 = Lactuca sagittarioides.
sarmentosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 629=Launaea pinnatifida.
Schraderi, Steud. Nom. ed. II. ii. 398, in syn.« aspera.
secunda, Royle, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 276 - Launaea secunda.
Sessaeana, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1888) 180 = Pyrrhopappus Sessaeanus.
sessiliflora, Lam. Fl. Fr. ii. 104=Lactuca viminea.
setulosa, *C. B. Clarke, ex Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 402.—Himal. bor. oec.
sonchifolia, Poir. Encyc. SuppL ii. 830-Lactuca Heyneana.
soongarica, *Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) I. 179.—Soongar.
squarrosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 332=Lactuca brevirostris.
stipitata, *Sch. Bip. in Linnaea,* xv. (1841) 653.—Europ.
stricta, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 146.—Sibir. altaic.
tenuifolia, Lam. Encyc. ii. 78 = Prenanthes purpurea.
tenuis, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8274-Lactuca polycephala.

CHOZTDRHIIIA:—
triquetra, Steud. Nom. ed. I. 191; ed. II. i. 354 = Lactuca triquetra.
mrsicolor, Sch. Bip. in Mas. Senckenb. iii (1845) 49, in obs. 2=Lactuca Fischeriana.
viminea, Lam. Encyc. ii. 27 = Lactuca viminea.
virgata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 328=Prenanthes virgata.
virgata,}. 8c C. Presl, Delic. Prag. 116= juncea.
visedsa, Gilib. Fl. Lituan. i. 232= juncea.

CHONDROCARPUS, Nutt. Gen. Am. ii. in corrigend. (1818)=Hydrocotyle, Linn. (Umbellif.).
asiaticus, Nutt. 1. c—Cf. i. 177 = H. asiatica.
erectus, Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 426, sphalm. = H. repanda.
repandus, Nutt. Gen. Am. ii. in corrigend.—Cf. i. 177 = H. repanda.
sibthorpioides, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 185 = H. rotundifolia.
triflorus, Nutt. Gen. Am. ii. in corrigend.—Cf. i. 177 - H. asiatica.

CHONDROCARPUS, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc. iv. (1882) 268-Astragalus, Toum. (Legumin.).
brachycarpos, Stev. 1. c —A. brachycarpus.
clavatus, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 149-A. clavatus.
elongatus, Stev. 1. c iv. (1832) 268 = A. elongates.
incurvus, Stev. 1. c. = A. incurvus.
macrorhiius, Stev. 1. c — A. macrorrhizus.
nummularioides, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 149 = A. nummularioides.
platyphyllus, Stev. 1. c.=A. platyphyllus.

CHONDROCHILUS, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 711 = Chaetanthera, Ruiz & Pav. (Compos.).
crenatus, Phil. 1. c—Chili.
involucratus, Phil. Fl. Atac. 27.—Chili.
parvifolius, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 114.—Chili.

CHONDROLAENA, Nees, Fl. Afr. Austr. Gram. 133 (1841) -Prionachne, Nees (Gramin.).
dentata, Steud. Nom. ed. II. i. 355, sphalm. = seq.
phalaroides, Nees, Fl. Air. Austr. Gram. 134 - P. Ecklonii.

CHONDRODENDRON, Spreng. Syst. ii. 155, in syn. (1825) = Chondodendron, Ruiz & Pav. (Menisp.).

CHONDROLOMIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.173 (1842)-Scleria, Berg. (Cyperac).
Selloviana, Nees, 1. c. 174 = S. Sellowiana.

CHONDROPETALUM, Rottb. Progr. 12 (1772); Desc 10. t. 3 (1773) = Elegia, Linn. (Restiac).
deustum, Rottb. 11. cc. = E. deusta.
nudum, Rottb. 11. cc. 12, 11-K nuda.
tectorum, Rafin. Fl. Tellur. iv. 88=E. deusta.

CHONDROPIS, Rafin. Fl. Tellur: iii. 29 (1886) " Ezaoum, Linn. (Gentian.).
trinervis, Rafin. 1. c.=E. zeylanicum.

CHOJTDRORHYTTCHA, Lindl. Orch. Linden. *M* (1846). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 548.
Chestertoni, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1879) H- [e4B>] —N. Granat.
fimbriata, *Reichb. f. in Sound. Refug. Bot.* t. 107-^ N. Granat.
rosea, *Lindl. Orch. Linden.* 13.—Venezuela.

CHONDROSEA, Haw. Saxifr. Enum. 10 (1821) = Saxifraga, Toum.
Avsoon, Haw. L c 11=S. Aizoon.
aiBoopsis, Jord. *8c* Fourr. Ic. PL Eur. ii. 5 - S. Afeoon.
alpicola, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fasc. i. *3** S. Aizoon.
aretioides, Haw. Saxifr. Enum. 14 - S. aretioides.
beugesiaca, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i- 8 S. Aizoon.
brevicaulis, Jord. 8c Fourr. Ic. PL Eur. H. » S. Aizoon.
Burseriana, Haw. Saxifr. Enum. 15=S. Burseriana-
caesia, Haw. I. c. 14=S. cacsia.
calcarea, Jord. *8c* Fourr. Ic. PL Eur. ii. 3-S. Aizoon.
calycifiora, Haw. Saxifr. Enum. 13>=S. media.

CHONDROSEA:—
carthusiana, Jord. *Sc* Fourr. Ic PL Eur. ii. 8- Saxifraga Aizoon.
cartilaginea, Haw. Saxifr. Ennm. 12=S. cartilaginea.
tiapensoides, **Haw.** 1. c. 18 = S. diapensoides.
ftexipes, Jord. & Fourr. Ic. PI. Enr. ii. 8=S. Aizoon.
glabrata, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 34 = S. Aizoon.
glareosa, Jord. & Fonrr. Ic. PI. Eur. ii. 4=S. Aizoon.
gracilescens, Jord. & Fourr. Brev. Fl. Nor. fasc. i. 86= S. Aizoon.
intermedia, Haw. Saxifr. Ennm. 11=S. intermedia.
juniperina, Haw. 1. c 15=S. juniperifolia.
laevigata, Jord. & Fourr. Ic. PI. Enr. ii. 5 = S. Aizoon.
leptopetala, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fasc. i. 84 = S. Aizoon.
longifolia, Haw. Saxifr. Ennm. 11 = S. longifolia.
'tteo-purpurea, Haw. I. c. 13-S. luteopurpurea.
"tutata, Haw. 1. c = S. mntata.
nitida. Haw. 1. c. 16=S. nitida.
•x-ophila, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc i. 88= S. Aizoon.
Patens, Haw. Saxifr. Enum. 14-=S.'caesia.
Patulipes, Jord. & Fourr. Ic PI. Eur. ii. 4-S. Aizoon.
Mrophila, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 34 = S. Aizoon.
Punctillata, Jord. & Fonrr. 1. c. 88=S. Aizoon.
Pusilla, Jord. *Sc* Fourr. Ic PI. Eur. ii. 3 =& Aizoon.
Pyramidalis, Haw. Saxifr. Ennm. 10=S. Aizoon.
**fracta,* Jord. & Fourr. Ic. PL Eur. ii. 4=S. Aizoon.
rosella, Jord. & Fourr. 1. c.=S. Aizoon.
**uularu,* Haw. Saxifr. Ennm. 12=S. Aizoon.
tenella, **Haw.** 1. c 15=S. tenella.
**<>lida,* Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 32 = S. Aizoon.
?ndellii. Haw. Saxifr. Enum. 15=S. Vandelli.
irgata, Jord. & Fourr. Ic. PI. Eur. ii. 4=S. Aizoon.
<ndula, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fasc. i. 33 = o. Aizoon.

CHONDROSIA, Benth. in Jonm. Linn. Soc. xix. (1881) *W*,m.* typ.=seq.

CHONDROSIUM, Desv. Journ. Bot. iii. (1813) 68= seq.

CHONDROSUM, Desv. in Nouv. Bull. Soc.Philom. ii. (1810) 188-Bouteloua, Lag. (Gramin.).
"sthenbornianum, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 692= .o. oligostachya.
Wtatum, Beauv. Agrost 41, nomen-Chloris ciliata, *'lopodum,* To». in Emory, Notes Mil. Reconnois. 158 i?-eriopoda.
**tU,* Fourn. Mex. PI. Enum. Gram. 187, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 564.—Mexic.
foen I« " " " " Torr - in Emory, Notes Mil. Reconnois. 168. t. H - B . hirsute.
*****,. H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 176. t 58 = « • oligostachya:
" " " «». Sweet, Hort. Brit ed. I. 455, nomen=seq.?
" " " • H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 176. t. 59 - B. hirsuta.
Hum oldtianum, Kunth, Rev. Gram. i. 98 = B. bvata.
humile . Beauv. Agrost. 41 = B. prastrata.
K gnnskii, Fourn. Mex. PL Enum. Gram. 187, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 564.—Mexic
" "tachyum, Foum. 1. c. 138, ex Hemsl. 1. c. 562 = » • Polystachya.
offstachyum, Torr. in Marcy, Rep. 300-B. oligo. ptachya.
JJWi Fourn. Mex. PL Enum. Gram. 150, ex HemsL J. V Centr - Am. Bot iii. 562=a polystachya.
p ystachyum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 66=B. polystachya.
procumbens, Desv. in Nouv. Bull. SocPhilom.ii. (1810) 188 = B. tennis,
prostrata M, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 455 = B. prostata.
scorpioides, Kuuth, Rev. Gram. i. 94=B. scorpioides.
simplex, Kunth, l. c. = B. prostrata.
subscorpioides, C. Muell. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 847. —Calif.
tenue, Beauv. Agrost. 41 = B. tenuis.
Virleti «> ronin. Mex. PL Ennm. Gram. 136, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iiL 664.—Mexic.

CHONDROSPERMUM, Wall. Cat. n. 2837 (1882)- **Myxopyrum,** Blume (Oleac).
coriaceum, Wall. I. c. n. 2838 = M. smilacifolium.
laurifolium, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 648 = M. smilacifolium.
smilacifolium, Wall. Cat. n. 2837=M. smiladfolinm.

CHOiraSMOItPHA, G. Don, Gen. Syst iv. 76 (1886).
APOCYNACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 720.
EPICHYSIANTHUS, Voigt, Hort. Suburb. Calc 628 (1845).
antidysenterica, G. Don, 1. c = Holarrhena antidysenterica.
bantamensis, G. Don, 1. c =Echites bantamensis.
convolvuloides, *G. Dan, I. c*—Ins. S. Thomas.
coriacea, G. Don, L c. = Echites coriacea.
cristata, G. Don, 1. c- Aganosma marginata.
densiflora, G. Don, 1. c. = Echites densiflora.
dichotoma, G. Don, 1. c. = Aganouna caryophyllata.
grandiflora, G. Don, 1. c. = macrophylla.
Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iiL 662.—Reg. Himal.
inflata, G. Don, Gen. Syst. iv. 76=Echites inflata.
macrophylla, *G. Don, I. c*—Ind. or. j Malaya,
malabarica, *G. Don, I. c*—Ind. or.
mollis, Miq.Fl. Ind. Bat. ii. 444= macrophylla.
pubescens, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 458= Holarrhena antidysenterica.
reticulata, G. Don, Gen. Syst iv. 76=Cryptolepis Buchanani.
vestita, G. Don, 1. c=Wrightia tomentosa?

CHORETIS, Herb. Amaryll. 219. f. 85 (1837)-Hymenocallls, Salisb. (Amaryllid.).
galvestonensis, Herb. 1. c. 221. t 41. £ 84, 85 = H. galvestonensis.
glauca, Herb. L c 220. t. 85. f. 1 = H. glanca.

OHOEETBtntt, R. Br. Prod. 354 (1810). *SANTALACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 228.
Candollei, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 219.—Austral.
chrysanthum, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet i. (1855) 23=glomeratum.
glomeratum, *R. Br. Prod.* 354.—Austral.
lateriflorum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 675 = Candollei.
lateriflornm, *R. Br. Prod.* 354.—Austral,
oxycladum, *F. Muell. Fragm.* i. 21.—Austral.
pauciflorum, A. DC. in DC. Prod. xiv. 676=Uteririorum.
Preissianum, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 608- Leptomeria Preissiana.
spicatum, *F. Muell. Fragm.* i. 21.—Austral.
spinosum, Miq. inLehm. PL Preiss. i. 609=Leptomeria spinosa.

CHORIBENA, Steud. Nom. ed. II. i. 355 (1840), spbalm. = Chorilaena, Endl. (Rutac).

CHORICARPHA, Boeck. in Flora, xli. (1858) 19 = Iiepironia, Rich. (Cyperac).
aphylla, Boeck. I. a 20=L. mucronata.

CHORICERAS, Baill. Adansonia, xi. (1878) 119 = Diasiliaria, F. Muell. (Enphorbiac).
australiana, Baill. 1. c. 120=D. tricomis ?

CHOBHiAEWA, Endl. Enum. PL Hueg. 17 (1887). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 295.
angustifolia, F. Mnell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 10=Phebalium diosmeum.
hirsuta, *Benth. Fl. Austral.* L 367.—Austral,
myoporoides, *Endl. ex Heynh. Nom.* ii. 140.—Austral,
qnercifolia, *Endl. Enum. PI. Hueg.* 17.—Austral.

CHOHIOPHYLLUM, Benth. in Hook. Ic. Pl.t. 1280 (1829). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 280.
malayannm, *Benth. I. e.*—Malaya.

CHORIOZANDRA, Stend. Nom. ed. II. i. 865 (1840), sphalm. = Chorlaandra, R. Br. (Cyperac).

CHORIPETALUM, A. DC. in Trans. Linn. Soc xvii. (1834) 131 **=Embelia,** Burm. f. (Mynin.).
aurantiacum, A. DC. l. c - E . viridiflora.

CHORIPETALUM:—
australianum, F. Muell. Fragm. iiL 36 (=*Samara australiana).*—AustraL
Benthamii, Hance, in Walp. Ann. iii. *10=obovatum.*
obmatum, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 490.—Ins. Hongkong.
Reevesianum, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc 338, nomen=*obmatum* 1
undulatum, A. DC. in Tram. Linn. Soc. xvii. (1837) 132 = E.Nagushia.
viridiflorum, A. DC. in DC. Prod. viii. 88=E. viridiflora.

CHORISANDRA, Benth. & Hook. f. Gen. iiL 1057 (1883) err. typ. = Chorizandra, R. Br. (Cyperac).

CHORISANDRA, Wight, Ic. vi. 13. t. 1994 (1853)- **Fluggea,** Willd. (Enphorbiac).
pinnata, Wight, 1. c. = F. microcarpa.

CHORISANTHERA, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 109=Fentarhaphia, Lindl. (Gesnerac).
tenera, Oerst. 1. c = P . tenera.

CHORISEMA, Fisch. Ind. Sem. Hort. Pctrop. viii. 54 (1841) err. typ.=Chorizema, Labill. (Legumin.).

CHOBIBIA, H. R & K. Nov. Gen. et Sp. v. 295. **t.** 485 (1821). *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 210.
crispiflora, *H. B. V K. I. e.* 297.—Bras,
insignis, *H. B.* 6" *K. I. c.* t. 485. f. 1.—Pemv.
rosea, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 84.—N. Granat.
speciosa, *St. Hil. PI. Us. Bras.* t. 68.—Bras.
ventricosa, Nees & Mart, in Nov. Act Nat. Cur. xi. (1823) 102. t. 9=crispiflora.

CHORISIS, DC. Prod. vii. 177 (1838) = **Laotuoa,** Toum. (Compos.).
repens, DC. 1. c. 178 =L. repens.

CHORISMA, D. Don, in Edin. N. Phil. Joum. (1828-29) 808=CHORISIS, DC.=Lactuca, Linn. (Compos.).
repens, D. Don, L c.=L. repens.

CHORISMA, Lindl. in Sweet, Geran. sub t. 79 (1820) = Pelargonium, L'He'rit (Geraniac).
flaoescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 71 = P. tetragonum.
tetragona, Lindl. in Sweet, Geran. sub t. 79 = P. tetragonum.

CHORISPERMUM, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 129 (1812)=Chorispora, R. Br. (Crucifer.).
arcuatum, Andrz. ex DC. Syst. ii. 436 = Chorispora tenella.
ibericum, Andrz. ex DC. 1. c. 437 = Chorispora iberica.
sibiricum, Andrz. ex DC. 1. e.=Chorispora sibirica.
strietum, Andrz. ex DC. 1. c. 436=Diptychocarpus strictus.
tenellum, R. Br. in Ait. Hort Kew. ed. II. iv. 129 - Chorispora tenella.

CHOKI8POBA, R. Br. ex DC. Syst. ii. 485 (1821). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 102.
CHORISFEKMUM, R. Br. in Ait. Hort Kew. ed. II. iv. 129 (1812).
Bungeana, Fisch. & Mey. in Enum. PL Nov. Schrenk, 96 = exscapa.
compressa, Boiss. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* II. xvii. (1843) 385=iberica?
elegans, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 15. t. 14=- sabulosa.
exscapa, *Bunge, in Ledeb. Fl. Ross.* i. 169.—Sibir. altaic
Greigi, *Regel, Gartenfl.* (1879) 257. t. 984.—As. temp,
hispida, *Regel, in Bull. Soe. Nat. Mosc.* xliii. (1870) I. 266.—As. temp.
iberica, *DC. Syst.* ii. **487.—**Ac Min.; Persia,
macropoda, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxiii. (1860) 1.109.—Soongaria.
persica, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. jtvii. **(1842)** 884.—Persia,
sabulosa, *Cambess. in Jacquem. Voy. Bot.* 15.1.15.—Reg. Himal.; Afghan,
sibirica, *DC. Syst.* ii. 487.—Sibir. altaic; Tibet.

CHOBISPORA :—
sibirica, Regel *Sc Herd,* in Bull. Soc. Nat Mosc. xliii. (1870) I. 266-macropoda.
songarica, *Fisch. V Mey. Enum. PI. Nov. Schrenk,* ii. 67.—Soongar.
stenopetala, *Regel V Schmalh. in Ait. Hart. Pttrop.* v. (1877) 239.—Taschkent
strieta, DC. Syst ii. 436 = Diptychocarpns strictns.
syriaca, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvii. (1842) 884.—Syria,
tenella, *DC. Syst.* ii. 436.—Reg. Caucus, et Himal.; Persia; Aighanist

CHORISTEA, Thunb. Prod. PI. Cap. 168 (1800); Nov. Gen. 179 (1801)-Didelta, *VHirit.* (Compes.).
earnosa, Thunb. U. cc. 163, 180=D. carnosa.
glaira, Soland. ex Poir. Encyc. v. 607 =D. spinosa.
spinosa, Thnnb. Prod. PI. Cap. 163; NOT. Gen. 180 = D. spinosa.

CHORISTES, Benth. PI. Hartw. 68 (1840)=Deppea, Cham. & Schlecht. (Rnbiac).
cornifolia, Benth. 1. c. 64=D. cornifolia.
excelsa, Benth. 1. c. = Psychotria excelsa.
obtusifiora, Benth. 1. c 68 = D. obtusiflora.

CHOBISTYLIS, Harr. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 19. *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 647.
ihamnoides, *Haro. I. c.*—Afr. austr.

CHOBITAEMTA, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 907 (1867). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. I.e.
PAPPEA, Sond. *Sc* Hair. Fl. Cap. ii 662 (1862).

CHORIZANDRA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 276, in textn (1880) -CHORISANDRA, Wight -FLuggea, Willd. (Euphorb.).

CHOBIZAXTDBA, R. Br. Prod. 221 (1810). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1057.
cymbaria, *R. Br. L c*—Austral,
enodis, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 73.—Austiat
mnltiarticnlata, *Nees, in Ann. Nat. Hist.* Ser. I. vi. (1841) 48.—Austral,
sphaerocephala, *R. Br. Prod.* 221.—Austral.

CHOBIZAMTHB, R. Br. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. XIL (1836) 416. t. 19. *PCLYGONACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 98.
ACANTHOGONUM, Toir. in Pacif. Rail. Rep. iv. 132 (1866).
MUCKONEA, Benth. in Trans. Tjnn Soc. xvii. (1836) 419. t. 20.
TRIGONOCARPUS.-Bert ex Stend. Norn. ed. II. ii. 710 (1841).
angustifolia, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 167.—Calif,
brevicomu, *Torr. in Bot. Hex. Bound. 111.*—Am. bor. occ.
Breweri, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 270. -Calif,
californica, *A. Gray, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* vii. (1861) 149.—Calif.
Cleveland!, *Parry, in Proc. Davenp. Acad.* iv. (1884) 62.—Am. bor. oca
commisaralis, *Remy, in C. Gay, Ft. Chil.* v. 287.—Chili,
corrogata, *Torr. tf Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 198.—Calif,
dasyantha, *Phil in Linnata, xn&.* (1864-66) 227.—Chili.
diffnsa, *Benth. PI. Hartw.* 333.—Calif,
discolor, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 167.—Calif
Douglasii, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1836) 418.-Cali£
femandina, 5. *Wats. Bot. Calif,* ii. 481.—Calif,
fimbriata, *Nutt. in Joum. Acad, Philad.* N. S. i. (1847) 168.-Calif.
flavescens, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 226.—Chill
frankenioides, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 288.—Chili,
glabrescens, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1886) 418—Chili.
Kingii, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 538.—Chili.

CHOBIZ AfJ •*i'U.U* :—
laciniata, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* vii. 19.—Calif.
Lastarriaea, *Parry, in Proc. Davenp. Acad.* iv. (1884) 68.—Am. bor. occ.
ltptoceras, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 269.—Calif.
Macraei, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1836) 417. —Chili.
membranacea, *Benth. I. c.* 419.—Chili.
nudicaule, Benth. PI. Hartw. 332 - Douglasii.
nudicaule, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 166.—Calif.
Orcnttiana, *Parry, in Proc. Davenp. Acad.* IT. (1884) 64.—Am. bor. occ
Palmeri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 271. —Calif,
paniculata, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1836) 417.—Chili.
Parryi, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 271.—Calif,
peduncularis, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* rvii. (1836) 416.—Chili,
perfoliata, *A. Gray, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* vii. (1861) 148.—Calif.
polygonoideg,i4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 197.—Calif.
procumbens, A. Gray, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vii. (1861) 148-Xanti.
procumbens, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 167.—Calif,
pungens, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1836) 419. —Calif.
ramosissima, *Benth. 1. c.* 417.—Chili.
rigida, *Torr. (f Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 198.—Am. bor. occ.
rosea, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 225.—Chili.
spinosa, 5. *Wats. Bot. Calif,* ii. 481.—Calif,
staticoides, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1836) 418.—Cali£
stellnlata, *Benth, PI. Hartw.* 333.—Calif,
tennis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 227.—Chili.
Thnrberi, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 269 —Am. bor. occ.
umbellate, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 225.—Chili,
uncinata, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 167.-Calif.
uniaristata, *Torr. & Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) W6.-Calif.
vaginata, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1886) 417. ^GhilL
valida, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii (1877) 271.—Calif,
viigata, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1836) 416. 1.19. f. 1.—Chili.
Watsoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 199. —Calif
Wheeleri/s[1]. *Wats. I. c.* xii. (1877) 272.—Calif.
Xanti, *S. Wats. I. c.—COif.*

CHOBIZEMA, Labill. Voy. i. 408. t. 21 (1799). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 467.
ORTHOTROFIS, Benth. in Iindl. Swan River App. 16 (1839).
angustifolium, *Benth. Enum. PI. Hutg.* 28.—Austral.
Baueri, Benth. in Ann. Wien. Mug. ii. (1838) 71-Mirbelia pungens.
Baueri, MeJssn. in Lthm. PI. Preiss. i. 84; ii. 209 = Hendunanni*
Baxteri, R. Grah. in Edinb. Phil. Joura. (Apr.-June 1831) 187-Oxylobinm scandens.
callistachys, F. Muell. Fragm. iv. 18 = Oxylobinm caliistachys.
capillipes, Turcz. in Ball. Soc Nat Mosc xxvi. (1863) I. 255=angastifolium.
Chandleri, Sort, ex Nichols. Diet. Gard. i. 318-varium.
cordatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) 110.—Austral,
cordifolium, F. Muell. Fragm. iv. 17=Oxylobium cordifolium.
coriaceum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 254-Oxylobiam retusum.
costatum, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 83-Dicksoni.
cytisoides, *TurcM. in BulL Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1863) i. 256.—Austral.

CHOBIZEMA :—
daviesioides, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 34 = Mirbelia daviesioides.
denticulatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxvi. (1863) I. 252=angustifolium.
Dicksoni, *R. Grah. in Mound, Botanist,* iii.t 106.—Austral,
diversifolium, *A. DC. PI. Rar. Jard. Gentv.* 7* *Not.* (1836) 44.18.—Austral.
ellipticum, F. Muell. PL Viet. ii. 39-Oxylobinm ellipticum.
eridfolium, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 209.-Austral.
ericoides, Hort. Belg. ex Heynh. Norn. ii. 141 - praec.I
flavum, Henfrey, in Moore & Ayres, Gard. Mag. Bot. i. 73. t 7=cordatum.
gomphocarpum, *Benth. ex A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 880. —Austral.
Henchmanni, tf. *Br. in Bot. Reg.* t 986.—Austral
heterophyllum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) 1.255 = Oxylobium heterophyllum.
humile, *Turcz. 1. c.* 254.—Austral,
ilicifolium, *Labill. Voy.* i. 405.—Austral.
ilieifolium, Steud. Nom. ed. II. i. 856, sphalm.—Oxylobium trilobatum.
Leichhardtii, F. Muell. Fragm. iv. 20 - Isotropis filicaulis.
lineare, F. Muell. Fragm. iv. 17=Oxylobium lineare.
magnifolium, F. Muell. 1. c. 18=Mirbelia racemosa.
nanum, Sims, Bot. Mag. 1.1032=ilicifolium.
nervosum, *T. Moore, in Gard. Comp.* (1862) 122.—Austral.
ovatum, Lindl. Bot Reg. t. 1528-rhombenm.
parviflorum, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 71. —Austral.
parvifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc xxvi. (1853) I. 253=nervosnm.
platylobioides, DC. Prod. ii. 103 = Mirbelia grandiflora.
pubeseens, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvi. (1863) I. 286=Oxylobium carinatum.
Pultenaeae, F. Muell. Fragm. iv. 19=parviflorum.
xeticulatum, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 84.—Austral,
rhombeum, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. IL iii. 8.—Austral.
rhombeum, Lodd. Bot. Cab. 11619 = diversifolium.
rhynchotropis,TAeissa.in Lehm. PI. Preiss. ii. 209 * Henchmanni.
scandens, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (18*08) 258= Oxylobinm scandens.
sericeum, Sm. 1. c = Brachysema undulatum.
spartioides, Lodd. Bot. Cab. t. 1953-Isotropis striata.
spectabile, Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 45- diversifolium.
superbum, Lem. IUustr. Hortic. i. (1854) t 29-cordatum.
triangulare, Lindl. Bot Reg. t. 1518 = ilicifolium.
trigonum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1858) I. 254.—Austral.
trilobatum, DC. Prod. ii. 103, sphalm. -seq.
trilobum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 258-= Oxylobinm trilobatum.
varium, *Benth.ex Lindl. Bot. Reg.* (1839) t. 49; *Misc.* 46.—Austral.

CHORIZOTHECA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 76-Feeudanthus, Sieber (Euphorbiac).
micrantheoides, Mueli Arg. 1. c—P. virgatus.

CHOROBANCHE, Presl, Bot. Bemerk. 91 (1845) (Chorobane) - Orobaaohe, Linn,
indica, Presl, 1. *c* - O. indica.

CHOROSEMA, Brangn. Enum. Gen. 126 (1848)-Choriaoma, Labill. (Legumin.).

CHOROZEMA. Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 261. sphalm.-Chorizema, Labill. (Legumin.).

CHORYZEMUM, Bosc, Encyc. Agric. vii. 297 (182«) —praec

CHOTECKIA, Stend. Nom. ed. II. L 3S6 (1840) sphalm.—seq.

CHOTEKIA, O[illegible] & Coria> in Flora, xiii - ("SO) '• 38 =D[illegible] y Dh y l l a, Blume (Labiat.).
serueu, Opfe & Corda, 1. c. 85 = D. quadrifolia.

CHOULETTIA, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 81 (1874) -Oaillonia. A. Rich. (Rubiac.).
Reboudiana, Pomel, L c. = G. Reboudiana.

CHRESTA, Veil. [illegible] (1827)
alpest [illegible] 239 = Veraonia alpestris.
angu [illegible]
cordata, Veil. Fl. Flnm. viii. t. 150 = E. sphaerocephalus.
txsucca, DC. Prod. y. 85 = E. exsuccus.

- (1846) 236 = E. sphaerocephalns.
Ittnceatata, Veil. Fl. Flnm. viii. 1.151. Vanlllosmopsis erytnropappa.
[illegible] (1842) 241 = E. plantaginifolius.
Pycnocephala, DC. Prod. v. 85=E. pycnocephalns.
[illegible] =E. scapigerus.
* f M «I Gardn. [illegible] c 240 = E. speciosns.
'phaerocephala; DC. in Deless. Ic. Sel. iv. 2. t. 6 = E. sphaerocephalns.
[illegible] 241'= E. plantaginifolius.

CHRISANT [illegible] Delic. Gallo-Belg. ii. 858 (1768) = Chrysanthemum, Tonm. (Compos.).

CHRISOS [illegible] Gallo-Belg. i. 190 (1768)-ChryBospleniuin, Tourn. (Saxifrg.).

CHRISTANNIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 91, t. 67 (1881)
sa

CHRISTANNIA, Walp. Rep. i. [illegible] (1842), sphalm. = Christiana, DC. (Tiliac.).

CHRI TIA, Moenc [illegible] Meth. Suppl. 89 (1802) = Lourea, Nefwt
"-*« iijegumin.).
'«««fa, Moench, 1. c 40=L. vespertilionis.

CHRISTIANA, DC. Prod. [illegible] (1824)- *TILIACEAE,* Benth. & Hook. f.
africana, *DC. I. c.*—Afr. trop. 232.
cordifolia, Hook. f. in Niger Fl. 238 = africana.
madagascariensis, *c. Linn. Par.* i. (1885) 542.—M[illegible]

CHRISTISONIA, Garfn in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 153. *OROBANCHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 982.
CAMPBELLIA, Wight; [illegible]c. iv. 5. t. 1424, 1425 (1850).
OLIGOWIOLIS, Wight, L c. 1.1422 (1850).
albida [illegible] *Hook, f, Fl, Britm Ind>* iTl 828>~
Zeyl'anf
^rantiaea, Wight, Ic. iv. t. 1486 = bicolor.
Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 160.—InJ[illegible]
calcarata, *Wight, Ic.* iv. t. "M-Ind or.
grandiflora, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hhl (1847) 155 = tricolor.
Hookeri, *C. B. Clarke, ex Hook.* 321.—Reg. Himal.
Lawii, *Wight* Ic. [illegible] l«r.—Ind. or.
neilgherrica, *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 157.—Ind. or.
pallida, Gardn. l. c. 169 = bicolor.
Stocksii, Hook. Ic. Pl. t. 886 = calcarata.-
subacau[illegible] *Calc. Journ. N*[illegible]- *Hist.* viii. (18[illegible] Ind. or
Thwaites, *Trim. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 240.—Zeylab.
tricolor, *Gardn.* [illegible] Cafc yw"^- ^«<- *Hist.* viii. 347) 156—Zeylan.
tubulosa, *Ben* [illegible] 321.—Ind. or.
unicolor, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 161 = neilgherrica.

CHRISTMANNIA, Dennst. Schlness. Hort. Malab. 30 (1818). ' Genus delendum,' Benth. & Hook. f. iii. 150. CURONDIA, Kafin. Sylva Tellur. 154 (1888).
Courendi, Deanst. 1. c.—Ind. or.

CHBIBTOZLBA, Cambess. in Jacqnem. Voy. Bot. 17. 1.17 (1837). *CRVCIFERAS,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 80.
crassifoHa, *Cambess. I. c*—Tibet, occ.

CHRISTOPHORIANA, Town, ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 94 (1745)-Aotaea, Linn. (Rananculac).
spicata, Moench, Meth. 276=A. spicata.
mUgaris, Rupr. Fl. Cancas. 44-A. spicata.

CHRISTYA, Ward & Harv. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 134. t 21 - Strophanthus, DC. (Apocynac).
spedosa, Ward *Sc* Harv. L c.=S. capensis.

CHRITMUM, Brot. Fl. Lusit. i. 436 (1804), sphalm.= Crithmum, Linn. (Umbell).

CHROILEMA, Bemh. Del. Sem. Hort. Erf. (18401; et in Linnaea, xv. (1841) Litt 90-Aplopappus, Cass. ? (Compos.).
suicanescens, Bemh; 1L cc—Chili.

CHROMANTHTTS, Phil. Sert. Mend. Alt. 14 (1871). *PORTULACEAE*\

CHROMATOLEPIS, Dulac.Fl. Hautea-Pyr. 526 (1867) = Carlina, Linn. (Compos.).
acaulis, Dulac, 1. c. 527=Carl, acaulis.
lanata, Dulac, 1. c=Carl. lanata.
magna, Dulac, 1. c. = Carl. acanthifolic
mlgaris, Dulac, 1. c. = Carl. vulgaris.

CHROMATOPOGON, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aofs. i. 275 (1795) = Scoraonera, Linn. (Compos.).
Jacquini, F. W. Schmidt, 1. c.=S. hirsuta.

CHROMOCHITON, Cass. in Diet. St. Nat lvi. 220 (I828)-Cassinia, R. Br. (Compos.).
aculeata, Cass. 1. c=Cassinia acufeata.
affinis, Cass. 1. c. = Cassinia aculeata.
aurea, Cass. 1. c.=Cassinia aurea.

CHROMOLAENA, DC. Prod. v. 133 (1836) = BupatorlUm, Linn. (Compos.).
Mternifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bbt v. (1846) 465 = E. sUchyophyllum.
Candolleana, Gardn. 1. c. 464 - E. horminoides.
decumirns, Gardn. 1. c. 468=E. aecumbens.
epaleacea, Gardn. 1. c. vi. (1847) 486=E. lupulinum.
horminoides, DC. Prod. v. 138=E. horminoides.
teucoeephala, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 465 = E. hoiminoides.
pratensis, Gardn. 1. c. i. (1842) 176 - E. macrocephalum*

CHBOMOLEPIB, Benth. PL Hart*. 40 (1840). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. £ ii. 366.
heterophylla, *Benth. I. c*—Mexic.

CHRONE, Dnlac, FU Hautes-Pyr. 512 (1867) = Eupatorium, Linn. (Compos.).
heterophylla, Dulac, 1. c. = E. cannabinum.

CHRONOBASIS, DC. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 457 (1873) = Ursinia, Gaertn. (Compos.).

CHBOITOFAFPUS, DC. Prod. v. 84 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 236.
bifrons, *DC. I. c.*—Bras.

CHROSPERMA, Rafin. Neogenyt 3 (1825) - Zyga. denus, Michx. (Liliac).
laetutu, Rafin. L c.=Z. muscaetendenm.

CHBOZOFHORA, Neck. Elem. ii. 337 fl790\ *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 305.
CROZOPHORA, A. JUSS. Tent Euph. 27 (1824).
LEPIDOCROTON, Presl, Epim. Bot. 218 (I860).
RICINOIDES, Toura. ex Moench, Meth. 286 (1794).
TOURNESOLIA, Nissol. ex Scop. Introd. 243 (1777).
Brocchiana, *Schveinf. PI. Nilot.* 9.—Aft. trop.
Burmanni, Spreng. Syst iii. 851-plicata.

CHBOZOFHOBA :—
gracilis, *Fiseh. V Mey. ex Kar. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1839) 171, nomen; *Soiss. Fl. Orient,* iv. 1140.—As. centr.
hierosolymitana, Spreng. Syst. iii. 850 = verbascifolia.
iniegrifolia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. P^tersb. vii. (1851) 490=verbascifolia.
mollissima, A. Juss. Tent. Euph. 28 = Mallotus viscinoides.
obliqoa, *A. Juss. 1. e.*—Afr. bor.; As. occ.; Ind. or.
oUiqva, Schweinf. PI. Nilot. 13=plicata.
ebUmgifotia, A. Juss. Tent. Euph. 28 = obliqua.
paroifolia, Klotzsch, ex Schweinf. PI. Nilot. 11 - plicata.
peltata, Labill. Sert. Austr.-Caled. 74. t 75 - Codiaeum inophyllum.
plicata, *A. fuss. Tent. Euph.* 28.—Europ. austr.; Afr. bor.; As. occ.; Ind. or.
prtstrata, Dalz. *8c* Gibs. Bomb. Fl. 238=plicata.
Rottleri, A. Juss. Tent Euph. 28 = plicata.
sabulosa, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 446 = gracilis.
senegalensis, *A. Jtiss. Tent. Euph.* 28.—Afr. trop>
Sieberi, Presl, Bot. Beinerk. 10»=verbascifolia.
tinctoria, *A. juss. Tent. Euph.* 28. t. 7.—Europ. austr. ; Oriens; Ind. or.; Afr. bor>
tinctoria, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 749» obliqua.
verbascifolia/ *A. Juss. Tent. Euph.* 28-.—Reg. Mediterr.; Oriens.

CHROZORRHIZA, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789) > Asperula, Linn. (Rubiac) (A. tinctoria).

CHRYSA, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1809) 850-Coptis, Salisb. (Ranunculac).

CHRYSACTUTIA, A. Gray, in Mem. Am. Ac. N. S. iv. (1849) (PI. Fendl.) 93. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 412.
inexicana, *A. Gray, I. e.*—Mexic.

CHRYSACTINIUM, Wedd. Chlor. And. i. 212. t. 89. (1856)=Idabum, Adans. (Compos.).
acaule, Wedd. 1. c. = L- acaule.

CHRYSALIDOCAKPTTS, H. Wendl. in Bot. Zeit. xxxvi. (1878) 171. *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 882.
lntescens, *H. Wendl. I. c.*—Madag.

CHRYSANGIA, Link, Handb. i. 632 (1829)-Musskia, Dum. (Campanul.).
aurea, Link, 1. c. = M. aurea.

CHRYSANTHELLINA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 891 (1822) = Chryaanthellxim, Rich. (Compos.).
fasciculata, Cass. 1. c. = Chrysanthellnm procumbent.
gracilis, Cass. 1. c 892 = Chrysanthellum proenmbens.
Svartni, Cass. 1. c. = Chrysanthellum procumbens.

OHRYSANTHEIiIiUM, Rich, in Pers. Syn. ii. 471 (1807). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 389.
ADENOSPERMUM, Hook. *8c* Am. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 318.
CHRYSANTHELLINA, Cass. in Diet Sc Nat. xxv. 891 (1828).
COLLAEA, Spreng. Syst. iii. 622 (1826).
HiNTERHUBERA,Sch. Bip, ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 389 (187S).
NEURACTIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 496 (1825).
SEBASTIANiA, Bertol. Lucobr. (1822) 87.
UCACOU, Adans. Fam. iL 131 (1763).
abyssinicum, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) 440 = Microlecane abyssioica.
americanum, *Vatke, in Bremen Abh.* ix. (1885) 122:—Am. trop.
boliviense, *Seh. Bip. in Bull. Sec. Fr.* xii. (1865) 82, nomen.—Boliv.
erectum, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1863 (1855) 188.—Ins. Galapag.
indicum, *DC. Prod.* v. 631.—As et Afr. trop.
integrifolium, *Steet*, in Seem. Bot. Voy. Herald,* 160.—Panama.
procumbens, *A. Rich, in Pers.* JPyn. ii. 471.—Am. trop.
pusillum, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.*xx. (1851) 214—Ins. Galapag.
senegalense, DC. Prod. v. 631-= indicum.
SmartMii, DC. L c.» procumbens.

CHRYSANTHEMOIDES, Tourn. ex Medic. PhiL Bot. i. 159 (1789)=OBteospermum, Linn. (Compos.).
caerulea, Moench, Meth. 584=O. caeralenm.
pisiformis, Medic. Phil. Bot. i. 159=O. monilifernm.

CHEY8ANTHEMtTM, [Tourn.] Linn. Syst. «d. I (1735). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. £ ii. 424.
AMMANTHUS, Boiss. ft Heldr. Diagn. Ser. L xi. 18 (1849).
ARGYRANTHEHUM, Webb, ex Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 258. t. 90 ad 96 (1*86-50).
BALSAMITA, Desf. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 1.1.
BRACHANTHEMUM, DC. Prod. vi. 44 (1887).
CENTRACHAENA, Schott, Ind. Sem. Hort. Vindob. (1823), ex Reicbb. Ic. PI. Crit. iv. *43* (1827).
CENTROSFERMUM, Spreng. NOT. Prov. 19 (1818); Syst iii. 362 (1826).
COLEOSTEPHUS, Cast in Diet. Sc Nat xli. 43 (1826).
DECANEURUH, Sch. Bip. Tanacet. 44 (1844).
DENDRANIHEMA, Dei Monl. in Act. Soc. Linn. Bord. ix. (1855) 56L
ENDOPAPPUS, Sch. Bip. in Bonplandia, viii (1860) 369.
GLEBIONIS, Cass. Diet. Sc. Nat. xli. 41 (1826).
GLOSSOPAPPUS, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 748.
GYMNOCLINE, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 199 ; et in Diet Sc. Nat. xx. 119 (1821).
HETERANTHEMIS, Schott, in Oken, Isis, (1818) 821.
HETEROMERA, Pomel, Nonv. Mat. Fl. Atl. 60 (1874).
HYMENOSTEMIIA, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 699.
ISMELIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xli. 40 (1826).
KREMERIA, Dnr. in Duch. Rev. Bot i. (1846) 364.
LEUCANTHEMUM, [Tonrn.] DC. Prod. vi. 45 (1887).
MATRICARIA, Hall.«x Scop. FL Cam. ed. II. ii. 147 (1772).
MONOPTKRA, Sch. Bip. in Webb *k* Berth. Phyt Canar. ii. 268 (1886-50).
MYCONIA, Neck. Elem. i. 22 (1790).
OTOSPERMUM, WUlk in Bot. Zeit xxii. (1864) 251.
PHALACROCARPUM, WiUk. 1. c. 252 (1864).
PHALACRODISCDS, Less. Syn. Comp. 253 (1832).
PHALACROGLOSSUM, Sen. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 276 (1855-60).
PINARDIA, Cass. in Diet. Sc. N#t. xU. 88 (1826).
PLAGIUS, L'Herit. Diss. ex DC. Prod. vi. 186 (1837).
PONTIA, Bnbani, in Nnov. Giom. Bot Ital. v. (1878) 818.
PREAUXlA.Sch. Bip. in Webb ft Berth. Phyt. Canar. ii. 250 (1836-50).
PROLONGOA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 230. t. 29 a (1840).
PYRETHRUM, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 720 (1742).
RICHTERIA, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Most (1842) 126.
STIGMATOTHKCA, Sch. Bip. in Webb ft Berth. Phyt. Canar. ii. 265 (1836-50).
TRIDACTYUNA, Sch. Bip. Tanacet 48 (1844).
XANTHOPHTHALMUM, Sch. Bip. 1. c 17 (1844).
absinthifolium, Fisch. ex DC. Prod. vi. 46-sinuatum.
Acbilleae, *Linn. Syst.* ed. XII. 262.—Italia.
achiUeaefolinm, *DC. Prod.* vi. 68.—Reg. Caucas.; Sibiria.
adustum, Fisch. ex Herd, in Bnll. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1865) 1.415 =arctieum.
alpestre, DC. Prod. vi. 68=coronopifolinm.
alpinum, Bieb. Casp. 211—caucasicum.
alpincm, *Linn. Sp. PI.* 889.—Enrop.
anethifolium, *Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 904, in note.—Ins. Canar.
angustifolium, *Rafin. Herb.* 25; *Atl. Joum.* 178.—Am. bor.
anomalnm, *Lag. Varied. Citnc.* ii. IV. (1806) 40.—Hispan.
apetalom, *Hort. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 866.—Europ.
aragonense, Asso, Syn. 128. t. 9. f. l=pnlverulentum.
arcticum, *Linn. Sp. PI.* 889.—Reg. arct.
argentenm, *Willd. Sp. PI.* iii. 2146.—Armenia.
artemisiaefolium, Klatt, in Sitz. Akad. Mnench. (1878) 88-C. Eichteiia.

CHRYSANTHEMUM :—
amense, Herb. Mex. ex DC. Prod. v. 811=Xanthocephalam hnmile.
asteroides, *Desf. Tail.* ed. II. 118, nomen.—Hab. I
Atkinsoni, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* **147.—Reg.** HimaL
atlanticnm, *Ball, in Journ. Bot.* xL (1873) 866.—Marocco.
atratum, Georgi, Beschr. Russ. Reieh. iii. IV. 1252-maximum ?
atratnm, *Linn. Sp. PI.* ed.-II. 1252.—Enrop.
Balsamita, Baill. Hist PI. viii. 311 = Tanacetmn Balsamita.
Balsamita, *Linn. Sp. PL* ed. IL 1252.—As. occ.
Barrelieri, DC. Prod. vi. 88—coronopifolinm.
Bauhini, Tausch, in SylL Ratisb. ii. (1838) 251 = atratum.
bellidiflorum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 856 = Bellis dnbia.
Biebersteinianum, Adam, in Weber ft Mohr, Beitr. i. 70=Anthemis Biebersteiniana.
bipinnatum, *Linn. Sp. PI.* 890.—Reg. arct
Bocconi, *Pourr. ex DC. Prod.* vi. 61.—Hispan.
brenradiatum, Hort. ex DC Prod. vi. 64=coronarium.
Broussonetii, *Balb. ex Pers. Syn.* ii. 461.—Ins. Canar.
caespitosum, *Weinm. Cat. Hort. Dorp.* 43.—Hab. 1
carinatum, *Schousb. Vextr. Marokko,* **198. t. 6.—** Marocco.
carneum, Steud. Nom. ed. I 192=coccinenm.
carnosulum, DC. Prod. vi. 65 = Phymaspermnm caroosulum.
carnosum, Pers. Syn. ii. 460=glabrum.
carolinianum, Walt. Fl. Carol. 204 = Boltonia asteroides.
Catananche, *Ball, in Joum. Bot.* xi. (1873) 866.—Marocco.
cancasicum, *Pers. Syn.* ii. 462.—Reg. Caucas.
cebennense, DC. ex Stead. Nom. ed. L 192, 183 = monspeliense.
centrospermum, Bemh. ex Reichb. Ic PI. Crit. iv. 47 = viscosum.
eeratophylloides, AIL Fl. Pedem. i. 190-atratum.
Chamomilla, Bernh. Syst. Verz. Erf. 145 = Matricaria Chamomilla.
dnerariaefolinm, *Vis. Fl. Dalmat.* iL 88. .. 8.—Dalmatia.
cinerarium, Steph. in Ledeb. Fl. Ross. ii. 542 = sinuatum.
coccineum, Sims, Bot Mag. t 1080 = coronopifolium.
coccineum, *Willd. Sp. PI.* iii. 2144.—Reg. Caucas.; Persia.
coronarinm. *Linn. Sp. PI.* 890.—Reg/Mediterr.
coronopifolinm, *if as/, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* **x.** (1881) 208.—Ins. Canar.
coronopifolium, Steud. Nom. ed. II. i. 856-grandiflorum.
coronopifolium, *Vill. Fl. Delpkin.* **98;** *Hist. PI. Dauph.* iii. 202.—Corsica.
coronopifolium, Willd. Herb, ex Boils. Fl. Orient iii. 840=coccineum.
corsicum, Sieber, ex DC. Prod. vi. 47-coronopifolium, ***Vill.***
corymbiferum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1251.—Helv.; Austr.; Germ.
corymbiferum, Pall Reise, i. 196—corymbosum.
corymbosum, *Linn. Sp. PI.* 890.—Europ.; Afr. bor.; Reg. Caucas.
crithmifolium, Brouss. ex Willd. Enum. Hort Berol. 904, in syn.; Buch, in Berl. Acad. Abh. 1816-17 (1819) 875=anethifolinm.
cuneatum, Roxb. Hort. Beng. [101]; Fl. Ind. iii. 436 =Boltonia indica.
daucifolium, *Pers. Syn.* ii. 462.—Hab. ?
densum, *Steud. Nom.* ed. 1.192.—Syria.
dentatum, Gilib. FL Lituan. i. 219 = C. Leucan**themum.**
diffusum, *Veil. Fl. Flum.* viii. 1.128.—Bras.
disciforme, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 76-Matricaria disciformis.
discoideum, *All. Fl. Pedem.* L 190.—Italia,
dissectum, *Lome, in Trans. Cpmb. Phil. Soc.* **vi. (1838)** reimpr. 17.—Ins. Canar.
elegans, Stend. Nom. ed. 1.192-maritimum.
ericaefolium, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 27.—Afr. anstr.
fioridum, Salisb. Prod. 202-frutescens.
floscnlosum, *Linn. Sp. PI.* 890.—Reg. Mediterr.

CHEYSANTHEMUM :—
foeniculaceum, Steud. Nom. ed. I. 192; DC. Prod. vi. 66=anethifolium.
foliosum, Brouss. Hort. Monsp. (1804); ex DC. Prod. vi. 66—grandiflorum.
frutescens, *Linn. Sp. PI.* 887.—Ins. Canar.
frutescens, Thunb. Prod. PI. Cap. 161 = Thunbergii.
fruticosum, Buch, in Abh. BerL Acad. 1816-17 (1819) 875=frutescens?
fruticosum, *Veil. Fl. Flum.* viii. 1.180.—Bras,
fruticulosum, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 117.—Sibir. altaic.
fuscatum, Desf. FL Atlant. ii. 288 = Matricaria fuscata.
Gayanum, Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 509 = Mawii.
glabratum, Thunb. Prod. PI. Cap. 161 = Matricaria glabrata.
glabrum, DC. Prod. vi. 49, in syn. = paludosum.
glaucum, Pers. Syn. ii. 461=mnltifidum.
Gmelini, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc (1888) 94 = arcticum.
gracile, *Afasf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* **x. (1881)** 207.—Ins. Canar.
gracilicaule, Dufour, in Ann. Gen. Sc. Phys. vii. (1820) 306=montanum.
graminifolium, *Linn. Sp. PI.* 889.—Europ.
grandifiorum, Brouss. Elench. PL Hort. Monsp. (1804) 15=coronopifolium.
grandifiorum. Hook, in Parry, App. Second Voy. 898—Matricaria inodora.
grandifiorum, Hort. Par. (1819) ex DC. Prod vi. 47" lacustre.
grandifiorum, Lapeyr. Hist Abr. PL Pyr. 627 = maximum,
grandiflomm, *Willd. Enum. Hort. Berol.* **904.—Ins.** Canar.
Griffithii, C. B. Clarke, Compos. Ind. 148-Stoliczkai.
haematomma, *Lowe, in Hook. Kew Joum.* viii. (1866) 296.—Ins. Madera.
Halleri, Suter, Fl. Helv. ii. 193-coronopifolium, *Vill.*
Herminii, Hoffmgg. ft Link, Fl. Port ii. t 102« oppositifolium.
heterophyllum, *Willd. Sp. PI.* iii. 2142.—Europ.
hirtum, Hort ex Reichb. Ic PL Crit iv. 47 •= viscidum.
hirtum, Thunb. Prod. PI. Cap. 161 = Matricaria hirta.
hispidum, Rich, ex DC. Prod. vi. 47 - L . pallens.
humile, Spreng. Syst. iii. 584 - Xanthocephalum humile.
hybridum, Guss. Adnot. Cat. PI. Bocc. 3 = C. Myconis.
incanum, Thunb. Prod. PI. Cap. 161=Pentzia virgata.
indicum, *Linn. Sp. PI.* 889.—China; Japan.
indicum, Thunb. Fl. Jap. 320—sinense.
inodorum. Linn. Sp. Pi. ed. IL 1263-Matricaria inodora.
integrifolium, *Richards, in FranU. 1st Joum. App.* ed. IL S3.—Reg. arct
intermedium, Hort Monsp. ex DC. Prod. vi. 66 = grandiflomm.
ircutianum, *Turci. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xix.** (1846) II. 177.—Sibiria.
italicum, *Linn. Mant.* i. 116.—Italia.
japonicum, Thunb. Fl. Jap. 321 = indicum.
lacerum, Auct. ex Desv. in Lam. Encyc iii. 729, in syn. —pinnatifidum.
laciniatum, Gilib. FL Lituan. i. 218=segetum.
lacustre, *Brot. Fl. Lusit. i.* 379.—Europ.
lanccolatum, *Pers. Syn.* ii. 460.—Europ.
lanceolatum, Vest, in Flora, iii. (1820) 4-C. Leucanthemum.
lanuginosum, Geners. ex DC. Prod. vi. 57= corymbosum.
larvatum, *Griseb. ex Pant, in Oestr. Bot. Zeitschr-* xxiii. (1873) 266.—Montenegro.
latifolium, DC. Prod. vi. 69=grandiflorum.
leptophyllum, DC. 1. c. 65=nodosum.
Leucanthemum, *Linn. Sp. PI.* 888.—Europ.; As. bor.
lidbeckioides, *Less. Syn. Comp.* 258.—Afr. austr.
macrocephalum, Viv. Fl. Lib. Spec 56. t 10. *t. i"* txifurcatum.
macrophyllum, *Waldst. (f Kit. PI. Rar. Hung,* **i- ^7-**—Europ. or.; Reg. Caucas.
macrotum, *Ball, in Joum. Linn. Soc.* xvi. (1878) W*.—Hispan.; Marocco.
tnajus, Aschers. Fl. Brandenb. 329 - C . Leucanthemnffl-Maresii, *Ball, in Joum. Bot.* xi. (1873) 366 (Maressii)-—Marocco.
maritimum, *Pers. Syn.* ii. **462.—**Europ. occ

CHRYSANTHEMUM :—
Mawii, *Hoot./. Bot. Mag.* t 5997.—Marocce.
maximum, *Ramond, in Bull. Soc. Philom.* ii. (1800) 140.—Mont Pyren.
mexicana, *H. B.* fcr *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 299.—Mexic.
millefoliatum, *Linn. Syst.* ed. Xn. 588.—Reg. Caucat; As. Min.
minimum, Brot. Fl. Lnsit. i. 379=pulverulentumt
minimum, VU1. Hist. PI. Danph. ill. 202=alpinum.
monspeliense, *Linn. Sp. PI.* 889.—Europ.
monspeliense, Schkuhr,- Handb. iii. 181. t. 253 = arcticum.
montanum, *Linn. Sp. PI.* 888.—Europ.
montanum, WiMd. Sp. PI. üi. 2148-C. Lencanthemnm.
moschatum, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. 1.192, nomen; ed. II. i. 367.—Hab. 1
multicaule, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 282.—Afr. bor.
moltifidnm, *Desf. Cat. Hart. Par.* ed. ML 170.—Oriens.
Myconis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1254.—Reg. Mediterr.
nanum, Hook. Fl. Ber. Am. i. 820 = Blennosperma californicum.
nodosum, *DC. Prod.* vL 65.—Afr. anstr.
ochroleucum, *Mas/, in Anal. Sec. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 2O8.-Ins. Canar.
odoraium, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 462 =pinnatifiduni.
oppositifolium, *Brot. FL Lusit.* i. 381.—Lnsit.
orcastrum, *Hance, in Journ. Bot.* xL (1878) 108.—duiut.
orientale.Vea. Syn. ii. 482-Antfaemis Biebersteiniana.
osmitoides, *Han. Thes. Cap.* ii. 33.1.152.—Natal.
Pallens, *% Gay, ex Perreym. in Guill. Arch. Bot.* ii (1833) 645.-Ewop.
Pollens, Pen. Syn. ii. 461, in syn.=pulverulentum.
paUidum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 12-pulverulentum.
Palmatum, Ledeb. Fl. Ross* il 652, sphalm. = parthenifolium.
Pajudosum, *Poir. Voy. Barb.* ii. 241.—Afr. bor.
Palustre, *Pen. Syn.* it 461.—Armenia.
Parthenifolium, Pers. L c. 462=praealtnm.
Partnenium, *Bernh. Syst. Ven. Erf.* 145.—Europ.
porviftonm, Pers. Syu. ii. 462=Matricaria praecox.
Pectmatnm, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1255.—Hispan.
Porpusillum, Loisel. in Desv. Jonm. Bot ii. (1809) 889 = Nananthea perpnsilla.
Pinnatifidnm, *Linn.f. Suppl.* 877.—Ins. Madera.
Praealtum, *Vent. Jard. Cels,* t. 4S.-Reg. Caucas.; As. Mm.; Persia.
Praecox, DC. Prod, vt 69 -Matricaria praecox.
Pretense, Salisb. Prod. 203 = CLeucanthemum.
P<x*mbens,* Lour. FL Cochinch. ii. 499=indicum.
Pnstratum, Pers. Syn. ii. 460=E[illegible]letis domingensis.
Pt'rmicaefolium, Puschk. ex WUld. Sp. PI. iii. 2151; Pers. Syn. ii. 460 = Achillea Ptarmica.
*P*bescens,* Hort. ex Reichb. It PI. Crit iv. 47 = «adum.
PWTerulentum, *Lag. ex Pers. Syn.* ii. 461.—Hispan.
P"mUum, *WUld. Enum. Hort. Berol.* 903.—Hab.?
P»ctatum,* Pets. Syn..ii. 461, in syn.=palustre.
W-^H-nm, Pen. 1. c=indicum.
Pwillum, *Viv. Ft. Lib. Spec.* 56.—Afr. bor.
™»outt, *Pers. Syn.* ii. 462.-Hispan.
ramosu[illegible] *W. Schmidt> Samnl_ Phys. Aufs.* i. (179[illegible]S231
Rich[illegible]> nomen.—Europ. *t. Brit. Ind.* iii. 315.—
teria[illegible] *Benih, ex Hook•fm P*
iMongana; Tibet, occ.
"gidum » Vis. Del. Sem. Hort. Patav. (1826) =
onerariaefoliom.
*** Adam, in Weber & Mohr, Beta, i. 70=
coneum.
IOt UI[illegible]olion>. *Waldst. V Kit. PI. Sar. Hung.* iii. 262.
i. «6. Hungar.
^ [illegible] Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 170 =
[illegible]uni.
scandens, *yell. Fl. Flum.* viii. t. 129.—Bras.
segetale, ^[illegible] Prod. a0S=segetum.
segetum, Forsk. ex DC. Prod. vi. 64 =coronarium.
segetum, *Linn. Sp* PI.* 889.—Europ.j Afr. bor.; As. occ.
senecioides, Dun. *ex* DC. Prod. vi. 64=coronarinm.
^. Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 69 -
[illegible]
se[illegible]ceum, Hos[illegible] LI"*. «• ?<>«• ii. t 101 -
oppositifolium.
serotinum, *Linn. Sp. pi.* 488.—Hungar.

CHBYBASTTHEMUM :—
setabense, Dufour, ex DC. Prod, vi 49 sglabrum.
sibiricum, Turcz.ex DC. 1. c.46=arcticum.
sinense, *Sabine, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 145.—Japon.
sinuatum, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 116.—Sibir. altaic
spathulatum, *F. W. Schmidt, Sammt. Phys. Au/s. U* (1796) 281.—Europ.
spedosum, Brouss. ex Pen. Syn. ii 468=coronarium.
speciosum, Steud. Nom. ed. II. i 367-grandiflonim.
Stoliczkai, *C. B. Clarke, Camp. Ind.* 147.—Tibet, occ.
suaveolens, *Aschers. Fl. Brandenb.* 332.—Europ.
subcorymbosum, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturv. x.* (1869) 146.—Transsylv.
sylvaticum, Hoffmgg. *b.* link, ex Link, Handb. i. 756 «=C. Leucanthemnm 1
sylvaticum, Jauvy, ex DC. Prod. vi. 47 -pallens.
syhestre, Brot. ex Steud. Nom. ed. I. 198 ; ed. II. i. 357, nomen.—Lusit.
syhestre, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 60 = C.
tanacetifolium, D«sf. Cat Hort. Par. (1821); ex DC. Prod. vi. 66=grandiflonim.
tanacetifolium, *Willd. Sp. PI.* iii. 2146—Oriens.
Tanacetum, Vis. II. Dalmat. ii. 89 =. Tanacetum vulgare.
tenuifolium, *Kit. in Schult, Oester.Fl.* ed. II. ii. 498.—Hungaria.
tenuifolium, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. i. 857 = C. Achilleae.
tenuissimum, *[Soland. in] Russell, Aleppo,* ed. II. ii. 263.—Syria.
Thunbergü, *Harv. in Han. tf Sond. Fl. Cap.* iii. 162.—Afr. austr.
tibeticum, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 147.—Tibet occ.
tingitanum, *Bernh. in Linnaea,* x. (1885) *Litt.* 74.—Marocc.
tomentosum, *Loisel. Fl. Gall.* 580.118.—Corsica,
trichophyllum. *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 10.—As. Min.
trichotomum, Walp.Ann. Ii. 891=trichophyllum.
tricolor, Andr. Bot Rep. 1109 -carinatnm.
trifnrcatum, *Desf. Fl. Atlant.* ii 281.—Afr. bor.
tripartitum, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t 193 = indicum.
Turreanum, Vis. Stirp. Dalm. Spec 19 = dnerariaefolium.
uliginosum. *Pers. Syn.* ii. 440.—Hungar.
umbellatum, *Vell.Fl. Flum.* viii. 1127.—Bras,
umbrosum, *Willd. Sp. PI.* iii. 2149.—Graecia.
variabile, Rochel, PL Banat. Rar. Ind. Spet = atratum.
vucosnm, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. IIL 170.—Reg. Mediterr.
Webbianum, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 509.—Marocc.
Webbü, *Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 207.—Ins. Canar.
Wehnlschii, Sen. Bip. ex Nym. Consp. 870 = segetum.
Zawadskü, *Herbich, Add. Fl. Galic.* 48.—Gallcia.

CHRVSEIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. vii. 877; ix. 154 (1817) = Centaurea, Linn. (Compos.).
Centaurium, Kostel. Allg.Med. Pharm. Fl. ii. 606-Cent Centaurium.
glauca, Can. in Diet. Sc. Nat xliv. 89 = Cent moscbata.
moschata, Cass. 1. C.-Cent. moschata.
odorata, Cass. 1. c. ix. 164=Cent moschata.
suaveolens, Casg. 1. c xliv. 89=Cent moschata.

CHRYSEIS, Lindl. Bot Reg. t 1948 (1885) = EaohBCholzla, Cham. (Papaverac.).
caespitosa, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 68 = E. califonica.
calif arnica, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 319 = E. caltfomica.
compacta, Lindl. Bot. Reg. 11948-E. californica.
crocea, LindL 1. c = E. caUfomica.
Douglasii, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 820 = E. califomica.
hypecoides, Ton. & Gray, Fl. N. Am. L 64 =E. califomica.
tenuifolia, Torr. *Ik* Gray, 1. c. = E. califomica.

CHRYSION, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 609 (1886) = Viola, Linn.
biftorum, Spach, L c 510=V. biflora.

CHRYSIPHIALA, [Ker-GawL in] Bot Reg. t. 778 (1824) =Stonome88on, Herb. (Amaryllid.).
aurantiaca, Schult. f. Syst. vii. 904 »S. aurantiacum..
coccinea, [Ker-Gawl. in] Bot Reg. sub t. 778=S. cocdneam.
curvidentata, Herb, ex Steud. Nom. ed. II. 1. 868-S. flavum.
flava, [Ker-Gawl. in] Bot Reg. t. 778-S. flavum.
incarnata, Schult. f. Syst vii. 908 =-S. incarnatum.
latifolia, [Ker-GawL in] Bot. Reg. sub t. 778 - Urceolina latifolia.
paucifiora, Hook. Exot. FL 1.132-S. flavum.
recurvata, [Ker-Gawl. in] Bot Reg. sub t 778 = S. recurvatum.
trichroma, Schult. f. Syst vii. 907 -> Pancratium trichromum.
variegata, Schult. f. 1. c. -Pancratium variegatum.
viridiflora, Schult. f. 1. c 908=S. viridiflorum.

CHRYSIS, Renealm. ex DC. Prod. v. 586 (1886)-Helianthus, Linn. (Compos.).

CHRYSITKIX, Linn. Mant. ü. 165 (1771% *CYPERACEAE,Sen!ih.* & Hook. f. iii. 1057.
capensis, *Linn. Mant.* ii. 304; *Linn. f. Gram.* 27. t. 1, 2.—Afr. austr.
jnnciformù, *Nees, in Linnaea,* x. (1836) 144.—Afr. austr.

CHRYSOBACTRON, Hook. f. FL Antarct i. 72. t. 44 (1845)-BulbineUa, Kunth (Liliac).
Hookeri, Colenso, in Hook. Ic. PL t. 817.—N. Zel.
Rossii, Hook. f. FL Antarct. i. 72. t. 44-45.—Ins. Auckland.

CHHYSOBAZANTXB, Linn. Gen. ed. I. 365 (1737). *RQSACEAE* Benth. *Sc.* Hook. f. i. 606.
ICACO, Adans. Fam. U. 805 (1768).
cuspidatus, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 711.—Ind. occ.
ellipticns, *Soland. ex Sabine, in. Trans. Hort. Soc.* v. (1824) 463.—Afr. trop.
guianensis, Klotach, in Schomb. Fauna et Fl. Brit. Guian. 1024=ellipticus.
Icaco, *Linn. Sp. PI.* 513.—Afr. et Am. trop.
incanus, Rafin. New Fl. Am. üi. 26 = oblongifolius.
luteus, Sabine, in Trans. Hort. Six:, v. (1824) 463 ^C. Icaco}
macrophyllus, *Schott, in Spring. Syst.* iv. *App.* 407.—Bras,
oblongifolias, *Uichx. Fl. Bor. Am.* i. 283.—Am. bor.
orbicularis, Schum. in Sebum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 232=C. Icaco.
owlifolius, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *App.* 406.—Bras.
peUocarpus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 198 - C. Icaco.
pnmifolius, Rafin. New Fl. Am. Ul. 26 => oblongifolius.
purpureus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-C. Icaco.
racemosus, *Roxb. Hort. Beng.* [92]; *Fl. Ind.* iL 506.—Ins. Molucc.
retusus, Rafin. New FL Am. iii 26'OblongUblnu.
subnndulatus, *Brig*, in Mem. Soc. Hal. Mod.* Ser. IL i. (1862) 71.—Bras.

CHRYSOBAPHUS, Wall. Tent Fi. Nep. 87. t 27 (1826)=Anoectochllus, Blume (Orchid.),
Roxburghii, Wall. I. c-A. Roiburghii.

CHRYSOBOTRYA, Spach, in Ann. Sc Not Sén II. iv. (1885) 18=Kibes, Linn. (Saxifrag.).
intermedia, Spach, 1. c. 19 =R. anreum.
Lindleyana, bpach, 1. c. 20=R. aurenm.
moluta, Spach, L c 19 = R. aureum.

CHRYSOCALYX, Guill. ft Perr.Fl. Seneg. Tent 157. t 43 (1832)=Crotaloria, Linn. (Legumin.).
ebenoides, GuilL & Perr. L c. 158. t 48. f. l=Crot. ebenoido.
graeilis, Guill. *Sc* Pen. I. c 159=Crot. gracilis.
Perrottetii, Guill. *Sc.* Perr. 1. c. 160. t. 43. f. 2-Crot. Perrottetil.
Petitianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. L 159-Crot. macrscalyx.

CHRYSOCALYX :—
platycalyx, Stead, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. 160 =Crotalaria platycalyx.
Quartinianus, A. Rich. 1. c. 159=Crot Dilloniana.
rubiginosa, Guill. & Petr. Fl. Seneg. Tent. 168=Crot. atrorubens.
Schimperi, Hochst ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 151 -Crot incana.

CHRYSGCEBHALUM, Walp. in Iinnaea, xiv. (1840) 508=Helichry8Um, VaIlL (Compos.).
apiailatum, Steetz, in Lehm. I>l. Preiss. i. 47-4 - H. apicalatum.
asperum, Steetz, 1. c. 478=H. semipapposam.
Behrianum, Sond. in Linnaea, ixv. (1852) 617 —H. Baxteri.
brenˆcilium, Walp. Rep. vi. 238 = H. semipapposnm.
canescens, Turez. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 196=H. apicalatum.
eiliatum, Steetz, in Lehm. Fl. Preiss. i. 474 =H. semipapposnm.
flavispinum, Walp. Rep. i. 237, sphalm.=seq.
Jlamssimum, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 472 - H. apicnlatum.
glabratum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 197 - H. apiculatnm.
helichrysoides, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 508-H. apiculatnm.
odorum, Walp. Rep. vL 288 = H. apiculatnm.
pterochaetum, F. Muell. in Linnaea, xxr. (1852) 416 = H. pterochaetum.
semipapposum, Steetz, in Lehm. PL Preiss. i. 474 - H. semipapposnm.
squarrulosum, Sond. in Linnaea, xxi. (1862) 515—H. semipapposnm.
squarrulosum, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 472 - H. apicuiatum.
vitellinum, Sond. & F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 514 = H. apicnlatum.

CHRYSOCHAMELA, Boiss. Fl. Orient, i. 81S (1867) = Coohlearia, Tonrn. (Crucifer.).
elliptica, Boiss. 1. c. 314.—As. Min.
Notana, Boiss. 1. c.—Armenia.
velutina, Boiss. 1. c. 318=Coch. vdutina.

CHETSOCHIiAMYS, Poepp. & Endl. NOT. Gen. et Sp. iii. 13. t. 211 (1842). *GUTTIFERAE,* Berth. & Hook. f. 172.
BERTOLONIA, Spieng. Neue Entdeck. ii. 110.1.1. f. 1 (1821).
COMMIRHOEA, Mien, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1856) 252. t. 26.
POECILOSTEMON, Planch. *Sc* Triana, in Ann. Soc. Nat. Sir. IV. xiv. (1860) 256.
TOVOMITOPSIS, Planch. *Sc* Triana, I. c. 261 (1860).
clusioides, *Griseb. Cat. PL Cub.* 37.—Cuba,
costa-ricana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 87.—Costa Rica,
dependent, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiv. (1860) 259.—Am. trop.
glauca, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 87.—Costa Rica.
Goudotii, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiv. (1860) 259.—N. Granat.
laxa, *Planch, tf Triana, 1. c.* 258.—N. Granat.
membranacea, *Planch, tf Triana, 1. c.* 260.—N. Granat
multiflora, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 18. t. 211.—Pernv.
myrcioides, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xiv. (1860) 260.—N. Gianat.
nicaraguensis, *Hemsl. Bůd. Centr. Am. Bot.* L 87.—Nicaragua,
pachypoda, *Planch,* b* *Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiv. (1860) 257.—Peruv.
Pavonii, *Planch. V Triana, 1. c.* 258.—Peruv.
psychotriaefolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 87.—Costa Rica.

CHBYSOCOMA, Linn. Gen. ed. 1.248 (1787), partim. *COMPOSITAE, Heath.* & Hook. f. ä. 286.
acaulis, Walt. Fl. Carol. 196-Vemonia oligophylla.
adpressa, Veil. Fl. Flnm. 332; viii. t 85 = Vemonia monticola.
Aitoni, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 50.—Hab.t
alata. *Veil. Fl.Flum.* 835 ; viii. t.48 (Eupatorii sp.!).—Bras,
albida, *Veil. I. c.ZZZ;* viii. t. 42.—Bras.

CHBYSOCOMA :—
altema, *Veil. Fl. Flum.* 338; viii. t. 40 (Vemoniae sp. ?).—Bras.
amara, Schnm. *Sc* Thonn. Beskr. Gnin. PI. 388 - Vernonia senegalensis.
angusti/olia, Steud. Norn. ed. II. i. 358=Vernonia angnstifolia.
aphylla, Veil. Fl. Flnm. 324; viii. t. 1 = Baccharis aphylla.
arborea, Veil. 1. c. 326; viii. t. 11 = Vemonia Tweedieana.
artemisifolia, Poepp. ex Steud. Norn. ed. II. i 858 = Eupatorium coronopifolium.
aspera, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. ii. 239 = Inula germanioa.
aurea, Boj. ex DC. Piod. vi. 322 = Nidorella Chrysocoma.
aurea, Salisb. Prod. 118=C. Coma-aurea.
biflora, Linn. Sp. PI. 841=Aster dracuncnloides.
camphorata, Rob. & Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 35 =Jasonia glutinosa.
candicans, Delile, Fl. Egypte, 271. t. 46 (= *Varthemia candicans).*—Aegypt
capillacea, Michx. Fl. Bor. Am. ii 101 = Eupatorium foeniculaceum.
cernua. Linn. Sp. PI. 840=C. Coma-aurea.
cenua, Thunb. Prod. PI. Cap. 142, partim=tenuifolia.
ciliaris, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 311=Aster Ecklonis.
ciliaris, Willd. Sp. PI. iii. 1789=ciliata.
ciliata, *Linn. Sp. PL* 841.—Afr. austr.
ciliata, E. Mey. ex DC. Prod. v. 854=oblongifolia.
cinerea, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 39.1.182 - HeUchrysum cinereum.
Coma-aurea, *Linn. Sp. PI.* 840.—Afr. austr.
coronopifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 102=Eupatorium coronopifolium.
crassa, *Veil. Fl. Flum.* 326; viii. t. 8.—Bras,
cruciata, *Veil. 1. c.* 326; viii. t. 10 (Baccharidis sp. 1).—Bras.
cuneifolia, *Jacq. Coll.* iii. 280.—Reg. Magell.
cymosa, Veil. Fl. Flum. 827; viii. t 16-Vemonia missionis.
deenrrens, *DC. Prod.* v. 854.—Afr. austr.
decurrens, Harv. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. iii. 96 - Heteromma decurrens.
decussata, Veil. Fl. Flum. 326; viii. t. 9 = Baccharis camporum.
dentata, Veil. 1. c. 334; viii. 147 = Baccharis orgyalis.
jlenticulata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 62=Chrysanthemum flosculosum.
dichotoma, Jacq. Ic. PI. Rar. i. 17. t 171 = Allagopappus dichotomus.
divaricata, Fisch. Hott. Gorenk. ed II. (1812) 87 = Aster divaricatus.
dracunculoides, Lam. Encyc. ii. 192=Aster dracunculoides.
dracunculoides, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 517 = Bigelowia dracunculoides.
ferruginea, Spreng. Syst iii. 424 = Helichrysum ferrngineum.
florida, *Veil. Fl. Flum.* 834 ; viii. t. 44.—Bras.
foetida. Lam. Encyc. ii. 193=Nidorella foliosa.
fruticosa, J. F. Gmel. Syst. 1203=cuneifolia.
fruticosa, Steud. Norn. ed. IL i. 358 = Vernonia rigida.
gigantea, Walt Fl. Carol. 196-Vemonia altissima.
gnaphaloides, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 23.—Afr. austr.
graminifolia, Boeber, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 261 =Aster Linosyris.
graminifolia. Linn. Sp. PI. 841=Solidago lanceolate.
graminifolia,V/ait. Fl. Carol. 196 = Vemonia angustifolia.
grandis, *Lepech. It.* iii. 88.—Sibir. ami.
graveolens, Nutt. Gen. Am. ii. 136=Bigelowia dracunculoides.
graveolens, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 211 = Bigelowia pluriflora.
herbacea, Veil. Fl. Flum. 330; viii. t 29 = Vemonia obovata.
heterophylla, Rafin. FL Ludov. 64 (-Baccharidis sp. I).—Am. bor.
hirsuta. *Veil. Fl. Flum.* 333 ; viii. t. 41.—Bras.
horimontalis, Veil. Fl. Flum. 330; viii. t. 28 = Vernonia obscora.
humilis, DC. Prod. vii. 280 = Aster angustns.
imberbis, *Veil. Fl. Flum.* 831; viii. t. 34.—Bras.
incana. Barm, *t* FL Cap. Prod. 23=Pteronia incana.

CHBYSOCOMA:—
incana, LeVeilte, in Demid. Voy. Ross. *Hit.* ii. 237; iv. 496 (=*Linosyris villosa).*—Rossia.
indivisa, Veil. Fl. Flum. 326; viii. t. 12 = Baccharis brachylaenoides.
integerrima, *Veil. 1. c.* 328; viii. t 19.—Bras,
jnncea, *Desf. Tabl.* ed. II. 115, nomen.—Hab. t
lappulina, Boj. ex DC. Prod. v. 323 = Nidorella mucronata.
lateralis, Veil. Fl. Flum. 329; viii. t 21 = Baccharis cassinaefolia.
liburnica, Spreng. Syst. iii. 425=Aster Linosyris.
linearis, *Veil. Fl. Flum.* 330; viii. t. 27.—Bras.
linifolia, Steud. Norn. ed. II. i. 868 = Aster subolatnsi
Linosyris, Linn. Sp. PI. 841 — Aster Linosyris.
longifolia, *DC. Prod.* v. 354.—Afr. austr.
maculata, VelL Fl. Flum. 325; viii. t. 6 «= Eupatorium conyzoides.
maritima, Veil. 1. c. 329; viii. t. 22 = Baccharis orgyalis.
medioserrata, *Veil. 1. c.* 827; viii. 1.15.—Bras.
megapotamica, Spreng. Syst iii. 424 - Eupatorium ericoides.
microcephala, DC. Prod. v. 853 = tenuifolia.
microphylla, Thunb. Prod. PL Cap. 142 = tenuifolia.
monantha, *Veil. FL Flum.* 331; viii. t 33.—Bras.
Montana, Vahl. Symb. Bot. i. 70 (= *Varthemia mentana).*—Arabia.
mucronata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 147 = Iphiona juniperifolia.
nauseosa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 517 = Bigelowia dracunculoides.
nivea, *Willd. Sp. PI.* iii. 1790.—Afr. austr.
noveboracensis, Desf. Tabl. ed. I. 98 - Vemonia noveboracensis.
nuda, VelL Fl. Flam. 835; viii. t. 50 = Baccharis aphylla.
nudata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 101 = Bigelowia nudata.
nupera, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PL ii. 467-Aster Linosyris.
oblongifolia, *DC. Prod.* 354.—Afr. austr.
obscura, *Veil. Fl. Flum.* 330; viii. t 30.—Bras.
odoratissima, Raeusch. Norn. ed. III. 2S5=TrilisU odoratissima.
oligophylla, VelL FL Flam. 324; viii. t. 2. = Vemonia Cephalotes.
opposita, *Veil. 1. c.* 834; viii. t. 46.—Bras.
oppositifolia, Linn. PL Rar. Afr. 18 = Pteronfe divaricata.
oppositifolia, *Veil. Fl. Flum.* 328 ; viii. 118.—Bras,
ovate, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 147.—Arabia.
palustris, Sad, PugilL 12 ; ex BertoL Fl. Itel. ix. 91" Aster linosyris.
paniculata, J. F. Gmel. Syst. 1204 = Trilisia paniculätes.
paniculata, Veil. Fl. Flum. 327; viii. t 14=Vemonia geminata.
patula, Berg. Desc. PL Cap. 284=C. Coma-aurea.
pauciflora, Veil. Fl. Flum. 325; viii. t. 5=Ageratum melissaefoUuni.
peduncularis, *DC. Prod.* v. 853.—Afr. austr.
pedunculata, Veil. Fl. Flum. 332; viii. t. 37* Vernonia ammophila.
phosphorica, VelL 1. c. 825; vSi. t. 4-VemWU» polyanthes.
pilosa, J. F. GmeL Syst. 1203=Liatris pyenostachya-
pilosa, *Veil. 1. c.* 328; viii. t 17.—Bras,
pinifolia, *Burm.f. FL Cap. Prod.* 23.—Afr. austr.
pinifolia, Spreng. Syst. iii. 424 *(=0sothamnus pi"' folius).*—*N.* Zel.
pinnatifida, *DC. Prod.* v. 354.—Afr. austr.
praeacoa, Stead. Nom. ed. II. i. 358 = C. Preacaa.
praealta, Desf. Tabl. ed. I. 98-Vemonia altissima?
Preacaa, *Veil. Fl. Flum.* 333 ; viii. t. 89.—Bras,
pterocaula, *DC. Prod.* v. 354.—Afr. austr.
pumila, Veil. Fl. Flum. 331; viii. t. 82=Veraom» grandiflora.
punctata, Steud. Nom. ed.II. i. 858 = seq.
punctulata, Veil. Fl. Flum. 335; viii. t. 49 = Eupatorium laevigatum.
purpurascens, *Veil. 1. c.* 831; viii. t. 31.—Bras,
purpurea, *Forst.f. Prod.* 54.—N. Hebrid.
purpurea, Rafin. Fl. Ludov. 64 (=Liatridis sp.)-"~ Am. bor.
purpurea, VelL L c. 334; viii. t. 45 - Baccharis ca»>' naefolia.
quadrangularis, Veil. Fl. Flum. 329; viii. t. 2» Piptocnrpha. quAdrsngiiArw*

CHRYSOCOMA:—
radiata, *fUck. ex Steud. Norn.* **ed. II. i. 869.—Hab.**
ramosa, *Raeusch. Norn,* **ed. III. 285, nomen.—Carolin.**
«panda, Veil. Fl. Flum. 827; viii. t. 18=Venionia scorpioides.
reticulata, **Labill. Nov. HolL PI. ii. 40. t. 188 = Helichrysum reticulatum.**
rosmarinifolia, **Spreng. Syst. iii. 424 - Helichrysum rosmarinifolium.**
sancta, **Veil. Fl. Flora. 824; viii. t. 3 = Baccharis Lundii.**
saxatilis, **DC. Fl. Fr. Suppl. 468=Jasonia saxatilis.**
scabra, **Ledeb. in M&n. Acad. Pétersb. v. (1812) 668 = Inula germanica.**
scabra, **Linn. Sp. PI. ed. II. 1177-Felicia reflexa.**
scoparia, **Linn. Pl. Jam. Pug. 21; Amoen. Acad. v. 881 —Baccharis scoparia.**
se *Λ*[oLinn f. Su PP'- 360 C=*Schizogyne sericea).*—**Canar.**
*"•»»«, **Hill, Veg. Syst. Hi. 128, sphalm.=C. Comaaurea.**
"errata, *Veil. Fl. Flum.* **329; viii. t. 28.-Bras.**
stssilts, **Veil. 1. c. 328; viii. t 20-Vemonia macrophylla.**
singularis. **Veil. 1. c. 825 ; viii. t. 7=Vemonia nitidula et Baccharis cassinefolia.**
P*thtulat, **Forsk. FL Aegypt. Arab. 147-Vemonia ampliafolia.**
'Phacelata, **Moench, Meth. 577 = Senecio paniculatus.**
'ptcata, **Forsk. Fl. Aegypt Arab. p. lxxiii = Ifloga Fontanesii.**
pinoša, **'Delile, Fl. Aegypt. 128. t 46-Iphiona junipenfolia.**
***9«a«ote,** Labill. Nov. HolL PI. ii. 40. t. 184= Leptorhynchus squamatus.*
***wanca,** Less, in Linnaea,* **ix. (1834) 186.—Reg. vasp.**
tennifolia, *Berg. Desc. PI. Cap.* **235.—Afr. austr.**
***"'"/0«<'. Salisb. Prod. 188-Aster Linosyris.**
***" " " toa. Veil. Fl. Flum.* 332 ; viii. t. 88.—Bran,**
romentosa, *Linn. Syst.* **ed. XII. 589.—Afr. austr.**
***tom**tosa,* **Walt. Fl. Carol. 196 = Vemonia noveboracensis.**
Edentata, *DC. Prod.* **v. 864.-Afr. austr.**
innems, *Veil. Fl. Flum.* **888; viii. t. 48.—Bras.**
***Shaw in Journ. hinB Soc,* xiv. (1874) 20, spatul. =tenuifolia.**
***T?*> ^ «• «««m. 832; viii. t. S6.-Bras.**
***"utulata,** Thunb. Prod. PI. Cap.* **142 =Nidorella amplexicaulis.**
***ora, Raeusch. Norn.* ed. III. 285, nomen.—Am. bor.**
***«iflora,** Spreng. Nov. Prov. (181«) 11 (= Varthemia «»rf.((«). Aegypt.*
***iff** Lag- Gen. et Sp.* **Nov. 25-Jasonia saxatilis.**
***verticillat«,** Veil. Fl. Flum.* **330; viii. t 26=Piptocarpha oxyphylla.**
***villosa, Linn. Sp. Pl. 841 (-1-inosyris villosa).*—Euro p.; Cane.; Sibir.**
***«a, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 884= vernonia cinerea.**
Sal«, Nutt. Gen. Am. ii. 187 -Bigelowia nndaU.
finee Hlt, ** DC- Prod, v, 841 *Solida o
***vai. Fl. Flum.* 329; viii. t. 24,-Bras.**
***IS, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 495-Aster osyris.**

CH, Y m?,9 COPTIS, No"- ^n Joum. Acad. Philad. vii. *asiiZ-J* 8> *. 1 = Coptia, Salisb. (Ranunculac.).
***Nutt. Lc 9,m obs.=Coptis asplenifolia.**
***">entalis,* Nutt 1. c. 8=Coptis occidentalis.**

C YSOCORYNE, End 1. in Bot. Zeit. i. (1848) 457 = ngianthus Wendl. (Compos.).
***angiantholdes,** Fl Mne11 in* **Linnaeai «•• (1S52) 404, 488 Å. pusillns.**
***rummon>dii,* A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 165 = A. tenellus.**
***Ituegg H.* A. Gray, l. c. 151 = A. tenellus.**
***myosuroides,* A. Gray, 1. c. 152=A. myosuroides.**
***pusilla,* End I. in Bot. Zeit i. (1843) 468 = A. pusillus.**
***tenella,* Fr.-Muell. in Trans. Viet. Inst. (1855) 130 = A. tenellus.**
***uniflora,* Tur<a in Bull so c- Nat. Mosc. »iv. (1851) I. 186 =A.myosnioides.**

CHRYSOCYATHUS, Falc. in Proc. Linn. Soc. i. (1889) 17 = Calatb.od.es, Hook. f. & Thorns. (Ranunculac.).

CHBYSOCYCNI8, Linden & Reichb. f. in Bonplandia, U. (1864) 280. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 563.
Schlimii, *Linden b" Reichb.f. I. c*—N. Granat.

CHRYSODENDRON, Vaill. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 280 (1856-67)-Frotea, Linn.

CHRYSODISCUS, Steete, in Lehm. PI. Preiss. i. 460 (1845)=Athrixia, Ker-GawL (Compos.).
***niveus,* Steetz, 1. c.=A. stricta.**

CHBYSOOIiOSSTTM, Blume, Bijdr. 337. t. 7 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 507.
DIGLYPHIS, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vii. (1828).
DIGLYPHOSA, Blume, Bijdr. 336. t. 60 (1825).
latifolium, *Benth.* b* *Hook.f. Gen.* iii. 508.—Java,
omatum, *Blume, Bijdr.* 838.—Java,
vesicatum, *Reichb.f. in Seem. Fl. Vit.* 804.—Ins. Fiji,
villosum, *Blume, Bijdr.* 888.—Java.

CHBYSOOOKinkT, Linn. Hort. Cliff. 424 (1787); Coroll. Gen. 17 (1787). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, *t* ii. 350.
CARGILLA, Adans. Fam. ii. 130 (1763).
DIOTOSTEPHUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlviii. 548 (1827).
MOONIA, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 348.
PENTALEPIS, F. Muell. in Trans. Bot. Soc. Edinb. vii. (1863) 496.
Amottianuin, *C. B. Clarke, Compos. Ind.* 132.—**Ind. or.**
dichotomum, *Vahl, in West, Bidr. Ste. Croix,* 303 ; ***DC. Prod.* v. 610.—Ins. S. Crucis.**
***Diotostephus,* DC. 1. c.-virginianum.**
ediptoides, *Benth. V Hook./, ex F. Muell. Census,* 88. —**Austral.**
heterophyllum, *C. B. Clarke, Camp. Ind.* 182.—Ind or.
***perumanum,* Linn. Sp. PI. 920 = Zinnia multiflora.**
procumbens, *Benth.* to" *Hook. f. ex F. Muell. Census,* **88.—Austral.**
trichodesmoides, *Benth. V Hook.f. I. c*—Austral,
virginianum, *Linn. Sp. PI.* 920.—Am. bor.

CHRYSOLIGA, Willd. ex DC. Pro-i iii. 89, in syn.(1828) -Neaaea, Comm. (Lythrar.).

CHRYSOLINUM, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 349-Linum, Tourn.
***gallicum,* Fourr. 1. c.=L. gallicum.**
***strietum,* Fourr. 1. c.=L. strictum.**

CHRYSOLYGA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 359 (1840)=Nesaea, Comm. (Lythrar.).
***salicifolia,* Willd. ex Steud. 1. c. = N. salicifolia.**

CHRYSOMA, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 67=Solidago, Vaill. (Compos.).
***pumila,* Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 325=S. pumila.**
***solidaginoides,* Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 67-S. paucifloscolosa.**
***uniligulata,* Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 825-S. neglecta.**

CHRYSOMALLUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 8 (1806) - Vitex, Linn. (Verbenac).
***madagascariense,* Thou, ex Steud. Nom. ed. 1.194 = V. ChrysomaUum.**

CHRYSOMELEA, Tausch, Hort. Canal, fase. i.—Cf. DC. Prod. v. 569 (1836) = Coreopsis, Linn. (Compos.).
***auriculata,* Tausch, 1. c.; ex DC. 1. c. 571-= Cor. pubescens.**
***lanceolata,* Tausch, 1. c; ex DC. 1. c 570 - Cor. lanceolate.**

CHRYSOMELON, Font, ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 874^ in syn. (1854)=8pondiaa, Linn. (Anacard.).
***pomiferum,* Forst, ex A. Gray, 1. c =S. dulds.**

CHRYSONIAS, Benth. ex Steud. Nom. ed. II. i. 269 (1840) err. typ.=Chrysosoias, E. Mey.

CHRYSOPHANIA, Knnth, ex Less. Syn. Comp. 224 (1832) = Zaluzania, Pers. (Compos.).
***fastigiata,* Kunth, 1. c. = Z. angusta.**

CHRYSOPHORA, Cham, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 94, 95. 147=Oxymeria, DC. (Melastomac).
***cinnamomifolia,* Cham, ex Triana, I. c. 147=Ossaea cinnamomifolia.**
***eordigera,* Cham, ex Triana, 1. c. 94 « Oxym. cordigera.**
***hirsutior,* Cham, ex Triana, 1. c. 95-Oxym. deflexa.**
***seeundifolia,* Cham, ex Triana, 1. c.=Oxym. secundiflora.**

CHRYSOPHTHALMUM, Phil, in Linnaea, xxix. (1857) 9 = Grindelia, Willd. (Compos.).
***andinum,* Phil. 1. c = G. andina.**

CHRYSOPHTHALMtnil, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 955 (1848) (Chrysophtalmnm). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 341.
dichotomum, *Boiss. V Heldr. Diagn. Sit.* I. ri. 6.—**As. Min.**
***montanutn,* Boiss. 1. c. 4»=stemutatorium.**
sternutatorium, *Sch. Bip. in Walp. Rep.* ii. 965.—As. Min.

CHBYSOPHYIiLTTM, Linn. Gen. ed. I. 861 (1737). *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 653.
CAINITO, Plum, ex Adans. Fam. ii. 166 (1768); Tuss. Fl. Antill. iii. 41. t. 9 (1824).
DACTIMAIA, Rafin. Sylva Tellur. 153 (1838).
GUERSENTIA, Rafin. 1. c (1888).
NIEMEYERA, F. Muell. Fragm. vii. 114 (1869-71).
NYCTERISITION, Rniz & Pav. Prod. 30. t. 6 (1794).
SCLEROXYLON, Bertol. in Mem. Ace. Sc. Boloe. viii. (1857) 237 (Misc. Bot. xiii. 15).
***acuminatum,* Boj. Hort Manrit 197—Sideroxylon ferrugineum.**
***acuminatum,* Lam. TabL Encyc. ii. 44-monopyrenum.**
***acuminatum,* Poir. Encyc. Snppl. ii. 15-Sideroxylon gnyanense.**
***acuminatum,* Roxb. Hort Beng. 17; Fl. Ind. i. 599 » Roxburghii.**
***acuminatum,* Willd. ex Roem. *k* Schult. Syst. iv. 813 = Humboldtianum.**
africanum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 163.—Afr. trap,
albidum, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 82.—Afr. trop.
alnifolium. *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 499.—Aft. Lib*p.
amplifolium, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 169.—Bras.
angustifolium, Za>K. *Tab!. Encyc.* ii. 44.—Ins. S. Doming.
***aquaticum,* H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 236-C. Cainito.**
argenteum, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 15.—Ins. Martinic.
auratum, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 97.—Bras,
bancanum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 679.—Ins. Banca.
***Barbasco,* Loefl. ex DC. Prod. via. 149=Jacquinia armillaris.**
bicolor, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 16.—Ins. Porto Rico.
***Bonplandii,* Klotzsch, ex Miq. in Mart Fl. Bras, vii 94 = C. Cainito.**
brasiliense, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 156.—Bras,
bumelioides, *Mart, in Flora,* xxii. (1839) I. *Beibl.* 1. —Bras.
***Buranhem,* Riedel, in Taunay, Man. Agric. Bras. ed. II. 318-Lncnma glycyphloea.**
***caeruleum,* Jacq. Stirp. Select. Am. 62=C. Cainito.**
Cainito, *Linn. Sp. PI.* 192.—Ind. occ /
***earolinense,* Jacq. Obs. Bot. iii. 3-Bumelia tenax.**
cayennense, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 160.—Guiana,
cuneifolinm, *A. DC. 1. c.*—Guiana,
decandrum, *Montr, in Mint. Acad. Lyon,* x. (18601 228.—N. Caled.
dubinm, *Steud. Nom.* ed. II. i. 859.—Ins. S. Doming,
dubium. *Punch,* b* *Sebert, Not. Bois. Nouv. Calid.* 195. —N. Caled.
ebenaceum, *Mart, in Flora,* xxi. (1838) II. *Beibl.* 96.—Bras,
emarginatum, *Klottsch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui* **1087.—Guiana.**
***ferrugineum,* Gaertn. Fruct. iii. 122-monopyrenum.**
ferrugineum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 359.—Peruv.
firmum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 579.—Ins. Banca.
flexuosum, *Mart, in Flora,* xx. (1887) II. *Beibl.* 98.— Bras,
fnscum, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 369.—Ind. or.

CHBYSOPHYXIiITM :—
Gardneri, *Mart. If Eickl. ex Miq.* ẗit *Mart. Fl. Bras.* vii. 102.—Bras.
glabrnm, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 15.—Ins. Martinic.
glabrum, Joss: ex Lam. Encyc. i. 245=Bnmelia tenax.
glycyphloeum, Casar. in Attí 8zia Riun. Sc. Ital. Firenze (1841) 514; Dec. Stiip. Bras. 12=Lncuma glycyphloea.
granatense, *Spreng. Syst.* i 667.—N. Granat.
grandifolinm, *Steud. Norn.* ed. II. i. 859.—Ins. Philipp.
guyanense, Klotzsch, ex Miq. in Mart Fl. Bras. vii. 98 -sericeum.
GuiBeminianum, A. DC. in DC. Prod. viii. 161 = ebenaceum.
Hostmannianum, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 98—sericeum.
Humboldtianum, *Roem.* to[1] *Sckult. Syst.* iv. 819.—Am. snstr.
Inopkyllum, Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 105 = Lucuma Inophyllum.
inomatnm, *Mart, in Flora,* xxi. (1888) II. *Beibl.* 96.—Bras.
jamaicense, Jacq. Stirp. Select. Am. 52=C. Cainito.
jannariense, *Eichl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1870) 206.—Bras.
javanicum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 859.—Java.
lanceolatum, Casar. Stirp. Bras. Dec. 64 = inomatum.
lanceolatnm, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 162.—Java.
leptocarpum, Spruce, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 106 -Lucuma leptocarpa.
longifolinm, *Mart,* b* *Eichl. ex Miq. 1. c.* 97.—Bras,
lncumifolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xiiv. (1879) 228.—Reg. Argent.
ludoviciannm, *Rafin. Fl. Ludov.* 58.—Louisiana.
Maconcou, *Aubl. PL Gui.* i. 288. t. 92.—Guiana.
macrophyllum, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 182- grandifolium.
macrophyllum, Gaertn. f. Fruct. iii. 122. t. 202. f. 1 = dubium.
•*macrophyllum,* Lam. Tabl. Encyc. ii. 44-Lucuma Rivicoa.
macrophyllum. Mart, in Flora, xxi. (1888) II. Beibl. 95 = brasiliense.
macrophyllum, Sabine, in Trans. Hort. Soc. v. (1824) 458—africanum.
magalis-montana, *Sond. in Linnata,* xxiii (185Q) 72.—Afr. anstr.
maliforme, Linn. Syst. ed. X. 937-C. Cainito.
Manglillo, Lam. Tabl. Encyc. ii. 45=Myrsine Manglilla.
Martianum, A. DC. in DC. Prod. viii. 161=ebenaceum.
maytenoides, *Mart, in Flora,* xxii. (1839) I. *Beibl. 1.*—Bras.
melanophleum, Lam. Tabl. Encyc ii. 45=Myreine mitis.
Michino, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 286.—N. Granat
microcarpum, *Sm. Prod. Veg. Ind. Occ.* 49.—Ins. S. Doming.
microphyllum, A. DC. in DC. Prod, viii 158-monopyrenum.
microphyllum, Jacq. Stirp. Select. Am. 58. t. 87.£2 = C. Cainito.
Millerianum, Lam. Tabl. Fneyc. ii. 45=Myrsine mitis.
molle, Wall. Cat. n. 4161=Payena Maingayi.
monopyrenum, Spreng. Syst. i. 666 - C . Cainito.
monopyrenum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 49.—Ind. occ.
myrsinodendron, F. Muell. Fragm. vi 178=Sideroxylon Brownii.
myrHfolium, Mart, in Flora, xxii. (1889) I. Beibl. 1- maytenoides.
natalense, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 72.—Afr. austr.
nitidissimum, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Brat. vii. 98—auratum.
nitidnm, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Ssseq.* 116.—Guiana,
obovatnm, *Sabine, in Trans. Hort. Soc.* v. (1824) 458.—Afr. trop.
obovatum, Wall, ex A. DC. in DC. Prod, viii 178- Sideroxylon ferrngineom.
obtusatum, Willd. ex Roem. & Schnlt Syst iv. 813 = C. Cainito.
oleaefolium, *Spruce, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 101.—Bras.
Olfersii, Klotzsch, ex Miq. 1. c 91=splendent.
oliviforme, Lam. Encyc. i. 6fi2-monopyrenum.
oliviforme, Linn. Syst. ed. X: 987 = C. Cainito.

CHBYSOPH YLLUM :—
Ottonis, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 94 = C. Cainito.
parviflorum, *Casar. Stirp. Bras. Dec.* 68.—Bras.
paucifiorum, Lam. Tabl. Encyc. ii 44= glabrum.
pentagonum, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 78.—China.
Perslcastrum, *Eichl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1870) 208.—Bras.
pomiforme, *Bert, ex Spreng. Syst.* i. 667.—Jamaic.
Prieurei, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 161.—Guiana,
prunifemm, *F. Muell. Fragm.* vi. 26.—Austral,
prunifolium, *Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* iii. 499.—Afr. trop.
psilophyllnm, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 160.—Guiana,
pulcherrimum, *Mart. V Eichl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 92.—Bras.
pyriforme, Willd. Sp. PI. i. 1084 = C. Macoueou.
ramifiorum, A. DC. in DC. Prod. viii. 158=Ecclinosa ramiflora.
revolutum, *Mart. V Eichl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 104.—Bras,
rhodoneurum, *Hassk. in Flora,* xxxviii. (1855) 579.—Java.
Richardii, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 97—auratum.
Roxburghii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 83.—As. trop.
rufnm, *Mart, in Flora,* xxi. (1838) II. *Beibl.* 94.—Bras.
rugosum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 49=Sideroxylon rugosum.
Schomburgkianum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 167.—Guiana.
Sebertii, *Punch, in Panch.* b* *Sebert, Not. Boh Nouv. Calid.* 194.—N. Caled.
sericeum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 158.—Guiana.
sericeum, Salisb. Prod. 188=C. Cainito.
sessiliflorum, *Pair. Encyc. Suppl.* ii 16.—Guiana,
sessilifolium, *Panch. (f Sebert, Not. Beds Nouv. Caled.* 195.—N. Caled.
sparsiflorum, *Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 90.—Guiana.
splendens, *Spreng. Syst.* i 666.—Bras.; Peruv.
subnudum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 499.—Afr. trop.
sumatranum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 579 = Roxburghii.
sundaicnm, *Miq. I. c.* 578.—Ins. Sunda.
viride, *Mart. V Eichl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 102.—Bras.
Wakere, *Panch. V Sebert, Not. Bois Nouv. Calid.* 193.—N. Caled.

CHRYSOPIA, Noronha, ex Thou. Gen. Nov. Madag. 14 (1806) = 8ympb.onia, Linn. (Guttif.).
fasciculata, Thou. 1. c. n. 48 = S. fesciculata.
gymnoclada, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat Sér. IV. xiv. (1860) 291.—Madag.
tnacropkylla, Cambess. Mém. Tern, et Gutt. 55. t 4.—Madag.
microphylla, Cambess. *Sc* Boj. ex Cambess. in Mem. Mus. Par. xvi. (1828) 423. t. 4.—Madag.
urophylla, Decne. ex Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 291.—Madag.
verrucosa, Hilsenb. *Sc* Boj. ex Planch. *Sc* Triana, I. c. 290.—Madag.

CHBYSOPOGON, Trin. Fund. Agrost 187 (1820).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1185.
CENTROPHORUM, Trin. 1. c. 106. t. 5 (1820).
PORANTHERA, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1880) 221.
RAPHIS, Beauv. Agrost. 120 (1812).
RHAFHIS, LOOT. FL Cochinch. 652 (1790).
TRIANTHIUM, Desv. Opusc. 69, obs. (1831).
aciculatus, *Trin. Fund. Agrost.* 188.—Reg. trop.
alternans, Trin. ex Steud. Norn. ed. II. i. 859- violascens?
argutus, *Trin. ex Steud. I. c.* 860.—Austral.
A'mottianus, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 896.—Ind. or.
avenaceus, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 78.—Am. calid.
ciliolatus, Boiss. FL Orient, v. 458-semlatns.
filiformis, Voigt, Hort. Suburb. Calc 704-Dimeria oraithopoda.
elongates, *Benth. Fl. Austral,* vii. 688.—Austral.

CHBYSOPOGON :—
Esenbeckii, Am. ex Stend. Syn. PL Gram. 895 - serrulatus.
FrancaviUanus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 530 -avenaceus.
fuscus, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 860=Andre pogon scir&tns.
glabratus, Trin. in Mém. Acad. Pftersb. Ser. VI. ii. (1838) 318 = C. Gryllus.
Gryllus, *Trin. Fund. Agrost.* 188.—Reg. trop. et subtrop.; Europ. austr.; Afr.
increscens, Nees, ex Stead. Syn. PL Gram. 396 = serrulatus.
Minarum, Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 73 - stipoides.
montanus, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 98.—Ind. or.
nutans, *Benth. m Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 78.—Am. calid.
pallidus, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 360.—Austral.
parviflorus, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii (1843) 411-violascens.
pauciflorus, Benth. ex Vasey, Gram. IT. St 20 = Sorghum paucifloram.
pictus, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. r. (1866) 262.—As. trop.
quinqueplumis, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 450.—Abyssin.
seeundum, Benth. ex Vasey, Gram. U. St. 20 = Sorghum seeundum.
serrulatus, *Trin. in Mlm. Acad. Pttersb.* Ser. VI. ii (1888) 818.—Ind. or.; Afr. trop.
sHpoides, Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 78 = avenaceus.
stipoides, *Trin. in Bull. Sc. Acad. P/tersb.* i (1836) 71.—Bias.
strictus, Nees, in Hook. Kew Journ. ii (1850) 95 = Andropogon interraedius.
subtilis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii 492.—Java.
subulatus, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 860 = aciculatus.
tener, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 897.—' Andor.'
trivialis, Am. & Nees, in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 171-aciculatus.
verticillatus, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 860.—Ind. or.
violascens, *Trin. iv Mem. Acad. Pétersb.* Ser. VI. ii (1838) 819.—As. trop.; Abyssin.; Austral.
Wightianus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 866.—Zeylan.
Wrightii, Munro, ex Vabey, Cat. Gram. U. St. 29 = Sorghum paucifloram.
teylanicus, Thw. Enum. Pi Zeyl. 866=Amottianu».

CHHYSOPSIS, Ell. Sketch, ii. 833 (1824). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 252.
AMMODIA, Nutt. in Trans. Am. Phil Soc. Ser. II- vii (1841) 321.
DIFLOGON, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
HECTOREA, DC. Prod. v. 95 (1886).
HEYFELDERA, Sen. Bip.in Flora, xxxvi. (1853) 35.
MACRONEMA, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. H- vij. (1841) 322,
PITYOPSIS, Nutt. 1. c. (1841) 817.
acaulis, Nutt in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 83 = Aplopappns acaulis.
alba, DC. Prod. v. 264, in syn.-Aster ptarmicoides.
alpina, Nutt in Joum. Acad. Philad. vii. (1884) 34. <• 8. f. 2=Aster scopulorum.
amygdalina, DC. Prod. V. 272, in syn. - Alter umbellatus.
andicola, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) ii. 898; *in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 131.—Chili.
argentea. Ell. Sketch, ii. 334-graminifolia.
Bolanden, A. Gray, in Proc Am. Acad. vi (1864-66) 543=villosa.
Breweri, *A. Gray, I. c.* 642.—Calif.
caespitosa, Nutt in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) »» —Aplopappus acaulis.
canescens, DC. Prod. v. 328-Erigeron filifolius.
canescens, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 256 * villosa.
coronopifolia, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii (1834; 34=Aster tanacetifolius.
decumbens, Chapm. Fl. S. U. St. 217-gossypina.
dentata, Ell. Sketch, ii. 387 -gossypina.
divaricata, Ell. 1. c. 338=Aster divaricatus.

CHKY8OP8IB:—
eckioides, Benth. Bot Voy. Sulph. 25=villosa.
ericoides. Torr. *8c* James, ex Eaton, N. Am. Bot ed. VIII. 195 - Aster ericaefolius.
falcata, Ell. Sketch, ii. 336=villosa.
foliosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1811) 316-villosa.
gossypina, *Ell. Sketch,* ii. 237.—Am. bor.
gnuniniiblia, *Ell. I. e.* 334,—Am. bor.
hirtella, DC. Prod. v. 827 = Erigeron chrysopsidis.
hispida, DC. 1. c vii. 279-villosa.
humilis, DC. 1. c. v. 273, is syn.=Aster infirmns.
hyssopifolia, *Nutt. in Jmrn.Acad.Ph.ilad.* vii, (1884) 67.—Am. bor.
Lamarckii, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 316-Aplopappus spinnlosns.
linariifolia, DC. Prod. r. 277 = Aster linariifolius.
linifolia, DC. 1. a 255, in syn.-Aster acris.
Mariana, *Ell. Sketch,* il. 385.—Am. bor.
mollis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 316-villosa.
obovata, Nott. Gen. Am. ii. 152=Aster retieulatns.
oligantha, Chapro. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. 258 :* graminifblia.
oregana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-66) 643.—Am. bor. occ.
pilosa, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 66.—Texas.
Pbifolia, *Ell. Sketch,* ii. 3S5.-Am. bor.
scabra, Ell. 1. c 339-Heterotheca Lamarckii.
scabra, Hook. 4: Am. Bot. Beech. Voy. 484 = Oxypappus scaber.
scabrella, *Torr. &• Gray, Fl. N. Am.* ii. 255.—Am. bor.
sessiliflora, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 817-villosa.
tziehophylla, *Ell. Sketch,* ii. 336.—Am. bor.
villosa, *DC. Prod.* v. 327 i vii. 279.—Am. bor.
Wrightii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 445.—Calif.

CHRYSORHOË, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) 357-Verticordia, DC. (Myrtac.).
nitens, Lindl. 1. c.=V. nitens.
'errata, Lindl. Swan River App. 6=V. senate.

CHRYSOSCIAS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Attstr. 189 (1835)=Bhynohosla, Lour. (Legnmin.).
fycina, E. Mey. 1. c. 140=R. leucoscias.
floribunda, Lem. in Illnstr. Hortic i. (1854) Misc. 56; «• (1855) t. 47.—Afr. austr.
grandiflora, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 189-R- Chrysoscias.
«"*«, E. Mey. L c—Afr. anstr.
Parviftora, E. Mey. 1. c.=R. microsdas.

CHRYSOSPERMUM, Reichb. Consp. 166 (1828), nomen ^Anthospermum, Linn. (Rnbiac).
"pens, Pritz. Ind. Ic. 288, sphalm.= *Cryphiospermum "epens,* Beauv. - Enhydra ñuctnang, *Lour.* (Compos.).

CHETSO8PLBiaUM, Toum. ex linn. Syst. i. (1785). *SAXIFRAGEAE,* Benth. * Hook. f. i. 838.
xdoxoides, Hook. f. & Thorns, ex Maxim. In BulL Acad. Pe-tersb. xxiii. (1877) S42~lanuginosum.
"bum, *Maxim. I. c.* xvii. (1872) 420.—Japon.
upinutn, Schur, in Verb- Siebenb. Ver. Naturw. v. (1852) 86=oppositifolium.
otternans, Thunb. Fl. Jap. 182-alternifolium.
"temlfolium, *Linn. Sp. PL* 398.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
•mericanum, *Schvein. ex Hook. Fl. Bar. Am.1* 342.—Am. bor.
»o'cocarpnm, *Ernst, in Flora,* Mi. (1874) 214.—
[illegible], CraM% j^ ' L i33—oppositifolium.
axilla«, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) - S41.—China.
•^Mlense, *Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mote,* liv, (1879) >• 21.—Sibir.
'"; »«« '««, Maxim, in BnU. Acad. Pétenb. xxiii. (1877) oiO = can josnn,,
carnosum, *Hook.f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii (1858) 7 8 - R«g. Himal.
Davidianum, *Deene ex Maxim.in Bull. Acad. Pitersi.* xxii. 877) 843,-Tibet. or.
Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. FT. XMBL* (1886) 7.—As. or.

CHEYSOSPLEUTTJII:—
Dickinsii, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 367.—Japon.
dubium, J. Gay, ex DC. Prod. iv. 48>macrocarpnm.
echinulatum, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 858.—Japon.
Echinus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) 347.—Japon.
elevatum, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antaret. ii. 281» macranthum.
Fauñae, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 85.—Japon.
flagelliferotn, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 184.—As. or.
fiageUiforme, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 855, lapsu = praec.
geoides, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 227 = altemlfolium.
glaciate, Fuss, Fl. Transs. 247=oppositifolium.
glechomaefolium, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am. i.* 589.—Am. bor. occ.
Grayannm, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersi.* xxiii. (1877) 848.—Japon.
Griffiths, *Hook. f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 74.-Reg. Himal.
kamtschaticum, *Fisch. ex DC. Prod.* iv. 48.—Kamtschat.
kamtschaticum, A. Gray, Bot. Jap. S89=ramosum.
lannginosum, *Hook./. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 74.~Reg. Himal.
macranthum, *Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 458. t. 16.—Patagon.
macrocarpum, *Cham, in Linnaea,* vi. (1831) 558.—Am. arct.
macrostemon, *Maxim, ex Franch.* b* *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 858.—Japon.
Maximowiczii, *Franch. V Sav. I. c.*—Japon.
mnlticanle, *Franch. tf Sav. I. o.* 861.—Japon.
nepalense, *D. Don, Prod. Fl. Nip.* 210.—Reg. Himal.
nepalense, Maxim. Prim. Fl. Amur. 121, in nota=»ulcatum.
nipponicum, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 866.—Japon.
nivafe, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 28=alternifoliura.
nndicaule, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* it 114.—Sibir.
octandrum, Caqui, ex Stead. Mom. ed. II. L 860 = oppositifolinm.
oppositifolium, Cham, in Linnaea, vi. (1881) 657 = kamtschaticum.
oppositifolium, *Linn. Sp. PI.* 398.—Europ.; As. bor.; Ind. or.
oppositifolium, Trautv. & Mey. in Middend. Reite (FL Ochot). 42=ramosom.
oppositifolium, Walt Fl. Carol. 140=americanum.
ovalifolivm, Bertol. Fl. Ital. iv. 449=macrocarpom.
ovalifolium, *Bieb. ex Ledeb. Fl. Alt.* ii. 115.—Sibir. altaic
ovalifolium, Miq. Ann. Mas. Lugd. Bat. iii. 97-macrostemon.
papillosum, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii 856 = alternifolinm.
peltatum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 27S.-Sibir.
pilosnm, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 122.—Manchnr.
ramosum, *Maxim. I. c.* 121.—Manchur.
repens, Link, ex Stead. Nom. ed. II. i. 860=oppositi. folium,
rhabdospermam, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii, (1877) 847.—As. or.
rosulare, Schott, ex Maxim. 1. c 346=oppositifolium.
rotundifolium, Schlecht ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 227 - altemifolium.
Sedakowii, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 27S.-Sibir.
sibiricum, Steph. ex DC. Prod. iv. 48-altemifolium.
sinicum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) 848.—China.
sphaerospermum, *Maxim. 1. c.* 849.—Japon.
sulcatum, Maxim. 1. c. 847-nepalense.
tenellum, *Hook. f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 78.—Reg. Himal.
tetrandrum, Fries, in Bot. Notiser (1868), 198 - altemifolium.
trachyspermum, *Maxim, in Butt. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 474.—China,
transsilvanicum, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1858) 28.—Transsylvan.

CHBTSOSPLSINIUM :—
trichospermnm, *Edgew. ex Hook.f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 78.—Reg. Himal.
uniflornm, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 472.—China,
valdivicum, *Hook. Land. Journ. Bot.* i (1842) 469 t. 17.—Chili.
Vidalii, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii 360.—Japon.
Wightii, *Franch. V Sav. I. e.* 856.—Sibir. or.
yesoense, *Franch.* b* *Sav. 1. e.* 365.—Japon.
yonnanense, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 7.—China.

CHRYSOSTACHYS, Pohl, PL Bras. ii. 65.1.143 (1831) - Combretum, Linn.
ovatifolia, Pohl, 1. c. 66.—Bras.

CHRYSOSTEMMA, Less. Syn. Comp. 227 (1832) = Coreopsis, Linn. (Compos.).
calendulacea, E. Mey. ex DC. Prod, vi 601=Gorteria calendulacea.
senifolium, ShuttL ex Walp. Ann. ii. 857=Cor. senifolta.
Tripteris, Leu. Syn. Comp. 227 =Cor. Trlpteris.

CHRYSOSTEMON, Klotzsch, in Lehm. PL Preiss. ii. 282 (1847)=PseudanthuB, Sieber (Compos.).
virgatus, Klotzsch, 1. c.=P. yirgatus.

CHRYSOSTOMA, Lilja, Fl. Suppl. i. 38 (1840); et in Linnaea, *xt* (1841) 268=MentaeUa, Linn. (Loas.).
aurea, Lilja, 11. cc 33, 264 = M. oligosperma.

CHRYSOTHAMNUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 328=Bi«elowia, DC. (Compos.).
depressus, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. & i. (1847) 171=B. depressa.
draeunculoides, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii, (1841) 324-B. draeunculoides.
lanceolatus, Nntt. 1. C.«=B. viscidiflora.
pumilus, Nutt. 1. c. 328=B. viscidiflora.
speciosus, Nutt. 1. c=B. viscidiflora.
visddiflorus, Nutt. 1. c. 824 - B. viscidiflora.

CHRYSOTHEMIS, Decne. in Rev. Hortic Sir. III. iii. (1849) 242=Tuasaoia, Reichb. (Gesnerac.).
aurantiaca, Decne. 1. c iv. (I860) 881.—Ind. oca
melissaefolia, G. Don, ex Load. Encyc. PI. SappL ii. 1402=T. pulchella.
mellitifolia, G. Don, ex Loud. 1. c.=praec
ovata, Klotzsch, in Schomb. Fauna et FL Gni. 108 — Gaiana.
pulchella, Decne. in Rev. Hortic Sér. m. iii. (1849) 242 = T. pulchella.
venosa, Decne. L a-Eplsda melittifolia i

CHRYSOTHRIX, Roem. & Schult. Mant iL 6. 144 (1824) = Cbxyelthrix, Linn. (Cyperac).

CHRYSOXYLON, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 59 (184S) = Plathymenla, Benth. (Legnmin.).
Vinhatico, Casar. 1. c = P. reticulata.

CHRYSOXYLON, Wedd. Hist. Nat Quinquin. 100 (1849)=Pogonopua, Klotzsch (Rnbiac).
febrifugum, Wedd. 1. c—Bolivia.

CHRYSURUS, Pers. Syn. 1. 80 (1805)=Iiam»rokla, Moench (Gramin.).
aureus, Beauv. Agrost. 128=L. aurea.
eynosuroides, Pers. Syn. i 80=L. aurea.
echinatus, Beanv. Agrost. 128=Cynosures echinatns.
effusus, Beauv. 1. c.=Cynosures elegans.
elegans, Beanv. L c.-Cynosurus polybracteatns.
giganteus, Tenore, FL Nap. iv. 18. t 210-Cynosarus echinatus.
gracilis, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 60-Cjnosarus gracilis.

CHRYTOTHECA, G. Don, Gen. Syst. ii. 706 (1882) - CRYPTOTHECA, Blume = Ajntn^n^n Houst, (Lythrar.).

CHRYZA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 852-CoptlB, Linn. (Ranuncolac).
borealis, Rafin. 1. c.-Coptis trifolia.

CHTHAMALIA, Decne. in DC. Prod. viii. 605 (1844) • GonolobUS, Michx. (Asclepiad.).
biflora, Decne. 1. c. = G. biflorus.
kuhnifusa, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 318.—Bras.
major, Foam. 1. c. 311.—Bras.
nummularia, Decne. in DC. Prod. viii. 605 «= G. nnmmalarias.
pedunculata, Decne. 1. c. = G. pedanculatos.
pubiflora, Decne. 1. c. «= G. pubiflorus.
purpurea, Decne. 1. c.—Bras.

CHTHONIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. ix. 173 (1817) = Pectis, Linn. (Compos.).
Bonplandiana.Cass. 1. c. xxvii. 206 = P. Bonplandiana.
caneseens, Cass. 1. c.»P. canescens.
ciliaris, Cass. 1. c. = P. ciliaris.
elongata, Cass. 1. c. = P. elongata.
glauceseens, Cass. 1. c. ix. 173 = P. ciliaris.
kumifusa, Cass. 1. c. = P. humifusa.
leptocephala, Cass. 1. c. xxvii. 206 = P. Swartziana.
prostrata, Cass. 1. c. ix. 178=P. prostrata.
pygmaea, Cass. 1. c. xxvii. 206 = P. pygmaea.
repens, Cass. 1. c. = P. serpyllifolia.

CHTHOXTOCEPHAIiUS, Steete, in Lehm. PI. Preiss. i. 441 (1815). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 322.
CHAMAESPHAERION, A. Gray, in Hook. Kew Jonrn. iii. (1851) 170.
GYROSTEPHIUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 78.
LACHNOTHALAMUS, F. Muell. Fragm. iii. 156 (1863).
Dmmmondii, *A. Gray, in Hook. Kew Journ.* iii. (1851; 178.—Austral,
psendevax, *Steetz, in Lehm. PI. Preiss.* i. 445.—Austral.
pygmaeus, *Benth. Fl. Austral,* iii. 682.—Austral,
tomentellus, *Benth. 1. c.* 581.—Austral.

CHUKRASIA, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 251. t. 22, vide Chickraasia, A. Juss. (Meliac).

CHULUSIUM, Rafin. Ann. Nat. 12 (1820) = Polygonum, Toum.
acuminatum, Rafin. Fl. Tellur. iii. 11 = P. acuminafnm.
amphibium, Rafin. 1. c. = P. amphibium.
JUiforme, Rafin. 1. c. = P. tenue.
fiuitans, Rafin. L c. = P. amphibium *1*
natans, Rafin. 1. c. =P. amphibium t

CHUNCHOA, Pers. Syn. i. 486 (1805)=seq.

CHUNCOA, Pav. ex Juss. Gen. 76 (1789) = Terminalia, Linn. (Combretac).
acHnophylla.Grixb.in Goett. Abh. xxiv. (1879) 133 = T. actinophylla.
amazonia, J. F. Gmel. Syst. 702.—Bras.
arbuscula, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 275 = T. arbuscula.
brasiliensis, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 241 - T . brasiliensis. *Eichl.*
Chicharronia, Griseb. Cat PI. Cub. 109-T. Chicharronia.
diptera, F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. ii. 214=T. oblonga.
eriostachya, Griseb. Cat. PI. Cub. 109 = T. eriostachya.
flavescens, Presl, Epim. Bot. 215.—Bras.
glabra, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 8979=T. Arjuna.
lactiflua, F. Muell. Fragm. ii. 149 = T. bursarina.
oblonga, Pers. Syn. i. 486 = T. oblonga.
obovata, Pers. 1. c.=T. obovata.
tomentosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. subn. 3978 - T . tomentosa.
tnflora, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 132.—Reg. Argent.

CHUPALON Adans. Fam. ii. 164 (1763) "Thibaudia, Pav. (Vacdniac.).

CHUPALONES, Nieremb. ex Stend. Norn. ed. IL i. 361 (1840)=praec.

CHUQUIHAQA, Juss. Gen. 178 (1789). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 488.
DASYPHYLLUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 17. t. 308 (1820).
DIACANTHA, Lag. Amen. Nat. i. 40 (1811).
FLOTOVIA, Spreng. Syst. iii. 359 (1826).
JOANNESIA, Pers. Syn. ii. 883 (1807).
JOHANNIA, Willd. Sp. PI. iii. 1706 (1801).
FIPTOCAKPA, Hook. *Sc* Am. in Comp. Bot Mag. i. (1835) 110.
acanthophylla, *Wedd. Chlor. And.* i. 5.—Bolivia,
adcularis, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 892.—Chili.
alpina, Poepp. ex Less. Syn. Comp. 96 = oppositifolia.
anomala, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 392.—Chili.
Avellanedae, *Lorentt, in Roca, Exped. Rio-Negro,* ii. 245.—Patagon.
Candolleana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 358.—Bras.
chrysantha, *Field,* b* *Gardn. Serf. PI.* t 12.—Chili,
ciyptocephala, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 355.—Bras.
Doniana, *Baker, 1. c.* 368.—Bras.
Echegarayi, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iv. (1881) 17.—Reg. Argent,
erinacea, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 892.—Chili; Patagon.
excelsa, *D. Don, 1. c.*—Chili,
floribunda, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 362.—Bras.
fodinarum, *Baker, I. c.* 856.—Bras.
fruticosa, Juss. ex Steud. Norn. ed. II. i. 361 = insignis.
glabra, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 363.—Bras.
Grisebachii, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iv. (1881) 359.—Reg. Argent
hispida, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 287.—Bras.
Hystrix, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 392.—Chili; Patagon.
incana, D. Don, 1. c. = ulicina.
infundibularis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 367.—Bras.
insignis, Humb. & Bonpl. PL Aequin. i. 163 = Jussieui.
juniperina, *Decne. in Orbign. Voy. Bot.* t. 11.—Am. austr.
Jussieui, *7. F. Gmel. Syst.* 1205.—Perav.; Ecuador.
Kingii, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1881) 224.—Patagon.
lancifolia, *Humb. &• Bonpl. PI. Aequin.* i. 153.—Peruv.; Ecuador,
latifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 357.—Bras.
latifolia, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 288=glabra.
leptacantha, *Baker, in Mart. Fl. Bxas.* vi. III. 360.—Bras,
leucoxylon, *Poepp. ex Less. Syn. Comp.* 95, in syn.—Chili,
linearis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 91.—Chili,
macrocephala, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 359.—Bras.
microphylla, Humb. *Sc* BonpL PI. Aequin. i. 151.1.13 = Jussieui.
oppositifolia, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 392.—Chili,
orthacantha, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 360.—Bras,
paniculata, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 289.—Bras,
patagonica, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 111.—Patagon.
peruviana, Jaume St. Hil. Fam. Nat. i. 394=Jussieui.
racemosa, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. HI. 363.—Bras.
Regnellii, *Baker, 1. c.* 369.—Bras,
reticulata, *DC. Prod.* vii. 9.—Bras,
revoluta, *Field, (f Gardn. Serf. PI.* sub t. 43.— Chili,
rotundifolia, *Wedd. Chlor. And.* i. 4.11.—Peruv.
ruscifolia, *D. Don, in Phil. Mag.* (1832) 392.—ChiU.
spinescens, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 362.—Bras,
spinosa, *D. Don, in Trans. Linn. See.* xvi. (1830) 286.—Peruv.
Sprengeliana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 357.—Bras.
synacantha, *Baker, 1. c.* 861.—Bras.
tomentosa. Baker, 1. c. 860 = paniculata.
trichophylla, *Baker, 1. c.* 856.—Bras,
ulicina, *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 110.—ChiU.

CHUQUrRAO A :—
Unguis-cati, *Ces. in Atti Soc. Sc. Nap.* v. (1878) 11. n. 7.-Hab.J
vagans, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 361.—Bras,
velutina, *Baker, 1. c.* 358.—Bras,
vepreculata, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 290.—Venezuela.

CHURUMAYA, Rafin. Sylva Tellur. 85 (1838)° Piper, Linn.
arborea, Rafin. 1. c—P. Churumaya.

CHUSQUEA, Kunth, Syn. PI. Aequin. i. 251 (1822). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1209.
DENDRAGROSTIS, Nees, in Linnaea, ix. (1831) 187.
MUSTELIA, Cav. ex Steud. Norn. ed. II. i. 361, in syn. (1810); &. 168.
RETTBEKGIA, Raddi, Agrost. Bras. 17 (1823).
abietifolia, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 529.—Ind. occ.
acuminata, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 204.—Bras.
amplopaniculata, Steud. Syn. PI. Gram. S37=Dinochloa Tjankorreb,
andina, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 103.—Chili,
anelythra, *Nees, in Linnaea,* ix. (1831) 191.—Bras,
anelytroldes, *Rupr. ex Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 206.—Bras,
aristata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 61.—Ecuador.
Bilimeki, *Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 687.—Mexic
breviglumis, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 103 = C. Culeou.
capitate, *Nees, in Linnaea,* ix. (1831) 189.—Bras,
capituliflora, *Trin. in Mém. Acad. Petersb.* Sér. VI. iii. (1835) 613.—Bras,
cannata, *Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 587.—Mexic.
ciliata, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1861-65) 299=tenuiflora.
Culeou, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.-ri.* 450.—Chili.
Cumingii, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 487.—Chili.
Dombeyana, *Kunth, Rev. Gram.* ii. 553. t. 191.—Peruv.
fasciculata, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. ill. 202.—Bras.
Feadleri, Munro, in Trans.Linn. Soc. xxvi. (1868) 61.—Venezuela.
Fernandeziana, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 577.—Chili.
fimbriaia, Steud. Syn. PI. Gram. 838=Merostacbys capitata.
Galeottiana, *Rubr. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 216.—Mexic.
Gaudichaudii, *Kunth, Rev. Gram.* i. 138, 331. t. 78.—Bras.
glomerata, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 60=Merostachys capitata.
heterophylla, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 488.—Bras.
humilis, Lechl. ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868)60 = spicata.
intermedia, .Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 52, nomen»C. Quila.
Jamesoni, Steud. Syn. PI. Gram. 887=scandens.
Uptophylla, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 489-Arthrostylidium leptophyllum, Trinii.
Liebmanni, *Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. vi.* 687.—Mexic.
ligulata, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 62 = Fernandeziana.
Lorentziana, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1871) 249.—Reg. Argent
Meyeriana, *Rupr. ex Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. "'• 203.—Bras,
montana, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1861-65) 298.—Chili.
Mulleri, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 65.—Mexic.
oligophylla, *Rupr. in Mém. Acad. Pitersb. Sit.* VI. v. (1839) 121.—Bras,
nigricans, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1865) II. 323.—Chili,
pallida, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 65.—N. Granat
parmfolia, Phil, in linnaea, xxxiii. (1864-65) 299" Cumiogii.
pinifblia, *Nees, I. c.* ix. (1831) 490.—Bras.

CHXrSQTTBA:-
pubescens, Steud. Syn. PI. Gram. 387 = C. Quila.
Purdieana, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 56.-N. Gnuiat.
Quila, E. Desv. in C. Gay, Fl. ChiL vi. 447 = tenuinora.
Quila, *Kuntk, Rev. Gram.* i. 138, 829. t. 77.—Chili,
•candens, *Kunth, Syn. PI. Aequin.* i. 254.—Am. austr.
sclerophylla, *Dotll, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 200.—Bras.
Sellowii, *Rupr. in Mini. Aead. Pitersb.* Ser. VI. v. (1839)] 26.—Bras,
simplidflora, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 54.—Panama.
simplicifolia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 587, sphalm.=simpliciflora.
Spencei, *Ernst, in Journ. Bot. x.* (1872) 262.—Venezuela,
spicata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 60.—Pernv.
spinosa, *Faurn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 587.—Mexic.
tenella, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 492.—Bras,
tenniflora, *Phil, in Linnaea,* xxx. (18S9-60) 206.—Chili.
tenaiglnmis, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 199.—Bias,
tessellata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 60.—N. Granat.
uliginosa, *Phil, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 207.—Chili.
uniflora, *Steud. Syn. PI. Gram.* 887.—Ins. Cuba.
valdiviensis, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 146 = C. Quila.
Veneiuelae, *Steud. Syn. PI. Gram.* 887.—Venezuela,
wilkesii, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 88.—Bias.

CHYDENANTHUS, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. >• (1875) lll=Barringtonia, Forst. (Myrtac).
"celsus, Miers, 1. c. 112-B.excelsa.

CHYLOCALYX, Hassk. in Flora, xxv. (1842) n. Beibl. .•^0=Polygomun, Toum.
perfoliatus, Hassk. 1. c-P. perfoliatum.
senticosus, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 65 = P. senticosum.

CHYLODIA, Rich, ex Cass. in Diet. Sc. Nat. xxix. 491 a828) = Wxilfaa>Neck. (Compos.).
'armentosa, Rich. 1. c 492-W. stenoglossa.

CHYLOGALA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. wn- (1869) 150-Euphorbia, Linn.
Errata, Fourr. 1. c. = E. serrata.

CHXHOCARPUS. G- Don.in Tran»- L">»- Sot xvii. 13 -{i834)=Tropaeoliim, Linn. (Geraniac.).
Q'achyceras, Heynh. Nom. i. 195=T. brachyceras.
vonttii Heynh. 1. c. = T. Jarattii.
pentaphyllus, D. Don, in Trans. Linn. Soc.: vii. (1884) 14 = T. pentaphyllum.
Wyphyllus, Heynh. Nom. i. 195 = T. polyphyllum.
fectesus, Walp. Ann. i. 142 = T. spedosum.
'"color, Heynfi. Nom. i. 195 = T. tricolorum.
**l*rosus,* Heynh. 1. c.-T. tuberosum.

C^™fpCOCCA, Meissn. in DC. Prod. xiv. 665 ffi 19. *THYMELAEACEAE,* Benth. & Hook. f. 4.
"npetroides, *Meissn. I. c.—ASr.* austr.

°HX*IOCORMUS, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 23=Fockea, Endl. (Asclepiad.).
**•'"> Harv. 1. c. 24.—Afr. austr.

CHYSIS, Lindl. Bot. Reg. xxiii. t. 1937 (1837). ORCHIDEAE> Benth_ * Hook_ f_ia_ 5„_
£ ? ' *Undl* _ '• '—Chili.
'n«!tescens, *Lindl. I. c.* (1840) *Misc.* 61.—Mexlc.
Bruenn. (W57^*anai *Reichb_ *, V WarsCm ,n Bot_ Zeit_ xv_ 57.—Peruv.
Chfj°niY,* Reichb. f. in Gard. Chron. (1874) I. 535

»,.*Lindl. Bot. Reg.* (184«) *Mite.* 61.-Mexic.
Lim minghii, *Linden V Reichb. f. in C. Koch, Allg.* Gartt "£ xxvi, <1858) S80.-Mexie.
£™°y»> *Heynh. Nom.* ii. 148.-Mexic.
•*»• x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1880) I. 616.

CHYTRA, Gaertn. f. Frnct. iii. 184. t. 214 (1805) = Buohnera, Linn.) (Scrophularin.).
anomala, Gaertn. f. 1. c.—Hab. I

CHYTRACULIA.P. Br. Hist. Jamaic. 239. t. 87 (1756) = Calyptranthes, Sw. (Myrtac.).

CHYTRALIA, Adans. Fam.ii. 80 (1768) = Calyptranthea, Sw. (Myrtac).

CHYTKANTHUS, Hook. f. in Benth. & Hook, f. Gen. i. 408 (1863). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook.f. 1.c.
Mannii, *Hook.f. I. c.—Ah.* trop.
Prieurianus, *Baill. Adansonia,* xi. (1878-76) 241.—Guiana.

CHTTBOOL08SA, Reichb. *f.* in Hamb. Gartenz. xix. (1863) 546. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 569.
auiata, *Reichb. f. I.* c—Hab.t
Marileoniae, *Reichb. f. 1. c.*—Bras.

CHYTROMA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 229 =Leoythis, Loefl. (Myrtac).
amara, Miers, 1. c. 231=L. amara.
apiculata, Miers, 1. c. 245.—Bias.
basilaris, Miers, 1. c. 239.—Guiana.
chartacea, Miers, 1. c. 231=L. chartacea.
cincturata, Miers, 1. c 287.—Bras.
cistella, Miers, 1. c 233.—Bras.
grandifolia, Miers, 1. c. 237 = L. grandiflora.
Ibiriba, Miers, 1. c 236.-Bras.
Idatimon, Miers, 1. c. 289 = L. Idatimon.
incareerata, Miers, 1. c 282.—Bras.
marawynensis, Miers, 1. c. 246=L. marawynensis.
monosperma, Miers, 1. c. 239-L. monospenna.
ovalifolia, Miers, 1. c. 244 = L. ovalifolia.
perspicua, Miers, 1. c. 246.—Gniana.
pilocarpa, Miers, 1. c. 238.—Bras.
retusa, Miers, 1. c. 248=L. retusa.
rorida, Miers, 1. c.=L. rorida.
rosea, Miers, 1. c. 242 = L. rosea.
rubriflora, Miers, 1. c.241.—Guiana.
salebrosa, Miers, 1. c. 240 «=L. salebrosa.
Schomburgkiana, Miers, 1. c. 230=L. Schomburgkii.
Spruceana, Miers, 1. c. 235=L. Spruceana.
turbinata, Miers, 1. c, 284 = L. turbinata.
urceolata, Miers, 1. c. 237.—Bras.
valida, Miers, 1. c. 241.—N. G.snat.

CIANITIS, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 10 = CYANITIS, Reinw.=Dichroa, Lour. (Saxifrag.).

CICCA, Linn. Mant i. 124 (1767) - PbyUanthus, Linn. (Euphorbiac).
acidissima, Blaaco, Fl. Filip. ed. I. 700 = P. acidissimus.
albúzioides, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 239.—Burma.
anomala, Baill. Etud. Gen. Euph. 619 = P. indicus.
antillana, A. Juss. Tent. Euph. 108. t. 4. f. 13 13 = P. nobilis.
arborea, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 166 = P. nobilis.
brasiliensis, Baill. Etud. *Gin.* Euph. 618, nomen = P. nobilis.
chinensis, Baill. 1. c; Atlas, 45 = P. nobilis.
decandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 701 = P. reticulatus.
discoidea, Baill. ia Adansonia, i. (1860-61) 85 - P. discoideus.
disticha, linn. Mant. i. 124=P. distichus.
Emblica, Kurz, For. Fl. Brit. Bnrma, ii. 352--P. Emblica.
fiexuosa, Sieb. *Sc* Zncc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 35= P. japonicus.
Gaertneriana, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 416, in syn.=P. cyanospermus.
Leueopyrus, Kurz, For. Fl. Brit Burma, ii. 353= Fluggia Leucopynis.
macrocarpa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 239.—Burma.
macrostachya, Benth. Bot. Voy. Sulph. 166 = Picramnia Antidesma.
microcarpa, Benth. Fl. Hongk. 812=P. reticulatus.
nodiflora, Lam. Encyc. ii. 1 = P. dislichus.
obmata, Kurz, For. Fl. Brit Burma, ii. 854 = Fluggia microcarpa.

CICCA :—
Pavoniana, Baill. Etud. Gen. Enph. 618 = Phyllanthus nobilis.
pentandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 701 = Fluggia microcarpa.
racemosa, Lour. Fl. Cochinch. ii. 656 = P. acidissimus ?
reticulata, Knrz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 854 = P. reticulatus.
rhomboidalis, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 51=P. rhomboidalis.
scandens, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 165=P. scandens.
sinica, Baill. Etud. Gen. Euph. 618. t. 24=P. nobilis.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xxi. (1848) 479=P. nobilis.
virens, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 166 = P. virens.

CICENDIA, Adans. Fam. ii. 503 (1763). *GENTIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 810.
compestris, Rafin. Fl. Tellur. iii. 26 = Gentiana campestris.
Candollei, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 168 = pusilla.
exaltata, Griseb. 1. c. 159 = Erythraea Douglasii.
fastigiata, Griseb. 1. c 158 = Hoppea fastigiata.
filiformis, Delarb. Fl. Auv. L 20; ed. II. 20-Micro cala filiformis.
glacialis, Rafin. Fl. Tellur. iii. 26 = Gentiana tenella.
hyssopi/olia, Wight & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 249 - Enicostema littorale.
microphylla, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 88 = Sebaeakhasiana.
Poeppigii, Griseb. in DC. Prod. ix. 62 (Microcalae sp).—Bras.
pulchella, Griseb. Gen. et Sp. Gent 159 = Eiythraea ramosissima.
pusilla, *Griseb. I. c.* 157.—Enrop.
quadrangularis, Griseb. 1. c. = Microcala qnadrangularis.
quitensis, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 38 = Erythraea quitensis.
Roxburghii, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 160=Hoppea dichotoma.
stricta, *Griseb. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 143.—Guatemala.
tenella, Rafin. Fl. Tellur. iii. 26-= Gentiana tenella.

CICEB, [Tourn.] Dim. Syst ed. I (1735). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 524.
NOCHOTTA, S. G. Gmel. Reise, iii. 23. t. 3 (1774).
Adonis, Orph. ex Nym. Consp. 200=ervoides.
anatolicum, *Ale/, in Bonplandia,* ix. (1861) 349.—As. Min.
arietinum, *Linn. Sp. PI.* 738.—Enrop.; Oriens; Ind. or.
cuneatum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 195 = arietinum.
ervoides, Brign. Fasc. PI. Forojul. 27 = Lens Lenticula.
ervoides, *Fentl, in Russegg. Reise, i.* 894, in obs.—Graecia; As. Min.; Syria,
floribundnro, *Fentl, I. c.* 892. t 9.—Cllicia.
glutinosum, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 349 - anatolicum.
graecum, *Orph. ex Soiss. Diagn.* Ser. II. ii. 43.—Graecia.
grossum, Salisb. Prod. 840=arietinum.
Jacquemontii, Jaub. *Sc* Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xviii. (1842) 231 = soongaricum.
judaicum, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. ISO = pinnatifidum.
Lens, Willd. Sp. PI. iii. 1114 = Lens esculent*.
microphyllum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 200 = soongaricum.
minutum, *Boiss. (f Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 130.—Persia.
Montbretii, *Jaub. V Spach, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 229.—As. Min.
nigrum, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 861 = Lens esculents.
numulariaefolium. Lam. Encyc. ii. 2 = Crotalaria biflora.
oxyodon, *Boiss. b" Hohen. Diagn.* Ser. I. ix. 129.—Persia.
physodes, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 532 = arietinum.
pimpinellifolium, Jaub. *Sc* Spach, in Ann. Sc. Nat. *Sit.* II. xviii. (1842) 228-ervoides.

CICER:—
pinnatifiAam,7aub.b"Sfiach,in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842) 227.—As. Min.; Mesopotam.
punctatum, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 861-Lens Lenticula.
punctulatum, Hort ex Ser. in DC. Prod, it 366=Lens escalenta.
pnngens, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 44.—Afghanist.
sativum, Schkuhr, Handb. ii. 367. t. 202 = arietinum.
soloniense, Schrank, ex G. Don, Gen. Syst. ii. 312 = Lens Lenticnla.
songaricum, Jaub. *8c* Spach, Illnstr. i. 84. t. 43 B •= anatolicmn.
songaricum, *Steph. ex DC. Mtm. Ug.* viil. 349.—Soongar.; Himal. bor. occ.
spiroceras, *jaub. V Stack, in Ann. Sc. Nat.* Sér.- II. xviii. (1842) 283.—Persia.
subaphyllnm, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 44.—Persia,
tragacanthoides, *Jaub. &• Spach, in Ann. Sc. Nat. Sit.* II xviii. (1842) 234.—Persia; Turkestan.

CICERBITA, Wallr. Sched. Crit. 433 (1822)=Laotuoa, Toum. (Compos.).
acuminata, Wallr. 1. c. 434 = L. acuminata.
alpina, Wallr. 1. c. = L. leucophaea.
iorealis, Wallr. I. c. = L. leucophaea.
canadensis, Wallr. 1. c. = L. canadensis.
corymbosa, Wallr. 1. c.=L. quercina.
elongata, Wallr. 1. c.=L. canadensis.
floridana, Wallr. 1. c.-L. floridana.
intybacta, Wallr. 1. c.= Brachyramphus intybaceus.
leucophaea, Wallr. 1. c.=L. leucophaea.
macrophylla, Wallr. 1. c.=L. macrophylla.
muralis, Wallr. 1. c 486 = L. muralis.
Plumieri, Kirschl. in Mem. Soc. Hist. Nat. Strassb.iv. (18B5) [n. xv.] t. 1=L. Plnmieri.
quercina, Wallr. Sched. Crit. 435 = L. quercina.

CICERCULA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. i. (1787) 358=Iiathyrus, Tonm. (Legumin.).
alata, Moench, Mcth. 163 = L. sativus.
alia, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (17-87) 368 = L. sativus.
anceps, Moench, Meth. 168 = L. Cicera.
caerulea, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 858=L. sativus.
Cicera, Met. in Bonplandia, ix. (1861) 147-L. Cicera.
sativa, Media Phil. Bot 1. 203=L. sativus.

CICERELLA, DC. Prod. iL 869 (lB26)=praec

CICHOBIT7M, [Toom.] Linn. Syst. ed. I (1786). *COUPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 506.
ACANTHOPHYTON, Less. Syn. Comp. 128 (1832).
alatum, Hochst. & Steud. ex DC. Prod. vii. 75 = Geigeria alata.
ambiguum, Schnlt. Obs. 170=pumilnm.
bytantinum, Clem, in Mem. Ace. Sc. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 285 = C. Intybus.
caeruleum, Gilib. Fl. Lituan. i. 224 - C. Intybus.
callosnm, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 17.—Afr. bor.
calvum, *Sch. Bip. in Ind. Sent. Hort. Berol.* (1859) 7,nomen; *Sckveinf. Beitr. fl. Aethiop.* 148.—Afr. trop.
Casnia, C. B. Clarke, Comp. Ind. 260=C. Intybus.
Cicorea, Dum. Fl. Belg. Prod. 64 = C. Intybus.
commune, Pall. Reise, iii. 855 = C. Intybus.
Cosnia, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 3241 = C. Intybus*
crispum, Mill. Card. Diet ed. VIIL n. 4 - C. Endivia.
dichotomum, Link, Handb. i. 811, sphalm.=pnmilum.
divaricatum, Heldr. ex Nym. Consp. 472 - C. Intybus.
divaricatum, Schousb. Vextr. Marok. 197=pumilum.
Eodivia, *Linn. Sp. PI.* 818.—Europ.; Oriens.
esculentum, Salisb. Prod. 183=C. Endivia.
glabratum, PresI, Fl. Sic i. 32-C. Intybus.
glandulosum, *Boiss. (S Huet, Diagn.* Ser. II. iii. 87.—As. Min.; Mesopotam.
glaucum, *Hoffmgg. tf Link, Fl. Port.* ii. 178.—Hispan.
hirsutum, Gren. in Acad. Sc. Besanç. Séanc. Publ. (1838) 187=C. Intybus.
Intybus, *Linn. Sp. PI.* 813.—Europ.; Oriens.

CICHOBimi:—
minimum, *Portenschl. Enum. PI. Dalm.* 16.—Dalmatia.
nanum, Portenschl. ex Nym. Consp. 472=pumilum
Noëanum, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 717—Mesopot.
officinale, Gueldenst ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 774 - C. Intybus.
ferenne, Stokes, Bot. Mat Med. 188 - C. Intybus.
polystachyum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 18.—Afr. bor.
pumilum, *Jacq. Obs.* iv. 8. t. 80.—Reg. Mediterr.
rigidum, Salisb. Prod. 183=C. Intybus.
spinosum. *Linn. Sp. PI.* 818.—Italia; Graecia.
sylvestre, Lam. FL Fr. ii 120 = C. Intybus.

CICLOSPERMUM, Lag. Amen. Acad. Madr. ii. (1821) 101=Apium, Linn. (UmbelUf).
Ammi, Lag. 1. c,=A. AmmL

CICONIUM, Sweet, Geran. i. p. ix (1822) - Pelargonium, L'Heiit. (Geraniac).
acetosellum, Hoffingg. Verz. Pfl. 48=P. acetosellum.
acetosum, Hoffmgg. 1. c.=P. acetosum.
aequalifiorum, Sweet, ex Stead. Nom. ed. IL i. 862 = P. aequalifloram.
aibidum, Sweet, 1. c.=P. albidum.
amabile, Hoffmgg. Verz. Pfl. 48 = P. amabile.
Bentinckianum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 85 = P. Bcntinkiaantn*
Bluecherianum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 48 - P. Bluecherianum.
bracteosum, Sweet, Hort Brit. ed. I. 85=P. bracteosum.
cerinum, Sweet, Geran. ii. t. 176-P. Inquinans.
clarum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 48=P. zonale.
coccineum, Hoffmgg. 1. c. = P. hybridum.
eoccinifiorum, Hoffingg. Lc.«P. zonale.
crenatum, Hoffmgg. 1. c.=P. zonale.
crenatum, Hoffmgg. I. c.; Sweet, Hort Brit. ed. I. 85 —P. crenatum.
densiflorum, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 75=P. zonale.
Fothergillii, Sweet, Geran. iii. t. 226=P. Fothergillii.
fulgens, Hoffmgg. Verz. Pfl. 48 = P. formosissimom.
/»/£««, Sweet, Hort. Brit. ed. I. Add. 471 = P. fulgens.
glabrifolium, Sweet, Geran. iv. t. 363=P. glabrifofium.
heterogamum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 84= P. heterohilare, Hoffmgg. Verz. Pfl. 49=P. hilare.
homogamum, Hoffmgg. 1. c.=P. heterogamum.
humile, Sweet, Hort. Brit. ed. L 84-P. scandens.
hybridum, Sweet, Geran. i. Ind.=P. hybridum.
inquinans, Hoffmgg. Verz. Pfl. 49=P. inquinans.
lanuginosum, Hoffingg. 1. c. =P. lanńginosum.
lateritium, Hoffmgg. 1. c.=P. malvaefolium.
lavaterae/olium, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 76 = P. lavateraefolium.
leptopetalum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 84 - P. leptopetalum.
leucanthum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 49=P. zonale.
lucidum, Hoffmgg. 1. c.=P. lucidum.
malvaefolium, Sweet Hort. Brit. ed. L 84 = P. malvaefolinm.
marginatum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 49=P. marginatnm.
micranthum, Sweet, Geran. iii. t 196=P. micrantbum.
monstrum, Sweet, Geran. i. Ind.=P. monstrum.
multiflorum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 49»P. multiflorom.
orbicular, Hoffmgg. 1. c. = P. obtasifolium.
oxyphyllum, Sweet, Hort Brit ed. III. 120 - P. hybridum.
placidum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 49-P. amoenum.
Porphyrio, Hoffmgg. 1. c. 50=P. Porphyrio.
propugnatum, Hoffingg. 1. c.=P. fulminans.
pumilum, Hoflingg. L c.=P. scandens.
puniceum, Hoffmgg. 1. c.=P. punicenm.
purpurifiorum, Hoffmgg. 1. c.=P. purpureum.
reticulatum. Sweet, Geran. ii. t. 143=P. retinervium.
Xosula, Hoffmgg. Verz. Pfl. 60 = P. zonale.
scandens, Hoffmgg. 1. c. = P. scandens.
siccifolium, Hoffmgg. 1. c. = P. siccifolium.
Skelii, Hoffmgg. L c.=P. Skelii.
stenopetalum, Hoffmgg. 1. c.^P. zonale.
umbellatum, Hoffmgg. l.-e.=P. nmbellatum.
urenaefolium, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 76=P. urenaefolinm.
velutinum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 50=P. ovale.
tonale, Hofimgg. 1. c = P. zonale.

CICtTTA, [Tourn.] linn. Syst. ed. I (1785). *UMBELLIFERAE,* Benth. *8c* Hook, *t I* 889.
KERASKOMION; Rann. New Fl. Am. iv. 21 (1836).
africana, Lam. Encyc. ii. 4 - CapnophyUum africanum.
Amomum, Crantz, CI. Umb. Emend. 96 » Sison Amomum.
angustifolia, Kit in Schnlt Oester. FL ed. II. i. 615 »-virosa.
Bolanderi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xl. (1876) 189. —Am. bor. occ.
bulbifera, *Linn. Sp. PI.* 256.—Am. bor.
califoraica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vil. (1868) 844.-Calif.
capillacea, Nutt. ex DC. Prod. iv. 107'Discopleura Nuttallii.
cynapicum, Crantz, CL Umb. Emend. 98-Aethnsa Cynapium.
Cynapium, Targ. 1st. Bot. ii. 227-Aethusa Cynaplum.
cellulosa, Gilib. Fl. lituan. ii. 36>virosi.
dahurica, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 45, nomen=Apium lineare.
dichotoma, Poir. Encyc Snppl. ii. 261=CapnophyUum dichotomum.
latifclia, Crantz, Cl. Umb. Emend. 97=Sium latifolium.
maculata, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 142 = califoraica?
maculata, Lam. Fl. Fr. iii. 104 = Conium maoulatum.
maculata, *Linn. Sp. PI.* 266.—Am. bor.
major, Lam. Fl. Fr. iii. 456=Conium maculatum.
Ninci, Crantz, Cl. Umb. Emend. 97=Sium Ninsi.
nipponica, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 86.—Japon.
nodifiora, Crantz, Cl. Umb. Emend. 97-Apium nodiflorum.
occidentals, *Dougl. ex Heynk. Nom.* ii. 144, nomen.—Am. bor.
officinalis, Crantz, Cl. Umb, Emend. 98= Conium maculatum.
perennans, Walt. Fl. Carol. 116=Cryptotaenia canadensis?
rigens, Lam. Encyc. ii. 4 (=5«»i«> *» rigens).*—Afr. anstr.
sicula, Crantz, Cl. Umb. Emend. 97 = Kundmannia sicula.
sinensis, Zuccagni, in Roem. Collect. 135»Selinsm Monnieri.
suffruticosa, Poir. Encyc. Snppl. ii. 261 - CapnophyUum Jacquini.
tenuifolia, Schrank, in Denkschr. Akad. Mnench. vii. (1818?)56.t.4.f. l = virosa.
trachypleura, *S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* 417. —Am. bor. occ.
venenata, Nutt. ex Steud. Nom. ed. II. i. 862 = Archangelica hirsuta.
venenosa, Greenw. in Trans. Am. Phil. Soc. Iii (1798) 234=Archangelica hirsuta.
virosa, *Linn. Sp. PL* 255.—Europ.; As. bor.; Ambon

CICUTARIA, Moench, Meth. Suppl. 82 (1802) (Un>bellif.).
dioica, Moench, 1. c.=Trinia vulgaris.
verticillata, Moench, 1. c. - Molopospermnm dcutarium.

CICUTARIA, [Toum.] Lam. Fl. Fr. iii. 445 (1778)-Ciouta, Tourn. (Umbellif.).
aquatica, Lam. Fl. Fr. iii. 445 = Cicnta virosa.
bulbifera, Lam. Encyc. ii S=Cicnta bulbifera.
maculata. Lam. 1. c. 2-Cicota maculata.
virosa, Delarb.Fl. Auv. ed. II. 415-Cicuta virosa.

CIECA, Adans. Fam. ii. 855 (1768) - JuloorotoS, Mart. (Euphorb.) (J. argenteus).

CIECA, Medic. Malv. 97 (1787)=Passiflora, Linn.
angustifolia, M. Roem. Syn. Pepon. 143=P. snberosa.
appendiculata, M. Roem. 1. c. 146=P. auriculata.
auriculata, M. Roem. 1. c. 148 = P. auriculata.
bauhinaefolia, M. Roem. 1. c 146=P. bauhinifolia.
Berteriana, M. Roem. 1. c.=P. Berteriana.
bilobata, M. Roem. 1. c 146=P. bilobata.
Cavanillesii, M. Roem. 1. c. 140=P. enprea.
cinerea, M. Roem. 1. c. 148 - P. dnerea.

CIECA:—
colubrina, M. Roem. Syn. Pepon. 143=>Passiflora triloba.
coriacea, M. Roem. 1. c 148 - P. eoriaeea.
euprea, M. Roem. 1. c. 139=- P. cuprea.
Dictamo, M. Roem. 1. c. 116 = P. Dictamo.
difformis, M. Roem. 1. c 140 = P. coriacea.
discolor, M. Roem. 1. c.-P. Maximiliana.
flexuosa, M. Roem. 1. c. 148 = P. suberosa.
glabrata, M. Roem. I. c. 148 = P. lunata.
globosa, M. Roem. 1, c. 144 = P. suberosa.
gracilis, M. Roem. 1. c 141 = P. gtacilis.
guyanensis, Klotzsch, in Schomb. Fauna et FL Gui. 986, nomen.—Guian.
hederacea, Klotzscb, 1. c. 1090, nomen.—Guian.
hederacea, M. Roem. Syn. Pepon. 141 = P. suberosa.
heterophylla, Moencb, Meth. Suppl. M l = P. angustifolia.
Umbata, M. Roem. Syn. Pepon. 148 = P. limbata.
littoralis, M. Roem. 1. c. 145 = P. suberosa.
maculata, M. Roem. 1. c.=P. maculata.
membranacea, M. Roem. 1. c. 140=P. membranacea.
mexicana, M. Roem. 1. c. 146=P. mexicana.
minima, Moencb, Meth. Suppl. 102 = P. minima.
misera, M. Roem. Syn. Pepon. 140=P. misera.
mulHftora, M. Roem. 1. c. 148-P. multiflora.
nigra, Medic. Malv. 97 = P. suberosa.
normalis, M. Roem. Syn. Pepon. 144= P. perfoliata.
olivaeformis, M. Roem. L c.=P. suberosa.
pallida, M. Roem. 1. c. 142=P. suberosa.
pannosa, M. Roem. 1. c. 148=P. pannosa.
peltata, M. Roem. 1. c. 141=P. suberosa.
porophylla, M. Roem. L c. 147=P. porophylla.
pseudo-suberosa, M. Roem. 1. c. 146=P. suberosa.
*P*b?seens,* M. Roem. 1. c. 141=P. capsularis.
suberosa, Moench, Meth. Suppl. 102=P. suberosa.
Sururuca, M. Roem. Syn. Pepon. 141=P. setacea.
Msetosa, M. Roem. 1. c. 147=P. fuscinata.
variUata, M. Roem. 1. c. 140-P. variolata.
VtUoni, M. Roem. 1. c. 142=P. Velloai.
viridis, Medic. Malv. 97 = P. minima.
Irani, M. Roem. Syn. Pepon. 146=P. Ware!.

CIENFUEGIA, Willd. Sp. PI. iii. 723 (1800) =seq.

CIENFUEGOSIA, Cav. Diss. 174. t 72. *t.* 2 (1787) = Fugosia, Juss. (Malvac.).
digitata, Cav. 1. c.*F. digitata.
heterophylla, Garcke, in Bonplandia, viii. (1860) 150= F. heterophylla.
"Udebrandtii, Garcke, in EichL Jahrb.Bot. Gard. Berl. ii. (1883) 337.—Afr. trop.
phlomidifolia, Garcke, in Bonplandia, viii. (1860) 150 = F. pMomidifolia.
"dpkurea, Garcke, 1. c = F. sulfurea.
Welshii, Garcke, in Eichl. Jahrb. Bot. Gard. Berl. ii. (1888) SS7.-Arabia.

CIENFUGOSIA, DC. Prod. L 457 (1824)=praec.

CIENKOWSKIA, Regel & Rach, in Ind. Sem. Hort. «trop. (1868) 48. 'Gen. dub.[1] Benth. *Sc* Hook. £ i. 997.
nitida, Regel & Rach, 1. c—Hab. ?

CIENKOWSKIA, Solans, in Schwein£ BeHr. Fl. Aethiop. t'l (1867) q.

CIENROWSKYA, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Mop. 197 (1887) =» Kaempferia, Linn. (tamin.),
tpkiopica,' Solms, 1. c—Afr. trop.
**rkii,* Hook. f. Bot. Mag. t. 6994.—Afr. trop.

CILIARIA, Haw. Saxifr. Enum. 41 (1821) = Saxifraga, Tourn.
?*Ma, Haw. 1. c. 42=S. aspera.
%<>*ckialis,* Haw. 1. c. 48=S. bronchialis.
"ryouUs, Haw. L c. 42=S. aspera.

CIMBARIA, Hill, Veget. Syst. xx. 48 (1772)-Cymbaria, Linn. (ScrophuL).

CIMICIFUGA, Linn. PL Rar. Camsch. 21 (1760).
"ANUNCULACEAE, Benth. & Hook. f. i. 9.
ACTINOSPORA, Turcz. in Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hon. Petrop. i. 21 (1885).
BOTROPHIS, RaGn. Med. Fl. i. 86 (1828).

CIMICIFUGA:—
MACROTRYS, Rafin. in Med. Repos. N. York. II. v. (1808) 352.
MACROTVS, DC. Syst. i. 888 (1818).
MEGOTRYS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267.
PITYROSPERMA, Sieb. & Zucc. In Abh. Acad. Muench. iii. (1846) 734.
americana, *Michx. Fl. Bar. Am.* i. 816.—Am. bar.
americana, Muhl. Cat. ed. II. 54 =cordifolia.
arizonica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 852. —Arizona,
biternata, *Miq. Ann. tfus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 9.—Japon.
cordifolia, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 873.—Am. bor.
elata, *Nutt. in Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 36.—Am. bor. occ
foetida, *Linn. Syst.* ed. XII. 659.—Europ.; Sibir.
foetida, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 373=elata.
frigida, Royle, Illustr. Bot. Himal. 67.114-foetida.
japonica, Spreng. Syst. ii. 628.—Japon.
laciniata, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 352. —Am. bor. occ.
obtusiloba, *Miq. Ann. Mia. Bot. Lugd. Bat.* iii. 9.—Japon.
palmata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 316=Trantvetteria palmata.
podocarpa, Ell. Sketch, ii. 16=americana.
racemosa, *Nutt. Gen. Am.* ii. 15.—Am. bor.
Serpentaria, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 372=raceme«a.
simplex, Wormsk. ex DC. Prod. i. 64=foetida.

CIMINALIS, Adans. Fam. ü. 504 (1768)=Gentians, Tourn.
acaulis, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 26 = G. acaulis.
algida, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gentian. 10 = G. frigida.
decumbens, Bercht. & Presl, 1. C.-G. decumbens.
frigida, Bercht. & Presl, 1. c.=G. frigida.
glauca, Bercht. & Presl, 1. c 11 = G. glauca.
grandifiora, Mayrh. in Schrank, Fl. Monac. t. 87 = G. acaulis.
linearis, Bercht. *St.* Presl, Rostl. i. Gentian. 11 = G. linearis.
longiflora, Moench, Meth. 514 =G. acaulis.
ochrolenca, Bercht & Presl, Rostl. i. Gentian. 11 = G. ochroleuca.
Pneumonanthe, Borckh. in Roeir. Arch. i. I. 26 = G. Pneumonanthe.
pseudopneumonanthe. Bercht. & Presl, Rostl. i. Gentian. 11 = G. Pneumonanthe.
saponaria, Bercht. *Sc* Presl, 1. c. = G. saponaria.
saxosa, Bercht. & Presl, 1. c = G. montana.
septemfida, Bercht. & Presl, 1. c. 10«G. septemfida.
vulgaris, Bercht. & Presl, 1. c. = G. Pneumonanthe.

CIMINALIS, Rafin. FL Tellur. iii. 19 (1886)=Voyria, Aubl. (Gentian.).
alpina, angustifolia, grandifiora, Rafin. 1. c. = V. aphylla.

CINARA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I. (1735)=Cynara, Linn. (Compos.).

CINCHONA, Linn. Gen. ed. II. 6Z6 (1742). *RUBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 82.
CAUSAYA, Hort. ex Pav. Nuev. Quinol. sub t. 6. p. 6 (1862).
CASCARELLA, Ruiz, ex Steud. Norn. ed. II. 1. 165 (1840).
KINKINA, Adans. Fam. ii. 147 (1763).
QUINQUINA, Condam. in 'Act. Acad. Par. (1788) 226.'
academica, Gnibourt, Drogues Simples, iii. 98=officinalis.
acuminata, Poir. Encyc. Suppl. iv. 640=Cosmibnena acuminata.
acutifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. iil. 1. t. 225 - Cascarilla acutifolia.
affinis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. x. (1848) 8.—Peruv.
afrminda, Willem. in Usteri, Ann. Bot xviiL (1796) 16 -Danaisfragrans.
amygdalifolU, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. x. (1848) 6.—Bolivia.
angustifolia, Ruiz, Quin. Suppl. 14. n. 17=landfolia.
angustifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 41 =Exostemma anenstifolium.
asperifolia, *Wedd. in. Ann. Sc. Nat. Sit.* ILL x. (1848) 7.—Bolivia.

CINCHONA:—
australis, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 68 = Exostemma australe.
anstralls, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. x. (1848) 7.—Bolivia,
barbacoënsis, *Karst. in C. Koch V Pint. Wochensch.* ii. (1869) 31.—N. Granat.
Bergeniana, A. Braun, ex Mart Reise Bras. iii. 1286 = Remijia Bergeniana.
tricolor, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 68=Exostemma bicolor.
bogotensis, *Karst. in C. Koch t* Pint. Wochensehr.* ii. (1869) 30.—N. Granat.
boliviano, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. x. (1848) 7 = C. Calisaya.
Bonplandiana, *Klotzsck, in Hayne, Anneigem.* vii. t. 37.—Peruv.
*brachycarpa,Sv.*Prod. Veg. Ind. Occ. 41=Exostemma brachycarpum.
brasiliensis, Hoffmgg. ex Humb. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 119 = Machaonia brasiliensis.
caduciflora, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. i. 168, in obs. —Cascarilla caduciflora.
Calisaya, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 6. —Bolivia,
caloptera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. (1868-69) 273.—Peruv.
Candollii, G. Don, Gen. Syst iii. 479 - Remijia paniculata.
canescens, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 68 = Exostemma canescens.
capensis, Burm. ex DC. Prod. iv. 369 « Burchellia capensis.
capitata, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 63=Exostemma capitatum.
carabayensis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.Sit.* III. x. (1848) 9.—Peruv.
caribaea, Jacq. Enum. PI. Carib. 16 = Exostemma caribaeum.
caribbeana, W. Wright, in Phil. Trans, lxvii. (1778) 606-»praec.
caroliniana, Poir. Encyc. vi. 40=Pinckneyapubens.
Carua, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 275.—Bolivia.
Cattukambar, Koen. ex Retz, in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1814) 82. t. 3 = Uncaria acida.
cava, Pav. ex Lamb. Illustr. Cinch. 8 = Cascarilla Pavonii.
Chahuarguera, Pav. ex DC. Prod. iv. 852=officinalis.
China, DC. Prod .iv. 356, sphalm. = Cosmibuena obtusi. folia.
chlorrhita, Bory, ex DC. L c. S61=Danais rotundifolia.
Chomeliana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 9.—Bolivia.
cladorrhita, Bory, ex Wedd. Hist. Nat. Quinq. 72= Danais rotundifolia.
coccinea, Pav. ex DC. Prod. iv. 358=macrocalyx.
colorata, Laubert, in 'Bull, de Pharm. (1810) 294' = offiuinalis.
Cendaminea, Humb. *Sc* Bonpl. PL Aequin. i. 33 = officinalis.
conglomerate, *Pav. Nuev. Quinol.* t.15.—Ecuador,
cordifolia, *Mutis, ex Humb. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* i. (1807) 117.—N. Granat.; Peruv.
coriacea, Poir. Encyc. vi. 88= Exostemma coriaceum.
coronulata, *Miq. in Journ. Bot. Neèrl.* i. (186]) 14*0—Peruv.
corymbifera, Font, in Act Nov. Soc. Sc. Ups. iii. (1780) 176 = Exostemma corymbiferum.
corymbosa, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 63 »= Exostemma corymbosum.
corymbosa, Kant. Fl. Columb. i. 19. t. 10 » pitayensis.
crassifolia, Pav. ex DC. Bibl. Univ. xli. (1829) 150 = Cascarilla calyptrata.
crispa, Tafalla, ex Howard, in Pav. Nuev. Quinol. t. 2 =ofiicinalis.
cucumaefolia, Pav. ex Lamb. Illustr. Cinch. 2=lancifolia.
cujabensis, Manso, ex Klotzsch, in Hayne, Arzneigew. xiv. sub t 15 = Remijia cujabensis.
cuspidata, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 68 = Exostemma cuspidatum.
decurrentifolia, Pav. Nuev. Quinol. t. 28=purpurascens,
Delondriana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. x. (1848) 7<=scrobiculata.

CINCHONA:—
densiflora, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 63 = Remijia densiflora.
dichotoma, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 58. t. 197=Ladenbergia dichotoma.
disco/or, Klotzsch, in Hayne, Arzneigew. xiv. sob t. 14 = pnbescens.
dissimiliflora, Mutis, ex Humb. in Ges. Naturf. Fr. Beil. Mag. i. (1807) 120 = Exostemma dissimilifioruni.
clliptica, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xii. (I860) 60.—Pemv."
erythrantha, *Pav. Nuev. Quinol.* t. 12.—Ecuador,
erythroderma, *Wedd in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xi. (1869) 362.—Peruv.
eunenra, ***Miq. Ann. Afus. Bot. Lugd. Bat.*** **iv. 265.—** Bras.
excelsa, Roxb. PI. Corom. ii. 3. t. 106 = Hymenodictyon excelsum.
ferruginea, St. Hil. *inMim.* Mas. Par. ix. (1822) 314 = Kemijia ferruginea.
firmula. Mart, ex Klotzsch, in Hayne, Arzneigew. xiv. sub t 15=Remijia firmula.
flaccida, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 73=Hymenodictyon flaccidnm.
floribunda, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41 = Exostemma floribundum.
Forbesiana, Howard, Quinol. E. Ind. Plant. 37* = lancifolia.
formasa, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 63 = Exostemma formosum.
fusca, Ruiz, ex Vitm. Summa, Suppl. i. 262 ***{=-Lasionema roseum).—Am. trop.***
glabra, Ruiz, Quinol. 64 — lancifolia.
glandulifera, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iii. 1. t. 224.—Peruv.
globifera, Pav. ex DC. Prod. iv. 845 = Nauclea Cinchonae.
Rovana, ***Miq. in Journ. Bat. Nierl.*** **i. (1861) 142.—** Peruv.
grandiflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 54=Cosmibnena obtusifolia.
grandifolia, Poir. Encyc vi. 36-Cascarilla magnifolia.
gratissima, Wall, in Koxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 151 =Luculia gratissima.
Haenkeana, Bartl. ex DC Prod. iv. 630=PaIiconrea Haenkeana.
Haiskarliana, ***Miq. Ann.Mm. Bet. Lugd. Bat.*** **iv.266.** —Peruv.
Henlcana, ***Karst. in C. Koch tf Fint. Wochenschr.*** **ii.** (1859) 31.—Venezuela.
herbacea, Linn. Mant. ii. 338 = Exostemma caribaeum ?
heterocarpa, *Karst. Fl. Columb.* i. 11. t. 6.—N. Granat.
heterophylla, Pav. ex DC. Prod. iv. 353 = cordifolia.
heterophylla, Pav. Nuev. Quinol. t 18 = macrocalyx.
hexandra, G. Don, Gen. Syst. iii. 478-Cascarilla hexandra.
hirsuta, *Ruia & Pav. Fl. Per.* ii. 51. t. 192.—Peruv.
Howardiana, *O. Kuntse, Monog. Cinch.* (1878). 80.—Peruv.
Humboldtiana, ***Lamb. Illustr. Cinch. 1.*****—Peruv.**
Humboldtiana, Koem. & Schult. Syst. v. 13 ***{=Lasianema Humboldtianum).—Peruv.***
Humboldtiana, Wedd. Hist. Nat. Quinq. 67 = villosa.
jamaicensis, W. Wright, in Phil. Trans. Ixvii. (1778) 506 = Exostemma caribaeum.
Josephiana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xii. (1869) 58.—Bolivia.
Kattuiambar, Koen. ex DC. Prod. iv. S47 = Uncaria acida.
lacci/era, Ruiz *Sc* Pav. ex Fée, Ess. Crypt. Ecorces Exot. Off. 8 ; Tafalla, ex Wedd. Hist. Nat Quinq. 72=Condaminea tinctoria 1
Lambertiana, A. braun, ex Mart. Reise Bras. iii. 1286 =Cascarilla Lambeniana.
lanceolata, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. ii. 61=officinalis.
lancifolia, ***Mutis, in Periodico de Santa Fi*** **(1798) 465,** nomen.—Peruv.; N. Granat.
Lechleriana, *Schlecht. in Linnaea,* xxvl. (1853-55) 728. —Peruv.
Ledgeriana, ***Moens, ex Trimen, in Journ. Bot.*** **xix.** (1881) 328.—Bolivia.
legitima, ***Ruin, ex Laubert, in Bull, de Pharm.*** **(1810)** 293.—Peruv. 1

CINCHONA:—
leucocalyx, ***Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod.*** **Ser. II. i.** (1862) 64.—Bras.
lineata, Vahl, in Skriv. Naturh.-Selsk. i. (1790) 22 - Exostemma lineatnm.
longiflora. Lamb. Desc. Cinch. 38. t. 12 = Exostemma longiflorum.
longiflora, Mutis, ex Steud. Nom. ed. I. 196 = Cosmibuena obtusifolia.
longifolia, Mutis, ex Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 62 = praec.?
Luciana, Vitm. Summa, Suppl. i. 264 = Exostemma floribnndum.
lucumaefolia, Pav. ex Lindl. Fl. Med. 416 = macrocalyx.
lutea, Pav. Nuev. Quinol. t. 14=cordifolia.
lutescens, Ruiz, ex Vitm. Summa, Suppl. i. 262 = Cascarilla magnifolia.
macrocalyx, ***Pav. ex DC. in Bibl. Univ. Sc. et Arts,*** xii. (1829) 150.—Am. austr.
macrocarpa, Vahl, in Skriv. Naturh.-Selsk. i. (1790) 20 = CascariUa macrocarpa.
Macrocnemia, A. Braun, ex Mart. Reise Bras. iii. 1286 » Kemijia Macrocnemia.
macrophylla, *Karst. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 151.—N. Granat.
magniflora, Pav. ex DC. Prod. iv. 364-Cascarilla macrocarpa.
magnifolia, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aequin. i. 136 = CascariUa caduciflora.
magnifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 58. L 196 = CascariUa magnifolia.
maynensis, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 63 = Exostemma maynense.
micrantba, *Run V Pav. Fl. Per.* ii. 62. t. 194.—Peruv.
microphylla, Mutis, ex Lamb. Illustr. Cinch. 9=Mutisii.
microphylla, *Pav. Nuev. Quinol.* 1.17.—Peruv.
montana, Badier, in Jonm. Phys. (1789) 129=Exostemma floribundum.
Mar ado, Ruiz, QuinoL 67. n. 5 =pnrpurea.
Moritziana, ***Karst. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** iv. 275.—Peruv.
Mutisii, ***Lamb. Illustr. Cinch.*** **9.—Peruv.**
mutonensis, Goudot, in Phil. Mag. (1828) 182 = CascariUa muzonensis.
myrtifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 859= Exostemma caribaeum.
nitida, Benth. PI. Hartw. 109=CascariUa nitida.
nitida, *Ruia tf Pav. Fl. Per.* ii. 50.—Peruv.
oblongifolia, **Lamb.** Illustr. Cinch. 12=Buena Riveroana.
oblongifolia, Mutis, in Periodico de Santa *Yi* (1793) 465, nomen; Humb. in Ges. Nalucf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 118=Cascarilla oblongifolia.
obovata, Pav. Nuev. Quinol. sub t. 18. et t 24 = pnbescens.
obovata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 73=Hymenodictyon obovatum.
obtusifolia, D. Dietr. Syn. PI. i. 721 = Cosmibuena obtusifolia,
obtusifolia, Pav. ex DC. Prod. iv. 853=macrocalyx.
officinalis, Linn. Mant. ii. 338=cordifolia.
officinalis, *Linn. Syst.* ed. X. 929.—Peruv.
malifolia, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aequin. i. 65 ***(=Lasionema Humboldtianum).—Peruv.***
malifolia, Mutis, ex Humb. in Ges. Naturf. FT. Berl. Mag. i. (1807) 118 = CascariUa macrocarpa.
ovata, *Ruiz (f Pav. Fl. Per.* ii. 62. t. 195.—Peruv.
Pahudiana, ***Howard, in Pav. Nuev. Quinol.*** **t 21.—** Am. austr.
pallescens, Ruiz, ex DC. Prod. iv. 353 « ovata.
Palton, Pav. Nuev. Quinol. t. 18 = macrocalyx.
paniculata, D. Dietr. Syn. PI. i. 721 = Remijia paniculata.
parabolica, *Pav. Nuev. Quinol.* 1.16.—Peruv.
parn'flora, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. i. (1862) 68 = Exostemma parviflorum.
parviflora, Poir. Encyc. vi. 88 =micrantha.
panciflora, *Tafalla, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 363.—Am. austr.
Pavoniana, ***O. Kuntie, Monog. Cinch.*** **(1878) 29.—** Peruv.; Bolivia.
Pavonii, Lamb. Illustr. Cinch. 8=CascarjUa Pavonii.
pedunculata, ***Karst. in C. Koch*** **b* *Fint. Wochenschr.** ii. (1859) 30.—N. Granat.
Pelalba, *Pav. ex DC. Bibl. Univ.* xii. (1829) 152.-Am. austr.

CINCHONA :-
Pelletieriana, Wedd. in Ann. Sc Nat. Se>. III. x. (1848) 8 = pnbescens.
peruviana, ***Howard, in Pav. Nuev. Quinol.*** **t. 27.—** Andes.
peruviana, Poir. Encyc. Suppl. iv. 640=Exostemma peruvianum.
philippica, Cav. Ic. iv. 15=Exostemma philippicum.
pitayensis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xi. (1840) 269; et V. xii. (1862) 37.—N. Granat.
platyphylla, *Wedd. 1. c.* Sér. V. xi. (1869) 362; xii. (1869) 73.—N. Granat.
prismatostylis, *Karst. Fl. Columb.* i. 13. t. 7.—N. Granat.
pubescens, Hort. Mack, ex Walp. Rep. ii. 948 = Rhyssocarpus pubescens.
pubescens, Lamb. Illustr. Cinch. 6 = ovata.
pubescens, Vahl, in Skriv. Naturh.-Selsk. i. (1790) 19 = cordifolia.
purpurascens, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 8.—Bolivia.
purpurea, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 52. t 193.—Peruv.
quercifolia, Pav. ex Lamb. Illustr. Cinch. 9 -= Mutisii.
Quina, Ruiz, in Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iii. 4 = Cosmi-Bnena obtusifolia.
racemosa, Schrank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 868 = Exostemma caribaeum.
Reicheliana, Howard, in Pav. Nuev. Quinol. t. 6=» micrantha.
Remijiana, St. Hil. PI. Us. Bras, sub t. 2=Remijia Hikrii.
Riedeliana, Casar. in Atti 3zia Riun. Scienz. Ital. (1841) 613 = CascariUa Riedeliana.
robusta, ***Howard, in Journ. Linn. Soc.*** **xx. (1884) 827,** nomen.—Hab.!
Roraimae, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 214 =CascariUa Roraimae.
rosea, Kuiz *Sc* Pav. Fl. Per. ii. 54. t. 199 (***=Lasionema roseum).—Peruv.***
rosulenta, ***Howard, ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.*** **V.** xi. (1869) 362.—N. Granat.
rotundifolia, Pav. ex Lamb. Illustr. Cinch. 6=cordifolia.
rubicunda, *Auct. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 863.—Am. austr.
rubicunda, Tafalla, ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V.xi. (1869) 862 = ovata.
rufinervis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. x. (1848) 8.—Peruv.
rugosa, Pav. ex DC. Prod. iv. 853=cordifolia.
Sanctae-Luciae, Davids, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 19 = Exostemma floribundum.
scrobiculata, ***Humb. tf Bonpl. PI. Aequin.*** **i. 165. t.** 47.—Peruv.
soutana, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. (1862) 63 = Exostemma souzanum.
spinosa, Vavass. in Joura. Phys. (Oct. 1790) 273 = Exostemma Vavassorii.
stenocarpa, Lamb. Illustr. Cinch. 13 = CascariUa stenocarpa.
stupea, Pav. ex Lindl. Fl. Med. 416=lucnmaefolia.
subcordata, Pav. Nuev. Quinol. ed. Howard, ad calcem « cordifolia.
suberosa, Pav. 1. c.=macrocalyx.
subsessilis, ***Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **iv. 272.'** Perav.
succuubn, ***Pav. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl.*** 1857 (1858) 60.—Perav.
Tarontaron, ***Pav. Nuev. Quinol. ed. Howard,*** **ad** calcem.—Peruv.
tenuyfora, Brign. in Mem. Soc. Ital. Mod. Ser. II. (1862) 63 - Remijia tenuiflora.
tennis, Ruiz, ex DC. Prod. iv. 858=cordifolia.
thyrsiflora, Roxb. Hort. Beng. 15 j Fl. Ind. i. 530-Hymenodictyon excelsum.
timorana, Span, in Linnaea, xv. (1841) 316 = Hymencdictyon timoriense.
timorensis, Walp. Rep. ii. 509=praec.
Trianae, Karst. in C. Koch & Fint. Wochenscbr. » (1859) Sl-pitayensis.
triftora, W. Wright, in Lond. Med. Joum. vili. (1787) 240 = Exostemma triflorum.
tucujensis, *Karst. Fl. Columb.* i. 17. t. 9.—N. Granat.
umbellulifera, *Pav. Nuev. Quinol.* t. 22.—Peruv.
undata, Karst. ex Wedd. in Joum. Linn. Soc. * (1869) 187 = CascariUa undata.
undulata, Pav. Nuev. Quinol. 2. t. 8.=glandulifera.
Uritusinga, Pav. ex DC. Prod. iv. 868=macrocalyx.

CINCHONA:—

Vritusinga, Pav. ex Howard, Nuev. Qninol. t. 19. officinalis.
vanilliodora, *Auct.ex Steud. Nom.* ed. II. i. 363.—Am. austr.
Vellorii, St. Hil. PL Us. Bras, sub t. 2-Remijia Vellozii.
villosa, Pav. ex Lamb. Illustr. Cinch. 7 = Humboldtiana.
violacea, *Pav. Nuev. Quinol. ed. Howard, ad calcem.*—Ecuador.
viridifiora, Pav. L c.=pubescens.
Vritusino.Vax. ex DC. Prod. iv. 852-C. Condaminea.
Weddelliana, *O. KunUe, Monog. Cinch.* (1878) 29.—Bolivia.

C1NCLIA, Hoffmgg. PreUverz. (1841).—Cf. Linnaea, xvi. (1842) Litt. 267-Ceropegia, Lino. (Asdepiad.).

CINCLIDOCARPUS, ZoU. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie, iii. (1846) 81 = Caesalpinia, Linn. (Legumin.).
nitidus, ZoU. Sc Mor. 1. c. 82 = Caesalpinia Cinclidocarpa.

CINERARIA, Linn. Sp. PL ed. II. 1242 (1768). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. ff. iii. 445.
XENOCARPUS, Cass. in Diet Sc. Nat. lix. 108 (1829).
sbrotanifolia, *Berg. Desc. PI. Cap.* 292.—Afr. austr.
abyssinica, *Sck. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. «3.—Afr. trop.
•*vanthifolia,* Reichb. Hort. Bot t. 24-Senedo Cineraria.
"mtangula, Bertol. FL Guatimal. 35=Senecio acntangulus.
Aitoniana, Spreng. Fl. Hal. Mant. 51-canescens.
"lota, Linn. C Suppl. 374-Othonna alata.
alchemilloides, *DC. Prod.* vi. 807.—Afr. anstr.
alllarifolia, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. HI. 408.—Hab. ?
"ipestris, Hoppe, Taschenb. (1806) 180=Senecio alpestris.
"ipestris, Pall. Reise, ii. 28-Senecio campestris.
olpestris, Willk. in Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. "• 111 = Senecio brachychaetus.
"Ipina, AIL Fl. Pedem. i. 208. t 38-Senedo aurantiacus.
"Ipina, Huds. Fl. AngL ed. II. 870-Senedo campestris.
-ipina, Linn. Sp. PL ed. II. 1248-Senedo alpinns.
"ttaica, C. A. Mey. ex DC. Prod. vi. 816-Senecio altaicus.
<*"nbigua,* Bivona, Manip. iii. 5-Senecio ambiguus.
"nhracea, Hornem. Hort. Hafn. Add. 972-Senecio •mbraceus.
<*">ulloides,* Linn. Sp. PL ed. II. 1246-Aster rotundifolins.
'"nerieana, Linn. f. Suppl. 878-Senecio denticulatus.
a""">ena, Salisb. Prod. 200 -Aster rotundifolius.
""gtlata, Alam. ex DC. Prod. vL 481. n. 544-^enecio snblobatus.
angulata > Mair > exDC - *• c - "• 547=Senedo angulifolius.
""gulosa, **Lam.** Encyc. ii. 6=humifusa, geifolia.
*a*xulosa,* E. Mey. ex DC. Prod. vi. 837-Senecio "Wgiflorua.
"ngustata, Schur, Enmn. PI. Transs. *W=transsilca.*
*a*gustifolia,* H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 189-oeaecio salignus.
a;"'"'«, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod, ii/179; Fl. a*•'FM*0" >x, 56 = Senecio Othonnae.
o«!'*'W'*!, Lam - Encv=- »• 9=Senecio gallicus.
"tnemoides, Spreng. ex DC. Prod. vi. 366 = Senecio 'ainosus.
"Ppendiculata, Poir. Encyc. Snppl. ü. 268=Senecio "PPendiculatus.
appendiculata, Steud. Nom. ed. H. i. 863=Senecio populifolius.
arachnoidea, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1501 = Senecio lanat s.
ar V™">idea, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 632 = Senecio frigidus.
*arIT^2' DC - Proi - «• 306,-Afr. anstr.
arbutifolia, mollis, Dr*e*- « Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 809 -
arverna ! *tris Roq y*in Bnl* - **Soc. Bot. Fr.** - « viii. (1880) 68 =! ien*ec*i*0* **campestris.**

4D.N7AP.ARIA:—

aspera, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 155.—Afr. austr.
atriplicifolia, *DC. Prod.* vi. 808.—Afr. austr.
atropurpurea, Ledeb. in Mém. Acad. P&ersb. v. (1814) 574-Senecio frigidus.
Aucheri, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 868.—Oriens.
aurantiaca, Bess. Enum. PI. Volh. 38-Senecio eampesbis.
aurantiaca, Hoppe, ex Willd. Sp. PL iii. 2081 = Senecio aurantiaens.
aurea, Linn. Sp. PL ed. II. 1244-Senecio anratns.
auriculata, Ledeb. FL Alt. iv. 105-Senecio racemosus.
aurita, Andr. Bot. Rep. i. 24. t. 24=Doronicum
aurita, L'Herit. Sert. Angl. 26 = Senecio maderensis.
Balbisiana, *Bertol. Fl. Ital.* ix. 290.—Italia.
Balsamita, Lam. Encyc. ii. 7=Senecio aureus.
belbeisia, Spreng. Syst. iii. 552= Senecio belbeysius.
Bergeriana, Spreng. 1. c. 651=Aster Bergerianus.
bicolor, Willd. Sp. PL iii. 2085 = Senecio bicolor.
bipinnata, Willd. 1. c. 2075=Senecio pinnatifidns.
bracteata, Chr. Sm. ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 148=Senecio malvaefolius.
brasiliensis, Spreng. Neue Entdeck. ii. 142-Senecio brasiliensis.
cacaliformis, Lam. Fl. Fr. ii. 124-Senecio Ligularia.
cacalioides, Linn. f. Suppl. 374 = Othonna carnosa.
Caledoniae, Spreng. Fl. Hal. Mant. 50=Brachyglottis Caledoniae.
calvescens, Nym. Syll. SuppL 1=Senecio Cineraria.
campestris, DC. FL Fr. iv. 164-Senecio campestris.
campestris, Fellm. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 647=Senecio aurantiacus.
campestris, Zett. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 110—Senecio pyrenaicus.
canadensis, Linn. Sp. PL ed. IL 1244 - Senecio Cineraria.
canadensis, Walt. Fl. CaroL 207-Eiechtites hieraciifolia?
Candida, J. & C. Presl, Delic. Prag. (1822) 96 = Senecio candidus.
canescens, Spreng. Syst. iii. 549 = Erigeron canescens.
canescens, *Wendl. Obs. ex Lint, Enum. Hort. Berol.* ii. 832.—Afr. austr.
cantabrica, Nym. Syll. 2-Senecio brachychaetns.
capillacea, Linn. f. SuppL 875 = Steirodiscus capillaceos.
capitata, Ledeb. FL Alt. iv. 104=Senecio campestris.
capitata, Wahlenb. Fl. Carp. 271 - Senecio aurantiacus.
earolinensis, Walt FL Carol. 207 (sp. jndetenninab.).—Am. bor.
caspica, Vets. Syn. ii. 439-Senecio racemosus.
caucasica, Bieb. FL Taor. Cauc. ii. 813 = Senecio caucasicus.
caucasica, Hofim. Hort. Mosq. (1808) n. 598-Senecio platyphyllns.
caucasica, Schlecht. ex Ledeb. Fl. **Ross.** ii. 858= Senecio renifolius, *Sch. Bit.*
ceratophylla, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. 1826-Senecio Cineraria.
cernua, Thore, Chi. Land. 344 « Arnica montana.
cernua, Wall, ex DC. Prod. vi. 314-Senecio amicoides.
chamaedrifolia, *Lam. Encyc.* ii. 9.—Afr. austr.
chinensis, Spreng. Syst. iii. 549-Senecio scandens.
Cinia, Webb, in Webb *8c* Berth. Phyt. Canar. ii. 338= Doronicum papyraceum.
Clusiana, Host, FL Austr. ii. 482-Senecio alpestris.
Coderi, Nym. Consp. 352-Senecio brachychaetus.
collina, Salisb. Prod. 200=Senecio campestris.
conformis, Rochel, PI. Banat. Rar. Ind. = Senecio anranticus, brachychaetus.
congesta, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 279-Senecio palustris.
cordata, Jacq. Fl. Anstr. ii. 1.176 -seq".
cordifolia, Gouan, Illustr. 69 = Senecio alpinns.
cordifolia, Jacq. Fl. Austr. t 177 = Senecio snbalpinus.
cordifolia, Lapeyr. ex Willk. *Sc* Luge, Prod. Fl. Hisp. ii. 115-Senecio Doronicum.
coronata, Thunb. Prod. PL Cap. 154-Senecio lasicrhizns.
coronata, Zeyh. ex DC. Prod. vi. 488 •> Senecio jnnceus.
corymbosa, Moench, Metb. 688 -Erigeron annuus.

CRASSIFLORI:—

crassifiora, Poir. Encyc. Snppl. ii. 267 -Senecio crassi. floras.
crassifolia, Host, [Fl. Anstr. ii. 482?] ex DC. Prod. vi. 860.—Europ.
crassifolia, Kit. in Schnlt Oestr. Fl. ed. II. U. 614 - Senecio alpestris.
crenata, Spreng. ex DC. Prod. vi. 888-Senecio erosns.
crispa, Jacq. Fl. Austr. ii. 48-Senecio crispatus.
crocea, Tratt. Arcb. i. 26-Senecio crispatus.
cruenta, Mass. ex L'HeriL Sert. Angl. 26 -Doronicum cruentum.'
cuneata, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 489 - Senecio diversifolius, *Han.*
cymbalarifolia. Linn. Amoen. Acad. vi. 106 - Senecio cymbal arilblius.
dealbata, Spreng. ex DC. Prod. vi. 369 - Senecio Knnthiuius*
dedpiens, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iiL 312.—Afr. austr.
dedpiens, Spreng. ex DC. Prod. vi. 366 - Senecio chrysanthemoides.
degenerans, Kit. ex Kanitz, in Verb, Zool.-Bot. Ges. Wien, xiii. (1863) 523-Senecio alpestris?
deltoidea, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 68.—Afr. anstr.
denticulata, DC. Prod. vi. 416, in syn." Senecio denticulatus.
denticulata. Linn. f. Suppl. 875 *{=Brachyrhynchos eupatorioides).*—Afr. austr.
difformis, Rochel, PL Banat. Rar. Ind. - Senecio alpinus.
discoidea, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 889.—Europ.
discolor, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 114 - Senecio discolor.
distorts, Kunze, In Linnaea, xvii. (1843) 571 - Senecio geifolius.
divaricata, Spreng. ex DC. Prod. vi. 870 - Senecio scandens.
Doria, Spreng. ex DC. 1. c. 364-Senecio Wallichii.
dracunculoides, Moc. & Sesse, ex DC. 1. c. 430-Senecio salignus.
Dregeana, *DC. Prod.* yi. 305.—Afr. anstr.
dubia, Spreng. Syst. iii. 550=Senecio tomentosus.
elata, Steud. Nom. ed. II. L 364-Senecio Lignlaria.
elatior, Bouché, in Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 333 = Senecio multiflorus.
elodes, Nym. Syll. 2 = Senecio elodes.
elongata, linn. f. Suppl. 874 - Senedo diversifolium, *Harv.*
erodioides, *DC. Prod.* vi. 807.—Afr. austr.
erosa, Harv. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. iii. 309 - oxyodonta.
erosa, *Willd. Sp. PI.* iii. 2073.—Afr. austr.
exilis, *DC. Prod.* vi. 805.—Afr. austr.
Farfara, Berah. Syst. Verz. Erf. 146 - Tussilago Farfara.
filifolia, Thunb. Prod. PI. Cap. 154 - Senedo longifolins.
Fischeri, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1820) 17 = Senedo Ligularia.
fiammea, Turcz. ex DC. Prod. vi. S62 - Senedo flammeus.
Forsteri, Spreng. Pngill. i. 68-Brachyglottis Forsteri.
fragrans, Hoflmgg. ex Steud. Nom. ed. II. i. 864-Erigeron fragrans.
frigida, Richards, in Frankl. Narr. 1st Joura. App. 748 -Senecio frigidus.
fulva, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. iv. (1816) 64-Senedo aurantiacus.
Fussii, Griseb. & Scbenk, in Wiegm. Arch, xviii. (1852) 342-Senecio campestris.
geifolia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1242.—Afr. austr.
geifolia, C. A. Mey. ex Steud. Nom. ed. II. i. 364 = Senedo geifolius.
geniculata, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 364-Senecio geniculatus.
geraniifolia, *DC. Prod.* vi. 308.—Afr. anstr.
gibbosa, Guss. Adnot. Cat PI. Hort. Bocc. (1821) 3-Senecio gibbosus.
gigantea, Sm. Exot. Bot. ii. 11-Senedo Smithii.
glabella, Turcz. ex DC. Prod. vi. 360 - Senecio campestris.
glaberrima, Spreng. ex DC. 1. c. v. 25 = Vemonia cinerea.
glabra, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 113 = Senecio Swartzii.
glabrata, Ledeb. Ic. Ross. t. 94-Senedo racemosus.

fIT*W;*S3rfLAT>:T.A.*—
glabrata, Sw. FL Ind. Occ. iii. 1354=Senedo Swartrii.
glandulifera, Vnkot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, li. (1880) S4=Senecio crispatns.
glastifolia, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 148-Senedo glastifolius.
*glauca,*Linn. Sp. PI. ed. n. 1242 *(=-Senecillisglauca).* —Ross, austr.
gnaphalodes, *Nym. Consp.* 861.—Europ.
grandiflora, Spreng. ex DC. Prod. vi. 814 = Senedo amicoides.
grandiflora, Vatke, in luinaea, xxxix. (1876) 608 = abyssinica.
Gualtata, Gill, ex Hook, & Am. in Hook. Jonrn. Bot. iii. (1841) 840-Senedo Hualtata.
hastifolia, Linn. £ Soppl. S76=Senecio cymbalarifolius.
Heldreichii, Nym. Syll. 2=Senedo Heldreichii.
Helenitis, Georgi, Beschr. Kuss. Reich, iii. IV. 1246 = Senecio campestris.
Helenitis, Stend. Norn. ed. II. i. 884-Senecio brachychaetna.
heterophylla, Fisch. in Mém. Soc Nat Mosc. iii. (1812) 76=Senecio resedifolius.
heterophylla, Orteg. Hort. Matr. 71-= Senecio minntus.
heterophylla, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 628=Senecio tomentosus.
Heuffelii, Hoppe, ex Nym. Consp. 861 = Senecio lugens.
Hinnicnlusx, Hort. ex Maraock.Floric Mag.iv.(1839) t. 89.
hirsuta, Vent. Jard. Malm. 95-Aster hirsutus.
hirta, Vahl, ex DC. Prod. v. 226-Aster elongatus.
Hualtata, Walp. Rep. ii. 658 = Senecio Hualtata.
humifusa, *L'Hirit. Sert. Angl.* 25.—Afr. austr.
humilis, Poepp. ex DC. Prod. vi. 417 = Senecio glaber.
hybrida, Berah. Syst Verz. Erf. 146 = Petasites offidnalis.
hybrida, Willd. Ennm. Hort Berol. 893 - Doronicnm croentam.
hypoleuca, *Reichb. ex DC. Prod.* vi. 889.—Afr. anstr.
hypoleuca, Sieber, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 881 = Senecio verbascifolius.
hypoleuca, Spreng. ex DC. 1. c 869—Senecio rufinervis.
incana, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1856—Senecio jamaicensis.
incisa, Hontt. ex DC. Prod. vi. 438 = Senecio incertus.
incisa, Thnnb. Prod. PI. Cap. 156-Senecio incisus.
incisa, Willd. Sp. PI. iii. 2074-Senecio erosus.
integrifolia, Betath. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 110=Senecio pyreñaiens.
integrifolia, Hook. & Am. in Bot. Beech. Voy. 126 = Senedo lugens.
integrifolia, Jacq. ex Willd. Sp. FL iii. 9082-Senecio alpestris.
integrifolia, Pnnh, Fl. Am. Sept. ii. 628 - Senecio tomentosus.
integrifolia, Richards, in FrankL Narr. 1st Jonrn. ed. II. 31 -Senecio Hookeri.
integrifoHa,Sebkuhi, Handb. t. 246 - Senedocrispatus.
integrifolia, Vill. ex Stend. Norn. ed. II. L 864 = Senedo aunntiaens.
integrifolia, Wallr. Sched. Crit 474 - Senecio spatnulaefolius.
integrifolia, With. Bot Air. ed. II. 920; Sm. Eng. Bot t. 162-Senecio campestris.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 817-Senecio japonicus.
laciniata, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1862 - Senecio Swartzianus.
lactea, Jacq. f. Eclog. t 106=Senecio cruentns.
lactea, Willd. Ennm. Hort. Berol. Suppl. 69-Senecio appendiculatus.
laevis, Spreng. ex DC. Prod. vi. 404-Senecio angulatus.
lanata, Jacq. Coll. iii. 177-lanoxa.
lanata, Lam. Encyc. ii. 7-Senecio Heritoi.
lanata, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 883—Deronicum crocntuni.
lanceolata, Lam. fl. Fr. ii. 125 » Senecio campestris*
lanosa, *DC. Prod,* vi 809.—Afr. austr.
laricifolia, Lam. Encyc ii. 8-Senecio pinifolius.
leucanthema, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 316.-Senecio Smithii, acanthifolins.
Lewisii, Richards, in FrankL Narr. 1st Jonm. App. 748-Erigeron compositui.

CINERARIA :—
lineata, Linn. f. Snppl. 875—Senecio lineatns.
lineata, Vahl, ex DC. Prod. vi. 895-Senecio triplinervins.
linifolia, linn. Amoen. Acad. vi. 106 — Euryops linifolius.
linifolia, Zeyh. ex DC. Prod. v. 224-Aster linifolius.
littoralis, Vest, in Flora, iii. (1820) 2 - Senecio gibbosus.
lobata, *L'Hirit. Sert. Angl.* 26.—Afr. anstr.
lobata, Mair. ex DC. Prod. vi. 481-Senecio snblobatus.
longifolia, All. Fl. Pedem. i. 208 - Senecio Balbisianus.
longifolia, Bess. Ennm. PI. Volh. 88 - Senecio alpestris.
longifolia, Eichw. Casp. Cane. 22 - Senecio cladobotrys.
longifolia, Jacq. Fl. Anstr. ii. 49. t. 181 - Senecio brachychaetus.
longifolia, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 621 = Senecio pyrenaicus.
lucida, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1860-Senecio lnddus.
lyrata, *DC. Prod.* vi. 308.—Afr. anstr.
lyrata, Ledeb. in Mém. Acad. Pftersb. v. (1818) 676 = Senecio resedifolius.
lyratifolia, Bluff & Fůg. Comp. ii. 377 = Senecio alpmns.
macrophylla, Ledeb. Fl. Alt. iv. 108 - Senecio Ledebourii.
malvaefolia, L'Hérit. Sert. Angl. 26-Senecio malvaefolius.
maritima. Linn. Sp. PL ed. II. 926 = Senecio Cineraria.
maritima, Wulf. ex Stend. Norn. ed. II. i. 364 = Senecio gibbosus.
megapotamica, Spreng. Syst iii. 547—Senecio pinnatus.
microglossa, *DC. Prod.* vi. 305.—Afr. austr.
microphylla, Vahl, ex DC. L c v. 226-Aster aethiopicus.
microrhUa, Schnr, in Verh. Siebenb. Natnrw. Ver. (1859) 147=Senecio campestris.
minuta, Cav. Ic. i. 21. t 33. f. 3-Senecio minntus.
mitellaefolia, *L'Hirit. Sert. Angl.* 25.—Afr. anstr.
mollis, *E. Mey. ex DC. Prod.* vi. 306.—Afr. anstr.
mongdica, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1882) 199 = Senecio mongolicns.
montevidensis, *Spreng. Syst.* iii. 548—Senecio chilensis.
multiflora, L'Hirit. Sert. Angl. 26 - Senecio multifloras.
nebrodensis, Gnus. Adnot. Cat. PL Boca (1821) 4-Senecio candidus.
nivea, WlUd. Sp. PI. iii. 1974=Senecio nivens.
nuda, Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 389 = Senecio alpestris.
oppositifolia, Moench, Meth. 588 = Aster rotundifolius.
Othonnitis, Linn. Sp. PI. ed. II. 1244 - Othonna frntescens.
othonnoides, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 814.—Afr. austr.
ovaia, Spreng. ex DC. Prod. v. 344 - Aster asperulus.
ovirensis, Koch, in Flora, vi. (1828) 507 - Senecio alpestris.
oiyodonta, *DC. Prod.* vi. 306.—Afr. austr.
palmensis, Nees, Hort Phys. Berol. 115. t. 24 = Senecio palmensis.
palustris, Linn. Sp. PI. ed. II. 1248 - Senecio palustris.
pandurata, Thnnb. Prod. PI. Cap. 166 - Senecio panduratna,
papposa, Reichb. in Moessl Handb. ed. II. ii. 1600= . Senecio papposus.
Parnassi,Njm. Consp. 852=Senecio Parnassi.
parriflora, Bieb. FL Taur. Cane ii. 816= Senecio lampsanoides.
parriflora, [R. Br. in] Ait Hort. Kew. ed. II. v. 72= canescens.
paucifiora, Spreng. ex DC Prod. vi. 867-Senecio nudicanlis.
peduncnlosa, *DC. I. c.* 806.—Afr. anstr.
perfoliata, Linn. f. Snppl. 876 —Othonna perfoliata.
Petasitis, Sims, Bot Mag. t 1636 - Senecio Petasitis.
phylicaefolia, Poepp. ex DC. Prod. vi. 416-Senecio phylicaefolius.
pinnata, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Doc. i. 29-Senecio pinnatisectus.

CINERARIA :—
pinnatifida, Willd. Sp. PI. iii. 2074 - Senecio incert us.
platanifolia, Schrank, PI. Rar. Hort Monac. t 95 = Senecio Petasites.
platycarpa, *DC. Prod.* vi. 305.—Afr. anstr.
polycephala, *DC. 1. c.* 807 •—Afr. austr.
polyglossa, DC. 1. c. 806-mollis.
populifolia, Lam. Encyc. ii. 8 — Senecio appendiculatus.
populifolia, L'Hirit. Sert. Angl. 25 - Senecio populifolius.
praecox, Cav. Ic. iii. 23. t 244-Senecio praecox.
Pratensis, Herder, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) I. 400, partim — Senecio lugens.
pratensis, Hoppe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. ii. 241 —Senecio campestris.
procera, *Griset. Spidl. Ft. Rumel.* ii. 218.—Rumel.
pulchella, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 488 = Senecio cymbalariaefolius.
pulchella, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 282.—Ins. Canar.
pumila, Thunb. Prod. PL Cap. 155=Senecio repandns.
purpurascens, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct ii. 818-Senecio acanthifolins.
purpnrata, *Linn. Afant.* 285.—Afr. austr.
pyrenaica, Nym. Syll. 2 — Senecio pyrenaicus.
racemosa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 314 — Senecio racemosns.
ramentosa, L'Hérit Sert Angl. 26 = Senecio ecbinatus.
ramosa, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, li. (1880) 35.—Europ.
renifolia, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 82-Senecio renifolius.
reniformis, Spreng. ex DC. Prod. vi. 316 - Cremanthodium reniforme.
repanda, Lour. Fl. Cochinch. ii. 601 - Senecio scandens.
repanda, Willd. Sp. PI. iii. 2076-Senecio Forsteri.
retusa, Wall, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 206" Senecio retnsus.
rimilaris, Waldst. & Kit PI. Rar. Hung. Ui. 265 = Senecio crispatus.
robusta, Ledeb. Fl. Alt. iv. 106-Senecio robustus.
rotundifolia, J. F. Gmel. Syst. 1240; Willd. Sp. PI. iii. 2076-Senecio rotundifolius.
rupicola, Nym. Consp. *S51 = transsihanica.*
salidfolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 188 = Senecio salignus.
samnitum, Huet, ex Nym. Consp. 362 - Senecio alpinus.
sarmentosa, Lesch. ex DC. Prod. vi. 869 ••=* Senecio candicans.
Saxifraga, *DC. I. c.* 306.—Afr. austr.
scapiflora, L'Hérit. Sert. Angl. 25 - Senecio diversifolius, *Harv.*
scapigera, Banks, ex DC. Prod. vi. 489 - Senecio diversifolius, *Harv.*
Schimperi, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i-*439.—Abyssin.
Schkuhrii, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1499 = Senecio crispatus.
sdrpina, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 438-Senecio junceus.
scordifolia, Link, ex DC. 1. c 439 - Senecio diversifolius, *Han.*
Selloi, Spreng. Syst. iii. 541=Senecio Selloi.
senecifolia, Foir. Encyc. Suppl. ii. 265 = Senecio alpinus.
Senedonis, *L'Hirit. Sert. Angl.* 26.—Hab.?
serrata, Willd. Sp. PL iii. 2078-Senecio Leontodontis.
serratifolia, S. F. Gray, Nat An. Brit FL ii. 469 = Senecio paludosus.
sessilifolia, Jacquem. Voy. Bot. 91 - Wemeria nana.
sibirica, Linn. Sp. PL ed. II. 1242-Senecio Ligalaria.
solidaginifolia, Fisch. ex Ledeb. FL Ross. ii. 858 - Senecio racemosus.
soncUifolia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1248.—Afr. anstr. .
spathulaefolia, C. C. Gmel. FL Bad. UL 454 -Senecio spathulaefolius.
spathulata, Lam. Encyc ii. 8 = Othonna alata.
specioso, Fiscb. ex Turcz. in BulL Soc. Nat Mosc **• (1847) II. 11 *(-Lifularia spedosa).-Sibirii.*

CINERARIA:—
speciosa, Schrad. ex Link, Enum. Hort Berol. ii. 834 -Senecio Lignlaria.
spinulosa, *Lam. Encyc.* ii. 9.—Afr. anatr.
suhdentata, Bunge, Enam. PL Chin. Bor. 89 = Senecio campestris.
sudetica, Koch, in Flora, vi. (1828) 605-Senecio crispatus.
taraxacifolia, Bieb. Fl. Tanr. Cauc ii. 818 - Senecio taraxadfolins.
tuygetea, Nym. Syll. 2 » Senecio Candidas.
tenella, Link, Enum. Hort Berol. ii. 384 - Aster tenellus.
inuifolia, Gaudin, Fl. Helv. v. 806-Senecio brachychaetas.
thapsoides, Nym. Syll. 2=Senecio thapsoides.
thyrsoidea, *Host.Fl. Austr.* ii. 481.—Austria.
tityrsoidm, Ledeb. Fl. Alt. iv. 107"Senecio sibiricus.
tillandsuufolia, Poepp. ex DC. Prod. Ti. 415 - Senecio argenteus.
tomentosa, *Less. Syn. Comp.* 891.—Afr. austr.
tomentosa, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 5 - Senecio canadensii.
irachyfhylla, Sprang. Nene Entdeck. iii. 48=Aster Ecktonis.
transsilvanica, Schnr, Enum. PI. Transs. 846=Senecio lugens.
trifurcata, Sprang. Syst. iii. 661=Senecio trifarcatus.
"tberosa, E. Mey. ex DC Prod. vi. 488 - Senecio incertus.
ivssilaginea, Thunb. Fl. Cap. 671 = Senecio verbasdfolius.
russilaginis, L'He>it Sett Angl. 26 - Senecio Tussilaginis.
iHssilaginoides, Webb, ex Load. Hort. Brit SuppL ii. 621, nomen—Senecio Tussilaginis.
"I'ginosa, Ledeb. in Sprang. Nov. Prov. (1818) 11 - Senecio gallicus.
**ncinata,* Sprang, ex DC. Prod. vi. 369 - Senecio densiflorus.
"nctuosa, Gilib. Fl. Iituan. i. 211-Senecio palustris.
"ndulata, Willd. Sp. PI. iii. 2071-Senecio petiolaris.
**erna,* Mair. ex DC. Prod. vi. 430-Senecio salignns.
"^rtinllata, Mair. ex DC. 1. c=Senecio AndrieuxiL
***tita,* Haw. in Phil. Mag. (1828) 187-Othonna vertita.
**fstita,* Sprang. Syst. iii. 660=Senecio crassifloms.
!«»»a, CHlrit. Sert. Angl. 25.—Afr. aostr.
"uianiima, Nym. Consp. 851-Senecio thapsoides.
cineraria, Alam. ex DC. Prod. vi. 428 - Senecio vnlnerarius.
Walerhousiana, Paxt. Mag. Bot. iv. (1888) t 219°= Senecio TussilaginU I
Wflberiana, Paxt. 1. c. ix. (1842) 1.126.—Hab. I
Wolffii, Schur, ex Nym. Consp. 352 «= Senecio campestris.
Zahlbruclmeri, Host, Fl. Anstr. ii. 479 - Senecio 'yratifolins.

[C1]JfGA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. L [A]«. IV. 2 (Quid 1).

[C1]NHONA, Linn. Gen. ed. VI. 91 (1764), lapsu= Cinchona, Unn. (Rnbiac.).

CINNA, LUM. Sp. PL s (1768). *GRAMINEAE,* Bf th.& Hook.?, iii. 1161.
ABOLA, Adans. Fam. iL 31 (1768).
BLYTTIA, Fries, Nov. FL Suec. Mant. U. 2 (1889).
'Vfostidea, Beanv. ex Steud. Norn. ed. I. 20, 198- -•rundinacea.
***». Vees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 182.—Chili.
'"tknoidea, Kunth, Rev. Gram. i. 67«arandinacea.
•^ndi nacea, Hdo .Fl. Bor. Am. ii. 288-Colpodium' -stif olinm.
"undinacea, *Linn. Sp. PI.* 6.-Reg. bor.
""gdinacea, Ret*, ex Stead. Norn. ed. *U.* i. 865 - Muehlenbergia mexicana.
"rovnii, Rupr. Bdtr. Pfl. Rosa. Reich, il. 66"-Col-Podium Utifolium.
crinita crini Trtat Fund Agrost. 118 = Dichelachne ta.
decipiens, scabra. Kunth, Rev. Gram. i. 67 = Deyeuxia
expansa, filiformis, Link, Hort Berol. iL 236-amndinacea.
bergia Link, Enum. Hort. Berol. i. 70 = Muehlen. mexicana.

CUtfTTA:—
glomerate, Link, Hort Berol. ii. 287-Muehlenbergia glomerata.
glomerata, Walt. Ft. Carol. 59 - Andropogon ma. crourus.
jafmica, Steud. Syn. PI. Gram. 182 = Sporobolus indiens.
Ianata, Kunth, ex Stead. Norn. ed. II. i. 866 = Epicampes Ianata.
lateralis, Walt FL Carol. 59 = Andropogon vir. ginicus.
lateriflora, Ktmth, Rev. Gram. i. 67 - Muehlenbergia mexicana.
latifolia, Griseb. in Ledeb. Fl. Ron. iv. 485 - arnndinacea.
macroura, Kunth, Rev. Gram. i. 67 = Epicampes macronra.
macroura, Thurb. in & Watt. Bot. Calif, ii. 276= Epicampes rigens.
mexicana, Beauv. Agrost 82 = Muehlenbergia mexicana.
ovata, Kunth, Rev. Gram. i. 67 •= Echinopogon ovatas.
pendula, Trin. in Mem. Acad. Pitersb. Ser. VI. vi. (1846) II. 280-anmdinacea.
phleoides, *Kuntk, Rev. Gram.* i. 67.—Venezuela.
pubescens, Kunth, 1. c.=Epicampes pubescens.
Purshii, Kunth, 1. c.=Calamagrostis canadensis.
racemosa, Kunth, 1. c.-Muehlenbergia glomerata.
seHfolia, Kunth, 1. c. 64 j et Enum. PI. i. 208 =Epicampes macroura.
sobolifera, Link, Enum. Hort. Berol. i. 71 = Muehlenbergia sobolifera.
stricta, Kunth, Rev. Gram. i. 67 = Epicampes macrows.
suaveolens, Rupr. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 485 = arundinaceft.
tenuiflora, Link, Enum. Hort. Berol. i. 71 = Muehlenbergia Willdenowii.
valdiviana, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 663.—ChiU.

CEBTNAOROSTIB, Griseb. in Goett Abh. xix. (1874) 266. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1162.
polygama, *Griseb. I. c.* 257.—Reg. Argent.

CrNWAMODENDBOW, Endl. Gen. 1029 (1840). *CANELLACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 121.
axillare, *Endl. ex Walp. Rep.* i. 898.—Bras,
corticosum, *Miers, in Ann. (fMag. Nat. Hist.* Ser. III. i. (1858) 861.—Ind. occ.
macranthum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 317.—Porto Rico.
rubrum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 109=corticosum.

CnOTAMOinUt, [Toum.] Linn. Syst. ed. I. (1785); Blurae, Bijdr. 568 (1826). *LAURINEAE,* Benth. *Be* Hook. f. iii. 155.
CAMPHORA, [Bauh.] Linn. Syst. ed. I (1785): Nees, in Wall. PI. As. Rar. iL 61 (1831); Syst. Lanrin. 87 (1836).
CECICODAPHNE, Nees, Syst. Lanrin. 202 (1886).
PARTHENOXYLON, Blume, Mus. Bot. Logd. Bat i. 822 (1851).
albiflorum, Hook. f. & Thorns, ex Melon, in DC. Prod. xv. I. 21=impressinerrium.
albiflorum, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii 76-C. Tamala.
angustifolium, Rafin. Sylva Tellur. 136-Acrodididium salicifolium ?
aromaticum, J. Grah. Cat. Bomb. PL 173-zeylanicum.
aromaticum, Nees, in Wall. PI. As. Rar. u. 74-C. Cassia.
aromaticum, Zoll. Syst Verz. Ind. Arch. 112= iners.
BaBania, Nees, in Wall. PL As. Rar. U. 78-obtusifolium.
Bejolghota, Sweet, Hort Brit. ed. L 844-obtusifolium*
bomeense, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* L 260; *Meissn. in DC. Prod.* xv. 1.19.—Borneo,
brevifolium, *Miq. in Verh. Nederl. Inst.* III. (1852) v. 14.—Japon.
Burmanni, *Blume, Bijdr.* 569.—Java.
calophyllum, Nees, SystLauiin. 40-camphoratnm.
calyculatum, J/ry. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 869.—Sumatra.

CINNAMOMUM:—
Camphora, *T. Nees (f Eberm. Handb. Med.-Pharm. Bot.* ii. 430.—China; Japon.
camphoratum, *Blume, Bijdr.* 571.—Java.
camphoriferum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122- C. Camphora.
Cappara-Coronde, Blume, Rumphia, i. 84. t. 9. £ 2, 8 -iners.
Cassia, *Blume, Bijdr.* 670.—Burma; China.
Cassia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 67=C. Tamala.
Cassia, Siebold, in Verh. Batav. Gea. xii. (1830) 28-BunDtumi.
Cathia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 66-Phoebe paniculata.
caudatnm, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 76.—Reg. HiTflri* f Buixnft*
Cecidodaphne, *Meissn. in DC. Prod.* xv. L 26.—Reg. Hlmal.
celebieum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 264.-Ins. Celebes.
chinense, Blume, Bijdr. 669-Burmanni.
Chloroxylon, J. S. PresL Rostl. ii. 37=Ceanothus Chloroxylon.
dtriodorum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 253.—Zeylan.
crassinervium, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 264. —Malaya.
Culiban, Rafin. Sylva Tellur. 185-seq. t
Culilawan, *Blume, Bijdr.* 571.—Malaya; China.
Culitlawan, Nees, in WalL PL Ax. Rar. ii. 75= praec.
currifolium, *Nees, Syst. Laurin.* 80.—China,
cuspidatum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 262. —Sumatra.
cyrtopodum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 897.—Sumatra,
daphnoides, *Sieb. V Zucc. in Abh. Acad. Muench.* iv. Hi. (1846) 202.—Japon.
dasyanthum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* L 269.— Sumatra.
Doederleinli, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vL (1886) 67. —Archlp. Loo-Choo.
dubium, Nees,in Wall. PL As. Rar. !L 78-iners.
dulce, Nees, L c. 76-Burmanni.
eucalyptoides, Nees, 1. c. 78=iners.
glabrescens, *Miq. Ann- Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 264.— Malaya,
glanduli&rum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 26.—Reg. HimaL
glaucum, J. S. Pretl, Rostl. ii. 87 ; G. Don, ex Loud. Hort Brit. 160-Litsaea glanca.
gracile, Hort. ex Sweet, Hort. Brit ed. L 344, nomen =C. Camphora.
gracile, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. L 259 = iners.
Griffithii, Meissn. in DC. Prod. xv. 1.19-iners,
Heyneanum, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iL 76.— Ind. or.
impressinervium, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 21.—Reg. Himal.; China.
iners, *Reinw. ex Blume,'Bijdr.* 670.—Burma; Malaya.
iners, Wall. Cat. n. 2588 K=nitidum.
iners, Wight, Ic. t 122, bi»=zeylanicum.
inodoram, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 26.—Malaya,
inunctnm, *Meissn. I. c.* 24.—Burma.
japonicum, Siebold, in Verh. Gen. Batav. xiL (1830) 28 - pedunculatum.
javanicum, *Blume, Bijdr.* 570.—Malaya.
Kiamis, Hassle Cat. Hort. Bogor. Alt 87 =pedoncu-— um.
Kiamis, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 75-Bnrmanni.
lampongnm, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 868.— Sumatra.
Laubatii, F. MnelL Fragm. v. 165 = C. Tamala.
laxniorum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 21.—Java,
litsaeaefolium, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 253.—Zeylan.
Loureirii, *Nees, Syst. Laurin.* 65.—Cochinch.
lucens, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat i. 261-tavoyanum.
macrophyllum, *Miq. 1. c.* 269.—Java.
Malabathrum, Batka, in Nov. Act. Nat Car. xvii. (1886) II. 618 = iners.
Malabathrum, Miq. PL Jungh. i. 174 = subtetraptcrum.
malaccense, Meissn. b DC. Prod. xv. I. 27 = C. Parthenoxylon.
Maruba, *Meissn. in DC. 1. c.* 15.—Malaya.
montanum, J. S. Presl, RostL U. 36; Nees, Syst. Laurin. 81-Phoebe montana.

CnnTAMOHTTM :—
mnltiflorum, *Wight, Ic.* t. 131.—Zeylan.
Neesianum, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 26 = C. Parthenoxylon.
neglectum, Blume, Rumphia. i. 88, in nota, t. 11. f. 2 =javanicum.
nitidum, *Blume, I. e.* 35. t 13. f. 2; t. 16. f. 1, 2.—Burma; Malaya.
nitidum, Hook. Exot. Fl. iii. t. 176=iners.
obscarum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 26.—Sumatra,
obtusifolium, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 78.—Reg. Himal.; Burma.
ochraeeum, Blume, Rumphia, i. 87—iners.
officinarum, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 866 = C. Cassia?
ovalifolium, Gardn. ex Meiisn. in DC. Prod. xv. I. 11 -Wightii.
ovalifolium, *Wight, Ic.* t.125.—Zeylan.
paraneuron, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 895.—Sumatra.
Parthenoxylon, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 26.—Burma; Malaya; China,
pauciflorum, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 75.—Reg. Himal.
pedatinervium, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 15.—Ins. Fiji,
pedunculatum, *J. S. Presl, Rostl.* **ii. 87;** *Nees, Syst. Laurin.* 79.—Japon.
Perrottetii, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 22.—led. or.
politum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **i. 265.—**Malaya.
pseudo-sassafras, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 27 = C. Parthenoxylon.
pseudo-sintok, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 902=iners.
pyrifolium, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 66 (sp. dubia).—Nepal.
Rauwolfii, Blume, Rnmphia, i. 86. t. 9. f. 4, 6-inen.
recurvatum, Wight, Ic. t. 133=pauciflorum.
Reinwardti, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.900 miners.
Reinwardti, Nees, Syst. Laurin. 70-C. Tainala.
rhynchophyllum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 895.—Sumatra.
ruirum, Blume, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. i. (1881) 62=C. Culilawan.
sericans, *Hanct, in Journ. Bot.* xv. (1877) 336.—China.
sericeum, Siehold, in Batav. Gen. Verh. xii. (1880) 24 =Lauras sericea.
Sieboldii, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 18 = Burmanni.
Sintok, *Blume, Bijdr.* 671.—Malaya,
subavenium, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1.902.—Sumatra,
snbeuneatum, *Miq. I. c.* 895.—Sumatra,
subtetrapterum, *Miq. I. c.* 902.—Sumatra.
sulphuratum, Kurz, For. Fl. Brit Burm. ii. 288» tavoyanum.
sulphuratum, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* **ii. 74.—**Ind. or.
sumatranum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 25.—Sumatra.
Tamala, *T. Nees &* Eberm. Handb. Med.-Pharm. Bit.* ii. 426.—Reg. Himal.
tavoyanum, *Meissn. in DC. Prod.* xv. i. 20.—Burma.
tomentosum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 66 = Phoebe paniculata.
validinerve, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 80.—China.
verum, J. S. Presl, Rostl. ii. 36; Sweet, Hort. Brit. ed. I. S44 = zeylanicum.
villosum, Wight, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 16 = multiflorum.
villosum, Wight, Ic. t. 127miners,
viminenm, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* **ii. 76.—Ins.** Penang.
Wightii, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 11.—Ind. or.
xanthoneurum, *Blume, in Hoev. V De Vriese, Tijdschr.* i. (1884) 68.—N. Guinea,
zeylanicum, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 74; iii. 32.—Ind. or.; Malaya.

CINWAMOSMA, Baill. Adansonia, vii. (1866 67) 219. *CANELLACEAE,* Benth. & Hook, f" i. 970.
fragrans, *Baill. I. e.*—Malaya.

CINNASTRUM, Fourn. Gram. Mex. 90, ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1153 (1883) = Deyeuxia, Clar. (Gramin.).

CINOGASUM, Neck. Elem. ii. 886 (1790)=Croton, Linn. (Euphorbiac.).

CIONANDRA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 286 (1860) = Cayaponia, Silva Manso (CucurbiUc).
angustiloba, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist Nat. x. (1881) 274.—Porto Rico.
cuspidata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 287=Cay. americana.
graciliflora, Griseb. I. c.-=Cay. amerlcana.
racemosa, Griseb. 1. c. 286 •= Cay. racemosa.

CIONISACCUS, Breda, Orch. Kuhl et Hass. (1827) [t. 8] = Goodyera, R. Br. (Orchid.).
lanceolatus, Breda, 1. c.-G. procera.

CIONOSICYOS, Benth. & Hook. f. Gen. i. 826 (1867) =seq.

CIONOSICTS, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 288 (1860). *CUCURBITACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 826. "
pomiformis, *Griseb. 1. c.*—Ind. occ

CIONURA, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 69 (1844) = Uaradenia, R. Br. (Asclepiad.).
erecta, Griseb. 1. c. = M. erecta.

CIPADES8A, Blame, Bijdr. 162 (1825). *MELIACEAE* [Benth. & Hook. f. i. 332].
MALLEA, A. JUSS. in Mem. Mas. Par. xix. (1880) 221.
baccifera, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 6-fruticosa.
Boiviniana, *Baill. Adansonia,* xi. (1874) 255.—Madag.
borneensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iv. 6.—**Borneo,
depauperata, *Baill. Adansonia,* xi. (1874) 266.—Ins. Coraor.
fruticosa, *Blume, Bijdr.* 162.—Java.
subseandens, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 7 = fruticosa.

CIPONIMA, Anbl. PI. Gui. i. 566. t. 266 (1775)=Symplocos, Linn. (Styrac).
guianensis, Aubl. 1. c. 567 = S. Ciponima.
scabridula, Miers, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1879) 288 « S. Ciponima.

CIFTTBA, Anbl. PI. Gui. i. 38. t. 13 (1775). *IRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 694.
MARICA, Schreb. Gen.Pl. 37 (1789) (non Ker-Gawl.).
aturea, Griseb. & Klatt, in Abh. Natnrf. Ges. Halle, xii. (1882) 387 -Calydorea azurea.
caerulea, Heynh. Nom. i. 197 — Marica caerulea.
coelestis, Heynh. 1. c. = Nemastylis coelestinus.
cubensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 251.—Ins. Cuba.
graeilis, Heynh. Nom. i. 197 >= Marica gracilis.
graminea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 820 = palndosa.
humilis, H. B. & K. 1. c.» palndosa.
linearis, Klotzsch & Klatt, in Abh.Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) S87=Calydorea cipuroides.
longifolia, Heynh. Nom. i. 197 = Marica longifolia.
martinieensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 820 = Trimezia lurida.
Northiana, *Endl. in Harting. Parad. Vindob.* **t 6.—**Bras.
palndosa, *Aubl. PI. Gui.* i. 38.1.13.—Am. trop.
plicata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 689 = Eleutherine plicata.
Sabini, Heynh. Nom. i. 197 - Northiana.
Sabiniana, Voigt, Hort. Snburb. Calc. 602 = Marica Sabini.
semiaperta, Heynh. 1. c.=Trimezia lurida.

CIPURA, Klotzsch, ex Klatt, in Abh. Natnrf. Ges. Halle, xii. (1882) 862 - **Herbertia,** Sweet (Irid.).

CIRCAXSA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 8 (1737). *ONAGRARIEAE.Denth.* & Hook. f. i. 793.
REGMUS, Dnlac, FL Hautes-Pyr. 328 (1867).
alpestris, Schur, Enum. PI. Transs. 214= C. lutetiana.
alpestris, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 167=alpina.
alpina, *Linn. Sp. PI.* 9.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
canadensis, Muhl. Cat 2-=C. lutetiana.
cordata, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* **211. t. 43. f. 1.—**Reg. Himal.
cordifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 26=alpina.
deeumbens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 127=alpina.
erecta, Gilib. 1. c. 126 = C. lutetiana.

CTRCAEA:—
ericetorura, *Martr. PI. Crit. Tarn.* 29.—Gallia.
erubescens, *Franch.* **&" *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 370.—**Japon.
intermedia, *Ehrh. Beitr.* iv. 42.—Europ.
intermedia, Wall. Cat. n. 6342-alpina.
lutetiana, Georgi, It. i. 195=alpina.
lutetiana, *Linn. Sp. PI.* 9.—Reg. bor.
major. Lam. Fl. Fr. iii. 478=C. lutetiana.
minima. Lam. 1. c. = C. alpina.
mollis, *Sieb. V Zucc. in Abh. Ahad. Muench.* **iv.** (1847) 134.—Japon.
nemoralis, Salisb. Prod. 276 = C. lnteriana.
ovatifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 26=C. lutetiana.
pacifica, *Aschers.* **&•** *Magnus, in Bot. Zeit.* **xxix. (1871)** 392.—Am. bor. occ.
pubescens, Pohl, ex Stead. Nom. ed. II. i. 866=C. lutetiana.
quadrisulcata, *Maxim, in Franch.* **6" *Sav. Enum. PI. Jap.* i. 169.—Japon.
repens, Wall. Cat. n. 6341=C. lutetiana.
•*oulgaris,* Moench, Meth. 279 = C. lutetiana.

CIBCAEASTEE, Maxim, in Boll. Acad. Petersb. xxvii. (1881) 566. *CHLORANTHACEAE1,* Benth. * Hook. f. iii. 1220.
agrestis, *Maxim. I. c.* 557.—Reg. Himal.; As. centr.

CIRCINNUS, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 884 = HymenoearpuB, Savi- [1798] (Legumin.).
vulnerarioides, Medic. 1. c. = H. circinnata.

CIRCINUS, Medic. Phil. Bot. i. 208 (1789)=praec

CIRCIS, Chapm. Fl. S. U. St. 114 (1860), lapsu = CerdB, Linn. (Legumin.).

CIRINOSUM, Neck. Elem. ii. 84 (1790) = Cereufl, Haw. (Cactac.;.

CIRIPEDIUM, Zumag. Fl. Pedem. i. 18 (1829) =• Cypripedium, Linn. (Orchid.%

CIBKHAEA, Lindl. Bot. Reg. snb t. 930 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 686.
SARCOGLOSSUM, Beer, Prakt. Orch. 306 (1854).
SCLEROFTERIS, Scheidw. in Allg. Gartenz. (1839) 407-
adspersa, *Hoffm. ex Heynh. Nom.* ii. 145, nomen.—Bras-
dependens, Loud. Hort. Brit. 870 = Loddigesii.
dependens, Reichb. £ in Walp. Ann. vi. 496 = viridipurpurea.
fuscolutea, Hook. Bot Mag. t 8726 = saccata.
fuscolutea, *Lindl. Bot. Reg.* sub t 1538.—Bras.
Hoffmanseggii, Heynh. ex Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 496=viridipurpurea.
Loddigesii, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1538.—China?
obtusata, *Lindl. 1. c.* xxiii. (1837) 2005.—Bras,
pallida, *Lindl. I. c.* sub t 2005, nomen.—Hab.]
saccata, *Lindl. I. c.* (1839) *Misc.* 72.—Bras,
tristis, *Lindl. I. c.* t. 1889.—Mexic.
violaceo-virens, *Hoffmgg. Ver: Orck.—Cf. Bot. Zeil-i.* (1848) 831.—Hab. ?
violascens, *Hoffmgg. II.* re.—Hab. ?
viridipurpurea, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1588.—Bras.
viridi-purpurea, Lodd. Bot. Cab. t. 1967 = Loddigesii.
Warreana, *Lindl. ex Reichb. f. in Walp. Ann.* **vi. 497-**—Bras.

CIBBHOPETAI.UM, Lindl. Bot. Reg. sub t. *M** (1824). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 504.
EPHIPPIUM, Blnme, Bijdr. 309. t. 65 (1825).
BOLBOPHYLLOPSIS, Reichb. f. in Bot Zeit. x. (1852) 988.
HIPPOGLOSSUM, Breda, Orch. Kuhl et Hass. (1827; **ft- !*]•**
ZYGOGLOSSUM, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) *•
abbreviatum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1881) "• 7°-—Hab. ?
albidum, *Wight, Ic.* t. 1653.—Ind. or.
Andersonii, *Kurt, Rep. Veg. Andaman.* **51.—l**os" Andaman,
antenniferum, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) sub t 49.—lnS-Philipp.
auratum, *Lindl. 1. c.* (1840) *Misc.* 60.—Ins. Philipp.
Blumii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **69.—Java.**
bootanensis. Griff. Notul. iii. 296 = roaculosum.
caespitosum, *Wall, ex Lindl. Bot. Reg.* (1838) »«*• 85.—Reg. Himal.

CIBBBOPETALUM :—

capitatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1848) snb t. 49.—Java,
carinatum, *Teijsm. V Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1855) 897.—Java.
caudatum, Wight, Ic. t. 1668=vaginatum.
winense, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 87.—China,
davigerum, *Fittgerald, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 204—Austral.
compressum, *Lindl. Bot. Reg.* xxix. (18481 sub t. 49.—Java.
cprautum, *Lindl. 1. c.* (1888) *Misc.* 75.—Reg. Hirnal.
Lumingii, *Lindl. 1. c.* sub t. 49.—Ins. Philipp.
delitescent, Rolfe, in Gard. Chron. (1882) II. 461.—Hongkong,
elegans, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* x»v. (1862) 810.—Malaya.
Slisae, F. Muell. Fragm. vi. 120. t. 57=Bulbophyllum Elisae.
elongatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1848) snb t. 49.—Reg. Himal.
nmbrjatnm, *Lindl. 1. c.* (1889) *Misc.* 72.—Ind. or.
flagelliforme, Teijsm. & Binn. ex Reichb. in Walp. Ann. vi. 264=Pahudi.
gamosepalnm, *Griff. Notul.* iii. 298.—Burma,
erandiflorum, *Wight, Ic.* v. 1.1658.—Zeylan.
Uaochilum, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn Soc.* * «. (1874) 153 (BulbophylliS).—Burma,
'eopardimim, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 309.—Java.
Jineatum, *Teijsm. V Binn. 1. c.* 811.—Malaya,
longiscapum, *Teijsm. V Binn. I. c.* 810.—Malaya.
Macraei, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 59.—Zeylan.
Macraei, Wight, Ic. t. 1662 - Wightii.
•nacalosum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 81.—Reg. Himal.
Mi[illegible], Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) I. 284 "Bulbophyllum Makoyanum.
""iUare, *Lindl. Bot. Reg.* (1848) snb t. 49.—Ins. «Mr[illegible].
MMusae, *Lindl. 1. c.* (1842) 1.12.—Malaya.
"Wgherrense, *Wight, Ic.* vi. t. 1654.—Ind. or.
""tans, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 71.—Manilla,
ornatisaninn,, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. p 42*—Reg. Himal.
[illegible] *De Vriese> Epim_ Lugd.-Bat.* (1863) 2.—javl.
Pictoratum, *Lodd. in Bot. Reg.* (1840) Jtf:se. 49.—Burma.
Pur[illegible] *Par_ V Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. U874) 158 (Bulbophylli J).-Burma.
Pnodum, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* »>•. (1862) 811._Java.
refractu[illegible] *ZM[illegible] Flnra<* XXXl ^1847) 456.—Reg. Hitaa?'• Malaya.
'ttisiuscnl'nm, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869)1182. Ro—Burma.
[illegible] *Lindl., Gen. et Sp. Orch.* 68.—Ind. or.
[illegible] *f- oti* Hamburg. 48—Burma.
[illegible] *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl.*
Th[illegible] (186a) 310.—Java.
[illegible] *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 882, in textu.—Ins.
[illegible] *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) II. 71.—Hab.?
tripodians, *Par. & Reichb. f. l. c.* (1876) 1. 816.—Burma.
[illegible]i, Linden, Illustr. Hortic. xxviii. (1881) 80. = maculosum?
vagina[illegible]twn, *Lindl. in Watt. Cat.* n. 1979.—Malaya.
[illegible] *um*, Wight, Ic v. t. 1657-Macraei.
[illegible] *Grah- Cat* P1- Bomb_ 205 = fimbriatum.
[illegible] *Lindl* -« WalL Cat. n. 1980 = refractum.
[illegible] *Enum. PI. Zeyl.* 299.—Zeylan.

CIRSELIUM. Brot. Fl. Lusit. i. 346 (1804) - seq.

CIRSIUM, [Tonrn.1 Adans. Fam. ii. 116 (1783); DC. Fl. Fr. iv. 110 (1805)=Cnicus, Toura. (Compos.).

abyssinicum, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 456=Cn. lanceolatus.
acanthifoliuvt, Arv. in Boll. Soc. Dauph. iii. (1876) 73.—Gallia.
Acama, Moench, Meth. Suppl. 226-Cn. Acama.
acaule, [Weber, ex] Wigg. Prim. Fl. Hols. 59 » Cn. acaulis.
acaulos, Scop. Fl. Cam. ed. II. M. 181-Cn. acaulis.
aciculare, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 40.—Hab. 1
aduncum, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 636 =*fallax*.
affine, Tausch, in Flora, xvi. (1883) 228.—Bohem.
a/rum, DC. Cat. Hort. Monsp. 96=Cn. afer.
aggregatum, LedeK Fl. Ross. ii. 787.—Reg. Caocas.
Alberti, Regel & Schmalh. in Act Hort. Petrop. v. (1879) 818.—Turkestan.
alUcans, Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 109.—Hispan.
Allionii, Spenn. Fl. Friburg. iii. 1079=Cn. acaulis.
Alliomi, Thum. ex Arduin. Fl. Alpes-Marit. 198-Cn. pyrenaicus.
alpestre, Naegeli, Cirs. Schw. 84-Cn. acaulis.
altestrex, Treuinf. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xix. (1875) 228.-Tyrol.
alpinum. All. FL Pedem. i. 15S=San«surea alpina, discolor.
altissimum, Hill, Hort. Kew. 63-Cn. altissimus.
ambiguum, AH. Auct. Pedem. 10-Cn. heterophyllus.
anglicum, DC. Fl. Fr. iv. 118-Cn. prattnBis.
angvlosum, Tausch, in Floia, xix. (1836) 402.—Hab.?
angustifolium, DC. Prod. vi. 648 = Cardan* angustifolius.
angustifolium, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. *S9* = *Tauschii.*
angustissimum, DC. Prod. vi. 652 - Tricholepis strictophyllnm.
apiculatum, DC. 1. c. *Ub*libanoticum.*
appendiculatum, Griseb. Spidl. Fl. Rnmel. ii. 250.—RumeL; Herceg.
arachnoideum, Bieb. Fl. Taor. Caac. iii. 557-Cn. arachnoideus.
araneosum, Steud. Norn. ed. II. i. 367-Cn. areneosns.
arctioides. Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 124 = Carduus arctioidea.
arctotidifolium, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 144=Cn. Schimperi.
argentum, Peyer, ex Vest, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 67=Cn. arvensis.
argunense, DC. Prod. vi. 644.—Sibiria.
argyracanthum, DC. 1. c. 640-Cn. irgyracanthus.
aristatum, DC. 1. c.—Armenia.
armenum, DC. 1. c. 647= *simplex*,
aroense, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 126 = Cn. arvensis.
Aschersoniix, Celak. in Arch. Naturfvr. Landesd. Boehm. ii. (1873) 268.—Bohem.
atriplidfolium, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. 367 = Serratula atriplicifolia.
atticum, Sch. Bip. ex Nym. Consp. *iW^crinitum.*
Avsserdorferix, Hausm. ex Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 223 = Cn. ochroleucus ?
autareticum, Mutel, Fl. Dauph. ii. 262-Cn. heterophyllus.
baeticum, Spreng. Syst. iii. 877.—Hispan.
benacense, Treuinf. in Oestr. Bot Zeitschr. xxiv. (1874) 172.—Tyrol.
Bertolonii, Spreng. Syst. iii. 877=Cn. Bertolonii.
Bigelomi, DC. Prod. vi. 662-Cn. maticus.
bipontinum, *V.* Schultz, in Arch. Fl. Fr. et Allem. 34—Cn. acanlis.
Boujarti, Sch. Bip. in Oestr. Bot. Wochenbl.vi. U856) 299=Cn. ciliatus.
Bourgaeanum, WiUk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 191.—Hispan.
brachyeephalum, Juratzka, in Verb. Zool. Bot. Ver. Wien, vii. (1857) *W-Chailleti*, Koch.
iraeteatum, Link, in Linnaea, *a.* (1884) 580 »Cn. syriacus.
braeteosum, DC. Prod. vi. 641 = Cn. strigosus.
Braunii, F.Schnlti, ex Nym. Consp. 409 = Cn. oleraceus.
brevicaule, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 396-Cn. japonicus.
brenfolium, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 421-Cn. undulatus.
brerispinum, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 410 ^Cn. pungens.

CIRSIUM :—

britannicum, Scop. Ann. II. Hist. Nat. (1769) 60-Cn. pratensisi
Brueggeri x, Kill, ex Bruegg. in Jahresb. Natnrf. Ges. Granb. II. xxiii-xxiv. (1880) 108.—Helvet.
Brunneri, A. Braun, ex Nym. Consp. 407-Cn. tuberosus.
Buchingeri, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 284, nomen.—Abyss.
Buergeri, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. ii. 185 = Cn. Bnergeri.
bulbosum, DC. Fl. Fr. iv. 118=Cn. tuberosus.
bulbosum, Lam. Fl. Fr. ii. 22-Cn. monspessnlanns.
bulbosum, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 760=//*pendulum*, Lange.
bulgaricum, DC. Prod. vi. 689-Cn. giganteos.
bytantinum, Steud. Nom. ed. II. i. 367.—Rumel.
californicum, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 112« Cn. califoraicus.
Candelabrum, Griseb. Spidl. FL Rnmel. ii. 251.—Graecia; Rumel.
Candolleanum, Naeg. Cir. Schweiz. 98-Cn. ochroleucust
canescens, A. Gray, PL Fendl. 110 - Cn. neo-mexicanus.
canescens, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 420 = Cn. andalatus.
canum, All. Fl. Pedem. i. 151- Cn. pratensis ?
canum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 274-Cn. canus.
Caput'Mtdusae, Schnr, ex Nym. Consp. 408-Cn. spinosissimus.
carlinoides, Fisch. in DC. Prod. vi. 661-Cn. carli noides.
carminans, Dmn. Fl. Belg. 74.—Belgium.
carniolicum, All. Fl. Pedem. i. 149 = Cn. rivularis.
carniolicum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 128-Cn. rufescens.
Carolorumx, C. Jenner, ex Nym. Consp. 407"Cn. beterophyHus.
carthamoides, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 803= Centaurea carthamoides.
Casabonae, DC. Fl. Fr. iv. 121-Cn. Casabonae.
castellanum, Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 109 - Cn. flavispinus.
cataonicum, Boiss. *8c* Haassk. in Boiss. Fl. Orient, iii. „ 5S5.-Syria.
Celaiovskianumx, Knaf, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 309-Cn. arvensis.
Cephalotes, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 102-Cn. horridns.
cernuum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 = Cn. nivalis.
Ceryini, Koch, Syn. Fl. Germ. ed..I. 399=Cn. spinosissimus.
ChailleH, Gaudin, Fl. Helv. v. 182-Cn. palustris.
Chailleti, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 893.—Europ.
Chamaepeuce, Tenore, Fl. Nap. v. 211-Cn. gnaphalodes.
chelmeum, Orph. in Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 41 = *Candelabrum*,
chinense, Gardn. & Champ, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 323-Cn. chinensis.
chium, DC. Prod. vi. 646-Cardans chins.
chynysicum, Boiss. Fl. Orient, iii. 636.—Armenia.
cichoraceum, Spreng. Syst. iii. 370=Serratula cichoracea.
ciliato-affine, Bess. Enum. PI. Volh. 82-Cn. serrnlatus.
ciliatum, Bieb. Fl. Taur. Cane. iii. 556 = Cn. ciliatus.
ciliatum, Moench, Meth. Snppl. 227.—Hab. t
ciUacum, Tardent, Ess. Hist. Nat. Bessar. 62=Cn. ciliatus.
compactum. Lam. Fl. Fr. ii. 24-Cn. monspessnlamK.
congestum, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 641.—Persia.
consanguineum, DC. I. c.=*congestum*.
conspicuum, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 312 — Cn. conspicuus.
contrmersum, DC. Prod. vi. 654 = Cn. spinosissimus.
Cosmelii, Fiscb. & Mey. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1838) 251-Cn. lappaceus.
Cotdteri, Harv. & Gray, PI. Fendl. 110-Cn. occidentals.
creticum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 363.—Archip. Graec.
crinitum, Boiss. ex DC. Prod. vii. 80S.—Hispan.
cryptocephalum, Sch. Bip. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 692 = Centaurea pygmaea.
csepeliense, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 892.—Europ.
cyanoides, Hill, Hort. Kew. 63-Jnrinea cyanoides.
cynaroidts, Griseb. Spieil. Fl. Rumel. ii. 354 ~ Cn. «fer.

CIRS1UM :—
cynaroides, Sprang. Syst. iii. 872-Cnicus cynaroides.
dealbatum, Bieb. Fl. Tant. Cauc. iii. 560.—Reg. Cancas.
dedpiens, Nym. Syll. Snppl. 4 - Cn. acanlis.
decoloratum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 898=Cn. acaulis, oleracens.
dnussatum, Janka, in Linnaea, xxx. (1869-60) 682 = Cn. ferox, *Sibth. V Sm.*
defioratum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 127-Carduus defloratus.
dentatum, DC. Prod, vi.854 - Kentrophyllum dentatnm.
depUatum, Boiss. & Bal. in Boiss. Fl. Orient, iii. 543. —As. Min.
deseriorum, Fisch. ex Link, Enum. HorL Berol. ii. 300. —Sibiria.
desertorum, Janka, ex Nym. Consp. 405=Cn. diktats.
Diacantha, DC Cat. Hort. Monsp. 96=Cn. Diacantha.
dioicum, Cass. in Diet. Sc. Nat xxvii. 190 = Cn. arvensis.
discolor, Hort. ex Stend. Norn. ed. II. i. 368=Cn. dliatus.
discolor, Spreng. Syst. iii. 378=Cn. altissimns.
dissectum. Hill, Hort. Kew. 63=Cn. dissectus.
diversifolium, DC. Prod. vi. 649 =Cn. altissimos.
Dollinerii, Scb. Bip. ex Hausm. in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 373-Cn. pannouicus.
Douglasii, DC. Prod. vi. 643-Cn. undulatus.
Drejeri, Reicbb. f. Ic FL Germ. xv. 60"Cn. lanceolatus.
Drummondii, Ton. *Sc* Gray, Fl. N. Am. U. 469-Cn. Drummondii.
duriusculum, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 410-*elodes,* Cn. palustris.
echinatum, DC. Fl. FT. SuppL 465-Cn. echinatus.
echinocephalum, Bieb. FL Taur. Cane. iii. 669-Cn. ecbinocephalni.
echinopifolium, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot ii. 343.—As. Min.
edule, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 420 = Cn. ednlis.
elatius, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 299-Cn. polyanthemos.
datum, Sauter, in Flora, xxviii. (1845) 130.—Enrop.
elatum. Tod. Ind. Sem. Hort. Panorm. (1858) 26; et in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xi. (1869) 378.—Sicilia.
elegant, Willd. ex Spreng. Syst iii. *S76=igniarium.*
elodes, Bieb. Fl. Taw. Cane. iii. 655.—KossU; Reg. Caucas.; Persia.
Empedocleanum, Lojac. in Natural. SidL iii. (1884) 284. —Sicil.
eriocephalum, A. Gray, in Proc. Acad. Sc Philad. • 1863 '(1864) 69=Cn. eriocephalns.
eriocephalum, Walk. Beitr. Fl. Hercyn. 262-Cn. eriophorus.
eriopkorum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 130-Cn. eriophorns.
Erisithales, Scop. Ann. II. Hist. Nat 62-Cn. ochrolencns?
erisithaloides x, Hnter, ex Tieainf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 271.—Tyrol.
erucagineum, DC. Fl. Fr. iv. 116=Cn. rivularis.
erythrolepis, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 41.—Reg. Cancas.
esculentum, C. A. Mey. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, iv. 43; et in Flora, xxxii. (1849) 747 = Cn. esculentus.
exaltatum x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Granb. H.iriii-xxiv. (1880) 109.—Helvet
exscapum, Fisch. Hort Gorenk. ed. II. (1812) 35, nomen.—Hab. T
falcatum, Turcz. ex DC Prod. vi. 650-Cn. pendulus.
fallax, Fisch. & Mey. ex Hohen. in Boll. Soc. Nat. Mosc (1838) 280.—Reg. Caucas.
fallax, French, in Billot, Annot. 109-Cn. acanlis.
ferox, DC. Fl. Fr. iv. 120-Cn. ferox.
ferox, Schnr, ex Nym. Consp. 405-Cn. dliatns.
fieifolium, Fisch. in Mem. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 69=Serratnla atriplidfolia.
filipendulum, Engelm. in A. Gray, Man. Bot N. U. St ed. V. 273=Cn. altissimns.
filipendulum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861) 92.—Hispan.
fimbriatum, Spreng. Syst. iii. 878 »Cn. fimbriatns.
Fischerianum, Andre, ex Trantv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 501, nomen.—Rossia.
fissumx, Ansserd. ex Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 262.—Tyrol.
Jtavescens, Koch, Taschenb. 292—Cn. ochroleucus.
Jtavescens Lam. FL Fr. ii. 28 - Cn. parrifloms.

CIRSIUM :—
flamispinum, Boiss. in DC. Prod. vii. 305 -Cnicus flavispinus.
foliosum, DC. 1. c. vi. 654-Cn. foliosus.
Forsteri, Load. Hort Brit SuppL i. 686-Cn. palastris.
fraternum, DC. Prod. vi. 636-Cn. strigosns.
Freyerianum, Koch, Taschenb. 288; Syn. Fl. Germ. ed. II. 454.—Dalmat.
Frickii, Fisch. & Mey. in Mlm. Acad. Pltersb. Sér. VI. Sc Nat vi. (1849) 47-*rhitocepkalum.*
fuhnspinum, Walp. Rep. ii. 676, sphalm. = Cn. flavispinns.
furiens, Griseb. *Sc* Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852)1. 848=Cn.dliatus.
Gaillardoti, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 42.—Syria.
Galactites, Hill, Hort. Kew. 64=Galactites tomentosa.
Ganderix, Huter, ex Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 274.—Tyrol.
Gerhardti, Sen. Bip. in Flora, xxxli (1849) 517-Cn. lanceolatns.
giganteum, Spreng. Syst. iii. 875-Cn. giganteus.
glabrum, DC. Fl.Fr. Suppl. 463-Cn. spinosissimus?
glaucescens x, Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 227—Tyrol.
glutinosum, Lam. Fl. Fr. ii. 27-Cn. ochroleucus.
Gmelini, Tansch, in Flora, xi. (1828) 482-Cn.acanlis.
gnaphalodes, Spreng. Syst. iii. 375-Cn. gnaphalodes.
Godroni, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 406-Cn. lanceolatus.
gracile, Rostr. ex Nym. 1. c. -Cn. lanceolatns.
graeile, Schnr, Ennm. Pl. Transs. 422-Cn. rivnlaris.
Grakami, A. Gray, PL Wright, ii. 102-Cn. Graham!
grandiflorum x, Kitt. Taschenb. ed. II. 551.—Europ.
gregarium, Willk. in Willk. *Sc* Lange, Prod.Fl. Hisp. if. 189—Hispan.
Gremblichiix, Treninf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 213.—Tyrol.
Griffith™, Boiss. Fl. Orient iii. 640.—Afghanis!.
grumosum, Fisch. *Sc* Mey. in Mém. Acad. Pe'tersb. Sér. VI. Sc. Nat vi. (1849) 48 = *rhitocephalum.*
grumosum, Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. ii. 199-Cn. gmmosns.
Gutnickianumx, Loehr, Ennm. Fl. Deutsch. 865.—Enrop.
Halleri, Tansch, ii Flora, xix. (1836) 401.—Helvet.
Hallerianum, Gandin, FL Helv. v. 188-Cn. spinosissimus.
HaUerianum, Hill, Veg. Syst iv. 27.-Helvet.
halophilum, Turcz. ex Herd, in Boll. Soc Nat Mosc. xliii. (1870) I. 83-Cn. arvensis.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient iU. 635.—Kurdistan.
helenioides, All. Fl. Pedem. i. 162-Cn. heterophyllus.
helenioides, Hill, Hort. Kew. 64-Cn. helenioides.
hellenicum, Boiss. *Sc* Orph. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 630-Cn. ferox.
Hermonis, Boiss.Diagn. Ser. II. iii. 40-Cn. lappaceus.
heterolepis, Benth. PL Hartw. 87-Cn. snbeoriaceus.
heteromallum, Spreng. Syst. iii. 472; Sweet, Hort. Brit. ed. L 214=Saussurea candicans.
heterophylloidesx, Treninf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 245.—Austr.
heterophyllum, Hill, Hort. Kew. 64; AIL Fl. Pedem. i. 162-Cn. heterophyllus.
heterotrichum, Pan*. Elem. Fl. Bulg. 42.—Enrop.
HippolyH, Link, ex Stend. Norn. ed. II. i. 868-Cn. pUQgCDL
Hookerianum, Nntt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 418-Cn. Hookerianni.
korridulum, Michx. Fl. Bor. Am. iL 90-Cn. horridnlus.
horridum, Fisch. Hort Gorenk. ed. II. (1812) 35-Cn. horridns.
horridum, Lag. ex DC. Prod. vi. 660.—Hispan.
Hugueninix, Bnegg. In Jahresb. Naturf. Ges. Granb. II xxiii-xxiv. (I860) 109.—Enrop.
Huterix, Hansm. ex TreninC in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1876) 221.—Europ.
hybridum, Koch, in DC. FL Fr. Suppl. 463 - Cn. ochrolencus.
hygrophilum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 89.—Persia.
hypoleucum, DC. Prod. vi. 645.—Balkan; As. Min.
hypopsilum, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. L vi. 101-Cn. ferox.
igniarium, Spreng. Syst. iii. 373.—Sibir. altaic.
imereticum, Boiss. Fl. Orient, iii. 637.—Reg. Cancas.
incanum, Bieb. Fl. Taur. Cauc iii. 661-Cn. arvensis.
inclinatum, Latn. FL Fr. ii. 22 = Carious medins.

CIRSIUM:—
inerme, G. Don, in Loud. Hort Brit 830; Reichb. FL Germ. Excuis. 287— Cnicus tuberosus.
inerme, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 301-Cn. cynaroides.
insubricum, Moretti, ex Bertol. Fl. Ital. ix. 25-Cn. eriophorus.
involucratum, DC. Prod. vi. 689-Cn. involucratus.
italicum, DC. Cat Hort. Monsp. 98=Cn. italicus.
Jaegerix, F. Schultz, in Flora, xxxii. (1849) 228.—Enrop.
japonicum, DC. Prod. vi. 640 = Cn. japonicus.
jorullense, Spreng. Syst. iii. 876-Cn. joraUensis.
Joschii, Pacher, in Jahrb. Landesm. Kaemt xv. (1882) 186.—Europ.
JuratMkae x, Reichardt, in Verh. Zool.-Bot Ges. Wien, xi. (1861) 380.—Austr.
tamtschaticum, Ledeb. ex DC. Prod. vi. 644.-Cn. kamtschaticus.
Kernerix, Ausserd. ex Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. HI. xix. (1876) 260.—Europ.
KiUiaHi, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Granb. II. xxiii-xxiv. (1880) 108.—Helvet
kirbense, Pomel, Now. Mat Fl. Atl. 274.—Afr. bor.
Kochianum, Loehr, in Flora, xxv. (1842) lll=Cn. palustris.
KosmelU, Boiss. Fl. Orient iii. 681, in syn.- Cn. lappaceus.
Koischyanum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi *103=libanoticum.*
Lachenalii, DC. Prod. vi. 648, in syn.-Cn. rigens.
Lachenalii, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 397 = Cn. acanlis, oleracens.
laciniatum, Doell, ex Nym. Consp. 409 - Cn. palustris.
lacteumx, Rohm, in Eichl. Jahrb. Bot. Gart. BerL i. (1881) 241.—Europ.
lacteum, Schldch. Cat. (1821), ex Koch, Syn. FL Germ. ed. I. 394—palustris.
laeve, Moench, Meth. SuppL 227-Cn. tatariens.
laevigaium, Tansch, in Flora, xi. (1828) 483-Cn. arvensis.
lamprophyllum, Herbich, Stlrp. Rar. Bncov. 54.—Bukovina.
lanatum, Spreng. Syst iii. 373—Cn. arvensis.
lanceolatum, Hill, Herb. Brit. i. 80; Scop. Fl. Cane. II. ii. 130-Cn. lanceolatns.
laniflorum, Bieb. FL Tanr. Cauc. ill. 657-Cn.laniflorns.
lanigerum, Naegeli, Cirs. Schweiz. 114. t. 8 = Cn. lanceolatns.
lappaceum, Fisch. Hort. Gorenk. ed. IL (1812) 35-Cn. lappaceus.
lappaceum, Lam. Fl. Fr. iL 24—Cardnus Personata.
lappoides, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 312-Cn. lappoides.
latifolium, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 28.—Ins. Madera.
Lecontei, Torr. & Gray, FL N. Am. ii. 468=Cn. Lecontei.
Ledebourii, Stend. Norn. ed. II. i. 868.—Sibiria.
leucanicum, Lojac. in Natural. Sidl. iii. (1884) 283.-Sidlia.
leucocephalum, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1861) 101 *"chynysicum.*
leucocephalum,Spreag.Syst. UL377 -Cn.leucocephalns-
leuconeurum, Boiss. *Sc* Heldr. in Boiss. Fl. Orient u>-584.—Cataonia.
leucophanum, Schnr, Enum. PL Transs. 418 - Cn. 1W1, floras.
leucopsis, DC. Prod. vi. 644.—As. Min.
leucostylum, Moench, Meth. 656=Carduns defloratos.
libanoticum, DC. Prod. vi. 647.—As. Min.; Syria.
ligulare, Boiss. Fl. Orient iii. 529.—Thrada.
Linkii, Nym. Syll. 23.—Lusitan.
lineare, Sch. Bip. in Linnaea, xix. (1847) 835-O linearis.
Morale, Maxim. Prim. Fl. Amur. 173-Cn. japonico*-
Linkianum x, Loehr, Enum. FL Deutsch. 864.—Europ-
Lobelii, Tenore, FL Nap. v. 211.1189-Cn. ferox.
longespinosum. Tod. ex Nym. Consp. 406=Cn. lanceolatus.
longifolium, Boiss. Fl. Orient. iiL 568, sphalm. (= *Epitrachys longifolia).*—Reg. Caucas.
lucidum, DC. Prod. vi. 664.—Hab. *1*
lutescens, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. V. (1808) 364, nomen.—Hab. ?
lycaonicum, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. I. «• 90 = *libanoticum.*

CIRSIUM:—

lyratum, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 86-Saussurea affinis.

Maackii, Maxim. Prim. Fl. Amur. 172=Cn. japonicns.

>nacracanthum, Sch. Bip. in Flora, xxxv. (1852) 186 = Cn. Wallichii.

nacrobotrys, Boiss. Fl. Orient, iii. 532.—Armenia.

"wcrocephalum, C. A. Mey. Vera. PH. Cauc. 70 = Cn. mnnitBB.

macrochaetum, Tausch, in Flora, xiz. (1886) 897.—Hab. 1

"uurostachyum, Boiss. Fl. Orient iii. 650.—Reg. Cancas.

macrostylon. Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 856=Cn. arvensis.

naculatum, Lam. Fl. Fr. ii. 22=Tyrimnus lencographus.

"uuulatum, Moench, Meth. 657-Cn. syriacus.

naculatum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 130-Silybum Mariannm.

"wreoticutn, Spreng. Syst. iii. 877=Carthamus mareoticns.

"latritense, Lag. ex Cnt. Fl. Comp. Madrid, 409=Cn. navispinus.

"Mximum, Benth. PI. Hartw. 289 = Cn. snbcuriaceus.

Medium, All. Fl. Pedem. L 149=Cn. tuberosnm.

""gacantkum, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc N. S. *»• (1841) 421 = Cn. horridulus.

"uxtcanum, DC. Prod. vi. 636=Cn. mexicanus.

"tcranthum x, Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. ax. (1875) 218.—Eurqp.

""•ocephulum, Lange, Bad. Sem. Hort. Havn. (1854) 22.—Hispan.

""crocephalum, Moris, Fl. Sard. ii. 486=Cn. micro pephalus.

"frocephalum, Sch. Bip. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 246-Cn.siculis.

Muhchhoferi, Sauter, in Flora, xxviii (1845) 130=Cn. heterophyllus.

"isiltnerense, Ces. Passer, & Gib. Comp. Fl. Ital. 483 =Cn. mUilmerensis.

»»<*, Fisch. in Spreng. Nov. Prov. 18=Cn. mitis.

""W*, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 126=Jnrinea mollis.

"KMtspessulanum, HilL Hort. Kew. 68 j All. Fl. Pedem. 1.152=Cn. monspessulanus.

"«"'«»«, Hill, Herb. Brit. i. 80=Cn. montanus.

merina, tum, Nym. Syll. 24 - Cn. spathulatus.

580 fum, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. Creta.

Morisianum , Rdchb. f. Ic. Fl. Germ. xv. 59.-Europ.

munitum Il. (1812) 86 = Cn.

munitus. F1SCh„ *HOA* Golenk> ed>

utat Menyh- Kalocsa Vidék. Növény. 102-Cn.

"arvensis.

«•«<«, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 89=Cn. muticus.

"<eelTanumx, Loehr, Ennm. Fl. Dentsch. 362.—Europ.

"Wfrrfam, Fisch.ex Spreng. Syst. iii. 870-Cn.arvensis.

nemor lataf'' Reichb„ FL Germ_ ExC0IS_ *286„Cn_* lanoeo-

"°-w«V«««««, A. Gray, PI. Wright, ii 101=Cn "69-mexicanus.

nepalense. DC. Prod. vi. 642=Cn. Wallichii.

nevadense, Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 111.—Hispan.

ms, Regel in BnU_ Soc. Nat- Moic. xl. (1867) 60.—As_ centr_

»i_va.e, Sch. gip. in Seem. Bot Voy> Herald, 312 = Cn.

nWal ia.

niveum, Spreng. Syst_ia_- 878=Cn. niveus.

numidicum, Spreng. 1. c 877.-A&. bor.

Nuttalii, DC. Prod. vi. « "- Cn. NuttalUi.

oblong f„m> C> Koch> ™ Linn"*. *»*"• (1843) 41.—

R- s- Cancas.

obscur x, Kern. ex Treuinf. in Zeitschr_ Feldn_

obvallat IL xix. (1875) 264.—Europ.

Bieb. F1> Tani_Canc, „ 8B9_Cn_obw1,

Utus.

ochro-centrum >> A. Gray, PI. FendL 110—1Cn. ochrocentrus.

ochroleucu AU_n- Pedem- »• 160-Cn. ochroleucus.

odontolep Boiss Balkan. * " „ DC- Prod_ ^ 80-5 H ispan.;

onanum x, Treninf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. HI. xix. (1875) 216 Europ.

onipontanum x, Twuint I c. 280.—Enrop.

oleraceum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 124 = Cn. olcracens.

CIRSIUM :—

onofordioides, Kotscby, ex Boiss. Fl. Orient, iii 664 = Onopordnm polycephalum.

oreithales, Hance, ex Walp. Ann. ii. 944-=Cnicns chinensis.

crgyale, Hort. ex Tansch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. *il = aciculare1*

orgyale, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 302 = Cn. orgyalis.

orientate, Spreng. Syst. iii. 873 = Galactites tomentosa.

palatinum, Sch. Kp. ex Nym. Consp. 409 - Cn. palnstris.

pollens, DC. Prod. vi. 647-Cn. oleracens.

paludosum, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 381=Cn. paludosns.

palustre, Coss. ex Willk. *8c* Lange, Prod. n. 191 = *Baurgeanum.*

palustre, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 128 = Cn. palnstris.

paniculatum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient iii. 535 *=cataonieum* ?.

paniculatum,tam. Fl. Fr. ii.26=Carduns carlinoides.

paniculatum, Spreng. Syst. iii. 871.—Mont. Pyren.

paniculatum, Vahl, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 186 = Cn. flavisplnns.

pannonicum, Link, Ennm. Hort Berol. ii. 801-Cn. p&nnoDicns*

paradoxumx, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 264.—Europ.

paniflorum, DC. Prod. vi. 647-Cn. oleraceus.

parviflorum, Lange, ex Nym. Consp. 409 = Cn. palustris.

parviflorum, Schleich. ex Stend. Norn. ed. II. *I* 369-Cn; ochrolencus.

paudflorum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 396 = Cn. heterophyllus.

paudflorum, Lam. Fl. Fr. ii. 22-Carduns defloratus.

paudflorum, Spreng. Syst. iii. 875 = Cn. paucifloros.

paicuarense, Spreng. 1. c. 872-Cn. pazcuarensis.

pectinellum, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1868-59) 895-Cn. pectinellus.

pendulum, Fisch. ex DC. Prod. vi. 650-Cn. pendulus.

penidlllatum, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 41-Cn. lappaceus.

persicum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 108 -=Cn. strigosus.

phyllocephalum, Boiss. & Blanche, in Boiss. 1. c. Ser. II. iii. 39.—Syria.

pinnatifidum, Spreng. Syst. iii. 895 =SerratnIa pinnatifida.

Pitcheri, Ton. & Gray, Fl. .V. Am. ii. 456-Cn. Pitched.

platycephalum, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 110-Cn.snbcoriaceus.

polyacanthum, Hochst. ex A. Rich. Tent FL Abyss, i. 466=Cn. polyacanthus.

polyacanthum, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat Mosc. (1841) 450.—Sibir. altaic.

polyanthemon, Spreng. Syst. iii. 371 - Cn. polyanthemns.

polyanthos, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) 863 =Cn. pungens.

polycephalum, DC. Prod. vi. *W9 = byzantinum.*

polycephalum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 371.—Hab. ?

polymorphum, Doll, ex Hauxm. in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) *S75 •* Lintianum.*

ponticum, C. A. Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 67 = *polycephalum.*

Portae, Hausm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii (1858) *Sn-LinUanum.*

praealtum, Cass. in Diet. Sc. Nat xli. 333 = Cn. arvensis.

praemormm, Koch, Syn. Fl., Germ. ed. I. 397-Cn. ochrolencus!

pretense, DC. Fl. Fr. iv. 118 = Cn. monspessnlanns.

propmticum, Griseb. Spicfl. Fl. Rumel. ii. 254-Cn. eriophorus.

pseudo-canum, Schnr, Ennm. PI. Transs. 421-Cn. pannonicus.

pseudo4anceolatum, Schur, 1. c 418-Cn. lanceolatns.

pseudo-eleraeeum, Schur, 1. c 423=Cn. pannoniens.

pseudo-palustre, Schur, 1. c. *iW~Ckailleti,* Koch.

pseudo-pannonicum, Schur, 1. c.-Cn. canns.

pseudo-personata, Boiss. *Sc* Bal. ex Boiss. Fl. Orient, iii 645.—As. Min.

pubigerum, DC. Prod. vi. 650-Cn. pubigenu.

Pumilio, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 249.—Austria.

pumilum, Spreng. Syst. iii 876-Cn. pnmilus.

CIRSIUM:—

pungens, Schnr, Enum. PI. Transs. 420.—Europ.

pungens, Spreng. Syst. iii. 370=Cnicus polyanthemus.

purpureum. All. Fl. Pedem. i. 150=Cn. spinosissimus.

Pustariacumx, Ausserd. ex Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1876) 258.—Europ.

pygmaeum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 128=Saussurea pygmaea.

pyrenaicum, AU. Fl. Pedem. i. 151 = Cn. montanus.

pyrenaicum, DC. Fl. Fr. iv. 112 = C. pyrenaicus.

racemosum, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 338 - *tenuilobum.*

radians, Benth. PI. Hartw. 77-Cn. radians.

Reichardtii x, Jurotzka, in Verh. Zool.-Bot. Ges, Wien, ix. (1859) 317.—Enrop.

Reichenbachianum x, Loehr, Enum. Fl. Deutsch. 364 —Cn. arvensis.

remotifolium, DC. Prod. vi. 655-Cn. remotifolins.

repandum, Michx. Fl. Bor. Am. iii. 28 = Cn. repandus.

replicatum, DC. Prod. vi. 655-Cn. replicatus.

rheginum, Spreng. PugilL ii. 77 = Cn. strictus.

rhiiocepkalum, C. A. Mey. Vera. Pfl. Cauc. 70.—As. Min.; Persia; Afghan.

rhodo-leucanthum, Walp. Ann. i. 463=Cn. esculentm

Riehterianum, Gillot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) p. Ii—Europ.

rigens, Spreng. Nene Kntdeck. iii. 38-Cn. oleraceus.

rigens, Wallr. Sched. Crit. 446-Cn. acaulis.

rigidum, DC. Prod. vi. 640—Cn. arachnoideus.

rivulare, All. Auct. Pedem. 10 — Cn. montanns.

rivulare, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 801-Cn. rivularis.

Rosani, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 15; ex Syll. 414 = Cn. lanceolatus.

Rosenii, Vill. Hist PL Dauph. iii. 14. t. 21 - Cn. acaulis?

rufescens, Ramond, ex DC. Fl. Fr. iv. 114-Cn. rnfescens.

ruthenicum, Fisch. Hort. Gorenlc. ed. II. (1812) 35-Cn. arvensis.

sabaudum x, Loehr, Enum. Fl. Deutsch. 362.—Europ.

sabaudum x, Ruhm. in Eichl. Jahrb. Bot Gard. Berl. i. (1881) 240.—Europ.

salamautieum, Hill, Hort. Kew. 64-Centanrea salmantica.

salinum, Bieb. ex Stend. Norn. ed. II. i. 870 - Centaurea salina.

salisburgense, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 831-Cn. rivularis.

samniticum, Stend. Nom. ed. II. i. 870 ^=Cn. italicus.

scariosum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 420-Cn. scariosus.

schantarense, Trautv. *Sc* Mey. in Middend. Reise (FL Ochot 58).—Sibir. or.

Schultnanum x, Loehr, Enum. Fl. Deutsch. 365.

scleranthum, Bieb. Fl. Taut. Cauc. iii. 659.—As. Min.; Persia.

Scopolianum, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 408-Cn. Eristhales.

segetum, Bunge, Enum. PL Chin. Bor. 36 - Cn. segetnm.

Semenom, Regel, in Bull. Soc Nat. Mosc xl. (1867) II. 161.—As. centr.

semidecurrens, DC. Prod. vi. 646.—Hab. ?

semidecurrens, Richt. Fl. lips. 673—Cn. palustris.

semipettinatum, Ledeb. ex Stead. Nom. ed. II. i. 370 *"Ledebourii.*

semipectinatum, Reichb. FL Germ. Excurs. 287 - Cn. rivularis.

semipectinatum, Spreng. Syst. iii. 378 - Cn. semipectinatus.

serratuloides, Hill, Hort. Kew.-64-Cn. serratuloides.

serratuloides, Scop. FL Cam. ed. II. ii. 127-Cn. pannonicus.

serratum, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 39.—Europ.

strrulatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 657-Cn. serrulatus.

serrulatum, Schnr, Ennm. PI. Transs. 419 - Cn. fimbriatus.

sessiliflorum, Herbich, Stirp. Rar. Bucov. B4.—Tnrcia.

setigerum, Ledeb. Ic. PI. Fl. Ross. i. 9.—Sibir. altaic

setosum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 660-Cn. arvensis.

sieulum, Spreng. Neue Entdeck. iii. 36-Cn. pungens.

Sieboldi, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 184-Cn. Sieboldii.

Siegerti, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 408 = Cn. rivularis.

CIRSIUM s—
silesiacum, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 409—Cnlcus palustris.
silvaticum, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 88 = Cn. lanceolatus.
simplex, Homem. Hort. Hafh. Snppl. 98=Centaurea salina.
simplex, C. A. Mey. Vera. Pfl. Caoc. 70.—Reg. Caucas.
sinense, C. B. Clarke, Comp. Ind. 219 = Cn. chinensis.
sinuatum, Boiss. Fl. Orient, iii. 546—Cn. cynaroides.
sinuatum, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. 1. c. 642 — *rhi»ocephalum.*
mrdidum, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 266=Cn. arvensis.
sorocephalum.DC. Prod. vi. 636 =*fallax,* Fisch. & Mey.
sorocephalum, Fiach. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 33.—Reg. Caucas.
spathulatum, Gandin, Fl. Helv. v. 202-Cn. eriophorus.
spectabile, DC Prod. vi. 641.—Persia.
spinifoliumx, Beck, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 312.—Europ.
spinosissimoides x, Ansserd. ex Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. xix. (1875) 250.—Europ.
spinosissimum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 129 - Cn. spiaosissimus.
Spitielii, Seri. Bip. ex Nym. Consp. 408 =- Cn. spino&issimus.
spurium, Delastre, in Ann. Sc. Nat. Sér. IL xviii. (1842) 149-Cn. pratensis.
squarrosum, Fisch. ex Spreng. Syst iii. 376—Cn. squarrosus.
stellatum, All. Fl. Pedem. i. 163=Cn. stellatus.
stenolspidum, Nntt in Trans. Am. Phil. Soc N. S. vii. (1841) 419- Cn. remotifolius.
stenophyllum, Boiss. Fl. Orient, iii. 534 - *tenuilobum.*
Stoeksii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 40-Cn. arvensis.
strictum, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 27-Cn. microcephalus.
strictum, Spreng. Syst. iii. 370-Cn. strictus.
strigosum, Bieb. Fl. Taur. Cane. iii. 558 - Cn. strigosus.
subalatum, Gandin, FL Helv. v. 180 -Cn. oleraceus.
subalpinum, Gaudin. 1. c. 182-Cn. palustris.
subalpinum, Schleich. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xv. 73. —Helvetia.
subcoriaeeum, Seh. Bip. ex Seem. Bot. Voy. Herald, 812 = Cn. sabcoriaceus.
subinerme, Fisch. & Mey. in Mém. Acad. Petersb. Ser. VI. Sc. Nat. vi. (1849) 66=*/«*«.
subsagittatum, Schur, Enum. PL Transi. 421-Cn. pannonicus.
succinctum, Ledeb. Fl. Ross.ii. 732-Cn. lappaceus.
supertextum, Tansch, in Flora, xix. (1836) 397.—Hab.?
syhaticum, DC. Prod. vi. 656—Cn. lanceolatus.
syriacum, Gaertn. Fmct. ii. 383. t. 163. f. 2-Cn. syriacus.
Smvitsii, Boiss. Fl. Orient iii. 527.—Reg. Cancas.
tartaricum, All. Fl. Pedem. i. 151 =Cn. tatariens.
tataricum. DC. Fl. Fr. iv. 114 -Cn. rigens.
tauricolum, Boiss. *Sc* Bal. ex Boiss. Fl. Orient iii. 551. —Cataonia.
Tauschii, DC. Prod. vi. 656.—Hab. ?
tchefouense, Debeaux, Fl. Tchef. 86 = Cn. tchefouënsis.
tenuilobum, Boiss. FL Orient, iii. 684.—Armenia.
texanum, Bockl. in Proc. Acad. Sc. Philad. < 1861 (1862) 460 -Cn. virginianus.
Thomasii, Naeg. Cirs. Schweiz. 93-Cn. oleraceum.
tirolensex, Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. IIL xix. (1875) 243.—Europ.
tomentosum, C. A. Mey. Ven. Pfl. Cane. 69-Cn. mnnitus.
tomentosum, Moench, Metb. SuppL 227-Jurinea cynaroides.
trachylepis. Boils. Fl. Orient, iii. 628.—Armenia.
transsilvanicum, Schur, Enum. PI. Transs. 419 •= Cn. transsilvanicus.
tricephalodes, DC. Fl. Fr. iv. 116-Cn. rivnlaris.
tricephalum, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 122-praec.
tricholoma, Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat Mosc (1888) 261.—Reg. Caucas.
trispitwsum, Moench, Meth. 656—Cn. Casabonae.
tryihilinumx, Treuinf. in Zeitschr. Ferdin. Tirol. III. zix. (1876) 276—Europ.
tuberosum, All. Fl. Pedem. i. 151 =Cn. uberosus.

CIRSIUM :—
uiranicum, Bess, ex DC. Prod. vi. 635-Cnicus serrulatus.
uliginosum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 655-Cn. uliginosus.
uliginosum, Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. I. x. 90 = *libanoticum.*
undulatum, Spreng. Syst. iii. 874 -Cn. undulatus.
Vallis-Demonii, Lojac. in Natural. Sicil. iii. (1884) 267. —Sicilia.
variabile, Moench, Metb. 658=Cn. oleraceus.
Verutum, Spreng. Syst. iii. 370-Cn. argyracanthus.
virens, Timb. *Sc* Jeanb. ex Nym. Consp. 406 = Cn. lanceolatus.
virgatum, Tansch, in Flora, xix. (1836) 402.—Tauria.
virginianum. Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 48 = Cn. Lecontei.
virginianum, Michx. Fl. Bor. Am. it 90 = Cn. virginianus.
Vlassovianum, Fisch. ex DC. Prod. vi. 653=Cn. Vlassovianus.
Wallichii, DC. 1. c. 643-Cn. Wallichii.
Wankelii x, Reichardt, in Verh. Zool.-Bot. Ges. VVien, xi. (1861) 381.—Europ.
Welmtschii, Coss. Notes Crit. 118.—Hispania.
Weyrichii, Maxim. Prim. Fl. Amur. 174-Cn. Weyrichii.
Wiedemanni, Fisch. Mey. & Ave-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 48 -*hypoleucum.*
Willdenowii, Steud. Norn. ed. II. *I* 3*0 = Cn. Willdenowii.
Wimmeri, Celak. in Arch. Naturfw. Landesd. Boehm. ü. (1873) 263.-Bohemia.
Winklerianum x, Celak. 1. c. 262.—Europ.
Wirtgenii x, Loehr, Enum. Fl. Deutsch. 862.—Europ.
Woodwardii, H. C. Wats, ex Nym. Consp. 407-Cn. tnberosns.
Wrightii, A. Gray, PL Wright, ii. 101-Cn. Wrightii.
Zitianum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 898-Cn. tuberosus.

CISSAMPELOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 102 (1856) = Senecio, Tourn. (Compos.).
volubilis, Miq. 1. c.=S. araneosus.

CISSAMPELOS, linn. Gen. ed. I. 368 (1737).
MENISPERMACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 37.
ANTIZOMA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. •ii. (1851) 41.
CAAPEBA, Plum, ex Adans. Fam. ii. 357 (1768).
DISSOPETALDM, Miers, in Ann. & Mag. Nat Hist. Ser. III. xvii. (1866) 267.
Abutua, Veil. Fl. Flnm. x. t. 140 = Chondodendron platyphyllum.
acuminata, Benth. PL Hartw. 58-C. Pareira.
acuminata, *DC. Syst.* i. 638.—Ind. or.
acuta, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. xvii. (1862) 43.—N. Granat.
amamonica, Miers, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 114-ovalifolia.
andromorpha, *DC. Syst.* i. 639.—Guiana,
angnstifolia, *Butch. Tram.* i. 389.—Afr. austr.
angustifolia, Drége, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 13 *(^Antiioma Miersiana).*—Afr. austr.
apiculata, Hochst. in Flora, xxviii. (1846) 93 = C. Pareira.
argentea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 67 - C. Pareira.
aristolochiaefolia, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312 = C. Pareira.
assimilis, Miers, ex Benth. in Hook. Kew Jonm. iii. (1861) 114-ovalifolia.
auriculata, *Miers, Contrib.* iii. 158.—Reg. Argent.
australis, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 64 - C. Pareira.
barbata, Wall. Cat. n. 4978-Cyclea peltata.
Benthamiana, *Miers, Contrib.* iii. 144.—Mexic.
Boivini, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 460. —Madag.
Bojeriana, *Miers, Contrib.* iii. 182.—Ins. Maurit.
Caapeba, Linn. Sp. PI. 1032=C. Pareira.
Caapeba, Veil. Fl. Flnm. x. t. 189 - fasciculate t
calcarifera, Burch. Trav. ii. 266—fruticosa.
canescens, Miq. Sert Exot. i. 7. t 4 - C. Pareira.
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 110.—Afr. anstr.
capiUU, *Griff. Notul.* iv. 309.—Ind. or.
clematidea, Presl, Bot. Bemerk. 7 = C. Pareira.
Cocculus, Buch.-Ham. ex Steud. Norn. ed. II. i. 371 = C. Pareira.

CISSAMPELOS :—
Cocculus, *Poir. Encyc.* v. 9.—Ind. or.
Cocculus, Steud. Nom. ed. I. 198-Anamirta paniculata.
comata, Mien, in Hook. Niger Flora, 215-C. Pareira.
communis, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 52 -ovalifolia.
consociata, *Miers, Contrib.* iii. 167.—Ind. occ.
convexa. Veil. Fl. Flum. x. t. 142 = Abuta rufescens.
convohulacea, Willd. Sp. PI. iv. 863 - C. Pareira.
cordifolia, *Boj. Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xx. (1843) 64.— Afr. austr.
crenata, DC. Syst 1. 637=ovalifolia.
Cumingiana, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 283.—Ins. Pbilipp.
delicatula, Miers, Contrib. iii. 197 = C. Pareira.
denudata, Miers, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 115 -fasciculata.
diffusa, *Miers, Contrib.* iii. 168.—Ind. occ.
discolor, DC. Syst. i. 534=Stephania hernandifolia.
discolor, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 38 - C. Pareira.
discolor, Wall. Cat n. 4982 = Cyclea peltata.
diversa, Miers, Contrib. iii. 187 ^ C. Pareira.
ebracttata, St. Hil. PI. Us. Bras. t. 35 - ovalifolia.
elata, Miers, Contrib. iii. 187 =C. Pareira.
eriantha, Miers, 1. c. 192=C. Pareira.
eriocarpa, Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat Ser. IV. xvii. (1862) 41 = C. Pareira.
errabunda, *Miers, Contrib.* iii. 138.—Bras,
fasciculata, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 861.-Bras.
ñoribunda, *Miers, Contrib.* iii. 164.—Peruv.
fluminensis, *Eichl.* tit *Flora,* xlvii. (1861) 392 *[err. typ-* '382';] *et in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 191.—Bras.
fruticosa, Thunb. Prod. PL Cap. 110-capensis.
glaberrima, *St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 67.—Bras.
glabra, Buch.-Ham. ex Wight *Sc* Arn. Prod. i. 14 = Clypea hernandifolia et Cocculus Roxburghianus.
glabra, Roxb. Hort. Beng. 74; Fl. Ind. iii. 840 = Stephania rotunda.
glaucescens, Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xvii. (1862) 41 = C. Pareira.
gracilis, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 56 = C. Pareira.
grallatoria, Miers, Contrib. iii. 189 — C. Pareira.
grandifolia, Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xvii. (1862) 44-C. Pareira.
guayaquilensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 67 = C. Pareira.
Haenkeana, Presl, Rel. Haenk. ii. 80-ovalifolia.
hederacea, *Miers, Contrib.* iii. 159.—Reg. Argent.
Hernandia, *Veil. Fl. Flum.* x. t 136.—Bras.
hernandifolia, Wall. Cat. 4977, partim-C. Pareira.
hernandifolia, Willd. Sp. PI. iv. 861-Stephania hernandifolia.
heterophylla, DC. Syst i. 534 - C. Pareira.
hexandra, Roxb. Hort Beng. 74; Fl. Ind. iii. 841°* Stephania hernandifolia.
hirsuta, Bach.-Ham. in DC. Syst i. 535-C. Pareira.
hirsutissima, Presl, Rel. Haenk. ii. 80 = ovalifolia.
hirta, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 174[s] C. Pareira.
humilis, Poir. Encyc. v. 11—capensis.
hypoglauca, *Schau. in Nov. Act:Acad. Nat. Cur.* xix. *Suppl. i.* (1843) 479.—China,
insolita, *Miers, Contrib.* iii. 179.—Afr. trop.
kohautiana, Presl, Rel. Haenk. ii. 81 - C. Pareira.
laurifolia, *Poir. Encyc.* v. 11.—Ind. occ
limbata, *Miers, Contrib.* iii. 143.—Am. tiop.
littoralis, St. HiL Fl. Bras. Mer. i. 54 = C. Pareira.
longipes, *Miers, Contrib.* iii. 138.—Ind. occ.
macrostachya, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb-Bot. 172=C. Pareira.
madagascariensis, *Miers, Contrib.* iii. 181.—Madag.; Ins. Borb.
mallophylla, *Miers, 1. c.* 169.—Am. trop.
mauritiana, Thou, in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 67- t 3, 4=C. Pareira.
mauritiana, Wall. Cat. n. 4980 = PericampyM* incanus.
microcarpa, DC. Syst. i. 534=C. Pareira.
monoica, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 55=C. Pareira.
mucronata, A. Rich, in Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent- i. 11-C. Pareira.
myriocarpa, Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc Nat. Ser- IV. xvii. (1862) 42 = C. Pareira.
nephrophylla, Boj. 1. c Ser. II. xx. (1848) 55-C Pareira.

CI8SAMPELO8:—
nympheae/olia, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = Stephania abyssintca.
eitecta, Wall. Cat. n. 4981-=C. Pareira.
oleracea, Wall. 1. c. n. 4984-Parabaena sagittata.
orticulata, DC. Syst. i. 537 = C. Pareira.
orinocensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 68 = C. Pareira.
ovalifolia, *DC. Syst. i.* 587.—Bras.
ovata, Poir. Eneyc. v. 10=Pachygone ovata.
ovata, Veil. FL Flnm. z.t 141 = Abuta Selloana?
owariensis, Beauv. ex DC. Prod. i. 100-C. Pareira.
pannosa, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Afosc.* xxvii. (1864) H. 288.—Cuba.
Pareira, *Linn. Sp. PI.* 1081.—Reg. trop.
pareiroides, DC. Ess. Med. PI. Comp. cd. II. 78 = C. Pareira.
Parriera, VelL Fl. Flnm. x. t. 188 -glaberrima.
Pata, Roxb. ex Wight & Am. Prod. i. 15 = C. Pareira.
pauciflora, Nutt in Jonrn. Acad. Philad. vii. (1884) 114 -Croomia pauciflora.
peltata, Ruiz, ex Eichl.in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 191 = tropaeolifolia.
Psilophylla, *Presl, Ret. Haenk.* ii. 80—Ins. LUKMI.
ranuflora, *Mien, Contrit.* iii. 168.—Bras.
ntundata, Pohl, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1.187 =ovalifolia.
sagittata, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4983-Parabaena sagittata.
Salnnanni, *Turci. in Bull. Soc. Nat. Mate,* xxvii. (1864) H. 284.—Bras.
"tiigera, Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. *vii. (1862) 42-C. Pareira.
***nenris,* Klotesch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. i. 178=C. Pareira.
*»*ulacina,* Linn. Sp. PI. 1082 = Menispermnm canadense.
•nbcrenata,*Klotzseh, in.Schomb. Fauna,Fl. Gut.* 1162, Bomen.—Guiana.
svhorbicularis, St. Hil. FL Bias. Mer. i. 58-ovalifolia.
^ *elitata,* Thw. Ennm. PI. Zeyl. 18, 899 «C. • reira.
JlJ*i/ormis,* Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir. *V. xvii. (1862) 41-C. Pareira.
****triangularis,* St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 61-ovalifolia.
sympodiales, *Eichl. in Flora,* xlvii. (1864) 882 [err. typ- 382]._Bras.
""nnifolia, *Mien, Contrib.* iii. 186.—Afr. auitr.
f'nmmdes, Sagot, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 194 = fasciculata.
»»oides, *Willd. ex DC. Syst. I* 636.-Bras.
"stodinaria, Miers, in Ann. & Mag. Nat Hist. Ser. «L xvii. (1866) 184,nomen=seq.!
JWtudmum, *Miers, Contrib.* iii. 143.—Ins. Galapag.
"'randra, Roxb. Hort. Beng. [105] ; Fl. Ind. iii. 842 "C. Pareira.
«»*entosa,* DC. Syst i. 585-C. Pareira.
»nentosa. Veil. FL Flum. x. t. 148-AbuU ru- •escens.
lorulosa, *E. Mey. ex Han. V Sand. Fl. Cap.* i. 11.—MI anstr.
"Uoba, *Spreng. Neue Entdech.* ii. 152.—Bras.
"°P»eolifoHa, *DC. Syst. i.* 682.—Am. austr.
"*>*l>eUata,* E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. FL Cap. i. 10 -"•Stephania heraandifolia.
™'«««a, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 52-ovalifolia.
"'»?a, Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc Nat. Ser. IV. v.f*»- (1862) 44^ovalifolia.
"'>.*yell. Fl. Flum,* x. t. 137.-Bras.
£&!"•. Mier m Hook. N'gef Fl. 2"-C. Pareira.
»s. *Miers, Contrib.* iii. 180.—Afr. trop.

CISSABRYON, Meisan. Gen. 58; Comm. 42 (1887) = seq.!

Ciss
T£«OBRYON, Poepp. Fragm. Syn. Fl. Chil. 29 (1838)_Vivlaiila, Cav. (GeTaniac.).
*J*gans,* Kunze, 1. c. 80.—Chilà
•asrophyllus, Phil, in Linnaea, xxxUi. (1864-66) 32. —Chili.
parvifo««m, PhiL Lc. 33.—Chili.

C
^.JDENDRON, F. Muell. Census, 61 (1882) - KIS-JDENDRON

CISSUS, Linn. Diss. Dass. 6 (1747); Amoen. Acad. i. 869 (1749)=Vitls, Tonrn. (Ampelid.).
acetosa, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. iii. (1859) 24-V. acetosa.
acida, Linn. Sp. PI. ed. II. 170 = V. acida.
acida, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 127=V. trifolia.
acida, Wall. Cat. n. 6009 B = V. setosa.
aconitifolia, Walp. Rep. i. 441 - V. serjaniaefolia.
aculeata, Span, in Linnaea, xv. (1841) 184 = V. aculeata.
acuminata, A. Gray, Bot. U. St. Expl.Exped. i. 273 = V. acuminata.
acuminata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 62-V. repanda.
acutifolia, Poir. Encyc. Suppl. i. 106 - V. trilolia.
adenantha, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 283-V. adenantha.
adenocaulis, Steud. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 111 =V. adenocaulis.
adnata, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 405-V. adnata.
adnata, Wight, ex Wall. Cat. sub n. 6988 = V. Heyneana.
aegirophylla, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga, i. (1847) 198 = V. aegirophylla.
alata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 51-V. geniculata.
alata, Tacq. Select. Am. 23 = V. sulcicaulis?
albida, Cambesa. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. 1. 844-V. albida.
alHssima, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. *I* 74 = V. papuana.
amatonica, Linden, in Belg. Horde, xv. (1865) 99.—Bras.
amboinensis, Zipp. ex Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 76 = V. amboinensis.
Ampelopsis, Pers. Syn. i. 142 = V. indivisa.
anaimalaiensis, Bedd. in Madr. Jonrn. Sc. Ser. III. i. (1864) 41 = V. anamallayana.
anemonifolia, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat i. 80 — V. anemonifolia.
angulata, Lam. Tabl. Encyc. i. 331-V. Linnaei.
angustifolia, Roxb. Hort Beng. 11; Fl. Ind. i. 408-V. angustifolia.
antarctica. Vent. Choix, 21. t. 21-V. antarctica.
aquosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6000 = V. repanda.
arachnoidea, Hassk. Cat. Hort Bog. Alt 166 - V. indica.
araneosa, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 617 = V. araneosa.
arborea, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 51 = Evodia Roxburghiana.
arborea, Desmoul. in Durand, Monog. Vit. 60 - V. arborea.
arborea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 82 - Salvadora persica.
arborea, Willd. ex Roem. *8c* Schult. Syst. iii. Mant. 248-Cybianthus Humboldtii.
argenteus, Linden, in Belg. Hortic xvii. (1867) 108.—Bras.
arguta, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 261 = V. arguta.
aristata, Blume, Bijdr. 183-V. adnata.
articulata, Guill. *Sc* Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 185, in obs.—Afr. trop.
assimilis, Kurz, ex Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 660 = V. lanceolaria.
auriculata, DC. Prod. i. 682 = V. auriculata.
auriculata, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 411 = V. trifolia.
australasica, F. Muell. in Trans. PhiL Soc. Viet. i. (1856) 8 = V. hypoglauca.
Baudiniana, Brouss. ex DC. Prod. i. 629 = V. antarctica.
bifida, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 80 = V.quadrangularis.
bigemina, Harv. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 263=V. gracilis.
biglandulosa, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 75 = V. pubi flora.
bipinnata, Nutt. Gen. Am. i. 144 = V. arborea.
Blumeana, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 89-V. indica.
Blumeana, Span, in Linnaea, xv. (1841) 184.—Java.
Blumeana, Steud. Nom. ed. II. i. 371-V. pallida.
bonariensis, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1888) 159-V.striata.
bororensis, Klotzseh, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 179—V. bororensis.
brevipedunculata, Maxim. Prim. Fl. Amur. 68 - V. heterophylla.

CISSUS:—
bryonifolia, Regel, Fl. Ussur. t. 3. f. 3-VMs heterophylla.
caesia, Afzel. Rem. Guin. 65 =» V. caesia.
canescens, Lam. Tabl. Encyc. i. 831.—Peruv.
cantoniensis, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 175 = V. cantoniensis.
capensis, WiUd. Sp. PL i. 655 - V. capenais.
capreolata, Walp. Rep. i. 489-V. capreolata.
carnosa, Lam. Encyc. i. 81=V. trifolia.
caustica, Tussac, Fl. Ant i. 116. t 16-V. trifoliata, *Baker,*
cerifera, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xv*. (1863) 418 = V. cerifera.
cinerea, Lam. Tabl. Encyc. i. 332-V. trifolia.
cirrhiflora, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 56 = *pauciflora.*
cirrhosa, WiUd. Sp. PI. i. 657 = V. cirrhosa.
clematidifolia, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 184 - V. aculeata.
clematifolia, Walp. Rep.,i. 439 = V. aculeata.
cochinchinensis, Spreng. Syst. i. 450.—Cochinchin.
compressa, Blume, Bijdr. 182—V. adnata.
compressicaulis, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. i. 64. t. 100.—Pernv.
connivens. Lam. Tabl. Encyc. i. 332.—Madag.
cordata, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 407-V. glauca, repens.
cordata, Wall. Cat. n. 6001 - V. adnata.
cordifolia, Linn. Sp. PI. ed. II. 170.—Am. austr.
coriacea, DC. Prod. i. 632 = V. coriacea.
crenata, Blume, Bijdr. 186—*Blumeana.*
crenata, Vahl, Symb. Bot. iii. 19-V. trifolia.
cunei/olia, Eckl. 8c Zeyh. Enum. 56.—Afr. austr.
Currori, Hook, t in Hook. Niger Fl. 265-V. Curroni.
cyanocarpa, Miq. Fl. Ind. Bat. L II. 603 - V. japonica.
cymosa, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 82 =• V. Thonningii.
cymosa, Steud. Nom. ed. II. i. 872 - V. tenuifolia.
cyphopetala, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 282 - V. .cyphopetala.
Darik, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 615.—Sumatra.
Davidiana, Carr. in Rev. Hortic. (1868) 29.—China.
dealbata, Bedd. in Madr. Joum. Sc. Ser. II. xxii. (1861) 74.—Ind. or.
defidens, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 160-V. striata.
dendroides, Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. Mant 248-Ardisia acuminata.
denticulata, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxxvi. (1863)1. 591 = V. Afzelii?
dichotoma, Blume, Bijdr. 186-V. dichotoma.
dichrothrix, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 514.—Sumatra.
Diepenkorstii, Miq. 1. c. 516 = V. Diepenhorstii.
digitata, Lam. Tabl. Encyc. i. 332.—Arabia.
dimidiata, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 57.—Afr. austr.
dioica, Roxb. ex DC. Prod. i. 632 = V. lanceolaria.
discolor, Blume. Bijdr. 181-V. discolor.
diversifolia, DC. Prod. i. 631 (=*heterophylla.* Link). —Hab. ?
diversifolia, Walp. in Nov. Act. Nat Cur. xix. Suppl. i. (1843) 314 = V. cantoniensis.
Dregeana, Bemh. in Flora, xxvii. (1844) 297 = V. capensis.
Duarteana, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 343 = V. Duarteana.
dubia, Steud. Nom. ed. II. i. 372.—China.
edulis, Dalz. in Hook. Kew Joum. ix. (1857) 248-V. quadrangularis.
elegans, Hort ex C. Koch, Dcndrol. i. 555=V. heterophylla.
elliptica, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 221 = V.elliptica.
elongata, Miq. in Nat Verh. Wet. Haarl. vii. (1851) 110=V. Migneliana.
elongata, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 411 = V. elongati.
emarginella, Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockl. (1825) 427-V. crenata.
Endresii, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1876) I. 522.—Costa Rica.
enneaphylla, Veil. Fl. Flum. 40; i. t 108-V. enneaphylla.
epidendrica, VelL 1. c. 39; L t. 98=V. trifoliata.
Epidendron, Eichl. in Mart. Fl. Brat. xiv. II. 217 = praec

CISSUS:—
erosa, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 =• Vitis erosa.
erythrod.es, Hochst. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79-V. erythrodes.
fminea, Roxb. Hort. Beng. 11; Tl. Ind. i. 410 = V. lanceolaria.
ferruginea, E. Mey. Zwei Pfl. Docnm. 178 = 7"Aunbergii.
ferruginea, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. Mant. 248 = Ardisia ferruginea.
Figariana, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 58 - V. Figariana.
flexuosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxxi. (1858) I. 415.—Ins. Luzon.
foemina, Steud. Norn. ed. II. i. 372 = V. lanceolaria.
fragariaefolia, Boj. Hort. Maurit. 60.—Zanzibar.
fragilis, K. Mey. Zwei Pfl. Docum. 173, nomen ; Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 249.—Aft. austr.
frutescens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 70 = Evodia Roxburgbiana.
fuliginea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 224.—Am. austr.
Gardneri, Thw. Enum. PI. Zeyl. 63 =V. Gardner!
geniculata, Blame, Bijdr. 184 = V. geniculata.
gigantea, Bedd. in Madr. Joam. Sc xxii. Ser. II. (1861) 76.—Ind. or.
glaberrima, Stend. Nora. ed. II. i. 372-V. glaberrima.
glabra, Herb. Madr. ex Wall. Cat. sob n. 6988-V. Heyneana.
glabra, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 173 = V. orientalis.
glabrata, Blume, Bijdr. 189-V. serrulata.
glandulosa, J. F. Gmel. Syst. 266.—Arabia.
glandulosa, Poir. Encyc Suppl. i. 106 —• V. antarctica.
glandulosa, Roxb. Hort. Beng. 11, nomen.—Ind. or.
glauca, Roxb. 1. c. 11; Fl. Ind. i. 406 = V. glauca.
glauca, Thw. Enum. PI. Zeyl. 62-V. pallida t
glaucophylla, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 263 = V. glaucophylla.
glyptocarpa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 62 = V. glyptocarpa.
gongylodes, Burch. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 209 - V. gongylodes.
gracilis, Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 134-V. gracilis, *Baker.*
granulosa, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. i. 62 = V. strlato.
haematantha, Miq. in Linnaea, xxvi. (1858) 220.—Guiana.
Hahniana, Ernst, in Jonrn. Bot. xiv. (1876) 179.—Venezuela.
hastata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 517 = V. hastata.
hederacea, Pen. Syn. i. 143 = V. hederacea.
hederacea, Royle, ex Walp. Rep. i. 489 -V. capreclata.
helleborifolia, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 184 = V. auriculata.
heptaphylla, Retz. Obs. v. 22 «=V. pedata.
heteroma, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 591.—Java.
heterophylla, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6036 = V. Rheedei.
heterophylla, Link, Enum. Hort. Berol. i. 143-ttovrrifolia, DC.
heierophylla, Poir. Encyc. Sappl. i. 107.—Java.
heterophylla, Walp. Rep. i. 441-V. Landuk.
heterotoma, Torcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 591.—Java.
Heyneana, Steud. Norn. ed. II. i. 872 = V. Heyneana.
himalayana, Walp. Rep. i. 441 = V. himalayana.
hirsuta, Steud. Nom. ed. 1. 199-V. hederacea.
hirtella, Blume, Bijdr. 185 -. V. geniculata.
humulifolia, Regel, Tent Fl. Ussur. 36-V. heterophylla.
hydrophora, Gaud. Bot. Voy. Bonite, t. 131.—Hab.!
hypoglauca A. Gray, Bot U. St Expl. Exped. i. 272 = V. hypoglauca.
hypoleuca, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 252.—Afr. austr.
ibuensis, Hook. f. in Hook. Niger FL 265 = V. ibuensis.
inaequalis, Heyne, ex Wall. Cat. n. 6010-V. inaequalis.
incarnata, Teijsm. & Bins, in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1868) 417-V. incarnata.
incisa, Deanoul. in Durand, Monog. Vit. 59, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 17S=V. incisa.
indica, Koen. ex Steud. Nom. ed. II. i. 871, 372 = V. —— •

CISSUS:—
indica, Rottl. in Ges. Naturf. Freunde, Nene Schr. iv. (1808) 188 - Vitis reparida.
indica, Walp. Rep. i. 441 ^V. indica.
indivisa, Deunoul. in Durand, Monug. Vit. 59, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot 178-V. indivisa.
intermedia, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 811 - V. trifoliate, *Baker,*
involucrata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 44-Pterisanthes cisaoides.
ipomaeifolia, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 57-V. ipomoeifolia.
Jackii, Korth. ex Miq. in Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. i. 81 = V. geniculata.
japonica, Willd. Sp. PI. i. 659-V. japonica.
javana, DC. Prod. i. 628,—Java.
juncea, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 57 — V. juncea.
Kleinii, Laws, in Hook. f. FL Brit. Ind. i. 649, in syn. = V. adnata.
laciniata, Linn. Syst. ed. X. 897-Sicyos laciniata.
laevigata, Blume, Bijdr. 191 = V. auriculata.
Lamarckiana, Roem. & Schult. Syst. iii. Mant 239 - V. sicyoides.
lanceolaria, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 412 = V. lanceolaria.
Landuk, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 39 = V. Landuk.
lanigera, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 252.—Afr. austr.
latifolia, Descourt. Fl. Med. Ant. v. 29. t 11-V. sicyoides.
latifolia, Lam. Encyc. i. 30-V. glauca.
latifolia, Vahl, Symb. Bot. iii. 18 =V. adnata.
latifolia, Walp. Rep. i. 441 = V. latifolia.
leonensis, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 264 = V. leonensis.
Uucocarpa, Blnme, Bijdr. 189 = V. japonica.
leucostaphyla, Steud. Nom. ed. II. i. 872 - V. lanceolaria.
Lindeni, André, Illustr. Hortic. xvii. (1870) 12. t. 2.—N. Granat
Livingstoniana, Welw. in Joum. Linn. Soc. viii. (1865) 76.—Afr. trop.
lonchiphylla, Thw. Enum. PI. Zeyl. 62 -V. lonchiphylla.
longepedunculata, Teijsm. *Sc* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (.1863) 417 = V. longepedunculata.
lucida, Poir. Encyc. Suppl. i. 106 = V. erosa.
macrobotrys, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 269.—Sumatra.
macropkylla, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 306.—Java.
macropus, Welw. in Joum. Linn. Soc. viii. (1S65) 77 = V. macropus.
Mappia, Lam. Tabl. Encyc. i. 332 = V. Mappia.
membranacea, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 266 = V. gracilis.
mexicana, Moc. *Sc* Sesie, ex DC. Prod. i. 631 = V. mcxicana.
micrantha, Poir. Encyc. Sappl. i. 105.—Ins. S. Doming.
micrantha, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iiL Mant *Ut-paniflora.*
microcarpa,Vah\fcc\og. Am. i. 16=V. trifoliata,£afer.
microphylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxxi. (1868) I. 416.—Afr. austr.
mollis, Steud. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. L 413=V.serpens.
mucronata, Hook. *Sc* Am. ex Steud. Nom. ed. II. i. 372 = V. lanceolaria.
multibracteata, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 75 -V. pubiflora.
multiflora, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. Mant. 249.—Am. austr.
muricata, Dalz. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. 40; Thw. Enum. PI. Zeyl. 63-V. lanceolaria.
mutabUis, Blume, Bijdr. 190 = V. mutabilis.
napaulensis, DC. Prod. i. 682 = V. capreolata.
natalensis, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 349 - Rhus natalensis.
neilgherrensis, Wight, Spicil. Neilgh. i. 82. t. 86 = V. himalayana.
nepalensi,* Stend. Nom. ed. II. i. 372, vide *napaulensis.*
nilagirica, Miq. in Linnaea, xxvi. (1863) 221.—Ind. or.
nitida, Veil. Fl. Flum. 39; i. 1.100 »V. sicyoides.

CISSUS:—
nivea, Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 83.—Abyssin.
nodosa, Blume, Bijdr. 182=Vitis nodosa.
obliqua, Ruiz & Pav.'Fl. Per. i. 65.—Peruv.
obovata, Vahl, Symb. Bot. iiL 19-V. trifoliata, *Baker,*
obscura, DC. Prod. i. 629=V. sicyoides.
obtusata, Benth. Bot Voy. Sulph. 77.—Panama.
obtusifolia, Lam. Encyc. i. 31-V. trifolia.
ochracea, Teijsm. *Sc* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 35-V. ochracea.
officinalis, Klotzsch, in Bot Zdt. iv. (1846) 110.—N. Granat.
opaca, F. Muell. in Trans. Phil. Inst Viet. iii. (1859) 23»V.opaca.
orientalis, Lam. Tabl. Encyc. i. 882. t 84. f. 2 - V. orientalis.
ovata, Lam. 1. c. 381 = V. sicyoides.
ovata. Rich, in Act Soc Hut. Nat. Par. i. (1792) 106. — ana.
oxyodon, Planch, in Catal. PI. Hort. Donat 6.—Hab. T
pallida, Salisb. Prod. 66 = V. sicyoides.
pallida, Steud. Nom. ed. II. i. 872 - V. pallidà.
palmata, Poir. Encyc. Suppl. i. 107 =V. Commersoni.
paniculata, Heyne, in Wall. Cat. n. 6022 = V. tenuifolia.
papillosa, Blume, Bijdr. 183 = V. pubiflora.
pamiflora, Roem. & Schult Syst. iii. Mant 248.—Ind. or.
parvifolia, Salisb. Prod. 66 = V. acida.
paucidentata, Ernst, in Journ. Bot. viii. (1870) 874.—Venezuela.
paucidentata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. i. 179 - V. paucidentata.
pauciflora, DC. Prod. i. 630.—Afr. austr.
Pauli-Guilielmi, Schweinf. Rel. Kotsch. 46.—Afr. trop.
paullinifolia, VelL Fl. Flnm. 40; i. t. 102-V. tematat
pedata, Lam. Encyc. i. 31 = V. pedata.
pedata, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. Ill-Nov. App. 50—V. lanceolaria.
peltata, Torcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxvi. (1863) '• 590.—Java.
pentagona, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl.Ind. L 408-V. pentagona.
pentandra, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. Mant. 248.—Am. austr.
pentaphyila, liuch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 6016 = V. elongata.
pentaphyila, Herb. Madr. ex Wall. 1. c. sub n. 6022 » V. tenuifolia.
pentaphyila, Willd. Sp. PI. i. 659 = V. pentaphyila.
pergamacea, Blume, Bijdr. 188 = V. pergamacea.
petiolata, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 262»v-pallida.
pinnata, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed. II. ii. 2*7-—Cilicia.
pisocarpa, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79 = V. pisicarpa.
platanifolia. Cm. in Rev. Hortic. (1868) 39.-, China.
populnea, Guill. *Be* Perr. FL Seneg. Tent. i. 184 - pallida.
porphyrophylla, Lindl. in Proc Hort. Soc i. (1861) 226-Piper porphyrophyllum.
producta, Afzel. Rem. Guin. 63 = V. producta.
pruinata, Weinm. in Syll. Ratisb. i. (1824) 22*-—• Brss.
pruinosa, Des£ Cat. Hort. Par. ed. III. 288.—Hab.'
pubescens, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. v. 226.—A* austr.
pubescens, Walp. Rep. i. 441 = V. pubescens.
pubiflora, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 516 - V. p»l«' flora.
pubinenis, Blume, Bijdr. 186.—Java.
pulcherrima, VelL Fl. Flum. 40; i. t. 101 = V. P"'1, cherrima.
puncticulosa, Rich, in Act. Soc Hist. Nat. P**- (1792) 106 = V. sicyoides.
purpurea, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 878"* glauca.
purpurascens, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 85 - V. rostnta.
Pyrrhodasys,Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. L 517.—Sumat»»-
quadrangula, Salisb. Prod. 66=V. quadrangnlaris.
quadrangularis, Linn. Mant. i. 8>J«V. quadrong" laris.

CISSUS:—
quadrialata, H. B. *to* K. Nor. Gen. et Sp. v. 225-Vitis erosa.
finata, [Dryand. in] Ait Hon. Kew. cd. II. i. 260-V. cirrhosa.
auinquefolia, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 288 = V. hederacea.
ouinquefolia, Soland. in Sims, Bot. Mag. t. 2418 = V. Simsiana.
repanda, Vahl, Symb. Bot. iii. 18-V. repanda.
repens. Lam. Encyc. i. 81 = V. repens.
*'*pens,* Thw. Ennm. PI. Zeyl. 62 = V. repandn.
retieulata, Willd. ex Roem. *to* Sennit. Syrt. iii. Mant. *i&=-canescens.
retieulata, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 68 = V. reticnlata.
rhodocarpa, Blume, Bijdr. 185-V. geniculata.
rhomiifolia, Vahl, Eclog. Am. ii. 10 = V. thombifolia.
rhomboidea, E. Mey. Zwei Pfl. Docnm. 178, nomen; Harv. *to* Sond. Fl. Cap. i. 252—Afr. austr.
rxparia, Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 649, in syn. V. repanda.
Rocheana, Planch, in Comptes-rendus, zciii. (1881) 869. Afr. trop.
To°sea, Walp. Rep. i. 487 = V. repanda.
rotundata, Heyne, ex Wall. Cat. snb n. 5988=V. Heyneana.
r»tundifolia, Blume, Bijdr. 480 = V. pallida.
"tundi/olia, Vahl, Symb. Bot. iii. 19.-Arabia.
'ubescens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 71-V. geniculata.
rubneaulis, Carr. in Rev. Hortic. (1868) 89.—China.
Tfescm s, Gill. *to* Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 188 - V. mfescens.
r«fosa, DC. Prod. i. 629.—Ins. Jamaic.
"lutaris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 228-V. salutaris.
s«ndersoni, Harv. in Harv. *to* Sond. Fl. Cap. i. 268.—Afr. anstr.
*w»«i», Blnme, Bijdr. 191 = V. coriacea.
^mperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 111 = V.oxyphylla.
*n»<:ordata, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 481 himalayana.
"niglabra, Harv. in Harv. *to* Sond. Fl. Cap. l. 250 - V. semiglabra.
*encea, EcW, & 2xyb. ^maa. 67.—Afr. anstr.
2iaefolia, Walp. Rep. i. 441=V. setjaniaefolia.
WMis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 111 = V - serpens.
'"Tfijfolia, Rottl. ex Wight, in Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 104 = V.pedata.
serr^tata, Roxb. Hort. Beng. 11; FL Ind. i. 414 - capreolata.
Z. Roxb - »• cc. 88 ; 410 = V. setosa.
'^Wrisa Emst, in Joum. Bot. viu. (1870) 874.—
sicyoid K. Klein, ex Steud. Norn. ed. II. i. 872, 878 = V. discolor.
sicyo Unn Svst «4 x- 8W-V. sicyoides.
Sill- Blan «>> Fl. Filip. ed. I. 72=V. adnata.
Rom & &HL Syt 246 = V
L. H. B. & K<NoV Gen. et Sp. v. 224 = V. sicyoides.
spicifera, Griff_Notnl_iv- 698-V. macrostachys.
spinos Calnbess - in St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 345 - V - spinosa.
Per. Svn ! - M8-V. arborea.
rtrt 7 Vel1_F1 - ^o"1-s9 i »• «• 99=v, sulcicaulis?
rfw* Cert. & Pav. Fl. Per. i. 64. t. 100 = V. striaU.
V?Mriata. eX Steudg Nom e i IL L S72, in syn< =
W. Stend. in A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 110 = V-Sracilis.
Bedd. in Madr. Jonrn. Sc. Ser. IL xxii. (1861) 75.
Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 846 = V. erosa.
Cambess. l. c - 842 = V. sicyoides.
Hoo k, f, H0Ok, Ng, FL 266 = V. tennicaulis.
Heyne, in W«M- C«tn. 6022 A =• V. tennifolia.
Gmel Svst - 25«--A»bia.
•«, Harv. in Harv. *to* Sond. Fl. Cap. i. 249—
Hook. f. in Hook. Niger Fl. 263 V quadrangularis.

CISSUS:—
Ttysmanni, Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl. i. 516.—Sumatra.
Tkuniergii, Eckl. & Zeyh. Enum. 66.—Afr. austr.
Thunbergii, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. II. (1846) 195 = Vitis inconstans.
thyrsiflora, Blame, Bijdr. 187 = V. thyrsiflora.
iiliacea, H. R *to* K. Nov. Gen. et Sp. v. 222-V. tiliacea.
timoriensis, DC. Prod. L 630.—Ins. Timor.
tinetma, Arrada, in Koster, Trav. Brai. 496.—Bras.
tinetoria, Mart, in Spix *to* Mart. Reise Bras. 868-V. sicyoides.
tomentosa Lam. Tabl. Encyc. i. 330 = V. capensis.
Mantra, Schnm. *to* Thonn. Beskr. Gnin. PI. 81 - V. quadrangularis.
tricuspidata, Sieb. *to* Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. II. (1846) 196.—Japon.
Mcuspis, Burch. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 209 = V. tricuspis.
tridentata, Eckl. *to* Zeyh. Ennm. 66 =*pauciflora.*
trifoliate, Bncti.-Ham. in Wall. Cat. n. 60181 K = V. angustifolia.
trifoliata, Linn. Sp. PI. ed. II. 170=V. trifoliate, *Baker.*
trifoliata, Lour. Fl Cochinch. *Si-dubia.*
trigona, Willd. ex Roem. *to* Sennit. Syst. iii. Mant. 248.—Bras.
trilobata. Lam. Encyc. i. 81=V. Rheedei.
triternata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 516.—Sumatra.
truncata, Laws, in Hook. f. Fl. Brit Ind. i. 660 = V. tennifolia.
tubcrculata, Blume, Bijdr. 189 - V. tuberculata.
tubereulata, Jacq. Hort. Schoenb. i. 14.—Am. austr.
tuberosa, Moc. *to* Sesse, ex DC. Prod. i. 629=V. tuberosa.
umiellata. Lour. Fl. Cochinch. 84.—China.
umbrosa, H. B. *to* K. Nov. Gen. et Sp. v. 228.—Am. anstr.
unifoliata, Harv. in Harv. *to* Sond. Fl. Cap. i. 250.—Afr. austr.
uvifer, Afzel. Rem. Guin. 69=V. nvifer.
vagans, Carr. in Rev. Hortic (1876) 60-V. japonica? *Veitchii,* Carr. 1. c. (18771 176.-Hab.»
velutinus, Linden, ex Hook. Bot. Mag. t. 6207—Hab. ?
venatorum, Descourt. Fl. Med. Ant. v. 21. t 309 = V. sicyoides.
verrucosa, Steud. Nom. ed. II. i. 378=V. tnberculata.
vesicatoria, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 50 = V. repens.
villosa, Roxb. Hort. Beng. 11, nomen.—Hab. ?
violacea, Meyen, Reise, i. 800.—Chili.
viticifolia, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. n. (1846) 196=V. serianaefolia.
vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 272 = V. vitiensis.
vitifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 81=-V. persica.
vitifolia, Salisb. Prod. 66 = V. repanda.
nttiginea, Linn. Sp. PI. 117=V. repanda.
vitiginea, Roxb. FL Ind. i. 406 = V. lanata.
Vogelii, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 267 = V. Vogelii.
Wallichiana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1658) I. 416=Hedera Helix.
Zollingeri, Turcz. 1. c. xxxvi. (1868) I. 691.—Java.

CISTAITCHE! Hoffmgg. *to* Link, Fl. Port. i. 318. t. 63 (1806). *OROBANCHACEAE,* Benth. *to* Hook, f. ii. 988.
HAEMODORON, Reichb. Consp. 212[k] (1828).
lutea, *Hoffmgg. (f Link, 1. c.* 319.—Reg. Medherr.; Arabia.
lutea, Wight, Illustr. ii. 180. t. 158. b. f. 4-tubulosa.
tubulosa, *Wight, Ie.* t. 1420 bis.—Ind. bor. occ.

CISTANTHE, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 229 (1836) = Calandrinla, H. B. *to* K. (Portulac).
anceps, Spach, 1. c. 230 ~CaL grandi flora.
discolor, Spach, 1. c. 231-Cal. discolor.
glauca, Spach, ex Heynh. Nom. ii. 146-Cal. grandiflora.
speciosa, Lilja, ex Heynh. 1. c. »Cal. discolor.

CISTELA, Blume, Fl Jar. praef. p. vi (1828; = seq.

CISTELLA, Blume, Bijdr. 293. t. 55 (1825)-Oeodorum, Jack (Orchid.).
cernua, Blume, 1. c.»G. dilatatum.

CISTICAPNOS, Adans. Fam. ii. 481 (17681 = CYSTICAPNOS, Boerh. = C!orydallfl, Vent (Papaverac.).

CISTOCARPIUM, Spach, Hist Veg. Phan. vi. 471 (1838)=Vealoaria, Toum. (Crucifer.).
utriculatum, Spach, L c. 472 = V. utriculata.

CISTOCARPUM, Pfeiff. Nom. i. 766 (1874)=seq.

C1STOCARPUS, Kunth, in M^m. Soc. Nat. Hist. Par, iii. (1827) 889=Balbiala, Cav. (Geraniac.).

CISTOMORPHA, Caley, ex DC. Syst i. 427, in syn. (1818)=HU>bertia, Andr. (Dilleniac.).
lanceolata, Caley, 1. c - H. saligna.

CISTRUM, Hill, Veg. Syst. iv. 86 (1782) - Centaurea, Linn. (Compos.).
asperum, Hill, 1. c-Cent. aspera.
Isnardi, Hill, 1. c. = Cent. aspera.
napifolium, Hill, 1. c. = Cent. napifolia.

CISTULA, Noronha, in Verh. BaUv. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2 (Quid 1).

CISTX78, [Toum.] Linn. Syst ed. I (1735). *CISTINEAE,* Benth. *to* Hook. f. i. 113.
HALIMIUM, Spach, in Ann. Sc. Nat Sir. II. vi. (1836) 366.
LAUANIUM, Spach, I. c. 867 (1886).
LEDONIA, Spach, 1. c. 869 (1836).
LIBANOTIS, Rafin. Sylva Teller. 182 (1838).
RKODOCISTUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 867.
STEPHANOCARPUS, Spach, 1. c. 368 (1836).
STROBON, Rafin. Sylva Tellur. 132 (1888).
acuminatus, Viv. Ann. Bot i. n. (1804) 172 = Helianthemum rariabile.
acutifolius, *Sweet, Cist.* t. 78.—Europ.
aegyptieus. Linn. Sp. PI. 527=Helianthemum aegyptiacum.
aegyptius, Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 8 = Helianthemum salicifolium.
affinis, Bertol. ex Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 12 = monspeliensia.
albidus, *Linn. Sp. PI.* 524.—Reg. Mediterr.
albissimus, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 10.-Malaya.
algarvensis, Sims, Bot. Mag. t. 627 - Helianthemum ocymoides.
alpestris, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. Cæ ii. 78 ; ed. II. 103 = Helianthemum cinereum.
alternifolius, Vahl, Symb. Bot. i. 88 =- Helianthemum brasiliense.
alyssoides, Lam. Encyc ii. 20 = Helianthemum alyssoides.
anglicus. Linn. Mant. ii. 245 = Helianthemnm cinereum.
angustifolius, Jacq. Hort. Vindob. iii. 29 = Helianthemum variabile.
angustifolius, Lag. ex Willk. *to* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 784 = Helianthemum leptophyllum.
angustifolius, Salisb. Prod. 368 = Helianthemum umbellatum.
annuus, Lamb, ex Dun. in DC. Prod. i. 272 — Helianthemum villosum.
anthurus, Link, in Schrad. Neues Joura. i. (1805) 112 = Helianthemum umbellatum.
appeninus. Linn. Sp. PL 529 - Helianthemum variable.
araHcus, Linn. Cent. i. 14 — Helianthemum arabicum.
asperifolios, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 855.—Afr. bor.
asperifolius. Sweet, Cist. t. 87-longifolius.
atriplicifolius. Lam. Encyc. ii. 19 - Helianthemum, atriplicifolium.
barbatus, Lam. 1. c. 24 = Helianthemum vnlgare.
Barrelieri, Stend. Nom. ed. I. 199 = Helianthemum glutinosum.
Bourgaeanus, *Coss. Notes Crit.* ii. 30.—Hispan.
brasiliensis, Lam. Encyc. ii. 22 = Helianthemum brasiliense.
brevifolius, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 8.—Hab. ?
bupleurifolius, Lam. Encyc. ii. 22 - Helianthemum guttatum.
ealydnus, Linn. Mant. ii. 565 = Helianthemum Fumana.
canadensis, Linn. Sp. PI. 526 = HeHanthemam canadense.

CISTTTB :—
canariensis, Jacq. Misc. ii. SS9 = Helianthemum canariense.
candidissimus, Don. ex DC. Prod. i. 264 = vaginatns.
caneseens, Sweet, Cist, t 45=polymorphus.
canus, Georgi, Beschr. Russ. Reich, liii. IV. 1047 = Helianthemum oelandicum.
canus, Jacq. Fl. Austr. iii. 42. t. 277 = Helianthemum montannm.
canus, Linn. Sp. PI. 525 = Helianthemum vineale.
capensis, *Linn. I. c.* ed. II. 7S6.—Afr. austr.
carolinianus, Walt. Fl. CaroL 152 = Helianthemum carolinianum.
cheiranthoides, Lam. Encyc. ii. 19 =- Helianthemum lasianthum.
ciliatus, Desf. Fl. Atlant. i. 421.1.109 = Helianthemum virgatum.
ciliatus, Rostung, ez Dun. in DC. Prod. i. 281 = Helianthemum obtusifolium.
cinereus, Cay. Ic. ii. SS. t. 141 - Helianthemum cinereum.
cistifolius, Stend. Nom. ed. I. 200 = Helianthemum variabile.
ClusU, *Dun. in DC. Prod.* i. 266.—Hispan.; Aft. bor.
collinus, Salisb. Prod. 868—monspeliensis.
complicatus, Lam. Encyc. ii. 14 = parviflorus.
complicatus, Sprun. ex Nym. Consp. 70=villosu».
corbariensis, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) B12 = salvifolius.
cordifolius, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 12.—Hab.t
cordifolius, Moench, Meth. 246 = popnlifolius
coriaceus, Poir. Encyc. Suppl. il. 278 (=• *Hemistemma Aubertii, Commersonii*).—Madag.
corsicus, Loisel. Nouv. Not. 24=villosus.
corymbosus, Poir. Encyc Suppl. ii. 272 = Helianthemum corymbosum.
crassifolius, Poir. 1. c. 277—Helianthemum dnereum.
creticus, Linn. Sp. PI. ed. II. 738 - polymorphic.
creticus, Sibth. & Sin. Fl. Graec Prod. i. 864 = parviflorus.
crispus, *Linn. Sp. PI.* 624.—Reg. Mediterr.
croceut, De»f. Fl. Atlant. i. 422.1110 = Helianthemum glaucum.
Cupanianus, Presl, Fl. Sic. 1. 117 = polymorphic.
cymosus, Dun. in DC. Prod. L 265 = parviflorus.
cyprius, *Lam. Encyc.* ii. 16.—Ins. Cyprus,
denticulate, *Kit. ex Kanite, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xiii. (1863) 52».-Hnng»r.
denticulatus, Poir. Encyc Suppl. ii. 278 - Helianthemum salicifolium.
dickotomus, Cav. Ic iii. 82 =" Helianthemum origanifolium.
distachyus, Roth, Catalecta, i. 62 — Helianthemum distachyum.
dubius, *Pourr. in Mem. Acad. Toul.* iii. (1788) 312.—Mont. Pyren.
Dunalianus, Steud. Nom. ed. II. i. 874 = polymorphus.
echioides, Lam. Encyc. i. 21 = Helianthemum variabile.
ellipticus, Desf. Fl. Atlant. i. 418. t. 107 •= Helianthemum Lippii.
elongatus, Vahl, Symb. Bot. i. 88=Helianthemum lasianthum.
ericoides, Cav. Ic. ii. 56. t. 172 •= Helianthemum Fumana.
eriocephalus, Viv. Fl. Con. Sp. Nov. 8 = polymorphns.
fasciculatus, Steud. Nom. ed. I. 200 = Helianthemum fasciculatum.
fastigiatus, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 18-Clusii.
feredjensisx, Battand. in Boll. Soc. Bot. Fr. xxx. (1888) 268.—Afr. bor.
ferruginous, Lam. Encyc. it 25 = Helianthemum arabicum.
florentinus, Lam. 1. c. 17=mon»peliensii.
floribundus, *Tausch, in Flora*, xix. (1886) 417.—Gallu.
foetidus, Jacq. Misc. ii. 841 = Helianthemum variabile.
fonnosissimus, *Schnen. Ic. PI. Rar.* t. 47.—Lniitan.
formosus, Curt. Bot. Mag. t 264 - Helianthemum lasianthum.
fumana, Linn. Sp. PI. 625 = Helianthemum procumbens.
Fumana, Schousb. ex Ball, in Journ. Iinn. Soc. xvi. (1877) 848 = Helianthemum glutinosum.

CISTUS:—
galactites, Schmidel, Ic. PI. ed. II. 250. t 65 = Helianthemum vulgaret
garganicus, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 15, exSyll. ed. fol. 74»villosus.
glaucophyllus, Lam. FL Fr. iii. 162 - Helianthemum laevipes.
glaucus, Cav. Ic. iii. 8L t. 261 - Helianthemum glaucum.
glaucus, Desf. Fl. Atlant i. 418 - Helianthemum crassifolium.
glaucus, *Pourr. in M6m. Acad. Toul.* iii. (1788) 811. -GaUia.
glaucus, Salisb. Prod. 868-> Helianthemum laevipes.
globularifolius, Lam. Encyc. ii. 22 = Helianthemum Tuberaria.
glomeratus, Lag. Gen. et Sp. Nov. 16 =• Helianthemum glomeratum.
glutinosus, Linn. Mant ii. 246 •= Helianthemum clutinosum.
grandiflorus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 712 = ladaniferus.
grandifiorus, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 877 - Helianthemum vulgare.
guttatus. Linn. Sp. PI. 626 = Helianthemum guttatum.
halimifolius, Linn. 1. c. 524 = Helianthemum halimifolium.
helianthemoides, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. i. 69; ed. II. 101 = Helianthemum variabile.
helianthemoides, *Desf. Fl. Atlant.* i. 422.—Afr. bor.
Helianthemum, Linn. Sp. PI. 528 - Helianthemum vulgare.
heterophyllus, Desf. FL Atlant. i. 411. t. 104 - polymorphus.
hirsutus, *Lam. Fl. Fr.* iii. 157.—Hispan.; Lusitan.
hirsutus, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 303 = Helianthemum polymorphum.
hirtus, Chaub. ex Nym. Consp. 74 -• Helianthemum glaucum.
hirtus, Gilib. Fl. Lituan. v. 225 = Helianthemum vulgare.
hirtus, Linn. Sp. PI. 628 •> Helianthemum hirtum.
hirtus, Sibth. & Sm. FL Graec vi. 1.1. 501 = Helianthemum obtnsifolium.
hirtus, Thib. ex Dun. in DC. Vrod. i. 282 - Helianthemnm asperum.
hispanicus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Hispan.
hispidus. Lam. Encyc. ii. 26 = Helianthemum hirtum.
korridus, Lag. in Varied. Cienc ii. iv. (1805) 214, sphalir. *{^Cirsium horridum)*.
humilis, Salisb. Prod. 368 = Helianthemum vulgare.
hybridus, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788; 812 = salvifolius.
hybridus, *Vahl, Symb. Bot.* i. 87—Hispan.
imbricatus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 278 =- Helianthemum ledifolium.
immaculatum, Steud. Nom. ed. 1.200=Helianthemum
incanus, Linn. Sp. PI. 524 = polymorphus.
incanus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. v. 76. t 494 = parviflorus.
inconspicuus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 278 = Helianthemum guttatum.
indicus, Linn. Syst ed. XIL 867, <phalm. vide *italicus*.
intermedius, Poir. Encyc. Suppl. ii. 278 = Helianthemum intermedium.
involucratus, Lam. Encyc. ii. 20 = Helianthemum lasianthum.
italicus, Linn. Syst. ed. X. 1078 = Helianthemum montanum.
italicus, Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 8 - Helianthemum oelandicum.
japonicus, *Fortune, in Journ. Agri.-Hort. Soc. Ind.* ix. (1856) 96.—Japon.
iahiricus, Steud. Nom. ed. I. 200 = Helianthemum kahiricum.
ladaniferus, Curt. Bot Mag. 1112 = cyprius.
ladamferus, Gouan, ex Steud. Nom. ed. II. i. 374 = C. Ledon.
ladaniferus, *Linn. Sp. PI.* 628.—Reg. Mediterr. occ.
ladaniferus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 209 - polymorphus.
ladanosma, Hoffmgg. Verz. (> - ladaniferus.
laevipes. Linn. Cent. i. 14 = Helianthemum laevipes.
laevis, Cav. Ic ii. 85. t. 145. f. 1 - Helianthemum thymiiblium.

CI8TU8 :—
lanceolatus, Vahl, Symb. Bot ii. 62 - Helianthemum guttatum.
lanuginosus, Viv. FL Lib. Spec 28. t. 14. f. 8= Helianthemum lanuginosum.
lasianthus, Lam. Encyc. ii. 19 •> Helianthemum lasianthum.
latifolius, Sweet, Cist t. 15 = popnlifolius.
laurifolius, *Linn. Sp. PI.* 628.—Europ. austr. OCA; As. Min.
lavandulaefolius, Lam. Encyc. ii. 25 » Helianthemum lavandulaefolium.
laxus, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 805» longifolius, *Lam.*
laxus, Brot. ex Nym. Consp. 71 = hirsutus.
ledifolius, Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr. 276 = Helianthemum salicifolium.
ledifolius, Linn. Sp. PI. 527 = Helianthemum ledifolium.
ledonius, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 122=glaucns.
Ledon, Lam. Encyc. ii. 17 = glaucus.
lepidotus, Amo, FL Iber. vi. 867 - Helianthemum halimifolium.
Libanotis, Desf. Fl. Atlant. i. 412--ClusiL
Libanotis, Linn. Syst. ed. X. 1077 - Helianthemum Libanotis.
lilacinus, Hoffmgg. ex Steud. Nom. ed. II. i. 374 - parviflorus.
linearis, Cav. Ic iii. 8. t. 216 - Helianthemum variabile.
Lippi, Linn. Mant. ii. 245 = Helianthemum Lippii.
longifolius, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 874" grandiflorus.
longifolius, *Lam. Encyc.* ii. 16.—Hispan.; GaUia.
longifolius, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 18.—Hab ?
lunula'tus, All. Auct Pedem. 80. t. 2. f. 3 - Helianthemum lunulatum.
lusitanicus, W. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 - Helianthemum variabile.
luteus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 225 = Helianthemum variabile.
majoranifolius, Gouan, Herbor. 86 = Hellanthemnn hirtnm.
marifolius, Bieb. FL Taur. Cauc. ii. 8 - Helianthemum oelandicum.
marifolius, Linn. Sp. PI. 526 = Helianthemum vineale.
mauritanicus, Thib. ex Dun. in DC. Prod. L 276 = Helianthemum glutinosum.
medius, *J. F. Gmel. Syst.* 822.—Italia.
micranthus, Viv. Fl. Lib. Spec. 27 - Helianthemum micranthum.
mollis, Cav. Ic. iii. 82. t. 262. f. 2 = Helianthemum origanifolium.
monspeliensis, *Linn. Sp. PL* 624.—Reg. Mediterr. occ
multiflorus, Amo, Fl. Iber. vi. 359 - Helianthemum halimifoliuro.
Munbyi, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 215.—Afr-bor.
mutabilis, Jacq. Misc. ii. 840 = Helianthemum variabile.
myrthifolius, Lam. Fl. Fr. iii. 161 = Helianthemum cinereum.
nervosus, Lam. 1. c 164 = Helianthemum Tuberarw-
nigricans, Pourr. in Mlm. Acad. Toul. iii. (1788) 31* =» longifolius.
niloticus, Linn. Mant. ii. 246 - Helianthemum led'' folium.
nudifolius, Lam. FL Fr. iii. 163 - Helianthemum Fumana.
nummularius, Cav. Ic. ii. 84. t. 142 = Helianthemum rubellum.
nummularius, Linn. Sp. PI. 527 - Helianthemum vulgare.
oblongifolius, Sweet, Cist. t. 67 = longifolius.
obscurus, Steud. Nom. ed. I. 201 - Helianthen""" variabile.
obtusifolius, Sweet. Cist, t 42 =» longifolius.
occidental, Amo,%l. Iber. vi. 352 - Helianthem alyssoides.
ochrtatus, *Chr. Sm. ex Buch, in Berl. Acad.* •"" 1816-17 (1819) 880.—Ins. Canar.
ocymoides, Brot.—Cf. Nym. Consp. 72 = Helianth ocymoidei.
ocymoides, Lam. Encyc. ii. 18 = polymorphus.

CISTtTS :—
oelandicus, Lam. Encyc. ii. 20 — Helianthemnm montanum.
otlandicut, linn. Sp. PI. 526 « Helianthemum Ualicum.
olbiensis, Huet & Hanry, in Bull. Soe. Bot. Fr. vii. (1860) 848-monspeliensis.
okoefolius. Mill. Gard. Diet. ed. V1IL n. 10 - monspeliensis.
digophyllus, Clark, Tnv. it 452 - Helianthemnm ohgophyllnm.
origanifolius, Lam. Encyc. ii. 21 - Helianthemnm onganifolium.
ovatus, Viv. Fl. Ital. Fragm. i. 6 - Helianthemnm vanabile.
parasitieus, *Noronha, in Verh. Bator. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 10.—Malaya.
PUVMorns, *Lam. Encyc.* ii. 14.—Reg. Mediterr. or.
**^U> Pourr_ „ Timi_ in BuU_ s<t- Se_ phi' 't Jfat. Toul.* ii. (1874) 90,-Gallia.
Petiolatus, *Martr. Herbor. Midi Fr.—Cf. BuU. Sec. Bot. Fr.* ii. (1865) 122.—Gallia.
petiolatus T<at. Encyc. Soppl. ii. 278-Helianthemum petiolatum.
**il?/™>* Gmel. ex Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hhp. ill. 729 = Helianthemum pulverulentum.
*/•/osri/<»rf«,Upeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 801-Helianthenram montanum.
^•ow i. All. Fl. Pedem. ii. 104 - Helianthemum polifolium.
£'«««*, Unn. Sp. PI. 828 - Helianthemom variabile.
pfluliferus, Thib. ex Dun. in DC. Prod. i. 282- Heljanthemnm variabile.
Pipenfolins, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) «• I. Art. IV. 10.—Malaya.
plantag ineus, Willd. Sp. PI. ii. 1197 - Helianthemum guttatnm.
plantaginifolius, Salub_ Prod_ M8-Helianthemum Tuberaria.
platypepalu, *Sweet, Cist.* t. 47.—Int. Creta.
poli fus, Unn. Sp. PI. ed. II. 746 - Helianthemum Pulverulentum.
P°l«folius, Huds. Fl. Angl. ed. I. 205-praec.
PUyanthos, Deaf. Fl. Atlant. i. 420 - Heliantbemnm po'yanthum.
poiymorphus, *will*. Ic. PI. Hisp.* ii. 19 (sp. aggregat). —Keg. Mediten.
Popullfolius, *Unn. Sp. PL* i. 628.—Reg. Mediterr. occ.
**°r<l«erollensis,* Hanry & Hnet, in Bnfi. Soc. Bot. Fr. ^«. (I860) 845-monspeliensis.
"utoltii, Delile, Suppf. Cat. Hort. Monsp. (1889) j « Cren. & Godr. FL Fr. i. 168=albidut.
toopi Sweet, Cist, t 38-hirntus.
Pulverulentus, Pourr. in Mem. Acad. Toul. ii. (1788) 312 ~ albidua.
punctatus, Willd_ Sp- M_ a- 1199-Helianthemum salicifolium.
purpureus, *Lam. Encyc.* ii. U.-Oriens.
quinquenervis, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. io—Malaya.
^ n evalu s , *Vis. in Act. 1st. Ven. Sc.* Ser. III. "• (1868-69) 188.-Hab.J
^nonu, Cav. Ic ii. 81. L 140 = Helianthemom vandulaefolium.
rcmosus, Enqrc< iL 25 = Helianthemum virgatain.
racemosus, Linn_ Mant_ *• 76-Helianthemum variabile.
'i/lorus, Poir. Encyc. Suppl ii. 274-HelianJ^wncanadense.
ractus, Poir. 1. c. 278-Helianthemnm retrofractum.
rorismarinifolius, Pourr. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. & N«. Toul. ii. (1874) 101=Clurii.
roseus, All_ F1_ PedeBI_ "• 105=Helianthemum vulgare.
roseus, Ha^. HOrt. Vmdob_ iil 87 = Helianthemum variabile.
rosmarinifolius AU_ F1_ Pedem. ii. 105 = HeUanthemum ro°an«rinifolium.
rosmarinifolius M«*. Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 318-Clurii.
rosmarinifolius, Salisb- Prod> 3«8-Helianthemum Libanotis.
rotundifoli?/ Sweet> Cist_ '• 75-vulgaris.
ruficomus, ly« „ «C. ore. S. p. NoT< 8 = Helianthemnm ruficomun.
salicifolius, Cav. Ic. " 85. t. l«-~Helianthemum intermedium.

CI8TUB:—
salid/olius, Huds. Fl. Angl. ed. II. 283 • Helianthemum ledifolium.
salicifolius,L\BD. Sp. PI. 627-Helianthemum salicifolinra.
sahiaefolius, Boisj. Fl. Orient iii. 438 = seq.
salvifolius, *Linn. Sp. PI.* 524.—Reg. Mediterr.
salvifalius, Pall, e' Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 7-poljrmorphua.
sampsucifolius, Cav. Ic. i. 65 = Helianthemum ocy moides.
sampauifoKus, Sims, Bot. Mag.xliu (1816) 1.1808 = Helianthemum Tariabile.
sanguineua, *Lag. in Varied, dene. ii.* IV. (1806) 40.—Austr.
Savi, Bertol. ex Dun. in DC. Prod. i. 275-Helianthemum arabicum.
scabrosus, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 286- Helianthemum lasianthum.
scorpioides, Desf. ex Steud. Norn. ed. IL i. 876 = Helianthemum glaucum.
stdjera, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 216.—Afr. bor.
Seguieri, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 74, ed. II. 104 = Helianthemum cinereum.
Seguieri, Poun. ex Dun. in DC. Prod. i. 277-Helianthemum italicum.
sericeus, *Munby, Fl. Algir.* 68.—Algeria,
•ericeus, *Vahl, Symi. Bot. i.* 37.—Hispan.
serpillifolius, Balb. ex Dun. in DC. Prod. i. 280- Helianthemnm variabile.
sezpillifolius, Linn. Sp. PI. 627= Helianthemum vulgare.
serratifolius, Lamb, ex Dun. in DC. Prod. i. 271 = Helianthemum guttatum.
serratus, Cav. Ic. ii. 57. t. 176=Helianthemum guttatum.
sessiliflorus, De»t Fl. Atlant. i. 417-Helianthemum Iippii.
Sideritis, *Presl, Fl. Sic.* i. 116.—SiciEa.
Skanbergi, *Lojac.* in *Natural. Sicil.* iv. (1885) 96.—Sicilia.
splendent, Lam. Fl. Fr. iii. 166=Helianthemum variabile.
squamatus, Linn. Sp. PI. 1196-Helianthemum squamatum.
stellulatus, Steud. Nom. ed. I. 201-Helianthemnm stellulatum.
stenophyllus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 74 - Clnsii, cypnus.
stipulates, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 100 = Helianthemum kahiricum.
stoechadifolius, Brot. Fl. Lush. ii. 270 » Helianthemum glaucum.
stoechadifolius, Hort. ex Dun. in DC. Prod. i. 280 = Helianthemnm leptophyllum.
strictus, Cav. Ic. iii. 82. t. 263. f. 2-Helianthemnm virgatum.
strigosus, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. i. 376 - Helianthemum cinereum.
sulphureus, Steud. 1. c. ed. I. 201 - Helianthemum variabile.
surrejanus, Linn. Sp. PI. 527 = Helianthemum Chamaecistus.
symphytifolius, Lam. Encyc. ii. 15-vaginatus.
syriacus, Jacq. Ic PI. Rar. i. 10. t. 96-Helianthemum lavandulaefolium.
syrtieus, Viv. Fl. Lib. Spec. 27-Helianthemum syrticnin.
tauricus, *V. VC. Presl, Delic. Prag.* 24.—Tauria.
telephioides, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (.1790) ed. I. Art. IV. 10.—Malaya.
teretifolius, Poir. Encyc SuppL ii 279 = Helianthemum tirtuin*
teretifolius, Thib. ex Dun. in DC. Prod. i. 281 = Helianthemum variabile.
Thibaudi, Poir. Encyc. Suppl. ii. 277-Helianthemum lavandulaefolium.
thimifolius, Goran, ex VilL Prosp.49-Helianthemum thymifolium.
thymi/olius, Falk, Beitr. ii. 197 = Helianthemum soongoricum.
thymifolius,lion. Sp. PI. 528-Helianthemum glutinoorn.
thymi/olius, Sibth. & Sm. Fl. Grace, v. 81. t 500- Helianthemum thymifolium.
tomentosus, Lam. Fl. Fr. iii. 168 = poiymorphus.
tomentosus, Scop. Ann. II. Hist. Nat. (1769) 58; Fl. Cain. ed. II. i. 376 B Helianthemum Chamaeciitus.

CISTUS :—
tricuspis, Darwin, Variation PI. & Anim. Damett. i. 877, err. typ.—Hibiscus tricuspis.
Tuberaria, Linn. Sp. PI. 526 - Helianthemum Tuberaria.
umbellatus,timi.l. e. 526 'Helianthemum umbel latum.
undulatus, Moencb, Meth. 246 •= poiymorphus.
vaginatus, *[Dryand.* ts] *Ait. Hort. Km.* ed. II. iii. 30*.—Teneriffa.
valentinus, Pourr. ex Nym. Consp. 71=monspeliensi*.
varius, POUR, in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 812- albidus.
verticiliflorus, Steud. Nom. ed. II. i. S75 - HelianttcifiUDi ftntlmruiD.
vertidllatus, Brot. FL LusiL iL 262 = Helianthemum umbellatnm.
villosus, *Linn. Gen.* ed. VI. pag ult (nomea incertum). —Hispan.
vinealis, Willd.Sp.PI. ii.ll95 = Helianthemumvineale.
violaceus, Cav. Ic. ii. 38. t. 147 - Helianthemum variabile.
virgatus, Deal Fl. Atlant i. 422 = Helianthemum vitgatum.
virgatus, Thib. ex Dun. in DC. Prod. i. 289-Helianthemum canadense.
viscosissimus, Tausch, in Flora, xix. (1836) 418.—Hab. I
viscosus, Stokes, Bot Mat. Med. iii. 209 - ladaniferus.
vulgaris, Spach, in Ann. Sc Nat. Ser. II. vi. (1836) 868 = poiymorphus.

CITHARELLA, Noronha, in Verh. BaUv. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2-(QuidI).

CITHABXIiOMA, Bunge, in Cat Hort. Dorp. (1843) 6 ; et in Unnaea, xviii. (1844) 149. *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 67.
canescens, Bunge, in Linnaea, xviii. (1844) 150, in nota = vemum.
Lehmanni, *Bunge, Cat. Hort. Dorp.* (1843) 6; *et in Linnaea,* xviii. (1844) 149.—As. med.
vemum, *Bunge, in Linnaea,* xviii. (1844) 160, in nota. —As. med.

CITHABBXXLUM, Mill. Gard. Diet. ed. VI. 175 (1752); Linn. Sp. PI. ed. I. 625 (1758). *VERBENACEAE,* Benth. *It* Hook. f. ii. 1149.
POEPPIGIA, Bert, in Bnll. Ferussac, xxiii. (Oct. 1830) 109.
RAUWOLFIA, Ruiz & Pav. FL Per. ii. 26. t. 152 (1799).
affine, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-Marcb 1831) 238.—Mexic.
affine. Mart. & GaL in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 328-Tetkulatum.
albicaule, *Tuns, in Bull. Soc. Nat. Most,* xxxvi. (1863) II. 208.—Cuba.
album, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-caudatnm.
alpinum, Poepp. ex Schau. in DC. Prod. xi. 646- Verbena dnerascens.
barbinerve, *Cham, in Linnaea,* viL (1882) 116.—Bras.
Berteiii, *Spreng. Syst.* ii. 7«a.—Ins. Jamaica.
caudatum, Hort ex Walp. Rep. vi. 646 = Buddleia melliodora.
caudatum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 872.—Ins. Jamaic
caudatum, Sw. Obs. Bot. 234 •= quadrangulare.
Chamissonis, Walp. Rep. iv. 75-caudatum.
cinereum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 872.—Am. trop.
cinereum, Moç. 8c Sesse, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (Jan.-March, 1831) 238 = lucidum.
cinereum, Spreng. Syst. ii. 764, partim = myrianthum.
coriaceum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 892-quadrangulare.
cyanocarpum, C. Gay, Fl. Chil. v. 84 -Rhaphithamnus parvifolius.
cyanocarpum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 68. L 11 -Rhaphithamnus cyanocarpus.
dentatum, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum.* (Jan.-March, 1881) 287.—Perav.
discolor, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) II. 209,-Cuba,
elegans, Phil, ex Miere, in Trans. Linn. Soc xxvii, (1870) 98 = Rhaphithamnus longiflorus.
ellipticum, *Moç. V Sesse, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-March, 1881) 238.—Mexic
erectum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 91-caudatum.
flexuoaum, *D. Don. in Edinb. N. PhiU Journ.* (Jan.-March 1831) 237.-Peruv.

OXTM-ARE x..x XiTJM;—
frutieosum, Linn. Syit ed. X. 1115-cinereiini.
ilicifoliam, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp. ti.* 256.—Ecuador,
incanum, *Moc. & Sesse, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-March, 1831) 288.—Mexic.
laetnm. *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 101.—Am. centr.
laevigatum, Hostm. ex Griieb. Fl. Brit W. Ind. 497 = lucidum.
Lindenii, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Afosc.* xxxvL (1863) II. 208.—Cuba.
longiflorum, *Tun: 1. c.* 207.—Cuba.
lucidum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1880) 97 = caudatum.
lucidum, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-March, 1881) 288.—Mexic.
lycioides, *D. Don, 1. c.* 237.—Mexic.
macropbyllum, *Pair. Encyc. Suppl.* iL 887.—Guiana.
melanocardium, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 91-Petitia domingensis.
mendocjnnm, *Phil. Serf. Mend. Alt.* 35.—Chili.
Mocinni, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-March, 1881) 288.—Mexic.
molle, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 257 = quitense.
molle, *Jacq. ex Spreng. Syst.* ii. 764.— Am. austr.
molle, Salisb. Prod. 108=villosnm.
myrianthnm, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 117.—Bias,
ovatum, *TUTCM. in Bull. Soc. Nat. Afosc.* xxxvi. (1863) H. 207.—Chili.
paniculatum, *Gaertn. Fructi.* 270. t. 66.—Jamaica.
paniculatum, Poir. in Lam. Tabl. Encyc. iii. 95 = Premna integrifolia.
pentandrum, *Vent. Jard. Cels, t* 47.—'Potto Rico.
perforatum, Forst. f. Prod. 44=Myoporum laetnm.
Poeppigii, *Walp. Rep.* iv. 76.—Bras,
polystachyum, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) II. 209.—Cuba,
psilacanthum, *Turct. 1. c.* 207.—Hab. ?
pulverulentum, *Pen. Syn.* ii. 142.—Am. auitr.
quadrangulare, Hort Madr. ex Stead. Nom. ed. II. L 375 = pnlverulentum.
quadrangulaie, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 26.—Ind. occ.
quadrangulare, Moç. & Sesse, .ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (Jan-March, 1831) 238-Sessaei.
quitense, *Spreng. Syst.* ii. 768.—Ecuador,
reticulatum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 257.—Peruv.
retusum, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-March, 1881) 287.—Peruv.
Rugendasii, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 120.—Bras.
scabrum, *Mof.* &" *Sesse, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum.* (Jan.-March, 1831) 288.—Mexic.
scabrum, Willd. ex Cham, in Linnaea, vii. (1882) 117 = myrianthum.
scariosum, Mof. *Sc* Sesse, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan.-March, 1831) 238=reticulatum.
Sessaei, *D. Don, 1. c.*—Mexic.
solanaceum, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 119.—Bras,
spinotnm, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 256.—Peruv.
spinosum, *Linn. Sp. PI.* 625.—In*. Barbad.
subseiratnm, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 91.—Ins. S. Doming.
snrrectum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 497.—Ind. occ
tenuifolium, *Forst. f. Prod.* 44 = Myoporum tenuifolium.
teres, Jacq. Enum. PI. Carib. 46=cinereum.
tomentosum, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 258.—Am. anstr.
tomentosum, M09. & Sose, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (Jan.-March, 1831) 238-Mocinni.
tomentosum, Poir. Encyc Snppl. ii. 368 = pentandrum,
tristachyum, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) II. 209.—Cuba,
venustum, *Phil, in Bot.Zeit.* xiv. (1856) 646 - Rhaphithamnus longi floras.
verticillatum, Klotzsch, ex Walp. Rep. iv. 78-cyanocarpnm.
villosum, *Jacq. Ic. PI. Rar.* i. 12. t. 118 ; *Coll.* i. 72.—Ins. S. Doming.

CITINUS, All. Fl. Pedem. ii. 214 (1785) = Cytinua, Toum.

CITREUM, Toum. ex Rnpp. Fl. Jen. ed. Hall. 141 (1745); Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1762) - Citrus, Linn.

CITRIOBATHUS, A. Juss. in Orb. Diet. x. 228 (1849) -seq.

CITBIOBATT7B, A. Cunn. in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 586 (1832). *PITTOSPOREAE,* Benth. & Hook. f. i. 132.
IXIOSPORUM, F. Muell. Fragm. ii. 76 (1860).
megacarpus, *F. Muell. Fragm.* ii. 76.—Austral,
multiflorus, *A. Cunn. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* i. 685.—Austral,
pauciflora, *A. Cunn. I. c.*—Austral.

CITRONELLA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Jonra. [xiii.] (Oct. 1832) 243'VUlanaia, Ruiz *Sc* Pav. (Oladn.).
mucronata, D. Don, 1. c - V. mucronata.

CITROSENA, Bosc, ex Steud. Nom. ed. II. i. 376 (1840) = seq.

CITROSMA, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. et Chll. Prod. 134. t. 29 (1794) = 8iparuna, Aubl. (Monimiac).
alternifolia, Spreng. Neue Entdeck. ii. 112=S. altemifolia.
amoMonum, Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1856-56) 832=S. asperula.
andina, Tul. in Ann. Sc. Nat Ser. IV. iii. (1865) 36 = S. andina.
apidfera, TuL 1. c. 88 - S . apicifera.
Apiosyce, Mart, ex Tul. 1. c. 84 = S. Apiosyce.
aspera, Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 324 = S. aspera.
asperula, Tul. in Ann. Sc Nat. Ser. IV. iii. (1855) 35—S. asperula.
bifida, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 48=S. bifida.
brasiliensis, Spreng. Neue Entdeck. ii. 113=S. brasiliensis.
buddleiaefolia, Benth. PI. Hartw. 250-S. budleiaefolia.
camporum, TuL in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. iii. (1865) 39 = S. camporum.
chiridota, Tul. 1. c. 37 = S. chiridota.
cristata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 47. t. 164=& cristate.
cujabana. Mart, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. iii. (1856)S3=S.cujabana.
cuspidata, Tul. 1. c. 40-S. cuspidata.
dedpiens, Tul. in Arch. Mas. Par viii. (1855-66) 868 - S. decipiens.
dentata, Poepp. ex A. DC. Prod. xvi. IL 653-S. mollicoma.
dentata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. i. 264=S. limoniodora.
dimidiata, Sello, ex A. DC. Prod. xvi. II. 656 = S. paniculata.
discolor. Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iL 47=S. discolor.
dubia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 174=S. mollis.
echinata, H. B. & K. 1. c. 178 = S. echinata.
eriocalyx, Tul. in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. iii. (1855) 35 - S . eriocalyx.
erythrocarpa. Mart, ex A. DC. Prod. xvi. II. 645=S. estrellensis.
erythrocarpa, Tul. in Ann. Sc. Nat *Sit.* IV. iii. (1856) 82—S. erythrocarpa.
estrellensis, Tul. 1. c. 88=S. estrellensis.
foliosa, Tul. 1. c. 38 =S. foliosa.
gesnerioides, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iL 172=S. gesnerioides.
glabra, Spreng. Syst. ii. 545=S. glabra.
glabrescens, Presl. Bot Bemerk. 110=S. glabrescens.
grandiflora, H. 1 . *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 172=S. Kunthii.
Gudotiana, Tul. in Ann. Sc Nat Se*r. IV. iii. (1855) 38=S. Goudotiana.
guianensis, Tul. in Arch. Mas. Par. viii. (1866-56) 361—S. gaianensis.
Kunthii, Tul. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. iii. (1865) 37 - S . Kunthii.
Lagopus, Tnl. 1. c—S. Lagopns.
lanceolata, Tul. L c. 33-S. lanceolata.

CITROSMA :—
laurifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 171-Siparuna laurifolia.
lepidota, H. B. *Sc* K. 1. c. 170-S. lepidota.
limoniodora, Pav. ex Tul. in Ann. Sc Nat. Sir. IV. iii. (1856) 35 =S. limoniodora.
Lindeni,Seem. Journ. Bot ii. (1864) 343-S. Iindeni.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 172-S. macrophylla.
macrophylla, Mart, ex A. DC. Prod. xvi. II. 655=S. cristata.
mollicoma. Mart, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. iii. (1855) 38=S. mollicoma.
mollis, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 178 - S. mollis.
muricata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 265=S. muricata.
Mutisii.il. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iL 170-S. Mutisii.
myristicoidea, Spruce, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 5.—Bras.
neglecta, Tul. in Ann. Sc. Nat Ser. IV. iii. (1855) 36 - S. neglecta.
oblongifolia, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. i. 266=S. laurifolia, oblongifolia.
obovata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 843-S. obovata.
oligandra, Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. iii. (1856) 82=S. obovata.
oligocarpa. Mart, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 654 =S. guianensis.
malts, Ruiz & Pav. Syst. Veg. i. 266=S. ovalis.
Paniculata, Sjreng. Syst. ii. 645 = S. paniculata.
pauciflora, Beurling, in Vet Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 144 «=S. pauciflora.
pellita, Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. iii. (1856) 34 = S. pellita.
petiolaris, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 171 =S. petiolaris.
plebeia, Tnl. in Ann. Sc Nat. Ser. IV. iii. (1855) 33 = S. cujabana.
Poeppigii,Txil. 1. c. 39-S. Poeppigii.
polyantha, Tul. 1. c. 31 = S. polyantha.
pyricarpa, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. i. 264=S. macrophylla.
pyricarpa, Willd. ex Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 368 = S. mollis.
radiata, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 48 = S. radiata.
reginae, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. iii. (1856) 39 - S. reginae.
riparia, Tul. L c. 86 «S. riparia.
ruficeps, Tul. L c. 34 - S . nificeps.
Schottiana, Spreng. Syst iv. Cur. Post 407 = Moll"-nedia brasiliensis.
Selloi, Spreng. Syst. ii. 645=Mollinedia cinerea.
sessiliflora, H. B. Ac K. Nov. Gen. et Sp. ii. 174-S. sessiliflora.
suaveolens, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. iii. (1855) 36 = S. suaveolens.
subinodora, Ruiz & Pav. Syst. Veg. i. 266=S. subinodora.
Thea, Seem. Joum. Bot ii. (1864) 343 - S . Thea.
thecaphora, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 48 ' S. thecaphora.
tomentosa, Ruiz & Pav. Syst. Veg. i. 266- S. aspera, tomentosa.
tomentosa, Willd. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. iii-(1855) 86 = S. neglecta.
triflora, Spreng. Syst. ii. 544 - Mollinedia triflora.
umbellata, Spreng. 1. c. 645 = Mollinedia umbellate.

CITKTJLLUS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 167 (1776) i Neck. Elem. i. 240 (1790). *CUCURB1TACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 826.
amarus, Schrad. in Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 279 =• vulgaris.
aquosus, Schur, Enum. PI. Transs. 221=vulgaris.
Battich, *Forst. Fl. Aegypt. Arab.* 167.—Arabia.
coffer, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1834); » Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 279=vulgaris.
caffrorum, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 41S=* vulgaris.
chodospermus, Fal. & Dun. in Bull. Soc. Agr. Hlrault (1836), 264-vulgaris.
Colocynthis, *Schrad. in Linnaea,* xii. (1838) 414." Afr. calid. *
edulis, Spach, Hist. *Vig.* Phan. vi. 214 = vulgaris.
fistulosus, Stocks, in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 74. t. 3—vulgaris.
Naudinianus, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 649—Afr. trop.

CITHUI,IiTTS:—
Pasteca, Sageret, in Ann. Sc. Nat. Se>. I. viii. (1826) 312—vulgaris.
Pseudo-Colocynthis, M. Roem. Syn. Pepon. 50=C. **Colocynthis.**
Mriegatus, Schrad. ex M. Roem. 1. c. 51-Cucurbita, Pepo.
vulgaris, *Schrad. ex Eckl. W Zeyh. Enum.* 279.—Afr. trop.

CITBUS. Linn. Syst. ed. I (1785). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 306.
CITREUM, Town, ex Rnpp. Fl. Ten. ed. Hall. 141 (1745); Mill. Gard. Diet. ed. VI (1762).
CITROPHORUM, Neck. Elem. ii. 401 (1790).
LIMON, Toum. ex Mill. Card. Diet. ed. VI (1752).
OXANTHERA, Montrous. in M&n. Acad. Lyon. x. (1860) 186.
PAPEDA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) H. Beibl. 42.
PONCIRUS, Ra6n. Sylva Tellur. 148 (1888).
PSEUDAEGLB, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. ii. 83 (1865-66).
SARCODACTILIS, Gaertn. f. Fruct. iii. 39. t. 185 (1805).
«p*j, Pers. Syn. ii. 78 = C. Medica.
albida, *Boj. Hort. Maurit.* 49.—Ins. Manrit.
*>n»ra. *Hassk. in Flora,* xxv. (1842) *Beibl.* II. 43.—Java.
amara. Link, Handb. ii. 846 = C. Aurantinm.
angulata, *Willd. Sp. PI.* iii. 1426.—Ins. Amboin.
articulata, *Willd. ex Spteng. Syst.* iii. 334.—**Afr.** trop.
Aurantium, *Linn. Sp. PI.* 783.—As. trop.
strata, Risso, Hist. Nat. Or. Europ. Mérid. i. 409=C. Aurantium.
»nstrala«ica, *F. Muell. Frag**, i. 26.—Austral,
anstralis, *Planck, in Hort. Donat.* 18.—Austral.
Bergamia, Risso, Hist. Nat. Or. Europ. Mérid. t. 53-56 = C. Aurantium.
Bergamota, Rafin. Sylva Tellur. 141=praec.
Bigaradia, Loisel. in Duham. Arb. ed. nov. vii. 99 = C. Aurantinm.
**uxifolia,* Hort. ex Ten. Atti S» Reun. Sc Ital. (1841) 503=Atalantiabuxifolia.
"uxifolia, Poir. in Lam. Encyc. iv. 680 = C. Aurantinm.
Calot, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17 = C. Aurantium.
Cr'dr$_a$, Link, Handb. ii. 346 = C. Medica.
"prata, Rafin. Sylva Tellur. 141-C. Medica.
chilensis, Molina, Sagg. Chile, 171 = Villaresia mucronata.
c»m4ara, Rafin. Sylva Tellur. 142.—Malaya.
*eo***tata,* Rafin. 1. c.=decumana!
5™sa, *Hassk. Cat. PI. Hort. Bog. Alt.* 217.—Java,
"wdai, *Bieb. ex Van Houtte, Cat.* n. 126 (1869).—
J»pon.
oecumana, *Murr. Syst.* ed. XIII. 508.—As. trop.
teliciosa, Tenore, Sull[1] Arancio Mandarino, 11 = C. Aurantium.
"lcimedulla, Pritz. Ic. Bot. Ind. 275 = C. Aurantium t
O*«M, Pers. Syn. ii. 74=C. Aurantium.
ochi, ia!f i[a>] St- ∧ l n Ann_Soc_Bot_L **yon, vii. (1880)**
emar. ed. III. 406.—
He ~C, Hystrix.
Hi nat *Dc, Cat Horim Par,*
floridn, Salisb. Prod. 878=C. Aurantium.
*fragran*s, Salisb. 1. c-C. Medica.
fusca, Lour. Fl. Cochinch. 467 = C. Aurantium.
*fusifo*li, Rafin. Sylva Tdlur. 142.—Hab. ?
Gongra, Rafin. 1. c.-C. Medica?
grandis, Hassk. in Flora, xxv. (1842) *Beibl.* II. 44.—Java.
granulata, Rafin. Syhtt Tellur. 143.-Hab. J
heterophyla, Rafin. 1. c. 141—Hab. t
H ..., *F. Muell.* '• 26.-Austral.
hamilis, *Poir. in Lam B. ncyc.* iv ,jgo^T^d. or.
Hystrix *DC, Ct H Hort, M Monip,* 97*~ ki ki <*••>
Malaya.
"rmis, R b H Hort Beng. 69; n l i iii. 89S *
japonica.
japonica, *Thunb. M- J°P-* 292.—Tapon ; China.
javanica, *Blume,* AyoV.140.-J.ya.
Karna, Rafin SylTOTell «- "2—Hab. ?
latifs, Hook> f * T00111*-« Hook £ n Brit Ind L
61? C. Hystrix.
Lima, M fad. in Bot. (1880) 800 =
C. Mec a.
Limetta, R ia8o-» **Ann. Mus. Par. xx. (1818) 195. t. 2.**
f. 1 = C — Medica.

CITRUS :—
Limonellus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6386 •= C. Medica.
Limon urn, Risso, in Ann. Mus. Par. xx. (1813) 201-= C. Medica.
lumia, Risso, Hist. Nat. Or. Europ. Me"rid. i. 414 = C. Medica.
macracantha, *Hassk. Cat. PI. Hort. Bog. Alt.* 218.— Java?-
macroptera, *Montrous. in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 187.—N. Caled.
madurensis, Lour. Fl. Cochinch. 467 -japonic*.
Margarita, Lour. 1. c. •= japonica.
marginata, Steud. Nom. ed. II. i. 876 -japonica.
Medica, *Linn. Sp. PI.* 782.—As. trop.
microcarpa, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Petersb. ii. (1835) 84— japonica.
mitis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 610 = C. Medica.
myrtifolia, Rafin. Sylva Tellur. 141.—Hab. ?
nobilis, Lour. Fl. Cochinch. 466 - C. Aurantium.
notissima, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 607=C. Medica.
obovata, Rafin. Sylva Tellur. 142.—Hab. ?
obversa, *Hassk. Cat. PL Hort. Beg. Alt.* 218.—Java.
***onto, Hassk. in Flora,* xxv. (1842) *Beibl. U.* 42.—Java,**
paniculata, *Schum. & Thonn. in Dan. Vid. Selsk. Afh.* iv. (1828) 152.—Afr. trop.
Papaya, *Hassk. in Cat. PI. Hort. Bog. Alt.* 218.
Papedia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. H. 530-C. Hystrix.
papillaris, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 610 = C. Anrantium.
Parodist, Macfad. Fl. Jamaic. i. 181 =C. Aurantium.
Planchoni, *F. Muell. Set. PI. Indust. Cult.* 84.— Austral,
pyriformis, *Hassk. in Flora,* xxv. (1842) *Beibl.* II. 44. **—Java.**
reticulata, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.610 - C. Aurantium.
rotundifolia, Rafin. Sylva Tellur. 141.—Hab.?
salicifolia, Rafin. 1. c.—Hab.?
scandens. Griff. Notul. iv. 495 »= Paramignya Griffithii.
sinensis, Pers. Syn. ii. 74=C. Aurantium.
spinosa, S. G. Gmel. Reise Russl. iii. 278. t. 22.—Persia.
spinarimma, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 247-C. Medica.
torosa, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 609.—Ins. Philipp.
trifolia, Thunb. Fl. Jap. 294-trifoliata.
trifoliata, Hort ex M. Roem. Syn. Hesper. 39 = Glycosmis pentaphylla.
trifoliata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1101.— Japon.
triptera, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 406 = trifoliata.
tuberosa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-C. Medica.
Vangasay, *Boj. Hort. Maurit.* 49.—Hab. ?
Volkameriana, *Pasq. Cat. Orto Bot. Nap.* 29.— Hab.!
vulgaris, Risso, in Ann. Mus. Par. xx. (1818) 190=C. Aurantium.

CITTA, Lour. Fl. Cochinch. 456 (1790)-Muouna, Adans. (Legumin.).
nigricans, Lour. 1. c.-M. nigricans.

CITTARONIUM, Reichb. Nom. 186 (1841)-Viola, Toum.

CITTORHINCHUS, Willd. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 14 (1828) = Gomphia, Schreb. (Ochnac.).
javitensis, Willd. 1. c.»G. aquatica.

CLADANTHU8, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 421.
arabicus, *Cass. I. c.; et in Diet. Sc. Nat.* ix. 342. t. 87.— Arab. (Quid?).
eanescens, Sweet. Hort. Brit. ed. III. 868.—Ins. Canar.
Geslini, Coss. & Dor. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 397 = Mecomischus Geslini.
halimifolius, Coss. *8c* Dor. 1. c. - Mecomischus Geslini.
peduncularis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 422, err. typ. -seq.
pedunculatus, Dnr. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 14—Anthemis peduncularis.
proliferus, *DC. Prod.* vi. 18.—Afr. bor.

CLADERIA, Rafin. Sylva Tellur. 12 (1838) -**Melia,** Linn.!
parviflora, Rafin. 1. c—Hab.!

CLADIUM, P. Br. Hist. Jamaic. 114 (1756). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1065.

CLADIUM:—
AGYLLA, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1865) I. 643.
BAUUEA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 416. t 2U (1826).
CHAPELLIERA, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 298
MACHAERINA, Vahl, Enum. ii. 228 (1806).
SCHOENOPSIS, Beanv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 341 (1819).
TEROBERA, Steud. Syn. PI. Cyp. 164 (1855).
TRASI, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 32 (1819).
TRACHVKHYNCHIUM, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Soppl. i. (1843) 118.
TRACHYRHYNGIOM, Nees, ex Kunth, Enum. PI. ii. 814 (1837).
VINCENTIA, Gaudich. in Freyc Voy. Bot. 417 (1826).
acutum, Poir. in Diet Sc. Nat. ix. 844 = schoenoides.
anceps, Hook. f. Handb. New Zeal. Fl. 305, in obs.= iridifolium.
andstrophyllum, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, **vii.** 415 - Gahnia ancistrophylla.
aristatum, F. Muell. ex Benth. 1. c. 416 = Gahnia aristata.
articulatnm, *R. Br. Prod.* 287.—Austral.
asperum, F. Muell. Fragm. ix. 12 = Gahnia aspera.
athrophyllum, *F. Muell. I. c.* 49.—Austral.
bahiense, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 801 - C. gennanicum.
chinense, Nees, 1. c.; et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 116=gennanicum.
complanatum, *Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallks. Lund,* (1877) n. 8. p. 23.—N. Zel.
decomposition, R. Br. Prod. 287 = Gahnia decomposita.
deustum, R. Br. 1. c-Gahnia deusta.
dubium, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 21 = glomeratum
effusum, Ton. in Ann. Lye N. York, iii. (1836) 374 gennanicum.
elynanthoides, F. Muell. Fragm. ix. 31.—Austral,
ensifolium, *Benth. V Haok.f. Gen.* iii. 1066.—Bras,
ensigerum, *Nance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 80.—China,
ficticum, *Hemsl. Bot. Challenger, Voy.* iii. 59, in obs. t. 60. f. 5-7.—Am. austr.
filifolium, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 1066.—Cuba.
Filum, R. Br. Prod. 237, partim-Gahnia trifida.
floribundum, Presl, in Oken, Isis, **xxi.** (1828) 270=. gennanicum.
gahnoides, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 340 = Sindairi.
germanicum, *Schrad. Fl. Germ.* i. 75. t. 5. f. 7.—Reg. temp, et subtrop.
giganteum, Willk. in Witlk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 186=germanicum.
glomeratum, *R. Br. Prod.* 237.—As. or.; Australas.
Gunnii, *Hook.f. Fl. Tasm.* ii. 95. t. 148 B.—Austral.; N. Zeland.
Huttoni, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (1877) 551. —N. Zeland.
insulare, *Benth. Fl. Austral,* vii. 403.—Austral,
iridifolium, *Baker, Fl. Maurit.* 424.—Ins. Mascar.; Bras.
jamaicense, Crantz, Inst. i. 362 = germanicum.
japonicum, Steud. Syn. PI. Cyp. 152= germanicum.
jnnceum, *R. Br. Prod.* 237.—Austral.
lanigerum, R. Br. 1. c. = Gahnia lanigera.
latissimum, *F. Muell. Fragm.* ix. 15.—Austral.
laxiflonan, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 95. t 148 A-Gunnii.
laxum, *Benth. Fl. Austral,* vii. 405.—Austral.
leptostachyum, [Nees, in] Meyen, Reise, ii. 119 ; et in Nov. Act. Nat Cur. **xix.** Suppl. i. (1843) 115 = germanicum.
mariscoides, Torr. in Ann. Lye N. York, iii. (1836) 372—triglomeratum.
mariscoides, *F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 309.—Ins. Philipp.
Mariscus,R. Br. Prod. 236 = germanicum.
medium, R. Br. 1. c 237 -Gahnia lanigera.
melanocarpum, 'F. MuelL Fragm. ix. 13 = Gahnia melanocarpa.
Melleri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 451. —Madag.
microstaehyum, F. Muell. Census, 129 - Gahnia microstachya.
nudum, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 236-Gunnii.

CLADITTM:-
ocddentale, Schrad. Fl. Germ. i. 76=germanicnin.
palustre, Poir. in Diet. Sc. Nat ix. 344 - germanicum.
pantopodum. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxL (1885) 451.—Madag.
pauriflorum, R. Br. Prod. 237 = Tricostularia panelflora.
polyphyllum, F. Mnell. Censns, 129 - Gahnia poly. phylla.
Preissii, F. Modi, ex Benth. Fl. Austral, vii. 405 = latissimum.
psittacorum, F. Modi. Fragm. ix. 13 = Gahnia psittacorum.
quadrangulare, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 301 = Lampocarya Gaudichaudii.
Radula, R. Br. Prod. 237 = Gahnia Radula.
rigidifolium, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 270 = teretifoUnm.
riparium, *Benth. Fl. Austral,* vii. 406.—Austral,
schoenoides, *R. Br. Prod.* 237.—Austral,
scirpoideum, *Benth. V Hook. /. ex Hemsl. Bot. Challenger Voy.* iii. 59. t. 60. f. 1-4.—Int. Juan Fernand.
scleroides, F. Muell. Fragm. ix. 12 = Exocarya scleroides.
Sieberi, F. Mnell. I.e. 14 = Gahnia Sieberi.
Sinclairii, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 304.—N. Zel.
teretifolinm, *R. Br. Prod.* 237—Austral.
tetragonocarpum, F. Mnell. Censns, 129 = Gahnia tetragonocarpa.
tetraquetrnm, *Hook. f. .Fl. Tasm.* ii. 95. t. 149.—Tasman a.
trifidum, F. Mnell. in Papers Roy. Soc. Tasm. (1878) 117 = Gahnia trifida.
triglomeratum, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 801.—Am. bor.
vndulatum, *Thw. Enum. PI. ZeyU* 8SS.—Malaya; Austral.
vaginale, *Benth. Fl. Austral,* vii. 408.—Austral.
xanthocarpum, F. Muell. Fragm. ix. 18 *- Gahuia xanthocarpa.
xipholepis, Baker, FL Manrit. 424 = Schoenus elongatus.

CLADOBIUM, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II 446 (1886) = Seaphyglottis,Poepp. (Orchid.).
violaceum, Lindl. 1. c - S. violacea.

CLADOCAULON, Gardn. in Hook. Ic. PI. t 528 (1843)=PaepalanthU8, Mart. (Eriocauleae).
brasiliense, Gardn. 1. c = P. Gardnerianus.

CLADOCHAETA, DC. Prod. vi. 245 (1887) - HeUohryBum, Vaill. (Compos.).
candidissima, DC. 1. c.-H. candidissimum.

CLADODA et CLADODEA, Poir. in Diet. Sc Natix. 345 (1817)-seq.

CLADODES, Lour. Fl. Cochinch. K. 674 (1790) = Alchornea, Svr. (Euphorbiac).
ilicifolia, Baill. Adansonia, ri. (18M) 1 = A. ilicifolia.
rugosa, Lour. Fl. Cochindu ii. 874=A. rugosa.
Thoietiana, BaiU. Adansonia, vi. (1866) 321 - A. Thozetiana.

CIiADOQTWOS, Zips, ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 349. *EUPHORBIACEAE, heath. &* Hook, f. iii. 328.
orientalis, *Zipp. I. c*—Malaya.

CLADOLEPIS, Moq. in DC Prod. xiv. II. 203, in syn. (1849) = Ofaiaton, Rafin. (Chenopod.).

CLADOMISCHUS, Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod. XT. i. 278 (1864)-Begonia, Linn.

CLADOPOGON,- Scb. Bip. in Ind. Sem. Hort. Hanb. (1862) 8, ex Lehm. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. (1853) 859«=Senecio, Tourn. (Compos.).
aurantiocum, Lehm. 11. cc 8; 360.—Mexic. f

CLADOSERIS, Spaeh, Hist. Vèg. Phan. x. 35 (1841) - Onoseris, DC. (Compos.).

CLADOSICYOS, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Aft. ii. J34 (1871)-Cueumaropsis, Naud. (Cucorbitac.).
edulis, Hook. f. 1. c-=Cucum. edulis.

CLADOSTACHYS, D.Don, Prod. FL Nep. 76 (1825)-Deeringia, R. Br. (Amarantac).
alterni/olia, Sweet, Hort. Brit ed. I. 8S6^Digera arvensis.
arboreseens, D. Dietr. Syn. PI. i. 861=Digera arvensis.
/rutescens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 76 - Deeringia celosioides,
murieata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 236 = ©igera arvensis.

CLADO8TEMO1T, A. Br. & Vatke, in Monatsb. Acad. Berl. (1876) 866. *CAPPARIDEAE.*
paradoxus, *A. Br.if Vatke, 1. c.*—An*, trop.

CLADO8TKJMA, Radlk. in Bremen Abh. viii. (1883) 413. *CONVOLVULACEAE.*
dioicnm, *Radlk. I. c.*—Abyssin.

CLADOSTYLES, Hnmb. 8c Bonpl. PL Aequin. i. 202. t. 57 (1808)=K»ohnilUs, Linn. (Convolvulac).
erieoides, Nees, ex Steud. Norn. ed. II. i. 877 = E. glomerate*.
paniculata, H. B. & K. PI. Aequin. i. 202 = E. paniculatns.

CLADOTHAMNTJS, Bong. Veg. Sitcha, 37.1.1, in M6n. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833). *ERICACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 698.
TOLMIEA, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 44 (1834).
pyrolifionu, *Bong. II. cc*—Am, bor. occ.

CLADOTHECA, Steud. Syn. PL Cyp. 178 (1855) = Cryptangium, Schrad. (Cyperac).
vaginans, Steud. 1. e. =Crypt. ieptocladum.

C0LA.DOTHBIX, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiiL n. 359 (1849). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 87.
lannginosa, *Nutt. ex Moq. I. c.* 860.—Calif,
oblongifolia, £. *Wats, in Proc. An. Acad.* xrii. (1881-82) 876.—Am. bor. oca

CLADOTRICHIUM, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 401 = Oaesaipinia, Linn. (Legumin.).
epunctatum, Vog. L c. 408=Caes. epunctata.
pilosum, Vog. 1. c.=Caes. pilosa.
rubicundum, Vog. 1. c. 401 = Caes. rnbiennda.
stipulate, Vog. 1. c. 403=Caes. stipuláds.

CIiADBABTIS, Rafin. Neogenyt 1 (1825). *LEGUUINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 554.
BUERGERIA, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 58 (1867).
MAACKIA, Rnpr. in Bull. Phyi.-Math. Acad. Petersb. xv. (1856) 188, 143.
albiflora, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 83.—Am. bor.
amurensis, *Benth. ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* sviii. (1873) 400.—Reg. Amur.
kentuckensis, Rafin. Neogenyt. (1826) l=-tinctorial
lutea, Rafin. 1. c-tinctoria.
secundifiora, Rafin. L c-Sophora secundiflora.
tinctoria, *Rafin. I. c; New Fl. Am.* iii. 83.—Am. bor.

CLAIRISIA, Abat, ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 78 (1878) = CLARISIA, Abat - Anredera, Juss. (Chenopodiac.).

CLAIRVILLEA, DC. Prod. v. 636 (1836) = Caooamla, H. B. & K. (Compos.).
quinquenermia, DC. 1. c.=Cacosmia rugosa.

CIiAMBtTS, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hut Ser. III. xviii. (1866) 16. *MENISPERMACEAE,* Benth. *Sc* Hook, *t* i. 962.
araneosus, *Mien, I. e.* 17.—Mexic

CLAMYDANTHUS, Four, in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 147 - CHLAMYDANTHUS, C. A. Mey.^Tbymelaea, Linn.

CLANDESTINA, Tourn. ex Adans. Fam. tt. 207 (1763) =Lathraea, Linn. (Orobanch.).
japonica, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. II. ii. (1868) 85 - L. Miqueliana.
pendulifiora, Lam. Fl. Fr. ii. 329 = L. Clandestina.
rectiflora, Lam. 1. c. 828=1. Squamaria.

CLANDESTINARIA, Spach, Hist. *Vig.* Phan. ri. 427 (1838)= Nasturtium, R. Br. (Crucif.).
indiea, Spach, 1. c 429 - N. indicum.

CLAOTRACHELUS, Zoll. in Nat en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 566-Vernonia, Schreb. (Compos.).
rupestris, Zoll. & Mor. 1. c—Java.

CIiAOZYIiOir, A. Juss. Euph. Tent. 43. t. 14 (1824). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 309.
ERYTHEOCHILUS, Reinw. ex Flora, viii. (1825) I. 103.
affine, BaiU. Adansonia, ii. (1861-62) 227=insnlanum.
afinne, *Zoll. If Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nefrl. Indie,* ii. (1845) 582.—Java.
africanum, MuelL Arg. in DC. Prod. xv. II. 777 = Barteri.
angolense, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* U. (1864) 883.—Afr. occ.
angnstifolinm, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 165.—Austral,
anstrale, *BaiU. Etud. Gin. Euph.* 493.—Austral.
Barteri, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* vi. (1882) 21.—Afr. occ.
capense, *BaiU. Etud. Gén. Euph.* 498.—Afr. anstr.
columnare, *Muell. Arg:. in Flora,* xlvii. (1861) 437.—Afr. trop.
cordifolium, Benth. in Hook. Niger Fl. 606-Mallotus oppositifolins.
coriaceum, BailL Etud. Gén. Euph. 493 = erytbrophyllum.
erassifolium, *BaiU. Adansonia.* i. (1860-61) 279.—.Aft. trop.
digynum, Wight, Ic. 1.1884 = Macaranga digyna.
eduoospermum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 787.-Ins. Pacif.
erythrophyllnm, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. IL 387.—Java,
faflai, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. n. 780.—Ins. Pacif.
glabrifolium, *Miq. Fl. Ind. Bat* i. II. 387.—Java,
glandulosum, *BaiU. Adansonia,* i. (1860-61) 281.—Ins. Mascar.
gracilifiorum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 886= affine.
grandidentatum, Boiv. ex Baill. in Adansonia, i. (1860-81) 283-racemiflorum.
grandifolium, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 168 =crassifolium.
hexandram, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1804) 438.—Afr. occ
Hillii, *Benth. Fl. Austral,* vi. 131.—Austral,
hirtellnm, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 284.—Madag.
indicum, *Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt.* 286.—As. trop.
insulanum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 164.—N.Caled.
Kirkii, *Muell. Arg. in Flora,* xlviL (1864) 486.—Afr. occ.
leucocarpum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii-(1873) II. 244.—Burma,
linostachys, *BailL Adansonia,* i. (1860-61) 281.—Ins. Manrit.
longifolium, Baill. Etud. Gén. Euph. 498, pro parte -oligandrum.
longifolium, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 781.—Malaya,
longipetiolatnm, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli>-(1878) II. 244.—Burma,
macranthum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-65) 164.—Ins. Madag.
macrophyllum, Boj. Hort. Manrit. 284=indicum.
Mannii, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 20.—Afr. trop.
marianum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 783.—Ins. Marian,
mednllosum, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 283.—Madag.
membranaceum, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 437.—Afr. trop.

CLAOXYIOIT:—
Meicurialis, *Thw. Enum. PL Zeyl.* 271.—As. trap.; Afr. trop.
Metzierii, *Bouton, ex Boj. Her*. Maurit.* 286.—Ins. Manrit.
minus, Hassk. PI. Jav. Rar. 251-indicnm.
nolle, Miq. FL Ind. Bat. i. II. 386 = indicum.
monoicum, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 283.—Madag.
muricatum, Wight, Ie. 1.1886 = Mallotus mnrieatus.
Nerandianum, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 280.—Afr. trop.
occidentale, *Muell. Arg. in Flora,* xlviL (1864) 438.—Afr. trop.
oligandram, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 164.—Afr. trop.
parviflorum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 212 = indicum.
parviflorum, *A. Juss. Tent. Euph.* 114. t. 14. f. 48.—Ins. Masear.
parmflorum, Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 258-fallax.
pauciflornm, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 333.—Afr. trop.
Pedicellare, *Muell. Arg. in Flora,* xlvil (1864) 487.—Afr. trop.
racemiflorum, *Baill. Etud. Gen. Euph.* 493.—Ins. Borbon.
Mticulatnm, *Boj. Hort. Maurit.* 285.—Ins. Maurit.
nvulare, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 618.—Afr. trop.
rubescens, *Miq. Fl. Ind. Bat.,* i. II. 887.—Ins. Pacit
Tvorinene, Baill. Etud. Gen. Euph. 493, nomen = rabescens.
*»n<lwicense, *MueU. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 165.—Ing. Sandvic.
Kairum, Boj. Hort. Maurit. 285, nomen=hnostachys.
**Piciflorum,* Baill. in Adansonia, i. (1860-61) 285 = indicum.
**picijlorum,* A. Juss. Tent Euph. 43 = Acalypha spiciflora.
Mtulosum, Reichb. [£] ex Zoll. in Verb. Naturk. Ver. Nederl. Indie, i. (1866) 20; et in Unnaea, xxvjii. .(1856) 323-Mallotus stipulosus.
""Jense, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 165.—I_M. Tahiti,
waerifolium, *F. Muell. ex Baill. Adansonia,* vi. .(M66) 828.—Austral.
"^Kyne, *MueU. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 334.
trist[illegible] VM? [illegible] t~P-
"Whchianum, *MueU. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 781.—Malaya.
»chianuin, *MueU. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) •"•—Afr. trop.

CLAPERTONIA, Meissn. Gen. PL 86 [28] (1887)-ttongkenya, Willd. (Tiliac).
«ne. in Deless. Ic Select. PL v. 1.t. 1 = H.

CLJIA, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 98. l«68). *COMPOSITAE,* Benin. & Hook. f. ii. 418.
r?»««o, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1104 (= Dysoj«esp.).-Mexic.
weajefolia, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 98.—Mexie.

CL6£A. Kunth, in Abb. Akad. Berl. (1848) 44-05?erta, Ruiz *8c* Pav. (Liliac.).
*"P**opogonoides,* Kunth, Enum. PI. v. 296.—Bras.

CLA CSJSJ A Jpnish « Am SeP'- j- 260 (1814)-wkla, Punh (Onagrar.).

CLARION A, Spreng. Syst. iii. 604 (1826) =seq.

CLARIONEA, Lag. ex DC. in Ann. Mns. Par. xix. (1812) 46. *aca^tk* -V * erez i»» Lag. (Compos.).
t, "**"**. D. Don, ex Hook. & Am. in Comp. «£?; X* !• (1835) 34-P. multiflora.
m Anal. Univ. ChiL (1878) 479.—ChUi.
carthamoides, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 328 = P. diversifolia.
ciliaris, D. Don, ex Hook. & Am. inComp. Bot. Mag. i. (1835) [illegible] i ¢ i**.
dicephala, C. Prod. **• 62-P- dicephala.
elegans, &3 [illegible] 1 in Linna e«. «»in. (1866) 717.—Chili.
Fonki • «uL 1. c. 718.—Chili.

CLARIONEA :—
glaberrima, Cass. Opusc H. 165-Perezia lactucoides.
humilis, Phil, in Linnaea, xxviii. (1866) 717.—Chili.
laeiniata, Phil, in Anal. Univ. Chil.'(1873) 479.-Chili.
lactucoides, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1833) 206 = P. lactucoides.
Leehleri, Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1865) 122.—Peruv.
macrocephala, Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr. 57.—Peruv.
mageUanica, DC. in Ann. Mns. Par. xix. (1812) 66. t. 3=P. magelknica.
multicapitata, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 410=P. mnlticapitata.
parvifolia, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 480.—Chu[illegible]
pedicuiarifolia, DC. Prod. vii. 61=P. pedicularidifolia.
pilifera, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 388=P. pillfera.
pinnata, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 718.—Chili.
pinnatifida, DC. Prod. vii. 62 = P. pinnatifida.
polycephala, Cass. Opusc. ii. 167 = K multiflora.
pungens, DC. Prod. vii. 62-P. pungens.
reeurvata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 206 = P. Doniana.
runcinata, Lag. ex D. Don, 1. c 207 = P. runcinata.
spathulata, Lag. ex D. Don, 1. c. 205=P. viscosa.
variabilis, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 125.—Chili.
virens, D Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1833) 208 = P. Poeppigii.
Volckmanni, Phil, in Anal. Univ. Cbil. (1878) 480.—Chili.

CLARIONELLA, DC. ex Steud. Norn. ed. II. i. 377 (1840) = CLARIONEA, Lag. = Feresta, Lag. (Compos.).
mageUanica, Hombr. & Jacquin. ex Decne. Bot. Voy. Astrol. & U\. 45=P. mageUanica.

CLARIONEMA, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 717 = praec.

CLARIONIA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 204-praec.

CLARISIA, Abat, in Mem. Soc. Med. Sev. x. (1792) 418.—Cf. Spreng. Gen. 202 (1830) = Anredera, Juss. (Chenopod.).
wlubilis, Abat, 1. c.j ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 280-A. spicata.

CILABISIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. Fl. Per. & Chil. 158. t 28 (1794). *URTICACEAE.* Benth. & Hook. f. iii. 877.
SOARESIA, Fr. Allem. in Palestr. Sclent. Rio Jan. (1856) 142.
biflora, *Suit V Pav. Syst. Veg.* 256.—Peruv.
racemosa, *Ruiz V Pav. I. c.* 255.—Peruv.

CIiASEKLIiA, Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 46 (1880). *RUBIACEAE.*
nana, *Hoot./. I. c*—Reg. Himal.

diABKIA. Pursh, Fl. Am. Sept. i. t. 11 (1814). *ONAGRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 789.
GUAKOPSIS, Presl, Epim. Bot. 219 (1849).
OPSIANTHES, Lilja, FL Sverig. Suppl. 25 (1840).
PHAEOSTOMA, Spach, Hist. Veg. Pnan. iv. 392 (1835).
Eiseneana, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* vii. (1877) 94.—Calif,
elegans, *Dougl. in Lindl.Bot. Reg.* t. 1675.—Am. bor. occ
elegans, Poir. in Diet. Sc Nat. ix. 265=pulchella.
gauroides, Dougl. ex Sweet, Brit. Flow. Card. Ser. II. t 379=rhomboidea.
pulchella, *Pursh, fl. Am. Sept.* i. t. 11.—Am. bor. occ
pulcherrima, Hort. ex L'Horticul. Franç. (1861) 7 - pulchella.
rhomboidea, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. I* 214.—Am. bor. occ.
unguiculata, Lindl. Bot. Reg.t. 1981-elegans.
Xantiana, *A. Gray, in Proc. Bast. Soc. Nat. Hist.* vii. (1859-61) 145.—Calif.

CLASTA, Comm. ex Vent. Choix, sub t. 47 (1808) = Casearla, Jacq. (Samydac).
fragilis, Comm. ex Vent. I. c-Cas. fragilis.

CLASTILIX, Rafin. Sylva Tellur. 99 (1838) =Mioonia, Ruiz *8c* Pav. (Melast.).
mexicana, Rafin. 1. c. = M. mexicana.
tunicata, Rafin. 1. c. = M. tunicata.

CLASTOPUS, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, i. 261 (1867) =Vesioaria, Toum. (Crucif.).
purpureus, Bunge, L c.—Persia.
vestitus, Boiss. T. c.—Persia.

diATHSOSPEIOCUM, Planch, ex Benth. *8c* Hook, f. Gen. i. 29 (1862). *ANONACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. 1. c
biovulatum, *S. Moore, in Journ. Bot.* xv. (1877) 65.—Afr. trop.
Mannii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 25.—Afr. trop.
Vogelii, *Planch, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 479.—Afr. trop.

CLAUCENA, Bunn. f. Fl. Ind. 87 (1768)=Clausena, Burm. f. (Rutac).

CLAUDIA, Opiz, ex Panz. in Denkschr. Bot Ges. (1808) II. 177-Melioa, Linn. (Gramin.).
ciliata, Opiz, 1. c.=M. ciliata.

CLATJBESA, Bunn. f. Fl. Ind. 248 (1768). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 304.
AULACIA, Lour. Fl. Cochinch. 273 (1790).
COOKIA, Sonner. Voy. ii. 130.1.131 (1782).
FAGARASTRUM, G. Don, Gen. Syst. ii. 87 (1832).
GALLESIOA, M. Roem. Syn. Hesper. 45 (1846).
GLAUCESA, Vitm. Summa, ii. 441 (1789).
MVASIS, Presl, Bot. Bemerk. 40 (1849).
QUINARIA, Lour. Fl. Cochinch. 272 (1790).
PIPTOSTYLIS, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 38. t. 2.
POLYCTEMA, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 141 (1845).
anisata, *Hook.f. in Hook. Niger Fl.* 256.—Afr. trop.
brevktyla, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 31.—Austral.
chrysogyne, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 502.—Malaya,
corymbiflora, *Linden, Cat.* n. 98 (1878), 3.—Ins. Loyalt.
crenulata, F. Muell. Phyt New Hebr. 7= Murraya crenulata.
dentata, M. Roem. Syn. Hesper. 44=Willdenowii.
excavata, *Burnt, f. Fl. Ind.* 89. t 29.—Ind. or.; Malaya.
Halmaheirae, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 211.—Malaya,
heptaphylla, *Wight (f Am. Prod.* 95, in nota.—Ind. or.; Burma.
inequalis, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 257.—Afr. trop.
indica, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl. ä.* (1861) 36.—Ind. or.
javanensis, Raensch. ex DC. Prod. i. 538-excavata.
javanica, *M. Roem. Syn. Hesper.* 45.—Java.
javensis, J. F. Gmel. Syst. 610-excavatal
macrophylla, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 604.—Burma.
nana, Wight & Am. Prod. 96 = Willdenowii.
pentaphylla, *DC. Prod.* i. 538.—Reg. Himal.
pubescens, Wight & Am. Prod. 96 = Willdenowii.
punctata, Wight *8c* Am. 1. c. 95 = excavata.
simplicifolia, Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 180-Acronychia laurifolia.
suffruticosa, *Wight V Am. Prod.* 96, in nota.—Reg. Himal.
sumatrana, Wight *8c* Am. 1. c. 96-excavata.
timorensis, *M. Roem. Syn. Hesper.* 44.—Ins. Timor.
Wallichii, *Oliver, in'Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 36.—Burma.
Wampi, *Oliver, 1. c.* 84.—China?
V/ightii, M. Roem. Syn. Hesper. 44 - Willdenowii ?
Willdenowii, *Wight tf Am. Prod.* 96.—Ind. or.: Malaya.

CLAUSIA, Trotzky, Ind. Sem. Hort. Casan. (1839) = Hesperis, Linn. (Crucif.).
aprica, Trotzky, 1. c =H. aprica.

CLAUSONIA, Pomel, Mat. Fl. Atl. 1 (1860 WAsphodelua, Toum. (Liliac.).
acaulis, Pomel, 1. &-A. acanlis.

CLAVARIA, Steud. Nom. ed. I. 204 (1821), sphalm.= Calvaria, Gaertn. (Gen. dub.).

CLAVENA, DC. Prod. vi. 63S (1887)-Cardmu, Tourn. (Compos.).
baeocephala, Sch. Bip. m Webb & Berth. Phyt. C«nar. ii. 373=Card. baeocephalus.
canariensis, DC. Prod. vi. 683-Cud. clavulatus.
squarrosa, DC. 1. c—Card, squarrosus.

CLAVENNA,Neck. Elem. it H5 (1790)- Ammannia, Houst *1* (Lythrar.).

CLAVIGERA, DC. Prod. v. 127 (18S6)-BrfokeUia, El], (Compos.).
brachyphylla, A. Gray, PI. Fendl. 68=B. brachyphylla.
corymbosa, DC. Prod. v. 128—B. oorymbosa.
dentata. DC. 1. c = B. Riddellii.
piniMia, Gardn. in Hook. Load. Town. Bot v. (1846) 461-B. plnifolia.
Riddellii, Tort. *8c* Gray, Fl. N. Am. ii. 77-B. Riddellii.
scabra, Benth. PI. Hartw. 19=B. corymbosa.
scoparia, DC. Prod. v. 128 = B. scoparia.
spinulosa, A. Gray, PL Fendl. 63 = B. spinulosa.

CLAVIJA, Ruiz *8c* Pay. Prod. 142. t. 80 (1794). *MYRSINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 649.
HORTA, Veil. Fl. Flam. 48 (1826) ; i. t. 124.
THEOPHRASTA, Linn. Gen. ed. I. 45 (1787).
ZACINTHA, Veil. Fl. Flnm. 276 (1825); viii. t. 9.
bibornna, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 117.—Costa Rica,
caloneura, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 277.—Bras,
clavata, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. iii. (1876) 144.—Hab.!
grandis, *Decne. I. c.*—Hab.!
fulgens, *Hook./. Bot. Mag.* t 6626.—Perav.
Hookeri, *DC. Prod.* viii. 148.—Peruv.
integrifolia, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 277.—Brat,
lancifolia, *Desf. in Nouv. Ann. Mia. Par.* i. (1882) 402. t 14.—Guiana,
latifolia, *C. Koch, in C. Koch V Pint. Wochensehr.* (1859) 108.—Ind. occ.
longifolia, *Rui* &• Pat. Syst. Veg.* i. 284.—Peruv.
macrocarpa, *Ruit If Pav. 1. c.*—Am. austr.
macrophylla, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 275.—Bras,
ornata, *D. Don, in Edinb. Phil. Journ.* (Jan. 1881) 236.—Am. austr.
pendola, *Rui** b* *Pav. Syst. Veg.* i. 285.—Am. austr.
Riedeliana, *Regel, Gartenfi.* (1859) 245.—Bras.
Rodekiana, *Linden (f Andri, Illustr. Hortic.* xxi. (1874) t188.—N. Granat.
sparsifolia, Miq. in Mart. FL Bras. x. 278-Leonia, glycycarpa.
spathulata, Hook. Ic. PI. 1.140-Hookeri.
spathulata, *Rui* & Pat. Syst. Veg. L* 286.—Am. austr.
speciosa, *C. Koch V Linden, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1867) *App.* i. 8.—Am. trop.
nmbrosa, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1868) 88.—Bras,
undulata, *D. Don, in Edinb. Phil. Journ.* (Jan. 1831) 234.—Am. austr.

CLAVIMYRTUS, Blame, Mus. BoL Lugd. Bat. i. 118. t 49 (1849)=Eugenia, Linn. (Myrtac).
clamflora, Blume, 1. c. 114, in obs.-E. claviflora.
cylindrica, Blume, 1. c. 116 • £. cylindrica.
firma, Blume, 1. c 116.—Java.
glabrata, Blume, 1. c. 114.—Java.
latifolia, Blume, 1. c 117.—Borneo.
Hneata, Blume, 1. c 116'E. lineata, *Duthie.*
marginata, Blume, 1. c 115.—Java.
pauciflora, Blume, 1. c. 114, in obs.-E. laeta.
ramosissima, Blume, 1. c. 116 - E. ramosissima.
symphytocarpa, Blume, I. c 117.—Sumatra.
virens, Blume, 1. c. 114.—Java.

CLAVULA, Dum. Fl. Belg. 143 (1827)=Eleooharla, R. Br. *8c* Scirpus, Linn. (Cyperac).
aeicularis, Dum. 1. c—E. acicularii.
Boeotryon, Dum. 1. c-S. pauciflorus.
caespitosa, Dum. 1. c - S. caespitosns.
comosa, Dum. 1. c—S. nanusi
fluitans, Dum. 1. c = S. fluitans.
multiculmis, Dum. 1. c. = E. multicaulis.
ovata, Dum. 1. c. = E. ovata.
palustris, Dum. 1. c - E. pahutris.
uniglumis, Dum. L c.-E. paluitris.

CLAVULIUM, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 407-Crotalaria, Dill. (Legumin.).
mucronatum, G. Don, Gen. Syst ii. 142-Crot. mucronata.
pedunculatum, Steud. Nom. ed. II. i. 378=seq.
pedunculosum, Desv. in Ann. Sc. Nat Sé>. L ix. (1826) 407-Crot. labnmifolia.

CLAVULUM, G. Don. Gen. Syst. ii. 96, 142 (1832)-praec.

CLAYTONA, Linn. Hort. Ups. 52 (1748)-seq.

CLAYTOHXA, Gronov. ex Linn. Gen. ed. I. 339 (1787). *PORTULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 168.
BELIA, Steller, ex S. G. Gmel. Fl. Sibir. iv. 88 (1769).
acutifolia, Ledeb. FL Alt. i. 263; Ic t. 272-arctica.
acutifolia, *Pall, ex Willd. in Roem. tf Schult. Syst.* v. 486.-Sibir. or.
cautiflora, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 220-virginica.
alsinoides, Sims, Bot. Mag. t. 1309 = sibirica.
ambigua, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 365.—Am. bor. occ.
aquatica, Nutt. in Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 201-Chunisson is.
arctica, *Adam, in Mem. Sec. Nat. Mosc.* v. (1817) 94.—As. et Am. arct
assarifolia, Bong. Veg. Sitcha, 186-sibirica?
anstralasica, *Hook.f. in Hoot. Ic. PI.* t. 293.—Austral.
balonnensis, F. Muell. Census, 27 = Calandrinia balonnensis.
bifida, Willd. ex Roem. & Schult Syst v. 484 = sibirica.
brevipedata, F. Muell. Census, 27-Calandrinia brevipedata.
bulbifera, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 54.—Am. bor. occ.
califomica, *Herb. Petrop. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 621.—Calif.
calyptrata, F. MuelL Fragm. iii. 89-Calandrinia calyptrata.
caroliniana, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 160.—Am. bor.
Chamissoi, Ledeb. ex Spreng. Syst i. 790—sarmentosa.
Chamissonis, *Eschscholt*, ex Cham, in Linnaea,* vi. (1831) 662.—Am. bor. occ.
composita, F. Muell. Census, 27 — Calandrinia composita.
cordifolia, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 865.—Am. bor. occ
corrigioloides, F. Muell. Census, 27-Calandrinia corrigioloides.
cubensis, Bonpl. in Ann. Mns. Par. vii. (1806) 82. t. 6—perfoliata.
dichotoma, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i.* 202.—Am. bor. occ
diffusa, JVutt. /. *c*—Calif.
Eschscholuü, *Cham, in Linnaea,* vi. (1881) 561.—Am. arct
exigua, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* L 200.—Calif.
filicaulis, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 224. t. 72 = parvifolia.
flagellaris, Bong. Veg. Sitcha, 186 = Chamissonis.
gracilis, F. Muell. Census, 27 = Calandrinia gracilis.
grandifiora, Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 216 - virginica.
granulifera, F. Muell. Census, 27 - Calandrinia granulifera.
gypsophiloides, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 83-perfoliata.
Joanneana, Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 434-arctica.
lanceolata. Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 128, 344 = sarmentosa.
lanceolata, Push, Fl. Am. Sept. i. 176. t 3=caroliniana.
Lehmanni, F. Muell. Census, 27-Calandrinia Lehmini,
linearis, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 224. t 71.—Am. bor. occ
liniflora, F. MuelL Census, 27-Calandrinia liniflora.
media, Link, Handb. ii. 44-virginica.
megarrhiza, *Parry, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i.* 118.—Am. bor. occ
nemorosa, 'Willd. ex Roem. *8c* Schult Syst v. 486 (-*Irlbachia Bonplandiana).—N.* Granat
nevadensis, *S. Wats. Bot. Calif. I* 77.—Calif.

CLATTONIA :-
parnflora, Dougl. ex Hook. FL Bor. Am. i. 226. t 73—perfoliata.
parvifolia, *Moç. ex DC. Prod. Hi.* 361.—Am. bor. occ.
perfoliata, *Donn. Ind. Hort. Cant.* 25, *ex Willd. Sp. PI.* i. 1166.—Am. bor.
Pickeringi, F. Muell. Census, 27-Calandrinia Pickeringii.
pleiopetala, F. Muell. 1. c -Calandrinia pleiopetala.
pogonophora, F. MuelL 1. c—Calandrinia pogonophora.
polyandra, F. Muell. 1. c. = Calandrinia polyandra.
polypetala, F. Muell. 1. c=Calandrinia polypetala.
Portulacaria, Linn. Mant. ii. 211 -Portulacaria afra.
ptychosperma, F. Muell. Census, 27 - Calandrinia ptychosperma.
pumila, F. Muell. 1. c -Calandrinia pumila,
quadrivalvis, F. Muell. 1. c. - Calandrinia quadrivalvis.
sarmentosa, *C. A. Mey. in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* vii. (1829) 137. t. 3.-As. ef Am. arct
sibirica. *Linn. Sp. PI.* 204.—As. bor.; Am. bor. occ
sibirica, Pall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 378-arctica.
Simsii, Sweet, Brit. Flow. Gard. sub t. 216 = virginica.
spathulaefolia, Salisb. Pared. Lond. t. 71 - caroliniana.
spathulata, Dongl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 226. t 74 -perfoliata.
spathulata, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 344 =» exigua.
spatulata, Eaton, Man. ed. IV. 268 - caroliniana.
spergularina, F. Muell. Census, 27 - Calandrinia spergularina.
stolonifera, C. A. Mey. in Nouv. Mem. Soc. Nat Mosc vii. (1829) 139 -Chamissonis.
strophiolata, F. Muell. Fragm. xi. 82 = Calandrinia strophiolata.
tenuifolia, Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 201-exigua.
triphylla, £ *Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1876) 345.—Am. bor. occ.
tuberosa, Moç & Sesie, ex DC. Prod. iii. 857=Talinum napiforme.
tuberosa, *Pall, ex Willd. in Roem.* b* *Schult. Syst.* v. 436.-Sibir. or.
umbellata, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 43. t. 6.—Am. bor. occ.
unalaschkensis, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 62; et in Roem. & Schult. Syst v. 484-sibirica.
uniflora, F. Mnell. Census, 27 - Calandrinia uniflora.
Vancouverii, *A. Murr. Or eg. Circ.* 1.—Am. bor. occ.
Vestiana, Fisch. ex G. Don, Gen. Syst. iii. *Si"* sarmentosa.
virginica, *Linn. Sp. PI.* 204.—Am. bor.
volubilis, F. Muell. Census, 27-Calandrinia volubilis-

CLEACHNE, Roland, ex Steud. Nom. ed. II. i. 878 (1840) = PaBpalum, Linn. (Gramin.).

CTaEAHTHE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 312. *IRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 701.
tricolor, *Salisb. I. c.*—Afr. austr.
melaleuca, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 1^ -bicolor.

CLEANTHES, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1880) 194 = TrixiB, P. Br. (Compos.).
brasiliensis, D. Don, 1. c. 195 = T. brasiliensis.
hieracioides, D. Don, I. c 197=T. ochrolenca.
othonnoides,Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 217[5] T. brasiliensis.

CLEGHORNIA, Wight, Ic. tt 1310, 1312 (1860) - Balssea, DC. (Apocyn.).
acuminata, Wight, L e t 1810-B. acuminata.
cymosa, Wight, 1. c. t 1812 - B. acuminata.

CliEIDION, Blume, Bijdr. 612 (1825). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 820.
LASIOSTYLES, Presl, Bot. Bemerk. 149 (1844).
PSILOSTACHYS, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. **>• (1843) 58.
RKDIA, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 61 (1842). ^
TETRAGLOSSA, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. '*• xxii. (1861) 70.
castaneaefolium, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1W[1]" 66) 184.—Peruv.
daoxyloides, *Muell. Arg. I. c*—N. Caled.

CLEIDIO1T.—
coriaceum, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 218 - Macaranga coriacea.
gabonicum, *Baill. I. c.* xi. (1874) 129.—Afr. trop.
)avanicum, *Blume, Bijdr.* 618.—Ind. or.; Malaya.
macrophyllum, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 219 = Vieillardii.
nicaraguense, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* iii. 180.—Nicaragua,
nitidum, *Thw. ex Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 245.—Ins. Andaman,
populifolinm, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 349, nomen.—Malaya,
spathnlatum, *Baill. Adansonia,* ii. (1861-62) 221.—N. Caled.
Mcoccum, *Baill. I. c.* iv. (1868-64) 870.—Bras,
nlmifoliom, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 481.—Ins. Loo-Choo.
verticillatnm, *Baill. Adansonia,* ii. (1661-62) 221.—N. Caled.
Vieillardu, *Baill. I. c.* 220.—N. Caled.

CLEIEMERA; Rafin. Fl. Tellur. iv. 77 (1836) = Ipo-n»oea, Linn. (Convolvulac).
cuspidata, Rafin. 1. c. 78 = Convolvulus Meyeri.
fuinensis, Rafin. 1. c. =1. capitata.
hederacea, Rafin. 1. c. 77 = 1. Nil.
hirsuta, Rafin. 1. c. 78 - L hederacea.
tndtca, Rafin. 1. c. *(= Pharbitis violacea).—A&.* trop.
P^uviana, Rafin. 1. c.=I. longicuspii.

C1^I8OCBATERA, Korth. Verh. Nat Geschied. 256. t. 62 (1842). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ••• 128.
el,'gans, Korth. L c. 267. t. 62.—Borneo.

Cl^8OSTOMA, Blume, Bijdr. 862 (1825). *ORCHI-°BAE,* Benth. *St.* Hook. f. iii. 580.
HiNOGLosscM, Reichb. Nom. 64 (1841).
ECHIOGLOSSUM, Blume, Bijdr. 864. t 28 (1826).
JOMATOCALPA, Breda, Orch. Kuhl & Hass. (1827).
OVNPTERA, Llanos, Fragm. PI. Filip. 98 (1851).
ocaule, Lindl. Gen. el Sp. Orch. 227 (=Saccolabii sp.).—Zeylan.
amabile, *Teijsm. V Binn. in Nat. Tjidschr. Ned. Ind.* v. (1853) 493—Malaya.
»PPendiculatum, *Benth. (f Hook. f. Gen.* Hi. 677.—id. or.
A'mti F. Muell. Fragm. ix. 49 - Sarcochilus jAnnitii.
™cklen, *p. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 296.—Austral.
bicolor *Lindl.* **Paxt. f10* Gard. "• (W51-62) 99.
™J™^7"^"*. ** BinH. Cat. Hort. Bo S. *9, nomen.
brevilabre, *F. Muell. Fragm.* xi. 87.—Austral.
ca Llos nm, Blumu)i *Bijdr!wi.-]m.*
Chi™' Hance> in *Joum. Bot.* xx. (1882) 859.—ua.
oo?i 2atnm Cunil (*/.&<>*• <* Sp. Orch.* 227. n. 8);
cra?v. Nem ** H. i; 888. 4nd or.
•»s«ol nin> Lindl • v *Paxt. Flow. Gard.* iii. (1852-53) -J" 98> 126.—Burma t
«yntochil.m, K Muell .(n m *ng, South Sc. Record,* N. S.
Cumin V(1885)—N - Guinea.
^>L?i?eichb -f- Otto &• Dietr. Allg. Garten*. Da*»»-(1856)218.-Hab.»
2»«an««, Reichb. f. in Gard. Chron. (1868) 815
deaW 1m^10"" Dawsoniana.
«eciri» •^ndl.Bet. Reg. (1843) *Misc.* 5.—Manilla.
dis^^%4'~«- «• *c* (1844) *Misc.* ll.-Zeylan.
a ^ '/•'"*• '• '• (18*6) "»«• 69.-Ind. or.
Bonatum, *Blume, ex Teijsm. V Binn. Cat. Hort.* ava.
erect 4 9 n J *PitBg Au^ki- Orch.* i. IV.—Austral.
expansum, Reic **# /- Otia Bot . Hamh% 62_~Ins_ Mindanao.
Fordii, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) *5_~Ins. Hongkong.
formosanum, Hance, I. c.* xxii. (1884) 364.—China.
fuscum Lindl. in Journ. Hort< SCn Vn (18M) 8 0= latifOlium.
galeatum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 806 = maculoium, indl.

CLEISO8TOMA:—
Guiberti, *Linden V Reichb. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 375; *in Hamb. Gartens,* xviii. (1862) 529__Hab. I
ionosmum, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) t. 41.—Manilla.
Keffordii, *F. M. Bailey, in Rep. Queensl. Acclim. Soc.* (Apr. 1684) 9.—Austral,
lanatum, *Lindl. in Joum. Hort. Soc.* iv. (1849) 164.—Burma,
latifolium, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 60.—Malaya,
longifolium, *Teijsm. VBinn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1858) 494.—Java,
loratum, *Reichb. f. in Flora,* Iv. (1872) 273.—Reg. Himal.
Macphersonl, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 297.—Austral,
macrostochyum, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 49.—Java,
maculosum, *Blume, ex Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 49, nomen.—Java.
maculosum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 227.—Zeylan.
maculosum, Thw. Enum. PI. Zeyl 804=decipiens.
Mannii, *Reichb. f. in Flora,* Iv. (1872) 274.—Reg. Himal.
roseum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 80.—Manilla.
sagittatum, *Blume, Bijdr.* 363.—Java,
spathnlatum, *Blume, I. c.* 364.—Jaya,
spicatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t. 82.—Malaya.
suaveolens, *Blume, Bijdr.* 363.—Java,
subulatum, *Blume, I. c.*—Java,
subviolaceum, *Reichb. f. in Bonplandia,* x. (1862) 335.—Ins. Philipp.
teretifolium, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 20.—Sumatra.
Thwaitesianum, Trim, in Joum. Bot. xxiii. (1885) 244 =decipiens.
tridentatom, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 33.—Austral,
undulatum, *Reichb. f. in Flora,* Iv. (1872) 274.—Reg. Himal.
virginale, *Hance, in Joum. Bot.* xv. (1877) 88.—Ins. Hongkong.
vitellinum,*ritA6./. in Linnaea,* xli. (1877) 76.—Ins. Philipp.
Wendlandorum, *Reichb. f. in Otto &" Dietr. Allg. Garten:* xxiv. (1856) 219.—Reg. Himal.; Burma.

CLEISOSTOMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 80 (1836)-ConTolTiUuB, Toum.
villosum, Rafin. 1. c=Conv. aggregatus.

CLEISSOCRATERA,Miq.Fl. Ind. Bat.-ü.. 888 (1856)-deisooratera, Korth. (Rubiac).

CLEISTACiLN Jii, Benth. in Jouro. Linn. Soc. xix. (1881) 61. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1120.
sorghoides, *Benth. in Hoot. Ic. PI.* 11879.—Afr. trop.; Ind. or.

CLEISTANTHIUM, Kunze, in Bot. Zeit ix. (1851) 850 = Oerbera, Gronov. (Compos.).
nepalense, Kunze, 1. c=G. Kunzeana.

CLEI8TANTHU8, Hook, f.ex Planch, in Hook. Ic. PI. t. 779 (1848). *EUPHORBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 268.
LEBIDIERA, Baill. Etud. Gen. Euph. Atlas, 50. t 27 (1858).
LEBIDIEROPSIS, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1868) 79.
LEIOPYXIS, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 445 (1860).
NANOPETALUM, Hassk. in Versl. Kon. Akad. Wetensch iv. (1855) 140.
acuminatus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 508.—Zeylan.
angolensis, *Welw. ex Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii (1864) 339.—Afr. occ.
apodus, *Benth. Fl. Austral,* vi. 122.—Austral.
Blancoi, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 816.—Ins. Philipp.
Boivinianus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 506.—Madag.
chartaceus, *Muell. Arg. 1. c.* 507.—Reg. Himal.; Malaya,
collinus, *Benth. tf Hook./. Gen.* iii. 268—Ind. or.

CXIEISTAHTHTJB:—
Cutiningk&mii, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 606.—Austral.
Dallachyanus, *Baill. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 122__Austral,
diversifolius, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 509.—Madag.
femigineus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 507.—Zeylan.
ferrugineus, F. Vill. in Blanco, Ft. Philipp. ed. III. Nov. App. 187. t. 858 = Blancoi.
Ianceolatus, *Muell. Arg. 1. c.*—Java,
malabaricns, *MueU. Arg. 1. c.* 508.—Ind. or.
monoicus, *Muell. Arg. 1. c.*—China,
myrianthns, *Kurt, For. Fl. Br. Burm.* ii. 370.—Burma; Malaya.
oblongifolius, MueU. Arg. in DC. Prod. xv. II. 506, pro parte—chartaceus.
pallidus, *MueU. Arg. I. c.* 508.—Zeylan.
patulus, *Muell. Arg. 1. c.* 605.—Ind. or.
polystachyus, *Hook. f. ex Planch, in Hook. Ic PI.* t. 779.—Afr. trop.
robustus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 604.—Zeylan.
semiopacus, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 123.—Austral,
stenophyllus, *Kurn, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 242.—Burma,
stipitatns, *MueU. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 506.—N. Caled.
stipularis, *Muell. Arg. I. c.* 509.—Ind. or.
subglaucus, Thw. ex Trimen, Cat. PL Ceyl. 78 = pallidus.
sumatranus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 604.—Sumatra,
tomentosus, *Hance, in Journ. Bot.* xv. (1877) 887.—China.

CLEISTES, Rich, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 81 = Fogonls, Juss. (Orchid.).
Liliastrum, Keichb. f. in linnaea, xxii. (1849) 816=P. Liliastrum.
lutea, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 409.—Guiana.
Miersii, Gardn. in Hook. Ic' PI. sub t. 478-474 = P. Miersii.
montano, Gardn. 1. c - P. montana.
paludosa, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 816=P. paludosa.
parviflora, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 410.—Guiana.
rosea, Lindl. 1. c - P. rotea.
speciosa, Gardn. in Hook. Ic. PI. t. 473-474 - P. speciosa.

CLEISTOCACTUS, Lem. Illustr. Hortic. viii. (1861) Misc. 35=Cereus, Mill. (Cact.1.
Baumannii, Lem. 1. c. = Cereus Baumannii.
colubrinus, Lem. 1. c.»Cereus colubrinus.
rhodacanthus, Lem. 1. c.=Echinopsisrhodacantha.

CLEISTOCALYX, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. i. 84. t. 66 (1849)=Eugenia, linn. (Myrtac.).
neroosus, Blume, 1. c. 85 «E. nervosa.
nitidus, Blume, 1. c. 84.—Java.

CLEISTOCALYX, Steud. Syn. PI. Cyp. 151 (1865)-Bynchospora, Vahl (Cyperac.).
junciformis, Steud. U - R. oligantha.

CIiEISTOCHIiAJCVS, Oliver, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 175. *ANONACEAE,* Benth. *Be* Hook. f. i. 956.
Kirldi, *Oliver, I. c*—Afr. trop.

CLEITHRIA, Steud. Nom. ed. It ii. 746 (1841)-seq.

CLEITRIA, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1881); ex Linnaea, viii. (1832) Litt. 23=Venidlum, Less. (Compos.).
hirta, Schrad. 11. c c - V. Schraderi.

CLELIA, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec 83 (1842)-CaXUandra, Benth. (Legumin.).
ornata, Casar. 1. c. 84-Call. Harrisii.

CLEMANTHUS, Klotzscb, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 148 (1861)-Modecca, Lam. (Passiflor.).
stntnsui Klotzseh. 1. c. - M. senensis.

CLEMATIS, Dill, ex Linn. Gen. ed. I. 163 (1737). *RANUNCULACEAB,* Benth. & Hook. f. i. 3.
ATRAGENA, Linn. Syst. ed. I (1785); et Diss. Dass. 21 (1747); in Amoen. Acad. i. 182 (1719) (Atragene).
CREIROFSIS, Spach, Hist Veg. Phan. vii. 260 (1839).
CLEMATITIS, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735).
MECLATIS, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 272 (1839).
MURALTA, Adans. Fam. ii. 460 (1768).
SIEBOLDIA, Hoffmgg. ex Heynh. Nom. ii. 666 (1846).
TRIGULA, Noronha, in Verh. Batay. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 4; ed.-II. 67 (1827).
VIORNA, Rdchb. Handb. 277 (1837).
VITICELLA, Dill, ex Moench, Meth. 296 (1794).
acapulcensis, *Hook,* b* *Am. Bot. Beech. Voy.* 410.—Mexic.
acerifolia, *Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* liv. (1879) I. 2.—China.
acuminata, *DC. Syst.* i. 148.—Reg. Himal.
acutangnla, *Hook. f. &• Thorns. Fl. Ind.* 6.—Reg. Himal.
aethusiaefolia,7 «re». *in Bull. Soc. Nat. Mosc.* v. (1882) 181.—Mongolia.
affinit, *St. Nil. Ft. Bras. Her. I* 8.—Bras,
affinis, *Wight, Illustr.* i. 5.—Ind. or.
afoliata, *7. Buck, in Trans. N. Z. Inst.iii.* (1871) 211. - N . Zel.
ajanensis, *O. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand,* xxvi. (1885) 176.—As. bor.
elbida, Klouscb, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise 131 = orientalis.
alpina, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Europ.; Am. bor.
americana. Mill. 1. c. n. 14= dioica.
amplexicaulis, Edgew. in Trani. Linn. Soc. xx. (1861) 24=connata.
anemonifiora, D. Don, Prod. Fl. Nep. 192 -montana.
anenumoides, O. Kuntze, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxvi. (1885) 149 = f)orida.
anethifolia, *Hook. Ic. PI.* t. 78.—Madag.
angustifolia, Jacq. Enum. Vindob. 810—C. Flammula.
aphylla, *O. Kuntme, in Verh. Bot. Ver. Brand,* xxvi. (1885) 146.— N. Zel.
apiculata, *Hook./. V Thorns, in Ft. Brit. Ind.* i. 4.—Reg. Himal.
apiifolia, *DC. Syst.* i. 149.—Upon,
aquifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 878, spholm.=apiifolia.
aristaU, *X. Br. in Bot. Reg.* t. 288.—Austral.
Armandi, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Sét. II. viii. (1886) 184.-As. or.
aromatica, *LennitfC. Koch, in App. Ind. Sem. Hart. Berol.* (1855) 15; *ex Walp. Ann.* iv. 4.—Hab. ?
asplenifolia, *Schrenk, Enum. PI. Nov. Alt.* 68.—Soongaria; Afghanist.
aznrea, *Hort. ex Tuns, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvu. (1854) II. 272 [bis].—Tauria (cult.).
aturea, Siebold, ex Stend. Nom. ed. IL i. 378 -florida.
toccata, Pers. Syn. ii. 99=C. Viticella.
Baldwini, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 8.—Am. bor.
balearica, Rich, in Joum. Phys. (Févr. 1779) 127 = cirrhosa.
bannatica, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 7.—Europ.
barbellata, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1861) 26.—Reg. Himal.
Bergeroni, *A. Lmall. Clemat.* 85. t. 10.—Hab. 1
bicolor, Stead. Nom. ed. II. i. 878-florida.
Bigelovi, *Torr. in Pacif. Sail. Sep.* iv. 61.—Am. bor. occ.
biloba, Stend. Nom. ed. II. i. 879, vide *triloba,* St. Hil.
biternata, *DC. Syst.* i. 149.—Japon.; China.
blanda, Hook. Joum. Bot i. (1834) 241=aristata.
Bojeri, *Hook. Ic. PI.* 1.10.—Madag.
bonariensis, *Juss. ex DC. Syst.* i. 145.—Reg. Argent.
brachiata, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 97 = Kerrii.
brachiata, *Tkunb. Prod. PI. Cap.* 94.—Aft. austr.
brachyura, *Maxim, in Bull. Acad. PHersb.* xxii. (1877) 221.—Corea.
bracteata, DC. Syst. i. 142= virginiana.
bracteata, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) H. 43.—Ind. or.
bracteosa, Banks, ex Stend. Nom. ed. I. 204, 205-recta.
brasiliana, *DC. Syst.* i. 143.—Bras,
btevicaudata, *DC. 1. c.* 188.—China.

CLEMATIS .—
Bucamara, Buch.-Ham. ex DC. Syst. i. 140 » Buchaniana.
Buchanani, D. Don, Prod. FL Nep. 191=seq.
Buchananiana, Wall. Cat. n. 4677=seq.
Buchaniana, *DC. Syst.* i. 140.—Reg. Himal.
Cadmia, *Buth.-Ham. ex Wall. Cat.* n. 4669.—Reg. Himal.; Burma.
caerulea, Lindl. Bot. Reg. 1.1955 = patens.
caesariaU, *Hance, in Joum. Bot.* viii. (1870) 71.—China.
caespitosa, Scop. FL Can. ed. II. i. 889=C. Flammula.
calycina, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 259 = cirrhosa.
campaniflora, *Brot. Fl. Lusit.* ii. 359.—Lnsitan.
campanifiora, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 879 «= parviflora.
campestris, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 4.—Bras.
cana, Wall. Cat. n. 4672=>Gouriana.
canadensis, Mill.' Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 - virginiana.
canaliculata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17 - C . Flammula,
capensis, Poir. Encyc Suppl. ii. 296 - Anemone capensis.
caracassana, H. B. & K. ex DC. Syst i. 141 = caripensis.
caripensu, *H. B. V K. Nov. Gen. etSp.y.* 86.—Mexic.
Catesbyana, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 786.—Am. bor.
caudata, Hook, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 2= Drnmmondii.
Chandleri, Hort. ex Lavall. Clemat. 40=eriostemon.
chinensis, Osb. Iter, ed. Angl. i. 893-recta,
chinensis, *Ret*. Obs.* ii. 18. t. 2.—China.
chlorantha, Lindl. Bot. Reg. t. 1284 - grandiflora.
chrysocarpa, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. A/r. i.* 5.—Afr. trop.
cirrhosa, *Linn. Sp. PL* 544.—Reg. Mediterr.
clitorioides, DC. Syst. i. 158-aristata.
cocdnea, Engelm. ex A. Gray, PI. Wright ii. 7-C. Viorna.
coccnlifolia, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* Ser. I. iv. (1840) 260.—N. Zel.
cognata, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 269=aristata.
Colensoi, *Hook.f. Fl. N. Zeland.* i. 6.—N. Zel.
coloradolnsis, Buckl. in Proc. Acad. Sc Pnilad. • 1S61' (1862) 448-Pitched.
columbiana, Torr. ft Gray, FL N. Am. i. ll=vejticillaris.
commutata, *O. Kuntte, in Verh. JBtt. Ver. Brand.* xxvi. (1885) 128.—Afr. trop.
comosa, DC. Syst 1.167=triloba 1
connate, *DC. Prod.* i. 4.—Reg. Himal.
contorta x, Carr. in Rev. Hortic. (1879) 880.
cordata, Push, Fl. Am. Sept. ii. 384 = virginiana.
cordata, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 51.—Ind. or,
cordata, Sims, Bot. Mag. 1.1816=crispa.
cordifolia, DC. Syst. i. 142 •= virginiana.
coriacea, DC. 1. c. 146 = aristata.
coriacea, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848) 208.—Java.
corymbosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 297-recta.
crassifolia, *Benth. Fl. Hongk.* 7.—China.
crenata, Jord. in Billot, Annot. Fl. Fr. AUem. 12 = C. Vitalba.
crispa. Lam. Encyc. ii. 44=cylindrical,
qrispa, *Linn. Sp. PI.* 643.—Am. bor.
crispa, Thunb. FL Jap. 289 -paniculata.
cylindrica, Sims, Bot. Mag. t 1160=crispa.
dahurica, DC. Prod. L 7=daurica.
dasyoneura, *0. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand,* xxvi. (1886) 123.—Borneo,
daurica, *Pers. Syn.* ii. 99.—As. temp.
Davidiana, Decne. ex Verlot, in Rev. Hortic. (1867) 90 = heiacleaefolia.
davurica, Ledeb. Fl. Ross. i. 4=daurica.
denticulata, Veil. Fl. Flnm. 240; v. t 184=Hilarii.
depanperata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* i. (1868) 248, nomen.—N. Zel.
dioica, *Linn. Syst.* ed. X. 1084.—Jamaica.
dioica. Lour. FL Cochinch. S44=Loureiriana,
dioica, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 278 - caripensis.
discolor, *Gardn. in Hook. Land. Joum. Bot.* ii. (1843) 330.—Bras.
discolor, Stead, in Lehm. PL Preiss. i. 262° aristata.
dissecta, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 87.—ag.

CLEMATIS :-
distorta, *Lavall. Clemat.Zl.* t. 11.—Hab. 1
divaricata, Jacq. Eclog. PI. i. 51. t. 83=crispa.
diversifolia, *DC. Syst. I* 155.—Hab. ?
diversifolia, Gilib. Exercit. i. 888=C. Flammula.
dominlca, *Lam. Encyc.* ii. 45.—Ind. occ
Douglasii, *Hook. Fl. Bor. Am.* L 1.1. 1.—Am. bor. occ.
Drnuimondii, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 9.—Am. bor.
dumosa, Salisb. Prod. 371 = C. Vitalba.
edentata, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xxi. (1884) 318.—Madag.
elliptica, tndl. in Enum. PL Hneg. 1 = aristata.
elongata, Tratt. Archiv, 1.149 = integrifolia.
erecta, Unn. Syst. ed. XII. 877; All. FL Pedem. i. 296-recta,
eriopoda, *Maxim, in Bull. Acad. PHersb.* xxii. (1877) 223.—Japon.
eriostemon, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. IV. i. (1862) 841.—Hab.}
excelsior x, Van Houtte, in Fl. des Serres, *Sir.* II. x. (1874) 24. t 2064-55.
Fawcettii, *F. Muell. Fragm. x.* 1.—Austral.
filifera, Benth. PL Hartw. 285=reticulata.
Flammula, *Linn. Sp. PI.* 544.—Reg. Mediterr.
Flammulastrum, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 158.—Cuba.
fiava, DC. Syst. i. 135 =• orientalis.
flsvescens, *Rafin. Fl. Ludov.* 81.—Am. bor.
floribunda, *Kurt, in Joum. Bot.* v. (1867) 240.—Ind. or.
floribunda, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 9.—N. Granat.
florida, *Thunb. Fl. Jap.* 240.—Japon.
fluminensis, *Veil. Fl. Flum.* 240; v. 1.133.—Bras,
foetida, *Raoul, Choix PI. Nouv. Zil.* 23.—N. Zel.
Forsteri, J. F. Gmel. Syst 873 =• hexasepala.
Fortunei, T. Moore, in Gard. Chron. (1863) 460, 676 = Williamsii.
fragrans, Salisb. Prod. 871« virginiana.
fragrans, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxii-C. Flammula.
francqfurtensis, Rinz. ex C. Koch. Dendrol. i. 481" C. Viticella.
Fremonti, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 389.—Am. bor. occ.
fruticosa, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* v. (1882) 180.—China.
fulva, *Zoll. (f Moritti, Syst. Ver*. Zoll.* 36.—Java,
tusca, *Turc: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 60.—China; Japon.
Gebleriana, Bong. ID Bull. Sc. Acad. Petersb. viii. (1841)[888=soongarica.
gentianoides, *DC. Syst.* i. 159.—Austral.
Gilbertiana, Turcz. in Ball. Soc. Nat. Mosc xxvii-(1854) II. 278 [bis]-aristata.
glabra, *DC. Syst.* i. 143.-r-Ins. S. Doming.
glandulosa, Blume, Bijdr. l=smilacifolia.
glauca, Claus, in Goebel, Reise, ii. 247 «• orientalis.
glauca, Willd. Berl. Baumz. 65-orientalis.
glaucescens, Presl, in Mus. Senckenb. ii. (1837) 268 aThunbergii.
globosa, Royle, Illustr. Bot. HimaL 61=orientalis.
glydnoides, *DC. Syst.* i. 145.—Austral
Goudotiana, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat. Sec* IV. xvii. (1862) 10.—N. Granat
Gouriana, *Roxb. Hort. Beng.* 43; *Fl. Ind.* ii. 670.--Ind. or.; Malaya.
gracilis, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1861) 24" connata.
Grahami, *Benth. PI. Hartw.* 3.—Mexic.
grandiflora, *DC. Syst.* i. 151.—Afr. trop.
grata, O. Hoffm. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. **-(1883) 88 = Wightiana.
grata. *Wall. PI. As. Rar.* L 88. t 98.—Reg. Him*1-China; Afr. trop.
graveolens, Hook. Bot Mag. t. 4495=orientalis.
graveolens, *Lindl. in Joum. Hort. Soc. I*' (1848) 307. —Reg. Himal.
grewiaeflora, *DC. Syst.* i. HO.—Reg. Himal.
grossa, *Benth. PI. Hartw.* 33.—Mexic.
grossa, *Wall. Cat.* n. 4671.—Burma.
Guadeloupe, Pers. Syn. ii. 99 -americana.
Guascoi x, *Urn.* & Versch. in Illnstr. Hortic. (1857) 117.
Haenkeana, *Presl, Rel. Haenk. a.* 69.—Peruv.
nakonensU, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii-Japon.

CLEMATIS:—

Hancockiana, *Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **liv.** (1879) 1.1.—China.

Hartmegi, Hort. ex-C. Koch, Dendrol. i. 484 « reticulata.

havanensis, *H. B.* b* *K. ex DC. Syst.* i. 162.—Cuba,

hedysarifolia, *DC. 1. c.* 148.—Ind. or.

Hendersonii, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 879- reticulata.

Henryi, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1878) II. **489.—**Hab. t

heracleaefolia, *DC. Syst.* i. 138.—China.

hexapttala, Linn. f. Suppl. 271»hexasepala.

hexapetala, Pall, Rdse, iL 786 - C . FlammuU.

bexasepala, *DC. Syst.* i. 146.—N. Zel.

Hilarii, *Spreng. Syst.* v. 177—Bras.

hirsuta, Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. i. l=Thunbetgii.

hirsutissima. Push, Fl. Am. Sept. ii. 886 = Anemone patens.

hisfanica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8=recta,

holosericea, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 3S4.-Am. bor.

Hooheri, Decne. in Fl. del Series, Sir. II. xiii. (1880) 282 = heracleaefolia.

Hothae, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* **i. 17.—Burma.**

hysudrica, Mttnro, ex Hook. f. & Thorns. £1. Ind. 9 = orientals,

ibarensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1881)** 264.—Madag.

incisodentata, A. Rich. Tent Fl. Abyss. 1. 2=grata.

inclinata, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 389=integrifolia.

indiea, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 252=Gouriana.

indivisa, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 262 =aristata.

indivisa, *Willd. Sp. PI.* iL 1291.—N. ZeL

Wsidiosa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1883)** 831.-Madag.

tnsutensis, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 438 = crispa.

Integra, *Veil. Fl. Flum. 241;* v..t. 136.—Bras.

integrifolia, Foist f. Prod. 42=indivisa.

integrifolia, *Linn. Sp. PI.* 644.—Ear. austr.; As. bor.

intermedia, *Can. in Rev. Hortic.* (1866) 889.—Hab. 1

latricata, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Acad. Petersi.* **vi.** (1886) 76.—China.

wveraa, *Griff. Notul.* iv. 700.—Ind. or.

pahaniea, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 3-orientalis.

italica, *Schnitl. Icon.* iii. *Ind.* 2.—Europ.

Jackmanni x, Van Houtte, in Fl. des Series, xvi. (1866) 89.

japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 240.—Japon.

javana, DC. Syst. i. 152-Gonriana.

javanica, Stend. Nom.ed. II. i. 379=praec

JOMta, *Bitch. Del. Sem. Hort. Heidelb.* **(1849) 4;** *ex Walp.Ann.* ii. 4.-Hab. ?

Jnaghuhniana, *De Vriese, in Miq. PI. Jungh.* **75.—** Java.

***amtschatica,** *Bong. Vert. Saisang-Nor Pfl.* **10 =** Kamtchatka.

Kirilowi, *Steud. Nom.* ed. II. i. &79.—Afr. austr.

o,n ' *«»"•• »» *Bull Acad. Pitersb.* xxii. (1877) *10.—China.

£>««», *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 6.-Afr. trop.

Kousabotan, *Decne. in Fl. des Serres,* **xxiii (1880)** -J—Japon.

laeta, Salisb. Prod. 870=drrhosa.

lanugi IOT—China. *LindL & Paxt. Flow. Gard.* ia- (1862-63)

lasiandra, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxii. (1877) 21**8.—Japon.

lasiantha, Fisch. Hort Gorenk. ed. II. (1812) 47 = y. HammuU.

lasuuuha, *Nutt. ex Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* **i. 9.—** Am. bor. occ.

" y » , Bess, ex Reiehb. FL Germ. Excurs. 784 =

^vallei, *Decne. in FL des Serres,* xxiii. (1880) 284,— japon.

laxiflora, *Miq. ex Walker, in Journ. Linn. Soc.* **xxi. (1884) 317.** —Madag.

Lechenaultiana, *DC. Syst.* **i. 151.—Java ; Ind. or.**

leptomera, *Hance, in Journ. Bot.* **xviii. (1880) 257.—** China.

ligusticifolia, *Nutt. ex Torr. tf Gray, FL N. Am.* **i. 9.** ..~~^>n. bor.

lincar. . . . Stend< m Lehm_ "• PhriM> ' 262_micro_ pius

linearilob. »i DC. Syst. i. 155=crispa.

loasaef.. »»à, DC. 1. c. 140 = grewiaeflora t

leasifo. ta, D. Don, Prod. Fl. Nep, 191 = Buchaniana >

CLEMATIS:-

longecaudata, Ledeb. Fl. Ross. i. 8=orientalis.

longicauda, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i. 2.—** Abyssin.

longiloba, *DC. Syst. L* 136.—Chili,

longipes, *Freyn, in Bremen Abh.* viii. (1880) 6.— Madag.

Loureiriana, *DC. Syst.* i. **144.—**China-.

lugubris, Salisb. Prod. 371-C. Viticell*.

Luloni, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 435=patens,

macropetala, *Ledeb. Ic. PL Fl. Ross. i.* **5. t 11.—** Sibiria.

magniflora, *Hqffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* **i. 167.—Hab. ?**

mandschurensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. L 429 = fusca,

mandschurica, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. xv. (1857) 268-recta,

marata, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* **xiii. (1881) 385.** - N . ZeL

maritima, Lam. Encyc. ii. 174 - C . Flammula.

maritima. Linn. Sp. PI. 767-recta.

Massoniana, DC. Syst. L 185=brachiata.

Massoniana, Maxim. Ind. FL Pekin. in Prim. Fl. Amur. 468-Kirilowi.

mauritiana, *Lam. Encyc.* ii. 42.—Ins. Maurit.; Madag.

Maximowicaana, *Franch. tf Sav. Enum. PI. Jap.* **ii.** 261.—Japon.

MechovriaDa, *0. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxvi. (1885) 171.—Afr. trop.

medusaea, *Planch, tf Linden, in Ann. Sc. Nat.***Sir. IV.** xvii. (1862) 11.—N. Granat.

mendodna, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 889.— Chili.

Meyeniana, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* **xix.** *Suppl.* I. (1848) 297.—China.

microcuspis. *Baker, in Journ. Linn..Soc.* **xxi. (1884)** 317.—Madag.

microphylla, *DC. Syst.* i. 147.—Austral.

millefoliaU, *Eichl. in Mart. Fl. Bras,* xiiit I. 150.— Peruv.

minor, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 346.—China.

Modniana, *G. Don, Gen. Syst.* i. 6.—Mexic.

monstrosa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 486 = patens.

montana, *Buch.-Ham. ex DC. Syst.* L164 —Reg. Himal.

montana, D. Don, Prod. Fl. Nep. 192=napaulensis.

montevidensis, *Spreng. Syst.* ii. 667.—Reg. Argent.

Munroiana, Wight. IUustr. Ind. Bot i. 6. t. l=smiladfolia.

nannophylla, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* **xxiii.** (187Z) 3O5.-China.

napaulensis, *DC. Syst. i.* 164.—Nepal,

naravelioides, *O. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxvi. (1885) 119.—Ind. or.

nepalensis, Royle, IUustr. Bot. Himal. 61 = barbellata.

nervata, Benth. PI. Hartw. 5=Drummondii.

Noronhiana, *DC. Syst.* i. 151.—Java.

nutans, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii, 110; ed. II. 127=integrifolia.

nutans, *Royle, IUustr. Bot. Himal.* **61.—Reg, Himal.**

occidentalis, A. Conn, ex Hook, in Mitch-. Joura. Trop. Austral. 368=microphylla.

occidentalis, *DC. Prod.* i. 10.—Hab.?

ochotensis, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 298.—Sibir. or.

ochroleuca, *[Soland. in] Ait. Hort. Kem..tA.* **I. ii. 260.** —Am..bor.

odora, *Wender. 'Ind. Sem. Hort. Marb. App.* **n. 4.'—** Cf. *Steud. Nom.* ed II. i. 380.—Hab. 1

odorata, *Wall, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 380.—Ind. or.

oligophylla, *Hook. Ic.Pl. t.* 80.—Madag.

Oliveri, *O. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand.* **xxvL** (1886) 165.—Abyssin.

oreophila, Hance, in Walp. Ann. ii. 3=Meyeniana.

orientalis, *Linn. Sp. PI.* 548.—Reg. Himal.; Oriens.

orientalis, Seem, ex Steud. Nom. ed. II. i. 380 = C. Flammula.

ovata, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 786.—Am. bor.

Orveniae, *Hare, in Hani, tf Sond* FL Cap.* **i. 2.—** Afr. trop.

Pallasii, J. F. Gmel. Syst. 873-C. Flammula.

pallida, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* **10.—Cuba.**

panduana, Steud. Nom. ed. II. i. 380, sphalm.= montana.

paniculata, J. F. Gmel. Syst 873=indivisa.

paniculata, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794)837. **—Japon.**

Parkinsoniana, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* **xii. (1880)** 869.—N. ZeL

CLEMATIS:—

parviflora, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* **Ser. I. iv.** (1840) 259.—N. Zel.

parviflora, *DC. in Mhn. Soc. Phys. Gentv.* **i. (1823) 433.—**Hab. f

parviflora, *Nutt. ex Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* **i. 9.—** Am. bor.

panifolia, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 25 = orientalis.

parvifolia, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. 9=graveolens.

parviloba, *Gardn.* **b*** *Champ, in Hook. Kern Journ.* i. (1849) 241.—China,

patens, *Morr. tf Decne^in Bull. Aead. Brux.* **iii.** (1886) 173.—Japon.

pauciflora, *Mutt, ex Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* **i. 9.—** Calif.

pedicellata, Sweet, Hort Brit. ed. 1. 2; Loud. Hort. Brit. l=cirrhosa.

pensylvanica, *Donn, Hort. Cantab.* ed.IV. 129 ; *Hort. ex Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii. (1854) II.** 273 [bis].—Am. bor.

perulata, *0. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand,* **xxvi.** (1885) 168.—Bras,

peruviana, *DC. Syst.* i. 141.—Peruv.

Petersiana, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. i. 170 - grata.

Pickeringii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* **L 1.—** Ins. Fiji.

Pierotii, *Miq.. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iii. 1.—** Japon..

pilosa, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 211=C. Vitalba.

pimpineUifolia, *Hook. Ic. PI.* t 77.—Madag.

pinnate, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxii. (1877)** 216.—China.

Pitcheri, Sarg. ex Lavall. Clemat. 60=Sargenti.

Pitcheri, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 10.—Am. bor. occ.

Plukenetii, DC. Syst. i. 153=Catesbyana.

Poimtti, Hort ex Lavall. Clemat. 40=eriostemon.

polycephala, *Bertol. Fl. Guat.* 28.—Guatemala,

polygama, *jacq. Enum. PI. Carib.* 24.—Ind. occ.

polymorpha, Viv. Fl. Cors.Sp. Nov. 9-cirrhosa.

polypetala, DC. Syst. i. 167-= Anemone japonica.

polypetala, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 296.—Japon.

popnlifolia, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii.** (1854) ii. 272.—Venezuela,

pseudoatragene, *0. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxvi. (1886) 160.—Am. bor.

pseudograndiflota, 0. *Kuntte, 1. c.* 128.—Afr. trop.

pseudo-orientalis, *0. Kuntit, I. c.* 171.—Persia,

puberula, *Hook. f. tf Thorns, in FL Brit. Ind.* **i. 4.—** Reg. Himal.

pubescens, *Benth. PL Hartw.* 5.—Mexic.

pubescens, Hueg. Enum. PL Hueg. I =aristata.

pulchella, Pers. Syn. ii. 99=C. Viticella.

punduana, Wall. Cat. n. 4682=montana.

Purshii, D. Dietr. Syn. PL iii. 346=virginiana.

quadribracteolata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* **xiv.** (1882) 829.—N. Zel.

recta, *Linn. Sp. PI.* 644.—Europ. austr.

reticulata, *Walt. Fl. Carol.* 156.—Am. bor.

revoluta, *Hort. Par. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 386 = parviflora.

Robertsiana, *Aitch. V Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 29.—Afghan.

rosea, Hort. ex Lavall. Clemat. 36=Bergeroni.

rosea, Sm. in Abbot, Nat. Hist Lepidopt. 201. t. 101 -reticulata,

rubella, Pers. Syn. ii. 100-C. Flammula.

rubr<Mnolaceax, Van Houtte, in Fl. des Serres, xvi. (1866>)37=lanuginosa.

Sargenti, *Lavall. Clemat.* 60.1.18.—Am. bor.

Savatieri, *Decne. in Fl. des Serres,* xxiii. (1880) 286.— **Japon.**

saxicola, *Hils. &• Boj. ex Bam. Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 331, nomen.—Madag.

scabiosaefolia, *DC. Syst.* i. 164.—Ind. or.

scandens, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1199 =C. Vitalba.

Schillingii, C. Koch, in App. Ind. Sem. Hort. Berol. (1856) 16-cylindrica.

Scottiu, *Porter, Syn. Fl. Colorado,* **1.—Am. bor.** occ.

Seemanni, *O. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand,* **xxvi.** (1885) 146.—Peruv.

semitriltba, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17 =cirrhosa.

sepium, Lam. Fl. Fr. iii. 306=C. Vitalba.

sericea, *H. B. tf K. ex DC. Syst. I* 144.—Am. austr.

sericea, Michx. Fl. Bor. Am. i. 319=ochroleuca.

CLEMATIS:—
sibirica, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 12 = angustifolia.
Sieboldii, D. Don, ex Stead. Norn. ed. II. i. 880 = florida.
simensis, *Fresen. in Afus. Senckenb.* ii. (1837) 267.—Abyssin.
sinensis, Lour. Fl. Cochinch. 844.—chinensis.
Simsii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 1=crispa.
smilacifolia, *Wall, in As. Res.* xiii. (1820) 402.—Ind. or.; Malaya.
smilacina, Blume, Bijdr. ls-smiladfoli*.
songariea, Siev. ex Steud. Nom. ed. II. i. 880 = glauca. *
songorica, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp.* (1889) 8.—*Cf. Linnaea,* xiv. (1840) *Litt.* 119.—Sibiria.
Sonnerati, Pen. Syn. ii. 99=mauritiana.
Standiski, Van Houtte, in Fl. des Series, xvi. (1865) 89=patens.
Stanley!, *Hook. Ic. PI.* t. 889.—Afr. austr.
stans, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. (1846) n. 177.—Japon.
stenopetala, R. Br. ex DC. Syst. i. 147=glycinoides.
stenophylla, Fraaer, ex Hook, in Mitch. Trop. Austr. 368 » microphylla.
stenosepala, DC. Syst i. 147 -glydnoides.
itipnlata, *O.Kuntte, in Verk. Bot. Ver. Brand,* xxvi. (1885) 154.—Mexic.
striata, *Safin. Fl. Ludov.* 82.—Am. bor.
stricta, *Wender. in Ind. Sem. Marb.* (1886).—*Cf. Linnaea,* xii. (1888) *Litt.* 85.—Hab.1
strigillosa. *Baker, in Journ. Linn. Sot.* zviii. (1881) 265.—Madag.
Strobeliana, *Ces. in Atti Soc. Ace. Sc. Nap.* v. (1873) 8. n. 7.—Europ.
Stronachii, *Hance, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 103.—China.
sumeolens, Salisb. Prod. 871 - C . Flammula.
subpeltata, Wall. PI. As. Rar. i. 19. t. 20-.smilacifolia.
substipulata, *0. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxvi. (1885) 147.—Ind. or.
subtriflora, Walp. Rep. i. 8, sphalm.=seq.
subtriloba, *Nees, ex G. Don, Gen. Syst.* i. 7.—Mexic.
snbumbellata, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* i. 16.—Burma*
sulcata, Wall. Cat. n. 4667=C. Cadmia.
Tatarinowii, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxii. (1877) 214.—China.
tauriea, Bess, ex Nym. Consp. 1 =C. Vitalba.
tenuiflora, DC. Prod. i. 8= recta.
tenuifolia, Poir. Encyc. Suppl. ii. 298-Anemone tenuifolia.
tenuifolia, Royle, Illastr. Bot. Himal. 61-orientalis.
ternxflora, DC. Syst. i. 188 = recta.
lessen, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 179-Noronhiana.
texensis, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. • 1861' (1862) 448-C. Vlorna.
thalictroides, *Steud. in Flora, mix.* (1856) 407.—Pernv.
Thnnbergii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 380.—Afr. anstr.
tibetana, *O. Kuntte, in Verh. Bot. Ver Brand,* xxvi. (1886) 172.—Tibet.
tortuosa, Wall. Cat. n. 4675 = Buchaniana.
Tournefortii, *DC. Syst.* i. 167__Oriens.
trifida, *Hook. Ic. PI.* t. 79.—Madag.
trifiora, Vahl, Symb. Bot. iii. 74 = mauritUna.
trifoliata, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1791) 337.—Japon.
triloba, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 251.—Ind. or.
triloba, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i 8 = montevidensis.
triloba, Thnnb. Prod. PI. Cap. 94=Thunbergii.
trinervis, Buch.-Ham. ex DC. Syst. i. 148-acuminate,
triternata, *DC. I. c.* 150.—Hab. »
tubulosa, Hook. Bot. Mag. t. 6801-heracleaefolia.
tubulosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1887) n. VII. 148=heracleaefolia.
tunbridgensis x, Hort. ex Lavall. Clemat 13.
umbraticola, Schur, in Verb. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 8=nets,
nncinata, *Champ, ex Benth. in Hook. Kern Journ.* iii. (1851) 255.—Hongkong.
uniflora, Balb. Cat Hort. Taur. (1810) 21-ochroleuca.
nrophylla, *Franch. in Bull. Soc. Linn. ParX* (1884) 438.—China.
telutina, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1859) 24=connate.

CLEMATIS:—
venosa. Royle, Illustr. Bot. Himal. SI-connata.
verticillaris, *DC. Syst.* i. 166.—Am. bor.
villosa, *DC. 1. c.* 164.—Ind. or.
violacea, *A. DC. in Mem. Soc.Phys. Genev.* xi. (1845) 67.—Hab. t
Viorna, Andr. Bot. Rep. i. t 71 = crispa.
Vioma, *Linn. Sp. PI.* 543.—Am. bor.
viornoides, *Schrad. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 880.—Am. bor.
virginiana, *Linn. Cent.* i. 18; *Amoen. Acad.* iv. 275.—Am. bor.
virginiana, Lour. Fl. Cochinch. 345-apiifolia.
virginica, Thunb. Fl. Jap. 240 = biternata.
•*viridiflora,* Bert. Misc. Bot xix. 7. t. 3=grata,
virosa, *Start. Hort. Nymph, ex Steud. Noto.* ed. II. i. 880.—Hab. I
Vitalba, Buch.-Ham. ex Steud. I.e. 879,380-grewiaefolia.
Viulba, £i»n. S^. «. 544.—Europ.; Afr. bor.; Reg. Caucas.
Viticella, *Linn. I. c.* 643.—Edrop. or.; As. Min.; Persia.
vitifolia, Wall. Cat. n. 4876 - Buehaniana.
Walteri, Pnrsh, Fl. Am. Sept. ii. 384 = crispa.
Welwitschii, *Hiem, ex 0. Kuntte, in Verh. Bot. Ver. Brand,* xxvi. (1885) 171.—Afr. trop.
Wenderothii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 880.—Europ.
Wightiana, *Wall. Cat.* n. 4674.—Ind. or.
Williamsil, *A. Gray, ex Perry, Jap. Exp.* ii. 806.—Japon.
Wyethii, Nutt ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 8 = • Douglasii.
taneebarica, Sweet, Hort. Brit. cd. II. l=seq.
zanzibarensis, *Boj. ex Loud. Hort. Brit.* 228.—Ins. Zanzibar.
teylanica, Poir. Encyc. Suppl. ii. 296 = Naravelia zeylanica.
Zollingeri, *Turci. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1864) II. 274 [bis].—Java.

CLEMATITARIA, Bur. Monog. Bign. 44 (1864) = Bignonia, T.inn,

CLEMATITIS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735) = Clematis, Dill. (Ranunculac.).
bracteata, Moench, Meth. Suppl. 103 = Clematis virginiana.
cordifolia, Moench, 1. c. 104-Clematis virginiana.
crispa, Moench, Meth. 296=Clematis crispa.
erecta, Steud. Nom. ed. I. 206 -Clematis erecta.
flava, Moench, Meth. 296=Clematis orientalis.
integrifolia, Moench, 1. c.=Clematis integrifolia.
Vitalba, Moench, 1. c-Clematis Vitelba.

CLEMATOPSIS, Boj. ex Hook. Ic. PI. i. t. 10 (1837) =Clematis, Dill. (Ranunculac.).
suaveolens, Boj. 1. c-Clematis Bojeri.

CLEMENTEA, Cav. in Anal. Ciena Nat vU. (1804) 68 ^Canavalia, Adans. (Legumin.).
nitida, Cav. Let. 47 = Can. ensifonnis.

CLEOBtTLA, VelL Fl. Flam. 187 (1825). *INC. SED.*
CHEOBULA, Veil. Fl. Flum. iv. t. 146 (1827).
pinnata, *Veil. I.* c—Bras.

CIiEOBTILIA, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mas. ii. (1888) 131. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 687.
diocleoides, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 168.—Am. trop.
leiantha, *Benth. I.* r.—Bras.
multiflora, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 131.—Bras.

CLEOCHROMA, Mien, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 849 = lQphroma, Benth. (Solanac).
calycina, Mien, 1. c. 850-I. calycina.
grandifiora, Mien, 1. c. 351-1. grandiflora.
macrocalyx, Mien, 1. c. 350 = 1. macrocalyx.

CLEODORA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 196 = Croton, Linn. (Euphorbiac).
Sellowiana, Klotzsch, 1. c 197 = Croton sphaerogynus.

CLEOME, Linn. Syst ed. I (1735). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 105.
ALEOME, Neck. Elem. iii. 68 (1790).
ANOMALOSTEMON, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 162 (1861).
ARIVELA, Rafin. Sylva Tellur. 110 (1888).
ATALANTA, JJutt. Gen. Am. ii. 78 (1818).
AUBION, Kafin. Sylva Tellur. 110 (1888).
BUHSIA, Bunge, Del. Sem. Hort Dorpat. (1859) 4.
CHILOCALYX, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 154 (1861).
COAMSIA, Kafin. Sylva Tellur. Ill (1838).
CORYNANDRA, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1846).
DECASTEMON, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 167 (1861).
DIANTHERA, Klotzsch, 1. c. 160. t. 27 (1861).
DIORIMASPERMA, Rafin. Sylva Tellur. Ill (1888).
HEMISCOLA, Rafin. 1. c. (1«38).
ISEXINA, Rafin. 1. c. 112 (1838).
LAGANSA, Rutnpf, ex Rafin. 1. c. 110 (1838).
MELIDISCUS, Rafin. 1. c. (1838).
MICAMBE, Adans. Fam. ii. 407 (1763).
MITOSTYLIS, Rafin. Sylva Tellur. 114 (1888).
MOZAMBE, Rafin. 1. c. 112 (1838).
ONCUFIS, Rafin. 1. c. 114 (1838).
PERICLA, Rafin. 1. c. 112 (1838).
PERITOMA, DC. Prod. i. 237 (1824).
PIIYSOSTEMON, Mart. Nov. Gen. et Sp. 1. 73. t 45 (1824).
PODOGYNE, Hoffmgg. *Ven.* Pfl. 186 (1840).
POLANISIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 ; Joum. Phys. (Aoflt 1819) 98.
RORIDA, J. F. Gmel. Syst. 260 (1791).
RORIDULA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 35 (1775).
SCOLOSPERMA, Rafin. Sylva Tellur. Ill (1838).
SIERUELA, Rafin. 1. c. 112 (1838).
SILIQL'ARIA, Fonk. Fl. Aegypt Arab. 78 (1776).
SINAFISTRUM, Toum. ex Hall, in Rupp. Fl. Jen. 269 (1745).
STYLISTA, Rafin. Sylva Tellur. 112 (1838).
SYMPHYOSTEMON, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 169 (4861).
TARENAYA, Rafin. Sylva Tellur. Ill (1838).
TETRATELEIA, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i-58 (1859).
aculeate, *Linn. Syst.* ed. XII. iii. 282.—Am. trop.
acuta, Schum. & Thonn. in Dansk. Vidensk. Selsk. Afh. iv. (1828) 67 = Gynandropsis pentaphylla.
affinis, *DC. Prod.* i. 241.—Bras.
affinis, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 138 •= Blumeana.
albescens, *Franch. in Revoil, Comali,* 11.—Afr. trop.
alliacea, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 622=Gynandropsis pentaphylla.
alliodora, Blanco, 1. c. ed. II. 863—Gynandropsis pentaphylla.
angulata, *Schult.f. Syst.* vii. 45.—Java.
angustifolia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 120 = tenella.
anomala, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 85.—N. Granat.
aphylla, Thunb. Prod. PI. Cap. 109 = Schepperia juncea.
arabica, *Linn. Cent. PI.* i. 20.—Afr. bor. j Arab,
arborea, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 86.—Venezuela
arborea, Schrad. in Goett Gel. Anz. i. (1821) 707" Crataeva Tapia.
arborea, Weinm. in Syll. Ratisb. i. (1824) 2'27=dendroides.
armata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 109.—Afr. austr.
Aschersoniana, Pfund, in Flora, lvii. (1874) 413" trinervia.
aspera, *Koen. in DC. Prod.* i. 241.—Ind. or.
atropurpurea, Schott, in Schreib. Nachr. Oestr. Naturf. i. 129 = dendroides.
aurea, *Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiv. (1884) 113—Graecia.
aurea, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 122[0] lutea.
bicolor, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 330.—Bras.
Blumeana, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1065.—Java,
bororensis, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 81.—Afr. trop.
brachycarpa, *Vahl, ex DC. Prod.* i. 240.—Afr. bor.; Arab.; Ind. bor. occ.
brasiliensis, *Weinm. in Syll. Ratisb.* i. (1824) 122—Bras,
brevisiliqua, *Schult.f. Syst.* vii. 40.—Arab.

CLEOME:—
Bongei, *Steud. Npm.* ed. II. i. 881.—China.
Bumanni, *Wight* to* *Am. Prod.* 22.—Ind. or.
canadensis, Hort. ex Schult. f. Syst vii. 88 - cardaminoides.
Candelabrum, *Sims, Bot. Mag.* t. 2656.—Hab. I
canescens, Stev. in DC. Prod. i. 241 - ornithopodioides.
capensis, Linn. Sp. PI. ed. II. 940 - Heliophila callosa.
capparoides, Willd. ex Eicbl. in Mart. FL Brat. xiii. I. 247 = anomala.
cardaminoides, *Hoffmgg. Vert. Pfi.* 93.—Afr. anstr.
cardinal, *DC. Prod.x.* 288.—Mexic.
Chelidonii, Boj. in Ann. Sc. Nat. Sèr. II. xx. (1848) 56 =-strigosa.
Chelidonii, *Linn./. Suppl.* 800.—Ind. or.; Java,
chilensis, *DC. Prod.* i. 238.—Chili,
chilocalyx, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* 1. 81.—Afr. trop.
chrysantha, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. iii. (1886)274.—Arab.; Nubia,
ciliata, *Schum. V Thonn. in Dan. Vid. Selsk. Afh.* iv. (1828) 67.—Afr. trop.
coluteoides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 8.—Persia.
cordata, Bnrch. ex DC. Prod. i. 289=monophylla.
cordata, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 68 - Ehrenbergiana.
cordobensis, *Eichl. ex Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 73.—Am. anstr.
cremoloba, *Turcm. in Bull. Soe. Nat. Mosc.* xxrii. (1864) n. 818.—Mexic.
erenopetala, *DC. in Mim. Soe. Phys. Geniv.* vi. (1886) 220. t. 2.—Am. anstr.
cubensis, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 74-Howloni.
cuneifolia. *Muhl. exNutt. Gen. Am.* ii. 78.—Georgia,
cypria, *Celak. in Oestr. Bot. Zeitsehr.* xxxiv. (1884) 114.—Ins. Cyprus,
decipiens, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.Sii.* IV. xvii. (1862) 74.—N. Granat.
deflexa, *RuiB V Pan. ex DC. Prod. i.* 240.—Peruv.
dendroidea, *Schult./. Syst.* vii. 28.—Bras,
"jenticulata, *Schult./. I. e.* 26.—Afr. trop.
oiandra, *Burch. Trav.* i. 548.—Afr. austr.
Mchotoma, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 818.—Bras,
wdynama, *Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 79.—Abyssin.
mffusa, *Banks, ex DC. Prod.* i. 241.—Bras.
<*>*ffusa,* Roxb. Hort. Beng. [96]; FL Ind. iii. 129 = "Pera.
QigiUta, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 120. -Arabia.
vitleniana, DC. Prod. i. 240=ornithopodioides.
<**versi/olia,* Hochst. *Sc* Steud. ex T. Anders, in Jonra. Linn. Soc. v. Suppl. i. (1860) 5 = brachycarpa.
*°*decandra.* Banks, ex Wight & Arn. Prod. 22, partim " BunnannL
dodecandra, Linn. Sp. PI. ed. II. 989=graveolens.
qodecaphylla, *Veil. Fl. Flum.* 271; vi. 1.110.—Bras,
"oserifolia, *Delile, Fl. Egypt.* 250.—Aegypt.; Arab.
"•*ckloniana,* Schrad. in Linnaea, x. (1886) Litt. 109 = Gynandropsis pentaphylla.
Wulis, *Rafin. Fl. Ludov.* 86.—Am. bor.
*Jtfenbergiana. *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. i.* 68.—"obia.
"*Pilobioides,* Jan, Elench. fide Schult. f. Syst. vii. 47 - graveolens.
£r «*Wo,Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6-heptaphylla, spinosa.
*."">a, *Linn./. Suppl.* 800.-Ind. or.
Wolia, Vahl, Symb. Bot. i. 48=tenella
•unbriata, *Vicary, in Ann. Nat. Hist.* Ser. II. i. (184B) 425.—Scinde.
fiava, Banks, ex DC Prod. i. 241=graveolens.
*S^MO>F_G_D^n1._Vollst._'Lc^nk_ Gaertn. Nachtr. ii. *»; ex Schult. f. Syst. vii. 27 = Gynandropsis pentaPnylla
n«uosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 73.—Am. anstr.
Joliolosa, *DC. Prod.* i. 240.—Persia.
£j!°sa, *Hook./, in Hook. Niger Fl.* 219.—Afr. trop.
*"wscens, *Aubl. PI. Gui.* ii. 677.—Guiana.
Mticosa, Linn. Sp. PI. 671 -Cadaba indica.
™gax, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1880).—*Cf. Ltnnaea,* vi. (1881) *Lift.* 72—Hab.»
fgaptea, Blanco, FL Filip. ed. II. 364 - Gynandropsis Pectosa.
R|eantea, *Linn. Mant.* 480.—Am. anstr.
giandulosa, *RuiM V Pen. ex DC. Prod.* i. 288.—Perav.

CLEOME:—
glauca, *DC. Prod.* i. 289.—Mesopotam.
glaucescens, *DC. I. c.*—Mesopotam.; Persia.
gracilis, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) II. 1212«papillosa.
gradUs, *Planch, (f Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 74.—N. Granat.
Grandidieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 462.—Madag.
grandiflora, *Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 71.—Afr. trop.
graveolens, *Rafin. in Journ. Phys. (Août* 1819) 98.—Am. boi.
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 675.—Guiana.
guineensis, Hook, £ in Hook. Niger Fl. 218 = ciliata.
gynandra, Linn. Sp. PI. 671 = pentaphylla.
heptaphylla, *Linn. 1. c.* ed. II. 987.—Am. trop.
heptaphylla, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 222 = Houstoni.
heptaphylla, Sw. Obs. 262 = pungens.
heratensis, *Bunge If Bien. ex Boiss. Fl. Orient.i.* 412. -Afghanis!.
heterotricha, Burch. Trav. i. 587=Gynandropsis heterotricha.
hexandra, Poir. ex Steud. Nom. ed. I. 206 = arabica.
hirsutn, *Ruit* 6* *Pan. ex DC. Prod.* i. 288.—Peruv.
hirta, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 81.—Afr. trop.
horrida, Mart, in Schult. f. Syst. vii. 32 = spinosa.
Hostnumni, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 470=latifolia.
Houstoni, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* iv. 131.—Jamaica.
Houstoni, Miq. 1. c. xix. (1847) 488=diffusa.
Houtteana, *Schlecht. in Linnaea,* ixiv. (1851) 669.—Am. austr.
Humboldtii, *DC. Prod. i.* 241.—Am. trop.
iberica, DC. 1. c. 240=ornithopodioides.
iberidella, *Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 79.—Afr. trop.
icosandra, Linn. Sp. PI. 672=graveolens.
indecora, *Hornem. Ind. Sem. Hort. Hafrt.* (1846); *ex Walp. Ann.* i. 60.—Mexic.
integrifolia, *Ton. V Gray, Fl. N. Am.* i. 122.—Am. bor.
jtuncea, Berg. Desc. PI. Cap. 164=Heliophila callosa.
juncea, Sparm. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. iii. (1780) 192 = Schepperia juncea.
khorassanica, *Bunge If Bien. ex Boiss. Fl. Orient, i.* 412.—Persia.
Kotschyana, *Boiss. I. c.* 413.—Assyria.
laevigata, Soland. ex DC. Prod. i. 200»Stanleya gracilis.
lateralis, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 73.—N. Granat.
latifolia, *Vahl, ex DC. Prod.* i. 239.—Guiana,
laxa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 109.—Afr. austr.
Lechleri, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 250.—Peruv.
Leschenaultii, Schult. f. Syst. vii. 49-Chelidonii.
linearis, Stocks, ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. i. (1860) 3=papillosa.
Iongifolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 84.—Peruv.
loHgi/olia, Vahl, ex DC. Prod. i. 240 - Wormskioldia heterophylla.
Iongifolia, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 1617 ~speciosa.
longipes, *DC. Prod.* i. 239.—Ecuador.
lusitanica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = graveolens.
lutea, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 70. t. 25.—Am. bor. occ.
lutea, *E. Mey. Zvei Pfi. Docum.* 173.—Afr. austr.
maenntha, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1864) II. 819.—Mexic.
macrophylla, Roxb. Hort. Beng. [96], nomen (quid?). —Ind. or.
macrorhiza, *Sauv. Fl. Cub.* 4.—Cuba,
macrothyrsus, *Planch, (f Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 72.—N. Granat.
malhadensis, Mart, ex Schult. f. Syst vii. 48= acnleata.
melilotoides, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 320.—Persia,
mexicana, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1068.—Mexic.
mexicana, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 20.—Mexic.
micrantha, *Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ.* 48.—Guiana.
micrantha, Schrad. ex Schult. f. Syst vii. 80 = Dactylaena micrantha.

CLEOME:—
monandra, DC. PI. Rar. Hort. Geniv. 54. t 15 = Dactylaena micrantha.
monophylla, Law, in J. Grah. Cat. Bomb. PI. 7- simplicifolia.
monophylla, *Linn. Sp. PI.* 672.—Ind. or.; Afr. trop.
Moritziana, *Klotzsch, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 250.—Venezuela.
moschata, Stocks, ex T. Anders, in Jonm. linn. Soc. v. Suppl. i. (1860) 4 = brachycarpa.
multicaulis, *Mof.* b* *Sesse, ex DC. Prod.* i. 240.—Mexic.
murlcata, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1847)11. 1212 -paradoxa.
muricata, *Schult./. Syst.* vii. 25.—Ind. or.
nivalis, Vahl, ex DC. Syst. ii. 245 = Macropodium nivale.
Nolana, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 48=quinqnenervia.
nummularia, DC. Prod. i. 239—rosea.
ofidocarpa, Balb. Hort. Lugd. Alob. (1826); ex Schult. f. Syst. vii. 51=Gynandropsis muricata.
oleracea, Welw. Apont. 686=pentaphylla.
ornithopodioides, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. n. 402 = brevisiliqua.
ornithopodioides, *Linn. Sp. PL* 672.—As. Min.; Persia.
oxalidea, *F. Muell. Fragm.* i. 69.—Austral,
oxypetala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 20.—Persia; Arab,
oxyphylla, *Burch. Trav.* ii. 226.—Afr. anstr.
pallida, *Kotschy, in Sittb. Acad. Wien. Math. Nat.* Hi. *Abth.* I. (1866) 262.—Arabia,
palmipes, *Spreng. Syst.* ii. 122.—Guiana,
paludosa, *Willd. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1. 255.—Bras,
palustris, *Saltm. ex Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1864) u. 817.—Bras,
papillosa, *Steud. Nom.* ed. II. i. 362.—Aegypt.; Arab.; Ind. bor. occ.
paradoxa, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 65.—Abyssin.
parvifiora, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65 = brachycarpa.
parviflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 88 = psoraleaefolia.
pedunculata, Veil. Fl. Flnm. 272; vi t 112 = gigantea.
pentaphylla, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 523=Gynandropsis spedosa.
pentaphylla, Hort. Van Houtte, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 261 = Houtteana.
pentaphylla, Linn. Sp. PI. ed. II. 938 = Gynandropsis pentaphylla.
pentaphylla, Veil. FL Flnm. 272; vi. t 111-rosea.
pilosa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 65.—Am. austr.
pinnata, Push, FL Am. Sept. ii. 789 = Stanleya pinnatiftda.
platycarpa, *Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped.* ii. 235. t. 2.—Am. bor. occ.
Poiteauana, *Pacquet, in Journ. Hort. Prat,* i (1843) 349.—Hab.)
polygama, Linn. Sp. PI. ed. II. 939; DC. Prod. i. 241 = serrata.
porphyrantha, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 71.—N. Granat.
procumbens, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 261; *Linn. Syst.* ed. XII. 448.—Ind. occ
prostrata, Hort. ex DC. Prod. ii. 382 = Rothia trifoliate.
prostrata, Koen. ex Steud. Nom. ed. II. L 382' aspera.
pruinosa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* i. (I860) 8.—Arabia,
pruriens. *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xvii. (1862) 68.—N. Granat.
psoraleaefolia, *DC. Prod. i.* 239.—Bras,
puberula, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xvii. (1862) 71.—N. Granat.
pubescens, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 882- Gynandropsis pentaphylla.
pubescens, *Sims, Bot. Mag.* t. 1857.—Panama,
pulchella, *Schult./. Syst.* vii. 1617.—Bras.
pungens, Willd. Enum. Hort. Berol. 689= spinosa.
purpurea, *DC. Prod.* i. 239.—Peruv.
quinquenervia, *DC. 1. c*—Persia; Afghanist; Ind. bor. occ.
Raddeana, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* i. (1871) 19. —Turcoman.
Radula, FenzL in Flora, xxvii. (1844) 812 -.papillosa.

CLEOME:—
ramosiwrima, *Purl, ex Webb, Fragm. Fl. Aetkiop.* 22.—Afr. trop.
raphanoides, DC. Syst. ii. 662 = Wormskioldia heterophylla.
recta, *Jacquem. Voy. Bet.* J*.—Ind. or.
Regnellii, *EicU. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1870) 190.—Am. austr.
Richii, *A. Gray, in Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 67.—Bias.
roridula, R. Br. in Salt, Abyss. App. 66-droserifolia.
rosea, Eckl. ex Stend. Norn. ed. II. i. S82 = Gynandropsis pentaphylla.
rosea, *Poit. in Rev. Horde. Sit.* II. i. (18*1-48) 69.—Texas.
rosea, *Vahl, ex DC. Prod.* i. 239.—Bras,
rubella, *Butch. Trav. i.* 543.—Afr. austr.
rabiginosa, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat. Set.* IV. xvii. (1862) 69.—N. Grant,
rnpestris, *Sond. in Linnaea,* nriii. (1850) 6.—Afr. anstr.
ropicola, *Vicary, in Ann. Nat. Hist. Set.* II. i. (1848) 425.—Scinde.
Ruta, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot 19. t. 19 = brachycarpa.
rntidosperma, *DC. Prod.* L 241.—Ind. occ. t
sondwicenas, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 66.•—Ins. Sandvic
scabrello, *Eichl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1870) 188.—Am. trop.
scandens, Ruiz, ex EicU. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 251 =longipes.
scaposa, DC. Prod. i. 239=papillose.
Schraderi, Sennit f. Syst vii. 48=Chelidonii.
secundiflora, *Schrad. in Schult.f. 1. c.* 87.—Hab. ?
Selloana, *Klotasch, ex EicU. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 252.—Bras,
semibetandra, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 5.—Aiir. anstr.
serrata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 26.—Ind. occ.
serrulata, Parsh, Ft. Bor. Am. ii. 441 = integrifolia.
sessilifolia, *Schult.f. Syst.* vii. 23.—Ind. or. occ.
sUiculifero, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 260.—Bras.
siliquaria, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65-arabica.
simplidfolia, *Hook. f. (f Thorns, in FL Brit. Ind.* i. 169.—Ind. or.
socotrana, *Balf.f. tn Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 501.—Ins. Socotra.
Sonorae, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 16.—N. Mexlc
aparsifolia, *S. Wats, in Bot. King, Exp.* 82. t fi.—Am. bor. occ.
speciosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 81. t. 486 = Gynandropsis speciosa.
speciosa, *Rafin. Fl. Ludov** 86.—Am. bor.
speciosissima, *Deppe, ex Lindl. Bot. Reg.* t. 1812.—Mexic.
spinosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 26; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 939.—Am. anstr.
spinosa, Sw. Obs. 262=pungens.
stenophyUa, Klotzsch, in Rich. Schomb. Reise, iii. 1164=Fbysostemon lanceolatnm.
Stevensiana, Scbnlt f. Syst. vii. 40=omithopodioides.
Stocksiana, *Boiss. Diagn. Set.* II. L 47.—Belnchistan.
strigosa, *Oliver, FI. Trop. Afr.* i. 80.—Afr. trop.
stylosa, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 250.—Venezuela.
subcordata, Stend. ex Oliver, in Trans. Linn. Soe. xxix. (1872) 28-moaophylla.
surinamensis, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 239.—Guiana.
tenella, *Linn.f. Suppl.* 300.—Ind. or.; Afr. toop.
tennifolia, *Le Conte, ex Terr. V Gray, Fl. N. Am. I* 123.—Am. bor.
ternata, Willd. ex- Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 257 -polygama.
tetnndra, *Bants, ex DC. Prod.* i. 240.—Aottial.
tetraphylla, Willd. ex Eichl. in Mart. FL Bras. xiii. I. 257=psoraleaefolia.
titnbans, *Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent.* XI. (1883) 97.—Reg. Argent,
trachycarpa, *Klottsch, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 252.—Bras,
trinervia, *Fresen. in Mus. Senchenb.* i. (1834) 177.—Aegypt.; Arabia.
triphylla, Desconrt. Fl. Med. Ant. i. t. 44=polygama.

CLEOME:-
triphylla, James, in Long, Exped. ii. 289-integrifolia.
triphylla, Linn. Sp. PI. ed. II. 938=serrata.
triphylla, Veli. Fl. Flam. 272; vi. t. 113=affinis.
uniglandulosa, *Cav. Ic.* iv. 3.—Mexic.
orens, *Brot. ex Heynh. Norn.* ii. 149, nomeu.—Hab.?
Vahliana, Fresen. in MM. Senckenb. ii. (1837) 110 = brachycarpa.
venusta, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 812-paradoxa.
rfllosa, *Gardn. in Hook. Lend. Journ. Bot.* i. (1842) 166.—Bras,
wminea, *Schrad. in Linnaea,* x. (1886) *Litt.* 109.—Hab.!
violacea, Linn. Sp. PI. 672=graveolens.
virgata, Stev. in DC. Prod. L 240 = oraithopodioides.
virgata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 109.—Afr. austr.
viridiflora, Schreb. in Nov. Act. Nat. Cor. iv. (1770) 186. t. 8-gigantea.
viscosa, *Linn. Sp. PI.* 672.—Geront. trop.

CLEOMELLA, DC. Prod. i. 237 (1824). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 106.
ISOPARA, Rafin. Atl. Jonrn. 144 (1832).
angustifolia, *Torr. in Hook. Kern Journ.* ii. (1850) 255.—Mexic.
bievipes, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 866.—Calif.
Coulteri, Hanr. ex A. Gray, PI. Wright, i. 12,129 = Wislizeniarefracta.
Fremontii, *Torr. in Smithson, Contrib.* iii. (1862) 12, in nota.—Am. bor.
longipes, *Torr. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 255.—Mexic.
medicaginea, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 813.—Mexic
mexicana, *Mqc. & Sesse, ex DC. Prod.* i. 237.—Mexic.
mexicana, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 167 = angustifolia.
obtusifolia, *Torr. V Frém. in Frtm. Second Report,* 811.—Am. bor. oec.
oocarpa, A *Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 72.—Am. bor. occ.
parviflora, *A. Gray, 1. c.* vi. (1864-65) 620.—Calif,
plocasperma, 5. *Wats, in Bot. King, Exp.* 83.—Am. bor. occ.

CLEOMENA, Roem. & Schnlt. Syst ii. 18, 888 (1817) -Huehlenbergla, Schreb. (Gramin.).

CLEOME m Llan. Sp. PL ed. II. 837 (1762). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1203.
Jnsitanica, *Linn. I. c*—Enrop. anstr.

CLEOPHORA, Gaertn. Froct ii. **M. t* 120 (1791) = Latania, Comm. (Palm.).
dendriformis, Lodd. ex Baker, FI. Manrit. 381 = L. Loddigesii.
lontaroides, Gaertn. Frnct. ii. 186. t. 120 = L. Commenonii.

CLERCIA, Veil. Fl. Fkm. 29 ; i. t. 73, *11* (1825) = Salads, Linn. (Celastr.).
clusiaefolia, Mien, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 881-S. sylvestris.
dispansa, Mien, 1. c. 879.—Bras.
quianensis, Miers, 1. c. 378.—Guiana.
hmceolata, Miers, 1. c. 877.—Bras.
micrantha, Miers, 1. c. 879=S. Miersii.
tnata, Veil. FL Flnm. 30; i. t. 78=S. arborea.
Passiflora, VelL 1. c. t. 74.—Bras.
retusa, Miers, in Trans. linn. Soc. xxviii. (1872) 380-S. .sylvestris.
Tweediana, Miers, 1. c.—Bras.

CLERKIA, Neck. Elem. i. 251 (1790) = Tabemaemontana, Plum. (Apocyn.).

CIiERMONTIA, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 459. t. 71 ad .73 (1826). *CAMPANULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 546.
grandiflora, *Gaudich. 1. c.* t. 73.—Ins. Sandvic.
Kakeana, *Meyen, Reise,* ii. 189.-Ins. Sandvic
macrocarpa, Gaadich. Bot. Voy. Bonite, t. 49-Kakeana.
macrophylla, Nntt. Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 261 = Kakeana.
oblongifoiu, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 469. t. 71.—Ins. Sandvic.

CLEBMONTIA:—
porvifloro, *Gaudich. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 150.—Ins. Sandvic.
persitifolia, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 469. t 72.—Ins. Sandvic.

CIiEBODENDROXT, Linn. Gen. ed. I. 186 (1787) *VERBENACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1155.
AGRICOLAEA, Schxank, in Denkschr. Akad. Mnench. (1808) 98.
CORNACCHINIA, Savi, in Mem. Soc. Ital. Mod. xxi. (1837) 184. t. 7.
CTCLONEMA, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 226.
CYRTOSTEMMA, Kunze, in Bot. Zeit. i. (1843) 272.
DOUGLASSIA, Adans. Fam. ii. 200 (1763).
EGENA, Rafin. FL Tellur. ii. 85 (1836).
OVIEDA, Linn. Gen. ed. I. 59 (1737).
ROTHECA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 69 (1886).
SIPHONANTHUS, Linn. Gen. ed. II. 626 (1742).
SPIRONEMA, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 226.
TORREYA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 221 (1821).
VALDIA, Plnm. ex Adans. Fam. ii 157 (1763).
VOLKAMERIA, Linn. Syst. ed. I (1785); Gen. ed. I. 347 (1737).
VOLKMAMNIA, Jacq. Hort. Schoenbr. iii. 48. t. 338 (1798).
Acerbiana, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1156.—Nubia,
aculeatum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 500.—Jamaic.
acuminatum, Wall. Cat. n. 1792 = disparifolium.
affine, *Griff. Notul.* iv. 170.—Banna,
amicorom, *Seem, in Bonplandia,* x. (1862) 249.—Ins. Pacif.
amplius, Hance, in Ann. St Nat. Se>. V. v. (1866) 233 = cyrtophyllnm.
angustifolium, Salisb. Prod. 108 = fortunatum.
angustifolinm, *Spreng. Syst.* ii. 758.—Jamaic.
attenuatum, R. Br. Prod. 511-floribundum.
aurantium, *G. Don, in Edinb. Phil. Journ.* xl. (Oct. 1824) 349.-Afr. trop.
Arthur-Gordoni, Home, ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xx. (1888) 370-Gordoni.
Balfouri, Hort. ex Flor. Mag. viii. (1869) snb t. 482 = Thomsonae.
Betbuneannm, *Low, Sarawak,* 378; *et in Bot. Mag.* '• 4485.—Borneo.
Blancoanum, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 161=Navesianum.
Blancoi, *Naves, ex Villar, I. c.*—Ins. Philipp.
Blumeanum, *Schau. in DC. Prod.* xi. 669.—Java,
brachyanthum, *Schau. 1. c.* 668.—Ins. Philipp.
bracteatam, *Wall. Cat.* n. 1800.—Reg. Himal.
bmnsvigioides. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 438.—Madag.
Bnchananii. *Herb. Roxb. ex Wall. Cat.* 2653 (sp.dub.).—Ind. or.
Bungei, Steud. Norn. ed. II. i. 882 =foetidum.
bonianum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 252.—Malaya.
bnxifolium, *Spreng. Syst.* ii. 758.—Hab.?
calamistratum, Hort. Belg. ex Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) Misc. 48«elegans.
calamitosom, *Linn. Mant'A*..90.—Malaya.
calycinum, Tnrcz. in Ball. Soc. Nat Mosc. xxxvk (1863) II. 222=infortunatnm.
canescens, *Wall. Cat.* n. 1800.—China,
capense, *D. Don, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 882.—Afr-anstr.
capense, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Schau. in DC. Prod. xi. 661 =glabrum.
capitatum, Hook. Bot. Mag. t. 4355=Whitfieldii.
capitatnm, *Schum V Thou, in Dan. Vid. Selsk. Afk-* iv. (1828) 81.—Afr. trop.
capsulare, Bianco, Fl. Filtp. ed. I. 509-inerme.
cardiophyllum, F. MueiL Fragm. iiL 144=flonbundum.
castaneaefolium, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem-Reise, 102=infortunatum.
castaneifolium, Hook. *Sc* Am. Bot Beech. Voy. 205* fortunatum.
canliflorum, *Vatke, in Linnaea,* xliiL (1880-82) 688—Ins. NossiW.
cernuum, *Wall, ex Steud. Norn.* ed. II. i. S82—Ind. or.
oaceineum, D. Dietr. Syn. PL iii. 616=squama turn.
Colebrookianum, *Walp. Rep.* iv. 114.—Ind. or.; Malaya.
Commenonii, *Syreng. Syst.* ii. 758.—Ins. Philipp.
coadensatnm, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 874.—Malaya.

CliERODENDBOIT :—
cordatum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 103 = infortunatnm.
cordifolium, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 170.—Abyssin.
coriaceum, R. Br. Prod, fill - floribnndum.
coriaceum, Poir. Eacyc. Suppl. iv. 868 = javanicmn.
coromandelianum, Spreng. Syst. ii. 758—ovatum.
costatum, *R. Br. Prod.* 511.—Austral,
croentum, *Lindl. in Card. Chron.* (I860) 456.—As. trop.
cubensis, *Sehau. in DC. Prod.* xi. 658.—Cuba.
Cnmiogianum, *Sehau. I. c.* 666.—Ins. Philipp.
cuneatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868) II. 221-serratum.
Cunninghamii, *Benth. FL Austral,* v. 64.—Austral,
cuspidatum, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) II. 221.—N. Granat.
cyrtophyllum, *TurcM. I. c.* 222.—China,
deflexum, *Wall. PI. As. Rar.* iii. 10. t. 215.—Malaya.
densiflorum. *Griff. Notul.* iv. 170.—Bnnna.
aentatum, Wall. Cat. n. 1799-squamatum.
depauperatum, Wall, ex Stead. Norn. ed. II. i. 882 = infortnnatum.
Diepenhotstii, *Uiq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 568.—Malaya,
discolor, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 538.—Afr. trop.
disparifolium, *Blume, Bijdr.* 809.—Malaya.
dnaricatum, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. p. 48=-senatum.
divaricatum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. HI. (1846) 164-Caryopteris divaricate.
diwsifolium, Vahl, Symb. Bot. ii. 75 = emirnense ?
elegans, *Manetti, ex Urn. Jard. Fleur.* iv. (1854) *Misc.* 47.—Hab. 1
'Uipticum, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 829 -laevifolium.
emirnense, *Boj. ex Hook. Bot. Mag.* t 2925.—Madag.
grioriphon, *Sehau. in DC. Prod.* xi. 662.—Java.
»Uax, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub 119.—Java.
Jarinosum, Wall. Cat. n. 1810-serretum.
f'rruginfum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868)II. 221-villosum.
•^losum, *Becc. Malesio,* ii. (1884) 48,-MaUya.
nonbundum, *R. Br. Prod.* 511.—Austral.
floribundum, Hort. Angl. ex Walp. Rep. iv. I11-cmiinense.
•oetidum, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 52.—China.
foetidum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 108 - Caryopteris Fata.
foetidum, Hort Par. ex Planch, in FL des Series, Sir. I- ix. (1853-64) 17=firagrans, *Vent,*
fortunatum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2662 (sp. *»b.).--Assam.
rtunatum, *Linn. Cent. PI.* ii. 28.—China.
Japans, *Vent. Jard. Malm.* t. 70.—China; Sumatra; - Java.
''•pans, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 659.—Am. trop.
galeatum, *Bolt. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xU. - U884)91._WSocotnu
etabrum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i 278.—Afr. austr.
tf'ndulosum, Colebr. ex Wall. Cat. n. 1806 = Cole-brookianum.
w Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t 19 = prasc. ?
glaucum, Wall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 383.—r.
G. *Baker,* ;„ *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 870. ~"*ns. Fiji.
J>*»ndiflorum, *Sehau. in DC. Prod.* xi. 659.—Hab. t
frandifolium. Salisb. Prod. 108-serrata.
"***, Kurt For. Fl. Brit. Burma, ii. 268-Caryo-Ptenspaniculata.
GriK.? 1813=Caryopteris grata.
fcTS. *Hook* «v.8»0.—Assam; Burma,
Hance, in Walp. Ann. iii. 238-
Schveinf. Beitr. Fl. Aethiop. 119.-
Lindl. Bot. Reg. 1.1807.—Reg. Himal.
roWum, WaU. ex Steud. Nomfed. II. i; 888, « Caryopteris Wallichiana.

GKEBODEHDBON :—
hemiderma, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 61.—Austral.
herbaceum, WaU. Cat. n. 1815 = serratum.
heterophyllum, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kev.* ed. II. iv. 64.—Ins. Mascar.
Hildebrandtii, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 636.—Afr. trop.
hircinnm, *Sehau. in DC. Prod.* xi. 661.—Madag.
hirsutum, G. Don, in Edinb. Phil. Joura. xi. (1824) 349 = umbellatum.
Horsfieldil, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 880.—Java.
Huegelii, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* (1861) 51.—Austral,
illustre, *If. E. Br. in Gard. Chron.* (1884) II. 424.—Ins. Celebes.
imperialis, *Carr. in Rev. Hortic.* (1874) 110.—Hab. 1
indsum, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 267.—Afr. trop.
inerme, R. Br. Prod. 511-neriifoHum.
inerme, *Gaertn. Fruct.* i. 271.—Ind. or.
infortunatum, *Gaertn. I. c*—Ind. or.; Malaya.
infortunatum, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 27-villosum.
intermedium, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 150.—Ins. Luzon,
involncratum, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 637.—Afr. trop.
ixoraeflorum, *Hassk. in Retzia,* 60.—Singapore.
Jackianum, Wall, in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 284; Cat. n. 1794-disparifolium.
japonicnm, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 822.—Japon.
javanicum, *Spreng. Syst.* ii. 759.—Java.
javanicum, Walp. Rep. iv. 118=serratum.
KaemPferi, Fisch. ex Morr. Ann. Soc. Gand, i. (1845) 17, in syn.=squamatum.
laciniatnm, *Balf.f. in Journ. Linn. So-.,* xvb ,1877) 19.—Ins. Mascar.
laevifolium, *Blume, Bijdr.* 808.—Malaya,
lanceolatum, *F. Muell. Fragm.* iii. 145.—Austral,
lanuginosnm, *Blume, Bijdr.* 810.—Ins. Molucc.
lasiocephalum, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl.Brit. Ind.* iv. 594.—Reg. Himal.
laxiflorum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 229.—Ins. Fiji.
Lehuntei, *Home, ex Baker, 1. e.* 369.—Ins. Fiji,
leucopbloeum, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 91.—Ins. Socotra.
Leueosceptrum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 103=Leucosceptrum canum.
ligostrinum, [A. *Br.* in] *Ait. Hort. Kew.* ed.II. iv. 64.—Mexic.
Lindemuthianum, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 687.—Afr. trop.
Iindenianum,A *Rieh.Fl.Cub.Fanerog.il.* 147.—Cuba.
Lindleyi, Decne. ex Planch, in Fl. des Series, *Sit.* I. ix. (1853-54) 17=fragrant, *Vent.*
Linnaei, F. Muell. Fragm. vi. 151=hemiderma.
Linnaei, Thw. Ennm. PL Zeyl. 248 = Glossocarya Linnaei.
lividum, Lindl. Bot. Reg. t 946 = fortunatum.
Lobbii, *C. B. Clarke, in Hook.}. Fl.Brit.Ind.* iv. 690.—Ins. Pexuuog.
longicolle, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 217.—Guiana,
longiflorum, *Decne. in Nov. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 400.—Ins. Timor,
macradenium, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 874.—Java,
macrocalycinnm, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881)' 276.—Madag.
macrophyllum, *Blume, Bijdr.* 808.—Java.
macrophyllum, Sims, Bot. Mag. t 2586-serratum.
macrosiphou, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6696.—Afr. trop.
macrostachyum, *Turct. in Buff. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) II. 220.—Reg. Himal.; Burma,
macrostegium, *Sehau. in DC. Prod.* xi. 666.—Ins. Philipp.
Madaeera, *Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 467.—Ind. or. ?
magnoliaefolium, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 243.—Madag.
Manetti, *Vis. Sem. Hort. Patav.* (1848-49) n. 2.—Hab. I
medium, R. Br. Prod. 510 - floribundum.
Minahassae, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 409.—Ins. Celebes,
mite, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 637.—Afr. trap,
molle, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* Ii. 244.—Ecuador.

CI1ERODENDR.OIT:
molle, Jack, in Malay. Misc. L (1820) n. 1.15 - villosum.
mossambicense, *Klotzseh, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 269.—Afr. trop.
multiflorum, G. Don, in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 850=volubile?
myricoides, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. lxv, nomen.—Abyssin.
Navesianum, *Vidal, Cat. Prev. Manila,* n. 398.—Ins. Philipp.
nereifolium, *Wall. Cat.* n. 1789.—Malaya.
Neumayeri, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 535.—Afr. trop.
nutans, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. I. 17 = Jackianum.
nutans, *Walt. Cat.* n. 1793.—Reg. Himal.; Burma,
obovatum, *Walp. Rep.* iv. 112.—Ins. Molucc.
obtusidens, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 870.—Malaya.
odoratum, D. Don, Prod. FL Nep. 102 - Caryopteris Wallichiana.
ornatum, WalL Cat. n. 1811-serratum.
ovale, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 257.—Afr. trop.
ovalifolium, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* vi. (1862) 60.—Ins. Fiji.
ovatum, Poir. Encyc. Suppl. iv. S52=coromandelinum.
ovatum, R. Br. Prod. 511-floribundum.
oxysepalum, *Miq. in Journ. Bot. Nierl.* L (1861) 114.—China,
paniculatum, *Linn. Mant.* i. 90.—Burma; Malaya; China,
papuanum, *Scheff. in Ann. Jard. Buitenz.* i. (1876) 41.—N. Guin.
penduliflorum, *Wall. Cat. a.* 1795.—Burma.
pentagonum, Hance, in Walp. Ann. iii. 288-fortunatum.
petunioides, *Baker, in Journ. Linn. Soe.* xx. (1883) 230.—Madag.
philippinum, *Sehau. in DC. Prod.* xi. 667.—Malaya.
phlomoides, Hort. Ital. ex DC. 1. c. v. 613-Montanoa arborescens.
phlomoides, *Linn./. Suppl.* 292.—Ind. or.
phyllomega, Steud. Norn. ed. II. i. 383 - macrophyllum.
pubescens, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1035.—Ind. or.
pubescens, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 380, lapsu°>canescens.
pulcbmm, *Fawc. in 0. Forbes, Nat. Wand. East. Arehip.* 514.—Ins. Timor,
pumilum, *Spreng. Syst.* ii. 759.—China,
putre, *Sehau. in DC. Prod,* xt 661.—Madag.
pyramidale, Andr. Bot. Rep. t. 628 = paniculatum.
pyrifolium, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) .228.—Madag.
ramosissimum, *Baker, 1. c.*—Madag.
Riedelii, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 100.—Ins. Celebes,
robustnm, *Klotzseh, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 259.—Afr. trop.
loseum, *Poit. in Rev. Hortic.* (1876) 80.-Hab. ?
rotundifolinm, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1876) 182.—Afr. trop.
rubellum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 229.—Madag.
Rumphianum, *De Vriese, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 252.—Ins. Amboina.
sagittatum, WalL Cat n. 1786 - hastatum.
Sagraei, *Sehau. in DC. Prod.* xi. 6591.—Ins. Cuba.
scandens, Beauv. FL Owar. i. 52. t. 32-umbellatum.
scopiferum, *Miq. Fl.Ind. Bat.* ii. 881.—Malaya,
semiserratum, *Wall. Cat.* n. 1785.—Burma.
sericeum, Wall. L c. n. 1814—Hiptage sericea.
serotinum, Carr. in Rev. Hortic (1867) 351-trichctomum.
serratum, *Spreng. Syst.* ii. 768.—Ind. or.; Burma,
simplex, *G. Don, in Edinb. Phil. Journ.* xi. (1824) 349.—Afr. trop.
singalense, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 568.—Sumatra,
sinuatum, *Hook. Bot. Mag. t.* 4255.—Afr. trop.
Siphonanthus, [A. *Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 65.—Ind. or.; Malaya.
spedosissimum, Hott Angl. ex Sehau. in DC. Prod. xi. 672=glandulosum.
spedosissimum, Paxt. Mag. Bot iii. (.1837) 217 et 271 -s squam&tnni •
speciosum x, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 386; et Lem. Illustr. Hortic. xvi. (1869) t. 593.
spicatum, *Thunb. FL Javan.* 22.—Java,
spinosum, *Spreng. Syst.* ii. 760.—Ins. Dominic

CUSRODKNDBOXr:—
splendens, *G. Don, in Edinb. Phil. Journ.* **xi. (1824)** 319.—Afr. trop.
splendidum, Wall. Cat n. 1803=paniculatum.
sqnamatnm, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 74.—Reg. Himal.; Banna; China,
stenanthum, *Klottsch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 258.—Afr. trop.
temifoltam, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xx. (1888)** 229.—Madag.
terni/olium, D. Don, Prod. Fl. Nep. 103-scrotum,
temifolium, *H. B. & K. NJV. Gen. et Sp.* ii. 244.—Fl. Orinoco.
Thomsonae, *Balf. in Edinb. New Phil. Journ.* **N. S.** xv. (Jan.-Apr. 1862) 233.—Afr. trop.
tomentosum, *R. Br. Prod.* 610.—Austral.
Tracyanum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austri.* **v. 62.—** Austral.
trichotomum, *Thunb. Fl. Jap.* 256.—Japon.
trichotomum, Wall. Cat. n. 6815 B=villosnm.
triflornm, *Vis. Illustr. Piante Nov. Ort Padov.* **19.** —Nubia.
trifoliatum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 383.—Ind. or.
tubercnlatum,^. *Rich. Fl. Cub. Fanerog.ii.* 147.—Cuba,
umbellatum, *Pair. Encyc.* v. 166.—Afr. trop.
urtidfolium, Wall. Cat. n. 1801=squamatum.
•*oelutinum,* Wall. 1. c n. 1797-villosnm.
venosum, *Wall. 1. c.* n. 1807.—Reg. Himal.
verracosum, *Splitg. ex De Vriese, in Nedert. Kruidk. Arch.* i. (1848) 851.—Gniana.
vertidllatum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 102=C. Siphonanthus,
vestitum, Wall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 883-infortunatum.
villosum, *Blume, Bijdr.* 811.—Malaya.
viscosum, Vent. Jard. Malm. t. 25 = infortunatum.
volubile, *Beauv. Fl. Ovar.* i. 52. t. 32.—Afr. trop.
Whitfieldii, *Seem, in Bonplandia,* x. (1862) 250.—Aft. trop.

CLERODENDRUM, Linn.-=praec.

CLETHRA, Bert, ex Steud. Nom.ed. II. i. 384 (1840) - Viviania, Car.
mollis, Bert, ex Steud. 1. c. - V. parvifolia.

CLETHBA, Gronov. ex Linn. SysL ed. I (1785). *ERICACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 603.
CROSSOPHRYS, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 8.
CDELLARIA, RUB *SC* Pav. Prod. 59. t. 10 (1794); Syst. Veg. 103 (1798).
GILLENA, Adans. Fam. it. 166 (1763).
JUNIA, Adans. 1. c. 165 (1763).
KOWALEWSKIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1859) 1.263.
TINUS, Linn. Syst. ed. X. 1010 (1759).
VOLKAMERIA, P. Br. Hist Jamaic 214. t. 21. f. 1 (1766).
acuminata, *Michx. Fl. Bar. Am.* i. 260.—Am. bor.
Alexandri, *Criseb. Fl. Brit. W. Ind.* 142.—Ind. occ.
alnifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 259=canescens.
alnifolia, *Linn. Sp. PI.* 396.—Am. bor.
angustifolia, *DC. Prod.* vii. 589.—Chili,
arborea, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. I. ii. 73.—** Ins. Madera.
arborea, Vent. Jard. Malm. t. 40—secundiflora.
barbinervis, *Sieb. (T Zucc. in Abh. Akad. Muench.* **iv.** HI. (1846) 128.—Japon.
bicolor,//. *B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 289.—N. Granat.
bracteata, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 141.—Ind. occ.
brasiliensis, *Cham. V SchUcht. in Linnaea,* viii. (1888) 510.—Bras.
brevifolia, *Benth. PL Hart*.* 143.—N. Granat.
byrsonimoides, *Griseb. PI. Wright. Cub.* 170.—Cuba,
canescens, *Herb. Reinw. ex Blume, Bijdr.* **863.—Java,**
castaneaefolia, *Sfeissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 189.—Peruv.
confertifolia, *Ernst, in Flora,* Ivii. (1874) 213.—Venezuela.
cubensis, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* **ii. 75.—Cuba.**
dentata, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 73 - alnifolia.
divaricata, *Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov.* **v. 184.—** Am. austr.
Fabri, *Nance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 130.—China,
fagifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **iii. 289.—** Am. austr.
ferruginea, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 896, nomen.—Hab.!

CLETHRA :—
ferruginea, *Rui* ty Pav. Fl. Per.* iv. t 380.—Peruv.
fimbriata, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 290. t. 264. —N. Granat.
Gardner!, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi. (1863)** II. 233.—Bras.
glauca, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 383 — pubescens.
glauca, Pers. Syn. i. 483=acuminata.
guianensis, *Klottsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* **vii.** 170.—Guiana.
incana, Pers. Syn. i. 483=pubescens.
integrifolia, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. vii. 590 = mexicana.
japonica, Thunb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 388 - barbinervis.
javanica, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1863) II. 282.—Java.
Kowalewskii, Turcz. 1. c 233 = mexicana.
laevigata, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 168.—Bras,
lanata, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* **ix. (1842)** 688.—Mexic.
landfolia, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi. (1868)** II. 231.—Singapore,
macrophylla, *Mart,* **b*** *Gal. in Bull. Acad. Brux.* **ix.** (1842) 539.—Mexic.
macrostachya, *Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov.* **v. 155.—** Hab. I
Mathewsii, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1868) II. 282.—Peruv.
mexicana, *DC. Prod.* vii. 590.—Mexic.
Michauxi, *R. Court, in Mag. Hortic.* i. (1883) 249.— **Am. bor.**
mierantha, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. vili. (1847) 288.—N. Granat
montana, Fras. ex Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. v. 180 a* acuminata.
nervosa, *Loisel. in Duham. 1. c.* 133.—Peruv.
obovata, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 302-quercifolia.
obovata, *Rui* (f Pav. Fl. Per.* iv. t. 881.—Pernv.
ocanensis, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi. (1863)** II. 281.—N. Granat.
occidentalis, Anct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 388 - tinifolia.
ovalifolia, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. vii. 590 = mexicana.
ovalifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi. (1863)** II. 232.—Reg. Andin.
paniculata, [Soland. in] Ait Hort Kew. ed. I. ii. 73 =alnifolia.
pedicellaris, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1868) II. 234.—Peruv.
pubescens, Willd. Ennm. Hort. Berol. 456=alnifolia.
punctata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi. (1868)** II. 235.—N. Granat.
querdfolia, *Schlecht. in Linnaea,* viii. (1883) 624; *Lindl. Bot. Reg.* (1842) t 23.—Mexic.
repanda, *Turn, in Bull. Sec. Nat. Mote,* **xxxvi. (1863)** II. 231—Venezuela.
revoluta, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* iv. t 880.—Peruv.
scabra, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. v. 182 = brasiliensis.
scabra, Pers. Syn. i. 482=alnifolia.
secundiflora, *Decne. in Fl. des Serres,* Ser. II. xii. (1877) 171, in nota.—Hab.?
serrulata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi, (1863) II. 288= mexicana.
spicigera, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 168.—Bras.
Sprucei, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi. (1863)** H. 282.—Peruv.
suaveoleng, *Turcz. 1. c.* 280.—Mexic.
tinifolia, Schlecht. in Linnaea, viii (1883) 624 = qucrcifoli&a
tinifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 74.—Jamaic.
tomentosa. Lam. Encyc. ii. 46=alnifolia.
virgata, *Ruit & Pav. FL Per.* iv. L 881.—Pemv.

CLETHROPSIS, Spach, in Ann. Sc. Nat Ser. IL xv. (1841) 201=Alnua, Toum. (Cupulif.).
nepalensis, Spach, 1. c. 202=A. nepalensis.
nitida, Spach, 1. c = A. nltida.

CLETHROSPERUM, Planch, in Hook. Ic. PI. sub t. 767 (1848), sphalm.-Clathroqpermum, Planch. (Anonac).

CLEYERA, Adans. Fam.ii. 224 **(1768) - Pdypramum,** Linn. (Loganiac).

CLEYEBA, DC. in Mem. Soc. Phys. Genev. i. (1822) 412; Prod. i. 524. (1824). *TERNSTROEMIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 183.
MOKOF, Adans. Fam. ii 50 (1763).
TRISTYLIUM,'Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 247.
elegans, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* **xiv. (1856)** 112.—Ins. Guadelup.
grandiflora, *Hooi.f. tf Thorns, in Fl. Brit. Ind.* **i. 284.** —Reg. Himal.
grandiflora, Wall. Cat. n. 1461 = ochnacea.
integrifolia, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* **xiv.** (1865) 112.—Mexic.
japonica, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 163. t. 81 = ochnacea.
Lushia, G. Don, Gen. Syst. i. 666-ochnacea.
Mertensiana, *Sieb.* b* *Zucc. Fl. Jap.* i. 154.—Japon.
mexicana, *Planch, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **i-** 93.—Mexic.
ochnacea, *DC. in Mim. Soc. Phys. Geniv.* **i. (1822)** 413.—Reg. Himal.
ochnoides, Wall, ex G. Don, Gen. Syst. i. 566-ochnacea.
serrulata, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* **xiv. (1865)** 112.—Mexic.
siphilitica, *Choisy, I. c*—Mexic.
theoides, *Choisy, I. c.*—Ind. occ.
Wallichiana, Sieb. *Sc* Zucc FL Jap. i. 154 = ochnacea.

CLEYERA, Thunb. Nov. Gen. 68 (1783)=Ternstroemia, Linn. f.
dubia, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iii- (1861) 308 = T. japonica.
emarginata, Gardn. in Calc. Joum. Nat. Hist vii. (1847) 447=T. emarginata.
fragrans. Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. i»- (1851) 307-T. japonica.
gymnanthera, Wight & Am. Prod. 87 = T. japonica.
japonica, Thunb. Nov. Gen. 69 = T. japonica.
lasiopetala, Wight, Illustr. i. 99=Adinandra lasiopetala.
Millettii, Hook, ft Am. Bot. Beech. Voy. 171[s] Adinandra Millettii.
pentapetala, Spreng. Syst. ii. 696=Saurauja tristyla.
rubiginosa, Spreng. 1. c—Sumatra.

CLEYRIA, Neck. Elem. ii. 183 (1790) = Dialium, Lnw. (Legumin.).

CLIANTHTJ8, Banks *Sc* Soland. ex G. Don, Syst. ii- 468 (1632). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. >• 603.
DONIA, D. & G. Don, Gen. Syst. ii. 467 (1832).
EREMOCHARIS, R. Br. in Start, Exped. Centr. Austral- ii. App. 73 (1849).
Binnendyckianus, *Kurz, in Joum. As. Soc. Beng.* ***'•** (1871) 51.—Ins. Ceram.
carneus, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 2~Streblorrbiza spedosa.
Dampieri, *A. Cunn. ex Lindl. in Trans. Hort. Soc-* Ser. II. i. (1835) 522.—Austral.
Dampieri, R. Br. in Start, Exped. Centr. Austral =Oxleyi.
Oxleyi, *A. Cunn. ex Lindl. in Trans. Hort. Soc. Sell,* i. (1835) 622.—Austral,
pictus, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* **1. (1836) 186"** Streblorrhiza spedosa.
punioeus, *Banks If Soland. ex Lindl. in Trans. Ho"- Soc.* Ser. II. i. (1886) 521.—N. Zel.
speciosus, Steud. Nom. ed. II. i. 881-Streblorrbu* spccioss*

CMBADnnil, Linn. Mart. ii. 161 (1771)- *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 345.
BAILLIERIA, Aubl. PI. Gui. ii. 804. t. 317 (177[5])'
OXSINIA, DC. Prod. v. 104 (1836).
OSWALDA, Cass. in Diet. Sc. Nat. lix. 322 (1829)-
TRIXIS, SW. Prod. Veg. Ind. Occ. 116 (1788).
acuminatum, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 114.— Cocos.
agreste, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. HI- =Ichthyotbera agrestis.
Alexandri, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 868.—J«m-
angustifolium, Mart, ex Baker, in Mart. Fl- Bra»- III. 164-Uneare.
Armani, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 152-rotundifol W"
asperum, DC. Prod. v. 506 = surinamense.
M m ,'Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 867-sorinamense-

CLIBADIUM :—

Barbasco, *DC. Prod.* v. 507.—Venezuela.
caracasannm, *DC. I. c.* 608.—Venezuela.
commelinoides, DC. 1. c.=Icthyothera Cunabi.
erosum, *DC. I. c*—Ind. occ
foetidum, Alemand, ex linn. Mont ii. 294-surinamense.'
fiaglferum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 368.—Ind. occ.
havanense, *DC. Prod.* v. 606.—Cuba.
leiocarpnm, *Steett, in Seem. Bot. Voy. Herald*, 162.—Panama.
neriifolinm, *DC. Prod.* v. 607.—Venezuela.
pedunculosum, *DC. I.* c—Guiana.
peruvianum, Poepp. ex DC. 1. c. 505—sprinamense.
fotundifolium, *DC. I. c*—Bras.
Schomburgkii, *Sch. Bip. in Schomb. Fauna V Fl. Cuian.* nomen, 940.—Guiana.
surinamense, *Linn. Mant.* ii. 294.—Am. anstr.
sylvestre, Baill. Hist. PI. viii. 807 = surinamense.
terebinthinaceum, *DC. Prod.* v. 506.—Ind. oca
Trinitatis, DC. 1. c. 606= surinamense.
Vargassi, *DC. I. c.* 606.—Venezuela.
villosum, Benth. PL Hartw. 205=nrinamense.

CUDANTHERA, R. Br. in Start, Exped. Centr. Austml. u. App. 73 (1849) = Qlyeyrrhlaa, Linn. (Legumin.).
psoralioides, R. Br. 1. c. 74 = G. psoraloides.

CX.XDKBOA, D. Don, in Mem. Went. Soc IT. (1823) 806. *MELASTOMACEAE*, Benth. ft Hook. £ i. 766.
DANCERA, Rafin. Sylva TeUur. 93 (1888).
STAPHIDIUM, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xvli. (1852) 306.
STEPHANOTRICHUM, Naud. 1. c iv. (1846) 64.
acuHflora, Naud. 1. c. xvii. (1862) 371 =Oxymeris acutiflora.
"Sgregata, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 309-Henriettella aggregata.
agrestis, D. Don, 1. c-Oxymeris agrestii.
"lata, G. Don, ex Loud. Hoit. Brit. 174=Miconia alata.
alpestris, Gardn. in Hook. Loud. Joum. Bot. iv. (1846) 101» Oxymetis alpestris.
"Ithaeoides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 363=Octopleura confertiflora.
"mhlyandra, Naud. 1. c. 363=Oxymeris subseriata.
amygdaloids<s, DC. Prod. iii. 156 - Ossaea amygdaloldes.
*a*gustifolia*, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xvii. (1852) 358 = Oxymeris angustifolia.
""isofhylla, DC. Prod. iii. 161 = Oxymeris anisophjjll.
"nisotrickum, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1838) 427= Miconia Berghesiana.
»phanantha, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xv. (1883) 827.—Guiana.
"ptera, DC. Prod. iii. 161= Oxymeris aptera.
"nstigera, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. in. xvii. (1862) 866 = Oxymeris aristigera.
"sperifolia, Naud. 1. c. 342 = Oxymeris asperifoUa, Ossaea asperifolia.
"strotricka, DC. Prod. iii. 161-Miconia astrotricha.
"ixata, Sprang, in Flora, xx. (1837) Beibl. ii. 78 = Miconia atrata.
*a*rea*, Cham, in Linnaea, x. (1886) 47 = Oxymeris aurea.
augcoma, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 075 = Le$_{an<}$raauiea>
"^tralis, Cham, in Linnaea, x. (1886) 44 => Oxymeris australis.
barb*TM1*> Tri<"">f in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 186.—N. Granat.
ba ^inervis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 96 « MiconU barbinervis.
Benthamiana, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 276 = hirta.
^iceana, DC. Prod. iii. 160-Miconia eriopoda.
***"•«, Griseb. in Goett. Abh. ix. (18«1) 47 - 5»graea plumosa.
bi•7"?I. Rich - « Naud. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* III. xvii. (18uz) 374 = Oxymeris heterobasis.
bisepiena IX. Prod. iii. 164 .Oxymeris dichotoma.
bisetXena, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 171 = Oxymeris Nianga.
biserrata, DC. Prod. iii. 168.—Bras.
blepharodes, DC. I. c.—Bras.

CLIDEJOA:—

botryophora, Naud. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* III. xvii. (1832) 350 = Oxymeris Nianga.
brachystachya, DC. Prod. iii. 166 = Ossaea brachystachya.
brachystephana, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 136.—N. Granat.
Brackenridgei, A. Gray, Bot. U. St. ExpL Exped. i. 591=Oxymeris Brackenridgei.
bracteata, DC. Prod. iii. 162=Miconia bracteata.
bullosa, *DC. I. c.* 158.—Bras.
calvescens, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 91=Oxymeris calvescens.
campestris, Benth. in Hook. Journ. But ii. (1840) 808 -Miconia campestris.
capillaris, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 309 — Octoplenra leptopus.
capillaris, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 184 -Sagraea capillaris.
capitata, Benth. in Hook. Journ. Bot ii. (1840) 307 = Sagraea capitata.
capitellata, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 810=dependens.
carassana, DC. Prod. iii. 162-Oxymeris carassana.
carassana, DC. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 111-Miconia spondylantha.
cephalophora, Steud. ex Triana, 1. c. - Miconia bracteata.
ceramicarpa, DC'Prod. iii. 160= Miconia spondylantha.
cemua, *D. Don, in Loud. Hort. Brit.* 174.—Peruv.
chaetocalyx, A. Gray, Bor. U. S. Expl. Exped. i. 589. t 74=Oxymeris chaetocalyx.
Chaetodon, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 360-Oxymeris Chaetodon.
Ckamissois, Nand. 1. c. 875—Miconia ibaguensis.
chinatlana, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 136.-Meric.
chrysopogon, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1864 (1866) 127 = Miconia barbinervis.
ciliata, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1824) 309 = Calophysa ciliata.
cinerea, Griseb. Cat PI. Cub. 97 -Oxymeris cinerea.
cinnamomifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1862) 869= Ossaea cinnamomifolia.
Claussenii, Naud. 1. c. 357 —Oxymeris purpurascens.
cocdnea, DC. Prod. iii. 162 - Miconia spondylantha.
cognata, Steud. ex Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. IIL xvii. (1852) 308-birta.
confertiflora, DC. Prod. iii. 166 = Ossaea confettiflora.
congestiflora, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. III. xvii. (1852) 344 = Oxymeris congestiflora.
conglomerate, *DC. Prod.* iii. 156.—Guiana.
cordifolia, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xvii. (1852) 861 = Oxymeris cordifolia.
cordigera, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 94=Oxymeris cordigera.
coriacea, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xvii. (1862) 368=Ossaea coriacea.
cornoides, *Griseb. in Goett. Abh.* ix. (1861) 60.—Reg. Argent.
crenata, DC. Prod. iii. 157-hirta.
crenata, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 308-Oxymeris crenata.
crossosepala, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 248 - Sagraea heteronenra, crossopetala.
Cruegeriana, Griseb. 1. c. 249-Sagraea salicifolia.
cuneata, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xvii. (1852) 376 - Oxymeris cuneata.
cyanocarpa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 94 - Octopleura quinquenervia.
dasytricha, A. Gray, Bot. U. S. ExpL Exped. i. 688-Oxymeris carassana.
debilis, Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 104=Sagraea rubra.
debilis, Nand. in Ann. Sc. Nat. Sér. DX xvii. (1852) 361 = Oxymeris debilis.
decurrens, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1864 (1866) 127 = Octopleura quinquenervia.
deflexa, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc xxviii. (1871) 94-Oxymeris deflexa.
deflexa, *Bunb. in Proc. Linn. Soc. I* (1841) 108.—Bras.
dendroides, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. IU xvii. (1852) 867-Oxymeris dendroides.

CLIDEM1A :—

dentata, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 308.—Peruv.
depauperata, DC. Prod. iii. 161 -Oxymeris agrestis.
dependens, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 807.—Peruv.
Deppeana, *Steud. Worn.* ed. II. i. 884.—Mexic
dtsmantha, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 309 — Miconia rhytidopbylla.
dichotoma, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1833) 307 = Oxymeris dichotoma.
dispar, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot ii. (1843) 845 = Oxymeris dispar.
divaricata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 373-Oxymeris secundiflora.
diversifolia, DC. Prod. iii. 159 = Octopleura diversifolia.
dolichantha, Naud. in Ann. Sc Nat. *Sit.* IIL xvii. (1852) 351=Oxymeris dolichantha.
ddichostachya, Naud. 1. c. 359 = Oxymeris dolichostachya.
Drosera, Sagot, 1. c. Sér. VI. xv. (1888) 828-aphanantha.
elegans, *DC. Prod.* iii. 167.—Am. trop.
elegans, D. Don, in Mem. Wem. Soc iv. (1823) 809 = hirta.
Epibaterium, DC. Prod. iii. 157 ™ Odopleura Epibaterium.
erestrata, DC. 1. c 160-Oxymeris erostrata,
erytbropogon, *DC. I. c.* 167.—Jamaica.
euphorbioides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1862) 870=Ossaea euphorbioides.
faUax, Cham, in Linnaea, x. (1886) 41 - Oxymeris fallax.
fallax, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 844 =jOxymeris xantholasia.
fenestrata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 94-nmbonaU.
fenestrata, Seem. Bot. Voy. Herald, 124=neglects.
floribunda, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. IIL xvii. (1852) S49=Oxymeris floribunda.
fmeolata, DC. Prod. iii. 163 = Oxymeris foveolata.
glabrata, *Bunb. in Proc. Linn. Soc.* i. (1841) 108.—Bras.
glabrata, Steud. in Flora, xxviL (1844) II. 721 = Miconia auriculata.
glabriflora, Presl, Bot. Bemerk. 70 - Miconia decussata.
glomerata, DC. Prod. iii. 163 = Oxymeris Nianga.
guadaloupensis, Griseb. in Goelt. Abh. viL (1867) 218 =Sagraea guadalupensis.
hematostemon, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. III. xvii. (1852) 348-Oxymeris aurea.
herbacea, Steud. ex Cogn. in Mart Fl. Bras. xiv. III. 468=Aciotis herbacea.
heterobasis, DC. Prod. iii. 164 = Oxymeris heterobasis.
heteroclita, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IIL xvii. (1852) 865-japurensis.
heteromalla, D. Don, in Mem. Wem. Soc IT. (1828) 810=Sagraea rubra.
heterophylla, *Steud. in Flora*, xxvii. (1844) II. 721.—Bras.
heterotricha, Griseb. Cat. PI. Cub. 96=Calycogoninm heterotrichum.
hirsuta, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S.* viii. (1861) 185.—Ind. occ.
hirsuta, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 248 = Ossaea hirsuta.
hirsuta, Macf. Fl. Jamaic. ii. 46=Ossaea asperifolia.
hirta, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 309.—Jamaica.
hirtella, Griseb. in Goett Abh. ix. (1861) 50 - Ossaea hirtella, Wrightii.
kumilis, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 642=Oxymeris Nianga.
holosericea, *D. Don, ex Loud. Hort. Brit.* 174.—Bras.
inaequalifolia, DC. Prod. iii. 164 — Oxymeris inaequalifolia.
inotogon, Mart, in Flora, xxiv. (1841) Beibl. ii. 37 = Oxymeris inopogon.
intermedia, DC. Prod. iii. 164 = Oxymeris intermedia.
interrupta, Poepp. ex Triana, in Trans. linn. Soc xxviii. (1871) 111=Miconia bracteata.
involucrata, *DC. Prod.* iii. 168.—Guiana,
japurensis, *DC. 1. c.* 169.—Bras.
lacera, DC. L c 164 = Miconia lacera.

CLIDEMIA :-

laevigata, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 94-Oxymeris laevigata.
Lambertiana, DC. Prod. iii. 161 = Oxymeris crenata.
lanata, DC. 1. c. 163 = Miconia lanata.
lanata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 184 -Ossaea lanata.
lappacea, DC. Prod. iii. 160 - Miconia lappacea.
latifolia, DC. 1. c. 159-Sagraea latifolia.
latifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 247 = Sagraea nmbrosa.
laxiflora, *Schlecht. in Linnaea,* xiii. (1839) 426.—Mexic.
leandroides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. m. xvii. (1862) 855= Oxymeris purpurascens.
leptodades, H. Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 103= hirta.
leptopus. Mart, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 147 = Ossaea leptopns.
leptostachya, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 172 - Ossaea brachystachya.
Uucandra, Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub. 96 = Sagraea domingensis.
Lima, DC. Prod. iii. 161-Ossaea Lima.
lineata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Se'r. III. xvii. (1852) 356 = Oxymeris purpurascens.
longibarbis, DC. Prod. iii. 163 - Oxymeris longibarbis.
lugubris, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 127 > Oxymeris heterobasis.
lutescens, Nand. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1852) 347 = Oxymeris crenata.
macrophylla, *Naud. 1. c.* 375.—Ins. Cocos.
macrophylla, Seem. Bot *Voy.* Herald, 124-Miconia simplex.
macropora, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 94—Oxymeris macropora.
maculata, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 310 = Miconia anriculata.
marginata, DC. Prod. iii. 166=Ossaea marginata.
Martiana, Nand. in Ann. Sc Nat. Sir. III. xvii. (1852) 840=Oxymeris cuneata.
Martii, Naud. 1. c. 375=Oxymeris ciliata.
melanodesma, Nand. I. c. 863 = Oxymeris melanodesma.
melanotricha, ***Triana, in Trans. Linn. Soc.*** **xxviii.** (1871) 186.—Costa Rica.
Mictmiastrum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1852) 352=Oxymeris Miconiastrum.
miconioides, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 810 — Miconia anricnlata.
micrantha, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sir. VI. xv. (1883) 327.—Guiana.
micropetala, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1852) 367=Oxymeris micropetala.
microphylla, ***D. Don, in Loud. Hort. Brit.*** **174.—** Am. austr.
microphylla, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 248 - Ossaea microphylla.
microstachya, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xvii. (1852) 857—Oxymeris purpurascens.
monticola, Naud. 1. c. 341-Miconia erythrantha.
multiplinervis, Nand. 1. c. 858 = Oxymeris multiplinervis.
mutabilis, DC. Prod. iii. 162 = Miconia mutabilis.
naevula, ***Triana, in Trans. Linn. Soc.*** **xxviii. (1871)** 187.—Guiana,
neglecta, *D. Don, in Mem. Went. Soc.* iv. (1828) 807. —Peruv.
nereosa, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1852) 341 = Oxymeris nervosa.
Nianga, DC. Prod. iii. 163=Oxymeris Nianga.
Nianga, Gaxdn. in Hook. Lond. Joum. Bot ii. (1843) 844 = Oxymeris xantholasia.
nivea, ***D. Don, in Loud. Hort. Brit.*** **174.—Am. austr.**
novemnervia, ***Triana, in Trans. Linn. Soc.*** **xxviii.** (1871) 186.—Am. trop.
oaxacensis, Steud. ex Triana, 1. c. 92 — Oxymeris subseriata.
obscura, DC. Prod. iii. 162 = Miconia obscnra.
octona, *Griseb. in Goett. Abh.* ix. (1861) 50.—Reg. Argent.
oligochaeta, Cham, in Linnaea, x. (1836) 45—Oxymeris foveolata.
oocarpa, A. Gray, Bot U. S. Expl. Exped. i. 690 = Oxymeris oocarpa.
ossaeoides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1862) 369 = Oxymeris ossaeoides.

CXIDEMXA :—

oxynra, ***Triana, in Trans. Linn. Soc.*** **xxviii. (1871)** 135.—Guiana.
paraguayensis. Stead, in Flora, xxvii. (1844) II. 721 = Oxymeris paraguayensis.
parasltica, ***O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc.*** xxviii. (1871) 135.—Bras.
pauciflora, DC. Prod. iii. 157= hirta.
penduliflora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 369-Oxymeris penduliflora.
penninerm$, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viij. (1861) 185-Sagraea penninervis.
pennipilis, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 92-Oxymeris pennipilis.
petiolaris, Triana, 1. c. 135 = Deppeana.
petiolata, DC. Prod. iii. 157 = Sagraea petiolàta.
phaeostaphis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1852) 343-Oxymeris dichotoma.
phaeotricha, Naud. 1. c. 35 = Oxymeris australis.
Pickeringii, A. Gray, Bot. U. S. Expl. Exped. i. 592 = Oxymeris Pickeringii.
pilosa, D. Don, in Mem. Wera. Soc. iv. (1823) 808 = Calophysa pilosa.
plumosa, DC. Prod. iii. 159–Sagraea plumosa.
polyandra, Benth. Bot. Voy. Sulph. 95 - Miconia Benthamiana.
polystachya, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 847 = Oxymeris polystachya.
pulchra, A. Gray, Bot U. St. Expl. Exped. i. 591-Oxymeris pulchra.
purpurascens, DC. Prod. iii. 161= Oxymeris purpurascens.
purpurea, DC. 1. c. 158 = den tat a.
purpurea, *D. Don, in Mem. Went. Soc.* iv. (1823) 308. —Pernv.
pustulata, DC. Prod. iii. 159 - nmbonata.
quadrisulca, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 864 = Oxymeris secundiflora.
quinquedentata, Naud. 1. c. 876 - Oxymeris quinquedentata.
quinquenodis, Naud. 1. c. 370 - Oxymeris quinquenodis.
quintuplinervia, Steud. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 187-involucrata.
radulaefolia, iienth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 309 = Miconia radulaefolia.
rariflora, *Benth. 1. c.* 808.—Guiana.
reclinata, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 125-petiolaris.
Regnellii, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 91-Oxymeris Regnellii.
Renggeri, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 721-Oxymeris inopogon.
repens, ***Triana, in Trans. Linn. Soc.*** **xxviii. (1871)** 186.—N. Granat
retropila, DC. Prod. iii. 156-Ossaea retropila.
reversa, DC. 1. c. 161 = Oxymeris reversa.
rhamnifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1S62) 878 -Oxymeris secundiflora.
rhodolasia, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 126- Miconia lacera.
rhodopogon, DC. Prod. iii. 163 - Oxymeris rhodopogon.
ribesiflora, Cham, in Linnaea, x. (1886) 38 - Oxymeris ribesiaeflora.
Riedeliana, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 92 = Oxymeris Riedeliana.
rubra, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 152. t. 281.—Am. austr.
rubrinervis, ***Griseb. in item. Am. Acad.*** **N. S. viii.** (1861) 185.—Cuba.
rufescens, Griseb. Cat. PI. Cub; 97—Ossaea rufescens.
sagittata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 359 - Oxymeris subseriata.
salicifolia, Naud. 1. c. 864-Ossaea brachystachya.
scabrosa, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 184.—Ind. occ
scandens, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848) 346 - blepharodes.
secunda, D. Don, in Mem. Went. Soc. iv. (1823) 308 = Oxymeris secunda.
secundiflora, DC. Prod. iii. 164-Oxymeris secundiflora.
sericea, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 309 - Sftgracft rnbra.
serrulate, *Schlecht. in Linnaea,* xiii. (1839) 425.—Mexic.
silvestris, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 760-Oxymeris sylvestris.

CLIDEMIA :—

simplidcaulis, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 346-Oxymeris simplicicaulis.
solearis, Naud. L c. 839=Octopleura macrophylla.
spaniflora, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 218.— Reg. Argent.
spicaeformis, DC. Prod. iii. 160=Miconia spondylantha.
spicata, DC. 1. c. 159-dependent
spicata, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 808-Miconia ipondylantha.
spicata, Gnseb. Cat. PI. Cnb. 96-neglecta, Heterotrichum octonum.
spondylantha, Mart, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 111-Miconia spondylantha.
staphidioides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 344-Miconia staphidioides.
stenopetala, DC. Prod. iii. 163-Oxymeris dichotoma.
strigilliflora, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 372-Oxymeris strigilliflora.
strigillosa, *DC. Prod.* iii. 159.—Am. trop.
subseriata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1852) 354-Oxymeris subseriata.
subspicata, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1864 (1856) 126-dependent
suffruticosa, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 185.—Bras.
suldcaulis, Poepp. ex Naud. in Ann. Sc. Nat Sir. III. xvii. (1852) 842 -Oxymeris dichotoma.
sulphurea, Naud. 1. c. 371-Oxymeris velutina.
surinamensis, Miq. Comm. Phytog. ii. 82=umbonata.
Swartrii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 248, pro parte = Sagraea pilosa.
sylvestris, Naud. in Ann. Sc Nat. Sir. III. xvii. (1852) 356— Oxymeris sylvestris.
tetraquetra, Cham, in Linnaea, x. (1836) 42=Oxymeris tetraquetra.
tiliaefolia, *DC. Prod.* iii. 158.—Bras.
trichodes, DC. 1. c 161-Miconia trichodes.
trichotoma, Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub. 96 = Sagraea trichotoma.
triflora, Scheele, in Linnaea, xvii. (1848) 838=Tibouchina viminea.
trinitensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 249-Sagraea trinitensis.
tristis, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1828) 307 - strigillosa.
umbonata, *DC. Prod.* iii. 158.—Bras.
urceolata, DC. 1. c.=neglecta.
urticaefolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii-(1852) 354 = Miconia Berghesiana.
VaUnmuelana, A. Rich. Ess. FL Cub. 652 = Heterotrichum octonum.
velutina, ***D. Don, in Loud. Hort. Brit.*** **174.—Ind: occ.**
verticillata, DC. Prod. iii. 160-Ossaea verticillaU.
violacea, DC. 1. c. 162 = Miconia spondylantha.
vittata, ***Linden & Andre; Illustr. Hortic.*** **xxii. (1875)** 152. t. 219.—Peruv.
Weddellii, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xvii. (1852) 846 — Oxymeris erostrata.
Wrightii, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 185 - Sagraea Wrightii.
xanthocoma, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xvii. (1852) 852=Oxymeris xanthocoma.
xantholasia, DC. Prod. iii. 163-Oxymeris xantholasia.
xantholasia, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. (1848) 344 = Oxymeris carassana.
xanthopogon, Naud. in Ann. Sc Nat Sir. III. xvu-(1852) 849-Oxymeris xanthopogon.

CLIDEMIASTRUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Se>. W-xvii. (1852) 87-Oxymeris, DC. (Melast.).
biseptum, Naud. 1. c. 88-Leandra reversa.
mexicanum, Naud. 1. c. 87 - O . heterobasis.

CLIFFORTIA, Linn. Gen. ed. 1.811 (1737). ROSA-
CEAE, Benth. & Hook. f. i. 624.
MONOGRAFHIDIUM, Presl, Epim. Bot. 202 (1850).
MORILANDIA, Neck. Elem. ii. 99 (1790).
acerosa, Banks, ex Gaertn. Frnct. i. 166 - Nen"x acerosa.
arachnoidea, Lodd. Bot. Cab. t 260=ruscifolia.
baccans, ***Harv. in Harv. (f Send. Fl. Cap.*** **ii. SOS."** Afr. austr.
berberidifolia, Lam. Encyc. ii. 48-femiginea.
cinerea, **Thunb. Prod. PI. Cap. 93 (=*Ambraria hirt*»>-** —Afr. austr.

CLIFFORTIA:—
complanata, E. Mey. ex Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. ii. 801-serpyllifolia.
concavifolia, *Eckl. &• Zeyh. Enum.* 268—Afr. austr.
cordifolia, lam. Encyc. ii. 47=ilicifolia.
cordfrolia, *E. Mey. ex Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 295.—Afr. anstr.
crenata, *Linn.f. Suppl.* 430.—Afr. austr.
cuneata, *[Dryand. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I. iii. 413. Afr. anstr.
dentata, Eckl. *8c* Zeyh. Ennm. 268 = triloba.
dentata, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 299 - gracilis.
dentata, *Willd. Sp. PI.* iv. 842.-Afr. anstr.
Dregeana, *Presl, Bot. Bemeri.* 141.—Afr. anstr...
drepanoides, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 268—"Afr. austr.
ericaefolia, *Linn.f. Suppl.* 480—Afr. austa.
eriocephalina, *Cham, in Linnaea,* vj. (1831) 349—Afr. anstr.
falcata, *Linn.f. Suppl.* 431—Afr. anstr.
falcata, Spreng. ex Eckl. & Zeyh. Enum. 269 = drepanoides.
ferruginea, *Linn.f Suppl.* 429.—Afr. austr.
filicaulis, E. Mey. ex Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. ii. 299 = tricuspidata.
filicaulis, *Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 83—Afr. austr.
filifolia, *Linn./. Suppl.* 430—Afr. anstr.
flobellifolia, Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 597 = Myrothamnns flabellifolia.
fiexuosa, E. Mey. ex Harv. *8c* Sond. 1. c. ii. 296 = ferruginea.
gracilis, *Harv. I. c.* 299.—Afr. austr.
graminea, *Linn.f. Suppl.* 429.—Afr. austr.
grandifolia, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 208—Afr. austr.
*!«/o, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c.=odorata.
>rta, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 81 (err. typ. 27).—Afr. austr.
icifolia, *Linn. Sp. PI.* 1088.—Afr. austr.
rtermedia, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 286—Afr. austr.
nauperina, *Linn.f. Suppl.* 480.—Afr. austr.
*ricina, E. Mey. ex Meissn. in Hook. Lond. Toum. Bot. ii. (1848) 528 -juniperina.
fptophylla, Eckl. *8c* Zeyh. Ennm. 271 = filifolia.
nearifelia, *Eckl. V Zeyh. 1. c.* 270—Afr. austr.
Jttginata, *Eckl. V Zeyh. 1. c.* 269.—Afr. austr.
eyeriana, *Presl, Epim. Bot.* 202.—Afr. austr.
obcordata, *Linn.f. Suppl.* 429—Afr. anstr.
oiliqua, Spreng. Neue Entde-Jt. ii. 174=obcordata.
obovata, *E. Mey. ex Harv. &" Sond. Fl. Cap.* ii. 297—Afr. austr.
°«andra, *Cham, in Linnaea,* vi. (1881) 850—Afr. austr.
odorata, *Linn.f. Suppl.* 481—Afr. anstr.
PWicoides, Eckl. & Zeyh. Ennm. 269=eriocephalina.
Polycephala, *E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 802.—Afr. austr.
Pojygonifolia, *Linn.Sp. Pt.* 1088—Afr. austr.
f'yphylla, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 268 - serpyllifolia.
propinqua, Eckl. *8c* Zeyh. l.c-serpylUfolia.
pulchella, *Linn.f. Suppl.* 480.—Afr. austr.
HOJJgns, *Presl, Epim. Bot.* 202.—Afr. austr.
**>culata, Eckl. & Zeyh. Ennm. 266 = odorata.
rtfaulis, Presl, Bot. Bemerk. 141 = ilidfolia.
*<afolia, *Linn. Sp. PI.* 1088—Afr. austr.
>Mtosa, *Linn. Mant.* ii. 299.—Afr. austr.
*^\, *E* - ****** *Enum.* 269—Afr. austr.
S *Schlecht. in Linnaea,* H. (1827) Afr. anstr.
serpyllifolia, E. Mey. ex Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. ii. 299 = octandra.
serrata, *Reichb. ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 209—Afr. austr.
*Prod. PI. Cap. 98.= ferruginea.
Afr. austr. *t Spreng. Syst*vt. Cur. Post.* 209.—
strobilifera, *Murr. Syst.* ed. XIII. 749.—Afr. anstr.
teretifolia, *I Lim-f Suppl.* 430.—Afr. austr.
tri Linn. f. 1. c. =polygonifolia.
«Mpidata, *Han. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 299.
*J7 - anstr.
, Willd. Sp. PI. iv. 888 = rusdfolia.
h.Sp.H 1038 = polygonifolia.

CJLIPTOIITIA:—
triloba, *Harv. in Hart,* b" *Sond. Fl. Cap.* ii. 298.—Afr. anstr.

CLIFFORTIOIDES, Dryand. ex Hook. Ic. PI. t. 639 (1844)=FagU0, Toum. (Cupulif.).
oblongata, Dryand. 1. c. 689, 673 - F . Solandri.

CLIFTONIA, Banks, ex Gaertn. f. Frnct. iii. 246. t. 225 (1805). *CYRILLEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 1226.
MVLOCAKYUM, Willd. Enum. Hort Berol. 454 (1809).
WALTERIANA, Fras. ex Endl. Gen. 1413 (1841).
ligustrina, Sims, ex Spreng. Syst. ii. 816 = nitida.
nitida, *Gaertn. f. 1. c.* 247.—Am. bor.

CLIMACANDRA, Miq. PI. Jungh. 199 (1851-55)-Ardisia, Sw. (Myrsin.).
littoralis, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) II. 68 = A. hnmilis.
multiftora, Miq. PI. Jungh. 200=A. humilis.
obovata, Miq. 1. c 199=A. hnmilis.
pergamacea, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 578**Embelia pergamacea.
salidfolia, Miq. PI. Jungh. 200-A. hnmilis.

CLIMEDIA, Rafarin, in Rev. Horrtc. (1877) 88, sphalm. -Clidemia, D. Don (Melast.).

CLINACANTH08, Nees, in DC. Prod. xi. 511 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1105.
angustus, Nees, 1. c-Isoglossa angusta.
Burmanni, *Nees, I. c.*—Java.

CLINANTHUS, Heib. App. 40 (1821) = Stenomeaaou, Herb. (Amaryll.).
luteus, Herb. 1. c. 40=S. lutenm.

CLINHYMENIA, A. Rich. & Gal. in Comptes-Rendus, Acad. Sc. Par. xviii. (1844) 612 = Cryptarrhena, R. Br. (Orchid.).
pallidiftora, A. Rich. & Gal. I. c. = Crypt pallidiflora.

CLINOGYNE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 276. *SCITAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. Hi. 651.
DONAX, Lour. Fl. Cochinch. 11 (1790).
dlchotoma, *Salisb. I. c.*—Ind. or.; Malaya,
filipes, *Benth. (f Hooh.f. Gen.* iii. 651.—Afr. trop.
grandis, *Benth.* b* *Hook.f. I. c*—Burma; Malaya,
virgata, *Benth. & Hook./. I.* c—Ind. or.

CLINOPODIUM, Linn. Syst. ed. I (1785) = Oalamintha, Toum. (LabiaO.
aegyptiacum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 - Calamintha Clinopodium.
albidum, Veil. Fl. Flum. 242; vi. t. 6 - Hyptis paludosa.
angustifolium, Roxb. Hort. Beng. 44, nomen (quid I).—Hab. f
arundanum, Nym. Syll. 101 = Calamintha Clinopodium.
arvense, Veil. Fl. Flnm. 243; vi. t. 9.—Bras.
asiaticum, Lour. Fl. Cochinch. ii. 874 *(=Melissa asiatica)* (=Anisochili sp.).—Cochinch.
atropurpureum, Hort. Hafn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 886 = Calamintha Clinopodium.
brasilicum, Veil. Fl. Flnm. 241; vi. t. 3.—Bras.
capitatum, Sw. Prod. Veg. lad. Occ. 88 - Hyptis capitata.
carolinianum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 5«Calamintha caroliniana.
Chamaedrys, Vahl, Symb. Bot. iii. 77=Marsypianthes hyptoides.
cordatum, Veil. Fl. Flum. 243; vi. t. 8.—Bras.
fruticosum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 107 = Otostegia scariosa.
glabrescens, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 122.—Algeria.
grandiftorum, Gueldenst. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 899-Suchys grandiflora.
humile, Mill. Card. Diet ed. VIII. o. 4.—Am. bor.

CUNOPODIUM:—
imbricatum, Veil. Fl. Flum. 242; vi. t. 5 = Hyptis pectinata.
incanum, Linn. Sp. PI. 588 = Pycnanthemum incanum.
longicaule, Benth. in Wall. PI. As. Rar. i. 66 - Calamintha longicanlis.
martinicense, Jacq. Enum. PI. Carib. 25 - Leucas martinicensis.
origanifacie, Gilib. Fl. Litnan. i. 76 = Calamintha Clinopodium.
origanifolium, Labill. Ic. PI. Syr. dec. iv. 14. t. 9 = Calamintha origanifolia.
plumosum, Sieber, in Flora, v. (1822) 242 - Calamintha Clinopodinm.
repens, Koxb. Hort. Beng. 44; Fl. Ind. iii. 13 - Calamintha umbrosa.
repens, Veil. Fl. Flum. 242; vi. t. 7 = Peltodun radicans.
rugosum, Linn. Sp. PI. 588 = Hyptis radiata.
variegatum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 386 = Calamintha Clinopodinm.
vertidllatum, Veil. Fl. Flum. 242; vi. t. 4—Bras.
villasum, Noé, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii (1855) 580 ~ Calamintha Clinopodium.
vulgare, Linn. Sp. PI. 587 = Calamintha Clinopodium.

CIiINOSTIGHA, H. Wendl. in Bonplandia, x. (1862) 196. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 8»4.
BUlardietii, Becc Maksia,i. (1877) 41 = Microkentia Billardierii.
bractealis, Becc. 1. c. 40 = Cyphokentia bractealis.
Deplanchei, Becc. 1. c. 41 = Microkentia Deplanchei.
eriostachys, Becc. 1. c. = Microkentia eriostachys.
Humboldtiana, Becc. 1. c. 40 = Cyphokentia Humboldtiana.
macrostachya, Becc. 1. c = Cyphokentia macrostachya.
Moorianum, *F. Muell. Fragm.* viii. 285.—Austral.
Pancheri, Becc. Malesia, i. (1877) 40 = Microkentia Paneheri
robusta, Becc 1. c. = Cyphokentia robnsta.
samoënse, *H. Wendl. in Bonplandia,* x. (1862) 196—Ins. Samoa.
surculosa, Becc. Malesia, i. (1877) 41 = Microkentia surculosa.
vaginata, Becc. 1. c. - Cyphokentia vaginata.

CLINOSTYLIS, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 26-Oloriosa, Linn. (Liliac).
speciosa, Hochst. L c.»G. abyssinica.

CLINTONIA, Dougl. exLindl. Bot. Reg. 1.1241 (1829) = Downiugia, Torr. (Campannlac).
Bergiana, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 217 = Lobelia Bergiana.
corymbosa, DC. Prod. vii. 847=D. elegans.
elegans, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1241 - D. elegans.
pulchella, Lindl. 1. c. t. 1909 - D . pnlchella.
pusilla, G. Don, Gen. Syst. iii. 718.—Chili.

CZiINTONIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266; Journ. Phys. lxxxix. (1819) 102. *L1LIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 832.
HYLOCHARIS, Tiling, ex Regel *8c* Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat Mosc. xi. (1859) 128.
XENIATKUM, Salisb. Gen. PI. Fragm. 58 (1866).
Aitoni, Rafin. Atl. Joura. 120=borealis.
alpina, *Kunth, Enum. PI.* v. 159.—Reg. Himal.
Andrewsiana, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* Iv. 150 Calif.
Andrewsii, Wood, in Proc. Acad. Philad. (1868) 174—Andrewsiana.
angustifolia, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 79.—Am. bor.
biflora, Rafin. 1. c. 78.—Am. bor.
biumbella, Rafin. 1. c. 81 = borealis.
borealis, *Rafin. Atl. Journ.* 120.—Am. bor.
ciliata, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 357 - borealis.
decantha, *Rafin. Atl. Journ.* 120.—Am. bor.
falcata, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 79—Am. bor.
fnlva, *Rafin. I. c.* 82.—Am. bor.
glomerata, *Rafin. I. c.* 83.—Am. bor.
fatifolia, *Rafin. 1. c.* 81.—Am. bor.
multiftora, Beck, Bot. 358=umbellata.

CLINTONTA:—
mnltiflora, *Roftn. All. Journ.* 120.—Am. bor.
mutatis, Rafin. Ann. Nat. 16 = borealis.
nutans, *Rafin. Med. Fl.* ii. SS = praec.
odorata, Rafin. Ann. Nat. 16=nmbellata.
ophioglossoides, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 80.—Am. bor.
parviflora, *Rafin. Ann. Nat.* 16.—Am. bor.
podanisia, *Rafin. I. c.*—Am. bor.
triflora, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 79.—Am. bor.
**udensis, *Trautv. V Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot.* 92).—Sibiria ; Japon.
nmbellata, *Torr. Fl. N. York*, ii. 801.—Am. bor.
undulata, Rafin. New Fl. Am. ii. 81 = borealis.
uniflora, *Kunth, Enum. PI.* v. 159.—Am. bor. occ.

CLIOCARPUS, Miens, in Ann. Nat. Hist Ser. II. IT. (1849) 141-Bolanum, Tonrn.
didymus, Miers, 1. c. xv. (1865) 204=S. didymum.
eriocalyx, Mien, 1. c. = S. trichocalyx.
Gardneri, Miers, 1. c iv. (1849) 141.—Bras.
megalockiton, Mien, 1. c xv. (1855) 208 = S. megalochiton.

CLIOCOCCA, Bab. in Proc. Linn. Soe. i. (1841) 90; et Trans. Linn. Soc. xix. (1842) 83. t 3 = Tiiniim, Tourn.
tenuifolia, Bab. in Trans. Linn. Soc. xix. (1845) 33, 34 = L. selaginoides.

CLIPTERIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 44 (1886) = Eolipta?, Linn. (Compos.).
dichotoma, Rafin. 1. c.—Am. bor.

CLISTANTHUS, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. n. 1025 (1866) = CLISTRANTHUS, Poit. = **Fera,** Matis (Euphorb.).

CLISTAX, Mart Nov. Gen. et Sp. iii. 26 (1829).
ACANTHACEAE, Benth. *8c* Hook. f. ii. 1120.
CORYTHACANTHUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 444 (1836).
brasiliensis, *Mart. 1. c.*—Bras,
speciosus, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 14.—Bras.

CLISTRANTHUS, Poit. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 484 (1868)-**Fera,** Mutis (Enphorb.).

CLITANDBA, Benth. in Hook. Niger Fl. 445 (1849).
APOCYNACEAE, Benth. *8c* Hook. f. ii. 692.
cirrhosa, *Radii, in Bremen Abh.* viii. (1883) 400.—Afr. trop.
cymulosa, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 445.—Afr. trop.

CLITANTHES, Herb, in Bot. Reg. (1889) Misc. 87 = Chlidanthus, Herb. & Stenomesson, Herb. (Amaryll.).
humilis. Herb. 1. c. - Stenomesson humile.
lutea, Herb. 1. c - Chlidanthus fragrans.
Macleanica, Herb. 1. c—Peruv.

CLITANTHUM, Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 733(1880-88)-ChlidanthU8, Herb. (AmarylL).

CLITOCYAMOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128,133-Ipomoea, Linn. (Convolvulac).
pinnatifidus, St. Lag. 11. cc. = I. Quamoclit.

CLITOBIA, Linn. Gen. PI. ed. I. 216 (1737).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 527.
MARTIA, Leandr. Sacr. in Denkschr. Akad. Mnench. vii. (1821) 233.112.
MARTIUSIA, Schult. Mant i. 69 (1822).
NAUCHBA, Desconrt. in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1825) 7. t 1.
NEUROCARPUM, Desv.Jonrn. Bot. i. (1813) 119; iii. (1814) 75.
RHOMBIFOLIUM, Rich, ex DC. Prod. ii. 235 (1825).
TERNATEA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I. (1735); H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi 415 (1823).
VEXILLARIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
acuminata, Benth. in Ann. Wien. Mm. i. (1838) 115—amazonum.

CLITOBIA:—
acuminata, R. Grah, in Wall. Cat. n. 5346-Mariana.
alaiamensis, Bertol. Misc. Bot. ix. 12-virginiana.
alba, G. Don, GeD. Syst. ii. 215.—Ins. S. Thomas,
amazonum, *Mart, in Ann. Wien. Afus.* ii. (1838) 115.—Bras,
ameena, Miq. in-Nat. Verh. Wet. Haarl. vii. (1851) 24—arborescens.
amoena. Roth, inRoem. Arch. i. III. 42-Centroseroa virginianom.
angustifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 417 = Centrosema angustifolium.
angustifolia, Nees *8c* Mart, in Nov. Act. Nat. Cnr. xii. (1824) 29=GalactisMartii.
aquilupiensis, Raensch. Nom. ed. III. 210=quadalupensis.
arborea, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 115-Hoffmanseggii.
arborescens, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 302.—Ins. Trinitat.
aastralis, *Benth. Fl. Austral*, ii. 242.—Austral.
Berteriana, DC. Mem. Leg. vi. 239 = Periandra Berteriana.
biflora, *Dal*, in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 35.—Ind. or.
brachystegia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 84.—Ecuador.
bracteata, Poir. Eneyc. Suppl. ii 301 = C. Tematea.
brasiliana, Linn. Sp. PI. 753 = Centrosema brasdlianum.
brasiliana, Veil. Fl. Flam. 312 ; vii. 1129 = Canavalia ensiformis.
Broussonetii,, Balb. Cat. Taur. (1813) 26 •= Cologania Broussonetii.
cajanifolia, *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. 1.121.—Reg. trop.
calcarata, L'Herit. ex DC. Prod. ii. 235-Centrosema Plumieri.
calcarigera, Salisb. Parad. Lond. t. 51 - Centrosema virginiannm.
capitata, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Pa*,* i. (1792) 111.—Ind. occ
coccinea, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 717 = Periandra coccinea.
densiflora, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 41.—Am. trop.
erecta, *Roxb. Hort. Beng.* 56.—Am. trop.
falcata, Lam. Encyc. ii. 61 = glycinoides.
faleata, Nees, in Flora, iv. (1821) 329 = Periandra coccinea.
flagellaris, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 89.—Am. trop.
fluminensis, Veil. Fl. Flnm. 312; vii. t. 128-Centrosema Plumieri.
formosa.H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 417-Centroscms bntsilianuni.
fulgens, Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 121 *(= CoUaea* ***scarlatina).*—Bras.**
Galactia, Linn. Sp. PI. ed. II. 1026 - Galactia pendula.
gemina. Veil. Fl. Flam. 318; vii. t. 180 = Centrosema virginianum.
glabella, Desf. Tabl. ed. 1.192-Galactia glabella.
gladiata, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 229 = Centrosema virginianum.
glomerata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 74.—Cuba,
glycinoides, *DC. Prod.* ii. 284.—Bras.
Grahami, Steud. Nom. ed. II. i. 386-Mariana,
grandiflora, *Mart, (f Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1848) II. 189.—Mexic.
guadelupensis, vide quodelupensis.
gaianensis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 40.—Am. trop.
heterophylla, *Lam. Encyc.* ii. 51.—Ind. or.
Hofiimanseggii, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 48.—Am. trop.
insulana, Veil. Fl. Flnm. 313; vii. 1131=Centrosema brasilianum.
javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 226=macrophylla.
Javitensis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1868) 42.—Mexic.
lactescens, Linn. Syst. ed. X. 1172 = Galactia pendula.
lasciva, *Boj. Hort. Maurit.* 92, nomen; *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 114.—Madag.
laurifolia, Desv. in Ann. Sc Nat. Ser. I. ix. (1826) 411 = Centrosema vexillatum.
laurifolia, Poir. Encyc Suppl. ii. 301-cajanifolia.
leptostachya, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 43.—Am. trop.
macrophylla, *Wall. Cat.* n. 6345.—Burma.

CLITOBIA:—
Mariana, *Linn. Sp. PI.* 753.—Ind. or.; Burma; Am. bor.
Mariana, Moc. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. ii. 238 = Galactia radicata.
mexicana. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 285 -Mariana,
micrantha, *Guill. (f Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 190.— Afr. trop.
micrantha,Scop. Delic. Insnb. ii. 1 = Galactia longifolia.
micrantha, Sm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 386-Centrosema virginianum.
mucronulata, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 435.—Bras,
multiflora, *Mart, &" Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 188.—Mexic.
muUiflora, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 106 = Vilmorinia mnltiflora.
nana, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 40.—Am. trop.
oilonga, Hassle, in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 48 = Centrosema virginianum.
occidentalis, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 140.—Ind. occ.
parviflora, *Rafin. Atl. Journ.* 147.—Am. bor.
pedunculata, *Boj. ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 114.—Madag.
pedunculata, *Micheli, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1876) 77.—Bras.
Phyrne, Steud. Nom. ed. I. 208, 349-Galactia sericea.
pilosula, Wall. Cat. n. 6347 =>C. Ternatea.
Plumieri, *Turp. in Pers. Syn.* ii. 303 = Centrosema Plumieri.
Poitaei, Benth. in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) 434 = arborescens.
Poiteaui, DC. Prod. ii. 234=arborescens.
polypkylla, Poir. Encyc. Suppl. ii. 800 - Barbieria polyphylla.
polystachya, *Benth. PI. Hartn.* 60.—Mexic.
portobellensis, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1856) 119.—Panama,
pudica, *Steud. Nom.* ed. II. i. 386.—Cuba,
quadalupensis, *Scop. Delic. Insub.* ii. 4.—Ins. Guadalup.
racemosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 215; *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 115.—Bras.
rubiginosa, Juss. ex Pers. Syn. ii. 312-glycinoides.
ruiiginosa, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 29 = Galactia Neesii.
rnfescens, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 39.—Bras.
Schiedeana, Schlecht in Linnaea, xii. (1838) 284 > Centrosema pubescens.
Selloi, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 42.— Am. trop.
simplicifolia, *Benth. 1. c.* 40.—Am. trop.
sinuata, Desv. in Ann. Sc Nat Ser. I. ix. (1826) 120—Centrosema sinuatum.
speciosa, *Cav. Desc.* 182.—Mexic.
spectabilis, Salisb. Prod. 836 - C . Ternatea.
stipularis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 41.—Am. trop.
Tematea, *Linn. Sp. PI.* 758.—Reg. trop.
ternatensium, Crantz, Inst. ii. 59 = C. Tematea.
tetragona, Poir. ex DC. Prod. ii. 236 - glycinoides.
tomentosa. Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 30=Galactia tomentosa.
tristis, *Tenore, Cat. Hort. Neap.* (1845) 82.—Hab. *1* ,.
vicioides, Nees *8c* Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 28 = Coursetia vicioides.
virginiana, Linn. Sp. PI. 753 - Centrosema virginianum.
viridifiora, Bouton, ex Hook. Ic. PI. t. 152 = Dolichos axillaris.
zanzibarensis, *Vatie, in Oestr. Bot. ZeiUchr.* xxviu. (1878) 261.—Afr. trop.
soophthalmum, Linn.Syst.ed. X. 1172 - Dolichosnrens ?

CLITORIASTRUM, Heist Syst. 9 (1748)=Clitoria, Linn. ? (Legumin.).

OLIVIA, Lindl. Bot. Reg. 1.1182 (1828). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 729.
IMATOPHYLLUM, Hook. Bot. Mag. t 2856 (1828).
Gardeni, *Hook. Bot. Mag.* t. 4896.—Afr. austr.
miniata, *Regel, Gartenfl.* (1864) 131.—Afr. austr.
nobilis, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1182.—Afr. austr.

CLOANTHE, Nees, in R. Br. Verm. Schr. i. 78 (182W = Ohloanthee, R. Br. (Verbenac).

CLOEZIA, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 676. *MYRTACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 709.
BALLARDIA, Montr, in Mem. Acad. Lyon, x. (1860) 201.
MOOKIA, Montr. 1. c. (1860) 207.
buxifolia, *Brongn. tf Gris, I. e.* 677.—N. Caled.
canescens, *Brongn. tf Gris, I. c*—N. Caled.
Deplanchei, *Brongn. tf Gris, I. e.*—N. Caled.
floribonda, *Brongn. tf Gris, I. c.*—N. Caled.
Mgustrina, *Brongn. tf Gris, 1. c*—N. Caled.
sessilifolla, *Brongn. tf Gris, I.* c—N. Caled.

CLOMENA, Beauv. Agrost. 28. t. 7. £ 10 (1812) = Jffuehlenbergia, Schreb. (Gramin.).
peruviana, Beanv. 1. c=M. Clomena.

CLOMENOCOMA, Cass. in Diet. Sc. Nat. ix. 416 (1817)=Dysodia, Cav. (Compos.).
auraniia, Can. 1. c.=D. appendiculata.
montana, Benth. PL Hartw. 86 «D. grandiflora.
pinnata, DC. Prod. T. 641=D. pubescens.

CLOMENOLEPIS, Cass. in Diet Sc Nat. iii. Snppl. 64 (1816), nomen (Compos.).

CLOMIUM, Adans. Fam. ii. 116 (1768)-Carduus, Tourn. (Compos.).

CLOMOPANUS, Stend. Norn. ed. II. i. 386 (1840) =seq.

CLOMPANUS, Anbl. PL Gnl. fl. 778 (1775)=Lonehocarpus, Hnmb. & Bonpl. (Legnmin.).
Paniculate, Anbl. 1. a—Guiana.

CLOMPANUS, Rafin. Sylva Tellur. 73 (1838)-Bter-OUlia, Linn.
nolucanus, Rafin. 1. c.—Ins. Molncc.

CLONODlA, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xfl. I. 26 (1858). *MALPIGHIACEAS*, Benth. & Hook. f. i. 253.
verrucosa, *Griseb. I. c.*—Bras.

CLONOSTACHYS, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 185=8ebastiania, Spreng. (Euphorbiac.).

CLOSASCHIMA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 139 (1842)~Laplaoea, H. B. *Sc* K. (Temstroemiac.).
[illegible], Korth. 1. c. 1441 L. marginata.
ovalis, Korth. 1. c. 140=L. ovalis.

CLOBIA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 119. t. 46. f. 2 (W49). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 404.
Wthemoides, *Phil. Fl. Atac.* 31.—Chili.
I*"'*, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 120.—Chili.
""ensis, *Regel tf Koern. Ind. Sent. Hort. Petrep.* ..(1857)89.1chili.
owcoidea, *Phil. Fl. Atac.* 81.—Chili.
[illegible], Phil. l. c.—Chili.
pusilla, Phil. I.e.—Chili.

CLOSIROSPERMUM, Neck. Elem. i. 54 (1790) = »Pta, Linn. (Compos.).

CLOSTERANDRA, Boiv. ex Belang. Voy. Indes Or. t. *wque num. (1839) = Fapaver, Tourn.
minor, Boiv.l.c. = P.BeUnBeri.

CLOSTERANTHERA, Walp. Rep. i. 116 (1842)=praee.

CLUSIA, Linn. Gen. ed. 1. 844 (1787). *GUTTIFERAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 170.
ANDROSTYLIUM, Miq. in Nat. Verh. Wet. Haarl. vii. (1851) 93.
ASKUDEA, St. Hil. Fl. Bras. Met. i. 318. t. 66 (1827).
ASTHOTHECA, Miers, ex Planch. *Sc* Triana, in Ann. Sc. Nat Ser. IV. xiv. (1860) 264.
BIKOLIA, Rafin. Sylva Tellur. 168 (1838).
CAHOTIA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 448.
COCHLANTHERA, Choisy, Gntt. Ind. 46. t. 3 (1828).
ELWERTIA, Rafin. Sylva Tellur. 163 (1838).
FIRKEA, Rafin. 1. c (1838).
HAVETIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 203 (1821).
ICOSTEGIA, Rafin. Sylva Tellnr. 163 (1838).
LIPOPHYLLUM, Mien, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1855) 251. t. 26.
OXVSTEHON, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. xiii. (I860) 314.
POLYTHECANDRA, Planch. & Triana, 1. c. (1860).
QUAPOYA, Aubl. PI. Gni. ii. 897 (1775).
SMITHIA, Scop. Introd. 322 (1777).
TRIPLANORON. Benth. Bot Voy. Sulph. 73. t. 38 (1844).
XANTHE, Schreb. Gen. 710 (1791).
acuminata, *Planch, (f Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 358.—Panama,
acuminata, *Spreng. Syst.* ii. 699.—Porto Rico,
alata, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xiii. (1860) 861.—N. Granat.
alba, Choisy, in Planch. *Sc* Triana, 1. c. 326 = palnicida.
alba, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 34.—Ind. occ.
alba, Kunth, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 107=rosea.
amazonica, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 358.—Bras,
bicolor. *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 164.—Bras.
Brongnitrfana, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. iiiii. (1860) 355.—Ind. occ.
Cambessedii, *Planch. & Triana, I. c.* 360.—Bras.
Candelabrum, *Planch. V Triana, 1. c.* 348.—Am. trap,
cassinioides, *Planch. V Triana, I. c.* 369.—Peruv.
Couleti, Duchass. ex Planch. *Sc* Triana, 1. c. 833-minor.
crassifolia, *Planch, tf Triana, I. c.* 351.—Am. trop.
Cniiva, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. tier.* i. 81?—Bras,
enneata, *Benth. in Hoot. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 368.—Guiana,
decussata, *Ruie V Pav. ex Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiii. (1860) 320, 345.—Peruv.
Ducu, *Benth. PI. Hartw.* 126.—PeruV.
elliptica, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 199.—Perav.
eugenioides, *Planch. V Linden, ex Planch, b" Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 319, 328.—N. Granat.
flava, *Jacq. Enum.*" *Carib.* 84.—Jamaica.
fiava, Willd. ex Steud. Mom. ed. II. i. 387 = Hoffmannseggiana.
flnminensis, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 849.—Bras.
Fockeana, *Miq. in Hon. V De Vriese, Tijdschr.* x. (1843) 82.—Gniana.
fragrans, *Gardn. in Hook. Lond. Journ.Bot.* ii. (1848) 334.—Bras.
ganabarica, Casar. Nov. Stirp. Bras. Decad. 60=Sellowiana.
Gardnerii, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 819, 328.—Bras.
Gaudichaudii, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Her.* i. 818.—Bras.
Gaudichaudii, Choisy, ex Planch. *Sc* Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiii. (1860) 359=Sellowiana.
grandiflora, *Splitg. in Hoev. tfDe Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 101.—Guiana.
guatemalensis, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 2.—Am. centr.
Gundlachi.ftoA/, *Estud. Fl. Puerto-Rico, foil.* ii. 122.—Ind. occ.
havetioides. *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiii. (1860) 368.-Ind. occ.
Hilariana, *Schlecht. in Linnaea*, vili. (1888) 181.—Bras.
Hoffmannseggiana, *Schlecht. 1. c.* 185.—Bras.
lldefonsiana, A. Rich, ex Planch. *Sc* Triana, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xiii. (1860) 359 = Sellowiana.

CLTJSIA:—
insignis, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 164.—Bras,
lanceolata, *Cambess. in St. Hil. PI. Bras. Mer. i.* 318.—Bras,
latipes, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiii (1860) 366.—N. Granat.
laurifolia, *Planch, tf Triana, I. c.* 844.—N. Granat.
laxiflora, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 868.—Peruv.
leprantha, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 165.—Bras,
leprata, *Mart. I. c*—Bras,
leucantha, *Schlecht. in Linnaea*, viii. (1833) 186.—Bras.
Lhotzkyana, *Schlecht. in Linnaea*, viii. (1833) 184.—Bras.
Lhottsiyana, Choisy, ex Planch. *Sc* Triana, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. xiii. (1860) 319, pro parte=Hila riana.
lineata, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 845.—N. Granat.
longifolia, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 113 = Micranthera dnsioides.
loranthacea, *Planch, tf Triana, in Ann.Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 846.—N. Granat.
macrocarpa, *Spreng. Syst.* ii. 599.—Guiana.
major, Linn. Sp. PI. 509=alba,
mammosa, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Decad.* 60.—Bras.
Mangle, *Rich, ex Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 369.—Ins. Guadelup.
maxima, Rich, ex Planch. *Sc* Triana, 1. c. 325=grandiflora.
micrantha, Choisy, ex Planch. & Triana, 1. c. 259= Sellowiana.
microcarpa, *Spreng. Syst.* ii. 598.—Guiana,
microstemon, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 381.—Bras,
minor, *Linn. Sp. PI.* 610.—Guatemala,
multiflora, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* v. 200.—N. Granat.
myriandra. *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 332.—Guiana,
nemorosa, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 203.-Guiana.
nutans, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 378.—N. Granat.
odorata, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 89.—Am. centr.
organensis, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (I860) 849.—Bras.
Orizabae, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 3.—Mexic.
ovigera, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 364.—Mexic.
palmicida, *Rich, ex Planch, tf Triana, I. c.* 826.—Guian.
Panapanari, Choisy, in DC. Prod. i. 559 = macrocarpa.
parviflora, *Humb. tf Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 976.—Ins. Margarita.
Pavonii, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV xiii. (1860) 863.—Peruv.
pedicellata, *Forst.f. Prod.* 74. n. 890.—N. Caled.
pentarhyncha, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xiii. (1860) 365.—N. Granat.
petiolaris, *Planch, tf Triana, I. c.* 378.—N. Granat.
Plumerii, *Planch, tf Triana, I. c.* 340.—Ins. S. Doming,
popayenensis, *Planch, tf Triana, 1. c.* 368.—N. Granat.
Pratensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 89=minor,
pseudochina, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 12.—Perav.
pseudo-havetia, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiii. (1860) 366.—Peruv.
pseudo-mangle, *Planch, tf Triana, I. c.* 370.—Peruv.
Puat, *Montr, in Mfm. Acad. Lyon*, x. (1860) 188.—N. Caled.
Quapoya, Choisy, in DC. Prod. i. 659=microcarpa.
radicans, *Pav. ex Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 374.—Peruv.
renggerioides, *Planch, tf Triana, 1. c.* 350.—Bras.
retusa, Poir. Encyc. v. 188=rosea.
rosaeflora, *Planch, tf Linden, ex Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xiii. (1860) 348.—Venezuela.
rosea, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 84.—Ins. S. Doming.
rosea, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 316 = Hilariana.
rnpicola, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Decad.* 60.—Bras.
Seemanii, *Planch, tf Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xiii. (1860) 847.—Panama.

CLUACENA, Rafin. Sylva Tellur. 104 (1838) = Myrtus, Tourn.
myrsinoides £ afin. l. c-M. myrsinoides.
vaccinioides, Rafin. 1. c.=M. vaccinioides, *H. B. tf K.*

CLUERI Rafin. Fl. Tellur. iii. w (18«)=Eremolaciniata, Rafin. L c.-E.'laciniata.

CLUGNIA, Comm. ex D yst. i. 433 (1816) = Wormia, Rottb. (Dillen
volubilis, Comm. ex SteBd_ Nom_ * I. 208 = w_ madagascariensis.
volupis, Comm. ex DC. W. madagascariensis.

CLUSIA:—
Sellowiana, *Schlecht. in Linnaea,* viii. (1833) 183.—Bras.
sessiliflora, *Pair. Encyc.* v. 183.—Madag.
sessilis, *Forst.f. Prod.* 74. n. 391.—Ins. Amicor.
Sieboldii, *Reǥel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 38.—Hab.?
sphaerocarpa, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat. Sir* IV. xiii. (1860) 862.—Peruv.
Spruceana, *Planch. V Triana, I. c.* 346.—Pernv.
sabsesàlis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 72.—N. Grenat.
sulphurea, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 866.—Peruv.
tetrandra, *Humb. V Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 978.—Ecuador,
thnrifera, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xiii. (1860) 364.—Pernv. *1*
venosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 34.—Ind. occ
venosa, L;mn. Sp. PI. ed. II. 1495-minor,
volubilis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 200.—N. Granat.
Weddelliana, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiv. (1860) 233.—Bras.

CLUSIANTHEMUM, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1865) 338 - Garcinia, Linn. (Gnttifer.).
coriaceum, Vieill. 1: c. *S83=pedicellatum.*
densiflorum, Vieill. ex Pierre, FL For. Cochinch. fasc. v. 25 = G. densiflora.
pedicellatum, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1365) 389.— N. Caled.

CIIUSZEIILA, Planch. & Triana, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 253. *GUTTIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 172.
elegans, *Planch, (f Triana, I. c*—N. Granat.

CLUSIOPHYLLEA, Baill. Adansonia, zU. (1878) 197 = Fleotronla, Linn. (Robiac).
Pervilleana, Baill. 1. c ˛ (=*Canthium Perrilleanum).* —Madag.

CLUSIOPHYLLUM, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 618 = Cunuria, Baill. (Euphorb.;.
Sprucei, MuelL 1. c. 619 >Cnn. Spruceana.

CLTTxTIA, Boerh. ex Linn. Syst. ed. I (1735) (CIntia). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 302.
ALTORA, Adans. Fam. ii. 356 (1763).
CRATOCHWILIA, Neck. Elem. ii. 339 (1790).
abyssinica, *Jaub. tf Spach, Illustr.* v. 77. t. 468.—Abyssin.
acuminata, E. Mey. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 125 = polifolia.
acuminata, *Linn./. Suppl.* 432.—Afr. anstr.
acuminata, Thunb. Prod. PL Cap. 63 = Lachnostylis hirta.
affinis, *Send, in Linnaea,* xxiii. (1850) 126.—Afr. anstr.
africana, Poir. Encyc. Suppl. ii. 802 = daphnoidei.
alaternoides. *Linn. Sp. PI.* 1042.—Afr. austr.
andregyna, Linn. Mant. i. 128=Sauropus albicans.
bengnelensis, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 337.—Afr. trap.
brevi/olia, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 125 = polifolia.
Cascarilla, Linn. Sp. PI. 1042 = Croton Cascarilla.
collina, Roxb. PI. Corom. ü. 37 = Cleistanthus collinus.
cordate, *Bernh. in Flora,* xxviii. (1845) 81.—Afr. austr.
cotinifolia, Salisb. Prod. S90=pulchella.
curvata, C. Mey. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 121 = polygonoides.
daphnoides, Eckl. & Zeyh. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1054=polygonoides.
daphnoides, *Lam. Encyc.* ii. 54.—Afr. austr.
decandra, Crantz, Inst. i. 201-Croton Elnteria.
diosmoides, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1860) 122.—Afr. austr.
diversifolia, Roxb. Hort. Beng. 104 ; Fl. Ind. iii. 731 = Cleistanthus diversifolius.
Dregeana, *Scheele, in Linnaea,* xxv. (1852) 583.—Afr. austr.
Eckloniana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1064.—Afr. austr.
Eluteria, Linn. Sp. PI. 1042=Croton Eluterla.

CLUVT1A:—
ericoides, Krebs, in Flora, xxviii. (1845) 82=polygonoides.
ericoides, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 68.—Afr. austr.
floribunda, BaUl. Etud. Gen. Euph. Atlas, SO. t. 16. C 1-5 >alaternoides.
gracilis, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 151-tenuifolia.
heterophylla, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 128 = Sonderiana.
heterophylla, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 63.—Afr. anstr.
hirsuta, Eckl. & Zeyh. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 126=daphnoides.
hirsuta, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. H. 1046.—Afr. austr.
hirta, Linn. f. Suppl. 432 =• Lachnostylis hirta.
hirta, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 101.—Afr. anstr.
humilis, Bemh. in Flora, xxviii. (1845) 81 - pubescens.
Jaubertiana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1044.—Arabia.
lanceolata, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* 170.—Arabia.
lanceolata, Jaub. & Spach, Illustr. PI. Or. v. t. 467 = Jaubertiana.
marginata, E. Mey. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 130—tomentosa.
Meyeriana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1055.—Afr. austr.
monoica, Lour. Fl. Cochinch. ii. 638 = Cleistanthus monoicus.
montana, Roxb. PI. Corom. iii. 38. t. 171 = Briedelia montana.
myricoides, *Jaub. &• Spach, Illustr. PI. Or.* v. 73. t 466, 466.—Arabia,
natalensls, *Bernh. in Flora,* xxviii. (1845) 81.—Afr. austr.
oblongifolia, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 730 = Cleistanthus chartaceus.
oblongifolia, Wall. Cat. n. 7886 = Trigonostemon semperflorens. JK
ovalis, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 583 = Andrachne ovalis.
ovalis, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1860) 129.—Afr. austr.
patula, Herb. Roxb. ex Wall. Cat. n. 7877 = Cleistanthus collinus.
patula, Roxb. PI. Corom. ii. 37. t. 170-Cleistanthus patnlus.
phyllanthifolia, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 188 = affinis.
polifolia, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 67. t. 250,-Afr. austr.
polifolia, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 124 = pterogona.
polygalaefolia, Salisb. Prod. 800 = afaternoide*.
polygonoides, *Burin./. Fl. Cap. Prod.* 31 (err. typ. 27).—Afr. austr.
polygonoides, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1475.—Afr. anstr.
polygonoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 53-daphnoides.
polygonoides, Willd. Hort. BeroL t. 51= alaternoides.
pterogona, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. 11. 1048.—Afr. austr.
pubescens, Eckl. & Zeyh. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 128 = affinis.
pubescens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 58.—Afr. anstr.
pubescens, Willd. Sp. PI. iv. 881 = daphnoides.
pnlchella, *Linn. Sp. PI.* 1042.—Afr. austr.
pulchella, Sparm. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 126 = daphnoides.
retusa, Herb. Wight, ex Wall. Cat n. 7877 = Cleistanthus collinus.
retusa, Linn. Sp. PI. 1475 = Bridelia retusa.
retusa. Moon, Cat. PI. Ceyl. 71 = Bridelia Moonii.
Richardiana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1044.—Afr. trop.
rubricaulis, Eckl. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 128—alaternoides.
scandens, Roxb. PI. Corom. ii. 89. t. 173 = Bridelia stipularis.
semperflorens, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 730 = Trigonostemon semperflorens.
semperflorens. Wall. Cat. n. 7852 B. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 474-Sympbyllia silhetiana.
sempervirens, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 764 = Symphyllia silhetiana, Trigonostemon Hookerianus.
sericea, *Muell. Arg. I. c.* 1058.—Afr. austr.
similis, *Muell. Arg. I. c.* 1046.—Afr. austr.
Sonderiana, *Muell. Arg. 1. c.* 1051.—Afr. anstr.

CIiUYTIA:—
spinosa, Roxb. PL Corom. Ii. 38. t. 172 = Briedelia retusa.
squarrosa, Lam. Encyc. ii. 64 = Briedelia retusa.
stipularis, Linn. Mant. 127-Briedelia stipularis.
tabularis, Eckl. & Zeyh. ex Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 122=polygonoides.
tenuifolu, *Willd. Sp. PI.* iv. 880.—Afr. austr.
teretifolia, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 124 - polifolia.
Thunbergii, Sond. 1. c 180=daphnoides.
tomentosa, *Linn. Mant.* 299.—Afr. austr.
tomentosa, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 271-daphnoides.

CLUYTIA, Roxb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 225 (1840)= Bridelia, Willd. (Euphorb.).

CIiTJTTIANDRA, Muell. Arg. in Joum. Bot. ii. (1864) 328. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 272.
trichopoda, *Muell. Arg. I. c*—Afr. trop.

CLYBATIB, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 742. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1237.
Volckmannj, *Phil. 1. c.* 743.—Chili.

CLYMENUM, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735) = Lathyrus, Toum. (Legnmin.).
alatum, Link, Handb. ii. 188=L.alatus.
articulatum, Medic. Phil. Bot. i. 204 - L. articulatus.
bicolor, Moench, Meth. 150 = L. articulatus.
dolichoides. Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 858 = L. articulatus.
Ochrus, Link, Handb. ii. 188; Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 127 = L. Ochrus.
tenui/olium, Link, 1. c. 494; Alef. 1. c. 128 = L. tenuifolius.
tingitanum, Medic in Vorles. Churpf. Phys. Ges. »• (1787) 858 - L. tinBitanus.
uncinatum, Moench, Meth. 150—L. Clymenum.

CLYNHYMENIA, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii (1845) 24, in syn. = CLINHYMENIA, A. Rich. & Gal.-Cryptarrhena, R. Br. (Orchid.).

CLYPEA, Blume, Bijdr. 26 (1825) = Stephanla, Lour. (Menispermac).
abyssinica, Dillon & A. Rich, in Ann. Sc Nat. Ser. II. xiv. (1840) 263=S. abyssinica.
acuminatissima, Blume, Bijdr. 28=S. acuminata.
Burmanni, Wight & Am. Prod. 14 = Cyclea Burmanni.
capitata, Blume, Bijdr. 28=S. capitata.
consummata, Miers, Contrib. iii. 209.—Japon.
corymbosa, Blume, Bijdr. 27=S. rotunda.
discolor, Blume, 1. c. 26-S. discolor.
effusa, Mien, Contrib. iii. 207.—Malabar.
Forsteri, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat Hist. Ser. HI-xvii. (1866) 270=S. Forsteri.
gtaucescens, Decne. in Nouv. Ann. Mas. Par. (1834) 423 1.18 = S. glaucescens.
hemandifolia.Wieht Sc Am. Prod. 14=S. hernandifolia.
longa, G. Don, Gen. Syst. 1. 113 = S. hemandifolia.
oxyphylla, Miers, Contrib. iii. 206.—Nepal.
rotunda, Steud. Norn. ed. II. i. 387=S. rotunda.
submata, Miers, Contrib. iii. 209.—Japon.
tomentosa, Blume, Bijdr. 27=S. tomentosa.
venosa, Blume, 1. c. = S. venosa.

CLYPEOLA, Burm. ex DC. Prod. ii. 420 (1826) - Pterocarpufl, Linn. (Legnmin.).

CLYPEOLA, Linn. Gen. ed. 1.198 (1737). *CRV&-FERAE,* Benth. & Hook. £ i. 98.
BERGERETIA, Desv. Journ. Bot. iii. (1818) 161-
FOSSELINIA, Scop. Introd. 818 (1777).
IONTHLASPI, Adans. Fam. ii. 423 (1768).
ORIUM, Desv. Joum. Bot. iii (1813) 161. t. 3»-10.
alliacea. Lam. Tabl. Encyc. iii. 118=Peltaria **M***a-
altaica, Schangin, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 136=Aly»uin spathulatum.
alyssoides, Linn. Sp. PL 652= Alyssum calycinum.
ambigua, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. ii. " * microcarpa.

CIiYPEOLA:—
auriculata, Cnntz, Class. Crndf. 93 - Biscutella auriculata.
Bruhnsii, *Gruner, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) n. 896.—Reg. Casp.
calycina, All. ex Stend. Nom. ed. II. i. 887 = Aly*sum calycinum.
capensis. Bum. ex DC. Prod, ii 420-Wiborgia fnsca.
capensis, Poir. Encyc Suppl. ii. 304 - Heliophila diffuse.
carMniana, Walt Fl. Carol. 173 - Lepidium virguiictiin.
chaetocarpa, Jauhi ft Spach, Illustr. Si. 8. t. 206 - echinata.
ciliata, *Boiss. Fl. Orient. I* 309.—Lyda.
edentula, Link, Handb. ii. 296—Alyssnm gemonense.
cydodontea, *Delile, in Bull. Soc. Agr. Hirault,* (1830) 268.—Gallia.
dichotoma, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sii.* IL xvii. (1842)175.—Persia; Amen.
'Myma, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fesc. i. 20; ed. II. 22 = Biscutella laevigata.
'ckinata, Boiss. Fl. Orient, i. 310-lappacea.
echinata, *DC. Syst.* ii. 328.—Syria; Persia; A%han.
elegans, *Boiss. (S Huet, Diagn.* Ser. IL v. 38.—Armenia.
eriocarpa, *Cav. Desc.* 401.—Hispan.
"iophora, DC. Syst. ii. 827 = eriocarpa.
Gaudini, Traehsel, in Flora, xiv. (1831) 743=microcarpa.
glabra, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 173 =microcarpa.
eraeilis, Planch, in Bull. Soc Bot Fr. v. (18S8) 494 "microcarpa.
kalimifolia, Link, Handb. ii. 295-Alyssnm halimifolinm.
nwpida, *Presl, Bat. Bemert.* 9.—Arabia.
hispidula, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov.. fasc il. 15 = microcarpa.
\ndiea, Poir. Encyc. Snppl. ii. 304=Fortuynia Gardnl.
Jonthlaspi, *Linn. Sp. PI.* 652.—Reg. Mediterr.; Oriens.
'anigata, Jord. Brev. PI. Nov. fast ii. 16 = microcarpa.
'"Pidicola, Jord. & Fourr. 1. c. 14=C. Jonthlaspi.
"Ppacea, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 174.—Mesopotam.; Persia.
'asiocarpa, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 6. t 205 = lappacea.
«siocarp„ Juss. ex Pers. Syn. ii. 193=echinata.
'owatotricha, Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 194-microcarpa.
**uurocarpa,* Link, Handb. ii. 295-Alyssum macrocarpum.
"w»«m«, Georgi, Beachr. Russ. Reich, iii. IV. 1126 "Alyssum canescens.
m?ritima, Linn. Sp. PI. 652-Alyssum maritimum.
"Hcrocarpa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 74.—Graecia ; As. occ.
monospnta, Lam. Fl. Fr. ii. 462; 484 - C. Jonthlaspi.
Montana, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 19; ed. II. 19-Alyssum montanum.
^"'it, Ard. Animad. Spec. 16. t. 6 = Peltaria •lliacea.
frtnua, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fate. ii. 14 = *-• Jonthlaspi.
P»locarpa,* Jord. *Sc* Fourr. 1. c. = C. Jonthlaspi.
tortnaica, Bordere, ex Dur. in Act. Soc. Linn. Bord. wvi. (1866) 87=C. Jonthlaspi
fy-enaica, Link, Handb. ii. 295 = Alyssum pyrenaicum.
ffftttru, Link, I. c. = Alyssum rupestre.
***Hgini,* Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 274 = Alyssum spathulatum.
"'JtfMra, Jord. Ac Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, **• V^s- XTii- (1869) 19*-C. Jonthlaspi.
V'thuldefolia, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 16=Microcarpa.
f>nosa, Link, Handb. ii. 295-Alyssum spinosum.
'°»>*entosa,* Linn. Mant 92-Alyssum orientale.

CLYTIA, Stokes Bo*- Mat- Med- iv. 543 (1812) = Cluytia, Boerh. (Euphorb.).

CLYTRUSTOTOLA, Presl Rp*11- iii. 19« (1835) = Jotola, linn. (Legumin.).

CLYTOSTOMA, Miers.ex Bur. in Adansonia, viii. (1868) w»=Fitheeoctenium, Mart. (Bignoniac.).
"ystegioides. Bur.—Cf. Adansonia, viii. (1868) 853.—Am. austr.

CNEMIDIA, Lindl. Bot Reg. sub t. 1618 (1833) = Tropidla, Lindl. (Orchid.).
angulosa, lindl. 1. c.=T. angulosa.
bambusifblia, Thw. Enum. PL ZeyL 814.—Zeylan.
ctenophora, Reichb. f. Oria Bot. Hamb. 61.—Ins. FijL
stmilibera, Lindl. Bot. Reg. sub 11618 = T. angulosa.

CNEMIDOSTACHYS, Mart Nov. Gen.et Sp. i. 66. t. 40-44 (1824)=8eba8tiana, Spreng. (Euphorb.).
acalyphmdes. Mart. 1. c. 71 - S. comiculata.
bidentata, Mart. 1. c. 69 = S. virgata.
campestris, Mart, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 616 - S. comiculata.
Chamaelaea, Spreng. Syst. iii. 885 - S. Chamaelea.
coriacea. Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 68 =S. marginal!.
crotonoides. Mart 1. c. 71=S. comiculata.
daphnoides, Mart. 1. c. = S. daphnoides.
ditassoides, F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 88 - S. ditassoides.
dubia, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 241 —S. comiculata.
glabra, Mart, ex Baill. in Adansonia, v. (1864-65) 326 —S. multiramea.
glabrata, Mart. Nov. Gen. etSp. i.70=S. comicnlata.
glandulosa, Mart. 1. c 71 = S. comiculata.
hispida, Mart 1. C = S. corniculata.
linearifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 460 = S. Chamaelea.
longifolia, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 71 - S. comiculata.
madagascariensis, Boj. Hort Maurit. 284»Excoecaria melanosticta.
marginata, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 68. t. 41=S. marginata.
myrtilloides. Mart. 1. c. 67. t. 40=S. daphnoides.
oleoides, Mart. 1. c 71-S. oleoides.
patula, Mart in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 8=S. corniculata.
prostrata, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 70=S. comiculata.
salicifolia, Mart. 1. c - S. corniculata.
scoparia, Mart. 1. c.=S. virgata.
Selloviana, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 616 =S. comiculata.
serrulata, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 68 - S. serrulate.
stipulacea, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 616 - S. stipulacea.
tragioides. Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 70=S. comiculata.
Pahlii, Spreng. Syst. iii. 834 = & comiculata.
velutina, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 516 - S. comiculata.

CNENAMUM, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 80 - CRENAMUM, Adams.-CrepiB, linn. (Compos.).

CNEORIDIUM, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 812 (1862). *SIMARUBEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c.
PITAVIA, Nutt. ex Ton. *Sc* Gray, Fl. N. Am. 215 (1840).
dumosum, *Hook./. 1. c*—Am. bor. occ

dTBORUM, Linn. Syst. ed. I (1736). *SIMARUBEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 311.
pulverulentum, *Vent. Jard. Cels,* t. 77.—Ins. Canar.
tricoccon, Gueld. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc iii. 160 = Evonymus nanus.
tricoccon, *Linn. Sp. PI.* 34.—Europ. austr.

CNESMOCARPUS, Zipp. ex Blume, RumphU, Iii. 116 (1847) = Pometla, Font. (Sapiud.).
exctlsus, Zipp. ex Blume, L c. (- *Irina Diplocardia).* — N. Guinea.

CTTESMOBTE, Blume, Bijdr. 630 (1825) (Cnesmosa); Fl. Jav. Praef. p. vi (1828). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. C iii. 330.
glabrata, *Kurt, in Flora,* lviii. (1876) 31.—Singapore, javanica, *Blume, Bijdr.* 630.—Java.

CNEBTIDIUM, Planch, in Linnaea, xxiii. (1860) 439. *CONNARACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 433.
lasiocarpum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 195.—Bras.
rufescens, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1860) 440.—Mexic.; Panama.

CNESTI8, Juss. Gen. 374 (1789). *CONNARACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 433.
SPONDIOIDES, Smeathm. ex Lam. Encyc iii. 23 (1789).
acuminata. Wall. Cat. n. 8533-Rourea acuminata.
borboniensis, Raeusch. Nom. ed. III. 182= glabra.
comiculata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 886=Connaras ferrugineus.
comiculata, *Lam. Encyc.* iii- 23.—Afr. trop.
diffusa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 886 = Rourea rugosa.
emarginata. *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 42.—Malaya.
ferruginea, *DC. Prod.* ii. 87.—Afr. trop.
fiaminea, Griff. Notul. iv. 433—raminora.
flammea, Kurz, in Joura. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) II. 76 = praec.
florida, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 43.—Sumatra.
foliosa, Planch, ex Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xiv. (1876) II. 216=ramiflora.
fratema, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 440.—Afr. trop.
glabra, Blanco, FL Filip. ed. I. 387 =• Connarus paniculatus.
glabra. *Lam. Encyc* iii. 23.—Ins. Mascar.
glabra, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. 1.140 - Rourea multiflora.
grisea, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 461.—Afr. trop.
ignea. Planch, ex Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xiv. (1876)11. 216 = ramiflora.
lasiocarpa. Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 195 = Cnestidium lasiocarpum.
lurida, *Baill. Adansonia,* vii. (1866-67) 244. — Ins. Nossibé.
macrantha, *Baill. I. c.* 242.—Afr. trop.
madagascariensis, Raeusch. Nom. ed. III. 132 — polyphylla.
mimosoides, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 44.—Malaya.
monadelpha, Roxb. Hort. Beng. 84; Fl. Ind. il. 464 - Rourea commutata.
natalensis. *Planch, if Send, ex Han. V Sand. Fl. Cap.* i. 528.—Afr. austr.
obliqua, *Beauv. Fl. Owar.* i. 97. t 69.—Afr. trop.
obliqua, Boj. Hort. Maurit. 84 = Agelaea Lamarckii.
oblongifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 462.—Afr. trop.
pentaphylla, *Sprnn. in Linnaea,* xv. (1841) 189.—Ins. Timor.
pinnata, Beauv. Fl. Owar. i. 98. t. 60=Rourea Palisotii.
platantha, Griff. Notul. iv. 434= ramiflora.
polyphylla, Blanco, Fl. Filip. ed. IL 270=Rourea rugosa.
polyphylla, *Lam. Encyc.* iii. 23.—Maurit; Madag.
racemosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 91.—Afr. trop.
ramiflora, *Griff. Notul.* iv. 432.—Ind. or.
scandens, J. F. Gmel. Syst. 729 = glabra ?
stenopetala, Griff. Notul. iv. 433= Rourea stenopetala.
trifolia, Lam. Encyc. iii. 24 - Agelaea villosa.
vestita. Wall.ex Hook. f. Fl.Brit. Ind. U. 47-Agelaea vestita.
volubilis, Blanco, Fl. Filip. ed. L 385-Roureaheterophylla.

CNICOTHAMNUS, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 196. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1237.
Lorentzii, *Griseb. 1. c.* 197.—Reg. Argent.

CNICUS, Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 468.
ACARNA, Hill. Veg. Syst iv. 13 (1762).
ANCATHIA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 331.
BREEA, Less. Syn. Comp. 9 (1832).
CEI-HANANOPLOS, Neck. Elem. i. 68 (1790).
CHAMAKPEOCE, DC. Prod. vi. 657 (1837).
CIRSIUM, [Tonra.] Adans. Fam. ii. 116 (1763) ; DC. FL Fr. iv. 110 (1805).
CLOMIUM, Adans. Fam. ii. 116 (1768).
ECHENAIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 83.
EPITRACHYS, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 896.
ERIOLEPIS, Cass. in Diet Sc Nat xxxv. 172 (1825); xli. 331 (1826).
ERYTHROLAENA, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. 1.1. 134 (1826).

CUICU8:-
IXINE, Hill, Veg. Syst iv. 17 (1762).
LAMYRA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 218 (1822).
LOPHIOLEPIS, Cass. 1. c xli. 313 (1826).
NOTOBASIS, Cass. 1. c. xxxv. 170 (1S25).
ONOTROPHE, Cass. 1. c xxxvi. 115 (1825).
ORTHOCENTRON, Cass. 1. c. 480 (182S).
PICNOMON, Adans. Fam. ii. 116 (J 768).
PLATYRAPHIUM, Cass. in Diet. Sc. Nat xxxv. 178 (1825).
POLYACANTHA, Hill, Veg. Syst. iv. 12 (1762).
PTILOSTEMON, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxv. 173 (1825).
PYCNOCOMON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 78, 84.
SPANIOPTILON, Less. Syn. Comp. 10 (1882\
TETRALIX, Hill, Veg. Syst. iv. 18 (1762).
XYLANTHEMA, Neck. Elem. i. 67 (1790).
acantholepis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 251.—Mexic.
Acama, *Linn. Syst.* ed. X. 1201.—Enrop.
acaulis, *Willd. Prod. Fl. Berl.* 260.—Europ.
aia, Sibth. V Sm. Fl. Graec. ix. 20. t. 829.—Graecia; As. Min.
afer, Tenore, Prod. p. Ixiii=niveus.
afer, Willd. Sp. PI. iii. 1682 - Cn. Diacantha.
alpinus, Loisel. Fl. Gall. 542=Saussurea alpina.
alsophilus, *Pollini, Fl. Veron.* ii. 620. t. 5.—Italia.
attaints, Steph. ex DC. Prod. vi. 538 = Saussurea Frolowii.
altissimus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1671.—Am. bor.
ambiguus, Loisel. Fl. Gall. 540=heterophyllus.
americanus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1884) 66.—Am. bor. occ.
Andeisonii, *A. Gray, I.* r. x. (1874) 44.—Am. bor. occ.
Andrewsii, *A. Gray, I. c.* 45.—Calif.
anglicus, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 872=pratensis.
angustifolius, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 2915 = Tricholepis Stictophyllnm.
arabicus. *Roth, in Usteri, Ann. Bot.* viii. 8.—Arabia.
araehnoides, Hort. Par. ex DC. Prod. vi. 686 = fimbriatus.
araehnoides, WalL Cat. n. 2891 = Wallichii.
arachnoidens, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 277.—Reg. Caucas.
araneosas, *Desf. ex DC. Prod.* vi. 685.—Reg. Caucas.
arenarius, Willd. Sp. PI. iii. 1603 = Carduus arenarins.
Argemone, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. ii. 498 = medins.
argentatus, Roth, Catalect. i. Ill = Cardnus argentatns.
argyracanthus, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 218.—Reg. Himal.
arizonicos, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 44.—Arizona,
armatns, *[Soland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. ii. 262.—Syria,
arvensis, *Hoffm. Deutschl. Fl.* ed. II. i. tl. 130.—Earop.; As. temp.
arvensis. Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 48 = virginianus.
asiaticus, *Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 850.—Sibir. altaic.
auriculatus, Wall. Cat. n. 8289 •= Sanssnrea hypolenca.
autaretieus, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. i. 381 ; Willd. Sp. PI. iii. 1676-heterophyllns.
autaretieus, Loisel. Fl. Gall. 541-rivularis.
Bertolonii, *Bertol. Fl. Ital.* ix. 23.— Italia.
Boujarti, DC. Prod. vi. 635 — fimbriatns vel arachnoidens.
braeteatus, Gilib. Fl. Litnan.i. 184 = oleraceus.
Breweri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 43.—CaUf.
Bnergeri, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 502.—Japon.
califomicus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 46.-Calif.
callosus, Roth, Catalect. iii. 76=Cardnus callosus.
candicans, Wall. Cat. n. 2893 = arvensis.
canus, *Roth, Tent. Fl. Germ. i.* 345.—Enrop.
capitatus, *Krock. Fl. Sil. Suppl.* it 290.—Europ.
carlinoides, *Fisch. ex Schrank, PI. Rar. Hort. Monac.* t. ll.-Reg. Caucas.
camolicus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1677.—Europ.
carthamoides, Wall. Cat. n. 2896=Saussurea affinis.
carthamoides, Willd. Sp. PI. iii. 1686 - Centaurea carthamoides.

CNICtrS:—
Casabonae, *Roth, in Usteri, Ann. Bot.* viii. 9.—Ins. Ital.; Marocco.
centanroides, *Linn. Sp. PI.* 826.—Mont. Pyren.
centauroides, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 763 = Leuzea salina.
cernuus, A. Gray, in Proc Am. Acad. x. (1874) 44 = subcoriacens.
cernuus, Linn. Sp. PI. 826—Cardnus cernuus.
cernuus, Wall. Cat. n. 2892 - Wallichii.
chamaecephalus, *Vatke, in Linnaea,* xxxix. (1875) 511.—Abyssin.
Chamaepeuce, *Desf. Art.* i. 280.—Graecia; As. Min.
Chamaepeuce, Tenore, Prod. p. xlviii=gnaphalodes.
chinensis, *Benth. ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 609.—China,
chrysacanthus, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 869.—Marocco.
ciliatus. *Roth, Catalect.* ii. 104.—Europ.
ciliatus, Vitm. Summa, iv. 447 = ochroleucus.
collinus, Homem. Hort. Hafn. Snppl. 92 = Carduus collinus.
communis, Lam. Fl. Fr. ii. 15 = Cynara Cardunculns.
comosus, *Franch. tf Sav. Enum.Pl. Jap.* ii. 409.—Japon.
conspicuus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 251.—Mexic.
costaricensis, *Polak. in Linnaea,* xli. (1879) SSL-Costa Rica.
cyanoides, *Roth, in Usteri, Ann. Bot.* viii. 9.—Earop.
Cynara, Lam. Fl. Fr. ii. 14— Centanrea cynaroides.
cynaroides, Bieb. Fl. Taur. Cane, it 280 *{=Cirsium sinuatum).*—Reg. Caucas.
cynaroides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 20. t. 828 - eriophorus.
cynaroides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1670.—Ins. Creta.
deltoideus, WalL ex DC. Prod. vi. 541 = Saussurea deltoidea.
dentatus, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 217 = Kentrophyllum dentatum.
dentatus, Willd. Sp. PI. iii. 1672=pratensis.
Diacantha, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 152.—As. Min.; Syria,
dipsacolepis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 497.—Japon.
discolor, *Muhl. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1670.—Am. bor.
discolor, Roth, ex Stead. Norn. ed. II. i. 283, 388 = Carduus callosus.
dissectus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1666.—Europ.
Drummondii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 40.—Am. bor. occ.
dubius, Willd. Prod. Fl. Berl. 260=acaulis.
Eatoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 56.—Am. bor. occ.
echinatus, *Willd. Sp. PL* iii. 1668.—Reg. Mediterr. occ.
echinocephalus, *Willd. 1. e.* 1686.—Reg. Caucas.
edulis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 47.—Am. bor. occ.
effusus, *Maxim, in Bull. Acad. PAersb.* xix. (1874) 500.—Japon.
elongatus, Wall, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 289 = Tricholepis elongata.
eriocephalus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 46.—Am. bor. occ.
eriophoroides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii 363.—Reg. Himal.
eriophorus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 217 - eriophoroides.
eriophorus, Juss. ex DC. Prod. vi. 635 = spathulatus.
eriophorus, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 845.—Enrop.; As. Min.
Erisithales, linn. Sp. PI. ed. II. 1167 - ochroleucus t
. esculentus, *Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 362.—Rossia.
Falconeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* Hi. 368.—Reg. Himal
ferox, *Linn. Mant.* i. 109; *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* ii. 152.—Europ. or.; As. Min.
fimbriatus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 276.—Reg. Caucas.
firmus, *J.* b" *C. Presl, Delic. Prog.* 107.—Europ.
flavescens, Willd. Sp. PI. iii. 1683 = Serratula flavescens.
flavispinus, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 522.—Hispan.; Marocco.
foliosus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 40.—Am. bor. occ.

CNICUS:—
fruticosus, *Desf. Arl.* i. 280.—Graecia.
Galactites, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 538=Galactites tomentosa.
giganteus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1671.—Reg. Mediterr.
glaber, Ell. Sketch, ii. 270-Nuttallii.
glaber, Nutt. Gen. Am. ii. 129 = muticus?
glutinosus, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 291 —mutiens.
glutinosus, Gilib. Fl. Lituan. i. 186=ochroleucus I
Gmelini, Spreng. Hist Rei Herb. ii. 270=acaulis.
gnaphalodes, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 376.—Italia.
gossypinus, Wall, ex DC. Prod. vi. 541,542=Saussurea gossypiphora.
Gouani, Willd. Sp. PI. iii. 1665 = Cardnus medius.
Grabami, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 57.—Arizona.
Grimthii, *Hook, f, Fl. Brit. Ind.* iii. 863.—Reg. Himal.
grumosns, *Hoffmgg. tf Link, Fl. Port.* ii. 196.—Lusitan.
Hallii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 56.—Am. bor. occ.
helenioides, Willd. Sp. PI. iii. 1674=heterophyllus.
heterolepis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 44 =snbcoriaceus.
heteromallus, Steud. Nom. ed. II. i. 388-Saussurea candicans.
heterophyllus, *Roth, Catalect.* i. 114.—Enrop.
Hilgendorfi, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 410.—Japon.
hispanicus, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 623.—Hispan.
Hookerianns, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 46.—Am. bor. occ.
horridulus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 507.—Am. bor.
hom'dus, Bertol. Amoen. Ital. 40 = Bertolonii.
horridns, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 278.—Reg. Caucas.
horridus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 220=Kalconeri.
horridus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 217-Cardopatiun> corymbosum.
hybridus, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. III. 12 = ochroleucus.
igniarius, *Benth. tf Hook. f. Gen.* ii. 469.—Sibir. altaic.
incomptus, *Franch.* b[1] *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 410.—Japon.
inermis, Willd. Sp. PI. iii. 1672 - centauroides.
intermedins, *Heller, Fl. Wire.* ii. 256.—Europ.
involucratus, *Wall, ex DC. Prod.* vi. 639.—Reg-HimaL
italicus, *Seb.* b* *Mauri, Fl. Rom. Prodr.* ii. 282 — Italia,
japonicus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 603.—Japon.
jorullensis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 22.—Mexic.
kamtschatiens, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 495.—Japon.; Alaska.
Kosmelii, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 729 ** lappaceus.
Kotschyi, Sch. Bip. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. 24=Carbenia benedicta.
Lachenaia, *C. C. Gmel. Fl. Bad.* iii. 380.—Europ.
lacteus, Schleich. Cat PI. Helv. ed. IV. 13 - palustrifc
lanatus, Willd. Sp. PI. iii. 1671 = arvensis.
lanceolatus, *Willd. Prod. Fl. Berl.* 259.—Europ.
laniflorus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 276.—Reg-Caucas.
lappaceus, *Bieb. I. c.* 277.—Reg. Caucas.
lappaceus, Hort. Par. ex DC. Prod. vi. 639-nivaIis.
lappoides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 251—Mexic.
Lecontei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 89.—Am. bor.
leucocephalus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1668.—Creta; As-Min.
leucographus, Roth, in Usteri, Ann. Bot viii. *" Tyrimnus lencographus.
leucophanus, Baumg. ex Schur, Enum. PI. Transs. 41o —lanceolatus.
linearis, *Benth.* 6" *Hook./, ex Franch. tf Sav. En**-PI. Jap.* i. 261.—Japon.
lomatolepis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 251." Mexic.
longifolius, Lam. Fl. Fr. ii. 13-Cardnncellns mo"[5] peliensis.
lucidus. WaU. ex DC. Prod. vi. 622=Carduus nutan*
macrostylos, *Moretti, in Brugnat. Giorn. Fis.* "* (1824) 102.—Italia.

CNICUS :—
medins, *Kroci. Fl. Sil. Suppl.* ii. 278.—Silesia.
mexicanus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* tt. 281.—Mexic
"nicrocephaln*. *Bertol. Fl. Ital.* ix. 36.—Ital.; Sardinia.
•*icrocephalus, Boiss. Fl. Orient. Ui. 705=Carbenia benedicta.
"isilmerensis, *Tineo, ex Ces. Passer. V Gib. Com*. Fl.* /f«/.483.-Ital.
mitis, *Hornetn. Hort. Hafn. Suppl.* 98.—Sibir.
"utissimus, Lam. Fl. Fr. ii. 13 - Carduncellus mitissimus.
»»««, DC. Prod. vi. 652, sphalm. = acaulis.
"tollis, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 316 - Jurinea moffis.
monspessulanus, *Roth, in Usteri, Ann. Bot.* viii. 9.—Pallia,
"nontanus, *Waldst. V Kit. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1676.—i-urop.
mulHcaulis, WalL ex DC. Prod. vi. 540-Saussarea affinis.
Wanitus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 279.—Reg. Cancas.
mnticus, *Ell. Sketch,* ii. 268.—Am. bor.
neo-mexicannsM. *Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) . *5—Am. boi. occ.
nipponicus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. .(1874)496.-Japon.
"!»alis, *H. B. (S K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 23.—Mexic.
"'»eus, *J. If c. Presl, Delic. Prog.* 108.—Europ.
««niu, Wall. Cat. n. 2898 = Saussurea deltoidea.
""difloius, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 14, nomen. Nu—Helvet.
atlli, A: Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 41.—Am. bor.
oovallatus, *Bieb. Fl. Taur.-Cauc.* ii 279.—Reg. Caucas.
°*><>*llatHs,* Salzm. ex DC. Prod. vi. 660 = Notobasis syriaca.
occidentalis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) *5—Am. bor. occ.
ocbrocentrus, *A. Gray, I. c.* xix. (1888) 67.—Am. bor. occ.
°<*roleucug, *Spreng. Nachr.* i. *Bot. Gart. Halle,* 19.—-Europ.
"twatus, Mnhl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 386 = Pumilus.
*accus, *Linn. Sp. PI.* 826.—Europ.
"""gophyllns, *Franch. V Sam. Enum. PL Jap.* ii. 412.—Japon.
*rlii P W
o^ralis,, *Willd. Enum. Hort.Berol. Suppl.* 66.—Hab.?
*"tow, WiUiSp. PL iii. 1670 = Galactites tomeosa.
ornatus. *Be% in Journ. Bot.* xi. (1878) 868.—Marocco.
"Wifouus, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 412.—Japon.
paludosus, *Loisel. Fl. Gall.* 542.—Europ.
palustr>, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. fl. 151« pungens.
palustris, *Willd. Prod_ m_ Berl_* 2««—Europ. i At. bor.
pannonicus, *Host, Fl. Austri_ac_* ii. 444 — Europ.
P *"F^A. Gray, in Proc. Am. Acad.* X. (1874) 47.—Am. bor. occ.
pi ifiorus, *Haler> &• Wirc_ Su PP'-* 7«—Europ.
pi...iflorus, Europ. or. *Waldst. V Kit. PI. Rat. Hung.* ii. 175.-
parcuarensis, *H. B. & K. Nov. Ge_n_ * Sp.* iv. 22. t. 310.—Mexic.
pecti ell 49 *Uaxim. in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1674) .—japon
j^emontanus,V,7/rf. *Sp. PI.* iii. 1675.-Europ.
51 bir. or. x. (1874)
pexus, *Franch. & Sav, Enumu Pl. Jap.* ii. 410.—Japon.
pi *$£ fidus,* Willd. Sp. PI. iii. 1884=Serratalapinn«-F
'heri, *Torr. in Eaton, Man.* ed. V. 180.—Am. bor.
polyacanthus, *Vatke, ,n Linnaea,* xxxix. (1875) 510.—Afr. trop.
polyanthen"". *Bertol. Amoen. Ital.* 41.—IUlia.
Pontederae, ^o 'in', in Brugnat. m . Fis. ix. (1816) 98—rivularis.
praemorsus, *Michl, in Flora,* iii. (1820) 817_oclm)_ leucus?
pratensis, Lam. Fl_ Fr_ «• "-oleraceu..
pratensis, *Willd. Sp. PI.* iii. 1672—Europ.

CNICtTS:—
pseudo-benedictus, Hort. Dorpat. ex Aschera. Ind. Sem. Hort. Berol. (1861) 5«=Carbenia benedicU.
pubigerns, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 399.—As. Min.
pnmilus, *Torr. Compend.* 282.—Am. bor.
pungens, Bivona, Sic. PL Cent. i. 26-siculia.
pungens, Sebast. PI. Rom. fasc i. 9. t. 2-poIyanthemua.
pungens, *Willd. Sp. PI.* Ui. 1663.—Europ. or.; As. Min.
purpuratns, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1879) 491.—Japon.
purpureus, Bertol. Fl. Ital. ix. 21 =spinosissimus.
pycnocepkalus, Rotb, in Usteri, Ann. Bot. viii. 8 = Catduus pycnocephalus?
pygmaeus, Linn. Sp. PL ed. II. 1156=Saussurea pygmaea.
pyrenaicus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1664.—Europ.
quercetorum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 40.—Calif.
radians, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 252.—Guatemala.
rbaphilepis, *Hemsl. 1. c.*—Mexic
rectus, Hort. Far. ex DC. Prod. vi. 659=strictns.
Reinii, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 413.—Japon.
temotifolius, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 47.—Am. bor. occ.
repandus, *Ell. Sketch,* ii. 269.—Am. bor.
replicatus, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 93.—Hungaria.
rigens, *Willd. Sp. PI.* iii. 1675.—Europ.
rivnlaris, *Willd. I. c.* 1676.—Europ.
Rothrockii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 220__Arizona.
rufescens, *Loisel. Fl. Gall.* 541.—Gallia.
ruthenicus, Henning, in Mim. Soc. Nat Mosc. vi. (1823) 7S=arrensis.
saanensis, Schlecht. ex DC. Prod. vi. 648-ochrolencus.
salinus, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 752=Leuiea serratuloides.
salisburgensis, Willd. Sp. PI. iii. 1675-rivnlaris.
samniticus, Tenure, ex Stead. Nom. ed. II. i. 389 = italicus.
scariosus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. n. 402.—Am. bor. occ.
Schimperi, *Vatie, in Linnaea,* xxxix. (1876) 511.—Afr. trop.
segeinm, Maxim, in Bull. Acad. Petenb. xix. (1874) 611.—China.
seminudus, Schleich. ex DC. Prod. vi. 660=rivnlaris.
semipectinatus, *Desf. Cat. Hort. Par',* ed. III. 151.—As. centr.
semipectinatus, *Hornem. tf Ledeb. ex DC. Prod.* vi. 647.—Hab. t
semipectinatus, Thorn, ex Steud. Nom. ed. II. i. 389 *(=Cirsium subalpinum).*—Europ.
serratuloides, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 346.—Sibiria.
serrulatns, *Bieb. Fl. Taur.-Cauc.* ii. 275.—Reg. Caucas.
setosus, Bess. Prim. Fl. Galic. ii 172-arvensis t
siculus, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 442=pungens.
Sieboldtl, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1674) SOS.—Japon.
sinensis, C. B. Clarke, Comp. Ind. 219=chinensis.
spathulatus, *Moretti, in Brugnat. Giorn. Fis.* II. v. (1822) 111.—Italia,
spicatus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 501.—Japon.
spinosissimus, Darling. FL Cestr. ed. II. 438= honidulns.
spinosissimus, Habl. Taur. 158, ex Bieb. PI. Taur.-Cauc ii. 281=echinocephalus.
spinosissimus, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. ii. 496=-seq. ?
spinosùsimus, *Linn. Sp. PI.* 826.—Europ.
spurius, Hoffm. DeuUchl. Fl. ed. IL ii 128 = pratensis.
squarrosus, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 782.—Sibiria.
stellatus, *Roth, in Usteri, Ann. Bot.* viii. 9.—Europ.
strictus, *Tenure, Prod.* p. xlviii—Italia,
strigósus, *Bieb. Fl. Taur.-Cauc.* U. 277.—Reg. Caucas.; Persia,
aubcoriaceus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 262.—Mexic
snffultus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xù. (1874) 498.—Japon.

CNICUB:—
syriacus, *Roth, in Usteri, Ann. Bot.* viii. 10.—Reg. Mediterr.
Tanakae, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap. U.* 411.—Japon.
tartaricns, *Willd. Sp.Pl.* Ui. 1677.—As. temp,
tehefouemis, *Franch. in M/mSoe. Sc. If at. Cherbourg,* xxiv. (1884) 229.—China,
transsylvanicns, *Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr.* x. (1860) 179.—Transsylvan.
tnberosus, *Roth, Tent. Fl. Germ.* i. 345.—Europ.
nliginosns, *Bieb. Fl. Taur.-Cauc.* ii. 274.—Reg. Caucas.
nndulatus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 42.—Am. bor.
uniflorus, Linn. Mant. ii. 572=Centaurea monanthos.
uniflorus, Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 346-Leuzea carthamoides.
Verutus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 167 - argyracanthus.
virginianus, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 48 - Lecontei.
virginianus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 506.—Am. bor.
Vlassovianus, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xix. (1874) 609.—As. temp.
Wallichii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii 363.—Reg. Himal.
Weyrichii, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 495.—Ins. Sachalin.
Wheeleri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 56.—Arizona.
Willdenowii, *F. G. Dietr. Voltst. Lexik. Gaertn. Nachtr.* tt.381.—Hab.1
Wrightii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 41.—Texas; Arizona,
yezoënsis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 508.—Japon.

CNICUS, [Vaill.] Gaertn. Fruct. ii. 885. t. 162 (1791) sCarbenia, Adans. (Compos.).
benedictus, Linn. Sp. PI. 826; Gaertn. 1. c.-Caib. benedicta.

CNIDIUM, Cusson, in Mém. Soc. Méd. Paris (178*2) 280=SeUnum, Linn. (Umbell.).
affine, C. A. Mey. in Beitr. Pfl. Kuss. Reich, vi. 88.—Reg. Caucas.
alatum, Spreng. ex Link, Handb. i 329=Ligusticum alatum.
alsaticum, Spreng. PI. Umbellif. Prod. 40=Pencedanum alsaticum.
anomalum, Ledeb. Fl. Alt. i. 380; Ic Fl. Ross. t. 311.—Sibir. altaic.
apioides, Spreng. PL Umbellif. Prod. 40 = Carum rigidulum.
argenteum, Cesati, in Linnaea, xi. (18S7) 824-Pencedanum involucratum!
athoum, Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. L 363 = Camm rigidulum.
atropurpureum, Spreng. in Roem. *Sc* Schult Syst. vi. 418 = Thaspium trifoliatum.
canadtnse, Spreng. 1. c. 415=S. canadense.
carvifolium, Bieb. Fl. Taor.-Cauc. iii. 212=Caram caucasicum.
cenolopkioides, Beath. A Hook. f. Gen. i. 914-S. sylvestre.
chinense, Spreng. ex Steud. Nom. i&. II. i. 389-S. canadense.
confertum, Moench, Meth. 98 »S. Monnieri.
coniifolium, Boiss. in Ann. Sc. Nat. *Six.* UI. i. (1844) 299.—As. Min.
cuneatum, Ledeb. Fl. Alt. i. SSI; et Ic. Fl. Ross. t. 812.—Sibir. altaic.
cunrifoliumy Griseb. Spicil. Fl. Ramel. i. 363, in obs. = Ligusticum cuneifolium.
dahuricum, Fisch. *St.* Mey. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IL v. (1836). 188.—Dahuria.
diffusum, TIC. Prod. iv. 163 = SeseIi indicum.
divaricatum, Ledeb. Fl. Alt i. 324=SUaus longi folius.
Fischeri, Spreng. Nor. Prov. 12=Silaos longifolins.
Fontanesii, Spreng. Sp. Umbellif. Prod. 41.—Numidia.
intermedium, Tchihat Asie Min. Bot. i 430.—As. Min.
japonicum, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. iii. 60.—Japon.
Kraussianum, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 662=Pimpinellacaffra.

CNIDIUM :—
meifolium, Bieb. Fl. Tanr. Cauc iii. 213=Carum armennm.
mierocarpum, Turcz. ex Stend. Nom. ed. II: i. 889.—Sibir. baical.
Monnieri, Cusson, in Me'm. Soc *VUA.* Par. (1782) 280 -Selinum Monnieri.
multicaule, Ledeb. Fl. Ross. ii. 284.—Sibiria.
myrrhidifolium, Bieb. Fl. Taui. Cans. iiL 212' Ligusticum alatnm.
orientate, Boiss. in Ann. Sc Nat Sér. III. i. (1814) 299-S. orienUle.
palustrt, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 469 = S. sylvestre.
Petroselinum, DC. Prod. iv. 152=Carum Petroselinum.
peucedanoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 15= Enlophns peucedanoides.
pyrenaeum, Spreng. in Roem. *Sc* Schnlt. Syst vi.416 = Ligusticum pyrenaeum.
salinum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. zvii. (1844) 788.—Dahuria.
Silaus, Bieb. Fl. Tanr. Cauc iii. 212=Silaus Besseti.
Silaus, Spreng. PI. Umbellif. Prod. 40 = Silaus pratensis.
striatum, Turcz. ex Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. **II. T. (1836)** ***18S=dahuricum.***
suffruticosum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 887 = S. suffruticosum.
tenuifolium, Moench, Meth. 88 = Apium leptophyllum.
tolucense, Spreng. Syst. i. 888=Arracacia tolucensis.
venosum, Koch, Umbellif. 109 = S. sylvestre.

CNIDONE, E. Mey. ex Endl. Gen. Suppl. ii. 76 (1842) = Kissenia, R. Br. (Loasac).
menttelioides, E. Mey. ex Presl, Rot. Bemerk. 73 = K. spathnlata.

CNIDOSCOLUS.Pohl.Pl. Bras. Ic. i. 56. t. 49 (1827)-Jatropha, Linn. (Euphorbiac.).
angustidens, Ton. Bot Mex. Bound. 198-J. augustidens.
cnicodendron, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 53. —Reg. Argent.
fragrans, Ponl, PI. Bras. i. 63—J. fragrans.
hamosus, Pohl, 1. c. 57 = J. hamosa.
lobatus, Pohl, 1. c. 62=J. phyllacantha.
Marcgravii, Pohl, 1. c. 68. t. 50=J. urens.
ARchauxii, Pohl, 1. c. 68-J. urens.
napaefolius, Pohl, 1. c 68-J. aconitifolia.
ntglectus, Pohl, 1. e, 60. t. 51=J. urens.
obtusifolius, Pohl, ex BailL in Adansonia, iv. (1863-64) 275=J. obtusifolia.
osteocarpus, Pohl, PI. Bras. i.-63-J. osteocarpa.
palmatus, Pohl, 1. c-J. palmata.
pubescens, Pohl, L c. 62=J. obtusifolia.
quenifdlius, Pohl, ex Baill. in Adansonia, iv. (1868-64) 276—J. phyllacantha.
quinquelobus, Pohl, PI. Bras, t 83=J. nrens.
repandus, Pohl, 1. c. 62-J. phyllacantha.
stimulosus, Engelm. & A. Gray, in Bost. Joorn. Nat. Hist. v. (1845) 234= T. texana.
stimulosus, A. Gray, Man. Bot. 389-J. nrens.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 749 = Croton lobatus.
mti/olius, Pohl, PI. Bras. i. 61-J. vitifolia.

CNOPOS,Rafin. Fl. Tellur. iii. 13 (1836)-Polygonum, Tourn.
ramosissimum, Rafin. 1. c.-P. ramosissimum.

COA, Adans. Fam. ii. 445 (1768) « Hippooratea, Linn. (Celastr.).

COALISIA, Rafin. Sylva Tellur. 114 (18S8)~Cleome, Linn. (Capparid.).
angustifolia, Rafin. 1. c.=Cleome angustifolia.

COATESIA, F. Muell. Fragm. iii. 26 (1862) =Gotf era, Schott (Rntac).
paniculata, F. MuelL 1. c-G. Muellerl.

COBAEA, Cav. Ic. i. 11. t. 16, 17 (1791). *POLEMONIACEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 824.
ROSBNBBRGIA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 30.
gracilis, *Hemsl. in The Garden,* xvii (1880) 352.—CosU Rica.

COBAEA:—
lutea, D. Don, in Edinb. Phil. Joorn. x. (1824) 4-macrostemma.
macrostemma, *Pan. ex D. Don, 1. c.* 112.—Guatemala.
minor, ***Mart. tf Gal. i» Bull. Acad. Brux.*** **xii. (1845)** II. 276.—Mexic
penduliflora, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6757.—Venezuela.
scandens, *Cav. Ic.* i. 11. tt. 16, 17.—Mexic.
•tipularis, *Benth. PI. Hartw.* 45.—Mexic.

COBAEA, Neck. Elem. i. 129 (1790)-**Ionloera,** Linn. (Caprifol.).

COBAMBA, Blanco, Fl. Filip. ed. L 610 (1887)-**Can**-BCora, Lam. (Gentian.).
Blancoi, Blanco, 1. c. ed. II. Suppl. 591—Cans, decussata.
dichotoma, Blanco, 1. c. ed. I. 510=Cans, diffusa.

COBRESIA, Pen. Syn. ii. 534 (1807) - Kobresia, Willd. (Cyperac).

COBURGIA, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 17 (1838) = 8tenomesson, Herb. (Amaryllid.).
acuta, Herb, in Bot. Mag. t. 3865 - S. incarnatum.
angusta, Herb, in Bot. Keg. (1842) Misc. 65=S. recurvatum.
Belladonna, Herb, in Bot. Mag. sub tt 2113, 2114 = Amaryllis Belladonna.
blanda, Herb. 1. c—Amaryllis Belladonna.
chachapoyensis, Herb, in Bot Reg. (1842) Misc. 63-S. incarnatum.
eiliaris, Herb, in Trans. Hort. Soc. iv. (1822) 181 = Buphane disticha.
coccinea, Herb, in Bot. Reg. (1842) Misc. 64 - S. coccineum.
discolor, Herb. Amaryll. 197 «=S. recurvatum.
/lava, Hort. Belg. ex Heynh. Nom. ii. 161=seq.
fulva, Herb, in Bot. Reg. 1.1497 - S. incarnatum.
humilis, Herb. 1. c. (1842) Misc. 65=S. hnmile.
incamata, Sweet, Brit Flow. Gard. Ser. II. t. 17-S. incarnatum.
Josephinae, Herb, in Trans. Hort. Soc. iv. (1822) 181 = Brunsvigia Josephinae.
latta, Herb, in Bot. Reg. (1842) Misc. 58=S. incamatum.
langensis, Herb. 1. c—S. incarnatum.
lutea, Herb. 1. c. 55=S. recurvatum.
Macleanica, Herb. 1. c.=S. recurvatum.
miniata, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 18.—Peruv.
multifiora, Herb, in Bot. Mag. sub tt. 2113, 2114-Brunswigia mnltiflora.
obragillensis, Herb, in Bot. Reg. (1842) Misc. 54-S. recurvatum.
pallida, Herb, in Trans. Hort. Soc. iv. (1822) 181 = Amaryllis Belladonna.
praecipitata, Herb, in Bot Reg. (1842) Misc. 54 = **S. coccineum.**
pudica. Herb, in Bot Mag. sub tt 2113, 2114 = Amaryllis Belladonna.
quitensis, M. Roem. Syn. Ensat. 165.—Ecuador.
Radula, Herb, ex Steud. Nom. ed. II. i. 890 = Brunsvigia Radnla.
recurvata, Herb, in Bot. Reg. (1842) Misc. 64 - S, rccnrvatuin*
reticulata, Herb. App. 34 = Hippeastntm reticalatmn.
splendens, Herb. Amaiyll. 400. t. 47. *t* 5=S. incanutmn.
striatifolia, Herb. App. 84 =« Hippeutrum reticulatoni.
stylosa, Lindl. in Journ. Hort Soc. ii. (1847) 310.—Peruv.
taenisphylla, Salisb. Gen. PI. Fragm. 184.—Hab. ?
trichroma. Herb. Amaryll. 196=5. incarnatum.
variegata, Herb. 1. c. = S. incarnatum.
venusta, Herb, in Bot. Reg. (1842) Misc. 64-S. coccineum.
versicolor, Herb. 1. c 68. t 66- S. incarnatum. •

COCCANTHERA, C. Koch *Sc* Hanst. Ind. Sem. Hort Berol. (1855) 17-Codonanthe, Hanst (Gesnerac).
Dtvosiana, C. Koch & Hanst. 1. c-Cod. Devosiana.
Hookeriana, C. Koch & Hanst. 1. c-Cod. Hookerii.

COCCOTIA, Wight *Sc* Am. Prod. 847 (1834). *CUCVRBITACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 827.
CEPHALANDRA, Scbrad. in Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. it. 280 (1836).
abyssinica, ***Cogn. in DC. Monog. Pkan.*** **iii. 686.—**Abyssin.
adoënsis, *Cogni I. c.* 638.—Afr. trop. et austr.
cordifolia, Cogn. 1. c. 629=indica.
decipiens, *Cogn. 1. c.* 589.—Afr. trap..
diversifolia, Cogn. 1. c. 536 =C. Hartmanniana.
grandis, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 59=iodica.
Hartmanniaiu, ***Schweinf. Reliq. Kotschy.*** **42. t. 27—**Abyssin.
indica, *Wight tf Am. Prod.* 347.—As. trop.
jatrophaefolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 638.—Abyssin.
Loureiriana, M. Roem. Syn. Pepon. 93=indica.
Mac-Kennii, ***Cogn. in DC. Monog. Phan.*** **iii. 541.—**Afr. austr.
Moghadd, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 267 =C. Moimoi.
Moimoi, *M. Roem. Syn. Pepon.* 93.—Afr. trop.; Arabia.
Monteroi, ***Hort.—Cf. Cat. Cr. Jard. Bet. Bordeaux*** (1866).—Afr. trop. T
palmata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 540.—Afr. austr.
palmata, M. Roem. Syn. Pepon. 93 = Bryonopsis laciniosa.
palmatisecta, ***Kotschy, in Sittb. Acad. Wien, Math.-Nat.*** Ii. (1865) 860. t. 4.—Abyssin.
quinqueloba, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 688.—Afr. austr.
Schimperi, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. viii. (1857; 366 = C. Moimoi.
senensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 536.—Afr-trop.
sessilifolia, *Cogn. 1. c.* **684.—**Afr. austr.
Wightiana, M. Roem. Syn. Pepon. 93-indica.

COCCOBRYON, Klotzsch, in Miq. Syst. Pip. 343 (1843) -Piper, Linn.
capense, Klotzsch, L c. = P. capensis, radicans.

COCCOCEBA8, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. 455 (1860). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. i«-818.
muticum, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 470.—Malaya.
plicatum, *Muell. Arg. I. c.* 539.—Burma,
sumatranum, ***Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.*** **466.-'** Sumatra.

COCCOCYPSELUM, P. Br. Hist Jamaic. 144 (1756) (Coccodpsilum). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. «• ii. 73.
BELLARDIA, Schreb. Gen. i. 790 (1789).
CONDALIA, Ruiz & Pav. Prod. 11. t. 2 (1794).
LIPOSTOMA, D. Don, in Edinb. Phil. foura. (1830) i. 168.
SICELIUM, P. Br. Hist. Jamaic. 144 (1756).
TONTANEA, Aubl. PI. Gui. i. 108. t. 42 (1775).
aureum, ***Cham, (f Schlecht. in Linnaea,*** **iv. (1829) 18&** —Bras.
bifiorum, Willd. Sp. PI. i. 618 - Manettia Lygistum.
buxi/olium, Spreng. Syst. i. 416 = Fernelia buxifoli*-
campanuliflorum, ***Cham, tf Schlecht. in Linnaea,*** (1829) 140.—Bras,
canescens, ***Willd. ex Roem. tf Schult. Syst.*** **iii.** ***Mont-*** 130.—Am. austr.
capitatum, Willd. ex DC. Prod. iv. 396=umbellatoni.
dliatum, ***Cham, tf Schlecht. in Linnaea,*** **vi.** ***(1&'>*** **414.—**Mexic.
Condalia, Pers. Syn. i. 132 = umbellatum.
cordifolium, ***Nees tf Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. *"•*** (1824) 14.—Bras,
dichroolasium, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *BetU-* 76,-Bras.
discolor, ***Van Houtte, ex Kunte, in Linnaea,*** **x»** (1861) 192.—Bras.)
erythrocephalum, ***Cham, tf Schlecht. in Linnaea,*** (1829) 144.-Bras.
geophiloides, ***Wamra, in Oestr. Bot. Zeitschr.*** **xxxi.** (1881) 70.—Bras.
glabrum, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 397.—Panama.
herbaceum, Aubl. PI. Gui. i. 68-repens.
hirsutum, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. S96.'-Hab. T
lanceolatom, *Pers. Syn.* i. 132.—Peruv.

COCOOCYPBELTO :—
metallicum, *Linden, in Btlg. Hortic.* xv. (1865) 99—Guiana.
nicrophyUum, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iii. *Mant.* 180—Ins. Maurit.
montanum, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 76—Bras.
munmularifolium, *Cham. V Schlecht. in Linnaed,* iv. (1829) 145.—Bras.; Ind. oca; Hexic.
obovatum, *Pers. Syn.* i. 182.—Peru*,
ovatum, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* iv. (1829) 141.—Bras.
pedunculare, *Cham. V Schlecht. I. c.* 142—Bras.
Pseudo-Tontanea, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 822__Ind. occ.
pulehellum, *Cham, in Linnaea,* ix. (1834) 238.—Bras.
repent, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 403 = canescens.
«pens, S». *Prod. Veg. Ind. Occ.* 31.—Ind. occ.
sessile, *Pen. Syn.* i. 182.-Perav.
spieatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 406—Gonzalea spicata.
Tontanea, *H. B. V K. I. c*—Am. austi.
ombellatum, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 307.—rernv.
"niflo Tvm, Willd. Sp. PI. i. 618 = Feroelia obovaU.
veronlcoides, *Presl, Bot. Bemerk.* 87.—Am. trop.
'"Tgatum, *Lam. lllustr.* i. 270. n. 1457=Manettia picta.
nolaceum, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 404 - capituliflomm.

COCCODERMA, Mien, in Lindl. Veg. Ktogd. 809 b (1847), nomen (Menisperm.).

COCCOLOBA, Linn. Syst. ed. X. 1007 (176»). *POLYOONACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 102.
LVPERODENDRON, Willd. ex Meissn. is DC. Prod, riv. 168, in syn. (1857).
NAUCOREPHKS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 34 (1886).
SCHLOSSEMA, Mill, ex Stead. Norn. ed. II. ii. S31 (X841).
UTostichoides, *Cham, in Linnaea.* •iii. (1833) 182—Bras,
"aminata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 176—N. Granat.
•ugoënsis, *Wedd. in Ann. *c. Nat.* Sir. HI. xiii. 0849) 260—Bras.
'*Inifolia,* Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. viii. 71 = Populifolia.
-*Ppressa,* Meissn. ex Steud. Norn. ed. H. i. 890 = rolygtmnm adpressnm.
•"?«», *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 288.—Cuba,
"flatten, Lour. VI. Cochinch.- 289-Polygonum asiaticum.
australis, Font, t Prod. 29. a. 176=Muehlenbeckia australls.
»'bad$_{en}$ri$_{ij}$ *y$_{acOw}$ Bnum— Pti Caribm* 87• ifnB• Sjfrf• «J- XII. 277.—Am. trop.
* * * « «•, Willd. Sp. Pi. ii 459 -caracasana.
*Bla*chetiana,* Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (*») 257'ochreolata.
bracteolosa, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* V.:. SO.—Bras.
brasiliensis, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) ,. so.-Bras.
*br*iptiensis,* Spreng. Syst U. 252 (=Hedyosmi sp.).—. was.
"«««, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 152-rugosa.
*talti*rrys,* Meissn. 1. c. 157 =coriacea.
Cand,olleana, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* v. I. 41—BrasV
c"*sana, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 167.—Venezneln
*car*inata,* Rniz, ex Meissn. L c. 150=Muehlenbeckia Jentobotrys.
!*"•»• *Cham, in Linnaea,* viiL (188S) ISS.-Bras.
™*Vfolia,* Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. I. 87 = laevis.
7™*, *A. Rich. Ft. Cub. Faneroq.* ii. 184.—Cuba.
•"»«, Willd. ex Meissn, in DC. Prod. xiv. 165-ob.«a.
coronaU, *Jacq. Bnum. PI. Cartt.* 19.—Ind. oce.
"*xtata.* Mart, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 168 ^ Popalifolia.
co;**, *Wright, in Sauv. Fi. Cub.* 139.—Cuba.
cn-centiaefolia *Cham, in Linnaea,* viii. (1883) 134.—Bras.
crispata, Bucb.-Ham. in Roxb. Fl. Ind. U. 292 = Polygonum chinense.

COCCOLOBA:—
Creegerä, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 710.—Ind. occ.
cubensis, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 162.—Cuba,
cujabensis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. xiii. (1849) 259.—Bras.
cyvwsa, Lour. Fl. Cochinch. 240 «Polygonum cymosum.
declinata, *Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 8O.-Bras.
densifrons, *Mart, ex Meissn. I. c.* 26.—Bras.
dioica, Stend. Nom. ed. II. i. S90=Muehlenbeckia sagittifolia.
diversifolia, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 19.—Ins. S. Doming.
emarginata, *Jacq. I. c.* 37 (sp. dnb.).—Am. austr.
excelsa, *Benth. in Hook. Land. Journ. Sot.* iv. (1845) 624.—Am. trop.
excoriata, *Linn. Syst.* ed. X. 1007.—Ind. occ.
fagifolia, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 55. t. 352.—Am. austr.
fasciculata, Meissn. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1870) l28=longependnla.
fasciculata, Wedd. in Ann. Sc Nat *Sii. Ul.* xiii. (1849) 258 - crescentiaefolia.
fastigiata, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 84.—Bras.
ferruginea, Endl. Cat. i. 274-excoriata.
flavescens, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 19.—Ins. S. Doming.
floridana, Meissn. in DC. Prod. xiv. 165 - laurifolia.
Gardneri, Meissn. in Mart Fl. Bras. v. I. 38 = crescentiaefolia.
Goudotiana, Meissn. 1. c. 35-fastigiata.
Goudotiana, Wedd. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xiii. (1849) 2t)0=obovata.
gradlis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 176.—Peruv.
gnndifolia, *Jacq. Bnum. PI. Carib.* 19.—Am. trop.
grandis, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 624=latifolia.
guatemalensis, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 883, nomen.—Hab. t
guianensis, *Meissn. in Linnaea,* xxi. (1848) 254.—Guiana.
Humboldtii, *Meism. in DC. Prod.* xiv. 163.—Bras,
ilheensis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. xiii. (1849) 258.—Bras.
indica, Wight, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 181 - Polygonum chinense.
japurana, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. I. 25-(Alsodeiae sp.).—Bras.
Klotzschiana, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 155.—Ins. S. Thomas.
Kunthiana, Meissn. L c. 166-pytifolia.
laevis, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* viii. 71.—Bras.
latifolia, *Lam. Encyc.* vi. 61.—Am. austr.
lati/olia, Poepp. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 151 = polystachya.
laurifolia, *jacq. Hort. Schoenbr.* iii. 9. t. 267.—Am. trop.
leoganensis, Jacq. Enum. PI. Carib. 19=uvifera.
leptostacbya, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 159.—Am. anstr.
longependnla, *Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 27.—Bras.
longifolia, *Fisch. Hort. Gorenk.* 25.—Ind. occ.
luddula, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 627.—Guiana.
maerantha, Hook. Bot Mag. sub t. 4536-seq.
macrophylla, Desf. Tabl. ed. I. 88=rugosa.
magni/olia, Hort ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 152 = rugosa.
manzinellensis, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockl.* 1854 (1856) 142.—Panama,
marginata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 626.—Bras.
Martii, Meissn. in Mart FL Bras. v. i. 87 -nitida.
membranacea, Ktotzsch, in Linnaea, xiv. (U81) 289, nomen-ilheensis.
microneura, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 168.—Demerare.
microphylla, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 62.—Cuba,
mlcrostachya, *Willd. Sp. PI.* Ii. 459—Ind. occ
mollis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec viii. 72-polystachya.
monoica, Rniz, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 149 = -Mnehlenbeckia tamnifolia.
Moritni, Klotzscb, ex Meissn. in Mart FL Bras. v. i. 28-ovata.

COCCOLOBA:-
nitida, Desf. TabL ed. IL 46 =fagifolU.
nitida, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 176.-N. Granat.
nitida. Mart, ex Meissn. In DC. Prod. xiv. 184-ovata,
nivea, Jacq. Enum. PI. Carib. 19-excoriata.
nutans, *H. B. V AT. Nov. Gen. (X Sp.* ii. 176.—Perov.
nymphaeifolia, Linden, Cat n. 18 (1868) - peltate,
obovata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 176—N. Granat.
obtusifolia, Jacq. Enum. PL Carib. tf-microstachya.
ochreolata, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. xiii (1849) 269—Am. austr.
orbicularis, Lodd. Cat. ex Load. Hort. Brit 169 = Mnehlenbeckia orbicularis.
ovata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bet.* iv. (1846.) 627—Guiana.
padiforois, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 166—Venezuela,
pallida, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 61.—Cuba.
paniculata, Meissn. in Mart. FL Bras. v. I. 43-polystachya.
paraënsis, *Meissn. I. c.* 38.—Bras.
parimensis, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1846) 626-excelsa.
parvifolia, *Nutt. N. Am. Sylv.* iii. 26. t 89 (sp. dub.).—Am. bor.
parvifolia, Poir. Encyc vi. 64=microstacbya.
peltata, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 406—Bras.
peltigera, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. I. 39» peltata.
pendula, Salzm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 169 =-nitida.
Persicaria, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. xiii. (1849) 256—Bolivia.
permiana, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 1S3 = gradlis.
pipericarpa, *Mart, ex Meissn. I. c.* 161.—Bras,
piantaginea, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. xiii. (1849) 257—Bras.
platyclada, F. Mnell. ex Hook. Bot. Mag. t. 5883-Muehlenbeckia platyclada.
Plumieri, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 162—Ind. occ
polystachya, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. xiii. (1849) 261—Bras,
populifolia, *Wedd. I. c.* 257.—Bras.
ptOescens, linn. Syst ed. X. 1007-grandifolia.
punctata, Linn. Sp. PI. ed. II. 623 = coronata.
pyrifolia, *Desf. Tabl.* ed. II. 46—Ind. occ.
racemulosa, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. I. SO—Bras,
ramosisissima, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IIL xiii. (1849) 258—Bras.
retusa, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 61.—Ind. occ.
rheifolia, Desf. Tabl. ed. II. 46-latifolia.
rigida, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. I. 29-parvifolia.
rigida, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 168-Humboldti.
rosea, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* v. I. 33.—Bras.
rotundifolU, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 154—Ins. S. Doming.
rubescens, Linn. Sp. PL ed. II. 523=gnndifolia.
rubiginosa, Mart, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 160-acrostichoides.
rufescens, *Wright, in Sam. Fl. Cub.* 188—Cuba,
rugosa, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 889—Ind. occ.
sagittata, Poir. Encyc. vi. 64-Muehlenbeckia sagittifolia.
sagittifolia, Ortega, Hort. Matr.v. 60 - Muehlenbeckia sagittifolia.
salidifolia, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xiii. (1849) 259.—Bras.
scandens, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec viii. 70 - sticticaulis.
scandens *Forsyth, ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 626.—Ind. occ.
scandens, Poepp. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 154 ~ peltata.
Schombargkiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 628—Guiana.
Schomburgkii, *Meissn. in Linnaea,* xxi. (1848) 265—Guiana.

COCCOLOBA :—
stictic&ulis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ziii. (1849) 261.—Bros,
strinta, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1846) 626.—Bras.
stricta, Klotzsch, in Schomb. Faun, et FL Gnian. 9S4 -lucidula.
strobilolifen, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. 1.26.—N. Gnnat
Swartzii, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 159.—Ind. occ.
tenui/olia, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 162-retusa.
tennifolia, *Linn. Syst.* ed. X. 1007 ; *Amoen. Acad.* v. 897 (sp. dub.).—Jamaic.
Totnea, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 74 = Polygonam molle.
uvifera, *Linn. Syst.* ed. X. 1007.—Am. trop.
Vellosiana, Casar. NOT. Stirp. Brag. Dec. viii. 70-crescentiaefolia.
venosa, Linn. Syst. ed. X. 1007 - coronata.
virens, Lindl. Bot. Reg.t 1816—coronata.
Warmingii, *Meissn. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1870) 128.—Bras.
Zebra, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 162.—Jamaic.

COCCOLOBIS, P. Br. Hist Jamaic. 209 (1766) = Coocoloba, Linn.

COCCOMELIA, Rein,. Cat. Gew. Buitenz, 110 (182S); et in Syll. Ratisb. ii. (1828) 6 = Baoeaurea, LOOT. (Euphorbiac.).
racemosa, Reinw. 1L cc. 110, 6 = B. racemosa.

COCCONEHIOMT, Baill. Adansonia, zi. (1873) 87. *EUPHORBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. Hi. 328.
Balansae, *Baill. I. c.* 88.—N. Caled.
minus, *Baill. I. c.—N.* Caled.

COCCOS, Gaertn. Frnct. i. 15 (1788)«Cooos, Linn. (Palm.).

COCCOSIPSILUM, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 81 (1788) =Coccocyp8elum, P. Br. (Rnbiac).

COCCOSPERMA, Klotzsch, in Linnaea, zU. (1888) 216 = Salaxis, Salisb. (Ericac).
Forbesianum, Klotzsch, 1. c = S. hexandra.
rugcsum, Klotzsch, 1. c.-S. xugosa.

COCCULIDIUM, .Spacb, Hist Vég. Phan. viii. 16 (1839) = CoeculUS, DC. (MenispT).
populifolium, Spach, L.c. 17->Cocculus carolinns.

COCCTJI/US, DC. Syst. i. 615 (1818). *MENISPERMACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 86..
ADENOCHETON, Fenzl, in. Flora, xxv. (1842) 312.
ANDROPHVLAX, Weodl. Beobacht. 38 (1798).
BAUMGARTIA, Moench, Meth. 660 (1794).
CEBATHA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 171 (1775).
CoccuuDlUM.Spach, Hist. Vég. Phan. viii. 16 (1839).
COLUHBRA, Comm. ex Endl. Gen. 826 (1840).
DIPLOCLISIA, Miers, in Ann. ft Mag. Nat Hist. Set. II. vil. (1851) 42.
EPIBATERIUM, Font. Char. Gen. 107. t. 54 (1776).
EPIBIASTBUM, Scop. Introd. 253 (1777).
FERRANDIA, Gaudich. Freyc. Voy. Bot 477 (1828).
GALLOA, Hassle. Cat Hort. Bog. Alt 172 (1844).
HOLOPEIRA, Mien, in Ann. & Mag. Nat. Hist Ser. II. vii..(1861) 42.
LEABBA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 172 (1775).
LEGNEPHORA, Miers, is Ann. ft Mag. Nat. Hist. Ser. III. zix. (1867) 88.
NEPHROIA, Lonr. Fl. Cochinch. 565 (1790).
QUINIO, Schlecht. in Linnaea, zzvi (1864) 732.
SELWYNIA, F. MuelL Ftagm. iv. 153 (1864).
WENDLANDIA, Willd. Sp. PI. ii. 276 (1799).
Abuta, Kostel. Allg. Med.-Phann. Fl. ii. Ml-Abuta rufescens.
acuminatus, DC. Syst i. 527=Tiliacora racemosa.
amazonnm, *Mart, ex Herberger, in Buchn. Rep. Pharm.* xxxvi. (1830) 353.—Bras.
anptstifolius, Hassk. Cat PL Hort. Bog. Alt. 172 - laurifolius.
Aristolochiae, DC. Syst. i. 520=villosus.
Baitś, A. Rich, in Gnill. ft Perr. Fl. Seneg. Tent *I* 12. t. 4=Tinospora Bakii.

COCCUIiUS:—
Balfonrii, *Schweinf. ex Balf. f. in Proe. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 500.—Ins. Soeotra.
banisteriaefolius, A. Rich, ex St Hil. ft Tnl. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. zvii. (1842) 186=Pachygoneoblongifolia.
bantamensis, *Blume, Bijdr.* 26.—Java.
Blumeanus, Wall. Cat. n. 4971, partim=CoEcinium fenestratnm.
brachystachyus, *DC. Syst.* i. 528.—Ins. Timor.
Burmanni, DC. 1. c. 617=Cyclea Burmanni.
calophyllus, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 331, oomen; et ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 578 = Erythiopalum scandens.
carolinus,Z)C.5j'st.i. 524.—Am. bor.
Cebatha, *DC. I. c.* 626.—Arabia.
Chondodendrom, *DC. I. c.* 622.—Am. anstr.
cinerascens, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 59 = Chondodendron platyphyllum.
cinerens, *Zoll.* to* *Moritn, Syst. Vere. Zoll.* 38.—Java.
ctnvolvulaceus, DC. Syst. i. 618=Tinospora cordifolia.
convolvnlaceos, *Endl. ex Walp. Rep.* i. 96.—Perav.
cordifolius, DC. Syst. i. 617-Tinospora cordifolia.
coriaceus, Blume, Bijdr. 25.—Java,
corymbpsus, *Blume, I. e.* 24.—Java.
Cotoneaster, *DC. Syst.* i. 525.—Am. austr.
crispus, DC. 1. c 621=Tinospora crispa.
cuneatus, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 60.—China.
euspidatus, Wall. Cat. n..4960=Limacia caspidata.
cynanchoides, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 79.—Zeylan.
diantherus, Hook, ft Arc. Bot. Beech. Voy. 167-Thnnbergii.
dichopetalus, *Turci. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) I!. 280.—Japon.
dictions, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 46.—Bras.
diversifolius, *DC. Syst.* i. 523.—Mexic
domingensis, DC. 1. c. 628 — Pachygone domingensis.
ellipticus, DC. 1. c 526 = C. Leaeba.
enneaudra, Eichl. in Flora, xlvii. (1864) 391.—Peruv.
Epibaterium, *DC. Syst.L* 580.—Ins. Pacif.
Ferrandianns, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 477.—Ins. Sandvic.
Fibraurea, DC. Syst i. 526 = Fibranrea tinctoria.
filipendula, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 43.—Bras.
Finlaysonianus, Wall. Cat. n. 4974 - Stephania rotunda.
flavescens, *DC. Syst.* i. 520.—Ins. Molucc.
flavicans, *Wall. Cat.* n. 4976.—Ins. Penang.
Forsteri, *DC. Syst.* i. 617.—Hab.1
glaber, Wight ft Am. Prod. i. 13=C. Leaeba.
glaucescens, *Blume, Bijdr.* 25.—Burma; Java,
glaucus, *DC. Syst.* i. 621.—Ins. Molucc.
gomphioides, *DC. 1. c.* 530.—Madag.
hastatus, DC. 1. c. 622=villosus.
hexagynos, *Colebr. in Trans. Linn. Soc. ml* (1822) 68.—China.
Hookerianus, *F. Muell. ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* ii. (1861) 62.—Austral.
Imene, Mart in Flora, xxiv. (1«41) U. *Beibl.* 44 = Anomospennum japurense.
incanus, Colebr. in Trans. Linn. Soc. ziii. (1822) 67. t 17—Peiicampylus incanus.
japoniens, *DC. Syst.* i. 616.—Japon.
japurensis, Mart, in Flora, zxiv. (1841) II. Beibl. ,44 = Anomospennum japurense.
lacunosus, DC. Syst. i. 619=Anamirta Cocculns.
laevigatus.Mtrt. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 45 = Abuta concolor.
laevis, Wall. Cat. n. 4975=C. Leaeba.
lanuginosus, *Blume, Bijdr.* 24.—Java,
laurifolins, *DC. Syst.* i. 520.—Reg. Himal.; Japon.
Leaeba, *DC. 1. c. i.* 529.—As. trop. occ.; Air. trop.
leptostachyns, *DC. 1. c.* 528.—Ins. Timor.
Limacia, *DC. I. c.* 526.—Cochinch.
Linnaeanus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 62 (err. typ. 61)—Burma.
lobata, Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 169 = Disciphania lobata.
longifolius, *Decne. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 84.—Ins. Timor.
lucidus, Teijsm. ft Binn. in Nat. Tijdschr. NederL Ind. iv. (1863) S97=-Antitaxis fasciculate.
macranthus, Hook. f. in Hook. Ic. PL t. 759=Jateorhiza strigosa.

COCCULU8:—
macrocarpus, *Wight V Am. Prod.* 13.—Ind. or.; Burma; China,
macrophyllus, *St. Hil. V Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II-xvii. (1842) 134.—Bras.
malabaricus, DC. Syst. i. 618-Tinospora malabarica.
Martii, *St. Hil. V Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 136.—Bras,
megaspermus, *Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 331.—Silhet.
membranaceus, Wall. Cat. n. 4967 = Cissampelos Pareira.
milleflorus, *DC. Syst* i. 530.—Madag.
mollis, *Wall. Cat.* n. 4973.—Reg. Himal.
Moorei, F. Muell. Fragm. i. 162-Pericampylus incanus.
Nephroia, *DC. Syst.* i. 531.—Cochinch.
nudifiorus, *Griff. Notul.* iv. 307.—Burma,
oblongifolius, *DC. Syst.* i. 629.—Am. bor. occ
oblongifolius, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 43 "= Pachygone oblongifolia.
oblongus, Wall. Cat. n. 4963=Limacia oblonga.
orbiculatus, DC. Syst. i. 523=Cissampelos Pareira.
ovalifolius, Blume, Bijdr. 25=umbellatus.
ovalt/olius, DC. Syst. i. 526=Thunbergii.
Pakni, Mart in Flora, zxiv. (.1841) »• Beibl. 46-Anomospermum japurense.
palmatus, DC. Syst. i. 622-Jateorhiza Columba.
palmatus, Hook. Bot. Mag. tt. 2970-71 = Jateorhiz* Miersii.
paniculiger, Mart in Flora, xxiv. (1841) H. Beibl. 43—Pachygone domingensis.
pauper, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1856-67) 182.—Am. trop.
peltatus, DC. Syst i. 516-Cydea peltata.
petiolaris, Wall. Cat. n. 4B64=Tinomiscium petiolarę.
planiflorus, Wall. 1. c. n. 4961 = Pycnarrhena planiflora.
platyphyllus, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 59-Chondodendron platyphyllum.
Pluienetii, DC. Syst. i. 620 = Pachygone ovata.
poly carpus, Wall. Cat. n. 4958=Tiliacora racemosa.
populifolius, DC. Syst. i. 519=Anamirta Coccnlns.
radiatus, DC. 1. c. 527=Tiliacora racemosa.
recisus, Miers/Contrib. iii. 258 - C. Leaeba.
reticulatus, Mart in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 4*° Anomospennum reticulatnm.
rimosus, *Blume, Bijdr.* 24.—Java,
rotundifolius, *DC. Syst.* i. 517.—Hab. ?
Roxburghianus, DC. 1. c 516 - Stephania rotunda,
sagittaefolius, *Miers, Contrib.* iii. 255.—Am. bor.
Selvynii, F. Muell. Fragm. iv. 163 «= Selwynia launna.
septum, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 68. '• 6=villosns.
smilacinus, F. Muell. ez Benth. in Journ. Linn. Soc. ᵛ-Suppl. ii. (1861) 52=Tinospora smilacina.
suberosus, DC. Syst. i. 519 = Anamirta paniculata.
tamoides, DC. 1. c. 521=Chondodendron tamoides.
tetrandrus, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) I**' nomen.—Malaya.
Thunbergii, *DC. Syst.* i. 624.—Japon.
tomentosus, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 69 = Tinospora tomentosa.
tomentosus, Mart, ez Eichl. in Mart. Fl. Bras. x>>'* 176=Abuta rufescens.
triandrus, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) ᵉ* = Limacia triandra.
triangularis, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) I nomen.—Malaya,
triflorus, *DC. Syst.* i. 529.—Java,
trilobus, *DC. 1. c.* 522.—Japon.
nmbellatus, *Steud. Norn.* ed. II. i. 392.—Java.
urophyllus, *Mart, in Flora,* zziv. (1841) II. *Beibl.* *°-—Bras.
velutinus, Wall. Cat. n. 4970-Limacia velutina.
mrrucosus, Wall. 1. c. n. 4966 A, B-Tinospo" crispa.
verrucosus, Wall. 1. c. n. 4966 C, D, E = Tino>p°r» cordifolia.
villosns, *DC. Syst.* i. 525.—Ind. or.; Afr. trop.
villosus, Wall. Cat. n. 4957, partim= Cissamp* Pareira.
Wightianus, Wall. *I* c. n. 4969 A - Pachyg ovata,

COCCUS, Linn. Mas. Cliff. 11 (1786); Gen. ed. 1 (17S7)-Coooa, Linn. (Palm.).

COCCYGANTHE, Reichb. Fl. Germ. Excurs. xvi. 66 (1844)= Lychnis, linn. (CaryophylL).
Flos-cuculi, Reichb. 1. c. = L. Flos-cuculi.
pratensis, Schur, Ennm. PI. Transs. 107-L. Flos-cuculi.

COCHLANTHERA, Choisy.in Mém. Soc. Phys. Geniv. xii. (1851) 426 = Clusia, Linn. (Gnttifer.).
lanceolata, Choisy, 1. c—Venezuela.

COCHliANTHtrS, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. »i. 11884) 78. *ASCLEPIADACEAE.*
socotranns, *Bal/.f. I. c.* 79.—Ins. Socotra.

COCHLEANTHES, Rafin. Fl. Tellur. 45 (1836) = Zygopetalum, Hook. (Orchid.).
fragrans, Rafin. 1. c. = Z. cochleare.

COCHXEAEIA, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 75.
ARMORACIA, Riv. ex Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 426 (1800).
CHRYSOCHAMELA, Boiss. Fl. Orient, i. 313 (1867).
GONYCLISIA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 191 (1867).
IONOPSIDIUM, DC. ex Stend. Nom. ed. II. i. 392 (1840).
KERNERA, Medic. Pflanzeng. 71 (1792).
RAPHANIS, Dod. ex Moench, Meth. 267 (1794).
RHIZOBOTRYA, Tausch, in Flora, xix. (1836) 33.
TAPHROSPERMUM, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt iii. 172 (1831).
TROPHOSPERMUM, Walp. Rep. i. 171 (1842).
•caulis, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 69.—Lusitan. j Afr. bor.
"Ipina, Sweet, Hort Brit. ed. I. 22 = officinalis.
"Itaica, Schlecht. ex DC. Prod. i. 173 = microcarpa.
"tyuoides, DC. 1. c. 172=flava.
amphibia, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 160.—Soongaria.
anglica, *Linn. Syst.* ed. X. 1128.—Keg. bor. et arct.
aphragmodes, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 15.—Persia.
otuatica, Eaton, Man. ed. V. 181 - Nasturtium lacustrel
aqnatica, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iii. 88.—As. bor.
ncKca, Schlecht. in DC. Syst. ii. 867-anglica.
Armoracia, *Linn. Sp. PI.* t. 648.—Europ.
Amoracia, Pall, ex DC. Syst. ii. 362=microcarpa.
Aucheri, *Boiss. in Ann. Se. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 168.—Armenia.
wricnlata, *Urn. Encyc.* ii. 165.—Europ.
austnaca, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 160.—Rossia.
"fstnàca, Vis. Fl. Dalm.iii. 122=Nasturtium austriacum.
^t»ya, *Dum. Fl. Belg. Prod.* 120.—Batavia,
"fevicaulis, *Facch. in Zeitschr. Ferdin. Tirol.* III. „ U854) 79.—Tyrol.
Cmna, Wall. Cat. n. 4802 = flava.
^-wnelinae, *Boiss. in Ann. Se. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 172—Persia.
^amelinae, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 160, in nota.—Manchuria.
•^Pylocarpa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (18*2) 17]?-Persia.
[illegible]°Ua, *Turct. ex Bunge, in Mém. Sav. Etr. Acad.* "*tersb.* ii. (1835) 579.—Sibir. baical.
°*Tonopus,* Linn. Sp. PI. 648 -Senebiera Coronopus.
"-'antzii, *CranU, Class. Crucif. Emend.* 100.—Europ.
yssifolia, Willd. ex DC. Prod. i. 178-macrocarpa.
? » ¦ « . Gunn. Fl. Norv. 72. n. 197-officinalis.
«uca, *Linn. Sp. PI.* 647.—Reg. bor. et arct.
Sapiens, *walk. Serf. Fl. Hispan.* 12.—Mont. Pyren.
Laba, Linn. Syst. ed. X. 1129 = Lepidium Draba.
[illegible]*Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 169—persia.
"nestrata, R. Br. in App. Voy. Ross, (1819) p. cxliii
[illegible] - officinalis.
flST,"[illegible] Gilib_ F1_ UtnaB_ H_ 61-officinalis.
Ind[illegible] *ueh_ Ham_ ** Roxb_ Hort_ Ben e_ *». nomen.—
[illegible] Schlecht. DC. Syst. ii. 865 = Camelina glabra.
[illegible] Linn_ Sp_ pl_ 6«.-Europ.
[illegible] Pall_ « DC Syst. ii. 869=Draba salsa.
[illegible]*Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Mr. II. xvii. 168—Persia.
[illegible] *Ledro_ ** *" « ' 169—Dahuria.
s-wtliflora, *DC. Syst.* ii. 363.—Sibiria.
«*landica,* Gunn. FL Norr. 72. n. 196 = anglica.

COCHIiEABIA:—
groenlandica, Linn. Sp. PI. 647 = officinalis.
groenlandica, Willd. ex DC. Prod. i. 173-lenensis.
hastata, Moench, Meth. Suppl. 87—danica.
hederacea, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. I'l. ii. 696 = danica.
heterophylla, Cav. Desc 405 = Camelina dentata.
heterophylla, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 50, nomen=seq.
heterophylla, Schlecht. in DC. Syst. ii. 872 = sisymbrioides.
himalaica. *Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 154.—Reg. Himal.
humifusa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 27 = Senebiera didyma.
integrifolia, DC. Syst. ii. 368=Entrema alpestre.
kamtschatica, Schlecht. ex DC. Prod. i. 173-officin&lis.
lancifolia, Stokes, Bot. Mat Med. iii. 437 =C. Armoracia.
lapathifolia, Gilib. Fl. Lituan. iv. 58=C. Armoracia.
lenensis, *Adams, ex Fisch. in DC. Syst.* ii. 867.—Sibiria.
Linnaei, Griewank, ex Aschers. in Fl. Prov. Brandenb. 54 = officinalis.
longifolU, *Medic, in Usteri, Neu. Ann.* ii. 41.—Europ.
lyraU, *Sibth. V Sm. Fl. Grate. Prod.* ii. 8 ; *Fl. Graec.* t. 619.—Sicilia.
macrocarpa, *Waldst.* b* *Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 101. L 184.—Hungar.; Transsylv.
mexicana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 820.—Mexic
microcarpa, *DC. Syst.* ii. 362.—Sibir.
minima, Steud. Nom. ed. II. i. 392 » danica.
natans, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 90 - amphibia.
niloHca, Delile, Fl. Egypte, 245 = Senebiera nilotica.
oblongifolia, DC. Syst. ii. 363=officinalis.
officinalis, Lapevr. Hist. Abr. PI. Pyr. 868 = pyrenaica.
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 647.—Reg. bor. et arct.
olyssiponensis, Brot. Fl. Lusit. i. 571 = acaulis.
ovalifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 436 = anglica.
planisiliqua, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 169.—Persia.
polysperma,CosU, ex Willie, in Linnaea, xxx. (1859-60) 86 = Kernera polyspenna.
Pseud-Armoracia, Czern. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 93 = macrocarpa ?
pusilla, Brot Phyt. 100=acaulis.
pyrenaica, DC. Syst. ii. 365 = officinalis.
renifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 485 = officinalis.
repanda, *Medic, in Usteri, Neu. Ann.* ii. 42.—Europ.
repens, Lam. V\. Fr. ii. 473 = Senebiera Coronopus.
rhizobotrya, *Walp. Rep.* i. 153.—Austria.
rotundifolia, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 695 = officinalis.
rusticana, Lam. Fl. Fr. ii. 471 =C. Armoracia.
sagittaefolia, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1812) 182.—Hab.t
sagittata, Crantz, Class. Crucif. Emend. 99=Neslia paniculata.
salsa, *Schlecht. ex DC. Syst.* ii. 369.—Sibiria!
saliva, Cav. Desc. 405 = Camelina sativa.
saxatilis, *Linn. Sp. PI.* 648.—Europ.
saxifragaefolia, DC. Syst. ii. 370 - Graellsia saxifragaefolia.
scapinora, *Hook.f. (f Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 164.—Reg. Himal.
Sempervivum, *Boiss.* b* *Bal. Diagn.* Ser. II. v. 28.—As. Min.
septentnonalis, DC. Prod. i. 174 = Draba hyperborea.
septentrionalis, Schlecht in DC. Syst. ii. 355 = officinalis.
sibirica, Willd. Sp. PI. iii. 450 = Sobolewskia lithophila.
siliquosa, Schlecht. in DC. Syst. ii. 369 = Draba hyperborea.
sisymbroides, *DC. I. c.* 368.—Sibir. arct.
spathulata, *Schlecht. in DC. I. c.* 369=Draba hyperborea.
Szovitzii, *Boiss. Fl. Orient,* i. 248.—Persia.
tenuifolia, Salisb. Prod. 267—Senebiera Coronopus.
tridactylites, *Banks, ex DC. Syst.* ii. 367.—Am. arct.
varii/olia, Salisb. Prod. 267 - C. Armoracia.
velutina, *DC. Syst.* ii. 870.—Mesopot.
violacea, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 171.—Persia.

COCHLEAKIA:-
Wahlenbergii, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich, ii. 21-anglica.
Wunderlichii, *C.A. Mey. ex Claus, in Beitr. Pft. Russ. Reich,* viii. 203.—Rossia.

COCHLEATA, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 264 (1745)-lCedieago, Linn. (Legum.).
intertexta. Medic, in Vorles. Churf. Ges. ii. (1787) 385 = M. intertexta.
scutellata, Media Phil. Bot. i. 210 = M. scutellata.

COCHLIA, Blume, Bijdr. 320. t. 59 (1825) = Bulbophyllum, Thou. (Orchid.).
violacea, Blnme, 1. c. = B. violaceum.

COCHIilANTHUS, Benth. in Miq. PI. Jangli. i. 234, in nota (1851 ?)• *LEGUMINOSAE,* Benth. *it* Hook. f. i. 533.
gracilis, *Benth. I. c.*—Reg. Himal.

COCHLIDIOSPERMUM, Reichb. Conip. 121 (1826)-Veronica. Toum. (Scrophuiarin.).
agreste, Opiz, Seznam, 31 = V. agrestis.
Buxbaumii, Opiz, 1. c.=V. Toumefortii.
digitatum, Opiz, 1. c.-V. triphyllos.
Frieseanum, Opiz, 1. c = V. opaca.
hederaefolium, Opiz, 1. c = V.'hederaefolia.
Lappago, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 158-V. hederaefolia.
opacum, Opiz, Seznam, 31—V. opaca.
praecox, Opiz, 1. c.=V. praecox.

COCHIiIODA, Lindl. Fol. Orchid. (1853). *ORCHIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 660.
densiflora, *Lindl. 1.*1.—Reg. Andin.

COCHLIOPETALUM, Beer, in Flora, xxxvii. (1854) 847; Bromel. 68 (1857) = Pltcairnia, L'Hérit. (Bromeliac.).
albiflos, Beer, Bromel. 68 = P. albi0os.
flavescens, Beer, 1. c. 69 = P. xanthocalrx.
odoratum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 817 = P. odorata.
Schuechii, Beer, Bromel. 69-P. albiflos.
stamineum, Beer, in Flora, xxxvii. (1864) 347-P. staminea.

COCHLIOSPERMUM, Lag. Mem. PL BarilL 68 (1817) -Suaeda, Forsk. (Chenopod.).
altissimum, Lag. 1. c. 57= a. altisslma.
Cavanillesii, Lag. 1. c. 60=S. maritima.
Clementei, Lag. 1. c. 62 - S. splendens.
fruticosum, Lag. 1. c. 59=S. fruticosa.
hispanicum, Lag. 1. c. 58=S. altissima.
salsum, Lag. 1. c. 65 = S. maritima.

COCHIiIOSTEMA, Lem. Illustr. Hortic. vi. (1859) Misc. 70 et t. 217. *COMMEL1NACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 860.
Jacobianum, *C. Koch V Linden, in C. Koch V Pint. Wochenschr.* x. (1867) 322.—Ecuador,
odoratissimum, *Lem. Illustr. Hortic.* vi. (1859) *Misc.* 70. t. 217.—Ecuador.
odoratum, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 340 = odoratissimum.

COCHIiOBPEBMUK, Kunth, Malv. 6 (1822). *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 124.
AZEKEDIA, Arruda, ex Allem. Desenb. (1846).
MAXIMILIANA, Mart, in Flora, ii. (1819) 451.
WITTELSBACHIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 80. t. 55 (1824).
angolense, *Welw. Apont.* 566; *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 113.—Afr. trop.
Cadinae, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 431.—Bras.
Fraseri, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 807.—Austral.
Gillivraei, *Benth. Fl. Austral,* i. 106.—Austral.
Gpssypinm, *DC. Prod.* i. 527.—Ind. or.
Gregorii, *F. Muell. Fragm.* i. 71.—Austral,
heteronemum, *K Muell. in Hook. Ken Journ.* ix. (1857) 15 (=seq.?)—Austral,
heteronenrum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 106.—Austral.
hibiscoides, *Kunth, Syn. PI. Aeq.* iii. 214.—Mexic.
insigne, *St. Hit. PI. Us. Bras.* t. 57.—Bras,
niloticum, *Oliver, Ft. Trop. Afr. I* 113.—Afr. trop.

COCHLOSPEBMUM :—
orinoccense, *Steud. Norn.* ed. II. i. 393.—Venezuela.
Parkeri, *Planch, in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1817) 310.—Guiana,
parkiaefolium, *Planck. 1. c.* 311.—Guiana.
Planchoni, *Hook./, ex Planck. I. c.* 809.—Afr. trop.
serrati/olium.VC. Prod. i. 637-hibiscoides.
tinctorium, *Pert, in Ann. de la Marine et des Colonies* (1880); *ex A. Sick, in Guill.* to" *Pert. Fl. Strug. Tent.* i. 99.—Afr. trop.
vitifolium, Spreng. Syst. ii. 696-serratifoUnm.
vitifolinm, *Spreng. I. c.* iv. *Cur. Post.* 206.—Mexic.

COCHRAXTBA, Mien, Trav. Chile, ii. 623 (1826) nomen; et in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. ii. (1868) 126. *BORAGINEAB,* Benth. & Hook. f. ii. 845.
chenopodiacea, *ifiers, in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. ii. (1868) 132.—Chili,
conferta,*Miers, Trav. Chile,* ii. 629, nomen; *et I. c.* 126.—Chili,
corymbosa, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. ii. (1868). 126.—Chili,
ericoidea, *Miers, I. c.* 180.—Chili,
filifolia, *Miers, I. c.* 131.—Chili,
florida, *Miers, I. c.* 129—Chili.
hebecula, *Miers, 1. c.* ISO.—Chili,
hispidula, *Miers, 1. c.* 132.—Chili,
myosotifolia, *Miers, I. c.* 128.—Chili,
sinuata, *Miers, I. c.* 127.—Chili,
stenophylla, *Miers, 1. c.* 128.—Chili.

COCKBTJKUTA, Balf. f. in Proc. Roy. Sob Edinb. xii. <1884) 90. *SELAGINEAE.*
socotrana, *Balf.f. I. c*—Ins. Socotra.

COCOCIPSILUM, Taume St. Hil. Expos, i. 434 (1806) = Coecooyp8elum, P. Br. (Kubiac).

COCOLOBA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 84 (1888) - Coooo-loba, Linn. (Polygal.).

COCOS, Linn. Sp. PI. ed. L 1188 (1753). *PALMAE,* Benth. & Hook, f.iii. 946.
GLAZIOVA, Mart, ex H. Wendl. in Flor. et Pom. (1871) 116.
LANGSDORPPIA, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Mod. xviii. (1820) 347.1.1.
LITHOCARPDS, Targ. Tozz. ex Stead. Norn. ed. II. i. 178, in syn. (1840).
PLATENIA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1866) 250.
SYAGRUS, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 129 (1824).
acaulis, *Drude, in Mart. Fl. Brás.* iii. II. 426.—Bras.
acicularis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68 - Bactris minor,
acrocomioides, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 409.—Bras.
aculeata, Jacq. Select. Am. 278 = Acrocomia sclerocarpa.
aequatorialis, Drnde, in Mart. Fl. Bras. iii. II. 407, sphalm.=C. Inajai.
amara, *Jacq. Select. Am.* 277.—Ind. occ.
arenaria, Gomez, in Mem. Ac. Lisboa, iii. (1812) Mem. dos Corresp. 61 - Diplothemium littorale.
argentea, *Engel, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 690.—N. Granat
Aricui, Nenwied, Reise Bras. i. 272 * schizopbylla.
australis. *Mart. Palmet. Orbign.* 96.—Paraguay.
Bonneti, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 210, nomen.—Hab. 1
botryophora, *Mart. Hist Nat. Palm.* ii. 118. t. 83,84.—Bras.
bntyracea, *Linn./. Suppl.* 454.—Am. austr.
butyracea, Mart, ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 140 = Scheelea butyracea.
butyrosa, H. Wendl. 1. c = Attalea humilis.
campestris, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 121.—Bras,
capitata, *Mart. I. c.* 114.—Bras.
ckilensis, Molina, ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 309, in obs. •> Jubaea spectabilis.
comosa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 12L t. 88. f. 1-2.—Bras.
coronata, *Mart. I. c.* 115. tt. 80, 81.—Bras,
crispa, *H. B. I* K. Nov. Gen. et Sp.* i. 302.—Cuba.
Datil, *Drude* b* *Griseb. in Goett. Abh.* xxir. (1879) 283.—Reg. Argent
elegantissima, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 241-Weddelliana.

COCO8 :—
equatorialis, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 38 = C. Inajai.
eriospatha, *Mart, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 424.—Bras.
flexuosa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 120.—Bras,
frigida, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16, nomen.—Bras.
fusi/ormis, Sw. Fl. Ind. Oca i. 616-Acrocomia sclerocarpa.
Geriba, Barb.-Rodr. Prot. App. 48=botryophora.
graminifolia, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 416.—Bras.
Guacnynle, *Liebm. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 323.—Mexic.
guineensis, Linn. Mant. i. 187 = Bactris minor.
Inajai, *Spruce, ex Trail, in Journ. Bot.* xv. (1877) 79.—Bras,
insighis, *Mart, ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 241.—Bras.
Kotchoubeyi, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16, nomen.—Bras.
lapidea, *Gaertn. Fruct.* i. 16. t. 6. f. 1.—Bras. I
leiospatha, *Barb.-Rodr. Prot. App.* 44.—Bras.
maldioica, J. F. Gmel. Syst. 569 = Lodoicea sechel-Urum.
mamillaris, *Blanco, Fl. Filip^* ed. I. 722.—Ins. Philipp.
maritima, Comm. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 241 = Lodolceae sp.
Martiana,* *Drude* b[1] *Glut, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 418.—Bras,
melanococca, Hort. Belg. ex Heynh. Norn. ii. 162, nomen.—Hab. ?
Mikaniana, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 128.—Bras.
Naja, *Arruda, ex Kunth, Enum. PI.* iii. 288.—Am. trop.
nana. Griff. Notnl. iii. 166=nucifera.
Nolaia-aasu, *Neuwied, Reise Bras.* i. 271.—Bras.
Normanbyi, W. Hill, Rep. Brisb. Bot. (1876) 6; ex F. MueIL Fragm. viii. 235 = Areca Normanbyi.
nucifera, *Linn. Sp. PI.* 1188.—Reg. trop.
Nypa, Lour. Fl. Cochinch. 567=Nipa fruticans.
oleracea, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 117. t 82.—Bras,
orinocensis. *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 161.—Am. trop.
ovata, *Hort. Belg. ex Heynh. Norn.* ii. 162, nomen.—Hab. I
petraea, *Mart. Palmet. Orbign.* 100.—Bolivia,
pityrophylla, *Mart. 1. c.* 99.—Bolivia,
plumosa, *Hook. Bot. Mag.* t 5180.—Bras.
plumosa, Lodd. ex Loud. Hort. Brit 381 •> comosa.
Procopiana, *Glat. ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 412.—Bras,
regia, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 823.—Mexic
Romanzofliuu, *Cham, in Choris, Voy. Pittor. {Chili)* 5. t 6 & 6 [bis].—Bras.
rupestris, Barb.-Rodr. Prot. App. 45 = petraea.
schizophylla, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 119. tt. 84, 86.—Bras.
spedosa, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 38.—Bras,
simplicifolia, *Hort. Belg. ex Heynh. Norn.* ii. 152.—Hab.?
Syagrns, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 406.—Bras,
sylvestris, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 241, nomen.—Hab. t
Urncuru, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16, nomen.—Bras.
ventricosa, *Arruda, in Rosier, Trav. Brat.* 485.—Bras.
venatorum, Poepp. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 241 = Maximiliana venatorum.
vini/era, Mart. Hist Nat. Palm. iii. 324~Gaussia vinifera.
Weddelliana, *H. Wendl. in Flor. et Pom.* (1871) 114.—Bras.
Weddellii, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 411.—Bras.
Yatay, *Mart. Palmet. Orb.* 93.—Reg. Argent.
Yunimaguas, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 241.—Peruv.

CODANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 90 (1886) = Salvia, Tonra. (Labiat).
biflora, Rafin. 1. c.=S. hebiflora.
glabra, Rafin. 1. c = S. strictiflora.

COD ARIA, Linn, ex Benn. PI. Jav. Rar. 99 (1838)-Lerchea, Kalm. (Rnbiac).

CODARIOCALYX, Hassle, in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 48 = Desmodium, Desv. (Legumin.).
capitatus, Hassk. 1. c. 49 = D. capitatum.
conicus, Hassk. 1. c. 49, 62=D. gyroides.
gyrans, Hassk. 1. c.=D. gyrans.
gyroides, Hassk. 1. c. 49=D. gyroides.

CODARIUM, Soland. ex Vahl, Enum. i. 302 (1806) = Siallum, Linn. (Legumin.).
acutiMium, Afzel. in Schrad. N. Journ. ii. (1807) 233 = D. guiueense.
discolor, DC. Prod. ii. 520=D. guineense.
nitidum, Vahl, Enum. i. 302 ; ii. 400 = D. guineense.
obtusi/olium, Afzel. in Schrad. N. Joum. ii. (1807) 233 = D. guineense.
Solandri, Vahl, Enum. i. 802 = D. guineense.

CODAZZIA, Karst. & Triana, in linnaea, xxviii. (1856) 426 = Delostoma, D. Don (Bignonlac.).
dentata, Karst. Fl. Columb. ii. 87. t. 119 = D. rosea.
rosea, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 427 = D. rosea.
spedosa, Karst. 1. c—N. Granat.

CODDAMPULI,Adans.Fam.ii.445(1768)=Gareirda, Linn. (Guttif.).

CODDA-PANA, Adans. Fam. ii. 25 (1768) - Bentinckla, Berry (Palm.).

CODIA, Forst. Char. Gen. 59. t. 80 (1776). *SAXIFRAGE JE,* Benth. & Hook. f. i. 648.
ferruginea, *Brongn.* &" *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix-(1862) 77.—N. Caled.
florihunda, *Brongn.* b* *Gris, 1. c*—N. Caled.
montana, *Forst. Char. Gen.* 68.—N. Caled.
montana, Labill. ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June 1830) 94 «= Callicoma Billardieri.
obcordata, *Brongn. If Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* w-(1862) 77.—N. Caled.
serrati/olia, Ser. ex DC. Prod. iv. 7-CalHconM serratifolia.
spathulaU, *Brongn.* b" *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* «• (1862) 77.—N. Caled.

CODIAEUM, Rumph. ex A. Juss. Euph. Tent. 33.19 (1824). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii-299.
CROZOPHYLA, Rafin. Sylva Tellur. 64 (1838).
JUNGHUHNIA, Miq. Fl. Ind. Bat i. II. 412 (1856).
PHYLLAUREA, Lour. Fl. Cochinch. 675 (1790).
SVNASPISMA, Endl. Gen. 1110 (1840).
alternifolium, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1M7—N. Caled.
andamanicum, Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xli-(1873) II. 246 (-Blachia sp.).—Ins. Andaman,
aurantiacum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. H.1118^ Ins. Banca.
Balansae, *Baill. Adansonia,* xi. (1878-76) 77.-N-Caled.
Brongniartii, *Baill. 1. c.* 76.—N. Caled.
Bureavi, *Baill. 1. c.* 74.—N. Caled.
carunculatum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1117—N. Caled.
chrysosticton, Spreng. Syst iii. 866 = variegatum.
cunei/olium, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 348=variegatum.
Deplanchei, *Baill. Adansonia,* xi. (1873-76) 76.—N-Caled.
drimiflornm, *Baill. I. c*—N. Caled.
inophyllum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1120." N. Caled.
lutescens, Kurz, in Joura. As. Soc. Beng. xlii. (1873) "• 246=Sphyranthera capitellata.
medium, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 251=variegatum.
moluccanum, Decne. in Nouv. Ann. Mas. Par. (1834) 485-variegatum,
obovatum, ZolL & Morr. in Nat. en Geneesk. ArcB. NeSrl. Indie, ii. (1845) 582=variegatum.
Pancheri, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. *U.* 1117=Baloghia Pancheri.
Penttii, Muell. Arg. 1. c. 1118 = Blachia Pentzii.
pictum, Hook. Bot. Mag. t. 3051 = variegatum.
rosec-pictum, *Andre, Illustr. Hortic.* xxvi. (1879) «"• t. 364.—Hab. I
timorense, A. Juss. Tent Euph. 34, nomen - variegatum-*umbeUatum,* Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1H[8] * Blachia umbellata.
variegatum, *Blume, Bijdr.* 806.—Malaya.

CODIAMINUM, Rafin. FI. Tellnr. iv. 21 (1886) = WarolesUB, Tourn. (Amaryllid.) (N. Bulbocodinm).

CODIPHUS, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 77 (1836)-Prismatocarpua, L'Herit. (Campanulac.).
nitidus, Rafin. 1. c = P. nitidus.

CODIVALIA, Rafin. Fl. Tellnr. fît 40 (1836) = Pupalia, Juss. (Amarant.).
lappacea, Rafin. 1. c. = P. lappacea.
patula, Rafin. 1. c.=P. lappacea.

CODOCHONIA, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 482 (1862) "AcniBtus, Schott (Solanac).
solanoides, Dun. 1. c.-A. nmbellatus.

CODON, Linn. Syst. ed. XII. 292 (1767). *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 830.
aculeatum, Gaertn. Fruct.ii. 88 = Royeni.
Dregei, *E. Mey. Z-aei Pfl. Docum.* 174, nomen.—Afr. austr.
Royeni. *Linn. Syst.* ed. XII. 292.—Afr. austr.

COpONACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 103 (!847). *ACANTHACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 1098.
acuminatus, Nees, 1. c -pauciflorus.
PMdflorus, *Nees, I. c*—Hongkong.

CODONACHNE, Wight ft Am. ex Steud. Norn. ed. II. J- 893 (1840^ChloriB, Sw. (Gramin.).
Neesiana, Wight & Am. 1. c-Chloris tenella.

CODONANDRA, Karat. Fl. Columb. tt. 43. t. 122 (18621) = Calliandra, Benth. (Legumin.).
'erolnsis, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 841, sphalm.-Call. purpurea.
Purpurea, Karat Fl. Columb. ii. 43. t. 122 = Call, ^•odonandra.

CODP NANTHE in Linnaea, xxvi. (1853) 20?. *GESNERACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 1011.
COCCANTHERA, C. Koch ft Hanst. Ind. Sem. Hort. Berol. (1865) 17.
*aggre*e*t*a, Hanst. in Linnaea, xxii.* (1858-55) 209.—Bras.
•^carata, *Hanst. 1. c.* xxxiv. (1865-66) 416.—Am. trap, samosa, *Hanst. in Mart.'Fl. Bras.* viii. 418.—Bras,
"'josa, *Lem. in Illustr. Hortic.* ii. (1865) sub t. 56.—Bras.
Dev,osiana, *Lem. I. c.* t. 56.—Bras.
gracilis, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 209.—Bras.
Hookerii, Lem. "'' *Illustr_ Hortic_* "•"(1855) snbl_ 56_—Bras.
picta, Lem. 1. c. iv. (1857) t. 144=Devosiana.

C°P°NANTHE, Mart, ex Stend. Norn. ed. II. i. 791. in VM1840)=HypoeyTta, Mart. (Gesnerac).

C°S°>NA.NTHEMUM. Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) «0=SimochelluB, Klotzsch (Ericac).
*V*c°lor,* Benth. in DC, Prod. vii. 708.—Afr. austr.
Pers ^0"""*' Klotzsch» in Linnaea, xii. (1838) 240.—A austr
^»«/aw,'Klotz»ch, I. c—Afr. anstr.
"•«'. Benth. in DC. Prod. vii. 708.—Afr. austr.

CO 5°NANTHES, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 24 (1886) = Jf^ataria, L'H&it. (Bromeliac).
—v—s, Rafin. 1. c.= p. abifl'os.

C°DONANTHUS, G. Don, Gen. Syst iv. 166 (1836) ^= ^ weria, R. Br.r(Convolvulac).
^«»a, G Don, 1. c. = B. africana.
eer"'Mia, Planch, in Hook. Ic. PL t. 796.—Afr. trop.

CODONANTHUS, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 24 =phy8ostolina> Wight (Asclepiad.).
campanulatus, Hassk. 1. c.=P. Wallichii.

CODONEMMA, Miers, Apocyn. S. Am. 72 (1878) = Tabernaemontana, Plum. (Apocynac).
calycinum, Miers, 1. c. 78 = T. Muelleriana.
macrocalyx, Miers, 1. c. =T. macrocalyx.

CODONIUM. Vahl, in Skriv. Naturh. Selsk. ii. (1798) I, 206; Symb. bot.' iii. 36(1794)=Sohoepfla, Schreb. (Olacin.).
arborescens, Vahl,11. cc 207; 86 = S. arborescens.
flexuosum, M. Roem. Syn. Hesper. 21 = S. flexuosa.

CODONOCALYX, Klotzsch, *ex* Baffl. Etud. Gen. Eupb. 369 (1858) = Croton, Linn. (Euphorb.).
divaricatus, Klotzsch, 1. c. 370=Crot. nitrariaefolius.
lanatus, Klotzsch, 1. c.=-Crot. lanuginosns.
longifolius, Klotzsch, 1. c. = Crot. montevidensis.
montevidensis, Klotzsch, I. c=CroL montevidensis.
polymorphus, Klotzsch, L c. = Crot nitrariaefolius.
vellerifiorus, Klotzsch, 1. c.=Crot. nitrariaefolins.

CODONOCALYX, Micrs, in Lindl. Veg. Kingd. 764 (1847) = 8uteria, DC. (Rubiac).

CODONOCARPUS, A. Cunn. ex Hook. Bot. Misc. i. (1830) 244, in syn. *PHYTOLACCACEAE,* Benth. ft Hook. £ iii. 86.
HYMENOTHECA, F. Muell. Fragm. i. 201 (1869).
australis, *A. Cunn. I. c*—Austral,
cotinifolia, *F. Muell. PI. Viet. i.* 200.—Austral.
pyramidalis, *F. Muell. 1. e.* 201.—Austral.

CODONOCEPHA1TIM, Fenzl, in Flora, xxvi. (1848) 897. *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii 330.
SPRUNNERA, Sch. Bin. in Walp. Rep. ii. 964 (1843).
innloides, *Fenzl, 1. c.*—Kurdistan.

CODONOCRINUM, Willd. ex Schult. *t.* Syst. vii. 718 (1829)=Yuooa, Dill. (Iiliac).
agavmdes, Willd. ex Schult. f. L c.=Y. acaulis.

CODONOPHORA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1110 (1827) —Paliavana, Vand. (Gesnerac.).
grandiflora, Lindl. 1. c.=P. prasinata.
lanceolata, Lindl. 1. c=Rytidophyllnm tomentosum.
prasinata, Lindl. 1. c = P. sericiflora.
Selloana, Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 896 - P. prasinata.

CODONOPRASUM, Reichb. Consp. 66 (1828) - AUlum, Tonm. (Liliac.).
alpicolum, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 127 = A. oleracenm.
carinatum, Reichb. Fl. Germ. Excnn. 114-= A. carinatum.
complanatum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 159=A. oleracenm.
consimile, Fourr. 1. c. = A. carinatum.
flavum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 115=A. flavum.
flexifolium, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 159=A. carinatum.
flexum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 114 - A. flavum.
fuscum, Reichb. 1. c. 116-A. paniculatum.
intermedium, Reichb. 1. c. 114=A. oleraceum.
longispathum, Reichb. 1. c. 115 = A. paniculatum.
oleraceum, Reichb. 1. c. 114 = A. oleraceum.
pollens, Reichb. 1. c 115 = A. flavum.
paniculatum, Reichb. 1. c = A. pnlchellum.
pulchellum,¥oaxr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.xvii. (1869) 159 = A. pulchellum.
viridiflorum, Schur, Enum. PI. Transs. 671=A. oleraceum.

OODONOPSIS, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 108 (1824). *CAMPANULACEAE,* Benth. ft Hook. £ ii. 557.
GLOSOCOMIA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 168 (1824).
afinis, *Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 12.—Reg. Himal.
albifiora. Griff. Notul. iv. 279=Campamunoea celcbica.
Benthamii, *Hook./. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) U.-Reg. Himal.
celebica, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 566 = Campanumoea celebica.
clematidea, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. lad. iii. 438=ovata.
convolvulacea, *Kurt, in Journ. Bot.* xi. (1873) 195.—Burma.
cordata, Hassk. in Retzia, i. 9 = Campanumoea javanica.
foetens, *Hook. f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 16.—Reg. Himal.
gracilis, Hook. f. ft Thorns, in Illustr. Himal. PI. t. 16 A=Leptocodon gracilis.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 431.—Reg. Himal.
infiata. Hook. f. & Thorns, in Jonrn. Linn. Soc. ii. (1858) 13=Campanumoea inflate,
japonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 192.—Japon.

CODONOPSIS:—
javanica, *Hook. f.* 6" *Thorns, in Illustr. Himal. PI.* t. 16 B=Campanumoea javanica.
lanceolata, *Benth.* b* *Hook.f. Gen.* ii. 558; *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 46.—As. temp.
leucocarpa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 565—Campanumoe.i celebica.
lurida, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 82 - rotundifolia.
ovata, *Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 258. t. 69. f. 8.—Reg. Himal.
parviflora, Wall. Cat. n. 1300 = Campanumoea parviflora.
purpurea, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 105.—Reg. Himal.
rotundifolia, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 254. t. 62.—Reg. Himal.
subsimplex, *Hook.f.* b* *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1868) 16.-Reg. Himal.
thalictrifolia, *Wall, in Roxb. Fl.Ind. ed. Carey,* ii. 106.—Reg. Himal.
truncata, Wall. Cat. n. 1301 = Campanumoea celebicn.
viridiflora, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881' 496.—As. or.
viridi's *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 108.—Reg. Himal.

CODONORAPHIA, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1859) 82; (Gesn. Centr. Am. 8) = Pentarhaphia, Lindl. (Gesnerac).

CODONORCHIS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 410 (1840) =Pogonia, Juss. (Orchid.).
Lessonii, Lindl. 1. c. 411 = P. tetraphylla.
Poeppigii, Lindl. 1. c. 410 = P. tetraphylla.

CODONOSTIGMA, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod, vii. 709 (1839) = 8oyphogyne, Brongh. (Ericac).
Erinus, Klotzsch, ex Benth. 1. c—Afr. austr.

CODORIOCALYX, Hassk.—Cf. Linnaea, xv. (1841) Lit. 80,81=CODARIOCALYX,Hassk.-Desmodium, Desv. (Legumin.).

CODYLIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 191 = mootiana, Linn. (Solanac).

COELACHNE, R. Br. Prod. 187 (1810). *GRAM I-NEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 1166.
brachiata, *Munro, ex Benth. Fl. Austral,* vii. 626, in obs.—Zeylan.; China.
infirma, *Buese, in Miq. PI. Jungh.* 350.—Java,
perpusilla, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 373.—Zeylan.
pulchella, *R. Br. Prod.* 187.—Burma; Austral.
simpliduscula, Munro, ex Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 93= brachiata.
subulifolia, F. Muell. Fragm. v. 208=Micraira snbulifolia.

COELACHYRUM, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 221-Eragrostis, Beauv. (Gramin.').
irevifolium, Nees, 1. c. = E. Coelachyrum.

COELANDRIA, Fitzg. Austral. Orch. i. pt VII. t. 2 (1882)=Dendrobium, Sw. (Orchid.).
Smilliae, Fitzg. 1. c.=D. Smilliae.

COELANTHE, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 297, in syn. (1839) = COILANTHA, Borckh. - Gentians, Linn.

COELANTHIUM, Sond. in Harv. ft Sond. FI. Cap. i. 147 (1859) =seq.

COELANTHTJM, E. Mey. ex Fenzl, in Ann. Wien. Mus. i. (1886) 358; ii. (1838) 267. *FICOIDEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 857.
grandiflorum, *E. Mey. ex Fentl, I. c.*—Afr. austr.
parviflorum, *Fcntl, 1. c.* 268.—Afr. austr.

COELANTHUS, Willd. ex Schult. f. Syst vii. p. xlvi (1830)=Lachenalia> Jacq. (Liliac).
complicate, Willd. 1. c in adnot.-L. reflexn.

COELAS, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 803 (1867) = PotentiUa, Toum. (Rosac).
procumbens, Dulac, 1. c. = P. Sibbnldi.

COELEBOGYNE, J. Sm. in I'roc Linn. Soc i. (1839) 41; Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 611. t. 38 = Alchomea, Sw. (Euphorb.).
ilicifolia, J. Sm. 1. c 512. t. 86 = A. ilicifolia.

COELESTINA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (Jan. 1817) 10 = CAELESTINA, Cass. = Ageratum, Linn. (Compos.).

COELESTINA, Hill, Hort. Kew. 8 (1769) ; Veg. Syst. ii. 60** = Aster, Tourn. (Compos.).

COELESTINIA, Endl. Gen. 866 (1838) = C AELESTINA, Cass. -= Ageratum, Linn. (Compos.).

COBLIA, Lindl. Gen. ct Sp. Orch. 36 (1880). *ORCH1-DEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 508.
BoTilRiocmi.us, Lem. Illastr. Hortic. iii. (1856) Misc. SO.
Baueriana, *I.indl. Gen. et Sp. Orch.* 36.—Mexic.
hella, *Reichb.f. in Walp. Ann.* vi. 218.—Guatemala.
Galeoltiana, *Van Houtte, ex Heynh. Nom.* ii. 152, nomen.—Mexic
glacialis, *Van Houtte, 1. c,* nomen.—Am. austr.
guatemalensis, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 219.—Guatemala,
macrostachya, *Lindl. in Benth. PI. Hartm.* 92.—Mexic
triptera, G. Ton, ex Steud. Nom. ed. II. i. 394 - Baueriana.

COELIDITTM, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 472. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 478.
Bovrei, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 454.—Afr. austr.
bullatum, *Benth. 1. c.* 453.—Afr. austr.
ciliare, *Vog. ex Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 472.—Afr. austr.
muraltioides, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1848) 465.—Afr. austr.
roseum, *Benth. I. c.* 454.—Afr. austr.
Thunbergii, *Harv. in Han. &" Soni. Fl. Cap.* ii. 24.—Afr. austr.
Vogelii, *Walp. in Linnaea,* xiii. (1889) 472.—Afr. austr.

COELINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 2 (Quid ?).

COELIOPSIS, Reichb. f. in Gard. Chron. (1872) 9. *ORCHIDEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 477.
hyacinthosma, *Reichb.f. I. c.*—Panama.

COELOCARPUM, Half. f. in Proc. Roy. Soc. Edirib. xii. (1884) 90. *VERBENACEAE.*
socotranum, *Balf. f. I. c.* 91.—Ins. Socotra.

COELOCHLOA, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. i. 894 (1840) = COELACHYRUM, Nees= Eragrostis, Beauv. (Gramin.).
irevifolia, Hochst. 1. c. = E. Coelachyrum.

COELOCLINE, A. DC. in Mem. Soc. Phys. Genev. v. (1832) 208-Xylopia, Linn. (Anonac).
acutiflora, A. DC. 1. c.--*X.* acutiflora.
lucida, A. DC. 1. c. 209 = X. longifolia.
oxypetala, A. DC. 1. c. = X. acutiflora!
parviflora, A. DC. 1. c.— X. parviflora.
polycarpa, A. DC. 1. c. =X. polycarpa.

COELOCOCCUS, H. Wendl. in Bonplandia, x. (1862) li)9=Metroiylon, Kottb. (Palm.).
vitiensis, H. Wendl. 1. c. = M. vitiense.

COELODEPAS, Hassk. in Flora, xl. (1857) 581. *EUPHORBIACEAE,Benth.* & Hook. f. iii. 813.
KOILODEPAS, Hassk. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. iv. (1855) 139.
bantamense, *Hassk. in Versl. en Med. Kon. Acad. Wetensch.* iv. (1855) 140(Koilodepas).—Ins. Bantam,
calycinum, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 207.—Ind. or.
Wallichianum, *Benth. in Hook. Ic. PL* t 1288.—Ins. Penang.

COELODISCTJS, Baill. Etud. Gén. Euph. 298 (1868). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 317.
diapar, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xiii. (1873) II. 244.—Ind. or.
eriocarpoides, Kurz, 1. c. = Mallotus decipieng.
eriocarpus, *Kurt, I. c.*—Ind. or.
glabriusculus, *Kurz, For. Fl. Brit. Burma,* ii 898.—Burma.

COEIiODISCTTS:—
hirsutulus, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xiii. (1873) II. 243.—Burma,
lappaceus, *Kurs, 1. c.* 244; *et For. Fl. Brit. Burma,* ii. 392.—Burma.
longipes, *Kurz, II. cc.* 244, 893.—Burma,
montanus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 759.—Ins. Penang.
speciosus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 154.-Ind. or.
Thunbergianus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 758.—Zeylan.

COELOGLOSSUM, Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. I. 329 (1820) = Habenaria, Willd. (Orchid.).
acuminatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch: 302 = H. lacertifera.
alhidum, Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. I. 329 = H. albida.
alpinum, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (18511 169 ; iv. (1853) 72 = H. cucullata.
bracteatum, Parl. Fl. Ital. iii. 40!)-H. viridis.
brevifolium, Lindl. Gen. ct Sp. Orch. 802 •=-• H. cubitalis.
cernuum, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 250 = H. stenostachya.
cordatum, Nym. Syll. 359 = H. cordata.
densiflorum, Hartm. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 164 = H. intacta.
densum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 302=H. stenostachya.
Erdingeri, Keraer, in Oestr. Bot. Zcitschr. xiv. (1864) 140 = H. viridis.
lacertiferum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 302 = H. lacertifera.
luteum, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 263.—Ind. or.
Mannii, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 64.—Reg. Himal.
peristyloides, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 821 -H. stenostachya.
purpureum, Schur, Enum. PI. Transs. 646 = H. cucullata.
satyrioides, Nym. Syll. 359.—Tauria.
secundum, Lindl. Bot. Reg. sub t 1701.—Ind. or.
tenue, Lindl. 1. c. = H. stenostachya.
Vaillantii, Schur, Enum. PI. Transs. 645 - H . viridis.
viride, Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. I. 829 = H. viridis.

COELOGYNE, Lindl. Collect, sub t. 38 (1825). *ORCHIDEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 518.
ACANTHOGLOSSUM, Blumc, Bijdr.'881 (1825).
BOLBORCHIS, Zoll. & Mor. Verz. Pfl. 89 (1846).
GOMPIIOSTYLIS, Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 43 (1830).
NEOGYNA, Reichb. f. in Bot. Zeit x. (1852) 931.
PLEIONE, D. Don, Prod. Fl. Nep. 36 (1825).
advena, *Par. b" Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 47.—Burma.
alba, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 236 - Otochilus alba.
angustifolia, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xv. (1841) 16. t. 6=odoratissima.
angustifolia, Wight, Ic. t. 1641 =• breviscapa.
apiculata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 225 = Panisea apicnlata.
Arthuriana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) I. 40 = maculata.
articulata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 238 = Pholidota articulata.
asperata, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* iv. (1849) 221.—Malaya.
assamica, Linden *8c* Reichb. f. in C. Koch, Allg. Gartenz. xxv. (1867) 403 = fuscescens.
barbata, *Lindl. ex Griff, /tin. Not.* 72.—Reg. Himal.
biflora, *Parish, ex Reichb.f. in Gard. Chron.* (1865) 1035.—Burma,
bilamellata, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 14.—Ins. Philipp.
birmanica, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1832) II. 840.—Burma.
brachyptera, *Reichb.f. 1. c.* (1881) II. 6.—Burma,
brevifolia, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 7.—Reg. Himal.
breviscapa, *Lindl. I. c.* 4.—Ind. or.
brunnea, Lindl. in Gard. Chron. (1848) 71 = fusccsccns.
calceata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 238 =• Pholidota calceata.

COELOGYNE :-
camelostalix, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 238' Pholidota camelostalix.
carnea, Reichb. f. 1. c. 237 = Pholidota camea.
ca'ulescens, *Griff. Notul.* iii. 282.—Malacca.
chinensis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 287 = Pholidota chinensis.
chloroptera, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) I. 466.—Ins. Philipp.
ciliata, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp.* «•• III. *Nov. App.* 237.—Ins. Philipp.
clypeata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 287 - Pholidota clypeata.
conchoidea, Reichb. f. 1. c.=Pholidota conchoidea.
conferta, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1875) I. 814.—Ind. or.
Convallariae, *Par. (f Reichb. f. in Flora,* Iv. (1872) 277.—Reg. Himal.; Burma,
comiculata. *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1865) 746.—Assam ?
coronaria, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 83=Trichosma suavis.
corrugata, *Wight, Ic.* t. 1639.—Ind. or.
corymbosa, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 7.—R«B' Himal.
cristata, *Lindl. Collect. Bot.* sub t. 83.—Reg. Himal.
Croockewitii, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nedtrl. Ind.* v. (1858) 488.—Java.
crotalina, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 288=Pholidot» crotalina.
Cumingii, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 76.—Malaya-
Cycnoches, *Par. W Reichb.f. in Trans. Linn. Soc.* ***• (1874) 147.—Burma,
cymbidioides, *Reichb.f. in Walp. Ann.* vi. 239.—U* Molucc.
Dayana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) I. 826.-~ Borneo,
decora, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 621> nomen.—Hab. ?
diphylla, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 15.—Ind. or.
elata, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1959.—Reg. Himal.
fimbriata, *Lindl. Bot. Reg.* t. f>68.—Reg. Himal.
flaccida, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1961.—Reg. Himal-
flavida, *Hook. f. ex Lindl. Fol. Orchid. Coelog. 10."* Reg. Himal.
fcliginosa, *Lodd. ex Hook. Bot. Mag.* t. 4440.—R* Himal.
fusca, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 236-Otochiln» fusca.
fuscescens, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1962.—Malaya,
fusco-lutea, *Teijsm. (T Binn. Cat. Hort. Bog.* 87°i nomen.—Hab. ?
Gardneriana, *Lindl. in Wall. PI. As. Rar.* i. S3. t. »=• —Reg. Himal.
gibbosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 237 = Phol»o gibbosa.
glandulosa, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 6.—Ind. or.
globosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 286 = Pholido» globosa.
Goweri, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) ***• Reg. Himal.
graminifolia. *Par.* b* *Reichb. f. in Trans. Linn.* 5» xxx. (1874) 146.—Burma.
Hookeriana, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* !*•— Reg. Himal.
Huettneriana, *Reichb. f. in Flora,* Iv. (1872) 277- Burma.
humilis, *Lindl. Collect. Bot.* sub t. 37.—Reg. Hta*'
imbricata, Reichb. f. in Walp. Ann.vi.238«Pl» olido imbricata.
incrassata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 40.—Java.
interrupta, *Lindl. ex Heynh. Nom.* ii. 158, nomen. Ind. or.
javanica, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 17.—Java.
ihasyana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 288 = Pholidota articulata.
lactea, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1885) I- *vim Burma.
Ugenaria, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 15.— Himal.
lentiginosa, *Lindl. 1. c.* 3.—Burma.
lignlata. *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* *" lava. IMJ.
longeciliata, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nedtrl-1"* xxvii. (1864) 16.—Ind. or.
longifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 42.—Java.
longipes, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 10-— Reg. Himal.

COELOQYOTE:—
loricata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 288 «= Pholidota loricata.
Laurii, Paxt. Mag. Bot. xvl. (1849) 225-asperata.
macrophylla, *Teijsm.* b" *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 241.—Sumatra,
maculata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 48.—Reg. Himal.
mannorata, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 116.—Ins.Philipp.
Massangeana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) II. 684.—Malay.
Mayeriana, *Reichb. f. I. c.* (1877) n. 134.—Hab.!
media, *Wall, ex Voigt, Hart. Suburb. Calc.* 621, nomen—Ind. or.
nucrantha, *Lindl. in Gard. Chron.* (1855) 173.—Reg. Himal.; Burma.
miniata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 42.—Java.
nenillosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi.23(i-Pholidota nervosa.
neruosa, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 16=corrugate.
"frvosa, Wight, Ic. t. 1688=Rlandulosa.
•"grescens, *P. Don, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 620, nomen.—Ind. or.
"'"da, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1954.—Reg. Himal.
°<*JUta, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 40.—Ind. or.
oc'Uata, LindL in Wall. Cat n. 1968=nitida,ochracea, enstata.
Ochracea, *Lindl. Bot. Reg.* (1846) t. 69.—Reg. HimaL
°doratissima, *Lindl. in Wall. Cat.* n. I960.—Ind. or.
ovalis, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 91.—Reg. Himal.
Pallida, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 238 = Pholidota imbricata.
Pa??nrata> *Lindl*_ »» *Gard. Chron.* (1853) 791.—Malaya.
Papagena, Reichb. f. in Bot Zeit xx. (1862) 214 = micrantha.
^anshu, *Hook.f. in Bot. Mag.* t. 5823—Burma.
raniflora, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 44 = Panisea Parviflora.
pelta *Reichb_-f- in Gard_ Chron_* (1880) ". 296-—Borneo.
Pholas, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 237 = Pholidota Pholas.
Wosissima, Planch. Hort. Donat. 144-ovalis.
Piantaginea, *Lindl. in Gard. Chron.* (1855) 20.—ind. or.
Porrecta *Reichb_ f_* ">Walp. Ann. vi. 286=Otochilus Porrecu.
praecox *Lindl. Collect. Bot.* sub t. 87.—Reg. Himal.
prolifera, *Lindl in WaH Cat n 1956 Re* 8
Himal.
psittacina, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 141.—Ins. Mol ucc.
pulverula, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* «y. (1862) 3O6.-Sumatra.
pun Reichb f_ *» Wal P- A™- »» 236 = Dendrochilum pumilum.
?!!ctulat «> LtadL Collect. Bot. sub t. 33 -nitida.
*•»»«, Reichb. £ in Walp. Ann. vi. 237 = Pholidota wcurva.
*eichenbachiana, *T. Moore, in Gard. Chron.* (1868) 1410.—Burma.
Rnbeana R (1867) 901 = Rossiana.
rhombopho *Reichb_-f- in Linnaea,* xli. (1877) 116.
--Ins.M™ anilla.
n^ a«»; &" *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. 574 "6.—Burma.
Rochusseni, *De Vriese, lllustr. Orch.* [t 2. et 111. f. 6].
—J«Va,
Rossiana, *Reichb. f. in Gard_ Chron_* (188*) «• 808-—Burma.
rubra «& a Reichb. f. in Wal P- Asm_ Ti_ 288 - PobUdota
Run
salmJS bii, il W_ Fol_ *Orchid. Coelog.* 14.-Malaya.
^mcolor, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1883) II.
Schillerlana, *Rei 'n C. Koch, Allg. Cartln_* xxvl. (1858) 189.—Uurma.
simplex, *Li* I*" fW_ Or<:*iy_ C % - 18.—Ind. or.
•Pant* *eiinb. /- *" Car<*_ C*row_ C1888) '• 306-—Ins_ Philipp.
xul en. et Orch. 39.—Malaya.
Malaya. *Reichb. f. in Bon Plandia>* v_ (1857) 43.—

COELOaYNE:—
testacea, *Zim2/.* £o<. X^. (1842) *Misc.* 88.—Malaya.
Thuniana, *Reichb. f. in Otto* b" *DUtr. Allg. Gartens.* xxiii. (1855) 145.—Nepal.
tomentosa, *Lindl. Fol. Orchid. Coelog.* 3.—Malaya.
trifida, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xix. (1863) 546 =odoratissima.
trinervis, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1956.—Burma,
triotos, *Reichb. f. in Hamb. Gartenz.* xviii. (1862) 34.—Ins. Philipp.
triplicatula, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxii. (1864) 416 = fuliginosumi
triptera, A. Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 201 ^ Epidendrum caespitosum, *Poepp. V End!,*
trisaccata, Griff. Notul. iii. 400 = Gardneriana.
undulata, Reichb. f. in Walp. Ann; vi. 238 = Pholidota rubra.
undulata, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 621, nomen.—Ind. or.
uniflora, *Lindl. in Wall. Cat. n.* 1U66.—Reg. Himal.; Burma,
ustulata, *Par. &" Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 146.—Burma.
ventricosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 287—Pholidota ventricosa.
viscosa, *Reichb. f. in Otto V Dietr. Allg. Gartens.* xxiv. (1856) 218.—Reg. Himal.
Wallichiana, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 43 = praecox.

COELONEMA, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 423. *CRUCIFERAE.*
draboides, *Maxim. 1. c.* 424.—China.

COELOPLEURUM, Ledeb. Fl. Ross. ii. 361 (1844) = Archangelica, Hoffm. (Umbellif.).
Gmelini, Ledeb. 1. c.-A. Gmelini.

OOEIiOPTBTJII, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) vil. 65. *INC. SED.*
coriaceum, *Jack, 1. c.*—Malaya.

COELORACHIS, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 64. 114 (1829)=Bottboellia, Linn. (Gramin.).
hirsuta, Brongn. 1. c. 65, in obs.=R. hirsnta.
muricata, Brongn. 1. c. 65.114 = R. glandulosa.

COEIiOSPERMTTM, Blume, Brjdr. 994 (1826) (Caelospermum). *RUBIACEAE,* Benth. *St.* Hook. f. ii. 119.
POGONOLOBUS, F. Muell. Fragm. i. 55 (1858).
Balansaeanum, *Baill. Adansonia,* xii. (1876-79) 286.—N. Caled.
barbatum, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 818.—Ins. Timor.
corymbosum, *Blume, ex DC. Prod.* iv. 468.—Java,
decipiens, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1879) 218.—Austral.
Gmelini, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 62, sphalm. = Archangelicn Gmelini.
panicnlatum, *F. Muell. Fragm.* v. 19.—Austral,
reticulatum, *Benth. Fl. Austral,* iii. 425.—Aubtral.
scandens, *Blume, Bijdr.* 994.—Malaya.

COELO8TEGIA, Benth. in Benth. & Hook. *i.* Gen. i. 213 (1862). *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
Griffithii, *Benth. I. c*—Malacca.

COELOSTELMA, Foura. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 320 (1886). *ASCLEPIADEAE.*
refractum, *Fourn. 1. c.*—Bras.

COELOSTYLIS, Ton. & Gray, ex End]. Nov. Stirp. Dec. 38 (1839) = 8pigelia, Linn. (Loganiac).
loganioides, Torr. & Gray, 1. c. - S. loganioides.
texana, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 44=S. texana.

COEMANSIA, March, in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xlvii. (1879) 94. *ARALIACEAE.*
COUDENBERGIA, March. 1. c. 514 (1879).
Warmingiana, *March. 1. c.* 95.—Am. austr.

COENOLOPHIUM, Reichb. Consp. 143 (1828) = CENOLOPHIUM, Koch = Selinum, Linn. (Urn. bell.).

COENOTUS, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 281 (1873), lapsn = CAENOTUS, Kafin. » Erigeron, Linn. (Compos.).

COERULINIA, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. xviL (1860) 128=Veronica, Tourn. (Scrophular.).
montana, Fourr. 1. c. = V. montana.

COETOCAPNIA, Link & Otto, Ic. PI. Rar. 35. t. 18 (1828) = Brayoa, La Llav. (Amaryllid.).
geminiflora, Link & Otto, 1. c. = B. geminiflora.

COPPEA, Linn. Syst. ed. I (1735). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 114.
HEXEPTA, Rafin. Sylva Tellur. 164 (1838).
LACHNASTOMA, Korth. in Ned. Arch. Kruidlc. ii. n. (1851) 201.
acuminata, *Ruiz* b* *Pan. Fl. Per.* ii. 64.—Peruv.
Afzelii, *Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1876) 174.—Afr. trop.
alpestris, Wight, Ic. t. 1040=Webera lucens.
angustifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 86; *Fl. Ind.* i. 541.—Malaya.
arabica, Benth. in Hook. Niger. Fl. 413 <• liberica, stenophylla.
arabica, *Linn. Sp. PI.* 172.—Arabia; Afr. trop.
australis. Veil. FL Fluin. 62; ii. t. 13 = Faramca australis.
bengalensis, *Roxb. Hort. Beng.* 15; *Fl. Ind.* i. 540.—Ind. or.; Malaya.
bidentata, D. Dietr. Syn. PI. i. 776=microcarpa.
biflora, Veil. Fl. Flum. 63; ii. t. 16=Coussarea biflora.
Boryana, D. Dietr. Syn. PL i. 777=Chasalia Boryana.
biachyphylla, *Radii, in Bremen Abh.* viii. (1883j 390.—Ins. Nossibé.
brasiliensis, Walp. Rep. ii. 477 = Rudgea lanceolata.
brevipes, *Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1876) 172.—Afr. trop.
calycina, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 232.—Guiana.
capitata, D. Dietr. Syn. PL i. 777 = Chasalia capitata.
capitata, Sieber, ex DC. Prod. iv. 631 = Chasalia divaricata 1
Chamissonis, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 86 = Straussia kaduana.
chasalioides, D. Dietr. Syn. PL i. 777 = Chasalia divaricata I
ciliata, *Ruie b" Pav. Fl. Per.* ii. 65. t. 216.—Peruv.
clusiaefolia, D. Dietr. Syn. PI. i. 777=Chasalia clusiaefolia.
coriacea, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 201=laurifolia.
corymbulosa, *Bertol. Fl. Guatimal.* 10.—Guatemala.
crassiloba, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 233 = Rudgea Schomburgkiana.
cymosa, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 201-= Chasalia Fontanesii.
densiflora, *Blume, Bijdr.* 965.—Java,
Deppeana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 394.—Mexic.
didymocarpa, Bartl. ex DC. Prod. iv. 481 = Declieuxia psychotroides.
divaricata, Tausch, ex PC. 1. c. 532 = Chasalia divaricata.
elliptica, Thw. Enum. PL Zeyl. 154 - Byrsophyllum ellipticum.
elongata, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1851) 254.—Sumatra.
eriantha, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842; 534=Rudgea eriantha.
flavicans, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 201 = Faramuajasminoides.
floribunda, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 85 = Ixora densiflora.
floribunda, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 804.—Bras.
Fontanesii, D. Dietr. Syn. PI. i. 777°»Chasalia Fontanesii.
foveolata, *Ruiz V Pav. Fl. Per.* ii. 65. t. 216.—Peruv.
fragrans, *Wall, ex Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 154.—bid. or.; Burma.
gardenioides, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 230-Rudgea gardenioides.
glabra, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. H. (1851) 254.—Borneo.
grandifolia, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 152 = macrocarpa.
grandifolia, D. Dietr. Syn. PI. i. 777 = Chasalia grandifolia.
grumelioides, Wight, Ic. t. 1041-Wcbera lucens.
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* i. 150. t. 57.—Guiana.
hirsuta, G. Don, Gen. S>st. iii. 581 = Crcmaspora africana.

COFFEA:—
Horsfieldiana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 808 = bengalensis.
Humblotiann, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 514.—Ins. Comor.
hypoglauca, *Welw. ex Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1876) 173.—Afr. trop.
indica, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 14.—Java.
jasminoides, Cham, in Linnaea, ix. (18S4) 222 = Rudgea jasminoides.
jasminoides, *Welie. ex Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1876) 175.—Afr. trop.
javanica, Blume, Cat. Gew. Bnitenz. 46 = Chiococca javanica.
Jenkinsii, *Hook.f.Fl. Brit. Ind.* iii. 155.—Reg. Himal.
kaduana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 33 = Straussia kaduana.
khasiana, *Hook.f. Fl.Brit.Ind.ia.*" 154.—Reg. Himal.
Kraussiana, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 237 = Kraussia floribunda.
lanceolata, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 232=Rudgea lanceolate.
lanceolata, Cham. & Schlecht. 1. c. vi. (1831) 412 = Deppeana.
lanrifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iil. 872.—Venezuela.
lauri/olia, Salisb. Prod. 62=arabica.
laurina, Poir. in Lam. Encyc. Suppl. ii. 14-Craterispermnm laurinum.
laurina, *Smeathm. ex DC. Prod.* iv. 499.—Afr. trop.
lepidophloia, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 548—Ins. Banca.
liberica, *Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1876) 171. t. 24.—Afr. trop.
longifolia, *RuieVPav. Fl. Per.* ii. 66. t. 218.—Pernv.
luconiensis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 82=-Psychotria luzoniensis.
macrocarpa, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 168.—Ins. Mascar.
macrophylla, Y. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. ii. 344 = subsessilis.
madurensis, *Teijsm. (f Binn. Cat. Hort. Bog.* 112.—Ins. Madur.
magnoliaefolia, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 225-Rudgea magnoliaefolia.
major, Cham. 1. c. 226 = Rudgea major,
marginata, *Benth. PI. Hartw.* 198.—N. Granat.
Mariniana, Cham. &. Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 35 •= Straussia Mariniana.
mauriliana, *Lam. Encyc.* i. 550.—Ins. Mascar.
melanocarpa, *Welw. ex Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (Ib76) 173.—Afr. trop.
meridionalis. Veil. Fl. Flam. 62; ii. t. 14 = Coussarea meridionalis.
mexicana, *DC. Prod.* iv. 501.—Mexic.
microcarpa, DC. 1. c. 499 = Perrottetii.
microcarpa, *Ruiz h" Pav. Fl. Per.* ii. 66. t. 218.—Peruv.
minor, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 227-Rudgea Clausseniana.
if oka, Hort. ex Heynh. Norn. ii. 153 = arabica.
mozambicana, DC. Prod. iv. 500 ••racemosa, *Lour.*
myrtifolia, *Roxb. Hort. Seng.* 15, nomen.—Ins. Maurit.
neurophylla, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1079.—Java,
nitida, *Ruiz &*[1] *Pav. Fl.Per.* ii. 65. t. 217.—Pernv.
nodosa, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 233-Rudgea nodosa.
novoguineensis, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 259.—N. Guinea,
obovata, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* vii. (1832) 412.—Mexic.
obovata, D. Dietr. Syn. PI. i. 777-Chasaliadivaricata.
Occidentalis, Jacq. Enum. PI. Carib. 16-Faramea odoratissima.
occidentalis, Veil. Fl. Flum. 62; ii. t. 12 = Faramea occidentalis.
odorata, *Forst.f. Prod.* 16.—Ins. Amicor.
oleifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. it Sp.* iii. 372.—N. Granat.
opulina, Forst. f. Prod. 16 = Pavetta opulina.
paniculata, *Aubl: PI. Gui.* i. 152. t. 58.—Guiana.
parquioides, Cham.in Linnaea, ix. (1834) 224-Rudgea parquioides.
parvifolia, Cham. 1. c. 231 = Rudgea parvifolia.
pedunculata, *Roxb. Hort. Beng.* 86 ; *Ft. Ind.* i. 641.—Ins. Molucc.
Perrottetii, *Steud. ex Buek, DC. Prod. Index,* L praef. p. ix.—Afr. trop.
porophylla, Veil. Fl. Flum. 62; ii. t. U-Coussarea porophylla.

COFFEA :-
psychotrioides, D. Dietr. Syn. PI. i. 777 = Gaertnera psychotrioides.
racemosa, *Lour. Fl. 'Cochinch.* 145.—Afr. trop.
racemosa, *Ruiz V Pav. Fl. Per.* ii. 64. t. 214.—Peruv.
rachiformis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 514.—Ins. Comor.
ramosa, Roem. & Schult. Syst.v. 198 = racemosa, *Lour.*
rosea, *Moc. If Sesse, ex DC. Prod.* iv. 499.—Mexic.
rupestris, *Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1876) 174.—Afr. trop.
salicifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 307.—Java.
sambucina, Forst. f. Prod. 16=Pavetta sambucina.
semiexserta, *Colebr. ex Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 195.—Ind. or.
sessilis, Veil. Fl. Flum. 64 ; ii. t. 20=Psychotiia axillaris.
spicata, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 371. t. 286.—N. Granat.
stenophylla, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 581.—Abyssin.
stipulacea, *DC. Prod.* iv. 499.—Guiana.
stipulacea, Steud. Nom. ed. II. i. 395—seq.
stipulata, Veil. Fl. Flum. 68 j ii. t. 17-Bathysa stipulata.
subcordata, *Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1876) 174.—Afr. trop.
subsessilis, Benth. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 232 = Mapouria subsessilis.
subsessilis, *Ruiz t? Pav. Fl. Per.* ii. 64. t. 215.—Peruv.
snndana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 306.—Java.
sylvestris, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 201-mauritiana.
tenuiflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iil (1841) 232.—Guiana.
tetrandra, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 638 = Prismatomeris albidiflora.
travancorensis, *Wight V Am. Prod.* 486.—Ind. or.
triflora, Forst. f. Prod. 16 = Pavetta triflora.
triflora, Moon, Cat. 15=travancorensis.
truncata, Veil. Fl. Flum. 63 ; ii. t. 15=Faramea truncata.
umbellata,- *Ruiz tf Pav. Fl. Per.* ii. 64. t. 215.—Peruv.
umbellata. Veil. Fl. Flum. 63; ii. t. 19 = Faramea salicifolia.
verticillata, *Ruiz V Pav. Fl. Per.* ii. 86. t. 217.—Peruv.
verticillata. Veil. Fl. Flum. 63; ii. t. 18-Ixora verticillata.
viburnoides, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 228 = Rudgea viburnoides.
volubilis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 157 = Morinda tinctoria.
vulgaris, Moench, Meth. 504 = arabica.
Wightiana, *Wall. Cat.* n. 6246; *Wight VArn. Prod.* 436.—Ind. or.
Zanguebariae, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 145.—Afr. trop.

COGNIAUXELLA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1884) 424 = Cogniauxia, Baill. (Cucurb.).

COONIATTXIA, Baill. in Bull. Soc. linn. Par. i. (1884) 423. *CUCURBITACEAE.*
COGNIAUXELLA, Baill. 1. c. 424.
podolaena, *Baill. 1. c.* 424.—Madag. ?

COGSWELLIA, Schult. in Roem. & Schult. Syst. vi. p. xlviii (1820) = Peueedanum, Toum. (Umbellif.).
villosa, Schult. 1. c. 588=P. foenicnlaceum.

COGYLIA, Molina, Sagg. Chil. ed. II. 300 (1810) = Ziardizabala, Ruiz & Pav. (Berberid.).
biternata, Molina, 1. c.=L. biternata.
ternata, Molina, 1. c. = L. trifoliata.
triternata, Molina, 1. c.=L. triternata,

COHAUTIA, Endl. Ench. 273 (1841) = KOHAUTIA, Cham. & Schlecht. = Oldenlandia, Linn. (Rubiac).

COHIBA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 75 (1836) = Wigandla, H. B. & K. (Hydrophyllac).
urens, Rafin. 1. c. = W. pruritivia.

COHNIA, Kunth, Ennm. PI. v. 35 (1850) = Cordyline, Comm. (Liliac.).
floribunda, Kunth, 1. c. 36 = Cord, floribunda,
macrophylla, Kunth, 1. c. 37 = Cord, macrophylla.
mauritiana, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 546 = Cord. macrophylla.
neocaledonica, Baker, 1, c. =Cord. neocaledonica.
parviflora, Kunth, Enum. PI. v. 37 =Cord. floribunda.

COHM1A, Reichb. f. in Bot. Zeit. *x.* (1852) 928-*ORCHWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 477.
quekettioides, *Reichb. f. 1. c.*—Nicaragua.

COILADENA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 12 (1836) - Ipomoea, Linn. (Convolvulac).
hyemalis, Rafin. 1. c - I. Horsfalliae.

COILANTHA, Borckh. in Roem. Arch. i. I. (1796) 26-Gentiana, Toum.
asclepiadea, G. Don, Gen. Syst. iv. 186-G. asclepiadea.
biloba, Bercht. & Presl, Roitl. i. Gentian. 6 - G. lutea.
Burseri, Bercht. & Presl, 1. c. = G. Burseri.
campanulata, G.Don, Gen.Syst iv. 185 = G. punctata.
glauca, G. Don, 1. c. = G. glauca.
Modnni, D. Don, ex G. Don, 1. c - G. calyculata.
pannonica, G. Don, 1. c — G. pannonica.
punctata, G. Don, 1. c. = G. punctata.
purpurea, Borckh. in Roem. Arch. i. I. (1796) 25 * G. purpurea.
Sessaei, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 186 [s]-G.Sessaei.

COILANTHERA, Rafin. Sylva Tellur. 38 (1838) - Cordia, Linn. (Boragin.).
rotundifolia, Rafin. 1. c.-Cordia rotundifolia.

COILMEROA, Endl. Gen. Suppl. iii. 99 (1848) = *CO*\ MEIROA, Reut. = Securinega, Juss. (EuphorbiacJ-

COILONOX, Rafin. Fl. Tellur. ii. 28 (1836) = OrnitW-galum, Toum. (Liliac.).
albucoides, Rafin. L c. = O. suaveolens.

COILOSPERMA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 43 (1886)* Deeringia, R. Br. (Amarantac).
cordata, Rafin. 1. c—D. baccata.

COILOSTIGMA, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 284-Scyphogyne, Brongn. (Ericac).
Dregeanum, Klotzsch, 1. c. 235.—Afr. austr.
glabrum, Bentb. in DC. Prod. vii. 708.—Afr. austr.
puberulum, Benth. 1. c.=S. puberula.
tenuifolium, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 234.—Afr. austr.
Zeyherianum, Klotzsch, 1. c.—Afr. austr.

COILOSTYLIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 37 (1836) - [Bpl"] dendrum, Linn. (Orchid.).
emarginata, Rafin. I. c. = E. ciliare.
obtusifolia, Rafin. 1. c. = E. lineare *1*

COILOTAPALUS, P. Br. Hist. Jamaic. Ill (1768)* Cecropia, Loefi. (Urticac).

COINOCHIiAMYS, T. Anders, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1091 (1876). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. I.e.
angolana, S. *Moore, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 3^- Afr. trop.
hirsuU, *T. Anders, ex Benth. (f Hook.f. Gen.* »• *" —Afr. trap.

COINOGYNE, Less, in Linnaea, vi. (1831) 520-J»[tt] mea, Pers. (Compos.).
carnosa, Less. 1. c. 521 = J. camosa.

COIX, Linn. Gen. ed. I. 280 (1737). *GRAMI#*[E/i] Benth. & Hook. f. iii. 1112.
LACRYMA, Medic. Phil. Bot. i. 177 (1789).
LACRYMA-JOB, Tourn. ex Linn. Gen. ed. » (1737).
LACHRYMARIA, Heist. Syst. 12 (1748).
LITHAGROSTIS, Gaertn. Fruct. i. 7. t. 1 (17oB/-
SPHAERIUM, Linn. Syst. ed. I (1785).
agrestis, *Lour. Fl. Cochinch.* 551.—Amboina j y [sal,]
angulata. Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 2=l"P dactyloides.
aquatica, *Roxb. Hort. Beng.* 66; *Fl. Ind.* "»• "' Ind. or.
arundinacea, Koen. ex Willd. Sp. PI- [IV]- * Chionachne barbata.
arundinacea, Lam. Encyc. iii. 422 = C. Lacryin»-J[tfp tf]
barbata, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Inu. "'• Chionachne barbata.

COIX :—
crypsoides, *C. MueU. in Bot. Zeit.* xix. (1861) 834—Ind. or.
•*hutyloides*, Linn. Sp. PI. 972 = Tripsacum dactyloides.
exaltata, Jacq. ex Spreng. Syst i. 228 = C. Lachryma-Jobi.
gigantea, Koen. ex Roxb. Hort Beng. 66; Fl. Ind. iii. 570 = 0. Lachryma-Jobi.
keteroclita, Roxb. 11. cc. 66; 572=Polytoca bracteaU.
Koenigii, Spreng. Syst. i. 228 = Chionachne barbate.
Lacryma, Linn. Syst. ed. X. 1261 = C. Lachyrma-Jobi.
Lacryma-Jobi, *Linn. Sp.* J7.972 —As. trop.
Ma·Yiiin, *Romanet, in Bull. Soc. Acclimat.* Sir. II. "". (1881) 442.—Cochinch.; China; Burma.
<*">*ta.* Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 342=C. Lachryma-Jobi.
Pndula, Salisb. Prod. 28=C. Lachryma-Jobi.
pumila, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 672.—Ins. Maurit.
stigmatosa, *C. Kochtf Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855)9.-Hab.?

COLA, Schott & Endl. Meletem. 38 (1882). *STERCULIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. £ i. 218.
WCHEA, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 664 (1812).
COLAJUA, Rafin. Sylva Tellur. 73 (1838).
COURTENIA, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 236 (W44).
EDWARDIA, Rafin. Speech, t 168 (1824); ex DC. , Prod. ii. 92 (1825).
LUNANEA, DC. Prod. ii. 92 (1825).
SIPHONIOPSIS, Karat FL Columb. i. 139. t 69 (1858).
acuminata, *Schott b- Endl. Meletem*, 83—Afr. trop.
Afzelii, *Uast . in OUveri [J_ Trop A/r* j, 223—Afr. trop.
"^fntea, *Mast. I. c.* 224—Afr. trop.
«nliflora. *Mast. I. c.* 221—Afr. trop.
clavata, *Mast. 1. c.* 222.—Afr. trop.
cordifol!-, *L. Br. in] Benn. PI. Jan. Rar.* 287.—Java.
digitata, *Mast, in Oliver, fl. Trop. Afr. i.* 224—Afr. trop.
jjeHbUa, *Mast. I. c.* 228—Afr. trop.
it, *?. "sis» Mast. 1. c.* 222—Afr. trop.
gjndiflora, *Schott V Endl. Meletem.* S3—Hab. 1
"tterophylla, *Schott V Endl. I. c; Mast, in Oliver*,]_„"; *T°P- *&•• 223—Afr. trop.
•nonfoha, *Mast, in Oliver, 1. c.* 222.—Afr. trop.
pu·Tenuiflora, *Schott & Endl. Meletem.* 38 = acuminata.
Oliver, in Hook. I PL *. 1890' __Afr- austr.
»«««rfo, Schott *Sc.* Endl. Meletem. 38=acuminaU.
quin I«y*eloba, Gtrcke, in Peters; Reise Mossamb. Bot. 130.*—Afr. trop.
'"*wntosa*, Schott *8c* Endl. Meletem. 33»Stercnlia "Mnentosa.

COLARIA > Rafin_ sylva Tdlur_ 73 (1838) = Cola Schott & Endl. (Stercul.).
acuminata, »», Rafin. 1. c. = Co!a acuminata.
heterophyl*a*, Rafin. 1. c. = Cola heterophylla.

COL. fc^' Lindl. ex Spreng. Syst. iii. 727 (1826); et Bot. ···s. (1843) Misc_ 50=I*yoaste, Lindl. (Orchid.).
aromaticus, Spreng. Sy... i v. C. ur. P ... 80T ... L-· ·omatica.
B ""gtoniae, Lindl. ex Spreng. Syst. iii. 727 = L. "arnngtoniae.
gra·ndiflorus, Rafin. Fl. Tellur. ii. 86 - Bifrenaria narnsoniae.
H "gjsoniae, Lindl. ex Spreng. Syst iii. 727 = Bifrenaria ·risoniae.
jugosus, Lindl. Bot ^B- (1848) Misc- 51—Bras.
modestior, Reichb_ f_ ta Harab- Gartenz. xvi. (1860) 14.—Bras.
pallidiflorus, Spreng. f. Tent.29=MaxillarU pallidiflora.
palmifolius, Lindl. ex Spreng_ Sy3t_iiL 727=M « « Ilaria palmifolia.
Parker", "Pn»g. f. Tent. 28 - Maxillaria Parkeri.
parvulu, BreDe,, SySt- iT- Cur> Post,, 8 o 7 Bfr i enaria parvuS.
placantherus 1 Lindl_ Bot. Reg. (1848) Misc_ 60___ Bras.
Puydtii, Linden & Andrê, in Illnstr. Hortic. xxvii. (1880) *• 369—Bras.
racemosu*' fP^enS- f- Tent. 29=Bifrenaria racemosa.
viridis, Ij^n « • Bot. Reg. (1843) Misc. 50=L. viridis.

COLBERTIA, Salisb. Pared. Lond. sub t. 73 (1807)-= Dillenia, Linn.
augusta, Wall. Cat. n. 948 « D. pentagyna.
coromandelina, DC. Syst. i. 436=D. pentagyna.
floribunda. Wall. Cat. n. 950=D. floribunda.
minor, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 579—Java.
obovata, Blume, Bijdr. 6=D. anrea.
scabrella, D. Don, Prod. Fl. Nep. 226 »D. scabrella.

COIJCHTCTJM, Linn. Syst ed. I (1785); Gen. ed. I. 107 (1737). *LIUACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 821.
FOUHA, Porael, Mat. Fl. Atl. 2 (1860).
HERMODACTVLOS, Reichb. Consp. 64 (1828).
MONOCARYUM, R. Br. in App. Voy. Denh. et Clapp. 243 (1826).
PALUDARIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 53 (1865).
SYNSIPHON, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 490.
aegyptiacum, Boiss. Diagn. Ser. I. y. 66=montanum.
aeslivale, Bor. Fl.Centr. Fr. ed. III. ii. 612·- byzantinum.
aetnense, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 818=neapolitaaum.
agrippinnm, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 425—Hab.!
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viiL (1884) 647.—As. centr.
alpinum, *DC. Fl. Fr.* iii. 195.—Europ.
alpinum, Sehimp. ex Nym. Consp. 742=montanum.
amabile, *Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze*, 1874 (1876) 227.—Graecia.
arenarium, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 836=neapoli. tanum.
arenarium, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* il. 195. t. 179.—Ital.; Hungar.
atticum, Sprun. ex Tommas. in Flora, xxiii. (1840) 730 =Merendera attica.
antumnale, *Linn. Sp. PI.* 841.—Europ.
Balansae, Planch, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. iv. (1855) 146*»laetum.
Bertolonii, Stev. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. vii. (1829) 268-montanum.
Bisignani, Tenore, fide Janka, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 427-TenoriL
Bivonae, *Guss. Adnot. Cat. Pl.Bocc.* (1821) 4.—Europ. austr.
Bivonae, Tenore, FL Nap. Prod. App. v. ll=Tenorii.
Bivonae, Willk. & Lange, Prod. Fl.. Hisp. i. 194, ex parte-lusi tanum.
Boissieri, *Orph. in Atti Cong. Bot. Firente,\SU* (1876) 31.—Graecia.
brachyphyllum.^ojsi. *(f Haussi. ex Boiss. Fl. Orient.* v. 164.—Syria.
bulbocodioides, Bieb. Fl. Taur. Canc/i. 293; iii. 281-XQontanum.
bulbocodioides, Brot Fl. Lusit i. 597 = Merendera Balbocodium.
Bulbocodium, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1028 = Bulbocodium vemum.
byzantinum, *Ker-Gawl. I. c.*—Graecia; As. Min.
byiantinum, Tenore, Fl. Nap. iii. 397=Tenorii.
castrense, Laramb. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 688 =neapolitannm.
candidum, Schott & Kotschy, ex Baker, in Joura. Linn. Soc xvii. (1879) 429 = laetum.
catacutenium, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, v. 165 = mon tanum.
caucasicum, Spreng. Syst. i. 143 = Merendera cancasica.
Monetise, Haw. ex Kunth, Enum. PI. iv. 189 -= variegatumi
Clementei, Graells, in Mem. Acad. Cienc. Madr. ii. [1854] 483=bulbocodioides.
commune, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 176=autumnale.
corsicum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 481.—Ins. Corsica.
crocifloram, *Sims, Bot. Mag. t.* 2678.—Europ. austr.
crociflorum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 385—Kokan.
crociflorum, Schott *Be* Kotschy, In Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 97=montannm.
crocifolium, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 67-= mon tanum.
Cupani, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 452=montanum.
Decaisnei, *Boiss. Fl. Orient*, v. 157.—Syria.
euboeum, Orph. in Atti Cong. Bot Firenze, 1874 (18761 28 = Bivonae.
fasciculare, *Boiss. Fl. Orient*, v. 163.—Syria.
fasciculare, R. Br. in Denh. & Clapp. Trav. 243« mon tanum.

COLCHICUM :—
falcifolium, *Stapf, in Denischr. Acad. Wien*, 1. (1885) 19.—Persia.
floribundum, Lawson, Cat. 6; ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 829 = byzantinum.
Haussknechtii, *Boiss. Fl. Orient*, v. 157.—Persia.
Haynaldi, Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 213= antumnale.
hexapetalum, Pourr. ex Schnlt. f. Syst. vii. 1521 = Merendera Bulbocodium.
hololophum, Coss. *Sc* Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 489-montasum.
illyricum, Frivald. ex Kunth, linum. PI. iv. 140-speciosum.
illyricum, *Stokes, Bot. Mat. Med.* ii. 381.—As. Min.
Jankae, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 361 "•neapolitanum.
Kochii, Parl. Fl. ltal. iii. 188 =neapolitanum.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 38 =• laetum.
laetum, *Stev. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* vii. (1829) 262. t. 18.—Oriens.
latifolium, Griseb. Spicil. Fl. Runtel. ii. 878 = speciosum.
latifolium, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 43. t. 350 = Sibthorpii, byzantinnm.
Levieri, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 82—Italia,
libanoticum, *Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient*, iii. 166—Syria,
lingulatum, *Boiss. V Sprun. Diagn.* Ser. L v. 66—Knrop.
•*longifolium*, Castag. Cat. l'l. Marseille, 185 = neapolitanum.
lusitanum, *Brot. Phyt. Lusit.* ii. 211. t. 173, 174—Lusitania.
luteum, *Baiter, in Gard. Chron.* (1874) 83.—Reg. Himal.
Merendera, Ker-Gawl. in Bot Reg. sub t. 541 = Merendera Bulbocodium.
micranthum, *Boiss. Ft. Orient*, v. 162.—Byzant.
minimum, Elwes, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 433=montanum.
monogynum, Bieb. ex Schult. f. Syst. vii. 796=Stembergia cancasica.
montanum, All. Fl. Pedem. i. 117 = alpinum.
montanum, *Linn. Sp. PI.* 842.—Europ. austr.
montanum, Linn. 1. c. partim — Merendera Bulbocodium.
montanum, Schousb. Vextr. Marok. 185 = autumnalc.
multiflorum, Brot. Fl. Lusit. i. 5U7=autumnale.
neapolitanum, Orph. ex Nym. Consp. 743=pamassicum.
neapolitannm, *Tenore, Fl. Neap. Prod. App.* v. 11.—Italia.
nivale, Boiss. & Huet, ex Baker, in Journ. Linn. Sue. xvii. (1879) 43S=montanum.
orientate, Frivald. ex Kunth, Enum. PI. iv. 148 = neapolitanum.
pannonicum, Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 359=autmnnale.
Parkinsoni, Hook. f. Bot. Mag. t. 6000=variegatum.
Parlatoris, *Orph. in Atti Congr. Bot. Firente*, 1874 (1876) 32.—Graecia.
pamassicum, *Sort. Orph.* b* *Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 122.—Graecia.
parviflorum, Bivona, ex Parl. Fl. ltal. iii. 191 - montanum.
parvulum, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 243=micranthum.
parvulum, Tenore, Viag. in Basilic. 120-alpinum.
patens, Schultz, in Flora, ix. (1826) 132»autumnale.
persicum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 430.—Persia.
polyanthon, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1028 = autumnale.
polymorphum, Orph. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 29 --neapolitanum.
polyphyllum, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iv. 121 = Steveni.
praecox, Spenn. Fl. Friburg. i. 215 *= autumnale.
provinciate, H. Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 459 = neapolitannm.
pulchrum, *Herb, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 425—Graecia.
pusillum, Sieber, in Flora, v. (1822) 248 =• montanum.
pyrenaicum, Pourf. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 316=Merendera Bulbocodium.

COLCHICUM :—
Ritchii, R. Br. in App. Denh. & Clapp. Trav. 241 = montanum.
Sibthorpii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 427.—Graecia.
speciosum, *Stev. in Nouv. Mlm. Soc. Nat. Afosc.* vii. (182D) 265. t. 15.—Reg. Caucas.
Steveni, *Kunth, Enum. PI.* iv. 144.—Syria j Arab.
Szovitsii, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 24. —Keg. Caucas.
Tenorii, *Part. Fl. Hal.* iii. 176.—Italia.
tessellatum, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 425-agrippinum.
tesselatum, Link.—Cf. Kunth, Enum. Fl. iv. 139 = Bivonae.
tessellatum, Salisb. Prod. 236= variegatum.
tessulatum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=variegatum.
Todarii, Parl. Fl. Ital. iii. 178=h»itanum.
trapesunticum, Boiss. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1879) 430=polyphyllum.
transsilvanicum, Scbur, Enum. PI. Transs. 679 = byzantinum.
triphyllum, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 756 = montanum.
Troodi, *Kotschy, in linger tf Kotschy, Cyprus,* 190.—Ins. Cyprus,
turcicum, *Janka, in Oestr. Sot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 242.—Europ. or.
umbrosum, *Stev. in Nouv. Mem. Soc. Nat. Afosc.* vii. (1829) 268.1.14.—Tauria.
Valery,T'mzo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 818 = montanum.
variegatum, Bivona, Sic. PI. Cent. i. 27 = Bivonae.
variegatum, *Linn. Sp. PI.* 842.—Europ. austr.
variegatum, Sieber, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 427=Sibthorpii.
variopictum, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 83=amabile.
vernale, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. 174 = aaturanale.
vernum, Kunth, Enum. PI. iv. 141=autumnale.
vernum, Kunth, 1. c. 146 = Bulbocodium vernum.
vernum. Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 293 =• montanum.
versicolor, Ker-Gawl. in Bot. Reg. 1671 - Bulbocodium versicolor.
Visianii, Parl. Fl. Ital..iii. 175 = Bivonae.

COLDENIA, Linn. Diss. Dass. 9 (1747); Amoen. Acad. i. 393 (1749). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 841.
EDDYA, Torr. & A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 170 (1855).
GAI.APAGOA, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 196.
GOLDENIA, Raeusch. Num. ed. III. 43 (1797).
LOBOPHYLLUM, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 21.
MONOMESIA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 87 (1836).
PTILOCALYX, Torr. & A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 170. t. 8 (1855).
STEGNOCARPUS, Torr. 1. c. 169 (1855).
TIQUILIA, Pers. Syn. i. 157 (1805).
angolensis, *Welw. Apont.* 591.—Afr. trop.
atacamensis, *Phil. Fl. Atac.* 87.—Chili,
canescens, *DC. Prod.* ix. 559.—Am. bor. occ.
dichotoma, *Lehm. Asperifol.* 9.—Peruv.
Dombeyana, Buek, Ind. DC. Prod. iii. 108 = dichotoma.
Greggii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.ii.* 1.182.—Am. bor. occ.
hispidissima, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. H862) 340.—Am. bor. occ
litoralis, *Phil. Fl. Atac.* 37.—Chili,
mexicana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 119.—Mexic.
Nuttallii, *Hook, in Hook. Kern Journ.* iii. (1851) 296.,-Am. bor. occ.
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 292. —Am. bor. occ.
pentandra, Juss. ex Steud. Norn. ed. II. i. 896 = dichotoma.
procumbens, *Linn. Sp. PI.* 125.—Ind. or.
tomentosa, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 120.—Am. bor. occ.

COIiEA, Boj. Hort. Maurit. 220 (1837). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1051.

COLEA :—
TRIPINNA, Lour. Fl. Cochinch. 391 (1790).
TRIPINNARIA, Pers. Syn. ii. 173 (1807).
ULOMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 62 (1836).
cauliflora, DC. Prod. ix. 241 = floribunda.
Chapelieri, DC. 1. c. 242=decora.
Commersonii, DC. 1. c. = floribunda.
decora, *Boj. Hort. Maurit.* 220, nomen; *DC. I. c.* 241. —Madag.
discolor, *Seem, in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 8.—Madag.
floribunda, *Boj. Hort. Maurit.* 220, nomen; *Lindl. Bot. Reg.* (1841) t. 19.—Madag.
hispidissima, *Seem, in Trans. Linn, Soc.* xxiii. (I860) 9.—Madag.
involucrata, *Boj. Hort. Maurit.* 221, nomen.; *DC. Prod.* ix. 242.-Madag.
mauritiana, *Boj. I. c.* 220.—Ins. Mascar.
nitida, DC. Prod. ix. 242=decora.
obtusi/olia, DC. 1. c. 241 = mauritiana.
parviflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 128. —Madag.
pedunculata, *Baker, Fl. Maurit.* 244.—Ins. Seychelles,
purpurascens, *Seem, in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (I860) 8.—Madag.
ramiflora, DC. Prod. ix. 241=mauritiana.
Seychcllarnm, *Seem, in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 8.- Ins. Seychelles.
Sieberi, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 240, in nota.—Hab.«
Telfairii, *Boj. Hort. Maurit.* 220.—Madag.
tetragona, *DC. Prod.* ix. 242.—Madag.
tripinnata, *Seem, in Bonplandia,* iv. (1856) 128.—Cochinch.
undulata, *Regel, Gartenfl.* (1870) 822.—Madag. ?

COLEACHYRON, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient, v. 408 (1881) = Carex, Dill. (Cyperac).
Oliverianum, J. Gay, 1. c=Carex illegitima.

COLEANTHEKA, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 4. *EPACRIDEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 611.
MICHIEA, F. Muell. Fragm. iv. 95. t. 27 (1864).
caelophylla, *Benth. Fl. Austral,* iv. 150.—Austral,
myrtioides, *Stschegl. in Bull. Soc. Nat Mosc.* xxxii. (1869) I. 4.—Austral,
virgata, *Stschegl. 1. c.* 6.—Austral.

COIiEAlTTHtrS, Seid. in Roem. & Schult. Syst. ii. 11, 276 (1817). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 1147.
SCHMIDTIA, Tratt. Fl. Austr. i. 12-1. 451 (1811).
WILIBALDA, Stemb. in Flora, ii. (1819) 6.
snbtilis, *Seid. in Roem. (f Schult. Syst.* ii. 276.—Europ.

COLEATAENIA, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 808 = Fanioum, Linn. (Gramin.).
gynerioides, Griseb. 1. c.—Reg. Argent.

COLEBROOKEA, Sm. Exot. Bot. ii. 111. t. 115 (1806). *LABIATAE,* Benth. & Hook. £ ii. 1180.
oppositifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 487 = Elsholtzia polystachya.
oppositifolia, *Sm. Exot. Bot.* ii. 111. t. 115.—Ind. or.; Burma.
ternifolia, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 26 = oppositifolia.

COLEBROOKIA, Donn, Cat. Hort. Cantab, i. (1796) = Crlobba, Linn. (Zingib.).
bulbifera, Donn, L c» G. marantina.

COLEBROOKIA, Spreng. Syst. ii. 713=Colebrookea, Sm. (Labiat.).

COLEMA, Rafin. New Fl. Am. iii 49 (1836) =Corema, D. Don (Empetrac).
arenaria, Rafin. 1. c=Cor. Conradii.

COLENSOA, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 166 (1853)-Fratia, Gaudich. (Campanulac).
physaloides, Hook. f. 1. c. 167.—N. Zel.

COLEOCOMA, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1867) 19. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 293.
Centaurea, *F. Muell. I. c*—Austral.

COLEOGYNE, Torr. in Smithson. Contrib. vi. (Plant. Fremont.) 8. t. iv. (1854). *ROSACEAE,* Benth. * Hook. f. i. 617.
ramosissiraa, *Torr. 1. c.*—Calif.

COIiEONEMA, Bartl. & Wendl. f. Diosm. 55. t. A (1824). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 289.
album, *Bartl.* b" *Wendl. f. 1. c.* 56.—Afr. austr.
album, E. Mey. Zwei PH. Docnm. 174=Diosma vulgaris.
aspalathoides, *A. Juss. in Mem. Mus. Par.* xii. (1825) 471.—Afr. austr.
Dregeanum, Presl, Bot Bemerk. 31=pulchrum.
filiforme, A. Juss. in Mem. Mus. Par. xii. (1825) 471 "=pulchrnm.
gracile, Eckl. & Zeyh. Enum. 106 = pulchrum.
juniperifolium, *Eckl. (f Zeyh. I. c*—Afr. austr.
juniperinum, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 37' =juniperifolium.
pulchrum, *Hook. Sot. Mag.* t. 3340.—Afr. austr.
virgatum, Eckl. & Zeyh. Enum. 106—pulchrum.
virginianum, Eckl. & Zeyh. I. c. = juniperifolium.

COLEOPHORA, Miers, in Ann. Nat. Hist. Ser. II. «'• (1851) 197-Daphnopais, Mart. (Thymel.).
gemmiflora, Miers, 1. c.-D. Martii.

COLEOPHYLLUM, Klotzsch, in Otto & Dietr. AUg-Gartenz. viii. (1840) 185 = Chlidanthufl, Herb. (Amaryll.).
Ehrenbergii, Klotzsch, 1. c.=Chlidanthus Ehrenberg"-

COLEOSANTHUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (18171 67; et Diet. Sc. Nat x. (1818) 36 =- Briekellia, E»-(Compos.).
Cavanillesii, Cass. in Diet Sc. Nat. x. 37 •* "' Cavanillesii.
tiliaefolius, Cass. 1. c. xxiv. 519 = Eupatorium macrophyllum.

COLEOSPADIX, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. «• (1885)90. *PALMAE.*
litigiosa, *Becc. I. c.—N.* Guinea,
oninensis, *Becc. 1. c.*—N. Guinea.

COXiEOSTACHYB, A. Juss. in Ann. Sc Nat Se£ II. xiii. (1840) 329. *MALPIGHIACEAE,* Benth. * Hook. f. i. 253.
genipaefolia, *A. Juss. I. c*—Bras.
hypoleuca, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. vu-(1848) 125 = Blepharandra hypoleuca.
spicata, Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) t ** genipaefolia.
vestita, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 124=Diacidia vestita.

COLEOSTEPHUS, Cass. in Diet. Sc. Nat xii. 43 (1826) = Chrysanthemum, Linn. (Compos.).
Clausonis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 59.—Algen»
hybridus, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (« 77 (Pugill. 127)=Chrys. Myconis.
macrotus, Dur. in Duch. Rev. Bot. i. (1846-46) 38* Chrys. macrotum.
multicaulis, Dur. 1. c. 864 = Chrys. multicanle.
Myconis, Cass. in Diet. Sc Nat. xii. 43 « Chrys. Myconis.

COLEOSTYLES, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 686 [bis] (1873)=seq.

COLEOSTYLIS, Sond. in Lehm. PI. Preiss. i- (1845) = Ievenhookia, K. Br. (Stylid.).
Preissii, Sond. 1. c. = L. Preissii.
Sonderi, F. Muell. in Trans. Phil. Soc Viet. i. 46 = L. Sonderi.
umbellulata, Sond. in Lehm. PI. Preiss. i. » stipitata.

COBEOTBYPB, C. B. Clarke, in DC. Monog. iii. 238. t. 8 (1881). *COMMEUNACEAE, Sc* Hook. f. iii. 851.
Goudotii, *C. B. Clarke, 1. c.* 240.—Madag.
madagascarica, *C. B. Clarke, 1. c.* 239.—Madag.
natalensis, *C. B. Clarke, I. c*—Afr. austr.

COLETIA, Veil. Fl. Flum. 32 (1825)-Mayaca *madida,* Veil. 1. c. 83; i. t. 79=M. Sellowiana.

COLEUS, Lonr. Fl. Cochinch. ii. 372 (1790). *LA. BIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1176.
MITSA, Chap, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 62 (1832).
acuminatus, *Benth. in Linnaea*, vi. (1881) 81.—Ins. Philipp.
afncanus, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 54.—Aft. trop.
albidus, *Vatke, in Linnaea*, xxxvii. (1871-78) 321.—Abyss.
alpmus, *Vatke, 1. c.* 322.—Abyss.
"mboinicus, Lonr. Fl. Cochinch. ii. 372=aromaticus.
anamallayensis, *Bedd. in Madr. Joum. Sc.* Ser. II. »ii. (1861) 78.—Ind. or.
arabicus, *Benth. in DC. Prod.* xii. 79.—Arab,
aromaticus, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* ii. 16.—Ind. or.
Mropnrpurens, *Benth. I. c*—Malaya; Pacific,
oarbatus, *Benth. 1. c.* 16.—Ind. or.; Afr. trop.
"tnthamianus, Am. in Nov. Act. Nat. CUT. xviii. . . (1886) 354 = inflates.
wcolor, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 65.—Java.
Jllancoi, *Benth. in DC. Prod.* xii. 78.—Ins. Philipp.
wnmei, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 56.—Java,
Boj.ri, *Benth. 1. c.* 52.—Madag.
caninus, *Vatie, in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 818.—Abyss.
^osns, *Hassk. in Mora*, xxv. (1842) H. *Beibl.* 25.—Java.
""nosus, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss. ii. 183 = spicatus.
cr<"«folius, Benth. in Wall. PI. As. Rar. ii. 15 = aromaticus.
edulis, *Vatke, in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 819.—Abyss.
acadus, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-32) 90.—Afr. trop.
fruticosus, Benth. in DC. Prod. xii. 78 = Plectranthns iraticosns.
•roticosus, *Wight, ex Benth. in DC. Prod.* xii. 78.—
galeatus, or.
Garckean, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 66.—Java.
323.—Abyss. *Vatke, in Linnaea*, xxxvii. (1871-78)
Gibsonii, *Verlot, in Rev. Hortic.* (1866) 279.—Hab.1
gi<, Benth Ub Gen rt Sp. 68 = Plectranthua Coleoides.
glandulos> H<x*-f- »« y<ntm. Linn. Soc.* vii. (1864) 911
*or*A— Afr. trop.
K«»mfolins, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 53.—Ins. Timor.
*%a*difolius*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 482 = Blancoi.
SSL!*?' Benth - Lab- Geo- <* Sp. 60 = spicatus.
Regel, in Act. Hart. Petrop. vu. (1880) 543.—Abyss.
Si'anus, *Schwrinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 121.—Afr. trop.
in ATUS, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 58.-Zeylan.
ingratus, *Benth. I. c.53.-Jv,i*
lacinialus mth 66—Java.
lactif lorns, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 89.—Afr. trop.
lanuginosus> H<i<**t- ex Benth. in DC. Prod.* xii. 79.—Abyss.
latifolius> *Hochst. ex Benth. 1. c.* 74.—Abyss,
leptostac nys £»M. /. *c.* 77.—Zeylan.
Macraei, Benth. Lab. Gen. et Sp. 58=malabaricus.
macrophyllus, *Benth. I. c.* 55.-Java.
macropus, *j f 0 - &• I'd. Bat.* ii. 966.—Java,
macrostachys, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 57.—Java.
malabaric lad. or "8" *Benth, in Wldl Pl As Par* iL 16>~
M ii
^\/f^ook -f- «* Jowrn. *Linn. Soc.* vii. (1864) 211.
m op.
"Jianthus, *Maxim, in Act. Hart. Petrop.* Hi. (1875)
6. - Ab s
mollis, Benth. in DC p10»3 "• 77=malabaricns.
multiflorus, *Benth £ai G «»- «* Sp.* 55.—Ins. Philipp.
ovatus, Benth U c - 57=malabaricn«.
palustri *Vat* **'" *Linnaea*> xxxvii - (1871-73) 319.—Abyss*;
pa iculatus, Benth. in Wall. PL As. Rar. ii. 16 = ? lectranth « coleoides.
parviflora *Benih in DC Pr «i- ">• 72.—Ind. or.
Perac ii, *veni* " *Lab Gen et Sp.* 55.—Madag.
Petw^n us ' *Vatie, in Linnaea*, xl. (1876) 180.—Afr. trop.
puberu 1 Jf »- ^- /||A 5a - ji - 955.-Malaya.
pumili anco, Fl Fili P- e4 I- 482-acnminatns.
remotifl^L
rivularis, !?' f* w /Bli 5 «'- »• 9«*—Java.
Abyss. Ka *»»»»» *Linnaea*, xxxviL (1871-78) 320.—

COLEUS:—
rugosus, Benth. in Wall. PI. As. Rar. ii. 16=PIectranthus rotundifolins.
Schimperi, Vatke, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 820 = barbatns.
Schweinfarthii, *Vatke, 1. c.* 323, in textn.—Afr. trop.
scutellarioides, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* ii. 16.—Malaya; Austral.
secundiflorus, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 65.—Ins. Timor,
spectabilis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 955.—Java,
spicatus, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* ii. 15.—Ind. or.
suborbicularis, *Zoll. V M critei, Syst. Vert. Zoll.* 4.—Java.
subspicatus, Walp. Rep. vi. 658 = Plectranthus spicatus.
Suganda, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 483 = aromaticus.
tenuicaulis, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 211.—Afr. trop.
temiifloros, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 92.—Afr. trop.
Tryoni x, *Hort. ex Flor. Mag.* N. S. i. (1872) t 84.
tuberosus, Benth. Lab. Gen. et Sp. 60-parviflorus.
tuberosus, *A. Rich. Tent. Ft. Abyss*, ii. 185.—Abyss,
umbrosus, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 91.—Afr. trop.
urtici/olius, Benth. in DC. Prod. xii. 78=Plectranthus urticifolins.
Verschaffeltii, *Lent. Illustr. Hortic.* viii. (1861) t. 298.—Java.
Walkeri, Benth. in DC. Prod. xii. 77 =malabaricus.
Wightii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 68 = Plectranthus coleoides.
Zatarhendi, Benth. 1. c. 60=spicatus I

COLICODENDRON, Mart, in Flora, xxii. (1889) I. Beibl. 25 = Capparis, Linn.
anceps, ShuttL ex Chapm. Fl. & U. St. 82 = Capp. jamaiccnsis.
avicenniaefolium, Seem. Bot. Voy. Herald, 78=Capp. avicennifolia.
Breynia, Endl. ex Heynh. Nom. ii. 154=Capp. Breynia.
lepidotum, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvii. (1864) II. 827.—Venezuela.
longifolium, Mart, in Flora, xxii. (1889) I. Beibl. 26.—Bras.
obliquifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1864) II. 328.—N. Granat.
obovatum, Turcz. 1. c. 827.—Venezuela.
pulchellum, Seem. Bot. Voy. Herald, 78-Capp. pulcherrima.
scabridum, Seem. 1. c = Capp. scabrida.
subbilobum, Seem. 1. c. = Capp. gubbiloba.
Yco, Mart, in Flora, xxii. (1839) I. Beibl. 25 = Capp. Yco.

COLIGNONIA, Endl. Gen. 811 (1887). *NYCTAGINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 8.
COLLIGNONIA, Endl. Ench. 193 (1841).
biumbellata, *Ball, in Joum. Linn. Soc.* xxii. (1886) 54.—*Peruv.
glomerata, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 87.—Reg. Argent,
parviflora, *Endl. Gen.* 811; *Choisy, in DC. Prod.* xiii. II. 439.—Peruv.
scandens,B««rt. *PI. Hartw.* 148.—Peruv.

COLIQUEA, Steud. ex Bibra, in Denkschr. Wien. Acad. v. (1853) 115 = Chusquea, Kunth (Gramin.).
Quila, Steud. ex Bibra, 1. c.=Chus. Cumingii.

COIIIIIABIUM, Blume, Bijdr. 357 (1825). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 508.
nebulosum, *Blume, I. c.* 358.—Java,
simplex, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) I. 462.—Borneo.

COLLADEA, Pen. Syn. i. 107 (1805)=seq.

COLLADOA,Cav. Ie. v. S7.t. 460 (1799) ^Isohaemum, Linn. (Gramin.).
distachia, Cav. 1. c.=I. rugosum.
monostachya, Pen. Syn. i. 107-Anthephora elegans.

COLLADONIA, Spreng. Syst. i. 516 (1825) = Palicourea, Aubl. (Rubiac).
tinifolia, Spreng. 1. c 767=P. tinifolia.

COLLADONIA, DC. Prod. iv. 240 (1880)=Prangos, Lindl. (Umbellif.).
alata, Boiss. Fl. Orient, ii. 945.—Syria.
anatolica, Boiss. 1. c.—As. Min.
angustifolia, Bertol. Fl. Ital. iii. 408-P. angustifolia.
anisoptera, Boiss. Fl. Orient, ii. 946.—Syria.
dlicica, Boiss. 1. c. 947.—Cilicia.
crenata, Boiss. 1. c. 946.—Syria.
heptaptera, Boiss. L c. 945 = P. colladonioides.
microcarpa, Boiss. 1. c. 946 = P. microcarpa.
syriaca, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. III. ii. (1844) 86 = Smyrniopsis cachroides.
triquetra, DC. Prod; iv. 240 = P. triquetra.

COLLAEA, DC. MAn. Leg. vi. 244 (1825); et in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 96 = Oalactia, P. Br. (Legumin.).
angustifolia, Benth. in Ann: Wien. Mus. ii. (1838) 12'J = G. angustifolia.
argentina, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 125.—Reg. Argent
bullata, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 149.—Bras.
cinerascens, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5575-Atylosia mollis.
crassifolia, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 128.—Bras.
decumbent, Benth. in Linnaea, xxii. (.1849) 515.—Bras.
diversifolia, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. 1.147.—Am, trop.
formosa, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 126.—Reg. Argent.
gibba, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5572 = Dunbaria Heynei, ferruginea.
glaucescens, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 128 = G. glaucescens.
grewiaefolia, Benth. I. c. 128.—Bras.
guianensis, Klotzsch, ex Schomb. Faun. & Fl. Gui. 1208.—Guiana.
lancifolia, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 150.—Bras.
latisiliqua, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 129 ~ G. latUiliqua.
longiflora, Benth. 1. c. 128.—Ins. Trinit.
longifolia, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 151.—Am. trop.
macrophylla, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 128.—Bras.
Martii, Benth. 1. c. 129 = G. Martii.
mollis, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6574 = Atylosia mollis.
Neesii, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 129 = G. Neesii.
obtusa, Benth. 1. c. 128.—Bras.
pascuorum, Mart, ex Benth. 1. c— Bras.
pedieellatum, Benth. in Hook. Journ. Bot ii. (1840) 60.—Bras.
peduncularis, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 128.—Bras.
pendula, Benth. 1. c. - G. pendula.
rosea, Benth. in Ann. Nat. Hist iii. (1839) 437 = G. Jussiaeana.
rotundifolia, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 149.—Bras.
rugosa, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 128.—Bras.
scarlatina. Mart, ex Benth. 1. c. 129.—Bras.
speciosa, DC. in Mém. Lég. vi. 245.—Peruv.
stenophylla, Benth. in Mart. Fl. liras. xv. I. 146-- G. stenophylla.
trinervia, DC. Mem. Leg. vi. 247 = Atylosia Candollei.
'omentosa, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 149 = G. tomentosa.
velutina, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 129 = G. velutina.
venosa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5573 = Dunbaria ferruginea.
virgata, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. 1.146 Bras.

COLLAEA, Endl. Gen. Suppl. ii. 20 '1842) in syn - COLLEA, LindL = Pelexia, Lindl. (Orchid.).

COLLAEA, Spreng. Syst. iii. 622 (1826) = Chrysanthellum, Rich. (Compos.).
procumbens, Spreng. 1. c«Chrys. procumbent.

COLLANDRA, Lem. in Fl. des Sere, iii. (1847) sub t 223 = Columnea, Linn. (Gcsnerac).
atronitens, G. Don, ex Lond. Encyc PI. Snppl. ii. 1402 = Colnmnea aureo-nitens.
aurea-nitens, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 209 = Columnea aureo-nitens.
petiolaris, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 468.—Ind. occ.
phoenicea, G. Don, ex Lond. Encyc. PI. Suppl. ii. 1402.—N. Granat.
ficta, Lem. Jard. Flew. ii. (1852) t. 214 = Columnea picta.
pilosa, Lem. in Fl. des Serres, iii. (1847) sab t. 223 = Columnea aureo-nitens.
sanguinea, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1868) 526=- Colnmnea sanguinea.

COLLANIA, Herb. Amaryll. 108. t. 8 (1837) = Bomarea, Mirb. (Amaryllid.).
andimarcana, Herb. 1. c. 105 = B. andimarcana.
dulcis, Herb. 1. e. 104 = B. glaucescens.
glaucescens, Herb. 1. c.—B. glaucescens.
involucrosa, Herb. 1. c. 108. t. 9 = B. glaucescens.
puberula, Herb. 1. c. 105. t. 11. f. 1=B. glaucescens.

COLLANIA, Schult. f. Syst. vii. II. p. liii, 898 (1880) = Ureeolina, Reichb. (Amaryllid.).
dubia, Schult. f. 1. c—Ecuador.
fulva, M. Roem. Syn. Ensat. 55 = U. fulva.
urceolata. Schult. *1*. Syst. vii. 893=U. pendula.

COLLEA, Lindl. Bot. Keg. sub t. 760 (1823)=Pelexia, Lindl. (Orchid.).
adnata, Lindl. 1. c. = P. spiranthoides.
calcarata, Lindl. I.e. —P. setacea.

COLLEMA, Anders, ex DC. Prod. vii. 512 (1889) = Ooodenla, Sm.

COTiTYRTIA, Comm. ex Juss. Gen. 380 (1789).
RHAMNEAE, Benth. & Hook. f. i. 883.
SCYPHARIA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. vi. (1860) 8.
aciculata, *Miers, in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (1860) 214.—Peruv.
armata, Miers, 1. c. 211 = spinow.
articulata, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (18S6) 679.—Chili,
atrox, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (1860) 206.—Reg. Argent.
bictonensis, Lindl. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 31 = crnciata.
brevispina, *Phil, in Anal. Univ. CHI.* (1872) 690.—Chili,
cataphracta, *Miers, in Ann.* b* *Mag. Mat. Hist.* Ser. III. v. (I860) 210.—Chili.
Ckacaye, G. Don, Gen. Syst. ii. 35 = Discariaserratifolia.
crenata, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 85.—Chili.
crenata, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 87 = Discaria crenata.
cruciata, *Gill. V Hook, in Hook. Bot. Misc. i.* (1830) 152. t. 48.—Chili..
Cruzerillo, *Bert, in 'Merc. Chil.* 1829'.—*Cf. Bull. Fhussac*, xx. (1830) 109, nomen.—Chili.
Cunninghami, Fenzl, in Enum. PI. Hueg. 28 = Discaria australis.
discolor, *Hook. Ic. PI.* t. 588.—Patagon.
disperma, *Mof. V Sesse, ex DC. Prod.* ii. 29.—Mexic.
Doniana, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 36.—Chili,
dumosa, *Miers, in Ann.* to" *Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (1860) 212.—Chili.
Ephedra, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 397='Trevoa Trntilla.
Ephedra, *Vent. Choix*, 16. t. 16.—Peruv.
exserta, *Khtssch, ex Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 100.—Bras,
ferox, *Gill. V Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 154.—Chili.
korrida, Brongn. ex Drap. Encyc & Fl. des Series Angl. iii. (Juill. 1835) f. 6=ferox.
horrida, Willd. Sp. PI. i. 1118=spinosa.
Hystrix, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 32.—Chili.
infesta, Brongn. in Ann. Sc Nat. Sét. I. x. (1827) 366 = Adolphia infesta.
insidiosa, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 100.—Bras,
intricata, *Miers, in Ann. If Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (I860) 204.—Chili,
invicta, *Miers, 1. c.* 205.—Chili.
Kunthjana, *Miers, I. c.* 208.—Pernv.

COLLETIA :-
longispina, *Hook, b" Am. in Hook, Bot. Misc.* iii. (1838) 173.—Chili.
longissima, Steud. Nom. ed. II. i. 897 = praec
maytenoides, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 117.—Reg. Argent,
montana, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 37.—Chili.
multiflora, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 29 = Celastrus aphyllns.
nana, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 87.—Chili,
obcordata, *Vent. Jard. Cels*, t. 92.—Peruv.
polyacantha, Hnmb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 513 = obcordata, spinosa.
pubescens, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 366 = Discaria australis.
pungens, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (1860) 2O9.-Chili.
serratifolia,\eat. Choix, 15. t. 15 - Discaria serratifolia.
spartioides, *Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxvii. (1834) 52.—Ins. J. Fernand.
spicata, *Humb.* to" *Bonpl. ex Roem. (f Schult. Syst.* v. 513.—Am. anstr.
spinosa, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 91. t. 129.—Am. austr.
spinosissima, J. F. Gmel. Syst. 408 = praec.
stipellacea, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 36.—Chili,
tenuicola, *Miers, in Ann. b" Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (I860) 209.—Reg. Argent.?
tetragona, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. x. (1827) 866.—Pemv.
tetrandra, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 31.—Chili,
tomentosa, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1856) 618.—Chili.
Tralhuen, Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxvii. (1834) 53=Trevoa quinqnenervia.
Treba, Bert, ex Colla, 1. c-Trevoa trinervia.
ulicina, *Gill*, to" *Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1880) 155.—Chili,
valdiviana, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 35.—Chili.
Valentuela, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 397 = ulicina.
velutina, *Spreng. Syst.* i. 771.—Bras,
veprecula, *Miers, in Ann. (S Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (1860) 213.—Chili.
Weddelliana, *Miers, 1. e.* 207.—Bolivia.

COLLETIA, Scop. Introd. 207 (1777) = Celtls, Linn. (Urticac).

COLLIGNONIA.Endl.Ench. 193 (1841) = Colignonia, EndL (Nyctag.).

COLLIGUAJA, Molina, Sagg. Chil. 168,854 (1782).
EUPHORBIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 338.
brasiliensis, *Klotusch, ex Baill. Etud. Gén. Euph.* 535.—Bras.
Bridgesii, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxii. (1868) 125.—Chili.
Dombeyana, C. Gay, Fl. Chil. 342 = salicifolia.
Dombeyana, *A. Juss. in Ann. Sc. Nat.* Sir. I. xxv. (1832) 23.—Chili,
integerrima. *Gill, b" Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 140.—Chili,
obtusa, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1855) 18.—Chili.
odorifera, *Molina, Sagg. Chil.* 158, 354.—Chili,
salicifolia, *Gill. V Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1880) 141.—Chili,
triquetra, *Gill. V Hook. I. c.* 142.—Chili.

COLLINARIA.Ehrh. Beitr. iv. (1780) 147 = Koeleria, Pen. (Gramin.).

COLLINIA, Liebm. inOefers. Danske Vid. Selsk. 1845 (1846) 8-Chamaedorea, Willd. (Palm.).
elatior, Liebm. 1. c. = Cham. Liebmanni.
elegans, Liebm. 1. c. - Cham, elegans.
fibrosa, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 6 =Synechanthus fibrosus.
humilis, Liebm. in Oefers. Danske Vid. Selsk. 1845 (1846)8=Cham. humilis.

COLLINIA, & COLLINIANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 194=seq.

COLLENBIA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. i. (1817) 190. t. 9. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook, f. ii. 941.
barbata, Bosse, in Verh. Berl. Gartenb. Ver. N. Keihe, i. (1858) 399= tinctoria.
bartsiaefolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 318.—Calif,
bicolor, *Benth. in Trans. Hort. Soc.* N. S. i. (1881-85) 480.—Calif.
Childii, *Parry, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 267-—Calif,
corymbosa, *Herder, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1867) 32; *Regel, Gartenft.* (1868) 33. t. 568.—Calif,
divaricate, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* iii. (1863^ 8tt.—Calif,
grandiflora, *Dougl. ex Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1166 et t. 1107.—Am. bor. occ.
.Greenii, *A. Gray, in Proc. Am, Acad.* x. (1874) 76.—Calif.
heterophylla, R. Grah. in Hook. Bot. Mag. t. 3695« bicolor.
hirsuta, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) U«-t. 88=bartsiaefolia.
linearis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 60.—Am. bor. occ.
minima, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1884) 47 - parviflora.
multicolor, *Lindl.* to" *Paxt. Flora. Gard.* ii. (1851-521 89. t. 55.—Calif.
Panyi, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 257.—Calif,
parviflora, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1082.—Am. bor.
paudflora, Hook. Fl. Bor. Am. ii 94, sphalm.=parviflora.
purpurea, *Rafin. Atl. Journ.* 149.—Am. bor.
Rattani, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 60.—Am. bor. occ.
septemnervia, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (18«[3]> 224=tinctoria.
solitaria, Kellogg, 1. c. 10 = sparsiflora.
sparsiflora, *Fisch. b" Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* »• (1886) 38.—Calif.
tenella, Benth. in DC. Prod. x. 698-Tonella collinsioides.
tinctoria, *Hartw. ex Benth. PI. Hartw.* 828.—Calif.
Torreyi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 37»-,—Calif.
tricolor, Rafin. Cat. 13=verna.
vema, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* i. (1817) 190-[9]—Am. bor.
violacea, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* v. (1837) I[9]-—Am. bor.

COLLLNSONIA, Linn. Gen. ed. I. 384 (1737)-
LABIATAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1181.
DIALLOSTEIRA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
HYPOGON, Rafin. Fl. Ludov. 148 (1817).
PLKURADENIA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
anisata, *Sims, Bot. Mag.* 1.1218.—Am. bor.
canadensis, *Linn. Sp. PI:* 28.—Am. bor.
cuneata, Wender. in Scbr. Nat. Ges. Marb. ? ex Benth. in DC. Prod. xii. 258=canadensis.
decussata, Moench, Meth. 379=canadensis.
dvalis, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 21 = scabriuscula.
praecox, Walt. Fl. Carol. 65=scabriuscula.
punctata, Ell. Sketch, i. 36=canadensis.
scabra, Pers. Syn. i. 29 « scabriuscula.
scabriuscula, *Ait. Hort. Kev.* ed. I. i. 47.—Am. bor.
serotina, Walt Fl. Carol. 66-canadensis.
tuberosa, Michx. Fl. Bor. Am. i. 17=scabriuscula.
urticifolia, Salisb. Prod. 76=canadensis.
verticillaris, Rafin. Fl. Ludov. 41—seq. I
verticillata, *Baldv. ex Ell. Sketch*, i. 86.—Am. bor.

COLLOCOCCUS, P. Br. Hist. Jamaic. 167 (1758) (Gen. dub.).

COLLOMIA, Nutt. Gen. Am. i. 126 (1818). POLE-
MONIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 822.
COURTOISIA, Reichb. Ic Exot. iii. 4. t. 208 *Of*V'
aggregata, T. C. Porter, ex A. Gray, Syn. Fl. N. A"-ii. I. S94 = Gilia aggregata.
Cavanillesiana, *G. Don, Gen. Syst.iv.2i7*—^*eXUI*„ Texas.
Cavanillesii, Hook. 8c Arn. Bot. Beech. Voy. »* coccinea.
coccinea, *Lehm. ex Benth. in Bot. Reg.* t 1fl^-^Chill. 190.
eritrichoides, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1858-55) —Chili,
eryfliraeoides, *Griseb. I. c.*—Chili.

O0LL0HIA.—
gilioides, *Benth. in Bot. Reg.* sub t 1622.—Calif.
glutinosa, Benth. 1. c.=gilioides.
gracilis, *Dougl. ex Benth. I. c*—Am. bor. occ.
grandiflora, *Dougl. in Lindl. Bot. Reg.* t 1174.—Am. bor. occ.
heterophylla, *Hook. Bot. Mag.* t. 2895.—Am. bor. occ.
lateriHa, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. iii.t.206=cocdnea.
leptalea, *A. Gray, inProc.Am. Acad.* viil. (1870) 261.—Calif.
linearis, *Nutt. Gen. Am.* i. 126.—Am. bor. occ.
Unoides, Nntt. in Joura. Acad. Philad. N. S. i. (1847), 159 = Giliaminntiflora.
longiflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870). 261.—Am. bor. occ.
"icrantha, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. iii. (1863) IS.f.sJgraciliT
myotica, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1853-65) 129.—Chili.
Nmarretia, G. Don, Gen. Syat. iv. 247-Gilia Navarettia.
nudicaalis, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 368.—Am. oor. occ.
tteOhiiphon, *Kunze, in Linnaea,* xxiv. (1851) 228.—
tenella,"^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 259.—Am. bor. occ.
Thurberi, *A. Gray, I. c.* 261.—N. Mexic.
Victoria, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. iii. (1863) 17. <• 2 e linearis.

COLLOMIA, Sieber, exStend. Norn. ed. II. i. 398 (1840) "Feliola, Cass. (Compos.).
**osa,* Sieber, ex Stend. 1. c.=F. reflexa.

COU.OPHORA, Mart, in Buchn. Rep. Pharm. (1828).—Cf. Bull. Férussac (Jan. 1831) 64=Couma, Aubl. (Apocyn.).
•«'«, Mart. 1. c. = Couma utilis.

CoLLYRIS, Vahl, in Skrift. Nat. Selsk. Kiobenh. vi. U810) 110 = DiBchldia, R. Br. (Asclepiad.).
"•/or, Vahl, 1. c.-D. Rafflesiana, D. Collyris.
meinor, Vahl, 1. c. 111-D. nummularia.

°OLMEIBOA, F. Muell. Fragm. vii. 149 (1871). *SAXIFRAGEAE.*
CMP°detoides, *F. Muell. I.* r.—Ins. D. Howe.

COLMEIROA, Reut. in Me'm. Soc. Phys. Genèv. K. U848) 240. t. 6-Seeurinega, Comm. (Euphorb.). *toxifolia,* Reut. 1. c =S. buxifolia.

CoLOBACHNE, Beanv. Agrost. 22. t. 6.19(1812) = AlopecuruB, Linn. (Gramin.).
"vhystachys, Nymi in Bot Notiser (1851) 69 - A. brachyatachys.
r^ar^A', Link, Hort Berol. i. 74~Phleum Gerardi.
*>*ttca,* Nym. in Bot. Notiser (1851) 69 = A. glacialis.
"ginata, Beauv. Agrost. 22=A. vaginatus.

COLLINSIA, Nutt. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1856) 101=subulatus.
quitensis, *Bartl. in Presl, Reliq. Haenk.* ii. 13. t 49. f. 2.—Ecuador.
saginoides, *Bartl. I. c*—Chili,
subulatus, *Hook./. Fl. Antarct.* 13.—Ins. Antarct.

COLOBANTHUS, Trin. in Me'm. Acad. P^tersb. Sér. VI. i. (1831) «6=AveUlnia, ParL (Gramin.).

COLOBATUS, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 478-COLOBOTUS, £. Mey.=Buohenroedera, £ckl. *8c* Zeyh. (Legumin.).

COLOBIUM, Roth, in Roem. Archiv, i. (1796) I. 86 = Ileontodou, linn. (Compos.).
hirtum, Roth, I. c. = L. hirtum.
hispidum, Roth, L c 37 = L. Rothii.

COLOBOGVNIUM, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) S4-8chisinatoglottis, Zoll. (Aroid.).
tecturatum, Schott, 1. c.=S. variegata.

COLOBOTUS, E. Mey. Comm. PL Aft. Anstr. 166 (1835) =Buehenroedera, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
ochreatus, E. Mey. 1. c.—Afr. austr.

COLOCASIA, Link, Diss. Bot. Suerin (1795) 77; et Handb. i. 267-Kichardla, Kunth (Aroid.).
aethiopica, Link, 11. cc.=R. aethiopica.

COLOCASIA, Neck. Elem. iii. 289 (1790) (Gen. dub. Aroidearum).

COLOCASIA, Schott, Meletem. i. 18 (1832). *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 974.
LEUCOCASIA, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii.. (1857) 34.
acris, Schott, Meletem. i. 18=antiquorum.
affinis, *Schott, in Bonplandia,* vii. (1859) 28.—Reg. Himal.
alba, Hort ex EngL in DC. Monog. Phan. ii. 501 = Alocasia alba.
argyroneura, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1876) I. 589 - Caladinm Schomburgkii.
antiqoorum, *Schott, Meletem.* i. 18.—As. trop.
Boryi, Kunth, Enum. PL iii. 41 = AlQcasia indica.
cochleata, Miq. Epim. Sem. Hort. Amstelod. (1863)-Alocasia cucullata.
cucullata, Schott, Meletem. i. 18 = Alocasia cucullata.
esculenta, Schott, 1. c. = antiquorum.
eucklora, C. Koch & Linden, in App. Sem. Hort. Bot. Berol. (1854) 4=antiquorum.
fcllax, *Schott, in Bonplandia,* viL (1859) 28.—Ind. or.
Fontanesii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 409 = antiquorum.
fornicata,Kunth, Enum. PI.iii. 41=Alocasiafomicata.
gracilis, *Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 185.—Sumatra.
Seterophylla, *Kunth, Enum. PI.* iii. 40.—Ins. Philipp.
humilis, *Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt.* 56.—Java,
indica, *Hassk. in Hoev. (f De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 160.—Java.
indica, Kunth, Enum. PI. iii. 39 = Alocasia indica.
macrorrhiza, Schott, Meletem. i. 18—Alocasia macrorhiza.
Marchalii, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 494.—Hab. ?
montana, Kunth, Enum. PI. iii. 40=Alocasia montana.
mucronata, Kunth, 1. c = Alocasia macrorhiza.
navicularis, C. Koch & Bouch6, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 13=Alocasia navicularis.
neo-gnineensis, *Andri, in Illustr. Hortic.* xxvii. (18S0) 68.—N. Guinea.
nitida, Walp. Ann. i. 1041, sphalm. = Coprosma nitida.
nymphaeifolia, Kunth, Enum. PI. iii. 87—anliquornm.
obtusiloba, *Kunth, 1. c.* 41—Hab. I
odora, Brongn. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 145. t 7 = Alocasia odora.
peregrina, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 65.—Hab. ?
prunipes, C. Koch & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) 4 = indica.
pubera, Hassk. Cat Hort Bogor. Alt. 802 - Alocasia pubera.

COLOCASIA:—
pumila, Kunth, Enum. PI. iii. 40 •> Gonatanthus sannentosus.
ramosa, Schott, ex Heynh. Norn, ii 154=Arum ramosum.
rapiformis, *Kunth, Enum. PI.* iii. 40.—Burma.
rugosa, Kunth, 1. c. 41-Alocasia cucullata.
virosa, *Kunth, 1. c.*—Ind. or.
vivipara, *Thm. Enum. PI. Ztyl.* 386.—Zeylan.
vulgaris, Rafin. Fl. Tellur. iii. 65—antiquorum.

COLOCOCCA, Rafin. Sylva Tellur. 40 (1888) - Cotdla, Linn. (Boragin.).
macrophyla, Rafin. L c—Cordia macrophylla.

COLOCYNTHIS, [Toura.] Linn. Syst. ed. I (1786); Schrad. Ind. Sem. Hort Gotting. (1838) 2; Linnaea, x. (1886) Lit. 70 = CitruUus,Neck. (Cucurbit.).
amarissima, Schrad. 11. cc = Cit. vulgaris.
officinalis, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 421-Cit. Colocynthis.
officinarum, Cogn. in DC. Monog. Phan. iiL 511, sphalm. =praec
vulgaris, Schrad. Ind. Sem. Hort Gotting. (1833) 2 =• Cit. Colocynthis.

COLOGRAXTIA, Kunth, Mim. 205. t. 57 (1823). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 529.
affinis, *Mart. &• Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1843j II. 188.—Mexic.
angustifolia, *Kunth, Mim.* 209. t. 58.—Am. bor. occ.
australis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 124.—Reg. Argent.
biloba, *Nichols. Diet. Gard.* i. 363.—Mexic.
Broussonetii, *DC. Prod.* ii. 237.—Mexic.
heteropkylla, Gill, ex Hook. Bot Misc. iii. (1833) 181 =-Galactia marginalis.
humifusa, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 47.—Mexic.
intermedia, *H. B: tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 414.—Mexic.
Lemmoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 74.—Arizona.
longifolia, *A. Gray, PL Wright.* iL 35.—Am. bor. occ.
Martia, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 345.—Mexic.
obovata, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 287.—Mexic.
ovalifolia, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 412-pulchella.
procumbens, *Kunth, Mim.* 206.157.—N. Granat
pulchella, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 413.—Am. bor. occ

COLOGYNE, Griff. Notul. iii. 280 (1861) en. typ.-Coelogyne, Lindl. (Orchid.).

COLOMANDRA, Neck. Elem. ii. 142 (1790)=Alouea, Aubl. (Uurin.).

COLON A, Cav. Ic. iv. 47. t 870 (1797) = ColumbU, Pers. (Tiliac.).
serrati/olia, Cav. I. &—Columbia americana.

COLONNA, Jaume St. Hil. Expos, ii. 96 (1806) - praec

COLONNEA, Endl. Gen. 421, in syn. (1888) - CALONNEA, Buchoz = Galllardla, Foug. (Compos.).

COLOPHONIA, Comm. ex Kuntl, in Am. Sc. Nat. Sér. I. ii. (1824) 352=Canarlum, Linn. (Burserac).
mauritiana, DC. Prod. ii. 79 = Canarium mauritianum.
tetramera, Boiv. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 27 =Commiphora tetramera.

COLPIA8, E. Mey. ex Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 53. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 931.
mollis, *E. Mey. 1. c*—Afr. anstr.

COIiPODIUM, Trin. Fnnd. Agrost. 119 (1820). *GRAM/NEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 1196.
altaicum, *Trin. in Lcdeb. Fl. Alt.* i. 100.—Sibir. alt.
aquaticum, Trin. Fund. Agrost. 186 = Catabrosk aquatica.
arundinaceum, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 288.—Am. bor.
bulbosum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 394-Catabrosa humilis.
Calverti, Boiss. Diagn. Sér. II. iv. 183-Catabrosa humilis.

COUODITJM:-
compressum, Trin. in Spieng. Neue Entdeck. ii. 58 - Sporobolus compressus.
fibrosum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1878) 486 =Catabrosa fibrosa.
filifolium, Trio, in Bull. Sc. Acad. P&erob. i. (1886; 69 =Catabrosa humilis.
fulvum, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 385 = Poa fulva.
humile, Griseb. 1. c. 884=Catabrosa hnmilis.
junceum, Trin. in Spieng. Neue Entdeck. ii. 37 = Sporobolus jnnceus.
latifolium, *R. Br. in Parry, 1st Voy. Suppl.* p. clxxzvi. —Reg. arct
Malmgrenii, *Anderss. in Ofvers. Vet. Akad. Stockh.* xziii. (1866) 121.—Ins. Spitzberg.
minutom, *Steud. Syn. PI. Gram.* 177.—Hispan.
monandrum, Trin. Fund. Agrost. 119 - Phippsia algida.
parviflorum, Boiss. & Buhse, Diagn. Sex. II. iv. 133 = Catabrosa parviflora.
pauciflornm, *Hook. Fl. Bar. Am.* ii. 238.—Am. bor.
pendulinum, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 886 = Poa Laestadii.
pusillum, *Nees, Fl. Aft. Austr.* 149.—Afr. anstr.
Steveni, Hohen. in Ball. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 213 = Catabrosa hnmilis.
Steveni, *Trin. Fund. Agrost.* 119. t. 7.—Reg. Caucas.
Tilesii, *Griseb. in Ledeb. Fl. Ross.* iv. 386.—Sibir. or.
variegatum, *Boiss. ex Griseb. I. c.* 384, in textn.—As. Mm.
violaceum, *Griseb. 1. c.*—Persia.

COLPOOW, Berg. Desc. PI. Cap. 38. t. 1 (1767). *SANTALACEAB,* Bentb. & Hook. f. iii. 225.
FUSANUS, Murr. Syst. ed. XIII. 765 (1774).
HAMILTONIA, Harv. Gen. PI. Cap. ed. L 298 (1888).
RKOICARPOS, A. DC. Prod. xiv. 634 (1857).
compressnm, *Berg. Desc. PI. Cap.* 38—Afr. austr.

COLPOTHRINAX, Griseb. & H. Wendl. in Bot. Zeit. xxxvii. (1879) 147. *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook, f. iii. 927.
Wrightii, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 241.—Cuba.

COIiQXTHOUNIA, Wall, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 608. *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1208.
coccinea, *Wall. 1. c.* 608.—Reg. Hirnal.
elegans, *Wall. PI. As. Rar.* i. 65.—Burma.
mc-Tlis, *ScMeckt. in Linnaea,* zziv. (1861) 681.—Reg. Himal. t
tenuiflora, *Hoot./. Fl. Brit. IndAv.* 674.—Burma.
tomentosa, Houll. in Rev. Hortic. (1873) 131 =coccinea.
vestiu, *Wall. Tent. Fl. Nep.* i. 14.—Reg. Himal.

COLSMANNIA, Lehm. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. viii. (1814) 92. t. 4-=OnoBma, Linn. (Boragin.).
fiava, Lehm. 1. c = 0 . flavum.

COLTJBRINA, Rich, ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Se>. I. x. (1827) 368. t. 15. f. 3. *RHAMNEAE,* Benth. & Hook. f. i. 379.
DIPMSCA, Rafin. SylvaTellnr. 31 (1838).
MARCORELLA, Neck. Elero. iii. 122 (1790).
TOBANTHERA, Comm. ex DC. Prod. ii. 30 (1825).
acnminata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 84.—Cuba.
Alamani, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 87.—Mexic.
americana, Nutt. Sylva, ii. 68 -= ferruginosa.
asiatica, *Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. x. (1827) 369.—As. et Afr. trop.
buxifolia, Schlecht. in Linnaea, xv. (1841) 468 = Ceanothns buxifolius.
celtidifolia, *Schlecht. 1. c.* 471.—Mexic.
cordifolia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. J. 98.—Bras.
cubensis, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sèr. I. x. (1827) 369=Ceanothus cubensis.
Ehrenbergii, *Schlecht. in Linnaea,* xv. (1841) 469.—Mexic.
excelsa, Fenzl, in Ennm. PI. Hueg. 20=Alphitonia excelsa.
fermenta, *Rich, ex Brongn. in Ann. Sc. Nat.* S6r. I. x. (1827) 369.—Guiana,
fenuginosa, *Brongn. 1. c.*—Am. bor.
glomerata, *Hemsl. Biol. Centr.Am. Bot.* i. 200.—Mexic.
granulosa, *Brongn, in Ann. Sc. Nat.* Sir. I. x. (1827) 369.—Mexic.
Greggii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 336.—Am. bor. occ.
guineensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 37=Chailletia toxicmriat

COLUBRINA :—
infesta, Schlecht. in Linnaea, xv. (1841) 468 = Adolphia infesta.
javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 648=asiatica.
Leschenaultii, G. Don, Gen. Syst. ii. 87-asiatica ?
macrocarpa, G. Don, 1. c 86 = Ceanothns macrocarpas.
Mociniana, G. Don, 1. c-Ceanothus Mocinianus.
mystacina, G. Don, 1. c. 37 -Helinus scandens.
nepaulensis, G. Don, 1. c. 86 = Rhamnus nepaulensis.
oppositifolia, *Brongn. ex H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 161.—Ins. Sandvic.
pubescens, G. Don, Gen. Syst. ii. S6=Ceanothus pubescens.
pubescens, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 301.—Burma.
pubiflora, G. Don, Gen. Syst. ii. 87 = Zizyphus pubiflorus.
reclinata, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 869=Ceanothns reclinatus.
rufe, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 98.—Bras,
texensis, *A. Gray, inBost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 169.—Texas.
travancorica, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 43.—Ind. or.
triflora, *Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. z. (1827) 369.—Mexic.
triquetra, G. Don, Gen. Syst. ii. 37=Rhamnus triquetra.
vitiensis. Seem. Syst. List Vit. PI. 4»Rhamnns vitiensis.

COLUMBARIA, J. & C. Presl, Fl. Čech. 32 (1819) = Scabiosa, Tourn. (Dipsac).
canescens, J. & C. Presl, 1. c. = S. suaveolens.
crenata, Presl, ex Stead. Norn. ed. II. i. 398=S. crenata.
glabrescens, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 401 = S. lucida.
gramuntea, Fourr. L c = S. gramnntea.
minor, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PI. ii. 476 = S. Columbaria.
norica, J. *Sc* C. Presl, Fl. Čech. 82=S. lncida.
ochroleuca, J. *Sc* C. Presl, 1. c.=_S. ochroleuca.
patens, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 401=S. Columbaria.
pratensis, Fouir. 1. c.=Knautia arvensis.
rubella, Opiz, ex Stend. Nom. ed. II. i. 898 =S. Columbaria.
suaveolens, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 401=S. suaveolens.
tenuisecta, Fourr. 1. c. =S. gramuhtia.
vulgaris, J. *Sc* C. Presl, Fl. Čech. 32=S. Columbaria.

COLUMBEA, Salisb. in Trans. linn. Soc. viii. (1807) 817-Araucaria, Jnss. (Conifer.).
angustifolia, Bertol. in Bologn. Opusc Sc iii. (1819) 411=excelsa.
angustifolia, Raddi, ex Steud. Nom. ed. II. i. 398-A. brasiliana.
Bidwilli, Carr. Conif. ed. II. 601-A. Bidwillii.
brasiliensis, Carr. 1. c 698=A. brasiliana.
excelsa, Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 215 = A. excelsa.
imbricata, Can. Conif. ed. II. 598 = A. imbricata.
quadrifaria, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii (1807) 317=A. imbricata.

COLUMBIA, Pen. Syn. ii. 66 (1807). *T1UACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 283.
COLONA, Cav. Ic. iv. 47. t. 870 (1797).
americana, *Pers. Syn.* ii. 66.—Ins. Pbilipp.
Anilao, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 654.—Ins. Philipp.
Blancoi, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 808. —Ins. Philipp.
celebica, *Blume, Bijdr.* 117.—Ins. Celebes.
fioribunda, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. t. 312 = Blancoi.
floribunda, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 63.—Burma,
gamosepala, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 57S.—Hab. *1*
inaequilatera, Tnrct. 1. c. xxxi. (1868) I. 233-semtifolia.
javanica, *Blume, Bijdr.* 117.—Java,
mergnensis, *Planch, ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 394.—Burma.
serratifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 427 = Grewia columnaris.
serratifolia, *DC. Prod.* i. 512.—Ins. Philipp.

COLUMELLA, Comm. ex DC. Prod. i. 448, in syn. (1824)=Pavonia, Cav. (Malvac.).
Malvinda, Comm. ex DC. 1. c. = P. Colnmella.

COLUMELLA, Lour. Fl. Cochinch. i. 85 (1790)-Vitla, Linn. (Ampelid.).
pedata. Lour. I. c. 86=V. cochinchinensis.

COLUMELLA, Vahl, Ennm. i. 300 (1805) = ColUmellia, Ruiz *Sc* Pav.

COLUMELLA, Veil. Fl. Flnm. 156 (1825); iv. t. 17» Pisonia, Linn. (Nyctagin.).
rustica, Veil. 1. c. =P. subcordata.

COLUMELLEA, Jacq. Hort. Schoenbr. iii. 28. t. 801 (1798)=Nestlera, Spreng. (Compos.).
biennis, Jacq. 1. c. 29=N. biennis.

COLUMELLIA, Ruiz & Pav. Prod. 8. t. 1 (17N)*-*COLUMELLIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 989.
ULUXIA, JUSS. in Diet. Sc. Nat. x. 103 (1818).
arborescens, Pers. Syn. i. 13=oblonga.
frutescens, Pers. 1. c.=oblonga.
oblonga, *Ruit* b" *Pav. Fl. Per. i.* 28.—Peruv.
obovata, *Ruia V Pav. I. c.*—Peruv.
sericea, *H. B.* b[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 388.—Ecuador.

COLUMNEA, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 878 (1737)-*GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ij. 1009.
APONOA, Rafin. fcylva Tellur. 84 (1888).
COLLANURA, Lem. in Fl. des Series, iii. (18*7) t. 223.
DALBERGARIA, Tussac, FL Antill. i. 141. t (1808).
EUSYNETRA, Rafin. Fl. Tellar. ii. 57 (1886).
GLYCANTHES, Rafin. Sylva Tellur. 83 (1838).
ORTHOLOMA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 209.
PENTADENIA, Hanst. 1. c 211 (1853).
STENANTHUS, Oerst. ex Hanst. 1. c 209 (1853).
STYGNANTHK, Hanst. 1. c. (1858).
acuminata, *Benth. PI. Hartw.* 281.—N. Granat.
anisophylla, *DC. Prod,* vii 542.—Am. austr.
argentea, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 465.—Ind. occ.
aurantiaca, *Decne. ex Planch, in Fl. des Serres,* (1850-61) 45.—Reg. Andin.
aurea, *Ware*, in Otto V Dietr. Allg. Garten:* (1845)258.—N. Granat. t
aureonitens, *Hook. Bot. Mag.* t. 4294.—N. Granat.
balsamea, Roxb. Hort. Beng. 47; Fl. Ind. iii. 87 Iimnophila gratioloides.
bilabiata, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 186.—Panama.
Billbergiana, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stock*.* 1854 (1856) 185.—Panama.
campanulata, *Benth. PI. Hartw.* 282.—N. Granat.
capitata, Walp. Rep. vi. 405, sphalm. = Besle"* capitata.
coccinea, Hort. ex Hanst in Linnaea, xxxiv. (1865-W 406='rotundifblia.
cochinchinensis, Poir. Encyc. Snppl. ii. 815(=/>«« *cochinchinensis).*—Cochinch.
consanguinea, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-»«/ 888.—Costa Rica.
crassifolia, *Hook. Bot. Mag.* t. 4380.—Mexic.
divaricata, Walp. Rep. vi. 405, sphalm. = Beslen* divaricata.
diffusa, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 277-Torenia vagans.
erecta, Lam. Encyc. ii. 66=Achimenes coccinea.
eriantha, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1885-66) 891—Ecuador.
erythrocalyx, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. (1861) 183=querceti.
erythrophaea, *Decne. ex Houll. in Rev. Hortic.* (1 887; 172.-Mexic
erythrophylla, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-0°.' 389.—N. Granat.
flaccida, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 186.—Panama,
flava, *Mart. &• Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. (1842) 39.—Mexic.
gUbra, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1881) I —Costa Rica.
grandiflora, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. 414 = Nematanthus longipes.
guttata. *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* &• erav.
henkelioides, Spreng. ex Heynh. Nom. Streplocarpus Rexii.

COIiUMITBA:—
heterophylla, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 390.—Costa Rica.
heterophylla, Roxb. Hort. Beng. 47; Fl. Ind. iii. 97 = Liumophila heterophylla.
hirsuta, Klotasch, ex Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 185=hirta.
nrsuta, *Sw. Prod. Veg. Ind. Oce.* 94.—Jamaica,
birta, *Klottsch V Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 403.—Costa Rica.
nupida, *Sw. Prod. Veg. Ind. Oce.* 94.—Jamaica,
numilis, *Lam. ex Steud. Norn.* ed. I. 213; ed. II. i. 899.—Hab.?
maequilatera, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 1.—Peruv.
Kalbreyeri, Hook. f. Hot. Mag. t 663S = Kalbreyeriana.
Kalbieyeriana, *Mast, in Gard. Chron.* (1882) I. 44 217.-N. Granat
Kienastiana, *Hegel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 274.—N. Granat.
«bellosa, *Kant. Fl. Columb.* ii. 105. t. 154.—N. Granat.
lepidocaula, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 411.—Costa Rica.
undleyana, *Pasq. Cat. Orto Bot. Nap.* 81.—Hab.1
"nearis, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V, v. (1861) 138.-Costa Rica.
'ongepedunculata, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 414 = Nematanthus longipes.
longi/olia, Linn. Mant. 90=Artanema sesamoides.
lucida, Walp. Rep. vi. 405, sphalm. = Besleria lucida.
macrantha, *Benth. PI. Hartm.* 282.—Ecuador,
•nagnifica, *Klottsch (f Hanst. ex Oerst. in Vidensk. Selsk. Sir.* V. v. (1861) 134.—Costa Rica,
""•jor, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 388.—N. Granat.
"njcrocalyx, *Hanst. 1. c.* 408.—Costa Rica.
n»crophyll$_a$, *Klottsch V Hanst. ex Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 137.—Costa Rica.
m»»or, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 887.—N. Uranat.
"»»«<«, Roxb. Hort. Beng. 47 ; Fl. Ind. iii 98 = Vandellia scab™,
n.oeta, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 1.1. 206.—Peruv.
ner.os *Klottsch V Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-.6«)400.-CostaRica.
guensis, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 136—Nicaragua.
ochrol euca, *Klottsch V Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 39S.-Costa Rica.
"Mstediana, *Klottsch, ex Oerst. in Vidensk. Selsk. Sir.* V. v. (18611 135.—Costa Rica.
r™w. *Cav. Ic.* iv. 62. t. 891.—Ins. Chiloe.
ox yphyll$_a$, *Hanst.in Linnaea,* xxxiv, (1865-66) 405.—*-osta Rica.
Pf d.nla, *Klottsch tf Hanst. 1. c.* 8»7.-Costa Rica.
Pj«unchensis, *Hanst. 1. c.* 898.—Ecuador.
P)«a. *Karst. Fl. Columb.* ii. 105. t. 154.—N Granat.
f'»sa, Lem. fa Fl. des Serres, iii. (1847) t. 223 = aureonitens.
prnete *Hanst. in Linnaea* xxxiv (1865-66) 394.—Costa Rica.
purpurata Hansi '• e- 886.—Costa Rica,
querceti, *Owst • in vidensit Selstm s i r* v; v. (1861) 138.-Costa Rica.
™£ 1 ff!"-*"» *Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 396.—Costa Rica.
2£«". Rafin. Sylva Tellur. 84=scandens?
rena, *Regnl, in Act Hort Petro* p-*"; (1883) 273.—N.G renat.
jotnndifolia, *Salisb. Parad. Land.* t. 29.—Ins. Trinit
utilans, *Sw. Prod Ve e- Ind. Oce.* 94.—Jamaica.
sanguinea, *Hans* *** *Linnaea* *** (1865-66) 384.—Ins S. Dc g.
sangu nolent r j J w /. *c.* 389.-Costa Rica.
scabrosa, Soland. ex DC. Prod. ix. 277 - Rhabdothamnus scabrosus.
scanden Stockl B «lb- ex Beurl. fa Vet. Akad. Handl 18 M (1856) 136=Billbergiana.
jens Linn, S P- Pl 888.—Am. austr.
vi(il?? rsuta Scoott. ex Hanst, fa Mart. FL Bras.
S*i i*r - Codonanthe Hookeru.
Mexie. *SchUcHt- in Linnaea,* viii. (1833) 249.-
serrata, *Hanst.* Linnaea, xxxiv. (1865-66) 8»0.—Costa Rica.

COLUMNEA:—
speciosa, Presl, BoL Bemerk. 145 = rotundifolia.
speciosa, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 399-Rytidophyllum prasinatum.
splendens, Paxt. Mag. Bot. x. (1843) 5=Nematanthus longipes.
stellata, *Lour. Fl. Cochinch.* 884.—Cochinch.
strigosa, *Benth. PI. Hartw.* 282.—N. Granat.
tenuis, *Klottsch, ex Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V.* v. (1861) 137.—Costa Rica,
tincta, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 626.—Ins. Cuba,
tomentosa, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 138.—Nicaragua.
tomentosa, Roxb. Hort. Beng. 47; FL Ind. iii. 98 = Mazns rogosus.
trifoliata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 145-Stemodia trifoliate:
nmbellata, *Bertol. Fl. Guatim.* '26.—Guatemala.
vestita, Hanst. fa Linnaea, xxxvi. (1865-66) 892 = Warszewicziana.
viilosa, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 43 = scandens.
violacea, Jacq. C ex Stead. Nom. ed. II. L 899 = Stemodia trifoliata.
Warscewicziana, *Klottsch If Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 892.—Costa Rica.
Wendlandiana, *Hanst. 1. c.* 402.—Costa Rica.
Wullschlaegeliana, *Hanst. I. c.* 414.—Jamaica.
tebrina, Hort. ex Lond. Encyc. PI. SuppL ii. 1402-Alloplectus dichrons.

COLUPPA.Adans. Fam. ii. 268 (176S) = Oomphrena, Linn. (Amarantac).

COIiUBIA, R. Br. in Parry, Voy. App. 276 (1823). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. L 619.
LAXMANNIA, Fisch. ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 262 (1880).
geoides, Ledeb. FL Alt. ii. 263'potentilloides.
mongolica, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 466.—As. or.
potentilloides, *R. Br. in Parry, 1st Voy. Suppl.* p. eclxxvi.—Sibir.

COLUS, Raeusch. Nom. ed. III. 17i (1797) = Coleus, Lour. (Labiat).

COLUTEA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *LEGUMWOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 505.
aescbinomenoides, *Scop. Delia. Insui.* iii. 22. t. 12.—Ins. Baham.
alpina, Lam. Encyc. i. 354 - Astragalus alpinus, membranaceus*
americana, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Mexic
annua, Murr. in Nov. Comm. Gottfag. 1774 (1775) 40 =halepica.
aperta, Moench, Verz. 24 = orientalis.
arborescens, *Linn. Sp. PI.* 723.—Europ.; Oriens.
arenaria, Poir Encyc. Suppl. i. 562=Astragalus chorinensis.
armena, *Boiss. tf Huet. Diagn.* Sér. II. v. 83.—Armenia.
astragalina, Poir. Encyc Suppl. i. 661=Astragalus alpinus.
australis, Lam. Encyc. i. 854--Astragalus australis.
baetica, Poir, Encye. SuppL i. 661 = Astragalus lusitanicus.
bievialata, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.* (1861) 80.—Hab.?
caspica, Bieb. FL Taur. Cauc. ii. 169=Sphaerophysa salsula.
cilicica, *Boiss. V Bed. Diagn.* Sér. It v. 83.—CiUcia.
cruenta, *[Dryand. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I. lii. 55.—Reg. Caucas.
davurica, Spreng. Syst. iii. 242 = Sphaerophysa salsula.
excisa, Thnnb. Prod, PI. Cap. 184 = Lessertia excisa.
fistulosa, Retz. Obs. iii. 40 «= Lessertia perennans.
floribunda, Poir. Encyc. Suppl. i. 662=Sesbania vesicaria.
fiorida, Salisb. Prod. 387 » arborescens.
frigida, Poir. Encyc. Suppl. i. 561 = Astragalus frigidus.

COLUTEA :—
frutescens, Linn. Sp. PI. 72S=Sntherkndia frutescens.
galegifblia, Sims, Bot. Mag. t. 792 = Swainsona galegifolia.
glabra, Poir. Encyc Suppl. i. 561 = Astragalns australis.
grandiflora, Salisb. Prod. 338 = Sutherlandia frutescens.
halepica, *Lam. Encyc.* i. 353.—Arab.; Abyssin.
halicacaba, Poir. Encyc. Suppl. i. 662 = Astragalus Vulneraria.
herbacea, Linn. Sp. PI. 728—Lessertia linearis.
hirsuta. Roth, Tent. FL Germ. i. 805=arborescens.
humilis, Scop. Delic. Insub. ii. 28=orientalis.
incana, Poir. Encyc. Suppl. i. 562 = Astragalus anthylloides.
istria, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = halepica.
linearis, Thunb. Prod. PI. Cap. 185 = Lessertia linearis.
media, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 771.—Hab. 1
melanocalyx, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. ix. 86 - arborescens,
microphylla, Delile, Ind. Sem. Hort Monsp. (1847) 7 =halepica.
nepalensis, Sims, Bot. Mag. t. 2622=arborescens.
Novae-Hollandiae, Walp. Ann. ii. 368 = Clianthus Dampieri.
obtusata, Thunb. Prod. PI. Cap. 134 - Lessertia obtnsata.
orientalis, Lam. Encyc. i. 353=cruenta.
pallida, Salisb. Prod. 837 = halepica.
Perennans, Jacq. Enum. Vindob. App. 311=Lessertia perennans.
persica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 33.—Persia.
Pocockii, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 66 = halepica.
procumbens. Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 7=Lessertia procumbens.
prostrata, Thunb. Prod. PI. Cap. 134=Lessertia prostrata.
pubescens, Thunb. 1. c. = Lessertia pubescens.
rigida, Thunb. 1. c.=Lessertia fruticosa.
rubra, Medic. Beobacht (1782) 859=arborescens.
salsola, Poir. Encyc. SuppL i. 562 = Sphaerophysa salsula.
sanguinea, Pall. Fl. Ross. ii. 88=cruenta.
spinosa, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 181 = Astragalus Russellii.
tomentosa, Thunb. Prod. PL Cap. 136 = Lessertia tomentosa.
triftora, Poir. Encyc. Suppl. i. 662=Astragalus trifloras.
trifoliata, Poir. 1. c. *{^Phaca trifoliata).*—China,
triphylla, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 196.—Persia.
vesicaria, Thunb. Prod. PI. Cap. 185= Lessertia vesicaria.
versieolor, Salisb. Prod. 337=cruenta.
Wightiana, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 399 = Sutherlandia frutescens.
wolgarica, Lam. Encyc. i. 353=Calophaca wolgarica.

COLUTEOCARFUS, Boiss. fa Ann. Sc. Nat. *Ut.* II. xxii. (1842) 162. *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. 178.
LAGOWSKIA, Trautv. in Ball. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xvi. (1858) 321.
reticulatus, *Boiss. I. c.*—As. Min.

COLUTIA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 366 = Sutherlandia, R. Br. (1812) (Legumfa.).
amoena. Medic. 1. c. = S. frutescens.
frutescens, Medic. Phil. Bot. i. 210 = S. frutescens.
rubra, Moench, Meth. 160=S. frutescens.

COLVXLLEA, Boj. ex Hook. Bot. Mag. tt. 8325, 8326 (1834). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. *I* i.669.
racemosa, *Boj. I. c.*—Madag.

COLYMBADA, Hill, Veg. Syst iv. 31 (1762) = Centaurea, Linn. (Compos.).
centauroides, Hill, Hort. Kew. 65-Cent Rhaponticum.
sicula, Hill, 1. c-Cent, sicula.

COLYMBEA, Stead. Norn. Bot. ed. II. i. 399 (1840) ~COLUMBEA,Salisb.=Araucaria,Juss. (Conif.).

COLYRIS,Endl.Gen. 596 (1838) =COLLYRIS, Vahl = Dlaohldla, R. Br. (Asdepiad.).

COLYTHRUM, Schott, Rutac. 13. t. 7 (1884)=JBsenboofcia, Kunth (Rutac).
febrifugum, Schott, 1. c. 14 = E. febrifuga,
grandifiorum, Steud. Nom. ed. II. i. 899 - E. grandiflora.
latifolium, Schott, Rutac. 14 =E. pumila.
maurioides, Schott, 1. c = E. maurioides.
puberulum, Schott, 1. c. 13. t. 7.—Bras.
pumilum. Schott, 1. c. 14 = E. pumila.

COMACEPHALUS, Klotzsch, in Linnaea, zii. (1838) 224-Gtrlsebachia. Klotzsch (Ericac).
incurvus, Klotzsch, 1. c.—Air. ausir.

COMACLINIUM, Scheidw. & Planch, in Fl. des Serres, viil. (1852) 19. t. 756 = Dyaodia, Cav. (Compos.).
aurmtiaeum, Scheidw. & Planch. 1. c = D. grandiñotn.

COMACUM, Adans. Fun. li. 845 (1763) .= Myristioa, Linn.

COMANDBA, Nutt. Gen. Am. i. 167 (1818). *SANTALACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 224.
HAMILTONIA, Spreng. Syst. i. 831 (1825), pro parte.
cuneifolia, Rafin. NewFl. Am. ii. 83=umbellata.
Darbya, *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 687.—Am. bor.
elegans, *Reichb.f. Ic. Fl. Germ.* xi. 11. t 647. f. 1162. —Europ. or. austr.'
elliptica,Knfin. New Fl. Am. ii. S3=umbellata.
livida, *Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. App.* 734. —Am. bor.
media, Rafin. New Fl. Am. ii. 33=umbellata.
obovata, Rafin. 1. c.=umbellate.
obtusifolia, Rafin. 1. c.« umbellata.
pallida, *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 686.—Am. bor.
rigida, Stend. Nom. ed. II. i. 399 = livida.
umbellata, *Nutt. Gen. Am. i.* 157.—Am. bor.
umbellulata, Rafin. New Fl. Am. ii. 83=praec.

COMABTTHOSPHACE, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 298. *LABI ATAE.*
barbinervis, *S. Moore, 1. e.*—Japon.
japonica, 5. *Moore, 1. c.*—Japon.
stellipila, 5. *Moore, 1. c.*—Japon.
sublanceolata, 5. *Moore, I. c.*—Japon.

COMAROPSIS, Rich, in Nestl. Monog. Potent. 16. t. 1 (1816)=Waldsteinia, Willd. (Rosac).
Doniana, Ser. in DC. Prod. ii. 558-W. fragarioides.
fragarioides, Ser. 1. c. = W. fragarioides.
pedata, Ser. 1. c. = Rubus pedatus.
radicans, Ser. 1. c.=Rubus radicans.
sibirica, Ser. 1. c.-W. sibirica.

COMAROSTAPHYLIS, Zucc. in Abh. Akad. Muench. ii. (1837) 331 = ArctO8taphylOB, Adans. (Ericac).
angustifolia, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 74 - A. angustifolia.
arbutoides, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 30=A. arbutoides.
arguta, Zucc. in Linnaea, xii. (1838) Litt. 86 = A. arguta.
attenuata, Klotzsch, 1. c. xxiv. (1851) 75=A. attenuata.
bicolor, Klotzsch, 1. c. 78 = A. bicolor.
formosa, Lem. in Illustr. Hortic. v. (1858) sub t 162 — Pieris formosa.
glauca, Buckl. in Proc. Acad. Sc Philad. '1861' (1862) 461 = Arbutus Menziesii.
glaucescens, Zucc. ex Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 76-A. glaucescens.
Hartwegiana, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 77 = A. Hartwegiana.
lati/olia, Klotzsch, 1. c 76.—Mexic.
longifalia, Klotzsch, 1. c. 75 = A. longifolia.
mucronata, Klotzsch, 1. c. 77 - A. mucronata.
mucroni/era, Klotzsch, 1. c. 76 — A. mucronifero.
oaxacana, Klotzsch, 1. c. 77=A. oaxacana.
polifolia, Zucc. ex Klotzsch, 1. c. = A. polifolia.
rubescens, Klotzsch, 1. c—A. rubescens.

COMAROUNA, Carr. in Rev. Hortic. (1873; 232 = COUMAROUNA, Aubl. = Dipteryx, Schreb. (Legumin.).

COMARUM, Linn. Syst. ed. I (1736) - Fotentffla, Linn. (Rosac).
angustifolium, Rafin. Fl. Tellur. ii. 56 - P. Comarum.
digitatum, Rafin. 1. c.=P. Comarum.
flamtm, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 39 ; Fl. Ind. ii. 621 = P. supina.
fragarioides, Roth, Tent Fl. Germ. ii. 577 = P. Fragariastrum.
palustre. Linn. Sp. PI. 602=P. Comarum.
rubrum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 255 = P. Comarum.
Salessowii, Bunge, Del. Sem. Dorp. (1839) 8.—Cf. Linnaea, xiv. (1840) Lit. 119 = P. Salessoviana.
supinum, Alef. in Bot. Zeit. xxiv. (1866) 262=P. supina ?

COMASPERMUM, Pers. Syn. ii. 276 (1807) = Comesperma, Labill. (Polygal.).

COMATOCROTON, Karat, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1859) 6 = Croton, Linn. (Euphorbiac.)
•*ovalifolia,* Karst. 1. c.=C. ovalifolius.

COMATOGLOSSUM.Karst. & Triana,in Linnaea, xxviii. (1856) 436 = Talisia, Aubl.? (Sapindac.
strictum, Karst. & Triana, 1. c. 437.—N. Granat.

COMBESIA, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 307 (1847) = Tillaea, Linn. (Crassulac).
abyssinica, A. Rich. 1. c. = T. pharaaceoides.
Schimperi, Schweinf. in Beitr. Fl. Aethiop. 80 - T. pentandra.

COMBBETOCARPTTS, Hook. f. in Benth. & Hook, f. Gen. i. 683 (1865). *RHIZOPHOREAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
Motleyi, *Hook.f. I. c*—Borneo.

COMBRETUM, Linn. Gen. ed. I. App. 308 (1737). *COMBRETACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 688.
AETIA, Adans. Fam. ii. 84 (1763).
BUREAVA, Baill. Adansonia, i. 71 (1860).
CALOPYXIS, Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. vi. (1866) 86.
CHKYSOSTACHYS, Pohl, PI. Bras. ii. 65. t. 143 (1831).
CRISTARIA, Sonner. Voy. Ind. iii. 284 (1782).
EMBRYOGONIA, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. ii. 122 (1854).
FORSGARDIA, Veil. Fl. Flum. 152 (1825); iv. 1.18 (1827).
GOKOCARPUS, Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 39 (1825).
PEVKAEA, Comm. ex Jnss. Gen. 320 (1789).
POIVREA, Comm. ex Thou. Obs. PL Afr. Austr. 28 (1806).
SEGUIERA, Reichb. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 424 (1871).
SCHEADENDRON, Bertol. f. in Mem. Ace. Sc. Bologn. ii. (1850) 672.
SHEADENURON, Bertol. f. 1. c. t. 40 (1850).
THILOA, Eichl. in Flora, xlix. (1866) 149.
accedens, *Heurck & Muell. Arg. in Heurck,Obs. Bot.* 234.—Guiana.
aculeatum, *Vent. Ckoix,* 68.—Afr. trop.
acuminatum, *Roxb. Hort. Beng.* [28] ; *Fl. Ind.* ii. 228. —Ind. or.; Malaya,
acutum. *Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 424.—Afr. trop.
adenogonium, Steud. ex A. Rich. Tent FL Abyss, i. 266 = reticulatum.
adenophyllum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 1 = Jacquini.
Aftflii, G. Don, in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 487 = grandiflorum.
Afselii, Hort. ex A. Juss. in Walp. Rep. v. 388= Hiraea Wiedeana.
albidum, G. Don, in Trans. Linn. Soc xv. (1827) 429 = ovalifolium.
album, Pers. Syn. i. 411 = decandrum.
Alfredi, *Nance, in Journ. Bot.* ix. (1871) 181.—China.
alternifolium, Herb. Madr. ex Wight & Am. Prod. 317 = Lumnitzera racemosa.
alternifolium, *Pers. Syn.* ii. 412.—Panama.
alternifolium, Spreng. Syst. ii. 831-aculeatum.

altum, *Guill. (f Perr. ex DC. Prod.* iii. 20.—Afr. trop.
anfrectuosum, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 8. —Bras,
angolense, *Welw. ex Lavs, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* H. 428.—Afr. trop.
anisopterum, *Welw. ex Laws. 1. e.* 429.—Afr.'trop.
apetalum, *Walt. Cat.* n. 3990.—Burma,
apiculatum, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 45.—Afr. austr.
arboreum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. 3at.* iv. 116.—Malaya.
argenteum, Bertol. Fl. Guatimal. 12—erianthum.
argyrotrichum, *Welw. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 432.—Afr. trop.
assimile, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 109.—Bras.
attenuatum, Wall. Cat. n. 3989=uoadrangulare.
Aubletii, *DC. Prod.* i. 19.—Guiana,
aurantiacum, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 222.—Guiana.
auratum, Steud. Nom. ed. II. i. 40O=seq.
aureum, *Wall. Cat.* n. 8988.—Burma,
barbatum, *Newm. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 187. —Bras.
bellum, Steud. Nom. ed. II. i. 400=trifoliatum.
Benthamianum, *Heurck V Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 220.—N. Granat.
Binderianum, *Kotscky, in Sittb. Wien. Akad.* li. *Abth.* II. (1865) 863.— Afr. trop.
Blanchetii, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 114.—Bras.
bracteatum, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 4009 - decandrum.
brevistylum, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 118.—Bras.
Bugi, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 247- «• 130=Jacquini.
butyrosum, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. vi. (1856) 87, in nota.—Afr. trop.
capituliflorum, *Fend, ex Schweinf. in Reliq. Kotsch.* 33.—Afr. trop.
celastroides, *Welw. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 422.—Afr. trop.
chinense, *Roxb. Hort. Beng.* [28]; *Fl. Ind.* ii. 230.—As. trop.
chrysophyllum, Guill. *8c* Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 289 =• tomentosum.
coccineum, *Lam. Encyc.* i. 734.—Madag.; Ins. Maurit.
collinum, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 153.—Abyssin.
comosum, *G. Don, in Edinb. Phil. Journ.* (1824) 344. —Afr. trop.
confertum, *Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 422.—Afr. trop.
constrictum, *Laws. I. c.* 423.—Afr. trop.
cordatum, *G. Don, in Trans. Linn. Soc.* xv. (1827) 440.—Ins. S. Doming.
corylifolium, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 711.—Ind. occ.
corymbosum, Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guio- PL 185 = racemosum.
costatum, Roxb. Hort. Beng. [28] j Fl. Ind. iL 227- acuminatum.
cuspidalum, *Planch, ex Benth. in Hook. Niger Fl.* 840.—Afr. trop.
cyclophyllum, Steud. Nom. ed. II. i. 400=extensum.
dasystachyum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* »TU- (1874) II. 187.—Reg. Himal.; Burma.
decandrum, Jacq. Enum. PL Carib. 19=alternifoUun≥.
decandrum, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 66o = Pavonii.
decandrum, *Roxb. PI. Corom.* i. 48. t. 59.—Ind. <"•• Burma.
dipterum, *Welw. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* "• 429.—Afr. trop.
distillatorium, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 295-oW1' folium.
Duarteanum, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras- Mer.* »• 248—Bras.
elaeagnifolium, Planch, in App. Speke, Journ. Disc. Nile, 684 « collinum.
elaeagnoides, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb-»°i,* 73.—Afr. trop. -IT--
elegans, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* Ii. >*'• Bras.
elegans, H. R & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 109. t 688 Aubletii.

COMBBETUM:-

elegans, Wall. Cat. n. 4008=trifoliatum.
erianthum, *Benth. PI. Hartw.* 78.—Guatemala,
enopetalum, *G. Don, Gen. Syst.* ii.665.—Ins.S. Doming,
erythrophyllum, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 43.—Afr. austr.
extensum, *Roxb. Hort. Beng.* [28] ; *Fl. Ind.* ii. 229.—Ind. or.; Malaya,
fcrinosum, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 110.—Mexic.
fenugineum, *G. Don, in Trans. Linn. Soc.* xv. (1827) 440.—Am. austr.
ferrugineum, Hoffmgg. ex Walp. Rep. ii. 65 = Jacquini.
/"rrugineum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 267=trithanthum.
"agrocarpum, *Herb. Cole, ex C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 466.—Ind. or.; Burma,
noccosum, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. H. 119.— Bras,
'ormosum, *G. Don, in Trans. Linn. Soc.* xv. (1827) 420.—Bras.
Mmosum, Griff. Notul. iv. 682=extensnm.
"angulaefolium, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 109.—Venezuela,
fascnm, *Planch, ex Benth. in Hook. Niger Fl.* 339.— Afr. trop.
gallabatense, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* Gewin. (1868) 664.—Afr. trop.
iw?*"[illegible] *& Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 228—Bras.
glabrum, *DC. Prod.* iii. 19.—Guiana,
glaucocarpum, *Mart, in Flora*, xxiv. (1841) II. *Beibl.* 3.—Bras,
glomeruliflorum, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 42.—Afr. austr.
[illegible]tinosum, *Guill. &• Perr. Fl. Seneg. Tent.* 288. t. 68. Afr. trop.
Goldieanum, *F. Muell. Desc. Papuan Pl.* iv. 66.— N. Guinea.
gracile, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *App.* 406.—Bras,
pandiflortim, *G. Don, in Edinb. Phil. Joum.* (1824) 846—Afr. trop.
Gnffithi, Heurek & MueL Arg. in Heurck, Obs. Bot. 281-chinense..
^ *J*, *Sond. in Linnaea*, xxiii (1850) 48.-Afr. austr.
Aubletii.
H»rtmannianum, *Schweinf. Beitr. Fl.Aethiop.* 24. t. 3. Afr. trop.
[illegible] *Don* *« *PM- Joum.* xi. (1824) 047.—Afr. trop.
Vneanum, Wall. Cat. n. 4001 = ovalifolium.
Dietr. Syn. PI. ii 1803.—Bras.
PWum, *Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 421.— Afr. troD.
«»n>, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 44.—
Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 609 = extensum.
Wawra, in Sittb. Acad. Wien, Math^Nat. (I860) 566.-Afr. trop.
Arg. »» Heurck, Obs. Bot. = pilosum.
JTT^ium, G. Don, in Edinb. Phil. Joum. xi. (1824) cornosum.
***BrU. W. Ind.* 275.—Ind. occ.**
P- *Afr-* »• 42».—Afr. trop.
austr.
4004=pilosum.
Don, in Trans. Linn. Soe. xv. (1827)
— Biume, Bijdr. 641=extensum.
Fl. Trop. Afr. ii. 428.— Afr tr
- I ^ G B I 851 -Aubletii.
Jacq. Enum. PI. Carib. 19=Jacqoini.

COMBBBTTJM:-

laxum, Loefl. It. 248, 808-Loeflingii.
laxum, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 231 = ovalifolium.
lepidotum, Presl, Bot. Bemerk. 142 = sqoamosnm.
lepidotum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. 268.—Abyss,
leprosnm, *Mirt. in Flora*, xxiv. (1841) II. *Beibl.* 1.—Bras.
leptostachyum, *Mart. 1. c.* 2.—Bras.
leucanthum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 240-extensum.
leucophyllum, G. Don, in Edinb. Phil. Joum. xi. (1824) 346=racemosum.
LoeAingii, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 110.—Am. trop.
lucidum. Blame, Bijdr. 641 = trifolUtum.
macrocarpum, Beauv. Fl. Owar. ii. 90. t. 118 ••racemosum.
macrophyllum, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 231 = latifolium.
macrostachyum, Wall. Cat. n. 8997=extensum.
Madolata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4009=decai>-drum,
magnificum, *Mart, in Flora*, xxiv. (1841) II. *Beibl.* 4.—Bras.
Malulaea, Wall. Cat. n. 3991=squamo«um.
Mechowunum, *O. Hoffm. in Linnaea*, xliii. (1880-82) 131.—Afr. trop.
mellifluum, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 118.—Bras,
mexicanum, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* ii. 159. t. 132.—Mexic.
micranthum, G. Don, in Edinb. Phil. Joum. xi. (1824) 347 = altum.
mieropetalum, DC. Prod. iii. 19=Loeflingii.
micropetalum, Llanos, in Mem. Acad. Cienc Madr. iv. (1856) 602=extensum.
microphyllum, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 74.—Afr. trop.
molle, *R. Br. ex G. Don,* in *Trans. Linn. Soc.* xv. (18i*7) 431.—Abyss.
Monetaria, *Mart, in Flora*, xxiv. (1841) II. *Beibl.* 2.—Bias,
mucronatum, *Schum. tf Thonn. Besir. Guin. PI.* 184. —Afr. trop.
myrtifolium, *Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 481.— Afr. trop.
nanum, *Buch.-Han. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 219 Reg. Himal.
neurophyllum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 608 - acuminatum.
nipicans, *Leprieur, ex Guill. V Perr. Fl. Seneg. Tent.* 1. 2M.—Afr. trop.
nitidum, *Spruce, ex Eichl. in Mart. Jt. Bras.* xiv. II. 118.—Bros,
obscuram, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Set. IV. vi. (1856) 88.—Madag.
obtusifolium, *Rich, in Act. Soc. Hist Nat. Par.* i. (1792) 108.—Guian.
obtusum, Walp. Rep. ii. 67=praec.?
occidentalis, *Linn. Syst.* ed. X. 999.—Am. austr.
odoratum, *Pav. ex G. Don, in Trans, Linn. Soc.* xv. (182?) 480.—Ecuador.
male, R. Br. ex G. Don, 1. c. 484=aculeatum.
ovalifolium, *Roxb. Hort. Beng.* [28]; *Fl. Ind.* ii. 226.—Ind. or.
oxypetalum, G. Don, in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 420 = Loefiingii.
oxystachyum, *Welw.ex Lavs, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 422.—Afr. trop.
pachyclarium, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xviii. (1881) 270—Madag.
paniculatum, *Vent. Choix*, t. 58.—Afr. trop.
paradoxum, *Welv. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 430.—Afr. trop.
parviflorum, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 114.—Bras.
parviflorum, Reirhb. ex DC. Prod. iii. 21 = altum.
Pavonii, *G. Don, in Trans. Linn. Soc.* xv. (1827) 4S6. —blcuador.
pedicellare, *DC. Prod.* iii. 20.—Bras,
pentagonum, *Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 424.— Afr. trop.
Petitianum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. 268.—Abyss,
phaeocarpum, *Mart, in Flora*, xxiv. (1841) II. *Beibl. 1.*—Bras,
pilosum, *Roxb. Hort. Beng.* [28]; *Fl. Ind.* ii. 231.— Ind. or.; Burma.

COMBHETUM:-

Pinckmum, *Hook. Bot. Mag.* (1846) sub t. 4262.—Afr. trop.
pisoniaeflbrum, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 114.—Afr. trop.
platypetalum, *Welm. ex Laws, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 483.—Afr. trop.
platyphyllum, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot 242=extensum.
polyandrum, Hoflmgg. ex Walp. Rep. ii. 6 = Moquilis paraensis.
Porterianum, Wall. Cat. n. 4000=chinense.
puberum, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792) 108.—Guiana.
pulchellum. Mart, in Flora, xxii. (1839) I. Beibl. 64 = Jacquini.
punctatum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 266 = lepidotum.
punctatum, *Blume, Bijdr.* 640.—Java.
punctatum, Steud. in Flora, xxvi. (1843) II. 761 = Aubletii.
purpureum, Vabl, Symb. Bot. iii. 51=cocclneum.
pyramidatum, *Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ.* 85. —Guiana,
pyrifolium, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 188.—Burma,
quadrangulare, *Kurt, 1. c.*—Burma.
Quartinianum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 266 = lepidotum.
racemosum, *Beauv. Fl. Omar.* 87.1.118.—Afr. trop.
reticulatum, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1887) 164.—Abyss.
reticulatum, *Presl, Reliq. Haenk.* ii. 25.—Mexic.
Kichardianum, *Heurck V Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 284.—Abyss,
riparinm, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 47.—Afr. austr.
Rochetinum, *A. Rich, ex A. Juss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. HI. xv. (1851) 369.—Abyss.
rotundifolium, Rich, in Act. Soc. Hist Nat. Par. i. (1792) 108=Anbletii.
rotundifolium, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 226=extensum.
Roxburghii, G. Don, in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 429-ovalifolium.
Roxburghii, Spreng. Syst. ii. 831=decandrum.
rubiginosnm, *Welw. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 428.—Afr. trop.
Rueppelliannm, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 267.—Abyss.
salicifolium, *E. Mey. ex Hook. Ic. PI.* t. 592.—Afr. austr.
sarcopterum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 415 » acuminatum.
Schimperiannm, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.* 265.— Abyss.
secundum, G. Don, in Trans. Linn. Soc. xv. (1837) 419 = Aubletii.
secundum, Jacq. Enum. PI. Carib. 19= Jacquini.
semiadnatum, *Heurck V Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 244.—Ind. or.
sericeum, *G. Don, in Edinb. Phil. Joum.* xi. (1824) 847.—Afr. trop.
sericeum. Wall, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 450—Calycopteris floribunda.
Smeathmanni, G. Don, in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 425= mucronatum.
Sonderi, *Gerr. ex Sond. in Hare. (T Sond. Fl. Cap.* ii. 611.—Afr. austr.
spinescens, Wall. Cat. n. 4006=pilosum.
spinosum, G. Don, in Edinb. Phil. Joum. xi. (1824) 845—paniculatum.
spinosum, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aeqnin. ii. 181a aUernifoHum.
Sprucei, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiv. 11.115.—Bras,
squamosum, *Roxb. Hort. Beng.* [88] ; *Fl. Ind.* ii. 281.—Ind. or.; Malaya.
stelligerum,>PmZ, *Epim. Bot.* 215.—Ind. or.
stenopetalum, Heurck & Muell. Arg. in Huerck, Obs. Bot. 225-acuminatum.
stigmarium, *Mart, in Flora*, xxiv. (1841) II. *Beibl.* 3.—Bras.
subalternans. Wall. Cat. n. 4008 = trifoliatum.
sundaicum, *Miq. F.I. Ind. Bat. Suppl.* 327 Sumatra.
terminialioides, *Steud. in Flora*, xxvi. (1843) II. 782.—Guiana.
ternatum. Wall. Cat. n. 4002=chinense.
tetragonocarpuin, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xli. (,1872) II. 306.—Burma.

COMBRETTTM :—
tetragonum, *Laws, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 480.—Afr. trop.
tetragonum, *Presl, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 400.—Mexic.
tetralophum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 454.—Malaya.
Theuschii, *O. Hoffm. in Linnaea,* xliii. (1880-88) 132.—Afr. trop.
Thwaitesianum, Henrck & Mnell. Arg. in Hemck, Obs. Bot. 238 = ovalifolium.
tinctorum, Welw. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 430=Kirkii.
tomentosum, *G. Don, in Edinb. Phil. Journ.* xi. (1824) 346.—Afr. trop.
tomentosum, Willd. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 111 = frangulaefolium.
trichanthum, *Fresen. in Mus. Senckeni.* ii. (1837) 155.—Abyssin.
trifoliatum, *Vent. Choix,* t. 58.—Hab. ?
trigonoides, Perr. ex DC. Prod. iii. 20 = racemosum.
trnncatnm, *Welw. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 427.—Afr. trop.
undulatuta, Wall. Cat. n. 3998=trifoliatum.
Vanheurckii, *Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 227.—Ind. or.
variabile, *Mart, in Flora,* xxii. (1839) I. *Beibl.* 62.—Bras.
velutinum, *DC. Prod.* iii. 20.—Bras.
vernicosum, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312*= lepidotum.
villosum, *Bot. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. vi. (1866) 80, in syn.—Madag.
violaceum, *Boj. ex Tul. 1. c.* 79.—Madag.
virgatum, Wall. Cat. n. 3992 = apetalum.
virgatum, *Welw. ex Laws, in Oliver, Fl. Trop, Afr.* ii. 425.—Afr. trop.
viscidnm, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 109.—Cuba.
Wallichii, *DC. Prod.* iii. 21.—Reg. Himal.
Wallichii, Knrz, For. Fl. Burm. i. 405 = flagrocarpnm.
Wightianum, Thw. Ennm. PI. ZeyL 103, partim= ovalifolium.
Wightianum, Wall. Cat n. 4007 =extensum.
Zeyheri, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (I860) 46.—Afr. austr.

COMESPEB.MA, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 21. 1.159-163 (1806). *POLYGALEAE,* Benth. & Hook. *I* i. 138.
acerosum, *Steels, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 299.—Austral.
acutifolium, Steetz, 1. c. 296-* ericinum.
aemulum, Steud. 1. c. i. 208=virgatum.
anthocarpum, Walp. Rep. v. 86, sphalm. = *xanthocarpum.*
aphyllum, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 148.—Austral.
ealymega, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 23.—Austral,
ciliatum, *Steetz, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 304.—Austral-
eompactum, Sieber, ex Steud. Norn. ed. II. i. 400 = retusum.
confertum,Ia4»«. *Nov. Holl. PI.* ii. 28.1.161.—Austral.
contractum, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 208 = virgatum.
eoridifolium, A. Conn, in Field, N. S. Wales, 337-ericinum.
corniculatum, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 206-virgatum.
defoliatum, *F. Muell. Viet. PI.* i. 189.—Austral.
Drummondii, *Steeti, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 301.—Austral.
ericinum, *DC. Prod.* i. 884.—Austral,
flavum, *DC I. c.*—Austral.
floribundum, St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 56. t. 91 = Bredemeyera floribunda.
gracile, Paxt. Mag. Bot. v. (1838) 145=volubile.
herbaceum, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 211 = calymega.
hirtulum, Steud. 1. c. 209 = confertum.
integerritnum, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 7.—Austral.
isocalyx, Spreng. Syst. iii. 172=calymega.
Kunthianum, St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 54. t. 90 = Bredemeyera Kunthiana.
lanceolatum, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 148.—Austral.
latifolium, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. ii. 285-ericinum.

COMESPERMA :—
laurifolium, St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 56"= Bredemeyera laurifolia.
laxiusculum, Stend. in Lehm. PI. Preiss. i. 210 = virgatum.
Lhotskyanum, Manso, ex Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot 117, nomen (=Bredemeyerae sp.).—Afr. trop.
linariaefolium, A. Cunn. ex Steetz, in Lehm. PI. Preiss. ii. 297=ericinum.
longebracteatum, Steud. 1. c. i. 207 = virgatum.
longifolium, Stend. 1. c. 206 = confertum.
lucidum, Baill. Hist. PL v. 82 = Bredemeyera lncida.
Mansonii, Lhotsky, ex Klotzsch, in Peters, Keise Mossamb. Bot. 117-~ Bredemeyera lucida.
megapteryga, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 207 = nudiusculum.
nudiusculum, *DC. Prod.* i. 384.—Austral.
nudiusculum, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. ii. 808-defoliatum.
parviflorum, Steud. 1. c i. 210=calymega.
patentifolium, F. Muell. Fragm. i. 48=ericinum.
paucifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1864)11. 352= volubile.
planifolium, *Hassi. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 185.—Austral,
polygaloides, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 7.—AustraL
praecelsum, *F. Muell. Fragm.* xi. 2.—AustraL
pubescens, Gardn. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. in. 49 = Bredemeyera brevifolia.
ramosissimum, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 209 = nudiusculum.
tetusum, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 22. t. 160.—Austral.
rhadinocarpum, *F. Muell. Fragm.* xi. 1.—Austral.
roseum, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 207= virgatum.
scandens, Steud. 1. c. 211=integerrimum.
scoparium, *Drum, in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 869; *Steetw, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 309.—Austral,
secundum, *Banks, ex DC. Prod.* i. 334.—Austral.
selaginoides, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xxvii. (1854) II. 352-virgatum.
silvestre, F. Muell. Fragm. L 49 = sylvestre.
simplex, Endl. in .Ennm. PL Hueg. 7 = virgatum.
spathulatum, Tnrez. in BulL Soc Nat Mosc xxvii. (1854) II. 852 = calymega.
sphaerocarpum, *SteetM, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 314.—Austral.
spinosum, *F.'Muell. Fragm.* i. 144.—Austral.
strictum, Endl. in Enum. PL Hueg. 7 = calymega.
subherbaceum, Walp. Ann. ii. 84, sphalm. = calymega.
sylvestre, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. AustraL* 342.—Austral.
tenue, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 208-calymega.
tortuosum, Steetz, 1. c. ii. 308-volubile.
variabile, Mart ex Steud. Nom. ed. II. i. 400 (=Bredemeyerae sp.).—Bras.
varians, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 210 = calymega.
virgatum, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 21. t. 158.—Austral.
viscidulum, *F. Muell. Fragm.* x. 4.—Austral,
volubile, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 24.—AustraL
xanthocarpum, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 209 = flavum.

COMETES, Linn. Mast i 4 (1767). *ILLECEBRACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 18.
CERATONYCHIA, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) 1215.
SALTIA,R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 (1811), nomen.
abyssinica,A..Sr.t» *Wall. Pl.As.Rar.i.* 18.—Abyssin.
alternifolia, Linn. Syst. ed. XIL 127=surattensis.
apiculata, Decne. in Ann. Sc. Nat Ser. IL ii. (1834) 244=surattensis.
surattensis, *Linn. Mant.* i. 39; *Burm.f. Fl. Ind.* 39. t. 15.—Ind. bor. occ.; Arab.

COMETIA, Thou, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 642 (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 283.
lucida, *Baill. Adansonia,* ii. (1861) 55.—Madag.
Thouarsii, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 643.—Madag.

COMEURYA, Baill. Adansonia. x. (1872) 329-Dracontomelon, Blume (Anacard.).
Cumingiana, Baill. 1. c. 380-D. Cumingianum.

COMMARUM, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 132 (1792)» COMARUM, Linn. =Potentilla, Linn. (Rosac).

OOMTWF1TJTTA, Plum, ex Linn. Syst. ed. I. (1735). *COMMELINACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 847.
ANANTKOPUS, Rafin. Kl. Ludov. 20 (1817).
DISECOCARPUS, Hassk. in Flora, xlix. (1866) 211.
ERXLEBIA, Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 494.
HEDWIGIA, Medic. 1. c. 495 (1790).
HETEROCARPUS, Wight, Ic. vi. 29. t. 2067 (1858).
LECHEA, Lour. Fl. Cochinch. 60 (1790).
OMPHALOTHECA, Hassk. in Bull. Congr. Bot. Amst. (1865) 103.
SPATHODITHYROS, Hassk. in Flora, xlix. (1866) 211.
TRITHYROCARPDS, Hassk. 1. c (1866).
ALLOSPERMA, ALLOTRIA, DITELESIA, DIRTEA, EUDIPETALA, LARNALLES, NEPHRAELES, et OVIDIA, Rafin. FL Tellur. iii. 68-70, 122 (1886).
acuminata, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 258.—Mexic.
acuminata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 324 = Aneilema acuminatum.
acuminata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62 •= pyrrhoblepharis.
aequinoctialis, Roem. & Schult Syst. i. 538 •= Aneilema aequinoctiale.
aequinoxialis, Beauv. FL Owar. i. t. 38 =praec.
aethiopica, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 189—Afr. trop.
affinis.Vod. Encyc. Suppl. ii. 824=Aneilema gramineum CHID$_a$
africana, *Linn. Sp. PI.* 41.—Afr. austr.
africana, Mirb. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 466' communis.
agraria, Knnlh, Enum. PL iv. 88 = nudiflora.
agrostophylla, *F. Muell. Fragm.* viii. 59.—Austral.
alba, Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 186 = appendiculata.
albescens, *Hassk. inSchweinf. Beitr. Fl. Aethiop.VW*—Afr. trop.
ambigua, Beauv. Fl. Owar. i. 26. t. 15 = Palisota ambigua.
amplexicaulis, *Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiof-*208.—Afr. trop.
angolensis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* 167.—Afr. trop.
angustifolia, Hassk. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 528-Gerrardi.
angustifolia, Hort. BeroL (1841) ex Kunth, Enum-PL iv. 659=graminifolia.
angustifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 24 -= virginica.
angustifolia, Reichb. Ic. Bot. Exot. ii. 17. t. 143 graminifolia.
anthericoides, Poir. Encyc. Suppl. ii. S24=Aneilen)
appendiculata, C. *B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng.* *• 13.—Ind. or.
aspera, *G. Don, ex Benth. in Hook. Niger Fl.* 64*2.—Afr. trop.
attenuata, Heyne, ex Stend. Nom. ed. II. i. 401 = snbulata.
attenuata, *Koen. ex Vahl, Enum.* ii. 168.—Ind. or.
auriculata, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 2.—Sumatra.
auriculata, E. Mey. in Presl, Rel. Haenlc. i. 137-= virginica.
a/enaefolia, *J. Grah. Cat. PI. Bombay,* 224.—Ind. or-
axillaris, Linn. Sp. PL 42 = Cyanotis axillaris.
bahiensis, Hoffmgg. ex Spreng. Jahrb. i. HI- virginica.
Bainesii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* Hi- W — Afr. austr.
barbata, Boj. Hort. Maurit. 369-~ communis.
barbata, *Lam. Tabl. Encyc.* i. 129.—Am. austr.
barbata, Sieber, ex C. B. Clarke, in DC Monog. Pn»»-iii. 247=Cyanotis cristata.
benghalensis, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 12 = divancat*
benghalcnsis, *Linn. Sp. PI.* 41.—Geront. trop.
benghalensis, Wall. Cat n. 8980=persicariaefolw.
beniniensis, Beauv. Fl. Owar. ii. 49. t 87 = Anole beninense.
bicolor, Poepp. ex Kunth, Euum. PL iv. 89-Trw scantia gradlis.
biflora, Poir. Encyc. Suppl. ii. 324-Aneilemabiflornn>-
Blumii, A. Dietr. Sp. PL ii. 400 -= auriculata.
Boissieriana, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Ph»»-*161.—Afr. trop.
braeteolata, Lam. Encyc. ii. 69 = Aneilema spiratuv-

COMMELINA :-

wacteosa, *Hasst. in Flora,* xlvi. (18631386.—Afr. trop.
Brovnii, A. Dietr. Sp. PI. ii. 416-Aneilema acuminatum.
bulbosa, Heyne, ex Steud. Norn. ed. II. i. 401-ADeileina dimotphum.
caerulea, Salisb. Prod. 216=virginica.
caespitosa, Roxb. Hort. Beng. 5; FL Ind. i. 174-nudiflora.
cajannensis, *Sieber, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 401.—Ins. Martinic.
cajennensis, Kunth, Ennm. PI. iv. 38, insyn.=nudiflora.
Callisia, Steud. Nom. ed. II. i. 401-Aneilema Hamiltomanum.
cnariensis, Ch.Sm.in Buch,Canar.Ins. 140 -nudiflora.
"tnescens, Vahl, Enum. ii. 173 = benghalensis.
<»P>tata, *Berth, in Hook. Niger Fl.* 641.-Afr. trop.
"Pitata, Kiotzsch. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 178 = obliqua.
nrdiocephala, Kunze, ex C. B. Clarke, 1. c. 187 = quitensis.
cardiosepala, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 9 = quitensis.
"tripetisis, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i. 260 = Virginica.
ca Schlecht. Ind. Sem. Hort. Halens. (1839) adn. *libra.*
"roliniana, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enum. PI. iv. 669=gtricta.
"roliniana, Walt. Fl. Carol. 68-nudiflora.
*c<**rohniana,* Willd. ex Kunth, Enum. PI. iv. 54 = angustifolia.
c<%?»e»«*,* Rich, in Act. Soc Hist. Nat. Par. i. W9-2) 105-nudiflora.
^iwrnissonis, *Klotisch, ex C. B. Clarke, in DC. Monog.*
fAa». ni. 186.—Austral.
wntransia, Roem. & Schult Mant. i. Add. I. 876 = Hoscopa africana.
ctd *d<**tina,* Hort. Berol. (1832) ex Kunth, Enum. PI. **clandesti** gnmiiiilblia, d» . 2a> *Mart ex Steud Nom* «*• n- "• 401.—Bras.
««vata, *C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng.* t. 5.—
co^d. or.; Malaya.
w m ^ *Willd Enum Hort Sml* **69—Mexic.**
ammelinoides, Forsi. Fl. Aegypt. Arab. 12.—Arab.
com *"?«i Engelm, ex Kunth, Enum. PI. iv. 88 = *grana.
commun,, F< MuelK Fn «m- *»• 59=cyanea.
commu *Linn S*P- «• ".-China.
commut **obliqu** T Kob Hort. B eng5 Fl Id^n ·17 1=
commu Wal1 Cat n- 8978=salicifolia, Hasskarlii.
comm » "'. Walt. Fl. Carol. 68=nudiflora.
" m D!!"' *" Me^ Zwei M Docum- 174=Aneilema
régeanum.
condensa 190.—^- *B Clarke> in DC Mmo8- Phan* iii- **trop.**
conges "* C * « " * < . *I- c* 160—Afr. trop.
consp ««««, Blume, Euum. PI. Jav. i. 4 = Aneilema
cos spicuum.
conspicua, Zoll. Syst. Ve tZ„ Ind> ArCh, 64 = Aneilema **monadelphum.**
cordifolia, *A. Rich.* *Tent M-Ab?**-il* **341.-Abyss.**
crassica li *C. B Clarke>in DC-* "<"«*• *Pi*"»- *i*»-
1« U ! A. \ **trop.**
£P«», Poir. Encyc. Suppl. ii. 824 = Pollia crispata.
fo *miL S P PPL* **«—Cyanotis cristata.**
cyane-» ^ *lnn Mant* "• 176 = benghalensU.
fv« *Br Prod* 289.—Austral •
dS *Hort.* **4=Floscopa scandens.**
659 = gramir (1841) Kunth, Enum. Pl. iv.
***debilis,* Ledeb. in Roem. & Schult Mant L 842 =**
virginica.
***decumbens,* E- Mey- in Presl,** Rel. Haenk. i. 136 =
pallida.
deficiens, *Herb. ex Steud. Nom. ed.* II. i 401.—Bras.
deficiens, Hook. Bot. Mag., t. 2644 = virginica.
deficiens, Van Houtte, Fl. des Serres, xviii. (1869) t.
1824 = nudiflora.
delicatul benghalensis, Gartenfl. (1864) 849. t. 104 =
densiflora, Blume, Enian, PL Jay- L **4 = Floscopa**
scandens.
diandra, Steud. Nom. ed. I **401 = Aneilema nudiflorum.**
dianthifolia, *[Delile,* ;„] ^. xa. vii. t. 890- **Mexic.**

COMMELINA :—

didyma, Steud. Nom. ed. II. i. 401=4>ollia sorzogonensis.
diffusa, Burm. f. Fl. Ind. 18. t. 7- f- 2=nudiflora.
rfi^usa, Willd. ex Kunth, Enum. PI. iv. 39, 40 = salicifolia, barbata.
diffusa, Zoll. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 171-clavata.
divaricata, *Vahl, Enum.* ii. 169.—Arab.
Donii, A. Dietr. Sp. PI. ii. 895 = obliqua.
dubia, *[Delile,* fit] *Red. Lil.* t. 859,-Mexic.
dubia, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enum. PI. iv. 659 = coelestis.
dubia, Jacq. Obs. Bot. iii. 9 = Heteranthera graminea.
ebracteata, Ehrenb. ex Schweint Beitr. fl. Aethiop. 210=Aneilema Ehrenbergii.
Eckloniana, *Kunth, Enum, PI.* iv. 57.—Austral,
edulis, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 341.—Abyss.
edulis, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 184-tuberosa.
Ehrenbergiana, Link, Kiotzsch & Otto, 1c. PI. Rar. 75. t.30=scabra.
elata, Vahl, Enum. ii. 178 = Aneilema herbaceum.
elegans, H. B. *8c* K. Nov. Gen.et Sp. i. 259=virginica.
elliptica, *H. B.* &" *K. I. c*—Am. trop.
ensifolia, F. Muell. Fragm. viii. 60 = undulata.
ensifolia, *R. Br. Prod.* 269.—Austral.
equinoctialis, Beauv. Fl. Owar. i. 65 = Aneilema aequinoctiale.
erecta, Chapm. Fl. S. U. St. 497=hirtella.
erecta, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enum. PI. iv. 659-coelestis.
erecta, *Linn. Sp. PL* 41.—Am. bor.
eseulenta, Herb. Madr. ex Wall. Cat. sub n. 5208 = Aneilema esculentum.
exilis, Steud. Nom. ed. IL i. 401=Aneilema nudiflorum.
falcata, Hassle, in Flora, xlvi. (1863) 387 = Forskalaei.
fasciculate, *Ruis V Pav. Fl. Per. i.* 44. t. 72. f. 6.—Peruv.
filiformis, Steud. Nom. ed. IL i. 401 = Aneilema vaginatum.
firma, Welw.ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 180=aspera.
flava, Salisb. Prod. 215 = africana.
flexuosa, Welw. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 258=Cyanotis nodiflora.
floribunda, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 260 = Tradescantia cumanensis.
foeeunda, Hochst. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 255=Cyanotis foeeunda.
formosa, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. (July-Sept. 1830) 866-nudiflora.
Forskailii, Hochst. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 173 = Kotschyi.
Forskalaei, *Vahl, Enum.* ii. 172.—Geront trop.
Gambiae, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 146.—Afr. trop.
gelatinosa, *Edgev. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 177.—Ind. or.
geniculata, *Ham. Prod. Fl. Ind. Occ.* 4.—Ins. S. Doming.
Gerrardi, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 183.—Afr. anstr.
gigantea, Vahl, Enum. ii. 177=Aneilema giganteum.
glabra, Baker, in Saund. Refug. Bot. ii. t. 166 = fasciculata.
glabra, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 168.—Ind. or.
glabra, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 22-nudiflora.
gracilis. Hook. BoL Mag. t. 8047 - fasciculata.
gracilis, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 44. t. 72. f. a-nudiflora.
graminea, Poir. Encyc. Suppl. ii. 324 = Aneilema gramineum.
graminifolia, *H. B. VK. Nov. Gen. et Sp.* i. 258.—Mexic.
graminifolia, Pav. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 151 *= dianthifolia.
grandiflora, *Tenore, Cat. Hort. Bot. Nap.* (1845) 22—Hab.?
guianensis, Kiotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guian. 1064 = Phaeospherion persicariaefolium.
Hamiltonii, Spreng. Syst.v. 186 = Floscopa scandens.
hamipila, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 167.—Cuba.
Harcocutkii, *Hort. Pillnit: ex Tenure, Cat. Ort. Bot. Nap.* (1845) 100.—Hab. ?
Hasskarlii, *C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Beng.* t. 6.—Ind. or.
herbacea, Roxb. Hort. Beng. [6]; FL Ind. i. 176-Aneilema herbaceum.

COMMEliUTA :—

Heudelotii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 184.—Afr. trop.
hexandra, Aubl. PL Gui. i. 35. t. 12-Dichorisandra Aubletiana.
hirsuta, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62 = benehalensis.
hinuta, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 163.—Ind. or.
hirsuta, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 344 = Cyanotis birsuta.
hirsuta, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enun. PI. iv. 660 ^elliptica.
hirsuta, Willd. in Sprang. & Link, Jahrb. L HI. 78-virginica.
hirtella, *Vahl, Enum.* ii. 166.—Am. bor.
hispida, Ham. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 25 = Floscopa scandens.
hispida, *Ruiz &" Pav. Fl. Per.* i. 43. t, 73. f. a.—Peruv.
Hookeri, A. Dietr. Sp. PI. ii. 404=Aneilema giganteum.
Hookeriana, Spreng. Syst. v. 186 - Aneilema giganteum.
huillensis, *Welw. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 175.—Afr. trop.
humilis, Kiotzsch, ex C. B. Clarke, 1. c 154 - C. elliptica.
ignorata, *Kunth, Enum. PI.* iv. 60.—Am. bor.
imberbis, Ehrenb. ex Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 209 = latifolia.
intermedia, Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 655 = coelestis.
involucrosa, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 342.—**Abyss.**
Jamesoni, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii.156.—Ecuador.
japonica, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enum. iv. 659-coelestis.
japonica, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 332-Aneilema japonicum.
karooica, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 166.—Afr. austr.
Kaminskiana, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Ennm. Fl.iv.660=seq.
Karmnskii, Mart.'ex Kunth, 1. c=elliptica.
Kirkii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 167.—Afr. trop.
Koenigii, Steud. Nom. ed. II. L 401 - Aneilema herbaceum, Koenigii.
Kotschyi, *Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 207.—Aegypt.
Krebsiana, Kunth, Enum. PI. iv. 40=africana.
Kurzii, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 444.—Ind. or.
lanceolata, Benth. Fl. Austral, vii. 84=agrostophylla.
lanceolata, *R. Br. Prod.* 269.—Austral.
lanuginosa, Heyne, ex Wall. Cat. n. 5221 = Aneilema lanuginosum.
latifolia, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii 340.—Abyss.
latifolia, Hochst. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 160,169 = benghalensis, jncata.
laxa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 324 = Aneilema laxum.
leiandra, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 160.—Mexic.
leiocarpa, Benth. in Bot. Voy. Sulph. 176 = Athyrocarpus leiocarpus.
linearifolia, Kunth, Enum. PI. iv. 43=subulata.
linearis, Benth. PI. Hart*. 27-dianthifolia.
lineolata, Blume, Enum. PI. Jav. i. 8 = Aneilema herbaceum.
Livingston!, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 190.—Afr. austr.
Loddigesii, Steud. Nom. ed. II. i. 401-tuberosa.
longicapsa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 176.—Afr. occ.
longicaulis, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enum. PI. iv. 659 = coelestis.
longicaulis, Jacq. Coll. iii. 234 = nudiflora.
longifolia, *Lam. Tabl. Encyc.* i. 129.—Java.
longifolia, Michx. Fl. Am. Bor. i. 28 = hirtella.
longifolia, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 25 = Aneilema giganteum.
longifolia, Thw. Enum. PI. Zeyl. 322-Kurzii.
Loureiri, *Kunth, Enum. PI.* iv. 60.—China.
ludens, Miq. in Joum. Bot. Neerl. i. (1861) 88 = communis.
lunata, Heyne, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan> iii. 188=ensifolia.
lutea, Moench, Meth. 237= africana.
macrophylla, Poir. Encyc. SuppL ii. 324 -Pollia macrophylla.

COMMELINA :—
maeulata, Edgew. in Trans. Linn. Soc xx. (1861) 89 =obliqua.
madagasuarica, *C. B. Clarke, in DC. Manor. Phan.* iii. m.-Madag.
Mannii, *C. B. Clarke, I. e.* 167.—Afr. trap.
Martiana, Seub. in Mart. Fl. Bra*, iii. I. 265. t. 87. f. 1-virginica.
mascareaica, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 174.—Ins. Maurit.
medica, Lour. Fl. Cochincb. 40 = Aneilema medicnm.
mexicana, E. Mey. in Presl, Rel. Haenk. i. 137 = Tradcscantia elongata.
micrantha, Vahl, Enum. ii. 178 =• Aneilema micranthum.
minuta, Blume, Cat Gew. Buitenz. 84 'Aneilema nuiliflorum.
mollis, Jacq. Coll. iii. 236=benghalensis.
moluccana, Roxb. Hort. Beng. [81J; FL Ind. i. 172 = Cyanotis uniflora.
numadelpha, Blume, Ennm. PI. Jav. i. 4=Aneilema monadelphum.
montana, Steud. Norn. ed. II. i. 401 =Aneilema montauum.
monticola, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 264.—Bras.
multicaulis, Hocbst. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 184 = albescens.
multifiora, Martens & Gal. in Bull. Acad. Brnx. ix. (1842) II. 874=Callisia Martensiana.
nana, Roxb. Hort. Beng. 5 ; Fl. Ind. i. 178=Aneilema spinlum.
nervosa, Bnrm. f. Fl. Ind. 18 = benghalensis.
nervosa, Rniz & Pav. Fl. Per. i. 44 = fasciculate.
nigritana, Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1876) 163 =subulata.
nigritana, BentL. in Hook. Niger Fl. 641=umbellata.
nilagirica, Stend. ex C. 13. Clarke, in DC. Monog. Pban. iii. 163, 171 = hirsuta, clavata.
Nimmoniana, *j. Grah. Cat. PI. Bombay,* 224.—Ind. or.
nitens, *Hort. Pillnitt. ex Tenore, Cat. Ort. Bot. Nap.* (1845) 100.—Hab.?
nudicaulis. Bum. f. Fl. Ind. 17. t. 8. f. 1 = Aneilema nndiflorum.
nudiflora. Linn. Mant. ii. 177 «• Aneilema nudinorum.
nudiflora, *Linn. Sp. PI.* 4.—Reg. trop.
obliqua, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 45.—Ind. or.; Malaya.
obliqua, Vahl, Enum. ii. 173=erecta.
oblongifolia, Hassk. Commel. Ind. 27=auriculata.
obtusifolia, Vahl, Enum. ii. 168 = nudiflora.
ochreata, Schau. in NOT. Act Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 447 = nudiflora.
oligotricha, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 632.—Malaya.
orchioides, Booth, ex Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 63 = elliptica.
orchioides, *Roth, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 402.—Mexic.
ovata, Steud. 1. c -Aneilema ovatum.
ovato-oblonga, Roem. & Schult. Mant. i. Add. I. 376 — Aneilema ovato-oblongum.
paeifica, Vahl, Enum. ii. 168=nudiflora.
paleata, *Hassk. in Miq. PI. Jungh.* 139.—Ind. or.; Malaya.
Palisoti, A. Dietr. Sp. PI. ii. 414 = Aneilema ovato-oblongum.
pallida, *Willd. Hort. Berol.il* 87. t. 87.—Mexic.
pallida, Schlecht in Linnaea, xxri. (1853-55) 484 = Athyrocarpus leiocarpns.
paludosa, Blume, Enum. PI. Jav. i. 2-obliqua.
paludosa, Steud. Nom. ed. II. i. 402 - persicariaefolia.
paniculata, *Hill, Veg. Syst.* xxiii. 4.—Ind. or.
paniculata, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enum. PI. iv. 659=coelestis.
paniculata, Soland. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 228.- Aneilema laxum.
paniculata, Vahl, Enum. ii. 179 = Aneilema Forskald.
papilionacea, Burm. f. Fl. Ind. 17 •= Cyanotis papilionacea.
parviflora, Link, Enum. Hort Berol. i. «l=graminifolia.
parviflora, Reichb. Fl. Exot. ii. 17.1142 = tnberosa.
pedunculosa, Spreng. *8c* Link, Jahrb. i. Ml. 74-ialicifolia.
persicariaefolia, [Delile, in] Red. Iii. t. 472=Atbyrocarpus persicariaefolins.
persicariaefolia, *Wight, in Wall. Cat.* n. 8984.—Burma.
Fetersii, *Hassk. in Flora,* xlvi. (1863) 385.—Afr. trop.

COMMELINA :—
phalangoides, *Crantt, lust.* i. 459.—Hab. 1
pilosa, Pers. Syn. i. 55 = nudiflora.
pilosa, Stend. Nom. ed. II. i. 402 = Aneilema ochraceum.
pilosula, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106=nudiflora.
platyphylla, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guiana,* 8*7.—Guiana.
Pohliana, Seub. in Mart Fl. Bras. iii. I. 265. t. 37. f. 1 -erecta.
poligama, Blanco, Fl. Filip. ed. Naves (Ic sine aum.) « benghalensis.
polyclada, Welw. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 165-afrfcana.
polygama. Roth, in Roem. & Ust. Mag. iv. x. (1790) 14 = communis.
polyspatha, Wight, Ic. t. 2066 - obliqua.
procurrens, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1862) 183 = benghalensis.
prostrata, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. i. 259 =nudiflora.
prostrata, Poepp. ex Kunth, Enum. PI. iv. 38 = nudiflora.
prostrata, Regel, Gartenfl. (1868) 289. t 692. f. 1 = benghalensis.
protensa, Steud. Nom. ed. II. i. 402 = Aneilema protensum.
puberula, Hort Berol. (1841) ex Kunth, Enum. PI. iv 659 ; et in Linnaea, xxiv. (1861) 197-dianthifolia.
pubescens, -Klotzsch, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 152-acuminata.
pubinervis, *Hassk. in Flora,* xxv. (1842) II. *Beibl.* 4.—Java.
pumila, Royle, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 207 = Aneilema spiratum.
pyrrho-blepharis, *Hassk. in Sckweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 209.—Abyssin.
quitensis, *Benth. PI. Hartw.* 258.—Ecuador.
radicans, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 25 = Aneilema nudiflornm.
radiciflora, R. Br. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 169 = benghalensis.
Rafinesquei, *Kunth, Enum. PI.* iv. 40.—Am. bor.
rajmahlensis, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 444 = attenuata.
rara, *Roxb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 402.—Ind. or.
reniformis, Steud. 1. c. -Pollia snbumbellata.
repens, Roxb. *8c* Heyne, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 172-attenuata.
rhimocarpa, Afzel. ex C. B. Clarke, 1. c. 159'benghalensis.
robnsta, *Kunth, Enum. PI.* iv. 52.—Bras,
rorigera, *Fisch. ex Tenore, Cat. Ort. Bot. Nap.* (1846) 100.—Hab. 1
rosea, *Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal.* (1838) 7.—Mexic.
rubens, Hort. Berol. (1841) ex Kunth, Enum. PI. iv. 659=graminifolia.
rubens, [Delile, in] Red. *U*\. vii. t. 367 = pallida.
rufipes, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 265 = Phaeaspherion persicariaefolium.
rugulosa.C B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 446 = suffruticosa.
Rumphii, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* i. 126.—As. trop.
Sabatieri, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 146. —Afr. trop.
sagittifolia, Hassk. in Schweinf. Beitr. FL Aethiop. 206-latifolia.
salicifolia, Boj. Hort. Maurit 860—communis.
salicifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 5 ; *Fl. Ind.* i. 172.—Ind. or.
salicifolia, Thw. Enum. PI. Zeyl. 321-clavata.
Saltiana, Steud. Nom. ed. II. i. 402- pyrrho-blepharis.
scaberrima, Blume, Enum. PL Jav. i. 4 = Aneilema protensum.
scabra, *Benth. PI. Hartw.* 26.—Mexic
scabrata, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 266 = Phaeospherion persicariaefolium.
scandens, *Welw. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 146.—Afr. trop.
scapiflora, Roxb. Hort. Beng. [5]; Fl. Ind. i. 175 = Aneilema scapiflornm.
scapigera, Hort. Berol. (1832) ex Kunth, Enum. PI. iv. 46-elliptica.
Schimperiana, Hochst. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Pban. iii. 184= albescens.
Schomburgkiana, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Guiana, 1064 = nudiflora.

COMMELINA :—
Schoubertii, Zucc. ex Tenore, Cat. Hort. Bot Nap. (1845) 22-hispida.
Schweinfurthii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* 158.—Atr. trop.
secundiflora, Blume, Enum. PI. Jav. i. 8 « Pollia sorzi-gonensis.
Sellowiana, Kunth, Ennm. PL iv. 44—nudiflora.
Sellowii, Schlecht, Ind. Sem. Hort. Hal. (1850) 7-nudiflora.
semi-ovata, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8885-obliqua, suflruticosa.
senegalensis, Tenore, Cat. Ort Bot. Nap. (1846) 22 - benghalensis.
serrulata, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 4.—Guiana.
setosa, Wight, in Wall. Cat. n. 8981 -undulate,
sikkimensis, C. *B. Clarke, Commel. V Cyrt. Beng.* t »•—Reg. Himal.
siliculosa, Poir. Encyc. SuppL ii. 824 = AneUeroa siliculosum.
simplex, Vahl, Enum. ii. 177-Aneilema sinicum.
Sitnsoni, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871 > 446 = sunruticosa.
singularis, *Veil. Fl. Flum.* 31; i. t. 76.—Bras.
sinica, Roem. *8c* Schult. Mant. i. App. I. 376 •* Aneilema sinicum.
spedosa, Thunb. Prod. PL Cap. 68 = Cyanotis nodiflora,
spectabilis, *C. B. (Harke, in DC. Monog. Phan.* ili-175.—Afr. trop.
s^icaro.Steud. Nom. ed. II. i. 402 = Aneilema Loureirii-
spirata, Koen. ex Steud. 1. c. = Aneilema herbaceum.
spirata. Linn. Mant. ii. 176 — Aneilema spiratum.
striata, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 89" obliqua.
striata, Hochst. ex. A. Rich. Tent. FL Abyss, ii. 340 - subulata.
striata, Wall. Cat. n. 8981 -albescens, Kurzii, ensifolia-
stricta, Desf. Cat. Hort. Par. ed. HI. 388-graminifolia.
subamplectens, Hassk. Commel. Ind. 27 - africana.
subaurantiaca, Hochst in Kunth, Enum. PL iv. 668* subulata.
subulata, *Roth, Nov. PI. Sp.* 28.—Geront trop.
siiffruticosa, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 8.—Java.
sulcata, Benth. in Hook. Niger Fl. 541 = Vogelii.
sulcata, Hoffmgg. in Spreng. & Link, Jabrb. i. m- —virginica.
tennis, Roth, Nov. PI. Sp. 22 = Aneilema acuminatum-
tinctoria, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 699 = diantbifolia.
tnquetra, Stend. Nom. ed. II. i. 402 - Aneilema tnquetrum.
truncata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 4=*ir, ginica.
tuberosa, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stock 1854 (1856) 110-virginica.
tuberosa, Burm. ex Steud. Nom. cd. II. i. 402 = salicifolia.
tuberosa, [DC. in] Red. HI. ii. t. 108 = coelestis.
tuberosa, Forsk. FL Aegypt. Arab. 12 = Aneilema *<"-skalei.
tuberosa, *Linn. Sp. PI.* 41.—Mexic.
tuberosa, Lour. Fl. Cochinch. 40-Aneilema Loureir"-
turbinata, Vahl, Enum. ii. 171=benghalensis.
umbellata, *Schum. V Thonn. Besir. Guin. PI-* Afr. trop.
umbrosa, Vahl, Enum. ii. 179 ~ Aneilema ovat°-oblongnm.
uncata, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii- 1 Abyssin.
undulata, Benth. Fl. Austral, vii. 88 = Chamisson*
undulata, Lodd. Bot. Cab. t. 1553 = tuberosa.
undulata, *R. Br. Prod.* 270.—Austral.
vaginata, Heyne, ex Steud. Nom. ed. II. Aneilema esculentum.
vaginata, Linn. Mant. 177-Aneilema vttginatnm.
vaginata, Sonn. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. f iii. 188-ensifolia.
variabilis, Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal. (1838) 7 elliptica.
vestita, Senb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 264 - monticoj
villosiuseula, Soland. ex C. B. Clarke, in DC. Mon°* Pnan. iii. 159 = benghalensis.
virginica, Font f. Prod. 6-nudiflora.
virginica, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 61.—Am. bor.
Vogelii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phuii.* in- Afr. trop.

COMMZELUfA:—
•*nulgaris,* [DC. in] Red. Lil. iv. t. 206=communis.
WallUhiana, Steud. Nom. ed. II. i. 402 = Aneilema divergens.
Welwitschii, *C. B. Clarke, in DC. Motiog. Phan.* iit". 175.—Afr. trop.
Werneana, Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 206 -nudiflora.
wtildenowii, Kunth, Enum. PI. iv. 87 — commnnis.
Mmbesica, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 161.—Afr. trop.
Zanonia, Linn. Sp. PI. 41-Campelia Zanonia.
Zebrina, Hort. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 318=Zebrina pendula.
*ylanica, *Falkenberg, in fust, Jahresb.* iy. (1876) 406.—Zeylan.

COMMELYNA, Hoftmgg. ex End]. Gen. 125 (1887) = Commelina, linn.

COMMERCONIA, F. Maell. Census, 16 (1882) - Commersonia, Font. (Stercul.).

COMMERSONA, Sonner. Voy. t. 89 (1782) = Barringtonla, Forst. (Myrtac.1.
'peciosa, Salisb. Prod. 356 = B. Butonica.

COMMERSONIA, Comm. ex DC. Prod. ii. 10, in syn. (1825)-Folycardia, Juss. (Celastrin.).

COMltER8ONIA, Forst. Char. Gen. 43. t. 22 (1776). *STERCULIACEAE,* Berth. & Hook. f. i. 226,
*P*ra,* G. Don, Gen. Syit. i. 523=Buettneria aspera.
tnurta, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 2S8 = Rulingia grandiflora.
"atrophylla, F. Mnell. Fragm. iz. 59=Rulingia craurophylla.
if p. TurcM. in Bull. Soc. if at. Mosc. xix. (1846) I. 601—Austral.
<*neata,* F. Muell. Census, 16 = Rulingia cuneate.
cygnorum, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 287 = Rulingia - malvaefolia.
""typhylla, Andr. BoL Rep. t. 603~Rulingia pannosa.
^*phylla,* Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 402- - Kulingia pannosa.
**nsiftora,* F. Muell. Fragm. x. 21 = Rulingia densi. ·flora.
d'fihlla,Andr. Bot. Rep. t. 60S=Rulingia pannosa.
nhinata, Blume, Bijdr. 86 = platyphylla.
ehmau, Forst. Char. Gen. 43. t 22.—MaUya.
*Fraseri, Gay> in Minu Ml ,, Par , * ^1828^215 tj ll — ! - istral.
*vas. ieber>ex Steetz in Lehm_ R Preiss_ "852 = RUTigta panno a. «
^"^aodii, J*Gay, in Mim. Mus. Par.* x. (1823) 14.—Austral.
hrbacea, G. Don, Gen. Syrt. i. 623 - Bnettneria "erbacea.
hermanniaefolia, J. Gay, in H. B. b" *K. Nov. Gen. et* ~ r. oil, in nota.—Hab.l
*ia J*amia efotia,* F. Muell. Census, 16-Rulingia hermanniaefoUa.
f *'?"" G Don G*0- Syst- S28 - Buettaeria jacciana.
javensis, G. Don, 1. c.-platyphylla.
Kempeana, F. Muell. Fragm. xi. 113 - Rulingia Kempeana.
laxophylla, F. MueU. 1. c. x. 22 = Rulingia laxophylla.
Leichardtii, Benth. Fl. Austr. i. 242—Austral.
*m^ni fl?r^a> F. Muell. Fragm. viii. 223 - Rulingia "agmflora.
*melanope^1"- F- Wue"- '• '• *• 21.—Austral.
microphylla> Benth- FL Austral, i. 244.—Austral.
*parvifloTa F- Muell. Census, 16=Rnlingia parviflora.
*pilosa, G. Don> Gen- Syst- ii-524-Buettneria pilosa.
*platycalyx, F Mue11- Census, 16 = Rulingia platycalyx.
*platyphylla, Andr- Bot- * * « • 60s » dn- « t. 519.- Malaya.
Preissii, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 238 = Rulingia corylifolia.
pulchella, Turc. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xix. (1846) 1. 502.—^nstra]
*rotundifolia, F- MneU- Censns« M-R«UngU rotundifolia.
*rugosa, F,, MueIUl_c_ = Kulingia rugosa.
salvifolia, F. MueU. l.c.-RuTingU salvtfolia.

COMMIA, Lour. Fl. Cochin. 605 (1790) =• Exooecarla, Linn. (Euphorb.).
cochinchinensis, Lour. 1. c. 606 »E. Agallocha.

COMMIANTHUS, Benth. in Hook. Joura. Bot. iii. (1841) 22S=Kotiniphyllum, Humb. *8c* Bonpl. (Rubiac).
eoncolor, Sprnce, ex Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1853) 235 = R. concolor.
discolor, Spruce, ex Benth. 1. c. 234 = R. discolor.
/(Vosas.Spmce, ex Benth. 1. c 238=R. pilosum.
Schomburgkii, Benth. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 223 = R. Schomburgkii.
speeiosus, Sprnce, ex Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1853) 234 = R. speciosum.

COMMIDENDRON, Lem. in Orb. Diet. iv. 147 (1849) -seq.

COMMTDENDRTTM, Burch. ex DC. in Guill. Archiv. Bot. ii. (1833) 334. *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. ii. 277.
Burchellii, *Benth. & Hoot. f. ex Hemsl. Bot. Chall. Voy.* i. II. 71.—Ins. S. Helena.
gummiferum, DC. Prod. v. 344 =robnstnm.
robustum, *DC. I. c.*—Ins. S. Helena.
rotundifolium, DC. 1. c.« Psiadia rotundifolia.
rugosum, *DC. I. c.* 345.—Ins. S. Helena,
spurium, *DC. I. c.* 344.—Ins. S. Helena.

COMMILOBIUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1833) 110=Pterodon, Vog. (Legumin.).
abru-ptum, Moric. PI. Rar. Nouv. Am. 98. t. 62 = P. abrnptus.
polygalaefiorum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 111-P. polygalaeflorus.
pubescens, Benth. 1. c. - P. pubescens.

COMMTPHOHA, Tacq. Hort. Schoenb. ii. 66 (1797). *BURSERACEAE.*
BALSAMEA, Gled. in Berl. Ges. Naturf. Fr. Schr. iii. (1782) 127.
BALSAMODENDRON, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ii. (1824) 348.
BALSAMOPHLOEOS, O. Berg, in Bot. Zeit xx. (1862) 163.
BALSAMUS, Stackh. De Liban. 11 (1814).
HEMPRICHIA, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 896.
HEUDEIX>TIA, A. Rich, in Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. 160. t. 39 (1832).
HITZERIA, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 89 (1861).
NIOTOUTT, Adans. Voy. 162 (1759).
PEOTIONOPSIS, Blume, Mus. Bot Lued. Bat. *i.* 229 (1850).
PROTIUM, Wight & Am. Prod. 176 (1834).
abyasinica, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 10.—Abyss,
africanum, *Endl. 1. c.* 14.—Abyss.
Agallocha, *Engl. 1. c.* 11.—Ind. or.
angolensis, *Engl. I. c.* 24.—Air. trop.
Berryi, *Engl. I. e.* 17.—Ind. or.
Boiviniana, *Engl. I. c.* 21.—Afr. trop.
capensis, *Engl. 1. e.* 18.—Afr. austr.
caudata, *Engl. 1. c.* 27.—Ind. or.
edulis, *Engl. 1. c.* 22.—Afr. trop.
erythraea, *Engl. 1. c.* 20.—Afr. trop.
grandifolia, *Engl. I. c.* 25.—Madag.
Harveyi, *Engl. I. c.*—Afr. austr.
Hildebrandtii, *Engl. I.e.* 15.—Afr. trop.
Kataf, *Engl. I. c.* 19.—Arab,
longebracteata, *Engl. I.* c—Afr. trop.
rnadagascariensis, *jacq. Hort. Schoenb.* ii. 66.—Madag.
Marchandi, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 26.—Madag.
mollis, *Engl. 1. c.* 33.—Afr. trop.
mossambicensis, *Engl. I. c.* 26.—Afr. trop.
Mukul, *Engl. 1. c.* 12.—Ind. or.
Myrrha, *Engl. I. c.* 10.—Arab.
Olivieri, *Engl. 1. c.* 24.—Afr. trop.
Opobalsamum, *Engl. 1. c.* 15.—Arab,
orbicularis, *Engl. I. c.* 18.—Madag.
parvifolia, *Engl. I. c.* 536.—Ins. Socotra.
pedunculata, *Engl. 1. c.* 23.—Africa.
Pervilleana, *Engl. 1. c.* 29.—Madag.
pilosa, *Engl. I. e.* 12.—Afr. trop.
planifrons, *Engl. I. c.* 536.—Ins. Socotra
pubescens, *Engl. I. c.* 21.—Ind. or.
Rehmanni, *Engl. I. c.* 15.—Afr. austr.
Schimperi, *Engl. I. c.* 18.—Abyssin.

COUMIPHOBA:—
serrata, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 24.—Afr. trop.
socotrana, *Engl. 1. c.* 686.—Ins. Socotra.
Stocksiana, *Engl. I. c.* 17.—Bcluchist.
tetramera, *Engl. I. c.* 27.—Madag.
Welwitschii, *Engl. 1. c.* 22.—Afr. trop.
zanzibarica, *Engl. I. c.* 28.—Afr. trop.

COMMIRHOEA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1855) 252 = Chrysoehlamys, Poepp. ? (Guttif.).
mecocarpa, Miers, 1. c. 268.—Hab. t

COMOCLADIA, P. Br. Hist. Jamaic 124 (1756). *ANACARD1ACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 419.
DODONAEA, Plum, ex Adans. Fatn. ii. 342 (1763).
acuminata, *Mot. I* Sesse, ex DC. Prod.* ii. 65.—Mexic
angulosa, Willd. Sp. PI. i. 188 =ilicifolia.
Brasiliastrum, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 326.—Am. austr.
dentata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 12.—Ind. occ.
Ehrenbergii, *Engl. in Bot. Jahrb.* i. (1881) 420.—Ins. S. Doming.
glabra, *Spreng. Syst.* i. 176.—Cuba,
Ilicifolia, *Sw.Prod. Veg.lnd. Occ.* 17.—Ind. occ.
integrifolia, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 12.—Am. trop.
intermedia, *Wright, ex Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 386.—Cuba,
loxensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 16.—N. Granat.
mollissima, *H. B. V K. 1. c.* 16. t. 607.—Mexic.
pinnatifida, Linn. Syst. ed. X. 861-integrifolia.
platyphylla, *A. Rich, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 68.—Cuba,
propinqua, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 16.—Cuba,
pnbescens, *Engl. in Bot. Jakrb.* i. (1881) 420.—Jamaic.
serrata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. SO-Salacia oblonga.
Tapaculo, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 16» Tapiria gnianensis.
tomentosa, Willd. ex Schnlt. Mant. i. 350-mollissima.
tricuspidata, Lam. in Mem. Acad. Sc. Par. 1784 (1787) 347-ilicifolia.

COMOLIA, DC. Prod. iU. 114 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. *t** Hook. f. i. 741.
HOSTMANNIA, Steud. ex Nand. in Ann. Sc Nat Sér. III. xiii. (1849) 25.
LEIOSTEGIA, Benth. in Hook. Joum. Bot ii. (1840) 294.
PACHVLOMA, DC. Prod. iii. 120 (1828).
TETRAMERIS, Naud. in Ann. Sc. Nat *Sit.* III. xiv. (1850) 120. t. 4.
TRICENTRUM, DC. Prod. iii. 123 (1828).
amazonica, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 422.—Bras.
Aubletii, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 37.—Guiana.
berberifolia, *DC. Prod.* iii. US—Bras,
denudata, A^ai^, *in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xiU. (1850) 25.—Bras.
birtella, *Naud. I. c.* 26 =- microphylla.
lanceaeAora, *Triana, in Trans, linn. Soc.* xxviii. (1871) 37.—Bras.
latifolia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. 483 = Aubletii.
leptophylla, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xiii. (1850) 27.—Guiana,
lythrarioides, *Naud. I. c*—Guiana,
microphylla, *Benth. in Hoot. Joum. Bot.* ii. (1840) 295.—Guianft.
neglecta, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. III. 483.—Guiana,
nummularioides, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IIL xiii. (1850) 27.—Bras.
malifolia, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 37. t. 2-denudala.
purpurea, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 617-veroni. caefolia.
Sertularia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 37. t. 2. f. 27 f.—Bras,
sessilis, *Triana, I. c. I.* 27 e.—Bras,
stenodon, *Triana, I. c.* 87.—Bras.
surinamensis, Miq. Stirp. Surin. 55 = lythrarioides.
tetraptera, *Cogn. in Mart. Fl. Brat.* xiv. Hi. 428.—Bra*.

COMOLIA:—
vernicosa, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* ixriii. (1871) 87. t. 2. f. 27 g.—Bras,
veronicaefolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 295.—Guiana.
veronicaefolia, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 86 = purpurea.
villosa, *Triana, 1. c.* 87.—Guiana,
violacea, *Triana, I. c.* —Bras.

COMOMYBSINE, Hook. f. in Bcnth. ft Hook. f. Gen. ii. 643 (1876). *MYRSINEAE,* Benth. & Hook, f. 1. c.
Schlimii, *Hoot./. I. e.* 644.—Am. austr.
simplex, *Hoot./. I. c.*—Am. austr.
Sprucei, *Hook./. 1. c.*—Am. austr.

COMOSPERMA, Poir. in Diet. Sc. Nat. x. (1818) 128 = Comeeperma, Labill. (Polygal.).

COMOSTEMUM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 288 = Androtrichum, Brongn. (Cyperac).
globuliferum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 5-A. polyeephalum.
impolitum, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 397 = Cyperus impolitus.
laetum, Nees, 1. c = Cyperus laetus, *Presl.*
montevidense, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 283-A. polyeephalum.
prolixum, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 897 = Cyperus prolixus.
Schottii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 288=Cyperus prolixus.

COMPARETTIA, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 42. t. 73 (1835). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. Hi. 558.
PLECTROPHOKA, H. C. Focke, in Tijdschr. Natunrk. Wetensch. i. (1848) 212.
coccinea, *Lindl. Bot. Reg.* xxiv. (1838) t. 68.—Bras,
cryptocera, *Morr. in Belg. Horde,* ii. (1852) 810.—Hab.J
falcata, *Poepp. V End!. Nov. Cen.et Sp.* i. 42. t. 78.—Peruv.
macroplectron, *Reichb./. V Triana, in Gard. Ckron.* (1878) II. 524; (1879) I. 398.—N. Granat.
rosea, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 78 = falcata.
saccata, *Poepp.* b* *Endl. Nov. Gen. el Sp.* i. 42. t. 72.—Perav.
speciosa, *Reichb.f. in Gard. Ckron.* (1878) II. 624.—Ecuador.

COMPERIA, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1840) 287 = Orchis, Linn.
taurica, C. Koch, 1. c. 288 = O. Comperiana.

COMPHOROPSIS, Moq. in DC. Prod. xiii. 11. 200, in syn. (1849)=CAMPHOROPSIS, Moq.=Hanophytum, Less. (Chenopod.).

COMPHRENA, Aubl. PI. Gui. i. 280 (1775), sphalm.= Gomphrena, Linn. (Amarant.).

COMPSANTHUS, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 187 (1827)=.Tricyrti8, Wall. (Liliac.).
maculatus, Spreng. 1. t « T . pilosa.

COMPSOA, D. Don, Prod. FI. Nep. 50 (1826)' TrioyrtlB, Wall. (1826) (LUUc).
maculata, D. Don, 1. c. 51 = T. pilosa.

COMPTONIA, Banks, ex Gaertn. Frnct. ii. 58. t. 90 (1791)-Myrioa, Linn.
asplenifolia, Banks, 1. c. — M. asplenifolia.
Ceterach, Mirb. in Duham. Arb. ed. nov. ii. t 11—M. asplenifolia.

COMUS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 24 (1866)-J£useari, Toum. (Liliac.).
carnosus, Salisb. 1. c. 25-M. eomosnm.

CONAMT, Aubl. PI. GuL U. 926. t 354 (1775)=PhyllanthuB, Linn. (Enphorb.).
brasiliensis, AubL 1. c. 927-P. Conami.

CONAUDBOTT, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Wiss. Muench. iii. III. (1843) 729. t. 3. *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1024.
ramond ioides, *Sieb.* b* *Zucc. I. c.*—Japon.

CONAUTHEEA, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iii. 68. t. 301 (1802). *HAEMODORACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 679.
CUMMINGIA, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. iii. t. 257 (1828).
albiflora, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, vi. (1881) 60 =Echeandia terniflora.
bifolia, *Ruiz V Pav. Fl. Per.* iii. 68. t. 301.—Chili.
bifolia, Sims, in Bot. Mag. t. 2496=Simsii.
eampanulata, Lindl. in Trans. Hort Soc. vi. (1826) 283 = Simsii.
Echeandia, Pers. Syn. i. 370 » Echeandia terniflora.
Forsteri, *Spreng. Syst.* ii. 91.—N. Caled.
Simsii, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 428.—Chili.

CONANTHODIUM, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 272 = Helichrysum, Vaill. (Compos.).
Drummondii, A. Gray, 1. c. = H. argyroglottis.

CONAKTHTIS. S. Wats. Bot. King's Exped. 256 (1871). *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 828.
aretioides, 5. *Wats. I.* (.-Am, bor. occ.

CONCEVEIBA, AubL PI. Gui. ii. 923. t. 353 (1775). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 816.
africana, *Muell. Arg. in Flora,* xxxiii. (1864-«6) 530.—Afr. trop.
cordata, A. Juss. Tent. Euph. 43. t. 13 = Alchornea cordata.
gnianensis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 924. t. 358.—Guiana.
Hostmani, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 882.-Guiana.
javanensis, Blnme, Bijdr. 614 = Alchomea rugosa.
latifolia, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 849 = Alchomea rugosa.
latifolia, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 882.—Bras.
macrophylla, Klotzsch,ex Benth. I. c. 838=Alchomea cordata.
Martiana, *Baill. in Adansonia,* v. (1864-65) 221.—Bras.
megalophylla, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 167— Alchomea Martiana.
ovata, Rich, ex A. Jnss. Tent. Euph. 43 = guyanensis.
rhylidocarpa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 372.—Peruv.
terminalis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 167.—Bras.
tomentosa, Span. 1. c. xv. (1841) 349-=Cladogynos orientalis.
trigonocarpa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 872.—Bras.

CONCEVEIBUM, Rich, ex A. Juss. Tent. Euph. 42 (1824)-praec.

CONCHIDIUM, Griff. Notul. iU. 321. t. 310 (1851) = Eria, Lindl. (Orchid.).
pusillum, Griff. 1. c. = E. pusilla.
sinicum, Lindl. ex Benth. in Hook. Kew Joum. vii. (1855) 34=E. sinica.

CONCHIUM, Sm. in Trans. linn. Soc. iv. (1798) 216 = Hakea, Schrad. (Proteac).
aciculare, Sm. ex Vent Jard. Malm. t. 111=H. adenlaris.
ceratophyllum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 124 — H. ceratophylla.
clavatum, Willd. Ennm. Hort. BeroL 141 » H. clavata.
compressum, Sm. in Trans. linn. Soc. ix. (1808) 121= H. acicularis.
corniculatum, Sm. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 141 = H. pugionifonnis.
comutum, Gaertn. f. Fruct. iii. 216. t. 219 - H. gibbosa.
dactyloides, Vent. Jard. Malm. t. 110-H. dactyloides.
drupaceum, Gaertn. f. Fruct. iii. 217. t. 219 = H. leucoptera.
rllipticum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1S08) 123-H. elliptica.

CONCHIUM:—
epiglottis, Willd. Enum. Hort. Berol. 141 - H. epiglottis.
gibbosum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 119-H. gibbosa.
longifolium, Sm. 1. c. 121 = H. pugioniformis.
mucronatum, Cels, ex Spreng. Syst. i. 480 = H. varia.
nervosum, Sm. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 141» H. dactyloides.
oleifolium, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 124 = H. oleifolia.
pubescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 141 = H. gibbosa.
pugioni/orme, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 122 = H. pugioniformis.
Pyriforme.Wm. Enum. Hort Berol. 141=Xylomelum pyrifonne*
ruscifolium, Willd. 1. c. = H. ruscifolia.
salid/olium, Gaertn. f. Fruct. iii. 217 = H. saligna.
salignum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 124 « H. saligna.
sphaeroideum, Sm. 1. c. 120—H. gibbosa.
teretifolium, Gaertn. f. Fruct. iii. 217. t. 219-E. epiglottis.
trifureatum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 122" H. trifurcata.

CONCHOCARPUS,Mikan, Delect fasc. i. t. 2 (1820)-Cusparia, Humb. (Rutac).
cuneifolius, Nees ft Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 162=Cusp, cuneifolia.
macrophyUus, Mikan, Delect, fasc. i. t. 2=Cusp, macrophylla.

CONCHOCHILUS, Hassle, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 146 = Appendioula, Blume, (Orchid.).
distichus, Hassk. 1. c. = A. pendula.
oppositions, Hassk. 1. c. 147 = A. cristata.

CONCHOPHYLLUM, Blume, Bijdr. 1060 (1826) = Dis-Chidia, R. Br. (Asclepiad.).
imbricatum, Blume, 1. c. 1061 = D. Collyris.

CONCILIUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 78 (1836)=Iiightfootia, L'Hérit. (Campan.).
pedunculare, Rafin. 1. c. — L. subulata.

CONDAEA.Steud. Nom. ed.II. i. 403(1840) =COND£A> Adans. = HyptlB, Jacq. (Labiat).

CONDALIA, Cav. in Anal. Ciena Nat i. (1799) 39. t 4. *RHAMNEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 376.
buxifolia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 89.—Bras.
coriacea, Reichb. in Flora, xiii. (1830) t. 130=Rh»nus integrifolins.
ftrrea, Griseb. Fl. Brit, W. Ind. 100-Scutia ferrea.
infectoria, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 90.—Bras,
lineata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 27»—Patagon.
maytenoides, *Miers, in Ann.* b* *Mag. Nat. Hist.* *-III. vi. (1860) 14.—Chili,
mexicana, *Schlecht. in Linnaea,* xv. (1841) 471-" Mexic.
microphylla, COT. *in Anal. Cienc. Nat.* i. (1799) 40.—Chili.
obovata, *Hook. Ic. PI.* t. 287.—Texas.
paradoxa, Spreng. Syst. i. 825 = Colletia cruciata.
spathulata, *A. Gray, PI. Wright,* i. 32.—Am. bor. *o*^
spinosa, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 108.—Bras.

CONDALIA, Ruk *Sc* Pav. Prod. 11. t. 2 (1794)-Coooocypseltun, P. Br. (Rubiac.).
lanceolata, Ruiz *Be* Pav. Fl. Per. i. 54 = Cocc. lance»latum.
obovata, Ruiz & Pav. 1. c. = Cocc. obovatum.
repens, Ruiz & Pav. I.e. — Cocc. nmbellatum.
sessilis, Ruiz & Pav. 1. a-Cocc. sessile.

COITDAMIirBA, DC. Prod. iv. 402 (1830). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 42.
corymbosa, *DC. 1. c.*—Am. austr.
glabrata, *DC. I. c*—Peruv.
macrophylla, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* —Bras.
microcarpa, *DC. Prod.* iv. 402.—Peruv.
linctoria, *DC. I. e.*—Venezuela,
utilis, *Goudot, in Comptes Rendus,* xviii. (1844) 2 «" N. Granat
venosa, *DC. Prod.* Iv. 402.—Peruv.

CONDEA, Adans. Fam. ii. 504 (1768)~Hyptfa, Jacq. (Labiat.).

CONDYLICARPUS, Stend. Norn. ed. II. ii. 691 (1841) «"•• typ. = CONDYLOCARPUS, Hoffm.- Tordy-Umn, Toum. (Umbellit).

CONDYLOCARPO1T, Desf. in Mem. Mus. Par. viii. (1822) 119. t. 11. *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 701.
HORTSMANIA, Miq. in Nat. Verh. Wet. Haarl. vii. 167 (1860).
, MAYCOCKIA, A. DC. Prod. viii. 824 (1844).
oraHliense, Mart, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 64 = Rauwolfiae.
breviarticulatum, *Muell. Arg. I. c.* 66—Bras,
ciliatum, *Muell. Arg. 1. c.* 66.—Bras.
Pacile, *Mien, Apocyn. S. Am.* 28.—Am. austr.
gnyanense, *Desf. in Mtm.Mus. Par.* viii. (1822) 120. t. o.—Guiana,
intermedium, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1.65.—Bras.
jsthmicum, *A. DC. Prod.* via. 881.—Bras.
worn, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 66.—Bras,
myrtifolium, *Muell. Arg. 1. c.* 66, in obs.—Guiana,
obtusiuseulnm, *Muell. Arg. I. c*—Bras.
Polnflorum, *Muell. Arg. 1. c.* 67.—Bras.
R«rwolnae, *Muell. Arg. 1. c.* 84.—Bras.

CONDYLOCARPUS, Hoflm. Gen Umb. ed. II. 202 (1816)=Tordylium, Toum. (Umbellif.).
apulus, Hoflm. 1. c. 203=T. apnlnm.
*«m»7«. Koch, in Nov. Act. Nat. Car. xii. I. (1824) o/=T. apulum.
officinalis, Koch, 1. c « T . offidnale.

CONDVLOCARPUS, Salisb ex Lamb. Pinus, ed. 8vo, W0, sub t. 64 (1882)=Sequoia, Endl. (Conif.).
fnpervirens, Salisb. ex Can. Conif. ed. I. 168=S. sempervirens.

CONFORATA, Caesalp, ex Fonrr. in Ann. Soc. Linn. J-yon, N. S. xvii. (1869) 91=Aehillea, Linn. (.Compos.).
Ag»atum, Fourr. 1. c.=A. Ageratum.

CONGDONIA, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 437. *RUBIACEAE.*
caerulea, *Muell. Arg. I.* f.—Bras.

CONOVEA
v-r^-i Roxb. PI. Corom. iii. 90. t 293 (1819). *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1159.
CALOCHI
a»ur ea -W*TM*' Pwd, Bot Beinerk 148 (1844).
^*a<a, Wall. 1. c. n. 1788 «Sphenodesma barbata.
ginea, Wall. 1. c.
cniata. *i.* n. 1737 s Sphenodesma unguU
inv, um
andrum, >, Wall. 1. c n. 1740-Symphorema poly-
Jackiana, Wall. 1. c
triflora. >• n. 1736=Sphenodesma pentandra,
paniculata, Wall. 1. c. n. 1739-Symphorema involucratum, Sphenodesma paniculate.
pentandra>, Wall. 1. c n. 1734-Sphenodesma pentandra.
tomentose, *Roxb. PI. Corom.* ill. 90.—Burma.
unguiculata, Wall. Cat n. 1736 = Sphenodesma unguiculata.
velutina, *Wight, I.* 1479 B.—Burma.
vestita, *Grif. Notul* iv. 174.—Burma.
villosa,
Wight, Ic. t" 1479 B.—Burma!

N
CO Fp?^S V WaU Cat "• 8°«0j ex Hiem, in Hook. f.
(S. S Ind< fl81 (18?6) - Schleichera, Wild.
ceylonensis, Wall. i: c = S . trijnga.

CONIAN Enum. 275
(1836)-KedPO8tto, Medic (Cnenrb.).
african ^ ^ i an Ha rv. * S ob F L Cap. ii. 488 =
K. af
corallina, Fenzl Naud m Ann. Sc. Nat. Ser. IV.
xvi. (1862) MO- Corallocarpus Fenriii.
digitata, Sond. in Harv. & Sond.
digitata.
dissect K.

*/"" "co' ^ ^ d - L c. 276-K. grossulariaefolia.

CONIANDRA:—
grossulariaefolia, Am. in Hook. Joura. Bot. iii. (1841) 278 = Kedrostis grossulariaefolia.
nuUis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 486=K. mollis.
pinnatisecta, Schrad. in Eckl. ft Zeyh. Enum.276-K. africana.
punctulata, Sond. in Harv. & Sond. FI. Cap. ii. 484 - K. punctulata.
Thunbergi, Sond. 1. c.-K. nana.
Zeyheri, Sehrad. in EckL & Zcyh. Enum. 276-K. Zeyheri.

CONIOGETON, Blume, Bijdr. 1166 (1826) = Buchananla, Roxb. (Anacard.).
arborescent, Blume, 1. c. = B. florida.

CONIOSELINUM, Fisch. ex Hoflm. Gen. Umb. ed. I. p. 180 et xxviii. (1814); ed. II. 186 (1816) = UgUfltlcum, Linn. (Umbellif.).
allaicum, Rupi. in Beitr. PH. Rnss. Reich, xi. 22.—Sibir.
canadense, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 619=Selinum cuifldnsCi
cenolophioides, Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 736-Selifium cenolophioides.
Cternaevia, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. it 88>Pencedannm latifolium.
Fischeri, Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1827) i. 266 = Selinum Benthami.
gayoides, Less, in Linnaea, ix. (1884) 178.—Sibir.
Gmelini, Steud. Norn. ed. II. i. 408 = Ugusticnm Gmelini.
humile, Tnrez. ex Ledeb. Fl. Ross. ü. 318=Pence-duiozo salionni.
ingricum, Fisch. Ind. Sem. Hort Petrop. (1824) ex ledeb. 1. c. 290-Selinum Benthami.
kamtschaticum, Rupr. in Beitr. Pfl. Rnss. Reich, xi. 22.—Kamtsch.
latifolium, Rupr. Sert. Tiansch. 48.—Am. centr.
longifolium, Ttmz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 786.—Sibir.
neglectum, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. 408, 404 = Selinum Benthami.
tataricum, Hoffm. Gen. Umb. ed. II. 186-Selinum Bentbami.
unimttatum, Tuna, ex Kar. *St.* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 868-Selinum Benthami.

CONIOTHELE, DC. Prod. v. 681 (1886)-=Blennoaperma, Less. (Compos.).
californica, DC. 1. c.-B. califomicnm.

CONIROSTRUM, Dulac, FL Hantes-l-yr. 196 (1867) = Brassies, Tourn. (Crucif).
obtusangulum, Dulac, 1. c.=B. Erucastrnm.

CONISA, Desf. «x Steud. Norn. ed. II. i. 404 (1840) - Conyza, Linn. (Compos.).

CC-HTUM, Linn. Syst. ed. I (1786). *UMBELLIFESAE,* Benth. & Hook. f. i. 888.
africanum, Hort. ex DC. Prod. iv. 108 - Carnm coptieum.
africanum, Jacq. Hort Vind. ii. SI. t. 194-Capnophyllum Jacquini.
africanum. Linn. Sp. PI. 248 = Capnophyllum africanum.
Arracada, Hook. Exot. Bot t. 152=Arracacia xanthorrhiza.
chaerophylloides, Eckl. & Zeyh. Enum. 355=SeseU chaerophylloldes.
Cicvta, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 142 =macnlatum.
croaticum. Waldst. & Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 805>=maculatum.
dichotomum,T>es(. FI. Atlant. i. 246. t 66=Capnophyllum dichotomnm.
divaricatum, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. v. 108 =» tnaculatum.
filifolium, Vahl, Symb. Bot. iii. 49-Oenanthe filiformis.
Jacquini, D. Dietr. Syn. PI. ii. 988 - Capnophyllum Jacqnini.
maculatum, *Linn. Sp. PI.* 248.—Europ.; Oriens.
maculosum. Pall. Reis. Statth. Kuss. Reich, i. 478 - maculatum.
Monieri, *Hort. ex OpU, Natural,* x. (1826) 260, nomen. —Europ.

CONIUM:—
moschatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 14. t. 420 =Arracacia moschata.
nepalense, D. Dietr. Syn. PI. ii. 988 -> Vicatia coniifolia.
nodosum, Fisch. ex Steud. Norn. ed. I. 215 = maculatum.
rigens, Linn. Mant. ii. 362, 512 = Bunium rigens.
rigidum, Mert. ex DC. Prod. iv. 140 (*"Sclerosciadium humile).*—Marocco.
Royeni, Linn. Sp. PI. 248-Caucalis daucoides.
rugosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 50-Capnophyllum Jacquini.
sibiricum, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 404« maculatum.
strictum, Tratt Arch. Gew. i. t. 21 - maculatum.
suffruticosum. Berg. Desc. PI. Cap. 77 - Selinum suffruticosum.
tenuifolium, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 2-maculatum.
tenuifolium, Vahl, Symb. Bot iii. 49 = Oenanthe filiformis.
verrucosum, Hochst ex A. Rich. Tent. FI. Abyss, i. 324 = Pimpinclla simensis.

CONIZA, Neck. Delia Gallo-Belg. ii. 848 (1768) - Conysa, Linn. (Compos.).

COKNASOFSI8, Planch, ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 166. *GERANIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 277.
diversifolia, Kurz, in Tourn. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) H. 69 = Griflithii.
glauca,/fa>*./. *in Linn. Soc. Trans,* xxiii. (1860) 166. —Borneo.
Griffithii, *Planch. 1. c. et ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.* 440.—Malaya.
monophylla, *Planch. II. a.*—Malacca,
philippica, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. IILMw. *App.* S3.—Ins. Philipp.

CONNABUS, Linn. Dias. Dass. 23 (1747) ; in Araoen. Acad. i. 406 (1749). *CONNARACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 482.
ANISOSTEMON, Tnrcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xx. (1847) 1.152.
CANICIOIA, VelL Fl. Flum. 184 (1S26); iv. t. 189 (1827).
CASTANOLA, Llanos, in Mem. Acad. Cienc. Madr. ii. (1859) 608.
ERYTHROSTIGMA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 46.
KALAWAEL, Adans. Fam. ii. 844 (1763).
MATHRANCIA, Stend. Norn. ed. II. i. 404, in syn. (1840).
OMPHALOBIDM, Gaertn. Froct. i. 217. t. 46 (1788).
TALI, Adans. Fam. ii. 319 (1763).
TAPOMANA, Adans. Fam. ii 34V (1768).
africanus, *Lam. Encyc.* ii. 95.—Afr. trop.
africanus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 228 = guineus.
Afnelii, R. Br. ex Planch, in Linnaea, xxiii. (1850) 418 = Rourea santaloides.
asiaticus, Willd. Sp. PI. iii. 692 -monocarpos.
Beyrichii, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (lbSO) 430.—Bras.
Blanchetii, *Planch. I. c.* 481.—Bras.
Championii, *Th-w. Enum. PI. Zeyl.* 80.—Zeylan.
conchocarpns, *F. Muell. Fragtn.* v. 106.—Austral,
confertiflorus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 193.—Guiana,
crassifolius, Benth. ex Baker, 1. c. 186-iavosus.
cundfolius. *Baker, 1. e.* 194.—Bras,
cymosus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 430.—Bras,
decumbens, *Thunb. in Roem. Arch.* i. I. (1796) 1.—Afr. austr.
detenus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 438.—Bros.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 629.—Sumatra.
Duparquetianns, *Baill. Adansonia,* vit (1866-67) 236.—Afr. trop.
erianthus, *Benth. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 191.—Bras,
falcatus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 266.—Malaya.
fasciculatus, Planch, in Linnaea, xxiii. (1880) 433» erianthus.
favosus. *Planch. 1. c.* 484.—Bras.

CONMABU8:—
fecundus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 185.—Bras,
ferrngineus, Jaci, *in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 37. —Malaya.
floribundus. Planch, in Linnaea, xxiii. (1850) 435 = Perrottetii.
floribondns, *Sckum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 299.—Afr. trop.
fioribundus. Wall, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 52 = semidecandrus.
florulentus, Thonn. ex DC. Prod. ii. 86=floribundus.
fluminensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Hot. i. (1842) 529 = Bemardinia fluminensis.
foetens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 525 = Munaya exotica.
foholosus, Jack, in Wall. Cat. n. 8629 = Cnestis ramiflora.
fulgens, Wall. Cat. n. 8524 = Rourea fulgens.
fnlvus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 434.—Bras,
furfuraceus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 268.—Sumatra.
Gaudichaudii, *Planch, in Linnaea,* niiL (1860) 429.—Ins. Molucc.
gibbosns, *Wall. Cat.* n. 8541, *ex Planch. 1. c.* 436.—Bnrma; Malaya.
glaber, DC. Prod. ii. 85 = Ronrea glabra.
grandifolius, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 482.—Ins. S. Doming,
grandis, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 40. —Burma; Malaya.
Giiffithii, *Hooi.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 52.—Banna.
Griffonianns, *Baill. Adansonia,* vii. (1866-67) 285.—Afr. trop.
guianensis, *Lamb, ex DC. Prod.* ii. 85.—Am. trop.
haemorrhaeus, *Karst. Fl. Columb.* ii. 73. t. 137.—N. Granat.
Hasseltii, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 266.—Java.
igneus, Wall. Cat. n. 8528 - Cnestis ramiflora.
incomptus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 433.—Guiana.
Jackianus, Wall. Cat. n. 8552 = Cupania Jackiana.
javanicns, *Blume, Bijdr.* 1166.—Java.
juglandifolius, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 179 = Khus succedanea.
kavaiensis, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 162.—Ins. Sandvic.
latifolius, *Wall. Cat.* n. 5837.—Burma,
laurifolius, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 186.—Bras,
lucidus, *Hassk. in Hoev. V De Vriese, Tijdschr.* x. (1843) 144.—Malaya.
lucidus, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 41. —Malaya.
macrophyllus, Poepp. & Endl Nov. Gen. et Sp. iii. 76 =Rourea macrophylla.
Maingayi, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 53.—Malaya.
Manni, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 459.—Afr. trop.
marginatus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 429.—Bras.
microphyllus. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 179 = Rourea microphylla.
mimosoides, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 44 s Ronrea concolor.
mimosoides, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 87 (sp. dubia).—Ins. Nicobar.
mimosoides, Wall. Cat. n. 8526 = Ronrea Wallichiana, similis.
moluccanus, Zipp. ex Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat i. 266 = Gaudichaudii.
monadelphus, *Wall. Cat.* n. 8547 B.—Ind. or.
monocarpus, *Linn. Sp. PI.* 675.—Ind. or.
monocarpus, Wight *8c* Am. Prod. 143 = Rourea santaloides.
monophyllus, Wall. Cat. n. 8551 = Ellipanthus tomentosus.
mutabilis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 269.—Malaya,
nemorosus, *Vahl, ex Schum. f? Thonn. Beskr. Guin. PI.* 299.—Afr. trop.?
nenrocalyx, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1860) 248.—Ins. Philipp.
nitidus, *Hassk. in Flora,* xxvii. (1844) II. 616.—Java,
nitidus, *Roxb. Hort. Beng.* 49; *Wall. Cat.* n. 8540 C. —Ind. or.
nodosus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 190.—Bras,
obliquus, *Presl, in Walp. Ann.* iii. 844.—Ins. Luzon.
cblongifolius, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1267 = Rourea glabra.

CONSABUS:—
obtusifolius, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 428.—Ins. Luzon,
odoratus, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 172.—Borneo,
oligophyllus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 427.—Penang.
panamensia, *Griseb. in Bonplandia,* vi. (1858) 6.—Panama.
panamensis, Turcz. in Bull. Soc Nat Mosc xxxii. (1859) I. 277=Turczaninowii.
paniculatus, *Roxb. Hort. Beng.* 49 ; *Fl.Ind.* iii. 139.—Ind. or.
Patrisii, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 432.—Guiana.
pentagynus, Lam. Encyc. ii. 95->Agelaea Lamarckii.
pentandrus, Roxb. Hort. Beng. 49; Fl. Ind. iii. 140 = paniculatus.
Perrottetii, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 482.—Guiana.
Plckeringii, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exfied.* i. 375. —Ins. Fiji.
pinnatus, Hasselt, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 266 = Hasseltii.
pinnatus. Lam. Encyc. ii. 95=monocarpus.
polyanthus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 428.—Ins. Luzon,
polyphyllus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 629.—Sumatra,
pubescens, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 458.—Afr. trop.
pubescens, DC. Prod. ii. 85 = Rourea revoluta.
punctatus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1860) 482.—Guiana,
pyrrhocarpus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 580.—Sumatra.
reticulatus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 84.—Cuba.
Kitchiei, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 51.—Ind. oi.
Rolfei, *Vidal, Phan. Cv.rn.ing. Philipp.* 23, 106.-Ins. Philipp:
Roxburghii, Hook. & Arn. Bot Beech. Voy. 179 = Rourea Millettii.
vxhet,Planck. in Linnaea, xxiii. (1850) 436.—Am. austr.
rugosus, Wall. Cat. n. 8527 = Rourea rugosa.
santaloides, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 366 = Murraya exotica.
santaloides, Vahl, Syra. Bot. iii. 87 •• Rourea santaloides.
Schomburgkii, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 431. —Guiana,
semidecandrns, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 89.—Burma; Malaya.
Smeathmanni, *Planck, in Linnaea,* xxiii. (1850) 436; *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 468.—Afr. trop.
Spanoghei, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 267.—Ins. Timor.
Sprucei, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 187.—Bras,
stictophyllus, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* i. 548.—Burma,
suberosus, *Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 433.—Bras.
Thomsoni, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 458.—Afr. trop.
Turczaninowii, *Triana &* Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 864.-Panama,
turgidus, *Wall. Cat.* n. 8545, *ex Planch, in Linnaea,* xxiii. (1850) 436.—Ind. or.
unifoliolatus, Tàw. Enum. PI. Zeyl. 80 •> Ellipanthus Thwaitesii.
velutinus, Wall. Cat. n. 8536 = Ellipanthus tomentosus.
venezuelanus, *Baill. Adansonia,* ix. (1868-70) 151.—Venezuela.
venosus, Smeathm. ex DC. Prod. ii. 85 •> africanns.
villosus, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 88. —Sumatra.
villosus, Planch, in Linnaea, xxiii. (1850) 429 = grandis.
Wallichii, Planch. 1. c. 426=grandis.
Wightii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 5L—Ind. or.

CONOBAEA, Bert ex Steud. Norn, ed II. i. 404 (1840) = Muehlenbeckla, Meissn. (Polygon.).
sagittaefolia, Bert, ex Steud. 1. c = M. sagittifolia.

CONOBEA, Aubl. PI. Gui. ii. 639. t 258 (1775). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 951.
BLANCKIA, Neck. Elem. i. 347 (1790).
LKUCOSPORA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 87.

CONOBEA:-
SCHISTOPHRACMA, Benth. in Endl. Gen. 679 (1888V
SPHAKROTHECA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 605.
alata, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Jdura. (1880) 3-Leucocarpus alatus.
aquaticL, *Aubl. PI. Gui.* ii. 689. t. 258.—Guiana.
aquatica, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 141-Herpestis lanigera.
borealis, Spreng. Neue Entdeck. iii. 26=Gratiola virginiana.
indica, Spreng. Syst. ii. 771=Limnophila polystachya.
intermedia, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 117. —Mexic
multifida, *Benth. in DC. Prod. x.* 391.—Am. bor.
ovata, Spreng. ex Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 62=Stemodia parviflora ?
pumila, Spreng. Nov. Prov. 13=Stemodia parviflora.
punctata, *Nees* 6" *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 148.—Bras.
pnsilla, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 951.—Mexic.
scoparioides, *Benth. in DC. Prod.* x. 891.—Mexic.
vandellioides, *Benth. I.* c—Bras.
verticillaris, Hort. Berol. ex Spreng. Nov. Prov. 18 = Stemodia durantifolia.
viscosa, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 61 •= Stemodia durantifolia.
viscosa, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 263.—Bras.

CONOCALPIS, Boj. ex Decne. in DC. Prod. viii. 621 (1844) = 0»yinnema, R. Br. (Asclepiad.).
umbellata, Boj. ex Decne. L c. = G. rufescens.

CONOCARPUS, Adans. Fam. ii. 284 (1763)=Leucadendron, R. Br. (Proteac.).

CONOCARPTJS, linn. Gen. ed. I. 376 (1787): Gaertn. Fruct. ii. 470.1.177 (1791). *COMBRETACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 686.
RHIZAERIS, Rafin. Sylva Tellur. 90 (1838).
RUDBECKIA, Adans. Fam. ii. 80 (1763).
acuminatus, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4014, 4016 " Anogeissus latifolia.
acuminatus, Roxb. Hort. Beng. 84 ; Fl. Ind. ii. 448-Anogeissus acuminata.
acutifolius, Willd. in Roem. *8c* Schult Syst. v. 574 = erectus.
erectus, *Linn. Sp. PI.* 147; *Jacq. Select. Am.* 78. t. 62-—Ind. occ.
hirtus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 4016=Anogeissus acuminata.
lanceolatus, Heyne, ex Wall. I.e. n. 4014= Anogeissus acuminata.
latifolius, Roxb. Hort. Beng. 84; Fl. Ind. ii. *M»~* Anogeissus latifolia.
leiocarpus, DC. Prod, iii 16=Anogeissus leiocarpa.
monocarpus, Steud. Norn. ed. I. 216 = Khus RhadaeUjavel.
myrtifolius, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4017* Anogeissus pendula.
niloticus, *Delile, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 40*-~" Aegypt. Neap.
Novae-Zeylandiae, *Cels, ex Tenore, Cat. Hort.* (1845) 82.—N. Zel.
parvifolius, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. >• 269-Anogeissus leiocarpa.
procumbens. Linn. Sp. PI. 148 = erectus.
pubescens, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* lw-"~ Afr. trop.
racemosus, Linn. Syst. ed. X. 930; Jacq. Select. Am-80—Laguncularia racemosa.
Schimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i- 2°" = Anogeissus leiocarpa.
sericea, Forst. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 662=erectus.
supina, Crantz, Inst. i. 356=erectus.

CONOCEPHALUS, Blume, Bijdr. 483 (1825). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 380.
acuminatus, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. (1847) 91.—Ins. Philipp.
azurens, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl- I**'* xxvi. (1864) 26.—Java; Sumatra.
Blumei, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* t. 96.—Malay*.
borneensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iu-21"' —Borneo,
concolor, *Dal». in Dale. V Gibs. Bomb. Fl.* 23ª-
ellipticus, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 91.—Penang.

CONOCEPHALTTS:—
erectus, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 203.—Ins. Philipp.
gratia, Miq. PI. Jnngh. i. 43-raaveoIens.
Unceolatus, *Trie, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. viiL (1847) 88.—Ind. or.
miennthns, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 210.—Borneo.
microphyllus, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Se"r. III. viii. (1847) 92.—Ins. Philipp.
naucleiformis, Lindl. Bot. Reg. t. 1203=suaveolens.
niveus, Wight, Ic vi. 7. t. 1959 - Drbregeasia velutina.
°»*atus,* Tree, in Aon. Sc. Nat. Ser. III. viii. (1847) 88 - suaveolens.
pubescens, Tree. 1. c. 90 = snaveolena.
Roxburghii, Trfc. 1. c. 88 = suaveolens.
snaveolens, *Blume, Bijdr.* 488.—Ind. or.; Malaya,
subtrinervius, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 417.—Malaya.

CONOCLINIUM, DC. Prod. v. 135 (1836)=Eupatorium, Toum. (Compos.).
acuminatum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. U. 361=E. organense.
«denolepis, Sch. Bip. ex Baker, 1. c - E . Selloi.
affitie, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. v. (,1846) 466 = E. betonicaeforme.
olium. Mart. Del. Sem. Hort. Monac. (1848) 4.—, Mexic.
wlotaefolium, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. H. 360 = K ballotaefolium.
'"onicae/orme, DC. Prod. v. 135 = E. betonicaeforme.
'"ionicum, DC. Prod. v. 135 = £ betonicom.
"rasi/olium, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. FL Bras. vi. H.808 = E.cerasifolram.
°flestinum, DC. Prod. v. 185-E. coelestinnm.
"Khotomum, Chapm. in Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 5 = *.. coelestinum.
ffsectum, A. Gray, PI. Wright, i. 88=E. Greggii.
">rsutUsimum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. *>. H. 311 = E. hirsutissimum.
*«mjfc, Benth. PI. Hartw. 199.—N. Granat.
'«»»*»»«««, Morr. in Ann. Soc. Gand, v. (1849) 173 =E. ianthinum.
xii, Dnr. Ind. Sem. Hort. Burdig. (1872) 15.—urnguay.
ritimum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bias. vi. ."•862 = E.apiculatum.
*K*ocephalunt,* Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 364-E. landolleanum.
*'f *ophyllum,* DC. Prod. v. 135 = E. microphyllum.
*"l'f"., Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. H. ovd = E. sordescens.
pis, Kunze, Del. Sem. Hort. Lips. (1840) iv. 2= E. oheolepis.
**, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. H. 361 = E. organense.
palustre, Sch. Bip. ex Baker 1. c 363 - E. palustre.
Pl&tylepig Sich. Bip. ex Baker, 1. c. 365 = E. Platylepis.
Prasiifolium, DC. in Deless. It SeL iv. t 15-E. petoides.
*Te*jZ?um,* Sch- Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. H. *?"•*= sordescens.
gaium, Chapm. *" CouU" **' G" "1- (1878) *= E- heteroclinium.
rugosum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) t. 168—Ecuador.
scandens, Gaidn. in Hook. Lond. Toum. Bot. vi. (1847) 487—Bras.
semi,-> ii £?*"'"Sch- 8»P- ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. *subl*tum, semistriatum.
nV o"?*'A- Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) •110; Sril U* wi i t ... = E. apiculatui.
Vin ? Bak «. 1- c., sphalm.-E. apiculatum.
iL. Vindex.

CONOHORIA, Aubl (1775) = Alsodeia, Thou.
alternifolia, Spreng" Neue Entdeck" " 151 = A. integrifolia.
Aubletii, D. Diet
*95 = *guianensis.* (1824)

CONOHORIA:—
Ctc^t, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 242= Alsodeia Cuspa.
dentata, D. Dietr. Syn. Ph i. 831-A. gnianensis.
flavescens, Aubl. PI. Gui. i. 239-A. flavescens.
Loboloba, St. Hil. in Mem. Mus. Par. xi. (1824) 494 = A. physiphora.
megapotamica, G. Don, Gen. Syst. i. 341 = A. megapotamica.
owariensis, D. Dietr. Syn. PI. i. 831 - A. owariensis.
Passoura, DC. Prod. i. 812 = A. flavescens.
Perrini, D. Dietr. Syn. PI. i. 882 = A. Perrini.
RegneUii, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 555.—Bras.
Riana, DC. Prod. i. 812 = A. prunifolia.
Rinorea, St. Hil. PI. Rem. 321 - A. paniculata.
ulmi/olia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 387. t. 491 =A. ulmifolia.

CONOMITRA, Fenzl, in Endl. Nov. Stirp. Dec. 65 (1839) = GloBBonema, Decne. (Asclepiad.).
linearis, Fenzl, 1. c. = G. lineare.

COirOHOSFHA, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 102. *MYRSINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 644.
CONOSTYLUS, Pohl, ex A. DC. 1. c. (1834).
bumelioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 168.—Cuba.
guianensis, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 92 = Cybianthus guyaiiensis.
heterantha, *Benth. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 304.—Bras.
jacquinioides, *Griseb. Cat. PI. Cut.* 168.—Cuba,
laxiflora, *DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 109.—Bras.
macrophylla, *Mart. Herb. Fl. Bras.* n. 260.—Bras,
multipunctata, *Miq. Stirp. Sunn. Sel.* 111. t. 84.—Guiana,
nemoralis, *Mart, (f Miq. in Mart. Fl. Bras.* X. 304.—Bras,
oblongifolia, *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 103.—Bras,
peruviana, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvi. (1841) 92.—Pernv.
reticulata, *Benth. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 303.—Bras,
robusta, *Klotssch, in Faun. If Fl. Gui.* 974.—Guiana*

CONOPHALLUS, Schott, Syn. Aroid. 34 (1856) - AmorphophallUB, Blume (Aroid.).
BlunuH, Schott, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 124.—Java.
bulbifer, Schott, Syn. Aroid. 34=A. bulbifer.
commutatus, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 28 = A. commutatus.
giganteus, Schott, ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 198=A. giganteus.
Gigas, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 285—A, Gigas.
Konjak, Schott, Syn. Aroid. 84 = A. Rivieri.
fyratus, Schott, 1. c. 35=A. lyratus.
Muelleri, Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat. 286, in obs. = A. Mulleri.
planus, Miq. 1. c. 286 •= A. planus.
punctulatus, Schott, Prod. Aroid. 35 = A. punctulatus.
sativus, Schott, 1. c = A. sativus.
spectabilis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 199 = A. spectabilis.
Titanum, Becc. in Bull. Soc. Tosc Ortic. iii. (1878) 271, 291-A. Titanum.
tuberculiger, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 28 = A. tuberculiger.

CONOPHARYNGIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 94 (1887) -Plumeria, Toum. (Apocyn.).
longifolia, G. Don, 1. c. 95 = P. longifolia.
retusa, G. Don, 1. c. = P. retusa.

COXTOFHOLIS, Wallr. Orob. Mask. 78 (1825). *OROBANCHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 986.
americana, *Wallr. 1. c.*—Am. bor.
americana, Endl. Iconogn. t. 81—mexicana.
mexicana, *A. Gray, ex S. Wats, in Proc. Ant. Acad.* xviii. (1882-83) 131.—N. Mexic.

CONOPHYTA, Schum. ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1856) 42-Thonningia, Vahl (Balaaoph.).

CONOPODIUM, Koch, in Nov. Act Nat. Cur. xii. (1824) 118. *UMBELLIFERAE,* Benth. *Ic* Hook. f. i. 896.
BULBOCASTANUM, Lag. Amen, Acad. Madr. 99 (1821).
BUTINIA, Boiss. Elench. 53 (1838).
ELAEOSTICTA, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 458.
HETEROTAENIA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 2S7. t. 80 A (1840).
SCAUGERIA, DC. Prod. iv. 248 (1830).
SPHALLEROCARPUS, Bess, in DC. Prod. iv. 230 (1830).
allioides, *Regel tf Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 688.—Turkestan.
boetica, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 738.—Hispan.
Bourgaei, *Coss. Notes Crit.* 110.—Hispan.
brachycarpum, *Boiss. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1865) 44.—Hispan.
butinoides, *Boiss.* b* *Rent, ex Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 736.—Hispan.
canadense, Koch, in Nov. Act. Nat Cur. xii. (1824) 119 = Cryptotaenia canadensis.
capillifolium, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 736.—Lusitan.
Cyminum, *Benth.* b* *Hook. f. Gen.* i. 896.—Dahuria; Volh.
denudatum, *Koch, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1824) 118.—Europ.
hirtulum, *Regel V Schmalh. in PI. Nov. Fedsch.* 28.—As. centr.
Marianum, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 232.—Hispan.
mutabile, Miegev. in Bull. Soc. Bot Fr. xxi. (1874) p. xxxii=denudatum.
pumilum, Nym. Consp. 803=Bourgaei.
pyrenaicum, Miegev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) p. xxxii = denudatum.
ramosum, *Costa, Fl. Catal.* 105.—Hispan.
subcameum, *Boiss. &• Reut. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 736.—Hispan.
subcameum, Bourg. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 643 = Bourgaei.

CONOPSIDIUM, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 147 = Haben&ria, Willd. (Orchid.).
platantherum, Wallr. 1. c = H. bifolia.
sthenantherum, Wallr. 1. c.«H. bifolia.

CONORIA, Juss. Gen. 287 (1789) = Alsodeia, Thou. (Violar.).

CONOSAPIUM.Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 87 •=Sapium, P. Br. (Euphorb.).
madagascariensis, Muell. Arg. 1. c.—Madag.

CONOSILENE, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 344=BUene, Unn. (Caryophyll.).
conica, Fourr. 1. c. = S. conica.
conoidea, Fourr. I. c.=S. conoidea.

CONOSIPHON, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 27 (1842); Endl. Gen. PI. Suppl. ii. 54 (1842) = SphinctanthuB, Benth. (Rubiac.).
aureus, Poepp. *8c* Endl. 1. c.-=S. rupestris.
polycarpus, Karst. in Linnaea, xxx. (1859-60) 155.—N. Granat.
striiflorus, Walp. Rep. ii. 620 - S. rupestris.

COITOSPEIlJftTTM, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 213. *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 174.
acerosum, *Lindl. Swan River App.* 30.—Austral,
acinacifolium, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr-July, 1826) 171.—Austral.
affine, *Roem. V Schult. Syst.* iii. *Mant.* 274—Anstral.
amoenum, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 522.—Austral.
bracbyphyllum, *Lindl. Swan River App.* 31.—Austral,
bracteosum, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* L 61S; ii. 248.—Austral.
Srownii, *Meissn. 1. c.* ii. 248.—Austral.
canaliculatum, Meissn. 1. c. 250 - Stoechadis.
capitatum, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 155.—Austral.
coerulescens, F. Muell. Fragm. i. 157 = amoenum.
cocruleum, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 154.—Austral,
commutatum, *Roem. V Schult. Syst.* iii. *Mant.* 275 - Austral.

CONOSPERMTTM ;—
cras&inervium, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 184—Austral.
Dallachyi, F. Muell. Ann. Rep. (1858) fide Benth. Fl. Austral, v. 371 = MitchelliL
debile, *Kipp. ex Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 70.—Austral.
riensiflorum, *Lindl. Swan River App.* 82.—Austral,
diffusum, *Benth Fl. Austral,* v. 867.—Australl.
distichum, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 622 - flori. bundom.
distichum, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 155. —Austral
ellipticum, 5m. *in Rees, Cycl.* ix. n. 2.—Austral,
ephedroides, *Kipp. ex Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 70.—Austral.
trectum, Hort. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June 1828) 172=ericifolium.
ericifolium, *Sm. in Rees, Cycl.* ix. n. 4.—Austral.
faldfolium, [Salisb. in] Knight, Prot. 95=taxifolium.
filifolium, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 623 - brachyphyllum.
flexuosum, *R. Br. Prod. Suppl.* 1L—Austral,
floribnndum, *Benth. Fl. Austral,* v. 873.—Austral,
glumaceum, *Lindl. Swan River App.* 30.—Austral.
Huegelii, *R. Br. ex End!. Nov. Stirp. Dec.* 68.—Austral,
imbricatum, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 46. —Austral.
incnmim, *Lindl. Swan River App.* SO.—Austral.
intricatum, Lindl. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 323 = Huegelii.
lanceolatum, *R. Br. Prod. Suppl.* 10.—Austral,
laniflorum, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 208. —Austral,
lavandulaefolium, *A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod.* xiv. 319.—Austral.
linifolium, *A. Cunn. 1. c.* 320.—Austral,
longifolium, *Sm. Exot. Bot.* ii. 46. t 82.—Australl.
lupulinum, Endl. ex Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 249=glumaceum.
marginatum, *Meissn. 1. c.* 248.—Austral.
Mitchellii, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 820.—Austral,
nervosnm, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1865) 71.—Austral.
patens, *Schlecht. in Linnaea,* xx. (1847) 587.—Austral,
petiolare, *R. Br. Prod. Suppl.* 11.—Austral,
polycephalum, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 249.—Austral.
procerum, F. Muell. Fragm. i. 157=distichum.
propinquum, R. Br. Prod. Suppl. 10=taxifolium.
repens, Sieber, ex Roem. & Schult. Syst. iii. Mant. 276 =tenuifolium.
reticulatum, Sm. in Rees, Cycl. ix. n. 5 = Synaphea petiolaris.
rigidum, [Salisb. in] Knight, Prot. 96=ellipticum.
scaposum, *Benth. Fl. Austral,* v. 369.—Austral,
sclerophyllum, *Lindl. Swan River App.* 30.—Austral.
Smithii, Pen. Syn. i. 118 = longifolium.
sphacelatum, *Hook, in Mitch. Trop. Austral.* 842. —Austral.
spicatum, R. Br. Prod. Suppl. 10=taxifolimn.
Stoechadis, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 208. —Austral.
taxifolium, Sieber, ex Roem. *ðt* Schult. Syst. iii. Mant. 274 = affine.
taxifolium, *Sm. in Rees, Cycl.* ix. n. 3.—Austral,
tennifolium, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. x.* (1811) 154. —Austral.
tenuifolium, Sieber, ex Roem. & Schult Syst. iii. Mant 275 = commutatum.
teretifolium, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 166. —Austral.
Toddii, *F. Muell. Fragm. x.* 20.—Austral,
triplinervium, *R. Br. Prod. Suppl.* 11.—Austral,
undulatnm, *Lindl. Swan River App.* 31.—Austral.

CO1TO8TEQIA, O. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 816. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 768.
BRUCUIEKA, Rich, ex DC. Prod. iii. 173, in syn. (1828).
CALYCOTOMUS, Rich, ex DC. 1. c (1828).
SYNODON, Rafin. Sylva Tellur. 95 (1888).
acuminata, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 722-Miconia axilliflora.
acutidentata, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 558-xalapensù.
alpina, Macf. Fl. Jamaic. ii. 72 = montana.

CONOSTEGIA:—
altemifolia, Mac£ Fl. Jamaic. ii. 71=superba.
arborea, *Steud. Norn.* ed. II. i. 406; *Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 788.—Mexic
attenuata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* ixviii. (1871) 98.—N. Granat.
Balbisiana, Ser. ex DC. Prod. iii. 174-procera.
bracteata, *Triana, in Journ. Bot.* v. (1867) 209.—Nicaragua,
calyplrata, *D. Don, in Mem. Wem. Soc.* iv. (1823) 817. —Ind. occ.
didemioides, *Wright, ex Griset. Cat. PI. Cub.* 98.—Cuba.
cornifolia, Ser. ex DC. Prod. iii. 176 = Miconia cinnamomifolia.
cucullata, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv: (1823) 817 -=Calyptrella cucullata.
dentata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 99. —N. Granat.
discolor, DC. Prod. ill. 174-Charianthus coccineus.
extinctoria, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1623) 817.—N. Granat.
formosa, Macf. Fl. Jamaic. ii. 70=rufescens.
Galeottii, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. IIL xvi. (1861) 107 = arborea.
flabra, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 817 = Astronia Forsteri.
gloriosa, Macf. FL Jamaic. ii. 6S=procera.
holosericea, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 317=xalapensis.
lasiopoda, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 96.—N. Granat.
lutescens, Ser. ex DC. Prod. iii. 176 = Miconia cinnamomifolia.
macrantha, *O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 97.—Costa Rica.
macrophylla, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. IIL xvi. (1851) 112=superba.
mexicana, Ser. ex DC. Prod. iii. 176 = Miconia mexicana.
montana, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 317. —Jamaic.
Mutisii, Ser. ex DC. Prod. iii. 174 - Centronia Mutisii.
myriasporoides, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 99.—N. Granat
Oerstediana, *O. Berg, ex Triana, I. c.* 98.—Costa Rica.
parviflora, *DC. Prod.* iii. 175.—Ins. S. Doming,
polyandra, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 96. t 86.—N. Granat
procera, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 317. —Jamaic.
pulverulenta, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 110=extinctoria.
purpurea, *Griseb. in Bonplandia,* vi. (1858) 6.—Panama,
quadrangularis, *Schlecht. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 405.—Mexic.
rufescens, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xvi. (1861) 107.—Ind. occ
semicrenata, Ser. ex DC. Prod, iii 176 - Miconia semicrenata.
setosa, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 99. —N. Granat.
spedosa, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. xvi (1861) 109.—Panama,
sphaerica, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 98.—Mexic.
subcrustulata, Triana, 1. c.=purpurea.
snbhirsuta, *DC. Prod.* iii. 174,-Cuba.
superba, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 317.—Am. austr.
tunicata, Ser. ex DC. Prod. iii. 176 = Miconia tunica ta.
xalapensis, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* iv. (1823) 317.—Mexic

CONOSTEMUM, Kunth, Enum. PL it 657 (1837), sphalm. = COMOSTEMUM, Nees - Androtri-ehuxn, Brongn. (Cyperac).

CONOSTEPHIOPSIS, Stschegl. in Bull Soc. Nat Mosc. xxxii. (1859) i. 5=Cono8tephiuiii, Benth. (Epacrid.).
Drummondi, StschegL I. c. 6=Conostephium planifolium.
minor, Stschegl. L c=Conostephium minus.
Preissii, Stschegl. 1. c-Conottephium Prdsaii.

CONO8TEPHIUM, Benth. in Enum. PL Hueg. 76 (1837). *EPACRIDEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 611.
CONOSTEPHIOPSIS, Stschegl. in Bull. Soc Nat Mosc xxxii. (1869) I. 6.
minus, *Lindl. Swan River App.* 26.—AustraL
nitens, *Lindl. ex Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 303.—Austral.
pendulum, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 76.—Austral.
Pendulum, Deless. Ic Sel. v. t 28-minus,
planifolium, *F. Muell. Fragm.* vi. 80.—Austral.
Preissii, *Sond. in Lehm. PI. Preiss.* i. 804.—Austral.
Roei, *Benth. Ft. Austral,* iv. 160.—Austral.

CONOSTYIiIS, S. Br. Prod. 300 (1810). *HAEMODORACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 676.
ANDROSTEMMA, Lindl. Swan River App. 46 (1839).
aculeata, *R. Br. Prod.* 300.—Austral.
aemula, Lindl. Swan River App. 45 = setigera.
albicans, A. Cunn. ex Benth. Fl. AustraL vi. 436 = candicans.
americana, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 224. t. 6 = Lophiola aurea.
androstemma, *F. Muell. Fragm.* viii. 19.—Austral.
assimilis, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 20 = setigera.
aurea, *Lindl. Swan River App.* 44.—Austral.
Bealiana, *F. Muell. Fragm.* ix. 60.—AustraL
bracteata, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* it 16.—Austral.
bracteata, Lindl. Swan River App. 45=dealbata.
breviscapa, *R. Br. Prod.* 301.—Austral,
bromelioides, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 18.—Austral.
candicans, *Endl. Nov. Stirp. Dec* 20.—Austral.
canescens, F. Muell. Fragm. viii. 19 = Blancoa canescens.
caricina, *Lindl. Swan River App.* 46.—Austral,
cymosa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 489.—Austral.
dealbata, *Lindl. Swan River App.* 46.—Austral.
discolor, Endl. in Lehm. PL Preiss. ii. 20=setigera.
Drummondi, *Benth. Fl. Austral,* vi. 433 —Austral.
ensifolia, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 21=serrulata.
festucacea, Endl. 1. c. 18-Preissii.
filifolia, *F. Muell. Fragm.* viii. 18.—Austral,
gladiata, *Benth. Fl. Austral,* vi. 484.—Austral.
graminea, Endl. in Lehm. PL Preiss. ii. 19=caricina.
involncrata, *Endl. 1. c.* ii. 23.—Austral.
juncea, *Endl. Nov. Stirp. Dec.* 19.—Austral.
juncea, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 64.—AustraL
laxiflora, *Benth. Fl. Austral,* vi. 439.—AustraL
longifolia, Endl. in Lehm. PL Preiss. ii. 22 " serrulata.
melanopogon, *Endl. 1. c.* ii. 18.—AustraL
minima, Endl. 1. c ii. 21 - C. Psyllium.
misera, Endl. 1. c 22 = serrulata.
occulta, EndL 1. c.=serrulata.
petrophiloides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* *-• 431.—Austral.
Preissii, *EndL in Lehm. PI. Preiss.* ii. 18.—Austral,
prolifera, *Benth. Fl. Austral,* vi. 436.—Austral.
propinqua, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. IT"***" dicans.
Psyllium, *Endl. 1. c.* 21.—Austral.
pusilla, Endl. 1. c. 20=psyllium.
racemosa, *Benth. Fl. Austral,* vi. 436.—AustraL
scorsiflora, *F. Muell. Fragm.* i. 158—Austral.
serrulata, *R. Br. Prod.* 800.—Austral.
setigera, *R. Br. I. c*—Austral.
setosa, *Lindl. Swan River App.* 44. t. 6 A—Australspathacea, EndL in Lehm. PL Preiss. ii. 22-serrol»'»-
spinuligera, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 4S8—Austral.
stylidioides, *F. Muell. Fragm.* viii. 17.—Austral.
sulphurea, Endl. in Lehm. PL Preiss. ii. 17= aurea.
teretiuKula, *F. Muell. Fragm.* viii. 18.—Austral." -
vaginata, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 23.—Austr*'-
vilfosa, *Benth. Fl. Austral,* vi. 433.—Austral.

CONOSTYLUS, Pohl, ex A. DC. in Trans. Linn,*** xvii. (1834) 102=Conomorpha, A. DC (MyraW'-
oblongifolius, Pohl, ex A. DC. 1. c. 10S=Conon>. ° longifolia.

COXTOTHAMmrS, lindl. Swan River ApP- ' (1889). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i- 7J*
divaricatus, *Benth. Fl. Austral,* iii. 164.—Austral,
trinervis, *Lindl. Swan River App.* 9.—Austral.

CONOTRICHIA, A Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. (1830) 277. t. 24, f. 1-Hanattia, Mutis (Rubiac).
Ha, A. Rich. I. c.=M. picta.

CONRADIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. Hi. 88 (1829) = Pentarhaphia, Lindl. (Gesnerac.).
calydna, Mart. 1. c. 88 = P. calycina.
calycosa, Hook. Ic. PI. t 689-690-P. calycosa.
cassioides, Benth. in DC. Prod. x. 511, lapsu, in syn.= Seymeria tennifolia.
cehoides, Griseb. Cat. PI. Cnb. 200.—Cuba.
dandestina, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 461.—Jamaica.
corrugata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 826-Cuba.
Craniolaria, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 88-P. Craniclaria.
««eifolia,* DC. Prod. vii. 526 = P. cnndfolia.
"tpressa, Griseb. Cat. PI. Cnb. 200.—Cuba.
'xserta, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 88=P. exserta.
Jtonbunda, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 99 = P. libanensis.
gloxinioides, Griseb. Cat. PI. Cnb. 200.—Cuba.
htspida, Benth. PI. Hartw. 264 = P. hispida.
*«««7«, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 88 = P. humilis.
Itbanensis, Griseb. FL Brit. W. Ind. 462=P. libanensis.
"umulrides, Griseb. 1. c. 461.—Jamaica.
-'glata. Hook. Ic. PI. t. 874=P. neglecta.
Pfdunculosa, DC. Prod. vii. 625 = P. pedunculosa.
fmila, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 88=P. pumila.
rthculata, Griseb. Cat PL Cub. 201.—Cuba.
«&ra, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 38 - P. scabra.
Sloanri, DC. Prod. vii. 526 = P. Sloanei.
vrutucosa. Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 38 = P. longiflora.
**rrucosa,* Scheidw. ii Otto *Sc* Dietr. AUg. Gartenz. xv- (1847) 226 = P. verrucosa.

CONRADIA, Nntt in Journ. Acad. PhiUd. vii. (1834) 88. L 12=Maoranthera, Torr. (Scrophul.).
Mhnoide, Nutt h c> — M {uchsi0> des.

CONRADIA, Rafin. Neog. 3 (1825) = Tofieldia, Huds. (Liliac.).

CONSjJ^pnTA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1871) 294> *LABIATAE>* Benth. * Hook. f. " 1191.
canescens. *A. Gray, 1. e.* 295.—Am. bor.

CONRINGIA, Heist ex linn. Syst. ed. I (1735); Link, Enum. Hort Berol. ii. 172 (1822). *CRUCIFERAE,* Benth. and Hook. f. i. 78.
alnif CORINKIA> J- & c_ Presl_ FI- Cech. 140 (1819).
anst *L* '"*. *Enum_ Hort_ Ber»l-* a- 172.—Enrop.
"anaca, *s-meet, Hort. Brit.* ed. I. 25.—Austria;
cl.. F" Canca s-
8? ' *"*. '" *Ann_ Sc_ N*t- s<k n.x»ii. (1842)
J*jr^Min.; Syria.
A. M'n' *""" ** *HeldT_ Diagn_ S* er. I. viii. 25.—
nana, Boiss. 1. c. *Sel,* Hl v- 25 „ Malcolmia conringioides.
orienta1,8, *Dum_ Fl_ Bel*e- 123.-Europ.; Oriens.
perfoliat, *Link, Ennm_ Hort_* B"01- 172 = orientalis.
persica, * *piss. D iagn. Set_ X-* « 12—Persia.
planisili *k. & Mey. Ic«d. Sem. Hort. Petrofi.* iii. 32 ~ .s. oco*
Thalianа, Reichb. Ic. Fl. Genn_ » « 60. fig. 4380 = Sisymbrium Thalianum.

CONSANA, Adans. Fam. ii. 420 (1763) = Draba, *Lioa_* (Crucif.).

CONSOLEA, Rev. Hortic. (1862) 174 = Opuntia, Tourn. (Cactac.).
catacantha = cotocantha.
ferox, Lem. L. - O. ferox.
leucacantha, m. I. c. - O. leucacantha.
rubescens, Lem. L. c. = O. rubescens.
spinosis, mo, Lem. 1. c. = 0. spinosissima.

CONSOLIDA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 711 (1821).
Aconifi TP^Phinium, Tourn. (Ronunculac).
Acon'it. *Linn. omn_ Hortp Soc_* (1851) 66 _ D _
Aji ceri, Sch 47 = D. >. in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. Iv. (1858)
*aru_* A jacls_
P«. Seznam, 32 - D. Consolida.

CONSOLIDA:—
paniculata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1863) 47 = Delphinium paniculatnm.
regalis, S. F. Gray, Nat. Air. Brit. PL il. 711 = D. Consolida.
segetum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 47 = D. Consolida.

CONSOLIDA, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 8 (1745) = Symphytum, Tourn. (Boragin.).
major, Gilib. FL Lituan. i. 24 = S. officinale.

CON8TANTIA, Rodrig. Orch. Nov. i. 78 (1877). *ORCHWEAE.*
rupestris, *Rodrig. I. c.* 79.—Bras.

CONSUEGRA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 303 (1821) = seq.

CONSUEGRIA, Mutis, ex Caldas, in Nuev. Seman. Gran. III. (1810) 22 (Quid?).

CONTARENA, Adans. Fam. ii. 120 (1763) - Corymbium, Linn. (Compos.).

CONTARENIA, Vand. FL Lusit. et Bras. Spec. 42. t 3. f. 20 (1788)(Gen. delend.). Benth. & Hook. f. ii. 1137.
trinmia, Vand. ex Roem. & SchulL Syst. iii. 294.—Bras.

CONTORTUPLICATA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 378=Astragalus, Tourn. (Legumin.).
astragaloides, Medic 1. c.=A. contortuplicatus.

CONTRARENIA, Jaume St. Hil. Expos, ii. 346 (1806) = CONTARENIA, Vand.

CONTJLBUM, A. Rich, in MeWSoc. Hist. Par. i. (1823) 391. t. 25. *MONIMIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 143.
gnianensis, *A. Rich. 1. c.*—Guiana.

CONVATITIAKTA, Linn. Syst. ed. I (1785); Gen. ed. I. 96 (1737). *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 770.
AxriXARiA, Ra6n. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 102, 261.
GLOBERIA, Rafin. Med. Fl. ii. 84 (1830).
LILIUM-CONVALLIUM, Tourn. ex Moench, Meth. 636 (1794).
ambigua, Schrank, Baier. FL i. 606-Polygonatum multiflorum.
angulosa, Lam. Fl. Fr. iii. 268=Polygonaturn officinale.
angusiifolia, Poir. Encyc. Suppl. v. 737=Polygonatum biflorum.
biflora, Walt. Fl. Carol. 122=Polygonatum biflorum.
bifolia. Linn. Sp. PL 316=Smilacina bifolia.
borealis, Poir. Encyc. Snppl. v. 737 = Clintonia borealis.
bracteata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 135 = majalis.
braeteata, Thomas, in Gaud. Fl. Heir. ii. 581 = Polygonatum multiflorum.
Broteri, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 416 = Polygonatum Gussonii.
canadensis, Poir. Encyc. Suppl. *iv.* 80 = Smilacina bifolia.
canalicuiata, Willd. Enum. Hort. Berol. 45=Polygonatum biflorum.
ciliata, Poir. Encyc. Suppl. iv. 30=Smilacina racemosa.
cirrhifolia. Wall, in As. Res. xiii. (1820) 882 = Poly. gonatnm sibiricum.
eommutata, Schult. f. Syst vii. 1671 = Polygonatum latifolium.
compressa, Steud. Nom. ed. II. i. 406 - Polygonatum japonicum.
cordifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 265 - Smilacina bifolia.
dichotoma, Thib. ex Pen. Syn. i 373-Stieptopus distortus.
diffusa, Veil. Fl. Flum. 148 ; iii. t. 160=Dichorisandra pubescens.
fragrans, Salisb. Prod. 254=majalis.
fruticosa, Linn. Syst. Nat. ed. X. 984 =- Cordyiine terminalis*
gigantea, Hort. ex Kunth, Ennm. PL v. 136 — Polygonatum latifolium.
glabra, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 347.—Europ.
Govaniana, Wall. Cat. n. 5187 = Polygonatum mnltiflorum.

COTTVALIiAEIA :—
graminifolia, Salisb. Prod. 254 = Ophiopogon japonicus.
hirta, Bosc, ex Poir. Encyc. iv. 369=Polygonalnm latifolium.
hybrida, March, in Van Hall, Bijdr. iv. 843 = Smilacina stellata.
jtapcnica, Linn. f. Suppl. 204=Ophiopogon japonicus.
Keiskei, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 148. —Japon.
latifolia, Jacq. Fl. Austr. iii. 18. t. 232 = Polygonatum latifolium.
latifolia, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. i. 406 = Polygonatum multiflorum.
latifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = majalis.
latifolia, Savi, Bot. Etrusc. ii. 222 - Polygonatum officinale.
Uptophylla, D. Don, Prod. Fl. Nep. 47 = Polygonatum vertidllatum.
majalis, *Linn. Sp. PI.* 814.—Reg. bor. temp.
Mappii, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 52=majalis.
mbnophylla, Oed.ia Fl. Dan. 1291=Smilacina bifolia.
multiflora,Linn. Sp.Pl. 315 = Polygonatum multiflorum.
obtusifolia, Guenth. ex Steud. Nom. ed. II. i. 406 = Polygonum officinale.
odorata. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=Polygonatum officinale.
oppositifolia, Wall, in As. Res. xiii. (1820) 380 = Polygonatum oppositifolium.
orientalis, Poir. Encyc. Suppl. iv. 80 = Polygonatum polyanthemum.
parviflora, Poir. 1. c. 29=Polygonatum officinale.
polyanthema, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 272-Polygonatum polyanthemum.
Polygonatum, Linn. Sp. PI. 815=Polygonatnm officinale*
Polygonatum, Muhl. Cat. 35 = Polygonatum latifolium.
Polygonatum, Thunb. Fl. Jap. 142 - Polygonatum japonicum.
pubescens, Willd. Hort. Berol. i. 45 = Polygonatum biflorum.
pulchella, Salisb. Prod. 255 = Smilacina bifolia.
punctata. Wall. Cat. n. 5133 = Polygonatum punctatum.
quadrifida, Lam. Fl. Fr. iii. 269=Smilacina bifolia.
racemosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 73 = Smilacina Forskaliana.
racemosa, Linn. Sp. PL 815=- Smilacina racemosa.
racemosa, Veil. Fl. Flum. 142; iii. t. 159 = Dichorisandra Gaudichaudiana.
rosea, Ledeb. Fl. Alt. ii. 41-Polygonatum roseum.
rupestris, Salisb. Prod. 254 = Polygonatum officinale.
scaposa, Gilib. Exercit. ii. 460 = majalis.
scepusiensis, Kit in Linnaea, xxxii. (1868) 347 = glabra.
sibirica, Schult. f. Syst. vii. 1, 297 = Polygonatum sibiricum.
spicata, Thunb. Fl. Jap. 141 = Liriope graminifolia.
stellata, Linn. Sp. PI. 316 = Smilacina stellata.
stellifolia, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 863 = Poly. gonatum verticillatum.
tetrapetala, Gilib. Exercit. ii. 461 = Smilacina bifolia.
Thunbergii, Stend. Nom. ed. II. i. 406 = Polygonatum latifolium.
trifolia, Linn. Sp. PL 316-Smilacina trifolia.
umbellata, Bunge. ex Baker, in Joarn. Linn. Soc. xiv. (1876) 553 = Polygonatum umbellatum.
umbellulata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 202-Clintonia umbellata.
verticillata, Linn. Sp. PL 315 = Polygonatum verticillatum.

CONVOLVULOIDES, Moench, Meth. 451 (1794) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
elongata, Moench, 1. c. 452 = 1. sibirica.
leucosperma, Moench, 1. c. = I. purpurea.
palmata, Moench, 1. c. = I. Pes-tigridis.
pilosa, Moench, 1. c.=I. pubescens.
purpurea, Moench, 1. c - 1. purpurea.
triloba, Moench, 1. c. = I. hederacea.

CONVOLVULUS, [Tourn.]. Linn. Syst. ed.I (1786). *CONVOLVVLACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 874.
BI/CHAREA, CALIXNOS, CAULOTUMS, CLEISOSTOMA, DITEREIA, EMULINA, EXALLOSIS, EXOCROA, IDALIA, LATKIENDA, LI7.ERON, NEMOSTIMA, PENTANTHUS, PERIPHAS, PODALETRA, RHOOOXVLON, SANILUM, SCIADIARA, SYMETHUS, THYELLA, Rafin. Fl. Tellur. 70-84 (1886).

CONVOLVULUS:—
MERREMIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 84 (1818L
PANTOdsEKiA, Griseb. in Oestr. Bot. Zeitschr. (1873) 267.
RHODORHIZA, Webb, in Bot. Reg. (1811) Misc. 69.
STEVOGTIA, Neck. Elem. ii. 23 (1790).
abruptus, Spreng. Syst. i. 696 = Ipomoea abrnpta.
abutiloides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 106 = Ipomoea abutiloides.
acanthocladus, *Boiss. (f Kotschy, Diagn.* Ser. I. vii. 27. —Persia.
acaulis, Choisy, in DC. Prod. ix. 406=erubescens.
acetosatfolius, Steud. Nom. ed. II. i. 400 — Ipomoea martinicensis.
acetosaefolius, Tnrcz. in Ball. Soc Nat Mosc. (1840) 73 = Calystegia hederacea.
acetosaefolius, Vahl, Eclog. Am. i. 18 = Ipomoea camosa.
aceiosellaefolius, Desr. in Lam. Encyc. iii. 564 = Ipomoea acetosellaefolia.
acicularia, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 518.— Afr. trop.
aculeatus, D. Dietr. Syn. PI. i. 667-Ipomoea Bona-nox.
aculeatus, *Hill, Veg. Syst.* vii. 10 (- seq. ?).—Am. merid.
culeatus, *Linn. Sp. PI.* 155.—Am. trop.
acuminatus, Salzm. ex Meisan. in Mart. Fl. **Bras.** vii. 267 — Ipomoea fastigiata.
acuminatus, Vahl, Symb. Bot iii. 26—Ipomoea acuminata.
acutangulus, Spreng. Syst. i. 605=Ipomoea coccinea.
Adansonii, Desr. in Lam. Encyc. iii. 560 = Ipomoea aqnatica.
adpressus. Wall. Cat. n. 1424 = Lettsomia adpressa.
adscendens, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 346 = erubescens.
adscendens, Steud. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 100 = reticulatus.
aegyptius, *Linn. Syst.* ed. X. 923.—Aegypt.
aftghanus, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 168.—Afghan,
affinis, *Scheele, in Linnaea*, xxi. (1848) 749.— Texas.
affinis, C. Sm. ex Steud. Nom. ed. II. J. 407=Tuckey-anns.
affinis. Wall. Cat n. 1385 = Ipomoea polyantha.
africanus, Nickols, Hort. St Doming. 260—Ipomoea cathartica.
aggregatus, Lour. Fl. Cochinch. 109 = Ipomoea aggregata.
aggregatus, Stead. Nom. ed. II. i. 407 = Lettsomia aggregate.
agrestis, Mart, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 405 = Jacqaemontia agrestis.
agraphilus, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 745 = galaticus.
agrostopelis, Veil. Fl. Flam. 71; ii. t. 51 = Breweria Burchellii.
Aitchisoni, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 179.—Afghan.
alatus, Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 24-Ipomoea Turpethum.
alatus, Spreng. Syst. i. 596=Ipomoea alata.
albicans, Wall. Cat. n. 1401 = Ipomoea pilosa.
albiflorus. West, Bidr. Ste Croix, 271-nodiflorus.
albivenius, Lindl. Bot Reg. t 1116 = Ipomoea albivenia.
albus, *[JVocca] Onom. Hort. Ticin.* (1813) 19.—Hab.?
alceaefolius, Bory & Chaub. Fl. Pelop. 14-althaeoides.
alceaefolius. *Lam. Tabl. Encyc.* i. 461.-Afr. austr.
alsinoides, Linn. Sp. PI. 157 = Evolvnlus alsinoides.
althaeoides, *Linn. I. c.* 156.—Reg. Mediterr.
althaeoides, Tenore, Syll. Fl. Neap. 92=tenuissimus.
althaeoides, Thunb. Fl. Cap. ii. 18 = Thnnbergii.
altissimus, Spreng. Syst. i. 613=Ipomoea staphylinai
amblyocalyx, Steud. Nom. ed. II. i. 407 = fatmensis.
Ammannii, *Desr. in Lam. Encyc.* **iii.** 549.—Sibir.
ammocharis, *Boiss. If Haussk. PI. Or. Nov. Dec. i. 6.* —Persia.
ammophilus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 123 -ammocharis.
amoenus, I). Dietr. Syn. PI. i. 670=Ipomoea amoena.
amoenus, C. Koch, in Linnaea, xix. (1846) 19» hirsutus.
ampelopsifolius, Cham. & Schlecht I. c. v. (1830) J18=Ipomoea quinquefolia.

CONVOLVULUS:—
ampliatus, Herb. Brit. Mus. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 361 = Ipomoea ampliata.
amplus, Wall. Cat. n. 1420-Argyreia Roxbnrghii.
ampullaceus, Vahl, ex Choisy, Conv. Or. 61=Lepistemon Wallichii.
anceps, Linn. Mant. L 43=Ipomoea Turpethnm.
andinus, *Phil, in Linnaea*, xxxiv. (1864-65) 184.— ChiU.
angularis, Bnrm. f. Fl. Ind. 46=Ipomoea vitifolia.
angulatus, Buch.-Ham. ex Choisy, Conv. Or. 62 = Ipomoea coccinea.
angulatus, Salzm. ex Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. ix. (1837) 137 = Ipomoea bahiensis.
angulatus, Spreng. Syst. i. 594 = Ipomoea angulata.
angusti/olius, Desr. in Lam. Encyc. iii. 647-= Ipomoea angustifolia.
angustissimus, R. Br. Prod. 482 = erubescens.
aphyllus, Viv. Ann. Bot. i. 95=Ipomoea pentaphylla.
apocynoides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 117 = Jacquemontia hirsuta.
aquaticus, Walt. Fl. Carol. 94 = Breweria aquatica.
arborescens, Humb. & Bonpl. ex Willd. Ennm. Hort. Berol. 204 = Ipomoea arborescens.
arboreus, Balb. ex Stend. Nom. ed. II. i. 407=praec.
arcuatus, Presl, FL Sic. p. xxxiii-pentapetaloides.
arenarius, Vahl, Symb. Bot. i. 18 = Ipomoea camosa.
argenteus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1394=Argyreia fulgens.
argenteus, Lam. Fl. Fr. ii. 266 ; **Desr.** in **Lam.** Encyc. iii. 562=C. Cneornm.
argenteus, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 316 = lanuginosus.
argenteus, Wall. Cat. n. 1364=Argyreia argentea.
argyraeus, DC. Fl. Fr. Suppl. 423=althaeoides.
argyrophyllus, Hoffmgg. Verz. Pfl. 63 = althaeoides.
argyrophyllus. Wall. Cat. n. 1395=Argyreia lanceclata.
aristolochiaefolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 102-Ipomoea aiistolochiaefolia.
aristolochiaefolius, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9 = Ipomoea umbellata.
aristolochiaefolius, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 802 = Homboldtianus.
armatus, Delile, Fl. Egypte, 189. t. 18=C. Hystrix.
armenus, *Boiss. if Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 105. —Armenia; Syria.
arvensis, *Linn. Sp. PI.* 153.—Geront. temp.
asarifolius, Desr. in Lam. Encyc. iii. 662 = Ipomoea asarifolia.
asarifolius, Salisb. Prod. 125=Calystegia Soldanella.
ascendens, Steud. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 400-reticulatus.
ascendens, Walp. Rep. vL 540-erubescens.
asclepiadeus. Wall. Cat. n. 1396=parviflonas.
asper. Wall. 1. c. n. 1388 = Ipomoea grandiflora.
assyricus, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 75, in nota.— As. Min.; Mesopotam.
asyrensis, *Kotschy, in Sitth. Acad. Wien, Math. Nat.* Iii. *Abth.* I. (1866) 260.—Oriens.
atriplicifolius, Poir. Encyc. Suppl. iii. 447=hirsutus.
atropurpureus, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 54 = Lettsomia atropurpurea.
attenuates, *Mart, (f Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1846) 261.—Mexic.
aturensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 96= Ipomoea aturensis.
Aucheri, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 402.—Syria.
aureus, D. Dietr. Syn. PI. i. 672=Jacquemontia hireuta.
aureus, *Thunb. Mus. Nat. Ups.* 168.—Hab.?
auriculatus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 540=arvensis.
auritus, *Willd. ex Roem. (f Schult. Syst.* iv. 301.— Ins. Porto Rico.
atureus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 554 ; Rich, in Act. Soc. Hist. Nat Par. i. (1792) 107=Jacquemontia hirsuta.
babylonicus, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Nap.* (1829) 16. ~"' Afr.'
bahiensis, Spreng. Syst. i. 598 = Ipomoea bahiensis.
barbarus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 294.—Afr. bor.
barbatus. Wall. Cat. n. 1391; PI. As. Kar. ii. 45. t. 155 = Lettsomia barbata.
barbiger. Wall. Cat. n. 1404 = Lettsomia barbigera.
barlerioides, Buch.-Ham. ex Wall. 1. c. n. 2266 = Ipomoea barlerioides.
Batata, Veil. Fl. Flum. 73 ; ii. t. 69(=seq. ?).—**Bras.**
Batatas, Linn. Sp. PL 154; Amoen. Acad. vi. 121-Ipomoea Batatas.

CONVOLVULUS:—
bataiaefolius, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient iv. 106 = armenus.
Batatilla, H. B. & K. Nov. Gen.et Sp. iii. 106 = Ipomoea Batatilla.
bauhiniaefolius, Salisb. Prod. 125-Ipomoea Pescaprae.
Beladambu,Spieng. Syst. i. 608 = Ipomoea Beladamboe.
bellus, Spreng. 1. c. 690=Ipomoea palmata.
benehoavensis, *C. Bolle, in Bonplandia*, ix. **(1861)-64.** —Ins. Canar.
Benthami, Wall. Cat. n. 1893 =- Ipomoea linifolia.
Bentira, Buch.-Ham. ex Wall. 1. c. sub n. 1868-Ipomoea martinicensis.
Besseri, Spreng. Syst. i. 610=lineatus.
betonicaefolius, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 20 = hirsutus.
bibracteatus, Poepp. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras, vii. 270 = Ipomoea lnxurians.
bicolor, Desr. in Lam. Encyc. iii. 564=Ipomoea pilosa.
bicolor, Vahl, Symb. Bot. iii. 26 = Hewittia bicolor.
bicuspidatus, Fisch. ex Link, Enum. Hort Berol. >• 201-arvensis.
bidentatus, *Bernh. in Flora*, xxvii. (1844) H. 828.-Afr. austr.
bifidus, Vahl, Symb. Bot. iii. 30=Ipomoea cymosa.
bifidus, Veil. Fl. Flum. 71; ii. t. 52 *{^Aniseia Vellonana).*—**Bras.**
biflorus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 208=Ipomoea acetosaefolia.
biflorus, *Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr.* 261 (quid?).—faun.
biflorus, Linn. Sp. PI. ed.II. 1668=Ipomoea biflora.
bigtandulosus, Stokes, Bot. Mat Med. i. 326=Ipomoea biloba.
bignonioides, Spreng. Syst. iv. Cnr. Post. 60=Ipomoea bignonioides.
bilobatus, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. 485 = Ipomoea biloba.
binectari/erus, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, >• 47 = Lepistemon Wallichii.
Blanchetii, Steud. Nom. ed. II. i. 407=Jacquemontia Blanchetii.
blandus, Roxb. Hort. Beng. [13]; Fl. Ind. i. 470-Ipomoea cymosa.
Blumii, D. Dietr. Syn. PI. i. 675= Ipomoea angustifolia.
Boerhavia, *ISpreng.] Bot. Gart. Halle*, 28.—Hab. ? .
boerhavioides, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 67-Brewena valeriauoides.
bogotensis, Humb. & Bonpl. ex Willd. Ennm. Hort. Berol. 203—Ipomoea bogotensis.
Boissieri, Sieud. Nom. ed.II. i. 407 = nitidns.
Bona-nox, Spreng. Syst. i. 600-Ipomoea Bona-nox.
bonariensis, Cav. Ic. v. 54. t. 480=incanus.
Bonplandianus, Roem. & Schult. Syst. iv. 884 = Ipomoea sidaefolia.
Bonplandii, Meissn. in Mart. FL Bias. vii. 825 = praec-
Bourgaei, *C. Bolle, in Bonplandia*, ix. (1861) 54.— Ins. TencritTa.
brachyphyllus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii 122=scindicu<-
bracteatus, Bert & Balb. ex Choisy, in DC. Prod, i*-859 = Ipomoea setifera.
braeteatus, Vahl, Symb. Bot iii. 25 - Hewitt* bicolor.
brasiliensis, Linn. Sp. PI. 159 = Ipomoea Pes-caprae.
breviacuminatus. Mart. & Choisy, in DC. Prod. !*• 409 = Jacquemontia racemosa.
breviflorus, Spreng. Syst. i. 606 = Ipomoea setifera.
brevipes, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 86.—Afr. bor.
brevispinus, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 106. t. 369" fruticosus.
Brownii, Spreng. Syst. L 590 = Ipomoea quinata.
Brownii, Spreng. 1. c. 612 = Ipomoea heterophylla.
bryoniaefolius, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 348 = *'-thaeoides.
bryoniaefolius, Salisb. Prod. 125 = Ipomoea P^" tigridis.
bryoniaefolius, *Sims, Bot. Mag.* t. 943.—Reg. Mediterr.
bufalinus. Lour. Fl. Cochinch. 109 - Ipomoe» bufalina.
Burmanni, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 405.—Afr. »«!*:„
caddoensis, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. *W** (1863) 6=Ipomoea leptophylla.
caeruleus, Auct. vide coeruleus.
caespitosus, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. «»•= Hewittia linifolia.
cairicus, Linn. Syst. ed. X. 922.-Ipomoea palnwta.

CONVOLVULUS :—

californicus, Benth. PL Hartw. 826=luleolus.
cahfornicus, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 405.—Am. bor. oce.
caliginosus, Koen. ex Choisy, in *Him.* Soc. Phys. Genev. vi. (1883) 461= Ipomoea cymosa.
Calverti, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 124.—Tauria; As. Min.
Calvcinus, *Drlge, ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 408.— Air. austr.
ealydnus. H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 109 = Ipomoea dssoides.
calycinus, Roxb. Hort. Beng. [13] j Fl Ind. i. 471- Ipomoea calycina.
olyculatus, *Noronha, in Verk. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 10.—Malaya,
•alystegioides, *Choisy, Conv. Or.* 98.—China.
campanulatus, Sprang. Syst. i. 608-Ipomoea campanulata.
campestris, Veil. Fl. Flnm. 74; Ii. t. 86 - Ipomoea polymorpha.
canariensis, *Linn. Sp. PI.* 155.—Ins. Canar.
candicans, Roem. & Schult. Syst. iv. 302-Rivea hypocrateriformis.
"ndicans, Roth, Nov. PI. Sp. 106-Rivea omata.
"ndicans, Soland. ex Sims, in Bot. Mag. t. 1603 = Ipomoea fastigiata.
""tiscens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 99 = Jacquemontia violacea.
C?f'S?ns> Phil- »» Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 182.—
onescens, Roth, Nov. PI. Sp. 107 = Lettsomia [a]E6regata.
[c]«»ta6er, Pall. Phys. Topogr. Gem. Taur. 99 = C. Cantabrica?
^•ntabrica, *Linn. Sp. PI.* 158.—Europ.; Oriens.
™Pensis, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 5.—Afr. austr.
<*pensis, Willd. Sp. PI. i. 877-hastatus.
'opillaceus, H. B. Sc K. Nov. Gen. et Sp. iv. 260= ipomoea muricata.
"pitatus, Cav. Ic. ii. 72. t. 189=lanuginosns.
[c]«pitatus, Desv. in Lam. Encyc iii. 554=Jacquemontia twnntfolia.
"pitatus, Schimp. ex T. Anders, in Jonrn. linn. Soc. v. auppl. j. (1860) 25=glomeratus.
™£™'MS' Vahl, Symb. Bot. iii. 28 = Lettsomia strigosa.
"ptellatus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2250 = Ipomoea Pes-tigridis.
[ca]pitatus, Bir. Encyc. pp . . . *69= Lettsomia strigosa.
[ca]PUuliferus, *Franch. in Rivoil, Çomali*, 41.—Afr. or. trop.
[ca]£jf es, Stokes, Bot Mat Med. i. 827=Ipomoea C«s-caprae.
^"-Medusae, *Lowe, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* =*>. HI. vi. (I860) 155.—Ins. Madera.
[car]«easanus, Willd. ex Roem. & Schult. Syst iv. 301 carl- Ipomoea umbellata.
car* ?. lus> Boiss- FL *Orient*, iv. 96.—Cilicia.
*co7?'" S Pren«- Syst. i. 602=Ipomoea carnea.
carolinus, Spren«•1- c. 609 = Ipomoea camosa.
carolinus, Linn- SP- Pl-164 = Ipomoea commutata.
cataoni,?!!. *Boiss. b- Haussk. ix Boiss. PI. Or. Nov.*
d V- — As. Min.
Cat.«»» Prengyst. i. 603=Calystegia sepium.
catharticus, Blanco, FL Filip. ed. I. »4-Ipomoea grandiflora.
catharticus, *Crantz Inst-* "• 388.-Am. trap. ?
Cavanillesii, Spreng. Syst- >• 580=Ipomoea Cavanillesii.
cephalanthus, Wall. Cat n. 1402 = Lepistemon Wallichii.
cephalophorus, *«« Diagn.* Ser. I. vii. 22.-Persia.
cephalopodus, Boiss. 1. c. 24=ericeus.
cespitosus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 97 = libanoticus.
chenopodioides, *Dtsr- «'» <£«»» Encyc.* iii. 544.- C Hab.?
Cherieri, Agardh, ex Roem- * Schult- Syst> iv> 261 = arvensis.
chilensis, Pers. Syn. L "O-dissectus.
chinensis, Ker-Gaw[l] "•• R'B-[l]- 822-arvensis.**
Choisyanus, Wall. Cat> n* 2*W=Argyreia Leschenaultii.
chofsule sty Sprcn8- Syst. i. 699 = Ipomoea coccinea.
Choy ndri?Wj a. Choisyanus. Nom. e lapsu =

CONVOLVULUS :—

chryseides, Sprang. Syst. i. 598 = Ipomoea chryseides.
chrysorrhiius, Schrad. (vel Soland.) ex Stead. Nom. ed. II. i. 108,109- Ipomoea mammosa?
dliatus, Roth, Catalect. fasc. i. 39 = undulatus.
citiatus, Vahl, Eclog. Am. ii. 13-= Jacquemontia tamnifolia.
dliolatus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 137 -= Ipomoea pandurata.
cinerascens, Sprang. Syst. i. 609 - Ipomoea incisa.
circinnatus, Willd. ex Roem. *Sc* Schult Syst. iv. 302 = Ipomoea parasitica.
drrhosus, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. lxiv; *ed. Germ.* 475.—Abyss.
dssoides, Lam. Tabl. Encyc. i. 462 ; Vahl, Eclog. Am. ii. 15=Ipomoea cissoides.
cladotrichus, *Mart. Del. Sem. Hort. Monac.* (1846) 4. —Mexic.
Clappertonii, Sprang. Syst. iv. 62 = Ipomoea Clappertonii.
clmatus, Pav. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 46 ***(= Calonyction clavatum).*—Bias.**
Cneorum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxiii-lanatus.
Cneorum, Habl. Taw. 147, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 146=Calverti.
Cneorum, *Linn. Sp. PI.* 157.—Europ. anstr.
Cneorum, Sprun. ex Nym. Consp. 605 = oleaefolius.
coccineus, Salisb. Prod. 124 = Ipomoea coccinea.
cochlearis, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 76, in nota.—Grace; As. Min.
coelestis, Forst. f. Prod. 14 = Ipomoea hederacea.
coelesyriacas, *Boiss. Diagn.* Ser. L xi. 85.—Syria.
coeruleus, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 11. (1845) 259 = Jacquemontia parviflora.
coeruleus, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 101 = Ipomoea ovalifolia.
coeruleus, Sprang. Syst. i. 593-=Ipomoea hederacea.
colubrinus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 66 = Ipomoea muricata.
commatophyllus, Stead, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 354 = Ipomoea commatophylla.
Commersonii, Steud. Nom. ed. II. i. 408=Evolvulas incanus.
commutatns, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 81.—Mesopot
compactus, *Boiss. 1. c.* iv. 40.—As. Min.
condensatus, Bertol. Misc. Bot xv. 18 = Jacquemontia tamnifolia.
confertus, Hort. Hamb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 408 = Argyreia setosa.
congestus, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. lxiv.— Abyss.
congestus, Spreng. Syst. i. 601 = Ipomoea congesta.
contortus, Veil. Fl. Flum. 7b; ii. t. 48 - Ipomoea glabra.
copticus, Linn. Mant. ii. 559 = Ipomoea dissecta.
cordatifolius, Veil. Fl. Flum. 73; ii. t. 60 = Ipomoea Batatas.
cordifolius, Bade, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 381 = Ipomoea Baclii.
cordifolius, Juss. ex Choisy, I. c. 412 = farinosus.
cordifolius, Salzm. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 267 = Ipomoea fastigiata.
cordifolius, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 85.—Afr. austr.
coriaceus. Herb. Brit Mus. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 885 = Ipomoea pentaphylla.
Correjuela, *Steud. Nom.* ed. II. i. 408 Chili.
corsicus, Roem. & Schult. Syst. iv. 256 = arvensis.
corymbosus, Forst f. Prod. 14 = parviflorus.
corymbosus, Linn. Syst. ed. X. 923 = Ipomoea Burmanni.
***costatus*, Meyen, Reise, i. 264 (-*Aniseia costata*).—** Chili,
crassifolins, *Scheele, in Linnaea*, xxi. (1849) 752.—Bras.
crassipes, Kunze, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 483 = Calystegia sepium.
crenatifolius, *Rui»* to" *Pav. Fl. Per.* ii. 10.—Pernv.
crenatus, Jacq. ColL ii. 277-= Hermanniae.
erenatus, Vahl, Symb. Bot. iii. 31 = Vahlii.
crinitus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 568^Jacquemontia tamnifolia.
crispatulus, Wall. Cat n. 1408=Ipomoea petaloidea.
crispifolius, *F. Muell. in Unnaea*, xxv. (1852) 423.—Austral.
crispus, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 15.—Afr. austr.
cumanensis,H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 99 - Ipomoea ferroginea.

CONVOLVULUS :—

cuneatus, Willd. Sp. PI. i. 873 = Argyreia cuneata.
cumiformis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 84. n. 1366 = Argyreia cuneata.
Cupanianus, Tod. in **Ann.** Sc Nat. *Sir.* IV. xx. (1863) 304 = tricolor.
Curtana, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 83, n. 1344 = Ipomoea eriocarpa.
cuspidatus, Willd. ex Spreng. Syst. i. 697-Meyeri.
cymosus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 556=Ipomoea cymosa.
cymosus, Herb. Madr. ex Wall. Cat p. 84, n. 1866 = Argyreia cuneata.
cymosus, Roem. & Schult Syst. iv. 803 = Senegambiae.
cymosus, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. ii. 9-Ipomoea ramosissima.
cynanchifolius, Wall. Cat. n. 1899 = Ipomoea cynanchifolia.
cynanchifolius, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 301 = mollis, Ipomoea Bona-nox.
cyprius, *Boiss. Fl. Orient*, iv. 93.—Ins. Cyprus.
dahuricus, Herb, in Bot Mag. t. 2609=Calystegia dahurica.
damascenus, Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II. vi. 122- stachydifolius.
dasycephalus. Pall, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 401 = lanuginosus.
dasyspermus, Spreng. Syst. L 591-Ipomoea dasysperma.
decumbens, Orteg. ex Steud. Nom. ed. II. i. 408 = undulatus.
deflorate, *Choisy, in Zoll. Syst. Vert. Ind. At chip.* 180, 132.—Malaya.
demissus, *Choisy, in DC. Prod.* ix. **404.—**Chili.
densifiorus, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 303 = Ipomoea umbellata.
dentatus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 89 = Ipomoea Blancoi.
dentatus, Vahl, Symb. Bot. iii. 25 = Ipomoea chryseides.
denticulatus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 540^Ipomoea denticulate.
denticulatus, Spreng. Syst. i. 603—Ipomoea angustifolia.
denticulatus, Steud. Nom. ed. II. i. 408-Ipomoea chryseides.
deserti, Hochst *Sc* Stead, ex Stead. 1. c.-microphyllus.
dianthoides, **Kar.** *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 708=C. Pseudo-Cantabrica.
Dianthus,J. F. Gmel. Syst 348-Ipomoea littoralia.
dichrous, Roem. & Schult. Syst. iv. 263-Ipomoea pilosa.
digitatus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat p. 85. n. 1423 = Ipomoea cissoides.
digitatus, Roxb. Hort Beng. 14; Fl. Ind. i. 479- Ipomoea palmata.
digitatus, Spreng. Syst L 592-Ipomoea digitata.
Dillenii, Desr. in Lam. Encyc. iii. 544 = Ipomoea hederacea.
discolor, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 105- Ipomoea discolor.
dissectus, Cav. Ic. v. 54— incanus.
dissectus. Herb. Madr. ex WaU. Cat. p. 84, n. 1351 = Ipomoea dissecta.
dissectus, Jacq. Obs. Bot. ii. 4 •= Ipomoea sinuata.
distillatorius, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 95-Ipomoea campanulata.
divaricatus, *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 337, 388.—Turkestan.
divaricatus, Wall. Cat. n. 1422 - arvensis.
diversifolius, Kunze, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 367 = incanus.
diversifolius, Schum. ft Thonn. Beskr. Gain. PI. 94 - Ipomoea sagittata.
diversifolius, Sprang. Syst 1. 592=Ipomoea diversifolia.
divisus, Veil. Fl. Flum. 71; ii. t. 49 = Jacquemontia menispermoides.
domingensis, Desr. in Lam. Encyc. iii. 654-Ipomoea tubata.
domingensis, Spreng. Neue Entdeck. iii. 29 = Ipomoea Hispaniolae.
doryenioides, *Den. Rep. Lig.* 283.—Ligur.; **Ins.** Palm.
Dorycnium, *Linn. Syst.* ed. X. 923.—Graeda.
Dorycnium, Pall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 408- lanoginosusi

CONVOLVULUS :—
Dregennus, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 411.—Afr. anstr.
Dryandri, Spreng. Syst. i. 697 = Massoni.
Dudia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat p. 88. n. 1828- Calystegia hederacra.
dumetorum, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. iii. 101 = Ipomoea dumetorum.
Durandoi, *Pomel, Noun,. Mat. Fl. Atl,* 85.—Afr. bor.
ebracteatus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 641 = Ipomoea ebractcata.
eckioides, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 832 = Argyreia abyssinica.
edulis, Thunb. Fl. Jap. 84"Ipomoea Batatas,
edulis, *Veil. Fl. Flum.* 72 ; ii. t. 55.—Bras.
Eichwaldi, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 27, in nota = frulicosus.
tlegans, Wall. Cat. n. 1392 = Breweria elegans.
elegantissimus, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 22 = althaeoides.
ellipticus, Spreng. Syst. i. 618 - Lettsomia elliptica.
elongatus, Salish. Prod. 128 = C. Scammonia.
elongates, *Willd. Enum. Hurt. Berol.* 205.—Ins. Canar.
emarginatus, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 201.—Hab. ?
emarginatus, Vahl, Symb. Bot. iii. 28'Ipomoea martinicensis.
equitans, Benth. PI. Hartw. 16 = incanus.
ereetus, Spreng. Syst. i. 612 = Ipomoea erecta.
eremophilus, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 148.—Persia.
erianthus, Willd. ez Spreng. Syst. i. 610-Breweria aquatica.
erinaceus, *Ledeb. in Eichw. Casp. Caue.* 11. t. 7.—Reg. Casp.
erinaceus, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 102=eremophilus.
eriocarpus, Spreng. Syst. i. 598 = Ipomoea eriocarpn.
eriocaulos, Willd. ex Roem. 8c Sennit. Syst. iv. 301 = Ipomoea purpurea.
eriospermus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 567 = Ipomoea Desrousseanxii.
erosus, Desr. 1. c. 558 = Hermanniae.
erubescens, *Sims, Bot. Mag.* t 1067.—Austral.
erythrocarpus, Wall. Cat. n. 1413=Argyrcia.lanceolata.
esculentus, Salisb. Prod. 123=Ipomoea Batatas.
tsculentus, Veil. FL Flnm. 73; ii. t. 58 = septangularis.
essequebensis, Spreng. Syst. i. 600-Ipomoea fastigiata.
evolvuloides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 25.—Persia.
evolvuloides, Desf. Fl. Atlant. i. 176. t. 49 = undulatus.
excisus, Zipp. ex Span, in linnaea, xv. (1841) 838 — Ipomoea reniformis.
Falckia, Thnnb. Prod. PI. Cap. 35-Falkia repens.
Falkia, *Jacq. Hart. Schoenb.* ii. 38. t. 198.—Afr. austr.
farinosus. *Linn. Mant.* ii. 208.—Afr. trap.
fastigiatus, Herb. Koxb. ex Wall. Cat. n. 2258 = Argyreia popnlifolia.
fastigiatus, Roxb. Hort Beng. [13] ; Fl. Ind. i. 468 = I[K>moea fastigiata.
fatmensis, *Kunue, in Flora,* xxiii. (1840) I. 172.—Afr. bor.
ferrugineus, Steud. Norn. ed. II. i. 408 = Jacqoemontia ferruginea.
ferrugineus, Vahl, Eclog. Am. i. 17 - Ipomoea ferruginea.
festivus, Wall. Cat. n. 1414 - Argyreia argentea, popnlifolia.
filicaulis, Vahl, Symb. Bot iii. 24=Ipomoea angustifolia.
filifolius. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 35 = Ipomoea Cinckkhanksii.
Sliformis, Desr. in Lam. Encyc. iii. 555'Ipomoea filiformis.
filiformis, Thunb. Fl. Cap. ii. 16 = Ipomoea angustifolia.
filipes,Ai//. /. *in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 82.—Ins. Socotr.
Finlaysonianus, Wall. Cat. n. 6607 (Argyreiae sp.).—Cochinch.
firmus, Spreng. Syst. i. 613 = Ipomoea stans.
flagelliformis, Roxb. Hort. Beng. 14 ; Fl. Ind. i. 481 = Ipomoea Beladamboe.
flavescens, D. Dietr. Syn. PI. L 680 — Ipomoea flavescens.
Jlavus, Heyne, ez Wall. Cat. sab n. 1849-Ipomoea chryaeides.
Jlmus, Salisb. Prod. 124 = Ipomoea umbellate.

CONVOLVULUS :—
flavus, *Willd. Sp. PI.* i. 852.—Ind. or.
flexuosus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 84.—Algeria.
flexuosus, Spreng. Syst. i 612 = Ipomoea erecta.
floribundus, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 96.—Am. austr.
floridus, *Linn.f. Suppl.* 136.—Ins. Teneriff.
formosus, J. F. Gmel 8ys.t 343 = Ipomoea sagituta.
formosus, Koxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 214 - Ipomoea kentrocaulos.
Forskalei, Delile, Fl. Egypte, 190.1.18. f. 8-sericeus.
Forskolei, Spreng. Syst. i. 596 = Ipomoea verticillata.
Frankeanus, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 613= Jacquemontia menispermoides.
frondosus, Willd. ex Koem. & Scholt. Syst iv. 803= havanensis.
frutescens. Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 18 = Ipomoea operculata?
frutescens, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross.· iii. 88= froticosns.
fruticans, Pall. Reise, ii. 474-seq.
fruticosns, *Pall. I. c.* ii. 734.—Oriuns.
fruticulosns, *Desr. in Lam. Encyc.* iii. 541.—Ins. Canar.
fugacissimus, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 449 = Evolvulus alsinoides.
fulcratus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 208 = villosus.
fulgens, Wall. Cat. n. 1394 = Argyreia fulgens.
galapagensis, *Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stocth.* 1853 (1855) 213.—Ins. Galap.
galaticns, *Host ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 408.—As. Min.
gangeticus. Linn. Cent. PI. ii. 9; Amoen. Acad. iv. 306 = Evolvulus gangeticus.
gangeticus, Roxb. Hort. Beng. [13]; Fl. Ind. i. 467 = Argyreia tiliaefolia.
gangeticus. Wall. Cat. n. 1340-Ipomoea staphylina.
Garberi, Chapm. in Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 11 = havanensis.
Gaudichaudii, Choisy, Conv. Or. 68 = Ipomoea Torpethum.
gemellus, Burm. f. Fl. Ind. 46; Vahl, Symb. Bot. iii. 27 = Ipomoea obscura.
geniculatus, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1826) 17 = erubescens.
geniculatus, *Munby, ex Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 85. —Afr. bor.
genistoides, Jaub. & Spach, Illnstr. iv. 107. t. 370 = spinosus.
geranioides, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1884) reimp. 7.—Chili.
Gerardi, Roem. & Schult. Syst. iv. 294 = lineatns.
Germaniciae, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 104.—As. Min.
giganteus, Silva Manso, Enum. Snbst. Braz. 18 = Calystegia palmato-pinnata.
glaber, Aubl. PI. Gui. i. 138 = Ipomoea glabra.
glaber, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIIL n. 11.—Ind. occ.
glandulifer, Spreng. Syst. i. 599 • Ipomoea purpurea.
glandulosus, Herb. Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2252 = Lettsomia rubens.
glaucescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 101 = Ipomoea dumetorum.
glaucifolius, Choisy, in DC. Prod. ix. 412 = incanus.
glaucifolius, Spreng. Syst. i. 604- Ipomoea glaucifolia.
glomeratns, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 401.—Arab,
gloraeratus, *Thunb. in Mus. Nat. Vps.* 168.—Hab. 1
glomeratus, Wall. Cat. n. 2257—Argyreia cymosa.
gonatodes, Steud. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 69 = Ipomoea obscura.
gonocladus, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 22 = Hanssknechtii.
Gortschakovii, *Schrenk, Enum. PI. Nov. Song.* 18.— Soongaria.
gassypifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 107 = Ipomoea tuberosa.
gossypinus. Wall. Cat n. 1407 = Ipomoea Wightii.
gracilis, Salisb. Prod. 124 = Argyreia mollis.
gracilis, Spreng. Syst. i. 604 = Ipomoea gracilis.
gramineus, Spreng. 1. c. 607 = Ipomoea graminea.
grandiflorus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 543 = Ipomoea Tuba.
grandiflorus, Hort Brit, ex Stead. Norn. ed. II. i. 409 •> Argyreia liliaefolia.
grandiflorus, Jacq. Hort Vindob. iii. 39 =• Ipomoea latiflora.

CONVOLVULUS :—
grandiflorus,lAna. f. Suppl. 136=Ipomoea grandiflora.
grandiflorus, Wall. Cat. n. 1370 = Ipomoea Bona-nox.
griseus, *Rafin. Atl. Journ.* 177.—Am. bor.
guadalonpensis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 409.—Ins. Guadalup.
guianensis, Aubl. PI. Gui. i. 136 - Jacquemontia guyanensis.
guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PL 90- Ipomoea capitata.
guinensis, D. Dietr. Syn. PI. i. 678 = Ipomoea pileata.
Hamiltonii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 61 = Ipomoea Hamiltonii.
Hardwickii, Spreng. 1. c 60 = Ipomoea calycina.
hastatus, Desr. in Lam. Encyc. iii. £42= Ipomoea angustifolia.
hastatus, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 203-aivensis.
hastatus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1384 = Ipomoea sepiaria.
hastatus, Nutt. in Am. Phil. Trans. N. S. v. (1837) 194 = incanus.
hastatus, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 412- fatmensis.
hastatus, *Thunb. Prod. PI, Cap.* 35.—Afr. austr.
hastifolius, Poir. Encyc. Suppl. iii. 467 = arvensis.
hastigerus, Spreng. Syst. i. 594 = Ipomoea coccinea.
Haussknechtii, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 102.—Persia,
havanensis, *Jacq. Obs. Bot.* ii. 25.—Ind. occ.
havanensis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 409- Ipomoea umbellata.
hederaceus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 90 = HewittU bicolor.
hederaceus, Linn. Sp. PI. 154 = Ipomoea hederacea.
hederaceus, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 17 * Ipomoea cotnmutata.
hederaefolius, Salisb. Prod. 123 = Ipomoea hederacea-
helianthemifolius, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 465.—A*- anstr.
hepaticaefolius, Spreng. Syst. i. 694 - Ipomoea Pestigridis.
hepaticaefolius, Willd ex Roem & Schult. Syst. *ii*- 303 = Ipomoea trifida.
heptaphyllus, Rottl. in Gen Naturf. Fr. Neue Schr. W- (1803) 196-Ipomoea palmata.
Hermanniae, Choisy, in DC. Prod. ix. 408- hermannioides.
Hermanniae, *VHirit. Stirp. Nov.* 67. t. 38.—Peruv.
hermannioides, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 216.-' Texas.
heterophyllus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 109- coelesyriacus.
heterophyllus, Spreng. Syst. i. 592 = Ipomoea heterophylla.
Heynii, Spreng. 1. c. 699 = Lettsomia aggregate.
Heynii, Wall. Cat. n. 1387 = Ipomoea sepiaria.
Hildebrandtii, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 619.—Afr. trop.
hirsutissimus, Wall. Cat. n. 1400=Lettsomia hirHtissiraa.
hirsutm, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* i. 422.—Graecia; A>- Min.
hirsutus. Roem. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 344- Ipomoea hederacea.
hirsutus, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. *W* Ipomoea pentaphylla.
hirsutus, Tenore, Fl. Nap. L 60. t. 16 •» althaeoides.
hirtus, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2264 = Ipomo«* rumicifolia.
hirtus, *Linn. Sp. PI.* 159.—Ind. or.
hirtus, Wight, ex Stend. Nom. ed. II. i. 409 - Ipomoea eriocarpa.
Hispaniolae, Spreng. Syst i. 690 = Ipomoea »•*' paniolae.
hispidus, Vahl, Symb. Bot iii. 29 = Ipomoea eriocarp*
holosericeus, Belong, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 403 - Aucheri.
holosericeus, *Bieb. FL Taur. Cauc.* i. 147.—A». Min.
Hookerianus, D. Dietr. Syn. PI. *L* 666 = Ipomoea ficilolia.
Horsfalliae, D. Dietr. 1. c. 664-Ipomoea HorsTa!"**
Houstoni, Stead. Nom. ed. II. L 408, in syn. = gW*[1]
Huegelii, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 846 ' erubescens.
Humboldtianns, *Roem. &• Schult. Syst.* iv. 884.—VeBir zuela.
humilis, Jacq. Coll. iv. 209. t. 32=undulatus.
humilis, Salisb. Prod. 125-lineatns.
humistratus, Walt. Fl. Carol. 94 = Breweria bumi*'*[1]*

CONVOLVULUS:—
hybridus, *Zoll. V Morr. in Nat. Gtneesk. Arch. Netrl.* /nrf.ii. (1846) 6.—Malaya,
nyoscyamoides, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 620.—Afr. trop.
bpocrateriformis, Desr. in Lam. Encyc iii. 661 - Rivea hypocrateriformis.
hpoleucus, Roem. & Schult. Syst. iv. 884 - Rivea hypocrateriformis.
Hyslrix, *Vahl, Symb. Bot.* i. 16—Aegypt; Arab.
\anthinus, Hance, ex Walp. Ann. iii. 113-parviflorus.
'gneus, Schrad. in Uoett. Gel. Anz. i. (1821) 716 = Ipoinoea flammea.
imbricatus. Spreng. Syst. i. 618-Lettsomia aggregata.
Inperati, Vabl, Symb. Bot L 17=Ipomoea littoralis.
acanns, Vahl, I. c. iii. 23.—Am. bor. et anatr.
mcarnatus, Vahl, Eclog. Am. ii. 12 - Ipomoea incarnata.
•"efsM, *Herb. Mus. Par. ex Choisy, in DC. Prod. ix.* 409.—Pemv.t
'ncisus, Spreng. Syst. i. 609-Ipomoea incisa.
incrassatus. Wall. Cat. n. 1386-Ipomoea sepiaria.
tncurvui, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 99 = Ipomoea Clappertonii.
'"dims, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6-Ipomoea violacea.
indiviais, Veil. FL Flnm. 71J ii. t 60-Ipomoea coccinea.
«flatus, Desf. Tabl. ed. I. 74=Calystegia silvatica.
™*>*gnis,* Spreng. Sjst i. 692-Ipomoea digitata.
nsuavis, D. Dietr. Syn. PI. i. 668 = Ipomoea obscure.
medius, Loisel. in Jonm. Bot ii. (1809) 264 (Not. «») = lineatus.
termedius, Roem. & Schult. Syst. iv. 264-Ipomoea Pnrpurea.
">Tolncellatus, *Klofsch, in Peters, Reise Mossamb. Jot.* 2U._Afr. trop.
»olucratus, Ker-Gawl. in Bot. Ree. t 318 - Hewittia bicolor.
Htblucratus, Spreng. Syst. i. 690-Ipomoea pileata.
•volucratus, Willd. Sp. PI. i. 845=Ipomoea tereti- Migraa.
Ponoea, Veil. Fl. Flum. 72; ii. t 56 - Ipomoea tnloba.
kUSf"1, Roem_ * S6b^t- Syrt- »» 266-althaeoides.
JMooaeus, £ *Sm. in Tuckey, Congo,* 249, nomen.—Cap. Verd.
Linn. Mant. i. 42=Ipomoea Jalapa.
jamaicensis, Jacq. Obs. iii. 6 = havanensis I
cen""*"' Spren6- Syft i. 595-Ipomoea jamoi-
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 85:*Ipolnoea angustifoUa.
«aea, J. F. GmeL Syst. 339-Ipomoea Jalapa.
javan, lat T" ", Burm. ,f FL ^ *8=JPomoe» denticu-
javan: «», Bnnn. f. 1. c. 50-Ipomoea sagittaefolia.
javan: «», Spreng. Syst. i. 605-Ipomoea hastata.
jemenus, Kotschy, *in Sitwb. Wien. Acad.* lit (1866) 2.—Arab.
Iroea«'«. Stend. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 362 -
Ki ^ ^ a k e nocah os.
Kleinii, Spreng. Syst. i. 606 = Ipomoea stolonifera.
Korolko i «" = Ipomoea sinuaU.
Ma?l) ***** &" &*«•«» «« *Act. Hart. Petrop.*
Kotschyi, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vii. 23.—Persia.
KratZ, «« - «a^n. Ser. I. vii. 23.—Persia.
vi. hKS *'^ri **' *Schmalh. in Act. Hurt. Petrop.* (1879) 339.-Turkestan.
lachnaea, Spren& SJ*- *• 606-Ipomoea lachnaea.
lachnospermus, miw> Hochst- «n Ind. Sem. Hort Monsp. (1847) 7
laciniatus, "J^Pomoea lachnospenna.
Argent. *in* Um- ^"9*- iii. 646.-Reg.
lactescens, Gronov. « Cho»7. i» DC. Prod. ix. 433 = Calystegia sepium.
lacteus, Wall. in J. Grah. Cat. Bomb. Pl. 133 = Ipomoea lactea.
lacunosus, Spreng. Syst. i. 597 = Ipomoea lacunosa.
lactus, Salisb. Prod. 123 = Calystegia sepium.
laevicaulis, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 303 = Ipomoea sidaefolia.
laevigatus, Herb. Mas. Brit, ex Stead. Nom. ed. II. i. 409 = Ipomoea laevigata.
lanatus, Vahl, Symb. Bot. i. 16 = sericeus.
laniger, Willd. ex ^ " V - Syrf, i. 698.-Hab.»
lanuginosus, Aitch. Cat Pnnjab PI. 98 = Aitchisoni.
lanuginosus, D, r. in ^ ^ E ncyc.* iiL 551.— Hispan.

CONVOLV'UiiUS:—
lanuginosus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1407-Ipomoea Wightii.
lanuginosus, Ledeb. FL Ron. iii. 88-CalvertL
lanuginosus, Vahl, S)mb. Bot. iii. 23 - hirsutus.
lapathifolins, *Schlecht. in Linnaea,* xix. (1847) 786.—Mexic.
lapathifolius, Spreng. Syst. i. 604 - Ipomoea acetosellaefolia.
lasianthns, Cm-. *Ic.* v. 58. t. 479.—Chili.
lasiophloeus, Janb. ft Spach, IUnstr. iv. 105. t 368 - leiocalycinns.
lasiospermus, Via. PI. Aeg. Nab. 13. t. I. f. 2 = Ipomoea rumicifolia.
latiflorus, Dear, in Lam. Bncyc. iii 561-Ipomoea Bona-nox.
laurifolius, Roxb. Hort Beng. [13]; FL Ind. i. 470 - Lettsomia elliptica.
laurifolius, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 186-Aigyreia obtecta.
leiocalycinus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 28.—Persia,
leptocladus, *Boiss. 1. c.* 25.—Persia.
leucanthus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 541=Ipomoea lencantha.
leucanthus, Herb. Madr. ex Wall. Cat p. 83, n. 1340 - Argyrda tiliaefolU.
Uucophyllus, Willd. ex Roem. & Schnlt Syst iv. 801 — Ipomoea discolor,
lencotricbus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 87.—Afr. bor.
libanoticus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 82.—Syria.
liieralis, Lhotsky, ex ChoUy, in Mem. Soc. Phys. Genev. ix. (1837) 132-Ipomoea echioides.
lilacinus, D. Dietr. Syn. PL i. 669 = Ipomoea lilacina.
limpkaticus, Veil. Fl. Flum. 70-Ipomoea palmata?
Lindleyi, Steud. Norn. ed. II. i. 409 - Ipomoea hederacea.
lineari/olius, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 28 = pilosellaefolius.
linearis, Cart. Bot Mag. t. 289 = oleaefolius.
linearis, DC. Fl. Fr. Snppl. 424 - lanuginosus.
linearis, Lam. Fl. FT. ii. 267 - cantabrica.
lineatus, *Linn. Syst.* ed. X. 923.—Europ. austr.; As. temp.
lineatus, Sibth. & Sm. Fl. Grace, ii. 81. t 199 - oleaefolius.
linifolius, D. Dietr. Syn. PL i. 675-Ipomoea linifolia.
linifolius, Linn. Cent. PI. ii. 10-Evolvulus alsinoides.
linifolius, Wall: Cat n. 1889 = Ipomoea angustifolia.
Linki, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. II. iii. 94=emarginatus.
littoralis, D. Dietr. Syn. PL i. 680, in syn.-Ipomoea littoralis.
littoralis, I inn. Syst. ed. X. 924-Ipomoea carnosa.
littoralis, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 619.—Afr. trop.
lividus, Moc. ex Stead. Nom. ed. II. i. 409-Ipomoea Jalapa.
lobatus, Engelm. & Gray, PL Lindhdm. i. 44 - incanns.
longifiorus, Heyne, ex Stend. Nom. ed. II. i. 409 = Ipomoea palmata.
longiflorus, Spreng. Syst i. 695—Ipomoea grandifloraf
longipes, 5. *Wats, in Am. Natural,* vii. (1873) 302.—Am. bor. occ
Lotnoha, Buch.-Ham. ex WalL Cat p. 83, n. 1342 = Ipomoea cymosa.
Loureiri, G. Don, Gen. Syst. iv. 290—calystegioides.
lucanus, Tenore, FL Neap. Prod. App. v. 9-Calystegia sepium.
lupulifolia, Griff. Notul. iv. 284 = Ipomoea palmata.
lnteolus,^. *Cray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 90.—Calif.
luteolus, Spreng. Syst. i. 599—Ipomoea coecinea.
luUolus, Wight, ex Wall. Cat p. 84. n. 1349 - Ipomoea chryseides.
luteus, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xiL II. (1845) 260.—Mexic.
lydoides, Boiss. Diagn. Ser. L vii. 28-leiocalycinus.
lyeioides. Wall. Cat n. 1390-Blinkworthia lyctoides.
lymphaticus, VelL Fl. Flnm. ii. t. 47-Ipomoea palmata.
macrantkus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 96 = Ipomoea murncoides.
macrocalyx, Ruiz & Pav. FL Per. ii. 10-Ipomoea glabra.
macrocarpus, *Linn. Syst.* ed. X. 923.—Ind. occ

CONVOLVULUS:—
macrocarpus, Spreng. Syst i. 592—Ipomoea tuberosa.
macrorhizus, KIL Sketch, i. 252-Ipomoea Jalapa.
macrorhizus,A. Gray, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 381 -Ipomoea fastiyiata.
macrorhiius, Linn. Syst. ed. X. 923 — Ipomoea Jalapa, macrorrhiza.
macrorrhizus, Heyne, ex WalL Cat. n. 1850—Ipomoea paniculate.
macrosolen, Spreng. Syst. i. 603-Ipomoea Bona-nox.
macrospermus, Willd. Sp. PL i. 860-Maripa passifloroide*.
macrostegius, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 2O8.-Ealif.
Mahur, Buch.-Ham. ex WalL Cat p. 85, n. 1422 = arvensia,
major, Gilib. Fl. Lituan. i. 43-Calystegia sepium.
major, Hort ex Nichols, Diet Gard. i. 370=Ipomoea purpurea.
malabaricus, Linn. Sp. PL 155-Argyreia malabarica.
malabaricus, Roxb. Hort Beng. [13]; Fl. Ind. L 469 =Ipomoea staphylina.
malabaricus, Wall. Cat. n. 1414 B - Argyreia Hookeri.
Malcolmi, Roxb. Hort Beng. [14]; Fl. Ind. i. 474 - arvensis.
malvaceus, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1874) 117.-A&. trop.
mammosus. Lour. Fl. Cochinch. 108 = Ipomoea mammosa.
marginalis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat p. 83, n. 1840 - Argyreia tiliaefolia.
marginatus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 558-Ipomoea sepiaria.
marginatus, Spreng. Syst. i. 603—Calystegia marginata,
maritimus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 550-Ipomoea biloba.
maritimus, D. Dietr. Syn. PL i. 6S0 - Ipomoea littoralis.
maritimus, Gouan, FL Monsp. 27-Calystegia sepium.
maritimus, Lam. Fl. FT. ii. 265~Calystegia Soldanella.
maritimus, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 89 - C. Cantabrica.
Martii, Spreng. Syst. i. 598 = Calystegia heterantha.
martinicensis, Jacq. Select. Am. 26— Ipomoea martinicensis.
mascatensis, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 2B=virgatus.
Massoni, *A. Dietr. Gaert. Nachr.* ii. 377.—Ins. Canar.
mataxocarpns, *Spreng. Syst. i.* 606.—N. G.-anat
matutinus,-HV^, *Bidrag. Ste-Croix,* 271.—Ind. occ.
manritanicus, *Boiss. Voy. Esp.* 418. t. 122.—Afr. bor.
Maximiliani, Nees, in Pr. Nenwied, Reise, 17 - Calystegia sepium.
maximus, Bach.-Ham. ex Wall. Cat n. 1341 - Ipomoea staphylina.
maximus. Linn. f. Snppl. 137; Vahl, Symb. Bot. iii. 26 -Ipomoea sepiaria.
Mechoacana, Vitm. Summa PI. i. 434 = Ipomoea Jalapa.
Medium, Linn. Sp. PL 156-Ipomoea denticulata.
Medium, Roxb. Hort Beng. 14; Fl. Ind. i. 474 - Ipomoea angustifolia.
megapotamicus, Spreng. ex Meissn. in Mart. FL Bras. vii. 259 = Ipomoea megapotamica.
melanostictus. Schlecht in Linnaea, vi. (1831) 787 - Argyreia tiliaefolia.
meonanthus, HoffmgR. ft Unk, Fl. Port i. 869 - tricolor.
meslatanus, *Thunb. Mus. Nat Up*. 168.—Hab.?
Meyeri, *Spreng. Syst.* i. 597.—Hab. J
micranthus, Kiddell, Syn. FL W. St. 70-Ipomoea lacunosa.
micranthus, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 276.—Ind. occ; Mexic.
micranthus, Willd. ex Spreng. Syst. i. 601 = Sprengelii.
microcalyx, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 220.—Assam,
microcalyx, *Pelletan, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 410.—Mexic
micropbyllus, *Sieber, ex Spreng. Syst. I* 611.—Aegypt.
Millerianus, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. Index, 821 - Ipomoea umbellata.
minimus, *Aubl. PI. Gut.* i. 141.—Guiana.
minimus, Vitm. Summa PI. i. 434 - Evolvolus incanus.

CONVOLVULUS:—
minor, Gilib. Fl. Lituan. i. 43-arvensis.
minor, Hort. ex Mil). Gard. Diet. ed. VIII. sub n. 24 -»tricolor,
minutiflorus, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* **xii.** II. (1845) 282.—Mexic.
modestus, Boiss. Diagn. *Set.* I. xi. 82-commutatus.
mollis, Bnrm. f. Fl. Ind. 44-Argyreia mollis.
mollis, H.B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 104 = Ipomoea mollis.
mollis, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* **vii. 314.—Bras,**
mollissimus, *Bertol. Misc. Bot.* xx. 11. t. 3.—Guatemala.
mollissimus. Fall, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 403 = holosericeus.
monospermos, *[Tin-] Elench. PI. Hort. Parm.* **(1802)** 12.—Hab.?
montevidensis, *Spreng. Syst.* i. 604.—Reg. Argent
mueronatus, Benth. PI. Hartw. 120 = nodiflorus.
mucronatus, Forst. f. Prod. 14 = Ipomoea palmata.
mucroni/er, Choisy, in DC. Prod. ix. 414-Jacquemontia guyanensk
multibracteatus, Wall. Cat. n. 1408-Argyreia tomentosa.
mnltifidus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 85.—Afr. anstr.
multiflorus, Banks, ex Stead. Nom. ed. II. i. 410 = Ipomoea congesta.
multiflorus, Bess, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 407 = arvensis.
multiflorus, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. iii. 100 = Ipomoea tubata.
multiflorus. Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 15 = Ipomoea multiflora.
multiflorus, Poit. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 367 = Ipomoea quinquepartita.
multivalvis, R. Br. Prod. 483 - parviflorus.
munitiflorus, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brnx. xii. II. (1845) 262, sphalm. = minntiflorus.
munitus, Wall. Cat. n. 1354 = Ipomoea quinata, pentaphylla.
muricatus, *Linn.* Mant. i. 44-Ipomoea muricata.
mutabilis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 92 = Ipomoea Bona-nox.
mutabilis, Salisb. Prod. 128 = Ipomoea purpurea.
mutabilis, Spreng. Syst. i. 598-= Ipomoea acuminata.
muticus, Stead. Nom. ed. II. i. 410=Ipomoea grandiflora.
natalensis, *Bernk. in Mora*, xxvii. (1844) II. 829.—Afr. anstr.
Neei, Spreng. Syst. i. 598 = Ipomoea peduncularis.
nemorosus, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 303 = Ipomoea pentaphylla.
nervosus, Burm. f. Fl. Ind. 48 = Argyreia speciosa.
nervosos. *Rafin. Fl. Ludov.* 46.—Am. bor.
nevisiensis, Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 25 = Jacquemontia hirsuta.
Nil, Linn. Sp. PI. ed. II. 219=Ipomoea hederacea.
nitens, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 743 = lineatus.
nitidus, *Boiss. Elench.* 65.—Hispan.
nitidus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 544 —Argyreianitida.
nodiflorus, *Desr. 1. c.* 657. —Mexic.
nolanaeflorus, Zipp. ex Span, in Linnaea, xr. (1841) 341 = Ipomoen pumila.
nummularius, Linn. Sp. PI. 157 = Evolvulus alsinoides.
nummularius, Vahl, Eclog. Am. ii. 13 -= Jacquemontia nummnlaria.
nymphaeaefolius, D. Dietr. Syn. PI. i. 670 = Ipomoea peltata.
obdentatus. Stead. Nom. ed. II. i. 410 •= Ipomoea chrysddes.
oblongus, Wall. Cat. n. 1882 = Ipomoea barlerioides.
nbmatus. Wall. 1. c. n. 1381 =Lettsomia setosa.
obscurus, Linn. Sp. PI. ed. II. 220=Ipomoea obsenra.
obtectus. Wall. Cat. n. 1416-Argyreia obtecta.
obtusilobus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 139-Ipomoea acetosaefolia.
obvallatus, Spreng. Syst. i. 595 = Tpomoea bracteata.
occidentalis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 89.—Am. bor. occ
occidentalis, S. Wats. 1. c 118 = macrostegins.
ocellatus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4065.—Afr. anttr.
ockraceus, Lindl. Bot. Reg. 1.1060 = Ipomoea ochraeea.
ochraceus, Vahl, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 380-Ipomoea afra.
Oenotherae, *VatU, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 520.—Afr. trop.
oenotheroides, Linn. f. Suppl. 157 —Ipomoea argyreioides?

CONVOLVULUS:—
officinalis, Pelletan, ex Steud. Nom. ed. II. i. 410= Ipomoea Purga.
oleaefolins, *Desr. in Lam. Encyc.* iii. 562.—Graec'a.
Olgae, *Regel & Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 55.—As. centr.
oligodontus, *Baker, in Journ. Linn. Sac.* **xx. (1883)** 212.—Madag.
operculotus, Gomez, in Mem. Ac. Lisboa, iii. (1812) Mem. Corresp. 27 = Ipomoea operculata.
orinoccensis, Willd. ex Stead. Nom. ed. II. i. 410 = Ipomoea cissoides.
orixensis, *Wall. Cat.* n. 1362 - Lettsomia aggregata.
orizabensis, Pelletan, ex Steud. Nom. ed. II. i. 410-Ipomoea orizabensis.
ornatus, Wall. Cat. n. 1369 = Rivea omata,
oronocensis, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 303, **vide *orinoccensis.***
osyrensis, Roth, Nov. PI. Sp. 405 =» Lettsomia aggregata.
Otites, *Willd. ex Fisch. in Cat. Hort. Gorenk.* **28.—** Hab.?
Ottonis, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 311.—Bras.
ovalifolius, Vahl, Eclog. Am. ii. 16 = Ipomoea ovalifolia.
ovalifolius, West, Bidrag. Ste-Croix, 271 = Ipomoea quinquepartita.
ovatus, Moench, Meth. 450—11*0010*.
ovatus, Reinw. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 382 = Argyreia Guichenotii.
owariensis, Spreng. Syst. i. 694=Ipomoea owariensis.
Owsjanianus, *Smirnow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 25, nomen.—Rossia.
oxyphyllus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 26.—Persia,
oxysepalus, *Boiss. I. c.* 23.—Persia,
palaestinns, *Boiss. 1. c.* xi. 84.—Palaestin.
pallidus, Salisb. Prod. 123 = canariensis.
paUidus, Wall. Cat. n. 1418 = Argyreia pallida.
palmatus. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = Ipomoea quinquefolia.
palustris, *Cav. Ic.* vi. 80. t. 600. f. 2.—Mexic.
palustris, Herb. Ham. ex Wall. Cat. p. 85, n. 1422 = arvensis.
panduratus, Linn. Sp. PI. 163 = Ipomoea fastigiata.
panduratus. Lour. Fl. Cochinch. 107 = Ipomoea panduraeformis.
paniculatus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 96=Ipomoea tuberosa.
paniculatus, Linn. Sp. PI. 156 = Ipomoea digitata.
paniculatus. Wall. Cat. n. 1350 - Ipomoea kentrocanlos.
pannifolins, *[Dryand. in] Ait. Hort. Ken.* **ed. II. i.** 828.—Ins. Canar.
pannosus, Spreng. Syst. i. 612 = Ipomoea erecta.
Papiria, Spreng. 1. c. 692 = Ipomoea pubescens.
paradoxus, Poir. Encyc. Suppl. v. 720=sagittatus.
parasiticus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 163 = Ipomoea parasitica.
pareiraefolius, Bert, ex Spreng. Syst. i. 613 = Ipomoea pareiraefolia.
parnassicus, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. iii. 125 = cochlearis.
parviflorus, Am. ex Steud. Nom. ed. II. i. 410=C. Retzia.
parviflorus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 556 -micranthus.
parviflorus, Salisb. Prod. 125 = siculns.
parviflorus, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 29.—Geront. trop.
parvifolius, Spreng. Syst. i. 611 = pluricaulis.
patens, *Clarke, Trav.* i. ed. II. *Add.* p. xxii.—Oriens.
patens, Desr. in Lam. Encyc. iii. 547 = Breweria hnmistrata.
pauciflorus, Willd. ex Roem. & Schult Syst. iv. 302 = Ipomoea fastigiata.
paulistanus, Silva Manso, Ennm. Snbst. Braz. 17 = Ipomoea echioides.
pedatus, Forslc. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 410 = althaeoides.
pedatus, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. 478 = Ipomoea dasysperma.
peduncularis, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 84 -hirsutus.
peduncularis, Wall. Cat. n. 1417 -Argyreia elliptica.
pedunculatus, Walp. Ann. iii. 112, sphalm. = hirsutus.
pellitus, Ledeb. Fl. Alt. i. 223 = Calystegia pellita.
peltatus, Linn. Sp. PI. 1194-Ipomoea peltata.
penangianus, Wall. Cat. n. 1425 = Lettsomia penangiana.
pendulus, Silva Manso, Enom. Subst. Bias. 17 = Ipomoea utilis.

CONVOLVULUS:—
pendulus, Spreng. Syst i. 690•Ipomoea palmata.
penicillatus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 74.—Abyssin.
pennatifolius, Salisb. Prod. 124-Ipomoea Qnamoclit.
pennatus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 567—praec.
pennifolius, Drapiez, Encycl. iii. (1835)=p'raec
pensylvanicus, Schrank, in SyU. Ratisb. i. (1824) 197 = spithamaens.
pentadactylis, Wall. Cat. n. 1867 = Ipomoea quinata.
pentagonus, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. 485 = Ipomoea cymosa.
pentanthus, Jacq. Coll. iv. 210 = Jacquemontu violacea.
pentapetaloides, *Linn. Syst.* ed. XIL 229.—Earop. austr.; As. Min.
pentaphylloides, *Schrank, in Flora*, vii. (1824) «• *Beil.* 50.—Bras.
pentaphyllus, Linn. Sp. PI. ed. II. 223 = Ipomoea pentaphylla.
pentaphyllus, Salzm. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 287 - Ipomoea glabra.
perfoliatus, Schum. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 89 Ipomoea involacrata.
persiens, *Linn. Sp. PI.* 158.—As. Min.; Persia.
peruvianus, Spreng. Syst. i. 593 — Ipomoea enspidata.
Pes-caprae, Linn. Sp. PI 159 = Ipomoea Pes-caprae.
Pes-tigridis, Spreng. Syst. i. 502 = Ipomoea Pes-tigridis.
petiolaris, Kunth, ex Spreng. 1. c. 698 = Ipomoea Bona-nox.
petraeus, *Lee, ex Choisy, in DC. Prod* **ix. 413.—Afr-** austr.
pkilomega. Veil. Fl. Flum. 74; ii. t 63 - Ipomoea capparoides.
phoeniceus, Pav. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. »1* **(= *Opereulina pteropus*).—*Bn**.**
phoeniceus, Spreng. Syst. i. 596 = Ipomoea coccinea-physoides, *Pomel, Nottv. Mat. Fl. Atl.* 294.—Algeria.
Pickeringii, M. A. Curt. In Bost. Joom. Nat. Hist. <• (1837) 180-Breweria Pickeringii.
pileatus, Spreng. Syst. iv. 61 = Ipomoea pileata.
piliferns, *Steud. Nom.* ed. II. i. 410.—Abyssin.
pilosella, *Liebm. Ind. Sent. Hort. Haun.* **(1853) 22;** »» *Ann. Sc. Nat.* Sef. IV. i. (1854) S3.—Hab. ?
pilosellaefolius, *Desr. in Lam. Encyc.* iii. 651.—A* Min.; Persia.
piloselloides, D. Dietr. Syn. PI. i. 676 = pilosellaefolius.
pilosus, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxivpilifem*-
pilosus, *Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* (1803) 196.-Ind. or.
pilosus, Roxb. Hort. Beng. 14 ; Fl. Ind. i. 473 = Ipomoe* pilosa.
pilosus, Wickstr. in Vet. Acad. Handb. Stockh. (1827) 60 = Ipomoea cissoides.
pinnatifidus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. W^ " Cuba.
pinnatus, Baker, Fl. Manrit. 212, sphalm. vide 1*°' natns.
Pinto, *Vand. Fasc. PI.* 9.—Bras.
plantagineus, Choisy, in DC. Prod. ix. 405-Ipo">o^» simplex.
platanifolius, Vahl, Sym. Bot. iii. 26 = Ipomoea fastigiata.
platensis, Spreng. Syst. i. 591 -Ipomoea digitata.
platycarpus, Cav. Ic. v. 55-Phacelia platycarpa.
platypeltis, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) S» Ipomoea campanulata.
platyphyllus, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 41° 460=Riveatiliaefolia.
plebejus, Spreng. Syst. i. 604 = Ipomoea plebeia.
plicatus, *Desr. in Lam. Encyc.* iii. 558.—Afr. anstr.
Plumerii, *Spreng. Syst.* i. 602.—Ins. S. Doming,
pluricaulis, *Choisy, Conv. Or.* 95.—Ind. or.
polyanthus, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 117—Jacquemontia violacea.
polyanthus, Wall. Cat. n. 1378=Ipomoea **polyantha,** staphylina.
polycarpus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. micranthns.
polyrhimos, Silva Manso, Ennm. Subst. Braz. I^ Ipomoea polyrhizos.
pomaceus, Wall. Cat. n. 1419 - Argyreia pomace*' nellygheria.
portoricensis, Spreng. Syst. i. 595-Ipomoea caw** **tica.**
pratensis, Bnch.-Ham. ex ChoUy, Conv. Or. 106" Ipomoea linifolia.

CONVOLVULUS :—

Preissii, De Vriese, in Lehm. PL Praia, i. 846 = erubescens.
procumbent, Lund, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 852 - Ipomoea polymorpha.
Procumbent, Pall, ex Roem. & Scbult. Syst. iv. 295 = holosericeus.
Proliferus, *Vahl, Eclog. Am.* i. 18.—Am. austr.
Proliferus, Willd. ex Roem. & Schult. Syst iv. 802 = Ipomoea tubata.
prostratus, Forsk. FL Aegypt. Arab. 208 - penta-Petaloides.
prostratus, F. W. Schmidt, Fl. Boem. ii. 93 = arvensis.
pruinosus, Stend. Nom. ed. II. i. 411 - Jacquemontia glaucescens.
*p*tudo.Cantabrica,* Schrenk, Enum. PI. Nov. i. 21 = dianthoides.
p>eudo.Scammonia, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 746=C. Scammonia.
rseudosicultis, Cav. Desc. 97 = elongatus.
P^do-Soldanella, Mer. in App. Loisel. ex Bull.. Ferussac (1828) 111=Calystegia Soldanella.
•yudo-tricolor, Viv. Ann. Bot. i. II. 164= tricolor.
Pterocarpus, Bert, ex Co& Hort. Ripul. 37 = Ipomoea •nartinicensis.
Mtrygocaulos, Steud. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 881 —Ipomoea pterygocaulos.
Pubescent, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 246 = wsotus.
Pubescent, Willd. Enum. Hort. Berol. 208=Ipomoea Pibescens.
Pudibundus, Lindl. Bot. Reg. t. 990 = Ipomoea gallarica.
Pulchellus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 101 = Ipomoea fastigiata.
Pulcher, D. Sietr. Syn. PI. i. 667 = Aigyreia ^nichenotiL
Pu.Uherrimus, Veil. Fl. Flum. 72 j ii. t 54=Ipomoea oona-nox.
pus 2&"". Kar_ & Kir_in Bull_ Soc_ Nat_ Mosc_ (1841) 70»Sortschakovii.
*P*inueut,* Silva Manso, Enum. Subst. Braz. 18 - ipomoea punicea.
ruTg„, Wender. in Pharm. Centralb. i. (1880) 457 = Ipomoea Purga.
*pur*Pureut,* Linn. Sp. PL ed. II. 219 = Ipomoea P«rputea.
Putilus, Pall, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 295 = [illegible]
tv [illegible] Hoehst ex Choiiy, in DC. Prod. ix. 865
rrhotnckus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 122 = Ha Va*nechtii.
quadr ATM,'TM8, *Hoehst_ in Lorent, Wanderungen,* 335.-in.
*Q"?»*oclit,* Spreng. Syst 1. 591=Ipomoea Quamoclit.
quinat Sprng-1- c. 690 "Ipomoea quinata.
quinquefol "*, Linn> SysL "*. X- S28"1?0TM06* lqueno L»<3ein. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiii. (-850) II. 508 = arvensis.
quin uelobu *' VaM> Symb- ^ iU> 82 = Ipomoea ps tmata.
VSZoHervis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat p. 85, n. 9u)t ab=par viflorus.
^epartitus, Van». Edog- Am- »" 14-Ipomoea ^1Ue»rtiU.
ra rosus f. Roem. & Schult. Syst. iv. 802 - Ipomoea staphylina.
radicans, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 15.—Afr. austr.
radicosus HMr.&• *Sart. in Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 124. Graecia
ramosissimus, Poir, EncyC> SnppL Uil 468=Ipomoea ramossima.
Rampania, Bn<*-Ham. ex Wall. Cat. n. 2251 - Ipomoea e o carpa.
refractus, P omel, Nouv_ Mat_ *M-Atl.* 84.—Afr. bor.
Reinwardtianus, D,,Dietr,, Syn, PL L 675 Ar e vreia Guichenotii.
remotus, R. Br_ Prod_ «B=erubeseens.
reniformis, cat Hort_Carlsr_ (1811) 76 (Quid !).
reniformis Poir. Encyc. Suppl. iii. 475 = Calystegia Soldanelia.
reniformis, Roxb_ Hort_ Beng. 14; Fl_ Ind_ i. 481 = Ipomoea reniformis.

CONVOLVULUS :—

repandus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 665=Ipomoea reranda.
repens, Linn. Sp. PI. 158 = Calystegia sepium.
repens, Sw. Obs. 64 = Ipomoea acetosaefolia.
ri^ns, Vahl, Symb. Bot. i. 17 = Ipomoea aquatica.
repens, Willd. Sp. PL i. 874=Ipomoea reptans.
reptans, Linn. Sp. PL 168 = Ipomoea aquatica.
reticulatut, Buch.-Hara. ex Steud. Nom. ed. II. i. 411 = Ipomoea petaloidea.
reticulatus, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 399.—Syria.
retusut, Colla, App. Hort. Ripul. iiL 31 = Ipomoea biloba.
Retzia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 410.—Ind. or.
Kheedii, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 70 - Ipomoea uniflora.
rhyniospermus, *Hoehst. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 405.—Afr. trop.
Riedlei, Choisy, Conv. Or. 68-Ipomoea Tnpethum.
riparius, H. B *8c* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 109 = Ipomoea cissoides.
Robertianus, Spreng. Syst v. 192=Ipomoea heterophylla.
roseus, H. B. *8c* K. Nov. Gen. Sp. iii. 108=Ipomoea digilata.
roseus, Mill. Gard. Diet. ed. MIL n. 18=Ipomoea fastigiata.
roseus, Pall. Reise, iii. 317-lineatns.
rostratus, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 839 = Ipomoea aquatica.
Rothii, Spreng. Syst. i. 600=Ipomaea cymosa.
Rottleri, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 61 = Argyreia malabarica.
Rottlerianus, *Choisy, Conv. Or.* 96.—Ind. or.
rotundifolius, Schum. & Thonn. Fl. Beskr. Guin. PL 102=Ipomoea biloba.
Roxburghii, Wall. Cat. n. 1415 - Argyreia Roxburghii.
Royeni, Steud. Nom. ed. II. i. 410, in syn. = Ipomoea pentaphylla.
rubens, Wall. Cat. n. 1421 = Lettsomia rubens.
ruber, Vahl, Kclog. Am. ii. 12 = Calystegia setifera.
rubescens, Poir. Encyc. Suppl. iii. 466 •= erubescens.
rubicundus, Wall. Cat. n. 1409 = Lettsomia rubicunda.
rubrocoeruleus, D. Dietr. Syn. PI. i. 670 •» Ipomoea rubrocoerulea.
ruderarius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 96 = havanensis.
rufescens, Choisy, Conv. Or. 97-flavus.
rugosus, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1808) 196-Ipomoea Beladamboe.
Ruirii, Spreng. Syst i. 594-Ipomoea villosa.
rupestris, Buch, beschr. Canar. Ins. 198 = Massoni.
rupestris, Pall. Reise, iii. 723-Ipomoea sibirica.
rupestris, *Willd. Sp. Fl.* i. 846,—Sibir.
Ruprechti, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 96.—Reg. Caucas.
sabatius, Viv. Fl. Lib. Spec. 67-elongatus.
sagittaefolius, Sallsb. Prod. 123 = arvensis.
sagittatus, Dulac, FL Hautes-Pyr. 439= arvensis.
sagittatus, A. Gray, in Syn. Fl. N. Am. ii. I. 434, -hirsutusT
sagittatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 85.—Afr: austr.
sagittifer, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 100= Ipomoea umbellata.
sagittifolius, Fisch. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 407 - arvensis.
sagittifolius, Michx. Fl. Bor. Am. i. 188 = Ipomoea sagittata.
sagittifolius, *Schlecht. in Linnaea,* xxi. (1848) 747.—Texas.
sagittifolius, Sibrh. & Sm. FL Graec. Prod. i. 138; Fl. Graec. t. 193=hirsutns.
salicifolius, Desr. fai Lam. Encyc. Iii. 648=Ipomoea martinicensis.
salicifolius, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 411 = Ipomoea salicifolia.
Saltii, *Steud. I. c.* = congestus.
sahifolius, Sieber, ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 203 =secundus.
sanguineus, Spreng. Syst. i. 594-Ipomoea hederifolia.
sanguineus, Willd. ex Roem. *Sc* Schult Syst. iv. 302 - Ipomoea snperba.
sarcocarpus, Silva Manso, Enum. Subst. Brat. 49 = Ipomoea operculata.
sarmentosus, *Balf.f, in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 83.—Ins. Socotra.

CONVOLVULUS :—

sarothrocladus, *Boiss. &* Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 92.—Assyria.
saxatilis, Bieb. Fl. Taur. Cauc i. 146 = Calverti.
saxatilis, Salisb. Prod. 124-Massoni.
saxatilis, Vahl, Symb. Bot. iii. 88=lanuginosus.
scamensis. Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 411 = siamensis.
Scammonia, *Linn. Sp. PI.* 158.—As. Min.
Scammonia, Lour. Fl. Cochinch. 106=calystegioides.
scandens, *Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp.* (1847) 7.—Aegypt.
Schiedeanus, D. Dietr. Syn. PL i. 670 - Ipomoea Schiedeana.
Schimperi, *Boiss. Diagn.* Ser.. I. xi. 81.—Arabia,
schirazianus, *Boiss. I. c.* 82.—Persia.
Schottianus, *Dehnh. Cat. P(. Hort. Camald.* ed. II. 19. —Hab. ?
Schultesii, Roem. *Sc* Schult. ex Steud. Nom. ed. II. i. 411 = Ipomoea purpurea.
Schultesii, Weinw. ex Steud. 1. a -Hewittia bicolor.
seindicus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 123 •» microphyllus.
seindicus, *Stocks, in Hoot. Kev Journ.* iv. (1852) 178. —Ind. bor. occ.
scoparius, *Linn.f. Suppl.* 135.—Ins. Teneriff.
scrobiculatus, Lindl. Bot. Reg. t. 1076 = Ipomoea scrobiculata.
secundus, *Desr. in Lam. Encyc.* iii. 553.—Aegypt.; Syria.
secundus, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 10-Jacquemontia seennda.
Selloi, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 314.—Bras.
Semenovii, *Herder, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xli. (1868) I. 74.—Sibir.
semidigynus, Roxb. Hort. Beng. [18]; FL Ind. i. 468 — Breweria cordata.
Senegnmbiae, Spreng. Syst. i. 610 — Ipomoea Senegambiae.
sepiarius, Wall. Cat. n. 1384-Ipomoea sepiaria.
sepincola, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128 <= Calystegia sepium.
sepium, Linn. Sp. PL 153= Calystegia sepium.
sepium, Pall. Reise, iii. 270 = arvensis.
septangularis, Steud. Nom. ed. II. i. 411 —Ipomoea Batatas.
septenatus, Spreng. Syst. i. 691 «= Ipomoea nmbellifera.
Ser, Sprang, 1. c. 698-Ipomoea sinensis.
sericeus, *Burm.f. Fl. Ind.* 49. t. 19. f. 3.—Persia.
sericeus, Ghoisy, in DC. Prod. ix. 400 = lanatus.
sericeus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 208 = tennissimus.
sericeus, Linn. Mant. 43 = Argyreia mollis.
sericophyllus, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* i. (1860) 25.—Arab.
serotinus, DC. Cat. Hort Monsp. 97 - Ipomoea serotina.
serpens, Linn. Syst. ed. X. 928 = Ipomoea pentaphylla.
serpiculans, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I, Art IV. 10.—Malaya I
serpllifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 95 - Ipomoea serpyllifolia.
serpylloides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 207.—Cuba.
sessilifiorus, Spreng. Syst. i. 699=Ipomoea eriocarpa.
setifer, Spreng. 1. c. 597=Calystegia setifera.
setosus, Spreng. 1. c. 694-Argyreia setosa.
setosus. Wall. Cat. n. 1412 = Lettsomia setosa.
Sherardi, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 30 = micranthus,
Shumardianns, *Ton. Bot. Expl. Red River* (1852) 291. —Am. bor.
siamensis, *Wall. Cat.* n. 6668.—Siam.
sibirinis, Linn. Mant. ii. 203-Ipomoea sibirica.
Sibthorpii, Roem. & Schult. Syst. iv. 285 - hirsutus.
siculns, *Linn. Sp. PI.* 156.—Reg. Mediterr.
sidaefolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 99 = Ipomoea tubata.
simplex, Buek, Ind. DC. Prod. iii. 118 = plantagineus.
simplex, Ten. Syn. i. 178 = Ipomoea angustifolia.
simplex, Spreng. Syst. i. 607 = Ipomoea simplex.
sinensis, Desr. in Lam. Encyc. iii. 557—Ipomoea sinensis.
sinuatus, Ners, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 276 - Ipomoea Deppeana.
sinuatus, Petagna, ex Steud. Nom. ed. II. i. 411 - Ipomoea carnosa.
sinuatus, *Scheele, in Linnaea,* xxL (1848) 748.—Texas.
Sloanei, Spreng. Syst I 598 = Ipomoea triloba.

CONVOLVULUS:—
smilacifolius, Salisb. Prod. 124 = Ipomoea muricata.
sogdianus, Bunge, Reliq. Lehm. Bot. 219 - pilosellaefolius.
solanifolius, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831)22 = Massoni.
solanifolius, Spreng. Syst. i. 698=Ipomoea solanifolia.
Soldanella, Despr. ex Cholsy, in DC. Prod. iz. 845 (.= *Pharbitis Preauxii).*—Ins. Canar.
Soldanella, Linn. Sp. PI. 189 =- Calystegia Soldanella.
somalensis, *Franch. in Rtvoil, Çomali,* 43.—Afr. trop.
soinalensis, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 517.—Afr. trop.
speciosus, Linn. f. Suppl. 137 = Argyreia speciosa.
speciosus, Walt. Fl. Carol. 93 = Ipomoea sagittata.
spectabilis, Hort. Brit, ex Stead. Norn. ed. II. i. 411 = Rivea tiliaefolia.
sphaerocephalus, Roxb. Hort. Beng. 14; FL Ind. i. 472 =eriocarpa.
sphaerostigma, Cav. Ic. v. 54. t. 481 = Jacquemontia hirsuta.
spicaefolius, T>esr. in Lam. Encyc. iii. 549=lineatus.
spicaefolius, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 83. n. 1816 = pluricaulis.
spinofus, *Burnt./. Fl. Ind.* 47.t.19. f. 4.—Persia.
spinosus, Desr. in Lam. Encyc iii. 548 = fruticosus.
spinosus, Forsk. FL Aegypt. Arab. p. cvi-Hyttrix.
spiralis, Willd. ex Roem. & Sjhult Syst. iv. 302-nodiflorns.
spithamaeus, *Linn. Sp. PI.* 158.—Am. bor.
splendens, Homem. Hort. Hafn. Suppl. 123—Argyreia splendens.
Sprengelii, *Ckoisy, in DC. Prod.* ix. 416.—Hab.?
stachydifolius, *Choisy, I. c.* 408.—Syria; Mesopotam.
stans, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 96 -ipomoea stans.
stans, Michx. Fl. Bor. Am. i. 136 =-spithamaeus.
stellaris, Salisb. Prod. 124 = Hermanniae.
stellatus, *Brot. ex Heynh. Norn.* il. 158, nomen.—Hab.?
stenophyllus, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 106.—Syria.
stipulaceus, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. 484 = Ipomoea sepiaria.
stipulatus, Desr. is Lam. Encyc. iii. 546-Ipomoea disseota.
Stocksii, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 110.—Beluchist.
stoloni/erus, Cyrilli, PI. Rar. Neap. i. 14. t. 6 - Ipomoea carnosa.
striatus, Vahl, Symb. Bot. ill. 28 - Ipomoea sepiaria.
strictus, Uhm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1823) 17 = undulatns.
strictus, Willd. ex Stead. Nom. id. II. i. 412 = Ipomoea murucoides.
strigosus, Russell, ex Wall. Cat. n. 2259 - Argyreia Leschenaultii.
strigosus, Spreng. Syst. i. 600-- Lettsomia setosa.
strigosus, Wall. Cat. n. 1365 - Lettsomia strigosa.
strigulosus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 63 = assyricus.
suaveolens. Mart. *8c* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 261 =Ipomoea suaveolens.
subacaulis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat snb n. 2256 = Ipomoea barlerioides.
subangularis, Buch.-Ham. ex Steud. Norn. ed. IL i. 412 - Ipomoea obscura.
suierosus, Willd. Ennm. Hort. Berol. SnppL 10-= Massoni.
subglobosus, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 293.—Cochinch.
lubhirsiitns, *Regel* b* *Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 338, 839.—Turkestan.
sublobatus. Linn. f. Suppl. 136 = Hewittia tricolor.
subpinnatifidus, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i.347 =erubescens.
subpubescens, Meyen, ex Walp. in Nov. Act. Nat Cur. xix. Suppl. i. (1843) 387 - incanus.
subsericeus, *Schrent, Enum. PI. Nov.* i. 19.—Sibir. altaic.
suisessilis. Stead. Norn. ed. II. i. 412=Jacquemontia snbsessilis.
subspalhulatus, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 620.—Afr. trop.
snbnlatifolius, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 10.—Malaya,
snbviscidus, *Steud. Norn.* ed. II. i. 412.—Chili.
subvolubilis, Ledeb. FL Alt i. 222, in nota=Calystegia subvoluhilis.
suffruticosus, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. i. 331 = Massoni.

CONVOLVULUS:—
suffruticosus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 175. t 48.—Afr. bor.
suffultus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 102. t. 211 = Ipomoea suffuita.
sulphureus, La Llave, in Nov. Veg. Desc. fasc. i. 17 = Ipomoea corralinensis.
superbus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 103-Ipomoea superba.
supinus, COM. *V Krai, in Bull. Soc. Bot. FT.* iv. (1867) 397, 487, nomen.—Algeria.
syhaticus, Spreng. Syst. i. 602 = Calystegia sylvatica.
sylvestris, Waldst. & Kit PL Rar. Hung. iii. 290 = Calystegia sylvatica.
tamnifolius, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 95= Jacquemontia tamnifolia.
tamnifolius, Willd. ex Roem. & Schult. Syst iv. 301—Ipomoea eriocarpa.
Tarita, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 2253 = Rivea ornata.
tenellus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 659 = Brewetia humistrata.
tenellus, Stocks, in Hook. Kew Joom. iv. (1852) 172 = Stocksii.
tenuiflorus, Steud. Nom. ed. II. i. 412=Jacquemontia parvi flora.
tenuifolius, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 84, n. 1354 = Ipomoea pentaphylla.
tenuifolius, Heyne, ex Wall. 1. c. n. 1353-Ipomoea palmata.
tenuifolius, *Mart, ty Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 260.—Mexic
tenuifolius, Vahl, Symb. Bot. iii. S3 = Ipomoea quinata.
tenuirostris, Steud. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 380= Ipomoea tenuiroslris.
tenuissimus, *Sibth. (f Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 134; *Fl. Graec.* t 195.—Europ. austr.; Afr. bor.
terminalis. Salisb. Prod. 125=cantabrica.
tematus, Spreng. Syst. i. 690-Ipomoea temata.
ternifolius, Spreng. 1. c. 613=Ipomoea ternifolia.
terrestris, Linn. Sp. PL ed. II. 224 = cantabrica.
thalassicus, Stead. Nom. ed. II. i. 412 = Ipomoea littoralis.
- *Thonningii.* Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PL 98 = Ipomoea dUsecta.
Thunbergii, *Roem. If Schult. Syst.* iv. 268.—Afr. austr.
tiliaceus, Willd. Enum. Hort. Berol. 203—Ipomoea fastigiata.
tiliaefolius, Desr. in Lam. Encyc. iii. 544 = Argyreia tiliaefoliv.
timorensis, D. Dietr. Syn. PL i. 667 - Hewittia bicolor.
tomentosus,Choisy, in DC. Prod. ix. 413"-hirsutus.
tomentosus, *Linn. Sp. PI.* 156.—Jamaica.
tomentosus. Veil. Fl. Flam. 74; ii. t. 66-Ipomoea acuminata.
Tournefortii, Sieber, ex Spreng. Syst. i. 611—oleaefolius.
tragacanthoides, *Turei. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* v. (1832) 201.—Mongolia,
translucens, *Seem, in Journ. Bot.* vii. (1869) 165.—Mongolia.
trianthus, Spreng. Syst. i. 598 = Ipomoea sepiaria?
trichocalyx, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PL 91 = Ipomoea ochracea.
trichocalyx, Zoll. *8c* Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nêerl. Indie, ii. (1845) 6 = Ipomoea pileata.
trichocarpus, Spreng. Syst. i. 693"Ipomoea commntata.
trichophorus. Wall. Cat. n. 1423—Ipomoea cissoides.
trichosanthes, Michx. FL Bor. Am. i. 137 —Breweria humistrata.
trichotosus, D. Dietr. Syn. PI. i. 670 •= Argyreia capitata.
tricolor, *Linn. Sp. PI.* 158.—Europ. austr.
tricornutus, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* V. (1790) ed. I. Art. IV. 10.—Malaya.
tridentatus, Linn. Sp. PI. 167 -Ipomoea tridentata.
trifidus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 107-Ipomoea trifida.
triflorus, Pav. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 840 = Ipomoea quinquefolia.
trifloras, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 188.—Chili.
triflorus, Vahl, Symb. Bot. iii. 30-Ipomoea sepiaria.
trigonus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat p. 84, n. 1383 -Ipomoea obscura.

CONVOLVULUS:—
trilobus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 564 ^ Ipomoea triloba.
trilobus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 35.—Afr. austr.
trinervis, *Thunb. Fl. Jap.* 85.—Japon.
triqueter, Rehm. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 94 •• CalverrJ.
triqueter, Vahl, Symb. Bot. iii. 30-Ipomoea Turpetham.
triquetrus. Veil. Fl. Flum. 71; ii. t. 83 = Ipomoea batatoides.
truncatus, *Veil. 1. c.* 74 ; ii. t. 74.—Bras.
Tuba, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 735=Ipomoea grandiflora.
tuberculatus, Desr. in Lam. Encyc. iii. 545-Ipomoea palmata.
tuberifer, Steud. Nom. ed. II. L 412 - Ipomoea Batatas.
tuberosus, Spreng. Syst i. 591— Ipomoea tnberosa.
tuberosus, Veil. Fl. Flam. 72; ii. t. 57 = Ipomoe* Batatas.
Tuckeyanus, .»««*. Mm. ed. II.i.4O7.1in. 1.—Afr. trop.
tuguriorum, Font f. Prod. 14 = Calystegia tug»riorum.
tarbinifolius, *Hort. Bonon. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap.* 81, nomen.—Hab. ?
Turpethum, Linn. Sp. PL 155 = Ipomoea Turpethnm.
ulicinus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 26.—Arabia.
umbellatus, Linn. Sp. PL 155=Ipoinoea nmbellata.
umbellatus, Wall. Cat. n. 2329 = Ipomoea cymosa.
undulatus, *Cav. Ic.* iii. 89. t. 277. f. 1.—Reg. Mediterr.
uniflorus, Barm. f. Fl. Ind. 47 = Ipomoea uniflora.
unilateralis, Roem. & Schult. Syst iv. 284-Jacquemontia secunda.
urbicus, Salzm. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 360 * Ipomoea asarifolia.
urceolatus, Spreng. Syst. i. 601-Ipomoea urceolala.
Vahlii, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 280. -Bras.
Vahlii, Spreng. Syst. i. 611 = Ipomoea chryseides.
valentinus, *Cav. Ic.* ii. 65. t. 180. f. 2.—Hispan.
valentinus, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 412^ Ipomoea. sagittata.
valensuelanus, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 134 " ÍULVñUdISIBB
valerianoides, Blanco, FL Filip. ed. I. 90~Evolvnlu« alsinoides.
variabilis, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, v. (18S0I 116 = Ipomoea variabilis.
variabilis, Weinm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 41*2 dissectus.
variifolius, Stead. 1. c—Ipomoea hederacea.
varius, Veil. Fl. Flum. 73; ii. t. 61 = Ipomoe* Batatas.
velutinus, Spreng. Syst. i. 601 = Ipomoea velutina.
venenatus, *West, Bidr. Ste-Croix,* 271.—Ins. S. Cnix-
venosus, Desr. in Lam. Encyc iii. 666 -= Ipomoe* venosa.
venosus, Herb. Madr. ex Wall. Cat. p. 84, n. 1863 - Ipomoea palmata.
ventricosus, Bert, ex Colla, Hort. Ripul. 87 = Ipomoea ventricosa.
ventricosus, Silva Manso, Ennm. Subst Braz. 2U" Ipomoea silvana.
venulosus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iv. H" stachydifolius.
venustus, Spreng. Syst. i. 600 = Ipomoea tricolor.
vtrrucipes, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1840; Ipomoea vemidpes.
verrucosus, D. Dietr. Syn. PL i. 670 - Ipo»°«» verrucosa.
versicolor, Salisb. Prod. 126 - tricolor.
vertidllatus. Linn. Sp. PL ed. II. 220=Jacquem[ontl]* hirsuta.
vestitus, WalL Cat n. 1411 •--Lettsomia bella ?
villosulus, D. Dietr. Syn. PL i. 667 = Ipomoea villosula.
villosns, *A. Gray, in Prec. Am. Acad.* xi. (1876) 9°. Calif.
villosus, Fen. Syn. i. 177=Jacquemontia tamnifol'*-
violaceus, Sprang. Syst. i. 599 = Ipomoea violacea.
violaceus, Vahl, Symb. Bet. iii. 28 = Jacquenao"[l]* violacea.
virgatus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 24.—Persia; *
viscidus, Roxb. Hort. Beng. 14, nomen = IpoO"* tridentata.
vitifolius, Burm. f. Fl. Ind. 45-Ipomoea vitifolj*-- ^
mittatus, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) S*[v] Ipomoea palmata.

CONVOLVULUS :—
volubilis, Brouss. ex Link, in Bnch, Beschr. Canar. Ins. 145 = Massoni.
Wallichianus, Sprang. SysL iv. Cnr. Post. 61=Calystegia hederacea.
waltheiioides, *Btiss. V Haussk. ex Boiss. PI. Or. Nov.* dec i. 6.-Persia.
wheleri, Vahl, Symb. Bot ii. S6 = Ipomoea sagittata.
Wightii, Wall. PI. As. Rar. ii. 65. t. 171 = Ipomoea Wightii.
Willdenomi, Steud. Norn. ed. II. i. 412-Ipomoea neterophylla.
'eylanicus, Hook, ex Steud. 1. c. = Argyreia populifolia.
yrkes. Moon, ex Wall. Cat. n. 1379=Ipomoea •idaefolia.
Zollingeri, *Choisy, in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 130, 132,-IniSaraja.

CONYSA, Burm. f. Fl. Ind. 180 (1788) = Conysa, Linn. (Compos.).

tONYSTYLUS, Pritz. Ic. Index, ii. 90 (1866) = Qony-Stylus, Teijsm. & Binn. (Thymel.).

CONYz A) Linn. Gen. ed. I. 251 (1737); Less. Syn. Coinp. 208 (1832). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 288.
DIMORPHANTHES, Cass. in Bull. Soc. Philom. ^1818) 30; et in Diet. Sc. Nat. xiii. 254 (1819).
EDEMUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 49 (1836).
tscHENBACHIA, Moench, Meih. 678 (1794).
*JMBKH.LARIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 81; et in Diet. Sc. Nat. xvii. 54 (1820).
JRAGMOSA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 60 (1886).
LAENNECIA. Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 91 (1822).
MARSEA. Adans. Fam. ii. 122 (1763).
MUSTERON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 60 (1886).
PlhARDiA, Neck, ex Steud. Norn. ed. II. i. 412 (18*0).
TUBIPERA, DC. ex Steud. 1. c. (1840).
VVEBBIA, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 970 (1848).
"*Wreviata.* Wall. Cat. n. 3048 - Vernonia cinerea.
"*wnthifolia,* DC. in Wight, Contrib. 16 = stricta.
abyssi*nica> Sch_ Bip_ »*A_ Rieh_ Te»*_ Fl_ Aby**_ i. o»«.—Ueront. trop.
"wocephala, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 43.—Malaya.
a<*minata.* Wall. Cat. n. S0S4=Vernonia arborea.
**<«<«, Miq. FL Ind. Bat. ii. 48-Blumea laciniata.
adenocarpa, *Data, (f Gibs. Bomb. Fl.* 126.—Ind. or. —
arcte. H_ B_ v K_ Nm>_ G'»- •' *Sp.* iv. 74.
•egyptiaca, *[Dryand.* »n] *Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. i»3—Aegypt.
at $ J Ka « . Hook. f. & Thorns, ex FL Brit Ind. iii. •» TM Erigeron asteroides.
^eratoides, *DC. Prod.* v. 885.—Madag.
"' "[" > Jiaumg. Enum. Transsyl. iii. 102-Inula bifrons.
anza, nox b, Hort„ *Ba>e,*fil . R Ind> *iil* 4S0 „ U^*Sen* alau.
albicans, WaU. Cat. n. 3072 = Vemonia albicans.
albida, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 614 = Erigeron bonariensis.
alopecuroides Lam _ Encvt_ "•9S •Sw_n_Ind_Occ_ iii. 134
alt ' a, * = Pterocaulon virgatum.
amV? DC_ Prod_V_ »80 = Aster angustus.
amig "' Dc_ Fl_ Fr- Suppk 468=. Erigeron unifolius.
chile*sis. Hook, & Am„ TM BoL Beech- Voy- 67=
a ion« . *Crantz, Inst.* i. 272.—Amboina.
a lacera. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 322 = Blumea
amorpho*ossa,* Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 81 - Erigeron **Or Phoglossus.
a *lectens>* WaU_ Cat_ n_ 3096-Blumea amplectens.
aZii *plectens,* Lam. Encyc. il 84 - Blumea amplectens.
amplexicaulis, Michx_ FL Bor. Am. il. 136 = Pluchea bifrons.
amplexis WaM_ Cat_ "• 3104-Blumea bifoliata.
amygdalina, £ *am. Encyc* 90,-Ins. Mascar.
amygdalina, Spreng. ex Dc_ Prod_ vi_ 446=Blumea densiflora.
anagalli f !?oK«>Wal1- Cat. n. 8098=Blumea bifoliata.
an[illegible] Poir_ £"^_ s***1 «• w ^ - & *
*ndlna' Hi *in C. Gay, Ft. Chil.* iv. 72.-ChiU.

CJONYZA:—
andryaloides, DC. Prod. v. 877 = Erigeron andryaloides.
angustifolia, Hort. Par. ex DC. 1. c. 420 = Baccharis Pingraea.
angustifolia, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 109=Pluchea bifrons ?
angustifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 61 j *Fl. Ind.* iii. 429.—Reg. Himal.
angustifolia, Steud. Nom. ed. I. 221 = Monarrhenus salicifolius.
angustifolia, Thw. ex Hook. £ Fl. Brit. Ind. iii. 264 -= Erigeron linifolius.
anthelmintica, Linn. Sp. PI. ed. II. 1207 = Vernonia anthelmintica.
appendiculata, Blume, Bijdr. 896 = Blumea balsamifera.
appendiculata, Lam. Encyc. a. 88-Senecio appendiculatus.
apurensis, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 73 = Erigeron apurensis.
arabica, *Willd. Sp. PI.* iii. 1943.—Arab,
arabidaefolia, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 76.—Chili.
arborea, WaU. Cat. n. 3074=Vernonia arborea.
arborescens, DC. Prod. v. 344, in syn. cum cit. falsa « Commidendron spurium 1
arborescens, Lino. Syst. ed. X. 1213 = Vernonia arborescens.
arbutifolia, Lam. Encyc. ii. 92 = Baccharis arbutifolia.
argentea, *Lam. 1. c.* 87.—Ins. Mascar.
argentea, Perr. & Lepyr. ex DC. Prod. v. 449 — Laggera aurita.
argentea, Wall. Cot. n. 3014 = Inula Cappa.
arguta, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 138.—Bras,
argutidens, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 58.—Malaya.
aromatica, Wall. Cat. n. 3054 - Blumea aromatica.
artemisiaefolia, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 262.—Pemv.
artemisioides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 68 = Baccharis rufescens.
articulata. Lam. Encyc. ii. 94 = Baccharis articulata.
arvensis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 143.—Chili.
aspera, *Bory, Voy.* iii. 174=melastomoides.
aspera. Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 413 = Vernonia Roxburghii.
asperifolia, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 284.-Guatemala.
asperula, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1S56) 736,-ChiU.
asteroides, Desf. Tabl. ed. II. (1815) 114 - Pluchea subdecurrens.
asteroides, Host, ex Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math. Nat. xliv. (1882) 332 = Inula'bifrons.
asteroides, Linn. Sp. PI. 861=Sericocarpus conyzoides.
asteroides, Wall. Cat. n. 3052 = aegyptiaca.
asteroides, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 413 = Chrysopsis gossypina.
attenuaia, *DC. Prod.* v. 884.—Madag.
attenuata, Wall. Cat. n. 3020 = Vernonia nttennata.
Aucheri, DC. Prod. vii. 281 = Erigeron Aucheri.
aurea, Perr. ex DC. 1. c. v. 68 = Vemonia senegalensis.
auriculata, Moench, Meth. Suppl. 235-Phagnalon rnpestre.
aurita, Heyne, ex DC. Prod. v. 441 >= Blumea lacera.
auiita, *Linn.f. Suppl.* 867.—Nubia,
axillaris, *Hornem. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 871.—Afr. occ.
axillaris, Lam. Encyc. ii. 84 = Blumea lacera.
Baccharis, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 16.—Honduns.
baccharoides, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 890 = Pluchea Dioscoridis.
balsamica, Wall, ex DC. Prod. v. 319=P«iadia balsamica.
balsamifera, lion. Sp. PL ed. IL 1208 - Blumea balsamiiera.
iarbata, Wall. Cat. n. 3099 = Blumea barbata.
bellidifolia, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 169.—Madag.
bellidifolia, Wal). Cat n. 3048 - Vernonia cinerea.
Berteroana, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 737.—Chill
bidentata, Steud. Nom. ed. I. 222=calocephala.
bifoliata, Cham. & Less, in Linnaea, vi. (1831) 138 = Blumea Wightiana.
bifoliata, Linn. Sp. PI. 862-Blumea bifoliata.

CONTZA:—
bifoliata, Walt. Fl. Carol. 204-Sericocarpus tortifolins.
bifoliolata, DC. Prod. v. 435 = Blumea Wightiana.
bifrons, Linn. Sp. PL 861; Gonan, Hort Reg. 436 = Inula bifrons.
bifrons, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 524 = Pluchea bifrons.
Bilbaoana, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. i*. 76 = Erigeron canadensis.
Blanchetii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 36.—Bras.
blanda. Wall. Cat. n. 3033 - Vernonia blanda.
Bojeri, *DC. Prod.* v. 384.—Madag.
Bovei, DC. in Ann. So. Nat. Sèr. II. i. (1834) 261-Eiigeron Bovei.
bovina, Euch.-Ham. ex DC. Prod. v. 444-Blumea oxyodonta.
bracteolata, Rottl. ex DC. 1. c. 434 = Blumea bifoliata.
bracteolata, Wall. Cat. n. 3036 = Vemonia subsf ssilis.
brasiliensis, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. BoL 456 = Epaltcs brasiliensis.
britannica, Rupr. Fl. Ingric. 669 = Inula britannica.
bryoides, Lam. Encyc. ii. 91 = Baccharis bryoides.
burmeana, *Miq. Fl. Ind. Bat',* ii. 44.—Burma.
Bustilloziana, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 72.—Chill
buxifolia. Lam. Encyc. ii. 92 = Baccharis buxifolia.
caffra, DC. Prod. v. 881 = Blumea natalensis.
calocephala, *Bory, Voy.* ii. 395.—Ins. Borbon.
callosa, *Klatt, in Decken, Reise Ost-Afr.* iii. 76.-Afr. trop.
calycina,Cvs. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 87 = Fhognalon rnpestre.
camphorata, Puish, Fl. Am. Sept. ii. 623-Pluchea camphorata.
canariensis, Willd. Sp. PI. iii. 1937 = Inula Candida.
candicans. Wall. Cat. n. 2999 - Leucomeris spectabilis.
Candida, Linn. Sp. PL 862 = Inula Candida.
Candolleana, Boiss. Fl. Orient iii. 217 = Pluchea Wallichiana.
canescens, Bory, ex DC. Prod. V. 478 *{^Schisogyne serieea).*—Ins. Canar.
canescens, Linn. f. Suppl. 867.=Vernonia pinifolia.
canescens, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 734.—Chili.
canescens, Thunb. Fl. Cap. 655 —Vernonia pinifolia.
capitata. Sprang. Neue Entdeck. ii. 141-Vanillosmopsis capitata.
Cappa. Buch.-Hom. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 176 = Inula Cappa.
caprariaefulia, *Willd. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 413.—*Hab.1*
cardaminaefolia, *H.B. <f K. Nov. Gen. etSp.* iv. 71.—Ecuador.
carolinensis, Jacq. Ic. Rar. iii. t. 686 = Pluchea odorata.
cataphracta, Willd. ex DC. Prod. v. 427 = Baccharis cataphracta.
cayennensis. *Spreng. Syst.* iii. 612.—Guian.
celebica, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 122.—Ins. Celebes.
cernua, Wall. Cat. n. 8012 = Laggera alata.
chenopodiifolia, Lam. Encyc. ii. 86 = Gynura mauritiana.
chenopodioideSfDC. Prod. v. 879 = Erigeron bonariensis.
chilensis, *Spreng. Nov. Prov.* 14.—Chill
chinensis, I^ani. Encyc. ii. 83 = Vemonia chinensis.
chinensis, Linn. Sp. PL 862 = Blumea chinensis.
chinensis, Pers. Syn. ii. 426 = Lourieiii.
Chingoyo, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 76. t. 828—Pluchea Chingoyo.
chrysocoma, *Vatke, in Bremen Abh.* ix. (1885) 120.—Madag.
chrysocomoides, Desf. Fl. Atlant. ii. 269. t. 232 = Nolletia chiysocomoides.
chrysocomoides, Desf. Hist. Arb. i. 292-Felicia angustifolia.
chrysocomoides, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. i. 413 — procumliens.
cichoriifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 47 = Blnmea laciniata.
ciliaris, *Spreng. Nov. Prov.* 14.—Hab. ?
cinerarioides, Boj. ex DC. Prod. v. 845 •= Rochonia cineraiioides.
cinerascens. Wall. Cat. n. 3062 = Vernonia cinerea.
cinerea, Linn. Sp. PI. 862 = VeruonU cinerea.
clarenceana, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii.816.—Air. trop.
clethraefolia, Willd. ex Baker, in Mart FL Bras. vi. II. 100 = Vernonia. scabra.

OOKYZA:—
collina, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 144.—Chili.
communis. Wall. Cat. n. SOU =Blumea hieracifolia.
concava, Spreng. ex Stcud. Nom. ed. II. i. 413 = Baccharis concava.
congesta, Spreng. ex DC. Prod. v. 383 = japenica.
cornea, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 841.—Hab. ?
consanguinea, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 142.—Chili.
conspicua, Wall. Cat. n. 3066 = Microglossa albescens.
coronipifolia, *H. B. V. K. Nov. Gen. tt Sp.* iv. 70.—Mexic.
Coronopus, Lam. Encyc. ii. 89=Psiadia Coronopus.
Cortesii, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 75.—Mexic.
corymbosa, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 7.—Mexic.
corymbosa, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 426 = Pluchea indica.
costata, *Harv. in Hare,* **to*** *Sond. Ft. Cap.* **iii. 114.—** Afr. austr.
Cotoneaster, Willd. ex Sprang. Syst. iii. 509 - Vemonia Cotoneaster.
Conlteri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 355.—Am. bor. occ
Coulteri, Rothr. in Wheeler, Rep. 155 = Erigeron subdecunens.
crispa, Rnpr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xiv. (1856) 285 = Erigeronlinifolius.
crispata, *Vahl, Symb. Bot.* i. 71.—Arabia.
ctenoptera, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 12 = Laggera pterodonta.
cuneata, Boj. ex DC. Prod. v. 345 — Rochonia cuneata.
cuneata, Buch.-Ham. ex DC. 1. c. 384 = absinthifolia.
cuneifolia, Lam. Encyc ii. 91 = Baccharis cuneifolia.
cuneifolia, Raensch. Nom. ed. III. 240=Commidendrum spurium.
cuneifolia, Wall. Cat. n. 3101 = Blumea lacera.
cupressiformis, Lam. Encyc. ii. 91; Illustr. t. 697 = Lepidophyllum cupressiforme.
Dampieri, A. Cnnn. ex DC. Prod. v. 266=Olearia axillaris.
dasycoma, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 56 = Blumea densiflora.
decurrens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1206.—Jnd..or.
densifiora, Heyne, in Wall. Cat n. 2997-Blumea densiflora.
dentata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 629 =Inula Cappa.
dentata, *Willd. Sp. PI.* iii. 1928.—Afr. trap.
dichotoma, Pers. Syn. ii. 423 - Jasonia dichotoma.
diffusa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 338-Gouani.
diffusa, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 429 = Blumea membranacea.
dilatata, Steud. Nom. ed. I. 222 = laurifolia.
Dioscoridis,Dest. Tabl.ed. II. 114 = PlucheaDioscoridis.
discolor, Bory, ex DC. Prod. vi. 376=Senecio appendiculatus.
disticha, Heyne, in Wall. Cat. n. 3024-visddnla.
disticha, *Spreng. Syst.* iii. 509.—Am. austr.
divaricata, Spreng. 1. c. 508 = Vemonia diffusa.
divergens. Wall. Cat. n. 8027 = Vemonia divergens.
diversifolia, Weinm. in Flora, iii. (1820) 611=chilensis.
domingensis, Willd. ex DC. Prod. v. 389 = lucens.
dongolensis, *Delile, PI. Afr. Voy. Miroi,* i. 43.—Nubia,
dumetorum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 144.—Chili.
echinoides, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.388 -aegyptiaca.
elaeagnifolia, WalL Cat. n. 3041 = Vemonia elaeagnifolia.
elata, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* **(1848)** 14.—Bras.
elegantula, Wall. Cat. n. 3049-Vemonia cinerea.
elongata, Wall. 1. c. n. 8078 = Blumea elongata.
ericoides,lam. Encyc. ii. 92 = Iiabum ericoides.
erigeroides, DC. Prod. v. 378—Erigeron bonariensis.
eriophora, Wall. Cat. n. 8018 = Inala Cappa.
erosa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 489 = Blumea manillensis.
eucoma, *Miq. PI. fungh.* 500—Java.
eupatorioides. Wall. Cat. n. 2993 = Inula eupatorioides.
excisa. Wall. L c. n. 8011 - Blumea densiflora.
extensa, Wall. 1. c. n. 3016 = Vemonia extensa.
falcata, *Buch.-Ham. ex Spreng. Syst.* **ii. 513.—Reg.** Himal.
faldgera, Wall. Cat. n. 2048 - Blnmea densiflora.
fasciculate, Wall. 1. c. n. 3019 = Laggera flava.
fasciculata. Wall. 1. c. n. 3094 (ex Steud.)-Blumea glomerata.

CONYZA:—
fastigiata, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* **57.—** Afr. bor.
fistulosa, Roxb. Hort. Beng. [101]; Fl. Ind. iii. 429 = Blumea glomerata.
flexilis, *DC. Prod.* v. 386.—Madag.
floresiana, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 121.—Malaya.
floribunda, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. iv. 78-Erigeron bonariensis.
foetida. Lam. Encyc. ii. 85 = Pluchea camphorata.
foetida, Willd. Sp. PI. iii. 1952 = Nidorella foliosa.
foliolosa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3281 = Pulicaria foliolosa.
foliolosa, Wall, ex DC. Prod. v. 451 = Pluchea indica.
foliolosa, Wight, in Wall. Cat. n. 8092 = Blumea bifoliata.
foliolosa, *Willd. Sp. PI.* iii. 1919.—Ind. or.
fruticosa, Linn. Sp. PI. ed. II. 1209 = Vernonia rigida.
Garaieri, *Klatt, in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 509.—Mndag.
Gayana, *Phil. 1. c.* xxviii. (1856) 787.—Chili.
geminiflora, Tenore, Cat. Hort. Neap. (1819) 75 •= Phagnalon rupestre.
genistelloides, Lam. Encyc. ii. 93=Baccharis genistelloides.
glabra, Willd. Sp. PI. iii. 1940 = Vernonia Vahliana.
glabrata, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 414 = Eupatorium glabium.
glomerata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 322 = decurrens.
glomerata, Wall. Cat. n. 3055=Blnmea glomerata.
glutinosa, Lam. Encyc ii. 89 = Psiadia glutinosa.
gnaphaliaides, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss. i. 389 =• Gouani.
gnaphalodes, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 78. t 827.—Mexic.
gnaphalodes, Sieber, Reise Kreta, i. 862; ii. 322-Senecio gnaphalodes.
Gouani, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 627 = Blumea manillensis.
Gouani, *Willd. Sp. PI.* iii. 1928.—Ins. Canar.
gracilis, Heyne, in Wall. Cat. n. 8064 = Blumea membranacea.
gracilis, Hofimgg. & link, Fl. Port. ii. 253-Pulicaria gracilis.
gracilis, Wall. Cat. n. 8064 = Blnmea glomerata.
graeca, Nym. Syll. 16 = Phagnalon graecum.
graminifolia, Spreng. Syst. iii. 515 = Aster divaricatns. Grahami, *DC. Prod.* v. 380.—Reg. Argent.
grandis, Wall. Cat. n. 3051 = Blumea densiflora.
graveolens, Steud. Nom. ed. I. 222 = Inula graveolens.
graveolens, Wall, ex DC. Prod. v. 292=Erigeron asteroides.
guineensis, Willd. Sp. PL iii. 1930=Laggera aurita.
gummifera, Roxb. in Beats. St. Hel. Tracts, App. 304 = Commidendrum robustum.
halimifolia, Dest Tabl. ed. II. 114=Baccharis halimifolia.
Hamiltoni, Steud. Nom. ed. II. i. 414 = Blnmea hieracifolia.
heliotropifolia, Lam. Encyc. ii. 90 = Monarrhenus rufescens.
heterophylla, Lam. Encyc. ii. 84 = Vemonia cinerea.
heterotricha, Wall. Cat. n. 3225=Inula eupatorioides.
Heudelotii, *Oliver (f Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 317.—Afr. trop.
Heyneana, Wall. Cat. n. 3089=Blumea lacera.
hieracifolia, Spreng. Syst. iii. 514 = Blumea hieracifolia.
hirsuta, Coram. ex DC. Prod. v. 458=Cylindrocline Commersonii.
hirsuta, Linn. Sp. PI. i. 868-Pluchea hirsuta.
hirsuta, Wall, ex DC. Prod. y. 292; et Cat. n. 8007 B, partim = aegyptiaca.
hirtella, *DC. Prod.* v. 385 Madag.
hispida, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 71.—Mexic.
Hochstetterii, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i.** 387.—Abyssin.
holosericea, Wall. Cat. n. 3103=Blnmea glomerata.
Huberti, *Boj. ex Sweet, Hort. Brit.* **ed. III. 849.—** Madag.
hnmifusa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 41.—Java.
hymenophylla, Wall. Cat n. 8088= Blumea membranacea.
hypoleuca, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 891.—Abyssin.
iliensis, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxix, (1866)** II. 342.—As. centr.

CONYZA :-
incana, Heyne, ex DC. Prod. v. 24 = Vemonia cinerea ?
incana, Wall. Cat. n. 8046 = Vemonia cinerea.
incana, *Willd. Sp. PI.* iii. 1937.—Arabia,
incisa, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. I. iii. 184.—** Afr. austr.
indica, Blume, ex DC. Prod. v. 451 = Pluchea indica.
indica, Wall. Cat. n. 3042 = Vemonia indica.
intermedia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 28 = Phagnalon saxatilc.
inuloides, [Dryand. inj Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 182 =Jasonia dichotoma.
iraefolia, *Burnt, f. Fl. Ind.* 180.—Ind. or.
ivaefolia, *Less, in Linnaea,* vi. (1881) 138.—Afr-austr.
japonic*, *Less. Syn. Comp.* 204.—Reg. Himal.; China; Japon.
javanica, Blume, Bijdr. 897 = Blumea lacera.
Jerdoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 62 = Erigeron asteroides.
Junghuhniana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 55.—Java.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 83 = Erigeron Aucheri.
Kotschyi, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop-807 = Vicoa auriculata.
Korthalsiana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 51.—Malaya.
Krausseana, *Regel & Schmalk. in Act. Hort. Petrof-* v. (1877) 616.—Tnrkestan.
Kraussii, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* ii. 972.—Afr. austr.
Kunthiana, *DC. Prod.* v. 379.—Ecuador.
lacera, Burnt, f. Fl. Ind. 180 = Blumea lacera.
laciniata, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 427-Blumea laciniata.
lactucaefolia. Wall. Cat. n. 3088-Blumea Wightiana·
laeta, Hort. Calc. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 14-Vemonia saligna.
lanceolana, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 432 = Blumea myriocephala.
lanceolata. Wall. 1. c. n. 2991 = Pluchea lanceolata.
lanceolate, Wall. Cat. n. 8059 = Vemonia divergens-
lanuginosa. Wall. 1. c. n. 2922=Inula Cappa.
Larrsiiniana, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* **iv. 71—** Chili.
laurifolia, *Lam. Encyc.* ii. 89.—Ins. Mascar.
laxa, *Spreng. Syst.* iii. 513.—Bras,
laxiflora, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 400.—Hab. ?.
leucanthema, Buch.-Ham. ex Steud. Nom. ed. II- " 414 = Blumea leucanthema.
lencodasys, *Miq. in Journ. Bot. Neerl.* i. (1860>1<>S-—Malaya.
leucophylla, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss- >• 387= incana.
limonifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 17*" Inula Candida.
linearifolia, Lam. Encyc. ii. 92 = Psiadia linearifoli*.
lineariloba, DC. Prod. v. 385 = aegyptiaca.
linearis, *DC. 1. c.* 378.—Chili,
linifolia, *Burm.f. Prod. Fl. Cap.* 26.—Afr. austr.
linifolia, linn. Sp. PL 861=Sericocarpus solidagineo/-
linifolia, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 784.—Chl»-
linifolia. Wall. Cat. n. 3063 = Vemonia cinerea.
lithospermifolia, *Lam. Encyc.* ii. 90.—Ins. Mascar.
lobata, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 414, 621-Verbesina diversilblia.
lobata, Linn. Sp. PI. 862=Neurolaena lobata.
longicaulis, Wall. Cat. n. 3078 = Eupatorium Reeve*"-
longifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. W*- cru lensis.
longifolia, Heyne, in Wall. Cat n. 8026=BluO>«» spectabilis.
longispina, Hook. f. FL Brit. Ind. iii. 268, sphalm-** seq.
longissima, Zoll. *8c* MoriUi, Syst. Vera. Zoll. 68* Blumea chinensis.
Lorentzii, *Griseb. in Goett. Abh.* **xxiv. (1879)** Reg. Argent.
Loureirii, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 339.—China,
lucens, *Poir. I.e.* 841.—Ins. S. Doming.
lucida, Spreng. Neue Entdeck. ii. 142-Piptocarp1h* lucida.
lwida, *J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins- W°-* —Ins. Madera.
lycopodioides, Lam. Encyc. ii. 91 = Eriotbrix junip*» folia.
lyrata, *H. B.* b1 *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 70.—Ecoado-
macrophylla, *Spreng. Syst.* iii. 513.—Reg. Argent.
macrorhiza, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. A&ss,* 887.—Abyssin.

CONTZA:—

nacrostachya, Wall. Cat. n. 8053-Blumea hieracifolia.

nadagascariensis, Lam. Encyc. ii. 85-^Psiadla madflgascariensis.

nwgellanica, Lam. 1. c. 91=Baccharis magellanica.

"wnillensis, Less, in Iinnaea,Ti. (1831) 135-Blumea •nanillensis.

marginata, Edgew. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 67—rufa,

wylandica, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 126 = Pluchea camphors ta.

mauritiana, *Boj. ex Srnet, Hort. Brit.* ed. III. 349.—Ins. Maurit.

mauritiana, Merat, ex Sleud. Nom. ed. II. i. 414-Nidorella compressa.

nauritiana, Willd. ex Steud. 1. c-Nolletia chrysocomoides.

maxima, *Zoll. V MOT. in Nat. en Ceneesi. Arch. Netrl. Ind.* it (1845) 236.—Java.

"gapotamica, Spreng. Syst. iii. 516-Stenachaeniom megapotamicnm.

melastomoides, *Lam. Encyc.* ii. 90.—Ins. Mascar.

"fnbranacea, Wall, ex DC. Prod. v. 441; Cat. n. 3019 ^Bliimea membranacea.

membranifolia, *Klatt, in Leofioldina,* xx. (1884) 94.—eras.

mexicantha, Spreng. ex DC. Prod. v. S84=stricta.

"icrocephaU, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* 126.—Mexic.

modatensis, Sch. Bip. ex Schweinf. Beltr. Fl. Aelhiop. "4 = Pluchea Dioscoridis.

modi ch[illegible] *Phiu in Linnaea* > xuduUi - (1864-65) ma—

"odesta, *Kunth, Ind. Sim. Hort. Berol.* (1845) 11.—nab. *1*

>qUis, Willd. Sp. PI. iii. 1924-Vemonia cinetea.

molu Mo?™*1 *Gaudich, Bot. Vo>- Bonite>* 465.—Ins. icc,

nwnocephala, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Ven. Ind. Arckip.* 122—Malaya.

™°*ntana,* Heyne, ex DC. Prod. v. 884-stricta.

"Jontevidensis, *Spreng. Syst.* iii. 510.—Reg. Argent.

""•{hom/M. DC. Prod. v. 888 = japonica.

"j»«i£«», Wall. Cat. n. 3032 = Vernonia divergens.

""'<**, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3077 = Blumea --membranacea.

*«r**«i Buch.-Ham. 1. c.n. 8095 = Blumea lacera.

myo *Gifolia, H, B, V K, Nov, Gen, et S* *iv, 69—N— Gat

"ypoçep'kala, Remy, in C. Gay, Fl. ChiL iv. 76-Engeron canadensis.

my na-? i l a i n - Enc y c - n - 92=Baccharis myrsinites.

™>. Art. *Bip. ex Oliver* 6" *Hiern, in Oliver, Fl. I"*:* *fi'-* "> 315.—Abyss.

nanifo, ? Wt l L Cat - n - 3075-Blumea laoera.

natalen *sis, Sh, Bip, * Walp, Rep,* i. 971.—Afr. austr.

"""if ns, Bnch, Ha™. « Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.263

Nanli ume a hi «»cifolia.

Nanii, Bonnet, i " *BulL Soe, Bot, FT,* xxv. (1878) 208.—Hab. ?

necessar «. Bnch.-Ham. ex DC. Prod. v. 439=Blumea hierac folia.

nereifolia, L'Hérit. ex DC - •• =• 430-Brachylaena nereifolia.

Neuri, *Oli* ^ r & *Hiern> in Oliver> Fl. Trop. Afr.* iii. 317. ~ A trop.

nitida, ¥S• F1 - Ind - ***• H - «* = Blumea Wallichii.

nitida, ZM - S *W*- *Vers. Ind. Archif.* 121.—Malaya.

nivalis, Bio ss. Dia g, *Sa,* L ^ 82 " Eri8eron chionophilus.

notobellidiastrum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxi$_T$. (1879) 177.—Reg. Argent.

nutans, Blume, Bijdr. 896 = Laggera alata.

nutans, Buch.-Ham. ex DC. Prod. v. 436-Blumea «rnua.

n ns, Wall. Cat. n. 3080-Blumea hieracifolia.

obt ua, Buch.-Ham. ex DC. Prod. v. 439 » Blumea flava.

obliqua, Willd. Sp. PI. iii. 1930-Blumea amplectens.

oblong «. Wall, ex DC. Prod. v. 469-Inula Cappa.

oblongifolia, *MJ, Prong, Sys(iif 512-_BraS-*

obovata, Wall. Cat. n. 3022 - Blumea obovata.

obscura, DC. *Prod.* v. 387.—Am. austr,

obtusa, *• B. & Ko Nov, Gem tt Sp.* iv- 71>— Mexic.

COKTZA:—

odontophylla, Boiss. Fl. Orient, iii. 217= Pluchea argata.

odontoptera, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 135.—Ins. Cap. Verd.

odora, *Forsk. Ft. Aegypt. Arab.* 148.—Aegypt

odorata, Linn. S>st ed. X. 1213-Pluchea odorata.

odorata, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 414 = Vernonia chinensis.

oleaefolia, Lam. Encyc. ii. 86-Linosyris villosa.

oligandra, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) i. 179.—Java.

oligocephala, Miq. FL Ind. Bat. ii. 41-Blumea bifoliata.

orientalis, *Willd. Sp. PI.* iii. 1981.—Armen.

ovata, Wall. Cat. n. 3097 = Blumea dnerea.

oxyodonta, Wall, ex DC. Prod. v. 444 = Blumea oxyodonta.

pallida, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 322 nomen.—Malaya.

panamensis, *Willd. Sp. PI.* iii. 1942.—Panama.

paniculata, Desf. Tabl. ed. II. 114 = fastigiata.

paniculota, Wall. Cat. n. 3090—Blumea Wightiana.

paniculata, Willd. Sp. PI. iii. 1920-Blumea membranacea.

pannosa, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 135.—Afr. trop.

parvifolia, Wall. Cat. n. 3004-Blumea Wightiana.

patula, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 184 = Vernonia chinensis.

pauciflora, Willd. Sp. PI. iii. 1927=Vernonia panciflora.

paucifolia, Wall. Cat. n. 3037 = Blumea membranacea.

pectinata, *Sch. Bip. ex Oliver* b* *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 315.—Air. trop.

pedunculate. *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 15.—Hab. 1

persica, Boiss. Diags.Ser. I. vi. 81 = Erigeron persicus.

persicaefolia, *Oliver &• Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 312.—Air. trop.

petiolaris, Wall. Cat. n. 8282=japonica.

pinifolia, Bory, Voy. ii. 895-Faujasia pinifolia.

pinifolia, Lam. Encyc. ii. 86 = Vernonia pinifolia.

pinnatifida, Bnth.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 430 = stricta.

pinnatifida, *less. Syn. Comp.* 204.—Afr. austr.

pinnatflobata, *DC. Prod.* v. 387.—Afr. austr.

platensis, SpreHg. Syst. iii. 509 = Vernonia platensis.

platylepis, Spreng. ex DC. Prod. v. 81= Vemonia Koxburghii.

podocepuala, *DC. I. e.* 387.—Afr. austr.

polycephalay Edgew. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 66 — viscidula.

polygonata, Wall. Cat. n. 3010-Innla polygonata.

Ponae, Sieber, ex Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 37 =Cylmdrocline Commersonii.

populifolia, Lam. Encyc. ii. b7 = Vernonia populifolia.

portoricensis, Bert, ex DC. Prod. v. 62-Vernonia remotiflora ?

pratensis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 736.—Chili.

procera, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 164 = chilensis.

procera, Wall. Cat. n. 3050-Blumea procera.

procumbens, *Bali. Cat. Hort. Tour.* 28.—Ins. Creta.

proli/era, Lam. Encyc ii. 84 = Vernonia cinerea.

prostrata, Tenore, Cat. Hort. Neap. (1819) 75=procumbens.

protei/ormis, Perr. ex DC. Prod. v. 376 = Pluchea lanceolata.

pterocaulon, *C. Bolle, in Bonplandia,* vii. (1859) 295.—Ins. Canar.

pubescens, DC. Prod. v. 381 — Brachyactis robnsta.

pubigera, *Linn. Mant.* L 113.—Amboina.

pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 73 - sophiaefolia.

pulchra, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. i. 415 = amygdalina.

pumila, *Lam. ex Pers. Syn.* ii. 427.—Hab. ?

pumila, Sibth. & Sm. Fl. Greet Prod. ii. 173 = Phagnalon pumilum.

punctata, Willd. Sp. PI. iii. 1937 = Aplopappus Chamissonis.

punctulata, WalL Cat. n. 2995-Vemonia chinensis.

punduana, Wall. 1. c. n. 8035 = Vernonia volkameriaefolia.

pungens, Lam. Encyc. ii. 86 = Iphiona juniperifolia.

purpurascens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 112-Pluchea purpurascens.

purpurea, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3076-Blumea glomerata.

COBTZA:—

pusilla, *Houtt. Handleid.* x. 618. t. 69.—Afr. austr.

pusilla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 69 = Kunthiana.

pyenostachya, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 126••Pterocaulon pyenostachyum.

pygmaea, Sieber, Reise Kreta, ii. 322 = Phagnalon pumilum.

pyrifolia, Lam. Encyc. ii. 89 = Microglossa volubilis.

pyrrhopappa, *Sch. Hip. ex A. Rich. Tetlt. Fl. Abyss,* i. 389.—Abyss.

racemosa, Spreng. Syst. iii. 508 - Baccharis avicenniaefolia.

racemosa, Wall. Cat. n. 3002 = Blumea glomerata.

ramiflora, Spreng. Syst. iii. 609 - Piptocarpha ramiflora.

redolens, Willd. Sp. PI. iii. 1951 (-= *Afonenteles redolens).—ti.* Caled.

repanda, Roxb. Hort Beng. 61; Fl. Ind. iii. 431 = Blumea procera.

retusa, *Lam. Encyc.* ii. 90.—Ins. Mascar.

rigida, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 118 •= Vemonia rigida.

riparia, Blume, Bijdr. 899=Blumea chinensis.

riparia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 76 = Tessaria integrifolia.

rivularis, *Gardn. in Hook. Lend. Journ. Bot.* iv. (1845) 124.—Bras.

robusta, Roxb. in Beats. St. Hel. Tracts, App. 304 - Commidendrum robustum.

Soylei, DC. Piod. v. 3sl = Brachyactis menthodora.

rubra, Buch.-Ham. ex DC. 1. c. 376 = Pluchea lanceolata.

rudis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 415-lyrata.

rufa, *Wall. Cat.* n. 3O79.-Ind. or.

rufescens, Hoflmgg. & Link, Fl. Port. ii. 258-I'ulicaria rufescens. >

rufidula, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 141.—Bras.

rugosa, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 184 - Commidendrum rugosum.

rugosa, Vahl, Symb. Bot. i. 71 = Pterocaulon virgatum.

runcinata, Wall. Cat. n. 3087 = Blumea laciniata.

rupestris. Linn. Mant. 113 •= Phagnalon rupestre.

rutilans, Poir. Encyc Suppl. ii. 841 = Vernonia senegalensis.

sagittalis, Lam. Encyc. ii. 94 = Baccharis sagiltalis.

salicifolia, lam. Encyc. ii. *bS* - Monarrhenus salicifolius.

salicifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.-Ind. occ.

salicina, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* iii. (1863) 36.—Calif.

salicina, Rupr. Fl. Ingric. 568 = Inula salicina.

saligna, Wall. Cat. n. 3061 = Vernonia saligna.

salsoloides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1882) 197 — Inula ammophila.

salvifolia, Bory, Voy. iii. 176 = Blumea salvifolia.

saxatilis, Linn. Sp. PI. ed. II. 1206 = Phagnalon saxatile.

saxatilis, Sibth. *8c* Sm. Fl. Graec. t. 862 - Phagnalon graecum.

saxatilis, Tenore, Fl. Neap. ii. 213 = Phagnalon rupestre.

saxatilis, Zoll. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 90-Blumea balsamifcra.

scabiosaefolia, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 72.—Chili.

scabra, *Linn. Mant.* 113.—Ind. or.

scabrida, *DC. Prod.* v. 387.—Afr. austr.

scandens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 11.—Mexic.

scandens, Wall. Cat n. 3080- Vemonia scandens.

Schimperi, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 886-stricta.

Schlechtendalii, *C. Bolle, in Bonplandia,* vii. (1859) 2H4.—Ins. Canar.

scorpioides, Lam. Encyc. ii. 88=Vernonia scorpioides.

semipinnatifida, *Wall. Cat.* n. 3058.—Ind. or.

semivestita. Wall. 1. c n. 2996-Blumea procera.

senegalensis, Sieber, ex DC. Prod. v. 44»«Laggera aurita.

senegalensis, *Willd. Sp. PI.* iii. 1928.—Afr. trop.

sericea, *Bory, Voy.* ii. 376.—Ins. Horbon.

sericea, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed.-I. iii. 183 (» *Schitogyne sericea).*—Ins. Canar.

sericea, Wall. Cat. n. 3021 •-Blumea glomerata.

serici-vestita, Wall. 1. c. n. 2996 = Blumea chinensis.

serpentaria, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 176.—Reg Argent*

CONYZA:—
terrain, Bory, ex DC. Prod. vi. 876-Senedo salicifolius.
serrulata, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 64.—Ind. or.
serrulata, Lam. Encyc. ii. 85 = Baccharis serrulata.
serrulata, Wall. Cat. sub n. 8024 = viscidula.
sessifolia, Blame, Bijdr. 897 = Pluchea sessifolia.
sessiliflora, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 48.—Ins. Timor,
lessiliflora, *Salisb. Prod.* 185.—Ins. Bourbon.
sessilifolia, Steud. Norn. ed. II. i. 419 = Pluchea sessifolia.
sessilifolia, Wall. Cat. n. 3029 = Pluchea Wallichiana.
sicula, Willd. Sp. PI. iii. 1981 - Pulicaria sicula.
sinensis,]. F. Gmel. Syst. 1221 = Blnmea chinensis.
sinuata, Ell. Sketch, ii. 323 = Erigeron liuifolius.
solidaginoides. Wall. Cat. n. 3066 = Aster ignoratus.
sonckifolia, Buch.-Ham. in Wall. 1. c. n. 8085-Blumea Iaciniata.
sophiaefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 73. t. 826.—Mexic.
sordida, Linn. Mant. 466=Phagnalon sordidum.
spathulata, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 805.—Hab. ?
spathulifolia, Maxim, ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1874) 109 = stricta.
spatulata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 822 = Vemonia pauciflora.
spicata. Lam. Encyc. ii. 98 = Pterocaulon virgatnm.
spicata, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 14.—Hab. ?
spinellosa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 45.—Burma.
spinidens, Miq. 1. c. 44 = Blnmea membranacea.
spinosa, *Sch. Bip. ex Oliver (f Hiern, in Fl. Trop. Afr.* iii. 812.—Air. trop.
spinulosa, Spreng. Syst. iii. 510 = Sommerfeldtia spinulosa.
splendens, Spreng. 1. c. 509 = Piptocarpa lucida.
Sprengelii, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* ii. 958.—Afr. austr.
squamata, Spreng. Syst. iii. 515 = Aster divaricatus.
squamosa, Dory, Voy. iii. 110=Senecio squamosus.
squarrosa, *Georgi, It.* i. 229.—Sibir. baical.
squarrosa, Linn. Sp. PI. 861 — Inula vulgaris.
squarrosa, Wall. Cat. n. 8025 = Blumea myriocephala.
stachyoides, Spreng. ex DC. Prod. v. 442 = Blumea glomerata.
Steetzii, *Griseb. App. Ind. Sent. Hort. Gotting.* (1878) 8.—Afr. anstr.
stellata, Spreng. Neue Entdeck. ii. 142=Veroonia oppositifolia.
Steudelii, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.* 388.—Abyssin.
stipulacea, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 164.—Hab. ?
stipulata, Vahl, ex DC. Prod. V. 97 = Liabum Jussisni.
striata, Wall. Cat. n. 8065= viscidula.
stricta, Wall. 1. c. n. 3044 = japonica.
stricta, *Willd. Sp. PI.* iii. 1922.—Ind. or.; Afr. trop.
subcapitata, Wall. Cat. n. 3056 = Blumea subcapitata.
subdecurrens, DC. Prod. v. 379 = Erigeron- subdecurrens.
subdecurrens, A. Gray, PI. Fendl. 78 ; PL Wright, i. 102 = Coulteri.
subracemosa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 41.—Java.
subsessilis, Wall. Cat. n. 3000 = Vernonia subsessilis.
subsimplex, Wall. 1. c. n. 8003 = Vernonia cinerea.
subspicata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856} 735.—Chili.
suffruticosa, *Phil. I. c*—Chili,
nmbavensis, *Miq. Fl- Ind. Bat.* ii. 46.—Malaya.
sylvatica, Blume, Bijdr. 898 = Blumea sylvatica.
symphytifblia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 10.—Hab.?
syringaefolia, *Meyen (f Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 263.—China,
tenella, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 40.—Ins. Timor.
tenera. Wall. Cat, n. 3023 = Blumea oxyodonta.
Tenorii, Presl, ex Spreng. Pugill. i. 65 = Phagnalon rupestre.
tenuifolia, Salisb. Prod. 194 *(=Schi*ogyne sericea).*—Ins. Canar.
tematensis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 49.—Ins. Temate.
tetraptera, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxiv. (1851) 1.178 = Blumea tetraptera.
thapsoides, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 304 = Inula thapsoides.
thermarum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 381.-Chili,
thesiifolia, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 75.—Mexic.

CONYZA:—
thuyoides, Lam. Encyc. ii. 90=Baccharis thyoides.
thyrsi/era, C. B. Clarke, Comp. Ind. 76, sphalm.= seq.
thyrsiflora, Wall. Cat. n. 3082-Blumea lacera.
thyrsoidea, Pers. Syn. ii. 426. n. 8-Blumea lacera.
tigrensis, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 316.—Afr. trop.
timorensis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 47.—Ins. Timor.
tomentosa, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 26 == Alciope lanata.
tomentosa, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 148 = Phagnalon rupestre.
tomentosa, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 5.—Mexic.
tomentosa, Wall. Cat. n. 8031=Pluchea tomentosa.
tortnosa, *Linn. Sp. PI.* 862.—Am. austr.
travancorensis. Wall. Cat. n. 3067=viscidula.
tricuneata, Willd. Sp. PI. iii. 1946 = Baccharis conferta.
tridentata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 342 - Baccharis tridentata ?
triloba, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1884) 261 = Erigeron trilobus.
trinervia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 12.—Meric.
trinervis, Lam. Encyc. ii. 85 = Baccharis trinervig.
triplinervia, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 187.—Bras.
trisulca, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 172 = stricta.
luberosa, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. i. 415 = Jasonia radiata.
uliginosa, Pers. Syn. ii. 426 = Pluchea bifrons.
umbrosa, *Kar. b" Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 379.—Sibiria.
undulata,. *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 339.—Afr. trop.
uniflora, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 140 = Helichrysum filicaule.
uniflora, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 18.—Mexic
vagans, Vftdl. Cat. n. 3040=Vernonia vagans.
variegata, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 889.—Abyssin.
Vatkfana, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 314.—Air. trop.
verbaseifolia, Bieb. ex Georgi, Beschr. Russ. Reich, iv. 1239 -Inula thapsoides.
verbaseifolia, Bory, Voy. ii. 377—ancbusaefoUa.
verbaseifolia, Frivald. ex Nym. Consp. 398 = Inula Aschersoniana
verbaseifolia, Willd. Sp. PI. iii. 1924-Inula Candida.
veronicaefolia, Wall. Cat. n. 8005 =• japonica.
verrucosa, Hontt. ex DC. Prod. vii. 13 = Printzia Bergii.
vestita, Wall. Cat. n. 2998 = Blumea balsamifera.
villosa, Herb. Madr. ex Wall. 1. c. n. 8106 - Blumea amplectens.
villosa, Willd. Sp. PI. ill. 1929-Laggera auriU.
viminea, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 49.—Malaya.
virens, Wall. Cat. n. 3087-= Blumea vireni.
virgata, *DC. Prod.* v. 386.—Madag.
virgata, Linn. Sp. PI. ed. II. 1206 = Pterocaulon virgatum.
viscidula, *Wall. Cat.* n. 3006.—As. trop.; Austral,
viscosa, *Boj. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 349.—Ins. Manrit
viscosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 415=Inula viscosa.
viscosa, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 8.—Mexic.
viscosula, Wall, ex DC. Prod. v. 441 •> Blnmea membranacea.
volkameriaefolia. Wall. Cat. n. 3001 - Vernonia volkameriaefolia.
volubilis, Wall. 1. c. n. 3057 = Microglossa volubilis.
vulgaris. Lam. Fl. Fr. ii. 78 = Inula vulgaris.
vulgaris, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 736.—Chili.
Wallichii, DC. Prod. v. 384=viscidula.
wangtuensis, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 61.—Reg. Himal.
Wightiana, Wall. Cat. n. 3028 = Vernonia arborea.
Wightiana, Wall, ex DC. Prod. v. 43S - Blumea Wightiana.
Wulfeni, Host, ex Beck, in Denkschr. Akad. Wien, Math. Nat. xliv. (1882) 832 = Inula bifrons.
Zollingeriana, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 179.-Java.

CONYZELLA, Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xiv. n. 4 (1869); Sert. Tiansch. 51 - Erigeron, Linn. (Compos.).
canadensis, Rupr. 1. c. =-E. canadensis.

CONVZOIDES, Toum. ex DC. Prod. vi. 281 (1887) = Carpesium, Linn. (Compos.).

COOCKIA, Batscb, Tab. 63 (1802)=COOKIA, Sonner.

COOKIA, J. F. Gmel. Syst. 24 (1791) = Pimelea, Hanks *Sc* Soland. (Thymel.).
Gnidia, J. *V.* Gmel. 1. c = P. Gnidia.
pilosa, J. F. Gmel. 1. c. =P. pilosa.
prostrata, J. F. Gmel. 1. c.=P. prostrata.

COOKIA, Sonner. Voy. Ind. iii. 258. t. 130 (1782) -Clausena, Burm. f. (Rutac).
anisata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 415, 406.—Hab.?
anisodora, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 253=Claosena excavata.
Anisum-olens, Blanco, 1. c ed. I. 359=Clausena excavata.
australis, F. MuelL Fragm. i. 25 = Pentaceras australis.
chlorosperma, BInme, Bijdr. 136=Glycosmis chlorosperma.
cyanocarpa, Blume, I. c. 136 - Glycosmis cyanocarpa.
dulcis, Bedd. in Madr. Jonrn. Sc. Ser. II. xxii. (1861) 73 = Clausena Willdenowii.
faleata, DC. Prod. i. 637.—China.
glabrescens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 524.—In«-Philipp.
graveolens, Wight *8c* Am. Prod. 95 - Clausen* excavata.
macrophylla, Lindl. in Wall. Cat. n. 6367 = Clausen* heptaphylla.
pentaphylla, Wight *Sc* Am. ex M. Roem. Syn. Hesper. 46=Clausena pentaphylla.
punctata, Hassk. Cat Hort Bog. Alt. 215=Micromclum pubescens.
punctata, Ketz. Obs. vi. 29=Clansena excavata.
punctata, Sonner. Voy. Ind. iii. 258. t 180 = Clausen* Wampi.
Sonneratii, Montr, in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 1«-—N.Caled.l
Wampi, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 358 = Clausen* Wampi.

COOPEEIA, Herb, in Bot. Reg. t. 1836 (183[5])-*AMARYLLIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 722.
SCEPTRANTHUS, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xx. (1888) 413.
chlorosolen. Herb, in Bot. Reg. t. 1835 - Drammond*-
Drummondii, *Herb. 1. c.*—Texas.
mexicana, Herb. Amaryll. 182 — Drummondii.
pednnculau, *Herb. I. c.* 179. t 42. ff. 8-5.—Texas.

COPAIBA, Adans. Fam. U. 341 (1763)-seq.

COPAIFERA, Linn. Sp. PI. ed. II. 657 (1762). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 585.
COPAIBA, Adans. Fam. ii. 341 (1763).
COPAIVA, Jacq. Enum. PL Carib. 4 (1760).
GORSKIA, Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot. >• 16. t. 3 (1861).
GUIBOURTIA, J. J. Benn. in Journ. Linn. Soc. >• (1857) 149.
Beyrichii, *Hayne, Anneig.* x. t 12.—Bras,
bijuga, *Willd. ex Hayne, 1. c.* t 16.—Bras.
bracteata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 1W-—Guiana.
coleosperma, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxr. (1866) 816. f. 43.—Afr. trop.
confertiflora, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 9*^" Am. trop.
copallina, Baill. Hist PL iL 142,163 = Guibourlian*-
cordifolia, *Hayne, Artneig.* x. t. 21.— Bras,
coriacea, *Mart. Reise Bras. I* 285; *et in Hayne,* t 20.—Bras.
disperma, *Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1795) 34.—Ins. Maurit
elliptica, *Mart, in Flora,* xx. (1887) »• *Beibl.* 127.— Bras.
glabra, *Vogel, in Linnaea,* xi. (1887) 410.—Br**;
Gorskiana, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 817.—Afr. trop.
gnyanensis, *Desf. in Mim. Mus. Par.* vii (1821) 37«-Guiana.
Guibourtiana, *Benth. in Trans, Linn. Soc.* «ᵛ - (1866) 817.—Afr. trop.

COPAIPKBA:-

nymenadfolia, *Moric. in Mem. Soc. Pkys. Gentv.* **vi.** (1833) 529.—Cuba.

Jacquini, Desf. in Mem. Mas. Par. viL (1821) 878 = officinalis.

Jacquiniana, G. Don, Gen. Syst, ii. 455-=offidnalis.

Jussieui, *Hayne, Arming*, x. sob t. 17.—Peruv.

Lansdorfii, *Desf. in Mem. Afus. Par.* vii. (1821) 877. —Bras.

Ma, *Hayne, Anneig.* x. 1.18.—Bras.

Mannii, Baill. Adansonia, vi. (1866) 202=Hardwickia Mannii.

marginata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 243.—Bras.

Martii, *Hayne, Anneig. x.* 1.16.—Bras.

Mopane, J. Kirk, ex Benth. in Trans. Linn. Soc xxv. (1866) 317—Afr. trop.

njulUjuga, *Hayne, Anneig.* x. sab t. 17.—Bras.

"«ida, *Mart, ex Hayne, I. c.* x. t. 17—Bras.

oblonifolia. *Mart, ex Hayne, I. c.* **t. 23 j** *et in Mart.* *f»«a«w.i. 545.—Bras,

oniânalis, *Linn. Sp. PI.* ed. IL 557.—Am. trop.

Pibiflora, *Benth. in Hoot. Journ. Bot.* ii. (1840) 101, —Guiana.

"§»», *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. II. 243.—Bras.

***™omi Hayne, Ar,neig.* x. t 22.-Bras.**

trapeafblia, *Hayne, I. e.* snb t. 23.—Bras.

COPA1VA, Jacq. Ennm. PI. Carib. 4 (1760) = **Copaiba ,** Linn. (1762).

officinalis, Jacq. 1. c. 21=Copaifera officinalis.

COPERNICIA, Mart Hist. Nat. Palm. ii. 151. t. 50 A; iii. 242 (1837 !). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 927.

CRYOSOPHILA, Blume, Rumphia. ii. 58, in nota (1886).

CRYSOPHILA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 928 (1883).

cerif«», *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 242. t. 60 A.— . nm. trop.

=°¹Pita, *Mart. I.* c.-Cuba.

"Mrollossa, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 241, nomen. ~'/*iab.?

marttima, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 243. t. 50 A. —Cuba.

Mira «»»o, Mart 1. c. -Thrinax Miraguana.

nan *Lieb* ... ·m- .* ****** BM_ Cenir_ Am_ Bot_ y". *"·

·~Mexic.

Pumos, *Mart Hist N*<>*t- Pol*™- "·> 248,—Cnba.

robusta, *Hart. ex Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Cu'».

tectorum, *Mart.* *Hist Nat Palm* "»·" 2«.—N. Granat.

Wrightii, *Griseb, Cat. PI. Cub.* 22O.-Cnba.

COPIANTHUS, Hill, Decade 1.1 (1778). Amaranthac.!

monstr.

***indica*, Hill, l. c.—Ind. or.**

COPIOGLOSSA, Miers, in Proc. Roy. Hort Soc. iiL (1863) 294 =

***pilosa*, Miers, l.** °" (=£»><«•<»«»'*«« *Neesianus*).—Bras.

COPIS RhJi**A, E. Mey.** Comm.Pl. Afr. Anstr. 132 (1886) = **Rhynchosia, L**"- (Legumin.).

***caribaeum*, E. Mey**, L c. 133=R. caribaea.

***diversifolium*, E.** Mev- '·c- 186 = R. hirsuta.

***effusum*, E. Mey**. 1. c = R. adenodes.

***falcatum*, E. Mey**. 1. c. 136-R. minima.

***gibbum*, E.** Mey. 1. c. 187 - R. caritaea.

***glabrum*, E.** Mey- *·c- "* = *· glandulosa.

***glandulosum*, E.** Mey. 1. c. 133 = R. glandnlosa.

***grandifolium*, E-** Mey. c. 138R = . gran ^ a ia.

***nitidum*, E. Mey. l. c. 136 = R. nitida.**

paniculatum*, E. Me L c_134=R_ totto_

***pictum*, E. Mey. l.** c- "*-R_ caril*eiL

***pilosum*, E. Mey. l** cey. 133=R. pilosnm.

***rotundifolium*, E.** 137 xiii. (1888) fol 527 = R. secunda.

***secundum*, Walp. In Linnaea,** r

T s i *icifolium*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 1.188 = ngulifolia.

***gulifolium*, Steud. Nom. ed. II. ii. 454, sphalm. = R. singulif**

***subsericeum*, in Linnaea, xxiii.**

Galactia te (1860) 84 =

***tenue*, E. Mey** Conu»-P1_Afr- **Austr**

***tottum*, E. Mey.** ·f· 1 S»R- p**nberaf**- 186=R. minima.

trichodes *

viscidulu JT"^2- l c- 1S4,,R-tott*-

"», E. Mey. L c - R. viscidaU.

COPPENSIA, Dum. in Mem. Acad. Brux. ix. (1885) (Sur Maelen.) 10, in nota. = Onoidlum, Sw. (Orchid.).

bifolia, **Dum.** 1. c.-O. bifolinm.

COPPOLERIA, Todaro, in Atti Ace. Sc. Palermo, N. S. i. (1846) 14 = Vioift, Toura. (Legnmin.).

monantha, Todaro. 1. c. = V. monantha.

COPROSMA, Font. Char. Gen. 187. t. 69 (1776;. *RUBIACEAE*, Benth. *It* Hook, f ii. 189.

EUARTHRONIA, Nntt. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 49, in syn.

EURYNOME, DC. Prod. iv. 475 (1830).

MARQUISIA, A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par. T. (1830) 192.

PELAFHIA, Banks *Sc* Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 206.

acerosa, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1889) 207. —N. ZeL

acutifolia, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 128. - N . Zel.

acutifolia, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, iii. 429 *= Morinda acutifolia.

affinis, Hook. f. Fl. Antarct. i. 21. t 14=foetidiasima.

arborea, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* x. (1878) 420. —N. Zel.

arcuata, *Colenso, Excurs. North. 1st.* 84.—N. Zel.

Baueri, *Endl. Iconog.* t. 111.—Ins. Norfolc.; N. Zel.

Baueriana, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 104=Baueri.

Billardieri, *Hoot./, in Hoot. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 465 [bis].—Austral.

calycina, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 306 ***("Leptostigma Arnottianum).*—Chili,**

ciliata, *Hoot./. Fl. Antarct.* i. 22.—Ins. Auckland.

***Colensoi, Hook./. Handb. New Zeal. Fl.* 117.—N. Zel.**

concinna, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 330.—N. Zel.

con/erta, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 206 •= Cnnninghamii

cnlssifolia, *Colenso, Excurs. North. IsL* 75.—N. ZeL

cuneata, *Hook./. FL Antarct.* i. 21. t. 16.—N. Zel.

Cnnninghamii, *Hook. /. Handb. New Zeal. Fl.* 113.— N. Zel.

cuspidifolia, DC. Prod. iv. 678=hirteIla.

depressa, *Colenso, ex Hook. /. Fl. N. Zel.* 110.— N. Zel.

divaricata, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 207. —N. ZeL

ernodeoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 49.—Ins. Padf.

/oetidissima, A. Cunn. in Ann. Nat Hist. ii. (1839) 206 Cunninghaniii.

foetidissima, *Forst. Char. Gen.* 138.—N. Zel.

foUosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 48.— Ins. Sandvic.

gradlis, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 206 = **rhaJ]ad s?**

grandifoUa, *Hook./. Fl. N. Zel.* **104.—**N. Zel.

hirtella, *Labill. Noy. Hot!. PI. i.* 70. t. 96.—Austral,

lanceolaris, *F. Muell. Fragm.* ix. 70.—Austral,

lignstrina, *Kunth, Jnd. Sem. Hort. Berol.* (1846) 13. —Hab. ?

linariifolia, *Hook. /. Handb. New Zeal. Fl.* 118.— N.ZeL

longifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 48. —Ins. Sandvic.

lucida, *Forst. Char. Gen.* 188.—N. Zel.

Menziesii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 49.— Ins. Pacific.

microcarpa, *Hook./. Ft. N. Zel.* 110.—N. Zel.

micropkylla, A. Cum. ex Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 465 [bis] = Billardieri.

myrtifolia, *Noronha, in Ver. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art iv. 10.—Java.

myrtilli/olia, Hook. f. Fl. Antarct. i. 21=parviflora.

Nertera, F. Muell. Fragm. ix. 186-Nertera depressa.

nitida, *Hook. /. in Hoot. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 465 [bis].—Austral.

parviflora, *Hook./. Fl. N. Zel.* 106.—N. ZeL

persicaefblia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 50,-Ins. Fiji,

petiolata, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 128. —Int. Kermadec.

pilosa, *Endl. Fl. Ins. Nor/. Prod.* 60.—Ins. Norfolc.

propinqua, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 206.—N. ZeL

pubens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 49.— Ins. Sandvic.

COPBOSMA:-

pumila, *Hook./. Fl. N. Zel.* 111.—Austral.; N. Zel.

pusilla, Forst. f. Prod. 90; A. Rich. Voy. Astrol. Bot. i. 265 = foetidissima.

putida, *C. Moore V F. Muell. Fragm.* vii. 45.—Ins. D. Howe.

repens, A. Rich. Voy. Astrol. Bot. i. 264=foetidissima.

repens, *Hook./. Fl. Antarct. i.* 22.1.16.—N. Zel.

reptans, *F. Muell. Fragm.* ix. 186.—Austral.

retusa, Banks & Soland. ex Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1844) 416 = Baueri.

rhamnoides, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 206.—N. Zel.

rhyncbocarpa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 48.—Ins. Sandvic.

robusta, *Raoul, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 121.—N. Zel.

rotundifolia, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 206.—N. Zel.

rubra, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1886) 269.— N. Zel.

serrulata, *Hook. f. ex J. Buck. I. c.* iii. (1871) 212.— N.ZeL

spathulata, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1889) 207.—N. Zel.

Stocki Hort. ex J. Barbier, in Rev. Hortic. Belg. iii. (1877) t. 12 = Baueri.

snndana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 827.—Malaya,

taitensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 49. —Ins. Tahiti.

tennicaulis, *Hook./. Fl. N. Zel.* **106.—**N. Zel.

triflora, *Benth. V Hook. /. Gen.* ii. **139.—**Ins. Juan Fernand.

venosa, A. Cunn. ex Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 466 [bis] = hirtella.

virescens, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xi. (1879) 426. —N. Zel.

Waimeae, *Wawra, in Flora*, lvii. (1874) 327.—Ins. Padf.

COPROSMANTHUS, Kunth, in Abh. Akad. Berl. (1848} 85; et Enum. PI. v. 263 (1850)WSmilax, Linn. (Iiliac).

consanguineus, Kunth, Enum. PI. v. 268 »S. herbacea.

herbaceus, Kunth, 1. c. 265 «=S. herbacea.

japonicus, Kunth, 1. c. 268 = S. China.

lasioneuron, Kunth, 1. c. 266 = S. herbacea.

*pedunculari*s, Kunth, 1. c. 264 -=S. herbacea.

tamni/olius, Kunth, 1. c. 267 = S. tamnifolia.

COPTIDIUM, Nym. Consp. 13 (1878)=Banunovaus, Toura.

ranunculoides, Nym. 1. c.-R. lapponicus.

COFTIS, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 805 *RANUNCULACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 8.

CHRYSOCOPTIS, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 9. t. 1.

anemonaefolia, *Sieb.* b* *Zucc. in Abh. Math. Phys. Kl.* *Muench.* iv. II. (1843) 180.—Japon.

asplenifolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 306.—Am. bor.

brachypetala, *Sieb. V Zucc. in Abh. Math. Phys. Kl.* *Muench.* iv. II. (1843) 180.—Japon.

occidentals, *Torr. tf Gray, FIJ N. Am.* i. 28.—Am. bor. occ.

orientalis, *Maxim, in Bull. Acad. Pttersi.* xii. (1868) 60.—Japon.

quinquefolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iiL 7.— Japon.

Teeta, *Wall, in Linnaea*, xii. (1888) *Litt.* 227.-Reg. Himal.

trlfolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) **306.—** Reg. bor. temp, et arct.

COPTOCHEHiE, Hoffmgg. Vera. Pfl. Nachtr. (1841) ex Linnaea, xvi. (1842) Litt. 279. *GESNERACEAE1* macrorhiza, *Hoffmgg. II. cc.*—Bras. ?

COPTOPHYIiLtntt, Korth. in. Ned. Kmidk. Arch, ii. (1861) 161. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 68.

bracteatum, *Korth. 1. c.* 162.—Sumatra,

capiutum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 848.—Malaya,

pilosum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 230.— Java.

COPTOBAPELTA, Korth. in Ned. Kruidk. Arch. ii. n. (1851) 112. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 36.

flavescens, *Korth. 1. c.* 113—Malaya.

Griffithii, *Hook./. Ic. PI.* 1.1089.-Mala/a

COPTOBPEBMA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 86 (1878). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook, f. 1. c.
nigrcscens, *Hook.f. 1. c.* 87.—Afr. trap.

COQUEBERTIA, Bronpn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xsx. (1833) 111 = Zollarnia, Maximil. & Nees (Legumin.).
ilicifolia, Brongn.l. e.=Z. ilicifolia.

CORALLIORRHIZA, Aschers. Fl. Brandenb. 697 (1864) = Corallorrhiza, Hall. (Orchid.).

COBALLOBOTBY8, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 575 (1876). *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. 1. c.
acuminata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* Hi. 456.—Reg. Himal.

COBALLOCABPU8, Welw. ex Benth. & Hook, f. Gen. i. 831 (1867). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. I. c.
conocarpns, *Benth. (f Hoot. f. 1. c*— Ind. or.; Afr. trop.
corallmus, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 647 = Fenzlii.
Courb/nii, Cogn. 1. c. 656=velntinus.
Ehrenbergii, *Hook.f. in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 566.—Nubia.
epigaeus, *Benth. V Hook.f. Gen.* i. 881.—Ind. or.
erostris, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 667.—Afr. trop.
etiaicus, Hook. f. 1. c. = velutinns.
Fenzlii, *Hook.f.l. c.* 565.—Afr. trop.
Gijef, *Hook.f. I. c.* 566.—Nnbia.
glomeratus, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 658.—Venezuela.
gracilipes, *Cogn. I. e.* 650.—Ind. or.
palmatus, *Cogn. 1. c.* 648.—Ind. or.
parvifolius, *Cogn. I. c.* 658.—Arabia,
pedunculosus, *Cogn. 1. c.* 654.—Abysiin.
Poissonii, *Cogn. 1. c.* 651.—Madag.
Schimperi, *Hook.f. in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 567.—Abyssin.
velutinns, *Benth.br Hook.f. Gen.* i. 831.—Ind. or.
Welwitschii, *Benth. V Hook.f. I.* c—Afr. trop.

CORALLODENDRON, Tourn. ex Rnpp. Fl. Jen. ed. Hall. 257 (1745) = Erythrina, Linn. (Legumin.).
aculeatum, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 341 = E. Corallodendron.

CORALLOPHYLLUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 276. t 660 bis (1825) = Lennoa, La Llave & Lex.
caeruleum, H. B. & K. 1. e. 276 = L. caerulea.

COBAIiLORRHIZA, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 278 fl742) (Corallorhiza); R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 209 (1813). *ORCHIDEAB*, Benth. & Hook, f. iii. 497.
RHIZOCORALLON, Hall, in Rupp. Fl. Jen. 301 (1745).
arizonica, *S. Wats, in Proe. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 379.—Arizona.
Bigelovii, *Wats. I. e.* xii. (1877) 275.—Calif.
huliosa, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. iii. (1845) 19 = mexicana.
dentata, Host, Fl. Austr. ii. 547 = innata.
Ehrenbergii, *Reichb.f. inLinnaea*, xxii. (1849) 883.—Mexic.
ericetorum, Drej. in Fl. Dan. t. 2864 = innata.
foliosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 685.—Ind. or.
grandiflora, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 19.—Mexic.
Halleri, Rich, in Mém. Mas. Par. iv. (1818) 61 = innata.
hiemalis, *Nutt. Gen. Am.* ii. 198.—Am. bor.
indica, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 26.—Ind. or.
innata, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 209.—Europ.; Am. bor.
intacta, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 85 = innata.
Jacquemontii, *Decne. in Jacquem. Voy. Bot.* 165. t. 168.—Reg. Himal.
Macraei, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. (1866) 453 = stricta.

COBAI.LOBHIZA:—
Mertensiana, *Bong. Veg. Ins. Sitcka*, 165.—Alaska,
mexicana, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 534.—Mexic
micrantha, *Ckapm. Fl. S. U. St.* 454.—Am. bor.
multiflora, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* iii. (1823) 138. t. 7.—Am. bor.
nemoralis, Sw. ex Nym. Consp. 686 = innata.
Neottia, Scop. Fl. Cam. cd. II. ii. 207 = innata.
odontorhiza, *Nutt. Gen. Am.* ii. 197.—Am. bor.
patens, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 535 = Oreorchis patens.
squamata, Poir. in Diet. Sc. Nat x. 875 =- Dipodium squamatnm.
striata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 534.—Am. bor.
verna, Nutt. in Journ. Acad. Philad. iii. (1823) 136-innata.
virescens, Drej. ex Heynh. Norn. ii. 159, nomen = innata.
Wisteriana, Conrad, in Journ. Acad. Philad. vi. (1829) 145 = odontorhiza.

COBALLOSPABTIUM, Armst. in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 333. *LEGUMINOSAE*.
crassicaule, *Armst. 1. c.*—N. Zel.

CORALLUMA. Schrank, ex Haw. Syn. PI. Socc. ed. II. 47 (1819) = Caralluma, R. Br. (Asclep.).

CORBICHONIA, Scop. Introd. 264 (1777) = Orygla, Forsk. (Ficoid.).

CORBULARIA, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 849 = Narcissus, Tourn. (Amaryllid.).
atbicans. Haw. Revis. 122 - N. Bulbocodium.
aurea, Haw. Monog. (in Sweet, Brit. Flow. Gard. iv.) 1. n. 5 = N. Bulbocodium.
Bulbocodium, Haw. Revis. 123-N. Bulbocodium.
cantabrica. Haw. Monog. 1. n. 1 = N. Bulbocodium.
conspicua, Haw. 1. c. n. 8 = N. Bulbocodium.
filifolia, M. Roem. Syn. Engat. 190 = N. Bnlbocodium.
Gigas, Haw. Monog. 1. n. 10 = N. Bulbocodinm.
Graellsii, Webb, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hûp. i. 150 = N. Bulbocodium.
hedraeantha, Webb & Heldr. Cat. PI. Hisp. 220 = N. Bulbocodium.
lobulata. Haw. Revis. 122 = N. Bulbocodinm.
monophylla, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1846-47) 425 = N. Bulbocodium.
nival is, Nym. Consp. 718 =N. Bulbocodium.
obesa, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 850-N. Bulbocodium.
Schultesii. M. Roem. Syn. Ensat. 190=N. Bulbocodinm.
serotina. Haw. Monog. 1. n. 9-N. Bulbocodium.
tenuifolia, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 349 = N. Bulbocodium.
turgida, Salisb. 1. c. 851 = N. Bulbocodium.

COBCHOBOF8I8, Sieb. & Zucc. in Abh. Alcad. Muench. iii. (1843) 737. t 4. *TILIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 235.
crenata, *Sieb.* fc" *Zucc. I. c*—Japon.

COBCHOBTJB, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1785). *TILIACEAE*, Benth. Sc Hook. f. i. 235.
ANTICKORUS, Linn. Mant. 9. n. 1257 (1767).
CARICHEHIA, Scop. Introd. 104 (1777).
GANJA, Reichb. Handb. 303 (1837).
MAERLENSIA, Veil. FL Flura. v. 1.112 (1827).
PALLADIA, Lam. Illustr. t. 285 (1792).
acutangulos. *Lam. Encyc.* ii. 104.—Cosmop. trop.
aesticans, Hill, Veg. Syst. xiv. 23 = aestuant.
aestuans, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 441-acutangulus.
aestuans, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 101 - trilocularis.
aestuans, Herb. Madr. ex Wall. Cat. p. 237. n. 1074 = urticaefolius.
aestuans, *Linn. Syst.* ed. X. 1079.—Am. trop.
alatns, *G. Don, Gen. Syst. i.* 542.—Afr. trop.
americanus, Schrank, ex Stead. Nom. ed. II. i. 416 = Sida erubescens.
angustifokus. *Schum.* &" *Thonn. in Dan. Vid. Selsk. Afh.* x. (1828) 18.—Afr. trap.
Antichoras, *Raeusch. Nom.* ed. III. 158.—Geront. trop.
artnarius, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* v. 389.—Mexic.

COBCHOBUB:—
argutus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 337.—N. Granat.
asplenifolius, *Burch. Trav.* i. 400.—Afr. austr.
asplenifolius, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i-229-triloculaiia.
australis, A. Cunn. ex F. Muell. Fragm. iii. 8' Cunninghami.
bifurcatus, *Mill. Gard. Diet*, ed VIII. n. 6.—Jamaic.
brachycarpos, *Rich, ex Steud. Nom.* ed. II. L 416.—Afr. trop.
brachycarpus, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent i. 89 » fasicicularis.
bullatus, Jacq. Eclog. PI. t. 168 = pilolobus.
Burmanni, DC. Prod. i. 506-tridcns.
campestris, Macfad. Fl Jamaic. i. 107 «- aestuans.
capsularis, *Linn. Sp. PI.* 529.—Cosmop. trop.
caryophylloides. Linn. Syst. ed. X. 107»-siliquosus?
catharticus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 442 = olitorius.
cordifolius, Salisb. Prud. 866= capsularis.
Coreta, Linn. PI Jam. Pugill. 14 = siliqnosns.
Cunninghami, *F. Muell. Fragm.* iii. 8.—Austral.
decemangularis, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 582 = olitorius.
depressus. Stocks, in Proc. Linn. Soc. i. (1848) 867" C. Antichorus.
echinatus, *Benth. Fl. Austral*, i. 276.—Austral,
elachocarpus, *F. Muell. Fragm.* viii. 6.—Austral,
erodioides, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 504.—Ins. Socotra.
fascicularis, *Lam. Encyc.* ii. 104.—Geront. trop.
flexuosus, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* it (1794) 335.—Japon.
foliosus, *Sprung. Syst.* ii. 683.—Cuba.
frutescens, Lam. Encyc. ii. 105»hirsutus.
fruticulosus, Vis. in Hora, xx. (1837) 443 = triloculares.
furcatus, G. Don, Gen. Syst. i. 644 = seq.
fuscus, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 682 = actitangulus.
gradlis, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 65.—Abyssin.
grandiflorus, Spring, ex Mart, in Flora, xx. (1837) »• Beibl. 102 = Tumeraserrata.
Gteveanus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. I* (1886) 643.—Madag.
guadaluprnsis, *Spreng. Syst.* ii. 584.—Ins. Guadalnp.
hinutus, *Linn. Sp. PI.* 530.—Ind. occ.
hirtus, *Linn. I. c.* ed. II. 747.—Am. calid.
hirtus, Thunb. Fl. Jap. 228 = Zelkova acuminata.
humilis, Munro, ex Stocks, in Proc. Linn. Soc. >• (1848) 867-C. Antichorus.
humilis, *A. St. Hit. Fl. Bras. Met.* i. 280.—Bras,
hygrophilus, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral*, i- 276-—Austral.
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 227 = Kerria japonic*,
javanicus, *Burm.f. Fl. Ind.* 123. t. 86. f. 3.—Ind. «•
lanceolatus, *G. Don, Gen. Syst.* i. 548.—Guinea.
lanuginosus, Macfad. Fl. Jamaic. i. 108 = hirsutus.
lasiolobus, Spreng. Syst. ii. 583 - pilolobus.
leptocarpus, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral*, i- 278.-" Auslral.
linearis, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 5.—Mexic.
linearis, Wall. Cat. n. 1070=tridens.
longicarpus, *G. Don, Gen. Syst.* 1. 543.—Guinea,
longipedunculatus, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* •• 262.—Afr. trop.
Marua, Buth.-Ham. in Wall. Cat. n. 6311-capsuUnfe
microphyllus, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1637) »e = C. Antichoras.
mompoxensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 838.—N. Granat.
muricatus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss.* >• »*-—Abyssin.
muricatus, *Schum. V Thonn. in Dan. Vid. Selsk. Af*-x. (1828) 20.—Afr. trop.
olitorius, *Linn. Sp. PL* 529.—Cosmop. trop.
oppositiflorus, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xii. (1845) 126 = acutangulus.
orinocensis, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 837." Venezuela.
patens, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1828) ex Linnaea, iii. (1828) Lit. 9 - tridens.
pilolobus, *Link, Enum. Hort. Beret*, ii. 72•—Aiiii ealid.
pilosus, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* v. 888. t. 4«-N. Granat
polygonus *Schum. V Thonn. in Dan. Vid. Selsk. W* x. (1828) 20.—Afr. trop.

COHCHOBUS:—
prismatocarpus, *St. Hit. ft. Bras. Mer.* i. 282.—Bras.
procumbens, *Boj. Hort. Maurit.* 43.—Afr. trop.
pseudocapsularis, *Schweinf. in Verh. Zoal.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 670.—Afr. trop.
Pumilio, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 277.—Austral.
pumilus, *Buck-Ham, ex Wall. Cat.* n. 631O.-Ind. or.
quadrangularis, *J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins.* 293.-Ins. Cap. Verd.
lumquelocularis, Moench, Meth. 248 -= olitorins.
quinquenervis, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 80-urticifolius.
scandens, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1704) 835.—Japan.
secundiflorus, M09. & Sesse, ex DC. Prod. i. 604-siliquosns.
stnegalensis, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 417 = tndens.
Mrraefolins, *Burch. Trav.* i. 537.—Afr. anstr.
serraefolius, DC. Prod. i. 504 = trilocnlaris.
drains, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 885.—Jiipon.
sidoides, *F. Muell. Fragm.* iii. 9.—Austral.
sHiqnosiis, *Linn. Si. PI.* 629.-Am. calid.
nlifuosus, Poepp. ex Steud. Nom. ed. II. i. 417 = iohosus,
"Hquosus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. 1. 289 = pilololobus.
spinasus, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 417 = Favonia spinifex.
***bscandens.* Wall. Cat. n. 1074-urticaefolius.
Wragonu, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 4.—Hab.t
tetrangulus, Langsd. in Syll. Ratisb. il. (1828) 168 = pilololius.
jomentillus, *F. Muell. Fragm.* iii. 10.—Austral,
vmeniosus, *Thunb. Fl. Jap.* 228.—Japon.
'onesianus, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* 477.—Ins. Manan.
to rpp >, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 281 =hirtu.
"Wens, *Linn. Mont.* 566.-Cosmop. trop.
'pfls Boj. Hort. Maurit. 4S=triloi:ularis.
trilocu 3ris. *Linn. Mant.* 77.—Geront. trop.
icaefolius, *Wight V Am. Prod.* 73.—Ind. or.j Afr. wop.
^micularis, *F. Muell. Fragm.* iii. lO.-Austral.
Sf'osssimus, *Am Stm Ha . pi . Bras Mlr* L. 280.—Bras,
^alcottu, *F. Muell. Fragm.* iii. 9.-Austral.

CoRDA, St.Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon.viii. (1881) 177
w>raia, Linn.

CORDAEA, Spreng Gen. M1 (1831) = Cyamopsis, D. C.
eformis, Spreng. L c-Cyamopsis psoralioides.

Cor^?iMOYA Baill. Adansonia, i. 255 (1861) = JttaUotns, Lour. (Euphorb.).
acuminofa, Baill. 1. c. - M. BaillonUnus.
integnfolia, Baill. 1. c. = M. integrifolius.

CORDIA J Linn. Gen. ed. 1.62 (1737). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. fii. 838.
ACNADENAJ CAXPIPHEA, COILANTHERA, COLOCOCCA, ECTEMIS, NOVELLA, PILOISA, QUARENA, TOPIARIS, TOQUERA, Ra6n. Sylva Tellur. 39-48 (1838).
5°*EI-i-U, Neck. Elem. i. 275, 276 (1790).
^RDIADA, Veil. Fl. Hum. 98 (1826) ; ii. 1.156.
vf *DN A, Rn« & pav. Prod. 87. t. 6 (1794).
*"<ENsu, Neck. Elem. i. 275, 276 (1790).
GER sc ANTHUS P. Br. Hist. Jamafc-170. t. 29. f. 3 U756).
GYNAPN, A. DC. Prod. ix. 468 (1845\
HEMIGYMNA, Griff' fa Cl a c. ourn. N at. H ist. iii. (1843) 363.
MACIELIA, Vand. Fl. Lnslt rt Bras Spec. 14 (1788).
MACRIA, Tenore, m Mem Soc. It al. Moden. xxiv. UB48) 366.
MYXI «yn *' Caesal P ex LiTM". Hort. Cliff. 68 (1737) in
PARADIGMA, Miei (1875) 30 ». 8.
PAVONIA, omb. ex Lam Tabl. Encyc. i. 421 (1800).

COBDIA:—
PLETHOSTEPHIA, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 1875)82. t. 8.
RHABDOCALYX, Lindl. Veg. Kingd. 629 (1847).
SEBESTENA, [Dill.] Gaertn. Fruct. i.-364. t. 7«. f. 1 (1788).
VARRONIA, P. Br. Hist. Jamaic. 172 (1756); L n. Syst. ed. X. 916 (1759).
abyssinica, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65; ,ed. Germ. 473-C. Myxa.
acuminata, Wall. Cat. n. 896 ; et in Roxb. Fl. Ind. ed. Caiey, ii. 839 *-Ehretia Wallicbiana.
acutifolia, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 11.—Am. trop.
arinata, *DC. Prod.* ix. 493.—Cuba!
affinis, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 22.—Am. trop.
africana, Lam. Illustr. n. 18>6 = C. Myxa.
alba, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 466.-Ind. occ.
alliodora, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 121.—Am. trop.
alnifolia, *Hornem. Hort. Hafn.* i. 227.—Hab. ?
altiifolia, Roem. & Schult. Syst. iv. 801 = serratifolia.
ambigua, *Chant, in Linnaea,* r. (1830) 115.—Mexic.
ambigua. Cham. 1. c viii. (1833) 125 = anabaplista.
amphfolia, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 4tt1.-Mauiit. ?
anabaptista, *Cham.in Linnaea,* viii. (1833) 512.—Bras,
angiocarpa, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 110.—Cuba
angustifolia, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 460.—Ind. occ.
angustifolia, Koxb. Hort. Beng. 17 ; Fl. Ind. i. 595 = Rothii.
aspera, *Forst.f. Prod.* 18. n. 109.—Austral.; Ins. Pacif.
asperrima, *DC. Prod.* ix. 498 Jamaic.
asptrrima, Spreng. Syst. i. 649 = Hyptis membranacea.
asterophora, *Mart, ex Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 5.—Am. trop.
avicularis, Salisb. Prod. 111=nodosa.
Aubletii, *DC. Prod.* iv. 490.—Guiana.
bahiensis, DC. 1. c. ix. 489 = cylindristachya.
Banalo, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.124 - subcordata.
bantamensis, *Blume, Bijdr.* 843.—Java.
Berterii, Spreng. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 480 - salvifolia.
Beurreria, Willd. Sp. PI. i. 1073, in syn. = Bourreria succulenta.
bicolor, *A. DC. ex DC. Prod.* ix. 485.—Guiana,
bifurcate, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 466.—Peruv.
Blanche'.ii, *DC. Prod.* ix. 477.—Am. trop.
bogot.nsis. *Benth. PI. Hartv.* 24U.—N. Granat
Boisiieri, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 478.—Mexic.
Bonplandiana, H. B. & K. Nov. Gen et Sp. iii. 77* = seq.
Bonplandii, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 462.—Am. austr.
Bourreria, Linn. Syst. ed. X. 936 = Bourreria succulenta.
brachypoda, *DC. Prod.* ix. 487.—Am. tiop.
brachytricha, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 13.—Am. trop.
bracleata, *DC. Prod.* ix. 472.—Cnba.
brevispicata, *Mart,* b* *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) Ml.—Mexic.
Brownii, DC. Prod. ix. 499 = C. Myxa.
bullata, Koem. & Schult. Syst. iv. 462=globosa.
buxifolia, *Juss. in Poir. Encyc.* vii. 47.—Ind. occ.
caffra, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 81.—Afr. austr.
Callococca- Collococca.
calocephala, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 488.—Bras,
calocoma, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 916.—Java,
calophylla, *Vahl, Eclog. Am.* iii. 5.—Guiana.
calyptrata, Bert, ex Spreng. Syst i. 649 = alba.
campanulata, Roxb. Hort. Beng. 17 ; Fl. Ind. i. 693 = snbeordata.
campestris. *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1867) 12.—Bras,
cans, *Mart, (f Gel. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 331.—Mexic.
Candida, *Veil. ?/. Hum.* 98; ii. t. 156.—Bras,
canescens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 73.—N. Granat.
canescens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 798 = polystachya.
caracasana, *DC. Prod, ix,* 488.—Venezuela.
Cerdana, Koem. & Schult. Syst. iv. 467 = alliodora.
chamaedrifolia, DC. Prod. ix. 499, in syn.=mirabiliflora.
chamaedryoides, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 801.—Hab. 1
Chamissoniana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 417.—Bras.
cinerascens, DC. Prod. ix. 493 > cylindristachya.

CORDIA:—
coReoides, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1867) 4.—Bras.
Collococa, Aubl. PI. Gui. i. 219 = nodosa.
Collococca, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 274.—Jamaic.
Collococca, Sw. ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 479 = nitida.
copulata, *Poir. in Diet, Sc. Nat.* x. 410.—Java,
corchorifolia, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 496.—Am. trop.
cordata, Steud. Nom. ed. II. i. 417=grandis.
cordifolia, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 70.—N. Granat.
cordifolia, Wall. Cat. n. 8»4=grandis.
coromandeliana, Retz. ex DC. Prod. ix. 509>*Ehretia buxifolia.
corylifolia, Willd. ex Roem. *8c* Schult Syst. iv. 461 --- alba.
corymbosa, O. Don, Gen. Syst. iv. 383 = monosperma.
corymbosa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 417 = alba,
crenata, *Delile, Fl. Egypte,* 195. t. 20.—Aegypt.
crenata, Roem. & Schult. Syst. iv. 463 = lnntanoides.
crenulaU, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 492.—Mexic.
crispiflora, *DC. 1. c.* 476.—Mexic.
cujabensis, *Manso (f Lhotzky, ex Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 12.—Bras.
Cumingiana, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 187.—Ins. Philipp.
cuneata, Heyne, ex DC. Prod. ix. 480 = Rothii.
cuneiformis, *DC. 1. c.* 492.—Venezuela,
curassavica, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 460.—Am. anstr.
cylindristachya, *Roem. &* Schult. 1. c.* 459.—Am. trop.
dasycephala, *H. B.V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 76.—Mtxic.
decandra, *Hook, if Am. Bot. Beech. Voy.i.* 38.—Chili.
dentata, Vahl, Eclog. Am. iii. 5 = alba.
dichotoma, Forst. f. Prod. 18. n. 110 -=C. Myxa.
digynia, *Veil. Fl. Flum.* 97 ; ii. 1.153.—Bras.
Dillenii, *Spreng. Syst.* i. 649.—Ins. Baham.
dioica, *Boj. ex DC. Prod.* ix. 481.—Madag.
dioica, Thonn. ex DC. 1. c. 480=guineensis.
diospyrifolia, *Cham, in Linnaea,* iv. (182!)) 477.—Bras,
discolor, *Cham. I. c.* 482.—Bras,
divaricata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 74.—Am. austr.
diversa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 214.- monoica.
diversifolia, *Pav. ex DC. Prod.* ix. 474.—Mexic.
dodecandra, *DC. I. c.* 478.—Mexic.
domestica, Bouton, ex Boj. Hort. Maurit. 285-amplifolia.
domestica, Roth, Nov. Sp. PI. 123 = C. Myxa,
domingensis, *Lam. Illustr. a.* 1000.—Ins. S. Doming,
dubiosa, *Blume, Bijdr.* 844.—Java,
ecalyculata, *Veil. Fl. Flum.* 96; ii. 1.149.—Bras,
egypiiaca, *Rafin. Sylva Tellur.* 37.—Aegypt.
ehretioides, Lam. Illustr. n. 1902.- C. Collococca vel nitida.
elaeagnoides, *DC. Prod. ix.* 474.—Mexic.
elliptica, Sieber, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 479-laevigata.
elliptica, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 47.—Ind. occ
erythrococca, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 208.—Cuba,
exaltata, *Lam. Illustr.* n. 1919.—Guiana,
excelsa, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 473.—Am. trop.
ferruginea, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 468; *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 71.—Mexic.; N. Granat.
Finlaysoniana, *Wall. Cat.* n. 7010.—Ind. or.
flavescens, *Aubl. PI. Gui. i.* 226. t. 89.—Guiana,
floribunda, *Spreng. Syst.* i. 65*2.—Am. austr.
fioridana, Nutt. Sylva, iii. 107 = Bourreria havanensis.
foliosa, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 830.—Mexic
formicarum, Roem. *Sc* Scbult. Syst iv. 800-nodosa.
fragrantissima, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 207.—Ind. or.; Burma.
Francisci, *Tenore, Cat. Orto Nap.* (1845) 83.—Hab. 1
frmdosa, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 403=alliodora.
fulvosa, *Wight, Ic.* iv. 1.1380.—Ind. or.
Galeottiana,i4. *Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 109.—Cuba.
Gerascanthus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 69 = tinifolia.
Gerascanthus, *Linn. Syst.* ed. X. 936.—Mexic.
Gerascanthus, Sw. ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 478-geraschcanthoides.
geraschanthoides, *H. B.* &• *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 69.—Cuba.
geraschanthoides, Rich, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 478 = A. Gerascanthus.

COKDIA:—

Geraschantkus, Jacq. Select. Am. 43. 1.175 = A. Gerascanthns.
glabra, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 124.—Bras.
glabra. Linn. Sp. PI. 191 = C. Collococca.
glabrata, *A. DC. Prod.* ix. 473.—Am. trap,
glandulosa, *Fresen. in Mart. Ft. Bras.* viii. 19.—Am. trop.
globosa, Andr. ex DC. Prod. ix. 497—oaracana.
globosa, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 76.—Ind. occ.; Am. centr.
glomerata, *Lem. Jard. Fleur.* iv. (1854) t. 826.—Bras,
grandiflora, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 77.—Am. austr.
grandifolia, *DC. -Prod.* ix. 475.—Am. trop.
grandis, Cham, in Linnaea, iv. (1829) 473 = grandifolia.
grandis, *Roxi. Hort. Beng.* 17; *Fl. Ind.* i. 593.—Ind. or.
grandis, Wall. Cat. n. 892 B=obliqua.
giaveolens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 74.—Am. austr.
Greggii, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 136.—Calif, j Mexic.
Griffiths, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 139.—Malaya.
guayaquilensis, *DC. Prod.* ix. 496.—Ecnador.
guaeumaefolia, Roem. & Schult. Syst. iv. 463»nrticifolia.
guianensis, *Roem.* b* *Schult. 1. c.* 460.—Guiana,
guineensis, *Thonn. in Schum. Beskr. Guin. PI.* 128.—Afr. trop.
Hartwissiana, *Regel, Gartenfl.* (1857) 342.—Mexic.
hebecarpa, *DC. Prod.* ix. 488.—Am. trop.
hermanniaefolia, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 484.—Am. trop.
heterophylla, *Poir. in Diet. Sc. Nat.* x. 409; *Roem. V Schult. Syst.* iv. 800.—Gniana.
hexandra, Willd. ex Roem. *8c* Schult. 1. c 799 =subcordata.
hirsuta, Willd. Sp. PI. i. 1076=nodosa.
hispida, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 139.—Mexic.
hispidissima, *DC. Prod.* ix. 475.—Am. trop.
Humboldtii, Willd. ex Roem. & Schult Syst. iv. 801 = floribanda.
hypolenca, *DC. Prod.* ix. 472.—Am. trop.
ignota, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 88 = subcordata.
incana, Royle, Illustr. Bot. Himal. 306,non<en-vestita.
indica, Lam. Encyc. vii. 49.; Illnstr. n. 1913 = C. Myxa.
insignis, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 122.—Bras,
integrifolia, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 461.—Ins. S. Doming,
intermedia, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 8.—Am. trop.
interrupts, *DC. Prod.* ix. 491.—Guiana,
intricate, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 109.—Cuba,
ipomoeaefolia, *Hook. Bot. Mag.* t. 5027.—Hab. ?
ixiocarpa, F. Muell. Fragm. i. 59 = C. Myxa.
juglandifolia, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 14.—Ins. S. Doming.
lacerata, F. Muell. Fragm. v. 193-aspera.
laevigata, *Lam. Illustr.* n. 1912.—Ind. occ.
laevis, *Jacq. Hort. Schoenb.* 1. t 40.—N. Granat
lanata, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. iii. 7*2 = tomentosa.
lanceolata, *H. B. b" K. 1. c.* 75.—N. Granat.
lantanoides, *Spreng. Syst.* i. 658.—Pernv.
lapensis, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. MeddeL* (1867) 9.—Bras.
latifolia, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 126.—Bras.
latifolia, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 588 = obliqua.
latifolia. Wall. Cat. n. 893-C. Myxa.
Latora, *Buch.-Ham. ex Royle, Illustr. Bot. Himal.* **806.**—Ind. or.
laxiflora, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 72.—N. Granat.
Leschenaultii, DC. Prod. ix. 482 = oblongifolia.
lencocalyx, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 22.—Am. trop.
leucocephala, *Moric. PI. Nouv. Am.* 148. t. 88.—Bras,
lencocoma, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 916.—Malaya,
lencophlyctis, *Hook./.in Trans.Linn. Soc.* xx. (1851) 199.—Ins. Galap.
lencosebestera, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 208.—Cuba.
Lima, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 475.—Ins. S. Doming,
linearis, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 493.—Mexic.
linearis, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 199.—Ins. Galap.

COBDIA:—

lineata, Roem. & Schult. Syst iv. 464=ulmifolia.
longifolia, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 495.—Am. trop.
Loureiri, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 465.—China,
lntea. *Lam. Tail. Encyc.* i. 421.—Peruv.
Macleodii, *Hook.f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 128.—Ind. or.
macrocephala, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 77.—Pernv.
macrophylla, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 273.—Ind. occ.
macrophylla, Vahl, ex Griseb. FL Brit. W. Ind. 480 -- snlcata.
macrostachya, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 461.—N. Granat.
macrostachya, Spreng. Syst. i. 652=cylindristachya.
magniliaefolia, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 476.—**Bras.**
mariquitensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 76.—N. Granat.
Martii, DC. Prod. ix. 471=insjgnis.
martinicensis, Link, Enum. Hort. Berol. i. 162 = cnrassavica.
martinicensis, *Roem. If Schult. Syst.* iv. **461.**—Ins. Martinic.
martinicensis, Sieber, ex Griseb. FL Brit. W. Ind. 480 = cylindristachya.
McLeodii, vide Macleodii.
melanoneura, *Klotasch, in Schomb. Fauna et Fl. Gut.* 960.—Guiana.
membranacea, *A. DC. ex DC. Prod.* ix. 484.—Ecuador,
micrantha, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 47.—Jamaica.
micrantha, Sw. 1. c. pro parte, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 479=C. Collococca.
microcephala, *Willd. in Roem. (f Schult. Syst.* iv. 801.—Venezuela,
microphylla, *Roem. If Schult. I. c.* **463.—**Ins. S. Doming.
mirabiliflora, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 499.—Cuba,
mirabiloides, *Roem. t* Schult. Syst.* iv. 465.—Ins. S. Doming.
miranda, *DC. Prod.* ix. 475.—Am. trop.
moluccana, *Roxb. Hort. Beng.* 84; *Fl. Ind.* ii. 694.—Ins. Molucc.
monoica, Boj. Hort. Maurit. 2S6=ovalis.
monoica, *Roxb. PI. Corom.* i. 48. t. 58.—Ind. or.
monosperma, *Roem. b" Schult. Syst.* iv. 463.—Venezuela.
nracronata, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 9.—Am. trop.
multispicata, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 499.—Bras.
Munneco, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 207.—Venezuela.
Myxa, Forsk. Fl. Aegypt Arab. p. lxiii=crenata.
Myxa, *Linn. Sp. PI.* 190.—As. trop.; -Austral.
Myxa, Thw. Enum. PI. ZeyL 213 = obliqua.
Neowediana, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 498.—Am, trop.
nervosa, *Lam. Illustr.* n. 1906.—Gniana.
nitida, *Vahl, in West, Bidrag Ste-Croix,* 275.—Ind. occ.
nitida, *Willd. in Roem. V Schult. Syst.* iv. 800.—Hab.?
nivea, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 26.—Am. trop.
nodosa, *Lam. Illustr.* n. 1905.—Guiana,
oaxacana, *DC. Prod.* ix. 497.—Mexic.
obliqua, Heyne, ex DC. 1. c. 479=Wallichii.
obliqua, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 74 = peruviana.
obliqua, *Veil. Fl. Flum.* 97; ii. 1.150.—Bras,
obliqua, *Willd. Sp. PI.* i. 1072.—Ind. or.
oblongifolia, *Hochst. ex DC. Prod.* ix. 480, note.—Abyssin.
oblongifolia, *Thw. Enum. PI. ZeyL* 214.—Zeylan.
obovata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 80.—Ins. Socotra.
obscnra, *Cham, in Linnaea,* xiii. (1889) 480.—Bras,
obtusa, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 80.—Ins. Socotra.
ochnacea, *DC. Prod.* ix. 477.—Am. trop.
octandra, *A. DC. 1. c.*—Ind. or.
officinalis, Lam. Illustr. ii. 420=C. Myxa.
olitoria, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 123.—Ins. Philipp.
oncocalyx, *F. Allem. in Trab. Comm. Sc. Expl. Bot.* i. (1862) 11.—Bras.
orientalis, R. Br. Prod. 498 = subcordata.
ovalis, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 65.—Abyssin.
oxyphylla, *DC. Prod.* ix. 492.—Guiana,
panicularis, *Rudge, PI. Guian.* 30. t. 46.—Guiana.
paniculata, Roth, NOT. PI. Sp. 126=C. **Myxa.**

CORDIA:—

paniculata, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273 = Wilbrandia panicnlata.
parvifiora, Orteg. Hort. Matr. 85 = serratifolia.
parvifolia, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 498.—Mexic.
parvifolia, Hemsl. BioL Centr. Am. Bot. ii. 369, in syn. — serratifolia.
Patagonula, Ait Hort. Kew. i. 269 = Patagonula americana.
patens, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 75.—Am-austr.
patens, Miq. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 480 - ulmifolia.
paucident ta, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 26.—Bras.
pedunculosa, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 209.—Cuba.
Pelida, Perr. ex DC. Prod. ix. 480 = senegalensii.
pellita, Willd.. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 800=Toumefortia hirsntissima.
Perrottetii, *A. DC. Prod.* ix. 482.—Ind. or.
pernviana, *Roem.* &* *Schult. Syst.* iv. 459.—Peruv.
petiolata, Hort ex Steud. Norn. ed. II. i. 418 = Ehretia petiolaris.
Pettapelioporet, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 126" paniculata.
piauhiensis, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 9:—Bras.
pilulifera, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst iv. 801[s] globosa.
platyphylla, Steud. Nom. ed. II. i. 418 = latifolia.
podocephala, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 136.—Texas; Mexic.
Poeppigii, *DC. Prod.* ix. 492.—Am. austr.
poliophylla, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 26.—Am-trop.
polyantha, *Benth. PI. Hartw.* 121.—Ecuador.
polygama, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 594 *• monoica.
polygama, Wall. Cat. n. 892, partim=fulvosa.
polystacbya, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 73 ← Venezuela.
portoricensis, Spreng. Neue Entdeck. ii. 127 - cylindnstachya.
prionodes, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 441 = octandra.
pubescens, *Willd. ex Roem.* b" *Schult. Syst.* iv. 80S.—Venezuela.
pyrifolia, Willd. ex Roem. & Schult 1. c. 802 «= fermginea.
quercifolia, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot-* 247.—Afr. trop.
Radula, Spreng. Syst. i. 654 = Lima.
rariBora, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 110.—Cuba,
reflexa, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 800.—1»»-or.
reticulata, Roth, Nov. PI. Sp. 124=Rothii.
reticulata, *Vahl, Eclog. Am.* iii. 5.—Ins. Montserrat.
retusa, Vahl, Symb. Bot. ii. 42^Ehretia buxifolia.
revoluta, *Hook.f. in Trans.Linn. Soc.nx.* (1851) 1[9V], —Ins. Galap.
riparia, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 71-—"' Granat.
rotata, *Moc.exDC. Prod.* ix. 483.—Mexic
Rothii, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 798.—Ind. or.
rotundifolia, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. £ *" Brit. Ind. iv. 189 = fragrantissima.
rotundifolia, *Ruin V Pav. Ft. Per.* ii. 24. t. 1« ' " Panama.
Roxburghii, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit.* /*»• "' 138.—Zeylan.
rubra, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 82 - [1] " Myxa.
rufa, *Klottsch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui.* 9[30>] —' Gniana.
rufescens, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 476.—Am. trop.
rugosa, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 801" **cadescens.**
Rumphii, Blume, Bijdr. 843 — subcordata.
salicifolU, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 481.—*•*•
salicina, *DC. Prod.* ix. 492.—Am. trop.
salviaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iB- cylindristachya.
salvifolia, *Juss. in Poir. Encyc.* vii. 46.—&«• dalup.
Salmmanni, [Benth. ex] Griseb. Fl. Brit. W. Ind- «° =ulmifolia.
Salzmanni, *DC. Prod.* ix. 494.—Bras.
sarmentosa, Lam. Illustr. n. 1907 = flavescens.
scaberrima, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* '»• Peruv.

COHDIA:—
«abra, *Desf. Tail.* ed. I. 71.—Ind. or.
Wabrida, *Mart, ex Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 11.—Bras.
scabrifolia, [Benth.ex] Grtoeb. Fl. Brit. W. Ind. 479=paniculata.
scabrifolia, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 485.—Guiana.
*andens, *Martin, ex Pair, in Did. Sc. Nat. x.* 410.—Guiana.
Schomburgkii, *DC. Prod. ix.* 490.—Guiana.
Scnottiana, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 7—Am. o tro P-
Seouleri, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1861) 200.--Ins. Galap.
Sebestena, Andr. Bot. Rep. iii. t. 157=scabra.
fbestena, Foisk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxiii=C. Myxa.
sebesten, a Koret. f. Prod. 18=subcordata.
Sebestena, *linn. Sp. PI.* 190.—Am. trop.
Sebestena, Willd. ex Spreng. Syst. i. 648 - Dillenii.
Sebestena, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 479.—Bras,
megalensis, *Juss. in Pair. Encyc.* vii. 47.—Afr. occ
wnacalyx, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 485.—Guiana.
, yMM· „: Poir_ En cycl. 41._Ind. or.
Errata, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 591 = octandra.
swratifolia, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 76.—Mexic.
sessilifolia. *Cka_m, {„ Linnaea,* iv. (1829) 488.—Bras,
".nenas, *Lam. Illustr.* n. 1914.—China:
f'aosa, Salisb. Prod. 111 = C. Sebeatena.
spectabilis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 419.—Ind. or.
SOT[illegible] WiUi ex Roem- & Schnlt- Syst- iv.
s#«ta, Willd.-ex Roem. *Sc* Schult. 1. c 799 - graveolero.
gjnescens, /„«„. Mant 206.—Ind. or.
Sprengelii, *DC. Prod.* iv. 473.—Ins. Fiji.
striata, *Fresen. in Mart. Fl. Bras.* viii. 23.—Am. trop.
s n » & *Sf Ttn f- Ntut Entdeck.* iii. 80.—Ind. occ.
subcordat. *Blume, Bijdr.* 848.-Java,
hrop. "• L „m, illu ir n- W'9-—As. et Austral.
b d 1 „ tata> *•»• m Ind 8at Su pp 67L—Sumatra.
£ W M « 7 U , DC. Prod. ix. 480 = RothiL
sul?Ua, be *"** Decne Herb Timor 67.—Ins. Timor.
superba, °£ Cham in Prod. ix. 488.-Ind. or.
taguahyensis, *Linnaea,* iv. (1829) 474.—Bras,
tenuifolia, *BerioL Misc_ BoU* TM L 18p *• 1> ~ Guate,, mala.
tetrandra, *Aubl. PI. Gui.* i. 222. t. 87.—Guiana.
tetraphylla, Aul L l_ c_ %**• «• 88.-Gniana.
Thibaudian"• ^ Prad_ **• «9.—Am. austr.
thyrsiflor, Sieb. & Zucc. Fl. Tap. Fam. Nat. ii. 26 = Ehretiacnminata.
timorensis, Span, in linnaea, xv. (1841) 834-subpubescens.
tinifolia, *Willd. ex Roem. VSchult. Syst.* iv. 800.—Am. austr.
tomentosa, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 472 = Chamissoniana.
tomentosa, *Roem.* &" *Schult. Syst.* iv. 459.—Am. austr.
tomentosa, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed Carey, ii. 359 = obliqua.
Toqueve, *Aubl. Pl_ Gui_* »• 228 - »• 9O.-Am. trop.
Toqueve, Sieber, ex Grisebl F1, Brit> W> Ind„ * 80 = sulcata.
trachyphylla, **"*• *Herb. Fl. Bras.* n. 412.—Bras.
tremula, *Grise*. Fl.* *«•• W-1«*. 479—Ind. occ.
trichoclada, *OC Proi* «• 4r4.-Am. trop.
trichostemon, C '• * 482 Ins„ Timor
trichotom, > w- «* »«<* *Norn.* ed. II. i. 419.—B[illegible].
trunca > ,VMen- «» *ar«. M. *Bras.* viii. 25.—Am. trop.
ulmifolia, *Juss.* " *Dum.-Cours. Bet. Cult.* ed. I. ii. 148.—Panama; Ind. occ.
ulmifolia, Spreng. S yst. i. «5S-monosperma.
umbi [illegible] «*—Amf trop.
u
V »lenZ)' "'"•'" ««« "»• *»• (1829) 48S.-Bras.
velutina, Mart Herb_ F1- B~- »• 268-ctijabensis.
verbenacea, C. / 7d . ix. »1—Am. trop.
vestU M' ?
& Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii.
.eg. Himal.
»des, *Zipp. ex Span. in Linnaea,* xv. (1841) 335, nomen.—Malaiya.

CORDIA:—
villicaulis, f« « ». »n *Mart. Fl. Bras.* viii. 24.—Am. trop.
villosa, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 81.—Ins. S. Doming.
Wallichii, G. Don, Gen. Syst iv. 879-obliqua.
Wickstroemii, *Steud. Norn.* ed. II. i. 419.—Ins. Guadalnp.

CORDIADA, Veil. Fl. Flum. 98 (1825); ii. t. 166-Cordia, Linn. (Boragin.)-
Mchotoma, Veil. 11. cc = Cordia trichotoma.

CORDIERA, A. Rich, in M<<m Soc. Hist. Nat. Par. v. (1880) 222. t. 20 = Alibertia, A. Rich. (Rubiac).
aeuminata, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 221.—Guiana.
latifolia, Benth. 1. c—Bras.
triflora, DC. Prod. iv. 445.—Guiana.
trifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 419, sph»lm.-praec.

CORDIOPSIS, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 28 (1825)-=Cordia, Linn. (Boragin.).
mirabiliflora, DC. Prod. ix. 499=Cordia mirabiliflora.
mirabiloides, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 28-Cordia mirabiliflora.
monosperma, Ham. ex Heynh. Nom. ii. 160 = Cordia monosperma.

CORDULA, Rafin. n. Tellur. iv. 46 (18861 = Cypripedium, Linn. (Orchid.).
insignis, Rafin. 1. c. - Cyprip. insigne.

CORDYLA, Blume, Bijdr. 416 (1825)=Pogonla, Juss. (Orchid.).
eoneolor, Blume, 1. c.-P. concolor.
discolor, Blume, L C.-P. discolor.

CORDYIiA., Lonr. Fl. Cochinch. 411 (1790). *LEGVMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 562.
CALYCANDRA, Lepr. ex A. Rich, in Guill. & Ferr. FL Seneg. Tent. SO; et 232. t. 9 (1882).
africana, *Lour. 1. c.* 412.—Afr. trop.
Richardi, Planch, in App. Speke, Joura. Disc. Nile, 632 = africana.

CORDYLANTHUS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 27. t. 8. 1852 [1856] - Homalidm, Jacq. (Samydac.).
frutescens, Blume, 1. c. 28 » H. Cordylanthus.

COKDYXANTHX7S, Nutt. ex Benth. in DC. Prod, x. 597 (1846). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 974.
AOENOSTEGIA, Benth. in Lindl. Nat Syst. ed. II. 445 (1826).
CHLOKOFVRON, Behr, In Proc Calif. Acad. 1. (1865) 61.
canescens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 388.—Am. bor. occ.
capitatus, *Nutt. ex Benth. in DC. Prod.* x. 697.—Am. bor occ.
filifolius, *Nutt. ex Benth. I. c*—Calif.
Kingii, *S. Wats, in Bot. King's Exp.* 233, 469. t. 22.—Am. bor. occ.
laxiflorus, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 120.—Arizona,
maritimus, *Nutt. ex Benth. in DC. Prod.* x. 598.—Calif,
mollis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vu. (1868) 884.—Calif.
Nevinii, *A. Gray, I.* e.xvii. (1881-82) 229.—Calif.
Orcnttianus, *A. Gray, 1. c.* xix. (1883) 96.—Calif.
Parryi, S. Wats, in Am. Natural, ix. (1875) 346-canescens.
pilosus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 882.—Calif.
Pringlei, *A. Gray, I. c.* xix. (1888) 94.—Calif,
ramosus, *Nutt. ex Benth, in DC. Prod.* x. 597.—Am. bor. occ.
tenuis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 883.—Am. bor. occ.
Wrightii, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 120.—Texas; N. Mexic.

CORDYLESTYLIS, Falc. in Hook. Joura. Bot. iv. (1842) 74-Ooodyera, R. Br. (Orchid.).
foliosa, Falc. L c 76=G. procera.

CORDYLIA, Pers. Syn. U. 260 (1807) = Coryda, Lour. (Legumin.).

COBDYIilNE, Royen, ex Adans. Fam. ii. 54 (1763).
L1LIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 799.
CALOORACON, Planch, in Fl. des Series, Sir. I. vi. (1850-51) 137.
CHARLWOODIA, Sweet, Fl. Austral. 118 (1827).
COHNIA, Kunth, Enrnn. PI. v. S5 (1850).
DRACAENOFSIS, Planch, in Fl. des Series, Sér. I. vi. (1860-51) 110.
TAETSIA, Medic. Theodora, 82 (1786).
angustifolia, Kunth, Enum. Pl.v. 32=stricta.
arborea, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1855) 55.—Afr. trop.
atropurpurea, Planch, in Fl. des Serres, Sir. I. vi. (1850-51) 132 - Dracaena clliptica.
australis, Endl. Prod. Fl. Inis. Norf. 29=Baueri.
australis, *Hook. f. in Gard. Chron.* (1860) 792.—N. Zel.
australis, Nadeaud *Sc* Jouan, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xi. (1865) 127^terminalis.
Banksii, *Hook. f. in Gard. Chron.* (1860) 792.—N.Zel.
Baueri, *Hook./. 1. c*—Ins. Norfolc.
Betschleriana, Goepp. in Nov. Act Nat. Cur. xxv. (1885) 66 •> Dracaena concinna.
Beuckelaerii, C. Koch, Wochenschr. viii. (1866) 91-=Banksii.
brasiliensis, *Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1850-51) 136.—Bras.
calocoma, Hort. ex Baker, in Joura. Linn. Soc xiv. (1875) 542=australis.
cannaefolia, R. Br. Prod. 280=terminals.
Casanovae, *Linden, ex Andri, Illustr. Hortic.* xxi. (1874) 137. t. 181.-N. Hebrid.
cernua, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1850-61) 111 = Dracaena reflexa.
coerulea, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1855) 55.—Hab. 1
congesta, Endl. Gen. 151=stricta.
congesta, *Steud. Nom.* ed. II. i. 419.—Austral.
Dennisoni, *Hort. ex Andri, Illustr. Hortic.* xix. (1872)360.-Hab.l
denacoma, Linden tf Andri, 1. c. (1874) 185. t. 190.—Austral,
diffusa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1888) 380.—N. Zel.
dracaenoides, *Kunth, inAbh.Acad. Berl.* (1842) SO.—Bras.
ensifolia, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1860-51) 182-Dianellaensifolia.
erythrorachis, Hort. ex Baker, in Jonrn. Linn. Soc xiv. (1875) 641 = Banksii.
EschschoUiana, Mart, in Schult. f. Syst. vii. 347, 1677 »terminalis.
ferret, C. Koch, Wochenschr. xiv. (1871) 12=terminalis.
ñabelliformis, *C.Koch, Allg.* Garí«»».(1858) 254.—Ins. Maurit.
flexuosa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 658.—Malaya,
floribunda, *C. Koch, Allg. Gartent.* (1868) 264.—Ins. Maurit.
Fontanesiana, Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur. xxv. (1855) 54 t. 3 = Dracaena Fontanesiana.
Forsteri, F. Muell. Sel. PI. Indnst. Cult. 58 =• australis.
fragrans, *Planch, in Fl. des Serres, Sir.* I. vi. (1850-51) 111, 136.—Afr. trop.
fruticosa, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1866) 53.—Java.
gloriosa, Linden & André, Illustr. Hortic. xx. (1873) t, 125-6 = terminalis.
Guilfoylei, Hort. Linden, ex Lem. Illnstr. Hortic xvi. (1869) t. 600=terminalis.
Haageana, *C. Koch, Wochenschr.* (1867) 195.—Austral.
hedychioides, F. Muell. Fiagm. v. 196 «terminalis.
heliconiaefolia, Otto & Dietr. in Allg. Gartenz. (1835) 32 •= terminalis.
hemichrysa, *Comm. ex Lam. Encyc.* ii. 276.—Ins. Maurit.
Hooibrenkeana, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1855)55.—N.Zel.
Hookeri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* vi. (1874) 246.-N.Zel.
humilis, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1885) 55.—Hab. ?

CORDYIiIOTB :—
indivisa, Kegel, Gartenfl. (1859) 8Sl-flustralis.
indiviaa, *Steud. Norn.* ed. II. i. 419.—N. Zel.
Jacquinii, Kunth, in Abh. Acad. Berl. (1812) 30 = terminalis.
javanica, Klotzsch, ex Kunth, Enum. Fl. v. 26 = terminalis.
lentiginosa, Linden & Andre[1], IUustr. Hortic. xvii. (187O)t. 85=australis.
linearifolia, *Miq. Fl Ind. Bat. Suppl.* 610.—Sumatra.
longifolia, Benth. PI. Hartw. S3 = Nolina Hartwegiana.
macrophylla, *C. Koch, Allg. Gartens.* (1858) 254.—Ins. Mascar.
maeulata, Planch.in Fl. d« Serrei, Sér. I. vi. (1850-61) 132 = Dracaena, elliptica.
madagascariensis, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1855) 58.—Madag.
Manners-Suttoniae, F. Muell. Fragm. v. 195 = terminalis.
marginata, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1855) 55.—Madag.; Ins. Borb.
metallica, Hort. Dallière, in Belg. Hortic. xxii. (1872) 858. t. 26 = terminalis.
micrantha, Baker, in Gard. Chron. (1880) II. 218 = Brocchinia cordylinoides.
Afurckisoniae, F. Muell. Fragm. v. 195 — Haageana.
neo-caledonica, *Linden, Cat.* n. 97 (1877) 4.—N. Caled.
notilis, C. Koch, Allg. Gartenz. (1858) 254=terminalis.
nutans, *Hort. ex Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1855) 55, notnen.—Hab. ?
obtecta. Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xiv. (1876) 548 = Baueri.
odorata, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1858) 97 = dracaenoides.
ovata, Planch, in Fl. des Serrei, Sér. I. vi. (1850-51) 111, 136 = Dracaena ovata.
oxyphylla, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 609.—Sumatra.
parviflora, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. i. 269=Nolina parviflora.
Pumilio, *Hook. f. in Gard. Chron.* (1860) 792.—N. Zel.
Reali, *Nichols. Diet. Gard.* i. 874.—Hab. *1*
reflexa, *Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1850-61) 109.—Afr. trop.
Regelii, *C. Koch, Wochenschr.* viii. (1865) 90.—Hab.?
Regina, Veitch, ex Regel, Gartenfl. (1871) 149 = terminalis.
rigida, *Miq. Fl. Ind. Bat. Súppl.* 610.—Sumatra.
rigidifolia, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1858) 359 = stricta.
rubra, *Hueg. ex Kunth, Enum. PI.* v. 34.—N. Zel.
Rnmphii, *Hoot. Bot. Mag.* t. 4297 = Dracaena angustifolia, Hookeriana.
Rumphii, F. Muell. Fragm. v. 194 = Dracaena angustifolia.
salicifolia, *Goepp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xxv. (1865) 58.—Java.
Sellowiana, Kunth, in Abh. Acad. Berl. (1842) 80 = dracaenoides.
Sepiaria, Seem. Fl. Vit. 311. t. 94=terminalis.
Sieberi, Kunth, in Abh. Acad. Berl. (1842) 30-terminalis.
Sieboldii, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1850-61) 10!>. sub t. 669 = Dracaena elliptica.
spectabilis, Kunth & Bonché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) = dracaenoides.
spicata, *Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1850-61) 132.—Hab. ?
stricta, *Endl. in Ann. Wien. Mus. i.* (1836) 162.—Austral.
stricta, Hook. f. in Fl. N. Zel. i. 257. t. 50 = Pumilio.
Sturmii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 331.—N. Zel.
superbiens, C. Koch, in C. Koch *Sc* Fint. Wochenschr. (1859) 881 =australis.
terminalis, *Kunth, in Abh. Acad. Berl.* (1820) 30.—As. trop.; Austral.
Ti, Schott, in Flora, xi. (1828) 576-terminalis.
timorensis, *Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1850-51) 132.—Ins. Timor.
umbraculifera, Planch. 1. c 111 - Dracaena umbraculifera.

COHDYIiIlTE :—
Veitchii, Kegel, Gartenfl. (1871),149-australis.
violaseens, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 25 ; et Gartenfl. (1859) 331 = rubra.
vivipara, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 419 = Chlorophytum Sternbergiannm.
Wallichii, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1850-51) 182 (Dracaenae sp.).—Ind. or.

CORDYLOBLASTE, Hensch. ex Morltzi, in Bot. Zeit. vl. (1848) 604 = 8ymploo08, Linn. (Styrac).
Henschelii, Moritzi, 1. c.-S. Henscheli.

CORDYLOCARPUS, Desf. Fl. Atlant. ii. 79. t. 152 (1800)-*Rapistrum, Toum. (Crucif.).
crassifolius, Steud. Nom. ed. I. 226 = Erócaria crassifolia.
glaber, Dietr. ex Steud. 1. c.-R. glabrum.
laevigatus, Willd. Sp. PI. iii. 563 =- Erucaria aleppica.
muricatus, Desf. Fl. Atlant. ii. 79. t. 152.—Algeria.
pubescens, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 88 = Brassica adpressa.
ramosissimus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. AtL 867.—Algeria.
tenuifolius, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod, it 33= Erucaria tenuifolia.

CORDYLOGNE, Lindl. Veg. Kingd. 626 (1848), sphalm.-seq.

CORDYLOOYNE, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 218 (1837). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 759.
PERIGLOSSUM, Decne. in DC. Prod. viii. 620 (1844).
globosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 218.—Afr. austr.

COREMA., D. Don, in Edinb. N. Phil. Joura. ii. (18211-27) 63. *EMPETRACEAE.* Benth. & Hook, f. iii. 414.
ENDAMMIA, Rafin. New Fl. Am. iii. 49 (1836).
EULEUCUM, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (1836).
OAKESIA, Tuckerm. in Hook. Lond. Journ. Bot. i (1842) 445.
TUCKERMANNIA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 248.
album, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* ii. (1827) 63.—Lusitan.
Conradi, *Torr. ex Loud. Encyc. Trees,* 1092.—Am. bor.
febrifugum, Boiss. ex Willie. & Lange, Prod. Fl. Hisp. Ui. 512 = album.

COREOCARPtTS, Benth. Bot. Voy. Sulph. 28.1.16 (1844). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 884.
ACOMA, Benth. Bot. Voy. Sulph. 29.1.17 (1844).
heterocarpus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 162.—Calif,
parthenioides, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 28.116.—Calif.

COREOPIS, Gunn. Fl. Norveg. ii. 87 (1772), spbalm.= seq.

COREOPSIS, Linn. Gen. ed. I. 263 (1787). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 885.
AdSPERMUM, Neck. Eletn. i. 34 (1790).
AGARISTA, DC Prod. v. 569 (1836).
ANACIS, Schrank, in Denkschr. Acad. Muench. v. (1817) 5.
CALLIOFSIS, Reichb. Ic. et Descr. PL 1.10 (1824).
CAMPVLOTHECA, Cass. Diet Sc. Nat. Ii. 476 (1827).
CHRVSUMELEA, Taiisch, Hort. Canal, fasc. i. (1J>2S).
CHRYSOSTEMMA, Less. Syn. Comp. 227 (1882).
COREOPSOIDES, Moench, Meth. 594 (1794).
DIATONTA, Walp. Rep. it 614 (1843).
DIODONTA, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. Ser. II. vii. (1841) 360.
DIPLOSASTERA, Tausch, Hort. Canal, fasc i. t. 4 (1823).
DOLICHOTHECA, Cats. Diet. Sc. Nat. Ii. 476 (1827).
EI.ECTRA, DC. Prod. v. 680 (1836).
EPILEPIS, Benth. PI. Hartw. 17 *(W&).*

COREOPSIS :—
HETERODONTA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 361.
LEACHIA, Cass. in Diet. Sc. Nat xxv. 888 (1822).
LERCHIA, Reichb. Consp 109 (1828).
PERAMIHUS, Rafin. ex DC. Prod. v. 568 (1836).
PRESTINARIA, Sea. Bip. ex Steud. Nom. ed. II. 393 (1841).
abyssinica, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* vi. 163.—Abyssin.
acuta, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 569-Actinomeris squarrosa.
alata, Cav. Ic. iii. 30. t 260-Actinomeris tetraptera.
alata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 667 = Verbesina occidentalis.
alba. Linn. Sp. PI. 908-Bidens pilosa.
alternifolia, Linn. 1. c. 909 = Actinomeris squarrosa.
ambigua, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 75 =aurea.
amplexicaulis, Cav. Desc. 226 -Encelia amplexicaulis.
angustifolia, *[Dryand. in] Ait. Hort. Km.* ed. I. 253—Am. bor.
angustifolia, Linn. Sp. PI. 908 = Helianthns angustifolius.
angustifolia, Pav. ex DC. Prod. v. 608 = Bidenprojera.
anthemoides, *DC. Prod.* v. 573.—Mexic.
arguta, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 517=aurea.
aristata, Willd. Sp. PI. iii. 2253=aristosa.
aristosa, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 140.—Am. bor.
artemisiaefolia, Jacq. Coll. SuppL 155 = Cosmus sulphureus.
aspera, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 670.—Am. bor.
Atkinsoniana, *Dougl. in Lindl. Bot. Reg.* t 1376.—Am. bor. occ.
anrea, *[Dryand. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I. iii. 252.-Ac. bor.
aurea, Lindl. Bot. Reg. t. 1228 =trichospenna.
auriculata, *Linn. Sp. PI.* 908.—Am. bor.
auriculata, Schkuhr, Handb. t 260 = pubescens.
Bacana, Heyne, ex DC. Prod. v. 632 = Glossog[1] pinnatifida.
baccata, Linn.' PI. Snrin. n. 111; Amoen. Acad. v. 262 = Wulffia stenoglossa.
baccata, *Linn.f. Suppl.* 880.—Guiana.
Barteri, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* 890.—Afr. trop.
bicolor, *Bosse, ex Buchenau, in Linnaea,* (1862) 680.—Hab. t
Bidens, Linn. Sp. PI. 908 = Bidens cernua.
Bidens, Walt. Fl. Carol. 215 = Bidens chrysantbemoides.
bidentoides, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am-* 889.—Am. bor.
bitemata, *Lour. Fl. Cochinch.* 508.—China.
bituminosa, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. *(11* ed. I. Art. IV. 11.—Malaya.
Borianiana, *Sch. Bip. ex Schneinf. in Verh. Zool<-P-Ges. Wien,* xviii. (1868) 884.— Afr. trop.
Boytiniana, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II- (1841) 358 = grandiflora.
calliopsidea, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. *90"* Leptosyne calliopsidea.
callosa, *Bertol. Misc. Bot.* vii. 42.—Am. bor.
capillacea, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 230.-Peruv.
cardaminefolia, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ü. 346-^ Am. bor. occ.
chrysantha, Linn. Sp. PI. ed. II. 1282 *> Bidens chr)' santha.
chrysantha, Spreng. Syst. iii. 614 = Bidens rubifoli*-
chrysantha, *Vatke, in Linnaea,* xxxix. (1876) *V*-" Afr. trop.
coronata, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 420-=CosO>»-caudatus.
coronata, *Hook. Bot. Mag.* t 3460.—Texas.
coronata, Linn. Sp. PI. ed. II. 1282 (ex syn. PI*"-' -Bidens pilosa.
coronata, Walt. Fl. Carol, ii. 15 = aurea.
corymbifolia, Buch.-Ham. ex DC. Prod. v. 602 - Bidens pilosa.
cosmoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 126.—Ins. Sand vie.
crassifolia, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. ! 252 -- lanceolate.
cuspidata, *Bertol. Misc. Bot.* vii. 44.—Am. bor.
delphinifolia, *Lam. Encyc.* ii. 108.—Am. bor.
dichotoma, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 137 =gladiat»-

COREOPSIS :-

discoidea, *Torr. tf Gray, FL N. Am.* ii. 889.—Am. bor.

discolor, *Link, Enum. Hurt. Berol.* ii. 868.—Am. bor. <W«/oKa, DC. Prod.v. 671.(excl. ayn.)=auriculata.

atyerst/olia, Hook. Bot. Mag. t 8474 - Dmmmondii.

diversifolia, Jacq. Eclog. 80. t 54=Bidens grandiflora.

Urummondii, *Torr. V Gray, Ft N. Am.* ii. 346.—lexas.

emarcjda, *Noronha, in Verh. Batav. Gin.* v. (1790) - «d. I. Art. IV. 11.—Malaya.

»»ciculata, *Wedd. Chlor. And.* i. 71.—Perav.

ferulae/olio, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 65 - Bidens ferulaefolia.

Mi/Ma, Hook. Bot. Mag. t. 3606 = Thelesperma filifolnm.

«««n«te, Banks, ex Stend. Nom. ed. I. 226,108 = Bidens chrysanthemoides.

[illegible] *Sg:* *i* [illegible] »• (1808) .—Am. bor.

foeniculacea, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. v. 603= Bidens foeniculifolia.

foetida, Cav. Ic. i. 56=Encelia foetida.

loUosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 125.—Perav.

formosa, *Bonato, Memoria* 2; *ex Pritm. Ic. Ind.* i. 801.—Hah, I

formosa, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 420=Cosmos tapmnatus.

Jraticosa, *Forst.f. Prod.* 91.—Ins. Sandvic.

nuticosa, *Soland. ex Seem. Fl. Vit.* 148.—Ini. Pacif.

fruhcosa, Vest, in Flora, iii. (1820) 7-Bidens frutiçosa.

Galjottii, *ffemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 195—Mexiç

G*i'o'gina,* Cass. in Diet. Sc Nat. xviii. 441 = Dahlia »anabilis.

g adiata, *Walt. Fl. Carol.* 215.—Am. bor.

glaucescens, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 389.-Afr. trop.

grandiflora, [illegible] *Gmelin. Fl. S. Vist.* 886.—Am. bor.

Grai*fi> Ol**ii>er, in Trans, linn. Soc.* xxix. (1874) 98. i. C5.—Afr. trop.

gu?ee*i*Sf' *Oliver* "• *Hiern*>«« *Olimlr*> *f- Trop. Afr.* ..«n. 8»0—Afr. trop.

"•iveyana, *A. Gray.Syn, Fl. N. Am.* i. II. 392.-Am. oor. occ.

h*f*terophylla, *Bertol. Misc. Bot.* vii. 48.—Am. bor.

h*"erophylla,* Cav. Ic. iii. 84. t. 268 = lostephane oeterophylla.

he•Z°f*'Ua> Nntt_ * Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. hJ[illegible] (J8«) 358-grandiflora.

i.-a, *&*•Ann^ Nat -15.—Am. bor.

[illegible] Ker-Gawl. in Bot. Keg. t. 7 = Bidens rnbifolia.

incL.'[illegible] Moench> Meth_ Sup^L 245=Bidens ferulaefoli..

integrifolia, *Poir_ Encyc_ Suppl.* .. SM (1811).—Am. bor.

in Tolncrata, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* vii. (1884) 74.—A m< bor_

invo.u *Seh_ Bi*P_ '* *Wal*P_ *R*P- *»•163.—Abyss.

ja °}> *B"*EM- Bot.y*. 44.-Am. bor.

[illegible] 390. ~Air. trop.

i anc ola ta> *Unu_ S*P- *Pl*- 90S—Am. bor.

laMfAv > *Michx_ Fl_* *"• *Am.* ii. 187.—Am. bor.

U[illegible] Am. bT *ha> Torr, ** Gray»m, N^Anu* "• S48#~

leucantha, Linn, *S*P- *Pl*_ ^ n. 1282* Bidens pilosa.

leucanth[illegible] *Cent_ PL* '• 29-praec.

leucorrh[illegible] *Loiir_ Fl*- Cochinch. ii. 608 - Bidens leucorrhiza.

Liebmannii, Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 196.—Mexic.

limensis, Jac^_ ColL "• 2»9 = Encelia canescens.

linearifolia, *DC Prod*_ ^_ 570,-Mexic.

linearifolia, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 390.7~[illegible] fon.

linifolia, Nutt, in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 75 = angustifolia.

longipes, Ho^' *Bot*_ *Ma*B-1. 3586=grandiflora.

lucida, Cav. *Desc*' 22*-Bidens heterophy"»-

Macraei, *A.* [illegible] *Fraca mi. ta* v. (1661.) 126.—Ins. Sandvic.

macrantha, *Sch. Bip. ex Walp. Sep.* vi. 163.-Abyss.

COKEOP8I8 -—

macrocarpa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 126.—Ins. Sandvic.

major, Walt. Fl. Carol. 2H=senifoIU.

maritima, *Hoot./. Bot. Mag.* t 6-241.—Calif.

Menziesii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 127.—Ins. Sandvic.

mexicana, *Hemsl. BioL Centr. Am. Bot.* ii. 196.—Mexic.

mienntba, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 127.—Ins. Sandvic.

minima, *Hort. exSteud. Nom. ed.* II. i. 420.—Am. bor.

mitis, Michx. Fl. Am. Bor. ii. 140-anrea.

monticola, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 890.—Afr. trop.

mnltifida, *DC. Prod.* v. 578.—Perav.

mutica, *DC. I. c.* 571.—Mexic.

Neaei, *DC. I. c.* 573.—Am. austr.

nudata, *Nutt. Gen. Am.* ii. J80.—Florida.

ohlongifolia, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 76-lanceolata.

odorata, Lam. IUustr. t. 704. f. 1 =BWcns odorata.

odoratissima, Cav. ex Pen. Syn. ii. 477 = Cosmos tenellns.

Oemleri, EU. Sketch, ii 435»senifolia.

Oerstediana, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1863) 98.—Bias.

ovata, Cav. Ic. iii. 41. t. 280=Actinomeris ovaU.

pachyloma, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 891.—Afr. trop.

palmata, *Nutt. Gen. Am.* ii. 180.—Am. bor.

paniflora, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 86 - Cosmos parviflonu.

paucifiora, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1838); Unnaea, x. (1886) Utt. 76 = palmate.

perfoliata, Walt Fl. Carol. 214 - Bidens chrysanthemoides t

Pickeriagii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 124.—Peniv.

praecox, Fresen. in Linnaea, xiii. (1889) Litt 93 = palmata.

Prestinaria, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* vi. 163.—Abyss,

prestinariaeformis, *Vatke, in Linnaea,* xxxix. (1875) 489.—Afr. trop.

procera, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 253-Actinomnis squanosa.

pnbescens, *Ell. Sketch,* ii. 441.— Am. bor.

purpurea, Moç, *Sc* Sesse, ex DC. Prod. v. 604 - Cosmos pnrparens.

quadricornis, Krock. Fl. Siles. ii. il. 481 - Bidens cemaa.

radiata, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Am. bor.

reptans. Linn. Syst. ed. X. 1228 ; Amoen. Acad. v. 607 - Bidens rubifolia.

ridens, *Gunn. Ft. Norveg.* ii. 87.—Norvegia.

rigida, Nntt. Gen. Am. ii. 180=delphinifolia.

rosea, *Nutt. 1.* c. 179.—Am. bor.

rudis, *Benth. V Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 196.—Mexic.

Rueppellii, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 16S=chryaantha.

sambuci/olia, Cav. Desc. 225=Bidens sambucifolia.

scabra, *Safin. Fl. Ludm.* 72.—Louisiana.

Schaffneri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 15.—Mexic.

senifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 138— Am. bor.

serrulata, Poir. Encyc Suppl. iii. 852 = Bidens grandiflora.

setigera, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* vi. 163—Abyss.

spectabilis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 125.—Perav.

stellata. Banks, ex DC. Prod. v. 572 = senifolia.

stellata, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* vii. (1834) 76.—Am. bor.

Steppia, *Steels, in Peters, Seise Messamb. Bot.* 496.—Afr. trop.

Tanna, Stend. Nom. ed. II. i. 420-GIossogyne tenuifolia.

tannenas, Spreng. Fl. Hal. Mant. 58 = GUiSsogyne tennifolia.

tenuifolia, Ehrh. Beitr. vii. 168-vertlcillata.

tetragona, Cerv. ex La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 81 = Bidens tetragona.

tinctoria. *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* ii. (1821) 114.—Am. bor.

trichospenna, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 139.—Am. bor.

trifida, Poir. Encyc. Suppl. ii. 353 = Thelesperma filifolinm.

COBEOP8IS:—

trifoliata, *Bertol. Fl. Guatimal.* 36.—Guatemala.

Tripteris, *linn. Sp. PI.* 908.—Am. bor.

variifolia, Salisb. Prod. 206 = Bidens rubifolia.

vennsta, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 229.—Perav.

verticillata, Ehrh. Beitr. vii. 168-^delphinifolia.

verticillata, Lam. Encyc. ii. 108 -»tenuifolia.

verticillata, *Linn. Sp. PI.* 907.—Am. bor.

Wrayi, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 76 = senifolia.

COREOPSOIDES, Moench, Meth. 594 (1794)-Oore-. opsis, Linn. (Compos.).

lanceolata, Moench, 1. c.-Coreopsis lanceolata.

COREOSMA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1885) 2 = Bibes, Linn. (Saxifrag.).

affinis, Spach, 1. c. 24 = R. campannlatum.

Dombeyana, Spach, 1. c 25- K. viscosnm.

florida, Spach, L c. 22 = R. floridum.

multiflora, Spach, 1. c 24 = R. Kunthii.

sdnguinea, Spach, Hist Veg. Phan. vi. 166 = R. sanguinenm.

viscosissima, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. iv. (1836) 23 = R. viscosissimnm.

CORESANTHA, Alef. in Bot. Zeit xxi. (1863) 298-Iris, Toum.

alata, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-68) 575 - • I. stylosa.

caucasica, Klatt, 1. c.=I. caucatica.

persica, Alef. in Bot Zeit. xxi. (1863) 298 = I. persica.

CORESANTHE, Baker, in Joum. Linn. Soc xvi. (1877) 12S = praec.

COKETECRODENDBON, Fitch. *Sc* Basin, in Mem. Sav. Etr. Pctersb. vi. (1851) 90 (Monogr. Hedys. 46. t. 2). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Rook. f. i. 512.

scoparium, *Basin. I. c.* 91.—Soongaria.

CORETECKOaYNE, DC. Prod. v. 215 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 270.

California^ *DC. 1. c.*—Calif.

detonsa, Greene, in Bull. Toner Club, *x.* (1883) 41 = Diplostephium canum,

filaginifolia, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* Ser. II. vii. (1841) 290.—Calif.

incana, Nntt 1. c - califoraica.

obovata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 22.—Calif.

spatkulata, A. Gray, in Proc Am. Acad. vii. (1868) 851 = obovata.

tomentella, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 99-filaginifolia.

virgata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 23~nlaginifolia.

CORETHROSTYLES, Benth. & Hook. f. Gen. i. 288 (1862), sphalm.~seq.

CORETHROSTVLIS, Endl.Nov. Stirp. Dec. i.(1839) 1 =Laaiopetalum,Sni. (Stercul.).

bracteata, Endl. 1. c. = L. bracteatum.

cordifolia, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. ii. 844-L. cordifolium.

coriacea, Steud. 1. c i. 236 = L, bracteatum.

membranacea, Steud. 1. c. = L- membranaceom.

microphylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxv. (1R52) II. 148 = L. cordifolium.

oppositi/olia, F. Moell. Fragm. ii. 6 = L. floribondnm.

parmflora,Taia. in Ball.Soc. Nat Mosc. xx. (1847) l. 174 = L. floribnndum.

Schultenii, V. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet i. (1856) 36 - L. Schulzenii.

CORETHRUM, Vahl, in Skr. Naturk. Selsk. Kiobenh. vi (1810) 85=Bont©loua, Lag. (Gramin.).

tromoides, Vahl, 1. c.=B. bromoides.

COBIANDBXTM, [Tourn.] linn. Syst ed. I (1735). *UMBELLI FERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 926.

KERAMOCARPUS, Fenzl, in Russegg. Reise ii. 966 (1843).

americanum, Nutt. ex DC. Prod. iv. 250-Bifora amcricana.

Cicuta, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fate. iii. 100; ed. II. 211 = Conium macnlatnm.

Cicuta, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 180 »Cicuta virosa.

COBIAUDBUM:—
Cynapium, CnnU, Stirp. Anstr. ed. I. fasc. iii. 99; ed. II. 211=Aethusa Cynapium.
didymum, Stokes, Bot Mat. Med. ii. 121=Bifora testicnlata.
diversi/olium, Uilib. Fl. Lituan. ii. 26—sativom.
globosum, Salisb. Prod. 166=utivum.
lati/olium, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 101; ed. II. 211-Sium latifolinm.
maculatum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. ISO = Coninm maculatum.
majus, Goiian, Hort. Monsp. 115=sativum.
melphltense, *Tenore & Guss. Ind. Sem. Hort. Neap.* (1887) 3.—Italia.
sativnm, *Linn. Sp. PI.* 256.—Europ. austr.; Oriens.
seselifolium, DC. ex DC. Prod. iv. 250 = Astoma seselifolium.
tordylioides, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 921.—Oriens.
testiculare, Salisb. Prod. 166-Bifora testiculata.
testiculatum, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 228 = Bifora radians.
testiculatum, Linn. Sp. PI. 258 = Bifora testiculata.
testiculatum, Lour. Fl. Cochinch. 225 « Bifora Loureiri.

COBIABIA, Niss. ex Linn. Gen. ed. I. 810 (1737). *CORIARIEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 129.
HETEROCLADUS, Turcz. in Bull. Soc Nat Mosc. xx. (1817) 1.162.
HETEROPHYLLEIA, Turcz. 1. c. (1818) I. 591.
angustissima, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 17.—N. Zel.
arborea, *Lindsay, Contrib. N. Z. Bot.* 81.—N. Zel.
atropurpurea, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. i. 710-thymifolia.
kermaphrodita, Turra, Farset. Nov. Gen. 18 - myrtifolia.
japonica, *A. Gray, in Mem. Acad. Am.* N. S. vi. (1858-59) 888.—Japon.
microphylla, *Pair. Encyc.* vi. 87.—Perav.
myrtifolia, *Linn, Sp. PI.* 1037.—Reg. Mediterr.
nepalensis, *Wall. PI. As. Rar.* iii. 67.—Keg. Himal.; China,
phylicifolia, *Humb. V Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 819.—Peruv.
procumbens, *Whitl. ex Hoffmgg. Veru. Pft. Nachtr.* iii. 9, nomen.—Hab.?
ruscifolia, *Linn. Sp. PI.* 1087.—Peruv.
sarmentosa, *Forst.f. Prod.* 71. n. 877.—N. Zel.
sinica, *Maxim, in tiitn. Acad. Pitersb.* Seir. VII. xxix. (1881) n. HI. 9.—China,
thymifolia, *Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 819.—Peruv.
tinctoria, Dulac, BI. Hantes-Pyr. 218 - myrtifolia.
Tutu, *Lindsay, Contrib. N. Z. Bot.* 81.—N. Zel.

CORIDOCHLOA, Nees, in Edwb. N. Phil. Joura. xv. (1888) 381, in nota-Panioiun, Linn. (Gramin.).
cimicina, Nees, 1. c. = P. cimicinum.
semialata, Nees, ex Benth. Fl. Austral, vii. 473' P. semialatum.

CORIDOTHYMUS, Reichb. f, in Oestr. Bot. Wochenbl. vi. (1857) 160-Thymua, Toura. (Ubiat.).
capitatus, Reichb. f. L c. 161=T. capitatus.

CORILUS, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. ii. (1798) 50-Corylua, Toum. (Cupul.).

CORINDUM, Adans. Fam. ii. 388 (176S)-Paullinia, Linn. (Sapind.).

CORINDUM, Tourn. ex Medic. Malv. 110 (1787)-Cardiospennum, Linn. (Sapind.).
Halicacabum, Medic. 1. c.»Card. Halicacabum.

CORINGIA, J. *Sc* C. Presl, < Fl. Cecil. Ill'; Fl. Sicula, 79 (1826)-Canringia, Heist. (Crucif.).

CORINOCARPUS, Poir. in Diet. Sc Nat. x. Ill (1818)-Corynooarpua, Font. (Anacard.).

CORION, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 157 (1820)-Bifora, Hoffm. (Umbellif.).
esticulatum, Hoffmgg. & Link, 1. c. - B. testicnlata.

CORION, Mitch, in Act. Nat. Cur. viii. (1718) 208, App. -Spergularia, J. & C. Presl (Caryophyll.).

COBIS, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 838 (1787). *PRIMULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 688.
hispanica, *Lange, in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1863) 53 *{Pugill.* 219).—HUpan.
monspeliensis, *Linn. Sp. PI.* 177.—Europ. austr.

CORISANTHERA, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 373 (1881)=CORYSANTHERA, Wall.-Bhynchotechum, Blume (Gesnerac.).

CORISANTHES, Steud. Norn. ed. II. i. 174, in syn. (1810)=CRIOSANTHES, Rafinn.=Cypripedium, Linn. (Orchid.).

COBISPEBMUM, B. Juss. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 57.
apetalum, *Hort. ex Steud. Norn.* ed. II. L 420.—Hab. ?
borysthenicum, *Andre, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1881) 129, nomen.—Rossia.
bracteatum, Viv. Lett. Corisp. 2-Marschallii.
canescens, *Kit. ex Schult. Oestr. Fl.* ed. II. i. 7.—Europ. occ.
coloratum, *Andre, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 129, nomen.—Rossia.
confertum, *Bunge, in Maxim. Prim. Fl. Amur.* 225.—Reg. Amur,
crassifolium, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) 128.—Sibiria.
declinatum, Steph. ex Stev. in Mlm. Soc. Nat. Mosc. v. (1811) 331-hyssopifolium.
elatum, Host, Fl. Austr. i. 819 = Marschallii.
elongatum, *Bunge, ex Maxim. Prim. Fl. Amur.* 221.—Man char,
filifolium, *Becker, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 13.—Rossia.
glomeratum, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 1.—Hab. ?
Gmelini, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* xxv. (1879) 857.—Sibiria.
heteracanthnm, *Ledeb. ex Heynh. Nom.* ii. 161, nomen.—Rossia.
hybridum, Bess, ez Moq. in DC. Prod. xiii. II. 141 = Marschallii.
hyssopifolium, *Linn.Sp. PI. A.*—Europ.; As. temp.; Am. bor.
hyssopifolium, Pall. Reise, i. 481; FL Ross. t. 98 = oiientale.
intermedium, Reichb. Fl. Germ. Excurs, 581 = Marschallii.
intermedium, *Schveig. in Koenigsb. Arch. Natural,* i. (1812) 211.—Europ.
latifolium. Link, Handb. ii. 108-orientale.
laxiflorum, Schrenk, in Ball. Phys.-Math. Acad. Pitersb. i. (1813) 361-Marsc5allii.
Lehmannianum, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 158.—Turkestan,
macrocarpum, *Bunge, in Maxim. Prim. PI. Amur.* 226.—Manchur.
macrospermum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1881) 180=macrocarpum.
marginatum, Steph. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 110 = Marschallii.
Marschallii, *Stev. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* v. (1811) 336.—Enrop.
microspermum, Host, Fl. Austr. i. 319=nitidum.
nitidum, *Kit. ex Schult, Oestr. Fl.* ed. II. i. 7.—Europ.; As. bor.
orientate, *Lam. Encyc.* ii. Ill; *Illustr.* i. 15.—Rossia; As. bor.; Persia.
Pallasii, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc v. (1811) 336-orientate.
patens, Fisch. in Roem. & Schult. Syst. i. 579=hyssopifolium.
patens, Link, in Spreng. Jahrb. Gewaechsk. L III. 28 = Redowskii.
patens, *Roem. (f Schult. Syst.* i. 579.—Sibir.
pentandrum, Willd. ex Link, in Spreng. Jahrb. Gewaechsk. i. m. 28 - orientale.
pilosum, Rafin. New Fl. Am. iv. 16 = hyssopifolium!
polygaloides, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 21 = Anthochlamus polygaloides.
pungens, Savi, sec. Uechtr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 121=squarrosum.
pungens, Vahl, Enum. i. 117 = Agriophyllnm arenarium, *Bieb.*
purpurascens, Host, FL Austr. i. 318=nitidum.
Redo/ski, Fisch. *Sc* Stev. in *Mim.* Soc. Nat. Mosc. v. (1811) 886=seq.

COBISPEBMUM:—
Redowskii, *[Fisch.] Hort. Gorent.* ed. I. (1808) 25.—Sibir. baical.
sabulosum, *Ledeb. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 267.—Sibir.
salsoloides, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 420 = glomeratum.
spicatutn, Willd. Ennm. Hort Berol. Suppl. 1 = orientale.
squarrosum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 3 - Marschallii.
squarrosum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 7= orientale.
squarrosum, Linn. Sp. PL 4- hyssopifolium.
squarrosum. Pall. Fl. Ross. i. II. 118. t. 99 — Agriophyllum arenarium, *Bieb.*
squarrosum, *Vahl, Enum.* i. 16.—Europ.; As. temp.
squarrosum, Willd. Enum. Hort. Berol. 8=Marschallii.
Stauntonii, *Moq. Chenop. Enum.* 104.—China.
subpentandrum, Pall. Illustr. t. 59 = orientale.
tenue, Link, in Spreng. Jahrb. Gewaechsk. i. III. 29 = nitidum.
tylocarpum, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 47.—China,
ulopterum, *Fenzl, ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 765.—Sibir.

CORISTOSPERMUM, Bertol. Fl. ItaL iii. 166 (1887) = Iiigusticum, Linn. (Umbellif.).
cuneifolium, Bertol. 1. c. 167 = L. cuneifolium.

CORIZOSPERMUM, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd-Bat i. 255 (1850) = Casearia, Jacq. (Samyd.).
clutiaefolium, Zipp. ex Blume, 1. c. = Cas. clutiaefolia.

CORMIGONUS, Rafin. in Ann. Gen. Sc. Phys. vi. (1820) 83=BUdria, Reinw. (Rubiac).

COBMONBMA, Reissek, ex Endl. Gen. 1098 (1840). *RHAMNEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 379.
CAESIA, Veil. Fl. Flum. Hi. t. 23 (1827).
spinosum, *Reissek, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 96.—Bras.

CORMUS, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 96 (1834)* Pyrus, Linn. (Rosac).
domestica, Spach, 1. c 87=P. Sorbus.

CORNA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 2 (quid?).

CORNACCHINIA, Savi, in Mem. Soc. Ital. Moden. *»' (1837) 181. t. 7 - Clerodendron, Linn. (Verbenac.)-
fragi/ormis, Savi, 1. c 185 = Clerod. Acerbiana.

CORNELIA, Ard. Spec. ii. 9 (1761)=Ammanni»i Houst. (Lythrar.).
verticillata, Ard. 1. c. = A. salicifolia.

CORNICINA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 162 (18101) = Anthy Ills, Linn. (Legumin.).
cirdnata, Boiss. 1. c. 163 = Hymenocarpus circinnatus.
hamosa, Boiss. 1. c. 162 = A. hamosa.
Loeflingii, Boiss. 1. c. = A. Cornicina.
lotoides, Boiss. 1. c. = A. lotoides.
nummularia, Boiss. 1. c. 163 - Hymenocarpus nummolarius.
pseudocytisus, Boils. ViiLga. Ser. I. ii. 15 = Cytisop* dorycniifolia.

CORNIDIA, Ruii & Pav. Prod. 68. t. 85 (1794)" Hydrangea, Linn. (Saxifrag.).
integerrima, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. >» (1833) 344 = H. scandens, A M #.
radiata, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) = H. peruviana.
serratifolia, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. "• (1888) 311 - H. serratifolia.
umbellata, Ruiz & Pav. Syst Veg. 91.—Peruv.

CORNIOLA, Adans. Fam. ii. 821 (1763) = Cenista, Linn. (Legumin.).
anxanthica, Presl, Bot. Bemerk. 137=G. anxantica.
Corsica, Presl, 1. c. 136 = G. Corsica.
mantica, Presl, 1. c. = G. mantica.
microphylla, Presl, 1. c. 187 = G. microphylla.
ovata, Presl, 1. c. 186=G. ovata.
scariosa, Presl, 1. c = G. triangularis.
Scorpius, Presl, 1. c. 187 - G. Scorpius.
sibirica, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Gen. ii. (I'8" 342 = G. sibirica.
tinctoria, Medic. L c. = G. tinctoria.
triangularis, Presl, Bot. Bemerk. 136 = G. triangulan>
virgata, Presl, 1. c = G. virgata.

COKNUCOPIAE, Linn. Gen. ed. I. 13 (1737). *GRAMINBAE,* Benth. *Sc* Hook. £ iii. 1139.
wapecuroides, Linn. Mant. i. 28-Alopecurns utricu. latus.
altusinium, Walt. Fl. Carol. 74 = Agrostis eUta?
cncolUtum, *Linn. Sp. PI.* 64.—As. Min.; Mesopot.
hyemale, Walt Fl. Carol. 78 = Agrostis scabra.
Perennans, Walt 1. c. 74-Agrostis scabra.

COCP'ACA, Delile, Fl. Egypte, 206. t 22. f. 3 S. 69 *CIIENOPODIACEAE>* Benth. * Hook. f.
amblyacantha, *Bunge, Anabas. Rev.* 88.—Persia.
Anchen, *Moq. Chenop. Enum.* 168—Persia,
a-nrenbergii, *Aschers. in Sckwinf. Beitr. Fl. Aeihiop.* 18».—Afr. trop.
nwnacantha, *Delile, Fl. Egypte,* 206.—Aegypt. j Persia.
muncata, Delile, Fl. Egypte IUnstr. 67=Kochia muricata.
"Soldes. Moq" TM DC" Prod- "ii- ". 2i8=tragacantagacanthoides, *Moq. Chenop. Enum.* 168.—Syria; Mesopot

COi ? ^ 8 , t Tonm] Linn. Syst. ed. I (1785). *CORNACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 950.
BENTHAMIA, Undl. Bot Reg. 1.1679 (1888).
CYNOXYLON, Rafin. Alsog. Am. 59 (1838).
EUKRANIA, Rafin. 1. c. (1838).
sviDA, Opiz, Seznam, 91 (1852).
Tsuk RAMA> Rafin. Alsog. Am. 6* (1888)-
«/* « EnCyon iii. 115> Pritim (Ct anCt Amer)'
alba, Bank. & Am. Bot. Beech. Voy. 142-californica, stolonfcrn.
alb »«*' &"*• Mant. *• ".-Sibir.
X' W ^ ' J°P- «2-macrophylla.
~J?l W *U F1 Carol. 88 = C. Amomum.
«*>*», Ehrh. Beitr. iv. 16=candidissima.
»ffern ? ', Marsb - Arbnst. 86-altemifoIU.
•Itenufoha, *Linn./. Suppl.* 126—Am. bor.
Amor m. bor.
a Ia> Uichx. Fl. Bor. Am. »• 98.-Am. bor.
a jata, *Rafin. Aho. Am* 61.-Am. bor.
a ^ £ a ' -9- A Mey. in Bnll, Phys-Math. Acad. Petersb. i«. (1846) 372-sanguinea.
biram «, Stokes. Bot. Mat Med. i. 221-sueciea.
boreal !/ i Clasch R In P-- 24-suecica. Pétersb. vii. (18) »• 228-macrophylla.
caerulea, A u G t.v j coeru ea.
californica, *C. A. Petersb.* iii. (1845) 878.-Am. bor. i c.
canadensis, Cham. lecht. in Linnaea, iii. (1828) 189 = unalaschken
canadensis, £ sp. Pi. H8._Am. bor.
canadensis W Uld ex LedebL FL RoM u 877 = suecica. *
candissima, Biach. Ind. S. Hort. Hdddb.(1861)- stolonifera.
candidissima, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 6.-Am. bor.
capitata, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey> I* 434>~ Reg. Himal.
candata, Zoll. in Flora, xxx. (1847) 608 = Polyosma integrifolia.
chilensis, Molina, Saf K Chil 173=Aristotelia Macqui.
cinerea, *Rafin. Alsog* ilm - 69.—Am. bor.
circinata, *L'Herit. Cornus.* 7—Am. bor.
circinnata, Cham. & Schlec nnaea, iii. (1828) 189 = californica.
citrifolia, Hort. ex Lam. Encyc. ii. 116 = candidissima.
citrifolia, Wahlenb. in Isis, xxi. (1828) 982 - sanguinea.
coerulea, Lam. Encyc. ii. 118=C. Amomum.
coerulea, Meerb. Pl. Sel. t. 3 = stricta.
comosa, *Rafin. Alsog. Am.* 69>.~Am. bor.
crispula, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881) 216 = macrophylla.
cyananthus, *Rafin. Atl. Journ.* I51.-Am. bor.
cyanocarpus, J. F. Gmel. Syst. 257 = stricta.
cyanocarpus, Moench, Verz. 27 = C. Amomnm.
dasurica, Laxm ex Ledeb. Fl. Ross. " 86 = Viburn TM n daviiricum."
dichotom *. *Rafin. Alsog: Am.* 60.—Am. bor.
discifi Me*£ "* & Sesse, *ex Di. Prod.* iv. 273.—Drummondi, *C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Ptersb.* iii. (1845) 872.—Am. bor.

COBNTTS :—
erythrocorpa, St. Lager, ex Ball. Soc. Bot. Fr. xzxi. (1888) Bibl. 201=C. Mas.
excelsa, *H. B. &* K. Nov. Gen. el Sp.* ill. 430.—Mexic.
fastigiata, Michx. FL Bor. Am. i. 92 = stricta.
femina, Anct. *vide foemina.*
ferruginea, Hort. ex Lam. Encyc. ii. 116 - C. Amomum.
ferulacea, Jacq. ex Roem. *8c* Schnlt. Syst. iii. 325 = ferulaeiblia.
ferulaefolia, *Nocca, Syn. PI.* 88.—Hab.»
flava, Steud. Norn. ed. I. 227=C. Mas.
florentina, *Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Ser. I. x. (1874) 157.—Hab. I
florida. Hook. Fl. Bor. Am. i. 277, partim=Nnttallii.
florida, *Linn. Sp. PI.* 117.—Am. bor.
foemina, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4=sangninea.
glabrata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 18.—Calif,
grandis, *Cham. V Schlecht. in Unnaea,* v. (1830) 171.—Mexic.
herbacea, Steller, in Pall. N. Nord. Beitr. ii 300« snecica.
ignorata, *C. Koch, Ind. Sent. Hort. Berol.* (1867) *App.* i. 8.—Japon.
ilicifolia, Hassk. & Zoll. ex Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 168, 311-Polyosma ilicifolia.
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 63.—Japon.
Kousa, *Buerger, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 169, in syn.—Japon.
landfolia, *Rafin. Alsog. Am.* 60.—Am. bor.
lanuginosa, Michx. FT. Bor. Am. i. 92 = C. Amomnm.
latifolia. Bray, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. II. (1818)86-sanguinea.
longifoUa, *Medic. Beobacht.* (1782) 308.—Hab. ?
macrophylla, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed Carey,* i. 488.—Reg. Himal.; China; Japon.
Mas, *Linn. Sp. PI.* 117.—Enrop.; As. Min.
mascula, Linn. Syst. ed. X. 897 = C. Mas.
mexicana, Carr. in Rev. Hortic. (1875) 460 = C. Amomum.
minor, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 421 =sericea.
nudiflora, Dum. Fl. Belg. 83 = C. Mas.
Nuttallii, *Audubon, Birds Am.* t. 867; *ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 652.—Am. bor.
obliqua, Rafin. Ann. Nat. (1820) 18 - C . Amomum.
oblonga, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* i. 482.—Reg. Himal.
oblongifolia, Rafin. ex DC. Prod. IT. 272—sericea.
omcinalis, *Sieb. (f Zucc. Fl. Jap.* i. 100. t. 60.—Japon.
paniculata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 140=oblonga.
paniculata, L'Hérit Comus, 9. t. S=tandidissima.
parvifolia, *Rafin. Alsog. Am.* 61.—Am. bor.
pandnerris, *Hance, in Journ. Bot.* xix. (1881) 216.—China.
plicata, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 733=alternifolia.
polygama, Rafin. Fl. Ludov. 78=C. Amomum ?
praecox, Stokes, Bot Mat Med. i. 222=C. Mas.
pubescens, Nntt. Sylva, iii. 54 = C. Amomum.
pubescens, Torr. Bot. Mex. Bound. 71=califomica.
pubescens, WiUd. ex Roem. *Be* Schnlt. Syst. iii. 252 = excelsa.
punctate, *Rafin. Alsog. Am.* 62.—Am. bor.
purpurea, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 791 •= tartarica.
Purshii, G. Don, Gen. Syst. iii. 399=stolonifera.
racemosa, Lam. Encyc. ii. 116—candidissima.
riparia, *Rafin. Alsog. Am.* 62.—Am. bor.
rotnndifolia, *Rafin. I. c*—Am. bor.
rubiginosa, Ehrh. Beitr. iv. 16=C. Amomum.
rugosa, Lam. Encyc il. U6=cirdnata.
sanguinea, Forsk. FL Aegypt. Arab. 33-Cordia Myxa.
sanguinea, *Linn. Sp. PI.* 117.—Europ.; As. bor.
sanguinea, Thnnb. Fl. Jap. 68 = macrophylla.
sanguinea, Walt. Fl. Carol. 88 -stricta.
sericea, Linn. Mant. ii. 199; L'Hérit. Comus, 6. t. 2 = C. Amomum.
serotina, *Rafin. Alsog. Am.* 60.—Am. bor.
serrulata, Hassk. & Zoll. ex Hassk. Cat. Bog. Alt. 168 - Polyosma serrulata.
sessilis, *Torr. ex Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.* Ser. II. iii. (1855) 89.—Am. bor. oca
siUrica, Lodd. in Loud. Hort. Brit. 60-tartarica.
stolonifera, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 92.—Am. bor.

COBNTTS :—
striata, DC. Prod. iv. 272 = foemina.
stricta, A. Gray, in Hall, PI. Texas, 11, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 438-Drummondii.
stricta, L'He'rit. Comus, 8=foemina.
stricta, *Lam. Encyc.* ii. 116.—Am. bor.
stricta, Zoll. *Sc* Morr. in Nat en Geneesk. Arch. NeSrl. Indie, ii. (1845) 10= Polyosma integrifolia.
suecica, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 387 = canadensis.
suecica, *Linn. Sp. PI.* 118.—Reg. bor. et arct.
suflruticosa, *Rafin. Ail. Journ.* 151.—Am. bor.
tartarica, *Mill. Gard. Diet* ed. VIII. n. 7.—Sibir.
tolucensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 480.—Mexic.
tamentosa, Steud. Nom. ed. II. i. 422 - circinata.
tomentosula, DC. Prod. iv. 272=circinata.
tomentulosa, Michx. Fl. Bor. Am. i. 91 = circinata.
Torreyi, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 145.—Calif,
trilobata, *Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Ser. I. x. (1874) 157.—Hab.?
unalaschkensis, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 378.—Alaska,
undulata, *Rafin. Alsog. Am.* 61.—Am. bor.
vernalis, Salisb. Prod. 66=C. Mas.
virginiana, Hort. ex Lam. Encyc. ii. 115=circinata.

CORNUTA, Linn. Gen. ed. VI. 316 (1764) - Cornutia, Plum. (Verbenac).

COBNTTTIA, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 366 (1737). *VERBENACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1153.
AGNANTHUS, Vaill. ex Linn. Gen. ed. 1.366 (1737).
CORNUTA, Linn. 1. c. ed. VI. 816 (1764).
HOSTA, Jacq. Hort. Schoenb. i. 60. t. 114 (1787).
HOSTANA, Pers. Syn. i. 143 (1805).
cayennensis, *Schau. in DC. Prod.* xi. 681.—Guiana.
corymbosa, Burm. f. Fl. Ind. 182=Premna corymbosa.
corymbosa, Lam. Encyc. i. 54—Callicarpa lanata et Premna tomentosa.
crenata. Medic. Beobacht. (1783) 112=pyramidata.
grandifiora, Steud. Nom. ed. II. i. 422 = seq.
grandifolia, *Schau. in DC. Prod.* xi. 682.—Mexic.
longifolia, *Spreng. Syst.* i. 39.—Mexic.
odorata, *Poepp. ex Schau. in DC. Prod.* xi. 681.—Am. trop.
pubescens, *Gaertn.f. Fruct.* iii. 172. t. 213.—Guiana,
punctata, *Willd. Sp. PI.* iii. 322.—Am. trop.
pyramidata, Ait. Hort. Kew. ii. 858=punctata.
pyramidata, *Linn. Sp. PI.* 628.—Mexic.
quinata, Lour. Fl. Cochinch. ii. 387=Vitex Loureirii.

CORNUTIOIDES, Linn. Fl. Zeyl. 196 (1747) (Gen. dub.).

COROCEPHALUS, D. Dietr. Syn. PI. i. 424,640 (1839), sphalm. = Conooepholiu, Blame (Urtia).

CORONA-IMPERIALIS, Tonrn. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 148 (1745)=PritiUaxia, Linn. (LUiac.).

COBOKIA, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) 249. *CORIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 949.
buddleioides, *A. Cunn. I. c.—N.* Zel.
Cotoneaster, *Raoul, ChoixPl. N. Zel.* 22.—N. Zel.

COBONANTHEBA, Vieill. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 170 (1883). *GESNERACEAE.*
aspera, *C. B. Clarke. I. c.* 172.—N. Caled.
barbata, *C. B. Clarke, 1. c*—N. Caled.
deltoidifolia, *Vieill. ex C. B. Clarke, 1. c.* 171.—N. Caled.
glabra, *C. B. Clarke, I c.* 174.—N. Caled.
Pancheri, *C. B. Clarke, I. c*—N. Caled.
pedunculosa, *C. B. Clarke, 1. c.* 178__N. Caled.
pinguior, C. *B. Clarke, 1. c.* 171.—N. Caled.
pulchra, C. *B. Clarke, 1. c.* 173.—N. Caled.
sericea, *C. B. Clarke, 1. c.* 172.—N. Caled.

CORONARIA, Linn. Gen. ed. L 135 (1737) = Iiyohnia, Linn. (Caryophyll.).
Coeli-rosa, Fries, ex Heynh. Nom. ii. 161 - L. Coelirosa.
Flos-cuculi, A. Br. in Flora, xxvi. (1848) 368=1. Flo»-cuculi.
Flos-Jovis, A. Br. L C.-L. Flos-Jems.
• *tomentosa,* A. Br. 1. c.=L. Coronaria.

CORONE, Hoffmgg. ex Stead. Nom. ed. II. i. 422 (1840) = SUene, Linn. (Caryophyll.).
agrestina, FOUIT. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 344 = S. lylvestris.
gallica, Fourr. 1. c = S. gallica.
nocturna, Fouir. 1. c. = 5. noctuma.
quinquevulnera, Hoffmgg. ex Steud. Nom. ed. II. i. 422 = S. quinquevulnera.
vespertina, Hoffmgg. ex Stead. 1. c=S. vespertina.

CORONTLLA, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 227 (1737). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. S09.
AVIVNCULUS, Four, in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 367.
CALLISTEPHANA, Fonrr. 1. c. (1868).
EMERUS, Tonm. ex Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1752).
SCORPIUS, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 369.
aculeata, Willd. Sp. PI. iii. 1147 =Se»bania aculeata.
argentea, Burm. f. Cap. Prod. 22; Thunb. Prod. ii. 131 = Lessertia argentea.
argentea, *Linn. Sp. PI.* 743.—Ins. Creta.
atlantica, *Boiss. & Rent. Pugill. PI. Nov.* (1852) 42, in syn.—Marocco.
Balansae, Boiss. & Bal. in Boiss. Fl. Orient, ii. 181 = cappadocica.
buxifolia, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. xviii. (1862) 219.—China.
cannabina, Willd. Sp. PI. iii. 1147 = Sesbania aculeata.
cappadocica, *Willd. I. c.* 1152.—As. Min.
chia, Orph. ex Boiss. Fl. Orient ii. 183 = parviflora.
Clusii, Dufour, in Ann. Sc. *Gin.* Phys. vii. (1620) 807 =• minima.
coccinea, Willd. Sp. PI. iii. 1145 = Sesbania grandiflora.
cochinchinensis, *Lour. Fl. Cockinch.* ii. 452.—Cochinch.
coronata, DC. Trod. ii. 310 = minima.
coronata, Jacq. Fl. Austr. i. 59. t. 95 = montana.
coronata. *Linn. Syst,* ed. X. 1168.—Europ. austr.
cretica, *Linn. Sp. PI.* 743.—Europ. or.; As. Min.
dura, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 34.—Lusitan.
elegans, Pang, ex Nym. Consp. 185 -varia?
emera, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 123 - C . Emerus.
emeroides, *Boiss. & Sprun. Diagn.* Ser. I. ii. 100.—Graecia; As. Min.
Emerus, *Linn. Sp. PI.* 742.—Europ. austr.
Emerus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 7. t. 710 = emeroides.
eriocarpa, Boiss. Elench. 37- Hippocrepis squamata,
extensa, Jord. Pngill. 61=minima.
fiorida, Salisb. Prod. 341 - C. Emerus.
frutican*, *Jord. Pugill.* 62.—Europ.
gibraltarica, *Brouss. ex Ball, in Joum. Linn. Soc.* xvi. (1*78) 426.-Hispan.; Afr. bor.
glauca, Asso, ex Nym. Consp. 185 = coronata.
glauca, *Linn. Cent. PI.* i. 23.—Reg. Mediterr.
globosa, *Lam. Encyc.* ii. 122.—Ins. Creta.
Glycyrrhiia, Spreng. Syst. iii. 324=Glycyrrhiza asperrima.
grandiflora, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 88.—As. Min.
grandiflora, Willd. Sp. PI. iii. 1145=Sesbania grandiflora.
Haussknechtii, Rent ex Boiss. Fl. Orient ii. 182 = varia.
Heineri, *Regel, Cat. PI. Hort. Atsatov.* 41.—As. temp.
hirsuta, *DC. Prod.* ii. 310.—Afr. austr.
hirsuta, Veil. Fl. Flum. 311; vii. t 122 = Isodesmia tomentosi.
hirta, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 182 = varia.
hispanica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=glauca.
iberica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 171 = cappadocica.
juncea, *Linn. Sp. PI.* 742.—Europ. anstr.
libanotica, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 104 = varia.
/<rfo»rf«,Koch, in Roehl. Deutschl. Kl. ed. Mert. & Koch, v. 199 = minima.
minima, Jacq. Fl. Austr. iii. 39. t. 271 -= virginalfa.
minima, *Linn. Cent. PI.* ii. 28.—Enrop.
monilis, Linn. PI. Surin. n. 102; Amoen. Acad. viii. 261 - Muellera moniliformis ?
montana, *Scop. PI. Corn.* ed. II. ii. 72.—Reg. Caucas.; Persia.
multiflora, *DC. Prod.* ii. 310.—Hispan.
myrti/olia, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 22-Tephrosia myrtiiolia.
ocddentalis, Willd. Sp. PI. iii. 1147 = Sesbania occidentalis.
oriieulata, Moencb.Meth. Snppl. 40-valentina.

CORONTLLA:-
orientalis, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 8.—Iberia; As. Min.
pallida, Salisb. Prod. 341 = glauca.
parviflora, Moench, Meth. 121=cretica.
parviflora, *Willd.Sp. PI.* iii. 1155.- Graecia; As. Min.
pauciflora. Lam. Fl. Kr. ii. 661 = C. Emerus.
pendula, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 634.—Europ.
pentaphylla, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 171.-Afr. bor.
pieta, Willd. Sp. PI. iii. 1148=Sesbania aegyptiaca.
pubescens. *Schum.* &* *Thonn. in Kon. Dan. Vid. Sel. Afh.* iv. (1828) 128.—Afr. trop.
pulchra. Ball, in Joum. Bot. xi. (1873) 307=viminalis.
ramosissima, *Ball, I. c.* 306.—Marocco.
repanda, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 35.—Hispan.
rostrata, Boiss. *Sc* Sprun. Diagn. Ser. I. ii. 100 = parviflora.
sanguinea, *Roxb. Hort. Beng.* 56, nomen.—Hab. ?
scandens, *Linn. Sp. PI.* 743.--Ind. occ
seandens, Veil. Fl. Flum. 310; vii. t. 121 = Chaetocalyx brasiliensis.
scorpioides, *Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. ed Mert. V Koch,* v. 201.—Reg. Mediterr.; Persia.
Securidaca, Linn. Sp. PI. 748=Securigera Coronilla.
Securigera, Salisb. Prod. 841 = Securigera Securidaca.
sericea, Willd. Enum. Hort. Berol. 773 = Sesbania seiicea.
Sesban, Moench, Meth. 120=Sesbania aegyjrtiaca.
squamata, Cav. Ic. ii. 43 = Hippocrepis squamata.
stipularis, Lam. Encyc. ii. 120-valentina.
stipulata, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 246. —Reg. Himal.
suaveolens, Salisb. Prod. 340=valentina.
surattensis, Garc. ex DC. Prod. ii. 323- Smithia sensitiva.
thymilolia, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 22.—Afr. austr.
vaginalis, *Lam. Encyc.* ii. 121.—Europ.
vaginalis, Ledeb. Fl. Ross. i. 625 = emeroides.
valentina, Lam. Fl. Fr. ii. 663=coronata.
valentina, *Linn. Sp. PI.* 742.—Europ. austr.
valentina, Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 173- parviflora.
varia, *Linn. Sp. PL* 743.—Europ.
viminalis, *Salisb. Parad. Lend.* t. 13.—Afr. bor.
virgata, Willd. Sp. PI. iii. 1148 = Counetia virgata.

CORONOCARPUS, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 393 (1827)=Aspilia, Thou. (Compos.).
Gayanus, Benth. in Hook. Niger FL 434-A. helianthoides.
helianthoides, Benth. 1. c.=A. latifolU.
heliantkoides, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 393 - A. helianthoides.
Kotschyi, Benth. in Hook. Niger Fl. 433-A. Kotschyana.
Prieurianus, Benth. 1. c. = A. Kotschyana.

CORONOPUS, Reichb. Handb. 202 (1837)=Plantago, Toum.
vulgar is, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 140-P. Coronopus.

CORONOPUS, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1785); Caertn. Fruct. ii. 293 (1791) = Senebiera, DC. (1799) (Crucif.).
anomalus, Spreng. Syst. ii. 853 — Brachycarpaea varians.
coadunatus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 440=S. Coronopus.
cristatus, [Clairv.] Man. Herb. 212=S. Coronopus.
depressus, Moench, Meth. 220-S. Coronopus.
didymus, Sm. Fl. Brit. ii. 691=S. didyma.
fungosus, Sm. ex DC. Syst. ii. 622 - S. integrifolia.
Helenae, Spreng. Syst. ii. 853 = 3. Heleniana.
incisus, Homem. Hort. Ham. 599 « S. didyma.
integrifolius, Spreng. Syst. ii. 858 = S. integrifolia.
linoides, Spreng. 1. c = S. integrifolia.
myricaefolius, Sm. ex DC. Syst. ii. 526 = S. serrata.
niloticus. Spreng. Syst ii. 853 - S . nilotica,
pinnatifidus, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. [186] = S. didyma.
pinnatus, Homem. Hort. Hafn. 599 = S. didyma.
procumbens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 52 = S. Coronopus.
Raddii, Savi, in Mem. G. Raddi, (1880; 83.—Aegypt.
Ruellii, All. Fl. Pedem. i. 256 - S . Coronopus.
serratus, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 163 = S. serrata.
squamatus, Aschers. Fl. Brandenb. 62=S. Coronopus.
vulgaris, Desf. Tabl. ed. I. 132 = S. Coronopus.

COROTHAMNUS, Presl (Bot. Bemerk. 137); in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1844) 667 = Genista, Linn. (Legumin.).
decumbens, C. Koch, Dendrol. i. 44 - Cytisus decumbens.
diffusus, Presl, Bot. Bemerk. 137 = Cytisus decumbens.
Halleri, Presl, 1. c. = Cytisus decumbens.
myrtifolius, Presl, 1. c.—Hungar.
procumbens, Presl, 1. c— G. procumbens, *Waldst.*

COKOZO, Jacq. ex Giseke, Prael. 42 (1792)=EUeto, Jacq. (Palm.).

CORPODETES, Reichb. Consp. 61 (1828) = CARPOD ETES, Herb. - Stenomesson, Herb. (Amaryll.).

CORRAEA, Sm. in Trans. Linn. Sociv. (1798) 219«seq.

CORREA, Andr. Bot. Rep. 1.18 (1798). *RUTACEAB,* Benth. & Hook. f. i. 294.
.ANTOMMARCHIA, Colla, Hort. Ripul. A pp. ii. 840 (1826).
DIDIMERIA, Lindl. in Mitch. Three Exp. Austral, ed. II. ii. 198 11839).
MAZEUTOXEHON, Labill. Voy. ii. 11 (1798).
aemula, *F. Muell. Fragm.* i. 3.—Austral,
alba, *Andr. Bot. Rep.* t. 18.—Austral.
Backhousiana, Hook. Joum. Bot. i. (1834) 263- speciosa.
Bauerlcnii, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. W.* i»- (1885) 960.—Austral.
bicolor, Paxt. Mag. Bot. ix. (1842) 267 «= speciosa.
cardinalis, F. Muell. ex Hook. Bot. Mag. t. 4912" speciosa.
cordifolia, Lindl. in Mitch. Three Exp. Austral, ii. 233 —speciosa.
cotinifolia, Salisb. Parad. Lond. 1.100-alba,
decumbens, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1865) 30.—Austral.
ferruginea, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 276 » Lawrenciana.
glabra, Lindl. in Mitch. Three Exp. Austral, ii. 48" speciosa.
Latrobeana, F. Muell. in Dietr. Fl. Univ. N. Ser. t. M — Lawrenciana,
Lawrenciana, *Hoot. Joum. Bot.* i. (1834) 254.—Austral.
leucoclada, Lindl. in Mitch. Three Exp. Austral, ii- -speciosa.-
pulchella, Mackay, ex Sweet, Fl. Austral, t. 1* speciosa.
reflexa, Vent. Jard. Malm, sub 1.13-speciosa.
revoluta, Vent. 1. c. sub 1.13=speciosa.
rotundi/olia, Lindl. in Mitch. Three Exp. Austral. •• 219 = alba.
rubra, Sm. Exot. Bot. ii. 26-speciosa.
rufa, Vent. Jard. Malm, t.13 adnot.-alba.
Schlechtendalii, Behr, in Linnaea, xx. (1647) 630=- speciosa.
speciosa, *Ait. Epit. Hort. Km.* 366.—Austral,
virens, *Hook. Joum. Bot.* i. (1834) 263.—Austral.
- *virens,* Sm. Exot Bot. ii. 25. t. 72=speciosa.
viridiflora, Andr. Bot. Rep. t 486—speciosa.

CORREAS, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 168 (1824)^ Correa, Andr. (Kutac.).

CORREIA, Veil, in Roem. Script. 106. t 6 (1796)* Gomphia, Schreb. (Ochnac).

CORRIGIOLA, linn. Gen. ed. I. 340 (1737).
CEBRACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 17.
POLYGONARIA, Heist Syst. 6 (1748).
POLYCONIFOLIA, Adans. Fam. ii. 272 (1763).
albella, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 207 = ParonycW* arabica.
andina, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV xvii. (1862) 146.—N. Granat.
capensis, *Willd. Sp. PI.* i. 1507.—Afr. austr.
deltoidea, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 24 = Monocosmia corrigioloides.
glomeruliflora, *Steud. Nom.* ed. II. i. 423.—Chili-
imbricata, Lapeyr. Fl. Pyr.i. 83; Abr. 169=litW»
latifolia, *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 517.—Chili,
littoralis, *Linn. Sp. PI.* 271.—Europ.
littoralis, Thunb. Prod. PI. Cap. 55-capensis.
propinqua, *C. Gay, Fl. Chil.* ii. 617.—Chili,
psammatrophoides, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* **' (1883) 238.—Madag.

COBBiaiOLA :-
**pens*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 207 = Polycarpaea Sagilis.
«jnamosa, *Hook.* Cr *Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 337.—Chili.
'tlrphiifolia, Pourr. in Mém. Acad. TouL iii. (1788) 316; (Chi. Narb. 20) -littoralis.

CORSIA, Becc. Malesia, i. 238. t. 9 (1878). *BURMANNIACEAE*, Benth. & Hook.f. iii. 160.

CO J F S I A , Cav. Ic. iv. 83. t. 377 (1797). *BORAGINEAB*, Benth. & Hook. f. ii. 841.
***tata*, Miera, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. ii. (1868) 429=cuneifolia.
enneifolU, *Cm. Ic.* iv. S3. t 377.—Reg. Argent
vneiformis, Poir. in Diet. Sc. Nat. *x.* 668-cuneifolia.
mierophylla, *Mien, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. ii. (1868) 430.—Am. austr.

CORTHUMIA, Reichb. Nom. 201 (1841)=PeUrgonimn, L'Hérit. (Geran.).

CORTHUSA, Reichb. Consp. 128 (1828) = **CortUBa, Linn.** (Primal.).

CORTIA, DC. Prod. iv. 188 (1830)- *VMBELUFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 915.
SCHULTZIA, Wall. Cat. n. 689 (1830).
«««. Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1861) 56-Ligusticum elatum.
H?!£^-B- £'<"**< »» *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 702—Reg. Himal.
J-mdleyi, *DC. Prod.* iv. 187.-Reg. Himal.
Vagnata, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 56 = aelinum vaginatum.

CORTUSA, Li. Gen. ** *• *° ("37). *PRIMULACEAB*, Benth. & Hook. f. ii. 638.
Gm «»»» Linn. Sp. PI. 144-Androsace Gmelini.
grad. »7«. Schur, Enum. PL Transs. 556 - Matthioli.
Matthioli, P- **144.**—Europ.; As. bor.
Fttoens, *Schott, Nyman V Kotschy, Analect. Bot.* 17. —Transsylv.
'*?M Herd. Butt. Soc. Nai. wo *sc*- Ji- **(!868)** V, —As. centr.
7£?*> ***Andra. e*x *Steud. Nom.t*A. II. i. 428.—Sibir.**
ical.

CORTI Sl A ' E*1- & ^yn- &""»• 77 (1835)=Felargoni
odora, L'Hirit. (Geraniac).
reniformis, Eckl. * ^y11, L c. = p- odoratissimum.
rubropu, ^W" * Zeyk 1- C- = P- renifoime.
sidaefoh, Eckl- & Zeyh. 1. c - P. echinatum.
*velut*la> Eckl. & Zeyh. 1. c = P. sidoides.
Eckl. & Zeyh. 1. c = P. velntinum.

CORVIN ltnrt A, £tend. Nom. *&• ". • 2^s6 (I^8*^0) »phalm.= *urtoaria, Desv. (Crucif.).
fotrta, Steud. 1. c.=M. prostrata.

CORVINIA, Stadtm. ex Willem. in Utteri, Ann. Bot. xviii. 28 (1796) = **Nephelium, Linn. (Sapindac.).**
Litschi, Stadm. ex Willem. l. c. = N. Litchi.

CORVISARTIA, (C i ^ **l. Par. ed. I. 328 (1812)=Inula, Linn.**
caucasica, Gn Don, ex Loud. Hort. Brit 350 - Bnphthalmum speciosum.
Helenium, Mé, ?l n Par. ^ L 828 = I. Helenium.
indica, Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 68-1. Royleana.

0 Q RYANTHES Hook. Bot Mag. t. 8102 (1831).
ORCHIDEAE, Benth. & Hook, friii. 549.
CORYTHANTHES, Lem n Orb. Dict iv. **259 (1849).**
PANSTREPIS D **41 (1836).**
MELICLIS, R8fin 1 -c. i. 99(18S6).
Albertinae, Lanjt Aw, NeUer Gew, Venez. 5 = maculatj.
Barkerii, Bec. Prakt. Orch. 222. sphalm.- ***Parkeri.***
bifla-
Br
N. Granat *"***•/• '" "«»«"». *'i- (1877) 74.—
***et antissima*, Mart. in Gard. (1885)**
elegantium.
elegantium, *Linden & Reichb. f. in Gard. Chron.* (1868) 1114.—Bras.

CORYANTHES :—
Feildingii, *Lindl. in Joum. Hort. Soc.* iii. (1848) 15. -Hab.?
macrantha, *Hook. Bot. Mag.* t 3102, in textu.—Venezuela.
macrantha, [Mast, in] Gard. Chron. (1882) I. 692-elegantium.
maculata, *Hook. Bot. Mag.* t. 3102.—Am. austr.
Parieri, Endl. in Harting. Parad. Vindob. 19. t. 32. f. 1-speciosa.
picturata, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxU. (1864) 332.—Honduras.
punctata, Beer, Prakt. Orch. 222 - maculata.
speciosa, *Hoot. Bot. Mag.* t. 3102. in textu.—Bras.
splendens, *Rodrig. Orch. Nov.* i 103.—Bras.
Sumneriana, *Lindl. in Gard. Chron.* (1856) 462.—Hab.»

CORYBAS, Sallsb. Parad. Land. t. 83 (1805) = Coryaanthes, R. Br. (1810) (Orchid.).
aconitifolius, Salisb. 1. c. = Corysanthes bicalcarata.
fimbriatus, Reichb. *t* Bsitr. Syst. Pfl. 42=Corysanthes fimbriata.
fornicatus, Reichb. f. 1. c 67 = Corysanthes fornicata.
macranihus, Reichb. f. 1. c. = Corysanthes macrantha.
mucronatus, Reichb. f. 1. c =Corysanthei mucronata.
oblongus, Reichb. f. 1. c^- Corysanthes oblonga.
pictus, Reichb. f. 1. c-Corysanthes picta.
pruinosus, Reichb. f. 1. c. 43"Corysanthes fimbriata.
rhularis, Reichb. f. I. c. 67 = Corysanthes rivularis.
rotundifoliui, Reichb. £ 1. c.=Corysanthes rotundifolia.
trilobus, Reichb. £ 1. c.=Corysanthes triloba.
unguiculatus, Reichb. f. 1. c. 43=Corysanthes unguiculata.

CORYCARPUS, Zea, ex Spreng. Syst. i. 123 (1825)-Diorrhena, Rafin. (Gramin.).
arundinaceus, Zea, ex Spreng. 1. e.-D. americana.

COBTCITTM, Sw. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. xxi. (1800) 220. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. £ iii. 633.
bicolorum, *Sw. I. c.* 222.—Aft. anstr.
bifidum, *Sond. in Linnaea*, xu. (1847) 111.—Afr. austr.
crispum, *Sw. in Vet. Acad. Nya Handl. Stocih.* xxi. (1800) 222.—Afr. austr.
excisum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 368.—Afr. austr.
ligulatum, Reichb. f. in Linidea, xix. (1847) 376 = bifidum.
microglossnm, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 869.—Afr. austr.
nigrescens, *Sond. in Linnaea*, xix. (1847) 110.—Afr. austr.
orobanchoides, *Sw. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh.* xxi. (1800) 222.-Afr. austr.
vestitum, *Sw. I. c*—Afr. austr.

COBYDALIS, Vent. Choix, 19 (1803), in nota; DC. Fl. Fr. iv. 636 (1805). *PAPAVERACEAE*, Benth. &Hook.f.i.55.
BORCKHAUSENJA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 4 (1801).
BULBOCAPNOS, Bernh. in Linnaea, viii. (1833) **469.**
CAPNOIDES, Adans. Fam. ii. 481 (1763).
CERATOCAPNUS, Dur. in Parl. Giom. Bot. Ital. i. l. (1844) 336.
CRYPTOCERAS, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 121.
CYSTICAPNOS, Boerh. ex Adans. Fam. iL 431 (1768).
NECKERIA, Scop. Introd. 818 (1777).
PHACOCAPNOS. Bernh. in Linnaea, xii. (1838) 664.
PISTOLOCHIA, Bernh. Syst. Vera. Erf. 57 (1800).
PSEUDOFUMARIA, Medic Phil. Bot. i. 110 (1789).
SOPHOROCAPNOS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (184811. 670.
acaulis, ten. Syn. ii. 270 - ochrolenca,
adiantifolia, *Hook. f. V Thorns. Fl. Ind.* i. 271—Reg. Himal.
aduncа, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 29.—China.
albicaulis, *Frank. PI. David*, i. (1884) 30.—As. or.
albiflora, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 491.—Hungar.
alpestris, C. A. Mey. Vezz. Pfl. Cauc. 176=pauciflora.
alpina, J Gay, in Ann. Sc. Nat Sér. I. xxvi. (1832) 252«=fabacea.

COBTOAIiIS:—
alpina, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 252-rutaefolia,
ambigua, *Cham. V Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 668.—Kamtschat.
angustifolia, *DC. Syst.* ii. 120.—Reg. Cancas.; Persia.
annua, Hoffmgg. ex Steud. Nom. ed. II. i. 423= glauca.
astragalina, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i. 270» strict*.
aurea, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 740.—Am. bor.
biaurita, Homem. Hort. Ham. ii. 668 - Dicentra formosa.
bicalcarata, Haw. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 585-rutaefolia.
Bidwelliae, *S. Wats, in Bot. Calif*, ii. 429.—Calif.
blanda, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 149=tuberosa.
bracteata, *Pers. Syn.* ii. 269.—Sibiria.
bracteosa*, Spreng Syst. iii. 162 (= *Diclytra bracteosa). —Am. bor. I
Brandegei, *S. Wats, in Bot. Calif*, ii. 430.—Calif,
breviflora, *DC. Syst. ii.* 127.—Kamtschat.
bulbosa, *DC. Fl. Fr.* iv. 637.-Europ.
bulbosa, Pen. Syn. ii. 269 = lubrrosa.
bulbosa, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 423 = Turtschaninovii.
Bungeana, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 62. —Sibir.
Burmanni, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 4.—Afr. austr.
canadensis, Goldb. in Edinb. Phil. Joum. vi. (1822) 329 - Dicentra canadensis.
capnoides, Pers. Syn. ii. 270-lutea.
Caseana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 69.— Calif,
cashmeriana, *Royle, Jllustr. Bot. Himal.* 69.1.16. f. 1. —Reg. Himal.
caucasica, Adams, ex Steud. Nom. ed. II. i. 428=-angustifolia.
caucasica, *DC. Syst.* ii. 119.—Reg. Caucas.
caudata, Pers. Syn. ii. 269 = longiflora.
cava, Schweigg. *Sc* Kort Fl. Erlang. ii. 44; Wahlenb. Veg. Helv. 126 [bisj-tuberosa.
chaerophylla, *DC. Prod.* i. 128.-Reg. Himal.
chinensis, Franch. PI. David, i. 28-edulis.
clavicula, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 700-Mq.
claviculata, *DC. Fl. Fr.* iv. 638.—Europ.
conorhiza, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 99.—Keg. Caucas.
comuta, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 69.—Reg. Himal.
Cracca, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea*, i. (1836) 667. —Afr. austr.
crassifolia, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 68.—Reg. Hlmal.
crassissima, Jacquem. Voy. Bot. 12. t. 11-crassifolia.
crithmifolia, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 68.—Reg. Himal.
crystallina, *Engelm. ex A. Gray, Man. V. St. Bot.* ed. V. 62.—Am. bor.
Cucullaria, Hers. Syn. ii. 269 - Dicentra Cucullaria.
curvisiliqua, *Engelm. ex A. Gray, in Man. Bat. V. St.* ed. V. 62.—Am. bor. occ.
Cusickii, *S. Wats, in Bot. Calif*, ii. 480.—Calif,
dasyptera, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 28.—China.
debilis, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 30-cornnta.
decipiens, Schott, Nyman & Kotschy, Analect. Bot. 42=pumila.
decumbens, *Pers. Syn.* ii. 269.—Japon.
densiflora, J. *Sc C.* Presl, Delic. Prag. 10-bulbosa.
depauperata, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 51-bulbosa.
digitata, Pers. Syn. ii. 269-bulbosa.
diphylla, Wall. Tent. Fl. Nep. 54^rutaefolic.
edulis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 30. -China.
elegans, *Wall. Cat.* n. 1485.—Rep. Himal.
Emanueli, C. A. Mey. Verz. PA. Cauc. 176-pauciflora.
enneaphylla, DC. FL Fr. Suppl. 687-Sarcocapnos enneaphylla.
epithymifolia, Walp. Rep. i. 120, sphalm. - crithmil'olia.
Erdelii, Zucc in Abh. Akad. Muench. iii. (1848) 251-rutaefolia.
tximia. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 218-Dicentra eximia.
fabacea, *Pers. Syn.* ii. 269.—Europ.

COBYDALIB:—
Falconeri, *Hook.f. tf Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 124 —Reg* Himal.
Fedtschenkoana, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 3.—As. oentr.
fibiosa, *Maxim, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pttersb.* xv. (1857) 227, nomen.—Manchui.
filiformis, Royle, Illustr. Bot Himal. 68 = sibirica.
flabellata, *Edge*, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 30.—Reg. Himal.
flaccida, *Hoot. f. tf Thorns. Fl. Ind.* i. 260.—Reg. Himal.
flavidula, Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 604=flavula.
flavula, *DC. Prod.* i. 129.—Am. bor.
formosa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii 462 » Dicentra canadensis, eximia.
formosa, Sprang. Syst iii. 162=Dicentm fonnosa.
fumariaefolia, *Maxim, in Prim. Fl. Amur.* 89.—Manchur.
fungosa, Vent Choiz, t 19=Adlumia cirrhosa.
gamosepala, Maxim. Prim. Fl. Amur. 88= bulbosa.
Gebleri, Ledeb. Ind. Hart. Dorpat. (1828) 3=capnoides.
geraniifolia, Hook. f. & Thorns. FL Ind. i. 269 = chaerophylla.
gigantea, *Trautv. tf Afey. in Middend. Reise (Fl. Ochot.* 18).—Manchur.
glanca, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 468.—Am. bor.
glancescens, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xliii. (1870) I. 253.—As. temp.
Gortschakovii, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* i. 100.—Reg. Himal.; Soongar.
Govaniana, *Wall. Tent. Fl. Nep.* 55.—Reg. Himal.
gracilipes, S. Moore, in Jonrn. Bot. xiii. (1875) 226-decnmbens.
gracilis, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 101.—Reg. Caucas.
Griffithii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 16 *(Griffithsii)* = rutaefolia.
Halleri, Willd. Ennm. Hort. Berol. 740 "bulbosa.
Hamiltoniana, G. Don, Gen. Syst. i. 148=rutaefolia.
beterocarpa, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 314.—Afr. bor. occ
heterocarpa, Sieb. & Zuec. in Abb. Akad. Mnench. iv. (1843)11. 173=pallida.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 129=meifolia.
Impatiens, Fisch. in DC. Syst ii. 124 = sibirica.
incisa, *Pers. Syn.* ii. 269.—Japon.
inconspicna,*Bunge,exLedeb. Fl. Ross.*i. 104.—Sibiria.
intermedia, M£rat, Fl. Par.272»£abacea.
juncea, *Wall. Tent. Fl. Nep.* 54. t 42.—Reg. Himal.
Kareliniana, *Pritt. ex Walp. Rep.* ii. 750.—As. centr.
taschmiriana, Aact.=cashmeriana,
kashgarica, *Rupr. Serf. Tiansch.* 38.—As. centr.
Kolpakowskiana, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 633.—Turkestan.
lachenaliaeflora, Fisch. ex DC. Syst. ii. Ill-Dicentra lachenaliaeiiora.
laevigata, £. Mey. ex Bejph. in Linnaea, xii. (1888) 664=C. Cracca.
latiflora, *Hook. f. tf Thorns. Fl. Ind.* i. 270.—Reg. Himal.
laxa, *Franch. tf Sam. Enum. PI. Jap.* ii. 274.—Japon.
laxa, *Fries, Summa Veg. Scand.* 145.—Fennia.
Ledebouriana, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 877.—Sibiria.
leptocarpa, *Hoot. f. tf Thorns. Fl. Ind. I* 260.—Reg. Himal.
libanotica, Hochst in Lorent, Wandemngen, 389 = rutaefolia.
linarioides, *Maxim, in Bull. Acad. Pttersb.* xxiv. (1878) 27.—China.
linearilobа, Sieb. *Sc* Zncc in Abh. Akad. Mnench. iv. H. (1843) 174-bulbosa.
Lobelii, Tausch, ex Hoppe.in Flora, xxii. (1889) 879-pumila.
longifloia, *Pers. Syn.* ii. 269.—Reg. Casp.; Sibir.
longipts, DC. Prod. i. 128 -sibirica.
longipes, D. Don, Prod. Fl. Nep. 198= rutaefolia.
lutea, *DC. Fl. FT.* iv. 638.—Europ.
Maackii, *Rupr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 71.—Manchur.
macrocentra, *Regel, 1. c.* viii. (1884) 694.—As. centr.
macrophylla, *Nutt. in Torr.tfGray, Fl. N. Am.* i. 69.—Am. bor. occ.
macrosepala, *Ssred. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* vfli. (1883) 71.—Reg. Caucas.
Marschalliana, *Prrs. Syn.* ii 269.—Rossia; As. Min.

COBYDAXI8 :—
meifolia, *Wall. Tent. Fl. Nep.* 65.—Reg. Himal.
melanochlora, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 26.—China,
micropoda, *Franch. PI. Davidian.* i. (1884) 29.—As. or.
montana, Engelm. ex A. Gray, Man. U. St. Bot. ed. V. 62 = anrea.
Moorcroftiana, *Wall. Cat.* n. 1432.—Reg. Himal.
nana, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 68.—Reg. Himal.
nivalis, Boiss. & Huet, in Diagn. Ser. IL v. 16 = pauciflora.
nobilis, *Pers. Syn.* ii. 269.—Sibir.
nudicaulis, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 895.—As. centr.
ochotensis, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 62.—Sibir.
ochroleuca, *Koch, in Flora,* xiv. (1831) 708.—Italia,
ophlocarpa, *Hoot./. tf Thorns. Fl. Ind.* i. 269.—Reg. Himal.
oppositifolia, DC. Syst. ii. 114-nitaefolia.
orthoceras, *Sieb. tf Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. (1843) II. 175.—Japon.
paeoniaefolia, *Pers. Syn.* ii. 269.—Sibir.; Am. bor. occ.
pallida, *Pers. 1. c.* 270.—China; Japon.
paniculigera, *Regel tf Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 8.—As. centr.
pamassica, *Orph. tf Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 9.—Graecia.
pauciflora, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1861) 30= rutaefolia.
pauciflora, *Pers. Syn.* ii. 269.—As. bor.; Am. bor. occ.
persica, *Cham. tf Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 567.—Persia.
physocarpa, Cambess. in Jacqnem. Voy. Bot. 18.1.12 « crassifolia.
polygalina, *Hook.f. tf Thorns. Fl. Ind.* i. 263.—Reg. Himal.
pruinosa, *E. Mey. ex Bernh. in Linnaea,* xii. (1838) 664, in syn.—Afr. austr.
pseudo-cava, Panto*, in Verb. Ver. Narnr- u. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 88 = tuberosa.
pseudo-pumila, Schur, Enum. PI. Transs. 87—pumila.
pulchella, *Aitch. tf Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 151.—Afghan.
pumila, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 34.—Europ.
racemosa, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 5=Bungeana.
racemosa, *Pers. Syn.* ii. 270.—Japon.
Raddeana, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxiv. (1861) II. 143.—Manchur.
ramosa, *Wall. Cat.* n. 1484.—Reg. Himal.
remota, Fisch. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 87 =» bulbosa.
rosea, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 28.—China.
rosea, *Zeyh. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 424.—Afr. austr.
rupestris, *Kotschy, ex Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 8.—Persia.
rutacea, *T. M. Fr. in Bot. Notiser* (1854) 39.—Sibir. »
rutaefolia, Boiss. & Buhse, in Nouv. Me'm. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 13=persica.
rutaefolia, *DC. Syst.* ii. 118.—As. Min.; Persia; Reg. Himal.
scandens, Spreng. Syst. iv. Cor. Post. 265 — Dicentra spectabilis.
Schelesnowiana, *Regel tf Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 4.—As. centr.
Scouleri, *Hook. Fl. Bor. Am. I* 36. t. 14.—Am. bor. occ.
Semenowii, *Regel If Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxviL (1864) I. 407.—Sibir.
sempervirens, Pers. Syn. ii. 269=glauca.
senanensis, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 273.—Japon.
Sewerzowi, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xliii. (1870) I. 262.—As. centr.
Sheareri, *S. Moore, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 225.—China.
sibirica, *Pers. Syn.* ii. 270.—Sibir.; Reg. Himal.
solida, [Sw. in] Svensk Bot. viii. 531 (1819) = bulbosa.
spedosa, Maxim. Prim. Fl. Amur. 89=pallida.
spectabilis, Pers. Syn. ii. 269 = Dicentra spectabilis.
streptocarpa, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 80.—China,
stricta, *Steph. ex DC. Syst.* Ii. 128.—Sibir.; Reg. Himal.
Stummeri, *Pantol. in Magyar Nővint. Lapok,* v. (1881) 160.—Hangar.

COBYDA1I8:-
suaveolens, *Hance, in Journ. Bet.* xviii. (1880) 268.—China,
tenella, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 148.—As. centr.
tenella, *Ledeb. ex Nordm. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* ii. (1837) 813.—Reg. Caucas.
tenuifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 462= Dicentra lachenaliaeflora.
tennis, Schott, Nyman & Kotschy, Analect. Bot. 43= bulbosa.
thalictrifolia, *Jameson, ex Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxiv. (1861) II. 148.—China,
tibetica, *Hook. f. tf Thorns. Fl. Ind.* i. 266.—Reg-Himal.
trachycarpa, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiv. (1878) 27.—China.
triternata, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1848) 251-bulbosa.
tnberosa, *DC. FL Fr.* iv. 637.—Europ.
Turtschaninovii, *Bess, in Flora,* xvii. (1834) I. *Beibl.* 6—Rossia.
uniflora, Nym. Syll. 185=rntaefolia.
uralensis, *Fisch. ex DC. Syst.* ii. 127.—Mont Ural,
vaginans, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 68.—Reg. Himal.
Vernyi, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* U. 273.—Japon.
vertidllaris, DC Syst ii. 114=rutaefolia.
vesicaria, *Pers. Syn.* ii. 269.—Afr. austr.
Wilfordi, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. jexxiv. (1861) II. 148-pallida.

CORYDALLIS, Aschers. Fl. Brandenb. 28 (1864) - praec.

CORYDANDRA, Reichb. Nom. 68 (1841) = G*18" andra, Lindl. (Orchid.).

COBYLOP8IS, Sieb.& Zucc. Fl. Jap. i. 46. tt. 19, «° (1835). *HAMAMELIDEAE,* Benth. *Se* Hook- *• •• 667.
glabrescens, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 867.—Japon.
himalayana, *Griff, in Journ. As. Soc. Beng.* **>- (1854) 641.—Reg. Himal.
Kesakii, *Sieb. tf Zucc. Ft. Jap.* i. 49.—Japon.
multiflora, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xv. (1861) 224.—China.
pauciflora, *Sieb. (f Zucc. Fl. Jap. i.* 48. t 20.—Jap0"'
spicata, *Sieb. tf Zucc. 1. c.* 45.1.19.—Japon.

COBYLUS, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1786). *CUPUUFERAE,* Benth. & Hook. f. iii. 406.
alba, Ait. ex Steud. Nom. ed. II. i. 421 -=C. Avellana.
americana, Siebold, in Verh. Bat. Gen. xii. (1880) 26" heterophylla.
americana, *Walt. Fl. Carol.* 236.—Am. bor.
americana, Willd. Sp. PI. iv. 471 = humilis.
arborea, Hort ex Stead. Nom. ed. II. i. 424-<" Avellana.
arborescens, Gaertn. Mey. ft Scherb. Fl. Wett. iii. >"" =tubulosa.
arborescens, Muench. Hausv. iii. 826-C. Colurna-
atropurpurea, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. » •—tubulosa.
Avellana, *Linn. Sp. PI.* 998.—Europ.; As. Min.
Avellana, Thunb. Fl. Jap. 160= heterophylla.
biMantina, Desf. Tabl. ed. II. 245 - C. Colurna.
californica, Hort ex C. Koch, DendroL ii «. rostrata.
Colurna, *Linn. Sp. PI.* 999.—Enrop. or.; As. »» • -Himal.
cornuta, Dnroi, ex Stend. Nom. ed. I. 229=rostrat«-
Davidiana, *Baill. Hist. PI.* vi. 224.—China,
ferox, *Wall. Cat.* n. 2797.—Reg. Himal.
filicifolia, Hort. ex A. DC. in DC Prod. xvi. II. » C. Avellana.
grandis, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii > C. Avellana.
Hasibani, *Siebold, Kruidk. Naaml.* 27.-J«P°"-
heterophylla, Fisch. ex Bess, in Flora, xvii. (1884) > Beibl. 24 = C. Avellana.
humilis, Willd. Enum. Hort Berol. 983~amencan»-
intermedia, Fingerh. in Linnaea, iv. (1829) 386 - " • Colurna.
Jacqucmontii, Decne. in Jacquem. Voy. Bot 160-1- =C. Colurna.
lacera, WalL Cat n. 2798-C. Colurna.

COHYLTJ8 :-
laaniata, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. H. 181 = C. Avellana.
nandshuriea, Maxim, in Bnll. Phys..Math. Acad. fetersb. xv. (1856) 137 = rostrata.
"Mxima, Mill. GanJ. Dieted. VIII. n. 2-C. Avellana.
nencana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 15-wstrata.
Kwngotica, Hort. ex C. Koch, 1. c. 13=C. Avellana.
fata, Lam. ex Steud. Norn. ed. II. i. 421=C. Avellana.
ponhca» Dochmahl, Fnehr. Obstknnde, iv. 88 = C. Avellana.
pontiea, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 829-C. toluma.
P"»>la,* Lodd. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 523 = *-» Avellana.
pu»p«, Hort. ex A. DC in DC. Prod. xvi. II. 132 - tubulosa.
3??™?Wai, Hort - « A DC '• <> M l - C Avellana.
tostrata, Ait. Hart. Kev. iii. 384.—Am. bor.
Se??*iana*> pin*- in Oestr. Bot. Wochenbl. ii. (1852) cl, " C - Avellana.
*u*oldiana,* Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat i. 310= neterophylla.
ylwstris, Salisb. Prod. 892=C. Avellana.
ffr! la, Ledeb_ m 'Denkachr. Baier. Bot. Ges. iii. (1[illegible] II. 58-sphalni=C. Avellana.
nbergii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. it II. 13 = heterophylla.
V£!5ea> Jacquem. Voy. Bot. 160-C. Coluraa.
soonlosa, Willd. Sp.Pl. iv. 470.—Europ. austr.; As. Min.
*T**chamnovii,* Steud. Norn. ed. IL i 425, sphalm.= Corylus Turtschaninovii.

COR MBIS, Thou_ Orch_ ne» Afr_ *• 37« 38 (1822).
KCHIDEAE, Benth. ft Hook. f. iii. 591.
J;HU>IDIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 484 (1840).
ORH BORCHIS> T"0"- « Blume, Orch. Arch. Ind. -- 125(1865).
HYSTERIA, Reinw. m Blame, Cat. Gew. Buitenz. 99 1822).
MACROSTYUS, Breda, Orch. Kuhl. et Hass. (18271).
«HVNCHANTHEEA, Blume, Bijdr. Tabell. 78 (1828).
nJ, ??T^IS> Ra1°- FL Tellur. ii! 89 (1886).
S S S 6 * * ' *'"»• Fl_ '**• *Bat. Suppl.*617.-Sumatra.
Thou_ Onh_ n<ls Af_ «• 37, 38.—Madag.
XjhdL Fol - Orchid. Corynibis=corymbosa.
BioL Centr_ Am_ B<>t_ '"• 297.—Mexic.
Flora, 1 v 1. (1868) w 2.—
Am.bop. [S> ReiChb, f, '*
Reichb. f. in Bot. Zeit. vii. (1849) 886 = J ^ fib osa.
^ folia, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 184.—Vr ;.-or>! Malaya.
Wi *>tschii, Rti *Z.f. I. c.* 188,-Afr. occ.

CORYMBIUM, Linn. Coroll. Gen. 14 (1787). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. £ ii. 234.
CONTARENA, Adans. Fam. ii. 120 (1763).
africanum, Linn. Sp. PI. 928.—Afr. austr.
congestum>> *B. Mey. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 425.—Afr. austr.
cymosum, E. Mey. ex Steud. I. c—Afr. austr.
filiforme, Linn. f. Suppl. 392.—Afr. austr.
glabrum, Linn. Syst. ed. XII. 682 —Afr. austr.
glabrum, Thunb. Prod. PI. Cap. 170-filiforme?
gramineum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 29=filiforme.
gramineum, Lam. Encyc. ii. 129 = filiforme, glabrnm.
hirsutum, Eckl. ex ü^. rrod. v. 89=villosum.
hirsutum, Thunb. Fl. Cap. 729, 730-seq.
hirtum, Thunb. Prod. Pt. Cap. 170.—Afr. austr.
latifolium, Harv. in Harvi. V Sond. Fl. Cap. iii. 55.—Afr. austr.
'"teum, *E. Mey. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 425.—Afr. austr.
nervosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 170.—Afr. ausft.
scabridum, Berg. Desc PI. Cap. 341=afrlcanum.
scabrum, Linn. M[ant. i. 120 = praec.
villosum, Linn. f. Suppl. 892.—Afr. austr.

CO-
^ BORCHIS, Thou ex Blnme> 0«*- Ind Areo
^ 1855 — - - - -
assamica,) Corymbi8, Thou. (Orchid.).
Corymbis Blnme. -Orchid. Archip. Ind. 126. t 48-
arsii, Blume, [illegible] folia 126 '• **• f_ L a-c-Corymbis corymbosa.
veratrifolia, Blume, 1. c. 125. t. 42-Corymbis verttrifolia.

CORYMBULA, Rafin. New Fl. Am. iv. 88 (1836) = Polygala, Linn.

COBY1TAEA, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1856) 81. t. 13, 14. *BALANOPHOREAE,* Benth. & Hook. f. iii. 237.
crassa, *Hook.f. 1. c.* 81, 54.1.18.—N. Granat.
Purdiei, *Hook./. 1. c.* 31, 55.—N. Granat.
sphafcrica, *Hook.f. 1. c.* 81, 54.1.14.—N. Granat.
Sprucei, *Eiehl. in DC. Prod.* xvii. 187.—N. Granat.

CORYNANDRA, Schrad. ex Spreng. Syst. iv. Cw.Post. 201 (1827) = Cleome, Linn. (Cappar.).
pulchetta, Schrad. ex Spreng. 1. c. 204 = Cleome Chelidonii.

COBYWAMTHE, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 37. t. 14. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 36.
paniculate, *Welw. 1. c*—Afr. trop.

CORYNANTHELIUM, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 19=Mikanla, Willd. (Compos.).
Moronoa, Knnze, 1. c.—Bras.

CORYNANTHES, Schlecht. in Bot. Zeit. vi. (1848) 65 = Coryanthes, Hook. (Orchid.).

CORYNELIA, Reichb. Nom. 148 (1841) = seq.

CORYNELLA, DC. in Ann. Sc. Nat. Se>. I. iv. (1825) 93. *LEGUM1NOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 500.
CORYNITIS, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 263 (1827).
TOXOTROPIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xix. (1846) 506.
gracilis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 71.—Cuba,
immarginata, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 26.—Cuba,
pandfolia, *DC. in Ann. Se. Nat. Sel.* I. iv. (1825) 93.—Ins. S. Doming,
polyautha, *DC. 1. c.*—Ind. occ.

CORYNELOBOS, R. Roem. ex Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 7-Brassioa, Linn. (Cruci/.).
boeticus, R. Roem. ex Willk. 1. c-Brassica cornyeloba.

COBTNEPHOBU8, Beauv. Agrost. 90. t 18. f. 2 (1812). *GRAMINEAE,* Benlh. & Hook. f. iii. 1157.
WEINGAERTNERIA, Bernh. Syst Verz. Erf. 28, 51 (1800), nomen prius.
aetnensis, Schult. Mant. iii. 641-articulatus.
articnlatns, *Beauv. Agrost.* 90.—Europ.; As. Min.
canescens, *Beauv. I. c.* 1.18. f. 2.—Europ. austr.
fasciculatus, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 123.—Algieria.
maeranthenu, Boiss. ft Reut. 1. c. 124=fasciculatus.

CORYNITIS, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 268, 280 (1827) = CoryneUa, DC. (Legura.).
domingensis, Spreng. 1. c. 280—Corynella paudfolia.
polyantha, Spreng. I. c = Corynella polyantha.

COBYITOCABP08, Font Char. Gen. 81. t. 16· (1776). *ANACARDIACEAE,* Benth. ft Hook, t L 426.
laevigata, *Font. 1. c.* 82.—N. ZeL

CORYNOPHALLUS, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 389=AmorphophallUB, Blume (Aroid.).
Aftelii, Schott, 1. c. *(=Hydrosme leonensis).—Ab.* trop.
leonensis, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 826 - A. leonensis.

CORYNOPHORUS, Kunth, in Mém. Mas. Par. a (1816) 72=CorynephoniB, Beauv. (Gramin.)

CORYNOSICYOS, F. Muell. Sel. PI. Indust. Cult. 69 (I870)-Cuoumeropaia, Naud. (Cncuibit.).
edulis, F. Muell. L c. = Cucum. edulis.

CORYNOSTIGMA, Presl, Epim. Bot 218 (1849) - Jussieua, Linn. (Onagrar.).
jussiaeoides, Presl, 1. c. - J. nervosa.

COBTITOSTYIiIS, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 26. t. 17, 18 (1824). *VIOLARIEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 116.
CALYPTRION, Ging. in DC. Prod, i. 288 (1824).
albiflora, Linden, ex T. Moore, in Florist (1872) 9.—Bras.
Benthami, Walp. Rep. i. 228=C. Hybanthus.
Berterii, *Spreng. Syst.* i. 805.—Mexic
carthagenensis, Karst. Fl. Columb. ii. 58. 1.127. f. 9-14 = C. Hybanthns.
diandra, *Spreng. Syst.* 1, 806.—Am. austr.
guayanensis, Karst Fl. Columb. ii. 53.1.127. f. 1-8 = C. Hybanthus.
Hybanthus, *Mart. V Zuec. Nov. Gen. et Sp.* i. 26. t. 17.—Mexic.
Loeflingii, *Spreng. Syst.* i. 805.—Am. austr.

COBYNOTHECA, F. Muell. Fragm. vii. 68. (1870). *ULIACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 792.
acanthoclada, *F. Muell. I. c*—Austral,
dichotoma, *F. Muell. 1. c.*—Austral,
lateriflora, *F. Muell. I. c*—Austral.

COBYNTJIiA, Hook. f. Ic. PI. t. 1123 (1872). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 188.
pilosa, *Hook./. I. c*—Am. austr.

COBYPHA, Linn. Mus. Cliff. 11 (1786) ; Gen. ed. I. 854 (1787). *PALMAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 922.
BESSIA, Rafin. Sylva Tellur. 13 (1838).
CODDA-PANA, Adans. Fam. ii. 25 (1788).
DENDREMA, Rafin. Sylva Tellur. 14 (1838).
GEMBANGA, Blume, in Flora, viii. (1825) 580, 678.
TALIERA, Mart. Progr. Palm. Fam. et Gen. 10 Ub24).
africana, Lour. Fl. Cochinch. 218=Hypbaene coriacea,
australis, R. Br. Prod. 267=Livistona australis.
cerifera, Arruda, in Koster, Trav. Braz. 494; Mart. Hist. Nat Palm, it 56. t. 49=CopernicU cerifera.
dulds, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i. 300 = Brahea dulcis.
elaia, *Roxb. Hort. Beng.* 25 ; *Fl. Ind.* ii. 176.—Ind. or.
Gebang, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 238.—Bras.
Gebanga, *Blume, Rumphia,* ii. 69. t 97, 98, 105.—Malaya.
glaucescens, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 125=Sabal glaucescens ?
guineensis, Linn. Mant. i. 187-umbraculifera?
Hystrix, Desf. Tabl. ed. I. 19 = Rhapidophyllum Hystrix.
Licuala, Lam. Encyc. ii. 181=Licuala Rumpbii.
macropoda, *Kurt, ex Linden, Cat.* n. 87 (1871).—Ins. Andam.
maritima, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i. 298 = Copernicia maritima.
minor, *Blanco, Fl. Filip.* ed. L 229.—Ins. Philipp.
minor, Jacq. Hort. Vindob. iii. 8=Sabal Adansoni.
Miraguama, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp i. 298 = Thrinax Miraguama.
nana, H. B. ft K. 1. c. 299 = Copemicia nana.
palmacea, Steud. Nom. ed. I. 229,884 - Thrinax parviflora.
Palmetto, Walt. Fl. Carol. 119=Sabal Palmetto.
pilearia, Lour. Fl. Cochinch. 218-Licuala pilearla.
pumila, Walt Fl. Carol. 119-Sabal Adansoni.
Pumas, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i. 298 = Copernicia Pumos.
repenr, Bertram, Trav. 61-Rhapidophyllum Hystrix.
rotundifolia. Lam. Encyc. ii. 131=Livistona rotundifolu.
Saribus, Lour. Fl. Cochinch. 212 = Linstona cochinchinensis.
sylvestris, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 233.—Ins. Molucc.
Taliera, *Roxb. Hort. Beng.* 25; *Fl. Ind.* ii. 174.—Ind. or.
tectorum, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. i. 299 = Copernicia tectorum.
thebaica. Linn. Sp. PI. 1187 - Hyphaene encifen.
umbraculi/era, Jacq. Fragm. Bot. 12-Sabal Blackburaiana.
umbraculifera, *Linn. Sp. PI.* 1178.—Afr. trop.; Ind. or.
Utan, Lam. Encyc. ii. 181-sylvestris.

CORYPHANTHA, Lem. Cact 32 (1868)>MammiIlaria, Haw. (Cact).
acanthostepkes, Lem. 1. c. 86-M. acanthostepha.
aneistraeantha, Lem. 1. c. 34-M. raphidacantha.

CORYPHANTHA :—
aulacothele, Lem. Cact. 81 = Mammillaiia aulacothele.
brevimamma. Lem. ex Foeist. Handb. Cact ed. II. 394 —M. breviraamma.
calcarata, Lem. Cact. 35 = M. calcaiata.
Clava, Lem. 1. c. 34 = M. Clava.
cottspieua, Lem. 1. c.—Hab. ?
cornifera, Lem. 1. c. 35—M. cornifera.
daimonoceras, Lem. 1. c. = M. scolymoides.
elephantidens, Lem. 1. c. = M. clephantidens.
Engelmanni, Lem. 1. c. 34.—Hab. t
erecta, Lem. 1. c.-M. erecta.
exsudans, Lem. ex Foeist. Handb. Cact. ed. II. 395 = M. exudans.
glandulifera, Lem. Cact. 34 « M. glandnlifera ?
keterophylla, Lem. 1. c—Hab.?
Hookeri, Lem. 1. c—Hab. *1*
impexieoma, Lem. ex Foerst. Handb. Cact. ed. II. 414 — M. cornifera.
Lehmanni, Lem. Cact. 84 — M. Lehmanni.
loricata, Lem. 1. c 35 = M. loricata.
macromeris, Lem. 1. c. — M. macromeris.
Nuttallii, Engelm. ex Foerst. Handb. Cact. ed. II. 407 -M. Nuttallii.
Ottonis, Lem. Cact. 34 - M. Ottonia.
pycnacantha, Lem. 1. c. 35 = M. pycnacantha.
raphidacantha, Lem. I. c. 34 =M. rapbidacantba.
Schetrii, Lem. 1. c. 35 = M. Scheerii.
Schlechtendalii, Lem. 1. c 34-M. Schlechtendalii.
sublanata, Lem. 1. c. 35 —Hab. ?
sulcolanata, Lem. 1. c.-M. sulcolanata.

CORYSADENIA, Griff, in Proc Linn. Soc. i. (1846) 281 -Uligera, Blume (Combret).

CORYSANTHERA, Wall. Cat. n. 6411 (1832)-Rhynchotechum, Blame (Gesnerac.).
elliptica. Wall. L c.-K. ellipticum.
vestita. Griff. Itin. Notes, 124-R. vestitum.

COBYSANTHES, R. Br. Prod. 828 (1810). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 609.
CALCEARIA, Blame, Bijdr. 417. t. 33 (1825).
CORYBAS, Salisb. Paiad. Lond. t. 83 (1806), nomen prius.
NEMATOCERAS, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 249. t. 57 (1853).
Betchei, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record, i.* (1881) 171.—Ins. Samoa,
bicalcarata. *R. Br. Prod.* 328.—Austral,
callosa, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 173. t. 63.—Malaya.
Cheesemanii, *Hook.f. ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 180.—N. Zel.
diemenica, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 893 = fimbriata.
fimbriata, *R. Br. Prod.* 82S.-Anstral.
fornicata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 394.—Malaya,
hypogea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi (1884) 336.—N. Zel.
limbata, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5357.—Java,
macrantha, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Ft.* 266.—N. Zel.
maculata, Heynh. Nom. i. 222 = Coryanthes maculata.
mncronata, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 175.—Malaya,
oblonga, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Ft.* 266.—N. Zel.
papillosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 337.-N. Zel.
picta, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 394.—Malaya.
pruinosa, R. Conn, in N. S. Wales Mag. (1833) n. 1 = fimbriata.
rivularis, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 266.—N. Zel.
rotnndifolia, *Hook.f. I. c.—N.* Zel.
triloba, *Hook.f. I. c.* 265.—N. Zel.
nndulata, *R. Cunn. in N. S. Wales Mag.* (1833), nomen.—Austral,
nnguiculata, *R. Br. Prod.* 328.—Austral.

CORYTHACANTHUS, Nees in Lindl. Inrrod. Nat. Syst. ed II. 444 (1836) =Cliatax, Mart (Acanthac).
speciosus, Nees, 1. c.—Bras.

CORYTHANTHES, Lem. in Orb. Diet. iv. 259 (1849) = Coryanthes, Hook. (Orchid.).

CORYTHOLOBIUM, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii (1838) 93 = Securidaca, Linn. (Polygal).
macrophyilum, Benth. 1. c. =S. Corytholobinm.

CORYTHOLOMA, Decne. in Rev. Hortic. Sir. III. ii. (1848) 466 = Oesneria, Mart
aggregatum, Decne. 1. c. 467=G. aggregaU.
caracasanum, Decne. 1. c.=G. caracasana.
chelonoides, Regel, Gartenfl. vii. (1858) 374 =G. cbelonoides.
ellipticum, Decne. in Rev. Hortic. Sér. III. ii. (1848) 466=G. elliptica.
fragile, Decne. 1. c 467 =G. Sceptrum.
gracile, Brongn. ex Decne. 1. c. 466.—Hab.?
igneum, Decne. 1. c. 467 - G. Sceptrum.
Lindleyi, Decne. 1. c. = G. Lindleyi.
Marchii, Decne. l.c.—G. Marchii.
melittifolium, Brongn. ex Decne. 1. c.=G. melittifolia.
Merckii, Decne. ex Rcgel, Gartenfl. iv. (185.5) 247 = G. Merck ii.
pendulinum, Decne. in Rev. Hortic Sér. IILii. (1848) 467 = G. pendalina.
rupicolum, Decne. 1. c = G. rupicola.
rutilum, Decne. 1. c. = G. rutila.
Sceptrum, Decne. 1. c. = G. Sceptrum.
strictum, Decne. 1. c. 4«6 =G. stricta.
tv.bift.orum, Decne. 1. c. 467-Isoloma tubiflorum.

CORYTOPLECTUS, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V.v. (1861) 119=AlloplectU8, Mart. (Gesnerac).
capitatus, Oerst. 1. c. 120=A. capitatus?

CORYZADENIA, Griff. Notul. iv. 356 (1854) =HUgera, Blume (Combretac).
trifoliata. Griff. 1. c. - I. Coryzadenia.

COSARIA, J. F. Gmel. Syst. 22, 71 (1791) = KOSARIA, Fonk. -Dorstenia, Linn. (Urticac.).
ForskUii, J. F. Gmel. 1. c. = D. radiata.

COSBAEA, Lem. Illustr. Hortic. ii. (1855) Misc. 71 = Bchisandra, Michx. (Magnoliac)
coccinea, Lem. 1. c. = S. Hanceana.

COSCINIUHC, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 51. *MENISPERMACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 35.
PEREIRIA, Lindl. Fl. Med. 370 (1838).
Blumeanum, *Miers, in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* Ser. II. vii. (1851) 87.—Ind. or.
fenestratum, *Colebr. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 65.—Ind. or.
Maingayi, *Pierre, Fl. For. Cochin,* nib t. 112 (err. Mangayi).—Malaya,
usitatum, *Pierre, 1. c.*—Cambodia.
Wallichianum, Miers, in Ann. & Mag: Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 37 = fenestratum.
Wightianum, Miers, 1. c. - fenestratnm.

COSMANTHUS, Nolte, ex A. DC. Prod. ix. 296 (1838) = Phaoelia, Juss. (Hydrophyll.).
fimbriatus, Nolte, ex A. DC. 1. c 297 = P. fimbriata.
grandiflorus, A. DC. 1. c.-P. grandiflora.
mexicanus, A. DC. 1. c. — P. pimpinelloides.
nemophiloides, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846; 12.—Texas.
parvifiorus, A. DC. in DC. Prod. ix. 297 - P. parviflora.
pectinatus, E. Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IIL y. (1846) 368.—Am. bor.
viscidus, A. DC. in DC. Prod. ix. 296-P. grandiflora.

COSMARIUM, Dnlac, Fl. HautesPyr. 215 (1867) [non Corda, quod Algar. gen.] ~ Adonis, Linn. (Ranunc).
aestivale, Dulac, 1. c.=A. aestivalis.
autumnale, Dulac, 1. c.=A. autumnalis.
pyrenaicum, Dulac, 1. c. = A. pyrenaica.

COSMEA, Willd. Sp. PI. iii. 2250 (1803) = Cosmos, Cav. (Compos. V
bipinnata, Willd. 1. c. = Cosmos bipinnatus.
caudata,Spteag. Syst. iii. 615 = Cosmos caudatns.
chrysanthemifolia, 'Spreng. 1. c. = Cosmos chrysanthemifolins.
crithmifolia, Spreng. 1. c. — Cosmos crithmifolius.
diversifolia, Heynh. Nom. ii. 163 = Cosmos diversifolius.
lutea, Sims, Bot. Mag. t. 1689 = Bidens grandiflora.

COSMEA :—
parmfiora, Willd. Sp. PI. iii. 2250-Cosmos parviflorus.
pilosa, Spreng. Syst. HL 615-Cosmos pilosus.
Scabiosae, Spreng. 1. c.=Cosmos scabiosoides.
sulphurea, Willd. Sp. PI. iii. 2250 - Cosmos sulphoreus.
tenella, Spreng. Syst. iii. 616-Cosmos tenellus.

COSlCEIiiA, R. Br. Prod. 558 (1810). *EPACRIDEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 617.
angustifolia, DC. Prod. vii. 766=rubra.
rubra, *R. Br. Prod.* 553.—Austral.

COSMIA, Domb. ex Juss. Gen. 312 (1789) - Calandrinia, H. B. & K. (Portulac.).
caulescens, Domb. ex Spreng. Syst. Ii. 453 - CalandrinU caulescens.
montana, Domb. ex DC. Prod. iii. 359 - CalandrinU caulescens.
prostrata, Domb. 1. c.=CalandrinU acaulis.

COSKIBTTEITA, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. S. t 226 (1802). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook, *t* Ii. 40.
BUENA, Pohl, PI. Bras. Ic. i. 8, partim (1827).
acuminata, *Ruit if Pav. Fl. Per.* iii. 3. t. 286.—Peruv.
dichotoma, G. Don, Gen. Syst. iii. 479 - Ladenbergia dichotoma.
latifolU, *Klotssch, ex Walp. Rep.* vt 69.—N. Granat.
macrocarpa, *Klotesch, ex Walp. I. c.*—Ins. Gorgona.
obtasifolia, *Ruitif Pav. Fl. Per.* iii. 8.—Peruv.
ochracea, *Endl. Iconogr.* t. 90.—Hab. 1
qninqueflora, *Klottsch, in Hayne, Anting,* xiv. sub t 16.—Venezuela.
Skinneri, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bo* ii. 12.—Nicaragua,
triflota, *Klotssch, in Hayne, Araneig.* xiv. sub t 15.—Guiana.

COSMIBUENA, Ruiz *8c* Pav. Prod. Fl. Per. 10. t. 2 (1794)-HirteUa, Linn. (Rosac).

COSMIDIUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. V-vii. (1841) 361-TheleBperma, Less. (Compos.).
Burridgeanum x, Hort. ex Regel, Ind. Sem. Ho". Petrop. (1857) 40 = T. filifolium.
filifolium, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. "> (1841) 362=T. filifolium.
gracile, Nutt. 1. c = T. gracile.
simplidfolium, A. Gray, PI. Fendl. 86 = T. subsimpfolium.

COSMIUSA, Alef. in Bot. Zeit. xxiv. (1866) 146 =PaTOchetus, Buch.-Ham. (Legumin.).
repens, Alef. 1. c.-P. communis t

COSMIZA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 110 (1836) - Polypompholyz, Lehm. (LentibulA
coccinea, Rafin. 1. c. = P. multifida.

COSMOPHYLLUM, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) 12=Podachaenium, Benth. (Compos.).
cacaliaefolium, C. Koch, 1. c—Guatemala.

COSMOS, Cav. Ic. i. 9. tt. 14, 79 (1791). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 387.
ADENOLEPIS, Less, in Linnaea, vi. (1831) 510.
COSMEA, Willd. Sp. PI. iii. 2260 (1808).
COSMUS, Pen. Syn. ii. 477 (1807).
bipinnatus, *Cav. Ic.* i. 10. t. 14.—Am. bor.; Mexic-
carvifolius, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 117.—Mexic
caudatus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 240.—Iocc.
chrysanthemifolius, *H. B. V K. 1. c.* 239. t 382-Mexic.
crithmifolius, *H. B. W K. I. c.* 242.—Mexic
diversifolius, *Otto, in Knowles* 6* *Westc. Flor. Cat-* 3. t. 47.—Am. bor.
integrifolius, *Wedd. Chlor. And.* i. 70, nota.—Bo
linearifolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* Mexic.
marginatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. HalU* (1882) 328—Peruv.
parviflorns, *Pers. Syn. ii.* 477 i *H. B. VK. Nov. Gen-* J>.iv.241.—N. Mexic
peucedanifolius, *Wedd. Chlor. And.* i. 70.—Bolivia.
pilosus, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 241.—Mexic.
pinnatus, Jacq. ex Steud. Nom. ed. II. i* Coreopsis coronala.

COBMOS :-
"£«•"»««, Sch. Bip. in BnU. Sot BoL Ft xii.

Pwpuieus, *Benth. V Hook. f. ex Hemtl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 200.—Mexic.
"flans, Benth. PI. Hartw. 40=diversifolius.
towns, *Marf. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 426.—**ras
scabiosoides, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 242.—"lexic.
TMbPubescens, *Wedd. Chlor. And.* i. 70.—Perov.
mlphureus, *Cm. Ic.* i. 66. t 79.—Mexic.
ten
Mexic.
tenuiflius *Lindl_ Bot_ Re*e-1- 2007.—Mexic.
Uhdeanus, *unth, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 12.—Mexic.

°°!?!K>?nCHtA> Wight, Contrib. Bot. Ind. 41 (1884).
ASCLBPIADEAE, Benth. *Sc* Hook. £ ii. 774.
<*Kuminata,* Wight, Ic. t. 1270-racemosa.
racemose *Wight, Contrib. Bat. Ind.* 42.—Ind. or.

COSSIGNEA, Willd. Sp. PI. ii. 226 (1799)=-seq.

COSSIGNIA, Comm. a Jun. Gen. 248 (17*9).seq.

COSSIGNYA, Baker, Fl. Manrlt. 68 (1877) =«eq.

CO (1786).
SA*PHVDACEAE,* Benth. & Hookf f. i. 897.
MHUCOFSIDIUM, BailL Adansonia, xi. (1874) 243.
forbontca, DC. Prod. i. 614=pinnati
Comm. *TM" Kaeusch. Nom. ed. III. 103-pinnata.
madaga a cins s, *Bai U, AdaHSonia>* *". (1874) 247.—
Mada
pinnata, *Comm. ex Lam. Encyc.* ii. 182. t. 256.—Ins. Maurit.
splondens, Sieber, ex Steud. Nom. e4 IL 4M= pinnata.
tern «<«, Baker, Fl. Manrit. 59=pinnata.
trif S*ft**"» &'«*. *MathrPhys. Acad. Uuench.* J?!U,\«78) 272.-N. Caled.
W h > c««nn>. ex Lam. Encyc. ii 182=-pimiata.

CO SONIA, Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xx. (1858) 2. t. 6 = Rafi
africana, Dur.

COSTA, V. (1825)! L <•"(1827)"
Galipea f A S L S S C ?
aromati
,,, Veil. 1. c. 30; i. t 48=Galipea Arrabidae.

COSTAFA »
-•£:,,, **•,A- Rich. Fl. Cub. Fanerog. H. 75 (1858)
cu i f-A a e a , PUnch. (Cyrill.).

COSTEA,"• A. Rich. L c. 76 = P. ionodynaina.
praec.

COSTIA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. H. 828 (1858) =
Willk. in Bot. Zeit. xvi. (1858) 377
rom, J. Gaertn. (Gramin.). -Agropy-
cristata, Willk. l. c. = A. cristatum.
imbricata, Willk. l. c. = A. imbricatum.
orientalis, Willk. l. c. = A. orientale.
squarrosa, Willk. l. c. = A. patulum.

COSTIA, Willk_ "» Bot. Zeit xviii. (1860) HI-Ms,
Tourn.
cauca Willk. l. c. = I. caucasica.
persic illk. l. c. = I. persica.
scorpioides, Willk. l. c. = I. alata.

COSTUS, -
3»1 (I»q^7)" Mns_ CUff_ 2 C1^8)! Gtai- ed I. iii. 646. *SCITAUINEAE,* Bentb, & Hook. f.

ACINAX, Rafin. Fl. Tellur iv. (1836).
ANKSEA, K<?n in Ret!! Ob Hl »- - » C"8»)-
GISSANTHE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 279.
HELLENIA, Retz. Obs. vi. 18 (1791).
TSIANA, J. F. Gmel. Syst. 9 (1791).
JACUANGA, Lestib. in Ann. Sc. Nat Se>. IL xv. (1841) 339, 341.
PLANERA, Gieske, Prael. 205
afer, *Ker-Gawl. in Bot.* *.«•• •• 688—Afr- trop.
Anachiri, Jacq. Fragm, 66 = sp ca us.
angustifolius, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 665 = spi ciosus.

OOSTTJS:—
appendicnlatns, *Humt. &* Bonpl. ex Roem.* b* *Schult. Mant.* L S3.—Am. austr.
arahicus, Anbl. PI. Gui. i. 3=spicatus.
arabicus, Linn. Sp. PI. 2=speciosns.
arahicus, Rose, ex Spreng. Syst. i. 18»glabratus.
arabicus, Veil. Fl. Flam. 2; i. t. 5=Arrabidae.
argentens, *Ruit V Pav. Fl. Per.* i. 8. t. 4.—Pemv.
argyrophyllus, WalL Cat. n. 6555 G, H •= spedosus.
Arrabidae, *Steud. Nom.* ed. II. i. 426.—Bras,
cemnns, *Sm. ex Roem. V Schult. Syst.* i. 25.—Am. trop.
dilates, *Humb. tf Bonpl. ex Roem. If Schult. Mant.* i. 82.—Am. trop.
dliatus, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 78.—Gnian.
comosus, *Rose, in Trans. Linn. Soc* viii. (1807) 850.—Am. austr.
conicus, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 76=spicatus.
crispiflorus. Stokes, 1. c.-spedosus.
cylindricus, Jacq. Fragm. 64=spiralis.
cylindricus, *Rose. Scitam.* t 78.—Ins. Trlnit.
discolor, *Rose. 1. c.* t. 81.—Bras.
eehinatus, Pers. Syn. i. 3=Amomnm echinatnm.
foenicnlaceus, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IT. 12.—Malaya.
glabratus, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. 8 = spedosus.
glabratus, 5m. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 11.—Ind. occ.
globosus, *Blume, Enum- PI. Jav.* 62.—Java,
hirsutns, *Presl, Rel- Haenk. L* 112.—Mexic.
igneus, A^. *E. Br. in Illustr. Hortic.* xxxi. (1884) 25. t. fill.—Bras.
laevis, *RuU tf Pav. Fl. Per.* i. 8.—Pernv.
linearis, Spreng. Syst i. 13=Kaempferia secunda.
Loureiri, *Horan. Prod. Scitam.* 88.—Sumatra.
luteus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 4 = Roscoea lutea.
macnlatus, *Rose. Scitam.* t. 82.—Afr. trop.
malaceensis, Retz. Obs. iii. 71-Alpinia malaccensis.
Malortieanus, *H. Wendl. in Hamb. Garten*,* xix. (1863) 30.—Am. centr.
nepalensis, Rose. Scitam. t. 80-spedosus.
nigricans, Blanoo, Fl. Filip. ed. IL 8=Roscoea nigrociliata.
niveopnrpureus, *Jacq. Fragm.* 55.—Ins. Martinic.
nivens, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 1.—Guian.
plctus, *D. Don, ex Lindl. Bot. Reg.* 1.1594.—Mexic.
Pisonis, Lindl. 1. c. t. 899=spiralis
Potierae, *F. Uuell. Fragm.* iv. 164.—Austral,
pulverulentus, *Presl, Rel. Haenk.* i. 111.—Mexic.
pungens, Tdjsm. ft Binn. in Tijdschr. NederL Ind. xxix. (1867) 244-Tapeinocheilos pungens.
quartus, Roem. *Sc* Sehult. Syst. i. 26 = cylindricus.
quintus, Roem. *Sc* Schult 1. c. = spicatus.
ruber, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 256.—Cuba,
sarmentosus, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sei. II. iv. (1885) 262. t 8.—Ins. Manrlt
scaber, *Ruim V Pav. Fl. Per.* i. 2. t 3.—Perov.
secundus, Roem. & Schult. Syst i. 22 = Renealmia Pasco-Secora.
secundus, Spreng. Syst. i. 13 •= Kaempferia seennda.
septimus, Roem. *Sc* Schult. Syst i. 26=villosissimus.
sericeus, Blume, Enum. PL Jav. 62=spedosus.
sextus, Roem. *Sc* Schult Syst. i. 26=niveo-puipureus.
spedosus, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 249.—Ind. or.; Malaya.
spicatus, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* IL—Ind. occ.
spiralis, *Rose, in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 360.—Venezuela.
vaginalis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 277-spedosus.
Verschaffeltianus, *Lem. in Jard. Fleur.* iv. (1864) t. 881—Bras.
villosissimus, *Jacq. Fragm.* 56.—Ins. S. Vincent.
Zerumbet, Pen. Syn. i. 3-Alpinla nutans.

COTA, J. Gay, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 866 (1844) - Antnemis, Mich. (Compos.).
altissima, J. Gay, 1. c. 867-A. Cota.
austriaca, Sch. Bip. in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1864) 165=A. austriaca.
Bourgaei, Boiss. Fl. Orient iii. 284=A. coelopoda.
brachycentros, J. Gay, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 867 = A. brachycentros.
Brachmanni, Boiss. Diagn. Ser. IL iii. 21=A. Brachmanni.
caelopoda, Boiss. 1. c = A. coelopoda.
Cossoniana, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 86 = A. austriaca.

COTA:—
lyonnetioides, Boiss. *Sc* Kotschy, Diagn. Ser. II. v. 109 = A. lyonnetioides.
ormenioides, Boiss. I. c iii. 21 — A. Wiedemanniana.
oxylepis, Boiss 1. c. v. 109—A. oxylepis.
palaestina. Rent, ex Unger *Sc* Kotschy, Ins. Cyp. 240 = A. palestinat
parnassica, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 20—A. tinctoria.
Pestalomtae, Boiss. 1. c. 21-A. Pestalozzae.
Thirkei, Sch. Bip. in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 163=A. brachycentros.
tinctoria, J. Gay, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 867=A. tinctoria.
Triumfetti, J. Gay, 1. C. = A. austriaca.

COTINUS. [Tonm.] Linn. Syst ed. I (1736) = Bhus, Linn. (Anacard.).
americanus, Nutt Sylva, ii. t. 81 - R. cotinoides.
coggygria, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 220 = R. Cotinus.
Coriaria, Duham. Arb. ed. I. i. 191-R. Cotinus.

COTONEASTER, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 187 (1745); Medik. Phil. Bot. i. 166 (1789). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 627.
GYMNOFYXZNIUM, Dulac, FL Hautes-Pyr. 316 (W67),
NAEGELIA, Lindl. Veg. Kingd. 560 (1847).
acuminata, *Lindl. in Trans. Linn. Soc.* xiiL (1822) 101.—Reg. Himal.
acutifolia, Maxim. Prim. Fl. Amur. 171 = integerrima.
acutifolU, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mote.* iv. (1882) 190.—Mongolia.
aestivalis, Wenzig, in Linnaea, xxxviil. (1874) 202 = Crataegus aestivalis.
affinis, DC. Prod. ii. 632=buxifolia.
affinis, Hohen. ex Hook. *t.* FL Brit. Ind. ii. 886-frigida?
affinis, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 101 = Stranvaesia glaucescens.
arborescens, Wenzig, in Linnaea, xxxviil. (1874) 203 = Crataegus arborescens.
badllaris, *Watt, ex Lindl. Bot. Reg.* lubt. 1229.—Reg. HimaL
buxi/olia. Baker, In Saund. Refug. Bot. i. t. 62-microphylla.
buxifolia, *Wall. Cat.* n. 661; *et Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1229.—Reg. Himal.
califomica, *A. MUTT. Oreg. Cire.* 1, nomen.—Calif.
cocdnea, Stend. Nom. ed. II. i. 426=tomentosa.
comptns, *Lem. in Fl. des Serres, Sit.* I. iv. (1848) 388 b.—Mexic.
congesta, Baker, in Saund. Refug. Bot. i. t. 61-microphylla.
crenulata, C. Koch, Dendrol. i. 175-Crataegus crenulata.
Cuila, Lee, ex C. Koch, 1. c 172 =nummularia.
denticulau, *H. B. VK. Nov. Gen. et Sp.* vi. 214.1656. -Mexic.
disticha, *Lange, in Bot. Tidssk.* xiii. (1882) 19.—Nepal?
elliptica, Hort ex Loud. Encyc. PI. 1208-nummularia.
emarginata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 178 = microphylla.
Fontanesii, *Spach, Hist. Vlg. Pkan.* ii. 77—Hab. ?
Fortunei, Wenzig, in Linnaea, xxxviii. (1874) 200= Photinia Fortuneana.
frigida, *Wall. Cat.* n. 657 i *et Lindl. Bot. Reg.* t. 1229.—Reg. Himal.
Grammontii, Hort ex C. Koch, Dendrol. i. 172 = nnmmularia.
granatensis, *Boiss. Elench.* 41.—Hispan.
horizontalis, *Decne. in Fl. des Serres,* Sér. II. xii. (1877) 168.—China,
hymalaica, *Carr. in Rev. Hortic.* (1876) 160.—Reg. Himal.
integerrima, *Medic. Gesch.* 85.—Europ.; As. temp.
intermedia, Medic, ex Trautv. in Act Hort. Petrop. viii. (1883) 837, sphalm.=praec.
laevis, Hort ex Steud. Nom. ed. II. i. 426—nummularia.
lanata, Hort ex Regel, Gartenfl. ix (1860) 69-buxifolia.
laxiflora, Jacq. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1305-integerrima.
Lindleyi, Steud. Nom. ed. II. L 426=nnmmularia.

COTONEASTER :—
lucida, Schlecht. in Linnaea, xxvii. (1861) 641° integerrima.
marginata, Hort. ex C. Koch, DendioL i. 177 = buxifolia.
melanocarpa, Fisch. ex Loud. Hort. Brit. Snppl. ii. 624=integerrima.
microphylla, *Wall, ex Lindl.Bot. Reg.* **t. llli; Cat.n.** 862 A.—Reg. Himal.
microphylla, Wall. Cat. n. 662 B=thymifolia.
multiflora, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 220.—Sibir. alt.
multiflora, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cave 171-nummularia.
nebrodensis, *Nym. Syll.* 267.—Sidl.
nepalensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. L 177-frigida.
nervosa, *Oeene. in Nouv. Arch. Mus. Par.* **Ser. I. x.** (1874) 177.—Hab. I
nigra, Wahlenb. Fl. Gothob. 68=integerrima.
nummularia, *Fisch. tf Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 84.—Afr. bor.; Oriens.
oitusa, Wall. Cat. n. 659; et Lindl. Bot. Reg. sab t. 1229-badllarls.
orientalis, *Kerner, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xix. (1869)** 270.—Enrop.
pamasiica, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* **Ser.** IL ii. 48.—Graecia.
peduncttlaris, Boiss. 1. c. Ser. I. iii. 8=integerrima.
polonica, *Jastrt. ex Rostaf. Fl. Polon. Prod.* **121.—** Polonia.
prostrata, Baker, in Saund. Refug. Bot. i. t. 53 = rotundifolia.
Pyracantha, Spacli, Hist V^g. Phan. ii. 73=Crataegus Pyracantha.
racemiflora, C. Koch, Dendrol. i. 170 - nnmmularia.
reflexa, *Carr. in Rev, HorHc.* (1870-71) 520.—China.
rosea, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 46 = bacillaris.
rotundifolia, *Wall. Cat.* **n. 663; et Lindl. Bot. Reg.** sub t. 1229.—Reg. HitnaL
Royleana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 171=acuminata.
Simonsii, *Hort. ex Baker, in Saund. Refug. Bot.* **i. t.** 55.-Reg. Himal.
spathnlata, *Wenrig, in Linnaea,* xxxviii. (1874) 201. —Am. bor.
spicata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 166 = tomentosa.
thymaefolia, *Hort. ex Baiter, in Saund. Refug. Bot. i.* t. 50.—Reg. Himal.
thymifolia, Hort. ex Load. Encyc PI. 1384=microphylla.
tomentosa, *Lindl. in Trans. Linn. Soc.* **xiii. (1822)** 101.—Europ.
tomentosa, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cue. 171 = numxnularia.
nniflora, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 220.—Sibir. alt.
Uva-ursi,G. Don, in Loud. Hort. Brit. 480=rotnndifolia.
vulgaris, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 101 = integerrima.

COTTAEA, Endl. Gen. 92 (1841)-seq.

COTTEA, Kunth, ReV. Gram. i. 84, 281. t 52 (1830). *GRAMWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1174.
pappophoroides, *Kunth, I. c*—Peruv.
sarmentosa, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* **201.—Ins,** S. Vine.

COTTENDORPIA, Schult *i.* Sy«t. vii. 64, 1193 (1830). *BROMELIACEAE* [Benth. & Hook. f. iii. 667].
alblcans, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 880.— Reg. Argent.
florida, *Schult. f. Syst.* vii. n. 1193.—Bras,
guianensis, *Klottsch, ex Beer, Sromel.* **44.—Guiana.**

COTTONIA, Wight, Ic. v. L 21. t. 1765 (1862). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 572.
Championii, *Lindl. ex Benth. in Hook. Kern Joum.* vii. (1855) 85.—Hong Kong,
macrostachya, *Wight, Ic.* t 1755.—Ind or.
peduncularis, Thw. Enum. PI. Zeyl. 308-macrostachya.

COTULA, [Tonm.] Linn. Syst. ed. I (1786). *COM. POSITAE,* Benth. *U* Hook. f. ii. 428.
BALDINGERIA, Neck. Elem. i, 88 ? (1790).
BROCCHIA, Vis. PI. Aeg. et Nub. 85 (1836).
CENOCLINE, C. Koch, in Bot. Zeit. i. (1843) 41.
CHLAMYDOPHORA, Ehrenb. ex Less. Syn. Comp. 265, 448 (1832).
COTULINA, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 66 (1874).
CTENOSPERMA, Hook. £ in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 116.
GYMNOGYNE, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 481 (1846).
LANCISIA, Adans. Fam. ii. 126 (1763).
LEPTINELLA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1822) **127.**
LEPTOGYNE, Less, in Linnaes, vi. (1831) 151.
MACHLIS, DC. Prod. vi. 140 (1887).
OTOGLYMHS, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 56 (1874).
PLEIOGYNE, C. Koch, in Bot. Zeit. i. (1843) 40.
STRONGYLOSPERMA, Less. Syn. Comp. 261 (1832).
SYMPHYOMERA, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 116.
abrotanifolia, Willd. Sp. PI. iii. 2167=Anacyclus cretiens.
abyssinica, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i.** 419.—Afr. trop.
africana, Steud. Nom. ed. I. 230—Matricaria capensis.
alba, Liiin. Syst. ed. XII. ii. 664 = Eclipta erecta.
alpina, *Hook./. Fl. Tasm.* i. 192. t. 51 A.—Austral,
anthemoides, *Linn. Sp. PI.* 891.—Hisp.; Afr. bor. et austr.; Ind. or.
anthemoides, Willd. Sp.Pl. iii. 2165 = microcephala.
atrata, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **142.—N. Zel.**
aurea, *Loefl. Her,* 163.—Reg. Mediterr.; Oriens.
aurea, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 61=Matricaria decipiens.
australis, *Hook. /. Fl. Nov. Zel.* 128.—Austral.; N. Zel.
barbata, DC. Prod. vi. 79=Cenia barbata.
bicolor, Roth, Catalect. fasc. ii. 116 = Dichrocephala latifolia.
bipinnata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 162.—Afr. austr.
bracteolata, *E. Mey. ex DC. Prod.* vi. 78.—Afr. austr.
capensis, linn. Mant. ii. 287=Matricaria capensis.
ceniaefolia, *DC. Prod.* vi. 79.—Afr. austr.
chamaemelifolia, *Ehrenb. ex C. Koch, in Bot. Zeit.* **i.** (1843) 41.—Africa?
chrysanthemi/olia, Blume, Bijdr. 918— Dichrocephala chrysanthemifolia.
cinerea, *Delile, Fl. Egypte,* 276. t. 47. f. 4.—Afr. bor.; Arab.
cinerea, Kotschy, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 420= Kotschyi.
complartata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 187 - Anthemis pectinate.
conica, Wall. Cat. n. 3185 - Spilanthes Acmella.
coronopifolia, *Linn. Sp. PI.* 892.—Afr. austr. (Europ. alien.).
crinita, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 144-Hippia gracilis.
cryptocephala, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 420.—Abyss.
cunei/olia, Willd. Sp. PI. iii. 2169-Centipeda orbicnlans.
Cunninghami, F. Muell. Fragm. viii. 143-Centipeda Cunninghami.
debilis, Balb. ex Spreng. Neue Entdeck. it 1S7 •= Eclipta pnsilla.
decumbens, Pers. Syn. ii. 464 -Centipeda orbicnlaria.
dichotoma, Pers. 1. c =C. Pyrethraria.
dichrocephala, Sch. Bip. ex A. Rich. Teat. Fl. Abyss. i. 419=anthemoides.
dichrocephaloides, C. B. Clarke, Comp. Ind. 160-Dichrocephala Hamiltoni.
diolca, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **143.—N. Zel.**
divaricata, Wall, ex DC. Prod. v. 375=Thespis divaricata.
Drummondii, *Benth. Fl. Austral.* Iii. 550.—Austral.
ebracteata, Walp. Rep. ii. 991-bracteolata.
ebracteolata, C. Koch, in Bot. Zeit. i. (18431 39 = bracteolata.
elongata, *C. B. Vogel, in Trev, PI. Rar.iiL* **11. t. 26.** —Java.
Featherstonei, *F. Muell. ex J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* vii. (1875) 337.—Ins. Chatham.
Filicula, *Hook. /. ex Benth. Fl. Austral,* **iii. 661.—** Austral.
filifolia, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 161.—Afr. austr.
filiformis, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **142.—N. Zel.**

COTULA:—
fimbriata, Spreng. Neue Entdeck. iii. 41 = HippU gracilis.
/oetida, Poepp. ex DC. Prod. vi. 189 *(=Myriogyne elatinoides).—Chi\i.*
globi/era, Licht. ex Steud. Nom. ed. II. i. 427=- Pentzia globosa.
globi/era, Thunb. Prod. PI. Cap. 162-Matricaria globifera.
grandis, Jacq. Obs. Bot. iv. 4. t. 81=Chrysanthemum ---------
grandis, **Linn. Sp. PI. «d. II. 1257** *(-Plagiusgrandiflorus).*—Afr. bor.
gymnogyne, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **iii. 54»-** —Austral.
bcmisphaerica, *Wall. Cat.* n. 8286.—Ind. or.
heterocarpa, *DC. Prod.* vi. 80.—Afr. austr.
hispida, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 188= Cenia hispida.
humifusa, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 427" Egletes humifusa.
integrifolia, Burch. Trav. i. 51-bracteolata.
integrifolia, *Hook./. Fl. Tasm.* i. 192. t. 50 R—Tasmania.
Kotschyi, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 429.—Afr. trop.
lanata, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **141.—N. Zel.**
latifolia, Pers. Syn. ii. 464=Dichrocephala latifolia.
laxa, *DC. Prod.* vi. 78.—Afr. austr.
leptalea, *DC. 1. c.* 80.—Afr. austr.
linearifolia, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* **xv. (18»»)** 299.—N. Zel.
lini/olia, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 27-Felicia fragile
lyrata, Boj. ex DC. Prod. v. 372 - Dichrocephala lyrata.
maderaspatana, Willd. Sp. PI. iii. 2170-Grange* maderaspatana.
Maniotota, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* **xiv. (1882)** 362.—N. Zel.
matricarioides, Bong. Veg. Ins. Sitcha, 29 = Matricar» discoidea.
microcephala, *DC. Prod.* vi. 79:—Afr. austr.
minima, *DC. 1. c.* 80.—Hab. 1
minima, Willd. Sp. PI. iii. 2170=Centipeda orbicularis.
minor, Caruel, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 858=cinere*< **minor,** *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **142.—N. Zel.**
minuta, Forst. f. Prod. 57=Centipeda orbicularis.
montevidensis, Spreng. Syst. iii. 497 - coronopiW
Moseleyi, *Hemsl. Bot. Voy. Challenger,* **i. II. «»•** Tristan d'Acugna.
multifida, DC. Prod. vi. 89-villosa.
myriophylloides. *Hook. Ic. PI.* t. 835.—Afr. austr.
nudicaulis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 162.—Afr. austr.
Oederi, *Murr. Hort. Bot. Stirp.* **228.—Hab. J**
oxydonta, DC. Prod. vi. 78 =bipinnata.
pectinate, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **142.—N- Z**
perpusilla, *Hook. /. 1. c.* **143.—**N. Zel.
pilulifera, linn. f. Suppl. 378-Matricaria globuW-Piper, *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 186.-Bras.
plumosa, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **141.—N. »**
poekilophylla, *C. Koch, in Bot. Zeit.* i. (1843) »- Abyss.
prostrata, Linn. Syst. ed. XII. 564=Eclipta erecta.
pterocarpa, *DC. Prod.* vi. 80.—Afr. austr.
psbescens, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 284.—Afr. bor.
pubescens, Viv. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. &• * (1866) 278=aurea.
pumila, Houtt. Handleid. x. 772 = Cenia turbinatfl-pusilla, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 162.—Afr. austr.
pygmaea, *Benth. (f Hook. /. ex Hemsl. Biol-Am. Bot.* ii. 230—Mexic
Pygmaea, Poir. Encyc. Suppl. ii. (1810) 871" Jamathea perpusilla.
Pyrethraria, *Linn. Mant.* i. 116.—Am. austr.
pyTethrifolU, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **! Zel.**
quinquefida, Thanb. Prod. Fl. Cap. 161 - Penttk <f& quefida.
quinqueloba, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 626 •< Centipeda orbicnlfiiis.
quinqueloba, Linn. f. Suppl. 877»Lidbeckia lot*"-reptans,fle»t*. *Fl. Austral.* iU. 561.—Austral,
repdam, Boj. ex DC Prod. v. 371=Sphaerantnus t» J°^es.
Tosea, *Boj. ex Less, in Linnaea,* **vi. (1831;** Madag.
Russeliana, Wall. Cat. n. 8240 - Sphaeromorphea Russeliana.
sericea, Linn. f. Suppl. 877 = Cenia serice*.

COTOTiA:—
sinapifolia, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 487 = Dichrocephala latifolia.
stnqpifolia, Wall, ex DC. Prod. v. 876 - Thespis divaricata.
sonchifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc ii 828=Dichrocephala latifolia.
sororia, *DC. Prod*, vu 79.—Afr. austr.
Sphaeranthus, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 844-Orrangea maderaspatana.
Spilanthus, Linn. Mant. i. 116 - Spilanthes wens, sqnahda, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 148.—N. Zel.
Menophylla, - *Koch, in Bot. Zeit.* L (1848) 40.—Afr. austr.
'ternutatoria, Wall. Cat. a. 8269 = Centipeda orbiculari*
*stoloni*fera, Harv. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. iii. 182 = ceniaefolia.
stricta, Linn. Mant. 287 = Lidbeckia pectinata.
tanacetifolia, Linn. Syst ed. XII; Murr. Syst Veg. ed. XIII. 644 n. 10=-Matricaria multiflora.
Teesdaliae, *DC. Prod.* vi. 80.—Afr. austr.
tenella, *E. Mey. ex DC. I. c.* 80.—Afr. austr.
""spidioides, F. Muell. Fragm. viii. 148-Centipeda thespidioides.
"tunbergii, Harv. in Hair. *Sc* Sond. Fl. Cap. iii. 188 =Cenia Thunbergii.
tndentata, *Benth.* b" *Hook.f. Gen.* H. 420.—tegypt.
"tpmnata, Thnnb. Prod. PI. Cap. 162-Matricaria Brandiflora.
turbinata, Linn. Sp. PI. 892 - Cenia turbinata.
umbellata, Lann. t. Suppl. 878=Peyrousea calyeina.
valparadisea, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 60S.—Chili.
Verbesina, *Linn. Amoen. Acad.i.* 407 = Ad<postemama Swartzii.
illon, DC *Prod.* vi. 79.—Afr. austr.
*»«osa. Linn. Sp. PI. 892=Eglet*es viscosa.
'Vaill, *Fentl, ex Han. tf Sond. Fl. Cap.* iii. *W0.*—Afr. anstr.

CO
SJ"NA, Pomel, Nonv. Mat. Fl. Atl. 66 (1874) = Cotttla, Town. (Compos.).
<""«», Pomel, 1. c-Cotala auiea.

COTYLANTHERA, Blume, Bijdr. 707 (M25). *GENTUNEAE*. Bentn. *Sc* Hook, f. ii. 808.
Eor HYLON> A- Gr«y> «> J01TM-1*TM- Soc- *'. (1871) 82.
P»j>cisquama, C. S. CWfc,»« *Hoot, f. Fl. Brit. Ind.* 94^-Reg. Himal.
" «w, *Bijdr.* 708.-Java.

COTYLARIA, R«fin- Princ- Somiol. 25 (1814) = Cotyledon, Town. (Crassulac).

CO
^ J 1 D O K, Tonra. ex Linn. Syst. ed. I (1785), *WSSULACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 669.
COTYLIA, Rafin. Prf"6- Somiol. 26 (1814).
COTYLI PHYLUJM> u*k> Handb »•• 22 C1*81)'
COURA " TM ' Lem< J*"1, Flenr, i. (1851) Misc. 92.
ECHEVERIA, DC. Pn>d. iii. 401 (1828).
OROSTACHYS, tF lach.] Hort_ Gorenk_ ed. I. 99 (1808).
ORTHOSTACHYS, Spach, Hist. Veg. Phan. ix. 82 (1840).
PA CHYPHYTUM, KlotBch, in Otto & Dietr. AUg. p G»rtenz. ix. (1841) 9.
US ? " NI *, D C. Prod. Hi. 899 (1828).
S 6W (I W
*»«?„«??• ^ ^ in Bnll- Soc- PW1°«»- (W01) 49.
acntifin? ' e* Steud_ Non>- =d-1- 280-spuria.
n 34 ejtic
sdanca, *Baker, i.* 60.—Mexic.
aegyptiaca, Lam. Encjrc_ u_ Wa- Kalanchoë crenata.
africana, Burm. f> ex Steni Nom_ ed. I. 230 = spnria.
agavoides, Baker> »* *Saund. Refug. Bot.* t. 67.—Mexic.
albiflora, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* ».—Mexic.
alternans, Haw. Suppl. Pl. Succ. 26-macnlata.
alternans, Vahl, Symb. Bot_ a_ 61 ' Kalanchoë alternana.
ambigua, Salisb. Prod- 807=orbicnlata.
amplexicaul'' He y"e exc- B- Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. M. 416-Kalanchoë floribunda.

COTTLBDON:—
arborescens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7=Crassula arborescens.
aristata, Walp. Rep. ii. 258, sphalm. =cristata.
atropurpuiea, *Baier, in Sound. Refug. Bot.* t. 198.—Mexic.
Batesii, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 9.—Mexic.
bifida, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 888.—Mexic.
bracteolata, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* sub t. 62.—N. Granat.
brasilica, Veil. Fl. Flum. 197; iv. t 184 - Kalanchoe" brasiliensis.
caealioides, Eckl. & Zeyh. Ennm. 807—Eckloniana.
cacaUoides, *Linn./. Suppl.* 242.—Afr. anstr.
caespitosa, *Haw. Syn. PI. Succ.* 107.—Am. bor. occ.
californica, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* 70.—Am. bor. occ.
calyeina, Roth, Nov. PI. Sp. 217 = Bryophyllum calycinum.
canalicnlata, *Baier, in Saund. Refug. Bot.* i. sub t. 58.—Mexic.
canaliculata, Haw. Snppl. PI. Succ. 22 = ungulata.
canalifolia. Haw. in Phil. Mag. (1826) 827 = coruscans.
camicolor, *Baier, in Saund. Refug. Bot.* iii. t. 199.—Mexic
caryophyllacea, *Burnt, f. Prod. Fl. Cap.* 18.—Afr. anstr.
cespitosa, Haw. Misc. 180=caespitosa.
chiclensis, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 88.—Perav.
clavifolia, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 274.—Afr. austr.
coccinea, *Cav. Ic.* ii. 64.1.170.—Mexic.
Cooperi, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 72.—Afr. austr.
Corderoyi, *Baker, in Gard. Chron.* (1874) 699.—Mexic.
coruscans, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 21.—Afr. austr.
corymbosa, Rottl. ex Wight & Am. Prod. 860 = Kalanchoë floribunda.
Cossoniana, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1878)332.—Marocc.
crassifolia, Haw. in Phil. Mag. (1827) 278 - orbicnlata?
crassifolia, Salisb. Prod. 807 = hemisphaerica.
crenata, Vent. Jard. Malm. 49—Kalanchoë crenata.
cristata, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 274.—Afr. anstr.
cuneata, E. Mey. ex Harr. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 372—Meyeri.
cuneata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 83.—Afr. anstr.
cunelformis, *Han. in Phil. Mag.* (1828) 186.—Afr. anstr.
curviflora, *Sims, Bot. Mag.* t. 2044.—Afr. anstr.
cymosa, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* t. 68.—Mexic
dedpiens, *Baker, I. c.* 200.—Pernv.
decussata, *Sims, Bot. Mag.* t. 2518.—Afr. anstr.
defldens, Forsk. FL Aegypt Arab. 89 = Kalanchoë crenata.
deficiens, Hochst *Sc* Steud. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 310-Kalanchoë Schimperiana.
Desmetiana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* L 889.—Mexic
dichotoma, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 27.—Afr. austr.
Eckloniana, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 874.—Afr. austr.
ednlis, *Brewer, in Bot. Calif, i.* 211.—Calif.
elata, Haw. Suppl. PI. Succ. 20 = orbiculata, triflora.
erecta, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1626-lnsitanica.
farinosa, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* i. t. 71.—Calif,
ferinnlenta, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 389.—Mexic
fasciclnlaris, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 106; *Bot. Mag.* L 6602.—Afr. austr.
filicaulis, Eckl. *Sc* Zeyh. Ennm. 807-mamillaris.
fimbriata, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 241.—China; As. bor.
fulgens, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t 64.—Mexic
Galeottiana, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* i. 9.—Mexic.
gibbiflora, *Moç. tf Sesse, ex DC. Prod.* iii. 401.—Mexic.
glauca, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 61.—Mexic

COTYIiEDOM[1]:—
globulariaefolia, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 201.—Syria; As. Min.
gracilis, *Harv. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 878.—Afr. austr.
gracilis. *Haw. Suppl. PI. Succ.* 26.—Afr. austr.
grandiflora, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 18 =tubercalosa.
Grayii, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* sub t. 71. n. 33. - N . Mexic.
hemisphaerica, *Linn. Sp. PI.* 429.—Afr. austr.
heterophylla, Roxb. Hort. Beng. 84; Fl. Ind. ii. 456-Kalanchoë floribunda.
hirsuta, Herb. Heyne, ex C. B. Clarke, in Fl. Brit. Ind. 414=Kalanchoë glandulosa.
hispanica, *Linn. Sp. PI.* 1196.—Hispan.; Marocc.
hispida, Lam. Encyc. ii. 141 = C. Mucizonia.
horizontalis, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1826) 4 = C. Umbilicns.
hybrida, Hort. Par. ex DC. Prod. iii. 395 = Kalanchoë spathulata.
incarnm, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 87 (err. typ. *incanum).*—Peruv.
integra, Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. iii. Phys. (1775) 200. t. 9 = Kalanchoë crenata.
interjecta, *Haw. in Phil. Mag.* (1828) 185.—Afr. anstr.
japonica, *Maxim, in Bull. Acad. Pltersb.* xxix. (1888) 122.—Japon.
jasminiflora, *Salm-Dyck, Obs.* 6.—Afr. austr.
Jurgensenii, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 9.—Mexic
laciniata, Linn. Sp. PI. 480=Kalanchoë laciniata.
lanceolata, *Benth.* b* *Hook. f. ex S. Wats. Bot. Calif.* i. 211.—Calif.
lanceolata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 382=spathulata.
lanceolata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 89 = Kalanchoë lanceolata.
laxa, Benth. *Sc* Hook. f. ex Bot. Calif, i. 212 = californoica.
lencantha, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 198.—As. bor.; Sibir. altaic
libanotica, LabilL Ic. PI. Syr. Dec iii. 3.—Kurdist.; Syria.
Iievenii, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 197.—Persia; Sibiria.
UnguaefoUa, *Lem. Jllustr. Hortic.* x. (1863) *Misc.* 81, in syn.—Mexic.
linguaeformis, [R. Br. in] Ait Hort Kew. ed. II. iii. 109= caespitosa.
Lingula, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 298.—Am. bor. occ
lurida, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t 69.—Mexic.
ludtanica, *Lam. Encyc.* ii. 140.—Europ.
lutea, Hort. ex Lam. 1. c. 172=Crassula portulacea.
lutea, Huds. Fl. Angl. ed. IL 194 =lusitanica.
maculata, *Salm-Dyck, Obs.* 5.—Afr. austr.
malacophylla, *Pall. Seise*, iii. 729.—Sibiria.
mamillaris, *Linn.f. Suppl.* 242.—Afr. anstr.
marginatum, *Rafin. Atl. Journ.* 79.—Hab.»
mexicana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 890.—Mexic.
Meyerii, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 872 Afr. austr.
Mucizonia, *Ortega, Mucit.* (1772).—Hispan.; Marocc.
mucronata, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* sub t. 55. n. 4.-Mexic
mucronata, *Lam. Encyc.* ii. 142.—Afr. anstr.
nevadensis, *S. Wats. Bot. Calif*, i. 212.—Am. bor. occ.
nodulosa, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 56.—Mexic
nuda, *Baker, 1. c.* t. 57.—Mexic.
nudicaulis, Lam. Encyc. ii. 142; Vahl, Symb. Bot ii. 51 —Kalanchoë crenata.
oblonga, Haw. Syn. PI. Succ 106 - orbiculata.
ombilicus, Lam. Encyc. ii. 140=C. Umbilicus,
oppositifolia, *Ledeb. ex Nordm. in Bull, Sc. Acad. Pltersb.* ii. (1887) 813.—Reg. Caucas.
orbiculata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxii = Kalanchoë altemans.
orbiculata, *Linn. Sp. PI.* 429.—Afr. anstr.
Oreades, *C. B. Clarke, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* ii. 416.—Ind. or.
oregonensis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 878.—Am. bor. occ.
ovata, Haw. Syn. PI. Succ. 106=orbiculata.
ovata, Mill Gard. Diet. ed. VIII. n. 8-CmssuIa portulacea.
Pachyphytum, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* i. snb t. 69. n. 12.—Mexic
Palmeri, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 292.—Am. bor. occ.

COTYLEDON:—
paniculata, Linn. f. Suppl. 242 = orbiculata.
panieulata, Rottl. ex Wight & Am. Prod. 860 = Kalanchoë floribunda.
paniculata, Thnnb. Prod. PI. Cap. 88=fasdcularis.
pannosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 269.—Madag.
papillaris, Haw. Suppl. PI. Sncc. 21 = decussate,
papillaris, *Linn./. Suppl.*242.—Air. austr.
papillosa, *Aitch.* to" *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 68.—Afghan,
parviflora, *Desf. in Ann. Mus. Par.* xi. (1808) 444; *Sibth. V Sm. Fl. Crate. Prod.* i. 808.—Europ.
pàrviflora, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 9.—Mexic.
parvnla, *Burch. Trav.* i. 219.—Afr. austr.
Peacockii, *Baker, in Gard. Chron.* (1874) II. 258.—Am. bor.
peltata, Wendl. Beobacht. 49=C. Umbilicus,
peruviana, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* sub t 58.—Perov.
Pestalozzae, *Mast, in Card. Chron.* (1877) ir. 456.—Oriens.
pinnata, Lam. Encyc. ii. 141 — Bryophyllum calycinum.
Pistorinia, *Ortega, Mud*.* (1772).—Hispan.
pubescens, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* i. sub t. 55.—Mexic.
pubescens, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 150 = Sedum pilosum.
pulverulenta, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* i. t. 66.—Calif.
pumila, *Baker, I. c.* t. 62.—Mexic.
punctata, Hoit. ex Lam. Encyc. ii. 173 = Cras5ula arborescens.
purpurea, Haw. Suppl. PI. Sncc. 23 - curviflora.
purpurea, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 83.—Afr. austr.
quiteosis, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* sub t. 55.—Ecuador,
racemosa, *E. Mey. ex Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 375.—Afr. austr.
ramosa, Haw. Suppl. PI. Succ. 24-orbicnlata.
ramosissima. Mill. Gard. Diet ed. VIII, n. 6 = orbiculata.
ramosissima, *Salm-Dyck, ex Haw. I. c.* 25.—Afr. austr.
rejlexa, Willd. Eiium. Hoit. Berol. SuppL 24-caespitosa.
reticulata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 88.—Afr. austr.
retusa, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* sub t 64. n. 22.—Mexic.
rhiwophyUa, Roxb. Hort. Beng. 34 ; Fl. Ind. ii. 456 = Bryophyllum calycinum.
rhombifolia, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 807 = hemisphaerica.
rhombifolia, *Haw. in Phil. Mag.* (1825) 83.—Afr. austr.
rosea, *Less, in Linnaea,* ix. (1884) 177.—Sibiria.
roseata, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* sub t. 56. n. 3.—Mexic.
rotundifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 307 = hemispbaerica.
rotundifolia, Haw. in Phil. Mag. (1827) 273 = orbiculata.
rupestris, Salisb. Prod. 307 = C. Umbilicus.
Rusbyi, *Greene, in Bull. Torrey Club,* x. (1883) 125.—Am. bor. occ.
Salimannii, Hook. f. Bot. Mag. t.5801-hispanica.
Samium, *Urv. in Mém. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 806.—As. Min.
Schaflheri, 5. *Wats, in Proc. Ant. Acad.* xvii. (1881-82) 854.—Am. bor. occ.
Scheerii, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* sub t. 62. n. 1. 9—Mex. c.
secunda, *Baker, I. c.* sub t. 60. n. 14.—Mexic.
sediformis, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 267 - sedoides.
sedoides, *DC. Rapp. Jard. Bot. Geniv.* ii. 79.—Europ.
Sempervivum, *Bieb. Beschr. Casp.* 176.—Reg. Casp.
serrata. *Linn. Sp. PI.* 429.—As. Min.
simensis, *Britten, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ñ. 399.—Afr. trop.
spathuUu, *C. R. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 416.—Reg. Himal.
spatkulata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 873 - Kalanchoë spathulata.
spinosa, C. B. Clarke, in Hook, £ Fl. Brit Ind. ii. 416 = leucantha.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 429.—As. bor.
Sprocei, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* sub t. 71.—Ecuador.

COTYLEDON,—
spuria, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 614.—Afr. austr.
stolonifera, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 63.—Mexic.
strictiflora, *Baker, I. e.* sub t. 62. n. 17.—N. Mexic.
subspicata, *Baker, I. c.* sub t. 71.—N. Granat
subulata, C. A. Mey. Verx. Pfl. Cauc. 150 = Sedum subulatum.
subulifolia, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* sub t. 71. n. 82.—Mexic.
tardiflora, Bonpl. PI. Rar. Malm. 93. t. 87=fasciculatis.
tenuicaulis, *Aitch. V Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 67.—Afghan.
teretifolia, Lam. Encyc. ii. 189 = spuria.
teretifolia, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 83.—Afr. austr.
thyrsiflora, £>. *Dietr. Syn. PI.* ii. 1627.—Sibir.
thyrsiflora, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. xxix. (1884) 123=leucantha.
tomentosa, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 873.—Afr. austr.
tricuspidata, Harv. in Phil. Mag. (1825) 32 = papillaris.
triflora, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 83.—Afr. austr.
trigyna, *Burch. Trav.* ii. 226.—Afr. austr.
tuberculosa, *Lam. Encyc.* iii. 139.—Afr. austr.
tuberosa, *Hort. Par. ex Webb If Berth. Pkyt. Canar.* i. 177.—Ins. Canar.
umbilicata, Lam. Fl. Fr. iii. 59=C. Umbilicus.
umbilicifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii 545 = C. Umbilicus.
Umbilicus, *Linn. Sp. PI.* 429.—Europ.; As. Min.
undulata, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 306 = cuneata.
undulata, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 20.—Afr. austr.
ungulata, *Lam. Encyc.* ii. 139.—Afr. austr.
velutina, *Hook.f. Bot. Mag.* L 6602.—Afr. austr.
ventricosa, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 13.—Afr. austr.
Verea, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 17 = Kalanchoë crenata.
viridis, Haw. in Phil. Mag. (1827) 273 - orbiculata 1
visdda, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 872.—Am. bor. occ.
viscosa, Vahl, Symb. Bot. ii. 61 = C. Mudxonla.
Wallichii, *Harv. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 374.—Afr. austr.
Zeyheri, *Harv. 1. c.* 377.—Afr. austr.

COTYLEPHORA, Meissn. Gen. Comm. 28 (1887)-Neesia, Blume (Maivac).
altissima, Meissn. 1. c. = N. altissima.

COTYLIPHYLLUM, Link, Handb. ii. 23 (1831) = Cotyledon, Toura. (Crassulac).
erectum, link, 1. c = Cotyledon Umbilicus.
horimontale. Link, 1. c—Cotyledon Umbilicus
Muciuonia, Link, 1. c - Cotyledon Mucizonia.
Umbilicus, Link, 1. c. = Cotyledon Umbilicus.

COTYLISCUS, Desv. Joum. Bot. iii. (1818) 164,175 = Benebiera, DC. (Cructt).
niloticus, Desv. 1. c=-S. nilotica.

COTYLODISCU8, Radlk. in Sitzb. Math.-Pbys. Acad. Muench. viii. (1878) 334. *SAPINDACEAE.*
stelechanthus, *Radlk. I. c.* Madag.

COTYLOPLECTA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 14 > Hibiscus, Linn. (Malvac).
corymbosa, Alef. 1. c. 15 — H. corymbosns.
dongolensis, Alef. 1. c = H. lunariifolius.
macrantha, Alef. 1. c = H. lunariifolius;

COUBLANDIA, Aubl. PI. Gui. ii. 937. t 856 (1776) = Muellera, Linn. tLegumin.).
frutescens, Aubl. 1. c = M. monilifonnis.
mexicana, Baill. Adansonia, ix. (1870) 238.—Mexic.

COUDENBERGIA, March, in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xlvii. (1879) 514 = Coemansia, March. (Araliac.).

COtJEPIA, Aubl. PI. Gut i. 618. t. 221 (1776).
ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 608.
ACIA, Willd. Sp. PI. iii. 717 (1800).
ACIOA, Aubl. PL Gui. ii. 698. t 280 (1776).
DULACIA, Neck. Elem. ii. 414 (1790).
bracteosa, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840; 215.—Guiana*

COTJEPIA:—
canomensis, *Benth. in Hook. Journ. Bat.* ii. (1840) 215.—Bras.
chrysocalyx,5«»M. *ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 42.—Bras,
comosa, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 215.—Guiana,
eriantha, *Spruce, ex Hook.f. in Mart.Fl. Bras.* xiv. II. 45.—Bras.
glandulosa, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 28.—Guian.
glaucescens, *Spruce, ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras-* xiv. II. 49.—Bras,
grandiflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii (1840) 215.—Bras.
gnianensis, *Aubl. PL Gui.* i. 619, 207.—Guiana,
hypoleuca, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 488.—Mexic.
Kunthiana, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 216.—Mexic.
leptostachya, *Benth. ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 44.—Bras.
macrophylla, *Spruce, ex Hotk.f. I. c.* 41.—Peruv.
magnoliaefolia, *Benth. ex Hook.f. I. c.* 43.—Bras.
Martiana, *Hook.f. 1. c.* 47.—Bras,
multiflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* it (1840) 215.—Guiana,
myrtifolia, *Benth. ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 44.—Bras,
ovatifoli*, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 216.—Bras.
paraënsis, *Benth. I. c*—Bras.
Parillo, *DC. Prod.* ii. 526.—Guiana,
racemosa, *Benth. ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 43.—Bras.
Steudeliana, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 28.—Guiana,
subcordata, *Benth. ex Hook.f. in Mart. Fl. Bras.* »»• II. 46.—Bras.
thyrsiflora, *Hook.f. 1. c.* 45.—Bras.
vismioides, Klotzsch, ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 48 = paraënsis.
Uiti, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 216.—Bras.

COULA, Baill. Adaasonia, iii. 61, 64. t. 3 (1862). *OLACINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 995.
ednlis, *Baill. 1. c.* 64.—Afr. trop.

COULETIA, Dennst Schluess. Hort. Malab. 81 (1818)-Antidesma, Linn. (Euphorb.).
amentacea, Dennst. 1. c—Ind. or.

COULTERIA, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 328. t. 668 = Caesalpinia, Linn. (Legumin.).
africana, Guill. *Sc* Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 266=Pf°-sopis oblonga.
chilensis, DC. Prod. ii. 481-Caesalp. tinctoria.
horrida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 380 - Caesalp-horrida.
mexicana, DC. Prod. ii. 481=Caesalp. vesicaria.
mollis, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 830-Caesalp-mollis.
tinctoria, H.B.&K.U. 381-Caesalp. tinctoria.

COUMA, Aubl. PI. Gui. Suppl. 39. t. 392 (1775).
APOCYNACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 693.
COLLOPHORA, Mart. in Buchn. Rep. Pharm. xxxv. (1880) 196, ex Bull. Férussac (Janv. 1831), **•, iv
dulcis, Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I--ntilis.
gnianensis, *Aubl. PI. Gui. Suppl.* 39. t. 392-Guiana.
rigida, *Muell. Arg. in Mart.Fl. Bras.* vi. I. 20.—B"5-urilis, *Muell. Arg. I. c.* 19.—Bras.

COUMAROUNA, Aubl. PI. Gui. ii. 740. t. 296 (1776)-*--Dlpteryx, Schreb. (1791) (Legumin.).
odora, Aubl. L e t 296 -seq.
odorata, Anbl. L c. 740=1). odorata.

COUPIA, G. Don, Gen. Syst. ii. 44 (1832) sphalm-Ooupia, Aubl. (Celastrm.).

COUPOin, Anbl. PI. Gui. Suppl. 16. t. 377 (1775).
APOCYNACEAE [Benth. *Sc* Hook. f. i. 696].
CUPIRANA, Mien, Apocyn. S. Am. 15 (1878).
CuraiA, Rafin. Princ. Somiol. 29 (1814).
aquatics, *Aubl. I. c.*—Guiana.

COTTRAliIA, Splitg. in Hoev. & De Vrieie.Tijdschr.ix. (1842) 14. *BICNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1042.
nuviatilis, Splitg. I. c. 15.—Guiana,

COURANTIA, Lem. Jard. Fleur. i. (1861) Misc. 92-Cotylodon, Tonm. (Crassulac).
theverioides, Lem. 1. c. =Cotyl. roseata.
rosea, Lem. 1. c. iii. (1853) 244, in aota-Cotyl. rosea.

COTJBATABI. Aubl. PI. Gui. ii. 728. t 290 (1775). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i 722.
AMPHORICARPUS, Spruce, ex Mien, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 288.
CARINIANA, Gasar. Nov. Stirp. Bras. 86 (1842).
aulacocarpa, Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 5O9.-firas.
coriacea. Mart, ex Berg, 1. c. 610.—Bras,
flictyocarpa, Mart, ex Berg, I. c—Bras,
domestica, Mart, in Flora, xx. (1837) II. *BeiU.* 127, in textu.—Bras,
estrellensis, Raddi, in Mem. Mod. xviii. *Fit.* (1820) 403.—Bras.
gmanensis, Aubl. PI. Gui. ii. 724. t. 290.—Am. trop.
Lecythopsis, *Mart, in Flora,* xx. (1887) IL *BeiU.* 89.—Bras.
Jegalis, *Mart. 1. c.* 88.—Bras.
"Mate, *Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 508.—Bras.
jjiacrocarpa, Mart, ex Berg, 1. c. 509.—Bras.
Martiana, Miers, in Trans. Linn. Soe. xxx. (1874) 282.—Bras.
Paraensis, Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 610.—Bras.
rebra, Gardn. ex Miers, in Trans. Linn. Soe. xxx. (W74)288.-Bras.
»nari, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 509.—Bras,
appensis, Spruce, ex Berg, I. c. 508.—Bras.
jesu, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 284.—Uuiana.

COHEATARI. Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. »7» (1829) = Leoythop818, Schrank (Myrtac).
^«*r«, Camb^ss. I. c-LVglabra.
Tfescens, Cambess. 1. c. 380-L. rufescens.

CURBARI, Adans. Fam. ii. 817 (176S)=Hymenaea, n. (Legumin.).

COURBARIL, Plum, ex Endl. Gen. 1817 (1841) =praec.

COURBONIA, Brongn. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 901. *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 969.
^HYSANTHBMUM, Klotasch, in Peters, Reise Mossimb. Bot. 167. t 29 (1861).
decum, virgata, *Brongn. I.* c.-Afr. trop.

COURIMARI Anbl P1- Gni_ Suppl- 27 (1775) (Gen. dub. affin.).
guianensis, *Aubl. l.*c._Gniana.

COURINGIA, Adans. Fam. ii. 418 (1763) = Conringia, Heist. (Crucif.).

COUROUPITA, Aubl. PI. Gui ii. 708. t. 282 (1775). *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 722.
EUSHOLTZIA, Neck. Elem. 256 (1790).
nttli.. rop IDANA> Scop. Introd. 195 (1777).
a "•na, J/i«.S| ,-., *Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 191.—inn, occ—
crenulata, *Miers, I. cm-Bras.*
guianensis *Aubl. PI. Gui.* ii. 708. t. 282.-Guian.
guiane ', le *DM"V/" Hook. Bot. M*6 «: S158-antillana, *Trans. Linn. Soc.* xxi. (1874) 194.—Bra!' *'''
^ranacea, *Miers, I.* c.-N. Granat.
odo£P"'ren*is> *DC- Prod.* iii. 294.-Am. centr.
peruviana, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 126-Panama.
Rariv. *Bngr, Linnaea* xxxi- (1861-62) 261.—surina 476. ^ ^ ^ *Mart ex Ber8> in Mart_ Fl_ Bras_* ^^ L man.

COUI
Ca^A^TIA, S**_ KP- ^ Webb & Berth. Phyt. (Com "U 276. t. M ^ 1845)-Matrioaria, Linn.
pos..
" ..oni oides Sch. Bip. 1. c. 278 = M. Courrantia.

COUR8ETIA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv/ (1825) 92. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 601.
POISSONIA, Baill. Adansonia, ix. (1870) 295.
arborea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 183.—Ins. Trinit.
dnbia, *DC. Prod.* ii. 264.—Am. austr.
eriantha, Benth. in Hook. Ic. PI. sub 1.1066.—Peruv.
glandulosa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 156.—Calif,
grandiflora, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 10.—Peruv.
microphylla, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 201.—Arizona.
orbicularis, Benth. in Hook. Ic. PI. 1.1065.—Pernv.
rostnta, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 44.—Am. trop.
tomentosa, DC. in Ann. Sc. Nat. Ser* I. iv. (1825) 92.—Peruv.
vicioides, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. i. 44.—Am. trop.
virgata, DC. in Ann. Sc. Nat. Sit. I. iv. (1825) 92.—Mexic.

COURTENIA, R. Br. in Benn. Fl. Jav. Rar. 2S6 (1844) = Cola, Schott (Sterculiac).
Aftelii, R. Br. 1. c. = Cola Afeelii.
heterophylla, R. Br. 1. c. - Cola heterophylla.
triloba, R. Br. L c = Cola heterophylla.

COTJBTOISIA, Nees, in Iinnaea, ix. (1834) 286. *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1046.
cyperoides, *Nees, 1. c.*—Ind. or.
olivacea, *Boeck. in Flora,* xliv. (1861) 831.—Guiana.

COUSI2TIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlvii. 503(1827). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 467.
AUCHERA, DC. Prod. vi. 557 (1887).
acicularis, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sir. VI. xvi. (1883) 819.—Turkestan.
Actinia, *B.oiss. Diagn.* Ser. II. iii. 55.—Afghan.
actinocephala, Janb. & Spach, Illustr. ii. 98. t 175 = xiphiolepis.
adnata, *Bunge, Gatt. Caus.* 60.—Persia,
affinis, *Sehrenk, Enum. PL Nov. i.* 41.—Soongaria.
aggregata, *DC. Prod.* vi. 553.—Persia,
aintabensia, *Boiss. (f Haussk.ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 508.—Syria,
alata, *Sehrenk, Enum. PI. Nov. I* 40.—Reg. Casp.; Soongaria.
Alberti, *Regel* b* *Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 315.—Turkestan,
albicaulis, *Boiss. V Buhse, in Noun. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 128.-Pereia.
albida, *DC. Prod.* vi. 552.—Persia.
Alepideae, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 53.—Beluchist.
aleppica, *Boiss. 1. c. Set.* I. x. 101.—Syria.
alpicola, Borszczow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 484 = seq.
alpina, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp.* (1845) 3.—Turkest.
amplissima, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 462.—Persia.
anisoptera, Jaub. *It* Spach, Illustr. ii. 8». t. 170«-calolepis.
anomak, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xvi. (1883) 316.—Tnrkestan.
anthacantha, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) II. 156, sphalm. *vide* xanthacantha.
aptera, *Aitch.* b* *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 170.—Afghan,
arachnoidea, *Fisch.* b* *Mey. ex DC. Prod.* vi. 553.—Soongar.
aralensis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 854 = minuta.
araneosa, *DC. Prod.* vi. 656.—Persia,
arctioides,*Sehrenk, in Bull.Phys-Math. Acad.Pitersb.* ii. (1844) 115.—Soongaria.
arctotidifolia, *Bunge, Gatt. Cous.* 42.—Persia,
arenaria, *Bunge, I. c.* 29.—Persia.
assyriaca, Jaub. 8c Spach, Illustr. ii. 87. t. 179-leucochlora.
atropatana, *Bunge, Gait. Cous.* 17.—Persia.
Aucheri, *DC. Prod.* vi. 555.—Cappadoc.
auriculata, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 58.—Ind. bor. occ
auriculata, Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 360-buphthalmoides.
Baberi, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 63.—Afghan,
bachtiarica, *Boiss. (f Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 475.—Persia.

COUSINIA:—
Bclangeri, *DC. Prod.* vi. 553.—Persia.
Bienerti, *Bunge, Gatt. Cous.* 27.—Persia,
bipinnata, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 62.—Afghan.
Boissieri, *Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 127.—Persia.
Bonvaleti, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (1883) 320.—Turkestan,
brachyptera, *DC. Prod.* vi. 554.—Armenia.
Brandisii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 214-Thomsoni.
Buhsei, Bunge, Gatt. Cons. 22 - hamosa.
bulgarica, C. *Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 385.—Europ. or.
Bungeana, *Regel* (T *Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 318.—Turkestan,
bnphthalmoides, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 156.—Afghan.; Ind. bor. occ.
caesarea, *Boiss. tf Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 116.—Cappadoc.
calcitrapae/ormis, Jaub. & Spach, IUnstr. ii. 76.1.158 = minuta.
Calcitrapa, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 490.—Persia,
calocephala, *Jaub. If Spach, Illustr.* ii. 96. t. 178.—Persia.
calolepis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 116.—Persia.
calolepis, Boiss. Fl. Orient, iii. 480-commutata.
Candolleana, *Jaub. &• Spach, Illustr.* ii. 74. t. 156.—Persia.
canescens, *DC. Prod.* vi. 556.—Armenia,
canescens, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (1883) 328.—Turkestan.
Capusi, *Franch. I. e.* 317.—Turkestan,
carduiformis, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xlvii. 60S.—Reg. Caucas.
carduncelloidea, *Regel tf Schmalh. in PI. Nov. Fedsch.* 60.—As. centr.
carlinoides, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 126 - obovata.
carlinoides, *DC. Prod.* vi. 554.—Persia,
carthamoides, *Aitch. (f Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 171.—Afghan.
cataonica, *Boiss. W Haussk. Ft. Orient,* iii. 488.—As. Min.
centauroides, *Fisch. tf Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* a889) 159.—Persia,
centauroides, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 162.—As. centr.
Chamaepeuce, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 120.—Persia,
chlorocephala, C. *A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 554.—Armenia,
chrysacantha, *Jaub.* CT *Spach, Illustr.* ii. 78. t. 160.—Persia,
cirsioides, *Boiss. tf Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 117.—Cappadoc.
commutata, *Bunge, Gatt. Cous.* 24.—Persia,
concinna, *Boiss. (f Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 613.—Persia.
concolor, *Bunge, Gatt. Cous.* 33.—Persia,
congesta, *Bunge, 1. c.* 12.—Persia,
coronate, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (18t>3) 321.—Turkestan.
crispa, *Jaub. tf Spach, Illustr.* ii. 81. t. 163.—Persia,
cylindracea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 115.—Persia,
cylindrocephala, *Jaub. (f Spach, Illustr.* ii. 84. t. 166.—Persia.
cymbolepis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 119.—Kurdist.
cynaroides, *C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc.* 230.—Reg. Caucas.
dedpiens, *Boiss. tf Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (I860; 125.—Persia,
decurrens, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 154.—Afghan.
deserti, *Bunge, Gatt. Cous.* 29.—Persia,
dichotoma, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dor pat.* (1845) 3.—Turkest.
discolor, *Bunge, Gatt. Cous.* 34.—Persia,
dissecta, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (18421 891.—Turcoman,
dolicholepis, *Sehrenk, in Bull. Phys.-Moth. Acad. Pltersb.* iii. (1845) 107.—Soongana.
elate, *Boiss. tf Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 126.—Persia,
elegans. *Aitch. tf Hemsl, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 172.—Afghan.
erinacea, *Jaub. tf Spach, Illustr.* ii. 83.1.166.—Persia,
eriobasis, *Bunge, Gatt. Cous.* 37.—Persia,
eriocephala, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 504.—As. Min.

COUSINIA :—
eriophora, *Regel tf Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 313.—Turkestan.
eryngioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 101.—Persia.
Falconeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 360.—Reg. Himal.
flavispina, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sen VI. xvi. (1888) 315.—Turkestan.
foliosa, *Boiss.* &" *Bal. Diagn.* Set. IL vi. 116.—Cappadoc.
gracilis, *Boiss. I. c.* Ser. I. vi. 117.—Persia,
grandiceps, *Bunge, Gatt. Cous.* 54.—Persia,
grandis, *C. A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 657.—Persia.
Griffithiana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 60.—Afghan.
Gundelia, C. Koch, in TjMMf, xxiv. (1851) 887 = brachyptera.
Hablitzii, *C. A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 554.—Persia,
hamosa, C. *A. Mey. I. c.* 555.—Persia,
hamulosa, *C. A. Mey. ex Boiss. Fl. Orient,* vi. 488-hamosa.
heliantha, *Bunge, Gatt. Cous.* 39.—Persia.
Hermonis, *Boiss. Diagn.* Ser. L x. 102.—Syria.
heterolepis, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 386-brachyptera.
heterophylla, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 54.—Afghan.
Hohenackeri, *Fisch. (f Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* ii. 84.—Persia.
hololeuca, *Bunge, Gatt. Cous.* 27.—Persia,
humilis, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. ii. (1854) 248.—Cappadoc.
hypolenca, *Boiss. Diagn.* Ser. I. z. 103; *Fl. Orient,* iii. 464.—Persia.
Hystrix. C. B. Clarke, Comp. Ind. 214-microcarpa.
Hystrix, *C. A. Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 84.—Persia.
ilicifolia, *Jaub.V Spach, Illustr.* ii. 82. t. 164.—Persia,
incompta, *DC. Prod.* vi. 553.—Persia,
inflata, *Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 512.—Kurdistan,
integrifolia, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (1883) 322.—Turkestan,
intermedia, *C. A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 553.—Armenia.
involucrata, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 114.—Persia,
karatavica, *Regel (f Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 317.—Turkestan.
Karelini, Less, ex Kar. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1839) 159 = onopordioides.
kokanica, *Regel* &" *Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsck.* 49.—As. cenlr.
Komhuberi, *Heimerl, in Denischr. Acad. Wien,* 1. (1885) 62.—Persia.
Korolkowi, *Regel* &" *Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 315.—Turkestan.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 120.—Persia.
Krauseana, *Regel* &• *Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 48.—As. centr.
lachnosphaera, *Bunge, Gatt. Cous.* 36.—Persia,
lappacea, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* i. 42.—Soongaria.
lasiandra, *Bunge, Gatt. Cous.* 40.—Persia,
lasiolepis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. lift.—Persia,
lepida, *Bunge, Gatt. Cous.* 26, in nota.—Persia,
leptocephala, *Fisch. Cf Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1839) 159.—Turcoman.
leucochlora, *Bunge, Gatt. Cous.* 24, in nota.—Persia,
libanotica, *DC. Prod.* vi. 566.—Syria,
lucida, *DC. I. c.* 553.—Assyria,
lyrata, *Bunge, Gatt. Cous.* 53.—Persia,
macrocephala, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 281.—Reg. Caucas.
macrolepis, *Boiss.* &" *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 505.—Persia,
macroptera, *C. A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 555.—Armenia,
microcarpa, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 59.—Persia; Reg. Himal.
microcephala, *C. A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 552.—Persia,
minuta, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 117.—Persia; Ind. bor. occ.
mollis; *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1845) 108.—Soongaria.
monocephala, *Bunge, Gatt. Cous.* 52.—Persia,
multiloba, *DC. Prod.* vi. 554.—Persia,
neurocentra, *Bunge, Gatt. Cous.* 29.—Persia.
Noëana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 57.—Persia,
obovata, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 491.—Persia,
odontolepis, *DC. Prod.* vi. 556.—Assyria.

COTJSHJ1A :—
odontolepis, Sch. Bip. ex Boiss. I. c. 512=cymt>olepis.
Olgae, *Regel (f Schmalh. in PL Nov. Fedsch.* 48.—As. centr.
oligocephala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 116.—Persia.
oligocephala, Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 475 = bachtiarica.
Olivieri, *DC. Prod.* vi. 552.—Persia?
Olivieri, Jaub. Sc Spach, Illnstr. t 172=serratuloides.
onopordioides, *Ledeb. in Eichw. PI. Casp. Cauc.* 10. t. 37.—Turcoman,
orientalis, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 386.—Oriens.
outichaschensis, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (1883) 322.—Turkestan.
palmatiloha, Jaub. *8c* Spach, Illnstr. ii. 80. t. 162 = multiloba.
paudflora, Bunge, Gatt Coos. 12=aggregate,
pentacontha, *Regel (f Schmalh. in Act. Hort. Petrop,* vi. (1879) 815.—As. centr.
pergamacea, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 513.—Persia.
Pestalozzae, *Boiss. 1. c.* 471.—Syria,
pinarocephala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 121.—Persia,
piptocephala, *Bunge, Gatt. Cous.* 26.—Persia.
platyacantha, Bunge, 1. c. 87 =centauroides.
platylepis, *Fisch. Mey. V Avi-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. *Suppl.* 10.—Turkestan,
polycephala, *Rupr. Sert. Tiansch.* 54.—As. centr.
prasina, *Jaub.* to[1] *Spach, Illustr.* ii. 86. t. 168.—Persia.
Princeps, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (1883) 824.—Turkestan,
prolifera, *Jaub. V Spach, Illustr.* ii. 74. t. 157.—Persia.
pterocarpa, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 501.—Afghan,
pugioniferi, *Jaub.* &• *Spach, Illustr.* ii. 92. t 174.—Persia.
pulchella, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat.* (1845) 8.—As. centr.
purpurea, *C. A. Mey. ex DC. Prod,* vi 665.—Persia.
pycnoloba, Boiss. Diagn. Ser. IL iii. 57 •= multiloba.
pyrrhocephala, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 86.1.167 = Olivieri.
racemosa, *Boiss, Diagn.* Ser. II. iii. 56.—Afghan,
radians, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat.* (1846) 3.—As. centr.
ramosissima, *DC. Prod.* vi. 562.—Cappadoc.
recurvata, *DC. I. c.* 555.—Persia,
sakawensis, *Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 488.—Persia,
Scala, *Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 172.—Afghan.
scariosa, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 164.—Afghfin.
Schtschurowskiana; *Regel (f Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 50.—As. centr.
Schulttiana, Jaub. *8c* Spach, Illnstr. ii. 95. 1.177 = cymbolepis.
Seidlitzii, *Bunge, Gatt. Cous.* 20.—Persia.
Semenovii, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xL (1867) II. 147.—As. centr.
serratuloides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 118.—Persia.
Sewerzowi, *Regel, in BulL Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 151.—Turkestan.
silyboides, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 94. t 176 = Kotschyi.
Smimowii, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii (1883) 488.—As. centr.
sphaerocephala, Jaub. & Spach, Jllnstr. ii. 79.1.161 = C. Chamaepeuce.
sqnarrosa, *Boiss. Diagn.* Set. L x. 102.—Persia.
squarrosa, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 387 = brachyptera.
stenocephala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 115.—Assyria,
stenolepis, *Regel (f Schmalh. in PI. Nov. Fedsch.* 49.—As. centr.
submutica, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. xvi. (1883) 314.—Turkestan.
sylvicola, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp. (1845) 3— dichotoma.
tabrisiana, *Bunge, Gatt. Cous.* 16.—Persia,
tenella, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 25.—Armenia.
tenuifolia, *C. A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 564.-Persia,
thamnodes, *Boiss. (f Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 471.—Persia.
Thomsoni, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 213.—Reg. Himal.

COUSINIA :—
trachylepis, *Bunge, Gatt. Cous.* 22.—Persia.
Trautvetteri, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 257.—Turkestan,
triflora, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii (1845) 108.—Soongaria.
umbrosa, *Bunge, Gatt. Cous.* 10.—Persia,
uncinata, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xL (1867) H-145.—Soongaria.
verbascifolia, *Bunge, Gatt. Cous.* 52.—Persia,
verticillaris, *Bunge, in Mém. Sav. Eir. Pitersb.* vi. (1851) 357.—As. centr.
Verutum, *Bunge, Gatt. Cous.* 31.—Persia,
wolgensis, *C. A. Mey. ex DC. Prod.* vi. 555.—Rossia.
xanthacantha, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 156 *(sphalm.* anthacantha).—Oriens.
xeranthemoides, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient iii. 497-microcarpa.
xiphiolepis, Boïss. *Diagn.* Ser. I. vi. 121.—Persia.

COTT8SAPOA, Anbl. PI. Gui ii. 955. t. 862, 368 (1775). *URTICACEAE,* Uenth. *8c* Hook. f. iii. 379.
acutifolia, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 629.—Peruv.
angustifolia, *Aubl. PI. Gui.* ii. 956. t. 863.—Guiana,
asperifolia, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. (1847) 96.—Guiana.
cuneata, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.138.—Guiana,
dealbata, *Andri, Illustr. Hortic.* xvii. (1870) 16.—Bras,
fagifolia, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 628.—Guiana,
ferruginea, *Tree, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 93.—Guiana.
Fontanesiana, *A. Brongn. ex Tree. I. c.* 94.—Bras,
hirsuta, *Tree. 1. c.* 97.—Peruv.
intermedia, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I-183.—Bras.
laevigata, *Poepp. tf Endl. Gen. et Sp.* ii. 33.—Bras,
latifolia, *Aubl. PI. Gui.* ii. 955. t. 362.—Guiana,
magnifolia, *Trtc. in Ann. Sc. Nat. Set.* III. viii. (1847) 98.—Peruv.
Martiana, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 132.—Bras.
microcephala, *Trtc. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viu-(1847) 96.—Guiana.
nitida, *Miq. in Mart. Ft. Bras.* iv. I. 133.—Brns.
obovata, *Miq. in Versl. en Medel. Kon. Nederl. In**[1]-1842 (1843) 200.—Hab.»
ovalifolia, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IIL viii. (18*7) 96.—Peruv.
pnberula, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 529.—Pernv.
Ruirii, *Klottsch, 1. c.* 529.—Peruv.
Schottii, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.137.—Bras,
setosa, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 528.—Peru*-
subincana, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. 1.1[8]*"—Bras,
vellerea, *Klottsch, in Linnaea,* xx. (1847) 627.—Peruv.
villosa, *Poepp. if Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 83.11«-—Peruv.

COTJSSAKEA, Aubl. PI. Gui. i. 98. t. 88 (1775). *RUBIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 120.
BILLARDIERIA, Vahl, Eclog. Am. i 13. t. 10 (1796).
FROELICHIA, Vahl, I. c. Praef. 3 (1796).
PECHKYA, Scop. Introd. 143 (1777).
accedens, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) *^-" Bras.
albescens, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 87, >[D] nota.—Guiana,
ampla, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) * «[6] Bras.
bahiensis, *Muell. Arg. I. c.* 467.—Bras,
biflora, *Muell. Arg. 1. c.* 468.—Bras,
capitata, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 121.—Bras.
Catingana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) *6[8] Bras aa —
coffeoides, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. o»-Bras.
congesdflora, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) —Bras.
contracta, *Benth. V Hoot./. Gen.* ii. 121.—Brat.
coroovadensis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) *[00] —Bras,
comifolia, *Benth. tf Hook./. Gen.* ii. 121.—Bras,
flava, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 26. t- ^ —Peruv.

C0TTS8ABEA:-
"oelichia, *A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 177.-Ins. Trinit.
graciliflora, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 121.—Bras.
Srandis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 100.—Bras.
hydrangeaefoHa, *Benth. br Hook. f. Gen.* ii. 121.—Bras.
ilheotica, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 466.—Bras.
lagoënsis, *Muell. Arg. I. c*—Bras,
lanceolata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 104.—Bras.
leptol[illegible] Bras, *MuelL Argm in Ftora>* Wt (187B) *68>~
[illegible]> *Muell. Arg. 1. c.* 466.—Bras.
jeptopus, *Muell. Arg. 1. c.* 465.—Bras.
{ongiflora, *Muell. Arg. I. c.* 468.—Bras.
longifolia, *Muell. Arg. I. c*—Bras.
"•"^"Pa, *A. Rich, in Mint. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1884) 177—Guiana,
"acrophylla, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 466.—Bras.
Martini, *Benth. tf Hook.f. Gen.* ii. I21.-Am. trop.
"*ndxonalis,* Muell. Arg. in Mart Fl. Bras. vi. v. 85 =nemoralis.
nemoralis, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. I21.-Bras.
"poosa, *Benth. &• Hook.f. I.* c.-Bras.
obscu[illegible] *MueU, Arg, in Flora,* lvi,,," ^&1^ 487"~
pentamera, *Karst. Fl. Columb.* ii. 18. t. 107.—Costa Rica.
platyphylla, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 466.—Bras.
Porophylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 87.—Jras.
rocumbens, *Muell. Arg. 1. c.* 104.—Bras.
racemosa *A.* «"• *i» Mint. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1884) 177—Guiana.
[illegible] *MuM Arg in Fhra lym* C1876)468—
homiurgtiana, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 121 -^olacea.
squamosa, *Lam. Jbubl. Encyc. i.* 281.—Ind.occ.
[illegible] *M rielL Ar in Flora* M (1875) *—
S?fl°^f [illegible] Hooi Lund Journ. Bot. iv. (1845) 10?.-Bras.
verticillata, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 467.—Bras.
violacea, *Aubl. Pl* G"»- i- 98. t 88.-Guiana.
virens, *Mue. Arg in Flora* Wil <1875> «7--Bras.
viridis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 104.—Bras.

COUTAREA, AnbL H Gul L **314. t. 122** (1775). *RUBIACEAE,* Bent[illegible] & Hook **f. ii. 42.**
alba, *Griseb. in Goe* tf-Abh [illegible] (1879) 18S~ Reg. Argent.
Campanilla, *DC. Prod.* **iv. 350.—Venezuela.**
corymbosa, *Brign. in Mem Soc Ital Mod Ser H* (1862) 89.—Bras.
diervilloides, *Pla*TM*- & Linden, Cat.* n. 9 (1854) 3.-N. Granat.
flavescens, *M* Mexic. *of V Sesse, ex DC Prod* "• 86o •
latifolia, *Moc. & S*« ». " *DC-1-* c-Mexic
Lindeniana, *BaiU- Adansonia, TO.* (1879) 3OO.-Venezuela.
Lumaeana, *,* [illegible] 801-Gnatemala.
mexicana *Zu*[illegible] DC- ^^ "• 850.—Mexic.
mollis, [illegible] M. * (1834) 259.—Bras.
pubescens, *Pohl, PI. Bras. Desc.* ii. 148. t. 200.—Bras.
Scherff [illegible] /««rfr. fforftV. m. (1878) 126.
specicta, *Aubl. Pl. Gui. I* 814. t. 122.-Gniana.

COUTHOVIA, A. Gray, [illegible] (1858) 324; V. 320.
Benth. & Hook. f. ii co—
[illegible] A. Gr v> i. riv. (1858) 3 [illegible]
Seem

COU •"»• -4. Croj., /. ,. v. (1861) 820.—Ins. Fiji.

"^UBAEA Ham. PI. Ind. Occ. 18 (1825)=*q.

COTTTOUBEA, Aubl.Pl. GuL i. 72. t 27, 28 (1775)
GENTIANEAE, Benth. & Hook. f. ii. 812.
LIMBORCHIA, Scop. Introd. 139 (1777).
PICRIUM, Schreb. Gen. 791 (1791).
alba, Lam. Encyc. ii. 162=spicata.
arenaria, Willd. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 132 = racemosa.
densiflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 111. t. 185 = spicata.
lutea. Stead, in Flora, xxvi. (1843) 765-spicata.
minor, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 179 •= spicata.
purpurea, Lam. Encyc. ii. 162-ramosa.
racemosa, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 86.—Guiana.
ramosa, *Aubl. PI. Gui. I* 74. t 28.—Am. trop.
reflexa, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 442.—Guiana.
spioata, *Aubl. PI. Gui.* i. 72.—Am. trop.
spicata, Griseb. in Jonra. Linn. Soc. vi. (1862) 141 = reflexa.
spicata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 179 - densiflora.
ternifolia, Cav. Ic iv. 14=densiflora.
verticillata, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 48 =- Enicostema littorale.
volubilis, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 112.—Ins. S. Doming.

COUTUBEA, Stend. Norn. ed. II. i. 429 (1840) = Coutoubea, Aubl. (Gentian.).

COVALIA, Reichb. Consp. 64 (1828) - COVOLIA, Neck.=Spermaooce, linn. (Kubiac.).

COVELIA, Endl. Gen. 627, in syn. (1838) = praec.

COVELLIA, Gasp. Nov. Gen. Fie. 10 (1844) = Pioufl, Toum. (Urticac.).
albipila.Uiq. Fl. Ind. Bat Suppl. 434 = F. mollis.
assamica, Miq. in Hook. Lond. Tourn. Bot. vii. (1848) 464 = F.hispida.
aurata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 433-F. chrysocarpa.
Barclayana, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 461. t. 7 B = F. Barclayana.
composita, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 324=F. rapiformis.
congesta, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 468 = F. congesta.
conglomerata, Miq. 1. c. 459=F. Cnnia.
costata, Miq. 1. c. 468-F. costigera.
courtallensis, Miq. 1. c. 463=F. hispida.
cuneata, Miq. 1. c. 466. t. 8 B = F. cuneata.
Cunia, Miq. 1. c. 459=F. Cnnia.
cyrtophylla, Miq. 1. c. 460=F. cyrtophylla.
daemonum, Miq. 1. c. 462 = F. hispida.
dasycarpa, Miq. 1. c. 465 = F. hispida.
dasycaula, Miq. 1. c. 460=F. obscura.
didynama, Miq. PI. Jungh. i. 65 = F. lepicarpa.
glomerata, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 465 =• F. glomerata.
grandifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. SuppL 434 = F. rapiformis.
Griffithii, Miq. in. Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1818) 467 = F. heterophylla.
guttata, Wight, Ic t. 1966 = F. guttata.
hispida, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot vii. (1848) 462 = F. hispida.
inaequiloba, Miq. 1. c. 459 = F. Cnnia.
lanceolata, Miq. 1. c 465 = F. lanceolata.
lepicarpa, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 828 = F. lepicarpa.
leucopleura, Miq. 1. c. 826 = F. leucatoma,
macrophylla, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 465 = F. Roxburghii.
microcarpa, Miq. L c. 466. t. 9 A = F. Ribes.
mollis, Miq. 1. c. 466=F. glomerata.
oppositifolia, Gasp. Nov. Gen. Fie 85 = F. hispida.
paniculata, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 467 = F. Ribes.
prostrata, Miq. 1. c. 465 = F. prostrata.
racemifera, Miq. 1. c = F. variegata.
radiata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 328 - F. septica.
rapiformis, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 464 = F. rapiformis.
Ribes, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 825 = F. Ribes.
rufescens, Kurz, ex Teijsm. *V* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 28 = F. botryocarpa.
setuUsa, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot vii. (1848) 462 = F. hispida.
stictocarpa, Miq. Fl. Jungh. 65=F. leucantatoma.

COVELLIA:—
subdenticulata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 324 = Kicus subdenticulata.
subopposita, Miq. PI. Jungh. 66 = F. fistulosa.
ternatana, Miq. Fl. Ind. Bat i. II. 323 - F. tematana.
tuberculata, Miq. in Zoll. Syst. Vera. Ind. Arehip. 94, 99 = F. fistulosa.
umbonata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 323 = F. umbonata.
venosa, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 468-F. leucatoma.
volkameriaefolia, Miq. in Hook. 1. c. 464. t. 8 A= F. lepicarpa.
Webbiana, Miq. 1. c. 467 = F. Webbiana.
Wightiana, Miq. 1. c. 463-F. hispida.
Zollingeriana, Miq. 1. c. 460=F. coronata.

COVTLHAMIA, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848)307. *STERCUUACEAE]*
ovata, *Korth. I. c*—Borneo.

COVOLA, Medic, in Staatsw. Vorles. Chnrpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 227 = Salvia. Tourn. (Labiat).
napifolia, Medic. Phil. Bot. ii. 67 = S. napifolia.
verticillata, Medic. 1. c.=S. verticiUata.

COVOLIA, Neck. Elem. i. 201 (1790)=8pennacoce, Linn. (Rubuc).

COWANIA, D. Don, in Trans. Linn. Socxiv. (1825) 574. t. 22. *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 618.
GREGGIA, Engelm. in Bot. Wisliz. Exped. 30 (1848).
ericaefolia, *Torr. ex A. Gray, PI. Wright,* ii. 106.—Calif.
Havardia, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 364.—Texas,
mexicana, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 676. t. 22. f. 1-6.—Am. bor. oct
plicata. *D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard.* Ser. IL t 400.—Am. bor. occ.
plicata, Torr. in Frém. Rep. 314=mexicana.
purpurea, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 7. t. 2 = plicata.
Stansburiana, Torr. in Stansb. Exped. Utah, 386=. mexicana.

COXIA,Endl. Gen. 733 (18S8)-I»yBimaohia, Linn. (Primulac).

CRABBEA, Harv. Gen. S. Afr. PI. 276 (1838) = Barleria, Linn. (Acanthac).
pungens, Harv. 1. *c* = B. pungens.

CBABBEA, Harv. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 26. *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. it 1092.
angustifolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 163.—Afr. austr.
cirsioides, Nees, 1. c. 163-nana.
hirsuta, *Harv. in Hooi. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 27.—Afr. austr.
nana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 162.—Afr. austr.
ovalifolia, *Ficalho V Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1881) 24.—Afr. trop.

CRABOWSKIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 480 (1836), sphalm.=Qrabowsld*, Schlecht. (Solan.).

CBACCA, Benth. ex Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 8. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 601.
caribaea, *Benth. ex Oerst. I. c.* 9.—Ind. occ.
Edwardsii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 85.—Mexic.
glabrescens, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (18535 9.—Ecuador,
glandulifera, *Benth. I. c.* 8.—Ecuador,
mollis, *Benth. I. c.* 9.—Peruv.
ochroleuca, *Benth. I. c*—Peruv.
sericea, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 74.—N. Mexic.

CRACCA, Linn. Fl. Zeyl. 139 (1747)-Tephrosia, Pen. (1807) (Leyumin.).
maxima, Linn. Sp. PI. ed. I. 752 «T. purpurea.
purpurea, Linn. 1. c.-T. purpurea.
senticosa, Linn. 1. c.-T. senticosa.
tinctoria, Linn. 1. c. = T. tinctoria.
villosa, Linn. 1. c. = T. villosa.
virginiana, Linn. 1. c. = T. virginiana.

CRACCA, [Kiv.] Medic, in Vorles. Chnrpf. Phys. Ges. ii. (1787) 359=Vioia, Tourn. (Legum!).
acutifolia, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 118=Vicia acntifolia.
agrigeniina, Alef. 1. e. 119=V. Bivonea.
albicans, Alef. 1. c. 120-V. atropnrpnrea.
atropurpurea, Gren. & Godr. Fl. Ft. i. 471 «V. atropurpurea.
benghalensis. Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 359-V. benghalensis.
Bertolonii, Gren. & Godr. FL Fr. i. 470=V. Pseudocracca.
Bivonea, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 121-V. Bivonea.
Boissieri, Alef. 1, c.=V. villosa.
Broteriana, Alef. 1. c. 120-= V. atropurpurea.
calcarata, Gien. *tc* Godr. Fl. Fr. i. 472 - V. calcarata.
caroliniana, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 124 = V. caroliniana.
cassubica, Opiz, Seznam, 34=V. cassnbica.
ciceroidea, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 121 = V. ciceroidea.
cirrhosa, Alef. 1. c. 119 = V. cirrhosa.
Corsica, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 473 *(=Ervum corsicum).*—**Corsica.**
dasycarpa, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 121=V. varia.
disperma, Gren. & Godr. FL Fr. i. 472=V. disperma.
dumetorum, Opiz, Seznam, 34 = V. dnmetorum.
elegans, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 124 = V. tennifolia.
erotanthos, Alef. 1. c 118 = V. Leavenworthli.
exigua, Alef. 1. c. 119 =» V. exigua.
Gerardi, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 469=V. Gerardi.
Cerhardi, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 359 = V. Gerardi.
hypoleuca, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 123=V. alpestris.
Kotschyana, Alef. 1. c 119 - V . Kotschyana.
linifolia, Alef. 1. c. 118 = V. atropurpurea.
longifolia, Alef. 1. c. 123 = V. longifolia.
ludovidana,Alel. 1. c. 119 =V. lndoviciana.
major, Alef. 1. c. 126 = V. Cracca.
microphylla, Alef. 1. c. 121 = V. microphylla.
minor, Gren. & Godr. PI. Fr. i. 473 = V. hirauta.
monanthos, Gren. *Sc* Godr. 1. c. 471 = V. monanthos.
Monardi, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 119 - V. Monardi.
ochroleuca, Alef. 1. c. 123 - V . ochroleuca.
pauciflora, Genneri, in Nnov. Giorn. Bot; ii. (1870) 186 -=V. paociflora!
pineta, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 123 - V. pinetorum.
pisiformis, Opiz, Seznam, 34 —= V. pisiformis.
plumosa, Timb. in Bull. Soc Sc. Phys. et Nat. Tonlouse, iii. (1875-76) 143 = V. Cracca.
polyfhylla, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 124 = V. tenuifolia ?
Pseudocracca, Alef. 1. c. 121 = V. Pseudocracca.
pulchella, Alef. 1. c. 119 = V. pulchella!
Sibthorpii, Alef. 1. c. 120 = V. Sibthorpii.
sylvatica, Opiz, Seznam, 84 = V. sylvatica.
syriaca. Medic, in Vorles. Chnrpf. Phvs. Ges. ii. (1787) 359.—Syria.
tenuifolia, Opiz, Seznam, 84; Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 469 = V. tennifolia.
tenuissima, Alef. in Bonplandia, is. **(1861)** 120=V. gracilis.
Timbaliana, Debeaux.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxviii. (1881) Bibl. 73 = V. cuneata.
Mdentata, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 119, 125 = V. ludoviciana.
varia, Grei.. & Godr. Fl. Fr. i. 469-V. varia.
villosa, Gren. *Be* Godr. 1. c. 470=V. villosa.
vulgaris, Opiz, Seznam, 34 = V. Cracca.

CRACCINA, Stev. in Boll. Soc. Nat. Most iv. (1832) 266-Astragalus, Toum. (Legumin.).
austriaca, Stev. 1. c =A. austriacus.
bifidus, Stev. 1. c.xxix. (1856) II. 145=,A. multicaulis.
Cracca, Stev. 1. c iv. (1832) 266=A. CVacca.
depressa, Stev. 1. c. = A. depressns.
ervoides, Stev.l. c. xxix. (1856) II. 145 = A. ervoides.
falcata, Stev. 1. c. iv. (1832) 266 = A. falcatus.
gracilis, Stev. 1. c.—A. gracilis.
Uptocaulis, Stev. **1.** c. **xxix. (1856)** n. 145=**A.** leptocaulis.

CRACCINA:—
Uptostachys, Stev. in BnlL Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 266=Astragalus sulcatus.
Uucophaea, Stev. 1. c. = A. leucophaeus.
longipes, Stev. 1. c. xxix. (1866) II. 145 = A. macropterns.
multicaulis, Stev. L c = A . multicaulis.
puberulus, Stev. L c.-A. puberulus.
racemosa, Stev. 1. c. iv. (1832) 266-A. racemosus.
reptans, Stev. 1. c.=A. reptans.
scopaeformis, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 145=A. tauricus.
sulcata, Stev. 1. c. iv. (1832) 266=A. sulcatus.
taurica, Stev. 1. c. = A. tauricus.
triangularis, Stev. 1. c =A. triangularis.
tunetana, Stev. 1. c. - A. tunetanus.
vaginata, Stev. 1. c—A. vaginatus.
versicolor, Stev. 1. c.=A. versicolor.
vkioides, Stev. 1. c. xxix. (1856) II. 145 = A. macropterus.

CRAEPALIA, Schranlc, Baier. Fl. i. 102, 382 (1789) = Lollum, Linn. (Gramin.).
temulenta, Schrank, 1. c. 382=L. temulentum.

CRAEPALOPRUMNON, KarsL Fl. Columb. i. 123. t. 61, 62 (1869l)=Xylosma, Font (Bixin.).
heterophyllum, Karst. 1. c 128. t. 61.—N. Granat.
cordatum, KarsL 1. c. 124-> Flacourtia cordata.
obovatum, Karst. 1. c. 123. t. 61.—N. Gracat.
prumfolium, Karst. I.e. 124=Flacourtia prunifolia.
racemosum, Karat 1. c. = Flacourtia racemosa.
rubicundum, Karst. 1. c 126. t. 62.—Venezuela.

CRAFORDIA, Rafin. Speech, i. 156 (1814)=Tephroeia. Pen. ? .(Legumin.).
bracteata, Rafin. 1. c.=T. spicata?

CBAJCBE, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1785). *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 98.
amplexicaulis, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed. II. ii. 258 = Calepina Corvini.
aspera, Bieb. Fl. Taur. Cane ii. 90=tatarica.
Aucheri, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xvii. (1842) 388 •• orien tails.
Biebersteinii, *Janka, in Termis: Fuhetei,* viii (1884) 36.—Europ.
bursaefolia, L'Herit. ex DC. Syst. ii. 649=Calepina Corvini.
Buxbaumii, WiUd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 222 = orientalis.
caspica, Raeusch. Nom. ed. III. 188=taUrica.
chlorocarpa, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1883) 802.—Austria.
cordata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 43 = cordifolia.
cordifolia, Duf. in Ann. Gen. Sc. Phys. vii. (1820) 808 •cglabrata.
cordifolia, *Stev. in Mint. Soc. Nat. Mosc.* **iii. (1812)** 267.—Reg. Caucas.
Corvini, All. Fl. Pedem. L 256=Calepina Corvini.
edentula, *Fisch. if Mey. ex /Car. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1889) 145, nomen.—Turcoman.
filiformis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 43—hispanica.
filiformis, *Jacq. Coll. Suppl.* 120.—PaUgon.; Chili,
fruticosa, *Linn.f. Suppl.* 299.—Ins. Madera.
gibberosa, *Rupr. Fl. Cauc.* 186, in textu.—Reg. Caucas.
gigantea, Kit. ex Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 66 = maritima.
glabrata, *DC. Prod.* i. 226.—Hispan.
grandiflora, *DC. Syst.* ii. 662.—As. Min.
hispanica, *Linn. Sp. PI.* 671.—Reg. Mediterr.
juncea, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 421.—Reg. Cauc et Himal.
Kotschyana, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 19=cordifolia.
Kralikii, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* **iv. (1857) 466,** nomen.—Afr. bor. *1*
laciniata, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. L 429 = pinnatifida.
laciniata, Lam. Encyc. ii. 163 = tatarica.
lams', Kit in Linnaea, xxxii. (1863.) 602=chlorocarpa.
macrocarpa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 90 =Sob©Jewskia lithophila.
maritima, *Linn. Sp. PI.* **671.—Europ.**
orientalis, **Jacq. Ic. Rar. i. t. 128 ^pinnatifida.**
orientalis, *linn. Sp. PI.* **671.—As. Min.; Persia.**
orientalis, **Reich. Syst. iii. 2»0=Utarica.**

CRAMHE:—
palmatifida, *Regel* **b*** *SchmaUt. in Act, Hort. Petrop.* v. (1877) 248.—Turkestan.
paniculata., All. FL Pedem. i. 256=Neslia paniculata.
pannonica, Hort. Par. ex Lam. Encyc. ii. 163 = tatarica.
peraica, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 389.-Persia,
pinnatifida, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kern.* ed. II. iv. 72. —Reg. Caucas.
pontica, *Stev. ex Rupr. Fl. Cauc.* 293.—Tauria.
Pritzelii, *C. Bolle,* /«<*. *Sem. Hort Berol.* (1861) 10.—Ins. Canar.
quadricostata, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 388 = orientalis.
reniformis, Desf. Fl. Atlant. ii 78. t. 151=hispanica.
scabra, Lam. Encyc. it 163=strigosa.
Sewerzowi, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xliii-** (1870) I. 282.—Turkestan,
sinuato-dentata, *Hochst. V Schimp. Beitr. Fl. Aethiop-* , 238.—Abyss.
Steveniana, *Rupr. Fl. Cauc.* 136, in textu.—Reg-Caucas.
strigosa, *L'Herit. Stirp. Nov.* 151. t. 72.—Ins. Canar.
suecia. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = pinnatifida.
tatarica, *Jacq. Misc.* ii. 274.—Europ. or.; As. bor.

CRAMERIA, Murr. Syst. ed. XIII. 138 (1774) -**Krameria,** Linn. (Polygal.).

CRANICHIS, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 120 (1788) *ORCHWEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 693.
OCAMPOA, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. *Sir-* III. iii. (1846) 31.
aphylla, *STV. I.* r.—Jamaica.
apiculata, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* 92.—Guatemala.
ciliata, *Kunth, Syn. PI. Aeq.* i. 324.—Venezuela,
diphylla, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 120.—Jamaica.
Engelii, *Reichb. f. in Linnaea,* **xli. (1877)** *W--* Venezuela.
foliosa, *Lindl. Gen. etSp. Orck.* **461.—Peruv.**
gibbosa, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* xv. (1845) 385.—Jamaica,
glandulosa, *A. Rich. If Gal. in Ann. Sc. Nat. Sir.* **IH-** iii. (1845) 30.—Mexic.
Lehmanni, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* **4.—Ecuador.**
luteola,Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 14S8=Polystachyaluteola.
macroblepharis, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* **4.—** Ecuador,
micrantha, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (187fl) 337.—Reg. Argent.
micrantha, Sprang. Syst. iii. 700 - Prescottia Myosurus-monophylla, *Lindl. Orchid. Linden,* 27.—N. Granat.
multiflora, Ell. ex Nutt. Gen. Am. ii. 191 = Ponthiev» glandulosa.
muscosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 120.—Jamaic.
nudifolia, *Pers.,Syn.* ii. 511.—China.
oligantha, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 120 = Prescotn* Myosurus.
ovata, *Wictstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* **(1827)** 73.—Ins. Guadalup.
parvilabris, *Lindl. Orchid. Linden.* 27.—N. Granat.
pauciSora, *Sw. Fl. Ind. Occ.* iii. 1431.—Jamaic.
picta, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 52.—Ecuador,
reticulate, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* **62.—** Costa Rica.
Schaffneri,J?«VAA./. *in Bonplandia,* iii. (1855) 238.—Mexic.
Schlimii, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) I[9]-" Venezuela.
similis, *Reichb./. Otia Bat. Hamb.* 83.—Bros.
speciosa, *La Llave (f Lex. Nov. Veg, Desc. fa*C'* **"** *{Orch. Opusc.)* **5.—Mexic.**
stachyoides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 120 = Ponthi*v» glandulosa.
subumbellata, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat.* **=*r** III. iii. (1845) 80.—Mexic.
sylvatica, *A. Rich. V Gal. I. c*—Mexic.
tenuiflora, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 268.—Cuba.
tennis, *Reiehb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 274.—[ina>] occ.
tubularis, *La Llave V Lex Nov. Veg. Desc./asc-* **»•** *(Orch. Opusc.)* **6.—Mexic.**
tubulosa, *Lindl. Gen. et St Orch.* 451.—Mexic.
ventricosa, *Griseb. Fl. Bnt. W. Ind.* 689.—Ind. <*C[19>]
Wageneri, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) Venezuela.

CRAWIOIIABIA, Linn. Gen. *td.* I. 846 (1787). *PEDAL1NEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1056.
PETRAMNIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 68 (1836).
:onua, *Linn. Sp. Pi.* 618.—N. Granat.
»"«, *A. DC. ex DC. Prod.* ix. 254.—Hab.1
fragrant, Schenk, Ind. Sem. Hort. Wireeb. (1861) = Martynia fragrans.
fruticosa, Linn. Sp. PI. 618 = Pentarhaphia Craniolaria.
wtegrifolia, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 726.—Bras.
-niiraeteata, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cm. xi. (1820) 67 *{^Proboscidea unibracteata).—Bns.*

CBAHtO8PEBlCUM, Lehm. Aspetif. 836; Ic. t. SO (1818). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 852.
DIPLOLOMA, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pe"tersb. ii. (1844) 196.
owescens, *DC. Prod.* x. 175.—Sibir.
"tnutum, DC. 1. c.=snbvillosum.
Parviflorum, Decne. in Jacquem. Voy. Bot 126. t. 130 -Moltkia parviflora.
sufallosum, Bunge, Ven. Alt. 8 = canescens.
sabvillosum, *Lehm. Asperif.* 887.—Sibir.

CaAJnOTOME, Reichb. Ic. Exot. i. 39. t. 54 (1824)-*LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1207.
^*avritianum,* Boj. Hort. Manrit. 249-Anisomeles malabarica.
^•scolor, *Reichb. Ic. Exot.* i. 89.—Reg. Himal.

CBANOCAItPTJS, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. J0«-1.28 (1859). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. -'• > 523.
M«tu, *Benth. I. c*—Bras.

CRANTZIA, Lag. ex DC. Sys[t. U„ 609> 627, in syn. (1821).
fr[illegible] & «[illegible] 627 = Morieandia arvensis.-*roleuca.* Lag. ex DC. 1. c. 509-Conringia austriaca.

C[illegible]££TZIA, Nntt. Gen. Am. i. 177 (1818). , *UM-JfLUFERAB,* Benth. & Hook. f. i. 906.
7""«'«. Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 846=Mneata.
""fralicu, F. Mnell. First Gen. Rep. IS, ex Klatt, in lineat[illegible] C[illegible]) 714 lineata.
Nutt. Gen. Am. I. 177.—Am. bor. et anstr.; Austral.
S[illegible]*l"ffgeri,* Hemsi. Biol. Centr. Am. Bot. i.569 = lineata.
87o7"I*a, Schlecht_ m L[illegible]inn«a. »vi. (1853-56) [illegible] neata.

CRANTZIA, Pohl, (Quid?). fa Flora, viii> (1825) 188> nomen

CRANT A, Martin[illegible] (17")-AUoPlectu"> .

CRAN IA Bn 3 77 Sw_ P"*l_ Ve S- Ind- Oix- 38 (1788) = Wttni, Liran.(Euphorb.).
i^<««Sw.l.c.-B.laevigata.
St7f%?\Vahl- S>mb- Bot «99nB- Vahlii-

CRANTZIA, Vahl, ex Baill. Moo. Bux. 87-B. Vahlii.
CRANTZIA, Vell. Fl. Flum. viii. t 163 (1827) = Cantratherum, Cass.
ovata, Vell. l. c.—B

CRANZIA, I>F_Gn«l- Syst. 286 (1791)-CRANTZIA, Sw.=Bi^ usLinn- (Eophorb.).
laevigata, J. F. Gmd. L c. = B. laevigata.

CRANZIA, Schrebl Gen_ ;•143 (1789>" Toddalla, Juss. (RnUe.).
aculeata, Stead- Nom. ed. II. *I* 430=T. aculeata.

CRASPEDIA, Forst_f_^od. 58 (1786). *COMPOSITAE,* Benth. *-Hook. f. ii. 322.
CARTODIUM, xii. (1818) _ex R_Br_h Tnuls, Linn. Soc_
PYCNOSORUS, RICHEA, Labiu v gf_186_«(1798).
alpina, Backh in Hook<Lood_Journ. Bot. vi. (1847) 119=uniflora.
chrysantha, Benth. Fl. Austral. iii. 680—AMtral.
fimbriat DC. Prod_»-152=uniflora.
glauca, -|ren[illegible]_S^ iii. 4[illegible]=C R[illegible]_
globosa, [illegible] *Ft. Austral,* iii. 580.—Austral.

CKASPEDIA:—
gracilis, Hook. f. in Lond. Joam. Bot. vi. (1847) 118 ^ C. Richea.
macrocephala, Hook. Bot Mag. t. 3416=C. Richea.
pilosa, *Spreng. Syst.* iii. 441.—Austral.
plebria. Conn, ex Steud. Nom. ed. II. i. 430 = C.Richea *1*
pleiocephala, *F. MueU. in Linnaea,* xxv. (1862) 404. —Austral.
Richea, *Cass.in Diet. Sc. Nat.* xi. 353.—Austral.; N. Zel.
uniflora, *Forst. f. Prod.* 58.—N. Zel.
viscosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 833. -N.ZeL

CRASPEDOLEPIS, Steud. Syn. PI. Gram. 264 (1855) = Bestio, Linn.
fimbriata, Steud. 1. c = R. Garnottiamis.
Verreauxii, Steud. ex Mast, in DC. Monog. Phan. i. 280 = R. Garnottianus.

CRASPEDORHACHIS, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1377 (1881). *GRAMINBAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1168.
africana, *Benth. t. e.*—Afr. trop.

CRASPEDUM, Lour. Fl. Cochinch. 336 (1790) = £laeocarpus, .Burm. (Tiliac).
tectorium, Lour. 1. c. = E. tectorius.
tinctorium, Steud. Nom. ed. II. i. 430,sphalm.=praec.

CKASPIDOSPEBHTIM:, Boj. ex DC. Prod. yiii. 323 (1844.). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 695.
verticillatum, *Boj. I. c*—Madag.

CRASSA, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 26 (1746)= Anclepias, Linn.

CRASSINA, Scepin, Schediasma de Acido Veget. 42 (1768)-Zinnia, Linn. (Compos.).

CRASSOCEPHALUM, Moench, Meth. 616 (1794)-Oynura, Cass. (1825) (Compos.).
cernuum, Moench, 1. c. = G. cemua.
flatmense, Hochst. & Steud. ex DC. Prod. vii. 268 = Vemonia cinerea.
fiavum, Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. ii. (1834) 265 = Senecio Decaisnei.
sonchifolium, Less. Syn. Cump. 895-> Emilia sonchifolia.
valerianaefblium, Less, in Linnaea, T. (1880) 163 = Erechtites valerianaefolia.

CRASSOUVIA, Comm. ex DC. Prod. iii. 395 (1828) = CRASSUVIA, Comm. = BryophyUum, Salisb. (Crassulac).

CBASSUItA., Dill, ex Linn. Syst. ed. I (1736). *CRASSULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 657.
CRASSULARIA, Hochst ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 80 (1867).
CURTOGYNB, Haw. Revis. PI. Succ. 8 (1821).
DASYSTEMON, DC. Prod. iii. 382 (1828).
GLOBULEA, Haw. Syn. PL Succ. 60 (1821).
GOMARA, Adans. Fam. ii. 248 (1763).
LAROCHEA, Pen. Syn. i. 387 (1805).
PETROGEITON, Eckl. & Zeyh. Enum. 291 (1837).
PURCOSEA, Haw. in Phil. Mag. iii. (1828) 184.
RUCHEA, DC. Prod. iii. 393 (1828) partim.
SARCOLIfES, EckL *Sc* Zeyh. Enum. 290 (1837).
SEPTAS, linn. PI. Afr. Ra.. 10 (1760); Amoen. Acad. vi. 87 (1764).
SPHAERITIS, Eckl. & Zeyh. Enum. 299 (1837).
TETRAFHYLE, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 292 (18371.
THISANTHA, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 302 (1887).
abyssinica, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.* 309.—Afr. trop.
acuminata, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 349 =corymbulosa.
acutifolu, *Lam. Encyc.* ii. 175.—Afr. austr.
adscendens, *Thunb. in Nov. Act. Nat. Cur.* vL (1778) 341.—Afr. austr.
Agardhiaoa, *Roem. (f Schult. Syst.* vi. 718.—Hispan.
alba, *Forst. Fl. Aegypt. Arab.* 60.—Arabia.
alba, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 480-albiflora.
albicaulis, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 353.—Afr. austr.
albiflora, *Sims, Bot. Mag.* t. 2391.—Afr. austr.
alooides, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 394.—Afr. austr.

CRASSTTIiA.:—
alpestris, *Linn.f. Suppl.* 189.—Afr. austr.
alpina, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 253.—Afr. austr.
alteraifolia. *Linn. Sp. PI.* 283.—Afr. austr.
andegavensis, DC. Fl. Fr. vi. 522 = Sedmn andegavense.
anguina, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 348.—Afr. austr.
anthurus, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 338 —perforata.
arborea, *Medic. Beobacht.* (1783) 304.—Afr. austr.
arborescens, *Willd. Sp. PI.* i. 1564.—Afr. austr.
argentea, *Linn./. Suppl.* 188.—Afr. austr.
artieulata, Zuccagni, in Roem. Collect. 186=portulacea.
ascendens, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 368 - adscendens.
atropurpurea, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1081-portulacea.
barbata, *Linn.f. Suppl.* 188.—Afr. anstr.
bergioidet, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii 852.—Afr. austr.
bibracteata, Eckl. *Sc* Zeyh. Ennm. 295=densifolia.
bibracteaU, *Haw. in Phil. Mag.* (1824) 186.—Afr. austr.
biconvexa, *Haw. Misc.* 176.—Afr. austr.
biplanata, *Haw. in. Phil. Mag.* (1824) 186.—Afr. austr.
Bolusii, *Hoot./. Bot. Mag.* t. 6194.—Afr. austr.
bonariensis, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 140 —Tillaea peduncularis.
brachypetala, *E. Mey. ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 854.-Afr. austr.
brevifolia, *Harv. 1. c.* 339.—Afr. austr.
bullata, *Haw. Rev. PI. Succ.* 11.—Afr. austr.
bullulata, *Haw. 1. c.*—Afr. austr.
Burmanniana, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1082.—Afr. austi.
caerulata, J. F. Gmel. Syst. 618=crenulata<
caespitosa, Auct. vide *cespitosa.*
caffra, Linn. Mant. ii. 222-fruticulosa.
caffraria, Hunnem. ex Link *Sz* Otto, Ic. PI. Sel. i. 40 - corymbulosa.
calidna, Desf. Tabl. ed. II. 187.—Austral.
campestris, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 361 - Tillaea phamaceoides.
campestris, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 253.—Afr. austr.
canescens, *Roem. V Schult. Syst.* vi. 734.—Afr. austr.
capensis, Baill. Hist. PI. iii. 812=C. Septas.
capillacea, *B. Mey. ex Harv. tr Sond. Fl. Cap.* ii. 381. —Afr. austr.
capitata, Lam. Encyc. ii. 171 «=cymosa.
oapitata, *Salm-Dyck, Cat.* (1820) 14.—Afr. austr.
capitella, *Linn./. Suppl.* 190.—Afr. austr.
capitellata, DC. Prod. iii. 887-capitella.
capitellata, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 844 =lasiantha.
centauroides, *Linn. PI. Afr. Rar.* 9.—Afr. austr.
cephalophora, *Linn.f. Suppl.* 190.—Afr. austr.
cespitosa, Cav. Ic i. 60-Sedum caespitosum.
chloraefolia, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1032 ^Grammanthes gentianoldes.
ciliata, *Linn. Sp. PI.* 283.—Afr. anstr.
clavifolia, *E. Mey. ex Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 360. —Afr. austr.
coccinea, Linn. Sp. PI. 282 - Rochea coccinea.
columnaris, *Linn.f. Suppl.* 191.—Afr. austr.
concinna, *Haw. Rev. PI. Succ. 19D.*—Afr. austr.
concinnella, *Haw. in Phil. Mag.* (1823) 381.—Afr. anstr.
connata, Donn, Hort. Cantab, ed. III. 62 = perfossa.
Cooperi, A?;/, *Gartenfl.* (1874) 36. t. 786.—Afr. austr.
corallina, *Linn.f. Suppl.* 188.—Afr. austr.
cordata, Lodd. Bot. Cab. t. 359=spathulata.
cordata, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 396.—Afr. austr.
cordata, Thunb. Prod. PI. Cap. 57-neglecta.
coronata, Heynh. Nom. ii. 165—perfossa.
corymbulosa, *link, Enum. Hort. Berol.* i. 801.—Afr. austr.
Cotyledon, Haw. Syn. PI. Succ 56 = C. Cotyledonis.
Cotyledon, Jacq. Misc. ii. 295-arborescens.
cotyledonifolia, Salisb. Prod. 309 -arborescens.
Cotyledonis, *Linn.f. Suppl.* 190.—Afr. austr.
crenata, Desf. Choix, 76. t. 58 = Sedum crenatum.
crenulata, *Linn.f. Suppl.* 189.—Afr. austr.
cultrata, *Linn. Sp. PI.* 288.—Afr. austr.
cymos», *Berg. Desc. PI. Cap.* 84.—Afr. austr.
dasyphylla, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* it. 865.—Afr. austr.

CRASSTTLA:—

debilis, *Thunb. Fl. Cap.* 280.—Afr. austr.
decumbens, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 802—Afr. anstr.
decumbens, Thnnb. Prod. PI. Cap. 54=Tillaea decumbens.
decussata, Hort. ex DC. Prod. iii. S98 = fclcata.
decussata, Salisb. Prod. 309=tetragona.
decussata, *Sfireng. Syst.* i. 966.—Afr. austr.
dejecta, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 16. t 433.—Afr. austr.
deltoidea, *Linn./. Suppl.* 189.—Afr. anstr.
densifolia, *Han. in Hare,* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 840.—Afr. anstr.
dentata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 57.—Afr. austr.
dependens. *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 891.—Afr. austr.
diaphana, *E. Mey. ex Haro. V Sond. Fl. Cap.* ii. 355.—Afr. austr.
dichotoma, Linn. PI. Afr. Rar. 9; Amoen. Acad. vi. 86 - Grammanthes gentianoides.
dichotoma, Lino. f. Snppl. 188—ramosa.
diffusa, Lam. Fl. Fr, iii. 80~Sedumcaespitosum.
diffusa, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 395.—Afr. anstr.
divaricata, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 296.—Afr. anstr.
Dregeana, *Ham. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 346.—' Afr. austr.
Ecklonii, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1032 = Grammanthes gentianoides.
ericoides, *Haw. in Phil, Mag.* (1825) 30.—Afr. austr.
exilis, *Han. in Han. & Sond. Fl. Cap.* ii. 847.—Afr. austr.
expansa, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 390.—Afr. anstr.
falcata, *Wendl. Beobacht.* 44.—Afr. austr.
fascicularis. Lam. Encyc. ii. 171=Rochea fascicularis.
filicaulis, *Haw. in Phil. Mag.* (1824) 186.—Afr. austr.
filiformis, D. Dietr. Syn. PI. it. 1022 - Grammanthes gentianoides.
flabellifolia, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 357.—Afr. austr.
flava, *Linn. Mant.* i. 60.—Afr. anstr.
fruticosa, Mill Gard. Diet ed. VIII. n. 8=Euryops tenuissimus.
frnticulosa, *Linn. Mant.* i, 61.—Afr. austr.
furcate, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 253.—Afr. austr.
gentianoides. Lam. Encyc. ii. 176 = Grammanthes gentianoides.
glabra, *Haw. Syn. PI, Succ.* 68.—Afr. anstr.
glabrifolia, *Han. in Han. (r Sond. Fl. Cap.* it 881.—Afr. austr.
globiflora, Spreng. Syst i, 971-C. Septas.
globnlarioides, *Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 389.—Afr. trop.
globuli/olia, Steud. Nom, ed. II. i. 431=Sedum andegavense.
glomerata, *Berg. Desc. PI. Cap.* 85; *Linn. Mant.* i. 60.—Afr. anstr.
hemisphaerica, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 57.—Afr. anstr.
birta, *Thunb. Fl. Cap.* 284.—Afr. austr.
hirtipes, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 361.—Afr. austr.
hispida, *O. Dietr. Syn. PI.* ii. 1031.—Afr. austr.
imbricata, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 8.—Afr. austr.
imbricata, [Soland. in] Ait. Hort. kew. ed. I. i. 398 = lycopodioides.
impressa, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1879) II. 328.—Afr. austr.
impressa, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1081.—Afr. austr.
inanis, Thnnb. Prod. PL Cap. 54 = Tillaea capensis.
incana, *Eckl.* b* *Zeyh, ex Han.* b" *Sond. Fl. Cap.* ii. 869.—Afr. anstr.
indica, *Decne. in Jacquem. Voy. Bat.* 61.—Reg. Himal.
interrnpta, *E. Mey. ex Ham.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 361.—Afr. austr.
jasminea, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 2178=Rochea jasminea.
jasminiflora, Haw. in Bot. Mag. sub t. 2178=Rochea jasminea.
lactea, *[Soland. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I. i. 496.—Afr. anstr.
lanceolata, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 254.—Afr. anstr.
Unnginosa, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 847.—Afr. anstr.
lasiantha, *S. Mey. ex Han. I. e.* 344.—Afr. anstr.
Ugnlaefolia, *Haw. Misc.* 176.—Afr. anstr.

CBASSTJXA:-

lineolata, *[Soland.in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 390.—Afr. austr.
Lingua, *D. Dietr. Syn. PI.* it 1031.—Afr. austr.
linguaefoHa, *Haw. Misc.* 175.—Afr. anstr.
Lingula, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1031.—Afr. austr.
littoralis, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 258.—Afr. austr.
lucida, Lam. Encyc. ii. 173=spathulata.
lydoides, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 351 = lycopodioides.
lycopodioides. *Lam. Encyc.* ii. 173.—Afr. austr.
Magnolii, DC Fl. Fr. Snppl. 522=Sedum caespitosum.
Mannii, Hook. f. in Jonm. linn. Soc. vii. (1864) 193 =abyasinica.
margaritifera, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 362.—Afr. anstr.
marginalis, *[Soland. in) Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 396.—Afr. austr.
marginata, Thunb. Prod. PI. Cap. 56=marginalis.
media, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1032^Rochea versicolor.
mesembryanthemoides, *D. Dietr. 1. c.* 1081.—Afr. austr.
Meyeri, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 344.—Afr. austr.
micans, *Vahl, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1886) 469.—Madag.
microcarpa, *Sibth.* b* *Sm. Fl. Grate. Prod.* i. 217.—Syria.
minima, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 854—centauroides.
minima, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 57.—Afr. austr.
mollis, *Linn. f. Suppl.* 189.—Afr. austr.
tnongolica, *Franck. PI. David.* L (1884) 127.—Mongolia.
montana, *Linn./. Suppl.* 189.—Afr. anstr.
monticola, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1882) II. 264.—Afr. austr.
moschata, Forst. in Comm. Gotting. ix. (1789) 26= Tillaea moschata.
multicava, *Lent. Illustr. Hortic.* ix. (1861) *Misc.* 40.—Afr. austr. ?
multiceps, *Han. in Han.* b" *Sond. Fl. Cap.* ii. 359.—Afr. austr.
muricata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 55.—Afr. austr.
muscosa, *Linn. PI. Afr. Rar.* 10.—Afr. austr.
muscosa, Roth, Enum. PI. Phan. Germ. i. 994=Tillaea mnscosa.
natans, Thunb. Prod. PI. Cap. 54 = Tillaea capensis.
neglecta, *Roem.* b* *Schult. Syst.* vi. 722.—Afr. austr.
nemorosa, *Endl. in Walp. Rep.* it 253.—Afr. anstr.
nivalis, *Endl. I. c*—Afr. austr.
nudicaulis, *Linn. Sp. PI.* 283.—Afr. anstr.
nummulariaefolia, *Baker, in Journ. linn. Soc.* xx. (1883) 138.—Madag.
ob/alcata, Hort ex Willd. Enum. Hort. Berol. 342 = obvallata.
obliqua, Haw. in Andr. Bot. Rep. t 414=falcata.
obliqua, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed. I. i. 393=portulacea.
obovata, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 17.—Afr. austr.
obtusa, *Haw. 1. c.* 16.—Afr. austr.
obvallaris, Hort. ex DC. Prod. iii. 391 = seq.
obvallata, *Linn. Mant.* i. 61.—Afr. austr.
odoraiissima, Andr. Bot. Rep. t. 26 = Rochea odoratissima.
orbicularis, *Linn. Sp. PI.* 288.—Afr. austr.
mata, E. Mey. ex. Harv. & Sond. FL Cap.ii. 348 = sannentosa.
pallida, *Baker, in. Gard. Chron.* (1874) I. 786.—Afr. austr.
paniculata, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1031—Afr. austr.
parviflora, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 854 ••expansa.
parvula, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 253.—Afr. anstr.
patens, *Endl. I. c.*—Afr. austr.
pellucida, Jacq. Fragm. t. 44. f. S»centanroides.
pellucida. *Linn. Sp. PL* 283.—Afr. austr.
peploides, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 355.—Afr. austr.
perfilata, Scop. Delic. Insub. iii. 12=perfossa.
perfoliata, *Linn. Sp. PI.* 282.—Afr. austr.
perforata. *Linn./. Suppl.* 190.—Afr. austr.
per/orata, E. Mey. ex Harv. & Sond. FL Cap ii. 844 = stachyera.
perfossa, *Lam. Encyc.* it 173.—Afr. austr.
per/ossa, E. Mey. ex Harv. *If* Sond. Fl. Cap. ii. 347 = cordata.
Petrogeton, *Walp. Rep.* ii. 252.—Afr. austr.

CRASSUI.A :—

pharnaceoides, C. A. Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop. viiL 56 = Tillaea pharnaceoides.
pinnata, Linn. f. Suppl. 191 — Bryophyllum calycinura.
pinnata, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 181.—Cochinch.
platyphylla, *Han. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 363.—Afr. austr.
polpodacea, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 253.—Afr. austr.
Portuldcaria, linn. Sp. PL ed. II. 406 = Portulacaria afra.
Portulacastrum, Harv. in Harv. b* Sond. Fl. Cap. ii-386=Portulacaria afra.
poitulacea, *Lam. Encyc.* ii. 172.—Afr. austr
pro/usa, Hook. f. Bot. Mag. t. 6044= marginalis.
propinqua, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 253.—Afr. austr.
prostrata, *E. Mey. ex Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 354.—Afr. austr.
prostrata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 54.—Afr. austr.
pruinosa, *Linn. Mant.* i. 60.—Afr. austr.
puberula, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 - abyssinica.
pubescens, Endl. in Walp. Rep. ii. 252 = C. Sarcolipes-pubescens, *Linn./. Suppl.* 190.—Afr. austr.
pubescens, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. & 360=incana.
pulchella, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed.I i. 892.—Afr. austr.
punctata, *Linn. Syst. Nat.* ed. X. 969.—Afr. austr.
punctata, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7= perfossa.
pyramidalis, *Linn.f. Suppl.* 189.—Afr. austr.
quadrangula, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 253.—Afr. austr.
quadrifida, *Baker, in Sound. Re/ug. Bot.* t. 398.—Afr. anstr.
radicans, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1031.—Afr. austr.
ramosa, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 390.—Afr. austr.
ramuliflora, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 801.—Af'-austr.
retroflexa, *Ait. Hort. Kew.* ed. II. ii. 194.—Afr. austr.
retroflexa, Linn. f. Suppl. 188; Thunb. Prod. PL Cap-55 = Grammanthes gentianoides.
retroflexa, Meerb. PL Select, t. 16 = falcata.
revolvens, *Haw. in Phil. Mag.* (1824) 188.—An-austr.
rosularis, *Haw. Rev. PI. Succ.* 13.—Afr. austr.
rotundifolia, *Haw. in Phil. Mag.* (1824) 188.—AB-austr.
rubens, Linn. Syst. Nat. ed. X, 969=Sedum rubens.
rubicunda, *E. Mey. ex Han.* b[1] *Sond. Fl. Cap.* ii. >**• —Afr. austr.
rnbricaulis, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 296.—Afr. anstr.
rupestris, *Linn./. Suppl.* 189.—Afr. anstr.
sarcocaulis, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 295.—Afr. austr.
Sarcolipes, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 8*6.—Afr. austr.
sarmentosa, *Han. 1. c.* 348.—Afr. austr.
Saxifraga, *Han. 1. c.* 357.—Afr. austr.
scabra, *Linn. Sp. PI.* 283.—Afr. austr.
scabrella, *Haw. Rev. PI. Succ.* 11.—Afr. austr.
Schimperi, C. A. Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. till. - Tillaea pentandra.
Schkuhrii, Roth, Enum. PL Phan. Germ. i. 99[5]* Tillaea aquatica.
scleranthnides, Burra. f. Fl. Cap. Prod. 8=glome»U.
Scutellaria, *Burm./. Fl. Ind.* 78.—Ind. or.
sediflora, *Endl. in Walp. Rep.* ii. 254.—Afr. austr.
sediformis, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 80.—Afr. trop.
sediodes, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9 = orbicular*
semiorbicularis, *EckKV Zeyh. Enum.* 296.—Afr. a
Septas, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 57.—Afr. austr.
setulosa, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii- •*
Afr. austr.
sparse, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. >• SB
Afr. austr.
spathulata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 67.—Afr. • M'^ 869
Sphaeritis, Harv. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. cymosa.
spicata, *Linn.f. Suppl.* 189.—Afr. austr.
spinosa. Linn. Mant. ii. 888 " Cotyledon spinosa.
squamulosa, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap-346 > Dregeana.
squamulosa, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl- V>-* Afr. austr.
stachyera, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 297.—Afr. ****:.*
strigosa, Drige, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. Ü- lanuginosa.
strigosa, Linn. PI. Afr. Rar. 10; Amoen. Acad. " 86 - glomerata I

CBA8STTLA:-
subaphylla, *Harv. in Harv. &• Sond. Fl. Cap.* U. 862. —Afr. austr.
subincana, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1081.—Afr. austr.
subulata, Eckl. & Zeyh. Enum. 298 = cymosa.
subulata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 862= lillaeasnbulata.
subulate, *Linn. Syst. Nat.* ed. X. 969.—Afr. austr.
sulcata, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1031.—Afr. austr.
swphurea, *Kunte, in Linnaea,* xvii. (1848) 573.—Afr. austr.
Uingrebliana, Hort. ex DC. Prod. iii. 898=falcate.
A ? " *1 *Lieht_ in Rcem_ v Sckult. Syst.* vi. 726.—Afr. austr.
Jecta, *Linn.f. Suppl.* 180.-Afr. austr.
naephioides, *Haw. Rev. PI. Succ.* 9.—Afr. austr.
tetragona, *Linn. Sp. PI.* 288.—Afr. austr.
rhunbergiana, Roem. & Schult. Syst. vi. 738-Tillaea decumbens.
wyrsiflora, *Linn.f. Suppl.* 190.—Afr. austr.
tomentosa, *Linn.f. I. c*—Afr. austr.
U, Baker, in Sound. Refug. Bot. t. 154.—Afr.
fcachysantha, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 362. —Afr. austr.
rarnta, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 5C—Afr. austr.
Umbella, *Jacq. Coll.* iv. 172.—Afr. austr.
umbellate, *Tkunb. Prod. PI. Cap.* 54—Afr. austr.
«»efete, DC. Prod. iii. 892, in syn.=dejecta.
Kiolate, *Haw. Misc.* 176,-Afr. austr.
gluta, *Eckl. b- Zeyh. Enum.* 298.—Afr. austr.
%*?"»» oth, Enum. PI. Phan. Germ. *I* 992 = Tillaea Vaillantii.
T"rsicolor, Bureh. ex Bot. Reg. t. 820=Rochea versicolor.
verticillata, Linn. Syst Nat. ed. XII. 280 = Sednm caespitosum.
viciu, Linn.f. Suppl. 188.—Afr. austr.
vinjata, Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap. ii. 860.— Afr. austr.
Whjteheadii, *Harv. I. c.* 346.-A&. austr.
^hen, *Harv. I. c.* 377.-A&. austr.

CRASSULARIA, **Hochst. ex Schweinf.** Beitr. Fl. **Aethwp. 80 (1867)**= Oo*Billa, Dill. *"""/omits,* Hochst. 1. c-Crassula sediformU.

CRASSUVIA, Comm 1 (1786) = Bryoph ll m , Salisb. (1805) (Crassul.).
floripend *Comm_ ex hxm_ L c--8_* calycin um.
floripendula, Sims, Bot Mag. t. 1409=praec.

CRATAEGU Ton™, ex Linn. Syst. ed. I (1785). ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 626.
fl M Roem Syn- faso ill- (Rosifl -> 104> film, -847).
SEA LACEOS Wenzi & " Linnaea, xxxviii. (1874) 164.
TISUiA Hance, in Joum Bot *v- (1877) 207.
ALIA los , fa BulL Bot_ Fr_xviii< 1871) 178.
*jf? Moench, Vert Ausl. Baeume, 81 = coriata.
*nat Des£ ex stend_ Nom_ «d- H. i. 431 = ?—neaster acuminate.
aestivalis, *Torr. & Gray,* Fl. N. Am. i. 468.—Am. bor.
alnifolia, Hort. ex Lavall Albor_ SeP**- 18-cuneata.
alnifolia, Sieb. & Zucc. in Aih. Akad. Muench. iv. II. (1848) ??—Japon.
attest, Koch, Dendrol. i. 144 = C. *alpina,* S. F. G»y.Nat Arr. Brit. PI. ii. 664=Pyms Aria.
alpina, Chan Dirt rf VUL n 8 Pyrus
altaica nbi Encyc Trees, 863 = sanguinea.
Amelanchier, Desf. Hist. Arbr. i. 149 = Amelanchier canadensis.
amoena, Salisb. Prod. 357-Amelanchier canadensis.
an- ustifolia, Borckh. C. us-galli.
apiifolia, Medic. GesclL 88 » C. Oxyacantha.
*apiifolia, Michx. FL Bor_ An_* «• 287.-Am. bor.
arborescens, *Ell. Sketch-* 550._Am. bor.
arbutifolia, Desf. ex Pyrus densiflora. 431 =
arbutifolia, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 202 = Photinia arbutifolia.

CRATAEGUB:—
arbutifolia, Lam. Encyc i. 83=Pyrus arbutifolia.
Aria, linn. Sp. PI. 475-Pyrus Aria.
Aronia, Bosc, in DC. Prod. ii. 629 = C. Azarolus.
Aronia, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sêr. II. iii. (1835) 264 —sinaica.
atrofusca, Stev. ex Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1839) 366-pentagyna.
atropurpurea, Stev. ex Nym. Consp. 244-C. Oxyacantha.
Aucuparia, Salisb. Prod. 857-Pyrus Ancuparia.
ustera, Salisb. 1. c.=Pyrus domestica.
axillaris, Pen. Syn. ii. 89=C. Pyracantha.
Atarella, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 88 = C. Oxyacantha.
Azarolus, *Linn. Sp. PI.* 477.—As. Min.; Persia,
berberifolia, *Torr. V Cray, Fl. N. Am.* i. 469.—Am. bor.
Bibas, Lour. Fl. Cocbjnch. 819 = Eriobotrya fragrans.
Bosciana, M. Roem. Syn. Rosifl. iii. 119-C. Crns-galll
brachyacantha, *Engelm. in Coult. Bot. Ga*.* vii. (1882) 128.—Am. bor.
brevispina, Dougl. ex Stend. Nom. ed. IL i. 432 = Douglasii.
brevispina, *Kunee, in Flora,* xxw. (1846) 737.—Hispan.
Calpodendron, Borckh. in Roem. Archiv. i. III. 87 = tomentosfl.
calycina, Petenn. ex Nym. Consp. 244 «C. Oxyacantha.
caroliniana, Pers. Syn. ii. 36 = flava.
Celsiana, Bosc, in Nouv. Corns ACT. ii. 223-nigra.
Chamaemespilus, Jacq. Enum. Vindob. 86; 243 = Pyrus Chamaemespilus,
chinensis, Steud. Nom. ed. II. i. 432 -Raphiolepis indica.
ehlorocarpa, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) 17=coccinea.
chlorosarca, *Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* liv. (1879) I. 20.—Manchur.
Clarkei, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 383.—Reg. Himal.
cocdnea, *Linn. Sp. PI.* 476.—Am. bor.
corallina, Hort Par. ex Pers. Syn. ii. 36=cordata.
cordate, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 168.—Am. bor.
coriacea, Soland. in Trans. Linn. Soc. ziii. (1822) 104 •« Chamaemeles coriacea*
coronaria, Salisb. Prod. 357=Pyrus coronaria.
Cotoneaster, Borck. in Roem. Arch. i. III. 87 - Cotoneaster integerrima.
Coursetiana, M. Roem. Syn. Rosifl. 117 = C. Crus-galli.
crenulata, *Roxb. Hort. Beng.* 38; *Fl. Ind.* ii. 509.—Reg. Himal.
cretica, Desf. Choix, 79 = Amelanchier vulgarls.
Crus-galli, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 194 = coccinea.
Crus-galli, Duroi, Harbk. Baumz. ed. I. i. 183 = tomentosa.
Crus-galli, *Linn. Sp. PI.* 476.—Am. bor.
cuneata, *Sieb. V Zucc. in Aih. Akad. Muench.* iv. II. (1843) 180.—Japon.
cuneifolia, Borckh. in Roem. Arch. i. III. 86 = tomentosa.
cuspidata, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 106=Pyrus vestita.
densiflora, Desf. ex C. Koch, Dendrol. i. 186-Pyrus arbutifolia 1
dentata, Thuill. Fl. Par. 245 = Pyrus rotundifolia.
depressa, *Presl, Epim. Bot.* 204__Peruv.
digyna, Pall, ex Ledeb. FL Ross, ii. 88 = C. Oxyacantha.
dissecta, Borckh. in Roem. Arch. i. III. 86 - C. Oxyacantha.
diversifolia, Steud. Nom. ed. L 234=C. Oxyacantha.
Douglasii, *Lindl. Bot. Reg.X.* 1810.—Am. bor. occ.
dumosa, Salisb. Prod. 357 = C. Pyracantha.
edulis, Lodd. ex Moench, Verz. Ausl. Baeume, 80 - Pyrus edulis.
elegans, Poir. Encyc. iv. 439 = C. Oxyacantha.
elliptica, Ell. Sketch, i. 549 - aestivalis.
elliptica, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 168 - flava.
eriocarpa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 157.—Afr. bor.
escalloniaefolia, *Schleckt. in Linnaea,* xxviii. (1866) 468.—Peruv.
excelsa, Salisb. Prod. 357-Pyrus communis.

CKATAEOU8:—
fennica, Kalm, in Linn. Fl. Suec. ed. II. 167 = Pyrus intermedia.
ferruginea, Pers. Syn. il. 37 - Eriobotrya cordate.
fissa, Bosc, ex DC. Prod, ii, 628 = C. Oxyacantha.
flabellata, Heldr. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 114=orientalis.
flabellifolia, Spach, Hist Vég. Phan. ii. 103-Pyrus intermedia.
flava, Hook. Fl. Bor. Am. i. 202 (excl. syn.)=tomentosa.
flava, *{Soland.* »n] *Ait. Hort. Kew.* ed. II. ii. 19.—Am. bor.
flavescens, *Bosc, in DC. Prod.* Ii. 630.—Hab. f
flexuosa, Poir. Encyc. Suppl. iv. 78=tomentosa.
flexuosa, Schwein. in Long, Exped. Winnep. ii. 387 — tomentosa 1
florentina, Zuccagni, in Roem. Collect. 142=Pyrus crateegifolia.
floribunda, C. Koch, Dendrol. i. 149= coccinea.
Fontanesiana, Stend. Nom. ed. II. i. 432 = C. Crus-galli.
glabra, Thunb. Fl. Jap. 205=Photinia serrulate.
glandulosa, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. Nachtr. 278 = C. Oxyacantha.
glandulosa, *Moench, Vert. Ausl. Baeume,* 31.—Am. bor.
glandulosa, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 169 -flava.
glandulosa, Willd. Sp.PI. Ii. 1002, partim=coccinea.
glauca, Wall. Cat. n. 673=Stranvaesia glaucescens.
glomerate, *Booth, in Linnaea,* xxiv. (1861) 185.—Hab. ?
graeca, Spach, Hist Vég. Phan. ii. 102=Pyrus Aria.
granatenRis, *Boiss. Elench.* 41.—Hispan.
grandiflora, *Hort. Belg. ex Hornem. Enum. PI. Hort. Hafn.* 13.—Hab. *1*
grandiflora, *C. Koch, in C. Koch V Fint. Wochenschr.* (1859) 374.—Reg. Caucas.
grata, Salisb. Prod. 357=Pyrus Mains.
Heldreichii, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 47=tenacetifolia.
heterophylla, Flnegg. in Ann. Mus. Par. xii. (1808) 423. t. 38-C. Azarolus.
heterophylla, Stev. Taur. 147=C. Oxyacantha.
hiemalis, *Lange, in Bot. Tidss.* xiii. (1882-83) 20.—Europ.
hirsuta, Schnr, Enum. PI. Transs. 206=C. Oxyacantha.
horrida, Medic. Gesch. 84 - C . Crus-galli.
Hostii, Hort. ex Carr. Rev. Hortic. (1873) 470-Pyrus intermedia.
humilis, Lam. Fl. Fr. Iii. 485-Pyrus Chamaemespilus.
hybrida, Linn. Fauna Suec. it App. 567'Pyrus intermedia.
hypolasia, C. Koch, Dendrol. i. 132=mexicana.
hyracantha, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) I. n. 2. p. 248, err. typ. = C. Pyracantha ?
indica, Linn. Sp. PI. 477 = Raphiolepis indica.
inermis, Linn. Fl. Lapp. 199= Pyrus intermedia.
Insegnae, *Bertol. Fl. Hal.* vii. 629.—Ital.
integrifolia, Roxb. Fl. Ind. ii. 509-Cotoneaster microphylla.
intermedia, Fuss, Fl. Transs. 211 = Pyrus intermedia.
kyrtostyla, Fing. ex Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 372 - C . Oxyacantha.
laciniata, Borkh. Handb. Forstb. il. 1855=C. Oxyacantha.
ladniata, *Stev. in Bess. Enum. PI. Volh.* 38.—Tauria.
laciniata, Ucria, in Roem. Arch. i. III. 69 - tenacetifolia.
laevigata, DC. Prod. ii. 630 - C . Oxyacantha.
laevis, Thunb. Fl. Jap. 204-Photinia laevis.
lagenaria, Fisch. *Sc* Mey. in Bnll. Soc. Nat. Mosc. (1888) 367 - C . Oxyacantha.
lasiocarpa, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1881) 103.—Hispan.
latifolia, Lam. FL Fr. iii. 486 = Amelanchier vulgaris.
latifolia, Pers. Syn. ii. 37=tomentosa.
laurifolia, Medic. Gesch. 84-=C. Crus-galli.
Lavallei, *Hirincq, ex Lavall. Arbor. Segrez.* 21.17.—Hab.?
Lenneana, *Ware*, in Otto If Dietr. Allg. Garten*, xx. (1852)292.—Hab.»
leucophleos, Moench, Verz. Ausl. Baeume, 31 — tomentosa.
linearis, Pers. Syn. ii. 37 = C. Crus-galli.
lobata, Bosc, Nouv. Coura Agr. ii. 283; et in DC. Prod. ii. 628 -grandiflora.

CRATAEOUS:—

longifolia, DC. Prod. ii. 636, in syn. •= Pyrus Aria.
lueida, Ell. Sketch, 649-aestivalis.
lucida. Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 6 = C. CmsgalU.
Lndgl. (*Carr. in Rev. Hortic.* (1876) 199.—Calif.
lutea, Poir. Encyc. Suppl. iv. 72=tomentosa.
macracantha, Lodd. in Loud. Arb. Brit. ii. 1819 = cocciuea.
macroearpa, Hegetsch. Fl. Schw. 464 = C. Oxyacantha.
mandshurica, Hort. Bnek, ex Maxim, in Ball. Soc. Nat. Mosc liv. (1879) I. 20=chlorosarca.
maroccana, Lindl. Bot. Reg. t. 1855-sinaica.
maroccana, Pers. Syn. ii. 37—C. Oxyacantha.
maura. Linn. f. Snppl. 258 = C. Oxyacantha.
melanocarpa, Bieb. fl. Taur. Cauc. i. 886 = pentagyna.
melanocarpa, Bory & Chaub. Fl. Pflop. 61 •= Heldreichii.
mexicana. *Maç. (f Sesse, ex DC. Prod.* ii. 629.—Mexic.
Michauxii, Pers. Syn. ii. 88 = flava.
microcarpa, Lindl. Bot. Reg. 1.1846 = spathnlata.
mollis, Scheele, in linnaea, xxi. (1848) 569 = subvillosa.
monogyna, Jacq. Fl. Austr. iii. 50. t. 292. f. 1«= C. Oxyacantha.
monopyrena, Pall. Reise, i. 349 = praec. ?
multiflora, Hort. ex Laval]. Arbor. Segrez. 57 = heterophylla.
myrtifolia, *Presl, Epim. Bot.* 203.—Pernv.
nigra, Pall, ex Stend. Norn. ed. II. i. 433 = C. Oxyacantha.
nigra, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* i. t. 61.—Hungar.
nobilis, S. G. Gmel. Reise, i. 82-pentagyna.
nudiflora, Nntt. ex Torn & Gray, Fl. N. Am. i. 468-aestivalis.
obovatifolia, M. Roem. Syn. Rosifl. 120—tomentosa.
obtusata, Spach, Hist. Veg. Phan. ii. 104=Pyrus Aria.
obtusifolia, Pers. Syn. ii. 37 — Osteomeles glabrata.
odorata, Bosc, Cours Nouv. Agr. ii. 221 = tanacetifolia.
odoratissima, G. Don, Gen. Syst. ii. 601=orientalis.
odoratissima, Homem. Hort. Hafn. Snppl. 62-•tanacetifolia:
Oliveriana, Bosc, ex DC. Prod. ii. 680=pentagyna.
opaea. Hook. & Am. ex Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835)25=aestivalis.
orientalis, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 387.—Graecia; As. Min.
ovalifolia, Homem. Hort. Hafh. Suppl. 52=C. Crusgalli.
ovalis, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 686.- Enrop.
Oxyacantha, *Linn. Sp. PI.* 477.—Europ.; As. temp.
Oxyacantha, Walt. Fl. Carol. 147 = apiifolia.
oxyacanthoides, Thuill. Fl. Par. 245=C. Oxyacantha.
Pallasii, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 89-pentagyna.
pallida, Salisb. Prod. 357 = Pyrus Aria,
parvifolia, *[Soland. in] Ait. Hort. Kea.* ed. I. ii. 169.—Am. bor.
parvifolia, Willd. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 469 = aestivalis?
pauciflora, Pers. Syn. ii. 87 = C. Pyracantha.
pectinata, *Bosc, ex DC. Prod.* ii. 680.—Reg. Caucas.; Persia,
pentagyna, *Waldst. V Kit. in Willd. Sp. PI.* ii. 1006.—Europ.
pkaenopyrum, Borckh. in Roem. Arch. i. III. 86-cordata.
pinnatifida, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. ii. (1835) 11 = pentagyna.
pinnatiloba, *Lange, in Bot. Tidssir.* xiii. (1882-83) 22.—Reg. Caucas.
platyphylla, Lindl. ex Hohen. Enum. Talnesch. 130 = pentagyna.
Poiretiana, DC. Prod. ii. 630-=glandulosa.
pomifera, Georgi, It. i. 25-Pyrus baocata.
poniica, C. Koch, in Verh. Bef. Gartenb. Ver. n. i. 269-•C. Azarolus.
polyacantha, Jan, ex Nym. Consp. 244=C. Oxyacantha.
populi/olia, Ell. Sketch, i. 553 - coccinea.
populifolia, Walt. Fl. Carol. 147-cordata.
pruinosa,V/endl in Flora, vi. (1823) 501-glandnlosa.
prunellifolia, Bosc, ex DC. Prod. ii. 627-C. Crusgalli
pruni/olia, Bosc, 1. c.=C. Crus-galli.

CRATAEOUS:—

Pseudaria, Spach, Hist. Veg. Phan. ii. 108«Pyrus Aria.
pubescens, *Steud. Norn.* ed. II. i. 483.—Mexic.
punctata, Jacq. Hort. Vindob. i. 10=tomentosa.
punicea, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. 433 = C. Oxyacantha.
purpurea, Bosc, ex DC. Prod. ii. 628-sanguinea.
pycnoloba, *Boiss. b" Heldr. Diagn.* Ser. II. ii. 46.—Graecia.
Pyracantha, Brandis, For. Fl. 208 - crenulata.
Pyracantha, *Medic. Gesch.* 84.—Europ.
pyracanthifolia, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 209 = C. Crus-galli.
pyrifolia, Lam. Encyc. i. 84—Pyrus angustifolia.
pyrifolia, Moench, Verz. Ausl. Baeume, 30=Pyrus arbutifolia.
pyrifolia, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 168 = tomentosa.
quitensis, Benth. PI. Hartw. 173.—Ecuador.
racemosa, Lam. Encyc. i. 84 = Amelanchier canadensis.
ribesius, Bertol. Misc. Bot. xxii. 14. t 2=C. Oxyacantha.
riparia, Salisb. Prod. 357 = Pyrus baccata.
rivularis, *Nutt. ex Torr. If Gray, Fl. N. Am.* i. 464.—Am. bor. occ.
rosae/ormis, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 260-C. Oxyacantha.
rosea, Hort. ex DC. Prod. ii. 628 - C. Oxyacantha.
rotundifolia, Borckh. in Roem. Arch. i. III. 87 = glandulosa.
rotundifolia. Lam. Encyc. i. 84 = Amelanchier vnlgaris.
rotundifolia, Moench, Verz. Ausl. Baeume, 29 = C. Crus-galli.
rubra. Lour. Fl. Cochinch. 320 = Raphiolepis indica.
rubrinervis, *Lange, in Bot. Tidssir.* xiii. (1882-83) 25.—Hab.?
ruscinonensis, Gren. & Blanc, in Billotia, i. (1864) 71 = C. Azarolus.
salicifolia, Medic. Bot. Beobacht. **345**=C. Crus-galli.
sanguinea, J. G. Cooper, in Am. Natural, iii. (1870) 407-Douglasii.
sanguinea, *Pall. PI. Ross. i.* 25. t. 11.—Rossia; Sibir.
sanguinea, Schrad. Hort. Goett. (1884)-orientalis.
sanguinea, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 464 = coccinea.
scandica, Wahlenb. Fl. Upsal. 165-Pyrus intermedia.
Schraderiana, Ledeb. Fl. Ross. ii. 91 = orientalis.
semilobata, Bluff & Fing. Comp. Fl. Germ. i. 618, 1300 — Pyrus rotundifolia.
serotina, Salisb. Prod. 357-Pyrus baccata.
serrata, Poir. Encyc. SuppL i. 292-Photinia arbutifolia.
serratifolia, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 408 = Photinia serrulata.
serrulata, Poir. Encyc. Suppl. i. 292-Photinia arbuti. folia.
Shicola, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 288= Eriobotrya dubia.
Sieboldi, Steud. Nom. ed. II. i. 434 - Raphiolepis japonica.
sinaica, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 48.—Arab.; Persia.
sinensis, Loisel. Herb. Amat. iv. t. 247=Raphiolepis indica.
songorica, *Regel, Delect. Sem. Hort. Petrop.* (1876) 36, nomen.—Turkestan.
sorbifolia, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 408.—Hab. *1*
sorbifolia, Hort. ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 73-Pyrus spuria.
spatkulata, Hort. ex Lavall. Arbor. Segrez. 13 = cuneata.
spathulata, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 288.—Am. bor.
spathulata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 336-flava.
spectabilis, Can. in Rev. Hortic. (1873) 471 = C. Oxyacantha.
spectabilis, Salisb. Prod. 857-Pyrus spectabilis.
spicata, Lam. Encyc. i. 84 -Amelanchier canadensis.
spinosa, Gilib. Fl. Lituan. ii. 281=C. Oxyacantha.
spinosissima, Lodd. Bot Cab. t 1100—sanguinea.
spiralis, Steud. Nom. ed. II. i. 434 = Rhaphiolepis indica.
stipulosa, *Steud. I.* c—Ecuador.
subfusca, Ledeb. ex Nordm. in Bull. Sc. Acad. Petersb. ii. (1837) 313 = Pyrus subfusca.
subserrata, *Benth. PI. Hartw.* 10.—Mexic.
subspinosa, *DC. Prod.* ii. 626.—Chili,
subvillosa, *Schrad. ex Torr.* b* *Gray, Fl. N. Am. i.* 465.—As. or.; Am. bor.

CKATAEOUB:—

succulenta, Schrad. ex Link, Handb. ii. 78 « sanguinea.
tanacetifolia, *Pers. Syn.* ii. 38.—Cappadoc.
tanacetifolia, Webb, It. Hisp. 48=laciniita.
terminalis, Gonan, H. Monsp. 252 —• Pyrus torminalis.
texana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 454-subvillosa.
tomentosa, *Linn. Sp. PI.* 476 (syn. Gronov.).—Ambor.
tomentosa, Michx. Fl. Bor. Am. i. 289 = parvifolia.
torminalis. Linn. Sp. PI. 476 = Pyrus torminalis.
Tournefortii, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 90 » orientalis.
transylvanica, Hort. ex M. Roem. Syn. Rosifl. 107 = C. Oxyacantha.
trifoliata, *DC. Prod.* ii. 680.—Am. **bor.**
triloba, Poir. Voy. Barb. ii. 176-C. Azarolus.
trilobata, Labill. Ic. PI. Syr. Dec. iv. 15 - Py«» trilobata.
lurbinata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 735 = flava.
umbellata, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 408.-Hab.?
uniftora, Duroi, Harbk. Baumz. i. 184 = parvifolia.
uniflora, Muenchh. Hausv. v. 147 = tomentosa.
unilateralis, Pers. Syn. ii. 37-- parvifolia.
versicolor, Rochel, PI. Rar. Banat. II. [2] = nigra.
villosa. Thunb. Fl. Jap. 204-Photinia villosa.
virginica, Lodd. in Loud. Arb. Brit iii. 482-flava.
viridis, Linn. Sp. PI. 476 = coccinea.
viridis, Medic. Gesch. 85 = C. Crus-galli.
viridis, Walt. Fl. Carol. 147-flava.
Watsoniana, Steud. Nom. ed. II. i. 434 = C. Crusgalli.
xanthocarpos, Medic. Gesch. 85—tomentosa.

CRATAEVA, Linn. Syst. ed. I (1735) ; ed. X. 10« (1769). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. *t.* I. 110.

BELOU, Adans. Fam. ii. 408 (1763).
FARQUHARIA, Hilsenb. & Boj. ex Boj. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xx. (1843) 57.
NEVOSMILA, Rafin. Sylva Tellur. 107 (1838).
OTHRYS, Noronha, ex Thou. Nov. Gen. Madag. I[5] (1806).
TAPIA, Adans. Fam. ii. 407 (1763).

acuminata, DC. Prod. ii. 243 - C. Tapia.
acuminata, Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 21, in obs." **gynandra.**
Adansonii, DC. Prod. i. 243-religiosa.
apetala, Spreng. Syst. ii. 448=Niebuhria linearis.
arborea, Schrad. in Goett Gel. Anz. (1821) 707 -C Tapia.
avicularis, Burch. ex DC. Prod. i. 244 = Niebubn» triphylla.
Balangas, Koen. in Trans. Linn. Soc. v. (1800) 224 = Feronia Elephantum.
Benthamii, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 265.—Brat.
Brownii, Korth. ex Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 21" membranifolia.
caffra, Burch. ex DC. Prod. i. 243=Niebuhria triphylla.
capparoides, Andr. Bot. Rep. t. 176 = fragrans.
excels*, *Boj. Hort. Maurit.* 16.—Madag.
falcata, *DC. Prod.* i. 243.—China,
fragrans, *Sims, Bot. Mag.* t. 596.—Afr. trop.
Gorarema, Veil. Fl. Flum. 200; v. t. 4 - **Gallesia** scorododendrum.
Goratema, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 8=praec.
Greveana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (**1885**) 466.—Madag.
guineensis, Schnm. ft Thonn. Beskr. Gain. PI. 240-religiosa.
gynandra, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 686.—Am. trop.
hygropbila, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng-* (1872) II. **292.—**Ind. or.
laeta, DC. Prod. i. 243 = religiosa.
lophosperma, *Kurt, in Journ. Bot.* xii. (1870 [196] Burma.
macroearpa, *Kurt, I. c*—Malaya,
magna, *DC. Prod.* i. 248.—Cochinch.
Marmelos, Linn. Sp. PI. 444=Aegle Marmelos.
membranifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* [387] Sumatra.
moschata, Banks, ex Sims, Bot. Mag. sub t. o»*~ fragrans.
Nurvala, Bnch.-Ham. in Trans. Linn. Soc *n.* (I[8*7] 121-religiosa.

CBATAEVA:—
b ongifolia, Spreng. Syst. H. 448=Niebuhria oblongifolia.
obovata, *VaU, Symb. Bot.* iii. 61".—Madag.
octandra, Blanco, Ft Filip. ed. I. 400 = Capparis noribunda.
«*><«, Bnch..Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 118 = religiosa.
radiatiflora, *DC. Prod.* i. 248.—Ecuador.
"luiosa, Ainslie, Mat. Med. Hind. 124 = Aegle Marmelos.
rehgiosa, *Forst.f. Prod.* 85.—Geront. trop.
Koxburghii, R. Br. in Denh. & Clapp. Tray. App.224 = religiosa.
suaresensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 466—Madag.
Tapia, Bum. *I* Ft Ind. 109=religiosa.
«*pia*, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 6978=Cadaba trifoliata.
Tapia, *Linn. Sp. PI.* 444.—Am. austr.
fapia, Vahl, Symb. Bot. iii. 61 = religiosa.
rapioides, *DC. Prod.* i. 248.—Am. anstr.
tumnlorom, *Sfiq. Illustr. Ft. Arch. Ind.* 21. t. 11.—Java.
unilocularis, Bnch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 121-religiosa.
Vall a T.f l, Koea rex Wight & Am,, Prod,, 96=Feronia a T.f—ntum.

CRATEOLA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 64 (1836)-Antha. oanthua, Nees (Acanthac).
Parnflora, Rafin. 1. c. - Hemigraphis eleganst
•*oincoides*, Rafin. 1. c.=Anthacanthns vincoides.

CRATERIA, Pens. Syn. i. 485 (1806) - Casearia, Jacq. (aamydac.).
pitt, P. 1 c-Cas. sylveatris.
fpatta, Pets. 1 c-Cas. punctata,
fasciculata, Pers. 1. c-Cas. punctata,

tRATERICARPIUM, Spach, in Nonv. Ann. Mus. Par. Iv- (1885) 827, 397-Oenothera, Linn. (Onagrar.).
Qrgyrophyllum, Spach, 1. c. 398 - O. subulate.

CB,ATERISPEBMOTC Benth. in Hook. Niger Fl. *}\ (1849). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. 112.
"Mhynematum, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iiL *ol.—Afr. trop.
««nanthum, *Hiern, I.* c.-Afr. trop.
'aunnum, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 411.—Afr. trap.
"licrodon, *Baker, Fl. Mount.* 145.—Ins. Seychelles.
°">ntanum, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 162.—Afr. trop.
^cnweinfurthii, *Hum, I. c.* I61.-Afir. trop.

CRATERO ITECOMA ru? Tl ROTECOMA Mart - Madia, DC. (ff gn oa.).

CRATERROSTI> 1 U, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) $14. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii.
*"rtculaefolium, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 954 = Panulmi.
plant AD]"?"""11, *Hochst in Flan, ,,,* (1841)*869--
Pwail<"n, *Hochst. I. c.* 670—Abyss.

CRA.TEROTECOMA, Mart, ex DC. Prod. tx. 215 (1845)
kras.

CR^VA, Linn. Syst ed. I (1785) - Crataeva, (Capparr.).

CRATOCHWILIA m. ii. »89 (1790) . Cluytia, Boerh. (Euphorb.).

CRATOXYLOI*, Blulne> ffi Jdr_Ui (1825>- *HYPE.* RI, AL™***. Benth. & Hook. f. L 166.
"ROLOBUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. U8S6) 352. t 6.
E DEA, J**.» Malay. Misc. B. (1822) n. VII. 21.
SORNSC HffCHIA, Blnme> Cat_ Gew< Buiteni 16 (i8a«
T*»iS ESM S) S Pach>"a Ann.Sc. Nat Sér. II. v. (1886) t. v.
arborescens, Blume, Mus. Bot- Lugd. Bat. ii. 17= Blancoi.

CRATOXTTLON:—
Blancoi, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 17.—Ins. Pbilipp.
biflorum, Ture*. in Boll. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868) I. 580=polyanthnm.
carneum, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 84=polyanthum.
celebicum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 16.—Ins. Celebes.
clandestinnm, *Blume, 1. c.* 15.—Java.
cochinchinense, Blume, 1. c. 17 = polyanthum.
cuneatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 517.—Malaya,
floribundum, *F. Vill. in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 16.—Ins. Philipp.
formosum, *Benth.b" Hoot. f. ex Dyer, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 258.—Malaya.
glaucum, *Korth. in Flora*, xxxi. (1848) 579.—Borneo.
Hannandii, *Pierre, Fl. For. Cochinck.* 158.—Cambod.
Hornschuchii, *Blume, Bijdr.* 148.—Java.
lanceolatum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 500=polyanthum.
ligustrinum, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. ii, 16 -= polyanthum.
Maingayi, *Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 258.—Malaya,
microphyllum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* I. 600.—Ins. Banca.
myrtifolium, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* iL 17—Borneo,
neriifolium, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 298.—Burma.
pentadelphom, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 680.—Java.
petiolatum, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. iL 17 = polyanthum.
polyanthum, *Korth. in Flora*, xxxi. (1848) 679.—Malaya,
polystachyum. *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvL (1863) I. 579.—Sumatra,
pruniflorum, *Kun, For. Fl. Brit. Burma*, i. 84.—Burma.
pruni/olium, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1. 258 = praec.
racemosum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 16.—Java,
sumatranum, *Blume, I.* r.—Sumatra.
Wightii, Blume, 1. c. 18 - polyanthum.

CRATYIiIA, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 181. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 636.
Desvauxii, *Tut. in Arch. Mus. Par.* iv. (1841) 67.—Bras,
floribunda, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 182.—BIBS.
hypargyraea. *Mart, ex Benth. I. c.* 131.—Bras,
mollis, *Mart, ex Benth. 1. c.* 132.—Bras,
nitens, Benth. 1. c. = floribunda.
nnda, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1841) 68.—Bras.
spectabilis, Tul. 1. c 69=Camptosema grandiflorum.

CKAWFTJRDIA, Wall. Tent Fl. Nep. 68..tt 47, 48 (1826). *GENTIANEAE*, Benth. ft Hook. f. ii. 815.
GOLWONINIA, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. iv. (1862) 252.
PTEKYGOCALYX, Maxim. Prim. Fl. Amur. 19.8. t. 9 (1859).
TRIPTEROSPERMUM, Blame, Bijdr. £49 (1825).
affinis, *Wall. Cat.* n. 4370.—Reg. Himat
angustata, C. *B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 106.—Reg. Himal.
Blumei, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 200.—Java,
campanulacea, *Wall. V Griff, ex C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 106.—Reg. Himal.
fasciculata, Griff. Notul. iv. 92 -japonica.
fasciculata, Wall. Cat. n. 4369 A = affinis.
fasciculata, *Wall. Tent. Fl. Nep.* t 47.-Reg. Himal.; China,
japonica, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. III. (1846) 160-.—Reg. Himal.; China; Japon.
Loureiri, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 200 Cochinch.
luteo-viridis, C. B. Clarke, in Joora. Linn. Soc. xiv. (1875) 448= japonica.
paniculata, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 306»Paederia foetida.
puberula, C. *B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 442.—Reg. Himal.
speciosa, *Wall. Cat. a.* 4871.—Reg. Himal.
trinervis, D. Dietr. Syn. PI. iL 919=Blumei.

CKEAGHIA, Scortech. in Joum. Bot. xxii. (1884) 869. *RUBIACEAE.*
fagraeaopsis, *Scortech. I. e.* 870.—Malaya.

CREMANIUM, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 310°Mieonia, Ruiz *Sc* Pav. (Melastomac.).
ambiguum, Benth. PI. Hartw. 181 = M. milleflora.
amygdalinum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 261-M. integrifolia.
Aschenbornianum, S. Schau. in Iinnaèa, xx. (1847) 734 =Oxymeris comioides.
asfergillare, DC. Prod. iii. 198=M. aspergillaris.
axillare, Macbd. Fl. Jamaic. ii. 92 = M. integrifolia.
Berghesianum, S. Schau. in Linnaea, xx. (1847) 785 » M. Berghesiana.
calophyllum, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 812=M. myrtiformis.
caraccasanum, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 112- M. rubiginosa.
ehaenopleuroides, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848) 349 = M. late-crenata.
cinnamomifolium, DC. Prod. iii. 194=M. Candolleana.
clathranthum, Mart, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 129 - M. clathrantha.
coeleste, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 312 = M. coelestis.
coeruleum, D. Don, 1. c. = M. caerulea.
compressum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 96 = M. argentea.
cordifolium, Bunb. in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 109. —Bras.
croceum, DC. Prod. iii. 194 = M. crocea.
Elaeodendrum, DC. 1. c. 191-M. Elaeodendrum.
glaberrimum, DC. 1. c. 192 - M. milleflora.
glandulosum, DC. 1. c. 191-Tetrazygia hispida.
granulosum, DC. 1. c. 192 = M, granulosa.
hispidissimum, DC. 1. c. - M. hUpidissima.
inaequidens, DC. 1. c. 194=M. inaequidens.
integri/olium, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 93-M. moldspicata.
latecrenatum, DC. Prod. iii. 194-M. latecrenaU.
latifolium, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 311 = M. latifolia.
laurinum, D. Don, 1. c. 812 ^M. laurina.
ledi/olium, DC. Prod. iii. 193 - M. ledifolia.
ligustroides, DC. 1. c. 194=M. ligustroides.
mediumi D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 812 - M. media.
milleftorum, DC. Prod. iii. 193-M. milleflora.
minutifiorum, DC. 1. c. = M. milleflora.
nitidum, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1828) 311 = M. nitida.
nitidum, Griseb. ex Triana, in. Trans. Linn. Soc xxviii. (1871) ISO = M. andina.
oligotrichum, DC. Prod. iii. 193 =M. oligotricha.
paludosum, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848J847-M. paludosa.
paniculatum, DC. Prod. iv. 799=M. paniculata.
paniculatum, Mart, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 118 = M. minntiflora.
papillosum, DC. Prod. iii. 192 = M. papillosa.
pulverulentum, D. Don, ex Triana, 1. c. 120 «M. pulverulenta.
pulverulentum, Triana, (1871) in Trans. Linn. Soc. xxviiL127-M. Tiri.
pttrpurascens, Griseb.ex Triana, I.e. 140<-Mecr«nium vxrgatnm.
pusUliflorum, DC. Prod. iii. 194-M. Gardneriana.
pmillum, Cham, ex Triana, in Trans. Linn. Soc xxviii. (1871) 117 - M. depauperate.
quadrangulare, DC. Prod. iii. 192 - M. qnadrangularis.
racemosum, Griseb. Cat. PI. Cub. 102 - Mecranium integrifolium.
reclinatum, DC. Prod. iii. 192 = M. reclinata.
rigidum, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 98=M. rigida.
Rivoeriae, Griseb. Ft Brit. W. Ind. 262 = M. trichotoma.
rotundi/olium, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 811 = M. rotundifolia.
rubens, DC. Prod. iii. 191 ^M. rabens.
rubens, Griseb. Cat. PI. Cub. 103 = M. minutiflora.
rubens, Griseb. FL Brit. W. Ind. 261 = M. milleflora.
Sellomianum, Cham, ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 206-M. Sellowiana.
serrulatum, D. Don, in Mem. Wem. Soc lv. (1828) 812=M. galactantha.
Sieberii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 262-M. vulcanica.

CREMANIUM:—
splendens, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 94 = Miconia obovalis ?
tetrandrum, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 186 = M. tetrandra.
theezans, DC. Prod. iii. 194 = M. milleflora.
thyrsiflorum, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 180 = M. thyrsiflora.
thyrsoideum, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 311 = M. thyrsiflora.
tinctorium, DC. Prod. iii. 193 = M. media.
trineroe, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 94 = M. triplinervis.
Trinitatis, Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 111 = M. minutiflora.
vaceinioides, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1823) 312 = M. vaccinioides.
nirgatum, Griseb. Cat. PI. Cnb. 102=Mecranium haemanthum.
virgatum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 261 = Mecranium vjrgatum.

CBEMAHTHODIUM, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1141,1142 (1873). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f. ii. 489.
Decaisnei, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 168.—Reg. Himal.
discoideum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii (1881) 482.—China.
Hookeri, *C. B. Clarke, Camp. Ind.* 169.—Reg. Himal.
hnmile, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 481.—China.
lineare, *Maxim. I. c.* 482.—China,
oblongatum, *C. B. Clatke, Comp. Ind.* 168.—Reg. Himal.
palmatnm, *Benth. in Hoot. Ic. PI.* t 1142.—Reg. Himal.
pinnatifidnm, *Benth. 1. c.*—Reg. Himal.
plantagineum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 481.—China.
reniforme, *Benth. in Hook. Ic. PI.* 1.1141.—Reg. Himal.
Thomsoni, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 169.—Reg. Himal.

CREMASPORA, Benth. in Hook. Niger Fl. 412 (1849). *RUBIACEAB,* Benth. & Hook. f. ii. 108.
SCHIZOSPERMUM, Boiv. ex BaiU. Adangonia, xii. (1879) 23S.
africana, *Benth. 1. c.*—Afr. trop.
Bocandeana, *Webb, in Hook. Kemjourn.* ii. (1850) 371.—Ins. Gorgona.
comorensis, *Baill. Adansonia.iii.* (1879) 334.—Madag.
congesta, *Baill. I. c.* 283.—Ins. Comor.
grandis, *Baill. 1. c.* 235—Madag.
heterophylla, F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 186. n. 5 > africana.
maxima, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 236.—Madag.
Thomsoni, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 126.—Afr. trop.
tubulosa, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 234.—Madag.

CREMASTOSTEMON, Jacq. Fragm. 68 (1809).= Olinia, Thunb. (Lythrar.).
capensis, Jacq. I. c.-O. capensis.

CBEMASTRA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 172 (1883). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 538.
DACTYLOSTALIX, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxrvi. (1878) 74.
HYACINTHORCHIS, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat i. 48. t. 16 (1849).
mitraia, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.vl. (1858-59) 411=Wallichiana.
WalUchiana, *Lindl. Gen.etSp.Orch.* 173 ; *etin Wall. Cat.* n. 7349.—Reg. Himal.; Japon.

CREMASTUS, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 187=Bignonia, *Linn,*
angustifolius, Miers, 1. c.-=B. glutincca.
Balbisianus, Miers, 1. c.-=B. Balbiaiana.
coriaceus, Miers, 1. c nomen = B. Selloi!
crassus, Miers, 1. c. nomen.—Bras.
glutinosus, Miers, 1. c. - B. glutinosa.
grallatoriui, Miers, 1. c.—Bras.
longipes, Miers, 1. c. nomen.—Brai.
loricatus, Miers, 1. c. 188, nomen.—Bras.
luridus, Miers, 1. c. 187, nomen.—Bras.
nervosus, Mien, 1. c 188, nomen ^Delostoma nervosum?
plenifolius, Miers, 1. c. nomen.—Bras.
trichocladus, Miers, 1. c. 187, nomen = B. trichoclada.

CREMATOMIA, Miers, m Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. iii. (1869) 801=Bourreria, P. Br. (Boiagin.).
Andrieuxii, Miers, 1. c. 254 = B. Andrieuxii.
attenuata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. iii. (1869) 807 - B. domingensis?
calophylla, Miers, 1. c. 306 - B. calophylla.
coriacea, Miers, 1. c 307.—Ind. oca
cumanensis, Miers, 1. c. 802.—Venezuela.
elongata, Miers, I. c. 308.—Jamaic.
fasciculata, Miers, L c 812.—Venezuela.
formosa, Miers, 1. c. 308 - B. formosa.
grandiflora, Miers, 1. c. 808 «=B. grandiflora.
guatemalensis, Mieis, 1. c. = B. grandiflora.
Guildingiana, Miers, 1. i. 804.—Ind. occ.
Huanita, Miers, 1. c. 818=B. Huanita.
Jacquiniana, Miers, 1. c. 805.—N. Granat.
Kunthiana, Miers, 1. c. 311.—Venezuela.
molliuscula, Miers, 1. c. 809.—Ind. occ.
revoluta, Miers, 1. c.-B. revoluta.
spathulata, Miers, 1. c. 810 - B. spathulata.
velutina, Miers, 1. c.—Ind. occ.
venosa, Miers, 1. c. 805.—Ind. occ.

CREMOBOTRYS, Beer, in Flora, xxxvii. (1854) 848 = BiUbergia, Thunb. (Bromeliac.).
aebrina, Beer, 1. c = B. zebrina.

CREMOCEPHALIUM, Miq. Fl. Ind. Bat.ii. 97 (1856) -seq.

CREMOCEPHALUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 390 fl824) = Gynura, Cass. (Compos.).
cernuum, Cass. 1. c = G. cernua.

CREMOCHILUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 174 = Siphooampylua, Pohl (Campanulac.).
meridensis, Turcz. 1. c.—Venezuela.

CKBMOLOBUS, DC. Syst. ii. 418 (1821). *CRUCIFERAE,* Benth. *8c* Hook. f. i.90.
aphanopterus, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 65.—Peruv.
chilensis, *DC. Syst.* ii. 419.—Chili,
lihearifolius, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* Iii. (1833) 138.—Chili,
parriflorus, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sét. V. i. (1861) 288—Bolivia.
pernvianus, *DC. Syst.* ii. 419.—Peruv.
pinnatifidus, *Hook. Ic. PI.* 1.100.—Peruv.
pubescens, *Hook. 1. c.* t. 81.—Peruv.
rhomboideus, *Hook. 1. c.* t 82.—Peruv.
sinuatus, *Hook. t. c.* t 99.—Peruv.
suffruticosus, *DC. Syst.* ii. 419.—Peruv.

CREMOPHYLLUM, Scheidw. in Bull. Acad. Bnn. ix. I. (1842) 23-Daleohampia, Linn. (Enphorb.).
spathulatum, Scheidw. 1. c—D. spathulata.

CREMOPYRUM, Schur, Enum. PI. Transs. 807 (1866) =Agropyron, J- Gaertn. (Gramin.).
pectinatum, Schur, 1. c.=A. cristatum.

CREMOSPERMA, Benth. PI. Hartw. 284 (1846) •= Besleria, Linn. (Gesnerac).
hirsutissima, Benth. L c—Peruv.

CREMOSTACHYS. Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 259-Galearia, Zoll. (Euphorb.).
filiformis, Tul. 1. c 260 = G. pediciUata.
fulva, Tul. 1. c 261=G. fulva.
Lindlaeana, Tul. 1. c. 262.—Ind. or.

CRENA, Scop. Introd. 220 (1777) = Crenea, Anbl. (Lythrar.).

CRENAEA, Scheb. Gen. i. 817 (1789) = praec.

CRENAMON, Rafin. New Fl. Am. iv. 86 (1836) (Genus dubium).
pectinatum, Rafts. 1. c.—Am. bor.

CRENAMUM, Adans. Fam. ii. 112 (1768) = Crepia, VaiU. (Compos.).

CB.ENEA, Aubl. PL Gui. L 6231.209(1775). *LYTHRARIEAE.*
DODECAS, Linn. f. Suppl. 36, 245 (1781).
FAYA, Neck. Elem. ii. 102 (1790).
maritima, *Aubl. I. c.*—Bras,
repens, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 186.—Bras.
surinamensis, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. iii. (1882) 820-repens.

CRENIAS, Spreng. Syst. iv. Cor. Post 246, 247 (1827) - Mniopsis, Mart. (Podostem.).
scopulorum, Spreng. 1. c = M. scopulorum.

CRENOSCIADIUM, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. I. <• 30 (1849) = Opopanax, Koch (Umbellif.).
siifolium, Boiss. *Sc* Heidi. 1. c. 31.—As. Min.

CRENULARIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat Se"r. II. xvii. (1842) 181=Moriera, Boiss. (Crucif.).
eunomioides, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 41.—Cilicia.
glaucescens, Boiss. Fl. Orient, i. 337.—Cilicia.
orbiculata, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 181.—Macedon.
polygaloides, Boiss. Fl. Orient, i. 837.—As. Min.
umbellata, Boiss. 1. c 838 = M. umbellata.

CBEOCHITON, Blume, in Flora, xiv. (1831) 606. *MELASTOMACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 758.
bibracteata, *Blume, 1. c.* 607.—Java.
emarginata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 561=pudibunda-pudibunda, *Blume, in Flora,* xiv. (1831) 606.—Java-
superba, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xviii. (186% 168 = bibracteata.

CREOCOME, Kunze,in Bot. Zeit vi. (1848) 133, sphalm-=OREOCOME,Edgew.-Selinvun,Linn. (UmbeUO-

CREODUS, Lour. FL Cochinch. 88 (1790) = Chloranthus, Sw.
odorifer, Lour. 1. c. 89 = C. inconspicuus.

CREOLOBUS, Lilja, n. Sver. Odl. Vext. 67 (1839)* Mentzella, Linn. (Loasac).
aureus, Lilja, 1. c. =M. aurea.

CREPALIA, Steud. Nom. ed. I. 235 (1821) -CRA&-PALIA, Schrank=Lolium, Linn. (Gramin.;.

CREPIDARIA, Haw. Syn. PL Sure. 136 (1812) - Fedilanthus, Neck. (Enphorb.).
carinata. Haw. Suppl. PL Succ. 67 = P. carinatus.
cordellata, Haw. Syn. PL Succ. 136 = P. cordellatus.
myrtifolia, Haw. 1. c = P. tithymaloides.
padifolia, Haw. 1. c. =P. padifolius.

CREPIDISPERMUM, Fries, Epicris. Hieiac. 153 (1862) oHieraoium, Linn. (Compos.).

CREPIDIUM, Blume, Bijdr. 387 (1825) = MloroBtyl[IB], Nutt (Orchid.).
flavescens, Blume, 1. c. 888—M. flavescens.
Rheedii, Blume, 1. c 387-M. Rheedii.

CREPIDIUM, Tausch. in Flora, ix. (1828) i. Erg. 80>s Crepifl, VaiU. (Compos.).
asperum, Tausch, 1. c.=Crepis aspera.
caulescens, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. a- (1841) 436=Crepis glauca.
Dioscoridis, Tausch, in Flora, ix. (1828) I. Erg. 8" Crepis Dioscoridis.
glaucum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. w (1841)=Crepis glauca.
runcinatum, Nutt. 1. c^Crepis rundnata.

CREPIDOCARPUS, Klotzsch, ex Boeck. in Linn*** xxxvi. (1869-70) 414 = 8olrpufl, Linn. (Cyperae-^
cubensis, Klotzsch, ex Boeck. 1. c = S. cubensis.

CREPIDOPTERIS, Benth. in Mart. R Bras. xv. «a*o-11859), sphalm. - CREPIDOTROPIS, Walp. - •"* clea, H. B. *Sc* K. (Legumin.).

CREPIDOSPERMUM, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 617, sphalm. = CREPIDISPERMUM, Fries = Hieracium. Linn. (Compos.).

CBEFIDOSFEBMXTH, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 325 (1862). *BURSERACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c. ^., $#•
Goudotianum, Triana & Planch, in Arm. Sc. ">**• V. xiv. (1872) 300=Spracei. , ,i»
guyanense, *Marchand, ex Triana tf Planch.* *• obs.—Guyana.
rhoifolium, *Triana V Planch. I. c*—N. Granat-, Sprncei, *Hook./, in Benth. tf Hook./. Gen.* >• °* Peruv. ^

CREPIDOTROPIS, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) =Dloolea, H. B. *Sc* K. (Legumin.).
brasiliensis, Walp. 1. c. = D. lasiocarpa.

CREPINIA, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1415 (1828)=Pterotheoa, Cass. (Compos.).
Marschalliana, Reichb. 1 c. =P. bifida.

CREPIS: [Vaill.] Linn. Gen. ed. I. 240. n. 621 (1787).
COMPOSITAE, Benth. &. Hook. f. ii. 513.
AEGOSERIS, Steud. Nom. ed. II. i. 30 (1840).
AETHEORHIZA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlviii. 425 . (1827).
ANISODBRIS, Cass. 1. c. 429 (1827).
. ANISORAMPHUS, DC. Prod. vii. 251 (1888).
ANTHOCHYTRUM, Reichb. Ic. Fl. Germ. xix. 89. t. 1482 (1869).
ARACIUM, Neck. Elem. i. 49 (1790).
BARKHAUSIA, Moench, Meth. 587 (1794).
BARKHUSENIA, Hoppe, in Flora, xii. (1829) 512.
BERINIA, Brignol. PL Forojul. 30 (1810).
BIIAOTIA, Sch. Bip. in Herb. & Winck. Tahrb. Pharmac. iv. (1841) 156, in nota.
BORKHAUSIA, Nutt. Gen. Am. ii. 125 (1818).
BRACHYDEREA, Cass. in Dict. Sc. Nat xlviii. 429 „ (1827).
CALLIOPEA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Toura. (Jan.-Mar. 1829) 809.
tATONiA, Moench, Meth. 535 (1794).
CERAMIOCEPHALUM, Sch. Bip. i» Bull. Soc. Bot. Fr. ".(1862)284.
CLOSIROSPERMUM, Neck. Elem. i. 54 ^790).
J;*ENAMUM, Adans. Fam. ii. 112 (1768).
J-IEPIDIUM, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 80.
DEROUETIA, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 114 (1866).
«NDOPTERA, DC. Prod. vii. 178 (1838).
JJATYOMA, Cass. in Dict. Sc Nat xviii. 184 (1820)
^KBLERA, Andrz. ex Bess, in Flora, xvii. (1834) I. Beibl. 18
GMACIUM,' Reichb. in Moessl. Handb. ii. 1345 (1828).
HAPALOSTEPHIUM, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (Jan.-Mar. 1829) 307.
HMERODERIS, Boiss. FL Orient, iii. 793 (1875).
HOMALOCLINE, Reichb. Consp. 97 (1828).
WOSTIA, Moench, Meth. Suppl 221 (1802).
INTYBELLIA, Monn. Essai Hierac. 78 (1829).
INTYBUS, Fries, Novit. Fl. Suec. ed. II. 244 (1842).
^GOSERIS, Hoffmgg. &. Link, FL Port. ii. 149 (1820); Link, Enum. Hort. Berol. ii. 289 (1822).
LEPICA UNE| Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 478 (1813).
^SPIDOSERIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvu. (1869) 108-
WMNOCREPIS, Fourr. 1. c. 104.
WMONOSERIS Peterm. FL Lips. 389 (1838).
«BMAUCHENIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 77.
OMALOCLINE CaBS in Dict Sc. Nat. xlviii. 431 (1827).
^ALEYA, Cass. 1. c. xxxix. 393 (1826).
«AMMOSERIS, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 52 (1849).
«IL OCHENIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. TM. ((1841)) 437.
"HVNCHOPAPPUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 493 (1867).
5°Y«UA,-Monn. Essai Hierac. 75 (1829).
WCCISOCREPIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N- S. xvii. (1869) 104.
WIBEL ,G aerta. M ey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 97 (801).
YOUNG U> CBSS> in Ann Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 88.
W'«o, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 808
abjT'*'ulSBtium abietinum).—Oriens,
Aby's^a> Seh Bi*, ' ' Mttra> ' ' ' (1889^ 20 ~
acanlis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 896.—Ind. or.; Burma.
achyrophoroides, *Vatke, in Linnaea,* xxxix. (1875) 514.—Abyss.
aculeata, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 856.-Syria.
acumin S. vii.
*JJ*H)* 437.-Am. bor. occ.
-»"«»tto, Vis. in Flora, xiii. (1880) 53=nicaeensis.
^£'*?*. Sch. Bip. ex Oliver & Hiera, in Fl. Trap.
--ppeUii.
Adonis, S pg Pugill. i. 54 = chondrilloides.
aethensis, *Presl, Fl. Sicul.* i. 81.—Sicilia.
agrestis, S or Cauc ii. 268 = seto»a.
agrestis t 'ties, ex Nym. Consp. 457-nicaeensis.
agrestis, *f.* Sadler, ex DC. Prod. vii. 164=bienms.
vutu, Walds t- & Kit. ex WUld. Sp. PL tti. 1802 =

CEEPIS:—
albida, AH. Fl. Pedem. i. 219. t. 32=alpestris.
albida, Bory & Chaub. Fl. P^lop. 54 = incana.
albida, *Vill.- Prmfi.* 87; *Hist. PI. Dauph.* iii. 189.—Hispan.
alpestris, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1403.—Europ.
alpina. *Linn. Sp. PI.* 806.—As. Min.; Sibir.
altissima, Balb. Cat. Hort. Ta"r. (1804) 15=Tolpis virgata.
ambigua, Balb. in Mem. Acad. Turin, xiv. (1805) It. 69 =Tolpis virgata.
ambigua, A. Gray, PI. Fendl. 114 = Hieracium Fendleri.
ambigua, A. Gray, PI. Wright i. 129 = Hieracium Rusbyi.
amplexicaulis, Schur, Enum. PI. Tianss. S74=bUttarioides.
amplexifolia, *WiUk. in Willk. b[1] Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 272.—Hispan.
amygdalina, Lag. Cat. Hort. Madr. (1814) 8 = foetida.
Andersonii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. n.* (1666) 558.—Calif,
andryaloides, *Lime, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 25.—Ins. Madera.
angustifolia, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) 357 = tectorum.
Apargia, Pers. Syn. iL 875 = Chondrilla Peltidium.
apargioides, Willd. Sp. PI. iii. 1594-Chondrilla Peltidium.
aiMca.,Boiss,Fl. Orient. Hi. 858.—Arabia,
arenaria, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 261, in nota.—Afr. bor.
arenosa, *Scop. Ann.* ii. *Hist. Nat.* (1769) 59.—Europ.
armena, *DC. Prod.* vii. 168.—Armen.
aspera, Lam. Encyc. ii. 180 = Picris aspen,
aspera, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1183.—Syria; Creta.
aspera, Suter, Fl. Helv. ed. II. ii. 187 -setosa.
athoa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 57.—Macedon.
aurea, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1402; *Tausch, in Flora,* xi. (1828) I. *Erg.* 78.—Europ.
auriculaefolia, Froel. in DC. Prod. vii. 165 = incamata.
auriculaefolia, *Sieler, in Spreng. Syst.* iii. 634.—Ins. Creta.
austriaca, Jacq. Enum. Vindob, 140, 270»blattarioides.
baetica, Lange, in Kjoeb. Vidcnik. Meddel. (1877-78) 227=spathulata.
baetica, Mill. Card. Dict. ed. VIIL n. 8=ToIpis barbata.
baicalensis, *Ledeb. in Mem. Acad. Pitersb.* v. (1814) 569.—Sibir.
Balbisiana, F. Schultz, in Flora, xxui. (1840) 718 = bursifolia.
balearica, *Costa, Fl. Catal.* 153.—Hispan.
bannatica, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 66 = setosa.
barbata. Linn. Sp. PI. 805-Tolpi> barbata.
barbata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = foetida.
Bauhiniana, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. S 3 - virens.
bellidifolia, *Loisel. Fl. Gall.* 527. t. 18.—Corsica.
bellidifolia Not, ex Nyn. Consp. 460 = cretica.
Bergen, *Steud. Nom.* ed. II. i. 436.—Graecla.
bicolor, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1409, in obs.—Sicil.
biennis, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 257 ^MarschalUi.
biennis, Hook. Fl. Bor. Am. i. 297—runeinata.
biennis, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 84 -taraxacUfolia.
bieunis, *Linn. Sp. PI.* 807.—Europ.
biennis, Sebast; & Maur. FL Rom. Prod. 272= lacera.
bithynica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 29.—As. Min.
blattarioides, *Vill. Hist. PL Dauph.* iii. 136.—Europ.
boetica, Auct. vide baetica.
boliviensis, *Wedd. Chlor. And.* i. 226.—Bolivia.
borealis, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 698=Leontodon borealis.
bracteolata, Nym. Syll. 49-athoa.
breviflora, *Delile, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 486.—Aegypt.
bullosa, *Tausch, in Flora,* xi. (1818) I. *Erg.* 78.—Reg. Mediterr.
Bungeana, C. A. Mey. ex DC. Prod. vii. 164-Bungei.

CBEPIB:—
Bungei, *Ledeb. ex DC. Prod.vii.* 164.—Sibir.
burejensis, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 52.—Reg. Amur.
bureniana, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 862.—Persia,
bursifolia, *Linn. Sp. PI.* 806.—Sicil.
bursifolia, Pall, ex DC. Prod. vii. 179 = Pterotheca bifida.
caespitosa, *Gren. If Godr. Fl. Fr.* ii. 332.—Corsica.
campestris, Schur, Enum. PI. Transs. 376=tectorum.
canariensis, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 461, in textu=Lowei.
Candollei, Sch. Bip. 1. c. 457=virens.
capillaris, *Wallr. Beitr. Fl. Hetcyn.* 287.—Europ.
carbonaria, *Sch. Bip. in Flora,* xxii. (1889) 19.—Abyss,
caucasica, *C. A. Mey. in Mem. Acad. Petersb.* Ser. VI. *Sc. Nat.* vii. (1855) 15.—Reg. Caucas.
cernua, Tenore, ex Spreng. Pugill. i. SS^neglecta.
chondrilloides, Froel. in DC. Prod. vii. 171-Jacquini.
chondrilloides, *Jacq. Enum. Vindob. App.* 312.—Austria,
chrysantha, *Froel. in DC. Prod.* vii. 165.—Sibir. altaic.
ciliata, *C. Koch, in Linnaea,* xvii. (1843) 277.—As. Min.
dnerea, Desf. Tabl. ed. 1.89=taraxacifolia.
Clausonis, *Pomel, Nom. Mat. Fl. Atl.* 261, in nota.—Afr. bor.
cochlearifolia, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) 1.190 (» *Youngia pygmaea).—Kosat.*
Columnae, *Froel. in DC. Prod.* vii. 167.—Ital. J Graecia.
comata, *Banks V Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 28.—Ins. Madera.
conyzaefolia, *Dalla Torre, Atl. Alpenfl.* 145.—Europ.
Cooferi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 214 = virens.
coriacea, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 768.—Hab. ?
comiculata, *Regel (f Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 64.—As. centr.
coronopifolia, Desf. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1782) 38=Tolpis coronopifolia.
corymbosa, Tenore, Prod, p xlvii=neglecta.
cretica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 68.—Ins. Creta.
crinita, Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831)24=Tolpiscrinita.
crithmifolia, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 147 = TolpUcrithmifolia.
croatica, Hornem. Hort Hafn. Suppl. 90-Dioscoridis.
croatica, *Schlos. V Vukot. in Rod Jugos. Akad. Zagreb,* lviii. (1881) 156.—Croatia,
crocea, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1402,—Europ.
crocifolia, *Boiss. V deldr. Diagn.* Ser. L vii. 14.—Graecia.
decumbens, *Gren. V Godr. Fl. Fr.* ii 382.—Gallia.
decumbens, Lose. & Pardo, Ser. Inconf. PI. Arag. 64-taraxacifolia.
Dens-leonis,C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 689 = sonchifolia.
dentata, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 126, nomen.—Malaya,
depressa, *Hook. f. (f Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 255.—Reg. Himal.
diffusa, DC. Cat. Hort. Monsp. 98-virens.
dioritica, *Schott b[1] Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 842.—Cilicia.
Dioscoridis, Koch, Syn. Fl. Germ. [ed. II. 5081]-taraxacifolia.
Dioscoridis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1133.—Graecia.
Dioscoridis, Follich, FL Hist PI. Palat. ii. 399 = tectorum.
Dioscoridis, Pourr. ex Willk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 248=virens.
divaricate, *Boiss.* b* *Heldr. Diagn.* Ser. I. vii. 14.—Graecia.
divaricata, *F. Schult*, in Flora,* xxiii. (1840) 719.—Ins. Madera.
diversifolia, Walp. Rep. vi. 361 = tenuifolia.
djimilensis, *C. Koch, in Linnaea,* xxiii. (1860) 688.—Reg. Caucas.
dubia, *Krock. Fl. Sil.* ii. II. 324.—German,
dubia, *F. Schultw, in Flora,* xxiii. (1840) 718.—In. Madera.

CREPIS:—
echioides, All. Fl. Pedem. i. 222 = Helminthia echioides.
echioides, Ledeb. Ind. Sera. Hort. Dorpat. (1821) 23 = foetida.
elbrusensis, *Boiss. Diagn.* Ser. L xi. 58.—Persia.
elegans, Fisch. ex DC. Prod. vii. 161 = baicalensis.
elegans, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 297.—Am. bor. occ.
erucaefolia, *Gren. If Godr. Fl. Fr.* ii. 331.—Gallia.
erucaefolia, Tausch, in Flora, xi. (1820) I. Erg. 31 -lacera.
fallax, *Boiss. Fl. Orient,* iii. £50.—As Min.
farinoaa, *Lam. Fl. Fr.* ii. 112.—GaUia.
fastigiata, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Arckip.* 125.—Malaya.
filiformis, [Diyand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 128 =Tolpis filiformis.
filiformis, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 51. t. 21. f. 1.—Afr. bor.
fistulosa, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. II. (1848) 112-praemorsa.
flexuosa, *Benth. tf Hook. f. Gen.* ii. 515; *C. B. Clarke,* *Comp. Ind.* 254.—Reg. Himal.
flexuosa, Bernh. ex Stead. Norn. ed. II. i. 486 = Sonchus flexnosus.
floribunda, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 261, in nota.—Afr. bor.
foeniculacea, Froel. in DC. Prod. vii. I 172 = cbondrilloides.
foeniculacea, *Reichb. in Afoessl. Mandb.* ed. II. ii. 1401.—Europ.
foetens, *Froel. in DC. Prod.* vii. 172.—Armen.
foetens. Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 147=foetida.
foetida, *Linn. Sp. PI.* 807.—Europ.; As. or.
foliosa, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 492 = blattarioides.
Fraasii, Sch. Bip. in Flora, xxr. (1842) 173 = Sieberi.
Froelichiana, DC. Prod. vii. 165—incarnata.
Froelichii, Stend. Norn. ed. II. i. 486 = Jacqnini.
fuliginosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. il. 138 = **neglecta.**
fuliginosa, *Webb tf Berth. Phyt. Canar.* ii. 455.—Ins. Canar.
fuscipappa, *Benth. tf Hook./. Gen.* ii. 514.—Ind. or.
Fussii, Kovats, ex Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 587 = Hieracium rotnndatnm.
gaditana, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 743-virens.
glabra, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 843.—Reg. Caucas.
glabra, *Krock. Fl. Sil. Suppl.* ii. 270.—Europ.
glandnlosa, *Bast, in Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 17.—GaUia.
glandulosa, Gold. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825); PI. Rar. 329-= foetida.
glauca, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 516 = flexnosa.
glauca, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* ii. 488.—Am. bor. occ.
globifera, Hall. f. in Nature. Anzeig. i. (1818) 91 = Dioscoridis.
glomerata, *Benth. tf Hook. f. Gen.* ii. 516.—Reg. Himal.
glomerata, C B . Clarke, Comp. Ind. 255=depressa.
Gmelini, Schnltes, Oestr. Fl. ii. 419-biennis.
Gmelini, *Tausch, in Flora,* (1828) I. *Erg.* 78.—Sibir.
gradlipes, *Hook f. Fl. Brit. Ind.* iii. 396.—Reg. Himal.
gracilis, Hook. *i.* & Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 254 = fuscipappa.
graminifolia, Ledeb. in Mem. Acad. P&ersb. v. (1814) 568 -Lactuca Fischeriana.
grandiflora, Ledeb. Fl. Ross. ii. 827 =djimilensis.
grandiflora, *Tausch, in Flora,* xi. (1828) I. *Erg.* 80.—Europ.
grandiflora, Willd. Enum. Hort. Berol. Snppl. 66 = albida.
graveolens, *Schrad. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 436.—German.
Hackelii, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 228-taraxacifblia.
Haenseleri, F. Schultz, in Flora, xxiii. (1840) 718-taraxacifolia.
hamata, Vitm. Snmma PI. iv. 417 = setosa.
hastata, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) **414.**—Europ.
heterantha, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866) 318 = Lactuca Dubyaea.
heterocarpa, Nym. Syll..48- taraxacifolia.
heterogyna, *Froel. in DC. Prod.* vii. 169.—Dalmat.
heterosperma, Schrad. ex Link, Handb. i. 799; DC. Lc. 179 = Dioscoridis.
heterotricha, *DC. 1. c.* 168.—Persia.

CKEPIS:—
hiemalis, Bivona, Man. i. n. 6. t. 2=taraxadfolia.
hieracioides, **Lam.** Fl. Fr. ii. Ill-Picris hieracioides.
hieracioides, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 126.—Sibir. altaic.
hieracioides, Schrank, Baier. Fl. ii. 338 - Picris laciniata.
hieracioides, F. Schultz. in Flora, xxiii. (1840) 718 = Lowei.
hieracioides, Waldst. & Kit. ex Willd. Sp. PI. iii. 1601 -succisaefolia.
hierosolymitana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 54.—Syria,
hireata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 261, in nota.— Afr. bor.
hiria, Linn. Sp. PI. 807-Leontodon hirtus.
hirta, Pers. Syn. ii. 877 = bursifolia.
hispida, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hong. i. 42 = setosa.
hispidissima, Bartl. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 258 -Picris laciniata.
hispidula, Delile, Fl. Egypte, 261. t. 42-Leontodon hispidulus.
Hookeriana, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 371.—Marocco.
Hookeriana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 255 - glomerata.
Hookeriana, *Oliver tf Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 460.—Afr. trap.
Hnetii, *Boiss. tf Kotschy, in Bpiss. Fl. Orient,* iii. 838. —Oriens.
humilis, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc. Nat Mosc. xliii. **(1870) I. 190 *(-Youngia pygmaea).—Siba.;* Am.** bor.
hybrida x, *A. Kern. Sched. Fl. Exsicc.* i. 62.—Tyrol,
hyoseridifolia, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1403; *Tausch, in Flora,* xi. (1828)1. *Erg.* 79.—Europ.
hyoseroides, 'Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 139. t. 809-neglecta.
incana, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 483 = Andryala integrifolia.
incana, Ledeb, Fl. Ross. ii. 827 — macropns.
incana, *Sibth. tf Sm. Fl. Graec. Prod.* ii. 136; *Fl.* *Graec.* t. 802.—Graecia.
incarnate, *Tausch, in Flora,* xi. (1828) I. *Erg.* 79; ***Less. Syn. Comp.* 187.— Europ.**
incarnata, Vis. Stirp. Dalm. Spec. 17. t 6 = rubra.
incrassata, Banks, ex Lowe, in Trans. Camb, Phil. Soc iv. (1831) 24=Tolpiscrinita.
insnlaris, *Moris tf DeNot. in Mem. Ace. Tor.* ii. (1840) 141. t. 3. f. 1.—Ins. Capraria.
integra, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 190.— Japon.
integrifolia, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 492 = succisaefolia.
integrifolia, *Vest, in Flora,* iii. (1820) 7.—Hab. ?
intermedia, *4- Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 482.—Am. bor. occ.
interrupta, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 137; Fl. Graec. t. 803-rhoeadifolia.
interrupta, Siebtr, ex DC. Prod. vii. 161=Sieberi.
intybacea, Brot. Fl. Lusit. i. 321-tanxacifolia.
Jacquini, *Tausch, in Flora,* xi. (1828) I. *Erg.* 79.—Enrop.
japoniea, *Btnth.Fl. Hongi.* 194.—As. trop.; Austral,
jubata, *Koch, Taschenbuch,* 321.—Helvet.
juvenalis, *F. Schultw, in Flora,* xxiii. (1840) 719.—Gallia?
Keiskeana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 523.—Japon.
khorassanica, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 835.—Persia.
Kitaibelii, *Froel. in DC. Prod.* vii. 168.—Croatia.
Kochiana, Boiss. Fl. Orient, iii. 847 -seq.
Kochii, *Tchihat. Asie Min. Bot.* il. 874.—As. Min.
Kotschyana, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 852.—Persia.
Kotschyana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 252-foetida.
Kralikii, *Pomel, Nout. Mat. Fl. Atl.* 261, in nota.— Afr. bor.
lacera, *Tenore, Prod.* p. lxxi.—Ital.
Lachenalii, Gochn. Tent. Cichor. 19. t 3—tectorum.
laciniata, Schkuhr, ex DC. Prod, vii. 129-Picris laciniata.
laciniata, *F. Schultt, in Flora,* xxiii. (1840) 718.—Ins. Madera.
laevigata, *Dum. Fl. Belg. Prod.* 61.—Belgium,
lampsanoides, *Froel. in DC. Prod,* vii 169.—Mont. Pyren.
lanceolata, Kit. in Linnaea, xxxii (1868) 414-virens.

CKEPIS:—
lanceolata, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 126, nomen.— Malaya.
lappacea, Host, Fl. Austr. ii. 421-Picris laciniata.
lappacea, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 483 = Picris hieracioides.
lappacea, Willd. Sp. PI. iii. 1599-Picris pauciflora.
lapsanifolia, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 257-pulchre.
latialis, Sebast Rom. PI. fasc. ii. 16. t. 5 = lacera.
latifolia, Balb. ex Pers. Syn. ii. 877-rigid*.
Lechleri, *Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 54.— Chili.
leiocarpa, *Steud. Nom.* ed. II. i. 487.—Graecia.
leiosperma, Gaud, ex DC. Prod. vii. 162-virens.
leontodontoides, *All. Auct. Fl. Pedem.* 13.—Europ.
linearifolia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 123-tectorum.
linguaefolia, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix (1874) 525.—As. or.
linifolia, Thuill. Fl. Par. 408=virens.
lodomiriensis, Hess. Prim. Fl. Galic. ii. 159-biennis.
longe-pinnatifida, Chev. Fl. Par. ii. II. 542-virens.
longifolia, *Hegetschn. Fl. Schw.* 766.—Helvet.
Lowei, *Sch. Bip. in Webb tf Berth. Phyt. Canar.* 461.—Ins. Canar.
lusitanica, Boiss. ex Sch. Bip. in Webb *8c* Berth. 1. 456-virens.
lyrata, Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 514 = japoniea.
lyrata, *Froel. in DC. Prod.* vii. 170.-Sibir.
macrocephala, DC. Prod. vii. 173=albida.
macrophylla, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 231.—Afr. bor.
macropus, Boiss. *V Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 57.—As. Min.
macrorhiza. Banks, ex Hook. Bot. Mag. t. 2988 Tolpis macrorhiza.
marginata, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 492 = lampsanoides.
maritima, Bouchez, Fl. Abb. ed. III. 59 = biennis.
Marschalliana, Reichb. Ic. Fl. Germ. xix. 126, spbalm- **vide *Crepinia Marschalliana.***
Marschallii, *F. Schultn, in Flora,* xxiii. (1840) 718.-Reg. Casp.
manritiana, *Froel. in DC. Prod.* vii. 164.—Ins. Maunt.
microcephala, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ino- iii. 415 = Launaea microcephala.
mollis, Aschers. Fl. Brandenb. 385 = succisaefolia.
montana, Berah. Syst. Verz. Erf. 138 = Hieracium sabaudum.
montana, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1404.-Europ.
montana.XSn. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) 357-Reuteriana.
mucronata, Nym. Syll. 46= alpestris.
multicaulis, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1860) 690-Kochiana.
multicaulis, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 126.—Sibir. altaic.
multiflora, *Sibth. If Sm. Fl. Graec. Prod.* ii. 188; *Graec.* t. 806.—Graecia; As. Min.
Mungierii, Boiss. *8c* Heldr. in Boiss. Diagn. Ser. I- 55 = Sieberi.
muralis, Neck, ex Steud. Nom. ed. II. i. 437 - tectorum.
muricata, Gilib. Fl. Lituan. i. 231 -biennis.
muricata, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 138; ? Graec. t. 807 = parviflora.
muricata, Vitm. Summa PI. iv. 417 = hispida.
muricata, Viv. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1665) 278=vesicaria.
murorum, S. G. Gmel. Reixe, i. 188-tectorum.
nana, *Richards. Franil. Journ. App.* ed. II. Sibir.; Am. arct.
neglecta, Bieb. Casp. App. 210=virens.
neglecta, *Linn. Mant.* i. 107.—Graecia; Oriens.
nemausensis, Bieb. Fl.Taur. Cauc. iii. 588 = PterotW*" bifida.
nemausensis, Gouan, Illustr. 60=Pterotheca nemsensis.
nemorosa, Less. *in Linnaea,* ix. (1834) 167, nomen.
nemorum, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. H**P' ii. 248-virens.
Newii, *Oliver tf Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr-* 449.—Afr. trop.
nicaeënsis, *Balb. ex Pers. Syn.* ii. 376.—Europ. *i* Min.
nigricans, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 51. t. 10.—Afr. bor.
Novae-Zelandiae, *Hook.f. Handb. New Zeal. Fl-* —N. Zel.
nuda, Lam. Fl. Fr. ii. 110-Pterotheca nemausensw-

CHEPI8:—
nudicanlfa, *Linn. Sp. PI.* 805.—Europ.
nudjcaalis, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iii. 684.—Creta.
nudifiara, Viv. Fl. Lib. Spec. 81. t 18. f. 2 - aspera.
nnmidica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ail.* 261, nota.—Afr. oor.
nut «"*> Geyer, » Hook. Lond. Jonm. Bot vi. (1847) *58=Calais nutans.
°=ddentalis, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* viL (1834) A.m. bor. oce.
o *C. Koch, in Linnaea,* xidii. (1860) 691.—Hh pan.
Onadis, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* ii. 82.—Soongaria.
(184 1848) II. HO.-As. bor.
PaUtda, Hort Par. ex Sch. Bip. in Webb & Berth, f nf., Canar. ii. 400-ToIpis barbata.
ta, *Presl, Fl. Sicul.* p. xxxi.—SicilU.
*P°*nonica,* C. Koch, in Linnaea, jutiii. (1860) 689-
parviflora, *Desf. Tail.* ed. I. 88—As. Min.; Persia.
*P*r»iflora,* Moench, Meth. 585~virens.
*P*t«la,* Desf. Tabl, ed, j, 88=Dioscoridis.
w«ta., Poir. Voy. Barb. ii. 227 = Lapsana virgata.
P»ucinora, *Desf. Tabl.* ed. II. 108.—Aegypt.
»*«[nata, *Lone, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1881) 24—Ins. Madera.
Pectinaia, Steph. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) i. 197 = Crepistennifolia.
Phrygia, Bo S- * Bal„ ex TM>Us_ FL Orient_ ia_ 8S„ = macropus.
pinnatifida, *Froel. in Dc_ Prod_* TM_ 167.—As. Min.
pinnatifid, Hort. ex DC. Prod. vii. 93 - Hypochoeris P'atensis.
i>^t ifida, Will. Sp. PI. iii. 1604-virens.
p carp 82) 221 = Intermedia.
Poeppig i S«h. Bip. in Flora, xxxviii. (1856) 122-
po Lech n.
pha i a ? *ch* _ *B* *P-»»* *Zo11*- &**• *Ver*_ *Ind*- *Archip.* nomen.-Malaya.
p morpha, Glib_ FL_ *Ut*TM*_ 2Sl=tectorum.
tZ m 0 ^ *, PomT_ iD M&n_ Acad_ Toul_ ai_ (1788) SW
polym ?*o> Wallr_ Sc*- Crit. 426-virens.
polytric. *urca. in Bi* &e ^«*-*«*. (1888) 9 6; xxi. (18«) II. 113.—A.-temp.
pontica, *C. Sc. Nat.* ^- ^ ' ^ ' *Mim_ Acti_* *P^tersi. Sir.* VI.
porrifolia, L^ (18M) 1*—As. Min.
praecox, Bai (1 Z)oB, ^rorf- «• M*- W*—Reg- Himal.
praemorsa, *Tausch, in Flora,* ix. (1828) I. *Erg.* 79.—Europ.; As. bor.
primulifolia, Hook. f. & Thoms. ex C_ B_ CUrke_ Comp. Ind. 395 = fusci ppp a.
prostrata, *Dum.* «• ^if- *»»«*. 61, in syn.-Belginm.
pterosperma, Hort ex Dc_ Prod_ vii_ W = Dioscondis.
pterothecoides, *Boiss_ & Orient,* iii. 850—Syria.
pulcher ma Fisch ex L'"'! En"'"1_ Hort_ S erol. ii. 290 = ient" folia.
pulchra, Linn. Sp. Pl. 806 = Phaecasium lampsanoides.
pulchra, Scop. ex Stend. Nom. ed. I. 236 = virens.
pulmonaria *C. Prod.* vii. 169.—Italia.
p & *Tabl* «*. L 88, nomen; *et Pers. Syn.*
Pur & Wab. ?
kind? Bieb" F1_ Tanr_ Cauc. ii. 255 = Pterotheca
pygmaea, Linn. Sp. «• 805.-Eorop.
racemifera, *Hook.* 397.—Reg. Himal.
racemosa, Tausch, in Flora xi. (1828) »• 487-=pana.
radiata, Nym. Consp. 458-foetida.
radicat ie<u!!* e??!^ Aegypt Arab. 146 - Picris radicata.
ra *Gl**,* 1800-foetida.
ramosissima, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 358.—Graecia.
raphanifolia, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 65.-Hab. ?
Raulaii, *Boiss. Diagn.* S«-1- «• 68.-Ins. Crete.
recognita, *Gaud. Fl. Helv.* v- 134.-Helvet.
recognita, Hall. f. in Naturw. Anzeig. i. (1818) 90 = taraxacifolia.

CBEPI8:—
reflexa, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 413.—Sicilia.
Renteriana, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 55.—As. Min.
rhaetica, Nym. Consp. 456=Jacquini.
rhagadioloid.es, linn. Mant. 108 = Picris Sprengeriana.
rkoeadifolia, Bieb. FL Taur. Cauc. ii. 259=foetida.
rigena, *\Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 127.—Ins. Azores,
rigida, *Waldst.* b[1] *Kit. PI. Rar. Hung.* i. 18. t. 19.—Earop. occ.; As. or.
robertioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 69.—Syria.
rodigioides, Sch. Bip. in Linnaea, xix. (1847) 314-foetida.
Roylei, F. Schnltz, in Flora, xxiii. (1840) 718-Pterotheca bifida.
rubialis, Juss. ex DC. Prod. vii. 154-taraxacifolia.
rubicaulis, Per*. Syn. ii. 875 - taraxadfolia.
rnbra. *Linn. Sp. PI.* 806.—Ital.; Graecia.
ruderalis, Boucher, Fl. Abbev. ed. III. 69=taraxacifolia.
Rueppellii, *Sch. Bip. in Flora,* xxii. (1839) 20.—Abyss,
rumicifolia, *Boiss. &* Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 848.—As. Min.
rnncinata, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 487.—Am. bor. occ.
rupestris, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1402 = Hieracinm rupestre-
Ruprechti, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 843.—Reg. Cancas.
sabauda, Balb. ex DC. Prod. vii. 163 = biennis.
sagittata, *Wender. Ind. Sem. Hort. Atari.* (1829); *ex Linnaea,* v. (1880) *Lilt.* 54.—Hab. ?
Sahendi, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 141.—Reg. Caucas.
salicifolia, Froel. in DC. Prod. vii. 169 = Bnngei.
Sartoriana, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 100 = Columnae.
scabra, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 483 = Picris hieracioides.
scabra, Willd. Sp. PI. iii. 1608-taraxadfolia.
scanensis. Linn. It Scan. 170—biennis.
scariosa, Willd. Sp. PI. iii. 1596 -vesiuaria.
scepusiensis, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 413.—Earop.
Schimperi, *Sch. Bip. ex Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 449.—Air. trop.
Schreberi, *Froel. in DC. Prod.* vii. 168.—Hab. ?
Schultzii, *Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 448.—Abyss.
scofoneroides, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxi. (1884) 274 =albida.
segetalis, Roth, ex Steud. Nom. ed. II. i. 437 = tectomm.
segetum, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 14, nomen.—Helv.
senedoides, *Delile, Fl. Egypte,* 262. t. 42. f. 2.—Aegypt.
setosa, *Hall. f. in Roem. Arch.* i. II. 1.—Enrop.; As. Min.
sibirica, Gonan, IUnstr. 60—blattarioides.
sibirica, *Linn. Sp. PI.* 807.—Europ.; As. Min.; Reg. Himal.
Sibthorpiana, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 55.—Ins. Creta.
sicula, *Ucria, in Roem. Arch.* i. I. 69.— Sidlia.
Sieberi, *Boiss. Diagn.* Ser. L xi. 53.—Graeda.
silenifolia, *Froel. in DC. Prod.* vii. 169.—Hab. ?
silhetensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 397.—Reg. Himal.; Burma.
simplex, *Froel. in DC. Prod.* vii. 168.—Afr. bor.
sinuata, Lam/ Encyc. ii. 179=Picris asplènioides.
smyrnaea, *DC. Prod.* vii. 170.—As. Min.
sonchifolia, *C. A. Mey. in Schrenk, Enum. PI. Nov.* ii. 82.—Oriens.
spathnlata, *Guss. Adnot. Cat. PI. Boccad.* 5.—Manritan.
spathulata, Lam. Encyc. ii. 181-Suffreniana.
Sprengeriana, All. FL Pedem. i. 221 = Picris paoriflora.
Sprengeriana, Willd. Sp. PI. iii. 1598 = Picris Sprengeriana.
stellata, Ball, in Jonm. Bot. xi. (1873) 371=tar»xacifolia.
stenoma, *Turcm. ex DC. Prod.* vii. 164.—Dahur.; China.
stenotheca, Fries, ex Walp. Aon. ii. 1009 - Hieracium Crepidupermom.

CREPIS:—
Stoliczkai, *C. B. CUrke, Camp. Ind.* 397.—Re?. Himal.
striata, Thonb. Prod. PI. Cap. 139 - Hieracinm capense.
stricta, Schnltz, Fl. Starg. Soppl 41=tectornm.
stricta, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 99 =neglecta.
snccisaefolia, *Tausch, in Flora,* ix. (1828) I. *Erg.* 79.—Rossia.
succulenta, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 128-Tolpis fruticosa.
Suffreniana, *Steud. Nom.* ed. I. 236; *Lloyd, Fl. Loir. Inf.* 155. —Europ.
sulphnrea, *Pourr. ex Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 261.—Hispan.
tanegana, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 198.—Japon.
taraxacifolia, *Thuill. Fl. Par.* 409.—Europ.
taraxadfolia, Willd. Sp. PL iii. 1593 - taraxacoides.
taraxacoides, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 231.—Afr. bor.
taraxacoides, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 317=albida.
taraxacoides, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 438 = taraxacifolia.
Taraxacum, Stokes, in With. Bot. An. ed. II. ii. 858 -Taraxacum offidnale.
taurinensis, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. iii. 587 - Marschallii.
taurinensis, Willd. Sp. PI. iii. 1595 = taraxacifolia.
tectorum, Huds. Fl. AngL ed. I. 301 = virens.
tectorum, *Linn. Sp. PI.* 807.—Europ.; As. bor.
tectorum, Vill. Hist PL Danph. iii. 144 - taraxacifolia.
tenerrima, Sch. Bip. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 449 = carbonaria.
tenuifolia, Soland. & Banks, ex Lowe, in Trans. Camb. Phil, Soc. iv. (1881) 24>Tolpis pectinata.
tennifolia, *Willd. Sp. PI.* iii. 1606.—Reg. Himal. As. bor.
terglouensis, *A. Kern. Sched. Fl. Ersicc.* 61.—Europ.
thracia, Spreng. Syst. iii. 634 -foetida.
tinctoria, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 491=tectornm.
tingitana, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 537.—Marocc.; Hisp.
tomentosa, Moench, Meth. 585^Dioscoridis.
transsilvanica, Scaur, Enum. PL Transs. 376 — biennis.
triangula, J. & C. Presl, Delic Prag. 110 = leontodontoides.
Triasii, *Nym. Syll.* 49.—Hispan.
trichotoma, Moench, Meth. SuppL 216 = Tolpis coronopifolia.
tuberculata, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 459=leontodontoides.
Turctanimraii, C. A. Mey. in Schrenk, Enum. PL Nov.ii. 32-Pallasii.
umbellata, Bemh. Syst. Verz. Erf. 188 - Hieracium umbellatum.
umbellata, Thuill. Fl. Par. 409-virens.
uniflora, Thuill. 1. c. 410=virens.
varia, Moench, Meth. 534-tectomm.
variabilis, Krock. Fl. Siles. ii. II. 326=virens.
versicolor, Fisch. ex DC. Prod. vii. 151 = Lactuca Fischeriana.
vesicaria, Balb. Elene. 93 = taraxacifolia.
vesicaria, *Linn. Sp. PI.* 805.—Hispan.
virens, *Linn. 1. c.* ed. II. 1134.—Europ.; Reg. Caucas.
virgata, Desf. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 37 —Tolpis virgata.
virgata, Lapeyr. Hut. Abr. PL Pyr. 488 •= Picris bieradoides.
viscidula, *Froel. in DC. Prod.* vii. 166.—Banat.
willemetioides, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 845.—Persia.
youngiformis, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1848) 277 = Phecasium lampsanoides.
Bocinthia, Nym. SylL 49-foetida.

CREPULA, Hill, Veg. Syst iv. 9 (1762)=Centaurea, Linn. (Compos.).
centauroides, Hill, Hort Kew. 58=Cent, centeuroidea,
cernua, Hill, I.e.—Hab.?

CBE8CBNTIA, Linn. Syst. ed. I (1786). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1058.
DENDKOSICUS, Rafin. Sylva Tellur. 80 (1838).
iculeata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 168-Parmenliera edulis.

CKESCENTIA :—
acuminata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 57 = C. Cujete.
aggregata, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* **xxvi. (1868)** 172.—Jamaic.
alata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 158 =Pannentiera alata.
angustifolia, Willd. ex Seem, in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1862) 20=C. Cnjete.
arborea, Rafin. Sylva Tellur. 81 - C . Cujete.
confertifolia, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 170.—Jamaic.
coriacea, *Miers, I. c.* 177—Am. trap,
cucurbitina, *Linn. Mant.* 250.—Am. tiop.
Cujete, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1851 (1856) 138 = cucurbitina.
Cujete, *Linn. Sp. PI.* 626.—Am. trop.
Cujete, Veil. Fl. Flum. 269 ; vi. t. 103-plectantha.
cuneifolia, Gardn. in Hook. Jonm. Bot. ii. (1840) 122 - C . Cujete.
cuspidate, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* **xxvi. (1868)** 178.—Venezuela.
edulis, Desv. Joum. Bot. iv. (1814) 118 = Pannentiera ednlis.
elongata, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxvL (1868) 178. —Ind. occ.
fasciculata, *Miers, 1. c.* 171.—Ind. occ.
jasminoides, *Lam. Encyc.* i. 559.—Ins. Baham.
laiifolia. Mill. Can]. Diet. ed. VIII. n. 2=cucurbitina.
latifolia, Rafin. Sylva Tellur. 81 = C. Cujete.
lethifera, Tuss. Fl. Antill. iv. 50. t. 17=cucurbitina.
linearifolia, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 172.—Ind. occ.
macrophylla, Seem, in Hook. Kew Joum. vi. (1854) 273 = Amphitecna macrophylla.
microcarpa, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* **x.** (1881) 294.—Porto Rico.
musaecarpa, Zaldivar, ex Heller, Reisen in Mexico, 414 — Parcnentiera edulis.
nigripes, Linden, Cat. n. 17 (1862) 7 =• Amphitecna nigripes.
obovata, Benth. Bot. Voy. Sulph. 180. t. 46 = cucurbitina.
ovata, Burm. f. Fl. Ind. 132 — cucurbitina.
palustris, Forsyth, ex Seem, in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 20-cucurbitina.
***pinnata,* Jacq. Coll. iii. 208 (= *Tripinna africand).*—** Afr. trop. ?
plectantha, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* **xxvi. (1868)** 170.—Bras.
pumila, Rafin. Sylva Tellur. 81 = C. Cujete.
regahs, *Linden, PI. Nouv.* (1859) 7.—Am. trop.
spathulata, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* **xxvi. (1868)** 178.—Ecuador.
toxicaria, Tuss. Fl. Antill. iv. 60. t. 17=cucnrbitina.
trifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 489=Pannentiera alata.

CEESSA, Linn. Diss. Dass. 12 (1747) i Amoen. Acad. i. 895 (1749). *CONVOLVVLACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 881.
arabica, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* **64.—Arabia.**
arenaria, Willd. ex Roem. & Schult. Syst vi. 207 = truxillensis.
australis, R. Br. Prod. 490= cretica.
cretica, *Linn. Sp. PI.* 223.—Cosmop. trop.
humifusa, Lam. Fl. Fr. ii. 268-cretica.
indica, Retz. Obs. iv. 24=cretica.
intermedia, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* **v.** *Suppl.* i. (1860) 32.—Aden.
latifolia, T. Anders. 1. c. 26 = Breweria latifolia.
microphylla, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 63,128 = cretica.
monosperma, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 83-cretica.
multiflora, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* **vi. 207.—** Am. anstr.
nudicanlis, *Griseb. in Coett. Abh.* xxiv. (1879) 266.— Reg. Argent,
sericea, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* **vL 207.—** Am. anstr.
truxillensis, *H. B.* fa" *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 93.— Peruv.
villosa, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 372= cretica.

CRINIPES, Hochst. in Flora, xxxviiL (1855) 279-**Dan**thonia, DC. (Gramin.).
abyssinicus, Hochst. 1. c. 280 —D. tenuigmmis?

CRINISSA, Reichb. Norn. 95 (1841)=Pyrrhopappus, DC. (Compos.).

CRINITA, Houtt. Handl. vii. 861. t. 40. f. 1 (1777) = **Paretta,** Linn. (Rubiac).
capensis, Houtt. 1. c. 862-P. caffra.

CRINITA, Moench, Meth. 578 (1794)-**Aster,** Toum. (Compos.).
linearifolia, Moench, Meth. Suppl. 287—Chrysocoma Coma-aurea.
punctata, Moench, Meth. 578-A. acrisi

CRINITARIA, Cass. in Diet Sc. Nat. xxxvii.475 (1825) = Aster, Tourn. (Compos.).
biflora, Cass. 1. c. 476 = A. acris.
humilis, Hook. Fl. Bot. Am. ii. 24 = A. angustus.
Linosyris, Less. Syn. Comp. 195—A. Linosyris.
***oleaefolia,Cass.in* Dict.Sc. Nat.xxxvii.** *47-6(=Linosyris villosa).*—Europ. or. ; As. bor.
punctata, Cass. 1. c = A. acris.
villosa,* Cass. 1. c.** *{—Linosyris villosa).—Europ. or.;** As. bor.
viscidiflora. Hook. Fl. Bor. Am. ii. 24=Bigelowia viscidiflora.

CRINODENDRON, Molina, Saggio Chili, 179 (1782) -Tricuspidaria, Ruiz *Sc* Pav. (Tiliac).
Hookerianum, C. Gay, Fl. Chil. i. 841-T. dependent
Patagua, Molina, Saggio Chili, 179 = T. dependent

CRINODENDRUM, Juss. Gen. 481 (1789) = praec.

CR1NONIA, Banks, ex Tul. in Arch. Mns. Par. viii. (1855) 405=Hedyoarya, Font. (Monim.).

CRINONIA, Blume, Bijdr. 338 (1825)=Pholidota, Lindl. (Orchid.).
carnea, Blume, 1. c. 389 = P. carnea.
globosa, Blume, 1. c.=P. globosa.

CRINOPSIS, Herb. Amaryll. 270 (1887) - Crinum, Linn. (Amaryllid.).

CRINUM, Linn. Gen. ed. I. 97 (1737). *AMARYLLIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 726.
CRINOPSIS, Herb. Amaryll. 270 (1837).
EKIGONA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 115 (1866).
LIRIAMUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 (1886).
SCADIANUS, Rafin. Atl. Joum. 164 (1838).
TAENAIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 115 (18i>6).
TANOHEKOLLI, Adans. Fam. ii. 57 (1763).
abyssinicum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **ii.** 811.—Abyss.
africanum, Linn. Sp. PI. 292—Agapanthus umbellatns.
albiflorum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I Art. IV. 12 =asiaticum !
album, *Herb. Amaryll.* 272.—Arab,
algoense, *Herb. 1. c.*—Afr. austr.
amabile, *Donn, Hort. Cantab,* ed. VI. 83.—Sumatra.
amabile, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 438 -latifolium.
ameriianum, Hort. Prag. ex Stend. 1. c. - erubescens.
americanum, *Linn. Sp. PK* 292.—Am. austr.
americanum, [DC. in] Red. Lil. t. 332-asiaticum.
ammocharoidei, *Baker, in Journ. Bot,* xvi. (1878) 195.—Afr. trop.
amoenum, *Roxb. Hort. Beng.* **[28];** *Fl. Ind.* **ii. 127—** Ind. or.
angustifolium, Herb, ex Steud. Nom. ed. II. i. 438 = asiaticum.
angustifolium. Linn. f. Suppl. 195 = Cyrtanthus angustifolius.
angustifolium, *R. Br. Prod.* 297.—Austral.
angustum, Steud. Nom. ed. II. i. 438, sphalm.—augustnm.
anomalum, Herb. App. 22 = asiaticum.
aquaticum, Burch. ex Spreng. Syst. ii. 55 - campanulatum.
aquaticum, Herb. App. 22—erubescens.
arenarium. Herb, in Bot. Mag. t. 2855—angustifolinm.
asiaticum, Blanco, FL Filip. ed. I. 251-gracile.
asiaticum, [DC. in] Red. Lil. t. 348 =americanum.
asiaticum, *Linn. Sp. PI.* 292.—As. trop.
asiaticum, Lour. Fl. Cochinch. 197=cocbinchinense.
asiaticum, Roxb. Hort. Beng. [23]=defixum.
attenuatum, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 878 = Commelyni.
angustum, *Roxb. Hort. Beng.* [23]; *Fl. Ind.* ii. 136.— Ins. Maurit.
australasicum, Herb. Amaryll. 259-angustifolium.
australe, Donn, Hort. Cantab, ed. VI. 83; Homem. Hort. Hafn. 818 = pednnculatum.

CRIHTJM:—
Bainesii, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) H. 89.—Airaustr.
Balfouri, *Baker, in Hook. Bot. Mag. i.* **657O.-Ii>«-** Socotra.
bancanum, *Kurt, in Tijdschr. Nederl. Ind.* **xxvii.** (1864) 231.—Malaya.
barbatum, Linn, ex Herb. Amaryll. 188 - Hippeastrum equestre.
blandum, M. Roem. Syn. Ensat. 76-angustifolium.
brachyandrum, *Herb, in Bot. Mag.* sub t. 2121. p. 8.— Austral.
brachynema,/fer£. *in Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 36.—I>>d or.
bracteatum, *Willd. Sp. PI.* ii. 47.—Ins. Seychell.
brevifolium, Roxb. Hort Beng. [23]; FL Ind. ii. w =bracteatum.
brevilimbum, *Carey, ex Herb, in Bot. Mag.* **sub 12121-** p. 7.—Ins. Pacif.
Broussoneti, Herb. 1. c. t. 2121 = ynccaeflorum.
Broussonetianum, Herb. Amaryll. 260. i. 44. £ I* yuccaeflorum.
buphanoides, *Wetw. ex Baker, in Journ. Bot.* ****•** (1878) 195.—Afr. trop.
caffrum, Herb, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 678 campanulatum.
campanulatum. *Herb, in Bot. Mag.* sub t. 2121- P- "—Afr. austr.
canaliculatum, Carey, ex Stend. Nom. ed. II. i- W canalifolinm.
canaliculatum, Roxb. Hort. Beng. [23]; Fl. Ind. "• 182—pedunculatum.
canalifolium, *Herb, in Bot. Mag.* sub t. 2121. P- Ind. or.
Candelabrum, Hort. ex M. Roem. Syn. Ensat. 57 Brunsvigia gigantea.
capense. Herb. Amaryll. 269 - longifolinm.
Careyanum, *Herb, in Bot. Mag.* t. 2466.—Ins. Mase-
caribaeum, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) »• Janiaic.
carinifolium. Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 215 = asiatid""-
caspium, Pall. Reise, ii. 786-Allium caspium.
chinense, Lodd. ex Kunth, Enum. PI. v. 550 = «
cochinchinense, *M. Roem. Syn. Ensat.* 71.—Cochin-
Commelinianum, Herb. Amaryll. 254 = Commelyoi-
Commelyni, [DC. in] Red. Lil. t. 322-americanuB>.
Commelyni, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 40. t. 2O2.—* austr.
concinnum, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 857.—
confertum, Herb, in Bot. Mag.t. 2522-angustiw"
conicum, M. Roem. Syn. Ensat. 67 - americanum.
corantinum, Herb, ex Steud. Nom. ed. II. '• erubescens.
corantynum, M. Roem. Syn. Ensat. 80-praec
cordofanum, *Kotschy V Peyr. PI. Tinn.* **14. t.** * Afr. trop.
crassifolium, Herb. App. 28=vaiiabile.
Cruribulum, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1181-cruenturin
cruentum, *[Ker-Gawl. in] Bot. Reg.* 1.17'1—
Cumingii, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) "• Ins. Philipp.
declinatum. Herb, in Bot. Mag. 12281-ariatie
defixum, *[Ker-Gawl.] in Journ. Sc. VArts,* **w-** 105.—Ind. or.
dentatum, Klotzsch, ex Kunth, Enum. PL - graciliflorum.
Dieterichii, Schult. Obs. 65-Commelyni.
distichum, Herb, in Bot. Mag. sub t. 2121- P- yuccaeflorum.
elegans, Carey, ex Herb. I.e. — prntense. ..
ensifolium, Roxb. Hort. Beng. [88]; FL Ind. i<- defixum.
erubescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp- Kunthianum.
erubescens, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* **ed.** *I-* —Am. austr.
erythrophyllum, *Carey, ex Herb, in Sot.* 2121. p. 7.—Burma.
exaltatum, Herb. 1. c. p. 5 - peduncnlatnm.
falcatum, Jacq. Hort. Vindob. iii. 84=A falcata.
fimbriatulum, *Baker.in Journ. Bot.* xvi. (187»J Afr. trop.
firmifolium, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* ****•** 270.—Madag
flaccidum, *Herb, in Bot. Mag.* sub t. 2121-P
fioridanum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. SS
floridanum, Steud. Nom. ed. II. i. 489=«eq«

CB1NTJH:-

floridum, Fraser, ex Herb, in Bot. Mag. t. 2121. p. 8 = asiaticum.

figridum, Salisb. Prod. 228=Agapanthus umbellatus.

Forbesianum, Herb. Amaryll. 267 = seq.

orbesii, Schult.f. Syst. vii. 864.—Afr. trop.

lormosum, *Herb, ex Seub. in Mart. Fl. Bras.* ii. I. .169.—Bras.

g'ganteum, *Andr. Bot. Rep.* 1169.—Afr. austr.

giganteum, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 175 = asiaticum.

[illegible] M. Roem. Syn. Ensat. 80=erabescens.

Governeurm, Herb, in Trans. Hort. Soc. iii. (1822) 190 [illegible] longifolium J

gra die, *G. F. W. Mey. ex Presl, Rel. Haenk.* ii. 120. —Ins. Luzon,

graciliflornm, *Kunth, Enum. PI.* v. 565.—Venezuela.

KUtanense, M. Roem. Syn. Ensat. 80 = Kunthianum.

"aylockii x, Herb. Amaryll. 274.

Herberti G. Don, ex Loud. Hort. Brit 120-Com. melyni.

Herbertianum, Schult. f. Syst viL 871=strictum.

fjjf*'°"" «» Wall- PL As. Rar. ii. 38. t. 145- zeylanicum.

Hildebrandtii, *Vatke, in Monaisb. Acad. Berl.* (1876) 863.—Ins. Johanna.

"°?"*mannianum,* M. Roem. Syn. Ensat. 71=asiaucum.

S e > *Herb*_ •» *Boi*_ M <V-1. 2686.-Ind. or.

"nbncatum, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) II. 760.- Afr. austr.

in in!!?"*1·* *Regel, Cai*_ *PL Hort*_ ^*«^<w. 43.—Hab. J anstr"'"l, *Tauseh*> *in Flora,* xix_ C1886) "• 422.—Am.

in *Vu*i Sweet, Hort. Brit. ed. I. 405-Utifolium.

Kirkii, M. Roem. Syn. Ensat. 98 = lineare.

Kirkii, R*«, *in Hook. Bot. Mag.* t. 6512.—Afr. trop.

*»y|i. C JI/0IT. „ 5, ^. *Hortic.* iL (1852) 373. t 68. j.—Hab. 1

Aunthianum, *M. Roem. Syn. Ensat.* 80.—Nicaragua.

£«"<*«»«.«, Willd. ex M. Roem. 1. c. 94-seq.

**"=«, *Herb, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 677.—Vlntmm.

latifolium, [illegible] Andr_ Bot_ Re P- '• 478-zeylanicum.

tifoli SuconHi *Linn*_ *• *PL* 291__Ind_ <"•

]W [illegible] *lum*> *•«»*• *•*• *Ma*e- »• «783.—Afr. trop

2»n[illegible]TM"'' ***"• »» y«wr«. £in». *Soc.* xx. (1888) Madag.

Li△ 2 M[illegible]

Lindleyanum, *Schsilt.f. ex Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 159.—Bras.; Guiana.

Lindleyanum. Herb. Amaryll. 252 = Commelyni.

lineare, *Linn. f. Suppl.* 195.—Afr. austr.

Linna·*i M. Roem. Syn. Ensat 89 = oraatnm.

Lodd[illegible]TI/"""**"*'H «b. Amaryll. "258, 401 = cruentum.

lonS?"?TM1". *Herb, in Bot. Mag.* sab t. 2121.—Jamaic.

"8«olium, *Roxb. Hort. Beng.* [23]; *Fl. Ind.* U. 130. —Ind. or.

longifolium, Thunb. Prod. PI. Cap. 59 = capense.

longistylum, Herb, ex Steud. Nom. ed. II. i. 440- latifolium.

lorifolium, Roxb. Hort. Beng. [23]; Fl. Ind. ii. 131 = pratense.

Loureiri, M. Roe»- Syn. Ensat. 85«zeylanicnmt

Macowani, *Baker, in* Afr. austr. *Gnd, Chr0H,* (1878^ '• 29&~"

macrocarpum, Care yiex Kunth, Enum. Ii. v. 658 = sumatranum.

Makoyanum, Carr" ln Rev* Hortic_ (1877) W oo Moorei.

Mart. [illegible] P«ng- Syst. ii. 56=Lapiedra MartineziL

mau Wianum, *Edd, Bot Cab,* t. 65O.-Madag.

moluccanum, Herb. ex Rdchb_ Exot_ *• *7 " "y* lanicum.

moluccanum, Roxb. 140 = latifolium. Hoit,Beng- [2S]i Fl< Ind„„

Moorei, *Hook. f. Bot.* ^V-'• 6118.—Afr. austr.

multiflorum, *Desf*

nervosum, L'H[illegible]t- S*'*- Ane'- 8 = Eurycles sylvestris.

nervosum, R»jb. Hort. Beng. [28]; FL Ind. ii. 135 - Eurycles [illegible]

norfolkianum [illegible] *A_Cunn_in Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 123

Northianum, —Ins. Norfolk.

Borneo. *Bater*>»» *Gard. Chron.* (1882) I. 671.—

obliqu

octopl[illegible]?' LE^n>f- SuPPl- l»5 = Cyrtanthus obliquus.

[illegible]TJT' ™rb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 440 = [illegible]

od[illegible]

H[illegible]mum, *Tausek, in Flora,* xix. (1836) 422.—

CRINUM:—

ornatum, Herb. Amaryll. 262-zeylanicum.

Osbeckii, *Schult.f. Syst.* vii. 1721.—Hab.?

pauciflorum, *Baker, in Jmrn. Bot.* xvi. (1878) 185.—Afr. trop.

Paxtoni, *Herb. Amaryll.* 271. t. 44. f. 24.—Ind. or.

pedunculatnm, *R. Br. Prod.* 297.—Austral.

petiolatum, Herb. App. 22=gigantenm.

plicatum, Livings!, ex Hook. Bot. Mag. t. 2908=asiatienm.

podophyllum, *Hook. Bot. Mag.* t. 6483.—Afr. trop.

pretense, *Herb. Amaryll.* 268.—Ind. or.

procerum, Carey, ex Herb. App. 22 = asiaticum.

purpurascens, *Herb. Amaryll.* 250.—Ins. Fernand. Noronh.

pusillum, *Herb. I. c.* 255. t. 32. f. 8.—Ins. Nicobar.

quitense, Spreng. Syst ii. 65=Phaedranassa chloracea.

Redouteanum, M. Roem. Syn. Ensat 70-asiaticum.

revolutum, Herb, in Bot. Mag. sub t. 2121. p. 6 = lineare.

revolutum, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 285 =Commelyni.

rigidum, Herb. Amaryll. 248=sumatranum.

riparium. Herb. App. 28 = longifolium.

roseum, *Eekl. ex M. Roem. Syn. Ensat.* 84, nomen.—Afr. austr.

rubricaule, M. Roem. 1. c. 70 = pedunculatum.

rubrilimbum, Sweet, ex Steud. Norn. ed. II. i. 440 = erubescens.

Rueppelianum, Fresen. in Verb. Befoerd. Gartenb. iii. 266—scabrum.

Sanderianum, Lafer, *in Gard. Chron.* (1884) II. 102 Afr. trop.

scaberrimum, Herb, in Trans. Hort. Soc. iii. (1822) 195 — scabrum.

scabrum, *Herb, in Bot. Mag.* t. 2180.—Bras.

Schmidti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 644. —Afr. austr.

sectitubum, *Teijsm.* b* *Binn. Cat. Hort. Bog.* 377, nomen.—Hab.?

serrulatum, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) I. 786.—Cambodia.

sinicum, Roxb. ex Herb. In Bot. Mag. sub t. 2121. p. 7=asiaticum.

spedosissimum. Herb. I. a p. 6 = zeylanicum.

spedosum, Herb. 1. c. t 2217-latifolium.

speciosum, Linn. f. Suppl. 195 = Vallota purpurea.

spectabile, Herb, ex Steud. Norn. ed. II. i. 440 = giganteum.

spirale, Andr. Bot. Rep. t. 92-Carpolyza spiralis.

Spofforthianum, Herb, ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 678=capense.

stenophyllum, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) I. 786.—Burma.

Stracbeyi, *Baker, I. c.* xvi. (1881) 72.—Reg. Himal.

strictum. *Herb, in Bot. Mag.* t. 2635.—Am. austr.

strictum, *Hornem. Enum. PI. Hort. Hafn.* (1807) 18 ; *Hort. Hafn.* i. 318.—Hab. 1

subcemuum, *Baker, in Gard. Chron.* (1881) II. 180.—Afr. trop.

submersum, *Herb, in Bot. Mag.* t. 2463.—Bras,

sumatranum, *Roxb. Hort. Beng.* [23]; *Fl. Ind.* ii. 131. —Sumatra.

superbum, Roxb. 11. cc. [23] 133 = amahile.

taitense, [DC] in Red. Lil. t 408 = pedunculatum.

tenellum, Jacq. Coll. Suppl. 48=Carpolyza spiralis.

tenellum, Linn. f. Suppl. 194 =*Strumaria nliiolia.

Tinneae, Kotschy & Peyr. in Flora, Ii. (1868) 508«=seq.

Tinneanum, *Kotschy & Peyr. PI. Tinn.* 44. t. 21.—Afr. trop.

toxicarium, Roxb. Hort. Beng. [23]; Fli Ind. ii. 134 - asiaticum.

umbellatum, Carey, ex Herb, in Bot. Mag. sub t. 2121. p. 7=amoenum.

undulaefolium, Herb. 1. c. p. 8 -scabrum.

nndulatum, *Hook. Exot. Fl.* t. 200.—Bras,

unifloram, *F. Muell. Fragtn.* iii. 23.—Austral.

urceolatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 68. t 287. f. b =Ufceolha pendula.

vanillodorum, Welw. ex Baker, in Joum. Bot. xvii. (1878) 196-giganteum.

varUbile, *Herb. Amaryll.* 268. t. 44. t 28.—Afr. austr.

venosum, *R. Br. Prod.* 297.—Austral,

vennstum, *Herb. Carey, ex Steud. Norn.* ed. IL i. 440. —Ind. or.

verecundum, Carey, ex M. Roem. Syn. Ensat. 76 - amocnum.

virgineum, *Mart, in Schult.f. Syst.* vii. 865.—Bras.

CBrtfTTM:—

viridifolium, M. Roem. Syn. Ensat. 78 = Commelyni.

Wallichianum, M. Roem. Syn. Ensat. 85 - zeylanicum.

Weinmanni, M. Roem. 1. c 90=flaccidum.

Welwitschii, *Baker, in Gard. Chron.* (1884) II. 40.—Afr. trop.

ynccaeflorum, *Salisb. Parad. Land.* t. 52.—Afr. trop.

yuccaeoides, Herb. Bot. Mag. sub t. 2121=yuccaeflorom.

zeylanicum, *Linn. Syst.* ed. XII. 236.—Ind. or.

CRIOSANTHES, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 = Cypripedium, Linn. (Orchid.).

borealis, Rafin. 1. c. = Cyp. arietinum.

parviflora, Rafin. Fl. Tellur. iv. 46 = praec. t

CRISTA-GALLI, Rupp. Fl. Jen. «d. Hall. 240 (1745)=- Bhtnanthua, Linn. (Scroph.).

CRISTAHIA, [Heist. Syst. 12 (1748)] Cav. Ic. v. 10. t. 418 (1799). *MALVACEAE,* Benth. *8c* Hook. *f.* i. 202.

andicola, C. *Gay, Fl. Chil.* i. 817.—Chili,

argyliaefolia, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (186<-65) 29.—Am. austr.

aspera, C. *Gay, Fl. Chil.* 1. 320.—Chili,

betonicaefolia, *Cav. Ic.* v. 11, in obs.; *Pers. Syn.* ii. 248.—Chili.

bipinnata, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 31.—Am. austr.

cocdnea, Pursh, Fl. Am. Sept. H. 458=Malvastrum coccineum.

concinna, *Phil. Fl. Atac.* 11.—Chili,

corchorifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 91.—Reg. Argent.

cordato-rotundifolia, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 828.—Chili,

dissecta. *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 153.—Chili.

diversifolia, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1870) II. 165.—Chili,

ecristata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i.* 165.—Bras.

elegans, C. *Gay, Fl. Chil.i.* 325.—Chili,

eriantha, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. U838) 152.—Chili,

foliosa, *Phil. Fl. Atac.* 11.—Chili,

geraniifolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 119.—Chili,

glandulosa, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 31.—Am. anstr.

glaucophylla, *Cav. Ic.* v. 11. t. 418.—Chili,

gracilis, C. *Gay, Fl. Chil.* i. 326.—Chili.

grandiflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxxvi. (1868)1.564 «= eriantha.

Haenkeana, *Presl, Rel. Haenk.* iL 120.—Chili,

heterophylla, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 153.—ChilL

heterophylla, Phil. Fl. Atac. 11 = diversifolia.

hirsuta, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 119.—Chili.

hispida, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 153=heterophylla.

insularis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1875) 187.—Chili.

integenima, *Phil. Fl. Atac.* 11.—Chili,

intermedia, C. *Gay. Fl. Chil.* i. 819.—Chili,

lata, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 565.—Chili,

loasaefolia, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 28.—Chili.

lobulata, *Phil. Fl. Atac.* 11.—Chili.

Moliniae, C. *Gay, Fl. Chil.* i. 827.—Chili,

multifida, *Cav. Ic.* v. 11, in obs.—Chili,

multiflora, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 321.—Chili.

obtusiloba, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 564 = multifida.

Ovallea, *C. Gay, Ft. Chil.* i. 82O.-Chili.

patagonica, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 28.—Patagon.

pinnata,/>*</. *in Anal. Univ. Chil.* (1872) 682.—Chili,

pinnatifida, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 12.—Chili.

Sadae, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 30.—ChilL

sessilifblia, *Turcm. in Bull. Soc. If at. Mosc.* xxxi. (1858) I. 197.—Chili.

Spinolae, *C. Gay, Fl. Chil. i.* 826.—Chili,

trichocaula, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 682.—Chili.

Urmenetae, *Phil. 1. c.* 681.—Chili,

virgata, *C. Gay, Fl. Chil.* L 322.—Chili,

viridi-luteola, C. *Gay, I.* (.—Chili.

CRIST ARIA, Sonner. Voy. Ind. iii. 284 (1782) = Combretum, Unn.
coccinea, Sonner. 1. c. - Combr. pnrpureum.

CBISTATXZJiA, Nutt. In Jonrn. Acad. Philad. vii. (1834) 86. t. 11. *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook, f. i 105.
CYRBASIUM, Endl. Gen. 891 (1838).
DISPARA, Rafin. Sylva Tellnr. 112 (1838).
erosa, *Nutt. I. e.* 86.1.11.—Am. bor.
Jamesii, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 124.—Am. bor.

CRITAMUS, Bess. Enum. PI. Volh. 93 (1821) = Faloaria, Host (Umbell.).
agrestis, Bess. 1. c. = F. Rivini.
Falcaria, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. 478 = F. Rivini.
heterophyllus, Mert. & Koch, in Roehl. DeuUchl. Fl. ii. 441 = Carum Bunius.
saxifragut, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. 478 = Carom Bunius.

CRITAMUS, Hoffm. Gen. Umb. ed. II. 182 (1816) = Apium, Tonro. (Umbell.).
dauricus, Hoffm. 1. c. 184 = A. lineare.

CRITESION, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1810) 103 = Hordeum, Linn. (Gramin.).
geniculatum, Rafin. 1. c. = H. jubatum.

CKITES1UM, Endl. Gen. 104 (18S8) = praec.

CRITHMTJM, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 74 (1787). *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook. *(. i.* 905.
campestre, Gueld. ex Bieb. Fl. Tanr. Cane. iii. 215 *(= Cenolophium Fischeri).—Reg.* Caucas.
canariense, Cav. in Anal. Cienc iii. (1801) 36 = maritimum.
latifolium, Linn. f.Snppl. 180=Astydamiacanariensis.
Libanotis, Link, Enum. Hort. Berol. i. 270 = Hippoinarathrnm Libanotis.
maritimum, *Linn. Sp. PI.* 246.—Europ.
mediterranean, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 215 (-*Cenolophium Fischeh).—Reg.* Cancas.
pyrenaicum, Forsk. ex Delile, Illnstr. Fl. Egypte, 10 = Deverra tortuosa.
pyrenaicum, Linn. Sp. PI. 246=Seseli Libanotis.
Silaus, Wibel, Prim. Fl. Werth. 197 = Silaus pratensis.

CRITHO, E. Mey. Ind. Sem. Hort. Regiom. (1848) 5 = Hordeum, Linn. (Gramin.).
Aegiceras, E. Mey. L c.=H. Aegiceras.

CRITHODIUM, Link, in Linnaea, in. (1834) 132. t. 3-Tritieum, Toura. (Gramin.).
aegilopoides, Link, 1. c. = T. monococcnm?
aegyptiacum, Trin. ex Stead. Nom. ed. II. i 440 - T. bicorne.

CRITHOPSIS, Jaub. & Spach, IUnttr. iv. 80. t. 321 (18S0) -=Elymus, Linn. (Gramin.).
brachytricha, Walp. Ann. iii. 786=seq.
rhackitricha, Janb. *Sc* Spach, Illustr. iv. 30 = E. Delileanns.

CRITHOPYRUM, Hort. Frag, ex Stend. Syn. PI. Gram.S44(1855)~AgropyTon,J.Gaertn.(Gramin.).
trachycaulon, Hort. Prag. ex Steud. 1. c. - A. Richardsoni?

CRITONIA, P. Br. Hist. Jamaic. 490 (1756) i DC. Prod, v. 140-=Eupatorlum, Toum. (Compos.).
Dalea, DC. Prod. v. 140 = E. Dalea.
daUoides, DC. 1. c. 141 = E. daleoides.
ellipHca, Rafin. ex DC. 1. c. 178=E. rotundifolium.
eupatorioides, Gaertn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 441 =• Kuhnia eupatorioides.
hebebotrya, DC. Prod. v. 141 = E. hebebotrya.
heteroneura, Ernst, in Flora, lvii. (1874) 210.—Venezuela.
imbricata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 512.—Ind. occ.
Kuhnia, Gaertn. Frnct. ii. 411. t 174. *I.* 7 = Kuhnia eupatorioides.
macropoda, DC. Prod. v. 140 = E. macropodum t
parviflora, DC. L c. = E. parviflorum.
Pseudodalea, DC. 1. c—Cuba.

CRITONIOPSIS, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 430-Vernonia, Schreb. (Compos.).
Lindenii, Sch. Bip. 1. c. 481 - V. pyenantha,

CROCANTHEMUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 370 = Hellanthamum, Toum. (Cistin.).
brasiliensis, Spach, 1. c. = H. brasiliense.
carolinianum, Spach, 1. c. = H. caroliniannm.

CROCANTHUS, Klotzsch, ex Klatt, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 518 (1863)=Croco8inia, Planch. (Irid.).
mossambicensis, Klotzscb, ex Klatt, L c-Crocosmia aurea.

CKOCIDIUM, Hook. Fl. Bor. Am. i. 335. t. 118 (1833). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. £ ii. 440.
multicaule, *Hook. 1. c.*—Am. bor. occ.

CROCIRIS, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 73 (Sert. PL Transs.) - Crocus, Toura. (Irid.).
iridifiora, Schur, 1. c. = Crocus byzantinus.
speciosa, Schur, 1. c.-Crocus byzantinus.

CROCISERIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404-Seneolo, Tourn. (Compos.).
Doronicum, Fourr. 1. c = S. Doronicum.
Cerardi, Fourr. 1. c. = S. Gerardi.

CBOCKEBIA, Greene, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 445 (1884). *COMPOSITAE.*
chrysantha, *Greene, ex A. Gray, I.* c—Calif.

CROCODEILANTHE, Reichb. f. & Warcz. in Bonplandia, ii. (1854) 113 = Pleurothallifl, R. Br. (Orchid.).
xiphitusa, Reichb. f. & Warcz. 1. c. 114- P. Crocodilanthe.

CROCODILIUM, [Vaill.] Juss. Gen. 173 (1789) = Centaurea, Linn. (Compos.).
aureum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 217 = Cent aurea.
Crocodylium, Hill, Hort. Kew. 63 = Cent. Crocodilium,
cucullatum, Sweet, Hort. Brit ed. I. 217 = Cent. Crocodilinm.
Galactites, Dnm.-Conrs. ex Steud. Nom. ed. II. i. 440 =Galactites tomentosa.
muricatum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 217, noznen.—Hispan.
peregrinum, Hill, Hort. Kew. 63 = Cent, peregrina.
salmanticum, Sweet, Hort. Brit .ed. I. 217 = Cent. salmantica.
syriacum, Cass. in Diet. Sc. Nat. xii. 19 = Cent. Crocodilinm.
Verutum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 217 - Cent Verutum.

CROCODILOIDES, Adans. Fam. ii. 127 (1763) = Berkheya, Ehrb. (Compos.).

CROCODYLIUM, Hill, Hort. Kew. 63 (1769)= CROCODILIUM, Vaill. = Centaurea, Linn. (Compos.)

CROCOSMA, Klatt, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 516 (1863)-seq.

CBOCOSMIA, Planch, in Fl. des Series. Sér. I. vii. (1851-52) 161. *IRIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 707.
CROCANTHUS, Klotzsch, ex Klatt, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 516 (1863).
aurea, *Planch. I. c.*—Aft. austr. et trop.
crocata, Planch. 1. a, in obs.-Tritonia crocata.
deusta, Planch. L c, in obs.-=Tritonia deusta.
fenestrata. Planch. 1. c, in obs.« Tritonia fenestrata.
longiflora, Klatt, in Peters, Reise Mossamb, Bot. 516 =Ixia longiflora.
miniata, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vii. (1851-52) 161, in obs.«Tritonia miniata.
Rochensis, Klatt, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 616 =Tritonia Rochensis.
tenuiflora, Klatt, 1. c. - Ixia panicnlata, longiflora.

CROCOXYLON, Eckl. & Zeyh. Enum. 128 (1835) = EOaeodendron, Jacq. (Tiliac).
excelsum, Eckl. *8c Zeyh.* 1. c. -E. crocenm.

CBOCXXS, [Toum.1 Linn. Syst ed. I (1786). *IRIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 693.
CROCIRIS, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. W. (1853) 73 (Sert. PL Truss.).
SAFRAN, Medic, in Act. Theod. Palat. vi. Pby<- (1790) 478.
amtiflorus, Seidl, in Opiz, Natural, n. ix. (1825) »9 —vernus.
Adami, J. Gay, in Mém. Bull. Férussac, xxv. (1831) 319 (err. typ. 219) - biflorus.
aerius, *Herb, in Journ. Hort. Sac.* ii. (1847) 288.-Perria.
alaUvicus, *Regel (f Semenm, in Bull. Soc. Hat-Mosc.* xli. (1868) I. 484.—Sibiria.
albiftcrus, Kit. ex Schult. Oestr. FL ed. II. i. 101" vemus.
aleppictu, Baker, in Gard. Chron. (1873) *6W* ~ Uaillardotii.
algeriensis, Baker, 1. c. (1877) I. 45—nevadensis.
ancyrensis, *Maw, I. c.* (1881) II. 528.—As. Min.
annulatus, Herb, in Bot Mag. t. 3868 = chrysanthus.
annulatus, Steph. ex Spreng. & Link, Jahrb. i. "'• *» =biflorus.
aphyllus, Ker-GawL in Kon. & Sims, Ann. Bot. >• (1805) 222=nudiflorus.
argenteus, Sabine, in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) *" •= biflorus.
asturicus, *Herb, in Bot. Mag.* sub t. 3998.—Hispan-
atlanticus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. AtL 883=ne»»-densis.
atticus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 94 = Sieberi.
atticus, *Orph. in Bull. Congr. Bot. Pitersb.* « (1870) 118.—Graecia.
Aucheri, Boiss. Diagn. Ser. I. xlii. 16-Suterianus.
aureus, Clarke, Trav. ii. 146«gargaricus.
aureus, *Sibik.* b" 5m. *Fl. Graec. Prod. i.* 24.—Europ-
autumnalis, Brot. Phytogr. ii. 40. t. 94-=Clusii.
autumnalis, Ker-Gawl. Irid. Gen. 77 = serotinus.
autumnalis, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 2.—Europ.
autumnalis, Sm. Engl. Bot t. 343; Bleb. Fl. »»"• Cauc. i. 27=sativus.
autumnalis, Vis. ex Steud. Nom. ed. II. >• longiflorus.
Balansae, *7. Gay, ex Mam, in Gard. Chron.* (1879) I. 234.-Oriens.
balcanensis, Janka, in Oestr. Bot Zeitschr. xxii. (1873) l»l=velnchensis.
banaticus, J. Gay, in Bull. Fe"rossac, » •• (J881J (err. typ. 220)-byzantinus.
banaticus, *Heiff. in Flora,* xviiL (1835) Hangar.
biflorus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VnL n. 4.-E"'''''; Taur.
Biliottii, *Maw, in Gard. Chron.* (1881) «• *"* Pontns.
Boissieri, *Maw, I. c.* 804.—Oriens.
Boryanus, Herb, in Bot. Reg. (1843) Misc. *» Boryi.
Boryi, *J. Gay, in Bull. Férussac,* xxv. (18» (en. typ. 220).—Graecia.
Bultocodium. Linn. Sp. PI. 86=Ronnie* «• codium.
Bulbocodium, Pall. Ind. Taur. ex Bieb. Fl. *Tut-* i. 28-reticulatus.
byzantinns, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* »»b t i* Europ.
Cambessedesianus, Herb, in Bot. Reg. (1843) =seq.
Cambessedesii, *J. Gay, in Bull. Firussac,* xxv. 320 (err. typ. 220).—Ins. Majorca.
Cambessedesii, Klatt in Linnaea. xxxlv. 684-cyprius.
Cambessedianus, Herb, in Bot Reg. (M«> *• " ~ Cambessedesii.
eampestris, Herb. 1. c. (1848) Misc. ". =sativus.
cancellatus, *Herb, in Bot. Mag.* sab t. w Min.
candidus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 17-Fle-d*1*
candidus, *Clarke, Trav.* ii. 145.—As. Min.
candidus, Schl<lss. *Sc* Vukot. Syll. H banaticus.
capensis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. « - * ^ules roseo. *Hisp. 24.*
calpetanus, *Boiss. V Rent. Diagn. PI- N"'* —Hispan.
CartmrighHanus, Herb, in Bot Reg' (1843) =sativus.
cashmerianus, Royle, IUustr. Bot. HimaJ-90 Sac.
caspius, *Fisch. V Mey. ex Hohen.* »« *Bun-Mosc.* (1838) 252.—Reg. Casp.

CBOCTJS:—

chrysanthus. Herb. in Bot. Reg. (1848) Misc. 88 = Suterianns.

ehrysanthus, *Herb, in fount. Sort. Soc.* it (1847) 885. —Rumelia.

"'*?•«". KotKhy, ex Baker, in Jonra. Linn. Soc. xvi. (1877) 84 = Schimperi.

nrcumscissus, Haw. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 187

"..usianus, Herb, in Bot. Reg. (1845) t. 87. f. 8 = Clusu.

Clusii, *% Gay, in Bull. Ferussac,* xxv. (1881) 820 (err. typ. 220).—Lusitan.

wrsicus. *Vanucc. ex Mam, in Gard. Chron.* (1878) IX. 867.—Ins. Corsica.

"mentis, Nym. Coup. 707 = versicolor.

cretensis, Koem. in Flora, xxxix. (185B) 469 = Veneris.

>-«wa, *Hooh.f. Bot. Mag.* t. 6168.—Archip. Grace.

" " S.. ..alcuer m BdU_ S"0_ Bot_ Fr_ xv_ C1868) crocus: ^- Koch, in Llnnaea, xix. (1847) 7-chrysanthus, *Boiss.* to- *Kotschy, in linger O- Kotschy, Ins. Lyp.* 208.—Ini. Cyprus.

dalmaticus, *Vis. Fl. Dalm.* i. 119.—Dalmat.

«*mascenus. Herb, in Bot. Reg. (1845) Misc. 1 = cancellatus.

Damasci Mto*** *ifaw> *"" Gard«Chrm_ (1881> "• Wl.—A*. di. ^ us,o" Koch> in Linnaea, Mi_ (18*8) 8S4~ It_atus.

j?^?!°r. Reuss, KvBt Slov. (1858) 418-reticulatns.

«*«'", Boiss. & Blanch, ex Bdus.Fl. Orient, v. 101 - «neelUtus.

«nucus, J>ar/. jy. *Iial_* Ui. 228.—Italia.

ex: S*"* Schnr, Enuln_ PL Transsyl. 662 = banaticus. fat.is, *Jd* - ..ys. (1790) «78.—Europ.

fimbriatus, Lapey- "ist. Abr. PI. Pyr. 22 = nudiflorus.

flavus, Haw. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 185= aureus.

Flerisch fJ^ Baker, in Gard. Chron. (1873) 860 - candn.

Fleischeri, *Y. Gay, ill. Ferussac,* xi. (1827) 319 (err. typ. 219).— n.

Fleischerianus, Herb, in Joum. Hort. Soc ii. (1847) 278 = Fleischeri.

floribundus, Ha»"• iM Trans. Hort. Soc. i. (1812) 183 = aureus.

Fontenayi, Reut. ex Nym Con> P- 706-Tonrnefortii.

frag, Ha_w» m Trans- Hoit_ Soc_ '.(1812) 136= «>Scllor.

Fus i. ^ G»i5a*rdoii*.*o Gay> TM Nym- Cons P- 705-biflorus. m~Eh Bmss_ TM Ul»*> »« <?<«* CAr««. (1879)I. gargaricus, *Herb. in Bot. Mag.* (1841) snb t. 3866.— As. Min.

grandiflorus, Hegetschw. Fl. Schw. 41=venras.

graecus, Chapp. in Bull. Soc_ Bot_ Fr* tt (1878) 19S = sativus.

granatensis, *Boiss. ex Maw, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 368 S ?'2 =Hispan.

graveol S ous. vit^i^ * Rcut_ Boiss_Fl_ Orient_ T_ 107

undriatic Ewop. Htrb- «» *»». «rr- (1846) JIftw. 82.- Haus ld^U 1, BoUl* * Reut „ BoisB_ n< OrienL v_ hermoneus, *Kotschy, ex Maw, in Gard. Chro».* (1881) II. 569.—Syria.

Herbertianus, Koern. in Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1854) 15; et in Walp. Ann. vi. 51 = byzantinus.

Heuffelianus, Herb. in Journ. Hort. Soc. ii. (1847) 278 = banaticus.

Heuffelii, S°."0.- «• Flora, m ù ! (1866) 476 = praec

hybernus, *nv. ui Griseb. Spicil. Fl. Rumel. B. 374 - sativus.

hyemalis, *•*". b- ^anri,, ZWay. Ser. IL *iv.* 93.— Syria.

Imperati, C olu- Hort RipuL App. iv. 12-suaveolens.

Imperati ' r">°re, *Mem. Crock,* Fl. *Nap.* 10. t. 3.— mpera oni

""Pe'ratt*"**' Herb" to Bot_ Ma«- »ub *• *S99i"* in ^?°>Pletzl. »• *Richter, in Corresp. V*tr. iV«<»r*. /•««««. incurvus, Donn, Imperati. "* Stend_ Noin_ ed. II. *. 441 =

CBOCnJ8:—

indivisns, *Richter, in Corresp. Ver. Naturk. Presb.* ii. (1868) 198.—Enrop.

insularis, J. Gay. in BnlL Fernssac, xxv. (1831) 321 (en. typ. 221) —minimus.

insularis, Herb, in Bot. Reg. (1843) t. 21-corsicns.

intromissus, Herb, in Bot. Reg. (1845) Misc. 2 = GaUlaidotii.

ionicus. Herb. 1. c S = Boryi.

iridiflorus, Heuff. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. ix. (1847) 10—byzantinus.

italicus. Gaud. Fl. Helv. i. S8-biflonu.

karduchorum, *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* v. 99.— Kurdistan.

Kirkii, *Maw, in Gard. Chron.* (1879) I. 284 = Candidas.

Korolkowi, *Maw* b* *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 499.—Tnrkest.

Kotschyanus, Boiss. Fl. Orient, v. 102, in syn.=cancellatns.

Kotschyanus, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 17 — zonatus.

Kotschyi, *Lennf V C. Koch, in Verh. Berl. Gartenb. Ver.* II. i. (1863) 398.—Oriens.

lacteus, Sabine, in Trans. HorU Soc. vii. (1830) 432 = aarens.

laevigatns, *Bory V Chaub. Expld. Marie,* 21 Graecia.

laevigatus, Sprun. ex Nym. Consp. 706 — Boryi.

lagenaeflorus, Salisb. Parad. Lond. t. 106 - anrens.

latifolius. Stokes, Bot Comment, i. 199 = vernus.

laziens, *Boiss. Fl. Orient.* T. 97.—Lazistan.

lineatus, Jan, Elench. l=biflorus.

longiflorus, *Rafin. Car att.* 84. t. It), f. 2. n. 203.—Italia.

longiflorus, Reichb. PI. Crit. x.. 17 = sativus.

luteus, Bieb. Casp. 82 —reticulatus.

luteus. Lam. Tabl. Encyc. i. 106-aurens.

maesiacus, Ker-Gawl. in Bot. Mag. snb t. 652 j t. 1111 =aureus.

magontanus, Rodrig. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. iii. (1874)56 = Cambessedesii.

Malyi, *Vis. in Mem. 1st- Venet.* xri. (1871) 213.— Dalmat.

marathonisius, Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 236-Boryi.

mazziariens, *Herb, in Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 3.— Caria.

medius, Balb. Elench. 83.=nudiflonis.

meridionalis, list, *Fl. Nice,* 474.—Enrop.

mesiacus, Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. 33 = aurens.

micranthus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 95 —reticnlatus.

minimus, *[DC. in] Red. Lil.* ii. t. 81.—Ins. Corsica.

minimus, Tenore, Fl. Med. i. 24 : Hook. Bot. Mae. t. 2991 = biflorus.

moesiacus, Ker-Gawl. Irid. Gen. 76 = aurens.

montenegrinus, *Kern, ex Maw,.in Gard. Chron.* (1882) II. 368.—Dalmatia.

multifidus, Ramond, in Ball. Soc. Philom. ii. (1800) 129. t. 8 = nudiflorns.

multifidus, Rochel, ex Ledeb~ FL Ross. iv. 110 = spedosns.

muitiflorus, Schnr, Enum. PI. Transs. 662=vemns.

nanus, Dnby, Syn. Gall. ed. I. 168 = minimus.

nanus, Herbich, ex Stend. Nom. ed. II. i. 441 = biflorus.

neapolitanus, Hoppe, in Flora, i. (1818) 688-serotinus.

neapolitanus, Tenore, Cat Sem. (1816) Collect. Adn. II = Imperati.

nervUblius, *Reichb. PI. Crit.* x. 16.—Enrop.

nevadensis, *Amo b" Camto, Revis. Prog. dene. Madr.* v. 65, 57.—Hispan.

nivalis, Bory & Chaub. ExpAl. Morée, 21. t. 2. f. 1 = Sieberi.

nivalis, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 720 = hadriaticus.'

nivigena. Herb, in Bot. Reg. (1848) Misc. 82, sphalm. 1 = *nubigena.*

nubigena, Herb. 1. c. 81-biflorus.

nudifiorus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 60G=granatensis.

nudiflorus, Hohen. in BulL Soc. Nat. Mosc v. (1833) 212-speciosus.

nudifiorus, Schult. Oesti. Fl. ed. II. i. 101-byzantinus.

nudifiorus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. *I* 23-eancellatns.

nudiflorus, *Sm. Engl. Bot.* t. 491.—Enrop. j Oriens.

obovatus, Haw. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 133» versus.

CROCUS:—

ochroleucDS, *Boiss. V Gaill. Diagn.* Ser. II. iv. 93.— Syria.

odorus, Bivona, Stirp. Rar. Sidl. Manip. iii. 8 - longiflorus.

odorus, Vis. Stirp. Dalm. Spec. S2=sativus.

officinalis, Honcfc. Syn. i. 278 = sativus, vernus.

oMcinalii, Martyn, Fl. Rustic, ii. t. 68=sativus.

Olivieri, *J. Gay, in Bull. Ferussac,* xxv. (1831) 819 (err. typ. 219).—As. Min.

Orphanidis, Hook. *I* Bot. Mag. t. 5776 = Tournefort>i.

Orsinii, Parl. Fl. Ital. iii. 238 = sativns.

Pallasianus, Herb, in Bot. Reg. (1844)t. 3. f. 2 - sativus.

PaUasii, Goldb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 157—sativus.

Pallasii, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 374 = velnchensis.

PaUasii, Sprun. ex Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 103 = cancellatus.

Parkinsonii, Steud,Nom. ed. II. i. 441 ^biflorus.

parviflorus. *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 266.— Cilicia.

peloponnesiacus, Orph. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. OS -hadriaticus.

pendulus. Stokes, Bot Comment, i. 209 = sativus.

penidllatus, Steud. ex Baker, in Gard. Chron. (1881) II. 680-Fleischer!.

penidllatus, Steud. Nom. ed. II. i. 441 = aureus.

PestaloMMoe, Boiss. Diagn. Ser. L xiii. 17 = biflorus.

pholegandrius, Orph. in Bull. Congr. Bot. Pétereb. 1869 (1870) 118, lS4 = Tournefortii.

pictus, Stend. Nom. ed. II. L 441-vemus.

praecox, Haw. in Engl. Bot. Suppl. t. 2645 -biflorus.

pulchellus, *Herb, in Bot. Mag.* sub t. 3862.—As. Min.

pulchricolor. Herb, ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 523 ^aerins.

pusillus, Tenore, in Mem. Crochi FL Nap. 8. t. 1 = biflorus.

pylarum, J. Gay, ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 5i6 = cancellatus.

pyrenaeus. Herb, in Journ. Hort. Soc ii. (1847) 265=. nudiflorus.

recunms. Haw. in Lond. Hort Brit. Suppl. i. 586 = Imperati.

rrflexus, Donn, Hort. Cantab, ed. IV. 11 = Imperati.

Reineggeri, Opiz, Natural, x. (1826) 2«2 = vemus.

Reinvardti, Reichb. PL Crit. x. 14 = versicolor.

reticulatus. *Steven, ex Adam, in Web. V Mohr, Beitr.* i. 45.—Reg. Cauc.

revolutus, Haw. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 136-susianus.

Roegnerianus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 634-snsift•ius.

Salzmanni, *J. Gay, in BuU. F/russac,* xxv. (1881) 320 (err. typ. 220).—Marocc.

Salmmannianus,McTb. in Bot. Mag. snb t. 3S68 = Praec.

sativus, Bivona, ex Steud. Nom. ed. II. i. 441 —longiflorus.

sativus, *Unn. Sp. PI.* 36.—Graecia; As. Min.

sativus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = aureus.

sativus, Tenore, Fl. Med. i. 12 ^ Thomasii.

Scharojani, *Rupr. in Regel, Gartenfl.* xvii. (1868) 134. —Reg. Caucas.

Schimperi, J. Gay, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 84 =cancellatus.

serotinus, Bert, in Nouv. Coll. Opusc. Sc. ii. 150 = longiflorus.

serotinns, *Salisb. Parad. Lond.* t. SO.—Europ.; As. Min.

seti/olius, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 104-sativus.

sibiricus, Barr, in Gard. Chron. (1876) I. 307, 336 -Sieberi.

Sibthorpianus, Herb, in Bot. Reg. (1848) Misc. 83 = Sieberi.

siculus, Tineo, in. Guss. Suppl. Fl. Sic Prod. i. 7 - vernus.

Sieberi, *J. Gay, in Bull. Firussac,* xxv. (1831) 320 (err typ. 220).—As. Min.

Sieberianus, Herb, in Bot. Mag. snb t 8866=praec.

smyrnensis, Poech, Ennm. PI. Ins. Cyp. 11, in obs.- Fldscheri.

speciosus, *Bieb, Fl. Taur. Cauc.* L 27.—Tauria.

speciosus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 374 = pulchellus.

speciosus, Rochel, PI. Rar. Banat. S = byzantinus.

speciosus, Wilson, in Engl. Bot. Suppl. t. 2752-nudiflorus.

Spruneri, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 103 = cancellatus.

stellaris. *Ham. in Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 136. t. 6. —Europ.

CROCUS:—
striatus, Link, Enum. Hoit. Berol. i. 48 = minimus, biflorus.
snaveolens, *Bertol. Desc. Zaffer. Hal.* n. 3.—ItaL
mbapenninus, *Herb, in Journ. Hort. Soc.* ii. (1847) 259.—Europ.
sublimis, Herb, in Bot. Reg. (1845) Misc. 81=Sieberi.
sulphurtus, Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. ii. 87S - chrysanthns.
sulphureus, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 938.—As. Min.
sulphurtus, Klatt, in Linnaea, zxxiv. (1865-66) 676-Olivieri.
susianus, Hayne, ex Steud. Norn. ed. II. i. 441 = sulphureus.
snsianns, *Ker-Gaml. in Bot. Mag.* t. 652.—As. Min.
Snterianos, *Herb, in Bot. Reg.* (1845) Jftw. 5.—As. Min.
Suwarimianus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 633 = vallicola.
syriacus, Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II. iv. 94 = vitellinns.
syriacus, Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 622=Balansae.
Tauri, *Maw, in Gard. Ckron.* (1881) II. 749.—Lycia.
tauricus, Stev. ex Nym. Consp. 706 - speclosua.
thessalus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 17 = Sieberi.
Thirkeanus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 633 = garg&ricus.
Thomasianus, Herb, in Bot. Reg. (1844) t. 3. f. 6 = sativus.
Thomasii, Tenore, in Mem.Crochi Fl. Nap. 12.*t*.1 = sativus.
tingitanus, Herb, in Bot. Mag. sub 13868—Salzmanni.
Tomasinianus, *Herb, in Journ. Hort. Soc.* ii. (1847) 273.—Dalmatia.
Tourne/ortianus, Herb, in Bot. Reg. (1845) t. 87. f. 3 -Tournefortii.
Tournefortii, *J. Gay, in Bull. Firussac*, xxv. (1831) 820 (err. typ. 220).—Europ. austr.
triflorns, *Burnt./. Fl. Cap Prod.* 2.—Afr. anstr.
uniflorus, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 90 = banaticus.
vallecola, Herb, in Bot. Reg. (1845) Misc. 31-beq.
vallicola, *Herb. I. c. Misc.* 2.—Persia.
variegatus, Hoppe & Horn. Tageb. 187=reticulatus.
veluchensis, *Herb, in Bot. Reg.* (1846) *Misc.* 80.—Graecia.
veluchensis, Schott, in Bot. Zeit. ix. (1851) 281-banaticus.
Veneris, *Tappein, ex Poech, Enum. PL Ins. Cyp.* 10.—Ins. Cyprus.
vemus, *All. Fl. Ped'em.* i. 84.—Europ.
•*vernus*. Curt. Bot. Mag. t. 45=aureus.
vernus, Desf. Fl. Atlant. i. 83=nevadensia.
-*vernus*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 109 = biflorns.
vernus, Sibth. & Sin. Fl. Graec. Prod. i. 24-Sieberi.
vernus, Sieber, ex Tenore, Mem. Crochi Fl. Nap. 5. t. 1 = minimus.
vernus, Ucria, Hort. Reg. Panborm. 46 = longiflorus.
versieolor, Barcelo, Fl. Isl. Balear. 449-Cambessedesii.
versieolor, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* 1.1110.—Europ.
Visianicus, Herb, in Bot. Reg. (1845) Misc. 83 = sativus
Visianicus, Herb, in Jonra. Hort. Soc. ii. (1847) 263 = longiflorus.
vitellinus, *Wahlenb. in Isis*, xxi. (1828) 1000.—Syria.
vittatus, Schloss. & Vukot. Syll. FL Croat. 22 = banaticus.
Meldeni, [Hoppe & Fnernr. in] Flora, xxiii. (1840) 208 =biflorus.
zonatus, *J. Gay, in Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 525.—As. Min.

CHOCYLLIS, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 176 <1843). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 186.
anthospennoides, *E. Mey. I. c.*—Afr. austr.

CRODISPERMA, Poit. ex Cass. in Diet. Sc. Nat. xlvi. 403 (1827)=Wulffla, Neck. (Compos.,.
aspera, Poit ex Cass. L c.=W. platyglossa.

CROLOCOS, Rafin. FL Tellur. iii. 93 (1836)-8alvia, Tourn. (Labiat).
aurea, Rafin. 1. c = S. aarea.
calidna, Rafin. 1. c - S. calycina.
colorata, Rafin. 1. C.-S. anrea.
pemifera, Rafin. 1. C.-S. pomifera.

CRONYXIUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 28 (1836) - Lloydla, Salisb. (LiUac).
serotinum, Rafin. 1. c.-LL alpina.

CBOOXIA, Ton. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 663 (1840). *ROXBURGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. iit 747.
TORRBYA, Croom.ex Meissn. Gen. Comm. 340 (1843).
japonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 188.—Japon.
pauciflora, *Torr. ex Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 663.—Florida.

CROPTILON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 47 (1836)=Aplopappus, Cass. (Compos.).
divaricatum, Rafin. L c.-=A. divaricatus.

CROSPERMA, Rnfin. Fl. Tellur. ii. 83 (1836)=Zygadenus, Michx. (Liliac).
angustifolia, Rafin. 1. c. - Z. angustifoHus.
laeta, Rafin. 1. c. iv. 27 — Z. muscitoxicus.
pkalangioides, Rafin. 1. c. 38—Z. muscitoxicus.

CB088ANDBA, Salisb. Parad. Lond. t. 12 (1806). *ACANTHACEAE*, Bentb. & Hook. f. ii. 1094.
HAR.RA.CHIA, Jacq. f. Eclog. i. 38. t. 21 (1816).
POLYTHRIX, Nees, in DC. Prod. xi. 285 (1845).
axillaris, Nees in Wall. PI. As. Rar. iii. 98=undulaefolia.
coccinea, Dak. & Gibs. Bomb. Fl. Suppl. 71-nndulaefolia.
diffusa, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2383 -Hemigraphis elegans.
fascicularis, Benth. PI. Hartw. 21=Stenandrium dnlce.
flava, *Hook. Bot. Mag.* t. 4710.—Afr. trop.
Greenstockii, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 87.—Afr. austr.
guineensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 281.—Afr. trop.
Haenkeana, Nees, 1. c—Aphelandra verticillata.
*infundibuliform^*, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 98 — undulaefolia.
madagascariensis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 83.—Madag.
nilotica, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 128.—Afr. trop.
nutans, Wight, ex Nees, in DC. Prod. xi. 280 - undulaefolia.
oppositifolia, Wight, ex Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 98=undulaefolia.
puberula, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb, Bot.* 214.—Afr. trop.
pnbescens, *Klottsch, 1. c.* 213.—Afr. trop.
spicata, *Buch.-Ham. in Wall.* Cai.subn. 2341.—Ind.or.
undulaefolia, *Salisb. Parad. Lond.* t. .12.—Ind. or.

CROSSOCOMA, Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 392 -CroBSosoma, Nutt. (Dillen.).

CROSSOLEPIS, Benth. in Enum. PI. Hueg. 61 (1837) -AngiaathUB, Wendl. (Compos.).
pusilla, Benth. 1. c. = A. pusillus.
pusilla, Hook. Ic Fl. t. 413-A. tenellus.

CROSSOLEPIS, Less. Syn. Comp. 270 (1832) = anephosia, Cass. (Compos.).
bremfolia, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 175=G.torevifolia.
eriocephala, A. Gray, 1. c. 176 = G. eriocephala.
linifolia, Less. Syn. Comp. 270.—Austral.
pygmaea, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 176=G,pygmaea.

CBOSSOITBPHEIiIS, BaUL Adansoiu, xi. (1874) 245. *SAPINDACEAE*.
Pervillei, *BailL I. c*—Madag.

CROSSOPETALON, Adans. Fam. ii. 224 (1768)-seq.

CROSSOPETALUM, P. Br. Hist. Jamaic. 145 (1766) = Hyginda, Linn. (Celastr.).
Rhacome, Crantz, Inst ii. 321=M. Rhacoma.

CROSSOPETALUM, Roth, Enum. PI. Phaen. Germ. i. i. 515 (1827)-Oenttana,Toum.
ciliatum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 120=G. ciliata.
Gentiana, Andrz. ex Trautv. in Act. Hort Petrop. ix. (1884) 20-G. ciliata.
genlianoides, Roth, Enum. PI. Phaen. Germ. L I. 516-G. ciliata.

CROSSOPHORA, Link, Handb. ii. 438 (1831) = Chrozophora, Neck. (Euphorb.).

CROSSOPHRYS, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 3 = Clethra, Linn. (Ericac).
brasiliensis, Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 167 = C1. brasiliensis.
Chamissonis, Klotzsch, 1. c.-Cl. brasiliensis.
guyanensis, Klotzsch, 1. c. 170-Cl. guyanensis.

CBOSSOPTERYX, Fenzl, in Nov. Stirp. Dec. Mus. Vind. 45 (1839). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook, f. ii. 41.
africana, Baill. Hist. PI. vii. 439 - Kotschyana.
febrifuga, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 381.—Afr. trop.
Kotschyana, *Fenil, in Nov. Stirp. Dec. Mus. Vind.* 45-—Afr. trop.

CBOSSOBOMA, Nutt in Journ. Acad. Philad. N. & i. (1847) 150. *DILLENIACEAE*, Benth. & Hook, f. i. 15.
Bigelovii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad. xi.* (1876) 122-—Calif.
californicum, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. (1847) 150. t. 22.-CaUf.

CBO8SOSTEMMA, Planch, ex Bentb. in Hook. Niger Fl. 364 (1849). *PASSIFLOREAE*, Benth. * Hook. f. i. 813.
laurifolium, *Planch, ex Benth. 1. c.* 876.—Afr. trop.

CBOSSOBTEPHIUM, Less, in Linnaea, vi. (1831) 220. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 454.
artemisioides, *Less. 1. c.*—Ins. Luzon.; China.
turkesUnicum, *Regel (f Schmalh. in PI. Nov. Fedsch.* 44.—Aa. centr.

CROSSOSTIGMA, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. (1835) S28=Epilobium, Dill. (Onagrac.).
Lindleyi, Spach, 1. c. 404=E. minntum.

CBOSBO8TYI.I8, Forst Char. Gen. 87. t. 44 (177«)-*RHIZOPHOREAE*, Benth. & Hook. f. i. 681.
TOMOSTYLES, Montr, in Mem. Acad. Lyon, x. (18<^)-201.
biflora, *Forst. 1. c.* 88. t. 44.—Ins. Soc.
grandiflora, *Brongn. (f Gris, in Ann. St. Nat.* 3* V. xiii. (1870-71) 398.—N. Caled.
Harveyi, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 77-Ins. Fiji.
multiflora, *Brongn. V Gris, ex Panch. VSebert, Bois Nouv. Calèd.* 260.—N. Caled.

CROSSOSTOMA, Spach, Hist. Vég.Phan.ix. 588 (1840) =Scaevola, Linn. (Gooden.).
fydoides, De Vriese, in Verh. Haul. x. (1854) 88=S. spinescens.
oleoides, De Vriese, 1. c 37-S. spinescens.
spinescens, De Vriese, 1. c. 36=S. spinescens.

CROSSYNE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 116 (1866)= Buphane, Herb. (AinarylL).
ciliaris, Salisb. 1. c. 117-B. ciliaris.

CBOTAIiABIA, Dill, ex Linn. Gen. ed. } (1787). *LEGUM1N0SAE*, Benth. * Hook. «• 479.
ATOLARIA, Neck. Elem. iii. 81 (1790).
CHRYSOCALYX, Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. t. 4 (1832).
CtAvSuUM/Desv. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. i*- (1826) 407.
CYRTOLOBUM, R. Br. in Wall. Cat. in note «" " " 5 1 (1, 32)
IocloioN^, Ra"fin. New Fl. Am. U. 53 (188«)-3
MARIA-ANTONIA, Parl. Mar. Ant. Nov. i>e (1844).
PHYLLOCALYX, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i-16ft t. 34 (1847).
QUIROSIA, Blanco, Fl. plip. ed. II. 898 (1845).
abscondita, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl.* ii. 19.—Afr. trop.
abyssmica, *D. Dietr. Syn. PL* iv. 988.—Aby*
acapulcensis, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy- *
aci^£ris", iwA..«««. *in Wall. Cat.* n. 689°-" trop.

CROTALAHIA:-
acuminata, *DC. Prod.* ii. 128.—Afr. anstr.
atwfunata, G. Don, Gen. Syst. ii. 184=verrncosa.
acutiflora, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 482.—Bras.
"cuHfolia, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 150=glauca.
aegyptiaca, *Benth. in Hoot. Lend. Journ. Bot.* ii. (1843) 188.—Egypt.
"fflnis, DC. Prod. ii. 132=incana.
Afaelii, R. Br. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 36 =lathyroides.
«., Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Seng.* 98; *Fl. Ind.* m.274.-As. trop.
"tote, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 442=rubiginosa.
alatipes, *R. Br. Nev pi.* Am. jj. 57. Am< ^*i.*
t\W, ^P"- SP. pl. 716 = Baptisia alba.
alK-S, *Fra*di'»» Rnoilt Somali,* 26.—Afr. trop.
»«:J "&*">ex Rt>*th, Nov. Pl. Sp.* 338.—Ind. or.
amoena, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 5414 = Heyneana.
amoena, » « • • «* *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 26.—Afr. trop.
amplexicaulis, Lam. Encyc. ii. 194 = Rafnia perfoliata.
amplexicaulis, *D. Don. Pim. Nm. Afr. R. 16* Rafnia amplex.*
anagyroides, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 404.—Venezuela.
angulata, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Honduras.
angulosa, Lam. Encyc. ii. 197=verrucosa.
angustifolia, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 49. t. 219=Lebeckia sericea.
angustissima, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* i. 26.—Afr. austr.
anthylloides, *D. Don. Pim. TO. Nm. 941 enivrlm.*
anthyllopsis, Lam. Encyc. ii. 195=sessiliflora.
anthyllopsis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 15.—Afr. trop.
arborea, *SETH. Wight *******************enth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* it.(1848) 1—Afr. trop.
arenaria, Lo«. &• Jlfor. in *Nat. eh Gtneesk. Arch. Nederl. Ind.* iii. (1846) 76.—Java.
argentea, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 60. t. 220 = Argyrolobium petiolare.
argyraea, *Fr.* uncA. *in Révoil, Çimali,* 27.—Afr. trop.
argyraea, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 26.—Afr. trop.
Arnottiana, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 560 = semperflorens.
arvensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 53 = podocarpa.
asarifolia, *Jlafin. New Fl. Am.* ii. 57.—Am. bor.
Asarina, Berg. Desc. Pl. Cap. 194 = Hallia Asarina.
aspalathoides, *Lam. Encyc.* ii. 202.—Afr. austr.
assamica, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1848) 181—As. trop.
astragalina, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 155.—Abyss.
atrorubens, *Hochst. ex B«»/A. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 572.-Afr. trop.
Atusia, Buch.-Ham< "* Steud# Nom, ^ I I. i. 442=ericea.
aurea, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) 6. Lata.
axiUarUrVv. "—Malaya.
—Afr, *[Dr*and-»] ^«- ^of<. Ken.* ed. II. iii. 20. *urea,* Eckl. op.
lanaae, *Afzhel,* * Zey^h- E"""- 174-LotonmiMaznrea.
(1888) n. *'n Mint. Soc. Phys. Genet,* xxviii. 3.
barbata *R.* arago .
bengha;nse&«*.«» Wa«. Gar. n. 5394.—Ind. or.
Bernieri *wall* Lam. Enc y c- « • l»6=juncea. (1885) 444.—Madag.
Berteriana, DC. Prod. ii. 127 = fulva.
bialata, Schrank, Pl. Rar. Hort- Monac- •• 18=sagittalis.
bialata, Roxb. Hort. Beng. 54; Fl-Ind- i«.27* = alata.
bifaria, *Linn. f. Suppl.* 322.—Ind. or.
bifaria, Wall. c f. n< M99, P"tim-liirsuta.
biflora, Herb. Madr ex Wall Cat- "• 5381=nana.
biflora, *Linn M<"*t.* ii. 570—Ind. or.; Malaya.
bituminosa, Sprene-syst. iii. 239 = Fagelia bitnminosa.
Bojeri, *Swee.,* ^/w*- -sv- «d- "- 128.-Madag.
brachycarpa, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 29.—Bras.
brachystachya, *Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 612.—Bras.

CBOTALABIA:—
òracteata, Cham, ft Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 57B = Schiedeana.
bracteata, *Roxb. Hort. Beng.* 64; *Fl. Ind.* iii. 278.—As. trop.
bracteolata, Perr. ex DC. Prod. ii. 223 = Indigofera bracteolata.
bracteosa, Benth. in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) 428 - paolina.
brasila, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 77 = vitellina.
brevidens, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bet.* ii. (1843) 585.-Afr. trop.
breviflora, *DC. Prod.* ii. 127.—Bras.
brevipes, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 44 = sessiliflora.
Bromnei, Bert, ex DC. Prod. ii. 130=Saltiana.
bupleurifolia, *Cham. V Schlecht.in Linnaea,v.* (1830) 575.—Mexic.
Bnrhia, *Buch.-Ham. in Wall. Cat. a.* 5386.—Ind. or.
Burkeana, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1848) 693.—Afr. austr.
Burmanni, *DC. Prod.* ii. 126.—Ind. or.
caerulea, Veil. Fl. Flum. 807; vii. t. 107=>Lupinns velutinas vel subsessilis.
caespitosa, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 269 - linifolia.
cajanifolia, *H. B. V Kt Nov. Gen. et Sp.* vi 405.—Mexic.
calycina, *Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac.* 1.12.—Afr. trop.
Campbellii, Arm ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. *it* 81 = ramosissima.
candicans, Wight & Am. Prod. 184 = madurensis.
canescens. Wall. Cat. n. 5416 - ferrupinea.
capensis, Baker, in Oliver, *'l. Trop. Afr. ii. 38 = laburnifolia.
capensis, *Jacq. Hort. Vindob.* iii. 36.—Afr. austr.
capitata, *Benth. ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 74.—Reg. Himal.
capitata, Lam. Encyc. ii. 195 = reflexa, Priestleya Cephalotes.
carinata, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 164 - maxillaris.
Carmioli, *Polaiows. in Linnaea,* xli. (1877) 568.—CosU Rica,
caudata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 18.—Afr. trop.
Cephalotes, Herb. Madi. ex Wall. Cot. n. 5378 - speciosa.
Cephalotes, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 156.—Abyss.
Chincia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 5437 = medicaginea.
chinensis, Lam. Encyc. ii. 195 = paniculate,
chinensis, *Linn. Syst.* ed. X. 1158.—China.
chinensis, Koxb. Hort. Beng. 64; Fl. Ind. iii. 268 = hirta.
ciliata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 241 = prostrata.
cistoides, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 18.—Afr. trop.
Clausseni, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. 1.28.—Bras.
clavata, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 188-hirsuta.
clavata, *Wight W Am. I. c.* 194.—Ind. or.
cleomifolia, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 43.—Afr. trop.
cleomoides, Kiotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 59=lanceolata.
coerulea, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xix. (1858; 179.—Ind. or.
coerulea, Jacq. Coll. i. 67 = verrocosa.
coluteoides, Lam. Encyc. ii. 200 = purpnrea.
comosa, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. *ii.*—Afr. trop.
cordata, *Welw. ex Baker, I. c.* 27.—Afr. trop.
cordifolia, linn. Mant. 266 = Hypocalyptus obcordatus.
crassifolia, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 5416 = ferruginea.
crassipes, *Hook. Ic. Pl.* t. 880.—Austral.
crenata, Wight & Am. Prod. 181->seq.
crinita, R. Grab, in Wall. n. 5408=calycina.
crispata, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 179.—Austral,
ctenoides, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 59.—Afr. trop.
cubensis, DC. Prod. ii. 131 =incana.
cuneifolia, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 65.—Am. bot.

CBOTALABIA :—
cuneifolia, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 78 = sericea.
cuneiformis. Lam. Encyc. ii. 195'Rafnia cuneifolia.
Cunmnghamii, *R. Br. in Sturt, Exped.* ii. *App.* 71.—Austral.
curtata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 229.—Hab. *1*
cyanca, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 39.—Afr. trop.
cylindrica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 154 = emarginata.
cylindrocarpa, *DC. Prod.* ii. 183.—Afr. trop.
cylindrostachys, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 15.—Afr. trop.
cytisifolia, *Hoffm. ex Heynh. Nom.* ii. 171, nomen.—Peruv.
cytisoides, *Hilsenb. b[1] Boj. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 591.—Madag.
cytisoides, Roxb. Hort. Beng. 54; Fl. Ind. iii. 276 = Priotropis cytisoides.
cytisoides, Wight, in WalL Cat. n. 5424 D=clavata.
decumbens, *Pers. Syn.* ii. 285.—Afr. austr. .
decumbens, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 88.—Afr. trop.
deflexa, *Benth. in Miq. Pl. Jungh.* 206.—Java,
densicephala, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 21.—Afr. trop.
depauperata, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 30.-Bra6.
diehotoma, Boj. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 128 = Bojeri.
diehotoma, R. Grab., in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.-Dec. 1826) 186°pmnila.
diehotoma, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 340-hirsuta
diffusa. Link. Enum. Hort. Berol. ii. 228-=Linkiana.
diffusa, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 151 = hnmilis.
diffusa, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 190 = linifolia.
diffusa, Veil. Fl. Flum. 307; vii. t. 110 = incana.
digitata, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 354.—Ind. or.
digitata, Wight, in Wall. Cat. n. 5430 = Grahemiana.
Dilloniana, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 41.—Afr. trop.
diosmaefolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 691.—Madag.
dissitiflora, *Benth. in Mitch. Trop. Austral.* 386.—Austral,
distans, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 582.—Afr. austr.
disticha, ZoU. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 75=aciculnris.
divaricata, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 420.—Bras.
divaricata, R. Gi»h. in Wall. Cat n. 5436 = medicaginea.
divergens, Benth. in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) 429 = breviflora.
diversifolia, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. i. 27 - Lotononis laxa.
Dombeyana, DC. Prod. ii. 132 = anagyroides.
Doniana, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 28.—Afr. trop.
Derycnium, A. Rich, ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 16-microcarpa.
dubia, *Balf. f. in Proc. Roy Sot. Edinb.* xi. (1882) 608.—Ins. Socotr.
dubia, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6404.—Ind. or.
dumetorum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 22.—Afr. trop.
dumosa, *Franch. in Rhoil, Çomali,* '25.—Afr. trop.
ebenoides, *Walp. Rep.* i. 590.—Afr. trop.
Eckloniana, Presl, Bot. Bemerk. 46 = humilis.
Ecklonis, *Han. in Hani.* 6* *Sand. Fl. Cap.* ii. 42.—Afr. austr.
effusa, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 25, ex parte.—Afr. austr.
effusa, E. Mey. 1. c. ex parte=humilis.
elata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 29.—Afr. trop.
elegans, Bedd. in Madr. Journ. xix. (1858) 178 = peduncularis.
elegans, Hort. ex DC. Prod. ii. 134 - purpurta.
eUiptica, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843)34.—Mexic.
eUiptica, Roxb. Hort. Bang. 54; II. Ltd. iii. 279 - uicinella.
elongate, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 126.—Afr. auitr.
emarginata, *Boj. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1848) 584.—Afr. trop.

CBOTALABIA:-

emarginella, *Vatke, in Oestr. Boh Zeitschr.* xxviii. (1878) 199.—Afr. trap,
emirnensis, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 681.—Madag.
epunctata, Dalz. in Hook. Kew Jonm. iii. (1861) 210 =albida.
eremaea, F. Muell. Rep. Greg. PI. 5 - dissitiflora.
eriantha, Sieb. & Zucc. in Abh. Acad. Maench. iv. II. (1848) 121-sessiliflora.
eriocarpa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 80.—Mexic.
eriocaula, 5. *Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 738.—Mexic.
etisemoides, *Ficalho et Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1881) 17.—Afr. trap,
crvoides, *Welw. ex Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 19.—Afr. trop.
rrythrophleba, *Welw. 1. c.* 25.—Afr. trop.
Espadilta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 399 - stipularia.
evolvuloides, *Wight, in Wall. Cat.* n. 5410.—Ind. or.
exstipulata, *Mart, ex Schrank, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 78.—Bras.
falcata, Schnm. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 335 = goreensis.
falcata, *Vahl, ex DC. Prod.* ii. 132.—Afr. trop.
farcta, *R. Bt. in Salt, Abyss. App.* p. lxv, nomen.—Abyss.
fastigiata, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 152 = Lotononis angustifolia.
fenestrata, Sims, Bot. Mag. t. 1933 = juncea.
ferruginea, *R. Grth. in Wall. Cat.* o. 5898.— As. trop.
ferruginea, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 671 - Pohliana.
fertilis, *Delile, in Ferr. tf Galin. Voy. Abyss,* iii. 122. —Abyss,
filicaulis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 24.—Afr. trop.
filiformis, *Wall. Cat.* n. 6389.—Burma,
filipes, *Benth. in Hook. Loud. Journ. Bot.* ii. (1843) 475.—Ind. or.
flavicoma, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 429. —Bras,
Hcxuosa. *Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 29.—Afr. trop.
flfxuosa, Moench, Meth. Suppl. 65=verrucosa.
floribunda, Ajt. Hort. Kew. ed. II. iii. 19 = Wiborgia sericea.
floribunda, Lodd. Bot Cab. t 509 = Wiborgia floribunda.
florida, *Welw. ex Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 80.—Afr. trop.
foliosa, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1889) 429.—Bras.
foliosa, Rottl. in Ges. Natnrf. Fr. Nene Schr. iv. (1803) 217 = medicaginea.
Forbesii, *Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.'d.* 18.-rAfr. trop.
fonnosa, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5893.—Ind. or.
fruticosa, Herb. Madr. ex Wall. Cat. sub n. 5874= pulcherrima.
fruticosa, Macfad. Fl. Jamaic. i. S40=pteroaaula.
fruticosa, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 4.—Jamaic.
fnlgida, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 32.—Afr. trop.
fulva, *Roxb. Hort. Beng.* 64; *Fl. Ind.* iii. 266.—As. trop.
furfuracea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 6.—Abyss.
Galeotti, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot:* ii. (1843) 582.—Mexic
genistella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 398 = pterocanla.
genistifolia, Schnm. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 885 = glanca.
genistoides, *Lam. Encyc.* ii. 196.—Afr. austr.
genistoides, Willd. Sp. PI. iii. 987 - Willdenowiana.
glahra, Steud. Norn. ed. II. i. 443 = nncinella.
glabra, Steud. 1. c.=glauca.
glabrescens, *Anderss. in Vet. Akad. Hindi. Stocth.* 1853 (1855) 248—las. Galap.
glabrescens, Benth. in Hook. Lond. Jonm. Bot. iii. (1843) 563 = obtecta.
glanca, *Willd. Sp. PI.* iii. 974.—Afr. trop.
glaucifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 88.—Afr. trop.
globifera, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i.* 24.—Afr. austr.

CBOTALABIA:—

globosa, *Wight et Arn. Prod.* 190.—Ind. or.
globulosa, Wight, in Wall. Cat. n. 5412 = globosa.
glycinea. Lam. Encyc. ii. 200 = Fagelia bituminosa.
goodiaeformis, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 220.—Afr. trop.
goreënsis, *Guill. V Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 165.—Afr. trop.
gradlis, Pen. ex DC. Prod. ii. 133 = senegalensia.
gracilis, *Waif. Rep.* i. 591.—Afr. trop.
gracillima, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. BoL 55=hyssopifolia.
Grahami, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 128=dichotomy
Grahamiana, *Wight V Arn. Prod.* 194.—Ind. or.
grandiflora, Benth. in Ann. Nat Hist. iii. (1889) 429 -acutirlura.
grandifiora, Reinw. ex Miq. FL Ind. Bat. i. I. 383 = tetragona.
grandis, Hort. Calc. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit Ind. ii. 80=fuWa.
Grantiana, *Hare, in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 48.—Natal.
Grantii, *Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 32.—Afr. trop.
guatemalensk, *Benth. ex OersL in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 2.—Guatem.
guianensis, Aubl. PI. Gni. ii. 761-Clitoria guianensis.
Guilleminiana, D. Dittr. Syn. PI. iv. 932 = atrorubens.
quineensis, D. Dietr. 1. c. 933= goreensis.
hastata, Steud. Norn. ed. I. 239=verrucosa.
havanensis, *Guss. in Linnaea,* iv. (1829) *Litt.* 86.—Cuba.
Heldeana, A. DC. In Mém. Soc. Phys. Genev. U. (1841)97-.Pohliana.
heptaphylla, *Lour. Fl. Cochinch.* 433.—Cochineh.
herbacea, Schweig. ex Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828)77-incana.
herniarioides, Wight & Am. Prod. 192 - medicaginea.
heterophylla. Linn. *I* Suppl. 323—quinqnefolia.
hexaptera, Schrank, in SyU. Ratisb. ü. (1828) ii. 79 = pterocanla.
Heyneana, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6414.—Ind. or.
Hilariana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. L 25 — Bras.
Hildebrandtii, Baill. in BulL Soc. Linn. Par. i. (1885) 446 =orthoclada, *Baker.*
Hildebtandtii, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 220.—Afr. trop.
hirsuta, Roxb. Hort. Beng. 64; FL Ind. iii. 270 = mytorensis.
hirsuta, Wall. Cat. n. 5413 A, C -eyolvuloides.
hirsuta, *Willd. Sp. PI.* iii. 978.—Ind. or.
AlWa, Lag. Gen. et Sp. Nov. 22=incana.
hirta, Roth, Nov. PL Sp. 839 = biflora.
hirta, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 217.—Ind. or.
holoptera, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 13.—Air. trop.
holosericea, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiL (1824) 26.—Bras.
Xookeri, Am. in Ann. So. Nat. Ser. II. iii. (1835) 248 -Saltiana.
Hookeriana, A. DC. in Mem. Soc. Phys. Genev. ix. (1841)97=ovalis.
Hostmanni, Steud. in Flora, xxvi. (1843) 757-retusa.
humifusa, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5421.—Ind. or.
humilis, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 174.—Afr. austr.
hjtssopifolia, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bat.* 55 — Afr. trap.
imbricata, Linn. PL Afr. Rar. 16 = Amphithalea<densa.
imbricata, Willd. ex Stend. Norn. ed. II. i. 443 = Aspalathns lotoides.
impressa, Nees, Del. Sem. Hort Vrat. (1841) 3 = astragalina.
.ineana, *Linn. Sp. PI.* 716.—Am. trop.
incanescens, Linn. f. Suppl. 323 = capensis.
Indigqfera, Sonnerat. ex Lam. Encyc. ii. 200=purpurascens.
inflata, Buch-Ham. ex Steud. Nom. ed. II. i. 443 a sessiliflora.
intermedia, *Kotschy, in Sitzb.Acad. Wien, Math.-Nat.* 1. Abth. i. (1865) 362.—Afr. trop.
involucrata, E. Mey. in Linnaea, vii. (1882) 152 - Lotononis involucrata.
involucrata, Soland. ex Baker, in Oliver, FL Trop. Afr. ii. 22=ononioides.

CBOTAXiABIA:—

iodina, Benth. in Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 572 - atrorubens.
ivantulensis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 26.—Afr. trop.
javanica, *Jungh. in Hon. tf De Vriese, Tijdschr.* vii. (1840) 80S.—Java.
juncea, *Linn. Sp. PI.* 714.—As. trop.; Anstral.
JMncea, Willd. Sp. PL iii. 976=sencea.
Kirkii, *Baker, in Oliver, FL Trop. Afr.* iL 36.—Afr. trop.
Kurzii, *Baker, ex Kurs, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1873) II. 229.—Burma,
labumifolia, *Linn. Sp. PI.* 715.—As. trop.
laburnoides, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 57 = Saltiana.
lachnocarpa, *Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 83.—Abyss.
Itchnophora, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss. 151 = lachnocarpa.
lseta, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. SO.—Bras.
laevigata, *Lam. Encyc.* ii. 198.—Madag.
laevigata, Punh, Fl. Am. Sept ii. 469 = Pnrshii.
lanata, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xix. (1858) 178.—Ind. or.
lanata, Thnnh. Prod. PL Cap. 124=Priestleya villosa.
lanceolata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i.* 24.—Afr-austr.
lanceolata, Roxb. Hort Beng. 54=Brownei.
latbyroides, *Guill. V Perr. Ft. Seneg. Tent. i. 1M* — Afr. trop.
latifolia, *Linn. Sp. PI.* 715.—Jamaic.
latifolia, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 180 = Saltiana.
laxa, *Franch. in Rivoil, Comali,* 24.—Afr. trop.
leiocarpa, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl-* (1848) 8.—China.
leioloba, Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1837); Linnaea, xii. (1838) Litt 80=ferruginea.
Lenticula, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 26" Lotononis Lenticula.
Leprieurii, *Guill.* to" *Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 162—Afr. trop.
leptoclona, £ *Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 737" Mexic.
leptophylla, Benth. in Ann. Nat. Hist. UL (1882) =maypurensis.
leptostachya, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* (1843) 662.- Ind. or.
Leschenaultii, *DC. Prod.* ii. 125.—Ind. or.
LeschenauUi, Macfad. Fl. Jamaic. i. 289 = sericea.
linearis, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6970 calycina.
linearis, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 54.—Am. bor.
lineata. Lam. Encyc. ii. 200=Eriosema violacesm-
lineata, Thnnb. Prod. PL Cap. 125»decumbuns.
linifolia, *Linn. f. Suppl.* 822.—As. trop.; Austral.
linifolia, Willd. Sp. PL iii. 976=albida.
Linkiana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 443.—Hab. ?
Uttoralis, DC Prod. ii. 134=-pumila.
littoralis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 401.- Cuba.
longifolia. Lam. Encyc. ii. 201 = CHtoria guianensis.
longipes, *Rafin. New Ft. Am.* ii. 64.—Am. bor.
longipes, *Wight* b" *Arn. Prod.* 183.—Ind. or.
longirostrata, *Hook, b[1] Arn. Bot. Beech. Voy.* 28»- Mexic.
lotifolia, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 19=latifoli»
lotifolia, Poepp. ex Steud. Nom. ed. II. i- vitellina.
lotoides, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. 675.—Afr. austr.
lotoides, Pers. Syn. i. 284 = latifolia.
lotoides, A. Rich. Tent. FL Abyss, i. 157 -n carpa.
Lotononis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop-AT* ii. 89.—Afr. trop.
lunaris, Bum. {. Fl. Cap. Prod. 21 = lotoides.
lunaris, Unn. Sp. PI. 715=Argyrolobium lat .
/»m. Bedd. in Madr. Journ. Sc. *Sex.* III. L =lanata.
lunulato, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 5878.—Ind. or-
lunulata, *Rafin. New Ft. Am.* ii. 65.—Am. bor.
lupinifiora, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5« Leschenaultii.
lupinifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 448-praec.

CROTALARIA :—

Benth. in Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 688.—Afr. trop.

Sf 18 Dttl ... Hi Ky ... ourn. ii. (1850) 34.—

luxurians, Benth. in Hook. ... (1848) 578 = medicaginea.

macilenta, D ... elile, in Cull. Voy. Meroe, ii. (reimp. 35) t. 64 = senepalen»i».

macrocal ... *nth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii (1848) ... Afr. trop.

macrocarpa, E. Mey. Comm. Pl. Afr ... Austr ... austr.

macrc ... *Journ. As. Soc. Beng.* xlr. (1878) II. 266.—Burma.

"urophll ... Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 26 - sericea.

macrophylla, Willd. Sp. PL Hi. 982 - Flemingia congesta.

macropod ... Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Auyss. i. 167 = ori«nsis.

macrostachya, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 27 = globifera.

macrostipula, Stend. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 158 -goreensis.

macros ... *. Don, Prod. F* K ... = Les ... *macrostyla.*

madurensis, Wight, ... *WaU. Cat.* ... 5878.—Ind. or.

mag ... *Tenore,* ... *Hort. N* ... *p.* (1829) 16.

ma a4ar. ... *aTm0MDMm*

Mar ... Aschers. ex Baker, in OUver, Fl. in. ... -nicrocarpa.

Bantim ... *Chapm. Fl. S. U. St. Suppl.* 614.-Am. bor.

Martiana, B ... Hook. Lond. Joum. Bot ii. (1843) 482 = foliosa.

M ... *Benth. I. c.* 479.-Pernv.

... *Xlot* ... *in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 58.—Afr. trop.

mavr ... *Nov. Gen. et Sp.* vi. 408.-

medicaginea, DC. Prod. ii. 133 = C. Trifoliastrum.

medicaginea ... Anstral.

melanocarpa ... Wall. Cat. n. 5882 - linifolia.

melilotoides, ... A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 155

Meyeri ... = pyenostachya.

micans, Lin ... 228.-Hab. f

micrantha, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 229.—Zeylan.

micrantha, E. ... Afr. Acstr. i. 27 = Lotononis m ...

microcarpa, Hochst. ex Benth. in Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 573.—Nubia.

microphylla, Vahl, Symb. Bot. i. 52.—Arab.

Mitchelli, F. Muell. Fragm. iii. 50=Novae-Hollandiae.

Mitchellii, Benth. in ... 122.—A

mollicula, ... Mexico.

molli ... Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 28 - Meyeria

mollis, ... *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 25.—China, ... folk, ... eyne> ex Roth> NoT_ Pl_ Sp_ 8S6 " lini_

montana, A. ... 162.-Abyss.

montana, ... albida.

massambicensis, ... »d». in Peters, Reiie Mossamb. Bot ... t. 10 ... -lanceolata.

... Uiflnr ... Jofc iii. (1814) 76.—Ind. occ. (1843) ... *Bot.* ii. ... *Hook. Lmd. J**r*- ... ey|an.

mysorensis, Roth, ... S38.-Ind. or.

nana, Burm. f. Fl. ... DC. ... 128 = *nepalensis.*

napaul ... *n Hook. Lond. Journ. Bot.* ii.

natal ... —Afr. austr.

nerl ... *a,* Wight & Am. Prod. 192=medicaginea.

ne ... *tensis,* Lin ... flora.

neriifolia, Wall. Cat. n. 5862. Burma.

nervosa, R. Grah. ... 6428 " Pycnospora bedysaroides.

nigricans, Baker, in ... *Afr. trop.*

CEOTAIiAHIA :—

nipaulensis, G. Don, Gen. Syst ii. *187-nepalensis.*

nitens, /f. fi. &• AT. ATOT. 6«n. rf j>. vi. 399.—N. Granat.

nitidula, Mart, ex Schrank, in Syll. Ratisb. it. (1828) 78=nitens.

Notonii, *Wight (f Am. Prod.* 192.—Ind. or.

Novae-Hollandiae, *DC. Prod.* ii. 127.—Austral,

nnbica, *Benth. in Hook. Lond. fount. Bot.* ii. (1848) 681.—Afr. austr.

nummularia, Willd. Sp. PI. iii. 979=blflora.

nutans, *Welm. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 24.—Afr. trop.

obcordata, *Berg. Desc. PI. Cap.* 196.—Afr. austr.

obliqua, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5388 = ferrn. ginea.

oblongifolia, Hook. Ic. PI. sub t. 830 - Novae-Hollandiae.

obovata, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 138.—Afr. trop.

obscura, *DC. Prod.* ii. 134.—Afr. austr.

obtecta, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6372.—Ind. or.

occulta, *R. Grah. 1. c.* n. 5860.—Reg. Hiinal.

ocbroleuca, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 138.—Afr. trop.

Oldhami, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat iii. 42 = sessiliflora.

oligostachya, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 41.—Afr. trop.

Onobrychis, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 154.—Abyss,

ononoides, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 672.—Afr. trop.

opposita, Linn. f. Suppl. 322=Rafnia opposita.

orbicularis, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 161 = Podalyria orbicularis.

orixensis, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 217.—Ind. or.; Afr. trop.

orthoclada, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 124.—Madag.

orthoclada, *Welv. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 29—Afr. trop.

utoptera, *Benth. in. Ann. Nat. Hist.* iii. (1889) 429.—Bras.

ovalifolia, Wall. Cat n. 5411=rubiginosa.

ovalis, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 469.—Georgia.

oxalidifolia, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 444 = Loddigesia oxalidifolia.

oxyptera, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. 28 = Lotononis oxyptera.

pallida, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 670=sessiliflora.

pallida, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 20.—Afr. trop.

pallida, Klotesch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 58 = Saltiana.

paniculata, Pers. Syn. ii. 284 - senegalensis.

paniculata, *Willd. Sp. PI.* iii. 982.—As. trop.

paramariboeñsis, Miq. in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist. xi. (1843) 14=verrucosa.

parva, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5402=aIbida.

parviflora, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 469 = Pnrshii.

parviflora, Roth, Catalect. i. 88 = sagitulis.

parvifolia, Thunb. Prod. PL Cap. 124 = Coelidinm Thunbergii.

parvula, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 25.—Afr. trop.

patula, R. Grab. in. Wall. Cat. n. 5871=nana.

paulina, *Schrank, PI. Rar. Hort. Monac.* t. 88,—Bras.

peduncularis. Dak. & Gibs. Bomb. Fl. 55=lutescens.

peduncularis, *R. Grah. in WaU. Cat.* n. 5369.—Ind. or.

pedunculosa, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 76 = labumifolia.

peguana, *Benth. ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 77.—Burma.

pellita, Bert, ex DC. Prod. ii. 128-ramosissima.

pendula, Bert. 1. c. 130=labumifolia.

perfoliata, Linn. Sp. PI. 714=Baptisia perfoliata.

perforata, Linn. PL Afr. Rar. 15; Amoen. Acad. vi. 92 = Borboniaciliata.

perplexa, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 26 = Lotononis perplexa.

Perrottetii, *DC. Prod.* ii. 128.—Afr. trop.

Pervillei, *Baill. in Bull. Soe. Linn. Par. i.* (1885) 444.—Madag.

petiolaris, *Franch. in Révoil, Qomali,* 26.—Afr. trap,

petiolata, *Vog. ex Walp. in Linnaea,* xiii. (1839) 474.—Afr. austr.

Petitiana,i4. *Rich. Tent. Fl. Abyss,* i, 169.—Abyss.

physocarpa, Fenzl, ex Baker, in Oliver, FL Trop. Afr. ii. 17-podocarpa.

CROTAI^ABIA :—

pilifera, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot 54 =podocarpa.

pilosa, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 2.—Mexic.

pilosa, *Rafin. NewFl. Am.* ii. 64.—Am. bor.

pilosa, Roxb. ex Mart, in Denkschr. Acad. Muench. vi. (1820) 156 -hirta.

pilosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 125-obscura.

pilosissima, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 827 = ferruginea.

pisicarpa, *Welu. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* il. 16.—Afr. trop.

pisiformis, Guill. & P«rr. Fl. Seneg. Tent. i. 182 = Slltiana.

platycalyx, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 160.—Abyss.

platycarpa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 227 = sagittalis.

platysepala, *Hart. Thes. Cap.* i. 19. t 29.—Afr. austr.

Plowdeni, *Baker, in OUver, FL Trop. Afr.* ii. 41.—.Afr. trop.

podocarpa, *DC. Prod.* ii. 133.—Afr. trop.

Poeppigii, *Presl, Bot. Bemerk.* 123.—Cuba.

Pohliana, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 428.—Bras.

polycarpa, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.ii. (1843) 580—sphaerocarpa.

polyclados, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i». 17.—Afr. trop.

polygaloides, *Welw. ex Baker, 1. c.* 16,—Afr. trop.

polysperma, *Kotschy, Reliq. Kotsch.* (1868) 18. t 14.—Afr. trop.

porrecta. Wall. Cat n. 5368 = juncea.

priestleyoides, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 74.—Ind. or.

Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 200.—Am. bor. oce.

procumbens, [Moc, & Sesse,] ex DC. Prod. II. 129 = ovalis.

Procumbens, Roxb. Hort Beng. [98]; FL Ind. iii. 278 =medicaginea.

procumbens, C. Sm. in Tuckey, Congo, 252 = Tuckeyana.

Procumbens, Wall. Cat. n. 64S7=hemiarioides.

prolifera, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 162 - Lotononis porrecta.

prolongata, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 26.—Afr. trop.

propinqua, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. lxv, nomen.—Abyss,

prostrata, *Rottl. in Willd. Enum. Hort. Berol.* 747.—As. trop.

prostrata, Wight, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. IL 67=humifbsa.

protensa, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 35.—Afr. trop.

Psendoeriosema, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvüi. (1878) 198.—Afr. trop.

psoralmdes, D. Don, Prod. Fl. Nep. 242»Riotropis cytisoides.

psoraloides. Lam. Encyc. ii. 201=villosa, Rhynchosia psoraloides.

pterocaula, *Desv. Joum. Bot.* iii. (1814) 76.—Am. austr.

pteropoda, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 508.—Ins. Socoti.

pubera, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 55.—Ind. occ.

puberula. Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 225 =pumila.

pubescens, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. L 444 = pubera.

pubescens, Moench, Meth. 161=incana.

pulchella, Andr. Bot. Rep. t U7=Lebeckia cytisoides.

pulcherrima, *Roxb. Hort. Beng.* 54; *Fl. Ind.* iii. 267.—Ind. or.

pulchra, Andr. Bot. Rep. t. 601 - pulcherrima.

pulchra, DC. Prod. H. 126 = falva.

pumila, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 897 = sessiliflora.

pumila, Hochst. & Steud. ex Baker, in Oliver, Kl. Trop. Afr. U. 17=microphylla.

pumila, Or^. *Hort. Matr.* 23—Cuba.

pumila, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 56.—Am. bor.

pumilu, Schrank, in Denkschr. Acad. Muench. vi. (1820) 188 = pusilla.

punctata, R. Grah. in WaU. Cat. n. 6401 A, C = albida.

purpurascens, *Lam. Encyc.* ii. 200.—Madag.

CBOTALAKIA :—
purpnrea, *Vent. Jard. Malm.* t 66.—Afr. austr.
Purshii, *DC. Prod.* ii. 124.—Am. bor.
posilla, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 885.—Ind. or.
pusilla, Roxb. ex Wight & An. Prod. 189=evolvuloides.
pycnostachya, *Benth. in Hook. Land, fount. Bot.* ii. (1843) 584.—Abyss.
Qnartiniana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* L 168.—Abyss.
quinata, E. Mey. Comm. Fl. Afr. Austr. i. 27 = Lotononis acntiflora.
quinquefida, Heyne, ex Roth, NOT. Fl. Sp. 342 = C. Trifoliastrum.
qninqnefolia, *Linn. Sp. PI.* 716.—As. trop.
racemose, Veil. Fl. Flum. 806; vii. t. 106=paulina.
ramiflora, Pen. ex DC. Prod. ii. 168 = Tephrosia obcordata.
ramosissima, *Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 26.—Afr. trop.
ramosissima, F. Muell. Fragm. iii. 65 = crispata.
ramosissima, *Roxb. Hort. Beng.* 54 ; *Fl. Ind.* iii. 268.—Ind. or.
recta, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 152.—Afr. trop.
reflexa, Thunb. Prod. PI. Cap. l?5=Priestleya sericea.
Regnellii, Benth. in Linnaea, xxii. (1849) 511 = Pohliana.
remotiflora, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 81 = senegalensis.
reniformis, Lam. Encyc. ii. 194-Valcoa perfoliata.
retnsa, *Linn. Sp. PI.* 715.—Cosmop. trop.
retusifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 516-retusa.
rhitophylla, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5481=occulta.
rigida, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 343.—Ind. or.
rostrata, Wight & Am. Prod. 191=NotoniL
Rothiana, DC. Prod. ii. 127 -biflora.
Rothii, Spreng. Syst. iii. 287 = praec.
rotnndifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* ii 402.—Am. bor.
Roxburghiana, DC. Prod. ii. 129 -calycina.
Roxburghii, Spreng. Syst. iii. 239 = praec.
rubiginosa, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6356 = alata.
rubiginosa, Herb. Madr. ex Wall. 1. c. n. 5861=myso-rensis.
rubiginosa, Roxb. Hort Beng. 98; Fl. Ind. iii. 269 = hirsuta.
rubiginosa, Walp. Rep. i. 590 - atrorubens.
rubiginosa, *Willd. Sp. PI.* iii. 978.—Ind. or.
rufescens, Franc̆b. PI. Davidian. i. (,1884) 79 = ferrnginea.
ruñpila, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xr. I. 28.—Bras.
sagittalis, Desr. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 178 = stipularis.
sagittalis, *Linn. Sp.Pl.* 714.—Am. bor.
sagittalis, Veil. Fl. Flnm. 308 ; vii. t. lll=stipularia.
sagitticaulU, Wall. Cat.n. 5357=alata.
Saharae, *Coss. in Bull. Sac. Bot. Fr.* xi. (1864) 165.—Afr. bor.
salicifolia, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 6359 A.—Ind. or.
Saltiana, *Andr. Bot. Rep.* t. 648 (1811).—Geront. trop.
Saltiera, Ait. ex Steud. Nom. ed. I. 289 = praec.
saxatilis, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 219.—Afr. trop.
saxatilis, Zoll. & Mor. in Nat en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 76=llnifolia.
scabrella, Wight *St.* Am. Prod. 181= rubiginosa.
scandens, *Lour. Cochinch.* ii. 435. -Cochinch.
scariosa, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 56.—Am. bor.
Schiedeana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 445.—Mexic.
Schimperi, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 151 = incana.
Schumacheri, D. Dietr. Syn. PI. iv. 933 = fklcata.
Schweinfurthii, *Defiers, in Bull. See. Bat. Fr.* xxxii. (1885) 848.—Afr. trop.
scoparia. Wall. Cat. n. 5418-albida.
semperflorens, *Vent. Jard. Cels,* t 17.—As. trop.
senegalensis, *Bade in DC. Prod.* ii. 133.—Afr. trop.
sericea, Burm. f. Fl. Ind. 156 = Burmanni.
sericea, *Rets. Obs.* v. 26.—Ind. or.
sericea, Willd. Sp. PI. iii. 519 = juncea.
serpens, E. Mey. in Linnaea, vii. (1882) 158 = Eochlora serpens.
serpyltifalia, Lamb, ex DC. Prod. ii. 124=stipnlaria.
serpyllifolia, Wight, ex Wall. Cat sub n 6358 = Wightiana.
sessiliflora, *Linn. Sp. PI.* ed. IL 1004.—China.
sessilifolia, Linn. Mant. ii. 440 = sesiiliflora.
setifera, *DC. Prod.* ii. 131.—Mexic.
simplex, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 153=recta.

CROTAZiABIA :—
sinensis, J. F. Grael, Syst 1095-chinensis.
sobolifera, R. Gralh in WalL Cat. n. 5420 A=linifolU.
sobolifera, R. Grah. 1. c. n. 6420 B=nana.
sparsiflora, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 26.—Afr. austr.
spartea, *R. Br. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 12.—Afr. trop.
spartioides, *DC. Prod.* ii. 128.—Afr. anstr.
spartioides, E. Mey. Comm. Fl. Afr. Austr. i. 23 = virgultalis.
spartioides, Spreng. Syst iii. 240=Willdenowiana.
speciosa, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 336.—Ind. or.
spectabilis, Roth, 1. c. 341 = sericea.
sphaerocarpa, *Perr. ex DC. Prod.* ii. 133.—Afr. tro .
spinosa, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Iniell.* 32; *et ex Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 576.—Abyss.
spinulosa, *Burm.f.Fl. Cap. Prod.* 21.—Afr. austr.
splendens, Vog. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848)8«elliptica.
stenophylla, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 174=Ecklonis.
stenopkylla, Vog. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 7-linifolia.
stenoptera, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 12.—Afr. trop.
Steudneri, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 651.—Afr. trop.
Stewartii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 32.—Afr. trop.
stipitata, K. Grab, in Wall. Cat n. 5425 A = C. Trifoliastrum.
stipitata, R. Grah. 1. c. n. 5425 B=laevigata.
stipulacea, Roxb. Hort Beng. 54; Fl. Ind. iii. 264 = mysorensis.
stipularia, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 76.—Guian.; Ind. occ.
stipulata, Veil. Fl. Flum. 307; vii. t. 109=anagyroides.
Stocksii, *Benth. ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 67.—Ind. or.
striata, A. Br. in Flora, xxiv. (1841) 280=astragalina.
striata, DC. Prod. ii. 181=Saltiana.
striata, *Schrank, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 76.—Bras.
striata, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 336=falcata.
stricta, Roth, Nov. PL Sp. 342=C. Trifoliastrum.
stricta, Roxb. Hort. Beng. 64; Fl. Ind. iii. 265 = calycina.
strigosa, *Boj. Hort. Mount.* 88.—Hab. »
strigulosa, *Balf.f. in Proc. Roy. Sec. Edinb.* xi. (1882) 508.—Ins. Socotr.
Sturtii, *R. Br. in Sturt, Exped.* ii. *App.* 70.—Austral,
styracifolia, *Desf. Tail.* ed. II. 214, nomen; *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 151.—Afr. austr.
subdecurrens, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 20.—Bras.
subperfoliata, *Wight, in Wall. Cat.* n. 5377.—Ind. or.
tecta, *Heyne, ex Roth, Nov. PL Sp.* 834.—Ind. or.
tenella, E. Mey. in Linn»f. vii. (1832) 152 = Lotononis tenella.
tenuiflora, *Steud. Nom.* ed. II. i. 445.—Afr. anstr.
tenuifolia, Roxb. Hort. Beng. 54; Fl. Ind. iii. 263 = juncea.
tenuifolia, Wight, ex Wall. Cat. sub n. 5869 = pedunclaris.
tenuirama, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 24.—Afr. trop.
tenuis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 124.—Madag.
tenuis, Wall. Cat n. 5408-albida.
tepicana, *Hook, br Am. Bot. Beech. Voy. Suppl.* 414.—Mexic
tetragona, *Roxb. ex Andr. Bat. Rep.* 1593; *Fl. Ind.* iii. 263.—As. trop.
tetragona, Wall. Cat. n. 5367 D=obtecta.
Mragonoloba, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 445 = tetragona.
tetrasperma, Dietr. ex DC. Prod. ii. 126=pulcherrima.
thebaica, *DC. Prod.* ii. 128.—Afr. trop.
thebaica, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 160 = arenaria.
Thomsoni, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 399.—Afr. trop.
Thunbergiana, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 476=Lotononis excisa.
tigrensis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 36.—Afr. trop.

CBOTAIiABIA;
tinctoria, Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 443-striata.
tomentosa, Perr. ex DC. Prod. ii. 128=Perrottetii.
tomentosa, Rottl. ex Spreng. Syst iii. 230 - ramosissima.
tomentosa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 192.—Afr. austr.
tomentosa, Wight, ex Stend. Nom. ed. II. i. 445» digitata.
topicauca, Walp. Rep. i. 594, sphalm. = tepicana.
triantha, [Moc, & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 135 - pumila.
triantha, Steud. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. 16 = microcarpa.
trichophora, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind-* ii. 67.—Ind. or.
trichopoda, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 154» Lotononis trichopoda.
trichotoma, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. iv. (1835) 265.—Madag.
triflora, Heyne, in Wall. Cat. n. 5387 = hirsuta.
triflara, Linn. Sp. PI. 715=Rafnia triflora.
Trifoliastrum, Wall. Cat. n. 5432 G-Notonii.
Trifoliastrum, *Willd. Sp. PI.* iii. 983.—Ind. or.
t.igonelloides, Webb, in Hook. Niger Fl. 117, in obs.* microphylla.
triphyUa, Veil. Fl. Flum. 307; viL t. 108-brachystachya.
triquctra, *Dais, in Hook. Km Journ.* ii. (1850) 84.—Ind. or.
truncata, £. Mey. in linnaea, vii (1832) 151 = Lotononis umbellate.
tuberosa, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. FL Nep. 241 £riosema chinense.
Tuckeyana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 445.—Afr. anstr.
turgida, *Loisel. Herb. Amat.* t. 238.—Hab. ?
Tweediana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* (1848) 482.-Reg. Argent,
nkambensis, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1» 219.—Afr. trop.
umbellata, Wight, in Wall. Cat n. 6383=nana.
uncinata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr-* 33.—Afr. trop.
uncinella, *Lam. Encyc.* ii. 200.—China,
undulata, *Knowles (f Westc. Fl. Cab.* ii. (1838) *H*. Mexic.
uniflora, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 13.—trop.
uniflora, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl- I iii. 271 = Heylandia latebrosa.
unifoliolata,5entt. *in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) «—Bras.
Vachellii, Hook. *8c* Am. Bot Beech. Voy. 18 elliptica.
variegata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr* 19.—Afr. trop.
vasculosa, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6427.—Ind-
velutina, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1889) — Bras.
venusta, Wall. Cat. n. 5365=sessiliflora.
verrucosa, *Linn. Sp. PI.* 715.—Cosmop. trop.
versicolor, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 28.— rop.
versicolor, E. Mey. in Linnaea, vii. (1882) 152 - nonis versicolor.
Vespertilio, .»«««<*. *in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) —Bras.
vestita, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 67.— r.
velillata, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 153 - nonis prostrata.
villosa, Linn. Sp. PL 715-Podalyria calyptrata.
villosa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 125.—Afr. austr.
viminea, Wall. Cat. n. 5397 B-juncea.
viminea, Wall. 1. c. n. 5897, pro parte= tecta.
virgata, Benth. in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) « paulina.
virgata, Herb. Holm, ex Harv. in Harv. *8c* Son- Cap. ii. 36 - Rafnia Thunbergii.
virgata. Mart in Denkschr. Acad. Muench. vi. I 157 = medicaginea.
virgata, Roxb. ex Wight *8c* Am. Prod. i. C. Trifoliastrum.
virgatula, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. virgulata.
virgulaU, *Klotisch, in Peters. Rtise Mossamb-* —Afr. trop.
virgulta, 5^r«i;. *Syst.* iv. C«r. /»»sf. 276.—A»-

CROTALARIA:—
»«gultalis, *Bunk, ex DC. Prod.* ii. 128.—Afr. anstr.
viscosa, Pursh, ex Stead. Nom. ed. II. i. 444, in syn. = Paoicalata.
xitellina, *Ker-Ganl. in Bot. Reg.* t. 447.—Bras.
Vogelii, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* iL (1843), 561,-Afr. trop.
Vogelii, D. Dietr. Syn. PI. iv. 926=linifolia.
volubilis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 125.—Afr. austr.
Walkeri, Am. in Nov. Act Nat Cur. xviii. I. (1840) S28-=semperflorens.
Wallichiana, Wight & Am. Prod. 187 = semperflorens.
Welwitschii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 18.—Afr. trop.
Wightiana, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5358 = rubiginosa.
WiUdenowiana, *DC. Prod.* ii. 184.—Afr. austr.
*anthoclada, *Boj. ex Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* ii. (1843) 588.—Madag.
ainzjoarica, *Benth. 1. c.* 584.—Afr. trop.
Aplliiigeriana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 844.—Java.
tuccariniana, D. Dietr. Syn. PI. iv. 9S5=striata.

^ROTALOPSIS, Michx. ex DC. Prod. ii. 100, in syn. (.1825)=BaptiBia, Vent. (Legum.).

CROTON, Linn. Gen. ed. I. 288 (1787). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 293.
ANCELANDHA, Endl. Gen. Suppl. iv. HI. 91 (1850).
ANISEPTA, Rafin. Cat. 18 (1824).
ANISOPHYLLUM, Boiv. ex BaiU. Adansonia, L (1860-«1) 153.
ARGY***'Noronia, ex Bull. Adansonia, i. (1860-81) 162.
ARGYRODENDRON, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot 100 (1861).
AROTON, Neck. Elem. ii. 886 (1790).
ASTRAEA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 194.
ASTROGYHE, Benth. PI. Hartw. 14 (1839).
AUBRETIA> Chapel ex Baill Adansonia, i. (1860-61) 162,166.
BARHAMIA> Klotech> ™ Seem_***. voy_Herald> i04 (1858).
BRACHYSTACHYS, Klotzsch, in Hook. Lond. Jonm. „ Bot. n. (1843) 47.
«*«msviA, Neck. Elem. ii. 337 (1790).
^ALYMKRIOPETALUM, Hassk. Retzia, i. 34 (1858).
^*SCARILLA, Adans. Fam. ii. 865 (1763).
^INOCASUM, Neck. Elem. ii. 336 (1790).
t-LEODORA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 196.
CODONOCALYX, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gen. ¬ Enph. 869 (1858).
*-OMATOCROTON, Karst. in C. Koch, Wochenschr. ii. - (.1859) 6.
^OTONANTHUS, Klolach|ex Schlecht. in Linnaea, Cv Mvi. (1853-56) 634.
1C^/STIGMA>Klotzsch>in Scem_ B<*_ Voy_Heraldl *«4 (1853),
DSCARIUM, Rafin. Neogenyt. 1 (1825).
DREPADENIUM, Rafin. 1.*I* 2 (1826).
ELUTHERIA, Linn. Hort. Cliff. 486 (1737).
ENGMANNIA> Klotzsch, in Wiegm. Archiv, viL - U841) 258.
FUTRONIA) Klotzsch, 11.cc. ((1841) 196
r ?E CIA, Baiw ex BaiU. Et»d Gen. Euph. 356
HIS 26.*LEWA>KlotB<:h> >» Wiegm. Archiv, vii. (1841) 4.
GYNAMBLOSIS, Torr. in Rep. Marcy Exped. 295 (1853).
HALEC)
HENDECANDRA, Eschsch. in M«n. Acad. Petersb. x 1 HR^(82B) 287.
KiO. SCALLON- Rafin- Neogenyt. 1 (1825).
KIPHIPHYTUM> Baill. Etud. Geo" Enph. 382 (1858).
KURKAS, Rafin. Sylva Tellur. 62 (1838).
LASTROGYNE, Klotzsch, in Nov. Act. Nat. Cm. xix. , i*Ppl. l. 418 (1848).
LONTIA> Keichb- Consp. 195 (1828).
LOXOEUCADENIA, Klotzsch, ex Baill. Adansonia, iv. (1864) 288 www.
LUNTIA, Neck. Elem. ii. 335 (1790).
MACROCROTON, Klotisch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui. 1186 (1848).

CBOTON:—
MEDEA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 198.
MEIAMSA, Rafin. Sylva Tellnr. 63 (1838).
MONGUIA, Chapel, ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 147.
MYRIOGOMFHUS, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 142.
OCALIA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 195.
ODOTALON, Rafin. Sylva Tellur. 66 (1838).
PALAMOSTIGMA, Mart, ex Klotzsch, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 49.
PENTECA, Rafin. Sylva Tellur. 62 (1838).
PILINOFHYTUM, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 255.
PODOSTACHYS, Klotzsch, 1. c. (1841) 193.
SCHRADERA, Willd. in Goett. Journ. Wiss. i. (1787) 1.
SEMILTA, Rafin. Sylva Tellur. 63 (1838).
TIGLIUM, Klotzsch, in Nov. Act. Nat. Cor. xix. Suppl. i. 418 (1843).
TIMANDRA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 197.
TRIDESMIS, Lour. Fl. Cochinch. 576 (1790).
TRIFLANDRA, Rafin. Sylva Tellnr. 62 (1838).
abaitensis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 337.—Bras,
aberrans, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 232.—Bras.
abnormis. Mart, ex Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 354 =• timandroides.
abntiloides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sfi.* ii. 86.—Peruv.
acerifolius, A. Cnnn. ex Hook, in Mitch. Jonrn. Trop. Austral. 371=Adriana glabrata.
acerrimus, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Bnitenz. 104 = Dalechampia bidentata.
acronychioides, *F. Muell. Fragm.* iv. 142.—Austral.
acuminatus, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxv « macrostachys.
acuminatus, Lam. Encyc ii. 207—Mallotus japonicus.
acuminatus, A. Rich, ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 276 = Cephalocroton leucocephalus.
acutus, Thunb. Fl. Jap. 269 = C. Tiglium.
adamantinus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 115.—Bras,
adenocalyx, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 344.—Bras,
adenodontus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 267-—Am. anstr.
adenopetalus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 90-gracilipes.
adenophorus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 168-—Madag.
adenophyllus, *Spreng. Syst.* iii. 869.—.Jamaica,
adipatus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sj>.* ii. 68.—Bras,
adpressus, *Wright V Griseb. in Goett. Nachr.* (1665) 173.—Cuba.
adspersus, *Benth. PI. Hartw.* 51.—Mexic.
affinis, Geisel. Crot. Monog. 25=glandnlosus.
agoensis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 348.—Bras.
agrarius, *Baill. I. c.* 319.—Bras,
agrophilus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. n. 175.—Bras,
alabamensis, *E. A. Smith, ex Chapman, Fl. S. V. St. Suppl.* 648.—Am. bor.
alagoensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 121.—Bras.
albellus, *Muell. Arg. 1. c.* 180.—Bras.
albescens, Anderss. in Vet Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 242=Scouleri.
albicans, Reichb. f. *8c* Zoll. in Verh. Naturh. Ver. Nederl. Ind. Batav. L (1856) 21 = Cephalocroton albicans.
albicans, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, vi. (1881) 634 -rhamnifolius.
albidus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 645.—Cuba.
Algernoni, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 320 ~ grandivelum.
alnifolius, *Lam. Encyc.* ii. 205.—Peruv.
alnoideus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 819.—Bras,
altheaifolius, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9 ; *Vahl, in Geisel. Crot. Monog.* 57.—Am. trop.
althaeifolius, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.f.* (1790) ed. I. Art. iv. 12 ^err. althiesolium).—Malaya.
amabilis, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 687—Afr. trop.
amazonicus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 102.—Bras.

CBOTON:—
ambanivoulensis, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 165.—Madag.
andinus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 126.—Bolivia.
Andreanusx, Linden, in Andrei Illustr. Hortic. xxii. (1875) 56. t 201.
Andreeus, Linden, ex Rev. Hortic. (1877) 87 = praec.
angolensis. *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 339.—Afr. trop.
angularis, Klotzsch, ex Baill. in Adansonia, iv. (1868-64) 299=salutaris.
angustifrons, *Muell. Arg. in Mart. FL Bras.* xf. II. 222.—Bras,
angustissimus, *Hort. in Gard. Chron.* (1871) 612.—Hab,?
anisatus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 159.—Madag.
anisodontus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (,1865-66) 91.—Bras.
antisiphiliticus, *Mart. Reise Bras.* i. 282.—Bras.
apetalum, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 104 - Alchornea rngosa.
argenteus, Forsk. Fl. Aegypt Arab. p. lxxv = Chrozophora obliqua.
argenteus, Linn. Sp. PL 1004—Julocroton argenteus.
argentinus, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 200.—Reg. Argent.
argothamnoides, Bert, ex Spreng. Syst. iii. 872 = Argithamnia Fendleri.
argutus, Heyne, in Wall. Cat. n. 7768 - Klotzschianns.
argyranthemus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 215.—Am. bor.
argyratus, *Blume, Bijdr.* 602.—Ind. or.; Malaya.
Argyrodaphne, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 146.—Madag.
argyroglossus, Baill. 1. c iv. (1863-64) 290-micans.
argyrophylloides, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 96.—Bras.
argyrophyllus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 68-= micans.
arahemicus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 112.—Austral.
aromaticus, Gaertn. Fruct. ii. 119.1.107 » caudatus.
aromaticus, *Linin, Sp. PL* 1006.—Ind. or.
aromaticus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 380.—Ins. Molucc.
aromaticus. Wall. Cat. n. 7773-birmanicus.
asper, Desv. ex Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 300 = floribundus.
asper, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 681-Chrozophora plicata.
asperrimus, *Benth. in Hook. Kev Journ.* vi. (1854) 376.—Bras.
astraeatus, Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 341-Klotzschii.
astrogynus, *Baill. I. c.* 810.—Bras.
Astroites, *\Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 375.—Ins. S. Thorn.
Astroites, Willd. Sp. PI. iv. 654*-flavens.
atro-rufus, *Muell. Arg. in Mart. Fl.Bras.* xi. II. 194.—Bras.
atrovirens. Wall. Cat. n. 7771-Mallotus atrovirens.
aucubaefolius, *Andr. Illustr. Hortic.* xix. (1872) 327.—Ins. Pacif.
Augustinianus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 320^ grandivelum.
auriculatus, Muell. Arg. in linnaea, xxxiv. (1865-66) 98=.jacobinensis.
avenius, Geisel. Crot. Monog. 11-lucidus.
axillaris, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 126.—N. Granat.
bacciferus. Wall. Cat n. 7826 - Mallotus repandus.
bahiensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 127.-Bras.
Baillonianus, *Muell. Arg. 1. c.* 86.-Peruv.
baliospermum, Span, in Linnaea, xv. (1841) 348-Codiaeum variegatum.
balsameus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 107.-Peruv.
balsamifer, Jacq. Enum. PI. Carib. 82-Havens,
barbatus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iL 73.—Mexic.
bellulus x, Linden & Andre', Illustr. Hortic. xxii. (1875) 104.
Benthamianus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II, 105.—Bras.
Bentaoe, Linn. Mant. iL 297 — Terminalia angustifolia.
Bentoe, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 721-praec.

CROTON:—
Berlandient, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 141.—Mexic.
Berlandiera, Tout, in Bot. Mex. Bound. 193=hnmilis.
Berniera, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 162.—Madag.
betacens, *Baill. 1. c.* iv. (1863-64) 841.—Bras.
Betulaster, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 201.—Bras.
betnlinus, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 98.—Ind. occ.
bicolor, Koxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 680 = argyratus.
bidentatus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 140.—Bras.
WuTcatm,Baill.Adansonia,i. (1860-61)164.—Madag.
Billbergianus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 98.—Panama.
birmanicus, *Muell. Arg. 1. c.* 112.—Burma,
bispinosns, *Wright, in Sauv. FL Cub.* 128.—Cnba.
bixoides, *Vahl, in Geisel. Crot. Monog.* 68.—Am. austr.
Blanchetianns, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 301.—Bras.
Bocquilloni, *Baill. I. c.* 161.—Madag.
Boissieri, *Muell. Arg, in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 188.—Peruv.
Boivinianus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 168.—Madag.
Bojerianus, *Baill. I. c.* 151.—Madag.
boliviensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 91.—Bolivia.
Bonplandianus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 339 = C. Persicaria.
Boragatch, Wall. Cat. n. 7735 = longifolius.
Boutonianus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 80.—Ins. Maurit.
braehiatus, Mart, ex Baill. Etnd. Gen. Euph. 368 - serratus.
lirachybotryns, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 671.—Madag.
bracteatus. *Lam. Encye.* il. 208.—Madag.
bractiferus, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 680 =Codiaeum variegatum.
brasiliensis, Mart, ex Klotzsch, in Nov. Act Nat. Cur. xix. SuppL i. (1843) 419 = compressus.
brasiliensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 104.—Bras.
Bredemeyeri, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 8.—Venezuela.
brevifolius, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1868 (1855) 241 = Scouleri.
brevispicatus, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 162 = brachybotryus.
Bridgesii, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 116.—Bolivia.
Broeckianus, Vis. PI. Aegypt. ac Nub. 39. t. 8. f. 2 = Chrozophora Brocchiana.
Burchellii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 139.—Bras.
buxifolius, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 676.—Bras.
Cajucara, *Benth. in Hook. Km Journ.* vi. (1864) 376.—Bias,
caldeusis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 98.—Bras,
califomicus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 691.—Calif,
callicarpaefolius, *Vahl, in Geisel. Crot. Monog.* 87.—Pernv.
calooephalus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 121.—Bras,
calococcus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 242.—Burma.
calycinus, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 24.—Bras,
campestris, *St. Hil. PI. Us. Bras.* t. 60.—Bras.
canescens, Boj. Hort. Maurit. 281=mauritianu».
capensis, Linn. f. Suppl. 422=Jatropba eapensis.
caperoniaefolius, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 206.—Bras.
capitatus, *Michx. Fl. Bar. Am.* ii. 214.—Am. bor.
cardiospermus, *Gaertn. Fruct.* ii. 120. t. 107.— Zeylan.
carinatus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 126.—Bras.
Caryophyllns, *Benth. in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 374.—Bras.
Casarettoanus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 628.—Bras.
Cascarilla, *Benn. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 80.—Ins. Baham.
Cascarilla, Lam. Encyc. ii. 208 = Havens.
Cascarilla, Linn. Sp PI. ed. II. 1428 = Jinearis.

CROTOXT:—
cascarilloides, *Geisel. Crot. Monog.* 8.—Ins. S. Doming.
cascarilloides, Raeusch. Norn. ed. III. 280=Mallotus philippinensis.
cassinioides, *Lam. Encyc.* it 211.—Madag.
castaneaefolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 70 = Caperonia palustris.
castaneifolius, Linn. Sp. PI. 1005 =• Caperonia castaneaefolia.
castanifolius, Wall. Cat n. 7760-Mallotus Wallichianus.
Catariae, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 849.—Bras,
catinganus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 263.—Bras.
caudatus, *Geisel. Crot. Monog.* 73.—Ind. or.
ceanothifolius, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64; 295.—Bras.
cearensis, *Baill. 1. c.* 827.—Bras.
cearensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 119 = betacens.
celtidifolius, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 881.—Bras,
cerino-dentatus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 186.—Bras.
cerinus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 570.—Cuba,
chaetocalyx, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1665-66) 133.—Bras.
chaetophorus, *Muell. Arg. 1. c.* 180.—Bras,
chamaedryfolius, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 41.—Guiana.
chamaedryfolius, Lam. Encyc. ii. 214=Acalypha reptans.
Chamaepitys, Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 866 = pycnocephalus.
cbapadensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 262.—Bras.
Chapelieri, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 166.—Mada-
Chiamaia, Wall. Cat n. 7776=Alchornea tiliaefolia.
chilensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 92.—Chili.
ehinensis, Bentb. Fl. Honglc. 309—tomentosus.
chinensis, Geisel. Crot. Monog. 24 = Mallotus Apelta.
chlorocalyx, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 109.—Ind. or.
chloroleucus, *Muell. Arg. I. c.* 106.—Bras.
chrotophoroides, Auct. vide *croBophoroides.*
chrysocladus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 172.—Bras.
Chrysodaphne, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 147.—Madag.
ciliato-glanduliferus, *Ortega, Hort. Matr.* 51.—Mexic.; Cuba,
cinctus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 235.—Bras,
cinerellus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 187.—Bras,
citrifoliiM, *Lam. Encyc.* ii. 210.—Ins. S. Doming,
cladotrichns, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 124.—Mexic.
Claussenianus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 291.—Bras,
clavuliger, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 644.—Cuba.
cluytioides, Forst f. Prod. 92—Euphorbia tannensis.
cneorifolius, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 676.—Bras,
coccineus, *Noronha, in Verh. Batao. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 11.—Malaya.
coccineus, Vahl, Symb. Bot. it 97=Mallotus philippinensis.
coccineus, Wall. Cat. n. 7771-Mallotus atrovirens.
codonocalyx, Baill. Adansonia, ix. (1863-44) 853 = nitrariaefolius.
Coelebogyne, Baill. 1. c. 298 = Gaudichaudi.
Colliguay, *Molina, Sagg. Chil.* ed. II. 147.—Chili.
Colliguaya, Spreng. Syst. iii. 875 - Colliguaya odorifera.
collinus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 78 = ferrugiu eus.
coUi'nm, Panch.ex Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 217 =insnlaris.
collinns, *Phil. Fl. Atac.* 49.—Chili,
comatus, *Veil. Fl. Flum.* x. t 74.—Bras,
comosns, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 667.—Bras.
compressns, *Lam. Encye.* ii. 208.—Bras.
conduplicatus, H. B. & K. Nov. Gen.et Sp. ii. 80 - rhamnifolius.

CBOTON:—
congestns, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 582.—China,
consanguineus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxiv. (1865-66) 117.—Ins. Philipp.
conspurcatus, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 880 - Julocroton conspurcatus.
constrictus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 860.—Bras.
corallatus, Soland. ex Baill. Etud. Gen. Euph. 351 - Kicinocarpus pinifolius.
corchorifolius, Geisel. Crot. Monog. 25=glandnlosus.
Corchoropsis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 864.—Bras.
cordatus, Veil. Fl. Flum. x. t. 66-Julocroton tnqueter.
cordiaefolius, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 884.—Bras,
coriaceus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 87.-Ecuador.
comutus, *Andrl, Illustr. Hortic.* xix. (1872) 188.—Ins. Salomon,
corrientesianus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 309—Am. austr.
Cortesianus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 88.—Mexic.
corylifolius, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. vin. (1861) 159=-cubanus.
corylifolius, *Lam. Encyc.* ii. 205.—Jamaic
corymbulosus, *Rothr. in Wheeler, Rep. Bot.* 242.—Am. bor.
cosUtus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 67.—N-Granat.
Cotoneaster, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1884) 484.—Madag.
craspedotrichus, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 178.—Cuba.
crassifclius, Geisel. Crot. Monog. 19-tomentosus.
crassirameus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66; 108=astrogynus.
cremostachyus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 321 - grandivelum.
crenatus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66; 129,-Venezuela.
croBophoroides, Kurz, in Journ. As. Soc Beug. *(1873) II. 243 = tomentosus.
cubanus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66; 94.—Cuba.
Cumingii, *Muell. Arg. I. c.* 101.—Ins. Philipp.
cuneatus, *Klotssch, in Hook. Land. Journ. Bot.* (1843) 49.—Bras.
cuneatus, Miq. in Linnaea, xxii. (1848) 477 =sann»mensis.
cyanospermus, Gaertn. Fruct. ii. 120. t. 107 = Phyllanthus cyanospermus.
cynanchicus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 829 celtidifolius.
daphnargyreus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, (1880) 123=C. Argyrodaphne.
debilis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) —Bras.
decalobus, Muell. Arg. 1. c. 80=Julocroton decalobodedpiens, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 310.—*»»•
dentatus, Sm. in Rees, Cyclop, x. n. 40-populi«oH»
denticulatus, Blume, Bijdi. 803 » caudatus.
denticulatus, Geisel. Crot. Monog. 72 •= FuphorWIanata.
denticulatus, Wall. Cat. n. 7731=rhodostachyu3.
dentifolius, Baill. AdansonU, iv. (1868-64) 34i Lundianus.
dentosus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 97.—Arg
denudes, BaiU. Adansonia, iv. (1863-64) SI*" agrarius.
Deppeanus, Steud. Norn. ed. II. i. 446=fragile-
desertorum, *Muell. Arg. in Mart. FL Bras.* xi. "• —Bras.
diadenus, Miq. Fl. Ind. Bat Snppl. 451-laevifoU»
dichotomus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. "• —Bras.
dichotomus,VimA. Sp. PL iv. 6S7 = Bemardi» dichotOIEUL.
dichrous, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-0 / 106.—Bras.
diffusus, Geisel. Crot. Monog. 41 - ovalifolius.
digitatus, Fisch. ex Stead. Norn. ed. I. 240; «•» 446 = Manihotdigitata.
digitatus, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. J»«-IU. 601-hibiscifolius.

CHOTON:—
digitatus, Hort. Kew. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 696-lacerus.
>gitatus, Salzm. ex Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 210^-lobatus.
digitifolius, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 340-comosus.
dioiciis, COT. *IC. i.* 4. t. 6.—Mexic
aiouitt, Iaert, ex Geisel. Crot. Monog. 18-discolor.
Qiolcus, *Roxb. Hort. Seng.* 104; *Ft. Ind.* iii. 680—Malaya.
dimcus, Wllld. Sp. PI. iv. 684-gracffls.
discolor, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 172-orjganifolius.
discolor, *Willd. Sp. PI.* iv. 582.—Ins. S. Doming.
"tsjunctijlorus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 216 = maritimos.
distant, Wall. Cat. n. 7772 A = Mallotus philippinensis.
[illegible], Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 100 = glandulosus.
[illegible]*ingensis,* A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 213-waberrimus.
"omingensis, Vahl, in Geisel. Crot. Monog 42 = udaefolius.
doratophyllus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 861 = Mocroton doratophyllus.
[illegible] Schlecht. *in Linnaea,* vi. (1881) 860.—Mexic.
draconoides, [illegible] (1866-66) 90.—Bras.
draconoideus, [illegible] (1880) 123.
Dracoonopsis, *Muell. Arg. in Jo-urn. Bot.* ii. (1861) [illegible]o.—Afr. occ.
[illegible]loides, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 865.—Bras.
drupaceus, [illegible] Fl- Filip. ed. II. 519 = luzoniensis.
drupaces [illegible] «udat!fi
[illegible], Wall. Cat. n. 7744=birmanicus ?
echin [illegible] (1868-64) 820-gus (2)velum.
echinocarj [illegible] 66) 50 : 3ras.
Ech [illegible] *Adansonia,* iv. (1868-64) 884.—Bras.
[illegible] *Schlecht. Linnaea,* xix. (1847) 248—Mex.
Elei[illegible], *Muell. Arg. in Mart. Fl. Brtt.* xi. [illegible] 272—Bras.
elaeagnifolius, Vahl, in Geisel. Crot. Mono 8- 9 dioicus.
elaeagnoides, *Baif.* *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 95.—Ins.
elaeocarpifolius, Wall. Cat. n. 7784-oblongifolius.
Ellio[illegible] *ellipticus,* [illegible] eUfttica[illegible] f«[illegible] «[illegible] «[illegible] [illegible] ST[illegible] Eluteria, *Benn. in Journ* [illegible] (1860) 29.—Ins. Baham.
Elsteria, Sw. Prof. & Ind. Occ. 100 = glabellus.
Emeliae, Baill. [illegible] (1860-61) 166-bifurcatus.
emirnensis, Baker, in Journ. [illegible] xx. (1883) 252.—Madag.
eremophilus, Muell. Arg. i. [illegible] *Bras.* xi. II. 184.—Bras.
erianthus, [illegible] Cyclop, x. n. 21-laxifloras.
ericoideus, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 293.—Bras.
eriocladoides, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 228.—Bras.
eriocladus, [illegible] 222—Bras.
eriospermus, [illegible] Trigonia crotonoides.
erythrochilus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 93.—Peruv.
erythroxyloides, Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 297 = chloroleucus.
erythroxyloides, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 111—Brais.
essequiboeus[illegible]; Jtlotiwh, in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848) [illegible] = populifolius.
eutrigynus, *A. Gray, Man. Bot.* ed. V. 438.—Texas.

CROTON:—
exuberant, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. H. 85.—Bras,
fallax, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 187.—Braa.
farinosns, *Lam. Encyc.* ii. 211.—Madag.
fastuosus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 330.—Bras,
ferrnginellns *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 175.—Bras,
ferrnginens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 77.—Pcrav.
flabellifolius, Lodd. Cat. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. HI. 601 = hibiscifolius.
flavens, *Linn. PL Jam. Pugill.* 28; *Syst.* ed. X. 1276.—Am. austr.
flocculosus, Geisel. Crot. Monog. 14 - flavens.
rlocculosus, *Kurm, in Journ. As. Soc- Beng.* xlii. (1878) II. 242.—Burma.
floribundus, Lund, ex Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 139 = urticaefolius.
floribundus, *Spring. Syst.* iii. 873.—Bras.
foetens, Anders, in Trans. Soc. Arts, xxv. (1807) 202 = helicoideus.
fothergillaefolius, *BaiU. Adansonia, i.* (1860-61) 150.—Ins. Maurit.
fragilis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 76.—Am. trop.
fragilis, *Schlecht, in Linnaea,* xxvi. (1865) 688.—N. Granat.
fragrans, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 81.—N. Uranat.
Francarillanus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 111.—Cuba.
Francoanns, *Muell. Arg. I. c.* 124.—Mexic
Kraseri, *Muell. Arg. I. c.* 113.—Peruv.
Frieseanus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 643.—Am. austr.
Frionis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 176.—Bras.
fruticosus, Mill. Gard. Diet. td. VIII. n. 6 = lucidu8.
fruticulosus, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 194.—Texas,
fulvus, *Mart. Reise Bras. i.* 282.—Bras,
fulvus, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 212.—Cuba.
Funckianus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 846.—N. Granat.
furfuraceus, Pers. Syn. ii. 586 = xnmctatus.
fuscescens, Spreng. Syst. ii. 874 = Julocroton fusceseens.
fuscus, *Muell. Arg. in Linnoea,* xxxiv. (1865-86) 181.—Bras.
Galeottianus, BailL Etud. Gen. Enph. 855=nmnmulariaefolias.
Garckeanus, *Baill. Adansonia,* iv. (1883-64) 808.—Bras.
Gardneri, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 135.—Bras.
Gardnerianus, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 301.—Bras.
Gaudichaudi, *BaiU. 1. c.* 298.—Bras.
Gibsonianus, *Nimmo, in J. Grah. Cat. PI. Bomb.* 251.—Ind. or.
Gibsonii, J. Grab. 1. c. 132 = Rh«dei.
glabellus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8012-Dimorphocalyx glabellus.
glabellus. *Linn. Syst.* ed. X. 1276.—Am. trap,
glabrescens, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 882.—Java,
glandulatus, *Veil. Fl. Flum.* x. L 78.—Bras.
glanduli/ents, Vahl, in Geisel. Crot. Monog. 37 = luddus.
glandulosus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 754 — muricatus.
glandulosBS, *Linn. Syst.* ed. X. 1275.—Am. bor. et trap.
glandulosus, Veil. Fl. Flum. x. t. 78 = pungens.
Glaziovii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 94.—Bras,
glechomaefolius, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 126.—Bras.
glsbosus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 100-Mettenia globosa.
glutinosus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras* in. II. 200.—Bras.
glycosmeus, Muell. Arg. in Uunaea, xxxiv.. (1866-66) 140'grewioides.
glyptospermus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 117—Bras.
Gnaphalii, *Baill. Adansonia,* Iv. (1863-64) 859.—Bras,
gnaphaloides, *Sehrad. in Goett. Gel. Anm. i.* (1821) 708.—Bras.

CROTON:—
gnidiaccus, *Baill. Adansonia, iv.* (1868-64) 354.—Bras.
gonocladus, Mart, in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 119-compressus.
gossypiilbliuB, *Vahl, Symb. Bot.* iù 98.—Am. centr.
Goudotii, *Baill. Adansonia, i.* (1860-61) 167. t. 6.—Madag.
goyazensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 120.—Bras.
gracilescens, *Muell. Arg. I. c.* 110.—Bras,
gradlipes, *BaiU. Adansonia,* iv. (1863-64) 383.—Bras,
gracilis, *H. B. t* K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 69.—Mexic.
grandi/olius, Blanco, FL Filip. ed. I. 763 - Macaranga moluccana.
grandivelum, *BailL Adansonia,* iv. (1863 64) 822.—Bras*
grangerioides, *Boj. Hort. Maurit.* 281, nomen ; *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 149.—Ins. Maurit.
gratissimus, *Burch. Trav.* ii. 268.—Afr. austr.
grewiaefolius, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 87.—Mexic
grewioides, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 865.—Bras.
Grisebachiaiuis, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 484.—Jamaic
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 882.—Guian.
GuiMingii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 38.—Ins. S. Vincent.
gummiferus, A. Cunn. ex Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot iv. (1845) 473=Beilya gummifera.
guyanensis, Auct. vide guianensis.
Hadriani, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 313.—Bras.
Halecum, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 683-Claoxylon indicum.
Hancei) *Benth. Fl. Hongk.* 308.—Hongkong.
Hasskarlianus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 573.—Ins. Madura
hastatus, Burm. f. Fl. Ind. 806. t. 63. f. 1-Chrotophora plicata.
hastatus, Linn-. Sp. PI. 1006 —Tragia involucrata.
hecatonandrns, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi.* ii. 705.—Bras.
helichrysoideus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 123-seq.
Helicbrysum, *Baill. Adansonia,* iv. (1883-64) 368.—Bras,
helicoideus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 97.—Ins. S. Vincent.
keliotropiifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 88 = rhamnifolius.
hemiargyreus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 81.—Bras.
herbaceus, VelL Fl. Flum. x. t. 69 - glandulosuc
heterocalyx, *BailL Adansonia,* iv. (1868-64) 324—Bras,
heterocarpus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. ii. 621.—Sumatra,
heterochrous, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 121.—Am. oentr.
heterodoxus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 309.—Bras,
faeteronenms, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 114.—Reg. Argent.
heterophyllus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 88 = gossypiifolius.
heterotrichus, *Muell. Arg, in- DC. Prod.* xv. II. 620.—Ins. Fiji.
Hialmarsonii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ina*\. 40.—Ind. occ.
hibiscifolius, *Kuntk, ex Spreng. Syst.* iii. 876—N. Granat.
Hieronymi, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 54.—Reg* Argent.
hieronymoides, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 98=Sellowii.
Hilarii, *BaiU. Adansonia,* ivv (1868-64) 322—Bras.
Hillianus, *Veitch, in Andri, JUustr. Hortic.* xix. (1872) 826.—Ins. Pacif.
hitpophdeoides, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 212 - lineaiis.
hircinus, Vent. Jard. Malm. 50"=popnlifoliui.
hirsutus, Thou, ex Baill. Adansonia, i (1860-61) 167 — Thouarsianus.
hirsutus, Veil. Fl. Flum. x. t 66=Julocroton fus- CCBC&ISa
hirtus, L'Herit. Stirp. Nov. 17. t. 9 - glandulosus.
hispidus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 72-populifolius.

CKOTON:—
Hoffmanni, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. .(1865-66) 86.—Costa Rica.
Holtonis, *Uuell. Arg. I. c.* 116.—N. Granat.
homolepidus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 518.—Cuba.
Hookerianus, Baill. Etnd. Gén. Euph. 368 = lucidus.
horminoideus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128=seq.
Horminnm, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 815.—Bias.
homidvlw, Baill. Adansonia, iv. (1868-61) 320.—Bias.
Hostmanni, *Miq. ex Scklecht. in Linnaea,* xxi. (1818) 177.—Guiana,
humilis, *Linn. Syst.* ed. X. 1276; *Amoen. Acad.* v. 110, 1759.—Jamaica.
hypoleucus, Dalz. in Hook. Kew Journ. Bot. Ui. (1851) 12S = reticulart».
hypoleucus, *Sehleeht. in Linnaea,* xix. (1847) 246.—Mexic.
impetiginosus, Poepp. ex Baill. Adansonia, iv. (1868-61) 298 = matouiensis.
incanus, Andens. in Vet. Alcad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 248-Scouleri.
incanus, Blume, ex Baill. Etnd. Gén. Enph. 170, obs.-= Pretoria incana.
incanus, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 73.—Mexic.
incertus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. H. 177.—Bras.
incisus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 159.—Madag.
indivisus, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 68.—Bras.
Inophyllum, Font f. Prod. 67 = Codiaenm Inophyllum.
insularis, *Baill. Adansonia,* ii. (1861-62) 217.—N. Caled.
intercedens, *MuelU Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 168.—Bras.
intricata, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 109.—Cuba.
inversus, Baill. Adansonia, iv. (1863-61) 821 - piauhiensis.
irregularis, *Andrl, Illustr. Hortic.* xix. (1872) 185.—Polynes.
Isabelli, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-61) 318.—Bras.
Iserti, *Geisel. Crot. Monog.* 21.—Ins Martin.
Iserti, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 89 - Grisebacbianus.
itabirensis, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 296-ceanothifolius.
Itacolum, *Muell. Arg. in Mart. SI. Bras.* xi. II. 246.—Bras,
jacobinensis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 302.—Bras.
jacobinensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 91=echioides.
Jaegerianns, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 7.—Ind. occ.
Jamalgota, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc xiv. (1821) 258-C. Tiglium.
Jamesoni, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. H. 549.—Ecuador.'
japirensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 122=laurifolius.
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 270=Mallotus japonicus.
Jardini, Jtfitf//. *Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 119.—Ins. Martin.
Jatropha, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 667.—Bras,
jatrophaefolius, *Muell. Arg. I. c.* 600.—Java.
Jennyanus, *Gris, ex Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 160.—Madag.
Josephinus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 195.—Bras.
Joufra, *Roxb. Hort. Beng.* 101; *Fl. Ind.* iii. 685.—Ind. or.
Julopsidium, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-61) 318.—Bras.
junceus, *Baill. I. c.* 339.—Bras.
Kalkmanni, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 612.—Bras.
Klaenzei. *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras* xi. II. 202.—Bras.
Klotzschianus, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* 276.—Ind. or.
Klottschii, Baill. Adansonia, iv. (1863-61) 316 = glandulosns.
Klotzscbii, *Muell. Arg. in Linnaea,* xudv. (1865-66) 136.—Bras.
Korthalsii, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 527.—Borneo.
Kroneanus, *Miq. in Joum. Bot. Nierl.* L (1861) 97.—China.

CKOTON:—
lacciferus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 731 = Macaranga Tanarius.
lacciferus, Linn. Sp. PL 1005=aromaticus.
lacciferus, Wall. Cat. n. 7774 = Mallotus repandus.
lacerns, *Desf. Tabl.* ed. I. 206.—Hab. ?
lachnocarpns, *Benth. in Hoot. Kern Joum.* vi. (1851) 6.1—Hongkong,
lachnocladus, *Mart, ex Muell. Arg. in Mart.Fl. Bras.* xi. II. 258.—Brai.
lachnostacbys, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 868.—Am. austr.
lachnostephanus, Baill. 1. c. 857 = pycnocephalns.
laetifolius, Baill. 1. c. 321=campestris.
laetus, Wall. Cat. n. 7738 •= Coelodiscus lappaceus.
laevifolius, *Blume, Bijdr.* 608.—Ind. or.; Malaya,
laevigatus, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 97.—China.
laevigatus, Wall. Cat. n. 7749 = Actephila excelsa.
laevigatus, Wall. 1. c. 7785*>oblongifolius.
lagoënsis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 99.—Bras.
lanatus, Klotzsch, ex Baill. Etnd. Gén. Euph. 870 = lanuginosus.
lanatus, *Lam. Encyc.* ii. 211.—Bras.
lanatus, Lonr. Fl. Cochinch. ii. 581—lasianthus.
lanceolatus, Cav. Ic. vi. 88 = Argithamnia tricuspidata.
lanceolatus, Hornem. ex Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 148 = Caperonia heteropetala.
Langsdorffii, *Muell. Arg. in Mart.Fl. Bras.* xi. II. 183.—Bras,
lanuginosus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-61) 355.—Bras.
lanuginosus, Sebum, ex Schweinf. PL Nilot. 10 = Chrozophora plicata.
lapanus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 258.—Bras.
Lasegnei, *Muell. Arg. I. c.* 154.—Bras,
lasianthus, *Pers. Syn.* ii. 586.—Cochinch.
laurifolius, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 586 = laurinus.
laurifolius, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 13.—Malaya,
laurifolins, *Spach, ex Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 63.—Bras.
laurinus, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 100.—Jamaic
Lawianus, Nimmo, in J. Grab. Cat. Fl. Bomb. 251-Trigonoslemon Lawianus.
laxiflorus, *Geisel. Crot. Monog.* 44.—Cochinch.
Lechlcri, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 515.—Peruv.
leiocarpus, Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1855) 3 ; Linnaea, xxviii. (1856) 358 = lobatus.
leiopbyllus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 103.—Ins. Philipp.
leprosus,Spteag. ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 38=flavens.
leprosus, W'illd. Sp. PL iv. 558 = Bemardia leprosa.
leptobotryns, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 165.—Bras,
leptophyllus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 103.—Bras,
leptopus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 622.—Ins. Fiji,
leptostachyus, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 79.—N. Granat
leucadenius, Baill. Adansonia, iv. (1863-61) 338-fuscus.
leucocephalus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 131-heterodoxus.
leucophlebius, *Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 172.—Cuba,
leucophyllus,*Muell.Arg.in Linnaeu,xniv.* (1865-66) 139.—Mexic.
Liebmanni, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 666.—Mexic.
Lindenianus,/*. *Rich. Fl. Cub.Fanerog.* ii. 212.—Culm.
Lindheimeiianus, *Scheele, in Linnaea,* xxv. (1852) 580.—N. Mexic.
linearifolius, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* XL II. 112.—Bras.
linearis, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 32.—Ind. occ.
lobatus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 162 - Jatropha lobata.
lobatus, *Linn. Sp. PI.* 1005.—Am. trap.
lobatus, Veil. FL Flum. x. t. 70 = C. Jatropha.
longifolius, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 170.—Bras.
longifolius, Will. Cat n. 7717-Trigonostemon longifolios.

CKOTON:—
longinervius, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. H. 215.—Bras.
Lorentzii, *Muell. Arg. ex Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1871) 96.—Am. trap.
loucoubensis, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 165" adenophorus.
lucidus, *Linn. PL Jam. Pugill.* 28; *Syst.* ed. X. 1275—Ind. occ.
Lundianus, *Muell. Arg.in DC. Prod.*xv.II. 662.—Bras,
luridus, *Geisel. Crot. Monog.* 26.—Hab. I
luteo-brunneus, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 251.—Madag.
luzoniensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiy. (1865-66) 118—Ins. Philipp.
Macraei, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 188 =Scouleri.
macrobothrys, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-61) 832.—Bras.
macrocalyx, Ehrenb. ex Schweinf. PI. Nilot. 9 » Chrozophora Brocchiana.
macrocalyx, *Mart, ex Baill. Adansonia,* iv. (1868-61) 303.—Bras.
macrocarpus, Reichb. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 698 = Excoecaria sebifera.
macrodontus, *Muell. Arg.in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 128.-Mexic.
macrophyllus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 100 - Lasiocroton macrophyllus.
macrostachys, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii-251.—Abyss.
maculatus, *Vahl, in Geisel. Crot. Monog.* 80.—Java,
magdalenensis, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1861) lM—N. Granat.
malabaricus, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 204.—Ind. or.
malacophyllus, Benth. PL Hartw. 248 = leptostachyus.
malacotrichus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 101— lanuginosus.
Malambo, *Karst. I. c.* xxviii. (1856) 418.—Venezuela-
Mandonis, *Muell. Arg. I. c.* xxxiv. (1865-6(1) 85.—Bolivia.
Manihot, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 311 " lobatus.
marginatus, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, vi. 73 = Kicinocarpus marginatus.
maritimus, *Walt. Fl. Carol.* 289.—Texas.
Martii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 88.—Bras.
Massangeanum, Linden, ex Andre', in lllustr. Hortic-xxvi. (,1879) 77. t. S47 = Codiaeum variegatum.
matourensis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 879. t. 338.—Am. trop.
matronalis, Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 80S * vestitus.
mauritianus, *Lam. Encyc.* ii. 205.—Ins. Maurit.
mauriuanus, *Stadtm. ex Willem. in Usteri, Ann. Bot-*xviii. 56.—Maurit.
mauritianus, Thou, ex Baill. Adansonia, i. (1860-6U 150 = tiliaefolius.
medians, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 169-" Bras.
Medusae, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 580.—»*»•
megalobotrys, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1861) »*—Afr.trop.
megalocalyx, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* *••;•. 220.—Bras,
megalodendron, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) •—Venezuela,
megaponticus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* »• 211.—Bras.
Meissneri, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. ô*-" Mexic.
melanoleucus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* *>• 185.—Bras.
melanostictus, Boiv. ex Baill. Adansonia, i. (1860-285 - Stillingia melanosticta.
membranaceus, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1861) » —Air. trop.
menthodoms, *Benth. PI. Hartw.* 218.—N. Gran»t-,
metallicus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-» 103.—Ins. Fiji.
mexicanus, *Muell. Arg. 1. c.* 113.—Mexic.
micans, *Sn. Fl. Ind. Occ.* ii. 1185.—Jamaic.
micranthus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 92=C.Persicaria.
microcarpus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 112.—Bras.
microphyllus. Lam. Encyc. U.^12=Andracbne microphylU.

CROTON:—
mierostachys, *BaiU. Adansonia,* iv. (1863-64) 866.—Bras.
migrant, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* 88.—Bras.
Minarum, Mnell. Arg' in linnaea, xxxiv. (1865-66) I38«=ceanothifolius.
minutiflorus, Muell. Arg. 1. c. - Gandichaudji.
miradorensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 627.—Mexic.
Mollii, *Muell. Arg. in Flora,* lv. (1872) 6.—Ind. occ.
roollis, *Benth. in Hook. Km Journ.* vi. (1854) 375.—Bras.
"tollissimus, Geisel. Crot Monog. 78 = Mallotus ridnoides.
**>olli$_{ss}i_{muSt}$* Vahl, ex Geisel. 1. c. 66=lanatus.
moluccanus, Linn. Sp. PI. 1005 - Mallotus moluccanus.
moluccanus, Willd. Sp. PL iv. 651=Chrozophora plicata.
monanthogynus, *Michx. Ft. Bor. Am.* ii. 215.—Am. bor.
Mongue, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 168.—Madag.
nontanus, Geisel. Crot Monog. 23-corylifolius.
tontanus, Wall. Cat. n. 7828 - Coelodiscus montanns.
"ontanus, Willd. Sp. PI. iv. 545 = Mallotus philippinensis.
montevidensis, *Spreng. Syst.* iii. 873.—Reg. Argent.
Tfticola, Steud. Nom. ed. II. *I* 446=corylifolius.
Moonii, *Tin,. Enum. PI. Zeyl.* 276.—Zeylan.
monfolius, *Willd. Sp. PL* iv. 585.—Am. trop.
"oritOnuu, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 882= rhamnifolins.
Mubango, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 388.—Afr. trop.
**vcronatus,* Willd. Sp. PI. iv. 642 = flaven*
•"Mronifolini, *Muell. Arg. in Mart. Ft. Bras.* xi. II. *16.—Bras.
*mi*TM*<:ostatus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-«t) 79-,-Ins. S. Doming.
""Utglandulosus, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 105 = Mallotus moluccanus.
"Kltmpicatus, Veil. FL Flum. x. t. 75=urticaefolius.
*m**ncatus,* Blanco, FL Filip. ed. II. 518-C. Tiglium.
nuneatus, Boj. Hort. Maurit. 281=fothergillaefolius.
""tncatus, Heyne, in Wall. Cat. n. 7751-Mallotus •nnricatus.
""J?iff "*» Nutt_ in T TM » Am. Phil. Soc N. S. v. (1.887) 173=texensis.
"uricatus, *V$_a$hl, ,,, Geisel. Crot. Monog.* 47.—Madag.
""mcatus, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841)848, Maonwn—Ins. Timor.
uscuap^ *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 199. Mutu Bras. *H. B. & K. Nov. Gen_ et Sp.* ii. 8 .— . Gri ^ 7 N
myriadenus, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 130 = Garckeanus.
TMynanthus, *Muell. Arg. 1. c.* 188.—Bras.
myrinst Madag. *" Bah" '* Jmrn_ Bot_ X x. (1882) 268.—
t ifolius, *Griseb_ Goett_Nachr_*(1MB) m ba.
myriodonta, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 202.—Am.
Myrsinites, *Baiu Adansonia,* iv. (1868-64) 8O5.-Bras.
neo-mexica us, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. U88S-66) 141. N. Mexic.
nepetaefolius, *BaiUAdansonia,* iv. (1863-64)344.—Bras.
nervosus, Klotj Kh. in Hook. Lond. Jonm. Bot ii. (1848) 50 i micans.
^ Ca . Rich, ex A. Rich. Fl. Cob. Fanerog. ii. 218
nervosus, *Kottl_ m Ges_ N«'»rf- Fl_ Nene Sda_* (1803)
Neuwiedii, 190-Mallotns rhamuifolms.
divelum. ^ Ada0SODi»» iv- C1863-e4) 320-gran
Neuwiedii, *Muell. Arg. in Mart. Fl.Bras.* xi. II. 100.—Bras.
nigro-viridis, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 276.—Zeylan.
nil A cus, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 687.—
nitens, Sw. Prod. Vee. Ind. Occ. 100=glabellus.
nitidulus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 253.—Madag.
nitrariaefolius, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 361.—Bras.

CBOTON:—
niveus, Billb. ex Benrl. in Vet Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 146-glabeUus.
niveus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 40=helicoides.
niveus, *Jaeq. Enum. PL Carlo.* 82.—Venezuela,
nobilis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 148.—Madag.
Noronbae, *Baill. 1. c.* i. (1860-61) 162.—Madag.
Novi-Friburgi, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 97.—Bras?
nudatus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 168.—Madag.
nudus, Willd. ex Schlecht in Linnaea, vi. (1831) 359 = reftexifolius.
nummulariaefolius, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. Stll.—Cnba.
nummularius, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 860.—Bras.
nutana, *Forst.f. Prod.* 67 = Carumbium nutans.
obliqui/olius, Vis. PL Aegypt. ac Nnb. 89 - Chrozophora plicata.
obliquus, Vahl, Symb. Bot. i. 78 »Chrozopaora obliqua.
oblongifolius, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 7718 D = C. Joufra.
oblongifolius, Delile, Fl. Egypte, 283 = Chrozophora obUqua.
oblongifolius, *Roxb. Hort. Beng.* 69; *Fl. Ind.* iii. 685.—Ind. or.
oblongifolius, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 860=Chroiophora tinctoria.
oblongifolius, Wall. Cat. n. 7738-robustus?
oblongus, *Burnt, f. Fl. Ind.* 205 (err. typ. 806).—Malaya?
occidentalis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 159.—Bras.
odontadenius, *Muell. 1. e.* 227.—Bras.
odontopetalus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 7?-C. Myrsinites.
Oerstedianus, *Muell. Arg. I. c.* 105.—Am. centr.
oleoides, Muell. Arg. 1. c 82=cneorifolius.
oliganthns, *Muell. Arg. 1. c.* 106.—Bras,
olivaceus, *Muell. Arg. I. c.* 98.—Peruv.
opponens, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 125.—Austral.
opposiHfolius, Geisel. Crot Monog. 23-Mallotus oppositifolius.
orbicularis, *Thunb. Fl. Jav.* 23.—Java.
Orbignyanus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 123.—Reg. Argent
oreophilus, MuelL Arg. 1. c. 84 = celtidiibllus.
organensis, *BaiU. Adansonia,* iv. (1863-64) 825.—Bras.
origanifoliui, *Lam. Encyc.* ii. 205.—Ind. occ.
orinocensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bias.* xi. II. 135.—Venezuela,
ortholobus, *Muell. Arg. in Flora,* lv. (1872) 9.—Am. centr.
ovalifolius, *Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix,* 807.—Ins. St. Thorn.
ovatus, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 12-Mallotus tiliaefoUus.
oxypetalus, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 339.—Afr. trop.
oxyphyllus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 101.—Bras.
pachycalyx, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 109=sphaerogynus.
pachysepalus, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 159.—Cuba.
padifolius, GeiseL Crot. Monog. 18=flavens.
palanoitigma, *Klottsch,in Hook.Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 48.—Bras.
pollens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 100 - lucidus.
pallidulus, *BaiU. Adansonia,* iv. (1863-64) 298.—Bras,
pallidus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 614.—Ins. S. Doming.
palmatus, Cels, Nouv. Cat. 116, nomen=-lacerus.
Palmeri, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 162.—Am. bor. occ.
paludosus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1886-66) 188.—Bras.
palustris, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 71= Caperonia castaneaefolia.
palustris. Linn. Sp. PI. 1004 = Caperonia palustris.
palustris, Veil. Fl. Flum. x. t 67 = Vellozianus.
panamensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. H. 546.—Panama,
panduraeformis, *Muell. Arg. I. c.* 671.—Cuba.

CBOTOIT:—
paniculatus, Lam. Encyc. ii. 207"Mallotus cochin. chinensis.
paniculatns, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 87.—Bras.
pannosus, *Thunb. PL Bras. Dec.* ii. 24.—Bras,
paraënsis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 116.—Bras.
pardinus, *Muell. Arg. 1. c.* 217.—Bras,
parvifolius, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 687.—Bras,
parvulus, *MuelL Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 106.—Am. trop.
patulus, Lag. Gen. et Sp. Nov. 21 = Chrozophora verbascifolia.
pauciflorns. *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 348, nomen.—Hab.?
paucistamineus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. n. 188.—Bras.
paulinianus, *Muell. Arg. 1. c.* 112.—Bras,
paulinus, *MuelL Arg. 1. c.* 236.—Bras,
pauperulus, *Muell. Arg. in Flora,* xIviL (1864) 485.—(Mi.
Pavana, Bnch.-Ham. in "Trans. Linn. Soc. xiv. (1825. 269-C. Tiglinm.
Parana, Wall. Cat. n. 7722-praec.
Pavonis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 116.—Peruv.
Payerianus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 154.—Madag.
pedicellatus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 76.—N. Granat
pedunculatus, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 76.—Bras.
pedunculatus, Wall. Cat. n. 7767 - Phyllanthus longipes.
pellitus, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 73.—Pernv.
peltatus, *Thunb. FL Javan.* 23.—Java.
peltoideus, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 78 - ferruginens.
pertophorus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 154.—Bolivia.
penaeaceus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 852=.montevidensis.
pendulus, Hassk. PI. Jav. Rar. 266-Pancroton pendulus.
penicillatus, Vent. Cholx, 12=ci)iato.glandulosus.
penninervis, *Scheele, in Linnaea,* xvii. (1848) 843—Ins. Martin.
pentandrus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 97 - Claussenianus.
peraffinis, *Muell. Arg. in Mart. FL Bras.* xL II. 166.—Bras.
perdidpes, St. HiLPl. Us. Bras. t. 58=antisiphiliticus.
Perrottetianus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 67.—Afr. trop.
Persicaria, *Baill. 1. c.* iv. (1863-64) 842.—Bras.
persimilis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 116-C. Joursa.
pervestitus, *Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 172.—Cuba,
petraeus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 172—Bras.
phebalioides, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, vi. 125 = Insularis.
phebalioides, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 485.—Austral.
philippinensis, Lam. Encyc ii. 206 - Mallotus philip. pinensis.
phlomoides, Pers. Syn. ii. 585=C. Astroites.
phlomoides, Salzm.ex Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 369=Julocroton pycnophyllus.
piauhiensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 120.—Bras.
pictus, Lodd. Bot Cab. t. 870»Codiaeum variegatum.
pigmentarius, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 13 = Claoxylon indicum.
pilosus, *Spreng. Pugill.* ii. 87.—Ind. or.
pimeleus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 307.—Bras,
piptocalyx, *MuelL Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. H. 103.—Bras.
plagiographis, *Muell. Arg. 1. c.* 93.—Bras,
platanifolius, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 268.—Madag.
platycladus, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 123 - organensis.
plicatus, Vahl, Symb. Bot. i. 78 = Chrozophora plicata.
Plukenetii, Geisel. Crot. Monog. 40-maritimus.

CROTON:—
Pohlianus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1665-66) 92—horridnlus.
Polot, *Burnt, f. Fl. Ind.* 205 (err. typ. 305).—Malaya.
polyandrus, Roxb. Hort. Beng. 69 ; Fl. Ind. iii. 682 = Baliospennum axillare.
polyandrus, Sprang. Neue Entdeck. ii. 120»btasifiensis.
polycarpns, *Benth. PI. Hartw.* 249.—N. Granat
polycarpus, Wall. Cat. n. 7716=Chroiophora plicata.
polygamus, *Geisel. Crot. Mono p.* 24.—Hab. ?
polygamus, Jacq. Enum. PI. Carib. 12 = Argithamnia lancifolia.
polymorphus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 100 *m* nitrariaefolins.
polystachyus. Sprang. Syst, iii. 868=matonrensis.
Pomaderris, *Baill. in Adansonia,* iv. (1S6S-64) 811.—Bras,
populifolius, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 7; *Lam. Encyc.* ii, 205.—Am. trap.
Pottsii, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 661.—Mexic.
Pmrdiaei, Muell. Arg. vide Purdiaei.
praetervisus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xL II. 240.—Bras.
Pringlei, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1886) 378.—Am. bor. occ.
proenmbens, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 82.—N. Granat.
procumbens, Wright, ex Griseb. in Goett Nachr. (1865) 174 = cerinns.
prunifolius, Vahl, in Geisel. Crot Monog. 47 = Lasiooroton prunifolius.
Pseudo-China, Schlecht. in Linnaea, iv. (1830) 84 = niveus.
Pseudo Populus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 335.—Bras.
pubescens, *Ceisel. Crot. Monog.* 14.—Hab. 1
pulcbellus, *Baill. Adansonia, i.* (1860-61) 161.—Madag.
pulcher, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 644.—Mexic.
pulcherrimus, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 361=ciliato-glandulosus.
pulegiodorus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 361.—Bras,
pulegiodorus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 259.—Bras.
pulegioides;tlLnt\l. Arg. 1. c.» pulegiodorus, *Baill.*
punctatus, Anders, in Trans,. Sot Arts, xxv. (1807)-202 a*corylifolins.
punctatus, Jacq. Coll. i. 166=argyranthemus.
punctatus, *Lour. Fl. Cochinch.* 581.—Cochinch.
punctatus, Moon, Cat. Ceyl. PI. 65-Moonii.
punctatus, Retz. Obs. v. 30 = Mallotus philippiaensis.
punctatus, Rich, ex Baill. Adansonia,-!. (1860-61) 168 = squamigerus.
puncticulatus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 249.—Bras.
pungens, *Jacq. re. PI. Rar.* iii. 19. t. 622.—Bras.
Purdiaei, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 483.—(Pourdiaei) N. Granat.
pyenadenins, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 216.—Bras.
pyenanthus, *Benth. PI. Hartw.* 247.— Peruv.
pyenocarpus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 120=grandivelum.
pycnocephalus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 856.—Bras.
pycnophyllus,Sa.hm. ex Schlecht in Linnaea, xiz. (1847) 245=Jnlocroton pycnophyllum.
pyenotrichus, Muell. Arg. 1. c. xxxiv. (1865-66) 122 = Vautberianus.
pyrifolius, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 388.—Afr. trop.
quodripartitus, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 73. t 225 = Adriana quadripartita.
quadrisetosus, *Lam. Encyc.* ii. 208.—Peruv.
quitensis. Sprang. Syst. iii. 872=alnifolios.
racemosus, *Burnt./. Fl. Ind.* 206 (err. typ. 306).—Java,
ramiflorus, *J. Grarl. Cat. PI. Bomb.* 182.—Ind. or.
reflexifolius, *H. B, V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 68.—Mexic.
refractus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 189.—Bras.
Regelianus, *Muell. Arg. 1. c.* 133.—Bras.
Regnellianns, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 122.—Bras.
repandus, Rottl. in Ges. Natnrf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 206 = Mallotus repandus.

GROTON:—
repens, *Schlecht. in Linnaea,* xix. (1847) 237.—Mexic.
reticulatus, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 7724.—Ind. or.
reticulatus, *Thuni. Fl. Javan.* 28.—Java,
reticulatus, Willd. Sp. PI. iv. 545 - Mallotus rhamnifolius.
rhamnifoUus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 75.—Am. trop.
rhamnifoUus, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1808) 190 = MaUotus rhamnifoUus.
Rheedei, *J. Graft. Cat. PI. Bomb.* 182.—Ind. or.
rhexiaefolius, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 818.—Bras,
rhodostachyus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 108.—Ind. or.
rhombifolius, Willd. Sp. PI. iv. 555 = Mallotus repandus.
Sichardi, Willd. 1. c. 553 = Havens.
ricinoearpus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1427 = Leidesia Sonderiana.
ridnoides, Vets. Syn. ii. 686 = Mallotus rieinoides.
Siedelianus, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 104=buxifolins.
riparius H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 90=lobatus.
rivinaefolius, *H. B.* b* *K. 1. c.* 80.—N. Granat.
tfivularis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 112.—Afr. anstr.
robustus, *Kurt, in •Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 242.—Burma.
rosmarinifolius, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, vi. 78 = Ricinocarpus rosmarinifolius.
rosmarinifolius, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 355 •sBertya rosmarinifolia.
rosmarinifolius, Drumm. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 208 = Hippocrepandra ericoides.
rosmarinifolius, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 174.—Cuba.
rosmarinifolius, Salisb. Prod. 389=linearis.
rottleraefolia, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 827.—Bras.
Rottleri, Geisel. Crot Monog. 64 = Chrozophora plicata.
Rudolphianus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 654.—Bras.
rufescens, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 118 = cordiaefolins.
rufidulus; Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 347 = sclerocalyx.
rufo-argenteus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 135.—Bras.
Ruizianus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 89.—Peruv.
Sagraeamu, *Muell. Arg. in DC Prod.* xv. II. 617.—Cuba.
salicifolius, Geisel. Crot. Monog. 6 = Homonoia riparia.
saltensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxlv. (1879) 54.—Reg. Argent.
salutaris, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* 89.—Bras.
salviaefolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 74 = rhamnifolius.
salvifolius,W\\. Gard. Diet. ed. VHI. n. 10 = humilis.
Sampatik, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 94.—Peruv.
sanguifluus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 89 = gossypiifolius.
Sanguis-draconis, Mart, ex Baill. in Adansonia, iv. (1863-64) S27=celtidifolius.
santolinus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 859.—Am. austr.
sapiifolius, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 187.—Bras,
sarcocarpus, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 94.—Ins. Socotr.
sarcopetalus, *MuelL Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 201.—Am. trop.
saxosus, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 119—corchoropsis.
scaber, *Willd. Sp. PI.* iv. 550.—Peiuv.
scaberrimus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 125.—Cuba.
tcabiosus, *Bedd. Fl. Sylv.* ii. t. 283.—Ind. or.
scandens, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 109 = Fragia volubilis.
scandens. *Veil. Ft. Flunt.* x. t. 72 = Plukenetia tamnoides.
Schiedeanus, *Schlecht. in Linnaea,* xix. (1847) 243.—Mexic.
Schimperianus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 82.—Abyss.

CBOTON:—
Schultesii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 193.-Bras.
Schultzii, *Benth. Fl. Austral,* vi. 124.—Austral,
sclerocalyx, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 184.—Am. trop.
scordioidis. Lam. Encyc. ii. 215 =glandulosus.
Scouleri, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1857) 188—Ins. Galapag.
sebiferus, Linn. Sp. PI. 1004 =Sapram sebifernm.
Sellowii, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 304.—Bras,
seminudus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 629.—Bras.
semivestitus, *Muell. Arg. 1. c.* 628.—Bias.
senegalensis. Lam. Encyc. ii. 212 = Chrozophora seuegalensis.
sericeus, Lam. 1. c 210 = matourensis.
sericeus, Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 85-fragilis.
serpyllifolius, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 355.—Bras.
serpyllifolius, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 596 " seq.
serpylloides, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii-(1861) 159=nummulariaefolius.
serratifolius, *BailL Adansonia,* iv. (1863-64) 312.—Bras.
serratus, Hochst. ex Baill. 1. c. i. (1860-61) 66°* Caperonia senata.
serratus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 647.—Bras.
sessiliflorus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 100=Savi» sessiliflora.
setigerus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 141 = Eremocarpo' setigerus.
shepherdiaefolius, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 7[2,J] = hypoleucus.
sidaefolius, *Lam. Encyc.* ii. 204.—Ins. S. Doming,
siderophyllus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 306.—Bras.
similis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 184" Ljundifuitis.
sincorensis, *Mart, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras-*xi. II. 86.—Bras.
Siraki, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 86-Excoecaria japonica.
Sloanei, Benn. in Joum. Linn. Soc. iv. (1860) 30 •= glabellus.
socotranus, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (18»[4ak]95.—Ins. Socotr.
solanifolius, Geisel. Crot. Monog. 74 = Baliospennum axillare.
Soliman, *Cham,* to* *Schlecht. in Linnaea,* vi. (18SU 361.—Mexic.
Sonderianus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 657-" Bras.
Sonorae, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 194.—N. Mexic
soratensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 115.—Bolivia.
sordidus, *Benth. PI. Hartw.* 247.—N. Granat
speciosus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-6«J 83.—N. Granat.
sphaerocarpus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii, 105=morifolius.
sphaerogynus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 326.-" Bras.
Spica, *Baill. 1. c.* 362.— Bras.
spicatus, Berg, in Phil. Trans, lviii. (1768) 182- «• ldcd us.
spicatus, St. Lag. in Ann. Soc Bot Lyon, vii. (1880) 128 = C. Spica.
spiciflorus, *Thunb. Fl. Javan.* 28.—Java.
spinosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 163=J»[tr0]P[Dhs] spinosa.
spinosus, Linn. Sp. PI. 1005 = Ricinus commnnif.
spinosus, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 127.—Cuba.
spiralis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-W 125.-Cuba.
splendidus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 29* migrans.
Spruceanus, *Benth. in Hook. Kew Journ.* »i. 376.-Bras.
squamigerus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) I[68], Madag.
squamulosus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* »• 244.—Bras.
squamulosus, Vahl, in Geisel. Crot. Monog- glabellus.
staminosus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 83.—Bras.

CROTON :—

stenandrus, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) B4=vnlnerarius.

stenophyii$_{us}$, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 158—Cuba.

stenosepalns.^ari/. *Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 114—Perav.

stenotrichus, *Muell. Arg. I. c.* 105.—Bias.

"tgmatosus, F. Muell. Fragm. iv. 140=phebalioides.

stipnlacens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 85.—Mexic.

ыipnlatns, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 77.—Bras.

Moechadis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 814.—uras.

Stordii, Seem. Viti, 441 = Verreauxii.

stic[illegible] *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 28.—Ins. S. Doming.

styloans, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 128.—Mexic.

snaveolens, *Torr. Bat. Mex. Bound.* 194.—N. Mexic.

snavu, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 76.—N. Granat.

"ubacutus, *Muell. Arg. in Mart. Ft. Bras.* xi. II. 167.—was.

•"bagrarius, *Muell. Arg. I. e.* 174.—Bras.

**bcapitatus,* Mnell. Arg. in Buek, Ind. ad DC. Prod. iv. p. v=humilis.

subcomosus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 284.—Bras,

snbcompressns, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 557.

subcr Am. austr.

[illegible]

subferrugineus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 185.-Bras.

subfragilis, *Muell. Arg. 1. c.* 111.—Mexic.

subincanus[illegible] *S-1- c*-189.—Guiana.

sub[illegible] *Mart. Fl. Bras.* xi. II. «»0.—Bras.

»«blucid$_{nS}$(*Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) ;8.—Ins. S. Doming.

[illegible] *uteus,* Lam. Encyc. ii. 210 = guianensis.

[illegible] Andam.

[illegible] annosus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 96. -J*6- Argent.

[illegible] s, Linn. Syst. ed. X. 1276 = humilis.

[illegible] *M, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 168.—ias.

succiruber, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* xi. (1881) 55.—Reg. Argent.

sulcifructus, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. [illegible]94.-lis/socotr.

sumatran[illegible] *Bat.* i. II. 881.—Sumatra.

sori,same[illegible] *Linnaea,* xxxiv. (1865-66)

sy.vatt[illegible] *in moTa xxyiil* (1845) [illegible]

[illegible] Schlecht. in [illegible] xix. (1847) 240 = reflexifolius.

[illegible] PP- ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865)

[illegible] d'iellasylvestris.

[illegible] H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 87-

tabacifolius, *Muell. Arg. in Mart. M. Bras.* xi. II. «UD.—Bras.

[illegible] Pptensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 114 —fnv.

[illegible] *Bras.* 129.—Bras.

tejucensis, *Muell. A* 176.—Bras.

tenellus, *Mell. A* 2«.-Bras.

tenuis, *S. W* (1879) 297.—Calif.

tenuissimus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 295.—Bras.

terminalis, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 78.—Bra*.

tetradenius, *Baal. Adansonia,* iv. (1868-64) 348.—Bras.

Teucridium, *Baill. l. c.* 349.—Bras.

texensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 692.—Texas.

the[illegible] *Hort. Sydn. ex Bonn.* Cat. [illegible] *Bog.* 392. nomen.-Hab.f

thermarum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 151.—Bras.

Thouarsianus, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 167.—Madag.

CBOTON:-

thurifer, *H. B. V K. Nms. Gen. et Sp.* ii. 76.—Bras.

Thwaitesianus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 116-Klotzschianus.

thymelinus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 352.—Bras.

tiglioides, Blume, Bijdr. 602=lacyifolius.

Tiglinm, *Linn. Sp. PI.* 1004.—Ind. or.; Malaya,

tiliaefolius, *Lam. Encyc.* ii. 206.—Ins. Manrit.

tiliaefolius, Pers. Syn. ii. 585 = populifolins.

tiliaefolius, Thou, ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 150 = fothergillaefolius.

Timandra, Baill. 1. c. iv. (1863-64) 351 = serratus.

timandroides, *MueU. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 132.—Bras.

tinctorius, Bnrm. f. Fl. Ind. 804. t. 62=Chrozophora plica ta.

tinctorius, Linn. Sp. PI. 1004-Cbrozophora tinctoria.

tomentellus, *F. Muell. Fragm.* iv. 141.—Austral.

tomentosus, Hort Par. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 406=dioicus.

tomentosus, Link, 1. c. = flavens.

tomentosus, MueU. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 107=crassifolius.

tomentosus, Pav. ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 347 •= Baillonianus.

Torreyanus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 579.—N. Mexic.

tragifolius, Baill. Adansonia, vi. (1865) 16=glechomaefolins.

triacros, *F. Muell. Fragm.* vi. 185.—Anstral.

triangnlaris, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 128.—Bras.

trichocarpus, Torr. Bot. Mex. Bound. 196 - Cortesianns.

trichocephalusMwiW. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1885-66) 102 = pycnocephalus.

trichophorus, Muell. Arg. 1. c. 182=vestihis.

tridiotomus, *Geisel. Crot- Monog.* 50.—Madag.

tricolor, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 291=argyrophylloides.

tricolor, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 96.—Bras.

tricuspidatus, Lam. Encyc. ii. 212 = Argithamnia tricuspidau.

tridentatus, *Mart, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 219.—Bras.

Tridesma, Leand. ex Baill. Adan*>nia, iv. (1863-64) 367=Julocroton fuscescens.

triglandulatns, *Veil. Ft. Flum.* x. t. 79.—Bras,

trigonocarpus, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 173.—Cuba.

trilobatus, *Forsi. Ft. Aegypt. Arab.* 163.—Arab.

trilobatus, Willd. Sp. PI. iv. 556=lobatns.

triqueter, Lam. Encyc. ii. 215=Julocroton triqneter.

tristis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 140 • pulegioides.

tuberculatus, Bunge, in M^m. Sav. Etr. Petersb. ii. (1885) 134 - Argithamnia tnberculata.

tocumanensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 96.—Reg. Argent

Tulasnei, *Baill. Adansonia, i.* (1860-61) 156.—Madag.

umbellatus, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 231 = Blachia denudata.

umbellatus, Heyne, in Wall. Cat. n. 7768 = Klotzschianus.

umbellatus, Wight, Ic. 1.1874 «= Blachia calycina.

umbellatus, Willd. Sp. PI. iv. 545 = Blachia umbellata.

umbratilis, *H. B. bf K. Nm. Gen. et Sp.* ii. 82.—Venezuela.

umbrinus, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 86 sheterocalyx.

undulatus, *Andre", in Illustr. Hortic.* xix. (1872) 265.—Ins. Salomon.

wceolatus, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 299 = salntaris.

urens, Linn. Sp. PI. 1005=Tragia involacrata.

urophylla, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 167, nomen.—Ind. or.

nrticaefolius, *Lam. Encyc.* ii. 219.—Bras.

urticoides, A. Cunn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 447 = Adriana glabrata.

urucurana, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 836.—Bras.

unignayensis, *Baill. 1. c.* 292.—Uruguay,

vaccinioides, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 211.—Cuba.

CROTOXT .—

Vahlii, *Geisel. Crot. Monog.* 41.—Hab.J

Vaillanti, *Geisel. 1. c.* 10.—Ind. oca

variegatus, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 751.—Ins. Philipp.

variegatus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 168=Jatropha variegata.

variegatus, Linn. Sp. PI. 1199=Codiaeum variegatum.

Vauthieri, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 93=macrobothrys.

Vauthierianus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 317.—Bras.

Veitchianus, *Andri, Illustr. Hortic.* xix. (1872) 135.—Ins. Pacif.

Velame, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 181.—Bras.

velleriflorus, Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 353 = nitrariaefolius.

Vellozianus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 553.—Bras.

velutinus, *Baill. Adansonia,* iv. (1868-64) 825.—Bras.

venosus, Geisel. Crot. Monog. 42 = Lcptonema venosum.

venosus, Spreng. Neue Entdeck. iii. 24= *C. Astroites.*

vepretorum, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 172.—Bras.

verbascifolius, Willd. Sp. PI. iv. 589=Chrozophora verbascifolia.

verbenaefolins, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 140.—Bras.

Verreauxii, *Baill. Etud. Gen. Euph.* 357.—Austral,

versicolor, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 630.—Bras.

vestitus, *Spreng. Syst.* iii. 875.—Bras.

villosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 163 - Jatropha villosa.

villosus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 169.—Bras.

villosus, Sibtb. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 249; Fl. Graec. t. 951 = Chrorophora verbascifolia.

viminalis, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 158.—Cuba,

virens, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 142.—N. Mexic.

virgnltosus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 104.—Bras.

Virletianus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 183.—Mexic.

viscosus, LabilLNov. Hall. Pl.ii. 72. t. 222 = Beyeria viscosa.

volubilis, Llanos, in Mem. Acad. Cienc Madr. iv. (1856) 603 = Mallotns repandus.

•*vulnetanus,Baill. Adansonia,iv.* (1863-64) 328.—Bras.

Wagneri, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 6.—Ecuador.

Wallichii, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 118.—Burma.

Warmingii, *Muell. Arg. in Mart. Ft. Bras.* xi. II. 106.—Bras.

Welwitschianus, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 338.—Afr. trop.

Widgrenianus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 104.—Bras.

Wilsonii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 40.—Cuba.

Wrightii, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 160 = Leucocroton Wrightii.

Wullschlaegelianus, *Muell. Arg. in Flora,* Iv. (1872) 10.—Ind. occ.

xalapensis, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 188=Sconleri.

xalapensis, *H. B. VK. Nov. Gen. et Sp.* ii. 85.—Mexic.

ypanemensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 165.—Bras.

yunguensls,Gnieft. *in Goett. Nachr.* (1865) 171.—Cnba.

zambesicus, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (,1864) 468.—Afr. trop.

teylanicus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 107=reticularos.

Zollingeri, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 881-argyratus.

CROTONANTHUS, Klotzsch, ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1858-56) 634 = Croton, Linn. (Euphorb.).

padifolius, Klotzsch, 1. c. = Croton rhamnifolius.

pradifolius, MueU. Arg. in DC. Prod. xv. II. 635, tphalm.=praec

CBOTONOCrYTTE, Mnell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) 635. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 306.

Manniana, *Muell. Arg. I. c.*—Afr. trop.

CBOTONOP8IS, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 185. t 46 (1603). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 296.
FRIESIA, Spreng. Anleit. ii. II. 885 (1818).
LKPTEMON, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) S52.
abnormis, BailL Etud. Gén. Euph. 381=linearis.
mrgentea, Pnrsh, Fl. Am. Sept. i. 206=linearis.
elliptica, Willd. Sp. Fl. iv. 880=linearis.
Iinearis, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 185. t. 46.—Am. bor.

CROTULARIA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Gen. ii. (1787) 844 = Crotalaria, Linn. (Legum.).

CROTULARIUS, Medic, in Vorles. Churpf. Phys Gen. ii. (1787) 897=praec.

CROUM, Gled. ' Berl. v. (1749) 127,' sphalm. ex Pfeiff. Norn. i. 1253=Ervùm, Tourn. (Legum.).

CBOWEA, Sm. in Trans. Linn. Soc iv. 222 (1798). *RUTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 298.
angustifolia, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 13.—Austral,
dentata, *X. B'r. ex Benth. Fl. Austral,* i. 330.—Austral,
exalata, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 11.—Austral.
latifolia, Lodd. in G. Don, Gen. Syst. i. 792 = saligna.
saligna, *Andr. Bot. Rep.* t. 79.—Austral.
scabra, R. Grah. in Edifib. Phil. Journ. (1827) 174 = Eriostemon salicifolius.

CROZOPHORA, A. Juss. Tent. Euphorb. 27 (1824) = Chrozophora, Neck. (Euphorb.).

CROZOPHYLA, Rafin. Sylva Tellur. 64 (18S8) = Codiaeum, A. Juss. (Euphorb.).
angustifolia, Rafin. 1. c.—Hab. 1
elliptica, Rafin. 1. c—Hab. ?
picta, Rafin. 1. c—Codiaeum variegatum.
variegata, Rafin. 1. c. = Codiaeum variegatum.

CRUCIANELLA, Linn. Syst. ed. I (1735). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 150.
LAXMANNIA, S. G. Gmel. ex Trin. in Mem. Acad. PAersb. vi. (1818) 492. t. 11.
RUBEOLA, Toum. ex Adans. Fam. it 144 (1763).
aegyptiaca, *Linn, itant.* i. 38.—Aegypt.
americana, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.—Mexic.
angustifolia, Koch, ex Nym. Consp. 335=latifolia.
angustifolia, *Linn. Sp. PL* 109.—Europ.; As. Min.
anomala, Balb. ex DC. Prod. iv. 587=molluginoides.
aspera, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 107=Asperula aspera.'
bithynica, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 58= graeca.
bracteata, Boiss. 1. c. Ser. I. iii. 29=Asperula glomerata.
capitata, Labill. PI. S>T. Dec. i. 12. t. 3=Asperula glomerata.
Morantka, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 8=seq.
chlorostachys, *Fisch. V Mey. 1. c.* 25.—As. Min.; Persia.
ciliata, *Urn. Encye.* ii. 217.—Syria; Arab.
eonfinis, Jord. ex Nym. Consp. 335=angustifolia.
Decaisnei, Steud. Norn. ed. II. i. 448=ciliata.
decumbens, Adam, ex Ledeb. Fl.'4toss. ii. 404 = Asperula aspera.
diffusa, Roth, in Usteri, Ann. Bot. x. (1794) 40 = ciliata.
disticha, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 25.—As. Min.
exasperata, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 8.—As. Min.; Persia.
fibrosa, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 29-Asperula glomerata.
filifolia, *Regel If Sehmalk. Fl. Turkest.* iii. 18.—Turkestan.
fimbriata, Boiss. Fl. Orient, iii. 20-macrostachya.
galioides, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 29 = Asperula aspera.
gilanica, Trin. in Mem. Acad. Petersb. vi. (1818) 4113 = glanca.
glauca, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 131.—Persia.
glomerata, Bieb. FL Taur. Cauc. i. 107 = Asperula glomerata.
graeca, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 25.—Graecia.
herbacea, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 80.—Aegypt.
hirta, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 74.—Afr. bor.

CBTJCIAMEIiIiA:
hispida, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 - Crusea rubra.
hispidula, Decne. in Ann. Sc. Nat Sér. II. ii. (1834) 269 - ciliata.
hispidula, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 25—exasperata.
imbricata, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 59.—As. Min.
insignia, *Vatke, in Linnaea,* xxxviii. (1874) 714.—Kurdistan.
Kotschyana, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. iii. 28 = Asperula Kotschyana.
latifolia, *Linn. Sp. PL* 109.—Enrop.; As. Min.
macrostachya, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 27.—As. Min.
maritima, *Linn. Sp. PL* 109.—Reg. Mediterr.
membranacea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 27—Arab.
molluginoides, Bieb. Cent. ii. L 65 = Asperula molluginoides.
monspeliaca. Linn. Sp. PI. 109-latifolia.
monspeliaca,Sibth.ScSm. Fl. Graec. ii. 31.1.140=graeca.
monspeliensis, Hill, Veg. Syst. vii. 38 = latifolia.
mucronata, Roth, in Usteri, Ann. Bot. x. (1794) 41 = angustifolia.
orientalis, Willd. ex Schult. Mant. iii. 215=glauca.
oxyloba, Janka, ex Nym. Consp. 335 = angustifolia.
patula, *Linn. Amoen. Acad.* iii. 401.—Hispan.
penicillata, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 26 = macrostachya.
pentandra, Dufour, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. 2,215 =patula.
pentandra, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 404 - molluginoides.
prostrata, Adams, in Weber *Sc* Mohr, Beitr. i. 46 = Asperula aspera.
pubescens, Willd. Sp. PI. i. 602 = Asperula incana.
purpurea, [Honck.] Verz. Gew. Teutschl. 431 = Galium purpureum.
purpurea, Wulff. ex Steud. Norn. ed. II. i. 448 = Galium Aparine.
rigida, Tausch, in Flora, xviii. (1835) 359=Asperula rigida.
rupestris, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 44=maritima.
sherardioides, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 24=Aspemla sherardioides.
spicata. Lam. Fl. Fr. iii. 372=angustifolia, latifolia.
stylosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. vi. (1818) 485 = Asperula ciliata.
suaveolens, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 32.—Persia.
suffruticosa, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 404 = Asperula glomerata.
suffulta, *Woods, Tour. Fl.* 168.—Gallia.
syriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 58 =macrostachya.
Tournefortii, Tausch, in Flora, xviii. (1836) 359 = Asperula Toumefortii.
tuberculosa, Cav. Desc. 349=ciliata.
vulgaris, Gater. ex Steud. Norn. ed. II. i. 448 = latifolia.

CRUCIATA, Gilib. Fl. Lituaa. i. 36 (1781) - Gentiana, Toum.
verticillata, Gilib. 1. c.=G. Cruciata.

CRUCIATA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 144 (1763) = Galium, Linn. (Rubiac).
ciliata, Opiz, Scznam, 34 = G. anisophyllum.
kirsuta, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N.S. xvi. (1868) 896 = G. Cruciata.
laevipes, Opiz, Scznam, 84 = G. Cruciata.

CRUCIELLA, Leschen. ex DC. Prod. ii. 74 (1880) = XanthoBia, Rudge (Umbellif.).
Candida, Leschen. I. c. 75 = X. rotundifolia.

CRUCITA, Linn. Sp. PL ed. II. 179 (1762) - Iresine, Linn. (Amarant.).
americana, Lam. Encyc. ii. 218 (Cruzita) -1 . celosioides!
hispanica, Linn. Sp. PI. ed. II. 179 = *americana.*
hispanico-americana, Roem. & Schult. Syst. iv. 484 •= *americana.*

CRUCIUNDULA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 100 (1836) = Xfocoaea, Moench (Crucif.).
minima, Rafin. 1. c. = N. stylosa.

CRUCKSHANKSIA, Hook. Bot. Misc. ii. 211. t. 90 (1831) - Balbisia, Cav. (Geraniac).
cistiflora. Hook. 1. c. = B. verticillata.
peduncular is, Steud. Norn. ed. II. i. 448 = B. verticillata.

CBUCKSHANKSIA, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 361. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 97.
ROTHERIA, Meyen, Reise, i. 402 (1834).
Bustillosii, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 696.- Chili.
capitata, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 731.—Chili.
chrysantha, *Phil. 1. c.* 730—Chili,
densifolia, *Phil. I. c*—Chili.
glacialis, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 31. t. 286 =Oreopolus citrinus.
hymenodon, *Hoot.* b" *Arn. in Hoot. Bot. Misc.* (1888) 361.—Chili,
macrantha, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 97—Chili,
montana, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 195. t. 33. 1.—Chili.
Monttiana, *Clos, I. c*—Chili.
Palma, *Clos, 1. c.* 194.—Chili,
pumila, *Clos, I. c.* 196. t. 33. f. 2.—Chili,
tripartite, *Phil. Fl. Atac.* 26.—Chili.

CRUCKSHANKSIA, Miers, Trav. ji. 529 (1826) - Solenomelus, Miers (irid.).
graminea, Miers, 1. c. = S. chilensis.

CBTTDIA, Schreb. Gen.^82 (1789). *LEGUMINOSAB* Benth. & Hook. f. i. 584.
APALATOA, Aubl. PI. Gui. 382 (1775) (& t. 1<> OPALATOA).
CYCLAS, Schreb. Gen. 282 (1789).
PRYONA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.1081 (1855).
TOUCHIROA, Aubl. PI. Gui. 884.1.148 (1775).
WALDSCHMIDTIA, Scop. Introd. 100 (1777).
acumiuata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 89.—A" centr.
amazonica, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras-* II. 238.—Bras.
Apalatoa, *Steud. Norn.* ed. II. i. 110.—Guiana,
aromatica, *Willd. Sp. PL* ii. 540.—Guiana.
Blancoi, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 809.—Ins. Philipp.
bracteata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) —Guiana,
falcata, *Klotasck, inSchomb. Faun.et Fl. Gui.* Guiana,
hirtelloides, *Miq. ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* 288.—Guiana.
obliqua, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 216.—Cuba,
oblonga, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 89.—Ind. occ.
oblonga, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 216 = obliqua.
orientalis, *Hasst. Cat. PL Hort. Bog. Alt.* Java.
Parivoa, *DC. Prod.* ii. 520.—Guiana.
pubescens, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* 240.—Bras.
Schrebcri, *J. F. Gmel. Syst.* 674.—Guiana.
senegalensis, *Planch, ex Benth. in Trans. Linn.* xxv. (1866) 314.—Afr. trop.
spicata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 261 •= Blancoi.
spicata, Willd. Sp. PI. ii. 539 = Schreberi.
Vouarana, DC. Prod. ii. 520 = Cupania Vouarana.
zeylanica, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866;» —Zeylan.

CRUDYA, Batsch, Tab. 98 (1808); DC. Prod. (1825)-praec

CRUIKSHANKSIA. Benth. & Hook. f. Gen. i. =Balbisia, Cav. (Geran.).

CRUIKSHANKSIA, Reichb. Consp. 212' Solenomelus, Miers (Irid.).

CBTJMENABIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. j. 160 (1826). *RHAMNEAE,* Benth. *Sc* Hoo*- 885.
choretroides, *Mart, ex Reiss. in Mart. FL Bras-* 114.—Bras.
decumbens, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 89- ras.
erecta, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 114.—Bras.
polygaloides, *Reiss. 1. c.* 113.—Bras.

CRUMINIUM, Desv. in Ann. Sc. Nat Sér. I. 423=Centrosema, DC. (Legumin.).
giganteum, Desv. 1. c. =Cent. Plumieri.

CE P ?INA DHL ex Linn. Syst ed. I (1735); CMS. in "»«• Sc. Nat. xii. 67 (1818). *COMPOSITAE*, Benth. * Hook, t U. 476.
al If^f"' Arv«—*Cf.* Bull. SOC Bot Fr. xxvi. (1879)
brack ypβpa, J or d. & FOOT. Brev. PI. Nor. fesc. ii. 84
Cra vulgaris.
C *, Vis. Fl*
intermed ia, Walp „ Ann. '• *47=Centaurea intermedia, Mutel.
Morisii, Boreau, Fl. Centr. Fr. ed. II. 292 = C. Cropinastrum.
Pandfloia, *Hoffmgg.* 6" £,«*, *Fl. Part.* U. 241.—Lnsitan.
pas ?? Kar - * Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc xv. (—4.) 39 = tu g 15.
pseudo-crup ina, Wal P- Ann- L «7-Centaureapseudocrupina.
vulgaris, c « «. Arf. *Sc Nat.* xii. 68.—Reg. Mediterr. j As. occ.
Zuccarini" Bnnge, ex Nym. Consp. 488 - C. Cropinastrum.

CRUPINASTRUM, Schur, in Ber. ^• Rnndl)Cn• (1868) 37 • Enum. Pl. Transs. 411 = Serratula, Linn.
centaureum, Schnr, 1. & = S. coronata.

R
^EA. Cham, ex DC. Prod. iv. 871 (18S0)=Mitra- "" Wun, Zncc. (Rubiac.).

RUS Hv Cham> * Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 165.
acum • RUBI^CEAE, Benth. & Hook. f. ii. 143.
nat i*ia. j E M ey. Zwd M- D0"™- W«=Hedyotis
allococca, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 78. —Texas.
aspera, *Bartl.* »'* Imnwo, xiv. (1840) *Lift.* 124.—Mexic.
brachyphylla, *Cham. & Schlecht. in Unnaea.v.* (1830) 165.—Mexic.
calocephala, *DC. Prod.* iv. 567.—Mexic.
coccinea, *DC. l. c.*—Mexic.
glaucescens, E. Mey. ex Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 22 = Pentanisia variabilis.
hispidul «. Hemsl. KoL Centr. Am. Bot. ii. 57 - Mpera.
lanceol ta, £ NU? - ent Mey- ex Hochst. in Flora, xxvi. (1848) " ^ ^ Jpi l is.
longibractea *Vidensk. Med*
lucida, 1?• (A 8M) ^-Nicaragua.
parvifo.^"f*- **• ^ -S^i**. 109.—Mexic
pok. & Arn. Bot. Beech. Mexic. * Kay. 430. t. 99.-
rubra, *Bartl.* '" *Knnaea*, xiv. (1840) £i«. 125.—Mexic.
rubra, Cham. * Schlecht. in Linnaea, v. (1880) 165, excl. syn. = ^P a.
subalata, *Hous. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 481.—Mexic.
subulata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 78. —Mexic.
subulata, Walp. Rep. ii. 467, sphalm.-snbalata.
variabilis, E. Mey. ex Harv- "» Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 22 = Pentanisia variabilia.
violacea, *Brongn.* ex *Neumann, in Rev. Hortic.* Ser. II. iv. (1845-46) 36 8 i »• (1846) 61.-Mexic.
Wrightii, *A. Gray. PI. Wright*, ii. 68.-N. Mexic.

CRUSEA, Rich- ia Mem. Soc. Hist. Nat Par. v. (1830) 2n;
glabra, A R \^ 9 * fl i-CMon*. DC. (Rubiac.).
nitida, A. Rich. l. c. t. c. = Chi0I « *el*** -

CRUZEA, A Rich F1- Cnb- Fane" «- "• 22« m 'J"4 (1858) = c k u w;

CRUZET CRuSEA,A.Rich.«Chione,DC.(Rnbiac.>. Ireni A' T oea
americana, r ing Iter> 20S (1758)=CRUCITA, Linn. = *celosioides* f (Amarant-)- Prod. xiii. II. 349 = I. ica Loefl. Iter, 208 = *americana*.

CR ^ A ; Unn. ti?? - ^s*- rf. XII. 129 (1770) = CRUCITA, I M B i, n e W (mstant.

CRYBE, Lindl. Introd. Nat Syst. ed. II. 446 (1836) = Arethusa, Linn. (Orchid.).
rosea, Lindl. l. c. = A. rosea.

CRYOSOPHILA, Blume, Rnmphia, ii. 58, in note (1836) = Copernioia, Mart. (Palm.).
nana, Blume, L c.—Cop. nona.

CRYPHAEA, Bnch.-Ham. in Brewst. Edinb. Joum. Sc. ii. (1825) 11-ChloranthuB, Sw.
erecta, Bnch.-Ham. 1. c=»Chloranthus offidnalis.

CRYPHIA, R. Br. Prod. 608 (1810)=.ProBtanthera, LabiU. (Labiat.).
microphylla, R. Br. 1. c = P. microphylla.
serpyllifolia, R. Br. L c - P. microphylla.

CRYPHIACANTHUS, Nees, in Del. Sem. Hort. Vrat (1841) ; et in Linnaea, xvi. (1842) 298=Buellia, Linn. (Acanthac).
ofaufe,-Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 49.—Bras.
angustifolius, Nees, in DC. Prod. xi. 199 > R. TweetUana.
australis, Nees, 1. c. 198 = R. anstralis.
iarbadensis, Nees, Del. Sem. Hort Vrat. (1841) = R. toberosa.
etandestinus, Nees in DC. Prod. xi. 166, insyn.=R. tnberosa.
Dipteracanthns, Nees, 1. c 199 = R. Dipteracanthus.
lacteus, Nees, Del. Sem. Hort. Vrat (1841)=R. lactea.
macrosipkott, Nees, in DC. Prod, xi 198 = R. lactea.
malifolius, Oerst. in Kjoeb Vidensk. Meddel. (1854) 129-R. ovalifolia.
pumilus, Nees, in DC. Prod. xi. 199 - R. pomila.
tuHflorus, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1864) 129.—Mexic.
udus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 49.—Bras.
•*riscosus*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1864) 128 =R. tnberosa.

CRYPHIANTHA, Eckl. & Zeyh. Enum. 171 (1886). Amphithalea, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
imiricata, Eckl. & Zeyh. I. c. 172-A. micrantha.

CRYPHIOSPERMUM, Beauv. Fl. Owar. ii. 24. t 74 (1805)=Enhydxa, Lour. (Compos.).
abyssinicum, Sch. Bip. in Walp. Rep. vi. 147 a Sigesbeckia abyssinica.
repens, Beauv. Fl. Owar. ii. 24. t. 74 «=E. fluctuans.

CRYPSINNA, Fonm. ex Benth. in Toorn. Linn. Soc. xix. (1881) 87 = Epicampes, ^resl (Gramin.).
macroura, Fourn. ex Benth. 1. c = E. macronra.
seti/olia, Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 549 = E. macroura.
stricta, Foam. 1. c = E. macroura.

CBYP8I8, Ait Hort. Kew. i. 48 (1789); iii. 505. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. *I* iii. 1189.
ANTITRAGDS, Gaertn. Fruct ii. 7. t. 80 (1791).
PACHEA, Pourr. ex Steud. Norn. ed. II. L 449, in syn. (1840).
PALLASIA, Scop. Introd. 72 (1777).
RADDIA, [Pien!] in Ionios Anthol. ii. (1834) 448.
acnleata, *Ait. Hort. Kew.* i. 48.—Geront. temp, et trap.
acuminata, Trin. in Spreng. Neue Entdcbk. ii. 67 = Heleochloa alopecuroides.
aegyptiaea, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 120 = Heleochloa alopecuroides.
alopecuroides, Guss. ex Schult Mant ii. 569 = Agrostis brachystachys.
alopecuroides, Schrad. FL Germ. i. 167=Heleochloa alopecuroides.
alpicola, Hochst. ex Steud. Syn. PL Gram. 152 = Heleochloa alpicola.
ambigua, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient, v. 477 = Heleochloa ambigua.
arenaria, Desf. Fl. Atlant i. 68 -Phlentn arenarium.
Boiszczowi, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1868) II. 306.—As. centr.
compact*, *Steud. Syn. PI. Gram.* 151.—Afr. trop.
erucianelloides, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient, v. 477 = Heleochloa erucianelloides.
dura, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 125 - Heleochloa dura.
geniculata, Roem. & Schult. Syst. ii. 376 = Heleochloa alopecuroides.
juncea, Steud. Norn. ed. 1. 242=Sporobolus junceus.
maerostachya, Brot. Fl. Lusit. i. 78=Heleochloa alopecuroides.
macroura, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. L 140-Epicampes macroura.

CBTP8IS —
maritima, Mnnro, ex Macowan, in Cape Month. Mag. N. S. iii. 11871) Suppl. 7-Sporobolos virginicus.
Myosurus, *Nets, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 152.—Aegypt.
nigricans, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 73=Agrostis brachystachys.
niliaca, Figar. *Sc* De Notar. in Mem. Ace. Tor. Ser. II. xiv. (1854) 822-Heleochloa schoenoides.
phalar(rides, Bieb. FL Tanr. Cauc. i. 45=Heleochloa alopecuroides.
phleoides, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. L 140-Cinna phleoides.
pygmaea, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. iv. 8 - Heleochloa pygmaea.
schenoides, Beauv. Agrost, 22—aculeata.
schoenoides, Hochst. ex Steud. Syn. PL Gram. 152 = Heleochloa alopecuroides.
schoenoides, Lam. Tabl. Encyc. 1. 166«Heleochloa schoenoides.
seti/olia, J. & *C.* Presl, Reliq. Haenk. L 246=Epicampes macronra.
sicula, Jan, Elench. 1=nigricans.
squarrosa, *Nutt. Gen. Am.* i. 49.—Am. bor.
stricta, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. i. 140 « Epicampes macroura.
tenuissima, *Tausch, in Flora*, xx. (1837) 121.—Sibiria.
vaginiflora, *Opir, Natural.* viiL (1824) 83.—Aegypt.
virginica, Nutt Gen. Am. i. 49=Heleochloa schoenoides.

CRYPSOCALYX, Endl. in R. Br. Verm. Schr. v. 390, in adnot. Q884), sphalm. = CHRYSOCALYX, Guill. *Sc* Perr.sCrotalaria, Linn. (Legum.).

CRYPTA.Nutt. in Joum. Acad. PhiUd. L (1817) 117. t. S^Elatine, linn.
minima, Nutt 1. c. = E. americana.
triandra, A. Braun, ex Walp. Rep. v. 83=E. triandra.

CBYPTADENIA, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 404. *THYMELAEACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 195.
CALYSERICOS, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 573 (1856-57).
breviflora, *Meissn. in Linnaea*, xiv. 406.—Air. austr.
ciliata, *Meissn. 1. c.* 407.—Afr. austr.
filicaulis, *Meissn. 1. c.*—Afr. austr.
grandiflora, *Meissn. I. c.* 405.—Afr. austr.
nniflora, *Meissn. 1. c.* 406.—Afr. austr.

CRYPTADIA, Iindl. ex Endl. Gen. PL Snppl. i. 1381 (1841) = Oymiiarrheiia, Desf. (Compos.).
euphratensis, [Lindl. in] Chesn. Narrat. Euph. (1868) t. ad p. 441=G. micrantha.

CBYPTANDRA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 217. *RHAMNEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 383.
WICHURAEA, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. 290 (1847).
albicans, F. Muell. Census, 60 = Trymalinm albicans.
alpina, *Hoot./. Fl. Tasm.* i. 75. t. 12.—Tasmania,
amara, *Sm. in gees, Cycl.* x. n. 2.—Austral.
angusti/olia, *F.* Muell. Census, 60 — Trymalium angustifolium.
anomala, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 187—Trymalium ledifolium.
arbutiflora, *Fen*!, in Enum. PI. Hueg.* 26.—Austral.
australis, *Pen.* Syn. i. 250 (sp. delend.).
Behriana, Reiss. in Linnaea, xxix. (1867-58) 293 = tomentosa.
bifida, F. Muell. Census, 61=Spyridium bifidum.
BiUardieri, F. Muell. 1. c. 60-Trymalium Billardieri.
buxifolia, *Fentl, in Enum. PI. Hueg.* 28.—Austral.
campanulata, F. MuelL Fragm. iii. 67-tomentosa.
campanulata, Schlecht. in Linnaea, xx, (1847) 639 = amara.
capitata, Sieber.ex Benth. Fl. Austral, i. 438 -ericifolia.
coactilifolia, *V.* Muell. Census, 61 =Spyridium coactilifolium.
complicata, F. Muell. 1. c. 61-Spyridinm complicatum.
cordata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 459-Spyridium cordatum.
coronata, Keiss. in I^hm. PL Preias. Ii. 288^Stenanthemum coronatum.
Daltoni, F. Muell. Census, 60 = Trymalium Daltoni.
divaricata, F. Muell. 1. c. 61=Spyridium divarioatum.
divaricata, Reiss. in Lehm. PL Preiss. ii. 286-tomentosa.
ericifolia, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 294. t. 18=seq.

CRYPTAITDRA :—
ericoides, *Sm. in Rees, Cyclop,* x. (1808) n. 1.—Austral.
eriocepkala, Hook. f. Fl. Tasm. i. 72=Spyridium eriocephalum.
erubescent, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 29S = tomentosa.
floribunda, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 186= Tiymalium ledifolinm.
glabrata, Steud. 1. c. 188 = miliaris.
glabriflora, *Benth. Fl. Austral,* i. 441.—Austral.
glaucophylla, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 187 = Trymalium ledifolinm.
globulosa, F. Muell. Census, 61 = Spyridium globulosum.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. i. 78. t. 11 = Spyridium Gunnii.
halmaturina, F. Muell. Census, 61=Spyridium halmaturinum.
hispidula, *Reiss. &" F. Muell. in Linnaea,* xxix. (1857-58) 294.—Austral.
holostyla, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 188 = pungens.
kumilis, F. Muell. Census, 61 = Stenanthemum humile.
Hookeri, F. Muell. 1. c.—Spyridium parvifolium.
intangenda, F. Muell. Fragm. x. 52 = Pomaderris intangenda.
lanosiflora, *F. Muell. I. c.* iii. 65.—Austral.
largiflora, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-68) 292-amara.
lasiophylla, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 188 = miliaris.
Lawrencii, Hook. f, Fl. Tasm. i. 72 = Spyridium Lawrencii.
ledifMa, F. Muell. Census, 60 = Trymalium ledifolium.
leucophracta, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 640= Stenanthemum leucophracta.
Leucopogon, *Meissn. ex Reiss. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 287.—Austral.
longistaminea, *F. Muell. Fragm.* iii. 64.—Austral.
magniflora, F. Muell. 1. c. 65 = propinqua.
microcephala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 458=Spyridium microcephalum.
miliaris, *Reiss. in Lehm. PL Preiss.* ii. 288.—Austral.
mollis, Hook. f. Fl.Tasm.i. 78-Spyridiumparvifolium.
mutila, *Nees, ex Reiss. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 289.—Austral.
nervata, Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-581292 = amara.
nudiflora, *F. Muell. Fragm.* iii. 64.—Austral,
nutans, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 186.—Austral.
obcordata. Hook. f. Fl. Tasm. i. 71 = Spyridium serpyllaceum.
obavata, Hook. f. 1. c. 74-Spyridium obovatum.
parvifolia, Hook. f. 1. c. 78=Spyridium parvifolium.
parvifolia, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 459.—Austral.
pauciflora, Turcz. 1. c. 458=Spyridium pauciflorum.
phlebophylla, F. Muell. Census, 61 = Spyridium phlebophyllum.
pimelioides, Hook. f. Fl. Tasm. i. 75. t. 12 B=Stenanthemum pimeleoides.
pomaderroides, Reiss. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 29-Stenanthemum pomaderroides.
propinqua, *A. Cunn. ex Fenzl, in Enum. PL Hueg.* 28.—Austral.
propinqua, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 638 = tomentosa.
pumila, F. Muell. Census, 61« Spyridium pumilum.
pungens, *Steud. in Lehm. PL Preiss.* i. 187.—Austral.
pyramidalis, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 373-spinescens.
rotundifolia, F. Muell. Census, 61=Spyridium rotundifolinm.
scoparia, *Reiss. in Lehm. PL Preiss.* ii. 285.—Austral.
Scortechinii, *F. Muell. in Austral. Chem.* b* *Drugg.* (1884).—Austral.
Sieberi, Fenzl, in Enum. PI. Hueg. 28 = amara.
spadicea, F. Muell. Census, 61=Spyridium spadiceum.
spathulata, F. Muell. I.e.-Spyridium spathulatum.
spinescens, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 38.—Austral.
spinosa, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 40 = ericoides?
spyridioides, *F. Muell. Fragm.* iii. 68.—Austral.
suavis, Lindl. Bol. Reg. (1844) t. 66. Misc. 25 = arbutiflora.
subochreata, F. Muell. Census, 61=Spyridium subochreatum.
tomentosa, *Lindl. in Mitch. Three Exped.* ii. 178.—Austral.
tomentosa, Reiss. in Lehm. PI. Preiss. ii. 286=nutans.
tridentata, Steud. in Lehm. t. c. i. 186-Spyridium tridentatum.

CRYPTANDRA :—
tubulosa, Fenzl, in Enum. PI. Hueg. 26=arbutiflora.
ulicina, Hook. Joum. Bot. i. (1884) 257= Spyridium ulicinum.
vexillifera, Hook. L c.=Spyridium vexilliferum.
villosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 468=Spyridium villosum.
Waterhousii, F. Muell. Census, 61-Stenanthemum Waterhousii.
Wayii, F. Muell. 1. c. 140-Trymalium Wayae.
•*mestringifolia,* F. Muell. 1. c. 61 = Spyridium westringiaefolium.
Wichurae, F. Muell. 1. c. 60=Trymalium Wichurae.

CRYPTANGITJM, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras, ii. I. 163. t 19 (1842). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1067.
ACROCARPUS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 167- tt. 16,17 (1842).
CLADOTHECA, Steud. Syn. PI. Cyp. 178 (1855).
MICROLEPIS, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 167 (1842).
arundinaceum, Boeck. in Flora, lxv. (1882) 851 = Lagenocarpus rigidus.
campestre, *Boeck. in Linnaea,* xxxviji. (1874) 416.—Bras.
comatum, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 361.—Bras.
densifolium, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 418-Minarum.
Dracaenula, Boeck. 1. c. 415 = Cephalocarpus Draeaenula.
Glaziovii, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (18/9-80) 29.—Bras.
humile, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 413.—Bras,
junciforme, *Boeck. I. c.* 415.—Bras,
leptocladum, *Boeck. 1. c.* 420.—Bras.
Minarum, *Boeck. I. c.* 417.—Bras.
paucifolium, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-80) 28—minarum.
polyphyllum, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 414.—Bras.
stellatum, Boeck. 1. c. 421 (Lagenocarpi sp.).—Bras,
triquetrum, *Boeck. 1. c.* 413.—Bras,
uliginosum, *Schrad. ex Nees, in Mart. FL Bras.* ii. I. 164.—Bras.

CRYPTANTHA, Lehm. ex Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 85 (1886)=Eritrichiuin, Schrad. (Boragin.).
glomerata, Lehm. ex Fiscb. *Sc* Mey. I. c. = E. cryptanthum.
microcarpa, Fisch. *Sc* Mey. 1. c. = Krynitzkia clandestina,

CRYPTANTHE, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 851 (1876) = praec.

CRYPTANTHUS, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. it 54 (1849)---Aphftnisma, Nutt. (Chenopod.).
blitoides, Nutt. 1. c = A. blitoides.

CRYPTANTHTJS, Otto & Dietr. AUg. Gartenz. iv. (1836) 298. *BROMELIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 661.
MADVIGIA, Liebm. in Ann. Sr. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 373.
PHOLIDOPHYLLUM, Vis. Sem. Hort. Patav. (1847) 4.
acaulis. Beer, Bromel. 75 *• undulatus.
Beuckeri, *E. Morr. in Belg. Hortif.* xzx. (1880) 241; xxxi. (1881) 342. L 17.—Bras,
bivittatus, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1864) 15.—Am. austr.
bromelioides, *Otto tf Dietr. AUg. Garten:* iv. (1836) 298.—Bras.
discolor, *Otto &* Dietr. I. c.* 299.—Bras.
diversifolius, Beer, Bromel. 76-bromelioides.
undulatus, *Otto (f Dietr. AUg. Garten:* iv. (1836) 299.—Bras,
zonatus, *Beer, Bromel.* 76.—Bras.

CRYPTARRHENA, R. Br. in Bot. Reg. t. 153 (1816). *ORCHJDEAE,* Benth & Hook. f. iii. 568.
CLINHYMENIA, A. Rich. & Gal. in Compt. Rend. Acad. Sc. Par. xviii. (1844) 612.
ORCHIDOFUNCKIA, A. Rich, in Ann. Sc. Nat Sér. III. iii. (1845) 24.
Kegelii, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 766.—Guian.
lunata, *R. Br. in Bot. Reg.* t 153.—Ind. oca
pallidiflora, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 766.—Mode.

CRYPTERONTA, Blume, Bijdr. 1161 (1826). *VITHRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 782.
HENSLOWIA, Wall. PI. As. Rar. iii. 18 (1832).
QUILAMUM, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 851 (1887).
afflnis, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 39=pubescens.
Cumingii, *Endl. 1. c.*—Ins. Philipp.
glabra, *Endl. I. c*—Reg. Himal.; Malaya.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* «• 574.—Malaya.
Hookeri, A. DC. in DC. Prod. xvi. H. 679 = pubescens-leptosUchys, *Endl. Gen. Suppl.* iv. II. 39.—Ins. PbilipP-lutea, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 123.—Java,
paniculata, *Blume, Bijdr.* 1161.—Java.
paniculata, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) II. 86=pubescens.
pubescens, *Endl. Gen. Suppl.* iv. II. 89.—Burma i Malaya.
Wallichii, *A. DC. in DC. Prod.* xvi. H. 679.—Burntf-

CRYPTINA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) I[92] =Elatlne, Linn.

CRYPTOCALYX, Benth. in Ann. Nat Hist. Ser. I- »• (1839) 446-Iiippia, Linn. (Verbenac).
nepetaefolia, Benth. 1. c. = L. betulaefolia.

CRYPTOCARIA, C. Gay, Fl. Chil. v. 299 (18«)=* Cryptocaxya, R. Br. (Laurin.).

CRYPTOCARPA, Steud. Nom. ed. II. i. 449, spbak«»--wq.

CRYPTOCARPHA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 34-Acioarpha, Juss. (Calycer.).
lanata, Cass. in Diet. Sc Nat xii. 86 = A. lanata.
spathulata, Cass. 1. c. 85 = A. spathulata.
tribuloides, Cass. 1. c. — A. tribuloides.

CRYPTOCARPUS, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp.jj-187. tt 123, 124 (1817). *NYCTAGINEAE,* Benin-*Sc* Hook. f. iii. 11.
cordifolius, Moric. PI. Nouv. Am. 75-pyrifonnis.
globosus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sj>.* ii. 187. «•-Cuba.
paniculatus, *H. B: tf K. ex Schlecht. in Linnaea,* » (1853-55) 643.—N. Granat
pyriformis, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 188. t. 1**'—Ecuador.
rhomboideus, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 88 -glow"

CBYPTOCARYA, R. Br. Prod. 402 (1810). *LA V& NEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 150.
BEIAOTA, C. Gay, Fl. Chil. v. 297. t. 69 (18«)-
BOLDU, Nees, Syst. Laurin. 177 (1838).
CARVODAPHNE, Blume, ex Nees, Syst. Launn. (1886).
ENDOCXRPA, Rafin. in Sylva Tellur. 185 (18»»>
acutiflora, Blume, ex Nees, Syst. Laurin. 214=cost. amygdalina, *Nees, in Wall. PL As. Rar.* ii. 6[9].—Reg. Himal.
angastifolia, *E. Mey. Zwei Pfi. Docum.* 176, nomen; *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 74.—Afr. austr.
australis, *Benth. Fl. Austral,* v. 229.—Austral.
Aue-ueva, Mart.exNees.1. c. 246 = Aydendron per[101]-
Berteroana, C. Gay, Fl. Chil. v. 301=C. *PevJaa*-
Bidmllii, Meissn. in DC. Prod.xv. I. 74=gl"»«[s]-caeisa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 835.—»" Andam.; Java.
Canelilla, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 192.—Am. austr
caudat'a, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 68 - Griffithi
cinnamomifolia, *Benth. Fl. Austral,* v. [29]8.—A<»-ina.
concinna, *Hance, in Joum. Bot.* xx. (1882) 79.-^°
costata, *Blume, Bijdr.* 658.—Java.
crassifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 241.—Madag.
crassinervia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 924.—Snm»»»
cuneata, Blume, Bijdr. 558 = Dehaasia cuneata-
cuneata, Zoll. ex Meissn. in DC. Prod. xv. I- •• Phoebe javanica.
Cunninghamii, Meissn. 1. c. 73 •= glaucescens.
dealbata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1[8(w —Madag.
denriflora, *Blume, Bijdr.* 666.—Java.
discolor, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat >• = litsea timoriana.
diversifolia, *Blume, I. c.* 335.—Sumatra.
dubia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. N. Granat. Mexpito
dubia, Spreng. ex Nees, Syst Laurin. 400 (» *daphne phillyrtoides).*—Bras.

CRYPTOCARYA:—
emarginat[illegible] *DC*
ferrea, [illegible] 5W—MaUya.
ferrea, [illegible] —Burma.
ferruginea, Blume, Ca[illegible]=Litsea ferruginea.
ferruginea, A. Cunn, [illegible]
floribunda, Miq. ex Meissn. [illegible]=Machilus macrantha.
floribunda, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. ii. 69=amygdalina.
floribunda, Wight, Ic. t. 1829=Wightiana.
glaucescens, R. Br. [illegible]
glaucescens, Hassk. [illegible] Hort.Bogor.Alt. 89=tomentosa.
Griffithiana, *Wight*, *Ic.* t. 1880.—Ind. or.
guianensis, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 76.—Guiana.
hirsuta, *Schott*, *in Spren*[illegible]
hypoglauca, Meissn. in DC. Prod. [illegible]=glaucescens.
hypospodia, F. Muell. Fra[illegible] 170 = obovata.
impressa, *Miq. Fl. In*[illegible] Griffithiana.
infectoria, Miq. [illegible] —Malaya.
lacunata, *Blume* [illegible] —Java.
[illegible] Nees, ex [illegible]
laurifolia, Sond. [illegible]
lucida, *Blume*, *Mus* [illegible]
lucidula, *Miq. Fl. Ind. Bat.* [illegible]
Mackinnoniana, *F. Muell. Fragm.* [illegible]—Austral.
macrophylla, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Bat. ii. 14=Cylicodaphne macrophylla.
Meissn. in DC. Prod. xv. I. 75.—Bras.
Muell. Fragm. v. 170—Austral.
Thw. Enum. Pl. Zeyl. 254.—Zeylan.
Syst. Lauri[illegible] 218.—Java.
[illegible] 75.-Bras.
monticola, Mart. ex Nees, Sys. t. Laurin. 400 (=*Mespilodaphne pretioides*).—Bras.
moretoniana, Meissn. in [illegible] xv. 1. 74=glaucescens.
moschata, *Nees & Mart. in Linnaea*, vol. (1833) 87.-Bras.
luTix[illegible] 271.Guiana.
[illegible] DC. Prod. xv. I. 78 = Endiandra urrayi, F
[illegible] 170.-An.tral.
[illegible] 241.—Madag.
netigherrensis, Meissn. to DC. Prod. [illegible] 71 - Stocksii.
nitida [illegible]
[illegible] xxxiii. (1864-65) 228.—Chili.
[illegible] *If*, [illegible] *Bat.* i. 834.—Java.
[illegible] —Java.
obscura, *Blume*, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* 335.—Java.
obtusifolia, F. Muell. [illegible] Prod. xv. I. 508 (=*N* [illegible] Austral.
palembanica, [illegible]
patentinervis, [illegible] *Suppl.* 359.—Sumatra.
pendul'f [illegible]
[illegible] *Revista Napol.* i. in. 173.—Madag.
[illegible] *in Bull. Soc. Li nn. Par.* i. (1886) 447.
[illegible] 222.-CWH.
pretiosa, Nees, Lft 287; Reise Bras. iii. 1128=Ocotea pretiosa.
pyriformis, Nees, Syst. Laurin. 220 (=*Mespilodaphne pyriformis*).—Guiana.
reticulata, *Blume*, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* 835.-Java.
retrospiralis, Voigt, Hort. Suburb. [illegible] =Cryptocoryne retrospiralis.
Riedelii, *Meissn.* [illegible] 75-Bras.
rigida, Meissn. [illegible]=Patentinervis.
rubiginosa, *Griff.* [illegible] 739.-Bunna.
stenantha, Phil. [illegible] Peumus.
Stocksii, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 71.—In
Teysmanniana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 360.—Sumatra.
tomentosa, *Blume*, *Mus.* [illegible] 835.-Java.
triplinervis, *R. Br. Prod.* 402.-Austral.
Wightiana, *Thw. E*
Zollingeriana, *Miq.* [illegible] 924.—Java.

CKYPTOCENTBUM, Benth. in Jonrn. Linn. Soc. xviii. (1881) 325. *ORCHIDEAE*, Benth. *8c* Hook, f iii. 557.
Jamesoni, *Benth. in Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 557.—Ecuador.

CRYPTOCERAS, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 121 = Corydalis, Vent. (Papav.).
bracteatum, C. Mnell. in Walp. Ann. vii. 91-Coryd. bracteata.
giganteum, C. Mnell. 1. c. = Coryd. gigantea.
longiflorum, C. MueU. I. c. =Coryd. longiflora.
modestum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 160=Coryd. rutaefolia.
oppositifolium, Schott, 1. c. iv. (1864) 121 = Coryd. rntaefolia.
pauciflorum, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 91^Coryd. pauciflora,
pulchellum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 150 = Coryd. rutaefolia.
purpurans, Schott, in Oestr. 1. c = Coryd. rutaefolia.
purpurascens, Boiss. Fl. Orient, i. 12^=praec.
remotum, C. Muell. in Walp. Ann. vii. Sl^Coryd. bnlbosa.
rutifolium, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 121 = Coryd. rutaefolia.
verticillare, Schott, 1. c. = Coryd. verticillaris.

CRYPTOCHILOS, Spreng. Gen. ii. 676 (1831) =seq.

CBTPTOOHILUS, Wall. Tent. Fl. Nep. 86. t. 36 (1822). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 518.
lutea, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 21.—Reg. Himal.
Meirax, Par. *8c* Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 148=Kria Meirax.
reticulatus, Reichb. f. in Bot. Zeit xx. (1862) 214 = Eria reticulata.
sanguinea, *Wall. Tent. Fl. Nep.* 36.—Keg. Himal
Wightii, Reichb. f. in Bot. Zeit. xx. (1862) 214 = Eria Lichenora.

CRYPTOCHLORIS, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1376 (1882). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1166.
.pathacea, *Benth. 1. c.*—Patagon.

CBYPTOCORYNE, Fisch. ex Reichb. Consp. 44 (1828). *AROIDEAE*, Bentb. *8c* Hook. f. iii. 963.
MELIOBLASTIS, C. Muell. in Bot. Zeit. iv. (1846) 158, sphalm.
MYRIOBLASTUS, Wall, ex Guff, in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 264.
alata, Griff. Ic. PI. iii. tt. 170, 171 = ciliata.
auriculata, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 302.—Borneo.
Beckettii, *Thv. ex Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 269.—Zeylan.
bulbosa, *Becc. ex Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 802.—Borneo,
caudata, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 242.—Borneo,
ciliata, *Fisch. ex Schott, Melet.* 16, nomen; *Blu-me, Rumphia*, i. 86.—Ind. or.
cognata, *Schott, in Bonplandia*, v. (1857) 222.—Ind. or.
consobrina, *Schott, 1.* c.—Ind. or.
cordata, *Griff. Notul.* iii. 138.—Malaya.
Dalzellii, *Schott, in Bonplandia*, v. (1857) 221.—Ind. or.
drymorrhiea, Zipp. ex Schott, in Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd, Bat. t 122=ciliata.
egregia, *Schott, I. c.* 122.—Sumatra.
elata, Griff. Notul. iii. 184=ciliata.
ferruginea, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 302.—Borneo.
Gomezii, *Schott, in Bonplandia*, v. (1857) 221.—Ind. or.
Griffithii, *Schott, Syn. Aroid.* l.-Malacca.
Huegelii, *Schott, Aroideae*, 8. t. 12.—Ind. or.
Koenigii, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 81 = Lagenandra Koenigii.
land/olia, Schott, 1. c. v. (1857) 221 = Lagenandra lancifolia.
Lingua, *Becc. ex Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 301.—Borneo.
longicauda, *Becc. ex Engl. I. c.* 802.— Borneo.
ovata, Schott, Melet. 16 = Lagenandra toxicaria.

CBYPTOCOBYNE:—
pallidinerria, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 301.—Borneo,
pontederiifolia, *Schott, in Miq. Ann. Mus. Boi. Lugd. Bat. I* 122.—Sumatra.
retrospiralis, *Kunth, Enum. PI.* iii. 12.—Ind. or.
Roxburghii, Schott, Prod. Aioid. 18 = unilocularif.
spathulata, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 301.—Borneo,
spiralis, *Fisch. ex Wydler, in Linnaea*, v. (1830) 428.—Ind. or.
striolata, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 301.—Borneo.
Thwaitesii, *Schott, in Bonplandia*, v. (1867) 221.—Zeylan.
unilocularis, *Kunth, Enum. PI.* iii. 13.—Ind. or.
unilocularis, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 223-Wightii.
Walkeri, *Schott, I. c.* 221.—Zeylan.
Wightii, *Schott, Prod. Aroid.* 17.—Ind. or.

CRYPTODIA, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 955 (1843), sphalm. - CRYPTADIA, Lindl.- Crymnarrhena, Uesf. (Compos.).

CRYPTODI8CU8, Schrcnk, Enum. PI. Nov. 64 (1841). *VMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 872.
ammophilus, £«K^ev£<'AM. *Relig. Bot.* 13U.—Turkestan,
cachroides, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 65.—Sibir.
persicus, *Boiss. Fl. Orient*, ii. 935.—Persia,
rutaefolius, *Bunge, Lehm. Reliq. Bot.* 138.—Turkestan.

CRYPTOGLOCH1N, Heuff. in Flora, xxvii. (1844) 527, 528«=Carex, Dill. (Cyperac).
curvulus, Heuff. 1. c. 6'iS-Carex curvula.

CRYPTOGLOTTIS, Blume, Bijdr. 296. t. 42 (1825) -= Fodochilua, Blumc (Orchid.).
serpyllifolia, Blume, 1. c. 2»7.—Java.

CRYPTOGYNE, Cass. in Diet. Sc. Nat. 1. 491 (1827)-Erioeephalus, Linn. (.Compos.).
absinthioides, Cass. 1. c. 492.—Afr. austr.

CBYPTOOYNE, Hook. f. in Benth. & Hook. f.Gen ii. 656 (1876). *SAPOTACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 656.
Gerrardiana, *Hook./. 1. c.* 657.—Madag.

CRYPTOLEPIS, R. Br. in Mem. Wem.Soc. i. (1S09) o'J. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 741.
CRYFTOLOBUS, Meissn. ex Stcud. Nom. ed. II. i. 450 (1840).
LEPISTOMA, Blume, Fl. Jav. Praef. 7 (1828).
LEPOSMA, Blume, Bijdr. 104!) (1826).
Buchanani, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 409.—Ind. or.
Edithae, Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 741=elegans.
elegans, *Wall. Cat.* n. 163!).—Ind. or.; Malaya.
filiformis. Wall. 1. c. n. 4458 = Atherandra acutifolia.
grandiflora, *Wight, Ic.* t. SSL—Ind. or.
javanica, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 146.—Java.
laxifiora, Blume, 1. c. 147 = elegans.
longiflora, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisatov.* 48.—Hab. 3
pauciflora, Wight, let. 493—elegans.
reticulata, Wall. Cat. n. 1640 = Buchanani.
Wightiana, Wall. 1. c. n. 4457 -grandiflora.

CRYPTOLOBUS, Spreng. Anleit. ii. 760 (1818) ; Syst. iii. 152 (1826)=Amphiearpaea, Ell.etVoandzeia, Thou. (Legnmin.).
africanus, Spreng. Syst. iii. 218 — V. subterranea.
americanus, Spreng. 1. c. = A. monoica.
sarmentosus, Spreng. 1. c. 219 = A. monoica.
subterraneus, Spreng. Anleit. ii. 760 = V. subterranea.

CRYPTOLOBUS, Meissn. ex Stend. Nom. cd. II. i. 450, in syn. (lS40)=Cryptolepis, R. Br. (Asclepiad.).

CRYPTOLOMA, Hantt. in Linnaea, xxix. (1857-58) 506 = Isoloma, Decne. (Gcsnerac).
anonymum, Hanst. 1.c. 636—Hab.?
coloratura, Hanst. L c—N. Granat.
cordifolium, Hanst. 1. c. 538 –1 . cordifolium.
hondense. Klotzsch *Sc* Hanst. 1. c. 534=I. hondense.
Hooterianum, Hanst. 1. c 536 = I. hondense.
pictum, Hanst 1. c. 536 ^ I. pictum.
pilosum, Hanst. 1. c. 638 = I. pilosnm.
rhynchocarpum, Hanst. 1. c. = I. rhynchocarpuin.
strictum, Hanst. 1. c. = I. strictum.
triflorum, Hanst. 1. c 534 = 1. triflorum.

CRYPTOMERIA, D. Don, in Tram. Linn. Soc xviii. (1841) 166. f. 1. t. 13. *CONIFERAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 429.
Fortunei, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. (1868) 234 = japonica.
japonica, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xviii. (1841) 167.—Japon.
Lobbiana, Billain, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. (1853) 234 - japonica.
nigricans. Cut. in Rev. Hortic (1870-71) 119 = japonica.

CRYPTONEMA, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat Mosc xxi. (1848) i. 690 = Burmannia, Linn.
mtUaccensis, Tnrcz. 1. c. 691 = B. caelestis.

CRYPTOPETALON, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 12 ; et in Diet. Sc. Nat. xii. 123 (1818) = Pectis, Linn. (Compos.).
ciliare, Cass. in Diet Sc Nat. xii. 123=P. ciliaris.

CRYPTOPETALUM, DC. Prod. v. 101, in syn. (1836) - praec.

CRYPTOPETALUM.Hook.a Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 844-Iiepuropetalon, Ell. (Saxifrag.).
pusillum, Hook. *Sc* Am. 1. c. 345-L. spathulatum.

CRYPTOPHORANTHUS, Rodrig. Orch. Nov. ii. 79 (1881) = PleurothaUls, R. Br. (Orchid.).
cryptantkus, Rodrig. 1. c. BO.—Bras.
fenestratus, Rodrig. 1. c.—Bras.
unctatus, Rodrig. Rev. Engenh. iii. n. 9 ; et 1. c—Bras.

CRYPTOPHRAGMIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1099 (1876)-seq.

CRYPTOPHRAGMIUM, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 76 et 94 (1832) = Gymnostachyum, Nees (Acanth.).
axillare, Nees, in DC. Prod. xL 96=G» sanguinclentnm.
eanescens, Nees, I. c. 95 = G. canescens.
cordifolium, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 100= Andrographis elongata.
elongatum,Nets, in DC. Prod. xi. 95=Andrographis elongata.
glabrum, Dalz. in Hook. Kew Jonm. ii. (1850) 838 -> G. glabrnm.
latifolium, Dalz. 1. c. 137-G. latifolinm.
sanguinolentum, Nees, in DC. Prod. xi. 96 = G. sanguinolenrum.
serrulatum, Nees, 1. c. 95=G. canescens.
venustum, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 180=G. venustum.

CRVPTOPLEURA, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. Sér. II. vii. (1841) 431 = Troxlmon, Nutt (Compos.).
calif arnica, Nutt. 1. c. = T. heterophyllum.

CKYPTOPtTS, Lindl. Bot. Reg. sub t. 817 (1824). *ORCHWEAB*, Benth. & Hook. f. iii. 583.
BBCLARDIA, A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 69.
elatus, *Lindl. Bot. Reg.* sub t 817.— Madag.

CRYPTOPYRUM. Heynh. Norn. ii. 174 (1846)=Trittoum, Linn. (Gramin.).
Richardsonii, Heynh. 1. c.«T. violaceum.

CRYPTOSACCUS, Reichb. f. XenU Orch. i. (1858) 15, in syn.=IieiodhiluB, Knowles *Sc* Westc. (Orchid.).

CRYPTOSANUS, Schddw. in Otto & Dietr. Alls. Gartenz. xi. (1843) 101-Leiochllus, Koowles & Westc. (Orchid.).
scriptus, Scheidw. 1. c. *=L. scriptus.

CRYPTOSEMA, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. U. 207 (1847)=Jansonia, Kipp. (Legumin.).
pimeleoides, Meissn. L c.=J. formosa.

CBYFTOSEPAXUM, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 584 (1867). *LEGUMINOSAE*, Benth. *Sc* Hook. f. 1. c.
maraviense, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 304.—Air. trop.
mimosoides, *Welw. ex Oliver, 1. c.* 305.—Afr. trop.
tetraphyllum, *Benth. in Trans, linn. Soc.* xxv. (1866) 315. t 43 a—Afr. trop.

CRYPTOSPERMUM, Steud. Norn. ed. II. i. 450, in syn. (1840), sphalm. = CYRTOSPERMUM, Rafin. - Cryptotaenia, DC. (Umbell.).

•CRYPTOSPERMUM, Young, in Trans. linn. Soc. iii. (1797) 80=Operoularia, Gaertn. (Rubiac).
Youngii, Pen. Syn. i. 122=0. aspen.

CBYPTOSFOBA, Kar. & Kir. in BulL Soc Nat. Mosc. xv. (1842) 161. *CRVCIFERAE*, Benth. *Sc* Hook, £ i. 101.
falcata, *Kar. (f Kir. I. c*—Soongaria.
Griffithiana, *Fenml, in Tchihat. Asie Min. Bat.* i. 851. —Persia.
rostrata, Fenzl, 1. c.-Parlatoria rostrata.

CRYPTOSTACHYS, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229 nomen; Syn. PI. Gram. 181 (1855) = Sporobolua, R. Br. (Gramin.).
vaginata, Steud. 11. cc.=S. vaginaeflorui ?

CB.YPTO8TEGIA, R. Br. in Bot. Reg. t 486 (1819). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 742.
grandiflora, *R. Br. 1. c.*—Afr. trop. (Ind. or. cult), madagascariensis, *Boj. Hort. Maurit.* 212.—Madag.

CRYPTOBTEMMA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 141 (1813). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. £ ii. 458.
ALLOIOZONIUM, Kunze, in Linnaea, xvii. (1843) 672.
CYNOTIS, Hoffmgg. Verz. Pit. Nachtr. ii. (1826) 98.
MICROSTEPHIUM, Less, in Linnaea, vi. (1831) 92.
calendulaceum, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 141. —Afr. austr.
Forbesianum, *Han. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* Iii. 468.—Afr. austr.
hypochondriacum, R. Br. in Ait. Hort Kew. ed. II. v. 141=calendulaceum.
niveum, *Nichols. Diet. Card.* i. 404.—Afr. austr.
runcinatum, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 141 = calendulaceum.

CRYPTOSTEMON, F. Muell.ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 114-Darwinia, Rudge (Myrtac).
ericaeus, F. Muell. ex Miq. 1. c 116 = D. fascicularis.
fascicularis, F. Muell. ex Miq. 1. c. = D. fascicularis.

CRYPTOSTEPHANE, Sch. Bip. in-Flora, xxvii. (1844) 782=Dieoma, Cass. (Compos.).
Kraussii, Sch. Bip. 1. c = D. diacanthoides.

CBYPTOSTEPHAMTTJS, Welw. ex Baker, in Joum. Bot. xvi. (1878) 193. t. 197. *AMARYLUDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 718.
densiflorns, *Welw. ex Baker, 1. c.*—Afr. trop.

CRYPTOSTOMA, D. Dietr. Syn. PI. i. 561, 625 (1889) =seq.

CRYPTOSTOMUM, Schreb. Gen. 137 (1789) = Moutabea, Aubl. (PolygaL).
coriaceum, Vahl, Eclog. Am. iii. 4 = M. guianensis.
guianense, Raeusch. Nom. ed. III. 61=M. guianensis.
laurifolium, Willd. Sp. PI. i. 1061=M. gaianensis.

CBTPTOSTTnil5B,R.Br. Prod. 317 (1810). *ORCHIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 608.
ACKONIA, Presl, ReL Haenk. *I* 103 (1827) ; Symb. Bot. ii. 9 (1858).
ZOSTEB.OSTYI.IS, Blame, Bijdr. 418. t. 32 (1825).
alismifolia, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record*, i. (1881) 172.—Ins. Samoa.
Arachnites, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 138.—Malaya,
erecta, *R. Br. Prod.* 317.—Austral,
filiformis, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 134.—Malaya,
leptochila, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, vi. 334.— Austral.
longifolia, *R. Br. Prod.* 817.—Austral,
ovata, *R. Br. 1. c.*—Australl.
subulata, Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 15 - longifolia.
Walkerae, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 133.—Zeylan.
zeylanica, *Blume, I. c.*—Zeylan.

CBYFTOTAEHIA, DC. Coll. Mém. v. 42 (1829); et Prod. iv. 118 (1830). *UMBELLIFERAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 696.
ALACOSFERMUM, Neck. Elem. i. 167 (1790).
CYRTOSPERMUM, Rafin. ex DC. Prod. iv. 118, in syn. (1880).

CBYPTOTAENIA :—
DERINGA, Adans. Fam. ii. 498 (1763).
MESODISCUS, Rafin. New Fl. Am. iv. 19 (1836).
canadensis, *DC. Coll. Mem.* v. 42 ; *et Prod.* iv. 119.— Am. bor.
elegans, Webb, ex C. Bolle, Ind. Sem. Hort. Berol. ApP- (1861) 9 (Anthrisci sp. ?).—Ins. Canar.
japonica, Hassk. in Reizia,). 118 - canadensis.
Thomasii, DC. Prod. iv. 119 - Pimpinella Thomasii.

CRYPTOTHECA, Blume, Bijdr. 1128 (1826) - AmmiTHUfftj Linn. (Lythrar.).
apetala, Blume, 1. c. 1129=A. baccifera.
dichotoma, Blume, 1. c.=A. multiflora.

CRYPTOTONIA, Tausch, in Flora, xvii. (1834) I. S<« sphalm.=Cryptotaenia, DC. (Umbell.).

CRYPTURUS, Link, in Linnaea, xvii. (1848) 887- Xiolliun, Linn. (Gramin.).
loliactus, Link, 1. c -L. lepturoides.

CRYSOPHILA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 828 (1888)* CRYOSOPHILA, Blume = Copernioia, Mart- (Palm.).

CRYSTALLOPOLLEN, Steetz, in Peters, Reise Motsamb. Bot. 868 (1863) = Vernonia, SchreD- (Compos.).
angustifolium, Steetz, 1. c. 866 = V. Steetziana.
latifolium, Steetz, 1. c 384=V. Petersii.

CSZERNAEYIA, Endl. Gen. 777 (1839) = NAEVIA, Turcz. = Archangelica, (Umbell.).

CTENANTHE. Eichl. in Abh. Berl. Acad. (1884) W- *SCITAMINEAE*.
compressa, Eichl. 1. c 88=Luschnathiana.
glabra, *Eichl. I. c*—Am. trop.
Kummeriana, *Eichl. 1. c.* 84.—Am. trop.
Luschnathiana, *Eichl. I. c.* 83.—Am. hop.
• pilosa, *Eichl. 1. c.*—Am. trop.
setosa, *Eichl. I. c.* 84.—Am. trop.
Steudneri, *Eichl. U* c—Am. trop.

CTENTTJM, Panz. in Denkschr. Acad. Muench. (1814) 288. t. 13. *GRAMINEAE*, Benth. *Sc* Hk> f. iii. 1165.
CAMPBLOA, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 69.
CAMPULOSUS, Desv. in Bull. Soc Philoin. « 189, nomen prius.
MONATHERA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (» 190.
MONOCERA, Ell. Sketch, i. 126 (1821).
americanum, *Spreng. Syst.* i. 274 = carolinianum.
brachystachyum, *Kunth, Riv. Gram.* ii. 447.—* trop.
canescens, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 566.—A«r^
carolinianum, *Pant, in Denkschr. Acad.* 1813 (1814) 311.—Am. bor.
chapadense, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* » Bras.
cirrhosum, *Kunth, Riv. Gram.* ii. 445. t.
concinnum, *Nees, Fl. Afr. Austr.* L 287.—Afr-*
digitatum, Spreng. Syst. i. 274 = Chloris digitalelegans, *Kunth, Rev. Gram.* i. 98.—Afr. trop.
indicum, Spreng. Syst. i. 274 = Chloris
nubicum, *De Not. Ind. Sem. Hort. Gen.* (*trap- in Ann. Sc. Net.* Sér. III. xix. (1853) 871--A
nukaviense, *Steud. ex Jard. in Mim. Soc. Cherb.* v. (1857) 299, nomen.—Hab. 1
planifolium, *Kunth, Enum. PI.* i. 275—**«
polystachyum, *Balansa, in Bull. Soc. Bot.* (1885) 244.—Paraguay.
rupestre, *J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap-* 149.—Ins. Cap. virid.
sechellense, Baker, Fl. Maurit 462 -= Seychellarum.
serpentinum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 202.—A*-

CTENODAUCUS, Pomel, Nouv. Mat Fl. A& (1874)=Dauons, Toum. (Umbellit).
virgatus, Pomel, 1. c. = D. laserpitioides.

CTENODOIT, Baill. Adansonia, ix. *LEGUMINOSAE*.
WeddeUianum, *Baill. I. e.* 237.—Bras.

CTENOLEPIS Sl S OOlt f in **«*• & Hook f Gen i • 832 (1867)=Blastania, Kotschy & Peyr. (Cucurb.).
cerasifo 630 -B. fimbristipnla.
Garcini, ^ S * & Hook f Gen *• 882 B Ga rcini.
stipulacea, Benth. & Hoolc. f. 1. c. = B. Garcini.

CTENOLOPHOIX, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 448. OI-*ACINEAE*.
erandiv V Parrifo?"S> Oliver>l c «17.-Malaya.
P»rv.fol,us, *Oliver, I. c.* 516—MaUyi

CTENOMERIA, Harv. in Hook. Lond. Joum. Biot. i. (1842) 29 = horb.).
cordata: Marv. 1. c. «T. capensis.
Kvaussi capen S T " Hochst,to HotEi ,,,,,,(1846) 85=T_

CTENOPSIS, ^? NoUr_Ind_Sem_Hort_G en. (1847) 825. *GRAMIN* 1171.
pectinella, *De No* t. trop.

CTENOPSIS, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. vi. (1866) 12 = **Blastania**, Kotschy & Peyr. (Cucurb.).
cerasiformis, Naud. l. c. 13 = B. fimbristipula.
Garcini, Naud. l. c. = B. Garcini.

CTENOSPERMA, Hook. f. in Hook. Lond. Journ Bot vi. (1847) 115 = **Cotula**, Tourn. (Compos.).
alpinum, Hook. f. l. c. = Cot. alpina.

CTENOSPERMA, F. Muell. ex Pfeiff. Nom. (1874) = **Brachycome**, Cass. (Compos.). 986

CUBA, Soop. Introd. 300 (1777) = **Tachigalia**, Aubl. (Legumin.).

CUBAE Schreb. Gen. pl 278 (1789)=Taehigalia, AnU.? Legumin.).
bijuga, Spreng. Neue Entdedt »• 290-Leptolobium bijugum.
emarginata, Spreng. Syst. ii. 848-T. emarginata.
paniculata, J. F. Gmel. Syst. 671-T. paniculate.
speciosa, Spreng. Syst. 845 flbrfbuibd a.
trigona, J. F. Gmel. Syst. 671=T. trigona.

CUBEBA, Rafin. Sylva Tell 84 (1838); Miq. Comm. Phyt. 33. t. 1 ad 3 (1840) = P
acris, Miq. l. c. 34 = P. acre.
albido-punctata, Miq. l. c. = P. albido-punctatum.
arborescens, Miq. l. c. = Thottea dependens.
arcuata, Miq. l. c. = P. arcuatum.
auriculata, Miq. l. c. = P. miniatum.
bantamensis, Miq. l. c. 33 = P. bantamensis.
borbonense, Miq. Syst. Pip. 301 = P. borbonense.
canina, Miq Comm. Phyt. 33. t. 3 = P. caninum.
capensis, Miq. Syst. Pip. 303.—Afr. austr.
celebica, Miq. Comm. Phyt. 33 = P lebicum.
Chaba, Miq. l. c. 34 = P. Chaba> *Hūnt*
Clusii, Miq. Syst. Pip. 304 = P Clnsii
coriacea, Miq. Comm. Phyt 34 = Peperomia coriacea.
costulata, Miq. Syst. Pip »«n. Phyt 45-P. crassipes.
crassi M C bontt'se:
h S »eraceum.
(1845)435 % Hook Lond ourn B ot. «v.
la yst. Pip. 298 = P. caninum.
Lowong, Comm. Phyt. 33 = P. Lowong.
majuscula, Miq. l. c. 34 = P. majusculum.
Melamiri, Miq. l. c. = P. Malan>iri.
miniata, Miq. l. c. 33 = P-miniatum.
mollissima, Miq. in Zo„S yst. Vera,Ind Archip 34 = P. mollissimum.
Neesii, Miq. Syst. Pip. 292 = P. pedicellosum.
nigrescens, Miq. Comm. Phyt 38 = P. nigrescens.
officinalis, Rafin. Sylva Tel 7 Miq. Comm. Phyt. 33. t. 1 = P. Cubeba.
phyllosticta, Miq. Pl. Mgh. 294-P. phyllosticum.
pipereta, Rafin. Sylva Tellur. 165 = P. Cubeba ?
segetum, Miq. Syst. Pip. 304.—Borneo.
seriboa, Miq. Comm. Phyt. 34-P. Betle.
sulcata, Miq. l. c. 33 = P. sulcatum.
sumatrana, Miq. l. c. 33. t. 6. f. A - P. sumatranum.
venosa, Miq. Pl. Jungh.
Wallichii, Miq. Syst. Pip. 289=P. ribesioides.

CUBELIU
(Violar 1, Rafin> Cat -18 (1824)=Ionidium, Vent.
concolo =I. concolor.
parvifl Rafin. l. c. = I. glutinosum.

CUBELIA, Blume, Rumphia, iii. 100 (1849). *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 400.
Blancoi, *Blume, 1. c.* 101.—Ins. Philipp.
Rumphii, *Blume, I. c.*—Ins. Celebes.

CUBOSPERMUM, Lour. Fl. Cochinch. 278 (1790)-Jussiaea, Linn. (Onagiar.).
palustre, Lour. 1. c. = J. repens.

CUCIFERA, Delile, Fl. Egypte, 145 (1818) = Hyphaene, Gaertn. (Palm.).
thebaica, Delile, 1. c = H. Cucifera.

CnCTTBAIiUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 147.
LYCHNANTHOS, S. G. Gmel. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xiv. (1770) I. 525.
LYCHNANTHUS, C. C. Ginel. Fl. Bad. ii. 249 (1806).
acaulis, Linn. Sp. PI. 415=Silene acaulis.
aegyptiacus, Linn. 1. c. = Silene aegyptiaca.
alpestris, All. Auct. Fl. Pedem. 28=Silene Campanula.
alpinus, Lam. Kncyc. ii. 200=Silene Cucubalus.
angustifolius, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = Silene Cucubalus.
angustissimus, Nocca & Balb. Fl. Ticin. i. 199. t 7 = Silene Cucubalus.
antelopum, Vest, in Flora, iv. (1821) 149=Silene Cucubalus.
astrachanensis.S. *G. Gmel. Reise*, ii. 107 (quid ?).—Reg. Casp.
baccatus, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 333 = seq.
bacoifer, *Linn. Sp. PL* 414.—Europ.; As. bor.
Behen, Linn. 1. c. = Silene Cucubalus.
caespitosus, Desf. Tabl. ed. I. 169-Silene spergulaefolia.
caryophylloides, Poir. Encyc. Suppl. ii. 416 = Silene caryophylloides.
catholicus, Ficin. Fl. Dresd. i. 318 = Silene italica.
catholicus, Linn. Sp. PI. 415=Silene catholica.
chloraefolius, Poir. Encyc. Suppl. ii. 416 = Silene perfoliata.
chlorantkus, Willd. Pred. Fl. Berl. 155 •> Silene chlorantha.
clavaecarpus, Schult. Obs. Bot. 81=Silene italica.
congestus, Willd. ex Cham. & Schlecht. in Linoaea, i. (1826) 89 = Silene repens.
canicus, Lam. Fl. Fr. hi. 33=Sileoe conica.
conoideus, Lam. 1. c. 27 ™ Silene conoidea.
cyclamineus, Sieber, Reise K'eta, ii. 324—Silene variegata.
Cterei, Stend. Norn. ed. II. i. 461-Silene Fabaria.
dauricus, Pall, ex Bnnge, Verz. Alt. 31 = Silene tennis.
dichotomus, Lam. Fl. Fr. iii. 82-Silene Muscipula.
dioicus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 167 = Silene Otites.
divaricatus, [Clairv.] Man. Herb. 145 = baccifer.
Douglasii, Eaton, Man. ed. VII; ex ej. ed. VIII. 427 =Silene Douglasii.
dubrensis. Mill. Gard. Diet, ed VIII. n. 6=Silene viscosa.
effusus, Fisch. ex DC. Prod. i. 878-Silene Otites.
fabarius, Linn. Sp. PI. 414-Silene Fabaria.
fabarius, Sieber, Reise Kreta, ii. 324-Silene variegata.
fabarius, Thore, Chlor. Land. 172 = Silent Thorei.
fasciculatus. Lam. Fl. Fr. iii. 27-Silene Armeiia.
fimbriatus, *Balb. in Mem. Acad. Turin*, xviii. (1811) 356. t. 6.—Hab. ?
fimbriatus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 833 - Silene fimbriata.
foetidus, Gueldenst ex Ledeb. Fl. Ross. i. 325 (quid ?). —Rossia.
floccosus, Ficin. Fl. Dresd. i. 813 = Silene italica.
fruticosus, Pall. Reise, ii. 739-Silene altaica.
fruticulosus, J. F. Gmel. Syst. 718-Silene turgida.
glaucus, Spreng. Nachr. i. Bot Gart. Halle, 19 = Silene glauca.
glutinosus, Ketz. Obs. ii. 18=Silene catholica.
hermaphrodites, Gilib. Fl. Lituan. ii. 167-Silene Otites.
horiiontalis, Moench, Meth. 711-baccifer.
inapertus, Lam. Fl. Fr.iii. 31-Silene inaperta.
inflatus, Salisb. Prod. 302=Silene Cucubalus.
italicus, Linn. Syst. ed. X. 1030 = Silene italica.
lacerus, Stev. in M<<m Soc. Nat Mosc. iii. (1812) 262 = Silene fimbriata.
latifolius, MiU. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-Silene Cucubalus.
UUoralis, Pers. Syn. i. 496=Silene maritime.
littoralis, Vis. Stirp. Dalm. 32-Silene Cncubalus.

CUC0BALTJS :-
longicilius, Brot. Fl. Lusit. ii. 180=Silene nutans.
macrophyttus, Hort ex Rohrb. Monog. 81-Silene Fabaria.
marginatus, Schult. Oestr. Fl. ed II. i. 674-Silene Cucubalus.
maritimus, Lam. Encyc. ii. 220-Silene maritime.
mollissimus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 324= Silene Marschallii.
mollissimus, Linn. Sp. PI. ed. II. 693=Silene mollissima.
mollissimus, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. iii. 277 = Silene italica.
montanus, Vest, in Flora, iv. (1821) 149 - Silene Cucubalus.
multifidus, Adam, ex Weber & Mohr, Beitr. i. 67 = Silene fimbriata.
multiflorus, Ehrh. Beitr. vii. 141-Silene multiflora.
muscosus. Lam. Fl. Fr. iii. 30=Silene acaulis.
niveits, Nutt. Gen. Am. i. 287 = Silene nivea.
noctiflorus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8= Silene noctiflora.
nutans, Lam. Fl. Fr. iii. 35 = Silene nutans.
Otites, Linn. Sp. PI. 415-Silene Otites.
paniculatus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 12 — Hispan.; Ital.
pannonicus, *Fisch. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 451, nomen.—Hungar.
parviflorus, Lam. Fl. Fr. iii. 26-Silene Otites.
Personii, Spreng. ex Steud. Nom.ed. II. i. 461-Silene Cueubalus.
pilosus, Willd. ex Spreng. Syst ii. 411-Silene Italica.
polygunoides, Willd. Sp. PI. ii. 690-Silene polygonoides.
polypetalus, Walt. Fl. Carol. 141-Silene ovata.
polyphyllus, Fisch. Hort. Gorenlc. ed. II. 60, nomen - Silene procumbens.
procumbens, *J. F. Gmel. Syst.* 712.—Hab. t
Pumilio, Linn. Mant. i. 71-Silene Pumilio.
quadrifidus, Linn. Sp. PI. 415-Silene quadridentata.
quadrifidus, PoUini, in Bmgnat. Giorn. Fis. ix. (1816) 29-Silene nutans.
reflexus, Linn. Sp. PI. 416-Silene reflexa.
roseus, *Desf. Tabl.* ed. I. 159, nomen.—Hab.!
rotundifolius, Steud. Nom. ed. I. 243-Silene inflata.
Royeni, Bieb. Casp. 174-Silene viscosa.
rubens, Roth, Enum. PI. Phaen. Germ. i. II. 286-Silene nutans.
saponariaefolius, Moench, ex Steud. Nom. ed. II. i. 451; Bonata, ex ejusd. ii. 687-Silene Cucubalus.
saxatilis, Lam. Fl. Fr. iii. 80 = Silene nipestris.
saxifragus, Lam. 1. c. 2!)-Silene Saxifraga.
saxifragus, Linn. Mant. i. 71-Silene dianthoides.
saxifragus, Schang. ex Bunge, Verz. Alt. 32-Silene turgida.
scaber, Fisch. ex Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) II. 647 -Silene Cucubalus.
secundus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 168-Silene tatarica.
sibiricus, Linn. Syst. ed. X. 1081 = Silene sibirica.
sibiricus, Willd. ex Walp. Rep. ii. 777—Silene tennis.
silenoides, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 614 - Silene italica.
spergulaefolius, Willd. Sp. PI. ii. 690 = Silene spergulaefolia.
spicatus, Lam. Fl. Fr. iii. 34-Silene noctuma.
staticaefolius, Poir. Encyc.Suppl. ii. 416-Silene tenuis.
stellatus, Linn. Sp. PI. 414-Silene stellata.
striatus, Willd. ex Walp. Rep. ii. 777 - Silene pauciflora.
strictus, *Roth, in Usteri.Ann.Bot.* x.(1794) 44.—Hab. ?
strict us, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 306-Silene pauciflora.
syhestris. Lam. Fl. Fr. iii. 28 = Silene gallica.
tataricus, Linn. Sp. PI. 415-Silene tatarica.
variegatus, Lam. Fl. Fr. iii. 28 = Silene gallica.
venoms, Gilib. Fl. Lituan. ii. 166 = Silene Cucubalus.
viridis, Lam. Encyc. ii. 221-Silene Cucubalus.
viscidus, Krock. FL Sil. ii. I. 40=seq.
m'seosus, Linn. Sp. PI. 414-Silene viscosa.
•wolgensis, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 24 = Silene Otites.

CUCULARIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (18081 352-Sicentra, Bernh. (Papaverac).
bulbosa, Rafin. 1. c «= D. Cucularia.

CUCULINA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 49 (1886)-Cata-Betum, Rich. (Orchid.).

CUCULLARIA, Endl. Gen. 659 (1839) = Cuoularia, Rafin.

CUCULLARIA, Schreb. Gen. 6 (1789)=Voohysia, Juss.
alpestris, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 9=V. alpestris.
citrifolia, Schult. Mant. i. 52 = V. citrifolia.
eUiptica, Sprang. Syst. iv. Cur, Post. 9 = V. elliptica.
emarginata, Vahl, Enum. i. 5=V. emarginata.
excelsa, Vahl, 1. c. 4 = V. ferruginea.
excelsa, Willd. Sp. PI. i. 17 - V. guianensis.
ferruginea, Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 9 — V. ferruginea.
floribunda. Sprang. 1. c.-V. floribunda.
grandis, Sprang. 1. c. = V. grandis.
Haenieana; Spreng. 1. c. = V. Haenkeana.
lutea, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 461 = V. emarginata.
pyramidalis, Sprang.,Syst. iv. Cur. Post. 9 = V. pyramidalis.
racemosa, Roem. & Schult. Syst. i. 36 = V. racemosa.
rotundifolia, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 9 = V. rotundifolia.
rufa, Spreng. L C.—V. rnfa.
tetraphylla, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 12 = V. tetraphylla.
tomentosa, G. F. W. Mey. 1. c. 13=V. ferraginea.
tucanorum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 9=V. tncanomm.
Vochy,]. F. Gmel. Syst. 10 ^V. guianensis.

CUCULLIFERA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 451 (1836) = Cannamois, Beauv. (Restiac).
dura, Nees, 1. c. = Cannamois simplex.

CUCULLIGERA, Mast, in Joum. Linn. Soc. x. (1869) 2S8=praec.

CUCUMEROIDES, Gaertn. Fruct. ii. 485. t ISO. t. 4 = Triehoaanthes, Linn. (Cucnrb.).

CTJCUMEROPSIS, Naud.in Ann. Sc. Nat. Se>. V.v. (1866) 30. *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 830.
CLADOSICYOS, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 534 (1871).
CORYNOSICYOS, F. Muell. Sel.'Pl. Indust. Cult. 59 (1876).
edulis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 518__Afr. trop.
Mannii, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. v. (1866) 30. —Afr. trop.

CUCTJMIS, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1785). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 826.
MELO, Adans. Fam. ii. 138 (1763;.
RIGOCARPUS, Neck. Elem. i. 238 (1790).
abyssinicus, A. Rich. Tent. Il. Abyss, i. 294 = C. Figarei.
abyssinicus, Schimp. ex Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 544 = pustulatus.
acidus, Jacq. Obs. Bot. iv. 14=C. Melo.
acutangulus, Descourt. Fl. Antill. v. 94. t. 828- Sechinm edule.
acutangulus, Linn.Sp. PI. 1011 = Luffa acutangula.
acutangulus, Wall. Cat. n..6736 A = Luffa aegyptiaca.
africanus, Lindl. Bot. Reg. t. 980 — Momordica Charantia.
a&iaams, Lindl. f. Suppl. 423.—Afr. austr.
agrestis, Mill, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 439 = Momordica Balsamina.
agrestis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 294 •= EcbaKum agreste.
amarissimus, Schrad. Ind. Sent. Hort. Gotting. (1827) = Citrullus vulgaris.
amarus, Stocks, ex T. Anders, in Joum. Linn. Soc. v. Snppl. i. (1860) 19*= prophetarum.
ambigua, Fenzl, ex Hook. *1.* in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 643.= dipsaceus, C. Melo.
angolensis, *Hook. f. ex Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 487.—Afr. trop.
anguinus, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. v. Suppl. i. (I860) 19, sphalm. = prophetaram.
anguinus. Linn. Sp. PI. ed. II. 1487=Trichosanthes Anguina.
angulatus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 168.—Arabia.
Anguria, Forsk. 1. c. = prophet&rum.
Angnria, *Linn. Sp. PI.* 1011.—Am. trop.

CTJCTMIS :—
Anguria, Rodsch. Obs. 56=Luffa operculata.
angurioides, M. Roem. Syn. Pepon. 79 = C. Angnria.
arabicus, Delile, ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. xi. (1859) 14 = prophetarum.
arenarius, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 416 = africanus.
arenarius, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PI. 426 =C. Melo.
aromaticus, Royle, IUuitr. Bot. Himal. iL 220=C. Melo.
barbatus, *Roth, Catalect. fax.* ii. 122.—Hab. t
Bardana, Fenzl, ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xi. (1859) 25=dipsaceus.
bicirrha, Forst. ex Guill. 1. c. Sér. II. vii. (1837) 850 = Lagenaria vulgaris.
bipinnatifidus, Wight, ex Naud. L c xii. ?1859) 99 = Citrullus Colocynthis.
campechianus, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 123 = C. Melo.
cantalupensis, Haberle, ex M. Roem. Syn. Pepon. 69 - C. Melo.
Cantalupo, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 296=C. Melo.
Chaete, Wall. <iat. n. 6727-C. Melo.
Chate, Hasselq. Iter Palaest. 491; Linn. Syst. ed. X. 1279 ~ C: Melo.
Chiio, Morr. in Ann. Soc. Gand, v. (1849) 341. t. 278 = C. Melo.
chrysocarpa, *Welw. Apont.* 589. n. 68.—Afr. trop.
chrysocomui, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 427 = Figarei.
cicatrisatus, Stocks, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 148 = C. Melo.
Citrullus, Ser. in DC. Prod. iii. 801 = Citrullus vulgaris.
cognata, *Feral, ex Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 543; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 487.— Afr. trop.
Colocynthis, linn. Sp. PI. 1011=Citrnllus Colocynthis.
Colocynthis, Thunb. Prod. PI. Cap. 13 = Citrullus vulgaris.
Conomum, Thunb. Fl. Jap. 824=C. Melo.
cordifolius, E. Mey. ex Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 492=Momordica fqetida.
cubensis, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 419=C. Melo.
delidosus, Salisb. Prod. 157 ; Roth, Catalect. fuse. iii. 80 = C. Melo.
dipsaceus, *Ehrenb. ex Spaeh, Hist. Vig. Phan.* vi. 211. —Arab.; Afr. trop.
dipsaceus, Wender. ex Steud. Norn. ed. II. i. 451 = africanus.
dissectifolius, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xi. (1859) 23.—Afr. austr.
dissectifolius, Naud. 1. c. partim = Citrullus Naudinianus.
dissectus, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 449 - Citrullus vulgaris.
Dudaim, Linn. Sp. PI. 1011=C. Melo.
echinatus, Moench, Meth. 654 = C. Anguria.
edulis, Steud. Nom. ed. II. i. 451 = C. Citrullus.
eriocarpus, Boiss. & Noe, Diagn. Ser. II. ii. 59=C. Melo.
erivanicus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 451=C. Melo.
esculentus, Salisb. Prod. 157=sativus.
ficifolius, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i 294. t. 63 = Figarei.
Figarei, *Delile, Cat. ex Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xi. (1859) 16.—Afr. trop.
flexuosus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1437 = C. Melo.
foetidissimus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 488 = Cucurbita foetidissima.
foetidus, Salisb. Prod. 156 = prophetaram.
glaber, Walt. Fl. Carol. 240 = Melothria pendula.
grossularoides, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 451 -= myriocarpus.
Gurmia, Wall. Cat. n. 6726=C. Melo.
Hardwickii, Royle, Illustr. Bot. Himal. S20. t. 47- sativus.
heptadactylus, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xi. (1859) 24.—Afr. austr.
Hilapikiu, Herb. Madr. ex WalL Cat. sub n. 6754- Momoidica tuberosa.
hirsutus, Hook. f. in Oliver, FI. Trop. Afr. ii. 546, pro parte=Welwitschii.
hirsutus, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 497.— Afr. austr.

CUCTJMIS:—
Hookeri, *Naud. in Gard. Chron.* (1870) 1503.—Afr. trop.
integrifolius, Roxb. Hort. Beng. 70; FL Ind. iii. 73* — Trichosanthes integrifolia.
intermedium, M. Roem. Syn. Pepon. 80—Momordica Charantia.
jamaicensis, Bert, ex Spreng. Syst. iii. 46 = C. Melo.
jucunda, F. Mnell. in Trans. Phil. Inst Viet, iii- (1859) 46 - C. Melo.
laciniosus, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 461 = Citrullus vulgaris.
lagenarius, Dum. Fl. Belg. 54 = Lagenaria vulgaris.
lineatus, Bosc, in Joum. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 251. t 87 = Luffa aegyptiaca.
longipes, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 547— Afr. Irop.
lusonicus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 861 •= Melothria indica.
macrocarpos, Wender. ex Mart. Reise Bras. i. 536" Cucurbita Pepo.
maculatus, Willd. Sp. PI. iv. 614 = C. Melo.
maderaspatanus, Linn. Sp. PI. 1012 ^ Melothria maderaspatana.
maderaspatanus, Soland. ex Seem, in Journ. Bot. (1864) 47 = Melothria Grayana.
madraspatanus, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. 723 = C. Melo.
megacarpus, G. Don, Gen. Syst. iii. 28=Luff* aegyptiaca.
Melo, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 775-trigonns.
Melo, *Linn. Sp. PI.* 1011.—Geront. trop.
melonitrigonusx, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. xviii. (1862) 171.
membranifolius, *Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* 545.—Afr. trop.
metuliferus, *E. Mey. ex Schrad. in Linnaea,* (1838) 406, nomen; *et Naud. in Ann. Sc. Nat-* Ser. IV. xi. (1859) 10.—Afr. austr.
missionis, Wall. Cat. n. 6728 = Trichosanthes cucumerina.
Momordica, Roxb. Hort. Beng. 70; Fl. Ind. iii. 720" C. Melo.
moschatus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 852 • Melo.
Muelleri, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. 84 = Melothria Muelleri.
muricatus, Willd. Sp. PI. iv. 613 = sativus.
myriocarpus, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. (1859) 22.—Afr. austr.
Naudinianus, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. =dissectifolius, Citrullus Naudinianus.
odoratissimus, Moench, Meth. 654=C. Melo.
officinarum-melo, Crantz, Inst 1.172 = C. Melo?
operculatus, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 348* Luffa acutangula.
Panchenànus, Naud. in Ann. Sc. Nat Ser. IV. (1859)112. t. 8 = C. Melo.
pareiflorus, Salisb. Prod. 157 = C. Anguria.
Pavel, Kostel. in Allg. Med-Pharm. Fl. ii. 73* Coccinea indica.
Pedate, Crantz, Inst. i. 172 = Anguria pedata?
pedatijidus, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 418= Melo.
pedatus, Linn. Syst. ed. X. 1279 = Anguriaped*.
pentandrus, Roxb. ex Wight & Am. Prod. Luffa aegyptiaca.
Pepo, Dum. Fl. Belg. 54"Cucurbita Pepo.
perennis, E. James, Exped. Rock. Mount, n- Cucurbita foetidissima.
perpusillus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. ed. I. Art. iv. 11 = Melothria perpqsilla.
persicodorus, Seiz. in Verh. Ver. Bef. Gartenb. 879 = C. Melo.
persicus, M. Roem. Syn. Pepon. 71 = C. Melo.
picrocarpus, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. (1859) 46 = C. Melo.
pictus, Jacq. Hort. Vindob. iii. 17 = C. Melo.
Princeps, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. Linnaea, xv. (1841) Litt. 100 = C. Melo.
prophetarum, Jacq. Hort. Vindob. t. 9 =
prophetarum, *Linn. Cent.* i. 32; *Amoen. Acad.*. —Arab.; Afr. trop.
prophetarum, Meyer, ex Cogn. in DC. Monog. iii. 492=dissectifolius.
prophetarum. Wall. Cat. n. 6738 =trigonus-
Pseudocolocynthis, Royle, IUnstr. Bot. Him»l- 47. f. 2-trigonns.

CUCUMIS:—

^*fnol ocynthis,* Wender. Sel. Sem. Hort. Marb. ^834) ; Linnaea, x. (1888) litt. 77 = Citrullus Colocyntms.

Putescens, Willd. Sp. PI. iv. 614 = C. Melo.

pubiflorus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 12—Malaya.

Afiiflrop.

pyriformis, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 342 = trigonus.

Rapallito, Carr. in Hortic. (1872) «0-CncurHta maxima.

reflexus, Zeyh. ex DC. Prod. 8°0=C-Melo.

fe^f-Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 419-C. Melo.

Wtel Allg-Med Phann F1 788 - Coccinia indica.

Sow. i» Han. h- Sond. Fl. Cap.* il. 497—Afr. austr.

sagittatus, Pey in S«b. Aead. Wien. Mat.-Nat. xxxviii (18«» 567.—Afr. trop.

sativus, Linn. Wlt-Ind. or.

Schraderi M. Roem. Syn. Pepon. 78-C. Melo.

sepium, G. F. Mey- Pl*m F^ EsSeq 278=Lnffa opercaUta.

serotinus, Haberle, (1827) 376 = C. ? Verh - Vtrr GBttBb

setosus, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 491—Ind. or.

Sonderii, Cogn. I. c. 480.—Aft. austr.

striatus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. L 296 Coccil)ia adoensis.

subsericeus, Hook./, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 54fi.—Afr. trop.

Tinneanus>. Kotschy & Peyr. PI. Tinn. 17.18 = metuliferus.

trijoi Wxs, Linn. Syst. ed. X. 1279 - Anguria trifoliata.

trigo, Ras Hort. *Ind.* iii. 722—Ind. or.

trilobatus, forsk. Fl. Aegypt. Arab. 168-FigareL

trilobat 1279 = Anguria trilobata.

tuberosus, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 344 = Momordica tuberosa.

tubiflorus, Roxb. ex Wight nopetalum cochinchinense. Ara L c M8 Gym

turbinatus, Roxb. Hort. Beng. 70 ; F1 Ind HL 728= trigonus.

umbilicatus, Sallsb. Prod. 1W-C Melo.

utilissimus, Roxb. Hoit BTM« 70! FL Ind iU 721 ~ C. Melo.

verruc Herb. Rottl. exC. B. Clarke, in Fl. Brit. Ind. =Hbyonopisis ladhiaa.

villosus, BoiS5, & Mdo. N<5. Diagn. Ser. II. ii. 59=C.

Welwitschii Cogn. in DC. Mo»<>g- Pha Ui 490—A Mrop.

Zapalito, Carr. in Rev Horti«- (IKS) 298 = Cucurbit* maxima.

Zapallo, Steud. Nom. ed. II. i. 452 = CucurbiU Pepo.

CUCURBITA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i 822

OZODY Rafin. Atl. Journ. 145 (1832).

PEPO, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).

PILEOCALYX, Gasparr. in Rendic Acad. Sc. Nap. vi. (1847) 409.

SPHENANTHA, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 416.

TRISTEMON, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 586.

acutangula, Blume, Bijdr. 932 = Luffa acutangula.

alba, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 344 = Benincasa cerifera.

Anguria, Duchesne, in Lam. Encyc. 168-atrnllm vulgaris.

aspera, Soland. ex Forst. Prod. 92. Cucumis Melo.

asperata, Gill. in Hook. Cucurbitella asperata. Misc (1853) M4 = C. Pepo.

asteroides, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 407, nomen illd. Sp. Pl. iv. 607 = C. Pepo.

aurant *All. ex Steud. N* I. 244.—Hab. ?

bonon

cafra, Ecki. & Zeyh. Enum. 279-Citrullus vulgaris.

californica, (1876) ISR. Torr. *Wat. Prac. Am. Acad.* xi. 0»« ga, bor. occ.

<aaacerife,a. Ch,Hain Wall, C L 6718 Benin

CTJCTJRBITA:—

campanulata, D. Dietr. Syn. PI. v. 860-Luffa ombellau.

ceratoceras, Haberle, ex Mart. Relse Bras. i. 636 = C. Pepo.

cerifera, Fisch. Cat. Hort. Gorenk, ex Savi, in Bibliot. Ital. ix. (1818) 158-Beninca>a cerifera.

ciceraria, *Molina, Sagg. Chil. ed. Germ.* 316.—Chili.

Citrullus, Linn. Sp. PI. 1010 = Citrullus Tulgaris.

dtrullus, M. Roem. Syn. Pepon. 84 = C. Pepo.

clodiensis, Nocca, Fl. Ven. v. 62 = C. Pepo.

coccinea, G. Don, Gen. Syst. iii. 41 = Physedra Barter.

Colocyntha, Link, Handb. i. 643 - Citrollns Colocynthis.

Courgero, Ser. in Mem. Soc. Phys. Genier. iii. (1826) II. t. 1-C. Pepo.

cucullata, Boj. ex Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 627-PeponiaVogelii.

cucumifera, Schrad. in Linnaea, iii. (1838) 407, nomen = C. Pepo.

digitata, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 60.—N. Mexic.

dioica, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 347 - Coccinia indica.

elongata, Bean, ex Schrad. in Linnaea, xil. (1888) 407 = C. Pepo.

eseulenta, S. F. Gray, Nat. AIT. Brit. PI. ii. 662 = C. Pepo.

evodicarpa, Hassk. Hort. Bogor. Desc. i. 306 - Sicana odorlfera.

exanthematica, Fenzl, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 298 = Coccinia Moghadd.

Farinae, Mozz. ex Nnud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 17-maxima.

farinose, Blume, Bijdr. SiSl = Benincasa cerifera.

fastuosa, Salisb. Prod. 157 = C. Pepo.

ficifolia, *Boucht, in Verh. Ver. Gartenb. Berl.* xii. (1837) 206—As. or.

ficifolia, Wall. Cat. n. 6721 = Trichosanthes himalensis.

foetidissima, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 123 Mexic.

Galeottii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 661—Mexic.

gigantea, Salisb. Prod. 157=C. Citrullus.

grisea, M. Roem. Syn. Pepon. 86 - C . Pepo.

hieroglyphica, *Rosenth. Syn. PI. Diaph.* 683.—Hab.?

hippopera, Ser. FL Jard. et Cult il. 681 = moschata.

hispida, Thunb. Fl. Jap. 322 = Benincasa cerifera.

hybrida, Bertol. ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 29 = C. Pepo.

idolotatrica, Willd. Sp. PI. iv. 607 = Lagenaria vulgaris.

Lagenaria, Linn. Sp. PI. 1010 = Lagenaria vulgaris.

leucantha, Duchesne, in Lam. Encyc ii. 150 =• Lagenaria vulgaris.

lignosa, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.—Am. austr.

littoralis, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 190-Benincasa cerifera.

macrocarpa, Gasparr. in Rendic. Acad. Sc Nap. vi. (1847) 447=moschata.

mammeata, Molina, Sagg. Chil. 133 - C . Pepo.

mammosa, J. F. Gmel. Syst. 101 = praec.

marsupiiformis, Haberle, ex M. Roem. Syn. Pepon. 92 = C. Pepo.

maxima, *Duchesne, in Lam. Encyc.* ii. 161.—As. trop. (Orb. trop. cult).

maxima, Wall. Cat. n. 6720 = moschata.

medullaris, *Haberle, ex M. Roem. Syn. Pepon.* 92, nomen.—Hab.?

melanaeformis, *Carr. in Rev. Hortic.* (1880) 187.—Japon.

melanosperma, A. Braun, Cat. Hort. Karls (1824), nomen; Gasparr. in Rendic. Acad. Sc. Nap. vi. (1847) 448 = ficifolia.

Melopepo, Linn. Sp. PI. 1010 = C. Pepo.

Melopepo, Lour. Kl. Cochinch. 598^moschata.

Melopepo, Wall. Cat. n. 6725 = Trichosanthes pubera.

micrantha, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1856) 17 - Melothria Muelleri.

moschata, *Duchesne, ex Poir. in Diet. Sc. Nat.* xi. (1818)234.—As. trop.

multiflora, Soland. ex Forst. f. Prod. 92, nomen-Luffa aegyptiaca.

oblonga, Link, Handb. i. 643 = C. Pepo.

odori/era. Veil. Kl. Flum. x. t. 98 = Sicana odorifera.

mi/era, Linn. Mant i. 126 = C. Pepo.

OTJCTTRBITA:—

palmata. 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 137.—Calif.

Pepo, *Linn. Sp. PI.* 1010.—Oriens j Afr. trop.

Pepo, Lour. Fl. Cochinch. 693 = Benincasa cerifera.

Pepo, Veil. Fl. Flum. x. t. 100 = Lagenaria vulgaris.

Pepo, Wall. Cat. n. 6722-moschata.

perennis, A. Gray, in Bost. Journ. Nat Hist. vi. (1850) 193 = foettdissima.

perpusilla, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 105 = Melothria perposilla.

pitei/ormis, M. Roem. Syn. Pepon. 88=maxima.

pinnatifida, Schrank, in Syll. Ratiab. i. (1824) 190 = Cltmllus vulgaris.

polymorpha, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 162 = C. Pepo.

pomiformis, M. Roem. Syn. Pepon. 86 = C. Pepo.

pruriens, Soland. in Font. f. Prod. 92 = Benincasa cerifera.

purpurea, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 11 (Quid?).—Java.

pyridaris, Duchesne, ex Foir. in Diet. Sc. Nat xi. (1818) 287 = C.Pepo.

pyriformis, M. Roem. Syn. Pepon. 89 = Lagenaria vulgaris.

pyxidaris, DC. Fl. Fr. iii. 698 = C. Pepo.

radicans, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. vi. (1866) 8.—Mexic.

Rapallito, Carr. in Rev. Hortic. (1872) 399 - maxima.

sagittata, Klein, ex Steud. Nom. ed. II. *I* 462-Melothria heterophylla.

scabra, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 106 = Melothria perpusilla.

Schimperiana, Hochst. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 632-Coccinia Moghadd.

siceraria, Molina, Sagg. Chile, 133 >» Lagenaria vulgaris.

simplex, DC. ex Steud. Nom. ed. II. i. 462 = bononiensis.

spathularis, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 406, nomeu —moschata.

subverrucosa, Willd. Sp. PI. iv. 609 - C . Pepo.

Succado, Naeg. ex Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. IV. vi. (1866)29. t. 2-C. Pepo.

Succedo, Am. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841; 278 = praec. ?

sulcata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 773— maxima.

texana, A. Gray, in Bost. Journ. Nat Hist. vi. (1860) 193-C. Pepo.

triangulata, Hochst. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 532 = Coccinia Moghadd.

tuberculosa, Schrad. Ind. Sem. Hort Golting. (1833) ; Linnaea, x. (1885-36) Lilt. 70 = C. Fepo.

turbaniformis, M. Roem. Syn. Pepon. 87—maxima.

umbellata, Klein, ex Willd. Sp. PI. iv. 6P8 ; Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 616 = Luffa umbellata.

umbellata, Wall. Cat. n. 6724 = Gymnopetalum Wightii.

uraigera, Schrad. in Linnaea, x. (1836) Litt 110-C. Pepo.

vacua, F. Muell. Fragm. vi. 186 = Benincasa cerifera.

variegata, Steud. Nom. ed. II. i. 452-C . Pepo.

venosa, Descourt. Fl. Med. Antill. v. 79. t. 832 - C. Pepo.

verrucosa, Linn. Sp. PI. 1010 = C. Pepo.

villosa, Blume, Bijdr. 931 - Benincasa cerifera.

vittata, Blume, 1. c. 982 —Lagenaria vulgaris.

CUCtTHBITEIOiA, Walp. Rep. vi. 60 (1846) (Cnrcubitella). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook, f, i. 834.

SCHIZOSTIGMA, Am. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 276.

asperata, *Walp. Rep.* vi. 50.—Reg. Argent,

cucumifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 70.—Reg. Argent.

Duriaei, *Cogn. 1. c.* 70. t. 19.—Reg. Argent.

integrifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 733. Paraguay.

CUDICIA, Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Syst. IT. 80, in •yn. (1837).

gynandra, Buch.-Ham. ex Dillw. Rev. Hort. Malab. 41 = Ecdysanthera micrantha ?

trichotoma, Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 80 = Pottsiacantonenuat

OUDBAUTA, Trée in Ann. Sc. Nat Ser. III. viä. (1847) 122. t. 8. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 374.
acuminate, *Afiq. in Zoll. Syst. Ven. Ind. Archip.* 90, 96.—Java.
amboinensis, Miq. Fl. Ind. Bat i. II. 290=javanensis.
frnticosa, *Wight, ex Kurt, For. FL Brit. Burma,* ii. 434. —Reg. Himal.; Burma,
javanensis, *Trie, in Ann. Sc. Nat. Sir.* Ill, VJIL (1847) 123.—Trop. As.; Afr.; Austral,
obovata, *Trie. I. c.* 126.—Malaya,
pubesceni, *Trie. I. c.* 125.—Banna ; Java,
reetispina, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 865 — Hongkong.
Rumpkii, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 262 = javanensis.
sumatrana, *Miq. PL Jungh.* 44.—Sumatra,
triloba, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 49.—China.

CUDRANUS, Miq. Fl.Ind. Bat. i. II. 290 (1859)=praec.

CUELLARA, Fen. Syn. i. 483 (1806) -seq.

CUELLARIA, Ruiz & Pav. Prod. 59.1.10 (1794); Syst. Veg. 108 (1798)-Clethra, Linn. (Ericac).
ferruginea, Ruiz & Fav. Syst. Veg. 103-Clethra ferruginea.
obovata, Ruiz & Pav. 1. c 104-*Clethra obovata.
revoluta, Ruiz & Pav. 1. c 103=Clethra revoluta.

CUEPIA, J. F. Gmel. Syst 820 (1791) =Couepia, Anbl. (Rosac).

CUERVEA, Triana, ex Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 370-Hippocratea, Linn. (Celastrin.).
amplissima, Miers, 1. c. 378.—Ind. occ.
granatensis, Miers, 1. c. 371 = H. granatensis.
latifolia, Miers, 1. c.372 = H. integrifolia.
megacarpa, Mien, 1. c. = H. megacarpa.
ovali/olia, Mien, 1. c. 871 - H. ovalifolia.

CUIETE, Adans. Fam. ii. 207 (1768) - Creucentia, Linn. (Bignoniac.).

CUITLANZINA, Lindl. Orch. Sel. 15 (1826) = seq.

CUITLAUZINA, La Llave *Sc* Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. (Orch. Opusc.) 32 (1825) - Odontoglossum, H. B. & K. (Orchid.).
pendula, La Llave *Sc* Lex. 1. c 33 = 0. citrosmum.

CUITLAUZINIA, Reichb. Norn. 54 (1841)=praec.

CUJETE, Auct CUIETE, Adans. = Crescentia, Linn. (Bignoniac.).

CUJUNIA, Alef. in Bonplandia, ix. (1861; 101- Viola, Toum. (Legumin.).
grandiflora, Alef. 1. c = V. grandiflora.

CUXCASIA, Beauv. Fl.' Owar. i. 8. t. 8 (1805). *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 980.
DENHAMIA, Schott, Melet. 19 (1832).
angolensis, *Welw. ex Schott, in Journ. Bot.* iii. (1865) 86.—Afr. trop.
scandena, *Beauv. Fl. Owar.* i. 4. t. 3.—Afr. trop.

CUIiCITITTM, Hnmb. & BonpL PI. Aequin. ii. 1.1. 66, 67 (1809). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. £ ii. 444.
LASIOCEPHALUS, Schlecht. in Get. Nat. Fr. Berl. Mag. viii. (1818) 808.
ORESIGONIA, Schlecht ex Lets. Syn. Comp. 393 (1882).
adscendens, *Benth. PI. Hartw.* 205.—N. Granat
candidum, D. Don, ex Hook. *Sc* Am. in Hook. Journ. Bot iii. (1841) 843 = Senecio Poeppigii
canescens, *Numb, (f Bonpl. PL Aequin.* ii. 4.167.—Peruv.
dentatum, D. Don, ex Hook. *8c* Am. in Hook. Joum. Bot iii. (1841) 343 = Senecio Gilliesii.
denticnlatum, *Turcw. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 205.—Peruv.
deiressum, D. Don, ex Hook. *Sc* Am. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 342-Senecio depresras.
Gayanum, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 180.—Chill
glaciale, *Ueyen V Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* six. *Suppl.* i. (1843) 278.—Peruv.

CUIiCITOTH:—
Haenkei, *Wedd. Chlor. And.* i. 139.-Perav.
humile, *DC. Prod.* vi. 325.—Am. austr.
Hyoseridis, *Benth. PL Hartw.* 204.—N. Granat
hypoleucum, *Turc: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1861) I. 206.—Ecuador.
ilici/olium, Spreng. Syst. iii. 431-Senecio Scrobicaria.
Lechlerii, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 66, nomen.—Peruv.
ledifolinm, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 170.—Ecuador.
lineare, Spreng. Syst. iii. 481-Bedfordia linearis.
longifolium, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 206.—Ecuador,
magcllanicum, *Hombr.* to" *Jacquem. ex Decne. Bot. Voy. Astral, et Zil.* 45.—Reg. Magellan.-
Neaei, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 140.—Peruv.
nitidum, Spreng. Syst. iii. 431 = Senecio nitidus.
nivale, *H. B.* &• *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 171.—Ecuador.
Pavonii, *Wedd. Chlor. And.* i. 141.—Peruv.
Poeppigii, *DC. Prod.* vi. 824.—Chili,
reflexum, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 171.—Ecuador.
rosmarinifolium, *Benth. PL Hartw.* 207.—Chili,
nifescens, *Humb. if Bonpl. PL Aequin.* ii. 1. t. 66.—Ecuador.
salicinum, Spreng. Syst. iii. 481 = Bedfordia salicina.
serratifolium, *Meyen* b" *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 279.—Peruv.

CULHAMIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 96 (1775)- Sterculla, Linn.
hadiensis, J. F. Gmel. Syst. 754=S. platanifolia?
platanifolia, Steud. Nom.ed. I. 245 - S. platanifolia.
triloba, Rafin. Sylva Tellur. 73 = S. platanifolia 1

CULLAY, Molina, ex Steud. Norn. ed. II. i. 452 (1840) =Qulllaja, Molina (Rosac.).

CULLEN, Medic in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 881=PBoralea, Linn. (Legnmin.).
corylifolium, Medic 1. c. = P. corylifolia.

CTTJIJIIENXA., Wight, Ic. tt 1761,1762 (1852). *MALVACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 212.
excelsa, *Wight, I. c.*—Ind. or.

CULLOMIA, Juss. in Diet Sc Nat xlU. 307 (1826) = Collomia, Nutt. (Polemon.).

CUIiLTTMIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 137 (1818). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 460.
adnata, DC. Prod. vi.499=setosa.
adpressifolia, Sond. in linnaea, xxiii. (1850) 69 = sulcate.
bisulca, *Less. Syn. Comp.* 82.—Afr. austr.
carlinoides, DC. Prod. vi. 499-cirsioides.
ciliaris, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 137.—Afr. austr.
drdoides, *DC. Prod.* vi. 499.—Afr. austr.
decorrens, *Less. Syn. Comp.* 88.—Afr. austr.
floccosa, *E. Mey. ex DC. Prod.* vi. 499:-^Afr. austr.
hispida, *Less. Syn. Comp.* 87.—Air. austr.
intermedia, DC. Prod. vi. 498=decurrens.
micracantha, *DC. Prod.* vi. 499.—Afr. austr.
obovata, E. Mey. ex DC. 1. c.=micrantha.
patula, *Less. Syn. Comp.* 82.—Afr. austr.
paudflora, DC. Prod. vi. 500-hispida.
pectinate, *Less. Syn. Comp.* 85.—Afr. austr.
reflexa, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 777 •= decurrens.
rigida, *DC. Prod.* vi. 500.—Afr. austr.
setosa, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 187.—Afr. austr.
setosa, Sieber, ex DC. Prod. y. 222 = Felicia reflexa.
squarrosar *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 138.—Afr. austr.
tublanata, *DC. Prod.* vi. 500.—Afr. austr.
sulcata, Drège, ex Harv. *8c* Sond. FL Cap. iii. 481-bisutca.
sulcata. *Less. Syn. Comp.* 84.—Afr. austr.

CUMAROUMA, Steud. Norn. ed. II. i. 453 (1840) - COUMAROUMA, Aubl. = **Dipteryx,** Schreb. (Legumin.).

CUMARUMA, Steud. **Norn. ed. 1.246** (1821)=praec

CUMARUNA, J. F. Gmel. Syst 1084 (1791)-pnec.

CUMBATA, Rafin. Sylva Tellur. 160 (1888)-Subus, Toum. (Rosac.).
alcefolia, Rafin. L c—R. rugosus.
villosa, Rafin. L c. — R. rugosus.

CUMfiEA, Wight *Sc* Am. Prod. 834 (1834)-seq.

CUMBIA, Buch.-Ham. Mysore, iii. 187 (1807) - Carey* Roxb. (Myrtac).
Coneanae, Bnch.-Ham. in Trans. linn. Soc. xv. (1827) 97=Careya arborea.

CUMBULA, Steud. Norn. ed. II. 1. 463 (1840)=seq.

CUMBALU, Adans. Fam. ii 199 (1768)-Catalp»- Scop. (Bignon.;.

CUMETEA, Rafin. Sylva Tellur. 106 (1838) = Eugenia. Mich. (Myrtac).
alba, Rafin. 1. c.=Myrcia Coumete.
angustifolia, Rafin. 1. c. 107 = E. angustifolia.
divaricata, Rafin. 1. c. 106 = Myrcia divaricata.
fragrans, Rafin. 1. c. = E. fragrans.
microphyla, Rafin. 1. c—Hab. t
Mini, Rafin. 1. c. = Myrcia Mini.
montana, Rafin. 1. c =,£. fragrans.
multiflora, Rafin. 1. c. = E. multiflora.
tomentosa, Rafin. 1. c. = Myrcia tomentosa.

CUMINGIA, Kunth, Enum. PI. iv. 681 (1843) = CUM. MINGIA, D. Don = Conanthera, Ruiz & (Haemodor.).

CTTMUTGIA, Vidal, Phan. Cuming. PhU. 211 (1885). *MALVACEAE.*
philippinensis, *Vidal, I. c.* 212.—Ins. Philipp.

CUMIKIA, Colla, in Mem. Ace. Tor. xxxviii. (1838) 139. t 47. *LABIATAE,* Benth. & Hook, *i-* 1184.
brevidens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 258.—I»- Femand.
eriantha, *Benth. I. c.*—Ins. Juan Femand.
fernandezia, *Colla, in Mem. Ace. Tor.* xxxviii. (1835) 139. t. 47.—Ins. Juan Femand.

CUMINIA, J. F. Gmel. Syst. 309 (1791)-Cuml»«in, Toum. (Umbell.).
Cyminum, J. F. Gmel. L c. 484=Cuminum Cyminum.

CUMINOIDES, Toum. ex Moench, Meth. 98 (1794) -Lagoooia, Linn. (Umbellif.).
obliqua, Moench, 1. c 94-L. cuminoides.

CTJMINTTM, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735) JJp* & ed. II. 115 (1742). *UMBELLIFERAE,* Ben* Hook. f. i. 926.
aegyptiacum, Me'rat, ex DC. Prod, iv- 201 Cyminum.
Cyminum, *Linn. Sp. PI.* 254.—Reg. Mediterr.
Cyminum, Wall. Cat n. 594 = Conandrum »
hispanicum, MArat, ex DC. Prod. iv. 201 Cyminum.
minimum, Steud. Norn. ed. II. i. 458, sphalm. =
minutum, Urv. iu *Uim.* Soc. Linn. Par. i. (18=^ =Microsciadium tenuifolinm.
odorum, Salisb. Prod. 165=C. Cyminum.

CUMMIN, Hill, Veg. Syst. vi. 7 (1764) -praec.

CUMMINGIA, D. Don, in Sweet. Brit Flow. I. iii. t 257 (1828)«Conanthera, Ru» (Haemodor.).
andica, Rafin. n. Tellnr. iii. 61=Con.
campanulata, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. G»r°- I. iii. t. 257 = Con. campanulata.
parvula, PhiL in Linnaea, xxix. (1867-88) 74.
teneUa, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. iv. sub t. 88-Con. campanulata.
trimaculata, D. Don, 1. c t. 88.—Chili.

CUNCEA, BudL-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. (1826)-Enoxla, Linn. (Rubiac.).
trifida, Buch..Ham. I. c.-K. corymbosa.

CUNILA, Linn. Gen. ed. I. 174 (1787). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1188.
MAPPIA, Heist _ M AdanSl Fam_ U_ 193 (1763).
angustifolia, *Gen. et Sp.* 361.—Bras.
bracteolata, ... Pl. i. 354 = Micromeria bracteolata.
Buchanani, Spreng. Neue Entdeck. iii. 88 = Mosl« dianthera.
pitata, Linn. f. Suppl. 87 „ Zizi p ho TM clinopo- "dioides.
coccinea, Nutt. ex Hook. Exot. Fl. ii. t. 163 = Calamintha coccinea.
fasciculata, *Benth. Lab. Gen. et* ... 363.—Bras.
fru ... Willd. Sp. P1_ '• 122=Westrin_gia rosmarini- form?"
g ... FL Bor> Am> '• 18 - CaUraintha
glabeUa
gl 1n0n FL N_ U_ St 2S " CaUmintha
tt - iii.
glabra, A. Gray, Syn. ... N> Am_ Hr x_ 360 « sphalm. = praec.
hispida, Spreng. Syst. i. 54 = Hedeoma hispida.
incana, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 361.—Bras.
incisa, *Benth. l. c.*—Bras.
... tha, *Benth. l. c.*—Mexic.
... Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 57 = Salvia lyrat'a.
... folia, *Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1289.—Mexic.
... na, Lin« *Syst.* ed. X. 1359.-Am. bor.
menthoides, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 363.—Bras.
microcephala, *Benth. 1. c.* 364.—Bras.
nepalensis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 107-Mosla dianthera.
paniculata nomen "ILf... ex Steud_ Nom_ ... 4S8>
pipe, r&ISssS:" "/\ /\ /\ rt Sp7_ • 3
polyantha, Benth. I. c. 362.—Mexic.
pulegioides, Linn. Sp. PI. ed. II. 8( ) = Hedeoma pulegioides.
secunda, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 186.—N. Mexi
spi ... Lah_ Gen_ *SP- 362—Bias.
sta Sloif ... Ga/_ •" BulL Acad_ BTUX_ xi„ »• (3*4) 'iQn— Mexic.
str CLL » ... Lai_ Gen_ *SP- 362,-Bras.
thymoides, ... lienth_ L & 878 = Micromeria filiformi
thymoides, Linn. Sp. Pl. ed. II. 31 = Thymus Serpyllum.
verticillata, *Moench, Meth. Suppl.* HL—Hab.J

CU ... A, Clos, in C. Gay> FL Chil_ Ui> 20L t. 34 (1849)
... Ban! * S014„„1_ (Rnbiac.).
Sanfuen ... Clos, 1. c. 203. t. 34 - N. depress*.

c UNNINGH_ M l A i R_ Br_in Rich_ Coni£]*9_ * 486. 826). *ONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii.
... LIS, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vii. (1807) 315, nomen prius.
... CULARIA, Rafin. in Load. GanL Mag. viii. (1882) 247.
RATOPITYS, Carr. Conif. ed. II. 227 (1867).
RAXOPITYS, [Nelson] Senilis, Pinacese, 97 (1866).
cupressoides, Zucc. in Sieb. Fl. Jap. ii. 9 = Athrotaxis cupressoides.
lanceolata, Lamb. Pln_ A I. i. 62 ... nenBS.
selaginoides, Zucc. in Sieb. Fl. Jap. ii. 9 = Athrotaxis selaginoides.
sinensis, *" Br_ •» *icA. Co»i/. 80.1.18. f. 8.—China.

CUNNINGHAMIA, Schreb. Gen. 789 (1789) = Malanea, Aubl. (Rubiac.).
sarmentosa, Willd. Sp_ P1_ «• «15 = M. sarmentosa.
verticillata, Willd. l. c. - Duais fragrans!

c UN ... IA, ^"n> S_gL ed_ x_1025 F ... AR, Benth_ * Hook_f_ «• 8 « - (1759). *SAXI-*
... OsTERDICK U B ... urn. Afr 259. t. 96 (1737).
... unsac, *Brongn. & G.* ... in BulL SK_Bot_Fr_ xix. (1672) 150.—N. Cale t'
ballata, *Brongn.* ... I- '--N. Caled.
capensis, *Linn. Sy* Gris' ... X-1026.—Afr. austr.
celebica, *Blume*, "• ^
Deplanchei, *Brongn.* Bidr_ ... *Gris*in Bull ... Bot. Fr.* ix. (1862) 72.—N. Caled.

CUITOSIA:—
indica, *Blume, Bijdr.* 867.—Java.
Lenoimandi, *Vieill. exBrongn. V Gris, in Bull. Soe. Bot. Fr.* xix. (1872) 147.—N. Caled.
macrophylla, *Brongn. (f Gris, 1. c.* ix. (1862) 71.—N. Caled.
pulchella, *Brongn. V Gris, I. e.* 72.—N. Caled.
purpnrea, *Brongn. tf Gris, I. c*—N. Caled.
simplieifolia, Vieill. ex Brongn. *St* Gris, 1. c. xix. (1872) 160-Balansae.
Vieillardi, *Brongn. V Gris, 1. c.* ix. (1862) 72.—N. Caled.

CUNONIA, Mill. Gard. Diet. ed. VIII (1868) = Antholyaa, Linn. (Iiid.).
Antholym, Mill. 1. c = A. Cunonia.

CtnrCTEIA, BaUL Adansonia, iv. 287 (1863-64). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 289.
CLUSIOPHYU.UM, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864) '518.
crassipes, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 610.—Bras.
Sfnceaati, Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 288.—Am. austr.

CUNTO, Adans. Fam. ii. 446 (1763)-Aoronyohla, Forst. (Rutac.).

CUPADESSA, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 219 (1844) = Clpadess», Blume (Meliac.).

CUPAMENI, Adans, Fam. ii. 866 (1763)=Aoalypha, Linn. (Enphorb.).

CUPAMENIS, Rafin. Sylva Tellur. 67 (1838)=Aoalypha, Linn. (Euphorb.).
chamedrifolia, Kahn. 1. c.=A. reptans.
indica, Rafin. 1. c.=A. indica.
reptans, Rafin. 1. c = A. reptans.

CUPANIA, Plain, ex Linn. Gen. ed. I. 339 (1787). *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 399.
DICTYONEURA, Blume, Rumphia, iii. 163 (1849).
DIGONOCARPOS, Veil. Fl. Flum. iv. 1.14 (1827).
DIMEREZA, Labill. Sert. Austro-Caled. 61. t 61 (1824).
DIPLOPETALON, Spreng. Syst iv. Car. PosL 146 (1827).
GUIOA, Cav. Ic iv. 49. t. 3/3 (1797).
LACCODISCUS, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Mnepch. ix. (1879) 496.
MOLINAEA, Juss. Gen. 245 (1789).
TRIGONIS, Jacq. Enum. PI. Carib. 3 (1760).
TRIGONOCARPUS, Veil. Fl. Flum. iv. 1.15 (1827).
TKIPHA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 4.
VOUARANA, Aubl. PI. Goi. Suppl. 12. t. 374 (1775).
acuminata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 667.—Borneo,
acuta, *Hiern, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 677.—Malaya,
adenophylla, *Planch, ex Hiern, 1. c.*—Burma; Malaya,
affinis, *KlotBsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1180, nomen.—Guian.
Aieesia, Cambess. ex Spach, Hist. Veg. Phan. iii. 60 = Blighia sapida.
alba, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 4=dnerea.
Alphandi, F. Muell. Fragm.iv. 158 - Castanospora AlphandL
altemifolia, *Pers. Syn.* i. 413.—Ins. Borbon.
americana, Gaertn. Fruct. ii. 469=glabra.
americana, *Linn. Sp. PI.* 200.—Mexic.
anacardiaefolia, Gardn. in Hook. Lond. Jonm. Bot. ii. (1848) 338=obloDgifolia.
anacardioides, *A. Rich. Sert. Astrol.* 88. t. 13.—Austral.
anodonta, F. Muell. Fragm. ii. 76 = Ratonia anodonta.
apetala, Labill. Sert. Austro-Caled. 72-Elattostachys apetala.
apetala, Macfad. Fl. Jamaic. i. 162-Ratonia .apetala.
apetala. Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 254-Cupaniopsis Storckii.
Aubletii, Miq. Stirp. Surin. SeL 67 *{^Matayba orborescens).—Gvitta.*
Bidwilli, *Benth. Fl. Austral, i.* 460.—Austral.
Blumei, Stead. Norn. ed. II. i. 463 = Harpalia cupanioides.
Brackenridgei, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 266 *{-Arytera Brackenridgn).—hit.* Fiji.

CTTPANIA:—
bracteosa, *Radlk. in Sitib. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 563.—Bras.
canescens, Am. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. ii. (1834) 236 *°Pancovia bijuga.
canescens, Pers. Syn. i. 413 = Hemigyrosa canescens.
castaneaefolia', *Mart, in Flora*, xxi. (1838) II. *Beibl.* 71.—Bras.
Chapelieriana, Cambess. in Mem. Mus. Par. xviii. (1829) 44 (=7Vna *madagasea riensis).*—Madag.
dnerea, *Poepp. br Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 38.—Peruv.
clethrodes. Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 72 - vernalis.
collina, *Punch, tf Sebert, Not. Bois Nouv. Caled.* 230.—N. Caled.
Cordierii, F. Muell. Fragm. ix. 93=Synima Cordierii.
Cunninghamii, Hook. Bot. Mag. t. 4470=Diploglottis Cunninghamii.
cupanioides, *Camb. in Mint. Mus. Par.* xriii. (1829) 29.—Maurit.
Daemeliana, F. Muell. Fragm. ix. 96=Toechima Daemelianum.
denUta. *Moc. V Sesse, in DC. Prod.* i. 614.—Mexic.
Dimereta, Steud. Nom. ed. II. i. 458 =glauca.
diphylla, *Vahl, Eclog. Am.* iii. 9.—Guian.
diphyllostegia, F. Muell. Fragm. v. 146=Diploglottis Cunninghamii.
diplopetala, *Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt.* 224.—Java.
discolor, Vahl, Eclog. Am. iii. 9 *(-Matayba arborescens).*—Guian.
distachya, Blame, Rumphia, iii. 162=verrucosa.
ednlis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin.PI. 190-Blighia sapida.
emarginata, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* L 386.—Bras.
erythrocarpa, F. Muell. Fragm. v. 7 = Toechima erythrocarpa.
erythrorhachis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 509 - Lessertiana.
euphoriaefolia, Cambess. in St Hil. Fl. Bras. Mer. i. 388. t. *80(=Mataybaguianensis).*—Bras.
exangulata, F. Muell. Fragm. iv. 156-Ratonia exangnlata.
excelsa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 126-glabra.
falcata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 252.—Ins. Fiji,
ferrnginea, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 425.—Afr. trop.
foveolata, F. Muell. Fragm. ix. 96=Cupaniopsis ibveolata.
frigida, Linden, Cat n. 12 (1857) 13-dentata.
frondosa, Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 199 = scrobiculata.
frutescens. Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 73 = Sapindus frutescens.
fulva, Mart 1. c. 71 = paniculate,
fulvida, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 875.—N. Granat.
furfuracea, Autfi. *in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 567.—Bras.
fuscescens, Miq. Fl.Ind. Bat.i. II. 567 (=*Mischocarpus fuscescens).*—Java,
fuscidula, *Kurt, in Joum. As. Sac. Beng.* xli. II. (1872) 302.—Burma.
Gelonium, Steud. Nom. ed. II. i. 464>laevis, et *Tina Gelonium.*
geminata, Poir. Encyc Suppl. ii. 419 = diphylla.
glaberrima, Duchass. ex Tnana & Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xviii. (1862) 876 - *{Matayba glaberrima).*—Panama.
glabra, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 61.—Ind. occ.
glabra, Triana A Planch, in Ann. Sc. Nat Ser. IV. xviii. (1862) 373=papillosa.
glabrata, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xli. II. (1872) 303.—Burma; Malaya,
glauca, *Cambess. in Mim. Mus. Par.* xviii. (1829) 28. - N. Caled.
gracilis, *Punch. V Sebert, Not. Bois Nouv. CaUd.* 281.-N. Caled.
grandissima, F. Muell. Fragm. iv. 156-Ratonia grandissima.
Griffithiana, *Kurt, in Journ. As. Sac. Beng.* xliv. (1875) II. 188.—Burma,
guatemalensis, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 562.—Guatemala.
guianensis, Miq. Stirp. Surin. Sel. 71=scrobiculata.
Helferi, *Hiern, in Hook. /. FL Brit. Ind.* i. 679.—Burma.

CUPANIA:—
heterophylla, Mart, in Flora, xxi. (18S8) II. Beibl. 69 *(•> Matayba heterophylla).—Sna.*
hinata, Radii, in Sitei. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. 11879) 665.—Guiana,
bispida, *Radlk. 1. c.* 564.—Bras.
inelegans. Spruce, ex Radlk. 1. c. 517 *(—Matayba heterophylla).—Bias.*
isomera, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 52.—Madag.
Jackiaiia, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 678.—Ins. Nicobar.
juglandifolia, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 290-macrophylla.
juglandifolU, *Seem.Fl. Vit.* 46.—N.Caled.
lachnocarpa, F. Mnell. Fragm. iv. 157-Ratonia lachnocarpa.
laevigata, *Miq. Stirp. Surin. Set.* 72.—Guian.
laevigata, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109 *(=Matayba arborescens (f M. guianensis).*—Guiana.
laevis, *Pers. Syn.* i. 418.—Int. Mascar.
lanuginosa, *Sagot, ex Radlk. in Sitei. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 518, nomen ; *et Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xii. (1881) 198.—Guiana,
latifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 126.—Am. austr.
laxiflora, *Benth. in Hook. Kea Journ.* iii. (1851) 198.—Bras.
lentiscifolia, *Pers. Syn.* i. 418.—Ins. Amic.
leptobotrys, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 255 — Ins. Fiji.
Lessertiana, *Cambess. in Mim. Mus. Par.* xviii. (1829) 46. t 8.—Banna ; Malaya,
longifolia, *Benth. in Hook. Kent Journ.* ii. (1850) 211.—Bras.
lucens, F. Muell. Fragm. iii. 44 = Akania Hillii.
Macgillivrayi, *Seem. Fl. Vit.* 46.—N. Caled.
macrophylla, Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 74 =Talisia macrophylla.
macrophylla, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 291.—Cuba.
madagascariensis, G. Don, Gen. Syst. i. 669 *(-Tina Gelonium).*—Madag.
Martyana,F. Muell. Fragm. v. 8=Sarcopteryx Martyana.
mexicana. Tun. in Bull. Soc Nat Mosc xxxi. (1658) I. 405 *(= Matayba mexicana).*—Mexic.
micrantha, Mart, in Flora, xxi. (1888) II. Beibl. 68 (-*Matayba guianensis).*—Bras.
Minjalilen, *Blume, Rumphia,* iii. 162.—Java.
Mischocarpus, Steud. Norn. ed. II. i. 454=Lessertiana.
Mortoniana, F. Muell. Fragm. v. 177 =Rhysotoechia Mortoniana.
multiflora, Mart, in Flora, xxi. (1888) II. Beibl. 75 = Scyphonycbium multiflorum.
tnultijuga, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 287. t. 31-glabra.
mutati.'is, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 666-distachya.
nervosa, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict.iii.* (1869) 27.—Austral.
nitida, DC. Prod. i. 61S=Paullinia tricomis.
oblongifolia, *Mart, in Flora,* xxi. (1&38) II. *Beibl.* 67.—Bras.
oblongifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 587-DitteIasma Rank,
obtusa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 667.—N. Guinea.
oppositifolia, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 292. t 32 = Ratonia apetala.
O'Shanesiana, F. Muell. Fragm. ix. 96 - Ratonia O'Shanesiana.
pallidula, *Hiern, in Hook./. Fl. Brit.* i. 676.—Malacca.
Pancheri, Baill. Adansonia, xi. (1874) 246-Storthocalyx Pancheri.
paniculata, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Her.* i. S88.—Bras,
papillose, *Radlk. in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 567.—N. Granat
pentapetala, *Wight V Am. Prod.* 113.—Ind. or.
pentapkylla, Wight, Ic. t. 402 = pentapetala.
Perrottetii, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 45 (*-Lepidopetalum Perrottetii).*—Ins. Philipp.
platycarpa, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 567.—Bras,
pleuropteris, *Blume, Rumphia,* iii. 168.—Borneo.
Poiretii, *Kunth, in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. i. (1824) 458.-Ins. S. Trinit
porosa, Miq. Stirp. Surin. SeL 70 = scrobiculata.
praealta, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xii. (1881) 199.—Guiana.

CTTPANIA:—
Pseudorhus, *A. Rich. Serf. Astrolab.* 84. t. 14.—Austral.
punctata, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 889 (*-Matayba punctata).*—•Bras,
punctulata, *F. Muell. Fragm.* iii. 12.—Austral.
purgans, Poepp. *Sc* Endl. Nor. Gen. et Sp. iii. 88 (*=Matayba purgans).*—Bras.
pyriformis, F. Muell. App. Rep. Intercol. Exhib. 25-Ratonia pyriformis.
quercifolia, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1180, nomen.—Guiana,
racemosa, *Radii, in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 568.—Bras.
Ratonia, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 47 — Ratonia domingensis.
regnlaris, *Blume, Rumphia,* iii. 159.—Borneo.
reticulata, Cambess. in M£m. Mus. Par. xviii. (1829) 41; Splitg. in Hoev. *Sc* De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 708=scrobiculata.
rettisa, *Klottsch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui.* 1180, nomen.—Guiana,
revoluta, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 49,105.—Ins. Philipp.
rboifolia, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 254.—Ins. Fiji.
Richii, A. Gray, 1. c. 267 (- *Lepidopetalum Perrottetii).—ha.* Philipp.
rigida, *Radlk. in Stttb. Math-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 564.—Bras.
Robertsoni, F. Muell. Fragm. v. 146-Rhysotoechia Robertsoni.
Roxburghii, Wight, Ic t. 402=pentapetala.
rubiginosa, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 666 = Poiretii.
rufescens, *Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xviii. (1862) 374.—N. Granat.
rugosa, *Radlk. in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 563.—Bias.
rupestris, Cambess. in M<m. Mus. Par. xviii. (1829) 29 = Harpullia cupanioides.
salicifolia, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 443 = Atalaya salicifolia.
sapida, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 94=Blighia sapida.
Saponaria,Ya%. Sya. i. 418=americana, et Sapindus Saponaria.
saponarioides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 61=praec.
Scbomburgkii, *Klottsch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui.* 1180, nomen.—Guiana.
scrobiculata, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 281=dentata.
scrobiculata, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. v. 127 (= *Matayba scrobiculata).*—N. Granat.
scrobienlata, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 109.—Guian.
Seemanni, Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. xviii. (1862) 875 = sylvatica.
semiglauca, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 457.—Austral.
serrata, *F. Muell. Fragm.* iii. 43.—Austral.
setigera, A. Conn, ex Heynh. Nom. i. 239 - Pseudorhus.
Sideroxylon, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 28 = Stadntannia oppositifolia.
spectabilis, *Radlk.in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 559.—Mexic.
spinosa, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 184.—Ins. Philipp.
Spruceana, Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 199 (=*Matayba Spruceana).*—Bras.
stipata, F. Muell. Fragm. ii. 75-Ratonia stipitata.
stipitata, *Panch. (f Sebert, Not. Bois Nouv. CaUd.* 282.—N. Caled.
subalbens, Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 72-Talisia subalbens.
subcinerea, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 258.—Austral.
subrepanda, Mart, in Flora, xxi. (1888) II. Beibl. 70=Poiretii.
subsinuata, *Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui.* 1180, nomen.—Guiana,
snbundulata, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 6, 106.—Ins. Philipp.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 666.—Sumatra.
sylvatica, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 46 (= *Matayba sylvatica).*—Bras.
sylvatica, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 98.—Panama.
tenax, A. Conn, ex Benth. FL Austral, i. 462-Ratonia tenax.

CUPANIA:—
ttnvinhii,Radlk.inSittb.Math~Phys.Acad.Muench. ix. (1879) 562.-Bras.
Thouarsiana,Cambes&. in Mim.Mus. Par. xviii. (1829) 45 *('Tina Gelonium).*—Madag.
Tolambitou, *Cambess. I. c.* 43.—Madag.
tomentella, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 468.—Austral.
tomentosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 61=*americana.
trachycarpa, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii-(1861) 168=Trichilia spondioides.
triloba, Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat. *Sit.* IV. xviii. (1862) 876 = scrobiculata.
triquetra, *A. j^ich. Ess. Fl. Cub.* 290.—Cuba,
uraguensis, *Hook, tf Am. in Hook. Bot. Misc.* (1833) 169.—Am. austr.
velutina, *Klo*tsch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui-* 1180, nomen.—Guiana.
venulosa, DC. Prod. i. 613-laevis.
vernalis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 387.—Am. anstr.
verrucosa, *Blume, Rumphia,* iii. 161.—Java.
vitiensis, Seem. Viti, 434 - Elattostacbys vitiensis.
Voua-rana, *Cambess. in Mim. Mus. Par.* xviU (1829) 42.—Guiana.
Wadsworthii, F. Muell. Census, 24 = Cupaniopsis Wadsworthii.
xylocarpa, *A. Cunn. ex F. Muell. in Trans. PhU-Inst. Viet.* iii. (1869) 27.- Austral,
zanthoxyloides, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* 386.—Bras.
Zippeliana, Blume, Rumphia, iii. 160 - Elattostachys Zippeliana,

CTJPANTOP8IS, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 498, 684. *SAPINDACEAE.*
anacardioides, Radlk. 1. c. 685=Cnpania anacardioides.
apiocarpa, *Radlk. 1. c.* 686.—N. Caled.
azantha, *Radlk. 1. c.* 687.—N. Caled.
chytradenia, *Radlk. I. c*—N. Caled.
crassivalvis, *Radlk. I. c.—N.* Caled.
dictyophora, *Radlk. 1. c.* 589.—N. Caled.
foveolata, *Radlk. I. c.* 585.—Austral,
fruticosa, *Radlk. I. c.* 688.-N. Caled.
ganophloea, *Radlk. 1. c.* 590.—N. Caled.
glomeriflora, *Radlk. 1. c.* 589.—N. Caled.
inoplea, *Radlk. I. c.—S.* Caled.
leptobotrys, Radlk. 1. c. 685 = CupanU leptobotrys.
macrocarpa, *Radlk. 1. c.* 587.—N. Caled.
mynnoctona, *Radlk. I. c.* 688.—N. Caled.
oedipoda, *Radlk. 1. c.* 590.—N. Caled.
petiolulata, *Radlk. 1. c.* 686.—N. Caled.
psilocarpa, *Radlk. I. c.*—N. Caled.
punctulata, Radlk. 1. c 585 = Cupania punctulata.
serrata, Radlk. I. c. = Cnpania serrata.
Storckii, *Radii. 1. c.* 687.—Ins. Fiji,
subcuneata, *Radlk. 1. c.* 689.—N. Caled.
trigonocarpa, *Radlk. 1. c.* 586.—N. Caled.
Wadsworthii, *Radlk. 1. c.* 585.—Austral.

CUPARILLA, Rafin.SylvaTeUur 120 (1838) = Acacia, Tourn. (Legumin.).
myrtifolia, Rafin. 1. c. = A. myrtifolia.
Sophorina, Rafin. 1. c.=A. longifolia.

CUPHAEA, Moencb, Meth. 664 (1794) =seq.

CUPHEA, P. Br. Hist. Jamaic. 216 (1766). *LYTHRA', RIEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 778.
BALSAMONA, Vand. Fast PI. 15 (1771).
BANKSIA, Domb. ex DC. Prod. iii. 88 (1828).
BERGENIA, Rafin. Sylva Tellur. 102 (1838>
DIPETALON, Rafin. Fl. Tellur. 103 (1838).
DUVERNAYA, Desp. in DC. Prod. iii. 8<>
ENDECARIA, Rafin. Sylva Tellur. 102 (1838).
MAJA, Klousch, in Schomb. Fauna et 1191 (1848).
MBLANIUM, P. Br. Hist. Jamaic. 215 (1766)
MELFONA, Rafin. Sylva Tellur. 103 (18S»)-
MEL VILLA, Anders, in Joum. Arts As Sc. » 207, nomen j Lindl. Bot. Reg. t. 852 ("7/J56).
PARSONSIA, P. Br. Hist. Jamaic. 199. t. 21 ("°
QUIRINA. Rafin.-Sylva Tellur. 102 (1838).
acinifolia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.iii-* 99.—Bras,
acinos, *St. Hil. I. c.* 101.—Bras.
acuta, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. — C. Spermacoce.

CUPHEA:—
acutissima, St. Hil. Fl. Bras. Mer. ifi. 105 = antisyphilitica.
aequipetala, *Cav. Ic.* iv. 67. t. 882. f. 2.—Mexic.
aequipetala, Willd. ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 415 = nitidnla.
albida, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 82.—Am. bor.
anagalloides, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 122.—Bras.
angustifolia, *Ja . ex Koehne, in Mart. Fl. Bras*, xiii. II. 232.—
angustifolia, Mart. ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 149 = thymoides.
anti ylla, *Hemsl.* ... *gracili* ... 304.—
to%£ ... Benlh. in Hook. Jonrn. Bot. ii. (1840) ... isyphilitica. V *B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 202—
antisyphilitica, Seem. ... Bot., Voy., Herald> 121=aniso-phylla.
Apanxaloa, DC. Prod. iii. 88=aequipetala.
aperta, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 256.—Bras.
apetala, Hort. ex Koehne 1. c. 232 = micropetala.
appendiculata, ... Voy. Bot. Herald, 121 = C. Infundibulum.
arenarioides, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 121.—Bras.
aristata, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 51.—Guatemala,
arvensis, Benth. PI. Hartw. 87 = jorullensis.
ascendens, ... & Sesse, ex DC. Prod. iii. 86-acquipetala.
aspera, *Chapm. Fl. S. V. St.* 185.—Florida.
aspera, Willd. ex Schlecht. & Cham, in Linnaea, v. (1830) 569 = aequipetala.
atrosanguinea, Warsz. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. ... aequipetala.
Bailloni, ... *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* iv. (1883) 401.—Mexic.
... *Schlecht. Linnaea*, ii. (1827)
barbigera, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 289-C. Llavea, *Lex.*
bilateralis, Pohl ... 256 = aperta.
Boisseriana, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* iv. (1886) 42.—Mexic.
bonariensis, Gill. ex Hook. & Arn. Bot. Misc. iii. (1829) ... = iruticosa.
brachiata, *Mart. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 298.—Bras.
bractcata, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 289.—Mexic.
bracteata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 16 = aequipetala.
Brownei, Jacq. Holt Vil. >dob. ii. 83=viscosissima.
Bustamanta, ... *Desc. fasc.* i. ... —Mexic.
calaminthaefolia, *Schlecht. in Linnaea*> xii. (1838) 274.—Mexic.
calcarata, *Benth. Pl. Hartw.* 7.—Mexic.
calophylla, *Cham.* b* *Schlecht. in Linnaea*, ii. (1827) 361.—Bras.
campestris, *Mart. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 265.—Bras.
campylocentra, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 180.—Uruguay.
cataractarum, *Spruce, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 226.—Venezuela.
ciliata, Koehne, in Engl. ... gl- Bot Jahrb. i. (1881) 454-
cilifolia, Link, ... Koehne. L c ii. (1882) 400 = micropetala.
... 2261 ... Koehne, ... Mart. Fl. B... -xiii. ... niceana.
... LT, (IM6)
cordifolia, *Sims, Bot. Mag.* t. 2201.-Bras.
... (1882) 40 ... Koehne, in *Bot.* ... 85=cyanea.
Comm... pulchra.
... *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II.
... *HiLFl. Bras. Mer.* iii. 112.-Bras.
ifolia ... Nov. Gen. et Sp. vi. 206 =
eordalata, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 140 = Swartziana.

CUPHEA:—
comicnlata, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 236.—Mexic.
corymbifera, Nees, in Flora, iv. (1821) 80a-spicata.
costata, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 298.—Bras.
cuiabensis, *Mart, ex Koehne, I. c.* 801.—Bras,
cyanaea, *Mac. tf Sesse, in DC. Prod.* iii. 85.—Mexic.
dactylophora, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 266.—Guiana.
debilis, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 51.—Mexic.
decandra, *\Dryand. in] Ait. Bert. Kew.* ed. II. iii. 161.—Jarnaic.
densiflora, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 247.—Bras,
densiflora, *St. Hil. ex Steud. Nom.* ed. IL i. 454, nomen.—Bras,
denticulate, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 198.—Venezuela.
diosmaefolia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 118.—Bras.
dipetala, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1682) 422 = verticillata.
dispenna, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 278.—Bras.
divaricata, Pohl, ex Koehne, 1. c. 255 = C. Balsamona.
dodecandra, Hemsl. Diagn. PI. Nov. 51 = subuligera.
Donkelaarii, Hort. Berol. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. n. 237=nitidula.
elegans, Klotzsch, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. i1.301=C. Melvilla.
elliptica, *Koehne, ex Engl. Bot. yahrb.* it (1882) 145.—Mexic.
elongata, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras, xiii II. 270=Pseudovaccinium.
eminens, Planch. & Linden, in Fl. des Serres, Sir. I. x. (1864-55) 69=micropetak.
enneanthera, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 280.—Bras.
epilobiifolia, *Koehne, 1. c.* 228.—Costa Rica.
erecta, Hoffmgg. Verz. Pfl. 290—procumbens,
erectifolia, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 277.—Bias.
cricoides, *Cham. V Schlecht. in Linnaea*, ii. (1827) 866.—Bras.
euphorbioides, St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 112 = micrantha.
excoriata, *Mart, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 278.-Bras.
expansa, Schott, ex Koehne. 1. c. 256-aperta.
ferruginea, *Pohl, ex Koehne, I. c.* 274.—Bras,
flava, *Spreng. Nov. Prtm.* 14.—Bras.
floribunda, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 289 = Hookeriana.
floribunda, Lehm. in Linnaea, vi. (1881) Litt. 11 = aequipetala.
fruticosa, Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiH. II. 244 = spicata.
fruticosa, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 156.—Bras.
fruticulosa, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 715--spicata.
fuchsiaefolia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 106.—Bras.
fulgens, Fenzl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 237 = Hookeriana.
fulgida, Fenzl, ex Koehne, 1. c. = Hookeriana.
Galeottii, Hort. Berol. ex Koehne, 1. c-cyanea.
Gardneri, *Koehne, I. c.* 303.—Bras.
glabra, Gill, ex Hook. *8c* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 814=Commersoniana.
glauca, *Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 288.—Bras.
glossostoma, *Koehne, 1. c.* 234.—Mexic
glutinosa, *Cham. & Schlecht. in Linnaea*, ii. (1827) 369.—Bras,
graciliflora, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 236.—Mexic.
gracilis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 199.—Am. austr.
gracilis, Seem. Bot. Voy. Herald, I21=utriculosa.
grandiflora, *Pohl, tx Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 303.—Bras.
gratioloides, Griseb. Cat. PI. Cub. 105 = mimuloides.
Grisebachiana, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 225.—Cuba.
Gùelichii, *Spegaei. in Anal. Soc. Cient. Argent*, xvi. (1883) 99.—Reg. Argent,
heteropetala, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 232.—Mexic.
heteropbylla, *Benth. PI. Hartw.* 87.—Mexic.

CIXPHEAs—
hirsuta, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1888) 315=glutinosa.
hirsuta, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras, xiii: n. 258 = ingrata.
hirta, DC. Prod. iii. 86-micrantha.
hirtella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 197-decandra.
hispida, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 297 = sessiliflora.
Hookeriana, *Walp. Rep.* ii. 107.—Mexic.
hypericoides, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 261 = thymoides.
hyssopifolia, Giiseb. in Goett Abh.xix. (1874) 140. mesostemon, Grisebachiana.
hyssopifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 199.—Mexic.
hyssopoides, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 114.—Brat.
hyssopoides, Schott, ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 148 = ingrata.
ianthina, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 288—Bolivia.
idiotricha, Steud. ex Koehne, 1. c. 294 = flava.
ignea, *A. DC. in Fl. des Serres*, Ser. I. v. (1849) 500 C.—Mexic.
tmbricata, Moric. ex Koehne, in Mart. FL Bras. xiii. II. 291=sericoides.
impatientifblia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 113.—Bras,
inaequalifolia, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 286.—Bras.
Infundibulum, *Koehne, 1. c.* 286.—Costa Rica,
iiigrata, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea*, ii. (1827) 371.—Bras.
intermedia, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 62.—Mexic.
ixodes, *Hemsl. I. c*—Mexic.
jorullensis, Hook. Bot. Mag. t. 5232 = micropetala.
jorullensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 208 — Mexic.
Karwinskii, *Koekne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 234.—Mexic.
Klugii, *Roetl, in Belg. Hortic.* xxiv. (1874) 39.—Peruv.
laminnligera, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 234.—Mexic.
lanceolata, Baill. Hist PI. vi. 481=procumbent
lanceolata, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 150.—Mexic.
lanceolatt-ovata, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 299 = lutescens.
laricoides, *Koehne, I. c.* 292.—Bras.
leptoclada, Casar. ex Koehne, 1. c. 240 = pascuorum.
leptopodaj *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 52.—Guatemala.
Liebmannii, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 231.—Mexic.
ligustrina, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, il. (1827) 85D-= fruticosa.
linarioides, *Cham. V Schlecht. I. c.* 307.—Bras,
linifolia, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 282.—Bras.
Llavea, Hort. ex Koehne, in Engl. Bot Jahrb. ii. (1882) 410=aequipetala.
Llavea, *Lex. in La Have b" Lex. Nov. Vtg. Besc fasc.* i. 20.—Mexic.
Llavea, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1386.—Guatemala.
Llaveana, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 422 -C. Llavea, *Lindl.*
lobelioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 105.—Cnba.
lobophora, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. It. 285.—Mexic.
longiflora, *Koehne, I. c.* 246.—Bra*.
longipedunculata. Mart, ex Koehne, 1. c. 281-linarioides.
lophostoma, *Koehne, 1. c.* 235.—Mexic.
loxensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 200 = microphylla.
ludda, Langsd. ex Koehne, in Mart. Fl.Bras. xiii. II. 266=aperta.
lutescens, *Pohl, ex Koehne, I. c.* 299.—Bras,
lysimachioides, *Cham. & Schlecht. in Linnaea*, ii. (1827) 874.—Bras.
megapotamica, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 190 = Comxnersoniana.
melampyrifolia, *Pohl, ex Koehne, in Mart. Ft. Bras.* xiii. II. 288.—Bras.
Melanium, R. Br. ex Steud. Nom. ed. I. 245 = viscosissima.
Melvilla, *Lindl. Bot. Reg.* t. 852.—Guiana,
mesostemon, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 252 —

CUPHEA:—
micrantha, *H. B.* &* *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 196.—Venezuela.
micropetala, Baill. Hist Fl. vi. 432=C. Llavea, *Lex.*
micropetala, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 209. t S61.—Mexic.
microphylla, *H. B.* 6* *K. I. c.* 201.—Peruv.
microstyla, *Koehne, in Mart. Fl. Bras,* xiii II. 224.—Mexic.
millefoliata, Pohl, ex Koehne, 1. c. 258=ingrata.
mimnloides, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 570.—Mexic.
miniata, Brongn. in Fl. des Serres, Sér. I. iii. (Janv. 1846) t 10 = C. Llavea, *Lex.*
montana, Roezl, ex Regel, Gartenfl. viii. (1859) 277=jorullensis.
multicanlis, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 228.—Venezuela.
mnltiflora, *Lodd. Bot. Cab.* t. 808.—Ins. Trinit.
Neuberti, Hort ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 397 = C. Llavea.
nitens, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 270 = Pseudovaccinium.
nltidnla, *H. B. (S K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 206.—Mexic.
nudicostata, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 52.—Mexic.
nudiflora, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 454 = spicata.
ocymoides, Decne. in Journ. Horticnlt. iii. t. 8 = aequipetala.
origanifolia, *Cham. If Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 373.—Bras.
origanifolia,~Griieb. in Goett.Abh. xxiv. (1879) 180=spicata.
oriaabensis, Peyr. ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 414 = calaminthifolia.
orthodisca, *Koehne, in if art. Fl. Bras.* xiii. II. 224.—Mexic.
palustris, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 446 = procumbens.
palustris, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 232.—Mexic.
panamensis, Hemsl. Diagn. PI. Nov. 52 = utriculosa.
paradoxa, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 230.—N. Granat.; Venezuela.
parietarioides, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 170 = petiolata.
Parsonsia, *R. Br. ex Steud. Norn.* ed. I. 245.—Ind. occ.
parviflora, Hook. Exot. Bot. t. 151-multiflora.
pascuorum, *Mart, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 240.—Bras.
patula, *St. Hit. Fl. Bras. Mer.* iii. 101.—Bras.
penicillaria, Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 801 ^C. Melvilla.
peplidioides, Mart, ex Koehne, 1. c 255=C. Balsamona.
petiolata, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 173 =viscosissima.
petiolata, *Pohl, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 298.—Bras.
pinetorum, *Benth. PI. Hartw.* 74.—Mexic.
platycentra, Lem. in Fl. dds Serres, ii. (1846) 1.180 = ignea.
platycentra, Benth. PI. Hartw. 7 = C. Bnstamanta.
plumbaginea, Mart, in Flora, xxL (1838) II. Beibl. 62 = calophylla.
Pohliana, Mart, ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. ziii. II. 272 = C. Spermacoce.
polygalaefolia, Pohl, ex Koehne, 1. c. 281=linarioides.
polymorpha, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 108.—Bras,
polymorphoides, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 269.—Bras.
procumbens, *Can. Ic.* iv. 55. t. 380.—Mexic.
procumbens, *Orteg. Hort. Matr.* 17—Cuba,
propinqua, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 53.—Mexic.
prunellaefolia, St. HiL Fl. Bra*. Mer. iii. 108-circaeoides.
Pseudomelanium, Griseb. Cat. PI. Cub. 104-viscosissima.
Pseuaosilene, *Griseb. I. c* 105.—Cuba.
Pseudovacciniam, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 102.—Bras,
pterosperma, *Keohne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 264—Bras.
pubiflora, Benth. PI. Hartw. 61 = cyanea.
pnlchra, *Moric. PI. Nouv. Am.* 168. t. 89.—Bras.
pumila, Pohl, ex Koehne, in Mart Fl. Bras. xiii. II. 26l=linarioides.
pumila, Scbott, ex Koehne, in Engl. Bot Jahrb. ii. (1882) 162=retrorsicapUla.

CUPHEA.—
punctulata, *Koehne, in Mart. FL Bras.* xiii. II. 848.—Bras.
purpurea, Hort. ex Lem. in FL des Serres, Sér. L iv. (1848) 412 •= procumbens.
pustulata, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 224.—Hab.?
quadrifolia, Pohl, ex Koehne, 1. c. 272=C. Spermacoce.
racemosa, Spreng. Syst. ii. 465=spicata.
radicans, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 37=C. Parsonsia.
Radula, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 287.—Bras.
ramosa, Schott, ex Koehne, I. c 256=aperta.
ramosissima, *Pohl, ex Koehne, 1. e.* 249.—Bras,
ramulosa, *Mart, ex Koehne, 1. c.* 289.-^-Bras.
rapunculoides, Griseb. Cat. PI. Cub. 105 = micrantha.
repens, *Koehne, in Mart. Fl. Bras* xiii. II. 251.—Bras.
reticulata, *Koehne, 1. c.* 275.—Bras,
retrorsicapilla, *Koehne, I. c.* 279.—Bras,
rigidula, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 816.—Guiana.
rigidula, Seem. Bot. Voy. Herald, 121=setosa.
rivularis, *Seem. L c.*—Panama.
Roeilii, Cut. in Rev. Hortic (1877) 469 - Hookeiiana.
rotnndifolia, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 224.—Ins. S. Doming,
rnbescens, *Koehne, I. c.* 366.—Bras.
ruficapilla, Mart ex Koehne, 1. c 274=ferroginea.
salicifolia, *Cham.* &• *Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 569.—Mexic.
scaberrima, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 238.—Bolivia.
scabra, Pohl, ex Koehne, 1. c 256=aperta.
scabrida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 203 = aequipetala.
sclerophylla, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 268.—Bras.
secundiflora, Moc & Sesse, ex DC. Prod. iii. 44=spicata.
serpyllifolia, *H. B. ff K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 201. t. 550.—N. Granat.
serpyllifolia, Schuech, ex Koehne, in Mart. FL Bras. xiii. II. 261=thymojdes.
serpyllifolia, Sims, in Bot. Mag. t. 2680=multiflora.
sessiliflora, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 110.—Bras,
sessilifolia, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 7.—Bras.
setose,Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 223.—Mexic.
silenoides, Nees, in Linnaea, x. (1836) Litt. 71 = lanceolata.
Simsii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 151 = multiflora.
spedosa, Hort. ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. ii. (1882) 896=Llavea.
sperguloidés, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 121.—Bras.
Spermacoce, *St. Hil. 1. c.* 114.—Bras,
spicata, *Cav. Ic.* iv. 56. t. 381.—Am. trap.
spicata, Cham. & Scblecht in Linnaea, ii. (1827) 358 = origanifolia.
splendens, Pohl, ex Koehne, in Mart. FL Bras. xiii. II. 270=Psendovaccinium.
Spruceana, *Koehne, 1. c.* 226.—Peruv.'
squamuligera, *Koehne, 1. c.* 235.—Mexic.
stenopetala, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* ii. (1882) 150.—Paraguay.
stricta, Moric. ex Koehne, 1. c. 167=ericoides.
stricta, Pohl, ex Koehne, in Mart Fl. Bras. xiii. II. 277—erectifolia.
strigillosa, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 14 = cyanea.
strigulosa, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 204.—Am. anstr.
strigulosa, Lem. in Fl. des Serres, i. (1845) 39. t. 14 = cyanea.
strumosa, Mo;. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 84=micropetala.
subnligera, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 281.—Mexic
Swartziana, *Spreng. Syst.* ii. 455.—Ins. S. Doming.
tenella, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 289 = mimnloides.
tennissima, *Koehne, in Mart. fl. Bras.* xiii. II. 254.—Bras.
ternata, *Peyr. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 71.—Mexic.
tetrapetala, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 223.—Mexic.
tetraphylla, Pohl, ex Koehne, 1. c. 272=C. Spermacoce.

CTJPHEA:—
thesioides, Hnmb. ex Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i-(1881) 454 = denticulata.
thymoides, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 868.-Bras.
thymoides, Lorentz, Veg. Nordeste Entrerios, 135 glutinosa.
tolucana, Peyr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 72 = Wrightii.
tricolor, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 84=jorullensis.
trifoliata, Pohl, ex Koehne, in Mart Fl. Bras. xiii. 272=C Spermacoce.
Trinitatis, DC. Prod. iii. 88 = multiflora.
tuberosa, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 372.—Bras.
tubiflora, Hort. ex Lem. in FL des Serres, Ser. I. (Dec 1846) 1.180 = ignea.
Urbaniana, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* ii. (1882) 152—Br&s.
utriculosa, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 222.—Mexic.
verticillata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 207.1562—Peruv.
vesiculosa, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 287.—Bras.
villosa, Pohl, ex Koehne, 1, c 299=lutescens.
violacea, Regel, in Flora, xxxiii. (1850) 864=aequipetala.
virgata, Cav. Ic iv. 56. t. 882 = aequipetala.
virgata, DC. Prod. iii. 86=nitidula.
viscosissima, *Jacq. Hort. Vindob.* ii. 83. t. 177.—Ambon
viscosissima, St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 110 = lutescens.
Warmingii, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 802." Bras.
Weddelliana, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* iv. (188») 402.—Bolivia.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 56.—N. Mexic
xorullensis, Spreng. Syst. ii. 466 = jorullensis.
Zimapani, E. Morr. in Belg. Hortic. xiv. (1864) /» Roezl, ex Regel, in Suppl. ad Ind. Sem. Hort. Petr,, (1868) 15=lanceolata.

CUPHEANTHTTS, Seem. Fl. Vit 76 (1865-78)-*MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 724.
neocaledonicus, *Seem. 1. c.*—N. Caled.

CUPHOCARPXTS, Decne. 8c Planch, in Rev. Hortic-(1854) 109. *ARALIACEAE,* Benth. &" Hook. « >• 937.
aculeatus, *Decne.* &* *Planch. 1. e.*—Madag.
inermis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* in. (1884) »"—Madag.

CUPHOEA, Brongn. ex Neumann, in Rev. Hortic. Se* II. iv. (1845-46) 225=Cuphea, R. Br. (Lythrar.)-

CUPI, Adam. Fam. ii. 158 (1768)-seq.

CUPIA, DC. Prod. iv. 398 (1830)=Bandia, Linn. (Rubiac).
auriculata, DC. 1. c. 394 = Anomanthod in auriculata.
corymbosa, DC. 1. c *(=Webera corymbosa).*—Hong-kong.
corymbosa, Hook, ft Am. Bot Beech. Voy. 1» *Webera attenuata).*—Ind. or.
cymosa, DC. Prod. iv. 394=Plectronia didyma.
densiflora, DC. 1. c.=Randiadensiflora.
macrophylla, DC. 1. c. (= *Webera odorata).*—
mollissima, Hook. *8c* Am. Bot Beech. Voy *Webera mollissima).*—China.
odorata, DC. Prod. iv. S94 *{ = Webera odorata),* Ind. or.
oppositifolia, DC. L c =Randia densiflora.
scandens, DC. 1. c. = Randia longiflora. *„ gtr)*
setigera, Korth. Nederl. Kruidk. Arch. ii. n. (1856) 176 *(=Sfylocoryna setigera).*—Sumatra.
thyrsoidea, DC. Prod. iv. 894-Wendlandm « o ^ niana.
truncata, DC. 1. c.=Trisciadia tmncata.

CUPIRANA, Miera, Apocyn. S. Am. 15 (1878) - Coupoul, Aubl. (Apocyn.).
Aubletiana, Miers, 1. c 16 = Couponi aquatics.
Martiniana, Miers, 1. c. 17.—Am. austr.

CUPRESPINNATA, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 61 (1866) = Taxodium, Rich. (Conif.).
disticha, [Nelson] Senilis, l. c. = T. distichum.
heterophylla, [Nelson] Senilis, l. c. 62 = T. heterophyllum.
mexicana, [Nelson] Senilis, l. c. 62 = T. mexicanum.
sinensis, [Nelson] Senilis, l. c. = T. distichum.

CUPRESSTELLATA, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 60 (1866) = Fitzroya Hook. (Conif.).
patagonica, [Nelson] Senilis, l. c. = F. patagonica.

CUPRESSUS L. (1753); ex Linn. Gen. ed. 5. 294 (1787). Bentl. & Hook. f. H. Gard. 417. Callitris Mpreiso Mes! Vul. Obs. Bot. Dec. ai. v. 71 = Callitris quadrivalvis, Pl. Imag. fc. Fl. Russ. = Callitris quadrivalvis, Lour. Fl. Cochin. 392 (1790). Uo!—China. *Natsschr. Garten. Pflans.* i. 72 = sempervirens. *australis,* Pers. Syn. ii. 580 = Thuya orientalis. *baccaeformis,* Knight, ex Gord. Pinet. Suppl. 38 = Juniperus oxycedrus. *bacciformis,* Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 64, Ba[illon] en = Juniperus phoenicea. bor. occ. Bo[issier] Gord. Pinet. 79 = Thuya obtusa. *californica,* Carr. (Gord. ed.) 127 = Goveniana. *chilensis,* Gill. ex Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 199 = Libocedrus chilensis. *columnaris,* Forst. Prod. 67 = Araucaria excelsa. *conoidea,* Spad. Xilolog. i. 189 = sempervirens. *cornuta,* Carr. in Rev. Horticol. (1866) 250 = Goveniana. *Coulteri,* Forbes, Pinet. Wobum. 190-Lindleyi. *disticha,* Linn. Sp. Pl. 1003 = Taxodium distichum. *Ehrenbergii,* Kunze, in Linnaea. (18*7) 16 = Benthami. *elongata,* Sabisb. Prod. 397 = sempervirens. *excelsa,* Scot. ex Carr. Conif. 128-Bentbami. *expansa,* Tausch, ex Steud. Norn. ed. II. i. 455 = sempervirens. *fastigiata,* DC. Fl. Fr. v. 336 = sempervirens. *flagelliformis,* Knight, Syn. Conif. 90 = torulosa. *Fothergilli,* Forbes, Pinet. Wobum. 191 = Callitris quadrivalvis. *fragrans,* Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. (1856) 103 = Lawsoniana. *funebris, Endl. Syn. Conif.* 58.-China. *glandulosa,* Hook. ex Gord. Pinet. 64 = Macnabiana. *globulifera,* Par. in Ann. Sc. Nat. IV. (1860) 377 = sempervirens. *glauca* Lamb. Pin. ed. II. 2.-Ind. or. Govt. Bot. Gard. —Calif. *Hart. Soc.* iv. (1849) 295. *guadalupensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad.* (1879) 300 = Cajii. *Hartwegi,* Carr. in Rev. Hort. (1855) 283- macrocarpa. *horizontalis,* Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = sempervirens. *humilis,* Salisb. Prod. 398 = Callitris arborea. *imbricata,* Nutt. ex Gord. Pinet. 307=Taxodium distichum. *japonica, Greene,* in Bull. Torr. Bot. Club. ix. (1882) 64. —Arizona *lusitanica,* Carr. Conif. ed. II. 165 = Benthami. *lusitanica,* Lindl. ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 472 - Iindleyi. *lusitanica,* Mill. Gard. Diet. ed. VIII n. 3 = glanca. *Macnabiana, Andr. Murr. in Edinb. New Phil. Journ.* N. S. i. (Jan.-Apr. 18S5) 293.—Calif. *macrocarpa, Hartw. in Journ. Hort. Soc.* ii. (1847) 187.-Calif. *majestica,* Knight, Cooif. 20 = torulosa. *Montetumae,* Humb. & Bonpl. ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 441 = Taxodiom mucronatum. *nepalensis.* Loud. Encyc. Trees, 1118 = torulosa. *nootkatensis, Lamb. Pin.* ed. I. ii. 18.—Am. bor. occ. *nucifera,* Hort. ex Carr. Conif. ed. 1. 151 =<Taxodium heterophyllum. *nutkanus,* Torr. in Bot. U. St. Expl. Eped. ii. 1.16 = Lawsoniana. *nutiatensis,* Hook. Fl. Bor. Am. ii. 165 = nootkatensis. *obtusa,* C. Koch, Dendrol. ii. II. 168 = Thuya obtusa. *palustris,* Salisb. Prod. 398=sphaeroidalis. *patula,* Pers. Syn. ii. 580 = Thuya orientals. *patula,* Spad. Xilolog. i. 193 = semperviiens. *pendens,* F. Muell. Sel. PI. Indust. Cult. 64=Thuya obtusa. *pendula,* [Abel, in] Stannt. Embassy, China, ii. 525 = funebris. *pendula.* Griff. Notul. iv. 26=tornlosa. *pendula,* L'Hlrit. Stirp. Nov. 16. t. 18=glauca. *pendula,* Thunb. Fl. Jap. 265 = Thuya onentalis. *pisifera,* C. Koch, Dendrol. it II. 170 = Thuya pisifera. *pyramidalis,* Targ. Tozz. Obs. BoL Dec. Ui-v. 73= sempervirens. *Roylei,* Carr. Conif. ed. 1.128=sempervirens. *sabinoides,* H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 3 = Juniperus tetragona. *Schomburgkii,* Van Hontte, ex Gord. Pinet. Suppl. 27 = thurilera. sempervirens, *Linn. Sp. PI.* 1002.—Europ.; Orient. *sinensis,* Lee, ex Gord. Pinet. 63=glauca. *sphaerocarpa,* Parl. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiii. (1860) 878 = sempervirens. *squarrosa,* Laws, ex Gord. Pinet. 296-Thuya pisifera. *stricta,* Mill, ex Gord. I.e. 67 = sempervirens. *tetragona,* Humb. *Sc* Bonpl. ex Carr. Conif. ed. II. 33. =Janiperus tetragona. *Thuia,* Targ. Tozz. Osserv. Dec. ii. 52 = Thuya onientalis. *thuioides,* Pav. ex Carr. Conif. II. 89 - Libocedrus chilensis. *thujaefolia,* Knight, ex Gord. Pinet. 69 = sempervirens. *thujaeformis,* Parker, ex Gord. 1. c. Suppl. 26 = sempervirens. *thujaeoides,* Low, ex Gord. I. *c*= sempervirens. thurifera, *H. B. V K. Nov. Gen. etSp.* ii. 3.—Mexic. *thurifera,* Lindl. Bot Keg. (1839) Misc. 64 = Lindleyi. *thurifera,* Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 493 = Benthami. *Thuya,* Targ. Tozz. Obs. Bot. Dec. iii-v. 72 = Thuya orientaHs. *thyoides,* Linn. Sp. PI. 1003 = Thuya sphaeroidalis. *thyoides,* Pav. ex Gord. Pinet. Suppl. 41 = Libocedrus chilensis. torulosa, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 55.—Reg. Himal. *Tournefortii,* Audib. Cat. (1834) ex Carr. Conif. ed. I. 115=sempervirens. *Tournefortii,* Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1852:).—Cf. Mem. Soc. Ital. Sc. Modena, xxv. II. (1855) 194 =torulosa. *triquetra,* Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 388 - Callitris quadrivalvis. *Uhdeana,* Gord. ex Carr. Conif. ed. 1129=thurifera. *umbilicata,* Parl. Ind. Sem. Hort. Florent. (1860) 22.—Cf. Ann.Sc. Nat Sér. IV. xiii. (1860) 378= sempervirens.

CUPRESTELLATA, Carr. Conif. ed. II. 115 (1867) = CUPRESSTELLATA, [Nelson] = Pŕtzroya, Hook. f. (Conif.).

CUPUIA, Rafin. Princ. Somiol. 29 (1814)-Coupoul, Aubl. (Apocynac).

CUPULARIA, Godr. & Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 180 (1850) = Inula, Linn. (Compos.).
Clausonis, Billot, ex Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 36 = Pulicaria Clausonis.

CUPULARIA :—
graveolens, Godr. & Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 180—Inula graveolens.
viscosa, Godr. & Gren. I. c. 181*1. viscosa.

CUPULISSA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 57 (1836)= Bignonift, Linn.
grandifolia, Rafin. 1. c. = B. grandiflora.

CTJBAITOA, Joss, in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 81'J.
SCROPHULARWEAE, Benth. & Hook. f. ii. 954.
CURANIA, Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 138 (1817).
D&I7PINA, Linn. PI. Surin. 11 (1775); Amoen. Acad. viii. 269 (1785).
PICRIA, Lour. Fl. Cochin. 392 (1790).
SVNFHYLLIUM, Griff, in Madr. Journ. Sc. iv. (1836) 873.
TREISTEWA, Griff. Notul. iv. 113 (1854).
amara, *Juss. I. c.* 820.—Ins. Molucc.
torenioides, Steud. Nom. ed. II. i. 455 = amara.

CUKANIA, Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 138 (1817)-° Curanga, Juss. (Scrophul.).

CURARE, Kunth, ex Humb. Rclat. Hist. ii. 549 (1817) = Strychnoa, Linn. (Loganiac).

CURATARI, J. F. Gmel. Syst. 1039 (1791) = Ooupatari, Anbl. (Myrtac).

CURATARIA, Spreng. Gen. L 486 (1830)»praec.

CTJHATELLA, Linn, in Loefl. It. Hisp. 260 (1758).
DILLENIACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 12.
PINZONA, Mart. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1832) 371.
alata, *Vent. Choix,* 49.—Guiana,
americana, *Linn. Syst,* ed. X. 1079.—Am. austr.
Cambaiba, St. Hil. PI. Us. Brés. t. 24 - americana.
glabra, Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 64-americana.
Grisebachiana, *Eichl. in Mart..Fl. Bras. xiii.* I. 69.—Bras.

CURCAS, Adans. Fam. ii. 35ft (1768) - Jatropha, Linn. (Euphorb.).
Adansonii, Endl. ex Heynh. Nom. ii. 176—J. Curcas.
cuneifolia, Baill. Etud. Gén. Euph. 315=J. spatulata.
indica, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 208=J. Curcas.
peltatum, Baill. Etud. Gén. Euph. 815-J. hemandiaefolia.
portoricensis, Baill. 1. c. 314 - J. hernandiaefolia.
purgans, Medic. Malv. 119 = J. Curcas.

CURCUBITELLA, Walp. Rep. vi. 50 (1846), sphalin. vide Cucurbitella, Walp.

CTTBCUIiIGO, Gaertn. Fruct *I* 63. t. 16 (1788).
AMARYLLIDEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 717.
AUROTA, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 61 (1886).
EMPODIUM, Salisb. Gen. PI. Fragm. 43 (1866).
FABRICIA, Thunb. in J. C. Fabric. Reiae nach Norw. 23 (1779).
FORBESIA. Eckl. Verz. Pfl. Samml. 4 (1827).
MOLINERIA, Colla, Hort. Ripul.App.ii.j23J (1826).
brevifolia, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. cd. II. ii. 253 sorchioides.
ensifolia, R. Br. Prod. 290-orchioides.
fascicularis.Spieag. Syst. ii. 60 - Colchicum montanum.
Finlaysoniaiia, *Wall. Cat.* n. 5162.—Siam.
firma, Kotschy *Sc* Peyr. PI. Tinn. 45. t. 22 B-orchioides.
gallabatensis, *Schweinf. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot. i.* (1878) 266.—Afr. trop.
gracilis, *Wall. Cat.* n. 5160.—Reg. Himal.
graminifolia, Nimmo, in J. Grah. Cat. PI. Bomb. 215 = Hypoxisaurea.
latifolia, [Dryand. in] Ait Hort. Kew. ed. II. ii. 253. —Burma; Malaya.
malabarica, Wight, Ic. t. 2043 =orchioides.
orchioides, *Gaertn. Fruct.* i. 63.1.16.—As. trop.
paudflora, Zipp. ex Span, in Linuaea, xv. (1841) 477 = orchioides ?
plicata, *[Dryand. in\ Ait. Hort. Kew.* ed. II. ii. 253. —Afr. austr.
recurvata, *[Dryand.] I. c*—As. trop.; Austral,
scorzoneraefolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 124.— Am. trop.
seychellensis, *Boj. Hort. Mount.* 842, nomen ; *Baker, Fl. Maurit.* 368.—Ins. Masc.

CUBCUIiIGO:—
starts; Labill. Sert Austr. Caled. 18. t. 24-orchioidfs.
sumatrana, Koxb. Hort. Beng. 24; Fl. Ind. ii. 146-latifolia.
veratrifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* rvii. (1878) 123.—Afr. austr.
villosa, Wall. Cat n. 5163-latifolia, recurvata.

CURCUMA, Linn. Mus. Cliff. 11. n. 4 (1736); Gen. ed. 1.332 (1737). *SCITAAflNEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 643.
EKNDLIA, Giseke, Prael. Linn. 199, 209 (1792).
KUA, Medic, in Act. Theod. Palat. vi.Phys. (1790) 394.
STISSERA, Giseke, Prael. Linn. 207, 209 (1792).
aeraginosa, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 335.—Burma,
albiflora, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 3-18.—Zeylan.
Amada, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 341.—Ind. or.
amarissima, *Rose. Scitam.* t 101.—Ind. or.
americana, Lam. Encyc. ii. 228=Calathea Allouia.
angustifolia, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 274= neilgherrensis.
angustifolia, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 338. t. 3.—Reg. Himal.
aromatica, *Salisb. Par ad. Land.* t. 96.— Ind. or.
attenuata, *Wall. Cat.* n. 6602.—Burma,
anstralasica, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5620.—Austral,
caesia, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 334.—Ind. or.
Careyana, Wall. Cat. n. 6595 = Hitchenia Careyana.
caulina, *J. Grah. Cat. PI. Bomb.* 210.—Ind. or.
comosa, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 336.—Burma.
cordata, Wall. PI. As. Ran i. 8 = petiolata
cordifolia, Roxb. Hort. Beng. 1, nomen = praec.
decipiens, *DOIB. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 144.—Ind. or.
elata, *Roxb. Hort. Beng.* 1; *Fl. Ind.* i. 25.—Burma.
erubescens, Wall. Cat. n. 6608-rubescens.
ferruginea, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 836.—Ind. or.
glaucophylla. Wall. Cat. n. 6594 = Hitchenia glauca.
grandiflora, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 665, nomen.—Malaya.
latifolia, *Rose. Scitam.* t 108.—Ind. or.
leucorhiza, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 337.—Ind. or.
longa, *Linn. Sp. PI.* 2.—As. trop.
longiflora, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 286-rnbescens.
montana, *Roxb. PL Corom.* ii. 28.—lad. or.
musaceo, *Wall. Cat.* n. 6546.—Ind. or.
neilgherrensis, *Wight, Ic.* t. 2006.—Ind. or.
offieinalis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 285 = C. Zedoaria.
oligantha, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 245.—Zeylan.
omata, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 564, nomen.—Burma.
pallida, *Lour. Fl. Cochinch.* 9.—China,
paiviflora, *Wall. PI. As. Rar. i.* 47. t 57.—Burma.
petiolaris, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1871) 6-seq.?
petiolata, *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* i. 36.—Burma,
plicata, *Wall. Cat.* n. 6611.—Burma,
porphyrotanica, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 479, nomen.—In*. Timor.
Pseudo-montana, J. Grah. Cat. PI. Bomb. 210-montana.
purpurascens, *Blume, Enum. PI. Jan.* 46.—Java,
reclinata, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 342.—Ind. or.
Roscoeana, *Wall. PI. As. Rar.* i. 8. t. 9.—Bnrma.
rotunda, Linn. Sp. PI. 2 = Kaempferia pandurata.
rubescens, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 336.—Ind. or.
rubricaulis, link, Enum. Hort. Berol. i. 3 = rubescens.
speciosa, Hort. Angl. ex Link, 1. c. = C. Zedoaria.
strobilifera, *Wall. Cat.* n. 6599.—Burma.
strobilina, Wall, ex J. Grah. Cat. PI. Bomb. 210-strobilifera.
tumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 615.—Sumatra,
viridiflora, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 841.—Sumatra.
xanthorrhiea, D. Dietr. Syn. PL i. 19=seq.
zanthorrhiza, *Roxb. Hort. Beng* 1; *Fl. Ind.* i. 25.—Ins. Amboina.
Zedoaria, *Rose. Scitam.* t. 109.—Reg. Himal.
Zedoaria, Roxb. in As. Res. xi. (1810) 382.—Cf. etiam 165=aromatica.
Zerumbet. Roxb. 1. c. 833-C. Zedoaria.

CUBINTLA, Roem. & Schult. Syst. y. p. xxii (1819). *ASCLEPIADEAEt*
CURNILIA, Rafin. Sylva Tellur. 21 (1838).
Rheedi, *Roem. V Schult. I. e.* 876.—Malaya.

CURMERIA, Linden & André, in Illustr. Hortic. xx. (1873) 45. t. 121 = Homalomena, Schott (Aroid.).
metallica, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1884) I. 711.—Hab.?
picta, Hort.—Cf. I. c. (1874) 92-seq.»
picturata. Linden *Sc Andri,* in Illustr. Hortic. xx. (1873) 45. t. 121 = H. picturatnm.
Roemlii, Mast, in Gard. Chron. (1874) II. 804 = H. Roezlii.
Wallisii, Mast. 1. c (1877) 1.108 - H. WalUsii.

CURNILIA, Rafin. Sylva Tellur. 21 (1838)=Curinila, Roem. & Schult. (Asclep. ?).
sarmentosa, Rafin. 1. c.=Curinila Rheedi.

CURONDIA, Rafin. Sylva Tellur. 154 (1888) = Christmannia, Dennst. (Inc. sed.).
axillaris, Rafin. 1. c. - Christmannia Courondi.

CUBBOBIA, Planch, ex Benth. in Hook. Niger Fl. 457 (1849). . *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii.741.
decidua, *Planch, ex Benth. I. c.*—Afr. trop.

CURSONIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. vii. (1841) 422-Onoseris, DC (Compos.).
peruviana, Nutt. 1. c.=O. odorata.

CUBTIA. Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 209. t. 4. *GENTIANEAE,* Benth. & Hook. *I* ii. 808.
APOPHRAGMA, Griseb. Gen. et Sp. Gent 163 (1839).
SCHUEDLERIA, Mart Nov. Gen. et Sp. ii. 113. tt. 186 ad 188 (1827).
THURNHAUSERA, Pohl, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 201 (1837).
diffusa, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 14. in obs.—Bras,
gentianoides, *Cham,* to[1] *Schlecht. I. c.* i. (1826) 210.—Bras,
tenella, *Chant. 1. c.* viii. (1833) 13.—Bras.

CUBTISIA, Ait. Hort. Ke«r. ed. I. i. 162 (1789). *CORNACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 949.
DORATIUM, Soland. ex Janme St. Hil. Expos, ii. 267 (1805).
JUNGHANSIA, J. F. Gmel. Syst. 259 (1791).
RELHAMIA, J. F. Gmel. 1. c. 247 (1791).
fagifolia, Salisb. Prod. 67 = faginea.
iaginea, *Ait. Hort. Ktw.* ed. I. i. 162.—Afr. austr.

CURTISIA, Schreb. Gen. 199 (1789) = Zanthoxylon, Linn. (Rutac).
Schreberi, J. F. Gmel. Syst. 498 = Z. Ochroxylnm ?

CURTOGYNE, Haw. Rev. PI. Succ. 8 (1821) = Crasaula, Dill.
albiflora, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 303-Cr. albiflora.
Burmanniana, Eckl. & Zeyh. 1. c. 804=Cr. Burmanniana.
dejecta, DC. Prod. iii. 392-Cr. dejecta.
flava, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 803-Cr. flaya.
undata, Haw. Rev. PI. Succ. 8-Cr. dejects.
undosa, Haw. in Phil. Mag. (1827) 184-Rochea undosa.
undulata, Haw. R«v. PI. Succ. 9 = Cr. dejecta.

CURTOISIA, Endl. Gen. Suppl. ii. 60, in syn. (1842) = COURTOISIA, Reichb. = OoUomla, Nutt. (Polemon.).

CURTOPOGON, Beauv. Agrost. 32. t. 8. f. 7 (1812)-Arlsttda, Linn. (Gramin.).
dichotomus, Beauv. 1. c = A. dichotoma.

CUSCUARIA, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45 = ScindapBUS, Sehott (Aroid.).
marantifolia, Schott, Gen. Aroid. t. 80=S. Cuscuaria.
Rumphii, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 130 =S. Cuscnaria.
spuria, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 367=S. Cuscoaria.

CUSCUTA, [Tourn.J Linn. Syst. ed. I (17S5). *CONVOLVULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 881.
ANTHANEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 90 (1836).
APLOSTYLIS, Rafin. 1. c. 91 (1886).
BUCHINGERA, F. Schultz, in Jahrb. Pharm. (Mar. 1847).—Cf. Bot. Zeit-vi. (1848) 760.
CASSUTJIA, De* Monl. Etudes *Org.* Cusc. 66 (1853).

CUSCUTA:—
CASSYTHA, Gesner, ex S. I. Gray, Nat. Arr. Brit. PI-ii. 345 (1821).
CUSCUTINA, Pfeiff. in Bot. Zeit. iv. (1846) 492.
DASTVLEPIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 125 (1836).
ENGELMANNIA, Pfeiff. in Bot. Zeit. iii. (1845) 673-
EPILINELLA, Pfeiff. 1. c. (1845).
EPITHYMUM, Opiz, Seznam, 40 (1852).
ERONEMA, Kafin. Fl. Tellur. iv. 125 (1836).
GRAMMICA, Lonr. Fl. Cochinch. 170 (1790).
KADULA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 90 (1836).
KADURIAS, Rafin. 1. c. 91 (1886).
LEPIDANCHE, Engelm. in Am. Journ. Se. xliii. (1848) 343. t. 6.
LEPIMENES, Rafin. Fl Tellur. Iv. 91 (1836).
MONOGYNEIXA, Des Moul. Etudes Org. Cusc. 6» (1853).
NEMEPIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 91 (1886).
PENTAKE, Rafin. 1. c. 90 (1886).
PFEJFFEHIA, Buching. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 88.
SCHREBERA, Linn. Sp. PI. ed. II. 1662 (1763).
SUCCOTA, Des MouL Etudes Org. Cusc. 74 (1853).
abyssinica, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 78.—Abyss.
acaulis, Rafin. Ann. Nat. (1820) 13=compacta.
acuminata, Nutt. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 498 = californica.
acuminata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 88.—Algeria.
acuta, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1869) 497.—Am. trop.
acutiflora, Rota, in Parl. Giorn. Bot. Ital. il. (1847) 2» = C. Epithymum.
acutiloba, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, I* (1859) 478.—Am. trop.
acutissima, Buching. ex Engelm. 1. c. 490 = byalina-
africana, Choisy, Cusc. 176<=*angulata.
africana, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Engelm. in Trans. Acao-St. Louis, i. (1859) 475-nitida.
africana, Krauss, ex Engelm. 1. c. 503—appendicuw*
africana, *Willd. Sp. PI.* i. 703.—Afr. austr.
aggregata, Roxb. Hort. Beng. 12; Fl. Ind. i. * europaea.
alba, J. *Sc* C. Presl, Delic. Prag. 87 = C. Epithymum.
alpina, Hohen. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Lou i. (1859) 470-kurdica.
alpina, Kotschy, ex Choisy, in DC. Prod. ix. » minor.
americana, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1836) *U3"* glomerata.
americana, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 77 = obtusiflora.
americana, Jacq. ex Engelm. in Trans. Acad. St. L° i. (1859) 484=corymbosa.
americana, *Linn. Sp. PI.* 124.—Am. bor.
americana, Poepp. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 49 micrantha.
americana, Thunb. ex Engelm. in Trans. Aca* Louis, i. (1859) 479 = chinensis.
americana, Thunb. Prod. PL Cap. 32-africana.
anguina. Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1861; »' reflexa.
angulata, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. 1[10] 474.—Afr. anstr.
aphylla, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) *> glomerata?
aphylla, Steud. Norn. ed. 1.246=chinensis.
appendicnlata, *Engelm. in Trans. Acad. St. Lo<"* (1859) 503.—Afr. austr.
applanata, *Engelm. I. c.* 479.—Am. bor.
approximate, Bab. in Ann. & Mag. Nat. HW-(1844) 253 -pUniflora.
arabica, *Fresen. in Mus. Senckenb. I* (183*) Oriens.
arabica, Wight, Ic. t 1871 = hyalina.
arvensis, *Beyrich, ex Hook. Fl. Bor. Am.* bor.
asiatica, Pall, ex Engelm. in Trans. Acad. St. i* (1859) 465 = planiflora.
astyla. Engelm. in Bot. Zeit. iv. (1846)276 = n>
aurantiaca, Req. ex Bertol. Fl. Ital. vii. 623 = aurea, *Liebm.in Forhandl. Stand.Natuff-* (1847) 198.—Hab.?
anstralis, *R. fir. Prod.* 491.—Austral.
australis. Hook. f. *¥1.* Tasm. i. 278=>tasmanica.
babylonica, *Aucher, ex Choisy, Cusc.* 174-—Assyria.
Balansae, Boiss. *Sc* Rent, ex Engelm. in Trans-St. Louis, i. (1859) 468-globulosa.

CUSCUTA:—

Gussoni, Caspar, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis. i. (1859) 463 = C. Epithymum.
gymnocarpa, *Engelm. I. c.* 496.—Am. trop.
halophila, Engelm. 1. c. 469=europaea.
halophyta, Fries, Nov. Fl. Suec. Mant i. 8 = europaea.
hassiaca, Pfeiff. in Bot. Zeit. i. (1843) 705=racemoaa.
hispidula, Engelm. in Am. Joum. Sc. xlv. (1843) 76 = decora.
Hookeri, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 290=reflexa.
hyalina, Boiss. ex Engelm. in Trans. Acad. *St.* Louis, i. (1869) 469=europaea.
hyalina, *Roth, Nov. PI. Sp.* 100.—Ind. or.
hyalina, Wight, Ic. t. 1372=chinensis.
imbricata, Nutt. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1869) 611 = compacta.
inclusa, Choisy, Cusc. 179. t. 2. f. 2 = corymbosa.
incurvata, *Prog, in Mart. ft. Bras.* vii. 879.—Am. trop.
indecora, Choisy, Cusc. 182. t. 3. f. 8=decora,
inflexa, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1869) 602.—Am. bor.
inodora, Willd. ex Prog, in Mart. Fl. Bras. vii. 380 = obtusiflora.
inMexicdia, Choisy, Cusc. 179. t 2. f. 3=odorata,
jalapensis, *Schlecht. in Unnaea,* viii. (1838) 515.—
japonica, *Choisy, in Zoll. Syst. Vert. Ind. Arehip.* 130, 134.—China; Japon.
Kolschyana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. Mi. 29.—Persia.
Kotschyi, Des Monl. Etudes Org. Cusc. 56 = C. Epithymum.
kurdica, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 470.—Kurdist.
laxiflora, Benth. Bot. Voy. Sulph. 138 - corymbosa.
Lehmanniana, *Bunge, Lehm. Reliq. Bot.* 220.—As. centr.
leiolepis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 247=americana.
lentis, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1886) 21.—Persia.
leptantha, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i.* (1859) 489.—Am. trop.
leucosphaera, Boiss. & Heldr. ex Engelm 1. c. 465 = planiflora.
Ligustri, Areschoug, Revis. Cusc. Suec. 17 = europaea.
lupuliformis, *Krock. Fl. Sil.* i. 261. t. 36.—Europ.
macrantha, G. Don, Gen. Syst. iv. 305 = reflexa.
macranthera, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 126 = C. Epithymum.
macrocarpa, *G. Don, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 530.—Sibiiia.
macrostyla, Decne. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 464 = aby«sinica.
major, Gilib. Fl. Lituan. i. 18 "europaea.
major, Koch & Ziz, Cat. Palat. 5 = C. Epilinum.
megalantha, Steud. Nom. ed. II. i. 456 = reflexa.
micrantha, *Choisy, Cusc.* 17?. t. 1. f. 3.—Am. trop.
micrantha. Mart, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 606 = parviflora.
micrantha, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 887 = palaestina.
microcephala, D'Escayrac, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 467 = planiflora.
microcephala, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 88.—Algeria.
microcephala, Welw. ex Des Moul. Etudes Org. Cusc. 76 = C. Epithymum.
microstyla, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 506.—Am. trop.
Millettii, Hook. & Arn. Bot Beech. Voy. 201-obtusiflora.
miniacea, Choisy, in DC. Prod. ix. 456 = seq.
miniata. Mart. Reise Bras. i. 286=racemosa.
minor, Choisy, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 470=kurdica.
minor, Gilib. Fl. Lituan. i. 18 =• planiflora.
minor, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 345 - C. Epithymum.
mitraefonnis, *Engelm. ex Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 54.—Mexic.
monogyna, Auct. Fl. Germ, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859, 616 - lupuliformis,
monogyna, Schmidt, ex Engelm. 1. c. 469=europaea.
monogyna, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 32.—Europ.; Oriens.
Muelleri, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. ii. (1863) 326, 827 = C. Epithymum.
ueuropetala, Engelm. in Am. Journ. Sc. xlv. (1843) 75 =decora.

CUBCUTA:—

decora, *Choisy, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 601.—Am. trop.
densiflora, *Hook.f. ft. N. Zel. i.* 186.—N. Zel.
densiflora, Soyer-Willem. in Mim. Soc. Linn. Par. i. (1822) 26; et iv. (1826) 281 = C. Epilinum.
denticulata, *Engelm. in Am. Natural,* ix. (1875) 348.——Am. bor. occ.
desertorutn, Mart, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1869) 488 = umbellata.
diaphana, Wender. Fl. Hassiac. S64=rncemora.
elatior, Choisy, Cusc. 177-reflexa.
elegans, *Boiss.* &' *Bal. Diagn.* Ser. II. iii. 129.—Persia.
elegans, Hoi, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1869) 468=planiflora.
epicnidea, Bemh. in Thner. Gartenz. (1844) n. 4 = europaea.
Epilinum, *Weihe, in Arckiv Afioth.* viii. (1824) 64.—Europ.; As. or.
Epiplocamum, Webb, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 466-planiflora.
Episonchum, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 36 = planiflora.
Epispartos, Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 116 =planiflora.
Epithymipkyta, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 124-C. Epithymum.
Epithymum, BOYI, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 453 = arabica.
Epithymum, *Murr. Syst.* ed. XIII. 140.—Europ.; As. bor.
Epithymum, Sievers, ex Ledeb. Fl. Alt i. 293=pedicellata.
Epithymum, Thnill. Fl. Par. 85 = europaea.
Epithymum, Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. iii. 36 = planiflora.
Epitriphyllum, Bernh. in Thuer. Gartenz. (1844) n. 4 =europaea.
europaea, Bovi Sc Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 467=planiflora.
europaea, *Linn. Sp. PI.* 124.—Europ.; Oriens.
exaltata, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 513.—Am. bor. occ.
exigua. Herb. Par. ex Engelm. 1. c. 480 = chinensis.
filiformis, Lam. Fl. Fr. ii. 307 = C. Epithymnm, europaea.
fimbriata, Bunge, ex Engelm. in Tians. Acad. St. Louis, i. (1659) 480 = chinensis.
/lava, Sievers, ex Ledeb. Fl. Alt. i. 294 - lupuliformis.
floribonda, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 123.—Mexic.
floribunda, *Phil. ft. Atac.* 37.—Chili.
foetida, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 304 = gracillima.
foetida, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 122.—Ecuador.
fruticum, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. ii. (1850) 312 = compactum.
funiformis, Willd. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 519=africana.
fusiformis, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 205 = africana.
gamostyla, Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 513=exaltata.
gigantea, *Griff. Notul.* i. 243.—Reg. Himal.
globi flora, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i.* (1859) 520.—Bolivia.
globularis, Bertol. Fl. Ital. viii. 625 - palaestina.
globularis, Nutt. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 494 = arvensis.
globulosa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 138 ^ americana.
globulosa, *Boiss. & Rent. Diagn.* Ser. II. iii. 126.—As. Min.; Persia.
glomerate, *Choisy, Cusc.* 184. t. 4. f. 1.—Am. bor.
Godronii, Des Moul. Etudes Org. Cusc. 60-planiflora.
gracillima, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1869) 488.—Am. trop.
grandiflora, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 123.—N. Granat.
grandiflora, Wall. Cat. n. 1318 = reflexa.
Grassii, *Delp. in Mem. Ace. Tor.* Ser. II. xxvi. (1871) 132.—Hongkong.
graveolens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 122 = americana.
Gronovii, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* vi. 206.—Am. bor.

CtTBCTXTA:—
nitida, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 176.—Afr. austr.
obtusiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 122-australis.
odontolepis, *Engelm. in Trans. Ac/id. St. Louis,* i. (1859) 488.—Am. trap.
odorata, Poepp. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 455 = chilensis.
odorata, *Ruit tf Pav. Fl. Per.* i. 69. t. 105.—Peniv.
oxycarpa, Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 508 = rostrate.
oxypetala, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 130 = hyalina.
palaestina, *Boiss. I. c.* Ser. I. xi. 86.—Graecia; Syria.
paradoxa, Rafin. Ann. Nat. (1820) 13=glomerata.
partita, *Choisy, Cuse.* 188. t. 5. f. 3.—Am. trop.
parviflora, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 506.—Am. tiop.
parviflora, Nutt. ex Engelm. I. c. 502=inflexfl.
parviflora, Willd. ex Engelm. 1. c. 487=umbellata.
patens, *Benth. Bot. Voy.'Sulph.* 35.—Calif,
pauciflora, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 185.—Chili.
pedicellata, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 293. t. 234.—Sibir. altaic.
peduncularis, Kotschy, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 453-babylonica.
pentagona, Engelm. in Am. Journ. Sc. xliii. (1842) 340 =arvensis.
pentandra, Heyne, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 519-reflexa.
persica, Decne. ex Engelm. 1. c. 470 = Kotschyana.
planiflora, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 670-C. Epithymum.
planiflora, *Tenore, Fl. Nap.* iii. 250.—Hispan.
platyloba, *Prog, in Mart. Fl. Bras.* vii. 381.—Am. trop.
polyantha, Shuttl. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 508 = Gronovii.
Pofygonorum, Cesati, in Cat. Son. Genev. (1849) 22 ; Linnaea, xxiv. (1851) 199 = obtnsiflora,
Polygonorum, Engelm. in Am. Joum. Sc. xliii. (1642) 342. t. 6=chlorocarpa.
popayanensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 128 = corymbosa.
popayanensis, Poepp ex Engelm. in Trans. Acad. St Louis, i. (1859) 500 = micrantlia.
popayanensis, Poepp. ex Engelm. I. c. 505=racemosa.
potosina, *Schaffn. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 124.—Mexic.
prismatica, *Pav. ex Choisy, in Cusc.* 182. t. 3. f. 2.—Ecuador,
pnbernla, *Klotesch, in Schomb. Faun, et Fl. Gut.* 1154, nomen,—Guiana.
pulchella,.Enjrti«. *in Trans. Acad. St. Louis, 1.* (1859) 472.—Rossia; As. bor.
pulcherrima, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 750 = decora.
pycnantha, Benth. PI. Hartw. 226 •= foetida.
racemoia, *Mart. Reise Bras,* i. 286.—Bras.
reflexa, Decne. in Nouv. Ann. Mus, Par. iii. (1834) 394—tiraorensis,
reflexa, *Roxb. PI. Corom.* ii. 3. t. 104.—Ind. or.
remotiflera, Beitol. Misc. Bot. x. 29 = compacta.
Rogowitschiana, Trantv. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xiii. (1855) 376 = australis.
rosea, Jacquem. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 478-capitata.
rostrata, *Skuttlv. ex Engelm. b" A. Cray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 225.—Am. bor.
salina, *Engelm. in S. Wats. Bot. Calif,* i. 536.—Am. bor. occ
sandwichiana, *Choisy, Cusc.* 184. t. 5. f. 4.—Ins. Sandvic.
Saururi, Engelm. in Am. Joorn. Sci. xliii. (1842) 339 = Gronovii.
scandens, Brat. Fl. Lnsit. 208 = lapuliformis.
schiraaiana, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 86 = planiflora.
Schkuhriana,VieiS. in Bot Zeit. iii. (1845) 673 = europaea.
segetum. Rota, in Part. Giom. Bot. Ital. ii. Ann. II. (1847) 286=europaea.
sicula, Tineo, ex Engelm. in Trans. Acad. St Louis, i. (1859) 466= planiflora.
Sidarum, Liebm. in Forhandl. Skand. Naturf. Christiania (1847), 196-graciUima.
Solani, *Holuby, in Oestr. Bot. Zeitsehr.* xxiv. (1874) 804.—Austria.
spectabilis, Choisy, Cusc. 187-1. 5. f. 1 --americana.

CXJSCUTA :—
sqnamata, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 510.—Am. bor.
stenolepis, *Engelm. I. c.* 503.—Am. trop.
strobilacea, *Liebm. in Forhandl. Stand. Naturf. Christiania* (1847), 194.—Hab. ?
stylosa, Choisy, Cusc. 187. t. 5. f. 2 •= corymbosa.
suaveolens, Ser. in Ann. Sc. Phys. Nat. Agiie, et Indust. iii. (1840) 519 = racemosa.
subinclusa, *Dur. Ej" Hilg. in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.* Ser. II. iii. (1865) 42.—Am. bor.
subtilis, Chaub. ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis, i. (1859) 489=gracillima.
subulata, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 888 = C. Epithymum.
snbuniflora, *C. Koch, in Linnaea,* xxii. (1849) 747.—As. Min.
sulcata, Roxb. Hort. Beng. 12; Fl. Ind. i. 447=chinensis.
sulcata, Wall Cat n. 1320 = hyalina.
surinamensis. Schilling, Desc. PI. Lepr. 200. t. 2 = americana.
systyla, Maxim. Prim. Fl. Amur. 200 = japonica.
tasmanica, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 512.—Austral,
tenniflora, *Engelm. in A. Gray, Man.* ed. I. 350.—Am. bor.
tetrandra, Moench, Meth. 461= europaea.
tetrasperma, Jan, ex Engelm. in Trans. Acad. St Louis, i. (1869) 469 = europaea.
timorensis, *Decne. ex Engelm. 1. c.* 514.—Ins. Timor,
tinctoria, *Mart, ex Engelm. 1. c.* 480.—Mexic.
Tinei, Insenga, in Tineo, PI. Rar. Sicil. 14 = obtusiflora.
trichostyla, *Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 405.—Am. trop.
triflora, E. Mey. ex Engelm. 1. c. 519=africana.
Trifolii, Bab. in Phytolog. i. (1843) 467 = C. Epithymum.
Triumvirali,ia»^,»» *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1881) 98.—Iberia.
tubulosa, J. Sc C. Presl, Delia Prag. 215=europaea.
Ulicis, *Godr. in Mlm. Soc. Sc. Nat. Cherb.* xix. (1875) 198.—Gallia.
nmbellata, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 121.—Am. austr.
umbrosa, Beyrich, ex Engelm. in A. Gray, Man. ed. I. 351 = inflexa.
umbrosa, Beyrich, ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 78 = Gronovii.
urceolata, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 651- planiflora.
urceolata, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 238 = europaea.
verrucosa, Engelm. in Am. Journ. Sc. xliii. (1842) 341. t. 6. f. 25 = arvensis.
verrucosa. Sweet, Brit. Fl. Gard. Ser. I. i. t. 6-reflexa.
Viciae, F. Sehultz, ex Des Moul. Etudes Org. Cnsc. 77 =europaea.
vulgaris, Pers. Syn. i. 289 = europaea.
vulgaris, J. & C. Presl, Fl. Cech. 56=C. Epilinum.
vulgivaga, Engelm. in Am. Joum. Sc. xliii. (1842) 338. t. 6 = Gronovii.
xanthochortos, *Mart, ex Engelm. in Trans. Acad. St. Louis,* i. (1859) 486.—Bras.
xanthonema, Hort. Par. ex Engelm: 1. c. 462 = C. Epithymum.

CUSCUTINA, Pfeiff. in Bot. Zeit. iv. (1846) 492-Cuscuta, Linn. (Convolv.).
suaveolens, Pfeiff. 1. c.=Cu*cuta racemosa.

CUSPA, Hnmb. Relat. Hist. i. 366 (1814)=Alsodeia, Thou. (Violar.).

CUSPARIA, D. Dietr.Syn. ii. 1473 (1840) -CASPARIA, Kanth=Bauhinia, Linn. (Legum.j.

CUSPAHIA, Humb. Tabl. Géog. ex R. Br. in Flind. Voy. ii. App. HI. 545 (1814). *RUTACEAE* [Benth. &Hook. fii. 285],
ANGOSTURA, Roem. & Schult. Syst. iv. 188 (1819).
BONPLANDIA, Willd. in Mem. Acad. Berl. (1802) 24.
CONCHOCARFUS, Mikan, Delect, fasc. i. t. 2 (1820).
DANGERVILLA, Veil. Fl. Flum. 27 (1825) i. t. 66 (1827).
DIGLOTTIS, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 151, 170.
LASIOSTEHUM, Nees & Mart. 1. c. (1823) 152, 171.
OBENTONiA,Vell.Fl. Flnm. 18 (1825);i.t.46 (1827).
ROSSENIA, Veil. 1. c. 31 (1825); i. t. 77 (1827).

CUSPABIA:-
Candolleana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. U. 119.—Bras.
cuneifolia, *Engl. 1. c.* 116.—Bras,
elegans, *Engl. 1. c.* 121.—Bras,
febrifuga, *Humb. Tabl. Glogr. ex DC. in Mtm. Mus-Par.* ix. (1822) 144.—N. Granat.
Fontanesiana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. H. 122.—Bras.
Gaudichaudiana, *Engl. 1. c.* 116.—Bras,
grandiflora, *Engl. 1. c.* 112.—Bras,
heterophylla, *Engl. I. c.* 114.—Bras,
macrocarpa, *Engl. 1. c.* 121.—Bras,
macrophylla, *Engl. I. c.* 115.—Am. trop.
Martiana, *Engl. 1. c.* 119.—Bras,
nodosa, *Engl. I. c.* 123.—Bras,
obovata, *Engl. I. c.* 118.—Bras,
odoratissima, *Engl. 1. c.*—Bras,
ovata, *Engl. 1. c.* 117.—Bras,
paniculate, *Engl. I. c.* 120.—Bras,
pentagyna, *Engl. I. c.* 122.—Bras,
pentandra, *Engl. I. c.* 120.—Bras,
ramiflora, *Engl. 1. c.* 111.—Bras,
silvestris, *Engl. I. c.* 113.—Bras,
toxicaria, *Engl. 1. c.* 114.—Bras.
trifoliata, Engl. 1. c. 118=febrifuga.

CUSPID ARIA, DC. in Bibl.Univ. Genev. xvii. (1824) 125 [Rev. Bign. 9]. *BIGNONIACEAE,* Benth. * Hook. f. ii. 1036.
LOCHMOCYDIA, Mart, ex DC. Prod. ix. 177 (1845).
MANSOA, DC. in Bibl. Univ. Genev. xvii. (1838) [Rev. Bign. 12].
angustidens, *DC. Prod.* ix. 179.—Bsu.
callistegioides, *DC. 1. c.* 178.—Bras.
campanulata, *DC. 1. c.* 179.—Bras.
erubescens, *Bureau, Monog. Bignon.* 5. t. 8.—Bras.
fasdculata, Sond. in Linnaea, xxii. (1849) 660 = Arrabidaea fasciculata.
lateriflora, *DC. Prod.* ix. 179.—Bras.
multiflora, *DC. 1. c.*—Bras.
panciflora, *DC. 1. c.* 179.—Bras.
populeaster, Mart, ex DC. 1. c. 178 = trifoliata.
pterocarpa, DC. 1. c = trifoliata.
puberula, *Mart. Herb, ex DC. I. c.* 178.—Bras.
ramentacea, *Mart, ex DC. 1. c.*—Bras.
simplicifolia, *DC. Rev. Bign.* 9.—Bras.
trifoliata, *DC. I. c*—Bras.

CUSPIDARIA. Link, Handb. ii. 316 (1831) - Erysimum, Toum. (Crucif.).
Biebersteinii, Rnpr. Fl. Cauc 74 = E. cuspidatum.
cheiranthoides. Link, Handb. ii. 315 = E. cuspidatum.
stenocarpa, Rupr. Fl. Cauc. 75, in textu=«~ cuspidatum.

CUSPIDIA, Gaertn. Frnct. ii. 464.1.171 (1791)"= Berkheya, Ehrh. (Compos.).
araneosa, Gaertn. 1. c. = Dideita cernoa.
castrata, Cass. in Diet Sc. Nat. xii. 253 - Dideita cernna.

CUSPIDOCARPUS, Spenn. in T. Nees, Gen. Fl- Gamop. ii. n. 18 (1843) = Micromeria, (Labiat).
rupestris, Spenn. 1. C.-M. rupestris.

CUSSAMBIUM, [Rumph.] Bnch.-Ham. in Mem. «'g. Soc. v. II. (1826)356 = Sehleiehera,WilU.C>»P
glabrum, Buch.-Ham. 1. c - S . trijuga.
pubescens, Buch.-Ham. 1. c 357 = S. trijuga.
spinosum, Buch.-Ham. 1. c. 356=S. trijuga.

CUSSO, Bruce, Trav. v. t 22, 23 (1790)«Br*y«
Knnth (Rosac).

CUSSONIA, Comm. ex Endl. Gen. 1036, in sy- -Eliaea, Cambess. (Hyperic).

CUSSONIA, Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc (1780) 210. t. 12, 13. *ARAL1ACEAE,* Hook. f. i. 944.
GUSSONIA, D. Dietr. Syn. ii 925 (1840).
SPHAERODENDRON, Seem, in Journ. Bot 33.t.26.
angolensis, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr-* Afr. trop.

CUSSONIA:—
arborea, *Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss.* i. 356.—Abyss.
Barterii, *Seem. in Journ. Bot.* iv. (1866) 299.—Afr. trop.
Boyerii, *Seem. l. c.* 298.—Madag.
calophylla, *Miq. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 36.—Afr. austr.
dioica, *Virill. ex Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Calid.* 208.—N. Caled.
fraxinifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 157.—Madag.
Gerrardii, *Seem. in Journ. Bot.* iv. (1866) 298—Afr. austr.
Kirkii, *Seem. l. c.* 299.—Afr. trop.
Kraussii, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 431.—Afr. austr.
Lessonii, A. Rich. Fl. N. Zél. i. 235 = Pseudopanax Lessonii.
monophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 155.—Madag.
myriantha, *Baker, l. c.* 154.—Madag.
natalensis, *Sond. & Sond. Fl. Cap.* ii. 568—Afr. austr.
paniculata, *Eckl. & Zeyh.*, E. Mey. in Drge Zwei Pfl Docum 178 = umbellifera.
race mosa, *B*
-'Madag**''' '" *7«urn.Linn. Soc.* xx. (1883) 1B6.
spi[illegible] 25V? [illegible] (1780)
thyrsiflora, [illegible] austr.
thyrsoidea, [illegible] 12—Afr. austr.
triptera, [illegible] - thyrsiflora.
"belUfes? [illegible] 26.-Afr. austr.
vaniatiana, *Baker, in Journ. Li[illegible]* xxiii. (1860) 49.—Afr.—Madag.

CUSSUTHA, Benth. & Hook. f. Gen. [illegible] (1876) = sphalm. = CASSUTHA, Linn. (Convolv.).

CUSTENIA, Steud. Nomenclat. 247 (1821) = seq.

CUSTINIA, Neck. Elem. ii. 223 (1790) = Balaoia, Linn. (Hippocrat.).

CUTANDIA, Willk. in Bot. Zeit. iii. (1860) 130.
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. m. 1187.
divaricata, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 118.—Reg. Medit.
incrassata, *Benth. l. c.*—Reg. Medit.
lanceolata, *Benth. l. c.*—Reg. Medit.
maritima, *Benth. l. c.*—Reg. Medit.
memphitica, Benth. l. c. = scleropoides.
philistaea, *Benth. l. c.*
scleropoides, *Willk.* in Bot. Zeit. Iv. iii. (1860) 130.—Hispan.

CUTARIA (1862) = Coutarea, L. (Rubiac.).

CUTERIA Imune St. Hil. Expos., i. 441 (1805) = praec.

CUTTERIA Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176 = seq.

CUTTEE in Med. [illegible]
Catesbei, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176 = G. Andrewsii ?
ochroleuca, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = G. ochroleuca.
Saponaria, Rafin l. c. = G. Saponaria.

CUTTHIA, *SAXIFR*[illegible] Mnell. Fragm. v. 47. t. 40 (1865).
viburnea, [illegible] Hook. f. i. 1004.

CUTUBEA, Jaume St. Hil. Expos. i. 322 = Coutoubea, Aubl. (Gentian.). (1805)

CUVERACEAE, Jones, in As. Res. iv. (1795) 281 = Cedrela, P. Br. (Meliac.).

CUVIERA, DC. [illegible] Ann. Mus. Par. Ijt (1807) 2. t. 15. *Ri*[illegible] *AB*, lfcnth. & Hook, t ii 112. acutiflora, [illegible] —Afr. trop. *africana*, [illegible] —acutiflora.

CUVIEBA:—
asiatica, Sprang. Syst i. 760-Stigmanthus cymosus.
longiflora, *Hiern.in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iiL 157.—Afr. trop.
subuliflora, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 407.—Afr. trop.
trilocularis, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 167.—Afr. trop.

CUVIERA, Koel. Gram. Gall, et Germ. 328 (1802) = Eordeum, Linn. (Gramin.).
europaea, Koel. 1. c.=H. sylvaticum.

CYAMOPSI8, DC. Mém. Lég. 280 (1825). *LECU-MINOSAB*, Benth. & Hook, f. i. 493.
CORDAEA, Spreng. Gen. il. 581 (1831).
psoraloides, *DC. Prod.* ii. 216.—Ind. or.
sencgalensis, *Guilt. V Pen. Fl. Seneg. Tent.* I. 171. t. 45.—Air. trop.

CYAMUS, Sm. Exot Bot i. 59 (1804)=Kelumbimn, Juss. (Nymph.).
flaviamus, Salisb. in Ron. *Sc* Sims, Ann. Bot ii. (1805) 76=Nelumbium luteum.
luteus, Nutt. Gen. Am. ii. 25=Nelumbium luteum.
mysticus, Salisb. in Kon. & Sims, Ann. Bot ii. (1805) 75 = Nelumbium luteum.
Nelumbo, Sm. Exot. Bot i. (1806) 59. t. 31=Nelumbium speciosum.
pentapetalus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 398=Nelumbium luteum.
reniformis, Pursh, 1. c.=-Nymphaea odorata.

CYANAEORCHIS, Rodrig. Orch. Nov. i. 112 (1877). *ORCH1DEAE*.
Arundinae, *Rodrig. I. c.* 113.—Bras.

CYANANTHUS, Griff. Notul. iv. 154 (1854) = Staurantherа, Benth. (Gesnerac.).
umbrosa, Griff. 1. c = S. umbrosa.

CYANANTHUS, Mien, in Wall. Cat. n. 9007, 9008 (1849;=BurmannIa, Linn.
puallus, Miers, 1. c.=B. pnsilla.

CYANAHTHUB, Wall. Cat n. 1472, 1473 (1830). *CAMPANULACEAE*, Benth. 4" Hook. f. ii. 557.
barbafus, Edgew. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 82= integer,
barbatua, *Franck. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 9.—China.
Hookeri, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 435—Reg. Himal.
incanns, *Hook. f. if Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 2O.-Reg. Himal.
inflatus, *Hook.f. V Thorns. I. c.* 21.—Reg. Himal.
integer, *Wall. Cat.* n. 1472.-Keg. Himal.
linifotius, Wall, ex Hook. f. & Thorns, in Jonm.Linn. Soc. ii. (1858) 20=microphyllus.
lobatns, *Wall. Cat.* n. 1473.—Keg. Himal.
microphyllas, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* XX. (1851) 81.—Keg. Himal.
pednsculatus, C. *B. Clarke, in Hook.f. Pi. Brit. Ind.* iiL 434.—Reg. Himal.

CYANASTRUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 89 (1826) =Volutarella, Cass. (Compos.).

CTANEA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 457. t 75 (1826). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 546.
KITTELIA, Reichb. Handb. 186 (1837).
MACROCHILUS, Fresl, Prod. LobeL 47 (1836).
arborescens, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 183.—Ins. Sandvic.
aspera, A. Gray, I. c. v. (1861) 148=Rollandia calycina.
Grimesiana, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 458.—Ins. Sandvic.
hnmilis, *Wamra, in Flora*, lxv. (1873) 47.—Ins. Sandvic.
leptostegia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 149.—Ina. Saodvic.
lobata, *H. Mann, 1. c.* vii. (1867) 188.—Ins. Sandvic.
pilosa, *A. Gray, 1. c.* (1861) 149.—Ins. Sandvic.
Rollandia, *A. Gray, I. c*—Ins. Sandvic.
snperba, *A. Gray, I. c*—Ins. Sandvic.
tritomantha, *A. Gray, 1. c*—las. Sandvic

CYAOT3LLA, Linn. Gen. ed. V. 149 (1754). *HAEMODORACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 679.
PHARETRELLA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 47 (1866).
TRIGELLA, Salisb. 1. c. 46 (1866).
alba, Herb. exSchnlt. f.Syst. vii. 1700=Ornithogalnm affine.
alba, *Linn.f. Suppl.* 201.—Afr. austr.
opensis, *Linn. Gen.* ed. V. 149; *Syst.* ed. X. 985—Afr. austr.
coerulea, Eckl. Verz. 4scapensis.
lllcu, MoUna, Sagg. Chil. ed. II. 130=Pajithea csctulcft.
lineata, Burch, Trav. ii. 589=lotea.
lutea, *Linn.f. Suppl.* 201.—Afr. austr.
odoratissima, Lindl. Bot. Reg. 1.1111 = lutea.
orchidiformis, *Jacq. Coll.* iv. 211.—Afr. austr.
pulchella, Salisb. Prod. 249=capcnsis.
rosea, Eckl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 498 - lutea.

CYANITIS, Reinw. in Blame, Cat. Gew. Buitenz. 63 (1823j=Dichioa, Lonr. (Saxifrng.).
chinensis, Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 76=D. febrifuga.
sylvatica, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Buitenz. 68; Bijdr. 921 = D. febrifuga.
versicolor, Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 76=D. febrifuga.

CYANOBOTRYS, Zuec. in Abh. Akad. Mucnch. iv. II. (1845) 28=MueUera, Linn. (Legumin.).
mexicana, Zucc. 1. c. = M. mexicana.

CYAWODAPHNB, Blume, Mus. Hot. Lugd. Bat. i. 333 (1851). *LAUR1NEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 151.
cuneata, Blnme, I. c. 334 - Dehaasia cuneata.
glabra, *Miq. Ft. Ind. Bat. Suppl.* 360.—Sumatra,
tomentosa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 334.—Borneo.

CYANOPHYLLUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1852) 324-Mleonia, Ruiz & Par. (Melast.).
magnificum, Denis, in Rev. Hortic. (1863) 166 - M. magnifica.
metallicum, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xvii. (1862 325=M. metallic*.
vittatum, Linden, ex Rafarin, in Rev. Hortic. (1877) 3»cClidemiavittata.

CYANOPIS, Blume, Fl. Javjraef. p. vi (1828); et in DC. Prod. v. 69 (1886)« Vernonia, Schieb. (Compos.).
erigeroides, DC. in Wight, Contrib. 7-V. cinerea.
hypoleuca, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 98.—Abyss.
Leopold!, Sch. Bip. ex Walp. 1. c. ii. 949 - V. Leopoldi.
madagascariensis, DC. Prod. v. 69 = V. madagascariensis.
moluccensis, DC. 1. c. = V. molqccensls.
puiescens, DC. 1. c = V. chinensis.
villosa, DC. 1. c. = V. chinensis.

CYANOPIS, Stend. Nom. ed. II. i. 74, in syn. (1840)'CYANOPSIS, Cass.=Volutarella, Cass. (Compos.).

CYANOPOGON.Welw.ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 240, 258 (1881) = Cyanotis, D. Don, (Commelin.).

CYANOPSIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 200 = Volutarella, Cass. (Compos.).
Chingoyo, Steud. Nom. ed. II. i. 413, in syn.=Pluchea Chingoyo.
deeurrens, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neérl. Indie, ii. (1845) 563=Vernonia cinerea.
microcephala, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 120, nomen.—Malaya.
radieatissima, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 200—Vol. muricata.
Zollingeriana, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. lad. Archip. 120, nomen = Veraonia cinerea.

CYANOPSIS, Endl. Ench. 282 (1841) - CYANOPIS. Blume=Vemonla, Schieb. (Compos.).

CYANORCHIS, Thou, ex Stend. Norn. ed. II. i. 457 (1840)=PhaiUB, Lour. (Orchid.) (P. tetragonus).

CYANOSERIS, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 43=Iiactuca, Toum. (Compos.).
perennis, Schur, 1. c = L. perennis.

CYANOSPERMUM, Wight & Am. Prod. 259 = Rhynchosia, *LOUT.* (Legum.).
albiflorum, Wight *8c* Am. 1. c. 260 – R. cyanosperma.
angolense, Welw. Apont. 586-R. calycina?
calycinum, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 312 = R. calycina.
javanicum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.167 = R. rufescens.
tomentosum, Wight & Am. Prod. 280= R. cyanosperma.

CYANOSTE0HA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiii. (1849) II. 35. *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1140.
BUNNYA, F. Muell. Fragm. v. 36. t. 39 (1865).
angustifolia, *Turci. I. c.* 86.—Austral.
Bunnyana, *F. Muell. Fragm.* v. 36.—Austral,
intermedia, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 36.—Austral.
lanceolata, *Tare*. 1. c.* 35.—Austral.
Turczaninovii, *F. Muell. Fragm.* vi. 154.—Austral.

CYANOSTREMMA, Benth. ex Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 415 (1841) - Calopogonium, Desv. (Legumin.).
caeruleum, Benth. 1. c. = Calop. caeruleum.

CYANOTHAMNUS, Lindl. Swan River App. 18 (1839) = Boronia, Sin. (Rutac).
anethifolius, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 170 = B. ramosa.
ramosus, Liadl. Swan River App. 18 = B. ramosa.
tenuis, Lindl. 1. c = B. tenuis.
tridactylites, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 227 «B. anemonifolia.

CYAXTOTIS, D. Don, Prod. Fl. Nep. 45 (1825). *COMMELINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 851.
BELOSYNAfsis, Hassk. in Flora, Iiv. (1871) 259.
CVANOPOGON, Welw. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 240, 258 (1881).
DALZEIXIA, Hassk. in Flora, xlviii. (1865) 693.
ERYTHROTIS, Hook. f. Bot. Mag. t. 6150 (1875).
SIPHOSTIOMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 16 (1836).
TONNINGIA, Neck. Elem. iii. 165 (1790).
ZYGOMENES, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812; 271.
abyssinica, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 21 - Mannii.
abyssinica, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 344 = hirsute.
adscendens, Dalz. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 343 = tuberosa.
angusta, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 260.—Afr. occ.
arachnoidea, *C. B. Clarke, I. c.* 250.—Ind. or.
axillaris, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 46.—Ind. or.
barbata, *D. Don, 1. c.*—Reg. Himal.
Burmannia, Wight, Ic. t. 2089 = papilionacea.
caespitosa, Kotschy & Peyr. PI. Tinn. 48 = longifolia.
capitata, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 243.—Java.
ceylanica, *Hassk. Commel. Ind.* 145.—ZeyIan.
concanensis, Hassk. 1. c. 114 = tuberosa.
cristata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 46.—Ind. or.; Malaya,
cucullata, *Kunth, Enum. PI.* iv. 107.—Ind. or.
decumbens, Wight, Ic. vi. t. 2088 » fasciculata.
dichrotricha, Stocks, in Wight, 1. c 33. t. 2087-fasciculata.
disrumpens, Hassk. Commel. Ind. 105=axillaris, fasciculata.
djurensis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 256.—Afr. trop.
eriantha, Hassk. Commel. Ind. 138 — fasciculata.
fasciculata, *Schult.f. Syst.* vii. 1152.—Ind. or.
fasciculata, Wall. Cat. n. 8990- barbata, arachnoidea.
foecunda, *DC. ex Hassk. Commel. Ind.* 110.—Abyss,
geniculata, *C. 3. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 260.—Cochinch.
glaberrima, Hassk. Commel. Ind. 156 — barbata.
Gueinaii, Hassk. 1. c 132 = nodiflora.
hirsuta, Baker, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 162 = Commelina aspera.

CYANOTIS :—
hirsuta, *Fisch. Mey. V Avi-Lall. Ind. Sent. Hort. Petrop.* viii. 57.—Abyss.
hirtella, Miq. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 246 = papilionacea.
hispida, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 139 = papilionacea.
Huegelii, Hassk. CommeL Ind. 128 •= cristata.
imtricata, Kunth, Enum. PI. iv. 108 = cristata.
incerta, *Hassk. Commel. Ind.* 160.—Asia.
Karliana, *Hassk. I. c.* 146.—Ind. or.
kewensis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 243.—Ind. or.
lanata, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 642.—Afr. trop.
lanceolata, Wight, Ic. t. 2086 = villosa.
lanceolata, Thw. Enum. PI. ZeyL 32S=zeylanlca.
Lawiana, Wight, Ic. vi. 83. t. 2086 = fhsciculata.
longifolia, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 543.—Afr. trop.
longifolia, Wight, Ic. vi. 83. t. 2084 - Wightii.
Mannii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 258.—Afr. trop.
nilagirica, Hassk. Commel. Ind. 127—fasciculate.
nobilis, Hassk. 1. c 148 = barbata.
nodiflora, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 453 = barbata.
nodiflora, *Kunth, Enum. PI.* iv. 106.—Afr. austr.
papilionacea, *Schult.f. Syst.* vii. 1151.—Ind. or.
parasitica, *Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 214.—Abyss.
pauciflora, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 845.—Abyss,
pilosa, *Schult.f. Syst.* vii. 1154.—Ind. or.
pilosa, Wight, Ic. t 2088 = arachnoidea.
polyrrhiza, *Hochst. ex Hassk. Commel. Ind.* 150.—Abyss.
racemosa, C. B. Clarke, Commel. et Cyrt Beng. t. 38 - cristata.
racemosa, Heyne, ex Hassk. Commel. Ind. 125 = villosa.
rosea, Wight, Ic vi. 83. t. 2086-fasciculata.
sarmentosa, Wight, 1. c. t. 2087*- tuberosa.
scricea, *Hassk. Commel. Ind.* 152.—As. trop.
Schweinfurthii, Hassk. 1. c. 184=lanata.
spedosa, Hassk. 1. c. 108 = nodiflora.
Stocksii, Hassk. 1. c. 118 = tuberosa.
Thomsonii, Hassk. 1. c. 133 = tuberosa.
Thwaitesii, Hassk. 1. c. 136 = fasciculata.
tuberosa, *Schult.f. Syst.* vii. 1153.—Ind. or.
uniflora, *Hassk. Commel. Ind.* 104.—Malaya,
vaga, *Schult.f. Syst.* vii. 1163.—Java,
vaginata, *Wight, Ic.* vi. 84. t. 2088.—Ind. or.
villosa, *Schult.f. Syst.* vii. 1155.—Ind. or.
vittata, Lindl. in Joum. Hort. Soc. v. (1850) 139- Zebrina pendula.
vivipara, *Dais, in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 226.—Ind. or.
Wightii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 250.—Ind. or.
tebrina, Nees.—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 235 = Zebrina pendula.
zeylanica, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 252 =ceylanica.

CYANOTIS, Mien, in Wall. Cat. n. 9006 (1849) = Burmannia, Linn.
nepalensis, Miers, 1. c.—Ind. or.

CYANOTRIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 356; (1819) 192-Camassia, Lindl. (Liliac.) (1832).
angustifolia, Rafin. 1. c. (1819) 192-Cam. esculenta.
sdlloides, Rafin. 1. c. (1811) 356 = Cam. esculenta.

CYANTHILLIUM, Blume, Bijdr. 889 (1826) = Vernonia, Schreb. (Compos.).
moluccense, Blume, 1. c. 890 - V. moluccensis.
pubescens, Blume, 1. c — V. chinensis.
villosum, Blame, 1. c 889 = V. chinensis.

CYANUS, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1785); Juss. Gen. PI. 174 (1789)=Centaurea, linn. (Compos.).
aruensis, Moench, Meth. 561 = Cent. Cyanus.
atropurpureus, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 77 — Cent, atropurpurea.
austriacus, Baumg. I. c. 72-Cent, austriaca.
axillaris, J. * C. Tresl, Fl. Cech. 179 - Cent variegata.
collinus, Gaertn. Mey. & Scherb. FL Wett. iii. 172-Cent. Jacea.
coriaceus, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 76-Cent. Scabiosa.

CYANUS:—
cyanus, Hill, Hort. Kew. 64 = Centanrea Cyanus.
dentalo-folius, *Gitib.* Fl. Iitnan. i. 191-Cent. Cyanus.
eriophorus, Gaertn. Frnct. ii. 382. 1.161=Cent, eriophora.
flosculosus, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 79 =• Cent. flosculosa.
intermedius, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. 3. xvii. (1869) 96-Cent, intermedia.
hastatus, Moench, Meth. 561—Cent, sempervirens.
Jacea, Gaertn. Mey. *8c* Scherb. Fl. Wett.iii. 172-Cent. Jacea.
ladniatus, Gilib. Fl. Lituan. i. 192-Cent. Scabiosa.
lanceolatus, Moench, Meth. 660-Crupina vulgaris.
lugdunensis, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. "• xvii. (1869) 96-Cent, montana.
luteus, Moench, Metb. 560=Cent, moschata.
melitensis, Gaertn. Fruct. ii. 383-Cent, melitensis-*mollis,]. 8c* C. Presl, Fl. Cech. 179 = Cent, montana.
montanus, Hill, Hort. Kew. 64-Cent, montana.
moschatus, Gaertn. Fruct. ii. 382-Cent, moschata.
mucronatus, Moench, Meth. 660 = Volutarella IipP[II]-
napifolius, Gaertn. Fruct. ii. 883 = Cent napifolia.
niger, Gaertn. 1. c. 382 - Cent nigra.
nigrescens, J. & C. Presl, Fl. Cech. 17»=Cent. nig«»' cens.
orientalis, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 78-Cem-orientalis.
paniculatus, Gilib. Fl. Lituan. i. 192-Cent, maculos*-
paniculatus, Moench, Meth. 561 = Cent, paniculate.
phrygius, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. l[VS] = Cent phrygia.
plumosus, Gilib. Fl. Lituan. i. 191-Cent phrygia-
pullatus, Gaertn. Fruct. ii. 383-Cent, puilata.
pumilus, Baumg. Enum. Stirp, Transs. iii. 72 = Cent. phrygia.
ragusinus, Gaertn. Fruct. ii. 383-Cent ragusina-
roseus, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 75=[cent] trinervia.
rotundatus, Moench, Meth. 561-Cent, ragusina.
Scabiosa, Moench, 1. c.=Cent. Scabiosa.
segetum. Hill, Veg. Syst. iv. 29 = Cent. Cyanus.
sibiricus, Gaertn. Fruct. ii. 888 = Cent, sibirica.
solstitialis, J. *8c* C. Presl, Fl. Cech. 179-Cent, solatialis.
variegatus, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. *H*[r,v]^[v] variegata.
vulgaris, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 208=Cent. Cya[""8]-

CYATHANTHERA, Pohl, PI. Bras. Ic. ii. 130. '• [18]" (1881) = Mioonia, Kuiz & Pav. (Melastom.)-
lanceolata, Pohl, 1. c. 181 - M. Cyathanthera.

CYATHELLA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser. H-• (1888) 332. t. 12 = Vincotoxicum, RupP- *I** clepiad.).
Bojeriana, Decne. 1. c 338.—Madag.
mucronata, Decne. 1. c.—Madag.
repand-a, Decne. 1. c. t. 12.—Madag.

CYATHIDIUM, Lindl. ex Royle, Illustr. Bot. H[imal.] 251. t. 66 (1839)-Sau8Burea, DC. (Compos.)'
taraxacifolium, Lindl. 1. c.=S. taraxacifolia.

CYATHOCALYX, Champ, ex Hook. f. & [Thoms. Benth. &] Fl. Ind. i. 126 (1855). *ANONACEAE*, B Hook. f. i. 24.
SOALA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 487 (1837)-
Maingayi, *Hook. f.If Thoms.inHook.f.Fl- Brtt-* i. 68.—Malacca.
marginalis, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent.* ii- l*[6] 6.—Ins. Banca.
martabanicus, *Hook.f. b[1] Thorns, in Hook.f-* *'• *Ind.* i. 53.—Burma.
obtusifolius, *Becc. V Scheff. in Ann. Jard. Buttf*"* (1885) 6.—N. Guinea.
pubescens, *Scheff. 1. c.* 7.—Sumatra.
sumatrana, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. I*** (1871) 888.-Sumatra.
leylanicus, *Champ, ex Hook. f. tf Thorns. &*"* 127.—Zeylan.

CYATHOCHAETA, Nees, in Lehm. Fl. [F]5*f iii. 86 (1846). *CYPERACEAE*, Benth. * HooK- 1061.
TETRALEPIS, Steud. Syn. PI. Cyp. 159 (1855).
avenacea, *Benth. Fl. Austral*, vii. 851.—Austral.
clandestina, *Benth. I. c.*—Austral.
diandra, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 86.—Austral.

CYATH Ginra, Cas> _ lnAnn_ Sc- N «»- Sfr-1- «« (1829) ? «9. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 261.

fe[C,B].- Clarke, Comp. Ind. '87=lutea.

W ... -31 & Gibs Bomb FL ... Nc. Journ. ... at. Hist. vii. (1847) 159=lyr ...

lutea, *Law, ex Wight, /. c.* 158.—Ind. or.

lyrata, *Cass* ... *n. Si:. Nat.* Sér. I. xvii. (1829) 420. —Ind. or. ... B

'Kcta, DC. Prod. y. 874=lyrata.

CYA T8 HoC NEMIS, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1854) 100 = **Begonia,** Linn.

obliqua, Klotzsch, l. c. 101 = B. obliqua.

CYATHOCOMA, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 300 = **Tetraria,** Beauv. (Cyperac.).

Ecklonii, Nees, l. c. ; et x. (1836) 195.-Afr. austr.

Nestii, Boeck. ... xxxviii_(1874) 812 = **Macrochaetum** Dre ...

nigrovaginata, Nees, in tinnaea> *• C8S6) 196.-Afr. austr.

CYATHODES, LabilL Nov_ Ho»- "• i- »• t 81 (1804).

ANDRO... A> Hook> f, "• Antarct_ '• "• u 80 (1845)

abiet ... *Prod.* 540.—Austral.

acer ... *xr. l. c.* 539.—Austral.

ascendens, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847V>««

... Gaudich_ in ... reyc. Voy. Bot. 98=Tameia-

Baxteri, A. Cunn. in DC. Prod. ... 741=Astrolonia divaricatum.

Colensoi, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl. 111.*— N. Zel.

dealbata, *R. Br. Prod.* B29.-Tasman.

disticha, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 58. t. 82 = **Trochocarpa disticha.**

divaricata ... *Tasm.* i. 246. t 74 B.—Tasman.

Douglasii, A. Gra ... m. Acad. v. (1861) 324 = imbricata.

empetrifolia, *Hook. f. Fl. N. Zel.* 164-N. Zel.

glauca, *Labill. Nov. Holl. Pl. i.* ... 81—Austral.

imbricata, *Stschegl. in* ... *Soc. Nat. Mo* (1859) i. 10.—Ins. Sa ... xxltii_

laurina, R. Br. ex Rudge, in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 293. t. 9 = Trochо ... «"P» la»TM»-

Macraeana, DC. Prod_TM_ 742=Tameiameiae.

m"ranu.a, ook>f_Fl_Ta!m_>• 245=straminea.

yced.u ... rod, 54 ... rosa

parvifolia ... *c.*—Tasman.

Pomareae, *A ... in ..., Proc ... Antm Acad ...* (1861) 324. —Ins. Sandvic.

pumila, H ... 7- 735.—N. Zel.

robusta, ... i ... W—N. Zel.

rubicunda, ... Flagm_iv ... Leuco P°6 ori

rubicundus.

squamuligera, ... 97 = **Stenanthera**

squamuligera. F ... Muell> l# c-

straminea, *R. Br, Prod_* 639—Tasman.

tahitensis, *Nad ... d>Enum_PL Tahiti_*6a___Ins_Tahiti_

Tameiameiae, ... Linna**> • (1826) «39.—Ins. Sandvic.

CYATHODISCUS, Hochst in Flora, xxv. (1842) 240 = **Peddiea,** Harv. Th ...

umbellatus, Hochst. l. c = P. Dregei.

CyATHOGLOTTIS, Poepp. & Endl_Nov_Gen_<* Sp_ ... 5. t. 94 (1835) = **Sobralia,** Ruiz & Pav. (Oichid.S

candida, Poepp. & Endl. l. c. 5li ... candida.

crocea, Poepp. & Endl. l. c_58 ... S_cro<:ea_

macrantha, Lem. Jard. Flenr_iT_ (185*) • 865 ... s_

macrophylla ?

CYATHOGYNE, Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1884) 536. *EUPHORBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 286.

viridis, *Muell. Arg. l. c.*—Afr. trop.

CYATHOPAPPUS, F. Muell. Fragm. ii. 157 (1881)

Cyathophosis, Cass. (Compos. ...

hosoides, F. Muell. l. c. 158 = G. cyathopappa.

CyATHOPAPPUS, Seh_Bip_in Pollichia, xviii.-xii. (1861) 133 ... Bip- (Compos.).

Cyatalasioide., Swh. Bip. 1. c. =E. cyathiformis.

CYATHOPHORA, Rafin. Fl. Tellur. IT. 117 (1888) = **Euphorbia,** Linn.

ciliata, Rafin. 1. c. »E. heterophylla,

heterophyla, Rafin. 1. c. =E. heterophylla.

picta, Kafin. 1. c. =E. helerophylla.

CTATHOPSIS, Brongn. ft Gris, in Bnll. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 66 ; et in Ann. Sc. Nat Sér. V. ii. (1864) 152. *EPACRIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 61S.

floribnnda, *Brongn. tf Gris, II. cc.* 66,153.-N. Caled.

CYATHORHACHIS, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 403 (1855) = **Polytooa,** R. Br. (Gramin.).

WaUichiana, Nees, ex Stead. 1. c.~P. Wallichiana.

CTATHOSELINTJM, Benth. In Benth. ft Hook. f. Gen. i. 912 (1867). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.

tomentosnm, *Benth.* b* *Hook.f. I. c.*—Dalmat.

CTATHO8TELMA, Fonm. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 219 (1885). *ASCLEPIADEAE.*

furcatum, *Fourn. I. e.* 2iO.—Bras,

latipes, *Fourn. 1. c.* 219.—Bias.

CTATHO8TEM3IA, Griff. Notnl. W. 707. t. 650 (1854). *ANONACEAE* [Benth. & Hook. f. i. 28].

viridiflora, *Griff. I. c*—Malaya.

CYATHOSTEMON, Turcz.in BuU. Phys-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 331=**Baeckea,** J.inn. (Myrtac).

tenuifolius, Turcz. 1. c. 332 = B. Dnimmondii.

CYATHOSTYLES, Schott. ex Meissn. Gen. Comm. 184 (1840) = **Cyphomandra,** Sendtn. (Solanac.).

CTATHtTIiA, Lour. Fl. Cochinch. i. 101 (1790). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 31. POLYSCALIS, Wall. Cat. n. 6939 (188-2).

achyranthoides, *Moq. in DC. Prod.* ^iii. H. 826.—Am. trop.

angustifolia, *Moq. I.e.* 328.—Afr. austr.

capitata, *Moq. I. c.* 329.—Reg. Himal.

capitata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 249 = ceylaniea.

ceylanica, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv.723.—Zeylan.

cylindrica, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 328.—Afr. austr.

cylindrica, Schweinf. ex Benth. & *Hook. I.* Gen. iii. 86 — Pandiaka cylindrica.

geminata, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 880.—Afr. trop.

geniculata, *Lour. Fl. Cochinch.* 102.—Geiont. trop.

globosa, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 330=geniculata.

globulifera, *Moq. I. c.* 329.—Afr. austr.

natalensis, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 97.—Afr. austr.

orbiculata, Moq. 1. c. 330=>Pupalia orbiculata.

prostrata, Blume, Bijdr. 549=geniculata.

rtpens, Moq. in DC. Prod. xiii. u. 830=geniculata.

sanguinolenta, *Moq. 1. c.* 330.—Ind. or.

Schitnperiana, Moq. I.e. 328-cylindrica.

sequax, Moq. 1. c. 327=tomentosa.

sphaerocephala, *Baker, injourn. Linn. Soc.xx.* (1883) 238.-Madag.

tomentosa, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 327.—Reg. Himal.

triuncinata, *Moq. I. c.*—Madag.

CYBBANTHERA, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 87 (1885) = **Iiimnophila,** R. Br. (Scrophul.).

connata, Buch.-Ham. 1. c.=L. hypericifolia.

CYBELE, Falc. in Lindl. Veg. Kingd. 183 C (1847) = **Hermlnium,** Linn. (Orchid.).

CYBELE, Salisb. in Knight, Prot 123 (1809)=**8tenoоarpiia,** R. Br. (Proteac.).

umbelli/era, Salisb. I.e. 124=S.Forsteri.

CYBELION, Spreng.Syst. iii. 679,721 (1826)-IoilopBl8, H.B.&K. (Orchid.).

pallidifiorum, Spreng. 1. c. 721 = 1. utricularioides.

tulchellum, Spreng. I. a - 1. pulchella.

tenerum, Steud. Norn. ed. II. i. 458 = 1. utricularioides.

terts, Steud. 1. c. =1. teres.

testiculatum, Sprang. Syst. iii. 721=1. terticulata.

Utricularlat, Spreng. 1. c.=I. utricularioide*.

CTBIANTHUS, Mart. Nor. Gen. et Sp. iii. 87. t 286 (1829). *MYRSINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 643. PECKIA, Veil. FL Flnm. 51; i. t. 134,135 (1825). WEIGELTIA, A. DC. in. Trans. Linn. Soc. xv>. (1834) 102.

angustifolius, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvi. (1841) 92.—Bras.

Boissieri, *A. DC. 1. c.* 93.—Bras,

coriaceus, *Mart. Herb. Fl. Bras.* 259.—Bias,

coslaricanus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bat.* ii. 290.— Costa Rica,

crotonoides, *Schomb. Faun. If Fl. Cui.* 1086, nomen.— Guian.

cuneifolius, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 88.—Bras,

cuspidatus, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 297.—Ind. occ.

densicomus. *Mart. Herb. Fl. Bras.* 260.—Bras,

densiflorus, *Miq. in Mart. Fl. Bras. x.* 300.—Bras,

detergens, *Mart. Herb. Fl. Bras.* 260.—Bras,

fuscus, *Mart. I. c.* 259.—Bras,

glaber, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvi. (1841) 94. -Bras.

guyanensis, *Miq. in Mart. Fl. Bras. x.* 298.—Gniana.

Humboldtii, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 104=Ardisia aenminata.

Leasertii, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvi. (1841) 98.—Bias.

longifolius, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 299.—Bras.

luridus, Benth. ex Miq. 1. c 292=penduliflorns.

macrophyllhu, *Miq. 1. c.*—Bras,

mcridenais, *Miq. 1. c.* 297.—Venezuela,

microbotrys, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvi. (1841) 94.—Guiana.

multicostatns, *Miq. in Mart. Fl. Bras. x.* 299.—Bras,

multipunctatus, *A. DC. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvi. (1841) 94.—Guian.

myrianthos, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. SOO.—Guian.

myrtifolius, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 222.— Reg. Argent.

nitidus, *Miq. in Mart. Fl. Bras.* x. 295.—Bras,

obovatus, *Mart, ex Miq. in Mart. 1. c.* 301.—Bras.

parviftorus.Q. Muell. in Walp. Ann. v. (1858) 472 = see),

parvifolius, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1858) 67:2.— N. Granat.

penduliflorus, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 87.—Bras,

philippinensis, *Hook.f. ex Vidal, Sinops.* p. xxx. t. 61. f. B.-Ins. Philipp.

Prieurii, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvi. (1841) 98.—Guian.

Prindpis, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 104 =Ardisia acuminata.

subspicatus, *Benth. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* X. 296. —Bras.

CYBIOSTIGMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) IL 155-**Ayenla,** Linn. (Stercul.).

abutilifolium, Turcz. 1. c 156-A. magna.

sidaefolium, Turcz. 1. c. =A. mexicana.

CTBIBTAX, Mart, in DC. Prod. ix.. 198 (1845). *BIGNONIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1042. YANGUA, Spruce, in Journ. linn. Soc. iii. (1859) 197.

antisyphilitica, *Mart. I. c.* 199.—Bros.

macrocarpa, Benlh. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1043 = Godmania macrocarpa.

CYCAS, Linn. Hort. Cliff. 482(1737). *CYCADACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 444-. TODDA-PANA, Adans. Fam. ii. 25, 611 (1768).

angulata, *JR. Br. Prod.* 348.—Austral.

Armstrongs *Miq. in Arch. Néerl.* iii. (1868) 235.— Austral.

Beddomei, *Dyer, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1881) 85.—Ind. or.

caffra, Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. ii. (1775) 284 = Encephalartos caffer.

Cairnsiana, *F. Muell. Fragm.* x. 63.—Austral,

celebica. *Miq. Comm. Phyt.* 126.—Ins. Celebes,

eircinnalis, *Linn. Sp. PI.* 1188.—Ins. Molucc.

circinalis, Roxb. Hort. lteng. 71; Fl. Ind. iii. 744 = Rumphii.

dilatata. Griff. Notul. iv. 1,15=pectinata.

glauca, Miq. Comm. Phyt. 127 = Rumphii.

gracilis, *Miq. in Versl. Ron. Akad. Wet.* xv. (1863) 366.—Austral.

hypoleuca, *Prest, Efiim.Bot.2SS.-Ins.* Philipp.

inermis, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 632.- China.

inermis, Oudem. in Arch. Néerl. ii. (1867) 394 = revolut*.

CYCAB:-
fenkinsiana, Griff. Notul. iv. 9 = pectinata.
,kennedyana, *F. Mutll. in Melb. Chemist* (March 1882).—Austral.
macrocarpa. Griff. Notul. iv. 11 —Rumphii.
*madagascarien*sis, Miq. Comm. Phyt. 127 « circinalis.
•media, *R. Br. Prod.* 848.—Austral,
/neo-caledonica, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 32, nomen.-N. Caled.
'Normanbyana, *F. Muell. Fragm.* viii. 169.—Austral,
/.pandanifolia, *Hort.—Cf. Curd. Chron.* (1865) 365.—Hab. I
•"papuana, *F. Muell. Papuan PI.* iv. 76.—N. Gnin.
/pectinata, *Griff. Notul.* iv. 10.—Reg. Himal.; Burma,
^pluma, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1878) I. 11.—Hab. ?
revolutá, Bedd. For. Fl. 227 = Beddomei.
/revoluta,, *Thunb. Fl. Jap.* 229.—Japon.
' *Riedlei,* Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 434 = Macrozamia Fraseri.
'Riuminiana, *Regel, Gartenfl.* (1863) 16.—Ins. Philipp.
'Rumphii, *Miq. in Bull. Sc. Phys. Nat. Nierl.* **(1839)** 45.—Malaya; Austral.
Scratchleyana, F. Muell. Papuan PI. il. 15= Rumphii.
sSeemanni, *A. Br. in Sitii. Ges. Naturf. Fr.* (1876) 114.—Ins. Fiji.
Aiamensis,*Miq. in Bot.Zeit.* xxi. (1863) 334.—Burma; Siam.
speciosat-U. Don, in Proc linn. Soc. i. (1840) 64, 56 = Rumphii.
*spheric**, Roxb. Hort. Beng. 71; Fl. Ind. iii. 747 = circinalis.
squamosa, Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit 403 = circinalis.
jtquarrosa, Steud. Nom. ed. II. i. 468, sphalm. = praec.
' *Thouarsii,* R. Br. Prod. 347 - circinalis.
r-undulata, *Desf. ex Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 484.— Hab.?
villosa, Herb. Roy. ex A. DC. Prod. xvi. u. 532 = Encephalartos cafler.
Wallichii, Miq. Mon. Cycad. 32-Rumphii.

CYCCA, Batsch, Tab. 168 (1802)=CICCA, Linn.= Phyllanfims, Linn. (Euphorb.).

CYCLACHAENA, Fresen. Ind. Sem. Hort. Frankf. (18S6) 4; etin Linnaea, xii. (1838) Iitt. 78 = **Iva,** Linn. (Compos.).
ambrosiaefolia, Benth. & Hook. *i.* Gen. ii. 353 = 1. ambrosiaefolia.
xanthifolia, Fresen. Ind. Sem. Hort. Frankf. (1836) 4 ; ex DC. Prod. vii. 288 - 1 . xanthifolia.

CYCLADENIA, Benth. PI. Hartw. 322 (1850). *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 728.
humilis, *Benth. 1. c.* 328.—Calif,
tomentosa, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 474.—Calif.

CYCLAMEN, [Toum.] Liun. Syst. ed. I (1736); Gen. ed. I. 41 (1737). *PRIMULACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 634.
CYCLAMINUS, Hall. Stirp. Hehr. i. 281 (1768).
aestivum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 407—europaeum.
africanum, *Boiss. V Rent. Pugill. PI. Nov.* 76.— Afr. bor.
aleppicum, Fisch. ex Hoffmgg. Verz. Pfl. 54 •= latifolium.
antiochium, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. IV. iv. (1855) 23.—Hab. ?
AtUnsii x, T. Moore, Garden Camp. i. 89 ; ex *hem.* Jard. Fleur. iii. (1853) t. 297.
autumnale, J. Boos, Schoenbr. Fl. 46 = neapolitanum.
balearicum, Willk. in Oestr. Bot Zeitschr. xxv. (1875) 111— repandum.
caucasicum, Willd. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 11 -conm.
cilicium, *Boiss.* &• *Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 78.—Cilicia.
Clusii, Lindl. Bot. Reg. t 1013 - europaenm.
cordifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 295- enropaeum.
coum. *Mill. Gard. Diet.* ed. VIIL n. 6.—Graecia; Oriens.
coum, Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 406 = europaeum.
cyprium, Unger *Sc* Kotschy, Ins. Cypern, 296 =i neapolitannm.
deltoideum, *Tausch, in Flora,* xiL (1829) 667.—**Hab. ?**
elegans, Boiss. *Sc* Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 145-coum.

CYCLAMEN:—
europaeum, *Linn. Sp. PI.* 146.—Europ.; Reg. Caucas.
europaeum, Pall, ex Bieb. FL Taur. Cauc. 140 = coum.
europaeum, Savl, Fl. Pis. i. 213 = hederaefolium.
europaeum, Sm. Engl. Bot. t. 648 - neapolitanum.
fieariaefolium, Keichb. Fl. Germ. Excurs. 407 = neapolitanum.
floridum, Salisb. Prod. 119-europaeum.
graecum, *Link, in Linnaea,* ix. (1834) 673.—Graecia.
hastatum, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) 668.—Hab.?
hederaceum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 466 = latifolium.
hederaefolium, *Ait. Hort. Kev.* ed. I. i. 196.—Europ. austr.
hederaefolium, Sibth. & Sm. Fl. Graec Prod. i. 128- latifolium.
hederaefolium, Sims, Bot. Mag. t. 1001-vemale.
hederaefolium, Willd. Sp. PI. i. 810-nenpolitanom ?
hyemale, Salisb. Prod. 118=coum.
ibericum, *Goldie, ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 560, nomen.—Iberia.
ibericum, Stev. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 11-coum.
immaculatum, [Fieri I] in Ionios Aothol. v. 192 = hederaefolium.
indicnm, *Linn. Sp. PI.* 145 (cult. ?).—Zeylan.
intermedium, *Wender.Ind.Sem.Hort.Marb.* (1826).— Europ. austr.
latifolium, *Sibth.* b* *Sm. Fl. Graec.* ii. 71. t 185.—Graecia; As. Min.
linearifolium, *DC. Fl. Fr.* iii. 258.—Gallia.
littorale, *Sadler, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 406; *Lindl. Bot. Reg.* (1846) t. 66.—Reg. Mediterr.
macrophyllum, *Sieber, in /sis* (1823) 469.—Ins. Helena,
macropus, *Zucc. Del. Sem. Hort. Monac.* (1846) 4.— Oriens.
neapolitanum, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. lxvi.—Europ.
offidnale, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. i. 458 = europaeum.
orbiculatum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = europaeum.
persicum, MilL 1. c. = latifolium.
persicum, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Piod. i. 128 • graecum.
Pali, Chiaje, Opusc 166 = graecum.
purpurascens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = europaeum.
pyrolaefolium, Salisb. Prod. 119 - latifolium.
repandum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 128; Fl. Graec. 1.186=hederaefolium.
retroflexum, Moench, Meth. Suppl. 177 = europaeum.
romanum, Griseb. Spicil. <Fl. Rumel. i. 5 » repandum.
subhastatum, Reichb. FL Germ. Excurs. 407 "neapolitanum.
utopicum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 64 •- latifolinm.
vernale, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1343) 308- coum.
vernale, *MilL Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4.—Italia.
vernum, Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 407=hederaefoliura.
vernum, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser, I. i. t. 9 = coum.

CYCLAMINUS, Hall. Stirp. Helv. i. 281 (1758) = Cyclamen, Tourn. (Primul.).
europaeus. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 135 = Cyclamen europaeum.

CYCLANTHEBA, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1881).-Cf. .Linnaea, viii. (1838) Litt. 23. *CUCURB1TACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 836.
DISCANTHERA, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 696 (1840).
Achocchilla, Spruce, ex Cogn. in Mém. Cour. Acad. Belg. 8vo. xxviii. (1878) 73 = brachybotrys.
australis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 857.— Paraguay.
biglandulifera, *Cogn. I. c.* 849.—Mexic.
Bourgaeana, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. vi. (1866) 17.—Mexic.
brachybotrys, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878) 78.—Peruv.
brachystachya, *Cogn. I. c.* 64.—Mexic.
brasiliensis, *Cogn. 1. c.* 74.—Bras.
Burchellii, *Cogn. I. c.* 67.—Bras,
caracasana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 865.— Venezuela.

CYCLAMINUS:—
caerulea, Hort. Elwes, ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 285 = Calochortus glaucus.
cordifolia, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878) 76.—N. Granat
costaricensis, *Cogn. I. c.* 73.—Costa Rica,
digitata, *Am. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 380.—Peruv.
dissecta, *Am. 1. c.*—Am. bor.
dissecta,A. Gray, PL Wright, i. 76; ii. 61-Naudiniana.
Eichleri, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878) 74.—Bras,
elegans, *Cogn. I. c.* 70.—Bras,
eremocarpa, *Cogn. I. c.* 63.—Mexic.
explodens, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. iii. (1859) 160.—N. Granat.
filifera, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878) 72.—Guatemala,
glauca, *Cogn. I. c*—Venezuela,
gracillima, *Cogn. 1. c.* 71.—Mexic
Grisebachii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 854.—Venezuela.
hastata, Cogn. in Mem. Cour. Acad. Belg. 8vo. xxviii. (1878)64=Umnoides.
Hystrix, *Am. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 280.—Reg. Argent,
integrifoliola, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo- xxviii. (1878) 65.—Mexic.
Langaei, *Cogn. I. c.* 67.—Mexic.
leptostacbya, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 99.—Am. austr.
macropoda, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 858.— Peruv.
Mathewsii, *Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 280.—Peruv.
microcarpa, *Cogn. in Mém. Cour. Acad. Belg.* 8vo- xxvüi. (1878) 75.—Bolivia,
multifoliolata, *Cogn. 1. c.* 66.—Mexic.
Naudiniana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 831.— Texas.
Oerstedii, *Cogn. I. c.* 856.—Costa Rica,
pedata, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1831) • —*Cf. Linnaea,* viii. (1883) *Litt.* 23.—Mexic
quinquelobata, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo- xxviii. (1878) 64.—Bras,
ribiflora, *Cogn. I. c.* 63.—Mexic.
subinermis, *Cogn. in Bull. Acad. Belg.* Sér. IL xlfe (1880) 197.—N. Granat.
tamiiifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1847) *U7*-- Uruguay.
tamnoides, *Cogn. in Mém. Cour. Acad. Belg.* 8v»- xxviii. (1878) 64.—Mexic.
tenuifolia, *Cogn. 1. c.* 68.—Bras,
tenuisepala, *Cogn. I. c.* 64.—Peruv.
tomentosa, *Cogn. t. c.* 77.—Bolivia.
Trianaei, *Cogn. I. c.* 75.—Mexic.

CYCLAXTHU8, Poit. in Mém. Mus. Par. ix. (18»)) 35. tt. 2, 8. *CYCLANTHACEAE,* Benth. & Hook. «• "'•953.
CYCLOSANTHES, Poepp. in Froriep, Not. xxxi. o**(1831).**
DISCANTHUS, Spruce, in Journ. linn. Soc. iii. (1869) 196.
bipartitus, *Poit. in Mim. Mus. Par.* ix. (1822) 36- —Guiana.
cristatus, *Klottsch, in •Linnaea,* xx. (1847) 469.—*•• Granat.
discolor, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1888) I. 5-"~ Hab.t
Plumieiii, *Poit. in Mim. Mus. Par.* ix. (1822) 37- '• —Ins. Martin.

CYCLAS, Schreb. Gen. 282 (1789) - **Crudfc,** S<*re- (Legumin.).
aromatica, J. F. Gmel. Syst. 674 = C. aromatica.
spicata, J. F. Gmel. 1. c. = C. Apalatoa.

CYCLEA, Am. ex Wight, Illustr. i. 22 **(1840).**
MEN1SPBRMACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. L 88.
PERAPHORA, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist, a III. xviii. (1866) 20.
RHAPTOMEKIS. Mieis. 1. c. Ser. II. vii. (1861) *V
Arnottii, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. " • xviii. (1866) 19 = peltata.
barbata, Miers, 1. c=pel tat a.
Burmanil, *Miers, I. c.* Ser. II. vii. (1851) 40.—I*-
Burmanni, Am. ex Wight, Illustr. i. 22-pelt**

CYCIiBA:—
debiliflora, Mien, Contrib. iii. 242 = pelttta.
deltoidea, *Miers, in Hook. Keu Journ.* iii. (1851) 258. —China.
discolor. Mien, in Ann. Nat Hist. Ser. IT. vii. (1851) 41=peltata.
laxiflora, Miers, Contrib. iii. 241-peltata.
madagascariensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 460.—Madag.
Peltata, *Hook./. V Thorns. Fl. Ind.* i. 201.—Ind. or.; Malaya.
Pendnlina, *Miers, Contrib.* iii. 248.—Malacca,
peregrina, *Miers, I. c.* 242.—Borneo.
populifotia, Hook. f. ft Thorns. Fl. Ind. L 202= Lophophyllum bicristatum.
robusta, *Becc. Malesia,* i. (1877) 157.—Borneo.
versicolor, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist Ser. HI. xviii. (1866) 19 = peltata.
villosum. Miers, in Ann. Nat. Hist Ser. II. vii. (1851) 41 = Pericampylus incanus.

CYCLIUM, Stend. Nom. ed. II. i. 458 (1849) = Cyonium, £. Mey. (Scrophul.).

CYCLOBALANOPSIS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk.Meddel. (1866) 77-Quereus, Toum. (Cnpul.).
acuta, Oerst. 1. c. 78 = Q. acuta.
"nnulata, Oerst. 1. c - Q. glanca.
"rgentata, Oerst. 1. c. 79 = Q. argentata.
Burgerii, Oerst. 1. c. 78 = Q. Buergerii.
Championi, Oerst. 1. c. 79-Q. Champion!.
gemelliflora, Oerst. 1. c = Q. gemelliflora.
giha, Oerst. 1. c. 78 = Q. gilva.
glauca, Oerst. 1. c. ^Q. glauca.
Helferiana, Oerst. 1. c. 79 = Q. Helferiana.
Horsfteldii, Oerst. 1. c. 78 = Q. semiserrata.
Kamroopii, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1878) 879-Q.linenta.
'onigata, Oerst. 1. c.=Q. laevigata.
tamellosa, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 79 = Q.lamellosa.
"neata, Oerst. 1. c 78 = Q. lineata.
"wrginata, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1873) 379 = Q. marginata.
Merkusii, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 79 =Q. turbinata.
""spili/olio, Oerst. 1.C.-Q. mespilifolia.
"xtruata, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1878) 879 = Q. sundaica.
".Vrrsinaefolia, Oerst. 1. c =Q. myrsinaefolia.
otdocarpa, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1868) '8 = Q. oidocarpa.
°*yodon,* Oerst. 1. c 79 = Q. lineata.
P'ueilamellosa, Oerst. 1. c = Q. laroellosa.
salicina, Oerst 1. c. 78 = Q. salicina.
'"niserrata, Oerst. 1. c = Q. semiaerrata.
"tomsoniana, Oerst. 1. c. 79-Q. lineata.
vtiutina, Oerst. 1. c. = Q. velutina.

CYCLOBALANUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. -U866) 80 = Quereus, Tóum. (Cnpul.).
"mnettii, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1873) 375 = Q. Bennettii.
%."ncoi, Oeret 1. c - Q. Blancoi.
"'unteana, Oeret. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1868) ol «Q. Blumeana.
<*lebica, Oerst. 1. c.-Q. celebica.
°o*centrica, Oerst. 1. c. = Q. concentrica.
???rpa, Omt L C-"Q- conocarpa.
a, Oerst. 1. c - Q. costata.
cyrtop *i Oerst. 1. c. 80 = Q. cyrt<;poda.*
daphnoidea, Oerst. 1. c 81 = Q. dapWridea.
Di fenhorstii, Oerst. 1. c. 80=Q. Diepenhorstii.
"«nstocarpa, Oeret. 1. c 81 = Q. encleisacarpa.
V>v<=hi, Oerst. 1. c 80 = Q. Ewyckii.
gracilis' Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (187a) 876 *Q. gracilis.
Hanc ri, Oeret. 1. c. 375-Q. Hancei.
Hyn, Oeret. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866.) 81 ¿J° Synopsis Hystrix.
Oeret. l.c.80=Q.induta.
javen Oent- 81=Q-i avensi»-*
Lampon ga, Oeret. 1. c. 81-Q. Lamponga.
llff-k k" ptogyne - Selsk. Skr. V. ix. (1873)
Li n j? ent in ^i Vidensk. Meddel. (1866) 81
nit, Oerst. 1. c = Q. nitida.

CYCLOBALANUS:—
Omalokos, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 80 =Quercus Omalokos.
oogyne, Oerst. 1. c. 81 =-Q. oogyne.
ovalis, Oerst. 1. c.=Q. ovalis.
phtlifipensis, Oerst. 1. c = Q. philippensis.
platycarpa, Oeret. 1. c 80 = Q. platycarpus.
Rassa, Oeret. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ix. (1873) 376 = Q. Rassa.
Reinwardtii, Oeret. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 81 = Q. Reinwardtii.
Tysmanni, Oeret. 1. c. 80 = Q. Korthalsii.

CYCLOBOTHRA, [D. Don, in] Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. iii. t. 273 (1828) = Calochortua, Pursh (Liliac).
alba, Benth. in Trans. Hort. Soc. N. S. i. (1835) 413. t. 14. = Cal.albns.
barbata, [D. Don, in] Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. iii. t. 273 = Cal. flavus.
caerulea, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 4 = Cal. caeruleus.
elegant, Benth. in Bot. Reg. subt. 1662 = Cal. elegans.
tlegans-, Torr. in Pacif. Kail. Rep. iv. 146 = Cal. Maweanus.
flava, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1662=Cal. flavus.
fusca, Lindl. 1. c. = Cal. fuscus.
grandiflora, Mart. *BL* Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 384=Cal. Bonplandianus.
Hartwegi, Kunth, Ennm. PI. iv. 231=Cal. Hartwegii.
lutea, Lindl. Bot. Reg. t. 1663-Cal. flavus.
monophylla, Lindl. in Joum. Hort. Soc. iv. (1819) 81 -Cat. Benthami.
nitida, Kunth, Enum. Fl. iv. 230-Cal. nitidus.
nitida, Torr. in Pacif. Rail. Hep. iv. 146 = Cal. Benthami.
pallida, Lindl. Bot. Reg. snb 1.1662 = Cal. flavus.
paniculata, Lindl. 1. c.-Cal. albus.
propinqua, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 701 = Cal. Bonplandianus.
pulchella, Benth. in Trans. Hort. Soc. N. S. i. (1835) 412=Cal. pulchellus.
purpurea, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. iv. t. 20 = Cal. Bonplandianus.
uniflora, Kunth, Enum. PI. iv. 669 = Cal. sniflorus.

CYCLOCAMPE, Stend. Syn. PI. Cyp. 156 (1855) = Bchoenus, Linn. (Cyperac).
waigiouensis, Steud. 1. C--S.calystach.yus.

CYCLOCAMPE, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1063 (1883). *CYPERACEAE.*
arundinacea, Benth. & Hook. f. 1. c=Schoenus arundinaceus.
elongata, Benth. ft Hook. f. L c. =Asterochaeta elongata.
nkens, *Hook.f. 1c. PI.* sub t. 1434.—Ins. Maurit.

CYCLOCARPA, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 389 (1855) sphalm. -= CYCLOCAMPE, Steud. = Sohoenus, Linn. (Cyperac).

CYCLOCARPUS, Jungh. in Hoev. ft De Vrie»e Tijdschr. vii. (1840) 810 = Evodia, Forst. (Kutac).
japonieus, Jungh. 1. c 311 = E. rutaecarpa ?

CYCLOCODON, Griff. Notul. iv. 277 (1854) = Campanumoea, Blume (Campanul..).
adnatum, Griff, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 558 = Camp, celebica.
distans, Griff. Notul. iv. 277 = Camp, parviflora.
laneifolium, Kurz, in Flora, liii. (.1872) SOS = Camp. celebica.
laneifolium, Kurz, in Journ. As. Soc. Bang., xlvi. (1877) II. 210, partim - Camp, parviflora.
Itueocarpum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 1081= Camp. celebica.
parviflorum, Hook. f. ft Tboms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 18 = Camp, parviflora.
truncation, Hook. f. ft Thorns. 1. c. = Camp. celebicai.

CYCLODISCUS, Klotzsch, in Monatsb. Acad. BerL (1859) 591-^Bragantia, Lour. (Aristoloch.).
latifolius, Klotzsch, 1. c = B. tomentosa.
tomentosus, Klotzsch, 1. c. = B. tomentosa.

CYCLOGYNE, Benth. in Lindl. Swan River App. 16 (1889)=Swainsona, Salisb. (Legumin.).

CYCLOGYNE:—
canescens, Benth. in Lindl. Swan River App. 16 «S. canescens.
procumbent, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 393° Swainsona procumbent.
swainsonioides, Benth. in Mitch. Journ. Trap. Austral. 3'J7 = S. procumbens.

CYCXOLEPIS, Gill, ex D. Don, in Phil. Mag. xi. (1832) 392. *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 491.
denticulata, *Remy, in* C. *Gay, Fl. Chil.* iii. 292.—Chili,
genistoides, *Gill, ex D. Don, in Phil. Mag.* xi. (1832) 392.—Chili.

CYCLOLEPIS, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 203. t. 9 = Cycloloma, Moq. (Chenopod.).
platyphylla, Moq. 1. c.= Cycloloma platyphyllum.

CYCLOLEPSIS, Endl. Gen. Suppl. i. 1385 (1841) = Cyelolepis, Gill. (Compos.).

CYCLOLOBItTH, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838)92. *LEGUMINOSAE,* Benth. ft Hook. f. i. 545.
Blanchetianum, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 84. —Bras,
brasiliense, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 92. —Bras.
Clausseni, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 64.— Bras.
Hostraanni, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 52.-Guian.

CYCLOLOMA, Moq. Chenop. Enum. 17 (1840). *CHENOPOD1ACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 50.
AMOREA, Moq. in Delile, Cat. Hort. Monsp. (1844).
AMOREUXIA, Moq. in Mem. Soc. Hist Nat. Monsp. (1826).
CYCLOLEPIS, Moq. in Ann. Sc Nat. Sér. II. i. (1834) -208. t. 9.
PgrKRltANNiA, Reichb. Nom. 236 (1841).
platyphyllum, *Moq. Chenop. Enum.* 18.—Am. bor.

CYCLOMORIUM, Walp. Rep. ii. 890 (1848) = DeBmodium, Desv. (Legumin.).
caracasanum, Walp. 1. c. = D. spirale.

CYCLONEMA, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 225-Clerodendron, Linn. (Verben.).
discolor, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 260 = Gler. discolor.
hirsutum, Hochst in Flora, xxv. (1842) 228-Cler. umbeUatum ?
mucronatum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 262.—Afr. trop.
myricoides, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 226 = Cler. myricoides.
serratum, Hochst. 1. c 227.—Afr. austr.
spinescens, Oliver, in Joum. Linn. Soc xv. (1876) 96. —Afr. trop.
spinescens, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 262.—Afr. trop.
sylvaticum, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 227.—Afr. austr.
tettense, Klotzsch, in Fetere, Reise Mossamb. Bot 261. —Afr. trop.
triphyllum, Harv. Thes. Cap. i. 17.—Afr. austr.

CYCLOPHYLLTJM, Hook. f. in Benth. ft Hook. f. Gen. ii. pais prima Addend. 635 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. Gen. ii. 1. c. et 1229.
Deplanchei, *Hook.f. I. c.* 636,1229.—N. Caled.

CYCLOPIA, Vent. Dec. Gen. 8 (1808). *LEGUMINOSAE,* Benth. ft Hook. f. i. 466.
IBBBTSONIA, Sims, in Bot Mag. t 1259 (1810).
Bowieana, *Han. in Harv.* &• *Sond. Fl. Cap.* ii. 9.— *Air.* austr.
brachypoda,Benlb. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 67 = subtemata.
cordifolia, Benth. 1. c.= latifolia.
elata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 107, nomen.—Afr. austr.
galioides, *DC. Prod.* ii. 101.—Afr. austr.
galioides, E. Mcy. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838^ 67= genistoides.
genistoides, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 42 = t'alioides.
genistoides, *Vent. Dec. Gen.* 9.—Afr. austr.
grandifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 432 = praec.

CYCLOPIA:—
grandiflora,A. DC. Not. 8me PI. Rar. Jard. Geniv. 29 — subternata.
heterophylla, Eckl. & Zeyh. Ennm. 154=-genistoideJ.
intermedia, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 3 = subternata.
laricina, E. Mey. 1. c 153 = tennifolia.
latifolia, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. iv. (1825) 98.—Afr. austr.
latifolia, Eckl. *Sc* Zeyh. Ennm. 166-longifolia I
latifolia, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 3 = subternata.
laxiflora, Benth. in Ann. Wien. Mas. ii. (1838) 67 = longifolia 1
longifolia, *Vog. in Linnaca,* x. (1836) 595.—Afr. austr.
Meyeriana, Walp. inLinnaea, xiii. (1838) 454=sessailiflora.
pabescens, *EM. IS Zeyh. Enum.* 154.—Afr. anstr.
sessiliflora, Eckl. & Zeyh. 1. c. = subternata.
sessiliflora, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 4.—Afr. austr.
subternata, *Vog. in Linnaea,* x. (1835-36) 596.—Afr. austr.
tenuifolia, *Lehm. Ind. Sem. Hart. Hamb.* (1828) 16 ; *et in Linnaea,* v. (1830) 378.—Afr. austr.
teretifolia, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 154 = genistoides.
ternata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 107 = Aspalathus ferrnginea.
iriphylla, Sweet, L c. = Argyrolobium sericeum.
Vogelii, Harv. in Harv. & Sond. FL Cap. ii. 6 = subternata.

CYCLOPIS, Guill. Archiv. Bot. ii. (1883) 4(8, sphalm. -Cyololepls, Gill. (Compos.).

CYCLOPOGON, PresL, Ret. Haenk. i. 93. t. 13 (1827) -Spiranthea, Rich. (Orchid.).
albo-punctata, Rodrig. Orch. Nov. ii. 281.—Bras.
alpestris, Rodrig. 1. c. 283-S. alpestris?
atroviridis, Rodrig. 1. c. 284.—Bras.
cearensis, Rodrig. 1. c. 283.—Bras.
aealifolium, Presl, Rel. Haenk. i.93. t. 13=S. Preslii.
procera, Regnell, ex Rodrig. Orch. NOT. ii. 280.—Bras.
trilineata, Rodrig. I. c. 884.—Bras.
variegata, Rodrig. 1. c. 283.—Bras.

CYCLOPTERA, Endl. Ench. 118 (1841) - CYCLOPOGON, Presl = SpiranfheB, Rich. (Urchid.).

CYCLOPTERA, Nutt. ex A. Gray, in Journ. Am. Sc. Ser. II. xv. (1853; 319 = Abronia, Juss. (Nyctagin.).
annua, Nutt 1. c. = A. Cycloptera.

CYCLOPTERYGIUM, Hochst. in Flora, xxxi. (1848) 175 = Sehouwia, DC. (Crnetfer.).
treviseptum, Hochst. I. c. = S. Schimperl.
longiseptum, Hochst. 1. c 176—S. arabica.

CYCTLOPTYOHIS, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 176 (1843), nomen; et Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 34 (1869). *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook, f. i. 98.
pplygaloides, *Sond. I. e.*—Afr. anstr.
virgata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 176, nomen; *et Harv-* b* *Sond. I. c.*—Afr. austr.

CYCLOSANTHES, Poepp. in Froriep, Notfa. xxxi. 312 (1831)=CyelanthUB, Foit.

CYCLOSIA, Klotesch, in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. . vi. (1838) 305 = Mormodes, Lindl. (Orchid.).
maculata, Klotzsch, 1. c. 806 —M. pardinum.

CYCLOSTEGIA, Benth. in Bot Reg. subt 1282 (1829) -Elsholtsia, Willd. (Labiate.
strobilifera, Benth. 1. c. = E. strobilifera.

CYCIiOSTEMON', Blume, Bijdr. 597 (1825). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 279.
DODECASTEMON, Hassk. in Versl. Kon. Acad. Wetensch. iv. (1855) 141.
LANEASAGUM, Bedd. in Madr. Jonrn. Sc. Ser. II. xxii. (1861) 71.
PYCNOSANDR*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 191 (1856).
SPHRAGIDIA, Thw. in Hook. Kew Journ. vil. (1856) 269. t. 10.
argutus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. 41. 486.—Afr. astr.

CYCTiOSTEMOlT:—
coiiaceus, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 662.—Ins. Pacif.
Cumingii, *Baill. 1. c*—Ins. Philipp.
cuspidatus, Blume, Bijdr. 599 = Gironnieria reticulata.
eglandulosus, *Kurm, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 240.—Ind. or.
floribundus, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 582.—Afr. trop.
glomeratus, *Muell. Arg. 1. c.*—Afr. trop.
mdicus, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 81.—Reg. Himal.
leiocarpus, *Kurm, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 330.—Ins. Nicobar.
longifolius, *Blume, Bijdr.* 598.—Malaya,
macrophyllus, *Blume, I. c*—Malaya,
malabaricns, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 199.—Ind. or.
tnucronatus, *Blume, Bijdr.* 698.—Java,
natalensis, *Harv. Thes. Cap.* ii. 64.—Afr. austr.
natalensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. 11. 483.—Afr. austr.
occidentals, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 517.—Afr. trop.
parvifolius, *Muell. Arg. 1. e.* 632.—Afr. trop.
principum, *Muell. Arg. 1. e.* 681.—Afr. trop.
racemosus, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 348 = Teysmanni.
rhacodiscus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 484.—Java.
serratus, *Blume, Bijdr.* 599.—Java,
stipularis, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 531.—Afr. trop.
sutnessilis, *Kurm, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 240.—Burma.
Teysmanni, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 481.—Java.
meylanicus, Baill. Etud. Gén. Euph. 562 = macrophyllus.

CYCLOSTIGMA, Hochst. ex Endl. Gen. Suppl. ii. 66 (1842); et in Flora, xxvii. (1844) 828 = Voaeanga, Thou. (Apocyn.).
natalense, Hochst. 1. c - V . Dregei.

CYCLOSTIGMA, Klotesch, in Seem. Bot Voy. Herald, 104 (1868) = Crotpn, Linn. (Euphorb.).
abutiloides, Klotzsch, 1. c. 105 = Croton abutiloides.
denticulatum, Klotzsch, 1. c = Croton panamensis.
Draco, Klotzsch, 1. p. = Croton Draco.
hiSiscifolium, Klotzsch, I. c. = Croton gossypiifolius.
panamense, Klotzsch, 1. c. = Croton panamensis.
xalapense, Klotzsch, 1. c. = Croton xalapensis.

CYCLOSTIGMA, Phil. Sert. Mendoc. AU. 39 (1871) = Iieptogloaais, Benth. (Solan.).
tenue, Phil. 1. c.—Chili.

CYCLOTAXIS, Boiss. Diagn. Sec. I. x. 48 (1849)-Soandlx, Toum. (Umbellif.).
palaestina, Boiss. 1. c 49 — S. palestina.
turgida, Boiss. Sc Bal. I. c Ser. II. v. 101 = S. turgida.

CYCLOTHECA, Moq. In DC. Prod. xiii. II. 87 (1849) -QyroBtemon, Desf. (Phytolac).
australasica, Moq. 1. c 38 = G. Cydotheca.

CYCSTIA, Griff. Notnl. iv. 431; Ic. PI. Asiat t. 605. f. 5 (1854). *ROSACEAEt* Benth. *Sc* Hook. f. i. 606.
spinosa, *Griff. I. c*—Burma.

CYCNIA, Lindl. Veg. Kingd. 643 (1847)-Prinsepia, Royle (Rosac).

CYCKTUM, E. Mey. ex Benth. in Hook. Camp. Bot. Mag. i. (1835) 368. *SCROPHULAXINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 969.
adonense, *E. Mey. ex Benth. 1. c.*—Afr. austr.
brachycalyx, *Sckweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 681.—Abyssin.
hnmifusum, *Benth. &• Hook.f. Gen.* ii. 969.—Arab.
Kranssianum, *Benth. in DC. Prod.* x. 606.—Afr. anstr.
longiflortm, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Oliver, in Trans, linn. Soc. xxix. (1875) 122 = adonense.
racemosum, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1836) 368.—Afr. austr.
Sandersoni, *Harv. Thes. Cap.* i. 31.—Afr. anstr.
tnbattun, *Benth. in DC Prod. x.* 606.—Afr. anstr

CYCITOCHEB, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 154 (1883). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 552.
anreum, *Lindl. VPaxt. Flow. Card.* iii. (1852-63) t. 75 5.—Am. centr.
barbatum, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iv. (1849) 268 = Polycycnis barbata.
chlorochilon, *Lindl. Sert. Orchid.* (1838) t. 16.—Guiana.
cucullata, Lindl. Bot Reg. sub t 19Sl* = I.oddigesii.
Dianae, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 686.—Am. centr.
Egertonianum, *Batem. Orchid. Mex. et Gnat.* t. 40.—Guatemala.
Egertonianum, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 46-Warszewiczii.
Haagii, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 221.—Bras.
Lehmanni, Nichols. Diet. Card. i. 419 = Lueddemannia Lehxnanni. .
Lehmanni, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 10.—Ecuador.
Loddigesii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 154.—Guiana,
maculatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 10.—Mexic.
musciferum, Lindl. *Sc* Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 28 = Polycycnis muscifera.
pentadactylon, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 18.—Bras.
Pescatorei, Lindl. *Sc* Paxt. Flow. Gard. i. (1850-61) 123 - Lueddemannia Pescatorei.
stelliferum, Lodd. ex Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 661 ≈ Warszewiczii.
ventricosnm, *Batem. Orchid. Mex. et Guat.* t. 5.—Guatemala.
Warszewiczii, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 734.—Am. centr.

CYCNOGETON, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 210~Triglochin, Linn. (Naiad.).
Huegelii, Endl. Iconogr. t. 73 — T. procerum.
lineare, Sond. in Linnaea, xxviii. (1851) 226-T. procerum.
procerum, Buchen. in Bremen, Abh. i. (1867) 224= T. procernm.

CYCNOPODIUM, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. iv-(1845) 52 =araffenriedia, DC. (Melast).
latifolium, Naud. 1. c. = G. latifolia.

CYCNOSERIS, Endl. in Bot. Zeit. i. (1843) 468-Hypochoeris, Linn. (Compos.).
australis, Endl. 1. c. 459-H. glabra.

CYDENIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 99 (1866) - S«*-ciSSUS, Tourn. (Amaryll.).
poculiformis, Salisb. 1. c. = N. poculiformis.

CYDISTA, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 191^-Bignonia, Linn.
aequinoctialis, Miers, 1. c — B. aequinoctialis.
amoena, Miers, 1. c. nomen.—Ins. S. Doming.
analoga, Miers, 1. c. 192, nomen.—Bras.
blanda, Miers, 1. c. nomen.—Venezuela.
difficilis, Mieis, 1. c = B. difficilis.
diversifolia, Miers, 1. c. = B. diversifolia.
eximia, Miers, 1. c. nomen.—Uruguay.
incarnata, Miers, 1. c. — B. incarnata.
magnifies, Miers, 1. c. nomen.—Bras.
picta, Miers, 1. c —B. picta.
praepensa, Miers, 1. c 190.—Bras.
rubicunda, Miers, 1. c. 192, nomen.—Bras.
sarmentosa, Miers, 1. c 191 —B. aequinoctialis.
Seemanni, Miers, 1. c 192 = B. difficilis.
spectabilis, Miers, 1. c. 191 = B. aequinoctialis.
Vargasiana, Miers, 1. c 192 = Anemopaegma vargasianuxn.

CYDONIA, Toum. ex Mill. Gard. Diet. ed. VI (1752) = Pyrus, Toum. (Rosac).
Bourgeauti, Carr. in Rev. Hortic. (1872) 78—As. Mn.
chinensis, Steud. Norn. ed. II. i. 469 = P. sinensis, *P<n*-
communis, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. iv. 135. '• 36 = P. Cydonia.
europaea, Savi, Alb. Tosc. i. 90 > P. Cydonia.
indica, Spach, Hist. Veg. Phan. ii. 158-Docym» indica.
japonica, Pen. Syn. ii 40 = P. japonica.
Lagenaria, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. vi. 26S. >• 76 = P. japonica.
lotata, Bosc, Encycl. Agric vii. 662=P. CydonU.

CYDONIA :—
lusitanica, 'Mill. Gatd. Diet. ed. VIII. n. 8=Pyrus Cydonia.
mali/ormis, Mill. 1. c. n. 2=P. CydonU.
Maulei, T. Moore, in Fl. ft Pomol. (187S) 49-P. japonica.
oblonga, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1=P. Cydonia.
pirtformis. Medic. Gesch. Bot. 80 = P. Cydonia.
silvestris, Risso, Hist. Nat. Product. Europ. 296 = P. Cydonia.
sinensis, Thou, in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 145. t 8 -P. sinensis, *Pair.*
speciosa, Sweet, Hort. Suburb. Lond. 113 =• P. japonica.
Sumboshia, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 237 -P. Cydonia.
tomentosa, C. Koch, Hort. Dendrol. 180=P. Cydonia.
Umbato, M. Roem. Syn. Rosifl. 218 =P. Cydonia.
***lgaris,* Pers. Syn. ii. 40-P. Cydonia.

CYLACTIS, Rafin. in Am. Journ. Sc. i. (1819) 377 -Hubus, Toum. (Rostfc.).
bncemontana, Rafin. in Journ. Phys. (Aoflt 1819) t. 97-R. triflorns.
montana, Rafin. in Am. Joum. Sc i. (1819) 877 = R. triflorus.

CVLASTIS, Rafin. Sylva Tellur. 160 (1888) =BubuB, Toum. (Rosac.).
"rctieus, Rafin. 1. c = R. arcticus.
egopodioides, Rafin. 1. c. = R. triflorus.

CVLBANIDA, Noronha, ex TnL in Ann. Sc Nat. Sér. IV. viiL (1857) 135 = Pittosporum, Banks.

CVLICADENIA, Lem. Illnstr. Hortic.ii. (18S5) Misc. 9 = Odontadenia, Benth. (Apocyn.).
Harrisii, Lem. 1. c 10=O. speciosa.

CVLICHNANTHUS, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 260 (1867)-Dianthus, Linn. (Caryophyll.).
l»irbatus, Dulac, 1. c. 261 - D. barbatus.
"Hiatus, Dulac, 1. e. = D. Seguieri.
f-ltoides, Dulac, 1. c 262 = D. deltoides.
fimbriatus, Dulac, 1. c. = D. fimbriatus.
"uiculatus, Dulac, 1. c. 261 = D. Armeria.
".fglectus, Dulac, 1. c. 262 = D. neglectus.
P'umarius, Dulac, 1. c.-D. plumarius.
Pnlifer, Dulac, 1. c. 261 = D. prolifer.
"»'Uflorus, Dulac, 1. c. = D. Requienii.
Vaginatus, Dulac, *I* c - D. vaginatus.

CYWCHNIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 68 (1867) = Qauettnia, Beauv. (Gramin.).
fragile, Dulac, I. c = G. fragilis.

CYLICODAPHNE, Neea, in Wall. PI. As. Rar. ii. 61 (1881); et Laurin. Expos. 18 (1833)-IiitBoa, Lam. *VTetranthera,* Jacq.) (Láurin.).
Awkns, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 206.—Borneo.
»»«rfo«ia»o, F. Muell. Fragm. T. 167 - L. Bindoniana.
»ysopieura, Blume, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 198 *(=-Tetrantheraehrysopleura).—Ja.va.*
***tata,* Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 18.—Malaya.
"tneata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 18.—Sumatra.
***pidata,* Blume, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 198 *.S^Tetranthera cuspidata).*—Java.
«<rfor, Meissn. in DC. Prod. xv. l. 204 = L. timoriana.
?.'folia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 12=L. d'versifolia.
**»cettiana,* F. Muell. Fragm. v. 168-L. reticulata.
*T*ginea,* Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 11 = L. «rrugi.
% *Z*, Blnme. 1- c i. 887.—Ind. or.
•£«««„ Blume, 1. c. ii. 18,-Sumatra.
•?"«ceni, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 207.—Malaya.
hirsea, Hume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 13.—Sumatra.
hirta, Blume, l.c-Java.
*Ho»*fn, Meissn. in DC. Prod. xv. 1.209 = L. khasiana.
infectoria Blume, Mns„ Bott Lnedl Bat> ". IX-"~ fod. or.
Les W^!"",F_Mndl_ Frag"-^-169-L. ferruginea.
/JS^*- Meissn. in DC. Prod. xv. I. 205.—Ind. or.
luc?d? lume MBS* *BOt,* Lll8d, Bat,, Ug 12=L#
macrophylla, Blume, l. e- 14 = Actinodaphne macrophylla.

CYLICODAPHNE :—
magnifiea, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 986.—Sumatra.
inollis, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 207.—Java.
myristicaefolia, Meissn. 1. c 208.—Malaya.
Neesiana, Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 983.—Malacca.
nitida, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 208.—Nepal.
Noronhiana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 888=L. Noronhae.
oblonga, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 205 = L. oblonga.
obtusata, Meissn. 1. c 203.—Java.
obtusifolia, Nees, Syst. Laurin. 506—L. obtusa.
oekraeea, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. IS.—Sumatra.
pallida, Blume, 1. c. 11.—Malaya.
polyneura, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 205.—Java.
punctata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 13.—Bqmeo.
rigida, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 201=L. Gardneri.
robusta, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat ii. 11 = L. robusta.
rubiginosa, Blume, 1. c. 18.—Sumatra.
rubra, Blume, 1. c. i. 388 = L. rubra.
sebifera, Blume, 1. c—L. sebifera, *Blume.*
Seloang, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 361.—Sumatra.
sessilifiora, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 206.-Borneo.
sumatrana, Miq. PI. Jungh. 184. —Sumatra.
tephrophylla, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 207.—Java.
Thwaitesii, Meissn. 1. c. 208, pro parte-L. ovalifolia.
tuberculata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 12.—Sumatra.
unita, Blume, 1. c. i. 387.—Ins. Molucc.
velutina, Blume, 1. c. ii. 11.—Java.
Walkeri, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 208 = L. Walkeri.
WighHana, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 68 = L. Wightiana.
zeylanica, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 201 = L. Gardneri.

CYLIDIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 191, nomen (Convolv.).

CYL1NDRACHNE, Reichb. Consp. 106 (1828), sphalm. = Cylindrocline, Cass. (Compos.).

CYLINDBIA, Lour. Fl. Cochincb. 69 (1790). (Genus incertae sedis) Benth. & Hook. f. Hi. 168.
rubra, *Lour. I. c*—China.

CYIIHTDROCAKPA, Regel, in Act. Hort.Petro'p. v. (1877) 258. *CAAfPANULACEAE.*
Sewerzowi, *Regel, 1. c.*—Turkestan.

CYLINDROCHILUS, Thw. Enum. PI. Zeyl. 307 (1861) = 8arcoohilUB, R. Br. (Orchid.).
jmlchellus, Thw. 1. c.=S. pulchellus.

CYLINDROCLINE, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 11. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 295.
LEPIDOPOGON, Tausch, in Flora, xii, (1829) i. Erg. 37.
Commersonii, *Cass. I. c.*—Ins. Maurit.

CYLINDROLOBUS, Blume, Praef. Fl. Jav. 6 (1828) = Erla, Lindl. (Orchid.).

CYLINDROPUS, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 808; etinEdinb. N. Phil. Joum. xv. (Oct. 1834) 266 = Scleria, Berg. (Cyperac).
juncifolius, Stend. Nom. ed. II. i. 459, sphalm. = seq.
junciformis, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 308; et in Edinb. N. Phil. Joum. xv. (Oct. 1834) 266 -S. junciformis.

CYLINDROSORUS, Benth. in Enum. PL Hueg. 62 (1837)"-Anglanthu8, Wendl. (Compos.).
flavescens, Benth. 1. c. — A. tomentosus.

CYL1POGON, Rafin. in Journ. Phys. lxxrix. (1819) 97 - Fetalostemum, Michx. (Legumin.).
capitatum, Rafin. 1. c. = Dalea aurea.
virgatum, Rafin. L c. = P. corymbosum vel Dalea laxiflora.

CYIiISTA, Ait. Hort. Kew. ed. I. Hi. 612 (1789). *LEGUUmOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 542.
albiflora, Sims, Bot Mag. t. 1859 = RhynchosU cyanosperma.
angustifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 258 = Rhynchosia uniflora.
ongusti/blia, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 171 = RhynchosU leucoscias.
argentea, Eckl. ft Zeyh. Enum. 258-praec.
ferruginea, Herb.Madr.ex Wight & Am. Prod. 258 - Dunbaria ferruginea.
graveolens, Steud. Nom. ed. II. i. 469, sphalm. = *suoveolens.*
lanei/olia, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 259 = Rhynchosia Chrysoscias.
piseatoria, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 589^Milletia splendens.
polystachya, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 269-= seq.
pyenostachya, DC. Prod. ii. 410 = Rhynchosia calycina.
reticulata, Heyne, in Wall. Cat. n. 5584 = Rhynchosia Heynei.
scariosa, *Roxb. PI. Corom.* i. 64.—Ind. or.
suaveoUns, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5587 = Rhynchosia rufescens.
tomentosa, Roxb. Hort. Beng. 6fi; Fl. Ind. iii. 319-Rhynchosia cyanosperma.
villosa, *Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 300.—Afr. austr.

CYLIXYLON, Llanos, Fragm. 59 (1851) = Orymnanthera, R. Br. (Asclep.).
keterophillum, Llanos, 1. c.-G. pedunculata.

CYLIZOMA, Neck. Elem. iii. 88 (1790) -Derrln, Lour. (Legumin.).

CYLLENIUM.Schott, Gen. Aroid. t.9(1858) -Biarum, Schott (Aroid.).
karduchorum, Schott, Prod. Aroid. 65 = B. carduchorum.
Spruneri, Schott, Gen. Aroid. t 9 = B. Spruneri.

CTMAKIA, Benth. in Bot Reg. sub t. 1292 (1829) *LABI ATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1222.
ANTHOCOMA, Zoll. *8c* Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1846) 569.
acuminatai *Decne. Herb. Timor. Dese.* 71.—Ins. Philipp. et Timor.
dichotoma, *Benth. in Bot. Reg.* subt. 1292.—Burma,
elongata, *Benth. I. c*—Burma.
mollis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 992~acuminata.

CYMATION, Spreng. Syst. ii. 142 (1826) - Omithogloaaum, Salisb. (Liliac).
laevigatum, Spreng. L c.=O. glaucum.
undulatum, Spreng. 1. c.=O. glaucum.

CYMATOCHLOA, Schlecht. in Bot. Zeit xiL (1854) 821 = PaBpalum, Linn. f. (Gramin.).
ftuitans, Schlecht 1. c. 822-P. repens.
repens, Schlecht. I c.-=P. repens.

CYMATOPTERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 309-Menonvillea, R. Br. (Crucif.).
chilensis, Turcz. 1. c.-M. linearis.

CYMBA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 117 (1867) =Tofleldia, Huds. (LiUac.).
calyculata, Dulac, 1. c.=T. calyculata.

CYMBACHNE, Retz. Obs. vi. 36 (1791)-BottboeUia, Linn. f. (Gramin.).
alata, Beauv. Agrost 169-R. Cymbachne.
ciliata, Retz. Obs. vi. 86 - R. Cymbachne.

CYMBALARIA, Medic. Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 280 -Iiinarla, Mill. (Scrophul.).
contmuta, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 64--L. Elatine.
dentata, Schur, Enum. PI. Transs. 488 = L. spuria.
Elatina, Gaertn. Mey. ft Scherb. Fl. Wett. ii. 398 <* L. Elatine.
hederaeea, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 322 = L. Cymbalaria.
muralis, Gaertn. Mey. & Scherb. FL Wett. ii. 897-L. Cymbalaria.
Psrudo-elatine, Schur, Enum, PL Transs. 488- <• L. Elatine.

CYMBALARIA:—
spuria, Gaertn. Mey. & Scherb. FI. Wett. ii. 898- Linaria spuria.
vulgaris, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 126 = L. Cymbalaria.

CYMBALLARU. Stead. Norn. ed. II. i. 459 (1840) = praec.

CYMBANTHES, Salisb. in Tran». Hort. Soc. i. (1812) 329=Androcymbium, Willd. (Liliac).
foetida, Salisb. 1. c. = A. eucomoides.

CYMBABIA, Linn. Gen. ed. II. 282 (1742). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 975.
CYMBOCHASHA, Endl. Gen. 693 (1839).
borysthenica, *Pall, ex Schlecht. in Nees, Hor. Phys.* *Berol.* 107. t. 21.—Rossia.
daurica, *Linn. Sp. PI.* 618.—Dahuria.
mongolica, *Maxim, in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VII. xxix. (1881) n. III. 66.-*-Mongol.

CYMBICARPOS.Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1882) 266 = Astragalus, Tonra. (Legum.).
Christianas, Stev. 1. c.—A. Christianas.
tomentosus, Stev. 1. c.—A. tomentosus.
trigonus, Stev. 1. c.=A. trigonus.

CYMBIDITTM, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 70. *ORCHWEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. in. 536.
APLECTRA, Rafin. Cat. 18 (1824).
IRIDORCHIS, Blume, Coll. Orch. Jav. 90. t. 26 (1858).
JENSOA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 38 (1836).
OLGASIS, Rafin. 1. c. ii. 51 (1886).
TRICHORHIZA, Lindl. ex Stead. Nom. ed. II. ii. 702 (1841).
aculeatum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 77 - Eulophia aculeata.
adenoglossum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vL (1862) 134 = Eulophia adenoglossa.
affine, Griff. Notul. iii. 336 = Cyperorchis Mastersii ».
alatum, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 459 = Thecostele alata.
albueiflorum, F. Muell. Fragm. i. 188 — madidum.
Allagnata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7827 - Vanda Roxburghii.
aloifolium, BInme, Bijdr. 378. t. 19=pendulum I
aloifolium, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 7331 = Diplocentum recurvnm.
aloifolium, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 73.—Ind. or.
aloifolium, Wall. Cat n. 7352=Finlaysonianum.
altissimum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 74=Oncidlum altissinram.
alium, Willd. Sp. PI. iv. 105 = Bletia verecunda.
amabile, Roxb. Hoit. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 457 = Phalaenopsis amabilis.
Andersonii, [Lamb, in] Andr. Bot Rep. t. 651 = Cyrtopodium Andersonii.
angolense, *Reickb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 188.—Afr. trop.
apkyllum, Sw. in Nov. Act Soc. Sc Upial. vi. (1799) 73 = Dendrobium Pierardi.
appendieulatum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 36 = Cremastra Wallichiana.
assamicum, *Linden, in Jllustr. Hortic.* xxviii. (1881) 95, nomen.—Assam.
autumnale, Sw. in Nov. Act Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 72 = Earina mucronata.
bambusifolium, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 460 = Arundina bambusifolia.
ticolor, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 164-aloifolium.
Htubercitlatum, Hook. Exot. Fl. ii. t 116 = Liparis bituberculata.
boreale, Sw. in Nov. Act Soc. Se. Upsal. vi. (1799) 76 — Calypso borealis.
Boweri, *F. Muell. in Wing, South S. Record* (Aug. 1883).—Ins. Solomon.
Buchanani, *Reichb. f. in Flora,* lxiv. (1881) 329.—Afr. austr.
Calceolaria, *Willd. Sp. PI.* iv. 97.—Ind. or.
canaliculatum, *R. Br. Prod.* 381.—Austral,
candidum, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 342.—N. Granat.
carnosum, *Griff. Notul.* iii. 839.—Reg. Himal.
ehinense, Heynh. Nom. ii. 179 = sinense.
chloranthum, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 68.—Austral.

CYMBIDIUH :—
Clypeolum, Willd. Sp. PI. iv. 99 = Liparis Clypeolum.
coceineum, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 214 = Ornithidium coceineum.
cochleare, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 28 = Cyperorchis cochlearis.
CoraUorrhima, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1800) 238 = Corallorhiza innata.
cordatum, Londes, in Mém. Soc. Nat Mosc. i. (1811) 282 = Listera cordata.
cordigerum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 341 = Epidendrum atropurpureum.
corniculatum, Spreng. Syst. iii. 722 = Pleurothallis emarginata.
crassifolium. Wall. Cat. n. 7357 = pendulum,
ciispatum, *Tkunb. PI. Bras. Dec.* ii. 18.—Bras.
cucullatum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 73 - Brassavola cucullata.
cuspidatum, *Blume, Bijdr.* 378.—Java.
cylindricum, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 7817 = Aërides cylindricum.
cyperifolium, *Wall. Cat.* n. 7373.—Reg. Himal.
Dayanum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 710 = eburneum.
densiflorum, Griff. Notul. iii. 337 = Cyperorchis elegans.
dependens, Lodd. Bot Cab. x. 936=Cirrhaea Loddigesii.
Devonianum, *Paxt. Mag. Bot.* x. (1843) 97.—Reg. Himal.
diurnum, *Sw in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 75.—Venezuela.
ebumeum, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) t. 67.—Reg. Himal.
echinocarpon, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 71 = Dichaea echinocarpa.
elegans, Lindl. in Wall. Cat n. 7354=Cyperorchis elegans.
ensifolium, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 77.—Ind. or.; Japon.
equitans, Sw. 1. c. 72=Oberonia brevifolia.
erectum, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 226=Cephalanthera pallens.
erectum, Wight, Ic. t. 1758=aloifolium?
erythraeum, Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 30 =longifolium.
estriatum, Lindl. ex Stead. Nom. ed. II. i. 460=ensifolium.
falcatum, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 226 = Cephalanthera falcata.
Finlaysonianum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7368.—Malaya.
flabellatum, *Spreng. Syst.* iii. 724.—Madag.
fiabellifolium, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 629, sphalm.= Zygopetalum cochleare.
fiabelliforme, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 73 - Zygopetalum cochleare.
fiavescens, Llanos, Fragm. 96 = Cleisostoma amabile.
fioridum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 121 = Bletia florida.
fragrans, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 298 = chinense.
furvum, Willd. Sp. PL iv. 103-Vanda furva.
fuscescens, Griff. Ic PI. As. iii. p. ii. t. 919 - Tainia latifolia.
Gibsorii, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-68) 144 -lancifolium.
Gibsonii, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 627, nomen.—Reg. Himal.
giganteum, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 224 **(= *Cyrtopera gigantea*).—Afr. auitr.**
giganteum, *Wall. Cat.* n. 7355.—Reg. Himal.
glandulosum, *H. B. t* K. Nov. Gen. et Sp.* i. 340.— Venezuela.
glaucum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 71 = Dichaea glauca.
globosum, Sw. 1. c. 72 = Epidendrum globosum.
Goeringii, Reichb. f. in Walp. Ann. iii. 547 = virescens.
gomphocarpum, *Fittg. in Journ. Bot.* xxi. (1883) 203. —Austral.
graminoides, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. vi. (1799) 71 = Dichaea graminoides.
grandiflorum, Griff. Notul. iii. 342 = Hookerianum.
grandiflorum, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 76.—Guiana.
guttatum, Willd. Sp. PI. iv. 102=Oncidinm luridnm.
haematodes, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 162 = cyperifolium.
Hillii, *F. Muell. in Regel, Gartenfl.* (1879) 188.— Austral.

CTMBISIXTH :—
hirsutum, Willd. Sp. PI. iv. 94=EHeanthus Caravata.
Hookerianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1866) 7.— Reg. Himal.
humile, Sm. ex Lindl. Coll. Bot sub t. 37-Coelogyne humilis.
Huttoni, *Hock.f. Bot. Mag.* t. 5676.—Java.
hyacinthinum, Sm. Exot. Bot. i. 117-Bletia hyacinthina.
hyemale, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iv. 107 - Aplectrum hyemnle.
imbricatum, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 460 = Pholidota imbricata.
iridifolium, *A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 34.—Austral.
iridifolium, Roxb. Hort. Beng. 63 ; Fl. Ind. iii. 468 = Oberonia iridifolia.
iridifolium, Sw. ex Steud. Nom. ed. II. i. 460=Oncidium iridifolium.
iridioides, D. Don, Prod. Fl. Nep. 86 (Coelogynes sp. ?).—Nepal.
ixioides, D. Don, I. c.—Spathoglottis ixioides.
javanicum, Blume, Bijdr. 380 «. lancifolium.
juncifolium, Willd. Sp. PI. iv. 102 = Oncidium Cebolleta.
lancifolium, *Hook. Exot. Fl.* t. 51.—As. trop.
latifolium, Spreng. Syst. iii. 725 = Maxillaria latifolia.
latifolium, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 225 - Epipactis latifolia.
Leachianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) II. 106. —Ins. Formosa.
liliifolium, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (179») 76 = Liparis liliifolia.
limbatum, *Hook, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 165.— Ins. Trinitat.
lineare, Herb. Heyne. ex Wall. Cat. sub n. 7812= Saccolabium Wightianum.
lineare, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (17W) 72 — Isochilus linearis.
Loeselii, Sw. 1. c. 76 = Liparis Loeselii.
longifolium, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 36.—Reg. Himal.
Lowianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) I. 382, 405 » giganteum ?
luteum, Willd. Sp. PI. iv. 106 = Chloraea crispa.
lycopodioides, *Willd. 1. c.* 98.—Ind. or.
macrorrhizum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 162.—Reg-Himal.
madidum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 9.— Austral.
Mannii, Reichb. f. in Flora, Iv. (1872) 274- pendulum.
marginatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1530-MaxiUan* gradlis.
Mastersii, Griff, ex Lindl. 1. c (1845) t. 50-Cyp»-orchis Mastersii.
Meyenii, Schau. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Supp'-i. (1843) 433 = Arundina Meyenii.
micans, Schau. 1. c. — ensifolium.
micromeson, Lindl. in Journ. Linn. Soc iii. (1859) =Cyperorchis Mastersii.
montanum, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (179> 72.—Jamaic.
moschatum, Willd. Sp. PI. iv. 98-Dendrobium *B"** chatum.
muricatum, Sw. in Nov. Act. Soc Sc. Upsal. " (1799) 71 = Dichaea muricata.
nervosum, Sw. 1. c. 76 = Liparis nervosa.
nitidum, Roxb. Hort Beng. 63; Fl. Ind. iii. « * Coelogyne ocellata.
nitidum, Wall, ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 8 * Coelogyne nitida.
nodosum, Sw. in Nov. Act Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 73 = Brassavola nodosa.
nutans, Sw. 1. c. 77 = Geodorum pnrpureum.
ochroleucum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 168 = **Mari"** Camaridii.
odontorrhiium, Willd. Sp. PI. iv. 110-Corallorn«» odontorrhiza.
ovatum, Willd. 1. c. 101 - Dendrobium chlorops.
pollens, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 225 Cephalanthera pallens.
palustre, Sw. 1. c = Epipactis palustris. (1874)
Parishii, Reichb. f. in Trans. Linn. Soc xxx. 144 = ebumeum.
parviflorum, Reinw. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc-(1859) 55 = Eria Reinwardtii.
pedicellatum, Sw. in Schrad. Journ. ii. (1799) *" Eolopbia aculeata.

CTMBIDIUM:-
pendulum, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 78.—Ind. or. .
pictum, R. Br. Prod. 381 = Geodorum pictum.
plantaginifolium, *Willd. Sp. PI.* iv. 101.-Ind. or.
plicatum, Harv. ex Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mae. ii. (1836) 208 = Eulophia aculeata.
praecox.Sm. ex Lindl. Coll. Bot. sub t. 37 = Coelogyne praecox.
praemorsum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7825-Acampe multiflora.
praemorsum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 75-Acampe excavata.
proliferum, Sw. 1. c 71-Ponera prolifera.
pobescens, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 75.—Malaya.
pulchellum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 75-Calopogon pulcbellus.
purpureum, *Drapies, Herb. Amai.* v. (1831) 313.—Ind. occ
Ptrpureum, Steud. Nom. ed. II. i. 559, in syn., sphalm. -Ornithidium vesticum.
pusillum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 71 = Oncidium iridifolinm.
ramosissimum, *Presl, Rel. Haenk.* i. 98.—Am. anstr.
'?ftexum, R. Br. Prod. 831 = Liparis reflexa.
'•'plans, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 71 = Bulbophyllum nutans.
rigidum, Willd. Sp. PI. iv. 106-Tetramicra rigida.
rubrum, Sw. in Schrad. Journ. ii. (1799) 226-Cephalanthera rubra.
Sandersoni, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 880« Ansellia gigantea.
s<tnguineum, Teijsm. & Binn. Cat Hort. Bog. 51, sphalm. = seq.
swiguinolentum, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 318.—Java.
s"tyrium, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 7334=Sacco-Ubium buccosum.
"'rabaeiforme, Parish, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1865) 842 = Luisia Psyche.
sc<-iptum, Stead. Nom. ed. I. 248=Eulophia scripta.
**i£tum,* Sw. in Schrad. Journ. ii. (1799) 218 = Grammatophyllnm speciosum.
"rndatum,Sw. in Nov. Act. Soc Sc Upsal. vi. (1799) . 72 = Epidendrum serrnlatum.
Wnense, *Willd. Sp. PI.* iv. 111.—China.
tpKiosissimum, D. Don, Prod. FJ. Nep. 35-Coelogyne cnstata.
**P*ciosum,* Reinw. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 23 = Arundina densa.
**P*nescens,* Reinw. ex Lindl. 1. c. 14 =• Dendrobinm spinescens.
**W>*matum,* Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (.1800) 238 = Dipodium squamatum.
"apeliaeflorum, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. ind.* xxiv. (1862) 819.—Java.
*"*pelioides,* Link & Otto, Ic. PI. Sel. iii. t. 52= Ivgopetalnm stapelioides.
Menopetalum, Reinw. ex LindL Fol. Orch. Coelog. 14 -= Coelogyne longifolia.
"natum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 77 = Bletia hyacinthina.
st ytum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 35=Coelogyne elaniQI•
suave, *R. Br. Prod.* 331.—Austral.
subula tnm, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 78.—Jamaic.
rgodorum,* Griff. Notul. iii. 338=ebumeum.
»onlare, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) ''—Afr. austr.
'' '''/?*«•«», Lindl. Gen. et Sp. Orch. 167 = Luisia teniifolia.
teretifolia, Wight, Ic. t. 1689 (non text)-Luisia tetnifoliu, *Willd. Sp. PL* iv. 103.—Ind. or.
teretifolius, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 72 = Epidendram teretifolinm.
tesselatum Sw. 75-Vanda Roxburghii.
tessoides, RxMcb HorL Beng. 63; Fl. Ind. iii. 468 = Vat d Roxbnr hii
(vftE Swo Nov Act Soc U I i
I 71-Plenrothallis testaefolia.
tiflorum, Sw L c 74 = Onddium tetrapetalnm. —
Parish, ex Hook Bot Mis 1 0457
tribuloides, Sprenq. Syst. iii. 721=Pleurothallis tribuloidea.

CY3EBIDITT1C:—
trichocarpon, Sw. in Nov. Act. Soc Upsal. vi. (1799) 71 = Dichaea trichocarpa.
tricolor, Miq. Choix PI. Buitenz. 1.19 = Finlaysoniannm.
trifidum, Sw. in Schrad. Neues Joum. i. (1805) 73 = Bletia verecunda.
trinerye, C. *F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 268.—Guiana.
tripterum, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 214 =Coelia Bauerana.
triquetrum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 74 = Oncidium triquetrum.
triste, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 461 = Luisia teretifolia.
triste, Willd. Sp. PI. iv. 99 (Luisiae sp).—Penang; N. Caled.
umbellatum, Spreng. Pugill. ii. 82 = Cirrhopetalnm Thouarsii.
undulatum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. vi. (1799) 74 •= Oncidium carthagenense.
ustulatum, Bolus, in Joum. Linn. Soc xx. (1884) 469 (Eulophiae sp.).—Afr. austr.
utriculatum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 75 = Govenia utriculata.
variciferum, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 324 = chloTanthum.
variegatum, Sw.jnNov. Act. Soc. Sc Upsal. vi. (1799) 74 = Oncidium variegalum.
verecundum, Sw. 1. c 76 = Bletia verecunda.
vestitum, S». *1. c.* 70.—Jamaica,
vexilliferum, *La Llave* b" *Lex. Nov. Veg. Desc./asc.* ii. *{Orch. Opusc.)* 11.—Mexic
violaceum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 841 = Cattleya violacea.
virens, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 626, sphalm. = seq.
virescens, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Mite.* 87.—Japon.
virescens, Willd. Sp. PI. iv. 106=Chloraea Piquichen.
viridiflorum, Griff. Itin. Notes, 126=cyperifolium.
Wallichii, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 166 = Finlaysonianum.
xilophyllum, Sw. in Schrad. Joum. ii. (1799) 226 = Cephalanthera ensifolia.
xiphiifolium, *Lindl. in Bot. Reg.* t 529.—China.

CYMBOCARPA, Miers, in Proc. Linn. Soc. i. (1840) 61 ; et in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 543. t. 38. f. 4 = Oymnosiphon, Blume (Burmanniac).
refracta, Miers, 11. cc. 62, 544=G. refractum.

CYMBOCAaPtTM, DC. Prod. iv. 186, in nota (1830); C. A. Mey. Vera. Pfl. Cauc 132 (1881). *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook, t i. 907.
TRAGOSMA, C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. U. 865 (1844).
anethoides, *DC. Prod.* iv. 186, in nota (1880).—Reg. Cancas.; Persia.
erythraeum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 1028.—Persia,
marginatum, *Boiss. I. c.*—Persia.
Wiedemauni, *Boiss. 1. c.*—Anatolia.

CYMBOCHASMA, Endl. Gen. 698 (1889) = Cymbaria, Linn. (Scrophul.).

CYMBOCHASMIA, Reichb. Nom. 115 (1841)=praec.

C3YMBONOTUS, Cass. in Diet. Sc. Nat xxxv. 897 (1825). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 457.
Lawsonianus, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 462. t 86. —Austral.
Preissianus, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 486 = Lawsonianus.

CYMBOPETAIiTJTffl, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. 11861) 69. *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 27.
brasiliense, *Benth. I.* c—Bras.
penduliflorum, *Baill. Adansonia,* viii. (1868) 268.—Mexic

CYMBOPHYLLUM, F. Muell. in Hook. K«w Joum. viii. (1856) 202=Veronica, Town. (Scrophnl.) (V. densilolia).

CYMBOPOGON, Spreng. Pugill. ii. 14 (1815)=Asdropogon, Linn. (Gram.).
arabicus, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 387= A. laniger.

CYMBOPOGON:—
arundinaceus, Schult. Mant ii. 457 - Anthistiria gigantea.
citriodorus. Link, Enum. Hort. Berol. L 107 - A. Schoenanthus.
condensatus, Spreng. Syst. i. 289 = A. condensates.
distant, Duthie, in [Atkins. Gaz. N. W. Ind.] 640.—Ind. or.
elegans, Spreng. Pugill. ii. 14 = A. cymbarius.
foliosus, Roem. 8c Schult. Syst. ii. 835 = A. bracteatus.
glandulosus, Spreng. Pugill. ii. 14—Anthistiria prostrata.
glaucus, Schult. Mant ii. 459 = A. macrourns.
hirtus, Nees, ex Baker, Fl. Maurit. 446 = Heteropogon hirtus.
Humboldtii, Spreng. Pugill. ii. 15=A. bracteatus.
Iwarancusa, Schult Mant. ii. 458=A. Iwarancusa.
laniger, Duthie, in [Atkins. Gaz. N. W. Ind.] 640.—Ind. or.
Martinianus, Schn\t. Mant. ii. 459=A. Schoenanthus.
melanocarpus, Spreng. Syst. i. 289 = Heteropogon acuminatus.
prostratus, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 661=-Anthistiria prostrata.
reflexus, Roem. & Schult. Syst. ii. 834=A. bracteatus.
Schoenanthus, Spreng. Pugill. ii. 15=A. Schoenanthus.
strictus, Boj. Hort. Maurit. 375=A. foveolatus.

CYUBOSEMA, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 61. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 534.
roseum, *Benth. 1. c.* 60, 61.—Bras.

CYMBOSERIS, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 50 (1849)-Phaecaaium, Cass. (Compos.).
palaestina, Boiss. 1. c. 51.—Syria.

CYMBOSTEMON, Spach, Hist. Ve"g. Phan. vii. 444 (1839) = Illicium, Linn. (Magnol.).
parviflorus, Spach, 1. c. 446=1. parviHoram.

CYMBURUS, Salisb. Parad. Lond. t. 49, 53 (1806) = Stachytarpheta, Vahl (Verben.).
mutabilis, Salisb. 1. c. t. 49=S. mutabilis.
squamosus, Rafin. Fl. Tellur. ii. 103 - Elytraria caulescens.
urticae/olius, Salisb. Parad. Lond. t. 53-S. urticaefolia.

CYMELOlTEltA, Presl, Epim. Bot. 210 (1849). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 735.
memecyloides, *Presl, I. c.*—Ins. Philipp.

CYMICIFUGA, Reichb. in Moessl. Handb. ii. 942, (1826) sphalm. = dmiciftlga, Linn. (Ranunc).

CYMINON, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 65 = Cuminum, Linn. (Umbellif.).
longeinvolucellatum, St Lag. 1. c=Cum. Cyminum.

CYMINOSMA, Gaertn. Fruct. i. 280. t. 58 (1788)-Acronyohia, Forst. (Rutac).
Ankenda, Gaertn. 1. c. = A. laurifolia.
ckinensis, G. Don, Gen. Syst. i. 781 = A. laurifolia.
oblongifolia, A. Cnnn. ex Hook. Bot. Mag. t. 3322 •= A. laevis.
odorata, DC. Prod. i. 722 *(-Jambolifera odorata).*—Cochinch.
pedunculata, Roxb. Hort. Beng. 88; Fl. Ind. ii. 239-A. laurifolia.
resinosa, DC. Prod. i.722=A. laurifolia.

CYMINUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 142, in syn. = MicroBciadium, Boiss. (Umbell.).
minutum, Boiss. 1. c.-M.tenuifolium.

CYMODOCEA, Kon. in Kon. *8c* Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 96. t 7. *NAIADACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 1018.
DIFLANTHEKA, Thou. Gen. Nov. Madag. 8 (1809).
HALODILE, Endl. Gen. Suppl. i. 1368 (1841).
PHUCAGROSTIS, Willd. Sp. PI. iv. 649 (1805).
aequorea, *Kon. in Kon. V Sims, Ann. Bot.* ii. (1806) 96.—MareMeditcrr.
antarctica, *Endl. Gen.* 280.—Austral,
ciliata, *Ehrenb. ex Aschers. in SitBb. Get. Naturf. Fr. Berl.* (1867) 3.—Austral,
isoëtifolia, *Aschers. I. c.*—Austral,
manatorum, *Aschers. 1. c.* (1868) 19.—Ind. occ
nodosa, Aschers. 1. c. (1869) 4=aequorea.

CYMODOCEA:—
Preauxiana, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* iii. 802.—Ins. Canar.
rotundata, *Aschers. tf Schweinf. in Sitib. Ges. Naturf. Fr. Berl.* (1870) 84.—Mare Rubrum.
serrulata, *Aschers. V Magnus, I. c.*—Trop.
Webbiana, *A.Juss. in Am. Sc. Nat.* Ser. II. xi. (1889) 855.—Ins. Canar.
sosterifolia, F. Muell. Cenaui, 121-antarctica.

CYMOPTERIBUS, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 455, sphalm. = Cymopterus, Rafin. (Umbell.).

CYMOPTEB.U8, Rafin. Joum. Phys. lxxxix. (1819) 100. *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 911.
LEPTOCNEMIA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 624 (1840).
OREOXIS, Rafin. in Ser. Boll. Bot. (1830) 217.
PHKLLOPTERUS, Nutt ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 628 (1840).
PTERYXIA, Nntt. 1. c. 624 (1840).
albiflorus, Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 625 terebinthinus.
alpinus, *A. Gray, in Am. Yaunt. Se.* Ser. II. xxxiii. (1862) 408.—Am. bor.
anisatns, *A. Gray, in Proc. Acad. Philad.* (1883) 63.—Am. bor.
hipinnatus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 868.—Am. bor.
campestris, *Torr. V Gray, Fl. N.Am.i.* 624.—Am bor.
cinerarius, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 535.—Calif.
Fendleri, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. iv. (1849) *(PI. Fendl.* 66).—Texas.
/oeniculaceus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 624 - terebinthinus.
glaber, *Black, in Hodgson's Res. Hakodate,* 335.—Japon.
glaucus, *Nutt. in Joum. Acad. Philad.* viL (1834) 28.—Am. bor.
globoins, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 141.—Am. bor. oca
glomeratus, *DC. Prod. br.* 204.—Am. bor.
littoralis, A. Gray, in Mem. Am. Acad. vi. (1859) 891 =Phellopterns littoralis, *Benth. V Hook./.*
longipes, *S. Wats, in Bot. King's Exp.* 124.—Am. bor. occ.
macrorhiius, Bnckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 456-montanus.
montanns, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 624.—Am. bor. occ.
nevadensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 536.—Am. bor. occ.
nivalis,5. *Wats.in Bot. King's Exp.* 123.—Am.boi.occ.
purpureus, 5. *Wats, in Am. Natural,* vii. (1873) 800.—Am. bor.
terebinthinus, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 624.—Am. bor. occ.
thapsoides, Torr. & Gray, 1. c 625 - terebinthinus.

CYNANCHICA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 898-Asperula, Linn. (Rubiac).
tenui/olia, Fourr. 1. c = A. cynanchica.
tinctoria, Fourr. 1. c = A. tinctoria.

CYXTANCHTTM, Linn. Gen. ed. I. 68 (1737). *ASCLEPJADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 762.
DIPLOGLOSSUM, Meissn. Gen. 269 (1840).
ENDOTROPIS, End). Gen. 591 (1838).
EXOSTEGIA, Boj. ex Decne. in DC. Prod. viii. 628, 530, in syn. (1844).
PSANCHUM, Neck. Elem. i. 264 (1790).
SVMPHYOGLOSSUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxi. (1848) I. 255.
ZIERVOGLIA, Neck. Elem. i. 254 (1790).
abyssinicnm, *Decne. in DC. Prod.* viii. 548.—Abyss.
acuminatum, Buch.-Ham. ex Decne. 1. c 622 «• Gymnema acuminatum.
acuminatnm, *Humb. V Bonpl. ex Schult. Syst.* vi. 111.—Am. austr.
acuminatum, Thunb. Obs. in Cynanch. 6 = Pentatropis microphylla.
acntum, *Linn. Sp. PI.* 212.—Europ. austr.; Oriens; As. bor.
africanum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 54—pilosum.
alatum, *Wight tf Am. Contrib.* 57.—Ind. or.
album, Pen. Syn. i. 274 = Sarcostemma Dombeyanum.

CYNANCHUM:—
altissimum, Jacq. Select. Am. 84 •= Gonolobus altissimus.
androsaemi/olium, Vahl, ex Decne. in DC. Prod. viii. 500 = Pentopetia androsaemifolia.
angusti/olium, Pers. Syn. i. 274 •= Vincetoxicum palustre.
angusti/olium, Wight & Am. Contrib. 57 = C Callialata.
annulare, Heyne, ex Wight, 1. c. 55 - Holostemma Kheedianum.
aphyllum, Linn. Syst. ed. XII. iii. App. 236 = Sarcostemma aphyllnm.
aphyllum, Veil. Fl. Flum. 122; iii. t. 88 *(^Amplustelma aphyllum).*—Bras,
arboreum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 63.—Arabia.
Argel, Delile, Fl. Egypte, 197. t. 20=SoIenostemma Argel.
Arnottianum, *Wight, Contrib.* 58.—Reg. Himal.
asperum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.—Mexic.
Asterion, Veil. Fl. Flum. iii. t. 75 = Blepharodon Asterion.
asthmaticum, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.iv. 63-Leptadenia reticulata.
atratum, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 45 = Vincetoxicum atratum.
atropurpureum, D. Dietr. Syn. PI. ii. 906-Schizoglossum atropnrpureum.
auriculatum, Buch.-Ham. ex Wight, Contrib. Bot. Ind. 56 = C. Callialata.
auriculatum, *Royle, ex Wight, I. c.* 58.—Reg. HimaL
barbatum, Linn. f. ex Schult. Syst. vi. 103, in obs. = Vincetoxicum nignim.
bicolor, Andr. Rep. Bot. t. 562 = Daemia extensa ?
bidens, D. Dietr. Syn. PI. ii. 906 - Schizoglossum bidens.
birostratum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 36 = Oxypetalum Hooker!,
boerhavifolfum, *Hook.VArn. in Hook. Joum. Bot.* i. (1884) 294.—Chili.
Bonplandianum, Roem. & Schult. Syst. vi. 98 = Vincetoxicum Kunthii.
Boweanum, Steud. Nom. ed. II. i. 461 <= Glossonema Boveanum.
bracteatum, Thunb. Obs. in Cynanch. 7 =Tylophora pauciflora.
Brownianum, Schult. Syst. vi. 97-pedunculatum, *R. Br.*
Brunonis, Gill, ex Hook. Joum. Bot. i. (1834) 292• Oxypetalum Brunonis.
Bungei, *Decne. in DC. Prod.* viii. 549.—China.
Callialata, *Buch.-Ham. ex Wight, Contrib. Bot. Ind.* 56.—Ind. or.; Burma.
Candolleanum, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Joum. Bot i. (1834) 291 = Melinia Candolleana.
capense, Linn. f. Suppl. 168 *(=Bunburia elliptica).*—Afr. austr.
capense, Sieber, ex Decne. in DC. Prod. viii. 612-Tylopliora laevigata.
capillare, *Thunb. Obs. in Cynanch.* 8.—Zeylan.; Java.
carnosum, Hort. ex Decne. in DC. Prod. viii. 550-Hoya caraosa.
carolinense, Jacq. Coll. ii. 288 •= Goholobus carolinensis.
caudatum. Veil. Fl. Flum. 121; iii. t. 77 *{=Orthosia virgata* ?).—Bras.
cheiranthoides, Domb. ex Decne. in DC. Prod. viii. 687 — Oxypetalum Hookeri.
chinense, *R. Br. in Mem. Went. Soc.* i. (1809) 44.—China.
ciliatum, Veil. Fl. Flum. 122; iii. t. 84-Fischeria rotundifolia.
cirrhosum, Sw. in Cat. Dorpat (1810); ex Schult. Syst. vi. 111 (quid?).
clausum, Jacq. Select. Am. 87 = Sarcostemma Brownii.
congestum, Veil. Fl. Flum. 122; iii. t. 82 *{=Orthosia congesta).*—Bras.
connivens, Hook. & Am. in Hook. Joum. Bot. i. (1834) 294 — Roulinia connivens.
contiguum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 556-Vincetoxicnm officinale.
cordaium, Veil. Fl. Flum. iii. t. 56-Roulinia fluminensis.
cordifolium, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 90S.—Afr. austr.
cordi/olium, Retz. Obs. ii. 15 = Daemia extensa.
corymbosum, Pav. ex Decne. in DC. Prod. viii. 601 = Fischeria peruviana.

CYNANCHUM:—
corymbosum, *Wight, Contrib.* 66.—Reg. Himal.; Malaya.
crassi/olium, R. Br. in Mem. Wern. Sou. i. (1809) 46 (=*Cynoctonum crassi/olium).*—Afr. austr.
crispiflorum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 52-Fischeria scandens.
crispum, Thunb. Prod. PI. Cap. 46«Gomphocarpus crispns.
cuspidatum, Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot. i-(1884) 293-Metastelma cuspidatum.
cuspidatum, Thunb. Obs. in Cynanch. 6 =* Gymnema pergularioides.
dahuricum, Willd. ex Decne. in DC. Prod. viii. 582=° roseum.
Dalhousiae, *Wight, Contrib.* 55.—Reg. Himal.
De-Filippii, *Delp. in Mem. Ace. Tor.* Ser. II. xxvi. (1871) 130.—Hongkong.
deltoideum, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 228—chinense.
deltoideum, *Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iv. 24.—Reg-Himal.
denticulatum, Vahl, Eclog. Am. ii. 23 (ordo?).—Guiana,
diffusum, *Hook. V Am. in Hook. Joum. Bot.* i. (1834) 293.—Reg. Argent.
Dioscoridis, Thunb. Fl. Ceilan. 5, nomen (quid?).—Zeyl.
discolor, Sims, in Bot. Mag. t. 1273-Gonolobus obliquus.
echinatum, Thunb. Obs. in Cynanch. 8-Daemia extensa.
erectum, Linn. Sp. PI. 213 = Marsdenla erecta.
erubescens, *R. Br. in Mem. Worn. Soc.* i. (1809) 45 — Austral.
euphorbioides, D. Dietr. Syn. PI. ii. 906 - Schizoglossnm euphorbioides.
excelsum, *Des/. Fl. Atlant.* i. 212.—Afr. bor.
extensum, Jacq. Misc. ii. 353 = Daemia extensa.
fili/orme, Jacq. Select Am. 86 •= Sarcostemma Jacquiiii.
filifonne, *Linn./. Suppl.* 169.—Afr. austr.
ftmbriatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 203. t 234 = Metaplexis fimbriata.
fissum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 81.—Algeria.
flavens, Thunb. Obs. in Cynanch. 7 = Tyl»P^morB pauciflqra.
flavum, thunb. ex Hook. 1. Fl. Brit. Ind. iv. 45-Tylophora asthmatica.
floribundum, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) «• —Austral.
floridum, *Veil. Fl. Flum.* 123; iii. t. 86.—Bras.
/oetidum, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 202-Roulinia Jacquini.
/oetidum, L'Herit. ex Decne. in DC. Prod. viii. 602-Gonolobus prostratus.
/ruticulosum, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838; 332. t. 12-Vincetoxicum fruticulosum.
funale, *Pair. Eneyc. Suppl.* ii. 427.—Ins. S. Doming-
/uscatum. Link, Enum. Hort. BeroL i. 260*Vince-, toxicum luteum.
/uscum, Schult. Syst. vi. 111 •= Vincetoxicum medium-
ganglinosum, Veil. Fl. Flum. 119; Ut. t. 72-Gon«>-lobus ganglinosus.
glaucum, *Wall, ex Wight, Contrib.* 58.—As. or.; K* Himal.
gracillimum. Wall. 1. c. 57 - Adeloslemma gracillimum.
grandiflorum, Cav. Ic. i. 14 «oSolobus grandiflorus.
hamatum, D. Dietr. Syn. PI. ii. 906 = Schizoglossum hamatum.
hastatum, *Lam. Encyc.* ii. 236.—Oriens.
hastatum, Pers. Syn. i. 278 = Leptadenia lancifolia-
heteromorphum, *Vatke, in Linnaea,* xl. (1876) *W*—Abyss.
heterophyllum, Delile, Cent. PI. Afr. *ii.* *• «S Leptadenia heterophylla.
Heydei, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 25.—Tibet occ...
Heyneanum, Schult. Syst. vi. 101 = C. Ca»'» lata?
hirsutum, Veil. Fl. Flum. 121; ill. t. 78 (Ditassae sp.;—Bras.
hirsutum, Pen. Syn. i. 274 = Gonolobus hirsutus.
hirsutum, Vahl, Eclog. Am. ii. 24 = Macroscep" obovata.
hirtum, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 203.—Ins. Philipp-
hirtum, Linn. Sp. PI. 212 = Gonolobus obliquus.
Hookerianum, Steud. Nom. ed. II. i. 462 = Mettle"" cuspidatum.

CTxTTAJTOHUM :—
Humboldtianum, *Schult. Syst.* vi. 105.—Venezuela.
humile, Falc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 28 - Jacquemontianum.
Hystrix, VelL Fl. Flam. 119; lii. t. 79 = Gonolobos Hystriic
inconspicuum, Griff. Notul. Iv. 66 = pauciflorum.
indicum, Barm. f. Fl. Ind. 70-Tylophora asthmatica.
indicum. Lam. Encyc. ii. 286=Tylophora laevigata.
inodorum, Lour. Fl. Cochinch. 166 = Gymnema inodorum.
inundatum, Lem. ex Decne. in DC. Prod. viii. 606^ Ptychanthera Bcrterii.
Ipecacuanha, WiUd. in Jahrb. Pharm. (1795) 169 = Tylophora asthmatica.
Jacquemontianum, *Decne. in Jacquem. Voy. Bot.* 106. 1.112.—Reg:Himal.
japonicnm, *E. Morr. V Decne. in Bull. Acad. Brux.* iii. (1886) 172.—Japon.
kenouriense, Wight, Contrib. 58-C. Vincetoxicum.
lane, Pers. Syn. i. 274 = Gonolobui laevis.
laevigatum, Vahl, ex Decne. in DC. Prod. viii. 612 = Tylophora laevigata.
lanceolatum, H. B. *Be* K. Nov. Gen. et Sp. Hi. 203 - Vincetoxicum Kunthii.
lanceolatum, Poir. Encyc. Suppl. ii. ISO-Gymnema subvolubile.
lanci[illegible]linm, *Hook. V Am. in Hoot. Journ. Bot.* i. (1834) 294.-Chili.
'•"*td/olium,* Schnm. *8c* Thonn. Beskr. Gain. PI. 150 = Leptadenia lancifollum.
'atifolium, Sebum. & Thonn. 1. c.-Leptadenia landfolia.
laxum, Bartl. in Koch, Taachenb. 350 - Viocetaxicum omciuale.
leucanihum, Jacq. ex J. F. Gmel. Syst 442 = Sarcostemma Jacrjuini.
*t°*giflorum,* Jacq. Select. Am. *K{ = Schubertia longiflora).*—Am. anstr.
'"gi/olium, Martens, Reise Vened. a. 570. t. 6 - acuturn.
l-teolum, Vahl, ex Decne. in DC. Prod. viii. 689 - Melinia Commersoniana.
'uteum, Spreng. Syst. i. 852-glaucum.
'"»«», Steud. Nom. ed. I. 260 = Vincetoxicum lutenm.
'ycioides, Steud. 1. c. ed. II. i. 462; D. Dietr. Syn. PI. n. 906 = Tylophora lycioides.
Ma"aei, Hook. *8c* Am. in Hook. Joum. Bot. i. (1884) -'5 = Astephanus geminiflorus.
TOcrortfeon, *Carr. in Rev. Hortic.* (1877) 486.—Japon.
"•*acrophyiium,* Peis. Syn. i. 274 » Gonolobus caroliuensis.
•jacrophyllum, *Thunb. Obs. in Cynanch.* 7—Java,
"•agale, *Buch.-Ham. ex Dillw. Rev. Hort. Malab.* 83. —Ind. or.
""ttimum, Jacq. Select. Am. 83. t. 56=LachnoBtoma •oantimus.
»Mrtiiis Salisb. Prod. 149 = mouspeliacum.
mauritianum, Boj. Hort. Maurit. ex Deene. in DC. Prod. viii. 612 = Tylophora laevigata.
mauritianum, Lam. Encyc. ii. 336-Camptocarpus mauritianus.
"•'Mum, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 48 - Vincetoxicum nigrum.
mela[illegible] *WiUd' Enum_ Hart_ Bml_* ***Suppl. 18,*** B.O S.—H
melanthes, P[illegible] Encyc. Suppl. ii. 480 - Vincetoxicum medium.
[illegible]ica.
""^yian"TM' Thunb_ Obs_in CTnancl>- 5 = Tylophora
mic[illegible] *, ,"1*, H_B_ *K_NoT_Gen_ *Sp-•"•"20*-«•
mi[illegible] Vincetoxicum microphyllum.
—opuylum , *R"fl"- Nen FL Am_ '"•* 6»+—Am. bor.
minus, C_Ko<!h ; » Linnaea, xix. (1847) 27-Vincetoxicum
[illegible] ? Dysentum.
[illegible] *Nom. ed. II.* L *4e2i D_ Dietr_* **• *Pl_* ii. 905.—Afr. austr.
monspeliacum, Auch. ex Decne. in DC. Prod. viii. 816 = Mysdenia erecta.
monspeliacum, Linn. Sp. PI. 212 = acutum.
montevidense, Spren * S>st_l 8B1 — *Reg.* ***8. Argent. Abdr*** **8 = Tylophora**
mucrona[illegible] Sct,
[illegible]athum[illegible]
[illegible]ucr[illegible] *Wlo[illegible]n> H_ B- & K. Nov. Gen. et Sp. üi. 204. t.
* 8« M *>«Metastelma mucronatum.

CYITAXTCHTJIC:—
muUiJlorum, Spreng. Syst. iv. Cur. Pott. 110 (= *Schubertia multifiora).*—Bras,
myrtifolium, *Hook. &• Am. in Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 293.—Chili.
myrtifolium, Poepp. ex Decne. in DC. Prod. viii. 580 = Taasadia Poeppigeana.
nanum, Buch.-Ham. ex Wight, Contrib. 59 - Pentabothra nana.
ni#ricans,~Vah\, ex Decne. in DC. Prod. viii. 690 = Khyssostelma nigricani.
nigrum, Cav. Ic. ii. 46. t. 169-Gonolobus niger.
nigrum, Pers. Syn. i. 274 = Vincetoxicum nigrum.
nitidum, Veil. Fl. Flum. ISO; iii. t. 74 = Blepharodon diffusum ?
nivale, Nym. Syll. 108=Vincetoxicum nivale.
nnmmulariaefolium, *Hoot. V Am.* in *Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 293.—Chili.
obliquum, Jacq. Coll. i. 148 <* Gonolobui obliquus.
obtusifolium, Linn. f. SuppL 169 *{=Cynoctonum erassifolium).*—Afr. austr.
obtusifolium. Rich, ex Pers. Syn. i. 274=Gonolobua obtusifolius.
odoratissimum. Lour. Fl. Cochinch. 166'Pergularia odoratissima.
odoratum. Hook. *8c* Am. in Hook. Journ. BoL i. (1834) 2»4 = Morrenia odorata.
oleaefolium, Nect. Voy. Egypte, 20. t. 8-Solenostemma Argel.
orientate, Willd. ex Spreng. Syst. L 851-longifoliumi ovalifolium, *Wight, Contrib.* 57.—Malaya.
ovatum, Thunb. Obs. in Cynanch. 6 = Leptadenia reticulata.
pallidum, Salisb. Prod. 149-Marsdenia erecta.
parviflorum, Link, ex Fonrn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 210 = Metastelma odoratum.
parviflorum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 462 = Sarcostemma Brownii.
parviflorum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 58=Metastelma parviflornm.
pauciflorum, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 45. —Ind. or.
pedunculatrr, Lam. Encyc. ii. 236 (= Sarcostemmatu sp.).—Guiana,
pedunculatum, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 45.—Austral.
pedunculatum, *Thunb. Obs. in Cynanch.* 6.—Zeylan.
pendulum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 429 (— Leptadeniae sp.).—Afr. trop.
Pkylladen, VelL Fl. Flum. 120; iii. t. 76=Fischeria adenophylla.
pictum, Vahl, Eclog. Am. ii. 24 = Mandenia picU.
pitosum, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 46 (= *Cynoctonum pilosum).*—Air. austr.
planiflorum, Jacq. Select. Am. 82 = Gonolobus planiflorus.
plani/olium. Linn. Syst. ed. XII. 192 = Gonolobus planiflorus.
procumbens. Medic, ex Steud. Nom. ed. II. i. 462 - Marsdenia erecta.
prostratum, Cav. Ic. i. 6. t. 7-Gonolobus prostratus.
puberulum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 333.—Austral.
pubescens, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 44 = chinense.
purpurascens, *E. Morr. & Decne. in Bull. Acad. Brux.* iii. (1836) 172.—Japon.
pusillum, Spreng. ex Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 228 *(= Orthosia mrgata).—Bns.*
pyrotechnicum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 58-Leptadenia Spartum.
racemosum, Jacq. Select. Am. 81 = Roulinia Jacquini.
radians. Lam. Encyc i. 236 = Stdnheilia radians.
rectum, Forsk. ex Decne. in DC. Prod. viii. 616 = Marsdenia erecta.
refiexum, Vahl, ex Decne. 1. c. 581 - Oxypetalum Banksii.
reticulatum, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 86 = Marsdenia Hamiltonii.
reticulatum, Retz. Obs. ii. 15 = Leptadema reticulata.
roseum, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 47.—Sibir.
rostratum, Vahl, Symb. Bot. iii. 46— Gonolobus rostratu*.
rotatum, Veil. Fl. Flum. 121; iii. t. 79*>Exolobus rotatus.
ratundi/olium, Thunb. ex Decne. in DC. Prod. viii. 552 {— *Cynoctonum erassifolium).*—Afr. austr.

CY1TAXTCHTJM:—
Roylei, *Wight, Contrib.* 58.—Tibet, oce.
scabrum, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PL* 162.—Afi-, trop.
Schimperi, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. InteU. 25 = Marsdenia Schimperi.
scoparium, Nutt in Am. Jonm. Sc. v. (1822) 291 = Vincetoxicnm scoparium.
senegalense, Sieber, ex Decne. in DC. Prod. viii. 621 = Gymnema subvolubile.
serpyllifolium, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 205 *{-Orthosia serjpllifolia).*—Ecuador.
sibiricum, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 48 = Vincetoxicum sibiricum.
sibiricum, Willd. in Ges. Natnrt Fr. Neue Schr. ii. (1799) 124. t. 5. f. 2 = acutum.
speciosum, Nym. Syll. 108 = Vincetoxicum speciocura.
stellatum. Veil. Fl. Flum. 121; iii. t. 80-Fischeiia stellata.
suberosum, H. B. 8c K. Nov. Gen. et Sp. iii. 206 - Metastelma suberosum.
suberosum. Linn. Sp. PI. 212 —Gonolobus suberosns.
subulatum, *Veil. Fl. Flum.* 121; iii. t. 85.—Bras.
subvolubile, Schum. Sc Thonn. Beskr. Guin. PI. 150 - Gymnema subvolubile.
tamifolium. Hook. Sc Arn. in Hook. Joum. Bot. i. (1884) 294 --.Roulinia tamifolia.
tenellum, Blanco. Fl. Filip. ed. 1. 204-Tylophora Perrottetiana.
tenellum, Linn. f. Suppl. 168 (Metastelmatis sp.).—N. Granat.
tenellum, Riedel, ex Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 250 = Ditassa anomala.
tetragonum, Veil. Fl. Flum. 119 ; iii.t. 69 = Gonolobus tetragonus.
tingens, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 84 = Marsdenia tinctoria.
tomentosum, Lam. Encyc. ii. 236 — Tylophora asthmatica)
tomentosum, Royle, ex Wight, Contrib. 68-Roylei.
triflorum. Veil. Fl. Flum. 119; iii. t. 70 = Gonolobus retusus.
triste, Griseb. Spicil. Fl. RumeL ii. 68-Vincetoxicum speciosum.
umbellatum, Veil. Fl. Flum. 120; iii. t 78 (Sarcostemmatis sp.).—Bras.
undatum, Andr. Bot. Rep. t 410 (Tylophorae sp.): - Ind. or.
undutatum, Jacq. Select. Am. 85-Gonolobus undulatus.
usterion, *Veil. Fl. Flum.* 120; iii. t 75.—Bras.
•*versicolor,* Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 44 * Vincetoxicum versicolor.
vertidllare. Lam. Encyc. ii. 237 = filiforme.
villosum, Roem. & Schult. Syst. vi. 108 -Lacbhostoma Balbisii.
vimipale, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 203.—Ins. Philipp.
viminale, Linn. Mant. ii. 392-=Sarcostemma viminale.
Vincetoxicum, Pers. Syn. i. 274-Vincetoxicum officinale.
virens, D. Dietr. Syn. PI. ii. 906 - Schiioglossum virens.
virens, *Steud. Nom.* ed. II. i. 462 ; *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 906.—Afr. austr.
virginicum. Banks, ex Schult. Syst. vi. 63-Gonolobus discolor.
viride, Veil. Fl. Flum. 121; iii. t. 81-Gonolobus viridiflorus.
viridiflorum, Ker-Gawl. ex Spreng. Syst i. 862 - Dregea volubilis.
viridiflorum, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 141 - Gonolobus viridiflorus.
viridiflorum, Sims, Bot. Mag. t. 1929 = Tylophora astbmatica.
vomitorium, Lam. Encyc. ii. 285 = Tylophora asthmatica.
vulgare, Pers. Syn. i. 274-Vincetoxicum officinale.
Wallicbii, *Wight, Contrib.* 66.—Reg. Himal.
Wilfordi, *Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 26, in nota.—China; Japon.

CYNAPIUM, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 640 (1840) - Idgustioum, Linn. (Umbell.).
apiifolium, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, 1. c, 641-L. apiifolium,
Bigelovii, Torr. in Pacif. Rail. Rep, iv. 94-Ferula dissolnta.
nudicaule, Nntt. ex Torr. 3c Gray, Fl. N. Am. U 641 - L. apiifolium.

CYNAPIUM, Riv. ex Ropp. Fl. Ten. ed. Hall. 284 (1746)-AethUBa, Linn. (Umbell).

CYNAEA, Vaill. ex Linn. Gen. ed. I. 241 (1737).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 469.
BOURGAEA, Coss. Notes Crit. 39 (1849).
acaulis, Linn. Sp. PI. ed. II. 1160-Centanrea chamaerhaponticum.
acaulis, Sibth. & Sm. Fl. Grace. Prod. ii. 158-Centaurea pygmaea?
alba, Mis. *in DC. Prod.* vii. 804.—Hispan.
algarbiensu, *Coss. ex Nym. Consp.* 403.—Hispan.
Cafduncellus, Willd. ex Stend. Norn. ed. II. i. 462 = pygmaea.
Cardunculus, *Linn. Sp. PI.* 827.—Reg. Mediterr.
cernua, Stokes, Bot Mat. Med. iv. 148 = Carduus cernuus.
colorata, Stokes, 1. c. = Cnicus oleraceus.
Corsica, Viv. Fl. Lib. Spec. 68 = C. Cardunculus.
diversifolia. Stokes, Sot. Mat. Med. iv. 146=Cnicus heterophyllus.
eriocephala, Stokes, 1. c. 145 = Cnicus eriophorns.
esculenta, Salisb. Prod. 185 = C. Cardunculus.
ferox, Tenore.ex Stend. Norn. ed. II. i. *462=horrida* ?
glomerata, Thunb. Prod. PI. Cap. 141 = Platycarpha glomerata.
horrida, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 148 = C. Cardunculus.
hortensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-C. Cardunculus.
humilis, Juss. Gen. 173—Centaurea chamaerhaponticum.
humilis. *Linn. Sp. PI.* 828.—Kurop. austr.
humilis, Sibth. & Sm. Fl. Graeca, ix. 25 = Siblhorpiana.
humilis, Viv. Fl. Cors. App. ii. 8 = C. Cardunculus.
Hystrix, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 869.—Marocco.
integrifolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 68.-Hispan.
lamyroides, Webb, Iter Hisp. 84=alba.
lanceata, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 155=Cnicns lanceolatus.
palustris. Stokes, 1. c 164 = Cnicus palustris.
pusilla, Labill. Ic. PI. Syc Dec. ili. 11 = Centaurea pygmaea.
pygmaea, *Willd. Sp. PI.* iii. 1692.—Hispan.
repens, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 152 - Cnicus arvensis.
Scolymus, Linn. Sp. PI. 827 = C. Cardunculus.
Sibthorpiana, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 94.—Cyprus.
spinosissima, J. & C. Presl, Delic. Prag. 109-C. Cardunculus.
sylvestris, Lam. Encyc. i. 277 = C. Cardunculus.
syriaca, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 94.—Syria.
Toumefortii, *Boiss. If Reut. PI. Nov. Hisp. Diagn.* 18.—Hispan.
tuberosa, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 163=Cnicus tuberosus.

CVNOCARDAMUM, Webb & Berth. PhyL Canar. i. 96 (1836)=Lepidium, Tourn. (Crucif.).
Mentiesii, Endl. ex Heynh. Nom. ii. 180 = L. MenziesiL
virginicum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 97-L. virginicum.

CYNOCRAMBE, Tourn. exAdans. Fam. ii. 497 (1763); Gaertn. Fruct. i. 362. t. 75 (1788)=TheUgDnum, Linn. (Urtic).
prostrata, Gaertn. 1. c—T. Cynocrambe.

CYNOCTONUM, J. F. Gmel. Syst 448 (1791) = Mltreola, Linn. (Loganiac).
petiolatum, J. F. Gmel. 1. c-M. petiolata.
sessili/olium, J. F. Gmel. 1. c. = M. setsilifolia.

CYNOCTONUM, E. Mey. Comm. PI. Afr.Anstr. 215 (1837)=Vincetoxioum, Moench (Asclep.).
acuminatum, Benth. in Hook. Niger Fl. 453.—Afr. trop.
alatum, Decne. in DC. Prod. viiL 529 = Cynanchum alatum.
angusti/olium, Decne. 1. c.=Cynanchum Callialata.
biforum.FhiL in Linnaea,xxxiii. (1864-65) 176.—Chili.
Blumei, Decne. in DC. Prod. viii. 628= Cynanchum ovalifolinm.
boerhavi/otium, Decne. 1. c. 530 — Cynanchum boerhavifolinm.
Bqjerianum, Decne. 1. c—Madag.
Callialata, Decne. 1. c. 528-Cynanchum Callialata.

CYNOCTONUM^
capense, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 216 *(=Bunburia elliptica).—Ah.* austr.
ceramense, Tcijsm. & Binn. Cat. Hort Bog. 129, nomen.—Ins. Ceram.
chiloc̆nse, Decne. in DC. Prod. viii. 531.—Chili.
corymbosum, Decne. 1. c 528 = Cynanchum corymbosum.
crassifolium, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 216.—Afr. austr.
dimidiatum, Hassk. in Flora, xi. (1857) 98.—Java.
Dombeyanum, Decne. in DC. Prod. viii. 529.—Ecuador.
Dregeanum, Decne. 1. c. 531 = *crassifolium*.
erubescens, Decne. 1. c. 529 — Cynanchum erubescens.
eurychiton, Decne. 1. c. 528.—Madag.
fimbriatum, Decne. 1. c. 531 = Melaplexis fimbriata.
floribundum, Decne. 1. c 529 = Cynanchum Horibundum.
formosanum, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. xxiii. (1877) 370 (Cynanchi sp.).—Ins. Formosa.
insulanum, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 330 (Cynanchi sp.).—Ins. Hai-nan.
lycioides, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 217 = Tylophora lyciuides.
Meyeri, Decne. in DC. Prod. viii. 531 - V. Meyeri.
microstemma, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 316.—Venezuela.
molle, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 216 - Cynanchum molle.
mucronatum, Decne. in DC. Prod. viii. 631.—Chili.
muricatum, Decne. 1. c. 528.—Java.
myrti/olium, Decne. 1. c. 631 — Cynanchum myrtifolium.
nemorosum, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-66) 178.—Chili.
nummularifolium, Decne. in DC. Prod. viii. 581 = Cynanchum nummularifolium.
obovatum, Decne. 1. c. 529.—Madag.
ovali/olium, Decne. 1. c.=Cynanchum ovalifolium.
pachyphyllum, Decne. 1. c—Chili.
patagonicum, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 176.—Patagon.
pauciflorum, Decne. in DC. Prod. viii. 528 = Cynanchum pauciflorum.
pedunculatum, Decne. 1. c. 529—Cynanchum pedunculatum.
pilosum, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 216.—Afr. austr.
repandum, Decne. in DC. Prod. viii. 630.—Madag.
roseum, Decne. 1. c. 532 = V. roseum.
scoparium, Chapm. Fl. S. U. St. 367 = V. scoparium.
undulatum, Decne. in DC. Prod. viii. 531.—Chili.
virens, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 216=Cynanchum virens.
viride, Phil. Fl. Atac. 35.—Chili.
Watlichii, Decne. in DC. Prod. viii. 528 = Cynanchum Wallichii.
Wilfordi, Maxim, in Bull. Acad. Pėtersb. xxiii. (1877) 369=Cynanchum Wilfordi.
Zollingeri, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 479.—Malaya.

CYNODON, Rich, in Pens. Syn. i. 85 (1805).
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1164.
CAPRIOLA, Adans. Fam. ii. 31 (1763).
DACTILON, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 69 (1787).
FIBICHIA, Koel. Gram. Gall, et Germ. 808 (1802).
altior, F. Muell. Fiagm. viii. llS^tenellus.
arcuatus, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 290.—Ins. Luzon.
ciliaris, *Benth. Fl. Austral*, vii. 610.—Austral.
convergent, F. Muell. Fragm. viii. 113.—Austral.
Dactylon, *Pers. Syn. PI.* i. 85.—Cosmop.
Dactylon, Steud. Syn. PI. Gram. 212-glabratus.
elongatus, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* it 64.—Ind. or.
erectus, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 290.—Mexic.; Peruv.
filiformis, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 712-elongatus.
glabratus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 212.—Arab.; Nubia.
gracilis, Nees, ex Steud. 1. c 218=Leptochloa uniflora.
incompletus, *Nees, in Linnaea*, vii. (1832) 301.—Afr. austr.
leptochloides, *Steud. Syn. PI. Cram.* 423.—Ins. Nossibé.
linearis, Willd. Enum. Hort. Berol. 90 = C. Dactylon.

CYNODON':—
maritimus, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 170-C. Dactylon.
Neesii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 371 = Leptochloa Neesii.
notatus, *Nees, in Linnaea*, vii. (1832) 302.—Afr. austr.
occidental^, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 463 = C. Dactylon.
pascuus, *Nees, Agrost. Bras.* 425.—Bras.
Phragmites, Rasp, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 802 = Phragmites communis.
pilosissimus, Rasp. Ann. Obs. iii. 8; ex Pritz. Ic. Ind, 334 (quid?).
pilosus, Roem. & Schult. Syst. ii. 412 = Panicum sanguinale.
polystachyus, R. Br. Prod. 187=Leptochloa polystachya.
portoricensis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 463 = C. Dactylon.
praecox, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 412 = Panicum sanguinale.
radiatus, *Roth, Nov. PI. Sp.* 38.—Ind. or.
repens, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 76 = C. Dactylon.
sarmentosus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 100 = C. Dactylon.
stellatus, Willd. Enum. Hort. Berol. 90=C. Dactylon.
tenellus, *R. Br. Prod.* 187.—Austral,
tener, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 291.—Ins. Luzon.
tenuis, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 68-C. Dactylon.
ternatus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 405.—Abyss,
virgatus, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 218.—Ind. or.
virgatus, Willd. Enum. Hort. Berol. 90-Leptochloa chinensis.

CYNOGETON, Kunth, Enum. PI. iii. 590 (1841) = CYCNOGETON, Endl. = Trigloohin, Unn. (Naiad.).

CYNOGLOSSUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
BORAGINEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 848.
album, GueldensL ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 166-officinale.
amplexicaule, Lam. Tabl. Encyc. i. 399=pictum.
amplexicaule, Michx. Fl. Bor. Am. i. 182-virginianum.
amplifolium, *Hochst. ex DC. Prod.* x. 149.—Abyss.
anchusoides, Lindl. Bot. Reg. (1842) 1.14=Paracaryum heliocarpum.
angusti/olium, Auch. ex A. DC. Prod. x. 170=Paracaryum leptophyllum.
angusti/olium, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 251 officinale.
angusti/olium, Willd. Sp. PI. *I* 763 = Paracaryum angUbtifolium.
apenninum, Gouan, Fl. Monsp. 20=pictum.
apenninum, Linn. Sp. PI. 134 = Solenanthus appenninus.
apenninum, Roth, ex A. DC. Prod. x. 147 = monotanum.
argenteum, Lam. Fl. Fr. ii. 277 - cheirifolium.
arundanum, Coss. Notes PL Crit. 41 = cheirifolium.
australe, *R. Br. Prod.* 495.—Austral.
Azocarti, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1884), reirop. »—Chili.
baicalense, Pall, ex Roem. & Schult. Syst. W. 764-Craniospermum subvillosum.
Berteri, *Colla, ex DC. Prod.* x. 153.—Chili.
bicolor, Willd. Enum. Hort Berol. 180=officinale.
borbonicum, *Bory, Voy.* ii. 382.—Ins. Mascar.
brassicaefolium, Lag. Gen. et Sp. Nov. lO-Ompholodes amplexicaulis.
californicum, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. U. « index=Echinospermum californicum ?
calycinum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 100-Sucntelenia acanthocarpa.
calycinum, Wall. Cat. n. 923 = Wallichii.
canescens, Wall. 1. c. n. 918, partim=denticuUtuni.
canescens, Willd. Enum. Hort. Berol. 180 < cranthum.
cappadocicum, Willd. Sp. PI. i. 767-Ompba»« cappadocica.
cemuum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883; —Madag.
cheirifolium, Jacq. Coll. iii. SO—pictum.
cheirifolium, *Linn. Sfi. PI.* 134.—Reg. Mediterr. <

CYNOGLOSSUM:—
cheirifolium, Sieber, ex Nym. Consp. 522 = Columnae.
dliatum, Dougl. ex Lehm. Pugill. ii. 21 = Echinospermum ciliatum.
clandestinum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 359. t. 42.—Reg. Mediterr. occ.
clavatum, Viv. Fl. Lib. Spec. 11. t. 5. f. 2-cheirifolium.
Clusii, Loisel. in Diet. Sc. Nat. xii. 384 -Echincspermum Lappula.
coelestinum, Lindl. Dot. Reg. (1839) t. 36 = Paracaryum caelestinum.
coeruleum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 100 = furca turn.
cperuleum, *Hochst. ex DC. Prod.* x. 148.—Abyss.
<-olumnae, *Bivona, Stirp. Rar. Sicil. Manip.* ii. [7].—Italia; Graecia; As. Min.
congestum, Poepp. ex DC. Prod. x. 132=Eritrichium congestnm.
"•*eticum*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8-pictum.
cristatum, Auch. ex DC. Piod. x. 160=Omphalodes nigulo&a.
cristatum, Schreb. in Nov. Act. Nat. Cur. iii. (1767) 476; Lam. Tabl. Encyc. i. 400 = Paracaryum cristatum.
aecumbens, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 167.—Rossia.
oecurrens, *Ruit V Pav. Fl. Per.* ii. 6.—Chili.
aeflexum, Roth, Enum. PI. Phaen. Germ. i. I. 589 = tchinospermum deflexum.
aemiculatum, *A. DC. in DC. Prod.* x. 160.—Ind. or.; Malaya.
diffusum, Roxb. Hort. Beng. [18]; Fl. Ind. i. 4 = Bothriospermum tenellum.
Otoscoridis, Ledeb. Fl. Ross. iii. 166=nebrodense.
"loscoridis, *Vill. Prosp.* 21; *Hist. PI. Daupk.* ii. 457. ..~Keg. Mediterr.
•"•color, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 212.—Madag.
."jnaricatum, Steph. ex Lehm. Asperif. 161-officinale.
"rummondii, *Bentk. Fl. Austral*, iv. 409.—Austral.
"kmatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 84 - Echinospermum cynoglossoides.
MBeworthii, *A. DC. in DC. Prod. x.* 150.—Reg. Himal.
"ongatum, Hornem. Hort. Hafn. ii. 966 « Dioscoridis.
"*arginatum*, Lam. Tabl. Encyc. i. 400 = Paracaryum angustifolium.
omodi, Schouw, Ind. Sem. Hafn. Coll. (1846) 4; ex ^nm. in Hamb. Gartenz. vi. (1850) 352 = Paracaryum heliocarpum.
fmodum, Schouw, in Linnaea, xxiv. (1851) 160-P'aec.
"'YI*Tur"_ in BulL Soc_ Nai_ Mo*- (1840) 259—A& austr.
rectum, *Schveigg. ex Sckrank, in Denksckr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 29.-Hab.?
s<*tens, Gilib. Fl. Litnan. i. 22=ofBcinale.
ftoum, Rudolph, in Schrad. Joum. ii. (1799) 280-clandestinum.
""catus, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Cany*, ii. 6.—«d. or.
germanicum Jacq. Obs. Bot.ii. 31 = montanum.
gilfafense, Willd. ex Roem. & Schult Syst. iv. 761-aolenanthus mollissimus.
glastifwium, WiUd_ Sp< PL i-' M - Paracaryum glastifolium.
glochidiatum, Benth_ in Royle, Illustr. Bot. Himal. 306 = denticulatum.
glochidiatum, *Wall. Cat.* n. 922.—Ind. or.; Burma.
glomeratum Fraser> Cat_ (1818) « P"^. K. Am. er<T"II- 729 = Krynitzkia glomeraU.
irn~j'.l^oue!-e Lekm. Pugill.* ii. 25.—Am.bor. occ.
Sh?yy7rttm> Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. ^-.Lindelofiaspectabilis.
f».^Schult. Oestr. Fl.ed. II. i. 362-montanum.
Heynei, . Don, Gen. Syst. iv. 354 •= furcatnm.
hirsutissimum, *Lehm. Asperif.* 147 (err. typ. 145).—Afr.
hirsutum, Jacq. Hort. Schoenbr. if. 45. t 489 = lanceolatum.
hirsutum, *Tkunb. Prod. PI. Cap.* 84.—Afr. austr.
hispidum, Jacq. ex Roem & Schult_ SJ*_iT_ 78 = micranthum.
hispidum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 729 = Krynitzkia glomerata.
hispidum, r*«*- *Prod. PI. Cap.* 34.—Afr. austr.
holosericeum, *Siev_ in uhn_ St- Nat_ Mole_* iii. (1812) 255.- Reg. Caucas.

CTNOOLOSStrM:—
Howardi, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1.181 - Omphalodea Howardi.
humifusum, *Poepp. ex DC. Prod.* x. 133, in nota.—Chili.
kybridum, Thuill. Fl. Par. 94=officinale.
intermedium, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1834) 169 — Paracaryum micranthum.
japonicum, *Tkunb. Fl. Jap.* 81.—Japon.
javanieum, Thunb. ex Lehm. Asperif. 118 = Echinospermum javanicum.
laeve, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 188.—Calif.
laevigatum, Lehm. Asperif. 174 = Rindera pubescens.
laevigatum, MUTT. Syst. ed. XIII. 157 - Rindera tetraspis.
lanatum, Auch. ex DC. Prod. x. 169-Paracaryum Aucheri.
lanatum, Lam. Encyc. ii. 238 (= *Cypkomattia lanata).*—As. Min. j Persia.
lanceolatum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 41.—Arabia,
lanceolatum, *Georgi, Besckr. Russ. Reick.* iii. IV. 754.—Sibiria.
lanceolatum, Heyne, ex Wall. Cat n. 921 = furcatum.
lanceolatum, *Hochst. ex DC. Prod.* x. 149.—Abyss,
lancifolium, *Hoot./, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 207.—Afr. trop.
lanuginosum, *Lehm. Asperif.* 148.—Hab. I
Lappula, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 125 - Echinospermum Lappula.
lateriflorum, Aubr. Prog. Morb. x. 25 = Omphalodes littoralis.
lateriflorum, Bert ex DC. Prod. x. 120 = Pectocarya linearis.
lateriflorum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 464 *{—Ktenospermum linifolium).*—Hab.!
lateriflorum, Lam. Encyc. ii. 289 = Pectocarya lateriflora.
latifolium, *R. Br. Prod.* 496.—Austral.
laxum, G. Don, Gen. Syst. iv. 356 = Paracaryum glochidiatum.
leptostachyum, *DC. Prod.* x. 152.—Afr. austr.
limense, WiUd. Sp. PI. i. 762-decurrens.
lineare, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. ii. 6 = Pectocarya linearis.
lineatum, Klsso, ex Ces. Pass. & Gib. Comp. Fl. Ital. 380 = cheirifolium.
linifolium, Bove', ex DC. Prod. x. 159 = Paracaryum micranthum.
linifolium, Linn. Sp. PI. 134 = Omphalodes linifolia.
lithospermifolium, Lam. Encyc. ii. 240 — Omphalodes myosotoides.
litorale, Spreng. Syst. i. 567 = Omphalodes littoralis.
longiflorum, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 305 -Lindelofia spectabilis.
longiflorum, Lehm. Asperif. 162 •» Caccinia Russellii.
Loreyi, Jord. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 28 =pictnm.
lucidum, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 277-virginicum.
lusitanicum, Fortis, Osserv. Sopra Cherso ed Osero, 68 = Omphalodes Fortisii.
lusitanicum, Lam. Encyc. ii. 239 - Omphalodes amplexicaulis.
lusitanicum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = Omphalodes linifolia.
macranthum, Regel & Smiraow, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 623-macrostylum.
macrophyllum, Royle, ex DC. Prod. x. 186-Paracaryum glochidiatum.
macropterum. Borszcz. ex Trautv. in Act. Hort Petrop. ix. (1884) 49 = macrostylum *1*
macrostylum, *Bunge, in Lekm. Reliq. Bot.* (1847) 286.—Turkestan.
magellense, *Tenore, Fl. Nap.* iii. 183. t. 117.—Italia.
marifolium, Roxb. Hort. Beng. [13]; Fl. Ind. i. 457 — Heliotropium marifolium.
membranaceum, A. DC. in DC. Prod. x. 150 = Wallichii.
mexicanum, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, v. (1880) 114 = Echinospermum mexicanum.
micranthum, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 172 = lanceolatum.
micranthum, *Desf. Tabl.* ed. I. 220.—Reg. Himal.; Burma.
microcarpum, Kern. Nov. PI. Sp. Dec. ii. 13 - Wallichii.
microglochin, *Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 305.—Reg. Himal.
Moenchii, Nocca & Roem. ex Steud. Nom. ed. II. L 464 — Dioscoridis.

CYNOGLOSSUM:—
molle, *Phil, in Linnaea*, xrix. (1857-58> 18.—Chili.
mollissimum, Lehm. Asperif. 165-Solenanthus mollissimus.
tnonophlebium, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1S83) 211.—Madag.
montanum, *Linn. Amoen. Acad.* iii. 402; *Lam. Fl. Fr.* ii. 277.—Europ.; Oriens.
Morisoni, DC. Prod. x. 155 — Echinospermum virginicum.
muricatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 84 — Lithospermum flexuosum.
myosotoides, Auch. ex DC. Prod. x. 159 = Paracaryum hirsutum.
myosotoides, Labill. Ic. PI. Syr. dec. ii. 6. t. 2 = Paracaryum myosotoides.
myosotoides, Schimp. ex DC. Prod. x. 157 - Omphalodes rugulosa.
nebrodense, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 216.—Europ. austr.; Afr. bor.
nervosum, *Bentk. ex Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 168.—Reg. Himal.
nitidum, Willd. Enum. Hort.Berol. 181-Omphalodes amplexicaulis.
nobile, *Hook. f. in Gard. Chron.* (1858) 240.—Ins. Chatham.
Nuttallii, Spreng. Syst. i. 565 = Pectocarya penicillata.
occidentale, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 58.—Calif.
officinale.Bxot. Fl. Lnsit i. 295-clandestinum.
officinale, Desf. Fl. Atlant. i. 158-pictum.
offidnale, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. i. 152 = grande.
officinale, *Linn. Sp. PI.* 184.—Europ.; Oriens.
officinale, Willk. in Flora, xxxv. (1862) 217 - Dioscoridis.
Ompkalodes, Linn. Syst. ed. X. 914-seq.
ompkaloides, Linn. Sp. I'l. 135 = Omphalodes verna.
ovatifolium, *Griseb. in Goett. Abk.* xxiv.^1879) 271.—Reg. Argent.
ovatum, Moon, Cat. PI. Ceyl. 12-furcatum.
paniculatum, *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 37.—Chili.
papillosum, *Tkunb. Fl. Cap.* ii. 352.—Afr. austr.
parvifolium, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 645 = nebrodense.
pauciflorum, Bert. Merc. Chil. (Apr. 1829) 510 = Pectocarya pusilla.
pauciflorum, *Ruit if Pav. Fl. Per.* ii. 6.—Chili.
pellucidum, Lapeyr. Snppl. Hist. PI. Pyr. 28 = montanum.
penicillatum. Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 371 - Pectocarya penicillata.
petiolatum, *A. DC. in DC. Prod.* x. 149.—Reg. Himal.
pictum, *[Soland. in] Ait. Hort. Km.* ed. I. i. 179.—Reg. Mediterr.
pilosum, Nutt. Gen. Am. i. 114 - Echinospermum Redowskii.
pilosum, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 6 = Pectocarya lateriflora.
platyphyllum, *KlotBsck, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 254.—Afr. trop.
prostratum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 100 = Bothriospermum tenellum.
pustulatum, Boiis. Elench. 66 - nebrodense.
racemosum, Roxb. Hort. Beng. [18]; Fl. Ind. i. 456-lanceolatum.
racemosum, Schreb. in Nov. Act. Nat. Cur. iii. (1767) 475 - Paracaryum angustifolium.
remotum, Moench, Meth. 419 = Dioscoridis.
revolutum, *Ruit V Pav. Fl. Per.* ii. 6.—Peruv.
Rindera, Linn. *i.* Suppl. 130=Rindera tetraspis.
Ritchiei, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 157.—Ind. or.
robustum, *Hassk. in Ver. Nat- Ver. Nederl. Ind.* i. (1866) 44.—Malaya.
Rochelia, /. *DC. in DC. Prod. x.* 152.—Ins. Mascar.
Roylei, Wall. Cat. n. 917 = Paracaryum glochidiatum.
ruder ale, Salisb. Prod. 116-officinale.
rugosum, Sestini, ex Roem. & Schult. Syst iv. 764 - Moltkia coerulea.
scorpioides, Haenke, in Jacq. Coll. ii. 3 = Omphakxlrs scorpioides.
sessiliflorum, Poepp. ex DC. Prod. x. 133 = Eritrichium sessiliflornm.
siculum, Guss. SuppL Kl. Sic. Prod. 52 = pictum.
sphacioticum, *Boiss. V Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 125.—Ins. Creta.

CYNOGHiOSSTTM:-
stamineum, Bieb. Fl. Taur. Cane. Hi. 127 =Solenanthus Biebersteinii.
stamineum, Desf. in Ann. Mus. Par. x. (1807) 181 = Solenanttans Tournefortii.
stellulatum, Wall. Cat. n. 924-glochidiatum.
stylosum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. xv. (1842) 409=Solenanthus nigricons.
suav'eolens, *R. Br. Prod.* 495.—Austral.
sylvaticum, Haenke, in Jacq. Coll. ii. 77= montanam.
Tenorii, Guss. ex Nym. Consp. 621=nebrodense.
tomentosum, *Lehm. Asperif.* 144.—Italia.
Trianaeum, *Wedd. Chlor. And.* ii. 90.—N. Granat.
umbellatum, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 158 *(=Mattia umbellata,* Roem.& Schult.).-Hung.
uncinatum, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 805 = Paracaryum glochidiatnm.
valentinum. Lag. Gen. et Sp. Nov. 10 = Dioscoridis.
vernale, Salisb. Prod. 116 - Omphalodes verna.
vesiculosum, Wall. Cat n. 920 = micranthum, Wallichii.
virens, Scbreb. Spicil. Fl. Lips. [152] = montanum.
virginiannm, *Linn. Sp. PI.* 134.—Am. bor.
virginicum, T. F. Gmel. Syst. 319 = montanum.
virginicum, Linn. Syat. ed. XII. 146 = virginiannm.
virginicum, Willd. Enum. Hort. Berol. 180 = Dioscoridis.
viridiflorum, *Willd. ex Roem. tf Schult. Syst.* iv. 757.—Sibir.
vulgare, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 166 = offidnale.
Wallichii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 354.—Reg. Himal.
Xatarti.J. Gay, ex Nym. Consp. 521 = Dioscoridis.
zrylanicum, Thunb. ex Lehm. Asperif. 116 — denticulatum.'
eeylanicum, Wight, ex Wall. Cat. n. 7018-Heliotropium paniculatum.

CYNOMETBA, Linn, in Act. Soc Sc. Upsal. (1741) 78. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 584.
CYNOMORA, R. Hedw. Gen. 804 (1806).
IRIPA, Adans. Fam. ii. 608 (1768).
METROCYNIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 22 (1809).
Afzelii, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 318.—Afr. trap.
Agallocha, Spreng. Syst ii. 327 = Aquilaria Agallocha.
americana, *Vog. in Linnaea,* x. (1836)' 802.—Ins. S. Doming,
bauhiniaefolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 99.—Guiana.
bijuga, Span, in linnaea, xv. (1841) 201 = ramiflora.
cauliflora, *Linn. Sp. PI.* 382.—Ind. or.; Malaya.
cauliflora, Wall. Cat. n. 5816 = ramiflora.
Commersoniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (18831 376.—Madag.
crassifolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot. d.* (1840) 100.—Ind. occ.
cubensis, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 609.->Cuba.
cuneata, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 179.—Guiana,
falcata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 472.—Ins. Fiji,
floribunda, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 318.—Afr. trop.
grandiflora, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 470. t. 52.—Ins. Pacif.
guianensU, *KlotBsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gut.* 1035, nomen.—Guian.
Hostmanii, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 180.—Guian.
inaequifolia, *A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 473.—Ins. Philipp.
Iripa, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* iv. 1341.—Ind. or.
laxiflora, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 818.—Afr. trop.
madagascariensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1863) 375.—Madag.
Mannii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 817.—Afr. trop.
marginata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.ii.* (1840) 100.—Am. trop.
Martiana, Baill. Hist. PI. ii. 164 - Hymenaea Martiana.
mimosoides, WalL Cat. n. 5817 = ramiflora.
obtusa, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. IL 246.—Bras,
parvifolia, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 181.—Am. trop.
Fervilleana, *BailL in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1883) 376.-Madag.
pinnata, *Lour. FU Cochinch.* 368.—Cochinefa.

CTNOMETBA:—
polyandra, *Roxb. Hort. Beng.* 82; *Fl. Ind.* ii. 872.—Ind. or.
racemosa, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 100.—Guian.
ramiflora, Miq. Anal. Bot. Ind. 11—polyandra.
ramiflora, *Linn. Sp. PI.* 382.—As. et Austral, trop.
Schombnrgkiana, *Klottseh, in Schomb. Faun, et Fl. Gut.* 1035, nomen.—Guian.
Spruceana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 247.—Bras.
tetraphylla, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 329 -Cryptosepalum tetraphyllum.
travancorica, *Bedd. Fl. Sylv.* t. 316.—Ind. or.
Vogelii, *Hook./, in Hook. Niger Fl.* 328.—Afr. trop.

CYNOMORA, R. Hedw. Gen. 804 (1806) = Cynometra, Linn. (Legnmin.).

CYNOMORBIUM.Opiz, Fl. Caslav. Cent. iii. 255, 261 (1804).—Cf. Lotos, iv. (1864) 43=Banunoulufl, Tourn.
heterophyllum, Opiz, II. cc. = R. arvensis.

CYNOMOBIUM, Mich, ex Linn. Syst. ed. I (1735). *BALANOPHOREAE,* Benth. & Hook. f. iii. 234.
ausirale, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1866) 46, sphalm.'Balanophora fungosa.
Balanophora, Willd. Sp.PI. iv. 177 - Balanophora fungosa.
cayennense, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 12-Helosis guianensis.
cocdneum, Descourt. Fl. Med. Antill. ii. 118. t. 96 - Scybalium jamaicense.
coccineum, *Linn. Sp. PI.* 970.—Reg. Mediterr.; Oriens.
fungosum, Raensch. ex Steud. Nom. ed. I. 252= Balanophora fungosa.
jamaicense, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 12=Scybalium jamaicense.
parasiticum, Sw. ex Steud. Nom. ed. I. 252 = Balanophora fungosa.
philippense, *Blanco, FL Filip.* ed. I. 665.—Ins. Philipp.
purpureum, Rupr. Sert. Tiansch. 72=coccineum.
songaricum, *Rupr. I. c.* 73.—Soongaria.

CYNOPHALLA, J. Presl, RostL U. 275 (1825) = Capparis, Tourn.
flexuosa, J. Presl, L c. = Capp. Cynophallophora.
hastata, J. Presl, L c=Capp. Cynophallophora.
linearis, J. Presl, 1. c = Capp. linearis.
laeta, J. Presl, 1. c=Capp. verrncosa.
mollis, J. Pjesl, 1. c. = Capp. mollis.
pauciflora, J. Presl, L c. = Capp. Cynophallophora.
saligna, J. Presl, 1. c. = Capp. Cynophallophora.
sessilis, J. Presl, 1. c. = Capp. sessilis.
verrucosa, J. Presl, 1. c. = Capp. vermcosa.

CYNOPOA, Ehrh. Phytophyl. n. 72 (1780); Beitr. iv. (1789) 148 - Agropyron, J. Gaertn. (Gramin.) (A. c&ninunij.

CYNOPSOLE, Endl. Gen. 74 (1886)=Balanophora, Font.
elongata, Endl. 1. c. = B. elongata.

CYNORCHIS, Thou. Orch. lies Afr. in tab. synopt. et t. 13 (1822). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 628.
AMPHORCHIS, Thou. 11. cc. tt. 4, 6 (1822).
CYNOSORCHIS, Thou. 11. cc. tt. 14,15 (1822).
angustipetala, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 514.-Madag.
Boryana, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 831.—Ins. Maurit.
brevicornu, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 516.—Madag.
calanthoides, *Kraenilin, in Bremen Abh.* vii. (1882) 260.—Madag.
fastigiata, *Thou. Orch. lies Afr.* 1.13.—Madag.
flexuosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 381.—Madag.
gibbosa, Ridl. in Joura. Linn. Soc. xx. (1883) 331 - calanthoides.
grandiflora, *Ridl. 1. c.* 332.—Madag.
hispidula, *Ridl. L c.* xxi. (1886) 517.—Madag.
lilacina, *Ridl. I. c.* 615.—Madag.,
purpurasceas, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 881.—Ins. Maurit etBorbon.
squamosa, *LindU 1. c.* 382.—Ins. Maurit et Borbon.
triphylla, Lindl. L c *(=-Gymnadenia triphylla).*—Ins. Maurit.
uniflora, *Lindl. 1. c.* 831.—Madag.

CYNORHIZA, Eckl. & Zeyh. Enum. 851 (1887)-Peuoedanum, Tourn. (Umbell.).
alia, Eckl. & Zeyh. 1. c. 352 = P. Zeyheri?
montana, Eckl. & Zeyh. 1. c - P. Zeyheri.
sulcata, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c.=P. sulcatum, *Sond.*
typica, Eckl. & Zeyh. 1. c.=P. Cynorhiza.

CYNORRHYNCHIUM, Mitchell, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 207, App.=Stimulus, Linn. (Scrophnl.).

CYNOSBATA, Reichb. Handb. 290 (1837)-Pelargonium, L'Herit. (Geraniac).

CTirOSCIASnrM, DC. Coll. Mem. v. 44, t. 11 (1829); Prod. iv. 140 (1830). *VMBELLIFERAE,* Benth. *St.* Hook. f. i. 906.
digitatum, *DC. Coll. Mim. v.* 44.—Am. bor.
pinnatum, *DC. Lei*—Am. bor.

CYNOSORCHIS, Thou. Orch. lies Afr. in tab. «ynopt.et tt. 14,15 (1822) = Cynorohia, Thon. (Orchid.).
Boryana, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 72 = Cynorchis Boryana.
fastigiata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 332, in syn. = Cynorchis fastigiata.
flexuosa, Reichb. *(.* Otia Bot Hamb. 72 = Cynorchis flexnosa.
galeata, Reichb. f. in Flora, lxviii. (1885) 586.—I"s-Cdmor.
purpurascens, Thou. Orch. lies Afr. t. 15 = Cynorchis purpurascens.
squamosa, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 72=Cynorchis squamosa.
triphylla, Thou. Orch. lies Afr. t. 14 = Cynorchis triphylla.
uniflora, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 72-Cynorcbis uniflora.

CYNOSURUS, linn. Gen. ed. I. 18 (1737). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1183.
FALCONA, Adans. Fam. ii. 496 (1768).
PHALOKA, Dum. Agrost. Belg. 86, 114 (1828).
aegyptiacus. Link, Handb. i. 23, in syn. =seq.
aegyptius, Linn. Sp. PI. 72 = Eleusine aegyptiaca.
aristatus, *Brouss. Eleneh. Hort. Bot. Monsp.* 20, nomeo—Hab.?
aureus, Linn. Sp. PI. 73 =Lamarckia xurea.
Balansae, COM. *(f Dur. in Bull. Sec. Bot. Fr.* i. (»S4 J 818.-Afr. bor.
brizoides, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (18»* reimpr. 8 —Ins. Madera.
caeruleus, Lion. Sp. PL- 72=Sesleria caerulea.
callitrichus, *C. V W. Barb. Htrbor. Levant,* 166. t. »«• —Syria.
capillaceus, Beauv. Agrost. 169 = Leptochloa ten«Tini»-
capillaris, Hort. ex Homem. Hort Hafn. i- Leptochloa tenerrima.
capitatus, Wulf. ex Roem. & Schult. Syst it «°* Sesleria tenella.
carolinianus, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i- *66 Elensine aegyptiaca ?
Castagnei, Jord. ex Martr. Fl. Tarn, 814»echinaWS' *coeruleus,* Auct. vide *caeruleus.*
coeruleus, Turio, Sp. PL Clav. 7-Sesleria cyHndnc*
coloratus, Lehm. ex Steud. Nom. ed. IL >• ecbinatus.
coracanus, Linn. Syst. ed. II. 875-Eleusine corac»n»-
Crista-galli,M.anby, Fl. Alger. 10 = muldbracteatus.
cristatus, *Linn. Sp. PI.* 72.—Europ.; Reg. Caucas.
cylindricus, Balb. Eleneh. 86-Sesleria cylindnca...
distachyos, Rottl. ex Steud. Nom. ed. II. >• *°" Elensine aegyptiaca.
disHchus, Hoflm. Deutschl. Fl. ed. IL i. '• *s Oreochloa disticha.
domingensis, Jaoq. Misc. ii. 863-Leptochloa aom>
durus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 21 = Eragr cynosuroides.
durus. Linn. Sp. PI. 72=Sderochloa dun.
echinatus, *Linn. 1. c*—Europ.; Oriens.
effusus, Link, in Schrad. Journ. ii. (17»9) elegans.
elegans, *Desf. Fl.Atlant.* i. 82.—Reg. Mediterr.
erroneus, Jord. ex Martr. Fl. Tarn, 813 -echm
erucaeformis, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed- *• '• ^ BcckmviiuA erucae rnfis.

CYNOSURANRS:—
falcatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 28 *("Campulosus falcatus).*—*Afz.* anstr.
fertilis, De Lens, in Loisel. Fl. GalL ed. IL i. 68= echinatns.
JUiformis, Vahl, Symb. Bot. ii. 20 = Leptochloa cynosuroides.
JloccifMus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 21 = Eleusine floccifolia.
geniculatus, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 319 (quid?).—Rossia.
giganteus, Nym. Consp. 923=echinatus.
glaber, *Beam. Agrost.* 159.—Hab. 1
gracilis, Car. Hort Reg. Matr. i. t. 6. f. 3 ; ex Roem. & Schnlt. Syst ii. 805 = Aegopogon cenchroides.
gracilis, Viv. Fl. Lib. Spec. 67 ; Fl. Core. 3 -elegans.
Hystrix, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 887.—Algeria.
indicus, Linn. Sp. PI. 72 = Elensine indica.
juncifolius, Wulf. ex Mert. & Koch, in Roebl. DeutscEl. Fl. ed. III. i. 625 = Sesleria tenuifolia.
F'gopoides, Buim. *I.* Fl. Ind. 29 = Aelnropus pubescens.
Lima, linn. Sp. PI. 72 = Wangenheimia disticha.
macrocepkalus, Link, Handb. i. 81, sphalm. =seq.
microcephalies, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. I. 49= Sesleria tenella.
-wnostachyus, Vahl, Symb. Bot. ii. 20=Leptochloa monostachya.
multibracteatus, *Roem. If Schult. Syst.* ii. 618.—Afr. bor.
"tglectus, Opiz, Natural, ix. (1825) 161 - cristatus.
obliquutus, Link, in Linnaea, xvii. (1813) 406 = elegans.
•*Hiatus,* Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft vi = Sesleria tenella.
Puniceus, Linn. Sp. PI. 73-Polypogon monspeliensis.
paniculatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 28=Poa Uniolae.
paspaloides, Vahl, Symb. Bot. ii. 21 = Chloris petraea.
Peetinatus, Lam. Encyc. ii. 188=Leptochloa pectinata.
Poninllatus, Vahl, Symb. Bot. ii. 21 = Chloris penicillata.
Phleoides, Desf. FL Atlant. i. 82=Koeleria hispida.
Polybracteatus, Gren. *8c* Godr. FI. Fr. iii. 663= elegans.
Pohbracteatus, Poir. Voy. Barb. ii. 97 - cristatus.
Polydactylon, Nocca, Cat Pav. (1818); ex Roem. & Schult. Syst. ii. 619 (Quid!).
"etroflexus, Vahl, Symb. Bot. iL 20 *{"Leptochloa aratica].*—Hab. ?
"Vestris. Wulf. ex Steud. Nom. ed. II. L 465-Sesleria coerulea.
tooparitts, Lam. Encyc. ii. 188=Chloris radiata.
sec undus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 728-Bouteloua recemosa.
sesleria, Schrank, Baier. Fl. i. 350-Sesleria coerulea.
tculus, Jacq. Obs. Bot. iL 22=Desmazeria sicula.
*SP**erocepkalus,* Wulf. in Jacq. Misc. ii. 71 = Sesleria fPhaerocephala.
**P!*ndens,* Tenore, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 370= Apera interrupta.
*[illegible] "ort. Reg. Matr. i. t. 6. f. 2; ex Roem. * Schult. Syst. ii. 805 — Aegopogon geminiflorus.
"nerrimus, Hornem. Enum. Hort. Hafn. 8= Leptochloa filifoimis.
c£«tus,* Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 21.—Arab.
"t&achys, Um. Encyc. ii. 188=Eleusine tristachya.
ff'fiorus, Walt. FL Carol. 82 (Quid?).—Carolina.
**<™<*w,* Linn. f. Suppl. 110=Poa Uniolae.
•"*»<«*, Linn. Syst. ed. X. 876-Leptochloa virgata.

CYNOTis) Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. iL (1826) 98- Vfyptosteinma, R. Br. (Compos.),
Aynondruua, Hoff^BB- 1- c=CrypL hypochondracum.

CYNOIOXICUM, Veil. Fl. Flum. 197 (1825); iv. t di.T*"'188 - Connarua I Linn.
rfA»w«m, Veil. 1. c. 198; iv. 1.188.—Bras.
H?2lSpermum Veil. e.! •»• t. 187.—Bras.
"ffruttcosum Veil. 1. c.; iv. t186.—Bras.

CYNOTou^LONfil1_Also8-Am_M (1838)=Oornu«,
****• Rafin. L c-Comus florida.

CYNTHIA, Dl Don, in *EabA*_N_PhlL Jonrn_ (Mar. 1829) 309 =Krigia,Schreb. (Compos.).
Imt?™*'''' *Beck* TSot. N. et MM. St 168-K. "opiexicaulis.

CYNTHIA:—
Boscii, DC. Prod. viL 89 = Krigia Dandelion.
Dandelion, DC. 1. c - K. Dandelion.
Griffithii, Nutt. in Jonrn. Acad. Philad. vii. (1834). 69-K. amplexicaulis.
lyrata, Nutt. L c 68-K. Dandelion.
virginica, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (Mar. 1829) 809 - K. amplexicaulis.

CYPELLA, Herb, in Bot Mag. sub t. 2637 (1826).
1RIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 689.
HESPEROXIPHION, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 127.
PHALOCALLIS, Herb, in Bot Mag. t. 3710 (1839).
POLIA, Tenore, Cat. Ort. Bot Nap. (1845) 92.
cathartica, Mart ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. I. 526 *(" Lansbergia cathartica).*—Bras.
cultriformis, Seub. ex Klatt, 1. c. 521= gracilis.
Drummondii, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. xx. (1836) 190 = Herbertia Drummondiana.
gigantea, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 364.—Bras,
gracilis, *Baker, in Joum. Unit. Soc.* xvL (1877) 129. —Bras.
Herbert!, *Herb. Bot. Mag.* sub t. 2637.—Bras.
monticola, Mart, ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. I. 526 *(=Lansbergia monticola).*—Bras,
palndosa, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 366.—Bras.
peruviana, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6213.—Peruv.
plumbea, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) Misc. 71.—Bras.
purgans, Mart, ex Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. I. 627 (=*Lansbergia purgans).*—Bras,
pusilla, *Benth. & Hook.f. Gen.* iii. 690.—Bras.
ramosa, Klatt, in Abh. Naturf Ges. Halle, xii. (1882) 864=Herberti.
violacea, Seub. ex Klatt, in Mart. FL Bras. iii. I. 626 (=*Lansbergia violacea).*—Bras.

CYPELLA, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 538 = Mariea, Ker-Gawl. (Irid.).
brachypus, Baker, in Gard. Chron. (1876) I. 188=M. brachypus.
caerulea, Seub. ex Hook. f. Bot. Mag. t 5612 - M. caerulea.
glauca, Seub. ex Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 542 = M. glanca.
gracilis, Klatt, 1. c. 541=M. gracilis.
humilis, Klatt, 1. c 640 - M. humilis.
longifolia, Klatt, 1. c 641=M. longifolia.
lutea, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. I. 522 = M. lutea.
Northiana, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 689 - M. Northiana.

CYPELLIUM, Desv. in Ham. Prod. Ind. Oca 28 (1825) ' Gen. hand recog.' Benth. & Hook. f. ii. 668.
nervosum, Desv. 1. c.—Guiana.

CTrPEH.OB.CHIS, Blume, Rnmphia, iv. 47 (1848) in obs.; et Mus. Bot. Lugd. Bat i. 48 (1849). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 538.
cochleare, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* xviiL (1881) 818.—Reg. Himal.
elegans, *Blume, Rumphia,* iv. 47.—Reg. Himal.
Mastersii, *Benth. in Joum. Soc.* xviii. (1881) 818.—Reg. HimaL

CYPEBTJ8, [Mich.] Linn. Syst ed. I (1735); Gen. ed. I. 12 (1737). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1043.
ANOSPORUM, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 289.
ATOMOSTYLIS, Steud. in Flora, xxxiii. (1860) 229; Syn. PI. Cyp. 315 (1855).
BOBARTIA, Linn. Fl. Zeyl. 17 (1747).
BORABORA, Steud. Syn. PL Cyp. 71 (1866).
GALILEA, Parl. Fl. Palerm. i. 297 (1845).
HYDROSCHOENUS, Zoll. *8c* Mor. Syst. Verz. Zoll. 96 (1846).
OPETIOLA, Gaertn. Fruct. i. 14. t 2 (1788).
PAPYRUS, Willd. in Abh. Acad. Berl. (1812-18) 70.
PTEROCYPERUS, Opiz, Seznam, 80 (1852).
SOROSTACHYS, Steud. in Flora, xxxiii. (1860) 229; Syn. PL Cyp. 71 (1855).
TORRBYA, Rafin. in Jonrn. Phys. lxxxix. (1819) 106.
TORULINIUM, Desv. in Ham. Prod. PL Ind. Occ. 15 (1825).
TRENTEPOHLIA, Boeck. in Bot Zeit xvi. (1858) 249.

CYFEBTJB:—
abnormis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 48.—Hab. I
abyssinicus, Hochst. ex A. Rich. Tent. FI. Abyss, ii. 474=Pycreus flavescens.
acaulis, Steud. in Flora, xxv. (1842) 599 - Mariscus castaneus.
aciculfiris, Steud. Syn. PI. Cyp. 45 (Marisci sp.).—Bras.
acicularis, With. Bot. AIT. ed. III. ii. 78 = Eleocharis acicnlaris.
actinostachys, *Welm. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iL (1884) 140.—Afr. trop.
acuminatus, Roxb. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 77=laevigatus.
acuminatus, *Torr. V Hook, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 485.—Am. bor.
acutangulus, *Boeck. in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 651. —Chili.
acutiflorus, Steud. Syn. PL Cyp. 8S=proteinolepis.
acutiusculus, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 2.—Mexic.
acutus, R. Br. Prod. 217 (Marisci sp.).—Austral,
adenophorus, *Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 28.—Bras.
adotnsis, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 20 - rigidifolius.
adscendens, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 14.—Hab. ?
adustus, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 461 = *Aschenbornianus.*
adustus, J. *3c* C. Presl, Rel. Haenk. i. 167=melanostachyus.
aegyptiacus, *Gloxin. Obs.* 20. t. 3.—Europ.
aequalis, *Vahl, Enum.* ii. 820.—Afr. austr.; Ins. Mascar.
aethiops, Welw. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 129 (Pycrei sp.).—Afr. trop.
affinis, Roem. & Schult Syst. ii. 213 •= comosus.
Afmelii, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 476 (Pycrei sp.).—Afr. trop.
agrestis, Willd. ex Spreng. *8c* Link, Jahrb. i. III. 86 = rotundus.
Aitoni, *Spreng. Mant.* i. 29.—Hab.?
alatus, F. Muell. Fragm. viii. 272, in obs. - Kyllinga alba.
albiceps, Ridl. in Journ. Bot xxii. (1884) 16-Kyllinga sphaerocephala.
albidus, Lam. Tabl. Encyc. i. 146 — Pycreussanguinolentus.
albidus, *Ret*. Obs.* vi. 21 China.
albo-marginatus, Mart. & Schrad. ex Nees, in Mart. FI. Bras. ii. 1. c. 9=Pycreus albo-marginatus.
albostriatus, *Schrad. Anal. Cap. Cyp.* 7.—Afr. austr.
albus, *J. (f C. Presl, Rel. Haenk.* i. 176.—Ins. Luzon.
alopecuroides, [Koen.] ; Roxb. Hort Beng. 6 ; Fl. Ind. i. 208=exaltatus.
alopecaroides, *Rottb. Descr. Nov. PI.* 88. t. 8 fig. 2; *Prog.* 20.—Geront. trop.
alopecuroides, Thunb. Prod. PL Cap. 18-Mariscus riparius.
alpinus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 215 (Marisci sp.).—Mexic.
altemifiorus, R. Br. Prod. 216 (Marisci sp.).—Austral.
alterniflo Tus, Schweva. in Long, Exped. Winnep. ii. 381 = Schweinitzii.
alternifolius, *Linn. ManU* 28.—Madag.
alternifolius, Steud. Syn. PL Cyp. 64 (Marisci sp.).—Austral.
alternifolius, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 80 - longifolius.
altus, Nees, in Wight, Contrib. 84 = exaltatus.
amabilis, *Vahl, Enum.* ii. 318.—Geront. trop.
amauropus, Steud. Syn. PL Cyp. 83 (Mansci sp.).—Abyss.
ambiguus, Liebm. Vidensk. Selsk. Skr. V. iL (1861) 199 -Pycreus propinquus.
ambiguus, Steud. Syn. PL Cyp. 18«Scirpus cerouus.
amblyleptos, *Steud. I. c.* 80.—Abyss.
ambongensis, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 861 - obtusiflorus.
amentaceus, Rudge, PI. GuL 16. t. 19-Fimbristylis complanata.
amnicola, *Kunth, Enum. PI.* iL 62—Afr. austr.
amoenus, Koen. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 187-exaltatus.
amoenus, Kunth, Enum. PI. ii. 58 -longus.
amoyensis, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. V. (1866) 249 = procerus.
amphekes, Steud. Syn. PI. Cyp. 56 = anceps.
amphibolus, Steud. 1. c. 22=denudatus.
amplissimus, Steud. 1. c. 316—prolixos.

CYPEETJS :—
amuricus, *Maxim. Prim. Ft. Amur.* 296.—Reg. Amur,
anabaptistus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 87.—Ins. Luzon.
anceps, Heyne, ex Steud. Nom. ed. IL i. 466 = proeeius.
anceps, *Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1851) 218.—Cuba.
anceps, Steud. Syn. PI. Cyp. 22=Fimbristylis complanata.
Andersonianus, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 602 — Mariscus cyperinus.
Anderssonii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 888 = Mariscus brachystachys.
andongensis, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 140.—Afr. trop.
Andschoa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 481-dichroostachyus.
angolensis, *Boeck.inFlora,\xa1\.*(1880)435.—Afr. trop.
angulatus, Nees, in Wight, Contrib. 73—Pycreus angnlatus.
angulatus, W. Wats, in E. T. Atkinson, Gazetteer, x. (1876) 898 (Pycrei sp.) =*pauper,*
angustatus, Benth. Fl. Austral, vii. 282 (Marisci sp.) - Luerssenii, *Gunnii.*
angustatus, R. Br. Prod. 214 (Marisci sp.).—Austral
angustatus, Thunb. ex Spreng. & Link, Jahrb. i. III. 84=leonensis.
angustatus, Willd. ex Kunth, Ennm. PI. ii. 88 =• differmis.
angustifolius, Bnch.-Ham. in Wall. Cat n. 887S B-cuspidatus.
angustifolius, A. Dietr. Sp. PI. ii. 322 (Pycrei sp.) = *rivularis*, Kunth.
angustifolius,*Schum. V Thonn. Beshr. Guin.Pl.Vi.*—Afr. trop.
anises, Roem. & Schult Mant. ii. 131 (Marisci sp.) - *Manimae.*
anisostachyos, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 20 - amabilis.
annuus, Spreng. & Link, Jahrb. i. III. 88=Mariscus glomeratus.
annuus, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 233-Fimbristylis diphylla.
anomalus, Stead. Syn. PI. Cyp. 87 = Mariscus albescens.
apatris, *Steud. I. c.* 47.—Hab.?
aphyllus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68)) 450 (Pycrei *.io.)=latispicatus.*
aphyllus, Hassle Cat. Hort. Bogor. Alt 24-Kyllinga pungens.
aphyllus, F. Mnell. Fragm. viii. 272, inobs.«Kyllinga peruviana.
aphyllus, Vahl, Eclog. Am. ii. 6=C. Haspan.
apiculatus.Uebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V.ii. (1851) 220 (Marisci sp.) - *Manimae.*
appendiculatus, Kunth, Enum. PI. ii. 81 = Mariscus appendiculatus.
apricus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii (1884) 141.—Afr. trop.
aquatilis, R. Br. Prod. 213 -trinervis.
aquatilis, F. Muell. Fragm. viii. 270 = Pycreus polystachyus.
arabicus, Ehrenb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 284-tuberosus.
arcuatus, Boeck. 1. c. xxxv. (1867-68) 542 = conglomerates.
arenarius, Hance,exC. B. Clarke, in Joum.Linn. Soc. xxi. (1884) 173-=stoloniferus.
arenarius, *Ret*. Ois.* iv. 9.—As. trop.
arenarius, Salzm. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 46 (Marisci sp.).—Bras.
arenarius, Wight, in Wall. Cat. n. 3374-aristatus.
arenicola, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 51.—Texas.
areolatus, R. Br. Prod. 216 (Pycrei sp.) = *C. Eragrostis.*
argenteus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. IL ii. (Ib84) 183.—Afr. trop.
argentinus, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 502 = Mariscus flavus.
argentinus, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 64 (Pycrei sp.).—Reg. Argent
argyraeus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 11.—Afr. trop.
aristatus; Hook. f. & Thorns, partim, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 90-cuspidatus.
aristatus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 22; *Prog.* 16.—Orbis ternrum.
aristatus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) S01, partim =Scirpu» hamulosus.
Armstrongii, Benth. Fl. Austral, vii. 289 (Marisci sp.). —Austral.

CYPEBTJS :—
articulatus, Benth. PI. Hartw. 124-nodosus.
articulatus, *Linn. Sp. PI.* 44.—Cosmop. trop.
articulatus, Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849) 88, partim -• corymbosus.
arundinaceus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. ciii. n. 45 = conglomerates.
arundinaceus, Linn. Sp. PI. 44 - Dnlichium spathaceum.
arundinaceus, *Noronha, ex Thou. Prod. Phyt.* 2, *in Milang.* (1811) nomen.—Madag.
Aschenbomianus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 460 (Pycrei sp.).—Mexic.
asperifolius, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 887 = textilis.
asperrimus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 218 (Marisci sp.) = *Manimae.*
assimilis, Steud. in Flora, xxv. (1842) 584 (Courteisiae sp.).—Abyss.
ater, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 283=Pycreus capillaris.
ater, Vahl, Enum. ii. 335 (Pycrei sp.) = *C. Eragrostis.*
aterrimus, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 81.—Abyss.
Atkinsoni, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 109.—Ind. bor. occ.
atlantieus, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. II. 130= Mariscus appendiculatus.
atractocarpus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 141.—Afr. trop.
atratus, Steud. Syn. PI. Cyp. 12 = Pycreus sanguinolentus.
atro/errugineus, Steud. 1. c. 2"Pycreus capillaris.
atronervatus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 858 (Pycrei sp.).—Abyss.
atronitens, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 20 (Pycrei sp.).—Afr. trop.
atropurpureus, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 497.—Madag.
atropurpureus, Boj. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Sue. xx. (1883) 281 (Pycrei sp.) = *Boivini.*
atropurpureus, Pers. Syn. i. 60 = striatus.
atrosanguineus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 445 = Mariscus atrosanguineus.
atrosanguineus, Hochst ex Steud. Syn. PI. Cyp. 30 = rigidifolius.
Aucheri, *Jaub. & Spach, Illustr.* ii. 1.1101.—Persia; Aegypt.; Alger.
aurantiacus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 205 = amabilis.
aureolus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 23.—Guatamala.
aureo-rufus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 869 = auricomus.
aureus, Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr. 257 = glomeratus.
aureus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 205-amabilis.
aureus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 168=squarrosus.
aureus, Tenore, Fl. Nap. iii. 45.1.101 = esculentus.
auricomuSfC. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 188, pro majore parte=digitatus.
auricomus, *Sieber, ex Spreng. Syst.* i. 230.—Geront trop.
auriculatus, Nees & Meyen, in Linnaea, ix. (1884) 285 (Marisci sp.).—Ins. Sandvic.
australis, Schrad. Fl. Germ. i. 116=glqmeratus.
autumnalis, Puish, Fl. Am. Sept i. 51=articulatus.
autumnalis, Vahl, Enum. ii. 818 = C. Haspan.
Baatas, Steud. Syn. PI. Cyp. 816-reflexus.
Babakan, *Steud. 1. c.* 6.—As. trop.
babakensis, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 152-praec.
Baccka, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283 (Pycrei sp.) = *puncticulatus.*
badius, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 875 = Mariscus paniceus.
badius, Desf. Fl. Atlant i. 45. t 7 = longus.
badius, Steud. in Flora, xii. (1829) 158 = congestus.
Baenitzi, *Boeck. in Flora*, lxi. (1878) 140.—Uruguay.
bahiensis, Steud. Syn. PI. Cyp. 35—esculentus.
Bakeri, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 290.—Ins. Maurit.
Balbisii, Kunth, Enum. PI. ii. 68 = sphacelatus.
Baldwinii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70), partim = Mariscus uniflorus.
Baldwinii, Chapm. Fl. S. U. St 511, partim = Mariscus cylindricus.
Baldwinii, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1886) 270 = Mariscus echinatus.
Balfouri, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 289.—Ins. Borbon.
banaticus, Kit. ex Nym. Consp. 759=.glaber.

CYFEBTJ8 :—
bancanus, *Miq. Fl. Ind. Bat, Suppl.* 599.—Ins. Banca.
barbata, Poir. Encyc. SuppL v. 186 = Fimbristylis 61flmcptos&«
Baroni, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 289.—Madag.
Barteri, Boeck. in- Linnaea, xxxv. (1867-68) 460 (Pycrei sp.!) = pustulatus.
belfus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 62.—Afr. austr.
bengalensis, Spreng. Neue Entdeck. iii. 101 — tegetiformis.
benghalensis, C. B. Clarke, in Journ. Lion. Soc. xxi. (1884) 151 = C. Babakan.
Berteri, Kunth, Enum. PI. ii. 67 = digitatus.
Beyrichii, Stead. Syn. PL Cyp. 47 (Marisci sp.).—Bras.
biceps, Vahl, Enum. ii. 368=radiatus.
bicolor, Barton, Comp. Fl. Philad. i. 27-diandrus.
bicolor, Vahl, Enum. ii. 340 = rotundus.
bidentatus, Poir. Encyc. vii. 250 = alopecuroides.
bidentatus, *Vahl, Enum.* ii. 330.—Afr. trop.
bifidns, *Pourr. Chlor. Hisp.* 17i.—Mont. Pyren.
Bigelowii, Steud. Syn. PI. Cyp. 5 (Pycrei sp.)-W»»-*laris.*
biglumis, C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 199 - Mariscus Sieberianus.
bipartitus, Torr. in Ann. Lye. N.York, iii. (1886) 257 (Pycrei sp.) =*diandrus*, Torr.
Bipontini, *Boeck. in Flora*, xl. (1857) 33.—Mexic
bispicatus, Steud. Syn. PI. Cyp. 49=elatus.
bisumbellatus, Steud. 1. c. 46=prolixus.
biuncialis, Anderss. in Vet. Akad. HandL Stockb. 1853 (1855) 156=confertus.
Blanckeanus, Desv. ex Boiss. FL Orient v. 371" glaber.
blandus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 86.—Afr. austr.
blepkaroleptos, Steud. Syn. PI. Cyp. 28 = Scirpus cnbensis.
blysmoides, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 102.—Abyss.
Boehmii, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 498.—Afr. trop.
Boivini, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 481 (Pycrei sp.).—Madag.; Ins. Borbon.
borbonicus, Steud. Syn. PI. Cyp. 81=articulatus.
Boucheanus, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 816 (cult.).—Hab. J
Bowmanni, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, vii. 287 (Marisci sp.).—Austral.
brachiatus, Poir. Encyc. vii. 259 =compressus.
brachyphyllus, Sp. Link, Jahrb. i. III. 82-amabilis.
brachystachys, Anderss. Galapag. Oarnes Veg. 63-1. f. 2—Mariscus brachystachys.
brachystachys, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 310=digitatus.
brachystachys, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 15 •" longus.
bracteatus, Hort. Bonn, ex Steud. Syn. PI. Cyp. Zollingeri.
bracteiferus, Steud. 1. c. 28—Mariscus flavus.
bracteolatus, Salzm. ex Steud. 1. c. = Mariscus flavus.
bracteolatus, Steud. 1. c. 49 (Marisci sp.) =*ferax-*
bracteosus, *Kunte, ex C. Gay, Fl. Chil.* vi. Chili.
Braunii, *Vatke, Ind. Sem. Hort. Berol. App.* (1872)
Bratas, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 569, =reflexus.
breviculmis, R. Br. Prod. 214-trinervis.
breviculmis, F. Muell. Fragm. viii. 267=pumilus.
brevifiorus, A. Dietr. Sp. PI. ii. 316 = minutiflorus.
brevi/olius, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt 21* Kyllinga brevifolia.
breviradiatus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. "• (1851) 214 = Mariscus flabelliformis.
brevis, *Boeck. in Linnaea*, xxxvi. (1869-70) »«• Afr. austr.
brevispicatus, Boeck. in Flora, xlii. (1859) **' (Marisci sp.).—Hab.?
brizaemorphus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 5.—Bras.
briiaeus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 51 = Pycreus polystachyus.
brizaeus, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. u* (1792) 106.—Ind. occ.
briMoeus, Salan. ex Steud. Syn. PI. Cyp. morphus.
briiaeus, Vahl, Enum. ii. 316 (Marisci sp.).—Ind-

bromoides. Link, Jahrb. i. HI. 85 = Pycreus angulatus.

CTPEKUS :—
Brownei, Roem. & Schnlt. Syst. ii. 228=aristatus.
brunneo-atei, *Boeck. in Engl. Boi. Jahrb.* v. (1881) 498. —Madag.
irunneus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 565 (Marisd up.) =*purpurascens.*
irunneus, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 116 (Marisd sp.).—Ind. occ.
Bubani, Nym. Consp. 760 = Pycreus capillaris.
bufonius, Maack, ex Trantv. in Act. Hort Petrop. Ix. J1884) 289-Juncus bufonius.
amensis, *Steitd. Syn. PL Cyp.* 19.—Afr. trap.
bulbiferus, A. Dieti. Sp. PI. ii. 324 - bulbosus.
bulbillosus, Brot. ex Heynh. Norn. ii. 181, nomen-rotundus.
bulbocaulis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 372 = Mariscus bulbocaulis.
bulboso^toloni/ere, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 260, 569 =rotundus.
bulboso-stolonifere, Steud. Syn. PI. Cyp. 18 - stoloniferus.
bulbosus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 800-bnlbosus, usitatus, blysmoides.
bulbosus, Lag. Gen. et Sp. NOT. 2 -congestus.
bulbosus, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 24 = Martianns.
bulbosus, *Vakl, Enum.* ii. 842.—Afr.; Ind. or.
Bunhelli, Schrad, Anal. Fl. Cap. Cyp. 11-textilis.
caducus, Steud. Syn. PI. Cyp. 315 = Martianns.
caesius, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 831.— Venezuela.
caespitosus, *Llanos, Fragm.* 14.—Ins. Philipp.
caespitosus, Poir. Encyc. vii. 250—Pycreus polysUchyus.
caespitosus, St. Hil. Voy. Diam. II. 890 (Pycrei sp.) = *Hilairenus.*
caner, *Bertol.f. in Mem. Acad. Sc. Bolog.* v. (1854) 464. —Afr. austr. J
calacaryensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 34.—Ins. Luzon,
alulus, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitsehr.* xiv. (1864) 84. —Enrop.
•alifornicus, 5. *Wats. Bot. Calif,* ii. 216.—Calif.
caUophoros, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 82.— Guiana.
<»Uistus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) »8.—Afr. trop.
calopterus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 282 (Marisd sp.) = *ferax.*
c<"npestris, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 86 =radiatus.
c<"»phoratus, Iiebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1861) 216 (Marisd sp.)-strigosns.
'"naliculatus, Retz. Obs. vi. 20~ exaltatns.
wnariensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 42.—Ins. Canar.
"ancellatus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. U. ii. (1884) 131.—Afr. trop.
canescens, Vahl, Enum. ii. 855 =• Mariscus albescens.
«nus, *J. &• c. Presl, Set. Haent.* i. 170..—Mexic.
caPensis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 878 = Mariscus capensis.
"ptllaris, [Hochst] Steud. Syn. PI. Cyp. 1 (Pycrei sp.) *"^traminee.*
c«ptllaris, Koen. ex Roxb. FL Ind. i. 194=Pycreus •apillaris.
caP»lifolius, A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 476 (Pycrei sP0—Abyss.
capitatus, Bunn. f. Fl. Ind. 21 - aristatus.
<*pitatus, Poir. Encyc. vii. 246=Mariscus Dregeanus.
Status, *Set,. Obs.* iv. 9.—Madag.
'"Pttatus, Retz. 1. c. - Fimbristylis barbata.
Cafrtatus, Vand. Fasc. PI. 6=aegyptiacus.
CaP>tellaius, Schnlt Mant. U. 101=Mariscus Dregeanus.
Capi- SteOi *SjtL* P1 Cyp- M_MarisclB appendica-
lat *Oi*
ca ? & « » « i , Kunth, Enum. PI. ii. 86=Mariscus nibeUiformis.
e<^ibaeus, Pers. Syn. i. 65 - Fimbristylis monostachya.
c«ncifolius, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 99 = Manses. albescens.
carlcyor, F* MneU" Fra mt T> 9a = Mariicns
carici'orms.
^ricinus, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* S9.-Nepal.
car,"""« • Benth. Fl. AustraL vii. 274-fulvus, dactywtes, sexfloms, subulatus.
r^ntti , if! *Br. Prod.* 216.—Austral.
-?"'«". Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 72 = Bongestus.

CTPEEU8 :—
carnosus, Heyne, in Wall. Cat. n. 3856 A = procerns.
castaneus, Bigel. Fl. Bost. ed. III. 19=*diandre,* Torr.
castaneus, Hochst. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 261 = cuspidatus.
castaneus, *Willd. Sp. PI.* i. 278.—As. trop.; Austral.
caucasicus, Auct ex Link, Jabrb. i. III. 89=glaber.
cayennensis, link, L c. 84 = C. Haspan.
cephalanthus, *Torr. &* Hook, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1886) 431.—Texas.
cephalophorus, J. Sc C. Presl, Rel. Haenk. i. 170 (Marisd sp.) =/*erax.*
cephalostaehyus, Steud. Syn. PL Cyp. 816 =• crassipes.
Cephalotes, Bosc, ex Kunth, Enum. Fl. iL 96=Mariscus glomeratus.
Cephalotes, *Vakl, Enum.* ii. 311.—As. et Austral. trop.
chalannthus, *J. tf C. Presl, Rel. Haenk.* i. 177. t. 32.—Am. austr.
Chamissoi, *Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 33.—Bras.
chilensis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 323 (Marisd *Sf>.)i Conceptionis.*
chlorostachys, *Boeck. in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 540.—Afr. trop.
chromatolepis, Steud. Syn. PI. Cyp. 82=sphacelatus.
chrysanthus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 476 (Pycrei sp.).—Afr. austr.
chrysokerkos, Steud. Syn. PI. Cyp. 816, sphalm.= erythrorhizos.
chrysomelinus, Link, Hort. Berol. iL 805 - C . Iria.
chrysostachys, *Boeck. in Flora,* xlii. (1859) 438 [bis].— Am. bor.
dliatus, *Jungh. in Linnaea,* vi. (1831) 25.—Mexic.
dmicinus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 166 (Pycrei sp.).—Am. trop.
cinnamomeus, Retz. Obs. iv. 10=glomeratns.
clandestine, Steud. in Flora, xxv. (1842) 694 = Ficinia clandestina.
Cleaverii, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 258 = Pycreus polystachyus.
coercens, Reichb. ex Kunth, Enum. PI. ii. 20 = amabilis.
cognatus, *Kunth, 1. c.* 62.—Afr. austr.
colchicus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 623-Pycreus capillaris.
collinus, Vahl, Enum. ii. 301—striatus.
coloratus, Vahl, 1. c. 812-Mariscus coloratus.
colymbetes, Kotschy & Peyr. PI. Tinn. 49. t 24__ Afr. trop.
commutatus, Steud. Syn. PL Cyp. 10—pumilus.
comosus, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 185.—Am. austr.
comosus, Sibth. *Sc* Sm. *tl* Graec. i. 31. t. 44 = rotundus.
comosus, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 467 =• longus,
compactus, Lam. Tabl. Encyc. i. 144 = obtnsiflorus.
compactus, Retz. Obs. v. 10 = Mariscus microcephalus.
complanatus, Fonk. Fl. Aegypt. Arab. 14-diffonnis.
complanatus, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 271 = Pycreus capillaris.
complanatus, Willd. Sp. PL i. 270 =Fimbristylis complanata.
compositus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 388 (Marisd sp.) - *Gunnii.*
compositus, R. Br. Prod. 217 = alopecuroides.
compressus, Jacq. Hort. Vindob. iii. 10.112=vegetus.
compressus, Krock. Fl. Sil. i. 64 = mscus.
compressus, *Linn. Sp. PI.* 46.—Cosmop. trop.
compressus, Muhl. Desc. Gram. 15 (Pycrei sp.).—Am. bor.
compressus, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 271=surinamensis.
compressus, Thw. Enum. PL ZeyL 842, partim - Zollingeri.
Conceptions, Steud. Syn. Fl. Cyp. 42 (Marisd ep.).— Chili.
concinnus, R. Br. Prod. 214.—Austral.
concolor, Steud. Syn. PI. Cyp. 6 (Pycrei sp.) = *C. Eragrostis,* Vahl.
con/ertiftorus, Schult. Mant. ii. 181-radiatus.
confertus, Lam. Tabl. Encyc i. 146-Pycreus capillaris.
confertus, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 20.—Am. trop.
congestus, Poir. Encyc. vii 239 = Mariscus microcephalus.
congestus, *Vahl, Enum.* it 860.—Geront trop.

CYPEBUS :—
conglobatus, Link, Jahrb. i. III. 87 (Marisd sp.)-*firax.*
conglomerate, Coss. Expl. Alger. Bot. iU. 243 - Aucheri.
conglomerate, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 16=pungen».
conglomerate, Hochst ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 522=proteinolepis.
conglomeratus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 21; *Prog.* 17. —Geront trop.
conglomeratus, Thw. Enum. PL Zeyl. 343=pachyrrhizus.
conglomeratus, Vahl, Enum. ii. 884=Pycreus capillaris.
conglomerate, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 5 = compressus.
conicus, Benth. Fl. AustraL vii. 290, partim-Mariscus albescens.
conicus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 371 (Marisd sp.).—Austral.
conjuncte, Steud. Syn. PL Cyp. 18-stoloniferus.
conoidee, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat Par. i. (1792) 106=C. Luzulae.
consanguineus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 42.—Bras,
consodus, *Steud. ex Jard. in Mlm. Soc. Sc. Nat. Cherb.* v. (1857) 299, nomen.—Ins. Marquesas.
conspicue, Steud. Syn. PL Cyp. 39 = giganteus.
contracte, Steud. 1. c. 18=cuspidatus.
convallium, *Steud. 1. c.* 6.—Bras.
coriacee, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 42 =Mariscus rufus.
coriifolie, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 391 = Mariscus latifolius.
cornute, Anderss. Galapag. Oarnes Veg. 53 - Mariscus comutus.
coromandeline, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 480 (Pycrei sp.) = stramineus.
coromandelinus, Sprang. Syst i. 217—rubicundus.
coronarius, *Kunth, Enum. PI.* ii. 44.—Ind. or.
correctus, Steud. Syn. PI. Cyp. 7 -Pycreus propinquns.
corticalis, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 171.—Cuba.
corymbose, Heyne, in Wall. Cat. n. 8S52=tegetum.
corymbosus, *Hook. f. Fl. Tasm. Praef.* 47.—Afr.; Austral,
corymbosus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 42; *Prog.* 19.— Geront. trop.
corymbosus, Roxb. ex C. B. Clarke, in Journ. linn. Soc. xxi. (1884) 61=Pycreus polystachyus.
corymbose, Steud. in Flora, xii. (1829) 168-sphaerospermus.
cossyrensis, Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 779 = laevigatus.
crassipes, *Vahl, Enum,* ii. 299.—Afr. trop.
crinite, Poir. in Lam. Encyc vi. 762 (lapsu-Sdrpusf) «= Ficinia filiformis.
crinite, Spreng. in Flora, xii. (1829) I. Bdbl. 5 (err. typ. pro 'cruentus')—semitriftdus.
croceus, *Vahl, Enum.* ii. 867.—Porto Rico.
cruci/ormis, Boeck. in linnaea, xxxv. (1867-68) 672 = vaginatus.
entente, Baker, FI. Maurit. 408-Pycreus Mundtii.
cruentus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 838 = Mariscus Diegeanus.
entente, Retz. Obs. v. 18 (Pycrd sp.) = C. *Eragrostis,* Vahl.
entente, Rottb. Desc. Nov. PI. 21; Prog. 17 = conglomeratus.
cuadriflore, Llanos, Fragm. 18-Mariscus microcephalus.
cuanMensis, Ridl. in Trans. Linn. Soc Ser. II. ii. (1884) 128 (Pycrei sp.).—Afr. trop.
cubane, Iiebm. in Vidensk. Selsk. Ski. V. Ii. (1851) 222 (Marisd sp.) =*ferax.*
cubensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 42.—Cuba.
Cumingii, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 284 - xanthostachyus.
cupree, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 172 = erythrorhizos.
curtate, Vahl, Enum. ii. 838=Pycreus capillaris.
curvifolius, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 138.—Rec. Argent
cumulus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 541 = conglomeratus.
cuspidatus, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 204.— Cosmop. trop.
cyclostachye, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 567-Mariscus echinatus.

CYTEHTJS:—
cylindricus, *Boeck. in Flora,* xlii. (1859) 487 [bis].—Ind. or.
cylindrical, Britton, in Bull. Torrey Club, vii. (1880) 48. t. 3. f. 2 = Mariscns cylindricns.
cylindricus, *Chapm. in Coult. Bot. Gat.* iii. (1877) 18.—Am. bor.
cylindrostachys, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 888 -> flavns, Haenkei, macer, philippenais, Sieberianus.
cymbaeformis, *Liebm. in Videnst. Selsi. Skr.* V. ii. (1851) 208.—N. Granat.
cymnlosus, *Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 7.—Ins. Maurit.
cyrtolepis, *Torr. V Hook, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1880) 486.—Am. bor.
cyrtostackys, C. B. Clarke, in Jonrn. linn. Soc. xxi. (1884) 59 (Pycrei sp.)-C. *Eragrostis.*
dactyliformis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 829 (Marisci sp.).—Afr. acstr.
dactylotes, *Bentk. Fl. Austral,* vii. 278.—Austral.
damiettensis, A. Dietr. Sp. PI. ii. 269 = esculentus.
daphaenus, Ridl. in Journ. Bot. xxii. (1884) 16 = Mariscus Dregeanus.
debilis, *R. Br. Prod.* 213.—Austral,
deciduns, *Boeck. in Flora,* lxît. (1879) 547.—Afr.; Austral.
Deckenii, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 361.—Afr. trop.
declinatus, Moench, Meth. 817=vegetns.
decomposites, F. Muell. Fragm. viii. 267=Mariscus decompositus.
dehiscent, Kunth, Enum. PI. ii. 56 = tegetum.
Delesserianus, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 363-Meyerianus.
delicatulatus. Stead. Syn. PI. Cyp. 21 = flavidus.
densiflorus, Link, Jahrb. i. III. 88 - radiatus.
densiflorus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 34 (Marisci sp.) =*ferax.*
densiflorus, Reichb. ex Kunth, Enum. PL ii. 65 = giganteus.
densifolius, Kunth, Enum. PI. ii. 114=Pycreus densifolius.
densifolius, Stend. Syn. PI. Cyp. 6-Pycreus Mundtii.
densus, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxii=conglomerates.
densus. Link, Jahrb. i. III. 83 (Pycrei *tp.)* ^*Humboldtianus.*
dentate*, *Torr. Fl. U. St.* L 61.—Am. bor.
denticulatus, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 104 = surinamensis.
denudatus, Heyne, in Wall. Cat n. 3349=stenostachyus.
denudatus, *Linn./. Suppl.* 88.—Aff. austr.; Madag.
depauperatus, Steud. Syn. PI. Cyp. 34-flabelliformis.
depauperatus,\ah\, Enum. ii. 305 = Eleocharissetacea.
derreilema, *Steud. in Flora,* xxv. (1842) 585.—Abyss.
Dianae, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 28.—Tns. S. Helena.
diandrus, Bivona, Piant Ined. 3; ex Parl. Fl. Ital. ii. 28=fuscus.
diandrus, Torr. Cat. PI. N. York, 89 (Pycrei sp.).—Am. bor.
diaphaniria, Steud. Syn. PI. Cyp. 23 = C Iria.
diapbanus, *Schrad. ex Schult. Mant.* ii. 477.—Ind. or.
dichromenaeformis, *Kunth, Enum. PI.* ii, 26.—Bras,
dichrostachyus, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 21, nomen.—Abyss.
Dietrichiae, Boeck. in Flora, lviii. (1876) 87 (Marisci sp.).—Austral.
difformis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 32 = procerus.
difformis. *Linn. Cent. PI.* ii. 6; *Amocn. Acad.* iv. 802.—Geront. trop.
diffiusus, Roxb. Hort. Beng.^81]; Fl. Ind. i. 189-Scirpus Michelianus.
diffusus, *Vahl, Enum.* ii. 321.—Reg. trop.
digitatus, Nees, in Wight, Contrib. 85 = radiatus.
digitatus, *Roxb. Hort. Beng.* [81]; *Fl. Ind.* 1. 205.—Asia; America.
digitatus, Wall, ex C. B. Clarke, in Joura. Linn. Soc. xxi. (1814) 125-diffusus.
dilatatus, *Schum. in Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 88.—Afr. trop.
dilutus, Vahl, Enum. ii. 857 = Mariscus microcephalns.
diluvialis, Schult Mant. ii. 124 (Pycrei *sp.)* •= *puncticulatus.*
diphyllus, Benth. Fl. Austral, vii. 279 - articulates, dactylotes.
diphyllus, Retz. Obs. v. 11-corymbosus.

CYPEB.US:—
dipsaceus, liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 219 (Marisci sp.).—Mexic.
discigerus, *Liebm. 1. c.* 212.—Mexic.
dissitiflorus, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1858 (1855) 168 = confertus.
dissitiflorus, Hort. Vrat. ex Nees, in Linnaea, ix. (1834) 285 ; Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 266 (Marisci sp.).—Am. bor.
dissolutus, *Link, Jahrb.* i. III. 87.—Am. trop.
distachyos, All. Auct. Fl. Pedem. 48. t. 2. f. 5=laevigatus.
distans, Beyr. ex Kunth, Enum. PI. ii. 14=Pycreus polystachyus.
distans, *Linn.f. Suppl.* 103.—Cosmop. trop.
distans, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 85 (Marisci sp.) *=*ferax.*
distans, Pursh, Fl. Am. Sept. 63 (Marisci sp.) = *strigosus.*
distichophyllus, Steud. in Flora, xxv. (1842) 582 = Pycreus Mundtii.
distinctus, Steud. Syn. PI. Cyp. 24-- Drummondii.
diurensis, Boeck. in Flora, lxil. (1879) 656 (Marisci sp.).—Afr. trop.
divaricatus, Lam. Tabl. Encyc. i. 145 = Pycreus capillaris.
diver gens, Benth. PI. Hartw. 28—seslerioides.
divergens, Chapm. Fl. S. U. St. 512 (Pycrei sp.) = leucolepis.
divergens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 208 (Marisci *sp.)=Manimae.*
dives, Delile, FL Egypte, 149 = alopecuroides, exaltatus.
dives, Fenzl.ex Steud. Syn. PI. Cyp. 86 = radiatus.
divulsus, Ridl. in Joum. Bot. xxii. (1884) 15 (Pycrei sp.).—Madag.
Donianus, A. Dietr. Sp. PI. ii. 290=pilosus.
Dregeanus, Kunth, Ennm. PL ii. 31 = pulcher.
Drummondii, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 314-erythrorhizos.
Drummondii, *Torr. br Hook, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 437.—Texas.
dubius, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 282 = Mariscus coloratus, Schimpefi.
dubius, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 20. t. 4. f. 6.—Geront. trop.
dubius, Roxb. H. Ind. i. 188=Mariscus Dregeanus.
Duchaisingii, Steud. Syn. PI. Cyp. 45=sphacelates.
durus,Kunth, Enum. PL ii. 76 (Marisci sp.).—Afr.austr.
eburneus, Thonn. ex Kunth, Ennm. PL 46 =• margaritaceus.
Ecklonii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 825 = Mariscus humilis.
effusus, Dalz. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 109 = Atkinson!.
effusus, Rottb. Desc. et Ic 22.1.12. f. 8; Prog. 16 = conglomerates.
egregius, Kunth, Enum. PL ii. 69 = fastigiatus.
Ebrenbergianus, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 391.—Mexic.
Ehrenbergii, Kunth, Enum. PL ii. 89 (Marisci sp.) =-*ferax.*
elatior, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) S27 (Marisci sp.).—Afr. austr.
elatior, *Boeck. in Flora,* lxii. (1879) 658.—Afr. trop.
elatus, Griseb. FL Brit. W. Ind. 566=giganteus, comosus.
elatus, Jacq. Cat. Sem. Hort. Vindob. (1826), ex Linnaea, xi. (1837) Litt 87=nutans.
elatus, *Linn. Cent.* ii. 6; *Amoen. Acad.* iv. 801.—Ind. or.; Malaya.
elatus, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 285 = anricomus.
elatus, Rottb. Desc. et Ic. 37.1.10=distans.
elatus, Roxb. Hort Beng. 6; Fl. Ind. i. 204=platyphyllus.
elegans, Ktnth, Enum. PI. ii. 28-diffusus.
elegans, *Linn. Sp. PI.* 45.—America.
elegans, Schrad. ex Kunth, Enum. PL ii. 88 = Mariscus Meyenianus.
elegans, Schreb. ex Schult. Mant. il. 122—virens.
elegans, Walt FL Carol. 70 (Pycrei sp.) = flavicomus.
elegantulus, Steud. in Flora, xxv. (1842) 683 (Pycrei sp.) = *atronitens.*
eleusinoides, *Kunth, Enum. PI.* ii. 39.—Geront trop.
Elliotianus, Schult. Mant. ii. 100=Pycreus propinquus.
elongatus, Hochst ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. XXL (1884) 160=Schimperianns.
elongatus, Lej. ex Nees, in Linnaea, ix. (1834) 286-longus.
elongatus, Sieber, ex Kunth, Enum. PL il. 69 - rotunda*.

CTPEKTTS :—
elongatus, Steud. Syn. PL Cyp. 11=Pycreus polystachyus.
elytropiptos, *Steud. I. c.* 27.—Hab. t
emarginatus, Schrad. Anal.Fl. Cap. Cyp. 5 = longus.
eminent, Klein, ex Kunth, Enum. PL ii. 70=platyphyllus.
enervis, *R. Br. Prod.* 213.—Austral.
Engelmanni, Steud. Syn. PL Cyp. 47 (Marisci sp.).—Am. bor*
enodis, Boeck. in Linnaea, xxxvi (1869-70) 271[s] corymbosus.
ensifolius, *Nees if Ehrenb. ex Boeek. in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 545.—Arab.
Enslenii, Pursh, FL Am. Sept. i. 58 (Marisci *sp.)" strigosus.*
entrerianus, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 139.—Uruguay.
Eragrostis, Clem, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 137 = Pycreus Mundtii.
Eragrostis, Krauss, in Flora, xxviii. (1846) 764 (PycrM sp.) = lanceolatus.
Eragrostis, Lam. Tabl. Encyc i. 196 = vegetus.
Eragrostis, Rottb. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 48 = Pycreus capillaris.
Eragrostis, Vahl, Enum. ii. 822 (Pycrei sp.).—Geront. trop.
Eragrostis, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 50 = stoloniferus.
eriophorus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 50.— China.
erubescens, Link, Enum. Hort. Berol. i. 44=glaber.
erythraeus, Schrad. ex Schutt Mant. ii. 477 = glaber.
erythrorhizos, *Muhl. Desc. Gram.* 20.—Am. bor.
erythrorhitus, Torr. FL U. St. i. 61 (.Marisd sp-) —*Michauxianus.*
esculentus, Gouan, Fl. Monsp. 389=rotundas,
esculentus, *Linn. Sp. PI.* 46.—Cosmop. trop.
esculentus, Vahl, ex Kunth, Enum. PL ii. 60=longus-
etesios, Schult Mant. ii. 114 = Mariscus glomeratus.
eumorphus, Steud. Syn. PL Cyp. 22 = pulcherrimus.
eurystachys, Ridl. in Trans. Linn. Soc.Ser. II. ii. (1884) 143 (Marisci sp.).—Afr. trop.
evaginatus, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 351—Florida.
exaltatus, *Rett. Obs.* v. 11.—As. et Austral, trap.
exaltatus, Soland. ex Kunth, Enum. PL ii. 90 (Marisci [s]P0 = *ferax.*
exaltatus, Strachey, Cat Kumaon PL 74=nutans.
exciBus, *Boeck. in Linnaea,* xxxv. (1867-68; 628.—*" trop.
exiguus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 284 = cuspidato>-
exitts, *Willd. ex Kunth, Enum. PI.* ii. 60.—Ins. Mascar. Madag.
expansus, Boj. Hort. Maurit. 880=Pycreus albo-m»[r] ginatas.
expansus, *Pair. Encyc.* vii. 269.—Madag.
falcatus, Ehrenb. ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-0" J 647 = conglomerates.
falciculosus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. «• (1851) 204=aristatus.
familiaris, *Steud. Syn. PL Cyp.* 46.—Cuba.
/<««V»/an*,DC.FL Fr. iii. 722=Pycreus capiU"'5-
fascicularis, Phil, ex Kunth, Enum. PL ii. 25 -gl»b«j
fascicularis, Poir. Voy. Barb. ii. 88 = Pycreus *V»\r* stachyus.
fasciculatus, Ell. Sketch, i. 63 = Pycreus propinqun*.
fastigiatus, Forsk. FL Aegypt. Arab. 14 = exaltatus.
fastigiatus, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 3446-eleusinoides.
fastigiatus, *Rottb. Desc. Nov. PL* 31; *Prog.* 18.—*"" Austral.
fastigiatus, Vahl, Enum. ii. 867 «• platyphyllus.
fastigiatus, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 60=long[08] tegetum.
fastigiosus, J. F. Gmel. Syst. 134 = fastigiatus.
fastuosus, Desv. ex Ham. Prod. PL Ind. Occ. » (Marisci sp.) =*ferax.*
Fendlerianus, *Boeek. in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 6^-—Mexic.
Feraelianus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 33.—Afr. trop.
ferax, Benth. FL Austral, vii. 286=subulatus, baen» **todes.**
ferax **J Rich.** in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 1[08] (Marisci sp.).—Cosmop. trop.
femambucensis, Steud. Syn. PL Cyp. 42, »pn»[fBI]-" pemambucensis.
Urnandeaianus, Colla, in Mem. Ace. Tor. *» (1886)21. t 56=reflexns.
ferox, Vahl, Enum. tt. 357 (Marisci sp.)=/i»a*-

CYPEHTTS:—
ferruginescens, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) S96 (Marisci sp.) — *Michauxianus.*
ferrugineus, Forak. FL Aegypt. Arab. 14 = fuscus.
ferrugineus. Linn. Sp. PI. 44 = Dulichinm spathacenm.
ferrugineus, Poir. Encye. vii. 261— Pycreus polystachyus.
fertilfe, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 80.— Afr. trop.
festivus, Link, Jahrb. i. ill. 88=exaltatus.
fieldingii, Stend. Syn. PI. Cyp. 11-flavidus.
filicinus, Nees, ex Stead. Syn. PI. Cyp. 14 - acuminatus.
filicinus, Vahl, Ennm. ii. 332 = Pycreus polystachyus.
nliculmis, *A. Rich. Ft. Cub. Fanerog.* ii. 285.—Cuts.
filiculmis, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 40 = Mariscus filiformis.
filiculmis, Vahl, Enum. ii. 828 = Mariscus glomeratns.
filifolius, Willd. ex Kuntb, Ennui. PI. ii. 86 = Mariscus filiformis.
filiformis, Sw. Prod. Veg. Ind. Oec. 20-Mariscus havanensis.
filipes, *Benth. Fl. Austral,* vii. 271.—Anstral.
fimbriatus, Nees, in Wight, Contrib. 86 = pilosus.
firmus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 171 = Mariscus albescens.
"schcrianus, *Schimp. ex Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I, *Intell.* 2],nomen ; *etin A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* u. 488.—Abyss.
fissus, *Steud. in Flora,* xxv. (1842) 593.—Abyss.
fistulosus, Ehrenb. ex Boeck. in Linn...., xxxvi. (1869-70)275-articulatus.
fiobellaris, Schrad. ex Nees, 1. c. vii. (18S2) 519 = festigiatus.
nabelliformis, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 42; *Prog.* 22.— Arabia; Abyss.
flaccidus, R. Br. Prod. 218 - trinervis.
fi"gellatus, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 21 = nabelliformis.
flavamariscus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 687-Mariscus navus.
flavens, Pall. Tabl. Taur. 45 = Pycreus flavescens.
fiavescens, Linn. Sp. PI. 46-Pycreus flavescens.
flavescens, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) - 164 (Pycrei *sp.)=Af*elii.*
flmescens, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 2'l^articulatus.
flavescens, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 226 = Fimbristylis dichotoma.
J"nico$_{muSi}$ B , ^ $_{ex\ Kunthj}$ Ennm. $_{PL\ u}$ .92 (Marisci - *P0 =*ferax.*
ftemcomus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 27 (Marisci sp.) = - 'irigosus.
Jla^*omus,* Pnrsh. Fl. Am. Sept i. 53. (Marisci sp.) = - *M'chauxianus.*
"ancomus, *Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) 24.—Vera-Crux.
flavicomus, Torr. Bot. Mex. Bound. 226 = Pycreus albo-marginatus.
flancotnus, Vahl, Enum. ii. 360 (Pycrei sp.).—Am. bor. « anstr.
flav A!? $_{"1"\,"\,Wil\,M}$ - « Kunth, Enum. PL ii. 14 = Pycreus Polystachyus.
•OTf"«,Boj. Hort. Maurit 380=Pycreus polystachyus.
flavi $_{(vic\,Jus>}$ *gtfih* $_{Qbs_\ y_\ 1}$ J.—Geronti trop.
flavi<<w, Vahl, Enum. ii. 324 = Pycreus capillaris.
flavi....—Schrad. in Goett. Gel. An*z.* ~~(1841)~~ III. 7-obtusinonis.
flavissi $_{"\,"\,"1}$ Steud. in Flora, xii. (1829) 158 = denudatus.
•*"!".. Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 884 = "80 "5flavu
Sir «- PTOpinqnus P^{1*81} Rd $_{Haent}$ •• 176=Pycreus
Voli$_{us>}$ Boeck. in Flora, Mi. (187») 549=Mariseus airosanguineus.
flex ^{su} GliSeb, FL Bflt W,, Ind. 566 (Marisci sp.) = *Sk«?,
flexuosus. Vahl, Enum. ii. 359. (Marisci sp.) =/«•«*.
fluita «i,Buch..Ham. ex C. B. Clarke, in jiura. Linn. Soc. xxi. (1884) 118 =
fluminalis, Rkll. in Tran Sel. II. ii. (1884) 127. (Pycrei sp.)•—Afr. trop.
foliosus, Willd. ex Kunth, Enum* PL ii. ll^Pycieus
/o»«S?ri,; Kllatn, L <> B-Pycrens flavescens.
•»•«<*», Kunth, 1. c. 36-iJrginatu,.

CYPERTTS:—
formosus, Vahl, Ennm. ii. 327 = snrinamensis.
Forskolei, A. Dietr. Sp. PI. ii. 251-fuscns.
Fortunei, Stend. Syn. PI. Cyp. 21=malaccensis.
fossarum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1861) 225 (Marisci sp.) **ferax.*
fossarum, *Schlecht. in Linnaea,* xxxi. (1861-62) 816.— Guiana.
fragilis. Llebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 236 (Marisci sp.) =*ferax.*
fratemus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 42.—Bras.
fraternus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 19 •> reflexus.
Fresenii, *Steud. Norn.* ed. II. i. 469.—Abyss,
fucatns, *Boeck. in Flora,* Ixv. (1882) 13.—Afr. trop.
fugax, Liebm. in Vidensk. SelsJc. Skr. V. ii. (1831) 196 = Pycreus polystachyus.
fuligineus, Chapm. Fl. S. Un. St. 511 (Marisci sp.).— Am. bor.
fulvescens, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 210 = escutentus.
fulvus, *R. Br. Prod.* 215.—Austral.
fulvus, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Str. II. ii. (1884) 126 (Pycrei sp.).—Afr. trop.
fuscescens, *Link, Jahrb.* i. III. 83.—Am. anstr.
fuscus, *Linn. Sp. PI.* 46.—Europ.; Oriens.
galegensis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 285.—Ins. Galega.
gangeticus, Koxb. ex WalL Cat. sub n. 3351 = malaccensis.
Gardner!, Baker, Fl. Maurit. 41S = Bakeri.
Gardner!, *Nees, in Mart. Ft. Bras.* ii. I. 34.—Am. trap.
Gatesii, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 255-Pycreus polystachyus.
geminatus, Koen. ex Ainslie, Mat. Med. Hind. 250= bulbosus.
geminatus, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 96=- Fimbristylis bahiensis.
giganteus, Griseb. Cat. PI. Cub. 288 = digitatus.
giganteus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 85-comosus.
giganteus, *Noronha, ex Thou. Prod. Phyt.* 2, *in Mllang.* (1811) nomen.—Madag.
giganteus, *Rottb. ex Kunth, Enum. PI.* ii. 65 Jamaica.
giganteus, *Vahl, Enum. PI.* ii. 364.—Am. trop.
Gilesii, *Benth. Fl. Austral,* vii. 274.—Austral.
Ginge, *Wel-m. Apont.* 586.—Afr. trop.
glaber, Hoppe, in Sturm, Fl. Deutschl. Heft Iii = fuscus.
glaber, *Linn. Mant.* ii. 179.—Europ.; Oriens.
glaber, Pourr. ex Willk. *Be* Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 188 = vegetus.
glaber, Thon. ex Kunth, Enum. PI. ii. 12 = Pycreus polystachyus.
glaber, Vill. Hist. PL Dauph. ii. 182 = Monti.
glandulosus, Rolfe, in Journ. Bot. xx. (1882) 862 = Mariscus rufus.
glareosus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 204-amabilis.
glaudnus, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 89-Mariscus conicus.
glaucus, Steud. Syn. PI. Cyp. 42. (Marisci sp.) = *briBaeus.*
glaucus, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 20 = alope. curoides.
Glaziovianus, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 128 ; *et in Linnaea,* xxxviii. (1874) 365.—Bras.
globosus, All. Auct. Fl. Pedem. 49-Pycreus capillaris.
globosus, Baldw. ex Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 270 = Mariscus glomeratus.
globosus, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 546=Pycreus polystachyus.
globosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 18 - cruentus.
globuliferus, Link, Jahrb. i. ill. 89-Luzulae.
globuliferus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 165 = Androtrichum polycephalum.
globulosus, Aubl. PI. Gui. i. 47 = Mariscus glomeratus ?
glomeratus, Klein, ex Kuntb, Enum. PI. ii. 127*-Courtoisia cyperoides.
glomeratns, *Linn. Cent. PI.* ii 5; *Amoen. Acad.* iv. 301.—Europ.; As. temp.
glomeratus, Roxb. ex Am. in Wight, Contrib. 85 = digitatus.
glomeratus, Walt. Fl. Carol. 70-virens.
glomeratus, WHld. Sp. PI. L 277 (syn. Linn, exel.)-alopecuroides.
glomuliferus, Schrad. ex Schult Mant. ii. 108 - C. Luzulae.

CYPEH.TJS:—
Goeringii, Stend. Syn. PI. Cyp. 24-difformis.
Grabowskianus, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. r. (1884) 502 = Mariscus microcephalus.
gracilescens, Schult. Mant. ii. 100 — esculentus.
gracilinux, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 162.—Afr. trop.
gracilis, *R. Br. Prod.* 213.—Austral.
gradlis, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. iii. (1871) 210 = vegetus.
gracilis, Link, Jahrb. i. III. 84 = esculentus.
gracilis, Muhl. Desc. Gram. 18 = C. Haspan.
gradatus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 13 -= fiabelliformis.
Graeffei, *Boeck. in Flora,* lviii. (1875) 84.—Ins. Samoa.
gramineus, Roem. & Schnlt. Syst. ii. 205 =* C. Haspan.
gramineus, Steud. Syn. PI. Cyp. 5 (Pycrei sp.)» *grammicus.*
graminicolus, Steud. 1. c. 49 = distans.
graminifMus, Poir. Encyc. vii. 267 = C. Haspan.
grammicus, Kunze, ex Kunth, Enum. PI. it 6 (Pycrei sp.).—Chili.
granadinus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 224. (Marisci sp.) =/«•(«.
grandifolius, *Anders, in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 157—Ins. Galap.
Grantii, *Boeck. in Flora,* lviii. (1875) 260; *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1876) 164.—Afr. trop.
granulatus, Bosc, ex Kunth, Ennm. PI. ii. 96 - Mariscus ovularis, glomeratus.
Grayii, Torr. in Ann. Lye. N. Yotk, iii. (1886) 260 (Marisci sp.).—Am. bor.
Griffithianus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 601 = pilosus.
Griffithii, Steud. Syn. Fl. Cyp. 316-radians.
grossarius, Koen. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (Ifc84) 57-Pycreus sanguinolentus.
guatemalensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 47.—Guatemala.
Gula-Metthi, Schult. Mant. ii. 125 = tegetiformis.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 80. t. 140 (Marisci sp.). —Austral.
Gussonii, Gasp, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 779-Pycreus flavescens.
gymnocaulos, Steud. Syn. PI. Cyp. 12=vaginatns.
gymnoleptus, Steud. 1. c. 8 = Pycreus nitens.
gymnos, Schult. Mant ii. 97 = articulatus.
Ciyraudini, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 28.—Ins. Borbon.
haematodes, EndL Prod. Fl. Norfolk. 22 (Marisci sp.). —Ins. D. Howe et Norfolk.
haematostachys, Steud. Syn. PI. Cyp. 41=reflexns.
Haenkeanus, Kunth, Enum. PL ii. 93 = Mariscus microcephalus.
Haenkei, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 172 (Marisci sp.) *=/erax1*
Hahnianus, Boeck. in Flora, Ixi. (1878) 188 (Pycrei sp.).—Ind. occ
hakonensis, *Franch. V Sav. Enum. PL Jap.* ii. 104. 538.—Japon.
hamatus, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 28 - uncinulatus.
Hamiltonii, Kunth, Enum. PI. ii. 90 (Marisci sp.) = *ferax.*
hamulatus, *Kunth, I. e.* 22.—Ind. occ.
hamulosus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. S6 = Scirpns hanmlosus.
Haspan, Benth. Fl. Austral, vii. 270, partim = pulcherrimus.
Haspan, *Linn. Sp. PI.* 45.—Cosmop. trop.
Haspan, Rottb. Desc. Nov. PI. 36. t. 6 f. 2- fl.ividus.
havanensii, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 84 (Marisci sp.).—Ind. occ.
hawaiensis, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 208 = Mariscus phleoides.
Haworthii.S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Fl. ii. 730 = fuscus.
hebes, Steud. Syn. PI. Cyp. 815 = pilosus.
Heermannxi, Buckl. in Proc. Ac. Sc. Philad. 1862 (1863) 10 = esculentus.
Heldreichianus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 39-longus.
Helferi, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 360.— Burma.
helodes, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 87 = rotundus.
helvus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 197 -= Pycreus propinquus.
hemisphatricus, Boeck. in Flora, xlii. (1859) 486 tcr (err. typ. pro 439 bis) (Marisci sp.).—Afr. trop.
herbicavus, Melliss, S. Helena, 843 — rotundus.
herbivagus, Kunth, Enum. PI. ii. 53 = semitrifidus.

CYPEB.XTS:—
heterocladus, *Baker, in Journ. Linn. Sec.* xx. (1888) 292.—Madag.
heterophyllus, Boeck. in Flora, xlii. (1869) 441 = maritimus.
hexastachyos, Rottb. Desc. Nov. PI. 28—rotundus.
hexastachyos, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 117 - sphacelatus.
hexastachyus, Nees, in Wight, Contrib. 82—bulbosus, ruberosns.
Heyneanus, Boeck. in Flora, xlii. (1859) 440 [bis] = pilosus.
Heynri, Boeck. in Iinnaea, xxxv. (1867-68) 600 = procerus.
Hilairenus, Steud. Syn. PI. Cyp. 29 (Pycrei sp.).—Bras.
Hildebrandtii, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 436 (Marisci sp.) =*hemisphaericus.*
Hildra, Poir. Encyc. vii. 251= rotundas.
Hilgendorfianus, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 501.—Japon.
Hillebrandii, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 436 = Mariscus Kunthianus.
hirsutus, Berg. Desc. PI. Cap. 11 = Fnirena glabra.
kirtus, Thnnb. in Hoffm. Phytogr. Blaett. i. (1803) 6 (quid ?).—Afr. austr.
Hochstetteri, *Nees, ex Krauss, in Flora,* xxix. (1846) 755, in nota=Pycreus albo-marginatus.
holciflorus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 173 = Mariscus albescens.
holophyllus, *Miq. ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Reinw.* 189.—Ins. Celebes.
holoschaenoides, Jan, Cat. PI. Phaen. 75, ex Schult. Mant. ii. 111 = difformis.
Holoschoenus, R. Br. Prod. 215 (Marisci sp.).—Austral.
holosericeus, Link, Hort Berol. i. 317 -Pycreus polystachyus.
homoiiria, Steud. Syn. PI. Cyp. 23=din-usus.
honest us, Kunth, Enum. PI. ii. 74=pilosus.
honolulnensis, *Steud. ex Jard. in Bull. Soc. Linn. Normand.* Sir. II. ix. (1875) 278, 280.—Ins. Sandvic.
Hookeri, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 808=-digitatus.
Hookerianus, Am. ex C. B. Clarke, in Jonm. Linn. Soc. xx. (1883) 280=Pycreus polystachyus.
Hookerianus, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 342=Cephalotes.
horizontalis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 49.—Guiana.
horieontalis, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 5 = Pycrcus capillaris.
Hostmanni, Steud. Syn. PI. Cyp. 26=vegetus.
Hougktonii, Ton. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 277 = Schweinitzii.
haillensis, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. IL ii. (1884) 189.—Afr. trap.
Humboldtianus, Schult Mant. ii. 100 (Pycrei sp.).—Am. austr.
kumifusus, Roxas Clem. Ensay. Vid. 284=Pycreus capillaris.
humilis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 23.—Cuba.
hyalinolepis, Steud. Syn. PI. Cyp. 316 = pygmaeus.
hyalinus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3313 = squarrosus.
kyalinus, Vahl, Enum. ii. 320 = Pycreus pumilus.
Hydra, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 205 = esculentus.
Hydra, Michx. FL Bor. Am. i. 27=rotundus.
hyemalis, Pursh, ex C. *B.* Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxL (1884) 120 = C. Haspan.
hylaeus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser.'IL ii. (1884) 134.—Afr. trop.
ignoratus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 895 (Marisci sp.) =*/erax.*
imbecillis, K. Br. Prod. 218 = trinervis,
imbricatus, Llanos, Fragm. 17 =Mariscuj albescens.
imbricatus, Retz. Obs. v. 12 = platyphyllus.
imbricatus, Vill. ex Roem. & Schult Syst. ii. 208 = glaber.
imtricatus, Willd. ex Kunth, Ennm. PL ii. 20 = alopecuroides.
imerinensis, Boeck. in Engl. Bot Jahrb. v. (1884) 500 *m* madagascariensis.
immensus, *C. B. Clarke, in Joum. Lion. Sac.* xx. (1883) 294.—Madag.
impolitus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 78.—Bras.
imputes, Steud. Syn. PI. Cyp. 45 (Marisci sp.).—Abyss.
inaequalis, Bosc, ex Link, Jahrb. i. III. 84 - C. Haspan.
inaequalis. Link, L c 88 (Marisci sp.) =*Manimae.*

CYPEETJS :—
inaequalis, *Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 6. —Ins. Maurit
incarnatus, Link, Hort. Berol. i. 806 = congestus.
incompletus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 361 'Mariscus Jacquini.
incompletus, Link, Hort Berol. *I* 819 = Mariscus elatus.
incomtus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 39.—Bras.
inconspicuus, Gennari.—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 200 = rotnndns.
inconspicuus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 197 (Pycrei sp.).—Costa Rica.
incrassatus, Beyrich, ex Kunth, Enum. PL ii. 16 = Pycreui polystachyus.
ineurvatio, Roxb. Hort Beng. [5] ; Fl. Ind. i. 196-malaccensis.
incurvus, Sprang, ex Kunth, Enum. PI. ii. 18 — laevigatus.
indecorus, *Kunth, 1. c.* iL 85.—Afr. austr.
indicus, Rich, ex Pen. Syn. i. 66—Fimbristylis monostachya.
infirmus, *Boeck. in Flora,* xlii. (1869) 488 [bis].—Am. bor.
infirmus, Schrad. ex Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 8 = Pycreus propinquus.
inflexus, Muhl. Desc. Gram. 16—aristatus.
infra-apicalis, Nees, ex Aitch. Cat. Punjab PI. 155 = eleusinoides.
infucatus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 871-Mariscus longus, flabellifonnis.
infucatus, Kunth, Enum. PI. ii. 86 = Mariscus longus.
infucatus, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 865-Mariscus filifonnis.
ingratus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 31.—Afr. austr.
inornatus, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 86 (Marisci sp.) = *Gunnii.*
insignis, Kunth, Enum. PI. ii. 92 (Marisci sp.) =/«•«*.
intactus, Vahl, Enum. ii. 832-Pycreus polystachyus.
interceptus, Steud. Syn. PL Cyp. 31=corymbosus.
intermedius, Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 10 = longus.
intermedius, Steud. in Flora, xxv. (1842) 681 (Pycrei sp.) = *lanceolatus.*
intricatus, Kunth, Enum. PL ii. 23=aristatos.
intricatus, *Schrad. ex Schult. Mant.* ii. 98.—Bras.
inundatus, R. Br. Prod. 214'trinervis.
inundatus, Nees, in Wight, Contrib. 76 = Pycreus puncticulatus.
inundatus, *Roxb. Hort. Beng.* 6; *Fl. Ind.* i. 201.—Ind. or.; China.
involucratus, Poir. Encyc. vii. 253=radiatus.
involutes, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. Ixii — proteinolepis.
Iria, *Linn. Sp. PI.* 45.—Geront. trop.
iridifolius, A. Dietr. Sp. PI. ii. 315 = diffusus.
ischnocormus, Steud. Syn. PL Cyp. 11 (Pycrei sp.) = *atronitens.*
ischnos, Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849) 99 (Marisci sp.).—Ind. or.; Am. trop.
ischnostackys, Steud. Syn. PL Cyp. 68 — Mariscus cyperinus.
isocladus, Kunth, Ennm. PL ii. 87=aequalis.
italicus,7W. *Ind. Sent. Hort. PanornU.* 18«1)32.—Hab. ?
Jacquemontii, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 442 (Pycrei sp.).—Ind. occ.
Jacquini, Schrad. in Linnaea, xi. (1837) Litt. 87 = nutans.
jamaicensis, Poir. Encyc. Suppl. v. 166 — Pycreus capillaris.
japonicus, Miq. Ann. Mns. Bot Lugd. Bat. ii. 140 (Pycrei sp.).—Japon.
Jardinei, Steud. Syn. PL Cyp. 28=crassipes.
jemenicus, Bemh. ex Kunth, Enum. PI. ii. 21 — castaneus.
jeminicus, Heyne, ex C. B. Clarke, in Jonm. Linn. Soc. xxi. (1884) 59=Pycreus sanguinolentus.
jeminicus, Retz. Obs. iv. 11 = bulbosus.
jeminicus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 25; *Prog.* 24.—Geront trop.
jubaeflorus, Rudge, PL Gni. 17. t 21 (Marisci sp.)-*ferax.*
junceus, Link, Jahrb. i. III. 86-C. Haspan.
junci/ormis, Desf. Fl. Atlant i. 42-laevigatus.
juncoides, Lam. Tabl. Encyc. i. 147 - C . Haspan.
juncoides, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 77. —Hab. f
jungendus, Steud. Syn. FL Cyp. S - Pycreus capillaris.

CYPEHTJS :—
Jungkuhnii, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 260-Pycreus capillaris.
Kappleri, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 88.—Guiana.
Kegelianus, Steud. I. c. 29=>Remirea maritime.
Kersteinii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 878 (Marisci sp.).—Afr. trop.
Kleinianus, Hochst. ex Steud. Syn. PL Cyp. 71" Curtoisia cyperoides.
Koenigii, Vahl, Enum. ii. 802-corymbosus.
Kotschyanus, Fenzl, ex Steud. Syn. PL Cyp. 86-eleusinoides.
Krameri, Franch. & Sav. Enum. PL Jap. ii. 104, 689 = Textori.
Kraussii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 879-= Mariscus radiatns, Dregeanus.
Kunthianus, H. Mann, in Proc Am. Acad. vii (1867) 208 = Mariscus Kunthianus.
Kunthianus, Nees, in Nov. Act Nat Cur. xix. Suppl-i. (1843) 69 = Mariscus Meyenianus.
Kunthii, Parl. Fl. Ital. ii. 41 = longus.
Kurrii, Steud. Syn. PL Cyp. 38=distans.
Kurzii, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 129.—Ins. Andam.
kyllingaeoides, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 48 - C. Cephalotes.
kyllingioides, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 80=Mfiriscu» glomeratus.
kyllingioides, Sieber, ex Presl, in Oken, Ms, xxi-(1828) 270 = Kyllingia brevifolia.
kyllingioides, Vahl, Enum. ii. 312-Mariscus Dregeanus.
lacteus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 27.—Madag.
lacunosus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 287.—Cuba,
lacustris, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 270.—Chili.
lacustris, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. & = miliifolius.
laetus, *J. b- C. Presl, Rel. Haenk.* i. 172.—Chili.
laevigatus, Koen. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 106 =arenarius.
laevigatus, *Linn. Mant.* ii. 179.—Cosmop. calid.
laevis, *R. Br. Prod.* 218.—AustraL
laevissimus, Steud. Syn. PL Cyp. 82-rotundus.
lagorensis, *Steud. I. c.* 36.—Ins. Philipp.
Lagunetto, Steud. 1. c. 6 (Pycrei sp.).—Venezuela.
Lamarckianus, Hochst. ex C. B. Clarke, in Jo"""-Linn. Soc. xxi. (1884) 164 = Fenzelianns.
Lamarckianus, Schult. Mant. it 108 - Pyer* capillaris.
lamprocarpus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-W 490-stolonirerus.
lamprocarpus, *Nees, in Hook. Kew Journ.* vL {lo"* 27.—Sumatra.
lanatus, Ruiz, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-7"J 750=Soirpus fimbriatus.
lancastriensis, Porter, in A. Gray, Man. Bot. N. U- = ed. V. 665 (Marisci sp.).—Am. bor.
Lanceola, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. IL « (' 184-fertilis.
lanceolatus, Poir. Encyc. vii. 246 (Pycrei •P-)-- tro .
lancellatus, Sieber, ex Presl, in Oken, Ms. »* (1828) 271; J. & C. Presl. ReL Haenk. i. 16 Pycreus capillaris.
lanceus, F. Muell. Fragm. viii. 259=Pycreus a latus.
lanceus, Thunb. Prod. PI. Cap. 18 (Pycrei sp.).— austr.
lanuginosulus, Ruiz, ex Buchen. Krit. Verz. Juncec. =Luzula gigantea.
lateralis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 18 - laevigatus.
lateralis, Linn. f. Suppl. 102 =tenellus.
laterifiorus, Steud. in Flora, xii. (1829) 162»Io"g»f-
lateriflorus, *Terr, in Bot. Mex. Bound.* 226.—
latespicatus, Boeck. in Flora, xlii. (1859) 433 (Pycrei sp.).—Ind. or.
laticulmis, Spreng. Syst i. 228=C. Haspan.
latifolius, *Poir. Encyc.* vii. 268.—Afr. austr.; Masc.
laxiflorus, *Poir. I. c.* 270.—Madag.
laxiftorus, Sieber, ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (AO» 68)678 = aequalis.
laxiusculus, Steud. Syn. Pl. Cyp. 14 = Pycreus nitens.
laxus, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxii = bulbosus.
laxus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 565 = diffusus.
laxut, Lam. Tabl. Encyc. i. 146-elegans.

CTPERUS:—
laxus, Vahl, Enum. ii. 862-distant,
laxns, W.«*m. in *Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 6.—Ins. Maurit.
Lechleri, Stend. Syn. PI. Cyp. 27-=xanthostachyus.
Lecontii, *Torr. in Ann. Lye. N. York*, ifl. (1836) 278, in obs.—Am. bor.
Lehmanni, F. Mnell. Fragm. viii. 272 - Kyllinga Lehmanni.
leiocaulon, Benth. Fl. Austral, vii. 287 - Maiiscns Uevis.
lenticularis, Stend. Syn. PI. Cyp. 48 (Marisci sp.) = *ferax*.
leonensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 470.—Afr. trop.
lepidus, Hochst. in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 134, nomen ; Steud. Syn. PI. Cyp. 14=amabilis.
lepidns, *F. Muell. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soe.* xxi. (1884) 124.—Austral,
leptanthos, *Steud. 1. c.* 28.—Bras,
Ieptocladus, *Kunth, Enutn. PI.* it. 82.—Afr. anstr.
Uptophyllus, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 33 (Marisci sp.).—Afr. trop.
leptos, Schult. Mant ii. 105 = C. Haspan.
leptostachys, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 285 = flavidus.
leptostachys, Vahl, ex Kunth, Ennm. PI. ii. 93 = distans.
leptostachyus, Griff. Itin. Notes, 321 = rotnndus.
Lessonianus, Kunth, Enum. PI. ii. 29=trinervis.
leucanthus, *Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 18.—Bras.
leucocephalus, Hassk. PL Jav. Rar. 87 - Kyllinga monocephala.
leucocephalus, *Retz. Obs.* v. 11.—As. et Am. trop.; Austral.
leucocephalus, Wight, ex C. B. Clarice, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 84-Cephalotes.
leucolepis, *Boeck. in Linnaea*, xxxv. (1867-68) 610.—Mexic.
leucolepis, Carey, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 61 (Pycrei sp.).—Am. bor.
lencoloraa, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834) 284 et x. (1836) 183.—Afr.; Austral.
leucostnehys, Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 450-Dichromena Candida.
Ifucostachys, Link, Jahrb. i. III. 81=laevigatus.
"vis, F. Muell. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. XXL (1884) 69=Pycreus sangninolentus.
Uiotskyanus, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 498.-Austral.
Liebmanni, Steud. Syn. PI. Cyp. *7 = inconspicuus*, Liebm.
Hgularis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 832, Partim= Mariscus albescens.
ngularis, Chapm. Fl. S. U. St. 507, 689 (Marisci sp.) = *briaaeus*.
'igvlaris, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 196, partim = Mariscus brachystachys.
"gularis, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. II. 23 = Mariscus appendiculatus.
"guloris, Hort. Berol. ex Kunth, Enum. PI. ii. 87 = congestus.
'gularis, Linn. Amoen. Acad. v. 81 = Mariscus rufus.
lunosus, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 294.—Reg. Amur.
I'nctus, Forst. f. Prod. 89 (sphalm. pro 'linearis') = Mariscus Sieberianus.
y "kianus, Schult. Mant. ii. 118-congestus.
K t h E PI ii 115
t-innaeanus, Kunth, Ennm. PI. ii. 115 - Pycreus Linnaeanus.
l'tos, Schult. Mant. it 101 = Pycreus polystachyus.
"ttoralis, R. Br. Prod. 216=stoloniferus.
"ndus, Heyne, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc xxi. (1884) 49=Pycreus capillaris.
"idus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 35.—Guian.
l<-nwntaceus, Nees & Meyen, in Linnaea, ix. (1884) 485 (Marisci sp.)=/mi*.
longeradiatus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 87.—Mexic.
""Wcruris, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 358
^"pispO—Reg. Argent.
wngifblrus, A«>. £«<;ye.vii.27O.—Ins.Mascar.; Madag.
">ngt/olius, Ruiz, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 405 (Marisci sp.) ~*ferax*.
lon Pradiatus, Baldwin, ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 695-prolixus.
»gus. Baker, Fl. Maurit. 411=tuberosus.
l0 »gus, Boeck. in Joum. Linn. Soc. xviii. (1881) 104 = rotundus.
Linn. Sp. PI. 45.-Europ. j Oriens.

CYPEB.U8:—
longus, A. Rich. Tent. FL Abyss, ii. 484 - Schimperianus.
Lorentnanus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 857 (Pycrei sp.).—Reg. Argent.
Louisianae, Steud. Syn. PI. Cyp. 10=Pycreus polystachyus.
lucidulus, C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 99=Zollingeri, Schweinfurthianus.
lucidulus, Link, Jahrb. i. III. 86 = tuberosus.
lucidus, *R. Br. Prod.* 218.—Austral.
lucidus, Kunth, Enum. PI. ii. 89 (Marisci sp.) =*ferax*.
lucidus, Rottl. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 48 = Pycreus capillaris.
Luerssenii,&wi.«n *Flora*, lviii. (1875) 86.—Austral.
luteolus, Boeck. 1. c. 82 = Pycreus angulatus.
lutescens, *Torr. V Hook, in Ann. Lye. N. York*, iii. (1836) 433.—Am. bor. et austr.
luteus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 370 (Marisci sp.).—Madag.
luzonensis, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 174.—Ins. Luzon.
LuBulae, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 25 -vegetus.
Luzulae, *Rottl. ex Willd. Sp. PI.* i. 276.—Am. trpp.
luzuliformis,Boec*. *in Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 856.—Afr. austr.
macellus, Kunth, Enum. PI. ii. 88=trinervis.
macer, *C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc.* xxi. (1884) 160.—Burma.
macranthus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 462 (Pycrei sp.).—Afr. austr.
macreilema, *Steud. ex Jard. in Mim. Soc. Sc. Nat. Cherb.* iv. (1856) reimp. 10, 86; v. (1867) 298.—Ins. Marquesas.
macrocarpus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 880 = Mariscus macrocarpus.
macrocephalus, liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 221 (Marisci sp.).—Mexic.
macrophyllus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 376-Mariscus macrophyllus.
macropus, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 560-Mariscus Dregeanus.
macropus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 599-radians.
macrorrhiBUs, Nees, ex Boiss. Fl. Orient, v. 369 = conglomeratus.
macrorrhiaus, Nees, in Wight, Contrib. 78-aegyptiacus.
Macrosciadion, Steud. Syn. PI. Cyp. 87=radiatus.
macrostachyos, Lam. Tabl. Encyc i. 147 = Pycreus puncticulatus.
macrostachyus, Tenore, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 284 = rotundus.
maculatus, *Boeck. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 589.—Afr. trop.
madagascariensis, *Roem. V Schult. Syst.* it 876.—Afr. trop.; Madag.; Austral.
maderaspatanus, Willd. Sp. PI. i. 278 - squarrosus.
malaccensis, *Lam. Tabl. Encyc.* i. 146.—As. trop.
manilensis, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1684) 501 = Mariscus cyperinus.
Manimae, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 209 (Marisci sp.).—Am. trop.
margaritaceus, *Vahl, Enum.* ii. 307.—Afr. trop.
marginatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 18.—Afr. austr.
marginellus, Nees, in Wight, Contrib. 88-pilosus.
mariscoides, Nutt. Gen. Am. i. 35 = Mariscus glomeratus.
Mariscus, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 515=albostriatus.
maritimus, Boj. Hort. Maurit. 378 = rotundus.
maritimus, Gouan, ex Sprang. Syst. i. 217=laevigatus.
maritimus, *Pair. Encyc.* vii. 240.—Madag.
Martianus, *Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 32.—Bras.
Martianus, *Schult. Mant.* ii. 108 (sp. ignot.).—Bras,
mauritianus, *Willem.in Usteri,Ann.Bot.mW.* (1796) 4.—Ins. Maurit.
Maximiliani, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 811 (Marisci sp.) *"ferax*.
Maximiliani, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 7 = Pycreus propinquus.
maximus, Roxb. ex Nees, in Wight, Contrib. 85-platyphyllus.
megapotamicus, Kunth, Enum. PI. ii. 10-Pycreus megapotamicus.
melanocephalus, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxii (Pycrei sp.) = *atronitens*.
melanocephalus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 257=Pycreus sanguinolentus.

CYPEBTJS :—
melanopus, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 645 (Pycrei sp.) = *lanceus*.
melanorhimus, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 50 = esculentus.
melanostackyus, Auct. ex Walp. Ann. iii. 667 (Pycrei sp.) <=*piceus*.
melanostachyus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 207 (Pycrei sp.).—Am. austr.
melanostachyus. Palmer, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 64 (Pycrei sp.) = *C. Lagunetto*.
melas, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 127 (Pycrei sp.).—Afr. trop.
melicoides, Poir. Encyc. vii. 273 (Cladii sp.).—Ins. Mascar.
membranaceus, Vahl, Enum. ii. 380-Pycreus nitens.
mexicanus, Uebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 227=digitatns.
Meyenianus, Kunth, Enum. PI. ii. 88—Mariscus Meyenianus.
Meyenii, Nees & Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 57=compressus.
Meyerianus, *Kunth, Enum. PI.* ii. 49.—Afr. austr.
micans, Kunth, 1. c. 12 = Pycreus polystachyus.
Michauxianus, Schult. Mant. ii. 123 (Marisci sp.).—Am. bor.
Michelianus, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 50 = pygmaeus.
micranthus, J. *Sc* C. Presl, Rel. Haenk. i. 178 - minutiflorus.
micranthus, Schult. Mant. ii. 121 = dentatus.
micreilema, Steud. Syn. PI. Cyp. 32-rotundus.
microcarpus, Boeck. in Bremen Abh. vii. (1880) 37 = flavidus.
microcephalus, R. Br. Prod. 215.—Austral.
microcepkalus, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. App. 304-Mariscus microcephalus.
microcephalus, Nees, ex Kunth, Enum. PI. ii. 43—surinamensis.
microcephalus, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 95 = Mariscus Dregeanus.
microdontus, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 255 = Pycreus polystachyus.
microiria, Steud. Syn. PI. Cyp. 23-C. Iria.
microlepis, Baker, Fl. Maurit. 410-C. Iria.
microlepis, *Boeck. in Flora*, lxii. (1879) 551.—Afr. trop.
micromegas, *Nees, in Linnaea.* x. (1836) 181.—Afr. austr.
microstachyos, Rottl. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 125-diffusus.
microstachyus, Vahl, Enum. ii. 318 = amabilis.
miliifolius, *Poepp. & Kunth, Enum. PI.* ii. 29.—Pernv.
minimus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 202.—Mare Marmora.
minimus, Linn. Sp. PI. 44 = Scirpus capillaris.
minimus, Nutt. Gen. Am. i. 35 = Pycreus polystachyus.
minimus, Roth, ex Nees. in Linnaea, x. 11835-36) 182, cum cit. falsa pro C. *minuto*, Roth,
minimus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 18.—Afr.; Austral.
minor, Steud. Syn. PI. Cyp. 4-Pycreus polystachyus.
minutiflorus, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 351.—Ins. Luzon.
minutulus, Vahl, Enum. ii. 314=Scirpus Michelianus.
minutus, J. F. Gmel. Syst. 130, citatio falsa pro C. minimo. *
minutus, Roth, Nov. PI. Sp. 32 = Scirpus antarcticus.
mitis, Steud. Syn. PI. Cyp. 818 = tuberosus.
modestulus, Steud. 1. c. 16 -Suirpus antarcticus.
moestus, Kunth, Enum. PI. ii. 31 -= diffusus.
mollis, Poir. Encyc. vii. 247 = Mariscus Dregeanus.
monandrus, Roth, Catalecta, fasc. i. 3 = vegetus.
monocephaloides, Roxb.ex Nees, in Wight, Contrib.92 =• Cephalotes.
monocephalus, ¥. Muell. Fragm. viii. 271 = Kyllinga monocephala.
monocephalus, Roxb. Hort Beng. [6]; Fl. Ind. i. 188 =Cephalotes.
monogynus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 565 = Cephalotes.
monophyllus, Vahl, Enum. ii. 352 - corymbosus.
monostachys, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 389 (Marisci *sp.)-Seemannianus*.
monostachyus, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 138 — laevigatus.
monostachyus, Linn. Mant. ii. 180 - Fimbristylis monostachya.
monroviensis, A*r*. *in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 90.—Afr. trop.
Monti, *Linn f. Suppl.* 102.—Europ.; Oriens.

CYPEBU8 :—
mucronatus, Rottl. Desc. Nov. PI. 19=laevigatus.
mucronatus, Steud. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 63 =Pycreus capillaris.
Mueklenbergii, Sprang. Syst. v. 221-C. Haspan.
Muelleii, *Boeci. in Flora,* xlii. (1859) 484 [bis].—Afr. trop.
Mulen-Pullu, Schnlt Mant. ii. 99 = pygmaens.
multibracteatus, Boeck. in Flora, Iviii. (1876) 107 (Marisci sp.) -*ferax.*
multiceps, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 100 =/«•«*.
multiceps, Link, Hort. Berol. i. Sll = congestus.
multiflorus, Kunth, Ennm. PI. ii. 562 (err. typ.) = minutiflorus.
multiflorus, Stend. Syn. PL Cyp. 48, sphalm. = multifolius.
multifolius, *Kunth, Enum. PI.* ii. 91.—Ecuador,
multispicatus, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 862.—Ind. or.; Burma.
multispicatus, Kurz, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 129«Kjirzii.
multistriatus, Boeck. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 14, lapsus pro • multispicatus.'
multumbelliferus, Hort. ex Roem. & Schult. Syst ii. 200-glomeratus.
Mundtii, Kunth, Enum. PI. it 17=Pycreus Mundtii.
mundulus, *Kunth, I. c.* 74.—Bras.
musarius, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 8825 — Scirpus Michelianus.
Mutisii, Anderss. Galapag. Oarnes Veg. 58 = Mariscus brachystachys.
Mutisii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 567 = Mariscus Mutisii,
myriostachyus, Tenore, FI. Nap. iii. 47 = longus.
myrmecias, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.(1884) 144 (Marisci sp.).—Afr. trop.
mysurensis, Heyne, ex Wall. Cat. snb n. 8346 = eleusinoides.
nanus, Willd. Sp. PI. i. 272=Mariscus capillaris.
natalensis, *Hochst. ex Krauss, in Flora,* xxviii. (1845) 755.—Afr. austr.
natans, Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 34=Cephalotes.
Naumannianus, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 652 = maculatus.
navicularis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 32.—Cuba.
Neesii, D. Dietr. Syn. PL i. 228 = malaccensis.
Neesii, Kunth, Enum. PI. ii. 101 =digitatus.
neglectus, Parl. Giorn. Bot. Ital. ii. I. (1846) 181 = rotundus.
nemacaulos, Steud. Syn. PI. Cyp. 48 = Mariscus filifnrmis.
netnatodes, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 6 =Pycreus megapotamicus.
nemorosus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 81 = sphacelatus.
nervosus, Bertol. in Bologn. Opusc. Sc. iii. (1819) 407 =esculentus.
nemotropis, Steud. in Flora, xxv. (1842) 683-Pycrens sanguinolentus.
niger, *Rul* &* Pav. Fl. Per.* i. 47.—Peruv.
nigricans, Steud. in Flora,xxv. (1842) 584 (Pycrei sp.).—Abyss.
nigricans, With. Arr. Brit. PI. ed. III. iii. 44=Schoenus nigricans.
nigrwiridis, Thw. Enum. PI. ZeyL 844 = diffusus.
nilagiricus, Hochst ex Steud. Syn. PI. Cyp. 2.- Pycieus capillaris.
niloticus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 18=articnktus.
nipponicus, *Franch. (S Sav. Enum. PI. Jap.* ii 637.—Japon.
nitens, Retz. Obs. v. 13=aristatus ?
nitens, Rottl. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 104 = rnbicundus.
nitens, Vahl, Enum. ii. 331=Pycreus nitens.
nitidulus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 361 (Marisci sp.) =*ferax.*
nitidus, Boeck. 1. c. xxxv. (1867-66) 461 (Pycrei sp.), *piatim™ lanceus.*
nitidus, Lam. TabU Encyc. i. 145=Pycrens sanguinolentus.
niveus, Herb. Royle, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 109 = Atkinsoni.
niveus, *Ret*. Obs.* v. 12.—Ind, or.
nodosus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 72.—Am. trop.
nodulosus, F. Muell. ex Benth. Fl. Australl, wi. 283 (Marisci sp.) = *Gunnii.*
Noëanus, *Boiss. Fl. Orient,* v. 871.—Anatolia.

CYPEBTXS :—
Novae-Hannoverae, Boeck. in EngL Bot. Jahrb. v. (1884) 91 {Marisci sp.) =/«•«*.
Novae-Hollandiae, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 844 (Marisci sp.) = *Gunnii.*
nudicaulis, *Pair. Encyc.* vii. 240.—Madag.
nudiculmis, Sieber, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 161-Schimperianns.
nudiusculus, Nees, in Linnaea, x. (1836) 132=tenellus.
nudus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 203=C. Haspan.
nudus, Roxb. Fl. Ind. i. 187 - articulatus.
nudus, Roxb. 1. c. 209 = tegetiformis.
nuerensis, *Boeck. in Flora,* lxii. (1879) 655.—Afr. trop.
nutans, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 271—distans.
nutans, *Vahl, Enum.* ii. 883.—Ind. or.
Nuttallii, Beyr. ex Kunth, Enum. PI. ii. 6 (Pycrei sp.) = *rivularis,* Kunth.
Nuttallii, Eddy, in Spreng. Neue Entdeck. i. 240 = Pycreus polystachyus.
Nuttallii, *Ton. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1886) 252.—Am. bor.
obesus, *Liebm. in Vidensi. Selsi. Sir.* V. ii. (1851) 211.—Mexic.
obliquus, Nees, in Wight, Contrib. 86 = pilosus.
obscurus, Nees, in Hook. Kew Joum. vL (1864) 27 = radiatus.
abstinatus, Steud. Syn. PI. Cyp. 10=PycreuB nitens.
obtusifloius, *Vahl, Enum.* ii. 308.—Afr. austr.; Madag.
obtusus, *Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 6.—Ins. Maurit.
occidental, Torr. in Ann. Lye N. York, iii. (1836) 259 =erythrorhizos.
ochraceus, *Vahl, Enum.* ii. 826.—Ind. occ.
ocbreatus, *Boeci. in Linnaea,* xxxvi. 11869-70) 886.—Ind. occ.
ockreoidés, Steud. Syn. PI. Cyp. 84 = Fenzelianus.
ochrocephalus, Steud. in Flora, xxv. (1842) 601 = vegetns.
ochroleucus, Boeck. in Flora, Iviii. (1875) 86 - Mariscus albescensI
octophyUus, Hochst ex Steud. Syn. PI. Cyp. 20 = diffusus.
odoratus, Burm. f. Fl. Ind. 20. t. 8. f. 2«exaltatus.
odoratus, Forst. f. Prod. 6 (Marisci sp.) =*f«rax.*
odoratus, Kunth, Enum. PI. ii. 67, paitim=giganteus.
odoratus, Linn. Sp. PI. 46=malaccensis, Pycreus polystachyus.
odoratus, Osbeck, Voy. China, ed. Forster, i. 361=rotundus.
Oerstedii, Liebm. in Vidensk. Selsk.Skr. V. ii. (1851) 224 (Marisci *sp.)=Vahlii.*
officinalis, Nees, ex Gren. & Godr. FL Fr. iii. 359 = rotundus.
officinalis, T. Nees, PI. Medic Abbild. t. 25. f. B = esculentus.
oleraceus, Roxb. ex Nees, in Wight, Contrib. 81 = bulbosus.
Olfersianus, Kunth, Enum. PI. ii. 10=Pycreus propinquus.
olidus, Vahl, Enum. ii. 883 = Pycrens polystachyus.
oligostachyus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 204 = amabilis.
olivaceus, Fenzl, ex Steud. Syn. PI. Cyp. S3 = Fenzelianus.
olivaceus, Vahl, Enum. ii. 832=Pycreus polystachyus.
olivaris, Targ. Tozz. in Mem. Soc. Ital. Mod. xiii. II. (1807) 338.1.13 = rotundus.
onustus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 20.—Ins. Borbon.
oostachyus, Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 39 (Marisci *sp.)=laetus.*
ornatissimus, F. Muell. Fragm. viii. 265=Pycreus albomarginatus.
ornatus, R. Br. Prod. 217 « procerus.
ornithopodioides, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 50»anricomns.
ornithopus, Pets. Syn. i. 61 = Mariscus havanensis.
orthostachyus, French. & Sav. Enum. PL Jap. ii. 589 a»truncatus.
oryeeticola, Steud. Syn. PL Cyp.37=exaltatns.
oryeetorum, Steud. 1. c. 24"=difformis.
Ottonis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 350 (Marisci sp.) =*brunneus.*
ovatus, Llanos, Fragm. 15 =distant
ovularis, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1861-62) 876, pro majore parte = Sieberianus, umbellatus.
ovularis, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 278 = Mariscus ovularis.

CTPEBJTBi—
owahuensis, Nees, in Meyen, Reise, ii. 119; et in Kuntb, Enum. PL ii. 80=Mariscus albescens.
Oaanii, Boeck. in Flora, lxi. (1878) 29 (Marisci sp.).—Afr.; Austral.
oxycarioides, Britton, in Bull. Tórrey Bot. Club, xi. (1884) 86 (Marisci *sp.) =macrocepkalus.*
oxylepis, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 285.—Guian.
oxystachys, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70)280=longus.
pachyrhizus, *Nees, I. c.* xxxv. (1867-68) 545.—Ind. or.
pallescens, Boiss. Fl. Orient, v. 875 — Fenzelianus.
pallescens, Desf. Fl. Atlant. i. 46. t. 9=rotundus.
pallescens, Poir. Encyc. vii. 260=longus.
Pallescens, Sieber, ex Kunth, Enum. PL ii. 61=esculentus.
pallidus, *Kit.ex Kanitt, in Verh.Zool.-Bot. Ges. Wien,* xiii. (1863) 605.—Banat.
pallidus, Link, Jahrb. i. III. 86=Mariscus albescens.
pallidus, Nees, in Wight, Contrib. 79-platystylis.
pallidus, *Savi, Cat. Piant. Egi*.* 23, 31=esculentus.
Pangorei, Retz. Obs. iv. 10=tuberosus.
Pangorei, Rottb. Desc Nov. PL 31; Prog. 18«corymbosus.
Pangorei, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 202-malaccensis.
Pangorei, Thw. Enum. PL ZeyL 344<=tegetum.
Pangorei, Vahl, ex Kunth, Enum. PI. ii. 59=rotundus.
paniceus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 881 -= Mariscus paniceus, cyperinus, pictus.
paniciformis, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 637 •= C. Ilia.
panicoides, Lam TabL Encyc. i. 146 - C . Iria.
paniculatus, Balb. ex Kunth, Enum. PI. ii. <3[S] sphacelatus.
paniculatus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 32 - Eragrostis plumosa.
paniculatus, D. Don, Prod. FL Nep. 89=pilosns.
paniculatus, *Hoot. tf Am. Bot. Beech. Voy.* 99.—Ins-Sandvic.
paniculatus, Rottb. Desc. Nov. PL 40; Prog. 22-Pycreus polystachyus.
pannonicus, *Jacq. Fl. Austr.* v. 29. t. 6.—Hangar.. Reg. Caucas.
pannonicus, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 18" laevigatus.
papyraceus, Crantz, Inst. i. 411=C. Papyrus.
papyroides, Poir. Encyc. viL 272 = aequalis.
Papyrus, *Linn. Sp. PI.* 47.—Sicil.; Syria; Afr. trop.
paradoxus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 8.—Ins. Borbon.
paraënsis, Mart. & Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 8 = Pycreus flavescens.
paraguayensis, C. *B. Clarke, in Joum. Linn. Soc.* *"• (1884) 90.—Paraguay.
Paramatta, Balb. ex Kunth, Enum. PL ii. 81 -pM"[I] folius.
Paramatta, Mart. Cat. Hort. Erlang. 24 - congestus.
paramattensis, Link, Enum. Hort. Berol. 46 = congestus.
parciflorus,ljnk, Jahrb. i. III. 85=diffusus.
parviflorus, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 3348 = exaltatus.
parviflorus, Muhl. Desc. Gram. 19=dentatns.
parviflorus, Nees, in Wight, Contrib. 87 = C. Iria.
parviflorus, Vahl, Enum. ii. 352 = Mariscus albescens.
famulus, Steud. Syn. PL Cyp. 4 (Pycrei sp.) »^r«[w] *mints.*
parvus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) *(M&risci sp.)=Michauxianns.*
parvus, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 24 = Kyll«[1]6[a] Pumilio.
patens, Vahl, Enum. ii. 334 = Pycreus nitens.
patuliflorus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) «[B] =Pycreus albomarginatus.
patulus, Bieb. FL Taur. Cauc. iii. 47 = longus.
patulus, Kit. ex Host, Gram. iii. 49. t. 74 =glaber.
patulus, Willd. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. *[6]- congestus.
pauciflorus, Steud. Syn. PI. Cyp. 84=pilosus,
Pauper, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, u. *'" (Pycrei sp.).—Abyss.; Reg. Himal.
Pauper, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1878) 558 (Pycrei sp.).—Chili.
pectinatus, Hils. & Boj. ex C. B. Clarke, in [T]J[o]- Linn. Soc. xx. (1883) 284=uncinatns.
pectinatus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. 1[a] rubienndus.
pectinatus, Ruiz, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 360=Mariscus Jacquinii.

CYFEKTJS:—
pectinaius, Vahl, Ennm. ii. 298=nudicaulis.
pectiniformis, Schult Mant. ii. 128 = compressus.
pedatus, [Nees in] Meyen, Reise, i. 431; et ex Knntb, Enum. PI. it 35 = C Haspan.
pedunculosus, *F. Muell. Fragm.* viii. 266.—Austral.
pelophilus, Ridl. in Tram. Lien. Soc. Ser. II. Bot. il. (1884) 129 (Pycrei sp.).—Afr. trop.
pennatus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 404 (Maxisci sp.)••*ferax.*
pennatus, Lam. Tabl. Encyc. i. 144 = Mariscus albescens.
pennatus, Steud. inZoll. Syst Veiz. Ind. Archip. 62-pilosus.
pentadactylus, Willd. partim, ex Kunth, Enum. PI. ii. 12 = Pycieus polyatachyus.
pentadactylus, Willd. 1. c. 60-exilis.
permutatus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 477 = raacranthus.
punambucensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 42 (sphalm. *fernambucensis).*—Bras.
PUpusillus, *Boeck. in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 499.—Mexic.
pirsicus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 39-arenarius.
Pfrtenuis, Boj. Hon. Maurit. 879 —tuberosus.
prrtenuis, Roxb. Hort Beng. [5]; Fl. Ind. i. 198-scariosus.
Ponillei, Boeck. in linnaea, xxxviii. (1874) 869 (Pycrei _ »P.)—Madag.
res-avium, *Bertel. Misc. Bot.* viii. 30. t. 3.—Am. bor.
1 etersianus, *Boeck. in Peters, Raise Mossamb. Bot.* 637.—Afr. trop.
petraeus, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 29 = rubicundus.
pkaeocephalus, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 264 (Marisci sp.i.—Reg. Argent.
Philippensis, y. *V C. Presl, Ret. Haeni. i.* 174.—Ins. Luzon.
PMeoides, Bieb. ex Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. 674-glomeratus.
PUeoides, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 208 = Mariscus phleoides.
PUeoides, Seem. Fl. Vit. 319 (Marisci *sp.) =/erax.*
riprmatodes, Muhl. Desc. Gram. 23 — esculentus.
P'ceus, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 268 .-ustnlatns.
*P»*us,* Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) .200 (Pycrei sp.).—Mexic.
P'creus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 465, nota err. typ. = rrat
Pictus, StaxTSyl'. PI. Cyp. 48 (Marisci sp.).—Austral.
*•.«•», Tenore, Fl. Nap. iii. 47-glaber.
P'ctus, Wall, ex C. B. Clarke, in Joum. I inn. Soc. xxi. .U884) 32 = Mariscus pictus.
P!fe««, Baker, Fl. Maurit. 413-polystachyus.
P!osus, *Vahl, Enum.* ii. 354.—Geront. trop.
fnnatus, A. Rich. Sert Astrol. p. vii-Mariscus albescens.
fyM'pis, Steud. Syn. PL Cyp. 40-piIosus.
P!"Uculmis.sW. /. *c.* 2 2 . - W p,o,,"'/o««s, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat Par. i. (1782) ,,106 (Marisci sp.).—Ind. occ.
wtyculmis, R. Br. Prod. 214 = C. Haspan.
J)«ypnyllus, *Roem. V Schult. Syst.* it 876.—Zeylan.
flabell1*Jn*IjGriaeb_F1- Brit- W. Ind. 667 = Mariscns formus.
Pjatystylis, *R.Br. Prod.* 214.—Austral, j Ind. or.
'!"•"> Heyne, ex Wall. Cat sub n. 33S2 = Pycreus
Polystachyus.
, Nees, in Wight, Contrib. 73 = laevigatus.
Pnnth, Fl„ Am„ Sept „ Bo. = pycreus a-vescens.
£«;ocarpus, *Boeck.in Flora,* lxii. (1879) 551.—Afi.trop.
^ w e s , *Detn. ex Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 12.—Ind.
f.igii, Kunth, Enum. PL ii. 90 -Mariscus castaneus.
Steud. Syn. PL Cyp. 40 = digitatus.
, ^oen' . & Scliult. Syst. ii. 223 = alopecuroides.
Phalus, Lam. Tabl. Encyc. i. 147 = C. Lujulae.
Link, Enum. Hort Berol. i. 46 = congestus.
Poiyphyllus, *Vahl, Enum.* ii. 817.—Afr. trop.
Vstachys, Spreng. ex Kunth, Enum. PI. ii. 24 = ^"opressus.
Polystachyus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 478, partim = subulatus.
Polystachyus, Jungh. l. c. vi. (1881) 23 (Pycrei sp.) = picrus.
Polyssachyus, Nees, ex Boeck. 1. c. xxxvi. (1869-70) 286 "•tuberosus.

CYPEBTTB:—
polystachyus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 89; *Prog.* 21.—Cosmop. trop.
polystachyus, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 88 (Marisci sp.) — strigosns.
ponoiiicus, Cav. Desc. 29, sphalm. =pannonicus.
praelongatus, Steud. Syn. PL Cyp. 46 (Marisci sp.).—Texas,
praemorsus, *Boeck. in Flora,* xlii. (1869) 436 [bis].—Jamaic.
prasinus, *Kunth, Enum. PI.* it. 31.—Afr. austr.
pratensis, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 364.—Abyss.
Prescottianus, Hook. & *Am.* Bot. Beech. Voy. iii. 100 (Marisci sp.) =*ferax.*
Preslii, A. Dietr. Sp. PI. ii. 211=Androtrichum polyccphslum.
Preslii, Parl. Fl. Ital. ii. 40=longus.
Princeps, Kunth, Enam. Fl. ii. 66 = comosus.
Pringlei, Britton, in Bull. Torrey Bot. Clnb, xii. (1885) 7 >• Mariscus tetragonus.
prionodes, Steud. Syn. PL Cyp. 22 = marginatus.
prionotropis, *Steud. in Flora,* xxv. (1842) 601.—Chili.
procerulus, Nees, in Wight. Contrib. 82-tuberosus.
procerus, Bieb. ex Georgi, Beschr. Russ. Reich, iii. iv. 674—longus.
procerus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 29.—Ind. or.; Aegypt
procerus, Roxb. Hort. Beng. 6 ; FL Ind. i. 203, partim =Pycreus puncticulatus.
procerus, Vahl, ex Kunth, Enum. PI. ii. 72 = rotundus.
productus, Wright, in Sauv. FL Cub. 172-Mariscus flavus.
prolifer, Lam. Tabl. Encyc. i. 147 — aequalis.
prolifer, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 494 = Comostemum montevidense.
prolifer, Thunb. Prod. PL Cap. 18 = Scirpua Holoschoenus.
prolixus, Balb. ex Kunth, Enum. PI. ii. 67 = digiUtus.
prolixus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 206.—N. Granat.
propinquus, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 7 =Pycreus propinquus.
prostratus, Stend. Nom. ed. I. 257, sphalm. = fuscus.
proteinolepis, Boeck. in Flora, lxii (1879) 649 = rotundus.
proteinolepis, Steud. Syn. PI. Cyp. 15 = conglomeratus.
protractus, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 50 = fuscus.
protractus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 45 = difformis.
proximus, Steud. Syn. PI. Cyp. 19 - flabelliformis.
pseudo-bromoides, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) *iM = latespicatus* et Pycreus sanguinolentus.
pseudo-giganteus, Steud. Syn. PI. Cyp. S9 = comosus.
pseudostrigosus, *Steud. 1. c.* 46.—Afr. trop.
pseudovegetus, Steud. L c 24 = C. Luzulae.
psilostachys, Steud. 1. c 47 = distans.
pubesceus, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 181.—Calif.
pubescens, Steud. Syn. PL Cyp. 60 (Fimbristylidis sp. ?).—Ins. Borbon.
pubifolius, Stend. L c. 16 (Fimbristylidis sp. ?).—Venezuela.
pubisquama, *Steud. I. c* 20.—Ins. Philipp.
pugioniformis, A. Dietr. Sp. PL ii. 230 = pygmaeus.
pulchellus, R. Br. Prod. 213-leucocephalus.
pulcher, D. Don, Prod. FL Nep. S8-Wallichianus.
pulcher, Spreng. ex Kunth, Enum. PI. ii. 34 = albostriatns.
pulcher, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 18.—Afr. austr.
pulcherrimus, *Willd. ex Kunth, Enum. PI. a.* 35.—Ind. or.; Malaya.
pulvinatus, Nees & Meyen, in Wight, Contrib. 74-Pycreus nitens.
Pumilio, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 284-tenellus.
Pumilio, Steud. Syn. PL Cyp. 16-Scirpus cerauus.
pumilus, Linn. Cent. PI. ii. 6; Amoen. Acad. iv. 302 =• Pycreus nitens.
pumilus, Rottb. Desc. Nov. PI. 29. t. 9. f. 4 = Pycreus sanguinolentus.
punctatifolius, Steud. Syn. PL Cyp. 27=Mariscus ruiiu.
punctatus, Lam. Tabl. Encyc. L 144 = Scirpus prolifer.
punctatus, Roxb. Hort. Beng. [5] ; Fl. Ind. i. 193-Pycreus nitens.

CYPEKTJ8:—
puncticulatus, Aitch. Punjab PL 189-Monti.
puncticulatus, Vahl, Enum. ii. 348 = Pycreus puncticulatus.
punctorius, Schrad. ex Boeck. in Tin__*, xxxv. (1867-68) 567=textilis.
ptlngens, Boeck. 1. c. 587 = conglomeratus.
pungens, Hort. Berol. ex Kunth, Enum. PL ii. 32 = textilis.
purpurascens, Vahl, Enum. ii. 859 (Marisci sp).—Ins. S. Crucis.
Purshii, Roem. & Schult. Syst. il. 177-aristaU.
pusillus, *Vahl, Enum.* ii. 303.—Ind. or.
pusillus, Wight, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc xxi. (1884) 87, 90 = castaneus.
pustulatus, *Vahl, Enum.* ii. 341.—Afr. trop.
pycnocephalus, Steud. Syn. PL Cyp. 6 = Pycreus propinqnus.
pyenostachyus, Kunth, Enum. PL ii. 77-Mariscus pyenostachyus.
pygmaeus, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 7 = Scirpus Micheliauns.
pygmaeus, Lam. Tabl. Encyc. i. 148 —tenellus.
pygmaeus, Nutt. in Am. Phil. Trans. N. S. v. (1837) 142-iaristatus.
pygmaeus, Retz. Obs. iv. 9 —pusillus.
pygmaeus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 20.—Cosmop. trop.
pyrophilus, Reinw. ex De Vxiese, PL Ind. Bat. Reinvr. 189-pilosus.
quadriSorus, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70)867.—Abyss.
quinqueflorus, Hochst ex Steud. Syn. PL Cyp. 37 = digitatus.
quitensis, Spreng. Syst. i. 224 = amabilis.
racemosus, Dalz. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 142 = cleusinoides.
racemosus, Heyne, ex Boeck. in Flora, lxii. (1879) 655 = exaltatus.
racemosus, Retz. Obs. vi. 20 » elatus.
racemosus, Tenore, Prod. FL Nap. p. viii. = longus.
racemosus, Wight, in Wall. Cat. n. 3369 = Mariscus albescens.
radians, *Nees V Meyen, in Linnaea,* ix. (1834) 285, nomen; *et in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.i.* (1843) 63.—Burma; China,
radiatus, *Vahl, Enum.* ii. 369.—Ind. or.; Burma.
radicans, Kunth, Enum. PL ii. 96, err. typ. — radians.
radicosus, Reichb. ex Kunth, 1. c 26-simplex.
radicosus, Sibth. & Sm. FL Graec. Prod. i. 30-rotundus.
Ranko, Steud. Syn. PI. Cyp. 815-Scirpus perpusillus.
raphiostachys, Link, Jahrb. i. III. 87 (Marisci sp.)-*ferax.*
rarissimus, Steud. Syn. PL Cyp. 16 (FimbristyUdis sp.).—Abyss.
recurvatus, Willd. ex Kunth, Enum. Fl. ii. 22 = cuspidatus.
recurvus, *Vahl, Enum.* iL 310.—Afr. trop.
recurvus, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 210 (Fimbristylidis sp.).—Afr. trop.
reduncus, *Hochst. ex Boeck. in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 680.—Abyss.
reflexus, Hort. Par. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 70-juncoides.
reflexus, *Vahl, Enum.* il. 42.—Reg. Argent.; Chili.
refractus, Engelm. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 869 (Marisci sp.) = *lancastriensis.*
Rehmanni, Boiss. Fl. Orient, v. 364 (Pycrei sp.).—As. Min.
Reinschii, *Boeck. in Flora,* lxv. (1882) 11.—Ins. Comor.
repens, Ell. Sketch, i. 68-esculentus.
reptans, Boeck. in Tinnnea, xxxv. (1867-68) 485-laevigatus.
reptans, Boj. ex C. B. Clarke, in Joum. Soc. xx. (1883) 281 -Pycreus Mundtii.
resinosus. Hochst. in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 131, nomen; Steud. Syn. PL Cyp. 23 = C. Iria.
rctroflexus, Buckl. in Proc. Acad. Sc Philad. 1862 (1863) 9-Mariscus uniflorus.
retrofractus, Engelm. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 47 (Marisci sp.) = *lancastriensis.*
retrofractus, Torr. Fl. N. York, ii. 344 = Mariscus retrofractus.
retrofractus, Willd. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi, (1869-70) 878 - Mariscus ovularis.

CYPERTJ8:—

retrorsus, Chapm. in Coult Bot. **Gar.** iii. (1878) 176 (Marisci sp.).—Am. bor.
retusus, Nees, in Linnaea, is. (1834) 286-esculentus.
retusus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 486-Pycreui albomarginatus.
Retmii, Nees, in Wight, Contrib. 82=tnberosns.
Retail, Poir. Encyc. vii. 265-albldus.
rhaphiostaehys, Humb. *8c* Bonpl. ex Kunth, Enum. PI. ii. 68 (Marisci *sp.)-ferax.*
rhenanus, Schrad. ex Kunth, 1. c 60—longns.
rhigiophyllus, *Hochst. ex Krauss, in Flora,* xxviii. (1815) 756.—Afr. anstr.
Richardi, Steud. Syn. PI. Cyp. 8-Kyllinga macrocephala.
rigens, J. & C. Pied, Rel. Haenk. i. 170 (Marisci sp.).—Peruv.
rigidifoliua, *Steud. in Mora*, xxv. (1842) 598.—Abyss.
rigidulos, *Vahl, Enum.fi.* 342.—Ind. or.
rigidus, Vahl, 1. c. 309 = maritimus.
riparius, Schrad. ex Nees, in Mart. FI. Bras. ii. I. 28 = C. Haspan.
rimtlaris, Kunth, Ennm. PL ii 6 (Pycrel sp.).—Am. bor.
rivularis, Steud. in Lechl. Berb. Am. Anstr. 66-laevigatus.
robnstDs, *Kunth, Enum. PI.* ii. 41.—Bras.
Roestelii, Kunth, 1. c. 58-tuberosns.
Roklfsii, Boeck. in Flora, Ixr. (1882) 13 (Marisci sp.). —Abyss.
Rothianus, Schult. Mant. ii. 95-Scirpus antarcticus.
rotundus, Benth. Fl. Austral, vii. 279, partim-bulbosns, stoloniferus, Zollingeri.
rotundus, Benth. PI. Hartw. 28=esculentus.
rotundus, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1847) 177 = lutescens.
rotundus, Kunth, Enum. PI. ii. 68, partim - bnlbosos.
rotundus, *linn. Sp. PI.* 46.—Cosmop.
rotundus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 260, 600 = Zollingeri.
Roxburghianus, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 272 = laevigatus.
Roxburghii, A. Dietr. Sp. PI. ii. 214-laevigatus.
Roxburgh™, Nees, in Wight, Contrib. 84-platyphyllus.
Roylei, Am. in Wight, 1. c. 86, in nota-radiates.
rubescens, Kunth, Enum. PI. ii. 27, sphalm.—glaber.
rubicundus, *Vahl, Enum.* ii. 308.—Ind. or.; Afr. trop.
rubicundus, Willd. ex Link, Jahtb. i. III. 87 = rotundus.
rubiginosus, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1861) 178.—Ins. Galap.
Rudioi, *Boeck. in Flora*, lxv. (1882) 12.—Bras.
rufescens, Schrad. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 27 - Mariscus rufns.
ruficomus, Buckl. in Proc Ac Sc. Philad. 1862 (1863)9«lutescens.
rufescens, *Torr.* b* *Hook, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 436.—Texas.
rufidulus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 316.—Am.
rufinus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. iL (1861) **222 (Marisci *$.?.)=Michauxianus.***
rufus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 210—Am. auatr.
rufus, Nees, ex Kunth, Enqm. PI. ii. 98 = Mariscus microcephalus.
Ruiaianus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 360 = Mariscus Jacquinii.
rupestris, Kunth, Enum. PI. ii. 52.—Afr. austr.
Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot Club, xi. (1884) 89-Schweinitzii.
sabulicolus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. (1884) 136.—Afr. trop.
sabulosus, Mart. *8c* Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. iL I. 10-Pycreus sabulosus.
Salemanni, Steud. Syn. PI. Cyp. 16-cuspidatus.
sanguinalis, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. **39 (Marisci *sp.)—sanguineo-fuscus.***
sanguineo-ater, Boeck. in EngL Bot. Jahrb. i. (1881) 863-Mariscus atrosanguineus.
sanguineo-fuscus, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 80. L 139 (Marisci sp.).—Austral.; Tasmania.
sanguineofuscus, Nees, in Ann. Nat. Hist vi. (1841) 46 = lucidus?
sanguineus, Balb. ex Steud. Nom. ed. IL i. 478 **(Marisci sp.) •*'purpurascens.***

CTPEBU8:—

sanguinolentus, Vahl, Ennm. iL 351-Pycreus sanguinolentus.
Santonici, Rottb. Desc Nov. PL 41 j Prog. 19 - C. Iria.
Santonici, Rottl. ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 142 = eleusinoides.
scoter, Boeck. in Flora, lviii. (1876) 107; lxi. (1878) 31 — Mariscus scabcr.
scoter, Lag. ex Kunth, Enum. PI. ii. 78—eongestus.
scaberrimus, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 697 (Marisci sp.) —Afanmoe.
scariosns, *R. Br. Prod.* 216.—Ind. or.; Austral.
schaenoides, Poir. Encyc. Suppl. v. 186 = Fimbristylis squarrnlosa.
Schaffneri, *Boeck. in Flora*, lxi. (1878) 8O.-Mexic
Schimperianus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 34.—Afr. trop.
schoenoides, Griseb. Spicil. FL Rumel. ii. 421 = aegyptiaens.
schoenomorphus, Steud. Syn. PI. Cyp. 89=spicigerus.
Schomburgkianus, Nees, in Hook. Joum. Bot ii. (1840) 393 = leucanthus.
Schottianus, Cat. Sem. Hort. Vindob. (1836)=seq.
Schottii, Hort. BeroL ex D. Dietr. Syn. PI. i. 220 - prolixus.
Schraderianus, Mart, ex Steud. Syn. PL Cyp. 38 = distans.
Schweinfurthianus, *Boeck. in Flora*, lxlL (1879) 653.—Afr. trop.
Schweinitzii, *Torr. in Ann. Lye. N. York*, iii. (1836) 276.—Am. bor.
scirpoides, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxii-Fresenii.
scirpoides, J. & C. Presl, Rel. Haenk. 178 = diffusus.
scirpoides, *Vahl, Enum.* ii. 311.—Afr. trop.
scoparius, Poir. Encyc. vii. 253 = latifolins.
scopellatus, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106—Pycreus polystachyus.
Seemannianus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 390 (Marisci sp.).—Ins. Fiji.
Selloanus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 446 (Pycrei sp.).—Bras.
Sellowii, Link, Hort. Berol. i. 807=reflexus.
semiangulatus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 367 — fastigiatus.
semidives, Steud. Syn. PL Cyp. 36=radiatus.
seminudus, Roxb. Hort. Beng. [5]; Fl. Ind. i. 187 = corymbosns.
seminudus, ZoU. *Sc* Moritzi, Syst. Verz. ZoU. 96-C. Iria.
semiochraceus, *Boeck. in Flora*, lxi. (1878) 29.—Mexic.
semiradicifloms, *Boeck. I. c.* xlii. (1859) 434 [bis].—Hab.!
semiteres, Heyne, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc xxi. (1884) 49=Pycreus capillaris.
semitribrachiatus, *Boeck. in Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 386.—Ind. occ.
semitrifidns, *Schrad. Anal. Fl. Cap. Cyp.* 6.—Afr. austr.
septatus, Steud. Syn. PI. Cyp. 46=Mariscus microcephalus.
serotinus, Rottb. Desc Nov. PL 81; Prog. 18 = Monti.
Serra, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 479-rubicundus.
senulatns, *Vahl, Enum.* ii. 800.—Madag.
serrulatus, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 382.—Am. bor.
sertularinus, *Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. iL (1851) 218.—Nfcarag.
seslerioides, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* i. 209.— Bras.
setaceus, Retz. Obs. v. 10=Eleocharis chaetaria.
setaceus, Wnlfen, Fl. Norica, 49 = Pycrens flavescens.
setifolius, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 88.—Nepal.
setifolius, Torr. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc xxL (1884) 198 (Marisci sp.) = *Grayii.*
setigerus, *Torr. V Hook, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 484.—Am. bor.
sexangularis, Fenzl, ex Steud. Syn. PL Cyp. 19-flabellifonnis.
sexangularis, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834) 284.—Afr. austr.
sexflorus, *R. Br. Prod.* 216.—Austral.
Sieberi, Kunth, Ennm. PI. ii. 96 = Mariscus fulvus.
Sieberianus, Link, Hort. Berol. i. 313=escnlentus.
Sieberianus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 29—snrinamensis.

CYPEBITS:—

silletensis, *Nees, in Wight, Contrib.* 79.—Ind. or.; Burma.
silletensis, Thw. Ennm. PL Zeyl. 848-pnlcherrimus.
simplex, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp. i.* 207.—Am. anstr.
sinensis, Debeaux, in Actes Linn. Soc. Bord. xxxi. (1877) t. 2; xxxii. (1878) 28=radians.
Smithianns, *Ridl. in Journ. Bot.* xxii. (1884) 16.—Afr. trop.
Smithii, Schrad. Anal. Fl. **Cap.** Cyp. 12, in adn.-textilis.
loUdifoIins, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 499. —Madag.
solidus, Kunth, Enum. PI. ii. 76 (Marisci sp.)-tabularis, nsitatns.
solutus, Steud. Syn. PL Cyp. 14-cnspidatns.
Sonderi, J. A, Schmidt, Beitr. FL Cap Verd. Ins. 162 — polystachyus.
soongoricus, *Kar. &• Kir. in Bull. Soc. Nat. Ifosc.* (1841) 8S9.—Sibir.
sordidus, *J. 8c C.* Presl, Rel. Haenk. i. 171-virens.
sorostachys, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 688 = lencocephalns.
soriogonensis, *J. Sc* C. Presl, Rel. Haenk. i. 351-diffnsns.
Soyauxii,B«c*. *in Endl. Bot. Jahrb.* v. (1884; 501.-Afr. trop.
spadiceus, Heyne, ex C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 162-procerns.
spadiceus, Lam. Tabl. Encyc. L **147**- stoloniferus.
spaniophyllus, Steud. Syn. PI. Cyp. 2l=malaccensis.
sparteus, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.19 * reflexus.
spathaceus, Linn. Syst. ed. XII. 735 •= Dulichtam spathaceum.
speciosus, Torr. Bot. Mex. Bound. 226 - californictis.
speciosus, Vahl, Enum. iL 864 (Marisci sp.) - *Michauxianus.*
spectabilis, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 605 (Marisci sp.) •= *Mammae,*
spectabilis, Spreng. Nov. Prov. 15 ; Link, Hort. Berol. i. 818=eongestus.
sphacelatus, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 271 ~ rotundus.
sphacelatus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 26; *Prog.* 21.—AW- et Am. trop.
sphaerocephalus, Vahl, Enum. ii. 810 = obtusiflorus.
sphaerolepis, *Boeck. in Linnaea*, xxxv. (1867-68) 609-—Am. bor.
sphaerospermus, *Schrad. Anal. Fl. Cap. Cyp.* 8.—A»- austr.
sphaerostachys. Link, Jahrb. i. III. 89 «C. Luzulae.
spherobolos, Poir. Encyc. Suppl. v. 187 - C . Sporobolus.
spicato-capitatus, Steud. Syn. PI. Cyp. 27=Mariscus rufus.
spicatus, *J. (f C. Presl, Rel. Haenk. i.* 178.—Ins- Luzon.
spfcigerus, *Vahl, Enum.* ii. 800.—Bras.
spiculosus, Reichb. Cat Sem. Hort Dresd (1828)-congestus.
spinuliferus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 466-Pycreus angulatus.
spinulosus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 203-Mariscus microcephalus.
spongioso-coriaceus, Boeck. in Flora, xlii. (1859) 441*° Mariscus albescens.
Sporobolus, *R. Br. Prod.* 215.—Austral.
spretus, Steud. Syn. PL Cyp. 21-denndatus.
squalidus, *Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (18 199.—Costa Rica.
squamulatus, Steud. Syn. PL Cyp. 49=distans.
squarrosus, Afzel. ex Kunth, Enum. PL ii. 25-gWp""
squarrosus, Kotschy, ex C. B. Clarke, in Journ. *U'"* Soc. xxi. (1884) 46=Pycreus nitens.
squarrosus, *Linn. Cent. PI.* ii. 6 ; *Amoen. Acad.* iv. *W°'* —Cosmop. trop.
squarrosus, F. Muell. Fragm. viii. 262=cnspidaW»
squarrosus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 1 pygmaeus.
stachyphorus, C. Koch, in Linnaea, **xxi.** (1848) 623* Pycreus retusns.
St-Crucn, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. 223 (Marisci sp.)=/?ra*.
stellatus, Link, Jahrb. i. m. 84 = C. Haspan.
stellatus, *Noronha, ex Thou. Prod. Phyt.* 2, in *Milang.* (1811), nomen.—Madag.

CYPERU —

stellatus, Radge, PL Gni. 17. t. 20«giganteusl
stenolepis, Tore, in Ann. Lye. N. York, iii. (1886) 283 (Marisci sp.).—Am. bor.
ttenostachyus, *Benth. Fl. Austral*, vii. 28O.-An«tral.
Steudelianus, Boeck. in Linnaea, zxzvi. (1869-70) 882 -Mariscus Sieberianns.
stigmatosus, Steud. Syn. PI. Cyp. 88 - Mariscus •lbescens.
sMonifer, Wiild. ex Konth, Enun. PL U. 69 - rotundas.
stolonifena, Nets, in Wight, Contrib. 81, partim — oulbotns.
•tolonifems, *Ret: Obs.* iv. 10.—Geront trop.
'tratnineus, Link, Jabrb. i in. 84 * Pycreus flavescens.
tramineus,Hta, in Wight, Contrib. 74 (Pyctei sp.).—lad. or.
striatulus, Vahl, Enum. ii. 311-obtusiflonm
stnatns, *Suit V Pav. Fl. Per. I* 47.-Peniv.
stnetus, Lam. Tabl. Encyc i. 146 « Pycrens capillaris.
**Mctus*, Rottl.ex C. B. Clarke, in Joum. Linn..Soc Mi. (1884) 54=Pycrens.porystachyns.
"rictus, Wight, ex C. B. Clarke, 1. c. 46 - Pycrens pumilus.
stngosus, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 99 (Marisci spp.).—Am. bor.
stngosus, Linn. Sp. PI. 47 (Marisci sp.).-Am. bor.
**Mgosus*, Schlecht ex Knnth, Enum. PI. iL 89 (Marisci «P0 *"ferax*.
stngosus, Wight, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc "i. (1884) 61 = Pycreus polystachyos.
strigosus, Willd. Enum. Hort. Berol. 74=congestus.
stuppeus, Forst. f. Prod. 89^Mariseus albescens.
***6alatus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 291 = auricomus.
fbalatus. Stead. Syn. PI. Cyp. 81 = pilosus.
snbanceps, *Boeck. in Linnaea*, xxxviii. (1874) 368.—lad. occ.
ntbarticulatus, Nees & Meyen, in Linnaea, ix. (1834) 286=. articulates.
subbulbosus, Roem. & Scholt. Syst. ii. 186-=congestus.
sabenervius, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 27.—Reg. Argent.
Mbfuscus, *Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord*, xxxi. (1877) t. 8; xxxiL (1878) 28.-China.
***bnodosus*, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat Cur. »x. Snppl. i. (1843) 6»=nodosus.
suorotundus, Llanos, Fragm. 14 - difformis.
•ibtnonastichyus, *Steud. tf Jard. in Bull. Soc. Linn. Nonnand.* Sir. II. ix. (1876) 278, 280.—Ins. Mar. qnes.?
subulatus, Meyen, Reite, i. 108-Mariscus Meyenianns.
subulatus, *R. Br. Prod.* 217.—Austral.
***Icinux*, C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xxi. (1884) 06 (Pycrei sp.).—As. et Afr. trop.
Wnnamensis, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 35; *Prog.* 20.—A○». trop.
*"*namensis*, Vahl, ex Kunth, Enum. PI. ii. 43 = <~ Luzulae.
sylvestris, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* ii. (W84) 134.—Afr. trop.
*7«f««. Parl. in Mem. PnSs. Acad. Sc. Fr. xii. (1864) *?8.t.l=C. Papyrus.
ta○tna, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 66 (Marisci sa?pi.)—Peruv.
(Ma?ri^ ^ A"*1-F1- Ca P- Cy P-1« (Marisd sp.). . —Afr. austr.
"enensis, Nees & Meyen, Reise, i. 481 j et in Nov. Act. "•* Cur. xix. SuppL i. (1848) 64 (Marisci sp.) = *rigens*.
W tn *Steud. Syn. PI. Cyp.* 87.—Ins. Taiti.
*'PPbllus, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. Bot ii. U884) 148 (Marisci sp.).—Afr. trop.
tatari c^'Less- TM Li™"'*. «• (1834) 211 (Pycrei sp.). ~oJbir. oral.
fKformis, Benth. Fl. Austral, vii. 278=malaccensls.
«geUformis, *Roxb. Hort. Beng.* 6; *Am. in Wight, ContrH.to.-A** .tiop.
i i ? ? > Journ. Linn. Soc. xxi. (1884)
«0 (exempl. Afric.)=.Schimperianus.
r.; Aff. trop.
•usb,8"'**'"" Unnaea> xxxv. (1867-68) 504.—Afr.
endo Banks 8c Soland. ex Hook. f. FL N. Zel. L 273 Schoenns Tendo.
j f ^ t t w . / . *Suppl.* 103.—Afr. austr.; Austral.;

CYPERUS :—

tenellus, *J.* & C. Presl, Rel. Haenk. i. 176 (Pycrei sp.) =rivularU.
tenellus, Ton. in Ann. Lye. N. York, iii. (1886) 267 - Pycreus polystachyns.
tener, Nees & Ehrenb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 301=bulbosus.
teuer, *Vahl, Enum.* ii. 299 (Scirpust).—Ind. or.
Teneriffae, Nees, in Linnaea, z. (1886-86) 181 = Meyerianns.
Teneriffae, Poir. Encyc vii. 245-ruMcundus.
tenerrimus, Iiebm. in Vidensk. Selsk. Sb. V. iL (1851) 209=humilis.
tenerrimus, *J.* b* C. *Presl, Rel. Haenk.* i. 166.—Mexic.
Tenorianus, Schult. Mant. Ii. 644-esculentns.
Tenorii, Presl, Fl. Sicul. p. xliU-esculentus.
tenuicapitatus, Steud. Norn. ed. II. i. 470=*surinamensis.
tenuicomus, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 223-corymbosus.
tenuiculmis, Boeck. in Flora, bnL (1879) 654 = gracilinux.
tenuiculmis, Boeck. in Linnaea, xxzvi. (1869-70) 286 = Zollingeri.
tenuiculus, Kunth, Enum. PI. ii. 106 (Pycrei sp.) = *rivularis*.
ienuiflorus, EIL Sketch, i. 70=erythrorrhizos.
tenuiflorus, Jacq. Ic. PI. Rar. ii. 8. t. 296 = longus.
tenniflorus, *Rottb. Desc. Nov. PI.* 80.—Ind. or.; Ins. Manrit
tenuifiorus, Roxb. Hort. Beng. [6]; FL Ind. i. 199 = tuberosus.
tenuifolius, Walp. Ann. i. 898, sphalm.= rotundas.
tenuior, Engelm. in A. Gray, Man. Bot N. U. St. ed. II. 492 (Marisci sp.) =*Engelmanni*.
tenuis, Muhl. Desc Gram. 22=Pycreus polystachyns.
tenuis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 20 (Marisci sp.).—Jamaica.
tenuispica, Stead. Syn. PI. Cyp. ll=flavidus.
tenuispicatus, *Boeck. in Linnaea*, xxxv. (1867-68) 625. —Guiana,
tenuispiculatus, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 500.—Madag.
tephrodes, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. iL I. 30 » dichromenaeformis.
teretifolius, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* iL 477.—Abyss.
teretifructus, Steud. Syn. PI. Cyp. 8=Pycrens capillaris.
terminalis, *Marsh, ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 5.—Afr. trop.
terminalis, Michx. ex Steud. Nom. ed. I. 257 = flavescens.
tersus, Link, Jahrb. i. III. 82=rubicnndus.
tetracarpus, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 68 (Marisci sp.) =*Seemannianus*.
tetragonus, Ell. Sketch, i. 71 (Marisci sp.).—Am. bor.
tetragonus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 452 = Mariscus Jacquinii.
tetraphyllus, Beauv. ex Kunth, Ennm. PI. U. 13 = Pycreus polystachyus.
tetraphyllus, *R. Br. Prod.* 214.—Austral.
tetrastachyos, Desf. FL Atlant. i. 46 = rotundas.
texensis, Steud. Syn. PL Cyp. 9= Pycrens polystachyns.
textilis, Boj. Hort. Maurit 878=tegetum.
textilis, F. Muell. Fragm. viiL 281=vaginatus.
textilis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 18.—Afr. austr.
Textori, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iL 14L—Japon.
Teysmanni, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 269 (Pycrei sp.).—Sumatra.
thermalis, Duin. Fl. Belg. 145-longas.
Thomsonl, *Boeck. in Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 294.—Ind. or.
Tkouarsianus, Presl, in Oken, Ids, xxL (1828) 271 = Mariscus Dregeanus.
Thouarsii, Knnth, Enum. PI. ii. 12 » polystachyus.
Thunbergii, Reichb. ex Kunth, I. c. 72 = radiatus.
Thunbergii, Vahl, Enum. ii. 371 = Mariscus riparius.
thyrsiflorus, Boeck. in Linnaea, xxxvi (1869-70) 6 • Mariscus flabelliformis, rofus.
thyrsiflorus,Jvngh. in Linnaea, iv. (1831) 24 = Mariscns Jacquinii.
thyrsiflorus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. Ii. (1851) •214 (Marisci *sp.*) =*dissitiflorus*.
toluccensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. L 206 = difiusus.

CYPERTJS :—

tongatabuensis, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 86 => Mariscus albescens.
torosus, Sieber, ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 84 - Pycreus polystachyns.
torosus, Vahl, Enum. ii. 339 =malaccensis1
torosus, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 60 =longus.
Torreyanus, Schult. Mant iL 101 «- Pycreus polystachyus.
tortulanus, Vahl, ex Kunth, Enum. PL it 43 = surroamensis.
tortuosus, Koen. ex Roxb. Hort Beng. [6]; FL Ind. L 197 = Pycreus capillaris.
trachynotus, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 227.—N. Mexic.
trachyrhachis, Steud. Syn. PI. Cyp. 8 = Pycreus capillaris.
trachysanthos, *Hook. VArn. Bot. Beech. Voy.* 99.—Ins. Sandvic
tremulus, Baker, FL Maurit. 409, partim = Pycreus albomarginatns.
tremulus. Poir. Encyc vii. 264=Pycreus retusus.
triceps, Nees, in Linnaea, xix. (1847) 697 (Marisci sp.) =*Manimae*.
trichodes, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 564.—Ind. occ.
trichostachys, Benth. FL Austral, vii. 287 (Marisci sp.) *~Dietrichiae*.
trifiorus, linn. Mant. ii. 180 (Fimbristylidis sp.) =*tristachya*.
trigynus, Spreng. Syst i. 216 = Androtrichum polycephalum.
trinervis, *R. Br. Prod.* 213.—Austral.
Trinitatis, Steud. Syn. PL Cyp. 26 - C. Luzulae.
triqueter, *Boeck. in Flora*, lxii. (1879) 648.—Afr. trop.
Mspicatus, Boeck. 1. c lxv. (1882) 14 (Marisci sp.).—Am. austr.
tristachyus, Boeck. in Linnaea, xxzv. (1867-68) 454 iPycrei sp.).—Am. austr.
tristis, *Kunth, Enum. PI.* iL 36.—Afr. austr.
trisulcus, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 89.—Nepal.
truncatulus, Steud. in Flora, xxv. (1842) 681 = Pycreus nitens.
truncates, *C. A. Mey. ex Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1888) 103.—Reg. Amur,
truncatus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 487.—Abyss.
tuberiferus, Steud. Nom. ed. II. i. 474=digitatus.
tuberosus, Boj. Hort Maurit. 379 > stoloniferus.
tuberosus, Pursh, Fl. Am. Sept i. 62-esculentus.
tuberosus, Rottb. Desc. Nov. PL 28; Prog. 18.—Ind. or.; Afr. bor. I
tuberosus, Roxb. Hort. Beng. [5]; Fl. Ind. L 199 = rotundas.
tuberosus, Willd. ex Kunth, Enum. PL ii. 60, 93 = Mariscus microcephalus.
tunicatus, Roem. *Be* Schult Syst. Mant. ii. 115 = C. Haspan.
turfosus, Salzm. ex Kunth, Enum. PL ii. 7 = Pycreus Mnndtii.
turgidulus, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) ISO.—As. trop.
ubertus, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. 87 «rafus.
uliginosus, Thou, ex Link, I. c. 82=laevigatus.
umbellatus, Benth. Fl. Austral, vii. 289, partim = Mariscns albescens.
umbellatus, *Benth. Fl. Hongk.* 386 = Mariscus cyperinus.
umbellatus, Burm. f. Fl. Ind. 21. t. 9. f. l^C. Haspan.
umbellatus, Hemsl. Bot Voy. Challenger, L II. 28 - Mariscus appendiculatus.
umbellatus, Oliver, in Trans. Linn. Soc xxix. (1875) 166, partim - Mariscus macer.
umbellatus, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. L 206 - exaltatus.
umbellatus, Thw. Enum. PL Zeyl. 845 - Mariscus pictus, paoiceus, cyperinui.
umbraticola, Kunth, Enum. PI. iL 13«Pycreus umbrosus.
umbrosus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 285-difrasus.
umbrosus, Salzm. ex Steud. Syn. PL Cyp. 17= simplex.
undnatus, R. Br. Prod. 215-aristatus.
uncinatus, Desv. ex Ham. Prod. PL Ind. Occ. 12 - hamulatus.
uncinatus, *Poir. Encyc.* vii. 247.—Madag.
uncinulatus, *Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 23.—Bras,
unicolor, *Boeck. inKjoeb. Vidensk. Meddel.* (1879-80) 24.—Am. austr,

CYPERTJ8:—
nniflorus, *Thunb. Ft. Jinan.* 8.—Java.
uniflmts, Torr. & Hook, in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 431 •« Mariscns nniflorns.
unifolius, Boeck. In Iinnaea, xzxvi. (1860-70) 374 = Mariscus havanensis.
unioloides, R. Br. Prod. 216-Pycreus angulatns.
upoluensis, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 88 (Marisci sp.) =*Seemannianus.*
Uryilleanus, Stead. Syn. PI. Cyp. 16 = Scirpus inundatus.
usUatus, *Burch. ex Roem. b[1] Schult. Syst. Mant.* ii. 477.—Afr. austr.
ustulatus, A. Rich. Ess. Fl. N. Zel. 101. t 17 (Marisci sp.).—N. Zel.
vaginatus, *R. Br. Prod.* 218.—Austral.
vaginatus, Link, Jahrb. i. m. 85 «C. Haspan.
Vahlii, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 398 (Marisci sp.)=/«•«*.
Vahlii, Steud. Syn. PI. Cyp. 48 (Marisci sp.).—Ind. occ.
Valdiviae, Stead. 1. c. 45 = Mariscus albescens.
variabilis, Salzm. ex Steud. 1. c. 46 = esculentus, *ferax.*
variegatus, Boeck. in Linnaea, xxxvi (1869-70) 387-Mariscus bulbocaulis, plateilema, Schimperi.
variegatus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 562 = Pycreus propinquus.
variegatus, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. i. 208 (Pycrei *sp.)* = *melanostackyus.*
vegetus, Salzm. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 5 = coovallinm.
vegetus, *Willd. Sp. PI.* i. 283.—Chili.
ventricosus, R. Br. Prod. 217 = Mariscus albescens.
venustus, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 316--digitatus, anricomus.
venustus, R. Br. Prod. 217=exaltatns.
venustus, Forst. f. Prod. 89-Mariscus cyperinas.
venustus, Konth, Enam. PI. ii. 68-digitatus, fastigiatns.
venustus, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 271=anricoraus.
versicolor, Nees, in Wight, Contrib. 78 •= aristatus.
verticillatus, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 206 = radiatus.
vestitus, Hocbst ex Krauss, in Flora, xxviii. (1846) 765 (Marisci sp.).—Afr. anstr.
virens, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 28.—Am. bor.
virens, Reichb. ex Kunth, Enum. PI. ii. 43 = surinamensis*
virens, Willd. ex Kunth, 1. c. 34, 40 = denUtns.
virescens, Hoffm. Deotschl. Fl. ed. II. i. I. 21-fuscus.
virescens, Salzm. ex Stead. Syn. PI. Cyp. 16=compressus.
virginicus, Jacq. ex Stead. 1. c. 47 (Marisci sp.) = *Michauxianus.*
viridis, Krock. Fl. Sil. i. 64 = fuscus.
viridis, Roxb. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 172 = rotundas.
viridis, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 270 oglaber.
viridis, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 88 = difformis.
viridulus, Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 485 = laevigatus.
viscosus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 20 = elegans.
viviparus, Stend. Syn. PI. Cyp. 316 = elegans.
Volckmanni, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 269. -Chili.
vulgaris, Hochst. ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 490-^maculatos.
vulgaris, Sieber, ex Kunth, Enam. PI. ii. 4-Pycreus capillaris.
vulnerans, Salzm. ex Schlecht in Bot Zeit. vii. (1849) 98 = Mariscus ramns.
Wallichianus, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 28.—Nepal.
WaUichii, Nees, in Wight, Contrib. 83-malaccensis.
Warmingii, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 129.—Bras.
Watsonianus, *Boeck. in Flora,* xlii. (1869) 435 [bis].—Am. bor.
Wawrai, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 363.—Bras.
Webbianns, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 20.—Afr. anstr.
Widgrenii, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 499.—Bras.
Wiestii, Steud. Syn. PI. Cyp. 36 - anricomus.
Wightii, Hance, in Joum. Bot. xvi. (1878) 14 = Zollingeri.
Wightii, Nees, in Wight, Contrib. 78 = rnbicundns.

CYFERTJS:—
Wolfii, *Wood, in Coult. Bot. Gat.* i. (1876) 38.—Am. bor.
xanthinus, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 271 = Pycreus flavescens.
xanthocomus, Link, Hort. Berol. i. S16=auricomus.
xanthopus, Steud. in Flora, xxv. (1842) 596-eleusinoides.
xanthostachyus, *Steud. 1. c.* 600.—Chili.
xanthostathius, Steud. Syn. PI. Cyp. 332 (Index) = xanthostachyus.
yemenicus, Spreng. Syst. i. 221 =jeminicus, *Rottb.* (nee *RetM.).*
Zollingeri, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 17.—As. et Afr. trap.

CYPHAEA, Lem. in Orb. Diet. iv. Corrig. (1849) = Cuphea, P. Br. (Lythrar.).

CYPHANTHERA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. xi. (1853) 376 - Anthocercis, Labill. (Solanac).
albicans, Miers, 1. c. 379=A. albicans.
cuneata, Mien, 1. c. 378-A. Eadesii.
frondosa, Miers, 1. c. 376=A. Eadesii.
microphylla, Miers, 1. c. 381 =A. microphylla.
ovali/olia, Miers, 1. c. 880 = A. albicans.
scabrella, Miers, 1. c. = A. scabrella.
tastnanica, Miers, 1. c. 377=A.tasmanica.
tomentosa, Miers, 1. c. 379-A. albicans.

CYPHIA, Berg. Desc. PI. Cap. 172 (1767). *CAMPANULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 654.
CYPHIUM, J. F. Gmel. Syst. 370 (1791).
angustifolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 500, sphalm. -digitata.
angustifolia, Eckl. & Zeyh. Enam. 890 - undulata.
angustiloba, Presl, in Eckl. & Zeyh. 1. c. 389 = digitata.
anomala, Eckl. & Zeyh. 1. c. 890=nndulata.
assimilis, *Sond. in Horn, h" Sond. Fl. Cap.* iii. 600.—Afr. austr.
atriplicifolia, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enam. 889 = crenata.
Botrys, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 477 = bulbosa.
bnlbosa, *Berg. Desc. PL Cap.* 172.—Afr. austr.
campestris, *Eckl. O" Zeyh. Enum.* 891.—Afr. austr.
Cardamines, *Willd. Sp. PI.* i. 953.—Afr. austr.
dnarioides, Presl, in E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 293, sphalm. vide linarioides.
corylifolia, *Harv. Thes. Cap.* ii. 39.—Afr. austr.
crenata, *Presl, Prod. Monog. Lobel.* 51.—Afr. austr.
dentariaefolia, *Presl, in E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 295.—Afr. austr.
digitata, *Willd. Sp. PI.* i. 953.—Afr. austr.
Dregeana, Presl, in E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 294=crenata.
Eckloniana, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 392 = Zeyheriana.
data, *Harv. Thes. Cap.* ii. 39.—Afr. austr.
Gerrardi, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 601.—Afr. austr.
glandulifera, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 8.—Abyss,
heterophylla, *Presl, in Eckl. tf Zeyh. Enum.* 389.—Afr. austr.
incisa, *Willd. Sp. PI.* i. 963.—Afr. austr.
latipetala, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 391 = volubilis.
linarioides, *Presl, I. c.—Afr.* austr.
linarioides, Presl, in E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 294, ex parte=campestris.
longipetala, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 389 = volubilis.
oblongifolia, *Sond. in Harv.* b* *Sand. Fl. Cap.* iii. 601.—Afr. austr.
persicifolia, *Presl, in E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 296.—Afr. austr.
Phyteuma, *Willd. Sp. PI. i.* 953.—Afr. austr.
phyteumifolia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 124-praec.
pinnate, *Roem. V Schult. Syst.* v. 477.—Ind.' occ.
polydactyla, Presl, in E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 296=digitata.
salicifolia, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enam. 390 = sylvatica.
serrata, Spreng. Nene Entdeck. i. 274=C. Phyteuma.

CYPHIA:—
simplex, Spreng. ex Presl, Prod. Monog. Lobcl. 10 = Lobelia scabra.
Stheno, *Webb, in Hoot. Niger Fl.* 148.—Ins. Cap. de Verd.
sylvatica, *Eckl. V Zeyh. in S. Afr. Quart. Joum.* (1880) 373.—Afr. anstr.
tenuifolia, A. DC. in DC. Prod. vii. 498 = linarioides.
tomentosa, Presl, in E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 295=digitate,
undulate, *Eckl.* b* *Zeyh. in S. Afr. Quart. Joum.* (1830) 373.—Afr. austr.
volubilis, *Willd. Sp. PI.* i. 952.—Afr. austr.
Zeyheriana, *Presl, in Eckl. (f Zeyh. Enum.* 392.—Afr. austr.

CYPHIUM, J. F. Gmel. Syst. 870 (1791)-praec.
capense, j. F. Gmel. 1. c. = Cyphia bulbosa.

CYPHOCALYX, Presl (Bot Bemerk. 127) (1844), in Abh. Boehm. Ges. Wiss. V. iii (1846) 567=Aspalathua, Linn. (Legnmin.).
aridus, Presl, 1. c.-A. arida.
major, Presl, 1. c—A. arida.

CYPHOCABPTJ8, Miers, in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 62. *CAMPANULACEAE,* Benth. * Hook. f. ii. 554.
rigescens, *Miers, I. c*—Chili.

CTPHOKEHTIA, Brongn. in Comptes Rend. Acad. Sc. Par. Ixxvii. (1878) 397. *PALMAE,* Benth. * Hook. f. iii. 894.
Balansae, Brongn. 1. c. 400 = Cyphosperma Balansae.
Billardieri, Brongn. I. c. 401 -Microkentia Billardieri.
bracteata, *Brongn. I. c.* 400.—N. Caled.
Deplanchei, Brongn. L c 401 = Microkentia Deplanchei.
eriostachys, Brongn. 1. c. = Microkentia eriostachys.
gracilis, Brongn. 1. c. = Microkentia gracilis.
Humboldtiana, *Brongn. I. c.* 400.—N. Caled.
macrocarpa, Hort.—Cf. Card. Chron. (1878) I. «<> -Kentiopsis macrocarpa.
macrostachya, *Brongn. in Comptes Rend. Acad. Sc Par.* Ixxvii. (1873) 399.—N. Caled.
Pancheri, Brongn. 1. c. 400 - Microkentia Pancheri.
robusta, *Brongn. 1. c.*—N. Caled.
surculosa, Brongn. 1. c. 401 = Microkentia surculosa-vaginata, *Brongn. 1. c.* 402.—N. Caled.
Vieillardi, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 895, sphalm.-Cyphosperma Vieillardi.

CTPHOLOPHUS, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sfr. IV.-i. (1864) 198. *VRTICACEAE,* Benth. & Hook, f- «<>• 388.
Blumeanus, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1856-67; 487.—Ins. Molucc.
coeruleus, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 236" » Blumeanus.
ellipticns.H'aU. /. *c*—Java,
heterophyllus, *Wedd. I. c.* 235".—Ins. Fiji,
latifolius, *Wedd. 1. c*—N. Guinea.
lutescens, Wedd. 1. c. = rufescens.
macrocephalus, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV- >• (1854) 198.—Ins. Philipp.
melanocarpus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 268.—N. Guinea.
moluccanus, Miq. Ann. Mus. Bot.Lugd. Bat iv. 806-macrocephalus.
prostratus, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 235".—"• Guinea; Ind. bor.
rufescens, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. i. (1864) 198.—Java,
vestitus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 268.—N. Guinea.

CYPHOMANDRA, Mart, ex Sennta. in Flora,»« (1845) 162. *SOLANACEAE,* Benth. & Hook, t »• 889.
CYATHOSTYLES, Schott, ex Meissn. Gen. PI. Com*[1]-184 (1840).
PALLAVICINIA, DeNot. in Flora, xxx. (1847) 5«
PIONANDRA, Miers, in Hook. Lond. Journ. * «• f 1846) 353.
abutiloides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) a*»-
adenotricha, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1845) ^•'T^J.
aUophylla, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. a-* *"' Panama. 174 =
betacea, Miers, in Seem. Bot. Voy. Herald, «» HartwegL

CYPHOMAWDBA:-
betacea, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1846) 172.—Am. austr.
brachypodia, *Sendt. I. c.* 171.—Bras,
cajannmensis, *Seridt. ex Walp. Rep.* vi. 679.—Am. trop.
calycina, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1846) 167.—Bras,
capsicoides. *Dun. in DC. Prod.* xiiL I. 898; *Sendt. in Mart. Fl.Bras.* x. 128.—Bias,
caracasana, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1846) 168. t. 2. f. ¨1-3—Venezuela.
ouata, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 401 j *Sendt. ex Walp. Rep.* vi. 578.—Bras.
owiacea, *Dun. I. c.; Sendt. ex Walp. 1. e.* 579.—Peruv.
somigera, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 401.—Bias.
Cornucopia, *Dun. 1. e.* 400.—Bras,
corymbiflora, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1845) 174.—Bras.
crotonifolia, Sendt. ex Walp. Rep. vi. 579-Solanum crolonifolium.
ëyHndrica, *Sendt. in Mark Fl. Bras.* x. 121.—Bras,
oiploconos, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1845) 169. t 8. f. ¨ 1-10.—Bras.
wvaricata, *Sendt. 1. c.* 174. t. 9. f. 1-6.—Bras,
elliptica, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 121.—Bras.
flagrans, Sendt. 1. c. 123 = Solanum inaequale.
flonbunda, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 890.—Bras,
ira[illegible] *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 116.—Reg. Fraxi[illegible]
-—ella, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 122.-Bras.
Hartwegi, *Sendt. ex Walp. Rep.* vi. 579.—N. Granat.
Jtabirensis, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 400.—Bras.
Jaxiflora, *Dun. 1. c.* 897.—Bras.
loòata, *Sendt. in Mart- Fl. Bras.* x. 115.—Bras.
"*arenas,* Sendt. ex Walp. Rep. vi. 579= Solanum nareuse.
[illegible]»qua, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1845) 172.—Peruv.
Ov"'*fringillae,* Dun. in DC. Prod. xiii. I. 894-Velloziana.
°*yphylla, *Dun. 1. c.* 896.—Bras.
Pfnoola, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1845) 173.—Peruv.
Pnysaloides, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 388.—Bras.
Ptperoides, Dun. I.e. 390-floribunda.
Premnaefolia, *Dun. I. c.* 392.—Bras.
procera, *Wawra, m Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1868) [illegible].—Hab. T
Miadostylis, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1845) 170. t 4.—Bras.
[illegible]Plendens, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 395.—Peruv.
ycocarpa, *Sendt. in Mart. Fl. Bras.* x. 114.—Bras.
[illegible]*p*[illegible], Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii.417-seq.
-., *Sendt. ex Walp. Rep.* vi. 579.—Guiana; Nicaragua.
[illegible]*adhyphyllo* Sendt. 1. c. = Solanum trachyphyllum.
*«ioaana, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1846) 175. -Bras.
It-US"[illegible] *Sendt in Uart_ Fl_Bras_* *• 120.—Bras.
•inCUflora, *Sendt. in Flora,* xxviii. (1845) 175.—Costa Rica.

CYS°MATTIA, Boiss. Fl. Orient, iv. 272 (1879) = -uuidera, Pall. (Boragin.).
[illegible]«nata, Boiss. 1. c.-As?Min. j Persia.

CY?,[illegible]J?NEMA, Herb, in Bot Mag. sub tt. 3710, 8747
[illegible]*yu[illegible] Ait (Amaryll.).
[illegible]**W««a««, Herb. 1. c-Cyrt. helittus.

CYPHOPHOEinX, H. Wendl. ex Benth. *8c* Hook. *y «« .* iii. 893 (1883). *PALMAE,* Benth. *St.* Hook.

CAIWECMPITS, H. Wendl, ex Benth. & Hook. f. 1. c (1883).

Jkp**, *Benth.tf Hook.f. I. c.—S.* Caled.
""<«», *Benth. V Hook./. I. c.—N.* Caled.

CY^HORIMA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 191, [illegible]£7; Catal. 13 (1824)=Iiithospermum, Linn.
[illegible]fagin.
[illegible]*mbens,* Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 191 = £ Wgustifolium.
[illegible]< Rafin_ *• c = L. latifolium.
£"«Vl[illegible], Rafin. 1. c =L. angustifolium.
[illegible]fin. Catal. 18-L. IatifoUum.

CYPHOSPERM*, H. Wendl. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 895 (1883). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
Balan[illegible] *WendL ex Benth_ v Hook_* /• '•c_ 894,
W a ^ V[illegible]aled.
Vi«llardi, *Benth. V Hook./. I. c.* 896.—N. Caled.

CYPHO8TIGMA, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1380 (1882). *SCITAMJNBAB,* Benth. & Hook. f. iii. 645.
pulchellum, *Benth. I. c*—Zeylan.

CYPRIANTHE, Spach, Hist Vég. Phan. vii. 220 (1839) = Ranunculus, Tonrn.
anemonoides, Spach, 1. c. 221-R. asiaticus.
asiatica, Freyn. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 942 = R. asiaticus.

CYPRIPEDIUM, Linn. Syst ed. I (1735). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 684.
ARIETINUM, Beck, Bot. N. and Midi. U. St. 352 (1833).
CALCEOLARIA, Heist. Syst. 5 (1748).
CALCEOLUS, Adans. Fam. il. 70 (1763).
CORDULA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 46 (1836).
CORISANTHES, Steud. Nom. ed. II. i. 474 (1840) in syn.
CRIOSANTHES, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 102.
HYPODEMA, Reichb. Nom. 66 (1841).
MENEPHORA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 46 (1886).
SACODON, Rafin. 1. c. 45 (1836).
STIMEGAS, Rafin. 1. c. (1836).
acaule, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. SOS=hnmile.
album, Ait. 1. c.=spectabile.
Argus, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1873) 608.—Ins. Luzon,
arietinnm, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 222.—Am. bor.
Atsmori, *Morr. in Belg. Hortic.* i. (1851) 171. t. 1. 1.—Japon.
barbatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 63.—Java,
bifidum, *Rafin. Atl. Journ.* 178.—Am. bor.
Boissierianum, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 116 = Selenipedinm Boissierianum.
boreale, Salisb. Prod. 10 - C . Calceolus.
Boxallii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) I. 367 = villosum.
bulbosum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 637 = Eulophia sumatrana.
bulbosum, Linn. Sp. PL 961 - Calypso borealis.
Bullenianunt, Reichb. £ in Bot. Zeit. xxiii. (1865) 99 =• Hookerae.
Burbidgei, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) II. 38-Dayanum.
Calceolus, *Linn. Sp. PI.* 951.—Europ.
Calceolus, Thunb. Fl. Jap. 30-macranthum.
Calceolus, Walt. Fl. Carol. 222 >pubescens.
califomicum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 889.-Calif.
canadtnse, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 261 = spectabile.
candidnm, *Muhl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 142.—Am. bor.
cardinale, Reichb. f. in Gard. Chron. xviii. (1882) 488-Selenipedium cardinale.
cardiophyllum, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 39.—Japon.
caricinum, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-61) 89=Selenipedium caridnnm.
caudatum, LindL Gen. et Sp. Orch. 681'Selenipedium caudatum.
Chica, *Pfitur, Vergl. Morph. Orch.* 138.—Hab.?
ciliolare, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 488.—Ins. Philipp.
concolor, *Batem. in Hook. Bot. Mag.* t. 6613.—Burma,
cordigerum, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 37.—Reg. Hiraal.
cothumum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 63.—Bras.
Crossii, Morr. in Belg. Hortic. xv. (1865) 226 - barbatum.
cruciatum, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 128 - C . Calceolus.
cruciforme, Zoll. & Mor. ia De Vriese, Illustr. Orch. t. 6 = Lowei.
Curtisii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) II. 8.—Ins. Sondaic
dariense, *Reichb. f. I. c.* (1878) I. 202, in desc. C. Hincksiani.—Panama.
Dayanum, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 214.—Borneo.
debile, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 223.—Japon.
Drnrii, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 28.—Ind. or.
epidendricnm. *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 64.—Bras.
Fairieanum, *Lindl. in Gard. Chron.* (1857) 740.—Reg. Himal.
fasciculatum, *Kellogg, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 380.—Am. bor.
ferrugineum, S. F. Gray, Nat AFT. Brit. PI. ii. 218-C. Calceolus.
flavescens, [DC. in] Red. Lil. L t. 20-pubescens.

CYPRIPEDIUM:—
glanduliferum, *Blume, Rumphia,* iv. 56.—N. Guinea.
grande, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) I. 462-Selenipedium grande.
guttatum, *Sv. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1800) 251.—Sibir.
Harrisianum x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 108.
Hartwegii, Reichb. f. in Seem. Bot. Voy. Herald, 215 "Selenipedium longifolium.
Haynaldianum, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 222.—Ins. Philipp.
Hincksianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) I. 202=Selenipedium longifolium.
hirsutissimum, *Lindl. ex Hook. Bot. Mag.* t. 4990.—Java.
hirsutum, Mill Gard. Diet. ed. VIII. n. 8=spectabile.
Hookerae, *Reichb. f. in Hook. Bot. Mag.* t. 5362.—Borneo.
Humboldti, *Ware: ex Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852)691.—Peruv.; Panama,
humile, *Salisb. in Trans. Linn. Soc. i.* (1793) 79. t. 3. f. 4.—Am. bor.
insigne, *Wall, ex Lindl. CM. Bot.* t 82.—Reg. Himal.
irapeanum, *La Llave V Lex. Nov. Veg. Desc. fasc.* ii. *(Orch. Opusc.)* 10.—Mexic.
japonioum, *Thunb. Fl. Jap.* 80.—Japon.
javanicum, *Reinm. ex Blume, Cat. Gew. Buitena.* 98, nomen; in *Lindl. V Paxt. Flow. Gard.* i. (1850-51) 88.—Java.
Klottscheanum, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 811 =Selenipedium Klotzschianum.
laevigatum, Batem. in Hook. Bot Mag. t. 5508-philippinense.
Lawrenceanum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) n. 748.—Borneo.
Lexarnae, Scheidw. in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. viii. (1839) 265=irapeanum.
Lindenii, Van Houtte, Fl. des Serres, xviii. (1870) 155 =Selenipedium caudatum,
Lindleyanum, Schomb. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 63-Selenipedium Lindleyanum.
lineari-subulatum, Llanos, Fragm. 99-Cleisostoma longifolium?
longifolium, Warscz. *Be* Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 690=Selenipedium longifolium.
Lowei, *Lindl. in Gard. Chron.* (1847) 765.—Borneo.
luteum, Rafin. Med. Fl. (18281 140. t. 30 = pubescens, parviflorum.
maennthon, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1800) 251.—Reg. Himal.; Sibir.
Mastersianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1879) II. 102.—Ins. Sondaic.
molle, Lindl. in Benth. PI. Hartw. 72 = irapeanum.
montanum, *Dougl. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 528.—Am. bor.
nigritum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 102.—Borneo.
niveum, *Reichb. f. 1. c.* (1869) 1038.—Burma,
occidentale, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 147.—Am. bor. occ.
orientate, Spreng. Syst. iii. 748 - guttatum.
palmifolinm, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 527.—Guian.
pardinum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 554-venustum.
Parishii, *Reichb. f. in Flora,* Hi. (1869) 822.—Burma,
parviflorum, *Salisb. in Trans. Linn. Soc. i.* (1791) 77. t. 2.-Am. bor.
parviflorum, Sims, Bot. Mag. t. 911-pubescens.
passerinum, *Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. App.ed.n.Si.—Am.boT.*
Pearcei, Hort. ex Reichb. f. in Fl. des Serres, Sér. II. vi. (1866) 78^Selenipedium Pearcei.
paulistanum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 203.—Bras.
pat ens x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) II. 456.
Petri, Reichb. 11. c. (1880) I. 680 =Dayanum.
philippinense, *Reicho.f. in Bonplandia, x.* (1862) 335.—Ins. Philipp.
platytaenium, Reichb. f. in Gard. Chron. (1880) II. 134=Stonei.
plectrochilum, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 27.—China.
politum x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1880) II. 525.
pubescens, *Willd. Hort. Berol.* i. 13.—Am. bor.
purpuratum, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1991.—Malaya.
purpuratum, Wight, Ic. t 1760 = barbatum.
Reginae, Walt. Fl. Carol. 222 = spectabile.
reticulatum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) II. 520—Selenipedium Boissierianum.

CTPBIPBDITTM:—
Roebelenii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) II. 684 —philippinense.
Roetlii, Regel, Gartenfl. (187S) 97 = Selenipedium longifoliam.
Schlimi, Linden, ex Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 278, in syn.=Selenipedium Schlimi.
Schomburgkianum, Klotzsch, ex Schomb. Remin. 69 =Selenipedium Klotzschianum.
sinicum, Hanoe, ex Walp. Ann. iii. 602=purpuratum.
Socco, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 65.—Bras,
spectabile, *Salisi. in Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 78.— Am. bor.
Spicerianum, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1880) I. 40, 363.—Reg. Himal.
splendidum, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. viii. (1839) 266=irapeanum.
Stonei, *Hook. Bot. Mag.* t. 5349.—Borneo,
superbiens, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 227 Malacca.
Thunbergii,BUaae, Orch, Archip. Ind. 169=macranthon
tonsum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) II. 262.— Sumatra.
variegatum, Georgi, Reise, 1. 282=guttatum.
Veitchianum, C. Lem. Illustr. Hortic. xii. (1865) t. 429 = superbiens.
ventricosum, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1800) 251=macranthon.
venustum, *Wall, ex Sims, Bot. Mag.* t. 2129.—Reg. Himal.
villosnm, *Lindl. in Gard. Chron.* (18541135.—Burma.
virens, Reichb. *I* in Bot. Zeit. xxi. (1863) 128=javanicum.
viitatum, Veil. Fl. Flum. ix. t. 62=Selenipedium vittalum.
Warnerianum, Reichb. f. ex Wittm. in Bcrl. Gart. Zeit: (1888) [876] f. 1-2 = barbatum.
Warsaemczianum, Reichb. f. in Bot. ZeiL x. (1852) 692=Selenipedium caudatum.

CYPROLEPIS, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen-Kyllinga, Rottb. (Cyperac.).
denudata, Steud. 1. c. = K. vaginata.

CYPSELEA, Turp. in Ann. Mus. Par. rii. (1806) 219. 1.121. *FICOIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 866.
MILLEGRANA, Juss. ex Tnrp. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 220.
RADIANA, Rafin. Speech. i. 88 (1814), ex DC. Prod. iii. 853.
hnmifusa, *Turp. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 219. t. 121. f. 5.—Ins. S. Doming.

CYP8EIiOCABPU8, F. Mnell. Fragm. viii. 86 (1873). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 62.
haloragoides, *F. Muell. I.* «.—Austral.

CYPSELODONTIA, DC. Prod. vii. 286 (1888). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. £. ii. 832.
Eckloniana, *DC. I. c.—Afi.* austr.

CYPSOPHILA, Gaertn. Mey. *8c* Scherb. Fl. Wett. ii. 86 (1800), sphalm.^Gypaophila, Linn. (Caryophyll.).

CYRBASIUM, Endl. Gen. 891 (1889) = Cri8tatella, Nutt. (Capparid.).
erosum, Ends, ex Walp. Rep. i. 196-Crist, erosa.
Jamesii, Endl. ex Walp. 1. c.=Crist. Jamesii.

CYBIKLA, Garden, ex Linn. Mant. i. 5. (1767). *CYRILLEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1226.
antillana, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 158.—Jamaic.
aquatica, Roxb. PI. Corom. ii. 47.1.189 = JJmnophila racemosa.
caroliniana, Michx. Fl. Bor. Am. i. 168 «• racemiflora.
indica, Koen. ex Wight & Am. Prod. 364=Vahlia Uldenlandiae.
oldenlandoides, Koen. ex Wight & Am. 1. c. = Vahlia Oldenlandiae.
paniculata, Nntt. in Am. Joura. Sc. v. (1822) 290 « Ardisia Pickeringia.
racemiflora, *Linn. Mant.* i. 50.—Am. bor.
spinosa, Spreng. Nov. Prod. 16=Bursaria ipinosa.
viscosa, Koen. ex Wight & An. Prod. S64=Vahlia viscosa.

CYRILLA, L'Hérit Stirpes Nov. 147. t. 71 (1785) = Achimenes, P. Br. (Gesnerac).
puUkeUa, L'Hérit 1. c. = A. coccraea.

CYRTA, LOOT. FL Cochinch. 278 (1790) = Styrax, Linn.
agrestis, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 4402 « S. serrulatum.
agrestis, Lour. Fl. Cochinch. 278 = S. agreste.
dealbata, Miers, in Ann. & Mag. Nat Hist. Ser. III. iii. (1869) 279=S. Benzoin?
Finlaysoniana, Miers, 1. c. 278-S. Finlaysonianum.
japonica, Miers, 1. c. 279—S. japonicum.
luculenta, Miers, 1. c = S. serrulatum.
serrulata, Miers, 1. c 280=S. serrulatum.
suberifolia, Miers, 1. c. 279-S. suberifolium.
virgata, Mien, 1. c. 280 - S. serrulatum.

CYRTACANTHUS. Mart, ex Nees, in Mart Fl. Bras, ix. 51, in syn. (1847) - Ruellia, Linn. (Acanth.).
cordifolius, Mart, ex Nees, 1. c. (= *Stephanophysum cordifolium*).—Bras,
corymbosus, Mart, ex Nees, 1. c.=R. araoena.

CYBTANDBA, Font. Char. Gen. 6. t. 3 (1776). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1012.
GETONIA, Banks *8c* Soland, ex Benn. PI. Jav. Rar. 122 (1838).
RHYNCHOCARPUS, Reinw. *Sc* Blume, Cat. Gew. Buitenz. 84 (1823).
WHITIA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 16 (1823).
acuminata, Kurz, in Joum. Bot. xiii. (1875) 329 = Cyrtandromoea decurrens.
acuminata, Wall. Cat. n. 80S = Cyrtandromoea acuminata.
acutangula, *Seem, in Bonplandia*, ix. (1861) 267, nomen; *Fl. Vit.* 182.—Ins. Fiji.
Albertisi, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 264. —N. Guinea.
ampla, *C. B. Clarke, 1. c.* 269.—Sumatra,
antiteensis, *C. B. Clarke, 1. c.* 282.—N. Hebrid.
anisophylla, *C. B. Clarke, I. c.* 249.—Sumatra,
anthropophagorum, *Seem, in Bonplandia*, ix. (1861) 257, nomen; *Fl. Vit.* 182.—Ins. Fiji,
apicnlata, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 278. —Ins. Tahiti.
arborescens, *Blume, Bijdr.* 778.—Java,
arguta, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 229.— Ins. Sandvic.
aristata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 18- Dopatrium aristatum.
atrichos, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 237.— Borneo,
aurea, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 29.— Sumatra.
auriculata, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 251. —Ins. Philipp.
axillaris, *C. B. Clarke, I. e.* 260.—Borneo,
baccifera, *C. B. Clarke, 1. e.* 228.—Ins. Sandvic.
basiflora, *C. B. Clarke, 1. c.* 264.—Borneo,
bataviensis, *C. B. Clarke, 1. c.* 216.—Java.
Beccarii, *C. B. Clarke, 1. c.* 249.—Sumatra,
bicolor, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 27.— Sumatra.
Bidwillii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 272. —Ins. Societ.
biflora, *Forst. Char. Gen.* 6. t. 8.—Ins. Tahiti.
Hfiora, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 67 = Bidwillii.
Blumeana, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 875—pendula.
bomeensis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 244. —Borneo.
Brlghami, C. *B. Clarke, 1. c.* Ml.—Ins. Sandvic.
Burbidgei, *C. B. Clarke, I. c.* 262.—Borneo.
Butti, *Home, Fiji*, 260, nomen; *C. B. Clarke, I. c.* 279.—Ins. Fiji,
calycina, *Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* ii. (1843) 229.—N. Guinea,
capitellata, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v.* 269. —Ins. Molucc.
capsularis, Blanco, Fl. Filip. ed. L 17 -Didymocarpus Blanco),
camosa, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 50.— Malaya.
Carnotiana, G. Don, Gen. Syst. iv. 661»Garnotiana.
celebica, Blume, Bijdr. 772-coccinea.
Chippendalei, *Home, Fiji*, 260, nomen ; *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 230.—Ins. Fiji,
chrysea, *C. B. Clarke, I. c.* 212.—Borneo,
ciliata, *Seem, in Bonplandia*, ix. (1861) 257, nomen; *Fl. Vit.* 182.-Ins. Fiji,
coccinea, *Blume, Bijdr.* 772.—Java.

CYBTANDBA:—
coleoides, *Seem, in Bonplandia*, ix. (1861) 267, nomen; *Fl. Vit.* 181.—Ins. Fiji,
compressa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 279. —Ins. Samoa.
confertiflora, *C. B. Clarke, 1. c.* 235.—Ins. Sandvic.
connata, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti*, 60.—Ins. Tahiti.
cordifolia, De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient. 16 = aurea.
cordifolia, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 446. t. 66.— Ins. Sandvic.
coriacea, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 280.— Ins. Fiji.
Cumingii, *C. B. Clarke, 1. c.* 263.—Ins. Philipp.
cuneata, *Blume, Bijdr.* 773.—Java,
cymosa, *Forst. Char. Gen.* 6.—Ins. Tama.
cymosa, Mann, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 222=laxiflora.
decurrens, *De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient.* 14.—Ins. Amboina.
Denhami, *Seem. Fl. Vit.* 182.—Ins. Fiji.
Desvoeuxii, *Home, Fiji*, 260, nomen; *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 265.—Ins. Fiji.
diUtata, *C. B. Clarke, 1. c.* 288.—Borneo,
discolor, *Hort. Lugd. Bat.—Cf. Gard. Chron.* (1865) 865.—Hab.?
diapar, *DC. Prod.* ix. 282.—Malaya,
dissimilis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 207- —Java,
dolichocarpa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1862) 4O.-Ins. Fiji.
elongata, Korth. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 232=decurrens.
eminens, *C. B. Clarke, 1. c.* 208.—Borneo.
Endlicheriana, Walp. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl. i.-(1843) 859. t. 10 = grandiflora.
eximia, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 210.— Borneo.
falcifolia, *C. B. Clarke, 1. c.* 269.—Ins. Samoa,
farinosa, *C. B. Clarke, I. c.* 238.—Borneo,
fenestrata, *C. B. Clarke, I. c.* 233.—Sumatra,
flavescens, *Blume, Bijdr.* 772.—Java.
floribunda, Walp. Ann. iii. 99, sphalm.« Isnntbera permollis.
Fortunei, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 251- —China.
bvtescens, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 81- —Sumatra.
frutescens, Wall. Cat. n. 807 • decurrens, dispar
fusca, Herb, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 262=populifolia.
Gamotiana, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 447. t. 58.— Ins. Sandvic.
glaberrima, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 12-Bonnaya veronicaefolia.
glabra, Banks, ex Gaertn. f. Fruct. iii. 234. t. 224- biflora.
glabra, Herb. Korth. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 243=longepetiolata.
glabra, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1826) 28.— Sumatra,
glabrata, *Soland. ex C. B. Clarke, in DC. Monog-Phan.* v. 277.—Ins. Societ.
Gorriei, *Home, Fiji*, 260, nomen; *C. B. Clarke, I.* '• 273.—Ins. Fiji,
gracilis, *Hillebrand, ex C. B. Clarke, 1. c.* 226.— Ins. Sandvic.
Graeffei, *C. B. Clarke, I. c.* 268.—Ins. Samoa,
grandiflora, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 447.—W'- Sandvic.
grandis, *Blume, Bijdr.* 773.—Java.
Grayi, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 218.— Ins. Sandvic.
hapalantha, *C. B. Clarke, 1. c.* 252.—N. Gnin.
Harveyi, *Seem. Fl. Vit.* 182.—Ins. Fiji.
Hawaiensis, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Pha»*- 235.—Ins. Sandvic.
heterophylla, *De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient-* W.— Java.
Hillebrandi, C. *B. Clarke, in DC. Monog. P>*»- 228.—Ins. Sandvic
Hillebrandii, Vatke, in Linnaea, xl. (1876) « Waiolani.
hireuta, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1826) Sumatra.
holodasys, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 747.—Sumatra,
honolulensis, *Wawra, in Flora*, Iv. (1872) 667.- Sandvic.

CYRTABUBA:—
Homei, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 281.—Ins. Fiji.
ftorsfieldii, Miq. FL Ind. Bat. ii. 738-Pentaphragma begoniaefolium.
hmnilis, *Blume, Bijdr.* 769.- Malaya,
imminnta, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 264.—Borneo.
impressivenia, *C. B. Clarke, I. c.* 212.—Sumatra,
incisa, *C. B. Clarke, 1. c.* 260.—Ins. Philipp.
•ncompta, Jack, in Trans. Linn. Soc xiv. (1825) 29.—Sumatra,
induta, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1862) 88.—Ins. Societ.
insignia, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 263.—Java.
•ntegrifolia, *C. B. Clarke, I. c.* 248.—Sumatra,
uvolucrata, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 257, nomen; *Fl. Vit.* 183.—Ins. Fiji.
Kalichii, *Wawra, in Flora,* lv. (1872) 564.—Ins. Sandvic
jtauaiensis, *Wamra, I. c.* 668.—Ins. Sandvic.
Kealiae, *Wanra, I. c.* 666.—Ins. Sandvic.
labiosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1862) 40.—Ins. Samoa.
'inuginosa, R. Br. in Wall. Cat. n. 7131 = Isanthera permoUis.
latens, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 215.—Borneo.
laHfolia, Benth. in Hook. Load. Joum. Bot. ii. (1843) 228 - cymosa.
laxiflora, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 190.—Ins. Sandvic
Lessoniana, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 447. t. 64.—,. In.. Sandvic.
llgulifeia, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 252.—N. Gnin.
«>bbi, c. *B. Clarke, 1. c.* 282.—Ins. Philipp.
longe-petiolata, *De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient.* 12.—Java,
long rostri Celebes.
lysiosepala, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v.* 226—Ins. Sandvic.
Macraei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 862.—Ins. Sandvic.
macramha, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 265—Ins. Sandvic.
•oacrophylla. *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 26-t 2—Sumatra.
"jaculata, *Jack, 1. c.* 26.—Sumatra.
Uacophylla, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 227—Ins. Sandvic.
"lenaesii. *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 91.—Ins. Sandvic.
microcarpa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 244—Borneo.
"'"•ocarpa, Herb. Mns. Bot. Lugd. Bat. ex C. B. >larke, 1, e. 196 = Rhyncotechum parviflorum.
"•crostigma, *C. B. Clarke, 1. c.* 284.—Ins. Fiji.
"'"'«», *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 257, nomen; .«• *Vit.* 182.—Ins. Fiji,
"•"•atalis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 288.—Borneo.
moll
O? V ° » *Vriese, PI. Ind. Bat. Orient.* 16.—Ins. Celebes.
mu
"Shit?*' *Nadeaud,* «»»<"- *PI- Tahiti,* 69.—Ins.
•naltibracteata, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* vv 458—Borneo.
Nade
n.,•cea£*•c_B_ *Clarke, 1. c.* 264.—Ins. Tahiti.
n»L^ata> ^PP- '* *C- B. Clarke, I. c.* 240.—Sumatra,
neroorosa, *Blume, Bijdr.* 771.—Java.
n!S?' *Wadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 60.—Ins. Tahiti.
W & E
nudiflora,
oblongifoli
oenobarb
K° th^ Korth- « C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.v.241.-Sumatra.
Dalr.?™!"" Jack,' « C. B. Clarke, 1. c. 231-pilo«a.
Sand?' *Gaudich.* - *in Freyc. Voy. Bot.* 447.—Ins.

CTBTAMDRA:—
paradoxa, Hillebr. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 277 = longifolia.
parviflora, *C. B. Clarke, I. c.* 283.—Manilla,
peltata, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 80.—Sumatra.
pendnla, *Blume, Bijdr.* 768.—Java.
pendula, Nadeaud, Ennm. PI. Tahiti, 60 =apicnlata.
personata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 18; ed. U. 13 - Bonnaya brachiata.
philippinensis, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 250.—Manilla.
phoenicea, *C. B. Clarke, 1. c.* 266.—Ins. Ceram.
Kckeringii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 350.—Ins. Sandvic.
picta, *Blume, Bijdr.* 769.—Java.
picta, ZoU. Syst, Vera. Ind. Arch. (1854) 55 = repens.
pilosa, *Blume, Bijdr.* 770.—Java,
platyphylla, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 850.—Ins. Sandvic.
pogonantha, *A. Gray, 1. c.* vi. (1862) 40.—Ins. Samoa,
polyantba, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 220.—Ins. Sandvic.
populifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 741.—Java.
Fritehardii, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 364.—Ins. Fiji.
pubescens, Stend. Nom. ed. II. i. 476 = frutescens.
pulchella, *Rich, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1862) 33.—Ins. Samoa,
radiciflora, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 239.—Borneo.
repens, *De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient.* 14.—Java,
reticosa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 212—Java.
rhyncanthera, *C. B. Clarke, I. c.* 233.—Sumatra.
Kichit, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1862) 39.—Ins. Samoa.
rostrata, *Blume, Bijdr.* 771.—Java,
rubiginosa, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1826) 32.—Sumatra.
rubra, *De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient.* 16.—Java.
Ruckiana, Meyen, Reise, ii. 125 -= grandiflora.
russa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 238.—Borneo,
samoënsis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1862) 39.—Ins. Societal.
Sandei, *De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient.* 14.—Java,
sarawakensis, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 209.—Borneo.
scabrella, *C. B. Clarke, 1. c.* 277.—Ins. Sandvic.
schizostyla, *C. B. Clarke, I. c.* 204.—Borneo,
serrata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 18.—Ins. Philipp.
serrata, *Fame, in Forbes, Nat. Wand. East. Archip.* 513.—Ins. Timor.
spicata, *De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient.* 13.—Java,
splendens, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 209.—Borneo.
squamulata, Korth. ex C. B. Clarke, 1. c. 203 = dispar.
staminea, Vahl, Enum. i. 105 = Agalmyla stamlnea.
sulcata, *Blume, Bijdr.* 770.—Java,
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 60.—Ins. Tahiti,
taitensis, *Rich, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1862) 89.—Ins. Societ.
Tempesti, *Home, Fiji,* 260, nomen; *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 278.—Ins. Fiji,
teres, *C. B. Clarke, I. c.* 207.—Borneo.
Teysmanni, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 741.—Sumatra,
triflora, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 447. t 52.—Ins. Sandvic.
trisepala, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 268.—Borneo.
tristis, *Hillebr. ex C.B. Clarke, I.* r. 227.—Ins. Sandvic.
umbeUata, De Vriese, PI. Ind. Bat. Orient. 13 = cuneata.
urceolata, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 230.—Borneo.
Urvillei, *C. B. Clarke, 1. c.* 251.—Ins. Carol,
ntricnlosa, *C. B. Clarke, I. c.* 230.—Ins. Fiji.
velutina. Herb. Mns. Bot. Lugd. Bat. ex C. B. Clarke, 1. c. 260 —aurea.
velutina, *Korth. ex C. B. Clarke, I. c.* 208.—Borneo,
viridescens, C. *B. Clarke, I. e.* 247.—Sumatra,
vitiensis, *Seem, in Bonplandia,*'^.. (1861) 257, nomen; *Fl. Vit.* 182.—Ins. Fiji.
Vriesii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 287.—Ins. Celebes.

CTBTAHSBA:-
Waiolani, *Wamra, in Flora,* lv. (1872) 666.—Ins. Sandvic.
Wawrai, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 228.—Ins. Sandvic.
Zippelii, *C. B. Clarke, 1. c.* 239.—Java.
Zollingeri, *C. B. Clarke, 1. c.* 268.—Java.

OTETANDHOMOEA, Zoll. Syst. Vere. Ind. Archip. 68 (1864). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1020.
BUSEA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 732 (1866).
aenminata, *Benth.* b* *Hook. /. Gen.* ii. 1020.—Ins. Penang.
angustifolia, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 186.—Sumatra.
cymulosa, *C. B. Clarke, I. c.*—Burma,
decurrens, *Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 68.—Java,
dispar, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 187.—Sumatra.
grandiflora, *C. B. Clarke, 1. c.* 186.—Malaya.
Miqueliana, *C. B. Clarke, I. c.* 187.—Sumatra,
subintegra, *C. B. Clarke, I. c.*—Sumatra.

CVRTANHUS, Herb. App. 28 (1821), sphalm. = Cyrt&nthus, Ait. (Amaryll.).

CYRTANTHEMUM, Oerst in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 130; (Gesn. Centr. Am. 66. t. 10. f. 20, 39) = Besleria, Linn. (Gesnerac).
defiexum, Oeist. 11. cc. — B. defleia.
hirsutum, Oerst. 11. cc. «= B. Cyrtanthemum.

CYRTANTHERA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 99. t. 14 (1847)-Jaoobinia, Moric. (Acanthac).
aurea, Nees, in DC. Prod. xi. 829-J. aurea.
aurantiaca, Hook. Bot. Mag. t. 4468-»Beloperone aurantiaca.
catalpaefolia, Nees, 1. c. t 4444 = J. anrea.
Chamissoniana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 101.—Bras.
chrysostephana, Hook. f. Bot. Mag. t. 5887 = J. chrysostephana.
citrina, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 281.—Bras.
densifiora, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1854) 147 = J. aurea.
Ghiesbreghtiana, Decne. in Rev. Hortic. Sér. III. ii. (1848) 101.—Mexic.
Liboniana, Lem. Jard. Fleur. **ill.** (1862-63) t. 311-J. Liboniana.
longifiora, Nees, in DC. Prod. xi. 729"J. longiflora.
macrantha, Nees, 1. c. 880 = J. macrantha.
magnifica, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 100.—Bras.
Pohliana, Nees, 1. c. 101-J. Pohliana.
Sellowiana, Nees, 1. c. = J. Sellowiana.
umbrosa, Nees, in DC. Prod. xi. 896 —J. anrea.

CYRTANTHERELLA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (18S4) 148. t. 3. *C* 10, 11=- Jaoobinia. Moric. (Acanthac.).
macranthà, Oerst. 1. c = J. macrantha.

CYRTANTHUS, Schreb. Gen. 122 (1789) = Posoqueria. Aubl. (Rubiac).
longiftorus, Steud. Nom. ed. II. i. 476-P. longiflora.

CTBTABTTHTJS, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 414 (1789) ; iii. 510. *AMARYLLIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 729.
CVPHONEMA, Herb, in Bot Mag. snbt. 3710, et sub t. 8747 (1839).
EDSIPHO, Salisb. Gen. PI. Fragm. 189 (1866).
GASTRONEMA, Herb. App. 30 (1821).
MOUNELLA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 139 (1866).
TIMMIA, J. F. Gmel. Syst 688 (1791).
albo-luteus, Burch. ex M. Roem. Syn. Ensat. 49 - lutescens.
angusti/olius, Ker-Gawl. in Joum. Sc & Arts, ii. (1817) 370 = unifloms.
BXtgmtilolius, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. **414**—Afr. austr.
breviflorus, Harv. Thes. Cap. ii. 26. t. 139 - Anoiganthus breviflorus.
cameuB, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1462;—Aft-, anstr.
cocdneus, M. Roem. Syn. Ensat. 60—angustifolius.
collinus, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 162.—Afr. austr.
cordifolius. Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 205 sphalm. vide *Cyrtacanthus cordifolius.*

CYBTANTHTTS :—
helictus, *Lehm. Delect. Sem. Hort. Hand).* (1839) 7.—Afr. anstr.
lntescens, *Herb. Amaryll.* 129. t. 38. f. 14.—Afr. austr.
luteus, *Eekl. V Zeyh. ex M. Room. Syn. Ensat.* 52, nomen.—Afr. austr.
Mackenii, *Hook. f. in Card. Chron.* (1869) 643.—Afr. austr.
Macowani, *Baker, in Gard. Chron.* (1875) 98.—Afr. austr.
obliquus, *Ait. Hort. Kew.* ed. L i. 414.—Afr. austi.
ochroleucus, *Burch. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 475.—Afr. austr.
odorus, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 503.—Afr. austr.
pallidus, *Sims, Bot. Mag.* t. 2471.—Afr. austr.
Pnmilio, *Schult.f. Syst.* vii. 900.—Afr. austr.
puniceus, *Eckl. ex Salm-Dyci, Hort. Dyck.* 87, nomen.—Afr. austr.
purpureus, Herb, in Bot Mag. sub t. 2113=Amaryllis purpurea.
sanguinea, *Walp. Ann.* iii. 616.—Afr. austr.
Smithiae, *Watt, ex Hafv. Gen. S. Afr. PI.* 888.—Afr. austr.
Smithianus, Herb, in Bot Mag. sub t. 3779 =praec.
spiralis, *Burch. ex Ker-Gawl. in Bot. Reg.* 1.167.—Afr. austr.
striatus, Herb, in Bot. Mag. t. 284=angustifolius.
Tudcii, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 183.—Afr. austr.
uniflorus, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* 1.168.—Afr. austr.
varius, M. Roem. Syn. Ensat 48 =• obliquus.
ventricosus, Willd. Sp. PI. ii. 49=angustifolius.
vittatus, *Desf. ex [DC. in] Red. Lil.* iv. 1.182.—Afr. austr.
Welwitschii, *Hiern, ex Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 197.—Afr. trap.

CYRTOCABPA, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. iii. 19. t. 609 (1826). *ANACARDIACEAE,* [Benth. & Hook. £ i. 423].
DASYCARYA, Iiebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1868) 98.
Copalillo, *Schleckt. in Linnaea,* xvi. (1842) 485.—Mexic.
procera, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 20. t. 609.—Mexic.
quinquestila, Blanco, FI. Filip. ed. II. 269=Odina speciosa.

CYRTOCERAS, Benn. PI. Jav. Rar. 90. t. '21 (1838)-Hoya, K. Br. (Asclep.).
oruminafom, Regel, Cat.PI. Hort.Aksakov. 46,nomen.—Hab.?
coriaceum, Heynh. Nom. ii 188 = H. multiflora.
elegans, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 515.—Borneo.
*floribundum.'M.annA,*Botanist, iv. 1.178 = H.multiflora.
Gibsoni, Regel, Cat. PI. Hart. Aksakov. 46, nomen.—Hab. ?
laurifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 614.—Java.
Lindleyanum, Miq. 1. c. 515 = H. multiflora.
micranthum, Miq. 1. c.—Ins. Celebes.
multifiorum, Heynh. Nom. ii. 188 — H. multiflora.
reflexum, Benn. PI. Jav. Rar. 90 — H. multiflora.
speciosum, Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov. 46, nomen.—Hab.?
uncinatum, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 408.—Sumatra.

CYRTOCHILOS, Spreng. Syst. Ui. 729 (1826) -seq.

CYRTOCHILUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 349 (1815)-Oncidium, Sw. (Orchid.;.
bictoniense, Batem. Orch. Mex. et Gnat. t. 6—Odontoglossum bictoniense.
citrinum, Hook. Bot Mag. t. 4454 = Oncid. concolor.
filipes, Lindl. Bot JReg. (1841) t 59 -* Oncid. graminifolium.
flavescens, Lindl. 1. c. t. 1627 -Miltonia flavescens.
flexuosum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 350 = Oncid. cimiciferam.
graminifolium, lindl. in Ann. Nat. Hist. iv. (1840) 384 = Oncid. graminifolium.
insculptum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1872) 1035 = Oncid. insculptum.
ixioides, Lindl. Gen. et-Sp. Orch. 211=Odontoglossum ixioides.
Jurgensenianum, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) t. 368—Oncid. hastatum.

CYRTOCHILUM .—
Karwinskii, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1992 - Miltonia Karwinskii.
leucochilum, Planch, in Fl. des Serres, Sèr. I. v. (1849) t. 522 = Oncid. leucochilum.
maculatum, Lindl. Bot. Reg. (1838) t 44=Oncid. maculatum.
mystacinum, lindl. i c. Misc. 80-Odontoglossum mystacinum.
pardinum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 210.—Peruv.
stellatum, Lindl. Sert Orchid, t. 7 = Miltonia flavescens.
undulatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 349. t. 84 =Oncid. undulatnm.
volubile, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 85 = Oncid. corynephornm.
eebrinum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1872) 1365-Oncid. zebrinum.

CYRTOCLADON, Griff. Notul. iii. 147 (1851) = Homalomena, Schott (Aroid.).
sanguinolentum, Griff. 1. c. *{^Chamaecladon songuinolentutn).*—Ind. or.

CYRTODEIRA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 207 = Epiacia, Mart. (Gesner.).
chontalensis, Seem, in Gard. Chron. (1867) 655 - E. chontalensis.
coccinea, Hort Bull.—Cf. Gard. Chron. iii. (1875) I. 490.—Hab.?
cupreata, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1863) 207-1. 2. f. 39 = E. cupreata.
fulgida, Linden, «x Andre*, IUustr. Horde, xx. (1878) t. 131 = E.fulgida.
Trianae, Hanst. in Koch, Allgem. Gartenz. xxv. (1857) 237 = E. splendens.

CYRTOGYNE, Reichb. Consp. 168 (1828)=CURTOGYNE, Haw.=Crassula, Linn.

CYRTOLEPIS, Less, in Linnaea, vi. (1831) 166 = Anacyolus, linn. (Compos.).
alexandrina, DC. Prod. vi. 17 = A. alexandrinus.
numantha, Less, in Linnaea, vi. (1631) 166 = A. alexandrinus.

CYRTOLOBUM, R. Br. in Wall. Cat. in nota sub n. 6432 (.1882) = Crotalaria, Linn. (Legumin.).
divaricata, R. Br. 1. c. n. 6436 (cf. |482)=Crot. medicaginea.
elliptica, R. Br. I. c. n. 6483 (cf. 6432)=Crot. elliptica.
medicaginea, R. Br. *I* c. n. 5434 (cf. 5482) -Crot. medicaginea.
procumbent, R. Br. I. c n. 6487 (cf. 6432)= Crot. medicaginea.
spartioides, R. Br. 1. c. n. 5435 (cf. 5432) = Crot. Willdenoviana.
Trifoliastrum, R. Br. 1. c. n. 6432-Crot. Trifoli. astrum.

CYRTONEMA, Schrad. in Eckl. & Zeyh. Enum. 275 (1836)>Kedro8tla, Medic. (Cucurbit-).
convohulaceum, Hochst. in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 135-K. foetidissima.
digitatum, Schrad. in Eckl. & Zeyh. Enum. 277 - K. digitata.
divergent, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 286 -K. foetidissima.
elegans, Fenzl, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 657 — Corallocarpus Gijef.
foetens, Hochst. ex Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 664 = K. foetidissima.
hirtellum, Hochst ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1862) 181-K. hirtella.
latilobum, Schrad. in Eckl. & Zeyh. Enum. 277-K. nana.
molle, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 49 = K. mollis.
sphenolobum, Schrad. in Eckl. & Zeyh. Enum. 276 = K. Zeyheri.
trilobata, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 888-praec.
trilobum, Schrad. in EckL & Zeyh. Enum. 276-K. nana.

CYRTONORA, Zipp. ex Macklot, in Bijdr. Nat Wet. v. (1830) 179, nomen (qnid ?).
leucochlyda, Zipp. 1. c—N. Guinea.

CYRTOPERA, Lindl. in Wall. Cat. n. 7862-64 (,1831 ?); et Gen. et Sp. Orch. 189 (1833) -Eulophia, R. Br. (Orchid.).
amaaonica, Rodrig. Orch. Nov. ii. 180.—Bras.
aurea, Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 242, nomen.—Ins. Philipp.
bicarinata, Lindl. in Wall. Cat. n. 7363.—Reg. Himal.
Candida, lindl. in Journ. linn. Soc iii. (1869) 81.—Reg. Himal.
Cullenii, Wight, Ic. 1.1754 =;&»««.
densiflora, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 68, in obs.=E. densiflora.
ensiformis, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 31 = Cyrtopodium ensiforme.
flava, Lindl. in Wall. Cat n. 7864.—Ind. or.
flavo-purpurea, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 68.—Afr. trop.
foliosa, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 203=E. foliosa.
fusca, Wight, Ic. 1.1690 = E. nuda.
Gardneri, Thw. Enum. PL Zeyl. 302 = E. nuda.
gigantea, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 190*—Afr. austr.
Gafc/njyt, Reichb. f. Otia Bot Hamb. 86.—Cambodia.
laxiflora, Gardn. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 302 - E. nuda.
longifolia, Reichb. f. In Walp. Ann. vi. 668-Cyrtopodium Woodfordii.
ntacrobulbon, Par. & Reichb. f. in Trans. linn. Soc. xxx. (1874) 144.—Burma.
tnaculata, Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp-ed. III. Nov. App. 242,'nomen.—Ins. Philipp.
Mannii, Reichb. *t.* in Flora, Iv. (1872) 274.—Reg-Himal.
mysorensis, Lindl. in Journ. linn. Soc. iii. (1859) 32 - E. nuda.
nuda, Reichb. f. in Flora, Iv. (1872) 274 = E. nuda.
obtusa, lindl. Gen. et Sp. Orch. 190.—Ind. or.
Oliveriana, Reichb. f. in Flora, lxiv. (1881; 329.—Afr-austr.
pedicellata, lindl. Gen. et Sp. Orch. 190 = E-aculeate.
plantaginea, Lindl. L c. 189=Cyrtopodinm plantftgi" neum.
plicata, Lindl. in Wall. Cat n. 7862 - E. nuda.
rufa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 802 -*sanguinea.*
sanguinea, Lindl. in Journ. linn. Soc. iii. (1859) 82.—Ind. or.
scabrtiinguis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 189.—Peruv.
Shupanga, Reichb. £ Otia Bot. Hamb. 116.—A».
squalida, Reichb. f. in BonplandU, v. (1857) 88-*" sqnalida.
Vellosiana, Rodrig. Orch. Nov. ii. 179.—Bras.
Walleri, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 117.—Afr. trop.
Woodfordii, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 189=CyrW-podium Wpodfordii.
Zollingeri, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 38.—Java.

CYRTOPHYLLUM, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 47 (1823); et Bijdr. 1022 (1826) - P a g r a e a, Thunb. (Loganiac).
fragrans, DC. Prod. ix. 31-F. fragrans.
lanceolatum, DC. 1. c. = F. Wallichiana.
peregrinum, Reinw. ex Blume, Cat Gew. Buitenz. *'' et Bijdr. 1022 = F. fragrans.
speciosum, Blume, Bijdr. 1022 = F. speciosa.

CYBTOPODIUM, R. Br. in Ait. Hort. Kew. «*• Xjv. 216 (1813). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. J- •»• 541.
TyiocmLUS, Nees, in Verb. Gartenb. Ges. Berl. vi»-(1832) 194. t. 3.
Andersonii, *R. Br. in Ait. Hort. Kern.* ed. II. v. Z»°-Ind. ooc
bicolor, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) *>*• Ins. Timor.
Blanchetii, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) »»»»• Bras.
bracteatum, *Linden, ex Lindl. Orch. Linden.* »*• Venezuela.
Brandonianum, *Rodrig. Orch. Nov. i.* 132.— Bras.,
cardiochilum, IindL in Joum. Hort. Soc. iv. *V"* 266 = Andersonii.
cristatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) sab t.
ebumeum, *Rodrig. in Revist. Eng.* iii. 74, *Nov.* ii. 182.—Bras.

CYRTOPODIUM :—
elegans, Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 68=Tetramicra rigida.
Engelii, *Karst. in C. Koch V Fint. Wochenschr.* ii. (1859) 236.—Venezuela,
ensifoime, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 78, 80,150. —Ins. Philipp.
Eogenii, *Reichb. f. tf Warm, in Otia Bot. Hamb.* 89. —Bras,
navescens, *Lindl.exSteud, Norn.* ed. II. i. 476, nomen. —Mexic.
fiavum, Benth. in Jonrn. Linn. Soc xviii. (1881) 820 (Eulophiae sp.).—Ind. or.
navum. *Link & Otto, ex Reichb. Hort. Bot.* iii. 7.— Bras.
glutiniferum, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Mod. xix. II. (1828) 220 = Woodfordii.
glntinosum, *Meyer, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 476, nomen.—Am. anstr.
Pallidum, *Reichb. f. & Warm, in Otia Bot. Hamb.* 89. —Bras.
iwlmifrons, *Reichb. f. V Warm. I. c.* 88.-Bras.
Parviflorum, *Lindl. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 672.—Guiana.
Plantaginea, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 320.—Madag.
Poecilnm, *Reichb./.* &• *Warm, in Otia Bot. Hamb.* 89. —Bras.
Punctatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 188.—Ind. occ.
Purpureum, *Reichb. f.* &* *Warm, in Otia Bot. Hamb.* 90.—Bras,
kaintlegerianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1885) I. 756.—Paraguay.
spedosissimitm, Hort. ex Planch, in Fl. desSerres, xxii. (1877) 179 = pnnctatum.
malidum, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 79, 150 = Kulophia squalida.
strictum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 266.— Cuba,
t'gnnum, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 95, .nomen.—Bras.
'"Ste, *Reichb. f. V Warm, in Otia Bot. Hamb.* 90.— Bras.
vemam, *Reichb. f.* &[1] *Warm. I. c.* 89.—Bras,
verrucosum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 265.-Cuba.
Vrescens, *Reichb./.* &• *Warm, in Otia Bot. Hamb.* 89. —Bras.
Willmorei, Knowles & Westc. Fl. Cab. i. (1887) t. 4 = Pnnctatum.
Woodfordii, *Sims, Bot. Mag.* 1.1814.—Ind. occ.

CYRTOPOGON [illegible] *Syst.* > : 266 (1825)=CURTOPOGON, Beauv.=Aristida, Linn. (Gramin.).
"hotomus, Spreng. 1. c.=A. dichotoma.

CYRTORRHYNCHA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. A«n. i. 26 (1838) = Ranunculus, Toum.
r<*nunculina, Nutt. 1. c.*R. Nuttallii.

CYRTOSIA, Blume, Bijdr. 896. t. 6 (1825) - Galeola, Lonr, (Orchid.).
«'«»«, Blume, I. c - G. altissima.
Javanica, Blnme, 1. c. = G. javanica.
Lindleyana, Hook. f. & Thorns, in Hook. f. Illustr. Himal. PI. t. 22 - G. Lindleyana.

CYRTOSIPHONIA, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 401 (1856) = »auwoiaa,Linn.(Apocyn)).
frosonlaefolia, Miq. 1. c. 402 = R. amsoniaefolia.
Java, [illegible] FL Ind - B»t. - 402& R. reflexa.
sumatrana, Miq. 1. c. 401 =R. sumatrana.

CYRTOSPADIX C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1858) 18 - Caladlum, Vent. (Aroid.).
striatipes, c. Koch, 1. c. -Cal. striatipes.

CYTISOSPERMA, Griff. Notul. iii. 149 (1851). *JDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 997.
Afcelii [illegible] Scho". in Bonplandia, v. (1867) 127.
americanum, —Bras.
cuspidilobum, Schott, 284 = Mer
dubium, Schott. l.c.-Merkusii.

CYKTOSPBBMA :—
edule, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 867 = Merkusii.
intermedium, Schott, in Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 284 =Merkusii.
Johnstoni, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1882) II. 808.— Ins. Solomon,
lasioides, *Griff. Notul.* iii. 150; *Ic. Pl.Asiat.t.* 169. —Malaya,
macrotum. *Becc. ex Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* ir. (1879) 295.—N. Guin.
Matrieffianum, *Hort. ex Gard. Chron.* (1884) I. 711.— Sumatra.
Merkusii, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1857) 61. —Sumatra,
senegalense, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 270.— Afr. trop.
Spruceanum, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 118.— Bras.

CYRTOSPERMUM, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 18-CampnoBperma, Thw. (Anacard.).
gummi/erum, Benth. 1. c. = Camp, gummifera.

CYRTOSPERMUM, Rafin. ex DC. Prod. IT. 118 (1880) = Cryptotaenia, DC. (Umbellif.).
tri/oliatum, Rafin. 1. c. 119 = Cryptotaenia canadensis.

CTBTOSTACHYS, Blume, in Bull. *Nia\.* (1838) 66; et Rumphia, ii. 101. t. 120 (1843). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 892.
ceramics, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 242.—Malaya.
Lakka, *Becc. in Ann. Jard. Buitene.* ii. (1885) 141.— Malaya.
Renda, *Blume, in Bull. Nierl.* (1838) 66; *et Rumphia,* ii. 101.—Sumatra.

CYRTOSTEMMA, Kunze, in Bot. Zeit. i. (1843) 272= Clerodendron, Linn. (Verbenac).
myricoides, Kunze, 1. c. = Clerodendron myricoides.

CYRTOSTEMMA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 321 (1841) = Bcabiosa, Tourn. (Dipsac).
atropurpureum, Spach, 1. c. 822=S. atropurpurea.
maritimum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 401 =S. maritima.

CYRTOSTYIiIS, R. Br. Prod. 822 (1810). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 612.
Huegelii, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 6 = reniformis.
oblonga, *Hook./. Fl. N. Zel.* i. 246.—N. Zel.
reflexa, Spreng. Syst iii. 714 = Chiloglottis diphylla.
reniformis, *R. Br. Prod.* 822.—Austral,
rotundifolia, *Hook./. Fl. N. Zel. i.* 246.—N. Zel.

CYRTOTROPIS, Wall. PI. As. Rar. i. 49. t. 62 (1880) =Apioa, Moench (Legumin.).
cornea. Wall. 1. c. 50. t. 62; Cat. n. 5527 = A. carnea.

CYSSOPETALUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat, Mosc. xxii. (1849) II. 25 =Oenanthe, Tourn. (Umbellif.).
javanicum, Turcz. 1. c. 26=0. stolonifera.

CYST ACANTHUS, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 457. *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 1098.
MEN IN I A, Fua, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 6043 (1878).
cymosus, *T. Anders. 1. c.* 458.—Burma,
insignis, *C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iv. 514.—Burma,
paniculatus, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 458.—Burma,
pulcherrimus, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 514.—Burma,
turgida, *Nichols. Diet. Gard. i.* 428.—Cochinch.

CYSTANCHE, Ledeb. Fl. Ross. iii. 814 (1848)- Cistanehe, Hoffmgg. & Link (Orobanch.).

CYSTANTHE, R. Br. Prod. 555 (1810) = Bichea, R. Br. (Epacrid.).
acerosa, F. Muell. Fragm. i. 38 = R. acerosa.
Milligani, F. Muell. 1. c. = R. Milligani.
procera, F. Muell. 1. c «• R. procera.
sprengelioides, R. Br. Prod. 556 = R. sprengelioides.

CYSTIBAX, Heynh. Nom. ii. 184 (1846), sphalm.- CybiBtaz, Mart. (Bignon.).

CYSTICAPNOS, Boerh. ex Linn. Class. PI. 181 (1747); Gaertn. Fruct. ii. 161. t. 115 (1791) = Corydalis, Vent. (Papav.).
africana, Gaertn. 1. c-Coryd. vesicaria.
alexandrina, Link & Otto, ex G. Don, Gen. Syst. i. 141 = Coryd. vesicaria ?
cirrhoma, Moench, Meth. 52 = Coryd. vesicaria.
grandiflora, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 177 = Corydalis Burmanni.

CYSTIDIANTHUS, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1848) 125 = Physostelma, Wight (Asclep.l.
campanulatus, Hassk. 1. c. = P. Wallichii.
lauri/olius, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 57.—Java.

CYSTIUM, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 268 =Astragalus, Toum. (Legumin.).
Cicer, Stev. 1. c = A. Cicer.
macrophysa, Stev. 1. c.-A. physodes?
Pallasii, Stev. 1. C.=A. Pallasii.
physodes, Stev. 1. c -A. physodes.
Pseudodcer, Opiz, in Lotos, viii. (1858) 65 = A. Cicer.

CYSTOCARPUM, Benth. & Hook. f. Gen. i. 73 (1862) = CISTOCARPIUM, Spach = Vesioaria, Lam. (Crudf).

CYSTOCHILUJI, Rodrig. Orch. Nov. i. 197 (1877). *ORCHIDEAE.*
candidum, *Rodrig. 1. c.* 198.—Bras.

CYSTOGYNE, Gasp. Ricerch. Caprif. e Fie. 84. t. 8 (1845)=PicU8, Tourn. (Urticac.).
leucosticta, Gasp. 1. c.=F. leucosticta.

CYSTOPUS, Blume, Orch. Archip. Ind. 82 (1858)- Odontochilus, Blume (Orchid.).
elongatus, Blume, 1. c. 84.—Java.
Hasseltii, Blume, 1. c. 86.—Java.
occultus, Blume, 1. c. 85.—Java.
pubescens, Blume, 1. c. 86.—Java.
spicatus, Blume, 1. c. 84.—Borneo.
uniflorus, Blume, 1. c. 83.—Java.

CYSTOKCHIS, Blume, Orch. Archip. Ind. 87. t. 24, 36 (1858). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 599.
glandulosus, *Benth. V Hook. /. Gen.* iii. 698, in nota sub Physuro.—Borneo.
/usca, Benth. & Hook. f. 1. c. 599 = Hetaeria fusca.
javanica, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 87.—Java,
marginata, *Blume, 1. c.* in nota.—Java,
nebularum, *Hance, in Journ. Bot.* xxL (1883) 282.— China.
obscura, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 89.—N. Guin.
variegata, *Blume, 1. c.*—Java.

CYSTOSTEMMA, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 204 (18»5). *ASCLEPIADEAE.*
umbellatum, *Fount. I. c.*—Bras.

CYSTO8TEMO1T, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 82. *BORAGINEAE.*
socotranum, *Bal/./. 1. c*—Ins. Socotr.

CYTHAREXYLON, Batsch. Tab. 193 (1802) = seq.

CYTHAREXYLUM, Jacq. Enum. PI. Carib. 26 (1760) = Citharexylon, Linn. (.Verben.).

CYTHERAEA, Wight *St.* Am. Prod. 173, in textu (1834) =8pondias, Linn. (Anacard.).
dulcis, Wight *Sc* Am. 1. c. - S. dulcis.

CYTHEREA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. 1. (1812) 301 - Calypso, Salisb. (Orchid.).
borealis, Salisb. L c. =Cal. borealis.

CYTHERIS, Lindl. in Wall. Cat. n. 3750 (1880!); et Gen. etSp. Orch. 128 (1831)=Nephelaphyllum, Blume (Orchid.).
cordi/olia, Lindl. 11. cc. 3750,129 =N. cordifolium.
Griffithii, Wight, It v. 1.1751-52 = Calanthe vestita.

CYTHISUS, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 179 (1792) = Cytisus, Linn. (Legum.).

CYTICUS, Link, Handb. ii. 153 (1831), sphalm. = praec

CY'l'LNUS, Linn. Gen. ed. VI. 667 (1764). *CYTINACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 118.
BDALLOPHYTON, Eichl. in Bot. Zeit. xxx. (1872) 709. t. 8.
HAEMATOLEPIS, Presl, Epim. Bot. 288 (1849).
HYPOCISTIS, Adans. Fam. ii. 76 (1763).
HYPOLEPIS, Pers. Syn. ii. 698 (1807).
PHELYPAEA, Thunb. Nov. Gen. PI. 91 (1784).
THYRSINE, Gleditsch, Syst. PI. 286 (1764).
americanus, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xix. (1845) 246.—Mexic
americanus, Hook. f. in DC. Prod. srii. 108 = Andrieuxii.
Andrieuxii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 41.-Mexic.
canariensis, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 429 = C. Hypocistis.
Clusii, Nym. Consp. 646 = C. Hypocistis.
dioicns, *Juss. in Ann. Mus. Par.* xii. (1808) 448.—Afr. austr.
Hypocistis, *Linn. Gen.* ed. VI. 566; *Syst. Nat.* ii. 602.—Reg. Mediterr.; Oriens.

CYTI8OP8I8, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. i. 154. t. 84 (1842). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 489.
dorycniifolia, *Jaub. & Spach, I. c.* 165.—Syria.

CYTISUS, Linn. Syst ed. I (1785). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 483.
AULONIX, Rafin. Sylva Tellur. 25 (1888).
CHAMAECYTISUS, Link, Handb. ii. 154 (1831).
CHAMAESPARTIUM, Adans. Fam. ii. 821 (1768).
DIAXULON, Rafin. Sylva Tellur. 24 (1838).
LEMBOTROPIS, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 10 (1843).
LYGOPLIS, Rafin. Sylva Tellur. 23 (1838).
MEIEMIANTHERA, Rafin. 1. c. 25 (1838).
NUBIGENA, Rafin. 1. c. 23 (1838).
PEYSONELIA, Boiv. ex Webb *Sc* Berth. Phyt Canar. ii. 35, in obs. (1846).
PHYLLOCYTISUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 368.
SAROTHAMNUS, Wimm. Fl. Scales. 278 (1832).
SPARTOCYTISUS, Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. ii. 49 (1846).
SPARTOTHAMNUS, Webb, ex Walp. Ann. i. 221 (1848).
TELINARIA, Presl, Bot Bemerk. 49,135 (1844).
TELINE, Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. ii. 84 (1846).
TUBOCYTISUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 858.
VERZINUM, Rafin. Sylva Tellur. 28 (1888).
VIBORGIA, Moench, Meth. 132 (1794).
absinthioides, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 175.—Macedon.
acutangulus, *Jaub. b[1] Spach, Illustr.* ii. 70.1.158.—Galatia.
Adamix, Poit. in Ann. Soc Hort Par. vii. (1830) 501.
aeolicus, *Guss. ex Lindl. Bot. Reg.* t 1902.—Ins. Lipar.
aethiopicus, Linn. Sp. PI. 740 = Melolobium cemuum.
affinis, *Boiss. Elench.* 31.—Hispan.
affinis, *Presl, Fl. Sic.* t. p. xix.—Sicil.
africanns, *Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov.* v. 154.—Afr. bor.
aggregatus, Schur, Enum. PL Truss. 149 - prostratus,
albidus, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 101. n. 85.—Marocco; Ins. Canar.
albus, Jacquet, Reise Sarm. Karp. i. 49=austriacus.
albus, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 241.—Reg. Mediterr. occ.
alpestris, Schur, Enum. PI. Transs. 148=>supinus.
alpinus, *Lam. Fl. Fr.* ii. 621—Laburnum vulgare.
alpinus, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 2=Laburnum alpinnm.
Alschingeri, *Vis. in Linnaea,* xv. (1841) *Litt.* 101.—Dalmatia.
ambiguus, Schnr, Enum. PI. Transs. 147-austriacus.
anagyrifolius, Pourr. ex Colm. sec. Willk. *Sc* Lange, in Prod. FL Hisp. iii. 462-Adenocarpus hispanicus.

CYTISUS;—
anagyrius, L'Hérit. Stirp. Nov. 184 = Adenocarpm hispanicus.
angulatus, Boiss. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sé>. III. iii. (1845) 153 = Genista parviflora.
angusti/olius, Moench, Meth. 145 = Laburnum alpinnm.
antillanus, *DC. Prod.* ii. 157.—Ins. Carib.
apulus, Tenore & Guss. ex Nym. Syll. 288 = spinescens.
arabicus, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 78=Argyrolobiam arabienm.
arboreus, *DC. Prod.* ii. 154.—Afr. bor.
arcuatus, Vukot. in Rad Jngos. Akad. Zagreb, xxxi. (1875) 100 = Genista sylvestris.
Ardoini, *Fount, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 889.—Reg. Mediterr.
argenteus, Linn. Sp. PI. 740-Argyrolobium Linnaeanum.
argenteus, Schnr, in Verb. Natmf. Ver. Brnenn, xv. II. (1877) 167-austriacus.
argyreius, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 523-spinescens.
arvenais, *Veil. Fl. Flum.* 809; vii. t 117.—Bras.
aspalathoides, Sprang. Syst. iii. 226=Genista aspalathoides.
atratus, Schur, Enum. PI. Transs. 147=nigricans.
atropurpureus, Herb. Pav. ex Benth. in Joura. Linn. Soc iv. Suppl. (1860) 91—Lonchocarpus atropurpureus.
anrantiacus, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksaiov.* 46.—Hab.?
austriacus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1042.—Europ.; Reg. Cauc.
austriacus, Medic. Beobacht. (1782) 174 = polycephalus?
baetiens, *Steud. Norn.* ed. II. L 477.—Reg. Mediterr. occ.
Balansae, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 303.—Marocco.
banaticus, Griseb & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 292-austriacus.
Bartolottae, *Tod. in Ind. Sem. Hort. Bot. Panorm.* (1857) 41.—*Cf. Linnaea.xxii.* (1867-68) 743.—Ins. Lipar.
biflorus, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 808=elongatus.
biflorus, *UHirit. Stirp. Nov.* 184.—Enrop.; As. bor.
bisfiorens, Host, Fl. Anstr. ii. 340 = prostratus.
boavista. Veil. Fl. Flum. 309; vii. t. 116 *(=Collaea grewiaefolia^.*—Bras,
borysthenicus, *Gruner, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xli. (1868) II. 446, in textu.—Rossia.
brasiliensis, *Veil. Fl. Flum.* 308; vii. t. 114.—Bras.
Cajan, Linn. Sp. PI. 739= Cajanus indicus.
calycinus, Bieb. Fl. Taui. Cauc ii. 166 = Argyrolobium calycinum.
canariensis, *Steud. Norn.* ed. I. 259.—Ins. Canar.
candicans, *Lam. Fl. Fr.* ii. 623; *Boiss. Fl. Orient,* ii. 54.—Reg. Mediterr. occ.
candidus, *Presl, Fl. Sic.* p. xix.—Sicilia.
canescens, *Loisel. in Duham. Arb. ed. nov.* v. 151.—Hab.1
canescens, J. *Sc* C. Presl, Delic. Prag. 229 -austriacus.
canescens, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 477 = Teneriffae.
capensis, Berg. Desc PI. Cap. 217-Ramia opposita.
capensis, Lam. Encyc. ii. 249-Lebeckia cytisoides.
capitatus, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. ii. 70; *Jacq. Fl. Austr.* t. 38.—Europ. austr.
caramanicus, *Nym. Consp.* 155.—As. Min.
caraeus, *Hoffmgg. Preisvert.* ed. X. 275; *ex Linnaea,* xvi. (1842) *Litt.* 275, 276.—Hab. 1
cassius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 5.—Syria.
Cayan, Linn, ex Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 11 = Cajanus indicus.
Chamaecytisus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxxi. (1875) 104 = austriacus?
chrysobotrys, *Fisch. in Otto* to" *Dietr. Allg. Gartens,* v. (1837) 122.—Hab.?
chrysotrichus, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 12 — pygmaeus.
ciliatus, Wahlenb. FL Carp. 219=capitatus.
dncinnatus, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 404.—Marocco.
dnereus, Host, Fl. Aostr. ii. 343=biflorus.
rinereus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1875) 97 = Genista cinerea.
collinus, Schur, in Verb.. Naturf. Ver. Braenn, xv. II. (1877) 169 = biflorus.
communis, Lindem. in BulL Soc. Nat Mosc. xl. (1867) I. 494 = biflorus?

CYTISUS:—
complicatus, Raeusch. Norn. ed. III. 212 - Adenocarpns intermedius.
con/ertus, Schur, Enum. PI. Transs. 148 = capitatus.
congestus, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 404.—Ins. Canar.
corniculatus, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 521.—Rossia.
coronensis, Schur, Enum. PI. Transs. 148 s-supinus.
creticus, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. ix. 5.—Ins. Creta.
dalmaticus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1876) 101-Genista aristata?
decaphyilus, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 10 (Quid ?).—Java,
decumbens, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sér. HI. iii. (1845) 156.—Europ.
demissus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 54.—Thessalia.
diffusus, Jacquem. ex Jaub. *Sc* Spach. in Ann. Sc. Nat. tiér. II. xix. (1848) 48-Argyrolobium flaccidnm.
diffusus, Vis. Fl. Dalmat. iii. 269=decumbens.
divaricatus, L'Hérit Stirp. Nov. 184 = Adenocarpus intermedius.
Dorycnium, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 439 = Genista umbellate,
drepanolobus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 6.—Syria.
elongatus, Frivald. ex Nym. Consp. 156=hirsutus.
elongatus, Waldst. *Sc* Kit. PI. Hung. ii. 200. t. 183-biflorus.
emeriflorus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 524 - glabrescens.
eriocarpus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 11.—As. Min.
Everestianus, Carr. in Rev. Hortic. (1872) 299; (1873) 390. cum t.=racemosus?
falcatus, DC. Prod. ii. 165=biflorus.
falcatus, Hort. ex Presl, Bot. Bemerk. 140 = speciosus.
falcatus, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hung. iii. 284. t. 238 = hirsutus.
ferox, Hoffmgg. Verz. Pfl. 55-Genista ferox.
JUiformis, Spreng. Syst. iii. 225 - Indigofera sarmentosa.
filipes, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* ii. 62. t. 47—I"*-Canar.
flaccidus. Royle, Illustr. Bot. Himal. 197 = Argyro* lobium flaccidum.
foliolosus, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 4»" Adenocarpus foliolosus.
foliosus, L'Hérit. Stirp. Nov. 184. t. 96=Adenocarpus anagyrus.
Fontanesii, *Spach, ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* m- (1878) 405.—Reg. Mediterr. occ
fragrans, *Lam, Encyc.* ii. 249.—Ins. Teneriff.
fragrans, Weld, in Flora, xv. (1882) S28 = Pettenramentacea.
frutescens, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. ***'• (1875) 102 - Genista tinctoria.
gallicus, Kem. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp- iii. 454=supinus.
genistoides, *Regel, Gartenfl.* (1858) 840.—Hab. ?
germanieus, Vis. Fl. Dalmat. iii. 268=Genista germanica.
glaber, Lam. Fl. Fr. it. 621-nigricans, sessilifolins.
glaber, Linn. f. Suppl. 325 — biflorus.
glabratus, link, in Buch, Beschr. Ins. Canar. U>ert scoparius.
glabrescens, *Sartor. Alb. Indig. Ital. Sup.* 282.—Europ-
glabrescens, *Schrank, Baier. Fl.* ii. 269.—Bavar.
glomeratus, Boj. Hort. Maurit. 89=Eriosema Parvi, florum.
graecus, Linn. Sp. PI. 740 - Anthyllis Hermanniae.
grandiflorus, *DC. Prod.* ii. 154.—Lusitan.
graniticus, Rehm. Notiz. Veg. Schwarz. Meer. oV* biflorus?
guineensis, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI- *i9 Cajanus indicua.
Haeitt\en,Ball,in Journ.Bot. xi. (1873) 804.—Hisp*"-
heptaphyllus, Veil. FL Flum. 308; vii. 1112 - Lupin"" HiUrianus. Zagreb.
heterocanthus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. xxxi. (1876) 100 = Genista germanica. Fl.
heterochrous, Webb, ex Willk. *Sc* Lange, Prod- Hisp. iii. 462=patens. iQ,
heterophyllus, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr-* Mont. Pyren
Heuffelii, Wie'rzb. ex Griseb. *Sc* Schenk, in Archiv, xviii. (1852) I. 292-austriacus. Wiegm.
hirsutissimus, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) hirsatus.

CYTISUS:—

Krsutus, Crantz, Stirp. Anstr. ed. II. fasc. v. 898 = capitatus.
hirsutus, Jacq. Obs. ex Steud. Nom. ed. II. i. 477 = candicans.
hirsntus, *Linn. Sp. PI.* 739.—Europ. anstr.; As. Mia.
hirsutus, Pall. Reise, i. 21-biflorus.
hirsutus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t 706-spinescens.
/•trtellus, Reicbb. ex Nym. Consp. 1S7 = pygmaeus.
**irtus,* Buna. f. FL Cap. Prod. 22 = Ononis aspalathoides.
hispanicus. Lam. Encyc. il. 248 = Adenocaipus hispanicus.
kispanicus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1875) 100 - Genista hispanica.
"ispidus, Willd. Sp. PI. in. 1121-Robinia guineensis.
liolopetalus, Fleisch. in Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. i. 441 = Genista radiata.
nosmariensis, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xyi. (1878) 404. Marocc
htmifusits, Nym. Consp. 158=decnmbens.
•ncanns, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 46.—Hab. t
'ncarnatus, C. Koch, Dendrol. i. 32-albus.
"i/estus, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 872=Calycotome infesta.
"ntennedins, *Saltm. ex Presl, Bot. Bemerk.* 61.—Afr. bor.
jtnceus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1876) 103 = Spartiumjunceum.
Kitaibelii, Vis. Fl. Dalmat. iii. 269 = procnmbens.
Kunzeanns, *Willk. in Willk. &" Lange.Prod. Fl. Hisp.* iii. 452.—Hispan.
laburnum, Linn. Sp. PI. 789 = Laburnum vulgare.
•amarckii, Tenore, Fl. Nap. v. 94=hirsutns.
•anceolatus. Herb. Pav. ex Benth. in Joum. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 92 = Lonchocarpus lanceolatus.
lanigerus, DC. Prod. ii. 154 = Calycotome villosa.
'"nuginosus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 197-Argyrolobium flaccidum.
Wsiosemius, *Boiss. in Tckihat. Asie Min. Bot.* i. 12.—As. Min.
I<iocarpus, Kem. in Oestr. Bot. Zeitschr. (1868) 90 - biflorus.
Acanthus, Waldst. 8c Kit PI. Rar. Hung. ii. 141. t. 132-austriacus.
'"tcotrichus, Schnr, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 179=hirsntus.
"mfolius, Lam. Fl. Fr. ii. 624.—Reg. Mediterr. occ
Unkn, *Janka, in TernUs*. Fiieetek,* viii. (1884) 70.—Europ.
i»k
"thuanicns, *Gilib. Hist. PI. Eur.* ii. 275.—Lithuania.
I *W, Tausch, in Flora, xxi. (1888) 789 -sessilifolii ltl.
ktoides, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 818 = supinus.
lotoides, Willd. Sp. PI. iii. 1127 = Argyrolobium calycinum.
#> Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 196 = supinus?
***crospcrmus,* Bess, ex DC. Prod. ii. 155 = bifloms.
m ^ "sis, *Mas/, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881)149.—Madera.
™alacitanus, *Boiss. Elench.* 82.—Hispan.
Walyei, Steud. Nom. ed. II. i. 477=austriacus.
"'"«»«, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 8 - Adenocarpus Mannii.
'"gfginifolius, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. H»«p.8i. 460-patens.
"onBits# Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 6=austriacus,
microphyllug, *Link, in Buck, Beschr. Ins. Canar.* 156. —Ins. Canar.
Millen, *Steud. Nom.* ed. II. i. 477.—Lusitan.
mollis, Salisb. Prod. 330 = Cajanus indicus.
mollis, *mild Enum Horf Berol s* , *usp* 6 L — Hab ;
^PJ^'anus, *Linn. Sp. PI.* 740.-Europ.
2 ~rprus> Lindl. Bot. Reg. t. 1191=hirsutus.
"j*«i/!or«u, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.112=albus.
"Mi/oUus, Nym. Consp. 157 = Kitaibelii.
*"•"> Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 61 = candidus.
•>o««s, Willd. Enum. Hort. Berol. 769-Argyrolobium
<»lycinum.
*Linn_ Mant_* 444=triflorus.
) Linn_ Sp_ PL 789.—Europ. austr.
Jf?Cans> WI. Reise, iii. 764=Calophaca wolgarica.
Enum. Hort. Berol. ii. 240 = fragrans.
"£»«, Schur, Enum. PI. Transs. 147 = austriacus.
—"*Uatus,* Schur, 1. c =austriacus.

CYTISUS:—

onustus, *Tausch, in Flora,* xxi. (1838) 746.—Hab. ?
orientalis, *Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov.* 156.—As. Min.
ovatus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1875) 101-Genista ovata.
oxalidi/olius, C. A. Mey. ex Boiss. Fl. Orient, ii. S3 =Argyrolobium trigonelloides.
Paivae, Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 149 - Genista Paivae.
pallidus, Kit. ex Nym. Consp. 157=capitatus.
pallidus, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 442.—Ins. Canar.
pallidus, Stend. Nom. ed. II. i. 477= austriacus.
paniculatus, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. v. 148 = canarlensis.
parvifloras, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 9.—Anatolia.
parviflorus, Herb. Pav. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (I860) !)l = Lonchocarpus atropurpureus.
parvi/olius, Lam. Fl. Fr. ii. 623-Adenocarpus intermedius.
patens, *Murr. Syst. Veg.* ed. XIII. 555.—Lusitan.
pauciflorus, Willd. Sp. PI. Hi. 1126 = Argyrolobium calycinum.
Paucifolius, Boiss. FL Orient ii. 1119, sphalm. - praec.
penduliflorus, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 12 = Laburnum vulgare.
pendulinus, Linn. f. Suppl. 828 = paten;.
pendulus, Salisb. Prod. 830 - Laburnum vulgare.
pentaphyllus, Salzm. ex Walp. Rep. i. 623=Lotononis lupinifolia.
peregrinus, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 101.—Hab.?
persicus, Burm. f. Fl. Ind. 168. t. 51. f. l = Crotalaria furfuracea.
philippensis et pkilippinensis, Hort. ex Lindl. in Gard. Chron. (1841) 865 = praec.
Philippi, Lindl. in Gard. Chron. (1841) 328, 365 = canariensis.
pilosus. Pall. Reise, ii. 255=biflorus.
pilosus, Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1876) 97 = Genista pilora.
pinnatus, Linn. Sp. PI. 741=Pongamia glabra.
pinnatus, Pall. Fl. Ross. i. 78. t. 47 = Calophaca wolgarica.
plumosus, Spach, ex Nym Consp. 157 = Fontanesii.
polycephalus, *Tausch, in Flora,* xxi. (1838) I. *Beibl.H.* —Hab. ?
polymorphic, Pourr. ex Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 463 = Adenocarpus intermedium
polytrichus, *Bieb. Fl. Taur.-Cauc.* iii. 477.—Taurja.
pmticus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 9 -hirsutus.
ponticus, Willd. Sp. PL iii. 1120 - Adenocarpus intermedius.
Preslii, Nym. Syll. 283 = Calycotome villosa.
procerus, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 241.—Lusitan.
procumbens, Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 184 = Eriosema procumbens.
procumbens, *Spreng. Syst.* iii. 224.— Europ.
procumbens, *Veil. Fl. Flum.* 309; vii. 1.118.—Hras.
prolifer, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 611=pullulaiis.
proliferus, *Linn./. Suppl.* 328.—Ins. Teneriff.
propinquus, Schur, Enum. PI. Transs. 147 = austriacus.
prostratus, *Scop. Fl. Carn.* ed. II. ii. 70 —Cam.; Tyrol,
proteus, *Zumag. Fl. Pedem.* ii. 192.—Ital.
Pseudocajan, Jacq. Hort. Vindob. ii. 54 = Cajanus indicus.
Pseudo-nigricans, Schur, Enum. PI. Transs. 147 = nigricans.
psoraloides. Linn. PI. Rar. Afr. 15; Sp. PI. 1048 •> Indigofera psoraloides.
pterocladus, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 10 = Genista parviflora.
pubescens, Gilib. Fl. Liruan. ii. 81 = supinus.
pubescens, Moench, Meth. Suppl. 43 - candicans, *Lam.*
pulchellus, *Vis. Fl. Dalmat.* iii. 270.—Dalmat.
pullulans, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 611.—Hungar.
pumilus, De Not. ex Nym. Consp. 156=hirsutus.
pungens, *Spreng. Syst.* iii. 225.—Ins. Maurit.
purgans, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 166.—Europ.
purpureus, *Scop. Fl. Carn.* ed. II. ii. 69.—Europ. austr.
pygmaeus, *Willd. Sp. PI.* iii. I127.r-Macedon.
quinquepetalus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 698 = Desmodium Cephalotes.
racemosus, *Hort.—Cf. Marnock, Fl. Mag. V Misc. Gard.* ii. (1837) 87.1.19.—Ins. Teneriff.

CTTISUS:—

radiatus, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 157= Genista radiata.
ramentaceus, Sieber, in Flora, v. (1822) 242=Pettena ramentacea.
ramosissimus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 440—canariensis.
ramosissimus, Tenore, Syll. 843=spinescens.
ratisbonensis, Schaeff. Bot. Exp. (1760) tab. in prim. lib.; Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 171 = biflorus.
repens, Wolf, in Lotos, iv. (1854) 176 = hirsutus.
rhombifolius, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 741^Thcrmopsis rhombifolia.
Rochelii, Wierib. ex Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 293=austriacus.
roseus, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 35. t. 40 - Argyrolobium roseum.
rosmarinifoliua, *Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x.* (1881) 149.—Ins. Canar.
rufulus, *% V C. Presl, Delic. Prag.* 86.—Ital.
ruthenicus, Fisch. Ind. PI. Hort. Petrop. (1824) 25 • biflorus.
sagittalis, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 157-Genista sagittalis.
scariosus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1875) 100 = Genista triangularis.
scepusiensis, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 609.—Hungar.
Schimperianus, Steud. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 46 = Argyrolobium Schimperianum.
scoparius, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 241.—Europ. ; Japon.
sericeus, Noronha, in Verh. Barav. Gen. v. (1790) Art. iv. 9 (seriaeus) = Cajanus indicus.
sericeus, *Vis. Fl. Dalmat.* iii. 269.—Dalmat.
sericeus, Willd. Sp, I'l. iii. 1121 = Mundulea suberosa.
serotinus, Kit. ex DC. Prod. ii. 156"biflorus.
sessiliflorus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 439=Tephrosi.i brevipes.
sessilis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=se»silifolius.
sessilifolius, *Linn. Sp. PI.* 789.—Europ. austr.
smymaeus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 10.—As. Min.
sordidus, Bot. Keg. ex C. Koch, Dendrol. i. 17 - *Adami.*
specious, *Presl, Bot. Bemerk.* 140.—Hab. ?
spinescens, Presl, Fl. Sic. p. xix (-seq. ?;.—Ital.
spinescens, *Sieber, in Spreng. Syst.* iii. 225.—Ital.; Graec.
spinosus, Desc. Fl. Med. Ant. i. t. 8 = antillanus.
spinosus, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 170 = Calycotome infesta.
spinosus, Lam. Fl. Fr. ii. 625 = Calycotome spinosa.
spinosus, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 477 — spinescens.
strigulosus, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 508, sphalm. = virguiatus.
subleiocarpus, Sitnk. in Termész. Fiizetck, ix. (1885) 44 = leiocarpus.
supinus, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 398; Jacq. Fl. Austr. i. 15. t. 20 = biflorus.
supinus, Gri>eb. Spicil. Fl. Rumel. i. 7 = pygmaeus.
supinus, *Linn. Sp. PI.* 740.—Europ.
supinus, Pall. Ind. Taur. ex Steud. Nom. ed. II. i. 478 =hirsutus.
sylvestris, *Vis. Fl. Dalmat.* iii. 268.—Dalmat.
syriacus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 65.—Syria.
telonensis, Loisel. Fl. Gall. 446 = Adenocarpus grandiflorus.
tener, Jacq. Ic. Rar. iii. t. 556->Genista virgata.
Teneriffae, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 101.—Ins. Teneriff.
teneriffianus, Steud. Nom. ed. Ii: i. 477, in syn.- praec.
thessalus, Heldr. & Orph. ex Nym. Consp. 157 - austriacus.
Thirkeunus, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 61 = pygmaeus.
Thommasini, Vis. ex Reichb. Ic Fl. Germ. t. 2077 - capitatus.
tinctorius, Vis. Fl. Dalmat. iii. 268 = Genista tinctoria.
tmoleus, *Boiss. Diagn.* Ser. 1. ii. 11.—As. Min.
tomentosus, Andr. Bot. Rep. t 237 - Argyrolobium Andrewsianum.
Tommasinii, Vis. Fl. Dalmat. iii. 265 = enpitatus.
Tournefortianus, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. v. 137-hirsutus.
tragacanthaeformis, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Piod. Fl. Hisp. iii. 421 > Genista horrida.

CTTISUSf—
triangularis, Vis. Fl. Dalmat. iii. 268 "Genista triangularis.
tribracteolatns, *Webb, Otia Hisp.* 8. t. 8.—Hispan.
tridentatus, *Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb,* xxxi. (1876) 104.—Reg.Mediterr. occ.
triflonis, *L'Htrit. Stirp.* 184.—Reg. Mediterr. occ.
uniiraeteatus, Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1850) II. 47l=nigricans1
uniflorus, Decne. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* II. iii. (1885) 265 = Argyrolobium uniflorum.
nnilateralis, *Veil. Fl. Flum.* 308 ; vii. t. 118.—Bras.
uralensis, Hort. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 619 = capitatus.
Villarsii, Vis. Fl. Dalmat. iii. 270. t 65. f. 1=Genista Villaraii.
villosus, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 817 = triflonis.
villosus, *J. &• C. Presl, Delic. Prog.* 86.—Austria.
violaceus, Aubl. PI. Gui. ii. 766 = Eriosema violaceum.
virgatus, Salisb. Prod. 880 = nigricans.
virgatus, Vest, in Syll. Ratisb. i. (1824) 28 = hirsntus.
virgatus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, xxxi. (1875) 102-Genista virgata.
virgulatus, *Reichb. Ft. Germ. Excurs.* 524, in obs.—Corsica.
viscosus, *Hill, Hort. Ken.* 288.—Lusitan.
volubilis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 599 = Atylosia moll is.
Weldeni.Vis. in Flora, xiii. (1830) 52=Pitteria ramentacea.
wolgaricus, Linn. f. Suppl. 827 — Calophaca wolgarica.
Zanoni, Turn, Fl. Ital. Prod. 66=Argyrolobinm Linnaeanum.

CYTTARIUM, Peterm. Fl. Lips. Excurs. 608 (1838) (Compos.).
arenarium, Peterm. 1. c.—Helichrysnm arenarium.
dioicum, Peterm. 1. c = Antennaria dioica.
silvaticum, Peterm. 1. c. 609=Gnaphalium sylvaticom.

CZACKIA, Andrz. Diss. (1818); Sprang. Syst. ii. 90 = Parodlsea, Mazz. (Liliac).
Liliastrum, Andrz. 1. t,=P. Liliastrum.

CZEKFXIA, Schur, in Oestr. Bot. Wochenschr. (1856) 237=Musoari, Toum. (Liliac.).
transsyhanica, Schur, 1. c. ->M. botryoides.

CZERNAEVIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 789-Archangeliea, Honra. (Umbellif.).
Conioselinum, Turcz. L c. 740.—Dahuria.
laevigata, Turcz. 1. c = Peucedanum latifolium.

CZERNIAEVIA, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 422 (1858)=Deachampaia, Beanv. (Gramin.).
melicoides, Turcz. ex Ledeb. 1. c.; et in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) I. 82 =D. caespitosa.

CZERNIAJEVIA, Turcz. in Bull. Soc, Nat. Mosc. (1838) 93 = CZERNAEVIA, Turcz.=Archangeliea, Hoffm. (Umbell.).

CZERNYA, Presl, Cyp. et Gram. Sicul. 22 (1818) = Fhragmitea, Trin. (Gramin.).
arundinacea, Presl, 1. c.-P. communist

D

DABEOCIA, C. Koch, Dendrol. ii. II. 132 (1872) = seq.

DABOĒCIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Jonrn. xvii. (1834) 160. *ERICACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 596.
BORRETTA, Neck. Elem. i. 212 (1790).
cantabrica, C. Koch, Dendrol. ii. II. 18 = polifolia.
polifolia, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* xvii. (1884) 160.—Europ.

DACHEL, Adam. Fam.ii. 26 (1763)=Phoenix, Linn. (Palm.).

DACBYDIUM, Soland. ex Forst. f. PI. Escul. 80 (1786). *CONIFERAE,* Benth. *St.* Hook. f. iii. 483.
LEPIDOTHAMNUS, PhiL in Linnaea, xxx. (1859-60) 730.
araucaroides, *Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 426.—N. Caled.
arthrotaxoides, Can. Conif. ed. II. 697=araucaroides.
Balansae, *Brongn. &" Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvi. (1869) 328.—N. Caled.
Beccarii, *Part, in DC. Prod.* xvi. II. 494.—Borneo.
Bidwillii, *Hook. f. ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* x. (1878) 888.—N. Zel.
Colensoi, *Hook. Ic. PI.* t. 548.-N. Zel.
cupressiforme, Carr. Conif. 491=seq.
cupressinum, *Soland. ex Forst. f. PI. Escul.* 80. —N. Zel.
distichum, D. Don, in Lamb. Pin. ed. II. 120 = Podocarpus taxifolia.
elatum, *Wall. Cat.* n. 6045.—Malaya.
excelsum, D. Don, in Lamb. Pin. ed. II. App. = Podocarpus dacrydioides.
ferrugineum, Van Houtte, ex Gord. Pinet. 290 = Podocarpus dacrydioides.
Fitzgeraldi, *F. Muell. Fragtn.* xi. 102.—Austral.
Franklinii, *Hook. f. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 152. t. 6.—Tasmania.
huonense, A. Cunn. ex Can. Conif. ed. I. 490 = Franklinii.
intermedium, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* x. (1878) 886.—N. Zel.
Junghuhnii, Miq. PI. Jungh. 4=elatum.
Kirkii, *F. Muell. ex Part, in DC. Prod.* xvi. II. 495.—N. Zel.
laxifolium, *Hook. f. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 143.—N. Zel.
lycopodioides, *Brongn. tf Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvi. (1869) 829.—N. Caled.
Mai, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist i. (1838) 213 = Podocarpus spicata.
Mayi, Van Houtte, ex Gord. Pinet. 287=praec.
Pancheri, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 380 = Podocarpus pectinata.
plumosum, D. Don, in Lamb. Pin. ed. II. App. 143 > Libocedrus Doniana.
taxifolium, Banks & Soland. ex Lamb. Pin. ed. II. iii. 119. = Podocarpus spicata.
taxoides, *Brongn. &* Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 427.—N. Caled.
tenuifolium, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 521 = Podocarpus tenuifolia.
tetragonum, Parl. 1. c. 496=Microcachrys tetragona.
thuioides, Banks & Soland. ex Carr. Conif. ed. I. 479 = Podocarpus dacrydioides.
ustum, Vieill. ex Brongn. *Sc* Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 426 = Podocarpus usta.
Vieillardii, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 621=Podocarpus Vieillardii.
westlandicum, *T. Kirk, in Hook. Ic. PI.* t. 1218.—N. Zel.

DACRYODE8, Vahl, in Dansk. Selsk. Skrift. vi. (1810) 115. *BURSERACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 327.
excelsa, *Vahl, I. c.* 116.—Ins. Porto Rico.
hexandia.,Griseb.Fl.Brit. W.lnd. 174.—Ins. S. Doming.

DACTILIS, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 58 (1768) = Dactylla, Linn. (Gramin.).

DACT1LON, Vffl. Hist PI. Danph. ii. 69 (1787) = Cynodon, Rich. (1805) (Gramin.).
officinale, Vill. 1. c.=C. Dactylon.
sanguinale, Vill. 1. c.=Panicum sanguinale.

DACTIMALA, Rafin. Sylva Tellur. 153 (1838) = Chry-Bophyllum, Linn. (Sapotac).
angustifolia, Rafin. 1. c. = C. angustifolium.
microcarfa, Rafin. 1. c.=C. glabrum.
olivaeformis, Rafin. 1. c. = C. oliviforme.

DACTIPHYLLON, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) •268=Trifolium, Toum. (Legumin.).

DACTIPHYLLUM, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 261=praec.

DACTYXAENA., Schrad. ex Scbult. *i.* Syst. vii. p. ix (1829), in obs. *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook, f. i. 105.
micrantha, *Schrad. ex Schult.f. I. c*—Bras.

DACTYLAENA:—
microphylla, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 241.—Bras,
panciflon, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 17.—Am. austr.
Pohliana, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 242.—Bras.

DACTYLANTHEEA, Welw. Apont 560 (1858). nomen. *GUTTIFERAE.*

DACTYLANTHES, Haw. Syn. PI. Succ. 132 (1812)-Euphorbia, Linn.
anacantha, Haw. 1. c. = E. anacantha.
globosa, Haw. in Phil. Mag. (1823) 382 - E. globosa.
hamata, Haw. Syn. PI. Succ. 183 = E. hamata.
Medusa, Rafin. Fl. Tellur. iv. 112=E. cervicornis?
patula, Haw. Syn. PI. Succ. 182 = E. anacantha.
tuberculata, Haw. 1. c. 138 = E. tuberculata.

DACTYIiANTHUS, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1859) 425. t. 75. *BALANOPHOREAE,* Benth. & Hook. f. iii. 285.
Taylorii, *Hook./. I. c—ti.* Zel.

DACTYLTANDBA, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 657 (1871). *CUCURBITACEAE.*
•Welwitschii,/foe*./. /. *c*—Afr. trop.

DACTYLICAPNOS, Wall. Tent. Fl. Nep. 51. t. 39 (1828)-Dicentra, Bernh. (Papav.).
asplenifolia, Wall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 478=seq.
thalictrifolia, Wall. Tent. Fl. Nep. 51. t. 39 = Dicentra thalictrifolia.

DACTYLIOTA, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 21 (184»)=Medinilla, Gaudich. (Melast.).
bracteata, Blume, 1. c. 22 = M. bracteata.
setigera, Blume, 1. c. = M. setigera.

DACTYLIS, Linn. Gen. ed. II. 29 (1742). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1193.
AMAXITIS, Adans. Fam. ii. 34 (1763).
abbreviata, Bernh. ex Link, Hort. Berol. i. 153 = glomerata.
adscendens, Schrad. ex Schult Mant ii. 351 = Lasiochloa adscendens.
altaica, Bess, in Schult. 1. c. 626=glomerata.
bombycina, *Steud. Syn. PI. Gram.* 428.—Arab.
brevifolia, Koen..ex Willd. Sp. PI. i. 410 - Aeluropus pubescens.
caespitosa, Forst. in Comm. Goett. ix. (1789) 22 = F°» flabellata.
canariensis, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 478 = Aeluropus Smithii.
capitata. Linn. f. Suppl. 110=Lasiochloa laevis.
capitata, *Schult. Mant.* ii. 626.—Sardin.
capitellata. Link, Hort. Berol. i. 163 = glomerata.
caudata, Brot. Fl. Lusit. i. 100=Koeleria phleoides.
ciliaris, Linn. Mant. ii. 185=Lasiochloa ciliaris.
dliata, Opiz, ex Nym. Consp. 819=glomerata.
cristata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 67 = Koeleria cristata.
cylindracea, Brot Fl. Lusit i. 99-Koeleria phleoides.
cynosuroides, Linn. Sp. PI. 71-Spartina cynosuroides.
cynosuroides, Loefl. It 115=Spartina stricta.
cynosuroides, *Roth, Nov. PI. Sp.* 74.— Ind. or.
cynosuroides, Walt. Fl. Carol. 77 = Spartina juncea.
distichophylla,Bnga.Fasc. PI. Forojul. 16 = Aeluropus laevis.
fasciculate, Lam. Tabl. Encyc. i. 180 = Spartina fasciculate.
fasciculata, C. Sm. ex Link, in Buch, Beschr. H-8-Canar. 189=Aeluropus Smithii.
geniculata, Bonn. f. Fl. Ind. 28 = Spartina geniculata-glauca, *Roth, Catalecta,* iii. 16.—Hab. ?
*glaucesrens,*Willd. Enum. Hort. Berol. I1l=glomerata-glomerata, *Linn. Sp. PI.* 71.—Europ. j As. bor.
heterophylla, Steud. Nom. ed. II. i. 478 = AeluropW laevis.
kirta, Schrad. ex Schult. Mant. ii. aSO = Lasiochloa hirta.
kispanica, Noe', ex Stend. Syn. PL Gram. 297 = Noeana.
hispanica, Roth, Catalecta, i. 8 = glomerata.
hispida, Thnnb. Prod. PI. Cap. 22 = Lasiochloa h»P[illegible]j
Juncinella, Bory, ex Boiss. Voy. Bot Espague, »• =glomerata.
Kovarovicii, *Opim, in Lotos, HI* (1863) 67.—Hab. T
laevis, Thunb. Prod. PI. Cap. 22 = Lasiochloa l»[illegible]f.
lagofarides, Linn. Mant. i. 33 ; Burm. f. Kl. Ino- Aeluropus laevis.

DACTYLIS:-
Lima, Steud. Syn. PI. Gram. 446, iphalm. vide *Cynosurus Lima.*
littoralis, Willd. Sp. Fl. i. 408-Aeluropus laevis.
lobata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 67-Koeleria cristata.
longifolia, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 861 -=Lasiocbloa longifolia.
maritima, Cnrt. Enum. Brit. Gr. 4^Spartina stricta.
maritima, Schrad. Fl. Germ. i. 818. t. 6. f. i.^Aeluropus laevis.
maritima, Walt. Fl. Carol. 77=Spartina laevigata.
massaviensis, Steud. Syn. PI. Gram. 298= Aeluropus laevis.
nemphitica, Spreng. Nachr. I. Bot Gart. Halle, 20 = Cutandia scleropoides.
mucronata, Steud. Syn. PI. Gram. 298=Aeluiopus arabicus.
Noëana, *Steud. I. e.* 297.—Ins. Ossero.
o&tusifolia, Steud. 1. c 298 = Lasiochloa obtusifolia.
Ortmanniana, Opiz, Seznam, 36=glomerata.
ovata, Steud. Syn. PI. Gram. 298 = Lasiochloa ovata.
palaestina, *Steud. I. c.* 428.^-Palaest.
paleacea, Herb. Linn, ex Munro, in Jonm. Linn. Soc. vi. (1862) 44 - Koeleria cristata.
pasPaloides, Willd. Enum. Hort. Berol. I11 = Dinebra arabica.
patens Ait. Hort. Kew. ed. I. 104 = Spartina patens,
paucinervis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 429.—Afr. anstr.
pendula,Vxan. Obs. Gram. Belg. 146-glomerata.
Pbleoides, *Klein,ex Steud. Nom.* ed. II. i. 478.—Ind. or.
*P*ngens,* Hornem. Enum. Hort. Hafn. (1804) 9; ex Knnth, Enum. PI. i. I. 383 - Koeleria phleoides.
P-ngens, Schreb. Groes. ii. 42 = Echinaria capitata.
*'*Petu,* Desf. Fl. Atlant i. 79 = Aeluropus laevis.
"pens, Sieber, ex Spreng. Syst. i. 848=Aeluropus niliacus.
riBida, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. xiii. 6O.-Ins. Creu.
scabra, Mann, in Opiz, Natural, vii. (1824) 58 > glomerata.
serrata, Thunb. Prod. PI. Cap. 22=Lasiochloa serrata.
Smithii, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 139 = Aeluropus Smithii.
spicata, Brot ex Spreng. Syst. 1. 882 = Koeleria phleoides.
**picata,* Willd. in Ges. Naturf. Fr. N. Schr. iii. (1801) *16«=Elytrophorus articulatus.
stricta, Ait. Hort. Kew. ed. 1. i.'104-Spartina stricta.
**triculosa,* Steud. Syn. PI. Gram. 299=Lasiochloa .ntriculosa.
villosa, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. ix-glomerata.
vulosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 22 = Lasiochloa villosa.

DACTYLIUM, Griff, in Proc. Linn. Soc. ii. (1853) 252 = •Brythropalum, Blume (Oladn.).
vagum, Griff. 1. c = E. vagum.

DACTYLOCTENIUM, Willd. Enum. Hort. Berol. 1029 (1809) = Eleusine, Gaertn. (Gramin.).
aegyptiacum, Willd. 1. c. = E. aegyptiaca.
"•uti*t Unk, Hort. Berol. i. 69.—Aegypt.
australe, Steud. Syn. PI. Gram. 2122.—Afr. austr.
distackyum, Boj. Hort. Maurit. 370; Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 479 = E. aegyptiaca.
falcatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 1029 *(=Campulosusfalcatusy—Mr.* austr.
Figarei, De Not. in Ann. Sc. N.»'- Sef- m- »•• (W48) 825 = E. aegyptiaca.
glabrum, Beauv. Agrost. 72, nomen *(=Cynosurus glaber).*—Habf
glaucophyllum, Courb. in Ann. Sc Nat Sér. IV. xviii. U862) 188=E. glaucophylla.
m... ...enatum, Ham.Prod.PUnd.0cc.6=E. aegyptiaca.
mucronatum, Willd. Enum. Hort Berol. 1029 = E. aegyptiac.
nitidum, Link ex Steud. Nom. ed. II. i. 479 = Era-.:p°»tUnitida.
£'°«w, Beanv. Agrost. 72, nomen.—Hab. ?
^"*stratum,* Willd. Enum. Hort. Berol. 1029 = *• Mgyptiaca.
S ? » * . Beauv. Agrost. 72 = E. aegyptiaca.
si!?-^ Boiss- DiaB11-BSer. II. iv. 181 = E. aristata.
^"W*unctum,* Courbi in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 185—Afr. trop.

DACTYLOGRAMMA, Link, Hort. Berol. ii. 248 (1888) = Hyalopogon, Fresen. (Gramin.).
»n<ndes, Link, j. c>=sM. glomerata.

DACTYLON, Roem. & Schult. Syst ii. 411, in syn. (1817) - DACTILON, Vill. - Cynodon, Rich. (1805) (Gramin.).

DACTYLOPETALTTM, Benth. in Jonm. Linn. Soc. iii. (1859) 79. *RHIZOPHOREAE,* Benth. & Hook, f. i. 682.
Barteri, *Hook.f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* fi. 412.—Afr. trop.
gummifluum, Baill. Adansonia, iii. (1862) 22, 27 = sessiliflorum.
Mannii, *Hook. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 412.—Afr. trop.
sessiliflorum, *Benth. in Jowrn. Linn. Soc.* iii. (1859) 79.—Afr. trop.

DACTYLOPHYLLUM, Spach, Hist. Veg. Phan. ix. 108 (1840) - GUia, Ruiz & Pav. (Polemon.).

DACTYLOPHYLLUM, Spenn. Fl. Frib.iii. 1084 (1829) •=FotentiUa, Linn. (Rosac.).
Anserina, Spenn. 1. c. »=P. Anserina.
Ehrharti, Spenn. 1. c «= Fragaria collina.
Fragaria, Spenn. 1. c = Fragaria vesca.
Fragariastrum, Spenn. 1. c. = P. Fragariastrum.
Sibbaldia, Spenn. 1. c.»P. Sibbaldi.

DACTYLORHIZA, Neck. Elem. iii. 129 (1790) = Orchis, Tourn.

DACTYLOSTALIX, Reichb. f. in Bot. Zeit xxxvi. (1878) 74 = Cremastra, LindL (Orchid.).
ringens, Reichb. f. 1. c.—Japon.

DACTYLOSTEGIUM, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 182, t. 81 (1847)=DieJiptera, Juss. (Acantfa.).
portoricense, Nees, in DC. Prod. xt. 404, in obs. = Dicliptera portoricensis.
sparsiflorum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 164 = Dicliptera sparsiflora.

DACTYLOSTEMON, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 181 = Aotinostemon, Klotzsch (Euphorb.).
angustifolius, Klotzsch, 1. *c=Klotischii.*
angustifolius, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 604-A. caribaeus?
anisandrus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 61.—Reg. Argent.
australis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 608.—Bras.
brasiliensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1868) 114.—Bras.
communis, Muell. Arg. 1. c. 112—*KIcttschii.*
cuneatus, Klotzsch, ex Muell. Arg. 1. c. 114 ^ A. cuneatns.
desertorum, Muell. Arg. in Mart. FL Bras. xi. II. 608.—Bras.
estrellensis, Muell. Arg. 1. c. 609.—Bras.
Gardneri, Muell. Arg. 1. c. 602.—Bras.
glabrescens, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 181, nomen =*-KlotBschii.*
grandifolius, Klotzsch, 1. c. nomen; Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1868) 111 *(=A. Klottschianus).*—Bras.
guianensis, Klolzsch, in Schorab. Faun, et Fl. Gui. 1184, nomen.—Guiana.
Hagendorfii, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 181, nomen=*Klot»schii.*
KlotBschii, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 127.—Bras.
lagoënsis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 602.—Bras.
lasiocarpoides, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 114 = A. lasiocarpoides.
lasiocarpus, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 181, nomen ; Muell. Arg. 1. c. 111.—Bras.
leptopus, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 607.—Bras.
Lundianus, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 126—A. lasiocarpoides.
mandiocanus, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 601.—Bras.
obtusatus, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 181, nomen=*Kloteschii.*
oligandrus, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii (1868) 115= A. oligandrus.
Schomburgkii, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 181, nomen; et in Hook. Load. Journ. Bot. ii. (1848) 45.—Guiana.

DACTYLOSTEMON *v-*
sparsifolius, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xl. II. 610.—Bras.
verticillatus. Klotzsch, Ind. Sera. Hort. Berol. App. (1851)18; et in Linnaea, xxv. (1852) 298=A. verticillatus.

DACTYLOSTYLES, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Garten*, vii. (1889) 405 = Zygostates, Lindl. (Orchid.).
fimbrata, Scheidw. 1. c. 406 = Z. lunata.

DACTYLUS, Aschers. Fl. Brandenb. 810 (1864) = Cynodon, Rich. (Gramin.).
officinalis, Aschers. L c = C. Dactylon.

DACTYLUS, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3 (1768) •» Polllnla, Trin. (Gramin.).
spicatus, Burm. f. I.e.-P. villosa.

DACTYLUS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. xxxvi (1775) = Dioepyros, Linn. (Ebenac).
trapeMuntinus, Forsk. 1. c.=Diosp. Lotus.

DACTYPHYLLUM, Endl. Gen. 1268, in syn. (1840)-DACTIPHYLLUM, Rafin. = Trifolium, Tourn. (Legumin.).

DADIA, Veil. Fl. Flum. 847 (1825). *COMPOS1TAE* ! Benth. & Hook. f. ii. 228.
lixa, *Veil. I. c.* 848 ; viii. t. 86.—Bras.

DAEDALACANTHTFS, T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl. 229 (1864). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1082.
Griffithii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 486—Reg. Himal.
macrophyllus, *T. Anders. 1. c.* 487.—Burma,
microstachyus, *T. Anders. 1. c.* 488.—Burma,
montanns, *T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl.* 229.—Ind. or.
nervosus, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 487.—Ind. or.
Parishii, *T. Anders. 1. c.* 489.—Burma,
purpurascens, *T. Anders. 1. c.* 488.—Ind. or.
roseus, *T. Anders. 1. c.* 487.—Ind. or.
salaccensis, T. Anders, in Joum. Agr. Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 274-tetragonus.
scaber.T. Anders, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 487 = nervosus.
splendens, *T. Anders. I. c.* 486.—Reg. Himal.
strictus, *T. Anders. I. c.* 487.—Reg. Himal.
suffruticosus, *T. Anders. I. c.* 488.—Ins. Andaman,
tetragonus, *T. Anders. I. c.*—Burma,
tnbiflorus, *T. Anders. 1. c.* 486.—Reg. Himal.

DAEMIA, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 50 (Doemia). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. *i.* ii. 764.
aethiopica, *Decne. in DC. Prod.* viii. 644.—Afr. trop.
angolensis, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 887=scandens.
atropurpurea, F. Muell. Census, 94 •= Pentatropis atropurpurea.
barbata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 274 "extensa.
bicolor, Sweet, Hort. Brit ed. II. 861-extensai
cordata, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 50.—As. occ.; Afr. trop.
extensa, *R. Br. I.* r.—Ind. or.; Malaya; Afr. trop.
Forsiili, Schult. Syst vi. 113 = extensa.
garipensis, £. *Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 220.—Afr. austr.
glabra, *Schult. Syst.* vi. 118.—Arab.
guineensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 166=scandens.
incana, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 836 = cordata.
Kempeana, *F. Muell. Census,* 94.—Austral.
linearis, F. Muell. Census, 94 = Pentatropis linearis.
quinquepartita, F. Muell. 1. c.=Pentatropis quinque. partita,
scandens, *G. Don, ex Loud. Hort. Brit.* 94.—Afr. trop.
Schmittiana, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 82.—Algeria.
tomentosa, Pomel, I. c-cordata.

AEMONOROP8, Blume, ex Schult. f. Syst. vii. 1338 (1830). *PALMAE* [Bentfa. & Hook. f. iii. 932J.
accedens, Blume, Rumphia, ii. p. viii; iii. 13 = D. Draco,
adspersus, *Blume, I. c.* tt. 142,143 (Calamus in textu). —Java,
angustifolius, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 327—Malaya.
barbate, *Mart. 1. e.* 830.—N. Guinea,
calapparins, *Blume, Rumphia,* iii. 7.—Ins. Amboina.
calicarpus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 326.—Malaya,
cochleatus, *Teijsm.* to* *Binn. Cat. Hort. Bog.* 881; *et ex Miq. in Verh. Akad. Wetensch.* xi. (1868) n. V. 29.—Sumatra ?
crinitus, *Blume, Rumphia,* ii. p. viii; iii. 27.—Malaya.
Draco, *Blume, 1. c.* iii. 8.—Malaya,
clongatus, *Blume, I. c.* 16.—Borneo.
faseiculatus, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 380 = Calamus Femandezii.
fissus, *Blume, Rumphia,* iii. 17.—Borneo,
fuscus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 831.—Ins. Philipp.
Gaudichaudii, *Mart. I. c*—Ins. Philipp.
geniculatus, *Mart. 1. c.* 329.—Malaya,
grandis, *Mart. I. c.* 327.—Malaya.
Guruba, Mart. 1. c. 830 = Calamus Guruba.
heteracanthus, Blume, Rumphia, iii. 1.139 = Calamus beteracanthus.
hirsutus, Blume, 1. c. ii. p. viii; iii. 21-Hystrix.
hygrophilus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 828.—Malaya.
hypoleucus, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xliii. II. (1874) 208-Calamus hypoleucus.
Hystrix, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 828.—Malaya,
intermedius, *Mart. I. c.* 327.—Malaya.
Jenkinsianus, *Mart. 1. c*— Assam; Burma.
Kirttmg, Griff. Palms Brit. E. Ind. 102. t. 216 B = malaccensis.
Korthalsii, *Blume, Rumphia,* iii- 28.—Borneo.
latispinus, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 74 = Calamus latispinus.
leptopus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 329.—Malaya.
Lewisianus, *Mart. 1. c.* 827.—Penang.
longipes, *Mart. I. c.* 829.—Malaya,
longipes, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 592.—Sumatra,
malaccensis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 827.—Malaya.
manillensis, Mart. 1. c. 380 = Calamus manillensis.
marginatus, Blume, Rumphia, iii. 24 = Calamus marginatus.
melanochaeles, *Blume, in Schult. f. Syst.* vii. 1383.—Malaya.
melanolepis, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 831=Calamus Huegelianus.
mirabilis, *Mart. 1. c.* 329.—Malaya,
inonticolus, *Mart. I. c.* 328.—Malaya,
niger, *Blume, Rumphia,* iii. 5.—Ins. Amboina.
nutantiflorus, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 826=Jenkinsianus.
oblongus, Blnme, Rumphia, iii. 26. t. 141; Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 205 = Calamus oblongus.
ochreatus, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 74 = Calamus ochreatus.
palembanicus, *Blume, Rumphia,* iii. 20.—Sumatra,
periacanthus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 593.—Sumatra.
petiolaris, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 826.—Malaya.
platyacanthus, Mart. 1. c. 204, 828 = oblongus.
platyspathus, Mart. L c. 329 = Calamus platyspathus.
ramosissimus, Mart. 1. c. 380 •= Calamus ramosissimus.
Rheedii, Mart. 1. c. 380=Calamus Rheedei.
ruber, Mart. 1. c. 329 - D . Draco.
Kumphii, *Mart. 1. c.* 331.—IDS. Amboina.
strictus, Blume, Rumphia, iii. 19—longipes.
triehrous, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 692.—Sumatra,
verticillaris, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 329.—Malaya.

DAHLIA, Cav. Ic i. 56. t. 80 (1791). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 386.
GEORGIA, Spreng. Anleit. ii. II. 567 (1818).
GEORGINA, Willd. Sp. PI. iii. .2124 (1803).
arborea, *Regel, Cat. PI. Hart. Aksaiov.* 46, nomen.—Am. trop.
acutiflora, Moc.&Sesie, ex DC. Prod. v. 494 = coccinea.
astrantiaeflora, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 353, nomen.—Mexic
Barkeriae, Knowles & Westc. Flor.Cab. ii. (1838) 28; iii. (1840) 147. t. 127=-variabilis.

DAHLIA:—
bidentifolia, Salisb. Parad. Lond. t. 19 = coccinea.
Cervantesii, Lag. ex DC. Prod. v. 494 = coccinea.
coccinea, *Cav. Ic.* iii. 33. t 266.—Mexic.
erocata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 80=yariabilis.
crocea, Poir. Encyc. ii. 445=coccinea.
Decaisneana, Verlot, in Rev. Hortic (1864) 31 = Merckii.
excelsa, *Benth. in Maund, Botanist*, ii. t 88.—Mexic.
frustranea, Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 88 = coccinea.
glabrata, Lindl. Bot. Reg. (1840) t 29=Merkii.
gracilis, *Ortg. in Regel, Gartenfl.* (1876) 97. t. 861.—Mexic.
imperialis, *Roetl, I.e.* (1863) 243. t. 407.—Mexic.
Maximiliana, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1879) II. 216, 525; *et ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 197.—Mexic.
Merckii, *Lehm. Delect. Sem. Hort. Hamb.* (183!)); *ex Linnaea*, xiv. (1840) *Litt.* 180.—Mexic.
minor, Vis. in Nuovi Sagg. Ace. Padov. v. (1840) 263 = Merkii.
nana, Andr. Rep. Bot. viL t. 488 =• variabilis.
pinnata, Cav. Ic. i. 67. t. 80=variabilis.
platylepis, *A. Brongn. ex Neumann, in Rev. Hort.* Sir. II. iv. (1845-46) 305.—Mexic.
pubescens, *A. Brongn. I. c.*—Mexic.
purpurea, Poir. Encyc. Suppl. ii. 444=variabilis.
pusilla, Zucc. ex DC. Prod. v. 494 = variabilis.
rosea, Cav. Ic. iii. 33. t. 265=variabilis.
Royleana, Knowles & Westc. Flor. Cab. iii. (1840) 186 =variabilis.
sambucifolia, Salisb. Parad. Lond. t. 16-variabilis.
scapigera, *Knowles tf Westc. Flor. Cab.* iii. (1840) 1*8. t. 118.—Mexic.
spkondyliifolia, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 91=variabilis.
superjlua, Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 87 = variabilis.
variabilis, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 182.—Mexic.
Yuarezii, *Hort. ex Card. Chron.* (1879) II. 482.—Mexic.

DAHLIA, Thunb. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kiobenh. ii. (1792) 138. t. 4=Trichocladus, Pers. (Hamcmel.).
crinita, Thunb. 1. c.=T. crinitus.

DAHURONIA, Scop. Introd. 219 (1777)=Moquilea, AubL (Rosac).

DAIS, Royen, ex Linn. Sp. PI. ed. II. 656 (1762). *THYMELAEACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 192.
anthylloides, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 580, 596 = Lasiosiphon anthylloides.
argentea, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c. 694 = Lasiosiphon Meissnerianus.
canescens, *Bartl. ex Meissn. in Linnaea,* xiv. (1840) 388.—Afr. austr.
coccinea, Gaudicb. in Freyc. Voy. Bot. 443. t. 44 = Pseudais coccinea.
cotinifolia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 656.—Afr. anstr.
cuneata, Lam. ex Decne. in Jacquem. Voy. Lot. 149 = Lasiosiphon cuneatus.
disperma, Forst. f. Prod. 33 (=*Drimyspermtim Forsteri)*. —Ins. Tongatabu.
dubiosa, Blume, Cat. Gew. Buitenz.; Bijdr. 651 = Phaleria Blumei.
dubiosa, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 369 = Phaleria laurifolia.
eriocephala, *Lichtenst. ex Meissn. in Linnaea,* xiv. (1840) 389.—Afr. austr.
glaucescens, *Decne. in Ann. Sc.Nat. Sit.* II. xx. (1843) 51.—Madag.
gnidioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 244.—Madag.
laurifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 875-Phaleria Perrottetiana.
laurifolia, Jacq. Coll. i. 146=cotinifolia.
linifolia, Lam. Encyc. ii. 255 = Lasiosiphon linifolius.
longifolia, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 335, nomen.—Hab. ?
madagascariensis, Boj. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 529-glaucescens.
madagascariensis, Lam. Encyc. ii. 254=Lasiosiphon madagascariensis.
octandra, Linn. Mant. i. 69 ; Burm. f. Fl. Ind. 104. t. 32. f. 2 *{" Drimyspermum Burmanni).*—Ind. or.
Omnii, Eckl. *8c* Zeyh. ex Meissn ID DC. Prod. xiv. 596=Lasiosiphon triplinervis.

DAIS:-
Passerina, Wendl. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 889= eriocephala.
pubescens. Lam. Encyc. ii. 255 - Lasiosiphon pubescens.
purpurea, *Gaudich. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 479, nomen.—Hab. t
sericea, Lam. Encyc. ii. 767 = Lasiosiphon anthylloides.
spicata, Endl. Sert. Cabul. 5. t. 3=Stellera Lessertii.
virgata, Lichtenst. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 530, 561 = Arthrosolon polycephalus.

DAISWA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 18 (1836)-Paris. Lion. (Liliac).
polyphylla, Rafin. 1. c - P . polyphylla.

DALBERGARIA, Tussac, Fl. Ant. i. 141. t. 19 (1808) = Columnea, Linn. (Gesner.).
phoenicea, Tussac, 1. c.=C. sanguinea.
sanguinea, Steud. Nom. ed. II. i. 479=praec.

DALBERGIA, Linn. f. Suppl. 52 (1781). *LEGVMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 544.
AMERIMNON, P. Br. Hist. Jamaic. 288 (1756) i DC Prod. ii. 421 (1825).
ENDESPERMUM, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 23 (1823).
LEIOLOBIUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1339) 94.
MISCOLOBIUM, Vog. in Linnaea, xi. (18371 200.
PODIOPETALUM, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 657.
SALKEN, Adans. Fam. ii. 322 (1763).
SEMEIONOTIS, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 804.
SOLORI, Adans. Fam. ii. 327 (1763).
TRIPTOLEMEA, Mart, in Flora, xx. (1887) Beibl. 122-
acaciaefolia, Dalz.in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 87 -tamarindifolia.
acuminata, *Hassk. in Flora,* xxv. (1842) II. *Beibl.* 53. —Java,
acuta, *Benth. in Journ. Linn. Sac.* iv. *Suppl.* (1860; 86; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 223.—Bras.
Afzeliana, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 376.—Afr. trop.
Afeelii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 234.—Afr. trop.
alata, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 225.—Ind. or.
ambongoënsis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1880 488.—Madag.
Amerimnum, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 36.—Nicaragua.
nmorphoides, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 268=Eysenhardtia amorphoides.
angustifolia, Hassk. in Flora, xxv. (1842) H. Beibl. 63-Millettia sericea.
arborea, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 330 = lanceolaria-
arborea, Willd. Sp. PI. iii. 901=Pongamia glabra.
arbutifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 282.—Afr. trop.
argentea, Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Nefrl. Indie. iii. (1846) 65 = Derris thyrsiflora.
armata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 152.—Afr-austr.
assamica, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 256, in adnot—Assam.
Bakeri, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr-* 285.—Afr. trop.
Barclayi, Herb. Kew. ex Baker, in Journ. Lino. Soc-xx. (1883) 129 = Mundelia revoluta.
Barclayii, *Telfair, ex Hook. Exot. Fl.* iii. t. 188 —Madag.
Baroni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 387.—Madag.
Bemieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1884) »7-—Madag.
Blumei, Hassk. PI. Jav. Rar. 400-tamarindifolia.
Boivini, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1884) «»• —Madag.
bracteolata, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 284.—Afr. trop.
brasiliensis, *Vog. in Linnaea,* xi. (1837) 198.—Bras.
brevicaudata, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvw-(1878) 264.-A&. trop.
calycina, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl-* (W 35.—Guatemala.
campechiana, *Benth. 1. c.* 37.—Mexic.
cana, J?. *Grah. in Wall. Cat.* n. 6869.—Burma.
cassioides, Wall. 1. c. 5863 = stipulacea.
caudata, *G. Don, Gen. Syst.* ii 375.—Guiana.

DALBERGIA :—

Championii, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 94.—Zeylan.; Malaya.
Chapelieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 436__Madag.
confertiflora, *Benth.- in Miq. PI. Jungh.* 265, in adnot. —Ind. or.
confusa, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 129- Championii.
congesu, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5872.—Ind. or.
corymbifera, Blume, ex Miq. FL Ind. Bat. i. I. 130- Cumingiana.
Crouei, DC. Prod. ii. 417 = Derris robusta.
cujabensis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (I860) 36 ; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 224—Bras,
cultrata, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5861.—Burma.
Cumingiaua, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 255, in adnot. —Ins. Philipp. j Burma.
Cumingii, Benth. in Joum. Linn. Soc iv. Suppl. (1860) , 82—praec.
aensa, *Benth. in Hook. Land. Joum. Bot.* iL (1843) 217.—Ins. Pacific,
densicoma, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 438—Madag.
densiflora, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* _ (1860) 87 ; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 226.—Bras.
Oiphaca, Pen. Syn. ii. 276=Ormocarpum se'nniodes.
•Wolor, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 130.— Malaya.
domingensis, Turp. ex Pen. Syn. ii. 276-Lonchb- carpus sericeus.
elliptica, Span, in Linnaea, xv. (1841) 197 - purpurea.
'marginata, Roxb. Hort Beng. 53 ; Fl. Ind. iii. 224 = latifolia.
emirnensis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (I860) 83.—Madag.
ftrruginea, Hochst. ex Benth. in Joum. linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 42-sympathetic.
ferruginea, Roxb. Hort. Beng. 98; Fl. Ind. iii. 228= stipulacea.
flexuosa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5876-renifonnis.
johacea, *Wall. Cat.* n. 5856. A, C, D.—Burma,
foliolosa, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (I860) 87; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 225.—Bras.
frondosa, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 226 = lanceolaria.
frondosa, Wall. Cat. n. 5856 B-sympathetica.
bordneriano, Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 42-congesta.
glandulosa, *Benth. 1. c.* 35; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I- 228._Bras.
glauca, Wall. Cat. n. 6862-ovata.
glaucescens, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 37 ; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 224.—Bras.
glaucescens, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 149- Derris elliptica.
gjomerata, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 8.—Mexic.
g'omeriflora, *Kurt, in Journ. As- Soc. Beng.* xlii. (^73) H. 70.—Burma.
gracihs, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) [88] i *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 226.—Bras.
—tsuidieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 487.—Madag.
^"eveana, *Baill. I. c.* 436.—Madag.
*g>"*eensis,* Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 268-Loncho- ^carpus sericeus.
hancei, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) —China.
heptaphylla, Poir. Encyc SuppL ii. 446=Lonchocarpus latifolius.
jftfT<>phylla, Willd. Sp. PI. iii. 901-Derris uliginosa.
«iUebrandtii, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 101.
^.Nossibe.
Benth. in Journ. [illegible] iv. Suppl. (1860) *8.—Reg. Himal.
*nir<*na,* Buch.-Ham. in Wall. Cat.n. 5871 A-lancec- 'eria.
"ookerii, *Boj. Hort. Maurit.* 111, nomen.—Madag.
ho^a> Rl Grah_ » WaU_ c«- "> 6877=spinosa.
gj^11^ *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) Afr trop.
hu im, *?^1^1, *fiance, in Joum. Bot.* xx. (1882) 5—China.
To Ben*<-*n *Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) iii!? et in Uart_ Fl_ Bras_ XT_ >• 227.—Bras.
il G_ Don, Gen_ syst- >• 876.—Japon.
lWk"?, Mi<>- F1- In<l. Bat. i. I. 132 = latifolia.
tfSL I Benth_ in Uia_ Pl_ *J^ngh'.* 254.—Malaya.
"»»ee, Roxb. FL Ind. iii. 229-Derri* robusta.

DALBEB.GIA :-

lactea, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 251. —Afr. trop.
lanceolaria, *Linn./. Suppl.* 316.—Ind. or.
lanceolaria, Moon, Cat. PI. Ceyl. 51 - Pericopsis Mooniana.
lanceolata, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 197 = lanceolaria.
lateriflora, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 37; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 225.—Bras,
latifolia, *Roxb. PI. Corom.* ii. 7. t 118.—Ind. or.
latisiliqua, *Desf. Tabl.* ed. I. 198; ed. II. 226.—Am. austr.
livida, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6866 A=stipulacea, t&m&rindifolia*
luzoniensis, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 83.—China.
macrophylla, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 268 = Loncho- carpus sericeus.
macrosperma, *Welvi. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 235.—Afr. trop.
madagascariensis, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-81) 105.—Madag.
malifolia, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 283.—Afr. trop.
marginata, Roxb. Hort. Beng. 63; FL Ind. iii. 230= Dem's marginata.
melanoxylon, *Guill. &* Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 227. t. 53.—Afr. trop.
Meyeriana, Steud. Nom. ed. II. i. 480=multijuga.
Milletti, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (18B0) 34.—China.
Miscolobium, *Benth. 1. c.* 86; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 222.—Bras.
Momsita, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 5849=- Derris robusta.
Monetaria, Linn. f. Suppl. 317 = Ecastaphyllum Mon- tana,
monosperma, *Dolt, in Hook. Ktw Joum.* iL (1850) 36.—Ind. or.
Mooniana, Thw. Enum. PI. Zeyl. 93 = Pericopsis Mooniana.
mulHflora, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 5848 = pani- culata.
multijuga, R. Grah. in Wall. 1. c. n. 6865 = taraarindi- folia.
multijuga, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 158.—Afr. aus^r.
myriantha, *Benth. ex A. Gray,Bot. U. St. Expt. Expect.* i. 458.—Bras.
myriantha, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848) 100 = armata.
nigra, *Allem. ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 36 ; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 224. —Bras,
nigrescens, *Kurt, in Pegu Rep. App. A.* 48. *et B.* 45. —Burma,
nitidula, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 236.—Afr. trop.
oblongifolia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 875.—Afr. trop.
obovata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 162.—Afr. austr.
ougeinensis, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 220 (oojeinensis) = Ougeinia dalbergioides.
ovata, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5854.—Burma,
paniculata, *Roxb. PI. Corom.* ii. 8. 1.114.—Ind. or.
paniculata, Wall. Cat. n. 5848 J=monosperma.
paniculata, Wall. 1. c. £ ft I = confertiflora.
parviflora, Roxb. Hort. Beng. 98; Fl. Ind. iii. 225- Junghuhnii.
pendula, Tenore, in Rendic. Soc. Borb. Nap. i. (1842) 409 = D. Sissoo.
penduliflora, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 188 = stipulacea.
pentaphylla, Poir. Encyc. Suppl. it 446 =Lonchocarpus latifolius.
Pervillei, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 106.— Madag.
phoenica, Pritz. Ic. Ind. 348, sphalm. vide *Dalbergaria phoenicea.*
polyphylla, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* i. 258, in adnot. —Ins. Philipp.
polyphylla, Benth. 1. c. partim = Milletti.
polyphylla, Poir. Encyc. Suppl. ii. 446 = Sesbania vesicarea.
praecox, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 233- Pterocarpus lucens.
Pseudo-Sissoo, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.128 -Championii.

DALBEBGIA:-

pubescens, *Hook.f. ex Hook. Niger Fl.* 315.—Afr. trop.
pubinervis,.Span, in Linnaea, xv. (1841) 197=Derns pubinervis.
pulchra, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 242 - Millettia pulchra.
punctata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 268=Loncho- carpus violaceus, *H. B. b" K.*
purpurascens, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1884) 436.—Madag.
purpurea, *Reimv. ex Blume, Cat. Gev. Buitent.* 90, nomen; *Hassi. in Flora,* xxv. (1842) II. *Beibl.* S3. —Java.
purpurea, *Wall. Cat.* n. 2869.—Burma.
radicans, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat i. i 141 = Derris uliginosa.
reniformis, *Roxb. Hort. Beng.* 53; *Fl. Ind.* iii. 226.— Ind. or.; Burma.
repens, Span. Ic. 1; et in Linnaea, xv. (1841) 197- Derris uliginosa.
retusa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 488.— Madag.
retusa, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 8__Panama.
Richardi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 437. —Madag.
rimosa, *Roxb. Hort. Beng.* 53; *Fl. Ind.* iii. 283.—Reg. Himal.
riparia, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (186U) 31; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 221—Bras.
robusta, Miq. ex Benth. 1. c. 103 = Derris scandens.
robusta, Roxb. Hort. Beng. 58 = Derris robusta.
robusta, Wall. Cat. n. 5849 A = lanceolaria.
rostrata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5867 = stipulacea.
rostrata, *Hassi. in Flora,* xxv. (1842) II. *Beibl.* 58.— Java,
rotundifolia, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 35.—Afr. austr.
rubiginosa, *Roxb. PI. Corom.* ii. 9. t. 115.—Ind. or.; China.
rufa, G. *Don, Gen. Syst.* ii. 875.—Afr. trop.
rufa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5864 - tamarindifolia.
saxatilis, *Hook. f. in Hoot. Niger Fl.* 314.—Afr. trop.
scandens, Roxb. PI. Corom. ii. 49. t. 192=Derris scandens.
Schimperiana, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 232 = Lonchocarpus laxiflorus.
sennoides, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 134=. lanceolaria.
sericea, *Boj. Hort. Maurit.* 111, nomen.—Madag. I
sericea, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 875.—Reg. Himal.
sericea, Spreng. Syst. iii. 198 = Millettia sericea.
sissoides, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5876 = latifolia.
Sissoo, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 223.—Ind. or.; Afghan.
spinosa, Roxb. IL cc. [98]; 233.—Ind. or.; Afghan.
Sprueeana, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 35; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 228.—Bras,
stenocarpa, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) II. -205.—Reg. Himal.
stipulacea, *Roxb. Hort. Beng.* 53 ; *Fl. Ind.* iii. 283.— Reg. Himal.; Burma.
stipulata, Wall. Cat. n. 5868 A, B=velutlna, reni- formis.
Stocksii, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 42.—Ind. or.
striata, Boj. Hort. Maurit 111-Mundulea suberosa.
suaresensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 437.—Madag.
sympathetica, *Nimmo, in J. Grah. Cat. PI. Bomb.* 55. —Ind. or.
tamarindifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 53; *Fl. Ind.* iii. 233. —Ind. or.; Malaya.
Telfairii, Boj. Hort. Maurit. 111 = Mundulea Telfairii.
tephrosioides, Wight & Am. Prod. 210 = Millettia pulchra.
Thomsoni, Benth. in Joum. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 33.—Reg. Himal.
timoriensis, DC. Prod. ii. 417-Derris scandens.
tingens, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 438.— Madag.
tingens, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6860 - stipulacea.
tomentosa, Vog. in Linnaea, xi. (1887) 197-variabilis.
torta, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5873 - monosperma.
toxtcaria, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* L (1884) 438.—Madag.
vacciniifolia, *Vatke, in Oestr. Sot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 263.—Afr. trop.
variabilis, *Vog. in Linnaea,* xi. (1837) 196.—Am. trop.

DALBEB.OIA:—
velutina, *Benth. in Miq. PL Jungh.* 255, in adnot—Reg. Himal.; Burma.
venusta, Zipp. ex Span, in Linnaea, XT. (1841) 197 = Denis scandens.
villosa, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 38 ; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 226.—Bras.
violacea, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. I. 181=Loncho-carpos violaceus, *H. B. b" K.*
volubilis, *Roxb. PL Corom.* ii. 48. t 191.—Ind. or.
teylanica, Roxb. Hort Beng. 58; Fl. Ind. iii. 228 - Ianoeolaria.
Zollingeriana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 130 - Cumingi-ana.

DALEA, Gaertn. Fruct. i. 285.161 (1788) = **Microdon,** Choisy (Selagin.).
Lippiastrum, Gaertn. 1. c. = M. ovatns.

DALEA, Linn. Hort. Cliff. 363. t. 22 (1787) ; Gen. ed. I. 349 (1787). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 492.
ERRAZURIZIA, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 689.
JAMESIA, Rafin. Atl. Joum. 145 (1832).
PAROSELA, Cav. Desc. 18S (1802).
TRICHOPODIUM, Presl, Bot. Bemerk. 62 (1844).
acutiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 480 = acutifolia.
acutifolia, *Moç. tf Sesse, ex DC. Prod.* ii. 245.—Mexic.
agastachya, Moric. PI. Nouv. Am. 65. t. 44 = Fetalo-stemutn obovatnm.
agavacensis, Stend. Nom. ed. II. i. 480, «phalra.= ayavacensis.
alia, Michx. in Koem. Cat Hort. Soc. Phys. Turic. (1802) - alopecuroides.
albiflora, *A. Cray, PI. Wright,* ii. 88.—N. Mexic.
alopecuroides, Blanco, Fl. Filip. cd II. 889-nigra.
alopecuroides, *Willd. Sp. PL* iii. 1886.—Am. bor.
Alopecurns, *MM. If Sesse, ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 223.—Mexic.
Alopecurus, *Moric. PI. Nouv. Am.* 10. t. 8.—Mexic.
araoena, 5. *Wats, in Am. Natural,* vii. (1873) 300.—Am. bor.
angustifolia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 223.—Mexic.
annua, Thouin, ex Schrank, PI. Kar. Hort. Monac. t. 9 = Thoaini.
arborescens, *Torr. ex A, 'Gray, in Mem. Am. Acad.* N. ii. v. (1855) 316.—Calif,
argentea, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 225.—Mexic.
argentea, *Mart. Del. Sem. in Hort. Monac.* (1846) ; *ex *Walp. Ann.* i. 228.—Mexic.
argyraea, *A. Gray, PL Wright, i.* 47.—Mexic.
argyrostachys, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 285 = lasiostachya.
aristata, Benth. PI. Hartw. 11—mucronata.
astragalina, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 484.— Ecuador.
astragalina, Moç. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. ii. 245- hypoglottidea.
aurea, *Nutt. in Fras. Cat.* (1813), *ex Gen. Am.* ii. 101.—Am. bor.
ayavacensis, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 486.— Mexic.
Berlandiera, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 177.-Mexic.
bicolor, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort.Berol. 787-mutabilis.
brachysuchys, *A. Gray, PI. Wright,* ii 39.—N. Mexic.
californica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 132. —Calif.
calycosa, *A. Gray, PL Wright,* ii. 40.—N. Mexic.
Candida, Willd. Sp. PI. iii. 1387 = Petalostemum candidum.
canescens, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 12.—Calif,
canescens, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 43.—Mexic.
cornea, Poir. in Diet. Sc. Nat. xii. 46*=Petalostemum carneum.
chrysorhiza, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 156.—Mexic.
cinerea, *Moric. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 238, nomen.—Mexic.
citriodora, Hook. & Am. ex Hemsl. 1. e. 245=- polyphylla.
citriodora, *Willd. Sp. PL* iii. 1839.—Mexic.
Cliffortiana, Willd. 1. c. 1336=alopecuroides.
comosa, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1888) 289.—Mexic.
compacta, Spreng. Syst. tii 327=Petalostemum macro-stachynm.

DALEA:—
Coronilla, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 226.—Mexic.
corymbosa, Poir. in Diet. Sc. Nat. xii. 462-Petalo-stemum corymbosum.
crassifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 288.—Mexic.
crenulata, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 285 = nutans.
cylindrica, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1881) 213.—Perav.
decora, S. Schau. in Linnaea, xx. (1847) 743 - pulchella.
diffusa, *Moric. PL Nouv. Am.* 8. t. 6.—Mexic.
divaricata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 12.—Calif,
domingensis, *DC. Prod.* ii. 246.—Ins. S. Doming.
doryenioides, DC. 1. c. 245-pulchella.
Ehrenbergii, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 290.—Mexic.
elata, *Hook, b" Am. Bot. Beech. Voy.* 416.—Mexic.
elata, *Mart. If Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 41.—Mexic.
elegans, *Gill, ex Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 183.—Chili.
elegans, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 417—nigra.
Emoryi, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. v. (1855) 315.—Mexic.
enneandra, Fras. Cat. (1813), ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 741 = laxiflora.
enneaphylla, Bert, ex DC. Prod. ii. 246-domingensis.
enneaphylla, *Willd. Sp. PL* iii. 1388.—N. Granat.
eriophylla, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 840.—Mexic.
ervoides, *Benth. in Hemsl. Diagn. PL Nov.* 6.—Mexic.
exilis, *DC. Prod.* ii. 247.—Peruv.
eysenhardtioides, *Hemsl. Diagn. PL Nov.* 6.—Mexic.
filiformis, *A. Gray, PL Wright,* ii. 39.—N. Mexic.
flava, *Mart.* &" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 40.—Mexic
flava, Moç. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. ii. 245-lntea.
flava. Seem. Bot. Voy. Herald, 280 = similis.
flavorosea, *Moc. & Sesse, ex DC. Prod.* ii. 246.—Mexic.
formosa, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* ii. (1828) 177.—Am. bor.
Frcinontii, *Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. v. (1855) 316.—Am. bor. occ
frutescens, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 175.—Texas.
fruticosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 226.—Mexic
gracilis, Knnth, Mim. 166. t. 48=sericea.
gracilis, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 286 = diffusa.
Greggii, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. v. (1855) 314.—Mexic
guatemalensis, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 241, nomen.—Guatemala.
Hallii, J4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* viil. (1873) 625.—Texas.
Hegewischiana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 480.—Mexic.
herbacea, Mo;. *Sc* Sesse, ex G. Don, Gen. Syst. ii. 224- humilis.
humifusa, *Benth. PL Hartw.* 170.—Ecuador,
humilis, *G. Dan, Gen. Syst.* ii. 224.—Mexic
hypoglottidea, *DC. Prod.* ii. 245.—Mexic.
inconspicua, *S. Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 744.—Mexic.
insignis, *Hemsl. Diagn. PL Nov.* 7.—Mexic
Jamesii, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 3.08.'—Am. bor.
Johnsoni, 5. *Wats, in Bot. King's Exp.* 64.—Am. bor. occ.
Kingii, *S. Wats. 1. c.* 64. t. 10.—Am. bor. occ.
Kuhnistera, Willd. Sp. PI. iii. 1887=Petalostemum corymbosum.
lachnantha, *S. Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 743. —Mexic.
lachnostachys, *A. Gray, PL Wright,* i. 46.—Mexic.
laevigata, *A. Gray, 1. c.* ii. 38.—N. Mexic.
laevigata, Moç. b" *Sesse, ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 224. —Mexic·
lagopoda, St. Lag. in Ann. Soc Bot Lyon, vii (1880) 124 = seq.
Lagopus, *Willd. Sp. PL* iii. 1840.—Mexic.
lanata, *Spreng. Syst.* iii. 327.—Am. bor. occ.
lanuginosa,K\M. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 307 =lanata.
lasiathera, *A. Gray, PL Wright,* i. 48.—Texas,
lasiostachya, *Benth. PL Hartw.* 11.—Mexic.
lateripes, Moç. *Sc* Sesse, ex DC. Prod, ii 245 = citriodora.
laxiflora, *Pursh, FL Am. Sept.* U. 741.—Am. bor.
laxiflora, Schlecht in Linnaea, xii. (1888) 293 = Hegewischiana.
Lemmoni, *Parry, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii (1881-82) 200.—Am. bor. occ.

DALEA:—
leporina. Ait. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 287 = alopecuroides.
leptoclados, *Benth. ex Hemsl. I. c.* 242, nomen.—Mexic
leptostachya, *DC. Prod.* ii. 246.—Am. austr.
leucostachys, *A. Gray, PL Fendl.* 12.—Mexic.
teucostoma, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 294. —Mexic.
Linnaei, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 57. t. 38-alope-curoides.
longipes, Moç. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. ii. 245 = sericea.
luisana, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 341.—Mexic
lutea, *Willd. Sp. PL* iii. 1841.—Mexic
macrostachya, *Moric. PI. Nouv. Am.* 6. t. 5.—Mexic.
macrotropis, *S. Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 742. —Mexic.
megacarpa, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 859.—N. Mexic.
melantha, *S. Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 746. —Mexic.
melilotoides, Moç. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. ii. 246-n ii tans,
microphylla, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 482— Peruv.
mollis, *Benth. PL Hartw.* 306.—Calif.
Moricandi, *D. Dietr. Syn. PL* iv. 1015.—Am. austr.
mucronata, *DC. Prod.* ii. 246.—Mexic.
multifoliata, *Phil. f. Cat. PL Vase. Chil.* 55.—Chili,
mutabilis, *Willd. Sp. PL* iii. 1339.—Mexic.; Cuba.
Mutisii, *Kunth, Mim.* 161. t. 47.—N. Granat.
nana, *Torr. ex A. Gray, PL Fendl.* 81.—Texas,
naviculifolia, *Hemsl. Diagn. PL Nov.* 7.—Mexic.
nigra, *Mart.* &* *Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. I'- (1843) 43.—Am. austr.
nutans, *Willd. Sp. PL* iii. 1389.—Mexic.
obovaHfolia, Orteg. Hort. Matr. 82 = mutabilis.
onobrychioides, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) U[8]- —Reg. Argent.
onobrychioides, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 246 [s] tomentosa.
Onobrychis, *DC. I. c.* 247.—Peruv.
Orcuttii, A *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 3fi»- —Calif.
Ordiae, *A. Gray, 1. c.* xvii. (1881-82) 200.—Am. bor-occ.
ornata, Eaton *Sc* Wright, N. Am. Bot. 219 = Petalo-stemum ornatum.
ovalifolia, Orteg. Hort. Matr. 30. t 3=lutea.
Parryi, *Torr. V Gray, ex A. Gray, in Proc. Am. Aco»-* vii. (1868) 897.—Am. bor. occ
parviflora, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 474 - Astragalus gracilis.
parvifolia, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851J 225.—Ins. Galapag.
pectinata, *Kunth, Mim.* 169. t. 49.—Mexic
pectinata, Seem. Bot. Voy. Herald, 279 =- crassifolia.
pedunculata, Puish, FL Am. Sept ii. 474 = alop[e]- curoides.
pendulina, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. ii. *i^>"* tuberculata.
penidllata, Moric PI. Nouv. Am. 66. t. 45 ^la"[i], flora.
phymatodes, *Willd. Sp. PL* iii. 1338.—Venezuela,
platystegia, 5. *Schau. in Linnaea,* xx. (1847) *I*[l]-"* Mexic
pogonanthera, *A. Gray, PL Fendl.* 31.—N. Mexic.
polycephala, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Ai»-* ***Bot.*** i. 244, nomen.—Mexic. *xi*
polydenia, *Torr. ex S. Wats, in Bot. King's Exp.* »•• t. 9.—Am. bor. occ. »j
polygonoides, *A. Gray, PL Wright,* ii. 39.—^- Mexic.
polyphylla, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Bru*-* ¯* II. (1848) 44.—Mexic. *o i j , q*[BI]
Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-»** 201.—Am. bor. occ
procumbens, *Mof. tf Sesse, ex DC. Prod,* ii 2*»- Mexic.
prostrata, *Orteg. Hort. Matr.* 69.—Mexic.
psoraleoides, Moric. PI. Nouv. Am. 5. t. 4 = ver-benacea.
pulchella, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 224 —Mexic.,
pulchella, *Moric. PL Nouv. Am.* 9. t. 7.—Mexic.
pulcherrima, *Moç. <f Sesse, ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 225.—Mexic.

DALEA:—

purpurea, Vent. Jard. Cels, t 40 = Petalostemum violaceum.
Pyramidalis, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 292__ Mexic.
radieans, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 341.—Mexic
ramosissima, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 11 t. 10.—Calif.
ramosissima, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 41=diffnsa.
reclinata, *Willd. Sp. PI.* iii. 1340.—Mexic.
rosea, D. Pietr. Syn. PI. iv. 1017 = Hegewischiana.
mbescens, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviL (1881-82) 369.—Texas.
scariosa, A *Wats. I. c.*—N. Mexic.
5>chaffneri, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 7.—Mexic.
ochottii, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 53.—Am. bor. occ.
seoparia, *A. Gray, PI. Fendl.* 82.—Texas,
sericea, *Lag. Gen. etSp. Nov.* 23.—Mexic.
amilis, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 7.—Mexic.
spinescens, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot i. 247, sphalm. = seq.
* j w », A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 315 = Asagraea spinosa.
stenophylla, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 117.—Reg. Argent,
tenuicaulis, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 226,-Ins. Galapag.
wphrosioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 69.—Cuba.
1 nouini, *Schrani, PI. Rar. Hort. Monac.* t. 9.—Hab. ?
wymoides, *SchUcht. tf Cham, in Linnaea,* v. (1830) . 58O._Mexic.
tnyisifloia,^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 177.—Mexic.
tomentosa, Willd. Sp. PI. iii. 134] =verbenacea.
trifoliata, Moric. PI. Nouv. Am. 8. t. 8=-tiiphylla.
trifoliata, *Zucc. in Abh. Atad. Muench.* i. (1882) 843; . .«* in *Flora,* xv. (1882) II. *Beibl.* 69.—Mexic.
•"Phylla, *Pav. ex Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 389.—Mexic.
toberculata, Lag. Gen. et Sp. Nov. 23 = thymoides.
un<sfcra, *Schlecht.* tr *Cham, in Linnaea,* v. (1830) *80.—Mexic
tnguicularis, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. ii. 246 = mutabilis.
velutipes, *Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* >• 248, nomen.—Mexic.
verbenacea, *Schlecht. ff Cham, in Linnaea,* v. (1880) S79—Mexic.
verrucosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 225.—Mexic.
versicolor, *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1832) 842; *ft in Flora,* xv. (1882) II. *Beibl.* 69.—Mexic.
*vi*iiosa, Spreng. Syst. iii. 325-Petalostemnm villosnm.
violacea, Willd. Sp. PI. iii. 1337 - Petalostemum violaceum.
viBtta, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 23.—Mexic.
vuineraria, *Oerst. in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1863) 4. 7~Am - centr.
wilzehi, *A. Gray, PI. Fendl.* 82.—N. Mexic.
V"8hti>, *As Gray, PI Wright,* i. 49.—N. Mexid.
ccarinii, Walp. Rep. i. 654-trifoliata.

^ C H A M H A , Plnm. ex Linn. Gen. ed. I. 875 380 *EUPHORBIACEAE*> Benth. & Hobk. f. iii.
C*EMOPHYLLUM, Scheidw. in Bull. Acad. Brox. »• I. (1842) 23.
RHOAL0STYLIS> Klotzsch, ex BailL Adansonia, v. (1864-65) 317.
"^ndens, *MuelL Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi, II. 640.
affp Bras
Z\Muett- Ar*8-»» *Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 228.
e- in Bremen, Abh. vii. (1880) —Madag.
&»?' ?"illA<k»"0Hia, v. (1864-65) 814.—Bras.
anstolochiaefolU, *H. B. V K.Nov. Gen. et Sp.* ii. 99. 77«uador.
oaiensis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1247 = ilheotica.
Bernieri, *BaiU- Adansonia,* i. (1860-61) 277.-Madag.
bidentata, «<Myrf682Java.

DALECHAMPIA:—

bidentata, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 270=indica.
Bomhiana, BaiU. Adansonia, i. (1860-61) 277 <= tamnifolia.
brasiliensis, Lam. Encyc. ii. 258=scandens.
brevipes, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-6) 224.—Bras,
bnettnerioides, *Klotasch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1184, nomen.—Guian.
Borchellil, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 649.—Bras,
canescens, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 98.—N. Granat.
capensis, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 106 » natalensis.
capensis, *Spreng. f. Tent. Syst. Veg.* 18.—Afr. austr.
caperoniolides, *BaiU. Etud. Gin. Euph.* 487, nomen; *Adansonia,* v. (1864-65) 816.—Bras.
dssifolia, Poepp. & Eodl. Nov. Gen. iii. 20 = triphylla.
Clausseniana, BaiU. Adansonia, v. (1864-65) 810 = triphylla.
clematidifolia, *Boj. e# BaiU. I. c.* i. (1860-61) 277.—Madag.
colorata, linn. f. Suppl. 421=scandens.
colorata, Veil. Fl. Mum. x. t. 58 = brasiliensis.
convolvuloides, *Lam. Encyc.* ii. 256.—Bras.
cordifolia, Domb. ex Lam. 1. c. = convolvuloides.
cordofana, Hochst. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 178 ; A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 244 = scandens.
coriacea, *Klotasch, ex BaiU. Adansonia,* v. (1864-65) 314, nomen; *Muell.Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 223.—Bras.
coromandelina, Wall. Cat. n. 7798 = indica.
cujabensis, *Mart, ex BaiU. Adansonia,* v. (1864-65) 313, nomen; *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 222.—Bras,
denticulata, *Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 181.—Cuba.
digitata, Leandro, ex BaiU. Adansonia, v. (1864-65) 809 = pentaphylla.
dioscoreaefolia, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 20.—Peruv.
ficifolia, *Lam. Encyc.* ii. 258.—Bras.
fimbriata,H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii.. 100 — scandens.
Francisceana, *BaiU. Adansonia,* v. (1864-65) 316.—Bras.
Friedrichsthalii, *Muell. Arg. in Flora,* lv. (1872) 45.—Am. centr.
glecomaefolia, *BaiU. Adansonia,* v. (1864-65) 814.—Bras,
goyazensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 648.—Bras.
Granadilla, *BaiU. Adansonia,* v. (1864-65) 312.—Bras.
grandiflora, Mart, ex BaiU. 1. c. 309 - pentaphylla.
guianensis, *Klotzsck, in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1848) 48—Gnian.
heterophylla,Bo).exBaiU. Adansonia, 1. (1860-61)277 °*temata.
heterophylla, *Vohl, Eclog. Am.* iii. 44; *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 447.—Guian.
hibisdformis, Spreng. Syst. iii. 86=scandens.
hibiscoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 102-scandens.
hispida, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* ûi. 19.—Am. trop.
Houlletiana, *BaiU. Etud. Gen. Euph.* 486. t 3.—Bras.
hnmila, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 223.—Bras,
ilheotica, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1868) 222.—Bras.
indica, *Wight, Ic.* 1.1882.—Ind. or.
ipomoeaefolia, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 600.—Afr. trap.
latifolia, Lam. Encyc. ii. 257=scandens.
Leandri, *BaiU. Adansonia,* v. (1864-65) 315.—Bras,
leucophylla, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 219.—Bras.
linearis, *BaiU. Adansonia,* v. (1864-65) 816.—Bras,
longipes, *Muell. Arg. in Bremen, Abh.* vii. (1880) 29.—Ins. Nossibf.
magnoliaefolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 219.—Bras.
maxima, Salzm. ex Baill. Adansonia, v. (1864-65) 313 =tiliaefolia.

DAIiECHAMPIA:—

meridionalis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 648.—Bras,
micrantha, *Poepp. (f Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 19. t. 222.—Bras.
Micromeria, *Baill. Adansonia,* v. (1864-65) 810.—Bras.
microphylla, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 225=glecomaefolia.
mollis, *H. B.* to* *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 101.—N. Granat.
mollis, Vahl, Eclog. Am. iii. 44= scandens.
monophylla, Veil. Fl. Flum. x. t. 61 = convolvuloides.
natalensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1243.—Afr. austr.
occidental, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. H. 641.—Bras.
Olfersiana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 280,-Bras.
papposa, Endl. Atakt. 22. t. 20, 21= scandens
parvi/olia, Lam. Encyc. ii. 258 -= scandens.
P&koltiaiUL,Muell. Arg.in Mart. Fl. Bras. xi. 11.647.—Bras.
pentaphylla, *Lam. Encyc.* ii. 258.—Bras.
pernambucensis, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 311 = scandens.
peruviana, Lam. Encyc. ii. 257 "=tiliaefolia.
pruriens, Griseb. FL Brit. W. Ind. 51 - tiliaefolia.
Pseudo-clematis, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 278.—Madag.
pseudotriphylla, *Muell. Arg. in Bremen, Abh.* vii. (1880) 28.—Madag.
psilogyne, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 648.—Bras.
Regnellii, *Muell. Arg. I. c.* 647.—Bras.
Riedeliana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1236.—Bras.
Roezliana, *Muell. Arg. 1. c.* 1233.—Mexic.
rubiformis, Spreng. Syst. iii. 86 * scandens.
ruboides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 102 = scandens.
scandens, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, 400 (non Linn.).—Burma.
scandens, *Linn. Sp. PI.* 1064.—Am. trop.
scandens, Veil. Fl. Flum. x. t. 57 -= ficifolia.
schiaoloba, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 221 =arciana.
Sellowiana, *Muell. Arg. I. c.* 220.—Bras.
senegalensis, A. Jnss. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 174—scandens.
serrulata, Willd. ex Klotzrch, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 48 = tiliaefolia.
sidaefolia, H. B. *it.* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 200= scandens.
sinuata, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 278.—Madag.
smilacina, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 99 = canescens.
spathulata, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 487. t 3. f. 16-30.—Bras,
stenosepala, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1241.—Bras,
stipulacea, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 221.—Peruv.
subintegra, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 650.—Bras,
subternata, *Muell. Arg. in Bremen, Abh.* vii. (1880) 28.—Madag.
tamifolia, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1248-seq.
tamnifolia, *Lam. Encyc.* ii. 256.—Ins. Mascar.; Madag.
tenuiramea, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 222.—Bras,
teraata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1241 — Zeylan.
tiliaefolia, *Lam. Encyc.* ii. 257.—Bras.
triloba, Salzm. ex BaiU. 'Adansonia, v. (1864-65) 811 = scandens.
trilobata, Sieber, ex Baker, Fl. Maurit 817 =• tamnifolia.
tripartita, K. Br. in Salt, Abyss. App. p. Uv, nomen =scandens.
triphylla. *Lam. Encyc.* ii.>258.—Bras.
Vahliana, Stend. Nom. ed. II. i. 481 = scandens.
variifolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1805-66) 221.—Bras.
velutina, *Wight, Ic.* v. t. 188L—Ind. or.
villosa, Lam. Encyc. ii. 257= scandens.
volubilis, E. Mey. ez BailL Etud. Gen. Euph. 487-capensii.

DAIiECHAMPIA :—
vulpina, Muell. Arg. in Linnaea, xxziv. (1865-66) 222 —Leandri.
Weddelliana, *Baill. Adansonia,* v. (1864-65) 816.—Bras.

DAIiEMBEBTIA, Baill. Etud. Gen. Euph. 545. t. 5 (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 389.
Hahniana, *Baill. Adansonia,* xi. (1878) 125.—Mexic
platanoides, *Baill. 1. c.* 124.—Mexic.
popoUfolia, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 546. t. 5.—Mexic.
triangnlaris, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 218.—Mexic

DAIiENIA, Korth. Verb. Nat. Geseh. 243.t. 58 (1842 f). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 758.
Korthalsii, Blnme, Mas. Bot Lugd. Bat. i. 39 = speciosa.
pulchra, Korth. Verh. Nat Gesch. t 68=speciosa.
speciosa, *Korth. I. e.* 244.«-Borneo.

DALHOUSIA, Lem. in Orb. Diet. iv. (1849) 693 **-seq.**

DAIiHOUSIEA, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5339 (1832). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 552.
africana, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 2.—Afr. trop.
bracteaU, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5339.—Reg. Himal.
Haematoxylon, Benth. in Ann. Wien. Mas. ii. (1838) 69 = Baphia nitida.
ovalifolia, Benth. 1. c.— Baphia polygalacea.
paucisperma, *Griff. Notul.* iv. 445; *Ic. Pl. Asiat.* iv. p. vi. 603.—Assam.
pyrifolia, Benth. in Ann. Wien. Mas. ii. (1888) 69 = Baphia polygalacea.

nALIA, EndL Gen. 1444 (1841)=DULIA, Adans. = Ledum, Lino. (Ericac).

DALIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viil. (1881) 176 =Dalea, Linn. (Legumin.).

DAUBARDA, Linn. Sp. PI. ed. I. 491 (1763) **- Bubus,** Toum. (Rosac).
calycina, DC. Prod, ii. 568=R. calycinus.
eordata, Steph. in Mem. Soc. Nat. Mosc L (1806) 92 = R. Dalibarda.
fragarioides, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 800. t. 28 = Waldsteinia fragaroides.
geoides, Pers. Syn. ii. 63 = R. geoides.
latifolia, Blume, Bijdr. 1112=R. rotundifolius.
lobata, Baldw. in Ell. Sketch, i. 671=Waldsteinia lobata.
pedata, Steph. in Mem. Soc. Nat. Mose. i. (1806) 92 = R. pedatus.
pyrifolia, Blnme, Bijdr. 1112=R. pyrifolius.
repens, Linn. Sp. PI. ed. I. 491 - R. Dalibarda.
ternata, Steph. in Mem. Soc Nat. Mosc. i. (1806) 129. t. 10=Waldsteinia sibirica.
violaeoides, Michx. FL Bor. Am. i. 299.127 = R. Dalibarda.

DALLACHTA, F. MneU. Fragm. ix. 140 (1876). *RHAMNBAE.*
vitiensis, *F. Muell. 1.* c—Austral.

DALRYMPELEA, Roxb. Hort. Beng. 17 (1814); PI. Corom. iii. 76. t. 279 **(1819)=Tuipinia,** Vent. (Sapindac).
domingensis, Spreng. Syst. i. 771-T. paniculata.
pomifera, Roxb..Hort. Beng. 17; PI. Corom. iii. 76. t. 279-T. pomifera.

DALRYMPLEA, Roxb. Fl. Ind. ed Carey, ii. 421 (1824) -praec

DALUCUM, Adans. Fam. iL 828 (1763)-Melioa, Linn. (Gramin.).

DALZELLIA, Hassk. in Flora, xlviii. (1866) 693= Cyanotis, D. Don (Commelin.).
vimpara, Hassk. L c. 694 = C. vivipara.

DALZELLIA, Wight, Ic. v. 34. t. 1919, 1920 (1852)- Temiola, TuL (Podost).
foliosa, Wight, L c 85-Ter. foliosa.
La-mii, Wight, 1. c.=Ter. Lawii.
pcdunculosa, Wight, I. c. = Tristicha pednnculosa.
ramosissima, Wight, 1. c=Ter. ramosissima.
teylanica, Wight, L e t 1919=Ter.zeylanica.

DAMAPANA, Adans. Fam. ii. 328 (1763)-Smithis, Ait. (Legnm.).
Manneli, Rafin. Sylva Tellnr. 70=S. sensitive.

DAMASON1UM, Mill. Gard. Diet ed. VI (1752). *ALISMACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1007.
ACTINOCARPUS, R. Br. Prod. 342 (1810).
Alisma, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 1-stellatum.
angustissimum, Stead. Nom. ed. I. 26=Echinodonis rannncnloides.
australe, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 268.—Anstral.
Bourgaei, *Coss. Notes PI. Crit.* 47.—Reg. Mediterr.
californicum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 142. t. 21 = Alisma califomicum.
Dalechampii, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 217 = stellatum.
flavum, MilL Gard. Diet. ed. VIIL n. 2=Limnocharis flava.
maximum, Bnrm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 481 = Iimnocharis Plumerii.
minimum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 65=polyspermum.
minus, Buchen. in Bremen, Abh. ii. (1871) 20- australe.
polyspermnm, *Coss. Notes PI. Crit.* 47.—Europ.
stellatum, *Thuill. Fl. Par.* ed. II. 186; *Delarb. Fl. Auv.* ed. II. 696.—Europ.
vulgare, Coss. & Germ. FL Env. Paris, ii. (1845) 521 = stellatum.

DAMASONIUM, Schreb. Gen. PL 242 (1789) = OtteUa, Pers. (Hydroch.).
alismoides, R. Br. Prod. 344, in obs. = 0. alismoides.
brasiliense, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 81=O. brasiliensis.
cygnorum. Planch. L c. 82 = O. ovalifolia.
indicum, Willd. Sp. PI. ii. 270=0. alismoides.
javanicum, Blume, Ennm. PI. Jav. i. 80=O. javanica.
lactucaefolium. Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. Ill xi. (1849)81 = 0. alismoides.
landfolium, Presl, Rel. Haenk. i. 89 = O. alismoides.
ovalifolium, R. Br. Prod. 844 = 0. ovalifolia.
sessile, Bnch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5044 - O. alismoides.
timorense, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 477 - O. alismoides.
tran'quebariense, Schult. f. Syst. vii. 1595 = 0. alismoides.
ulvaefolium, Planch, in Ann. Sc Nat. Sér. III. xi. (1849) 81 = 0. ulvaefolia.

DAMATRAS, Reichb. Nom. 93 (1841) = seq.

DAMATRIAS, Reichb. Consp. Ill (1828) = seq.

DAMATRIS, Cass. in Ball. Soc Philom. (Sept. 1817) 189 ; et in Diet. Sc Nat. xii. 471 (1818)-Haploearpha. Less. (Compos.).
pudica, Cass. in Diet. Sc. Nat xii. 471.—Afr. austr.

DAMBURNEYA, Rafin. Sylva Tellnr. 186 (1838)- Neotandra, Roland. (Laurin.).
maritima, Rafin. L c. = N. Willdenowiana.

DAMERIA, Endl. Gen. 1444 (1841) = DAUCERIA, Dennst.=Embella, Bnrm. f. (Myrsin.).

DAMIRONIA, Cass. in Diet. Sc. Nat hi. 224 (1828) = Helipterum, DC. (Compos.).
cernua, Cass. 1. c 225 = H. variegatnm.
elegantissima, Cass. 1. a 282 = H. canescens.

DAMMARA, Gaertn. Frnct ii. 100. t. 108 (1791)= Frotlum, Barm. f. (Burserac).
graveolens, Gaertn. 1. c = P. obtusifelium.

DAMMARA, [Rumph..] Lam. Encyc. ii. 269 (1786), partim=Agathi8, Salisb. (Conif.).
alba, Lam. 1. c.=A. loranthifolia.
australis, Lamb. Pin. ed. I. ii. 14; ed. IL 73. t. 44=A. anstralis.
crassifolia, Knight, Syn. Conif. 46 = A. loranthifolia.
hypoleuca, C. Moore, ex Henk. & Hochst. Nadelhoelz. 217.—N. Caled.
lanceolata, Panch. & Sebert, Not. Bois Nov. Caled. 169.—N. Caled.

DAMMARA:—
longifolia, Iindl. ex Gord. Pinet Suppl. 28.—Ins. Fiji.
loranthifolia, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 411- Agathis loranthifolia.
macrophylla, Lindl. in Journ. Hort Soc. vi. (1861) 271. —Ins. Vanicolla.
Moorei, Lem. Jard. Flenr. ii. (1852) Misc. 112-seq.
Moorii, Lindl. in Joum. Hort. Soc. vi. (1861) 271.— N. Caled.
Motleyi, Parl. in Journ. Bot. i. (1863) 86.—Borneo.
obtusa, Lindl. in Jouro. Hort Soc. vi. (1861) 270.— Ins. N. Hebrid.
orientalis, Lamb. Pin. ed. IL 70=Agathls loranthifolia.
ovata, C. Moore, ex Gord. Pinet. Suppl. 28.—N. Caled.
Perousii, C. Moore, ex Hook. Kew Joum. iv. (1852) 116. t 4=*macrophylla.*
pinnata, Parment. ex Gord. Pinet Suppl. 42-Podocarpus latifolius.
robusta, C. Moore, ex F. Muell. in Trans. Pharm. Soc. Viet n. (1860) 174.—Austral.
rubricaulis, Can. Conif. ed. II. 618 = A. loranthifolia.
Rumphii, Presl, Epim. Bot. 236=A. loranthifolia.
selanica, Lam. Encyc. ii. 259 = Diospyros Embriopteris?
Veitchii, Henk. ft Hochst. Nadelhoelz. 216 (quidt).— Jappn.
vitiensis, Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 159.—Ins-Fiji.

DAMNACANTHUS, Gaertn. f. Frnct. iii. 18.1182-*i 7* (1805). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. & 118.
BAUMANNIA, DC. Not PL Rar. Jard. Genev. vi. 1-11 et 25 (1833).
indicus, *Gaertn. f. I. c*—Reg. Himal.; Japon.
macrophylla, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot Lugd-Bat. iii. 110=indicus.
major, Sieb. 3c Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. >" (1846) 177= indicus.

DATffPIERA, R. Pr. Prod. 687 (1810). *GOODSNOVIEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 540.
LINSCHOTENIA, De Vriese, in Mitch. Trop. Austral- 345 (1848).
adpressa, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vii. 608.—Austral.
adpressa, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 100* lanceolata.
alata, *Lindl. Swan River App.* 27.—Austral,
altissima, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. U3-— Austral.
asurea, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 400- lioeazis.
bicolor, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 11—Brownii.
bitoculata, F. Muell. Fragm. ii. 17=trigona.
Brownii, *F. Muell. 1. c.* vi. 29.—Austral,
candicans, *F. Muell. I. c.* x. 86.—Austral.
canescens, De Vriese, in Verh. HaarL x. (1854) lU- 19—Scaevola canescens.
carinata, *Benth. Fl. Austral,* iv. 111.—Austral.
cauloptera, DC. Prod. vii. 504 = alata.
coronata, Lindl. Swan River App. 27.—Austral,
coneata, *R. Br. Prod.* 588.—Austral.
Cunninghami, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch »• (1851) 11= lanceolata.
diversifolia, *De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i.* *0»-" Austral.
Drummondi, De Vriese, in NederL Kruidk. Arch. "• (1851) 8=triloba.
epiphylloidea, De Vriese, in Lehm. PL Preiss. i. *oic alata.
erecta, De Vriese, 1. c. 401 = linearis.
eriocephala, *De Vriese, in Verh. Haarl.* x. (18»*J t 21. f. 1-10.—Austral.
eriophora, De Vriese, in Lehm. PI. Preta. i- * linearis.
fasdcolata, *R. Br. Prod.* 688.—Austral.
fasdculata, DC. Prod. vii. 504=stricta.
ferruginea, *R. Br. Prod.* 588.—Anstral.
ferruginea, Sieber, ex DC. Prod. vii. 504-strict*, glabrescens, *Benth. Fl. Austral,* iv. 119.—Austral-
glabriflora, *F. Muell. Fragm.* i. 120.—Austral.
haematotricha, De Vriese, in Verh. Haarl. *• l» " 94-triloba.

DAMPTEBA:-
hederecea, *R. Br. Prod.* 687.—Anstral.
mcana, *g. Br. I. c.* 588.—Austral.
inundata, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 401 = Stylidium crassifolium.
jnncea, *Benth. Fl. Austral,* iv. 115.—Anstral.
lanceolate, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vii. 60S.—Austral.
lanceolate, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1864) 101. t 17=adpressa.
lanuginosa, De Vriese, 1. c. 81=cuneata.
javandulacea, *Lindl. Swan River App.* 27.—Austral,
leptodada, *Benth. Fl. Austral,* iv. 118.—Austral
Lindleyi, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 402=alata.
jinearis, *R. Br. Prod.* 588.—Austral.
Lmschotenii, *F. Muell. Fragm.* vi. 28.—Austral,
loranthifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 115.—Austral.
luteifolia, *F. Muell. Fragm.* x. 11.—Austral,
marifolia, *Benth. Fl. Austral,* iv. 114.—Austral.
melanopogon, R. Br. ex De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854)87-=Brownii.
neraosa, De Vriese, in Nederl. Kraidk. Arch. ii. (1861) 12 = Brownii.
oblongata, R. Br. Prod. 588 = stricte.
oligophylla, *Benth. Fl. Austral,* iv. 115.—Austral.
"nissa, De Vriese, in Nederl. Kruidlc. Arch. ii. (1851) 10-Brownii.
<»>*alifolia,* R. Br. Prod. 588 = BrowniL
Parvifolia, *R. Br. 1. c.* 589.—Austral.
Polygalacea, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 115 = Goodenia phylicoides.
preissii, *De Vriese, in Lehm. PI. Preiss.* i. 408.—Austral.
Prostrate, *De Vriese, in Lehm. PLPreiss.* i. 403 (Quid.!).—Austral.
Prostrate, *De Vriese, in Verh. Haarl.* x. (1854) 83 (non praec.).—Austral.
P"rpurea, R. Br. Prod. 588 = Brownii.
Rrinnardtii, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1864) 97 = Verreauxia Reinwardtii.
"panda, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 400=triloba.
"pens, DC. Prod. vii. 603=lavandulacea.
'<>*fiens,* De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 114 = Scaevola paludosa.
'OMBarinifolla, *Schlecht. in Linnaea,* xx. (1847) 608.—Anstral.
'otundifdia, R. Br. Prod. 587 = Brownii.
**-culata, *F. Mugll 'gx Benth m' Austral,* iv. 111.—Austral.
Scottiana, *p. Muell. Fragm.* xi. 120.—Austral,
"ncantha, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 118.—Austral.
"Picigera, *Benth. 1. c.* 109.—Austral.
^eta, *g. Br. Prod.* 689.—Austral.
«»;«rfa, Sieber, ex DC. Prod. vii. 604-fasciculate.
snospicata, *Benth. Fl. Austral,* iv. 117.—Austral.
""teerticiUata, De Vriese, in Lehm. PL Preiss. i 403 =. fasciculata.
"res, *Lindl. Swan River Apt.* 27.—Austral.
'<»*nentosa,* R. Br. ex DC. Prod. vii. 603=incana.
""*data,* De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 401 = •late.
{"£°na. *De Vriese, I. e.*—Austral.
"Uoba, *lindl. Swan giver App.* 27.—Austral.
**dulat„, R. Br. Prod. 587 -Brownii.
r'krOauxii, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 118.
W ii • fi 1 11 = Verreauxia paniculata.
"ellsiana, *F. Muell. Fragm.* x. 12.—Austral.

DANAA, All. Pedem. M- *• 63 (1785)=PhyBOspermum, Cusson (Umbell.).
aquilegifolia, All. 1. c = P. aquilegifolium.
sylvatica, Lag. Amen. Nat ii. 97 =P. aquilegifolium.

DA J AA Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1885) =8eneelo, Toum. (Compos.).
reeua, Colla, 1. c. 29-S. denticulatus.

DANAE > Medic. Malv. Fam. 72 (1787). *LIUACEAE,* R. & Hook. C iii. 766.
AIDIA, Link, Handb. 1. 274 (1829).
ngy„a Webb & Berth. Phyt. Canar. uï. 820. t. 224 = Semeleandrogyna.
V«e. Webb & Berth. 1. c = Semele androgyna.
*urus. *Medic. Malv.* 72.—Graecia; As. Min.; Persia.
"cemosa, Moench, Meth. 170-D. Lauras.

DAJfAIDA, Reichb. Norn, 48 (1841)-prtec

DANAIDIA, Link, Handb. i. 274 (1829) « Danafi, Medic. (Liliac).
racemosa, link, 1. c.«=Danaë Lauras.

DANAIS, Comm. ex Vent. Tabl. ii. 584 (1799). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 86.
breviflora. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 168.—Madag.
cemua, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 137.—Madag.
Chassallia, Poir. In Diet. Sc. Nat. xii. 481=Chasalia capitata.
coronata, Steud. Nom. ed. I. 263-fragrans.
corymbosa, *Balf.f. in Phil. Trans,* clxviii. (1879) 345.—Ins. Mascar.
denudata, Pers. Syn. i. 198=fragrans.
fragrans, *Gaertn.f. Fruct.* iii. 83.—Ins. Manrit; Madag.
Gerrardi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 160.—Madag.
hispida, *Baker, 1. c.* 161.—Madag.
laxiflora, DC. Prod. iv. 861=fragrans.
ligustrifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 162.—Madag.
microcarpa, *Baker, 1. c.* 168.—Madag.
pauciflora, *Baker, I. c.* 162.—Madag.
pubescens, *Baker, 1. c.* 164.—Madag.
rhamnifolia, *Baker, 1. c.*—Madag.
rotundifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 4B0.—Ins. Mascar.
sulcata, *Pers. Syn.* i. 198.—Ins. Maurit.
teraata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 162.—Madag.
verticillata, *Baker, 1. c.* 164.—Madag.
vestita, *Baker, 1. c.* xxi. (1885) 408.—Madag.
volubilis, *Baker, 1. c.* xx. (1888) 161.—Madag.

DANATOPHORUS, Blnme, Rumpbia, iii. 178 (1847) = Harpullia, Roxb. (Sapind.).

DANBVA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 67 (1866) - Bomarea, Mirb. (Amaryllid.).
distichifiora, Salisb. 1. c = B. disticbiflora.
secundiflora, Salisb. 1. c.-B. secundifolia,

DANCERA.Rafin.SylvaTellur. 98 (1838) = Clldemia, D. Don (Melastom.).
hirta, Rafin. 1. c - C. hirta.

DANGERVILLA, Veil. Fl. Flum. 27 (1825) i. t. 66 (1827) = Cusparia, Humb. (Rutac).
spinosa, Veil. 11. cc.- C. pentagyna.

DAHXELIA, Mello, ex VerL in Rev. Hortic. (1868) 154. *BIGNONIACEAE.*
splendens, *Mello, I. c.*—Bras.

DATMIIiil.T.A., J. J. Benn. in Pharm. Journ. xiv. (1855) 251. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 680.
oblonga, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 800.—Afir. trop.
thurifera, *J. J. Benn. in Pharm. Journ.* xiv. (1855) 262.—Afr. trop.

DANTHIA, Steud. Nom. ed. II. i. 482 (1840) - DANTIA, Petit-Ludwigia, Linn. (Onagrar.).

DANTHONIA, DC. FL Fr. iii. 32 (1806) partim. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1162.
CHAETOBROMUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat Syst. ed. II. 449 (1836).
CRINIFES, Hochst. in Flora, xxxviii. (1855) 279.
MERATHKEPTA, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1880) 221.
MONACHATHER, Steud. Syn. PL Gram. 247 (1855).
PENTAMERIS, Beauv. Agrost. 92.1.18. f. 8 (1812).
PLINTHANTHESIS, Steud. Syn. PI. Gram. 14 (1855).
STREBLOCHAETE, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 421 (1851).
TRIRAPHIS, Nees, Fl. Afr. Austr. 270 (1841).
abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 20
etenuiglumis.
airoides, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 284.—Afr. anstr.
albida, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 244.—Abyss.
Ailed, *Austin, in Bull. Torrey Bot. Club,* iii. (1872) 21.—Am. bor.
alpina, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst iv. (1872) 225 = sdni&niTiil&ris.
alpina. Vest, in Flora, iv. (1821) 146=provincialis.
angulata, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 818.—Afr. austr.
angustifblia, *Nees, I. c.* 302.—Afr. austr.

DAHTHON1A:—
Anisopogon, Trin. Sp. Gram. t. 81 = Anisopogon avenaceus.
anomala, *Steud. Syn. PI. Gram.* 245.—Abyss,
antarctica, *Spreng. Syst. i.* 831; *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 802.—N. Zel.
anthoxanthiformis, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1856) 276.—Abyss.
Archeri, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 122. t. 163=Amphibromus Neesii.
aristidoides, Lehm. ex Nees, FL Afr. Austr. 818 = trichotomo.
arundinacea, Steud. Nom. ed. II. i. 482 = Forsk&Iii.
aureoralva, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 362.—Chili.
australis, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. iv. (1872) 226 =Raoulii.
barbata, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 301.—Afr. austr.
bipartite, *F. Muell. Fragm.* i. 160.—Austral,
bromoides, *Hook.f. Fl. N. Zel. i.* 803. t. 68.—N. ZeL
Buchanani, J. Buch. Indig. Gr. N. Zeal. 87. t 36-Hierochloe redolens.
Buchanani, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 833.—N. Zel.
Buekeana, *Lehm. ex Nees, Fl. Afr. Austr.* 297.—Afr. anstr.
cachemyriana, *Jaub. tf Spach, Illustr.* iv. 46.—Ind. or.
caespitosa, Gaudich. in ireyc. Voy. Bot. 408 = semiannularis?
caespitosa, Neei, Lehm. PI. Preiss. ii. 104=setacea.
califomica, *Boland. in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 182.—Calif.
calydna, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1880 = provincialis.
calycina, *Roem. (f Schult. Syst.* ii. 691.—Afr. austr.
Candida, *Hochst. ex Steud. Syn. PL Gram.* 244.—Abyss,
carphoides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral;* vii. 692.—Austral.
cemua, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 101.—Bras,
cbilensis, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 360.—Chili,
dncta, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 332.—Afr. austr.
Cingula, Steud. Syn. PI. Gram. 246 = semiannslaris ?
circinnata, *Steud. 1. c.* 239.—Afr. austr.
drrhulosa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 809.—Afr. anstr.
collina, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 96.—Chili,
collinita, *Nees, Ft. Afr. Austr.* 815.—Afr. austr.
colorata, Steud. Syn. PI. Gram. 241=tortuosa.
compacta, fioiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 128-= Avena compacta.
compressa, *Austin, in Bull. Torrey, Bot. Club,* iii. (1872) 21.—Am. bor.
coronata, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 70=Inpulina.
crassiuscula, *T.Kirk, in Trans. N. Z. Inst.xnL.* (1865) 224.—N. Zel.
crispa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 310.—Afr. austr.
Cunninghamii, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 332.—N. Zel.
curva, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 328.—Afr. austr.
cumfolia, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 886.—Afr. anstr.
cyatophora, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 286.—Afr. austr.
decora, *Nees, 1. c.* 332.—Afr. austr.
decumbens, DC. Fl. Fr. iii. 83=Triodia decumbens.
densifolia, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 291.—Afr. austr.
denudata, *Nees, I. c.* 820.—Afr. austr.
depressa, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1856) 276.—Abyss:
disticha, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 836.—Afr. austr.
distichophylla, *Lehm. Pugill.* iii. 41.—Afr. austr.
Dregeana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 848.—Afr. austr.
elegans, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 296.—Afr. austr.
elephantina, *Nees, 1. c.* 884.—Afr. austr.
elongate, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 20, nomen; *et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 419.—Abyss.
eriantha, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 807 - semiannuiaris,
eriostoma, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 804.—Afr. austr.
(ascicularis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 248.—Afr. austr.
Faxoni, *Austin, in Bull. Torrey Bot. Club,* vi. (1875) 190.—Am. bor.
filiformis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 298.—Afr. austr.
flaccida, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885)224.—N. Zel.
flavescens, *Hook.f. HandbrN. Zeal. Fl.* 882.—N. Zel.
ForskSlii, *Trin. Sp. Gram.* t. 49.—Aegypt.; Arab,
glandulosa, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 885.—Afr. austr.
glauca, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 327.—Afr. anstr.

DANTHONIA :—
glumosa, Beanv. Agrost. 82 -sericea.
gracilis, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 303. t. 69 = semiannularis.
grandiflota, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 418. —Abyss,
giandiflora, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 668.- Chili.
Griffithiana, *C. Muell. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 847.—Ind. or.
Gunniana, Nees, in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 416—racemosa.
heptamera, *Nee*, Fl. Afr. Austr.* 809.—Afr. austr.
heteropla, *Steud. Syn. PI. Gram.* 239.—Afr. austr.
hirsnta, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 282.—Afr. austr.
hispida, Sprang. Syst. i. 831 - Tristachya leucothrix.
holciformis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 326.—Afr. anstr.
intercepta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 243.—Afr. austr.
intermedia, *Vasey, in Bull. TorreyBot. Club,* x. (1883) 62.—Am. bor.
involucrata, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. MS.—Afr. austr.
involuta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 240.—Afr. austr.
juncea, *Trin. in Bull. Sc. Acad. PHersb.* i. (1836) 67. —Afr. austr.
kashmiriana, ^ *Munro} Duthie, in Atkins. GOB. N. W. Ind.* 630.—Ind. or.
Koestlini, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 20 = D. Streblochaeta.
Knhlii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 240.—Afr. austr.
lanata, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 886,—Afr. austr.
lappacea, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. • 813 = Astrebla triticoides.
leonina, Stend. ex Kunth, Ennm. PI. i. 808=antarctiea.
leptophylla, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 421.—Abyss.
Lima, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 312.—Afr. austr.
Linkii, Kunth, Enum. PI. i. 815=semiannularisJ
livida, Trin. Sp. Gram. t. 50=curvifolia.
longifolia, *R. Br. Prod.* 176.—Austral,
longiglumis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 306.—Afr. austr.
lupulina, *Beam. Agrost.* 158.—Afr. austr.
Iuzoniensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 245.—Ins. Luzon,
macrantha, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 886.—Afr. austr.
maxima, Lehm. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 837 = Thouarsii.
micrantha, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 300.—Afr. austr.
micrantha, Trin. in Mém. Acad. Pétenb. Sér. VI. i. (1831)71-Thunbergii.
montana, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. in. 101.—Bras,
mutica, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 281.—Afr. austr.
nervosa. Hook. f. Fl.' Tasm. ii. 121—Amphibromus Neesii.
neuroëlytrum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 245.—China,
nuda, *Hook.f. Fl. N. Zel.* ii. 887.—N. Zel.
nutans, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 814.—Afr. austr.
obtusifolia, *Hochst. in Flora,* xxix. (1846) 120.—Afr. austr.
ovata, *J. Buck. Indig. Grass. N. Zeal.* t. 26.—N. Zel.
pallescens, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 386.—Afr. austr.
pallida, *R. Br. Prod.* 177.—Austral.
pallida, A. Cunn. in Hook. Comp. Bot. Mag. H. (1886) 370 =• Tristum antarcticum.
papillosa, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 885.—Afr. anstr.
papposa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 383.—Afr, austr.
paradoxa, *R. Br. Prod.* 177.—Austral,
patula, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 285.—Afr. austr.
pauciflora, *R.Br. Prod.* 177.—Anstral.
pauciflora, J. Buch. Indig. Grass. N. Zeal. t. 86=Triodia exigna.
pectinata, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 26 = Astrebla pectinata.
penicillata, Beauv. Agrost. 92=racemosa.
penicilUta, *F. Muell. Fragm.* viii. 135.—Austral,
pentaflora, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst* xvi. (1884) 343.—N. Zel.
periantha, Brongn. & Gnllem. in Ann. Se. Nat. *Sit.* II. XT. (1841) 64, sphalm. vide *eriantha.*
picta, *Nees b" Meyen, Reise,* i. 311, nomen; *et in Not. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl. I* (1848) 167.—Chili,
pilosa, *R. Sr. Prod.* 177.—Austral.; N. Ze[1]
pilosa, Trin. Sp. Gram, t 61—setacea.
porosa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 283.—Afr. austr.
propinqua, *Nees, 1. c.* 299.—Afr. austr.
provincialis, *DC. Fl. Fr.* iii. 88.—Europ. austr.
pseudo-spicata, *C. Muell. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 348. —Chili.

DANTHONIA :—
pumila, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 343.—Afr. austr.
purpurea, *Beauv. Agrost.* 160.—Afr. austr.
racemosa, *R. Br. Prod.* 177.—Austral.
radicans, Steud. Syn. PI. Gram. 243=- Trisetum Insulare.
Raoulii, *Steud. 1. c.* 246.—N. Zel.
rigida, Raonl, Choix PI. Nour. *Zil.* 12 = Raoulii.
rigida, *Steud. Syn. PI. Gram.* 243.—Afr. austr.
robusta, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1865) 44.— Austral.
rufa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 380.—Afr. austr.
rupestris, *Nees, 1. c.* 300.—Afr. austr.
scabra, *Nees, 1. c.* 287.—Afr. austr.
scabriflora, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 169.— Bras,
secundiflora, *J. If C. Presl, Rel. Haenk.* i. 255.— Peruv.
segetalis, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 276.— Abyss.
scmiannularis, *R. Br. Prod.* 177.—Austral,
sericantha, *Steud. Syn. PI. Gram.* 246.—Ecuador,
sericea, *Nutt. Gen. Am.* i. 71.—Am. bor.
setacea, Beanv. Agrost. 92 = Avena setacea.
setacea, *R. Br. Prod. 111.*—Austral.
setacea. Hook. f. Fl. Tasm. ii. 121 = semiannularis.
setosa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 326.—Afr. austr.
speciosa, *Lehm. ex Nees, I. c.* 307.—Afr. austr.
spicaeformis, *Beauv. Agrost.* 160.—Hab. ?
spicata, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 690.—Am. bor.
Streblochaeta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 245.—Abyss,
stricta, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 383.—Afr. austr.
strigosa, Beanv. Agrost. 160—Avena strigosa.
subulata, Hook. f. F). Tasm. ii. 121 = setacea.
subulata, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 420.—Abyss,
tenella, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 324.—Afr. austr.
tenuifolia, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 102.— Bras.
lenuiglnmis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 244.—Abyss.
Thomasonii, *J. Buch. Indig. Grass. N. Zeal.* t. 36.— 'N.Zel.
Thouarsii, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 387.—Afr. austr.
Thuarii, *Desv. Opusc.* 99.—Afr. austr.
Thunbergii, *Kunth, Rev. Gram.* i. 107.—Afr. austr.
tortuosa, *Trin. Sp. Gram.* t. 68.—Afr. austr,
trichopteryx, *Steud. Syn. PI. Gram.* 244.—Afr. austr.
trichotoma, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 818.—Afr. austr.
trisetoides, *Hochst* ex Steud. Syn. PI. Gram.* 244.— Abyss.
triticoides, Lindl. in Mitch. Trop. Austral. 366 •= Astrebla triticoides.
ubcrior, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 279.— Abyss.
Unarede, Raonl, Choix PI. Nouv. Zél. 11. t. 3 = semiannularis.
unispicata, Munro, ex Vasey, Cat Gr. Un. St. 69, nomen = califomica.
varia, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. 103 = semiannularis.
villosa, Steud. ex Trin. in Mém. Acad. Pgtersb. *Sit.* VI. iv. II. (1838) 33-Thunbergii.
violacea, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 865.— Chili.
virescens, *S. Desv. I. c.* 863.—Chili,
viscidula, *Nees, Fl. Afr.. Austr.* 80S.—Afr. austr.
Webbiana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 240.—Afr. austr.
Zeyheriana, *Steud. 1. c.* 244.—Afr. austr.

DANTIA, Lipp. ex Choisy, in DC. Prod. xiii. II. 449 (1849)-Boerhaavia, Vaill. (Nyctag.)..
nttiica, lipp. 1. c 458 = B. repens.

DANTIA, Petit, ex Linn. Gen. ed. I. 837 (1787)-Iiudwlgla, Linn. (Onagrar.).
palustris, Des Moul. in Act Sot Linn. Bord. xx. (1859) 517-Lpalnstris.

DANUBIUNCULUS, Sailer [in Linzer Zeit. 12 Sept. (1846) n. 147] ex Walp. Ann. i. 634 (1848) = Idmosella, Linn. (Scrophul.).
acaulis, Sailer, U. cc. = I_ aquatica.

DANZLERIA, Bert ex A. DC. Prod. viii. 224 (1844) = Dioepyros, Linn. (Ebenac).
axillaris, Bert, ex A. DC. 1. c.=Diosp. cayennensis.

DAPANIA, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1864) 381. *GERANIACEAE,* Bcnth. & Hook. f. i. 277-
racemosa, *Korth. 1. c.*—Sumatra.

DAPHNANDRA, Benth. Fl. Austral, v. 285 (1870). *MONIMIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 145.
micrantha, *Benth. I. c.*—Austral.
repandula, F. Muell. Fragm. x. 105=Atherosperma repandulum.

DAPHNE, Tonm. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *THYMELAEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 190.
ERIOSOIENA, Blume, Bijdr. 651 (1825).
GASTRILIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836).
LAUREOLA, C. Bauh. ex Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. 147 (1869).
MEZEREUM, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 358.
MISTRALIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. 147 (1869).
NEMOCTIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 106 (1836).
SANAMUNDA, Neck. Elem. ii. 179 (1790).
SCOFOLIA, Linn. f. Suppl. 60 (1781).
THYMELAEA, Adans. Fam. ii. 285 (1768).
TUMELAIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836).
acuminata, Stocks, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 180; Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. L xii. 103-oleoides.
albifiora, Wolf, in Oelh. Abbild. Wild. Baeume, iii-t. 38 = D. Mezereum.
alpina, *Linn. Sp. PI.* 356.—Reg. Mediterr.; Himal.
alpina, Savi, Due Cent. 98; ex Bertol. Fl. Ital. iv. 340 —sericea.
alpina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 261 - oleoides.
altaica, *Pall. Fl. Ross.* i. 53. t. 35.—Sibiria.
americana, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9 (Daphnopsidis sp.).—Ind. occ.
andina, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 66. t. I[1] —Ovidia andina.
angustifolia, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 611" oleoides.
anomala, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 151-Ovidi» Humboldtii.
Aguilaria; Blanco, Fl. Filip. ed. I. 310 = WikstroeiM* ovata.
argentata, Lam. Encyc. iii. 436 •= Thymelae'a nitida.
argentea, Clarke, Trav. iv. 718 « sericea.
argentea, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 258; * »• Graec. t. 355=Thymelaea Tartonraira.
aurea, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 816.—Oriens.
australis, CyrilL PI. Kar. Reg. Neap. fasc. ii. 1.16 •> sericea.
Bholua, Bnch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. *68"* cannabina.
Blagayana, *Freyer, in Flora,* xxi. (1838) 176.—CV-niolia.
Blagayana, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 535 - sericea.
Bonplandiana, Knnth, Syn. PI. i. »47=Daphnopsis Bonplandii.
brasiliensis, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 891-Fnniferautilis.
buxifolia, Ledeb. Fl. Ross. iii. 548 = sericea.
buxifolia, Vahl, Symb. Bot i. 29=oleoides.
cachemireana, Meissn. in DC. Prod. xiv. 53<> oleoides.
calydna, Berger. Fl. Basses-Pyren. ii. ail = Thymelaea dioiea.
calydna, Lam. Encyc iii. 435-Thymelaea nivalis.
calydna, Lapeyr. in Mim. Acad. Toul. i. (1782) « t 15=Thymelaea calycina.
candicans, Lam. Fl. Fr. iii. 221 = Thymelaea I» tonraira.
Candida, Vitm. Summa Fl. Ii. 614-alpina.
canescens, Wall. Cat. n. 1046 = Wikstroemia can^iJ
cannabina, Lour. Fl. Cochinch. 236 = Wikstroen» indica.
cannabina, *Wall, in As. Res.* xiii. (1820) 886.— Himal.
caracasana, KloUsch, ex Meissn. in DC. *rioa-* > 621, 541 = Daphnopsis caracasana.
caucasica, Bieb. Casp. 78—oleoides.
caucasica, *Pall. Fl. Ross.* i. 63.—Reg. Caucas.
cestrifolia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. « Daphnopsis cestrifolia.
Championi, *Benth. Fl. Hongk.* 296.—China.

DAPHNE :-

chinensis, Spreng. Sjrst. ii. 287 = odora.
Cneorum, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 649 = caucasica.
Cneorum, *Linn. Sf. PI.* 857.—Europ. austr.
Cneorum, Wahlenb. Veg. et Clim. Helv. 72=striata.
collina, Sm. Spicil. ii. t. 18 = sericea.
colhna, Urv. ex Meissn. in DC. Prod. xhr. 681 = oleoides.
comosa, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 53 - glomerata.
cor diiia, Link, Handb. i. 888, sphalm. *-coridifolia.*
cornacea, Royle, Illustr. Bot. Himal. 821=oleoides.
coriacea, Soland. ex Seem. Fl. Vit. 206 - Wikstroemia coriacea.
coridifolia, Lam. Encyc. iii. 487=Thymelaea coridifolia.
crassifolia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 816=Daphnopsis crassifolia.
Cytica, Steud. Norn. ed. II. i. 488 = oleoides.
decandra, Blume, Bijdr. 650.—Java.
dioica, Gonan, Illustr. 27. t; 17. f. 1 - Thymelaea dioica.
Edgeaagnoides, Humb. & Bonpl. ex Wikstr. Diss. Daph. ed, II. 40 = Daphnopsis salicifolia.
Misae, Vis. in Mem. 1st. Venet. vi. (1856) 247 = sericea.
Pavonia, Pav. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 622 = Daphnopsis Pavoni.
enocephala, Royle, IUostr. Bot. Himal. 821=seq.?
eriocephala, Wall. Cat. n. 1051 = Lasiosiphon eriocephalus.
euphorbioides, Pusch. ex Steud. Nom. ed. II. i. 488 = caucasica.
florida, Salisb. Prod. 281 - D. Mezereum.
Fortunei, Lindl. f. Suppl. 223 - Wikstroemia indica.
Fortunei, Benth. in Hook. Kevir Jonm. v. (1868) 196 "Championi.
Fortunei Lindl. in Jonm. Hort. Soc. i. (1846) 147=D. Genkwa.
Gardneri, Wall, in As. Res. xiii. (1820) 888. t. 9 = Edgeworthia Gardneri.
Genkwa, Sieb. V Zucc. Fl. Jap. i. 137. t. 76.—China.
Wandulosa, Bertol. Amoeii. Ital. 856 j Sprang. Syst. u. 287 -oleoides.
gigantea, Wall, *Lam. Encyc.* iii. 488.—As. Min.; Reg. Caucas.
Gnidioides, Jaub.VSpach, Illustr. iv. 4. t. 304.—As. Min.
Widioides, Szovits, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 586 ?oleoides.
Gnidium, Linn. Sp. PI. 857.—Reg. Medikerr.
Houttevnia, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1860-51) 170 "JJ. Mezereum.
humilis, Its, Vahl, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 372 - Thymelaea thesioides.
Japonica, Lindl. Bot. Reg. t. 1177=odora.
japrteifolia, Wall. Cat. n. 1048 = Stellera Chamaejasme.
japonica, erica, C. Koch, ID Linnaea, xxii. (1849) 618 - glomerata.
Japonica, Gardn. in Calc. Jonm. Nat. Hist. vii. (1847) 492 = Wikstroemia canescens.
japonica, Sc angin, Amat. ii. t. 105=odora.
japonica, Loisel. H Pall., N< Nold., Beitr. vi. 109 = Wikstroemia indica.
involucrata, Wall, in As. Ses. xBi# (1820) 888 - ind. or.
Jasminea, Thuib. in Mus. Nat. Acad. Upsal. xiii (1792) 282 = D. Laureola.
jezoensis, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 821 = oleoides.
Jonnea, Siitk. & Sm. *Fl. Grate. Prod.* i. 260 ; *Fl. Graeca,* t. 555.
javanica, Thunb, in Mus. Nat. Acad. Upsal. App. xi. 4 = Pendula.
jezoensis, Maxim. in Rel Bal Gar/«y?.(1866) 84.—Japon.
kamtschatica, Maxim. Prim. Fl. Amur. 237 = D. Pseudo-mezereum.
kinsiana, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii- 18 = Japon.
Lagetto, Bonpl. ex Kunth, Syn. PI. i. 447=Daphnopsis Bonplandii
laetiflora, Sw. Prod. 68 - tod. Occ. 68 = Lagetta lintearia.
laureola, Linn. Sp. 560; Hnmb. & BonpL ex WikstrfDis*. Daph. *lanuginosa,* Daphnopsis Hnmboldlii.
laureola, Lam. Encyc iii. 486 = Wikstroemia *laterifloraf* Ann. Soc. Bot. Lyon.vii. (1880) 124 = D. Mezerenm.

DAPHNE:—

Lanreola, *Linn. Sp. PI.* 856.—Europ.; *Aft.* bor.
laurifolia, Willd. ex Kunth, Syn. PI. i. 446-Daphnopsis Humboldtli.
Lerchenfeldiana, Schur, Enum. PI. Transs. 688 = Blagayana ?
linearifolia, *Hart, in Trans. R. Irish Acad.* xxviii. (1885) 442.—Palaestin.
linifolia, Meissn. in DC. Prod. xiv. 623 = Daphnopsis tinifolia.
Liottardi, Vill.Hist.Pl. Dauph. iii. 516=D. Mezereum.
longifolia, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. iii. (1841) 285 = involucrata.
lucida, Loisel. Nouv. Not. PI. Fr. 17=oleoides.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 151 = Daphnopsis Humboldtii.
major, Lam. Fl. Fr. iii. 221=D. Lanreola.
Mazeli, *Carr. Rev. Hortic.* (1872) 392.—Japon.
mexicana, Spreng. Syst. ii. 236 = Daphnopsis salicifolia.
Metereum, Gueidenst ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 647 = glomerata.
Mezereum, *Linn. Sp. PI.* 356.—Europ.; As. bor.
microphylla, Meissn. in DC. Prod. xiv. 533 =jasminea.
monostachya, Willd. Sp. PI. ii. 420=Cansjera Kheedii.
montana, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Kegensb. iii. (1841) 284 = pendula.
mucronata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 322. t. 81. f. 2 = oleoides.
multiflora, Thore, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 165 = D. Lanreola.
myrtifolia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 816 = Thymelaea velutina.
neapolitana, Lodd. Bot. Cab. t. 719=sericea.
nitida, Vahl, Symb. Bot. iii. 53 = Thymelaea nitida.
obovata, Hnmb. *8c* Bonpl. ex Wikstr. Diss. Daph. ed. II. 40 = Daphnopsis Bonplandii.
occidentalis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 63= Daphnopsis Swartzii.
odora, D. Don, Prod. Fl. Nep. 68 = cannabina.
odora, *Thunb. Fl. Jap.* 159; *Lour. Fl. Cochinch.* 287. —Japon.
odorata, Lam. Fl. Fr. iii. 222=D. Cneorum.
oleaefolia, Lam. Encyc. iii. 440=sericea.
oleoides, *Schreb. Ic. Desc. PI. Decad.* i. 13. t. 7 ; *Linn. Mant.* i. 66.—Europ.; As. Min.
oleoides, Tscherniaeff, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 632 =: caucasica.
oleoides, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) 299 = gnidioides.
oppositifolia, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 647 = Wikstroemia canescens.
orientalis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 483 = Thymelaea villosa.
orthophylla, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 124 = D. Gnidium.
osyroides, Vahl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 488 = Thymelaea Tartonraira.
paniculata, Lam. Fl. Fr. iii. 222 «=D. Gnidium.
papyracea, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 488— cannabina.
papyrifera, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 537= cannabina.
papyrifera, Siebold, in Verb. Bat. Gen. xiL (1830) 24 = Edgeworthia chrysantha.
paudfiora, Span, ex Walp. Ann. i. 689»Wikstroemia Spanoghii.
pendula, *Sm. Ic. Ined.* ii. 34. t. 84.—Burma; Malaya.
Philippi, Gren. & Godr. in Schultz, Arch. Fl. Fr. et All. 282 = D. Laureola.
Pillopillo, C. Gay, Fl. Chil. v. 315=Ovidia Pillopillo.
polystackya, Willd. Sp. PI. ii. 420=Cansjera Rheedii.
pontica, *Linn. Sp. PI.* 357.—As. Min.
prostrata, Salisb. Prod. 281 = D. Cneorum.
Pseudo-mezereum, *A. Cray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1868-69) 404.—Japon.
pubescens. Linn. Mant. i. 66= Thymelaea virgata?
Rodriguezii, *Texidor, in Rev. Prog. dene,* xviii. (1869). —*Cf. Bull. Soc. Bot. Fr.* xvi. (1869) *Rev. Bibl.* 222. —Ins. Minorca.
rosmarinoidesfivttm. I Fl. Cap. Prod. 12(Passerinae sp. t) —Afr. austr.
rotundifolia, Linu. f. Suppl. 223 - Wikstroemia rotundifolia.
Roumea, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 688.—China.
rupestris, Facch. ex Nym. Suppl. Syll. 67-petracn.
salicifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 150 = Daphnopsis salicifolia.

DAPHNE :—

salicifolia, Lam. Encyc. iii. 438=caucasica.
sempervirens, Salisb. Prod. 281 = D. Laureola.
sericea, D. Don, Prod. Fl. Nep. 69= Wikstroemia canescens.
sericea, No£, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 534=oleoides.
sericea, *Vahl, Symb. Bot.* i. 28.—Ital.; As. Min.
sinensis, Lam. Encyc. iii. 488—odora.
Sophia, *Kolenic*. in Bull. Soc. Mosc.* xxii. (1849) l. 311. t. 3.—As. occ.
squarrosa, Linn. Sp. PL 358=Gnidia carinata.
striata, *Tratt. in Arch. Cewaechsk. i.* 120. t. 133.— Alp.; Europ. austr.
tangutica, *Maxim, in Bull. Acad. Pltersb.* xxvii. (1881) 531.—China.
Tartonraira, Linn. Sp. PI. 356=Thymelaea Tartonraira.
tenuiflora, *Span. Ic.* n. 64 ; *et in Linnaea,* xv. (1841) 835, nomen.—Ins. Timor.
theosioides, Lam. Encyc. iii. 487=Thymelaea thesioides.
Thereminii, Lhotzky, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. I. 67 = Funifera utilis.
Thymelaea, Linn. Sp. PI. 356 = Thymelaea Sanamunda.
tinifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 63 = Daphnopsis tinifolia.
tomentosa,Vam. Encyc. iii. 336=Thymelaea Tartonraira.
triflora, *Lour. Fl. Cochinch.* 236.—China.
trifolia, J. F.Gmel. Syst. 1538, sphalm. = *tinifolia.*
vellaeoidts, Rodrig. in Bull. Soc. Bot Fr. xvi. (1869) 288 = Thymelaea velutina.
Verloti, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 59 = D. Cneorum.
vermiculata, Vahl, Symb. Bot. i. 28 = Thymelaea tinctoria.
villosa, Linn. Sp. PI. ed. II. 510 -= Thymelaea villosa.
virgata, Wall. Cat. n. 1047 - Wikstroemia canescens.
viridiflora, Mor. ft Zoll. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 642 -Wikstroemia Candolleana.
viridiflora, Wall. Cat n. 1049 = Wikstroemia indica.
Wallichii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 640-involucrata.

DAPHNEPHYLLUM, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 232 (1844) = Daphniphyllum, Blume (Euphorb.).

DAPHNICON, Pobl, in Flora, viii. (1825) 188, nomen = Hippocrates, Linn.

DAPHNIDIUM, Nees, in Wall. Fl. As. Rar. ii. 61, 63 (1831); et Laurin. Expos. 19 (1833) - Idndera, Thunb. (Laurin.).
acuminatum, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 851 = L. acuminata.
argenteum, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 103.—Burma.
bibracteatum, Nees, Syst. Laurin. 615.—Java.
bifarium, Nees, in Wall. PI. As. Rar.ii. 6S = L.heterophylla.
caesium, Miq. PI. Jungh. i. 186 =L. densifolia.
caesium, Nees, Syst. Laurin. 614-L. caesia.
caesium, Zoll. Verz. 114 - L. acuminata.
caudatum, Nees, ex Wall. PI. As. Rar. ii. 68.—Ind. or.
Cubeba, Nees, Syst. Laurin. 616 = Litsea Cubeba.
elongatum, Nees, ex Wall, in PI. As. Rar. ii. 63 = Iitsea elongata.
gemmiflorum, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 362.— Java.
gracile, Nees, in Otto 8c Dietr. AUg. Garten*, i. (1888) 91.—Hab.»
lancifolium, Sieb. & Zucc in Abh. Acad. Muench. iv. III. (1846) 207=Litsealancilblia.
lancifolium, Thw. Enum. PI. Zeyl. 257.—Zeylan.
macrophyllum, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 352.— Java.
melastomaceum, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 63 = L. melastomacea.
Myrrha, Nees, Syst. Laurin. 642=Litsca trinervia ?
Myrrha, Sieb. & Zucc. in Abh. Acad. Muench. iv. HI. (1846) 207 - L. strychnifolia.
oxyphyUum, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 63.—Ind. or.
pendulifolium, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 231.— Hab.)
pulcherrimum, Nees, in Wall. PI. Ah Rar. ii. 68.— Nepal.
sinense, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 852.—China.
strychnifolium, Sieb. & Zucc. in Abh. Acad. Muench. iv. III. (1846) 207 = L. strychnifolia.
venosum, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 281.—Bhotan.

DAPHNIDOSTAPHYLIS, Klotzsch, in Linnaea, xxlv. (1861) 79=Arotostaphylos, Adans. (Ericac.).
acuta, Klotzsch, 1. c. 81-A. Hookeri?
cordifolia, Klotzsch, 1. c. 80=A. tomentosa.
Fendleriana, Klotzsch, 1. c. = A. Uva-ursi.
glauca, Klotzsch, 1. c. = A. glauca.
Hookeri, Klotzsch, 1. c. = A. Hookeri.
pumila, Klotzsch, 1. c. 81-A. pumila.
pungens, Klotzsch, 1. c 80=A. pungens.
tomentosa, Klotzsch, 1. c 79—A. tomentoaa.

DAPHNIPHYLLOPSIS, Kurz, in Jonrn. As. Soe. Beng. xliv. (1875) ii. 201-Nyasa, Gronov. (Comae).
capitata, Kurz, 1. c.=N. sessiliflora.

DAPHUnPHYLLTOI, Blume, Bijdr. 1152 (1826).
EUPH0RB1ACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 282.
GOUGHIA, Wight, Ic. T. 22.11878,1879 (1852).
GYRANDRA, Wall. Cat. n. 8020 (1847!).
acutifolinm, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. I. 6.—Java,
africanum, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1861) 586.—Afr. trop.
bancanum, *Kun, in Tijdsehr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 188.—Java.
Benthamii, BaiIL Etad. Ge"n. Enph. 665, nomen - himalayense.
Blumeanum, *Baill. 1. c.*—Java.
Buergeii, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. I. 3.—Japon.
Calleryanum, Baill. Etud. Gén. Euph. 565-calycinura.
calycinnm, *Benth. Ft. Hongk.* 316.—Hongkong.
Gaudichaudianum, Baill. Etud. Gin. Euph. 565, nomen = calycinum.
glaucescens, *Blume, Bijdr.* 1158.—Ind. or.; Java; Corea.
himalayense, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. *X.* 4.—Reg. Himal.
humile, *Maxim, ex Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 488.—Japon.
laurinum, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 565. t. 21.—Malaya,
macropodium, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 129. —Japon.
majns, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 76. —Burma.
neilgherrev.se, Thw. Enam. PI. Zeyl. 290=glaucescens.
Pieirei, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 261.—Cambodia.
Roxburghii, Baill. Etud. Gén. Euph. 565=glaucescens.
Teysmanni, *Kurt, ex Teysm.* to" *Binn. in Tijdsehr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 52.—Java.
Zollingeri, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xvi. I. 2.—Java.

D APHNITIS, Spreng. Syst. i. 870 (1825) - Botryceraa, Willd. (Anacard.).
rapensis, Spreng. 1. c. 454 = B. laurinum.
madagascarensis, Spreng. 1. c—Madag.

OAPHNOBRYON, Meissn. in DC. Prod xiv. 666 (1857) =Drapetea, Banks (Thymel.).
ericoides, Meissn. 1. c.—Borneo.
tasmanicum, Meissn. 1. c = Drapetes tasmanica.

DAPHNOPSIS, Mart. *Sc* Zucc. Nov. Gen. et Sp. i. 65 (1824). *THYMELAEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 191.
COLEOPHORA, Mien, in Ann. Nat Hist Ser. II. vii. (1851) 197.
HARGASSERIA, Schiede *8c* Deppe, ex C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 366.
NORDMANNIA, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. 1. c. 355.
alpestris, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 192.—Bras,
angustifolia, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 110—Cuba.
bogotensis, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 521.—Am. austr.
Bonplandii, *Meissn. I. c.*—Mexic.
brasiliensis, *Mart. V Zucc. Nov. Gen. et Sp.* 1. 65.—Bras.
caracasana, *Meissn. in DC. Prod. xiv.* 521.—Venezuela.
caribaea, Griseb. Fl. Brit. Ind. 278-tinifolia, *Meissn.*
cestrifolia, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 623.—N. Granat
crassifolia, *Meissn. 1. c.* 624.—Ins. S. Doming.
cubensis, Meissn. 1. c. 622=Lasiadenia cubensis.
cuneata, *Radii, in Siteb. Acad. Muench.* xiv. (1884) 489.—Cuba.
dioica, Mart, ex Meissn. in Mart. FL Bras. v. I. 66 -= brasiliensis.
Guacacoa, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cut.* 110.—Cuba.

DAPHNOP8IS:—
Humboldtii, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 520.—Am. austr.
Lindeni, *Meissn. 1. c.* 523.—Mexic.
Martii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 66. t 28. f. 2. —Bras.
Pavoni, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 622.—Peruv.
Purdiei, *Meissn. I.* e.—N. Granat.
racemosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 134.—Reg. Argent.
salicifolia, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 522.—Mexic.
Swartzii, *Meissn. L* c—Ind. occ.
tinifolia, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 278.—Jamaic.
tinifolia, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 623.—Ind. occ
utilis, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1871) 818. —Bras.

DARBYA, A. Gray, in Am. Jonrn. Sc Ser. II. i. (1846) 888 = Buokleya, Torr. (Santalac).
umbellulata, A. Gray, 1. c. 386.—Am. bor.

DARGERIA, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 115, t 121 (1844)=Leptorhabdos, Schrenk (Scrophnl.).
linifolia, Decne. V. c. 116. t 121=L. linifolia.
pinnatifida, Decne. 1. c = L. Benthamiana.

DABLINOIA, F. Muell. Fragm. v. 162 (1866). *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 182.
spectatissima, *F. Muell. 1. c.*—Austral.

DARLINGTONIA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 97=DesmanthuB, Willd. (Legum.).
brachyloba, DC. L'eg. Mem. xii. t 66 = Desm. brachylobus.
brevifolia, Rafin. New Fl. Am. i. 42 - Desm. brachylobus.
glandulosa, DC. Le"g. M<5m. xii. t. 66 = Desm. brachylobus.
illinoënsis, DC. ex Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 191 = Desm. bracbylobus.
intermedia, Torr. 1. c. =Desm. brachylobus.
virgata, Rafin. New Fl. Am. i. 48 = Neptunia lutea.

DAHLINGTONIA, Torr. in Smithson. Contrib. vi. (1854) 4. t. 12. *SARRACENIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 48.
califomica, *Torr. t. c.* 6.—Calif.

DARLUCA, Rafin. in Ann. Gén. Sc Phys. vi. (1820) 87 =Paramea, Aubl. (Rubiac.).
prostrata, Rafin. New Fl. Am.iv. 65 - F. odoratissima.

DABTU8, Lour. Fl. Cochinch. 123 (1790). *SOLANACEAE* ? Benth. & Hook. f. ii. 888.
perlarius, *Lour. I. c.* 124.—China; Ins. Molucc

DARWIN1A, Dennst. Schluess. MaUb. 81 (1818) = Ziitsea, Lam. (Laurin.).
quinqueflora, Dennst. L c L zeylanica.

DARWINIA, Rafin. Fl. Ludov. 106 (1817)=Sesbanla, Pers> (Legum.).
exaltata, Rafin. 1. c = S. macrocarpa.

DABWTNIA, Rudge, in Trans. Linn. Soc. xi. (1813) 299. t. 22. *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. £ i. 697.
CRYPTOSTEMON, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 114.
GENETYLLIS, DC. Prod. iii. 20? (1828).
FRANCISIA, Endl. Gen. 1226 (1840).
HEDAROMA, Lindl. Swan River App. 7. t. 2 B (1889).
POLYZONE, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 191.
SCHUERMANNIA, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 386.
axillaris, F. Muell. Census, 51 = Chamaelaucium axillare.
brevifolia, F. MuelL 1. c •= Chamaelaucium brevifolium.
brevistyla, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xx. (1847) I. 155 = thymoides.
ciliata, F. Muell. Census, 51=Chamaelaucium dliatum.
citriodora, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 180. —Austral.
diosmoides, *Benth. 1. c.*—Austral.
Drummondii, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1847) 1.156.—Austral.
Endlicheri, F. Muell. Census, 51=Chamaelancium virgatum.

DAHWINIA:—
fascicularis, *Rudge, in Trans. Linn. Soc.* xi. (1815) 299. t. 22.—Austral,
fimbriata, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 17»-—Austral.
flavescens, A. Cunn. ex Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1841) 192 = Homoranthus virgatus.
Forrestii, *F. Muell. Fragm.* xi. 9.—Austral.
gracilis,V. Muell. Census, 61 = Chamaelauciumgracilc.
helichrysoides, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 179.—Austral.
heterandra, F. Muell. Census, 61 = Chamaelaucium heterandrum.
Hookeriana, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1667) 179.—Austral.
intermedia, A. Cunn. ex Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. it (1841) 190 = taxifolia.
laxifolia, Schau. 1. c. = taxifolia.
macrostegia, *Benth. in Journ. Linn. Soc. 'a.* (1867) 179.—Austral.
megalopetala, F. Muell. Census, 51 = Chamaelaucium megalopetalum.
Meissneri, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 179-—Austral.
micropetala, *Benth. I. c.* 181.—Austral.
Neildiana, *F. Muell. Fragm.* ix. 177.—Austral,
oederoides, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 17»-—Austral.
Oldfieldii, *Benth. 1. c.* 180.—Austral,
pauciflora, *Benth. I. c*—Austral,
pinifolia, *Benth. I. c.* 181.—Austral,
purpurea, *Benth. 1. c.* 180.—Austral,
radinophylla, *F. Muell. Fragm.* ix. 175.—Austral,
sanguinea, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 18[1]-—Austral.
saturejaefolia, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1852) 324 -= thymoidea ?
Schuermanni, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (186?) 181.—Austral.
speciosa, *Benth. 1. c.* 179.—Austral,
taxifolia, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 852.^ Austral.
Thomasii, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) I[81]"—Austral.
thymoides, *Benth. I. c.* 180.—Austral
Turctaninowii, F. Muell. Census, 51 = Chamaelaucmm pauciflorum.
uncinata, F. Muell. 1. c. = Chamaelaucium uncinatuni.
veiticordina, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867; 181.—Austral.
vestita, *Benth. 1. c.* 180.—Austral,
virescens, *Benth. 1. c.* 179.—Austral,
virgata, *F. Muell. Fragm.* ix. 174.—Austral.

DARWYNIA, Reichb. Norn. 176 (1841)=praec.

DASANTHERA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 =PentBtemon, Mitch. (Scrophul.).
cuneifolia, Rafin. New Fl. Am. ii. 69 = Herpest"s nigrescens.
fruticosa, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267* P. Menziesii.

DASIANTHERA, Presl, Rel. Haenk. ii. i. 90 (1831)=* Scolopia, Schreb. (Bixin.).
luzoniensis, Presl, 1. c.=S. Dasyantheia.

DASIOGYNA, Rafin. Atl. Joum. 145 (1882) (Quid')-*glandulosa,* Rafin. 1. c.—Am. bor.

DASIOLA, Rafin. Neogenyt 4 (1825)=Feetuea, Li"'"-(Gramin.).
Elliotea, Rafin. 1. c. = F. monandra.

DASIORIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 48(1886) = Solid**[0], Vaill. (Compos.).
Elliott, Rafin. 1. c - S. Elliottii.
limonifolia, Rafin. 1. c.=S. sempervirens.
mexicana, Rafin. 1. c.=S. sempervirens.

DASISTEMA, Rafin. New Fl. Am. ii. 66 (1838)" DASISTOMA, Rafin.

DASISTEPHA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 19 (1886) = Gentiana, Toum.
asclepiadea, Rafin. 1. a = G. asclepiadea.
cespitosa, Rafin. 1. c. - G. glauca.

DASISTOMA, Rafin. in Joura. Phys. lxxxix. (1819) 99 » Gerardia, Linn. (Scrophul.).
aurea, Rafin. 1. c - G. flava.
"urieulata, Rafin. New Fl. Am. ii. 67 =G. auricnlata.
"rummondii, Benth. in DC. Prod. x. 520 *G. grandinora.
integrifolia, A. Gray, Man. Bot N. U. St. 807 = G. 'aevigata.
'aciniatum, Walp. Rep. vi. 649-Seymeria virRata.
'aevigata, Rafin. ex Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 63ft= G. laevigata.
""nnphylla, Rafin. New Fl. Am. ii. 67 = G. macrcphylla.
patula, Chapm. in Coult. Bot. Gat iii. (1878) 10-G. patula.
Pectinata, Benth. in DC. Prod. x. 520 = G. pedicnlaria.
Pedicularia, Benth. I. c. 621 = G. pedicularia.
Pubescen, Benth. 1. c. 520 = G. flava.
quercifolia, Benth. 1. c = G. quercifolia.
*tubu*W .Bertol. Miac. Bot. xiii. 17 - Macranthera rachsioides.

DASSOVIA, Neck. Elem. i. 257 (1790) = Asclepias, Linn.

DASTYLEPIS, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 125 (18S6) = Cissie, Unn. (Convolv.).
Brownei, Rafin. 1. c.=C. americanat

DA5LRUS> Salisb. Gen. PI. Fragm. 61 (1856)=Ohamae-Urittm, Willd. (Uliac).
'«<««, Salisb.l.c.=C.luteum.

DA8.TJS, Lonr. Fl. Cochinch. 141. *{INC. SEDX*
"ASYS, Lem. in Orb. Diet. iv. 613 (1849).
v 3 ^ . J«»- ™ Diet. Sc. Nat. xxvii. 201 (1823).
vertiallatus, *Lour. I.* e._Cochinch.

DAS A rXT ? THERA, Reichb_ Handb_ 2,* («37) = "ASIANTHERA, Presl = Boolopia,Schreb.(Bixin.).

UAS,YANTHES, D. Don, in Edinb. N. Phil. Jonrn. wii. (18g4) 15 6=Erioa> LL,,,,.
Wnnanni, D. Don, 1. c. 156=E. Spannanni.
1 A > SAVLUS, Thw- En""- H. Zeyl- W (1860) = "Maia, Lmn. (Sapotac).
™." «>Thw.l.c.176-B.fnlva.
yopkllld, Thw. 1. c. 175-R microphylla.
Wrtii, Thw. 1. c. 176 = B. Moonii.
neriifolius, Thw. L c. 175-B. neriifolia.

DA?1YLARPUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. U856) 27 = Sloanea, Linn. (Tiliac).
Vodnvah, Oerst. 1. c. =S. quadrivalvis.

DASYCARYA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 98=Cyrtooarpa, H. B. & K. (Anacard.).
grisea, Liebm. l. c. 99-C. procera.

DASYCEPHALA, Benth. & Hook_ f_ Gen_ »• "3 (1878 alat., 1" *XVBIACEAE*, Benth. & Hook. f. 1. c barS. "*"'•. o" *«"*•/• '• '• 1** -Bras.
SSSV*?'*' ^ tfooi/-_'_<r_ins_S- Doming.
Benth_ V Ho»k f-1- '--Bras.
indecora, *"""'• *«««'. C*«r. i4». Sor. iL 57.—Mexic.
spicata, *Benth.* &•/^o,,*./. G«. ii. 144.—Gnian.

DAS? iSfc 11"TM' Tnrcz_ in Bnl1_ «« ' f-L 885 "41*" *MELIACEAB*, Benth. *Sc* Hook.
Beccarianum, As>7/. *Adansania*, xi. (1874) 268.—Borneo.
Cuminganum, C. Z)C. i» /)C. ifmt^. *Phan.* i. 541.-Ins. Philipp.
philippinum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) 1. 415.—Ins. Philipp.
sarawakanum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. B41,—Borneo.

DASYLEPIS, Oliver> m J«"_ Unn_ Soc_ i3t (1867) 170. *B^ ^ f i* , Benth. & Hook. f. i. 972.
racemosa, ,,,c, 17L~Afr_ trop.

DASYLIRION_z"cc. in Otto & Dietr. Allg. Gartent vi. (1838) 258» 303. *ULIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 780.
acrotrichum, *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iii. (1843) 228.—Mexic.

DASTLIBION;—
Berlandieri. 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 249—Mexic.
Bigelovii, Ton. in Pacif. Rail. Rep. iv. 151 = Nolina Bigelovii.
caespitosum, Scheidw. in C. Koch, Wochenschr. iv. (1861) 286 = Hookerl
erumfiens, Ton. in Bot Mex. Bound. 216=Nolma erumpens
flexile, C. *Koch, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1867) *App.* L 5.—Mexic.
glaucophyllum, *Hook. Bot. Mag.* t. 6041.—Mexic.
glaucum, Can. in Rev. Hortic. (1872) 436=glaucophyllum.
gracile, Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. II. (1846) 22 = acrotrichum.
graminifolium. Baker, in Jonm. Bot. x. (1872) 297, ex. parte—texanum.
graminifolium, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 249 = acrotrichum.
graminifolium, *Zucc. in Otto* b* *Dietr. Allg. Garten**. vi. (1838) 258, nomen; *et in Abh. Akad. Muench.* iii. (1843) 225.—Mexic.
Hart-wegianum, Hook. Bot. Mag. t. 6099 = Hooked.
Hartwegianum, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1845) 22=Nolina Hartwegiana.
Hookerű, *Lem. Illustr. Hortic.* vi. (1859) *Misc.* 24.—Mexic.
Humboldtii, Kunth, in Abh. Bed Acad. (1842) 32 -Nolina parviflora.
junceum, Zucc. in Abh. Akad. Muench, iv. II. (1846) 19=Nolina Hartwegiana.
laxiflorum, Baker, in Joum. Bot. x. (1872) 299=serratifolinm.
Lindheimerianum, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 262 =Nolina Lindheimeriana.
longifolium, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 224=Nolina longifolia.
longissimum, *Lem. Illustr. Hortic.* iii. (1856) *Misc.* 91.—Mexic
pitcairniaefolium, Karw. ex Zucc. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 258 - Hechtia glomerata.
pliabile, *Baker, in Joum. Unn. Soc.* xviii. (1880) 240.—Mexic.
quadrangulatum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 250.—Mexic.
serratifolium, Baker, in Joum. Bot. x. (1872) 298 ex parte=glaucophyllum.
serratifolium, *Zucc.in Otto tf Dietr. Allg. Gartenz.* vi. (1838) 268, nomen; *et in Abh. Akad. Muench.* iii. (1843) 225.—Mexic.
tenuifolium, Ton. Bot. Mex. Bound. 216 = Nolina Lindheimeriana.
texanum, *Scheele, in Linnaea*, xxiii. (1850) 140.—Texas.
Wheeleri, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 249.—Am. bor. occ.

DASYLOMA, DC. Prod. iv. 140 (1830) ~ Oenanthe, Tonm. (Umbell.).
benghalense, DC. 1. c = O. benghalensii.
corticatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.742 = O, stolonifera.
glaucum, DC. Prod. iv. 140 = O. benghalehsis.
japonicum, Miq. Ann. Mus. Bot.Lugd. Bat. iii. 59 = O. stolonifera.
javanicum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 741=0. stolonifera.
ladniatum, Miq. 1. c. = Falcaria laciniata.
latifolium, Lindl. in Royle, Illustr. Bot Himal. 232 = 0. stolonifera.
subbipinnatum, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 59 = O. stolonifera.

DASYMALLA, EndL Nov. Stirp. Dec. 11 (1889) = Pltyrodia, R.Br. (Verbenac).
axillaris, Endl. 1. c.=P. racemosa.
terminalis, Endl. 1. c 12-P. racemosa.

DASYNEMA, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 408 (1827)=Sloanea, Linn. (Tiliac.).
alnifolium, Walp. Rep. i. 362=S. alnifolia.
cuneifolium, Walp. 1. c. = S. cuneifolia.
hirsutum, Schott, in Spreng. Syst iv. App. 408 - S. monosperma.
laurifolium, Benth. in Hook. Joum. Bot iv. (1842) 132-S. laurifolia.
obtusum, Splitg. in Hoev. *Sc* De Vriese Tijdschr. U. (1842) 98 - S. parviflora.
obtusum, Walp. Ann. i. 110-S. obtnsa.

DASYNEMA:—
ochrocarpa, Mart, ex Benth. in Joum. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 70-Sloanea ochrocarpa.
pubescens, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 74 = S. pubescens, *Benth.*
pubescens, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 408 = S. pubescens, *Radii.*
pubescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xxxi. (1868) I. 224.—Bras.
riparia, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1848) S34=S. riparia.
salicifolium, Endl. ex Walp. Rep. L 852=S. monosperma.

DASYOCHLOA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 484 (1840)-Triodla,R. Br. (Gramin.).
avenacea, Willd. 1. c.«T. avenacea.
pulchella, Willd. 1. c - T. pulchella.

DASYPHYLLUM, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp iv. 17. t. 308 (1820) = Chuquiragua, Juss. (Compos.).
argenteum, H. B. & K. L c. 18.—Ecuador.

DASYPOOOM", R. Br.Prod. 263 (1810); et in Flind, Voy. ii. 608. t 8 (1814). *JUNCACEAE*, Benth. & Hook.f. iii. 865.
DASYPOGONIA, Reichb. Nom. 46 (1841).
bromeliifolius, *R. Br. I. c*—Austral.
glaber, Laharpe, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iii. (1827) 101 = bromeliifolius.
Hookeri, *Drumm. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 169.—Austral.
obliquifolius, Lehm. PI. Preiss. ii. 52 = bromeliifolius.

DASYPOGONIA, Reichb. Nom. 46 (1841)=praec.

DASYRANTHUS, Rafin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 484 (1840) = Gnaphalium, [.inn. (Compos.).

DASYS, Lem. in Orb. Diet. iv. 613 (1849) = Dasus, Lour. (Inc. sed.).

DASYSPERMUM,Neck. Elem. *I* 295 (1790)(= Farrago Umbelliferarum).

DABYSTACHTB, Baker, in Trans. Linn. Soc Ser. II. i. (1878) 255. t 85. *ULIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 789.
campanulata. *Baker, I. c.* 256.—A£r. trop.
colubrina, *Baker, I. c.—ASt.* trop.
falcata, *Baker, 1. c*—Afr. trop.
pleiostachys, *Baker, I. c.* 265.—Afr. trop.

DASYSTACHYS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1868) 25=Chamaedorea, Willk. (Palm.).
Deckeriana, Oerst. 1. c 26 = C. Deckeriana.

DASYSTEMON, DC. Prod. iii. 382 (1828) = Granule, linn.
calycinum, DC. 1. c.=C. calycina.

DASYSTEPHANA, Adans. Fnm. ii. 502 (1763); Borekh. in Roem. Archiv, i. I. 25 (1796) = Qentiana, Tourn.
adscendens, Borekh. 1. c 26 = G. decumbens.
algida, Borekh. L c. = G. frigida.
asclepiadea, Borekh. 1. c. = G. asclepudea.
auriculata, Borckh.'l. c. = G. auriculata.
glauca, Borekh. 1. c.-G. glauca.
punctata, Borekh. 1. c. = G. punctata.
purpurea, Stead. Nom. ed L 362; ed. II. i. 484, sphalm.—G. punctata.
triflora, Borekh. in Roem. Archiv, i. I. 26-G. triflora.

DASYSTOMA, Rafin. ex Endl. Gen. 691, in syn. (1839) _ DASISTOMA, Rafin. = Oerardia, Unn. (ScrophuL).

DATIBOA, Linn. Diss. Dass. 31 (1747); Amoen. Acad. i. 416 (1749). *DATISCEAE*, Benth. ft Hook, f. L 844.
TRICEKASTBS, Presl, ReL Haenk. ii. 88. t 64 (1886).
cannabina, *Linn. Sp. PI.* 1037.—Oriens; Reg. Himal.
glabra, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 568=cannabina.
glomerata, *Baill. Hist. PI.* ii. 407.—Calif.
hirta, Linn. Sp. PI. 1037 -Rhus typhina.
nepalensis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 203 - cannabina.

DATURA, Linn. Syst. ed. I (1736). *SOLAN ACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 901.
AFEMON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 11 (1836).
BRUGMANSIA, Pers. Syn. i. 216 (1805).
CERATOCAULOS, Reichb. Handb. 201 (1837).
STRAMONIUM. Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 489 (1742).
acaulis, Pav. ex Dun. in DC. Prod. ziii. I. 481-Jaborosa integrifolia.
aegyptiaca, Vesl. PI. Aegypt. 263 =fastuosa.
alba, F. Muell. Fragm. vi. 144 - Leichhardtii.
alba, Nees, in Trans. linn. Soc. xvii. (1881) 73 = fastuosa.
albido-flava, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) Misc. 16 = Dyssochroma albidoflavum.
arborea, *Linn. Sp. PI.* 179.—Am. austr.
arborea, Mart, in Flora, xxiv. (1841) IJ. Beibl. 111 = suaveolens.
Bertolonii, Parl. ex Gnss. Fl. Sic. Syn. 267=ferox.
Bojeri, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1836) 23; et in Ann. Sc Nat. Sér. II. vii. (1887) 286 - fastnosa.
Candida, Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. 36= arborea.
capensis, Hort. ex Bernh. in Tromms. N. Journ. Pharm. xxvi. (1883) 151 = D. Stramonium,
ceratocaula, *jacq. Hort. Schoenb.* iii. 48.—Am. trop.
chlorantha, *Hook. Bot. Mag.* t. 5128.—Hab. ?
coroigera, *Hook. I. c.* t 4252.—Mexic.
discolor, *Bernh. in Tromms. N. Journ. Pharm.* **xxvi.** (1833) 149.—*Cf. Linnaea,* viii. (1833) *Litt.* 138.-Mexic.
dubia, *Bianco, ex Tod. Ind, Sem. Hort. Panorm.* (1858)26.—Hab. ?
dubia, Rich, ex Pers. Syn. i. 216—fastuosa.
erinacea, *Vell.Fl. Flum.* 70; ii. t. 46.—Bras.
eximia,L<tm. Illustr. Hortic. vi. (1869) Misc. 23 = Dyssochroma eximia.
fastuosa, *Linn. Syst.* ed. X. 9S2.—Geront. trop.
ferox. *Linn. Diss. Dem. PI. in Amoen. Acad.* **iii. 403.**—China.
ferox, Nees, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 76 = D. Stramoninm.
.toribunda, *Paxt. Mag. Bot.* ix. (1842) 3—Am. austr.
fruticosa, Homem. Hort. Hafn. i. 212 = D. Metel.
Gardneri, Hook. Bot. Mag. sub t 4252 = suaveolens.
guayaquilensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 8 = D. Metel.
humilis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 396 = fastuosa.
Hummatu, Bemh. in Tromms. N. Joum. Pharm. xxvi. (1833) 153.—Ct Linnaea, viii. (1833) Litt. 141 = fastuosa.
hybrida, Tenore, App. iv. Prod. Fl. Neap. 34 = inermis}
inermis, *Jacq. Hort. Vindob.* iii. 44. t. 82.—Abyss.
inoxia, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 5 = fastuosa.
laevis, Bertol. Fl. Ital. iv. 780=ferox.
laevis, Linn. f. Suppl. 146 = inermis.
laevis, Schkuhr, Handb. i. t. 140=fastuosa.
Leichhardtii, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* **i.** (1855) 20, in obs. nomen.—Austral.
loricata, Sieber, ex Bernh. in Tromms. N. Journ. Pharm. xxvi. (1838) 151 = D. Stramonium.
lurida, Salisb. Prod. 131 = D. Stramonium.
macrocaulis, Roth, Beitr. 159=ceratocaula.
maxima, M09. & Sesse, ex Dun. in DC. Prod. xiii. I. 536 = Solandra guttata.
Metel, *Linn. Sp. PI.* 179.—Am. trop. (Cosmop. vulg.).
Metel, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8=fastuosa.
Metel, Moç. & Sesse, ex Dun. in DC. Prod. xiii. 1.544 = meteloides.
meteloides, *DC. ex Dun. 1. c.*—Am. bor. oca
microcarpa, *Godr. in Mém. Acad. Stanisl.* **Sér. IV. v.** 1872(1873)202.—Hab.?
muricata, Hort. Berol. ex Godr. 1. c. 199=praecox.
muricata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 177 = fastuosa.
nigra, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* **142.—Malaya.**
Nilhummatu, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 542 = fastuosa.
parviflora, Salisb. Prod. 131 = D. Stramonium,
praecox, *Godr. in Mim. Acad. Stanisl.* **Ser. IV. v.** 1872 (1878) 199.—Hab. ?
Pseudo-stramonium, Sieber, ex Bernh. in Tromms. N. Joum. Pharm. xxvi. (1883) 151 = D. Stramonium.
quercifolia, Godr. 1. c = praecox.
quercifolia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* **iii. 7.—**Mexic.
sanguinea, *Ruit V Pav. Fl. Per.* ii. 15.—Am. austr.
sarmentosa, Lam. Illustr. ii. 9=Solandra hirsnta.
scandens, *Veil. Fl. Flum.* 69; ii. t. 45.—Bras.
speciosa, Salisb. Prod. 131»arborea.

DATURA:—
Stramonium, *Linn. Sp, PI.* 179. — Cosmop. trop. et temp.
Stramonium, Thnnb. Fl. Tap. 91=fastuosa.
Stramonium, Wall. Cat. Suppl. n. 278 = trapezia,
suaveolens, *Hutnb.* **to**[1] *Bonpl. ex Willd. Enum. Hort, Berol.* 227.—Mexic.
Tatula.lAan. Sp. PI. ed. II. 256=D. Stramoninm.
Thomasii, Ton. Pacif. Rail. Rep. v. 362 = discolor.
timoriensis, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 837 - D . Metel.
trapezia, *Nees, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1884) 74.—Ind. or.
Wagmanni, Steud. Norn. ed. II. i. 484-fastuosa.
Wallichii, Dun. in DC. Prod. xiii. 1. 539 = D. Stramonium.
Wrightii, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1869) t 260 = meteloides.

DAUBENTONIA, DC. Mém. Lég. 285 (1825) = **Seabanla,** Pers. (Legumin.).
longifolia, DC. Prod. ii. 267-S. Cavanillesii.
punicea, DC. 1. c. = S. pnnicea.
Thurberi, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 318 = S.Thurberi.
Tripetiana Poit in Ann. Soc. Hortic. Par. xxxi. (1842) 120=seq.
THpetii, Poit. 1. c. xxvii. (1840) 136.—Reg. Argent.

DATJBENYA, Lindl. Bot. Reg. t. 1813 (1885). *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. **iii.** 806.
aurea, *Lindl. I. c.*—Afr. austr.
coccinea, *Harv. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xi.** (1871) 89S.—Afr. austr.
fulva, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) t. 53.—Afr. austr.

DAUCALIS, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 148 (1874 = Caucalis, Toum. (Umbell.).
leptophylla, Pomel, 1. c. 149 - C . leptophylla.
mauritanica, Pomel, 1. c.-=C. mauritanica.

DAUCERIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) =EmbeUa, Burm. f. (Myrsin.).
acuta, Dennst. 1. c.=E. robnsta.
obtusa, Dennst. 1. c. — E. robusta.

DAUCOSMA, Engclm. & A. Gray, ex A. Gray, in Bost. Joum. Nat. Hist. vi. (1850) 210 - Diseopleura, DC. (Umbell.).
laciniatum, Engelm. & A. Gray, 1. c. 211=Disc, laciniata.

DATTCUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 928.
AMMODAUCUS, COSS. & Dur. in BuIL Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 893.
BALLIMON, Rafin. New Fl. Am. iv. 28 (1836).
CTENODAUCUS, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 145 (1874).
DURIEUA, Boiss. & Rent. Diagn. PI. Nov. Hisp. 14 (1842).
ORLAYA, Hoffm. Gen. Umb. 58 (1814).
PELTACTILA, Rafin. New Fl. Am. iv. 28 (1836).
PLATYCODON, Reichb. Nom. 236 (1841).
PLATYDAUCON, Reichb. 1. c. 206 (1841).
PLATYSPERMUM, Hoffm. Gen. Umb. 64 (1814).
STAFLINUS, Rafin. New Fl. Am. iv. 28 (1836).
TIRICTA, Rafin. 1. c. 22 (1836).
abyssinicus, *Hockst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i.** 831.—Abyss.
abyssinicus, C. A. Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 68 = D. Carota.
agrestis, Rafin. New Fl. Am. iv. 27; Jord. ex Nym. Consp. 279 ^ D . Carota.
alatus, *Pair. Voy. Barb.* **i<. 135 ;** *Encyc. Suppl.* **ii 118.**—Algeria.
Allioni, Link, Handb. i. 844 = D. Carota.
anisodorus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 150-Carum copticum.
Anthriscus, Baill. Hist PI. vii. 88=Caucalis Anthriscus.
arenicola, Pan6. ex Boiss. Fl. Orient ii. 1076 = setulosus.
Artedia, Crantz, Inst ii. 116 = Artedia squamata.
asturiarum, Barnad, ex Cutanda, Fl. Comp. Madr. 820 =polygamus.

DAUCU8:—
atropatanus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 352, in textu = persicus.
aureus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 242. t. 61.—Reg. Mediterr.
australis, Guss. FL Sic. Prod. Suppl. i. 74 = rupestris.
anstralis, *Poepp. ix DC. Prod.* iv. 214.—Chili,
bactrianus, *Bunge, Rel. Lehm. Bot.* 136.—Turkestan,
bessarabicus, *DC. Prod.* iv. 210.—Ross, austr.
bicolor, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 64. t. 270 = Broteri.
Blanchei, *Rent. Ind. Sem. Hort. Genev.* **(1867);** *Boiss. Fl. Orient,* ii. 1077.—Syria.
Bocconi, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 822.—Calabria,
brachiatus, *Sieber, ex DC. Prod.* iv. 214.—Austral.
brachiatus, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 98 = Caucalis microcarpa.
brachylobus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 258. t. 68 ' setifolius.
brericaulis, Rafin. New Fl. Am. iv. 25 = D. Carota?
brevifolius, Rafin. *1.* c. 26 = pusillus.
Broteri, *Tenore, Syll.* 691.—As. Min.; Syria.
carnosus, Moench, Meth. 93=mauritanicus.
Carota, *Linn. Sp. PI.* 242.—Europ.; Oriens.
coadunatus, *Tenore, Syll. App.* iv. 10 (sp. dub.).-' Italia.
copticus, Lam. Encyc. i. 635-Caram copticum.
creticus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIH. n. 5.—Graecia; As. Min.
crinitus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 242. t. 62.—Maurit; Lusitan.
cuminoides. *Lam. ex Pair. Encyc. Suppl.* **ii. 118.—**Hab.1
dentatus, *Bertol. Fl. Ital.* iii. 168.—Gallia; Hispan.
depresses, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 119=Cortm Lindleyi.
divaricatus, Walt. Fl. Carol. U4 = Apium divaricatum.
Durieua, *Lange, in Willk.* **b" *Lange, Prod. Fl. Hisp.*** iii. 23.—Hispan.
esculentus, Salisb. Prod. 162 = D. Carota.
exiguus, Steud. Nom. ed. II. i. 485 = D. Carota.
foctidns, *Rafin. Fl. Ludov.* 81 (sp. dub.).—Louisiana,
foliosus, *Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* i. 73.—Sicilia.
gaditanus, *Boiss. V Reut. Diagn.* **Ser. II. ii.** [96]-~~ Hispan.
Gaillardoti, Boiss. FL Orient, ii. 1074-=Httoralis.
gibbosus, Bertol. Fl. Ital. iii. 160 = foliosus.
Gingidium, Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr. *W"* = D. Carota.
Gingidium, Linn. Herb, ex DC. Prod. iv. 118-Am"" Visnaga.
Gingidium, *Linn. Sp. PI.* 242.—Europ.; Afr. bor.
glaber, Opiz, ex Celak. Prod. Fl. Boehm. ffi. 582 «=U-Carota.
glaberrimus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 244.—Afr. bor.
glochidiatus, Fisch. Mey. & Ave"-Lall. Ind. ae"[1]-Hort. Petrop. ix. Suppl. 11 ~ brachiatus.
Golickeanus, *Regel* **b**[1] *Schmalh. in Act. Hort. Pttrop* v. (1877) 599,-Turkestan.
Gouani, Nym. Syll. 148 = polygamus.
gracilis, *Steinh. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. »• (1818W 208.—Algeria.
grandiflorus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 240. t. 69.—Algen"-
grandiflorus, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 18fl.—Europ-. Taur.
gummifer, Lam. Encyc. i. 634=D. Gingidium.
guttatus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 63. t. 2«» setulosus.
guttatus, Sieber, ex Nym. Consp. 279 " **D. Gingidium.**
halophilus, Brot. Phyt. Lusit. t. 168 = D. Gingfo
heterocarpus, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. III. u-I" 50 = muricatus.
heterophylus, Rafin. New Fl. Am. iv. 26=>D. Carol*'
hirsutus, DC. Prod. iv. 213=setulosus.
hispanicus, Gouan, Illustr. 9 = D. Gingidium.
hispidifolius, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ia.* Chili.
hispidus, Desf. Fl. Atlant. i. 243. t. 63=D-gidium.
hispidus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 10=D. Carota.
hispidus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 = polygamus. *involucratus,* Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. iii. <

jolensis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **146.—Alge""-**
laevis, Salisb. Prod. 162~Ammi Visnaga.
Lappula, [Weber in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. Caucalis daucoides.

DAUCUS:—
laserpitioides, *DC. Prod.* iv. 210.—Mauritan.
latifolia, Baill. Hist PI. vii. 19S = Cancalis latifolia.
leptocarpus, *Hochst. in Lorent, Wanderungen,* 887.—oyria; Mesopot.
leptopkyllus, Scop. Fl. Cam. ed. IL i. 190-Caucalis leptophylla.
{mis, Rafin. New FI. Am. iv. 25 = D. Carota!
uttoralis, *Sibth.* b* *Sm. Fl. Graec.* iii. 65. t. 272.—Syria,
lopadnsanus, *Tin. PL Rar. Sicil.* 88.—Sicilia.
lundus, Linn. f. Snppl. 179-D. Gingidium.
marcidus, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) p. civ=D. Carota.
narjtimus, Gaertn. Frnct. i. 20. t. 4 = pomilns.
mantimus, *Lam. Encyc.* i. 684.—Europ. occ.
naritimus, With. Bot. Arc. ed. III. ii. 290-D. Carota.
iKMritanicus, Linn. Sp. PI. ed. II. 848; All. Fl. Pedem. ii. 81. t. 61 = D. Carota.
"wuritanicus, Salzm. ex DC. Prod. iv. 212 = D. Gingidium.
maximus, *Desf. Ft. Atlant.* i. 241.—Reg. Mediterr.; Onens.
meifolius, Brot Phyt Lusit. L 82. t. 36 = crinitus.
nelananthus, Stend. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1814) 19=Caucalis melanantha.
Iffoides, Pers. Syn. i. 308 = Ammi anethifolium.
Michelii, Caruel, Prod. Fl. Tose. 292 = Broterl
TOicranthus, *Pomel, Nouv. Mat. FL AtL* 146.—Algeria.
nifrophyllus, Presl, ex DC. Prod. iv. 218 =pusfflus.
mcrosciadius, Boiss. Diagn. Ser. I. *. 47 = setulosus.
TOontanus, *Humb. & Bonpl. ex Schult. Syst.* vi. 482.—Venezuela.
nontanus, Schmidt, ex Nym. Consp. 279 = D. Carota.
montevidensis, *Link, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* U9.—Reg. Argent.
murieatus, Linn. Herb, ex Guss. Fl. Sic. Syn. i. 886 = Broteri.
muricatus, *Linn. Sp. PI.* ed. IL 849.—Reg. Mediterr.
"'orodensis, Strobl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 223 = D. Gingidium?
neglectus, *Love, in Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1888). .(reimpr.20).—Ins. Madera.
**ittdus,* Gasp, in Guss. Enum. PI. Vase. Inar. 147. t. 5 = D. Gingidium.
nudicaulis, Ra New Fl. Am. iv. 25=D. Carota J
officinalis, Gueldenst. ex Ledeb. FL Ross. ii. 339 = D. Carota.
"'alias, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 145.—Algeria.
parviflorus, [Willk. in] Lose. & Pardo, Sert. Inconf. ed. IL 156=aureus.
pectinaceus, DC. Prod. iv. 212.—Hab.?
persicus ^ *Boiu. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 49—Persia.
platycarpos, Scop. Fl. Cam. ed. IL i. 190=Caucalis dancoides.
P^ygamus, *Gouan, Illustr.* 9.—Hispan.; Sicil.
**r>oumut,* Jacq. ex Nym. Consp. 279-D. Carota.
prolifer h^Td J., & C. Pres1, Delic. Pra «- 130 = Laserpitium
puberulum, ^oc^ Gen - Umbell. 77=littoralis.
pubescens, ^oc^> Gen - Umbell. 77=littoralis.
pulcherrimus, Koch, ex DC. Prod. iv. 210.—Reg. Mediterr.
PUlcherrimus, Fall, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 477.—nnlm Med iterr.
rigidus, Michx. Fl. Bor. Am. • 164.—Am. bor.
rSwus, Hort. Par. ex DC PrBd ?15.-Hab.?
^ ^ y B u l l. Hist. PI. vii. 89, 198 = Caucalis
S J ^ V ? " * 1 - *Fl. Sic. Syn.* i. S85.-Ins. Sicil.
PodllM. CX Tr Ir * Gray> FL N Am i- 636 *
scoparius, cau is, Boiss. & Noe, Diagn. Ser. II. ii. 96 = -pocarpus.
scabrosus, Bert. ex DC. Prod. iv. 211 = setulosos.
scariosus, Rafin. New Fl. Am. iv. 25 = D. Carote ?
sciadophyllus -*, Rafin. 1. c. 24 = D. Carota.
serotinus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ail. 147.—Algeria.
serratus, Moris, in Mem. Acc. Tor. II. ii. (1840) 304 = maritimus.
setifolius, Desf. Fl. Atlant. i. 2*4. t. 65.-A&. bor.
*setulosus, Guss. J'DC. Prod. iv. ni.-1t*l.;* Graecia.
siculus, Tineo, rugill. Sic. i. 6 = Bocconi.
speciosus, Cesati, in Linnaea, xi. (1837) 322 = setulosus.
strigosus, Rafin. New Fl. Am. iv. 27 = D. Carota?

DAUCUS:—
sylvestris, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = D. Carota.
toriloides, DC. Prod. iv. 214=montanus.
verticillatus, Hornem. Hort. Hafn. i. 272=setifolius.
vertidllatus, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 477 = crinitus.
Visnaga, Linn. Sp. PI. 242 = Ammi Visnnga.
vulgaris, Lam. Fl. Fr. iii. 480 = D. Gingidium.
vulgaris, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 189 = D. Carota.

DAUTHONIA, Link. 'Handb. i. 45 (1829) sphalm.- Danthonia, DC. (Gramiu.).

DAUVENTONIA, Reichb. in Moessl. Deutsch. Fl. ed. II. p. xlvii (1827), sphalm.= DAUBENTONIA, DC. =8esbani&, Pers. (Legumin.).

DAVTDIA, Baill. Adansonia, x. (1871) 114. *HAMAMEUDEAE1*
involucrata, *Baill. I. c.* 115.—Tibet or.
tibetana, *David, in Nouv. Arch. Mus. Par.* v. (1882) 56.—Tibet, or.

DAVIDSOirLA, F. Muell. Fragm. vi. 4 (1867). *SAX1FRAGAEA.*
pruriens, *F. Muell. I. c*—Austral.
pungens, Hort. ex Gard. Chron.(1876) I. 603=praec.?

DAVIESIA, Poir.'EncycSuppl. v. 480(1817)= Borya, LabilL (Liliac).
lucens, Poir. 1. c. = B. nitida.

DAVTESIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 220. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 469.
abnormis, F. Muell. Fragm. ii. 106-Latrobea pungens.
acanthochlona, *F. Muell. I. c.* x. 32.—Austral.
acanthoclada, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1863) I. 262 -Hovea acanthoclada.
acicularis, *Sm. in Kon. V Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 506.—Austral.
adnata, F. Muell. Fragm. ii. 105=striata.
alata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ix. (1808) 259.—Austral,
altemifolia, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 199.—Austral,
anceps, *Turct. in BuU. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 266.—Austral,
angulata, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 67.—Austral,
aphylla, *F. Muell. in Benth. Fl. Austral,* ii. 88.—Austral,
arborea, *F. Muell. (f Scort. in Proc. Linn. Soc. N. S. W.* vii. (1883) 221.—Austral,
arthropoda, *F. Muell. Fragm.* viii. 22.—Austral.
Benthamii, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 48 = incrassata.
brachyphylla, Meissn. 1. c. 49=incrassata.
brevitolia, *Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral.* ii. 201.—Austral.
buxifolia, *Benth. Fl. Austral,* ii. 75.—Austral.
calystegia, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxvi. (1858) I. 264=crenulata.
cardiophylla, *F. Muell. Fragm.* ii. 105.—Anstral.
chordophylla, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 48.—Austral.
colletioides, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838)7S»genistifolia.
colletioides, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* L 48.—Austral.
coluteoides, Walp. Rep. i. 670=colletioides.
concinna, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 76.—Austral.
condensata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) 1.265=Dillwynia pungens.
cordata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ix. (1808) 259.—Austral,
corymbosa, *Sm. in Kon.* b* *Sims, Ann. Bot.* L (1806) 507.—Austral,
crenulata, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 265.—Austral,
daphnoides, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* i. 54.—Austral.
decurrens, Meissn. 1. c. 52 •pectinate.
denudata, Vent. Choix, 6 = Viminaria denudata.
divaricate, *Benth. in Enum. PL Hueg.* 81.—Austral.
Drummondii, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* i. 58.—Austral.
egena, F. Muell. in Trans. Viet Inst i. (1855) 118 = Templetonia egena..

DAVIESIA:—
elongate, *Benth. Fl. Austral,* ii. 74.—Austral.
Epiphyllum, *Meissn. in Bot. Zeit.* xiii. (1865) 27.—Austral.
ericoides, Pers. Syn. i. 464 = Aotus villosa.
euphorbioides, *Benth. Fl. Austral,* ii. 88.—Austral,
fihpes, *Benth. in Mitch. Journ. Trap. Austral.* 363.—Austral.
flexuosa, *Benth. in Enum. PL Hueg.* 32.—Austral,
genistifolia, *A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 75.—Austral.
genistoides, Lodd. Bot. Cab. t. 1652 = ulicina.
glauca, Lodd. 1. c. t 48=corymbosa.
hakeoides, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* i. 47.—Austral.
horrida, *Meissn. 1. c.* 54.—Austral.
humifusa, Sieber, ex DC. Prod. ii. 103- Oxylobiuiu scandens.
incrassata, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 49 = microphylla.
incrassata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ix. (1808) 255.—Austral.
juncea, Pers. Syn. i. 454=Viminaria denudata.
juncea, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ix. (1808) 260.—Austral.
lancifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 263=mollis.
latifolia, *R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 20.—Austral,
latipes, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1862) 390.—Austral.
lauri/olia, Link, Enum. Hort. Berol. i. 403 » corymbosa ?
leptophylla, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst ii. 125 = corymbosa.
linearis, Lodd. Bot. Cab. t. 1616=corymbosa.
longifolia, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 81.—Austral.
macrophylla, Endl. Nov. Stirp. Decad. 18-corymbosa.
microphylla, *Benth. Fl. Austral,* ii. 86.—Austral.
mimosoides, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 20 =corymbosa.
mollis, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 263.—Austral,
nematophylla, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 78.—Austral
nudiflora, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* i. 63.—Austral,
obovate, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi (1853) I. 261.—Austral.
obtusifolia, *F. Muell. Fragm.* ii. 104.—Austral,
oppositifolia, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 199.—Austral.
ovate, *Benth. FL Austral,* ii. 72.—Austral,
pachylima, *TUTCB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 263.—Austral.
pachyphylla, *F. Muell. Fragm.* iv. 15.—Austral,
paniculate, *Benth. in Enum. PL Hueg.* 31.—Anstral.
parifolia, F. Muell. Fragm. iv. 16=crenulata.
pectinate, *Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral,* ii. 151.—Austral,
pedunculate, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 60.—Austral.
physodes, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 125 = incrassata.
polyphylla, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 68.—Austral
Preissii, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* i. 50.—Austral.
prionodes, Meissn. 1. c. 52=pectinata.
pubigera, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 75 = umbellulate.
pungens, R. Cunn. ex Benth. 1. c. =• acicularis.
qnadrilatera, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 59.—Austral.
racemulosa, DC. Prod, ii 114 - umbellulate.
ramulosa, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 56.—Austral,
reclinate, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 77—Austral.
reticulata, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 256 - I'ultenaea reticulate,
reversifolia, *F. Muell. Fragm.* i. 145.—Austral.
rhombifolia, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 56—Austral.
ruscifolia, A. Cunn. ex Hook. Bot Mag. t. 3196 = ulicina.
spinosissima, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* i. 51.—Austral,
squarrosa, Sm. *in Kon. (f Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 607.—Austral.

DAVIESIA:-
striata, ***Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xxvi. (1868) I.** 264.—Anstral.
teretifolia.tf. *Br. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 82.—Anstral.
ternata, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 199.—AnstraL
trigonophylla, ***Meissn. in Lehm. PI. Preiss.*** **ii. 218.—** Anslial.
ulicifolia, Andr. Bot. Rep. t. 804=ulicina.
ulidna, ***Sm. in Kon. V Sims, Ann. Bot.*** **i. (1805) 506.** —Austral.
umbellata, Labill. Nov. Holl. PL i. 107. t. 187 - ulicina.
umbellata, Sieber, ex DC. Prod. ii. 108 - Oxylobium scandens.
umbellulata, DC. Prod. ii. 114-nlicina.
umbellulata, ***Sm. in Kon. V Sims, Ann. Bot. i.*** (1805) 507.—Anstral.
mllifera, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 76=squarrosa.
mrgata, A. Conn, ex Hook. Bot. Mag. 13196=corymbosa.
Wyattiana, ***F. M. Bailey, in Proc. Linn. Soc. N. S. W.*** vi. (1881) 145.—Anstral.

DAVH.LA, Vand. in Roem. Script 115 (1796). *DILLENJACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 12.
HIERONIA, Veil. Fl. Flum. v. 1.118 (1827).
adenophylla, Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 98 = flexuosa.
angostifolia, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 19.—Bras.
asperrima, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842)95 = Kunthii.
brasiliana, Billb. ex Beurl. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1854 (1866) 114-Kunthii.
brasiliana, DC. Syst. i. 405=rugosa.
castanefolia, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 17=elliptica.
ciliata, A. Rich. Ess. Fl. Cab. 19=rngosa.
cuspidolata, ***Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.*** **xiii. I.** 101.—Bras,
densiflora, ***Triana*** **b*** ***Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.*** **IV.** xvii. (1862) 18.—N. Granat.
elliptica, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 17.—Bras,
flexuosa, *St. Hil. I. c.* 17. t. 2.—Bras.
flexuosa, Splitg. in Nederl. Krnidk. Arca, i. (1848) 236 = Tetracera surinamensis.
glabrata, ***Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.*** **xUi. 1.97.** —Bras,
glabrata, ***Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xxxvi. (1868)** I. 648.—Bras.
Glariovii, ***Eichl. in Kjoeb. Videnst. Meddel.*** **(1870)** 178.—Bras,
grandiflora, ***St. Hil. (f Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.*** **II.** xvii. (1842) 131.—Bras,
grandifolia, ***Moric. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.*** **xiii. I.** 99.—Bras.
itaparicensis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 19=rugosa.
Knnthii, *St. Hil. PL Us. Bras,* sub t. 22. p. 6.—Panama.
lacunosa,A/ari. *in Florajxi.* (1888) II. *Beibl.* 49.—Bras,
latifolia, ***Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.*** **19.—Bras.**
lucida, Presl, Rel. Haenk. ii. 73=Knnthii.
macrocarpa, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1.96.—Bras,
macroclada, *Moric. ex Eichl. I. c.* 98.—Bras.
macrophylla, St. Hil. FL Bras. Mer. i. 18=multiflora.
Marti!, *Eichl, in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1.102.—Bras.
mnltiBora, *St. Hil. PI. Us. Bras.* snbt. 22. p. 5.—Bras.
multiftora, Seem. Bot. Voy. Herald, 76=Sagraeana.
ovata, Presl, Rel Haenk. ii. 78 = Knnthii.
pedicellaris, *Benth. in Hook. Kern Journ.* iii. (1861) 161.—Bras,
piauhiensis, ***TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xxxv.** (1868) i. 548.—Bras.
pilosa, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 134 = rugosa.
Radula, Mart, in Flora, XXL (1838) II. Beibl. 64 = Tetracera Radnla.
rngosa, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 467.—Bras.
Sagraeana, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 17.—Cuba.
SeUomana, Schlecht. in Linnaea, viii. (1883) 178-angustifblia.
surinamensis, Miq. 1. c. xviii. (1844) 611=rngosa.
tennis, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 107.—Bras,
tintinnabulata, *Schlecht. in Linnaea,* viii. (1833) 178. —Bras.
vaginata, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 99.—Bras,
villosa, *Eichl. 1. c.* 103.—Bras,
wortniaefolia, *Baill. Adansonia,* vi. (1865-66) 272.-Gniana.

DAVYA, DC. Prod. iii. 105 (1828)-Merlania, Sw. (Melast.).
adscendens, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 266 - Adelobotrys adscendens.
catophylla, Cham, in Linnaea, ix. (1884) 372=M. calo; "lylla.
calyptrata, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. III. xviii. (1852) 186=M. calyptrata.
ciliata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 266-Octoplenra ciliata.
ciliata, Naud. in Ann. Sc. Nat Sén III. xviii. (1862) 187=Adelobotrys ciliata.
Claussenii, Naud. in Ann. Sc Nat. Sir. III. ii. (1844) 147-M.Claussenii.
crassiramis, Naad. 1. c xviii. (1862) 188=Centronia crassiramis.
exceha, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot Iv. (1846) 100 =M. Clanssenii.
glabra, DC. Prod. iii. 105 = M. glabra.
guianensis, DC. 1. c =• Adelobotrys adscendens.
longipes, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 66 - M. longipes.
macrophylla, Benth. PL Hartw. 76=M. macrophylla.
paniculata, DC. Prod. iii. 105=M. paniculata.
perumana, DC. 1. c.=Adelobotrys adscendens.
scandens, Nand. in Ann. Sc. Nat Se>. III. xviii. (1852) 137 = Adelobotrys scandens.
sclerophylla, Nand. 1. c. 188 = M. sclerophylla.
sertulata, Rich, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 66-M. glabra.

DAVYA, Moo. & Sesse, ex DC. Prod. i. 625,526 (1824) = Sauraiya, Willd. (Ternstroem.).
serrata, Moç. & Sesse, 1. c. 626 = S. serrata.
villosa, Moc. & Sesse, 1. c 525-S. villosa.

DA VENA, Monier, ex Mill. Fig. PL t. 118 (1756) - Ayenia, Linn. (StercnL).
inermis, Medic Malv. 122 = A. pusilla.
pusilla, Mill. Gard. Diet. ed. VIII = A. pnsilla.

DAYENIA, Michx. ex Janb. & Spach, in Ann. Sc Nat Sér. III. vi. (1816) 137 = Bieberstoinia, Steph. (Geran.).

DAYENIA.-Mill. Gard. Diet. ed. Vn (1789)=**Ayenia,** Linn. (Stercul.).

DAZUS, Jnss. in Diet. Sc. Nat xxrii. 201 (1823) = Dasus, Lour. (Inc. sed.).

DEASTELLA, Loud. Hort. Brit. 38, in syn. (1830) = **Mimetes,** Salisb. (Proteac).
vaccinifolia, Lond. 1. c. = M. vacciniifolia.

DEBRAEA, Roem. & Schult Syst i. 4 (1817) - Erisma, Rudge (Vochys.).
floribunda, Roem. & Schnlt. 1. c. 34 = E. floribundum.
molacea, Mart. & Zucc. ex Steud. Norn. ed. II. i. 486 = E. violaceum.

DEBBEGEA8IA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 90 ('1844-66'). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 890.
LEUCOCNIDE, Miq. PL Jnngh. i. 86 (1861).
MOROCARPUS, Sieb. & Zucc in Abh. Math.-Phys. Akad. Muench. iv. m. **(1846)** 218; (Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 94).
bicolor, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 286" = hypoleuca.
dichotoma, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* viii. (1855-66) 462.—Ins. Java,
ednlis, *Wedd. I. c*—Japon.
hypoleuca, *Wedd. 1. c.* 463. t 15.—Ind. or.
leucophylla, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 285" - Wallichiana.
longifolia, Wedd. 1. c. 235[M]«velutina.
velutina, ***Gaudich. Bot. Voy. Bonite,*** **t. 90.—Ind. or.**
Wallichiana, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* viii. (1856-66) 464.—Reg. HimaL; Burma; Zeylan.

DECABELONE, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir. V. xiii. (1870-71) 404. t. 2. *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 784.
Barklyi, *Dyer, in Bot. Mag.* t. 6203.—Afr. austr.
elegans, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xiii. (1870-71) 404.—Afr. austr.

DECACERAS, Harv. Thes. Cap. ii. 9. t. 114 (1868)-Anlsotoma, Fenzl (Asclep.).
Huttoni, Harv. 1. c—Afr. austr.

DECACHAENA, Torr. A. Gray, ex Lindl. Veg. Kingd. 758 (1847) -OayluBBacia, H. B. & K. (Vaccin.).

DECACHAETA, DC. Prod. v. 133 (18&6). *COMPOS1TAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 238.
Haenkeana, *DC. I. c.*—Mexic
Seemanni, *Benth. (f Hook.f. Gen.* ii- 239.—Mexic.

DECACHAETA, Gardn. in Hook. Lond. Jonra. Bot. v. (1846) 462-Ageratum, Linn. (Compos.).
conferta, Gardn. 1. c. 468=A. confertum.
longifolia, Gardn. I. c 462-= A. longifolium.

DECADIA, Lour. FL Cochinch. 316 (1790). *INCERT. SED.—Ct.* Benth. *8c* Hook. f. ii. 668.
aluminosa, *Lour. I. c*—Cochinch.
racemosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4420 = Symplocos racemosa.
spicata, Buch.-Ham. 1. c n. 4417 = Symplocos spicata.

DECADON, G. Don, Gen. Syst. U. 721 (1882)=DECODON, J. F. Gmel.=Nesaea, Comm. (Lythrar.).

DECADONTIA, Griff. Notul. iv. 175 (1854) = Bphenodeama, Jack (Verbenac).
caerulescens, Griff. 1. c - S. Griffichiana.

DECAQONOCAKPUS, Engl. in Mart. FL Bras, xii-II. 106 (1874). *RUTACEAE.*
oppositifolius, *Engl. I.* c—Bras.

DECAISNEA, Brongn. in Dnperr. Voy. Coq. Bot. 192. t. 89 (1829)=Preseottia, Lindl. (Orchid.).
densiflora, Brongn. 1. c - P. densiflora.

DECAISNEA, Hook. *t.* & Thorns, in Proc Linn. Soc. ii-(1854) 860. *BERBERIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 42-insignu, *Hook.f.* 6" *Thorns. I. c*—Reg. Himal.

DECAISNEA, Lindl. in Walt. Cat n. 7888 (1881)-Tropidia, Lindl. (Orchid.).
angulosa, Lindl. 1. c—Ind. or.

DECALEPIS, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 509-Tetraiia, Btauv. (Cyperac).
Dregeana, **Boeck. 1. c. (** ***= Cyathocoma nigrovaginata)-*** —Afr. austr.

DECALEPIS, Wight & Am. Contrib. 64 (1834)-*ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 744.
Hamiltonii, *Wight tr Am. I.* c—Ind. or.

DECALOBA, Rafin. FL Tellur. iv. 76 (1836) - **Ipomoe*.** Linn. (Convolv.).

DECALOBA, M. Roem. Syn. Pepon. 131, 152 (1846)"
FasBiflora, Linn.
alnifolia, M. Roem.l. e. 158-P. alnifolla.
Andersonii, M. Roem. l.'c.-P. Andersonii.
biflora, M. Roem. 1. c 161 = P. lunata.
bilobata, M. Roem. 1. c. 154=P. capsularis.
bogotensis, M. Roem. 1. c. 158=P. alnifolia.
bryonioides, M. Roem. 1. c. 163=P. bryonioides.
capsularis, M. Roem. 1. c. 154 = P. capsularis.
cirrhiflora, M. Roem. 1. c. 164 = P. cirrhiflora.
cuneata, M. Roem. 1. c. 168 = P. cuneata.
cyathophora, M. Roem. 1. c 157?P. auriculata.
dentata, M.Roem. 1. C.156*-P. Raddiana.
elliptica, M. Roem. 1. c. 152 = P. elliptica.
exsudans, M. Roem. 1. c. 162=P. bryonioides.
filipes, M. Roem. 1. c. 161 = P. filipes.
geminifiora, M. Roem. 1. c. 164 = P. Vespertilio.
hemicycla, M. Roem. 1. c. 160 = P. Vespertilio.
holosericea, M. Roem. 1. c. 164=P. holosericea.
Jacavini, M. Roem. 1. c. 156 = P. pulchella.
jorullensis, M. Roem. 1. c. 160=P. jornllensis.
kermesina, M. Roem. 1. c. 156"P. Raddiana.
landfolia, M. Roem. 1. c. 159 = P. lancifolia.
Leschenaultii, M.Roem. 1. c. 160-P. Leschenaultu-*lunata,* M. Roem. 1. c. 168 = P. lunata, *Juss.*
lyraefolia, M. Roem. L c. 157=P. oblongata.
mollis, M. Roem. 1. c. 162 - P. mollis.
oblongata, M. Roem. 1. c. 155 = P. oblongata.
obscura, M. Roem. 1. c. 167-P. foetida.
obtusa, M. Roem. 1. c. 156 = P. organensist

DECALOBA:-
onychina, M. Roem. Syn. Pepoń. 162=Pas$iflora amethystina.
organensis, M. Roem. 1. c. 160=P. organensis.
pallida, M. Roem. 1. c. 152=P. mucronata.
penduliflora, M. Roem.L c. 157 = P. penduliflora.
Per/oliata, M. Roem. I. c. = P.perfoliata.
piligera, M. Roem. 1. c. 161=P. capsularis.
punctata, M. Roem. I. c. 156-P. punctata.
retusa, M. Roem. I. c = P. Maximiliana.
Rohrii, M. Roem. I. c - P . auriculata.
rotundifolia, M. Roem. 1. c. 159 = P. rotundifolia.
rubra, M. Roem. 1. c. 158=P. rubra.
ʳ«/o, M. Roem. 1. c 159=P. lunata I
semilunaris, M. Roem. 1. c. 154=P. capsularis.
stptenata, M. Roem.l. c. 164-P. cirrhiflora.
sexflora, M. Roem. 1. c.=P. sexflora.
siyoides, M. Roem. 1. c. 163 = P. sicyoides.
**I*fstris,* M. Roem. 1. c 153-P. silvestris.
tinithii, M. Roem. 1. c. 161=P. capsularis.
SHbbifida, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gni. 1168, nomen.—Guiana.
surinamensis, M. Roem. Syn. Pepon. 168 = P. Vespertilio.
f vartrii, M. Roem. 1. c. 160 = P. Swartzii.
tuberosa, M. Roem. 1. c.=P. tuberosa.
*ᵛ**pertilio,* M, Roem. 1. c 155-P. Vespertilio.

DECALOPHIUM, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 163=Chamaelaucium, Desf. (Myrtnc.).
*ᵈ*nrinioides,* Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. . Pftersb. x. (1852) 826=C. ciliatum.
Wniperinum, Turez. 1. c. 325=C. megalopetalum.
"Waleucum, Turez. 1. c. =C. megalopetalum.
*********n,* Turez. 1. c 826 - C. gracile.
pauciflorum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) 1. 164 = C. pauciflorum.
***gulosum,* Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. PAersb. «• (1852) 326 = C. ciliatum.

DEC.^MERIUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc Ser. II. ITM- (1848) 259 - GayluBsaeia, H. B. & K. (Vaccin.).
*ᵈJ*nosum,* Nutt. 1. c 260 = G. dumosa.
f??"dosum, Nutt. 1. c.=G. frondosa.
"""tellum, Nutt. 1. c. = G. dumosa.
"esinosum, Nutt. 1. c = G. baccata.

ᴰECANDOLIA, Bast. Fl. Maine-et-Loire, 28 (1809) = *8K»tiB, Linn. (Gramin.).
•*Aba,* Bast. l.c.29=A. alba,
^ " a . Bast. 1. c. 28 = Milium effnsum.
P"««a, Bast. 1. c. = A. vulgaris.
**°*jonifera,* Bast. 1. c. 29 = A. stolonifera,
Wgaris, Bast. 1. c. 28=A. vulgaris.

ᴱEMA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir. II. ix. (1838) 765 t. 12- *ASCLEPIADEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 883.
Bojerianunj, *Decne. 1. c.*-Madag.

ᴰECᴬᴺᴱURUM, DC. in Guillem. Arch. Bot. il. (1888) a«J ŦCfnf-atherum, Cass. (Compos.).
^S^tnum, DC. Prod. v. 68 -Vemonia amygdalina.
*ang*ssyriolum,* Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 8 = C. Hookeri.
courtallense, Wight, Ic. iii. iv. 6. 1081 = C_ couttal_lense.
dindigulense, DCl ᵐ Wight, Contrib_ 7 = Vernonia indica.
divergens, DC. 1. c. 8=Vernonia divergens.
epilejum. DC. 1. c. 7=C. molle.
*fimbrill*M,* DC. Prod. v. 68.-In». Borbon.
frutescens, DC. L c. 66 = C. frntescens.
glabrum, D . c. 67 = Eupatorium glabrum.
grande, DC. l. c.—Madag.
*ja*licum,* Mi q- !"• Ind. Bat. ii. 2O.-J'a«.
*lil£****!. Dalz_ * Gibs_. Boᵀᴹᴵᴵ_ Fl_ 314.—Ind. or.
********\

DECLrEtTXIA :—
latifolia, Hochst. in Flora, xxvi. (1848) 70=Pentanisia variabilis.
leiophylla, *Muell. Arg. in Flora,* lix. (1876) 436.—Bras.
lysimachioides, *Zuce. in Schult. Want.* iii. 112.—Bras,
marioides, *Mart, tf Zucc. 1. e.* 111.—Bras.
mexicana, DC. Prod. iv. 479 = chiococcoides.
mollis, *Zucc. in Schult. Mant.* iii. 112.—Bra*,
mucronalata, *Mart, ex Cham. tf Schlecht. in Linnaea,* iv. (1829) 10.—Bras,
muacosa, *St. Hil. Voy. Distr. Diam. Bras.* i. 366.—Bras,
oenanthioides, *Mart. tf Zucc. in Schult. Mant.* iii. 112.—Bras.
origanoides, *Zucc. in Schult. 1. c.*—Bras,
orthophylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 451.—Bras.
Passerina, *Mart. tf Zucc. in Schult. Mant.* iii. 112.—Bras.
polygaloides, *Zucc. in Schult. I. c.* 113.—Bras.
pruinosa, DC. Prod. iv. 481-glauca.
prunelloides, Klotzsch, in Eckl. & Zeyh. Enum. 368 = Pentanisia variabilis.
psychotrioides, *DC. Prod.* iv. 481.—Am. anstr.
puherulenta. Mart, ex Cham. & Schlecht in Linnaea, iv. (1829) 9-chiococcoides.
revoluta, *Muell. Arg. in Flora,* lix. (1876) 436.—Bras,
rhexioides, *Mart, tf Zucc. in Schult. Mant.* iii. 112.—Bras.
nibioides, *Zucc. I.* c—Bras,
satnreioides, *Mart. tf Zucc. I. c.* 111.—Bras.
scabra, Benth. in Linnaea, xxiU. (1850) 465=divergen tiflora.
scleropbylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.vi.* V.467.—Bras.
Selloana, *Muell. Arg. in Flora,* lix. (1876) 436.—Bras,
spergulifolia, *Mart. tf Zucc. in Schult. Mant.* iii. 111.—Bras.
thymbroides, *Mart, tf Zucc. 1. c.*—Bras.
verticillata, *Muell. Arg. in Flora,* lix. (1876) 486.—Bras.
vincoides, Mart Reise Bras. i. 397; et ex Zncc. in Schult. Mant iii. 113-chiococcoides.

DECODON, J. F. Gmel. Syst. 677 (1791)=NeBaaa, Comm. (Lythrar.).
aquaticum, J. F. Gmel. 1. c - N . verticillata.
verticiUatum, £11. Sketch, i. 548=N. verticillata.

DECODONTIA, Haw. Syn. PI. Sncc. 28, in obs. (1812) = Huernla, R. Br. (Asclep.).

DECORIMA, Rafin. Sylva TeUnr. 31 (1888)=Ziziphus, Town. (Rhamn.).
trinervis, Rafin. 1. c - Z . exserta.
umbellata, Rafin. 1. c. = Karwinskia Hnmboldtiana.

DECOSTEA, Ruiz; & Pav. Prod. 130 (1794) - Grise. linla, Font. (Comae.).
jodinifolia, Griaeb. in Goett. Abh. vi (1854) 122.—Chili.
racemosa, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 703.—Chili.
rusdfolia, C. Gay, Fl. Chil. viii. 895. t. 32 b.—Chili.
scandens, Rniz & Pav. Syst. Veg. 259.—Chili.

DECTIS, Rafin. Fl. Tellur. iL 48 (1836)-Solidago, Tonm. (Compos.).
arborescens, Rafin. 1. c = Olearia nitida.
decurrens, Rafin. 1. c = S. Virgaurea.
Leucadendron, Rafin. 1. c. =Senecio Leucadendron.
rugosa, Rafin. 1. c.—S. rngosa.

DECUMARIA, Linn. Sp. PI. ed. II. App. 1663 (1762). *SAXIFRAGEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 642.
FORSYTHIA, Walt Fl. Carol. 154 (1788).
barbara, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1663.—Am. bor.
Forsythia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 282 = barbara.
prostrata, Lodd. ex Loud. Hort. Brit 188 « barbara.
radicans, Moench, Meth. 107=barbara.
sarmentosa, Bosc, in Act. Soc Hist Nat. Par. i. (1792) 76 = barbara.
scandens, Salisb. Prod. 356-barbara.

DEDEA, Baill. Adansonia, xli. 388 (1879). *SAXIFRAGEAE.*
major, *Baill. I. c.* 389.—N. Caled.
minor, *Baill. 1. c*—N. Caled.

DEEBINGIA, R. Br. Prod. 413 (1810). *AMARANTACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 23.
CLADOSTACHYS, D. Don, Prod. Fl. Nep. 76 (1825).
COILOSPERMA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 43 (1836).
altissima, *F. Muell. Fragm.* ii. 92.—Austral.
Amherstiana, Wall. Cat n. 6889=Bosia Amherstiana.
baccata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 236-celosioides.
celosioides, *R. Br. Prod.* 418.—As. et Austral, trap.
indica, ReU. ex Blume, Bijdr. 642 ^celosioides.
polysperma, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 236.—Ind. or.
tetragyna, *Roxb. Hort. Beng.* 19; *Fl. Ind.* i. 688.—Ins. Molucc.
virgata, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 345 = celosioides.

DF.FFORGIA, Lam. Illustr. ii. 71.1.125 (1793) = Forgesia, Comm. (Saxifr.).
borbonica, Lam. 1. c. = F. racemosa.

DEGUELIA, Aubl. PL Gni. 750. t 800 (1775) - Derrls, Lour. (Legnmin.).
arborescens, Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 269 =Swartzia nitens.
scandens, Aobl. PL Gni. ii. 760. t. 300 = Denis guianensis.
uliginosa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 442 = Derris uliginosa.

DEHAASIA, Blume, Rumphia, i. 161. tt. 44, 45, 47 (1835). *LA URINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 152.
HAASIA, Nees, Syst. Laurin. 372 (1836).
caesia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 383. —Java,
cuneata, *Blume, Rumphia,* i. 164. t. 46.—Java,
elongata, *Blume, I. c.* 163. t. 47.—Sumatra,
firma, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 333.—Malaya,
media, *Blume, Rumphia,* i. 168. t. 45.—Ins. Amboin.
microcarpa, *Blume, 1. c.* 162. t. 44.—Java.
paradoxa,£Kum«, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 333.—Borneo,
pauciflora, *Blume, 1. c.*—Malaya,
spathulata, *Miq. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 113, I15.-Malaya.
squarrosa, *Hassk. Retmia,* 8.—Java.

DEHEBAINIA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Se*r. VI. iii. (1876) 188. *MYRSINEAE.*
smaragdina, *Decne. I. c.* 139.—Mexic

DEIANIRA, Cham. *8z* Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 195. *GENTIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 810.
CALLOFISMA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 107. tt. 183, 184 (1827).
divaricata, *Gardn. ex Benth. tf Hook.f. Gen.* ii. 810.—Bras,
erubescens, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 196.—Bras.
nervosa, *Cham. tf Schlecht. 1. c.* 197.—Bras.
pallescens, Cham. *8c* Schlecht 1. c. 196 = erubescens.

DEIDAMIA, Noronha, ex Thou. Hist. Ve"g Isles Afr. 61. t. 20 (1807). *PASSIFLOREAE,* Benth. & Hook, f. i. 811.
THOMFSONIA, R, Br. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1821) 221.
alata, *Thou. I. c*—Madag.
bipinnata, *Tul. in Ann.Sc. Nat. Sir.* IV. viii. (1857) 49.—Madag.
Commersoniana, *DC. Prod.* iii. 337.—Madag.
Noronhiana, DC. 1. c. =- alata.
setigera, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Se>. IV. viii. (1857) 50.—Madag.
Thompsoniana, *DC. Prod.* ill. 387.—Madag.

DEILOSMA, Andrz. ex DC. Syst. ii. 460, 451, in syn. (1821); Spach, Hist. Veg. Phan. vi. 897 (1888) = Hesperls, Linn. (CrucifA
albiflorum, Fuss, Fl. Truss. 57 = H. nivea.
alpinum. Fuss, 1. c.=H. alpina.
glabrum, Fuss, 1. c 66 = H. alpina.
inodorum. Fuss, 1. c. 67 = H. matronalis.
Kladnii, Fuss, 1. c 56-H. alpina.
matronale, Andrz. ex DC. Syst ii. 450 = H. matronalis.
moniliforme, Fuss, Fl. Transs. 57-H. alpina.
niveum. Fuss, 1. c. = H. matronalis.
runcinatum. Fuss, 1. c. 56 = H. matronalis.
sibirica, Andn. ex DC. Syst. 461 = H. matronalis.

DEILOSMA :—
suaveolens, Andrz. in Bess. Enum. PI. Volh. 83 - H. matronalis.
tristis, Spach, Hist. V<!g. Phan. vi. 398 = 11. tristis.

SEUTANTHE, Maxim, in Mém. Acad. Péteisb. Sir. VII. x. (1867) n. XVI. p. 2. *SAXIFRAGEAE.*
bifida, *Maxim. I. c.* 8.—Japon.

DEIH3OLLIA, Schum. & Thonn. in Danske, Selsk. Afh. iv. (1827) 16 ; (Beskr. Guin. PI. 242). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 405.
PROSTEA, Cambess. in Mem. Mus. Par. xviii. (1829) 23. t. 1 C.
borbonica, *Scheff. in Flora,* lit (1869) 306; *et in Tijdschr.Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 17.—Ins. Borbon.
cuneifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* i. 432.—Afr. trop.
grandifolia, *Hotk. f. in Hoot. Niger FL* 249.—Afr. trop.
insignia, *Hook.f. I. c.* 250.—Afr. trop.
laurifolia, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 48*2.—Afr. trop.
neglecta, *Radii, in Sitab. Math.-Phys. Acad. Muench-* viii. (1878) 368.—Madag.
oblongifolia, Radlk. 1. c 869- Sapindus oblongifolins.
obovata, *Radlk. I. c.* 868.—Afr. trop.
Pervillei, *Radlk. 1. c.* 369.—Madag. ?
pinnata, *Schum. tf Thonn. Beskr. Guin. PI.* 212.—Afr. trop.
xanthocarpa, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 869.—Afr. trop.

DEINOSMOS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 49 (1836) = ABttfV Tonrn. (Compos.).
siculus, Rafin. I. c. = A. Linosyris.

DEKINIA, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. »:• n. (1844) 195. *LABI ATAE,* Benth. & Hook. f. »• 1193.
cocdnea, *Mart, tf Gal. I.* c—Mexic

DELA, Adans. Fam. ti. 499 (1763) = Seseli, Linn- (Umbellif.).

DELABECHEA, Lindl. in Mitch. Joum. Trop. Austral- 166 (1848) = Steroulla, Linn.
rupestris, Lindl. 1. c. = S. rupestris.

DELAIRIA, Lem. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. i. (18**) 379 = Senecio, Tourn. (Compos.).
odorata, Lem. 1. c. 380=S. mikaniodes.

DELARBREA, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Norm. '»• (1865) 342. *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 9[35]-
collina, *Vieill. I. c.*—N. Caled.
Michieana, F. Muell. Fragm. viL 95 = Porospermu"[1] Micbieanum.
paradoxa, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. "• (1865) 343=collina.
spectabilis, *Linden tf Andri, in Illustr. Hortic.* **"• (1878) t 814.-N. Caled.

DELARIA, Desv. in Ann. Sc. Nat *Sir.* I. ix. I(1826) 406 =Baphla, Afzel. (Legnmin.).
odorata, Regel, Cat. PL Hort. Aksakov. «.—Hab.
ovalifolia, Desv. in Ann. Sc. Nat. Se>. I. ix. (1826) *<'»• —Bras.
pyrifolia, Desv. 1. c.=B. polygalacea.

DELASTREA, A. DC. in DC. Prod. via. 195 (1844) = Labramla, A. DC. (Sapot.).
Bo/eri, A. DC. 1. c. 196 = L. Bojeri.

DELIA, »Dum. FL Bete. 110 (1827)=Sporg«[1*ri*1] J. *8c C.* Presl (Caryophyll.).
segetalis, Dum. 1. c.=S. segetaUs.

DELILIA, Spreng. Syst iii. 387 (1826) - Elvira, Cas*- (Compos.).
Berterii, Spreng. 1. c. 674-E. Martyni.

DELIMA, Linn. Diss. Dass. 19 (1747); Amoen. Acad. i. 403 (1749) - Tetracera, Linn. (Dillen.).
aspera, Blanco, Fl. Filip. ed. L 429; ed. IL 299.— Ins. Philipp.
castaneaefolia, G. Don, Gen. Syst. i. 71.—B»-
dasyphylla, Miq. Stirp. Surin. Sel. 107.—Gnian.
frangulaefolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 73.—Ins. Philipp.
guianensis, Rich, ex DC. Syst. i. 408.—Guiana.

DELIMA :-
kebecarpa, DC. Syat. i. 407=Tetracera aannentoaa.
intermedia, Blame, Bijdr. 4 - T. urmentosa.
"*«Va»fl, Moç. & Sesse, ex DC. Syst. i. 407-T.sessilinora.
»i«da, DC. 1. c. 408.—Ins. Trinit.
Pirifiu, DC. 1. c.=T. sarmentosa.
urmentosa, Linn. Gen. ed. V.; Syst. ed. X. 1076- T. sarmentosa.
"garea, Eichl. in Mart. Fl. Bras, xiii. I. 98 = T. aspera.
tomfntosa, E. Mey.in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1825) 016 = Doliocarpus Rolandri.
"tpetala, G. Don, Gen. Syst. i. 71=T. sarmentosa.

DEL1MOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 9 (1859) **=Tetraoera,** Linn. (Dillen.).
*«»•««««, Miq. 1. c. 10.—Java.

DELIS8EA, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 457. t. 76 *» 78 (1826). *CAMfANULACEAE,* Benth. & . Hook. f. ii. S46.
oeuminata, Gandich. 1. c. t. 76 (Cyaneae sp.).—Ins. Sandvic.
ambigua, Presl, Prod. Lobel. 47 = Rollandia ambigua.
angustifolia, Presl, 1. c. (Cyaneae sp.).—Ins. Sandvic.
aroorea, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.rö.* (1867) 180. -Ins. Sandvic.
arborea, Presl, Prod. Lobel. 47=Sclerothecaarborea.
*as**2>lfolia,* H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 182 (Cyaneae sp.).—Ins. Sandvic.
cfycina, Presl, Prod. Lobel. 47 = Rollandi« calycina.
*"***nontioides,* Gaudich. Bot Voy. Bonite, t. 47 (Clermontiae sp.). Ins. Sandvic.
conaceaa, A. Gray, in Proc. Am. Acad.v. (1861) 147 n ^yaneae sp.).—Ins. Sandvic.
"elesseitiana, *A. Gray, I. c*—Ins. Sandvic.
Migera, Wawra, in Flora, lvi. (1878) 81 = Clermontia pandiflora.
•«•». H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 182 Cyaneae sp.).—Ins. Sandvic.
hirtella Sandvic H, Mum, ,, o„ 179 *(Cy**** SP-)-—"".
*ho*olulen'sis,* Wawra, in Flora, lvi. (1878) 11 (Cyaneae j/PQ.—Ins. Sandvic.
*Wawra, 1. c. 10 « rhytidosperma.
"«itniana, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* t. 77.—Ins. vnclvic.
lanceolata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 147 = Kollandia lanceolata.
n«crostachys, Presl, Prod. Lobel. 47 = Lobelia macro- Machys.
nii, W. T. Brigham, ex H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 182 (Cyaneae sp.).—Ins. Sandvic.
obtusa, A. Gra y, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 148 (Cya ea e SP-)—Ins. Sandvic
!«, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 182 = Cyaneapilosa!
Presl, Prod. Lobel. 47.—Ins. Sandvic.
Cyneae sp.).—Ins. Sandvic.
ann, L. c. vii. (1867) 181=<Rollandia
lvi. (1873) 80 (Cv«neae SP-)-
—Ins. Sandvic.
Regina, Wawra =• 9-Cyanea superba.
rhytidosperma, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 180—Ins. Sandvic.
subcordata, *Gaudich. in Freyc.* Koy. £«*. 457. t. 77. —s. Sandvic.
undulata, ?«««*«*• '• *c.* t. 78.—Ins. Sandvic.
Waihiae, Wawra, in Flora, lvi. (1878) 8 (CUrmontiae sp.).—Ins. Sandvic.

Jastts **Fl. Ind.** Bat. ii. 820 (1857) = DILI-
Acanthus, Toum.
DERIUM, Cass. in Diet. Sc. Nat xlviii. 430 (1827)
Leontodon l, Linn - (Com P o8 -'>-
taraxacifoliu w, Cass. 1. c. = L. creticus.
DELOGNAM (18 *\ /^> ^ ^> co q"- in BuH- Soc. Linn. Par. i.
HuiBhli: *CUCURBITACEAE.*
mbiof ». *Cogn. I.* c.-Madag.
X, Raf n F1- Tellllr - **93 (1886) = Poinciana,**
rigii Lourri ^ej™"-)-
«». Rann. 1. c. = P. regia.

DELOSTOMA, D. Don, in Kdinb. Phil. Joum. ix. (1828) 263. *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1043.
CODAZZIA, Karst. & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 426; FL Columb. i. 7. t. 4 (1858).
dentatum, *D. Don, 1. c.*—Peniv.
Dombeyanum, DC. Prod. ix. 172 = nervosnm ?
integrifolium, *D. Don, in Edinb. Phil. Journ.* ix. (1828) 264.—Pernv.
latifolium, Splhg. in Hoev. *8c* De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) ll = Callichlamys riparia.
Lobbii, *Seem, in Bonplandia,* x. (1862) 72.—Peruv.
nervosnm, *DC. Prod.* ix. 198.—Peruv.
stenolobium, Steud. Nom. ed. II. i. 487=Bignonia CAstanc&cfolia.

DELOSTYLIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192; Joum. Phys. lxxxix. (1819) 102 = Trillium, Linn. (Liliac).
cernuum, Rafin. 1. c.-=T. stylosum.
stylosum, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192 = T. stylosum.

DELPECHTA, Montr, in Mem. Acad. Lyon, x. (1860) 221. *INCERT.SED.* Benth. & Hook. f. ji. 29.
artensis, *Montr. I. c.* 222.—N. C'aled.
floribunda, *Montr. 1.* c.221.—N. C'aled.

DELPHIDIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 856 = Delphinium, Toum. (Kanunc).

DELPHINASTRUM, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 886 (1839) = Delphinium, Toum. (Ranunc).
elatuia,fissum,grandiflorum,hybridum,ochroleucum, *puniceum,* Spach, Hist. Nat. Veg. vii. 338 ad 345, omnia = Delphinii speciernm homonyma.

DELPHINIUM, Tourn. ex'Linn. Syst. ed. 1 (1785). *RANVNCVLACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 9.
CALCATRIPPA, Heist. Syst. 8 (1748).
CERATOSANTHUS, Schur, Enum. Pl. Transs. 30 (1886).
CONSOLIDA, S. F. Gray, Nat Arr. .Brit. PI. ii. 711 (1821).
DELPHIDIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) 356; Med. Fl. ii. 216 U830).
DELPHINASTKUM, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 836 (1889).
PHLEDINIUM, Spach, 1. c. 351 (1839).
PHTIRIUM, Rafiu. Princ. Somiol. 29 (1814).
STAPHYSAGRIA, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 347 (1839).
Aconiti, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 383- Hohenackeri.
Aconiti, *Linn. Mont.* i. 77.—Turda.
addendum, W. R. Me Nab, in Trans. Bot. Soc. Edinb. ix. (1868) 835 = Ajacis?
Ajacis, Ledeb. Fl. Ross. i. 58 = orientate.
Ajacis, *Linn. Sp. PI.* 531.— Europ. austr.
albiflorum, DC. Syst. i. 353=hybridum.
albocoeruleum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) 807.—China.
alpinum, Waldst & Kit. PI. Rar. Hung. iii. 273- elatum.
altissimsm, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 26. t. 128.—Reg. Himal.
ambignum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 749.—Mauritan.
ambiguum, Loisel. in Desv. Joum. Bot. ii. (1809) 841 = pubescens.
ambiguum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3-Ajacis.
americanum. Mill. 1. c. n. 7 = azureum?
omofnum.Bemh, ex Steud. Nom. ed. II.i. 488 = elatum \
amoenum, *Stev. ex DC. Syst. i.* 546.—Sibir.
anomalum, Spreng. ex Stend. Nom. ed. II. i. 488- elatum I
anthoroideum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xvi. (1841) 869.—Syria; Cilicia.
atropurpureum, *Pall. Reise Stattk. Russ. Reich,* i. 134.—Rossia.
Aucheri, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvi. (1841) 362=persicnm:
anthriscifolium, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 207. —China.
axillariflorum, G. Don, Gen. Syst. i. 60-seq.
axilliflorum, *DC. Syst.* i. 341.—Syria; Ciliciat,
azureum, *Michx. Fl. Bar. Am.* i. 814.—Am. bor.
aMureum, Newberry, in Pacif. Rail. Rep. vi. 66=simplex.
Balansae, *Boiss. If Reut. Diagn.* Ser. II. v. 12.— Algeria,
barbatnm, *Bunge, in Arbeit.Nat. Ver. Riga,* i. (1847) 126.—Turkestan.

DEIJPHINITTM :—
Barlowiix, Lindl. Bot Reg. t. 1944.
bicolor, *Nutt. in Journ. Acad. Phil.* vii. (1834) 10.— Am. bor. occ.
bicomutum, *Hetnsl. Diagn. PI. Nov.* 17.—Mexic.
bithynicum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 820=orientate.
Boissierii, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 8 <= speciosum.
Bovel, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. iv. (1885) 356. —Arab.
brachycentiura, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 60.—Kamschatka.
brevieorne, *Vis. Fl. Dalm.* iii. 90.—Dalmat.
Brunonianum, *Royle, Jllustr. Bot. Himal.* 56.—Rey. Himal.
caemleum, *Jacquem. Voy. Bot. 7.* t. 6.—Reg. Himal.
californicum, *Torr. V Gray, Fl. N. Am. I* 31.—Calif.
Callerii, *Franchet, in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 229.—China,
camptocarpum, *Fisch.* b* *Mey. in Ledeb. Fl. Ross.* i. 58.—Reg. Casp.
camptocarpum, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 247 = persicum.
cappadocicum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvi. (1841) 867.—As. Min.; Persia.
cardinale, *Hook. Bot. Mag.* t. 4887.—Am. bor. occ
cardiopetalum, DC. Syst. i. 847 = halteratum.
Carela, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 195 = scabrifolium.
carolinianum, Walt. Fl. Carol. 155= azureum.
Carumnae, Walp. Rep. ii. 744, sphalm. vide D. ***Garumnae.***
cashmerianum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 55. t. 12.— Reg. Himal.
caucasicum, *C. A. Mey. Ven. Pfl. Cauc.* 200.—Reg. Caucas.
Chamissonis, *Prit*. ex Walp. Rep.* ii. 744. —Am. bor.
cheilanthum, *Fisch. ex DC. Syst.* i. 352.—Sibiria.
chinense, Fisch. ex DC. Prod. i. 5S=grandifloram.
eiliatum, Stev. Cat. Hort. Dorpat (1811) ex Bieb. Fl. Taur. Cauc iii. 370-elatum.
cinereum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 67.—Lydia.
Clusianum, Host, Fl. Austr. ii. 67 = elatum.
coccineum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 42 =» canlinalc.
confertum, *Guss. Fl. Sic. Prod.* ii. SO.—Sicil.
confusum, *Lome, Man. Fl. Mad. i.* 585.—Ins. Matlera.
Consolida, Gouan, Hort. Monsp. 258 — pubescens.
Consolida, *Linn. Sp. PI.* 530.—Europ.; As. bor.
Consolida, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec Prod. i. 870 = Ajacis.
corymbosum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 647.—Turkestan.
crassicaule, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 62.-Sibiria.
crassifolium, Schrad. ex Spreng. Gesch. Bot. ii. 201 — speciosum.
cuneatum, Stev. ex DC. Syst. i. 359-elatum.
cyphoplectrum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 7.—Persia.
dahuricum, Stev. ex DC. Prod. i. 53 = cheilanthum.
dasyanthum, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 138.—Reg. Altai.
dasycarpum, Stev. ex DC. Syst. i 547 --elatum.
dasycaulon, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 272.— Ind. or.; Abyssin.
dasystachyon, *Boiss. V Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 7.—As. Min.
davuricum, Bess. Cat. Hort. Cram. Suppl. iii. (1814) 9-cheilanthum.
davuricum, Georgi, Bcschr. Russ. Reich, iii. IV. 1052 ^hybridum.
decorum, A. C. Anders. Cat. PI. Nev. 117, ex S.W*ats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 18=depauperatum ?
decorum, Benth. PI. Hartw. 295 = variegatum.
decorum, *Fisch. bf Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iii. 33. -Calif.
denudatum. *Wall. Cat.* n. 4719.—Reg. Himal.
depauperatum, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N.Am.i.* 33.—Am. bor. occ.
deserti, *Boiss. Fl. Orient,* i. 88.—Arabia.
dictyocarpum, Steud. Nom. ed. IL i. 488 = dyctiocarpum.
diffusum, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 213=D. Consolida.
discolor, *Fisch. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 9, nomen. —Sibir.
divaricatum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 223 - D. Consolida.
divaricatum, *Ledeb. in Eichv. Casp. Cauc.* 16. t. 16.— Reg. Caucas. et Casp.

DELPHINIUM :—

dyctiocaipum, *DC. Syst.* i. 860.—Sibiria.
datum. All. Fl. Fedem. ii. 63-montannm.
elatum, *Linn. Sp. PI.* 681.—Europ.; Reg. Himal.
datum, Porter, in Haydn, Rep. (1870) 473-trolliifolinm.
elatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 573=Iaxiflorum.
elegans, *DC. Syst.* i. 365.—Am. bor. ?
emarginatum, J. & C. Presl, Delic. Prag. 6= pentagynum.
exaltatum, *Ait. Hort. Ken.* ed. 1. ii. 244.—Am. bor.
exaltatum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 25 - scopulorum.
exaltatum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 817 = californicnm.
exsertum, DC. Syst i. 345 = rigidnm.
fissum, Waldst. *Sc* Kit PI. Rar. Hung. i. 88. t 81 = hybridum.
flammenm, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1803) 22.—Am. bor. occ.
flavum, *DC. Syst.* i. 846.—Assyria.
flavum, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1885) 856 =deserti.
flexuosum, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 12 = elatum.
flexuosum, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1811) 356, nomen; *Rafin. Ann. Nat.* 12.—Am. bor.
foliosum, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Afosc.* xxxvi. (1863) I. 547.—Calif,
fnnnosum, *Boiss. (f Huet, Diagn.* Ser. II. v. 13.—Armenia.
Forskolii, Reichb. Illnstr. Sp. Aeon. v. t. 6 [68] = nanum.
Garumnae, Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Pyr. 7S = cardiopetalum.
glabellum, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. I. 56.—Sibir. baical.
glaciale, *Hook./. V Thorns. Fl. Ind.* 53.—Reg. Himal.
glandnlosum, *Boiss. V Huet, Diagn.* Ser. II. v. 11.—As. Min.
glaueum, *S. Wats. Bot. Calif,* ii. 427.—Calif,
gracile, *DC. Syst.* i. 847.—Hispan.
grandiflorum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 212=nanum.
grandiflorum, *Linn. Sp. PI.* 631.—Sibiria.
gratum, Hoflmgg. Verz. PA. Nachtr. i. 182—datum,
halteratum, *Sibth. tf Sm. Fl. Graec. Prod.* L 871; *Fl. Grace,* t. 507.—Reg. Mediterr.
hellesponticum, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xvi. (1841) 866-tomentosnm.
Hendersoni, *Goualt, in Rev. Hortic. Sir.* IV. iii. (1854), 441.—Hab.?
hirsutum, Fers. Syn. ii. 82 = hybridum.
hispanicum, Rent, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 968-Loscosii.
hispanicum, *Willk. I. c.* 969.—Hispan.
hispidum, Boiss. Fl. Orient, i. 82 = cappadocicum.
hispidum, Stev.. ex DC. Syst. i. 368=palmatifidum.
Hoffmeisteri, Klotzsch, Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 132=elatum.
Hohenackeri, *Boiss. Fl. Orient,* i. 85.—As. Min.
humnlinum, *Baill. Hist. PI.* i. 32.—China.
hybridum. Linn, in Amoen. Acad. iii. 87; Gouan, Illustr. 82=elatum.
hybridum, *Steph. ex Willd. Sp. PI.* ii. 1229.—Europ.; Oriens.
incanum, *Clarke, Trav.* ii. 451-Aconiti.
incanum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 55.—Reg. Himal.
incisum, Wall. Cat. n. 4717 =elatum.
intermedium, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed. I. ii. 243=elatum.
ithaburense, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 9.—Palestin.
Jacquemontianum, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot.fl. t. 7 = Brunonianum.
junceum, DC. Fl. Fr. v. 641 = peregrinum.
Keteleerii, *T. Moore, Fl. (f Pomol.* (1874) 73.—Hab. ?
kioviense, Bess, ex Nym. Consp. 20 = elatum.
kurdicum, *Boiss. (f Hohen. Diagn.* Ser. I. i. 67.—As. Min.
lanigerum, *Boiss. I. c.* viii. 10.—Persia,
latisepalum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 17.—Mexic.
laxiflorum, *DC. Syst.* i. 360.—Sibiria.
lepidum, *Fisch. & Avi-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. 70.—Reg. Caucas.
leptophyllum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 18.—Mexic.
linarioides, *Boiss. in Ann. Se. Nat. Sit.* IL xvi. (1841) 868.—Persia,
longipedunculatum, *Regel V Schtnalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 226.—Turkestan.
longipes, Moris, Fl. Sard. i. 59 = peregrinum.

DELPHINIUM :—

Loscosii, *Costa, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. (1873) 26.—Hispan.
Maackianum, *Regel, in ttlm. Acad. Pitersb. Sit.* VII. iv. (1861) n. iv. 9.—Reg. Amur,
macrocentron, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 397.—Afr. trop.
macropetalum, DC. Syst. i. 850-halteratnm.
magnificum x, Paxt. Mag. Bot. xvi. (1849) 268.
maritimum, Cav. ex Balb. Cat. Hort Tanr. (1813) 31 = Requienii.
mauritanicum, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvii. (1880) 68.—Afr. bor.
Maydellianum, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 7.—Rossia.
Menziesii, *DC. Syst.* i. 356 Am. bor. occ.
Meneiesii, Darand, in Journ. Acad. Philad. iii. (1865-58) 80=decorum.
Menziesii, Darand, in Trans. Am. Phil. Soc. xi. (1860) 158 = bicolor.
Menziesii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 31-simplex.
Menziesii, Torr. *Sc* Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 119-depauperatum.
mesoieucum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 80.—Hab. ?
micranthum, *Boiss.* &" *Hohen. Diagn.* Ser. I. i. 68.—Kurdistan.
Middendorffii, *Trautv. in Middend. Reise Sibir.* i. *Bot. (Fl. Taimyr.)* 68.—Sibiria.
mixtum, Loisel. Fl. Gin. Fr. 46 = hybridum ?
monophyllum, Gilib. Fl. Iituan. ii. 287=D. Consolida.
montanum, *DC. Fl. Fr.* v. 641.—Europ. austr.
montanum, DC. Syst. i. 858 = elatum.
moschatum, Munro, ex Hook. f. *Sc* Thorns. Fl. Ind. 63 = Brunonianum.
moschatum, Soleir. ex Nym. Consp. 20=Reqnienii.
nannm, *DC. Syst.* i. 849.—Aegypt.
Napellus, Baill. Diet. t. ad fasc. xviii = Aconitum Napellus.
neglectum, *Colla, Hort. Ripul. App.* ii. **846,** nomen.—Hab.?
nevadense,*Kunze, in Flora,* xxix. (1846) 647.—Hispan.
nudicaule, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 33.—Am. bor. occ.
Nuttallianum, Pritz. ex Walp. Rep. ii. 744 - Menziesii.
obcordatum, *DC. Syst.* i. 350.—Afr. bor.
obscurum, Stev. ex DC. Prod. i. 56 = triste.
occidentale, 5. *Wats, ex Coult. Man. Bot. Rocky Mount. Reg.* 11.—Am. bor. occ
ochroleucum, Stev. ex DC. Syst. i. 353,546=hybridum.
officinale, *Wender, in Pharm. Centralbl.* (1834) 812, 813.—Europ. austr.
oliganthnm, *Boiss. Fl. Orient,* i. 80.—Syria.
Oliverianum, *DC. Syst.* i. 341.—Assyria,
olopetalum, *Boiss. in Ann.Sc. Nat.* Sir. II. xvi. (1841) 364.—Persia,
orientale, *J. Gay, in Desm. Catal. Dord.* 12.—Europ.; Oriens.
orientale, Lose in Trat. PI. Arag. ii. 10-Loscosii.
ornatum, Bouehe, in Bot. Zeit. i. (1843) 26 = orientale.
palmatifidum, *DC. Syst.* i. 358.—Sibiria.
palmatum, *Radde, in Beitr. Kenntn. Russ. Reich.* xxiii. 281.—Sibir. baical.
paniculatum, Host, Fl. Austr. il 65 =D. Consolida.
paradoxum, *Bunge, in Arbeit. Nat. Ver. Riga,i.* (1847) 124.—Turkestan,
parviflorum, *Tung, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 75.-Slbiria.
patens, Benth. PI. Hartw. 296-decorum.
patens, New berry, in Pacif. Rail. Rep. vi. 65 = Menziesii.
pauciflorum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 196 = Ajacis.
pauciflorum, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. Bor. Am. i. 38, 661-Menziesii.
pauciflorum, Reichb. ex Schlecht. in Linnaea, vi. (1881) 58'2=Chamissonis.
pauciflorum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 55—denudatum.
pedatisectuin, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 18.—Mexic.
penicillatum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvi. (1841) 869.—Arabia.
penicillatum, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. 48-uncinatum.
pentagynum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 18 = nevadense.
pentagynum, *Lam. Encyc.* ii. 264.—Lnsitan.; Afr. bor.
peregrinum, Delile, Fl. Acg. Illustr. 65= nanum.
peregrinum, Lam. Encyc ii. 264=halteratum.
peregrinum, *Linn. Sp. PI.* 531.—Europ. austr.; Oriens.

DELPHINIUM:—

persicum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvi. (1841) 862.—As. Min.; Persia,
phrygium, *Boiss. 1. c.* 363.—As. Min.
pictum, Willd. Enum. Hort. Berol. 574-Requienii.
plenum, *Medic. Beob.* (1788) 87.—Hab. »
Poltaratzkii, *Rupr. Sert. Tiansch.* 87.—As. centr.
pseudoperegrinum, *Fisch. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. lift, nomen.—Sibiria.
pubescens, *DC. Fl. Fr.* v. 641.—Gallia.
pubescens, Griseb. Spicil. FL Rumel. i. 319-Ajacis. ,
pubescens, Henning, in Mlm. Soc Nat Mosc. vi. (1823)73, 89=divaricata.
pubescens, Lose in Trat. PI. Arag. ii. 10-Loscosii.
pubiflorum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 73.—Sibir. baical.
pulchrum x, Van Houtte, Fl. des Series, xvU. (1867-68) 167.
puniceum, Pall. Reise, iii. 736=hybridnm.
pusillum, *Labill. lc. PL Syr. Dec.* iv. 6.—Syria.
pygmaeum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 458-pusillum.
Pylzowi, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) 307—China.
pyramidale, Royle, Illustr. Bot. Himal. 56-elatum.
pyrenaicum, Pourr. ex DC. Syst. i. 861«montanum.
ramosissimum, Stev. exLedeb. FL Ross. i. 69-diraricatum.
ranunculifolium, Wall. Cat n. 4716—elatum.
Raveyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 66.—As. Min.
rectivenium, Royle, Illustr. Bot. Himal. 56 = vestitum-Requienii, *DC. Fl. Fr,* v. 642.—Reg. Mediterr.
revolutum, *Desf. Tabl.* ed. II. 148.—Hab.?
rigidum, *DC. Syst. i.* 844.—Syria,
rugnlosum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sel. II. xvi. (1841) 361.—Persia; Turcoman
saniculaefolium, *Boiss. Diagn. Set. 1.* vi. 6.—Persia! Afghanist.
Sarcophyllum, Hook. *Sc* Am. Bot Beech. Voy. 317 nndicaule.
Savatieri, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 330.—China,
scabriflorum, *D. Don, in Mem. Went. Soc.* iii. (1821) 412*—Nepal,
scaposum, *Greene, in Coult. Bot. Gat.* vi. (1881) - N . Mexic.
sclerocladum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 8 = anthoroideum.
scopulorum, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 9.—N. Mexic.
segetum, Lam. Fl. Fr. iii. 825 = D. Consolida.
semibarbatum, *Bien. ex Boiss. Fl. Orient, i-* Persia,
simplex, *Dougt. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 25.—A»- bor. occ
simplex, A. Gray, PI. Wright, ii. 8=azureum.
simplex, Salisb. Prod. 875=Ajacis.
sinense, Fisch. ex Link, Enum. Hort Berol. U- grandiflorum.
sparsiflorum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* (1877) 307.—China,
speciosum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 12.—Reg. Caucas., Persia.
speciosum, Janka, ex Nym. Consp. 20-elatum.
spurium, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. U. speciosum.
Staphisagria, *Linn. Sp. PI.* 581.—Reg. Mediterr.
staphydium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, (1880) 124 = seq.
stenosepalum, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* » (1864) II. 278.—Kamtschatka.
Stocksianum, *Boiss. Diagn.* Ser. IL i. *li*— chistan.
sulcatum, *Reichb. ex Hoffmgg. VerB. Pfl. Nachtr-* 132, nomen.—Hab. ?
sulphureum, *Boiss. fa* Haussk. ex Boiss. Fl. One*-* 81.—Syria.
sylvaticum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* Algeria.
sylvaticum, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xv. (" 74=cheilanthum.
Szowitsianum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 89.—Reg. fr
tauricum, Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. **hybridum.**
teheranicum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 85.—Persia.
tenuissimnm, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* Graecia.
thirkeanum, *Boiss. Fl. Orient, i.* 84.—As. Mm.
tiroliense, *Kern, ex Dalla Tom, Atl. Alpenfl-* Tirol.

DELPHINIUM :-
tomentosnm, *Auck. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvi. (1841) 385, partim.—Persia.
tomentosum, Boiss. 1. c. pro parte = oliganthnm.
tribracteolatum, *DC. Syst.* i. 850.—Afr. bor.
tricolor, *Bernh. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 489, nomen. —Oriens.
tricome, *Michx. Fl. Bar. Am.* i. 314.—Am. bor.
tridoctylum, Michx. 1. c. =• exaltatum.
tngonelloides, *Boiss. in Ann. Sc. Not. Sir.* II. xvi (1841) 866.—Persia.
Mgynum, Schott, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ni. 970—peregrinum.
tnste, *Fisch. ex DC. Syst.* i. 862.—Davnria; Sibir.
trolliifolium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 276.—Am. bor. occ.
tnberosum, *Auch. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvi. (1841) 870.—Persia,
iliginosnm, *Curran, in Bull. Calif. Acad.* i. III. (1885) 161.—Calif,
uncinatum, *Hook./.* 6* *Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 24. —Reg. Himal.
urçeolatum, Jacq. Coll. i. IBS=exaltatum.
vanegatum, *Torr. (S Gray, Fl. N. Am.* i. 82.—Am. bor. occ.
velntinum, *Bertol. Excerpt.* 12.—Italia.
ivlutinum, Schur, Enum. PI. Transs. 29=fissum.
venulosum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 86.—Cappadocia.
verdunense, Balb. Cat: Hort. Taur. 31-cardiopetalum.
"oorsicolor, Salisb. Prod. 375=D. Consolida.
«"*.«/««, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 18-uncinatum.
vestitum, *Wall. Cat.* n. 4715.-Reg. Himal.
•*otllosum,* Stev. ex DC. Prod. i. 55=elatum.
•*mmineum,* D. Don, in Sweet, Brit Flow. Gard. Ser. II. .'• »74=azureum.
rescens, Nutt. Gen. Am. ii. 14=azurenm.
""jorufl„ Jacq. f. ex Spreng. Syst. ii. 617=grandinorum.
e«tum, *p„i-. Encyc. Suppl.* ii. 458.—Syria,
viscosnm, *Hook. /. V Thorns. Fl. Ind.* 62.—Reg. Himal.
tifolinm, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 489.—
W-Sil Zeni, E»gelm. *in Wisli*. Tour North Mexico,* 106.-Mexic.bor.

DELTOCARPUS, L'Hérit. ex DC. Syst. ii. 578 (1821) =-Myagruxn, Tourn. (Crncifer.).

'iELUCIA, DC. Prod. v. 688 (1886) = BWens, Linn. (Compos.).
oarnthtoides, *DC. I.* e.=B. ostruthioides.

DEf?£f ?opHYIiIiTTM, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. ul 7*- *ZYGOPHYLLEAE.*
isoloides, *Griseb. I.* c—Reg. Argent.

DEMAZERIA, Dnm. Comm. Bot. 26 (1822). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1194.
» «.» muii, Link, Hort. Berol. i. 159 (1827).
cal Wlana, *milk, in Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* i. 11 Z-~~Hispan,
lol acca, *Nym. Syll* <26.—Ins. Balear.
obiitera. tomsJ. *Bot. Voy. Challenger,* I. II. 90.—Ins. Helena.
si cnla. *Dum. Comm. Bot.* 27.—Enrop.

DEMETRIA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 30 (1816) = Grindelia, Wild - (Compos.).
glutinosa, * G. L 6 =G- glutinosa.
spathulata, Lag. 1. c.=G. inuloides.

DEMIDIUM, Dc Prod. * 246 (1887). *COMPOSITAE, Bmi * Hook P* 000 -
filagineum, DC. I. c.* 247.-Madag.

DEMII [AlE)ennst- Schluess, Hort. **Malab. 81 (1818)** =o!2F «- »od»!"??"*. Roxi>. (Rhizoph.).
nosa> ^nst .1. c. ^C. inligemma.

DEMI [A **(1791) =** Dierth F- Gmel- syst- 4S8 repen7 ?^*> Forst- (Convoly.).
*. J. F. Gmel. 1. c.=Dich. repens.

DEM h, Hoffm. Hort. Mosq. (1808) **Introd.** fol. ..., Linn.
po praylia, Hoffm. l. c. = p. incompleta.

DEMIDOVIA, Pall. Hort. Demid. 150. t. 1 (1781) = Tetragonia, Linn. (Ficoid.).
tetragonoides, Pall. L c.=T. expanse.

DEMOCBITA, Veil. FL Flnm. 176 (1826). *{INCERT. SED.)*
resinoaa, *Veil. I. c.* 177; w. 1.106.—Bras.

DEMOCRITEA, DC. Prod. iv. 640 (1830) = Berissa, Comm. (Rubiac).
serissoides, DC. 1. t = S. Democritea.

DENCKEA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 852-Oentiana, Tonm.
crinita, Rafin. 1. c.=G. crinita.

DENDRAGROSTIS, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 487 = Chusquea, Kunth (Gramin.).
anelythra, Nees, 1. c. 491=C. anelythra.
pinifolia, Nees, 1. c. 490 = C. pinifolia.
tenella, Nees, 1. c. 492 = C. tenella.

DENDRANTHEMA, Des Moul. in Actes Soc. Linn. Bord. xx. (1855; 561=Chry8antbemum, Tourn. (Compos.).
indicum, Des Monl. 1. c. 562 = C. indicum.
parthenioides, Des Monl. 1. c. 661-Anthemis parthenioides.
Parthenium, Des Moul. 1. c.-C. Parthenium.
sinensis, Des Moul. 1. c. 562 = C. sinense.

DENDREMA, Rafin. Sylva Tellur. l4 (1888) = Corypha, linn. (Palm.).

DENDRIUM, Desv. Joum. Bot. i. (1813) 36-Leiophyllum, Hedw. f. (Ericac).
buxifolium, Desv. 1. c.-L. buxifolium.

DENDHOBIUM, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 82. *ORCH1DEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 498.
ACLINIA, Griff. Notul. iii. 820 (1851).
APORUM, Blume, Bijdr. 334 (1825).
BOI.BIDIUM, Lindl. Veg. Kingd. 181 (1847).
CADETIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 422 (1826).
CALCATRIPPA, Heist. Syst. 8 (1748).
CALLISTA, Lour. Fl. Cochinch. 519 (1790).
CERAIA, Lour. 1. c. 518 (1790).
COELAHDRIA, Fitzg. Austral. Orch. i. VII. t. 2 (1882).
DBSMOTRICHDM, Blnme, Bijdr. 329 (1825).
DICHOPUS. Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 176 (1856).
DITULIMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 41 (1886).
ENDEISA, Rafin. 1. c. ii. 61 (1886).
FROSCULA, Rafin. 1. c. iv. 44 (1836).
GRASTIDIUM, Blume, Bijdr. 838 (1826).
KERANTHUS, Lour, ex Endl. Gen. 198, in syn. (1886).
LATOURIA, Blume, Rnmphia, iv. 41. t. 196, 199 (1850).
MACROSTOMIUM, Blume, Bijdr. 835 (1825).
ONYCHIUM, Blume, I. c 328 (1825).
ORMOSTEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 38 (1836).
OXYSTOPHYLLVM, Blume, Bijdr. 885 (1825).
PEDILONUM, Blnme, 1. c. 820 (1825).
PIERARDIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 41 (1836).
SARCOPODIUM, Lindl. in Paxt. Flow. Gard.L (I860) 154.
SARCOSTOMA, Blume, Bijdr. 839 (1825).
SCANDEDERIS, Thou. Orch. lies Afr. tabl. iii. (1822).
SCRISMOCEKAS, Presl, Rel. Haenk. i. 96. t. 18 (1827).
STACHYOBIUM, Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 786.
THELYCHITON, Endl. Prod. Fl. Norf. 32 (188S).
THIGUANIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 47 (1836).
TROPILIS. Rafin. 1. c. ii. 96 (1836).
acerosum, Lindl. Bot. Reg. (1841) *Misc.* 48.—Burma; Malaya.
Achillis, Reichb. f. Otia Bot Hamb. 55=calcararum.
adculare, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 81.—Malaya,
acinaciforme, *Roxb. Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii 487. —Reg. Himal.
Aclinia, Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (1869) 9 - incurvnin.
Aclinia, Reichb. *i.* in Bonplandia, iv. (1866) 329 = D. Psendadinia.

DENDBOBnJM :—
acrobaticum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1871) 802.—Burma.
acuminatissimum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 86.—Java.
acuminatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 857 •= PleurothalUs acuminata.
Adae, *F. If. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* i (1884) 149.—Austral.
aduncnm, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 68; (1846) t. 15.-Reg. Himal.
aemulum, *R. Br. Prod.* 388.—Austral,
affine, *Steud. Norn.* ed. II. i. 489; *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 64.— Ins. Timor.
aggregatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 858 =. Maxillaria aggregate, *Lindl.*
aggregatum, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 477.— Burma.
agrostophyllum, *F. Muell. Fragm.* viii. 28.—Austral.
Ainsworthii x, T. Moore, in Gard. Chron. (1874) I. 443.
alatum, Pen. Syn. ii. 624—Maxillaria alata.
albidulum, Thw. ex Trimen, in Joum. Bot. xxiii. (1885) 248 = D. Diodon.
albosanguineum, *Lindl.* b* *Paxt. Flo*. Gard.* ii. (1851-62) 93.—Burma.
album, Hook. Exot. Fl. t. 142- Maxillaria alba.
album, Wight, Ic. t. 1645=aqueum.
algosum, Keinw. ex Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 42, nomen (Taeniophylli sp.).—Java.
alolfolium, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 279 = D. Serra.
aloideum, *La Llove* b* *Lex. Nov. Veg. Desc.fasc.* ii. *{Orch. Opusc.)* 48.—Mexic.
alpestre, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 370.—Reg. Himal.
alpestre, Sw. in Nov. Act. Nat. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 84-Pleurothallis alpestris.
amblyomidis, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1878) I. 832. —N. Guin.
amboinense, *Hook. Bot. Mag.* t. 4987—Ins. Amboin.
amethystoglossum, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1872) 109.—Ins. Philipp.
amoenum, *Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 78.— Reg. Himal.
amplum, *Lindl. in Wall. Cat. n.* 2001.—Reg. Himal.
anceps, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1800) 246. —Ind. or.; Burma.
Andersonii, J. Scott, in Joum. Agr. Hort. Soc. Ind. N. S. iii. (1872) 117=draconU.
angulatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 76 ^ homonymum.
angulatum, *Wall. Cat.* n. 2010.—Burma,
angustifolium, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 76.—Java,
annuligernm, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1871) 675.— ' Marisa.'
anosmum, Lindl. Bot. Reg. (1846) Misc. 32 = snperbum.
Antelope, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) I. 656.— Ins. Molncc.
antennatum^ *Lindl. in Hook. Lond. Joum. Bot.* ii. (1843) 286.-N. Guinea.
Aphrodite, *Reichb. /. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 246.— Burma.
aphyllum, Roxb. Hort Beng. 63, nomen; et ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 78 = amoenum.
appendiculatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 76.—Java,
aqueum, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 6.—Ind. or.
Arachnites, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1874) II. 854. —Burma.
Arachnites, Thon. Orch. lies Afr. t 88 = Aëranthes Arachnitis,
arachnostachyum, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1877) I. 334.—N. Guinea,
articnlatum, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 42, nomen.—Sumatra,
asphale, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1874) II. 644. —Hab.!
atractodes, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 128.— Siam.
atropurpnreum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 644.—Burma; Ins. Malaya.
atrosanguineum, E. Morr. & De Vos, Ind. Bibliog. Hort-Belg. 166, sphalm. = albosanguineum.
attenuatum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 17. —Borneo.
aurantiacum, F. Mndl. Fragm. vii. 98 = Bulbophyllum aurantiacum.
aureum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 77=heterocarpnm.
auriferum, *Lindl. I. c.* 88.—China.

DENDBOBIUM :—
auroroscum, *Reichb.f. in Bonplandia,* v. (1857) 56'—Java.
Baileyi, *F. Muell. Fragm.* viii. 173.—Austral.
Bainlianum, *F. M. Bailey, Suppl. Syn. Queensl. Fl.* (1884),/<fc *F. Muell. Census, App.* ii. 8.—Austral,
bambusaefolium, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 149.—Burma.
barbatulum, Baton, in Bot. Mag. t 5444 - Fytcheanum.
barbatnlum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 2018.—Ind. or.
barbatulum, Wight, Ic. iii. t. 910=chlorops.
Banringtoniae, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 82 - Lycaste Barringtoniae.
Beckleri, F. Muell. Fragm. v. 95 = Mortii.
Bensoniae, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* xxv. (1867) 280.—Burma,
bicameratum, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 59.—Reg. Himal.
bicaudatum, *Reinw. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 20.—Java.
tricolor, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 90 -Eria Lindleyi.
bicolor, Pers. Syn. ii. 524 = Maxillaria bicolor.
bifalce, *Lindl. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 287—N. Guinea.
biferium, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 2002.—Malaya.
bifiorum, A. Rich. Ess. Fl. N. Zel. 167 = Conning. hamii.
bifiorum, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 84.—Ins. Societ.
bigibbum, *Lindl. in Paxt. Flaw. Card,* iii (1862) 25. f. 245.—Austral,
bilobum, *LindL in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 286.—N. Guinea.
Binnendijkii, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 74.—Java,
binocnlare, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 786.—Ind. or.
Blumii, *Lindl. Gen. etSp. Orch.* 88.—Java.
Bolbophylli, Griff. It. Notes, 65 = Bnlbophyllnm Grifhthii.
Boothii, *Teijsm. b" Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 318.—Java,
bostrychodes, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1880) II. 748.—Borneo.
Bowmannii, *Benth. Fl. Austral,* vi. 286.—Austral.
Boxallii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1874) I. 315 = gratiosissimum.
braccatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 75 = Eria braccata.
brachycarpum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 282.—Abyss,
brachypetalum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc* iii. (1859) 6.—Java,
brachypus, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 42.—Ins. Norfolk,
bracteatum, *La Llave V Lex. Nov. Veg. Desc.fasc.* ii. *(Orch. Opusc.)* 48.—Mexic
breviflorum, Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 14 = bicameratum.
brevifolium, Hort. ex Lindl. 1. c. 12=pulchellum.
brisbanense, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 299 = gracilicaule.
Brymerianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1876) II. 323.—Burma.
Bullenianum, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 214__ Ins. Philipp.
Bullerianum, Batem. in Bot. Mag. t. 5662 = gratiosissimum.
Burbidgei, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) II. 300.—Ins. Sondiac.
bursigerum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 16.—Ins. Philipp.
calamiforme, Lodd. ex LindL Bot. Reg. (1841) Misc. 9 = teretifolium.
calcaratum, LindL 1. c. (1840) Misc. 89 = conostalyx.
calcaratum, *A. Rich. Serf. Astrol.* 18. t 7.—Ins. Vanilcoro.
Calceolaria, *Carey, ex Hook. Exot. Fl.* 184.—Reg. Himal.
cakeolum, Roxb. Hort Beng. 68; Fl. Ind. iii. 488 = Roxburghii.
Caleyi, *A. Cunn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 377.—Austral. ?
calophyllum, *Reichb f. Xenia Orch.* ii. 167.—Malaya,
calopogon, *Reichb.f. I. c.* 23.—Malaya.
Camaridiorum, *Reichb.f. in Linnaea,* xlL (1877) 89.—N. Caled.

DENDBOBITJM :—
cambridgeanum, Paxt. Mag. Bot. vi (1839) 266 = ochreatum.
canaliculatum, *R. Br. Prod.* 333.—Austral,
candidum, *Wall, ex Lindl. in Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 86.—Reg. Himal.
capillipes, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1867) 997.—Burma.
carinatum, *Willd. Sp. PI.* iv. 133.—Ins. Luzon,
carinifernm, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 611.—Reg. Himal.
camosum, *Presl, Rel. Haenk.* i. 102.—Peruv.
carnosum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 280 = atropurpureum.
carnosum, *Teijsm.* 6" *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1853) 489.—Java.
cassythoides, A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg. sub 1.1828 = Galeola cassythoides.
castum, Batem. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1868) 943=moniliforme.
catenatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch,* 84.—Japon.
catillare, *Reichb.f. in Seem. Fl. Vit.* 304.—Ins. Fiji,
caudatum, *Teijsm.* b* *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 316.—Sumatra.
Ceraia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 89.—China ; Cochinch.
ceraula, *Reichb.f. in Linnaea,* xli. (1877) 40.—Ins. Philipp.
cerinum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1879) II. 654.—Malaya.
Chalmersii, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* ii. (1882) 96.—N. Guinea.
chlorops, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 44.—Ind. or.
chloropterum, *Reichb. f. if S. Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878)187.—Hab.?
Christyanum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) I. 178.—Siam.
chrysanthum, *Wall. Cat.* n. 2012.—Reg. Himal.
chrysocrepis, *Par. (f Reichb. f. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 6007.—Burma.
chrysotis, Reichb. f. in Gard. Chron. (1870) 1311-Hookerianum.
chrysotoxum, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t 19.—Burma,
ciliatum, *Parish, ex Hook. Bot. Mag.* t 6480.—Burma.
ciliatum, Pen. Syn. ii. 623 = Maxillaria ciliata.
cincinnatnm, *F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Queensl.* i. (1884) 118.—N. Guinea,
cinnabarinum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1880) II. 166.—Borneo.
clavatum, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 481 = densiilonim.
clavatum, *Wall. Cat.* n. 2004.—Reg. Himal.
Closterium, *Reichb.f. in Linnaea,* xli. (1877) 92.—N. Caled.
Cobbianum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1881) II. 780.—Hab. ?
Coelogyne, *Reichb.f. I. c.* (1871) 186.—Burma.
coerulescens, Wall, ex Lindl. Sert. Orch. t. 18 = nobile.
comalum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 76.—Java,
complanatum, *A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 34.—Austral.
compressum, LindL Bot. Reg. (1842) Misc. 63-lamellatum.
concinnum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 644.—Malaya,
connatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 89.—Java,
conostalix, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 292.—Malaya.
convexum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 76.—Java.
cerniculatum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 88=Pleurothalliscomiculata.
crassinode, Benson & Reichb. f. in Gard. Chron. (1869) 164 ; et in Flora, Iii. (1869) 73 = pendulum,
crassulaefolium, *A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 83.—Austral.
crepidatum, *Griff. Notul.* iii. 319 (sp. dub.).—Ind. or.
crepidatum, *Lindl. if Paxt. Flow. Card.* i. (1850-51) 63.—Ind. or.
cretaceum, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) L 62.—Reg. Himal.
criniferum, *Lindl. I. c.* (1844) *Misc.* 41.—N. Guinea,
crispatum, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 84.—Ins. Societ.
crispum, Dalz. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 111 = microbulbon.
cruentum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) I. 604.—Malaya.

DENDBOBITTM:—
crumenatum, *Sw. in Schrad. Journ.* ii. (1799) 237.—Ind. or.; China; Malaya.
crystaUinum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1868) 572.—Reg. Himal.; Burma.
cucullatum, R. Br. in Lindl. Bot. Reg. t. 548 = Pierardi.
cucumerinum, *W. McLeay, in Lindl. I. c.* (1842) *Misc.* 58.—Austral.
cultriforme, Thou. Orch. Isles Afr. t 87=Polystachya cultrata.
cumulatum, *Lindl. in Gard. Chron.* (1855) 756.—Burma.
Cunninghami, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1756.—N. ZeL
Cunninghami, Steud. Norn. ed. II. i. 490=Caleyi.
cupreum, Herb, ex Lindl. Bot. Reg. t 1779 = D-Calceolaria.
Curtisii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) H. 102.—Borneo.
cuspidatum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 4" Nathanielis.
cuspidatum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 2015.—Burma,
cymbidioides, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 77.—Java,
dactyliferum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1844) I. 638.—Hab. ?
dactylodes, *Reichb. f. in Journ. Bot.* xv. (1877) 182-—Ins. Samoa.
D'Albertisii, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1878) I. 366.—N. Guinea.
Dalnousieanum, Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 145" pulchellum.
DalBelli, Hook. Kew Journ. iv. (1852) 292 = Eria Dalzelli.
Dayanum, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp-* ed. III. *Nov. App.* 234, nomen.—Ins. Philipp.
Dearei, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 361.—Ins. Philipp.
demissum, fa. Don, Prod. Fl. Nep. 34-Panisea parviflora.
densiflorum, *Wall. Cat.* n. 2000.—Reg. Himal.
denudans, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 34.—Reg. Himal.
Deplanchei, *Reichb.f. in Linnaea,* xli. (1877) 90.—N-Caled.
Devonianum, *Paxt. Mag. Bot.* vii. (1840) 169.—R«K-Himal.
dicuphum, *F. Muell. Fragm.* viii. 28.—Austral.
Diodon, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 89.—Zeylan.
discolor, Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 52, Misc. 21* undulatum.
distachyon, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (185'J) —Borneo,
distichum, *Reichb.f. in Linnaea,* xli. (1877) »•—»»*• Philipp.
dixanthum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1865) 674.—Burma.
Dominyanumx, Reichb. f. 1. c. (1878) I. 202.
Draconis, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 214-^ Burma.
eburneum, Reichb. f. ex Batem. in Bot. Mag. t. 64a> = Draoonis.
Egertoniae, Lindl. Bot Reg. (1847) sub t » amoenum.
elegans, H. B. Sc K. Nov. Gen. et Sp. i. 858* Pleurothallis elegans.
elongatum, A. Cunn. in Lindl. Bot Reg. (1839) Mw-33= gracilicaule.
elongatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 77.—JavB.
eriaeflorum, *Griff. Notul.* iii. 316.—Reg. Himal.
erosum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 86.—Java,
erythropogon, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1885) 198.—Ins. Sondaic.
erythroxanthum, *Reichb. f. I. c.* (1874) II. 162.—* Philipp.
esuriens, *Reichb. f. in Hamb. Garten**, xvi. (1860) w—Java.
eulophotum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 5. —Burma; Java.
euosmumx, Reichb. f. in Gard. Chron. (1880; 174.
euphlebium, *Reichb.f. ex Lindl. in Journ. Linn-* * iii. (1859) 7.—Java.
excavatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 644.—J»va-
excisum, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. bifarium.
exiguum, F. Mnell. Fragm. v. 95=BulbopBy'' exiguum.

DENDROBIUM :—
exsculptum, *Teijsm. (f Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 316.—Java.
extinctorium, Lindl. Bot. Reg. sub t 1756 - Eria extinctoria.
Fair/axii, F. Mnell. in Sydney Mail, Sept. 21 (1872) 360; ex Benth. Fl. Austral, vi. 285 =teretifolium.
falconstre, Fiug. Austral. Orch. i. V. t. 4 = seq.
Jalconeri, *Hook. Bot. Mag.* t. 4944.—Reg. Himal.
falcorostrum, *Fitzg. in Sydney Morning Herald,* Nov. 18 (1876) J *Fittg. Austral. Orch.* i. V. (1879) t. 4. —Austral.
Farmerii, *Paxt. Mag. Bot.* xv. (1849) 241.—Reg. Himal.
Fellowsii, *F. Muell. Fragm.* vii. 63__Austral.
/fox, Hassk. Retzia, i. l^macrophyllum.
Mforme, Wight, Ic. t. 1642 = Eria Dalzelli.
fililobum, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* 1L (1882) 97.—Ins. Samoa.
fimbriatum, Dalz. in Hook. Kew Journ. iv. (J852) 292 c = Eria Dalzelli.
fjmbriatum, *Hook. Exot. Fl.* t. 71.—Reg. Himal.
jmbriatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 76=pHcatile.
'mdleyanum, *Par.* to" *Seickb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 149.—Burma,
nnnum, *Steud. Nam.* ed. II. i. 490.—Java.
Fuzgeraldi, *F. Muell. in Melb. Chemist,* Qnne 1884). —Austral.
Flabellum, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 56 = Macraei.
navescens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 85.-Java,
flavum, *Roxb. Hort. Beng.* 63, nomen.—Ind. or.
flexuosum, Griff. Notul. iii. 317-longicomu.
flonbundum, *D. Don, Prod. Fl. Neb.* 84.—Nepal,
"onbundum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1876) II. 772. —N. Hebrid.
'odichei, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 23O.-AustraL
KMbtom, *Bronigh. in Duperr. Voy. Cog. Bot.* 203. t. 41.—Ins. Amboin.
•ormosum, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 485.— fogeg. Himal.
[illegible] Ind. or.
nuuforme, *Blume, Rumphia,* iv. 40.—N. Guinea,
nircatam, *Rein-a. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 13,-Ins. Celebes.
fiucatum, Lindl. 1. c. 8 = Gibsoni.
"Keescens, *Griff. Notul.* iii. 808.—Reg. Himal.
"scum, *Fitzg. in Gard. Chron.* (1879) II. 680.— fusiAustTal.
V^Sl [illegible] *y> in Proc. Linn. Soc. N. S. W.* (1878) 277—Austral.
fnforme, Thou. Oreh. Isles Afr. t 88 = Polystachya tusiformis.
Fytc hianum, *Batem in Gard. Chron.* (1864) 100.—~ Burma.
"(2C"", Sw in Sellnd N «>es Journ. i. (1805) 98 = Bulbophyiiun, galeatum.
gemellum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 81.-Java.
& . atu> *Lindl.* '• c ".-Java.
ol,» *i. A; Paxt Ma e Bot T* (1888) 169.—Reg. Himal.
Bl[illegible]Mucophyllun, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl.* XXIV (1862) 8"—Java.
ri[illegible]«cum Amboin *Teijsm ** Binn Cat Hort Bo* 481 Ins
glo *ti Reicht f Otia so* #<"«• 55.—Ins. Tahiti,
"owmchii, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* (Jan. 1883).-Ins. Solomon.
Goldiei, [illegible] *Gari Ciuoc* (1878) i. 652 = superbiens.
Gordoni, *S. Woore< in 7ourn Linn. Soc.* xx. (1883) 372.—Ins. Fiji.
Gouldii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (188?) 901.—Ins. Pacif.
gracile, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 91.—Java.
gracilicaule, *F. Mueil. Fragm.* i. 179.—Ins. Dom. Howe.
graminifolium, *Wight, Ic.* t. 1649.-Ind. or.
graminifolium Octomeria graminifolia.
grandiflorum, H B & K Nov. Gen. et Sp. *I* 359. t. 88 = Maxillaria grandiflora.
grandiflorum, *H**"- Gen. et Sp. Orch.* 77-Java.
grandiflorum, Reinw « "»*• FoL Orch. Sarc.* 4 = Bulbophyllum Rawkwir til.
gratiosissimum, *Reichb. f. in Bo Zeii* xxiii. (1865) 99. —Burma.

DENDBOBIUM :—
GrifBthianum, *Lindl. Bot. Reg.* snb t. 1756.—Burma.
Guiberti, Can. in Rev. Hortic (1876) 431-Griffithianum.
haemoglossum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 429.—Ind. or.
Haenkeanum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 490.—Ins. Philipp.
Hanburyanum, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 329=lituiflorum.
Harrismiae, Hook. Exot. Fl. t. 120-Maxillaria Harrisoniae.
Harveyanum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) I. 624. —Burma.
Hasseltii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 87.—Java.
Hasseltii, *Reichb.J. Xenia Orch.* ii. 28.—Java?
hastatum, Pers. Syn. ii. 524 = Maxillaria hastata.
Hedyosmum, Batem. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 5515 = scabrilingue.
Henshalli, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 226 = transparent
heibaceum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 69.— Ind. or.
heterocarpnm, *Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 78. —Reg. Himal.
heteroideum, *Blume, Rumphia,* iv. 40.—N. Guinea,
heterostigma, *Reichb. f. in Hamb. Garten*,* xv. (1859) 51.—Java.
Hexadesmia, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1869) 710.— Hab.1
Heyneanum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1995.—Ind. or.
Hillii, Hook. Bot. Mag. t. 5261 = speciosnm.
Hillii, F. Muell. Fragm. i. 88 = Sareochilus Hillii.
hirsutum, Griff. Notul. iii. 818-longicomu.
hispidum, *A. Rich. Sert. Astrol.* 18.—Ins. Vanikoro.
homonymum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 490.—Java.
Hookerianum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 8.—Reg. Himal.
Homei, *S. Moore, 1. c.* xx. (1883) 378.—Ins. Fiji.
Hughii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) I. 764.— Singapore.
humile, Sm. in Rees, Cyclop, xi. n. 4=Coelogyne humilis.
humile, Wight, Ic. t. 1643 «= microbolbon.
Huttoni, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1869) 686.—Ins. Malaya,
hymenanthum, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 222.—Ins. Philipp.
Hymenophyllum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 86.—Java,
incrassatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 631.—Java,
incurvum, *Lindl. in Jaurn. Linn. Soc.* iii. (1859) 18. —Ind. or.
indivisum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 680.—Malaya,
inflexum, *Teijsm.* V *Binn. Cat. Hort. Bog.* 48, nomen. —Java.
Infundibnlum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 16.—Burma,
insigne, *Reichb. /. ex Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 640.—N. Guinea.
insulare, Steud. Norn. ed. II. ii. 489-plicatile.
intermedium, *Teijsm.* &" *Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1858) 490.—Java,
involutum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 15. —Ins. Societ.
ionopus, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1882) II. 808.— Burma.
Jamesiannm, *Reichb./. I. c.* (1869) 554.—Ind. or.
japonicum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 89 = moniliforme.
javanicum, Korth. ex Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 46 = Plocoglottis acnminata.
javanicum, Miq. Fl. Ind. Bat iii. 644 «=D. Sarcostoma.
javanicum, *Sw. in Schrad. Neues Journ. i.* I. (1805) 96.—Java.
Jenkinsi, Lindl. in Joura. Linn. Soc. iii. (1859) 4, Iapsu = parciflorum.
Jenkinsii, Wall, in Bot. Reg. (1839) t 37=aggregatum.
Jerdonianum, *Wight, Ic.* 1.1644.—Ind. or.
Jocosum, *Reichb. f. in Linnata,* xli. (1877) 91.—N. Caled.
Johannis, *Reickb.f. in Gard. Chron.* (1865) 890.— Anstral.
Johnsoniae, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* iL (1882) 95.—N. Gninea.
junceum, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 9.—Malaya.
Keffordii, *F. M. Bailey, in Proc. R. Soc. Queens!,* i. (1884) 11.—Anstral.

DENDBOBItTM :—
Kingianum, *Bidmill, ex Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 11.—Austral.
Kohlmeyerianum, *Teijsm. tf Binn. ex Miq. Choix, PI. Jard. Buitenl.* t. 24. f. 1.—Java.
Kuhlii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 87.—Java,
labuanum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 6. —Borneo,
lamellatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 89.—Burma; Ins. Malay,
lamorganense, *Reichb./. in Bonplandia,* v. (1857) 50. —Java.
Lanceola, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 83; et 11. Ind. Oca iii. 1639 - Pleurothallis Lanceola.
lanceolatum, *Caudich. in Freyc. Voy. Bot.* 423.—Ins. Molucc.
lancifolium, *A. Rich. Sert. Astrol.* 20. t. 8.—Ins. Molucc.
lasioglossum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1868) 682. —Burma.
latifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 860 = Maxillaria latifolia.
Lawanum, Lindl. in Journ. Linn. Soc iii. (1859) 10 = crepidatum.
Lawesii, *F. Muell. in Melb. Chemist* (June 1884). —N. Guinea.
laxum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 84 =Pleurothallis laxa, Stelis alba.
Leechianumx, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) I. 256.
Leonis, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 280.—Malaya.
leopardinum, Wall. Tent Fl. Nep. 39. t. 28 = Bulbophyllum leopardinum.
Lessonii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 326.—N. Zel.
leucochlorum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1879) 1.202. —Burma,
leucolophotum, *Reichb./. I. c.* (1882) II. 552.—Archip. Mai.
Lichenastrum, F. Mnell. Fragm. vii. 60 «> Bulbophyllum Lichenastrum.
ligulatum, Pers. Syn. ii. 524 - Maxillaria ligulata.
lilacinum, *Teijsm. tf Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 18.—Java.
Linawianum, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 284.— China; Japon.
Lindleyanum, Griff. Notul. iii. S09 = nobile.
Lindleyi, Steud. Nom. ed. II. i. 490 = aggregatum.
linearifolium, *Teijsm. (f Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 318.—Sumatra,
lineatum, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 43, nomen. —Java,
linguaeforme, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 247.—Austral.; Ins. Pacif.
Linguella, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1882) II. 552.— Ins. Malay.
linguiforme, Sm. Exot. Bot. i. 19. t. ll-=linguaeforme.
Ktuiftomm.Lindl.in Gard.Chron. (1856) 372.—Burma,
lividum, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 48, nomen. —Siam.
lobatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 631.—Java.
Lobbii, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 8.— Borneo.
Lobbii, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. v. (1853) 491 =Teysmanni.
longicolle, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 74.—Malaya,
longicornu, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1997.—Reg. Himal.
longi/olium, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 360 = Maxillaria longifolia.
longipetalum, Pers. Syn. ii. 628 = Maxillaria longipetala.
Lowii, *Lindl. in Gard. Chron.* (1861) 1046.—Borneo.
Lnbbersianum, *Reichb./1. c.* (1882) I. 460.—Burma,
lucens, *Reichb. /. in Bot. Zeit.* xxi. (1863) 128— Borneo,
lunatum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1659) 4__ Ins. Philipp.
luteolum, *Batem. in Gard. Chron.* (1884') 269.—Burma,
luzonense, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 64.—Ins. Philipp.
lycopodioides, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 13.—Borneo.
MacCarthiae, *[Thw. in] Bot. Mag.* 14886.—Zeylan.
Macfarlanei.F. *Muell. Papuan PI.* i. 29.—N. Guinea.
Mac/arlanei, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) II. 520 —Johnsoniae.
Macraei, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 75.—Ind. or.; Ins. Malay.

DENDROBIUM: :—

macranthum, De Vriese, ex Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 59 = Eria elongata?
macranthum, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 642=superbum.
macranthum, *A. Rich. Serf. Astrol.* 15. t 6.—Ins. Solomon.
macrophyllum, LindL Bot. Reg. (18S9) Misc. 36-snperbum.
macrophyllnm, *A. Rich. Sert. Astrol.* 22.—N. Guinea,
rnacropus, *Benth. V Hook. f. Gen.* iii. 500.—Ins. Norfolk.
macrostachyum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 78.—Ind. or.
maculatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 359-Maxillaria maculata.
manilense, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* I. (1843) 430.—Manilla.
marginatum, Batem. ex Hook. Bot. Mag. t. 5454 = xanthophlebium.
marginatum, *Teijsm.* b* *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1853) 490.—Java,
marmoratnm, *Reichb. f. in Gard. Chron.* iii. (187S) 492.—Burma.
mesochlorum, Lindl. Bot. Reg. (1847) sub t. 36 = amoenum.
metachilinum, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 222.—Ind. or.
mexicanum, Presl, Symb. Bot. i. 36. t. 25 (=Goveniae sp.).—Mexic.
micansx, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) I. 332.
micranthum, Lindl. in Joum. Linn. Soc iii. (1859) 3 - D . Serra.
micranthum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 84 = Stelis miciantha.
microbolbon, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xv. (1841) 19. t. 8.—Ind. or.
microchips, Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 345-EriaDalzelli.
microglaphys, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1868) 1014.—Borneo.
Milligani, F.Muell. Fragm. i. 88. t. 6=striolatum.
minax, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 129. t. **146.**—Ins. Amboina.
minutissimum, *F. Muell. Fragm.* v. 95.—Austral.
Mirbelianum, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 428.—Ins. Molucc.
miserum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 388.— Assam,
modestum, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 222.—Ins. Philipp.
Mohliannm, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 214.—Ins. Fiji,
monanthum, *Teijsm. tf Binn. Cat. Hort. Bog.* 43, nomen.—Sumatra,
moniliforme, *Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vi. (1799) 85.—Japon.
monopbyllum, *F. Muell. Fragm.* i. 189.—Austral.
Mooreanum, *Lindl. in Joum. Hort. Soc.* vi. (1851) 272.—Ins.' Aniteuna.'
Moorei, *F. Muell. Fragm.* vii. 26.—Ins. Dom. Howe.
Mortii, *F. Muell. 1. c.* i. 214.—AustraL
Mortii, F, Muell. 1. c. ii. 93 = Bowmanii.
moschatum, Griff. Notul. iii. 311=pulchellum.
moschatum, *Sw. in Schrad. Neues Joum.* i. (1806) 94.—Burma.
moschatum. Wall, ex D. Don, Prod. FL Nep. 34 = D. Calceolaria.
mucronulatum, *Planch. Hort. Donat.* 156.—Ind. or. ?
multicaule, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 43, **sphalm. — *muscicola.***
multiflorum, Far. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 149=Nathanielis.
muscicola, Lindl. in Wall. Cat. n. 2017 = Eria muscicola.
mutabile, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 86.—Java.
Myosurus, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 82—Oberonia Myosurus.
Nathanielis, *Reichb. f. in Schill. Cat. Orch.* ed. III. (1857) 26.—Burma,
nitidissimum, *Reichb. f. in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 112.—Ins. Admiralt.
nobile, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 79.—Reg. Himal.; China.
nodatum, Lindl. in Gard. Chron. (1862) 717 = D. Aphrodite.
nodosum, Dalz. in Hook. Kew Jouin. iv. (1852) 292 = Macraei.
normale, *Falc. in Proc. Linn. Soc.* i. (1839) 14.—Reg. Himal.

DENDROBIUM:—

nudum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 85.—Java.
nummulifolium, R. King, in Gard. Chron. (1879) I. 789 = Bulbophyllum minutissimum.
nutans, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 90.—Zeylan.
nutans, Presl, Symb. Bot. i. 34. t. 23 = Haenkeanum.
obtusa, Reichb. in Walp. Ann. vi. 1150, ind. lapsu, vide ***Dendrocolla obtusa.***
ochreatum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7410.—Reg. Himal.
ochroleucum, *Teijsm. &" Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1863) 490.—Java,
odontochilum, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 91.—N. Caled.
ophioglossoides, Sieber, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 9 - Pleurothallis floribunda.
ophioglossoides, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. vi. (1799) 88=Stelis ophioglossoides.
Ophioglossum, *Reichb. f. in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 118.—Austral,
pachyglossum, *Par.* b* *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 149.—Burma.
palmifolium, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 82=Maxillaria palmifolia.
Palpebrae, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* v. (1850) 33. —Burma.
panduratum, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 19.—Zeylan.
paniculatum, Pers. Syn. ii. 523 = Maxillaria paniculata.
paniculatum, Sj». *in Schrad. Neues Journ.* i. (1805) 97.—Afr. trop.
paradoxum, *Teijsm. (f Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 316.—Java,
parciflorum, *Reichb. f. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 4.—Reg. Himal.
parcum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1866) 1042.— Burma.
pardalinum, Reichb. f. 1. c. (1886) II. 230 = Macraei.
Parishii, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxi. (1863) 236; *Hook. Bot. Mag.* t. 6488.—Burma.
Parthenium, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) II. 489.—Borneo.
parviflorum, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 34.—Nepal.
paudfolium, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. **ii. 185 (= *Mitopetalum plicatum).—Jay*.**
Paxtoni, Lindl. Bot. Keg. (1839) Misc. 43 = chrysanthum.
Paxtoni, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 169-nmbriatum.
peguanum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 19. —Burma,
pendulum, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 484.— Burma.
Perula, *Reichb. f. in Hamb. Gartens,* xxi. (1865) 298. —Assam.
Petri, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) I. 107.— Polynesia.
Phalaenopsis, *Fittg. 1. c.* (1880) II. 38.—Austral.
pictum, Griff", ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 12 = Devonianum.
pfctum, *Lindl. in Gard. Chron.* (1862) 548.—Borneo.
Pierardi, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 482.— Reg. Himal.
planibulbe, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 54.—Manilla,
platygastrium, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 55.—Ins. Fiji.
platypetalum, Pers. Syn. ii. 523=Maxillaria platypetala.
pleiostachyum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 520.—N. Guinea.
plicatum, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. ii. 661-Maxillaria paniculata.
plicatile, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 10.—Ins. Philipp.
polyanthum, Wall. Cat. n. 2009 -= pendulum ?
polycarpum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) II. 492.—Ins. Sondaic.
polycladium, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 90.—N. Caled.
polypetalum, Stead. Nom. ed. I. 268, sphalm. = *platypetalum.*
polystachyon, Sw. in Vet Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 247-Polystachya luteola.
polystachys, Thou. Orch. Afr. t 85 = Polystachya mauritiana.
porphyrochilum, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 18.-Reg. Himal.
praecinctum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) I. 790.—Ind. or.
praecox, Sm. in **Rees,** Cyclop, xi. n. 3=Coelogyne praecox.

DENDROBITOI:—

prasinum, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 11.—Ins. Fiji,
primulinum, *Lindl. in Gard. Chron.* (1858) 400.—Reg. Himal.
profusum, *Reichb./. I. c.* (1884) I. 510.—Ins. Philipp.
proliferum, Pers. Syn. ii. 524 = Maxillaria prolifera.
prninosum, *Teijsm. b" Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 314.—Malaya.
Pseudadinia, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 9.—Ins. Philipp.
pubescens, Hook. Exot. Fl. t 124 = Eria flava.
pugioniforme, *A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.* (1889) *Misc.* 33.—Austral,
pulchellum, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1935 (non Roxb.).—China,
pulchellum, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 486.—Ind. or.
pumilum, *Roxb. II. cc.* 63, 479.—Burma; Malaya.
pumilum, Sw. in Schrad. Neues Joum. i. (1805) 97 = Bulbophyllum pumilum.
punctatum, Sm. Exot. Bot i. 21. t 12 = Dipodiurri punctatum.
pungentifolium, F. Muell. Fragm. i. 189-pugioniforme.
purpurascens, *Teijsm. &• Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 314.—Java.
purpurascens, Thw. Enum. PI. Zeyl. 298 (Coelogynes sp. ?).—Zeylau.
purpureum, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. **484.—** Ins. Molucc.
pusillum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 35=alpestre?
pusillum, H. B. &K. Nov. Gen.etSp. L 357-Pleuiothallis pusilla.
pusillum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 77.—Java,
pyenostachyum, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 19.—Burma.
pygmaeum, A. Cunn. in Hook. Comp. Bot Mag. (1836) 377-Caleyi.
pygmaeum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1999.—Reg-Himal.
pygmaeum, Sm. in Rees, Cyclop, xi. n. 27»Bnlbophyllum pygmaeum.
quadnfidum, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc ii. (Orch. Opusc.) 40=Pleurothallis quadrifida.
Rabani, Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) *1"* Macraei.
racemiflorum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 83-Pleurothallis oblongifolia.
radians, *Reichb. f. XeniaOrch.il* 180.—Borneo.
ramosissimum, Wight, Ic t. 1648 = herbaceum.
ramosum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 2003.—Reg. Himal.
ratnosum, Pers. Syn. ii. 524 = Maxillaria ramosa.
refractum, *Teijsm. &" Binn. in Tijdschr. Nederl. /** xxiv. (1862) 315.—Ins. Malay.
Reinwardti, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 17.—Ins. Banda.
reptans, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 510.—Japon.
reptans, Sw. in Schrad. Neues Journ. i. (1805) 96" Bulbopbyllum nutans.
retusum, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc fasc (Orch. Opusc.) 40 = Pleurothallis relusa.
retusum, Llanos, in Mem. Acad. Cienc. Madr. (1859) 498=macranthum?
revolutum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 51.—Burma. Malaya.
rhodocentrum, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1872) —Burma ?
rhodopterygimn, *Reichb. f. 1. c,* (1875) I. 684.—Barm*
rhodostomax, Reichb. f. 1. c. (1876) I. 795.
rhombeum, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 17-aureum.
rigens, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 280.—Java.
rigescens, Miq. Fl. Ind. Bat iii. 639-mnum.
rigidum, *R. Br. Prod.* 333.—Austral.
rigidum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 86 = firmum.
Rimanni, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) II. 6[80]- Ins. Molucc.
rorulentum, *Teijsm.* 6* *Binn. Cat. Hort. Bog- nomen.—Ins. Amboina.
Rosenbergii, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. !** xxiv. (1862) 317.—Java.
roseum, *Sw. in Schrad. Neues Journ.* i. (1805) 97-Afr. trop
Roxburghii *LindLin Journ. Linn. Soc.* iii. (I[8595] •^lad. or.
Ruckeri, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 25.—*«B Himal.

DEHDBOBITJM :—

ragosnm, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 87.—Java.
Rumphiae, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 803-angustifolium.
Rnmphianum, *Teijsm.* 6- *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 317.—Ins. Malay.
""ri^Wium, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 84-Pleurothallis ruscifolia.
salaccense, Hort. ex Reichb. f. in Bot. Zeit. xx. (1862) 214 = Bullenianum.
Mlaccense, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 86.—Java,
salicornioides, *Teijsm.* 6* *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 815.—Ins. Malay.
sanguineum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. vi. (1/99) 82=*Broughtonia sanguinea.
songuinolentnm, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 62. —Penang.
sarcanthum, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 20.—Java.
"arcostoma, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 80.—Java.
sarcostemma, Teijsm. & Binn. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 638 = macrophyllum.
scabrilingne, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 15.—Burma,
scalpelliforme, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 17.—Malaya.
scariosum. La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. (Orch. Opusc.) S9 = Pleurothallis scariosa.
Schimperianum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 282.—Abyssin.
K *W» I » K », Lindl. in Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) « ·r~ striolatum.
schroederi, Hort. in Flor. Mag. t. 502=densiflornm.
Mcrophyllum, Lindl. 1. c. (1844) Misc. 68 = firmum.
Ocopa *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 65.—Ins. Philipp.
secundum, *Lindl. in Bot Zeit* xxi 1868)128)
senile *Parish, Reichb. f. in Gard. Chron.* (1865) 484. —Burma.
Serra, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 3.—Malaya.
""*Marioides*, Sw. in Nov. Act. Soc Sc. Upsal. vi. U<99) 88-Pleurothallis sertularioides.
Shepherdi, = Bulbophyllum
natum, *Reichb.* (1884) i. 306.—
sinu um, *Lindl. ex Walp. Ann.* vi. 280.—Malaya.
Stella, *Reichb. f. in Hamb. GartenB.* xxi. (1865) 298. --Ind. or.
spathaceum, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 15. —Ree- Himal.
gPf?°ɔum» *Sm. Exot. Bot.x.* 17. t. 10.—Austral.
5Pectatissimum, *Reichb. f. in Linnaea*, xli. (1877) 41. -•Borneo.
<iglossum, Reichb. f. in Bonplanffia, ii. (1854)
spe *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 14.
splendidissimum ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) i. 298.
squalens, Lindl. 732 = Maxillaria squalens.
steatoglos *Reichb. f. in* (1877)
striatum, Griff. Notul. iii. 818 = Bulbophyllum stnatum.
St ndklandianum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) I.
£X *Reichb. f. in Hamb. Garten,,.* xUi. (1857) —Austral.
ngylanthum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1878) I. 62.—
Stuartii, (1884)
stupos *LindL* (1838) *MUc* fi2 Re8-
Gaxd- Chron. (1874) I.
sulacaule, *Fourn. Linn. Soc.* iii. (1859) 11. Java.
subarticulatu *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862)T316.-Java.

DENDROBIUM :—

subteres, LindL in Joum. linn. Soc iii. (1859) 4 = acerosum.
subulatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 91.—Malaya,
sulcatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) t. 65.—Reg. Himal.
Sumneri, *F. Muell. Fragm.* vi. 94.—Austral,
superbiens, *Reichb./• in Gard. Chron.* (1876) II. 516. —Austral,
superbum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 282.—Ing. Philipp.
sylvanum, *Reichb. /. in Linnaea*, xli. (1877) 91.—N. Caled.
Tattonianum, Batem. in Gard. Chron. (1865) 890 = canaliculatum.
taurinum, *Lindl. Bot. Reg.* (1848) t. 28.—Ins. Philipp.
tenellum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 91.—Java,
teres, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 61.—Malaya.
teres,- Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 485 = Vanda teres.
teretifolium, *R. Br. Prod.* 883.—Austral.
teretifolium, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc 82 = striolatmn.
terminate, Par. *(f Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 149.—Burma.
testiculatum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 83=Ionopsis testiculata.
tetrachromum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1880) I. 712.—Borneo.
tetraedre, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 89.—Java,
tetragonum, *A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 33.—Austral,
tetrodon, *Reichb. f. ex Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 10.—Java.
Teysmanni, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 640.—Singapore.
thrysiflorum, Reichb. f. in Illustr. Hortic. xxii. (1875) 88. t. 207=densiflorum.
thrysodes, *Reichb. f. in Hamb. Garten, xv. (1869) 51. —Java.**
tipuliferum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) I. 72.— Ins. Fiji.
Tmesipteris, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 13. —Borneo.
Tokai, *Reichb. f. in Hamb. Gartens,* xxi (1865) 293 —Ins. Fiji.
tortile, A. Cunn. in Lindl. Bot Reg. (1889) Misc. 38 = monophyllum.
tortile, *Lindl. in Gard. Chron.* (1847) 797.—Burma,
transparent *Wall. Cat.* n. 2008.—Reg. Himal.
Trcacherianum, *Reichb./. ex Hook./. Bot. Mag.* t. 6591. —Borneo.
triadenium, Lindl. Bot. Reg. (1847) t. l=mntabile.
tribuloides, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 88 = Pleurothallis tribuloides.
trichostomum, *Reichb. /. ex Oliver, in Joum. Linn. Soc.* xv. (1875) 30.—N. Guinea.
tricolor, Pers.Syn. ii. 524 = Maxillaria tricolor,
tricuspe, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 88.—Java,
tridentiferum, *Lindl. in Hook. Lond. Joum. Bot.* it (1848) 237.—N. Guinea,
triflorum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 77.—Java.
tripetaloides, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 478 — Bulbophyllum auricomum.
triphyllum, Pers. Syn. ii. 524 = Maxillaria triphylla.
truncatum, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 15. —Java.
tuadenum, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 234, nonren.—Ins. Philipp.
umbellatum, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 303.—Ins. Molucc.
uncatum, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 5.— Java.
undatiflorum, Pers. Syn. ii. 524=Maxillaria undatiflora.
undulatiflorum, Stead. Nom. ed. I. 268 - Maxillaria undulata.
undulatum, *R. Br. Prod.* 332.—Austral.
undulatum, Pers. Syn. ii. 524 <» Maxillaria nndulata.
unguiculatum, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* v. (1853) 491.—Java.
unifiorum, Griff. Notul. iii. S05=revolutum.
unifloram, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 813.—Sumatra,
untflos, *F. M. Bailey, in Proc. R. Soc. Queensl.* i. (1884) 12.—Austral.
utricularioides, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. vi. (1799) 88 = Ionopsi« utricularioides.
vandiflorum, *Reichb./. in Gard. Chron. (1882)* II. 620. —N. Guinea.

DEMDROBIUM :—

variegatum, Pers. Syn. ii. 524=Maxillaria variegata.
Veitchianum, Undl. Bot Reg. (1847) t. 25-macrophyllum.
vennstum, *Teijsm. tf Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 18.—Siam.
veratrifolium, *Lindl. in Hook. Lond. Joum. Bot.* ii. (1848) 286.—N. Guinea.
veratrifolium, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind: iii. 482 •= Phaius veratrifolius.
verruciferum, *Reichb. /. in Linnaea*, xli. (1877) 88.— N. Caled.
vestitum, Wall. Cat. n. 2006 - Eria vestita.
vexabile x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1884) I. 271.— Ind. or.
villosulum, *Wall. Cat.* n. 2006.—Penang.
virgineum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1884) H. 520. —Burma,
viridiroseum, *Reichb./. in Bonplandia*, iii. (1855) 226. **—Java.**
Wardianum, Warner, Select. Orch. Ser. I. t. 19.- pendulum.
Williamsianum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1878) I. 652.—N. Guinea.
Williamsoni, *Day* 6* *Reichb. /. I. c.* (1869) 78.—Reg. Himal.
xantholeucum, *Reichb./. Xenia Orch.* ii. 73.—Java,
xanthophlebium, *Lindl. in Gard. Chron.* (1857) 268. —Burma.
Zollingerianum, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 318.—Java.

DENDROBRIUM, Ag. Aphor. 188 (1823), sphalm. = Dendrobium, Sw. (Orchid.).

DENDROCAIAMUS, Nees, in Linnaea, be. (1834) 476. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1212.
Balcooa, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 718 = Bambusa Balcooa.
calosuchyus, *Kun, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 662.— Burma.
criticus, *Kurt, I. c.* 659.—Burma,
flagellifer, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 150.—Malacca.
giganteus, *Munro, I.* c—Burma.
Griffilhianus, *Kun, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 562. —Burma.
Hamiltonii, *Nees & Am. ex Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 161.—Keg. Himal.
Hookeri, *Munro, I. c*—Reg. Himal.
latiflorus, *Munro, I. c.* 162. t. 6.—China,
longispathus, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 561.— Burma,
membranaceus, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 149.—Burma.
monadelphus, Thw. Enum. PI. Zeyl. 876-Oxytenanthera Thwaitesii.
Parishii, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 149.—Reg. Himal.
senceus, *Munro, 1. c.* 148.—Ind. or.
strictus, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834) 476.—Ind. or.
Tulda, Voigt, Hort. Suburb. Calc 718 = Bambusa Tulda.

DENDROCHARIS, Miq. in Versl. en Med. Akad. Wet. vi. (1857) 194; et Fl. Ind. Bat. ii. 452 (1859) = Eodysanthera, Hook. (Apocyn.).
inflata, Miq. 11. cc. 194, 453 = Anodendron inflatum.
myrti/olia, Miq. 11. cc 194, 464.—Malaya.
rubescens, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 403.—Borneo.

DENDROCHLTITJM :, Blume, Bijdr. 398. t 52 (1825) quoad Sect 1. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 506 (cf. 496).
abbreviatum, Blume, I. c. 400 - Piatyclinis abbreviata.
Arachnites, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1882) I. 256.— Ins. Philipp.
aurantiacum, *Blume, Bijdr.* 398. t. 5.—Java,
auritum, *Reichb. /. in Bonplandia*, iv. (1858) 329.— Java.
***brachyotum, Reichb./. I. c.v.* (1857) 43=Platyclinis** brachyota.
bracteosum, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 241.— Hab. 1
Cobbianum, Reichb. *f.* in Gard. Chron. (1880) II. 748 = Platyclinis CobbUna.
cornutum, Blume, Bijdr. 939=Platyclinis comuta.

DENDROCHILUM :—
cncomerinum, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1884) II. 649.—Ins. Philipp.
edentulum, Blume, Bijdr. 899 = Platydinig edentula.
erosum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 241.—Java.
filiforme, Liodl. Bot. Reg. (1840) Misc. 52 -Platyclinis ñliformis.
fnscum, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 805.—Ind. or.
glumaceum, Andre[1], Illustr. Hortic xxv. (1878) t. 328 «= Platyclinis ñliformis.
glumaceum, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 23=Platyclinis glnmacea.
jnnceum, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 54.—Ins. Philipp.
lati/olium, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 56=Platyclinis latifolia.
longifolium, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1866) 329 = Platyclinis longifolia.
magnum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 240.—Hab.J
occultum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 84.—Java.
pallidiflavens, *Blume, Bijdr.* 399. t. 62.—Java.
pumilum, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1865) 222. —Ins. Philipp.
roseum, Dalz. in Hook. Kew Jonrn. iv. (1862) 291 = Dendrobium crepidatum.
simile,, *Blume, Bijdr.* 400.—Java.
spathacenm, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 43.—Java.
uncatum, *Reichb. f. 1. c.* iii. (1855) 222.—Ins. Philipp.
Zollingeri, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 626.—Java.

DENDROCNIDE, Miq. PL Jungh. 29 (1851) - Laportea, Gaudich. (Uitic).
coerulea, Miq. 1. c 81 = Cypholophns rnfescens.
costata, Miq. 1. c. 80=>L. costata.
crenulata, Miq. 1. c. 31=L. crenulata.
peltata, Miq. 1. c 80 = L. peltata.

DENDROCOLLA, Blame, Bijdr. 286. t. 67 (1825)-Sarcochilus, R. Br. (Orchid.).
acuminatissima, Blnme, 1. c. 288 = S. acuminatusimus.
amplexicaulis, Blume, 1. c.=S. amplexicanlis.
anceps, Blnme, 1. c. 292 = S. anceps.
angustifolia, Blume, 1. c. 291 = S. angustifolius.
apiculata, Zoll. ex Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 39, in obs. *{ = Camarotis apiculata).*—Java ?
appendiculata, Blume, 1. c. 289—S. pusillus.
Arachnites, Blnme, 1. c. 287—S. Arachnites.
compressa, Blume, 1. c. 289=S. compressus.
emarginata, Blume, 1. c. 290 = S emarginatus.
gracilenta, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 40=S. gracilentus.
Hystrix, Blume, Bijdr. 291=S. Hystrix.
minima, Blume, 1. c. 290=S. minimus.
obtusa, Blume, 1. c. 287 - S. obtusus.
pallida, Blnme, 1. c. 290 = S. pallidus.
pulchella, Thw. Enum. PI. Zeyl. 430 - S. pulchellus.
purpurascens, Blume, Bijdr. 288 =S. purpurascens.
pusilla, Blume, I. c 289 = S. pusillus.
rhopalorrhachis, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 40=S. rhopalorrhachis.
serraeformis, Lindl. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 30B ~ S. serraeformis.
spuria, Blume, Bijdr. 290=S. spurius.
subulata, Blume, 1. c. 291 = S. subulatus.
teres, Blume, 1. c. 289 =S. tens.
Zollingeri, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 40=S. Zollingeri.

DENDRODAPHNE, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 146, « Genus delendnm,' Benth. & Hook, f. iii. 150.
macrophylla, Beurl. 1. c.—Panama.

DENDROLIRIUM, Blame, Bijdr. 843. t. 69 (1825) = Eria, Lindl. (Orchid.).
abbreviatum, Blume, 1. c. 348—E. abbreviate
acuminatum, Blume, 1. c. 847=E. acumitata.
albidotomentosum, Blnme, L c 846 = E. albidotomentosa.
appendiculatum, Blume, 1. c 352=E. appendiculata.
bicristatum, Blume, 1. c. 846 - E. bicristata,
eoriaceum, Blume, 1. c 351 = E. coriacea.
densiflorum, Blume, 1. c. 350—Phreatia densiflon.
ebulbe, Blume, 1. c. 847= E. ebulbis.
erectum, Blume, 1. c 848=E. erecta.

DENDROLIRIUM :—
flavescens, Blume, Bijdr. 344 = Eria flavescens.
hyacinthoides, Blume, 1. c. 346-E. hyacinthoides.
laxiflorum, Blame, 1. c. 350-Phreatia laxiflora.
micranthum, Blume, 1. c. 349 - E . micrantha.
multiflorum, Blume, 1. c. = E. multiflora.
ornatum, Blume, 1. c. 345 = E. omata.
pusillum, Blume, 1. c. 350-Phreatia pusilla.
retusum, Blume, 1. c. 351 = E. rctusa.
robustum, Blame, 1. c. 847 « E. robusta.
rugosum, Blume, 1. c. 845 = E. stellate.
secundum, Blume, 1. c. 350—E. secunda.
sulcatum, Blume, 1. c. 847 = E. sulcata.

ENDROLOBIUM, Benth. in Miq. PI. Jungb. 216 (1852)=Desmodium, Desv. (Legnm.).
australe, Benth. 1. c. = Desm. Cephalotes.
Cephalotes, Benth. 1. c 216, 218 = Desm. Cephalotes.
Cumingianum, Benth. 1. c. 216.—Ins. Philipp.
umbellatum, Benth. 1. c. 218=Desm. umbellatum.

DEtTDBOMECON, Benth. in Trans. Hort. Soc. Ser. II. i. (1634) 407. *PAPAVERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 54.
Harfordii, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* v. (1878) 102.—Calif.
rigidum, *Benth. in Trans. Hort. Soc.* Ser. II. i. (1834) 407.—Calif.

DENDBOPANAX, Decne. & Planch, in Rev. Hortic. Se-r. IV. iii. (1854) 107. *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 943.
TEXTORIA, Miq. in Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 12 (1863).
alaris, *Decne. & Planch, in Rev. Hortic. Sir.* IV. iii. (1854) 107.—Mexic.
arboreum, *Decne. tf Planch. 1. c.*—N. Granat.
citrifolium, *Decne. &" Planch. 1. c.*—Mexic.
cuneatum, Decne. *8c* Planch. 1. c—Gilibertia cuneata.
dariense, Seem, in Joum. Bot ii. (1864) 800 = Hedera pendula.
densiflorum, Decne. & Planch, in Rev. Hortic. Sir. IV. iii. (1854) 107, nomen = Gilibertia cuneata.
Fendlerii, *Seem, in Journ. Bot.* ii. (1864) 801.—Am. austr.
japonicum, *Seem. I. c.*—Japon.
Juergenseni, *Seem. 1. c.*—Mexic.
lanceolatum, Decne. *8c* Planch, in Rev. Hortic. Sér. IV. iii. (1854) 107 = Gilibertia cuneata.
lancifolium, Seem. 1. c. 802 = laurifolium.
Langeana, *March, in Bull. Acad. Brux.* xlvii. (1879) 12.—Mexic.
laurifolium, *Decne. V Planch, in Rev. Hortic.* Se>. IV. iii. (1864) 107,nomen.—Hab.t
monogynum, Seem, in Journ. Bot. iii. (1865) 140 = Gilibertia monogyna.
montannm, *Decne. &" Planch, in Rev. Hortic.Sit.* IV. iii. (1854) 107, nomen.—Hab.J
nutans, *Decne. b" Planch. I. c.*—Jamaic.
oblongum, Decne. *8c* Planch. 1. c. = Gilibertia cuneata.
obovatum, Decne. *8c* Planch. 1. c. •= Gilibertia cuneata.
ovatum, Seem, in Journ. Bot. ii. (1864) 801=Arthrophyllum diversifolium.
parviflorum, *Benth. Fl. Hongk.* 137.—China.
pauciflorum, Decne. *8c* Planch, in Rev. Hortic. Sér. IV. iii. (1854) 107 = Gilibertia monogyna.
Pavonii, Decne. *8c* Planch. 1. c. « Gilibertia umbellata.
pendulum, *Decne. &* Planch. 1. c.*—N. Granat.
proteum, Benth. Fl. Hongk. 136 - parviflorum.
ramiflorum, Seem, in Joum. Bot. ii. (1864) 312 = Gilibertia cnneata.
Sellowianum, Miq. Ann. Mns. Bot Lugd. Bat. i. 27 - Gilibertia cuneata.
tomentosum, Seem, in Joum. Bot. ii. (1864) 802 = Didymopanax lucumoides.
trilobum, Seem. 1. c.—Gilibertia triloba.

DENDROPEMON, Blume, in Schult. Syst. £ vii. 1729 (1830)-=IiOranthus, Linn.
anceps, emarginatum, laxiflorum, accident ale, parvifolium, pedunculatum, uniflorum, Blnme, 1. c. Omnes Loranthi species homonymae.

DENDROPEUCON, Endl. Gen. Suppl. v. 19 (1850), sphalm.=praec.

DENDROPHILA, Zipp. *ex* Blnme, Rnmphia, iv. 34. 1.190 (1848)=Teooma, Joss. (Bignon.).
trifoliata, Zipp. ex Blume, 1. c. 85=T. Dendrophila.

DENDROPHTHOË, Mart, in Flora, xiii. (1830) I. 109 = Loranthus, Linn.
atropurpurea, Blume, in Schult f. Syst. vii. 1780 - L. atropurpareus.
bicolor, Mart in Flora.xiii. (1830) 1.109 = L. longiflorus.
biflora, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730 = L. Scurrulat
buddlejoides, Blume, 1. c. = L. Scurrula.
celastroides. Mart in Flora, xiii. (1880) I. 110=L. celastroides.
chrysantha, Blame, in Schult. f. Syit. vii. 1730 =» L. chrysanthus.
chrysanthoides, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 818=L. chrysanthoides.
cinnamomea, G. Don, Gen. Syst iii. 420 = L. Scurrula.
coccinea, G. Don, 1. c 419=L. coccineus.
congener, Mart, in Flora, xiii. (1830) I. 110-L. pendulus.
cordifolia. Mart. 1. c. = L. cordifolius.
Corynitis, Blame, in Schult. f. Syst. vii. 1729 - L. Corynitis.
costulata, Miq. FL Ind. Bat. Suppl. 344.—Sumatra.
cuneata, Blume, in Schult f. Syst. vii. 1730=L. rhopalocarpus.
curvata, Blume, 1. C.-L. curvatus.
cylindrica, Blume, 1. c. = L. cylindricas.
dasystemon, Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 1097.—Sumatra.
elegans, Mart, in Flora, xiii. (1830) I. 109-L. elegans.
falcata, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1780 - L. longiflorus.
farinosa. Mart, in Flora, xiii. (1830) I. 110 = L. pentandrus.
fasciculata, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730 = L-fasciculatus.
ferruginea, Blume, I. c. =L. ferrugineus.
Forsteriana, Blume, 1. c. = L. Forsterianus.
fulva, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 815 = L. fulvus.
fusca, Blume, in Schult. f. Syst vii. 1780=L. rhopalocarpus.
fuscata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 815=L. fuscatns.
Gaudichaudi, G. Don, Gen. Syst. iii. 419 - L. Gaudichaudii.
glauca, Mart, in Flora, xiii. (1830) I. 109=L. glaucus.
graciliflora, Mart. 1. c. 110 = L. Scurrula.
gracilifolia. Mart. 1. c. — praec.
Haenkeana, Mart 1. c. = L. Haenkeanus.
Heyneanus, Blume, in Schult f. Syst. vii. 1730=1-bracteatus.
Heynei, G. Don, Gen. Syst. iii. 420 = L. Scnrrula.
ignea, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 857.—Ins. Banca.
incarnata, Blume, in Schult f. Syst. vii. 1780 - L-incarnatus.
indica. Blame, 1. c. = L. longiflorus.
Junghuhnii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 817=L-J[un]£" huhnii.
kalahiensis, Miq. 1. c. 811=L. kalahiensis.
Koenigiana, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730-L. longiflorus.
Korthalsii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 814-L. Korthalsii.
kramatensis, Miq. 1. c.—Borneo.
lepidota, Mart, in Flora, xiii. (1830) I. HO • lepidotus.
leptantha, G. Don, Gen. Syst iii. 420 = L. pulvemlentus.
leucobotrya, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 345.—Ins. Banca-
leucostachys, Miq. 1. c. i. I. 819 = L. leucostachys.
ligustrina, Mart in Flora, xiii. (1830) I. XW* Iignstrinus.
linophylla, Steud. Nom. ed. II. i. 491-L. linophylws-
longiftora, Blume, in Schnlt. f. Syst. vii. 1730=1* longiflorus.
luBonensis, Blume, 1. c.«=L. luzonends.
macrocalyx, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.821 - L. heteranthus-
mali/olia, Blnme, in Schult. f. Syst. vii. 1730 = *-malifolius.
medinensis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 816 ~L. medinensis-
obovata, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1780 « *" Scurrula.
obtecta, G. Don, Gen. Syst. iii. 419-L. Scurrula,
Oortiana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 813 = L. ferrugio.eus.
ovali/olia, Steud. Nom. ed. II. i. 491 = L. ovalitolw* -
pendula, Mart, in Flora.xiii. (1830) I. 110=L- I*" dnlus.
pentandra, Blume, in Schult f. Syst. vii. 1730- Loran- thus pentandrus. ».
pentapetala, G. Don, Gen. Syst iii. 419 « L. P"" petalus.

nENDROPHTHOfi :—
pMippensis, Blame, in Schult. f. Syst. vii. 1730 = L. philippensis.-
praelonga, Blume, 1. c.=L. praelongus.
pulchra, G. Don, Gen. Syst. iii. 419 = L. pulcher.
pulverulenta, Blume, in Schnlt. f. Syst. vii. 1730=L. pnlveralentns.
racemifera, G. Don, Gen. Syst. iii. 419 = L. coccineos
recurva, G. Don, 1. c. 420=L. recurvus.
reparida, Blume, in Schnlt. f. Syst. vii. 1780 = L. repandus.
Roxburgkiana, Blume, I. e. = L. Scnnnla.
™*gulosa,* Blume, 1. c.=L. ragulosus.
Schultesii, Bluine, 1. c.=L. ferruginens.
Scurrula, Blume, 1. c. = L. Scunula.
'phenoidea, Blume, 1. c. = L. sphenoideus.
Mrapetala, Blume, 1. c.=L. tetrapetalus.
«mbellata, Blume, 1. c.=L. loniceroides.
«mbelli/er, Blume, 1. c. = L. nmbellifer.
venosa, Mart, in Flora, xiii. (1880) I. 110= L. venosus.
nerticillata, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 27. —N. Guinea.
**w«a,* Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1780=L. vestitns.
Wallichiana, G. Don, Gen. Syst. iii. 419 = L. Wallichlamis.

DENDBOPHTHOBA, Eichl. in Mart. Fl. Bias. v. "• 102. t 31 (1868). *LORANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. «i. 214.
ARCEUTHOBIUM, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 814 (I860).
"noebandra, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 141,-Cuba
"Wata, *Wright, I. c.* 142—Cuba.
biserrula, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* v. II. 104.—Am. trop.
Bonariae, *Eichl. I. c.* 108.—Cuba.
buxifolia, *Eichl. 1. c.* 105.—Ins. S. Doming,
constricta, *Eichl. 1. c.* 104.—Cuba.
Wbensis, *Eichl. I.* c.-Cuba.
™pressoides, *Eichl. I. c.* 103.—Ind. occ.
"•Pnlata, *Eichl. I. c.* 102.—Ins. S. Doming.
aomingensiSi *Eichl. I. c.* 108.—Ind. occ.
*-Piviscum, *Eichl. I. c*—Cuba.
£*»«, *Eichl. 1.* r.-Cuba.
f*" Is, *Eichl. I. c*-Jamaica,
graciljs, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* I41.-Cuba.
grandifolia, *EiM • in Mart •m Bras* v, H- 105- — Cuba.
Grisebachii, *Eichl. 1. c.* 104.—Cuba,
jptostachya, *Eichl. I. c*—Ind. occ.
macrostachya, *Eichl. I. c*—Ins. Martinic.
M^ eiiieai *Eichl* -1- '• 103.-Cuba.
m,...lloides, *Eichl. I. c.* 104.—Cnba.
-pnnûodes, *Eichl. I. c.* 102—Ind. occ.
w"ghtü, *Ei hi. 1. c.* 108.-Cuba.

DENDROP[illegible].liu♦a!, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 808 (1861). *ORCMDEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 585.
funalis, *Benth. ty Nook. f.—Cf. Gen.* iii. 585, 583.— . —u. OCC.
"ymenanthus, *Reichb. f. I.* e.-Cuba.

t>EN[illegible]?^.P0G0N, Rafin. Neogenyt. 8 (1826)-TO"*aaa«i, Linn. (Bromeliac.).
usneoid.>s, Rafin. 1. c.=T. usneoides.

DENn
38«r^?8BHIS,D_Do">.» ™1- Mag. xi. (1832) &* CSUPOSITAE, Benth. *Sc* Hook.Tii. 604.
—, ert. eXDecne_in GniUem_Arch- B01- »•(1 (1SM) 518. t. 9 10.
Berteri [illegible]ook. & Arn_in H»ok. *Comp. Bat. Mag.* i. (188., 82—Ins. J. Fernand.
lacerata, *Hems.*, S. Ambrosio.
macrophylla, *D. Don,* ffi Mw— *Mag.* jU (1832) 338.— Ins. J. Fernand.
marginata, *Hook.* * Arn_ in Hook. *Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 82_ Ins_ J_ Fernand_
micrantha, *Hoo*_ ^ Arn_l_ C__Ina_ J- Femand.
mollis, *Hook. &*
neriifolia, *Hook. &* "^"«. *• c-Int J. Femand.
pinnata, *Hook.* b- *Arn. I.* c.-Ins. J. Femand.

DENDROSICUS, Rafin_ Sylva Tellur. 80 (1888) = Ore^tia. Linn. (Bignon.).
«a«a«...». Rafin. l. c = cfcncurbittiia.

DENDBO8ICYO8, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 518. *CUCURBITACEAE.*
Jaubertiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 442.—Afr. trop.
socotrana, *Balf./. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 513.—Ins. Socotr.

DENDROSMA, R. Br. ex Cromb. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 395, nomen=Atherospenna, Labill. ^ (Monim.).
lucida, R. Br. ex Cromb. 1. c. nomen.—Austral.

DENDBOSMA, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. 245 (1873). *RUTACEAE.*
Deplanchei, *Panch. tf Sebert, I. c.—N.* Caled.

DENDROSPARTUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 152-Genista, Linn. (Legumin.).
aetnense, Spach, 1. c = G. aetnensis.
purgans, Spach, ex Walp. Ann. i. 220 - G. purgans.
sardoum, Spach, ex Walp. 1. c. = G. aetnensis.

DENDBOSTTI1I8, Kant. *Sc* Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 431. *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 125, 971.
apeibaefolia, *Karst. V Triana, I. c*—Venezuela,
denticulata, *Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xvii. (1862) 95.—Guiana,
echinata, *Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl.* ii. (1861) 82.—Bras,
grandifolia, *Karst. V Triana, in Linnaea,* xxviii. (1856) 431.—N. Granat.
microphylla, *Karst. V Triana, 1. c.*—N. Granat.
pubescens, *Karst. tf Triana, I. c.—H.* Granat.
suaveolens, *Karst. (f Triana, I. c.—N.* Granat.

DENDROTROPHE, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 778 (1855) • Henslowia, Blume (Santalac).
buxifolia, Miq. 1. c. 781 = H. buxifolia.
cassiaefolia, Miq. 1. c. 780 = H. cassiaefolia.
Lobbiana, Miq. 1. c. 1096 - H. Lobbiana.
philippinensis, Miq. 1. c.-H. varians I
plurinervia, Miq. 1. c.—Sumatra.
Reintaardtiana, Miq. 1. c. 780 = H. Reinwardtiana.
spicata, Miq. 1. c.-=H. spicata.
umbellata. Miq. 1. c. 779 - H. heterantha 1
varians, Miq. 1. c. 780 = H. varians.

DENECKIA, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 952 (1843)-Denekla, Thunb. (Compos.).

VESEK1A., Thunb. Prod. PI. Cap. ii. 153 (1800); Nov. Gen. 177 (1801). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 293.
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 163.—Afr. austr.
glabrata, *DC. Prod.* v. 462.—Afr. austr.

DENHAMIA, Meissp. Gen. 18 (1837). *CELASTRINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 366, 998.
LBUCARPUM, A. Rich. Sert. Astral. 46. t 46 (1834).
heterophylla, F. Mnell. in Trans. Phil. Inst. Viet. iii. (1859) 29 = obscnra.
leucocarpum, Steud. Nom. ed. II. i. 491 = qbscura.
obscura, *Meissn. in Walp. Rep.* i. 203.—Austral.
Oleaster, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. (1859) 29.—Austral.
pittosporoides, *F. Muell. 1. c.* 30.—Austral.
xanthosperma, F. Muell. 1. c. 28=obscura.

DENHAMIA, Schott, Melet. 19 (1832) = Culouia, Beauv. (Aroid.).
scandens, Schott, 1. c = C. scandens.

DENIRA, Adans. Fam. ii. 118 (1763) = Iva, Linn. (Compos.).

DENISAEA, Neck. Elem. i. 806 (1790) = Phryma, Linn. (Verben.).

DENISONIA, F. Muell. Fragm. i. 124. t. 2 (1859). *VERBENACEAE.Benlh.* & Hook. f. it 1141.
temifolia, *F. Muell. I. c*—Austral.

DENNECKIA, Steud. Nom. ed. II. i. 491 (1840)-Denekla, Thunb. (Compos.).

DENS-CANIS, Tourn. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 197 (1745) = Erythronium, Lion. (Liliac.).

DENS-LEONIS, Tourn. ex Rupp, Fl. Jen. ed. Hall. 197 (1745)=Taraxacum, Linn. (Compos.).

DENTARIA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735) - Cardamine, Linn. (Crucif.).
alterni/olia, Dalla Torre, At]. Alpenfl. *62-trifolia.*
americana, Bartr. ex DC. Syst. ii. 273-C. laciniata.
angulata, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 65 = *C.* paucisecta.
bifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 448 - C. diphylla.
bipinnata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 179.—Reg. Caucas.
bulbi/era, Linn. Sp. PI. 653 = C. bulbifera.
calif arnica, Nutt. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 88-= C. paucisecta.
canescens, Tenon, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13, ex Syll. 318 = C. pinnata.
caucasica, Willd. ex DC. Prod. i. *155-quinque/olia.*
Clusiana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 677.—Europ.
concatenata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 80=Thelypodinm laciniatum.
dasyloba, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 296~macrophylU.
digenea x, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. 3.—Europ.
digitate, Lam. Encyc. ii. 288 = C. pratensis.
diphylla, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 30 - C. diphylla.
dissect a, l.ear. in Am. Journ. Sc vii. (1824) 62-C. multifida.
enneaphylla, Genera. Elench. n. 604-*glandulosa.*
enneaphylla, GueldensL ex Ledeb. Fl. Ross. i. 130= *microphylla.*
enneaphylla. Linn. Sp. PL 653 «- C. enneaphylla.
glabra. Scop, ex Steud. Nom. ed. II. i. 492 = Arabis perfoliata.
glandulosa, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. iii. 302. t. 272.—Hungar.
Cmelini, Tausch, in Flora, xix. (1836) 402 - C. macro. phylla.
heptaphyllos, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 864 = C. pinnata.
heterophylla, Nutt. Gen. Am. ii. 66 = C. heterophylla.
hirsutula, Andrz. ex DC. Prod. i. 152 = C. macrophylla.
hypanica, Bess, ex DC. Syst. ii. 278 =>*quinquefolia.*
integrifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 88 = C. paucisecta.
intermedia, Sond. in Flora, xxxviii. (1856) 129=C. pentaphylla.
Killiasiix, Bruegg. in Jahresb. Natnrf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1(J80) 73.—Europ.
laciniata, Muhl. Cat. 60; ex Willd. Sp. PI. iii. 479-C. laciniata.
leucantka, Tausch, in Flora, xix. (1836) 404.—Hab. I
macrocarpa, Nutt. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 88. —Am. bor.
macrophylla, Bunge, ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 45.— Reg. Amur.
maxima, Nutt. Gen. Am. ii. 66=C. maxima.
microphylla, Willd. Sp. PI. iii. 479.—Reg. Caucas.
multifida, Muhl. Cat. 63=C. multifida.
ochroleuca. Gaud, ex DC. Prod. i. 154=C. macrophylla.
panifolia, Rafin. Ann. Nat. (1820) 12.—Am. bor.
penfaphyllos, Gueldcnst. Reisen, i. 194, *i20=guinquefolia.*
pentapkyllos, Linn. Sp. PI. 654 --C. pentaphylla.
pinnata, Lam. Encyc. ii. 268 -C. pinnata.
pinnata, Pall, ex DC. Syst. ii. 277 - *quinquefolia.*
polyphylla, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hnng. xi. 174. t. 160.—Hungar.
quinquefolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 109; Snppl. 486.—Rossia austr.
repens, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 5. —China.
tenella, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 439.—Am. bor. occ.
tenuifolia, Hook. Fl. Bor. Am. i. 46 = praec.
tenuifolia, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1815) 547 = C. tuberosa.
trifida, Lam. Illustr. t. 662. f. 2 = C. tenuifolia.
trifolia, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hung. ii. 148. t. 189. —Croatia.
Wallichii, G. Don, Gen. Syst.i. 172 = C. macrophylla.
Willdenmii, Tausch, in Flora, xix. (1836) 403-C. macrophylla.

DENTEIiILA, Forst. Char. Gen. 25. t. 18 (1776). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 64.
HEYMIA, Dennst Schluess. Hort. Malab. 85 (1818).
LIPPAYA, Endl. Atakt. 13. t. 18 (1833).

DETTTEI1I1A'—
bifida, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 6216=Spiradiclis bifida.
erecta. Roth, Nov. PL Sp. 140 = Cephalostigma Schimperi.
geminata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat sub n. 6287 = Polynia geminata.
minima, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 317, nomen.—Ins. Timor.
perotifolia, Willd. ex DC. Prod. Iv. 419 = Cephalostigma Schimperi.
repens, *Font. Char. Gen.* 26. t. 13.—As. et Austral. trop.
stolonifera, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 218.—N. Caled.

DENT1DIA, Lonr. FL Cochinch. 369 (1790)=Perilla, Linn. (Labiat).
nankinensis, Lonr. 1. a - P. nankinensis.
purpurascens, Vets. Syn. ii. 135-P. nankinensis.
purpurea, Poir. Encyc. Suppl. ii. 466 = P. nankinensis.

DEPIERREA, Anon.ex ScUlechtin Linnaea,-acvi. (1842) 374=Campanula, Town.
campanuloides, Anon. 1. c.=C. rotundifbliat

DEPLACHNE, Boiss. Fl. Orient, v. 661 (1881) = Diplachne, Beauv. (Gram.).

DEPLANCHEA, Vieill.in Bnll.Soc.Linn.Nonnand.vii. (1863) 96 - Diplanthera, Banks *Sc* Soland. (Bignon.).
Bulwerii, F. Mnell. Fragm. v. 92-Dipl. tetraphylla.
speciosa, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. vii. (1863) 96.—N. Caled.

DKPPEA, Cham. & Schlecht in Linnaea, v. (1830) 167. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 61.
CHOMSTES, Benth. PI. Hartw. 63 (1840).
coraifolia, *Benth. PI. Hartm.* 848.—Mexic.
costa-ricensis, *Polai. in Linnaea,* xli. (1877) 666.—Costa Rioa.
erythrorhiza, *Cham. V Schlecht. I. c.* v. (1830) 188.—Mexic.
floribunda, *Bemsl. Diag. PI. Nov.* 31.—Mexic.
grandiflora, *Schlecht. in Linnaea,* xix. (1847) 748.—Mexic
hedyotidea, DC. Prod. iv. 618=erythrorhiza.
obtusiflora, *Benth. PI. Hartm.* 849.—Mexic.
pubescens, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 31.—Mexic.
tenuiflora, *Benth. PI. Hartw.* 349.—Mexic.
nmbellata, *Hemsl. Diag. PL Nov.* 31.—Mexic.

DEPPIA, Rafin. Fl.TeIlur.tt.51(1836)=IiyoaBte,Lindl. (1842) (Orchid.).
mexicana, Rafin. 1. c = L. DeppeL

DEPREA, Rafin. Sylva Tellur. 67 (1838) = Withanla, Pauq. (Solan.).
orinocensis, Rafin. 1. c.=W. onnocensis.
xalapemsis, Rafin. 1. c.» Athenaea xalapensis.

DEPREMESITIIiIA, F. Muell. Fragm. x. 69 (1876). *LABI ATAE.*
chiysocalyx, *F. Muell. I. c*—Austral.

DERDERIA, Jaub. *Sc* Spach, Illnstr. i. 29. t 67 (1843) = Jurinea, Cass. (Compos.).
Aucheri, Jaub. & Spach, in Ana. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 863.—Armenia.
berardioides, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. Jii. 184 (= *Aegopogon berardioides).*—Persia.
cheirifolia, Jaub. *Sc* Spach, 1. c. ii. 98 - J. Aucheriana.
erioiasis, jaub. & Spach, I. c 97 = J. eriobasis.
macrocephala, Jaub. *Sc* Spach, 1. c. 129. t. 67 = J. macrocephala.

DERINGA, Adans. Fam. ii. 498 (1763) - Cryptotaenla, DC. (Umbellif.).

DERINGIA, Steud.Nom. ed. II. i. 492 il840)«praec.

DERLINIA, Neraud, in Freyc. Voy. Bot. 28 (1826) = Gratiola, Rupp. (Scrophul.).

DERMASEA, Haw. Enum. Saxifr. 8 (1821)= Saxiftaga, Toum.
elongata, Haw. 1. c. 9 =S. virginensis.
nivalis, Haw. 1. c. 8-=S. nivalis.
pilosa, Haw. 1. c. = S. virginiensis.

DEBMATOCAXYX, Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 29. *SCROPHULARINEAE.Btath.* &Hook.f. ii. 943.
parviflora, *Oerst. I. c.*—Costa Rica.

DERMATOPHYLLUM, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 468=Sophora, Linn. (Legum.).
Schomburgkii, Sen. Bip. in Schomb. Faun, et Fl. Gui. 1079, nomen.—Guiana.
speciosum, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 459=S. secundiflora.

DERMOPHYIXA, Silva Manso, Enum. 30 (1836) « Cayaponia, Silva Manso (Cucurb.).
elliptica, Silva Manso, 1. c. 82 - C, diflusa.
pendulina, Silva Manso, 1. c. 31.—Bras.

DEROEMERA, Reichb. £ Poll. Orch. Comm. 29 (1852)« Habenaria, Willd. (Orch.).
squamata, Reiehb. f. 1. c = H. aphylla.

DEROSIPHIA, Rafin. Sylva Tellur. 101 (1838) = Disuotis, Benth. (1849) (Melast).
tubulosa, Rafin. 1. c.=Diss. tubulosa.

DEROUETIA, Boiss. *Sc* Bal. Diagn. Ser. n. v. 114 (1866) = Crepis, Vaill. (Compos.).
Bourgaei, Boiss. Fl. Orient iii. £83 (=*Lagoseris frigida).—Ljdt.*
frigida, Boiss. *Sc* Bal. Diagn. Ser. II. v. 114 (=*Lagoxris frigida).*—Cappadoc.
•*robertioides,* Boiss. 1. c. 116 *(^Lagoseris frigida).*—Cilicia.

DEBBIS, Lour. Fl. Cochinch. ii. 432 (1790). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 549.
AGANOFE, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.151 (1855).
BRACKYPTERJDM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 101.
CYLIZOMA, Neck. Elem. iii. 88 (1790).
DEGUELIA, Aubl. PI. Gui. 750. t. 300 (1775).
acuminata, *Benth. in Miq. PL Jungh.* 262, in adnot—Reg. Himal.
acuminata, *Miq. FL Ind. Bat.* i. 144.—Java.
affinis, Benth. in Miq. PL Jungh. 252, in adnot.=oliginosa?
amoena, *Benth. I. c.*—Burma; Malaya.
Benthamii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 41S=paniculata.
brachyptera, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 246.—Afr. trop.
breripes,Baker,inHook.f.Fl.Brit.Ind.ii.2U<—1iiA.or.
canarensis, *Baker, 1. c.* 246.—Ind. or.
chinensis, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 104.—China.
Cumingii, *Benth. I. c*—Ins. Philipp.
cuneifolia, *Benth, in Miq. PI. Jungh.* 258.—Reg. Himal.; Malaya,
dalbergioides, Azfer, *in Hook. f. Ft. Brit Ind.* ii. 241.—Burma; Malaya,
discolor, *Benth. in Journ. Linn. Sec.* iv. *Suppl.* (1860) 111.—Reg. Himal.
elegans, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 252, in adnot—Burma,
elliptica, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (I860) 111.—Burma; Malaya,
eualata, *Bedd. Ic. PL Ind. Or.* i. 42,—Ind. or.
taragnea., Benth. in Miq. PL Jungh. 252, in adnot.—Reg. Himal.
floribunda, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 152; *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 106.—Java.
floribunda, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 68=sinuata.
Fonteniana, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.144. t. 3 =uliginosa.
glabrata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 244.—Afr. trop.
guianensis, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (I860) 106; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 288.—Bias. et Guiana.
Heyneana, *Benth. in Miq. PL Jungh.* 262, in adnot—Ind. or.
javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 143.—Java.
Korthalsiana, *Blume, ex Miq. I. c*—Borneo,
laxiflora, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 105.—Formosa,
longifolia, *Benth. I. c.* 107; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 289.—Bras,
lucida, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 245.—Afr. trop.

DEBBIS:—
macroloba, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 297.—Sumatra,
macrophylla, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 114.—Java.
Maingayana, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 245.—Singapore,
marginata, *Benth. in Miq. PL Jungh.* 252, in adnot.—Reg. Himal.
microptera, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iV. *Suppl-* (Ib60) 113.—Reg. Himal.
montana, *Benth. in Miq. PL Jungh.* 253.—Java,
multiflora, *Benth. 1. c.*—Ins. Philipp.
ntgtensis,Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. *Suppl.* (1860) 107; *et in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 288.—Bras,
oblonga, *Benth. 1. c.* 112.—Ind. or.
ovalifolia, Benth. in Miq. PI. Jungh. 252=obloDga.
paniculata, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl-* (1860) 106.—Zeylan.
parviflora, *Benth. 1. c.*—Zeylan.
pinnata, Lour. Fl. Cochinch. 482=tamarindifolia.
platyptera, *Baker, in Hoohf. Fl. Brit. Ind.* ii. 246.—Ind. or.
polyanthra, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 298.—Sumatra,
polyphylla, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *SuppL* (1860) 104.—Java.
polystachya, *Benth. I. c.* 114.—Reg. Himal.
preyarthra, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 797, sphalm. •* pyxrothyrsa.
pnbinervis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *SuppL* (1860) 109.—Ins. Timor,
pubipetala, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1.145.—Java,
pyrrothyrsa, *Miq. I. c. SuppL* 297.—Sumatra,
robusta, *Benth. in Joum. Linn. Soc* iv. *SuppL* (I860) 104.—Ind. or.
scandens, *Benth. I. c.* 108.—AustraL
secunda, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 247—Reg. Himal.
sinuata, *Benth. ex Thw. Enum. PL Zeyl.* 93.—Burmai Malaya.
Spanogheana, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* L 1.142.—Ins. Timor.
{hyrsiflora, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl-* (1860) 114.—Reg. Himal.; Malaya,
timorensis, *Blume, ex Miq, Fl. Ind. Bat.* i. I. IS8-" Timor; Java; N. Guinea.
trifoliata, Lour. Fl. Cochinch. 438, ed. Willd. ii. 626" uliginosa.
nliginosa, *Benth. in Miq. PL Jungh.* 252.—Geronttropvestita, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 24*—Malaya.
Wightii, *Baker, I. c.* 247.—Ind. or.

DERWENTIA, Rafin. FL Tellur. iv. 55 (1836)-Veronica, Tourn. (Scrophul.).
perfoliata, Rafin. 1. c.=V. perfoliata.
suaveolens, Rafin. 1. c—V. Dementia.

DESCANTARIA, Schlecht. in Linnaea, xxvl. (1863) I.40 = Tradescantia, Linn. (Commelin.).
Balbòd, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. ¥&*• iii. 303 = T. elongata.
cumanensis, Schlecht in Linnaea, xxvi. (1853) 1*° T. cumanensis.
diuretica, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. PI-iiù 304=T. elongata.
prncumbens, Schlecht in Linnaea, xxvi. (1853) I*1 " T. multiflora.
Schlechtendalii, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Mo»<*-Phan. iii. 804 - T. elongata.

DESCHAMPSIA, Beauv. Agrost 91. t 8.£ 8(18l2)-*CRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1157.
AIRIDIUM, Steud. Syn. PI. Gram. 423 (1864).
AVEKELLA, Parl. Fl. Ital. i. 244 (1850).
CAMPELLA, Link, Hort. Berol. i. 122 (1827).
CZERNIAEIRA, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. «• (1853).
LERCHENFELDIA, Schor, Enmm. PL Transs. (1866).
MONANDRAIRA, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 8*1-t 79 (1858).
PERIBALLIA, Trin. Fund. Agrost 133 (182°).
PEYRITSCHIA, Foum. ex Benth. *Sc* Hook, *i-* Ge"' 1168 (1883).
PODIONOPUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 82 (1867).
RYTIDOSPERMA, Steud. Syn. PI. Gram. 42 (1854).
VAHLODEA, Fries, in Bot. Notiser, (1842) 17§-
aenea, Trin. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 421-caespito»»-

DESCHAMPSIA :-
auaeformis, *Benth. b[1] Hook.f. Gen.* iii. 1158.—Chili,
alba, *Roem.* &• *Schult. Syst.* ii. 688.-Greenland.
<up'gena, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 326 = caespitosa.
alpina, *Roem.* &• *Sckult. Syst.* ii. 686.—Rossia.
ambigua, *Beauv. Agrost.* 91.—Am. bor.
andina, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 564.—Chili.
Andraei, Schur, Enum. PI. Transs. 758 = caespitosa.
antarctica, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 388-Aira antarctica.
antarctica, *Hook.f. in Phil. Trans,* clxviii. (1879) 18.—Ins. Antarct.
aralensis, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xii. (1868) II. 300=Bromus crinitus.
argentea, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1881) reimpr. 7.—Ins. Canar.; Azor.
arundinacea, Spreng. Nov. Prov. 16 = Danthonia Forskalii.
atropurpurea, *Scheele, in Flora,* xxvii. (1844) I. 56.—Reg. temp.
australis, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Ins. Hawaii,
oaetica, *Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* L 66.—Hispan.
Be'teroniana, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* i. (1S36) 66.-CMU.
wbersteiniana, Roem. *Sc* Schult. Syst. Mant. ii. 880 = caespitosa.
°°ttnica, Trin. Fund. Agrost. 158 = caespitosa.
"•evifolia, R. Br. in App. Parry, Voy. 191-caespitosa.
caespitosa, *Beauv. Agrost.* 91. t. 18. f. 3.—Cosmop. temp.
calycina, *J.* &• *c. Presl, Rel. Haenk.* i. 251.—Am. bor.
a»nthonioides, Mnnro, in Benth. PI. Hartw. 342 = ealydna.
discolor, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 686 = juncea, flexuosa.
ntana, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 187 = caespitosa ?
"ongata, *Munro, in Benth. PI. Hartv.* 842.-Am. bor.
lexuosa, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Petersb.* i. (1836) 66.
Keg- bor. temp.
Jsa, Hack. Cat. Gram. Portugal. 33.—Ins. Azor.
Gr Don> eX Lond< Hortl Brit,, 28 = caespitosa.
*VaSey, *n Cmlt, BoU Ca,,, X<* (1885^ 224.
E»pudiflora, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 220.—Hungon.
*«!«, Bess, ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 422=bottnica.
"Olciformis, *J. (y c. Presl, Rel. Haenk.* i. 251.—Calif.
involucrata *Trin.* «* «»«• *Sc. Acad. Petersb.* i. (1836) —Hispan.
B Jauv. *Agrost.* 91.—Europ.; Am. bor.
E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 836.—Chili,
koelerioides, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 96.—Mexic.
Re &/<»« B uU- S<K- Nat. Mosc. xii. (1868) 299.—As. temp.
laevigata, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 687=alpina.
laevis, *Schutt. Hand.* ii. 880.—Lusitan.
lasiantha, *Phil. in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 290.—Chili.
*Hochst- exA- Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 413 = pitosa.
latifolia *Lin «e"*> «« (1857-58) 91.—Chili.
Cat. Gram. U. St. 53.—Calif.
Uttl Lin »aea, xxix. (1857-58) 91.—Am. austr.
Reut_Cat_PI_Gene «1. II. 236=caespitosa.
*BUII> in J<mrn_LinH_S0C_ItXii_* (1885) 60
Roem. & Schult. Syst. ii. 687= juncea.
G. D0D, ,, ,ouii Hort_ Brit_ 28=Aiia
*fil. Fl. Ital. i. 241-bottnica ?
montana, *Schnr,* Ennni- PL Transs. 753=caespitosa.
nitida, *Cg Presl Rel_Haenk_ 251* = Deyeuxia
*B*auv_ A rMt 91>* 160 = caespitosa.
parviflora, parvula, *E G<V'Fl_chil_vi-339-Chili*
*Tnn_inB"U- Sc. Acad. Petersb. i. (1886) 66
pulchella, *Ne**f f"J 9'«». *Reise, 1*311,312, nomen.—
refracta, *Roem. 5 ' Sch Brt_ s*st_ U_ «87.-Hispan.
setacea, *Hack.* Cat. Gram. PortugaL 38 = Aira setacea.
stricta, *Hack. l.* '• 18—Lnsit.
subtrifora, P»rL FU Palerm. i. 101= juncea.

DESCHAMPSIA:—
Thuillieri, Gren. & Godi. Fl. Fr. iii. 508 - Aira setacea.
uliginosa, *Scheele, in Flora,* xxvii. (1844) 56.—Europ.
Wahlenbergiana, Scheele, 1. c. = bottnica?
Wibelicma, Parl. Fl. Palerm. i. 101=Aira Wibeliana.
Wiebeliana, Schur, in Oeslr. Bot Zeitschr. ix. (1859) 326-= caespitosa.

DESCUtAEA, [Moç. & Sesse] ex DC. Prod. iv. 483 (1830) = Symphoriearpos, Dill. (Caprifol.).
leucocarpa, [M09. & Sesse] ex DC. 1. c.= S. microphyllus.
margaritaria, [Moç. & Sesse] ex DC. 1. c. (= *Margaris nudiflora).*—Mexic

DESCURAINIA, Webb &. Berth. Phyt. Canar. i. 72 (1836) = 8iflymbrium, Linn. (Crucif.).
Boryi, Des Moul. in Actes Acad. Bord. vii. (1845) 353 ^ S_a pinuatifiduin.
Irio, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 73=S. Irio.
mille/olia, Webb & Berth. 1. c.=S. Irio?
Peyrusiana, Des Monl. in Actes Acad. Bord. vii. (1845) 853 = S. pinnatifidum.
pinnatifida, Webb, It. Hisp. 76=Braya pinnatifida.

DESFONTAENA, VeU. Fl. Flum. 95 (1825)=Apgithamnia, Sw. (Euphorb.).
tricocca, Veil. L c.; ii. 1.146-A. tricocca.

DESFONTAINA, Steud. Nom. ed. II. i. 498 (1840) ~ praec.

DESFONTAINEA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 273 (1825)=Desfontainia, Ruiz & Pav. (Logan.).

DESFONTAINEA, Reichb. Nom. 195 (1841) =DESFONTAENA, Veil. = Argithamnla, Sw. (Euphorb.).

DESFONTAINESIA, Hoflingg. Verz. *V&.* 56 (1824) =• rontanesift, Labill. (Oleac.).

DESPO1TTAIWIA, Ruiz & Pav. Prod. 29. t. 5 (1794).
LOGANIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 794.
LINKIA, Pers. Syn.i. 219 (1805).
acutangula, Dun. in DC. Prod. xiii. 676=spinosa.
chilensis, *C. Gay, Fl. Chil.* v. 100.—Chili.
fulgens, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvii. (.1837) 505 = spinosa.
Hookeri, Dun. in DC. Prod. xiii. 676- spinosa.
ilicifolia, Phil, in Linnaea, xxix, (1857-58) 25 = spinosa.
parvifolia, *D. Don, in Edinb. Phil. Journ. [Jul.-Sept.* 1881) 276.—Peruv.
spinosa, *RUIB tf Pav. Fl. Per.* ii. 47-1 186.—Peruv.
splendens, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aequin. i. 157=spinosa.

DESFORGIA, Steud. Nom. ed. II. i. 493 (1840) = DEFFORGIA, Lam.^ForgBBia, Comm. (Saxifr.).

DESMANTHODIUM, Benth. in Hook. I«. PL t. 1116.(1872). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 345.
guatemalense, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 142.—Guatemal.
ovatum, *Benth. in Hook. Ic. PI.* sub t. 1116.—Mexic.
perfoliatum, *Benth. I. c.* 11116.—Mexic.

DESMAKTHTTS, Willd.Sp. PI. iv. 1044, partim (1805).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. £ i. 592.
DARLINGTONIA, DC. in Ann. Sc. Nat Ser. I. iv. (1825) 97.
adnaciformis, Span. Ic. 60 j ex Linnaea, xv. (1841) 198 = Neptunia adnaciformis.
acuminatus, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 357.—Am. bor. occ.
Adenanthera, Wall. Cat. n. 5298=Neptunin plena,
arborescens, *Boj. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 387.—Madag.
brachyllobus, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 858.—Am. bor.
callistachys, *DC. Prod.* il. 416.—Hab. ?
caudatus, Steud. Nom. ed. II. i. 493 = Entada polystachya.
dnereus, Willd. Sp. PI. iv. 1048 = Dichrostachys cinerea.
Commersonianus, *Baill. in. Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 361.—Madag.
comosus, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 475.—Cuba.

DESMANTHUS :—
depressus, *Humb.* &• *Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 1046.—Am. bor. et trop.
diffusus, Willd. 1. c.=depressus ?
divergens; Willd. 1. c. 1048 = Dichrostachys nutans.
falcatus, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 456-brachylobus.
incurvus, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 84.—Mexic.
Jamesii, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 402.—Am. bor. occ.
lacustris, Torr. *Sc* Gray, 1. c.=Neptunia tenuis.
laeustris, Willd. Sp. PI. iv. 1044=Neptunia oleracea.
leptolobus, *Torr. ft Gray, Fl. N. Am.* i. 402.—Am. bor. occ.
leptophyllus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. Vi. 264 = virgatus.
leptostachys,I>C. Leg. *Mim.* xii. 443=Dichrostachys nutans.
natans, Willd. Sp. PI. iv. 1044=Neptunia oleracea.
nutans, DC. Prod. ii. 446 = Dichrostachys nutans.
obtusus, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 871.—Texas,
palustris, *Bertol.f. in Mem. Ace. Sc. Bolog.* iii. (1851) 266.—Afr. trop.
pedunculatus, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861, (1862) 454 = velutinus.
Pervilleanus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1883) 361.—Madag.
plenus, Willd. Sp. PI. iv. 1045-Neptunia plena.
polyphyllus, DC. Prod. ii. 444 = Neptunia plena.
pratorum, Macfad. Fl. Jamaic i. 811=depressus.
punctatus, Willd. Sp. PI. iv. 1047-Neptunia plena.
pusillus, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 198-Neptunia adnaciformis.
reticulatus, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 857.—Am. bor. occ.
rhombifolius, Buckl. in Froc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862), 454 = reticulatus.
salinarum, Steud. Nom. ed. I. 269 = Prosopis juliftora.
stolonifer, DC. Prod. ii. 444 = Neptunia oleracea.
strictus, Bertol. in Giom. Arcad. xxi. (1824) 190 [bis] =virgatus.
tenellus, DC. Prod. ii. 445 = depressus.
trichostachyus, DC. Mem. Leg. xii. 444.167-Dichiostachys nutans.
Mquetrus) Willd. Sp. Pl.iv. 1046=Neptunia triquetra.
trispermus, *Span. Ic.* 62 ; *ex Linnaea,* xv. (1841) 199 (Neptuniae sp. 1).—Ins. Timor,
velutinus, *Scheele, in Linnaea,* xxi. (1848) 455.—Mexic.
virgatus, *Willd. Sp. PI.* iv. 1047.—Am. DOT. ; Ind. occ.

DESMAZERIA, Dum. Obs. Gram. Belg. 48 (1828) = Demarzeria, Dum. (Gramin.).

DESMESIA, Rafln, Fl. Tellur. iii. 63 (1836) (Aroid.).
orixensis, Rafin. 1. c. = Typhonium trilobatum.
venosum, Rafin. 1. cSauromatum guttatum.

DESMIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1884) 153=Erica, Linn.
aequalis, D. Don, 1. c.=E. aequalis.
conferta, D. Don, 1. c. = E. conferta.
polifolia, D. Don, 1. c.-E. polifolia.

DESMIDOCHUS, Reichb. Consp. 130 (1828) ^Bouceroaia, Wight & Arn. (Asclep.).

DESMIDORCHIS, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 94 = BouoeroBia, Wight *Sc* Am. (Asclep.).
acutangula, Decne. in Ann. Sc.Nat. Sér. II. ix. (1838) 266 = B. acutangula.
crenulata, Decne. 1. c. = B. crenulata.
Forskalii, Decne. 1. c. = B. Forskalii.
pauciflora, Decne. 1. c. 266 = B. pauciflora.
retrospiciens, Ehrenb. in Abh. Acad.Berl. (1881) 33-B. Russeliana.
umbellata, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838} 266 = B.umbellata.

DESMITUS, Rafin. Sylva Tellur. 189 (1888) = Camellia, Linn. (Temstroem.).
reticulata, Rafin. 1. c. =C. reticnlata.

DESMOCARPUS, Wall. Cat. n. 6978 (1832) = Cadaba, Forsk. (Cappar.).
missionis, Wall. 1. c.=C. trifoliata.

DESMOCEPHALUM. Hook. f. in Proc. Linn. Soc. i. (1815) 277; et is Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 208 = Elvira, Cass. (Compos,).
inelegans, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1847) 209.—Ins. Galap.

DESMOCEPHALUS, Benth. & Hook. *C* Gen. ii. S4S (1878) = praec.

DESMOCHAETA, DC. Cat. Hort. Monsp. 101 (1813) —Fupalia, Juss. (Amarant.).
achyranthoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 210 =Cyathnla achyranthoides.
alternifolia, DC. Cat. Hort. Monsp. (1818) 103 = Digera arvensis.
atropurpurea, DC. 1. c. 102=P. atropurpurea.
ciliata, Roem. *8c* Schnlt. Syst. v. 663 ™ Digera arvensis.
densiflora, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 211 = P. densiflora.
fiavescens, DC. Cat. Hort. Monsp. (1818) 102=P. lappacea.
globosa, Roem. *Be* Schult. Syst. v. 633=Cyathnla globosa.
lappacea, Griff. Notnl. iv. 889 = P. atropurporea.
micrantka, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 102 = Cyathula geniculata.
muricata, DC. 1. c. 103=Digera arvensis.
orbiculata, Wall. Cat. n. 6986 = P. orbicnlata.
patula, Roem. & Schnlt. Syst v. 660 - P. lappacea.
patula, Wall. Cat. n. 6937=Cyathula prostrata.
prostrata, DC. Cat. Hort. Monsp. (1818) 102 = Cyathula geniculata.
repensJLoem. 8c Schult. Syst. v.552=Cyathula prostrata.
sanguinolenta, Link, Enum. Hort. Berol. i. 1S4 = P. lappacea.
sequax, A. Br. in Flora, xxiv. (1841) 288 = Cyathula tomentosa.
sordida, Bunbury, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 109 - Cyathula achyranthoides)
tomentosa, Roem. & Schnlt. Syst. v. 664 = Cyathula, tomentosa.
uncinata, Roem. *8c* Schult. 1. c. - Cyathula achyranthoides.
velutina, Wall. Cat n. 6935-P. lappacea.
xanthioides, A. Br. in Flora, xxiv. (1841) 285- P. lappacea.

DESMOCLADUS, Nees, in Lehm. PI. Pieiss. ii. 66 (1846)=Loxooarya, R. Br. (Restiac.).
Brunonianus, Nees, 1. c. = L. fascicnlata.

DESMODIUM, Desv. Joum. Bot. i. (1813) 122. t. 5 *LEGUMINOSAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 519.
CATENARIA, Benth. in Miq. PI. Jungh. i. 220 (1852).
CODARIOCALVX, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 48.
CVCLOMORIUM, Walp. Rep. ii. 890 (1843).
DENDROLOBIVM, Benth. in Miq. PI. Jnngh. i. 216 (1852).
DICERMA, DC. Mlm. Leg. 326 (1825); et Prod. ii. 339.
DOLLINXRA, Endl. Gen. 1285 (1841).
EDUSARON, Medic, in Vorles. Chnrpf. Phys. Ges. ii. (1787) 871.
HETEROLOMA, Desv. ex Reichb. Consp. 152 (1828).
LAGOTIA, C. Mnell. in Walp. Ann. iv. 409 (1857), sphalm.
MEIBOMIA, Heist ex Adam. Fam. ii. 509 (1763).
NICOLSONIA, DC. Prod. ii. 826; Me'm. Leg. 811. t. 51 (1825).
OTOTROPIS, Nees, in Del. Sem. Hort. Vratisl. (1888). —Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 120.
OXYDIUM, J. J. Benn. PL Jav. Rar. 156 (1888).
PERROTTETIA, DC. in Ann. Sc Nat. *Sir. 1.* iv. (1825) 95.
PHYLLODIUM, Desv. Joum. Bot. i. (1813) 123. t. 5.
PLEUROLOBUS, Jaume St Hil. in Nouv. Bull. Soc. Philom. iii. (1812) 192.
PTEROLOMA, DC. Prod. ii. 826, in textu (1825); Benth. in Miq. PI. Jungh. i. 219 (1862).
SAGOTIA, Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 737.
TETRANEMA, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 149 (1830).
TROPITOMA, Rafin. New Fl. Am. ii. 19 (1836).
abyssinicum, DC. Prod. ii. 338 » D. Scalpe.
acanthocladum, *F. Muell. Fragm.* ii. 122.—Austral.
acrocarpum, Hance, in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 478=triqnetrum.
acuminatum, *DC. Prod.* ii. 329.—Am. bor.
DESMODIUM :—
adhaesivum, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1888) 314.—Mexic.
adscendens, *DC. Prod.* ii. 332.—Ind. occ.
affine, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 812.-r-Mexic.
Aiiiinianum, Beck, Bot. U. St. 84 »eanescens.
alatum, DC. Me'm. Leg. 321; Prod. ii. 826 = triquetrum.
Alamani, *DC. Prod.* ii. 380.—Mexic.
albiflorum, *Saltm. ex Benth. V Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* **(1853) 17, nomen ; rf** *Mart. Fl. Bras.* xv. I. 99.—Am. trop.
altissimum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 151, nomen.—Ind. or.
ambiguum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **i. 274.—** Mexic.
amoenum, Wall. Cat. n. 5726=concinnum.
amplexicaule, *Zoll. &• Mar. in Nat. en Ceneeik. Arch. Neirl. Indie,* iii. (1846) 77.-Java,
amplifolium, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **i. 274.—** Mexic.
andstrocarpum, DC. Prod. ii. 831=incanum.
Andersoni, *Seem. Fl. Vii.* 56.—N. Caled.
angulatum, DC. in Ann. Sc. Nat Sir. I. iv. (1825) 101 = floribundnm.
angulatum,V/M. Cat. n. 5729 M = Lespedeza eriocarpa.
angulatum. Wall. 1. c. n. 6729, ex parte = polycarpum.
angnstifolium, *DC. Prod.* ii. 828.—Mexic.
annuum, A. Gray, PI. Wright, ii. 46=spirale.
Aparines, DC. Prod. ii. 830 = uncinatum.
Aparines, Hassk. PI. Jav. Rar. 366 — spirale.
arboreum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 151 = Uraria Lagopus.
arenarium, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 527.—Venezuela.
argenteum, Wall. Cat. n. 5718 = tiliaefolium.
arizonicum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* **xx. (1885)** 863.—Arizona.
asperum, *Desv. Joum. Bot.* i. (1813) 122.—Am. trop.
auricomum, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5704.—Ind. or.
auriculatum, DC. Me'm. Leg. 821=triquetrum.
australe, DC. Prod. ii. 826 = umbellatum.
australe, Hassk. PI. Jav. Rar. 856 = D. Cephalotes.
axillare, *DC. Prod.* ii. 338.—Ind. occ.
bambusetorum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 256=Gardneri.
habaXma, Benth. tr Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1863) 18.—Am. trop.
barbatum, Wall. Cat. n. 5724-confertum.
Barclayi, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 88.—N. Granat
batocaulon, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 47.—Am. bor. occ.
betuloides, *Bedd. in Madr. Joum. Sc.* Ser. III. i. (1864) 48.—Ind. or.
biarticulatum, *F. Muell. Fragm.* ii. 121. —As. trop.; Austral.
bicolor, Wall. Cat. n. 5719=laxiflorum.
bifloram, *DC. Prod.* ii. 336.—Ind. or.
•Bigelovii, A. Gray, PI. Wright, ii. 47=neo-mexicanum.
Boivinianum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1884)** 481.—Madag.
Boottii, Torr. ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 216 = Dillenii.'
brachypodum, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* **i.** 484.—Austral,
brachystachyum, *R. Grah. ex Benth. in Miq. PI. Jungh.* 223.—Ind. or.
brachystachyum, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1888) 321. —Mexic.
bracteatum, *Micheli, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 78.—Bras.
bracteosum, DC. Prod. ii. 329=cuspidatum.
brasiliense, Loud. Hort. Brit 310 = Aeschynomene brasiliana.
brevipes, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 100=cuneatum.
Buergeri, Miq. Ann. Mus. Bat Lugd. Bat. iii. 45=• polycarpum.
bullamense, G. Don, Gen. Syst. ii. 294=triflorum.
caespitosum, DC. Prod. ii. 333 = heterophyllum.
caffrum, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 251 = D. Scalpe.
cajanifolium, *DC. Prod.* ii. 331.—Am. trop.
cMileqis,Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. **i. 276.—Mexic.**
campy locaulon, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **ii.** 283.—Austral,
campyloclados, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **i. 276.—** Nicaragua.
canadense, *DC. Prod.* ii. 328.—Am. bor.
canescens, *DC. I. c.*—Am. bor.
capitatum, *DC. I. c.* 336.—Malaya,
caripense, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 292.—Venezuela.
DESMODIUM :—
cateniferum, Am. in Nov. Act Nat Cur. xviii. I. (1836) 831 = laburnifolium.
caudatum, *DC. Prod.* ii. 337.—Japon.
Cephalotes, *Wall. Cat.* n. 5721.—As. trop.
Chamissonis, Vog. in Linnaea, x. (1835-36) 588 = spirale.
ciliare, *DC. Prod.* ii. 329.—Am. bor.
ciliatum, *DC. 1. c.* 333.—Afr. austr.
dliosum, Hook. Comp. Bot Mag. i. (1885) 23 = ciliare *1*
cinerascens,^. *Gray, PI. Wright,* ii. 48.—N. Mexic.
cinereum, *DC. Prod.* ii. 330.—Mexic.
cinereum, Poepp. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 187 = D. Scorpiurus.
coeruleo-violacrum, DC. Prod. ii. 831 = barbatum.
coeruleum, G. Don, Gen. Syst. ii. 293 •= adscendens.
collinum, Loud. Hort. Brit. 310 = gangeticum.
collinum, Wall. Cat. n. 56a3=latifolium.
concinnuin, *DC. in Ann. Sc. Nat.* tier. I. iv. (1825) 101.—Reg. Himal.; Burma,
confertum, *DC. 1. c.*—Reg. Himal.
congestum, Benth. in Miq. PI. Jungh. 222=Lepto-desmia congesta.
congestum, Wall. Cat. n. 6723 = D. Cephalotes.
cordistipulum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **i. 277.—** Mexic.
cubense, *Griseb. Cat. PI. Cub.* **73.—Cuba.**
cumanense, DC. Prod. ii. 381=caripense.
cumanense, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. **494.—** Venezuela,
cuneatum, *Hook,* **b*** *Am. in Hook. Bot. Misc.* **iii-** (1838) 195.—Chili,
enspidatum, *Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 23.—Am. bor.
dasylobum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 805.—Sumatra.
dasyphyllum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 253 = Uraria hamosa.
delicatulum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i. 205.—** Abyssin.
deltoideum, Walp. Rep. L 787 = lasiocarpum.
densiflorum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **i. 277.—** Mexic.
denudatum, *DC. Mim. Llg.* 826.—Ins. S. Doming,
dependens, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* **i. I. 248.—** —Ins. Molucc.; N. Guinea.
dichotomum, DC. Prod, it 336=diffosum.
diffusum, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Set. I. iv. (1825) 100. —Ind. or. j Burma.
diffusum, DC. Prod. ii. 335 = laxiflornm.
Dillenii, *Darl. Fl. Cestr.* 414.—Am. bor.
dimorphum, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr-* ii. 161.—Afr. trop.
dioicum, *DC. Prod.* ii. 338.—Nepal,
discolor, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 103.—Bras.
distans, Royle, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 172 = polycarpum.
divergens, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 298, nomen.—Ind. or.
diversifolium, *DC. Prod.* ii. 334.—Madag.
diversifolium, Schlecht. in Linnaea, xii. (1888) 313 = incanum.
dolabriforme, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* **226.—** Ind. or.
Dregeanum, *Benth. 1. c.* 222.—Afr. austr.
dubium, Lindl. Bot. Reg. t. 967 = floribundnm.
elatum, *DC. Prod.* ii. 328.—Mexic.
elatum, H. B.& K. Nov. Gen.et Sp.vi. 528-aspernni.
elegans, *Benth. Fl. Hongk.* 83.—China.
elegans, DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. iv. (1825) 100-tiliaefolium.
elegans, Schlecht. in Linnaea, xii. (18S8) 320" venustum.
ellipticum, Macfad. Fl. Jamaic. i. 268 = adscendens.
elongatum, Wall. Cat. n. 5715 = laxiflorum.
elongatum, Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Neert. Indie, iii. (1846) 58 ~ Gardner!,
emarginatum, *DC. Prod.* ii. 388.—Ins. Martinic.
erythrynaefolium, *DC. I. c.* 831.—Am. austr.
exiguum, A. Gray, PI. Wright, ii. 46=neo-mexicanuni-
ferrugineum, Wall. Cat. n. 5732 = rufescens.
filiforme, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* **xx. (1851) »** —Ins. Galapag.
filiforme, *Zoll. V Mor. in Nat. en Geneesk. Arc*-Neirl. Indie,* iii. (1846) 77—Java,
flagellare, *Benth. Fl. Austral,* ii. 233.—Austral,
flexuosum, *Wall. Cat.* n. 5691.—Burma.
floribuudum, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 297.—Reg. Him*-
floridanum, *Chapm. Fl. S. U. St.* 102.—Florida.

DEBMODItTM:-
foliosum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 278.—Mexic.
formosum, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 29.-China.
fruticulosum, Walp. Rep. i. 787=mauritianum.
gangeticum, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 408 = latifolium.
g»»geticum, *DC. Prod.* ii. 327.—As. trop.; Austral.
Jjardneri, *Benth. in Miq. PI. Jungk.* 226.—Ind. or.
^niesbreghtii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 279.—Mexic.
glabellum, *DC. Prod.* ii. 329.—Am. bor.
glabrum, *DC. I. c.* 338.—Honduras,
glaucescens, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 569.—Gpiana.
fiTacile, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. H. „ (1843) 182.—Mexic.
Grahami, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 48.—N. Mexic.
graminenm, *A. Gray, 1. c.* 46.—N. Mexic.
gttnde, *Kurt, in Journ. Soc., Beng.* xliii. (1874) H. 184.—Burma.
grande, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 124 = paleaceum.
grandiflorum, DC. Prod. ii. 838=acuminatum.
grandifolium, *DC. I. c*—Ind. or.
granulatum, Walp. Rep. i. 737=triflorum.
^nffithianum, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 222.—Reg. Himal.
Buianense, *DC. Prod.* ii. 338.—Guiana.
°«nnianum, Benth. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 485=varians.
&«»»<», Hook. f. Fl. Tasm. i. 101=praec.
gyrans, *DC. Prod.* ii. 326.—As. trop.
Eyroides, *DC. Mem. Leg.* 322 ; Prod. ii. 326.—As. trop.
gynides, Hassk. PI. Jav. Rar. 862 = polycarpum.
namosum, Loud. Hort. Brit. S10 = Uraria hamosa.
Hardwiciianum, Voigt, Hort. Suburb. Calc 223-rhomboideum.
Hartwegianum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 279.—Mexic.
hepta*Peyr. in Linnaea, xa.* (1859-60) 79—Mexic.
phynum, Sweet, Hort. Brit. ed.II. 151, nomen.—Ind. or.
•"tterocarpum, DC. Prod. ii. 837=polycarpum.
neterophyllum, *DC. I. c.* 334.—As. trop.
neterophyllum, *Hook,* &" *Am. Bot. Beech. Voy.* 417.—Mexic.
-"fterophyllum, Wall. Cat. n. 5701, C-triflorum.
ttilsenbergii, *Boj. ex Steud. Norn,* ed. II. i. 495, nomen.
• ,—Madag.
"'Ppocrepidium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. ^^(1880)124 = iq. *
"}Ppocrepis, DC. Prod. ii. 338-polycarpum.
Mrsutum, *Mart.* &• *Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. ..(1843)186.-Mexic
wtum, *Guill. V Perr. Fl. Seneg. Tent.* 209.—Afr.
"ookerianum, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 1161.—Mexic.
"°rs/ieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 251 = Uraria hamosa.
"nablotianum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (18841 431.-Madag.
"nifusum, *Beck, Bot. U. St.* 86.—Am. bor.
"nose, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 489.—Am. bor.
jeanum, *DC. Prod.* ii. 332.—Ind. occ.
"ractum, *DC. I. c.* 830.—Mexic.
J'ponicum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 46 = Podocarpum.
jvanens Boj. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 18 = paleaceum.
n. *Thw. Enum. PL Zeyl.* 411.—Zeylan.
». 228, 232._Burma.
**rstenu, *O. Hoffm. in Linnaea,* xliii. (1880-«2) 127.
A.Tr. trop.
[«»*a, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 250= inorum.
»6umifolium, *DC. Prod.* ii. 837.—As. trop.
"'Krntfolium, Sieber, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 187
^eajanifolium.
"escens. *Boj. Hort. Mount.* 100.—Ins. Maurit.
Steud. Nom. ed. n. '•495 = praec?
eatUm> *DC. Prod.* "•329.—Am. bor.
*pr°ca*rpum, *Hms Bil Ct en A. m. Bt°. i* . 280.—Mexic.
lanceolatum, Walp. Rep. i. 787= gangeticum.
lasiocarpum, DC. Prod. ii. 828=latifolium.

DESMODITTM :—
lateristachys, Boj. ex Baker, in Oliver, FL Trop. Afr. ii. 166 = paleacenm.
latifolium, *DC. Prod.* ii. 828.—As. et Afr. trop.
latifolium, Wight, Ic t 272 = gangeticum.
laxiflorum, *DC. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. iv. (1825) 100.—As. trop.
laxum, DC. 1. c. 102 - podocarpum.
leiocarpum, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 294.—Reg. Argent,
leptoclados, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 44.—Mexic.
leptopus, *A. Gray, ex Benth. in Miq. PI. Jungh.* 226, in obs.—Ins. Philipp.
leptostachyum. Wall. Cat. n. 5697 B=laxiflorum.
Leschenaultii, DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. iv. (1825) 102 = Pseudarthria viscida.
lespedezioides, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 222.—Madag.
leucanthwm, Ra6n. New Fl. Am. ii. 19, in obs. (An monstrosa ?).—Am. bor.
limense, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 215.—Peruv.
Lindleyii, Mart. Ausw. Pfl. Muench. t. 17 =incanum.
linearifolium, *DC. Mim. Ug.* 825; *et Prod.* ii. 327.—Hab. ?
linearifolium, G. Don, Gen. Syst. ii. 294 = mauritianum*
lineatum, *DC. Prod.* ii. 880.—Am. bor.
lineatum. Span. Ic. 42; ex Linnaea. xv. (1841) 193 = D. Cephalotes.
lupulinum, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 317 = uncinatum.
lutescens, *DC. Prod.* ii. 326.—China,
macrophyllnm, *Desv. Journ. Bot.* i. (1818) 122, nomen.—Hab. ?
macropodium, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 44. —Mexic.
macrostachyum, *Hemsl. 1. c.*—Mexic.
maculatum, DC. Prod. ii. 327 — gangeticum.
madrense, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 45.—Mexic.
malachophyllum, *DC. Prod.* ii. 338.—Ins. Philipp.
marilandicum, *Boott, ex Darling. Fl. Cestr.* ed. II. 412.—Am. bor.
marylandicum, DC. Prod. ii. 828 = Dillenii.
mauritianum, *DC. I. c.* 384.—Ins. Maurit.
megaphyllum, *Zoll.* &• *Mor. in Nat. en Geneesi. Arch. Netrl. Indie,* iii. (1846) 77.—Java,
mexicanum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 479.—Mexic.
microphyllum, DC. Prod. ii. 837 = parvifolium.
molle, *DC. 1. c.* 332.—Am. bor.; Ind. occ.
molliculum, *DC. 1. c.* 331.—Am. austr.
monospermum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 1SL—Madag.
monospermum, Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par, i. (1884) 431-Boivinianum.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* ii. 235.—Austral,
multicaule, *DC. Prod.* ii. 331.—Peruv.
multifiorum, DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. iv. (1825) 101 = floribundum.
natalitium, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 82 = gangeticum.
Neaei, *DC. Prod.* ii. 888.—Hab. ?
nemorosum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 284.—Austral.
neo-mexicanum,i4. *Gray, PI. Wright,* i. 53.—Mexic.
nervosum, Vog. in Nov. Act. Nat. Cur. nix. Suppl. i. (1843) 28-polycarpum.
neurocarpum, *Benth. Fl. Austral,* ii. 234.—Austral,
nicaraguense, *Oerst. ex Benth. if Orst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 16.—Nicaragua,
nitidum, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 186.—Mexic.
novo-hollandicum, F. Muell. in Linnaea, xxv. (185t) 394 = Glycine tabacina.
nudiflorum, *DC. Prod.* ii. 830.—Am. bor.
nutans, Wall. Cat. n. 5706 - tiliaefolium.
obcordatum, *Kum, in Journ. As. Soc. Beng.* zlii. (1873) II. 229.—Burma,
oblatum, *Baker, ex Kurt, 1. c.* 230.—Burma.
oblongifolium, DC. Prod. ii. 382 = axillare 1
oblongum, *Wall. Cat.* n. 6714.—Burma.
obovatum, Wall. 1. c. n. 5722 B = capitatum.
obovatum,Vog. in Linnaea, xii. (1838) 106 = adscendens.
obtusum, DC. Prod. ii. 829 = marilandicum.
ochroleucum, *M. A. Curt, ex Canby, in Proc. Acad. Sc. Philad.* (1864) 17.—Am. bor.
Oldhami, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 166.—Japon.
orbiculare, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 311.—Mexic.
orbiculatum, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 298, nomen.—Hab. ?

DESMODIUM:—
orbiculatum, Wall. Cat. n. £695=retroflexum.
orizabanum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 45.—Mexic.
ormocarpoides, *DC. Prod.* ii. 327.—Ind. or.; Malaya.
ospriostreblum, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 204 = spirale.
ovalifolium, *Guill. V Perr. Fl. Seneg. Tent.* 208.—Afr. trop.
ovalifolium, Wall. Cat. n. 6780 = polycarpum.
ovalifolium, Walp. Rep. i. 787 = Alysicarpus rugosus.
oxalidifolium, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 249 = C. Trifoliastrum.
oxalidifolium, G. Don, Gen. Syst. ii. 294 = adscendens.
oxybracteum, DC. Prod. ii. 334=paleaceum.
oxylobum, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 764, sphalm. =• dasylobum.
oxyphyllum, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. iv. (1826) 102.—Reg. Himal.
pachyrhiza, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 97.—Bras,
paleaceum, *Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* 209.—Afr. trop.
Palmeri, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 45.—Mexic
paniculatum, *DC. Prod.* ii. 829.—Am. bor.
Parkinsoni, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 45.—Mexic.
Farryi, *Hemsl. 1. c.* 46.—Mexic.
parviflorum, *Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 172.—Ind. or.
parviflorum, *Mart. fJ Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 185.—Mexic.
parvifolium, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 408 = triflorum.
parvifolium, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. iv. (1825) 100.—As. trop.; Austral.
patens, G. Don, Gen. Syst. ii. 298, nomen; Wight, Ic. t. 407 = polycarpum.
pauciflorum, *DC. Prod.* ii. 330.—Am. bor.
paudnervium, DC in Ann. Sc Nat. Ser. I. iv. (1825) 101-concinnum.
pedicellatum, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5735 = tortuosum.
pedunculatum, *DC. Prod.* ii. 338.—Am. bor.
penduliflorum, Oudem. Neerl. Plantent. ii. (1866) t. 2 =Lcspedeza bicolor.
penduliflorum, Wall. Cat. n. 5727 =• concinnum.
pendulum, *F. Muell. Phyt. New Hebr.* 9.—N. Hebrides.
pendulum, Wall. Fl. As. Rar. i. 81. t. 94 = concinnum.
Perrottetii, DC. Me'm. Leg. 324; et Prod. ii. 827 - aspemm.
peruvianum, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 30.—Peruv.
physocarpos, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 104.—Bras.
pictum, Walp. Rep. i. 737 = Hedysarum pictum.
pilosiusculum, DC. Prod. ii. 335=uncinatum.
pilosum, *DC. I. c.* 387.—Japon.
platycarpum, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 100.—Bras.
plectocarpum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 46.—Mexic.
plicatum, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 685.—Mexic.
podocarpum, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. iv. (1825) 102.—Keg. Himal.; China; Japon.
podocarpum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 417. t. 96 = Hookerianum.
podocarpum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 46 = Gardneri.
polycarpum, *DC. Prod.* ii. 334.—As. trop.; Austral.
polycarpum, Wall. Cat. n. 5710 = oxyphyllum.
polycarpum, Wight 0c Am. Prod. 227, ex parte = capitatum.
polygonoides, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop Afr.* ii. 161.—Afr. trop.
polystachyum, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1888) 321.—Mexic.
portoricense, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 294.—Porto Rico.
praemorsum, K. Grah. in Wall. Cat. n. 6703-Lourea obcordata, D. Rottleri.
prehensile, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 315.—Mexic.
Pryoni, DC. Prod. ii. 834 = Wightii.
Pseudo-gyrans, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 244.—Java.
Pseudo-gyroides, Miq. 1. c.=gyroides.
Pseudo-triquetrum. DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. iv. (1825) ll'0=triquetrum.
psilocarpum, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 48.—N. Mexic.
psilophyllum, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 310.—Mexic.

DESMODIUM :-
pubens, Young, Fl. Texas, 233; ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 218-panicnlatnm.
pnlchellam, *Benth. Fl. Hongk.* 83.—As. trap.; Austral.
pulchellum, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 242 - polycarpum.
pulcherrimum, Shnttlew. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 188 - tortuosum.
punctatum, DC. Prod. ii. 338 =• Khynchosia densiflora.
purpureum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 62 = polycarpum.
pycnostachyum, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 299.—N. Caled.
quinquangulare, Wight, Ic. t 298=diffusum.
quinquangulatum, G. Don, Gen. Syst. ii. 298 = diffusum.
racemiferum, DC. Prod. ii. 831=adscendens.
racemosum, *DC. 1. c.* 337.—Japon.
radiatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 131.—Madag.
radicans, Macfad. Fl. Jamaic i. 269=axillare.
ramosissimum, G. Don, Gen. Syst. ii. 294-manritianum.
recurvatum, Wall. Cat. n. 5717=laxifloram.
reniforme, *DC. Prod.* ii. 327.—Ind. or.; Malaya.
repandum, DC. 1. c. 334 = 1). Scalpe.
ripens, DC. 1. c. 338 = Lespedeza repens.
reptans, DC. 1. c. 383 = axillare.
reticulatum, *Champ, ex Benth. in Hook. Kern Journ.* iv. (1852) 46.—China,
retinens, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 311.—Mexic.
retroflexum, *DC. Prod.* ii. 336.—Reg. Himal.; Burma; China.
retusum, G. Don, Gen. Syst. ii. 297 = polycarpum.
rhombifolium, DC. Prod. ii. 880 = laevigatum.
rhomboideum, *Sweet, Hart. Brit.* ed. II. 151.—Ind. or.
rhytidophyllum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 233.—Austral.
rigidum, *DC. Prod.* ii. 830.—Am. bor.
robustum, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 125 = Pscudarthria Hookeri.
Rottleri, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 174.—Ind. or.; Burma.
Rottleri, G. Don, Gen. Syst. ii. 297 = laxiflorum.
rotundifolium, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 172.—Ind. or.
rotundifolium, *DC. Prod.* ii. 330.—Am. bor.
rotundifolium, Wall. Cat. n. 5696 = retroflexum.
Roxburghii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 479=laxiflorum.
Roxburghii, Wall. Cat. n. 6716 = diffusum.
Roxburghii, Walp. Rep. iv. 369-latifolium.
Roy lei, Wight *8c* Am. Prod. 227 =gyrans.
rubescens, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 246 = megaphyllum.
rubiginosum, Benth. in Ann. Nat. Hist iii. (1839) 434 = asperum.
rubrum, *DC. Prod.* ii. 827.—Cochinch.
rufescens, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. iv. (1826) 101.—Ind. or.
sagittatum, *DC. Prod.* ii. 327.—Ind. or.
salicifolium, *DC. 1. c.* 337.—Ind. or.
salicifolium. Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 106 = Cranocarpus Martii.
Salvinii, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 46.—Guatemala.
sambuense, DC. Prod. ii. 885 = floribundum.
sandwicense, E. Mey. Cat. Sem. Hort. Regiom. (1850) 4.—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 230-uncinatum.
scabrellum, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 250= laxiflorum.
Scalpe, *DC. Prod.* ii. 334.—As. et Afr. trap.
scandens, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 246 = megaphyllum.
Schimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 20S = D. Scalpe.
sclerophyllum, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. 1.102.—Bras.
scoparium, Wall. Cat. n. 5699=parvifolium.
Scorpiurus, *Desv. Journ. Bot.* i. (1813) 122.—Jamaic.
scutatum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 287.—Mexic.
securiforme, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 226.—Ins. Philipp.
sennaarense, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 8.—Air. trop.
sequax, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 46.—Reg. Himal.

DESMODIUM:—
sericatum, Presl, Bot. Bemerk. 59 = D. Cephálotes.
sericocarpum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 47.—Mexic
sericophyllum, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 317.—Mexic.
serotinum, *DC. Prod.* ii. 338.—Mexic.
serpens, Wall. Cat. n. 6733 = polycarpum.
serriferum, Wall. 1. c. n. 5708 B=oxyphyllum.
sessilifolium, *Torr.* to" *Gray, Fl. N. Am.* i. 863.—Am. bor.
setigerum, E. Mey. Comm. PL. Afr. Austr. 124 = hirtum.
siliquosum, DC. Prod. ii. 336 = polycarpum.
simplex, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 294.—Afr. trop.
Sinclairi, Benth. Bot. Voy. Sulph. 82 = uncinatum.
sinuatum, *Blume, ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 166.—Reg. Himal.; Malaya.
Skinneri, *Benth. in Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 47.—Guatemala.
Sonorae, A. Gray, Fl. Wright, ii. 47 =uncinatum.
sparsiflorum, G. Don, Gen. Syst. ii. 294 = incanum.
spartioides, DC. Prod. ii. 337 = varians.
spectabile, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 670 = asperum.
spectabile, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 479.—Ins. Maurit.
spirale, *DC. Prod.* ii. 882.—Cosmop. trop.
spirale, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 188 = neo-mexicanum.
Sprengelii, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1154 = spirale.
squarrosum, DC. Prod. ii. 882 = Eriosema squarrosum.
stipulaceum, DC. 1. c. 330 = tortuosum.
stipulaceum, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 75-parvifolium.
stipulaceum, Wight & Am. Prod. 229 = triflorum.
stoloniferum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 496.—Porto Rico.
strangulation, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 87, partim = Thwaitesii.
strangulatum, Wight & Am. Prod. 228 = D. Scalpe.
striatum, *DC. Prod.* ii. 337.—Japon.
strictum, *DC. 1. c.* 329.—Am. bor.
strobilaceum, Benth. PI. Hartw. 11 = Hartwegianum.
strobilaceum, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 316.—Mexic.
subsecundum, *Vog. 1. c.* 99.—Bras,
subsessile, *Schlecht. I. c.* 319.—Mexic.
substipulaceum, *Blume, ex Kura, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) II. 230.—Burma,
subtile, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 47.—Mexic.
sutmbuense, G. Don, Gen. Syst. ii. 296 = floribundum.
sulcatum, Wall. Cat. n. 6736 = laxiflorum.
supinum, DC. Prod. ii. 332 =. incanum.
sylvaticum, Benth. PI. Hartw. 116 = spirale.
tenellum, DC. Prod. ii. 333-spirale.
tenue, G. Don, Gen. Syst. ii. 294=mauritiannm.
tenue, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5731=polycarpum.
tenuiculum, DC. Prod. ii. 333-spirale.
tenuifohum, *Torr. If Gray, Fl. N. Am.* i. 368.—Am. bor.
teres, *Wall. Cat.* n. 5694.—Burma.
terminate, DC. Prod. ii. 327 = molle.
terminate, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 207 - spirale.
Thonningianum,H. Dietr. Syn. PI. iv. 1147 = Alysicarpus rugosus.
Thunbergii, *DC. Prod.* ii. 337.—Japon.
Thwaitesii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 169.—Zeylan.
Jliaefolium, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 297.—Reg. Himal.; Burma,
timoriense, *DC. Mim. Ug.* 323; *et Prod.* ii. 327.—Ins. Timor.
tomentosum, *DC. Prod.* ii. 337.—Japon.
tortuosum, *DC. 1. c.* 332.—Am. bor.; Ind. occ.
tortuosum, Webb, in Hook. Niger Fl. 122 = spirale.
trichocaulon, Hassk. PI. Jav. Rar. 367 = D. Scalpe.
trichocaulum, DC. in Ann. Sc Nat. Ser. I. iv. (1825) 101 = polycarpum.
trichocaulum, Zo\\. ex Miq. FL Ind. Bat i. 1.246 = Pseudo-gyrans.
trichostachyum, *Benth. Fl. Austral,* ii. 234.—Austral,
triflorum, *DC. Prod.* ii. 334.—Cosmop. trop.
triflorum, Wall. Cat n. 5734 F, ex parte; Wight & Am. Prod. 229 = heterophyllum.
Trifoliastrum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 248.—Java.
trigonum, DC. Prod. ii. 382 - uncinatum.
trinerve, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5720 - podocarpum.

DESMODITJM :—
trinervium, *Fisch. ex Loud. Hort. Brit.* 310, noraen.—Hab.i
triquetrum, *DC. Prod.* ii. 326.—As. trop.
tuberculatum, G. Don, Gen. Syst. ii. 298-polycarpum.
tuberosum, G. Don, 1. c.; Voigt, Hort. Suburb. Calc. 222 = Pueraria tuberosa.
umbellatum, *DC. Prod.* ii. 325.—As. tiop.
uncinatum, *DC. 1. c.* 881.—Am. bor. et austr.
varians, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 298.—Austral.; N. Caled.
variifolium, Steud. Norn. ed. II. i. 496 = incanum.
velutinum, *DC. Prod.* ii. 828.—Am. austr.
venosum, *Vog. in Linnaea,* xii. (1838) 103.—Bras,
venustulum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 290.—Panama.
venustum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 496.—Mexic.
vestitum, *Benth. ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 162.—Burma.
villosum, *DC. Prod.* ii. 338.-Mexic.
villosum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 291.—Mexic.
violaceum, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 298.—Bras.
virgatum, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 122=Lespedeza virgata.
virgatum, Zoll. *8c* Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 78 = latifolium.
viride, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* >• (1843) 29.—China.
viridiflorum, *Beck, Bot. U. St.* 84.—Am. bor.
viridiflorum, DC. Prod. ii. 82!) = canescens
viscidum, DC. 1. c. 886 = Pseudarthria viscida.
vitidnum, Wall. Cat. n. 6709 = laburnifolium.
Vogelii, Steud. Norn. ed. II. i. 496=adscendens.
Wade,.*X*>C. *Prod.* ii. 331.—Bras.
Walkeri, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. I. (1886) 331 = Wightii.
Wallichii, Steud. Nom. ed. II. i. 496=polycarpum.
Wightii, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6718.—Ind. or.
Willdenowii, G. Don, Gen. Syst. ii. 296= diffusum.
Wislizeni, *Engelm. ex A. Gray, PI. Wright,* i. 68.—Mexic.
Wrightii, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist,* vi-(1850) 177.—Texas.
eonatum, Miq.Fl. Ind. Bat. i. I. 250 « onnocarpoides.

DESMONCHUS, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 30 (1829) =seq.

DEBMONCUS, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 84 (1824).
PALMAE, Benth. *8c* Hook. f. iii. 942.
aëreus, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 307.—Bras,
americanus, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 382, noroen.—Ins. S. Vincent.
andicola, *Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap.* 86.—Reg. Andin.
ataxacanthus, *Barb. Rodr. Enum. Palm. Nov.* 25.—Bras,
chinantlensis, *Liebm. in Mart. Hist. Nat. Palm.* >» 321.—Mexic.
dubius, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 382, nomen** polyacanthos I
grandifolius, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviiL (1881) 1«—N. Granat.
horridus, *Splitg. ex Mart, in Palmet. Orb.* 61.—Guian.
intermedius, *Mart, ex H. Wendl. in Kerch. Palm-* 24S, —Hab. *1*
leptoclonos, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 315.—Bras.
leptospadix, *Mart. Palmet. Orb.* 62.—Bras,
longifohus. *Mart. 1. c.*—Peruv.
lophacanthos, *Mart. I. c.* 50.—Bras,
macroacanthos, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 88.—Bras.
macroacanthos, Spruce, in Journ. Linn. Soc xi. (187*) 168 - phengopbyllus.
major, *Crueg. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 519.—«* Trinit
melanacanthos, Mart ex Drude, in Mart. Fl. Bras. »'• II. 806 "horridus.
mitis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 90.—Bras.
oligacanthus, *Barb. Rodr. Enum. Palm. Nov.* »*• Bras.
orthacanthos, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 87. «• 69 Bras,
oxyacanthos, *Mart. I. e.* ii. 88.—Am. trop.

DE8MO1TCXT8.—
palustris, *Trail, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 353.—Bras,
panamensis, *Linden, Illustr. Hortic.* xiviii. (1881) 16.—N. Granat.
phoenicophyllus, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. H. 814.
phoenicocarpus. Barb, Rodr. Enum. Palm. Nov. 24 - Pycnacanthos?
Poiyacanthos, *Mart. Nat. Hist. Palm.* ii. 85. t. 68.—Bras,
polyphyllus, *Poit, ex Desf. Cat. Hart. Par.* ed. III. 80, "omen.—Guiana.
Praiifer, *Poepp. in Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 148.—eruv.
pumilus, *Trail, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 853.—Pycnacanthos, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 89.—Bras,
nparius, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 156.—Bras.
mdentum, *Mart. Palmet. Orb.* 48.—Bras.
Woaat, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 89.-Bras.
"allisi, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 16.—Btas.

DESMONEMA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. »«. III. xx. (1867) 26o. *MENISPERMEAE.*
«*»». *Miers, I. c.—Kh.* anstr.

DESMONEMA, Rafin. Atl. Joum. 177 (1838) = Euphorbia, Linn.
h"-ta, Rafin. 1. c. 178 = E. pilulifeni.

DESMOPHYLA, Rafin. Sylva Tellur. 48 (1888) = EhretU, Linn. (Borag.).
ottena, Rafin. 1. c. = E. fasciculate.

r>ESM0PHYLLUM, Webb & Berth. Phyt. Canat. i. 14 (1886)=,Buta,linn.
P'tnatum, Webb & Berth. 1. c. = R. pinnata.

DHSMOS, Lonr. Fl. Cochinch. 852 (1790)-Unona, J<»n.f.(Anonac).
thtnensis, Lonr. L c - U. discolor.
coe>'tnchineni!is. Lour. 1. c.=U. Desmos.

DESMOSCELIS, Naiid. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ?}«• (1849) 29. *MELASTOMACEAE,* Beiith. & Hook. f. i. 740.
cl,C?rata> Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 84.—Bras.
hf toides, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) SO.villosa.
'"tfkyoides, Nand. 1. c. =villosa.
"llosa, *Naud. I.* r.-Bras.

"ESMOSCHOENUS, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 271 (1868) -Seippua, Tonrn# (Cyperac).
'Ptralu, Hook. f. 1. c. S72-S. frondosus.

DESMOSTACHYS, Planch, ex Miers, in Ann. & Mag. Nat. His. S"- U- ix -(1852) 8". *OLACINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 350.
acumina1>1 Baker> in ?mrn- lin»- So- *»•* (188*) 33i*—Madag.
£•*•.*«&, I. *-M«bfr
'anchonianos, *Miers.in Ann. VMag. Nat.Hist.* Ser. R.nsc. J.*(1852) 399.—Madag.; Afr. trap.
Maua- "—Madag.
tumifo*hn*s, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. S58.-Afr. trop.

DESMOSTEMON Pl. Zeyl. 278 (1861) = Ostodes, Blame (Euphorb.).
zeylanicus, Thw. 1. c. = 0. zeylanicns.

DESMOTRICHUM, Blume, Bijdr. 829. t. 35 (1825)-Dendrobium, Sw. (Orchid.).
angulatum, Blume, 1. c. 829-Dendrob. homonymum.
angustifolium, Blume, 1. c. 830 = Dendrob. angustifolium.
appendiculatum, Blume, 1. c.-Dendrob. appendiculatum.
*comatu*BI, Blume> 1- c. = Dendrob. comatum.
convex,,m Blume_I c- 331=Dendrob. convexum.
cymbidio'des, Blume, 1. *c* 832 = Dendrob. cymbidioides.
elongatum, Blume, 1. c. = Dendrob. elongatum.
fimbriatum, hl ume,, . c. 829-Dendrob. plicatile.

DESMOTRICHUM:—
- *geminatum,* Blume, Bijdr. 882=Dendrobinm geminatum.
grandiflorum, Blume, 1. c. 831 = Dendrob. grandiflorum.
pusillum, Blume, 1. c.=Dendrob. pusillum.
triflorum, Blume, I. c.=Dendrob. tiiflorum.

DE8PLATZIA, Bocqnill. in Adansonia, vii. (1866-87) 61. *TILIACEAE,* Benin. & Hook. f. i. 985.
subericarpa, *Bocquill. i. c.*—Afr. trop.

DESPRETZIA, Kunth, ReV. Gram. ii. 485.1.157 (1830) = Zeugitee, Schreb. (Gramin.).
mexicana, Benth. PI. Hartw. 82 - Z. Hartwegi.
mexicana, Kunth, Rév. Gram. ii. 485. t. 157 = Z. mexicana.

DESSENIA, Adans. Fam. ii. 285 (1768) = Qnidia, Linn. (Thymel.).
daphnefolia, Rafin. Fl. Tellur. iv. 106 = Lasiosiphon madagascariensis ?
hirsute, Rafin. 1. c.=Lasiosiphon pubescens?
lanceolata, Rafin. 1. c.«G. parviflora.

DESTRUGESIA, Gandich. Bot. Voy. Bonite, t. 57.(1844-46)-=Capparla, Linn.
scabrida, Gaudich. 1. c.=C. scabrida.

DESTRUGUEZIA, Benth. & Hook. f. Gen.i. 109 (1862) >praec.

DESVAUXIA, R. Br. Prod. 253 (1810) (Devauxia); ed. Nees, 108 (1827) - Centrolepis, Labill.
alepyroides, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 71 = C. aiepyroides.
aristata, R. Br. Prod. 253 = C. aristata.
Banisii, R. Br. 1. c = C. Banksii.
Billardieri, R. Br. 1. c. 262 -C. fasdcularis.
bremfolia, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 70 = C. Drummondii.
Drummondiana, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 51 = C. Drummondii.
exserta, R. Br. Prod. 253 = C. exsertft.
glabra,¥. Muell. in Unnaea, xxviii. (1866) 226 - C. glabra.
longifolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 418=-C. longifolia.
Patersonii, R. Br. Prod. 252=C. strigosa.
puhinata, R. Br. L c. = C. pulvinata.
pusilla, R. Br. 1. c 258 - C. pusilla.
strigosa, R. Br. 1. c. 262 =C. strigosa.
tenuior,R. Br. 1. c. = C. strigosa.
Urvillei, Steud. Syn. PI. Cyp. 267 - C. Drummondii.

DETANDRA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hut. Ser. III. xiii. (1864) 124; xx. (1867) 17 = Sychnoaepalum, Kichl. (Menisperm.).
latifolia, Mien, ll.ee. 124 j 19.—Bras.
ovata, Miers, 11. cc.=S. microphyllum.

DETARITTM, Joss. Gen. 865 (1789). *LEGUM1-NOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 585.
Beurmannianum, *Schweinf. in Zeitschr. Allg. Erdi.* (1868) 297; *ex C. Muell. in Walp. Rep.* vii. 824.—Afr. trop.
Heudelotianum, Baill. in Adansonia, vi. (1866) 201 = senegalense.
microcarpum, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 271 = senegalense.
senegalense, *J. F. Gmel. Syst.* 700.—Afr. trop.
teylanicum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 414=Crudia zeylanica.

DETHARDINGIA, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 80 = Breweria, R. Br. (Convolv.).
heterantha, Nees & Mart. 1. c—Bras.

DETHAWIA, Endl. Gen. 775 (1839)=Seseli, Linn. (Umbellif.).
tenuifolia, Endl. I.e. *{=Wallrothia tenuifolia).*—Mont. Pyren.

DETRIDIUM, Nees, Gen. et Sp. Ast. 255 (1833) = Pelioia.Cass. (Compos.).
Bergianum, Nees, 1. c. 266'Aster Bergianus.

DETRIS, Adans. Fam. ii. 131 (1768) = Felicia, Cass. (Compos.).

DEUTZIA, Thnnb. Nov. Gen. *V)* (1781); Fl. Tap. 10 (1784). *SAXIFSAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 642.
Brunoniana, Wall. Cat. n. 8650=staminea.
canescens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 347=scabra.
caneseens, Siebold, ex Stcud. Norn. ed. II. i. 497, sphalm.? pro *crenata.*
corymbosa, R. Br. in Wall. Cat. n. 8652 = parviflora.
corymbosa, Lindl. Bot. Reg. (184011. 5 = staminea.
crenata, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 19-=scabra.
dentata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 347 = scabra.
Fortunei, Carr. in Rev. Hortic. (1866) 388 = scabra.
gracilis, *Sieb. V Zucc. Fl. Jap.* i. 22.— Japon.
grandiflora, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pitersb.* ii. (1835) 104. -China,
macrantha, *Hook./, tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 84.—Reg. Himal.
mexicana, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 9.—Mexic.
parviflora, *Bunge, in Mlm. Sav. Etr. Pitersb.* ii. (1835) 104.—China.
scabra, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 20. t. 7 partim = Sieboldiana.
scabra, *Thunb. Nov. Gen.* 19, 20, 21; *Fl. Jap.* 185.— Japon.
Sieboldi, tfoem. in Gartenfl. (1867)74 = seq.
Sieboldiana, *Maxim, in Mem. Acad. Petersb.* Sér. VII. x. n. XVI. (1867) 26.—Japon.
staminea, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 865 ; *et PI. As. Rar.* ii. 82. t. 191—Reg. Himal.

DEVAUXIA, Beauv. ex Kunth, Enum. PI. i. 367, in syn. (1833) = Glyoeria, R. Br. (Gramin.).
fiuitans, Beauv. ex Kunth, 1. c. = G. fluitans.

DEVAUXIA, R. Br. Prod. 253 (1810\ sphalm. = DESVAUXIA, R. Br.-Centrolepis, Labill.

DEVERRA, DC. Mem. Omb. 45 (182!)) ; Prod. iv. 143 (18S0)=PituranthOB, Viv. (Umbellif.).
aphylla, DC. Prod. iv. 143.—Afr. austr.
Burchellii, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 347 = *aphylla.*
Burchellii, Sond. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. ii. 549.—Afr. austr.
chlorantha, Coss. & Dur. in Bull. Soc Bot. Fr. ii. (1855) 248.—Algeria.
juncea, Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1878) 468.—Marocco.
Korolkowi, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 589.—Turkestan.
Pituranthos, DC. Prod. iv. 144 = Pituranthos denudatus.
Reboudii, Coss. *8c* Dur. in Bull. Soc. Bot Fr. ix. (1862) 296.—Algeria.
scoparia, Coss. *8c* Dur. 1. c ii. (1856) 248.—Algeria.
tortuosa, DC. Prod. iv. 143.—Aegypt.
triradiata, Hochst. ex Baiss. Fl. Orient, ii. 861.—Arab.
virgata, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1865) *US—scoparia.*

DEVILLEA, Bert, ex Schult. f. Syst. vii. p. lxvii. 12-29 (1830)=Caraguata, Lindl. (Bromel.).
speciosa, Bert. 1. c. 1229 ^-C. Berteroniana.

DEVILLEA, Tul. & Wedd in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 107. *PODOSTEMACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 114.
fiagelliformis, Tul. *8c* Wedd. 1. c.—Bras.

DEWEYA, Torr. & Gray, FI.N. Am. i. 641 (1840)-= Arracaoia, Bancr. (Umbellif.).
acaulis, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 94 *{-Oreosciadium acaule).*—Am. bor. occ.
arguta, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 641 = A. arguta (in AddendA
Hartwegi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 342.—Am. bor. occ.
Kelloggii, A. Gray, 1. c. 343.—Calif.
vestita, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 874.—Calif.

DEYEUXIA, Clar. in Beanv. Agrost. 43. t. 9. f. 9, 1(-(1812). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1162
ACHAETA, Fourn. ex Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii 1152 (1883).
BROMIUIUM, Nees *8c* Meyen, in Nov. Act Acad Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 154.
CHAMAECALAMUS, Meyen, Reise, i. 456 (1834)
CINNASTRUM, Foum. ex Benth. & Hook. f. Gen iii 1152(1883).

DEYEUXIA:—
DIDYMOCHAETA, Stend. Syn. PI. Gram. 185 (1894).
LACHNAGROSTIS, Trin. Fund. Agrost. 128 (1812).
RELCHELA, Steud. Syn. Fl. Gram. 101 (1854).
abietina. Fuss, Fl. Transs. 714-syIvatica.
acutiflora, *Beauv. Agrost.* 44.—Enrop.
aemula, Kunth, Rev. Gram. i. 77 = Forsteri.
aequata, *Benth. Fl. Austral,* vii. 578.—Tasman.
aequivalvis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 91.—Am. bor. occ.
agrostidea, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 91.—Chili.
airoides, Roem. *ft* Schult Syst. ii. 422 = Arundo airoides.
alba, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 248.—Boliv.
aleutica *Munro, ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 845.—Am. bor. occ.
anomala, *Benth. (f Hook.f. Gen.* iii. 1158.—Bras.
anthoxanthoides, *Munro, ex Henderson (f Hume, Lahore to Yarkand,* 339.—Turkest.
Anthoxanthum, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1876) 176 (err. typ. 166), 178.—Reg. Andin.
arundinacea, Beauv. Agrost. 160 = Calamagrostis varia.
anrea, *Munro, ex Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 176 (err. typ. 156), 179.—Ecuador.
australis, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1158 = plebeia.
avenacea, Spreng. Syst. i. 254 = Anisopogon avenaceus.
uvenoides, *J. Buck. Man. Grass. N. Zeal.* p. vi.— N.Zel.
agorica, Hochst. ex Seub. Fl. Azor. 19 = Agrostis pallida.
Billardieri, *Kunth, Rh>. Gram.* i. 77.—Austral.; N. Zel.
Bolanderi, *Vasey, Desç. Cat. Grass. V. St.* 50.—Calif.
brasiliensis, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 497 (= ***Eutriana villosa).*—Bras,**
breviaristata, *Wtdd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 179.—Peruv.
brevifolia, *J. &• C. Presl, Rel. Haenk.* i. 248.—Peruv.
breviglumis, *Benth. Fl. Austral,* vii. 584.—Austral.
Breweri, *Vasey, Cat. Gr. U. St.* 50.—Calif.
caespitosa, Hochst. ex Seub. Fl. Azor. 18-Agrostis pallida.
canadensis, *Munro, ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 845.—Am. bor.
capillaris, Clar. fide Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 580 = Poa depauperata.
capitata, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 176 (err. typ. 156), 179.—Boliv.
Cephalotes, *Wedd. I. c.* 178, 179.—Boliv.
chalybaea, *Munro, ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 845.—Reg. arct.
Chamissonis, *Kunth, Enunt. PI.* i. 242.—Ins. Paschal,
chilensis, *E. Desv: in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 322.— Chili,
chrysantha, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 247.— Peruv.
cbrysostachya, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 328. —Chili,
coarctata, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 148.—Ecuador; N. Granat.
compacta, *Munro, ex Duthie, in [Atkins. Gag. N. W. Ind.]* 628.—Ind. or.
confinis, *Kunth, R(v. Gram.* i. 76.—Am. bor.
crassiglumis, *Vasey, Cat- Gr. U. St.* 50.—Calif,
cryptolopha, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 176 (err. typ. 156), 179.—Boliv.
curta, *Wedd. I.* c—Boliv.
curvula, *Wedd. 1. c.* 178, 179.—Perav.
Cusickii, *Vasey, in Coult. Bot. Gat.* x. (1885) 224.—Am. bor. occ.
cylindrica, *Benth. Fl. Austral,* vii. 582.—Austral,
densa, *Benth. 1. c.*—Austral.
densiflora, *J. & C. Presl, Rel. Haenk.* i. 247.—Peruv.
deschampsioides, *Vasey, Cat. Gr. U. St.* 50.—Am. bor. occ.
deserticola, *Phil. Fl. Atae.* 65.—Chili.
Drammondiana, *Benth. Fl. Austral,* vii. 680.—Austral,
effusa, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* i. 145.— Ecuador,
elata, *Munro, ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 346.—Reg. arct.
elata, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 289.—Chili,
elegans, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 179.—Boliv.
eminens, *J.* b* *C. Presl, Rel. Haenk.* i. 250—Peruv.

DEYEUXIA:—
eriantha, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 145.—Mexic.
erythrostachya, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 324. —Chili,
evoluta, *Fourn. in Bull. Soc. Bot.Fr.xxiv.* (1877) 181. —Mexic.
festucoides, *Wedd. 1. c.* xxii. (1876) 178,179.—Boliv.
fUifolia, *Wedd. I. c*—Boliv.
flavescens, Clar. ex Spreng. Syst. i. 264 = planifolia.
Forsteri, *Kunth, Rev. Gram.* i. 77.—Austral.; N. Zel.
frigida, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 588.— Austral.
Funckii, *Steud. ex Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* zxii. (1875) 178.—Reg. Andin.
fuscata, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 249.—Peruv.
glacialis, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 178, 179.—Boliv.
gracilis, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 554.—Mexic.
gracilis, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 179. —Boliv.
groenlandica, *Munro, ex Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 345.—Reg. arct.
Gunniana, *Benth. Fl. Austral,* vii. 584.—Tasman.
Haenkeana, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 179, 180.—Peruv.
Halleriana, *Vasey, Cat. Gr. U. St.* 60.—Am. bor. occ.
Hartmanniana, Munro, ex Hook. f. in Trans. Linn. Soc xxiii. (1862) 345 = Calamagrostis ambigua.
heterophylla, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.—Boliv.
Hostii, *Bess, ex Andrg. Rys Botan.* ii. (1830) 26.— Rossia.
Howellii, *Vasey, Agric. Grasses U.St.* 70. t.61.—Am. bor. occ.
imberbis, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.—Boliv.
intermedia, *J. b[1] C. Presl, Rel. Haenk.* i. 249.— .Peruv.
Jamesoni, *Munro, ex Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 176 (err. typ. 156).—Ecuador.
japonica, Spreng. Syst. i. 254 = Arthraxon ciliaris.
junciformis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 144.— Mexic.
Lagurus, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 176 (err. typ. 156), 180.—Boliv.
Langsdorffii, *Kunth, Rev. Oram.* i. 77.—Am. bor.
lapponica, *Kunth, 1. c.* 76.—Reg. bor. temp,
leiophylla, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.—Boliv.
leiopoda, *Wedd. I. c.*—Reg. Andin.
Liebmanniana, *Fourn. in Bull. Soc. Bot- Fr.* xxiv. (1877) 181.—Mexic.
ligulata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i.* 145.— Ecuador,
longearistata, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.xx.ii.* (1875) 176 (err. typ. 156), I80.-Boliv.
Macouniana, *Vasey, in Coult. Bot. Gag.* x. (1885) 297. —Am. bor.
Mandoniana, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 179, 180.—Boliv.
Mannii, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 228. —Afr. trop.
megapotamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 30 = Andropogon saccharoides.
minor, *Benth. Fl. Austral,* vii. 582.—Austral.
montana, Beauv. Agrost 44, 160 ; Poir. Tabl. Encyc. iii. 538=Calamagrostis varia.
montana, *Benth. Fl. Austral,* vii. 581.—Austral.
montana, Boiss. Fl. Orient, v. 526 = acutiflora.
montevidensis, Spreng. Syst. iv. Cor. Post. 30=Andropogon saccharoides.
multiflora, Beauv. ex Nym. Consp. 799 = Calamagrostis varia.
mutica, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.—Boliv.
neglecta, *Kunth, Rev. Gram. i.* 76.—Reg. bor. temp,
nematophylla, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 179, 180.—Boliv.
nivalis, *Benth. Fl. Austral,* vii. 583.—Austral,
nivalis, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 176 (err. typ. 156), 180.—Boliv.
nntkaë'nsis, *J.* 6" *C. Presl, Rel. Haenk.* i. 250.—Sinus Nutka.
Nuttalliana, *Vasey, Cat. Gr. U. Si.* 51.—Am. bor.
obtusata, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.-Boliv.
Orbignyana, *Wedd. 1. c.* 178, 180.—Boliv.

DEYEUXIA:—
Orizabae, *Rupr. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 283.—Mexic.
ovata,?. &• *C. Presl, Rel. Haenk.* i. 246.—Peruv.
pallens, *J. &" C. Presl, 1. c.* 249.—Peruv.; Ecuador,
phalaroides, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.—Boliv.
Pickeringii, *Vasey, Cat. Gr. V. St.* 51.—Am. bor.
picta, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.—Boliv.
pilosa, *J. Buck. Man. Grass. N. Zeal.* p. vi.—N. Zel.
planifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 145.— Peruv.
plebeia, *Benth. Fl. Austral,* vii. 580.—Austral.
poaeformis, H. B. *Be* K. Nov. **Gen.** et Sp. i. 146 = Poa subuniflora.
polystachya, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* **zxii.** (1875) 177,180.—Peruv.
Porteri, *Vasey, Cat. Gr. U. St.* 51.—Am. bor.
Preissii, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 97.—Austral.
Preslei, Kunth, Enum. PI. L 243 = Calamagrostis scabra.
purpurascens, *Kunth, Rev. Gram.* i. 77.—Am. bor. occ.
purpurea, Kunth, 1. c. = Calamagrostis purpurea.
quadriscta, *Benth. Fl. Austral,* vii. 581.—Austral.; N.Zel.
rariflora, Fuss, Fl. Transs. 714 = Halleriana?
recta, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 37 = Schiedeana.
recta, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 144.—Ecuador; Peruv.
retrofracta, Kunth, Rev. Gram. i. 77 =• Forsteri.
rigida, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. **144.—**Ecuador; Peruv.
robusta, *Phil. Fl. Atac.* 54.—Chili,
rubescens, *Vasey, Cat. Gr. U. St.* 51.—Am. bor. occ.
scabra, *Kunth, Rev. Gram.* i. 77; *Benth. Fl. Austral.* vii. 583.—Austral,
scabrescens, *Munro, ex Duthie, in _Atkins. Gag. N. W-Ind.]* 628.—Ind. or.
scabriuscuU, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1876) 177, 180.—Peruv.
Schaflheri, *Fourn. 1. c.* xxiv. (1877) 181.—Mexic.
Schiedeana, *Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix.* II. (1842) 233.—Mexic.
sciurea, (vide sub Agrostide, p. 65) recte= Dichelachne sciurea.
sedenensis, Beauv. Agrost. 44 = Avena gempervirens.
sesquiflora, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 1153.—Chili.
sesquivalvis, Benth. in Journ. Linn. Soc xiz. (1881) 91, sphalm. =praec.
setiflora, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1876) 176 (err. typ. 156), I80.-Boliv.
setifolia, *Hook.f. Fl. N. Zel.* 299. t. 65.—N. Zel.
spathacea, *Clar. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 497 -effusa.
spicata, Spreng. Syst. i. 254 = Andropogon condensatus-spicigera, *J. &• C. Presl, Rel. Haenk.* i. 247.—Pernv.
splendens, Brongn. in Dnperr. Voy. Coq. Bot. 28» Calamagrostis splendens.
Spruceana, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 178, 180.—Ecuador.
stricta, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* i. 146.—N. Gran«-strigosa, *Kunth, Rev. Gram.* i. 77.—Am. bor. occ.
subalpina, Schnr, Enum. PI. Transs. 740-°sylvatica-subsimilis, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 180.—Boliv.
subspicata, Desv. Opusc 60, in obs.=Trůetum «spicatum.
Suksdorfii, *Scribn. ex Vasey, Desc. Cat. Grass. U.* 61.—Am. bor. occ.
sulcata, Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 17»i 180=Mandoniana.
sylvatica, *Kunth, Rev. Gram. i.* 77.—Reg. bor. temp,
toluccensis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* i. I*-" Mexic.
toluccensis, Munro, ex Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr. **"• (1875) 180 = Spruceana.
toluccensis, J. *8c,* C. Presl, Rel. Haenk. i. 250=Haenk
trichodonta, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* zxii. (1875) 176 (err. typ. 156), 180.—Peruv.
triflora, *Nees, in Linnaea,* xix. (1847) «"l'-Me?J5'
Tweedyi, *Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club,* x. (1883) 64.—Am. bor. occ.
varia, *Kunth, Rev. Gram. i.* 96.—Reg. temp.
velutina, *Nees V Meyen, Reise,* i. 349; *et in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. (1843) *Suppl.* i. 147.—Chili

DEYEUXIA:—
vicunarum, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 177, 180.-Reg. Andin.
Vidali, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 668.—Chili,
wolacea, *Wedd. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 179, .180._Boliv.
viridiflavescens,Ar»ntt, *Rh. Gram.* 1.77.—Reg. Argent,
vindis, *Fount, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 181. —Mexic.
viridis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 288.—Chili
vwipara, *Phil. 1. c.* xxix. (1867-68) 90.—Chili,
vulcanica, *Phil. I. c*—Chili.
Youngii, *J. Buck. Man. Grass. N. Zeal.* p. vi—N. Zel.

DIACAECARPIUM, Endl. Gen. 745 (1839)=DIACICARFIUM, Blume-Itarlea, Roxb. (Comae.).

DIACANTHA, Lag. Amen. Nat. i. 40 (1811)-Chuquiraga, Juss. (Compos.).
ambigua, Cass. in Diet. So. Nat. xiii. 132 = C. spinosa.
spinosa, Lag. Amen. Nat i. 40=C. spinosa.

WACANTHA, Less, in Linnaea, v. (1880) 243 = Barnadesia, Mutis (Compos.;.
arborea, Less. 1. c. = B. arborea.

WACECARPIUM, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 169 (1844; = DIACICARPIUM, Blume=Marlea, Roxb. (Comae.).

DIACHROA, Nutt ex Stend. Norn. ed. II. i. 497 (1840)-Olyoeria, R. Br. (Gramin.).
"aritima, Nutt. ex Steud. 1. c.=G. maritima.

DIACHYR1UM, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 257 = Bporolobus, R. Br. (Gramin.).
arundinaceum, Griseb. 1. c—Reg. Argent.

DIACICARPIUM, Blume, Bijdr. 667 (1826)=Marlea, Roxb. (Comae).
»tundifolia, Hassk. in Bonplandia, vii. (1859) 172-M. begoniaefolia.
tomentosum, Blume, Bijdr. 657=M. begoniaefolia.

DIACIDIA, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. 1.119 (1858). *MALP1GHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 262.
gWphimioides, *Griseb. 1. c.* 120.—Bras.
stita, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 258, in nota sub Coleostachyde.—Guiana.

DIACLES, Salisb. Gen. PI. Fragm. ISO (1866)=Haenjanthua, Toum. (Amaryllid.).
"T'aris, Salisb. 1. c. = H. albiflos.
Pubescent, Salisb. 1. c. = H. albiflos.

DIACBIU]|i, Benth. in Joum. Linn. Soe. xviii. (1881) .?12. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 526.
JHCorautum, *Benth. I. c*—Guiana,
tndentatum, *Hemsl. Biol. Centr. Am.* Scf.iii. 22L—., Mexic.
8ibberosum, *Hhmsl. 1. c.* 222.—Guatemala.
«ameUatBm, *Hemsl. I. c*—Panama.

DIADENARIA, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. *"• (1859) 254 ; et in Abh. Akad. Berl. (1860) 107 =Pedilanthua, Neck. (Euphorb.).
Tbculata, Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. . ("80)108 = P. articulatus.
nvolucrata, Klotzsch & Garcke, L c 107 =P. involucratus.
avonis, Klotzsch & Garcke, 1. c. 108-P. Pavonis.
*P<>, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859)254.—Hab.t

DIADENIUM, Poepp. *8c* Endl Nov. Gen.et Sp. i.41. t. 71 667. *ORCHWEAE* Benth & Hoo*-c
CHAENANTHE Lindl Bot Re S. (1888, Mitc 88.
Barkeri, *Benth. &• ffooh.f. Gen.* iii. 658.—Bras.
micranthum, 71.—Peruv.

DIADESMA, Rafin. New Fl. Am. I. 41 (1836) - Bida, Linn. (Malvac.).
cardanisea, Rafin. 1. c. =S. eardanisea.
rhombifolia, Rafin. 1. c = S. rhombifolia.
ata, ? t. c = Sphaeralcea angustifolU.
virgata, Rafin. i. c -s:viiBata.

DIALANTHERA, Rafin. Sylva Tellur. 127 (1838)-Cassia, Tourn. (Legumin.).
glandulosa, Rafin. 1. c=C. glandulosa.

DIALESTA, H. B. & K. Nov. Gen.et Sp. iv. 46. t 320 (1820)=Oliganthes, Cass. (Compos.).
discolor, H. B. & K. L c. = O. discolor.
staavioides, Mart, ex DC. Prod. v. 79 -Lychnophora staavioides.

DIALION, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1838) = HeUotroplum, Toum. (Boragin.).
undulatum, Rafin. U » H . undulatnm.

DIALISSA, UndL in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 107=Stdi8, Sw. (Orchid.).
pulchella, Lindl. 1. c=S. Dialissa.

DIAIiIUM, Linn. Mant. i. 3 (1767). *LEGUMUNOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 574.
AROUNA, Aubl. PI. Gui. i. 16. t. 6 (1775).
CODAMUM, Soland. ex Vahl, Enum. L 302 (1805).
angolense, Welv. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 288.—Afr. trop.
anomalum, Webb, in Hook. Kev Journ. ii. (1850) 347. —Ins. Gorgona.
coromandelinum, Houtt. Handleid. ii. 39-indum f
discolor, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 829 - guineense.
divaricatum, Vahl, Enum. i. 308.—Guiana j Bras.
guianense, Stend. Norn. ed. II. i. 497=seq.
guineense, Willd. in Roem. Arch. i. I. 81. t. 6.—Afr. trop.
indum, Linn. Mant. i. 24.—Java.
javanicum, Bum. *t.* Fl.Ind. 12=indum.
laurinum. Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 269.—Malacca.
Maingayi, *Baker, 1. c.*—Singapore.
nitidum, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 269 = guineense.
ovoideum, *Thw. Enum. Pl.Zeyl.* 97.—Zeylan.
patens, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* U.-270.—Malacca,
platysepalum, *Baker, I. c*—Malacca.

DIALLA, Lindl. Veg. Kingd. 390 (1847)-BiceUa, Griseb. (Malpigh.).

DIALLOBUS, Rafin. Sylva Tellur. 128 (1838)=Cassia, Toum. (Legum.).
bicapsularis, Rafin. 1. c.-C. bicapsularis.
falcatus, Rafin. 1. C.-C. Tora.
subunifiorus, Rafin. 1. c = C. uniflora?
Thora, Rafin. 1. C.=C. Tora.
uniflorus, Rafin. 1. c.=C. nniflora.

DIALLOSPERMA, Rafin. Sylva Tellur. 69 (1888) = Aapalath.ua, Linn. (Legamin.).
spinosa, Rafin. 1. c.=A. spinosa.

DIALLOSTEIRA, Rafin. Neogenyt. 2 (1826)-Collinsonia, Linn. (LabiaL).
punctata, Rafin. 1. c.=C. canadensis.

DIALYCAEPA, Mast, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 605. *MALVACEAE.*
Beccarii, *Mast. 1. c.* 606.—Borneo.

DIALYPETALTJU, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 668 (1876). *CAMPANUIACEAE,* Benth. ft Hook. *11.* c.
floribundum, *Benth. 1. c.* 554.—Madag.

DIAMARIPS, Rafin. Alsog. Am. 15 (1838)-Saltx, Toum.
Croweana, Rafin. 1. c = S. Croweana.
rubra, Rafin. 1. c.-S. rubra.

DIAMONON.Rafin. FL Tellur. ii. 76(1886)-Solanum, Toum.
eoriaceum, Rafin. 1. c.-S. havanense.

DIAMOBPHA, Nutt. Gen. Am. i. 293 (1818). *CRASSULACEAE,* Benth. *8c* Hook. *i.* i. 661.
pusilla, *Nutt. I. c*—Am. bor.

DIANA, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 276 (1786) -seq.

BIAXTEIiLA, Urn. Encyc. ii 276 (1786). *ULIACBAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 793.
DIANA, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 276 (1786).
EXCKEMIS, Willd. ex Schult. f. Syst. vil. 354, in adnot. (1829).
RHUACOFHILA, Blume, Enum. PI. Jav. 13 (1830).
angusti/olia, Schult. f. Syst. vii. 362=caerulea.
Archeri, Hook. f. FL Tasm. ii. 58=tasmanica.
atrata, Hort. Petrop. ex Regel, Gartenfl. (1857) 87 - inconspicua.
anstro-caledonica, *Seem. Ft Vit.* 812.—N. Caled.
bancana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 610.—Ins. Banca.
caerulea, *Sims, Bot. Mag.* t. 606.—Austral,
celebica, *Kunth, Enum. PI.* v. 65.—Malaya.
coerulea, Willd. Enum. Hort. Berol. 875=caerulea.
congesta, R. Br. Prod. 280 = caerulea.
cubensis, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 272.—Cuba.
densa, Lindb. in Act. Soc. Sc Fenn.x. (1871) 132. L 6 <=tasmanica.
divaricata, R. Br. Prod. 280 = revoluta.
dubia, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* i 270. t 675.—Venezuela.
elegans, Kunth *8c* Bouché, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 11=caerulea?
elegans, F. Muell. Kragm. vi. 122-laevis.
ensifolia, [DC. in] Red. Lil. L l=nemorosa.
graminifolia, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) ll=caeruleal
hemichrysa, Lam. Encyc. ii. 276 = Cordyline hemichrysa.
Hookeri, Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 575-= tasmanica.
humilis, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. i 498 • nemorosa ?
inconspicua, *Regel, Gartenfl.* ^1857) 87.—Hab. ?
intermedia, *Endl. Prod. Fl. Ins. Norfolc.* 28.—N. Zel.; Ins. Norfolk.
javanica, Kunth, Enum. PI. v. 52=nemorosa.
laevis, *R. Br. Prod.* 280.—Austral.
laevis, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 67 = tasmanica.
longifolia, R. Br. Prod. 280= laevis.
longifolia, [Lindl. in] Bot. Keg. t. 734 - revoluta.
mauritiana, Blume, Enum. PI. Jav. i. 12 = nemorosa.
montana, Blume, 1. c.—seq.
nemorosa, *Lam. Encyc.* ii. 276; *Jacq. Hort. Schoeni.* t. 94—As. et Austral, trop.
nigra, Coleuso, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 889=-intennedia.
obscura, Kunth, Enum. PI. v. 66 = nemorosa.
odorata, Blume, Enum. PI. Jav. i 13 = nemorosa.
paniculata, Hort. Berol. ex Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 11-caerulea.
rara, R. Br. Prod. 280=laevis.
revoluta, *R. Br. I. c*—Austral.
sandmcensis, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 97 = nemorosa.
strumosa, [Lindl. in] Bot. Reg. t. 751=laevis.
tasmanica, *Hoot./. Fl. Tasm.* ii 57.1.183.—Austral,
triandra, *Aft. Remed. Guin.* 6 (Quid ?).—Afr. trop.

DIANIA, Noronha, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 142 = Dieoryphe, Thou. (Hamamelld.).
amplifolia, Noronha, ex Tul. 1. c. 147 = Dicoryphe Noronhae.

DIANTHELLA, Clauson, ex Pomel, Mat. Fl. Atl. 9 (1860)-Tunica, Hall. (Caryophyll.).
compressa, Pomel, 1. c.=T. compressa.

DIAWTHEEA, Gronov. R Virgin. 5 (1742); Linn. Gen. ed. II. 18 (1742). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1113.
CHILOOLOSSA, Oerst. in Kjt*b. Vidensk. Meddel. (1854) 160.
DIMANISA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 83 (1836).
DIFTANTHERA, Schraok, ex Steud. Nom. ed. II. i. 618 (1840).
LEPTOSTACHYA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 105 (1832).
LUSTRINIA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 62 (1836).
MEIOSPERMA, Rafin. 1. c. 64 (1836)
ORTHOTACTUS, Nees, in Mart. FL Bras. ix. 131. t 21 (1847).
PLAGIACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 385 (1847).
POFPHYROCOMA, Hook. Bot. Mag. t. 4176 (1845).
RHYTIGLOSSA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 286,444 (1836).
STETHOMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 61 (1836).
acuminata, Benth. & Hook. f. Gen. ii 1114-comata.

DIAIWHERA:—
acuminata, Ruiz & Pav. FI. Per. i. 10.1.16 = Dicliptera acuminata.
alata, Bnek, in DC. Prod. Index, iii. 136 = Andrographis alata.
americana, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 16 (=*Rostellularia Blancoi).—Hzb.* »
americana, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 9 -Barleria flava.
americana, Fraser, ex Nees, in DC. Prod. xi. 840= ovata.
americana, Linn. Sp. PL 27.—Am. bor.
Anagallis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 617.- Mexic.
androsaemifolia, Griseb. Ft. Brit. W. Ind. 455.—Ins S. Doming.
angularis, Salisb. Prod. 102= Dicliptera sexangnlaris.
angustifolia, Benth. & Hooi.f. Gen. ii. 1114.—Bras.
Anselliana, *Benth. V Hook.f. 1. c.—Afi.* trap.
appendiculata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 12. t. 11 = Beloperone appendiculata.
arvensis, Veil. Fl. Flam. 12; i.t. 30=Justicia arvensis.
biealyeulata, Retz. in Vet. Acad. HandL (1775) 297 = Peristrophe bicalycnlata.
bifida, Moench, Meth. 621= Peristrophe bicalycnlata.
brasiliensis, Veil. Fl. Flum. 11; i. t. 26 = Josticia Arrabidae.
' breviflora, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 517.— Mexic.
calycina. *Benth. V Hoot./. Gen.* ii. 1111.1113, in obs. —Guiana.
campestris, *Benth. V Hook.f. I. c.* 1114.—Bras.
Candelariae, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 617 — Costa Rica.
candicans, *Benth. &• Hook.f. Gen.* ii. 1113.—Mexic.
caroliniana, Fraser, ex Nees, in DC. Prod. xi. 310 = ovata.
cayennensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 197, in textu.— Guiana.
ciliata, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1114.—Costa Rica.
ciliata, Blanco Fl. Filip. ed. II. 12=Justicia simplex.
ciliata, Medic. Beobacht. (1783) 9-Schwabea ciliaris.
ciliata, *Ruia &" Pav. Fl. Per.* i. 12. t. 14.—Perav.
clavata, Forsk. ex Nees, in DC. Prod. xi. 475 = Dicliptera ciliaris.
clavata, Forst. f. Prod. 4 = Dicliptera clavata.
coccinea, Salisb. Prod. 102-Justicia coccinea.
coerulea, Forst f. Prod. 4 = Dicliptera pubescens.
collina, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 543.—Reg. Himal.
comata, *Linn. Syst.* ed. X. i. 850.—Mexic.
comata, Veil. Fl. Flum. 12; i. t. 27= Justicia fluminensis.
crassifolia, *Chapm. Fl. S. U. St.* 804.—Am. bor.
dasyclados, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1113.—Bras,
debilis, *C. B. Clarke, in Hook.f. Ft. Brit. Ind.* iv. 642. —Keg. Himal.
debilis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 9=Justicia debilis.
decumbens, Sw. ex Nees, in DC. Prod. xi. 882- comata.
dichotoma, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 543.—Zeylan.
distorta, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1113.—Bras.
elongata, Salisb. Prod. 103 - Thyrsacanthus bracteolatus.
ensiformis, Walt Fl. Carol. 63=americana.
eustachiana, *J. F. Gmel. Syst.* 36.—Ind. occ.
eustachiana, Hook, ex Nees, in DC. Prod. xi. 466 = Blechum trinitense.
flava, Vahl, Symb. Bot. i. 5=Adhatoda flava.
genistaefolia, Salisb. Prod. 108-Justicia orchidioides.
glabra, *Benth.* b" *Hook.f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 518.—Costa Rica,
glandnlosa, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 197.—Cuba.
Griffithii, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 542.—Reg. Himal.
harpochiloides, Griseb. Cat. PI. Cub. 196=Jacobinia barpochiloides.
heterophylla, *Benth. &• Hook. f. Gen.* tt. 1114.— Bras.
hirsuta, *J. F. Gmel. Syst.* 85.—Ind. occ.
hirsuta, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 11. t. 13=Jnsticia inficiens.
Hookeriana, *Benth.* b[1] *Hook.f. Gen.* ii. 1118.—Peruv.
humifusa, J. F. Gmel. Syst. 36 = comata.
humilis, Engelm. & A. Gray, in Bost. Jonrn. Nat Hist. v. (1847) 230-ovata.
hyssopifolia, Burm.f. Fl. Ind. 11. t.5. f. 1 = Peristrophe undulata.

DIANTHEBA:—
hyssopifolia, Medic. Beobacht. (1783) 7 = Justicia hyssopifolia.
inaequalis, *Benth.* b* *Hoot. f. Gen.* ii. 1113.— Guatemala,
indica, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 548. —Reg. Himal.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 21. t. 1- Dicliptera crinita.
justicioides, Sw. ex Nees, in DC. Prod. xi. 416 = Adhatoda tetramera.
laeta, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 83. —Bras.
lancifMa, Tafalla, ex Nees, in DC. Prod. xi. 857 = Amphiscopia lancifolia.
•latifolia, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1118.—Mexic.
latifolia, Salisb. Prod. 103 = Adhatoda Vasica.
leptostachya, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 542 = Wallichii.
Lindeniana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 518.— Mexic.
lineolata, *Tafalla, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 345.— Peruv.
linifolia, *Benth.* b" *Hook.f. Gen.* ii. 1114.—Am. bor.
longiflora, *Benth. (f Hook.f. 1. c.* 1113.—Bras,
lncida, *Benth.* b" *Hook.f. I. c*—Ind. occ
malabarica, Gouan, ex Nees, in DC. Prod. xi. 474 = Dicliptera resupinata.
malabarica, linn. f. Suppl. 85= Peristrophe bicalycnlata.
martinicensis, J. F. Gmel. Syst. 86 - Dicliptera martinicensis.
mexicana, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 1114.—Mexic.
mucronata, Math, ex Nees, in DC. Prod. xi. 480 = Dicliptera Hookeriana.
mucronata, Ruiz & Pav. FL Per. i. 11. t. 16. f. a = Dicliptera peruviana.
multiflora, Ruiz & Pav. 1. c. 10. t. 14. f. b = Dicliptera multiflora.
nitida, J. F. Gmel. Syst. 85 = Thyrsacanthus nitidus.
nodosa, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1113.—Ind. or.
obcordata, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 399 = Justicia tranquebariensis.
oblonga, *Benth. (f Hook. f. Gen.* ii. 1114.—N. Granat.
obtusifolia, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 525.—Ind. occ.
odora, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 8 = Adhatoda odora.
ovata, *Walt. Fl. Carol.* 68.—Am. bor.
paniculata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 7«Peristrophe biealyeulata.
paniculata, Lour. Fl. Cochinch. i. 26 = Rhinacanthus communis.
parviflora, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 880.—' Am. bor.
parviflora, Roxb. ez Nees, in DC. Prod. xi. 471 = Rungia parviflora.
parvifolia, *Benth.* fa" *Hook.f. Gen.* ii. 1114.—Texas,
pectoralis, *J. F. Gmel. Syst.* 36.—Ind. occ.; Mexic.
peploides, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 525.—Cuba.
pilosa, Rniz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 406 = Adhatoda pilosa.
punctata, *Vahl, Symb. Bot.* i. 4.—Arabia,
racemosa, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 1114.—Peruv.
repens, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 10. t. 15. f. b = Dicliptera tomenlosa.
reptans, *J. F. Gmel. Syst.* 36; *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 455.—Jamaica,
rigida, *Benth. (f Hook. f. Gen.* ii. 1115, in obs.— Bras.
Rugeliana, *Griseb. Cat. PL Cub.* 196__Cuba.
rugosa, Perr. ex Nees, in DC. Prod. xi. 497 = Peristrophe biealyeulata.
Sagraeana, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 196.—Cuba.
saxatilis. Salisb. Prod. 102 = Dicliptera viridis.
secunda, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 248.— Panama.
secundiflora, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. i. 11. t 15. f. a= Justicia secundiflora.
serrata, Veil, ex Nees, in DC. Prod. xi. 440-Justicia tenuispica.
sessilis, *J. F. Gmel. Syst.* 35; *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 455.—Ind. occ.
speciosa. *Benth. If Hook./. Gen.* ii. 1118.—N. Granat.
spicata. Veil. Fl. Flum. 12; i. t. 28 = Schaueria Schottii.
subserrata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 16-Justicia Gendarnssa.

DIANTHERA:—
sulcata, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 224 (Anisacanthi sp.?).—Reg. Argent.
sulcata, Vahl, Symb. Bot. i. 4 = Adhatoda sulcata.
terminalis, *Fame, in Forbes, Nat. Wand. East. Archip-* 613.—Ins. Timor.
tomentosa, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. FI. Brit. Ind. iv. 395—Nelsonia campestris.
trisulca, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 7 = Anisotes trisulcus.
verticillata, Forsk. 1. c. 9—Dicliptera micranthes.
violacea, *Vahl, Symb. Bot.* i. 6.—Arab,
virgata, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind.* iv. 542.—Reg. Himal.
viridiflora, Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 1114 - Gatesia' laete-virens.
Wallichii, *Benth. & Hook.f. I. c*—Ins. Philipp.

DIANTHERA, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 160. t 27 (1861)=Cleome, Linn. (Capparid.).
abyssinica, Schweinf. Fl. Aethiop. i. 70 = C. didynama.
Burchelliana, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 161=C. diandra.
grandiflora, Klotzsch, 1. c. = C. paradoxa.
lutea, Klotzsch, 1. c. 162 = C. lutea.
Petersiana, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 78=C. diandra.
Petersii, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 1«° = C. diandra.
semitetrandra, Klotzsch, 1. c. 162-C. semitetrandra-

DIANTHOSERIS, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) 439. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 527.
Schimperi, *Sch. Bip. 1. c.* 440.—Abyss.
Rueppellii, *Sch. Bip. 1. c*—Afr. trop.

DIANTHQS, Linn. Syst. ed. I (1735). *CARYOPHYLLEAE,* Benth. & Hook. f. i. 144.
CARYOPHYLLUS, Moench, Meth. 58 (1794).
CYLICHNANTHUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 2w (1867).
DIOSANTHOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, VII. (1880) 87.
DYANTHUS, P. Br. Hist. Jamaic. 228 (1756), err.typ-
PLEONANTHUS, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
PLUMARIA, Opiz, Seznam, 75 (1852).
abyssinicus, R. Br. in Salt, Voy. Abyss. App. p.lxiv = leptoloraa.
adcnlaris, *Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. i.* 284.—As. *cealt.*
acicularis, Schur, Enum. PI. Transs. 98=petraeus.
acinifolius, Schur, 1. c. 97 = D. Caryophyllus.
aciphyllus, Sieber, ex DC. Prod. i. 358 = juniperinus.
actinopetalus, *Fentl, Pugill. PI. Nov. Syr. U--~* Graecia; As. Min.
acuminatus, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 242" monspessulanus.
acuminatus, *F. W. Williams, in Journ. Bot.* *x[U]- (1885) 847.—Syria.
adulterinus x, Sweet, Hort. Brit ed. II. 50.
aggericolus, Jord. in Billot, Annot. 48—sylvestris.
aggregatus, Poir. Encyc Suppl. iv. 124 = barbatus.
aliens, Eckl. & Zeyh. Enum. 32 = pectinatus.
albens, Jacq. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. »• 122=caespitosus.
albens, *[Soland. in] Ait. Hort. Kent.* ed. I. ii. 90.—A[ir> austr.
albens, Turc in Bull. Soc. Nat Mosc. xxvii. (1854) «• 869 = Zeyheri.
albus. Schkuhr, ex Steud. Nom. ed. II. i. 498=<w[1]- toides.
algetamus, *Graells, ex F. N. Williams, in Journ- B°"* xxiii. (1885) 847—Hispan.
alpestris, Balb. in Mem. Acad. Taurin, Phys-Math. '• (1802-03) 13-chinensis.
alpestris, Sternb. in Sturm, Deutschl. n. Heft 2» monspessulanus.
alpinus, *Linn. Sp. PI.* 412.—Europ.; As. bor. i bor. occ.
alpinus, Sibth. *8c* Sm. FL Graec. Prod. i. 288 -haem» calyx.
alpinus, Sturm, ex Steud. Nom. ed. II- >• *98 glacialis. (go
o/>ȣ»us,Vill. Fl. Delph.41; Hist. PI. Dauph. »»• -neglectus. jj.
altaicus, Willd. ez Ledeb. Fl. Ross. i. 278 -e[1]"[1]"*^/.
ambiguus, *Pane, ex F. N. Williams, in Jour»- "* xxiii. (1885) 342.-Europ.
ambiguus, Salisb. Prod. 308=monspessulanus.
amoenus. *Pomel, Noun. Mat. Ft. Atl.* 210— Al[geria.

DIA1TTHUS :—
anatolicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 22.—As. Min.; Tibet, occ.
Andersonii,^. *N. Williams, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 846.—Syria.
angulatus E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 178 » caespitosus.
angulatus, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 79.—Reg. Himal.
anticaiius, *Boiss. b-Reut. Pugill. PI. Nov.* 19.—Hispan.
aragonensis, *Timb. in Mint. Acad. Toulouse,* Sér. VI. v. (1867) 242.—Hispan.
arborescens, Hoffnigg. Verz. Pfl. 56 = rupicola.
arboreus, *Linn. Sp. PI.* 413.—Archip. Graec.
arbuscula, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1086.—China.
arenarius. All. Fl. Pedem. ii. 77 = D. Caryophyllus.
arenarius, Colm. Fl. Catal. 22 = Requienii.
arenarius, *Linn. Sp. PI.* 412.—Europ.
arenarius, Pall. Reise, iii. 600 = sqnarrosus.
arenarius, Thore, Essai Chi. 171=gallicus.
arenarius, Thuill. Fl. Par. 212=pungens.
arenarius, Towns. It Hung. iii. 4b8 = plumarius.
andus, Griseb. ex Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1878) 196 = pubescens.
anstatus, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* i. 222.—As. Min.
Armeria, *Linn. Sp.Pl.* 410.—Europ.: Reg. Cancas.
Armeriastrum, Wolfn. in Oestr. BoU Zeitschr. viii. (1858) 818=D. Armeria.
armerioides, *Rafin. in Desv. Journ. Bot.* iv. (1814) 269.—Am. bor.
arragonensis, Timb. ex Nym. Consp. 105 = Requienii.
arrectus, Dum. Fl. Belg. 106 = D. Caryophyllus.
Arrosti, *J. (y c. Presl, Delic. Prag.* 60.—Sicilia.
asper, Willd. Enum. Hort. Berol. 466 = chinensis.
asperulus,BotM.ty.r7atf, *Diagn.* Ser. II. i. 51.—As.Min.
atlanticus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 332.—Algeria,
atomarius, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 71.-Persia.
atratus, Beauprf, ex Ser. in DC. Prod. 1. 806 = polymorphus.
atropurpureus, Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 180 = atrorubens ?
atrorubens, *All. H. Pedem.* ii. 76.—Europ. austr.
atrgrubens, Baumg. Enum. i. 388 = banaticus.
atrorubens, Bieb. PI. Taur. Cauc. i. 324 = capitatus.
atrorubens, Friv. ex Nym. Consp. 104 = intermedius.
atrorubens, Gaud. Fl. Helv. iii. 145 = Carthusianorum.
attenuatus, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 801.—Hispan.; Marocc.
attenuatus, Xatard, ex Walp. Rep. i. 267 = brocbyftnthus.
autumnalis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863; 530 = polymorphus.
axilliflo Tus, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. 10-=multi- Puuctatus.
»aUnsae, *Boiss. Fl. Orient,* i. 488.—As. Min.
Valbisii, Ser. in DC. Prod. i. 356=liburnicus.
"anaticus, *Heuff. ex Griseb. bf Schenk, in Wiegm. Archiv,* xviii. (1852) I. 301.—Banatus.
uf.".**,Kit- m Linnaea, xxxii (1863) 527 - trifctscicu-
«. Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot Fr. ii. (1855) u=tripnnctates.
is, *Linn. Sp. PI.* 409.—Europ.
barbatus, Pall, ex Ser. in DC. Prod. 1. 355-D. Pseudarmeria.
«, Vis. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 47=strictus.
jW'neBin, H. Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) & *i* = attenuatus.
fWolonii, *Woods, Tour. Fl.* 46.—Italia.
o r, Adam, in Web. *Sc* Mohr, Beitr. i. 65 = campestris.
Seb- Fl Tanr- Canc- »• 329 = pallens.
color, Homem. Hort. Hafn. 407 - leptopetalus.
SPEC. FL. Rumel. i. 189=gracilis.
corus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 285 = ciunaoannus.
binatus, Bartl. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 810 = biflorus ?
binatus, Schur, Enum. Pl. Transs. 97 = D. Caryophyllus.
Bisignani Tenore, Cat. Ort Bisig. (1805) 18 j Fl. Nap. 228 = nipicola.
TT*"'1". Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. U853) 11 = banaticus.
A^TM,' Kotsch y> e* Boiss- m- Orient- j> 483, ~ Dia.
blandus. Reichb. Fl Germ. Excun. 807-plumarius.
bohemi [Maser] ex Twuch . » Flor»> ^ . (188 0) 246 =petraeus.

DIANTHUS :-
Boissieri, *Willk. Ic. et Desc. PI. Hisp.* i. 22. t. 18.—Hispan.
brachiatus, Sieber, ex Steud. Norn. ed. II. i. 499 (Quid ?).—Hab. ?
brachyanthus, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 85.—Hispan.
brachyanthus, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 235=virgineus.
brachyanthus, Schur, Enum. PI. Transs. 96 — microlepis.
brachycalyx, Huet, ex Nym. Consp. 105 = sylvestris.
bracteatus, Willd. ex Ser. in DC. Prod. i. 360 = Liboschitzianus.
brevicaulis, *Fenil, Pugill. PI. Nov. Syr.* 10.—Cilicia.
brevifolius, Friv. in Flora, xviii. (1885) 334 = pinifolius.
brevilimbis, *Boiss. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1878) 506.—Armenia.
Broteri, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 22.—Hispan.
Buergeri, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 77.—Japon.
Burchellii, Ser. in DC. Prod. i. 359 = albens,
burchtonnensis, *Ledeb. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 499, nomen.—Rossia.
cachemiricns, *Edgew. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 214.—Reg. Himal.
caesius, *[Sm.] Engl. Bot.* (179211. 62.—Europ.
caespitosi/olius, Plan. Ens. Fl. Gall. 118 = Planellae.
caespitosus, Eckl. & Zeyh. Enum. 81. pro parte = crenatus.
caespitosus, Poir. in Lam. Encyc. iv. 625-caesius.
caespitosus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 81.—Afr. austr.
calliionus, *Schott V Kotsehy, in Bot. Zeit.* ix. (1851; 192.—Transsylv.
calocephalus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 23.—As. Min.
Calverti, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* i. 228.—As. Min.
campestris, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. i.* 826.—Reg. Caucas.
campestris, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 277 = chinensis.
canescens, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 710 = orientalis.
capillatus, Meinsh. Beitr. Pfl. Geogr. Sued-Ural-Geb. 6 - capitatus *1*
capitatus, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 103.—Rossia austr.
capitatus. Pall, ex Keichb. PI. Crit. vi. 28-- liburnicus.
Carmelitarum, *Reut. ex Boiss. Fl. Orient,* i. 512.—Armenia.
carolinianus, Walt. Fl. Carol. 140 = D. Armeria.
Carthusianorum, All. Fl. Pedem. ii. 74 = chiuensis.
Carthusianorum, *Linn. Sp. PI.* 409.—Europ.; As. Min.
Carthusianorum, Pall. Ind. Taur.; Bieb. Casp. App. 209 = capitatus.
Carthusianorum, Sibth. *8c* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 283 = intermedius.
caryophylloides, Schult. Obs. Bot. 78 - sylvestris.
Caryophyllus, *Linn. Sp. PI.* 410.—Europ.; As. occ.
catalaunicus, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 684 = attenuatus.
caucaseus, Sims, Bot. Mag. t. 795 = chinensis.
caucasicus, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 827-praec.
Cephalotes, Ser. in DC. Prod. i. 356 = capitatus.
chinensis, *Linn. Sp. PI.* 411.—Europ.; As. temp.
chloaephyllus, Schur, Enum. PI. Transs. 95=Carthusianorum.
chloroleucus, Fisch. in Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 187*ts* chinensis.
cibrariou, *Clem, in Mem. Ace. Sc. Torin.* Ser. II. xvi. (1857) 256.—Graecia.
ciliatus, Costa, Fl. Catal. 86=Costae.
ciliatus, *Guss. Ind. Sem. Hort. Bocc.* (1825) 6; *PI. Rar.* 168.—Italia,
cincinnatus, *Lem. Illustr. Hortic.* xi. (1864) t 888.—Japon.
cinnabarinus, *Sprun. ex Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 22.—Graecia.
cinnamomeus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 287. t. 400 = pallens.
Hntranus, Boiss. & Reut. Pugill. PI. Nov. 20=pungens.
clavains, Desf. ex Steud. >Tom. ed. II. i. 499.—Hab. ?
clavatus, Spreng. Neue Entdeck. ii. 169 ^ Carthusianorum.
cognobilis, Timb. in Bull Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 143 = Requienii.
Colensoi, *F. N. Williams, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 844.—Afr. austr.
collincola, *Spreng. Nachr.* I. *Bot. Gart. Halle,* 20.—Hab.?
collinus, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. i. 51 = chinensis.
collivagus, Jord. in Billot, Annot. 46—longicaulis.

DIANTHUS :—
compactus. Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 654 = barbatus.
condensatus, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 632 — monspessulanus.
congestus, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. »0=Carthusianorum.
consanguineus, Schur, Enum. PI. Transs. 93=cruenlos.
consimilis, Jord. in Billot, Annot. 47 -• sylvestris.
contortus, Sm. in Rees, Cycl. xi. = fimbriatus.
contractus, Jan, ex Nym. Consp. 105 ^ Arrosti.
controversus, Gaudin, Fl. Helv. iii. 157rasper, monspessulanus.
cornutus, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 49!)-~ clavatus.
coronarius, Lam. Fl. Fr. ii. 536=D. Caryophyllus.
corsicus, Link,ex Spreng. Syst. ii, 376 = D. Caryophyllus.
corymbosus, V. G. Dietr. Vollst Lexik. Gaertn. Nauhtr. ii. 667-barbatusI
corymbosus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 124 = Poiretianus.
corymbosus, *Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i.* 286; *Fl. Graec.* t. 395.—Archip. Graec.; As. Min.
Costae, *Willk. in Willk. tf Lange, Prod. Ft. Hisp.* iii. 683.—Hispan.
Courtoisii, Keichb. Fl. Germ. Excun. 806=snperbns.
Courtoisii, Schur, Enum. PI. Transs. 96 -= collinus.
cous, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 20—actinopetalus.
crassipes, *De Roem. in Linnaea,* xxv. (1852) 11.—Hispan.
crenatus, EckL & Zeyh. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 123-holopetalus.
crenatus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 161 = deltoides.
crenatus, [Ker-Gawl.J in Bot. Reg. t. 256 = prostratus.
crenatus, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 178^scaber.
crenatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 81.—Afr. austr.
cretaceus, Adam, in Web. & Mohr, Beitr. i. 66 - leptopetalus.
cibrarius, *Clem. Sert. Or.* 20. t. 2.—As. Min.
crinitus, Sin. *in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 800.—As. Min.; Persia; Ind. bor. occ.
cioaticus, *Borbas ex Just, Jahresber.* iv. 1059.—Croatia.
crossopetalus, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient, i. 496 = crinitus.
cruentus, *Fisch. ex Planch, in Fl. des Serres, Sit.* I. v. (1849) t. 488.—Reg. Caucas. t
cruentus, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 186.— Graecia.
cyathophorus, Moris, Ind. Sem. Hort. Tauiin. (1852) 32; et in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. (1853) 368 = Arrosti.
cylleneus, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. i. 63-pubescens.
Cyri, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 34.—As. Min.; Assyria; Afghjnist.
dalmaticus, *Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxv. (1885) 189.—Dalmatia.
danubialis, Griseb. ex Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 301 = banaticus.
decrescensx, ltorb. in Oestr. Bot Zeitschr. xxvii. (1877) 378.—Europ.
deltoides, Georgi, Reisen, i. 215 • chinensis.
deltoides, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 192-myrtinervius.
deltoides, *Linn. Sp. PI.* 411.—Europ.; Tibet, occ.
deltoides, Patrin, ex Steud. Norn. ed. II. i. 499 = chinensis.
dentosus, Fisch. ex Keichb. I'l. Crit. vi. 82. t. 646 = chinensis.
dtsaA, Kotsehy, in Sittb.Acad. Wien, Math. Nat. Iii. Abth. I. (1866) 262.—Arab.
dichotomus. Pall. Reise Statth. Russ. Reich, ii. 385 - polymorphust
diffusus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 191 = Friwaldskyanus.
diffusus, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 286; Fl. Graec t. 396 = pubescens.
diminutus, Linn. Sp. PI. ed. II. 587 — prolifer.
discolor, Sims, Bot. Mag. t. 1162'chinensis.
diutinus. Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 656 ~ polymorphus.
diutinus, Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 44-atrorubens.
divaricatus, *Urv. in Mint. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 802.—Archip. Graec.
dubius, Homem. Hort. Hafn. i. 408 = arenarim, plumarius, suaveolens.
dubius, *Rafin. Caratteri,* 76.—Sicil.
Dufftiix, Hausskn. ex Aschers.in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 259 (an Leitgebii ?).—Europ.

DIANTHUS:—
dumulosus, Boiss. *Sc* Huet, Diagn. Set. II. v. 53 = orientalis.
elatus, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 186.-Sibir. altaic.
elegans, *Bieb. ex Rupr. Fl. Cauc.* 174, in textu.—Reg. Cancas.
elegans, Urv. in Mėm. Soc. Linn. Par. i. (1822) 302= actinopetalus.
ellipticus, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii. (1864)** II. 869.—Japon.
elangatus, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* **211.—Reg.** Cancas.
emarginatus, Set. in DC. Prod. i. 359-pallens.
ericetorum, *Pourr. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1865) 109, nomen.—Hispan.
erinaceus, *Boiss. Diagn. Set.* I. i. 21.—Graecia.
erubescens, *Roth, Enum. PI. Phaen. Germ.* **i. II. 279.—** Enrop.
erythrocoleus, *Boiss. Fl. Orient,* i. 493. —Armenia.
Falconeri, *Edge*. V Hoot./. Fl. Brit. Ind.* **i. 214.—** Tibet, occ.
fallens, Timb. in Bull. Soc Bot. Fr. v. (1858) 329 = tenet.
fasciculatus, Gilib. Fl. Litnan. ii. 161 = Carthusianornm.
fastigiatus, Pant, in Verh. Ver. Natur- u. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 105 = cruentus.
Faurei, *Arvet, in Bull. Soc. Daupk.* **(1880) 268.—** Gallia.
ferrugineus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Italia.
ferrugineus, Pourr. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 232 = Carthusianornm.
filiformis, Lam. Fl. Fr. ii. 537 = Tunica Saxifraga.
fimbriatus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 832 = orientalis.
fimbriatus, Brot. Fl. Lusit. ii. 177 = Broteri.
fimbriatus, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1833) 232 = crinitus.
fimbriatus, Lam.Fl. Fr. ii.538=monspeliacus, superbus.
Fischeri, Spreng. Cat. Sem. Hort. Hal. (1810) j Pugill. ii. 62 = chinensis.
flaccidus, Fieber, in Flora, xvii. (1834) 633=caesius.
floribundus, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* **i. 221.** —As. Min.; Syria,
foliosus, *Turca. in Bull. Soc. Not. Mosc.* **v. (1832) 184.** —China.
fragrans, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 831.—Reg. Caucas.
frigidus, Zucc. in Flora, vii. (1824) 283=sylvestris.
Friwaldskyanus, *Boiss. Diagn. Set.* II. i. 65.— Rumelia.
fruticosus, *Linn. Sp. PI.* 413.—Archip. Graec.
furcatus, *Bald, in Mėm. Acad. Turin, Phys.-Math.* **i.** (1802-03) IS.—Pedemont.
furcatus, Bourg. ex Nym. Consp. 104=tener.
furcatus, Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 47 = Hornemanni.
gaditanus, *Boiss. Diagn. Set.* II. i. 67.—Hispan.; Marocco.
gallicus, *Pers. Syn.* i. 495.—Gallia.
Gasparrini, *Cuss. Fl. Sic. Syn. i.* 479.—Sicil.
gelidus, Schott, Nym. & Kotschy, Analect, Bot. 54 = glacialis.
geminatus, Kit. ex Schult Oestr. Fl. ed. II. i. 656= Homemanni.
geminiflorus, Loisel. Fl. Gall. 725 = Seguieri.
giganteus, Urv. in Mfm. Soc Linn. Par. i. (1822) 301 = banaticos.
Girardini, *Lamotte, in Bull. Soc. Bot. Fr.* **xxi. (1874)** 120.—Gallia.
Giaellae, x, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 378.—Europ.
glacialis, DC. Fl. Fr. vi. 608=neglectus.
glacialis, *Haenke, in Jacq. Coll.* ii. 84.—Europ. alp.
glaucophyllus, Boiss. Fl. Orient, i. 514-capitatus.
glaucophyllus, *Colla, in Mem. Ace. Torino,* **xxxr.** (1831) 187.—Hab. ?
glaucophyllus, Hornem. ex Ser. in DC. Prod. i. 356 = libumicus.
glaucophyllus, Wierzb. ex Griseb. *Sc* Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 301 = banatiens.
glaucus, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 656 = chinensis.
glaucus, Huds. Fl. Angl. ed. II. 185 = caesins.
glaucus, Linn. Sp. PI. 411 = deltoides.
glaucus, Schousb. ex Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 355=gaditanus.
glomeratus. Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 276-polymorphus.
glumaceus, Bory & Chaub. Nouv. FL Pdop. 26 = Tunica glumacea.

DIANTHUS:—
glutinosus, *Boiss. b> Heldr. Diagn.* Ser. II. i. 61.— Arcbip. Graec.
Godronianus, Jord. in Billot, Annot. 45-virgineus.
gracilis, *Sibth. tf Sm. Fl. Graec. Prod.* **i. 288;** *Fl. Graec.* t 402.—Macedon.
gramineus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturvr. iv. (1853) 11 = Carthusianornm.
graminifolius, *Presl, Fl. Sicul.* 147-—Sicil.
graminifolius, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 144 = tenuifolius.
grandiflorus, *Pair, in Lam. Encyc.* iv. 515.—Hispan.
graniticus, *Jord. Obs. PI. Crit.* vii. (1849) 13.—Gallia.
gratianopolitanus, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 598 = caesius.
Gremblichii x, Aschers. in Sitzb. Bot. Ver. Brandenb. xix. (1877) 28.—Europ.
Grisebachii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 62-viscidus.
Guliae, Janka, in <I1. Bartl.' iii. (1874) 422; ex Joum. Bot. xii. (1874) 338=ferrugineus.
guttatus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 328=chinensis.
Guyetani, Jord. in Billot, Annot 46«sylvestris.
haematocalyx, *Boiss.* to" *Heldr. Diagn.* SerMl. i. 68.— Graecia.
Haussknechtii, *Boiss. Fl. Orient,* i. 489.—As. Min.
Hellvigiix, Borb. ex Aschers. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 258.—Europ.
Hendersonianusx, Paxt. Fl. Mag. xiv. (1848) 126.
Henteri, Heuff. ex Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) I. 308 = D. Caryophyllus.
keptaneurus, Griseb. & Schenk, 1. c. 302 = trifasciculatus.
hirsutus, Lam. Fl. Fr. ii. 533 = D. Armeria.
hirtus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 326 = humilis.
hirtus, Lam. Fl. Fr. ii. 533 = D. Armeria.
hirtus, *Vill. Hist. PI. Dauph.* iii. 593. t 46.—Gallia; Tauria.
hispanicus, Asso, Syn. Stirp. Arag. 58->pungens.
Hoeltzeri, *Winkler, in Regel, Gartenfl.* **(1881) 1.—** Turkestan,
holopetalus, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxvii.** (1854) II. 869.—Afr. austr.
Homemanni, Salzm. ex Boiss. Diagn. Ser. II. i. 67 — gaditanus.
Homemanni, *Ser. in DC. Prod. i.* 262.—Reg. Mediterr.
hortensis,.Schrad. exWilld. Enum. Hort. Berol. 469 = plumarius.
humilis, *Willd. ex Ledeb. Fl. Ross.* **i. 280.—Rossia** austr.
hungaricus, Clem. Sert. Orient. 18 = crinitus.
hungaricus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 198-petraeus.
hungaricus, Pers. Syn. i. 494 = plumarius.
hybridus, Schmidt, ex Tausch, in Flora, xiii. (1830) 245 = D. Armeria.
hymeno\epis,Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 64.—Mesopotam.
hypanicus, Bess, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 809 = campestris.
hypochlorus, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 67.— As. Min.
hyssopifolius, Linn. Cent. PI. i. 11«superbus.
ibericus, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 283=crinitus.
ibericus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 24 = chinensis.
inaequalis, E. Mey. Zwei Pfl. Docurn. 178=crenatus, prostratus.
incertus, Jacquem. ex Edgew. & Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 216 = angulatus.
inclusus, Walp. Rep. i. 268=Saponaria inclusa.
incurvus, Thunb. Prod. PI. Cap. 81 = albens.
inodorus, Gaertn. Fruct. ii. 227.1129. f. 13=attenuatus.
inodorus. Pall. Reise, it. 523=chinensis.
inodorus, Steud. Nom. ed. I. 271—sylvestris.
insignitus, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 148 =pg. cos.
integerrima. in Flora, xii. (1829) I. Erg. ll = strictus.
integerrimus, Bunge, in Mem. Acad. P&ersb. Ser. Vt. vii. (1858) 683=Liboschitzianus.
integripetalus, Schur, Enum. PI. Transs. 98=petraeus.
intermedius, *Boiss. Fl. Orient,* i. 515.—Rumel.; As. Min.
intermedius, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 276 = polymorphus.
involucratus, Pall, ex Ledeb. 1. c. 277 = chinensis.
involucratus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 132=rupicola.
italicus, *Jan, ex Pasquale, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1866) adn.—Italia.
Jacquemontii, *Edgew. V Hook. f. in Fl. Brit. Ind.* **i.** 214.—Reg. Himal.

DIANTHUS:—
Jaczonisx, Aschers. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 257.—Europ.
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 183. t. 23 = barbatus.
jeniseensis, Less, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 278=chinensis.
indaicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 66.—Syria,
juniperinus, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 803.— Ins. Creta.
juratensis, Jord. in Billot, Annot. 47=sylvestris.
Kamisbergensis, *Sond. in Ham.* **b*** *Send. Fl. Cap.* **i-**124.—Afr. austr.
Kayserianus, Schur, Enum. PI. Transs. 97 = D. Caryophyllus.
Knappii, Aschers. ex Nym. Consp. 103=libumicus.
Kotschyanus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 68 = anatolicus.
Kremeri, *Boiss.* **6"** *Reut. Pugill. PI. Nov.* **21.—** Hispan.
Kuschakewiczi, *Regel &• Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 244.—Sibir. altaic.
lactiflorus, *Fentl, in Tchihat. Asie Min. Bot.* **i. 215.** —Cilicia.
lanceolatus, Stev. ex Eichw. Skizze, 172=bicolor.
lancifolius, Tausch, in Flora, xiv. (1831) 216 = trifasciculatus.
Langeanus, *Willk. in Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp-* iii. 690.—Hispan.
lancifolius, *Boiss.* **b"** *Reut. Diagn. PI. Nov. Hisp.* **7.—** Hispan.
latifolius, Willd. Enum. Hort. Berol. 466=barbatus.
leptoloma, *Steud. ex A. Rich, Tent. Fl. Abyss,* **i. 42 —** Abyss,
leptopetalus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* **468.—** Macedon.; Reg. Caucas.
leucophaeos, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod. i.* **288!** *Fl. Graec.* t. 406.—Bithynia.
leucophaeus, Sieber, Reise Kreta, ii. 820=sphacioticus.
Levieri, *Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxvii. (1877)** 281.—Ital.
Libanotis, *Labill. Ic. PI. Syr.* i. 14. t. 5.—Syria.
Liboschitaianus, Hohen. ex Boiss. Fl. Orient i. 491* fragrans.
Liboschitzianus, *Ser. ex DC. Prod.* i. 360.—As. Min.
libumicus, *Bartl. &• Wendl. f. Beitr.* ii. 62.—Europ. austr.
ligusticus, Willd. ex Nym. Consp. 103=libumicus.
lilacinus, *Beits,* b" *Heldr. Diagn.* Ser. II. i. 68.— Graecia.
liliodorus, *Pan!, ex Nym. Consp.* 105, nomen.—Serb.
lineolatus, [Bove"] Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp- (1838) ex Ann. Sc. Nat. Ser. II. vii. (1837) 286 = multipunctatus.
litoralis. Host, Fl. Austr. i. 522=ciliatus.
longicalyx, *Miq. in Joum. Bot. Neerl.* i. (1861) 127— **China.**
longicaulis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144=virgineus.
longicaulis, Costa, Fl. Catal. 36 = D. Caryophyllus.
longicaulis, *Tenore, Cat. Hort. Neap.* ed. II. (1BW 77, *ex Fl. Nap.* ii. 879.—Europ. austr.
longiflorus, Poir. in Lam. Encyc iv. 522=attenuatus.
longiglumis, *Delile, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. **• (1843) 89.—Abyss.
Lucae x, Aschers. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876; 259.—Europ.
lusitanus, Brot. Fl. Lusit. ii. 177 = attenuatus.
lydus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 20.—As. Min.
macranthus, *Boiss. 1. c.* 23.—Persia.
macrolepis, Boiss. L c 18=Cyri.
macrolepis, Fenzl, ex Boiss. L c. viii. 64 =stenocephalu»-
macronyx, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient ***** orientalis.
malacitanus, HaenseL ex Boiss. Voy. Bot. Espagnd ii. 85 = BroterL
marginatus, *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 131.—Jura.
marsicus, Tenore, Fl. Nap. iv. 61-monspessulann».
masmenaens, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 61.—As. Min.
mauritanicus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **383.—** Algeria.
Mayeri, *Presl, Bot. Bemeri.* 18.—Sibiria.
medius x, Bess, ex Nym. Consp. 103.
membranaceus, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv (1876) 125 r* polymorphus.
Mercurii, Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze, « (1876) 237 =gracilis.
micranthus, *Boiss. V Heldr. Diagn.* **Ser. L** *rou* **• Graecia.
microlepU, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 22.—Thracu.

DIAMTHTJS:—
micropetalus, Eckl. & Zeyh. Enum. 81 = kamisbergensis.
"ticropetalus, Ser. in DC. Prod. i. 859 =scaber.
Mikiix, Reichardt, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xvii. (1867) 8S1.—Europ.
miniatus, Hnet, ex Nym. Consp. 106=muItinervis.
moesiacus, *Vis.* &• *Panč, in Mem. 1st. Venet.* xv„ (1870) 17.—Europ.
"wnadelphus, Vent. Jard. Gels, t. 89 = pallens.
*m°*speliacus,* Linn. Syst ed. X. 1029 = monspessulanns.
monspessulanus, *Linn. Cent.* ii. n. 146 ; *Amoen. Acad,* iv. 313.—Europ. anstr.
monspessulanus, Wulf. in Roem. Arch. iii. in. 860 = erubescens.
***ontanus,* Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 328 = chinensis.
"wntanus, F. W. Schmidt, in Neu Abh. Boehm. Ges. .. "• (1791) SO = Carthusianorem.
Morrisii, *Hance, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 472.—China.
""schatus, J. F. Gmel. Syst. 711 " D. Caryophyllus ?
noschatus, Hort. Par. ex Ser. in DC. Prod. i. 368 = plumarius.
ntlticaulis, Boiss. & Hnet, Diagn. Ser. II. v. 58 = Liboschitzianns.
""flticaulis, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 280 = humilis.
nwlti$_{cepS}$ *Costa, ex Willk. in Linnaea.m.* (1859-60) »8—Hispan.
n"ltifidus, Gilib. Fl. Litnan. ii. 162-superbus.
"Kltifidus, Willd. ex Ser. in DC. Prod. i. 364 = fragrans.
"JWtinervis, *Vis. Fl. Dalmat.* iii. 164.—Dalmatia.
™nltipunctatus, *Ser. in DC. Prod.* i. 862.—Archip. ^{Gr} «c.; Syria.
»"*ltisquamatus,* Hochst. ex Boiss. Fl. Orient, i. 497 =smaicns.
mnltisqnamatus, *F. N. Williams, in Journ. Bot.* xriii. (1«85) 344,-Kurdistan.
"Xoschianus, *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* i. 610.—Armenia.
Mussini, Hornem. Hort. Hafn. i. 408-squarrosus.
""ttabilis, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. ii. (1854) *44. t. 2=masmenaeus.
ajWinervius, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 194.—Macedon.
-"""?/> Sweet, Hort. Brit. ed. I. 41=Carthusianorum.
"amifonis, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. V1878) 195.—Turcia.
n"•aronw, Clarke, Tray. ii. 420=serratifolius.
ue8»ectus, *Loisel. in Desv. Journ. Bot.* ii. (1809) 821.—Europ.
h^{TM}«, *Waldst. «- Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 209—»ngar.; Macedon.
nodos>*f, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 243 = longicaulis.
No«anus> *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 67.—Rumelia.
"«o»»s, Boiss. 1. c. v. 52 = floribundus.
nuf>florus. Griff. Notul. iv. 466; Ic. PI. Asiat t. 680 . i.2 = Veleziarigida.
°^°?f*tu, Reutin Mem. Soc. Phys. Geniv. viii. (1889) ovf\=glnmacea.
"•"junfolius, *Scheele, in Flora,* xxvi. (1848) 428.—Lu °p-
ochroleucus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 420 = chinensis.
ochrol ^{tueu}*>^{Pers}- Syn- *• 494^pallens.
oO»l ^{atu} ^{Boi}>*- •» *Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. ii. (1854) ?45. t. 2.—Cilicia.
odora ^{t} ^{p} ^{nus} Vest, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 807 = monspessulanus.
odoratus, Vest, ex Steud. Nom. ed. II. i. 500-plumarius.
oen pontanus x> ^{Kem}_ in Oestr_ Bot- Zeitschr. xv. 365) 209.—Enrop.
$^{-}$ympicus, ^{Boiss}_ Diagn. Ser. I. i. 19=visddus.
olympicus. ^{Sibth}_ ex Boiss. F$^{\cdot}$ 487 = leucophaeus.
Oreades, Bal^{1})_ ex Nym. Consp. 104 = monspessulanus.
oread 20—«w, Hance, in Ann. Sc. Nat Sér. V. v. (1866) orient 7. *P^{ere}M.
&*u ^{Donn}> *Hort*- *Cantab,* ed. IV. 101; *Sims,* oroph$^{\cdot}$ ^{e}r^{U} WW—Oriens.
pallens i-^{JoiA}_in BiUot Annot_ « = sylvestris.
pallet '^\$^{eb}$> *n*_ Tanr_ Canc_ >• S25=pallidiflorus.
^{1} "9—GraecU; As. Min.; Persia.

DIAMTHUS:—
pallidiflorns, *Ser. in DC. Prod.* i. 858.—Reg. Caucas.; Soongaria.
panieulatus, Gneldenst. Reis. i. 68, 110 = pallidiflorus.
papillosns, *Vis. tf Pani. in Mem. 1st. Venet.* x. (1861) 434.—Enrop.
parnassicus, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. i. 64 = viscidns.
parviflorus, Boiss. 1. c. Ser. I. i. 21 •= anatolicus.
parviflorus, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 279 = pallidiflonu.
patens, Willd. Ennm. Hort. Berol. Suppl. 24 = chinensis.
pavonicus, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) 145.—Helvetia.
pectinatus, E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 124 = prostratus.
pelviformis, *Heuff. in Flora,* xxxvi. (1853) 625.—Servia.
pendnlus, *Boiss. V Blanche, Diagn.* Ser. II. vi. 28.—Syria.
Pentynae'x, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 61.
petraeus, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 328=Liboschitzianns.
petraeus, *Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung.* iii. 246.—Hungaria; Thrada.
Petteri, *Boiu. Diagn.* Ser. II. i. 66.—Dalmatia.
pinifolius, *Sibth. V Sm- Fl. Graec. Prod.* i. 284.—Archip. Graec.
Planellae, *WiUk. Ic. et Desc. PI. Hisp.* i. 79. t. 58.—Hispan.
platyphyllns, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) H. 368.—Japon.
plumarius, AncL ex Pers. Syn. i. 494-monspessulanus.
plumarius, Gunn. ex Spreng. Syst. ii. S79=superbus.
plumarius, *Linn. Sp. PI.* 411.—Europ.; As. bor.
plumosus, DC. ex Spreng. Pugill. ii. 64=monspessulanus.
pogonopetaltis, Boiss. *Sc* Kotschy, Diagn. Ser. II. vi. 29 = orientalis.
Poiretianus, Ser. in DC. Prod. i. 360=corymbosus.
polycladus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 66.—Syria,
polylepis, *Bienert, ex Boiss. Fl. Orient,* i. 497.—Persia.
polymorphus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 824.—Reg. Caucas.
pomeridianus, Bieb. 1. c. 829 = leptopetalus.
pomeridianus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1678.—Palestin.
Pontederae, A. Kem. Sched. Fl. Exsicc. ii. 67 = D. Carthusianorum.
ponticus, Wablenb. in Isis, xri. (1828) 986-intermedius.
portensis, Libosch. ex Ser. in DC. Prod. i. 363 = plumarius.
praecox, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 381=arenarins.
pratensis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 800=chinensis.
pratensis, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 643 = D. Armeria.
pratensis, Lepech. It. iii. 138-deltoides.
procumbens, Vent. Jard. Cels, Index=pallens.
prolifer, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p..xxv«Aphyllanthes monspeliensis.
prolifer, Linn. Sp. PI. 410=Tunica prolifera.
propinquus, Schur, Enum. PI. Transs. 94-libumicua.
prostratus, Eckl. *Be* Zeyh. Enum. 32-scaber, crenatus.
prostratus, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 11. t. 271.—Afr. austr.
pruinosus, Boiss. *Sc* Orph. Diagn. Ser. II. vi. 28 = haematocalyx.
pruinosus, Janka, Del. Sem. Hort. Vindob. (1858) 4; et Linnaea, xxx. (1859-60) 748 = banaticus.
Pseud-Armeria, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 823; iii. 297.—Reg. Caucas.
Pseud-Armeria, Wierzb. ex Schnr, Enum. PI. Transs. 91 = D. Armeria.
Pseudo-barbotus, Bess, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 805=liburnicus.
Pseudo-caesius, Schur,Enum. PI. Transs. 98-petraeus.
puberulus, *F. N. Williams, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 344.—Persia.
pubescens, Fiscb. Cat. Hort. Gorenk. (1813) 69 = leptopetalus.
pubescens, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod. i.* 286.—Graecia.
pubescens, Urv. in M^m. Soc. Linn. Par. i. (1822) 303 -glutinosiis.

DIANTHUS:—
pulchellus, Pers. Syn. i. 495 -caesins.
pulchellus, Schrad. ex G. Don, Gen. Syst. i. 886-chinensis.
pulcher, Salisb. Prod. 303 = chinensis.
pulcherrimus, Loisel. in Diet. Sc. Nat. xxxv. 417 = barbatus.
pumilus, Frivald. ex Boiss. Diagn. Ser. L i. 22 - microlepis.
pumilus, *Vahl, Symb. Bot.* i. 82.—Arab,
punctatus, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 169.—Hab.?
pungens, J. Gay, ex Boiss. Voy. Bot Espagne, ii. 85 = brachyanthus.
pungens, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. L 234 -= furcatus.
pungens, *Linn. Mant.* ii. 240.—Hispan.
pungens, Poir. Encyc. iv. 526—virgineus.
purpureus, Poir. in Lam. Encyc. iv. 628=pungens?
purpureus, *F. N. Williams, in Journ. Bot.* xxiii. (1886) 343.—Syria,
pusillus, *F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. i.* (1791) 29.—Europ.
pyrenaicus, *Bernk. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 500.—Mont. Pyren.
pyrenaicus, Pourr. in Mém. Acad. Toul iii. (1788) 318=attenuatus.
quadrangularis, *Haberle, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 500.—Hab.?
quadrilobus, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 222-sulcatus.
Quetieriix, Carr. ex H^rincq, L'Horticulteur Franç. (1866) 48.
racemosus, Vis. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 12 » ciliatus.
ramentaceus, Fenzl, ex Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 122=scaber.
ramosissimus, Pall, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 130 = pallidiflorus.
recticaulis, Ledeb. Fl. Ross. i. 287 = Tunica stricta.
recurvus, Fiscb.. ex Ledeb. 1. c. 284 = squar. rosus.
repens, Willd. Sp. PI. ii. 681=alpinus.
Requienii, *Godr. in Gren. V Godr. Fl. Fr.* i. 284.—Europ. austr.
Reuteri, Jord. in Billot, Annot 49 - sylvestris.
revolutus, Tausch, in Flora, xiii. (1830) 245 - superbus.
rigidus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 325.—Tauria.
robustus, *Boiss. (f Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i.* 492.—Armenia.
rosulatus, Borb. ex Nym. Consp. 103-liburnicus.
rupestris, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 191= pubescens.
rupestris, Lam. Fl. Fr. ii. 636=virgineus.
rupestris, Linn. f. Suppl. 240—sylvestris.
rupicolus, *Bivona, Sicul. PI. Cent.* i. 81.—Sicilia.
rupicolus, Jord. ex Nym. Consp. 105=sylvestris.
rupicolus, Schur, Enum. PI. Transs. 93 ^ Carthusianorum.
ruthenicus, Roem. ex Poir. Encyc Suppl. iv. 131 = chinensis.
sabuletorum, Heuff. in Oestr. Bot Zeitschr. viii. (1858) 26=Carthusianorum.
sabuli. Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 530-polymorphus.
sabulosus, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. L 284« sqnarrosus.
saetabensis, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 44.—Hispan.
Samaritani, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, i. 511 = dnnabarinus.
sanguineus, Vis. Ind. Sem. Rar. Hort. Patav. (1846) l=atrorubens.
Sartorii, Frnehl. ex Nym. Consp. 107-velutinui.
saxatilis, Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 829 = pallens.
saxatilis, Pers. Syn. i. 494=monspessulanus.
scxicola, Jord. Pngill. 29 - sylvestris.
saxifragus, linn. Sp. PI. 418 = Tunica saxifraga.
scatter, Chaix, in Viil. Hist. PI. Dauph. i. 831 = hirtus.
scaber, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 81, partim«= crenatus.
scaber, Schleich. ex Suter, Fl. Helv. i. 259 -chinensis.
scaber, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 81.—Afr. austr.
Scheuchteri, Jord. Pugill. 29 = longicaulis.
Scheuchieri, Reichb. FL Germ. Excurs. 811 - sylvestris.
schimopetalus, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 670-superbus.

DIAITTHTJS:—
Schlosseri, *F. N. Williams, in Journ. Bot.* **xxiii.** (1855) 3*2.—Europ. austr.
Schousboei, Coss. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) S55=gaditanus.
Schraderi, Reichb. Hort. Bot. i. 24=chinensis.
scoparius, *Fenal, ex Boiss. Fl. Orient,* i. 494.—Persia.
Seguieri, Costa, ex Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. iii. 681 = hirtus.
Seguierii, Vill. Prosp. 48; Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. i. 330 ; iii. 594=chinensis.
Seidlitzii, *Boiss. Fl. Orient,* i. 506.—Persia.
serotinus, Waldrt. Kit. PI. Rar. Hung. ii. 188. t. 172 = plumarius.
Serpae, *Ficalho (f Hiern, in Trans. Linn. Soc.* **Ser. II.** ii. (1881) 17.—Afr. trop.
terratifolius, *Sibth. (f Sm. Fl. Graec. Prod.* **i. 287.—** Graeda.
serratus, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 241 =chinensis.
serrulatus, Boisa. Voy. Bot. Espagne, iL 84. t. 23 = Broteri.
serrulatus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 846.—Afr. bor.
sicnlus, *J. (f C. Presl, Delic. Prag.* **59.—Reg.** Mediterr.
silenoides. *Pair, in Lam. Encyc.* iv. 514.—Hab. *1*
sinaicus, *Boiss. Diagn.* Scr. I. i. 23.—Arab.
sinensis, Link, Handb. ii. 237 =chinensis.
speciosus, Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 46 — monspessulanns.
sphačioticus, *Boiss. If Heldr. Diagn.* Set. L viii. 70.— Ins. Creta.
spiculifolius, Schnr, Enum. PI. Transs. 98=petraeus.
spinosus, Desf. in Ann. Mas. Par. i. (1802) 198. t. 16. f. 1 = Acanthophyllnm spinosum.
Sprengelii, G. Don, Gen. Syst. i. 394 —monspessulanus.
spurius x , Kern, ex Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxxvi. (1876) 173.—Europ.
squarrosus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 831.—Tauria.
stenocephalus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 19.—Persia,
stenopetalus, *Griseb. Spirit. Fl. Rumel.* i. 187.—Thessal.; Macedon.
sterilis, Stev. ex Boiss. Fl. Orient, i. 505=humilis.
Sternbergii, Scbleich. ex Ser. in DC. Prod. L 365 = monspessulanus.
Sternbergii, *Sibth. ex [Capellt] Cat. Hort. Taur.* (1821) 24.—Tauria.
stramineus, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 70.— As. Min.
striatellus, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. 10 = multipunctatus.
strictus, *Sibth. (f Sm. Fl. Graec. Prod, t* **288.—** Dalmat.; Graecia.
strictus, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed. II. ii. 252= syriacus.
snaveolens, *Spreng. Nov. Prov.* 16.—Hab. !
suavis, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 24=caesius.
subacaulis, Cutanda, Fl. Madrid, 170=brachyanthus.
subacaulis, Vill. Hist. PI. Danph. iii. 597 = virgineus.
subbarbatus, *Schur, Enum. PI. Transs.* 92.—Transsylv.
subbifloius, *Pourr. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1865) 109, nomen.—Hispan.
subneglectus, Schur, Enum. PI. Transs. 85= Carthusianorum.
suffruticosus, Willd. Enum. Hort Berol. 466=rupicola.
sulcatus, *Boiss. Fl. Orient,* i. 483.—As. Min.
superbiens, Kotschy, ex Boiss. I. c. 492=robustus.
superbus, Eichw. Casp. Cauc. 31=monspessulanus.
superbus, *Linn.Amoen.Acad.iw.* 272.—Europ.; As. bor.
superbus, Willk. ex WUlk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii 684 = Broteri.
supinus. Lam. Fl. Fr. ii. 534=deltoides.
fylvaticus, *Hoppe, ex Willd. Enum. Hort. Berol.* **467;** *Sturm. Deutschl. Fl.* **Heft 28.—Europ.**
sylvestris, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 85 = Boissieti.
sylvestris, *Wulf. in Jacq. Coll.* i. 237.—Europ.
syriacus, *Steud. Norn.* ed. II. i. 501.—Syria.
syriacus, F. N. Williams, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 346 = pubescens?
Szowitisianus, *Boiss. Fl. Orient. I* 503.—Reg. Caucas.
tabrisianus, *Bienert, ex Boiss. 1. c.* 496.—Persia; Afghan ist.
talyschensis, *Boiss. tf Buhse, in Nouv. Mem. Mosc.* xii. (1860) 34.—Reg. Caucas.
tanaicensis, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Xoss.* **i. 287** (quid!).—Rossia.
tataricus, Fisch. Hort Gorenk. ed. II. (1812) 59 = chinensis.
Tauscheri, Eversm. ex Ledeb. Fl. Ross. L 284-acicularis.

DIANTH.U8:—
tener, *Balb. in Mem. Acad. Turin, Phys.-Math.* **1.** (1802-3) 14.—Italia,
tenuidorus, *Griseb. Spiril. Fl. Rumel.* i. 189.—Thracia; Macedon.
tenui/olius, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 143-Carthusianorum.
tergestinus, Reichb. Ic. Fl. Germ. vi.t. 266=virgineus.
thessalus, *Orph. in Bull. Congr. Bot. Pitersb.* **1869** (1870) 123.—Graecia.
toletanus, *Boiss. (f Reut. Diagn. PI. Nov. Hisp.* **7.—** Hispan.
transsylvanicus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. v. (1854) 82 = trifasciculatus.
tricolor, Adam, ex Ser. in DC. Prod. L 360=pomeridianus.
trifasciculatus, *Kit. ex Schult. Oestr. Fl.* ed. II. i. 654. —Hungar.
tripunctatus, *Sibth. (f* Sm. *Fl. Graec. Prod.* i. 286.— Archip. Graec.
tymphresteus, *Heldr. If Sort, in Boiss. Diagn.* **Ser.** II. vi. 27.—Graecia.
umbellatus, DC. Cat. Hort. Monsp. 104 = chinensis.
uniflorus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxi=pumilus.
uniflorus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 162=arenarius.
vaginatus, Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 44 = atrorubens.
vaginatus, Vill. Hist. Fl. Dauph. iii. 594^Carthusianorum.
valentinus, Willk. Ic et Desc. PI. Hisp. i. 14. t. 7 = Broteri.
velutinus, Gnss. PI. Rar. 166 = Tunica velutina.
Verschaffeltiix, Lent. Illustr. Hortic. vi. (1859) t. 220.
versicolor, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 420 = chinensis.
villosus, Gilib. Fl. Lituan. ii. 160=D. Armeria.
virgatus, *Pasq. in Ann. Ace. Asp. Nat.* **Ser. III. i.** (1861) 28.—Italia.
virgineus, Habl. Taur. 119, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 326=humilis.
virgineus, *Linn. Sp. PI.* 412.—Europ. austr.; Afr. bor. occ.
virgineus, Sims, Bot. Mag. t. 1740=sylvestris.
viridescens, *Vis. Ort. Bot. Padm.* 138.—Dalmatia.
viscidus, *'Bory (f Chaub. Nouv. Fl. Pelop.* **26.—** Graecia.
vivariensis, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 91 -hirtus.
volgensis, Hort. ex Ser. in DC. Prod. i. 861 = deltoides.
VukotinoviHi x, Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxxvi. (1876) 172.
mtlturius, Guss. & Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1837) 3; (1839) ll = libumicns.
Waldsteinii, Stemb. in Flora, ix. (1826) I. Beil. 73 = monspessulanus.
Webbianus, Parol. in Vis. Illustr. Ale. Piant. 20. t. 3. f. 2=erinaceus.
Willdenoml,l£.nk, Enum. Hort. Berol. i. 420=chinensis.
Wimmeri, Wichura, in Jahresb. Sohles. Ges. (1864) 75 ; et Flora, xxxix. (1856) 127=superbus.
Wolfii x, Vetter, in Bull. Soc Murith. xi. (1883) 8, 132-Courtoisii.
Wulfenii, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Caertn. Nachtr. ii. 669=sylvestris.
xylorrhizus, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 67.— Graecia.
Zeyheri, *Sond. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* **i. 124.—** Afr. austr.
zonatus, *Fend, Pugill. PI. Nov. Syr.* **11.—Graecia;** As. Min.

DIAPASIS, Poir. Encyc. Suppl. ii. 468 (1811)-**Bias,** pasifl, R. Br. (Gooden.).

DIAPEDIUM, Koen. Steud. Norn. ed. II. i. 601, 504 (1840)=Dleliptera,Juss. (Acanth.).

DIAPEN8IA, Linn. Gen. ed. I. 52 (1737). *DIAPENSIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 619.
REMBERTIA, Adans. Fam. ii. 226 (1763).
americana, Banks, ex Sims, Bot. Mag. sub t. 1108 = Pyxidanthera barbulata.
barbulata, E1L Sketch, i. 229 = Pyxidanthera barbulata.
cuneifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 148 = Pyxidanthera barbulata.
helvetica, Linn. Sp. PL 141 - Androsace bryoides.

DIAFENBIA:—
himalaica, *Hook. f. tf Thorns, in Hook. Kew Journ.* ix. (1857) 373.—Reg. Himal.
japonica, J. F. Gmel. Syst 1539, sphalm. = seq.
lapponica, *Linn. Sp. PI.* 141.—Reg. bor. alp.
obtusifolia, Salisb. Parad. Lond. t. 104=lapponica.

DIAPENZIA, Dum. Anal. Fam. 28 (1829)=praec.

DIAPERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 3S7=Evax, Gaertn. (Compos.).
multicaulis, Nutt. 1. c. = E. multicaulis.
prolifera, Nutt. 1. c.=E. prolifera.

DIAPHANE, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 304 = Iris, Tourn.
edulis, Salisb. 1. c =Moraea Sisyrinchium.
stylosa, Salisb. 1. c. 305=1. juncea.

DIAPHORA.Lour. Fl. Cochinch. 578 (1790) = Bcleris, Berg. (Cyperac).
cochinchinensis, Lour. l.c.=S. elata.

DIAPHORANTHEMA, Beer, in Flora, xxxvii. (1854) 349; Brom. 153 (1857) = Tillandsia, *Una.* (Bromel.)-
biflora, Beer, Bromel. 156 = T. biflora.
capillaris, Beer, 1. c. 158 = T. capillaris.
recurvata, Beer, 1. c. 156 = T. recurvata.
subulata, Beer, 1. c 155 » T. stricta.
triflora, Beer, 1. c.-T. triflora.
uniflora, Beer, I. c. 154 = T. recurvata.
versicolor, Beer, 1. c 155 = T. setacea.
virescens, Beer, 1. c. 154 = T. virescens.

DIAPHORANTHUS, Anders, ex Hook. f. Fl. Antaret. 238 (1845)-Pringlea, Anders. (Crucif.).

DIAPHORANTHUS, Meyen, Reise, i. 406 (1834) - Folyaohyrus, Lag. (Compos.).
fuscus, Meyen, 1. c. = P. sphaerocephalus, niveus.

DIAPHOREA, Pen. Syn. ii. 576 (1807) = DIAPHORA. Lour.=Solaria, Berg. (Cyperac).

DIAPHYLLUM, Hoffm. Gen. Umbell. 115 (1814)-Bupleurum, Linn. (Umbell.).
aureum, Hoffm. 1. c = B. aureum.
longifolium, Hoffm. 1. c. = B. longifolium.
triradiatum, Hoffm. 1. c = B. triradiatum.

DIARINA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) »W.I et Cat. 13 (1824) = Diarrhena, Beauv. *(.WV* (Gramin.).
festucoides, Rafin. 11. cc. — Diarrhena americana.
sylvatica, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 10*- Diarrhena americana.

DIABRHENA, Beauv. Agrost. 142 (1812). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1190.
CORYCARPCS, Zea, ex Spreng. Syst. i. 123 (1825).
DIARINA, Rafin. in Med Repos. N. York, v. (1808) 352; Cat. 13 (1824), nomen prius.
KORYCARPUS, Zea, in Act. Matr. (1806); ex Lag- et Sp. Nov. 4 (1816).
ONOEA, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 178 (1879).
ROEMERIA, Zea, in Roem. *Sc* Schult. Syst. i. Bii *» (1817).
americana, *Beauv. Agrost.* 142. t. 25.—Am.
japonica, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* **«-** Japon.
setacea, Roem. & Schult Syst. L 289 = Festuca setacea.

DIABTHBON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1852) 204; et (1852) II. 464. t. 11. *THYMELASACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 194.
carinatum, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 6. t. 105 = culosum.
linifolium, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1852) 204. —Mongolia.
vesiculosum, *Endl. Gen. Suppl.* **iv. II.** *W--* Persia; Afghan.

DIASCIA, Link & Otto, Ic PI. Sel. 7. t. ?. (J|?0)< *SCROPHULARINEAE,* **Benth.** *Sc* **Hook.** *f.* **??** . "gi 6)
alonzoides, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* « 1 17.—Afr. austr.
Barberae, *Hook. f. Bot. Mag.* 15933.—Afr. austr.

DIASCIA :-
Bergiana, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 17=sacculata.
BeiBJana, £,»* &• o«0,/,.« . SW. 7. t. 2.-A6. austr.
•Bnrchelln, Benth. in DC. Prod. x. 258.—Afr. anstr.
capsula *ft Benih_ in Hook_ Com P- Bot_ Ma S- «• (1836) %>—Afr. anstr.
*S"ta ' *• M *v- ex to"**-_-17—Afr. austr.
aenttculata, Benth. I. c. 18.-Afr. austr.
COttsa, Benth. I. c. 16.A-Afr. austr.
elongata, Benth. I. c—Afr. austr.
£eterandra, Benth. I. r.-Afr. anstr.
netrandra, Benth. I. c—Afr. anstr.
*^ " i " * . ^- Mey. ex Benth. I. c.* 18,-Afr. austr.
macrophylla, Benth. I. c. 17.-A&. austr.
macrophylU, 5>re»^. *Syst.* ii. 8OO.-Afr. austr.
me!!tg", 'SPren S-'• c. = Hemimeris montana.
"emoplùloides, Benth. in DC. Prod. x. 257.—Afr. austr.
*pacftyceras, E. Mey. ex Benth. in Hook. Comp. Bot. "*g- u.* (1836) 16.—Afr. austr.
P«TM>flora, fi^tt. /. ,. i7._Afr. austr.
raeemulosa, Benth. I. c—Afr. anstr.
"gescens, £. *Mey. ex Benth. I. c.* 18—Afr. austr.
TM"o"ata. £• **y. *ex Benth. I. c.* 16.-Afr. anstr.
sacculata, Benth. in DC. Prod. x. 258.—Afr. austr.
tan IP^.'f- "&•** *Benth.»» Hook. Comp. Bot. Mag.* T"» (1836) 17—Afr. anstr.
*. *'"n oer giana, Spreng. Syst.* ii. 800.—Afr. anstr.
"nilabiata, Benth. in DC. Prod. x. 257.—Afr. austr.

DI^L^A' DC. in Bull. Soc. Philom. iii. (1803) 151-Mel,asphaenda, Ker-Gawl. (Irid.).
fvnznifolia, DC. 1. *c;* et in Red. Iil. t. 16S-M. . graminea.
!-"?jr?'f»«. Heynh. Nom. i. 261 = M. graminea.
in ?'&'?>DC- in Bull. Soc. Philom. iii. (1808) 151; et • :'Red-Lil.t.E4 = M. graminea.
"»«»/o«o, Eckl. Top. Verz. 31=Lapeyrousia Fabricii.
P»rnflora, Steud. Nom. ed. II. i. 501-M. parviflora.

DIASPANANTHUS' Mi*in Ann_ Mus_ !* gd. Bat. ii. 186 (1865) Alnsllaea, DC. (Compos.).
palmatus, Miq. 1. c.==A. uninora.

DIASPASIS" R. Br. Prod. 586 (1810). *GOODS-*i£?v*AE, Benth_ * Hook. f. ii. 540.
Wolu, *R. Br. I. e.* 587.-AustraL

DIASPERUS, Linn. Syst. ed. 1 (1785) = Phyllanthus, Linn. (Euphorb.).

DIASTATEA, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 396. *CAMPANULACEAE.*
virgata, Scheidw. l. c—Mexic.

DIASTELLA, Salisb_in Kn; Sht- P"4- »1 (1809)=Leucospermua, R_ Br_ (181°) (Proteac).
bryifiora Salisb. 1. c. 62=L. pnbernm.
ericaefolia, Salisb_L c_ 64-Mimetes pnrpnrea.
*humifusa, Salisb_!_ «• 68.—Afr. austr.
myrtifolia Salisb_ •• c=Mimetes myrtifolia.
parilis, Salisb. l.c.62=L.parile.
serpyllifolia Salisb_X_c—Af_aMtr_
vaccinüfolia, Salisb. 1. c. 63-Mimetes vacdniifolia.

DIASTEMA, Benth. Bot. Voy. Sulph. 132 (1844). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1000.
DIASTEMATION' c_ MueU_ "> w »lP- Am. v. 426 (1858).
DIAS ELLA, Oerst in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 99.
bracteosum, canst in Linnaea rxxxiT (1865-66) 488. —Costa R[_a.
caracasanu 7?!:*'<"*«* b'*Hanst. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. vi. <185«) 871—Venezuela.
comiferum, Benih_ ex Wtd P- Rep. vi. 408.—Ecuador.
cristatum, Ha„ r{ tsinnaea >xxxiv- (1865-66) 438.—Costa Rica.
discolor, Benth. „ C< *Muel1 in Wal t- Ann_* v* 425 .— Peruv.
divarica[11?' Benth. ex Walp. Rep. vi. 403.—Pernv.
erinoide Benth_e* *Walp. I. c*—Venezuela.
gloxiniiflorum, Regd> Cat Hort> Zuer> (1853) 34 = Gloxinia gibrata.
gracilis, Regel, Flora, xxxii- (1849) 180 = Dicyrta candida.
incisum, f«•«• *PI. Hart*. 2S5.-Pernv.
longiflorum Benth. I. e. 234.-N. Granat

DIA8TEMA:—
maculatum, Benth. ex Walp. Rep. vi. 408.—Pemv.
molle, Benth. ex Walp. I. c—Pernv.
ochroleucum, Hook. Bot. Mag. t. 4254.—N. Granat.
pictum, Benth. ex Walp. Ann. i. 472.—Guatemala.
pictum, Regel, in Flora, xxxi. (1848) 260-Isoloma pictnm.
quinqnevnlnerum, Planch. 6* *Linden, in Fl. des Serres,* Sér. I. viii. (1852-53) 227.—N. Granat.
racemifernm, Benth. Bot. Voy. Sulph. 132.—Ecuador, scabrnm, *Benth. ex Walp. Rep.* vi. 403.—Pernv.
tenerrimum, Benth. ex Walp. I. c.—Peruv.
urticaefolium, Benth. ex Walp. I. c—Peruv.

DIASTEMANTHE, Steud. Syn. PI. Gram. 360 (1855) = Stenotaphrum, Trin. (Gramin.).
platystachys, Steud. 1. c = S. americanum.

DIASTEMATION, C. MueU. in Walp. Ann. v. 426 (1858) =seq.

DIASTEMELLA, Oerst. In Vidensk. Selsk. Skr. V. v,, (1861) 99-Blastema, Benth. (Gesnerac).
braeteosa, Oerst. 1. c. 100=Diastema bracteosum.

DIASTEMMA, Lindl. Veg. Kingd. 672 (1847)-Dia-Btema, Benth. (Gesnerac.).

DIASTROPHIS, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 85 (18S5)-Aethionema, R. Br. (Crncifer.).
cristata, Fisch. *Sc* Mey. 1. c. 86=A. Diastropbis.

DIATENOPTEKYX, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Mnench. viiL (1878) 284. *SAPINDACEAE.*
sorbifolia, *Radlk. I. c.* 285.—Bras.

DIATOMA.Lour. Fl. Cochinch. 295 (1790) = CaraUia, Roxb. (Rhizophor.).
brachiata, Lour. 1. c. 296 =C. integerrima.

DIATONTA, Walp. Rep. ii. 614 (1848) = DIADONTA, Nutt.=Coreopsis, Linn. (Compos.).

DIATOSPERMA, C. MueU. in Walp. Ann. v. 211 (1858) =DIOTOSPERMA, A. Gray=Ceratogyne,Turcz. (Compos.).

DIATREMA.Rafin. Fl. Tellnr. iv. 72 (1886) =Ipomoea, Linn. (Convolv.).
alba, Rafin. Fl. 1. c.=I. alba.
muricata, Rafin. 1. c. = 1. muricata.
purpurea, Rafin. 1. c = I. pnrpnrea.

DIATROPA, Dnm. Fl. Belg. 76 (1827) =BupIeurum, Linn. (Umbell.).
rotundifolia, Dnm. 1. c = B. rotnndifoHnm.

DIAXULON, Rafin. Sylva Tellnr. 24 (1838) = Cytisus, Linn. (Legum.).
argentium, Rafin. 1. c. 25=Argyrolobium Linneanum.
prolifer, Rafin. I. c.=C. prolifems.

DIAZEUXIS, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 251=Iiycoseris, Cass. (Compos.).
intermedia, DC. Prod. vii. 22=L. triplineryja ?
latifolia, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi.'(1830) 302 =L. latifolia.
Mutisiana, D. Don, 1. c. 253, in obs.=L. mexicana.
serrata, D. Don, 1. c. 254, 302=Vemonia arctioides.
trinervis, D. Don, 1. c 253.—Peruv.

DIAZIA, Phil. Fl. Atac. 22. t. 1. E. (1860) = Calandrinla, H. B. & K. (Portnlac.).
portulacoides, Phil. 1. c—Chili.

DIBERARA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1881) 279 =Nèbelia, Neck. (Brnniac.).

DIBOTHROSPERMUM, Knaf, in Flora, xxix. (1846) 298=Matricaria, Tourn. (Compos.).
agreste, Knaf, L c = M. inodora.
pusillum, Knaf, 1. c.=M. inodora.

DIBRACHIA, Steud. Nom. ed. II. i. 502 (1840)-DIBRACHVA, Eckl. *Sc* Zeyh. = Pelargonium, L'Hlrit. (Geraniac).

DIBRACHION, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. a865) 61; Gartenfl. xv. (1866) 100. t. 604 = HomalanthiiB, A. Juss. (Euphorb.).
ptltatum, Regel, 11. c c-H. giganteus.

DIBRACHION, TuL in Ann. Sc Nat. Sér. IL xx. (1843) 138>SlplotropiB, Benth. (Legum.).
brasiliense, Tul. 1. c 139-DipL brasiliensis.
guianense, Tnl. 1. c.—Guiana.
riparium, Spruce, ex Benth. in Mart Fl. Bras. xv. I. 821=Dipt. Martiusii.

DIBRACHIUM, Walp. Rep. v. 650 (1846-46) - DIBRACHION, Regel=HomalanthUB, A. Jnss. (Euphorb.).

DIBRACHYA, Eckl. *Sc* Zeyh. Enura. 74 (1836)=. Pelargonium, L'Hirit. (Geraniac.).
dypeata, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 75-P. peltatum.
peltata, Eckl. & Zeyh. 1. c. 74-P. peltatum.
scutata, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c = P. scntatnm.

DICAELOSPEBMUM, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 630 (1879). *CVCURBJTACEAE.*
Ritchiei, *C. B. Clarke, I.* c—Ind. or.

DICALIX, Lour. Fl. Cochinch. 663 (1790)-Symplooos, Linn. (Styrac.).
acuminatus, Blume, Bijdr. 1119=S. acnminata.
aluminosus, Blume, 1. c. 1117 (excl. syn.)=S. spicata.
eiliatus, Blume, 1. c. 1119=S. ciliatns, *Miq.*
cochinchinensis,Lom. Fl. Cochinch. ii. 663.—Cochinch.
costatus, Blume, Bijdr. 1117=S. costata.
fioridus, Regel & Koem. Ind. Sem. Hort. Pe(rop.(1868) 45.—Hab.?
javanicus, Blume, Bijdr. 1117—S. ferrnginea.
odoratissimus, Blume, 1. c. 1116 » S. odoratissima.
salaccensis, Blume, 1. c 1118—S. salaccensis.
sessilifolius, Blnme, 1. c =S. subsessilis.
spicatus, Blume, 1. c.*=S. caryophylloides.
sylvaticus, G. Don, Gen. Syst. ii. *6bl=cochinchinensis.*
tinctorius, Blnme, Bijdr. 1116 = S. fasciculate.

DICALVMMA, Lem. Illustr. Hortic. ii. (1856) Misc. 37 =Podachaenium, Benth. (Compos.).
fragrant, Lem. 1. c. — P. paniculatum.

DICALYX, Poir. in Diet. Sc. Nat. xiii, 172 (1819)-DICALIX, Lonr.-Symplooos, Linn. (Styrac.).

DICARDIOTIS. Rafin. Fl. Tellnr. iii. 31 (1836) = Oentlana, Tourn. (G. auricnlata, *Pall.).*

DICARPAEA, PresI, Symb. Bot. i. 37. t. 26 (1880) = Limeum, Linn. (Ficoid.).
lini/olia, Presl, 1. c. 38. t. 26-L. linifolinm.

DICABPIDITTM, F. MueU. in Hook. Kew Joum. ix. (1857) 302. *STERCULIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 224.
monoicum, *F. MueU. 1. c.*—Austral,

DICABYTTH, Willd. ex Roem. & Schult Syst iv. 802(1814). *LOGAN/ACEAE1*
serruUtum, *Willd. ex Roem. (f Schult. I. c.—S.* Granat.
subdentatum, *Willd. ex Roem. tf Schult. I. c.~* Ecuador.

DICELXA, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 250. *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 262.
braeteosa, *Griseb. 1. c.*—Bras,
holosericea, *A. fuss, in Ann. Sc. If at. Sit.* II. xiii. (1840) 823.—Bras.
lancifolia, A. Jnss. L c.=braeteosa.
macroptera, *A. Juss. I. c.*—Bras.
motif olio, A. Jnss. L c.=braeteosa.

DICELIiANDKA, Hook. f. in Benth. *8c* Hook. f. Gen. i. 757 (1867). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
Barteri, *Hvak.f. I. c*—Afr. trop.
setosa, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 469.—Afr. trop.

DICELLOSTTLE8, Benth. in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 122; et Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 207 (1862). *MALVACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 207.
axillaris, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* vi. (1862) 122. —Zeylan.
jujubifolia, Benth. *St* Hook. f. Gen. i. 207=Kydia jujnbifolia.

DICENTRA, Bemh. in Linnaea, viii. (1838) 457, 468 ; xii. (1638) 668. *PAPA VERA CEAE*, Benth. & Hook, f. i. 55.
BICUCULLARIA, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 202 (1840).
BIKUKULLA, Adans. Fam. ii. (28) 1768, nomen prim.
CAPN ORCHIS, Planch, in Fl. des Serres, viii. (1853) 193.
CUCULARIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352.
CUCULLARIA, Endl. Gen. 859 (1839).
DACTVLICAPNOS, Wall. Tent. Fl. Nep. 51. t. 39 (1828).
DACTYLISCAPNOS, Spreng. Gen. ii. 568 (1831).
DICLYTHRA, Rafin. Cat. 13 (1824).
DICLYTRA, Borck, in Roem. Arch. i. II. 46 (1797).
DIELYTRA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 556.
EUCAPNOS, Bemh. in Linnaea, viii. (1833) 468.
LAMPROCAPNOS, Endl. Gen. Suppl. v. 32 (1850).
MACROCAPNOS, Royle, ex Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 439 (1836).
canadenssis, *Walp. Rep.* 1.118; *Torr. Fl. N. York*, i. 46. —Am. bor.
chrysantha, *Walp. I. c*—Calif.
Cucullaria, *Bernh. in Linnaea*, viii. (1833) 468.—Am. bor.
eximia, *Torr. Fl. N. York*, i. 46.—Am. bor.
formosa, *Walp. Rep.* i. 118.—Am. bor. occ.
lachenaliaeflora, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 97.—Sibir.; Am. bor. occ.
ochroleuca, *Engelm. in Coult. Bot. Gat.* vi. (1881) 228.—Calif.
panciflora, *S. Wats, in Bot. Calif*, ii. 429.—Calif,
pnsilla, *Sieb.* &" *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1843) 172.—Japon.
Roylei, *Hook. f. V Thorns. Fl. Ind.* i. 278.—Reg. Himal.
saccata, Walp. Rep. i. 118 = formosa.
scandens, *Walp. 1. c.*—Reg. Hirnal.
spectabilis, *Lem. in Fl. des Serres, Sir.* L iii. (1847) t. 258.—Japon.
tenuifolia, Ledeb. Fl. Ross. i. 97=lachenaliaeflora.
thalictrifolia, *Hook.f. tf Thorns. Fl. Ind.* i. 273.-Reg. Himal.
torulosa, *Hook.f. V Thorns. 1. c.* 272.—Reg. Himal.
nniflora, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* iv. (1871) 141. —Am. bor. occ.

DICENTRANTHERA, T. Anders, in Joum. Linn. Soc vii. (1864) 62=A8y8tasia, Blume (Acanth.).
macrophylla, T. Anders. 1. c—Afr. trop.

DICERA, Forst. Char. Gen. 79. t. 40 (1776) = Elaeocarpua, Burm. (Tiliac.).
Craspedum, J. F. Gmel. ex DCs Prod. i. 620 *=E. tectorius.
dentata, Forst. Char. Gen. 80 - E . dentatns.
serrata, Forst. 1. c.=E. dentatns.

DICERA, Zipp. ex Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. ii. 67. 74 (1858) [1856] = Qironnlera, Gaudich. (Urticac).
lanceolata, Zipp. 1. c. 67 - Celtis paniculata.
rhamnifolia, Zipp. L c. = G. rhamnifolia.

DICERANDRA, Benth. in Bot. Reg. sub 1.1800 (1880) K=Ceranthera, Ell. (Labiar.).
densiflora, Benth. in DC. Prod. xii. 243=C. densiflora.
linearifolia, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1300 = C. linearifolia.
linearis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 418=C. linearifolia.

DICEBATEIXA, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 80 (1844). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 71.
DICKRATIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* II. xvil. (1842) 61.
canescens, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 61.—Persia.
floccosum, *Boiss. 1. c.*—Persia.
incano, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 500.—Ins. Socotr.

DICERATIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. II. xvii. (1842) 61-Diceratella, Boiss. (Crocif.).
canescens, Boiss. 1. c. 62 = Diceratella canescens.
floccosum, Boiss. L c 61=Diceratella floccosum.

DICERATIUM, Lag. Elench. Madr. 20 (1815); Nov. Gen. et Sp. 20 (1816) - Notoceras, R. Br. (Crucif.).
prostratum, Lag. Nov. Gen. et Sp. 20=N. canariense.

DICERMA, DC. Mem. Leg. 326 (1825) ; et Prod. ii. 3S'J=De8modium, Desv. (Legum.).
acanthocladum, F. Muell. Fragm. ii. 122=Desm. acanlhocladum.
biarticulatum, DC. Prod. ii. 339=Desm. biarticulatum.
elegans, DC. 1. c.=Desm. elegans.
pulchellum, DC. 1. c. = Desm. pulchellum.
repens, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5740 = Desm. heterophyllum.
vestitum, Wall. 1. c c. 5739-Desm. vestitum.

DICEROCARYUM, Boj. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 268. t. 10 = Pretrea, J. Gay (Pedalin.).
sinuatum, Boj. 1. c. 269.1.10=P. zanquebarica.

DICEROLEPIS, Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 145. t. 24 (1850) =Gymnanthera, R. Br. (Asclep.).
kypoleuca, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 466.—Malaya.
paludosa, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 146.—Java.
pedunculata, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 466 = G.pedunculata.

DICEROS, Blume, Bijdr. 752 (1826)=Vandellia, Linn. (Scrophular.).
caespitosus, Blume, 1. c. 753 - V. caespitosa.
glanduliferus, Blume, 1. c. 752-V. glandulifera.
latifolius, Blume, 1. c.-V. latifolia.
montanus, Blume, 1. c.-V. montana.

DICEROS, Lour. Fl. Cochinch. 381 (1790) =Iiimnophila, R. Br. (Scrophular.).
cochinchinensis, Lour. 1. c.—Cochinch.
stoloniferus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 349 = L. conferta.

DICEROS, Pers. Syn. ii. 164 (1807)=Artanema, D. Don (1834) (Scrophul.).
angustifolius, Benth. in Wall. Cat. n. 3885 = A. angustifolium.
longifolius, Pers. Syn. ii. 164-A. sesamoides.

DICEROSTYLIS, Blnine, Orch. Archip. Ind. i. 116 (1858) = Hylophila, Lindl. (Orchid.).
lanceolata, Blume, 1. c.=H. lanceolata.

DICERSOS, Lour. Fl. Cochinch. ii. 381 (1790), sphalm. = DICEROS, Lour.=liimnophila, R. Br. (Scrophular.).

DICHAEA, Lindl. Gen. et Sp. Orchid. 208 (1833). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 656.
EPITHECIA, Knowles & Westc Fl. Cab. ii. (1838) 167. t. 87.
FERNANDEZIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 123 (1794).
brachyphylla, *Reichb. f. in Nederl. Kruidt. Arch.* iv. (1859) 828.—Bras.
brachypoda, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 78.—Costa Rica.
bryophila, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 90.—Bras,
calyculata, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 4.—Peruv.
coriacea, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 181.—Bras,
echinocarpa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 208.—Mexic.
glauca, *Lindl. 1. c.* 209.—Jamaic.
gorgonensis, *Reichb. f. in Linnaea*, xii. (1877) 75.—Ins. Gorgona.
graminea,Gnstb. Fl. Brit. W. Ind. 625=seq.
graminoides, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 209.—Ind. occ.
Histrio, *Reichb. f. in Nederl. Kruidt. Arch.* iv. (1869) 330.—Venezuela,
hystricina, *Reichb. f. in Flora*, xlviii. (1865) 279.—Ind. occ.
Kegelii, *Reichb. f. in Linnaea*, xii. (1877) 129.—Guiana.
Lagotis, *Reichb.f. 1. c.* 112.—Venezuela,
latifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 208.-Ins. S. Vincent.
latifolia, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 91.—Bras,
laxa, *Poepp. b" Endl. Not. Gen. et Sp.* ii. 4.—Perav.
Liebmannii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1879) I. 678, nomen.—Mexic
maculata, *Poepp.* b[1] *Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 3.—Peruv.

DICHAEA :-
Moritzii, *Reichb. f. in Nederl. Kruidt. Arch.* iv. (1859) 328.—Venezuela.
Moseni, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 90.—Am. trop.
muricata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 209.—Jamaic.
ochracea, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 54.—Guiana.
Oerstedii, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 219.—Nicaragua.
panamensis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 209.—Panama,
picta, *Reichb. f. in Sound. Refug. Bot.* t. 84.—Ins. Trinit.
pumila, *Rodrig. Orch. NOB.* i. 91.—Bras.
Splitgerbeii, *Reichb. f. in Nederl. Kruidt. Arch.* iv. (1859) 327.—Guiana,
squarrosa, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (1840) 384.—Mexic.
tigrina, *Reichb. f. in Schiller, Cat. Orch.* 27; *ex RegtU Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1868) 80.—Am. austr.
trichocarpa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 209.—Jamaic.
Trulla, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 104.—Nicaragua.
Weigeltii, *Reichb.f. in Nederl. Kruidk. Arch.* iv. (1859) 328.—Guiana.

DICHAELIA, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 241 (1868) =Brachystelma, R. Br. (Asclep.).
Gerrardi, Harv. 1. c. = B. Gerrardi.

DICHAETA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 383=Baeria, Fisch. & Mey. (Compos.).
Fremontii, Torr. ex A. Gray, PI. Fendl. 102=» Fremontii.
tenella, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. v»-(1841) 383 = B. uliginosa.
uliginosa, Nutt. 1. c. = B. uliginosa.

DICHAETA, Sch. Bip. in Flora, xxxiii. (1850) 419-Schaetyellia, Sch. Bip. (Compos.).

DICHAETANDRA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IB-xiii. (1850) 31=Ernestia, DC. (Melastom.).
Goudotii, Naud. 1. c. 32 = E. Goudotii.

DICHAETANTHEBA, Endl. Gen. 1215 (18«> *MELASTOMACEAE*, Benth. &Uook. f. i. 747.
aculeolata, *Hook. f. ex Triana, in Trans. Linn. Soc*-xxviii. (1871) 61.-Madag.
arborea, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) I*-Madag.
articulata, *Endl. Gen.* 1215 ; *et in Walp. Rep.* —Madag.
cordifolia, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1888) 1«-—Madag.
heteromorpha, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* **"• (1871) 61.—Madag.
madagascariensis, *Triana, 1. c.*—Madag.
oblongifolia, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 147.—Madag.
Rutenbergiana, *Baill. ex Vatke, in Bremen Abn-* (1885) 116.—Madag.

DICHAETARIA, Nees, in Steud. Syn. PI. Gram. *1*=aymnopogou, Beauv. (Gramin.).
Wightii, Nees, U = G . rigidus, *Thw.*

DICHAETOPHORA. A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) (PI. Fendl.) 73 =Boltonia, L'Hérit. (Compos.).
campestris, A. Gray, 1. c. -=B. campcstris.

DICHANTHIUM, Willem. in Usteri, Ann. Bot. *x*[il] (1796) 11-Andropogon, Linn. (Gramin.).
nodosum, Willem. 1. c. = A. caricosus.

DICHAPETALUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 23 *{1&*[06]*)* =ChaUletia,DC.
Bailloni, Pierre, Fl. For. Cochinch. t. 47.-Cochmen
Helferianum, Pierre, 1. c. 48 = C. Helfenana.
Heudelotii, Baill. Hist. PI. v. 140 = C. Heudelotu-
hispidum, Baill. 1. c. 141=C. hispida.
madagascariensis.Poit. in Diet. Sc. Nat. xiii. 17" Dichapetalum.
pedunculatum, Baill. Hist. PI. v. 140-C. pedunculata. 342 = C.
Thouarsianum, Roem. & Schult Syst. v. Dichapetalum.
toxicarium, Baill. Hist. PI. v. 138-C. toxic*n»-

DICHELACHNES, Endl. Prod. Fl. Ins. Norf. 20 (1833). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1188.
comata, Trin. & Rupr. inMim. Acad. P&ersb. Se"r. VI. 7-Sc. Nat (1842) 4=crinita.
«""ta, #«,*./. f/. AT. *Zel.* i. 298.—Austral.; N. Zel.
*Ur*yimondiana,* Steud. Syn. PI. Gram. 120=Deyeuxia Unimmondiana.
Forsteriana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. .-Se». VI. v. Sc Nat. (1842) 4-crinita.
Hookeriana, Trin. & Rupr. 1. c. 8=crinita.
"ngiseta, Trin. & Kupr. 1. c. 5 = crinita.
montana, Endl. Prod. Fl. Ing. Norf. 24~sciurea.
procera, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Petersb. Sér. VI. .». Sc. Nat. (1842) 6 = crinita?
"^rfa, Trin. & Rupr. 1. c. 5 = sciurea t wiurea, *Hook.f. Fl. N. Zel.* 294.—Austral.; N. Zel.
setacea, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 98 - Stipa tereti-folia.
Sieberiana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. P&ersb. Sir. yi- v. Sc. Nat. (1842) 2-sciurea.
«<*>!<*«, Hook. f. Fl. N. Zel. 294. t. 66 = Stipa tereufblia.
vulgaris, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. *Sit.* VI - v. Sc. Nat. (1842) 3 = sciurea.

DICHELACTINA, Hance in Wal P- Al >n. Hi. 375 (1858) = PhyUanthU8, Linn. (Euphorb.).
nodtcaulis, Hance, 1. c. 376-= P. Emblica.

DICHELOSTEMMA, Kunth, Enum. PI. iv. 469 (1843) Jr?diaea, Sm. (Liliac).
W.fornica, Wood, in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. U868) 173=Strophol irion californicum.
capttat«, Benth. ex Wood, 1. c. = Milla capitata.
co»gestum, Kunth, Enum. PI. iv. 470 = B. congcsta.

DICHELOSTYLIS, Endl. Gen- "8, in syn. (1836) = DICHOSTYLIS, Beauv.-Scirpufl.Lii.. (Cyperac.).

DICHERANTHUS, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. v. (18*8) 27 l 2- Aw * Hook. f. iii. is. *ILLECEBRACEAE*, Benth.
•"ocamoides, *Webb, 1. e.* 29. t. 2.—Ins. Canar.

DICI^ , **ANTHE** n Hook. Kew Journ. viii. (1t , & Hook, f. 9, 876- t- 8„ A„ *RUBIACEAE*> Ben*- * u. 108
boneensis, *Baili. Hist. PI.* vii. 428.—Borneo,
ze ^ ca, *Thm. in Hook. Kew Journ.* viii. (1866) 270. ylan.

DICHILOS, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 263 (1827) = seq.

DICHILUS' DC. Mém. Lég. 201. t. 85 (1825). *LEGUMINOSAE*, Benth- &Hook. f. i. 479.
CALYMOSOTOME> E- Me 7- Comm. PI. Afr. Austr. 118
MOLLI OSPERMUM, Wal P- in Linnaea> *»»» (1889) 27.
cas jflfV' t£- Mey. in Linnaea, vii. (1832) 154 = *ciliat* Olobium candicans.
An?*' S P. ten g- f- Syst. Tent. Suppl. 20-Argyrolobium *era* rewslanil ni.
AS ^ E- Mey. in Linnaea, vii. (1832) 154 = *floribundus,* olobfuin crassifolinm.
Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 28 - Lotononis **dichiloides**.
gracilis E cic- <* Ze>h- Ent »-183.—Afr. austr.
bJDQ r ,um , S^rtn g- &** iv- Cur- Post- 273.—Afr. austr.
lanceola S l E Mey In Linaea (1832) 154 = Argyr lebeckio bTM Lanceolatum. C Mé Ug 202- *• 35.-Afr. austr.
microphyllus, E- Mev- in Linnaea, vii. (1832) 155- lolobi icrophyllum.
°Cr*y? *Paten* i L Mo ' C 15* = Argyrolobium obovatum.
*»«/E «Vy- Comm -- III- Afr. Austr. 36 = gracilis.
S5W im H ook- Lond. Journ. Bot. iii. (1841) gracilis.
sericeus, ^ Me Linnaea, vii. (1832) 154 = Argyro bium sericeum.
sericeus, Spreng. f. Syst Teni- s PP J- 20.—Afr. anstr.
spicatus E. Me ^nnaea, vii. (1832) 164 = Melo- |obium cernuum.
strictus »«<r! E, Mey, Comm- *PI- Afr. Austr.* 36.—Afr.

DICHISMUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106 = Seirpufl, Linn. (Cyperac).

DICHODON, Bartl. ex Reichb. Norn. 205 (1841) - Cerastium, Linn. (Caryophyll.).
anomalum, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 34 = C. anomalum.
cerastioides, Reichb. 1. c. f. 4915 = C. trigynum.

DICHOESPERMUM, Wight, Ic. vi. 81. t. 2078 (1853) sAneilema, R. Br. i,Commelin.).
aurantiaeum, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 207 = A. pauciflorum.
Blumei, Hassk. Commel. Ind. 41 = A. Hamiltonianum.
giganteum, Hassk. 1. c. 42 = A. Thomsoni.
juncoides, Wight, Ic. t. 2078 = A. panicnlatum.
Koenigii, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 215=A. Koenigii.
lanceolatum, Wight, Ic. t. 2078 = A. Koenigii.
ochraceum, Hassk. Commel. Ind. 41 = A. ochraceum.
paniculatum, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 215-A. paniculatum.
repens, C. B. Clarke, Commel. et Cyrt. Bcng. t. 28 = A. Hamiltonianum.
repens, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 207 = A. spiratnm.
repens, Wight, Ic t. 2078=A. ochraceum.
semiteres, Hassk. Commel. Ind. 41=A. paniculatum.

DICHOGLOTTIS, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. (1835) 25 =- Oypsophila, Linn. (Caryophyll.).
alsinoides, Walp. Ann. i. 90—G. alsinoides.
australis, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 631 = G. tubulosa.
bellidifolia, Walp. Rep. v. 78=G. bellidifolia.
floribunda, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 165 = G. floribunda.
frankenioides, Walp. Rep. v. 78=G. frankenioides.
hispida, Walp. 1. c. = G. hispida.
linearifolia, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hbrt. Petrop. i. (1835) 26 = G. linearifolia.
linifolia, Fisch. & Mey. ex Pritz. Ic. Ind. 362, sphalm. —praec.t
muralis, Jaub. *Sc* Spach, IUustr. i. 13=G. murahs.
Sanitsii, Walp. Rep. v. 78 = G. Szowitsii.
spathulaefolia, Fisch. *8c* Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 290-G. spathulaefolia.
trichopoda, Walp. Rep. v. 78 = G. linearifolia.
tubulosa, Jaub. & Spach, IUustr. i. 14 = G. tubulosa.

DICHONDKA, Forst. Char. Gen. 39. t. 20 (1776). *CONVOLVVLACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 879.
DEMIDOFIA, J. F. Gmel. Sybt. ii. 458 (1791).
STERIPHA, Banks, ex Gaertn. Fruct. ii. 81. t 91 (1781).
argentea, *Willd. Hort. Berol.* 297. t. 81.—Am. calid.
brevifolia, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 208.—N. Zel.
carolinensis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 136—repens.
caroliniana, Willd. ex DC. Prod. ix. 451 = praec.
cymbalariaefolia, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. vi. 209 = Sibthorpia pichinchensis.
macrocalyx, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 358 = repens.
parvifolia, *Meissn. 1. c.* 860.—Bras.
peruviana, Poir. Encyc. Suppl. ii. 470=repens.
repanda, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. vi. 209 = Sibthorpia pichinchensis.
repens, *Forst. Char. Gen.* 39. t. 20.—Reg. trop. et subtrop.
rotundifolia. Link, Enum. Hort. Berol. i. 249 (a Sibthorpiae sp.).—Persia.
sericea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 54=repens.
villosa, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* xiii. (1882) 9 ; *Contrib.* 32.—Reg. Argent.

DICHONE, Laws, ex Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) S20=Tritonia, Ker-Gawl. (Irid.).
crispa, Laws. Cat. 6; ex Salisb. 1. c = T. undulata.

DICHOPETALUM, F. Muell. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 378. t. 11; et in Trans. Phil. Soc. Viet. i. 101 (1855)-Azorella, Lam. (Umbellif.).
ranunculaceum, F. Muell. 11. cc. 102; 378 = A. dichopetala.

DICHOPOGON, Kunth, Encm. PL iv. 622 (1848). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 791.
SIONA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 67 (1866).
humilis, Kunth, 1. c 623 = strictus.
humilis, F. Muell. Fragm. vii. 67 .- Arthropodium minus.
leinumophilus, F. Muell. ex Baker, in Journ. linn. Soc. xv. (1876) 319.humilis.
setosus, Kunth, Enum. PI. iv. 623—strict us.
Sieberianus, *Kunth, I. c*—Austral,
strictus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 319. —Austral.
undulatus, Regel, Gartenfl. ii. (1853) 1. t. 37 = strictus.

DICHOPSIS, Thw. Enum. PI. Zeyl. 176 (1864). *SAPOTACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 658.
PALAQUIUM, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 403 (1887); ed. II. 282 (1845).
argentata, *Benth. b[1] Hook.f. Gen.* ii. 658.—Malaya.
calophyUa, Benth. & Hook. f. 1. c = Bassia caloneura.
canaliculata, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 541.—Zeylan.
elliptica, *Benth. tf Hook.f. Gen.* ii. 658.— Ind. or.
grandis, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 540.—Zeylan.
Gutta, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 658.—Malaya.
Helferi. *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 642.—Burma.
hexandra, *C. B. Clarke, I. c.* 543.—Malacca.
Homei, *Hartog, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 367.—Ins. Fiji.
Krantziana, *Pierre, in Beauvis, Contr. Gutta-Percka,* 60. t. 1.—Cambodia 1
laevifolia, C. *B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit: Ind.* iii. 541.—Zeylan.
lanceolata, *C. B. Clarke, in Hook.f. I. c*—Zeylan.
lanceolate, *F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. 124.—Ins. Philipp.
latifolia, *F. Villar, in Blanco, I. c*—Ins. Philipp.
luzoniensis, *F. Villar, in Blanco, I. c.* 125.—Ins. Philipp.
Maingayi, C. *B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 543.—Malacca.
obovata, *C. B. Clarke, 1. c.* 542.—Malacca,
oleifera,^. *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. 125. —Ins. Philipp.
pauciflora, C. *B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 541.—Zeylan.
petiolaris, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 176.—Zeylan.
polyantha, *Benth.* fa* *Hook. f. Gen.* ii. 658.—Burma,
rubens, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 543. —Malacca,
rubiginosa, *C. B. Clarke, I. c.* 641.—Zeylan.

DICHOPUS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 176 (1856) -Dendrobium, Sw. (Orchid!).
insignis, Blume, 1. c. = D. insigne.

DICHOBISAXTDBA. Mikan, Del. Fl. et Faun. Bras, t. 3 (1820). *COMMELINACEAE*, Benth. *Sc* Hook, f. iii. 853.
PETALOXIS, Rann. Fl. TeUur. ii. 88 (1836).
STICKMANNIA, Neck. Elem. iii. 171 (1790).
affinis, Mart, in Schult. f. Syst. vii. 1185 = Aubletiana.
alba, *Seub. V Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1872) 122.—Bras,
albo-marginata, Z.imfc», *in Regel, Gartenfl.* (1868) 34. t. 669.—Bras.
Aubletiana, *Schult. f. Syst.* vii. 1181.—Am. austr.
begoniaefolia, *Kunth, Enum. PI.* iv. 112.—Bras,
discrepans, Hassk. Commel. Ind. 59 = Gaudichaudiana.
Ehrenbergiana, KloUsch, ex C. B. Clarke, in I)C. Monog. Phan. iii. 302 - Tradescantia holosericea.
foliosa, *Kunth, Enum. PI.* iv. 112 Bras.
Gaudichaudiana, *Kunth, 1. c.* 113.—Bras.
gracilis, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 14.—Bras,
hirtella, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 1190.— Bras.
inaequalis, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 140.—Peruv.
inenrva, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 1184. Bras.
intermedia, Mart. 1. c 1183 = Aubletiana.
interrupta, Mart. 1. c. 1189.—Bras.
latifolia, Kunth, Enum. PI. iv. 112-oxypetala.

DICHORISANDRA :-
Leandri, Knnth, Ennm. PI. iv. 112 =villosula.
leucopbthalmos. *Hook. Sot. Mag.* t. 4738.—Bras.
longifolia. Mart. *8c* Gal. in Ball. Acid. Brnx. ix. (1842) 878-Tradescantia holosericea.
Luschnathiana, Kunth, Enum. PI. iv. Ill = pnbesccns.
marginata, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853-65) 454 = albo-marginata.
mexicaaa, *Presl, Ret. Haenk.* ii. 140.—Mexic
micans, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 281.—Bras.
mollis, Kunth, Enum. PI. iv. 112-villosula.
mosaics, *Linden, in Belg. Hortic.* xvii. (1867) 108.—Peruv.
musaiea, Koch & Linden, ex C. Koch, Wochenschr. ix. (1866) 846-mosaica.
ovalifolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 140.—Panama.
ovata, Mart, in Schnlt. f. Syst. vii. 1182 = Aubletiana.
tvata, Paxt. Mag. Bot. xr. (1849) t jaxta 5=Gaudichaodiana.
oxypetala, *Hook. Bot. Mag.* t. 2721.—Bras,
penduliflora, *Kunth, Enum. PI.* iv. 114.—Bras,
perforans, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 281.—Bras,
picta, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1667; *Hook. Bot. Mag.* t. 4760.—Bras.
procera. Mart, in Schult. f. Syst. vii. 1187-thyrsiflora,
pubernla, *Nees tf Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1828) 18. t. 1. f. 2.—Bras.
pubescens, *Mart, in Schult.f. Syst.* vii. 1186.—Bras,
radicalis, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1828) 11.—Bras,
rhizophya, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 1191.—Bras.
Saundersii, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6165.—Bras.
scandens, Gardn.ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 274 = Aubletiana.
Schomburgiiana, Klotzsch, in Schomb. Faun, et FI. Gui. 897=-Aubletiana.
tejucensis, Mart, in Schult. f. Syst. vii. 1186 = villosula.
tenuior, *Mart. I. c.* 1188.—Bras,
thyrsiflora, *Miian, Del. Fl. et Faun. Bras.* 3. L 8.—Bras.
undata, C. Koch & Linden, ex C. Koch, Wochenschr. ix. (1866) 846-mosaica.
villosnla, *Mart, in Schult. f. Syst.* vii. 1185.—Bras.
Warsgemcriana, Planch. Hort. Donat. 80-Tradescantia Warszewicziana.

DICHOROPETALUM, Fenzl, Pngill. PI. Nov. Syr. 17 (1842) = Johrenia, DC. (Umbellif.).
alpinum, Fenzl, 1. c. - J. alpina.

DICHOSEMA, Benth. in Ennm. PI. Hueg. 85 (1837) = Mirbelia, Sm. (Legnmin.).
microphyllum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 283=M. microphylla.
multicaule, Turcz. 1. c. - M. multicanlis.
racemosum, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 78 = Chorizema ericifolium.
spinosa, Benth. Ennm. PI. Hueg. 85=M. spinosa.
sutinerme, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 78 - M. spinosa.

DICHOSMA, DC. ex Loud. Hort. Brit. 85 (1880) = Agathoama, Willd. (Rutac.).
bifida, Lood. 1. c = A. nmbellata.

DICHOSPERMUM, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 158 (1861) = DICHOESPERMUM, Wight-Aneilema, R. Br. (Commelin.).

DICHOSTACHYS, Krauss, in Flora, xxvij. (1844) 859, sphalm.-Dichrostaehys, Wight & Am. (Legam.).

DICHOSTYLIS, Beanv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 89 (l819) = Scirpua, Linn. (Cyperac).
fiuitans, Reichb. Fl. Germ. Excurs. i. 75=S. fluitans.
kamulosa, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 289 = S. hamulosns.
Ludwigii, Nees, ex Knnth, Ennm. PI. ii. 189 *• S. Ludvigii.
Micheliana, Nees, in Wight, Contrib. 94 = S. Micheli-anus.
pygmaea, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 289-Cyperns pygmaens.

DICHOTOMA,Sch. Bip. PI. Moritz. ex Benth. & Hook, f. Gen. it 364 (1878) - Soleroearpus, Jacq. (Compos.).

DICHOTOMANTHES, Kurz, in Jonm. Bot. xi. (1878) 194. t. 133 f an Rosaceis aff. V).
tristaniaecarpa, *Kurt, 1. c.* 195.—Ynnan.

DICHOTOPHYLLUM, Moench, Meth. 845 (1794) = Ceratophyllum, Linn.
demersum, Moench, 1. c.=C. demersum.

DICHEOA, Lour. Fl. Cochinch. 301 (1790). *SAXI-FRAGEAB*, Benth. & Hook. £ i. 641.
ADAMIA, Wall. Tent. Fl. Nep. 46. L 36 (1824).
CIANITIS, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 10.
CYANITIS, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Buitenz. 68 (1828).
Cyanitis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 721 - febrifuga.
febrifnga, *Lour. Fl. Cochinch.* 801.—Reg. Himal.; Malaya; China.
latifolia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 722 = febrifuga.
pubescens, *Miq. I. c.*—Malaya.

DICHROANTHUS, Webb *8c* Berth. Phyt. Canar. i. 65 (1886) = Cheiranthus, Linn. (Crucif.).
dnereus, Webb & Berth. 1. c 67 = C. scoparius.
linifolius, Webb, ex Nym. Consp. 81 = Erysimum linifolium.
mutabilis, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 66 = C. mntabilis.
scoparius, Webb *8c* Berth. 1. c 68 = C. scaber.

DICHBOCEPHAIiA, L'Herit. ex DC. in Guill. Archiv. Bot. ii. (1883) 517. *COMPOSITAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 260.
abyssinica, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 26 -latifolia.
Benthami, *C. B. Clarke, Camp. Ind.* 36.—Reg. Himal.
bicolor, Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 209 -latifolia.
capensis, DC. in Gnill. Archiv. Bot. ii. 518; Prod. v. 871-latifolia.
cbrysanthemifolia, *DC. II. cc.* 618, 872.—Ind. or.; Java; Afric.
erecta, L'Hérit. ex DC. Prod. v. 872 = latifolia.
gracilis, DC. 1. c. 871=latifolia.
grangeaefolia, DC. 1. c 372 - chrysanthemifolia.
Hamilton!, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 246.—Ind. or.
latifolia, *DC. in Guill. Archiv. Bot.* ii. 518 ; *et Prod.* v. 872.—As. et Afr. trop. et subtrop.
lyrata, *DC. Prod.* v. 872.—Madag.
macrocepkala, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 145 = chrysanthemifolia.
minima, Boj. Hort. Maurit. 179=seq.
minuta, L'Herit ex DC. Prod. vi. 139 = Centipeda orbicularis.
nilagirensis, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 245=latifolia.
oblonga. Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi (1862) 12 - chrysanthemifolia.
oblongata, Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 260-chrysanthemifolia.
paniculata, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 38-latifolia.
Schmidii, Wight, Ic. t. 1610 = Centipeda orbicularis.
sonchifolia, DC. in Guill. Archiv. Bot ii. 518 ; et Prod. v. 372-latifolia.
tanacetoides, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 122 = chrysanthemifolia.

DICHROLEPIS, Welw. Apont 542, nomen (1858). *ERIOCAULEAE** .
pusilla, *Welw. I. c*—Afr. top.

DICHROMA, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 232 ; et Ic. vi. 59. t. 582 (1801) = Ourisla, Comm. (Scrophnlarin.).
coccineum, Cav. 11. cc. 283, 59 - O. coccinea.

DICHROMA, Pers. Syn. i. 57 (1805)-Diohromena, Michx. (Cyperac).
cespitosum, Mnhl. Desc Gram. 14 *(=Isolepis stenophylla).*—Am. bor.
ciliatum, Pers. Syn. i. 58 = Dichromena ciliata.
glabra, Pers. 1. c. 67—Dichromena lencocephala.
leucocephalum, Pers. 1. c. — Dichromena leucocephala.
reptans, Pers. 1. c. — Dichromena repens.

DICHROMENA, Michx. Fl. Bor. Am. i. 37 (1803). *CYPERACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 1047.
DICHROMA, Pers. Syn. i. 57 (1805).
albida, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 186.—Bras.
atrosanguinea, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 190 = Scirpus riparius.
blephanophora, Steud. Syn. PI. Cyp. 185-ciliata.
blepharophora, J." *8c*" C:- Presll, Rel. Haenk. i. 851-pulchella. "
caespitosa, Spreng. Syst. i. 202 *{=Isolepis stenophylla).*—Am. bor.
canaliculata, Stead. Syn. PI. Cyp. 186 - Rynchospora tennis.
Candida, Baker, in Jonm. Linn. Soc. xxi. (1885) 450, (Rynchosporae sp.).—Madag.
Candida, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 149 = Rynchospora Candida.
capillaris, Kunth, Ennm. PI. ii. 283 = Rynchosport tennis.
caracasana, *Kunth, I. c.* 281.—Venezuela.
ciliata, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 197 = pulchella.
ciliata, *Vahl, Enum.* ii. 240.—Am. trop.
compressa, Spreng. Nene Entdeck. i. 239 = Rynchospora rigida?
consanguinea, Konth, Ennm. PI. ii. 278=Rynchospora consangninea.
contracta, Steud. Syn. PI. Cyp. 186 (Rynchosporae sp.)-—Bras.
cubensis, Poepp. *8c* Kunth, in Kunth, Enum. PI. ii. 281 = Rynchospora tenuis.
Drummondiana, Steud. Syn. PI. Cyp. 135-leucocephala.
elatior, Knnth, Ennm. PI. ii. 282 = Rynchospora stricta.
emarginata, Steud. Syn. PI. Cyp. 186=Rynchospor» tenuis.
erostris, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291-pnbera.
filiformis, Knnth, Enum. PI. ii. 281 - Rynchospora longispicata.
foliosa, Hochst. ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-7ZJ 634-.Rynchospora albiceps.
fragifera, A. Dietr. Sp. PI. ii. 169-Calyptrocarya fragifera.
globosa, Roem. & Schult. Syst. ii. 90-ciliata.
gracilis, Kunth, Enum. PI. ii. 280 = Rynchospora tent"*-
heterophylla, Boeck. in Flora, xli. (1858) 644 * Rynchospora Chapmanii.
hirsuta, Knnth, Ennm. PL ii. 281=Rynch°»P°r* hirsuta.
hispida, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. I 11" Rynchospora consanguinea.
hispidula, Kunth, Enum. PL ii. 279 (Rynchosporae sp.).—Guiana.
Humboldtiana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 1" pubera.
intermedia, Schrad. ex Steud. Norn. ed. II. i- pubera.
jundformis, Knnth, Enum. PL ii. 279 - Rynchospo"1 jonciformis.
latifolia, *Baldw. ex Ell. Sketch*, i. 90.—Am. bor.
leucocephala, *Michx. FL Bor. Am.* i. 87.—Am- Ind. occ «n«
leucocephala, Willd, ex Stead. Norn. ed. II- i- 50S ciliata.
leucophylla, Willie ex Kunth, Enum. PL ii. 276=*cj»"
longifolia, Spreng. Syst. i. 208 = Calyptrocarya I«W folia.
micrantha, Kunth, Enum. PL ii. 278 = Rynchosp°r micrantha.
microcephala, Spreng. Syst. i. 202= pubera.
nardifolia, Knnth, Ennm. PL 280=Rynchospora nardifolia.
nervosa, Vahl, Enum. ii. 241 = pubera, ciliata.
nitens, Kunth, Enum. PL ii. 282 = Ryncnosp" nitens.
obtusifiora, Schrad. ex Nees, in Mart. FL Bras, ii- >• -ciliata.
obtusi/olia, Stend. Syn. PI. Cyp. 135=ciliata.
Persooniana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. »• cili&t&« 'losft'
pilosa, Kunth, Ennm. PI. ii. 279 = Rynchospor* P1
pilosa, Spreng. Syst. i. 203-ciliata. i.ncnor*
Pohliana, Stendf Syn. PL Cyp. 319 = Rynch<*P° tenuis.
Preslii, A. Dietr. Sp. PL ii. 170-pulchella.
pubera, *Vahl, Enum.* ii. 241 —Am. austr.
pulchella, *Poepp. V Kunth, in Kunth, Enu»-* 277.—Pernv.

DICHBOMENA :—
Pura, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 291=ciliata.
pusilla, Kunth, Enum. PL ii. 275 (Kyncbosporae sp.).—Ind. occ.
radicans, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* vi. (1881) 28.—Am. trop.
repens, *Vahl, Enum.* ii. 241.—Am. trop.
"igida, Kunth, Enum. PI. ii. 278=Rynchospora rigida.
"paria, Steud. Syn. PI. Cyp. 186= Rynchospora riparia.
robusta, Kunth, Enum. PI. ii. 283 = Rynchospora robusta.
rufidula, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 137.—Am. bor.
»»'««, Kunth, Enum. PI. ii. 283 = Rynchospora tennis.
Schiedeana, Kunth, 1. c 282=Rynchospora eximia.
Sellowiana, Knnth, 1. c. (Rynchosporae sp.).—Bras.
setacea, Kunth, 1. c 279 = Rynchospora tcnerrima, *Nees.*
setigera, Kunth, 1. c. 277 = Rynchospora setigera.
speciosa, Kunth, 1. c. 278 =Rynchospora speciosa.
»}«arr0M, Willd. ex Link, Jahrb. i. HI. 77=Cephalostemon squarrosus.
'*Monifera,* Steud. Syn. PI. Cyp. 186=Rynchospora stolonifera.
tenella, Steud. Syn. PI. Cyp. 136 - Rynchospora tenella.
ttnera, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I.118 = . Pubera.
""•"folia, *Spreng. Syst.* i. 208.—Am. austr. trop.
tntui,, Steud. Syn. PI. Cyp. 185 = radicans.
trachycarpa, *Steud. I. c.* 136.—Hab. ?
":»CO{OT-, Salzm. ex Steud. 1. e. = pubera.
*f»., A. Dietr. Sp. PI. ii. 169=Selen'a communis.
•««»»a, Kuntb, Enum. PI. ii. 2b2 = Rynchospora wlwina.

DICHRONEMA, Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xxi. (1885) ««0«Diohromena, Michx. (Cyperac.).

DI9JR.OPHYLLUM, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 249=Euphorbia, Linn.
,iZ>Klot»ch & Garcke, 1. c.; et in Abh. Akad. Berl. (U60)44 = E.bicoIor.
ypnatum, Klotzsch & Garcke, 11. cc.«=E. torrida.
eatum, Klotzsch & Garcke, 11. cc = E. marpnata.

DICHROSTACHYS, Wight & Am. Prod. 271 (1834). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 592.
^i?rena, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) J*"~Madag.
S - 356.-Madag.
> Meissn. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 859 —nutans.
Hassk- P1- Jav- Rar- 415=nutans.
q- Fl. Ind. Bat. i. I. 48=nutans.
gkt& Am. Prod. 271.—Geront. trop.
»» *Pnc- Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) Ofbesn, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 358. Q—Air. austr.
Bull Soc. Linn. Par. i. (1888) Kirk—ag.
Benth. in Trans. Linn.Soc. xxx. (1875) 383.-Afr. trop.
B83.-Guiana.
th. Fl. Austral, ii. 299.—Austral.
nutans, Ben. . in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 353.—Afr. trop.
Ru f e P WW». *Apont.* 576.-A&. trop.
Butt. Soc. Linn. Par. i. (1883) ~Madag.
n Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 353.

DICHROTRICHIUM, BentU. & Hook. f. Gen. ü. 1014 (1876) = seq.

DICPIUCHUM, Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. k7f • 1 (1856). *GESNERACEAE,* Benth. & , 1014.
*F[A.[Blume?]R. in Benn- PL Jav, Rar 116 (1838).
asperifol, *"*• O* «<«>*./. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. P Jan.* v.5 *—Java.
brevipes, C. B. Clarke, l. c.—N. Guinea.

DICHBOTBICHTTM :—
Chalmersii, /?. JI/»*«. i» i«W». *Chem. V Drug.* (June 1884).—N. Guinea,
chorisepalum, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 53.—Ins Philipp.
Griffithii, C. B. Clarke, Comm. & Cyrt. Beng. t. 51 = Loxostigma Griffithii.
tematenm, *Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Or.* 7. t. 1, 2.—Ins. Temat.

DICHYNCHOSIA, C. Muell. in Walp. Ann. v. 31 (1858) sphalm. = DIRHYNCHOSIA, Blume - SpiraeopsiB, Miq. (Saxifr.).

DICKIA, Scop. Introd. 199 (1777) = Stemodla, Linn. (Scrophul.).

DICIiADAHTHEBA, F. Muell. Fragm. xii. 23 (1882) j Census, 140 (1882). *ACANTHACEAE.*
Forrestii, *F. Muell. II. cc*—Austral.

DICLEMIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 102 = OBsaea, DC. (Melast.).
petiolaris, Naud. 1. c. 10i = O. petiolaris.

DICCLIDANTHERA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 189. t.196,197 (1827). *STYRACEAE,* Benth. & Hook. f. ü. 671,
PLUCHIA, VelL Fl. Flum. 167(1825); iv. t. 20 (1827).
elliptica, *Miers, in Ann. Nat. Hist.* Ser. III. iv. (1859) 136.—Bras,
laurifolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 141. t. 196.—Bras,
penduliflora, *Mart. I. c.* 140. t. J 97.—Bras.

DICLIDIUM, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 61 (1842)=MoriflCUS, Gaertn. (Cyperac).
adculare, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 65 (=*Cyperus ferax).*—Bras.
auriculatum, Nees, 1. c. 61 in obs. (= *Cyperus ferax*). —Bras.
conglobatum, Nees, 1. c. in obs. (- *Cyperus ferax).* —Bras.
ferax, Steud. Syn. PI. Cyp. [Index] 332 *(-Cyperus ferax).*—*Bias,*
ferox, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 54 (=*Cyperus ferax)* .—Bras.
fuscatum, Schrad. ex Nees, 1. e. 52 (= *Cyperus ferax).* —Bras.
lenticulare, Schrad. ex Nees, 1. c. 53 (= *Cyperus ferax).*—Bras.
hmentaceum,iteea, 1. c. 65 *(-Cyperusferax).*—Bras.
Maximiliani, Schrad. ex Nees, 1. c. 52 (= *Cyperus ferax).*—Bras.
odoratum, Schrad. ex Nees, 1. c. 54 (= *Cyperus ferax).* —Ind. occ.
Reinwardtii, Schrad. ex Nees, 1. e. 51 in obs. (= *Cyperus ferax).*—Bras.
«tttf»nosuffl,Schrad,exNees,l. c.56 *(^Cyperusferax).* Bras.
Vahlii, Schrad. ex Nees, 1. c. S3-Cyperus Yahlii.

DICL1DOCARPUS, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 200. t 14 (1854) = Triohospermum, Blume (Tiliac).
Richii, A. Grav, L e. = T. Richii.

DICLIDOSTIGMA.Kunze, in Linnaea, xvii. (1843) 576 sHelothria, Linn. (Cucurb.).
melothrioides, Kunze, 1. c. 577 = M. pemga.

DICLINOTHRYS, Endl. Gen. Suppl. i. 1857 (1841) = seq.

DICLINOTRYS, RaBn. Neogen. 3 (1825) = Chainaolirlum, Willd. (Liliac).
albifiorum, Rafin. 1. c - C. carolinianum.

DICLIPTEBA, Jusi. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 267. *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1120.
BROCHOSIPHON, Nees, in DC. Prod. xi. 492 (1847).
DACTYLOSTEGIUM, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 162 t. 81 (1847).
DIAFBDIUM, Koen. ex Steud. Norn. ed. II. i. 501, 604 (1840).

DICIilPTEBA:—
GKUNSIA, Neck. Elem. i. 331 (1790).
KUNIRIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 61 (1836).
PANEMATA, Rafin. 1. c (18S6).
acuminata, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 288.—Ecuador,
angolensis, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 862.—Afr. trop.
armata, F. Muell. Fragm. vi. 88 = glabra>
assurgens, *Juss. in Ann. Mus. Par. ix.* (1807) 269.—Am. trop.
baphica, *Nees, in DC. Prod.* xi. 490.—Mexic.
Beddomei, C. *B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. - 551.—Ind. or.
ticalyculata, Kostel. Allg. Med.-Pharm. FL m. 934 - Perisirophe bicalyculata.
bivalvis, Blume, Bijdr. 789 = javanica.
bivalvis, *fuss, in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Ind. or.; Arab.
bilvalvis, Nees, in DC. Prod. xi. 475-zeylanica.
blephmastegia, Presl, Bot. Bemerk. 95 = Justida debilis.
brachiata, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 478 = mucronifolia.
brachiata, *Spreng. Syst. i.* 86.—Am. bor.
bracteata, *Seem. Fl. Vit.* 184.—Ins. Tahiti.
brasiliensis, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. I. (1823) 60 *(= Rhytiglossa leucophloea).—Bns.*
brasiliensis, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 123.—Bras.
Buergeriana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. ii. 125; Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. i. 356» Roxburghiana.
bupleuroides, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 111 = Roxburghiana.
Bunnanni, *Nees, 1. c.* 112.—Java.
Burmanni, Nees, 1. c, partim; T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1868) 520 = D. Leonotis.
canescens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 476.—Java,
capensis, *Nees, in Linnaea,* xv. (1841) 373.—Afr. austr.
cardiocarpa, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 111 - Roxburghiana.
caracasana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 474.—Venezuela,
chinensis, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268; *Nees, in DC. Prod.* xi. 477.—As. trop.
chinensis, Roem. *Be* Schult. Syst. Mant. i. 146 = Roxburghiana.
ciliaris, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Am. trop.
ciliaris, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 384 ~ Schwabea ciliaris.
ciliata, Decile, in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 384 = Burmanni.
ciliata, Ruiz & Pav. Fl. Per. et Chil. i. 12. 1.14. f. a = Beloperone ciliata.
ciliata, Schau. in Ind. Sem. Hort. Vrat. ex Nees, in DC. Prod. xi. 479 = Moritziana.
clavata, *Jus*, in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 269.—Ins. Tahiti.
clinopodia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 483.—Afr. austr.
coerulea, Blume, Bijdr. 790-Rungia parviflora.
confinis, *Nees, ex Benth. Bot. Voy. Sulph.* 149.—Ecuador,
congesta, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii 237 Mexic
crenata, *Miq. Ft. Ind. Bat.* ii. 844.—Sumatra.
crinita, Nees, in DC. Prod. xi. 485 = Roxburghiana.
cuneata, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 111.—Ind. or.
effusa, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 89.—Ins. Socotra.
eriantha, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 884.—Ins. Timor.
falcata, Poir. ex Steud. Norn, ed I. 274=laevigata.
fasciata, Presl, Bot. Bemerk. 95 - Justicia fnsciata.
Korsteriana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 475.— Hab. ?
frondosa, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 269.—Ins. Tahi'i.
furcifera, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 96 = Herpeta. canthus melancholicus.
glabra, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1884") 383.—Ins. Timor.
glandulosa, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 765 = biachiata.
Haenkeana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 487.—Mexic.
Halei, Riddell, in N. Orl. Med. Jqum. (1852) Cbapm. Fl. S. U. St. 305 = Gatesia laete-virens.
heterostegia, *Presl, Bot. Bemerk.* 95; *Nees, in DC. Prod.* xi. 478.—Afr. austr.

DICIJFTEBA:—
hirtula, Nees, in DC. Prod. xi. 485 = Roxbnrghinna.
Hookeriana, *Nees, 1. c.* 480.—Peruv.
hyalina, *Nees, 1. c.* 484.—Ins. Comor.
intemipta, *Blume, Bijdr.* 790.—Java,
javanica, *Nees, in DC. Prod.* xi. 476.—Java.
Jussiaei, Webb, in Hook. Niger Fl. 168 = verticillaris.
Kureii, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 551.—Burma,
laevigata. *fuss, in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Ins. Mascar.
**Leonotis, *Dal*, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 553.—Ind. or.
lupulina, Presl, Bet. Bemerk. 95 = Adhatoda lupulina.
maculata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 485.—Afr.trop.
madagascariensis, *Nees, I. c.* 476.—Madag.
roartinicensis, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Ins. Martinic.
melancholica, Mart, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 96 = Herpetacanthns melancholicus.
micranthes, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii» 112.—Ind. or.
mollis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 490.—Mexic.
Moritziana, *S. Schau. in Ind. Sem. Hort. Vrat.* (1843) *ex Nees, I. c.* 479.—Am. trop.
mossambicensis, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* *Bot.* 220.—Afr. trop.
mucronifolisi, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 161.—Bras,
multiflora, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Ecuador.
multiflora, Nees, in DC. Prod. xi. 487 = Haenkeana.
ocymoides, *fuss, in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Am. austr.
ovata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 89.—Ins. Socotra.
ovata*, Presl, Bot. Bemerk. 95 (= *Rhytiglossa ovata). —Afr. austr.
paposana, *Phil. Fl. Atac.* 40.—Chili,
parvibracteata, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. Ill,—Ind. or.
pectinata, Juss. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 169 = Rungia parviflora.
peduncularis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 488.—Mexic.
peruviana, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Pernv.
piloM, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 287.—N. Granat.
Pohliana, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* Ix. 162.—Bras,
portoricensis, *Spreng. in Roem. &" Schult. Syst. Mant.* i. 149.—Porto Rico,
procumbens, *Humb. ex Link, Jahrb.* i. III. 48.—Am. austr.
propinqua, *Nees, in Linnaea*, xv. (1841) 578.—Afr. austr.
pseudoverticillaris, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 308.—Arizona,
pubescens, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 269.—Ins. N. Hebrid.
racemifera, F. Muell. Fragm. vi. 89=spicata.
ramentacea, Spreng. ex Nees, in DC. Prod. xi. 64 = Elytraria frondosa.
recurvata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 19 *(^Rhytiglossa* ***leucophloea).*—Bras.**
repens, Juss. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 269 = Rungia repens.
repens, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 470-Rungia parviflora.
reptans, *Nees, I. c.* 483.—Burma,
resupinata, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Mexic.
resupinata, Nutt. ex Nees, in DC. Prod. xi. 480 = brachiata.
retusa, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 268.—Ind. occ.
Rheedii, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 934 = Justicia Gendarnssa.
riparia, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 112.—Burma.
Roxburghiana, *Nees, I. c.* 111.—Ind. or.
Roxburghii, T. Anders, in Joum. linn. Soc. ix. (1867) 519=praec.
rupestris, Nees, in DC. Prod. xi. 486-Roxburghiana.
samoënsis, *Seem. Fl. Vit.* 184.—Ins. Samoa,
scabra, *Nees, in DC. Prod.* xi. 480.—Ecuador.
scorpioides, Juss. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 269 = Tetramerium scorpioides.
scutellata, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 226.—Reg. Argent.

DICIiIPTEBA:—
sericea, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 161.—Bras,
sexangularis, *Juss. in Ann. Mus. Par.* ix. (1807) 269.—Jamaic.
sparsiflora, *Nees, in DC. Prod.* xi. 488.—Bras,
speciosa, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 97.—Burma.
speciosa, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xi. (1823) 61 -Beloperone involucrata.
spicaia, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 386=Adhatoda Bojeriana.
spicata, *Decne. in Nouv. Ann'. Mus. Par.* iii. (1834) 884.—Ins. Timor.
spinosa, Lodd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 491 = Barleria lupulina.
spinulosa, Hochst. ex Nees, 1. c. 484 = micranthes.
squarrosa, *Nees, in Mart. Fl. Bras. ix.* 161.—Bras.
tetrandra, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 61=--Herpetacanthus Schultzii.
thlaspioides, *Nees, in DC. Prod.* xi. 474.—Am. centr.
timoriensis, Moric. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 845 = Burmanni.
tinctoria, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 937 = Peristrophe tinctoria.
tomentosa, *Nees, in DC. Prod.* xi. 481.—Pcruv.
Torreyi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1886) 808.—Arizona,
trifurca, *Oerst. inKjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 172.—Costa Rica.
trifurcata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 525-trifurca.
trinervia, Juss. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 169 = Justicia trinervia.
Tweediana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 482.—Uruguay.
umbellata, Juss. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 268 = micranthes.
unguiculata, *Nees, ex Benth. Bot. Voy. Sulph.* 149.—Costa Rica.
Vahliana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 489.—Am. trop.
velata, *Seem. Fl. Vit.* 183.—Ins. Tahiti.
verticillaris, Juss. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 268 ; Roem. & Schult. Syst. i. 170 = Hypoê'stes verticillaris.
villosa, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 200 = Ruellia villosa
viridis, *Hassk. in Flora*, xlvii. (1864) 54.—Ins. Philipp.
Welwitschii, *S. Moore, in Joum. Bot.* xviii. (1880) 362.—Afr. trop.
xipetensis, Roem. & Schult. Mant i. 248 (= *Rhytiglossa* ***leucophloea).*—Bras,**
zeylanica, *Nees, in DC. Prod.* xi. 474.—Ind. or.

DICIiIS, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 23. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. £ ii. 982.
ovata, *Benth. 1. c.*—Madag.
petiolaris, *Benth. in DC. Prod.* x. 265.—Afr. anstr.
reptans, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1886) 23.—Afr. austr.

DICLYTHRA, Rafin. Cat. 13 (1824) = DICLYTRA, Borkh.=Dicentra, Bernh. (Papav.).

DICLYTRA, Borckh. in Roem. Arch. i. H. 46 (1797) -Dicentra, Bernh. (1833) (Papav.).
bracteosa, DC. Syst ii. 109.—Am. bor. ?
canadensis, Borckh. in Roem. Arch. i. II. 46=Dicentra Cncullaria.
canadensis, DC. Prod. i. 126 =• Dicentra canadensis.
Cucullaria, DC. Syst ii. 108= Dieentra Cucullaria.
divaricata, Rafin. Cat. 18.—Am. bor.
eximia, Beck, Bot. U. St. 23—Dicentra canadensis.
eximia, DC. Syst. ii. 109-Dicentra eximia.
formosa, DC. 1. c. = Dicentra formosa.
formosa, £11. Sketch, ii. 177=Dicentra eximia.
lachenaliaeflora, DC. Syst. ii. Ill = Dicentra lachenaliaefiora.
scandens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 198 = Dicentra scandens.
spectabilis, DC. Syst. ii. 110 = Dicentra spectabilis.
tenuifolia, DC. 1. c. = Dicentra lachenaliaeflora.
thalictrifolia, D. Don, ex Walp. Rep. i. 118, et Index, 372 = Dicentra thalictrifolia.

DICNECKERIA, Veil. FLFlum. 41 (1825) -Euplassa, Salisb. (Proteac).
***legalis.* Veil. 1. c. 41; i. t 105 (= *Adenostephanus Sellomi).*—Bras.**

DICOCCA, Thou. Gen. Nov. Madag. 12, in syn. (1806) ^Dicorypha, Thou. (Hamatnel.).

DICODON, Ehrb. Beitr. ix. 146 (1789)-**Linnaea,** Gronov. (Caprifol.).

DICOELIA, Benth. in Hook. Ic. PI. t. 1289 (1879). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 286.
Beccariana, *Benth.'. 1. c.*—Borneo.

DICOLUS, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 550 ; Desc. PL Nuev. ii. 74=Zephyra D. Don (Haemodor.).
caerulescens, Phil. 11. cc 561; 76 = Z. elegans.

DICOMA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) «• *COMPOSITAE*, Benth. *Sc.* Hook. £ ii. 492.
CRYPTOSTEPHANE, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 782.
MACLEDIUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 39 (1826).
NITELIUM, Cass. 1. c. xxxv. 11 (1825).
RHIGIOTHAMNUS, Spach, Hist. *Vie.* Phan. x. 9 (1841).
SCHAFFNERA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (1841) I-Intell. 42.
STEIROCOMA, Reich. Nom. 88 (1841).
XEROPAPPUS, Wall. Cat. n. 2980 (1830 ?).
anomalg, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (.1850) 71.—Aft-austr.
argyrophylla, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1461.—Afr. austr.
Bunnanni, *Less, in Linnaea*, v. (1830) 279.—Afr. austr.
cana, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 841.—Ins. Socotra.
capensis, *Less, in Linnaea*, v. (1830) 277.—Afr. austr.
diacanthoides, *Less. 1. c.* 279.—Afr. austr.
karaguensis, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1874) 103.—Afr. trop.
Kirkii, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 518.—Afr. austr.
Kraussii, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 782* diacanthoides.
lanuginosa, DC. Prod. vii. 36=tomentosa.
latifolia, *DC. 1. c.* 37.—Afr. austr.
macrocephala, *DC. 1. c.* 36.—Afr. austr.
radiata, *Less, in Linnaea*, v. (1830) 278.—Afr. austr.
relhanioides, *Less. 1. c.* 279.—Afr. austr.
sessiliflora, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* »'• 618.—Afr. austr.
speciosa, *DC. Prod.* vii. 37.—Afr. austr.
tomentosa, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1818) *a." Ind. or.; Afr. trop.
Zeyheri, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1860) 70.—AH-austr.

DICONANGIA, Mitchell, in Act. Phys. Med. Ac**-Nat. Cur. viii. (1748) 208, App. = **Itea,** L'"[1]-(Saxifr.).

DICOPHE, Roem. Coll. 205 (1809) = DieoryP"[6], Thou. (Hamamel.).

DICOBIA, Torr. & Gray, in Emory, Rep. 143 (1848).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 358.
Brandigei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) /»•—Am. bor. occ.
canescens, *A. Gray, in Emory, Rep.* 143,—Calif.

DICORYNEA, Lindl. Veg. Kingd. 555 (1847) =««!•

DICOBYNIA, Benth. in Hoolc. Journ. Bot. ii. (1[8*O]) 82. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i-[57] J i [BA]
breviflora, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. Bras.
floribunda, Spruce, ex Benth. I. c, in obs. = P*[1*?[1]] [18,*0J]
paraënsis, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* i«- (—Bras.
Spruceana, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. H-paraënsis.
uaupensis. Spruce, ex Benth. 1. c, in obs.= *V* ënsis?

DICORYPHA, R. Hedw. Gen. 81 (1806) =seq.

DICOBYPHE, Thou. Gen. Nov. Madag. 12 (18°[6]>'
HAMAMELIDEAE, Benth. & Hook. f. i. *MZ-*.
DIANIA, Noronha, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. **'• viii. (1857) 142.
DICOCCA, Thou. Gen. Nov. Madag. 12, in syn. (1806).
DICOPHE, Roem. Collect. 205 (1809).

DICORYPHE:—
•ngustifolia, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1867) 145.—Madag.
leoides, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 111.—Madag.
gracilis, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. viii. (1867) 144.—Madag.
lanceolate, *Tul. 1. c.* 146.—Madag.
laurina, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 476.—Madag.
macrophylla, *Baill. I.lc*—Madag.
gascariensis, Poir. Encyc. Snppl. ii. 475 ; Illnstr. iu.6U7-stipulacea.
Nornnhac, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1857) «/.—Madag.
PUtyphylln, *Tul. 1. c.* 146.—Madag.
supulacea, *JaumeSt.Hil. Expos. FamM.* 348.—Madag.
Mouarsii, Roem. & Schult. Syst. iii. 486=stipulacea.
TOicoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 148.—Madag.

DICRAEA, Tul. in Ann. & Nat. Sér. III. xi. (1849) 100.=seq.

DIGRAEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 2 (1806) = fodoBtemon, Michx.
"gaeformis, Bedd. in Trans. Linn. Soc. xxv. (1866) 223. t. 24 = P. algaeformis.
"'gaeoides, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864) 54=praec
"P'f'ta, Tul. in Arch. Mus. Par. vi. (1852) 204-P. .oichotomus.
>chotoma, Tul. in Ann. Sc Nat. *Sit.* III. xi. (1849) 10l="P.dichotomus.
o»gata, Tul. 1. c. 102=P. elongatus.
?'ythrolichen.. Tul. *8c Wedd. ex Tul. 1.* c—Bras.
Tul 1. c. 100.—Madag.
*>*gifoli*„ Wight, Ic. t 1916. f. 4=P. dichotomus.
<Wi Wedd. in DC. Prod. xvii. 71=P. minor.
Ann. Sc Nat. Se>. III. xi. (1849) J0 = P.minutiflora.
Wedd- in DC* Prod- xvii- 71=P. ptetoπ phyllus.
&: Tul. in Ann. Sc Nat. Mr. III. xi. (1849) 101-dichotomus.
Wedd_in DC- Prod. xvii. 68.-Ind. or.
losa, Wight, Ic. t. 1917. f. 2 = P. stylosus.
1hcki, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xi. (1849) 101
T, Wallichii.
Tul. c—Peruv.; Chili.

DICRAMA, Klatt.in Linnaea, xxxii. (1863) 751, sphalm. = Dierama, C. Koch (Irid.).

DICRANACANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1864) 186-Barleria, Linn. (Acanthac.)
b£S- bispinosa.
Sti? 1- c. - a buxifolia.
tiln- 1- a - a mysorensis.
*- !• «•'»• spinicyma.
»». Oerst. 1. c. = B. stimulus.

CRA
*SA*THERA P"*!,p Symb, Bot. i. 75. t. 50 (Melastom.).
SalL 78. t. 50 = A. hedyotidea.
882°. Ann.Sc- «r." I. xii. (1849) •«. 1.13. f. 1=A Salzmanni.

DICRANOCARPUS, A. Gray, in Mem. Am. Acad. Ser. II. v. (Pl. Nov. Thurb.) 322 (1856). *COMPOSIT.*
parviflors, *A. Gray, I.* c—Mexic.

DICI
0 8 ^ .Kan*, in Hook. Ic. PI. t. 798
K 198 *ACEAE*, Benth. & Hook. f.
dantich
Mannif
trop!
fia>
*iiw««»a, xi. (1876) 302,-Afr.

DI A
^ E T A L U M , Presl, in Abh. Boehm. Ges. (1845) 454; (Bot- Bemerk.24) - Toulida, spindac.),
, Presl, il. cc.—Bras.

D
^H M STACHYS, Tr&. in Ann. Sc. Nat. Sét. in. *"rrail* $ 2 l=MyrianthUB, Beauv. (Urtic). c. = M. serrata.

DICRANOSTIGMA, Hook. f. ft Thorns. Fl. Ind. i. 265 (1856) = Stylophorum,Nutt. (Papav.).
lactuarides, Hook. f. *Sc* Thorns. 1. c.=S. laetucoides.

DICKANOSTTIiES, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 355. *CONVOLVVLACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 878.
densa, *Spruce, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 328.—Bras.
scandens, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 355.—Guiana.

DICBASTYLIS, Drum, ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 66. *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. *i.* ii. 1140.
Beveridgei, *F. Muell. Fragm.* viii. 60.—Austral.
Doranii, *F. Muell. I. c.* 230.—Austral,
fulva, *Drum, ex Han. in Hook. Kew Journ. Bot.* vii. (1855) 56.—Austral.
Gilesii, *F. Muell. Fragm.* viii. 229.—Austral.
Lewellini, *F. Muell. 1. c.* xi. 86.—Austral.
Nicholasii, *F. Muell. I. c.* x. 15.—Austral,
ochrotricha, *F. Muell. I. civ.* 161.—Austral,
parvifolia, *F. Muell. 1. c.* ii. 160.—Austral,
reticulate, *Drum, ex Harv. in Hook. Ken Journ.* vii. (1855) 57.—Austral.
rosmarinifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 226-parvifolia.
Stoechas, *Drum, ex Harv. in Hook. Km Journ.* vii. (1855) 57.—Austral.

DICBAT7BU8, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 42 (1880). *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 42.
leptoclades,/><x»t./. /. *c.* 43.—Texas.

DICROBOTRYON, Endl. Gen. 540 in syn. (1888) =seq.

DICROBOTRYUM, WiUd. ex Roem. *Sc* Schult Syst. v. 221 (1819) = Guettarda, Linn. (Rubiac.).
divaricatum, Willd. U. cc. = G. xylosteoides.

DICROPHYLA, Rafin. Fl. Tellur. ix. 89 (1836) = Haemaria, LindL (Orchid.).
elegans, Rafin. 1. c.-H. discolor.

DICRUS, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Boitenz. 47 (1823) =Voacanga, Thou. (Apocyn.).
foetidus, Reinw. 1. e.=V. foetida.

DICRYPTA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 44, 152 (1880) =Maxmaria, Ruiz & Pav. (Orchid.).
Baueri, Lindl. 1. c. 44, 152=M. crassifolia.
bicolor, Batem. ex Loud. Hort Brit. Suppl. ii. 630 = M. bicolor ?
crassifolia, LindL ex Loud. 1. c. Suppl. iii. 586 = M. crassifolia.
denHfolia, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 89. t. 68-M.densiiblia.
discolor, Lodd. ex Lindl. Bot Reg. (1839) Misc. 91 ->M. discolor.
elatior, Reichb. in Linnaea, xviii. (1848) 403=M. elatior.
iridifolia, Batem. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. il. 630-M. iridifolia 1
irisphyta, Rodrig. Orch. Nov. i. 126.—Bras.
longifolia, Rodrig. 1. c. 125.—Bras.
villosa, Rodrig. 1. c—Bras.

DICTAMMT7S, Linn. Syst. ed. I (1785). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 287.
FRAXINELI.A, [Town.] Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 291 (1745).
albus, *Linn. Sp. PI.* 883.—Europ.; As. bor.
angustifolius, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. i. t. 93 = albus.
Calodendrum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 476; Illustr. ii. 479 = Calodendrum capense.
capensis, Linn. f. Suppl. 232 = Calodendrum capense.
dasycarpus, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 637—Dahuria.
Fraxinella, Pers. Syn. i. 464=albus.
gymnostylis, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1866) I. 338 = albus.
himalayensis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 166=albus.
hispanicus, Webb, ex Nym. Consp. 142 = albus.
microphyllus, Schur, Enum. PI. Transs. 141 = albus.

DICTASTjnJS:—
ottusiflorus, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 160 = albus.
odoTus, Salisb. Prod. 320=albus.
sessilis, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 569=albus.
solitarius. Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 485 = albus.
suffultus, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 569; et Beitr. VI. Hercyn. 199-albus.

DICTAMUS, S. G. Gmel. FL Sibir. iv. 177(1769) sphalm. = proec

DICTILIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 89 (1886) = Otostegia, Benth. (Labiat.).
moluccoides, Rafin. 1. c. = O. scariosa.

DICTYALOMA, Walp. Rep. i. 519 (1842)=.Dictyoloma, A. Juss. (Simarub.).

DIC3TYA1TDHA, Welw. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii 85 (1873). *RUBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. I. c.
arborescens, *Welw. ex Benth. V Hook. f. I. c*—Afr. trop.
involucrata, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 86.—Afr. trop.

DICTYANTHES, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 247=Aristoloehia, Linn.
labiosa, Rafin. 1. c. = A. cymbifera.
stapeliaefiora, Reichb. Handb. 173 = Dictyanthus stapeliaeflorus.

DICTYAMTHTTS, Decne. in DC. Prod. viii. 604 (1844). *ASCLEPIADEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 765.
KYTIDOLOMA, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 319.
TVMFANANTHE, Hassk. in Flora, xxx. (1847) 757.
campanulatus, Reichb. Sel. Sem. Hort. Dresd. (1860) 4.—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 207 = Pavonii.
parviRorus, *Hcmsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 329.—Mexic.
Pavonii, *Decne. in DC. Prod.* viiL 605.—Mexic.
reticulatus, *Benth. V Hooi.f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 329.—Mexic.
stapeliaeñorus, *Reichb. Sel. Sem. Hort. Dresd.* (1860) *i.—Cf. Linnaea*, xxiv. (1851) 207.—Mexic.

DICTYOCALYX, Hook. f. in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 277 ; et Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 202 = Caoabus, Benin. (Solanac).
Miersii, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1851) 208 (= *Thinogeton Miersii*).—Peruv.; N. Granat.
multivalvis, Hook. f. ex Walp. Rep. vi. 672 =Nicotiana quadrivalvis.
quadrivalvis, Hook. f. ex Walp. 1. c = Nicotian* quadrivalvis.

DICTYOCARPUS, Wight, in Madras Journ. Sc. v. (1887) 309 ; et in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xi. (1830) 169 -Sida, Linn. (Malvac).
truncatus, Wight, 11. cc.=S. Schimperiana.

DICTYOCAHYTTM, H. Wendl. in Bonplandia, viU. (1860) 106. *PALMAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 901.
fuscum, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xxl. (1863) 181.—N. Granat.
glaucescens, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31.—N. Granat.
Lamarckianum, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xxi. (1868) 131.—Bras.
Wallisii, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 243; *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31.—N. Granat.

DICTYODAPHNE, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. L 270 (1850,-Endiandra, R. Br. (Laurin.).
Candolleana, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 80=Dehaasia cuneata.
cuneata, Meissn. 1. c. = E. cuneata.
macrophylla, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. 382.—Malaya.
micranlha, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 80.—Java.
rubescens, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. 1. 270=E rubescens.
sumatrana, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 80.—Sumatra
variaiilis, Meissn. 1. c = E. rubescens.

DICTYOLOMA, A. Juss. in Mém. Mas. **Par.** xii. **(1825) 499. t. 24.** *S1MARUBEAE,* **Benth. & Hook.** *I* **i. 312.**
BENJAMINA, Veil. Fl. Flam. ▷3 (1825); ii. t. 139.
DYCTIOLOMA, DC. Prod. ii. 89 (1825).
incancscens, **DC. Prod. ii. 8!) — Vandellianum.**
peruvianum, *Planck, in Hoot. Land. Jattrn. Bot.* **v.** (1846) 583.—Pernv.
Vandellianum, *A. Juss. in Mlm. Mus. Par.* xii. (182S) **499. t. 24.—Bras.**

DICTYONEURA, Blame, Rumphia, iii. 163 (1849)-Cupania, Linn. (Sapind.l.
acuminata, **Blume, 1. c.=C. acuminata.**
obtusa, **Blume, 1. c. 165 = C. obtusa.**

DICTYOPETALUM, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. (1835) 45 [§] ; et ex Baill. Diet. ii. 410 [1£84]-Oenothera, Linn. ^Onagrar.).

DICTYOrSIS, Harv. ex Hook. f. in BoL Mag. t. 5638 (1867)=Behnla, Didrich. (Liliac).
***Thunbergi,* Harv. 1. c.=-B. reticalata.**

DICTYOSPERMA, Regel, PI. Nov. Fedsch. 5 (1882). *CRUCIFERAE.*
Olgae, *Regel, 1. c.*—**Turkestan.**

DICTYOSFERMA, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 181. *PALMAE,* **Bcnth.** *Sc* **Hook, f.iii. 890.**
album,//. *Wendl.V Drude, in Linnaea,* **xxxix. (1875) 181 —Ins. Mascar.**
aureum, *H. Wendl.* **b" *Drude, in Kerch. Palm.* 248.—Hab.?**
farfuraceum, *H. Wendl. V Drude, I. c*—Hab.!
rubrum, *H. Wendl.* **&• *Drude, I. c*—Hab. ?**

DICTYOSFERMUM, Wight, Ic. vi. 29. tt. 2069-71 (1853)-Aneilema, R. Br. (Commel.).
conspicuum, **Hassle. Commel. Ind. 22 = A. conspicuum.**
montanum, **Wight, Ic. vi. t. 2069—A. montanum.**
ovalifolium, **Wight, 1. c. t. 2070-A. ovalifolium.**
ovatum, **Hassk. Commel. Ind. 24 = A. ovatum.**
protensum, **Wight, Ic. vi. t. 2071 — A. protensum.**
Wightii, **Hassk. Commel. Ind. 19 = A. ovalifolium.**

DICTYOSTEGA, Miers, in Proc Linn. Soc. i. (1840) 61; et Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 538. t. 37. *BURMANNIACEAE,* **Benth. & Hook. f. iii. 458.**
campanulata, *Karst. in Linnaea,* **xxviii. (1856) 422.—N. Granat.**
costata, *Miers, in Proc. Linn. Soc.* **i. (1840) 61J *Trans. Linn. Soc.* xviii. (1841) 542.—Bras,**
longistyla, *Benth. in Hoot. Niger Fl.* **528.—Afr. trop.**
orobanchioides, *Miers, in Pror. Linn. Soc.* **i. (1840) 61; *et in Trans. Linn. Soc.* xviii. (1841) 53!).—Bras,**
pectinata, *Karst. in Linnaea,* **xxviii. (1856) 422.—N. Granat.**
Purdieana, *Benth. in Hook. Ken Journ.* **vii. (1855) 14. —N. Granat.**
Schomburgkii, *Miers, in Proc. Linn. Soc.* **i. (1860) 61; *et in Trans. Linn. Soc.* xviii. (1841) 542.—Guian.**
nmbellata, *Miers, II. cc.* **61, 541.—Bras.**

DICTYOSTEGIA, Benth. *Sc* **Hook. f. Gen. iii. 458 (1883) = praec.**

DICYCLOPHORA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 89=Pyonocycla, Lindl. (Umbellif.).
persica, **Boiss. 1. c 91.—Persia.**

DICYMBE, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 564 (1865). *LEGVM1NOSAE,* **Benth. & Hook. f. 1. c.**
corymbosa, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. II. 60.—Venezuela.**

DICYPEIiIiITTM, Nees, Progr. 14 (1833) ; Laurin. Expos. 14 (18S6). *LA URINEAE,* **Benth.** *Sc* **Hook. f. iii. 159.**
caryophyllatum, *Nees, Syst. Laurin.* **344.—Am. trop.**

DICYHTA, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 181. *GESNERACEAE,* **Benth.** *Sc* **Hook. f. ii. 1000.**
Candida, *Hanst. V Klotesch, in Linnaea,* **xxvii. (1854) 714.—Guatemala.**

DICYHTA :-
parviflora, Seem. Bot. Voy. Herald, 326. t. 69 = **Anetanthus parviflora.**
Warszewicziana, *Regel, in Flora,* **xxxii. (1849) 181.—Guatemala.**

D1DACTYI.E, Until. Fol. Oreh. Didact. (1852) = Bulbophyllum, Thou. (Orchid.V
antennifera, Lindl. Fol. Orch. Didact. 2 ~ B. gerae'nse.
***atropurpurea,* Rodrig. Orch. Nov. ii. 125 = B. atropurpureum.**
***bidentata,* Rodrig. I. c. 127.—Bras.**
***cantagellense,* Rodrig. 1. c. 126.—Bras.**
***Clausseni,* Lindl. Fol. Orch. Didact. 3 = B. Clausseni.**
***exaltata,* Lindl. 1. c. 2 = B. exaltatum.**
***galeata,* Rodrig. Orch. Nov. ii. 129.—Bras.**
***gladiata,* Lindl. Fol. Orch. Didact. 1 - B. meridense.**
***glutinosa.* Rodrig. Orch. Nov. ii. 126.—Bras.**
***granulosa,* Rodrig. 1. c. 125 — B. granuloaum.**
laciniata, Kodrig. 1. c. i. 43.—Bras.
meridensis, Lindl. Fol. Orch. Didact. 3 = B. meridense.
***nemorosa,* Rodrig. Orch. Nov. i. 43.—Bras.**
***ochracea,* Rodrig. 1. c. ii. 127—Bras.**
***plumosa,* Rodrig. 1. c. i. 44.—Bras.**
***quadricolor,* Rodrig. 1. c. ii. 128.—Bras.**
***Regnellii,* Rodrig. 1. c. 123 = B. Regnelli.**
***tripetala,* Lindl. Fol. Orch. Didact. 2 - B. tripetalum.**
***Weddelii,* Lindl. 1. c. = B. Weddelii.**

DIDACTYLON, Zoll. *Sc* **Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 99 (1845-46)-Dimeria, R. Br. (Gramin.).**
***ramosum,* Zoll. & Moritzi, 1. c. 100 = Dim. omithopoda.**
***simplex,* Zoll. & Moritzi, 1. c. = Dim. omithoDoda.**

DIDASTE, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 472 (1862) = Acroaanthes, Eckl. *Sc* **Zeyh. (Ficoid.).**
***decandra,M.* Mey. ex Harv. & Sond. Lc.=A. angustifolia.**
***icosandra,* E. Mey. ex Harv.** *Sc* **Sond. 1. c. 473 = A. teretifolia.**
***pentandra,* K. Mey. ex Harv. & Sond. 1. c. 472 = A. humifusa.**

DIDELOTIA, Baill. Adansonia, v. (1865) 367. t. 8. *LEGUMINOSAE,* **Benth.** *Sc* **Hook. f. i. 1003.**
africana, *Baill. 1. c.*—**Afr. trop.**

DIDELTA, L'Hérit. Stirp. Nov. 55. t. 28 (1785). *COMPOSITAE,* **Benth.** *Sc* **Hook. f. ii. 461.**
BKETEUILLIA, Buchoz, ex DC. Prod. vi. 503, in syn. (1837).
CHORISTEA, Thnnb. Prod. PI. Cap. praef. et 163 (WOO) ; Nov. Gen. 179 (1801).
FAVONIUM, Gaertn. Fruct. ii. 481.1.174 (1791).
annua, *Less. Syn. Comp.* **62 (Berkheyae sp. ?).—Afr. austr.**
***capensis,* Lam. ex DC. Prod. vi. 503=camosa.**
camosa, *Ait. Hort. Kem.* **ed. I. iii. 256.—Afr. austr.**
cernua, *Less. Syn. Comp.* **61 (Berkheyae sp. 1).—Afr. austr.**
***obtusifolia,* Cass. in Diet. Sc. Nat. xxix. 451 = spinosa.**
spinosa, *Ait. Hort. Kem.* **ed. I. iii. 256.—Afr. austr.**
***tetragoniaefolia,* L'Hérit Stirp. Nov. 55,178. t. 28 = camosa.**
tomentosa, *Less. Syn. Comp.* **61.—Austral.**

DIDEROTA, Comm. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 356 (1844) = Ochrosia, Juss. (Apocyn.).
***ampkicarpa,* Comm. ex A. DC. 1. c.=0. borbonica.**

DIDEROTIA, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 274 = Alchornea, Sw. (Euphorb.).
***multispicata,* Baill. 1. c—Afr. trop.**

DIDESMIS, Loud. Hort. Brit. 286 (1830)=«eq.

DIDESMUS, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 160. t. 25-Rapistrum, Toum. (Crucifer.).
***aegypticus,* Desv. 1. c. = R. aegypticum.**
***aegyptius,* DC. Syst. ii. 658~praec.**
***bipinnatus,* DC. 1. c. 059=K. bipinnatam.**
***myagroides,* Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 160 = Erucaria aleppica.**
***panduriformis,* Stocks, in Proc. Linn. Soc. i. (1848) 367.—Ind. or.**
pilosus,* Steud. Norn. ed. II. i. 505, sphalm. vide *Didiscus pilosus.
***pinnalus,* DC. Syst. ii. 659 = Erucaria aleppica?**

DIDESMUS:—
***rostratus,* Boiss. Fl. Orient, i. 405.—Palaestin.**
***tenuifolius,* DC. Syst. ii. 659.—Archip. Grace.**

D1DIEREA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1E80) 2S8. *ANACARDIACEAE1*
madagascariensis, *Baill. 1. c.*—**Msdag.**

DIDIMERIA, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral, ed. II. ii. 198 (1839) = **Correa,** Sm. (Rutac.).
***aemula,* Lindl. 1. c. = C. aemula.**

DIDIPLI8, Rafin. Atl. Jonrn. (1833) 177. *LYTHRARIEAE,* **Benth. & Hook. f. i. 777.**
IIYPOHRicHiA, M. A. Curt, in Torr. *Sc* **Gray, Fl. N-Am. i. 479 (1840).**
PTII.INA, Nult. ex Torr. & Gray, 1. c. (1840).
***diandra,* Wood, Hot. and Flor.** *Vii* **— linearis.**
linearis, *Rafin. Atl. Journ.* **(1833) 177.—Am. bor.**

DIDISCUS, DC. in Bot. Mag. t. 2875 (1828)=Traehymene, Rudge (Umbellif.).
***albiflorus,* DC. Prod. iv. 72 = T. incisa.**
***anisocarpus,* F. Muell. in Proc. Roy. Soc. V. D. Land, iii. (1855) 238 = T. australis.**
***austro-caledonicus.* Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 272; in Ann. Sc. Nat. Sér. V. iii-(1865) 285 = T. austro-calcdonica.**
***caeruleus,* DC. in Hook. Bot. Mag. t. 2875 - T. cacrulca.**
***cyaneus,* DC. Mém. Ombell. 28. t. 4 = T. caerulea.**
cyanopctalus,* F. Muell. Fragm. ix. 46 = T. cyanopetalea-eriocarpus, V.* **Muell. I. c. = T. eriocarpa.**
***glandulosus,* F. Muell. in Proc. Roy. Soc. V. D. Land. iii. (1855) 238 = T. glandulosa.**
***glaudfolius,* F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 395 = T. glaudfolia.**
***grandis, V.* Muell. in Proc. Roy. Soc. V. D. Land, (1855) 238 = T. australis.**
***h'emicarpus,* F. Muell. in Trans. Bot. Soc. Edinb. «i. (1857) 4<Jl = T. hemicarpa.**
***humilis,* Hook. f. Ic. PI. t. 304 - T. humilis.**
***incisus,* Hook. Bot. Mag. subt. 2875 - T. incisa.**
pilosus,* Benth. in Enum. PI. Hueg. 54 = T. australis-procumbens,* **F. Muell. in Proc. Roy. Soc. V. D. Land, iii. (1855) 237 = T. procumbens.**
***pusillus,* F. Muell. Fragm. ix. 47 = T. pilosa.**
***setulosus,* F. Muell. in Pioc. Roy. Soc. V. D. Land, W-(1855) 238 = T. hemicarpa.**
***villosus,* F. Muell. 1. c. = T. villosa.**

DIDISSANDBA, C. B. Clarke, in DC. Monog.Phan. v. 65 (1883). *CYRTANDREAE.*
elongata, *C. B. Clarke, 1. c.* **67.—Sumatra,**
frutescens, C. *B. Clarke, 1. c.*—Malaya,
lanuginosa, *C. B. Clarke, 1. c.* **66.—Reg. Himal.**
Mihieri, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* **(1885) 450.—China,**
ornata, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* **v. 69.—Borneo.**
rufa, C. *B. Clarke, 1. c.* **70.—Borneo,**
rufa, *King, in Hook. Ic. PI.* **1.1487.—Tibet, or.**
Sprengelii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* **v. »»• —Sumatra,**
triflora, C. *B. Clarke, 1. c.* **69.—Borneo.**

D1DOTHION, Rafin. Fl. Tellur. iv. 39 (1836)-BP dendrum, Linn. i^Orchid.).
***clavatum,* Rafin. 1. c. = E. davatum.**

DIDYMAEA, Hook. f. in Benth. *Sc* **Hook. f. Gen. 150 (1873).** *RUBIACEAE,* **Benth.** *Sc* **Hook.f. >• mexicana,** *Hook.f. I. c*—**Mexic.**

DIDYMANDRA, Willd. Sp. PI. iv. 971 (1S05)- sterna, Sw.
***dentata,* Spreng. Syst. i. 94.—Bras.**
***purpurea,* Willd. Sp. PI. iv. 971 = L. purpurenm.**

DIDYMANTHTJS, Endl. Nov. Stirp. Dec. 7 (1839).
CHENOPODIACEAE, **Benth. & Hook. f. «>•**
Koei, *Endl. I. c.* **8.—Austral.**

DIDYMANTHUS, Klotzsch, ex Meissn. in DC & 436 (1857 ?) - Euplaasa, Salisb. (Proteac).
***incana,* Klotzsch, 1. c. (=*Adenostephanus incan* Bras.**
***Sellowii,* Klotzsch, 1. c. (-*Adenostephanus Sellowii).* —Bras.**

DIDYMEI.ES, Thou. Hist. Vég. Afr. Anstr. 9. t. 1 (1805) Gen. dub. affin.
excelsa, Baill. Hist. PI. iv. S9S = madagascariensis.
madagascariensis, *Willd. Sp. PI.* iv. 648.—Madag.

WDYMERIA, Lindl. ex Ann. Sc. Nat. Sir. II. XT. (1841) 59=DIDIMERIA, Lindl. = Correa, Sm. (Rutacj.

DIDYMOCARPUS, Wall, in Edinb. Phil. Jonrn. i. (1819) 878. *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1021.
HENCKEUA, Sprang. Anleit. ii. 402 (1817).
LOXOCARPUS, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 120 (1838).
ROTTLERA, Vahl, Enum. i. 88 (1805).
acuminata, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 118.—Reg. Himal.
"Ibicaulis. *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* V. 78. —Rep. Himal.
"Hernifolia, *C. B. Clarke, I.e.* 106.—Borneo.
»moena, *C. B. Clarke, I. e.* 87.—Borneo.
Andersonii, *C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.* t. 62. —Reg. Himal.
"ngovensis, Boj. ex DC. Prod. ix. 271 = Streptocarpus wgovensis.
Wgnstifolia, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 89. .—Borneo,
"istata, *Vill. in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov App.* 15O.-Ins. Philipp.
aromatica, D. Don, Prod. Fl. Nep. 12S=subaltemans.
aromatica, Griff. Ic. PI. Asiat. t. 440. f. 4=pulchra.
aromatica, *Wall. Cat.* n. 785.—Reg. Himal.
phylla. Wall. PI. As. Rar. t. 141. f. 4-7 = macro-
aurantiaca, *C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.* t. 60. .-Reg. Himal.
AUncnla, .y. *Mooj•e> in ymrn, Bot* ^H. (1878) 229.—»mna.
/"?»- *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxii. (1871) 418,-Ins. Banca.
°<"*«a Jack, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) 88 = Chwita Horsfieldii.
C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 85. —Burma.
Beccarii . ^ , *Clarke, I. c.* 89.-Bomeo.
bifolia. ex DC Prod. «• 268 ~ Chirita bifolia.
Blanc *Hassh in Plor* «> »- (!864) 65.—Ins. Philipp.
bullata, *C. B. Clark, in DC. Mohog. Phan.* T-92, — Borneo^
con?'*' 4 *Don< Prod. m. N*P-* **122.—Nepal.
«is. *C B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v.* \.—Borneo.
2 *Wall. Cat.* n. 792—Ins. Penang.
comiculata, *WalL l. c.* "l.-Penang.
Sumatra.
crinita, *Jack, l. c.* 1.—Mal
cristata, Dalj. in Hook. Kew Jonrn. iii. (1851) 225 = Chirita hamosa.
cyathiphora, Reichb. f. & Zoll. in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. (1866) 156 = Chirita caerulea.
detergibili *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 107.—Malaya
elegans, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. c.* 88,-Borneo.
elongata, Jack, in Trans. Linn. So. xiv. (1825) 37 = Didissandra elongata.
fascicularis C. B. Clarke> in DC. Monog. Ind «. 295 = Roni cularis.
floccosa llicnu *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 98, Borneo
"Malaya, ^"*1 ;Wnaj,> WsCl ^1820^ V> 5>~
gracilipes ~Kom *C. B. Clarke>»« DC. Monog. Phan. v. 97.*
grandiflora, Chiri a gran diffo Fl. Dietr. Vollst. Le*"5 Gaertn. Nachtr. li. iii «
Griffithii, Chirita macrophylla.
hamosa, vjRht, Illustr. ii. 182 = Loxostigma GriifitWi.
helicteroides Wall. Cat. 788 = Chirita hamosa.
Hilsenb carn»rS"i' ^J- CProd. ix. 268, 270=Strepto-
"ooklr "ienber Pi-
«e. ir CUrke, Comm et crrt Ben 8- <• 84.—

DIDYMOCAKPUS :-
Humboldtiana, *Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist.* vi. (1846) 477.—Zeylan.
incana, *Benth. &* Hoot. f. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 98.—Ins. Penang.
Kompsoboea, *C. B. Clarke, I. e.* 92.—Borneo.
Kurrii, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t. 66 = Chirita Kurzii.
lanceolate, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 89. —Borneo.
lanuginosa, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. xix. (1874) 685 = Oreocharis Maximowiczii.
lanuginosa, Wall. Cat. n. 791 - Didissandra lanngi-nosa.
lanuginosa, Wight, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 102 ~ Rottleriana.
lawesii, F. Muell. in Wing, South Sc. Record, ii. (1882)22'J=BoeaTreubii.
leptocalyx, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 91. —Borneo,
leucocalyx, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. S4B.-Reg. Himal.
longipes, *c. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 86.— Malacca,
longipetiolata, *Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist.* vi. (1846) 475.—Zeylan.
lyrata, *Wight, Ic.* iv. 1.1850.—Ind. or.
macrophylla, Hook. f. & Thorns, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 74 = Anderaoni.
macrophylla, *Wall, ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 122; *et Cat.* n. 1819.—Reg. Himal.
macrophylla, Wall. Cat. n. 784; Royle, Illustr. Bot. Himal. 294. t. 70. f. l^pedicellata.
madagascarica, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 108.—Madag.
marginata, *C. B. Clarke, 1. c.* 96.—Malacca.
membranacea, Bedd. Ic. PI. Ind. Or. i. 39. t 176 = missionis.
Minahassae, *H. Forbes, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 298.—Ins. Celebes,
missionis, *Wall. Cat.* n. 6396.—Ind. or.
mollis, *Wall. I. c.* n. 790.—Burma.
monophylla, Wall, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 72=macrophylla.
Mortoni, *C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng.* t. 65.— Reg. Himal.
multiflora, Wall. Cat. n. 798 = Boea multiflora.
nervosa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 95.— Borneo,
oblonga, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 84. t. 140.—Reg. Himal.
obtusa. Wall. Cat. n. 786 =cinerea.
Oreocharis, Hance, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* V. (1866) v. 230=Oreocharis Benthami.
ovalifolia, *Wight, Ic.* iv. 1.1351.—Ind. or.
Paraboea, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 106. —Borneo.
pancinervia, *C. B. Clarke, 1. c.* 83.—Burma,
pedicellate, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 118.— Reg. Himal.
petiolaris, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 109. —Borneo.
platycalyx, *C. B. Clarke, 1. c.* 81.—Burma,
platypus, 6. *B. Clarke, I. c.* 94.—Malacca.
plicata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 122 = macrophylla.
podocarpa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 76. —Reg. Himal.
primulaefolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 128=aromatica, subalternans.
primulaefolia, Gardn. in Calc. Jonrn. Nat. Hist. vi. (1846) 478 =• Humboldtiana.
primuloides, Maxim, in Bull. Acad. P&erzb. xix. (1874) 536 = Oreocharis primuloides.
producta, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 98—Sumatra.
pulchra, *C. B. Clarke, 1. c.* 79.—Reg. Himal.
punctate, *C. B. Clarke, I. c.* 90.—Borneo,
punduana, *Wall. Cat.* n. 777—Reg. Himal.
pygmaea, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 82.— Ind. or.
racemosa, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 34. —Sumatra,
repens, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 24. t. 120.—Ind. or.
reptans, *Jack, in Malay. Misc. i.* (1820) V. 3.— Malacc.
reticnlosa, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 90 Borneo.

DIDYMOCAB.PTXS :—
Rexii, Bowie, ex Hook. Exot. Fl. iii. t. 227 <= Streptocarpus Rexii.
Rottleriana, *Wall. Cat.* n. 778.—Ind, or,
rufrscens, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* V. 89.— Borneo.
rufipes, *C. B. Clarke, I. c.* 84.—Burma,
scabrincrvia, C. *B. Clarke, I. c.* 91.—Borneo.
Schefferi, *H. Forbes, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882; 298.—Borneo,
semitorta, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 99.— Malacca.
serrate, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 119.—Sumatra.
speciosa, Wall, ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 114 = Chirita pumila.
Sprengelii, Korth. ex C. B. Clarke, L c. 68 - Didissandra Sprengelii.
subalternans, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Deng. t. 65=pulchra.
subalternans, *Wall. Cat.* n. 782.—Reg. Himal.
teres, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 88.— Borneo.
ternata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 564.—Sumatra,
tomentosa, *Wight, Ic.* iv. t. 1349.—Ind. or.
verbenaeflos, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 99. —Borneo.
verticillata, Wall. Cat. n. 788-oblonga.
vestila, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 427.—Madag.
villosa, C. B. Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t. 59 = leucocalyx.
villosa, *D. Don, Prod. Ft. Nep.* 123.—Reg. Himal.
violoides, C. *B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 97.— Borneo,
zeylanica, *R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar.* 119.— Zeylan.

DIDYMOCHAETA, Steud. Syn. PI. Gram. 185 (1855) = Deyeuxia, Clar. (Gramiu.).
australis, Steud. 1. c. = Deyeuxia plebeia.
chilenaiis, Steud. 1. c. = Deyeuxia chilensis.

DIDYMOCHETON, Blume, Bijdr. 177 (1825) - **Dyso-** xylum, Blume (Meliac).
Gaudichaudianum, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (.1830) 231 = Dys. Gaudichaudianum.
Leschenaultianum, A. Juss. 1. c.—Java.
littorale, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 188.—Java.
nutans, Blume, Bijdr. 177 = Dys. nutans.
pruriens, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 183, nomen.—Ins. Timor.
Richii, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 239. t. 20 -Dys. Richii.
urens, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 391, nomen.—Ins. Batjan.

DIDYMOCHLAMYA, Hook. f. Ic. PI. t. 1122 (1872). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 67.
Whitei, *Hook.f. I. c*—N. Granat.

DIDYMOCOCCUS, Blume, Rumphia, iii. 103, in obs. (1847) = 8apindus, Linn. (Sapind.J.
Danura, Blume, 1. c. =S. Danura.
verticillatus, Blume, 1. c. = S. Danura.

DIDYMODOXA, E. Mey. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. i. (1854) 212, in syn. = Australina, Gaudich. (Urticac).
acuminata, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 549 = A. acuminata.
cuneata, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 285"= A. acn-**rainata.**
debilis, E. Mey. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1852)212--A. capensis.
integrifolia, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 649 = A. integrifolia.

DIDYMOGYNE, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. 1, (1854) 207 - **Droguetia,** Gandich. (Urticac).
abyssinica, Wedd. 1. c = Drag, diflusa.
boehmerioides, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 205-Boeh. meria Didymogyne.

DIDYMOMELES, Spreng. Syst. iii. 899 (1826) = **Dldy-** meles, Thou. (Inc. **sed.).**

DIDYMONEMA, Pred, Didym. NOT. PI. Gen. (1829); et Symb. Bot. i. S. t S (1830) - **Oahnia,** Forst. (Cyperac.).
filifolia, Pred, 11. cc. = G. tristis.

SIDTUOFAirAX, Decne. *Sc* Planch, in Rev. Hortic- (1854) 109. *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 9S9.
angustissimum, *March, in Mart. Fl. Bras.* zi. I. 241.—Bras,
argyrophyllum, *Decne. V Planch, in Rev. Hortic.* (1854) 109, nomen.—N. Granat.
Bnrchellii, *Seem, in Journ. Bot.* vi. (1868) 188.—Bras,
calophyllum, *Decne. tf Planck, ex March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 240.—Bras,
calvnm, *Decne. V Planch, in Rev. Hortic.* **(1854) 109.**—Bras.
chrysophyllum, Decne. & Planch. 1. c. — Morototoni.
Claussenianum, *Decne.* **to*** *Planch, ex March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 289.—Bras,
emarginatum, *Seem, in Illustr. Hortic.* (1854) 138.—Brag.
Gardner!, *Seem. Journ. Bot.* vi. (1868) 132.—Bras.
Houlletii, *Linden, in Gard. Ckron.* (1869) 587.—Hab.?
longipetiolatmn, *March, 'in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 234.—Bras,
lucumoides, *Decne.* **b*** *Planch, in Rev. Hortic.* **(1854)** 109, nomen.—Bras,
macrocarpum, *Seem, in Journ. Bot.* vi. (1868) 132.—Bras.
marginatum, Decne. & Planch, in Rev. Hoitic. (1854) 109, nomen *> macrocarpum.
micranthum, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 239.—Bras.
Morototoni, *Decne. V Planch, in Rev. Hortic.* **(1864)** 109.—Am. anstr.
pachycarpum, *Seem, in Journ. Bot.* vi. (1868) 132.—Bras.
pafiyriferum.Kodi, Wochenschr. ii. (1869) 69-Fatsia papyrifera.
parviflorum, Decne. & Planch, in Rev. Hortic. (1854) 109 = vinosum.
Poeppigii, Decne. *8c* Planch. 1. a-Morototoni.
SeUoi, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 236.—Bras.
sericeum, Decne. & Planch, in Rev. Hortic. (1854) 109, nomen—vinosum.
speciosum, Decne. *8c* Planch. 1. c.=Morototoni.
splendidnm, *Planch, ex Linden, Cat.* n. 10 (1855) 8.—N. Granat
Sprnceanum, *Seem. Journ. Bot.* vi. (1868) 132.—Bras.
tomentosum, Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 939-lucumoides.
vinosum, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 238.—Bras.

DIDYMOPELTA, Regel ft Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 669 = **Astragalus,** Toura. (Legumin.).
turiestanica, Regel & Schmalh. 1. c.=A. Schmalhauseni.

DIDYMOPHY8A, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xvii. (1841) 179. *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook, £ i. 91.
Aucheri, *Boiss. I. c.*—Persia.
Fedtschenkoana, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 8.—Turkestan.

DIDTMOPIiEXIS, Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist, iv. (1844) 383. t. 17. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 616,1226.
APETALON, Wight, Ic. v. 22.1.1758 (1852).
EPIPHANES, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 295 (1868).
LKUCORCHIS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 31 (1849).
micradenia, *Hetnsl. in Journ. Linn. Soe.* **xx. (1883)** 811.-Ins. Fiji.
pallens, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* **iv. (1844) t.** 17.—Ind. or.

DIDYMOSPEBMA, H. Wendl. *Sc* Drude, in Kerch. Palm. 243 (1878). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 917.
BLANCOA, Blume, Rumphia, ii. 128 (1836).
caudatum, *H. Wendl.* **to"** *Drude, I. c*—Siam.
Horsfieldii, *H. Wendl.* b* *Drude, I.* c—Java,
nanum, *H. Wendl.* **b"** *Drude, 1. c.*—Ind. or.
porphyrocarpon, *H. Wendl. V Drude, I. c.*—Java.
Reinwardtianum, *H. Wendl. V Drude, I.* r.—Java,
tremulum, *H. Wendl. V Drude, I. c*—Siam. I

DtDTMOTHECA, Hook. f. in Hook. Lond. Jonm. Bot. vi. (1847) 278. *PHYTOLACCACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 85.
Drummondii, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 87 - thesioides.
pleiococca, F. Muell. Fragm. i. 202; PI. Viet i. 198. t. Suppl. 92 = Gyrostemon Cyclotheca.
thesioides, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* **vi.** (1847) 279.—Austral.
veroniciformis, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 438 = thesioides.

DIDYMOTOCA, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 178 (1843), absque diag.-Australina, Gaudich. (Urticac).
debilis, E. Mey. 1. c.=A. capensis.

DIDYPLOSANDRA, Wight, Ic. iv. pars iv. 8. t. 1515 (1850) = Strobilanfiies, Blume (Acanth.) (S. luridns).

DIECTOMIS, Beauv. Agrost. 182. t. 23. f. 5 (1812); H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 193. t 64 (1815) = Andropogon, Linn. (Gramin.).
angustata, J. Sc C. Presl,Rel.Haenk. i. 338 = A. apricus.
fasciculata, Beauv. Agrost. 183. t. 23 = A. leptocomus.
fastigiata, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 193=A. fastigiatus.
laxa, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 840=A. apricus.

DIEFFENBACHIA, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829) 820; Melet. i. 20 (1832). *AROIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 986.
SEGUINUM, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (1836).
alliodora, Regel, in Gartenfl. (1870) t. 672 = humilis.
antioquensis, Linden & Andre, in Illustr. Hortic. (1875) t. 192-picta.
Barraquiniana, Versch. *Sc.* Lem. 1. c. xi. (1864) t. 387 = D. Seguine.
Baumanni, Hort. ex Engl. in DC Monog. Fhan. ii. 447 = D. Seguine.
Bausei, Regel, in Gartenfl. (1873) 49 =picta.
Bowmannii, *Carr. in Rev. Hortic.* (1872) 198.—Japon.
brasiliensis, Veitch, Cat. (1875) 12 = picta.
cognata, Schott, Syn. Aroid. 180=D. Seguine.
consobrina, Schott, 1. c. 181 = D. Seguine.
conspurcata, Schott, in Seem. Joum. Bot. ii. (1864) 62 - D. Seguine.
costata, Klotzsch, ex Schott, Syn. Aroid. 128-macrophylla.
daguensis, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 283.—N. Granat.
decora, Hort. Versch. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 446- D. Seguine.
Enderi, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* **vi. (1885) 284.—** N. Granat.
gigantea, Versch. in Illustr. Hortic. (1866) t. 470-471 = D. Seguine.
Gollmeriana, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 387=D. Seguine.
grandis, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 447 = D. Seguine.
humilis, *Poepp.* **to*** *Endl. Nov. Gen. et Sp.* **iii. 90.—** Bras,
imperialis, *Linden V Andre[1], in Illustr. Hortic.* **(1871)** t. 85.—Peruv.
irrorata, Schott, Prod. Aroid. 334 = D. Seguine.
Jenmanni, *Veitch, ex Regel, Gartenfl.* **(1884) 365.—** Hab.?
lancifolia, Linden *Sc* Andre[7], in Illustr. Hortic. xxi. (1874) t. 167 = picta.
latimaculata, *Linden V Andri, I. c.* xx. (1873) 8 1.112.—Bras.
Leopoldi, Hort. Bull, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 645 = D. Seguine.
lineata, C. Koch *Sc* Boucbé, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 14 - D. Seguine.
lingulata, Schott. Prod. Aroid. 834-D. Seguine.
liturata, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1852) 68= D. Seguine.
macrophylla, *Poepp. If Endl. Nov. Gen. et Sp.* **iii. 90.** —Peruv.
maculata, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 632 - D. Seguine.
magnifies, *Linden (f Rodigas, in Illustr. Hortic.* **xxx.** (1883) t. 482.—Venezuela,
membranulifera, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* **(1861)** 37.—Bras.
mirabilis, Versch. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 448=picta.
neglecta, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 80 = D. Seguine.

DEIFFENBACHIA:—
nobilis, Versch. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 446 = D. Seguine.
obliqua, *Poepp. (T Endl. Nov. Gen. et Sp.* **iii. 90.—Bras.**
Oerstedtii, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **(1858) 17J-**—Costa Rica.
Parlatorii, Linden *Sc* Andre, in Illustr. Hortic. xxiv. (1877) 152. t 291 = imperialis.
picta,*Schott.inOestr.Bot. Wochenbl.* **(1852) 68.—Bras.**
Plumieri, Schott, 1. c. 69 = D. Seguine.
Poeppigii, Schott, Syn. Aroid. 180 = D. Seguine.
robusta, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 15= D. Seguine.
robusta, Schott, Oestr. Bot. Wochenbl. (1864) 85 = macrophylla.
Seguine, *Schott, Melet.* i. 20.—Am. trap.
Shuttlevorthiana, Regel, in Gartenfl. (1878) 318 = picta.
Spruceana, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 30° humilis.
variegata, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 446 = D. Seguine.
Ventenatiana, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) 30 = D. Seguine.
Verschaffeltii, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii' 446=D. Seguine.
Wallisii, Linden, in Illustr. Hortic. (1870) t. 11 *=O-Seguine.
Weirii, *Bert, in Journ. Hort. Soc.* **N. S. i. (1866)** 201.—Bras.
Wendlandii, *Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **viii.** (1858) 179.—Am. centr.

DIELYTRA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (»82<S) 656.—Cf. Sprang. Syst. iii. 162 (1826) = Dicentrft, Bemh. (Papav.Y
bracteosa, G. Don, Gen. Syst. i. 140 *(^Diclytra* ***bracteosd).*—Am. bor. ?**
canadensis, G. Don, 1. c. = Dieentra canadensis.
chrysantha, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 320* Dieentra chrysantha.
Cucullaria, G. Don, Gen. Syst- i. 140 = Dicentr* Cucullaria.
eximia, G. Don, 1. c = Dieentra eximia.
eximia, Hook. Fl. Bor. Am. i. 35 = Dieentra formosa.
formosa, G. Don, Gen. Syst. i. 140=Dieentra formosa-*lachenaliaeflora,* Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, (1826) 556 = Dieentra lachenaliaeflora.
saccata, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. *7* Dieentra formosa.
scandens, G. Don, Gen. Systi. 140=Dieentra scanden*.
spectabilis, G. Don, 1. c.-= Dieentra spectabilis.
tenuifolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. **(1830)** 558 = Dieentra lachenaliaeflora.

DIEMENIA, Korth. in Nederl. Krnidk. Arch. iii. **(1855)** 888 = Trichocarya, Miq. (Rosac.).
racemosa, Korth. 1. c. = T. racemosa.

DIENA, Reichb. Consp. 69 (1828)-seq.

DIENIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 825 (1824)' = Microstylis, Nutt. (Orchid.).
calycina, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 23 = M. m»[cr0]" stachya.
carinata, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 223* »• carinata.
congesta, Lindl. Bot. Reg. sub t. 825 = M. congests.
cordata, Lindl. 1. c. (1838) Misc. 73 = M. cordata.
crispata, Undl. in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. xv. *(}»*•"* 385 -= M. crispata.
cylindrostachya. Lindl. in Wall. Cat. n. 1934 - cylindrostachya.
fusca, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 22 = M. congesta.
Gmelini, Lindl. 1. c. 23 = M. monophylla.
majanthemifolia, Reichb. f. in Linnaea, xix. I*[0]*j* 869 = M. fastigiata.
musdfera, Lindl. in Wall. Cat. n. 1935.—Reg.
Myurus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 23 = M. Myurus.

DIERAMA, C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) 10; et in Walp. Ann. vi. « *IRIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 703.
DICRAMA, KUtt, in Linnaea, xxxii. (18*8).%. iii. 73. t. 8.—Afr. trop.
cupuliflorum, *Klatt, in Decken, Reisen Ost-Afrt""*

DIERAMA:—

auifolium, *C. Koch (f Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol., App.* (1854) IO.-Afr. austr.

Pendulum, Baker, in Joum.Linn. Soc. xvi. (1877) 99 = ensifolium.

Pulcherrimum, Auier, /. c—Afr. anstr.

DIERBACHIA, Sprang. Syst. i. 512,676 (1825) = Dunalla, H. B. & K. (Solanac.).

solanacea, Spreng. 1. c. 676-Dunaliasolanaoea.

DIERVILLA, Tourn. ex Linn. Syst ed. I (1735). *CAPRjpoLIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 6.

«-ALYPTROSTIGMA, Trantv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 46) (1847).

<-ALESPHYIWJM, Bunge, Ennm. PI. Chin. Bor. 33 (1833).

WAGNERIA, Lem. Illnstr. Hortic. iv. (1857) sub t.

WEIGELA, Thunb. in Vet Acad. Handl. Stockh. (1780) 187. t. 5.

"florida, Duham. Arb. i. t 87«tri6da.

florida, Sieb, & Zucc. /. c. 75._china.

grandiflora, Sieb. & Zucc. 1. c. 71. t. 31=coraeensis.

hortensis, *Sieb, & Zucc. I. c.* 70. t. 29.—China; Japon.

japonica, DC. Prod. iv. 380.—Japon.

rosea, Lindl. Bot. Reg. 1.1201.—Hispan.

sessilifolia, Buctl. *in Am. Journ. Sc.* xlv. (1848) 174.

versicolor, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. 1. 74. t. 88= floribunda.

DIERVILLEA, Bartl. Ord. 21 (1880)=Dterv111a, Tourn.

DIOSCOREA, Flora, XI. (1882) 98= Psopho-carpus, Neck. (Legnmin.).

nodens, Endl. 1. c. 117=P. palnstris.

DIETERIA, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 300.

asteroides, Ton. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 141 (Compos).

canescens, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 300 = A. canescens.

dracunculifolia, Nntt. 1. c. 302=A. tanacetifolins.

graveolens, Nntt. 1. c. 301=A. canescens.

linifolia, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 177 = Aplopappus linifolius.

rubiginosa, Torr & Gray, Fl. N. Am. ii. 100 = A. incanus.

scabrella, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. vii. (1841) 300 = A. canescens.

viscosa, Nutt. l. c. = A. canescens.

DIETES, Salisb. in Linn. Trans. vi. (1812) 307 = Moraea, Linn.

bicolor, Sweet, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Snppl. i. 587 = M. bicolor.

DIETES:—

catenulata, Sweet, Hort Brit. ed. II. 497 = Moraea catenulata.

compressa, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 684 = M. iridioides.

crassifolia, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 661 - M. iridioides.

Huttoni, Baker, in Hook. f. Bot Mag. t 6174 = M. spathacea.

iridifelia, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 307 = M. iridioides.

iridioides, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 497 = M. iridioides.

Robinsmiana, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 374 = M. Robinsoniana.

DIETERICA, Ser. in DC. Prod. iv. 8 (1830) = Caldcluvia, D. Don (Saxifr.).

paniculata, Ser. 1. c = C . paniculata.

DIETERICHIA, Giseke, Prael. Linn. 228 (1792)=seq.

DIETRICHIA, Giseke, Prael. Linn. 199, 208 (1792) = Zingiber, Adans. (Scitamin.).

Lampujang, Giseke, 1. c. 199 = Z. Zerumbet.

Lampuyang, Giseke, 1. c. 208 = Z. Zerombet.

major, Raeusch. Nom. ed. III. 1=Z. Zernmbet

minor, Raeuscb, 1. c. - Z. Zerambet.

spuria, Giseke, Prael. Linn. 199=Z. Zerumbet.

DIETRICHIA, Tratt Arch. Gewaechsk. n. 449 (1812) - Boehea, DC. (Crassulac).

bicolor, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 805 = R. odoratissima.

coccinea, Tratt Arch. Gewaechsk. n. 449-R. coccinea.

jasminea, Eckl. & Zeyh. Enum. 306 = R. jasminea.

media, Eckl. *Sc* Zeyh. L c. 304 = R. versicolor.

odoratissima, Tratt. ex DC. Prod. iii. 894 = R. odoratissima.

versicolor, Eckl. & Zeyh. Enum. 304=R. versicolor.

DIEtrDONKAEA, Cogn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1876) 239. *CUCVRBITACEAE.*

rhizantha, *Cogn. 1. c.*—Peruv.

DIGASTER, Miq. Fl. Ind. Bat. Snppl. 829 (1860) = Pygeum, Gaertn. (Rosac).

sumatranus, Miq. 1. c. 880=P. sumatranum.

DIOESA, Forsk. R Aegypt Arab. 65 (1775). *AMARANTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 28.

ECLOTORIPA, et URETIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1836).

alternifolia, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 180—arvensis.

arvensis, *Forsk. Ft. Aegypt. Arab.* 65.—As. et Afr. trop.

ciliata, Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 286 =arvensis.

Forskaoli, Blume, Bijdr. 542 - arvensis.

frutescens, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 606=-arvensis.

murieata, Mart in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 285 «= arvensis.

DIGITALIS, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1786). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 960.

acuta, Moench, Meth. 448=lutea.

alba, Schrank, Baier. Fl. ii. 170=purpurea.

ambigua, *Murr. Prod. Stirp. Gotting.* 62.—Enrop.; As. occ.

ambigua, Roem. ex Steud. Nom. ed. I. 274 = purpurascens.

ambigua, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 222 = Pentstemon frutescens.

atlantica, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 300.—Algeria.

aurea, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 396 = D. Fontanesii.

aurea, Hort ex Benth. in DC. Prod. x. 460 = laevigata.

aurea, Lindl. Digit. Monog. 18. t. IS = ferruginea.

australis, Tenore, Fl. Med. Univ. 507 = lutea.

brachyantha, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 613 = ferruginea.

canariensis. Linn. Sp. PI. 368=Isoplexis canariensis.

DIGITALIS:—

cariensis, Boiss. ex Benth. in DC. Prod. x. 450-orientalis.

carnea, Meig. *Sc* Wenig. Syst. Verz. 80—purpnrea.

chinensis, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 204, sphalm. vide *sinensis.*

ciliata, *Trautv. in Bull. Acad. Pitersb.* x. (1866) 397.—Reg. Caucas.

cochinchinensis, *Lour. Fl. Cockinch.* 378.—Cochinch.

dasyantha, Pall, ex Lamb, in Trans. linn. Soc. x. (1811) 259 = Pentstemon frutescens.

denticulata x, Tausch, in Flora, xix. (1836) 390.—Europ.

dracocephaloides, Veil. Fl. Flum. 268; vi. t. 101 (Acanthac.).—Bras,

dubia, *Rodrig. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* iii. (1874) 46.—Ins. Balear.

epiglottidea, Brera, ex Steud. Nom. ed. I. 276 = lanata.

eriostachya, *Bess, ex Reichb. Hort. Bot.* iii. 12. t. 230.—Hab. ?

erubescens x, Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 29.

ferruginea, Lam. Encyc. ii. 280 = parviflora.

ferruginea, *Linn. Sp. PI.* 368.—Europ. austr.

ferruginea, Sibth. *Sc* Sm. FL Grace. Prod. i. 439 - aurea.

ferruginea, Wulf. PI. Rar. Desc 75 = laevigata.

flaoa, Georgi, Reise, ii. 718 = ambigua.

Fontanesii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 507.—Hab.!

fucata, Ehrh. Beitr. vii. 151 = purpurascens.

fulva x, Lindl. Digit. Monog. 15. t. 9.—Europ. austr.

fuscescensx, Waldst *Sc* Kit PI. Rar. Hung. iii. 304.—Croatia,

gloxinioides, *Carr. in Rev. Hortic.* (1872) 80.—Hab.!

glutinosa, J. Gaertn. in Nov. Comm. Petrop. xiv. i. (1770) 544 = Rehmannia chinensis.

grandiflora, Lam. Fl. Fr. ii. 332=ambigua.

Heldreichii, Jaub. & Spach, IUustr. v. sub t. 409 = orientalis.

integrifolia, Seenus, Reise Istrien, 63 »laevigata.

intermedia, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 357= purpurascens.

intermedia, Pers. Syn. ii. 167 = lutea.

Jaciniata, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1201.—Hispan.

laevigata, C. A. Mey. Verz. Pfl.Cauc. 110=nervosa.

laevigata, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* ii. 171. t. 158.—Reg. Dannb.; Graecia.

lanata, *Ehrh. Beitr.* vii. 152.—Reg. Danub.; Graecia.

leucocephala, Steud. Nom. ed. IL i. 607, sphalm. = leucophaea.

leucophaea, *Sibth. & Sm. Fl. Grate. Prod* i. 439.—Graecia.

Libertiana, Dum. Fl. Belg. Prod. 36=purpnrea.

Lindleyanax, Tausch, in Flora, xix. (1836) 389.

longebracteata, *Richter, ex-Staff, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 91.-Caria.

longiflora, Lej. Rev. Fl. Spa, 126-purpurasceni.

lurida, Salisb. Prod. 101 — Isoplexis canariensis.

lntea, *Linn. Sp. PI.* 368.—Europ. austr.

lutea. Poll. Hist. PI. Palat. ii. 199= ambigua.

lutea, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 439 = viridiflora.

lutea-major, Gilib. Fl. Lituan. i. 144 - ambigua.

lutescensx, lindl. Digit. Monog. 22. t. 21.

lutescens, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 81.—Gallia.

macrostachya, St Lag. in Aon. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 124 = Isoplexis Sceptram.

magniflora, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 4 = ambigua.

mariana, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 465. t. 126.—Hispan.

media, Elmig. Hist. Digit 42 » purpurascens.

media x. Roth, Catalect Bot. ii. 60.—Europ. austr.

micrantha, Roth, Nov. PI. Sp. 284 = lutea.

Milleri, G. Don, Gen. Syst. iv. 506 = ambigua.

minor, Bourg. ex Nym. Consp. 535=dubia.

minor, *Linn. Mant.* ii. 567.—Hispan.

nervosa, *Steud: W Hochst. ex Benth. in DC. Prod, x.* 450.—Reg. Caucas.; Persia.

nevadensis, Kunze, in Flora, txix. (1846) 673« pnrpurea.

nova, Winterl. ex Lindl. Digit. Monog. 19-lanata.

obscura, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 867.—Hispan.

obtusa, Moench, Meth. 448=media.

ochroleuca, Jacq. Fl. Austr. i. 86=ambigna

orientalis, Elmig. Hist Digit. 45 = lanata.

orientalis, *Lam. Encyc.* ii. 280.—As. Min.

DIGITALIS:—
orientalis. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7-ambigua.
parviflora, *Jacq. Hort. Vindob.* i. 6. t. 17.—Europ. austr.
parviflora. Lam. Fl. Fr. ii. 383 = lutea.
pilosa. Veil. Fl. Flum. 269 ; vi. t. 102 (Acanthac.).—Bras.
purpurascens, Lej. Fl. Spa, ii. 320 = purpurea.
purpurascens x, Lindl. Digit. Monog. 22 = *Lindr leyana.*
purpurascens, *Roth, Catalect. Bot.* ii. 62.—Europ.
purpurea, *Linn. Sp. PI.* 621.—Europ.
purpureo-lutea, G. F. W. Mey. Chloris Hanov. 324 = purpurascens.
regalis, Salisb. Prod. 101 =Isoplexis Sceptrum.
rigida x, Lindl. Digit. Monog. 21.1.19.
Roxburghii, Roth, Nov. PI. Sp. 288=Centranthera humifusa ?
Sceptrum, Linn. f. Suppl. 282 = Isoplexis Sceptrum.
sibirica, *Lindl. Digit. Monog.* 16. t. 11.—Sibiria.
sinensis, Lour. Fl. Cochinch. 378 = Adenosma grandifloruni.
speciosa, Salisb. Prod. 100 = purpurea.
stricta, Roxb. Hort. Beng. 45 ; Fl. Ind. iii. 99 = Centranthera hispida.
Thapsi, Bert, ex Nym. Consp. 535 = purpurea.
Thapsi, Cambess. ex Nym. 1. c.=dnbia.
Thapsi, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 867.—Hispan.
tomentosa. Link ft Hoffmgg. Fl. Port. i. 220. t. 29 = purpurea.
tubifiora x, Lindl. Digit. Monog. 22. t 22.—Europ. austr.
tubulosax, Tausch, in Flora, xix. (1836) 390.—Europ. ?
Urmangi, Noe, ex "Benth. in DC. Prod. x. 450 = laevigata.
viridiflora, *Lindl. Digit. Monog.* 21. t. 18.—Graecia ; Macedon.
Winterli, Roth, Catalect. Bot. i. 71 = lanata.

DIGIT ARIA, Heist, ex Adans. Fam. ii. 38, S50 (1763); Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 62 (1772)=Panicum, Linn. (Gramin.).
adpressa, Boj. Hort. Maurit. 363—P. ambiguum.
aegyptiaca, Willd. Enum. Hort. Berol. 93-P. sanguinale.
affinis, Koem. & Schult. Syst. ii. 470 = P. appressum.
appressa, Pers. Syn. i. 85 = P. fluitans.
aurea, Spreng. Syst. i. 272 = Paspalum pnlchrum.
australis, Willd. ex Trin. in Mem. Acad. P&ersb. Ser. VI. iii. (1836). n.201 = P. sanguinale.
barbata, Willd. Enum. Hort. Berol. 91-P. barbatum.
barbulata, Desv. Opusc. 62.—Ins. Borbon.
bicornis, Roem. & Schult. ex Loud. Hort. Brit. 24= P. bicome.
biformis, Willd. Enum. Hort Berol. 92=P. sanguinale.
borbonica, Desv. Opusc. 63.—Ins. Borbon.
brevifolia, Link, Hort Berol. i. 225 = P. brevifolium.
chinensis, Horaem. Hort. Hafn. Suppl. 8 = P. chinense
chrysoblephara, Fig. & De Not. in Mem. Ace. Tor. Ser. II. xiv. (1853) 864—Nubia.
ciliaris, Pers. Syn. i. 85 = P. sanguinale.
rollina, Salisb. Prod. 19=AndropogonIschaemum.
commutata, Schult. Mant. ii. 262 = P. sanguinale.
composita, Willd. Enum. Hort. Berol. 91 = Oplismenus compositus.
concinna, Schrad. ex Steud. Norn. ed. II. i. 507 = P. violascens ?
ronjugata, Schult Mant. ii. 262 —P. conjugatum.
consanguinea, Gaudich. in Freyc Voy. Bot. 410 = Paspalum dichotomum.
cuspidata, Schult. Mant. ii. 265=P. enspidatum.
Dactylon, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 52 = Cynodon Dactylon.
debilis, Willd. Ennm. Hort. Berol. 91 = Paspalum debile.
decipiens, Fig. & De Not. in Mem. Ace. Tor. Ser. II. xiv. (1853) 359.—Nubia.
denudata, Link, Hort. Berol. i. 222 = P. violascens.
didactyla, Sprenjj. Syst. i. 270 = Cynodon tenellus.
didactyla, Willd. Enum. Hort. Berol. 91-P. didactylum.
digitata, Buese, in Miq. PI. Juiigh. 381.—Java.
distachya, Pers. Syn. i. 85 = P. distachyom.
domingensis, Desv. ex Kunth, Enum. PI. i. 49 = Paspalum platycaule.

DIGITARIA :—
domingensis, Roem. & Schult. Syst. ii. 475=Panicum domingense.
elongata, Spreng. Syst. i. 271 = Cynodon elongates.
elatior, Willd. Enum. Hort. Berol. 91= P. elatius.
eriantha, Steud. in Flora, xii. (1829) 468 = P. ciliare.
eriogona. Link, Hort. Berol. i. 227 = P. sanguinale.
fascicularis, Link, 1. c. 223 = P. Schraderi.
fasciculata, Desv. Opusc. 63 = P. fasciculatum ?
filiformis, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 51-P. filiforme.
filiformis, Koel. Desc. Gram. 26 = P. glabrum.
fimbriata, Link, Hort. Berol. i. 226 = P. sanguinale.
foliosa. Lag. Gen. et Sp. Nov. 4 = Paspalum foHosum.
gibbosa, Beauv. Agrost. 160 = P. gibbosum.
glabra, Beauv. 1. c. 51 = P. glabrum.
gracilis, Guss. Enum. PI. Vase. Inarim. 375=P. gracile, *Nym.*
hispida, Spreng. Syst. i. 271 = Arthraxon ciliaris.
hispidula, Willd. Enum. Hort Berol. 91 = P. Crus-galli.
horitontalis, Willd. 1. c. 92 = P. sanguinale.
humifusa, Pers. Syn. i. 85 = P. glabrum.
humifusa, [Pieri ?] in Ionios Anthol. ii. (1834) 464 = P. sanguinale.
inaequalis, Link, Hort. Berol. i. 224=P. sanguinale.
Isckaemum, Muhl. Desc. Gram. 131 = P. sanguinale.
jamaicensis, Spreng. Syst. i. 272 = Paspalum digitatum.
lanosa. Llanos, Fragm. 28 = Eleusine aegyptiaca.
linearis, Pers. Syn. i. 85 = P. sanguinale.
linearis, Rostaf. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xxii. (1872) 99 = P. glabrum.
littoralis, Salisb. Prod. 19= Cynodon Dactylon.
longiflora, Pers. Syn. i. 85 = P. parvulum.
malabarica, Roem. & Schult. Syst. ii. 474 = Centotheca lappacea.
marginata. Link, Enum. Hort. Berol. i. 102=P. sanguinale.
maritima, Spreng. Syst. i. 272 = Cynodon Dactylon.
miliacea, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 507-P. fasciculatum.
mollissima, Schrad. ex Link, Hort. Berol. i. 229 = P. mollissimum.
monostachya, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 508 = P. rottboellioides.
nervosa, Roem. & Schult. Syst. ii. 473-P. Rottleri.
nodosa, Parl. PI. Nov. 89 = P. Parlatorei.
nuda, Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 45. —Afr. trop.
obtusifolia, Roem. & Schult Syst. ii. 889 = P. obtusifolium.
panicea, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 508 = P. sanguinale.
papposa, Beauv. Agrost. 51 = P. papposum.
paspalodes, Michx. Fl. Bor. Am. L 46 = Paspalum vaginatum..
per tennis, Bucse, in Miq. PI. Jungh. 381.—Ins. Banca.
Pes-avis, Buese, 1. c. 380.—Java.
pilosa, Michx. Fl. Bor. Am. 45= P. filiforme.
pilosa, [Pieri)] in Ionios Anthol. ii. (1884) 464 = P. sanguinale.
pilosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 51=Paspalum serotinum.
platicaulis, Desv. Opusc. 62.—Hispan.
plebeia, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 557.—Chili.
polystachya, Spreng. Syst i. 272 = Leptochloa polyslachya.
praecox, Willd. Enum. Hort. Berol. 91=P. sanguinale.
procumbens, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 608 = P. glabrum.
propinqua, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 410 = P. timorense.
pruriens, Buese, in Miq. PI. Jungh. 879=P. prnriens.
Pseudo-duroa, Nees, ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 458 = P. Pseudo-duroa.
Pseudo-ischaemum, Buese, in Miq. PI. Jungh. 382.—**Java.**
puberula. Link, Hort. Berol. i. 228=P. puberulum.
pulchella, Griseb. Cat. PI. Cub. 281.—Cuba.
radiata, Spreng. Syst. i. 272 = Cynodon radiatus.
radicosa, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 437 = P. sanguinale.
reflexa, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 44.—Afr. trop.
repens, Hort. Par. ex Kunth, Enum. PI. i. 84= P. domingense.
repens, Willd. ex Kuntb, 1. c. 81 = P. sanguinale.

DIGITARIA :—
ropalotricha, Buese, in Miq. PI. Jungh. 381.—Java.
Rottleri, Roem. & Schult. Syst. ii. 471 = Panicum appressum.
Roxburghii, Spreng. Syst. i. 270-Paspalum nematodes.
sanguinale, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 62 = P. sanguinale.
sanguinaria, Steud. Nom. ed. I. 276=seq.
sanguinea, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 8=P. sanguinale.
serotina, Michx. Fl. Bor. Am. i. 46 — Paspalnm serotinum.
setigera, Roth, ex Roem. & Schnlt. Syst. ii. 474 - P-sanguinale.
setosa, Desv. ex Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 6 = ?• Hamiltonii.
sienitica, Hort. Berol. ex Trin. in Mem. Acad. Petersb. Sér. VI. iii. (1885) II. 201=P. sanguinale.
stolonifera, Schrad. Fl. Germ. i. 165. L J. t 9« Cynodon Dactylon.
stricta, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 409-P. Gaudichaudi.
stricta, Roth, Nov. PI. Sp. 88-P. Kunthii.
stricta, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 508 » P-sanguinale.
tenuiflora, Beanv. Agrost. 51 = P. brevifolium.
Thunbergii, Beauv. 1. c. = Hemarthria compressa.
tristachya, Schult. Mant. ii. 261 = Paspalum distichum.
tristachya, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 508=P. •»" guinale.
utnbraticola, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. II. 134, •» syn. = P. sanguinale.
umbrosa, Link, Hort. Berol. i. 227 —P. sanguinale.
umbrosa, Pers. Syn. i. 85-P. prostratnm.
undulata, Scbrank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 508 = r-sanguinale.
uniflora, Salzm. ex Steud. 1. c.=Paspalum uniBoruro-
urochloides, Buese, in Miq. PI. Jungh. 382.—Java.
variabilis, Fig. & De Not. in Mem. Ace. Tor. Ser. H-xiv. (1853) 357.—Nubia.
velutina, Beauv. Agrost. 51 = P. sanguinale.
vestita, Fig. & De Not. in Mem. Ace. Tor. Ser. II. »*• (1858) 856.—Nubia.
villosa, Hort. Vindob. ex Trin. in Mem. Acad. P&effk Sér. VI. iii. (1835) H. 199 = P. Schraderi.
villosa, Pers. Syn. i. 85=P. filiforme.
violascens, Link, Hort. Berol. i. 229 = P. violascens.

DIGLOSSELIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 (1836) » •***' Btolochia, Tourn.
cymbifera, Rafin. 1. c. = A. cymbifera.
latifolia, Rafin. 1. c. = praec. ?
trinervis, Rafin. 1. c.=praec. ?

DIGLOSSUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 7° * Tagetes, Linn. (Compos.).
variabilis, Cass. in Diet Sc. Nat. xiii. 241 - foeniculacea.

DIGLOTTIS, Nee* & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. «•• (1823) 151, 170 = **Cusparia,** Humb. (Rutac).
obtmata, Nees & Mart. 1. c. 170. t. 25=C. obovata.

DIGLYPHIS, Blume, Praef. Fl. Jav. vi. (1828) p. •> " Chrysoglossum, Blume (Orchid.).

DIGLVPHOSA, Blume, Kjdr. 836. t. 60 (1825) - BOglossuzn, Blume (Orchid.).
latifolia, Blume, 1. c. = C. latifolium (in Addend.).

DIGLVPHYS, Spach, Hist Veg. Phan. xii. 176 (184*)" praec.

DIGNATHE, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iv. *0***® 268. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. Hi. M& pygmaea, *Lindl. I. c.*—Mexic.

DIGOMPHIA, Benth. in Hook. Lond. J o " ™ ^ f! (1846) 364. *BIGNONIACEAE,* Benth. & B°°K" ii. 1061.
laurifolia, *Benth. 1. c.*—Guiana.

DIGOMPHOTIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 87 (1886) * **Habenaria,** Willd. (Orchid.).
cordata, Rafin. 1. c. = H. cordata.
undulata, Rafin. 1. c = H. goodyeroides.

WGONOCARPUS, Veil. Fl. Flum. 158 (1825); iv. t. 14 = **Cupania,** Plum. (Sapind.).
"'flatus, Veil. 1. c. 154; iv. t. 14-C. emarginata.

DIGRAPHIS, Trin. Fund. Agrost. 127 (1820)-**Pha**^ S , Linn. (Gramin.)
"mericana, Loud. Hort. Brit. 27 = P. intermedia.
"'undinacea, Trin. Fund. Agrost. 127 - P. arundinacea.

DIOYHOLOMA. Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. »xy. (186-2) n. 829. *ACANTHACEAE.—Cf.* Benth. -* Hook. f. ii. 1071.
Ueghornii, *Tune. I. c.* 830.—Ind. or.

DIUNTHES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 70.(1866) = Antherioum, Linn. (Liliac).
reoolu=Slabs .1. c. = A. revolutum.

DILASIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 122 (1886) = Aneilema, R. Br. (Commel.).
vagtnata, Rafin. 1. c. 123 = A. vaginatum.

DI£ A J a i S , Berg. Desc. PI. Cap. 9. t. 3. f. 5 (1767).
"AEMODORACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 674.
c«rohana, Lam. Tabl. Encyc. i. 127 = Lachnanthes tinctoria.
corynibosa, *Berg. Desc. PI. Cap.* 9.—Afr. austr.
*:'<*ittera,* Pers. Syn. i. 54 = Lachnanthes tinctoria.
"exandra, Lam. Encyc. ii. 282 = Lanaria plumosa.
'xioides, U n , 1. c.=corymbose.
Pamculata, *Linn./. Suppl.* 101.—Afr. austr.
"nctoria, Pnrsh, Fl. Am. Sept. i. 30 = Lachnanthes tinctoria.
*.*e«a/o,* Linn. f. Suppl. 101-corymbosa.
v'°sa, Linn./. I. c.-AIr.* **austr.**

DILEMA J GrifF_Notul_iv_ ?05 ("54) **=DiUenia,** Linn. (Dodica.).

DILEPTIUM, Rafin. Fl. Ludov. 85 (1817) = Lepidiiun, T°«n>. (Crucifer.).
"UTasKw, Rafin. 1. c. 85 = L. virginicnm.
preco, Rafin. 1. c. 86 = L. Virginia™,
*virgi*mcuw, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 = L. rginicum.

D I.EP Y i U M , Michlt_ Fl. Bor. Am. i. 40 (1803) = «Uehlenbergia, Schreb. (Gramin.).
2 J.ff"in"». Michx. 1. t - M. aristata.
Ir«««.TO> Beauv- A gros t. 160=M· diffusa·
min.
n«i!:forum, Michx_ Fl. Bor. Am. i. 40 = M. diffusa.
u""florum, Beauv. Agrost. 160 = M. diffusa.

DILEPVRUM, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 352 = **OryzopBis,** Michx. (Gramin.).

DILIC R3<U^A*U< T_ Anders_ m Joum_ Linn_ Soc_ vU_ (1864) q.

DILrtJVARIA> Juss. Gen. 103 (1789) = **Acanthus,** Toura.
hcrV'i"^ Pers_ Syn_ »•• 179-A. ebracteatus.
horrida.
ilicifolia, Juss_ Gen. 103-A. ilidfolius.
longifolia, Poir.
folius.
*polystachy*S Endl_ Gen_ 7O3=A. polystachyus.
scandens, Nees, in DC. Prod. xi. 269-A. volubilis.
volubilis, Nees> iD WaU_P1_As_ *".i!i_98=A_volubilis.

DILKEA, Mast. in Trans. Linn_Soc_xxvii< (1871) 627.
PASSIFLOREAE.
acuminata, 8.—Bras.
retusa, *Ma*
Wallisii *Mast, in Mart. Fl. Bras.* **xiii. I. 622.—Bras.**

DILLENIA, Linn_Sv_«- «d. I (1785). *DILLENIACEAE,* Benth_ & Hook_f_ i- 18-
D,r*RTI*, Salisb_ Pa'«d. Load, sub t. 78 (1807).
Sma*, Gnff_Notul_iv_ **705 (1854).**
*Adans_ Fam. ii. 364 (J763).
alata, Ban*, ex DC_ Syst. i. 434 = Wormia alata.
Andreana, *.
^"5('-/rVa^m-v- 175.—Austral.
a»gust a, Roxb. Hort. Bene- 4S; Fh Ind* "" 652,
Kyna.

DILLENIA :—
aurea, *Sm. Exot. Bot.* ii. 65. t. 92.—Ind. or.
Blanchardii,Pierre,Fl.For. Coehinch.l. 14.—Cochinch.
bracteata, *Wight, Ic.* ii. t. 358.—Ind. or.
dentata, Thunb. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 201. t. 20 = Wormia triquctra.
elata, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* **t. 9.—Cochinch.**
elliptica, Thunb. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 200 -= iudica.
elongate, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. n. 12.—Sumatra,
eximia, *Miq. 1. c. Suppl.* 620.—Sumatra,
floribunda, *Hook./. V Thorns. Fl. Ind.* i. 71.—Burma,
grandifolia, *Wall. Cat.* n. 946.—Malaya.
grossulariae/olia, Poir. Encyc. Suppl. v. 146 = Hibbertia grossulariaefolia.
Hookeri, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* **t. 5.—Cambodia**
humilis, Donn, Cat. Hort. Cant. ed. I. 64 = Hibbertia volubilis.
indica, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 472 = philippinensis.
indica, *Linn. Sp. PI.* 535.—As. trap.
intcgra, Moench, Meth. Suppl. t. 76 = Hibbertia volubilis.
Integra, Thunb. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 199. t. 18 = retusa.
macrophylla, *Reinia. ex Blume, Cat. Gew. Buitens.* 78, nomen.—Java,
mcliosmaefolia, *Hook./. V Thorns, in Fl. Brit. Ind. i.* 36.—Malacca.
ochreata, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 178 = Wormia ochreata.
ornata, Wall. PI. As. Rar. i. 21. t. 23 = aurea.
ovata. *Wall. Cat.* n. 945.—Ins. Penang.
parviflora, *Griff. Notul.* iv. 704.—Burma,
pentagyna, *Roxb. PI. Corom.* i. 21. t. 20.—Ind. or.
philippinensis, *Rol/e, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 307.—Ins. Philipp.
pilosa, Bach.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 102 = scabrella.
pilosa, Roxb. Hort. Beng. 48; Fl. Ind. ii. 652=pentagyna.
procumbens, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 16. t. 166 = Hibbertia procumbens.
pulcherrima, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* **xl. (1871)** II. 46.—Burma.
racemosa, Buch.-Hatn. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 225 = Sanrauja nepaulensis.
radicans, *Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol.* **ii. 86.—** Hab. ?
Reifferscheidia, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* **ed. III.** *Nov. App.* 3.—Ins. Philipp.
repanda, Roxb. Fl. Ind. ii. 652=bracteata.
retusa, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* i. (1791) 200. t. 19. —Zeylan.
scabrella, *Roxb. Hort. Beng.* **43;** *Fl. Ind.* **ii. 653.—** Reg. Himal.
scandens, Willd. Sp. PI. ii. 1251-Hibbertia volubilis.
serrata, *Thunb. in Trans. Linn. Soc. i.* **(1791) 201.—** Malaya.
speciosa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 329 = philippinensis.
speciosa, Curt. Bot. Mag. t. 449 = Hibbertia volubilis.
speciosa, Griff. Notul. iv. 703 = aurea.
speciosa, Thunb. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 200 = indica.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 620.—Sumatra.
tetragyna, Lag. ex DC. Syst. i. 429 = Hibbertia diffusa.
turneraeflora, [Ker-Gawl.] Recens. PI. Bot. Rep. 27 = Hibbertia volubilis.
volubilis, Vent. Choix, 11 = Hibbertia volubilis.

DILLWINIA, Poir. in Diet. Sc. Nat. xiii. 250 (1819) = Dillwynia, Sm. (Legnmin.).

DILLWYNIA, Roth, Catalect. fasc. iii. 71 (1806) = Rothia, Pers. (Legumin.).
tri/oliata, Roth, L c.=R. trifoliate.

DILLWTNIA, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) **510.** ***LEGUMINOSAE,B*nth. Be*** **Hook. f. i. 471.**
XEROPETALUM, Reichb. Consp. 154 (1828).
acicularis, Meissn. ex Lehm. PI. Preiss. i. 62 = cinerascens.
acicularis, Sieber, ex DC. Prod. ii. 109 = praec. *1*
adenophora, Er.dl. Nov. Stirp. Dec. SO = floribunda.
brunioides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* **i. 612.—** Austral.
cinerascens, *R. Br. in Bot. Mag.* L 2247.—Austral.
cinerascens, DC. Prod. ii. 109 = juniperina.
clavata, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 117 ~ floribunda.

DHLWTKIA :—
cuneata, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, ii. 136 = l'ultenaea euchila.
divaricate, *Benth. 1. c.* ii. 151.—Austral.
Drummondi, *Van Houtte, in Regel, Garten/1.* **(1863)** 305. t. 412.—Austral.?
elegans, Endl. Nov. Stirp. Dec. 15 = floribunda.
erici/olia, Sims, Bot. Mag. t. 1545 =•- floribunda.
ericifolia, *Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i.* **(1805) 510.** —Austral.
ericoides, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, ii. 148-ericifolia.
fili/olia, Endl. Nov. Stirp. Dec. 15 - ericifolia.
floribunda, 5m. *in Kon. V Situs, Ann. Bot.* i. (1805) 510.—Austral.
glabcrrima, Sm. 1. c. = ericifolia.
glycinae/olia, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 264 = Chorizema angustifolium.
hispida, *Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral,* **ii.** 251.-Austral.
hispidula, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, ii. 149-floribunda.
juniperina, *Lodd. Bot. Cab.* t. 401.—Austral.
lanceolata, *Loisel. ex DrapieB, Herb. A mat. Fl.* **vii.** (1834) t. 478.—Austral.
laxiflora, Benth. in Hueg. Arch. Bot. t. 9 = cinerascens.
microphylla, Sieber, ex DC. Prod. ii. 109=ericifolia.
myrti/olia, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (180«) 268 = Eutaxia myrtifolia.
obavata, Labill. Nov. Holl. PI. i. 110. t. 140-Eutaxia myrtifolia.
parviflora, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 78, in obs. = parvifolia ?
parvi/olia, R. Br. in Bot Mag. t. 1527=ericifolia.
patula, *F. Muell. Fragm.* iv. 16.—Austral.
peduncularis, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 78 =• ericifolia.
phylicoides, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 847 = ericifolia.
Preissii, *Benth. Fl. Austral,* ii. 149.—Austral.
pungens, *Maciay, ex Sweet, Hort. Brit.* **ed. I. 474.—** Austral.
ramosissima, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 7tt =ericifolia.
rudis, Sieber, ex DC. Prod. ii. 109 * floribunda.
scabra, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 666 = hispida.
sericea, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 347= floribunda.
teriphioides, Endl. Nov. Stirp. Dec. 17 = ericifolia.
speciosa, Paxt. Mag. Bot. iv. (1838) 99-ericifolia.
saia^y/a.Colla, Hort. Ripul. App. ii. 347 (Dillwyniae sp.?).—Hab.!
tenui/olia, Sieber, ex DC. Prod. ii. 109= ericifolia.
teucrioides, Sieber, ex DC. I. c. 111 = Pultenaca flcxilis.

DHiOBEIA, Thou. Nov. Gen. Madag. 7 (1808). *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 175.
Thouarsi, *Roem.* b[1] *Schult. Syst.* iii. 476.—Madag.

DILOCHIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 38 (1830) ~ Arundina, Blame Orchid.).
pentandra, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 54-A. pentandra.
Wallichii.UaAX. in Wall. Cat. n. 1952 = A. Wallichii.

DILOCHUS, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 669 (1858) - praec.

DILODENDRON, Radlk. in Sitxb. Math.-Phys. Acad. Muench. viii. (1878) 355. *SAPINDACEAE.*
bipinnatum, *Radii. 1. c.* 357.—Bras.

DILOMILIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 43 (1886) = **Octadesmia,** Benth. (Orchid.).
serrata, Rafin. 1. c - O . serratifolia.

DUiOPHIA, T. Thorns, in Hook. Kew Joum. v. (1863) 19. *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook, f. i. 89.
fontana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxvi. (1880)** 428.—China.
kaschgarica, *Rupr. Sert. Tiansch.* 40.—As. centr.
salsa, 7'. *Thorns, in Hook. Kew Journ.* **v. (1853) 20.—** Tibet, occ.

DILWYNIA, Pers. Syn. ii. 688 (1807), sphalm. = **Dillwynia,** Sm. (Legumin.).

DIMACRIA, Lindl. in Sweet, Geran. t. 46 (1820) = Pelargonium, L'Hérit. (Geraniac).
affinis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 77 - P. affine.
Andrewsii, Sweet, 1. c. = P. Andrewsii.
apiifolia, Sweet, 1. c. = P. apioides.
aristata. Sweet, I. c. = P. aristatum.
astragalifolia, Sweet, Geran. t 108 = P. astragalifolium.
auriculata, Sweet, 1. c. S9S = P. longifolium.
barbata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 77 = P. barbatum.
bipartita, Sweet, Geran. t. 142 = P. bipartitum.
carnea, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 77=P. carneum.
coronillaefolia. Sweet, 1. c. =P. coronillaefolium.
depressa, Sweet, Geran. t. 290=P. longifolium.
elegans, Sweet, 1. c. t. 202 = P. elegantulum.
fissi/olia. Sweet, Hort. Brit.ed. I. 77 = P. fissifoliura.
ftoribunda, Sweet, 1. c. — P. rloribnndum.
foiiolosa, Sweet, Geran. 1.103 = P. astragalifolium.
fulgens, Sweet, Hort Brit. ed. III. 110=P. homonymum.
heracleifolia. Sweet, 1. c.=P. heracleifolium.
imbuta, Sweet, 1. c. ed. I. 77= P. imbutum.
lanceaefolia, Sweet, Geran. t. 887 - P. lanceolatum.
lanceolata, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 110=P. lanceolatum.
lincaris. Sweet, 1. c ed. I. 77=P. lineare.
longiflora. Sweet, 1. c. ed. III. 110= P. longifolium.
longifolia. Sweet, 1. c = P. longifolium.
oxalidifolia, Sweet, 1. c. ed. I. 77—P. oxalidifolium.
pinnata, Sweet, Geran. t. 46— P. viciaefolium.
punctata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 77=P. punctatum.
radiata, Sweet, 1. c.=P. radiatum.
recurvata. Sweet, 1. c. = P. recurvatum.
reflexa, Sweet, 1. c.=P. reflexum.
revoluta, Sweet, 1. c. = P. revolutnm.
rumicifolia. Sweet, Geran. t. 818 = P. rumicifolium.
setigera, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 110 = P. setigernin.
Smithiana, Sweet, Geran. t. 858 = P. Smithianum.
spathulata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 77 = P. spathulatum.
sulphurea, Sweet, Geran. t. 168=P. sulphureum.
tenella, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 77 = P. tenellum.
undulata, Sweet, 1. c = P. undulatum.
virginea, Sweet, 1. c = P. longifolium.

DIMANISA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 83 (1836)=Dianthera, Gronov. (Acantbac).
latifolia, Rafin. 1. c. 84 = Dianthera nodosa.
oblongata, Rafin. L c.=Beloperone plumbaginifolia.

DIMEIANDRA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) = Amaranthus, Toum.

DIMEIANTHUS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 41 (1886) = praec.

DIME1OSTEMON, Rafin. Neogenyt. 4 (1825)=Andropogon, Linn. (Gramin.).
macrurus, Rafin. in Ser. Ball. Bot. i. (1830) 221 = A. macrourus.
sessiliflorus, Rafin. 1. c. (quid ?).
tetrastachys, Rafin. 1. c = A. virginicus.
vaginatus, Rafin. 1. c. = A. virginicus.

DIMENOPS, Rafin. Atl. Journ. 144 (1832) -Krameria, Loefl. (Polygalac).
lanceolata, Rafin. 1. c. = K. lanceolata.

DIMENOSTEMMA, Steud. Norn. ed. II. i. 509 (1840) =Dimerostemma, Cass. (Compos.).

DIMEREZA, Labill. Sert. Austr. Caled. 51. t. 61 (1824) = Cupania, Plum. (Sapindac.).
glauca, Labill. 1. c.=C. glauca.

DIMERIA, R. Br. Prod. 204 (1810;. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1128.
DIDACTYLON, Zoll. & Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 99 (1846).
HAPLACHNE, J. & C. Fresl; Rel. Haenk. i. 234. t. 38 (1830).
PSILOSTACKYS, Stead. Syn. PI. Gram. 413 (1855).
PTERYGOSTACHYUM, Nees, ex Steud. 1. c. 413 (1855).
acinaciformis, *R. Br. Prod.* 204.—Austral.
diandra, Griff. NotuL iii. 71~omithopoda.

DIMERIA :—
filiformis, Hochst ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. lv. (1851) 35=omithopoda.
fuseescens, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Se>. VI. ii. (1883) 385.—Ind. or.
gracilis, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 413.—Zeylan.
Hohenackeri, *Hochst. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst.* III. iv. (1851) 85.—Ind. or.
laxiuscula, Thw. ex Trimen, in Joum. Bot. xxiii. (1885) 272=gracilis.
ornithopoda, *Trin. Fund. Agrost.* 167.—As. trop.; Austral,
pilosissima, *Trin. in MJm. Acad. Pitersb.* Se>. VI. ii. (1833) 336.—Ins. Marian.
psilobasis, F. Muell. Fragm. vii. 104 = omithopoda.
pusilla, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 869.—Zeylan.
stipaeformis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 288 = ornithopoda.
tenera, Trin. in Mlm. Acad. Pétersb.Sér. VI. ii. (1833) 335=ornithopoda.

DIMERIA, Endl. Gen. 81, in syn. (1836) sphalm.= DIMESIA, Rafin. = Hierochloë, S. G. Gmel. (Gramin.).

DIMEBOSTEMMA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1817) 11. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 876.
brasiliana, *Cass. I. c.* (1818) 68.—Bras.

DIMESIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175 = Hierochloë, S. G. Gmel. (Gramin.).
fragrans, Rafin. 1. c = H. borealis.
monticola, Rafin. 1. c. = Holcus monticola.

DIMETIA, Meissn. Gen. 160 (1838)=Hedyotifl, Linn. (Rubiac).
recurva, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1861) 154 = H. recurva.

DIMETOPIA, DC. Prod. iv. 71 (1830) = Trachymene, Rudgc (Umbellif.).
anisocarpa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849)11. 29=T. australis.
cyanopetala, F. Muell. Fragm. i. 231=T. cyanopetalea.
eriocarpa, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. i. (1865) 127 = T. eriocarpa.
grandis, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xxii. (1849) II. 29 - T. australis.
hirta, Benth. in Enum. PI. Hueg. 64=T. pilosa,
homocarpa,Bunge, in Bot. Zeit. v. (1847) 136 = T. pilosa.
isocarpa, Bartl. Del. Sem. Hort Gotting. (1845) 3 = T. pilosa.
Preissii, Bunge, inLehm. PI. Preiss. i. 284 = T. pilosa.
pusilla, DC. Prod. iv. 71=T. pilosa.
Walpersii, Bunge, Del. Sem. Hort Dorp. (1846).—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 156=T. pilosa.

DIMIA, Spreng. Anleit. ii. I. 486 (1817)-Daemia, R. Br. (Asdep.).

DIMITOPIA, D. Dietr. Syn. ii. 931 (1840)-DIMETOPIA, DC-Traohymene, Rudge (Umbellif.).

DIMOCARPUS, Lour. Fl. Cochinch. 233 (1790), partim =Nephelium, Linn. (Sapindac).
crinitus, Lour. 1. c 284-N. lappaceum.
informis, Lour. 1. c=Euphoria informis.
Litchi, Lour. 1. c. 233=N. Litchi.
Longan, Lour. 1. c. - N. Longana.
Pupilla, Moon, Cat. PI. Ceyl. 31 = N. Longana.
undulatus, Wight, ex Wight & Am. Prod. 113=N. Longana.
verticillatus, Roxb. ex Wall. Cat sub n. 8052 = Sapindus Danura.

DIMORPHA, D. Dietr. Syn. ii. 1328 (1840) =Diamorpha, Nutt. (CrassulacA

DIMORPHA, Schreb. Gen. 493 (1791) =Eperua, Aubl. (Legumin.).
falcata, Sm. in Rees, Cyd. xL n. 3 = E. falcata.
grandiflora, Willd. Sp. PI. iii. 971 = E. grandiflora.
tomentosa, Willd. 1. c. = Crudia Parivoa.

DIMORPHANDBA, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 404 (1827). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook, f. i. 587.
MORA, Schomb. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1889)210. t 16.

DIMORPHANDKA :—
biretusa, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 184= Gardneriana.
exaltata, *Schott,.in Spreng. Syst.* iv. *App.* 404.—Bra*.
excelsa, Baill. Hist. PI. ii. 167-D. Mora.
Gardneriana, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 186. —Bras.
guianensis, Baill. Hist. PI. ii. 149 = D. Mora,
latifolia, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 189.—Bras,
macrostachya, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* ii. (1840) 101.—Guiana.
mollis, *Benth. I. c.* 102.—Bras.
Mora, *Benth. V Hook./. Gen. i.* 588.—Guian.
oleifera, *Triana, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* 342.—Panama,
parviflora, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 251.—Bras,
pennigera, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 187. —Bras.
speciosa, Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. H. 250 = pennigera.
nnijuga, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 185.—Bras.
vemicosa, *Spruce, ex Benth. (f Hook. f. Gen.* i. 588 i *et Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 249.—Bras.

DIMORPHANTHES, Cass. in Bull. Soc Pbijom. (1818) SO; et in Diet. Sc. Nat. xiii. 254 (1819)-Cony»» Linn. (Compos.).
aegyptiaca, Cass. 11. cc 80, 256—C. aegyptiaca.
ambigua, Presl, FL Sic. p. xxviii - Erigeron linifolius.
angustifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 95 -C fastigiata, Erigeron linifolius.
apurensis, Cass. 1. c. 96—Erigeron apurensis.
bidentata, Cass. 1. c. vii. 256 = C. calocephala.
chinensis, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 30 - Erigeron apurensis.
coronopifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 96=1" coronopifolia.
crispa, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Peters')- xiv. (1856) 285=Erigeron linifolius.
floribunda, Cass. in Diet Sc. Nat. xxv. 96-Erigeroo bonariensis.
Gouani, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) SO; et 1. «• xiii. 265=C. Gouani.
hispida, Cass. 1. c. xxv. 96 = C. hispida.
linifolia, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. PétersB. xiv. (1856) 234-Erigeron linifolius.
myosoti/olia, Cass. in Diet. Sc Nat. xxv. 86 - C . myosotifolia.
obtusa, Cass. 1. c = C . obtusa.
procera, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1821) 175" chilensis.
pulchella, Cass. in Diet. Sc. Nat xxv. 98 = C. sophu*-folia.
sicula, Cass. in Bull. Soc Philom. (1818) 30 j et 1- * xiiL 256=Jasonia sicula.
sophiaefolia, Cass. 1. c. xxv. 96 = C. sophiaefolia.
stipulacea, Cass. I. c. 94=seq.
stipuXata, Cass. in Bull. Soc Philom. (1821) 176= incisa.
thexiifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat xxv. 96«=C. the»u-folia.

DIMORPHANTHES, Meissn. Gen. Comm. 859 (1843) -seq.

DIMORPHANTHUS, Miq. Comm. Phytogr. 95. t. I² (1840) = Aralia, Toum.
edulis, Miq. 1. c. 96=A. cordata.
elatus, Miq. 1. c. 95 = A. spinosa.
mandshuricus, Maxim. Prim. FL Amur. 183-A. m*''''' shurica.

DLMOKPHOCALYX, Thw. Enum. PI. *Zeyl.* (1861). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & HOOK- iii. 301.
glabellus, *Thw. I. c*—Zeylan.

DrMOKPHOCHIiABinrS, Hook. f. in Benth... Hook. f. Gen. i. 827 (1867). *CUCURBITACE*** Benth. & Hook. f. 1. c.
Mannii, *Hook./. I. c.—Ali.* trop.

DIMOKPHOCOMA, F. Muell. *3c* Tate, Roy. Soc S. Austral, vi. (1883) 107. *COMPOSITAE.*
mirmtula, *F. Muell. V Tate, I.* c—Austral.

DIMORPHOLEPIS, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 227; et in Hook. Ic. PL t 856 = Helipterum, DC. (Compos.).
australus, A. Gray, 11. cc = H. Dimorpholepis.

DIMORPHOPETALUM, Bert, in 'Merc. Chil. (1829) \ —Cf. Bull. Ferussac, xx. (1880) 110; et Am. Jonm. *•. «• (1831) 256, nomen-Tetilla, DC. (Saxifrag.).
illa, Bert.ll.cc.«T.hydrocotylaefolia.

WMORPHOSTACHYS, Fourn. in Comptes-Rendns Acad• Par. lxxx. (1875) 441 = Panicum, Linn, (Oamin.).
odoteriens, Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 499.—Mexic.
*•**»", Fonrn. ex Hemsl. 1. c. 14.—Mexic.
Drummondii, Fourn. ex Hemsl. 1. c—Mexic
bhusbreghtii, Fourn. ex Hemsl. 1. c—Mexic
*•«««•«", Fourn. ex Hemsl. 1. c—Mexic.
nonostachya, Fourn. ex Hemsl. 1. c—Mexic.
"Vacensis, Fonm. ex Hemsl. 1. c—Mexic.
Paspaloides, Fourn. ex Hemsl. 1. c—Mexic.
Wafrinae variabilis, Fourn. ex Hemsl. 1. c—Mexic.
t, Foum. ex Hemsl. 1. c—Mexic.

DIMORPHOTHECA, Vaill. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Moench, Meth. 585 (1794). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. it 353.
ACANTHOTHECA, DC. Prod. vi. 78 (1887).
ARNOLDIA, Cass. in Dict.Sc. Nat. xxx. 330 (1824).
BLAXIUM, Cass. 1. c. 828 (1824).
CASTALIS, Cass. 1. c. 332 (1824).
^ATTENHOFFIA, Neck. Elem. i. 89 (1790).
LESTIBODEA, Neck. 1. c. 40 (1790).
METEORINA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 167.
«*nua,* Less. Syn. Comp. 257=pluvialis.
?«antiaca, *DC. Prod.* vi. 72.—Afr. austr.
"arbenae, *Harv. in Hook. Bot. Mag.* t. 5837.—**Afr.** austr.
calendulaeea, *Harv. in Harv. &• Sond. Fl. Cap.* iii. «8—Afr. austr.
raulescens, *Harv. I. c.* 420.—Afr. austr.
«rysanthemifolia, *DC. Prod.* vi. 78.—Aft. austr.
cl"y's anthemoides, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 816, sphalm.=praec.
£?}••*Dc_Prod_*•72_Afr_msa_
aentata, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* iii. 423.-Afr. austr.
Dregei Sch. "«gei ata *DC. Prod.* vi. 72.-A&. austr.
B,P,, ,, Flora> xrvii> (1844^ 674= cune'
£*lonis, *'DC. Prod.* vi. 71.-Afr. austr.
Cramini, DC. I. C-MT.* **austr.**
hybrida C^a, DC-l c=nudicaulis.
incrass't C> L «• 70=pluvialis.
inte ri °v^a, Moench, Meth. 585 = pluvialis.
gfoha, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 424. *Kra* Afr. austr.
SCh, BiP,, b Fl0ra> XXTi, (1844) 674=nudl_
Ss.
leptocarpa, DC. Prod_*• 72.-Afr. austr.
lilacina, ?**1 & Herd_ i-d «- ***Sem. Hort. Petrop.*** (1864) 16—Afr. austr.
multifida, OC. Prod. vi. 7S.-Afr. austr.
nudicaulis, DC. I. c. 71.-Afr. austr.
perennis, Less. S*n Com P- 257=nndicaulis.
pinnata, Harv. *" Harv_v Sond_ PI- Ca P- >"• *23-— Afr. austr.
pluvialis, Moench, Meth. 585.-Afr. austr.
polyptera, DC. Prod. vi. 78—Afr. austr.
scabra, DC. us.
sinuata, DC" '• '•—Afr. austr.
Tragus, ^1 Ç-71-Afr. austr.
Zeyheri, Sond. Afr. austr. ***Cap.* iii. 421.—**

DINACRIA, Hatv_ln **Harv. & Sond_Fl_C»P-»•88o (1861–62). 657.** ***ULACEAE,*** Benth. & Hook. f.i.
fiMformU, *Harv. 1.e.* 331,-Afr. austr.

DINAEBA, Delile, Fl. Egypt. 28. t. 11. f. 3 (1813) = seq.

D1NEBA, Beanv. Agrort. 88 (1812) = seq,

DINEBRA, DC. Cat. Hort. Monsp. 104 (1813), partim = Bouteloua, Lag. (GraminO.
aristidoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 171 = B. aristidoides.
bromoides, H. B. & K. 1. c 172. t 51 = B. bromoides.
chondrosioides, H. B. & K. 1. c. 173. t. 53 = B. ovata.
curtipendula, DC. Cat. Hort. Monsp. 105 - B. racemosa.
repens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 172. t. 52 = B. bromoides.

DINEBBA, Jacq. Fragm. 77. t. 121. f. 1 (1809) *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1171.
aegyptiaca, Kunth, Enum. PI. i. 271-arabica,
amerieana, Beauv. Agrost. 98, 160 = Bouteloua bromoides, juncifolia.
arabica, *jacq. Fragm. 11.*—Afr. trop.; Ind. or.
brevifolia, *Steud. Syn. PI. Gram.* 299.—Abyss.
calycina, Wight, ex Nees, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 95—Tripogon Neesianns.
chloridea, J. *8c C.* Pre&l, Rel. Haenk. i. 291 (= Entrematis sp.).—Mexic.
OTStata, j. &• *C. Presl, 1. c.* i. 293.—Mexic.
divaricata, Beauv. Agrost. 98, 160 = Cutandia scleropoides.
hirsuta, *7. tf C. Presl, Rel. Haenk.* i. 292.—Pernv.
hirta, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 209-Leptochloa hirta.
juncifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 510= Bouteloua juncifolia.
Lima, Beauv. Agrost. 98,160 - Wangenheimia disticha.
melieoides, Beauv. 1. c. 160 = Bouteloua racemosa!
paspaloides, Beauv. L c. »praec. 1
retroflexa, Panz. in Denkschr. Acad. Muench. 1818 (1814) 270^arabica.
secunda, Roem. & Schult. Syst. iL 711 (= *Eutriana Ledebourit).*—Ins. S. Doming.
verticillata, Wight, ex Steud. Syn. PI. Gram. 209 = Eragrostis Wightiana.

DINEMA, Lindl. Orch. Seel. 16 (1826); et Gen. et Sp. Orch. Ill (1831)=Epidendrum, Linn. (Orchid.;.
paleaceum, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 61 = E. auritom.
polybutoon, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 111 = E. polybulbon.

DUNKMAGONTTM, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 585 (Monog. Malpig. 331). *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 261.
albicaule, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-S5) 32.—Chili.
Bridgesianum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 587 *(Monog. Malpig.* 333).—Chili.
Gayanum, *A. Juss. II. cc.* 585, 381.—Chili.

DINEMANDRA, A. Juss. ex Endl. Gen. 1059 (1840). *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 261.
ericoides, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* 682. t. 19; *(Monog. Malpig.* 328).—Pernv.
glaberrima, *A. Juss. II. cc.* 583, 829.—Chili,
ramosissima, *Phil. FL Atac.* 12.—Chili,
strigosa, *Phil. I. c*—Chili,
subaptera, *Phil. I. c*—Chili.

DINETUS, Buch.-Ham. ex D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. 1.127 (1825)=Porana, Bnrm. (Convolv.).
paniculata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 289-P. paniculate.
r<K«i»(tta, Sweet, Brit Flow. Gard. 1.127 = P. racemosa.

DUTOCHLOA, Bnese, in Miq. PI. Jungh. 387 (1851-55). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1214.
andamanica, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* zlii. (1873) II. 258.—Ins. Andam.
ciliate, *Kurt, I. c*—Ins. Philipp.
Maclellandii, *Kurt, 1. c.*—Burma.
Tjankorreh, *Buese, in Miq. PI. Jungh.* 388.—Java.

DnrOPHOBA. Benth. in Hook. Niger Fl. 855 (1849). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 746.
spenneroides, *Benth. I. c.*—Afr. trop.

DUTOSERIS, Griseb. in Goett.Abh. xxiv. (1879) 213. ***COMPOSITAE.***
salicifolia, *Griseb. I. c.* 214.—Reg. Argent.

DIOCLEA, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 487 (1823). *LEGUM1N0SAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 586.
CREPIDOTROFIS, Walp. in Linnaea, xiv. 296 (1840).
HYMENOSFRON, Sprang. Syst. iv. Cor. Post. 283 (1827).
LEPIDAMPHORA, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. **Bat.** i. I. 217 (1865).
apurensis, *H. B. V K. 1. c.*—Venezuela.
argentea, Desv. in Ann. Sc. Nat Ser. I. ix. (1826) 420 = Cratylia floribnnda.
bicolor, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 138.—Bras.
Boykinii, *A. Gray, ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot.* 219.—Am. bor.
cassinoides, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 410.—Hab. ?
coriacea, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 133.—Bras.
Fergusonii, Thw. Enum. PL Zeyl. 412^reflexa.
funalis, *Poepp. ff Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 69.—Peruv.
galactioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 76.—Cuba,
glabra, Benth. in Ann. Wien. Mus. it. (1838) 133.—Bras,
glycinoides, *Hort. Belg. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap.* 88, nomen (cf. cassinoides).—Hab. ?
grandiflora. *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 132.—Bras.
guianensis, *Benth. 1. c.* 184.—Guiana.
Jacquiniana, *DC. Prod.* it. 403.—Ins. Martinic.
javanica, Benth. in Miq. PL Jungb. 236 =reflexa.
lasiocarpa, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 133.—Panama.
lasiophylla, *Benth. 1. c.* 134.—Bras,
latifolia, *Benth. 1. c.* 132.—Bras,
marginata, *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. 1.166.—Bras,
mollis, *DC. Prod.* ii. 403.—Hab. ?
panamensis, Duchass. & Walp. in Flora, xxxvi. (1858) 229= guianensis.
panamensis, Seem, ex HemsL Biol. Centr. Am. Bot. L 802=reflexa.
panamensis, *Walp. Ann.* vii. 785.—Panama,
pilifera, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 71.—Bras,
purpnrea, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 69.—Bras,
reflexa, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 806.—Afr. et As. trop.
rostrata, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 138—Bras.
rubiginosa, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1844) 72 = rufescens.
rudolphioides, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1881) 178.—Cuba,
rufescens, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 133.—Bras.
Schottii, *Benth. I. c.* 134.—Bras,
sericea, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 487.—N. Granat.
violacea, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 132.—Bras.

DIOCLEA, Spreng. Syst i. 602 (1825) - **Arnebia,** Forsk. (Borag.).
hispidissima, Spreng. 1. c. 666-A. hispidissima.

DIOCTIS, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 15 (1886) - Polygomun, Toum.
bicorne, Rafin. 1. c. — P. pensylvanicnm.
equiseti/olia, Rafin. L c = P. eqnisetiforme.
maculatum, Rafin. 1. c. = P. lapathifolium ?
pensylvanica, Rafin. 1. c.=P. pensylvanicum.
vernum, Rafin. 1. c.=P. lapathifolium.

DIODEILIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 82 (1836) = **Gardoqula,** Ruiz & Pav. (Labiat).
coccinea, Rafin. 1. c. 83 - G. Hookeri.

DIODIA, Gronov. in Linn. Cor. Gen. 11 (1787). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 143.
alata, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xii. **(1824)** 11 = Dasycephala alata.
anthospermoides, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 34S=polymorpha.
arenosa, *DC. Prod.* iv. 564.—Bras.
articulata, DC. 1. c.-hyssopifolia.
auricnlosa, *Bertol. Misc.* ***Bot.*** x. 26.—Am. bor.
barbaia, DC. Prod. iv. 563 = Dasycephala **barbata.**

DIODIA:—
barbigera, *Hook, tf Am. Bot. Beech. Voy.* 295.—Mexic.
bogotensis, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 847.—N. Granat.
brasiliensis, Sprang. Syst. i. 406=polymorpha.
breviseta, Benth. in Hook. Niger Fl. 424=sarmentosa.
carnosa, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) 5SS.—Afr. austr.
conferta, *DC. Prod.* iv. 568.—Bras,
crassifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 108.—Mexic.
cymosa, *Cham, in Linnaea,* ix. (1884) 217.—Bras.
Dasycephala, *Cham. & Schlecht. I. c.* iii. (1828) 848.—Bras.
discolor, *DC. Prod.* iv. 564.—Guiana,
domingensis, *DC. I. c.* 563.—Ins. S. Doming.
elongata, E. Mey. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 655 = Spermacoce natalensis.
foliosa, Peyr. in Sitzb. Acad. Wien. Math.-Nat. xxxviii. (1860) 579 = Spennacoce natalensis.
Frankii, Steai. & Hochst. ex Presl, Bot. Bemerk. 86 = Hedyotis Frankii.
glabra, Pers. Syn. i. 124-Spermacoce glabra.
glabra, *Willd. ex H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 848, in syn.—Pernv.
grandifiora, DC. Prod. iv. 663=rigida.
hirsuta, Pnrsh, Fl. Am. Sept. i. 106=virginiana,
hispida, Muhl. ex DC. Prod. iv. 562=praec.
hispidula, A. Rich, ex DC. 1. c 565 = Dasycephala hispidula.
hyssopifolia, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,iii.* (1828) 850.—Venezuela.
indecora, DC. Prod. iv. 565 = Dasycephala indecora.
Kirkii, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 280.—Afr. trop.
lanigera, *Pohl, ex DC. Prod.* iv. 674.—Bras.
latifiora, DC. 1. c. 563=rigida.
lippioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 141.—Cuba.
littoralis, Peyr. in Sitzb. Acad. Wien. Math.-Nat. xxxviii. (1860) 579=sarmentosa.
maritima, *Thonn. in Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 75.—Afr. trop.
mitens, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 288.—Porto Rico.
multiflora, *DC. Prod.* iv. 564.—Bras.
muriculata, DC. 1. c.-D- Radula.
oblonga, Rafin. Fl. Ludov. 76=virginiana.
orientalis, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 880= Hydrophylax maritima.
palustris, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 847-alata.
paradoxa, *Cham. 1. c.* ix. (1884) 216.—Bras.
pedunculata, Spreng. Syst i. 405-Manettia Pseudodiodia.
pilosa, Schum. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 76 = Spermacoce pilosa.
polymorpha, *Cham, if Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 344.—Bras.
poly seta, DC. Prod. iv. 56S = rigida.
procumbens, Sw. ex DC. 1. c. 562 = prostrata.
prostrata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 30.—Jamaic.
radicans, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 850 = maritima.
Radula, *Cham. V Schlecht. I. c.* 842.—Bras.
reptans, F. Muell. in Trans. Viet. Inst i. (1855) 128 = Nertera reptans.
rigida, *Cham. V Schlecht. 1. c.* 341.—Am. austr.
rigida, Cham. & Schlecht. 1. c. partim = setigera.
rosmarinifolia, *Pohl, ex DC. Prod.* iv. 564.—Bras.
Tubricosa, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 231.—Afr. trop.
rudis, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 800=rigida.
saponarioides, *Presl, Bot. Bemerk.* 87.—Bras,
sarmentosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 80.—Ind. occ.
scabra, *Schum.* 6* *Thonn. Beskr. Guin. PI.* 76.—Afr. trop.
scandens, Benth. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 236=sarmentosa.
fcandens, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 30.—Ins. S. Doming,
senensis, *KlotMsch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 289.—Afr. trop.
setigera, *DC. Prod.* iv. 663.—Bras,
simplex, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 29.—Jamaic.
spicata, Miq. Stirp. Surin. Sel. 179 = Dasycephala spicata.
surinamensis, *Miq. I. c.* 180.—Guiana,
tens, *Wait. Fl. Carol.* 87.—Am. bor.

DIODIA:—
tetracocca, Hemsl. Diagn. PI. Nov. 82 = Crusea allococca.
tetragona, Walt. Fl. Carol. 87 = virginiana.
tricocca, Torr..& Gray, Fl. N. Am. ii. 80 = Crusea allococca.
vaginalis, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 424.—Afr. trop.
verticillata, *Vahl, Symb.Bot.* ii. 28.—Ins. S. Crucis.
villosa, *Moc. &" Sesse, ex DC. Prod.* iv. 562.—Mexic.
virginiana, *Linn. Sp. PI.* 104.—Am. bor.
virginica, Linn. Syst. ed. XII. 116; Jacq. Ic PI. Rar. t. 29-praec.

DIODOIS, Pohl, in Flora, viii. (1825) 183, nomen-FsyllocarpuB, Mart. & Zucc. (Rubiac).

DIODONTA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. 360 (18411=Coreopsis, Linn. (Compos.).
aristosa, Nntt. 1. c. = C. aristosa.
aurea, Nutt. 1. c. = C. aurea.
bidentoides, Nutt 1. c. 361 = C. bidentoides.
coronata, Nutt. 1. c. 860 = C. coronata.
involucrata, Nutt. 1. c. 861=C. involucrata, *Nutt. I. c.,* N. 1. 860 C.
leptophylla, Nntt. 1. c. 860=C. aurea.
mitis, Nutt. 1. c. = C. aurea.

DIODONTIUM, F. Muell. in Hook. Kew Joum. ix. (1857) 19 = Glossogyne. Cass. (Compos.).
filifolium, F. Muell. 1. c.«G. filifolia.

DIODOSPERMA, H. Wendl. in Bot. Zeitsxxxvi. (1878) 118=Trithrinax, Mart. (Palm.).
Burity, H. WendL 1. c.=T. schizophylla.

DIOLENA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. xv. (1851) 329. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 766.
auriculata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 81.—N. Granat
agrimonioides, *Triana, 1. c.*—N. Granat.
hygrophila, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xv. (1851) 829.—Venezuela,
obliqua, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 81.—N. Granat
pileoides, *Triana, I. c*—N. Granat
spicata, *Triana, I. c*—N. Granat.

DIOMEDEA, Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Torino, xxxviii. (1885) 85. t. 31 = Helianthua, Linn. (Compos.).
thurifera, Bert ex Colla, 1. c. 37. t 31 = H. thurifer.

DIOMEDEA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 175 = Borrlchia, Adans. (Compos.).
argentea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 218 = B. argentea.
bidentata, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiii. 288=B. frutescens.
glabrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 213 = B. arborescens.
indentata, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiii. 284=B. arborescens.
linearis, Cass. 1. c. 283, in obs.—B. frnteścens.

DIOMEDES, Haw. in Phil. Mag. lxii. (1823) 440-Narcissus, Tourn. (Amaryll.).
Macleayi, Haw. ex Herb, in Joum. Hort Soc. ii. (1847) 23 = N. Macleayi.
major. Haw. in Phil. Mag. lxii. (1823) 441 = N. Macleayi.
minor, Haw. 1. c. 440 ^N. Macleayi.
Parkinsoni, Haw. Monog. 5 = N. Macleayi.
Sabini x, Haw. ex Herb, in Joum. Hort. Soc ii. (1847) 23=N. Macleayi.

DION, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 59-Dioon, Lindl. (Cycad.).

DIONAEA, Ellis, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. i. (1770) 98. t 8. *DROSERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 663.
corymbosa, Rafin. Med. Fl. ii. 217 =muscipnla.
muscipnla, *Ellis, ex Linn. Mant.* ii. 238.—Am. bor.
sensitiva, Salisb. Prod. 821=muscipula.
sessiliflora, Rafin. Med. Fl. ii. 217 = muscipula.
uniflora, Rafin. Atl. Joum. 78-muscipnla.

DIONEA, Rafin. Med. Fl. ii. 217 (1830)-praec

DIONICHA, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 61 = seq.

DIOITYCHA, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xv. (1851) 48. *MELASTOMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 745.
Bojerii, *Naud. I. c*—Madag.

DIONYCHIA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 745 (1867)-praec

DIONYSIA, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) I. 389. *PRIMULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 632.
GREGORI A, Duby, Bot. Gall. i. 383 (1828); et in DC. Prod. viii. 4S (1844).
MACROSYPHONIA, Duby, in Mem. Soc. Phys. Genev. (1844) 426.
MACROTYBUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 425 (1867).
aretioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 68.—Persia.
Aucheri, Boiss. Fl. Orient, iv. 19=odora.
bryoides, *Boiss. 1. c.* 66.—Persia.
bryaides, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 145 - curviflora.
caespitosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 67.—Persia,
curviflora, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* xvi. (1871) 561.—Persia.
diapensiaefolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 65.—Persia,
drabaefolia, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* xvi. (1871) 558.—Persia.
Kotschyi, *Bunge, I. c.* 560.—Persia.
Michauxii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 67.—Persia,
odora, *Fenzl, in Flora,* xxvi. (1843) I. 889.—Assyria,
revoluta, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 65.—Persia,
rhaptodes, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* xvi. (1871) 562.—Persia,
tapetodes, *Bunge, I. c.* 560.—Persia.

DIOON, Lindl. Bot. Reg. (1848) Misc. 59 (Dion). *CYCADACEAE,* Benth. & Hook. f. iiL 445.
PLATYZAMIA, ZUCC. in Abh. Akad. Muench. fr-(1845) 23. t. 4.
aculeatum, Lem. in Illustr. Hortic. ii. (1855) Misc. 92 * edule.
angusti/olium, Miq. in Tijdschr. Wetensch. i. (1848) 37 = edule.
edule, *Lindl. Bot. Reg.* fl843) *Misc.* 59.—Mexic.
imbricatum, Miq. in Tijdschr. Wetensch. i. (1848) 86 = edule.
spinulosum, *Dyer, ex Eichl. in Gart. Zeit.* (1883) 4H—Mexic.
strobilaceum, *Lem. in Illustr. Hortic.* x. (1868) *Mis'-4.-Hab.1*

DIOPOGON, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. (1868) = Sempervivum, Rupp. (Crassulac.).
Allioni, Jord. & Fourr. 1. c. = S. hirtum.
Heuffellii, Jord. & Fourr. 1. c. 47 = S. patens.
stramineus, Jord. *8c* Fourr. 1. c. = S. stramineum.

DIORIMASPERMA, Rafin. Sylva Tellur. Ill (1888) = Cleome, Linn. (Capparid.).
violacea, Rafin. 1. c.=C. graveolens.

DIORYKTANDRA, Hassk. Retzia, 125 (1855) * Alsodeia, Thou. (Violar.).
Roxburghii, Hassk. 1. c.=A. Roxburghii.

DIOSANTHOS, St. Ug. in Ann. Soc. Bot. Lyon, (1880) 87 = Dianthua, Linn. (Caryoph.).
armerium, St. Lag. 124 = D. Armeria.
carthusianicum, St Lag. 1. c. = D. Carthusianorum.
cephalotum, St. Lag. 1. c. = D. Cephalotes.
lilanotum, St Lag. L c.=D. Libanotis.

DIOSCORIDIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, (1881) 175 = seq.

DIOSCOKEA, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 306 (1737)-*DIOSCOREACEAE,* Benth. 8c Hook. f. iii. 742.
BORDEREA, Miegev. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1866) 374.
BOTRYOSICYOS, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beil. 3.
ELEPHANTODON, Salisb. Gen. PI. Fragm. 12 [1866].
EPIPETRUM, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 158.
HAMATRIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 11 (1866).
HELMIA, Kunth, Enum. PI. v. 414 (1850).
MERIONE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 12 (1866).
POLYNOME, Salisb. L c. 12 £18661.

DIOSCOREA :—
RICOPHORA, Mill. Gard. Diet. ed. VI. 175. App-. (1752).
SISMONDAEA, Delponte, in Mem. Ace. Torin. Ser. II. xiv. (1854) 894.
STROPHIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 12 (1866).
UBIUM, J. F. Gmel. Syst. 839 (1791).
"byssinica, *Hochst. ex Kuntk, Enum. PI.* v. 387.—Abyss.
aculeata, Balb. ex Kunth, 1. c. 881 = cayenensis.
aculeata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5103 •* spinosa.
iculeata, *Linn. Sp. PI.* 1088.—As. trop.
acuminate, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 449—Madag.
acuminate, *Steud. Norn.* ed. II. i. 610.—Chili.
"*cutangula,* Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5109 = alata.
"*critifolia, Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 64.—('bill,
"*denocarpa, Mart. exGriseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. - 29.—Bras.
«nms, *Kunth, Enum. PI.* v. 872.—Guiana,
alata, *Linn. Sp. PI.* 1083.—As. trop.
altissima, Lam. Encyc. iii. 231 = alata?, sativa.
alhssima, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 116=mnlti-flora, *Presl.*
"Iissima, Steud. Nom. ed. II. i. 511=daemona.
Mnaranthoides, *Presl, Rel. Naeni.* i. 134.—Chili; "eruv.
amazonnm, *Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 39—Bras.
«moena, Roxb. ex Wight, Ic t 811=daemona.
anguina, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* in. 80S.—ind. or.
ao gulata, *Roxb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 511, nomen (-praec?).—Ind. or.
anguslifolia, *Urn. Encyc.* iii. 283.—Peruv.
»oomala, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 31.—Bras.
»!!?^ a Pha Kunth Enum Pl Univ 84 Chili (1873) 540.—
anfolia, *p res l, Rel. Haenk.* i. 134.—Peruv.
»nsto ochiaefolia, *Poepp. Fragm. Syn.* 11.—Chili.
a«i<nilata, *Steud. Nom.* ed. II, i. 61 .—Bras,
, *Humb.* b- *Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 794.—Venezuela.
Mfopurpurea, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 800.—Burma; Malaya.
"Kiculata, *Poepp. Fragm. Syn.* 13.—Chili.
"*atatas,* Decne. in Rev. HorticSer. IV. iii. (1854) 243 -divaricata.
7g ter oana, Kunth, Enum. PI. v. 881=cayenensis.
j^nana, *Kunth, 1. c.* 845.—Chili.
staca, Bnch H »ni. ex Wall. Cat. n. 5107 = alata.
uoergiana, Kunth, Enum. PI. v. 354 • macrostachya.
oroniea> Blanco, Fl. Filip. ed. I. 800 = Pueraria
Phaseoloidcs.
Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1888) 8;
hi 1V x1 n 6-Reg. Argent
bTM C ybott ya. *Poepp. Fragm. Syn.* 12.—Chili,
oiachycarpa, *Schlecht. in Linnaea,* xvii. (1843) 109.-
bras ff ona, Poir. Encyc. SuppL iii. 189-brasiliensis.
brasiliensis, *Willd. Sp. PI.* ivf 791,-Bras.
Bridges
GHsebm ex Kunih> Enum, PL v„ 858> —
Chili."
bryoniaefolia, *Poepp. Fragm. Syn.* IS.—Chili.
Buchanani, *enth. in Hook. Ic. PI.* t. 1897-98.—Afr. trop.
bulbifera, ? ^ Prod. 294 -satia
bulbifera, Linn S P- PL 1038.—As. trop.
bulbifera, s ex Wall- Cat.n. 5106=alata.
calystegioides
Cambilium > Kunth > £ »«»»- PI- v. 362.—Bras.
spbosa. Bnch Ham ex WalL Cat n> 6108 =
can«P'? tris> *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 3O.-Bras.
"*rtensis,* Webb & Berth. Phyt Canar. iii. 317 = Ta mus edulis
cannaris, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 854.—Mexic.
caracasana, *Kunth, Enum. PI.* v. 354.—Venezuela.
cayenensis, Lm En <yc. iii. 233.—Guiana.
chondrocarpa, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 34.—Bras.
cinnamomifolia, Hook. BoL Mag. t. 2825-Rajania brasiliensis.
cirrhosa, *Lour. Fl.* Cochinch ". 825 M or; Cochinch.

DIO8COKEA :—
Cliffortiana, Lam. Encyc. iii. 232=sativa.
composite, *Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 854.—Mexic.
conferta, Veil. Fl. Flum. x. L 122 = piperifolia.
convolvulacea, *Cham.* &* *Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) 49.—Mexic
coriacea, *Humb. tf Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 794.—Ecuador.
coriacea, Wight, ex Wall. Cat. n. 5104 - oppositifolia.
comifolia, *Kunth, Enum. PI.* v. 886.—Java,
cotinifolia, *Kunth, I. c.* 886.—Afr. austr.
crenata, Veil. Fl. Flum. x. t. 127=sinuata.
crepitans, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5105 = glabra.
crinita, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6804.—Natal,
crispata, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 802.—Ind. or.
cruenta, Kunth, Enum. PI. v. *879=crenata.*
crumenigera, *Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 36.—Bras.
cuspidata, Balb. ex Kunth, Enum. PI. v. 434=pilosius-cula.
cuspidata, *Humb. tf Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 794.—Am. austr.
cuspidata, Klotzsch, ex Kunth, Enum. PI. v. 429 (= *Helmia consanguinea).*—Guiana,
cylindrica, *Burm. Fl. Ind.* 316.—Ind. or.
cymosula, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 855 = spinosa.
cynanchifolia, *Griseb. in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1875) 166.—Bras. '
daemona, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 805.—Ind. or.; Malaya.
Decaisneana, *Carr. in Rev. Hortic.* (1865) 111.—China.
decemangularis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5106 = sativa.
decorticans, *Presl, Rel. Haenk. i.* 185.—Peruv.
deflexa, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 157.—Bras.
deleteria, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. 1. Art. IV. 13-sativa.
deltoidea, *Wall. Cat.* n. 5110.—Ind. or.
densiflora, *Hemsl. •« Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 356.—Mexic.
Deppei, Schiede, ex Schlecht in Bot. Zeiti. (1843) 890 = macrostachya.
Dempata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 5109 -alata.
diacantha, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 479, nomen.—Ins. Timor.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 611.—Sumatra.
digitata, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = pentaphylla.
discolor, *Hort. Berol. ex Kunth, Enum. PI.* v. 384.—Am. austr.
divaricata, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 797.—Ins. Philipp.
diversifolia, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 41.—Bras.
dodecandra, Steud. Nom. ed. II. i. 511 = seq.
dodecaneura, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 123.—Bras,
doryphora, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Six.* V. v. (1866) 244.—Ing. Formosa.
eburina, Lour. Fl. Cochinch. 625 = seq.
etramea, *Lour. 1. c. ed. Willd.* ii. 767.—Cochinch.
echinata, Herb. Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6103.- spinosa.
effusa, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 161.—Bras.
elegantnla, *Kunth, Enum. PI.* v. 366.—Guiana.
elephantopus, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 143 = Testndinaria elephantipes.
fasciculata, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 801.—Ind. or.
fastigeata, *C. Gay, Fl. Chil.* vi. 54.—Chili,
filiformis, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 22.—Java.
filiformis, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 44 = Grisebachii.
filipendula, Domb. ex Kunth, Enum. PI. v. 341 = humuusa.
floribunda, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 391.—Mexic.
fodinarum, *Kunth, Enum. PI.* v. 405.—Bras,
fracta, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 44.—Bras,
furcata, *Griseb. I. c.* 45.—Bras.
Galeottiana, *Kunth, Enum. PI.* v. 409.—Mexic.
galipanensis, *Klotzsch, ex Kunth, 1. c.* 417.—N. Granat.

DIOSCOKEA:-
glabra, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 804.—Ind. or.
glabra, Wall. Cat. n. 5106 D, E-oppositifolia.
glabra, Wall. 1. c. n. 5105 B = laurifolia.
glandulosa, *Klotesch, ex Kunth, Enum. PI.* v. 352.—Bras.
glauca, Muhl. ex Beck, Bot U. St. 855=qnaterata.
globosa, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 797.—Ind. or.
Goeringiana, *Kunth, Enum. PI.* v. 402.—Japon.
goyazensis, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 41.—Bras.
gracilis, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 48.—Chili,
gracillima, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 160.—Japon.
grandiflora, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Bros. ix. II. (1842) 392 = Galeottiana.
grandiflora, *Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 28.—Am. trop.
grandifolia, *Schlecht. in Linnaea,* xvii. (1843) 602.—Mexic.
Grisebachii, *Kunth, Enum. PI.* v. 853.—Bras.
Haenkeana, *Presl, Rel. Haenk.* i. 185.—Peruv.
hastate, *Mill. Gard. Dict.tA.* VIII. n. 2.—Am. austr.
hastata, Presl, Rel. Haenk. i. 133=Preslii.
hastata, *Veil. Fl. Flum. x.* t 126 (quid ?).—.Bras,
hastifolia, *Nees, in Lehm. PI. Preiss.* ii. 33.—Austral.
hebantha. Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 39 =dodecaneura.
hederaeea, Miers, Trav. ii. 531 - bryoniaefolia.
hederifolia, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 42.—Bras.
helidfolia, *Kunth, Enum. PI.* v. 348.—Chili.
heptaneura, Veil. Fl. Flum. x. t. 124=lutea.
heterophylla, Poepp. Fragm. Syn. 11 = arenaria.
heterophylla, Roxb. Hort. Beng. 72; Fl. Ind. iii. 804 = sativa.
heteropoda, *Baker, in fount. Bot.* xx. (1882) 270.—Madag.
hexagona, *Baker, I. c*—Madag.
hexaphylla, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 89.—Am. bor.
hirsuta, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 21.—Ind. or. ; Malaya.
hirsuta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 6103=spinosa.
hirsuta, *Mart, if Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 391.—Mexic.
hirtiflora, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 537.—Afr. trop.
hispida, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 83 = cylindrica.
humifnsa, *Poepp. Fragm. Syn.* 12.—Chili,
humilis, *Bert, ex Colla, in Mem. Ace. Tor.* xxxix. (1886) 12. t. 61.*1* 2.—Chili.
Hurchucia, Buch.-Ham. ex WaH. Cat. n. 5107 = alata.
intermedia, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* 826.—Zeylan.
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 151.—Japon.
japonica, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6107=alata.
japonica, Hort. ex Loud. Encyc. PI. Suppl. ii. 1541 = divaricata.
kamoonensis, *Kunth, Enum. PI.* v. 895.—Reg. Himal.
Kegeliana, *Griseb. in Linnaea, xA.* (1848) 279.—Guiana.
Kleiniana, Kunth, Enum. PI. v. 894=pentaphylla.
Lacerdaei, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 81.—Bras.
lanata, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 96 =spinosa.
latifolia, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 536.—Afr. trop.
laurifolia, *Wall. Cat.* n. 5111.—Ins. Penang.
laxiflora, *Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.32,—Bras.
laxiflora, Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 606 = remotiflora.
Leiboldiana, *Kunth, Enum. PI.* v. 355.—Mexic.
leptostachya, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 534.—Bras,
leonensis, G. *Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 690.—Afr. trop.
linearis, *Colla, in Mem. Ace. Tor.* xxxix. (1836) 11. t. 61. f. 1.—Chili.
linearis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 261.—Cuba,
litoralis, *Phil, in Linnnea,* xxix. (1867-68) 64.—Chili.
longifolia, *Phil. 1. c.* xxxffi. (1864-65) 254.—Chili,
longifolia, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 89.—Am. bor.

DIOSCOREA :-

lucida, R. Br. Prod. 295 (=Roxburghiae sp.).—Austral.
lunata, Roth, Nov. PI. Sp. 370=pentaphylla.
Luschnathiana, *Kuntk, Eratm. PI.* v. 361.—Am. tiop.
lutea, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 282.—Guian.
luzonensis, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 444.—Ing. Pbilipp.
macrocarpa, Wall. Cat n. 5100=daemona.
macrophylla, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 892=macrostachya.
macrostachya, *Benth. PI. Hartw.* 73.—Mexic.
macrostachya, Mart. & Gal. in Ball. Acad. Brax. ix. II. (1842) 392=capillaris.
marginata, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 37.— Bras.
Martiana, *Griseb. I. c.* 44.—Bras.
martinicensis, Spreng. Neue Entdeck. iii. 17 = ***altissima.***
maynensis, *Kunth, Enum. PI.* v. 357.—Bras,
megalantha, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 828.—Reg. Argent,
megalobotrya, *Kunth V R. Schomb. ex Kunth, Enum. PI.* v. 365.—Guiana.
megaptera, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 88.—Am. bor.
meridensis, *Kunth, Enum. PI.* v. 334.—Am. anstr.
micrántha, *Kunth, I. c.* 327.—Bras,
microbotrya, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 322.—Reg. Argent.
microphylla, *Steud. Norn.* ed. II. i. 511.—Chili,
modesta, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 256.—Chili.
mollis, *Kunth, Enum. PI.* v. 369.—Bras,
mollissima, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 21.—Malaya,
monadelpha, *Griseb. in Kjoeb. Videnst. Meddel.* (1875) 164.—Bras.
montana, Spreng. Syat. iv. Cur. Post. 143 = Testudinaria sylvatica.
mnltiflora, *Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 35.—Bras.
mnltiflora, *Presl, Bot. Bemert.* 116.—Ins. Martinic.
multiloba, *Kunth, Enum. PI.* v. 376.—Afr. austr.
multinervis, *Benth. PI. Hartw.* 52.—Mexic.
myriantha, *Kunth, Enum. PI.* v. 382.—Ins. Philipp.
nana, *Poepp. Fragm. Syn.* 12.—Chili.
nana, Schlecht in Linnaea, xviii. (1844) 112= mnltinervis.
narcotica, Steud. Norn. ed. II. i. 611 <= daemona.
nepalensis. *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 522, nomen.—Reg. Himal.
novemloba, *Steud. ex Phil./. Cat. PI. Vase. Chil.* 286, nomen.—Chili.
munmnlaria, *Lam. Encyc.* iii. 231.—Ins. Molucc.
obtusifolia, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 48.— Chili.
Olfersiana, *Klottsch, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* UL I. 38.—Bras,
oligophylla, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65)255.—**Chili.**
opposita, Thunb. Fl. Jap. 151 =-oppositifolia.
opposition, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 46.— Bras.
oppositifolia, *Linn. Sp. PI.* 1083.—Ind. or.
ovata, *Veil. Fl. Flum.* x. t. 117.—Bras.
Ovinala, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 269.—Madag.
pachycarpa, *Kunth, Enum. PI.* v. 870.—Bras,
pallens, *Schlecht. in Linnaea,* xvii. (1843) 610.—
palmata, *Juss. ex Pers. Syn.* ii. 621.—Am. austr.
paniculata, Michx. Fl. Am. Bor. ii. 289=villosa.
papillaris, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 801.—Ins. Philipp.
parviflora, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 257.—Chili
pedicellate, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 540.—Chili.
peltata, *Pers. Syn.* ii. 621.—Zeylan.
pendula, *Poepp. ex Kunth, Enum. PI.* v. 367.— Bras.
pentaphylla, *Linn. Sp. PI.* 1032.—As. trop.
pentaphylla, Wall. Cat. n. 5098 E=kamoonensis.
perforata, *Bert, ex Spreng. Syst.* ii. 152.—Ins. Guadalup.
pilosiuscnla, *Bert. I. c.*—Ins. S. Doming.
piperifolia, Hort. ex Griseb. in Mart Fl. Bras. iii. I. 42 •= polygonoides.
piperifolia, *Humb. V Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 795. —Am. austr.

DIOSCOREA:—

piperifolia, Klotzsch, ex Kunth, Enum. PL v. 354 = caracasana.
Pirita, *Nadeaud.Enum. PI Tahiti,* 35.—Ins. Tahiti
Poeppigii, *Kunth, Enum. PI.* v. 865.—Bras.
Pohlli, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iU. I. 35.—Bras,
polygonoides, *Humb. (f Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 795.—Am. trop.
polygonoides, Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 398=pallens.
polystachya, *TUTCB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. vil. 158.—China,
praehensilis, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 536.—Afr. trop.
Preslü, *Steud. Norn.* ed. II. i. 511.—Mexic.
propinqua, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 359.— Mexic.
pruinosa, *Kunth, Enum. PI.* v. 338.—Am. bor.
pnbera, *Blume, Enum. PL Jav.* i. 21.—Ins. Molucc.
pubescens, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 137.—Guian.
pulcheUa, Roxb. Hort. Beng. 72; FL Ind. iii. 801 = sativa.
Pumilio, *Griseb.in Kjoeb. Vidensk. Meddel.(1876)* 162. —Bras.
punctata, R. Br. Prod. 294 = transvena.
purpurea, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 799.— Ind. or.
pusilla, Hook. Ic. PI. t 678=hnmilis.
pyrenaica. *Bub. V Bordère, ex Gren. in Bull. Soc. Bot. FT.* xiii. (1866) 382.—Mont. Pyren.
pyrifolia, *Kunth, Enum. PI.* v. 384.—Burma; Malacca.
Quartiniana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 316.—Abyssin.
quatemata, *7. F. Gmel. Syst.* 581.—Am. bor.
quinata, J. F. Gmel. L c—villosa.
quinqueloba, *Thunb. Fl. Tap.* 150.—Japon.
quinquelobata, Veil. Fl. Flum. x. t. 128 = articulata.
remotiflora, *Kunth, Enum. PI.* v. 409.—Mexic.
repanda, *Blume, Enum. PI. Jan.* i. 22.—Java,
repanda, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 89.—Am. bor.
reticulata, *C. Gay, Fl. ChilM.* 61.—Chili,
retusa, *Mast, in Gard. Chron.* (1870) 1149.—Afr. austr.
riparia, *Kunth (f R. Schomb. ex Kunth, Enum.. PI.* v. 364.—Guiana.
rotundata, Poir. Encyc. Suppl. iii. 189=cayenensis.
rubella, *Roxb. Hort. Beng.* 72; *Fl. Ind.* iii. 798.— Ind. or.
rubiginosa, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 538.—Afr. trop.
rubricaulis, *Kunth, Enum. PI.* v. 368.—Peruv.
Ruiziana, *Klottsch, ex Kunth, I. c.* 874.—Peruv.
rumicoides, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 42.— Bras.
rupicola, *Kunth, Enum. PI.* v. 378.—Afr. austr.
sagittata, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 189.—Guiana,
salicifolia, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 23.—Java,
samydea, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 83.—Bras,
sapindioides, *Presl, Ret. Haenk.* i. 133.—Mexic.
sativa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 551 = fasciculata.
sativa, Bowdich, Excurs. Mad. 115—Tamus edulis.
sativa, Gaertn. Fruct. i. 66 = pruinosa.
sativa, Hort. Par. ex Lam. Encyc. iii. 231-villosa.
sativa, *Linn. Sp. PI.* 1038.—Reg. trop.
sativa, linn. 1. c partim=spinosa.
sativa, Rodsch. Obs. 67 = lutea.
sativa, Sieber, ex Presl, in **Oken,** Isis, xxL (1828) 275 = Anredera spicata.
sativa, Willd. ex Kunth, Enum. PI. v. 336 - quatemata.
saxatilis, *Poepp. Fragm. Syn.* 11.—Chili,
scabra, *Humb. If Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 794.— Venezuela.
scandens, Kunze, ex Kunth, Enum. PL v. 850 = brachybotrya.
Schimperiana, *Hochst. ex Kunth, I. c.* 339.—Abyss.
Schlechtendalii, Kunth, 1. c. 411 = multinervis.
Schomburgkiana, *Kunth, ex Schomb. Faun, et Fl. Gut.* 899, nomen.—Guiana.
scorpioidea, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 170.—Cuba.
septemloba, Hort. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 46 = sinuata.
septemloba, *Thunb. Fl. Jap.* 149.—Japon.
septemnervis, *Veil. Fl. flum.* x. t. 119.—Bras.
Sieberi, Kunth, in Abh. Acad. Berl. (1848) 58 = multiflora, *Presl.*
silvestris, *Veil. Fl. Flum.* x. 1.118.—Bras,
sinuata, *Veil. I. c.* 1129.—Bras,
sororia, *Kunth, Enum. PI.* v. 858.—Bras.

DIOSCOREA:—

sparsiflora, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 860.— Mexic.
spicata, *Roth, Nov. PI. Sp.* 371.—Ind. or.
spiculata, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 22.—Malaya,
spiculiflora, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 361.— Mexic
spinosa, *Roxb. ex Wall. Cat.* n. 5103.—Ind. or.
spinosa, Wall. 1. c. 5103 G, H = anguina.
stenocolpus, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 258.—Chili.
subhastata, Veil. Fl. Flum. x. t. 121-piperifolia.
Swinhoei, Rolfe, in Journ. Bot. xx. (1882) 359 = doryphora.
syringaefolia, *Kunth V R. Schomb. in Schomb. Faun. et Fl. Gut.* 1119, nomen.—Guiana.
tamifolia, Salisb. Parad. Lond. t. 17 = bulbifera.
tamoidea, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 42.—Cuba,
tenella, *Phil. Fl. Atac.* 51.—Chili,
lenuiflora, *Schlecht. in Linnaea,* xvii. (1843) 608.—Mexic.
tenuipes, *Franch.* to[1] *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 523.— Japon.
teretiuscula, Hort ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. 48 = Rajania brasiUensis.
teraata, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 158. —Bras.
tiliaefolia, Kunth, Enum. PI. v. 401 = spinosa.
tomentosa, *Hoken. ex Kunth, I. c.* 391.—Ind. or.
tomentosa, *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* [105]; *Fl. Indii.* 805.—Ind. or.
tomentosa, *Spreng. Pugill.* ii. 92.—Ind. or.
toxicaria, *Boj. Hort. Maurit.* 352.—Afr. trop.
trachyandra, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (187$) 165.—Bras,
trachycarpa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 274.— Guiana.
transversa, *R. Br. Prod.* 296.—Anstral.
triandra, Hort. ex Griseb. in Mart Fl. Bras. iii. I-[43] =sativa.
trichantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 271-—Madag.
trifida, *Linn./. Suppl.* 427.—Guiana,
trifoliate, *H. B.* 6* *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 275.—Venezuela.
tri/oliata, Mor. ex Kunth, Enum. PL v. 417 = gal'P»-nensis.
tri/oliata, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (17»«) ed. I. Art. IV. 13=hir>uta, *Blume.*
trilinguis, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (187»; 163.—Bras.
triloba, Karst. ex Kunth, Enum. PL v. 418=trifoliata.
triloba, *Lam. Encyc.* iii. 234.—Guian.
triloba, Willd. Sp. PL iv. 791 = trifida.
trinervia, Roxb. ex Wall. Cat. n. 5099=daemona.
triphylla, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 799=hirsnta.
triphylla, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 5099=daemona.
triphylla. Linn. Sp. PL 1032 = pentaphylla.
triphylla, Herb. Russ. ex Wall. Cat. n. 5001=tomentosa, *Koen.*
triphylla, *Schimp. ex Kunth, Enum. PI.* v. 436.— Abyss.
tuberosa, Veil. Fl. Flum. x. t. 125=Rajaniabrasiliensi[b].
**tubulosa, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1[8,D]; 154.—Bras.
Tugui, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 800 = fasciculata.
Tunga, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5107 »*»«»«•
undecimnervis, Veil. Fl. Flum. x. t. 120=glandulos»-
urophylla, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii-[s61] P&n&ma.
variifolia, *Bert, in Merc. Chil.n.* xiu. p. 612; *ex CoU»>* *in Mem. Ace. Tor.* xxxix. (1836) 12.—Chili,
variifolia, *Kunte, in Linnaea,* xx. (1847) 12.—Bra*
versicolor, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. SlOe^sati**
verticillata, *Lam. Encyc.* iii. 231.—Java.
Vespertilio, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 538.—Afr. W
vilis, *Kunth, Enum. PI.* v. 400.—Java,
villosa, *Linn. Sp. PI.* 1038.—Am. bor.
villosa, Willd. ex Kunth, Enum. PL v. 418 = trifoliata.
virosa, Wall. Cat. n. 6099=daemona.
vittata, *Bull, ex Baker, in Bot. Mag.* t. 6409. —Am. trop.
Volckmanni, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 255. —Chili.
vulgaris, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 572=alata.
Waltheri, Desf. TabL ed. II. 269= villosa.
Zollingeriana, *Kunth, Enum. PI.* v. 384.—J«v»-

DIOSMA, Linn. Syst. ed. I (1785). *RVTACEAE*, Benth. *&c* Hook. f. i. 289.
abietina, D. Dietr. Syn. PL i. 829 = Euchaetis glomerata,
"cicularis, Salisb. Prod. 142 = oppositifolia.
acmaephyUa, Eckl. & Zeyh. Enum. 849 = aspalathoides.
"cuminata, DC. Prod. i. 716 = Agathosma imbricata.
acuminata, Lodd. Bot. Cab. t. 493 = Adenandra uninora.
"cuta. Lee, ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 182 = Agathosma cuspidata.
oliq, Thnnb. Prod. PL Cap. 84 - Coleonema album.
*<*ptna*, D. Dietr. Syn. PL i. 828 = Barosma alpina.
«ungua, BartL & WendL f. Diosm. 42 = oppositifolia.
amlngua, Eckl. & Zeyh. Enum. 108 = aspalathoides.
"wfafaa, Drige, ex Presl, Bot. Bemerk. 81 = macrosticta.
ambigua, Lodd., Bot., Cabi t. 461 = Agathosma ambigua.
amoet, *Lodd. /.* c. t 161.—Afr. anstr.
"Ututifblia, Hort. ex Hook. Bot. Mag. sub t. 3340= ^•oleonema pulchrnm.
opiculata, Spreng. Syst. i. 787-Agathosma pilifera.
ooattea, Lour. Fl. Cochinch. i. 161 (= Pseudiosma ?). —Cochinch.
Mpalathoides, *Lam. Encyc.* ii. 286.—Afr. austr.
barbata, Ber & ex Harv. * Sond. Fl. Cap. i. 489 = Macrostylis villosa.
barbata, DC. Prod. i. 715 = Macrostylis lanceolata.
barbigero, Linn. f. Suppl. 155 = Macrostylis barbigera.
barbigera, Thunb., Prod, H- Cap, 4 = Macrostylis lanceolata.
betulina, T1,unb_ L «• = Barosma betnlina.
bifida, Jacq. 278, t- 20- I- i" Agathosma bifida.
bifurca, Willd. Sp. Pl. i. 1136 = Agathosma bisulca.
biseriata, Spreng. Syst. i. 784 = Adenandra biseriata.
bisulca, Thunb. Prod. Pl. Cap. 84 = Agathosma bisnlca.
brachyphylla, D. Dietr. Syn. Fl. i. 828 = Adenandra brachyphylla.
brevifolia, Um_ ^^cyc. ii. 285 = Agathosma erecta.
bruniades, Link, Enum. Hort. Berol. i. 287=Agathosma cuspidata.
Buc, HorL Berol_ ex Rege 1! Ind_ Sem. Hort. Petrop. U885) 51 = Adenandra umbellatat
calycina, Steu,,iD Flora> ,,,,(1880 ^ M9=rColeonenla p Sdi.rum.
cap ?", Linn_ Mant_ ,,• 84S, Agathosma hispida.
P'tata, Linn. 1. c. 210 j Thunb. Prod. PL Cap. 43 = Cerebandninia capitata.
cerefolia, Vent, JOrA Malm_ 9St_ 93 = Agathosma Cerefolium.
ciliata, fam. Ency^ «• 287-Agathosma pubescens.
ciliata, Linn. Sp. P1_ 198-Agatnosma ciliata.
ciliata, Thunb. Prod. PL C_ ap. 43 = Agathosma platypetala.
"22'**. Lam. Encyc. ii. 289 = Adenandra uniflora.
circinata, Man, Enum, Hort, Erkn e- 67=Agathosma imbricata.
coriacea, DC. P«*.S- 713 = Adenandra coriacea.
corymbosa, Montin. in Phys. S&llsk. Handl. i. (1776) 106 = Agathosma vHlos*
crassifolia, Hoffm K- Verz. Pfl. 57 = succulenta J
crenata, Linn crenulata. " SysL Nat- ^ X„ „# 9*o„Barosma
crenata, Lod Bot_ Cab_ v-1. 404=Barosma betulina.
crenulata, Linn_ Cent_ P1_ ,,• H = Barosma crenulata.
cupressina, *Li*"- *Mant.* i. 50.—Afr. austr.
cuspidata, Thunb. in HoffTm. Phytogr. Blaetter, i. (180-, 2*=Linconia cnspidata.
decussata, Jf E. ncyc. 283=succulenta.
depressa, Eckl. & Zeyh. E"II,,1- 108 = aspalathoides.
deusta, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i. (1803) *&*«?* « thermifolia
<iioica, S61^- Desc_ P1_ Ca P- 63=cupressina.
lata, Ver-^awl. in BoL Reg. t. 602 = Barosma lanceolata.
d big, Seng. exs end in Flora, xiii. (1830) 548 = Agathosma gnidioides.
Ecklooniana, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 375.—Afr. austr.
elata, D. Die? . Sa P1_ 829 = Euchaetis data.
ensata, Thunb. Prod> PL Ca P- *3 = Empleururr serrulatum.
erecta, DC. Prod. i. 715=Agathosma erectt.

DIOSMA:—
eriantha, Steud. in Flora, xiii. (1830) 550 •> Agathosma Schlechtendalii.
ericaefolia, Andr. Bot. Rep. t 451 = oppositifolia.
ericoides, Lam. Encyc. ii. 285 - aspalathoides.
ericoides, *Linn. Sp. PI.* 198.—Afr. austr.
ericoides, Sims, Bot. Mag. t. 2332 = oppositifolia.
ferulaeea, Hort. Kew. ex Harv. *&c* Sond. Kl. Cap. i. 376=teretifolia.
foetidissima, Spreng. Syst. i. 785 = Barosmafoetidissinia.
flavescens, *Oliver, in Hook. Ie. PL* t. 1476.—Afr. austr.
flexilis, D. Dietr. Syn. PI. i. 829 = Euchaetis flexilis.
fragrans, Sims, Bot. Mag. t. 1519 = Adenandra fragrans, *Rocm. V Schult.*
glabrata, G. F. W. Mey. ex Bartl. *&c* Wendl. f. Diosm. 82 = oppositifolia.
glandulosa, Hort. ex Bartl. & Wendl. f. 1. c. 110 = Barosma ovata.
glandulosa, Thunb. Diss. Diosm. 16 - Agathosma glandulosa.
glomerata, E. Mey. ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 16 = Euchaetis glomerata.
gnidioides, D. Dietr. Syn. PL i. 829 = Agathosma gnidioides.
grandiflora, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 6.—Afr. austr.
graveolens, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. v. 461 = Barosma pulchella.
hirsuta, Linn. Sp. PL 198 — oppositifolia.
hirta, Lam. Encyc. ii. 286=Agathosma hirta.
hirta, Vent. Jard. Malm. t. 72 = Agathosma Ventcnntiana.
hispida, Hort. Angl. ex Bartl. *&c* Wendl. f. Diosm. 159 = Agathosma Cerefolinm.
hispida, Hort. ex Bartl. *&c* Wendl. f. Diosm. 183 = Agathosma cuspida.
hispida, Thunb. Prod. PL Cap. 42 =• Agathosma hispida.
humilis, D. Dietr. Syn. PI. i. 828 = Adenandra humilis.
hybrida, Hort. Angl. ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 167 =Agathosma pubescens.
hybrida, *Spreng. Syst. i.* 787.—Afr. austr.
imbricata, Thunb. Prod. PI. Cap. 43 - Agathosma imbricata.
intermedia, D. Dietr. Syn. PI. i. 828 - Adenandra marginata.
juniperifolia, Salisb. Prod. 142 = oppositifolia.
juniperina, Moench, Meth. SuppL 26 = Coleonema album ?
juniperina, Spreng. Syst. i. 784=Coleonema jnniperifolium.
laevigata, Spreng. 1. c. = AcmadenH laevigata.
lanceolata, Linn. Sp. PL 198 ; Thunb. Prod. PL Cap. 48=Barosma lanceolata.
lanceolata, Spreng. Syst. i. 788 = Macrostylis lanceolata.
lancifolia, *F. W. Schmidt, Nette u. Selt. Pfl.* 87.—Hab. ?
lasiophylla, Spreng. Syst. i. 787=Agathosma villosa.
latifolia, Linn. f. Suppl. 154 = Barosma latifolia.
latifolia, Lodd. Bot. Cab. iii. t. 290 = Barosma crenulata.
laxa, Spreng. Syst. i. 787 = Agathosma villosa.
leiophylla, Spreng. 1. c. = Agathosma glabiata.
Lichtensteiniana, D. Dietr. Syn. PL i. 828=Adenandra cuspidata.
linearis, Eckl. *&c* Zeyh. Enum. 108=aspalathoides.
linearis, Thunb. Prod. PI. Cap. 48-Adenandra uniflora.
linifolia, DC. Prod. i. 715 = Agathosma linifolia.
linifolia, Hort. ex Bartl. *&c* WendL f. Diosm. 44 = longifolia.
linifolia, Lodd. Bot Cab. t. 400 = Barosma lanceolata.
longifolia, Eckl. *&c* Zeyh. Enum. 108=oppositifolia.
longifolia, Wendl. Coll. i. 61. t. 19 = oppositifolia.
lycopodioides, Willd. ex Rocm. & Schult. Syst v. 461 - Agathosma lycopodioides.
macrosticta, *Presl, Bot. Bemerk.* 81.—Afr. austr.
marginata.Linn. f. Suppl. 156•= Adenandra marginata.
Meyeri, D. Dietr. Syn. PL i. 828 = Adenandra cuspidata.
Meyeriana, Spreng. Syst i. 783=virgata.
Meyeriana, Steud. ex Harv. & Sond. FL Cap. i. 378 = Coleonema juniperifolium.
microphylla, Spreng. Syst. i. 787 — Barosma scoparia
mixta, Hort. Kew. ex Bartl. *&c* Wendl. f. Diosm. 182 = Agathosma cuspidata.
mundiaefolia, D. Dietr. Syn. PL i. 628 = Adenandra mundiaefolia.

DIOSMA:—
Myrsinites, Lam. Illnstr. ii. 82 = Agathosma ciliata.
myrtifolia, Hort. Angl. ex Bartl. *&c* Wendl. f. Diosm. 156 = Agathosma ciliata.
oblonga, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i. (1803) 23 - Barosma oblonga.
obtusa, DC. Prod. i. 714-Agathosma obtusa.
obtusa, G. F. W. Mey. ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 197 = Macrostylis squarrosa.
obtusata, Thunb. Prod. PL Cap. 84 •= Acmadenia juniperina.
obtusata, Willd. Sp. PI. i. 1134-Acmadenia obtusata.
obtusifolia, *Sond. in Harv. If Sond. Fl. Cap.* i. 377.—Afr. austr.
odorata, DC. Prod. i. 714 «• Barosma crenulata.
odoratissima, Montin, in Phys. SUlsk. Handl. i. (1776) 104 = Barosma latifolia.
oppositifolia, Drege, ex Presl, Bot Bemerk. 31 = Coleonema pulchrum.
oppositifolia, *Linn. Sp. PI.* 198.—Afr. austr.
oppositifolia, Roem. *&c* Schult. Syst. v. 457-succulenta.
orbicularis, Hort. ex BartL *&c* WendL f. Diosm. 110 = Barosma ovata.
orbicularis, Thunb. Prod. PI. Cap. 84 = Agathosma orbicularis.
ovata, Lodd. ex Bartl. *&c* Wendl. f. Diosm. 80 = Adenandra amoena.
ovata, Thunb. Prod. PL Cap. 43= Barosma ovata.
pallida, Salisb. Prod. 142 - oppositifolia.
parviflora, Willd. ex Roem. *&c* Schult. Syst. v. 402 = Agathosma parviflora.
parvifotia, Harv. *&c* Sond. Fl. Cap. i. 588, Index- Agathosma parviflora.
passerinoides, *Steud. in Flora*, xiii. (1830) 549.—Afr. austr.
patula, Spreng. Syst i. 786 - Agathosma patula.
pauciflora, D. Dietr. Syn. PL i. 829 - Barosma pauciflora.
pectinata, Thunb. Prod. PL Cap. 84 = oppositifolia.
perforata, Lam. Illustr. ii. 82 = Agathosma perforate.
pilifera, Steud. in Flora, xiii. (1830) 549 - Agathosma pilifera.
pinifolia, [Fisch.] Hort. Gorenk. ed. I. (1808) 94 = oppositifolia.
prolifera, DC. Prod. i. 715; Spreng. Syst. i. 786- Agathosma prolifera.
puberula, Steud. in Flora, xiii. (1830) 643 - Agathosma gnidioides.
pubescens, Thunb. ex Harv. *&c* Sond. Fl. Cap. i. 432 = Agathosma ericoides.
pubescens, Thunb. Prod. PL Cap. 43 = Agathosma villosa.
pulchella, Houtt. Handleid. iii. 326-Barosma ovata.
pulchella, Linn. Syst. ed. X. 940 - Barosma pulchella.
punctata, Licht in Roem. & Schult. Syst. v. 461- Barosma ovata.
pungens, Spreng. Syst. i. 784=Acmadenia pungens.
purpurea, Desf. Tabl. ed. II. 180 = Agathosma Ventenatiana.
purpurea, Hort. ex Bartl. & WendL f. Diosm. 163 -- Agathosma villosa,
ramosissima, *Bartl. &* Wendl. f. I. c.* 48.—Afr. austr.
recurva, Cham, in Linnaea, v. (1880) 51=ericoides.
reflixa, Lodd.ex DC. Prod. i.716-Agathosmareflexa.
reflexa, Soland. ex Harv. *Be* Sond. Fl. Cap. i. 419=. Agathosma imbricata.
rigidula, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 12 = succulenta.
rosmarinifolia, Lam. Encyc. ii. 286 = Adenandra marginata.
rotundifolia, D. Dietr. Syn. PL i. 828 = Adenandra rotundifolia.
rubra. Berg. Desc. PL Cap. 62-Coleonema album.
rubra, Hort. ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 168 = Agathosma villosa.
rubra, Linn. Sp. PL 189=oppositifolia.
rufescens, Spreng. Syst. i. 787 =» Agathosma rubra.
rugosa, Donn, ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 81 = Adenandra umbellate.
rugosa, Hort Angl. ex BartL & Wendl. f. 1. c. 1U2 =Agathosma villosa.
rugosa, Thunb. Prod. PL Cap. 48 - Agathosma pubescens.
rugosa, Willd. ex Harv. & Sond. FL Cap. i. 425 = Agathosma ciliata.
scabra, Lam. Encyc. ii. 283 = succulenta.
scoparia, D. Dietr. Syn. PI. i. 829 = Barosma scoparia.

DIOSBLA:-
serpyllacea, DC. Prod. i. 715 = Agathosma serpyllacea.
serpyllifolia, Salisb. Prod. 142=ericoides.
serrata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 168 =• Celastras paniculata.
serrati/olia, Curt. Bot. Mag. t. 4 56-Barosma serratifolia.
Simsiana, Eckl. & Zeyh. Enum. 108 = oppositifolia.
spartii/olia, Stend. in Flora, xiii. (1830) 550 = Barosma scoparia.
speciosa, Sims, Bot. Mag. t. 1271=Adenandra umbellata.
spicata, DC. Prod. i. 715=Agathosma spicata.
squamosa, Willd. in Roem. & Schult. Syst. v. 462 = Agathosma sqnamosa.
squarrosa, Wendl. ex Bertl. *8c* Wendl. f. Diosm. 198 = Macrostylis squarrosa.
stenopetala, Steud. in Flora, xiii. (1880) 549 = Agathosma filipetala.
stenophylla, Spreng. Syst. i. 785 = Barosma angnstifolia.
stricta, Willd. ex Roem. & Schult Syst. v. 462 = Agathosma serpyllacea.
subulata, Wendl. Coll. i. SI. t. 8 = oppositifolia.
succulenta, *Berg. Desc. PI. Cap.* 68.—Afr. austr.
tenuifolia, Presl, Bot. Bemerk. 31=CoIeonema pulchrum.
tenuifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 258= oppositifolia.
tenuissima, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 12 = Agathosma erecta.
teretifolia, *Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol.* i. 287.—Afr. austr.
ternata, D. Dietr. Syn. PI. i. 829•=Barosma ternata.
tetragona, Hort. ex Bartl. & Wendl. *f.* Diosm. 26 = succnlenta.
tetragona. Linn, f. Snppl. 155 — Acmadenia tetragona.
Thunbergiana, Spreng. Syst. i. 786 •= Agathosma platypetala.
thymifolia, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 462 = Agathosma pubescens.
thy/rides, Willd. ex Roem. *8c* Schult. 1. c. = Agathosma erecta.
thyrsophora, Eckl. & Zeyh. Enum. 107=ericoides.
tomentosa, Lee, ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 168 = Agathosma pubescens.
uitenhagensis, D. Dietr. Syn. PI. i. 827 = oppositifolia ?
ulicina, Lodd. Cat (1824) = Acmadenia juniperina.
umbellata, Hort. ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 81 = Adenandra umbellata.
umbellata, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i. (1803) 24 = Agathosma bifida.
undulata, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 132.—Afr. austr.
unicapsularis, Linn. f. Suppl. 155 = Empleurum serrulatum.
uniflora, Linn. Sp. PI. 198 = Adenandra uniflora.
ustulata, *Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter,* i. (1803) 25.—Afr. austr.
Ventenatiana, Spreng. Syst i. 786 = Agathosma Ventenatiana.
venusta, D. Dietr. Syn. PI. i. 829 = Barosma venusta.
vestita, DC. Prod. i. 715; Spreng. Syst i. 787 = Agathosma imbricata.
villosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 43 =- Macrostylis villosa.
virgata, Hort. ex Bartl. & Wendl. f. Diosm. 145 = Agathosma imbricata.
virgata, *Lam. Encyc.* ii. 286.—Afr. austr.
virgata, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 378 = Coleonema juniperifolium.
virgata, *G. F. W. Mey. ex Bartl.* b* *Wendl. f. Diosm.* 46. —Afr. anstr.
virgata, Thunb. Prod. PI. Cap. 84 = Agathosma virgata.
viscida, D. Dietr. Syn. PI. i. 828=Adenandra viscida.
vulgaris, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 200 = oppositifolia.
Wendlandiana, DC. Prod. i. 716=Agathosma villosa.

DIO8PTBO8,Linn.Gen.ed.I,143 1737). *EBENACEAE,* Berth. & Hook. f. ii. 665.
CARGILLIA, R. Br. Prod. 526 (1810), partim.
CAVANILLEA, Desr. in Lam. Encyc. iii. 663 (1789).
DACTYLIJS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. xxxvi (1775).
DANZLERIA, Bert, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 224 (1844).
EMBRYOFTERIS, Gaertn. Fruct i. 146. t 29 (1788).

DIOSPYBOS:—
GUNISANTHUS, A. DC. in DC. Prod. viii. 219 (1844).
LEUCOXYLUM, Blume, Bijdr. 1169 (1826).
MABOLA, Rafin. Sylva Tellur. 11 (1838).
NOLTIA, Schum. in Danske Selsk. Afh. iii. (1827) 209 (Beskr. PI. Guin. 189).
PARALEA, Aubl. PI. Gui. i. 576. t. 231 (1775).
FATONIA, Wight, Illustr. i. 19 (1838), partim.
PERSIMON, Rafin. Sylva Tellnr. 164 (1838).
ROSPIDIOS, A. DC. in DC. Prod. viii. 220 (1844).
acapulcensis, H. B. & K. Nov.. Gen. et Sp. iii. 264 = Maba acapulcensis.
acuminata, Wall. Cat n. 4129 { = *Cylicodaphne myristicaefolia).*—Ind. or.
acuta, *Thw. Enum. PL Zeyl.* 182.—Zeylan.
affinis, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 169=opaca.
affinis, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 179.—Ind. or.
aliens, Presl, Rel. Haenk. ii. 62 « Maba albens.
ambigua, Vent. Jard. Malm. t. 17 = Royena ambigua.
amoena. Wall. Cat. n. 4189 •= lanceaefolia.
amplexicaulis, LindL & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 11. n. 271. *t.* 139 = leucomelas.
angulata, Poir. Encyc. v. 434=nodosa.
angnstifolia, Audib. ex Spach, Hist. Veg. Phan. ix. 405=virginiaDa.
anonaefolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 227.—Ins. Maurit.
apeibacarpos, *Raddi, in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 391.—Bras,
apiculata, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 186.—Ins. Penang.
argentea, *Griff. Notul.* iv. 288.—Malacca.
Arnottiana, Miq. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 428-Candolleana.
artanthaefolia, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 7. —Peruv.
assimilis,.Sa&. *Rep. Forest. Madr.* (1866-67) 20. t. 1. —Ind. or.
asterocalyx, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 193.—Borneo.
attenuata, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 182.—Zeylan.
aurea, *Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1865) 406.— Java.
auriculata, Wight, ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1878) 188=foliolosa.
australis, Hiern, 1. c. 54, 246 = D. Cargillia.
Barteri, *Hiern, I. c.* 187.—Afr. trop.
batocana, *Hiern, 1. c.* 174.—Afr. trop.
Beccarii, *Hiern, 1. c.* 204.—Borneo.
Bernieri, *Hiern, I. c.* 268.—Madag.
Berterii, A. DC. in DC. Prod. viii. 284 = Maba inconstans.
bicolor, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 184 = mespiliformis.
biflora, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 803.—Ins. Philipp.
Blancoi, A. DC. in DC. Prod. viii. 287 - discolor.
Boivini, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 194.—Madag.
bomeensis, *Hiern, 1. c.* 173.—Borneo.
Boutoniana, A. DC. in DC. Prod. viii. 236=nodosa.
bracteata, Roxb. Hort. Beng. [93]; FL .Ind. ii. 589 - montana.
Brandisiana, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 72.—Burma.
brasiliensis, Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 5 - D. Ebenaster.
Burchellii, *Hiern, in Journ. Bot.* xii. (1874) 240.—Bras,
burmanica, *Kure, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 73.—Burma.
buxifolia, Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1878) 218 = microphylla.
calophylla, *Hiern, 1. c.* 156.—Madag.
calycina, Audib. ex Spach, Hist. Veg. Phan. ix. 405 = virginiana.
calycina, Bedd. Fl. Sylv. t. 68 = foliolosa.
calycina, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 204 = D. Lotus.
canarica, Bedd. Forest. Man. Bot. 145; Ic. PI. Ind. Or. 28. t. 137-Candolleana.
Candolleana, Thw. Enum. PI. Zeyl. 181-=Thwaitesii.
Candolleana, *Wight, Ic.* t. 1221.—Ind. or.
Canomoi, A. DC. in DC. Prod. viii. 287 - mnltiflora.
capensis, A. DC. 1. c. 226=nodosa.
capitulata, Wight, Ic. t. 1224 - D . Chloroxylon.
capreaefolia, *Mart, ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 254.—Bras.

DIOSPYBOS:—
Cargillia, *F. Muell. Austr. Veg. Intercol. Exhib. Ess.* (1866-67) 35.—Austral.
caroliniana, Muhl. ex Rafin. Fl. Ludov. 139= virginiana.
Carthei, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 198.—Ins. Philipp.
cauliflora, *Blume, Bijdr.* 668.—Java.
cauliflora, Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 7=Maba cauliflora.
cayennensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 224.—Am. trop,
cerasifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 144 = Enrya symplocina.
chartacea, *Wall. Cat.* n. 4185, partim.—Burma.
chinensis, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 110 = D. Kaki.
Chloroxylon, *Roxb. PI. Corom.* i. 38. t. 49.—Ind. or.
Chrysophyllos, *Poir. Encyc.* v. 433.—Ins. Maurit
ciliata, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 229.—Mexic.
ciliata, Rafin. New Fl. Am. iii. 25= virginiana.
citrifolia, Wall, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 235-D. Embryopteris.
davigera, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 558.—Malacca,
coccolobaefolia, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 6.—Bras.
Commersonii, Gaertn. f. Fruct. iii. 186. t. 208 "* leucomelas.
comorensis, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 220.—Ins. Comoro.
concolor, Moench, Meth. 470 = virginiana.
conduplicata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 254 = Maba inconstans.
i *cordifolia,* Roxb. PI. Corom. i. 88. t. 50=montana.
coriacea, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 259.—Borneo.
costata, Carr. in Rev. Hortic. (1870) 184 = D. Kaki.
crassiflora, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 260.—Afr. trop.
crumenata, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 179.—Zeylan.
Cunalon, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 237.—Ins. Philipp.
cuneifolia, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 268.—Mexic.
cupulosa, F. Muell. Austr. Veg. Intercol. Exhib. Ess. (1866-67) 86 = Maba rufa.
cystopus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 584.—Sumatra,
dasyphylla, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (187D II. 71.—Burma.
decandra, Boj. Hort. Maurit. 200=D. Ebenum.
decandra, *Lour. Fl. Cochinch.* 227.—Cochinch.
decipiens, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 563.—Malacca.
Dendo, *Welvi. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 195.—Afr. trop.
densiflora, *Wall. Cat.* n. 4140.—Burma,
dictyonema, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* *"• (1873) 192.—Borneo.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 583.—Sumatra.
digyna, Hort. ex Loud. Encyc. Trees & Shrubs, 627' virginiana.
digyna, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 35. t. 313 = D-Ebenum.
dioica, Span. Ic. n. 23; ex Linnaea, xv. (1841) 336 = montana.
discolor, *Willd. Sp. PI.* iv. 1108.—Ins. Philipp.
distyla, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. n. 205 •» vtf-giniana.
diversifolia,/for», ih *Journ. Bot.* xiii. (1875) 363.^ Ins. Mascar.
dodecandra, *Lour. Fl. Cochinch.* 228.—Cochinch.
dubia. Wall. Cat. n. 4407=melanoxylon.
Ebenaster, Retz. Obs. Bot. fasc. v. 81 = D. Ebenum.
Ebenum, Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (187W 208, partim = assimilis.
Ebenum, *Koen. in Phys. Sdlsi. Handl.* i. (1776) «»• —Ind. or.; Malaya.
Ebenum, Poir. Encyc. v. 429 =tessellaria.
edulis, Lodd. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 270- *>' Ebenum.
ehretioides, *Wall. Cat.* n. 4187.—Burma.
elegans, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.* /*»• 571.—Reg. Himal.
emarginata, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* *"• (1873) 256.—Bras.
Embryopteris, Blanco, Fl. Filip. ed. II. »» discolor.

DIOSPYROS :—
Embryopteris, *Pers. Syn.* ii. 624.—Afr. trop.
eriantha, *C. B. Clarke, in Hook. Kent Journ.* iv. (1852) 302—Hong kong.
exasperata, Bedd. Fl. Sylv. t. 66=melanoxylon.
exsculpta, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1826) 110 = tomentosa.
exsculpta Doiz. & Gibs. Bomb. Fl. 142 = D. Tupru.
fasciculata, Mauritius, Mueller, Austr. Veg. Intercol. Exhib. Ess. (1866-67) 35 = Maba fasciculosa.
ferrea, Buch.-Ham. ex A. DC. Prod. viii. 238 = Embryopteris symplocina.
ferrea, Splitgerber ex Vriese in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1848) 327-D. Parilea.
filipendula, Hodgson, Catalogue ex Loudon Arboret. ii. 1197 = virgiliana.
filiformis, Vieillard in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 201—Burma: Malaya.
foemina, Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Syst iv. 39 = Eurya symplocina.
foliolosa, *Wall. Cat.* n. 4145—Ind. or.
frondosa, Wall. l. c. n. 4125 = Bocagea elliptica.
frutescens, *Blume, Bijdr.* 668—Java.
frutescens, Hassk. Pl. Jav. Rar. 467 = Horsfieldii.
fuliginosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 204—Ins. Philipp.
fuscovelutina, Hiern in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1878) 422.—Madag.
Gardneri, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 181—Zeylan.
gaultheriaefolia, *Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 5.—Bras.
geminata, Mueller, Austr. Veg. Intercol. Exhib. Ess. (1866-67) 35 = Mabageminatl
glabescens, Rottl. & Willd. Nye. Saml. Vidensk. Selsk. Skr. iv. (1802) 10. t. 5 = D. Ebenum.
glandulosa, Rottl. in Ges. Naturf. Neue Schr. iv. (1803) 221 = montana.
glomerata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 204—Ins. Philipp.
gonoclada, Baker, *in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 424.—Madag.
Goudotii, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 249.—N. Granat.
graciliflora, *Hiern, l. c.* 191.—Borneo.
gracilipes, *Hiern, l. c.*—Madag.
grandifolia, *Wall. ex* Roxb. *Hort. Beng.* 40; *Fl. Ind.* iii. 845> nomen.—Hab. ?
grata, *Wall. Cat.* n. 2142.-Reg. Himal.
guaiacana, Robin, Voy. Louis, iii. 417 = virginiana.
halesioides, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 168.—Cuba.
haplostylis, *Boiv. ex Hiern in Trans. Camb. phil. Soc.* xii. (1873) 189—Madag.
hebecarpa, Hiern in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 159.—Madag.
heterophylla, Gaertn. f. Fruct. ii. 478. t. 179-lencomelas.
hexasperma, Hasselt, ex Hassk. pl. jav. n. 853 = Maba elliptica.
hirsuta, Deaf. Ann. Mus. Par. vi. (1805) 447 = Royena hirsuta.
hirsuta, Wight, Ic. t. 1644; Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 198.—Malacca, Penang, Moonii, Thwaitesil Zeylan.
horsfieldii, Hiern in DC. Prod. viii. 236—Bras.
humilis, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 198.—Malacca.
incisa, Thunb. Fl. Jap. 167 = Kaempferi.
integrifolia, Roxb. Hort. Beng. 40; Wall. Cat. n. 4138 = montana.
kaki, Linn. f. Suppl. 439.—Japon.
kaki, Thunb. Fl. Jap. 167 = Kaempferi.
kirkii, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 199.—Afr. trop.
korthalsiana, *Hiern, l. c.* 168.—Borneo.
kuhlii, *Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xiv. (1857) 159.—Java.
kurzii, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 162.—Ins. Andaman, et Nicobar.
laevis, *Boj. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 232.—Madag.
lanceaefolia, *Roxb. Hort. Beng.* [93]; *Fl. Ind.* ii. 587.—Ind. or.; Burma.
lanceolata, Poir. Encyc. v. 434 = Maba lanceolata.
lanceolata, Wall. Cat. n. 4122 = D. Toposia.
lateralis, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 167.—Borneo.
laurifolia, A. Rich. Fl. Cnb. Fanerog. ii. 86 -=D. Ebenum.
laxa, Teijsm. *&c* Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 406<=truncata.
lencocalyx, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 267.—Madag.
leucomelas, *Poir. Encyc.* v. 432.—Ins. Mascar.
lobata, *Lour. Fl. Cochinch.* 227.—Cochinch.
longifolin. *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 7 = D. Faralea.
Lotus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 210 = multiflora.
Lotus, *Linn. Sp. PI.* 1057.—As. temp.
Lotus, Lour. Fl. Cochinch. 226 = Loureiriana.
Loureiriana, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 39.—Afr. trop.
lucida, Hort. ex Loud. Card. Mag. (1841) 394 = virginiana.
lucida, *Wall. Cat.* n. 4127—Malaya.
lycioides, Desf. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 448 = Royena pallens.
Lycopersicon, *Carr. in Rev. Hortic.* (1878) 470—Japon.
mabacca, *F. MueU. Austr. Veg. Intercol. Exhib. Ess.* (1866-67) 35.—Austral
Afabola, Roxb. Hort. Beng. 40; Wall. Cat. n. 4131 A = discolor.
macrocalyx, A. DC. in DC. Prod. viii. 226 = nodosa.
macrocalyx, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 182 = Loureiriana.
macrocarpa, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 242.—N. Caled.
macrocarpa, Korth. ex Hiem, 1. c. 168 — Korthalsiana.
macrophylla, *Blume, Bijdr.* 670.—Java.
macrophylla. Wall. Cat *n.* 4141 = undulata.
malabarica, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 1099 = D. Embryopteris.
Malacapai, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 237—Ins. Philipp.
Mannii, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 255.—Afr. trop.
maritima, *Blume, Bijdr.* 669.—Malaya; Austral,
martabanica, *C.B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 554.—Burma.
mauritiana, A. DC. in DC. Prod. viii. 226-nodosa.
Mazelii, *Thib.* 6* *Ketel. ex E. Morr. in Belg. Hortic.* xxiv. (1874) 111—Japon.
megasepala, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 423—Madag.
melanida, Ncraud, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 236 = leucomelas.
melanida, *Poir. Encyc.* v. 431.—Ins. Mascar.
melanida, Sieber, ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 261= discolor.
melanoxylon, Blume, Bijdr. 669 - truncate.
melanoxylon, Hassk. Cat. PI. Hort. Bogor. Alt. 159 = D. Embryopteris.
melanoxylon, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1878) 159, partim = D. Tupru.
melanoxylon, *Roxb. PI. Corom.* i. 36. L 46.—Ind. or.; Zeylan.
melanoxylon, Willd. Sp. PI. iv. 1109 =. D. Ebenum.
membranacea, A. DC. in DC. Prod. viii. 227 = D. Ebenum.
mcspiliformis, *Hochst. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 672—Afr. trop.
mexicana, Scheele, ex Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 238 = texana.
microcarpa, Siebold, in Ann. Soc. Hort. Fays-Bas (1844) 28 = D. Lotus.
microcarpa, *Span, in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 348—Ins. Timor,
microphylla, *Bedd. Forest. Man, Bot.* 14S; *Ic. PI. Ind. Or.* 27. t. 183—As. trop.
microrhombus, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 187—Ins. Borbon.
mollis, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 514 - ehretioides.
montana, Heyne, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 239 <= D. Tupru.
montana, *Roxb. PI. Corom.* i. 87. t. 48.—As. trop.
Moonii, Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873') 164 = D.Helferi?
Moonii, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 182.—Zeylan.
Morrisiana, *Hance, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 29!).—Hongkong.
multiflora, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 803.—Ins. Philipp.
multiflora. Wall. Cat. n. 4144=lanceaefolia.
myrmecocarpus, Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 7 = Maba myrmecocarpa.
Neraudii, A. DC. in DC. Prod. viii. 227 = nodosa.
nigra, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 211 = D. Ebenum.
nigricans, Daiz. in Hook. Kew Joum. iv. (1852; 110 = assimilis.
nigricans, *Wall. Cat.* n. 6351.—Reg. Himal.
nilagirica, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 144.—Ind. or.
nodosa, *Poir. Encyc.* v. 432.—Ins. Mascar.
oblonga, G. Don, Gen. Syst. iv. 40=venosa.
oblonga, *Wall. Cat.* n. 4124—Malaya.
obovata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 34 = tetrasperma.
obovata, Wight, Ic. t 1226 = Isonandra diplostemon.
obtusifolia, Bert, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 234' Maba inconstans.
obtusifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 253. t. 247 - D. Ebenum.
obtusifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1112—Am. austr.
octandra, Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 167=burmanica.
oleifolia, *Wall. Cat.* n. 4128—Burma; Malaya.
Olen, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 246.—Ins. Fiji.
oligandra, Bedd. Rep. For. Madr. (1867) 68=»Candolleana.
oocarpa, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 180.—Zeylan.
opaca, C. *B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 567-—Zeylan.
oppositifolia, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 181.—Zeylan.
orixensis, Klein, ex Willd. Sp. PI. iv. 407^sylvatica.
orixensis, *Wigkt,ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 264—Ind. or.
ovalifolia, *Wight, Ic.* t. 1227.—Ind. or.
ovalis, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. W.* (1878) 248—Bras,
pachyphylla, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 568.—Malacca.
Packmanni, *C. B. Clarke, I. c.* 564.—Burma,
paniculata, *Dale, in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 109.—Ind. or.
Paralea, *Steud. Nom.* ed. II. i. 614.—Guian.
parvifolia, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 217—Madag.
Pearcei, *Hiern, 1. c.* 252.—Am. trop.
pellucida, *Hiern, 1. c.* 209.—Ins. Philipp.
pendula, *Hasselt, ex Hassk. PI. Jan.* 468—Java,
penduliflora, *Zoll. in Tijdschr, Nederl. Ind.* xiv. (1857) 159—Java,
pentamera, *Woods V F. MueU. ex F. MueU. Austr. Veg. Intercol. Exhib. Ess.* (1868-67) 85—Austral,
perforate, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Sec.* xii. (1873) 243—Ins. Molucc.
pergamena, *Hiern, I. c.* 234.—Borneo.
Persimon, Wikstr. Jahresb. Bot. 1830 (1834) ed. Beilschm. 92, 96 = virginiana.
peruviana, *Hiern, in Trans. Phil. Camb. Soc.* xii. (1878) 258—Peruv.
Pervillei, *Hiern, I. c.* 192—Madag.
philippinensis, *A. DC. in DC Prod.* viii. 281.—Ins. Philipp.
phyllomegas, Steud. Nom. ed. II. i. 514-macrophylln
pilosa, *A. DC. 1. c.* 219.—Cochinch.
pilosanthera, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 304.—Ins. Philipp.
pilosiuscula, G. Don, Gen. Syst. iv. 39=pilosula.
pilosula, *Wall. Cat.* n. 4132.—Ind. or.
platycalyx, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 267—Ins. Seychelles,
platyphylla, *Hiern, 1. c.* 266—Afr. trop.
plectosepala, *Hiern, I. c.* 201—Borneo.

DIOSPYROS:—
Poeppigiana, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 224.—Bras,
polyalthioides, *Hiern, in Trans. Comb. Phil. Soc.* xii. (1873) 198.—Borneo,
polyandra, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 7. —Bras,
pruinosa, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 268.—Madag.
pruriens, *Dale, in hook. Km Journ.* iv. (1852) 110. —Ind. or.
Psendo-Lotcs, *Naud. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Sir. II. iii. (1880) 220.—Japon.
psidioides, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. **iii.** 254 = Maba inconstans.
Pterocalyx, Boj. Hort. Maurit 200=melanida.
pterocalycina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 124 = praec.
pubescens, Pers. Syn. ii. 625 = Royena hirsuta.
pubescens, Pnrsh, Fl. N. Am. Sept. i. 265 =virginiana.
punctata, Decne. Herb. Tim. Dec. 79=montana.
punctata, Korth. ex Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 136 = Maba punctata.
pyrrhocarpa, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 588.— Sumatra.
quaesita, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 179.—Zeylan.
racemosa, Roxb. Hort. Beng. 40; Fl. Ind. ii. 536 = D. Toposia.
ramiflora, *Roxb. II. cc.* 10 ; 535.—Ind. or.
retieulata, Sieber, A. DC. in DC. Prod. viii. 236 = leucomelas.
retieulata, Wall. Cat. 150. n. 4120 = D. Ebenum.
retieulata, Willd. Sp. PI. iv. 1109 = tessellaria.
revoluta, Poir. Encyc v. 435 = D. Ebennm.
rhodocalyx, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 71.—Siam.
rigida, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 257.—Borneo.
rotundiflora, *Hiern, 1. c.* 163.—Borneo,
rotundifolia, *Hiern. 1. c.* 181.—Afr. austr.
Roxburghii, Can. in Rev. Hortic. (1872) 253 ^-D. Kaki.
Roylei, Wall. Cat. n. 4134 = melanoxylon.
rubiginosa, Roth, Nov. PI. Sp. 385 ~D . Tnpru.
rubra, *Gaertn./. Fruct.* iii. 138 (sp. dub.).—Hab. ?
rugosula, R. Br. Prod. 526=montana.
salicifolia, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1112 = Maba salicifolia.
salicifolia, Willd. Sp. PI. iv. 1112="Maba acapnl-censis.
samoénsis, *A Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 326. —Ins. Navigator.
Sapota, Roxb. Hort Beng. 40; Fl. Ind. ii. 535 = D. Ebennm.
sapotanigera, DC. Ess. Prop. Med. PI. 200 « D. Kbenum.
sapotoides, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 88.—Bnrma.
Schi-Tse, Bunge, Ennm. PI. Chin. Bor. 42 = D. Kaki.
tenegalensis, *Pen.* ex A. DC. in DC. Prod. viii. 234 = mespiliformis.
scnensis, *Klotesch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 183.—Afr. trop.
sericea, A. DC. in DC. Prod. viii. 236 = Maba sericca.
seriocarpa, F. Muell. Anstr. Veg. Intercol. Exhib. Ess. (1866-67) 35 - Maba rufa.
serrata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. FL Nep. 143 = Enrya aenminata.
spedosa, Wood, Rep. For. Oodh. (1867-68) 33, nomen = D. Tupru.
sphaerosepala, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 423.—Madag.
spinosa, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 247.-Bras.
Sprncei, *Hiern, I. c.* 210.—N. Granat.
squamosa, *Boj. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 282.— Madag.
sqnarrosa, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 184.—Afr. trop.
ttricta, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 201 = elegans.
stricta, Hort. ex Loud. Encyc. Trees & Shrubs, 627 = virginiana.
stricta, *Roxb. Hort. Beng.* 40; *Fl. Ind.* ii. 539.— Ind. or.
subacuta, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 185.—Madag.
suberifolia, *Hiern, 1. c.* 189.—Chili,
snbrotata, *Hiern, 1. c.* 250.—Bras.

DIOSPYBOS:—
snmatrana, *Miq. PI. Jungh.* 203.—Malaya,
sylvatica, *Roxb. PI. Corom.* i. 38. t. 47.—Ind. or.
sylvatica, Wall. Cat. n. 4117=montana.
Tectona, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 609 = Tectona philippensis.
tesselaria, *Poir. Encyc.* v. 430.—Ins. Mascar.
tetrandra, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 210.—Guiana.
tetrandra, Span, in Linnaea, xv. (1841) 836 •= maritima.
tetrasperma, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 62.—Jamaic
texana, *Scheele, in Linnaea*, xxii. (1849) 145.—Mexic.
Teysmanni, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 583.—Sumatra.
Thouarsii, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 282.—Madag.
Thwaitesii, Bedd. Forest. Man. Bot. 144 ; Ic. PI. Ind. Or. 27. t 135-hirsuta.
timoriana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 1045-D. Ebennm.
tomentosa, Poir. Encyc. v. 436 = chloroxylon.
tomentosa, *Roxb. Hort. Beng.* 40; *Fl. Ind.* ii. 532.— Ind. or.
Toposia, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xv. (1827) 115.—Ind. or.
toxicaria, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 176.—Madag.
tricolor, *Hiern, 1. c.* 183.—Afr. trop.
truncata, *Zoll. (f Moritn, Syst. Vert. Zoll.* 43.—Java.
Tupru, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xv. (1827) ill.—Ind. or.
undulata, Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 215=lucida.
undulata, *Wall. Cat.* n. 4136.—Burma; Malaya.
vaccinifolia, Ettingsh. in Sitzb. Acad. Wien, xxviii. (1858) 494=vaccinioides.
vaccinioides, *Lindl. in Hook. Exot. Fl.* ii. 1.189.—China.
•*oaccinoides*, Wall. Cat. n. 4180=microphylla.
variegata, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 73.—Burma,
velutina, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 200.—Am. trop.
venosa, *Wall. Cat.* n. 4126.—Ins. Penang.
verrucosa, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 167.—Afr. trop.
Vescoi, *Hiern, I. c.* 218.—Madag.
virginiana, *Linn. Sp. PI.* 1057.—Am. bor.
Waldemarii, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 101 =mon tana.
Weddellii, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1878) 253.—Bras.
Wightiana, Wall. Cat. n. 4406 = melanoxylon.
xylopioides, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* vii. 8. —Guiana.
Zollingeri, *Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc.* xii. (1873) 222.—Java.

DIOSTEA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1870) 103. t. 28 ~Baillonia, Bocq. (Verbenac.).
filifolia, Miers, 1. c. 106.—Chili.
infuscata, Miers, 1. c. 107 =• B. juncea.
juncea, Miers, 1. c. 103. t. 28 ~B . juncea.
scirpea, Miers, 1. c. 107.—Chili.
scoparia, Miers, 1. c 104=Verbena scoparia, *Gill*, &" *Hook.*
stenophylla, Miers, 1. c 105.—Chili.
valdiviana, Miers, 1. c. 107—B. juncea.

DIOTACANTHUS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1100 (1876). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. 1. c.
albiflorus, *Benth. I. c.* 1101.—Ind. or.
grandis, *Benth. I.* c—Ind. or.

DIOTHOtfEA, Lindl. in Hook. Joum. Bot. i. (1834) 12. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 523.
GASTROPODIUM, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 107.
HEMISCI.ERIA, Lindl. Fol. Orch. (1858).
cottoniaeflora, *Reichb.f. in Linnaea*, xii. (1877) 39.—N. Granat.
gratissima, *Reichb. f. in Bot. Zcit.* x. (1852) 772.—Pernv.
heterothonaea, *Reichb.f. V Worse, in Bonplandia,* ii. (1854) 112.—Peruv.
imbricata, *Lindl. Sert. Orch.* 40. n. L—Mexic.
lloënsis, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* i (1834) 12.—Peruv.

DIOTHONEA:—
***oppositifolia,* Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 842 =** Hexisea oppositifolia.
suavis, *Reichb. f. V Warsc. in Bonplandia,* ii. (1864) 112.—Peruv.

DIOTI8, Desf. Fl. Atlant. ii. 260 (1798). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 420.
NEESIA, Spreng. Anleit. ii. u. 547 (1818).
OTANTHUS,Hoffmgg.& Link, Fl.Port. ii. 364(1809).
candidissima, *Desf. 1. c.* 261.—Europ. occ.; Reg. Mediterr.
maritima, Sm. Engl. Fl. iii. 403 =• candidissima.

DIOTIS, Schreb. Gen. 638 (1791)=**Eurotia,** Adans. (Chenopod.).
atriplicina, Spreng. Syst. iii. 886 =» Atriplex pedunculate.
atriplicoides, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 397= Atriplex pedunculata.
ceratoides, Willd. Sp. PI. iv. 368 -Eurotia ceratoides.
ferruginea,T. Nees, Gen. Germ. Ic f. 14-19 =»Eurotia ceratoides.
lanata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 602 = Eurotia lanata.
revoluta, Nutt ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 121 = Eurotia lanata.

DIOTOCARPUS, Hochst. in Flora, xxvi. (1848) 70 = Pentaniaia, Harv. (Rubiac.).
angustifolius, Hochst 1. c. 71=P. variabilis.
prunelloides, Hochst. 1. c. 70=P. variabilis.

DIOTOLOTUS, Tausch, in Flora, xxv. (1842) 284-Argyrolobium, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
Ecklonis, Tausch, 1. c—Afr. austr.

DIOTOSPERMA, A. Gray, in Hook. Kew Joum. W- (1852) 275 = Ceratogyne, Turci. (Compos.).
Drummondii, A. Gray, 1. c. 276 = C. obionoides.

DIOTOSTEMON, Salm-Dyck, in Otto ft Dietr. Allg-Gartenz. xxii. (1854) = Cotyledon, Tourn. (Cr»»-snlac).
Hookeri, Salm-Dyck, 1. c.—Mexic.

DIOTOSTEPHUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlviii. *H** (1827) = ChryBOgonum, Linn. (Compos.).
repens, Cass. 1. c. 544 =C. virginiannm.

DIOTOTHECA,Rafin. Fl. Ludov. 74 (1817) = **Seabio»>** Toum. (Dipsac).
repens, Rafin. Fl. Ludov. 75 (quid ?).—Am. bor.

DIOXIPPE, M. Roem. Syn. Hesper. 33, 45 (1846)* Glycosmis, Correa (Kutac).
chlorosperma, M. Roem. 1. c 45 = G. chlorospernia.
cyanocarpa, M. Roem. 1. c. 46 = G. cyanocarpa.

DIFANAX, Seem, in Joum. Bot. vi. (1868) l*0- ***ARALIACEAE.***
Manni, *Seem. I. c*—Ins. Sandvic.

DIPCADI, Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. *>:.*£' 431 (1790). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. w- »u *j.
POLEMANNIA, Berg, ex Schlecht. in Linnae». (1826) 250.
TRICHARIS, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 24 (1866).
UROPETALON, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 156 (1816).
ZUCCAGNIA, Thunb. in Roem. Archiv, ii. 1. 2 (1799).
ZUCCANCNIA, Thunb. Nov. Gen. ix. 127 (17?8).
Bakerianum, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 394.—Afr. austr.
Balfourii, *Baker, in Gard. Chron.* (1880) II. «~~ *IM.*
Socotra. . gag"'
ciliare, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 0* "
Afr. austr. % g«r.
comosum, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn.* •*»• II. i. (1878) 247.—Afr. trop. (g71)
concanense, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* »• ^ 399.—Ind. or.
crispum, *Baker, 1. c.—Ab.* austr. ... gi.-~
erythracum, *Webb (f Benth. Phyt. Conor.* »'• • Arab.; Egypt .. *apl)*
filamentosum, *Medic, in Vsteri, Ann. Bot.* »• *• IS.—Afr. anstr. „*i*\ 822>"
filifolium, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (187B; Afr. trop. ... <JO "
fulvum, Webb ft Benth. Phyt Canar. !"• »
SGrotinunu

DIPCADI:—
glaucum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 401. —Afr. austr.
fieterocuspe, *Baker, 1. c.* xx. (1883) 274.—Madag.
byacin:hoides, *Baker, 1. c.* xi. (1871) 398.-A&. austr.
tydsuncum, *Baker, I.e.* 397.-Ind. or.
'•nceolatum.Sa*^, *in Journ. Bot.* xvi. (1878) 322.— Afr. trop.
latentium, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. I It i. (1878) 247—Afr. trop.
"SSI.olio "• *Baier> in 7°"™- Li*"*- Soc.* xi. (1871) ovf—Afr. trop.
m Th:m *Webb & BtTth_Phyt_Canar_ai_* 341 ~ Tbyl.
montanum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 398.—Ind. or.
or ?}obnm> *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. rJ5:^1878) 246-Afr. trop.
-.-.iiii

DIPLACUS:—
glutinosus, Nutt. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1888) 137 = M. glntinosus.
Godroni, Veisch. ex E. Morr. in Belg. Hortic. ziii. (1863) 4 = Mimulus glntinosus ?
grandiflorus, Groenl. in Rev. Hortic. Sér. IV. vi. (1857) 403 = M. glntinosus?
latifolius, Nutt. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1888) 188=M. glntinosus.
leptanthus, Nutt. 1. c. = M. glutinosus.
longiflorus, Nutt. 1. c. 139 = M. glutinosns.
puniceus, Nutt. I. c. 187 = M. glutinosus.
rugosus, Benth. in DC. Prod. x. 368 = Berendtia rugosa.
splendidus, Versch. ex E. Morr. in Belg. Hortic. xiii. (1868) 5 = M. glutinosus 1
steilatus, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 18 = M. glntinosus.
Verschaffeltii, Versch. ex E. Morr. in Belg. Hortic. xiii. (1868) 5=M. glutinosus]

DIPIiADENIA, A. DC. in DC. Prod. viii. 481 (1844). *APOCYNACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 726.
MICRADENIA, Miers, Apocyn. S. Am. 158 (1878).
FRESTONIOPSIS, Muell. Arg. in Bot Zeit. xviii. (1860) 22.
acnminata, *Hook. Bot. Mag.* t. 4828.—Bras.
alexicaca, A. DC. in DC. Prod. viii. 484-illustris.
androsaemifolia, A. DC. 1. c. = illustris.
amabilisx, Hort. Backh. ex Flor. & Pomol. (1868) 72.
amoena x, T. Moore, ex Flor. *8c* Pomol. (1868) 72.
atropurpurea, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 486.—Bras.
atropurpurea,1em. in Fl. des Serres, ii. (1845) t. [29]= atroviolacea,
atroviolacea, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 484.—Bras.
BUlbergii, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 137 = Echites Bill bergii.
boliviensis, *Hook./. Bot. Mag.* t 5783.—Bolivia.
Brearleyana, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1875) 220,222 = Odontadenia speciosa?
coccinea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 132.—Bras,
cordifolia, *Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1083, nomen.—Guiana.
crcssinoda, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 486.—Bras.
crassinoda, Lindl. Bot. Reg. (1844) t. 64 = Martiana.
Fendleri, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 417.—Venezuela.
flava, *Hook. Bot. Mag.* t. 4702.—N. Granat.
fragrans, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 433.—Bras.
Gardneriana, *A. DC. I. c*—Bras,
gentianoides, *A. DC. I. c.* 484.—Bras.
gentianoides, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 124 = Echites Pohliana.
Harrisii, Hook. Bot. Mag. t. 4825-Odontadenia speciosa.
illustris, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 483.—Bras.
linariaefolia, A. DC. 1. c. 482=polymorpha.
Lindleyl, *Lent. Illustr. Hortic.* ii. (1855) 12.—Bras,
linearis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 123.—Bras.
longiloba, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 485.—Bras.
Martiana, *A. DC. I. c*—Bras.
Moricandiana, *A. DC. 1. c.* 486.—Bras,
nobilis, *Morr. in Ann. Soc. Gand,* iii. (1847) 331. t. 1S2; *Lem. in Fl. des Serres, Six.* I. v. (1849) t. 487.—Bras.
pastorum, A. DC. in DC. Prod. viii. 482 = polymorpba.
peduncularis, A. DC. 1. c.=polymorpha.
polymorpba, *Muell. Arg. in Mart. Ft Bras.* vi. 1.121.—Bras.
pulchella, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 485.—Bras.
Riedelii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 181.—Bras.
Rosa-campestris, tern, in Fl. des Serres, *Sir.* I. iii. (1847) t. 266=illustris.
salicifolia, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 49.—Hab.?
sancta, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 484.—Bras.
Saponariae, *A. DC. I. c.* 485.—Bras,
scabra, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 128.—Bras.
Sellowii, *Muell. Arg. I.* c—Bras.
spigeliaeflora, Muell. Arg. 1. c. 122=longiloba.
splendens, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 676.—Bras.

DTPLADENIA:—
stenoloba, *Heurck V Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 158.—Perav.
temiifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 482.—Bras,
nrophylla, *Hook. Bot. Mag.* t. 4414.—Bras.
velutina,A. DC. in DC. Prod. viii. 483 = gentianoides.
venulosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 126.—Bras,
vincaeflora, *Lem. in Rev. Hortic.* (1868) 183.—Bras,
xanthostoma, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1.123.—Bras.

DIPLANDRA, Bert, in Merc. Chil. 612; ex Bull. Férussac, xx. (1830) 110 =Elodea,Michx. (Hydrocb.).
Potamogeton, Bert. 1. c=E. chilensis.

DIPLANDBA, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 291. t. 60 (1837). *ONAGRARJEAE,* Benth. & Hook. f. i. 792.
lopezoides, *Hook, (f Am. I. c.* 292. t. 60.—Mexic.

DIPTiANTHEBA, Banks *8c* Soland. ex R. Br. Prod. 449 (1810). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1048.
BUJ.WERIA, F. Muell. Fragm. iv. 147 (1864).
DEPLANCHEA, Vieill. in BulL Soc. Linn Normand. vii. (1863) 96.
bancana, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. lnd.* xxxi. (1870) 334; *et ex Hassk. in Flora,* liii. (1870) 220—Ins. Banca.
tetrapbylla, *R. Br. Prod.* 449.—Austral.

DIPLANTHERA, Schrank, PI. Rar. Hort. Monac t 62 (1819) = Justioia, Linn. (Acanth.).
formosa, Schrank, 1. c. = J. furcata.
furcata, Steud. Nom. ed. II. i. 515=J. furcata.

DIPLANTHERA, Thou. Gen. Nov. Madag. 3 (1806) = Cymodocea, Koen. (Naiad.).
indica, Steud. Nom. ed. II. i. 516 = C. isoetaefolia.
madagascariensis, Steud. 1. c.—Madag.
tridentata, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 98.—Madag.

DIPLAECHE, Hook. f. *8c* Thorns, in Hook. Kew Journ. vi: (1854) 382. t. 11. *ERICACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 597.
multiflora, *Hook./, (f Thorns. 1. c.* 388.—Reg. Hirnal.
pauciflora, *Hoot./, b" Thorns. I. c*—Reg. Himal.

DIPLARIA, Rafin. ex DC. Prod. vii. 610 (1839) = Cassandra, D. Don (Ericac).

D1PLARINUM, Steud. Nom. ed. II. i. 615 (1840) =seq.

DIPLARINUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106 = Sclrpus, Linn. (Cyperac.).

DIPIJAKPEA, Triana, in Benth. & Hook. f. Gen. i. 766 (1867). *MELASTOMACEAE,* Benth. *8c* Hook, f. 1. c.
paleacea, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxvtf. (1871) 80.—N. Granat.

DIPLAHRHENA, Labill. Voy. L 167 (1798) (Diplarrena). *IRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 696.
latifolia, *Benth. Fl. Austral,* vi. 400.—Tasmania.
Moraea, *Labill. Voy.* i. 157.1.15.—Austral.

DTPLARRHINUS, Endl. Gen. 119 (1837) -DIPLARINUS, Rafin.=Sctrpus, Linn. (Cyperac).

DIPLASANTHUM, Desv. Opnsc 66 (1831)=Andropogon, linn. (Gramin.).
lanosum, Desv. L c. 67= A. caricosus.

DIPIiASIA, Rich, in Pers. Syn. i. 70 (1805). *CYPERACEAE,* Benth. *8c* Hook, f.iii. 1065.
karataefolia, *Rich. 1. c.*—Guiana,
pycnostachya, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xv. (1877) 512.—Bras.

DIPLAPSIS, Hook. f. in Hook. Lond. Tonra. Bot vi. (1847) 469 [bis]=Huanaea, Cav. (Umbellif.).
cordifolia, Hook. f. FL Tasra. i. 157 = H. cordifolia.
hydrocotylea, Hook. f. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. vi. (1847) 469 [bis] = H. hydrocotylea.

DIPLAX, Soland. ex Benn. PI. Jav. Rar. 11 (1838)-Microlaena, R. Br. (Gramin.).
avenacea, Raoul, Choix PI. N. Zél. 11. t. 3 = M. avenacea.
polynoda, Hook. f. Fl. N. Zel. 290 ~M. polynoda.
tasmanica. Hook. f. Fl. Tasm. ii. 105 = M. tasmanica.

DIPLECOSIA, G. Don, Gen. Syst. iii. 838 (1834) = Diplycosia, Blume (Ericac).

DIPLECTHRUM, Pers. Syn. ii. 508 (1807) -Batyrium, Sw. (Orchid.).
amoenum, Thou. Orch. Isles Aur. t 21, 22 = S. amoenum.
bicallosum, Pers. Syn. Ii. 509 = S. bicallosum.
bracteatum, Pers. 1. c. = S. bracteatum.
corii/olium, Pers. 1. c. = S. coriifolium.
cucullatum, Pers. 1. c. 508 = S. bicorne.
cucullifiorum, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 287=praec.
erectum, Pers. Syn. ii. 509=S. coriifolium.
foliosum, Pers. 1. c. =S. foliosum.
membranaceum, Pers. 1. c.=S. membranaceum.
parvifiorum, Pers. 1. c. = S. parviflornm.
pumilum, Pers. 1. c.=S. pumilum.
striatum, Pers. 1. c.=S. striatum.

DIPLECTRADEN, Rafin. Fl. Tellur. ii. 90 (1836) = Habenaria, Willd. (Orchid.).
leptoceras, Rafin. 1. c. = H. leptoceras.

DIPLECTRUM,Endl.Gen.211(1837)=Dipleothrum-Pers.

DIPLEMIUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 50 (1886)-Brigeron, Linn. (Compos.).
carolinianum, Rafin. 1. c.=Solidago tenuifolia.
nervosum, Rafin. 1. c. = Chrysopsis graminifolia.
querci/olium, Rafin. 1. c. = E. quercifolius.
strigosum, Rafin. 1. c.=E. strigosns.

DIPLERISMA, Planch, in Proc. Linn. Soc. i. (1848) 361 i et in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 416. f. 15-20* MelianthuB, Linn. (Sapind.).
comosum, Planch, in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) * = M. comosus.
minus, Planch, in Proc. Linn. Soc. i. (1848) 361 = minor.

DIPLESTHES,Harv.in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 19-Salaoia, Linn. (Celastrin.).
Kraussii, Harv. 1. c = S. altemifolia.

DIPLIATHUS, Rafin. Sylva Tellur. 135 (1838) = Litsea, Lam. (Laurin.).
angulata, Rafin. 1. c. = L. glaucescens.

DIPLICOSIA, Endl. Gen. 756, in syn. (1889) = Diplycosia, Blume (Ericac).

DIPLIMA, Rafin. Alsog. Am. 18 (1838) - SaliXi Toornarenaria, Rafin. 1. c.=S. repens.
chrysantha, Rafin. 1. c = S. lanata.
lucida, Rafin. 1. c.»S. lucida.
stipulates, Rafin. 1. c. = S. stipularis.
Stuartiana, Rafin. 1. c.=S. Lapponum.
subsessilis, Rafin. 1. c.=S. repens)
viminatis, Rafin. 1. c.=S. viminalis.
Weigeliana, Rafin. 1. c.=S. phylicifolia.

DIPLISCA, Rafin. Sylva Tellur. 81 (1888)=*CesaotbV*' Linn. (Rhamn.).
elliptica, Rafin. 1. c = C. reclinatus.

DEPLOCALYMMA, Sprang. Neue Entdeck. ii'- 80 (1822). *INC. SED.* Benth. *8c* Hook. £ ii. *°8-volubile, Spreng. I. c*—Hab. ?

DIPLOCALYMNA,ChoUy, in DC. Prod. ix. 462 (I84 85) =praec.

DIPLOCALYX, Presl, Bot. Bemerk. 146 (18*0J in Abh r,v! Boehm. Ges. V. iii. (1845) 576=Mitrar». ^ (Gesnerac).
pallidus, Presl, 1. c. = M. pallida.
tomenUllus, Presl, 1. c. 147 = M. tomentelb.

DIPLOCALYX, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 81. t. 54 (1853) = 8ohoepfia, Schreb. (Oladn.).
chrysophylloides, A. Rich. 1. C.-S. chrysophylloides.

DIPLOC^ P [1] * ' [Zi]PP- [ex] Blnme. R™phU, iii. 115 Mata' [Lapp] ' eX Bl0me, h & (=/" »« *Diplccardia).*— ya.

DIPLOCEA, Rafn fa Am. Journ. Sc.i. (1818) 252-
Triplasia, Beauv. (Gramin.).
barbata, Rafn. 1. c.=T. purpurea.

DIPLOCIENTBX7M(Iindl. Bot. Reg. snb t. 1622 (1832). *ORCMDEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 682.
congestum, [Wi*hi>Ic] '• 1882.—Ind. or.
longifolium, Wight>L& *• WSl-recnrvnm.
recurvum, Linn. «.5. *ot. Reg.* snb t. 1522._Ind. or.

DIPLOCERAS, Meissn. Gen. Comm. wo (1848) = **Parolinia,** Webb (Crocif.).

DIPLOCHAETE, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 296-
R. Pyehospopa, Vahl (Cyperac).
*«<*nensis,* Nee., 1. c.=R. pterocarpa.

D PLOCHILUS, Lindl. Bot. Reg. snb *• !*" (1832) = **Diplomeris** D. Don (Orchid.).
hirsutus, Lindl. 1- c-Diplomeris hirsute,
longifolius, Lindl. 1.c. = Diplomeris pulchella.

DIPLOCHITA> DC Prod_iu_ !76 (1828) = Mieonia, Ruiz & ?"• (Melastom.).
albicans, Heynh, Norn. i. 877-M. holosericea.
angustifolia, Benh.,Pl.,H artw. 263-M. pallens.
aurea, DC. Prod. iii. 177 = M. aurea.
bracteata, DC. l. c. 176 = M. holosericea.
bubalina, DC. l. c. 177 = M. bubalina.
caudata, DC. l. c. = M. Donaeana.
florida, DC. l. c. 176 = M. florida.
Fothergilla, DC. l. c. M - Fothergilla.
leucocephala, 2£-, [L c]- W-M.Tacrophylla.
macrop *macrat* *>«« .»C. 1. c. = M. macrophylfa.
mucrondt Gn8eb- FL Brit. W. Ind. 711.-Ins. Trinitat.
parviflora, ?DTM-lia Hk. [Ic] J beth. W • (1840) S02 =M. ver cilata.
parviflora, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 262> partim = M. argentea.
pyramidalis, Heynh. Nom_ L 877=M_ ^ P [4] *
rosea, Macfad. Fl. Jamatc. ii. 74 =M. Fothergilla.
rufipila, Ste ex [Tri.in] a, in Trans. Linn. soc. xxviii. (1871) 104 [^f"^'] nifipila,
serrulata, DC> Prod_fa- 177-M. macrophylla.
sessilifol "» Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 262, partim ^ ^ . "•" P IK Plukenetii.
302 = M. Smth. in Hook. Jbnm. Bot. ii. (1840) *S»aw* nolo sericea.
tomZV"'^*00- Prod_ai- 177-M. Fothergilla.
^£'<wa, Gnseb. Fl. Brit. W. Ind. 252 - M. tomen-

D IPLOCHITON, Spreng. Gen. i. 340 (1880)-piaee.
PI **LAENA, Spreng. Gen. i. 869 (1880) = Diplo-**
la R. Br.

DIPI 53 ? ^ **LAMYS,** Muell. Arg. in Flora, xlvii. (1864)
—**allotus,** Lour. (Euphorb.).
Griffithianus, Muell. Arg. 1. c.-Ind. or.

DIPLOCHONIUM, Fenzl>Nov_Stir P_Dec_57 (1839) = **Trianthema,** Linn- (Ficoid.).
sesuvioides, Fenz [L] ° 68-T/hydaspica. **Sesuvium**
sesuvioides, Wight & Peyr, ^^ Ben«- 2*- **digynum.**

DIPLOCLINIUM, Lindl. Veg. Kingd. S19 (1847) = **Begonia,** Linn.
angustifolium, Miq. FL Ind. Bat i. I. 687 = B. angustifolia.
a [um] i
a^«««M V?"[, L C 691 - B. «pten.,* 5;«*.
4rn£• ««!• iI c 689 B.* areolata.
arrirt^iJ? [i Wi8ht]. Ic t. 1815-B. cordifolia.
4»7[oC]I? ^- [Fl_Ind] Sat_i-1-1091 = B. atricha.
*"*Sri« ?? [Ic] [Ind R flntata] W"" = B[^ 7" W ^ « h, in Abh Akad Berl (1855) 72 [ra.]

DIPLOCLINIUM:—
bracteatum, Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 688=Begonia bracteata.
caespitosum, Miq. I. c. 685=B. caespitosa.
camosum, Teijsm. *Sc* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xzv. (1868) 420=B. camosa.
cordifolium, Wight, Ic. t. 1816=B. cordifolia.
Cumingianum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 691=B. Cumingiana.
Evansianum, Lindl. Veg. Kingd. ed. I. 818. t. 220= B. Evansiana.
fasciculatum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 690 - B. fasciculate.
Hasskarlianum, Miq. 1. c. 1091 - B. Hasskarliana.
holoserieettm, Teijsm. *Sc* Binn. in Tijdichr. Nederl. Ind. xxv. (1868) 421 = B. holosericea.
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 691 = B. Horsfieldii.
lepidum, Miq. 1. c. 689 = B. lepida.
Lindleyanum, Wight, Ic. 1.1817 = B. fallax.
longifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 687=B. longifolia.
orbiculatum, Miq. L c. 686 = B. orbicnlata.
pilosum, Miq. 1. c. 688-B. pilosa.
racemosum, Miq. 1. c 691 = B. racemosa.
repandum, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1865) 72 - B. isoptera.
repens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 686 = B. mollis.
Roxburghii, Miq. 1. c. 692 = B. Roxburghii.
rubrum, Miq. 1. c 689 = B. robusta.
saxatile, Miq. 1. c. 686 = B. saxatilis.
sublobatum, Miq. 1. c. 690 = B. sublobata.
tenuifolium, Miq. 1. c. 698 = B. tennifolia.
timorense, Miq. 1. c. 692 = B. aptera, *Roxb.*
tuberosum, Miq. 1. c 685=B. tuberosa.
Wallichianum, Miq. 1. c. 690 - B. Wallichiana.

DIPLOCLISIA, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. II. Tii. (1851) 37, 42 = CocculUB, DC. (Menisperm.).
inelyia, Miers, Contrib. iii. 282-C. macrocarpus.
lepida, Miers, 1. c. 284=C. macrocarpus.
macrocarpa, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1861) 42 = C. marrocarpus.
pictinervis, Miers, Contrib. iii. 284=C. macrocarpus.

DIPLOCOEA, Reichb. Consp. 53, in syn. (1828) = DIPLOCEA, Rafin.

DIPLOCOMA, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. t 246 (1828) = **Heterotheca,** Cats. (Compos.).
villosa, D. Don, 1. c - H. inuloides.

DIPLOCONCHIUM, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (184S) 428=Agrostophyllum, Blume (Orchid.).
inocephalum, Schau. L c.—Ins. Luzon.

DIPLOCOS, Bureau, in DC. Prod. xvii. 215 (1873) = **Taxotrophis,** Blume (Urticac).
macrophylla, Bureau, 1. c. 216.—Ins. Celebes.
eeylanica, Bureau, 1. c. 215=T. zeylanica.

DIPLOCRATER, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 867 = **Cathedra,** Miers (Olacin.).
acuminatus, Benth. 1. c = C. acuminata.

DIPLOCRATEB, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 96 (1873). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. I.e.
coriacea, *Hook.f. I. c.*—Afr. trap,
reticulata, *Hook.f. 1. c*—Afr. trop.

DEPLOCTATHA, N. E. Br. in Joum. Linn. Soc. xvii. (1878) 167. *ASCLEPIADEAE.*
ciliata, *N. E. Br. I. c*—Afr. austr.

DIPLODI8CUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. More. xxxl. (1858) i. 236. *TILIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 232.
panicnlatus, *Turct. 1. c*—Ins. Philipp.

DIPLODIUM, Sw. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. iv. (1810) 84. t. 3=Fteroatylis, R. Br. (Orchid.).
australe, Sw. 1. c.=P. praecox.

DIPLODON, DC. Prod. iii. 94 (a) (1828) - DiplUflOdon, Pohl (Lythnr.).

DIPLODONTA, Karat, in Linnaea, xxviii. (1856) 439 = **Heterotrichum,** DC. (Melastom.).
setosa, Karst. 1. c. = H. octonum.

DIPLOGAMA. Opiz, Seznam, 88 (1862)=SiIene, Linn. (Caryophyll.).
Otites, Opiz, 1. c.-S. Otites.

DIPLOGASTRA, Welw. ex Reichb. f. in Flora, xlviii. (1866) 188 = HatylepiB, A. Rich. (Orchid.).
angolensis, Welw. ex Reichb. f. 1. c = P. glandulosa.

DIPLOGENAEA, A. Juss. in Orb. Diet. viii. 76 (1849) =seq.

DIPLOGENEA, Lindl. in Brand, Quart. Joum. (1828) 122=Medlnilla, Gaudich. (Melastom.).
miscoides, Lindl. 1. c. =M. viscoides.

DIPLOGLOSSIS, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762 (1876), sphalm.-seq.

DIPLOGLOSSUM, Meissn. Gen. PI. 269 (1840) = **Cynanchum,** Linn. (Asclepiad.).
auriculatum, Meissn. Gen. Comm. 176 = C. anriculatum.
Jacquenwntianum, Meissn. 1. c = C. Jacquemontianum.
Roy lei, Meisan. 1. c.-C. Roylei.

DIPLOGLOTTI8, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 895 (1862). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
australis, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 613, 545=Cunninghamii.
Cunninghamii, *Hook. f. in Benth. (f Hook. f. Gen.* i. 395.—Austral.

DIPLOGON, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 = **Chrysopsis,** Nutt. (Compos.).
ericoides, Rafin. Atl. Journ. 146—Aster ericaefolius.
graminifolium, Rafin. Cat. 13=C. graminifolia.
Marianum, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268-C. Mariana.
stenopkyllum, Rafin. ex DC. Prod. v. 327 = C. graminifolia.

DIPLOKNEMA, Pierre, in Arch. Ntel. xix. (1884) 104. *SAPOTACEAE.*
sebifera, *Pierre, 1. c.* 105.—Borneo.

DIPLOLAENA,R. Br.in Flind. Voy. ii. 546 (1814) *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 295.
DIPLUCHLAENA, Spreng. Gen. i. 369 (1830).
VENTENATUM, Leschen. ex Reichb. Consp. 199 (1828).
angustifolia, *Hook. Bot. Mag.* sub t. 4069.—Austral.
Dampieri, *Desf. in MAn. Mus. Par.* iii. (1817) 462.—Austral.
grandiflora, *Desf. I. c.* 451.—Austral.
Ruegelii, *Hort. in Hamb. Garten**, ii. (1846) *Feuill.* 8.—Austral,
microcephala, *Bartl. in Lehm. PI. Prriss. I* 178.—Austral.
salicifolia, Bartl. 1. c.=angustifolia.
speciosa, *Brongn. in Rev. Hortic.* Ser. II. iv. (1845-46) 138.—Austral.

DLPLOIiEPIS, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 41. *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 763.
SONNINIA, Reichb. Consp. 131 (1828).
apiculata, Lindl. in Trans. Hort. Soc vi. (1826) 68 = Tylophora hirsuta.
Menziesii, Poepp. ex Decne. in DC. Prod. viii. 588 = Oxypetalum Hookeri.
Menziesii, *Schult. Syst.* vi. 95.—China,
ovata, *Liniil. in Trans. Hort. Soc.* vi. (1826) 268.—China.
vomitoria, Lindl. 1. c. 68=Tylophora asthmatica.

DIPLOLOBIUM, F. Muell. in Trans. Bot. Soc. Edinb, vii. (1863) 489 = Swainsona,Salisb. (Legumin.).
Walcottii, F. Muell. 1. c. = S. occidentalis.

DIPLOLOMA, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acnd. Pétersb. ii..C1844) 195 - **Cranioepermum,** Lehm. (Borag.).
echioides, Schrenk, 1. c—Sibir.

DIPIiOIiOPHrDM, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xx. (1847) i. 178. *VMBBLUFERAE*, Berth. *Sc* Hook. f. i. 900.
abyssinicum, Benth. & Hook. f. 1. c.=africannm.
africanum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) I. 173.—Afr. trop.
zambesianum, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 18. —Afr. trop.

DIPLOMA, Rafin. Fl. Tellur.iii. 19 (1836)=Gentians, Toum.
altaica, Rafin. 1. c =G. altaica.
angustifolia, Rafin. 1. c.=G. angustifolia.
hudsonica, Rafin. 1. c. 27 = G. linearis.
pyrenaica, Rafin. 1. c. 19 = G. pyrenaica.
Unuifolia, Rafin. 1. c. 27 = G. linearis t

DIPLOMEKIS, D. Don, Prod. Fl. Nep. 26 (1825). *ORCHIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 627.
DIPLOCHILUS, Lindl. Bot. Reg. snb t. 1499 (1832).
PARAGNATHIS, Spreng. Syst. iii. 675 (1826).
hirauta, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 331.—Reg. Himal.
pulchella, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 26.—Reg. Himal.

DIPLOMORPHA, Griff. Notul. iv. 479 (1854) = Agyneia, Linn. (Euphorb.).
herbacea, Griff. 1. c.=A . bacciformis.

DIPLOMORPHA, Meissn. in Denkschr. Regensb. Ges. iii. (1841) 289 = Wikstroemia, Endl. (Thymel.).
canescens, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Matb. Acad. Petersb. i. (1843) 357 = W. canescens.
Chamaedaphne, C. A. Mey. 1. c. 358 = W. Chamaedaphne.
japonica, Endl. Gen. Suppl. iv. II. 66 = Stellera japonica.
virgata, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. i. (1843) 857 = W. canescens.
viridiflora, C. A. Mey. 1. c. 358=W. viridiflora.

DIPLONEMA, G. Don, Gen. Syst. iv. 42 (1837) = Euclea, Linn. (Ebenac).
ambigua, G. Don, 1. c. — Royena ambigna.
elliptica, G. Don, 1. c = E. polyandra.

DIPLONYX, Rafin. Fl. Lndov. 101 (1817), ex descr.-Wisteria, Nntt. (Legumin.).
elegans, Rafin. 1. c. = \V. speciosa.

DIPLOPAPPUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiii. 808 (1819) =Aster, Toum. (Compos.).
albus, Lindl. ex Hook. Fl. BOT. Am. ii. 21 =- A. ptarmicoides.
alpinus, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 304=A. scopuloram.
amygdalinus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 23-A. umbellatus.
annum, Blnff *Sc* Fingerh. Comp. Fl. Germ. ii. 868» Erigeron annuus.
asper, Less. Syn. Comp. 168 = A. hispidus.
asperrimus, DC. Prod. v. 277-A. trinervius.
asperulus, DC. 1. c. = A. asperulus.
australasicus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 171 = Vittadinia australis.
baccharoides, Benth. in Hook. 'Lond. Toum. Bot. i. (1842) 487 = A. baccharoides.
bellidifolius, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 46 = Aplopappnsglutinosus?
bellidioides, Gill. 8r Don, ex Hook. & Am. 1. c 50 = Erigeron nniflorus.
candidus, Gill. *Sc* Don, ex Hook. & Am. 1. c. 48 = Leucopsis sericea.
canescens, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 21 = Erigeron caespitosus.
canescens, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 47.—Chili.
caucasicus, DC. Prod. v. 277=A. caucasicus.
Ckamissonis, Less, in Linnaea, vi. (1831) lll=Aplopappus Chamissonis.
chinensis, Less. Syn. Comp. 165=Callistephus hortensis.
chrysanthemifolius, Less, in Linnaea, vi. (1881) 115 = Aplopappus chrysanthemifolius.
coquimbensis, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 47.—Chili.
cornifolius, Darlingt. Fl. Cestr. 474= A. infinnus.
cornifolius, Lindl. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 183 = A. umbellatus.

DIPLOPAPPUS :—
connopifolius, Less, in Linnaea, vi. (1881) 112 = Aplopappus coronopifolius.
corymbosus, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 48=A. tuberosus (in Addend.).
cuneatus, Hook. *Sc* Am. 1. c. 46-Aplopappus scrobiculatns?
delphinifolius, Cass. in Diet. Sc Nat xiii. 810, in textu — Erigeron delphinifolius.
diffusus, Less, in Linnaea, vi. (1881) 110, in obs.; Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1838) 48 = Leucopsis diffusa.
diplostephioid.es. Hook. f. *Sc* Thorns, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 45 = A. diplostephioides.
divaricatus, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 97 - Aplopappus divaricatus.
Donianus, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1836) 47=Aplopappus pulchellus.
dubius, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 187 - Erigeron annuus.
dysentericus, Bluff *Sc* Fingerh. Comp. Fl. Germ. ii. 869 - Pulicaria dysenterica.
elegans, Hook. f. *Sc* Thorns, ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 250=A. tricephalus, himalaicus.
elongatus, DC. Prod. v. 276 = A. filifolius.
elongatus, Gill. & Don, ex Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 49 = A. Gilliesii.
ericoides, Less, in Linnaea, vi. (1831) 117 •• Aplopappus ericoides.
ericoides, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii 182=A. ericaefolius.
extenuatus, DC. Prod. v. 276=A. fruticosus.
filifolius, DC. 1. c.=A. filifolius.
filifolius, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 21 = Erigeron filifolius.
filifolius. Less, ex Stend. Norn. ed. II. i. 516 = Hysterionica pinifolia.
foliosus. Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 45 = Aplopappus foliosus.
foliosus. Hook. *Sc* Am. 1. c. *16=ilicifolius*.
fruticulosus, Less, in Linnaea, vi. (1881) 118=A. fruticulosus.
glandulosus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xxiv. (1851) II. 62 = Olearia adenolasia.
glutinosus, Poepp. ex Less, in Linnaea, vi. (1831) 118 =Aplopappus glutinosus.
gnaphalioides, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 86 - Erigeron gnaphalioides.
graminifolius. Less, in Linnaea, v. (1830) 144~Chrysopsis graminifolia.
grandiflorus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 21 = Erigeron caespitosns.
grindelioides, Less, in Linnaea, vi. (1831) 115= Aplopappus Berterii ?
hispidus. Gill, ex Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1886) 48 = Hysterionica jasionoides.
hispidus, Hook. Fl. Bor. Am. it 22=Chrysopsis villosa.
ilicifolius, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 253.—Reg. Argent.
incanus, Lindl. Bot. Reg. t. 1698 = A. canescens.
integerrimus, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 47.—Chili.
intermedius, Cass. in Diet Sc. Nat. xiii. 309 = Chrysopsis gossypina ?
inuloides, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 46 - Aplopappus Berterii.
laevigatus, Sond. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. iii. 85.— Afr. austr.
lanatus, Cass. in Diet Sc. Nat xiii. 309=Chrysopsis gossypina.
lavandulifolius, Cass. 1. c. xxv. 96-A. lavandulacens.
laxus, Benth. in Hook. Lond. Joura. Bot. i. (1842) 487 » A. trinervius.
leucophyllus, Lindl. in DC. Prod. v. 278=Corethrogyne filaginifolia.
linariaefolius, Lindl. 1. c. 277=A. linariifolius.
linearis. Hook. Fl. Bor. Am. ii. 21=Erigeron ochroleucus.
lutescens, Lindl. in DC. Prod. v. 278=A. ptarmicoides.
macrocephalus, Poepp. ex Less, in Linnaea, vi. (1831) 114 ~ Aplopappus macrocephalus.
Marianus, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 97= Chrysopsis Mariana.
molliusculus, Lindl. in DC. Prod. v. 277-A. molliusculus.

DIPLOPAPPUS:—
mucronatus, Hook. *Sc* Ara. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) 45=Aplopappus Rengifoanns.
natalensis, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 957.—Afr. austr.
obovatus, Torr. & Gray, FL N. Am. ii. 184=A. recBculatus.
obtusatus, Less, in Linnaea, vi. (1881) 118-A. obtnsatus.
occidentalis. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 360= Erigeron foliosus.
paludosus, Lindl. ex DC. Prod. v. 264 = A. paludosus.
passerinoides, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xxiv. (1851) II. 62 = Olearia passerinoides.
pinifolius, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1886) 48 •--• Hysterionica pinifolia.
pinifolius, Less, ex DC. Prod. v. 696, add.-Erigeron Vahlii.
pinnatifidus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 22 - Aplopappus spinulosus, *DC.*
pinnatifidus, Hook. *Se* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 48.—Chili.
pluriflorus, Steud. Norn. ed. II. i. 516 = A. pluriflorus.
Poeppigianus, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 47 = Aplopappus Poeppigianus.
Prunelloides, Poepp. ex Less, in Linnaea, vi. (1831) 111 = Aplopappus prunelloides.
ptarmicoides, Lindl. ex DC. Prod. v. 264 = Aster ptarmicoides.
pubescens, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 96-Erigeron pubescens.
pulicarius, Ledeb. Fl. Ross. ii. 509 = Puhcarto vulgaris.
punctatus. Less, ex DC. Prod. vii. 280=AplopapP»> pulchellus.
rigidus, Lindl. in DC. 1. c. v. 277=A. linariifolius.
rotundifolius, Less, in linnaea, vi. (1831) 11* " Olearia dentata.
Roylei, DC. Prod. v. 276 - Erigeron multiradiatus.
scaber, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 22=Heterotheca gran*-flora.
scaber, Less, ex Nees, Gen. et Sp. Ast. 183 = A. scaber, *Thunb.*
scrobiculatus, Nees, 1. c. 284-Aplopappus scrobicnlatus.
sericeus, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1836) 97-=Cbrysopsis graminifolia.
sericeus, Less, in Linnaea, vi. (1831) 110=Leueop»» sericea.
serrulatus, Harv. in Harv. *Sc* Sond. FL Cap. iii. 86--" Afr. austr.
setiger, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot Mag- •» (1836) 47.—Chili.
spinulosus, Hook. & Am. 1. c. 46.—Reg. Argent.
stenophyllus, Hook. & Am. 1. c. 48 - HystenonK* pinifolia.
teretifolia, Less, in Linnaea,vi. (1831) 118.= A. fUiw"
trichophylla, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835)9" - Chrysopsis trichophylla.
trinervius, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 408 " *" trinervius.
turkestanicus, Regel & Schmalh. in Act. Hort.Fetror" v. (1877) 615= A. turkestanicus.
umbellatus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 22=A. »n>bella"
vestitus, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Comp- °°" Mag. ii. (1836) 48 = Leucopsis sericea.
villosus, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiii. 309=A. TMC*ZM
villosus. Hook. Fl. Bor. Am. ii. 22 = ChrysoP*" villosa.
villosus, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot Mag- (1836) 48 ~ Hysterionica montevidensis.
•*culgaris*, Bluff *Sc* Fingerh. Comp. Fl. Germ. Pulicaria vulgaris.

DIPIiOPELTIS, Endl. in Enum. PI. Hneg. 13 (18S7)- *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 397-
Huegelii, *Endl. I. c*—Austral.
Lehmannii, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 224 = Huegelii.
petiolaris, *F. Muell. ex Benth. Ft. Austral.* •• *" Austral.
Preissii, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 228 = Huegel»-
Stuartii, *F. Muell. Fragm.* iii. 12.—Austral.

DIPLOPENTA. Alef. in Oestr. Bot. Zdtschr. (18«*)
Pavonia, Cav. (Malvac.).
leptocarpa, Alef. 1. c. 11 - P. Typhalaea.
odorata, Alef. I. c. = P. odorata.
pedunculosa, Alef. 1. c.-P. zeylaaica?

DI
(Sapindac).
Spreng. 1. c. 16Q=C. glauca.

DIPL PHRACTUM, Desf. in M<5m. Mns. Par. M819) 34 1. *TILIACEAE*, Benth. & Hook. f. I. 283.
ulatum, *Desf. l.* f. Java.
salicifolium, Spreng. ys. S t . Cur. Post. 205 = Microsemma salicifolia.

DIPLOPHRAGMA, Meissn. Gen. 160 (1838) = Hedyotis, Linn. (Rubiac.).
ovalis, Kortl Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. fl857) 160 . = HoJI;.
ngularis, Korth. 1. c. 149 = H. quadrangular!*.

D OPHYLLUM, ag. viii. (1814) 81 =Veronica, Toum. (Scrophul.).
cardiocarpum, (1842) 417 = Nat. Mole, xv.
Crista-galli, Otto, ex Walp. Rep. iii. 835 = V. CrUtagalli.
hirsutum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 417 = V. Crista-galli.
veronicaeforme, Lehm. in Ges. Naturf. viii. (1814) 811 = V. Crista-galli.

DIPLOPOGON, R. Br. Prod. I76 (1810). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1145.
DIPOGONIA, Beauv. Agrost. 125 (1812).
setaceus, *R. Br. l. c.*—Austral.

DIPLOPRION, Viv. F ub Spec. 19 (1824) = Medicago, Toum. (Legum.).
medicaginoides, Viv. l. c. = M. coronata.

DIPI F
t. 3f f l YS J«- m Deless. Ic. SeL iii. 20. f i. 260 MALP HIACEAE, Benth. & Hook. Para Juss. l. c.—Guiana.

DIPLOPYRAMIS, Welw Apont 591 (1858). *POLYGONACEAE*.
aethiopica, *Welw. l. c*

DIPLORHYNCH U 8 Welw Fio^o * Hiem, in Trans. Linn. Soc< &r» Welv <1881) 22 AP C Y. *NACEAE*.
mossambicens is, Be *M- in Hook. Ic. PI.* t 1365.—Afr. trop.
pallopus, *Welw.* *Ficalho tf Hiem, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. (1881)

DIPLOSASTERA, Tau9ch Hort Canal. Coreopsis, Lmn. (Compos.). (1828)-
tinctoria, T anSch, L & c Y actoria.

DIPLOSCYPHUS, Liebm. in Vidensk. SeUt. Skr. V. ii. (1850) 262 = Scleria, Berg. (Cyperac.).
mexicanus, Liebm. l. c. = S. mexicana.

DIPLOSIPHON, Decne. in J«l»em- Voy. Bot. 186. t. 167 (1844) = Blyxa, Thou- (Hydrocharid.).
oryzetorum, Decne. l. B Roxburgh^

I IPLOS 'ORA, DC. Prod v. 477 (1880). *RVBIACE4E*, Benth. & Hook. f. 96.
DISCOSPERMUM, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 257.
apiocarpa, *Hook. f. Fl. Brit. In*. iii. W3.-Ind. or.
australis, *Benth. Fl. Austral*, iii. 418.—Austral.
confusa, *Hook. f. Fl. Brit* i 124.-Burma.
Dalzellii, *Hook. f. l. c.* 128.—Ind. or.
erythrospora, *Hook. f. l. c.* 124.—Zeylan.
Griffithii, *Hook. f. l. c.*—Burma.
ixoroides, *F. Muell* Fr V 182.—Austral.
Ja wica, F Ind Bai ii- 238.-Java.
CtfZff ii. 125,-Burma.
t. Ind. iii.
pubescens, *Hook. f. l. c.* 124.—Malacca.
singularis, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1851) 201.—Ind. or.; Mal
singularis, u-z, For. iTBrit. Burma, ii. 60, partim-confusa.
sphaerocarpa, *Hook. Brit. Ind.* iii. 128.—Ind. or.
truncata, Steud. Nom i- 516=TrisdadU truncata.
viridiflora, *DC. Prod.* iv. 477.—China.

PIPLOSTEGIUM, D. Don, in Mem. Wem. Soc. iv. (1823) 296=Tibouehlna, Aubl. (Melastom.).
canescens, D. Don, 1. c.-T. canescens.

DIPLOSTELMA, Rafin. New Fl. Am. ii. 44 (1836) = Chaetopappa, DC. (Compos.).
bellidioides, A. Gray, PI. Fendl. 73=C. modesta.
filiformis, Rafin. New Fl. Am. ii. 46=C. asteroides.
pumila, Rafin. 1. c.=C. asteroides.
radians, Rafin. L c.=C. asteroides.

DIPLOSTEMMA, 'Neck.' ex DC. Prod. vii. 306, in nota (1838) lapsu=DIPHYSTEMA, Neck.-Amasonia, Linn. f. (Verbenac).

DIPLOSTEMMA, Steud. & Hochst ex DC. Prod, vii, 75 (1838) = GeigerIa, Griessel. (Compos.).
acaule, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1812) I. Beibl. 134, nomen; et ex Oliver & Hiern, m Fl. Trop. Afr. iii. 868 = G. acaulis.
alatum, DC. Prod. vii. 75~G. alata.

DIPLQSTEMON, DC. ex Steud. Nom. ed. II. i. 76 (1840); Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 616 (1866)=Ammania, Houst. (Lythrar.).
octandrum, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 615-A. octandra.

DIFLOSTEPHITJM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 96 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 276.
LINOCHILVS, Benth. PI. Hartw. 197 (1845).
SIMBLOCLINE, DC. Prod. v. 297 (1886).
aculeatum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 192=Olearia ramulosa.
acuminatum, DC. Prod. v. 273=Aster acuminatus.
affine, *Wedd. Chlor. And.* i. 203.—Perav.
amygdalinum, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxvii. 486-Aster umbellatns.
anactinotum, *Wedd. Chlor. And.* i. 201.—N. Granat
boreale, Spreng. Syst. iii. 644=Aster reticulatus.
canum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 75.—Calif.
carabayense, *Wedd. Chlor. And.* i. 202.—Perav.
cornifolium, DC. Prod. v. 273=Aster infirmus.
Cyparissias, *Wedd. Cklor. And.* i. 203.—N. Granat.
dichotumum, DC. Pud. v. 273=Aster reticulatus.
eriophorum, *Wedd. Chlor. And.* i. 206.—N. Granat.
extenuatum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 195 = Aster fruticosus.
filifolium, Nees, I. c. 197 = Erigeroa ftlifolius.
floribundum, *Wedd. Chlor. And.* i. 206.—N. Granat.
fruticulosum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 194 = Aster fruticosus.
grandiflorum, Spreng. Syst iii. 644=Liabum grandiflorum.
Haenkei, *Wedd. Chlor. And.* i. 208.—Peruv.
hispidum, Nees,ex DC. Prod. v. 276=Chrysopsis villosa.
igniarium, Spreng. Syst iii. 644 = Iiabum igniarium.
lavandulaefolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 97 = Aster favandulaceus.
Lechleri, *Wedd. Chlor. And.* i. 204.—Perav.
lepidophyllum, Nees, Gen. etSp. Aster. 190-Olearia lepidophylla.
linariifolium, Nees, 1. c. 199=Aster linariifolius.
Hnifolium, Forbes, Hort. Wobum. 190-Aster acris.
longipes, Cass. in Diet. Sc. Nat lvi, 171=. Aster fruticosus.
lyratum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 188-Olearia stellulata.
Mandonii', *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1866-66) 684, nomen.—Bolivia.
melastomoides, Spreng. Syst iii. 644=Liabum melastomoides.
microphyllum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 191=Olearia ramulosa.
microphyllum, *Wedd. Chlor. And.* i. 201.—Venezuela.
Meyenii, *Wedd. I. e.*—Penw.
moranense, Nees, Gen. et Sp. Aster. 198 = Aster moranensis.
nubigenum, Spreng. Syst iii. 643 - Liabum nubigenum.
obovatum, DC. Prod. v. 273 = Aster reticulatus.
obtusatum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 196=Aster obtusatus.
ochraceum, Nees, 1. c. 201 = Tetramolopium ochracenm.
phlogotrichum, Nees, 1. c. 186 = Olearia stellulata.
phylicoides, Wedd. Chlor. And. i. 205 - Tetramolopinm phylicoides.
ramulosum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 193=Olearia ramulosa.

DrPLOSTEPHIUM: :—
rosmarinifolium, *Wedd. Chlor. And.* i. 202.—N. Granat.
rupestre, *Wedd. I. c.* 206.—N. Granat.
Schultzii, *Wedd. 1. c.* 204.—N. Granat.
sessiliflorum, Spreng. Syst. ii. 643«Liabiun sessiliflorum.
sessiliflorum, *Wedd. Chlor. And.* i. 204.—N. Granat.
solidagineum, Spreng. Syst. iii. 544=. Liabum solidagineum.
spinulosnm, *Wedd. Chlor. And.* i. 200.—Reg. Andin.
stellulatum, Nees, Gen. et Sp. Aster. 187 = Olearia stellulata.
teretifolium, Nees, 1. c. 197-Erigeron filifolium.
umbellatum, DC. Prod. v. 272-Aster umbellatus.
verbascifolium, Spreng. Syst. iii. 544=Liabum verbascifolium.
volubilis, Spreng. 1. c. 643=- Liabum volubile.

DIPLOSTYLIS, Karst. & Trian*, in Linnaea, xxviii. (1856) 483=Bochefortia, Sw. (Boragin.).
fasciculata, Karst & Triana, 1. c—N. Granat.

DIPLOSTYLIS, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 118 = Adenocline, Turcz. (Comos.).
angustifolia, Sond. 1. c. = A. sessilifolia.
bupleuroides, Sond. 1. c. 114 = A. pauciflora.
caffra, Sond. 1. c. 116-A. acuta.
serrata, Sond. 1. c. 114=A. serrata.

DIPLOTAENIA, Boiss. in Ann. Sc Nat Sér. III. i. (1844) 308-Feuoedanum, Toum. (Umbellif.).
cachrydifblia, Boiss. I. c. 809.—Persia.

DIPLOTAX, Rafin. Sylva Tellnr. 129 (1838) = Cassia, Toum. (Legnmin.).
arborescens, Rafin. 1. c - C . glauca? C. Sophera.

DIPLOTAXI8, DC. Syst. ii. 628 (1821). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 84.
acris, Boiss. Fl. Orient, i. 389-Sieberi.
apula, *Tenore, Syll.* 826.—Italia.
auriculata, Dur. Expl. Sc. Alglr. t. 76=tenuisiliqua.
Borrelieri, *DC. Syst.* ii. 634.—Hispan.
biloba, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 252=Sisymbrium pannonicum.
brachycarpa, *Godr. in Mém. Acad. Stanislas*, Se>. III. [xvii.] 1853 (1864) 374.—Hab. ?
bracteata, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 81 = Brassica Erucastrnm.
brassicaeformis, Koch, ex Boiss. Voy. Bbt. Espagne, ii. &4 = Moricandia arvensis.
brassicoides, Hook. f. *8c* Thorns, in Toum. Linn. Soc. v. (1861) 172-praec.
brassicoides, Rouy, in Bull. Soc. Bot Fr. xxix. (1882) 40 = Brassica Rouyana.
brevicaulis, Bluff *Sc* Fingerh. Comp. Fl. Germ. 153-viminea.
catholica, *DC. Syst.* ii. 632.—Europ. austr.; Afr. bor.
catholica, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 326=siifolia.
chilensis, *Barn, in C. Gay, Ft. Chil.* i..lS2.—Chili,
cinerea, *Potnel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 359.—Algeria,
coronopifolia, *Godr. in Mim. Acad. Stanislas*, Se>. III. [xvii.] 1853 (1864) 373.—Hab. I
crassifolia, DC. Syst. ii. 629=pendula.
Duveyrierana, *Cess, in Bull- Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 164.—Afr. bor.
Erucastrum, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 81 = Brassica Krucastrum.
erucoides, *DC. Syst.* ii. 681.—Reg. Mediterr.; As. Min.
erucoides, Schimp. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. v. 85=Brassica Schimperi.
glabra, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 195=viminea.
grandifiora; Wall, ex Kurz, Rep. Andam. ed II. 3, sphalm.=Chisocheton grandiflorus.
Griffithii, *Hook.f. (f Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 171.—Ind. bor. occ.; Afghan.
Harra, Boiss. Fl. Orient, i. S88 = pendula.
hirsuta, Bertol. Misc. Bot ii. 14 = pendula.
hispida, DC. Syst. ii. 630-pendula.
hispidula, *Tenore, Syll.* 325.—Italia.
humilis, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. i. 78 = Brassica humilis.
intermedia, Schur, Enum. PI. Transs. 60 = tenuifolia.
intricate, *Nym. Syll.* 197.—Hispan.
Lagascana, *DC. Syst.* ii. 629.—Hispan.
Lagaseana, Willk. ex Willk. *Be* Lange, Prod. FL Hisp. iii. 868 *(=Pendulina Webbiana)*.—Hispan.
leucanthemifolia, Jord. Diagn. L 190, in obs. = Brassica humilis.

BIFLOTAXIB:-
mnralis, *DC. Syst.* ii. 684.—Eorop.
nana, Boiss. ex T. Anders, in Jonrn. Linn. Soc. v. Snppl. i. (1860)2 = pendula.
pachypoda, *Godr. Fl. Juv.* ed. II. 54; *in Mém. Acad. Montp. [Sect. Medic.)* i. (1853) 414.—Hab. I
parvula, *Sckrenk, in Bull. Pkys.-Maih.Acad. PHersb.* ii. (1844) 199.—Soongaria.
pendula, *DC. Syst.* ii. 630.—Reg. Mediterr.; Oriens.
platystylis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl,* 224.—Algeria.
platystylos, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 288=virgata.
Prolongi, Boiss. Elench. 11; Voy. Bot. Espagne, 33=viminea.
ramosissima, Spreng. Neue Entdeck. iii. 62 = tennifolia?
repanda, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 79 = Brassica repanda.
saxatilis, *DC. Syst.* ii. 636.—Europ. austr.
saxatilis, Ledeb. Fl. Ross. i. 220=viminea.
scaposa, *DC. Syst.* ii. 635.—Ins. Lampednsa.
setosa, *DC. I. c.* 699.—Mont. Pyren.
Sieberi, *Presl, Bot. Bemerk.* 10.—Aegypt.; Arab,
siifolia, *Kunze, in Flora,* xxii. (1846) 686.—Hispan.; Marocc.
simplex, *Spreng. Syst.* ii. 914.—Afr. bor.
subcuneata, Jord. Diagn. i. 189 = Brassica hnmilis.
tenuifolia, *DC. Syst.* ii. 682.—Europ.; Reg. Mediterr.; As. Min.
tenuisiliqna, *Delile, Ind. Sent. Hart. Monsp* .(1847) 7.—Afr. bor.
variabilis, RochA, PI. Banat Rar. Ind. Spec. =muralis, tenuifolia.
vemiL\is,Phil. in Anal. Univ. ChiU (1872) 670.—Chili,
viminea, *DC. Syst.* ii. 635.—Reg, Mediterr.; As. Min.
virgata, *DC. 1. c.* 681.—Hispan.; Afr. bor.

DIPLOTER, Rafin. Sylva Tellnr. 165 (1838)=Tetraoera, Linn. (Dillen.).
alnifolia, Rafin. 1. c = T. alnifolia.

DIPLOTHECA, Hochgt. in Flora, xxix. (1846) 595 = Astragalus, Tonra. (Legnmin.).
abyssinica, Hochst 1. c.=A. abyssinicns.
atropilosula, Hochst. 1. c. 596=A. venosus.
tigrensis, Hochst. 1. c.=A. venosus.
venosa, Hochst 1. c. = A. venosns.

DIPLOTHEMIUM, Mart Hist. Nat. Palm. ii. 107 (1824). *PALAfAE,* Benth. & Hook. f. iii. 945.
ALLAGOPTERA, Nees, in Nenwied, Reise nach Bras. ii. 335 (1821).
campestre,Jfarr. *Hi*. Nat. Palm.* ii. 109. t 78. f. 1,2.—Bras.
candescens, *Mart. 1. c.* iii. t. 70, 77. fig. 1, 2.—Bras,
leucocalyx, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 481.—Bras,
littorale. *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 110. t 76. f. 6.—Bras.
maritimum, *Mart. 1. c.* 108. t. 75. 77. f. 3.—Brag.
Torrallii, Mart, in Palmet. Orb. 105. t 15. f. 3 = Jnbaea Torallii. i

DIPLOTHENIUM, Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 51 = praec.

DIPLOTHRIA, Walp. Rep. ii. 620 (1848) = seq.

DIPLOTHRIX, DC. Prod. v. 611 (1836) = Zinnia Linn. (Compos.).
acerosa, DC. 1. c.=Z. acerosa.
juniperifolia, DC. 1. c. 612 = Z. joniperifolia.

DIPLOTBOPIS, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 88. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 557.
DIBRACHION, TuL in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xx. (1848) 139.
brachypetalum, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) iii.—Guiana.
brasiliensis, *Benth. in Mart. Fl. Bras. JX.* 1.320.—Bras,
ferruginea, *Benth. 1. c.* 821.—Bras,
grandiflora, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 109.—Bras.
Martini, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1841) 72, in obs. sphalm. = seq.
Martinsii, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* H. (1838) 88.—Bras,
nitida, *Benth. in Hoot. Journ. Bot.* ii. (1841) 71.—Guiana.

DIPLOUSODON, Meissn. Gen. 83 (1838) - DiplnBOdon, Pobl (Lythrar.).

DIPLUKION, Rafin. Sylva Tellur. S3 (1888) = Iochroma, Benth. (1845) (Solanac).
cornifolium, Rafin. 1. c. = 1. coraifolia.
loxense, Rafin. 1. c.=I.'loxensis.
umbrosum, Rafin. 1. c. —I. umbrosa.

DIPLUSION, Rafin. Alsog. Am. 15 (1838) = Salix, Tonm.
cordata, Rafin. 1. c = S. cordata.
lucida, Rafin. 1. c = S. lncida.
rigida, Rafin. 1. c.=S. cordata.
undulata, Rafin. 1. c.=S. triandra?

BIPLU8ODO1T, Fohl, in Flora, x. (1827) 150. *LYTHRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 781.
DIPLODON, DC. Prod. iii. 94 (a) (1828).
DUBYAEA, DC. 1. c. in syn. (1828).
FRIEDLANDIA, Cham. *8c* Schlecht. in linnaea, ii. (1827) 348.
alutaceus, Pohl, in Flora, x. (1827) 152=lanceolatns.
alutaceus, St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 165=helianthemifolius.
amoenus, DC. Prod. iii. 94 (b)=virgatus.
angustifolius, DC. 1. c. 94 (a) = hexander.
arboreus, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 66 = Physocalymma scaberrimnm.
buxifoliuB, *DC. Prod.* iii. 94 (b).—Bras.
Candollei, *Pohl, ex DC. 1. c.* 94 (a).—Bras.
Candollei, St Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 146 = hexander, nninervins.
capitatus, *St. Hil. I. c.* 149.—Bras,
decussatus, *Gardn. V Field. Sert. PL* t. 1.—Bras,
divaricates, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 160.—Bras,
epilobioides, *DC. Prod.* iii. 94 (a).—Bras,
floribnndus, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 151.—Bras.
ginovioides, Griseb. Cat PI. Cub. 106=Ginora Diplusodon.
glaucescens, *DC. Prod.* iii. 94 (e).—Bras,
gracilis, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 323.—Bras.
helianthemifolins, *DC. Prod.* iii. 94 (c).—Bras,
hexander, *DC. 1. c.* 94 (a).—Bras,
hirsutus, *DC. I. c.* 94 (c).—Bras,
hirtellus, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 719.—Bras,
imbricatus, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 150.—Brag,
incanns, *Gardn. & Field. Sert. PI.* t. 2.—Bras,
kielmeyeroides, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 161.—Bras,
lanceolatus, *Pohl, in Mora,* x. (1827) 162; *PI. Bras.* i. 98. t. 81.—Bras.
lanceolatus, St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 150=oblongus.
longipes, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* iv. (1683) 404.—Bras.
lythroides, *DC. Prod, iii,* 94 (e).—Bras,
macrodon, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 388.—Bras.
marginatus, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 160.—Bras,
microphyllus, *Pohl, I. c.* 151.—Bras.
montanus, Casar. ex Koehne, in Mart. FL Bras. xiii. II. 827-hirsutns.
Myrsinites, *DC. Prod.* iii. 94 (b).—Bras,
nitidus, Z)C. /. *c.* 94 (d).—Bras,
oblongus, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 152.—Bras,
orbicularis, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 322.—Bras.
ovatus, Mart, ex Koehne, I. c. 819 =spedosus.
ovatns, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 151.—Bras,
parvifolius, *DC. Prod.* iii. 94 (c).—Bias.
pemphoides, DC. 1. c.=helianthemifolins.
puberulus, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 339.—Bras.
punctatus, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 151.—Bras,
quintuplinervius, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. H. 318.—Bras.
ramosissimus, *Pohl, in Flora, x.* (1827) 161.—Brag.
revoluti/olius, DC. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 826=parvifolius.
rosmarinifolius, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 147.—Brag,
rotuodifolius, *DC. Prod.* iii. 94 (f).—Bras.
scaber, Pohl, in Flora, x. (1827) 152-= lanceolate,
serpyllifolius, *DC. Prod.* iii. 94 (c).—Bras,
sessiliflorus, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 833__ Bras.
speciosus, *DC. Prod,* iii 94 (0.—Bras.
stachyaides, DC. 1. c. 94 (e)=villosissimus.

DIPLUSODON :—
strigosns, *Pohl, in Flora, x.* (1827) 161.—Bras,
subsericeus, *Casar. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras,* xiii-II. 829.—Bras.
thymifolius, *DC. Prod.* iii. 94 (b).—Bras,
uninervius, *Koehne, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 840.—Bras.
vaccinifolius, DC. Prod. iii. 94 (b)=buxifolius.
villosissimus, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 151.—Bras,
villosus, *Pohl, 1. c.*—Bras.
mrgatus, Gardn. ex Koehne, in Mart. Bras. xiii. II. 336, 838 - macrodon, incanns.
virgatus, *Pohl, in Flora,* x. (1827) 161.—Bras.

DIPIiYCOSIA, Blame, Bijdr. 857 (1826). *ERICACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 583.
AMPHICALYX, Blame, Fl. Jav. Praef. p. vii (1828).
acuminata, *Becc. Malesia,* i. (1878) 212.—Borneo.
amboinensis, *Becc. I. c.* 210.—Ins. Amboina.
ciliolata, *Hoot./. Ic. PI.* t. 894.—Borneo.
consobrina, *Becc. Malesia.* i. (1878) 211.—Borneo.
discolor, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* 459.—Reg. HimaL
heterophylla, *Blume, Bijdr.* 858.—Java.
latifolia, *Blume, I.* t.—Java.
macrophylla, *Becc. Malesia,* i. (1878) 212.—Borneo.
microphylla, *Becc. 1. c.*—Borneo.
pilosa, *Blume, Bijdr.* 858.—Java.
scabrida, *Becc. Malesia,* i. (1878) 211.—Borneo.
semi-infera, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind-* 459.—Reg. Himal.
Soror, *Becc. Malesia,* i. (1878) 210.—N. Guinea.

DIPODITTM, R. Br. Prod. 830 (1810). *ORCHIDEAB* Benth. & Hook. *i.* iii. 589.
LEOPARDANTHUS, Blume, Rumphia, iv. 47 (*lii8<;* et Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 47. t. 15 (1849).
WAILESIA, lindl. in Joum. Hort. Soc. iv. (1849)
ensifolimn, *F. Muell. Fragm.* v. 42.—Austral.
fiuvum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7364 *{ = Cyrtoperajlava.)*—Ind. or.
Hamiltonianum, *F. M. Bailey, in Proc. Linn. N. S. Wales,* vi. (1881) 140.—Austral.
khasyanum. Griff. Notul. iii. 564 *(-Sunipia bicolf)*—Ind. or.
paludosum, *Reichb.f. Xenia Orch.* ii. 15.—Malay*-
pictum, *Reichb.f. I.e.*—Malaya.
plicatum, Buch^Ham. ex Wall. Cat. n. 7862-Enwphia nuda.
punctatum, *R. Br. Prod.* 331.—Austral.
ramentaceum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7S7« Eulophia campestris.
Roniata, Buch.-Ham. 1. c. n. 7871 = Eulophia nuaasquamatum, *R. Br. Prod.* 831.—Ins. N. Hebrid.
venosum, F. Muell. Fragm. f. 61 = Eulophia venos»-

DIPOGON, *liebm.* Ind. Sem. Hort. Hafn. (1854) 37, ex Ann. Sc. Nat Sér. IV. ii. (1854) 374 = Dolichos, Linn. (Legumin.).
glydnoides, Liebm. 11. cc—Bras.

DIPOGON, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 518 (*lSi*0) = Chrysopogon, Trin. (Gramin.).
avenaceus, Willd. ex Steud. 1. c.=C. avenaceus-

DIPOGONIA, Beauv. Agrost 125 (1812) = Diplopogon, R. Br. (Gramin.).
setacea, Beauv. 1. c. — Diplopogon setaceus.

DIPORIDIUM, Wendl. £ in BartL & Wendl. £ BeJ^-24 (1825) = Ochna, Linn.
arboreum, Wendl. f. 1. c. 26=O. arborea.
atropurpureum, Wendl. 1. c. 24 = 0. atropurpurea.
delagoense, Eckl. & Zeyh. Enum. 1 1«8 O
integrifolium, Presl, Bot Bemerk. 32 = 0. »
natalitium, Meissn. in Hook. Lond. Joum- (1843) 58=O. atropurpurea.
pulchrum, Walp. Rep. iv. 878=O. pulchra.
serrulatum, Hochst. in Flora, xxvk (1844) atropurparea.

DIPOSIS, DC. Coll. *M6m.* v. 83. t. 8 (1829). 81 (1830). *UMBELLIFERAE,* Benth. 877.
Bulbocastanum, *DC. Prod.* iv. 668.—Chili.
saniculaefolia,.Z>C. *Coll. Mim. r.* 3J.—B«-

DIPSACELLA, Opii, Semam, 88 (1852)-Dipsaeus, Linn.
setigera, Opiz, 1. c.=Dipsacns pilosus.

DIPSACOZAMIA, Lehm. in Iindl. Veg. Kingd. 225 (1847)=Ceratozamia, Brongn. (Cydad.).
mexicana, Liebm. ex Dyer, in Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.iii. 192 = C. mexicana.

DIPSACU8, Linn. Syst. ed. I (1736). *D1PSACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 158.
DIPSACELLA, Opiz, Seznam, 38 (1852).
GALEDRAGON, *S.* F. Gray, Nat Arr. Bnt. PL u. 475 (1821).
VIRGA, Hill, Veg. Syst. v. 12 (1763).
*PPendiculatus, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, x.* 367—Abyss.
"per, *Wall. Cat.* n. 428.—Reg. Himal.
atratus, *Hook. f. V Thorns, ex C. B. Clarke, in Fl. Brit. Ind.* iii. 218.—Reg. Himal.
"uriculatus, Royle, Illustr. Bot. Himal. 245 = stnctus.
anreus, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 53.-Sibir.
Batten, Maly, ex Nym. Consp. 345=sylvestns.
terminatorius, Salisb. Prod. 55=fullonum.
comosus, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 81-lacimatus.
connatofolius, Gilib. Fl. Lituan. i. 166=fullonum.
™neifolius, *Rafin. Nea Fl. Am.* ii. 19.—Am. bor.
divaricatus, y. *V C. Presl, Delia. Prag.* 117.—Sicilia,
tlongatus, Salisb. Prod. 55=pilosus.
f«ox, *Loisel. Fl. Gall.* 719. t. 3.—Ins. Corsica,
"rtlonum, *linn. Sp. PI.* 97.—Europ.; Reg. Caucas.
Mlonum, S. G. Gmel. Reise, i. 158=laciniatns.
f'Uonum, Thore, Ess. Chlor. 36=sylvestris.
[illegible] «»rii»i, Bieb. Fl. Taur. Cauc i. 92=strigosns.
<?melini, Maxim. Prim. Fl. Amur. 472 = japomcus.
'orridus, Opiz, Seznam, 88=sylvestris.
"K-nnis, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, L* 367.—. Reg. Himal.
Mponicus, *Afia. in Versl. en tied. Akad. Wetensch.* ii. - ",-(1868)83.—China; Japon.
\anniatus, Falk, Beitr. ii. lll=strigosus.
ladpiatus, *Linn. Sp. PL* 97.-Europ.; Orieps.
:"nniatus, Ucria, Hort. Panorm. 66=divancatus.
«schenaultii, *Coult. in DC. Prod.* iv. 647.—Ind- or.
ffschenaultii.Thtt. Enum. PI. Zeyl. 160=Walken.
'"ngicaulis, Wall. Cat n. 6866=inermis.
""erocephalus, Martr. PI. Crit. Tarn, 25=lacmiatus.
»>nor, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 81=pilosus.
««««?, D. Don, Prod. Fl. Nep. 161=inermis.
Mo risonii, Bor. Ind. Sem. Hort Anger. (1842) = .sylvestris.
Orfini, Sangninetti, in Atti Ace. Pont Lincei, Ser. I. v. (1852) 72r. 1.1 = sylvestris.
palustris, Salisb. Prod. 55 = fullonum.
pilosus, *Linn. Sp. Pl.* 97.—Europ.; Reg. Caucas.
pinnatifidus, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 367.—'Abyss.
Phmosus, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 442-acabiosa plnmosa.
Pseudo-syhestris, Schur, Ennm. PI. Transs. 298 = Udniatus.
R<?l°i, Klotasch, in Bot Ergeb. Waldem. Reise, 83= inermis.
"»•«, [Honck.l Verz. Aller Gew. TentschL 874; C. ~ V': Gmel. Fl. Bad. i. 814=fullonnm.
*himp,ri, A. Br. ex Schweinf.& Ascbers. in Beitr. Fl. Aeth lop. 287=pinnatifidus.
scfosu iern Olimr FU Tropm *Afr.* iii. 250.—Aff tf
«;Kem. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 359 = sylvestris.
sinuat « , Schlecht ex Roem. & Sennit. Syst. iii. 519 - sylvratris.
stricti », *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 16O.-Reg. Himal.
strigosus, *Willd. ex Roem. VSehult. Syst.* m. *620.*—As Mia.; Persia.
2lf CTto*». Lam- Fl. Fr. iii. 345=fallonum.
»ylvestlSi mi *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 1.-Enrop.j Unens.
gari ?, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 312 = sylves.tris.
ike Arn »» N<»- *Act- Nat- Cur,* **". (1836) 344.—Zeylan.

D1^UDOCHORION, Buchen. in Flora, xlviU. (1866) 4Jf" J^mophyton, Miq. (Alismac).
«ri/oi,ttW) Bnchen. L c.-L. obtusifolium.

DIPTANTHERA, Schrank, ex Steud. Norn. ed. II. L 518 (1840)-Diaathera, Gronov. (Acanthac.).

DIPTERA, Borckh. in Roem. N. Mag. i. (1794) 29 = eynb. Nom. ii. 206 = S. cuscutaeformis.
sarmentosa, Borckh. in Roem. N. Mag. i. (1794) 29 = S. sarmentosa.

DIPTERACANTHUS, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 (1832) = Ruellia, Linn. (Acanth.).
acaulis, Presl, Bot. Bemerk. 98.—Chili.
affinis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 30 = R. speciosa.
angustus, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 10.—Panama.
australis, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 129 = R. s
bahiensis, Nees, in Bras. ix. 39 = R. trivialis.
Beyrichianus, Nees, .—Bras.
biflorus, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 294 = Calophanes oblongifolia.
Blanchetianus, Moric. Pl. Nouv. Am. 168.—Bras.
brachysiphon, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 34 = R. brachysiphon.
bracteatus, Nees, in DC. Prod. xi. 143 = R. bracteata.
brasiliensis, Presl, Bot. Bemerk. 98 = Hygrophila portoricensis.
brevicaulis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 35.—Bras.
calycinus, Champ. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 138 = Strobilanthes flaccidifolius.
calycosus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 28.—Bras.
canescens, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 6 geminiflora.
can es, in Mart. Fl. Bras. ix. 38.—Bras.
capreaefolius, Nees, l. c. «".Bras.
Chamaedrys, Nees, l. c. 31.—Bras.
ciliatus, Nees, in Wall. Cat. n. 7151 = Hygrophila phlomoides, Ruellia ciliata.
ciliosus, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 294 = R. ciliosa.
clandestinus, Presl, Bot. Bemerk. 98, 98 = R. tuberosa.
confinis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 31.—Bras.
cordifolius, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 354 = R. ovata.
cyaneus, Nees, in DC. Prod. xi. 121 = R. cyanea.
dejectus, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 82 = R. prostrata.
diffusus, Nees, in DC. Prod. xi. 124 = R. diffusa.
dissitifolius, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 33 = R. dissitifolia
domingensis, Nees, in DC. Prod. *i. 1 «-R. domingensis.
*Drummondi*n»s, Nees, 1. c. 123 = R- Drummondiana.
Drummondii, Torr. & Gray, ex Engelm. & Gray, in Hist. v. (1845) 258 = R. ciliosa. Prod. xi. 128.—Hab.! DC. l. c. 140 = Whitfieldia longi-
ejects', Ne«, in Wall. PI. As. Rar. ui. 82=R. patula.
floribundus, Nees, in DC. Prod. ». U1=R- floribunda.
foetidus, Nees, in W. Bot. Voy. Sulph. 146=R. rubB is.
fusca Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 35-Bras.
Gardneri, Nees, l. c. 28.—Bras.
geminiflorus, Nees, l. c. 40 = R. geminiflora.
genduanus, Schweinf. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 680.—Nubia.
glanduloso-punctatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 34.—Bras.
grandiflorus, Nees, in DC. Prod. xi. 134 = R. candida.
guttatus, Nees, l. c. 140 = R. guttata.
Haenkei, Nees, l. c. 724 = R. albicaulis.
Helianthemum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 36.—Bras.
Herbstii, Hook. Bot. Mag. t. 5156 = R. Herbstii.
hirsutus, Vell. Fl. Flum. vi. t. 96 = R. geminiflora.
hispidus, Bertol. Misc. Bot. xvii. 17 = Gratiola pilosa.
Hookerianus, Nees, in DC. Prod. xi. 130 = R. Hookeriana.
Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddd. (1864) mifusa, *rcmos.*
, in Mart. Fl. Bras. ix. 89 = R. humilis.
Chapm. Fl. S. U. St. 303 = Calophanes humistrata.

DIPTERACANTHUS :—
hygraphiloid.es, Neea, in DC. Prod. xi. 121 = Ruellia hygrophiloides.
hypericoides, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 89.—Bras.
inaequifolius, Nees, L c. 48.—Bras.
incomtus, Nee», 1. c. 44.—Bras.
interrupts, Presl, Bot. Bemerk. 97.—Bras.
jamaicensis, Nees, in DC. Prod, xt 140=Blechum laxiflorum.
lacteus, Presl, Bot. Bemerk. 98 = R. lactea.
lamiiformis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 43.—Bras.
lanato-glandulosus, Nees, in DC. Prod. xi. 130.—Brat.
lanato-viscosus, Nees, 1. c. = R. lanato-viscosa.
lanceolatus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 62 = R. repens.
leucanthus, Nees, in Benth. PI. Hartw. 236.—Bras.
Lindheimerianus, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 764 = R. Drummondiana.
linearis, Chapm. Fl. S. U. St. 303 -» Calophanes angustns.
linearis, Ton. & Gray, ex Engelm. & Gray, in Bost. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 258-Calophaneslinearis.
longepetiolatus, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 124 ~R. longepetiolata.
longiflorus, Nees, in DC. Prod. xi. 117 = R. longiflora.
longifolius., Stocks, in Hook. Kew Jonrn. iv. (1852) 177-R. longifolia.
macranthus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 37 •= R. macrantha.
macrophyllus, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 125.—Mexic
matutimts, Presl, Bot. Bemerk. 94=R. patula.
menthoides, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 44 = R. menthoides.
micranthus, Engelm. & Gray, in Bost. Joum. Nat. Hist. v. (1846) 267 *"R.* strepens.
microcalyx, Neea, in DC. Prod. xi. 116.—Guiana.
microphyllus, Nees, 1. c. 143=Calophanes microphyllus 1
Mitchillianus, Nees, 1. c. 123 =R. ciliosa.
monanthus, Nees, 1. c 126 = R. monanthos.
multifolius, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 83=R. subdentata.
Nagckana, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 82 = Calophanes Nagchana,
nanus, Nees, in DC. Prod. xi. 137=R. geminiflora.
Neesianus, Mart, ex Nees, in Mart. Fl. Brag. ix. 37.—Bras.
Neoaedia, Nees, L c. 30.—Bras.
nitens, Nees, 1. c. 41.—Bras.
noctiftorus, Nees, in DC. Prod. xi. 128=R. ciliosa, noctiflora.
nudiflorus, Engelm. & Gray, in Bost. Joum. Nat Hist v. (1845) 229=R. toberosa.
oblongifolius, Chapm. Fl. S. U.St.303»Calophanes oblongifolius.
ocymoides, Presl, Bot. Bemerk. 98-R. patula.
pallidus, Nees, in DC. Prod. xi. 126=R. pallida.
paniculatus, Nees, 1. c 142 = R. paniculata.
parviflorus, Nees, 1. c. 123 *• Hemigraphis elegans I
paiulus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 82=R. patula.
Pavonianus, Nees, in IX. Prod. xi. 133=R. binora.
pilosus, Nees, 1. c. 127-R. pilosa, *Pav.*
pilosus, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 353-R. pilosa, *Linn.*
Pohlii, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 43.—Bras,
porrigens, Nees, 1. c. 41 «=R. porrigens.
procumben's.'Stei, in DC. Prod. xi. 183-R. Schlechtendaliana.
prostratus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. Ui. 81-R. prostrata.
Pumilio, Nees, in DC. Prod. xi. 121 = R. australis.
Purdieanus, Nees, 1. c 724-R. Purdieana.
Puri, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 85-R. Puri.
racemosus, Presl, Bot. Bemerk. 98.—Bras.
repens, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 129 = R. repens.
riparius, Chapm. Fl. S. U. St. 803 = Calophanes humistratus.
rosmarinus, Nees, in DC. Prod. xi. 139.—Bras.
rubiaeformis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 32.—Bras.
rubicaulis, Nees, in DC. Prod. xi. 116 = R. rubicaulis.
scandens, Glendinn. ex Lindl. Bot Reg. (1847) sub t. 23, 31 - Henfreya scandens.
Schauerianus,'Ntes, in Linnaea, xvi. (1842) 290 »R. solitaria.
Schleehtendalianus, Nees, in DC. Prod. xi. 133 sR. Schlechtendaliana.
Sckottiaflus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 32.—Bras.

DIPTERACANTHUS :—
serpyllifolius, Nees, in DC. Prod. xi. 125.—Madag.
sessilifolius, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 28.—Bras.
Sibua, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 81 - R. suffruticosa.
speciosus, Presl, Bot. Bemerk. 98 = R. macrantha.
spectabilis, Hook. Bot. Mag. t. 4494.—Peruv.
squarrosus, Fenzl, Ind. Sem. Hort. Vindob. (1868) 10. —Am. trop.
strepens, Presl, Bot. Bemerk. 97 ; Nees, in DC. Prod. xi. 121 = R. strepens.
subcapitatus, Nees, 1. c. 723 ^R. subcapitata.
subdenticulatus, Miq. in Joura. Bot. N«erl. i. (1861) 117.—China.
subringens, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 81.—Bras.
sudanicus, Schweinf. in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 679.—Afr. trop.
suffruticosus, Torr. in Bot. Mex. Bound. 122=R. Parryi.
suffruticosus, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 483 = R. suffrutioosa.
surinamensis, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 471.—Guiana.
ttmentosus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 38.—Bras.
tubercsus, Nees, 1. c. 42.—Bras.
tubiflorus, Nees, in DC. Prod. xi. 128 = R. tubiflora.
tubiflorus. Seem. Bot. Voy. Herald, 178 = R. densiflora.
turbacensis, Nees, in DC. Prod. xi. 148.—N. Granat.
urophyllus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 82 = Strobilanthes urophyllus.
vagans, Benth. ex T. Anders, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 459 = Calophanes vagaos.
ventricosus, Nees, in DC. Prod. xi. 126.—Java.
vinciformis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 86=R. vincoides.
Vindex, Nees, 1. c. 42 = R. Vindex.
visddulus, Nees, in Ind. Sem. Hort. Vnt. (1838) et (1840).—Cf. Linnaea, xvi. (1842) 291=R. visddula.
viscidus, Nees, in DC. Prod. xi. 141.—Peruv.
viscosissimus, Nees, in Mart Fl. Bras. ix. 34.—Bras.
Zeyheri, Sond. in Linnaea, xxiii. (W50) 90=R. Zeyberi.

DIPTERANTHEMTntt, F. Muell. to Wing, South Sc. Record, iii. (1884) 281. *AMARANTACEAE.*
Crosslandi, *F. MuHL I.* c—Austral.

DIPTEBANTHUS, Rodrig. Orch. Nov. ii. 282 (1881). *ORCHIDACEAE.*
pseudobulbiferus, *Rodrig. I. c.* 233.—Bras.

DIPTERIX, Willd. Sp. PI. iii. 910 (1801)=Dipte*yx, Schreb. (Legumin.).

DIPTEROCALYX, Cham, in Linnaea, vii. (1832) 241 = Iiippia, Linn. (Verben.).
glabrescens, Cham. I. c. 242 =L. hirta.
hirtus, Cham. 1. c. 241 — L. hirta.
seaberrimus, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1863-55) 647.—N. Granat.

DIPTEROCARFTJ8, Gaerta. f. Fruct iii. 50. 1.187, 188 (1805). *DIPTEROCARPEAE*, Berth. & Hook, f. i. 191.
OLEOXYLON, Wall. Cat p. 157 n. 953 (1881 ?).
PTERIGIUM, Correa, in Ann. Mas. Par. viii. (1806) 397.
acutangulus, Vesque, in Compt.-Rend. Par. lxxviii. (1874) 626=appendiculatus.
alatus, A. DC. Prod. xvi. II. 611=scaber.
alatus, *Roxb. Hort.Beng.* 42 ; *Fl. Ind.* ii. 614.—Burma.
angulatus. Dyer, in Joum. Bot. xii. (1874) 104= geniculatus.
angustifolius, *Wight tf Am. Prod.* 84,—Ind. or.
appendiculatus, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* **xxxi.** (18701 347—Ins. Banca.
bahamifcr, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 37.—Borneo.
Baudii, Korth. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Bot. 59. t. 5 = pilosus.
Beccarianus, Vesque, in Compt.-Rend. Par. lxxviii. (1874) 627 -globosu
Beccarii, Dyer, in Journ. Bot. xii. (1874) 108 -globosus.
Blancoi, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 86=grandiflorus.
ramellatus, Proc Linn. Soc. (1878-74) 6, sphalm.= lamellatus.
cordatus, Wall. Cat. n. 956-ttiberculatus.
comutus, *Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.* 296.—Malacca.

DIPTEROCARPUS :—
costatus, Gaertn. f. Fruct. iii. 50. t 187=alatus.
costatus, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 618 = angustifolius.
crinitus, *Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 296.—Malaya.
Dryobalanops, Steud. Nom. ed. II. i. 618=Dryobalanops aromatica.
elongatus, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Bot.* 62.—Borneo.
eurhynchus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 485.—Borneo,
eurynchioides, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 346.—Ins. Banca.
fagineus, *Vesque, in Compt.-Rend. Par.* lxxviii. (1874) 625.—Borneo,
fulvus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 87.—Ins. Philipp.
geniculatus, *Vesque, in Compt.-Rend. Par.* lxxviii. (1874) 626.—Borneo.
glandulosus, *Thm. Enum. PI. Zeyl.* 34.—Zeylan.
globosus, *Vesque, in Compt.-Rend. Par.* lxxviii. (1874) 627.—Borneo.
gonopterus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1868)1. 576 = alatus.
gracilis, *Blume, Bijdr.* 224.—Java,
grandiflorus, *Blanco, FL Filip.* ed. II. **814.—**Ins. Philipp.
grandiflorus, Griff. Notul. iv. 515 = Griffithii.
grandiflorus, Wall. Cat. n. 957 = tnberculatus.
grandifolius, *Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat.* i. 214.—Siam.
grandifolius, Teysm. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 214-=tnberculatus.
Griffithii, *Miq. I. c.* 218.—Burma.
Guiso, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 813 = Anisoptera Guiso.
Hasseltii, Blume, Fl. Jav. Dipter. 22. t. 6 = trinervis.
hirtus, Vesque, in Compt.-Rend. Par. lxxviii. (1874) 627 = crinitus.
hispidus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 83.—Zeylan.
kispidus, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 20 =vemicifluus.
incanus, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 614.—Burma.
indicus, Bedd. in Conserv. For. Rep. (1864-65) 17= turbinatns.
insignis, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 34.—Zeylan.
insularis, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 241.—China.
intricatus, *Dyer, I. c.* xii. (1874) 105.—Borneo.
laevis, Buch.-Ham. in Trans. Wern. Soc. vi. (1829) 299 = turbinatus.
lamellatus, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 169.—Borneo,
lampongus, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 346.—Sumatra.
Lemeslei, *VeSque, in Compt.-Rend. Par.* lxxviii. (1874) 626.—Ins. Pulo-Condor.
littoralis, *Blume, Bijdr.* 224.—Java.
Lowii, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 160. —Borneo.
macrocarpus, Vesque, in Compt-Rend. Par. lxxviii. (1874) 627-pilosus.
Malaanonan, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 312 = Shorea Malaanonan.
Mangachapoi, Blanco, 1. c. 818 = Shorea Mangachapoi.
marginatus, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Bot.* 64.—Borneo.
May apis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 318 = turbinatus.
microcarpus,Z\pp.ex Miq. Fl. Ind. Bat i. II. 501 = Anisoptera polyandra.
Mottleyanus, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xxiii. (1862) 159=grandiflorus.
nobilis, Dyer, in Joum. Bot. xii. (1874) 106=stellatus.
nudus, *Vesque, in Compt.-Rend.* ***Par.*** lxxviii. (1S74) 626.—Borneo,
oblongifolius, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 86.—Borneo.
oblongifolius, Thw- Enum. PI. Zeyl. 38=hispidus.
oblongus, A. DC. in. DC. Prod. xvi. II. 608=hispidus.
obtusifolius, *Teysm. ex Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* L 214.—Burma.
Palosapis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 812.—**Ins.** Philipp.
parviflorus,Z\pp. in Alg. Konst. en Letter-bode, i. (1829) 297=Anisoptera polyandra.
pentagonus, *A. DC. in DC.Prod.in.* II.610.—Borneo.
pentaptenu, **Dyer, in Joum. Bot xii. (1874) 106 = nudus.**

DIPTEROCARPUS :—
pilosus, *Roxb. Hort. Beng.* **[98];** *Fl. Ind.* ii. 615.—Burma; Malaya.
plagatus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 311=Anisoptera plagata.
polyspeimus, *Blanco, 1. c.* 312.—Ins. Philipp.
prismaticus, Dyer, in Joum. Bot. xii. (1874) 104= fagineus.
pterygocalyx, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 347 = grandiflorus.
quinquegonus, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 36 = pentagonus.
retusus, *Blume, Cat. Gem. Buitene.* 77.—Java,
scaber, *Buch.-Ham. in Mem. Wern. Soc.* vi. (1826) 300. —Ind. or.
scabridus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 34.—Zeylan.
Spanoghei, *Blume, Fl. Jav. Dipter.* i. 16. t. 3.—Java.
stellatus, *Vesque, in Compt. Rend. Par.* lxxviii. (1874) 626.—Borneo.
stenopterus, *Vesque, 1. c.* 625.—Borneo.
Tampurau, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Bot.* 63. —Borneo.
teres, Steud. Nom. ed II. i. 518 = Dryobalanops aromatica.
thurifer, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 310-Anisoptera thurifera.
trinervis, *Blume, Cat. Gem. Buiteng.* 78.—Java,
turbinatus, *Gaertn. f. Fruct.* iii. 51. t. 188.—Ind. or.i Malaya,
tuberculatus, *Roxb. Hort. Beng.* [93] ; *Fl. Ind.* ii.614. —Burma.
undulatus, Vesque, in Compt.-Rend. Par. lxxviu- (1874) 626= Lowii.
validus, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 86.—Borneo,
vemicifluus, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 814; *Blume, Mus-Bot. Lugd. Bat.* ii. 85.—Ins. Philipp.
vestitus, *Wall. Cat.* n. 954.—Burma,
zeylanicus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 83.—Zeylan.

DIPTEBOCOME, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 26 (1835). *COMPOSITAE*, Benth. & HOOK. f. «• 454.
JAUBERTIA, Spach, in Jaub. & Spach, Illustr. m- »*• t. 289 (1849).
pusilla, *Fisch.* V *Mey. I. c*—Persia.

DIPTEROSPERMA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) .«• Beibl. 28=Stereospermum, Cham. (Bignoniac).
personatum, Hassk. 1. c.=S. caudatum.

DIPTEROSPERMUM, Griff. Notul. iv. 564 (1854)" Gtordonia, Ellis (Temstroem.).

DIPTEROTHECA, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, ≥*•• (1841) I. Intell. 42; et xxv. (1842) **434**=ASP"1*' Thou. (Compos.).
Kotschyi, Sch. Bip. ex Hochst. 11. cc 42, 436 -*• Kotschyana.

DIPTERYGIA, Presl, ex DC. Prod. iv. 80 (1830) «A B, teriscium, Cham. & Schlecht. (Umbell.)-
capitata, Presl, ex DC. 1. c. = A. polycephalum.
isatidicarpum, Presl, ex DC. 1. c.-=A. isatidicarpum-

DIPTEBYGIUM, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sen H-»* (1885) 66. t. 3. *CRUCIFERAE*, Benth. & HOOK- **. 95.**
'PTEROLOMA, Hochst.& Steud.ex Steud.Nom.ed-IJ- ii. 413 (1841).
glaucum, *Decne. I. c.* 67.—Ind. or.; Arab.
scabrum, Decne. ex Boiss. Fl. Orient, i. 417, »*" glaucum.

DIPTERYX, Schreb. Gen. 485 (1791). *LEGU-MINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 551.
BARYOSMA, Gaertn. Fruct. ii. 78. t. 93 (179D-
BOLDUCIA, Neck. Elem. iii. 32 (1790). „775),
COUMAROUNA, Aubl. PI. Gui. 740. t. 296 (1" nomen prius.
HEINZIA, Scop. Introd. 301 (1777).
TARALEA, Aubl. PI. Gui. 745. t. 298 (1776).
alata, *Vog. in Linnaea*, xi. (1837) 383.—Bras.
applanata, Benth. in Hook. Kew Joura. rt- *K*—oppositifolia.
coreaca, *Klotzsch, in Schomb. Faun, et* *• 1206, nomen.—Guiana.
crassifolia, *Benth. in Hoot. Kew Journ.* li. (V—Guiana.

DIPTERYX:—

"narginata, Spreng. ex Walp. Rep. i. 805 = Pterodon emarginatus.
nndipes, *Tul. in Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 100.—Brag.
odorata, *Willd. Sp. PI.* iii. 910.—Guiana.
olerfera, *Benth. in Hook. Ken, Journ.* ii. (1850) 235.—Honduras.
oppositifolia, *Willd. Sp. PI.* Mi. 910.—Guiana.
pannflora, Spruce, ex Benth. in Town. linn. Soc. iv. Suppl. (I860) 126=oppositifolia.
pteropus, *Mart, in Flora,* xx. (1887) n. *Beibl.* 127.—Bras.
pterota, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) H0=alata.
reticulata, *Benth. in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 285.—Guiana,
rosea, *Spruce, Benth. in Journ. Linn. Soc.* **iv.** *Suppl.* (I860) 125.-Bias,
tettaphylla, *Benth. I. c*—Bras.

DIPTTCHANDBA, Tul. in Ann. Sc Nat. Sér. IL (1848) 189. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 562.

aurantiaca, *Tul. I. c*—Bras,
epunctata, *Tul. I. c*—Bras,
glabra, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 62.—Bras.

DIPTYCHOCABPTTS, Trantv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (I860) I. 108. *CRUCIFERAE,* Benth. * nook. f. i. 67.

ALLOCERATIUM, Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 129.
"'spidus, *Regel, in Act. Hart. Petrop.* **v. (1877) 230.**—Juikestan.
"'gae, *Regel &• Schmalh. 1. c.* 281.—Turkestan.
«rawschanicus, *Regel V Schmalh. I. c*—Turkestan.
Mnctus, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxiii. (1860)** 1.108.—Reg. Casp.; Afghan.

DIPTYCHUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 81 (1867) = •wweria, Scop. (Gramin.).
entleum, Dulac, 1. c. 82=S. coeralea.

JHENA, Hook. Bot. Misc. i. (1880) 358. *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1146.
WILSONIA, Gill. & Hook. 1. c: 172. t. 49 (1830).
*«*ntata,* Phil, in Linnaea, xxix. (1857-68) 22=Baillonia juncea.
glaberrima *Gmv ,,,,* ,in Bot Misc ,i- (1880) 12.
am.
valdiviana, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 21 - Baillonia juncea.
lsonia, Phil. f. Cat PI. Vast Cbil. 217, sphalm. = g'aberrima.

DIRACHMA, Schweintex Bait f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. (3884) 403. *GERANIACEAE.*
<wrana, *Schweinf. ex Balf.f. I. c.* 404.—Ins. Socotr.

A 0DES, Blnme. ****• H. Jav. i. 65 (1827) = «?n««m. Linn. (Scitamin.).
javanica, Blume, 1. c,—Java.

DI, Amn. Diss. Chen. 17 (1751); Amoen. Acad. t. 91 (766), *THYMELAEACEAE,* Benth. & Hook.
J Adans. Fam. «• 286 (1768).
lis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **viii. (1873)** Calif.
Linn. Sp. PI. 858.—Am. bor.

DIRCA, Al Decne. in Rev. Hortic. Se>. III. ii. (1848) 466
O«8nera, Mart.
f'f"". Regel, Gartenfl. ii. (1852) 36-G. Blassii.
oulbosa.
"•Jtfiwfo, Regel, Gartenfl. ii. (1858) 85. t 41 = G. cardinajis.
"g^Decne. in Rev. Hortic. Sir. IIL ii. (1848) 466 - open.
fascialis, Decne. 1. c.-G. faucialis.
Houttei, niagninca.
Deene. 1. c.-G. lateritia.
Lem. J"d. Fleur. »•• (1852-58) t. 219 = G. cardinalis.
"'antha, Lem. ninstr. Hortic iL (1865) t 64 = «• nucrantha.

DIRCAEA :—
magnifica, Decne. in Rev. Hortic. Sér. HI. ii. (1848) 466 = G. magnifica.
picta, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852-58) t. 302 = Isoloma pictum.
reflexa, Decne. in Rev. Hortic. Sér. III. ii. (1848) 466 «G. reflexa.
Suttoni, Decne. 1. c.=»G. Snttoni.
Vauthieri, Decne. 1. c.=G. Vauthieri.

DIRHACODES, Lem. in Orb. Diet. v. 73 (1849)-DIRACODES, Blume = Amomum, Linn. (Scitam.).

DIRHYNCHOSIA, Blume, Mil. Bot. ex Flora, xli. (1858) 254 = 8piraeopsis, Miq. (Saxifrag.).
celebica, Blume, 1. c.=*S. celebica.

DtaiCHIiETIA, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1868) 494. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 66.
glabra, *Klotzsch, I. c.—hft.* **trap,**
glaucescens, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **Iii. 61.**—Afr. trop.
insignis, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 117 = seq.
Kirondron, Vatke, 1. c. =Carphalea Kirondron.
lanceolata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edini.* **ri. (1882)** 835.—Ins. Socotra.
obovata, *Balf.f. I. c*—Ins. Socotra.
Pervilleana, Vatke, in Bremen, Abh. ix. (1885) 117 = Carphalea Pervilleana.
pubescens, *Klotesch, in Monatsb. Akad. Berl.* **(1853)** 494.—Afr. trop.
venulosa, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* **xi. (1882)** 834.—Ins. Socotra.

DIRTEA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 69 (1836) = **Commelina,** Linn.
africana, Rafin. I. c. iv. 122=C. africana.
japonica, Rafin. 1. c iii. 69=Aneilema japonicum.

SI8A, Berg. FL Cap. 848 (1767). *ORCH1DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 680.
GAMARIA, Rafin. Fl Tellur. iv. 49 (1836).
HERSCHEUA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 362 (1888).
MONADENIA, Lindl. 1. c. 866 (1838).
FENTHEA, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446 (1836).
REPANDRA, Lindl. Orch. Seel. 12 (1826).
SCHIZODIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 358 (1888).
aconitoides, *Send, in Linnaea,* xix. (1847) 91.—Afr. austr.
aemula, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* **xxii. (1885) 69.**—Afr. austr.
affinis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* xxiv. (1885) 402.—Afr. austr.
alpina, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* **vii. (1864) 220.**—Afr. trop.
atricapilla, *Bolus, I. c.* xix. (1882) 844.—Afr. anstr.
atropurpurea, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 96.—Afr. austr.
attenuate, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 851.—Afr. austr.
aurantiaca, *Reichb. f. in Flora,* 1. (1867) 98.—Afr. trop.
barbata, 5a>. *in Vet. Acad. Handl.* xxi. (1800) 212.—Afr. austr.
Barelli. *Hort. ex De Puydt, Us Orchid.* **(1880) 276. t** 18.—Afr. austr.
bifida, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 212.—Afr. austr.
Bodkini, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* **xxii. (1885) 74.**—Afr. austr.
borbonica, *Balf. f. V Moore, in Journ. Bot.* **riv. (1876)** 298.—Ins. Borbon.
brachyceras, Emtf. *Gen. etSp. Orch.* 355.—Afr. austr.
bracteata, Lindl. 1. c. 354=cylindrica.
bracteata, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 211.—Afr. austr.
Buchenaviana, *Kraent*. in Bremen, Abh.* vii. (1882) 261.—Madag.
capricornis, Reichb. f. in Linnaea, xx. (1847) 692 = gladioliflora.
caulesceus, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 351.—Afr. austr.
Cephalotes, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* **106.—Afr.** austr.
ceroua, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 211.—Afr. austr.
Charpentieriana, *Reichb. f. in Linnaea,* nt. (1847) 668.—Afr. austr.

DISA:—
chrysostachya, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi.** (1800) 211.—Afr. anstr.
coerulea, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 119=Brownleea caerulea.
Cooperi, *Reichb. f. in Flora,* lxiv. (1881) 828—Afr. austr.
corauta, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 210.—Afr. austr.
crassicomis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 848.—Afr. austr.
cylindrica, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 218.—Afr. austr.
Deckenii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 105.—Afr. trop.
draconis, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 210.—Afr. austr.
elegans, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 182.—Afr. austr.
equestris, *Reichb. f. I. c.* 181.—Afr. trop.
excelsa, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 218, excl. syn.—Afr. austr.
excelsa, Thunb. ex N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 479=venosa.
extinctoria, *Reichb. f. in Flora,* lxiv. (1881) 828.—Afr. austr.
ftsdata, *Lindl. Gen. ei Sp. Orch.* 350.—Afr. austr.
ferruginea, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi.** (1800) 210.—Afr. austr.
filicornis, Thunb. Fl. Cap. i. 87= patens,
flexuosa, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 212.—Afr. austr.
gladioliflora, *Burch. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **352.**—Afr. austr.
glandulosa, *Burch. ex Lindl. I. c.* 351.—Afr. austr.
gracilis, Lindl. 1. c. 848=chrysostachya.
graminifolia, *Ker-Gawl. in Brande, Journ.* **vi. (1819)** 44.1.1.—Afr. austr.
grandiflora, Linn. f. Suppl. 406=uniflora.
Harveiana, *Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot.* **i.** (1842) 15.—Afr. austr.
hemisphaerophora, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 106 = stachyoides.
hians, Spreng. Syst. iii. 698 =lacera.
hircicomis, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 105.—Afr. trop.
Huttonii, Reichb. f. 1. c-sanguinea.
incamata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 348.—Madag.
inflexa, *Mundt, ex Lindl. I. c.* 860.—Afr. austr.
lacera, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi. (1800)** 212.—Afr. austr.
laeta, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* **106.—Afr. austr.**
leptostachys, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 98 = tenuis.
lineata, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 74.—Afr. austr.
longicornis, Thunb. Prod. PI. Cap. 4 = seq.
longicomu, *Linn.f. Suppl.* 406.—Afr. anstr.
longifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 349.—Afr. anstr.
lugens, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* **xx. (1884) 483.**—Afr. austr.
Macowani, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* **106.—Afr.** austr.
macrantha, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi.** (1800) 210.—Afr. austr.
macroceras, Reichb. f. Otia Bot Hamb. 119=Brownleea caerulea.
macroglottis, Sond. ex Drège, in linnaea, xx. (1847) 219, nomen=Charpentieriana.
maculata, Harv. ex Lindl. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 15 = ocellata.
maculata, *Linn. f. Suppl.* 407.—Afr. anstr.
megaceras, Hook. f. Bot. Mag. t. 6529=crassicomis.
melaleuca, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* **xxi.** (1800) 213.—Afr. austr.
minor, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 182.—Afr. austr.
modesta, Reichb. f. in Linnaea, xx. (1847) 690 = vaginata.
montana, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 90.—Afr. austr.
multifida, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 853.—Afr. austr.
natalensis, Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 16 = polygonoides.
neglecta, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 100.—Afr. austr.
nervosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 852.—Afr. austr.
obtusa, *Lindl. 1. c.* 365.—Afr. austr.
ocellata, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* **xx. (1884) 477.**—Afr. austr.

DI8A:-
ochrostachya, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 181.—Afr. trop.
oligantha, *Reichb.f. I. c.* 182.—Afr. anstr.
ovalifolia, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 98.—Afr. anstr.
parviflora, Reichb. f. Otia BoL Hamb. 119-Brownleea parviflora.
parrilabris, Bolns, in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 844 = oligantha.
pmtens, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xzi. (1800) 214.—Afr. austr.
patens, Thnnb. Fl. Cap. i. 85 = tenuifolia.
patula, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 94.—Afr. austr.
physodes, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 211.—Afr. anstr.
physodes, Thnnb. Fl. Cap. i. 71 •= Mooadenia inflata.
picta, *Sond. in Linnaea.* zix. (1847) 99.—Afr. anstr.
polygonoidei, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 849.—Afr. austr.
porrecta, [Kei-Gawl. in] Journ. Sc Roy. Instit. v. (1818) t. 1. f. 1-ferrnginea.
porrecta, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 211.—Afr. anstr.
prasinata, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. t. 210=cernua.
propinqua, *Sond. in Linnaea,* zix. (1847) 96.—Afr. anstr.
pulchella, *Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss,* ii. 801.—Abyss,
pulchra, *Sond. in Linnaea,* zix. (1847) 94.—Afr. anstr.
porpurascens, *Bolus, in Joum. Linn. Soc.* zx. (1884) 482.—Afr. anstr.
pygmaea, *Bolus, I. e.* zxii. (1885) 72.—Afr. austr.
racemosa, *Linn.f. Suppl.* 406.—Afr. austr.
recurvata, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 119 = Brownleea recnrvata.
reflexa, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 182 = patens,
reticnlata, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 73.—Afr. anstr.
Richardiana, *Lem. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 361.—Afr. austr.
rosea, *Lindl. 1. c.* 350.—Afr. anstr.
rufescens, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 210.—Afr. austr.
Rutenbergiana, *Kraentu. in Bremen, Abh.* vii. (1882) 262.—Madag.
sagittalis, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 212.—Afr. austr.
sanguinea, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 97.—Afr. anstr.
schizodioides, *Sond. I. c.* 92.—Afr. anstr.
Scnllyi, *Bolus, in Joum. Linn. Soc.* xxii (1885) 70.—Afr. austr.
icntellifera, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ziv. (1840) 272.—Abyss.
secunda, Sw. in Vet Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 213 = racemosa.
spathulata, *Sw. I. c*—Afr. austr.
itachyoides, *Reichb. f. in Flora,* Ixiv. (1881) 328.—Afr. austr.
stricta, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 91.—Afr. anstr.
tabnlaris, *Sond. I. c.* 99.—Afr. austr.
Telipogonis, *Reichb. f. 1. c.* zx. (1847) 689.—Afr. anstr.
tenella, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxL (1800) 212.—Afr. anstr.
tennicomis, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 68.—Afr. austr.
tennifolia, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* zxi. (1800) 214.—Afr. austr.
tennis, *Lindl. Gen. el Sp. Orch.* 854.—Afr. anstr.
torta, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 211.—Afr. anstr.
triloba, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 351.—Afr. austr.
tripartite, *Lindl. 1. c.* 353.—Afr. austr.
nncinata, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1884) 478.—Afr. austr.
uniflora, *Berg. Desc. PI. Cap.* 848.—Afr. anstr.
vaginata, *Ham. ex Lindl. in Hook. Lond. Joum. Bot.* I. (1842) 16.—Afr. anstr.
venosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 361.—Afr. austr.
venosa, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 213.—Afr. austr.
venusta, *Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx.* (1884) 482.—Afr. austr.
versicolor, *Reichb.f. in Flora,* xlviii. (1865) 181.—Afr. trop.

DISA:—
Walleri, *Reichb.f. Otia Bot. Hamb.* 105.—Afr. trop.
Welwitschii, *Reichb:/. in Flora,* xlviii. (1866) 181.—Afr. trop.
Zeyheri, Sond. in Linnaea, xiz. (1847) 95=ferrnginea.

DISACHOENA, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nelrl. Indie, i. (1844) 488, nomen. *UMBELLIFERAE (QniAl).*

DISADENA, Miq. Stirp. Surin. 160 (1850) = Voyri», Aubl. (Gentian.).
flavescens, Miq. 1. c. = V. flavescens.

DI8AKI8PEB.MA, Steud. Syn. PI. Gram. 287 (1856). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1096.
mexicana, *Steud. I. c*—Mexic

DISANDRA, Linn, in Mnrr. Syst. ed. XIII. 290 (1774) = Sibthorpia, Linn. (Scrophnl.).
DISTANDRA, link, Enum. Hort. Berol. i. 354 (1821).
africana, Linn. Syst. ed. Reich, ii. 137 " S. africana.
prostrata, Murr. Syst. ed. XIII. 290=S. peregrina.

DI8A1TTHTJ8, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. x. (1866) 485. *HAMAMELIDEAE,* Benth. & Hook, f. i. 1006.
cercidifolia, *Maxim. I. c.* 486.—Japon.

DISARRENUM, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 82. t. 232 (1806)=Hieroohloe, S. G. Gmel. (Gramin.).
antarcticum, Labill. L c. 83. t. 232 «=H. antarctica.

DISARRHENUM, Beanv. Agrost. 62 (1812) = praec

DISCANTHERA, Ton. *Sc* Gray, Fl. N. Am. 696 (1840) - Cyclanthera, Schrad. (Cucurbit).
dissecta, Torr. & Gray, 1. c. 697 - C. dissects.

BISCANTHUS, Spruce, in Joum. Linn. Soc iii. (1859) 196=CyclanthuB, Poit *i*
odoratus. Spruce, 1. c.=C. bipartitns.

DISCABIA, Hook. Bot. Misc. i. (1830) 156. t. 44, 46. *RHAMNEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 383.
NOTOPHAENA, Miers, in Ann. *Be* Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (I860) 267.
OCHBTOPHILA, Poepp. ex Reiss. in Endl. Gen. 1099 (1840).
TETRAPASMA, G. Don, Gen. Syst. ii. 40 (1832).
americana, *Gill. & Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 166.—Reg. Argent.
aphylla, *Meyen, Reise,* i. 488.—Peruv.
articulata, *Miers, Contrib.* i. 805, errat—Chili,
australis, *Hook. Bot. Misc.* i. 157, in note, t 45.—Austral,
crenata, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1860) 50.—Hab. ?
febrifuga, *Mart. Syst. Mat. Med. Veg. Bras.* 87.—Bras,
longispina, *Miers, in Ann.* to* *Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (1860) 373.—Reg. Argent,
lycioides, *Miers, 1. c.* 372.—Uruguay,
parviflora, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 229.—Ins. Galapag.
pauciflora, *Hook.f. 1. c.*—Ins. Galapag.
serratifolia, *Benth. & Hoot. f. ex [Mast, in] Gard. Chron.* (1876) II. 324, in nota.—Chili; Patag.
spicnlata, *Miers, in Ann. ff Mag. Nat. Hist.* Ser. III. v. (1860) 374.—Reg. Argent.
Toumatou, *Raoul, Ckoix PI. Nouv. Zil.* 29.—N. Zel.

DISCHANTHIUM, Kunth, Enum. PI. i. 498(1883)-DICHANTHIUM, Willem.-Androposon, Linn. (Gramin.).

DISCHEMA, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 566 (1846)-Hltobenia, Wall. (Sdtamin.).
glaucum, Voigt, 1. c = H. glauca.

DISCHIDIA, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 32. *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 777.
COLLYRIS, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 613 (1857).
COLYRIS, Vahl, in Skrift. Nat Seisk. Kiobenh. vi. (1810) 110.
CONCKOPHYLLUM, Blume, Bijdr. 1060 (1826).
LEPTOSTEMMA, Blume, L c 1057 (1826).

DI8CHIDIA:-
acutifolu, *Maingay, ex Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 51.—Malacca.
albida, *Griff. Notul.* iv. 46.—Malacca.
albiflora. Griff. 1. c. 47 = D. Collyris!
angustifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 512.—Java,
benegalensis, *Colebr. in Trans. Linn. Soc.* zii. (1818) 357.1.15.—Ind. or.; Malaya.
Brunoniana, Griff. Notul. iv. 44 = hirsnta.
chinensis, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 55.—China.
clavata, *Wall. Cat.* n. 4209; *PI. As. Rar.* ii. 36.—Burma,
coccinea, *Griff. Notul.* iv. 46.—Malacca,
cochleata, *Blume, Bijdr.* 1060.—Java.
Collyris, *Wall Cat.* n. 4207.—Malaya,
complex, *Griff. Notul.* iv. 50.—Malacca,
crassifolia, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 324; nomen.—Ins. Timor.
cuneifolia, Wall. Cat. n. 4206 •= bengalensis.
fasciculata, Decne. in DC. Prod. viii. 632 =hirsuta.
formosana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) 385.—Ins. Formosa.
Gaudichaudii, *Decne. in DC. Prod.* viii. 682.—Jav«; Ins. Timor.
Griffithii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 51.—Burma,
hirsuta, *Decne. in DC. Prod.* viii. 632.—Burma i Malaya.
Horsfieldiana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 510.-Java.
imbricata, Steud. Nom. ed. II. i. 519 = D. Collyris.
khasiana, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 50.—Reg. Him*'-
lanceolate, *Decne. in DC. Prod.* viii. 631.—Java,
latifolia, *Decne. 1. c.*—Java,
lutescens, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 824, nomen.—Ins. Timor,
nicobarica, *Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 189.—Ins. Nicobar.
Nummularia, Blume, Bijdr. 1059 = Gaudichaudii.
Nnmmularia, *R. Br. Prod.* 461.—Ind. or.; Malay**i*
Austral.
obovata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 633.—Java.
obovata, Griff. Notnl. iv. 51 = Griffithii.
orbicularis, Decne. in DC. Prod. viii. 682 = Nummularia.
ovata, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* ii. 0-226.-N. Guinea,
oxyphylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv-141-"" Ins. Celebes.
peltata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 148.—" Guinea.
picta, *Blume, I. c.*—*H.* Guinea.
pruinosa, Zipp. ez Blume, Rumphia, iv. 80 = Hoya pruinosa.
puberula, *Decne. in DC. Prod.* viii. 681.—»* Mariann.
punctata, *Decne. I. c.*—Java.
Rafflesiana, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 35. t 142.—A* Austral, trop.
rhombifolia, *Blume, Bijdr.* 1059.—Java.
Rumphii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 509.—Ins. Amboffl*-
sagittata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 681.—Java.
spatulata, Blume, Bijdr. 1060 = bengalensis.
Spironema, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xzv. (« » " II. 324.—Java.
timorensis, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. P*-(1834) 377.—Ins. Timor,
truncata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 632.—Java.
viridescens. Griff. Notul. iv. 49 = Rafflesiana.
Wallichii, *Wight, Contrib.* 48.—Singapore.

DISCHIDIUM, Reichb. Handb. 269 (1837)=Vfo Wl Tourn.
biflorum, Opiz, Sezoam, 38 = V. biflora.

DISCHIMIA, Reichb. Consp. 121 (1828)-seq.

DISCHISMA, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. II. (1823) 98. *SELAGINEAE,* Benth. & » « * • ' • 1128. , Afr•
arenarium, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* 251.—austr. , •* tl.
capitatum, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Genev-* »• (1823) 94.—Afr. austr. . .M
chamaedryfolium, Walp. Rep. iv. 148=erinoide»•
ciliatnm, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Genev.* »• (1828) 94.-Afr. austr. -gj.-
clandestinum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* *» Afr. austr. JJ,
erinoides, *Sweet, Hort. Bnt.* ed. II. 414.—Afr. •"

DISCHI8MA:-
flaccum, E. Mey. ComralPl. Afr. Aostr. 250=ertooides.
fruticosum, *Rolfe, in Voirn. Linn.Sec.* xx. (1888) 861. -Afr.au.tr.
Mspidum, Sweet, Hort fyit cd. II. 116; Choisy, in DC. Prod. xii. 7=cHiatum.
leptostachyum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 261.—Afr. austr.
spicatum, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Gentv.* ii. II. (1823) 94.-Afr. anstr.

IUSCHLIS, Phil. Sert. Mendoc. Alt 61 (1871), sphalm. =Difltichlis, Rafin. (Gramin.).

MSCHORISTE, D. Dietr. Syn. PI. iii. 686 (1848) = DYSCHORISTE, Nees = Calophanea, D. Don (Acanth.).

W8CIPHA3JIA, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1.168 t. 38 (1864). *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f.i.960.
Ernstii, *Eichl. in Jahrb. Bot. Cart. Berl.* ii. (1883) 329.-Venezuela.
lobata, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 169. t. 36. f. 1. —Bras.

DISCOCACTUS, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. v. (18S7) 241; et in Nov. Act. Nat Cur. xix. I. (1839) 117.115. *CACTEAE*, Benth. *Sc* Hook, f. i. 848.
alteolens, *Urn. ex A. Dietr. in Allg. Garten**, xiv. (1846) 202.—Bras.
fyormis, Walp. Rep. v. 817, sphalm.=Phyllocactns , bifonnis.
"isjgnis, *Pfeiff. ,M otto V Dietr. Allg. Garttat.* v. (1837) 241f *etin Nov. Act. Nat. Cur.* xix. I. (1839) 119.—Ind. occ.
Lehmanni, *Pfeiff. I. c.* xix. I. (1889) 120.—Hab. ?
LmWi, *Pfeiff. I.e.*—Hab.?
tncornis, *Monv. ex Pfeiff. if Otto, Ai&ild. Caeteen*, ii. t. 28.—Bras.

DlSCOCACTUS, Walp. Rep. v. 877 (1858), sphalm. -DISOCACTUS, Lindl- PhyUocsaotuB, Lmk (Cact.).

OISCOCAPNOS, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 669=Fumaria, Linn. (Papav.).
Mundtii, Cham. & Schlecht. 1. c.-F. Mnndtii.

DI8COCABPT7S, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 201. t. 9. *EUPHORBJACEAE*, Benth. & Hook. f. a 269.
"asiliensis, *KlotBsch, I. c*—Bras,
faeqneboensis, *Klot*sch, I.* c-Guian.
apruceanus, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxxu. (1868) 7B. —Bras.

niSCOCARPUS, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (WH) 808-Laportea, Gaudich. (Urticae.).
"»«Voni«, Liebm. 1. c. 809=L. platycarpa.
n'*caraguensis*, Liebm. L c.=L. nicaraguenas.

WSCOLENTA, Rafin. New Fl. Am. iv. 48 (1886) i Fl. Tellnr. iii. 15 (i836)=Folreonum, Tonm.
lopathifolia, Rafin. Fl. Tellur. iii. 16-P.lapathifohnm.
Pvnctata, Rafin. New Fl. Am. iv. 48 = P- pwictatum, Rafin.
W«*»-a, Rafin. 1. c.; Fl. Tellur. iii. 16 - P. lapathifoliumt

DISCOBITJM, Benth. in Ann. Wien. Mus. i ij. (1888) 105. *LEGVMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 516.
f.ongatnm, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 78.—Bras,
{urtum, *Benth. I. c*—Bras.
JfPtophyllum, *Benth. 1. c.* 72.—Bras.
Psoraliatfolhim, *Benth. I. c*—Bras.
P'chellum, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 106.—Bras.

DlSCOMELA, Rafin. Neogenyt. 8 (1825) - Helian-"*tta, Linn. (Compos.).
a*gu*tifolius*, Rafin. 1. c. =H. angnstifolius.
"*orubens*, Rafin. 1. c = H. atrornbens.
'Parsiflorus, Rafin. 1. c. - H. atrorubens.

DI8COFHORA, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat Hist g^n. x. (1852) 1)8. *OLACINEAE*, Benth. & Hk. f. i. 35.
KuMME»iA, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1276 (18401).
i, H9._Guiana.

DISCOPHYTUM, Miers, in Iindl. Veg. Kingd. 701 (1847) = Calyoera, Cav.

DISCOPLEtniA, DC. Coll. Mlm. v. 88(1829); et Prod. iv. 106 (1880). *UMBEU.1FERAE*, Benth. & Hook. f. i. 906.
DAUCOSMA, Engelm. *h* Gray, ex A. Gray, in Bost Joum. Nat. Hist. vi. (1850) 210.
PTILIMNIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192.
capilUcea, *DC. Coll. Mim.* T. 88. t. 8.—Am. bor.
capillacea, Hook. 8c Am. Bot Beech. Voy. 142 = Apiastram angustifolium.
costata, Steud. Nom. ed. II. i. 520-capillacea.
daucifolia, Benth. & Hook. *f.* Gen. i. 907-=Seseli daucifolinm.
juncea, Stend. Nom. ed. II. i. 520=NuttaUii?
laciniata, *Benth. tr Hook. f. ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* 420.—Am. bor.
NuttaUii, *DC. Coll. Mim.* v. 89. t 9.—Am. bor.

DISCOPLIS, Rafin. New Fl. Am. iv. 9 (1836) -Drypetes! Vahl (Euphorb.).
serrata, Rafin. 1. c—Florida; Cuba.

DISCOPODIXTSI, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 29. *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 893.
penninervium, *Hochst. 1. c.*—Abyss.

DISCOPODIUM, Steud. Syn. PI. Cyp. 150 (1855)-Tricostularia, Nees (Cyperac.).
Drummondii, Steud. 1. c.=T. compressa, Neesii.

DISCOREA, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 672 (1858) sphalm. = Dioscorea, Linn.

DISCOSPERMUM, Dalz. in Hook. Kew Jonrn. ii. (1850) 257-DiploBpora, DC. (Kubiac).
apiocarpum, DaU. 1. c.=Diplosp. apiocarpa.
Daltellii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 158 - Diplosp. Dalzellii.
erythrosporum, Thw. 1. c.-Diplosp. erythrospora.
sphaerocarpum, Dalz. in Hook. Kew Jonrn. ii. (1850) 257=Diplosp. sphaerocarpa.

DISCOSTIGMA, Hassk. in Flora, XJV. (1842) II. Beibl. S3 = Garcinia, Linn. (Gnttif.).
acuminatum, Planch. *8c* Triana, in Ann. Sc. Nat Sir. IV. xiv. (1860) 864 <-G. terpnophylla.
caudatum, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 217, in textu = G. rostrata.
corymbosa, Panch. & Sebert, Not. Bois Nouv. Caled. 224.—N. Caled.
febrile, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 496-G. cornea.
grandifolium, Choisy, in Zoll. Syit. Verz. Ind. Archip. 149, 150 = G.giandifolia.
merguense, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xiv. (1860) 368 - G. mcrgnensis.
rostratum, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 33 = G. rostrata.
mtiense, A. Gray, Bot U. St Expl. Exped.). 216.1.16 = G. vitiensis.
teylanicum, Planch. *Sc* Triaaa, in Ann. Sc Nat. Ser. IV. xiv. (1860) 864-G. terpnophylla.

DISCOVIUM, Rafin. in Joum. Phys. lxxxlx. (1819) 96-Iiepidium 1 Tourn. (Crncif.).
gracile, Rafin. 1. c.-L. virginicnm I
ohiotense, DC. Syst. ii. 700=L. virginicnm t

DISCURAINIA, Walp. Rep. i. 163 (1842) = DESCURAINIA, Webb=Si8ymbrium, linn. (Crncif.).

DISCUREA, Schur, Enum. PI. Transs. 54 (1866)-Siflymbrium, Linn. (Crucif.).
Sophia, Schur, 1. c.=S. Sophia.

DISECOCARPUS, Hassk. in Flora, xlix. (1886) 211-Coiniiieliiia, Linn.
Kotschyi, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii 173=C. Kotschyi.
polygamus, Hassk. Commel. Ind. 9 - C. communis.

DISELMA, Hook. f. Fl. Tajm. i. 363. t. 98 (1860) = Rtwoya, Hook. f. (Conif.).
Archeri, Hook. f. 1. c - F. Archeri.

DISEMMA, Ubill. Sert. Anstr. Caled. 78. t. 79 (1824)-FaesifloTa, Linn.
adianthifolia, DC. Prod. iii. 833-P. glabra.
aurantia, Labill.Sert.Austr. Caled.t. 79-P. aunntia.
Barclayi, Seem. Fl. Vit. 96=P. Bardayi.
Baueri, G. Don, Gen. Syst. iii. 66-P. Baneriana.
Baueriana, Endl. Prod. FL Norfolk. 128 - P. Baueriana.
brachystephanea, F. Muell. Fragm. i. 66-P. brachystephana.
caerulescens, Seem, in Bonplandia, x. (1862) 366.—Ins. Tongan.
Caleyana, M. Roem. Syn. Pepon. 189=P. Herbertiana.
cocdnea, DC. Prod. iii. 388 •= P. Banksii.
filamentosa, Regel *Sc* Koem. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 43 = P. filamentosa.
floribunda, Foum. in Rev. Hortic. xl. (1869) 480-P. sexflora.
Hahnii, Foum. 1. c.-P. Hahnil.
Herbertiana, DC. Prod. iii. 882=P. Herberr Jana.
Horsfuldii, Miq. FL Ind. Bat i. 1. 700-P. Horsfieldii.
Medusaea, Foum. in Rev. Hortic. xl. (1869) 430-P. jorullensis.
moluccana, Miq. Fl. Ind. Bat. 1.1.699-P.moluccana.
Muelleriana, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 101 = P. Muelleriana.
penangiana, Miq. Fl. Ind. Bat 1. I. 700-Modecca nicobarica I
StorcKi, Seem. Fl. Vit. 96.—Ins. Fiji.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.700=P. sumatrana.
timoriana, Miq. 1. c - P. timoriana.
vitiensis, Seem. Fl. Vit S6-P. vitiensis.

DISEFAIiTTM, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1862) 166. t 20. *ANONACEAE*, Benth. *Sc* Hook, f. i. 25.
anomalnm, *Hook.f. 1. c.*—Borneo,
coronatum, *Becc. in Nouv. Giorn. Bot.* ii. (1870) 165. —Borneo.

DISERIS, Wight, Ic. v. n. 1719, in textn (1852) = Disperla, Sw. (Orchid.).

DISERNESTON, Jaub. & Spach, IUustr. i. 78. t. 40 (1843) = Dorema, D. Don (UmbelL).
gummiferum, Jaub. *Sc* Spach, 1. c.=Dor. Ammoniacum.
hirsutum, Loftus, in Borcz. Feral. 28-Dor. Ammoniacum.

DISGREGA, Hassk. in Flora, xlix. (1866) 216 = Tradescantla, Linn. (Commelin.).
mexicana, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 805-T. Disgiega.

DISINSTYUS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 81 (1836) = Chlora, Adans. (Gentianac).
italica, Rafin. 1. c = C. imperfoliaU.

DISISOCACTUS, G. K[nnze], in Bot Zeit. iU. (1845) 683; Salm-Dyck, Cact ed. II. 57 (1850) = DISOCACTUS, Lindl.=Phyllocaetua, Link (Cacteae).
biformis, Salm-Dyck, 1. c.=P. bifonnis.

DISKION, Rafin. Sylva Tellur. 65 (1838)-Baraoha, Ruiz ft Par. (Solanac.).

DISMOPHYLA, Rafin. Fl. Tellnr. Iii. 36 (1886) - Drosera, Linn.
binata, Rafin. 1. c.»Dros. binaU.

DISOCACTUS, Lindl. Bot. Reg. (1845) t. »-FhyUocactus, Link (Cacteae).
biformis, LindL 1. c.=P. bifonnis.

DISODEA, Pen. Syn. L 210 (1805) -LygodiBodea, Rniz & Pav. (Rsbiac.).
foetida, Pers. 1. c.=L. foetida.

DISODIA, Dnm. Anal. Fam. 38 (1829)«=praec.

DISOMENE, A. DC. Prod. xvi. 11. 600, in syn. (1868) = DYSEMONE, Soland.=Ounnera, Linn. (Halorag.).

DISOON, A. DC. in DC. Prod. xi. 703 (1847) = Myoporum, Banks.
Beckeri, F. Muell. Fragm. ir. 48»M. Beckeri.
cordifolius, F. Mnell. 1. c. i. 126=M. salsaloides.
floribundus, A. DC. in DC. Prod. xi. 70S = M. floribnndura.

DISOXYLON, Reichb. Handb. 313 (1837)=DyBOxylum, Blume (Meliac).

DISOXYLUM, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 335 (1862) = DYSOXYLUM, Hook. f. & Thorns.=Amoora, Roib. (Meliac.).

DISOXYLUM, A. Juss. in Me"m. Mus. Par. xix. (1830) 224=Dysoxylum, Blume (Meliac.).

DISPARA, Rafin. Sylva Tellnr. 112 (1888) = Cristatella, Nutt. (Capparid.).
filiformis, Rafin. 1. c. 113=C. erosa.

DISPABAGO, Gaertn. Frnct. ii. 463. t. 173 (1791).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 323.
WIGANDIA, Neck. Elem. i. 95 (1790).
ericoides, *Gaertn. I. c.*—Afr. austr.
gomphienoides, *Sch. Bip. in Pollichia,* xviii-xix. (1861) 180.—Afr. anstr.
Kraussii, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii (1844) 698.—Afr. anstr.
lasiocarpa, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxxiv. 42.—Afr. austr.
laxifolia, *DC. Prod.* vi. 257.—Afr. austr.
seriphioides, *DC. I. c.*—Afr. austr.
tortilis, *Sch. Bip. in Pollichia,* xviii-xix. (1861) 181.—Afr. austr.

DISFELTOPHORUS, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1836) n. 2 = MenonviUea, R. Br. (Crucif.).
crassifolius, Lehm. 1. c. = M. linearis.

DISPERIS, Sw. in Vet. Acad. Hand]. Stockh. xxi. (1800) 218. *ORCH1DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 633.
DIPERA, Spreng. Syst iii. 676 (1826).
DRYOPEIA, Thou. Orch. lies Afr. t. 1 ad 3 (1822).
DKYOPKIA, Thou. 1. c. tabl. 1 (1822).
alata, Labill. PI. Nov. Holl. ii. 59. t. 210 = Pterostylis praecox.
anthoceros, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 103.—Afr. austr.
capensis, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 220.—Afr. anstr.
cardiophora, /faro. *Thes. Cap.* ii. 4.—Afr. austr.
Cooperi, *Han. 1. c.* 47.—Afr. austr.
cordata, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 218.—Ins. Maurit.
crassicaulis, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 860.—Abyss,
cucullata, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi (1800) 220.—Afr. austr.
Fanniniae, *Han. Thes. Cap.* ii. 46.—Afr. austr.
galerita, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 103.—Afr. trop.
graminifolia, Banks, ex Stead. Nom. ed. II. i. 520-capensis?
Hildebrandtii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 73; *et in Bot. Zeit.* xxxix. (1881) 449.—Ins. NossiW.
Humblotii, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1886) 877.—Afr. anstr.
Kerstenii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 102.—Afr. trop.
Lindleyana, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 181.—Afr. trop.
M'Kenii, *Han. Thes. Cap.* ii. 47, nomen.—Afr. austr.
Macowani, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 77.—Afr. austr.
Meirax, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 103.—Afr. trop.
mienntha, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 370.—Air. anstr.
namaquensis, Bolus, in Jonra. Linn. Soc. xx. (1884) 486 = purpnrata.
neilgherrensis, *Wight, Ic.* t. 1719.—Ind. or.
oppositifolia, *Sm. in Rees, Cycl.* xi. n. 6.—Ins. Mascar.
oxyglossa, *Bolus, in Journ. Linn. See.* xxii. (1886) 76.—Afr. austr.
paludosa, *Han. ex Lindl. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 14.—Afr. austr.
purpurata, *Reichb. f. in Linnaea,* xli (1877) 55.—Afr. austr.

DISPEHIS:
Reichenbachiana, *Welw. ex Reichb. /. in Flora,* xlviii. (1865) 180.—Afr. trop.
secunda, *$m. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 220.—Afr. austr.
stenoplectron, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 102.—Afr. anstr.
tenera, Spreng. ex Bolus, in Journ. linn. Soc. xix. (1882) 346 -= capensis.
tiipetaloidea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 871.—Ins. Ifarbon.
tripetaloidea, Lindl. 1. c. partnri-zeylanica.
Tysoni, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 79.—Afr. austr.
villosa, *Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 220.—Afr. austr.
Wealii, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 103.—Afr. austr.
Woodii, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 78.—Afr. austr.
zeylanica, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 245.—Ind. or.; Zeylan.

DISPERMA, J. F. Gmel. Syst. 885, 892 (1791) = Mltchella, Linn. (Knbiac).
repens, J. F. Gmel. 1. c.=M. repens.

DISPLASPIS, Klatt, in Linnaea, xxix. (1858) 711 = DIPLASPIS, Hook. f.=Huanaca, Cav. (Umbellit).

DISPOROCARPA, A. Rich. Tent. Ft. Abyss. L 307, in syn. (1847) = Tillaea, linn. (Crassulac).
pentandra, Aschers. ex Schweinf. *Sc* Aschers. in Beitr. FL Aethiop. 271=T. pentandra.
pkarnaceoides, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 307, in syn. =T. pharnaceoides.

DI8POBOP8IB, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 278. *LILIACEAE.*
fusco-picta, *Hance, 1. c.*—China.

DISPOBUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 331. *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 831.
DRAFIEZIA, Blnme, Ennra. PI. Jar. i. 8 (1827).
LETHEA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2.
PROSARTES, D. Don, In Proc. Linn. Soc. i. (1839) 48 ; et in Trans. Linn. Soc xviii. (1841) 531.
calcaratum, *D. Don, in Proc. Linn. Soc.* i. (1839) 45 ; *et in Trans. Linn. Soc.* xviii. (1841) 516.—Reg. Himal.
ceylanicum, Wight, Ic t. 2049 ^ Leschenaultianum.
chinensis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 50 = pullum.
fulvum, D. Don, 1. c. in obs. = pullum.
Hamiltmianum, D. Don, in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 45; et in Trans. Linn. Soc xviii. (1841) 517 = cwlcaratnm.
Hookerii, *Nichols. Diet. Gard.* i. 484.—Calif.
Horsfieldii, D. Don, in Proc. linn. Soc. i. (1839) 45 = pullum.
lanuginosum, *Nichols. Diet. Gard.* i. 485.—Am. bor. oca
Leschenaultianum, *D. Don, in Proc. Linn. Soc.* i. (1839) 45; *et in Trans. Linn. Soc.* xviii. (1841) 518.—Ind. or.
Menziesii, *Nichols. Diet. Gard. i.* 485.—Calif.
multiflorum, D.Don, in Trans. linn. Soc. xviii. (1841) 518—pullum.
mysorense, Wight, Ic. t. 2049=Leschenaultianum.
parviftorum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 50-pullum.
Pitsutum, D. Don, 1 c. = pullum.
pullum, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 881.—Ind. or.; Java; China,
sessile, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 50.—Japon.
smilacinum, *A. Gray, in Perry, Jap. Exped.* ii. 321.—Japon.; Sibir.
trachycarpa, *Benth. V Hook. /. Gen.* iii. 832.—Am. bor. occ.
uniflorum, *Baker, in Journ. Bot.* xiii. (1876) 280.—China.
Wallichii, D. Don, in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 45; et in Trans. linn. Soc. xviii (1841) 616-calcaratum.

DISQUAMIA, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852-5S) t 269 = Aeohmea, Ruiz *Sc* Pav. (Bromel.).

DI8SANTHELIUM, Trin. in Linnaea, x. (1836) 305.
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1185.
PHALARIDIUM, Nees, in Nov. Act. Nat Cur. xix. Suppl. i. (1843) (PI. Meyen.) 161.

STENOCHLOA, Nutt. in Joura. Acad. Philad. Ser. II. i. (1847) 189.
califomicum, *Benth. in Hook.lc. PI.* t.1375.—Calif,
sderochloides, *Fourn. ex Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* iii. 572.—Mexic.
supinum, *Trin. in Linnaea,* x. (1836) 805.—Chili.

DISSECOCARPUS, Hassk. Commel. Ind. 9 (1870) = DISECOCARPUS, Hassk.=Commelina, linn.

DISSHiIARIA, F. Muell. ex Baill. Adansonia, vii. (1867) 856. *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. iii. 279.
CHORICERAS, Baill. Adansonia, xi. (1873) 119.
baloghioides, *F. Muell. ex Baill. Adansonia,* vii. (1867) 359.—Austral.
Muelleri, *Baill. 1. c.* 359.1.1.—Austral,
tricornis, *Benth. Fl. Austral,* vi. 91.—Austral.

DISSOCARPUS, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet, ii-(1858) 75-Sclerolaena, R. Br. (Chenopod.).
biflorus, *F. Muell. I.* c.=S. biflora.

DISSOCHAETA, Blume, in FJora, xiv. (1831) *»• *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 768.
anceps, Naud. in Ann. Sc Nat. Ser. III. xv. (1861) 70 —Anplectrum divaricatum.
annulata, *Hook./, ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 88.—Malaya.
astnsticta, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 318-palUda.
bancana, Miq. 1. c. i. 1.529=celebica.
Barthei, Hance, ex Benth. Fl. Hongk. 115 = Bartnea chinensis.
bibracteata, BailL Hist PL vii. 25 « Creochiton bibracteata.
biligulata, Korth. in Verh. Nat. Gesch. Bot. 240 = Anplectrum biligulatum.
bipulvinata, Korth. 1. c. 28»=Marumia bipulvinata.
brachyanthera, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. 111. (1851)74-fusca.
bracteata, *Blume, in Flora,* xiv. (1831) 495.—M «J»/'
bracteata, Korth. in Verh. Nat. Gesch. Bot. 237" Korthalsii.
bracteosa, Naud. in Ann. Sc Nat. Se"r. III. xv. (I* 76=bracteata.
calothyrsa, *Miq. Fl. Ind. Bat. i.* I. 528.—Java.
celebica, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I* 36.—W* Malaya.
cinnamomea, Blume, 1. c.=inappendiculata.
Cummingii, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IH- * (1851) 75.—Ins. Philipp.
cyanocarpa, Blume, in Flora, xiv. (1831) 501-Anp trum glaucum.
cyanocarpa, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lngd. « 37 = Anplectrum reformatum.
decipiens, Blume, 1. c. 36 - monticola.
Diepenkorstii, Miq. Fi Ind. Bat. Suppl. 317=On>P lopus fallax.
divaricata, G. Don, Gen. Syst. iu 783=Anplectn» divaricatum.
fallax, Blume, in Flora, xiv. (1881) 493-Omph» P fallax.
fallax, Triana, in Trans. linn. Soc. xxviii. (1871) 83-gracilis.
fallax, Triana, 1. c.=celebica.
fusca, *Blume, in Flora,* xiv. (1881) 497.—J»
glauca, Blume, 1. c 501 = Anplectrum divaricatum.
gracilis, *Blume, I. c.* 498.—Malaya.
heteromorpha, Naud. in Ann. Sc. Nat *Sit.* (1851) 78 = Dichaetanthera heteromorpha.
hirsuta, *Hook. /. ex Triana, in Trans. Ltnn.* xxviii. (1871) 83.—Borneo.
inappendiculaU, *Blume, in Flora,* xiv. (189-U * Java.
intermedia, *Blume, 1. c.* 493.—Malaya.
intermedia, Herb. Batav. ex Triana, in Trans. Soc. xxviii. (1871) 84 = inappendiculata.
Korthalsii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1.528.-Sum»«a.
leprosa, *Blume, in Mora,* xiv. (1831) 494.-J
ligulata, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. »• Anplectrum ligulatum. n851)
microcarpa, Naud. in Ann. Sc Nat. Sir. III. ** I* 72 = celebica.
monticola, *Blume, iin Flora,* xiv. (W 49 !!?
nemorosa, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 783.—Sumatra.
nodosa, Korth. in Verh. Nat. Gesch. Bot. 239-Anp trum nodosum.

DISSOCHAETA:—
ovalifolia, Nand. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xv. (1851) 76-pallida.
palembanica, Miq. Fl. Ind. Bat Snppl. 317 = Anplectrum divaricatum.
Pallida, Blnme, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 86. partim - Korthalsii.
pallida, *Blume, in Flora,* »v. (1831) 500; *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xv. (1851) 77.—Malaya.
pepericarpa, Nand. 1. c. 71=Anplectrum divaricatum.
Punctulata.T/m,*./. *ex Triana, in Trans. linn.Soc.* xxviii. (1871) 88.—Malaya.
reformaia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 87 = Anplectrum reformatum.
reticulata, Blume, in Flora, xiv. (1831) 499=inappendiculata.
rostrata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 239 = Anplectrum Korthalsii.
sagittate, *Blume, in Flora,* xiv. (1831) 500.—Java.
sarcorhiia, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 88 (Medinillae sp.)._Madag.
sfioliata, Naud. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. xv. (1851) [69]-1. 4. £ l=Anplectrum glaucum.
supfrba, Naud. 1. c. 77 = pallida.
vajallans, *Blume, in Flora,* xiv. (1831) 495.—Java,
velutina, *Blume, 1. c.* 497.—Java.

DISSOLAENA, Lour. Fl. Cochinch. 137 (1790)-Bau-Tolfla, Plum. (Apocyn.).
verticillata, Lour. 1. c—China.

[D]ISSOLENA,G. Don, Gen. Syst iv. (1837) 99-praec.

DI8SOMEIIIA, Hook. f. ex Benth. in Hook. Niger «. 362 (1849). *SAMYDACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. 800a
"enata, *Houk.f. I. c*—Afr. trop.

DISSOPETALUM, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. s— ..«• III. xvii. (1866) 267 = Ciasampelos, Linn. (Menisperm.).
"uuiritianum, Miers, 1. c. 286 = C. mauritianum.

^ISSORHYNCHIUM, Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. «x. Suppl. i. (1843) 431 t 13 = Habenaria, Vrilld. (Orchid.).
m"ricatum, Schau. 1. c. = H. muricata.

DI88OTHBIX, A. Gray, in Hook. Kew Jeurn. iii. (1851) 223. t. 5. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f. u. 242.
Gardneri, *A. Gray. I. c*—Mexic.

IH8SOTIS, Benth. in Hook. Niger Fl. 3*6 (1849). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 746.
ARGYRELLA, Naud. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* III. xiu. - (1850)800.1.6.
DEROSIPHIA, Rafin. Fl. Tellnr. 101 (1888), nomen - Prius.
DOPINETA, Rafin. Sylva Tellur. 101 (1838).
HETEROTIS, Benth. in Hook. Niger Fl. 347 (1849).
LEIOCALYX, Planch, ex Hook. 1. c. 350 (1849).
LEPIDANTHEMUM, Klotzsch, in Peters, Mossamb. - Reise Bot. 64 (1861).
WEL,ASTOMASTRUM. Naud. in'Ann. Sc. Nat. Ser. III. - »». (1850) 296. t 5.
ŌSBECKIASTRUM, Naud. 1. c. xiv. (1860) 118.,
WEDELIOPSIS, Planch, ex Benth. in Hook. Niger Fl. 851(1849).
Al\Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 449,-Afr. trop.
^tennina, *Hook.f. l.c.-Ati.* top.
fatten, *Hook.f. I. c.* 454.—Afr. trop.
•"•**»». Hook. f. 1. c. 458=incana.
capitata, *Hook. /. /. c.* 449,-Afr. trop.
ia, *Hook. f. l. c.* 448.—Afr. trop.
Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 58.
j —A'r. austr.
"ecandra, *Triana, I.* c—Afr. trop.
wcumbens, *Triana, I.* e.-Afr. tiop.
eximia
Fi dla, *Hary. Gen.S. Afr. PI,* ed. II, lH.-Afr. austr.
?U«?S U871) 57 Siam 1
B»ndiflora, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 347.-Afr. wop.
hir [^?'* « * / :« *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 450,-Afr. irop.

DI8SOTIB:—
incana, *Triana, in Trans, linn. Soc.* xxviii. (1871) 68. —Afr. austr.
Irvingiana, *Hook.f. Bot. Wag.* t. 5148.—Afr. trop.
laevis, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 461.—Afr. trop.
Melleri, *Hook.f. I. c*—Afr. trop.
multiflora, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 68.—Afr. occ.
petiolata, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 448.—Afr, trop.
phaeotiicha, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* ed. II. 114.—Afr. austr.
plumosa, *Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 452.—Afr. trop.
Princeps, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 57 s eximia.
prostrata, *Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 452; *Triana, I. c.* 58.—Afr. trop.
radicans, *Hook.f. 1. c.* 450.—Afr. trop.
rotundifolia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 68=-plumosa.
segregata, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii 448.—Afr. trop.
senegambiensis, *Triana, in Trans. Linn: Soc.* xxviii. (1871) 58.—Afr. trop.
theaefolU, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 449.—Afr. trop.
tubulosa, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 58—Afr. trop.
villosa, *Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 450.—Afr. trop.
villosa, Tiiana, in Trans. Linn. Soc xxviii. (1871) 57 = Melastoma villosa.

DISTANDRA,Link, Ennm.Hort. Berol. i. 354(1821) = DISANDRA.Linn. = Sibthorpia, Linn. (Scrophul.).

DISTAS1S, DC. Prod. v. 279 (18S6)=Cbaetopappa, DC. (Compos.).
concinna, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 350-Erigeroa concinnua.
heterophylla, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 119 (Gen. dub.).—Mexic
modesta, DC. Prod. v. 279 -=C. modesta.

DISTEaANTHUB, Lem. in Fl. des Serres, iii. (1847) t. 227. *BROMEUACEAE,* Benth. & Hook, f. *Hi,* 661.
basilateralis, *Lem. 1. c.*—Guiana.
scarlatinas, Nichols. Diet. Gard. *1*484=Distiacanthus scarlatinus.

DISTEGIA, Rafin. New Fl. Am. ffi. 20 (1836) = Xionioera, Linn. (Caprifol.).
nutans, Rafin. 1. *c.3l=L.* involucrata.

DISTEGOCARPUS, Sieb. & Zucc. (Fam. Nat. Fl. Jap. ii. 102. t. 3) ; in Abh. Acad. Mueach. iv. m. (1816) 226=C6.rpinu8, Linn. (Cupulif.).
carpinoides, Sieb. & Zucc. 11. cc. 116, 240i=C. japonica.
Carpinus, Sieb. *Be* Zucc. 11. cc. 103, 227 «=C. japonica.
cordatus, A. DC. in DC. Prod. xvi. ll. 128 = C. cordata.
erosa, A. DC* 1. C.—C. erosa.
/o«i>ra,Sieb. *Sc* Zucc. PI. Jap. Fam. Nat. ii. 104 = C. laxiflora.

DISTEIRA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 68 (1886)=Martynia, Linn. (Pedalin.).
angulosa, Rafin. 1. c = M. diondra.

DISTEMMA, Lem. Hort. Van Houtte, fasc. ii. t. 11 (1847 ?) = DISEMMA, Labill.=Paastaora, Linn.
arfjon<i/o/i«m, Lem.IUustr. Hortic (1867) Misc. 57 = P. glabra.
aurantiacum, lem. L c. =P. aurantic.
Bauerianum, Lem. 1. c.«*P. Baueriana.
carinatum, Lem. Hbrt. Van Houtte, fasc. ii. t. 11; et in Fl. des Serres (1847) 236, verso.—Hub.?
coccineum, Lem. IUustr. Hortic. (1867) Misc. 57 = P. Banluii.
eglandulosum, Lem. 1. c. 56.—Austral.
Hahnii, Mast, in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 569-P. Hahnii.
Herbertianum, Lem. IUustr. Hortic. (1867) Misc. 67 = P. Herbertiana.

DISTEMON, Boudu?, in Linnaea, xviii. (1844)494-Canna, Linn. (Scitamin.).
brasiliensis, BoucM, I.e. 495 = C. brasiliensis.
grandis, Horan. Prod. Scitam. 14=C. brasiliensis.
Jacquinii, Bouche, in Linnaea, sriii. (1844) 495 - C. Jacquinii.
Kunaii, Bouche, 1. c nomen.—Bras.
Linkii, Bouche, 1. c. — C. Linkii.
miniatus, Bouche^ 1. c.=C. mioiata.
Ottonis, Bouche, 1. c. 494 - C. Ottonis.
Koscoianus, Bouché, 1. c. 496-C. denudata.

DISTEMON, Ehrenb. er Aschers. in Monatsb. Acad. Berl. (1866) 881-AnticharíB, Endl. (Scrophularin.).
angustifolius, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iv. 428 = A. linearis.
campanulatus, Ehrenb. *Sc* Hempr. ex. Boiss. 1. c. = A. arabica.
glandulosus, Ehrenb.. & Hempr. ex Aschers. in Monatsb. Acad. Berl. (1866) 881 = A. glandulosa.

DISTEMON, Wedd. in Arch. Mua. Par. ix. (1856) (Monog.. Urt.) 550. t. 20. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. *L* 1. c.
grossum, Wedd. in DC. Prod. xvi. i. 235" - indicum.
indicum, *Wedd. Monog. Urt.* 561. t. 20.—Ind. or.

DISTEMOHANTHUB, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 573 (1865). *LEGUMINOSAE,* Benth. 8c Hook. f. 1. c.
Benthamianus, *Baill. Hist. PI.* ii. 135.—Afr. trop.
laxus, Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 282-Benthamianus.

DISTEPHANA, Joss, in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 396 = PasBiflora, Linn.
Candida, M. Roem. Syn. Pepon. 199 = P. Candida.
citrifolia, M. Roem. 1. c.-P. citrifolia.
cuneata, M. Roem. 1. c. 200 = P. bienspidata.
Fockeana, M. Roem. 1. c. 199,= P. glandulosa.
glandulosa, Jnss. in Ann. Mus. Par. >i. (1805) 896=P. glandulosa.
pubescens, M. Roem. Syn. Pepon. 199-P. quadriglandulosa.
quadridentata, M. Roem. 1. C. = P. quadriglandulosa.
quadriglandulosa, M. Roem. 1. c.=»P. quadriglandulosa.
quitensis, M. Roem. 1. c. 200—Tacsonia mixta.
Rohriana, M. Roem. 1. c. 199-P. glandulosa.
spinosa, M. Roem. 1. c. = P. spinosa.
stoupyana, M. Roem. 1. c. = P. glandulosa.

DISTEPHANIA, Steud. Nom. ed. IL i. 621 (1840)-praec.

DISTEPHIA, Salisb. ex DC. Prod. iii. 335 (1828) = praec

DISTEPHANUS, Cass. in Bull. SocPhilom. (1817) 151 -Vernonia, Schreb. (Compos.).
capitatus, Boj. ex DC. Pjod. v.74.—Madag.
populifolius, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 151 = V, populifblia..
trinervis, Boj. ex DC. Prod. v. 75.—Madag.

DISTEREPTA, Rafin. Sylva Tellur. 126 (1838)-Caasia, Tourn. (Legumin.).
pilosa, Rafin. 1. C.-=C. pilosa.

SISTIACANTHTJB, Linden, Cat n. 23 (1869) 4. *BROMEUACEAE..*
erubescens, *Linden (f Andre.—Cf. IUustr. Hortic.* XX. (1873) 171.—N. Granat
acarlatinus, *Linden, Cat.* n. 23 (1869) 4.—Bras.

DISTICHEIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789)-Braohypodium, Beauv. (Gramin.).

DI8TICHIA, Nees *Be* Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 128. *JUNCACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 866.
AGAPATBA, Steud. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 891.
GOUDOTIA, Decne. in Ann. Sc Nat Sér. III. iv. (1845) 84. t. 4.
OXYCHLOE, Phil. Fl. Atac. 52. t 6 (1860).
andina, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 867 =macrocarpa.
brevifolia, *Phil, ex Benth.* £r *Hook.f. I. c*—Bolivia.

DIBTICHIA :-
clandestine, *Buchtn. in Bremen, Abh.* vi. (1879) 870.—Chili.
filamentosa, *Buchen. I. c.* 369.—Bolivia,
macrocaipa, *Wedd. ex Buchtn. I. c.* iv. (1874) 128.—Bolivia,
muscoides, *Nees tf Mtyen, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1848) 128.—Pemv.
tolimensis, *Benth. tf Hook. f. Gen.* iii. 867.—N. Granat.

DISTICHIS, Thou, ex Llndl. Veg. Kingd. 181 (1847) (Cf. Thou. Orch. Isles Austr. Afr. TabL Sme) - IiipariB, Rich. (Orchid.).

DISTICHIiIS, Rafin. in Jonrn. Fhys. Ixxxiz. (1819) 104. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1193.
BRIZOPYRUM, T. & C. Presl.Rel. Haenk. 280 (1830).
DISCHLIS, Phil. Sert. Mend. Alt. 51 (1871), sphalm.
ammobia, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 569.—Chili,
condensata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Sot.* iii. 578.—Mexic.
hirta, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 670.—Chili,
maritima, *Rafin. in Jourtt. Phys.* lxxxix. (1819) 104.—Am. bor.
mendoccina, *Phil. Sert. Wend. Alt.* 61.—Chili.
nodosa, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 104 «Poa Michanxi.
prostrata, *E. Desv. in C. Gay, Ft. Chil.* vi. 898.—Am. trop.; Mexic.
thalassica, *E. Desv. I. c.* 397.—Mexic.; Chili.
Volckmanni, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 571.—Chili.

DISTICHMUS, Endl. Gen.. 119 (1837)=DICHISMUS, Rafin.=8cirpua. Linn. (Cyperac.).

DISTICHOCAIiYX, T. Anders, ex Benth. & Hook, f. Gen. ii. 1080 (1876). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. 1. c
thonbergiaeflora, *T. Anders. I. e.* 1081.—Afr. trop.

DISTICHOSTEMON, F. Mnell. in Hook. Kew Joum. ix. (1857) 306. *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 410.
hUpidulum, Baill. Hist. PI. v. 411=phyllopterus.
phyllopterus, *F. Muell. in Hoot. Kern Joum.* ix. (1857) 306.—Austral.

DISTICTI8, Mart, ex Meissn. Gen. 800 (1840); et ex DC. Prod. ix. 191 (1845). *BIGNONIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1037.
MACKODISCUS, Bur. Monog. Bign. 46.1.11 (1864).
arthrerion, *DC. Prod.* ix. 101.—Bras,
lactiflora, *DC. 1. c.*—Ins. S. Doming.
Mensoana, *Bur. in Rev. Horiie.* (1868) 154.—Bras,
rigescens, *DC. Prod.* ix. 191.—Ins. S. Doming.

DISTIMAKE, Rafin. Fl. TeUur. iv. 82 (1836) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
glaber, Rafin. 1. c - I. glabra.

DISTIMUM, Stend. Norn. ed. U. i. 521 (1840) - seq.

DISTIMUS, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 108 = Pyoreus, Beanv. (Cyperac.).
flavescens, Rafin. 1. c.-P. flavescens.
fiavicomus, Rafin. 1. c. (•= *C. flavicomus*, Vahl).—Am. bor

DISTOMAEA, Spenn. Fl. Friburg. f. 245 (1825) = Idstera, R. Br. (Orchid.).
cordata, Spenn. 1. a 247=L. cordata.
Nidus-avis, Spenn. 1. c. 246 = Neottia Nidus-avis.
ovata, Spenn. 1. c.=L. ovata.

DIBTOMANTHEBA, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxv. (1862) II. 328. *SAXIFRAGEAE*t—Cf. Benth. & Hook. f. i. 634.
Dombeyana, *'furct. 1. c.*—Am. austr.

DISTOMISCHUS, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 91 (1867) = FeBtuca, Tourn. (Gramin.).
ciliatus, Dulac, 1. c. 92=F. ciliata.
Myuros, Dulac, 1. c. 91 «F. Myurus.
sciuroides, Dulac, L c. = F. bromoides.
suiuniglumis, Dulac, 1. c. 92 = F. bromoides.

DISTREPTA, Mien, Trav. Chil ii. 529 (1826) = Tecophilaea, Bert. (Haemodoraa).
vaginata, Miers, 1. c. = T. violaeflora.

DISTREPTUS, Cass. in Bull. Soc Philom. (1817) 66; et Diet. Sc Nat xiii. 866 (1819)=ElephantopU8, linn. (Compos.).
angustifolius, Cass. in Diet Sc. Nat xiii. 368 - E. angustifolius.
erispus, Cass. 1. c. Ix. 601=E. spicatus 1
nudiflorus, Cass. 1. c. xiii. 868; Less, in Linnaea, iv. (1829) S29=E. spicatus?
replicatus, Cass. 1. c. Ix. 601 - E. spicatus.
spieatus, Cass. 1. c. xiii. 367 = E. spicatus.
spiralis, Less, in Linnaea, vi. (1881) 690=E. spicatus *1*

DISTYLIS, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 460. t. 80 (1826) = Oalogyne, R. Br. (Goodeniac.).
Berardiana, Gaudich. 1. c. = C. Berardiana.

DISTYLIUM, Sieb. *Sc* Zucc. Fl. Jap. i. 178. t. 94 (1885). *HAMAMEUDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 666.
indicum, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hoot.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 427.—Reg. Himal.
racemosum, *Sieb. tf Zucc. Fl. Jap.* i. 179. t. 94.—China; Japon.

DISYNANTHES, Reichb. Consp. 106 (1828)=seq.

DISYNANTHUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268=Antennarla, Gaertn. (Compos.).
plantagineus, Rafin. 1. c.-A. plantaginea.

DISYNAPHEIA, Steud. Norn. ed. II. i. 621 (1840)-seq.

DISYNAPHIA, DC. Prod. vii. 267 (1838) =» Eupatorium, Toum. (Compos.).
montevidensis, DC. I. c.-E. calyculatum.

DISYNOMA, Rafin. Fl. TeUur. iii. 81 (1886)-Aethionema, R. Br. (Crucif.).
carnea, Rafin. 1. c. = A. cristatum.

DITA8SA, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 49. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 757.
abortiva, *Fmrn. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 240.—Bras,
acerosa, *Mart. Nov. Gen. et Sp. I* 63.—Bras,
adnata, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 256.—Bras,
aequicymosa, *Fourn. 1. c.* 248.—Bras,
angustifolia, *Decne. in DC. Prod.* viii. 575.—Guiana,
anomala, *Mart, in Flora*, xx. (1837) n. *Beibl.* 99.—Bras,
aristata, *Benth. ex Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 247.—Bras.
BanksB, *Roem. tf Sehult. Syst.* vi 112.—Bras,
barbata, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 255.—Bras,
bicolor, *Decne. in DC. Prod.* viii. 675.—Bras.
Blanchetii, *Decne. I. c*—Bras,
bonariensis, *Decne. I. c.* 677.—Bras.
Burchellii, *Hook, tf Am. in Hook. Joum. Bot.* i. (1834) 295.—Bras,
campestris, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 228.—Reg. Argent,
capillaris, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 253.—Bras.
congesta, *Fourn. 1. c.* 246.—Bras,
consanguinea, *Decne. in DC. Prod.* viii. 675.—Bras,
crassifolia, *Decne. 1. c.* 676.—Bras,
crassinervia, *Decne. 1. c.* 577.—Bras,
cucullata, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 256.—Bras.
decussata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 51. t. 81.—Bras,
divaricata, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 817.—Guiana,
ericoides, *Decne. in DC. Prod.* viii. 578.—Bras,
eximia, *Decne. 1. c.* 574.—Bras,
fallax, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 248.—Bras,
fasciculata, *Fourn. 1. c.* 258.—Bras,
fulva, *Fourn. 1. c.* 245.—Bras.
Gardnerii, *Decne. in DC. Prod.* viii. 675.—Bras,
glaucescens, *Decne. 1. c.*—Guiana.
Glaziovii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 250.—Bras,
grandiflora, *Fourn. I. c.* 255.—Bras.
Guilleminiana, *Decne. in DC. Prod.* viii. 574.—Bras,
hastata, *Decne. I. e.* 576.—Bras.

DITASSA:—
hemipogunoides, *Fourn. in Mart. Fl.Bras.* vi. IV. 238.—Bras.
Hilariana, *Fourn. I. e.* 254.—Bras,
imbricata, *Fourn. 1. c.* 240.—Bras.
Klotzschii, *Fourn. I. c.* 247.—Bras,
laevis, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 63.—Bras,
lagoënsis, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 256.—Bras.
lanceolata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 676.—Peruv.; Bras,
linearis, *Mart. Nov. Gen.et Sp.* i. 58.—Bras,
longiloba, *Benth. PI. Hartw.* 216.—N. Granat.
manicata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 676.—Bras,
micromeria, *Decne. 1. c.* 678.—Bras,
montana, *Decne. 1. c.* 576.—Bras,
mucronata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 62.—Bras,
myrtilloides, *Fenal, ex Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 261.—Bras.
Niruri, *Decne. in DC. Prod.* viii. 676.—Bras,
nitida, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 241.—Bras,
obcordata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 53.—Bras,
oxypetala, *Decne. in DC. Prod.* viii. 674.—Bras.
oxyphylla, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 260=lanceolata.
passerinoides, Decne. in DC. Prod. viii. 678»virgata.
passerinoides, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 63.—Bras,
pauciflora, *Decne. in DC. Prod.* viii. 577.—Bras.
Poeppigii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 244.—Bras.
Pohliana, *Fourn. 1. c.*—Bras,
praecincta, *Fourn. 1. c.* 253.—Bras,
ramosa, *Fourn. 1. c.* 246. - Bras,
reflexa, *Fourn. 1. c.* 255.—Bras,
retusa, *Mart. Nov. Gen.et Sp. i.* 53.—Bras.
Riedelii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 247.—Bras,
rufescens, *Decne. in DC. Prod.* viii. 674.—Bras.
Salzmanni, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 262.—Bias.
subtrivialis, *Griseb. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 68.—Peruv.
taxifolia, *Decne. in DC. Prod.* viii. 678.—Guiana,
trivialis, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. «» t. 277—Peruv.
umbellata, *Decne. in DC. Prodi* viii. 574.—Bras,
velutina, *Foum. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 248.—Br«s-venosa, *Decne. ex Fourn. 1. c.* 249.—Bras,
virgata, *Fourn. 1. c.* 238.—Bras.
Warmingii, *Fourn. I. c.* 242.—Bras.

DITAXIA, Endl. Gen. 670 (1889), sphalm. = DITOXIA, Rafin. = Celflia, Linn. (Scropnularin.).

DITAXIS, Vahl, ex A. Juss. Euph. Tent 27. t 7 (1884) ^Argl thamnla, Sw. (Euphorb.).
brasiliensis, BaiU. Adansonia, iv. (1863-64) 269 = brasiliensis.
castaneaefolia, Baill. 1. c. 274 = Caperonia castaneaefolia.
chiropetala, Bert, ex Bull. Férussac, xx. (1830) 110 = Berteroana.
chrysantha, Klotach, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 199, nomen —A. Simoniana.
cordata, Baill. Adansonia, iv.(1863-64) 272 ^Caperonia cordata.
dioica, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 170. t. 689 «= A. dioica.
fasciculata, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. (1842) 632 = A. Simoniana.
fasciculata, Vahl, ex A. Juss. Euph. Tent 110-fasciculata.
glabella, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) Wl"*" lancifolia.
haemiolandro, Griseb. 1L Brit W. Ind. 44-RiCne haemiolandra.
heterantha, Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1829-30) 290=A. heterantha.
Hilariana, Baill. Adansonia, iv. (1868-64) 270"'* Simoniana.
illimaniensis, BailL Etud. Gén. Euph. 299=A.i» maniensis.
lancifolia, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1858) 635-lancifolia.
linearifolia, BailL Adansonia, iv. (1863-64) •"" Caperonia linearifolia.
melochiaefolia, Baill. 1. c. 270-A. Simoniana.
polymorpha, Baill. L c. 273 = Caperonia heteropheteropetaloides.
Simoniana, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. «•»' Simoniana.

DITAXIS:—
trinervia, Baill. Adansonia, iv. (1868-84) 271,sphalm. =seq.
i[illegible] Klotzsch, » Wiegm. Archiv, vii. (1841) nomen=A. montevidensik.
DI[illegible] Rafin. Fl. Tellur. iii. 69 (1836) = Commo-nn.
**udifiora,* Rafin. 1. fc-C. nudiflora.
DITEREIA, Rafin [illegible] (1836)=Convol-vulus, Tourn.
parviflora, Rafin. 1. c. = c. parviflorus.
DITHECA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 615 (1855) = Am-mannia, Linn. (Lythrar.).
debilis, Miq. l. c. = A. multiflora.
densiflora, [illegible] P<»tandra.
verticillata, Miq. 1. c. = A. lanceolata.
DITHRICHUM [illegible] (1836) = DITRI-CHUM, Cass. -Verbesiaa, Linn. (Compos.).
DITHYRAEA, EndL Gen. Suppl. v. 35 (1850)=seq.
D[illegible] Bot iv. (1845)
californica, [illegible] californica.
Wislizenii, [illegible] in Widi[illegible]
WisITnn.
DITHYRIA, Benth. in Hook. Journ.
Swartzia, Schreb. (Legumin.). [illegible]
alterna, Benth. l. c. = S. alterna.
mollis, Benth. l. c. = S. mollis.
DITHYROCARPUS, Kunth. » Ber. Acad. BerL (1841) 245; et Enum [illegible] (Commelin.). [illegible]
capensis, [illegible] 78 = F. glomerata.
glabratus, Kunth, 1. c. 77 = F. glabrata.
glandul[illegible]
glomeratus, Kunth, Enum. PL iv. 78 = F. glomerata.
hirsutus, Kunth, I.e. 77 = F. glabrata.
Meyenianus, Kunth, 1. c. 78 = F. scandens.
paniculatus, Kunth, l. c. 79 = F. scandens.
petiolatus, Wight, Ic. t. 2079 = F. scandens.
robustus, Scub. in Mart. Fl. Bras. iii. 1.255 = F. robusta.
Rothii, Wight, Ic t.2079 = F. scandens.
rufus, Kunth, Enum. PI. iv. 79 = F. scandens.
Schomburgkianus, Knnth, 1. c 662 = Aneilema ovato-oblongum.
[illegible] Aneilema ovato-oblongum.
DITOCA, Banks, ex Gaertn. Fruct. ii. 196. t. 126 (1791) = sclerantifc-US, Linn. (Illecebrac.).
muscosa, Gaertn. 1. c. = S. biflorus.
DITOMOSTROPHE, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1846) II. 498 = Guichenotia, J. Gay (Sterculiac.).
angustifolia, Turcz. l. c. 499 = G. semihastata.
DITOXIA, Rafin. Journ. Bot. [illegible] v. (1814) 270-Celsii, Linn. (Scrophul.).
betonicaefol[illegible] Rafin. 1- c 40-C. betonicaefolia.
cretica, [illegible] c. 270 = C. cretica.
lyrata [illegible] »ecouv.40-C.cretica.
DITREMA, Raftn. Syn. Fl. N. Am. (1840) 127 - Cassia, *obtusifolia,* Linn.).
floridana, Rafin. [illegible] - C. occidentaUs.
fetida, Rafin. [illegible] occidental.
ligustrina, Rann. [illegible] c. = C. ligustrina.
DITRICHUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 83 = Verbesina, Linn. (Compost.
macrophyllum, Cass. 1. c. - V. diversifoiia.

DITRICLITA, Rafin. New Fl. Am. i. 68, nomen (1836) -Saxifrage, Linn.
DITRISYNIA, Rafin. Sylra Tellur. 64 (1838)=8tilling U, Garden (Euphorb.).
ligustrina, Rafin. 1. c = S. lignstrina.
DITRITA, Rafin. Sylva Tellur. 116 (1838) - Euphorbia, Linn.
hirta, Rafin. 1. c = E. pilulifera.
obliqua, Rafin. 1. a - E. hypericifolia.
rotundifolia, Rafin. 1. c. - E. Chamaesyce.
DITROCHE, E. Mey. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 19 (1849)-Semonvillea, J. Gay (Ficoid.).
furcata, £. Mey. ex Moq. 1. c. 20 = S. fenestraU.
DITR YSINIA, Rafin. NeogeneL 2 (1825) - Sebastianla, Spreng. (Euphorbiac.).
ligustrina, Rafin. 1. c = S. ligustrina.
sylvatica, Rafin. 1. C.—S. lignstrina.
DITTA, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 160 (PL Wright. Cub.). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 835.
myricoides, *Griseb. I. c.*—Cuba.
DITTEI.A8JIA, Hook.f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 395 (1862). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
Rarak, *Hook.f. 1. c.* 896.—Malacca.
DITTOCEBA8, Hook. f. in Hook. Ic. PI. t. 1422 (1883) *ASCLEPIADEAE.*
Andersoni, *Hook.f. I. c*—Reg. Himal.
DITTO8TIGMA, Phil. Sert. Mend. Alt. 86 (1871). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 906.
mendocinum, Phil. 1. c.-Chili.
DITUILIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1836) =- Llparis, Rich. (Orchid.).
nepalensis, Rafin. 1. c.=L. bituberculata.
DITULIMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 41 (1886) = Dendrobium, Sw. (Orchid.).
anceps, Rafin. 1. c.=D. anceps.
DIXTEIS, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 222. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 608.
abbreviata, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 329.—Austral.
aequalis, F. Muell. ex Benth. 1. a 328-maculata.
alba, *R.Br. Prod.* 316.—Austral,
aurea, *Sm. Exot. Bot.* i. 15. t. 9.—Austral.
Behrii, Schlecht in Linnaea, xx. (1849) 572 = pednnculata.
carinata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 610 = setacea.
corymbosa, Lindl. Swan River App. 51-longifolia.
curvifolia, lindl. Gen. et Sp. Orch. 507 = maculata.
dendrobioldes, *Fitzg. Australal. Orch.* i. vn. (1882) Austral.
Drummondii, Lindl. Swan River App. 51= emarginata.
elongata, Sw. in Schrad. N. Journ. i. (1806) 59 = punctata.
emarginata, *R. Br. Prod.* 316.—Austral.
fUifolia, Lindl. Swan River App. 51-setacea.
Fryana, *Ridl. in Forbes, Nat. Wand. East. Arehip.* 519.—Ins. Timor.
laertis, *Fitzg. in Gard. Chron.* (1882) I. 495.—Austral.
lanceolata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 508 = pedunculata.
laxiflora, Lindl. Swan River App. 61 = emarginata.
lilacina, F. Muell. in Linnaea, xxvi. (1858) 239-punctata.
longifolia, *R. Br. Prod.* 316.—Austral,
maculata, 5m. *Exot. Bot.* i. 57. t. 30.—Austral.
Novae-Zeelandiae, A. Rich. Fl. Nov. Zel. 163. t. 25 = Orthoceras strictum.
oculata, F. Mnell. Fragm. v. 173 = aurea.
oculata, F. Muell. in Linnaea, xxvi. (1853) 241-sulphurea.
pallens, *Benth. Fl. Austral,* vi. 329.—Austral,
palustris, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 507.—Austral.
pardina, Lindl. 1. c. = maculata.
panciflora, *R. Br. Prod.* 316.—Austral,
pedunculata, *R. Br. I. c*—Austral.
porrifolia, Lindl. Swan River App. 51-longifolia.
punctata, *Sm. Exot. Bot.* i. 13. t. 8.—Austral.

DITJHI8:—
secundiflora, *Fitwg. Austral. Orch.* i. IV. (1877).—Austral.
setacea, *R. Br. Prod.* 316.—Austral.
spaihulata, Sw. in Schrad. N. Journ. i. (1805) 60= aurea.
sulphurea, *R. Br. Prod.* 316.—Austral,
tricolor, *Fitmg. in Jovrn. Bot.* xxilL (1886) 157.—Austral.
DIUROGLOSSUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) H. 157=Guaauma, Plum. (Sterculiac).
rufescens, Turcz. 1. c. = G. tomentoaa.
DIUROSPERMUM, Edgew. in Proc. Linn. Soc. i- (1647) 861-TJtricularia, Linn. (Lentibnl.).
album, Edgew. 1. c.-U. kumaonensis.
DIZON1UM, Wllld. ex Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 411, in nota=Geigeria, Grlessel. (Compos.).
longifolium, Willd. 1. c. = G. africana.
DIZYGANDRA, Meissn. Gen. 294 (1840)=BueIlia, Plum. (Acanthac).
noctiflora, Shuttlew. ex Nees, in DC. Prod. xi. 128 = R. noctiflora.
SOHERA, Jnss. Gen. 425 (1789V *SALVADORACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 680; iii. 162, in obs.
SCHIZOCALYX, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beil. 1.
TOMEX, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 32 (1775), nomen prius.
coriacea, A. DC. in DC. Prod. xvii. 31 = Roxburghii.
dubia, *Steud. Norn.* ed. II. i. 621.—Africa 1
glabra, A. DC. in DC. Prod. xvii. 31-Roxburghii.
Roxburghii, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. x. (1848) 191.—Ind. or.; Afr.austr.
DOBERA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 56 (1836) = Bivinai Plum. (Phytolac.).
DOBINAEA, Spreng. Syst iii. 800 (1826) -seq.
DOBUJEA, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 249 (1825). *SAPINDACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 410.
vulgaris, *Buch.-Ham. 1.* c—Reg. Himal.
DOBROWSKIA, A. DC. in DC. Prod. vii. 856 (1839) = seq.
DOBROWSKYA, PiesL, Prod. Lobel. 8 (1886)-Lobelia, Linn.
anceps, Presl, I. c. 10—L. anceps.
aspera, DC. Prod. vii. 856 = L. aspera.
Dregeana, Presl, Prod. Lobel. 9-L. scabra.
Eckloniana, Presl, 1. c.=L. aspen.
laevicaulis, Presl, L c. 10 = L. scabra.
Massoniana, Presl, 1. c. -=L. tenella.
polyphylla, Presl, 1. c. = L. scabra.
scabra, A. DC. in DC. Prod. vii. 356 - L. scabra.
serratifolia, A. DC. 1. c. 366-L. debilis.
stellarioides, Presl, Prod. Lobel. 10 = L. stellarioides.
stricta, Presl, ex Eckl. & Zeyh. Enum. 393=L. tenella.
tenella, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 549 - L. tenella.
Thunbergiana, Presl, Prod. Lobel. 9-L. scabra.
unidendata, A. DC. in DC. Prod. vii. 855 = L. tenella.
Zeyheriana, Presl, Prod. Lobel. 10 = L. scabra.
DOCHAFA, Schott, Syn. Aroid. 24 (1866) - Arisaema, Mart. (Aroid.).
fiava, Schott, 1. c—A. flavum.
DOCYNIA, Decne. in Nouv. Arch. Mns. Par. x. (1874) 131. *ROSACEAE.*
Griffithiana, Decne. 1. c. t. 14-indica.
Hookeriana, *Decne. 1. c.* t. 15.—Reg. Himal.
indica, *Decne. 1. c.* t. 14.—Reg. Himal.; Burma.
DODABTIA, [Tonrn.] Linn. Syst. ed. I (1785) *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 948.
indica. Linn. Sp. PL 638 = Lindenbergia polyantha.
Linaria, MilL Gard. Diet, ed VIII. n. 2-Anarrhinum bellidifolium.
orientalis, *Linn. Sp. PI.* 638.—As. occ. et bor.
virgata, Moench, Meth. 446 = orientalis.

DODECADENIA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 61 (1831) ; Laurin. Expos. 19 (1888). *LAURINEAE,* Senth. *Sc* Hook. f. iii. 160.
grandiflora, *Nees, in Wall. I. c.* 63.—Reg. Himal.
robusta, Zoll. *Sc* Moritzi, Syst Verz. Zoll. 71= Lit sea sebifera, *Blume.*

DODECADIA, Lour. Fl. Cochineh. 316 (1790). *SAMYDACEAE1* (Gen. dab.) Benth. & Hook. *I. i.* 1007.
agrestis, *Lour. I. c.* 319.—China.

DODECAS, Linn. f. Snppl. 86, 215 (1781)=Crenea, Aubl. (Lythrar.).
maritimus, Griseb. fl. Brit. W. Ind. 270=C. maritima.
surinamensis, Linn. f. Soppl. 245 <=C. repens.

DODECASPERMA, Rafin. Fl. Tellnr. *it.* 35 (1836) = Bomarea, Mirb. (Amaryll.).
acutifolia, Rafin. 1. c. = B. acutifolia.

DODECASPERMUM, Forst. ex Scop. Introd. 219 (1777) (Gen. dub.).

DODECASTEMON, Hassk. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. iv. (1855) 141 = Cyclostemon, Blume (Euphorbiac).
Teysmanni, Hassk. 1. c.=C. Teysmanni.

DODECATHEON, Linn. Diss. Chen. 25 (1751); Amoen. Acad. iii. 16 (1766). *PRIMULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 634.
MEADIA, Catesb. ex Mill. Gard. Diet. ed. VL App. 175 (1752).
angustifolium, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 40 =D. Meadia.
californicum, A. Murr. Oreg. Circ. 1 = D. Meadia.
cordatum, crenatum, cuneatum, ellipticum, flexuosum, longifolium, obovatum, obtusum, ovatum, parviflorum,parvi/olium, serraium, triflorum, undatum, uniflorum, Rafin. Atl. Jonrn. 179, 180=D. Meadia.
dentatum, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 119 = D. Meadia.
ellipticum, Nutt. ex Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 94-D. Meadia.
frigidum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 217 = D. Meadia.
integrifolium, Michx. Fl. Bor. Am. i. 123 = D. Meadia.
Jeffreyi, Hort. Fl. des Series, Se"r. II. vi. (1865-67) 99 = D. Meadia.
Meadia, *Linn. Sp. PI.* ed. I. 144.—Am. bor. et arct.
reflexum, Salisb. Prod. 118=D. Meadia.

DODONAEA, Linn. Gen. ed. I. 341 (1737). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 410.
EMPLEUROSMA, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 228 (1847).
acerosa, Lindl. in Mitch. Joum. Trop. Austral. 273 = filifolia.
adenophora, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 95.—Austral.
adenophora, F. Muell. Fragm. i. 98 = concinna.
angustifolia, *Blanco, Fl. Filip.* ed. L 312.—Ins. Philipp.
angustifolia, Linn. f. Suppl. 218=viscosa.
angustifolia, Thunb. Plod. PL Cap. 77 = Thunbergiana.
angustissima, *Hart ex DC. Prod.* i. 617.—Hab. ?
aptera, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.* i. 225.—Austral.
arabica, Hochtt. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 28-viscosa.
asplenifolia, Rudge, in Trans. Linn. Soc xi. (1815) 297. t. 20-viscosa.
attennata, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 353.—Austral.
Baueri, *End!, in Enum. PI. Hueg.* 13.—Austral.
bialata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 134. t. 442 = viscosa.
boroniaefolia, *G. Don, Gen. Syst.* i. 674.—Austral,
brasiliensis, *Schlecht. in Linnaea,* xviii. (1844) 35 (err. typ. 61).—Bras.
Burmanniana, DC. Prod. i. 616-viscosa.
bursarifolia, *F. Muell. in Trans. Phil. Sac. Viet.* i. (1855) 8.—Austral.
caffra, Ecltl. & Zeyh. Enum. 55 = Combretvun saUcifolium.

DODONAEA :—
Caleyana, G. Don, Gen. Syst. L 674 - boroniaefolia.
calycina, Cnnn. ex A. Gray, Bot. U. St Expl. Exped. i. 262=trnncatialis.
Candolleana, *Blume, Rumphia,* iii. 190.—Malaya,
ceratooarpa, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 13.—Austral.
cestroides, Sieber, ex Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 640—triquetra.
condnna, *Benth. Fl. Austral,* i. 487.—Austral.
conferta, G. Don, Gen. Syst. i. 674=viscosa.
conglornerata, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 65 «= Combretum salicifolram.
cuneata, *Rudge, in Trans. Linn. Soc.* xi. (1813) 296. t 19.—Austral.
deflexa, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 8 = Baueri.
denticulata, F. Muell. Fragm. i. 96=ptarmicifolia.
dioica, Roxb. Hort. Beng. [28]; Fl. Ind. ii. 256 = viscosa.
divaricata, *Benth. Fl. Austral,* i. 481.—Austral.
Dombeyana, *Blume, Rumphia,* iii. 189.—Pernv.
dubia, Eckl. & Zeyh. Enum. 55 = Combretum salicifolium.
Ehrenbergii, *Schlecht. in Linnaea,* xviii. (1844) 36 (err. typ. 52).—Ins. S. Doming,
elaeagnoides, *Rudolph, in Schrad. N. Journ.* it II. (1807) 292.—Ins. S. Doming,
ericaefolia, *G. Don, Gen. Syst.* i. 674.—Austral,
ericoides, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.* i. 227.—Austral,
eriocarpa, 5m. *in Rees, Cycl.* xii. n. 6.—Ins. Sandvic.
filifolia, *Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 241.—Austral.
filiformis, Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 881=ericaefolia?
foliolosa, F. Mnell. Fragm. ii. 182 «larraeoides.
Forsteri, *Montr, in Mlm. Acad. Lyon,* x. (1860) 189.—N. Caled.
heterophylla, Hort. ex G. Don, Gen. Syst. i. 674 = viscosa.
hexandra, *F. Muell. in Trans. Viet Inst.* i. (1855) 117.—Austral.
hirtella, Miq in Linnaea, xviii. (1844) 91-boroniaefolia.
hispidula, Endl. Atakt. t. 80 - Distichostemon phyllopterus.
humifusa, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.* i. 226.—Austral,
humilis, *Endl. Atakt.* t. 31.—Austral,
illita, *F. Muell. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 36.—Austral,
inaequifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 408.—Austral.
jamaicensis, DC. Prod. i. 616= viscosa.
Kingii, G. Don, Gen. Syst. i. 674=viscosa.
Kohautiana, *Schlecht. in Linnaea,* xiii. (1839) 52.—Afr. trop.
Lamponga, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. Ell.—Sumatra.
lanceolata, *F. Muell. Fragm.* i. 73.—Austral,
larraeoides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 408.—Austral.
latifolia, Salisb. Prod. 276 = viscosa.
laurifolia, Sieber, ex Loud. Hort. Brit. 154=seq. J
laurina, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 152 - triquetra.
leptcsyga, F. Muell. Fragm. i. 219 = inaequifolia.
Lindleyana, F. Muell. PI. Viet. i. 88=triangularis.
linearifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 407.—Cuba.
linearis, E. Mey. ex Harv. & Sond. FL Cap. i. 242-Thunbergiana.
lobulata, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1862) 872.—Austral.
longipes, G. Don, Gen. Syst. i. 674=triquetra.
ludda, Moench, Meth. 358=viscosa.
Macrossani, *F. Muell. & Scortechini, in Melb. Chemist,* Jan. 1882).—Austral.
macrozyga, *F. Muell. Fragm.* iv. 135.—Austral,
madagascariensis, *Radlk. in Bremen, Abh.* viii. (1884) 470.—Madag.
megazyga, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 483.—Austral.
microcarpa, DC. Prod. i. 617-viscosa.
microzyga, *F. Muell. Ann. Rep. Melb. Bot. Gard.* (1863) 12.—Austral.
mollis, Lindl. in Mitch. Jonrn. Trop. AnstraL 212 - triangularis.
multijuga, *G. Don, Gen. Syst.* i. 674.—Austral.
multijuga, F. Muell. Fragm.i. 219-larraeoides.

DODONAEA :—
Mundiand, Eckl. & Zeyh. Enum. 55-Thnnbergiana.
natalensis, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 23-viscosa.
neriifolia, A. Cunn. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 262=viscosa.
nutans, *Tuns, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I-407.—Arab.
oblongifolia, Link, Ennm. Hort. Berol. i. 381; et in BoL Reg. t. 1051-viscosa.
ovata, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. IL vii. 327=viscosa.
oxyptera, *F. Muell. in Hook. Kem Journ.* ix. (1857) 197 ; *Fragm.* i. 74.—Austral.
pallida, Miq. AnaL Bot. Ind. iii. 7= viscosa.
paulliniaefolia, A. Cunn. ex Steud. Nom. ed. II. 622=vestita.
peduncularis, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 861.—Austral.
pentandra, Grift Notnl. iv. 548 = viscosa.
petiolaris, *F. Muell. Fragm.* iii. 13.—Austral.
physocarpa, *F. Muell. in Hoot. Kem Journ.* ix. (1857) 197 ; *Fragm.* i. 74.—Austral,
pinifolia, *Miq. in Lehm. PI. Preiss.* i. 227.—Austral
pinnata, *Sm. in Rees, Cycl.* xii. n. 7.—Austral,
platyptera, *F. Muell. Fragm.* i. 78.—Austral,
polyzyga, *F. Muell. I. c.* 74.—Austral.
Preissiana, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 226=»«nuata.
procumbens, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet-* (1855) 8.—Austral,
ptarmicaefolia, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1852) II. 155.—Austral.
pterocaulis, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 225=cerato-carpa.
pubescens, Lindl. in Mitch. Jonrn. Trop. Austral. 842 =peduncularis.
repanda, *Schum. (f Thonn. Beskr. Guin. PL* Afr. trop.
salicifolia, DC. Prod. i. 617=viscosa.
salsolifolia, A. Cunn. in Hook. Joura. Bot. i. (1834) 251=ericifolia.
scabra, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* 154, nomen.—Austral.
Schiedeana, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 33 (entyp. 49)-viscosa.
serrnlata, *DC. Prod.* i. 617.—Reg. Argent.
sororia, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 225 = aptera.
spatulata, Sm. in Rees, Cycl. xii. n. 2••viscosa.
stenophylla, *F. Muell. Fragm.* i. 72.—Austral,
stenozyga, *F. Muell. I. c.* 98.—Austral.
tenuifolia, Lindl. in Mitch. Joum. Trop. Austral. —adenophora.
Thunbergiana, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 54.—Afr.
triangularis, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. A* 219.—Austral,
trifida, *F. Muell. Fragm.* ix. 88.—Austral.
trifoliata, Trew, PI. Rar. 122 t. 9 = Ptelea trifoliata.
trigona, Lindl. in Mitch. Joum. Trop. Austral. triangularis.
triquetra, *Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch- Indie,* ii. (1845) 36.—Java,
triquetra, *Wendl. Beobacht.* 44.—Austral,
truncatialis, *F. Muell. Fragm.* ii. 148.—Austral-
umbellata, G. Don, Gen. Syst. i. 674 = viscosa.
vestita, *Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austral,* Austral.
viscosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 19 ; *Linn.Ma*t-* —Cosmop. trop. et subtrop.
viscosa, Mart, in Flora, xxii. (1839) I. Beibl.B'- Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 85 (err. typ- » > brasiliensis.
viscosa, Royen, ex Blume, Rumphia, iii. leana.
viscosa, Sieber, ex Schlecht. in Linnaea, 86 (err. typ. 52) = Kohautiana.
Waitziana, *Blume, Rumphia,* iii. 189.—
Wightiana, Blume, 1. c. = viscosa.
Zollingeri, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc-* (1863) I. 587.—Java.

DODONAEA, Plum, ex Adans. Fam. ii. S« Comocladia, P. Br. (Anacard.).
tricuspidata, Pritz. Ic. Ind. 874 =C. tricuspK"

DOELLIA, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) I-et in Warp. Rep. ii. 953 (1843; (Compos.).
Kotschyi, Sch. Bip. 1. c. nomen.—Hab.!

DOELLINGERIA, Nees, Gen. et Sp. Aster. 177 (1832) -Aster, Linn. (Compos.).
mygdalina, Nees, 1. c. 179= A. umbellatns.
aa i' *a, Lindh in Hook_ Com P_ Bot_ Ma 6- i. (1835)
so=A. nmbellatus.
"|"H/o«a, Nees, Gen. et Sp. Aster. 181-A. infirmus.
<»<n>*ata,* Nees, 1. c. 182-A. reticulatus.
P'armtcoides, Nees, 1. c 183 = A. ptannicoides.
«Ara, Nees, 1. e. = A. scaber, *Thunb.*
£ ? of *arpa;* DC_Prod_ '• 263 = A. striatus.
mbell N, Gen. et Sp. Aster. 178 - A. umbellate.

DOEMIA 'R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 60, err. typ^Daemia, R. Br. (Asclep.).

Don«RI?NA, Borkh_ in Rhe>n- Mag. i. (1798) 628-Cerastium, Dill. (CaryophA
"•«*«; Borkh. 1. c.=C. quatemellum.

DOE n^ENIA> D«"rat. Schlness. Hort. Malab. 81 U818)=Aoronychia, Forst (Rutac).
""*labarica,* Dennst. 1. c.=A. laurifolia.

DOERRIERA, Steud. Nom- «d- n. 1. 622 (1840) sphalm. =DOERRIENA, R,^. (Caiyoph.).

DOFIA, Adans. Fam. il. 286 (1763)=Dirca, Linn. (Thymel.).

DOGA, Baill. Adansonia, iu. (1869) 206 - Btorcklella, Seem. (Legumin.).
macrogemma, Panch. ex BaiU. Hist PI. ii. 182-S. Pancheri.
Pancheri, Baill. Adansonla, ix. (1869) 205 = S. Pancheri.

DOLIA, L'odl. Bot Reg. (1844) sub t 46. *CONVOLvi*CEAE, tihi*RE Benth. & Hook. f. ii. 880.
(1845) 505. Mi*ers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv.
^»(U)CARYA,Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t 46.
Li£?F7RIA- Gaudich. Bot Voy. Bonite, t. 110 (1844-66').
VE
da™ia, LPE ADLIA>.Gaudich. I. c. t 109 (' 1844-66 ').
60SI—aft*' *n Hcok_ Lond_ Jmrn_ Bot_ ". (1846)
laxh, —Peruv.
lepto S^ « • » '• c.-Peruy.
revol J Benth_ V *Hook.f. Gen.* ii. 880.—Peruy.
salsoloides, * LindL Bot_ R*e- (1844) sub t. 46.—Chili.
tot ver^T: Benth- ** *Hoot-f. Gen! ii.* 880.—Chili.
T>culata, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub t. 46.-ChiH.
]^ nllata, W»1P- Ajin. i. 623, sphalm.=praec

I ANDRA, Cham, in Linnaea, vii. (1882) 657-ufadyena, A DC. (Bignoniati).
cynanchoides, Cham- 1- c. 658 *(-Spatkodea Dolichandra)*—Bras.
Kohautiana, PleSI> ^ Bemerk_ 92 = Bignonia Ungnis-cati.

DOLICHAND1101111. Fa"1. ™ Seem, in Ann. & Mag. Nat. H.»»- Ser- HI. x. (1862) 81. *BIGNONIACEAE*> *"**•* Hook. f. ii. 1046.
MARKHAMIA> Seem_m J.um- Bot. i. (1863) 226.
arcu-I, C. B. a<*r***''' ****•/• FA •*"'•Ind_iv_S8o_ —Ind. M
Ca felina, *Benth.*> * • / G««.ii. 1048.—China.
cris ^ Seem. "' y"'"- *«*• "" (1870) 381.—Ind. or.
«cat> Coen_ '• '—Ind. or.
JUiji' • enri, ex F_ MndI_ Fragm. iv. 149 =
Spathodea ormis..
heter kylla, F. Muell. 1. c. -Spathodea heterophylla.
Lawi Seem. * *Journ. Bot.* viii. (1870) 880.—Ind. or.
latea, *Benth. & Hook. f. Ge*«. ii. 1046.-A&. trop.
Rheedii, Seem. "* *Journ. Bot_ i®* (1870) 380.—Ind. or.; Mal
serrulata, Sem Tc.383=Lawii.
spathacea, Seem LC_ •• (1868) 226-crispa, Rheedii.
stipulata, B I"'*' ^ tf«>*-/- G*n. ii. 1046,-Burma.
tomewn-a, *Benth & Hook. f. l. c.*—Afr. trop.

DOLICHLASIUM, Lag. Amen. Nat S3 (1811)-Trixis, P. Br. (Com).
glanduliferum, . e?" Hook. & Am. in Comp. Bot. Mag. i. (1835) 34 = seq.
Lagascae, Gill. Don, in Phil. Mag_<Apr> 1882) 389.—Chili.

DOLICHODEIRA, Hanst. in Linnaea, xxyi. (1853-65) 206=AohimeneB, P. Br. (Gesner.).
tubiflora, Hanst. 1. c—Uruguay.

DOLICHODERIA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iL 999 (1876)-praec.

DOLICHOGYNE, DC. Prod. yii. 256 (1838)=M"ardophylTum, Hook. (Compos.).
acaulis, Wedd. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 259 - Lepidophyllum acaule.
armata, Wedd. Chlor. And. i. 181.—Boliv.
Candollei, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. *103-staekelinoides.*
Mliotrichoides, Remy, 1. c. 104 = N. chiliotrichoides.
genistoides, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 738 = N. genistoides.
gnaphalioides, DC. Prod. rii. 266=*staehelinoides.*
lepidophylla, Wedd. Chlor. And. i. 182 = Lepidophyllum Meyeni.
rigida, Wedd. 1. c—Lepidophyllum rigidum.
rupestris, Wedd. 1. c. 183= Lepidophyllum rupestre.
staehelinoides, DC. Prod. yii. 256.—Reg. Argent.

DOLICHOLASIUM, Spreng. Gen. iL 623 (1831) = = DOLICHLAS1UM, Lag. = Trizis, P. Br. (Compos.).

DOLICHOIiOBIUM, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ir. (1860) 808. *RUBJACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 41.
Knollysii, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc,* xx. (1883) 860.—Ins. Fiji,
latifolium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 809.—Ins. Fiji,
longissimum, *Seem, in Bonplandia,* iv. (1861) 266; *et Fl. Vii.* 121. t. 25.—Ins. Fiji.
Macgregoii, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 360.—Ins. Fiji.
oblongifolium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 309.—Ins. Fiji.

DOLICHOLUS, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 354 = Rhynchosia, Lour. (1790) (Legumin.).
flams, Medic. 1. c.=seq. ?
minimus, Medic. J c. = R. minima.

DOLICHONEMA, Nees, in Flora, iv. (1821) 303-Ifoldenhauera, Schrad. (Legumin.).
speciosa, Nees, 1. c = M. floribunda.

DOLICHOB, Linn. Gen. ed. I. 222 (1737). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 540.
CHLORVLLIS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 149 (1835).
DIPOGON, Liebm. in Ann. Sc Nat. *Sir.* IV. ii. (1854) 374.
LABLAB, Adans. Fam. ii. 325 (1768).
LABLAVIA, D. Don, in Sweet, Brit Flow. Gard. Ser. II. t. 236 (1884).
abyssinicus, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 810 = Phaseolus violaceus.
acinaciformis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 678.—Ins. Philipp.
acinaciformis, Jacq. Coll. i. 114 - Canavalia ensiformis.
Aeschynome-Sesban, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 134 = Sesbania aegyptiaca.
Ahipa, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. vii. (1857) 118.—Peruv.
albus, Lour. Fl. Cochinch. ii. 489 - D . Lablab.
altissimus, Jacq. Enum. PI. Carib. 27 — Mucona altissima.
altissimus, Veil. Fl. Flum. 320; yii. 1.154 =Dioclea violacea.
amoenus, Salisb. Prod. 334=D. Lablab.
andongensis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 213.—Afr. trop.
angularU, Willd. Sp. PI. iii. 1051-Vigna sinensis.
angulatus, Willd. Enum. Hort Berol. SuppL 61 = praec.
angulosus, DC. Prod. ii. 399—Phaseolus diversifolius.
angustifolias, *Eckl. V Zeyk. Enum.* 258.—Afr. austr.
angustifolius, Vahl, ex Guill. & Perr. FL Seneg. Tent. i. 220 = Vigna capensis.
angustissimus, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 142 - angustifolius.
arborescens, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 358.—Mexic
arboreus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 134 = Sesbania grandiflora.

DOLICHOS :—
arboreus, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 262 = Pongamia glabra.
argenteus, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 249 — ciliatus.
argenteus, *Willd. Sp. PI.* iii. 1047.—Afr. trop.
aristatus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1021.—Am. austr.
articulatus, Lam. Encyc ii. 296 = Pachyrhizus angulatus.
arvensis, *Veil. Fl. Flum.* 322 ; vii. t. 161.—Bras.
axillaris, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. 144 = biflorus.
barbatus, Wall. Cat. n. 5548-Atylosia barbata.
benghalensis, Jacq. Hort. Vindob. ii. 67 - D. Lahlab.
Benthamii, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 96=gibbosus.
bicolor, Hoffmgg. ex Steud. Nom. ed. II. i. 522= Dioclea bicolor.
bicontortus, *Dur. in Actes Linn. Soc. Bord.* xxviii. (1869) 68.—Japon.
biflorus, *Linn. Sp. PI.* 727.—Geront trop.
blandus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6668-Atylosia mollis.
bracteatus, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 210.—Ind. or.
bracteatus, Wall. Cat. n. 6S54 = Rhynchosia bracteata.
brevicaulis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 211.—Afr. trop.
Brunelli, *Zuccagni, in Roem. Collect.* 151.—Hab. t
bulbosus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1020=Pachyrhizus angulatus.
callosus, *Blume, Cat. Gew. Buitent.* 91.—Java,
candicans, *Wall. Cat.* a. 6667.—Burma.
capensis, linn. PI. Rar. Afr. 17 = Vigna capensis.
capitatus, *Herb. Madr. ex Wall. Cat.* n. 6549= Vigna Catjang.
Catjang, Linn. Mant. i. 259=Vigna Catjang.
Chloryllis, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 246.—Afr. austr.
Cienskowstii, Schweinf. & Asch. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 256=Canavalia ensiformis.
ciliatus, *Klein, in Willd. Sp. PI.* iii. 1049.—Ind. or.
coccineus, *Veil. Fl.Flum.* 321; vii. 1.158.—Bras.
comosus, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 241 = Mucuna comosa.
conspersus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5642-Dunbaria conspena.
coriaceus, R. Grah. 1. c. n. 6562—Dioclea reflexa.
crassus, R. Grah. 1. c. n. 6653=Atylosia mollis.
crenatifructus, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 225-D.LabUb.
cultratus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 184.—Arabia.
cultratus, Thunb. in Trans. Linn. Soc ii. (1794) 340-D. Lablab.
cultratus, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 523-Canavalia ensiformis.
cuneifolius, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 134-Crotalaria retusa.
cuneiformis, Steud. Nom. ed. II. i. 623=praec.
Curtisii, G. Don, Gen. Syst ii. 867 - D . Lablab.
cuspidatus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5566 = D. Lablab.
cylindricus, Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ 51 = Vigna capensis.
cylindricus, Moench, Meth. Suppl. 48=Vigna sinensis.
Daltonii, Webb, in Hook. Niger Fl. 125-biflorus.
dasycarpus, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 186 - Vigna doUchoides.
debilis, D. Don, ex Hook. Niger Fl. 312 - Rhynchosia debilis.
debilis, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 223.—Abyss.
decumbens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* ISO.—Afr. austr.
densiflorus, *Welw. ex Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 214.—Afr. trop.
Didjre, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 133.—Arab.
Dillonii, *Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp.* (1847) 7.—Abyss.
dissectus, Lam. Encyc. Ii. 800 - Phaseolus aconitifolins.
Dongaluta, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 214.—Afr. trop.
echinatulus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 401-Vigna Catjang.
elatus, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 214.—Afr. trop.
elongatus, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5548-Atylosia elongata.

DOIiICHOS:—
emarginatus, Jacq. Hort. Scboenb. ii. 50—Canavalia obtusifolia.
ensiformis, Linn. Sp. PI. 725 = Canavalia ensiformis.
ensiformis, Thunb. Fl. Jap. 279 = I>. Lablab.
erosus, Linn. Sp. PI. 726 — Pachyrhizus angulatus.
fabaeformis, L'Heñit. Stiip. Nov. 168=Cyamopsis psoraloides.
Faba-indica, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 138.—Arab.
Faba-nigrita, *Forsk. 1. c.* 1S2.—Arab,
falcatus, *Klein, ex Willd. Sp. PI.* iii. 1047.—Ind. or.
feldformis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **i. 144.—** Afr. austr.
fatmensis, Hochst. & Stend. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 224 = Rhynchosia minima.
festivus, Wall. Cat. n. 5551 = D. Lablab.
ficifolius, R. Giah. in WalL 1. c. n. S563 = Pneraria phaseoloides.
fihformis, *Linn. PI. Jam. Pugill.* **19;** *Amoen. Acad.* v. 402.—Jamaic
Finlaysonianus, R. Grab, in WalL Cat n. 6565 = Dunbaria conspersa.
formosus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i. 223.** —Abyssin.
frutescens, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 240.—Reg. Himal.
funarius, *Molina, Sagg. Chile,* 156.—Chili.
galeatus, Gaudich. in Freyc Voy. Bot. 486. t. 115 = Canavalia galeata.
gangeticus, Roxb. Hort. Beng. 55; Fl. Ind. iii. 310 = Vigna glabra.
geminiflorus, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 358.—Mexic
geminus, *Veil. Fl. Flum.* 321; vii. t 159.—Bras,
gibbosus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 130.—Afr. austr.
giganteus, Willd. Sp. PI. iii. 1041 = Mucuna gigantea.
gladiolus, Jacq. Coll. ii. 276 = Canavalia ensiformis.
glutinosus, Roxb. Hort. Beng. 55; Fl. Ind. iii. 312 = Rhynchosia viscosa.
glycinoides, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. vi. 441 = Vigna glabra.
gracilis, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 219-Vigna gracilis.
grandifolius, R. Grah. in WalL Cat. n. 5556 » Puenuria ThomsonL
Halei, *Wood, Bot.* **b*** *Florist,* **98;** *ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* **219.—Am. bor.**
Hassjoo, *Siebold, in Verh. Baton. Gen.* **xii. (1830) 55.** —Japon.
hastaefolius, *Schnitil. in Flora,* xxv. (1842) I. *Beibl.* 146.—Nubia,
hastaeformis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **i. 142.—** Afr. austr.
hastatus, *Lour. Fl. Cochinch.* 442.—Afr. or.
Helicopus, *Steud. Nom.* ed. II. i. 523.—Afr. anstr.
helvolus, Nutt. Gen. Am. ii. 112-Phaseolus helvolus.
heterophyllos, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* **80.—Ins.** Canar.
hexandra, Roxb. Hort. Beng. 65, nomen (quid?).— Ind. or.
hirsutus, Thnnb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 339 - Pueraria Thunbergiana.
hirtus, Andr. Bot. Rep. t. 446 = Cylista villosa.
hirtus, Hort ex DC. Prod. ii. 389-FagelU bituminosa.
hispidus, Steud. Nom. ed. II. i. 628=Vigna hispida.
incurvus, Tbunb. Fl. Jap. 280 = Canavalia ensiformis.
Jacquini, *DC. Prod.* ii. 897.—Ind. occ
japonicus, Spreng. Syst iii. 252 = Wistaria chinensis.
Jnnghuhnianus, *Benth. in Miq. PI. Jungk.* **240.— Java.**
Lablab, *Linn. Sp. PI.* 725.—Reg. trop.
lacteus, Rafin. Fl. Ludov. 103 (quid?).—Am. bor.
lanceolatus, if. *Grah. in Wall. Cat.* n. 5547.— Burma,
leucomelas, *Kunie, Delect. Sem. Hort. Lips.* **(1842).—** Afr. austr.
lignosus, Jacq. Select. Am. 205 = Jacquini.
lignosus, Linn. Sp. PI. 726= D. Lablab.
linearis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **i. 142.—Afr.** austr.
lineatus, Thunb. Fl. Jap. 280 = Canavalia obtusifolia.
littoralis. Veil. Fl. Flum. 321; vii. t 160=Canavalia obtusifolia,
lobatus, Willd. Sp.Pl. iii. 1047-Vigna lobata.
Lotononis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1883)** 380.—Madag.

DOLICHOS:—
Lubia, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* **133.—iAegypt.**
luteolus, Jacq. Hort. Vindob. i. 39 = Vigna"glabra.
luteus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 105 = Vigna retusa.
macrodon, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5555=Rhynchosia sericea.
mammosus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 13 - Pachyrhizns angulatus *1*
maritimus, *Aubl. PI. Gui.* ii. 765.—Guiana; Java.
martinicensis, Jacq. ex Medic. Phil. Bot i. 205=D. Lablab.
medicagineus, Lam. Encyc. ii. 297 = Rhynchosia minima.
melanophthalmus, DC. Prod. ii. 400=Vigna sinensis.
Memnonius, Delile, FL Kgypte, 254=Rhyuchosia Memnonia.
mexicanus, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 829 = Vigna glabra.
miniatus, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 441 - Canavalia obtusifolia.
minimus, Linn. Sp. PI. 726 = Rhynchosia minima.
minutus, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 256 - Atylosia scarabaeoides.
mitis, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 224.—Abyssin.
mollis, Jacq. Fragm. 60 = Dioclea mollis.
monachalis, Brot. FL Lusit. ii. 125 = Vigna Caljang.
montanus, Lour. Fl. Cochinch. ii. 489=Pueraria phaseoloides.
monticola, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. I.** 196.—Bras.
multiflorus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 281 = Dioclea Boykinii.
mutabilis, Salisb. Prod. 334 = Canavalia ensiformis.
nervosus, *Schum. (f Thonn. Besir. Guin. PI.* **342.—** Afr. trop.
niloticus, Delile, FL Egypte, 253. t 88-Vigna luteola.
niloticus, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 523 = D. Lablab.
obcordatus, A. Cnnn. ex Benth. Fl. Austral, ii. 247= Hardenbergia retusa.
obcordatus, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 803 = Canavalia obtusifolia.
obliquifolius, *SchniUl. in Flora,* xxv. (1842) I. *Beibl.* 145.—Nubia.
obovatus, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL **841=** Canavalia obtusifolia.
obtusifolius, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 358.—Mexic.
obtusifolius, Jacq. Obs. Bot. iii. 6 = Rhynchosia minima.
obtusifolius, Lam. Encyc. ii. 295 = Canavalia obtusifolia.
oleraceus, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 340 = Vigna Catjang.
Oliveri, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* **xviii.** (1868) 656.—Afr. trop.
ornatus, Wall. Cat. n. 5561 =- Atylosia barbata.
malifolius, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL 341 = Canavalia obtusifolia.
ovatus, R. Grah. in Wall. Cat n. 5540 •= Psophocarpus tetragonolobns.
palmatiñdus, *Moç. If Sesse, ex DC. Prod.* **ii. 399.—** Mexic.
palmatilobus, Sesse, ex DC. L c. = Pachyrhizns palmatilobus.
palmatus, Forsk. ex Steud. in DC. Prod. ii. 894 = Phaseolus aconitifolius.
parabolicus, Nutt. Gen. Am. ii. 112 = Phaseolus helvolus.
Pavonii, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 858.—Peruv.
pentaphyllus, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. i. 113 = linearis.
phaseoloides, Roxb. Hort. Beng. 55; Fl. Ind. iii. '816 = Pueraria phaseoloides.
pilosus, Klein, ex Willd. Sp. PI. **iii.** 1043-Vigna pilosa.
Plectrotropis, Steud. Nom. ed. II. i. 623=Vigna capensis.
polystachios. Linn. Sp. PL 726 = Phaseolus perennis.
polystachyus, Thunb. Fl. Jap. 281 = Wistaria chinensis.
prostratus, Buch.-Ham. & Koen. ex Roxb. Hort. Beng. [98] ; Fl. Ind. iii. 810 = ciliata.
prostratus, *Steud. Nom.* ed. IL L 523.—Afr. austr.
protractus, Steud. 1. c. = Vigna triloba.
pruriens, Linn. Syst ed. X. 1162 = Mucuna pruriens.
Pseudo-cajanus, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 215.—Afr. trop.

DOLICHOS:—
psoraloides, Lam. Encyc. ii. 800—Cyamopsis psoraloides.
pubescens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1021.—Am. austr.
pugioniformis, Raeusch. Nom. ed. III. 209 (quid?). —Hab. ?
punctatus, Wight & Am. Prod. 247 = Dunbaria conspersa.
pungens, *Veil. Fl. Flum.* 321; vii, t. 157.—Bras.
purpureus, Linn. Sp. PL ed. II. 1021 = D. Lablab.
pyramidalis, Lam. Encyc.ii. 296-Rhynchosia phaseoloides.
racemosus, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 523 - D. Lablab.
racemosus, *Veil. Fl. Flum.* 822 j vii. t. 162.—Bras.
regularis, Linn. Sp. PL 726-Galactia glabella.
repens, *Linn. PI. yam. Pugill.* **19 ;** *Amoen. Acad.* **»•** 402.—Jamaic.
reticulatus, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5552 = Atylosia mollis.
reticulatus, [Dryand. in] Ait Hort. Kew. ed. I. iii. & =Atylosia reticulata.
reticulatus, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i. 225.** —Abyssin.
retusus, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **i. 147.—A&-** austr.
rhomboideus, *0. Hoffm. in Linnaea,* xliii. (1880-82) 128.—Afr. trop.
rhynchosioides, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sit.* **I.** (1826) 419.—Peruv.
rhynchosioides, Miq. Fl. Ind. Bat L I. 185=Dunbaria conspersa.
rhynchosioides, Schlecbt. in Linnaea, xxvii. (1854) 531 =lignosus.
roseus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 105 = CanavaW obtusifolia.
rotundifolius, Vahl, Symb. Bot. ii. 8l = Canaval» - obtusifolia.
ruber, Jacq. Select. Am. 204 = Dioclea Jacquiniana.
rufescens, R. Grah. in Wall. Cat n. 5544 = Rhynchosia aurea.
rufus, *Veil. Fl. Flum.* 320 ; vii. t. 155.—Bras,
rupestris, *Welv. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr-* "• 212.—Afr. trop.
sanguineus, Jacq. Fragm. 45-D. Lablab.
Savii, *Montr, in Mtm. Acad. Lyon,* **x. (1860) 197.—** Caled.
acaber,* M*. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) —Guiana.
scabriusculus, Hassk. in Flora, xxv. (1842) H. Beibl. »" -Centrosema virginianum.
scarabaeoides, Linn. Sp. PL 726- Atylosia scfttt* baeoides.
sericeus, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. I* **141.—** austr.
sesquipedalU, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 402=-Vig»» **Catjang.**
sesquipedalis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1019.—Am. austr.
Sessei, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 357.—Mexic.
setaefolius, *Boj. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 524.—W* Maurit
sinensis, Forsk. FL Aegypt. Arab. 132 - Vigna l
sinensis, Linn. Cent. PL ii. 28; Amoen. Acad. =Vigna sinensis.
smilacinus, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **i.** Afr. austr.
Soja, Linn. Sp. PL 727 - Glycine Soja.
Soorootoo, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 255-Mud* capitata.
sphaerospermus, *DC. Prod.* ii. 400.—Jamaic.
spicatus, R. Grah. in WalL Cat. n. 5557 Thomsoni.
spicatus, R. Grah. 1. c. n. 5557 A, B=Pueraria pnf* loides.
spicatus, Koen. ex Roxb. Cat Hort. Beng. Lablab.
splendens, *Wela. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop-* ii. 215.—Afr. trop.
spurius,G. F. W.Mey. Prim. Fl. Esseq. 242-MUC» spnria.
stenocarpus, *Hochst. ex A. Rich. Tent, fl-* 224.—Abyssin.
stipulaceus. Lam. Encyc. ii. 800 - Phaseolos tnlo
stipulosus., *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop-* ii. 212.—Afr. trop.
striatus, Steud. Nom. ed. II. i. 524 = Vigna capensis.
subaequalis, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6539— Burma.
subcamosus, *Wight (f Am. Prod.* 249.—lad- «*•

DOLICHOS:—
subracemosus, *Jacq. Select. Am.* 205.—N. Granat.
suffultus, R. Grah. in WalL Cat. n. 5564 » Psophocarpus palusttis.
wmulicus, *Spreng. Nachr.* i. *Bot. Gart. Halle,* 21.—«d. or.
knuis, *Stewi. Norn.* ed. II. i. 524.—Afr. austr.
tnragonolobus, Linn. Syst. ed. X. 1162 - Psophocarpus tetragonolobns.
t'traspermus, Willd. Sp. PI. iii. 1044-D. Lablab.
tomentosus, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 5538 = binorus.
tome**bot.**ntosus, *Rafin. Fl. Ludov.* 108 (sp. dub.).—Am.
tomentosus, Roth, Nov. PI. Sp. 345 = Rhynchosia **sericea.**
*tran**yuebaricus*, Jacq. Hort Vindob. iii. 89. t. 70 = Vigna Catjang.
tnhbatus, Linn. Mant i. 101-PhaseoIus trilobns.
tnlobatus, Wall. Cat. n. 6541=falcatus.
trilobus, Blanco, FL Filip. ed. II. 403=Phaseolus calcaratus.
jW.W«s, Hontt. Handleid. x. 168. t. 64=Vigna lobata.
™»«s, Linn. Sp. PI. 726-Pachyrhizus angulatus.
Wobus, Lour. Fl. Cocbinch. 635 = Pachyrhizus angu- latns, Pueraria Thnnbergiana.
"•tlobus, Roth, exWalL Cat. n. 6588, partim=PhaseoIus aconitifolius.
^ Thnnb. Fl. Cap. 590=Vigna triloba.
Wmcatns,^«. *Fl. Ind. Bat.* i. I. 186.-Java.
™*oerosus*, Lam. Encyc ii. 296=Pachyrhizus tuberosus.
tuber fi**catus.** ' Roxbl ex Wight & A™ - ro. *iii9.'*
tuncif o«w, Raeusch. Norn. ed. III. 209, spalm. = cuneifolius.
u,ba,a, ' *Thunb_ ' » Trm*_ linn_ Soc_ U_ <* 1794) 839 / —Japon.
*umbel**latus*, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 524- gibhosns.
uncinatus, Linn. S**uncinatus.**p„ *m*, **" 1I- 1021 ** Teramnus
*undula**tus* *Moc. (f Sesse, ex G. Don, Gen. Syst.* ii. "07.—Mexic.
*u;fil**ratus*, Linn. Sp. PI. 726=Vigna Catjang.
*ur**siculatus* ' Thunb - Fl. Jap. 279 = umbellatus.
uniflorus Um. Encyc. ii. 299 ~ biflorus.
urens, Linn_ syst_ed_ x_1162; Jao i- SelectAm>l- 182. I. 84 — B-Mucuna urens.
urens, Ro*b. ex Wight & Am. Prod. 254 - Mucuna monospenna.
**"os' *«»• *ex Miq. Fl. Ind. Bat.* I. i. 184.—Java.
vestit s R. Grah, in Wall> Cat- n„ 6545 = Phaseolus vestita. **Hemidesmia**
flatus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 440 = J.-fa capensis.
*ve**inatus*, Nntt> Gm- Am- ,L 112=Phaseolu9 helvolns.
*%?**> Hort. ex Stend. Nom. ed. IL i. 524 - "Wseolns violaceus.
virgatus, A 111.—G^ ' ' " *Act_ Soc_ Hist_ Nat_ Par*^ (1792)
vi^ B»|*-Hani. ex Wall. Cat. n. 5688 - Pneraria **olo des.**
*vi**ts*, R<»b. Hort. Beng. 55; Fl. Ind. iii. 301 = *£ —inv aliaensiformis.
Woolawa, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 248=bifloms.

DOL K P **OSIPHOP**Phil, in Ann. Univ. ChiL (1873)
^oldcmanni, *PAH. I.* <;._chili

DOLICHOJ Y U S ' CMS. in Diet Sc. Nat. lvi. 138 (1828) -^ **amadeaia,** Mntis (Compos.).
laurifo. !", Cass " L C< IM *(-Maldea lauri/olia).*-Peruv!

DC S f A **TYLIS** R Tufez. in L **Soc Nat Moc**
Hook f .: t5 ". 30B *CRUCIFERAE* [Benth. & Hook Ic " » « 92 18 ").
S **RMA, Hook. ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 75** (1862).
Funckii, Turcz. l. c- 806.—Veneznela.
Lindenii, Turcz. . c.—N. Granat.

DOLICHO **Nat.** U_ 476 (1827) = **Coreopsis,** Linn. (Compos.).

DOLICHUS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. p. liv. 140 (1835) = Doliohos, Linn. (Legumin.).

DOLICOTHECA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 386 (1873) sphalm.=DOLICHOTHECA, Cass.-Core-**opsla,** Linn. (Compos.).

DOLIOCAHPU8, Roland. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1756J 249. *DILLENIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 12.
CALINEA, Anbl. PI. Gni. i. 656. t. 221 (1775).
MAPPIA, Schreb. Gen. PI. 806 (1791).
OTKLIS, Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 407 (1827).
RHINIUM, Schreb. Gen. PI. 701 (1791).
RICAURTEA, Triana, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. ix. (1858) 47.
SORAMIA, Aubl. PI. GuL i. 552. t. 219 (1775).
TIGARBA, Aubl. 1. c. 917. t. 850, 351 (1775).
brevipedicellatus, *Garde, in Linnaea,* xxii. (1849) 47. —Bras.
Calinea, *J. F. Gmel. Syst.* 805.—Guiana; Bras.
Calinea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 3, partim = brevipedicellatus.
ealineus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125=D. Calinea.
castaneaefolius, *Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 78.—Bras,
dentosus,' *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 65.—Bras,
elegans, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 76. t 18. f. 1.—Bras.
glomeratus, *Eichl. 1. c.* 77. t. 18. f. 2.—Bras.
grandiflorus, *Eichl. I. c.* 73.—Bras.
macrocarpuB, *Mart, ex Eichl. 1. c.* 77.—Bras.
major, J. F. Gmel. Syst. 806-strictus.
nitida, *Triana &* Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (18621 16.—N. Granat.
piauhiensis, Mart, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 75=dentosus.
pubens, Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 49 - Rolandri.
pubifiorus, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 482 = Banara brasiliensis.
Rolandri, *J. F. Gmel. Syst.* 806.—Guiana; Bras.
scandens, Poir. E:.cyc. Suppl. ii. 497=Rolandri.
Schottianus, £i'rA/. *in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1.74.—Bras.
Sellowianus, *Eichl. I. c.* 76.—Bras.
semidentatus, Garcke, in Linnaea, xxii. (1849) 48 = Rolandri.
sessiliflorus, Afarf. *in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl. 7.*—Bras.
Soramia, *DC Syst. I* 406.—Guiana.
soramius, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125 = D. Soramia.
spintdifer, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 266=dentosus.
slrictus, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 498.—Guiana,
undulatns, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 78.—Bras,
virgatus, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. x. (1880) 381.—Guiana.

DOLLINERA, Endl. Gen. 1286 (1841) = **Demnodium,** Desv. (Legumin.).
rufescens, Endl. ex Walp. Rep. i: 736 = Pesm. rufescens.
satnbuensis, Endl. 1. c. = Desm. floribundum.

DOLLINERIA, Sauter, in Flora, **xxxr.** (1862) **358= Draba,** Dill. (Crucifer.).
ciliata, Sauter, 1. c. 864 = D. ciliata.

DOLOMIAEA.DC. in Guill. Archiv. Bot. ii. (1833) 380 = Jurinea, Cass. (Compos.).
macrocephala, DC. 1. c.=J. macrocephala.

DOLOPHRAGMA, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 63. t. 71 - **Arenaria,** Rupp. (Caryophyll.).
globiflorum, Fenzl, 1. c.=A. globiflora.
juniperinum, Fenzl, L c. - A. juniperina.

DOMA, **Um.** Illustr. t. 900 (1823)=Hyphaene, Gaertn. (Palm.).

DOMBEIA, Raeuscb. Nom. ed. III. 291 (1797)-DOMBEYA, **Lam.**^**Arauearia,** Juss. (Conif.).

DOMBETA, Cav. Diss. 121. tt. 88,41 (1787). *STERCULIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 221.
ASSONIA, Cav. Diss. 120. t. 42 (1787).
ASTRAPAEA, Lindl. Collect Bot. 114 (1822).

DOMBEYA:—
HILSENBERGIA, Boj. in Ann. Sc Nat Sér. II. xviii. (1842) 189.
KOENIGIA, Comm. ex Juss. Gen. 275 (1789).
LEEU WENHOECKIA, E. Mey. ex Endl.Nov. Stirp. Dec. 87 (1839).
VAHLIA, Dahl, Obs. Bot. 21 (1787).
WALCUFFA, J. F. Gmel. Syst. 1029 (1791).
XEROPETALUM, Delile, Cent. PI. Mero^, 84 (1826).
acerifolia, Gaertn. Fruct. it 260=Pterospermnm acerifolium.
acutangula, *Cav. Diss.* 123. t. 88. f. 2.—Ins. Mascar.
Ameliae, *Guill. Archiv. Bot.* i. (1833) 867.—Madag.
angulata, Cav. Diss. 123. t. 39. f. 1 = acutangula.
angulata, Mast, in Gard. Chron. (1867) 74 — Mastersii.
antsianakensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885)** 487.—Madag.
astrapaeoides, Boj. Hort. Maurit 40-Astiria rosen.
Beraieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885) 600.** —Madag.
biserrata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 244-Helicteres spicata.
Bojeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* **(1885) 496.** —Madag.
borbonica, *Gaertn. Fruct.* ii. 259. t. 137.—Ins. Borb.
Breonii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885) 4»4.** —Madag.
Bruceana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. 77.—Afr. trap.
Burgessiae, *Gerr. ex Hani. If Sond. Fl. Caf.* **ii. 590.—** Afr. austr.
cannabina, *Hilsenb. V Boj. ex Hook. Bot. Mag.t.* **3619.** —Madag.
Chapelieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885)** 4U3.—Madag.
cordifolia, DC. Prod. i. 499=acutangula.
Coria, *Baill. 1. c.* 4U1.—Madag.
cuspidata, *Boj. Hort. Maurit.* 40, nomen.—Madag.
cymosa, *Hare, in Hani. If Sond. Fl. Cap.* **ii. 689.—** Afr. austr.
decanthera, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 349 = Helicteres spicata.
decanthera, Cav. Disi. 126-Trochetia decanthera.
Delilei, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1650-51) 225 = multiflora?
densiflora, *Planch, ex Ham. (f Sond. Fl. Cap.* **ii. 589.** —Afr. austr.
diversifolia, Spreng. Syst iv. Cur. Post 256=Pterospermum diversifolium.
Dregeana, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 18.—Afr. austr.
elliptica, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xviii. (1842) 191.—Madag.
crythroclada, *Boj. 1. c.*—Madag.
Erythroxylon, Andr. Bot. Rep. t 389 = Melhania Melanoxylon.
Erythroxylon, Willd. Sp. PI. iii. 725 = Melhania Erythroxylon.
ferruginea, *Cav. Diss.* 128. t. 42. f. 2.—Ins. Mascar.
ferruginosa, Poir. Encyc. v. 159, in syn.—**praec.**
ficulnea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885) 488.** —Madag.
floribunda, *Baker, injourn. Linn. Soc.* xxi. (1884) 325. —Madag.
Glechoinaefolia, *Baker, 1. c.* xx. (1883) 101.—Madag.
globosa, Boj. ex Baker, Fl. Maurit. 28-populnea.
grandifolia, *Lamb, ex G. Don, Gen. Syst.* **i. 536.—** Maurit.
Greveana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885) 492.** —Madag.
guazumaefolia, *Baill. 1. c.* 495.—Madag.
Hamiltoniana, G. Don, Gen. Syst. i. £36=>Melhania Hamiltoniana.
Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn, Pat-. I* **(1885)** 493.—Madag.
Hilsenbergii, *Baill. 1. c.* 495.—Madag.
hirsuta, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xviii. (1842) 190. —Madag.
Humblutii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* **(18851** 493.—Madag.
Kirkii, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **i. 227 Afr. trop.**
Lantziana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* **(1885) 496.** —Madag.
Iaurifolia, *Baill. 1. c.* 494.—Madag.
longicuspis, *Baill. 1. c.* 488.—Madag.
longifolia, *Baill. :. c.* 495.—Madag.
longipes, *Baill. 1. c.* 487.—Madag.
loucoubensis, *Baill. 1. c.* 493.—Madag.
lucida, *Baill. 1. c.* 496.—Madag.

DOMBEYA:—
macrantha, *Baker, in fount. Linn. Soc.* xxi (1884) 325. —Madag.
manaharica, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 491.—Madag.
Mastersii, *Hoot./. Bot. Mag.* t. 5689.—Afr. trap.
Melanoxylon, Roxb. in Beatson.St. Hel. Tracts, 307' Melhania Melanoxylon.
minor, Planch, in Fl. des Series, Sér. I. vi. (1850-51) 226=multiflora.
***modest*, Baier, in Journ. Bot.* xx. (1882) 47.—Madag.**
mollis, *Hoot. Bot. Mag.* t. 4578.—Hab.?
multiflora, *Planch, in Fl. des Serres*, Sér. I. vi. (1850-51) 225.—Afr. trap,
natalensis, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 17—Afr. austr.
obovalis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 496. ^—Madag.
ovata, *Cav. Diss.* 127. t. 41. f. 2.—Ins. Borbon.
palmata, Cav. I. c. 122. t. 38. f. l=acutangula.
parviflora, *Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. I* (1885) 492.—Madag.
Pervillei, *Baill. 1. c.* 488.—Madag.
phoenicea, Cav. Diss. 129=Pentapetes phoenicea.
platanifolia, Ay'. *in Ann. Sc. Nat. Sit. 11.* xviii. (1842) 190.—Madag.
popnlnea, *Baill. Hist. PI.* iv. 67; *Baker,- Fl. Maurit.* 28.—Ins. Mascar.
prostrata, Burch. ex DC. Prod. i. 499=Melhania prostraia.
***Y>studo-Populns,Baill.inBull.Soc.Linn.Par. I* (1885)** 500.—Madag.
punctata, Cav. Diss. 125. t. 41. f. 2.—Ina. Mascar.
reflexa, *Drapies, ex Reichb. Fl. Exot.* vi. 40. t 348.— Madag.
repanda, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 326. —Madag.
reticnlata, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 228.—Afr. trop.
rigida, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1885) 487.— Madag.
rottleroides, *Baill. I. c.* 494.—Madag.
rotundifolia, *Planch, in Fl. des Serres.* Sér. I. vi (1860-51) 225.—Afr. austr.
rnbifolia, *BaiU. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 492. —Madag.
Schimperiana, *A. Sick. Tent. Fl. Abyss.* i 78.—Afr. trop.
senegalensis, Planch, in Fl. des Serres, Sir. I. vi. (1850-51) 225, sub t 605-multiflora.
spectabilis, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sel'. II. xviii. (1842) 191.—Afr. trop.
stipnlacea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 493.—Madag.
tiliacea, *Planch. Fl. des Serres*, Sèr. *I.* vi (1850-61) 225.—Afr. austr.
tiliaefolia, Cav. Diss. 124. t. 39. f. 2 = acutangula.
tomentosa, ***Cav.** 1. c.* 125. t. 39. £ 3.—Madag.
triumfettaefolia, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xviii. 1842) 191.—**Madag.**
J bellata, *Cav. Diss.* 127. t. 41. f. 1.—Ins. Mascar.
Valou.AriU. *in Bull. Soc. Linn.* ***Par.*** i. (1885) 494.—Madag.
velutina, Willd. Sp. PI. iii. 726 = Melhania velutina.
vibumiflora, *Boj. in Ann. Sc.Nat. Sit.* II. xviii. (1842) 191.—Ins. Comor.
Wallichii, *Benth. (f Hoot./. Gen. I* 221.—Madag. t

DOMBEYA, **Lam.** Encyc ii. SOL t 828 (1788)=**Araucaria**, Jnss. (Conif.).
araucdna, Raeusch, Nom. ed. III. 291« A. imbricata.
chilensis. Lam. Encyc. ii. 301=A. imbricata.
excelsa, Lamb. Pinus, ed. I. 87=A. excelsa.

DOMBEYA, L'Hérit Stirp. Nov. 33. t. 17 (1784) = Tourretia, Tnas. (Bignoniac).
lappacea, L'Hérit 1. c. = T. lappacea.
lapponica, J. F. Gmel. Syst 1541, »phalm.-=praec.
nodifiora, L'Hérit. ex DC. Prod. ix. 239=Eccremocarpns scaber.

DOMEYKOA, Phil. Fl. Atac. 25. t. 2 C (1860). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 876.
oppositifolia, *PhU. I. c*—ChilL

DONACIUM, Fries, in Bot. Notiser, (1843) 131 = DONAX, Beauv.=Arundo, Linn. (Gramin.).

DONACODES, Blnme, Enum. PL Jav. i. 64 (1827) = Amomum, Linn. (Scitamin.).
alliacea, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 58.—Java.
aperta, Teijsm. *Sc* Binn. 1. c. 880.—Ins. Banca.
elongata, Teijsm. *Sc* Binn. 1. c.—Java.
incamata, Teijsm. & Binn. 1. c—Ins. Amboina.
macrocephala, Zoll. *Sc* Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. NeSrl. Indie, ii. (1846) 211.—Java.
minor, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 880.—Java.
paludosa, Blume, Enum. PI. Jav. i. 64 = Elettaria paludosa.
Pininga, Blnme, 1. c.=Alpiiiia Pininga.
rosea, Teijsm. *Sc* Binn. Cat. Hort. Bog. 68 = Am. roseum.
rubra, Blume, Enum. PI. Jav. i 54=Alpinia rubra.
tomentosa, Blume, 1. c. 65=Alpinia tomentosa.
villosa, Teijsm. *Sc* Binn. in NederL Krnidk. Arch. iii. (1855) 392-A. villosum!
Walang, Blume, Enum. PI. Jav. i.66=AIpinia Walang.

DONALDIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1864) 127; et in Abh. Akad. Berl. (1854) 78. t 7 B =Begonia, Linn.
Ottonis, Klotzsch, 11. cc. 127, 78 - B . Ottonis.
ulmifolia, Klotzsch, 11. cc. 127, 78 - B . ulmifolia.

DONATIA, Bert, ex Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 289 (1849)=Ziastarriaea, Remy (Polygon.).

DONATIA, Font. Chw. Gen. 9. t. 5 (1776). *SAXU FRAGEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 634.
fascicularis, *Forst. 1. c.*—Reg. Magell.
magellanica, Lam. IUustr. i. 217. t. 51« fascicularis.
Novae-Zelandiae, *Hoot. f. Fl. N. Zel.* 81. t 20.—N. Zel.

DONATIA, Loefl. Iter, 193 (1758) = **Avieennia,** Linn. (Verbenac.).

DONATOPHORUS, Zipp. in Bijdr. Natuurk. Wetensch. v. (1830) 181-Harpullia, Roxb. (Sapindac).
erythrospermus, Zipp. 1. c. = H. thanatophora.

DONAX, Beauv. Agrost 77 (1812)=Arundo, Toum. (Gramin.).
acuminatus, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 524=A. Pliniana.
acutifiorus, Beauv. Agrost. 78=Deyeuxia acntiflora.
Ampelodesmos, Roem. & Schult. Syst ii. Mant 336, in syn.=Ampelodesmos tenax.
arundinaceus, Beauv. Agrost. t. 16. f. 4=A. Donax.
australis, Steud. Nom. ed. II. i. 524=Phragmites communis.
bengalensis, Beauv. Agrost. 78=A. bengalensis.
bicolor, Beauv. 1. c.= A. bicolor.
bifarius, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 73--A. bifaria.
borealis, Trin. Fund. Agrost 156 = Graphephorum arnndinaceum.
festucaceus, Beauv. 1. c. 78 = Graphephorum arnndinaceum.
festucoides, Beanv. 1. c.=Ampelodesmos tenax.
Kotmebulnsis, Trin. in Rupr. in Beitr. Russ. Reich, ii. 66 =Graphephorum psilosanthes.
mauritanicus, Beauv. Agrost. 78-A. Pliniana.
montanus, Beauv. 1. c. = Calamagrostis varia.
Plinii, C. Koch, Dendrol. ii. II. 362 = A. Pliniana.
sativus, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 32=A. Donax.
tenax, Beauv. Agrost 78=Ampelodesmos tenax.
Thouarii, Beauv. L e t 16. f. 6 (Thuarii) - A. madagascariensis.
versicolor, Beauv. 1. c. = A. Donax.
viridiflavescens, Roem. *Sc* Schult. Syst ii. 601 = Deyeuxia viridiflavescens.

DONAX, Lour. Fl. Cochinch. 11 (1790)=Clinogyne, Salisb. iScitamin.).
Arundinastrum, Lour. **L c - C .** dichotoma.

DONCKLAERIA, Hort. ex Loud. Encyc. PI. Suppl. Ii. 1350 (1855) = Centradenla, G. Don (Melastom.).
diversi/olia, Hort. ex Loud. 1. c.=C. inaequilateralis.

DONDIA, Adans. Fam. ii. 261 (1763) = **Suaeda,** Foisk. (1776) (Chenopod.).

DONDIA, Spreng. PI. Umb. Prod. 21 (1818)-**Haequetia**, Neck. (Umbell.).
Epipactis, Spreng. 1. c.=H. Epipactis.

DONDISIA. DC. Prod. iv. 469 (1830)=FIeotronia, Linn. (Rubiac).
fetida, Hassle. Cat Hort. Bog. Alt. 112 -seq.
foetida, Hassk. Ind. Sem. Hort Amstelod. (1841) = Vangueria edulis.
horrida, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 236 = P. horrida.
Leschenaultii, DC. Prod. iv. 469 = P. angustifolia.

DONDISIA, Reichb. Consp. 144 (1828)=Haoquetia, Neck. (Umbell.).
Epipactis, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. 493 = H. Epipactis.

DONDISIA, Scop. Introd. 816 (1777) = Baphanus, Linn. (Crucif.).

DONIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 82 (181*) =GrindeUa, Willd. (Compos.).
canariensis. Less. Syn. Comp. 199=Jasonia laeviga'*'
ciliata, Nutt. in Joum. Acad. Nat. Sc. Philad. ii. (1821) 118 = Aplopappus ciliatus.
edulis, Iindl. ex Lem. IUustr. Hortic ii. (1855) Misc-91.—Mexic.
fruticosa, Desf. Tabl. ed. II. 269 - Grindelia fruticosa.
glutinosa, R. Br. in Ait Hort. Kew. ed. II. v. 82 = G. glutinosa.
glutinosa, Hook. Fl. Bor. Am. Ii. 25 = G. oregana.
inuloides, Hook. 1. C.-G. inuloides.
lanceolata, Hook. 1. c.=Aplopappus lanceolatus.
squarrosa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 559 = G. glutinosa.
uniflora, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 25 = Aplopappns uniflorus.

DONIA, R. Br. in Ross, Voy. ed. I. App. p. xll (1819) - Oxyria, Hill. (Polygon.).
digyna, R. Br. in Parry, Voy. App. 41-0. digyna.
sapida, R. Br. in Ross, Voy. App. ed. I. p. xlii»O. digyna.

DONIA, G. & D. Don, in G. Don, Gen. Syst. ii. (1832) =Clianthua, Soland. (Legnmin.). *i67*
formosa, G. Don,I.e. 468 = C. Dampieri.
punicea, G. Don, L c. = C. puniceus.
spedosa, G. Don, 1. c.»C. Dampieri.

DONIANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268* Grindelia, Willd. (Compos.).

DONIDSIA, G. Don, Gen. Syst. iii. 461 (1834) * DONDISIA, DC.-Flectronia,Linn. (Rubiac.).

DONIOPHTTON, Wedd. Chlor. And. i. 7- *• * (1855). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii *[8]»-andicolum, *Wedd. 1. c.* 8. t 4 B.—Chili.

DONKELAARIA, Hort. ex Lem. IUustr. Hortic. «• (1855) Misc. 73, in nota = Centradenia, G. D°" (Melastom.).
diversifolia, Hort. ex Lem. i c.=C. inaequilaterflis-

DONKELAARIA, Lem. Illustr. Hortic. U. (1856) M *i9C#* 72 = auettarda, Linn. (Rubiac).
dichotoma, Lem. 1. c = G . dichotoma!

DONNINGIA, A. Gray, in Toum. Linn. Soc xiv. **(1875)** 29 sphalm. = DownIngia, Torr. (Lobeliac).

DONTOSPERMUM, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. *916* (1844) = Odontospermum, Neck. (Compos.).

DOHTOSTEMOBT, Andrz. ex DC. Prod, i 190 (182*)-*CRUCIFERAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 77.
ANDREOSKIA, DC. Prod, i 190 (1824).
brevipes, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Ri6»i 149 - Malcolmia brevipes.
cirdnatus, Bunge, 1. c. 148 = Malcolmia circinnats-dentatus, *Ledeb. Fl. Ross. i.* 175.—Dahuria.
eglandulosus, Ledeb. 1. c. = dentatus.
grandiflorus, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. K'B* (1847) 147-Malcolmia Bungei.
hispidus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. O 282.—Manchuria,
integrifolius, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 174.—Sibir.

DONTOSTEMON:—
matthioloides, Franck. Pl. DaMian L (1884) 85.—China.
micranthus, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 120.—China.
oblongifoli— Ledeb > n Ross '• l » = d entatus.
pectinatus, ^ , 4 , , , f • Dahnria , Sibir
perennis, c £ *Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iii. 121.-Sibir.
TEKSfii^' **•• Naturf_Ver_ **ga,*• <1847>'
senilfe £al(?>lmla scorpioides. xxvi. (1880)
« E ^ S 5 £ *" *Acad_Pitersb_*

DONZELLA, LTO. in orb. Diet, v.108 (1849)-seq.

D ELLIA S Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1839) 11. i. 7; et in A ^S a t • * IL 1U(m0) 89 • /RBIAC E1E.
8P«nosa, *Tenore, Ind. cc.* 11—n. Bras.

DOODIA, Roxb. Hort. 98 (1814); Fl iii. 365 (1832) = Uraria, (Leguinin.).
aiopecuroides, Roxb. Il. cc. 98, 368 = U. Lagopus.
crinita, Roxb. Fl. Ind. iii. 369-U. crinita.
hamosa, Roxb >.t c. 367- U. hamosa.
lagopodioides, . Roxb. 1. c. 366 - U. lagopodioides.
picta, Roxb. 1 .c.868 = U.picU.
simplicifolia, Roxb. 1. c. 366.—Ind. or.

DOONA, Thw. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 1.12 ; iv. (1852) 7. *DIPTEROCARPEAE,* Benth. & Hook. f. i. 198.
CARYOLOBIS, Gaertn.Fruct. i. 215. t 45 (1788).
affinis, Thw. Enum. PI. Zeyl. 36.—Zeylan.
congestiflora, Thw. l. c.—Zeylan.
cordifolia, Thw. l. c.—Zeylan.
Gardneri, Thw. l. c.—Zeylan.
macrophylla, Thw. l. c. 402.—Zeylan.
nervosa, Thw. l. c. 35.—Zeylan.
oblonga, Thw. ex Trimen, in Journ. Bat. x^ (1885) 206.—Zeylan.
ovalifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 402.—Zeylan.
trapezifolia, Thw. l. c. 35.—Zeylan.
venulosa, Thw. l. c. 402.—Zeylan.
zeylanica, Thw. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) t. 12! iv. (1852) 7.—Zeylan.

DOORNIA, De Vriese, in Hook. Kew Journ. vi. (1864) 36; et in Tuinb. Fl. 174 (1855)-Pandanua, Linn.
reflexa, De Vriese, Il. cc. 267, 174-P. reflexus.

DOOSERA, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 362 (1834)-Mollugo, Linn. (Ficoid.)
esculenta, Roxb. ex Wight"* Am. 1. c=M. hirta.

DOPATRIUM, (18»R\—^.^.*> Bnch-'Ham. ex Benth. Scroph. Ind. 80 ii. 958. SCROPHVLARINEAE, Benth. Sc Hook. f.
aristatum, Philipp. *Hassk. in Flora,* xlvii. (1864) 66.—Ins.
japonicum, Franck. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 345.—Japon.
junceum, Buch.-Ham. ex Benth. Scroph. Ind. 31.—As. et Austral. trop.
lobelioides, Benth. l. '—Ind. or.
macranthum, Oliver, '* TranSm Linn See " ^ (1876^ 120.—Afr. trop.
nudicaule, Benth. Aro^A./mi. 31.—Ind. or.; Malaya.
senegalense, Benth. í» *DC. Prod.* x. 407.-A&. trop.

DORAENA, Thunb. Noy. Gen. 59 (1783); Gaertn. f. Fruct. iii. 27 t. 1 M (1805) = * Br e k - (Myrsin.).
japonica, Thunb. L c.; FL Jap. 84-M. Doraena.

DORANTHERA, Stend. Norn. ed. II. i. 626 (1840)-seq.

DORATANTHERA, Benth. ex Endl. Gen. 685 (1839) = Anticharis, Endl. (Scrophulariu.).
linearis, Benth. in DC. Prod. X.347-A. linearis.
senegalensis, Walp. Rep. iii. 305-A. linearis.

DORA fl«^UM ' So'ttni ex Taume St Hit Expos, ii. 267 = Xanthoxylum, Linn. (Rntac).

DORATOLEPIS, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 693 = Leptorhynchos, Less. (Compos.).
tetrachaeta, Schlecht 1. C.-L. pulchellus.

DORATOMETRA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1864) 126; et Abh. Akad. Berl. (1854) 63. t. 6 B-Begonia, Linn.
Bowringiana, Seem. Bot. Voy. Herald, 879 = B. lacinata.
Wallichiana, Klotzsch, U = B . WalUchiana.

DORATOPHORA, Lem. in Orb. Diet. y. 119 (1849)-Doryphora, Endl. (Monimiac.).

DOBATOXTLON, Thou. sec. Boj. ex Benth. & Hook.f. Gen. i. 408 (1862). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
diversifolia, *Benth. V Hook./. I. c*—Manrit.
mauritanum, Thou, ex Baker, Fl. Maurit. 60=diversifolia.

DORCOCERAS, Bnnge, Ennm. PI. Chin. Bor. 54 (1832)—Boea, Comm. (Gesnerac).
hygrometrica, Bnnge, 1. c. = B. hygrometrica.

DOBEMA, D. Don, in Edinb. Phil. Mag. ix. (1881) 46 ; et in Trans. Linn. Soc. xvi. (1833) 601. *UMBELLIFERAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 918.
DISERNESTON, Jaub. & Spach, Illustr. i. 78. t. 40 (1848).
Ammoniacum, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1883) 601.—Persia; Afghan.
Aucheri, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. i. (1844) 829.—Persia,
aurenm, *Stocks, in Hook. Km Journ. Bot.* iv. (1862) 149.—Beluchist.
glabram, *Fisch. V Mey. ex Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 26.—Armenia.
hirsutum, Loft, in Borcz. Fend. 28 = D. Ammoniacum.
mei/olium, Fenzl, Pngill. PI. Nor. Syr. 18-Ferula meifolia.
odoriferum, Loft, ex Borcz. Feral. 28 {^*Ferulago carduchorum* ?).—Assyria.
robustum, Loft. 1. c—Aucheri.
songaricum, *Kar. (f Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 366.—Soongar.

DORIA, Adans. Fam. ii. 124 (1763) = Solidago, Linn. (Compos.).
nemorensu, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404-Senecio Toumefortia.
paludosa, Fourr. 1. c.=Senecio palndosns.
vera, Fourr. 1. c = Senecio Doria.
Virgaurea, Scop. Fl. Cam. ed. IL ii. 176-Solidago Virgaurea.

DORIA, Thnnb. Nov. Gen. xii. 162 (1800) = Othoana, Linn. (Compos.).
abrotanifolia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 824.—Afr. anstr.
acutiloba, DC. Prod. vi. 469 = 0. acutiloba.
alata, Thnnb. Nov. Gen. 164 = Othonopsis alata.
Arbuscula, DC. Prod. vi. 470 - O . Arbuscula.
bipinnata, Thnnb. Nov. Gen. 168=Senecio pinnatifidus.
campanulata, DC. Prod. vi. 473 = 0. campanulata.
carnosa, DC. 1. c. 471=0. pinnatilobata.
Ceradia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 823.—Afr. anstr.
chromochaeta, DC. Prod. vi. 472 » O. chromochaeta.
ciliata, Harv. in Harv. & Sond. Ft Cap. iii. 322 = Othonopsis ciliata.
cluytiaefolia, DC. Prod. vi. 470=Othonopsis duytiaefolia.
cneorifolia, DC 1. c - Othonopsis cneorifolia.
denticulata, Thnnb. Nov. Gen. 166.—Afr. anstr.
digitata, Less. Syn. Comp. 89 = O. digiuta.
diversifolia, DC. Prod. vi. 472-O. diversifolia.
elongata, Thunb. Nov. Gen. 166=Senecio diversifolius, *Harv.*
eriocarfia, DC. Prod. vi. 471-O. eriocarpa.
erosa, Thunb. Nov. Gen. 166=Cineraria oxyodonta.
glauca, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 696 = Senecio othonnaefloms.
gymnodiscus, DC. Prod. vi. 473 = O. gymnodiscus.
incisa, Thunb. Nov. Gen. 167-Senecio incisns.
KrausHi, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 769 = Othonnopsis Kraussii.
lasiocarpa, DC. Prod. vi. 469 = 0. lasiocarpa.
Laureola, DC. 1. c. 472=O. Uureola.

DORIA:—
Lingua, Less. Syn. Comp. 89 = O. Lingua.
linearifolia, DC. Prod. vi. 471-O. linearifolia.
longipes, Harv. in Harv. *8c* Sond. Ft Cap. iii. 822.—Afr. austr.
miser, Harv. 1. c 827.—Afr. anstr.
nana, DC. Prod. vi. 470=0. nana.
nivea, Thunb. Nov. Gen. 168 = Senecio niveus.
nodulosa, DC. Prod. vi. 470 = 0. nodulosa.
perfoliata, Thunb. Nov. Gen. 164 = O. filicaulis.
pinnatifida, Thunb. 1. c. 168-Senecio incertus.
ramosa, DC. Prod. vi. 472.—Afr. austr.
retrofracta, Less. Syn. Comp. 89 = 0. retrofracta.
rigida, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. 322=Senecio spinescens.
semicalva, DC. Prod. vi. 473 - O. semicalva.
serrata, Thunb. Nov. Gen. 165 - Senecio leontodontis.
sonchifolia, Thunb. 1. c. 167 - Cineraria sonchifolia.
spinescens, DC. Prod. vi. 470 = 0. rhamnoides.
taraxacoides, DC. 1. c. = O. taraxacoides.
tortuosa, DC. I. c. 472-0. tortuosa.
undulata, Thunb. Nov. Gen. 163-Senecio petiolaris.
undulosa, DC. Prod. vi. 472—Cineraria sonchifolia.

DORIENA, Endl. Gen. 1148, in syn. (1841)-DOERRINGIA, Dennst.-Acronychia, Forst. (Rutac.).

DOBITIS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 128 (1838). *ORCHIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 674.
CARTERETIA, A. Rich. Sert. Astiot 10. t. 4 (1834).
bifalcis, *Reichb. f. in Otto, Hamb. Garten:* (1860) 116.—N. Guinea.
latifolia, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 674.—Zeylan.
paniculata, *Benth. V Hook.f. I.* ft—N. Guinea,
pulcherrima, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 178 ; *et Wall. Cat.* n. 7848.—Ind. or.
taenialis, *Benth.* to- *Hook. f. Gen.* iii. 674. 577.—Reg. Himat; Burma.
Wighlil, *Benth. b Hook.f. 1. c.* 674.—Ind. or.; Burma.

DORNERA, Heuff. ex Schnr, Ennm. PI. Transs. 697 (1866) = Carex, Dill. (Cyperac.)*
alpina, Heuff; ex Schur, 1. c.-C. pyrenaica.

DOROBAEA, Cass. in Diet. Sc. Nat xlvili. 468 (1827) = Senecio, Town. (Compos.).
pimpinellaefolia, Cass. 1. c = S. pimpinellaefolius.

DOROBOEA, DC. Prod. vi. 340, in syn. (1837)«praec.

DOROCERAS, Steud. Norn. ed. II. i. 625 (1840)-DORCOCERAS, Bunge-Boea, Comm. (Gesnerac.,).

DOBONICUM, Toum. ex Linn. Syst ed. I (1735). *COMPOSITAE,* Benth. 8c Hook. f. ii. 440.
AKONICUM, Neck. Elem. i. 27 (1790).
FULLARTONIA, DC Prod. v. 281 (1836).
GRAMMARTHRON, Cass. in BuU. Soc. PhUom. (1817) 32.
acaule, Walt Ft Carol. 205 •= Arnica nudicaulis.
altaicum, *Pall, in Act. Acad. Petrop.* (1779) II. 271. t. 16.—Sibiria.
arabicum, Lam. Encyc ii. 816 = Gerbera hirsnta.
Arnica, Desf. Tabl. ed. 1.101 = Arnica montana.
Amottii, DC. in Wight, Contrib. 23=Senecio poly cephalus.
asplenifolium. Lam. Encyc. ii. 815=Gerbera aspleni-folia, ferroginea.
austriacum, Bieb. Fl. Tanr. Cane. ii. 321—macrophyllnm.
anstnacum, *Jacq. Fl. Austr.* ii. 18.1.130.—Europ.
Bauhini, Saut. ex Reichb. Ft Germ. Excnrs. 234 = hITSQtUDA*
Bellidiastrum.Uun. Sp. PI. 886-AsterBcllidiastrum.
Bellidiastrum, Sibth. & Sm. Fl. Grace. Prod. ii. 182 = Bellis sylvestris.
bellidiflorum, Schrank, Baier. Fl. ii. 400-Stenactis annna.
bellidifolium, Salisb. Prod. 201-Aster Bellldiastrum.
Bonrgaei, *Sch. Bip. in Bot. Mag.* t. 4994 (Senecionia sp.?).—Ins. Canar.
cacaliaefolium,£i»«. b* *Heldr.Diagn.* Ser. I. xl.31.—As. Min.
calcaratum, Roxb. Hort. Beng. 01; Fl. Ind. iii. 434 = Vicoa anriculata.
Candolleanum, Wight *8c* Am. ex Am. in Nov. Act. Nat Cur. xviii. (1836) I. 361-Senecio Hohenackeri.

DOROMTCTJM:—
Candollii, Wight & Am. ex Wight, Ic t. *1127 = Candolleanum.*
earpathicum, Nym. Syll. SuppL 1 = grandiflonim.
carpetanum, *Boiss. (f Reut. ex Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 108.—Hispan.
caucasicnm, *Bieb. Fl. Taur. Cave.* ii. 321.—Euiop. austr.; As. Mio.
caucasicum, Vis. Fl. Dalmat. ii. 72-Columnae.
ciliatum, Lam. Encyc. ii. 314 = Hypochoeris grandiflorus.
Claytoni, Poir. Encyc Suppl. v. 660=Arnica nudicanlis.
Clusii, *Tausch, in Flora,* xi. (1828) 178.—Mont Pyren.
Columnae, *Tenore, Fl. Nap. Prod.* 49.—Europ. austr.; As. Min.
cordatum, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 357 = caucasicum.
cordatum. Lam. Fl. Fr. ii. 128 - D . Pardalianches.
cordatum, Sch. Bip. in Oestr. Bot Wochenbl. iv. (1854) 411-Columnae.
cordifolium, Stemb. in Denkschr. Acad. Mnench. (1818) 147 = Columnae.
cordifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 233=D. Pardalianches.
coisicum, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 517.—Corsica.
crenatum, Poir. 1. c. = Mairea crenata.
croaticum, *Vukot. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) *Bibl.* 6.—Europ. austr.
cruentum, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 336—Senecio cruentus.
dentatum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii 337.—Hab. ?
echinatum, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 835—Senecio echinatus.
eriorrhizon, Guss. in Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. ii. 217 =caucasicum.
Falconeri, *C. 3. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 838.—Reg. Him. occ.
fulgens, Poir. Encyc Suppl. v. 680 = Arnica alpina.
Gardneri, Thw. Enum. PI. Zeyl. 167=Senecio Gardneri.
glaciale, *Nym. Syll.* 1.—Hispan.
glutinosum, VtHia. Sp. PI. iii. 2115 = Grindelia glutinosa.
gracile, Schur, Enum. PI. Transs. 340=grandiflorum.
grande, Poir. Encyc. Suppl. ii. 517 = Alciope lanata.
grandiflonim, *Lam. Encyc.* ii. 313.—Europ.
Halleri, Tausch, in Flora, xi. (1828) 180-grandiflonim.
helveticum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3=Senecio Doronicum.
hewrense, Dalz. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 130 = Senecio hewrensis.
hirsutum, *Lam. Encyc.* ii. 313.—Europ.
Hookeri, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 332.—Reg. Himal.
hungaricum, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 34. t. 956.—Europ. austr. or.
incanum, Hill, Veg. Syst. ii. 58=hirsutum.
incanum. Lam. Encyc. ii. 315 = Trichocline incana.
incanum. Linn. Sp. PI. 886 = Senecio Doronicum.
Jacquini, Tausch, in Flora, xi (1828) 180=grandiflorum.
japonicum, Lam. Encyc. ii. 314 = Senecio japonicus.
laevifolium, Walt. Fl. Carol. 205 = Erigeron nudicaulis.
lanatum, Poir. Encyc Suppl. ii. 517 — Alciope lanata.
Lessingianum, Wight & Arn. ex Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (Ib36) I. 350-Senecio Lessingianus.
linifolium. DC. Prod. vi. 822 = Senecio linifolius.
longifolium, Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) 341=hungarieum.
longifolium, Reichb. Fl. Germ. Excurs. ii. 234 = austriacum.
lucidum, Bemh. ex PantoS. Adnot. Fl. Herceg. 42 =» cordifolium.
macrophyllum, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 40; *Hornem. Hort. Bot. Hafn. Suppl.* 100.—Reg. Caucas.; Persia.
malvaefolium, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 830 —Senecio malvaefolins.
maritimum, Lam. Encyc. ii. 314=Senecio Pseudoarnica.
Matthioli, Tausch, ex Reichb. FL Germ. Excurs. ii. 234-D. Pardalianches.
maximum, *Boiss. (f Huet, Diagn. Set.* II. iii. 31.—Armenia.
mexicanum, Cerv. in Link *8c* Otto, Ic. PI. Rar. t. 22 = Heterotheca inuloides.
tnontanum, Lam. Encyc. ii. 312•Arnica montana.

DOBONICTTM:—
Nendtvickii, Sadler, in Nentvich, Enum. PI. Terr. Quin. Eccles. 35. t. 2=caucasicum.
nudicaule, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 121 - Arnica nudicaulis.
oblongifolium, *DC. Prod.* vi. 821.—Reg. Caucas.
oporinum, Poir. Encyc SuppL ii. 517 = Olearia operina.
oppositifolium, Lam. Encyc. ii. 312 •> Arnica montana.
orientale, Hoffm. in Comm. Soc. Phys. Med. Mosc. i (1808) 8 = caucasicnm.
orientale, Reichb. FL Germ. Excurs. i. 235 = Columnae.
Orphanidis, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 37S.—Macedon.
palmatum, Lam. Encyc. ii. 814-SenecioSyneilesis.
papyraceum, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 839 -Senecio papyraceus.
Pardalianches, Bourg. ex Reut. & Lange, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 46 = carpetanum.
Pardalianches, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. ii 109-glaciate.
Pardalianches, *Linn. Sp. PI.* 885.—Europ.
peruvianum, Lam. Encyc ii. 316=Wemeria rigida.
piloselloides, Lam. L c 314 = Gerbera piloselloides.
plantagifolium, Stokes, Bot Mat Med. iv. 232-= plantagineum.
plantagineum, *Linn. Sp. PL* 885.—Europ.
plantagineum, C. A. Mey. Vert Pfl. Cane. 80 = oblongifolium.
plantagineum, Poir. Encyc SuppL v. 660—Arnica plantaginea.
plantagineum. Roth, Tent. Fl. Germ. i. 358 = scorpioides.
plantaginifolium, Ledeb. Fl. Ross, ii 625= oblongifolium.
procurrens, Dum. Fl. Belg. Prod. 66 = D. Pardalianches.
pyrolaefolium, Lam. Encyc ii. 315 = Gerbera Burmanni.
ramosum, Walt. Fl. Carol. 205-Erigeron strigosus.
reticulatum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 12=Thirkei.
reticulatum, Dalz. *8c* Gibs. Bomb. Fl. 130-Senecio belgaumensis.
reticulatum, Wight, in Calc Joum. Nat. Hist. vii. (1847) 156; Ic. 1.1151 B = Senecio Grahami.
rotundifolium, Desf. FL Atlant. ii. 279. t. 235. f. 1 = Bellium rotundifolium.
Roylei, *DC. Prod.* vi. 321.—Reg. Himal.
rupestre, Wight, Ic. t. 1128=Senecio Hohenackeri.
scorpioides, C. B. Clarke, Comp. Ind. 169 = Hookeri, Falconeri.
scorpioides, *Lam. Encyc.* ii. 313.—Europ.
scorpioides, Lapeyr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 108 = D. Pardalianches.
scorpioides, Willd. Sp. PI. iii. 2114=grandiflonim.
serratum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 617 - Gerbera ferruginea.
sinuatum, Poir. I. c. = Gerbera ferruginea.
spinulosum, Lam. Encyc ii. 315=Alciope tabnlaris.
stenoglossum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 483.—China.
subalpinum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver, Naturw. iv. (1853) 41= austriacum?
tenuifolium, Wight, Ic. t. 1129 = Senecio tenuifolius.
Thirkei, *Sch. Bip. in Linnaea,* xix. (1847) 35, 314, nomen; *Boiss. Fl. Orient,* iii. 379.—Bithynia.
tomentosum, Wight, Ic. t. 1151- Senecio Edgeworthii.
toxicarium, Salisb. Prod. 201=D. Pardalianches.
Tussilaginis, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt Canar. ii. 331=Senecio Tussilaginis.
vaginatum, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 356 = macrophyllum.
Walkeri, Arn. in Nov. Act. Nat Cor. xviii. (1886) I. 350 = Senecio ludens.
Webbii, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 833 (Senecionis sp.).—Ins. Canar.
Wightii, DC. in Wight, Contrib. 28-Senecio saxatilis.
Wulfenianum, Poir. Encyc. Suppl. v. 660=Columnae.

DORRIEMA, Endl. Gen. Suppl. ii. 65, in syn. (1842) = DOERRIENIA, Reichb. = Grenliaea, A. St Hil. (Lentib.).

DORSTENIA, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 986 (1787).
URTICACEAE, Benth. *8c* Hook. f. iii. 366.
COSARIA, J. F. Gmel. Syst. 71 (1791).
KOSARIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 164 (1775).

DORSTENIA :—
SYCHINIUM, Desv. in Mem. Soc. linn. Par. iv. (1826) 216.1.12.
Alexiteria, Linn. Syst. ed. X. 899-D. Houstoni.
appendiculata, *Miq. in Mart. FL Bras.* iv. L 162.—Bras.
argentata, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6795.—Bras,
arifolia, *Lam. Encyc^* ii. 817.—Bras.
asaroides, Gardn. in Hook. Ic. PI. t 399 - D . Cayapia-
bahiensU, *Klotmsch, in Linnaea,* xiv. (1840) 288.—Bras.
Bomimiana, *Schmeinf. PI. Quoad. Nilot.* 36.t12.—Abyssin.
Barterii, *Bur. in DC. Prod.* xvii. 272.—Afr. trop.
benguellensis, *Welv. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 71.—Afr. trop.
bicomis, *Schmeinf. in Bot. Zeit.* xxix. (1871) 882.—Afr. trop.
Bowmanniana, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* v. t. 80S.—Bras.
brasiliensis, *Lam. Encyc.* ii. 817.—Bras.
bryoniaefolia, Mart, in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 128& nomen; Miq. in Mart. FL Bras. iv. I. 167-"• Cayapia.
caulescens. Linn. Sp. PL 121-=Procris quinquenenria-
caulescens, Poir. ex Bnr. in DC. Prod. xvii. 277 (d[illegible]* ordinis).—Hab. ?
caulescens, VelL Fl. Flum. 53; i. t. 141=urceoUta.
Cayapia, *Veil. Fl. Flum.* 52; i. t. 137.—Bra*.
Ceratosanthes, Lodd. Bot. Cab. t. 1216=arifolia.
chinensis, Lour. Fl. Cochinch. 90=Procris chinensis.
Contrajerva, *Linn. Sp. PL* 121.—Am. trop.
cordifolia, Mart, ex Miq. in Mart. FL Bras. iv. I- 16,7 — bahiensis.
cordifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 84.—Jamaic.
crassipes, *Griseb. Cat. PL Cub.* 58.—Cuba.
crenulata, *C. Wright, ex Griseb. in Mem. Am. Ac<X>-* N. S. viiL (1861) 173.—Cuba.
cuspidata, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) 103.—Abyss"1-
Cyperus, Veil. FL Flum. 53; L t. 140=arifolia.
digitifolia, Stokes, Bot Mat. Med. iv. 341=¥**& chinensis.
Drakena, *Linn. Syst.* ed. X. 899.—Mexic
Drakena, Veil. Fl. Flum. 53; i. t 139-arifolia.
elata, *Gardn. in Hook. Ic. PL* t. 220.—Bras,
elliptica, *Bur. in DC. Prod.* xvii. 271.—Afr. trop.
erecta, *Veil. Fl. Flum.* 53; i. t. 142.—Bras,
erythrantha, *Griseb. Cat. PL Cub.* 58.—Cuba.
exaltata. Herb. Mns. Vindob. ex Miq. in Mart. Bras. iv. I. 161=plumeriaefolia.
excentrica, *Marie. PL Nouv. Am.* 92. t. 59.—Mexic.
Faria, *Paiva, ex Spreng. in Schrad. Joum.* (18<W » 239 (sp. dub.?).—Bras.
fidfolia, Fisch. *8c* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. 68=arifolia.
Ficus, Veil. Fl. Flum. 58; i. t 138=arifolia.
Fischerii, *Bur. in DC. Prod.* xvii. 277.—Bras.
fluminensis, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. SupP • i. (1843) 421=arifolia.
fruticulosa, Schott, ex Endl. Cat. Hort Vindob. •• «• -erecta.
Gigas, *Schveinf. ex Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 95.—Ins. Socotra.
glauca, Fohl, ex Miq. in Mart. FL Bras. !•• '• 162-' nervosa.
Griffithiana, *Kurm, in Joum. As. See. Beng-* (1878) II. 104.—Burma.
hirta, Desv. in Mem. Soc Linn. Par. iv. (1826) 81° erecta.
hispida, Hook. Ic. PI. sub t. 220-erecta.
Houstoni, Linn. Sp. PL ed. II. 176=D. C[illegible]
Hydrocotyle, Mart, ex Miq. in Mart. FL Bras, w- - D . Cayapia.
indica, *Wall. Cat.* n. 4639.—Ind. or.
infundibuliformis, Lodd. Bot. Cab. »• tubieina.
lagoënsis, *Bur. in DC. Prod.* xvii. 268.—Bras.
Langsdorffiana, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. xi. 64=urceolata.
Lindeniana, *Bur. in DC. Prod.* xvii. 269.—Mexic.
longifolia, Moric. PL Nouv. Am 9 00. t 58.—M[illegible]
longifes, Mart, ex Bnr. in DC. Prod. xvu. * babidisis.
lucida, Forst. f. Prod. ll = Procris cephalida-
maculata, Lem. IUustr. Hortic x. (1863) t. W» Contrajerva.
mandioccana, Fiscb. & Mey. Ind. Sem. Hort. zi. 59-arifolia.

DOB8TENIA :—
Mannii, *Hook. f. Bot. Mag.* t 5908.-Afr. trop.
bahiensis.
mexicana, Pl. Hartw. 51 = D. Drakena.
minor, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 63 = ereeta:
"ontmidensis, Field. *8c* Gardn. Sert. PL sub t. 18 = orasrtiensis.
morifolia, Fisch. *8c* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 63 = arifolia.
multifida, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 165 = nervosa, *Desv. in Mém.* 7. —Bras.
obovata, *Ptora*, xxvii. (1844) 108.—Abyss.
ophioglossoides, *Hochst. ex Bur. in DC. Prod.* xvii. 276.—Afr. trop.
opifera, *Fisch. ex Regel, Gartenfl.* (1856) 87.—Bras.
opifera, Mart. Reise Bras. ii. 787 = D. Cayapia.
oppositifolia, Soland. ex Seem. Fl. Vit. 236 = Lecanthus Solandri.
ovalis, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 838-D. Drakena.
palmata, Pohl, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 167 = D. Cayapia.
palmata, Willd. ex Schult. Mant. iii. 317 = D. Contrajerva.
paradoxa, Berol. ex Bur. in DC. Prod. xvii. 261 = arifolia.
pedunculata, Auct. ex Steud. Nom. ed. n. i. 526 = Procris lucida.
peltata, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xii 66 = Fischerii.
peltata, Sprengel. Neue Entdeck. iii. 22.—Ins. S. Domingo.
Pernambucana, *Arruda, in Koster, Trav. Brag.* 498.—Bras.
picta, *Wright*, Griseb. Cat. pl. Cub. 58.—Cuba.
placentoides, *Bur. in DC. Prod.* xvii. 277.—Afr. trop.
plumeriaefolia, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 65.—Bras.
Psilurus, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 71. —Afr. trop.
pubescens, Blanco Fl. Philip. ed. I. 692 = Elatostema obtusum.
pubescens, Foist. f. Prod. H = Elatostema sessUe.
quadrangularis, Stokes. Bot Mat. Med. iv. 838=D. quadrata, *Desv. in Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 218 = arifolia.
radiata, *Lam. Encyc.* 318.—Arabia.
reniformis, Pohl, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. i = D. Cayapia.
Riedeliana, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xiii. 58 = arifolia.
rotundifolia, *Arruda, in Koster, Trav. Brat.* 498.—Bras.
setosa, *Mart. Pl. Nouv. Am.* 103. t. 64.—Bras.
Sychinium, Steud. Nom. ed. II. i. 526 = arifolia.
tenera, *Bur.*, Soc. Prod. xvii. 271.—Afr. trop.
tentaculata, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 59 = arifolia.
tenuis, *Bonpl. ex* Sur. *in DC. Prod.* xvii. 264.—Reg. Argent.
tomentosa, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 61 = brasiliensis.
tropaeolifolia, *Bur. in DC. Prod.* xvii. 276.-Abyss.
tuberosa, *Wright*, in Mem. Am. Acad. N. S. viii. 3-Cnba.
tubicina, Peruv. Pav. Per. i. 65. t. 102.
turneraefolia, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* si 63 -Bras.
urceolata, *Schott*, in Horo, iv. (1821) 197.—Bras,
varroniaefolia, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi 63 = ere
Vitifolia, Paiva, ex Pohl fr Schrad. Journ. (1890) *u.* 239 = D. Cayapia?
vitifolia, *Gardn*
vivipara, *Welw.* —Afr. trop.
volubilis, Wall. Pl. Ann. i. 736 (alins ordinis).—Java.

DORTMANIA, Neck. Elem. i. 132 (1790)-seq.

DORTMANNA, Linn. Syst. ed. I (1735)=**Lobelia,** Ljnn. (Campannlac.).
lacustris, G. Don, Gen. Syst. iii. 715=L. Dortmanna.
paludosa, G. Don, 1. c = L. palndosa.
palustris, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 425 = L. paludosa.

DORTMANNIA, Steud. Nom. ed. II. i. 526 (1840) = praec.

DORVALIA, Comm. ex DC. Prod. iii. 86 (1828)=seq.

DOR VALLA, Cemm. ex Lam. Encyc. ii. 565 (1786) = **Fuchsia,** Linn. (Onagrar.).
eucharis, Comm. ex Lam. 1. c. = F. magellanica.

DORVALUA, Comm. ex Jnss. Gen. 320 (1789) = praec.

DOBYANTHE8, Correa, in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 211. t. 28, 2:4. *AMARYLUDEAE*, Benth. & Hook. f. iii 739.
excelsa, *Correa, I. c.* 218.—Austral.
Palmeri, *W. Hill, ex Benth. Fl. Austral,* **vi. 452.**—Austral.

DORYCHEILE, Reichb. Nom. 56 (1841) = Cephalanthera, Rich. (Orchid..).
rubra, Fuss, Fl. Transs. 628-C. rubra.

DORVCHNIUM, Brongn. Enum. Gen. 128 (1848) = Doryenium, Toum. (Legumin.).

DORVCHNIUM, Royen, ex Moench, Meth. 109 (1794) = PBoralea, Linn. (Legumin.).
angustifolium, Moench, 1. c. 110 = P. bituminosa.
bracteatum, Moench, Meth. Snppl. 37 = P. bracteata.
corylifolium, Moench, Meth. 109-P. corylifolia.
rotundifolium, Moench, Meth. Suppl. 37-P. palestina.

DORTONIXTM, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 228 (1787) i Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 416 (1789). *LEGUMJNOSAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 490.
BONJEANEA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 507 (1882).
affine, Jord. Grain. Rec. Jard. Grenoble, (1849) 14 = berbaceum.
ambiguum, Poepp. ex Bernh. Sem. Hort. Erf. (1837); ex Linnaea, xii. (1838) Litt 76 (=*Anisolotus Poeppigiana).*—**Chili,**
anatolicum, *Boiss. &* Heldr. Diagn.* Ser. I. ix. 31.—As. Min.
argenteum, Delile, Fl. Egypte, 257. t. 40 = Lotus argenteus.
Broussonetii, *Webb tf Berth. Phyt. Canar.* ii 90.—Afr. bor.
calycinuin, *Stocks, in Hoot. Kev Journ.* iv. (1852) 145. —Beluchist.
caucasicum, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 49, sphalm. = Doronicum caucasicum.
cinerascens, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 22 = suffruticosum.
collinum, Jord. & Kourr. 1. c. 23—suffruticosum.
decumbens, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 60 = herbaceum.
diffusum, Janka, in Oestr. Bot Zeitschr. xiii. (1868) 816 herbaceum.
dispermum, *Ser. in DC. Prod.* ii. 209.—Europ. austr.
dolichocarpum, Clav. in Actes Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884; 524=suffruticosum.
dumulosum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 22 =suffruticosum.
elongatum, Jord. & Fourr. 1. c. 21 = suffruticosum.
eriophthalmum, *Webb (f Berth. Phyt. Canar.* **ii. 88.**—Ins. Canar.
frutescens, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 21 = suffruticosum.
fruticosum, Pers. Syn. ii. 854=suffruticosum.
gracile, Jord. Obs. Pl. Crit. **iii.** (1846) 70 = herbaceum.
graecum, Ser. in DC. Prod. ii. 208=latifolium.
Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient, ii. 163 = libanoticum.
herbaceum, *Vill. Prosp.* **44;** *Hist. Pl. Dauph.* **iii. 416.**—Europ. austr.; As. Min.
hirsutum, *Ser. in DC. Prod.* ii. 208.—Europ. austr.
hirtum, Poepp. ex Bernh. Sem. Hort. Erf. '1837); ex Linnaea, xii. (1838) Litt 76 = Hosackiasubpinnata.

DORYCHTUM:—
humile, Jord. *8c* Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 24 = suffruticosum.
ibericum, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 52-latifolium.
implexum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 21 = suffruticosum.
insulare, Jord. & Fourr. I. c 28 - suffruticosum.
intermedium, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorp. (1820) 14 =herbaceum.
Jordani, Loret *8c* Barr. Fl. Montp. 175=herbaceum.
Jordanianum, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 886 = praec.
Kotschyanum, Boiss. Fl. Orient, ii. 163 = libanoticum.
Kotschyi, *Boiss. I. c.* **161.**—Cilicia.
latifolium, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1897.—Graecia; As. Min.
libanoticum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 19.—Syria,
lutescens, *Steud. Nom.* ed. II. i. 526.—Abyss.
microcarpum, Ser. in DC. Prod. ii. 209 = Lotos parviflorus.
microphyllum, Sweet, Hort. Brit.ed. II. 137 = Indigofera gracilis.
monspeliense, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 221=pentaphyllum.
monspeliense, Willd. Sp. Pl. iii. 1896 = suffruticosum.
parviflorum, Ser. in DC. Prod. ii. 208 = Lotus parviflorus.
pentaphyllum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 607 = suffruticosum.
pentaphyllum, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. ii. 87.—Ross. austr.
procumbens, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 441 = Anthyllis Gerard i.
rectum, *Ser. in DC. Prod.* ii. 208.—Reg. Mediterr.
sabaudum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 867 = herbaceum.
Schimperi, Jaub. & Spach, Illustr. v. 82. t. 473 = Lotus brachycarpus.
sericeum, Sweet, Hort. Brit ed. I. 476-hirsutum.
spectabile, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* ii. 89.—Ins. Teneriffa.
sphaerocarpum, Clav. in Actes Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 524-suffruticosum.
stenocladum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fase. ii. 23=suffruticosum.
stenophyllum, Schur, Enum. Pl. Transs. 159=suffruticosum.
subbiflorum, *Ser. in DC. Prod.* ii. 209.—Hispan.
suffruticosum, Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. i. 41 = herbaceum.
suffruticosum, *Vill. Hist. Pl. Dauph.* iii. 417. t. 41.—Europ. austr.
tomentosum, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 300 — hirsutum.
torulosum, *Presl, Symb. Bot.* i. 19.—Ins. Teneriffa.
vexillare, Boiss. Fl. Orient ii. 162=latifolium.

DORYCINOPSIS, Lem. in Orb. Diet v. 118 (1849)-seq.

DORYCNOPSIS, Boiss. Voy. Bot Espagne, ii. 163-Anthyllis, Linn. (Legumin.).
Gerardi, Boiss. 1. c. 164 = A. Uerardi.

DORYCTANDRA, Hook. f. *8c* Thorns, in Fl. Brit. Ind. i. 186 (1872) = DIORYKTANDRA, Hassk. = **Alsodeia,** Thou. (Violar.).

DORYDIUM, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 72 (1866) = Asphodeline, Reichb. (Liliac).
creticum, Salisb. 1. c.=A. liburnica.
liburnicum, Salisb. 1. c. = A. liburnica.
luteum, Salisb. 1.c.=A. lutea.

DOE.YPHORA, Endl. Gen. 315 (1837). *M0NIM1ACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 145.
DORATOPUORA, Lem. in Orb. Diet. v. 119 (1849), 'LEAKOSA, Reichb. Nom. 69 (1841).
austro-caledonica, *Seem. Fl. Vit.* 206.—N. Caled.
Sassafras, *Endl. Ic. Gen. Pl.* t. 10.—Austral.
Vieillardi, *Baill. Adansonia,* ix. (1868-70) 128.—N. Caled.

DORYSTAECHAS, Boiss. & Heldr. ex Benth. in DC. Prod. xii. 261 (1848). *LABIATAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 1194.
haslata, *Boiss. b[1] Heldr. ex Benth. 1. e.*—**Lycia.**

DORYSTIGMA. Gaudich. Bot. Voy.Bonite, 1.13 (1844-66) [1842]-Fandanufl, Linn.
madagascariense, Gaudich. 1. c t 31-P. madagascariensis.
mauritianum, Gaudich. 1. c 1.13 =P. conglomerates.

DORYSTIGMA, Miers, in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (184S) 347-Jaborosa, Juss. (Solanac).
caulescent, Miers, 1. c. 348 =J. canlescens.
crisfum, Miers, 1. c. vii. (1848) 333.—Bolivia.
squarrosum, Miers, 1. c. iv. (1845) 348.—Chili.

DORYXYLON, Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 172= Sumbavia, Baill. (1858) (Euphorb.).
spinosum, Zoll. 1. c«-S. rottleroideB.

DOSSINIA, C. Morr. in Ann. Soc. Gand, iv. (1848) 171. *ORCHWEAE,* Beoth. & Hook. f. iii. 601.
cristata, Miq. Fl. Iud. Bat. iii. 781 = Hetaeria cristata.
lanceolata, Lindl. in Joum. Linn. Soc i. (1857) 186 = Hetaeria lanceolata.
marmorata, lindl. 1. c. 185 = Anaectochilns brevilabris.
marmorata, *C. Morr. in Ann. Soc. Gand,* iv. (1848) I71.-Java.
Meinerti, *Hort. Makoy, ex E. Morr. in Belg. Hortic.* zzxiv. (1884) 288.—Sumatra.
obliqua, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 731=Hetaeria obliqua.

DOTHILIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 60 (1836)= Bpiranthes, Rich. (Orchid.).
grandiflora, Rafin. 1. c. = S. grandiflora.

DOTHILOPHIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 39 (1886)-Epidendrum. Linn. (Orchid.).
purpurea, Rafin. 1. c = E . Skinneri.

DOTJABREA, Montr, in Mém. Acad. Lyon. x. (1860) 222. *INC. SED.* Cf. Benth. & Hook. f. ii. 89.
alba, *Montr. I. c.* 223.—N. Caled.
speciosa, *Montr. I. c.* 222.—N. Caled.

DOUEPEA, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot 18. t. 18 (1837)=Morieandia, DC. (Cmcif.).
tortuosa, Cambess. 1. c. = M. tortuosa.

DOUEPIA, Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc. v. (1861) 172-praec.

DOTJGIiASIA, Lindl. in Brande, Jonra. Sc (Oct. 1827) 385. *PRIMULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 632.
GRECORIA, Duby, Bot Gall. i. 383 (1828).
MACROTYBDS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 425 (1867).
arctica. *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 120.—Am. arct
dentaia, S. Wats, in Proa Am. Acad. xvii. (1881-82) 374=nivalis.
laevigata, *A. Gray, 1. c.* xvi. (1881) 105.—Am. bor. occ.
montana, *A. Gray, 1. c.* vii. (1868) 371.—Am. bor. occ.
nivalis, *Lindl. in Brande, Joum. Sc.* (Oct. 1827) S83.—Am. bor. occ.
Vitaliana, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 632.—Mont. Pyren.

DOUGLASSIA, Adans. Fain. ii. 200 (1763) = Clerodendron, Linn. (Verbenac).

DOUGLASSIA, Reichb. Consp. 128 (1828) - Souglaaia, Lindl. (Primul.).

DOUGLASSIA, Schreb. Gen. PI. 809 (1791)=Aiouea, Aubl. (Laurin.).
laurina, Sm. in Rees, Cyclop. xii = A. guianensis.

DOUMA, [Poir.] in Dnham. Arb. ed. Nov. iv. 47 (1809) =Hyphaene, Gaertn. (Palm.).
ihebaica, [Poir.] 1. c. 48-H. thebaica.

DOUPEA, D. Dietr. Syn. PI. iii. 684, 76 (1848)=-DOUEPIA, Cambess.=Moricandia, DC. (Crucif.).

DOVT3A, Kunth, Ennm. PI. iii. 457 (1841). *REST/ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1031.
binata, Steud. Syn. PI. Cyp. 248 - Hypodiscus binatus.
Bolusi, *Mast, in Joum. Linn. Soc.* xxi. (1885) 576.—Afr. austr.

DOVEA:—
ebracteata, *Kunth, Enum. PI.* iii. 458.—Afr. austr.
Hookeriana, *Mast, in Joum. Linn. Soc.* x. (1869) 249.—Afr. austr.
macrocarpa, *Kunth, Enum. PI.* iii. 458.—Afr. austr.
microcarpa, Kunth, 1. c. 459= ebracteata.
mucronata, *Mast, in Joum. Linn. Soc.* x. (1869) 251.—Afr. austr.
paniculata, *Mast. 1. c.* xxi. (1886) 577.—Afr. austr.
racemosa, *Mast. 1. c.* 578.—Afr. austr.
thyrsoidea, *Mast. 1. e.* x. (1869) 251.—Afr. austr.
tectorum, *Mast. I. c.* 219.—'Afr. austr.

DOVYALI8, E. Mey. ex Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 251. *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 128.
celastroides, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 12.—Afr. austr.
Monbazae, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. ix. (1868) 339.—Madag.
rhamnoides, Burch. ex Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. i. 69 = zizyphoides.
rotundifolia, Harv. 1. c. 70—celastroides.
zizyphoides, *E. Mey. ex Am. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 251.—Afr. austr.

DOWEA, Steud. Syn. PI. Cyp. 248 (1858)-Dovea, Kunth (Restiac.).

DOWNINGIA, Ton. in Pacif. Rail. Rep. iv. 116 (Bot. Whipple Exped. 60) (1856). *CAMPANULACEAE,Beath.* & Hook. f. ii. 650.
BOLELIA, Rafin. Atl. Joum. 120 (1832).
CLINTONIA, Dougl. ex Lindl. in Bot Reg. t. 1241 (1829).
GYNAMPSIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 6 (1836).
elegans, *Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped.* ii. 875.—Am. bor. occ.
pulchella, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 116.—Am. occ.
pusilla, *Torr. in Bot. V. St. Expl. Exped.* ii. 875.—Chili.

DOXANTHA, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 188=Bignonia, Linn.
acutistipula, Miers, 1. c. 190 - B. acutistipula.
adunca, Miers, 1. c. 188=B. Unguis-cati.
capreolata, Miers, 1. c. 190=B. capreolata.
chelephora, Miers, 1. c. = B. Unguis-cati.
cuspidata, Miers, 1. c. nomen.—Reg. Argent.
elongata, Miers, 1. c nomen.—Bras.
exilis, Miers, 1. c. nomen.—Reg. Argent.
exoleta, Miers, 1. c.»B. exoleta.
ferruginea, Miers, 1. c. = B. ferruginea.
hamigera, Mien, 1. c nomen.—Bras.
inoleta, Miers, 1. c. nomen.—Reg. Argent.
lanceolata, Miers, 1. c. = B. lanceolata.
lanuginosa, Miers, 1. c. = B. lanuginosa.
limbata, Miers, 1. c. nomen.—Bras.
longisiliqua, Miers, 1. c = B. longisiliqua.
mexicana, Miers, 1. c.»B. Unguis-cati.
praesignis, Miers, 1. c. nomen.—Ins. S. Doming.
radicans, Mien, 1. c. = B. Unguis-cati.
scitiflora, Miers, 1. c. nomen.—Ins. Antigua.
serratula, Miers, 1. c nomen.—Ins. Guadalup.
speciosa, Miers, 1. c. nomen.—Patagon.
taeniamorpha, Miers, 1. c. nomen.—Reg. Argent.
tenuicula, Miers, 1. c. nomen.—Ins. S. Doming.
Tweediana, Miers, 1. c. «• B. Tweediana.
torquata, Miers, 1. c.—Reg. Argent.
uncata, Miers, 1. c.=Spathodea uncata.
unguiculata, Miers, 1. c = B. Unguis-cati.
Unguis, Mien, 1. c.-B. Unguis-cati.

DOXANTHES, Rafin. Fl. TeUur. iv. 51 (1836)-Alpinia, Linn. (Scitamin.).

DOXEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 75 (1836) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
sanguinea, Rafin. I. c.»I. coccdnea,

DOXOMMA, Miers, in Trans. Linn. Soc Ser. II. L (1875) 98-Barriagtonia, Font. (Myrtac).
acuminatum, Miers, 1. c 102 = B. macrostachya.
angustatum, Miers, L c 106—B. angusta.
cochinchinense, Miers, L c. 101.—Cochinch.
cylindrostachyum, Miers, 1. c. 100-B. macrostachya.
macrostaehyum, Miers, L c 104 - B. macrostachya.

DOXOMMA :—
magnificum, Mien, in Trans. Linn. Soc.. II. i. (1876) 106=Barringtonia angusta.
neo-caledonicum, Miers, 1. c. 103 = B. neo-caledonica,
pendulum, Mien, L c. 99 = B. macrostachya.
rigidum, Mien, 1. c 104 = Symplocos rigida.
sarcostaehys, Miers, 1. c. 102 —B. macrostachya.
sumatranum, Mien, I.e. 103 — B. sumatrana.
Vriesii, Miers, 1. c. 106 = B. Vriesei.

DOXOSMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 9 (1836)=Epidendrum, Linn. (Orchid,),
gracilis, Rafin. 1. c — E. gradle.

DOYEBEA, Grosoudy, ex Bello, in Anal. Soc. Esp-HUt Nat. x. (1881) 273. *MYRTACEAE.*
emeto-cathartica, *Grosoudy, ex Bello, I. c.*—Polto Rico.

DBABA, Dill, ex Linn. Syst. ed. I (1735). . *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 74.
AIZODRABA, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. =• xvi. (1868) 335.
DOLLINERIA, Sauter, in Flora, xxxv. (1852) 863.
HOLARGES, Ehrh. Beitr. IT. 148 (1789).
HOLARGIDIUM, Turcz. in Ledeb. Fl. Ross. i. (1842).
MOENCHIA, Roth, Tent Fl. Germ. i. 273 (1788). partim.
PETROCALLIS, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. ft 93 (1812).
TOMOSTIMA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
acaulis, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sei. II. xvii. (1842) 164.—Cilicia.
Adamsii, Ledeb. Fl. Ross. i. 147-alpina.
affinis, *Hook./. Fl. Antarct.* 236.—N. Granat
affinis, Host, Fl. Austr. ii. 238= aizoides.
affinis, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 148.—Sibir.
aitoidea, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. 125-aizoides.
aizoides, Cav. Desc. 421—hispanica.
aimoides, Curt. Bot. Mag. t. 170 = brachystemon.
aizoides, *Linn. Mant.* i. 91.—Europ.
aiMoides, PalL ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 92-«»P
aiioides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 4»oly»> pica.
Aizoon, *Wahlenb. Fl. Carpat.* 198, in nota.—Europ.
aitoonia, St Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 125—praec
alba, Gilib. Fl. Lituan. ii. 47-Erophila vulgaris.
Alberti, *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrot-* (1877) .287.—Turkestan.
algida, Adams, ex DC. Syst. ii. 337-alpina.
alpestris, Jord. Diagn. i. 204-aizoides.
alpicola, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise. » — alpina.
alpina, Asso, Syn. Stirp. Arag. 83=hispanica.
alpina, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 281 lowskia alpina.
alpina, Cav. in Roem. Arch. ii. 227-cuspidata.
alpina, Crantz, Inst. it 82-aizoides.
alpina, *Linn. Sp. PI.* 642.—Reg. bor. et arct.
altaica, Bunge, Delect. Sem. Hort. Dorp. (18* fladnicDsis.
alyssoides, Benth. PI. Hartw. 159= Hallii.
alyssoides, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* v. 79.—* austr.
ambigua, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 151.—Sibir. »
ambigua, Schur, Enum. PI. Transs. 66=nemoros»-
americana, Pers. Syn. iL 190 = Erophila voig^fciiL
andina, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 66».
androsacea, Baumg. Enum. Stirp. Transs. »•
and?o7acVa, Willd. Sp. PI. iii. 428; Wahlenb. Fl. 174.1.11. f. 5 = fladnizensis.
arabiformis, Hohenwarth, Reisen, ii. 19$ =" vochinensis.
Arabis, Pen. Syn. ii. 190-arabisans.
arabisans, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 28.—Am-
arabisans, Punh, Fl. Am. Sept ii. 434-ramos
araboides, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. 287.—Peruv.
araratica, *Rupr. Fl. Cauc.* 114, in text".— Ararat.
araucana, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1 Gilliesii.
Arbuicnla, *Hooi.f. Fl. Antarct.* 287.—Venexoe*

DRABA :—

arctica, J. Vahl, in Fl. Dan. t 2294=hirta.
aretioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 77. t. 485.—Ecuador.
argaea, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. i. 296=natolica.
argentea. Lam. Encyc. ii. 829=Alyssum argenteum.
armata, Schott, Nyman,& Kotschy, Analect. Bot. 49 =longirostra.
arenosa, Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) —Armenia.
aspera, Adams, ex DC. Syst. ii. 887.—Sibiria.
aspera, Bertol. Amoen. Ital. 384=aizoides.
asprella [illegible], *in Bull. Torrey Bot. Club,* x. (1883) 192.—Arizona.
astyla [illegible] ex Schrenk, Reise Nordost Enr. Rnssl. ii. [illegible] 8 = alpina.
atwicca [illegible] 38—Graecia.
[illegible] in Anr[illegible] 232.—Algeria.
[illegible] = Aarabissulphurea.
aurea, C. [illegible] L^aea. [illegible] (1847) 58-olympica.
aurea, Vant, ex Hornem. Dan. t. 1460—Reg. bor. et arct.
aureola, S. Wats. Bot. Calif, ii. 430.-Calif.
australis, Hook. [illegible] CWf. ii. 430.-Calif.
austriaca, Crantz, [illegible] ^nfarrf. 235—Patagonia.
batava, Dum. Fl [illegible] *Prod.* 120.—Batav.
Baumgarteni [illegible] Ennm- [illegible] Transs. 65 «D. Aizoon.
Beckeri, [illegible] *Sched.* [illegible] *Exsicc.* iii. 78.—Austria.
Bertolonii, [illegible] P- 62=aizoides.
bifolia, Muhl. [illegible] W- n . W 173 = carolinianat
Boerhaavii, Van Hall> SpeC# Bot 149 [illegible] Erophila vulgaris.
Bonplandiana, H. & K. Nov. Gen. [illegible] Sp. v. 78" violacea.
borealis, DC. Syst. ii. 342=incana.
brachycarpa, Nuttin Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 106
brachycarpa, Zett. in Bot Notiser (1854), 151 = stellata.
brachystemon, DC. Syst. ii. 334.—Hab. ?
brachystemon, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125=praec.
Brackenridgei, A. Gray, Bot. U.S. Expl. Exped. [illegible] (1812) 268=olympica.
bruniaefolia, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. (1812) 268=olympica.
bryoides, DC. Syst. ii. 335=rigida.
caesia, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 108=stellata.
caespitosa, Pallas in Reise Nord. Russ. Reich. [illegible] (1808) n. 1225; ex Ledeb. Fl. Ross. [illegible] 5=rigida.
calycina, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 14-calycosa.
calycina, Desv. [illegible] (1813) 186.—Peruv.
calycosa, Boiss. & Bal. Fl. Orient, i. 299.-Ag. Min.
camptocarpa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854)
canadensis. ??9—Ecuador.
cantabrica, Will. ex Reichb. Pl. Canad. i. 22, ex Wats. in Proc. Am. Acad. vii. 354, non Reichb. Fl. Germ. Excurs. 666 = aizoides.
cappadocica, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. [illegible] Cappadoc.
carinthiaca, Hoppe ex Host, Fl. Austr. (1829) 487=siliquosa.
carnica, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 6=Thlaspi montanum.
carniolica, Vitm. Summa, Pl. iv. 13=Thlaspi montanum.
Suksdorfii, Sprang. ex Steud. Nom. ed. 1.284, nomen. —Reg. Caucas.
Chamissoni, G. Don> Gen. Syst. 184t=n«M*0»a.
cheiranthifolia, Lam. Ency. iL 828 = Alysium incanum.
cheiranthoides. Hook.f. Fl. Antarct. 236.-N. Granat.
cheiri, Lam. Fl. Fr. ex DC. Syst. ii. 291-Alygsum incanum.
cheiri, Lam. Fl. Fr. 482 = Alys»nm incanum.
chilensis, Phil. Atud. Vn. Chil. (1862) 877. —Chili.
chrysantha, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 364.
ciliaris, Host, Syn- PL 854-fladniansis.
ciliaris, Kit. ««Presl, Bot. Bemerk. 9-KitoibeUana.

DBABA:—

ciliaris, Linn. Mont. 91=brachystemon.
ciliaris, Salisb. Prod. 266; DC. Fl. Fr. iv. 697 = aizoides.
ciliaris, Schrank, Baier. Fl. iL 177 - D . Aizoon.
ciliata, *Scop. Fl. Cam.* ed. IL ii. 6.—Austria,
cinerea, *Adams, in Mim. Soc. Nat. Mosc. y.* (1817) 103.—Sibiria.
clypeata, Lam. Encyc. ii. 328=Farsetia clypeata.
cochlearioides, Langsd. ex DC. Syst ii. 863 = Cochlearia officinalis.
cochlearioides, *Turct. ex Bess, in Flora,* xvii. (1884) I. *Beibl.* 6.—Sibir. baical.
cognata, Scbott, in Oestr. Bot Wochenbl. iv. (1864) 198«cnspidata.
colchagnensis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 673.—Chili.
compacta, Schott, Nyman, & Kotschy, Analect. Bot. 50 = D. Aizoon.
confertifolia, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxrii. (1854) II. 301.—Ecuador.
confusa, Ehrh. Beitr. vii. 156=incana.
confusa, Hartm. Skand. ed. III. 163-hirta.
contorta, Ehrh. Beitr. vii. 155=incana.
corrugata, *S. Wats. Bot. Calif,* ii. 480.—Calif.
Corsica, Jord. Diajp. i. 205 - Loiselenrii.
corymbosa, R. Br. in Ross, Voy. App. p. cxliii=alpina.
corymbosa, Fries, ex Lange, Consp. Fl. Groenl. i. 48 = hirta.
crassifolia, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-June 1829) 182.—Am. bor.
cretacea, *Ciern. ex Linden, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxviii. (1866) I. 177.—Ucrania.
cretica, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 27.—Ins. Creta.
cryptantha, *Hook.f. Fl. Antarct.* 234.—Ecuador,
cuneifolia, *Nutt. in Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 108.—Am. bor.
curtisiliqua, Zett. PI. Vase. Pyr. p. xlviii« stellata.
cuspidata, Bertol. Fl. Ital. vi. 467>aizoidea.
cuspidata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 424.—As. Min.
cuspidata, DC. Syst. ii. 8S4=hispanica.
dahurica, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 87 = hirta.
dasycarpa, *Bernh. Syst. Vert. Erf.* 192.—Europ.
dasycarpa, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iii. 79.—Sibir. altaic.
daurica, DC. Syst. ii. 850.—Dauria.
Davilae, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 672 = Gilliesii.
davosianx, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii.-xxiv. (1880) 74.—Europ.
Dedeana, *Boiss. &* Reut. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 718—Hispan.
densifolia, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 104 = alpina.
dentata, Hook. *8c* Am. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 192 - raxnosissima.
depressa, *Hook.f. Fl. Antarct.* 234.—Ecuador,
diapensioides, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. i. (1864) 285.—Bolivia.
dicranoides, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 80= rigida.
discoidea, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. i. (1864) 286.—Bolivia.
diversifolia, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 80 = olympica.
Dorneri, Heuff. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii (1868) 25 = fladnizensis.
Douglasii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 328.—Am. bor. oca
dovrensis, Fries, Summa Veg. Scand. 32=hirta.
dubia, Suter, Fl. Helv. ii. 46 = tomentosa.
data, *Hook.f. (f Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 150.—Reg. Himal.
eUgans, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvii. (1842) 166-alpina.
ellipsoidea, *Hook.f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 153.—Reg. Himal.
elongata, Host, Fl. Austr. ii. 237=aizoides.
ericaefolia, Stev. in Mem. Soc. Nat Mosc. iii. (1812) 268=olympica.
eriopoda, *TWCM. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xr.* (1842) 260.—Dahuria.
eurycarpa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-66) 62O.-Cali£
extensa, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. i. (1864) 286.—Ecuador.

DBABA :-

falklandica, *Hook.f. Fl. Antarct.* 238.—Ins. Falkland.
filicaulis, Scheele, in Linnaea, xxL (1848) 683=caro-Unions f
fladnizensis, *Wulf. in Jacq. Misc. i.* 147. t 17. f. L—Reg. bor. et arct.
frigida, Sauter, in Flora, viii. (1825) 72 »tomentosa.
f rigida, Schur, Enum. PI. Transs. 64 = stellata.
funiculosa, *Hook. f. Fl. Antarct.* 238. t. 89.—Ins. Falkland.
gelida, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 250 =alpina.
Gigas, Stur, ex Boiss. Fl. Orient, i. 178-Arabis carduchorum.
GilliesU, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 137.—ChiU.
glabeUa, Pursh, FL Am. Sept ii. 434-arabisans.
glabella, Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. 744 = incana.
gladalis, Adams, in Mem. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 106-alpina.
glacialis, Hoppe, in Flora, vi. (1823) 424=aizoides.
globifera, Ledeb. Fl. Ross. 4. 145=olympica.
glomerata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 71=lasiophylla.
Gmelini, Adams, in Mem. Soc Nat Mosc. v. (1817) 107-repens.
gradlis, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June 1828) 172 -nemorosa.
gradlis, Ledeb. Fl. Ross. i. 152-hirta.
gracillima, *Hook.f.* £" *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 168.—Reg. Himal.
grandiflora, *Hook, (f Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 137, nomen; *Hook.f. Fl. Antarct.* 286.—Ecuador.
grandiflora, C. A. Mey. In Ledeb. Fl. Alt. iii. 74 = Parrya microcarpa.
gracilis, Langsd. ex DC. Syst. ii. 356-hyperborea.
Hallii[illegible]oides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 16.—g. Argent.
ii, *Hook.f. Fl. Antarct.* 237.—Ecuador.
Haynaldi, Stur, in Oestr. Bot Zeitschr. xi. (1861) 186. t. 2=D. Aizoon.
hederaefolia, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 64, nomen.—Afr. bor.
helvetica, Schleich. Cat PI. Helv. ed. III. 13; DC. Syst ii. 845 = fladnizensis.
Henneana, Schlecht in Linnaea, x. (1886) 100 = arabisans.
hesperidifiora, Lam. Encyc. ii. 328 - Aubrietia deltoidea.
heterocoma, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. 13 - olympica.
himalayensis, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 127 —incana.
hirsuta, Pen. Syn. il. 190-repens.
birsuta, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 64.—Ins. Kurile.
hirta, Gaudin, Fl. Helv. iv. 252-siliquosa.
hirta, Gunn. Fl. Norv. U. 81-laxa.
hirta, *Linn. Syst.* ed. X. 1127.—Reg. bor. et arct.
hirta, Oed. in Fl. Dan. t 142; Jacq. Fl. Austr. v. 15. t. 432 o stellata.
hirta, Sibth. *to* Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 5-Arabis drabaefonnis.
hirta, Sm. Fl. Brit. 677=rupestris.
hirta, Towns. It. Hung. 490, 853=tomentosa.
hispanica, *Boiss. Blench.* 18.—Hispan.; Marocc.
hispida, *Willd. Sp. PI.* iii. 426.—Rossia; Reg. Cauc.
hispidula, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 28=caroliniana.
Hookeri, *Walp. Ann.* i. 86.—Ecuador.
Hoppeana, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1182—aizoides.
Hoppii, Trachsel, In Flora, xiv. (1881) 741-siliquosa.
Howellii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1886) 854.—Calif.
Haeta,Btiss.Diagn. Set. II. v. 31.—As.Min.; Persia.
Humholdtii, Desv. Journ. Bot iii. (1814) 171 -Eutrema Humboldtii.
hyperborea, *Desv. I. c.* 172.—Am. bor. et arct.
Hystrix, *Hook. f.* 6" *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 149.—Afghan,
imbricate, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 182.—Reg. Caucas.
imbricatifolia, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* i. 168—Chili.
imeretica, *Rupr. Fl. Cauc.* 291, in textu.—Reg. Caucas.
incana, *Linn. Sp. PI.* 648.—Reg. bor. et arct.; Reg Magellan.

DBABA:—

incampta, Stev. in Mém. Soc. Nat Mosc. iii. (1812) 268 = alpina.
inflata, H. C. Wats. exSyme, Engl. Bot. ed. III. i. 191. t 134=Erophila vulgaris.
intermedia, Andrz. ex DC. Syst. ii. 351—nemorosa.
involuta, Ag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 889 = hispanica.
Tamesonii, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1864) II. 300.—Ecuador,
japonica, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxii (1877) 228.—Japon.
Johannis, Host, FL Anstr. ii. 240-siliquosa.
jonocalyx, *Tung, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 299.—Ecuador,
jorullensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 78.— Mexic.
juvenalis, *Delile, ex Godr. in Mini. Acad. Montp. (Sect. Médic)*, i. (1858) 415.—Hab. ?
Kitaibeliana, *Presl, Bot. Bemerk.* 9.—Hab. ?
Kotschyi, *Slur, in Oestr. Bot. Zeitschr.* ix. (1859) 33. —Europ.
Krockeri, Schnr, Ennnh Fl. Transs. 67 = Erophila praecox.
lactea, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 104 = fl&chizensis.
lactea, *Neilr. in Oestr. Bot. Zeitschr.* ix. (1859) 92.— Enrop.
***laevigata,Cham.8cSchlecht.* in Linnaea, i. (1826) 25 =** Eutrema Edwardsii.
laevigata, Hoppe, ex Koch, in Flora, vi. (1823) 441 = fladnizensis.
laevipes, DC. Syst. ii. 346-tomentosa.
lanceolata, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 72.—Ind. or.
lapponica, Schur, Enum. PI. Transs. 64 =• Kotschyi.
lapponica, Willd. ex DC. Syst. ii. 344 = fladnizensis.
lasiocarpa, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 248 = alpina.
lasiocarpa, Rochel, ex DC. Syst ii. 834 = D. Aizoon.
lasiophylla, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 71.—Reg. Himal.; Tnrkestan.
lasiopoda, *Turcz. ex Bess, in Flora*, xvii. (1834) I. *Beibl.* 6.—Sibir. baical.
laxa, *Lindblom, in Linnaea*, xiii. (1839) 826.-Scandinav.
leiocarpa, Lindbl. In Vet Alcad. Handl. Stockh. 1839, (1841) 66-hirta.
leiopoda, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125 = laevipes.
Lemmoni, J. *Wats. Bot. Calif*, ii. 480.—Calif.
ieptopetala, T. Fries, in Ofver. Vet. Akad. Stockh. xxvi. (1869) 130 = hirta.
Levieri, *Janka, in Termist. Fiiaetek*, vii. (1883) 107.— Enrop. anstr.
Leyboldi, *Phil, in Linnaea*, xxziii. (1861-65) 10.—Chili; Ecuador.
Liljetladii, Wallm. in Liljeb. Svenska Fl. ed. III. 350 -stellata.
linearis, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 167.—Persia; Tibet, occ
Loiseleurii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 34.—Corsica.
Longii, Schwein. ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. L 106 - arabisans.
longirostra, *Schoti, Nyman*, 6* *Kotschy, Analect. Bot.* 48.—Dalmatia.
lutea, Gilib. Fl. Litnan. ii. 46=nemorosa.
latescens, *Coss. Notes Crit.* 147.—Hispan.
Macleani, *Hook.f. Fl. Antarct.* 235.—Pernv.
macrantha, Vest, ex Reichb. PI. Crit. iii. 11 = stellata.
macrocarpa, Adams, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 249 = alpina.
macrocarpa, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 28 = Erophila macrocarpa.
macroloba, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 301.—Sibir. occ.
macropetala, *Hort. Wirceb. ex Schenk, Ind. Sem. Hort. Wirceb.* (1861).—Hab. ?
macrophylla, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 255.—Sibir.
magellanica, *Lam. Encyc.* ii 328.—Reg. Magell.
Mandoniana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. i. (1864) 287.—Bolivia.
maritima, Lam. Fl. Fr. ii. 461 = Alyssnm maritinram.
Martinsiana, *7. Gay, in Bibl. Univ. Geniv.* N. S. xxviii. (1840) 146.—Spitzbergen.
Mawii, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6186.—Hispan.
micrantha, Nutt. in Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 109 = caroliniana.

DBABA:—

micropetala. Hook, in Parry, 2nd Voy. App. 385 = alpina.
minima, Stend. Nom. ed. II. i. 528 - Erophila minima.
minutissima, Willd. ex DC. Syst. ii. 357, (err. typ. munitissima) - Erophila praecox.
mogollonica, *Greene, in Coult. Bot. Gat.* vi. (1880) 167.—N. Mexic.
mollis, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 7=Arabis vochinensis.
mollissima, *Stev. in Mtm. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 268.—Reg. Caucas.
mongolica, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 256.—Mongolia.
montana, Berg, ex DC. Syst. ii. 833=aizoides.
montaoa, *S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* i. 60.— Am. bor.
Moritziana, *Bruegg. injahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxv. (1882) 82.—Enrop.
muralis, Hook. Fl. Bor. Am. i.56—neinorosa?
muralis, *Linn. Sp. PI.* 643.—Europ.; As. temp.
muralis, Thnnb. Fl. Jap. 259—nemorosa.
muricella, Wahlenb. FL Lapp. 174=stellata.
musoosa, *Ruia V Pav. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 528. —Pernv.
mutabilis, Desv. Jonro. Bot. iii. (1814) 172-Alyssum mutabile.
myosotidioides, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 18.—Mexic.
Nasturtiolum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 8 =Smelowskia alpina.
natolica, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 163.—As. Min.
nemoralis, Ehrh. Beitr. vii. 163=nemorosa.
nemorosa, All. Fl. Pedem. i. 244 «= muralis.
nemorosa. *Linn. Sp. PI.* 643.—Reg. bor.
nepalensis, *Wall. Cat.* n. 4785.—Reg. Himal.
nivalis, DC. Fl. Fr. iv. 699 - fladnizensis.
nivalis, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 364-tomentosa.
nivalis, Lilj. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1793) 208 =stellata.
nivea, Sauter, in Flora, xxxv. (1852) 622 - tomentosa.
norvegica, Gunn. Fl. Norv. ii. 106=hirta.
nubigena, Desv. Journ. Bot iii. (1814) 171 *(=Eudema* ***nubigend).*—Ecuador.**
nummularia, Ehrenb. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 91=Alyssum libycum.
oblongata, R. Br. Voy. Ross. App. p. cxliii, nomen ; DC. Syst. ii. 842=hirta.
oblongata, Nym. Consp. 62—aizoides.
obbvata, *Benth. PI. Hartw.* 159.—Ecuador.
ochroleuca, Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 69 = alpina.
Oederi, Vill.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 152 = siliquosa.
Olgae, *Regel & Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 8.—Turkestan.
olympica, Gren. *8c* Godr. Fl. Fr. i. 128 •= Loiseleurii.
olympica, *Sibth. ex DC. Syst.* ii. 386.—Graecia; Oriens.
oligosperma, Hook. Fl. Bor. Am. i. 51 = alpina.
Oreades, *Sckrenk, Enum. PI. Nov.* ii. 56.—Turkestan.
essetica, Rupr. Fl. Cauc. 112••mollissima.
oxycarpa, *Boiss.* &* *Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 28.—Syria.
oxycarpa, Sommerf. ex Nym. Consp. 52 = alpina.
Pacheri, Stur, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855) 49 = tomentosa.
pachythyrsa, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 62.—N. Granat.
pamplorrensis, *Planch. & Linden, ex Triana* &" *Planch.* *1. c.* 61.—N. Granat.
pamassica, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 84.—Graecia.
parryoides, Cham, in Linnaea, vi. (1881) 533=Parrya Ermani.
patagonica, *Phil. I. c.* xxviii. (1856) 669.—Patagon.
pauciflora, R. Br. in Parry, 1st Voy. Suppl. App. p. cclxvi = alpina.
persica, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 164 = alpina.
petraea, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 285-Hutchinsia petraea.
Pickeringii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 64.— Peruv.
pilosa, Adams, ex DC. Syst.ii. 336= alpina.
platycarpa, *Torr.* 6* *Gray, Fl. N. Am.* i. 108.—Am. bor. occ.
polygonifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = nemorosa.
polytricha, Ledeb. Fl. Ross. i. 146=alpina.

BR ABA :—

pontica, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 381°= nemorosa.
popocatepetlensis, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 18.—Mexic.
porrecta, Trin. ex DC. Syst. ii. 339-repens.
praecox, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 26« = Erophila praecox.
primuloides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 250-alpina.
pulcheUa, Willd. ex DC. Syst. ii. 354 = alpina.
pnlvinata, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 298.—Venezuela.
pumila, Mielichh. ex Sauter, in Flora, xxxii. (1849) 666=tomentosa.
pumila, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125-seq.
Pumilio, R. Br. ex DC. Syst. ii. 853 = CapseUa procumbens *vel* australis?
pycnophylla, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 800.—Ecuador.
pygmaea, Turcz. 1. c. (1838) 87 - fladnizensis.
pyrenaica, *Linn. Sp. PI.* 642.—Mont. Pyren.
pyrenaica, Oed. in FL Dan. t. 148 = laxa.
radicans, Royle, Illustr. Bot. Himal. 71=alpina.
radicata, *Hook.f. Fl. Antarct.* 286.—Ecuador.
ragusana, Vest, ex Reichb. PI. Crit. iii. 29 = Alysson> mutabile.
ramosa, Gater. Desc. PI. Montaub. 114 = muralis.
ramosissima, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 186.—Ambor.
repens, B'M*. *Fl. Taur. Cauc.* ii 98.—Reg. Cancas.i Sibir.
Reuteri, Boiss. *8c* Huet, Diagn. Ser. II. vi. 13 «=alpina
rhaetica, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxv. (1882) 80.—Europ.
Rhiaobotrya, Steud. Nom. ed. II. i. 628 = CocWean» brevicaulis.
rigida, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 61 = Loiseleurii.
rigida, *Willd. Sp. PI.* iii. 425.—As. Min.
rivularis, Bemh. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs 667* stellata.
rivularis, *Hornem. ex Steud. Nom.* ed. II. i 528.—Sibir. baical.
Roegneri, Stev. ex Rupr. Fl. Cauc. 291, in text= imeretica.
Roemeriana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 683 = platycarpa *vel* enneifolia *1*
rosea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 280-Braya rosea.
rosularis, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (IS** 165=calycosa.
rosulata, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 669 - Gil**1
rubra, Crantz, Crucif. 95. t. 1. f. 5 = pyrenaica.
ruderalis, Banmg. Enum. Stirp. Transs. ii. 32 = Lepidium Draba.
rupestris, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kent.* ed. II. iv. 91< = Reg. bor. et aret.
rupestris, Willd. ex DC. Syst. ii. 839 = hispida.
sachalinensis, Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 92 = incana.
salsa, Spreng. Syst. ii. 876=Cochlearia salsa.
samojedorum, *Rupr. in Bull. Phys.-Math.* *Pitersb.* viii. (1850) 291.—Mont. Ural.
Sauteri, *Hoppe, in Flora*, vi. (1823) 425.—Tyrol*.
saxatilis, Mart. & Koch, in Flora, vi. (1823) «' stellata.
saxicola, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 53=A1*** drabaeformis.
saxigena, Jord. Diagn. i. 203 - aizoides.
scabra, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 182.—Reg- C? (1839)
scandinavica, *Lindblom, in Linnaea*, xiii. C —Scandinav.
Schivereckia, *Janka, in Termeśa. Ftizetek*, vii- (1883) 109.—Europ. austr.
sclerophylla, Uaudin, Fl. Helv. iv. 255 = fladni«oeg4
scopulorum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. i. *V* 286.—Bolivia.
setosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 71 = alpina
setulosa, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 63»* drabaeformis.
setulosa x, Leresche, in Compt.-Rend. Soc. (1852-58) 7.—Europ.
siliquosa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 94 ; W. * Min.; Persia.
siliquosa, Hook. £ Fl. Antarct. 235 = Hooken- *gii)*
soratensis, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. >• I 287.—Bolivia.
spathulata, Spreng. Syst ii. 876=hyperborea.

DRABA:-

*Pyrenaica, Lan 6- ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 665 = fcrophila praecox.

*spinosa. Ua - Fl. Fr. ii. 461-Alyssum spinosum.

Spitzeliana, *Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl.* **Heft lx.-Eur op '**

Spruwana, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* **V. i. (1864)** «6.—Ecuador.

*stellata, Jacq. ex DC. Syst ii. 839 = repens.

stellata, Cham. in Linnaea, i. (1826) 22=tomentosa.

---a, *Fac 9, Enum. Vindob.* - "3i 256.—Reg. bor. et arct

tUl?' 9ed. In FL Dan. *" **142-siliqposa.**

"ata Sieher, ex Steud. Norn. ed. ft. i. 528 = Cochlearia brevicaulis.

st 1 With Arr - Brit- PI- ed. III. 565-rupestris.

stenocarpa, Hook f. & Thoins - "» Jonm- Li™- Soc. **v. (186** !158=linearis.

stenoloba, Ledeb FL Ross - ! - 154=hirta.

stenopetala, TraUty„iD AcL Hort> PetrOp. "• **(1879) 11.**—As bor.

Stephanophylla> *l4yi*„„ i4„o/_1/"*»- *Chil.* **(1859) 678.—**

stipitata, Bam> m • C Gay- F1 chiI L **155 = Gilliesii.**

streptocarpa, *A Grajr„in Am y*ourn Sc &r n **xxxiii.** (1862) 24.

strigosa, laris 2.—Am. bor. ex DC- Sy81 ij- **348-incana.**

Stuartii, 5mac> FL Hautes-Pyr. 192 = aizoides.

Stuartii, » 800 —) S'i* *"" lSw;" *Nai Mosc.* **xxvii. (1854)** Ecuador.

subamplexicaulis, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* **iii. 77.**—Sibir. altaic.

Subularia, Lam. Tabl. Encyc. iii. 109 „ Subularia aquatica.

suffruticosa, *Barn. in C. Gay, Fl.* CT.7. i. 157.-Chili.

supranivalis, *Rupr. Fl. Cauc.* **11**«-Reg. Caucas.

taurica, *Willd. ex D*C- S-rf. ii. 335 - cuspidata.

tenuis, Bar V" C- Cay, J!/. CM/, i. **156.**—Chili.

Thomasii, Och> Syn F1 Germ ^ n 488 = in-cIT

tridactylites, (lRffl) 152.-Reg. Himal. **Linn. Soc. v.**

---scana, DC. Syst. ii. 841=toluce nsis.

toluccnsis, M B v K N<» t. *Gen. et Sp.* **v. 78.—Mexic.**

tomentosa, *LClairi,.-] Man. Herb.* **217 J WaAM- *Fl. Helv.* 138.** Europ.

tomentosa, Schur> **Enum.** PI. Transs. 64 - Kotschyi.

Trachselii, *Dalla Torre,* 4n - ^/^» A 65.—Europ.

transsilvanica, Schur, Enu ---- 4 = Kotschyi.

Traunsteineri> Hoppe. "> Sturm, Deutschl. Fl. Heft lxv = sili uosa q s a.

trichella, *ries Nov Fl- Suet Mant. ii. 40»rupestris.

tridentata, DC- S. yst. !i.. 38 = hispida.

tschuktschorum, *Trautv. i* (1879) 12.—Sibir. bor. *Act Hort Petrep* *

turgida, Huet, ex Nym- Consp. 52 - longirostra.

turkestanica, *Regel & 5t *ma . ex* .ifgri i, «. *Nov. Fedsch. 7.*—Turkestan.

umbrosa, Mukl at **62=caroliniana.**

nafa7iV- DC s y>. ii. 850«incana.

"nilat. "raiis G - ?"»«. «» 5«««. 7'orro' 5o<- *Club,* ix. (18te 11. c.

uralensis, Willd. ex DC> **Syst. ii. 300 = Alyssum podolicum.**

velutina, *Boiss. & Huet, Diagn.* **Ser. II. vi. 15.—Armenium.**

ventosa, *A. Gray, in Am. Naiural* vlii **(1874) 212.—Am. bor.**

vern Veri - Sp. PI. 642 = Erophila vulgaris.

vioC ' * " ' ^o*"1 «*- ff ii (181*) 186.-Syria.

volcanica, *Benth. PI. Hart*. 82.—Guatemala.

Wahlenbergii, Hartm. Skand. Fl. ed. I. 249=fladnizensis.

Wahlenbergii, Schur, Enum. PI. Transs. 64 = Kotschyi.

Wormskioldii, *Fisch. ex Spreng. Syst.* **ii. 874.—Sibiria**

Zahlbruckneri, *Wulk in Wi* **ilk. & Lange** Prod m Hisp.—Austria.

ill. 8Sn Hispan.

DRABELLA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. s. xvi. (18«rM\! Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. s. xvi. muralis, Foarr. 1. c. = Draba DRL (Crucif.).

DRABOPSIS, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 258 = Siaymbrlum, Tonm. (Crucif.).
vema, C. Koch, 1. c.—S. nndum.

DRACAKNA, Vand. Diss. (1762); Linn. Mant. i. 63 (1767). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 779.
DRACO, Crantz, Duab. Dracon. Arb. 13 (1768).
DRAKAINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 17 (1836)
NKMAMPSIS, Rafin. 1. c. (1836).
OEDERA, Crantz, Duab. Dracon. Arb. 30 (1768).
PLEOMELE, Salisb. Prod. 245 (17*6).
TERMINALIS, Medic. Theodora, 88 (1786).
STOERKIA, Crantz, Duab. Dracon. Arb. 25 (1768).

acanlis, *Baker, in Trans. Linn. Soc. Set.* II. i. (1878) 252.—Afr. trop.

acuminata, *Thunb. Diss. Dracaena*, 6.—Ins. Mascar.

Afeelii, *Baker, in Journ. Sot.* xii. (1874) 167.—Afr. trop.

albo-rosea, Hort ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 540 = Cordyline terminalis.

angustifolia, *Roxb. Hort. Seng.* 24 ; *Fl.Jnd.* ii. 165.—Ind. or.; Malaya,

arborea, *Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol.* i. 341.—Afr. trop.

arborea, C. Koch, Wocbenschr. x. (1867) 236 - Kochiana.

atropurpurea, Roxb. Hort. Beng. 24; Fl. Ind. ii. 160 elliptica.

Aubryana, Brongn. ex E. Morr. Belg. Hortic. x. (1880) 348 = thalioides.

aurantiaca, *Wall. Cat.* n. 5144.—Malaya,

aurea, *H. Mann, in Proc. Am. Acad,* vii. (1867) 207.—Ins. Sandvic.

Aurora, *Linden & Andri, in Illustr. Hortic.* xxv. (1878) 26. t 304.—Ins. Pacif.

australis, Forst.f. Prod. 24=Cordyline australis.

australis, Hook. Bot. Mag. t. 2835=Cordyline Baueri.

Bellula, Linden & Andre", in Illustr. Hortic. xxi. (1874) 41. 1.163 = Cordyline terminalis.

Betschleriana, C. Koch, in Berl. Allg. Gartenz. (1858) 254 = concinna.

bicolor, *Hook. Bot. Mag.* t. 5248.—Afr. trop.

Boerhavii, Tenore, in Mem. Ace. Sc. Born. Nap. iii. 11.(1832) 44. t. 3 = D.Draco.

borealis, [Sohnd. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 454 = Clintonia borealis.

Bo'scii, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 528-Agave geminiflora.

brachyphylla, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) H. 249.—Ins. Andaman.

brasiliensis, Hort. ex Schult. £ Syst vii. 1676 = Cordyline terminalis.

cameronniana, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 166.—Afr. ttop.

Candelaria, Hort. ex Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. (1850-51) 132 -reflexa.

Cantleyi, *Baker, in Journ. Bot.* xix. (1881) 826.—Singapore.

Casanovae, *Linden tf Andri, in Illustr. Hortic.* xxi. (1874) 137. t. 181.—N. Hebrid.

cernua, Jacq. Hort. Schoenbr. i. 50. t. 96=reflexa.

cincta, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xiv. (1875) 580.—Hab.?

cinnabari, *Balf. f. in Trans. Roy. Soc. Edinb.* xxx. (1882) 623.—Ins. Socotra.

coehinchinensis, Hort. ex Baker, In Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 532=fruticosa.

compacta, Hort. ex Baker, 1. c 540=praec.

concinna, *Kunth, Enum. PI.* v. 8.—Madag.

congesta, Sweet, Hort Brit. ed. I. 424=Cordyline congesta.

Cooperi, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1871) 148 j et Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 640 = Cordyline terminalis.

cylindrica, *Hook./. Bot. Mag.* t. 5846.—Afr. trop.

densiflora, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 165.—Afr. trop.

dentata, Pers. Syn. i. 371, in obs.=Lomatophyllnm borbonicum.

dnaricata, Willd. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 140 = reflexa.

Draco, *Linn. Syst.* ed. XII. 246.—Ins. Canar.

Ehrenbergii, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 538 = Yucca Ehrenbergii.

elliptica, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 388 = Fontanesiana

elliptica, *Thunb. Diss. Dracaena*, 6.—As. trop.

elliptica, Thunb. 1. c, partim - spicata.

DRACAENA:—

ensata, Thunb. Diss. Dracaena, 4 = Dianella ensifolia.

ensifolia, Haw. Syn. PI. Succ 67 = Yucca flexilis.

ensifolia, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xviii. (1880) 222=Yucca guatemalensit.

ensifolia, Linn. Mant. i. 63 = Dianella ensifolia.

ensifolia, Regel, Gartenfl. (1864) 321.t 461 - fraticosa.

ensifolia, Wall. Cat. n. 5143=angustifolia.

ensiformis. Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 675 = angustifolia.

erecta. Linn. f. Suppl. 204-Asparagus erectua.

esculenta, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1871) **148;** et Baker, in Jonm. Linn. Soc xiv. (1875) 540-Cordyline terminalis.

excelsa, Hort. ex Baker, 1. c. 532 = fruticosa.

excelsa, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1839) 11. n. 8—arborea.

ferrea, Linn. Syst. ed. XII. 246«Cordyline terminalis.

filamentosa, Scanag. ex Schult f. Syst. vii. 729 = Agave geminiflora.

JMformis,Tbmib. Diss. Dracaena, 4 = Xerotes filiformis.

Finlaysoni, *Baker, in Journ. Bot.* xi. (1873) 261.—**Malaya.**

Fintelmanni, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1871) 149 ; et Baker, in Joum. Linn. Soc. xviii. (1880) 222=Yucca guatemalensis.

flabelliformis, Bory, Voy. i. 270 — Cordyline macrophylla.

Flemingii, Hort ex Baker, in Joum. Linn.* Soc. xiv. (1875) 540 = Cordyline terminalis.

fiexuosa, Regel, Gartenfl. (1859) 329=reflexa.

floribunda, *Baker, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 6447.—Hab. ?

foetida, Salisb. Prod. 254 = Lomatophyllum borbonicum.

Fontanesiana, *Schult. f. Syst.* vii. 1676.—Ins. Mascar.

formosa, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 640=Cordyline terminalis.

fragrans, *Ker-Gaml. in Bot. Mag.* t. 1081.—Afr. trop.

Fraseri, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 540—Cordyline terminalis.

fraticosa, *C. Koch, Wochenschr.* x. (1867) 236.—Hab.?

fruticosa, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 137 = angustifolia.

Gibsoni, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 540 = Cordyline terminalis.

glomerata. *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 166.—Afr. trop.

gloriosa, Linden, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiii. (1878) 111 = Cordyline terminalis'.

gracilis, Hort. Bull, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 530-cincta.

gracilis, Salisb. Prod. 253 = marginata.

gracilis, *Wall. Cat.* n. 5150.—Malaya.

graminifolia, Linn. Syst. ed. XII. 246 — Liriope spicata.

graminifolia, Wall. Cat. n. 5149-Finlaysoni.

Griffithi, Regel, Gartenfl. (1871) 146 - Helferiana.

Guilfoylei, Veitch, Cat. ex Regel, Gartenfl. (1871) 149 -Cordyline terminalis.

Helferiana, *Wall, ex Kura, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 248.—Burma.

hemichrysa, Thunb. Diss. Dracaena, 5 (=Asteliae sp.) —'Ins. Maurif

Heyneana, Wall. Cat. n. 5151=spicata.

hirsuta.Thunb. Diss. Dracaena, 6 =Palisota thyrsiflora.

Hookeriana, *C. Koch, Wochenschr.* iv. (1861) 394.—Afr. austr.

humilis, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 166.—Afr. trop.

illustris, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 540-Cordyline terminalis.

imperialis, Hort. ex Baker, 1. c. = Cordyline terminalis.

indivisa, Forst. f. Prod. 24 = Cordyline indivisa.

inscripta, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 540-Cordyline terminalis.

interrupt:i. *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 252.—Afr. trop.

interrupta, *Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol.* i. 341 (= praec. ?).—Afr. trop.

Jackiana, *Wall. Cat.* n. 5145.—Malaya.

javanica, Kunth, Enum. PI. v. 12 = elliptica.

Kirkii, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 164.—Ins. Johanna.

Knerkiana, C. Koch, Wochenschr. iv. (1861) 394 = arborea.

Kochiana, *Regel, Gartenfl.* (1871) 137.—Hab. t

DRACAENA :-
lancea, Thunb. Diss. Dracaena, 5 ->refleza.
latifolia, Regel, Gartenfl. (1871) 141 - Hookeriana.
Lenneana, Hort. ex Baker, in Joura. Linn. Sac. xiv. (1876) 538 = Yucca Lenneana.
Lenneana, Regel, Gartenfl. (1871) 149=Yucca conspicua.
Lennei, Hort. ex Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xviii. (1880) 222=Yucca guatemalensis.
leonensis, *Lodd. ex Loud. Hort. Brit.* ISO, nomen.—Afr. trap.
tinearifolia, Ayres, ex Baker, in Joura. Linn. Soc. xiv. (1875) 581=reflexa.
lineata. Hort. ex Baker, 1. c. 543=Cordyline terminalis.
lntescens, *A. Versch.—Cf. Belg. Hortic.* xxiii. (1873) lll.-Hab. I
maculata, Roxb. Hort Beng. 24; Fl. Ind. ii. 157 = elliptica.
maculata, Wall. Cat n. 5148 A-Porteri.
magnified, Hort. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xiv. (1875) 540 = Cordyline terminalis.
Mannii, *Baker, in Joum. Bot.* xii. (1874) 164.—Afr. trop.
marginata, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 454 - Lomatophyllum borbonicum.
marginata, Home, ex Baker, in Joura. Linn. Soc. xiv. (1875) 580-concinna.
marginata, *Lam. Encyc.* ii. 824.—Madag.
mauritiana, Boj. Hort Manrit. 348 — Cordyline floribunda.
mauritiana,1»m. Encyc. ii. 325-Dianella manritiana.
medeoloides, linn. f. Suppl. 203 = Asparagus medeoloides.
monostachya, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 252.—Afr. trop.
Mooreana, Hort ex Baker, 1. c. 540=praec.
nemorosa, Steud.Nom. ed. II. i. 529=Dianella odorata.
nigra, Regel, Gartenfl. (1871) 142 = Fontanesiana.
nitens, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 262.—Afr. trop.
nobilis, Hort. ex Baker, in Joura. Linn. Soc. xiv. (1875) 540-Cordyline terminalis.
obliqua, Thunb. Diss. Dracaena, 6 — Xerotes flexifolia.
obtecta, R. Grab, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June 1827) 176 - Cordyline Baueri
Ombet, Kotschy & Peyr. PI. Tinn. 47 «D. Draco,
ovata, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 1180.—Afr. trop.
pachyphylla, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 249.—Ins. Andaman,
parviflora, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 252.—Afr. trop.
parviflora, Willd. ex Schult f. Syst. vii. 848 = Nolina parviflora.
Perrottetii, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 165.—Afr. trop.
pbrynioides. *Hook. Bot. Mag.* t. 5352.—Afr. trop.
plicata, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 675, nomen.—Hab. ?
Porteana, Hort ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 540=Cordyline terminalis.
Vorttri, Baker, in Journ. Bot. xi. (1873) 262.—Penang.
pulchella, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc xiv. (1875) 640 = Cordyline terminalis.
pulcherrima, Hort. ex Baker, I.e. — Cordyline terminalis.
puntila, Hort ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 341 = umbraculifera.
punctata, Hort. Van Houtte, ex Regel, Gartenfl. (1871) 189=stenophylla.
quitensis, Hort. ex Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xiv. (1875) 532 = fruticosa.
Reali, *Linden V Andri, in Illustr. Hortic. xi.* (1873) 166.—Archip. Ind.
reflexa, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 863=timorensis.
reflexa, *Lam. Encyc.* ii. 824.—Ins. Mascar.; Madag.
reflexa, F. Muell. Fragm. vi. 120 = angnstifolia.
regalis, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 540 = Cordyline terminalis.
resinifera, Salisb. Prod. 263 - D. Draco.
Robinsoniana, *Hort. ex Andri, in Illustr. Hortic.* xxvi (1879) 56. t. 342.—Ins. Solomon.
' *robusta,* Hort ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 540=Cordyline terminalis.
Rothiana, *Carr. in Rev. Hortic.* (1877) 68.—Hab.?
rubra, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IT. 13 = Cordyline terminalis I
Rumphii, Regel, Gartenfl. (1871) 140=Hookeriana.
salicifolia, Regel, 1. c 141=reflexa.

DRACAENA :—
Saposchnikowi, *Regel, Gartenfl.* (1871) 823.1706.—Hab. ?
sarmentosa, Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 545 = Cordyline floribunda.
schizantha, *Baker, in Journ. Bot.* xv. (1877) 71—Afr. trop.
sepiaria, Seem. Fl. Vit. t 94 =• Cordyline terminalis.
siamensis, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 540=Cordyline terminalis.
Sieboldii, Hort. ex Baker, 1. c=praec.
Sieboldii, Planch, in FL des Serres, Sér. I. vi. (1850 -61) t. 669-elliptica.
Smithii, *Baker, in Bot. Mag.* t 6169.—Afr. trop.
spectabilis, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 540-Cordyline terminalis.
spicata, *Roxb. Hort. Beng.* 24; *Fl. Ind.* ii. 157.—Ind. or.
splendens, Hort. ex Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xiv. (1875) 540-Cordyline terminalis.
stenophyUa, *C. Koch, Wochenschr.* iv. (1861) 395.—Afr. trop.
striata, Linn. f. Suppl. 204=Asparagus striatus.
stricta, Hort. ex Knnth & BoucW, Ind. Sem. Hort Berol. (1847) 11 -Cordyline dracaenoides.
stricta, Sims, Bot. Mag. t. 2575 ^ Cordyline stricta.
sulcata, Hort. ex Baker, in Joura. Linn. Soc. xiv. (1876) 540-Cordyline terminalis.
surculosa, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1169.—Afr. trop.
/ *terminalis,* Linn. Syst. ed. XII. 246 — Cordyline terminalis.
terminalis, Wight, Ic. t 2054 = spicata.
terniflora, Roxb. Hort. Benp. 24; Fl. Ind. ii. 159 = spicata.
terniflora, Wall. Cat. n. 5147 A-elliptica.
tessellata, Willd. Enum. Hort. Berol. 37 4=marginata.
thalioides, *Hort. Makoy, ex E. Morr. Belg. Hortic.* x. (1860) 348.—Afr. trop.
Thwaitesii, Regel, Gartenfl. (1871) 144-spicata.
timorensis, *Kunth, in Abh. Acad. Berl.* (1842) 26.—Ins. Timor.
triandra, Afzel. Remed. Guin. 6-Palisota thyrsiflora.
Troubetzkoi, *Linden V Andri, in Illustr. Hortic.* xxi. (1874) 168. t. 187.-Ins. Pacif.
nmbraculifera, *Jacq. Hort. Schoenbr.* i. 50. t. 95.—Java; Maurit.
undulata, Linn. f. Suppl. 203 = Asparagus undulatns.
utilis, Hort ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 540-Cordyline terminalis.
venenata, *Noronha, in Verh. Batav. Gen. r.* (1790) ed. I. Art. IV. 18. (Quid ?).—Java,
venusta, *Hort. ex Planch, in Fl. des Serres,* Sér. I. vi. (1860-51) 132.—Hab. i
volubilis, Linn. f. SuppL 204-Asparagus scandens, volubilis.
Wallichii, Kunth, in Abh. Acad. Berl. (1842) 26-spicata.
Warocquei, *Linden* b[1] *Andri, Illustr. Hortic.* xxii. (1875) 137. t 217.—Ins. Solomon.
Weismanni, *T. Moore, Flor. (f Pom.* (1873) 202.—Hab.?
xiphophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi (1885) 449.—Madag.
yucciformis, Vand. Fast PI. 12-D. Draco.
yuccoides, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 222 = Yucca gnatemalensis.
teelandica, Hort. ex Baker, 1. c. xiv. (1873) 644 = Cordyline rubra.

DRACAENOPSIS, Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. vi. 110 (1850-51) snb t. 569 = Cordyline, Comm. (Liliac.).
australis, Planch. 1. c—C. australis.
calocoma, H. Wendl. in Bot. Zeit. xvii. (1859) 277-C. australis.
indivisa. Planch, in Fl. des Serres, Ser. I. vL (1860-61) 182 - C. indivisa.

DRACO, Crantz, Duab. Dracon. Arb. 13 (1768)-Dracaena, Vand. (Liliac.), &c.
Clusii, Crantz, 1, c. = Dracaena Draco.
Dracunculus, Crantz, I. c. 14—Pterocarpus Draco.
dragonalis, Crantz, 1. c-Dracaena Draco.
Rhaa, Crantz, 1. c. 15.—Madag.
Rotang, Crantz, 1. c 16=Calamus Rotang.
Santalum, Crantz, 1. c. 15 = Pterocarpus sanlalinus?

DRACOCEPHALIUM, Hassk. Cat. Hort Bog. Alt. 132 (1844)=seq.

DRACOCEPHALON, Linn. Syst ed. I (1785)-Draoocephalum, Linn. (Labiat).

DRACOCEPHAIiUM:, Linn. Gen. ed. I. 173 (1737)-*LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1199.
CEPHALOMA, Neck. Elem. i. 814 (1790).
DRACONTOCEPHALIUM, Hassk. Cat. Hort Bog. Alt 132 (1844).
MOLDAVICA, [Tourn.] Linn. Syst ed. I (1785).
RUYSCHIA, Linn. 1. c. (1735).
RirvscHiANA, Boeh. ex Mill. Gard. Diet. ed. VII (1759).
acanthoides, Edgew. ex Benth. in DC. Prod. xii. 401-heterophyllum.
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 862.-Turkestan.
alpinum, Salisb. Prod. 87=D. Ruyschiana.
alpinum, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (185U II. 883.—Sibir. baical.
altaicense, Hort. Vilm. ex Vilm. Fl. PI. Tens, ed. >• 260 = D. Ruyschiana.
altaicense, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. *v-(1770) 566. t. 29. f. 3-grandiflorum.
altaiense, Hiltebr. Dracoc 50. t. 13-imberbe.
altajense, Murr. Syst. ed. XIII. 454=praec.
angustifolium, Uilib. Fl. Lituan. i. 78-D. Rnyschians.
argunense, Fisch. ex Link, Enum. Hort Berol. »•••••" =D. Ruyschiana.
aristatum, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. «• (1844 ?; 225 = Lallemantia iberica.
Aucberi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v, 25.—Persia,
austriacum, *Linn. Sp. PI.* 595.—Europ.; Keg. Caocas-*atureum,* Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 21 = LallemanO* canescens,
balsamicum, Salisb. Prod. 87 -Cedronella triphylla.
bipinnatum, Rupr. Sert. Tiansch. 65 - Rupiechti.
botryoides, Boiss. & Buhse, ex Boiss. Fl. Orient, iv. «* =Ancheri.
botryoides, *Stev. in Mlm. Soc. Nat. Mosc.* Iii- (.» 266.—Reg. Caucas.
canariense, Linn. Sp. Fl. 594 = Cedronella triphyH*-
canescens, Linn. 1. c. 595 - Lallemantia canescens.
chamaedrifolium, *Turct. ex Benth. in DC. Prod-v" 899.—Kamtchat.
chamaedry aides, Balb. Misc. 29-Sphacele camp** lata.
cochinchinense, *Lour. Fl. Cochinch.* 871.—CochuJcB-
cordatum, Nutt. Gen. Am. ii. 35 = Cedronella a*™^'
crenatifolium, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. **»' (1884) 233.—Turkestan.
cuniloides, *Pall. Reise Statth. Russ. Reich,* ii- »*• Tauria.
denticulatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 317 -PnT[1]^ **stegia virginiana.**
Hscdm, Bunge. Vert. Suppl. Fl. Alt. 51.—Sibir- alt**6-
diversifolium, *Rupr. Sert. Tiansch.* 66.—Asia <*?[a''];
erectum, Koyle, ex Benth. in Hook. Bot. Misc. (1888)S80=Nepetaerecta. « vfol-
foetidum, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt ii. 886-D- « davica.
fragile, *Turct. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* *[80>] Dahuiia.
fragrans, Salisb. Prod. 87=D. Moldavica.
fruticulosum, *Steph. ex Willd. Sp. PI.* ill. I*[8]
Govanianum, Benth. in Wall. PL As. Rar. «• Nepeta Govaniana.
grandiflorum, *Linn, Sp. PI.* 595.—Sibir.
grandiflorum, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i»- imberbe.
heterophyllum, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 7S»- Himal.; Turkest.
Hookeri, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brtt. I*»* 666.—Tibet, or.
hyssopifolium. Mart, ex Steud. Norn. ed. 1- Ruyschiana.
ibericum, Bieb. Fl. Taw. Cauc. ii. 54-La[ueln] iberica.
imberbe, *Bunge, Vert. Suppl. Fl. AH-* altaic.
incanum, Salisb. Prod. 87 ^ Lallemantia <»***- *Jfti-inderiense,* Less, ex Kar. & Kir. in Bull. S°* Mosc. xv. (1842) 428 = Lallemantia R°y[1]*fj8ir.-'
integrifolium, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* »• Sibir. altaic.
intermedium, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soft »• »' 187—Physostegia intermedia.
kaschygaricum, *Rupr. Sert. Tiansch.* 65.--[A]*l[en]tr.
kokanicum, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 66.—A»-•*"

DRACOCEPHALUM :—
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* **Ser. I. vii.** 5S.-Persia.
lamiifolium, **Desf. in Ann. Mus. Par. x. (1807) 305 = Lamium striatum.**
lancifolium, Moench< Meth- 410=Physostegia virginiana.
l^1n0nn11. *R*pr. Serf. Tiansch.* 65.—Turkestan.
Vnatum, DC. Prod. xii. 397, sphalm.=pinnatum.
[illegible], **xx. D. & C. Nov. Gen. et Sp. a. 1160 = Cedronella mexicana.**
microphyllum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxiv. (1851) II. 384.—Sibir. baical.**
Moldavica, *Linn-* *•* *Pl-* 595.—Europ.; As. bor.
moldavicum, Cl MoEr_ m BulL Acadl ^'S- i **v. (1837) 391 = prae-**
multicaule i^"'*'" &**"«•»n ^«»- &. JV«*. Se>. II. vi. (183 6) 47,-As. Min.; Persia.
nervosum. Rafin. Fl. Ludov. 43-parviflorum?
nodulosu" • ^ ' - ***• "«•«*• ".-As. centr.
nutans, ^ ' ^ ' ^ ' ^ ' - 596—As. bor.
oblongi.o.m, *egel, Pl. Nov. Fedsch.* 67.-Turkestan.
obovatum, Ell. Sketch, ii. 86=Physostegia virginiana.
^ / ^ Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 4 = Lallemantia peltata.
odoratu tauricr™*"*' Poir" EnCyC- SuppLU" **521=Zizyphora**
origanoides, Ledeb_ Fl_ Alt_ «• 883-discolor.
origanoides, -S***' »* *Willd_ SP-* «•*- I51.-Sibir.
origanoides pinnatum, Tnr<a- ex Benth. in DC. Prod. xii. 898-
palmatum, Panrifl.oru *St*fi^h_ ex Will<*- Sp- PI* M. IBl.-Sibir.
M£* 2 m ™> *Nutt_ Gen_ Am.* ± **85.-Am. bor.**
Um .S p.pl. 596=Lallemantia peltata.
peregrinum, *Linn.* Gfitf. *Pl.* ji. 2O.-Sibir.
pinnatifidum Lam_ Ency=-«- 319-pinnatum.
pinnatum, *Li2n.* *S* *PL* 594.-Sibir.
Royleanum, Benth_ in Wall_ Pl_ As_ *"•*• 65-Lallemantia Roy eana.
Chinl' *"""'' '» 7««"»- *>'• vii. (1869) 166.—**
Ruprech ^Tik V *****• •k ^* ***Hart. Petrop.* vi. (1879) 363.**
E- T- P L **lu es an.**
uyich ha, ann. SA Pl. **595—Enrop.; As. bor.**
Sc£££ tu™ **Salisb. Prod. 87-Lallemantia peltatt.**
I"*0*". Tnrcz. ex Ledeb. FL Ross. iii. 388 =
scrobi atu *Rs>* "<»• *"«*** **67.-Tnrkestan.**
setige S ? *Boiss. & Huet, Diagn.* **Ser. II. iv. 21.—Armenia.**
sibiricum, Linn. Syst. ed_ x- 1104-Nepeta macrantha.
sinense, *S. Moore* '* y0*"*' *Unn_ Soc_* **xvii_(1879) 385.—China.**
speciosum *Wall. Pl. As. R*"• «• **65.-Reg. Himal.**
speciosum, Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 98 = Physostegia virginiana.
spicatum, Dulac, F1- Hautes-Pyr. 399 = D. Ruyschiana.
spinescens, *Wender. **d-Stm. Hort. Mart.* **(1841).-C/. Linnaea, xvi. (1842) 4Ott** H0.-Hab.J
staminenm, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xv. (1842) 423**—Reg- Him«l.i Sibir.
Stellerianum, *ex Benth. in DC. Prod.* **xii. 602. —Sibiria.**
tang *Petersb.* **xxvii.**
TchiJ.- ow-~ **Moogol.**
if fe 5 ''Fi **sch- & Mey. in Ann. Sc. Nat. Wr. IV.**
tern 2 S *Salvia Vaihatcheffii.*
Cedro ffS a
teucrioides, Bun8e> ^ Pers. 59 = Nepeta lasioeepbala.
thymiflorum, *Linn_ SP- Pl-* 596.—Europ.; As. bor.
urticaefolium —Japon.
variegatum, Vent. Jard. = **Physostegia virginiana.**
virginianum, Linn. Sp. PL 594-Physostegia virginiana.

DRACONIA, Heist. Syst. 7 (1748) = Draoaena1> Vall. Liliac.).

DRACONTIUM. Linn. Coroll. Gen. 18 (1737). *AROIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 995.
CHERSY [illegible]UM> SChott, ta oeStrn " ^ ZeitSchr> " (1865) 72.
ECHIDNIUM, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 62.
EUTERELA: Rafin. Fl. Tellur. iv. 12 (1836).

DRACONTIUM.—
GODWINIA. Seem, in Jonrn. Bot. vii. (1869) 813. t. 96,97.
asperum, *C. Koch, in C. Koch & Pint. Wochenschr.* (1859) 259.—Bras.
bissectum, *Veil. Fl. Flum.* ix. 1.118.—Bras.
camtschatcense, Linn. Sp. PL 968 - Lysichiton camtschatcense.
camtschaticum, Spreng. Syst. v. 248-praec.
Carderi, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6523.—N. Granat
cordatum, *Aubl. Pl. Gui.* ii. 836.—Guian.
cordatum, Houtt. Handleid. xi. 200. t. 71. f. 2-Homa. **lomena aromatica.**
dubium, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol.* **(1814) 21.—** Guiana.
elatum, Mart, in Gard. Chron. (1870) 314 -asperum J foecunduro, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6808.—Guiana.
foetidum, Linn. Sp. Pl. 967 = Symplocarpus foetidus.
Gigas, *Engl. in DC. Atonog. Phan.* ii. 281.—Nicarag.
integerrimum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t 119.—Bras.
hexandrum,* Aubl. Pl. Gui. t. 326 - *pentaphyllum.
laciniatum, Veil. Fl. Flum. ix. t 120-Philodendron laciniatum.
lanceaefolium, Jacq. Coll. iv. 118 - Spathiphyllum lanceaefolium.
moluccanum, Zipp. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 250=Epipremnnm moluccanum.
paeoniaefolium, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 88 = Amorphophallus campanulatus.
pentaphyllum, Aubl. Fl. Gui. ii. 837>Anthurinm pentaphyllum.
pertusum, Foist f. Prod. 63 n. 831 = Rhaphidophota pertusa.
pertusum, Linn. Sp. Pl. 968-Monsters pertnsa.
pofyphyllum, A.Cunn. ex A, DC. in DC. Prod. xvi. II. 534 = Bowenia spectabilis.
pdyphyllum, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 38 = —Amorphophallus dubius.
polyphyllum, Forst. f. Pl. Escul. 61. n. 29—Amorphophallus campanulatus.
polyphyllum, Houtt. Handleid. xi. 199= Amorphophallus giganteus.
polyphyllum, *Linn. Sp. Pl.* 967.—Am. austr.
Quebited]SGmt\SyMm(~Quebiteogu ianensis). —Guiana.
repens, Descourt. 71. Antill. vii. t. 499 = Anthurium scandens.
sagittaefolium, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 196 = (Jrospatha Meyeri.
scandens, Aubl. Pl. Gui. il. 886-Anthurinm scandens.
spinosum, Linn. Sp. Pl. 967 "Lasia spinosa.
surinamense, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 283 = polyphyllum.
violaceum, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* **v. (1790)** ed. I. Art. iv. 18 (Quid ?).—Java.
Wallisii, C. Koch, in Ender. Ind. Aroid. 45 = asperum.

DRACONTOCEPHALIUM, Hassk. Cat. Hort. Bog.Alt. 132 (1844) = Draoooephalum, Linn. (Labiat.).

DBACOKTOMEIiON, Blume, Mus. Bot. Lngd.Bat 1. 231. t. 42 (1860). *ANACARDIACEAE*, Benth. Ac Hook. f. i. 427.
COMEURYA, Baill. Adansonia, x. (1872) 829.
costatum, *Blume, 1. c.* 282.—Borneo.
Cumingianum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1877)** 122.—Ins. Philipp.
cuspidatum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **i. 232.—** Borneo.
mangiferum, *Blume, 1. c.* 231.—Java,
pilosnm, *Seem. Fl. Vit.* 52.—Ins. Fiji,
pubemlum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 524.- -Sumatra,
sylvestre, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **i. 231** Borneo.
***ntieose,Engl. in DC. Monog. Phan.* ix. 253.—Ins. Fiji.**

DRACONTOPSIS, Lem. in Orb. Diet. v. 128 (1849) = DRACOPIS, Cass.-Budbeokia, Linn. (Compos.).

DBACOPHYIiLUM; Labill. Voy. ii. 210. t. 40 (1798). *EPARCIDEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 618.
SPHENOTOMA, R. Pr. Prod. 556 (1810).
acerosum, *Berggr. in Minnestr. Fisiog. Sdllis. Lund* (1877) n. VIII. 15.—N. Zel.
affine. Hook. f. Fl. Autarct. 48; Fl. N. Zel. i. 168 = strictum.
amabile, *Brongn. V Gris, in Ann. Sc. Nat.* **Sir. V. ii.** (1864) 157—N. Caled.

SBACOPHTLLtrU :-
attenuatum, A. Cunn. ex Walp. Rep. vi. 485 — Urvilleanum.
capitatum, *R. Br. Prod.* 656.—Austral,
cosmelioides, *Panch. ex Brongn. tf Gris, in Ann. Sc. Nat. Sit. V.* ii. (1861) 156.—N. Caled.
Drnmmondii, *Benth. Fl. Austral*, iv. 263.—Austral.
fili/olium, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 169 - Urvilleanum.
Fitzgeraldi, *F. Muell. Fragm.* vii. 27.—Austral.
gracile, Brongn. *Sc* Gris, in Ann. Sc. Nat *Sir.* V. ii. (1864) 156 = gracile.
gracile, *R. Br. Prod.* 656.—Austral,
involucratum, *Brongn.* b1 *Gris, 1. c.* 157.—N. Caled.
Kirkii, *Berggr. in Joum. Bot.* xviii. (1880) 104.—N. Zel.
latifolinm, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 48. —N. Zel.
Lessonianum, A. Rich. Bot Voy. Astral. **283-** Urvilleanum*.
longifolium, *R. Br. Prod.* 656.—N. Zel.
Lyallii, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 169=longifolium.
Menziesii, *Hook.f. 1. c.* 168.—N. Zel.
Milligani, *Hook. Ic. Pl.* t. 845.—Tasman.
minimum, *F. Muell. Fragm.* i. 89.—Austral.
muscoides, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 183- minimum,
parviflornm, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **iv. 265.** —Austral.
Pearsonii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* **xVii. (1885)** 228.—N. Zel.
phlogiflorum, *F. Muell. Fragm.* vi. 65.—Austral,
prostratum, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* **xiii (1881)** 884.—N. Zel.
ramosum, *Panch. ex Brongn. V Gris, in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. ii. (1864) 168.—N. Caled.
recurvum, *Hook.f. Fl. Antarct.* 50.—N. Zel.
robustum, Hook. f. 1. c. 49 = Urvilleanum.
rosmarinifolium, *R. Br. Prod.* 556.—N. Zel.
scoparium, Hook. f. Fl. Antarct. 46. t. 88-Urvilleanum.
secundum, *R. Br. Prod.* 556.—Austral.
setifolium, Stchegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 23 = Urvilleanum.
squarrosum, *R. Br. Prod.* 556.—Austral,
squarrosum, *Hook.f. Fl. Antarct.* 48.—N. Zel.
strictum, *Hook.f. I. c—K.* Zel.
subulatum, *Hook.f. 1. c.* 60.—N. Zel.
Thiebautii, *Brongn. V Gris, in Ann. Sc. Nat. Sit.* **V.** iti. (1865) 238.—N. Caled.
Traversii, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* **786.—N. Zel.**
uniflorum, Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallks. Lund (1877; n. viii. t. 4-Kirkii.
uniflorum, *Hook.f. 1. c.* 182.—N. Zel.
Urvilleanum, *A. Rich. Bot. Voy. Astrol.* 221.—N. **Zel.**
verticillatnm, *Labill. Voy.* ii. 211. t. 40.—N. Caled.

DRACOPIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxv. 273 (1825) —Budbeokia, Linn. (Compos.).
amplexicaulis, Cass. 1. c.-K. amplexicaulis.

DRACUNCULUS, [Rupp.] Ledeb. Fl. Ross. ii. 566, in syn. (1846)=Axtemi8ia, Linn. (.Compos.).
Marschallianus, Ledeb. 1. c. (cum cit. falsa)-A. campestris.

DRACTJNCTJIiTJS, [Town.] Adans. Fam. ii. 469 (1763); Schott, Melet. i. 17 (1882). *AROIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 969.
ANAKMODIUM, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 368.
canariensis, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 30.—Ins. Canar.
cannefolius, Rafin. Fl. Tellur. iii. 65=Spathiphyllum cannaeforme ?
creticus, Schott, Prod. Aroid. 120 - vulgaris.
crinitus, Schott, Melet. i. 17 - Helicodiceros crinitus.
divaricatus, Rafin. Fl. Tellur. iii. «5-Typhonium divaricatum.
minor, Blume, Rumphia, i. 125 = Helicophyllum crassipes.
muscivot :», Parl.Fl.Ital. ii. 252 = Helicodiceros crinitus.
polyphyllus, Blume, Rumphia, i. 124 - vulgaris.
spadiceus, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (Quid ?).—Hab. ?
trilobatus, Rafin. 1. c. = Typhonium divaricatum.
vulgaris, *Schott, Melet.* i. 17.—Europ. austr.

DBAKAEA, Llndl. Swim River App. 55 (1839\ *ORCHIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 611.
ARTHROCHILUS, F. Muell. Fragm. i. 42 (1858).
SPICULAEA, Iindl. Swan River App. 56 (183a).

DBAXAEA:—
ciliata, *RHchb.f. Britr. Syst. Pfl.* 68.—Austral,
elastica, *Lindl. Swan River App.* 56.—Austral,
glyptodos, *FitMg. in Gard. Chron.* (1882) I. 494.—Austral,
irritabilis, *Reichb.f. Britr. Syst. Pfl.* 68.—Austral.

DRAKAINA, Rafin. FI. Tellur. iv. 17 (1836)-Dracaena, Vaod. (Liliac).
Draco, Rafin. 1. c = Dracaena Draco.
marginata, Rafin. 1. c.=Lomatophylluin borbornicnm.

DRAKEA, Endl. Ench. 114 (1841)=Drakaea, Lindl. (Orchid.).

DRAKENSTEINIA, DC. Prod. ii. 476 (1825) =seq.

DRAKENSTENIA.Neck. Elem.iii. S3 (1790)=EcttBtaphyllum, P. Br. (Legumin.).

DRAPARNALDA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon.viii. 177 (1881)«=seq.

DRAPARNAUDIA, Montr, in M<<m. Acad. Lyon, x. (1860) 205=XanthoBtemon, F. Muell. (Myrtac).
multiflora, Montr. 1. c. 206.—N. Caled.

DBAPERIA, Torn in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 401.
HYDROPHYLLACEAE, Beuth. & Hook. f. ii. 880.
systyla, *Torr. I. c*—Calif.

DHAPETE8, Banks, ex Lam. in Jonrn. Hist. Nat. Par. i. (1792) 188. t. 10. *THYMELAEACEAE*, Berth. & Hook. f. Ui. 196.
DAPHNOBRYON, Meissn. in DC. Prod. xiv. 566 (1857).
KELLERIA, Endl. Gen. PI. Snppl. iv. II. 61 (1847).
Dieffenbachii, *Hook, in Land. Journ. Bot.* ii. (1848) 497.—N. Zel.
ericoides, *Hook.f. in Ie. PI.* t. 895.—Borneo.
Lyallii, *Hooi.fi Ft. N. Zeal.* ii. 836.—N. Zel.
muscoides, Pers. Syn. 1.148 = seq.
muscosus, Hook. f. Fl. N. Zel. 228 = Lyallii.
muacosus, *Lam. in Journ. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 189.—Reg. Magell.
tasmanicus, *Hook. f. in Hook. Kern Journ.* v. (1858) 299. t. 7.—Austral.

DRAPIEZIA, Blume, Enum. PI. Jav. 8 (1827)=Disporum, Salisb. (Liliac).
multiflora, Blume, 1. c.=D. pullnm.

DRAYTONIA, A. Gray, Bot U. St. Expl. Exped. i. 206. 1.15 (1864) = 8aurauja, Willd. (Terastroem.).
rubicunda, A. Gray, 1. c.=S. rubicunda.

DREBBELIA, ZolL & Morr. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 79=8patholobus, Hassk. (Legumin.).
ferruginea, Zoll. *Sc* Morr. 1. c.=S. ferrogineus.

DKEBBEIiIA, Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857)160. *OLACINEAE*\
subarborescens, *Zoll. 1. c.*—Ins. Bali.

DREGEA, Eckl. & Zeyh. Enum. 350 (1887)=Peuoedanum, Toum. (Umbellif.).
capensis, Eckl. & Zeyh. 1. c. 861=P. capense.
collina, Eckl. & Zeyh. 1. c - P . collinmn.
montana, Eckl. & Zeyh. 1. c. = P. Ecklonianum.
virgata, Eckl. & Zeyh. 1. c.-P. capense.

DBEGEA, £. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 199 (1637).
ASCLEPIADEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 775.
PTEROPHORA, Harv. Gen. S. Afr. PI. 223 (1838).
PTERYGOCARPUS, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 78.
WATTAKAKA, Hassk. in Flora, xl. (1857) 99.
arabica, *Decne. in DC. Prod.* viiL 618.—Arab,
floribunda, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 199.—Afr. aostr.
macrantha, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 272.—Afr. trap,
volubilis. *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 46.—Ind. or.

DREJERA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 112.1.17 (1847) = Jaeobinia, Moric. (Acanthac).
boliniensis, Nees, in DC. Prod. xi. 334.—Bolivia.
Greggii, Torr. in Bot. Mez. Bound. 124 = Anisacanthus Greggii.
juncea, Torr. Lc.=Anisacanthus juncea.

DREJERA:—
parviflora, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 462-Dianthera parviflora.
puberula, Torr. in Bot. Mex. Bound. 123-Aniaacanthos virgularis.
ramosa, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 112.—Bras.
Thurberi, Torr. in Bot. Mex. Bound. 124 = Anisacanthus Thnrberi.
virgata, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 154 = Jaeobinia virgata.
Wrightii, Torr. in Bot. Mex. Bound. 128=Anisacanthus Wrightii.
Willdenowiana, Nees, in DC. Prod. xi. 3S4=Jaoobinia Mohiatli.

DREPACHENIA, Rafin. Neogenyt 3 (1825)=Sagttaria, Rupp. (Alismac.).
lancifolia, Rafin. 1. c.=S. lancifolia.

DREPADENIUM, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) - Croton, Linn. (Eupborb.).
dichotomum, Rafin. Sylva Tellar. 66=Bemardia dichotoma.
maritimum, Rafin. Neogenyt. 2 = Croton maritimus.

DREPANANDRUM, Neck. Elem. ii. 118 (1790) = Topobea, Aubl. (Melastom.).

DREPANANTHTJS, Maing. ex Hook. f. Fl. Brit Ind. i. 56 (1872). *ANONACEAE*.
pruniferus, *Maing. 1.* c.—Malacca,
ramuliflorus, *Maing. I. c.*—Malacca.

DREPANIA, Juss. Gen. 169 (1789) = Tolpis, Adans. (Compos.).
ambigua, DC. Cat. Hort. Monsp. 105 = T. altissima.
barbata, Desf. Fl. Atlant. ii. 232=T. barbata.
faleata, Rouss. Fl. Calv. 127 =T. barbata.
pallida, Stead. Norn. ed. II. i. 580 = T. barbata.
utnbellata, DC. Cat. Hort. Monsp. 105 = T. umbellata.

DBEPANOOABPtrS, G. F. W. Mey. Prim. FL Esseq. 236 (1818). *LEGVMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 546.
NEPHROSIS, Rich, ex DC. Prod. ii. 420 (1825).
ORUCARIA, JUSS. ex DC. 1. c. (1825).
SOHUERFELUTIA, Schum. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 331 (1828).
africanus, G. *Don, Gen. Syst.* ii. 378.—Afr. trop.
aristulatns, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. *Suppl.* (1860) 69.—Bras.
Crista-castrensis, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838)96.—Bras.
Cumingii, Knrz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 282=Dalbergia Cumingiana.
cyathiformis, *DC. Prod.* ii. 420.—Mexic.
discolor, Benth. in Mart Fl. Bras. xv. 1.227=Dalbergia inundata.
dubius, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 390.—Venezuela,
falcatus, *Miq. in Linnaea*, xviii. (1844) 576.—Guiana,
ferox, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 96.—Bras.
floridus, *Mart, in Flora*, xx. (1837) II. *Beibl.* 118.—Bras,
frondosus, *Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838)96.—Bras.
inundatus. Mart, ex Benth-. 1. c. = Dalbergia inundata.
isadelphus, E. Mey. in Nov. Act. Nat. Cor. xii. (1825) 807 = Machaerium angustifolinm.
lunatus, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 238.—Am. austr.
microphyllus, *E. Mey. in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1825) 808.—Panama,
microphyllus, *Wawra, in Flora*, xlvii. (1864) 241.—Bras.
monospermus, Kurz, in Jonm. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 281 •= Dalbergia monosperma.
mncronulatus, *Benth. ex Hemsl. Diag. PI. Nov.* 8.—Mexic.
paniculatus, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 378.—Ins. S. Doming.
polyphyllus, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 96 = Machaerium aculeatum.
reniformis, Kurz, in Pegu Rep. App. A 49 & B 45 = Dalbergia reniformis.
Schomburgkii, *Klotasch, in Schomb. Faun, et Fl. Gut.* 1205, nomen.—Guiana.
senegalensis, T. Nees *Sc* Ebenn. Handb. Med. Pharm. Bot. iii. 184 = Pterocarpus erinaceus.
spinosus, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 281 = Dalbergia spinosa.

DREPANOLOBUS, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. S24 (1840) = Hosaokla, Dougl. (Legumin.).
crassifolius, Nutt ex Torr. & Gray, 1. c. 326 - H. crassifolia.
cytisoides, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, 1. c. 324=H. cytisoides.
decumbens, Nutt ex Torr. & Gray, 1. c. - H. decumbens.
junceus, Nutt. ex Torr. & Gray, 1. c. 325 •» H. juncea.
lanatus, Nutt ex Torr. *Si* Gray, 1. c. 324 - H . tonientosa.
micranthus, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, L c. - micron tha.
prosiratus, Nutt. ex Torr. & Gray, 1. c 325 - H. prostrata.
rubescens, Nutt ex Torr. *Sc* Gray, 1. c. 324 *= cytisoides.
scoparius, Nutt. ex Torr. & Gray, 1. c. 325=H. glabra-

DREPANOPHYLLUM, Wibel, Prim. PI. Werth. «6 (1799)=Palcarla, Host (Umbellit).
agreste, Hoffm. Umbellif. i. 109-F. Rivini.
luteum, Eichw. Skizze, 257 = Muretia tanaicensis.
palustre, Hoffm, Umbellif. 110 = Sium latifolium.
sioides, Wibel, Prim. Fl. Werth. 196 = F. Rivini.

DREPANOSPERMUM, Benth. in Benth. & Hook. f. G*-i. 425 (1862) = Campnospenna, Thw. (Anacard-).
gummiferum, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. n. 393 C. gummifera.

DREPAPHYLA, Rafin. Sylva Tellur. 120 (1838) - Acacia, Willd. (Legumin.).
lanigera, Rafin. 1. c. = A. lanigera.
multinervis, Rafin. 1. c. = A. lanigera.

DREPILIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 62 (1836) =TW»-mopsla, R. Br. (Legumin.).
rhombifolia, Rafin. 1. c. 53=T. rhombifolia.

DKIES8ENIA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 251. 63 (18441). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hoo«-f. i. 783.
axantha, *Korth. I. c.*—Borneo.
bulbosa, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1873.—Malacca.

DBIMIA, Jacq. Ic. Rar. t. 873-377 (1786). *LILIACEAE*, Benth. 3c Hook. f. iii. 808.
IDOTHEA, Knnth, Enum. PI. iv. 341 (1843).
IDOTHEARIA, Presl, Bot. Bemerk. 114 (1844).
STREPSIPHYLA, Rafin. Fl Tellur. iii. 60 (1886):
acuminata, Lodd. Bot. Cab. t. 1041 = Scilla lanceaefolia.
altissima, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5622.—Afr. austr.
altissima, [Ker-Gawl. in] Bot. Mag. t. 1074=Urg»» altissima.
angustifolia, Kunth, Enum. PL iv. 340-Scilla Ho*
apertiflora, Baker, in Saund. Refug. Bot. 1.19 = Scilla lorata.
Barteri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) ** Aft. trop.
bifolia, SchweinE Beitr. Fl. Aethiop. 294 - Scilla Richardiana.
Burchelli, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* ii. *App*- 2.— austr.
ciliaris, *Jacq. Coll. Suppl.* 41.—Afr. austr.
concolor, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) * —Afr. austr.
Cooperi, Baker, in Saund. Refug. Bot t. 1B - Scilla concolor.
Cowanii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 83* Madag.
Dregeana, Kunth, Enum. PI. iv. 840 = Scilla concoEckloniana, *Schult.f. Syst.* vii. 1710.—Afr. austr.
elata, *Jacq. Coll. Suppl.* 38.—Afr. austr.
ensifolia, Eckl. in Linnaea, xx. (1847) 235 = Scilla Ludwigii.
Gawleri, Schrad. Blumenb. 80=Scilla revoluta.
haworthioides, *Baker, in Gard. Chron.* (1876) I. —Afr. austr.
humilis. Berg, ex Eckl. Top. Vert 2-Ecklonian
hyacinthoides, *Baker, in Joum. Bot.* xii. (187V Afr. austr.
lanceaefolia, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t Scilla lanceaefolia.
lanceaefolia, Lodd. Bot Cab. t. 278=Scilla refoiw*
lanceolata, Schrad. Blumenb. 28=Scilla lweeolaol.
laxiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (187W —Afr. trop.

DRIM1A:—
Ulaeina, Schwemf. Beitr. Fl. Aetbiop. 294= Scilla lilacira.
lo"gipedunculata, G. Don, in Loud. Hoit. Brit. Suppl. 1. 687-Scilla Ianceaefolia.
Ludwigii, Miq. in Bull. Sc. Phys. Need. (1889) 89 = Swalla Ludwigii.
*media, J*acq. *Coll. Suppl.* 40.—Afr. austr.
malfolia, Schrad. Blnmenb. 30-Scilla revoluta.
pendula, Bnrch. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiii. (1873) 254=Scilla pendu'la.
Petiolata, *C. Koch &• Bouche, Ind. Sem. Hurt. Berol.* (1861) *App.* S.-Hab.J
Pnrpurascens. *Jacq.f. Eclog.* t. 80.—Afr. austr.
pnsilla, *Jacq. Coll. Suppl.* 42.—Afr. austr.
'*>oluta, Kunth, Ennm. PI. iv. 841=Scilla revoluta.
"Pdifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 420. —Afr. anstr.
'olausta, *Baker, in Sound. Refiig. Bot.* t 190.—Afr.
"nfulata, Jacq. Coll. Snppl. 41 = Scilla nndulata.
'Hlosa, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1&46.—Afr. austr.
v"idiflora, Eckl. Top. Verz. 2=Scilla viridiflora.

DRIMIOPSIS, Lindl. & Paxt Flow. Gard. ii. (1851-52) 73. f. 172. *LIUACEAE.Bentb.* & Hook. f. iii. 813.
*B*arteri, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* iii. *App.* 18.— Aft. trop.
•XJtryoides, *Baker, in Journ. Bot.* iii. (1874) 864.— Afr. trop.
Burkei, *Baktr*>»» *Sound. Refug. Bot.* iii. *App.* 17 •— Afr.austr.
A-irkh, *Baker, in Gard. Chron.* (1874) II. 644—Afr. trop.
•aculata, *Lindl. (f Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) —Afr. austr.
minor, *Baker, in Sound. Refug Bot.* 1192—Afr. trop.
Perfr., rtonata, *Baker, in Gard. Chron.* (1878) II. 864. —Afr. trop.

DRiJJOPHYLLUM, Nutt. N. Am. Sylv. i. 85 (1842)— OmbeUularia, Nutt. (Laurin.>
*r**nflorum,* Nutt. 1. c. = U. californica.

DRIMOPOGON_ Rafin_ s y w» TeUur_ **151 (1838) = Spiraea,** Linn. (Rosac).
Douglasii, Rafin. 1. c. = S. Douglasii.
ferruginea, Rafin. 1. c.=S. tomentos*
glomerata, Rafin. 1. c.=S. tomentosa.
Mens??,Ir1 Rafin,I c_=s- Douglasii.
parvi^'' Rafia_ L C--S- tomentosa.
rosea, Rafin. l.c.=S. tomentosa.
tomentosa, Rafin. 1. c.-S. tomentosa.

DRIMYCARPUS, Hook. f. in Benth. & Hook f. Gen. i. 42 (1862)" *ACARDIACEAE,* Benth. « Hook. f. 1.4.
ocus, Hook. *11.* c.-Reg. Himal.

DRIMYPHYLLUM, Bnrobelt·DC Prod·v. goi (1886) =Petrobium, R. Br. (Compos.).
"ntanum, Burch. ex DC. 1. c. 502 = P. arborenm.

D^fS-8, Forst. Char. Gen. 88. t. 42 (1776). *MAGNOLIACEAE,* Endl. & Hook. f. i. 17.
MAGALLANA, Comm. ex DC. Syst. i. 448 (1818).
MAGELLANU, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 830 (1786).
ASMANNIA> R. Br. in DC. Syst. i. 175 (1818).
W[f 5?]lA M" ^ dr,XIV,, 5W (1784),, C
sng, Wutolia, *Mien, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Set. III. "-(1858)46.-Bras.
aro Sf fiez.>»rt.Fl. MeU Antill. i. 188 = Winteri.
aro ica/. *Muell. Viet. PI.* i. 2O.-Australl.
axillaris, Balansae, Ba'". ^«»«»«». x- (18U-72) 885.-N. Caled.
brasiliensis, Mier»,in Ann. & Mag. Nat Hi.t Ser. III. ii. (1858) *7-Winter!.
chilensis, ?C- Sy*- i- 444=Winteri.
colo conf£?'Jaoul> Cho<* *PI- N. Zel.* 24.—N. Zel.
Winter.? PhiL in ^^ ^^ °V_ (1866) 841,,
crass s, *Baill. Adansonia,* vUL (1867-68) 199.-N. dl Petala, /?. *Muell. Pt. Vict.* L 21.-AustiaL

SBIKY8:—
fernandenana, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 408 - Winteri.
granatensis, Linn. f. Suppl. 269 = Winteri.
hatamensis, *Becc. Malesia,* i. (1877) 185.—N. Guinea.
Howeana, *F. Muell. Fragm.* vii. 17.—Ins. D. Howe.
lanceolata, Baill. Hist. PI. i. 159 = aromatica.
ledifolia, Herb, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1.136 =Winteri.
magnoliaefolia, Kunth, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1.135=Winteri.
membranea, *F. Muell. Fragm.* v. 175.—Austral.
mexicana, Moç. & Sesse, ex DC. Syst. i. 444 = Winteri.
montana, Miers, in Ana. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ii. (1868) 44=Winters.
paniculata, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 408=Winteri.
Pancheri, *Baill. Adansonia,* x. (1871-72) 386.—N. Caled.
piperita, *Hook.f. 1c. PI.* t. 896.—Borneo.
punctata, Lam. Encyc. ii. 330 « Winteri.
retorta, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. ii. (1858) 45 = Winteri.
uniflora, *Turns- in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 280.—Venezuela.
Winteri, *Forst. Char. Gen.* 84. t. 42.—Am. austr.

DRIMYSPERMUM, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 15 = **Phaleria,** Jack (Thymel.).
acuminatum, Seem. Fl. Vit. 209.—Ins. Fiji.
a-mbiguum, Meissn. in DC. Prod. xiv. 606.—Java.
Billardieri, Deqne. Bot Voy. Venus, 16.—Ins. Amicor.
Btumei, Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xix. (1843) 39 = P. Blumei.
Burmanni, Decne. 1. c. 40.—Ind. or.
Burnettianum, Seem. Fl. Vit. 208.—Ins. Fiji.
cauliflorum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 251 = P. cauliflora.
Clerodendron, F. Muell. Fragm. vii. 1 = P. Clerodendron.
Cumingianutn, Decne. Bot. Voy. Venus, 17 = seq. t
Cumingii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 605=P. Cumingii.
Forsteri, Meissn. 1. c.—Ins. Tongatabu.
lanceolatum, A. Gray, in Journ. Bot. iii. (1865) 304. —Ins. Fiji.
laurifolium, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir. II. xix. (1843) 89=P. laurifolia.
laurifolium. Zoll. Verz. ii. *1=ambiguum.*
longifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 886 = *ambiguum* I
macrqearpwn, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. (187.6) 46. —N. Guin.
macrophyllum, Decne. Bot. Voy. Venus, 15.—N. Hibern.
montanum, Seem. Fl. Vit. 209. t. 64.—Ins. Fiji.
Neumanni, F. Muell. Fragm. v. 26=P. Neumanni.
Pemttetianum, Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xix. (1843) 40 = P. Perrottetiana.
Phaleria, Meissn. in DC. Prod. xiv. 604 = P. capitata.
pubiflorum, Seem. Fl. Vit. 208.—Ins. Fiji.
revolutum, Teijam. & Binn. in Tijdschr. NederL Ind. xxvii. (1864) 80.—N. Guinea.
subcordatum, Seem. Fl. Vit. 209.—Ins. Fiji.
urens, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 15.—Ins. Celebes.

DRIPAX, Noronhat ex Thou. Hist. Veg. Afr. ii. 68 (1807) =**Alsodeia,** Thou. (Violar.).
lonchitifolia, Noronha, ex Thou. 1. c.-A. angnstifblla.

DROBROWSKIA, Brongn. Enum. Gen. 81 (1843) = **DOBROWSKYA, PresU Lobelia,** Linn.

DROGOUETIA, Steud. Norn. ed. II. i. 531 (1840)=seq.

DBOGtrfcTIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 505 (1826). *URTICACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 394.
DIDYMOGYNE, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Ser.. IV. i. (1864) 207.
ambigua,H'«tf.r» *Ann.Sc.Nat.Sit.lV.l* (1854) 211. —Afr. austr.
cuneata, Buck, Ind. Gen. DC. Prod. iv. 122 = ambigua.
diffusa, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. i. (1854) 211. —Ind. or.; Afr. trop.
elliptica, Gaudich. in Freyc Voy. Bot. 505; et Bot. Voy. Bonite, t. 86 = ovata.
leptostachys, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 236"=ovata.
ovata, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 506.—Ins. Mascar.
paudflora, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 235" -diffusa.
Thouarsiana, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* t. 37.—Ins. Mascar.

DROO-TJETIA:—
urticaefolia, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 285» - ambigua.
urticoides, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Se"r. IV. i. (1854) 311.—Ind. or.

DROMOPHYLLA, Lindl. Veg. Kingd. 816 (1847) = **DERMOPHYLLA, Manso = Cayaponla,** Manso (Cucurb.).

DROSANTHE, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. II. v (1836) 856 = **Hyperioum,** Tourn.
fimbriata, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 378 =»H. assyriaenm.
helianthemoides, Spach, 1. c. 379 = H. helianthemoides.
hiriella, Spach, 1. c. 877 = H. hirtellum.
hyssopifolia, Spach, 1. c. 880 = H. scabrum.
ledifolia, Spach, 1. c. 378 - H. nudiflorum.
scabra, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 366; et 1. c. 381 = H. scabrum.

DROSANTHUS, R. Br. ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848). 305=**Byblis,** Salisb. (Droserac.).

DBO8EBA, Linn. Syst. ed. I (1785). *DROSERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 662.
ADENOPA, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 37 (1836)
DISMOPIIYLA, Rafin. 1. c. 36 (1886).
ESERA, Neck. Elem.ii. 160 (1790).
FILICIRNA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 87 (1836).
RoREijji, Hall, ex All. Fl. Pedem. ii. 88 (1786).
ROSSOLIS, Adans. Fam. ii. 245 (1768).
SONDERA, Lehm. Pugill. viii. 44 (1844).
acaulis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 67.—Afr. austr.
Adelae, *F. Muell. Fragm.* iv. 154.—Austral.
adscendens, Planch, in Ann. Sc Nat. Sér. III. ix. (1848) 195=ascendens.
affinis, *Welw. ex Oliver, Ft. Trop. Afr.* ii. 402.—Afr. trop.
albiflora. Banks, ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1842) 192 = paudflora.
Aldrovanda, *F. Muell. Fragm.* x. 79.—Austral.
americana, Willd. Enum. Hort. Berol. 840=longifolia.
anglica, DC. Prod. i. 818'longifolia.
anglica, *Huds. Fl. Angl.* ed. II. i. 185.—Europ.; Am. bor.
angustifolia, *F. Muell. in Trans. PhiL Soc. Viet. i.* (1856) 7.—Austral.
Arcturi, *hook, in Journ. Bot. i.* (1884) 247.—Austral.; N. Zel.
ascendens, *St. Hit. PI. Rem. Bres.* 268.—Bras,
auriculata, SacAA. *ex Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér.-III. ix. (1848) 295.—Austral.; N. Zel.
Banksii, *R. Br. ex DC. Prod.* i. 319.—Austral.
barbigera, Planch, in Ann. Sc Nat. Sér. III. ix. (1848) 287 •= Drummondii.
biflora, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. vi. 763-pusilla.
Billardiera, Tratt. ex Steud. Nom. ed. II. i. 631-binata.
binata, *Labill. Nov. /foil. PI.* i. 78.1.106.—Austral.; N. Zel.
brasiliensis, Mart, .ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 396-graminifolia.
brevifolia, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 211.—Am. bor.
bulbosa, *Hook. Ic. PI.* t. 375.—Austral.
Burkeana, *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ix. (1848) 192.—Afr. austr.
Burmanni, DC. Prod. i. 318=Loureirii.
Burmanni, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 60.—As. et Austral. trop.
calycina, *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ix. (1848) 299.—Austral.
capensis, *Linn. Sp. PI.* 282.—Afr. austr.
capillaris, *Pair. Encyc.* vi. 299.—Am. bor.
cistifolia, *Linn. PI. Rar. Afr.* 9 ; *Amoen. Acad.* vi. 85. —Afr. austr.
communis, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 267.—Bras,
cuneifclia, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 67.—Afr. austr.
Cunninghamii, Walp. Rep. i. 229=binata.
curvipes, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ix. (1848) . 196.—Afr. austr.
dentata, Benth. in Hook. Journ. Bot iv. (1842) 105 = sessilifolia.
dichotoma. Banks *Sc* Soland. ex Sm. in Rees, Cycl. xii. -binata.
dichrosepala, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 848.—Austral.
Dietrichiana, *Reichb.f. Beitr. Syst. Pfl.* 73.—Aurtral.

DROSERA:—
Drummondtt, *Lehm. PI. Preiss.* ii. 235.—Austral.
Drummondii, Planch, in Ann. Sc. Nat Sér. IIL ix. (1848) 298-penicillaris.
erythrorhiza, *Lindl. Swan River App.* 20. n. 91.—Austral.
filicaulis, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 6.—Austral,
filiformis, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1608) 86O.-Am. bor.
filipes, *Turc: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 344.—Austral.
Finlaysoniana, Wall. Catn. 3752-indica.
flabellata, *Benth. Fl. Austral,* ii. 464.—Austral,
flexicaulis, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. A/r.* ii. 403.—Afr. trop.
/oliosa, Ell. Sketch, i. 876=intermedia.
foliosa, Hook. £ ex Planch, in Ann. Sc Nat Sér. III. ix. (1848) 292-peltate.
fulva, Planch. 1. c. 289 = petiolaris.
gigantea, *Lindl. Swan River App.* 20. n. 86.—Austral,
glanduligera, *Lehm. Pugill.* viii. 37.—Austral.
gracilis, Hook. £ ex Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 297 = peltate,
graminifolia, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 269. t. 25.—Bras,
grandiflora, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1843) 620.—Afr. austr.
Helianthemum, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ix. (1848) 203.—Afr. austr.
heterophylla,£«>utf.5wa» *River App.* 20. n. 80.—Austral.
hexagynia, Blanco, Fl. Filip. ed. IL 159=indica.
hilaris, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,i.* (1826) 548.—Afr. austr.
hirtella, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 262.—Bras.
Huegelii, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 6.—Austral,
humilis, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ix. (1848) 300.—Austral.
incisa, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 102.—Cuba,
indica, *Linn. Sp. PI.* 282.—Geront. trop.
intermedia, R. Cunn. in Ann. Nat Hist. iv. (1840) 210=binate.
intermedia, *Hayne, in Schrad. Journ. Bot.* (1800) I. 87 ; *Drev.* CT *Hayne, PI. Eur.* iii. 43. t 75.—Europ.
intermedia, Herb. Royle, ex Hook. £ Fl. Brit Ind. ii. 425-peltate.
intermedia, Wight & Am. Prod. 34— anglica.
intricata, Planch, in Ann. Sc. Nat Sér. III. ix. (1848) 293-Menziesii.
leionema, *Rafin. Fl. Tellur.* iii. 37.—Hab. ?
leucoblasta, *Benth. Fl. Austral,* ii. 488.—Austral,
linearis, *Goldie, in Edinb. Phil. Journ.* (1822) 325.—Am. bor.
Lobbiana, Turez. in BulL Soc Nat Most xxvii. (1854) II. 343-peltate.
longi/olia, Drev. & Hayne, PI. Eur. iii. 42. t 75 = anglica.
longifolia, *Linn. Sp. PI.* 282.—Europ.; Am. bor.
longi/olia, Sm. Fl. Brit i. 847 = intermedia.
Loureirii, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 167.—China.
lunata, Bnch.-Ham. ex DC. Prod. i. 319-peltata.
lusitanica, Linn. Sp. PI. 282—Drosophyllum lusitanicum.
macrantha, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 6.—Austral,
macrophylla, *Lindl. Swan River App.* 20. n. 91.—Austral.
madagasear iensis, DC. Prod. i. 318 - ramentacea.
maritima, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 264. t. 25.—Bras.
Mendesii, *R. Br. ex DC. Prod.* i. 319.—Austral.
micrantha, Lehm. Pugill. viii. 89 =paleacea.
microphylla, Endl. in Enum. PL Hueg. 6 - filicaulis.
minor, Schum, & Thonn. Beskr. Guin. PI. 167-indica.
minor, Wood, Class-book, 251 - capillaris.
minutiflora. Planch, in Ann. Sc Nat Sér. III. ix. (1848) 286-paleacea.
montana, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 260.—Bras,
myriantha, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ix. (1848) 291.—Austral.
Neesii, *Lehm. Pugill.* viii 42.—Austral,
nitidula, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ix. (1848) 285.—Austral.
obovata, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 502 - longifolia.
paleacea, *DC. Prod. I* 318.—Austral,
pallida, *Lindl. Swan River App.* 20. n. 81.—Austral,
parvifolia, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 263.—Bras,
parvula, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ix. (1848) 287.—Austral.
patelli/era. Planch. L c. 209 = glanduligera?
paucidora, *Banks, ex DC. Prod.* i. 817.—Afr. austr.

DROSERA:—
pedata, Pens. Syn. i. 337-binate.
pelUta, *Sm. ex Willd. Sp. PI.* i. 1546.—Austral.
peltata, Wight *8c* Am. Prod. i. 84=lunaU.
pendulifiora, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 301 =ramulosa.
penicillaris, *Benth. Fl. Austral,* ii. 467.—Austral,
petiolaris, *R. Br. ex DC. Prod.* i. 318.—Austral.
petiolaris, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 14=peltata.
Planchoni, Hook. f. Fl. Tasm. i. 29 - Menziesii.
platypoda, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 343.—Austral,
platystigma, *Lehm. Pugill.* viii. 87.—Austral.
porrecta, Lehm. 1. c 41 = stolonifera.
Preissii, *Lehm. I. c.* 45.—Austral.
primulacea, Schlotthaub. in Bonplandia, iv. (1856) 110—erythrorhiza.
propinqua, R. Cunn. in Ann. Nat. Hist. iv. (1840) 109 — spathulata.
pulchella, *Lehm. Pugill.* viii. 88.—Austral.
purpurascens, Schlotthaub. in Bonplandia, iv. (1856; 111-stolonifera,
pusilla, R. Br. ex DC. Prod. L 317 -pygmaea.
pusilla, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 390. t. 490. f. 1.—Venezuela.
pygmaea, *DC. Prod.* i. 817.—Austral.; N. ZeL
pygmaea, Lehm. in PI. Preiss. i. 250 = paleacea.
ramellosa, *Lehm. Pugill.* viii. 40.—Austral,
ramentacea, *Burch. ex Harv.* &" *Sond. Fl. Cap.* i. 77.—Afr. austr.
Roraimae, *Klotmsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1090, nomen.—Guiana.
Roridula, Thunb. Diss. Drosera, 7 = Roridula dentate.
rosulata, Behr. in Linnaea, xx. (1847) 628=Whittakerii.
rosulata, *Lehm. Pugill.* viii. 86.—Austral,
rotundifolia, *Linn. Sp. P'.* 282.—Reg. bor.
rotundifblia, Lour. Fl. Cochinch. i. 238"Loureirii.
(corpioides, *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ix. (1848) 288.—Austral.
septentrionalis, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 189 = rotnndifolia.
serpens, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 204 = indica.
sessilifiora,O. Don, Gen. Syst. i. 844,sphalm.=sessilifolia.
sessilifiora, Rafin. in AtL Joum. 148 = Dionaea muscipula?
sessilifolia, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 269. t. 25.—Bras,
spathulata, *Labill. Nov. Hall. PI. i.* 79. t 106. £ 1.—Austral.; N. Zel.
speciosa, *Presl, Bot. Bemerk.* 14.—Afr. austr.
spiralis, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 270.—Bras,
squamosa, *Benth. Fl. Austral,* ii. 468.—Austral,
stenopetala, *Hook./. Fl. N. Zel.* 19. t. 9.—N. Zel.
stolonifera, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 5.—Austral.
subhirtella, Planch, is Ann. Sc. Nat. Ser. III. ix. (1848) 292-macrantha.
sulphurea, Lehm. Pugill. viii. 43-Neesii.
tenella, *H. B.* b[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 891.—N. Granat.
tenui/olia, Willd. Enum. Hort. Berol. 340 = filiformis.
tomentosa, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 261.—Bras.
trincroia, Spreng. NeueEnldeck. i. 298-paudflora.
umbellate, *Lour. Fl. Cochinch.* 186.—China.
uniflora, Rafin. Atl. Joum. 148=Dionaea nrascipula.
uniflora, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 340.—Reg. Magellan.
verticUlata, Linn. Epist ed. Van Hall, 76-Roridula dentata.
villosa, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* 267.—Bras,
violacea, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 340.—Afr. austr.
Whittakerii, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. HI. ix. (1848) 302.—Austral,
zonaria, *Planck. I. c.* 80S.—Austral.

DROSOCARPIUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 353 = Hyperioum, Tourn.
fimbriatum, Fourr. 1. c. = H. Richeri

DROSODENDRON, M. Roem. Syn. Hesper. 140 (1846) =Baeckia, Linn. (Myrtac).
Rosmarinus, M. Roem. L c — B. cochinchinensis.

DROSOPHORUS, R. Br. ex Planch. In Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 306 = Byblia, Salisb. (Droserac).
caerulea, R. Br. ex Planch. 1. c - B. Uniflora.

DROBOPHYIiLUM, Link, in Schrad. Neues Journ. i. (1806) II. 63. *DROSERACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 663.
SPERGULUS, < Brot' ex Steud. Norn. ed. IL ii. 618 (1841).
lusitanicum, *Link, I. c.*—Lusitan.; Marocc

DROSSERA, Gled. in Mém. Acad. BerL v. (1749) 126 = Drosora, linn.

DROUGUETIA, EndL Gen. Suppl. iv. 37 (1847)° Droguetia, Gaudich. (Urtic).

DROZIA, Cass. in Diet. Sc Nat xxxiv. 217 (1825)= Perezia, Lag. (Compos.).
dicephala, Cass. 1. c. 218 = P. dicephala.
macrocephala, Steud. Norn. ed. II. i. 531=P. pinnatifida.
monocephala, Cass. in Diet. Sc Nat. xxxiv. (1825)218 - P. pinnatifida.

DRUDEA, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 26. *CARYOPHYLLEAE.*
lycopodioides, *Griseb. I. c.*—Peruv.

DRUMMONDIA, DC. Prod. iv. 49 (1830) = MiteUa, Linn. (Saxifrag.).
mitelloides, DC. L c. 50=M. pentandra.

DRUMMONDITA, Harv. in Hook. Kew Joum. vii. (1855) 53. *RUTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. *L* i. 294.
ericoides, *Harv. 1. c.*—Austral.

DRUPARIA, [Clairv.] Man. Herb. 159 (1811) = Prunua, Toum. (Rosac).
Amygdalus, [Clairv.] L c. 160-P. Amygdalus.
Avium, [Clairv.] 1. c 159 = P. Avium.
Cerasus, [Clairv.] 1. c = P. Census.
insititia, [Clairv.l 1. c. 160-P. insititia.
Mahaleb, [Clairv.] L c 159-P. Mahaleb.
Padus, [Clairv.] 1. c = P. Padus.
Prunus, [Clairv.l 1. c. = P. domestica.
spinosa, [Clairv.] 1. c. = P. spinosa.

DRUPARIA, Manso, Enum. 35 (1836) - Cayaponla, Manso (Cncurb.).
racemosa, Manso, 1. c.—Bras.

DRTJPATRIS, Lour. Fl. Cochinch. 314 (1790). *GEN. DUB.—Cl* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 668.
cochinchinensis, *Lour. 1. c.*—Cochinch.

DRUPIFERA, Rafin. Sylva Tellur. 140 (1838) - Camellia, Linn. (Terastroem.).
oleosa, Rafin. 1. c. = C. drupifera.

DRUPINA, linn. PI. Sunn. 11 (1775) ; Amoen. Acad. viii. 259 (1785) - Curanga, Juss. (Scrophular.).
cristata, Linn. 11. cc. *{=Picria surinamensis).*—Guiana.

DRUSA, DC. in Ann. Mus. Par. x. (1807) 466. t. 88 - Bowlesia, Ruiz & Pav. (Umbellif.).
oppositi/olia, DC. 1. c = B. oppositifolia.

DRY AD AEA, linn. Syst. ed. I (1735) - Diyas, Linn. (Rosac).

DRYADANTHE, Endl. Gen. 1242 (1840)-Potentilla, Linn. (Rosac).
Bungeana, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc Nat. Mosc xv. (1842) 849 = P. tetrandra.
pusilla, Walp. Rep. ii. 37=P. tetrandra.

DRYANDRA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 211. t 3. *PROTEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ «'• 185.
JOSEPHIA, Salisb. in Knight, Prot. 110 (1809).
HEMICLIDIA, R. Br. Prod. Suppl. (Prot Nov.) i. 40 (1830).
Arctotidis, *R. Br. Prot. Nov.* 39.—Austral,
armata, *R. Br. in Trans. Linn. Sfc.* x. (1810) 213.—Austral.
Baxteri, *R. Br. Prot. Nov.* 38.—Austral,
bipinnatifida, *R. Br. I. c.* 39.—Anstral.
blechni/olia, R. Br. in Trans. Linn. Soc x. (1810) 2» -pteridifolia.

DBYATTDBA :—
Brownii, Meiun, in Lehm. PI. Preiss. i. 595=nivea.
calophylla, *R. Br. Prot. Nov.* 40.—AnstraL
carduacea, *Lindl. Swan River App.* 33.—Austral,
carlinoides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 267.— Austral.
cirsioides, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 476.—Anstral.
comosa, *Mrissn. I. c.* 478.—Austral,
concinna, *R. Br. Prot. Nov.* 88.—Austral,
conferta, *Bentk. Ft. Austral*, v. 678.—Austral.
cryptocephala, Meissn. in Lehn> PI. Preisl. i. 596- seneciifolia.
cuneata, *R. Br. in Trans. Linn. See.* x. (1810) 212.— Austral.
Drummondii, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 267 = calophylla.
elegans, Meissn. in DC. Prod. xiv. 47S = tenuifolia.
falcata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 213.— Austral.
favosa, Lindl. Swan River App. 33-armata.
ferruginea, Kipp. ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. (1655) 123-proteoides.
floribunda, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 212. —Austral.
foliolata, *R. Br. Prot. Nov.* 38.—Anstral.
foliolata, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 266 - Kippistiana.
formosa, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 218. t. 3.—Austral.
Frasen, *R. Br. Prot. Nov.* 89.—Austral.
Hewnrdiana, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 477.—Austral,
horrida, *Meissn. I. c.* 476.—Austral.
Kippistiana, *Meissn. I. e.* 473.—Austral.
LindleyanaMeissa. in Lehm. PI. Preiss. i. 698= nivea.
longifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 215. —Austral.
mucronulata, *R. Br. 1. c.* 213.—Austral.
multiserialis, F. Muell. Fragm. v. 185 = obtnsa.
mutica, Meissn. in DC. Prod. xiv. 475 - foliolata.
nana, *Mrissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1856) 121.— Austral.
nenosa, K. Br. in Sweet, Fl. Austral, t. 22-pteridifolia.
nivea, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 214.— Austral.
nobilis, *Lindl. Swan River App.* 33.—Austral,
obtusa, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 214.— Austral.
patens, *Benth. Fl. Austral*, v. 578.—Austral,
plumosa, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 214.— Austral.
polycephala, *Benth. Ft. Austral*, v. 570.—Austral,
praemorsa, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 265.— Austral.
Preissii, *Meissn. I. c.* 599.—Austral,
proteoides, *Lindl. Swan River App.* 33.—Austral,
pteridifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 215. —Austral.
pulchella, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 478.—Austral,
quercifolia, *Mrissn. 1. c.* **467.—**Austral,
nincioata, *Mrissn. I. c.* 469.—Austral,
sderaphylla, *Mrissn. in Hoot. Kew Journ.* vii. (1855) 128.—Austral.
seneciifolia, *R. -Br. Prot. Nov.* 39.—Austral.
Serra, *R. Br. 1. c.* 38.—Austral,
urratuloides, *Mrissn. in Hook. Ken Journ.* vii. (1855) 123.—Anstral.
Shuttelwonhiana, *Meissn. I. e.* 122.—Austral,
tpeciosa, *Mrissn. in DC. Prod.* xiv. 479.—Austral,
squarrosa, *R. Br. Prot. Nov.* 38.—Austral.
squarrosa, Meissn. in Lehm. PL Preiss. ii. 266 •= polycephala.
stenoprioti, Meissn. in Hook. Kew Joura. vii. (1855) 122- nivea.
stuposa, *Lindl. Swan River App.* S3.—Austral,
tenuifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 215. —Austral.
tortifolia, Kipp. ex Meissn. in Hook. Kew Joura. vii. (1855) 121-Arctotidis.
tndentata, *Mrissn. in DC. Prod.* xiv. 479.—Austral.
"ncata, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, v. 681=tenuifolia.
T «tita, *Mrissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 121. —Austral.

°RYANDRA, Thunb. Nov. Gen. 60 (1783)= Aleuritas, Forst. (Euphorb.).
rordata, Thunb. 1. c - A. **triloba.**

DRYANDRA:—
olrifera. Lam. Encyc. ii. 829=Alenrites triloba.
Verniria, Correa, in Ann. Mm. Par. viii. (1822) 69 = A. triloba.

DBYAB, Linn. Gen. ed. I. 148 (1737). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 618.
DRYADAEA, Linn. Syst. ed. I (1735).
PTILOTUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 813 (1867).
alpina, Salisb. Prod. 863=octopetala.
anemonoides, **Pall.** Reise, iii. App. 738 > Geum anemonoides.
chamaedrifolia, S. F. Gray, Nat. AIT. Brit. PI. ii. 678 = octopetala.
chamaedrifolia, Richards, in Frankl. Narr. 1st Joum. 740 = Drummondii.
chamaedryaides. Pall. Reise, iii. App. 733=octopetala.
depressa, Bab. in Trans. Bot. Soc. Edinb. i. (18481) 195-octopetala.
Drnmmondii, *Richards, in Hook. Bot. Mag.* t 2972.— Sibir. or.; Am. arct.
geoides, Pall. Reise, iii. App. 782 = Coluria geoides.
integrifolia, *Vahl, in Skriv. Naturh. Selsk. Kjoeb.* iv. II. (1798) 171.—Groenl.; Am. bor.
octopetala, *Linn. Sp. PL* 601.—Reg. bor. temp, et arct.
pentapetala. Linn. 1. c.=Geum anemonoides.
pentapetala, Pall. Reise, ii. 559 = Coluria geoides.
pentaphyllaea, Hill, Veg. Syst. xvi. *S0-octopetala.
tenella, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 350=integrifolia.
trifoliata, Pall, ex Ser. in DC. Prod. ii. 655 = Dalibarda fragarioides.

PBYMARIA, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. p. xxxi (1819). *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook, f. i. 152.
apetala, *Bartl. in Presl, Ret. Haenk.* ii. 7.—Chili,
arenarioides, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 406. —Mexic.
riliaris, Hort.,Berol. ex C. A. Mey. in Ind. Sem. Hort Petrop. ix. 71—cubensis.
ciliata, Hort. Bcrnl. ex C. A. Mey. 1. c - p n e c
cor dot a, A. Gray, PI. Fendl. 13=glandulosa.
cordata, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 406.— Cosmop. trop.
crassifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 16.—Mexic.; Calit
cubensis, *Regel. in Otto V Dietr. Allg. Garten*, viii. (1840) 298.—Cuba.
diandra, Blume, Bijdr. 62—cordata.
divaricata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 24.— Peruv.
effusa, *A. Gray, PL Wright*, ii. 19.—Mexic.
extensa, Wall Cat. n. 647 - cordata.
fasciculata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* L 125.— Peruv.
Fendleri, 5. *Wats. inProc. Am.Acad.* xvii. (1881-82) 328.—N. Mexic.
filiformis, *Benth. Fl. Austral*, i. 162.—Austral.
frankenioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 21. t. 615=arenarioides.
glaberrima, *Bartl. in Presl, Ret. Haenk.* it 7.—Peruv.
glandulosa, *Bartl. I. c.* 9.—Mexic
gracilis, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 232. —Mexic.
grandiflora, *Bartl. in Presl, Rel. Haenk.* ii. 7.— Chili.
grandiflora, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 205 = megalantha.
hirsuta, *Bartl. in Presl, Rel. Haenk.* ii. 8.—Peruv.
holosteoides, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 16.—Calif.; Mexic.
laxiflora, *Benth. PI. Hartw.* 73.—Mexic.
leptoclados, *Hemsl. Diag. PL Nov.* 2.—Guatemala.
macrantha,i4. *Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 126.— Peruv.
megalantha, *Steud. Norn.* ed. II. i. 532.—Mexic.
molluginea, Didr. in Linnaea, xxix. (1857-58) 738 = Arenaria molluginea.
nitida, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 31.—Peruv.
nodosa, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 12.—Mexic.
OTtegioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 21.—Cuba,
ovata, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 406.— Ecuador.
Palmeri, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 22.—Mexic.
palnstris, *Cham.* (T *Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 232.—Mexic.

DBYMABIA.—
paposana, *Phil. Fl. Atac.* 10.—Chili,
pauciflora, *Bartl. in Presl, Rel. Haenk.* ii. 8.—Peruv.
polycarpoides, *A. Gray, PL Fendl.* 12.—Mexic
ramosissima, *Schlecht. in Linnaea*, xii. (1838) 206.—Mexic.
retusa, Wight & Am. Prod. 359-cordata.
xotundifolia, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 123. —Peruv.
sperguloides, *A. Gray, PI. Fendl.* 11.—N. Mexic
stellarioides, *Willd. ex Roem. tf Schult. Syst.* v. 416. —Ecuador,
suffruticosa, *A. Gray, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 828.—Mexic
tenella, *A. Gray, PL Fendl.* 12.—N. Mexic
villosa, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 282. —Mexic.
viscidula, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Sped.* i. 124.— Peruv.
xerophylla, *A. Gray, PL Wright*, ii. 18—N. Mexic.

DRYMEIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789) - **Carex,** Linn. (Cyperec).

DRYMIPHILA, Jnss. in Diet. Sc. Nat. iii. Suppl. 58 (1816)-DrymophUa, R. Br. (Liliac).

DRYMIS, Juss. Gen. 280 (1789) = Drlmya, Forst. (MagnoL).

DRYMISPERMUM, Reichb. Nom. 65 (1841) - DRIMYSPERMUM.Reinw. = Phaloria, Jack (Thymel.).

DRYMOCALLIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 371=Potentilla, Linn. (Rosac).
rubricaulis, Fourr. 1. c.—Gallia.

DRYMOCODON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 111 •= Campanula, Tonrn.
bononiense, Fourr. 1. c = C. bononiensis.
latifolium, Fourr. 1. c.=C. latifolia.
rapunculoides, Fourr. 1. c = C. rapunculoides.
Trackelium, Fourr. 1. c = C. Trachelium.

DBYMODA, Lindl. Sen. Orch. t. 8 C (1838). *ORCHIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 506.
picta, *Lindl. I. c*—Burma.

DRYMONACTES, Steud. Nom. ed. II. i. 632 (1840) sphalm. = seq.

DRYMONAETES, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789) = Festuca, Linn. (Gramin.).
giganteus, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 187 = F. gigantea.

DRTMONXA, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 57. t 224 (1829). *GESNERACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 1007.
alloplectoides, *Hanst. in Linnaea*, xxxiv. (1866-66) 358.—Costa Rica.
bicolor, Mart, ex Lindl. Bot. Reg. xxiv. (1838) t. 4 = serrulata.
calcarata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 57. t. 224.—Bras.
Candida, *Hanst. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 358.—Peruv.
coerulea. Mart, ex Steud. Nom. ed. II. i. 532 = calcarata.
conchocalyx, *Hanst. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 360.—Costa Rica.
cristata, *Miq. I. c.* xviii. (1814[V] 26.—Guiana,
delphinioides, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 186.—N. Granat.
grandiflora, G. Don, Gen. Syst. iv. 653=Besleria grandiflora.
Jacquini, G. Don, 1. c. = serrulata.
longifolia, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 4. t. 204.—Peruv.
marmorata, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6763.—Guian. ?
mollis, *Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr.* V. v. (1861) 111. —Costa Rica,
mucronnlosa, *Hanst. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 353.—Guatemala.
ochroleuca, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 5 = Episcia ochroleuca.

DBYMONIA:—
ovate, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 355.—Costa Rica.
parviflora, *Hanst. I. c.* 352.—Costa Rica,
parvifolia, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 468.—Ind. occ.
punctata, Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 6S=Episcia punctata.
sarmentosula, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iv. (1848) t. 8S8 = cristata.
sernilata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 59.—Ind. occ.
spectabilis, *Wart. I. c*—Panama,
splendens, *Triana, ex Galeotti, in Journ. Hort. Prat.* Sér. II. i. (1857) 97. t. 9.—Reg. Andin.
Torrialvae, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 359.—Costa Rica.
villosa, Hook. Bot. Mag. t. 4866 - Episcia villosa.
villosa, *Kunth &• Bouchi, Ind. Sent. Hort. Berol.* (1847) 12 (=pracc. ?).—Guian. ?
Warscewicziana, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 352.—Costa Rica.

DBYMOPHILA, R. Br. Prod. 292 (1810). *ULIACEAE,* Bcnth. & Hook. f. iii. 769.
cyanocarpa, *R. Br. Prod.* 292.—Austral.
Moorei, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 571.—Austral.
pyrrhocarpa, F. Mnell. Fragm. ix. 190 = Moorei.

DBYMOPHIiOEUS, Zipp. in Alg. Konst. en Letterbode, i. (1829) 297. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 892.
ambiguus, Becc. Malesia, i. (1877) 42 = Actinophloeus ambiguus (in Addend.).
angustifolius. Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 314 = Coleospadix oninensis.
appendiculatus, *Miq. Palm. Arch. Ind. Obs. Nov.* 24 ; *Becc. Malesia,* i. (1877) 45.—Malaya,
bifidus, *Becc. I. c.* 44.—N. Guinea,
ceramensis, *Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch.* xi. (1868) n. v. 5.—Ins. Ceram.
ceramensis, Scheff. Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 121 = olivaeformis.
communis, *Miq. Palm. Arch. Ind. Obs. Nov.* 24 - Coleospadix oninensis.
divaricatus, Benth. ft Hook. f. Gen. iii. 893 = Kentiopsis divaricata.
fili/erus, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) If 8 = Vitiphoenixfilifera.
jaculatorius, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 314.—N. Guinea,
leprosus, *Becc. in Ann. Jard. Buitene.* ii. (1885) 119.—N. Guinea.
Normanbyanus, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 893 = Normanbya Mcellerii.
olivaeformis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 314.—Ins. Amboina.
olivaeformis, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 157=bifidus.
paradoxus, Scheff. 1. c. 53 — Ptychococcus paradoxus.
propinquus, Becc. Malesia, i. (1877) 43 = Actinophloeus propinquus (in Addend.),
puniceus, *Becc. I. c.* 47 -Pinanga tematensis.
Rumphianus, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 314 = Pinanga ternatensis.
Rumphii, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885)119 = leprosus.
Rumphii, Scheff. 1. c. i. (1876) 52-bifidus.
saxatilis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 814.-Ins. Amboina.
singaporensis, Hook. f. in Kew Report, 1882 (1884) 55 = Ptychmraphis singaporensis.
vestiarius, Miq. Palm. Arch. Ind. Obs. 24 = Mischophloeus paniculatus.
Zippellii, Hassk. in Hoev. & De Vrkse, Tijdschr. ix. (1842) 170'Caryotamitis.

DRYMOPOGON, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 124 (17*5)-Spiraea, Linn. (Rosac).

DRYMOSPARTUM. PresI, (Bot Bemerk. 138) (1844) in Abh. Boehm. Ges. V. iii. 567-Genista, Linn. (Legumin.1.
aetnense, Presl, 1. c. = G. aethnensis.
purgans, Presl, 1. c. = G. purgans.
Sardum, Presl, 1. c.-G. aethnensis.

DRYMOSPHACE, Opiz, Seznam, 38 (1852) - SalvU, Toum. (Labiat).
glutinosa, Opiz, 1. c.=S. glutinosa.

DKYMYS, Veil. Fl. Flam. 240 (1825) = Drimys, Forst. (Magnol.).

DBYOBALANOPS, Gaertn. f. Fruct. iii. 49. t. 186 (1805). *DIPTEROCARPEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 191.
aromatica, *Gaertn. f. I. c.*—Archip. Ind.
Beccarii, *Dyer, in Journ. Bot.* xii. (1874) 100.—Borneo.
Camphora, Colebr. in As. Res. xii. (1816) 535 = aromatica.
oblongifolia, *Dyer, in Journ. Bat.* xii. (1874) 100.—Borneo.
Schefferi, *Hance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 307.—Sumatra,
sericca, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* 68.—Borneo.

DRYOPAEIA, Linnaea, ii. (1827) 629=seq.

DRYOPEIA, Thou. Orch. lies Afr. t. 1-3 (1822)-Disperia, Sw. (Orchid.).
discolor, Thou. 1. c. = Disperis cordata.
oppositifolia, Thou. 1. c = Disperis oppositifolia.
tripetaloides, Thou. 1. c.=Disperis tripetaloides.

DBYOPETAIiON, A. Gray, in Smithson. Contrib. v. (PI. Wright, ii.) 11. t. 14 (1853). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 69.
runcinatum, *A. Gray, I. c.* 12.—N. Mexic.

DRYOPETALUM, Benth. ft Hook. f. Gen. i. 69 (1862) = praec.

DRYOPRIA, Thou. Orch. lies Afr. Tabl. 1 (1822) -DRYOPEIA, Thou.=Diaperis, Sw. (Orchid.).

DRYOPSILA, Rafin. Alsog. Am. 25 (1838) = Quercus, Toum. (Cupul.).
aprica, Rafin. 1. c. 26 = Q. aprica.
cinerea, Rafin. 1. c 27 = Q. cinerea.
cuneifolia, Rafin. 1. c. = Q. cuneifolia, *Rafin.*
laurina, Rafin. 1. c = Q. laurina.
maritima, Rafin. 1. c. - Q. nigra.
oligodes, Rafin. 1. c. 28 = Q. oligodes.
verrucosa, Rafin. 1. c. 26 = Q. verraoosa.
virens, Rafin. 1. c. 28=Q. virens.

DBTPETES, Vahl, Eclog.iii. 49 (1815). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 278.
FREIREODENDRON, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 244 (1866).
LIFARENA, Poit. ex Leman, in Diet. Sc. Nat. xxvii. 6 (1823).
alba, *Poit. in Mint. Mus. Par.* i. (1815) 157. t. 7.—Ins. Testudin.
bengalensis, Spreng. Syst. iii. 902 = Fluggia microcarpa.
crocea, Poit. in Mem. Mus. Par. i. (1815) 159. t. 8 = Xylosma nitidum.
cyathophora, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. n. 454.—Bras.
glauca, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1800) 157 — Xylosma nitidum.
glauca, *Vahl, Eclog.* iii. 49.—Porto Rico,
glomerate, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 172.—Ind. occ.
incurva, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 82.—Cuba,
mucronata, *Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 165.—Cuba.
sessiliflora, *Allem. Diss. Dry.* (1844).—Bras.
sessiliflora, Bulll. Etud. Gén. Euph. Atlas, 45 = Xylosma nitidum.
Spruceana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 454.—Bras,
triplinervia, *Muell. Arg. I.e.* 456.—Ind. occ.

DKYPIS, Mich, ex Linn. Syst. ed. I (1735). *CARYOPHYLLEAE,* Benth. & Hook. f. i. 145.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 413.—Reg. Mediterr.

DRYPSIS, Duch. in Orb. Diet. ix. 424 (1849)-Dypaia, Noronha (Palm.).

DRYPTOPETALUM, Am. in Ann. Nat. Hist. i. (1838) 872 = Gynotroehes, Blume (Rhizoph.).
coriaceum, Am. 1. c. 373 = G. axillaris.

DRYPTOPETALUM :—
metnbranaceum, Miq. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. iii. (1659) 78-Blepharistemma corymbosum.

DTJABANGA, Bnoh.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 178. *LYTHRARIEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 783.
grandiflora, Warp. Rep. ii. 114 = sonneratioides.
moluccana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 109.—Ins. Molucc.
sonneratioides, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1835) 177.—Ind. or.

DUANIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. rv.2-Homalan.thus, A. Juss. (Euphorb.).

DUBAEA, Steud. Norn. ed. II. i. 517, in syn. (1840) = DUBYAEA, DC.=Diplusodon, Pohl (Lythrar.).

DUBATJTIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 469. t. 84 (1826). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 393.
laevigata, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* v. (1861) 135.—Ins. Sandvic.
laxa, *Hook,* fa[1] *Am. Bot. Beech. Voy.* 87.—Ins. Sandvic.
paleata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 135.—Ins. Sandvic.
plantaginea, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 468. t. 84.—Ins. Sandvic.

DTJBOISIA, R. Br. Prod. 448 (1810). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 911.
Hopwoodii, *F. Muell. Fragm.* viii. 232.—Austral.
Leichhardtii, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* it (1882) 222.—Austral,
myoporoides, *R. Br. Prod.* 448.—Austral.

DUBOISIA, Karst. in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. xv. (1847) 894-PleurothaUis, R. Br. (Orchid.).
Reymondi, Karst. 1. c. = P. Raymondi.

DUBOIS-REYMONDIA, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 397-PleurothalIis, R. Br. (Orchid.).
lancipetala, Karst. Fl. Columb. i. sub t. 47.—N. Granat.
palpigera, Karst. in Bot. Zeit vi. (1848) 397, 898.—N. Granat.

DUBOSCIA, Bocq. in Adansonia, vii. (1866) W>: *TILIACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 985.
macrocarpa, *Bocq. I. c.*—Afr. trop.

DUBOUZETIA, Panch. ex Brongn. & Giis, in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 199. *TILIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 240.
campanulata, *Panch. ex Brongn.* b[1] *Gris, 1. c.*—N. Caled.
elegans, *Brongn. tf Gris, I. c.* x. (1863) 476.—N. Caled.
parviflora, *Brongn. Cf Gris, 1. c.*—N. Caled.

DUBREUILIA, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1884) 489 = seq.

DUBRUEILIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 495 (182«) = Pilea, Lindl. (Urtic).
callitrichoides, Gaudich. 1. c. •= P. callitrichoides.
dliaris, Gaudich. 1. c. = P. ciliaris.
crassi/olia, Gamiich. 1. c. = P. densiflora.
cuneiformis, Gaudich. 1. c.=P. cuneiformis.
grandifolia, Gaudich. 1. c. = P. grandis.
hederacea, Gaudich. 1. c. = P. hederacea.
inaegualis, Gaudich. 1. c. = P. inaequalis.
lanceolata, Gaudich. 1. c. = P. lanceolate.
lucens, Gaudich. I. c. = P. lucens.
melastomoides, Gaudich. 1. c = P. trinervia.
membranacea, Gaudich. I.e. 496 = Urticamembranace*-
microphylla, Gaudich. 1. c. 495 = P. microphylla.
multiflora, Gaudich. 1. c = P. multiflora.
orbiculata, Gaudich. 1. c. 496 (= *Urtica orbiculata}*—Hab.?
Parietaria, Gaudich. 1. c 495 = P. Parietaria.
peploides, Gaudich. 1. c.=P. peploides.
pumila, Gaudich. 1. c. = P. pumila.
rhombea, Gaudich. 1. c, 496 = P. rhombea.
Riedlei, Decne. Herb. Timor. Desc. 161 = P. lncen'-
rotundifolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 496 * Pipturus rotundifolia.
rupipendia, Gaudich. 1. c. 495 = P. rupipendiM.
semidentata, Gaudich. 1. c. = P. rupipendia.

DUBRUEILIA :-
serpillifolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 495 = Pilea serpillifolia.
sessili/otia, Gaudich. 1. c. =P. lessilifolia.
trilobata, Gaudich. 1. c -P. trilobata.
triplinervia, Gaudich. 1. c. 496 = P. lucens.
verbascifolia, Gaudich. 1. c. 495 - P. verbaicifolia.

DUBYAEA, DC. Prod. Hi. 94W, in syn. (1828) - Diplusodon, Pohl (Lythrar.).
nelastomoides, DC. 1. c. 94(0-Dipl. speciosus.

I>UBYAEA, DC. Prod. vii. 247 (1888) - Lactuca, Tourn. (Compos.).
cristulata, DC. 1. c—Austral.
hispida, DC. Coll. Mém. ix. t. 19 = L. Dnbyaea.
ramosissima, Hance, ex Walp. Ann. ii. 1028 =L. denticulata.
sonchoidea, DC. Prod. vii. 247 => Taraxacum montanum.

WCHARTREA, Decne. in Ann. Sc. Nat Sér. III. vi. (1846) 109. t. 8=Pentarhaphia, Lindl. (Gesnerac).
viridtflora, Decne. I. c.=P. viridiflora.

"UCHASSAINGIA, Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 741 -Brythrina, linn. (Legmmin.).
arborescent, Walp. in Flora, xxxvi. (1858) 150 = E. arborescens.
eaffra, Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 742 = E. caffra.
glauca, Walp. 1. c.=E. glanca.
"vali/olia, Walp. Lc. = E. ovalifblia.
resupinata, Walp. in Flora, xxxvi. (1858) 150 = E. resupinata.

"UCHEKIA, Kostel. AUg. Med.-Phann. Fl. i. 218 (1881) , = Palisota, Reichb. (Commelin.).
nirsuta, Kostel. 1. c. 214-P. ambigual

"UCHESNEA,Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 872 = *Tagaria, Linn. (Rosac).
chrysantha, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 872 =»F. indica.
f"agarioides, Sin. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 878 = F. indica.
fragiformis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 283 - F. indica.
'undaica, Miq. FL Ind. Bat i. I. 372=Potentilla Kleiniana.

"UCHESNIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 153 = Pulie&ria, Gaertn. (Compos.).
<=*rUpa,* Cass. in Diet. Sc. Nat xiii. 646 = P. crispa.

DUCHOLA, Adans. Fam. ii. 357 (176S) = Omphalea, Linn. (Euphorb.).

"UCOUDRAEA, Bur. Monog. Bign. 49 (1864) = Tecoma, Juss. (Bignon.).

c"pensis, Bur. 1. c - T. capensis.

WCROISIA, Endl. Gen. Suppl. v. 10 (1850) =seq.

DUCBOSIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. i. (1844) 341. *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 928.
Jnethifolia, *Boiss. I. c*—Persia,
"abellifolia, *Boiss. I. c*—Assyria.
* Ismaelis, *Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand,* xxi. 1879 „ (1880) 67.-Aegypt.
Olhieri, Boiss. & Bnhse, in Nouv. M<Sm. Soc. Nat. Mosc xii. (1860) 101-anethifolia.

1JUEOUREA, Bory, ex Willd. Sp. PI. v. 65 (1810) = *risticha, Thou. (Podostem.).
-tterni/olia, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vi. (1812) 64; Roem. & Schult. Syst. Veg. i. 50 = T. altemifolia.
foryi, A. Rich, in Diet. Hist. Nat. v. 636-T. trifaria.
**ypHoides,* St. Hil. in Mem. Mus. Par. x (1823) 472 = T. hypnoides.
[r]*j«arri,-, A. Rich, in Diet. Hist. Nat. v. 636 = T. altemifolia.
"Varia, Bory, ex Willd. Sp. PI. v. 56-T. tri&ria.

DUJOUREA, Gren. in Act Soc. Linn. Bord. ix. (1887) ^=Arenaria, Rupp. (Caryophyll.).
'"•ostiifolia. Gren. 1. c.=A. cerastiifolia.
purpurascens, Gren. 1. c.— A. purpurascens.

DUFOUREA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 113. t. 214 (1818)-=Breweria, R. Br. (Convolvul.).
amatonica. Mart, ex Cboisy, in DC. Prod. ix. 437.—Bras.
aurea, Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch, i, (1848) 160 =*sericea.*
glabra, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 114.—N. Granat.
heterantha, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. I. (1828) 79 *(=Aniseia heterantha).*—Bras.
sericea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 114. t. 214.—N. Granat.

DUFRENOYA, Chatin, in Compt-Rend. Par. Ii. (1860) 657-Henslowia, Blume (Santalac).
heterantha, Chatin, 1. c.-H. heterantha.

DUFRESNEA, Meissn. Gen. 178 (1838) =seq.

DUFRESNIA, DC. Coll. Mim. viii. t. 3 (1829); et Prod, iv. 624 (1830)=Valerianella, Moench.
leiocarpa, Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 34 = V. Dufresnia.
orientalis, DC. Coll. Mém. viii. t. 3=V. Dufresnia.

DUGAGELIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 518 (1826). 'Deleatur,' Benth. & Hook. f. iii. 127.

DUGALDIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. lv. 270 (1828) = Helenium, Linn. (Compos.).
chrysanthemoides, Cass. 1. c = H. integrifolia.
integrifolia, Cass. 1. c. = H. integrifolia.

DUOESIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (J881-82)215. *COMPOSITAE.*
mexicana, *A. Gray, I. c.* 216.—Mexic

DTJGEZIA, Montr, in Mém. Acad. Lyon, x.(1860) 187. *GENUS DUBIUM,* Benth. & Hook. f. i. 979.
artensis, *Montr. I. c.—N.* Caled.

DUGGENA, Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix, 269 (1793) -Gozusalea, Pers. (1805) (Rubiac.).
Richardii, Vahl, 1. c.=G. spicata.

DUGLASSIA, Houst. Reliq. 13 (1781) = Clerodendron, Linn. (Verbenac).

DUGORTIA, Scop. Introd. 217 (1777)=Parinarium, Juss. (Rosac).
nucamentosa, J. F. Gmel. Syst. 816.—Guiana.

DTTGTJETIA, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 35. t. 7 (1826). *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 23.
ABEREMOA, Aubl. PI. Gui. t 245 (1775), nomen prius.
CAR DIOFETALUM, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 328.
bracteosa, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 28.—Bras.
Candollei, *Baill. Adansonia,* viii. (1868) 327.—Bras.
coriacea, *Sond. in Linnaea,* xxii. (1849) 557.—Bras,
dicholepidala, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 22.—Bras.
Gardneriana, *Mart. I.* f.—Bras,
inconspicua, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xi. (1881) 185.—Guiana.
lanceolata, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 35.—Bras,
longicuspis, *Benth. in Hook. Kem Journ.* v. (1853) 9.—Bras,
longifolia, *Baill. Adansonia,* viii. (1867-68) 327.—Guiana; Peruv.
Marcgraviana, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 25.—Bras.
Moricandiana, *Mart. I. c.* 22.—Bras.
Pohliana, *Mart. 1. c.* 24.— Bras,
quitarensis, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* it (1843) 861.—Guiana.
Schlechtendaliana, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 24.—Bras.
Spixiana, *Mart. I. c.* 23.—Bras,
uniflora, *Mart. 1. c.* 24.—Bras.

DUGULDEA, Meissn. Gen. Comm. 133 in syn. (1844) = DUGALDIA, Cass. = Helenium, Linn. (Compos).

DUHALDEA, DC. Prod. v. 866 (1836)=Inula, Linn. (Compos.).
chinensis, DC. 1. c. = 1. Cappa.
eriophora, Steetz, in Bonplandia, v. (1857) 308 = 1. Cappa.
eupatorioides, Steetz, 1. c. = I. eupatorioides.
macrophylla, Steetz, 1. c.-=I. macrophylla.

DUHALDIA, Sch.-Bip. in Walp. Rep. ii. 952 (1843) = praec.

DUHAMELA, Rafin. in Ann. *Gin.* Sc Phys. vi. (1820) 82 = seq.

DUHAMELIA, Domb. ex Lam. Encyc i. 245 (1783) *> Myrsine, Linn.
Manglillo, Domb. ex Lam. 1. c. = M. Manglilla.

DUHAMELIA, Pers. Syn. i. 203 (1805) = Hamelia. Jacq. (Rubiac).
chrysantha, Pers. 1. c. = H. chrysantha.
glabra, Pers. 1. c. = Amaioua guianensis.
odorata, Roem. & Schult. Syst. v. 267 = H. suaveolens.
patens, Pers. Syn. i. 203 = H. patens.
sphaerocarpa, Pers. 1. c. = H. sphaerocarpa.
ventricosa, Pers. 1. c = H. ventricosa.

DULACIA. Neck. Elem. ii. 414 (1790) - Couepia, Aubl. (Rosac).

DULACIA, Veil. Fl.Flum. 32 (1825); i. 178-Llriosma, Poepp. (Olacin.).
singularis. Veil. 11. cc.=L. Velloziana.

DULCAMARA, Moench, Meth. 514 (1794)=Solanum, Tourn.
flexuosa, Moench, 1. c.-=S. Dulcamara.
lignosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 37 =S. Dulcamara.

DULIA, Adans. Fam. ii. 165 (1763) = Ledum, Linn. (Ericac).

DULICHIUM, Pers. Syn. i. 65 (1805). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1046.
PLEURANTHUS, Rich, ex Pers. Syn. i. 65 (1805).
canadense. Rich, ex Pers. Syn. i. 65=spathaceum.
spathaceum, *Rich. 1. c.*—Am. bor.

DULONGIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 76. t. 623 (1825) =PhyUonoma, Willd. (Saxifrag.).
acuminata, H. B. & K. 1. c. = P. ruscifolia.
integerrima, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 454= P. ruscifolia.
laticuspis, Turcz. 1. c. = P. ruscifolia.

DUMARTROYA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 97 (' 1844-66') -Malaisia, Blanco (Urtic).
fagifolia, Gaudich. 1. c. = M. tortuosa.

DT7MASIA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 96. *LEGUAiINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 529.
capensis, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 245.—Afr. austr.
congesta, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6524=villosa.
cordifolia, *Benth. ex Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 183.—Ind. or.
glaucescens, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 227.—Java.
leiocarpa, Benth. in Miq. PI. ijungh. 231=villosa.
pubescrns, DC. Mém. Leg. 257-1. 45 = villosa.
truncata, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1843) 119.—Japon.
villosa, *DC. Mim. Ug.* 257. t. 44.—Ind. or.

DUMERILIA, Lag. ex DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 71. t. 6 (15) et 7 (16)=Jungia, Linn. f. (Compos.).
auriculata, Steud. Norn. ed. I. 287"= J. auriculata.
axillaris, Lag. ex DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 72-J. axillaris.
crenata, Steud. Norn. ed. I. 287=J. crenata.
paniculata, Cass. Opusc i. t 12 =J. spectabilis.
paniculata, DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 72= J. ferruginea.
paniculata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 166 = J. rugosa.
pubescens, Steud. Nom. ed. I. 287 = J. floribunda.
sericea, Steud. 1. c = J. sericea.

DUMERILIA, Less, in Linnaea, v. (1830) 13 =PereBfa, Lag. (Compos.).
Alamani, DC. Prod. vii. 67 = P. Alamani.
Humboldtii, Less, in Linnaea, v. (1830) 13 = P. Humboldtii.

DUMREICHERA, Hochst. & Steud. in Flora, xxi. (1838) l. Intell. 26 - Senra, Cav. (Malvac).
arabica, Hochst. *Sc* Steud. 1. c. = S. incana.

DUNALIA, R. Br. in Salt, Abyss. Suppl. p. lxiv (1814) = Torenla, Linn. (Scrophul.).
acaulis, R. Br. 1. c—Abyssin.

DUBTAIJA, H. B. & K. Nor. Gen. et Sp. iii. 65.1.194 (1818). *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 895. DIERBACHIA, Spreng. Syst. i. 512, 676 (1825).
acniatoides, *Mien, in Hook. Land. Journ. Bot.* TO. (1848) 838.—Peruv.
aurantiaca, Dun. in DC. Prod. ziii. I. 627-Iochroma fuchsioides.
brachyacantha, *Mien, in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1848) 339.—Bolivia.
brachystemon, *A. Br. b- Bouchi, lnd. Sem. Hort. Berol.* (1861) *App.* 6.—Chili.
corni/olia. Dun. in DC. Prod. xiii. I. 527 «= Iocbroma comifolia.
cyanea, *Rouv. ex Dun. I. c.* 484.—Hab. I
gesneroides, Dun. 1. c. 527 — Iochroma gesnerioides.
lilacina, *Miers, in Ann.* &• *Mag. Nat. Hist.* Ser. II. iv. (1849) 32.—Peruv.
loxensis. Dun. in DC. Prod. xiii. I. 627 - Iochroma loxensis.
lycioidcs, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1848) 839.—Am. austr.
ramiflora, *Miers, I. c.* 840.—Mezic.
senticosa, *Miers, I. c*—Bolivia,
solanacea, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 65. t. 194. —N. Granat.
•pathnlata, *A. Br. W Aschers. in lnd. Sem. Hort. Berol.* (1861) *App.* 6.—Hab.?
umtrosa, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 528 = Iochroma umbrosa.

DUNALIA, Montr, in Act Soc. Linn. Bord. xxvi. (1866) 576 = AjnorphophalluB, Blume (Aroid.).
artensis, Montr. 1. c.—N. Caled.

DUNALIA, Spreng. Pugill. ii. 25 (1815) =I»uoya, DC. (Rubiac).
tuberosa, Spreng. I. c = L. tuberosa.

DUNANTIA, DC. Prod. v. 626 (1886) = Isocarpha, R. Br. (Compos.).
Achyranthes, DC. 1. c. 627; et in Deless. Ic. Sel. iv. t. 73 = 1. oppositifolia.
micrccephala, DC. Prod. v. 627.—Patagon.

DTTBTBABIA, Wight *8c* Am. Prod. 258 (1824). *LEGUMINOSAE*, Benth *8c* Hook f. i. 541.
acuminatissima, *Miq. Fl. lnd. Bat.* i. I. 180.—Java.
barbata, Benth. in Miq. PI. Jungh. 242-Atylosia barbata.
calydna, Miq Fl. lnd. Bat i. 1.180 = Atylosia barbata.
cirdnalis, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. lnd.* ii. 219.—Burma.
conspersa, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 241.—As. trop.
Cumingiana, *Benth. 1. c.* 242.—Ins. Philipp.
debilis, *Baker, in Hook./. Fl. Brit. lnd.* ii. 218.—Reg. Himal.
ferruginea, *Wight* &• *Am. Prod.* 258.—lnd. or.
fitsca, Knrz, in Joam. As. Soc Beng. xliii. (1874) II. 186 = Fhaseolus fuscus.
Hey net, Span. Ic. n. 9 ; ex Miq. Fl. lnd. Bat. i. I. 179 — Spanoghei.
Heynei, *Wight V Am. Prod.* 258.—lnd. or.
Horsfieldii, Miq. Fl. lnd. Bat. i. 1.179 - Atylosia mollis.
lati/olia, Wight & Am. Prod. 268 = ferruginea.
nivea, *Miq. Fl. lnd. Bat.* i. I. 177.—Java.
oblonga, Wight ex Am. in Nor. Act Nat. Cur. xviii. (1836) 833-Heynei.
podocarpa, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 185.—Burma.
polysperma, *Miq. Fl. lnd. Bat.* i. I. 179.—Java,
pulchra, *Benth. ex Baker, in Hook./. Fl. Brit. lnd.* ii. 218.—Reg. Himal.
punctata, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 242.—Java,
rubella. *Span, ex Miq. Fl. lnd. Bat.* i. I. 178.—Java. Spanoghei, *Miq. 1.* c.—Java.

DUNCANIA, Reicbb. Consp. 197 (1828)-ToddaUa, Juss. (Rutac).
undulata, Keichb. ex Stend. Nom. ed. II. L 633 = T. undnlata.

DUPARQUETIA, Baill. in Adansonia,vi. (1865-66) 189. t. 4-OIlgostemon, Benth. (Gesnerac.).
orckidacea, Baill. 1. c. 190 — O. pictub.

DUPATYA, Veil. Fl. Flnm. 85 (1826) - Paepalanthus, Mart. (EriocauL).
aequalis. Veil. 1. c. 86; i. t. 85 = P. blepharocncmis.
hirsuta. Veil. 1. c.; i. t. 87 = P. Dupatya.
ligulata, Veil. U j i . t 86 = Eriocaulon KunthiL

DUPERREYA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 462. t. 68 (1826)-Porazia, Burm. (Convolr.).
sericea, Gaudich. 1. c.=P. sericea.

DUPINETA, Rafin. Sylva Tellnr. 101 (1838)-Dissotls, Benth. (1849) (Melast.).
multifiora, Rafin. 1. c-Dis. mnltiflora.

DUPINIA, Scop. Introd. 195 (1777)=TernBtroemia, Linn. f. (1781).

DUPONTIA, R. Br. in Parry, Voy. App. 290 (1824) = Graphephorum, Desv. (Gramin.).
Fischeri, R. Br. 1. c. 191 —G. psilosanthus.
pelligera, Rupr. ex Nym. Consp. 80B = G. psilosanthus.
psilosantha, Kupr. Fl. Samoj. Cisural. (Beitr. Russ. Reich, ii.) t. 6-G. psilosanthus.
scleroclada, Rupr. 1. c. t 6 = G. psilosanthus 1

DUPRATZIA, Rafin. Fl. Ludov. 64 (1817) = Phlox?, Linn. (Polemoniac.).
scoparia, Rafin. 1. c.—Louisian.

DUPUISIA, A. Rich, in Guill. *8c* Perr. Fl. Seneg. Tent i. 148. t. 38 (18S2)-Sorindeia, Thou. (Anacard.).
juglandi/olia, A. Rich. 1. c = S. joglandifolia.
longi/olia. Hook, f. in Hook. Niger Fl. 287 = S. macrophylla.

DUQUETIA, G. Don, Gen. Syst. L 07 (1881)-Duguetia, A. St. Hil. (Anonac.).

DURANDEA, Delarbr. Fl. Auv. ed. II. 866 (1800)-Baphanus, Toum. (Crucif.).
unilocularis, Delarbr. 1. c = R. Raphanistrum.

DTJRAMDEA, Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot vi. (1847) 594. *LINEAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 245.
serrata, *Planch. I. c.* vii. (1848) 528.—N. Caled.

DURANDOA, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 2 (I860)-Carthamus, Toum. (Compos.).
arborescens, Pomel, 1. c. 22 —C. arborescens.
Clausonis, Pomel, L c. 3 = C. arborescens.

DTTRANTA, Linn. Gen. ed. I. 867 (1787). *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1150.
EIAISIA, P. Br. Hist. PI. Jamaic. 262 (1756).
HOFFHANNIA, Loefl. It 194 (1758).
angusti/olia, Salisb. Prod. 108 = Plumieri.
argentea, *Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 248. —lnd. or.
brachypoda, *Tod. Num. Gen. e Sp.* 24.—Hab. ?
buxi/olia. Herb. Willd. ex Schau. in DC. Prod. xi. 610 = Citharexylum spinosum.
buxifolia, Poir. ex Schau. in DC. 1. c. 616 = triacantha.
dent at a, Rich. Herb, ex Pen. Syn. ii. 142 = Plumieri.
Ellisia,Jacq. Enum. Fl. Carib. 26 « Plumieri.
erecta, Linn. Sp. Fl. 637 = Plumieri.
Fischeri, Mart, in Flora, xxi. (1888) II. Beibl. 60=-Casselia integrifolia.
ilid/olia. Herb. Willd. ex Schau. in DC. Prod. xi. 609 = Citharexylum ilicifolium.
inermis. Linn. Sp. PI. 687 - PlUmieri.
integrifolia, *Tod. Num. Gen. e Sp.* 27.—Hab. ?
lati/olia, Salisb. Prod. 108 = Plumieri.
Lorentzii, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 280.—Reg. Argent,
macrocarpa, *H. B. V X. Nov. Gen. et Sp.* ii. 255.—Mexic.
microphylla, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 43 = Plumieri.
Mutisiana, Sm. Introd. Bot S81 = seq.
Mutisii, *Linn./. Suppl.* 291.—Am. trop.
obtusi/olia, H. B. * K. Nor. Gen. et Sp. ii. 254-Mutisii.
parietariae/olia, Juss. ex Walp. Rep. iv. 78=Mutisii.
parviflora, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) II. 210.—Cuba.
phytolaccaefolia, Juss. Herb, ex Schau. in DC. Prod. xi, 616 = Mutisii.
Plumieri, *Jacq. Select. Am.* 188.1.176. f. 76.—Am. trop.
racemosa. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-Plumieri.
repens. Linn. Sp. Fl. 687 = Plumieri.
spinosa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8-Plumieri.
stenostachya, *Tod. Num. Gen. e Sp.* 26.—Hab. t
triacantha, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 77.—Pernv.

DTJKANTA:—
turbinata, *Tod. Num. Gen. e Sp.* 28.—Hab. ?
umbilicata, Miers, Trav. Chil. ii. 530 = Rhaphithamnus cyanocarpus.
•*vestita*, Cham, in Linnaea,vii. (1832) 115-Plumieri.
xalapensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 254 = Plumieri.

DURETIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 600 (1826)-Boehmerla, Jacq. (Urticac).
cylindrica, Gaudich. 1. c. — B. cylindrica.
palustris, Gaudich. 1. c. = B. cylindrica.

DURIA, Scop. Introd. 289 (1777)=Durio, Adans. (Malvac).

DURIEUA, Boiss. *8c* Reut Diagn. PI. Nov. Hisp. 14 (1842) = Daucua, Toum. (Umbellif.).
abyssinica, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 51 =Daucus abyssinicus.
qraeca, Boiss. 1. c. 60 = Daucus creticus.
hispanica, Boiss. *8c* Keut. Diagn. PI. Nov. 15 = Daucus Durieua.
juncea, Willk. Sett. Fl. Hisp. 57-Daucus setifolius.

DURIEURA, Mérit, Diss. in Mém. Soc. Acad. Lille, (1829) 432. t. 4=Iiafuentea, Lag. (Scrophul.).
spicata, M^rat, L c.—L. rotundifolia.

DTJBIO, Adans. Fam. ii. 899 (1763); Murr. Syst. ed. XIII. 681. *MALVACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 213.
carinatus, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xiv. 1,1675) 500. —Borneo.
ceylanicus, Gardn. in Calc. Joum. Nat. Hist viii. (1847) l = Cullenia excelsa.
lanceolatus. *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 499.—Borneo.
lissocarpus, *Mast. I. c.* 501.—Borneo,
malaccensis, *Planch, ex Mast, in Hook. /. Fl. Brit. lnd.* i. 851.—Burma; Malacca,
oblongus, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 600. —Borneo.
Oxleyanus, *Griff in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1846'. 115, in nota.—Malacca.
stercoraceus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. r. (1790; ed. I. Art. iv. 13 = zibethinns.
meylanicus, Auct. = *ceylanicus.*
ribethinus, Moon, Cat. PI. Ceyl. 66-CuIlenia excelsa.
zibethinus, *Murr. Syst.* ed. XIII. 581.—Malaya.

DTJROIA, Linn. f. SuppL 30, 209 (1781). *RUBIACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 82.
PUDETA, Linn. Diss. PI. Surin. 16 (1776).
eriophila, *Linn./. 1. c.* 209.—Guiana,
saccifera, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 82.—Bras,
surinamensis, *Benth. V Hook./. 1. c.*—Guiana.

DUSCHEKIA,Opiz,Seniam, 88 (1852) = Alnua, Tourn. (Cupulif.).
mata, Opiz, 1. c.=A. viridin, Z>C.

DTTTAILLYEA, Baill. Adansonia, x. (1872) 327-*RUTACEAE.*
trifoliolata, *Baill. 1. c.* 828.—N. Caled.

DUTRA, Bemh. ex Stend. Nom. ed. II. i. 484, in syn. (1840) = Datura, Linn. (Solanac.).

DUTTONIA, F. Muell. in Hook. Kew Joum. viii. (1856) 74. t. l = Pholidia, R. Br. (Myopor.).
gibbi/olia, F. Muell. 1. c.=P. gibbifolia.

DUTTONIA, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 409 = Helipterum, DC. (Compos.).
sessiliceps. F. Muell. 1. c 410 = H. Dimorpholepis.

DUVALIA, Bonpl. Descr. PI. Rar. Malm. ISO. t. 5[s] (1818)-=Hypooalyptus, Thunb. (Legumin.).
oxalidifolia, Bonpl. 1. c ^ H. obcordatus.

DUVALIA, Haw. Syn. PI. Succ. 44 (1812). *CLEP1ADEAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 784.
angustiloba, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1883) H. —Afr. austr.
caespitosa. *Haw. Syn. PI. Succ.* 46.—Afr. austr.
compacta, *Haw. 1. c.* 46.—Air. austr.
Corderoyi, *N. E. Br. in Bot. Mag.* sub t 6245.—**•»

DTXVALIA:—
deflexa, G. Don, Gen. Syst. iv. 121=Stapelia deflexa.
elegans, *Haw. Syn. PL Succ.* 44.—Afr. austr.
glomerata, *Haw. 1. c.* 46 j *Suppl.* 14.—Afr. austr.
nirtella, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 276.—Hab. ?
Jacquiniana, *Sweet, I. c*—Afr. austr.
laevigata, *Haw. Syn. PL Succ.* 46; *Suppl.* 14.—Afr. austr.
mastodes, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 276, nomenj *G. Don, Gen. Syst.* iv. 122.—Afr. austr.
polita, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1876) II. ISO.—Afr. austr.
radiata, *Haw. Syn. PL Succ.* 48.—Afr. austr.
reclinata, *Haw. 1. c.* 44.—Afr. austr.
replicata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 276.—Afr. austr.
tuberculata, Haw. Syn. PI. Succ. 46; Suppl. 1S= radiata.

DUVALLIA, Haw. PI. Succ. Suppl. 18 (1819)«praec

DUVAUA, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sir. I. ii. (1824) 340=8chinuB, Linn. (Anacard.).
crenata, Phil. Fl. Atac. 14=S. crenatus.
cuneata, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 176=S. dependens.
dentata, DC. Prod. ii. 74=S. dependens.
dependens, DC. 1. c.=S. dependens.
fasdculata, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 116=S. dependeni.
inebrians, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 176=S. dependens.
latifolia, Gill, ex Lindl. Bot. Reg. t1580 = S. latifolius.
longifolia, Lindl. 1. c (1843) t. 69 = S. dependens.
nolle, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 634 = S. latifolius.
wsate.l'hil. f. Cat. PI. Vase. Chil. 47, sphalm.=seq.
ovata, Lindl. Bot. Reg. 1.1568 = S. dependens.
pleuropogon, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 467=Mauria simplicifolia *et* Lithraea caustica.
polygama, Kunth, in Ann. Sc. Nat Sér. I. ii. (1824) 340=S. dependens.
praecox, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 116=S. dependens.
sinuata, Griseb. 1. c. xxir. (1879) 88 = S. sinuatus,
"Pinescens, Tenore, Cat. Ort. Nap. (1845) 85 -=S. dependens.
vtlutina, Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. 40.—Hab. ?
Mutina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I-467 =S. latifolius.

DUVAUCEIiIiIA, Bowd. Mad. 259 (1825). *OLEACEAE*?
te»nis, *Bowd. 1. c.—Afi.* trop. ?

DUVERNAYA, Desv. ex DC. Prod. iii. 86, in syn. (1828) = Cuphea, Jacq. (Lythrar.).

DUVERNOIA, Nees, in DC. Prod. xi. 822 (1847)=seq.

DUVERNOYA, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.150 U843), nomen=Adhatoda, Nees (Acanth.).
"dhatodoides, E. Mey. 1. c—Afr. austr.

DuVOA, Hook. &Am. Bot. Beech. Voy. 55 (1832) = DUVAUA, Kunth = Bohinus, Linn. (Anacard.).

DYANTHUS, P. Br. Hist. Jamaic. 228 (1756) err. typ. -DianthuB, linn. (Caryophyll.).

DVCHOTR1A, Rafin.in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 85 = Psyohotrla, Linn. (Rubiac.).

DTCK1A, Schult. f. Syst. vii. 65,1194 (1830). *BROMEL1ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 667.
ENCHOLIRIUM, Mart ex Schult. f. Syst. vii. 68, 1283 (1830).
GARRiBLiA.Gaudich. Bot Voy. Bonite, 1.115 (' 1844-66 ').
NAVIA, Schult. f. Syst. vii. 65,1195 (1830).
PRIONOPHYLLUM, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1873), App. iv. 3.
•IHssima, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 84.—Bras.
argentea, *Nichs Diet. Gard.* i. 497.-Hab.?
brevifol, *Hort. ex Baker, in Sound. Refug. Bot.* t •»6.—Bras.
•atharinensis, *C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berth* (1873) *AM.* iv. 4.—Bras.
"Wsiflora, *Schult./.Syst.* vii. 1194.—Bras.
•Wflora, *Schultlf. I. c-Bn*.*

DYCKIA:—
floribunda, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) SSL-Reg. Argent.
frigida, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6294.—Bras.
leptostachya, *Baker, in Gard. Chron.* (1884) II. 198.—Bras.
montevidensis, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1873) App. iv. 4=rariflora.
Princeps, Lem. Jard. Fl. iU. (1852-53) t. 224, 225, ex parte=altissima.
rariflora, *Schult./. Syst.* vii. 1195.—Bras.
remotiflora, Otto, in Otto & Dietr. Allg. Garten*, i. (1833) 129-rariflora.
sulphurea, *C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1873) *App.* iv. 3.—Reg. Argent.
tuberosa, Beer, BromeL 157= rariflora.

DYCTIOLOMA, DC. Prod. ii. 89 (1826)=Dietyoloma A. Juss, (Simarub.).

DYCTIOSPORA, Reinw. ex Korth. in Nederl. Kruidk. Aich. ii. II. (1851) 157 = HedyOtis, Linn. (Rubiac).
vaginata, Reinw. 1. c.=H. vaginata.

DYCTISPERMA, Rafin. Sylva Tellur. 159 (1838) = Bubus, Tourn. (Rosac).
apetalus, Rafin. 1. c. 160=R. apetalus.
lasiocarpus, Rafin. 1. c.-=R. lasiocarpus.
rigidus, Rafin. 1. c. = R. rigidus.
urtici/olius, Rafin. 1. c —R. urticaefolius.

DYCTOSPERMA, H. Wendl. in Kerch. Palm. 854 = Dietyosperma, H. Wendl. (Palinae).

DYDACTYLON, Zoll. Syst. Ven. Ind. Archip. 55 (1854) = DIDACTYLON, Mor. = Dimeria, R. Br. (Gramin.).

DTEHA, Hook. f. in Toura. Linn. Soc. xix. (1882) 293. *APOCYNACEAE.*
costulata, *Hook./. I. c*—Malaya,
laxiflora, *Hook./. FL Brit. Ind.* iii. 644.—Singapore.
Lowii, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 293.—Malaya.

DYLLWINIA, Nees, in R. Br. Verm. Schr. ii. 466 (1826), sphalm.=JDlllwynia, Sm. (Legum.).

DYMCZEWICZIA, Horan. Prod. Scitam. 26 (1862) = Zingiber, Adans. (Scitam.).
capitata, Horan. 1. c = Z. capitatum.
elata, Horan. 1. c.=Z. capitatum.
graminea, Horan. 1. c.«Z. gramineum.
marginata, Horan. 1. c. = Z. marginatum.

DYNAMIDIUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 371-Potentilla, Linn. (Rosac.).
agrivagum, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, iv. (1870)47, 170-P.vema.
aureum, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 871 = P. aurea.
australis, Timb. in Bull. Soc Hist. Nat. Toulouse, iv. (1870)47, 170=P. vema.
Clementi, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon N. S. xvi. (1868) 371 = P. subacaulis.
erodorum, Fourr. 1. c—Gallia.
juranum, Fourr. L c.=P. rubens.
minimum, Fourr. 1. c.~P. minima.
montanum, Timb. in Bull. Soc. Hist Nat. Toulouse, iv. (1870) 170 = P. splendent.
montivagum, Timb. 1. c 47= P. montivaga.
opacum, Fourr. in Ann. Soc linn. Lyon, N. S. xvi. (1868)371=P.opaca.
procumbens, Fourr. 1. c.=P. Sibbaldi.
reptans, Fourr. 1. c. = P. reptans.
stipulaceum, Timb. in Bull. Soc Hist. Nat. Toulouse, iv. (1870) 171-P. vema.
subacaule, Fourr. in Ann. Soc linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 371 = P. subacaulis.
syeniteum, Fourr. 1. c.=P. verna.
vernum, Fourr. 1. c.=P. vema.
vivariense, Fourr. L c = P. vema.
xerophilum, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat Toulouse, iv. (1870) 170 = P. vema.

DYNEBA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 5 (1816)=Dlnebra, Jacq. (Gramin.).

DYOSPYROS, Dum. Comm. Bot. 57 (1822)-Dlo-Bpyros, Linn. (Ebenac).

DYPLECOSIA, G. Don, Gen. Syst. iii. 788 (1834)-Diplycosia, Blume (Ericac).

DYPLOTAXIS, DC. in Mém. Mus. Par. vii. (1821) 243 -Diplotaxis, DC. (.Crncif.).

DYPONTIA, Dietr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 534 (1840) =Dupontla, R. Br. (Gram.).

DYPSIS, Noronha, ex Thou. Prod. Phytol. 2; in Mélang. Bot, nomen (1811). *PALMAE.* Benth. & Hook. f. iii. 909.
forficifolia, *Noronha, ex Thou. I. c; Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 180. t. 143. f. 2.—Madag.
hirtula, *Mart. 1. c.* 181.—Madag.
nodifera, *Mart. 1. c.* 812.—Madag.
pinnatifrons, *Mart. I. c.* 18U. t 158. f. 1.—Madag.

DYPTERYGIA, C. Gay, Fl. Chil. iii. 102 (1847) = DIPTERYGIA, Presl=Asteriacium, Cham. & Schlecht. (Umbellif.).

DYSCHORISTE, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 (1832) = Calophanee, D. Don (Acanthac).
biloba, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 72 = Asystasia coromandeliana.
cernua, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 81 = C. Nagchana.
depressa, Nees, 1. c- C. Nagchana.
geniculata, Nees, in DC. Prod. xi. 107.—Madag.
litoralis, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 81=C. littoralis.
radicans, Nees, in DC. Prod. xi. 106=C. radicans.

DYSEMONE, Soland. ex Forst. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) 46, nomen = Gunnera, Linn. (Halorag.).
integri/olia, Banks & Soland. ex Forst. f. 1. c.-G. magellanica.
lobata, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 275 = G. lobata.

DYSINANTHUS, Rafin. ex DC. Prod. vi. 270, in syn. (1837) = DISYNANTHUS, Rafin.=Antennarla, Gaertn. (Compos.).

DYSMICODON, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. Ser. II. viii. (1843) 255 = Speoularia, Heist. (Campan.).
cdli/ornicum, Nutt. 1. c. 256 - S. biflora.
ovatum, Nutt. 1. c.=-S. biflora.
perfoliatum, Nutt. 1. c. = S. perfoliata.

DYSODA, Lonr. Fl. Cochinch. 145 (1790) = SeriBBa, Comm. (Rubiac).
/asciculata. Lour. 1. c 146-S. foetida.
/oetida, Salisb. Prod. 60=S. foetida.

DYSODIA, Cav. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1802) 834 (Dyssodia). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 409.
BOEBERA, Willd.Sp. PI. iii. 2125 (1803).
CLOMENOCOMA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1816) 199 ; et in Diet. Sc Nat. ix. 416 (1817).
COMACLINIUM, Scheidw. & Planch, in FLdes Serres, viii. (1852). 19. t. 756.
acerosa, DC. Prod. v. 641 = Hymenatherum acerosnm.
alteraifolia, *Regel V Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857)41.—Hab. ?
anthemidifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 29.—Calif,
appendiculata, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 29.—Mexic.
appendiculata, Sch. Bip. ex A. Gray, in Proe. Am. Acad. xix. (1884) 88=squamosa.
cancellata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 38.—Mexic.
Cavanillesii, Lag. Gen. et Sp. Nov. 29 - Adenophyllum coccinenm.
chrysanthemoides, *Lag. I. c.*—Am. bor.
coccinea. Lag. 1- c.=Adenophyllum coccinenm.
Coopeii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 201.—Calif.
/astigiata, DC. Prod. v. 640, excl. syn.-chrysanthemoides.
glandulosa, Cav. Desc. 202-chrysanthemoides.
glandulosa, Less. Syn. Comp. 888=Adenophyllum Porophyllum.
grandiflora, DC. Prod. v. 640.—Mexic
incana, DC. I. c.=pubescens.
integerrima, Lag. Gen. et Sp. Nov. 29—pubescens.

DYSODIA :—
integrifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 87.—Mexic.
montana, *A. Gray, I. e.* 88.—Guatemala.
porophylla. Lag. Gen. et Sp. Nov. 29 = *D. Pi/rophyllum.*
porophylloides, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. v. (18S5) 322.—Calif.
Porophyllum, Cav. in Anal. Cienc. Nat. vi. (1808) = Adenophyllum Porophyllum.
pubescens. *Lag. I. c*—Mexic.
serratifolia, DC. Prod. v. 641 = Hymenatherum serratifolium.
speciosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (18W) 163.—Calif.
squamosa, *A. Gray, I. c.* xix. (1888) 88.—Mejiic.
subintegerrima, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 29.—Mexic.
tagetiflora, Lag. 1. c. - chrysanthemoides.
tagetoides, Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. 861 = Hymenatherum tagetoides.

DYSODIA, Spreng. Anleit. ii. n. 564 (1818) = DYSSODIA, Willd. = Adenophyllum, Pers. (Colppos.).

DYSODIDENDRON, Gardn. in Calc. Joum. Nat Hist, vii. (1847) 1-Baprosma, Blume (Uubiac).
ceylanica, Gardn. 1. c. 2 = S. ceylanicam.
glomeratum, Gardn. 1. c. 3 = S. indicum.
Wightii, Gardn. 1. c. = S. ceylanicum.

DYSODIUM, Rich, ex Pers. Syn. ii. 489 (1807) = Melampodium, Linn. (Compos.).
divaricatum, Rich. 1. c. = M. paludosum.
radiatum, Desf. Cat. Holt. Par. ed. III. 182 *M. palndosnm.

DYSOPHTIiLA, Blume, Bijdr. 826 (1826). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1180.
CHOTEKIA, Opiz & Corda, in Flora, xiii. (1880) I. 83.
EUSTERALIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 95 (1886).
auricularia, *Blume, Bijdr.* 826.—As. trop.
Benthamiana, Hance, in Ann. Sc. Nat. Se>. V. v. (1866) 234-verticillata.
crassicaulis, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* i. 30.—Reg. Himal.
crnciata, *Benth. 1. c.*—Ind. or.
erecta. *Dale, in Hoot. Kew Joum.* ii. (1850) 887.—Ind. or.
gracilis, *Dal*. 1. c.*—Ind. or.
Griffithii, *Hook. f. Ft. Brit. Ind.* iv. 641.—Ind. or.
Helferi, *Hook./. 1. c.* 640.—Burma,
japonica, *Miq. Ann. Afus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 102.—Japon.
linearis, *Benth. in DC. Prod.* xii. 157.—Reg. Himal.
linearis, Wall. Cat. n. 1540 = quadrifolia.
myosuroides, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* i. 80.—Ind. or.
myosuroides, Benth. 1. c. partim—rugosa.
penUgona, *C. B. Clarke, ex Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iv. 641.—Ind. or.
pumila, Benth. in Wall. PI. As. Rar. i. 30=crassicaulis.
quadrifolia, *Benth. 1. c.*—Ind. or.
ramosissima, Benth. in Wall. Cat. n. 1548 = verti-dllata.
rugosa, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 638.—Ind. or.
rupestris, Dalz. in Hook. Kew Jonm. iii. (1851) 120 = quadrifolia.
sahcifolia, *Dale, ex Hook. f. Ft. Brit. Ind.* iv. 638.—Ind. or.
Sampsoni, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Se>. V. v. (1866) 234.—China.
stellata, *Benth. in Wall. PI. As. Rar. i.* 30.—Ind. or.
Stocksii, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 642.—Ind. or.
strigosa, Benth. in Wall. I'l. As. Rar. i. 30 = Pogostemon strigosus.
tetraphylla, Wight, Ic. 1.1444=crnciata.
tomentosa, *Dale, in Hook. Kew Joum.* ii. (1850) 387.—Ind. or.
velutina, Benth. in Wall. Cat. n. 1538 = quadrifolia.
verticillata, *Benth. in Wall. PI. As. Rar.* i. 30.—As. ct Austral, trop.

DY8OP8I8, Baill. Etud. Gén. Euph. 435 (1858). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 264.
MIRABELLIA, Bert, ex Baill. Etud. Gen. Euph. 436 (1858).

DY8OPSIS :—
MOLINA, C. Gay, Fl. Chil. v. 845. t. 61 (1833).
Gayana, *Baill. 1. c.* 486.—Ins. J. Fernandez.
gleehomoides, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 949 = Gayana.

DYSOSMIA, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 325 (1856) = Saprosma, Blume (Rubiac).
dichotoma, Miq. 1. c. 826.—Malaya.

DYSOSMIA, M. Roem. Syn. Pepon. 149 (1846) - Passiflora, Linn.
aceri/olia, M. Roem. 1. c. 151=P. adenopoda.
ciliata, M. Roem. 1. c. 149 = P. foetida.
fluminensU, M. Roem.,1. c. 150 = P. Vellozii.
/eetida, M. Roem. 1. c. 149 = P. foetida.
gossypii/olia, M. Roem. 1. c. = P. foetida.
kastata, M. Roem. 1. c. = P. foetida.
hibisa'/olia, M. Roem. 1. c. = P. foetida.
nigelliflora, M. Roem. 1. c. 160=P. foetida.
polyadena, M. Roem. 1. c. 151 = P. foetida.

DYSOSMON, Ra6n. Fl. Ludov. 48 (1817)-Sesamum, Linn. (Pedalin.).
amoenum, Rafin. 1. c.—S. indicum.

DYSOXYLON, Bartl. Ord. 856 (1830)=seq.

DYSOXYIiUH, Blume, Bijdr. 172 (1825). *MELIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 332.
CAMBANIA, Comm. ex M. Roem. Syn. Hesper. 88.1C2 (1846).
DIDYMOCKETON, Blume, Bijdr. 177 (1825).
GONIOCHETON, Blume, 1. c (1825).
GONIOSCHETON, G. Don, Gen. Syst. i. 688 (1881).
HARTIGHSEA, A. JUSS. in Me'm. Mus. Par. xix. (1830) 227. t 4.
PRASOXVLON, M. Roem. Syn. Hesper. 83 (1846).
aculeatissimum, Steud. Norn. ed. II. i. 534, sphalm. = seq.
acuminatissimum, Blume, Bijdr. 173=alliaceum.
acutangulum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 503.—Sumatra,
albicans, *Vieill. ex C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 522. - N. Caled.
alliaceum, *Blume, Bijdr.* 172.—Java.
alliaceum, Seem. Fl. Vit. 36 = Richii.
amooroides, *Miq. in Ann, Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 16.—N. Guinea.
arborescens, *Miq. 1. c.* 24.—Borneo.
Balanseanum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 508.—N. Caled.
Beccarianum, *C. DC. I. c.* 496.—Borneo.
Becklerianum, *C. DC. I. c.* 509.—Austral.
Beddomei, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 548.—Ind. or.
bijugum. Seem. Fl. Vit. 87 - Lessertianum.
binectari/erum, Hiem, in Hook. f.Fl. Brit. Ind. i. 546, ex parte = Amoora filiciformis. *"
binectariferum, *Hook./, ex Bedd. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 212.—Ind. or.
binectari/olium, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 592 - Amoora filiciformis.
Blancoi, *Vidal. Cat. PI. Pr. Man.* 22; *Sinops.* p. xix.—Ins. Philipp.
Blumei, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 25.—Java,
brevipes, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 546.—Malacca,
camalense, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 505.—N. Caled.
cauliflorum, *Hiern, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 549.—Malacca,
caulostachynm, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 12.—N. Guinea.
Championii, Hook. f. & Thorns, ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 61 = Pseudocarapa Championii.
chrysophyllinum, *Vieill. ex C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 524.—N. Caled.
costulatum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 21.—Sumatra.
costulatum, Miq. 1. c. ex parte - Miquelianum.
Cumingionum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 497.—Ins. Philipp.
cuneatum, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 549.—Malacca.
cyrtobotryum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 604.—Sumatra.

DYSOXYLTJM :—
dasyphyllum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. IB.—Ins. Celebes.
densiflorum, *Miq. 1.* c. 9.—Java.
distantinerve, F. Muell. Fragm. ix. 61=latifolinm.
euneuron, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 22.—Ins. Ceram.
excelsum, *Blume, Bijdr.* 176.—Java,
flavescens, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 649.—Malacca.
Forsteri, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 507.—Austral,
foveolatum, *Radii, in Siteb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 598.—Ins. Timor.
Fraseranum, *Benth. Fl. Austral,* i. 381.—Austral.'
fraternum, *Miq Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 25.—Java,
gatopense, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 524.— N. Caled.
Gaudichaudianum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 15.—Ins. Rawak.
glabrum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 488.—Java.
glomeratum, *Vieill. ex C DC. 1. c.* 521.—N. Caled.
grande, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 647.—Ind. or.
grandiflorum, Wight & Am. Prod. 128 = Chisocheton grandiflorus.
Griffithii, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 649.—Malacca.
Halmaheirae, *C. DC. in DC. Monog. hhan.* i. 488.—Java.
Hamiltonii, *Hiern, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 548.—Reg. Himal.
Klanderi, *F. Muell. Fragm.* v. 176.—Austral.
Kunthianum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. IS—N. Guin.
Lampongum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. i. 503 *• macrothyrsum.
lasiocarpum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Ludg. Bat.* iv. 13—N. Guin.
latifolium, *Benth. Fl. Austral,* i. 381.—Austral.
lati/olium, F. Muell. Fragm. v. 144-oppositifolium.
laxiflorum, Blume, Bijdr. 174 = alliaceum.
Lenormandianum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 512.—N. Caled.
Lessertianum, *Benth. Fl. Austral,* i. 382.—Austral.
Lobbii, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 484.—Java.
longi/olium, Blume, Bijdr. 173= alliaceum.
macranthum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 625.—N. Caled.
macrocarpum, *Blume, Bijdr.* 175.—Java.
macrocarpum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 60=binectariferum.
macrophyllum, *Teijsm. (f Binn. Cat. Hort. Bog.* 2Hi nomen.—Java,
macrostachyum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 504.—N. Caled.
macrothyrsum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* "• 20.— Borneo.
Maingayi, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind. i.* 547.—Malacca,
malabaricum, *Bedd. ex C. DC. in DC. Monog. Phan.* <• 491.—Ind. or.
minutiflorum, *C. DC. 1. c.* 487.—N. Caled.
Miquelianum, *C. DC. I. c.* 488.—Malaya,
molle, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 18.—N. Guinea.
mollissimum, *Blume, Bijdr.* 175.—Java.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* i. 881.—Austral.
multijugum, Am. ex Wight & Am. Prod. 121 - Chisocheton paniculatus.
Nagelianum, *C. DC in DC. Monog. Phan.* i. 604.—Java.
Nemstii, *F. Muell. Fragm. v.* 176.—Austral,
nitidum, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 622.—N-Caled.
nutans, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 17.—J[ava>
oppositifolium, *F. Muell. Fragm.* v. 177, 144.—Java,
otophorum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 16-" Java,
pachypodnm, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 6H—N. Caled.
pallens, *Hiern, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 648.—-Reg. Himal.
Pancheri, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 514.—«• Caled.
paniculatum, Am. ez Wight, Ic. t. M6~Chuocnetoa pAniculstns*

DTBOXYLUM:—
parvifol'am, *C. DC. in DC. Manog. Phan.* i. 611.—N. Caled.
Patersoni, *F. Muell. Census, Suppl.* i. S.—Ins. Norfolc.
procerum, *Hiern, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 647.—Ind. or.; Bnrma.
ptychocarpum, *Radii, in Siteb. Math.-Phys. Acad. Muench.* ix. (1879) 593.—Anstral.
pubesccns, *Teijsm. (f Binn. Cat. Hort. Bog.* 311, nomen.—Java,
ramifiornm, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 10.—Java.
Richii, *C. DC. in DC. Uonog. Phan.* i. 511.—Ins. Fiji.
roseum, *C. DC. I. c.* 514.—N. Caled.
nifescens, *Vieill. ex Panch.* &" *Scbert, Not. Bois Nouv. Calid.* 226.- N. Caled.
nifum, *Benth. Ft. Austral,* i. 382.—Austral.
salutare, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 42 = Blancoi.
•amoënse, *A. Gray, Bot. U. St. Exfil. Exped.* i. 241.—Ins. Tntuila.
SchiSheri, *F. Muell. in Melb. Chemist* (1881), 53 ; *et in Trans. Bot. Soc. Edinb.* xiv. (1883) 369.—Austral,
schizochitoidc, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 519.—Malaya.
Schnlzii, *C. DC. 1. c.* 602.—Austral,
sessile, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 16.—Ins. Amboina.
setosum, *Miq. I. c.* 13.—Ins. Timor,
simile, *Blums, Bijdr.* 174.—Java.
Spanoghei, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 14.—Ins. Timor.
speciosum, *Miq. I. c.* 11.—Ins. Timor,
spectabile, *Hook. /. Handb. N. Zeal. Fl.* 41.—N. Zel.
spicifiorum, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 35 = Amoora timorensis.
Teysmannii, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 610.—Java,
thyrsoideum, *Hiern, in Hook./. Fl.Brit. Ind.* i. 547.—Malacca,
trichostylum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 11.—Java.
Turczanihowii, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 501.—Ins. Philipp.
nnijugum, *C. DC. 1. c.* 507.—N. Caled.
Vieillardi, *C. DC. 1. c.* 513.—N. Caled.
Vrieseanum, *C. DC. 1. c.* 491.—Java.

DTSPHANIA, R. Br. Prod. 411 (1810). *ILLECEBRACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 14.
Httoialis, *R. Br. Prod.* 412.—Austral.
Uttoralis, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 86 = myriocephala.
myriocephala, *Benth. Ft. Austral,* v. 165.—Austral.
Plantaginella, *F. Muell. Fragm.* i. 61.—Austral.

DY8SOCHKOMA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. iv. (1849) 250. *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 901.
TRIANAEA, Planch. & Linden, in Linden, Prix-Cour. n. 8 (1653), 4.
albidoflavum, *Lem. Illustr. Hortic.* vi. (1859) *Misc.* 40.—Bras.
ttimia,.5»>M. *V Hook./. Gen.* ii. 904, in nota.—Hab. ?
longipes, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. II. iv. (1849) 252.—Bras.
Thidiflora, *Miers, 1. c.* 261.—Bras.

DYSSODIA, Cav. in Anal. Clenc. Nat. vi. (1802) 334 = Dyaodia, Cav. (Compos.).

DYSSODIA, Willd. Enrnn. Hort. Berol. 900 (1809)- Adenophyllum, Pers. (Compos.).
Porophylla, DC. Prod. v. 689= sea.
Porophyllum, Willd. Enum. Hort. Berol. 900 = A. Porophyllum.

DZtBDTJSZYCKIA, Rehm. in Oestr. Bot. Zeitschr. xviii. (1868) 374. *NAIADEAE.*
umnobia, *Rehm. I. c*—Reg. Caucas.

E

EADESIA, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet ii. (1858) 71=Anthooereis, Labill. (Solanac).
'nthocerddea, F. Muell. 1. c. 72-A. Eadesii.

EAPLOSIA, Rafin. New Fl. Am. ii. 61 (1836) = Baptisia, Vent. (Legumin.).
longi/olia, Ratin. 1. c. 52.—Am. bor.
ovata, Rafin. 1. c = B. simplicifblia.

EAKINA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1699 (1834). *ORCHIDEAE.* Benth. ft Hook. f. iii. 516.
autumnalis. Hook. f. Fl. N. Zel. i. 239 = suaveolens.
Deplanchei, *Reichb./. in Linnaea,* xli. (1877) 96.—N. Caled.
laxior, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 64.—Ins. Taiti.
mucronata, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1699.—N. Zel.
plana, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 54.—Ins. Fiji,
quadrilobata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 325.—N. Zel.
suaveolens, *Lindl. Bot. Reg.* (1B43) *Misc.* 61.—N. Zel.
valida, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 96.—N. Caled.

EARLIA, F. Muell. Fragm. iii. 159 (1863) - Graptophyllum, Nees (Acanthac).
excelsa, K. Muell. 1. c. 160 = G. Earlii.

EATONELLA, A. Gray, in Froc. Am. Acad. xix. (1883) 19. *COMPOSITAE.*
Congdoni, *A. Gray, I. c.* 20.—Calif,
nivea, *A. Gray, I. c.* 19.—Am. bor. occ.

EATONIA, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 104. *GRAMINEAE,* Benth. 8c Hook. f. iii. 1184.
COLOBANTHOS, Trin. in Mem. Acad. Petersb. Sér. VI. i. (1830) 66.
REBOULEA, Kunth, Rev. Gram. 341 (1830).
obtusata, *A. Gray, in S. Wats. Bot. Calif,* ii. 302.—Am. bor. occ.
purpurascens, *Rafin. in Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 104.—Am. bor.

EBELIA, Reichb. Norn. 74 (1841) - Triodon, DC. (Rubiac).

EBEL1NGIA, Reichb. Consp. 199 (1828) = Harrisonia, K. Br. (Simarub.).
Brownei, Steud. Norn. ed. II. i. 635 = H. Brownei.

EBENIDIUM, Jaub. ft Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 162 = EbenUS, Linn. (Legumin).
Lagopus, Jaub. *8c* Spach, 1. c. 163 = Ebenus Lagopus.

EBENOXYLON, Spreng. Gen. i. 40 (1830) < seq.

EBENOXYLUM, Lour. Fl. Cochinch. ii. 613 (1790) - Maba, For.-t. (Ebenac.).
verum. Lour. 1. c. = M. elliptica.

EBENTJS, Linn. Sp. PI. 764 (1763). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Be* Hook. f. i. 512.
EBENIDIUM, Janb. ft Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 1S2.
barbigera, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 98.—As. Min.
Boisseri, *W. Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.* xxl. (1885) 95.—Oriens.
Bourgaei, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 554.—Lycja.
capensis. Linn. Mant. 264 = Lebeckia cytisoides.
cilidca, Schott *Be* Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, ii. 656 = Montbretii.
cretica, *Linn. Sp. PI.* 764.—Ins. Creta.
depressa, *Boiss.* b* *Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 60.—Cappadoc.
erinacea, Janb. & Spacb, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 161 = stellata:
/erruginea, Jaub. *Sc* Spach, 1. c 160 •» stellata.
hirsuta, *Jaub. V Spach, IUustr.* iii- 65. t. 251.—As. Min.
horrida, Jaub. *Sc* Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1848) 159 = stellata.
Lagopus, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 568.—Persia.
laguroides, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 99 = Montbretii.
leucomelas. Comm. ex Poir. Encyc. v. 432 = Diospyros leucomelas.
longipes, *Boiss. b[1] Bal. Diagn.* Ser. II. vi 60.—Cappadoc.
macrophylla, *Jaub. V Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xix. (1843) 156.—Cappadoc.
melanida, Comm. ex Poir. Encyc. v. 431 = Diospyros melanida.
molucca, *Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xvtii. (1796) 60.—Ins. Maurit.

EBENUS:—
Montbretii, *Jaub.* &" *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xix. (1843) 154.—Cappadoc.
pinnata, *Ait. Hort. Ken.* ii. 27.—Barbaria.
pinnata, Sibth. *Be* Sm. Fl. Graec. t. 740 - Sibthorpii.
plumosa, *Boiss. V Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 59.—As. Min.
pogonotropis, Jaub. ft Spach, in Ann. Sc Nat Sér. II. xix. (1843) 155-barbigera.
Stbthorpii, *DC. Mim. Ug.* vii. t. 63.—Graecia.
stellata, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 100.—Arab, j Persia.
stipulacea, Griseb. Spicil. H. Rumel. i. 12-Montbretii.
tesselaria. Comm. ex Poir. Encyc v. 430-Diospyros melanida..
tragacanthoid.es. Jaub. *8c* Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. II. xix. (1843) 158 '- stellata.

EBERLEA, Riddell, ex Nees, in DC. Prod. xi. 85 (1847) = Hygrophila, R. Br. (Acanthac).
glomerata, Riddell, ex Nees, 1. c 86 - H. lacustris.

EBERMAZERA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 (1832). *ACANTHACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 1074.
ERYTHRACANTHUS, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 (1832).
STAUROGYNE, Wall. 1. c ii. 80. t. 186 (1832).
STIFTIA, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 70 (1847).
angustifolia, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 451.—Ind. or.
anigozanthus, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 17.—Bras.
argentea, Nees, in DC. Prod. xi. 76 = lanceolata.
aristata, T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 398-angustifolia.
axillaris, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. SO.—Penang.
Beddomei, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 402.—Burma,
brachiata, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 69.—Bras,
condnnula, *fiance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 300.—China,
coriacea, *T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 402.—Burma,
debilis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 452.—Ins. Philipp.
diffusa, Kurz, in Joum. As. Soc. Berg. xl. (1871) n. 74 = thyrsoidea.
elegans, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 17.—Bras,
elongate, *Nees, in DC. Prod.* xi. 721.—Malaya,
fastigiata, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 19.—Bras.
glauca, T. Anders, in Joum. Linn. Soc ix. (1867) 450, partim = glulinosa.
glauca, T. Anders, in Thw. Enum. PL Zeyl. 224—zeylanica.
glauca, *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 310.—Ind. or.
glutinosa, *Wall. Cat.* n. 9087.—Ind. or.
gracilis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 453.—Burma,
gracilis. *Wawra, Itin. Princ. Coburgi,* i. 94. t. 10 B.—Bras.
Griffithiana, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 452.—Malacca.
Helferi, *T. Anders. I. c*— Burma.
Hel/eri, T. Anders, in Herb. Kew. ex T. Anders, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 400 = E. macrophylla.
hirsuta, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 18.—Bras,
humilis, *Miq. Stirp. Surin. Select.* 128.—Guiana,
humilis, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 80.—Burma,
incana, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 147.—Burma; Java.
Itatiaiae, *Wawra, Itin. Princ Coburgi,* i. 93. t. 11.—Bras.
lanceolata, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 147.—Malaya,
lasiobotrys, *Nees, in DC. Prod.* xi. 722.—Burma.
ligulata, Bedd. Ic. Ind. Or. i. 69 = glauca.
longifolia, *Nees, in DC. Prod.* xi. 76.—Malacca.
Macclellandii, *T. Anders, in Journ. Linn. Sec. ix.* (1867) 454.—Burma,
macrophylla, *T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iv. 400.—Burma,
mandioccana, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 80.—Bras,
merguensis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 452.—Burma.

EBEBJffAIERA :—
minarum. *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 17.—Bras.
Neesii, *Vidal, Phan. Cuming. Pkilipp.* 84.—Ins. Philipp.
nelsonioides, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 566.—Ins. Banca.
nitida, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1879) I. 812.—Bras,
obtusa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 458.—Burma.
paniculata, *Wall, ex T. Anders. 1. c.*—Ind. or.
parviflora, *T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook, /, Fl. Brit. Ind.* iv. 402.—Burma,
pedicellate, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 176.—Ind. or.
polybotrya, *Nees, in DC. Prod.* xi. 74.—Ind. or. j Burma.
pulchella, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 183 = Turraea pinnata.
racemosa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 775.—Malaya,
repens, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 20.—Guiana.
Riedeliana, *Nees, I. c.* 18.—Hras.
Sanctae-Catharinae, *Nees, in DC. Prod.* xi. 72.—Bras.
setigera, T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 898 = angustifolia.
setigera, *Nees, in DC. Prod.* xi. 76.—Malaya.
Simonsii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 451.—Reg. Himal.
spathulata, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 147=glauca.
spiciflora, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 566.—Sumatra.
Staurogyne, T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 398 = angustifolia.
Staurogyne, *Nees, in DC. Prod.* xi. 75.—Keg. Himal.
stolonifera, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 19.—Bras.
subpaniculata, Hassk. in Retzia, i. 77=elongata.
thyrsoidea, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 80.—Burma.
trichocephala, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 774=setigera.
Vauthieriana, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 15.—Bras.
velutina, Nees, in DC. Prod. xi. 76=incana.
venosa, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 453 =paniculate,
veronicifolia, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 18.—Bras.
Warmingiana, *Hiern, in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1877-78) 68.—Bras.
acylanica, T. Anders, in Jonm. Linn. Soc. ix. (1867) 451, partim = thyrsoidea.
zeylanica, *Nees, in DC. Prod.* xi. 74.—Ind. or.

EBERMAYERA, Meissn. Gen. 293 (1840) = praec.

EBERMEYERA, Endl. Gen. 698 (1889)-praec.

EBERMIERA, Wight, Ic. iv. 17 (1849)= praec.

EBULUM, Garcke, Fl. Deutschl. ed. VII. 184 (1865) = Sambucus, Toura. (Caprifol.).
humile, Garcke. 1. c.=S. Ebulus.

EBULUS, Pont, ex Linn. Syst. ed.I. (1735) = SambucuB, Toum. (Caprifol.).

EBURNAX, Rafin. New Fl. Am. i. 42 (1836) - Mimosa, Toum. (Legumin.).
pudica, Rafin. 1. c. = M. pudica.
spinalba, Rafin. Sylva Tellur. 119=Acacia eburnea.

EBTTBOFETAIiTTM, Becc. in Nuov. Giorn. Bot. iii. (1871) 181. *ANONACBAE.*
bomeense, *Becc. 1. c.*—Borneo.

ECA.8TAPHYI.IIUM:, P. Br. Hist. Jamaic. 299 (1756). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 545.
ACOUROA, Anbl. PI. Gui. 753. t. 301 (1775).
DRAKENSTF.NIA, Neck. Elem. iii. 33 (1790).
HECASTOPHYLLUM, H. B. *SC* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 887 (1824).
PTEROCARPUS, Berg, in Vet. Acad. Handl. Stockh. 116 (1769).
Benthamianum, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 575 = E. Monetaria.
Berterii, DC. Prod. ii. 421 = E. Monetaria.
Brownei, *Pers. Syn.* ii. 277.—Am. austr.
dubium, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 388.—Venezuela.

ECASTAPHYLLUM.—
foliosum, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 64 = glaucum.
glaucum, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sir.* I. ix. (1826) 423.—Porto Rico.
hygrophilum, Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 93 = E. Monetaria.
microphyUum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 268.—Venezuela.
molle, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 437 = Brownei.
Monetaria, *Pers. Syn.* ii. 277.—Am. trop.
nitidum. Mart, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 93 = E. Monetaria.
Plumieri, Pers. Syn. ii. 277 = E. Monetaria.
pubescens, *DC. Prod.* ii. 421.—Guiana.
Richardi, Pers. Syn. ii. 277 = E. Monetaria.
Sieberi, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 535' Brownei.
tomentosum, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 229.—Bras.
violaceum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 98 = Geoffrea violacea.

ECBALIUM, DC. Prod. iii. 811, in syn. (1828) = seq.

ECBALLION, Koch, Syn. FL Germ. 251 (1885) -seq.

ECBAIiLItTlE, A. Rich, in Diet. Class. Hist. Nat. vi. 19 (1824). *CUCURBITACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 826.
ECBALIUM, DC. Prod. iii. 811, in syn. (1828).
agreste, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 294 = E. Elaterium.
Elaterium, *A. Rich, in Diet. Class. Hist. Nat.* vi. 19.—Reg. Mediterr.
Lambertianum, M. Roem. Syn. Pepon. 62 = Cocumis trigonus.
officinate, T. Nees, PI. Off. t. 271 = E. Elaterium.
officinarum, Rich, ex M. Roem. Syn. Pepon. 52=E. Elaterium.
purgans, Schrad. in Linnaea, xii. (1888) 421 ^ E. Elaterium.

ECBOLIUM, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) II. 75. *ACANTHACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1118.
Linneanum, *Kurt, 1. c*—As. et Afr. trop.
striatum, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 89.—Ins. Socotra.

ECBOLIUM, Riv. ex Linn. Syst ed. I (1735)-Justicia, Linn. (Acanth.).

ECCLIMUSA, Mart, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 156 (1844) =seq.

ECCLINUSA, Mart, in Flora, xxii. (1889) I. Beibl. 2 (Herb. Fl. Bras. 177). *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 654.
PASSAVERIA, Mart. & Eichl. Fl. Bras. vii. 85. tt. 88 et 47. f. 1, 3 (1863).
ramiflora, *Mart. II. cc.*—Bras.

ECCOILOPUS, Steud. Syn. PI. Gram. 123 (1855) = Eulalia, Trin. (Gramin.).
andropogonoides, Steud. 1. c. 124=E. cotulifera.

ECCREMANTHUS, Thw. in Hook. Kew Journ. viL (1855) 272. t. 9=Pometia, Forst. f. (Sapindac).
eximius, Thw. 1. c =P. tomentosa.

ECCREMIS, Baker, in Joum. Linn. Soc. xv. (1876) 319 sphalm.=Excremis, Willd. (Liliac).

ECCBEMOCARPUS, Ruiz & Pav. Prod. 90. t. 18 (1794) *BIGNONIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1050.
CALAMPELIS, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. vii. (1829) 89.
longiflorus, *Humb. (f Bonpl. PI. Aequin. i.* 229. t 65.—Peruv.
ruber, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 51.—Hab.t
scaber, *Ruis & Pav. Syst. Veg.* 157.—Chili.
sepium, Bert, in 'Merc. Cb.il. 1829'.—Cf. Bull. Férossac, xx. (1830) 111=scaber.
viridis, *Ruis (f Pav. Prod.* 90. t. 18.—Peruv.

ECDEIOCOLEA, F. Muell. Fragm. viii. 236 (1874). *RESTIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1030.
monostachya, *F. Muell. 1. c.*—Austral.

ECDY8ANTHEHA, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 198. t. 42 (1836). *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 714.
DENDROCHARIS, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 452 (1856).
barbata, Miq. Fl. Ind. Bat.ii. 451-Parameria glandulifera.
brachiata, A. DC. in DC. Prod. viii. 443 = micrantha.
densiflora, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 452.—Java.
glandulifera, A. DC. in DC. Prod. viii. 443 = Parameria glandulifera.
Griffithii, Wight, Ic. t 1307= Parameria glandulifera.
micrantha, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 442.—Reg. Himal.; Burma.
pedunculosa, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 557=Parameria pedunculosa.
rosea, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 198.—China.
scandens, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 309 =Anodendron inflatum.
Schrieckii, Heurck *Sc* Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 191=Micrechites Schrieckii.
torosa, Llanos, Fragm. 51 "Parameria philippinensis.

ECHALTIUM, Wight, Ic. ii. 4. t. 472 (1841)=Melodinus, Forst. (Apocyn.).
piscidium, Wight, 1. c. = M. monogymu.

ECHEANDIA, Orteg. Hort. Matr. 90, 135. t. 18 (1797). *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. *t.* iii. 789.
albiflora, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Bmx. ix. (1842) reimpr. 15 = temiflora.
eleutherandra, *C. Koch, Ind. Sent. Hort. Berol.* (1861) *App.* 4.—Mexic.
graminea, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux.ix. (1842) reimpr. 16 = Anthericum leptophyllum.
Haenkeana, Kunth, Enum. PI. iv. 629— temiflora.
leptophylla, Benth. PI. Hartw. 25 = Anthericum leptophyllum.
leucantha, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. viii. (1840) 275=temiflora.
scabrella, Walp. Ann. iii. 1010 = Anthericum scabrellum.
temiflora, *Orteg. Hort. Matr.* 90, 186.—Mexic.

ECHENAIS, Cass. in Bull. Soc. Fhilom. (1818) 83-Cnicus, Toum. (Compos.).
carlinoides, Cass. in Diet. Sc. Nat xiv. 170 - C. cariinoides.
cirsioides, DC. Prod. vi. 661 = C. argyracanthns.
ferox, Edgew. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 318 = C. Wallichii.
nutans, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiv. 170 *{ = Cirsium scleranthum).*—As. Min. ; Persia.
scleranthe, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 404 (= *Cirsium scleranthum).*—As. Min.; Persia.
Sieversii, Fisch. *Sc* Mey. in Schrenk, Enum. PI. Nov. 44.—Sibir.

ECHETBOSIS, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 129 (reimpr. 28). *COMPOSITAE.*
pentasperma, *Phil. II. cc.*—Reg. Argent.

ECHEVERIA, DC. Prod. iii. 401 (1828)=Cotyledon, Linn. (Crassul.).
abyssinica, Otto, in Hamb. Gartenz. xxix. (1878) 6.—Abyss.
acuti/olia,Uadl. Bot Reg. (1842) t. 29-C. acutlfolia.
adunca, Otto, in Hamb. Gartenz. xxix. (1873) 6 = C. adunca.
agavoides, Lem. Illusti. Hortic. x. (1863) Misc. 78 =• C. agavoides.
amoena, L. de Smet, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxv. (1875) 216.—Mexic.
argentea, Hort. ex Lem. Illustr. Hortic. x. (1863) Misc. 78 — C. pulverulenta.
atropurpurea, Hort. ex Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. (1870) sub t. 198 = C. atropurpurea.
Bernhardyana, Foerst. ex Lem. Illustr. Hortic <• (1863) Misc. 78.—Hab.?
bifida, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 411=C. bifida.
bracteolata, Link, Klotzsch, *Sc* Otto, Ic. PI. ii. 68-=C. bracteolata.
bracteosa, Lindl. *Sc* Paxt. Flow. Gard. iii. (1862-63) 60 = C. Pachyphytum.
caespitosa, DC. Prod. iii. 401 - C. caespitosa.
californica, Hort ex Baker, in Saund. Refug. Bot. i. sub t. 70 = C. californica.

ECHEVERIA:—
calophana, Hort. ex Lem. lllustr. Hortic. x. (1863) Misc. 78 = Cotyledon acutifolia.
campanulata, Knnze, Delect Sem. Hort. Lips. (1842); et in Linnaea, xvii. (1813) 574 = C. caespitosa?
canaliculata, Hook. Bot. Mag. t. 4986=C. canalicula
carnicolor, E. Morr. Belg. Hortic. xxiv. (1874) 158=C. carnicolor.
clavifolia, Delenil, ex £. Morr. 1. c. 329 = C. Pachyphytum.
coccinea, DC. Prod. iii. 401 = C. cocdnea.
Cooperi, Otto, in Hamb. Garteiiz. xxix. (1873) 7 = C. Cooperi.
Corderoyi, E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 159 = C. Corderoyi.
cymosa, Hort. ex Lem. lllustr. Hortic. x. (1863) Misc. 79 = C. cymosa.
decipiens, E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 159 = C. decipiens.
Desmetiana, L. De Smet, ex E. Morr. 1. c = C. Desmetiana.
discolor, L. De Smet, ex E. Morr. 1. c.—Mexic.
erectax, Delenil, ex E. Morr. 1 c. 329=C. coccinea.
eximia, De Vos, ex E. Morr. 1. c. xxv. (1875) 99.—Hab. ?
farinosa, Hort. ex Van Houtte, in Fl. des Series, xviii. (1873) 1 = C. pulverulenta.
farinosa, Lindl. in Jonrn. Hort. Soc. iv. (1849) 292 = C farinosa.
farinulenta, Lem. Illnstr. Hortic. xi. (1864) sub t. 392 = C. farinnlenta.
ferrea x, Delenil, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 829 - C . Scheerii.
fulgens, Urn. in Hort. Van Houtt. (1845) fasc. i. 8 j et Jard. Fleur. iii. (1853) t. 244 = C. fulgens.
Funki, L. De Smet, ex E. Morr. Belg. Hortic. xxvii. (1877) 169.—Hab. ?
gibbiflora, DC. Prod. iii. 401 = C. gibbiflora.
glauca, Hort. ex Baker, in Sannd. Refug. Bot. i. snb t. 61 = C. glauca.
globosa, Hort ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 161 =C. glauca?
gracillima, Muehlenpf. ex Otto, in Hamb. Gartenz. xxix. (1873) 7=C. secunda.
grandiflora, Haw. in Tayl. Pbil. Mag. (1828) 263 = C. gibbiflora.
grandifolia. Otto, in Hamb. Gartenz. xxix. (1873) 7- C. gibbiflora.
grandis, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 161 = C. gibbiflora.
grandUepala x, Deleuil, ex E. Morr. 1. c. 329.
Grayii, Morr. 1. e. 161 = C. Grayii.
Greeni, L. De Smet, ex Morr. 1. c—Afr. anstr.
Hookerii, Lem. lllustr. Hortic. x. (1863) Misc. 80.—Mexic.
imbricata x, Deleuil, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. . (1874)329.
imbricatissima, L. De Smet, in Rev. Hortic. iii. (1877)147.—Hab.?
lanceolata, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 561 = C. caespitosa.
'anceolata, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 89, partim =C. farinosa.
'axa, Lindl. in Joum. Hort. Soc. iv. (1849) 292 = C. caespitosa.
'nguaefolia, Lem. Illustr. Hortic. x. (1863) Misc. 81 = C. linguaefolia.
«cida, Steud. Nom. ed. II. i. 535 = C. lurida.
"•ida, Haw. in Tayl. Phil. Mag. (.1831) 418 = C. lurida.
vacrophylla, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 162,nomen.—Hab.?
"letallica, Hort. Kew. ex Lem. Illustr. Hortic. x. U863) Misc. 81=C. gibbiflora.
mirabilis x , Delenil, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxv. (1875) 370.
""steca, L. De Smet, ex E. Morr. I.e. xxiv. (1874) 162. '—Hab. ?
nucronata, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1836) 411=C. mucronata, *Baker,*
""ttabilisx, Deleuil, ex E. Morr. in Belg. Hortic. x»v. (1874) 330.
"avicularis, L. De Smet, ex E. More. 1. c 162.—Hab.»
"odulosa, Otto, in Hamb. Gartenz. xxix. (1873) 8 = C. nodulosa.
«uda, Baker, in Gard. Chron. (1856) 280 = C. nuda.
""•atax, Deleuil, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 330.
pacl>yphytioidesx, L. De Smet, ex E. Morr. 1. c. 168.

ECHEVERIA :—
Pachypkytum, E.' Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874') 157 = Cotyledon Fachyphytum.
paniculata, A. Gray, PI. Wright, i. 76 = C. Grayii.
paniculata, Moç. & Seise, ex DC. Prod. iii. 850 = Fouquiera spinosa.
Peacockii, Baker, in Gard. Chron. (1874) II. 258=C. Peacockii.
peruviana, Meyen, Reise, i. 448 = C. peruviana.
Pfersdorffii, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 163.—Hab. ?
pruinosa x, E. Morr. L c.
pubescens, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 411 = C. pubescens.
pulverulenta, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. S60 = C. pulverulenta.
pumila, Van Houtte, Cat. (1846); Schlecht. Hort. Hal. 20=C. pumila.
quitensis, Lindl. in Joum. Hort Soc. vii. (1852) 268 = C. qujtensis.
raeemosa, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 554 = C. lurida.
retusa, Lindl. in Joum. Hort. Soc. ii. (1847) 306=C. retusa.
rhombifolia, Otto, in Hamb. Gartenz. xxxix. (1873) 9 = C. rhombifolia.
rosacea, Lind. & Andre[1], Illustr. Hortic. xx. (1873) 64. 1.124 =C. secunda.
rosaeformis, L. De Smet, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxv. (1875) 100.—Hab. ?
rosea, Lindl. Bot. Reg. (1842) t. 22 = C. roseata.
sanguinea, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 166=C. atropurpurea.
scaphyllax, Deleuil, ex E. Morr. 1. c. xxii. (1872) 305.
Scheerii, Lindl. Bot. Reg. (1845) t. 27 = C. Sheerii.
Scheidecieri, L. De Smet, in Rev. Hortic. Beler. iii. (1877) 148.—Hab. ?
secunda, Booth, ex Lindl. Bot Reg. (1888) Misc. 59= C. secunda.
securifera x, Delenil, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxv. (1875) 870.
spathulata, Bull, ex E. Morr. 1. c. xxiv. (1874) 176 = Kalanchoë ipathulata.
spathulifolia, L. De Smet, ex E. Morr. 1. c. 167.—Hab.?
spicata, Moç. *8c* Sesse, in DC. Prod. iii. 349 = Fonqueria formosa.
spilota, Kunze, ex Walp. Ann. v. 12 = C. secunda.
spiralisx, Delenil, ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxv. (1875) 871.
Sprucei, E. Morr. 1. c. xxiv. (1874) 167 = C. Sprucei.
stellata x, Deleuil, ex E. Morr. 1. c xxv. (1875) 371.
stolonifera. Otto, in Hamb. Gartenz. xxix. (1873) 9 = C. stolonifera.
strictiflora, A. Gray, PI. Wright i. 76=C. strictiflora.
subspicata, E. Morr. in Belg. Hortic xxiv. (1874) 168 = C. subspicata.
subulifolia, E. Morr. 1. c. = C. subulifolia.
teretifolia, DC. Prod. iii. 401=C. subulifolia.
tortuosa, Hort. ex E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 168, nomen.—Hab. ?
undulatax, L. De Smet, ex E. Morr. 1. ç.-C. undulata.
Van-Celsti, L. De Smet, ex E. Morr. 1. c., nomen.—Hab. ?
VervlieH, Hort. ex E. Morr. 1. c, nomen.—Hab. ?
villosa, L. De Smet, ex E. Morr. 1. c, nomen.—Hab. ?
yuccoides, Hort. ex E. Morr. 1. c. =• C. agavoides.

ECHEVERRIA, Lindl. & Paxt Flow. Gard. iii. (1852-53) l=praec.

ECHIDIOCARYA, A. Gray, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 854 (1876). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
arizonica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 89.—Arizona.
californica, A. Gray, I. c. xii. (1877) 164 = Plagiobothrys Cooperi.
ursina, A. Gray, 1. c. xix. (1883) 90 = Plagiobothrys uninus.

ECHIDNIUM, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 62 = Dracontium, Linn. (Aroid.).
Regelianum, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 286.—Am. trop.

ECHIDNIUM:—
Schomburgkii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 62.—Guiana.
Spruceanum, Regel, Gartenfl. (1866) 98. t. 503 = *Regelianum.*
Spmceanum,Sdiott,iii Oestr. Bot. Zeitschr.viil. (1858) 850=Cyitosperma Spruceanum.

ECHIDNOPSIS, Hook. f. Bot. Mag. t. 5930 (1871). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 781.
cereiformis, *Hook.f. 1. c.*—Afr. austr.

ECHOTACANTHTTS, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75, 90 (1832). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1080.
Andersoni, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 415.—Reg. Himal.
attenuatus, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 90.—Reg. Himal.
Brugmansianus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 168.—Ind. or.
calycinus, Nees, 1. c.=Strobilanthes helictns.
longistylus, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 415.—Reg. Himal.
LyaUianus, Nees, in DC. Prod. xi. 168—Nomaphila Lyalliaua.
madagascariensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 218.—Madag.
parviflorus, *T.Anders. I. c.* ix. (1867) 459.—Reg. Himal.
Pumilio, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 415.—Reg. Himal.

ECHINACEA, Moench, Meth. 591 (1794). *COMPOSJTAE.* [Benth. & Hook. f. ii. 866.]
BRAUNERIA, Neck. Elem. i. 17 (1790).
HELICHROA, Rafin. Neogenyt. 8 (1825).
LEPACHIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195.
angustifolia, *DC. Prod.* v. 554.—Am. bor.
atrorubens, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 354 = Rudbeckia atrorubens.
Dicksoni, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) t. 27.—Mexic.
dubia, *Knowles V Westc. Fl. Cab.* iii. (1840) 163—Mexic.
keteropkylla, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. 32 = Iostephana heterophylla.
intermedia, Lindl. ex Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 79 = purpurea.
napifolia. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 310 - Rudbeckia napifolia.
pallida, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 354=angustifolia.
purpurea, *Moench, Meth.* 591.—Am. bor.
sanguinea, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. N. S. vii. (1841) 854-angustifolia.
seretina, DC. Prod. v. 654=purpurea.
spedosa, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 79-Rudbeckia speciosa.

ECHINAIS, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 408 = ECHENAIS, Cass. = Cnioua, Linn. (Compos.).

ECHINALYSIUM, Trin. Fund. Agrost 142 (1820)-Elytrophorus, Beauv. (Gramin.).
articulatum, Kunth, Enum. PI. >. 891, sphalm.=seq.
strictum, Trin. Fund. Agrost. 142 = Elyt. articulatus.

ECHINANTHTTS, Cerv. in La Naturaleza (1870), 351. *GRAMINEAE.*

ECHINANTHUS, Neck. Elem. i. 91 (1790)=Echinops, Linn. (Compos.).

ECHINABIA, Desf. Fl. Atlant. ii. 885 (1799). *GRAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 1181.
PANICASTRELLA, Moench, Meth. 205 (1794), nomen prius.
capitata, *Desf. I. c*—Reg. Mediterr.
pumila, Willk. in Bot Zeit. vi. (1848) 415 = capitata.

ECHINOCACTUS, Link Ac Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver. iii. (1827) 420. t. 13. *CACTEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 848.
ASTROPHYTUM, Lemaire, Cact. Gen. Nov. et Sp. 3 (1839).
GYMNOCALYCIUM, Pfeiff. Cat. Hort. Schelh. ex Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, ii. 1.12 (1844).
MAI-ACOCARPUS, Salm-Dyck, Cact Hort. Dyck. ed. IL 24, 141 (1850).

ECHIBTOCACTTJ8:—
Acanthion, Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 65=exsculptus.
Acanthion, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyct.* ed. II. 81, 161—Hab.?
acanthodes, *Lem. Cact. Nov. Gen. et Sp.* 106.—Calif.
acanthostephes, Poselg. in Otto &Dietr. Allg. Gartcnz. xxi. (1853) 102 = Mammillaria acanthostephes.
aciculatns, *Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 341.—Bras.
acifer, Hopf. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 520; Labour. Cact. 226 - spinosus.
acrocanthns, *Stieber, in Bot. Zeit.* v. (1847) 491.—Mexic
acuatus, *Link* b[1] *Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 424.—Reg. Argent.
acutangulus, Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 56 = coryaodes.
acutissimus, *Otto* b" *Dietr. in Allg. Garten*,* iii. (1«85) 353.—Chili,
adversispinns, *Muehlenpf. in Otto* b* *Dietr. I. c.* xvi. (1848) 10.—Mexic.
agglomeratus, Hort. ex Pfeiff. Ennm. Diagn. Cact. 60 •= spiralis.
agglomeratus, Karw. ex Pfeiff. 1. c. 61 = robustus.
albatus, *A. Dietr. in Otto (f Dietr. Allg. Garten*,* xiv. (1846) 170.—Mexic.
Allardtianus, *A. Dietr. 1. c.* xv. (1847) 178.—Mexic.
ancylacanthus, Monv. ex Labour. Monog. Cact 201 = uncinatus.
anfractuosus, *Mart, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 63.—Mexic.
arachnoideus, *Scheidw. in Bull. Acad. Brux.* vi. (1839) 90.—Mexic.
araneifer, Lem. ex Labour. Monog. Cact. 248 = Odierii.
araneolarius, *Reichb. in Terscheck, Suppl.* 2; *ex Walp. Rep.* ii. 317.—Reg. Argent.
arcuatus, G. Don, Gen. Syst. iii. 163, sphalm. = acuatus.
armatissimus, *Foerst. in Hamb. Garten*,* xvii. (1861) 162.—Peruv.; N. Granat.
armatus, Salm-Dyck, Hort Dyck. S41=Melocactus ferox.
arrectus, Otto, ex Labour. Monog. Cact. 225 = *arrigens.*
arrigens, Link, ex A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. viii. (1840) 161=crispatus.
Asterias, *Sieb.VZucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1843) 13. t. 3.—Mexic.
aulacogonus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 14.—Mexic.
auratus, *Pfeiff. Abbild. Cacteen,* ii. sub t. 14.—Chili.
aureus, Meyen, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 68.—Peruv.
Berterii, *C. Gay, Fl. Chil.* iii. 15.—Chili,
biceras, *Jacobi, in Otto (f Dietr. Allg. Garten*,* xvi. (1848)370.—Mexic.
bicolor, *Gal. ex Pfeiff. Abbild. Cacteen,* ii. t. 25.—Mexic.
bolivianus, Pfeiff. L c. sub t. 14=echinoides.
Boutillieri, Parm. ex Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 814 = Cereus Schelhasii.
brachiatus. Labour. Monog. Cact. 636 = brachycentrus.
brachycentrus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 31, 160.—Mexic.
brevihamatus, *Engelm. in Proc. Am. Acad.* iii. (1857) 271.—N. Mexic.
brevimammus, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 102 = Mammillaria brevimamma.
Bridgesii, *Pfeiff. Abbild. Cacteen,* ii. t. 14.—Bolivia.
Buckii, Klein, in Regel, Gartenfl. (1859) 257. t 266.—Mexic.
caespititius, Pfeiff. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 35 = horripilus.
californicus, Hort. ex Foerst. Handb. Cact.ed. II. 472 = viridescens.
californicus, *Monv. Cat.* (1846); *Cels, ex Labour. Monog. Cact.* 199.—Calif.
campylacanthus, Scheidw. in Otto *8c* Dietr. Allg. Gartenz. viii. (1840) 887 = macrodiscus.
candicans, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 9 1 - Cereus candicans.
capricornis, *A. Dietr. in Otto* b" *Dietr. Allg. Garten*.* xix. (1851) 274.—Mexic.
castaneoides, *Cels, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 165.—Chili.

ECHINOCACTTJS :—
centeterius, *Lehm. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 65.—Bras.
cephalophorus, Poselg. in Otto *8c* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 102 = Mammillaria cephalophora.
Ceratistes, *Otto, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 51.—Chili.
Ceratitis, Salm-Dyck, Cact Hort. Dyck. ed. II. 34, 167 = praec
cereiformis, *DC. in Mém. Mus. Par.* xvii. (1828) 115.—Mexic.
chloropthalmus. *Hook. Bot. Mag.* t. 4486.—Mexic.
cinerascens, *Salm-Dyck, in Otto & Dietr. Allg. Gartens,* xiii. (1845) 887.—Chili,
cinereus, *Phil. Fl. Atac.* 23.—Chili.
cinnabarinus, Hook. Bot. Mag. t. 4826 *(=Echinopsis cinnabarina).*—Bolivia.
Clava, Poselg.' in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 125=Mammillaria Clava.
coccineus, Hort Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 50 (=» *Echinopsis rhodacanthd).*—Reg. Argent,
columnaris, *Pfeiff. Abbild. Cacteen,* ii. sub t. 14.—Chili.
concinnus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4115.—Hab.!
confertus, *Hort. Berol. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. 1.346, nomen.—Hab. ?
conglomerates, *Phil. Fl. Atac.* 23.—Chili.
conoideus, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 107 = Mammillaria conoidea.
conothelos, *Regel* b" *Klein, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1860) 48.—Mexic.
conquades, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 838 = corynodes.
copiapensis, Pfeiff. Abbild. Cacteen, ii. sub t. 14 = cinerascens.
coptonogonus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 28.—Mexic
cornacanthus, *Scheidw. in Otto &" Dietr. Allg. Garten*.* ix. (1841) 50.—Mexic.
corniferus, Poselg. 1. c xxi. (1853) 102 = Mammillar.a cornifera.
cornigerus, *DC. in Mém. Mus. Par.* xvii. (1828) 36. t. 7.—Am. centr.
corrugatus, *Steud. Norn.* ed. II. i. 536.—Chili,
corynodes, *Otto, in Otto* b* *Dietr. Allg. Garten*,* i. (1838) 864, nomen; *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 55.—Reg. Argent.
Coulteri, G. Don, Gen. Syst. iii. 162 = Histrix.
Courantii, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 21).—Bras.
crenatus, Hort. Gallic, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 181 = exsculptus.
criocerus, Lem. ex Labour. Monog. Cact 178 = intricatus, *Salm-Dyck.*
crispatus, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 37. t. 8.—Mexic.
Cnmingi, *Regel* b[1] *Klein, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (I860) 48.—Chili.
Cumingii, *Hopf. in Otto* b* *Dietr. Allg. Garten*,* xi. (1843) 225.-Peruv.
Cummingii, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 174.—Hab. ?
curvicornis, Miq. in Linnaea, xii. (1888) 5 —• spiralis.
curvispinus, *C. Gay, Fl. Chil.* iii. 16.—Chili,
cylindraceus, *Engelm. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 32.—Calif,
cylindricus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* 152, nomen.—Mexic.
deùilispinus, *A. Berg, in Otto V Dietr. Allg. Garten*.* viii. (1840) 181.—Mexic.
Decaisnei, *Steud. Norn.* ed. II. i. 586.—Hab. ?
densus, Steud. 1. c. sphalm.=Mammillaria densa T
denudatus, *Link* b" *Otto, Ic. PI. Rar.* 17. t 9.—Bras.
Deppii, *Link & Otto, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 536, nomen.—Mexic.
depressus, *DC. Prod.* iii. 463.—Am. austr.
dichroacanthus, *Mart, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 62.—Mexic.
dicracanthus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* 160, nomen.—Hab. ?
Dietrichianus, *Foerst. in Hamb. Garten*,* xvii. (1861) 160.—Hab. ?
Dietrichii, Heynh. Norn. ii. B2=lancifer.
dolichacanihus, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 25 = E. Echidne.
dolichocentrus, Salm-Dyck, Cact Hort Dyck. ed. I. 22-praec.
Dumelianus, Cels, ex Salm-Dyck, I. c. ed. II. 89 = Cereus auratus.

ECHINOCACTUS :—
ebenacanthus, *Monv. ex Labour. Monog. Cact.* 253.—Chili.
Echidne, *DC. Mim. Cact.* 19. t. 11.—Mexic
echinatus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* 152, nomen.—Mexic.
echinoides, *Lem. ex Salm-Dyck, in Otto* b" *Dietr. Allg. Garten*,* xiii. (1845) 386.—Bolivia,
edulis, *Haage, ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 346, nomen.—Hab. ?
Ehrenbergii, *Pfeiff. in Otto (f Dietr. Allg. Garten*.* vii. (1838) 275.—Mexic.
electracanthus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 24.—Mexic.
elegans, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 86 = Cereus chilensis.
elephantidens, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 102=Mammillaria elephantidens.
Ellemeetii, *Miq. in Nederl. Kruidk. Arch.* iv. (1859) 387.—Mexic.
ellipticus,ljem.}»xA.Y\tat. iii.(1852-53) 270=rhodophthalmus.
Emoryi, *Engelm. in Emory, Notes. Mil. Reconnois.* 156.—Am. bor. occ.
ensiferus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 26.—Mexic.
equitans, Scheidw. in Bull. Acad. Brux. vi. (1839) 88 = horizon thalonius.
erectus, Poselg. in Otto *8c* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 126=Mammillaria erecta.
erinaceus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 16.—Reg. Argent
erinaceus, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 236 = Cereus erinaceus.
exsculptus, *Otto, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 65.—Am. austr.
Eyriesii, Turp. Obs. Cact 58. t. 2=Cereus Eyriesii.
farinosos, *Cels, ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 288, nomen.—Hab.»
farinosus, Hort. ex Foerst. 1. c. 896 = Ceieus Beneckei.
fascicularis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 536.—Peruv.
Fischeri, Hozt. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 59 = Melocactus ferox.
flavispinus, *Meinsh. in C. Koch* b* *Fint. Wochenschr.* i. (1858) 28.—Mexic.
fiavo-virens, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 50 = orthacanthus.
fiexispinus, Engelm. in Wisliz. Tour N. Mexico, 111 = longihamatus.
flexispinus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 159.—Mexic.
flexuosus, *A. Dietr. in Otto* b" *Dietr. Allg. Gartenz.* xix. (1851) 347.—Mexic.
fluctuosus, *A. Dietr. 1. c.* 154.—Mexic.
Foereteri, *Stieber, in Bot. Zeit.* v. (1847) 491.—Mexic.
foliosus, *Steud. Norn.* ed. II. i. 536.—Chili.
Forbesii, *Lehm. in Terscheck, Suppl.* 2; *ex Walp. Rep. ii.* 319.—Hab.?
formosus, Hort. Angl. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 60 (-• *Echinopsis formosa).*—Chili.
fossulatus, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 49=hexaedrophorus.
foveolatus, Haage, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 83= exsculptus.
fuscus, *Muehlenpf. in Otto* b" *Dietr. Allg. Garten*-* xvi. (1848) 10.—Chili.
Galeottii, *Schiedw. 1. c.* ix..(1841) 50.—Mexic.
Gayanus, Hort Par. ex Lem. Cact. Gen. et Sp. 22 '• acutissimus.
gemmatus, Hort. ex Otto, in Otto *8c* Dietr. Allg. Gartenz. i. (1838) 365 = Cereus Eyriesii.
Ghiesbrechtii, *Salm-Dyck, I. c.* xviii. (1850) 395.—Mexic
Ghiesbreghtianus, *Lem. Hort. Univ.* 227. t. 5.—Mexic.
gibbosus, *DC. Prod.* iii. 461.—Mexic.
Gigas, *Pfeiff. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 347, nomen.—Hab. ?
Gilliesii, Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ. 1M, nomen = formosus.
gilvus, A. Dietr. in Otto 8c Dietr. Allg. Gartenz. x«i. (1845) 170 - E . Echidne.
gladiatus, *Link* b[1] *Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1S27) 426.—Mexic.
glanduligerus, Poselg. in Otto *8c* Dietr. Allg. Garten*. xxi. (1053) 102 = Mammillaria glanduligera.
glaucescens, *DC. in Mém. Mus. Par.* xvii. (1828) 1 «--Mexic
glaucus, Karw. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 57°* recurvus.

ECHTNOCACTTJS :—
gradlis, Hoit. ex Foerst. Handb. Cact ed. L 304 = gracillimus.
gracilhmus, *Lent. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 24.—Hab. 1
grandicornis. *Lent. I. c.* 30.—Mexic.
griseispinus, *Jacobi, in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xxiv. (1856) 99.—Hab. *1*
guyannensis, Hort. Gall, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. lt)l = exsculptus.
Iiaageanus, *Foerst. Handb. Cact.* ed. II. i. 469.—Peruv.
haematochroanthus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot i. 532 = hamatocanthus.
hamatocanlhus, *Muehlenpf. in Otto (f Dietr. Allg. Garten*,* xiv. (1846) 871.—Mexic
hamatus, *Hort. ex Forbes, Hurt. Tour Germ.* 152, nomen.—Reg. Argent.
hamatus, Muehlenpf. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848) 18=setispinus.
hamulosus, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 34.—Mexic.
Hankeanus, Foist Handb. Cact. ed. II. i. 471 -humilis, *Auct.*
hastatus. *Hop/, ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 315, nomen.—Hab. ?
Haynii, *Otto, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 82,165.—Peruv.
kelianthodiscus, Lem. ex Salm-Dyck, 1. c. ed. I. 17 — turbiniformis.
helophorus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 12.—Mexic.
hemifossus, *Lerr. Illustr. Hortic.* v. "(1858) *Misc.* 10.—Peruv. vel Boliv.
heteracanthus, *Muehlenpf. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* xiii. (1845) 845.—Mexic.
heteromorphus, Poselg. 1. c. xxi. (1853) 126>°Mammillaria heteromorpha.
hexacanthus, *Muehlenpf. 1. c.* xiv. (1846) 369.—Mexic.
hexaedrophorus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 27.—Mexic.
hexaedrus, *Scheidw. in Bull. Acad. Brux.* vi. (1889) 89.—Mexic.
Heyderi, *A. Dietr. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xiv. (1846) 170.—Mexic.
histricacanthus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 632 = hystrichacanthus.
Histrix, *DC. in Mim. Mus. Par.* xviL (1828) 115.—Mexic.
holopterus, Miq. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 27 = ornalus.
Hookeri, *Muehlenpf. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xiii. (1846) 345.—Mexic.
horitontalis, Hott. ex Foerst Handb. Cact. ed. I. 327 — hoiizonthalonius.
horizonthalonius, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 19.—Mexic.
horridus, *C. Gay, Ft. Chit.* iii. 15.-Chili,
horripilus, *Lem. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 283 ; *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 35, 173.—Mexic.
humilis, *Auct. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. II. i. 471.—Hab. *1*
humilis, *Phil. Fl. Atac.* 28.— Chili.
Huotti, Cels, Portef. Hort. (1847) 216; *ex Labour. Monog. Cact.* 801 *(-Echinopsis Huotti).*—Chili,
hybocentrus, *Lehm. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 65.—Bras,
hybogonus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 167. -Chili,
hyptiacanthus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 21.—Hab.!
hypocrateriformis, *Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* vi. (1838) 169.—Reg. Argent,
hystrichacanthus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 17.—Mexic.
hystrichocentrus, *A. Berg, in Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* viii. (1840) 131.—Mexic.
hystrichodes, Monv. ex Labour. Monog. Cact. 215 = hystrichocenlrus.
Hystrix, *Haw. in Phil. Mag.* (1880) 116.—Ind. occ.
Hystrix, Monv. ex Labour. Cact. 1«4 = E. Echidne.
inflatus, *Gill, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 836, nomen.—Chili,
•ngens, *Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 54.—Mexic
insculptus, *Scheidw. in Bull. Acad. Brux.* vi. (1889) 89,-Mexic.
interruptus, Hort. Berol. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 65=exscurptus.

ECHINOCACTUB :—
interruptus, Scheidw. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 29=coptonogonu8.
intertextus, *Engelm. in Proc. Am. Acad.* iii. (1857) 277.—Mexic.
intertextus, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 81.—Chili.
intortus, *DC. Prod.* iii. 462.—Ind. occ.
iatrialm, Lint tf Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver. iii. (1827) 428.—Reg. Argent,
intricatus, *Salm-Dyck, in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xiii. (1845) 387.—Hab. t
irroratus, *Scheidw. in Bull. Acad. Brux.* vi. (1889) 90.—Mexic.
islayensis, *Foerst. in Hamb. Garten*,* xvii. (1861) 160.—Perav.
Jenischianus, *Pfeiff. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* viii. (1840) 406.—Am. austr.
Johnsoni, *Parry, ex Engelm. in Bot. King's Exp.* 117.—Am. bor. occ.
Jussieuii, *Monv. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck,* ed. II. 34, 170—Chili.
Karwinskii, Zucc. ex Labour. Monog. Cact. 193 = ingens.
Karwinskii, *Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 50.—Mexic.
Kunzii, *Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 293 ; *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 33,167.—Chili,
lamellosus, *A. Dietr. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xv. (1847) 177.-Mexic.
lancifer, *A. Dietr. I. c.* vii. (1889) 154.—Mexic.
lancifer, Reichb. in Terscheck, Suppl. 2; ex Walp. Rep. ii. 820=electracanthus.
Langsdorfi, *Link Jtf Otto, Ic. PI. Rar.* 79. t 40.—Bras.
laticostatus, Engelm. & Bigel. in Pacif. Rail. Rep. iv. 32 -horizonthalonius.
latispinus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 533.—Mexic.
latispinus, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 318 = comigeros.
Leechii, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 283 = Cereus Lecchei.
Lecontei, *Engelm. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 29. t. 2. f. 3-5.—Mexic.
Leeanus, *Hook. Bot. Mag.* t 4184.—Reg. Argent.
Lemarii, Monv. ex Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 17 = Melocactus Lemairei.
lencacanthus, *Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 66.—Mexic.
leucanthus, Gill, ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 341-Cereus leucanthus.
leucodictyus, Hort. ex Salm-Dyck, Cact. Hort Dyck. ed. 11.84 -gibbosus.
Lindheimeri, Engelm. ft Gray, in Bost Journ. Nat. Hist v. (1845) 246'texensis.
Lindleya, *Foerst. in Hamb. Garten*,* xvii. (1861) 162.—Peruv.
Linkeanus, *A. Dietr. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xvi. (1848) 298.—Mexic
Linkii, *Lehm. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 48.—Mexic.
longihamatus, *Gal. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. 1.821, nomen; *et ex Pfeiff. Abbild. Cacteen,* ii. 1.16.—Mexic
lophothele, *Salm-Dyck, in Otto & Dietr. Allg. Garten*.* xviii. (1850) 395.—Mexic.
loricatus, Poselg. 1. c. xxi. (1853) 107 =Mammillaria loricata.
Mackieanus, *Hook. Bot. Mag.* t. 8561.—Chili.
Macleanii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot i. 534, sphalm. = Maelenii.
macracanthus, *De Vriese, in Hoev. tf De Vriese, Tijdschr.* vi. (1889) 49.-Mexic.
macracanthus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 26, 143.—Bolivia,
macrocephalus, *Muehlenpf. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* xiv. (1846) 870.—Mexic.
macrodiscns, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xvi. I. (1832) 341. t 26.—Mexic.
macromeris, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 102 = Mammillaria macromeris.
macrothele, Poselg. 1. c 125 = Mammillaria macrothele.
Maelenii, *Salm-Dyck, ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 288; *Labour. Monog. Cact.* 263.—Mexic.
Malletianus, *Lem. ex Salm-Dyck, in Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* xiii. (1845) 387.—Chili.
mamillosus, Lem. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. 1.19, nomen=mammnlosus!

ECHUfOCACTUS :—
mammillarioides. Hook. Bot. Mag. t. 3558-Pfeifferi, *Zucc.*
mammillifer, *Miq. in Linnaea,* xii. (1838) 8.—Mexic.
mammillosus, Lem. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 298 -seq.
mammulosus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 40.—Bras.
marginatus, *Salm-Dyck, in Otto tfDietr. Allg. Garten*.* xiii. (1845) 386.—Chili.
melanochnus, Cels, ex Labour. Monog. Cact. 174 — marginatus.
Melmsianus, Wegener, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xii. (1844) 65 = tricuspidatus.
melocactiformis, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828') 38. t. 10.—Mexic.
melocactoides, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 28.—Hab. t
meonacanthus, *Link tf Otto, in Verh. Preuss.,Gartenb. Ver.* iii. (1827) 428.—Jamaic.
micracanthus. *Fennel, ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 847, nomen.—Hab. 1
minax, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 18°*platyceras.
Mirbelii, Lem. 1. c. 22=omatus.
montevidensis, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 283, nomen —Montevideo.
montevidensis, Hort. Dresd. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 2U2-exsculptua.
Monvillii, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* 14.—Paraguay.
Muehlenpfordtii, Fennel, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xv. (1847) 65 = setispinus.
Muehlenpfordtii, Poselg. 1. c. xxi. (1853) 102-Mammillaria Scheerii.
multiflorus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4181.—Mexic.
multiplex, Hort. ex PfeiffT Enum. Diagn. Cact. 70 = Cereus multiplex.
muricatus, Hort. ex Pfeiff. 1. c. 49 -tortuosus.
muricatus, *Link tf Otto ex Pfeiff. I. c.*—Bras,
mutabilis, *Foerst. in Hamb. Garten*,* xvii. (1861) 161.—Peruv.
myriostigma, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. I. 22 ; ed. II. 2», 155.—Mexic.
napinus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 720; *etin Regel, Gartenfl.* (1872) 129.—Chili.
Netrelianus, *Monv. ex Labour. Monog. Cact.* 248.—Hab.?
Neumannianus, Cels, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 38 = Kunzii.
niger, Hurt, ex Salm-Dyck, 1. c. 84 = Jussieui.
nobilis, Haw. in Phil. Mag. (1880) 115 = gibbosns.
nodosus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 535.—Mexic.
nummularioides, Steud. Nom. ed. IL i. 536, sphalm. = Pfeifferi.
obrepandus, Salm-Dyck, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xiii. (1846) 386 *(—Echinopsis cristata).*—Bolivia,
obvallatus, *DC. in Mim. Mus. Par.* xvii. (1828) 37. t. 9.—Mexic.
obvallatus, Pfeiff. Abbild. Cacteen, ii. t. 22 = lancifer.
occultus, *Phil. Fl. Atac.* 23.—Chili,
ochroleucus, *Jacobi, in Otto tf Dietr. Allg. Garten*.* xxiv. (1856) 101.—Hab. ?
octacanthus, *Muehlenpf. in Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* xvi (1848) 10.—Mexic.
octogonus, G. Don, in Sweet, Hort Brit. ed. III. 283 = Cereus oxygonus.
Odierii, *Lem. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. II. 174.—Chili.
oligacanthus, Hort. ex Salm-Dyck, Cact. Hort Dyck. ed. II. 31 = brachycentrns.
oligacanthus, *Mart, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 63.—Mexic
Oreptilis, *Haage, ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 847, nomen.—Hab.!
omatus, *DC. in Mém. Mus. Par.* xvii. (1828) 114.—Mexic.
orthacanthus, *Link tf Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 427.—Mexic.
Ottonianus, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 102- Mammillaria Ottonis.
Ottonis, *Link tf Otto, Ic. PI. Rar.* 31. t. 16 Mexic.
Ourselianus, Cels, ex Salm-Dyck, Cact. Hort Dyck. ed. II. 84 = multiflorus.
oxyacanthus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* 152, nomen.—Hab. ?
oxygonus, Link ft Otto, in Verh. Preuss. Gartenb, Ver. vi. (1880) 419.1.1 = Cereus oxygonus.
oxypteras, *Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 57.—Mexic.
pachycentrus, Lehm. ex Pfeiff. 1. c. 66-centeterins.

ECHIKOCACTUS:—
pachycomis, *Muehlenpf. in Otto* **b[1]** *Dietr. Allg. Garten:* xiv. (1846) 871.—Mexic
papyracanthus, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1860-63) 198.—Am. bor.
Parryi, *Engelm. in Proc. Am. Acad.* iii. (1857) 276.—Mexic.
parvispinus, *DC. Prod.* iii. 463.—Am. austr.
pectinatus, Scheidw. in Bull. Acad. Brux. v. (1888) 492 = Cereus pectinatns.
pectiniferus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* 25.—Mexic.
Pepinianus, Cels, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 44 = Cereus Pepinianus.
pentacanthus, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 27 = anfractuosus.
Pentlandi, **Hook. Bot. Mag. t. 4124** *{ = Echinopsis Pentlandi).—Paay.*
Pfeifferi, *Seitz, in Otto h" Dietr. Allg. Gartens,* **v,** (1887) 242.—Mexic.
Pfeifferi, *Zucc. in Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* **68.—** Mexic.
phyllacantkoides, Lem. Cact Nov. Gen. et Sp. 28 = phyllacanthus.
phyllacanthus, *Mart, in Otto* **6*** *Dietr. Allg. Gartens.* iv. (1836) 201.—Mexic.
phyllantoides, Lem. ex Labour. Monog. Cact 211 = phyllacanthus.
piliferus, Lem. ex Labour. 1. c. 186 = pilosus.
pilosus, *Gal. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* **ed. II.** 148.—Mexic.
placentiformis, Lehm. ex Foerst. Handb. Cact. ed. II. i. 449 = Discocaclus insignis.
Plaschnickii, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 125 = Mammillaria Plaschnickii.
platyacanthus, *Link* **b"** *Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 428.—Mexic.
platycarpus, *Hort. Berol.ex Foerst. Handb. Cact.eA.1.* 847, nomen.—Hab.?
platycephalus, *Muehlenpf. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* xvi. (1818) 9.—Mexic.
platyceras, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* **19.—Mexic.**
polyacanthus, *Link V Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 422.—Bras,
polyancistrus, *Engelm. tf Bigel. in Pad/. Sail. Rep.* iv. 29.—Am. bor. occ
polycephalus, *Engelm. V Bigel. 1. c.* 81.—Calif.
polyocentrus, Lem. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 22 = orthacanthus.
polyraphis, *Pfeiff. ex Salm-Dyck, I. c.* ed. II. 33, 166. —Peruv.
porrectns, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* **17.—Mexic.**
Poselgerianus. *A. Dietr. in Otto* **b[1]** *Dietr. Allg. Gartens,* xix. (1851) 846.—Mexic
Pottsianus, Poselg. 1. c. xxi. (1853) 107 = Mammillaria Pottsii.
Pottsii, *Salm-Dyck, 1. c.* xviii. (1850) 895.—Mexic.
Pottsii, Schur, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 35=bicolor.
praegnacanthus, *Foerst. in Hamb. Gartens,* xvii. (1861) 160.—Chili,
pruinosus. *Otto, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* **54.—** Mexic.
Pseudo-cereus, *Meinsh. in C. Koch* **b[1]** *Fint. Wochenschr.* i. (1858) 29.—Mexic.
pubispinus, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* **ii.** (1868) 199.—Am. bor.
pulchellus, Mart in Nov. Act. Nat. Cur. xvi. i. (1882) 342. t. 23. f. 2 = Cereus pulchellus.
pumilus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* **21.—Hab.?**
pulverulentus, *Muehlenpf. in Otto* **b*** *Dietr. Allg. Gartenz.* xvi. (1848) 9.—Bolivia.
pycnacanthus, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 102 = Mammillaria pycnacantha.
pycnoxyphus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* **16.—** Hab.!
pyramidalis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 86 - Cereus chilensis.
pyramidatus, *Foerst. in Hamb. Garten**, xvii. (1861) 162.—Peruv.
quadrinatus, *Wegener. in Otto* **to[1]** *Dietr. Allg. Garten*,* xii. (1844) 66.—Mexic.
radiatus, Hort. Belg. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 180 = Mammillaria pycnacantha.
radicans, Poselg. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 107 = Mammillaria radians.
radiosus, Poselg. 1. c. = Mammillaria vivipara.
raphidacanthus, Poselg. 1. c. 126 = Mammillaria raphidacantha.

ECHIJTOCACTTTS:—
raphidacanthus, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* **ed. II.** 160.—Hab.?
raphidocentrus, *Jacobi, in Otto* **b"** *Dietr. Allg. Garten*.* xxiv. (1866) 101.—Hab. ?
recurvus, *Link & Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 426; *DC. Prod.* iii. 462.—Mexic.
Reichenbachii, *Terscheck, Suppl.* **2;** *ex Walp. Rep.* ii. 820.—Mexic.
retusus, *Scheidw. ex Foerst. Handb. Cact.* **ed. I. 847,** nomen.—Hab. ?
rhodacanthus, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 341 *(=Echinopsis rhodacantha).*—**Keg. Argent,**
rhodanthus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* **151,** nomen.—Hab.?
rhodophthalmus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4486.—Mexic.
rinconensis, *Poselg. ex Foerst. Handb. Cact.* **ed. II. i.** 472.—Mexic.
robustus, Karw. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 60 = spiralis.
robustus, *Otto, in Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* **i. (1833) 864, nomen;** *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* **61.** —Mexic.
rosaceus, Hort. ex Pfeiff. 1. c. 55 = corynodes.
rostratus, *Jacobi, in OttoVDietr. Allg. Garten*,* **xxiv.** (1856) 108.—Chili.
Saglionis, Cels, Portef. Hort. (1847) 180; ex Labour. Monog. Cact. 257=hybogonus.
salinensis, *Poselg. in Otto* **b"** *Dietr. Allg. Garten*,* **xxi,** (1853) 106.—Calif.
Salm-Dyckianus, *Pfeiff. Abbild. Cacteen,* ii. sub t 14. —Bolivia.
Salm-Dyckianus, Poselg. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 102 = Mammillaria Salm-Dyckiana.
Salmianus, Link *Sc* Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver. iii. (1827) 423= Melocactus Salmianus.
Salmii, *Jacobi, in Otto V Dietr. Allg. Garten*,* **xix.** (1851)9.—Hab.?
salpigophorus, Pfeiff. ex Labour. Monog. Cact. 302 = *Echinopsis salpigopkora).*—**Hab. ?**
saltillensis, *Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Garten*.* xxi. (1853) 101.—Mexic.
Sandillon, *C. Gay, Fl. Chil.* iii. 14.—Chili.
Sandillon, Hort. ex Foerst. Handb. Cact ed. II. i. 57S = Ceratistes.
Scheerii, *Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* **ed. II. 155.—** Mexic.
Scklechtendalii, Poselg. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 125 = Mammillaria Schlechtendalii.
sderothrix, *Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb.* **(1838).** —*Cf. Linnaea,* xiii. (1839) *Litt.* t 101.—Mexic.
Scopa, *Link* b[1] *Otto, Ic. PI. Rar.* 81. t. 41.—Bras.
Sellowianus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 55 = corynodes.
Sellowianus, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 55, sphalm. = Sellowii.
Sellowii, *Link* **b"** *Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 425.—Reg. Argent.
sessiliflorus, Hook. Bot. Mag. t. 3569=Sellowii.
sessiliflorus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* **152,** nomen = seq. ?
sessiliflorus, *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 56.—Hab. ?
setispinus, *Engelm. tf Gray, in Bost. gaum. Nat. Hist.* v. (1845) 246.—Texas,
aetosus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **i. 537.—** Mexic.
Sickmanni, *Lehm.exSteud.Nom.* ed. II. i. 537, nomen. —Am. austr.
Siekmannii, Hort. Berol. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 347, nomen=praec. 1
similis, Poselg. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 107 = Mammillaria missouriensis.
Simpsoni, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* **ii.** (1863) 197.—Am. bor.
sinuatus, *A: Dietr. in Otto* **b*** *Dietr. Allg. Garten*.* xix. (1851) 845.—Texas; Mexic.
Smithii, *Muehlenpf. 1. c.* xiv. (1846) 370.—Mexic
solenacanthus, *Scheidw. I. c.* ix. (1841) 50.—Mexic.
sparathacanthus, *Mart, ex Foerst. Handb. Cact.* **ed. I.** 844, nomen.—Mexic.
spectabilis, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 61-= robustus.
sphacelatus, Poselg. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 107 = Mammillaria sphacelata.
sphaerocephalus, *Muehlenpf. 1. c.* xiv. (1846) 870.— Mexic.
Spina-Christi, Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 59 = Melocactus ferox.

ECHINOCACTUS:—
spinosus, *Wegener, in Otto* **b*** *Dietr. Allg. Gartenz.* xii. (1844) 66.—Mexic.
spinosissimus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* **152,** nomen.—Hab. ?
spiralis, *Karw. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* **60.—** Mexic.
Steinesii, Hook, ex Salm-Dyck, Cact Hort. Dyck. ed. II. 27 - pilosus.
stellaris, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 588 = spiralis.
stellatus, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. viii. (1840) 338=spiralis.
streptocaulon, *Hook. Bot. Mag.* t. 4562.—Bolivia.
strobiliformis, Poselg. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1858) 107 = Mammillaria strobiliformis, *Scheer.*
subgibbosus, Haw. in Phil. Mag. (1831) 419=ex-scnlptus.
sabgrandicomis, *Haage, ex Foerst. Handb. Cact.* **ed. I.** 847, nomen.—Hab.?
submammulosus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* **20.—** Hab.?
subporrectus, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 25=leucacanthus.
subuliferus, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 61 = robubtus.
subuliferus, *Link* **b*** *Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 427. t. 27.—Mexic.
sulcatus, Hort. ex Pfeiff. 1. c. 70 - Cereus oxygonus.
sulcatus, *Link V Otto, ex Steud. Norn.* **ed. II. i. 537,** nomen.—Mexic.
sulcolanatus, Poselg. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 102 = Mammillaria sulco-lanata.
sulphurous, *A. Dietr. 1. c.* xiii. (1845) 170.—Mexic.
supertextus, Pfeiff. Abbild. Cacteen, ii. sub t. 14 = Kunzii.
tenuiflorus, *Link, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* ed. I. 2U, nomen.—Hab.!
tenuispinus, *Link* **b"** *Otto, in Verh. Preuss. Gartenb. Ver.* iii. (1827) 421.—Bras,
tephracanthus, *Link V Otto, I. c.* 422.—Bras.
Terscheckii, *Reichb. in Terscheck, Suppl.* **8;** *ex Walp. Rep.* ii 315.—Keg. Argent,
tetracanthus, *Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc.* **15.—Reg.** Argent,
tetracentrus, *Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp.* **31.—** Mexic.
tetraxiphus, *Otto, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.* **ed.** I. 20, nomen.—Hab. ?
texensis, *Hopf. in Otto (f Dietr. Allg. Gartenz.* **x.** (1842; 297.—Texas.
theiacanthus, Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp. 86 = Pfeifferi, *Zucc.*
theionacanthus, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc 22 = Pfeifferi, *Zucc.*
thelephorus, *Hort. ex Forbes, Hort. Tour Germ.* **152,** nomen.—Hab. ?
theloideus, *Salm-Dyck, in Otto* **b[1]** *Dietr. Allg. Garten*,* xviii. (1850) 395.—Mexic.
thrincogonos, Lem. Cact. Gen. Nov. et Sp. 22=acutissimus.
tortuosus, *Link* b" *Otto, Ic. PI.* **Rar.** 29. t 15.— Bras.
tortus, Scheidw. in Bull. Acad. Brux. v. (1888) 493 = ornatus.
Treculianus, *Labour. Monog. Cact.* 202.—Texas,
tribolacanthus, *Monti. Cat. Cact.* **(1846);** *ex Labour. Monog. Cact.* 221.—Mexic.
tricornis, Monv. ex A. Dietr. in Otto & Dietr. **Allg.** Gartenz. xiv. (1846) 203 = Discocactus alteolens.
tricuspidatus, Scheidw. 1. c ix. (1841) 51 = phyllacanthus.
tnberculatus, *Link* **b*** *Otto, in Verh. Preuss. Gartenb.-Ver.* iii. (1827) 425.—Mexic.
tuberisulcatus, *Jacobi, in Otto* **b*** *Dietr. Allg. Garten*.* xxiv. (1856) 108.—Chili.
tuberosus, Salm-Dyck, ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 287 — leucacanthus.
tubiflorus, Hort. Angl. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 71; Hook. Bot. Mag. t. 8627.—Mexic.
tulensis, *Poselg. in Otto V Dietr. Allg. Garten*,* **xxi.** (1853) 125.—Mexic.
turbinatus, Hort ex Pfeiff. in Otto *Sc* Dietr. 1. c. iii. (1835) 314'Cereus turbinatus.
turbiniformis, *Pfeiff. I. c.* vi. (1888) 276.—Mexic.
uncinatus, *Engelm. ex Scheer, in Seem. Bot. Voy. Herald,* **290;** *Engelm. Cact. U. St. et Mex. Bound. Sure.* 20.—Texas.

ECHINOCACTUS :—
uncinatus, *Hopf. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 321, nomen; *Gal. in Pfeiff. Abbild. Cacteen,* ii. t. 18. —Mexic.
nnduktus, *A. Dieir. in Otto b" Dietr. Allg. Garten*.* xii. (1844) 187.—Mexic.
unguispinus, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, lll=intertextus, *Engelm.*
Valparaiso, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. 1.292 = exsculptus.
Vanderaeyi, Lem. Cact Aliq. Nov. Desc. 20 = E. Echidne.
Van-Geertii, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 378 =Cereus lamprochlorus.
Vargasii, *Regel* 6" *Klein, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1860) 48.—Mexic.
verutum, *Hort. Angl. ex Foerst. Handb. Cact.* ed. I. 344, nomen.—Hab.!
villiferus, *Scheidw. ex Foerst. I. c.* 847, nomen.- Hab. ?
villosus, Lcm. ex Salm-Dyclc, Cact. Hort. Dyck. ed. L 18; ed. II. S3=polyraphis.
viiidescens, *Nutt. in Torr.* £r *Gray, Fl. N. Am.* i. 554. -Calif.
viridifiorus, Pritz. Ic. Ind. ii. 114 — Cereus viridiflorus.
Visnaga, Hook, in 111. Lond. News (1846); ex Bot. Mag. t. 4559 = ingens.
viviparus, Foselg. in Otto ft Dietr. Allg. Gartenz. xxi. (1853) 107 - Mammillaria vivipara.
Wegeneri, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 31, 160=quadrinatus.
Whipplei, *Engelm. b" Bigel. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 28. t. 1.—Am. bor. occ.
Williamsii, *Lem. ex Salm-Dyck, in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* xiii. (1845) 385.—Hab. ?
Winkleri, Poselg. 1. c. xxi. (1853) 102 = Mammillaria Winklerii.
Wippermanni, Mueblenpf. L c. xiv. (1846) 870 = spinosus.
Wislizeni, £nfe/m. *in Wislie Tour North Mexico,* 96. —Am. bor. occ.
xanthacanthus, Miq. in Linnaea, xi. (1837) 155. t.4 = Melocactus xanthacanthus.
xiphacanthus, Miq. L c. xii. (1838) l = arrigens.

ECHINOCALYX, Benth. in Benth. ft Hook. f. Gen. i. 584 (1865) = Sindora, Miq. (Legumin.).

ECHINOCABPU8, Blnme, Bijdr. 56 (1825). *TILIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 239.
assamicus, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* II. (1861) 72.-Assam.
australis, *Benth. I. c.* 73.—Austral.
dasycarpus, *Benth. I.* f.—Reg. Himal.
Langii, F. Mnell. Fragm. v. 28=Sloanea Langii.
Macbrydei, F. Muell. 1. c. vi. 170»Sloanea Macbrydei.
Murex, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* II. (1861) 72 —Reg. Himal.
Sigun, *Blume, Bijdr.* 56.—Java,
sinensis, *Hance, in Journ. Bot.* xxii. (1684) 108.—China,
sterculiaceus, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* II. (1861) 72.—Reg. Himal.
tetragonns, *Teijsm. if Binn. Cat. Hort. Bog.* 184, nomen.—Java,
tomentosus, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* v. *SuppL* II. (1861) 73.—Reg. Himal.
Woollsii, F. Mnell. Fragm. vi. 171 = Sloanea Woollsii.

ECHINOCAULON, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 521 (1841)=Folygonum, Linn.

ECHINOCAULOS, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 20=Polygonum, Linn.
per/oliatus, Hassk. 1. c. = P. perfoliatum.

ECHIUOCEPHALXJM, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 294. *COMPOSITAE* [Benth. & Hook. f. ii. 377].
angustifolinm, *Gardn. I. c.* 295.—Bras,
discoideum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. m. 280.—Bras,
lanceolatum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 294.—Bras,
latifolia, *Gardn. I. c.* 295—Bras.

ECHINOCEREUS, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 91 (1848)-Census, Haw. (Cact.).
acifer, Lem. Cact. 57, nomen-C. acifer.
adustus, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 104 = C. adustus.

ECHINOCEREUS:—
Berlandieri, Hort. ex Palm, in Rev. Hortic. (1865) 92 =C. Berlandieri.
Blankii, Palm. 1. c. = C. Blanckii.
caespitosus, Engelm. in Wisliz. Tonr North Mexico, 110 =-C. caespitosus.
candicans, Lem. Cact. 57, nomen = C. candicans.
chilolnsis, Console & Lem. in Rev. Hortic. (1864) 173; Illustr. Hortic xi. (1864) Misc. 15 = C. chiloënsis.
chloranthus, Haage, Preis-Verz. Cact. 22=C. chloranthns.
cinerascens, Lem. Cact. 56, nomen = C. cinerascens.
cirrhiferus, Engelm. ex Haage, Preis-Verz. Cact. 22= C. cirrhiferus.
claviformis, Haage, L c. = C. claviformis.
coccineus, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 93 = C. phoeniceus.
dasyacanthus, Engelm. 1. c. 100-C. dasyacanthus.
Ehrenbergii, Engelm. ex Haage, Preis-Verz. Cact 22 = C. Ehrenbergii.
Engelmanni, Lem. Cact. 56, nomen = C. Engelmanni.
enneacanthus, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 111-=C. enneacanthus.
Fendleri, Sencke, ex Haage, Preis-Verz. Cact. 22 = C. Fendleri.
flavescens, Engelm. ex Haage, 1. c.=C. flavescens.
gladiatus, Engelm. ex Haage, 1. c. = C. candicans.
gonacanthus, Lem. Cact. 57, nomen=C. gonacanthus.
intricatus, Sencke, ex Haage, Preis-Verz. Cact. 22= C. intricatus.
Labouretianus, Lem. Cact. 57, nomen.—Hab. ?
lamprochlnrus, Engelm. ex Haage, Preis-Verz. Cact. 22 —C. lamprochlorus.
Leeanus, Lem. Cact. 57, nomen = C. Leeanus.
longisetus, Lem. 1. c. nomen = C. longisetos.
multangularis, Engelm. ex Haage, Preis-Verz. Cact. 23 = C. multangularis.
pectinatus, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 110 = C. caespitosus.
penicilliformis, A. Linke.in C. Koch ft FintWochenschr. I. (1858) 85.—Bolivia.
pentalophus, Lem. Cact. 56, nomen - C. pentalophus.
persolutus, Foerst. in Hamb. Gartenz. zvii. (1861) 163. —Peruv.
phoeniceus, Lem. Cact. 67, nomen=C. phoenicens.
polyacanihus, Engelm. in Wisliz. Tonr North Mexico, 104=C. polyacanthus.
Poselgeri, Lem. Cact. 57, nomen.—Hab. t
Poselgerianus, A. Linke, in Koch, Allg. Gartenz. xxv. (1857) 239.—Mexic.
Prineeps, Foerst. in Hamb. Gartenz. xvii. (1861) 168.—Hab.!
procumbens, Lem. Cact 56, nomen-C. procumbens.
radians, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 104 =-C. adustus.
raphicephalus, Foerst. in Hamb. Gartenz. xvii. (1861) 164.—Hab.?
Reichenbachianus, Engelm. ex Haage, Preis-Verz. Cact. 23 = C. caespitosus.
rigidispinus, Engelm. ex Haage, I. c.=C. rigidispinus, *Muehlentf.*
Roemeri, Engelm. ex Haage, I. c = C. Roemeri, *Engelm.*
rotatus, A. Linke, in C. Koch ft Fint. Wochenschr. i. (1858) 85.—Texas.
rufispinus, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 104 = C. rufispinus.
Salm-Dyckianus, Scheer, in Seem. Bot. Voy. Herald, 291 ^ C. Salm-Dyckianus.
Seheeri, Lem. Cact. 57, nomen-C. Scheerii.
serpentinus, Lem. 1. c. nomen - C . serpentinus.
splendens, Lem. 1. c. nomen = C. splendens.
strigosus, Lem. 1. c. nomen —C. strigosus.
subinermis, Salm-Dyck, ex Scheer, in Seem. Bot Voy. Herald, 291 = C. subinermis.
texensis, Jacobi, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xxiv. (1856) 110.-Texas.
trichacanthus, Engelm. ex Haage, Preis-Verz. Cact. 23 « C. lutescens.
triglochidiatus, Engelm. in Wisliz. Tour North Mexico, 98 = C. triglochidiatus.
viridiflorus, Engelm. 1. c. 91-C. viridiflorus.

ECHINOCHLAENA, Sprang. Gen. i. 65 (1830) = Echinolaena, Desv. (Gramin.).

ECHINOCHLOA, Beauv. Agrost. 58. t. 11 (1812) = Panicum, Linn. (Gramin.).
colona, Link, Hort Berol. ii. 209=P. colonum.
commutata, Schult. Mant. ii. 267 = P. Crus-galli.
composita, Presl, ex Steud. Norn. ed. IL i. 537 = P. Crus-galli.
Crus-corvi, Beauv. Agrost. 63=P. Crus-galli.
Crus-galli, Beauv. 1. c.=P. Crus-galli.
Crus-pavonis, Schult. Mant. ii. 269=P. Crus-galli.
cuiensis, Schult. 1. c. 596 = P. cubense.
divaricata, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 549.—Afr. trap.
dubia, Roem. ft Schult. Syst ii. 479=Oplismenus dubius.
echinata, Beauv. Agrost 53 = P. Crus-galli.
elephantipes, Nees, in Mart Reise Bras. iii. 1123, nojrien = P. elephantipes.
eruciformis, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 437 = P. eruciforme.
erythrosperma, Roem. & Schult. Syst ii. 477=Setaria italica.
frumentacea, Link, Hort. Berol. i. 204-P. Crus-galli.
hirta, Schult. Mant. ii. 270 = P. Rothii.
hirtella, Schult. 1. c. 269=Oplismenus loliaceus.
hispida, Schult. 1. c. 267-P. Crus-galli.
Hosti, Link, Hort. Berol. ii. 209-* P. Crus-galli.
intermedia, Roem, & Schult. Syst. ii. 477=Setaria italica.
lanceolata, Beauv. Agrost. 63 = P. lanceolatum.
pulchella, Kunth, Ennm. PI. i. 73= P. pulchellum.
scabra, Roem. & Schult. Syst. ii. 479 = P. Crus-galli.
setigera, Beauv. Agrost. 6»=P. setigerum.
setigera, Roem. & Schult. Syst ii. 480 = P. prostratum.
setosum, Beauv. Agrost. 53-Setaria setosa.
spectabile, Link, Hort. Berol. ii. 209 = P. spectabile.
squarrosa, Roem. *8c* Schult. Syst. ii. 479- P. squarrosum.
stagnina, Beauv. Agrost. 68=P. Crus-galli.
subcordata, Koem. ft Schult. Syst. ii. 480=P. prostratum.
telayensis, Schult. Mant. ii. 269=P. zelayense.
Zenkowskii, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1853) ; ex Schlecht in Linnaea, xxvii. (1854) 477 = P. Zenkowskii.
sonalis, Parl. Fl. Panorm. i. 119 = P. colonum.

ECHINOCROTON, F. MuelL Fragm. i. 31 (1858) = KLallotUB, Lour. (Euphorb.).
claoxyloides, F. Muell. 1. c. 32=M. claoxyloides.

ECHINOCYSTIS, Torr. ft Gray, Fl. N. Am. i. 542 (1840). *CUCURBITACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 835.
EcmNOPEPON, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. V. iv. (1865) 17.
HEXAMEMA, Torr. ft Gray, in Torr. Rep. PI. N. York, 137 (1839) [Geol. Surv.].
MARAH, KeHogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1868) 18; et i. ed. II. (1878) 87.
MEGARRHIZA, Torr. ft Gray, in Pacif. Rail. Rep. vi. 74, nomen (1857) ; xii. H. 61 (1880).
australis, *Cogn. in M(m. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (1878); *{Diagn. Cucurb.* fasc. ii.) 93 = Cydanthera australis.
araneosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 136.—Reg. Argent.
Bigelovii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 804.—Calif.
Coulteri, *Cogn. in Mint. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (1878) 88.—N. Mexic.
fabacea, A. Gray, in Pioc. Am. Acad. viii. (1873) 384 = oregana.
fabacea, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xii. (1859) 154.-Calif,
floribunda, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (1878) 89.—Mexic.
gemella, *Co?n. 1. c.* 88.—Mexic.
gilensis, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 189. —N. Mexic.
glutinosa, *Cogn. in M/m. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (1878) 93. -Mexic.
guadalupensis,CV>£'». *in DC. Monog. Phan.* iii. 819.—Ins. Guadalup.
lanata, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (1878) 92.—Mexic.
lobata, *Torr. If Gray, Ft. N. Am.* i. 542.—Am. bor. occ.
longispina, *Cogn. I. c.* 91—Mexic.
macrocarpa, *Greene, in Bull. Calif. Acad i.* IV. (1885) 188.—Calif.

ECHINOCYSTIS:—
Marah, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 817.—Calif,
milleflora, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (1878) 88.—Mexic.
minima, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 805.—Calif,
muricata, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (18781 88.-Bras.
muricata, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. 67-Watsonii.
oregana, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* Svo, xxviii. (1878) 87.—Am. bor. occ.
paniculata, *Cogn. I. c* 90.—Mexic.
parriflora, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 873.—Am. bor. occ.
pedata, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) S87 -Cyclanthera dissecta.
polycarpa, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii. (1878) 90.—Venezuela,
pubescens, *Cogn. 1. c.* 88.—Mexic.
torquats., *Cogn. 1. c.*—Mexic.
Watsonii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 819.—Am. bor. occ.
Wrightii, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviii. (1878) 88.—N. Mexic.

ECHINODENDRUM, A. Rich. Fl^Cub. Fanerog. ii. 18 (185ft) = SoolosanthuB.Vahl (Rnbiac.).
campanulatum, A. Rich. 1. c.=S. parviflorus.
parviflorum, A. Rich. 1. c. t. 47[b]=S. parviflorus.

ECHINODISCUS, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 94 = PterooarpuB, Linn. (Legumin.).
echinatus,Miq. H. Ind. Bat. i. I. 137 = P. echinatus.
erinaceus, Benth. ex Walp. Rep. i. 798=P. erinaceus.

liCHINODIUM, Poit. ex-Giss. in Diet. Sc. Nat. lix. 235 (1829) = Acanthospermum, Schrank (Compos.).

ECHINODOKUa, Rich, in Mém. Mus. Par. i. (1815) 365. *ALISMACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1006.
alpestris, *Micheli, in DC. Monog. Phan.* iii. 47.—Hispan.
bracteatus, *Micheli, 1. c.* 69.—Panama.
cordifolius, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 257 = rostratus.
ellipticus, *Micheli, in DC. Monog. Phan.* iii. 51.—Am. trop.
Aoṅbxui&va,Seub.ex Warm, in Kjoeb. Vidensk.Meddel. (1872) 113.—Bnw.
grandiflorus, Micheli, in DC. Monog. Phan. iii. 57 = floribundus.
guyanensis, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 505 = Sagittaria guyanensis.
humilis, *Buchen. in Pringsh. Jahrb.* vii. (1869) 28.—Afr. occ.
intermedius, *Griseb, Cat. PI. Cub.* 218.—Bras,
longipetalus, *Micheli, in DC. Monog. Phan.* iii. 60.—Bras.
macropkyllus, Micheli, 1. c. SO^muricatus.
Martii, *Micheli, 1. c.* 49.—Bras,
muricatus, *Griseb. in Bonplandia,* vi. (1868) 11.—Am. trop.
natans, Engelm. in Aschers. Fl. Brand, i. 651 — Elisma natans.
ovalis, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 168.—Cuba,
paniculatus, *Micheli, in DC. Monog. Phan.* iii. 51.—Am. anstr.
parnassifolius, Engelm. in Aschers. Fl. Brand, i. 651 = Alisma parnassiiolium.
parvulus, Engelm. in A. Gray, Man. Bot. ed. II. 438 (1856), 492-tenellus.
pubescens, Seob. ex Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1872) 118-ellipticus.
punctatus, *Micheli, in DC. Monog. Phan.* iii. 69.—Bras,
radieans, *Engelm. in A. Gray, Man. Bot.* ed. I. 460; ed. II. 488.—Am. calid.
ranunculoides, *Engelm. in Aschers. Fl. Brand, i.* 651.—Europ. et Afr. bor.
rostratus, *Engelm.in A. Gray, Man. Bot.* ed. I. (1848) 460; ed. II. 438.—Am. bor.
subulatus, Engelm. 1. c.=tenellus.
fiubnlatus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 218.—Guiana,
tenellus, *Buchen. in Bremen, Abh.* ii. (1871) 21.—Am. anstr.
virgatus, *Micheli, in DC. Monog. Phan.* iii. 54.—Mexic.

ECHINOGLOSSUM, Reichb. Norn. 54 (1841) - ECHIOGLOSSUM,Blume=Cleisostoma,Blume(Orchid.).

ECHINOLAENA, Desr. Journ. Bot. i. (1813) 75. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1107.
ECKINOCHLAENA, Spreng. Gen. i. 65 11830).
brachystachya, Kunth, Rév. Gram. i. 54 = Panicum brachystachyum.
hirta, *Desv. Journ. Bot.* i. (1818) 75.—Am. austr.
loliacea, Kunth, Enum. PI. i. 172 = Ichnanthus candicans.
madagascariensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 452.—Madag.
navicularis, Kunth, Rév. Gram. i. 54 = Panicum nemorale.
nemorosa, Kunth. 1. c. = Ichnanthus nemorosus.
polystachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 119 - Panicum uncinatum.
procurrens, Kunth, Rév. Gram. i. 54=Panicum procurrens.
scabra, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 118. t. 38 - hirta.
Trinii, Zoll. & Moritzi, Syst. Verz. Zoll. 102=Panicum uncinatum.

ECHINOLEMA, Jacq. f. ex DC Prod. v. 8 (1836) = Aolcarpha, Joss. (Calycer.).
arenarium, Jacq. f. 1. c. = A. spathniata.

ECHINOLITRUM, Steud. Nom. ed. II. i. 537 (1840) = ECHINOLYTRUM, Desv.- Pimbrlatylls, Vahl (Cyperac).

ECHINOLOBIUM, Desv. Jouro. Bot. i. (1818) 128. t. 5 = Hedysaruin, Linn. (Legumin.).

ECHINOLOMA, Steud. Nom. ed. II. i. 587 (1840), sphalm. = ECHINOLEMA, Jaoq. f.-Aoicarpha, Juss. (Calycer.).

ECHINOLYSIUM, Benth. in Joura. Linn. Soc xix. (1881) 114 = ECHINALYSIUM, Trin.-Elytrophorua, Beauv. (Gramin.).

ECHINOLYTRUM, Desv. Joum. Bot. i. (1808) 20. t 1 = Pimbri8tyliB, Vahl (Cyperac.).
dipsaceum, Desf. 1. c.—Geront. trop.

ECHINOMERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. vii. (1841) 356=EeUanthuB, Linn. (Compos.).
apetala, Nntt. 1. c = H. Radula.

ECHINONYCTANTHUS, Lem. Cact. Nov. Gen. et Sp. 10 (18S9) = Cereu8, Haw. (Cact.).
Decaisneanus,Lem. 1. c. 55 = Echinocactus Decalsnei.
Eyriesii, Lem. 1. c. 84 - C. Eyriesii.
leucantkus, Lem. 1. c. 85 = C. leucanthus.
multiplex, Lem. 1. c.=C. multiplex.
nigrispinus, Lem. L c. (=*Echinopsis nigrispina).*—Hab. ?
oxygonus, Lem. 1. c. = C. oxygonns.
pictus, Lem. 1. c 84 *(=*Echinopsispicta).*—Hab.?
pulchellus, Lem. 1. c. 85 - C. pulchellus.
tubiflorus, Lem. 1. c. = Echinocactus tubiflorus.
Schelhasii, Lem. 1. c 84 - C. Schelhasii.
turbinatus, Lem. L c.=C. turbinatus.

ECHINOPANAX, Decne. & Planch, in Rev. Horti'c. (1854) 106 = ratsia, Decne. *Sc.* Planch. (Araliac).
horridus, Decne. & Planch. 1. c. = F. horrida.

ECHINOPEPON, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. vi. (1866) 17-EohinocystiB, Torr. (Cucurbit.).
giutinosa, Naud. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 801 = Echinoc. giutinosa.
horridus, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. V. vL (1866) 19 - Echinoc. Coulteri.
milliflorus, Naud. 1. c. 18 = Echinoc. milleflora.
quinquelobatus, Naud. L c.=- Echinoc. torquata.

ECHINOPHORA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. II. 20 (1740). *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 881.
ANISOSCIADIUM, DC. Prod. iv. 234 (1880).
anatolica, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 56.—As. Min.
carvifolia, *Boiss. V Bal. 1. e.* Ser. II. v. 104.—Cilicia.
caspica, DC. Prod. iv. 286 = Hippomanthrum crispum.

ECHINOPHOBA:—
Exoacantha, D. Dietr. Syn. PI. ii. 985-Exoacantha heterophylla.
flabellifolia, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 92 - Pycnocycla flabellifolia.
platyloba, *DC. Prod.* iv. 235.—Persia,
radians, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. ii. (1844) 92.—As. Min.
Sibthorpiana, *Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* 69.—Graec.; Oriens.
spinosa. *Linn. Sp. PI.* 239.—Europ.; Reg. Mediterr.
tenuifolia, *Linn. 1. c.*—Europ. austr.
tenui/olia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 266=Sibthorpiana.
Tournefortii, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 50, 241 = anatolica,
tiichophylla, *Sm. in Sees, Cycl.* xii. n. 3.—Armen.; Persia.

ECHINOPOGON, Beauv. Agrost. 42. t. 9. f. 6 (1812). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1145.
HYSTERICINA, Steud. Syn. PI. Gram. 35 (1855).
asper, Trin. Fund. Agrost. 126=ovatus.
Gunnianus, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 413-.Deyeuxia Gunniana.
ovatus, *Beauv. Agrost.* 42. t. 9.—Austral.
Sieberi, Stead. Syn. PL Gram. 183-ovatus.

ECHINOPS, Linn. Gen. ed. I. 242 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 462.
ECHINANTHUS, Neck. Elem. i. 91 (1790).
ECHINOPUS, Toum. ex Adans. Fam. ii. 114 (1768).
SPHAEROCEPHALUS, Linn. Syst. ed. I (1785).
Acantholepis, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. iii. 99-=Acantholepis orientalis.
acanlis, *Lavy, Vig. Orig.* 11; *ex DC. Prod.* vi. 527.—Hab.?
adenocaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 88=viscosus.
albicaulis, *Kar. &* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 387.—Soongaria.
albidus, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. vi. 97 = sphaerocephalus.
altaicus, Hoit ex DC. Prod. vi. 524 = sphaerocephalus.
amplexicaulis, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) 101. t. 67.—Afr. trop.
armatus, *Boiss. (f Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 436.—Assyria.
armatus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 389 = bannaticus.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 98.—Persia.
australis, Tenore, ex Nym. Consp. 399 = E. Ritro.
bannaticus, *Rochel,exSchrad. Blumenb.W.*—Bnnnat.; Tauria.
bithynicus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 100 — viscosus.
Blanchianus, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 480.—Syria.
Bovei, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 99.—Afr. bor.
candidus, Boiss. 1. ex. 86 = Cephalotes.
castaneus, *Munby, Cat. PI. Alger.* 17, nomen.—Algeria.
Cephalotes, *DC. Prod.* vi. 526.—Persia,
ceratophorus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 100.—Persia,
chamaecephalus, *Hochst. ex A. Rick. Tent. Fl. Abyss.* i. 448.—Abyss,
chantavicus, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) I. 365.—As. centr.
Chardini, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 124.—Persia,
choetocephalus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. W*—Alger.
chorassanicus, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* vi. (1868) 405.—Persia,
ooeruleus, *Owerin, ex Trautv. in Act. Hart. Petrop-* viii. (1883) 477, nomen.—Transcauc.
commutatus, *Jurattta, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,* viii. (1868) 17.—Europ. austr.
connatus, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1861) 380°= viscosus.
coriarius, C. B. Clarke, Comp. Ind. 212=comrgerus.
comigerus, *DC. Prod.* vi. 525.—Ind. or.
corymbosus. Linn. Sp. PI. 815 - Cardopatium corymbosum.
creticus, Boiss. *Sc* Hcldr. Diagn. Ser. I. x. 87 = viscosus.
cyanocephalus, *Boiss. V Haussk. in Boiss. Fl. Orient-* iii. 434.—Persia,
dahuricus, *Fisch. Cat. Hort. Gorenh.* ed. II. 37.—Dahur.; Mongol,
dasyanthus, *Regel V Schmalh. ex Regel, PI. &<"• Fedsch.* 47.—As. centr.

ECHIWOPS:—
davuricus, Trevh. Ind. Sera. Hort. Wratislaw. (1819); Ledeb. Fl. Ross. iii. 658=hnmilis.
dichroas, *Boiss.* 6" *Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 431.—Persia,
echinatus, *Roxb. Hort. Beng.* 62; *Fl. Ind.* iii. 447.—Ind. or.
echinophorus, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 87-spinosus.
eglandulosus, Schur, Enum. PLTranss. 426= exaltatus.
elatus, Bunge, in Bull. Acad. Pétersb. vi. (1868) 407 = horridus.
eUgans, Bertol. Fl. Ital. ix. 513 = E. Ritro.
eriophorus, Slev. ex DC. Prod. vi. 523 =humilis.
exaltatus, *Koch, Syn. FL Germ.* ed. II. 452 = commutatus.
exaltatus, *Schrad. Hort. Getting,* ii. 15. t. 9.—Hungar.
fruticosus, Linn. Sp. PI. 815 = Kolandra argentea.
Gaillardoti, *Boiss. Diagn.* Ser. IL iii. 38.—Syria.
giganteus, Hort. ex DC. Prod. vi. 524 = sphaerocephalus.
giganteus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 449.—Abyss,
glaberrimus, *DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ii. (1834) 260.—Arab.
glandulosus, E. Weiss, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 433 = viscosus.
globifer, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 581 = exaltatus.
Gmelini, Ledeb. Fl. Alt. iv. 45 = dahuricus.
Gmelini, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* v. (1832) 195.—Mongol.
graecus, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 4.—Graecia.
grandiflorus, Clarke, Tiav. ii. 462 = graecus.
Griffithianus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 39-echinatus?
Grijsii, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 221 =dahuricus.
Haussknccht*ii, Boiss. Fl. Orient,* iii. 438.—Persia,
hebelepis, *DC. Prod.* vi. 524.—Persia.
Heldreichii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 84.—As. Min.
heterumorphus, *Bunge, in Bull. Acad. Petersb.* vi. (1863) 406.—Persia,
hispidus, *Fresen. in Mus. Senckenb.* Ui. (1845) 68.—Abyss.
horridus, *Desf. Tabl.* ed. I. 94.—Persia.
horridus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 367=sphaerocephalus.
humilis, *Bieb. Fl. Tour. Cauc. Suppl.* 598.—Sibir. altaic
humilis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 292 = platylepis.
Hussoni, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 86.—Arabia,
hypoleucus, *Rupr. Sert. Tiansch.* 53.—Turkestan,
ilicifolius, *Bunge, in Bull. Acad. Petersb.* vi. (1863) 403.—Persia,
inermis, *Boiss.* b* *Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 436.—Persia,
integrifolius, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 446.—Sibiria.
jaxarticus, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Petersb.* vii. (1851) 350 *(Lehm. Rel.* 174).—Turkestan,
jesdianus, *Boiss. (f Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 125.—Persia,
karatavicus, *Regel & Sehmalh. in Act. Hort. Petrob.* v. (1877) 256.—Turkestan.
Kemeri, *Heimerl, ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 61.—Persia.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 99.—Persia,
kurdicus, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 487 (=sei|.?).—Persia,
kurdicus. *Bunge, in Bull. Acad. Pitersbi* vi. (1863.) 408—Persia.
lanatus, Steph. ex DC. Prod. vi. 523 = humilis.
'anuginosus, Lam. Encyc. iii. 317 = graecus.
'anuginosus, Sibth. & Sin. Fl. Graec. t 925 = miercephalus.
lasioclinius, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 89 = Blancheanns.
lasiolepis, Bunge, in Bull. Acad. Pétersb. vi. (1863) 403 = Cephalotes.
latifolius, Tausch, in Flora, xi. (1828) 486=dahuricus.
leucographus, *Bunge, in Bull. Acad. Petersb.* vi. (1863) 4O6.-Persia.
Jongifolius, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 452.—Abyss,
longisetus, *A. Rich. I. c.* 450.—Abyss.
macrochaetus, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 85=viscosus.
"nacrochaetus, *Fresen. in Mus. Senckenb.* iii. (1845) 69.—Abyss,
macrophyllns, *Boiss. (f Haussk. in Boiss. Fl. Orient.* HI. 426.—Persia,
nuracandicus, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb.* vii. (1851) 351 *'{Rel. lehm.* 175).—Turkestan.

ECHHTOPS:—
maximus, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 823 = sphaerucephalus.
microcephalus, *Sibth. If Sm. Fl. Graec. Prod,* ii 209. —Graecia.
mollis, Schur, in Verh. Siebeab. Ver. Naturw. iv. (1853) 34-commutatas.
multiflorus. Lam. FL Fr. ii. 2=sphaerocephalas.
nanus, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* vi. (1863) 411.—Hab.?
Neumayeri, *Vis. Fl. Dalmat.* ii. 25. t. 10. ter.—Europ.
niveus, *Wall. Cat.* n. 2686.—Reg. Himal. occ.
nodiflorus. Lam. Encyc. ii. 337 = Rolandra argentea.
Oiivieri, Jaub. & Spach, Illustr. ïll 100-Acantholepis orientalis.
orientalis,Tnutv Diss. Echin. 22 = horridus.
ossicus, *C. Koch, in linnaea,* xxiv. (1851) 880.—Reg. Caucas.
paniculatusr Jacq. f. Eclog. i. t-9=sphaerocephalus.
parviflorus, *Boiss.* 6* *Buhse, in Nouv.. Mim. Sec. Nat. Mosc.* xii. (1860) 124.—Persia.
pauciflorus, Lam-Fl. Fr. ik 2:-E. Ritro.
persicus, *Stev. ex Fisch. Cat. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 37.—Reg. Caucas. ; Persia,
platylepis, *Trautv. Diss. Echin.* 11. f. 1.—Hab. *1*
polycephalus, Gonan, ex Steud. Norn. ed. II. i. 537 = E. Ritro.
polyceras, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 85 = Blancheanus.
pelygamus, *Bunge, in Bull. Acad. Petersb.* vi. (1863) 405.—Persia.
pratensis, Turcz. ex Ledeb. Fl. Rose. ii. 653 = dahuricus.
Prescottii, Fisch. & M.y.. ex DC. Prod. vi. 525 = glaberrimus.
pungens, Trautv. Diss. Echin. 18=persicus.
Ritro, Georgi, Reise, i. 231 - dahuricus.
Ritro, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross..ii. 655 -.sphaerocephalus.
Ritro, *Linn. Sp. PL* 815.—Reg. Mediterr.; Oriens; As. bor.
Ritro, Schkuhr, Handb. t. 268=exaltatus.
ritrodes, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* vi. (1863) 407 (rytrodes) .—Persia,
robustus, *Bunge, 1. c.* 405.—Persia.
Rochelianus, *Griseb. Spidl. Fl. Rumtl.* ii. 229.—Banat.
ruthenicus, Bess. Enum. PI. Volh. [77 ?]; ex DC. Prod. vi. 523^dahuricus.
ruthenicus, Bieb. Fl. Taut Cauc iii. 597-E. Ritro.
ruthenicus, Reichb. Ic. PI. Crit. t 450=bannaticus, sphaerocephalus.
ruthenicus, Rochel, PI. Rar. Banat. 77. t 87 = bannaticus.
rytrodes, Bunge, in Bull. Acad. Pétersb. vi. (1863) 407 >= ritrodes.
Sartorianus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 97 = E. KUro.
serratifolius, Sch. Bip. in Follichia, xviii-xix. (1861) Ifc5 = longifolius>
siculus, *P. G. StrobL in Flora, \vr.* (1882) 505.—Sicilia.
sphaerocephalus, *Linn.Sp.PL* 814.—Europ.; Oriens; As. bos.
sphaerocephalus, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 182 = dahuricus.
sphaerocephalus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 923= viscosus.
spinosissimus, Tana, Farset. Nov. Gen. 13=spinosus.
spinosus, Bové, ex DC. Prod. vL 625= glaberrimus.
spinosus, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2985-echinatus.
spinosus, *Linn. MantA.* 119.—Creta; Aft. bor.
spinosus, Urv. in *Mim.* Soc. Linn. Par. i. (1822) 374 -viscosus.
strictus, Eichw. Skizze, 146 = E. Ritro.
strictus, Fisch. ex Sims, Bot. Mag. t. 2.457-exaltatus.
strigosus, Bieb. Casp. App. 211 "Sphaerocephalus.
strigosus, *Linn. Sp. PI.* 815.—Hispan.; Marocc.
subglaber, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* iii. (1845) 110.—Soongaria.
syriacus, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 84»viscosus.
Szowitzii, *Fisch. V Mey. ex DC. Prod.* vi. 525.—Reg. Caucas.
tauricus, Hort. ex DC. 1. c. 528=platylepis.
tauricus, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 638-sphaerocephalus.
taygetus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 98-sphaerocephalus.

ECHtETOFS:—
tenui/olius, Fisch. ex Schkuhr, Handb. iii. 181= E. Ritro,
tenui/olius, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) (il=bannaticns.
tenuissimus, Sibth. & Sm. Fl. Graec. x. 19. t. 926 =-graecus.
tibetiens, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* vi. (1863) 404.—Tibet.
Tournefortii, *Ledeb. in Trautv. Diss. Echin.* 21.—Reg. Caucas.
tricholepis, *Schrenk, Enum. PL Nov.* 47.—Soongaria.
tunetanus, Vahl, ex Vitm. Summa, v. 175 = spinosus.
Turceaninowii, Trautv. Diss. Echin. 28; Ledeb. Fl. Ross. ii. 657 = Gmelini.
vaginatus, *Boiss.* b* *Haussk. in Boiss. FL Orient,* iii. 437.—Syria.
villosis»imus,.Bimf«, in *Bull. Acad. Pitersb.* vi. (1863) 406.—Persia.
villosus, Hort. ex DC. Prod. vi. 624=sphaerocephalus.
virgatus, Lam. Encyc. ii. 287 — E. Ritro.
viscosus, *DC. Prod.* vi. 525__Reg. Mediterr.; Oriens.
viscosus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 856 = sphaerocephalus.
xanthacanthus, *Regel b" Sehmalh. ex Regel, PL Nov. Fedsch.* 46.—Turkestan.

ECHINOPSILON, Moq. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. ii. (1834) 127 = Chenolea, Thunb. (Chenop.).
anisacanthoides, F. Muell. in Trans. Phil. Inst Viet. ii. (1858) 76 = Anisacanthaechinopsila.
brachypterus, F. Muell. Fragm. vii. 18 = Kochia brachyptera.
carnosus, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 136 - C. carnosa.
caspicus,.Bnnge, in *Mim.* Sav, Etr. Pitersb. vii. (1861) 455.—As. centr.
crassifolius, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 187 = Kochia hirsute.
dasyphyllus, Moq. 1. c. 136 = Kochia dasyphylla.
diffusus, Moq. 1. c. 137 = C. diffusa.
divaricatus, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 736.—Soongaria.
eriophorus, Moq. in Ann. Sc Nat. *Sir.* II. ii. (1884) 127 = Kochia latifolia.
eurotioides, F. Muell. Fragm. vii. 18-C. eurotioides.
hirsutus, Moq. in Ann. Sc Nat. Sér. II. ii. (1834) 127 - Kochia hirsuta.
kyssopifolius, Moq. in DC Prod. xiii. II. 135-Kochia hyssopifolia.
lanatus, Moq. in Ann. Sc Nat. Sér. II. ii. (1884) 127 - Kochia hyssopifolia.
muricatus, Moq. 1. c. •= Kochia muricata.
Reuterianus, Boiss. in Boiss. & Reut. Pugill. PI. Nov. 105 = Kochia Reuteriana.
sclerolaenoides, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. ii. (1858) 75 = C. sclaerolenoidas.
sedoidesMoq. in Ann. Sc N«h *Sir.* II. ii. (1884) 127 - Kochia sedoides.
sericeus, Moq. Chenop. Ennm. 89-C. diffusa.
stelligerus, F. Muell. Fragm. vii. 13 - Kochia stelligera.

ECHINOPSIS, Linn. Horb Cliff. 391 (1737)-Eohlnops, Linn. (Compos.).

ECHINOPSIS, Zuce. in Abh. Akad. Muench. ii. (1837) 675 = Cereus, Haw. (Cact.).
amoena, A. Dietr. in Otto *it* Dietr. Allg. Gartenz. xii, (1844) 187 = C. amoena.
amoenissima, Wender. Analect. Kijt. Bemerk. (1852) n. 6.—Hab. ?
apiculata, Linke, in C. Koch *Sc* Fint. Wochenschr. i, (1858) ft5.—Bolivia.
aurata, SalmDyck, Cact Hort. Dyck. ed. II. 39, 182 =C. auratus ?
£K^«»;Salm.Dyck, 1. c. 181.—Bolivia.
campylacantha, Pteiff. *Sc* Otto, Abbild. Cacteen, i. sub t. 4 = C. leucanthus.
cinnabarina, Labour. Monog. Cact 288.—Bolivia.
cristata, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.ed. II. 88, 178. —Bolivia.
Decaisniana, Walp. Rep. ii. 324 — Echinocactus Decaisnei.
Eyriesii, Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, i. sub t. 4 « C. Eyriesii.

ECHINOPSIS:—
' *Forbesii,* Hort. Angl. ex A. Dietr. in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. xvii. (184<J) 198.—Hab. ?
formosa, Jacobi, ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyclc. ed. II. 39.—Chili.
formosissima, Labour, in Rev. Hortic. Se'r. IV. iv. (1859) 26.—Mexic.
gibbosa, Pfeiff. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 291 = Echinocactns gibbosus.
grandiflora, Liuke, in C. Koch, AUg. Gartenz. (18S7) 289.—Bras.
Haageanus, Linke, in C. Koch & Fint. Wochenschr. i. (1858) 86 = Echinocactus Haageanus.
Huotti, Labour. Monog. Cact. 801.—Chili.
Jamessianus, Hort. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. *2%=Descaisniana.*
Kuotti, Schlumb. in Rev. Hortic. Sér. IV. iii. (1854) 348-//«««»?
leucantha, Walp. Rep. ii. 824 = C. leucanthns.
Maximiliana, Heyder, ex A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xiv. (1846) 250.—Hab. ?
melanacantha, A. Dietr. 1. c. 306—Echinocaetus tubiflorus.
Misleyi, Labour. Monog. Cact. *291=cristata.*
multiplex, Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, i. t. 4 - C. multiplex.
nigricans, Linke, in C. Koch, Allg. Gartenz. (1867) 23a.—Chili.
nigrispina, Walp. Rep. ii. 324.—Hab.?
nodosa, Linke, in C. Koch *k* Fint. Wochenschr. i. (1858) 85-Echinocactus nodosus.
octacantha, Muehlenpf. in Otto *It* Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848) 19.—Texas.
oxygona, Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, i. snbt. 4-C. oxygonus.
pectinata, Fennel, in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xi. (1843) 282-C. caespitosus.
Pentlandi, Salm-Dyck, ex A. Dietr. I. c. xiv. (1846) 250.—Peruv.
picta, Walp. Rep. ii. 324.—Hab. ?
pulchella, Zucc. ex Foerst. Handb. Cact ed. I. 363 = C. pulchellus.
Reichenbachiana, Pfeiff. ex Foerst. 1. c 365 - C. caespitosus.
rhodacantha, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 39, 182.—Reg. Argent
salpigophora, Lem. ex Salm-Dyck, I. c. 181; Labour. Monog. Cact. 802.—Hab. ?
Scheerii, Salm-Dyck, 1. c. 179.—Bolivia.
Schelkasii, Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, i. sub t. 4 =C. Schelhasii.
Scopa,Cm. in Rev. Hortic. (1875) 874»Echinocactns Scopa.
setosa, Linke, in C. Koch & Fint. Wochenschr. i. (1858) 86-Echinocactus setosus.
simplex, Niedt, in C. Koch. Allg. Gartenz. (1867) 238.—Hab. ?
Tougardiix, Herincq, L'Horticult. Franç, iii. (1853) 198.
tricolor, A. Dietr. in Otto 4 Dietr. Allg. Gartenz. xvi. (1848)210.—Hab.?
tuberculata, Niedt, in C. Koch. Allg. Gartenz. (1857) 287.—Bolivia.
tubifiora, Zucc. ex A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xiv. (1846) 306 = Echinocactui tubiflorus.
turbinata, Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, i. sub t. 4 = C. turbinatus.
valida, Monv. ex Salm-Dyck, Cact. Hort Dyck. ed. II. *1S1= Forbesii.*
Zuccarinii, Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, i. sub t 4 = Echinocactus tubiflorus.

ECHINOPSUS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 109 =Eoliinop8, Linn. (Compos.).

ECHINOPTERIS, Lindl. Veg. Kingd. 390 (1847) = seq.

ECHINOPTERYB, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (.1843) 342 (Monog. 88. t. 9). *MALPIGH1ACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 264.
ECHINOPTERIS, Lindl. Veg. Kingd. 390 (1847).
Lappula, *A. Juss. II. cc*—Mexic.

ECHINOPUS, Toira. ex Adans. Fam. ii. 114 (1763) = EchinopB, Linn. (Compos.).
Ritro, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 121 - Echinops Ritro.
tpkaerocephalus, Scop. 1. c = Echinops spbaerocephalns.

ECHINOSCHOENUS, Nees *8c* Meyen, Reise, i. 116 (1884); et in Linnaea, ix. (1884) 297-Bynoho-Bpora, Vahl (Cyperac).
Beyrichii, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 132 = R. Beyrichii.
sparganioides, Lindl. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 103 = R. exaltata.
triceps, Nees *8c* Meyen, Reise, i. 116,117; et in Linnaea, ix. (1834) 3, 297 = R. exaltata.

ECHINOSPARTON, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1888) 858 = Genista, Linn. (Legumin.).
Barnadesii, Fourr. 1. c. = G. Bamadesiŕ.
horridum, Fourr. 1. c.=G. horrida.
lugdunense, Fourr. I. c. = G. horrida.

ECHINOSPERMUM, Sw. ex Lehm. Asperif. 113 (1818). *BORAGINEAE,* Beniǹ. *8c* Hook. f. ii. 650.
HETEROCARYUM, A. DC. in DC. Prod. x. 144 (1846).
LAPPULA, [Riv.] Kupp. Fl. Jen. ed. Hall. 12 (1745); Moench. Meth. 416 (1794).
ROCHELIA, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 11 (1819).
affine, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1841) 714.—Sibir. altaic.
alpinum, Schur, Enum. PI. Transs. 464=E. Lappula.
anisacanthum, *Turct. ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 156.—Sibir. baical.
barbatum, *Lehm. Asperif.* 128.—Marocco; Oriens ; Sibir.
borbonicum, Lehm. 1. c 119 = Cynoglossum borbonicum.
brachycentrum, Eichw. Casp. Cauc. 4 -= microcarpum.
brachycentrnm, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 203.—Sibir. altaic.
brachyscpalum, *Clous, in Beitr. Pfl. Suss. Reich,* viii. 240.—Reg. Casp.
Bungei, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 252.—Persia.
caelestinum, Wight, Ic. t. 1894 = Paracaryum caelestinum.
calathicarpum, Stocks, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 175 -= Paracaryum calathicarpum.
califomicum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 225.—Calif.
cancellatum, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect Médic) i. (1853) 439 = Rochelia stellulata.
canum, Benth. in Royle, Illustr. Bot Himal. 806= Eritrichium strictum.
capense, *DC. Prod.* x. 188.—Afr. anstr.
cariense, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 40 = barbatum.
casanense, Wirz. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 156— seq.
casanicum, Wirz. Geogr. PI. Casan. 84; et in Flora, xxv. (1842) 668 = E. Lappula.
caspium, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. v. 84 = semiglabrum.
ciliatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 225.—Am. bor. occ.
cirdnnatum, A. Dietr. ex DC. Prod. x. 164 - Solenanthus circinnatus.
compressum, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiii. (1850) I. 522.—Sibir. baical.
concavum, *F. Muell. Fragm.* ii. 139.—Austral,
condylophorum, *Lehm. Asperif.* 125.—Sibir.
consangnineum, *Fisch. if Mey. Ind. Sem: Hort. Petrop.* v. 35.—Sibir. altaic.
eristatum, Bunge, Del. Sem. Dorp. (1889) 8 = Paracaryum eristatum.
cymosum, *Stscheg. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) I. 184.—Soongaria.
cynoglossoides, *Lehm. Asperif.* 131.—Afr. austr.
cynoglossoides, E. Mey. ex A. DC. in DC. Prod. x. 137 = E. Lappula.
deflexum, *Lehm. Asperif.* 120.—Reg. bor. temp,
difiusnm, *Lehm. Pugill.* ii. 23.—Am. bor. occ.
diplololoma, *Fisch. V Mey. Enum. PI. Nov. Schrenk,* 86.—Sibir. altaic.
divaricatum, *Bunge, in Lthm. Rel.* (1847) 234.—As. centr.
enerve, E. Mey. ex DC. Prod. x. 154 - Cynoglossum enerve.
filiforme, Godet, ex DC. Prod. x. 140=microcarpum.
floribundum, *Lehm. Pugill.* ii. 24.—Am. bor. occ.
Fremontii, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. xii. 46 = Redowskii.
glochidiatum, A. DC. Prod. x. 136 = Paracarynm glochidiatum.
gracile, Lehm. Asperif. 129 = Pectocarya linearis.
Grecnei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 163.—Calif.

ECHINOSPERMUM :—
heteracanthum, *Ledeb. Suppl. Ind. Sem. Hort. Dorp.* (1823)8.— Reg. Caucas.
heterocaryum, *Bunge, in Rel. Lehm.* (1847) 235.—As. centr.
hispidum, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 106.—Am. bor. occ.
intermedium, Ledeb. Fl. Alt. i. 199 = Redowskii.
ispahanicum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 123 =» E. Lappula.
javanicnm, *Lehm. Asperif.* 118.—Java.
Karelini, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi.67.—Soongaria; Sibiria.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 29 •= sinaicum.
laemigatum, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat. Mosc. xv. (1842) 411.—Soongaria.
Lappula, *Lehm. Asperif.* 121.—Europ.; Oriens.
Iatifolium, *Hockst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 89.—Abyss.
leiocarpum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 36 = Krynitzkia leiocarpa.
macranthum, *Ledeb. Fl.ÁU.* i. 205.—Sibir.; Turkestan,
marginatum, *Lehm. Asperif.* 130.—Reg. Caucas. et Ural.
mexicanum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 377.—Mexic.
microcarpum, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 202.—Persia; Sibiria.
minimum, *Lehm. Asperif.* 126.—Rossia.
myosotiflorum, A. DC. in DC. Prod. x.141 = Eritrichium strictum.
nervosum, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 146. t:42=dimisum.
oligacanthum, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 248.—Persia; Afghan.
oligacanthum, *Ledeb. Fl. Xoss.* iii. 161.—Sibir. altaic.
omphaloides, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1845) 211.-Sibiria.
pachypodum, *Hohen.ex A. DC. in DC. Prod.* x. 145.—Mesopot.
paniculatum, E. Mey. ex A. DC. 1. c. 149, 143 = Cynoglossum micranthnm.
patens, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 878.—Am. bor.
patulum, *Lehm. Asperif.* 124.—Reg. Mediterr.; Sibir.
patulum, Lehm. in Hook. FL Bor. Am. ii. 84-Redowskii.
pilosum, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 462 = Redowskii.
pinetorum, *Greene, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1(81-82) 224.—N. Mexic.
pyrenaicum, *Willk. V Vayr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xi. (1882) 117.—Mont. Pyren.
Redowskii, *Lehm. Asperif.* 127.—As. et Am. bor.
rigidum, DC. Prod. x. 141 —- microcarpum.
rupestre, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. PHersb.* ii. (1842) 194.—Sibir. altaic.
scabrosum, Buckl. in Proc. Acad. Sc Philad. 1861 (1862), 462 = Redowskii.
secundum, Kar. *8c* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 718 =—deflexum.
semicinctum, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 605, m textu.—Rossia.
semiglabrum, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 204.—Sibir. altaic.; Turkestan.
sericeum, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 306 = Eritrichium basifixum.
sessiliflorura, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 124.—Persia; Beluchist.
sinaicum, *A. DC. in DC.Prod.* x. 141.—Arab.; Persia.
spathulatum, Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 306 = Eritrichium spathulatum.
spinocarpos, Boiss. Fl. Orient, iv. 249 = Vahlianum.
squarrosum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 165 = patulum.
squarrosum, Reichb. FL Germ. Excurs. 346 = £• Lappula.'
strictum, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 200.—Sibir. altaic
strictum, Nees, in Neuwied, Reise Nord-Am. ii. 443 = Redowskii.
strigosum, Steud. Norn. ed. II. i. 588= Cynoglossum borbonicum.
stylosum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 715 = microcarpum.
subdecumbens, Parry, in Proc Davenp. Acad. i. (1876) 148-diffusum.
Szovitsianum, *Fisch. if Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 86.—As. Min.; Persia; Soongar.
tenne, *Ledeb. Fl. Alt.* i. 201.—Sibir. altaic.
ttxanum, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 260 - Redowskii.
thymifolium, A. DC. in DC. Prod. x. 136-deflexum.

ECHINOSPERMUM:—
Mseriale, Bunge, Del. Sem. Hort Dorpat. (1840) 8.
n. lS^barbatum.
Mseriale, Kar. & Kir. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 162 (Quid ?).—Sibir. altaic.
tuierculosum, Ledeb. in Eichw. *Sc* Mey. Fl. Casp. 11. t. 6 = Vahliannm.
nrsinum, *Greene, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) '224.—N. Mexic.
Vahlianum, *Lehm. Asperif.* 182.—Aegypt.; Oriens.
virginicum, *Lehm. 1. e.* 117.—Am. bor.
vulgare, Sw. ex Schrad. in Comm. Gotting. iv. (1816-18)195. f. 7 = E.Lappula.
zeylanicum, Lehm. Asperif. 116 = Cynoglossum denticulatum.

ECHINOSPHAERA, Sieber, ex Steud. Norn, ed, II. i. 588 (1840) = Bielnocarpua, Desf. (Euphorb.).
rosmarinoides, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, vi. 70 = R. pinifolius.

ECHINOSTACHYS, Brongn. in Planch. Hort. Donat. 26 (1854 ?) - Aechmea, Ruiz *Sc* Pav. (Bromel.).
Pineliana, Brongn. 1. c—A. Pineliana.
rosea, Beer, Bromel. 149=A. Pineliana.
Van-Hmtteana, Van Houtte, Cat. (1878) = Quesnelia Van-Houttei.

ECHINOSTACHYS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 248 (1837)=PyonOBtachys, Hook. (Labiat.).
reticulata, E. Mey. 1. c.-P. reticulata.

ECHINUS, Lour. Fl. Cochinch. 633 (1790) - Mallotus, Lour. (Euphorb.).
claoxyloides, Baill. Adansonia, vi. (1866-66) 316 = M. claoxyloides.
Dallachyanus, Baill. 1. c. 814 = M. Dallachyi.
mollissimus, Baill. 1. c. 316 = M. ricinoides.
nesophilus, Baill. 1. c. 314 = M. nesophilus.
philippinensis, Baill. 1. c. = M. philippinensis.
trisulcus. Lour. Fl. Cochinch. 633 = M. cochinchinensis.

ECHIOCHILON, Desf. Fl. Atlant. i. 166. t. 47 (1800).
BORAGINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 852.
fruticosum, *Desf. I. c.*—Afr. bor.
hispidissimum, Tausch, in Flora, xii. (1829) 643 = Arnebia hispidissma.
longiflorum, *Benth. in Hoot. Ic. PI.* t1277.—Arab.

ECHIOGLOSSUM, Blume, Bijdr. 364. t. 28 (1825)-Cleisostoma, Blume (Orchid.).
javanicum, Blume, 1. c.—Java.
minax, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 14.—Java.
muticum, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855), 226.—Java.
quartum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 891.—Java.
striatum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) II. 890.—Reg. Himal.

ECHIOIDES, Moench, Meth. 416 (1794)«Myosotla, Tourn. (Borag.).
annua, Moench, 1. c. — M. arvensis.
palustris, Moench, 1. c - M. palustris.
perennis, Moench, 1. c. = M. palustris.

ECHIOIDES, [Toum.] Desf. Fl. Atlant. i. 168 (1800) = Nonnea, Medic. (Boragin.).
alba, Poir. in Diet. Sc. Nat. xiv. 218=N. alba.
alpestris, Poir. 1. c. 220=N. alpestris.
arvensis, Poir. ex Steud. Norn. ed. II.i. 538-Lycopsis arvensis.
caspica, Poir. in Diet Sc. Nat. xiv. 219=N. picta.
ciliata, Poir. 1. c. 218 = N. ciliata.
Colsmanniana, Poir. 1. c. 219 = N. Colsmanniana.
elongata, Poir. 1. c.=N. elongata.
grandiflora, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 120 - N. rosea.
lutea, Poir. in Diet. Sc. Nat. xiv. 217 - N. lntea.
nigricans, Desf. Fl. Atlant. i. 168=N. nigricans.
obtusifolia, Poir. in Diet. Sc. Nat. xiv. 218=N. obtnsifolik.
picta, Poir. 1. c.218 = N. picta.
rosea, Poir. 1. c 220 = N. rosea.
rubra, Desf. Tabl. ed. I. 73 = N. rubra.
•nentricosa, Poir. in Diet Sc. Nat xiv. 218 = N. alba.
violacea, Desf. Fl. Atlant. i. 164 = N. nigricans.

ECHION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144cEchlum, Tourn. (Boragin.)-

ECHIOPSIS, Reichb. Handb. 192 (1887) = Lobo-8t6mon, Lfthm. (Boragin.).

ECHISACHYS, Neck. Elem. iii. 228 (1790)-Tragus, Hall. (Gramin.).

ECHITES, P. Br. Hist. Jamaic. 181 (1756). *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 724.
BELUTTA-KAKA, Adans. Fam. ii. 172 (1768).
CHARIOMMA, Miers, Apocyn. S. Am. 110 (1878).
HETEROTHRIX, Muell. Arg. in Mart. FL Bias. vi. 183. t. 40 (I860).
MESECHITES, Muell. 1. c. 150. t. 46 (1860).
MITOZUS, Miers, Apocyn. S. Am. 218 (1878).
acuminata, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 15 = Aganosma marginala.
acuminata, *Rui* V Pav. Fl. Per.* ii. 19. t 184.—Peruv.
acuminata, Willd. ex DC. Prod. viii. 478 = mucronata.
acutiloba, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 461.—Peruv.!
adglutinata, Burm. f. Fl. Ind. 68 (Holarrhenae sp.).—Ind. or.
adglutinata, Jacq. Select. Am. 81. t 28=agglutinata.
affinis, Roem. & Schult. Syst iv. 398 = Ichnocarpus ovatifolius.
agglutinata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 18.—Ins. S. Doming.
albifiora, Miers, Apocyn. S. Am. 204 = brachyloba.
alexicaca, *Mart, ex Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 68.—Bras.
almadensis, *Stadelm. 1. c.* 28.—Bras,
amazonica, *Stadelm. I. c.* 50.—Bras,
amplissima, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xr. (1841) 824, nomen (Aganosmatis sp. *V).*—Ins. Timor,
andina, *Miers, Apocyn. S. Am.* 204.—Ecuador.
Andrewsii, *Chapm. Fl. S. V. St.* 359.—Ind. occ
Andrieuxii, Miers, Apocyn. S. Am. 206=Mandevilla Andrieuxii.
angustata, Veil. Fl. Flum. iii. t. 48 = Macrosiphonia longiiioiA.
angustifolia, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 247.—Guiana,
angustifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 637.—Ins. S. Doming,
annularis, Linn. Diss. PI. Sunn. n. 82 ; Amoen. Acad. viii. 264 = seq.f
annularis. Linn. f. Suppl. 166 = Prestonia annularis.
antennacea, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 466.—Peruv. ?
antidysenterica, Roxb. ex Flem.in As. Res. xi. (1810) 166 = Holarrhena antidysenterica.
apoxys, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 622 = Aganosma marginata.
arborea, Veil. FL Flum. 114 J iii. t. 47=Secondatia arborea.
arborescens, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viiL 488-Mascarenhasia arborescens.
aspera, *Mart, &• Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1844) 859.—Mexic.
Asperuginis, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 52.—Ind occ.
atropurpurea, Lindl. in Paxt. Mag. Bot. ix. (1842) 199 = Dipladenia atropnrpnrea.
atroviolacea, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 76 = Dipladenia atroviolacea.
augusta, Veil. Fl. Flum. 114; iii. t. 48 - longiflora.
auriculata, *Pohl, ex Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 25.—Bras.
bantamensis, *Blume, Bijdr.* 1041.—Java,
barbata, *Den. Prod. PI. Ind. Occ.* 80.—Ind. occ.
barbata, D. Dietr. Syn. PL i. 661=Parameriaglandulifera.
Benthamii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 467.—Guiana.
Berterii, *A. DC. in DC. I. c.* 447.—Ins. S. Doming.
bicolor, Miq. Stirp. Sunn. Sel. 164.—Guiana,
bicomis. *Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1.114.—Bras.
bifiora, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 187-Billbergii.
bifiora, Chapm. in Coult. Bot. Gazette, iii. (1878) 11 = paludosa.
biflora, Ehrenb. ex Schlecht in Linnaea, xxvi. (1853-66) 666 - Ehrenbcrgii.
biflora, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 13; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 807.—Ind. occ.
bifurcata, Pof pp. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 119 = OdontadeniaPoeppigii. . . . . .
bignoniaeflora, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 372 = Stemmadenia bignoniaeflora.
Bilbergii, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh,* 1864 (1856) 137.—Panama.

ECHITES:—
bispinosa, Linn. f. Suppl. 167 - Pachypodium bispinosum.
Blanchetii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 448.—Bras,
bogotensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iti. 216. t. 248.—N. Granat.
brachiata, Wall. Cat. n. 1668=Ecdysanthera micrantha.
brachyloba, *Miers, Apocyn. S. Am.* 208.—Peruv.
brachysiphon, Ton. in Bot. Mex. Bound. 168 = Macrosiphonia brachysiphon.
brachystachya, Benth. in Hook. Joum. Bot iii. (1841) 248.—Guiana.
bracteata, Griseb. in Goett Abh. ix. (1874) 208 = Parsonsia bracteata.
bracteata, Heyne, in Wall. Cat sub n. 1656'Aganosma cymosa.
bracteaU, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 217.—N. Granat.
bracteata, Veil. Fl. Flum. 112 ; iii. t 41-Forsteronia bracteata.
brasilicnsis, *Thunb. Diss. Echit.* 6.—Bras,
brevipes, *Benth. PI. Hartw.* 216.—N. Granat.
calycina. Wall. Cat. n. 1663 = Aganosma calycina.
calycosa, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 94.—Ind. occ.
campestris, *Veil. Fl. Flum.* 118; iii. t. 43.—Bras,
canescens, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 795.—Am. austr.
caryophyllata, Blume, Bijdr. 1041 = Aganosma caryophyllata.
caryophyllata, Roth, PL Nov. Sp. 133 - Ichnocarpus ovatifolius.
caryophyllata, Roxb. Hort. Beng. 20; FLInd. ii. 11 = Aganosma calycina.
Catesbaei, G. Don, Gen. Syst. iv. 74 = Andrewsii ?
caudata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 106 - Ichnocarpus frutescens.
caudata, Burm. f. Fl. Ind. 68. t 26; Linn. Mant. i. 52 - Strophanthus dichotomus.
chilenns, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 468.—Chili,
chlorantha, *Schlecht. in linnaea,* xxvi. (1853-55) 663.—N. Granat.
christophoriana, *Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 31.—Ind. occ.
ciliata, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 32.—Bras.
cimidda et *cimicifuga,* Pav. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 413 = Haplophyton cimicidum.
cinerea, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. 11. 93 =• Haplophyton cimicidum.
circinalis, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 52.—Ind. occ.
citrifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 216.—N. Granat.
citrina, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 474.—Ind. occ.
clavata, *Roxb. Hort. Beng.* 86; *FLInd. ä.* 20.—Ins. Molucc.
coalita, *Veil. Fl. Flum.* 112; iii. t 40.—Bras.
cocdnea. Hook. & Am. in Hook. Joum. Bot. i. (1834) 286 = Dipladenia coccinea.
cognata, *Stadelm. in Flora,****. (1841) *I.Beibl.* 79.—Bras.
concolor, *Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 31.—Ind. occ.
con/erta, Wall. Cat. n. 1665 = Aganosma cymosa.
congesta, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 214.—N. Granat.
conoidea, *Zipp. ex Span, in linnaea,* xv. (1841) 324, nomen (Aganosmatis sp. ?).—Ins. Timor.
convolvulacea, A. DC. in DC. Prod. viii. 451 = Mandevilla convolvulacea.
cordata, *A. DC. t. c.* 461.—Mexic.
coriacea, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 240.—Guiana.
coriacea, *Blume, Bijdr.* 1039.—Java.
coriacea, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 6» Cryptolepis grandiflora.
coriacea. Wall. Cat. n. 1686=Anodendron paniculatum.
corymbosa, Jacq. Enum. PI. Carib. 13 = Parsonsia corymbosa.
costata, Forst. f. Prod. 20=AUtonia costata.
Coulteri, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 113.—N. Mexic.
crassifolla, *Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 143.—Bras.
crassinoda, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 644 = Dipladenia crassinoda.
crassipes, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 91.—Cuba'.
cristata, Roth, Nov. PL Sp. 136 = Aganosma marginata.

ECHITES:—
cubensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 172.—Cuba.
cuiabensis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 145 = cuyabensis.
Cururn, *Mart, in Buchn. Rep. Pharm.* (1830) n. 101. —*Cf Linnaea,* vi. (1831) *Lift.* 80.—Bras.
cuspidata, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 6 = Cryptolepis Buchanani.
cuspidata, Willd. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 152=trinda.
cuyabensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 462.—Bras.
cymosa, Roxb. Hort. Beng. [84]; Fl. Ind. ii. 16 = Aganosma cymosa.
densevenulosa, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 47.—Bras.
densiflora, *Blume, Bijdr.* 1040.—Java.
densiflora, Pohl, ex Stadelm. io Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 56-pycnantha.
denticulata, *Veil. Fl. Flum.* 110 ; iii. t. 30.—Bras.
dichotoma, Heyne. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 14 = Toxocarpus Roxburghii.
dichotoma, *H. B. tf K. Nov. Gen.et Sp.* iii. 217.—Am. austr.
dichotoma. Roth, Nov. Fl. Sp. 136 «= Aganosma caryophyllata.
dichotoma, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 19 = Vallaris Heynei.
dichotoma, *Thunb. Diss. Echit.* 6.—Hab. t
didyma, *Veil. Fl. Flum.* 109; iii. t. 27.—Bras.
difformis, Walt. Fl. Carol. 98 - Trachelospermum difforme.
disadena, *Miq. Stirp. Sunh. Set.* 156.—Guiana,
discolor, *Morite, ex Miers, Apocyn. S. Am.* 224.—Venezuela,
domingensis, *Jacq. Coll.* i. 73; *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 52.—Ind. occ.
dubia, *Veil. Fl. Flum.* 114; iii. t. 60.—Bras.
edulis, Thnnb. Diss. Echit. 5 = Brachy»telma macrorhizum.
Ehrenbergii, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-56) 666.—Ins. S. Doming,
elastica, *Hort. Angl. ex A. DC. in DC. Prod.* viii. 479, nomen.—Bras.
elegans, Benth. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 249 = Odontodenia geminata.
elegans, Wall. Cat. n. 1656.—Aganosma cymosa.
elliptica, *Thunb. Diss. Echit.* 4.—N. Granat.
elliptica, Wall. Cat. n. 1666 = Rhynchodia Wallichii.
emarginata, Veil. Fl. Flam. 113; iii. t. 46^ Laseguea emarginata.
ertcta, DC. Prod. viii. 469 = Rhodocalyx rotundifolius.
erecta, *Thunb. Diss. Echit.* 7.—Ind. or.; Java,
erecta, *Veil. Fl. Flum.* 113 ; iii. t. 45.—Bras.
esculenta. Wall. Cat. n. 1671 = Urceola esculents,
ferruginea, *A. Rich. FL Cub. Fanerog.* ii. 92.—Cuba,
ferruginea, *Thunb. Diss. Echit.* 6 (sp. ignot.).—Java.
fioribunda, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 62-Parsonsia floribnnda.
fluminensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 452.—Bras.
fragrans, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 71 = Dipladenia fragrans.
Franciscea, A. DC. in DC. Prod. viii. 462 = violacea.
Franciscea, Lindl. Bot. Reg. (1847) t 24=»varia.
Fraseri, *Willd. ex Roem. b1 Schult. Syst.* iv. 796.—Am. bor.
frutescens, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 12 = Ichnocarpus frutescens.
funiformis, *Veil. Fl. Flum.* 109 ; iii. t. 29.—Bras,
galegiformis, *Rudolph, ex Ledeb. PI. S. Doming.* 6.—Ins. S. Doming.
ganabarica, Casar. ex Mnell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1.144 = funiformis.
geminata, *Hoffmgg. ex Roem. (S Schult. Syst.* iv. 795.—Bras.
glandulifera, Wall. Cat. n. 1659 = Parameria glandulifera.
glandulosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 537 = laxa.
glandulosa, Rniz & Pav. Fl. Per. ii. 19 -Prestonia peruviana.
glaura, Roem. *Sc* Schult Syst. iv. 796 = Hancomia speciosa.
glaucescens, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brtut. xi. (1844) 858--Mandevilla oaxacana.
glomerata, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 636.—Ins. S. Doming,
gracilipes, *Stadelm. in Flora,* xxiv. *(Uil)* I. *Beibl.ii.*—Bras.
gracilis, *H. B.* &• *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 219.—Venezuela.

ECHITES:—
grandiflora, Hook. *8c* Am. in Jonrn. Bot. i. (1834) 286 = longiflora.
grandiflora, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 131 = Odontadenia speciosa.
grandiflora, Roth, Nov. PI. Sp. 136 = Chonemorpha macrophylla.
grandiflora, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 14 = Beaumontia grandiflora.
grandiflora, Stadelm. in Flora (1841) I. Beibl. 49 = Odontadenia sylvestris.
grandis. Wall. Cat n. 1658 = Chonemorpha macrophylla.
guaranitica, St Hil. in Mem. Mas. Par. xii. (1825) 324 = E. Velame.
guianensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 459.—Guian.
guineensis, Thonn. in Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Gain. PI. 149 = Motandra guineensis.
Havetii, Boj. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 488 = Mascarenhasia Havetii.
hebecarpa, *Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 112.—Bras.
heterophylla, J. F. Gmel. Syst. 437=domingensis.
heterophylla, Miq. in Linnaea, xxv. (1852) 653 = chilensis ?
Heynii, Spreng. Syst. i. 632 = Aganosma caryophyllata.
hircosa, Roxb. Hort Beng. 85 ; Fl. Ind. ii. 18 = Vallaris Pergulana.
hirsuta, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 107.—Guiana.
hirsuta, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 19 = Prestonia hirsuta.
hirsuta, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 27 ~ Mandevilla hispida.
hirsuta, Veil. Fl. Flum. 113 ; iii. t. 44 = fluminensis.
hirtella, Benth. PI. Hartw. 67 = Mandevilla oaxacana.
hirtella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 213- Prestonia hirsuta.
hirtiflora, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 456.—Mexic.
hispida, Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 795 - Mandevilla hispida.
Hoffmannseggiana, Steud. Norn. ed. II. i. 689- Odontadenia speciosa.
Hookeri, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 476.—Bras.
Hostmanni, *KlotBsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gut.* 1146, nomen.—Guiana.
hypoglauca, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 28 = Odontadenia hypoglauca.
hypoleuca, Benth. PI. Hartw. 23 = Macrosiphonia hypoleuca.
illustris, Veil. Fl. Flum. 114; iii. t. 49 = Dipladenia illustris.
inflata, *Blume, Bijdr.* 1089.—Java.
insignis, Spreng. Syst. i. 632=Odontadenia speciosa.
isthmica, Veil. Fl. Flum. 112; iii. t. 39 = Condylocarpon isthmicum.
jamaicensis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 416.—Ind. occ.
japurensis, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. Beibl. l'J.—Bras,
jasminiflora, *Mart. If Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1844) 857.—Mexic.
javanica,D. Dietr. Syn. PI. i. 651 (= *Chavannesia javanica).*—Java.
javitensis, Benth. ex Muell. Arg. in Mart Fl. Bras. vi. I. 143 *{-Amblyanthera Spruceana).*—Bras,
javitensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 220.—N. Granat.'
Karminskii, Mien, Apocyn. S. Am. 206 = Mandevilla Karwinskii.
laevigata, Wall. Cat. n. 1669 = Epigynum laevigatum.
laevis, *Thunb. Diss. Echit.* 4.—Zeylan.
lanata, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1844) 359.—Mexic.
lanceolata, Spreng. Syst. i. 684 = Parsonsia lanceolata.
lanuginosa, Mart. *8c* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (1844) 857 = Macrosiphonia lanuginosa.
lappulacea, *Lam. Encyc.* ii. 841.—Ins. S. Doming.
lasiocarpa, A. DC. in DC. Prod, viii 468=Mandevilla hispida.
latifolia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 1657 = Chonemorpha macrophylla.
laxa, *Ruit V Pav. Fl. Per.* ii. 19.1.184.—Peruv.
laxiflora, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 324, nomen — Cryptolepis elegans.
leptoloba, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 16.—Bras.
leptophylla, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 455.—Bras.
Lrodeniana, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 173.—Cuba.

ECHITES:—
linearifolia, *Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 31.—Ind. occ.
linearifolia, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 18 = leptophylla.
linearis, Veil. Fl. Flum. 111; iii. t. 36 =- Forsteronia linearis.
lisianthiflora, Boj. Hort. Maurit. 211= Mascarenhasia lisianthiflora.
littorea, *H. S. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 212.—Cuba.
lobata, Afzel. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 479 = lorata.
Lockharti, *Steud. Norn.* ed. II. i. 589.—Ins. Trinit.
longiflora, *Desf. in Mem. Mus. Par.* v. (1819) 276.——Bras.
longiflora, Miers, Apocyn. S. Am. 104 =nmbellata.
lorata, *Aftel. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 639.—Afr. trop.
lucida, G. Don, Gen. Syst. iv. 75 = Urceola esculenta.
lucida, *Ruit b" Pav. Fl. Per.* ii. 19.—Peruv.
lucida, Wall. Cat. n. 1670 - Urceola lucida.
lucida, *Willd. ex Roem. tf Schult. Syst.* iv. 795.—Venezuela.
lutea, *Veil. Fl. Flum.* 109 ; iii. t. 25.—Bras.
macrantha, Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 796=Odontadenia speciosa.
macrantha, Spreng. Syst. i. 632 = Chonemorpha macrophylla.
macrocalyx, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 160.—Bras,
macrocarpa, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 94.—Cuba.
macrocarpa, Wall. Cat. n. 1662 = Aganosma marginata.
macrophylla, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 218.—Venezuela.
macrophylla, Roxb. Hort. Beng. 20 ; Fl. Ind. ii. 13 = Chonemorpha macrophylla.
macrosiphon, Torr. in Bot. Mex. Bound. 158. t. 48 = Macrosiphonia Berlandieri.
inacrostoma, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 248.—Guian.
maculata, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 474.—Ins. S. Doming.
madida, *Veil. Fl.Flum.* 112; iii. t. 42.—Bras.
malabarica, Lam. Encyc. ii. 342 = Alstonia scholaris.
Mansoana, A. DC. in DC. Prod. viii. 448=sulphurea.
manubriata. Wall. Cat. n. 1668 = Anodendron paniculatum.
maranhamensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 74 = versicolor.
marginata, Roxb. Hort. Beng. [841 ; Fl. Ind. ii. 18 - Aganosma marginata.
Martiana, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 31 = Dipladenia Martiana.
Martii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 155.—Bras.
Maximiliana, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) l. *Beibl.* 43.—Bras.
megagros, Veil. Fl. Flum. 110; iii. t. 33 (Asclepiad. ?)•—Bras,
melaleuca, *Hort. ex Regel, Cat. PI. Hort. Aisatov.* 52.—Hab. ?
membranacea, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 457.—Peruv. ?
mexicana, *Miers, Apocyn. S. Am.* 205.—Mexic.
Meyeriana, Roem. & Schult. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 426 = Odontadenia speciosa.
micrantha, Wall. Cat. n. 1667 = Ecdysanthera micrantha.
microcalyx, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 456.—Ind. occ.
microphylla, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 35.—Bras.
- *mollis,* Spreng. Syst. i. 684 = Parsonsia lanceolata.
tnollis, Willd. in Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 795 = macrophylla.
mollissima, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 218.—N-Granat
monilifera, Wall. Cat. n. 1660 = Parameria glandulifera.
montana, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 213.—N-Granat.
mucronata, Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 796=trifida.
multinervia, Gomez, ex A. DC. in DC. Prod. viii. *«> = Forsteronia multinervia.
muricata, *A. DC. in DC. 1. c.* 474.—Ind. occ.
myrti/olia, Poir. Encyc. Suppl. ii. 536 = Parsonsia myrtifolia.
myrti/olia, Roem. & Schult. Syst. iv. 795=rosea.

ECHITES:—
Neriandra, Giiseb. Fl. Brit. W. Ind. 415=Andrewsii.
nitida, Vahl, Eclog. Am. ii. 19.—Am. austr.
nobilis, Hort. Belg. ex Lem. in Fl. des Series, Sér. I. v. (1849) sub t. 437-Dipladenia nobilis.
nodosa, Willd. ex Roem. V Schult. Syst. iv. 796.—Am. austr.
nummularia, Burm.f. Fl. Ind. 69.—Ind. occ.
nutans, Anders, in Trans. Soc. Arts Lond. xxv. (1835?) 203 *{ = Haemadiction venosum.).*—Ind. occ.
oaxacana, A. DC. in DC. Prod. viii. 451 = Mandevilla oaxacana.
obliqua, Miers, Apocyn. S. Am. 193 = nmbellata.
oblongifolia, Ham. Prod. PL Ind. Occ. 30.—Ind. occ.
obovata, Nees, ex Steud. Norn. ed. II. i. 640.—Bras,
obtusa, Thunb. Diss. Echit. 6.—Ind. or.
odoratissima, Griff. Notul. iv. 76 (sp. dab.)—Burma,
odorifera, Veil. Fl. Flum. 109 ; iii. t. 28.—Bras.
ovalifolia, Hook. & Am. in Hook. Joum. Bot. i. (1834) 286 = Hookeri.
ovalifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 535.—Ins. S. Doming.
Pala, Buch.-Ham. ex Spreng. Syst. i. 638=Alstonia scholaris.
pallida, *Miers, Apocyn, S. Am.* 195.—Ecuador,
paludosa, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 19; *Ic.* t. 5.—Am. trop.
palustris, Salm, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 463 = tomentosa.
pandurata, *A. DC. I. c.* 458.—Mexic.
paniculata, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 636.—Am. austr.
paniculata, Roxb. Hort. Beng. 20; Fl. Ind. ii. 17 = Anodendron paniculatum.
paniculata, Thonn. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 423 = Motandra guineensis.
parviflora, *A/eel, ex Steud. Norn.* ed. IL i. 540.—Afr. trop.
parviflora, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. ii. 20 = Epigynum parviflorum.
pastorum, Mart, ex Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 52 = Dipladenia pastorum.
pauciflora, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 6 = Cryptolepis elegans.
Pavonii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 463.—Peruv.
peduncularis, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 54= Dipladenia peduncularis.
Pellieri, Loud. Encyc. PI. 1541 = Andrewsii.
peltata, Lockh. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 67 = Lockharti.
peltata, *Veil. Fl. Flum.* 110; iii. t. 113.—Bras.
Peltigera, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 21.—Bras.
petraea, St. Hil. in *Mim.* Mus. Par. xii. (1825) 822 - Macrosiphonia verticillata.
pilosa, Veil. Fl. Flum. 112; iii t 38 *{-Thyrsanthus pilosus).*—Bras.
pini/olia,St. Hil. in Mefn. Mus. Par. xii. (1825) 325 = Macrosiphonia verticillata.
plicata, A. DC. in DC. Prod. viii. 464=peltata.
Pohliana, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 73.—Bras.
polyantha. Wall. Cat. n. 1664 - Anodendron paniculatum.
portobellensis, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1866) 187.-Panama.
Prieurei, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 458.—Guiana.
Primula, Hort. ex Walp. Rep. vi. 742 - Dipladenia vincaeflora.
procumbens, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 78 = Holarrhena macrocarpa.
Psidiifolia, *Mart, ex Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 46.—Bras.
Ptarmica, *Poepp. £j- Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 69. t. 278.-Chilif
Puberula, Michx. Fl. Bor. Am. i. 120=Trachelosperma difforme.
Pubescens, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 524 - Holarrhena antidysenterica.
pubescens, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 34 = chilensis.
Pubescens, *Willd. ex Roem. If Schult. Syst.* iv. 796.—Am. austr.
Pubiflora, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 78.—Bras.
Pulchella, Gardn. in Hook. Ic. PI. t. 470 = Dipladenia longiloba.
Pulcherrima, *Pohl, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 112.—Bras.

ECHITES:—
puncticulosa, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 107.—Guiana.
pycnantha, *Steud. Nom.* ed. II. i. 540—Bras.
quinquangularis, Jacq. Enum. PI. Carib. 18; Linn. Sp. PI. ed. II. 307 = Prestonia quinquangularis.
religiose, *feijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 84.—Siam.
repens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 109 - Holarrhena macrocarpa.
repens, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 13.—Ins. S. Doming.
reticulata, Boj. Hort. Maurit. 211 = Aganosma marginata.
reticulata. Roth, Nov. PI. Sp. 184 = Cryptolepis Buchanani.
revoluta, A. DC. in DC. Prod. viii. 457-cirdnaIis.
rhynchosperma, Wall. PI. As. Rar. i. 43. t. 49 = Khynchodia Wallichii.
Richardi, Roem. *Be* Schult. Syst. iv. 391-hirsuta.
riparia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 218.—N. Granat.
Rosa-campestris, Endl. in Halting. Parad. Vindob. t. 51 = Dipladenia Rosa-campestris.
rosea, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 450.—Ind. occ.
rotundifolia, *Mitan, ex A. DC. /. c.* 479.—Bras,
rubricaulis, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 535.—Guiana,
rubro-venosa, *Linden, in E. Morr. Belg. Hortic.* xvii. (1867) 103.—Bras,
rugellosa, *Rick, in Act. Soc. Nat. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 107.—Guiana,
rugosa, *Bentk. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 248.—Guiana.
sagittate., Poir. Encyc. Suppl. ii. 687-subsagittata.
Sagraei, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 450.—Florida,
salicifolia, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 59—Am. bor.
salici/olia, Willd. in Roem. & Schult. Syst. iv. 796 = Alfamanda cathartica.
sancta, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 69 = Dipladenia sancta.
sanguinolenta, Tussac, Fl. Antill. 95.1.11 *{=Haemadictyon venosum).*—Ind. occ.
scabra, *Hoffmgg. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 795.—Bras.
scabra, Labill. Sert Austro-Caled. 26. t. 31 = Thenardia scabra.
scandens, Thunb. Diss. Echit. 6.—Java; Zeylan.
scholaris. Linn. Mant. 65 = Alstonia scholaris.
Schomburgkii, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gut.* 1146.—Guiana.
secundiflora, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 457.—Mexic.
semidigyna, *Berg, in Verh. Zeeusch. Gen. Wetens.* iii. (1773) 588.—Guian.
sessilis, Veil. Fl. Flum. 111; iii. t 35-Malonetia sessilis.
sinensis, Hort. Angl. ex Walp. Rep. vi. 491 *(-=Hybanthera cordifolid).*—China.
siphilitica, Auct. = syphilitica.
speciosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 219.—Venezuela,
spectabilis, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 44.—Bras.
spicata, Jacq. Enum. PI. Carib. IS = Forsteronia spicata.
spigeliaeflora, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 68.—Bras.
spinosa, Burm. f. Fl. Ind. 69=Carissa Carandas.
spiralis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 110 - Parsonsia Rheedii.
splendens, Hook. Bot. Mag. t. 3976-Dipladenia splendens.
splendens, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 824.—Ins. Timor.
Stadelmeyeri, *Mart, ex Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 29.—Bras.
stellaris, *Lindl. in Bot. Reg.* 1.1664.—Bras.
stellulifera, Lem. in Jard. Fleur. i. (1851) t. 67 = violacea.
suaveolens, A. DC. in DC. Prod. viii. 452-Mandevilla suaveolens.
suaveolens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (1844) 356 = Macrosiphonia hypoleuca.
subcomosa, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 247.—Guiana.
suberecta, Andr. Bot. Rep. t. 187-Andrewsii.
suberecta, Jacq. Enum. PI. Carib. 13 *{=Haemadictyon suberectum).*—Ind. or.
suberosa, *Veil. Fl. Flum.* 111; iii. t. 84.—Bras,
subsagittata, *Rui» b" Pav. Fl. Per.* ii. 19.—Peruv.
subsessilis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 461.—Peruv.

ECHITES:—
subspicata, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 18.—Am. austr.
succulent a, Lina. f. Suppl. 167 -Pachypodum tomentosum.
sulphurea, *Veil. Fl. Flum.* 109; iii. t. 26.—Bras,
sunnamensis, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 155.—Guiana.
sylvestris, A. DC. in DC. Prod. viii. 464 - Odontodenia sylvestris.
symphytocarpa, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 132.—Guian.
syphilitica, *Linn.f. Suppl.* 167.—Am. austr.
tenuicaulis, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 40.—Bras.
tenuifolia, Mikan, Fl. et Faun. Bras. fasc. 3=Dipladenia tenuifolia.
thyrsoidea, Vell.Fl. Flum. 111; iii. t. 37 = Forsteronia thyrsoidea.
tomentosa, *Rafin. Fl. Ludov.* 46.—Am. bor.
tomentosa, Roth, Nov. PI. Sp. 137 = Wrightia tomentosa?
tomentosa, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 44.—Guian.
torosa, Jacq. Enum. PI. Carib. 13-torulosa.
torquata, Casar. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1.102 = Forsteronia brasiliensis.
torulosa, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 307.—Mexic.
triangularis, Buch.-Ham. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 411, 480=Trachelospermum fragrans.
trichonema, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 824 =Ichnocarpus moluccanus.
trichotoma, *Desf. Cat. Hort. Par-* ed. III. 398.—Hab. ?
trifida, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 109.—Ins. Philipp.
trifida, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 13.—Ind. occ.
tropaeolifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 447.—Bras.
truncata, Lam. Encyc ii. 340 = Gonolobns carolinensis.
tuberosa, Haw. ex Steud. Nom. ed. II. i. 640 (-Pachypodii sp.).—Afr. austr.
tubiflora, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. (1844) 358.— Mexic.
tubulosa, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 249.—Guian.
Tweediana, *Hieron. in Bol. Acad. Nae. Cirdova,* iv. (1881) 370.—Reg. Argent.
umbellata, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 137 - portobellensis.
umbellata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 13 ; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 307.—Ind. occ.
Valenzuelana, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 93.—Ind. occ.
varia, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 17.—Bras.
variegata, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 707 = obovata.
Vauthieri, A. DC. in DC. Prod. viii. 457 =coalita.
Velame, *St. Hil. in Bull. Soc. Philom.* (1824) 77.—Bras.
Velloriana, A. DC. in DC. Prod. viii. 474 - Forsteronia bracteata.
velutina, Mart, ex Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 72 = Dipladenia gentianoides.
velutina, Spreng. Syst. i. 684 = Parsonsia velutina.
venenata, Roxb. Hoit. Beng. 20; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 411 = Alstonia venenata.
venenosa, *Mart, ex Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 66.—Bras.
veraguensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 168 = Mandevilla veraguensis.
verrucosa, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 796.—Bras,
versicolor, *Mart, ex Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 38.—Bras.
verticalis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 1666 = Rbynchodia Wallichii.
vestita, Roem. & Schult. Syst iv. 394 - Chonemorpha vestita.
violacea, *Veil. Fl. Flum.* 110 ; iii. t. 31.—Bras,
virescens, *St. Hil. in Bull. Soc. Philom.* (1824) 77 — Bras.
virescens, Stadelm. in Flora, xxiv. (1841) I. Beibl. 63 - Macrosiphonia Martii.
volubilU, *Thunb. Diss. Echit.* 5.—Java,
xanthostoma, *Stadelm. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Beibl.* 65.-Bras.
Zuccariniana, *Stadelm. 1. c.* 76.—Bras.

ECHITHES, Thunb. Fl. Cap. ii. 150 (1818) = Eehites, P. Br. (Apocyn.).

ECHIUM, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 38 (1737). *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 863.
AXGYREXIAS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 86 (1836).
ISOPLESION, Kafin. 1. c. (1836).
ISORIUM, Rafin. 1. c. ii. 61 (1636).
LARKPHES, Rafin. 1. c. iv. 86 (1836).
acnleatum, *Poir. Encyc.* viii. 664.—Ins. Canar.
acutifolium, Willd. ex Lchm. Asperif. 487 =rnbrum.
africanum, Pen. Syn. i. 168 — Lobostemon fruticosus.
albereanum, Debeanx, ex Nym. Coup. 51S — italicum.
albicans, *Lag. (f Rod. in Anal. Cienc. Nat.* v. (1802) 269.—Hispan.
albicans, Schott, ex Koem. & Schult. Syst. iv. 726 - pomponium.
alopecuroideum, *DC. Prod.* x. 15.—Afr. austr.
altissimum, Jacq. Fl. Anstr. v. 85. t. 16 = italicum.
ambiguum, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813; 107 - brachyanthum, gigantenm.
amoenum, *Fisch.* to* *Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* iv. 35.—Reg. Casp.
anglicum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 70; Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. l-=vulgare.
angustiflium, *Lam. Tail. Encyc.* i. 412.—Hispan.; Marocc.
angustifolium, Link, ex Willie. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 486-tuberculatum.
angustifolium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6-cretienm.
angustifolium, Thnnb. Fl. Cap. ii. 248-Lobostemon Swartzii.
arenariom, *Cuss. Ind. Hort. Boccad.* (1825); *PI. Rar.* 88. t. 17.—Reg. Mediterr.
argenteum. Berg. Desc. PI. Cap. 40; Linn. Mint. 202 = Lobostemon argenteus.
argenteum, Roth, Bot. Abh. 25 - Lobostemon ferocissimus.
armatum, Man. ex C. Sm. sec DC. Prod. x. 18 - -aculeatum.
asperrimum. Lam. Tabl. Encyc. i. 412; Bieb. Fl. Tanr. Cane. i. 135-italicum.
Anberianum, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* iii. 42.-Ins. Canar.
australe, Lam. Tabl. Encyc. i. 413—creticum.
Benthami, Wall. Cat. n. 931 = Macrotomia Benthami.
Bergianum, E. Mey. ex DC. Prod. x. 6—Lobostemon fruticosus.
bifirons, *DC. Cat. Hort. Monsp.* (1813) 107.—Ins. Canar.
Boissieri, Stead. Nom. cd. II. i. 540 - pomponium.
bonariense, Poir. Encyc. viii 674 — violaceum.
brachyanthum, *Hornem. Hort. Hafn.* i. 182.—Ins. Madera.
brachystachyum. Pall, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 726-glomeratum?
callithyrsum, *Webb, ex C. Bolle, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1867) *App.* i. 6.—Ins. Canar.
calydnum, *Viv. in Ann. Bot. i.* II. 164.—Reg. Mediterr.
canaliculatum, Drège, ex DC. Prod. x. 11-Lobostemon trichotomus.
candicans, DC. Cat. Hort. Monsp. 25 — Marianum.
candicans, Lam. Tabl. Encyc. i. 414-giganteum.
candicans, *Linn.f. Suppl.* 131.—Ins. Madiera,
canescens, *Presl, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 541.—Hab.t
capitatum, Linn. Mant. 42-Lobostemon capitatus.
caudatum, Thunb. Prod. Fl. Cap. 83-Lobostemon caudatus.
dandestinum, *Pomel, Nom. Mat. Fl. All.* 95.—Alger.
clavatum, Willd. ex Lehm. Asperif. 440=rubrum.
collinum, Salisb. Prod. 114 -= italicum.
Columnae, Ehrenb. ex -Boiss. Fl. Orient, iv. 206 = glomeratum.
creticum, Forslc Fl. Aegypt. Arab. 41—sericeum.
creticum, Lam. Tabl. Encyc. i. 412-violaceum.
creticum, *Linn. Sp. PI.* 189; *DC. Prod.* x. 22.—Reg. Mediterr.
creticum, Pall, ex DC. Prod. x. 20-rabrum.
creticum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ii. 69. t. 183-calycinum.
creticum, Sims, Bot. Mag. t. 19,34-Simsii.
cynoglossoides, *Desf. Tabl.* ed. II. 86; *Poir. Encyc. Suppl.* v. 487.—Ins. Canar.
cyrenaicnm, *Pacho, Voy. Marm.* t. 97.—Afr. bor.

ECHIUM :—
dahuricum, *G. Don, ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 541.—Dahuria.
dalmaticum, Tausch, in Flora, xlv. (1831) 20 - Rauwolfii?
Davaei, *Rouy, in La Natural.* (1882) n. 47 ; *ex Bolet. Broter.* ii. (1884) 28.—Lusitan.
Decaisnei, *Webb tf Berth. Phyt. Canar.* iii. 49.—Ins. Canar.
decipiens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 91.—Alger.
densiflorum, *DC. Cat. Hort. Monsp.* (1818) 10b.—Ins. Canar.
densiflorum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 92.—Alger.
diffusum, Guss. Cat. Hort Boccad. 23-arenarium.
diffusum, Jan, ex Nym. Consp. 515-maritimum.
diffusum, Sibth. & Sm. Fl. Graec ii. 69. t. 182-sericeum.
diffusum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. IL i. 541 - selosum.
distachyum, Viv. Fl. Libyc Spec. 8. t. 5. f. 1 = senceum.
Ecklonianum, *DC. Prod.* x. 14.—Afr. austr.
elegans, Lehm. Asperif. 459-sericeum.
elegans, Noe, ex Nym. Consp. 514 - vulgare.
elongatum, Lam. Tabl. Encyc. i. 412 - italicum.
elongatum, Poir. Encyc. viii. 669 - glomeratum.
eriobotrium, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 92.—Alger.
eriostachyum, *DC. Prod.* x. 14.—Afr. austr.
expansum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. PI. Or. Nov dec. ii. 7 = sericeum.
falcatum, Lam. Tabl. Encyc. i. 413-Lobostemon glaber.
fastuosum, DC. Prod. x. 17-Marianum.
fastuosum, Herb. Banks, ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 144 = thyrsiflorum.
fastuosum, *Jacq.f. Eclog.* t. 41.—Ins. Canar.
fastuosum, *Salisb. Prod.* 114.—Ins. Teneriffa.
ferodssimum, Andr. Bot. Rep. t. 39 = Lobostemon ferocissimus.
ferox, Pers. Syn. i. 168—Lobostemon argenteus.
flavum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 166.—Hispan.; Afr. bor. occ.
foliosum, *Lehm. Asperif.* 412.—Ins. Canar.
Fontanesii, DC. Prod. x. 24-flavum.
formosum, Pen. Syn. i. 168=Lobostemon formosus.
frondosum,Sn\itb. Prod. 114 = Lobostemon fruticosus.
fruticosum, Jacq. Hort. Schoenb. i. 15 — Lobostemon argenteus.
fruticosum, Linn. Sp. PI. 189—Lobostemon fruticosum.
gaditanum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 422—tuberculatum.
giganteum, *Linn.f. Suppl.* 131.—Ins. Teneriffa.
glabrum, Thunb. Prod. PL Cap. 33 = Lobostemon glaucophyllus.
glabrum, Vahl,Symb. Bot. iii. 22-Lobostemon glaber.
glaucophyllum, Jacq. Coll. ii. 825—Lobostemon glaucophyllus.
glomeratum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 424-pomponium.
glomeratum, Ledeb. Fl. Ross. iii. 106 = linearifolium.
glomeratum, *Poir. Encyc.* viii. 670.—Cilicia; Syria.
grandiflorum, Andr. Bot. Rep. (1798) t 20 = Lobostemon formosus.
grandiflorum, Desf. Fl. Atlant. i. 166-violaceum.
grandiflorum, Salisb. Prod. 115 — Megacaryon armenum.
hierrense, *Webb, ex C. Bolle, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1867) *App.* i. 7.—Ins. Canar.
hispanicum, *Asso, Syn. Arag. Mant.* 162.—Hispan.
hispidum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 4-Lobostemon capitatus.
hispidum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ii. 68. t. 181-sericeum.
hispidum, Thunb. Prod. PI. Cap. 38-Lobostemon hispidus.
humile, Desf. Fl. Atlant. i. 165-setosum.
hypertropicum, *Webb, in Hook. Niger Ft.* 165.—Ins. Cap. Verd.
incanum, *Thunb. Prod. PL Cap.* 38.—Afr. austr.
indicum, *Bernh. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 541.—Hab. t
italicum, Bov£, ex DC. Prod. x. 18 - tuberculatum.
italicum, S. G. Gmel. Itin. i. 119. t. 19-rubrum.
italicum, Hoffmgg. & Link, ex Steud. Nom. ed. II. i. 641 = lusitanicnm.
italicum, *Linn. Sp. PL* 139.—Enrop.; Reg. Mediterr.
italicum, Salzm. ex Ball, in Journ. linn. Soc. xvi. (1878) 677-flavum.
italicum, Sieber, ex DC. Prod. x. 24-pyramidatnm.

ECHITJK :—
laetum, Salisb. Prod. 115 » vulgare.
laevigatum, Lam. Tabl. Encyc. i. 413—Lobostemon glancophyllus.
laevigatum, Linn. Syst. ed. X. 916 = Lobostemon laevigatus.
Lagascae, Boiss. Elench. 69—pomponium.
Lagascae, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 27.—Hispan.
lasiophyllum. Link, Enum. Hort. Berol. i. 170-molle.
latifolium, *DC. Prod.* x. 14.—Afr. austr.
linearifolium, *C. Koch, in Linnaea*, xxii. (1849) 629.—Reg. Caucas.
linearifolium, Moench, Meth. Suppl. 149 = italicum.
lineatum, *Jacq.f. Eclog.* 62. t. 42.—Ins. Canar.
lineolatum, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 46 - lineatum.
longiflorum, Bertol. Misc. i. 15—Mollkia angustifolia.
longiflorum, Dum.-Conrs. Bot. Cult. ed. II. Suppl. vii. 147-Lobostemon formosus.
longifolium, *Delile, Fl. Egypte*, 184. t. 16. f. 3.—Afr. bor.; Arab.
longifolium, Hort. ex DC. Prod. x. 10 «• Lobostemon lasiophyllus.
longifolium, Wiest, Herb. Un. Itin. n.548; ex DC. Prod. x. 19= sericeum.
longistamineum, Pourr. ex Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. Suppl. 29— violaceum.
lucidum, Lehm. Sem. Hort. Bot. Hamb. (1827) - Lobostemon lucidus.
lusitanicum, All. Fl. Pedem. i. 62—calycinum.
lusitanicum, DC. Prod. x. 20—polycaulon. -
lusitanicum, Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr. 260 —vulgare.
lusitanicum, *Linn. Sp. PI.* 140.—Hispan.; Lusit.
lusitanicum, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 4 -• violaceum.
luteum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 91-italicum.
macranthum, Roem. & Schult. Syst. iv. 20 -. violaceum.
macrophyllum, *Lehm. Asperif.* 412.—Ins. Canar.
maderense, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 541 = candicans.
margaritaceum, Lehm. Asperif. 446 = Rauwolfii.
Marianum, *Boiss. Diagn.* Ser. 1. xi. 90.—Hispan.
maritimum, Guir. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 487—creticum.
maritimum, Tenore, ex Stead. Nom. ed. II. i. 641-setosum.
maritimum, *Willd. Sp. PL* i. 788.—Reg. Mediterr. occ.
megalanthos, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. Suppl. 29 = violaceum.
megalanthum, Steud. Nom. ed. II. i. 541-praec.
Mertensii, Lehm. Asperif. 468-albicans.
Menaiesii, Lehm. Pugill. ii. 29 = Amsinckia intermedia.
micranthum, Roem. &c Schult. Syst. iv. 25 —tenue.
micranthum, Schousb. Vextr. Marokko, 75 = maritimura.
moJestum, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 373.—Marocco.
molle, Pett. in Rdchb. Fl. Germ. Excurs. 336, in obs. -vulgare.
molle, *Poir. Encyc.* viii. 663.—Ins. Canar.
menstrosum, Schmidt, ex Steud. Nom. ed. II. i. 641 = vulgare.
montanum, *DC. Prod.* x. 15.—Afr. austr.
nervosum, [Dryand. in] Ait. Hort Kew. ed. II. i. 300 = macrophyllum, candicans.
onosmaefolium, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* iii. 46.—Ins. Canar.
onosraoides,/><«»*/, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 295.—Algeria.
orientate, Linn. Sp. PI. 139 — Megacaryon armenum.
orientate, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 97 = amoenum.
orientate, Steph. Fl. Mosq. n. 124 •= violaceum.
ovatum, Poir. Encyc. viii. 666—calycinum.
pallidum, Salisb. Prod. 114-candicans.
paniculatum, Drege, ex DC. Prod. x. 8 -Lobostemon paniculaeformis.
paniculatum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 10-Lagascae.
paniculatum, *Thunb. Prod. PL Cap.* 38.—Afr. austr.
papillosum, *C.* Koch, in Linnaea, xvii. (1848) 307 - linearifolium.
papillosum, Lehm. Asperif. 441-glomeratum t
papillosum, Thunb. Fl. Cap. ii. 8 - Lobostemon Swartzii.
paryiflorum, Moench, Meth. 423 ; Roth, Catalect. fasc- ii. 14—calycinum.
parviflorum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii- (1880) 144-vulgare.
parviflorum, Willd. Enum. Hort. Berol. 187-tenue.

ECHIUM :-
Pavonianum, *Boiss. Diagn.* Scr. I. xi. 91.—Hispan.
petraeum, Tratt. Thes. Bot. 8 = Moltkia petraea.
pictum, Jan, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 207 — Rauwolfii.
Pininana, *Webb V Berth. Phyt. Canar.* iii. 44.—Ins. Canar.
plantagineum, Jacq. Hort. Vindob. i. t. 45=violaceum.
plantagineum, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 761 = creticum.
plantaginenm, *Linn. Mant.* ii. 202.—Reg. Mediterr.
plantaginifolium, Linn, ex Moris, in Atti Ottav. Riun. Sc. Ital. (1847) 564 =. plantagineum.
plantaginoides, Roem. & Schult Syst iv. 19 = violaceum.
polycaulon, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 92.—Hispan.
pomponium, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* t. 124.—Hispan.; Afr. bor. occ.
prostratum, Delile, Fl. Egypte, 185. t. 17. f. 1; Poir. Encyc Suppl. v. 486-sericenm.
prostratum, Sieber, ex DC. Prod. x. 21-arenarium.
prostratum, Tenore, Fl. Nap. t. 12=calycinum.
Pseudooiolaceum, Schur, Enum. PL Transs. 470 = violaceum.
pumilum, Lehm. Pugill. i. 16-sericeum?
Pustulatum, Lehm. Asperif. 448=tuberculatum.
pustulatum, Sibth. *Sc.* Sm. Fl. Graec Prod. i. 125 = Rauwolfii?
pycnanthum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 29.—Algeria.
pyramidale, Lapeyr. Hist Abr. PL Pyr. 90-italicum.
pyramidatum, DC. Prod. x. 23=italicum.
pyramidatum, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. II. vii. 147.—Afr. austr.
Pyrenaicum, Linn. Mant. 334 = italicum.
pyrenaicum, *Milgev. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 842.—Mont. Pyren.
Rauwolfii, *Delile, Fl. Egypte,* 195. t. 19. f. 8.—Aegypt.
regulariflorum, Ker-Gawl. Recens. 11. n. 42-Lobostemon formosus.
rosmarinifolium, Schrank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 641 = Moltkia petraea.
rosmarinifolium, Vahl, Symb. Bot iii. 22 = Lithospermnm rosmarinifolium.
rossicum, J. F. Gmel. Syst. i. 328=rubrum.
rosulatum, *Lange, Ind. Sent. Hort. Haun.* (1864) 22.—Hispan.
rubrum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 41-sericeum.
rubrum, *Jacq. Fl. Austr.* v. 27.—Europ. austr. j Reg. Caucas.
rubrum, Moench, Meth. 422 = creticum.
rupestre, Salisb. Prod."114=giganteum.
russicum, Roem. & Schult Syst. iv. 28=rubrum.
sabulicolnm, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 90.—Algeria.
salmanticum, Lag. Gen. et Sp. Nov. (1806) 10-lusitanicum.
scabrum, Eckl. & Zeyh. ex DC. Prod. x. 6=Lobostemon scaber.
scabrum, Thunb. Fl. Cap. iL U - Lobostemon fruticosus, Thunbergianus.
Schifferi, Lange, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 218 = vulgare.
sericeum, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 35.—Reg. Mediterr. or.
setosum, Bory & Chaub. Fl. Pélop. 18=sericeum?
setosum, Delile, Fl. Egypte, 186. t. 17. f. 2=creticnm.
setosum, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 85.—Aegypt.
stbthorpii, Roem. & Schnlt Syst. iv. 26=sericeum.
simplex, *DC. Cat. Hort. Monsp.* (1813) 108.—Ins. Canar.
Simsii, *G. Don, ex A. DC. in DC. Prod.* x. 22.—Europ. austr.
spathulatum, Drige, ex DC. 1. c. 10=Lobostemon obovatus.
spathulatum, Viv. FL Libyc. Spec 8. t. 9. f. 1 = maritimum.
sphaerocephalum, Vahl, Symb. Bot. iii. 22-Lobostemon sphaerocephalus.
spicatum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 4-Lobostemon spicatus.
•Pinescens, *Medic. Bot. Beobacht.* (1788) 36.—Hab. *1*
JPlendens, *DC. Prod. x.* 16.—Afr. austr.
aprengelianum, *DC. I. c.* 16.—Afr. austr.
stenosiphon, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 166. t. 15.—Ins. Cap. Verd.
stnctissimum, Schur, Enum. PL Transi. 471 = italicum.

ECHIUM :—
stnctum, *Linn./. Suppl.* 130.—Ins. Canar.
strictum, Lam. TabL Encyc. i. 414 — virescens.
strigosum, Eckl. ex DC. Prod. x. 12 = Lobostemon thymelaeoideus.
strigosum, Thnnb. Fl. Cap. ii. 8 - Lobostemon strigosus.
Swartrii, Dreġe, ex DC. Prod. x. 6 «= Lobostemon laevigatus.
Swartrii, Lehm. Asperif. 426=Lobostemon Swartdi.
tenue, *Roth, CataUct.* ii. 16.—Hab. ?
thyrsiflorum, *Mass, ex Link, in Buck, Beschr. Canar. Ins.* 144.—Ins. Canai.
thyrsoideum, Vent. Jard. Malm. 98=rubrum.
tinctorium, Viv. PL Aeg. Dec. n. 24; ex DC. Prod. x. 25 = Rauwolfii.
trichotomum, Drige, ex DC. Prod. x. 10, 26 = Lobostemon cinereus.
trichotomum, Thunb. Prod. PI. Cap. 83 « Lobostemon virgatus.
trigonum, Thunb. 1. c-Lobostemon trigonus.
trygorrhiznm, *Pomel, Now. Mat. Fl. Alt.* 94.—Algeria.
tuberculatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 27=vulgare.
tuberculatum, *Hoffm. & Link, Fl. Port.* i. 183.—Europ. austr.; Afr. bor.
tubiferum, Poir. Encyc. viii. 668 = Lobostemon formosus.
Vahlii, Roem. & Schult. Syst. iv. 14, 715 = Lobostemon glaber.
valentinum, Lag. Gen. et Sp. Nov. (1806) 10-flavum.
vaudense, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 88 - vulgare ?
verecundum, Salisb. Prod. 115=creticum.
verecundum, Viv. PL Aeg. Dec. n. 26; ex DC. Prod. x. 25—setosum.
verrucosum, Thunb. Fl. Cap. iL 8 — Lobostemon verrucosus.
violaceum. *Linn. Mant.* i. 42.—Europ. austr.
violaceum, Stokes, in With. Bot. Arr. ed. II. i. 201 - vulgare.
virescens, DC. Cat. Hort Monsp. (1818) 107 - candicans.
virescens, *Jan, Blench.* 3; *ex DC. Prod.* x. 17, in nota.—Sicil.
viridi-argentenm, *DC. Prod.* x. 18.—Afr. austr.
vulgare, Bourg. ex Reut in Bu'.l. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 46 = polycaulon.
vulgare, Brot. Fl. Lnslt. *u* 289 = Rauwolfii.
vulgare, *Linn. Sp. PI.* 189.—Europ.
WierMckii, Haberle, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. L 386=vulgare.
Zeyheri, Eckl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 542=Lobostemon Zeyheri.

ECHTHRONEMA, Herb, in LicdL Bot. Reg. (1843) Misc. 85 = 8isyrinchiiun, Linn. (Irid.).
californica, Herb. 1. c.=S. californicum.
convoluta, Herb. 1. c.=S. convolutum.
graminifolia, Herb. L c. =S. graminifolium.
maculata, Herb. 1. c. — S. graminifoliom.
pumila. Herb. 1. c=TapeiniamagelUnlca.
tenuifolia, Herb. 1. c.=S. tenuifolium.

ECHTRUS,Lonr. Fl.Cochinch.844 (1790)=Argemone, Linn. (Papav.).
trivalvis, Steud. Nom. ed. II. i. 548 = A. mexicana.
trivialis, Lour. Fl. Cochincb. 344 = A. mexicana.

ECHYROSPERMUM, Schott, in Isis (1828), 1060. (Legumin.). (Quidl)

ECKARDIA, Endl. Gen. Suppl. iL 17, in syn. (1842) =Perifl teria, Hook. (Orchid.).

ECKARTIA, Reichb. Nom. 53 (1841)=praec.

ECKEBERGIA, Batsch, TabL 63 (1802)-Ekobergia, Sparrm. (Meliac.).

ECKLONBA, Steud. in Flora, xii. (1829) 138. *CYPERACEAE* [Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1062].
TRIANOPTILES, Fenzl, in Endl. Gea. 113 (1836).
australis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 642.—AustraL
capensis, *Steud. in Flora,* xii. (1829) 138.—Afr. anstr.

ECKLONIA, Schrad. in Comm. Gotting. vU. (1882) 184 =praec.

ECLIPTA, Linn. Mant. ii. 157 (1771). *COAIPOSITAE;* Benth. & Hook. f. ii. 361.
MICRELIUM, Forsk. FL Aegypt. Arab. 152 (1776).
PALRISTA, Rafin. New Fl. Am. ii. 43 (1836).
adpressa, Moench, Melh. Suppl. 245=erecta.
alba, Hassk. PL Jav. Rar. 628; Miq. Fl. Ned. Ind. ii. 66 — erecta.
angustifolia, Presl, Bot. Bemerk. 105=erecta.
arabica, Steud. Nom. ed. II. i. 642=erecta.
brachypoda, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 180=erecta.
ciliata. Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 3214=Q>rpesium cernuum.
ciliata, *Rafin. Fl. Ludov.* 69.—Am. bor.
dentata, Heyne, ex Wall. Cat. 3211=erecta.
dichotoma, Rafin. New Fl. Am. ii. 42=erecta.
dubia, Rafin. 1. c. 40 = erecta.
elliptica, *DC. Prod.* v. 491.—Am. austr.
erecta, *Linn. Mant.* ii. 288.—Cosmop. trop.
filicaulis, Schum. *St.* Thonn. Beskr. Guin. PL 390-Spilanthes Acmella.
flexuosa, Rafin. New FL Am. iL 41 = erecta.
heterophylla, Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1857) 3.—Guatemala.
hirsuta, Bartl. in Linnaea, xiii. (1839) Litt 96-erecta.
humilis, H. B.& K. Nov. Gen. et Sp. iv. 264. t 394-Sabazla humilis.
integrifolia, Spreng. Syst. iii. 602=Bellis inlegrifolia.
lanceofata, *DC. Prod.* v. 491.—Brat.
latifolia, Linn. f. Snppl. 878-Blainvillea rãombotdea.
linearis.Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 808 - prostratat
longifolia, Schrad. in DC. Prod. v. 480=erecta.
marginata, Steud. Nom. ed. II. i. 642=erecta.
nutans, Rafin. New FL Am. ii. 42-erecta.
paludicola, *Steud. Nom.* ed. II. i. 542.—Bras.
palustris, DC. Prod. v. 491-erecta.
palustris, Veil. FL Flum. viii. t. 139 = paludicola.
parviflora. Wall. Cat n. 823-erecta.
patula, Schrad. ex DC. Prod. v. 491 = erecta.
peduncularis, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 113 = elliptica.
platyglossa, *F. Muell. Fragm.* ii. 185.—AustraL
procumbens, Michx. Fl. Bor. Am. iL 129-erecta.
prostrata, Linn. Mant. it. 286—erecta.
pumila, Rafin. New Fl. Am. ii. 42-erecta.
punctata, Linn. Mant. ii. 286—erecta.
pusilla, *DC. Prod.* v. 491.—Porto Rico.
quinquenerms,VA\. Fl. Flum. viii. 1.188 (Quid ?).—Bras.
scabriuscula, Wall. Cat. n. 8212-Wedelia biflora.
sessilis, Sw. Prod. Veg.Ind.Occ. 114 ~ t'nhydra senilis.
simplex, Rafin. New Fl. Am. ii. 41 = erecta.
spicata, *Spreng. Syst.* iii. 603.—China.
strumosa, Salisb. Prod. 205 = erecta.
sulcata, Rafin. New Fl. Am. ii. 41-erecta.
thermalis, Bunge, Enum. PL Chin. Bor. 39-erecta.
tinctoria, Rafin. New Fl. Am. il. 41 = erecta.
trinervis, Veil. FL Hum. viii. 1137 (Quid ?).—Bras.
undulata, Willd. Sp. PL iii. 2219-erecta.
Zippeliana, Blurae, Bijdr. 914-erecta.

ECLOPES, Gaertn. Fruct Ii. 440. t 169 (1791)-Halhania, L'He>it. (Compos.).
acicularis, Cass. in Diet Sc. Nat. xlv. 81 = R. pungens.
apiculata, DC. Prod. vi. 289 = R. quinquenervis.
buxifolia, Gaertn. Fruct ii. 441 - R. speciosa.
centauroides, DC. Prod. vi. 288 - R. centauroides.
cuneata, Less. Syn. Comp. 379—R. cuneata.
decussata, DC. Prod. vi. 288 = R. cuneata.
genistaefolia, DC. 1. c. = R. genistaefolia.
glutinosa, DC. L c - R. affinu.
paleacea, Lam. TabL Encyc. iii. 268 - R. ericoldes.
parallelinervis, Less. Syn. Comp. 880 = R. trinervis.
pumila. Less. 1. c. 382=R. pedunculate, *VHirit.*
punctato,Caa.in Diet. Sc. Nat. xlv. 32 - R.genistaefolia.
pungens, Cass. 1. c. 81—R. quinquenervis.
schitolepis, DC. Prod. vi. 289-R. speciosa.
sedifolia, DC. I. c. 288-R. sedifolia.
speciosa, DC. 1. c. 289-R. speciosa.
styphelioides, DC. 1. c. 289 = R. styphelioides.
subpungens, Cass. in Diet. Sc Nat. xlv. 81 - R. pungens
tenuifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 620, in syn.• Helichrysum teretifolium.
trinervis, Less. Syn. Comp. 881 = R. quinquenervis.
visdda, Gaertn. Fruct ii. 440—R. genistaefolia.

ECLOTORIPA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1886) - Digera, Forsk. (Amarant).
annua, Rafin. 1. c.=seql
fruticosa, Rafin. L c = D. arvensis.

ECLYPTA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 821 (1837) = Eclipta, Linn. (Compos.).

ECTADIOFSIS, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 741 (1876). *ASCLEPIADEAE,* Benth. ft Hook. f. 1. c.
acutifolia, *Benth. I. c.*—Afr. anstr.
brevifolia, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 78.—Ins. Socotr.
nigritana, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t 1187.—Afr. trop.
oblongifolia, *Benth. in Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 741. —Afr. austr.
volubilis, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 78__Ins. Socotr.

BCTADIUM, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. ed. II. 231 (1837). *ASCLEPIADEAE,* Benth. ft Hook. t. ii. 742.
oblongifolium, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 542 (err. typ. 4421 = E>.jadiopsis oblongifolium.
virgatum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 188.—Afr. austr.

ECTASIS. D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 156=Erica, Linn.
Banksiana, D. Don, 1. c. 156=— Erica llanksii.
bruniades, I). Don, 1. c. = Erica bruniades.
demissa, G. Don, Gen. Syst iii. 827 — Erica demissa.
filiformis, G. Don, 1. c = Erica filiformis.
follicularis, G. Don, 1. c = Erica Petiverii.
furfurosa, G. Don, 1. c. = Erica monadelpha.
imbricata, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 15B = Erica imbricata.
melastoma, G. Don, Gen. Syst. iii. 827-Erica Petiverii.
monadelpha, G. Don, 1. c. = Erica Banksii.
penicilliflora, G. Don, 1. c.= Erica penicilliflora.
Petiverii, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 166 = Erica Sebana.
picta, G. Don, Gen. Syst. iii. 827 = Erica vestiflna.
placentaeflora, G. Don, 1. c = Erica tiaraeflora.
Plukenetii, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii, (1836) 156-Erica Plukenetii.
pudibunda, G. Don, Gen. Syst. iii. 827 = Erica nutans.
Sebana, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 156 = Erica Sebana.
socciflora, G. Don, Gen. Syst. iii. 827 = Erica socciflora.
stellaris, G. Don, 1. a-*Erica stellata.
turgida, G. Don, 1. c. = Erica turgida.
velleraeflora, G. Don, 1. c. = Erica bruniades.
vestiflua, G. Don, 1. c =Erica vestiflua.

ECTEINANTHUS, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 46-jBOgloasa, Oerst. (Acanthac.).
divaricatus, T. Anders. 1. c—Afr. austr.
Ecklonianus, T. Anders. 1. c—Afr. austr.
ofiganoides, T. Anders. 1. c.—Afr. austr.
ovaius, T. Anders. 1. c.—Afr. austr.
prolixus, T. Anders. 1. c.—Afr. austr.

ECTEMIS, Rafin. Sylva Tellur. 39 (1838) = Cordia, Linn. (Boragin.).
lutea, Rafin. 1. c. = C. lutea.

ECTINOCLADUS, Benth. in Benth. ft Hook. f. Gen. ii. 718 (1876). *APOCYNACEAE,* Benlh. ft Hook. f. 1. c

ECTOZOMA, Miers, in Ann. Nat. Hist. Ser. II. iv. (1849) 191 = JuanuUoa, Rniz & Pav. (Solanac).
Pavonii, Miers, 1. c—Ecuador.

ECTROSIA, R. Br. Prod. 186 (1810). *GRAM1NEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1188.
agrostoides, *Benth. Fl. Austral,* vii. 634.—Austral.
Gulliveri, *F. Muell. Fragm.* viii. 201.—Austral,
leporina, *R. Br. Prod.* 186.—Austral.
Schultzii, *Benth. Fl. Austral, ml* 638.—Austral.
spadicea, R. Br. Prod. 186=leporina.
vaginata, *Trin. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 543.—Hab.?

EDDYA, Torr. ft Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 170 (1855) = Coldenia, Linn. (Boragin.).
hispidissima, Torr. ft Gray, 1. c—C. hispidissima.

EDEMIAS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 49 (1836)-Conysa, linn. (Compos.).
egyptiaca, Rafin. 1. c—C. aegyptiaca.
Gouani, Rafin. 1. c —C. GouanL

EDQARIA, C. B. Clarke, in Joum. linn. Soc. xv. (1876) 113. *CUCURBITACEAE.*
darjeelingensis, *C. B. Clarke, I. c.* 114. f. 1-9.—Reg. **Himal.**

EDGEWORTHIA, Falc. in Proc. Linn. Soc. i. (1842) 129=Beptonia, A. DC. (Mjrsin.).
buxifolia, Falc. 1. c. = R. buxifolia.

EDQEWORTHIA, Meissn. in Denkscjir. Bot. Ges. Regensb. iii. (1841) 280. t. 6. *THYMELAEACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 193.
chrysantka, Lindl. in Joum. Hort. Soc. i. (1846) 148 — Gardneri.
Gardneri, *Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* iii. (1841) 280. t. 6.—Reg. Himal.; China; Japon.
papyrifera, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. m. (1846) 199 = Gardneri.

EDGWORTHIA, Lindl. in Joum. Hort. Soc. i. (1846) 148 = praec.

EDITELES. Rafin. Sylva Tellur. 103 (1838) = Iiy-thrum, Linn.
thymifolia, Rafin. 1. c. = L. thymifolia.

EDMONDIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 76 ; et in Diet. Sc. Nat. xiv. 252 (1819) = Heliehrysum, Vaill. (Compos.).
bicolor, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiv. 254.—Afr. austr.
bmcteata, Cass. 1. c. = H. sesamoides.
splendens, Cass. 1. c. 253 = H. sesamoides.

EDMONDIA, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 420 (1881). *CUCURBITACEAE.*
spectabilis, *Cogn. 1. c.*—Venezuela.

EDMONSTONIA, Seem. Bot. Voy. Herald, 98. t. 18 (1853?) = Tetrathylaeium, Poepp. (Violar.).
pacifica, Seem. I. c = T. macrophyllum.

ENDOSMIA, Nutt. ex Torr. et Gray, Fl. N. Am. i. 612 (1840) = Carum, Linn. (Umbellif.).
Gairdneri, Torr. & Gray, 1. c. = C. Gairdneri.
montana, Nutt. ex Torr. & Gray, 1. c. = C. Gairdneri.
neurophylla, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xviii. (1873; 285 = C. neurophyllum.
oregana, Nutt ex. Torr. & Gray, Fl. N. Am. 612=C. Gairdneri.
praealta, Nutt. ex Torr. ft Gray, 1. c.=C. Gairdneri.

EDRAIANTHUS, A. DC. in DC. Prod. vii. 448 (1839) = Wahlenbergia, Schrad. (Campanulac).
caricinus, Schott, Nyman, ft Kotschy, Analect. Bot. 6 = W. tenuifolia.
caudatus,Reicbb. Ic. Fl. Germ. xix. 109 = W. dalmatica.
croaticus. Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 390, in textu = W. Kitaibelii.
dalmaticus, A. DC. in DC. Prod. vii. 449 = W. dalmatica.
graminifolius, A. DC. 1. c 448 = W. graminifolia.
Kitaibelii, A. DC. 1. c. 449 = W. Kitaibelii.
Owerinianus, Boiss. Fl. Orient, iii. 886.—Reg. Caucas.
Pumilio, A. DC. in DC. Prod. vii. 449 = W. Pnmilio.
serpyllifolius, A. DC.1. c.=Campanula serpyllifolia.
siculus, P. G. Strobl, in Flora, lxvi. (1883) 561 - W. graminifolia ?
tenuifolius, A. DC. in DC. Prod. vii. 449 = W. tenuifolia.
thymifolius. Vis. ex Nym. Consp. 486=Campanula serpyllifolia.

EDRASTENIA, Rafin. New. Fl. Am. iv. 101(1836) = Oldenlandla, Plum. (Rubiac.).
uniflora, Rafin. 1. c.=O. glomerata.

EDRISSA, Endl. Suppl. ii. 53 (1842) (sphalm. pro Edrisia, Rafin. g) = Hedyotis, Linn. (Rubiac.).

EDUSARON, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 371=Desmodium, Desv. (1818) (Legumin.).
canadense, Medic. L c. = D. canadense.

EDUSARUM, Steud. Norn. ed. II. i. 643 (1840)-praec.

EDWARDIA, Rafin. Speech, i. 168 (1814); ex DC. Prod. ii. 92 (1825)=Cola, Schott ft Endl. (1883) (Sterculiac).
lurida, Rafin. 1. c.=C. acuminata.

EDWARDSIA, Endl. Gen. 413 (1838)-EDWARSIA, Neck. = Bidens, Linn. (Compos.).

EDWARDSIA, Salisb. in Trans. Linn. Soc ix. (180S) 298. t. 26-Sophora, linn. (Legumin.).
cassioides, Phil, in Bot. Zeit. xxxi. (1873) 741.—Chili.
chilensis, Miers, Trav. ii. 531, nomen; Bot. Reg. t. 1798—S. macrocarpa.
chrysophylla, Salisb. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 299 - S. chrysophylla.
denudata, DC. Prod. ii. 97=S. denudata.
Fernandeaiana, Phil, in Bot Zeit. xiv. (1856) 642 = S. tetraptera.
grandiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 29!) = S. tetraptera.
hortensis, Boiss. ft Buhse, in Nouv. Mlm. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 77 = Keyserlingia Buxbaumii.
hydaspica, Edgew. ex Aitch. in Joum. Linn. Soc. viii. (1865) 64.—Ind. or.
intermedia, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 489 = S. tetraptera.
Macnabiana, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. xxvi. (1838) 195=S. tetraptera.
macrophylla, Wender. in Iinnaea, v. (1830) 202 = S. tetraptera.
maderaspatana, Wight, Ic t 1054 = S. glauca, interrupta.
masafuerana, Phil, in Bot. Zeit. xxxi. (1873) 713 = S. tetraptera.
microphylla, Salisb. in Trans. linn. Soc. ix. (1808) 299 - S tetraptera.
minima, Lodd. ex W. Baxt. in Loud. Hort Brit Suppl. ii. 631 - S. tetraptera.
mollis, Royle, Illustr. Bot. Himal. 196-S. mollis.
myriophylla, Wender. in Linnaea, v. (1830) 202 = S. tetraptera.
nitida, DC. Prod. ii. 97=S. nitida.
parvifolia, Wight, Ic. sub 1.1054.—China.
persica, Boiss. ft Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc xii. (1860) 77 = Keyserlingia Buxbaumik
Reedeana, Phil, in Bot. Zeit. xxxi. (1873) 742 = S. tetraptera.
tetraptera, Foir. Encyc. Suppl. ii. 539, in obs. = S. tetraptera.
Toromiro, Phil, in Bot. Zeit xxxi. (1878) 743.—Chili.

EDWARSIA, Dum. Anal. Fam. 40 (1880)=praec.

EDWARSIA, Neck. Elem. i. 87 (1790)=Bidene, Linn. (Compos.).

EGANIA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 324 (1849)-Chaetanthera, Ruiz ft Pav. (Compos.).
acerosa, Remy, 1. c 325.—Chili.
apiculata, Remy, 1. c. 826.—Chili.
dioica, Remy, 1. c. 827. t. 26. f. 1.—Chili.
pallida, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 712.—Chili.
racemosa, Pritz. Ic. Ind. ii. 114=*acerosa.*

EGENA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 86 (1836) = Clerodendron, linn. (Verbenac).
emirnensis, Rafin. 1. c.=C. emiraense.

EGEHTA, Neraud, in Freyc. Voy. Bot. 28 (1826), nomen. *RUBIACEAE.*

EGERIA, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 79=Elodea, Michx. (Hydrochar.).
chilensis, Planch, ex Benth. ft Hook. f. Gen. iii. 450 = Elodea callitrichoides.
densa. Planch, in Ann. Sc Nat. Sér. III. xi. (1849) 80 = Elodea densa.
Matthewsi, Planch, ex Benth. ft Hook. f. Gen. iii. 450 -Elodea callitrichioides.
Naias, Planch, in Ann. Sc Nat. Sér. III. xi. (1849) 80 -Elodea Najas.

EOOERSIA, Hook. f. in Hook. Ic. PI. t. 1401 (1883). *NYCTAGINEAE,* Benth. ft Hook. f. iii-1217.
buxifolia, *Hoot./. I. c.*—Ind. occ.

EGLETES, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 1«-*COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 261.
EVSBLIA, Reichb. Iconog. Exot iii. 35. t. 242 (1880).

EGLETES:—
PLATYSTEPHIUM, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 80.
XEROBIUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 158; et in Diet. Sc. Nat. lix. 127 (1829).
arkansana, Nutt. in Tians. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 394 - Aphanostephus arkansanus.
oellidiflora, *Less. Syn. Camp.* 262.—Am. austr.
californica, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 56 = Eriophyllum caespitosnm.
domingensis, *Cass. in Diet. Se. Nat.* xiv. 265.—Ind. occ.
fioribunda, *Poepp. &" Bndl. Nov. Gen. et Sp.* Hi. 50.—Bras,
glabrata, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 103.—Ind. occ.
huraifusa, *Less. Syn. Comp.* 252.—Ecuador.
humilis, Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. ii. 411 = Aphanostephus humilis.
Liebmanni, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 117.—Mexic.
obovata, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 103.-N. Granat.
ramosissima, A. Gray, PI. Fendl. 71-Aphanostephus ramosissimus.
texana, Engelm. ex A. Gray, in Bost. Joum. Nat. Hist. v. (1847) 222-Aphanostephus arkansanus.
viscosa, *Less. Syn. Comp.* 252.—Am. austr.

EHRARDIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 153 (1880) = EHRHARDIA, Seop.=Aiouaa, Aubl. (Laurin.).

EHRARTHA, Beauv. Agrost. 60 (1812)=Ehrharta, Tnunb. (Gramin.).

EHRARTIA, Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 56 sphalm.-EHRHARTIA, Weber - Leeruia, Sw. (Gramin.).

EHRENBERGIA, Mart Nov. Gen. et Sp. ii. 72. t. 163 (1827)-Tribulus, Toum. (Zygophyll.).
tribuloides, Mart. 1. c 73 = T. brasiliensis.

EHRENBERGIA, Spreng. Nene Entdeck. ii. 129 (1821); « Syst. ii. 12 (1825)=Amaioua, Aubl. (Rubiac.).
citato, Spreng. 11. cc 129,183 = A. intermedia.

EHBETIA, Linn.Syst. ed. X. 936 (1759). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 840.
CARMONA, Cav. Ic. v. 22 (1799).
DESMOPHYLA, Rafin. SylvaTellur. 43 (1838).
HILSENBERGIA, Tausch, ex Reichb. Consp. 117 (1828).
LITHOTHAMNUS, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 834.
SUBRISIA, Rafin. Sylva Tellnr. 43 (1888).
TRAJHLUM, Rafin. 1. c. 42 (1838).
"Dysainica, *R. Br. in Salt. Abyss. App.* p. lxiv, nomen; « « ». *in Flora,* xxi. (1888) 608.—Abyss.
"canthophora, DC. Prod. lx. 510=Rochefortia acanthophora.
atjominata, *X. Br. Prod.* 497.—As. et Austral, trop.
"ffinis, Wall. Cat. n. 900=laevis.
»»qena, *Klotzsch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 248. Afr. trop.
Andrieuxii, DC. Prod. ix. 510-Bourreria Andrieuxii.
'rticulata, Walp. Rep. iv. 75, sphalm. = Citharexylum **ucnlatum.
«*»•«, Willd. Phyt. 4-.laevis.
•sperula, *Zoll. & if or. Syst. Ven. Zoll.* 62.—Java.
"reria, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 127 = Blancoi.
rreria, Chapm. Fl. S. U. St. 329 = Bourreria succulenta.
Wancoi, *DC. Prod.* ix. 611.—Ins. Philipp.
°°*gotensis,* Spreng. Syst. i. 648 = Aegiphila tomentosa?
«rreria, Desf. in Ann. Mns. Par. i. (1802) 279 = Bourreria recurva.
"ourreria, Linn. Sp. PI. ed. II. 276 « Bourreria succulenta.
"fannij, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 215.—*fr. trop.
Sf lia, Roxb. Pl. Corom. i. 42. t. 57.—Ind. or.; Malaya.
Pkylla, A. Rich. FL Cub. Fanerog. ii. 112 = Bourreria calophylla.
»pestri, Salisb. Prod. 112 = tinifolia.
«**«rensis, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. fed. ,v. 142=laevis.
E®*> *«*». *in Flora,* xxviL (1844) 880.—Afr.

EHRETIA:—
cassinefolia, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 113 = Bourreria cassinifolia.
Catronga, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7012-laevis.
Championi, Wight *St.* Gardn. exC. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit Ind. iv. 142 = laevis.
ciliata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist Ser. IV. iii. (1869) 111-elliptica.
cirrhasa. Lam. Encyc. i. 627 = Maripa scandens.
coromandeliana, ReU. ex DC. Prod. ix. 509 = buxifolia.
corymbosa, *Boj. Hort.Maurit.2W,* nomen ; *DC. Prod.* ix. 505.—Ins. Comor.
cumanensis, *DC. Prod.* ix. 611.—Venezuela.
cuneata, Wight, Ic. t. 1385 = Rhabdia lycioides.
Cutranga, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 142, sphalm. = laevis.
cymosa, *Thonn. in Sckum.* to* *Thonn. Beskr. Guin.Pl.* 129.—Afr. trop.
cymosa, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 805 = Toumefortia hirsntissima.
dichotoma, *Blume, Bijdr.* 842.—Java.
dichotomy Rottl. ex Wall. Cat n. 904 = laevis.
Dicksoni, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 224.—China.
diffusa, Vahl, ex DC. Prod. ix. 608-= cymosa.
divaricata, DC. Cat. Hort. Monsp. 108 = Bourreria divaricata.
domingensis, *DC. Prod.* ix. 60S.—Ins. S. Doming.
dubia, Jacq. Obii. Bot. i. 19-Cordia Collococca.
duplicata, Nees, ex Am. in Linnaea, xi. (1837) 485 = Grabowskia duplicata.
Eckloniana, Bnek, ex Harv. Thes. Cap. i. 5 = hottentotica.
elliptica, *DC. Prod.* ix. 603.—Texas; Mexic.
exasperata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. iii. (1867) 112=elliptica.
exsucca, Bert, ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 482-Bourreria domingensis.
exsucca, Linn. Sp. PI. ed. II. 276 — Bourreria exsucca.
fasciculata, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 66.—Venezuela.
ferrea, Willd. Phyt 4 = Maba buxifolia.
fioribunda, Royle, Illustr. Bot Himal. 806=laevis.
formosa, DC. Prod. ix. 510 - Bourreria formosa.
glabra, Roth, ex Roem. *Sc.* Schult. Syst. iv. 532; et Nov. PI. Sp. 127=Cord:a Myxa.
grandiflora, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 3.—Ins. S. Doming.
guatimalensis, DC. Prod. ix. 607=Bourreria grandiflora.
halimifolia, L'Hérit Stirp. Nov. 45=Grabowskia boerhaviaefolia.
halimifolia, Nees, ex Am. in Linnaea, xi. (1837) 486 = Grabowskia obtusa.
havanensis, Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 805-Bourreria havanensis.
heterophylla, Spreng. Syst. i. 648 = buxifolia.
Hey net, Roem. & Schult Syst. iv. 582-laevis.
hottentotica, *Burch. Trav. Afr.* ii. 147.—Afr. austr.
internodis, L'Hérit. Stirp. Nov. 47. t. 24=petiolaris.
javanica, *Blume, Bijdr.* 842.—Java,
laevis, *Roxb. PI. Carom,* i. 42. t 66.—As. et Austral. trop.
laevis, Sieber, ex DC. Prod. ix. 606 = corymbosa.
lanceolata, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.iv. 143=Wightiana.
lanceolata, *Veil. Fl. Flum.* 79; ii. t. 88.—Bras,
latifolia, *Loisel. Herb. Amat.* v. t. 350.—Mexic.
laurifolia, *Deem, in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 395.—Ins. Timor.
laxa, Jacq. Hort. Schoenb. i. 18. t. 41 - petiolaris.
linifolia,}. F. Gmel. Syst. 1542, sphalm. = tinifolia.
longiflora, *Champ, ex Benth. in Hook. Ken Joum.* v. (1858) 58.—China,
longifolia, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. hi. (1869) 110.—Mexic.
ludda, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 334.—Ins. Timor,
lycioides, *Wall, ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 391, in syn. —Ind. or.
macrophylla, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 343.—Reg. Himal.
mauritiana, *Willem. in Usteri, Ann. Bot.* xviii. (1796) 18.—Ins. Maurit.
membranifolia, *R. Br. Prod.* 497.—Austral,
microcarpa, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1883) 46. —Hab. ?
micropkylla, Lam. TabL Encyc i. 425-budfolia.

EHRETIA:—
mollis, Wall. Cat. n. 7011-Mappia ovata.
montevidensis, Spreng. Syst. i. 647-Citharexylum barbinerve.
mossambicensis, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 249.—Afr. trop.
obovata, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. lxiv, nomen; *DC. Prod.* ix. 607.—Ind. bor. occ.; Abyss.
obtusifolia, Hochst. ex DC. 1. c — obovata.
Onava, DC. 1. c. 511 = acuminata.
ovalifolia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 137 = acuminata.
ovalifolia, *Wight, Ic.* t. 1388.—Ind. or.
ovata, *Sieb. V Zucc. ex Teijsm.* b* *Binn. Cat. Hort. Bog.* 13!), nomen.—Japon.
parallela, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 143.—Burma.
petiolaris, *Lam. Encyc.* i. 527.—Ins. Mascar.
philippinensis, A. DC. in DC. Prod. ix. 504-laevis.
pilosula, *F. Muell. Fragtn.* v. 20.—Austral,
polyantha, *DC. Prod.* ix. 60S.—Ins. Philipp.
pubescens, Royle, Illustr. Bot. Himal. 306 = laevis.
punctata, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 532; et Nov. PI. Sp. 126= laevis.
pyri/olia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 102"acuminata.
Radula, Poir. Encyc. Snppl. ii. 2 = Bouniria Radula.
resinosa, *Hance, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 299. —China.
reticulata, Roem. & Schult. Syst. iv. 806=Citharexylum reticulatum.
retusa, *Wall. Cat.* n. 908.—Burma.
revoluta, DC. Prod. ix. 507 —Bourreria revoluta.
rupestris, Salisb. Prod. 112 = Bourreria succulenta.
saligna, *R. Br. Prod.* 497.—Austral,
scabra, *Kunth (f Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1847) 12.—Mexic.
scandens, Poir. Encyc. Suppl. iii. 690, in obi. —Maripa scandens.
serrata, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 696 = acumjnata.
setosa, *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 342.—Ins. Samoa,
siamensis, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 189, nomen.—Siam.
spicata, Boj. Hort Maurit. 236 = Maesa indica.
spinifex, Roem. & Schult. Syst. iv. 805 - Bourreria spinifex.
spinosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 14; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 275.—Ind. occ
spinosa, Spreng. ex DC. Prod. ix. 510—Rochefortia acanthophora.
sulcata, *Miers, in Ann. b" Mag. Nat. Hist.* Ser. IV. iii. (1869) 109.—Ind. occ.
ternifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 66—N. Granat.
timorensis, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 395-laevis.
tinifolia, *Linn. Syst.* ed. X. 936.—Ind. occ.
tinifolia, Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 832 = longifolia.
tomentosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 65 = Aegiphila tomentosa.
tomentosa, Lam. TabL Encyc. i. 425 = Bouneria tomentosa.
tomentosa. Roth, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 682 ; et Nov. PI. Sp. 126 = laevis.
triphylla, Hochst in Flora, xxvii. (1844) 830 *{~Amerina triphylla).—Kit.* austr.
umbellulata, WalL in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 344 -Ilex Godajam.
uniflora, *Roxb. Hort. Beng.* [84]; *Fl. Ind.* i. 598.—Ins Molucc.
velutina, DC. Prod. ix. 608 = Bourreria tomentosa.
venulosa, Spreng. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 395 = Lithraea brasiliensis.
viminea, Wall. Cat. n. 906 = Rhabdia lycioides.
violacea, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 12.—Afr. austr.
virgata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 127-acuminate.
virgata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 47 = Bourreria **virgata.**
Wallichiana, *Hook.f. V Thorns, ex Gamble, List Trees Darjeel.* 57; *et Fl. Brit. Ind.* iv. 143.—Ree, Himal.
Wightiana, *Wall. Cat.* n. 7018.—Ind. or.
Zeyheriana, Buek, ex Drège, in Linnaea, xx. (1847) 196, nomen; et Harv. Thes. Cap. i. 5-hottentotica.

EHRHARDIA, Scop. Introd. 107 (1777)-Aiouea, Aubl. (Laurin.).

EHRHARDTA, Hedw. f. Gen. 247 (1806)-Ehrharta, Thnnb. (Gramin.).

EHRHARTA, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1779) 216. t 8. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. Hi. 1187.
TROCHERA, Rich, in Jouro. Phys. xiii. (1779) 225. t. 8.
abyssinica, *Hochst. in Flora*, xxxviii. (1866) 193.—Afr. trop.
acuminata, Spreng. Syat. ii. 114 = TetnuThena acuminata.
adscendens, Schrad. in Goett Gel. Anz. (1821) III. 2078 = calycina.
aemala, *Schrad. I. c.* 2077.—Afr. austr.
aphylla, *Schrad. 1. c.*—Afr. austr.
aristata, Thunb. Prod. PI. Cap. 66=longiflora.
auriculata, Steud. in Flora, xii. (1829) 491 = calycina.
avenacea, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 1378.—Ins. Borbon.
Banksii, J. F. Gmel. Syst. 649 = longiflora.
barbinodis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 215.—Afr. austr.
brevifolia, *Schrad. in Goett. Gel. Ant.* (1821) III. 2077.—Afr. austr.; Austral.
bulbosa, 5m. *PI. Ic. Ined.* sub t. 83.—Afr. austr.
bulbosa, Steud. in Flora, xii. (1829) 491=aemnla.
ealycina, Eckl. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 203-- melicoides.
calydna, *Sm. PI. Ic. Ined.* t. 38.—Afr. austr.
capensis, Thunb. in Vet Acad. Handl. Stockh. (1779) 216. t. 8 = E. Mnemateia.
eartilaginea, Sm. PI. Ic. Ined. sub t. 83 = E. Mnemateia.
caudata, *Munro, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-69) 420.—Upon.
clandestine [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 64-Leersia oryzoides.
Colensoi, *Hook.f. Fl. N. Zel. I* 288. t 65 a.—N. Zel.
contexta, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1865) 111 = Tetrarrhena juncea.
diarrhena, F. Muell. Fragm. vii. 89 = Microlaena tasmanica.
digyna, Thnnb. Prod. PI. Cap. 66 = ramosa.
Diplax, F. Muell. Sel. PI. Indust Cult. 74 = Microlaena avenacea.
distichophylla, Labill. Nov. Holl. PI. i. 90. t 117 = Tetrarrhena distichophylla.
Drummondiana, Steud. Syn. PI. Gram. 7=Tetrarrhena laevis.
dnra, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 218.—Afr. austr.
Eckloniana, *Schrad. Rev. Alt.* n. 16; *ex Schult. f. Syst.* vii. 1376.—Afr. austr.
erecta, Lam. Encyc. ii. 347—panicea.
festucacea, *Willd. ex Schult./. Syst.* vii. 1878.— Madag.
geniculata, Thunb. Prod. PI. Cap. 192 = ealycina.
gigantea, Steud. in Flora, xii. (1829), 491 = villosa.
gigantea, *Thunb. 1. c.* 192.—Afr. austr.
hispida, Beauv. ex Steud. Norn. ed. II. i. 644-Tristachya leucothrix.
juncea, Spreng. Syst. ii. 114=Tetrarrhena juncea.
laevis, Spreng. 1. c. 116 = Tetrarrhena laevis.
laxifolia, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) HI. 2078 •ealycina.
longiflora, Eckl. ex Schult. f. Syst vii. 1376 - Eckloniana.
longiflora, *Sm. PI. Ic. Ined.* t 82.—Afr. austr. (Austral. introd.).
longifolia, *Schrad. in Goett. Gel. An:* (1821) III. 2077.—Afr. austr.
longiseta, Schrad. 1. c 2078 = longiflora.
melicoides, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 192.—Afr. austr.
melicoides, Willd. ex Nees, Fl. Afr. Austi. 209 = ealycina.
Microlaena, *Nees, I. c.* 217.—Afr. austr.
Mnemateia, *Linn.f. Suppl.* 209.—Afr. austr.
nutans, Lam. Encyc. ii. 846 —E. Mnemateia.
nutans, Willd. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 209=calydna.
Ottonis, Kunth, Rev. Gram. i. 9 = longifolia.
ovata, *Nees, in Linnaea*, vii. (1882) 836.—Afr. austr.
panicea, *Sm. PI. Ic. Ined.* t. 9.—Afr. auBtr.
paniciformis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 226.—Afr. austr.
paniculata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 642=ealycina.
pilosa, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 544 =• ealycina.
punicea, J. F. Gmel. Syst. 1542, sphalm.=panicea.
pusilla, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 223.—Afr. austr.
ramosa, Steud. in Flora, xii. (1829) 491-aphylla.
ramosa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 192.—Afr. austr.

EHBHARTA:—
ramosa, Willd. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 209=ealycina.
rupestris, *Nees, 1. c.* 227.—Afr. austr.
setacea, *Nees, 1. c.* 228.—Afr. austr.
stipoides, Labill. Nov. HolL PI. i. 91. t. 118-Microlaeoa stipoides.
stricta, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 214.—Afr. auitr.
tenacissima, Steud. Syn. PI- Gram. 7= Tetrarrhena juncea.
tenella, Spreng. f. Tent. Snppl. Syst. Veg. ll=Sporobolns tenellus.
Thomsoni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xii. (1880) 356.—N. Zel.
triandra, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 221.—Afr. austr.
Trochera, Schrad. in Goett Gel. Anz. (1821) III. 2077 = bulbosa.
undulata, Nees, ex Steud. Norn. ed. II. i. 544; et Fl. Afr. Austr. 208= ealycina.
uniflora, *Burch. Trav.* i. 67, nomen.—Afr. austr.
uniglumis, F. Muell. in Trans. Phil. Soc Viet, i-(1856) 111-Tetrarrhena juncea.
Urvilleana, Kunth, Rev. Gram. i. 189. t. 6 = longiflora.
varicosa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 200.—Afr. austr.
versicolor, *Schrad. in Goett. Gel. Ant.* (1821) III. 2078.—Afr. austr.
villosa, *Schult. f. Syst.* vii. 1374.—Afr. austr.

EHRHARTIA, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 68 (1780)=IieerBia, Sw. (Gram.In.).
clandestina, [Weber, in] Wigg. 1. c.=L. oryzoides.

EICHHORNTA, Kunth, Enum. PI. iv. 129 (1843).
PONTEDERIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 838.
CABANISIA, Klotzsch, ex Schlecht in Abh. Naturf. Ges. Halle, vi. (1862) 176.
LEFTOSOMUS, Schlecht. 1. c. 174 (1862).
VIAROPUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 81 (1836).
aquatica, Schlecht. in Abh. Naturf. Ges. Halle, vi. (1862) 177=azurea.
azurea, *Kunth, Enum. PI.* iv. 129.—Am. trop.
caracasana, Benth.&Hook. f. Gen. iii. 831=Schultesiana.
cordifolia, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 273.—Cuba.
crassicaulis, Schlecht. in Abh. Naturf. Ges. Halle, vi. (1862) 177 = speciosa.
crassipes, Solms, in DC. Monog. Phan. iv. 627 = speciosa.
graminea, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 91 = Heteranthera Seubertiaaa.
Martiana, *Seub. I. c.*—Am. trop.
Martiusiana, Walp. Ann. i. 848—praec.
natans, *Solms, in Bremen, Abh.* vii. (1882) 254.—Afr. trop.
fianiculata, Solms, in DC. Monog. Phan. iv. 530 = Martiana.
paradoxa, Solms, 1. c. 631-Schultesiana.
pauciflora, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 91.—Bras.
Schultesiana, *Seub. I. c.* 98.—Bras,
speciosa, *Kunth, Enum. PI.* iv. 131.—Am. trop.
subovata, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 91-Reussia snbovata.
tricolor, Seub. L c. 92 = Martiana.

EICHLERIA, Hartog, in Joum. Bot xvi. (1878) 72-Muriea, Hartog (Sapotac).
albescens, Hartog, 1. c. = M. albescens.
discolor, Hartog, 1. c = M. discolor.

EICBXEBIA, Progel, in Mart. Fl. Bras. xii. H. 518 (1877). *OXALIDEAE*.
Blanchetiana, *Progel, I. c*—Bras,
lucida, *Progel, I.* c—Bras.

EICHORNIA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 273 (1853) =Eiohhornia, Kunth (Ponted.).

EICHWALDIA, Ledeb. in Eichw. PI. Casp. 38. t 84 (1831) - Beaumuria, linn. (Tamariscin.).
oxiana, Ledeb. 1. c =R. oxiana.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 13=R. filifolia.

EICO8IA, Blnme, Fl. Jav. Praef. p. vii (1828), nomen. *ORCHWEAE*.

EILEMANTHUS, Hochst. in Flora, xxlx. (1846) 698 = Indigofera, Linn. (Legumin.).
strobilifer, Hochst. L c.=I. strobilifer.

EINADIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 121 (1886) = Buaeda, Forsk. (Chenop.).
linifolia, Kafin. 1. c.-S. linifolia.

EINOMEIA, Rafin. Med. Fl. i. 62 (1828)-=Ariatolodiia, Linn.
Berlandierii, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859; 606-A. micrantha.
bracteata, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 = A. bracteata.
brevipes, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 606 = A. brevipes.
hastata, Klotzsch, 1. c. 625. t. 2 = A. pentandra.
pentandra, Rafin. Med. Fl. i. 62 = A. pentandra.

EIMOMENIA, Meissn. Gen. 834 (1841)-praec.

EINOMERIA, Reichb. Norn. 68 (1841)=praec.

E1SENMANNIA, Seh. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. InteU. 42; et xxv. (1842) I. Beibl. 134 = Blainvillea, Cass. (Compos.).
clandestina, Sch. Bip. ex Hochst. 11. cc. = B. rhomboides.

EIZAGUIRREA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 401 (1849) =Iieuceria, Lag. (Compos.).
Candollii, Remy, 1. c. 402 - L. floribunda.
drsioides, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 719.—Chili.
sonchifolia, Turcz. in BulL Soc. Nat. Most xxiv. (1861) 1.213—Chili.

3SKEBERGIA, Sparrm. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1779) 282. t. 9. *MELIACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 385.
ECKEBERGIA, Batsch. Tab. 63 (1802).
benguelensis, *Welw. ex C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 642.—Afr. trop.
capensis, *Sparrm. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1779) 282. t. 9.—Afr. austr.
convallariaeodora, *Baill. Adansonia*, xi. (1874) 263." Madag.
discolor, *O. Hoffm. in Linnaea*, xliii. (1880-82) 128.-Afr. trop.
fruticosa, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 644.—Afr. trop.
indica, Roxb. Hort Beng. 33; Fl. Ind. ii. 892 = Cipadessa fruticosa.
integerrima, Wall. Cat. n. 1257 = Cipadessa fruticosa ?
Meyeri, *Presl, Bot. Bemerk.* 25.—Afr. trop.
Petitiana, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 105-Ruppeliana.
Ruppeliana, *A. Rich. I. c.*—Afr. trop.
senegalensis, *Juss. in Mem. Mus. Par.* xii. (1830) 234, 273.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, ex CDC in DC. Monog. Phan.* i. 648.—Afr. trop.

ELACHANTHUB, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852 410. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 431.
pusillus, *F. Muell. I. c.* 411.—Austral.

ELACHIA, DC. Prod. vii. 256 (1838) = Chaetanthera, Ruiz & Pav. (Compos.).
euphrasioides, DC. 1. c.=C. multicaulis.
renifolia, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 315.—Chili.
spinulosa, Phil, in Linnaea, xxriii. (1864-66) 116.—Chili.
splendent, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 815.—Chili.

ELACHOCROTON, F. Muell. in Hook. Kew Journ. te-(1857) 17-8eba8tiania, Spreng. (Euphorb.).
asperocoeeum, F. MndL I.e.—S. Chamelaea.

ELACHOPAPPUS, F. Muell. Fragm. iii. 167 (1868)-MyriocephalUB, Benth. (Compos.).
Rudallii, F. Muell. 1. c.-M. Rudallii

ELACHOTHAMNOS, DC. Prod. v. 898 (1836) - Minuria, DC. (Compos.).
Cunninghami, DC. L c - M. Cunninghamii.

ELAEAGIA, Wedd. Monog. Cinch. 94 (1849). *W BIACEAE*, Benth. ScHook. f. ii. 60.
auriculata, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 82.—Costa Rica.
Mariae, *Wedd. Monog. Cinch.* 94.—Perav.
ntilis, *Wedd. 1. c*—N. Granat.

ELAEAGNXTS, [Toum.] Linn. Syst. ed. 1 (17S5).
ELAEAGNACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 204.
LEPARGYREA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176.
•LEPTARGYREIA, Schlecht. in DC. Prod. xiv. 607 (1857).
OCTARILLUM, Lour. Fl. Cocbinch. 90 (1790).
amminata, Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort Berol. i. 111=latifolia.
Alingaro, *Schlecht. in DC. Prod.* xiv. 615.—Ins. Philipp.
angustifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 74 -latifolia.
angustifolia, *Linn. Sp. PI.* 121.—Enrop.; As. bor.
arborea, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 461*>latifolia.
argentea, Colla, Hort RipnL t. 28-latifolia.
argentea, Moench, Meth. 688=angustifolia.
argentea, *Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 114.—Am. bor.
armata, Buch.-Ham. ex Schlecht. in DC. Prod. xiv. 611-latifolia.
Breyniastrum, Fisch. ex Schlecht. 1. c. = latifolia.
caudata, *Schlecht. in Linnaea*, xixii. (1863) 801.—Ind. or.
commulata, Serah. in Allg. Thaer. Gartenz. ii. (1843) 187= argentea.
conferta, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 440=latifolia.
crispa, Thunb. Fl. Jap. 66 = mnltiflora.
Cumingii, Schlecht. in DC. Prod. xiv. 613=latifolia.
cyanea. *Ait. ex Steud. Norn.* i. 544.—Hab. *1*
dactyliformis, Hort. ex Schlecht. in DC. Prod. xiv. 615—angustifolia,
• dnlcis, *Roxb. Hort. Beng.* 11, nomen.—Ind. or.
edulis, Siebold, ex E. May, in Rev. Hortic (1876) 18 ; Lavall. Arbor. Segrez. 9-mnltiflora.
'Uiptica, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2048=latifolia.
rrivanensis, Fisch. ex Schlecht in DC. Prod. xiv. 615 =angustifolia?
fesciculata, *Griff. Notul.* iv. 374.—Assam.
ferruginea, Rich, in Mém. Soc Hist Nat. Par. i. (1782) 387,404=latifolia.
fnsca, *Pepin, ex Lent. Hortic. Univ.* iii. 804.—Hab.?
Oandichandiana, *Schlecht. in DC. Prod.* xiv. 612.—Cocbinch.
glabra, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 389 = argentea.
elabra, *Thunb. Fl. Jap.* 67.—Japon.
gonyanthes, *Benth. in Hook. Kev Journ.* y. (1853) 197.—China.
grandifolia, Boj. ex Schlecht. in DC. Prod. xiv. 612-latifolia.
Grijsii, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xv. (1861) 227.—China.
Gussoni, Gasparr. in Ann. Civ. i. (1833) 118 = latifolia.
hortensis, Bieb. Fl. Tanr. Cane. i. 112 = angustifolia.
incana, Lam. Fl: Fr. iii. 476 = angustifolia.
inermis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = angustifolia.
javanica, *Blume, Bijdr.* 638.—Java.
f'loga, Schlecht. in DC. Prod. xiv. 611 =latifolia.
'aetevirens, *Lindberg, in Act. Soc. Sc. Fenn.* x. (1871) 125.—Hab. I
latifolia, *Linn. Sp. PI.* 121.—As. trop.
latifolia, Lour. Fl. Cochinch. 89 = Loureiri.
'ongipes, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858 -59) 405-multiflora.
Loureiri, *Champ, in Hook. Ken Journ.* v. (1853) 196.—Hongkong.
macrophylla, *Thunb. Fl. Jap.* 67.—Japon.
nuurophylla, Wall, ex DC. Prod. xiv. 612=latifolia.
Moorcroftii, Wall. Cat. n. 4031-angustifolia.
multiflora, *Thunb. Fl. Jap.* 66.—Japon.
nepalensis, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 99=latifolia?
Oldhami, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xv. (1871) 377.—Ins. Formosa.
orientalis, linn. Mant. L 41-angustifolia.
Padifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 890 = umbellata.
P""gnayen»is, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent.v.* (1878) 156 ; *Contrib.* 49.-Reg. Argent.
P"rvifoli„Vfal\. Cat. n. 4026; Royle, IlTustr. Bot. Himal. – 323. t. 61. f.l-umbellata.
Fwrottetii, *Schlecht. in DC. Prod.* xiv. 618.—Ins. Philipp.
punctata, Schlecht. 1. c. 610=latifolia.
Pungens, *Thunb. Fl. Jap.* 68.—Japon.
reflexa, E. Morr. & Decne. in Bull. Acad. Brax. iii. . (1836) 171-umbellata.
ngida, *Blume, Bijdr.* 688.—Java.

ELAEAGNUS:—
rotundifolia, Gagn. in Rev. Hortic. (1870-71) 540 = multiflora ?
salicifolia, *D. Don, ex Loud. Encyc. Trees V Shrubs*, 697. t. 1866.—Hab.?
Simonii, Carr. in Rev. Hortic. (1869) 100-latifolia.
songorica, *Fisch. ex Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) H. 87.—Sibir.
spadicea, Savi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xxi. (1837) 175-latifolia.
spinosa, Linn. Cent. ii. 9; Amoen. Acad. iv. 305 = angustifolia.
tenuiflora, Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1863) 197 = glabra.
Thwaitesii, Schlecht in DC. Prod. xiv. 611-latifolia.
tifiiensis, Fisch. & Vis. Ort. Bot. Padov. 77 = latifolia.
tomentosa, Moench, Meth. 638=angustifolia.
triflora, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 439=latifolia.
nmbellata, *Thunb. Fl. Jap.* 66.1.14.—Japon.
undulata, Hort. ex Ind. Sem. Hort. Genuens. (1855) 14, in nota=Olearia Forateri.
Wallichiana, Schlecht. in DC. Prod. xiv. 612-latifolia.

ELAEAGRUS, Pall. Fl. Ross. i. I. 23, 25 (1789) = Elaeagnus, Toum.

ELAEIS, Jacq. Select. Am. 280. t. 172 (1763).
PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 944.
ALFONSIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. L 806 (1815).
BARCELLA, Dnide, in Mart. Fl. Bras. iii. n. 459. t. 106 (1881).
COROZO, Jacq. ex Giseke, Prael. 42 (1792).
guineensis, *Jacq. Select. Am.* 280.—Afr. trop.
melanococca, *Gaertn. Fruct.* i. 18. t. 6. f. 2.—N. Granat.
montana, *Page, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 545.—Jamaica.
occidentals, *Sw. Fl. Ind. Occ.* i. 619.—Ind. occ.
odora, *Trail, in Journ. Sot.* xv. (1877) 81.—Bras,
pernambucana, £<*&{. *ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 399.—Bras.
spectabilis, *Lodd. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 716.—' Ind. or.'

ELAEOCAHPU8, Burm. ex Linn. Diss. Dass. 11 U747) ; Amoen. Acad. i. 402 (1749). *TIUACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 239.
ACERATIUM, DC. Prod. i. 519 (1824).
ACRONODIA, Blume, Bijdr. 128 (1825).
ACROZUS, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 149 (1827).
ADENODUS, Lour. Fl. Cochinch. 294 (1790).
BEYTHEA, Endl. Gen. 1011 (1840).
CRASPEDUM, Lour. Fl. Cochinch. 336 (1790).
DlCERA, Forst. Char. Gen. 79. t. 40 (1776).
ERIOSTEMUM, Colla, ex Steud. Nom. ed. II. i. 688 (1840).
GANITROS, Gaertn. Fruct. ii. 271.1.189 (1791).
LOCHNERIA, Scop. Introd. 271 (1777).
MISIPUS, Rafin. Sylva Tellur. 60 (1888).
MONOCERA, Jack, in Malay Misc. i. (1820) v. 42; reimpr. in Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 86.
PERINKA, Rafin. Sylva Tellur. 60 (1888).
SKIDANTHERA, Rafin. 1. c. (1838).
Acronodia, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 408.—Malacca.
acuminatus, *Wall. Cat.* n. 2675.—Ind. or.
adenophyllus, Wall. 1. c. n. 6860=oblongu».
adenopus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. ii. 209.—Java,
alateraoides, *Brongn. &" Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 201.—N. Caled.
alnifolius, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1863) 107.—Madag.
amoenus, *Tka. Enum. PI. Zeyl.* 82.—Ind. or.
amygdalinus, Wall. Cat n. 6857=robustus.
angnstifolius, *Blume, Bijdr.* 120.—Java.
angustifolius, Wight, Illustr. 84 = oblongus.
apiculatus. *Mast, in Hook. Fl. Brit. Ind.* I. 407.—Malacca,
argyrodes, *Hance, in Journ. Bot.* xv. (1877) 880.—China,
aristatus, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 599.—Ind. or.
aristatus, Wall. Cat n. 2666 B-robustus.

EIiAJEOCAHPUS:—
amhemicus, *F. Muell. Desc. Not. Papuan PI.* i. 6.—N. Guin.
atrovirens, *Zoll. V Mar. Syst. Vert. Zoll.* 26.—Java.
Bancroftii, *F. Muell. & Bailey, in Proc. Roy. Soc Queens!*, ii. II. (1885).—Austral.
Baudouini, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 801.—N. Caled.
bifida, *Nook*, b* *Am. Bot. Beech. Voy.* 110. t. 24.—Ins. Sandvic.
bilocularis, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 88—tuberculatus.
bracteatus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 48.—Burma,
cassinoides, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 204.—Ins. Fiji,
ceylanicus, *Am. in Npv. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836) 323.—Zeylan.
Chackroula, Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 408, sphalm. = seq.
Chakrosila, Bnch. Ham. in Wall. Cat. n. 2674 (sp. dub.).—Ind. or.
chinensis, *Hook.f. ex Benth. Fl. Hongk.* 43.—China.
copalli/erus, Ketz. Obs. iv. 27 - Vateria acuminata.
coriaceus, *Hook. Ic. PI.* 1.164.—Ind. or.
Corsonianus, *G. Don, in Loud. Gard. Mag.* xviii. (1842) 870.—Ins. Batagoda.
Cumingii, *Turn, in Bull. Soc. Nat- Mosc.* xii. (1846) II. 491.—Ins. Luzon,
cuneatus, *Wight, Illustr.* i. 83.—lad. or.
Cunninghamii, Raoul, Choix PI. N. Zeland, 25 - dentatus.
cyaneus, *Sims, Bot. Mag.* t. 1737.—Austral,
cyanocarpus, *Maingay, ex Mast, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 406.—Malacca,
dasyandrus. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 108.—Madag.
dentatus, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 66.—N. Zel.
Deplanchei, *Brongn. tf Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* x. (1863) 477.—N. Caled.
Dicera, Vahl, Symb. Bot. iii. 67 = dentatus.
dioicus, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xix. (1846) 498.—Japon.
edulis, *Teijsm. (f Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 39.—Ins. Amboin.
ellipticus, *Sm. in Rees, Cycl.* xii. n. 3.—Hab. ?
ferrugineus, *Steud. Nom.* ed. II. i. 645; *Beddome, Fl. Sylv. t.* 112.—Ind. or.
Finlaysonianus, Wall. Cat. n. 6861 - E. Varunua.
fissistipula.jtfiy. *Fl. Ind. Bat.* i. H. 210.—Java,
floribundus, *Blume, Bijdr.*]20.—As. trop.
foveolatus, F. Muell. Fragm. v. 157 = obovatus.
fruticosus, *Roxb. Hort. Beng.* [93]; *Fl. Ind.* ii. 600.—Ins. Molucc.
Ganitrus, *Roxb. II. cc.* 42,592.—Ind. or.; Malaya,
geminiflorus, *Brongn. (J Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr* x. (1863) 477.—N. Caled.
glaber, *Blume, Bijdr.* 122.—Java,
glabrescens, *Mast, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 403.—Malacca.
glandulifer, *Mast, in Hook. f. I. c.* 406.—Zeylan.
glandulosus, Wall. Cat. n. 6859 = oblongus.
Graeffei, *Seem, in Joum. Bot.* ii. (1864) 76.—Ins. Fiji.
Grahami. *F. Muell. Fragm.* x. 3.—Austral,
grandiflorus, *Boj. Hort. Maurit.* 46.—Ins. Maurit
grandiflorus, 5m. *in Rees, Cycl.* xii. n. 5.—Austral,
grandifolius, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xii. (1872) II. 294.—Burma.
grandis, *F. Muell. Fragm.* ii. 81.—Austral.
Griffithii, *A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 20.1.—Burma; Malaya.
Grijsii, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 465, sphalm.—Elaeagnus Grijsii.
grossus, Wall. Cat. n. 2661 = floribundus.
Guillaumii, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix.* (1866) 836.—N. Caled.
Helferi, *Kurt, ex Mast, in Hook. Fl. Brit. Ind. I* 402.—Burma.
Henryi, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 822.—China.
Hinau, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. iv. (1840) 23 - dent·situs*
holopetalus, *F. Muell. Fragm.* ii. 143__Austral.
Hookerianus, *Raoul, Choix Pl.N. Zeland*, 26.—N. Zel.
hygrophilus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 133.—Burma.
hypadenus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 406.—Sumatra,
integer, *Wall. Cat.* n. 2668, 2673.—Burma: Malaya.

ELAEOCABPXJ8:—
integeirimus, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 412.—Cochinch.
integrifolius, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 306 = Chailletia gelonioides.
integrifolius, Lam. Encyc. ii. 604= serratus.
integrifolius, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273 = Ochna integrifolia.
integripetalus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 407.—Snmatra.
isotrichus, *Villar, in Blanco, Ft. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 81.—Ins. Philipp.
Jackianus, *Wall. Cat.* n. 2679.—Singapore,
japonicus, *Siebold, in Verh. Batav. Gen.* xii. (1830) 68.—Japon.
japonicus, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xix. (1846) II. 492.—Japon.
lacunosus, Wall. Cat. 6858, 9026 = serratus *vel* cnneatus.
lanceaefolins, *Roxb. Hort. Beng.* 42 ; *Fl. Ind.* ii. 598.—As. trop.
lanceolatus, *Blume, Bijdr.* 119.—Java.
lanceolatus, Wall. Cat. 2667, partim=lanceaefolius.
laurifolius, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 203.—Ins. Fiji.
Lenormandii, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* ix. (1865) 385.—N. Caled.
leptosUchyua, *Wall. Cat.* ri. 2672.—Burma ; Penang.
littoralis, *Teijsm.* b* *Binn. ex Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 182.—Tenasserim.
Lobbianus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 285 " floribundus.
longifolius, *Blume, Bijdr.* 120.—Java,
longifolius, *Wall. Cat.* n. 6682.—Burma,
lucidns, *Roxb. Hort. Beng.* 42 ; *Fl. Ind.* ii. 600.—Ind. or.
macrocarpus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 406.—Sumatra.
macrophyllus, *Blume, Bijdr.* 122. —Java,
micranthus, *Teijsm. b" Binn. Cat. Hort. Bog.* 890.—Menado.
micranthus, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* ix. (1865) 392—N. Caled.
Milnd, *Seem. Fl. Vit.* 28.—Ins. Fiji,
moluccanus, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 345.—Ins. Molucc.
Monocera, *Cm. Ic.* vi. 1.1. 601.—As. trop.
monoceroides, *Wight. Illustr.* i. 84.—Ind. or.
montanus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 82.—Zeylan.
multiflorus, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 81.—Ins. Philipp.
Munroii, *Mast, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 407.—Ind. or.
nitidus, *Jack, in Malay Misc.* i. (1820) n. v. 41.—Malaya,
oblongus, *Gaertn. ex Sm. in Sees, Cycl.* xii. n. 2.—Ind. or.; Malaya.
oblongus. Wall. Cat. n. 2677 = floribundns, robustus.
obovatus, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 828=-coriaceus.
obovatns, *G. Don, Gen. Syst.* i. 559.—Austral,
obtusus, *Blume, Bijdr.* 128.—Java,
oppositifolius, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 211.—Ins. Amboin.
ovalifolius, Wall. Cat. n. 2665 = robustus.
ovahs, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* i. 406.—Sumatra,
ovigerus, *Brongn.* b[1] *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* x. (1863) 477.—N. Caled.
paniculatns, *Wall. Cat.* n. 2663.—Malaya.
parviflorus, A. Rich. Sert. Astral. 67. t. 24 = obovatus.
parviflorus, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 176.—Ins. Timor.
parvifolius, *Wall. Cat.* n. 2662.—Malaya,
pauciflorus, *A. Rich. Voy. Astrol.* 67.—N. Zel.
paudfiorus, Walp. Rep. i. 864 = obovatus.
peduncularis, Labill, Nov. Holl. PI. ii. 15. t. 155 = Aristotelia peduncularis.
pedunculatus, *Wall. Cat.* n. 2678.—Malaya.
Perim-kara, DC. Prod. i. 519=oblongus.
persicifolius, *Brongn. (f Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* (1861) 202.-N. Caled.
petiolatus, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. SOS-Burma.
petiolatus, Wall, ex Steud. Nom.ed. II. i. 545 = integer.
photiniaefolU, *Hook, ff Am. Bot. Beech. Voy.* 269.—China.
pilosus, *Roxb. Hort. Beng.* 42.—Ins. Mascal.
Pirincara, Wall. Cat. n. 2664. partim - senates,
polystachyus, *Wall. 1. c.* n. 2671.—Malaya.

ELAEOCAHPUS : -

prinodes, *Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 128.—Hab. ?
prunifolius, *Wall. Cat.* n. 2669.—Ind. or.
pubescens, Hook. Ic. PI. t. 155»subvillosus.
pulchellus, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 300.—N. Caled.
punctatus, *Wall. Cat.* n. 2676.—Singapore,
pyriformis, *A. Gray,Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 205.—Ins. Fiji,
quercifolius, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 108.—Madag.
resinosus, *Blume, Bijdr.* 122.—Java.
reticulatus, Sm. in Rees, Cycl. xii. n. 6=cyaneus.
retusus, *Brongn.* b" *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* x. (1863) 477.—N. Caled.
rhodanthus, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 107.—Madag.
robustus, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 597.—As. trop.
robustus, Wall. Cat. n. 2644 A-integer?
rotundifolius, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1801) 202.—N. Caled.
rnfovestitus, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1888) 106.—Madag.
rugosns, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 586.—Ind. or.
rugosus, Wall. Cat. n. 2658 A, B-tubercuIatus.
ruminatus, *F. Muell. Fragm.* viii. 1.—Austral,
sericeus, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 106.—Madag.
sericopetalus, *F. Muell. Fragm.* vi. 171.—Austral.
Seringii, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 188.—N. Caled.
serratus, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 264 - lanceacfoliua.
serratus, Heyne, in Wall. Cat. n. 2666 - oblongus.
serratus, *Linn. Sp. PI.* 515.—Ind. or.; Malaya.
serratus. Linn. f. Suppl. 266 =• dentatus.
serratus, Retz. Obs. iv. 27 = oblongus?
serratus, Roxb. ex Wall. Cat n. 2666 A, B, partim = floribundus.
serrulatus, Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1861) 263 = lanceaefolius.
serrulatus, Roxb. Hort. Beng. 42, nomen=tuberculatus.
sikkimensis, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 402,—Reg. Himal.
silvestris, Poir. Encyc. Suppl. ii. 704=sylvestris.
simplex, *Kurt, in journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 132.—Burma,
spathulatus, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 202.—N. Caled.
speciosus, *Brongn. (f Gris, 1. c.* 201.—N. Caled.
stipularis, *Blume, Bijdr.* 121.—Burma ; Malaya.
SIOTCVM, Seem.in Bonplandia, x. (1862) 295.—Ins. Fiji.
strictus, Lamb, ex G. Don, Gen. Syst. i. 559 = dentatus.
subdenticulatus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 408.—Sumatra.
submonoceras, *Miq. 1. c.* 407.—Sumatra,
subpuberus, *Miq. 1. c.* 406.—Sumatra,
subserratus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 105.—Madag.
subvillosus, *Am. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1886) 828.—Zeylan.; Malaya.
sylvestris, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 309 = oblongus.
sylvestris, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 704 (silvestris).—Cochinch.
tectorius, *Poir. 1. c.*—Cochinch.
tinctorius, Steud. Nom. ed. II. i. 430, sphalm. = praec.
tomentosus, *Blume, Bijdr.* 121.—Java,
transultus, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 504.—Ins. Socotra.
tuberculatus, *Roxb. Hort. Beng.* [93]; *Fl. Ind.* ii. 594.—Ind. or.; Malaya,
vaccinioides, *F. Muell. ex Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 801.—N. Caled.
Varunua, *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* n. 2666 G, H.—Ind. or.; Malaya.
venustus, Bedd. Fl. Sylvat 1.174 = E. Monocera.
verrucosus, Steud. Nom. ed. II. i. 49, sphalm. = Aleurites cordata.
Vieillardii, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 202.—N. Caled.
Wallichii, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 133.—Burma.

ELAEOCHARIS, Brongn. Enum. Gen. 12 (1843) = Eleocharis, R. Br. (Cyperac).

ELAEOCHYTRIS, Fend, in Russegg. Reise, i. 957. t. 19 (1848) (111. PI. Syr. 71)=Peueedanum, Tourn. (Umbell.).
cachroides, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 462 « P. Schlechtendalii.
meifolia, Kenzl, in Russeg. Reise, ii. 958. t. 19 = Ferula meifolia.

ELAEOCOCCA, Comm. ex A. Juss. Euph. Tent. 38. t. 11 (1824)-Aleurites, Forst. (Euphorb.).
cordata, A. Juss. 1. c.; Blume, Bijdr. 618 = A. cordata.
Vernicia, A. Juss. ex Spreng. Syst. iii. 884 = A. cordata.
verrucosa, A. Juss. ex Spreng. 1. c. = A. cordata.

ELAEOCOCCUS, Spreng. Syst. iii. 884 (1826) = praec

ELAEODENDRON, Jacq. f. in Nov. Act. Helv. i. 38 (1787). *CELASTRINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 367.
CROCOXYLON, Eckl. & Zeyh. Enum. 128 (1835).
LAMARCKIA, Hort. ex Lndl. Gen. 1088, in syn. (1841).
LAURIDIA, Eckl. & Zeyh. Enum, 124 (1S35).
LOUREIRA, Raeusch. Nom. ed. III. 67 (1797).
MYSTROXYLON, Eckl. & Zeyh. Enum. 125 (1835).
NEERIJA, Roxb. Fl. Ind. i. 646 (1824).
PARILIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818).
PORTENSCHLAGIA, Tratt. Archiv, 250 (1812).
RUBENTIA, Comm. ex Juss. Gen. 878 (1789).
SCHREBERA, Retz. Obs. vi. 25. f. 8 (1791).
SCYTOPHYH.UM, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 124 (1835).
aethiopicum, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 365.—Afr. trop.
angusufolium, *Presl, Bot. Bemerk.* 84.—Afr. austr.
arboreum, *Punch.* b" *Sebert, Not. Bois Nouv. Caled.* 234.—N. Caled.
Argan, Retz. Obs. vi. 26 = Argania Sideroxylon.
artense, *Montr, in Mém. Acad. Lyon,* x. (1860) 194.—N. Caled.
athranthum, *Presl, Bot. Bemerk.* 84.—Afr. austr.
attenuatum, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 348.—Ind. occ.
australe, *Vent. Jard. Malm.* t. 117.—Austral,
capense, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 127.—Afr. austr.
camosum, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) I. 602.—N. Zel.
clusiophyllum, *Baill. Adansonia,* xi. (1873-76) 269.—Calif.
croceum, *DC. Prod.* ii. 11.—Afr. austr.
Cunninghami, *Montr, in Mém. Acad. Lyon,* x. (1860) 194.—N. Caled.
curtipendulum, *EndL Prod. Ft. Ins. Norf.* 141.—Ins. Norfolk.
dioicum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 709.—Ind. occ.
Dregeanum, Presl, Bot. Bemerk. 84 = Pterocelastrus Dregeauus.
ellipticum, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii-(1834) 478.—Ins. Timor.
Fortunei, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 603.—China,
glaucum, *Pers. Syn.* i. 241.—As. trop.
griseum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 834.—Madag.
horizontal, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 603.—Java,
ilicifolium, *Tenore, in Atti Terta Ruin. Sc. Hal.* 504.—Hab.?
indicum, Gaertn. Fruct. i. 274. t. 67 = orientale.
indicum, *Poit. in Rev. Hortic. Sir.* II. v. (1846) 125 (=praec.?).—Hab.?
integrifolium, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 110 = australe.
japonicum, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 310.—Japon.
javanicum, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 602.—Java.
laurifolium, *Harv. Thes. Cap.* ii. 54.—Afr. austr.
laurinum, Presl, Bot. Bemerk. 84=-Celastrus laurinus.
maculosum, Lindl. in Mitch. Joum. Trop. Austral. 384 =- FHndersia maculosa.
melanocarpum, *F. Muell. Fragm.* iii. 62.—Austral.
Meyerianum, Presl, Bot. Bemerk. 34 = Celastrus heterophyllus, *Eckl. V Zeyh.*
micranthum. Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. «• (1844) 229 - Melicytus micranthus.
micranthum, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. «»• (1857) 110.—Madag.
nilghirense, Wall. Cat. n. 4409 = Microtropis ovalifolw.
nitidulum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. *(lit*)* 333.—Madag.

ELAEODENDBON :-
Novae-Zelandiaei *Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 602.-N. Zel.
obtusum, 1'resl, Bot. Bemerk. 34-Celastrus oleoides.
oliganthum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 121.—Madag.
urientale, *Jacq. Ic. Rar.* t. 48.—Ins. Maurit.; Madag.
uxyodon, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxxvi. (1863) I. (S08 = glaucum.
paniculatum, Wight & Am. Prod. 157 - glaucum.
papillosum, *Hochst. in Flora,* xvii. (1841) 305.—Afr. austr.
pauciflorum, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1857) 109.—Malaya,
pilosum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 122. —Madag.
punctulatum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 602.—N. Zel.
Pyramidale, Salisb. Prod. 148 = orientale.
Huadrangulatum, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 88.—Bras.
rotundatum, *DC. Prod.* ii. 11.—Ins. S. Thomas.
Roxburghii, Wight *Sc* Arn. Prod. 157=glaucum.
sckinoides, Spreng. Syst. i. 780 .= Hartogia capensis.
iphaerophyllum, *Presl, Bot. Bemerk.* 34 ; *Bail I. Hist. PI.* vi. 27.—Afr. austr.
totnentosum, Willd. ex Koem. & Schult. Syst. iii. 845 = Cervantesia tomentosa.
trachydadum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 833.—Madag.
trinerve, *Hort. Madr. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 845.—Ind. or.
"ndulatum, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 186 =ellipticum.
vaccinioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 33S.-Madag.
velutinum, *Harv. Thes. Cap.* ii. 55.—Afr. austr.
•*"errucosum,* Kunth, Ind. Sem. Hort Berol. (1846) 12; et in Linnaea, xix. (1847) 398 = croceum.
v'ride, *Burh.-Ham. ex Wall. Cat.* n. 4326.—Ind. or.
xylocarpum, *DC. Prod.* ii. 11.—Ins. S. Thomas.
Zeyheri, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) •• 452.—Afr. austr.

KLAEODFNDRUM, Mnrr. Syst. ed. XIV. 241 (1784) = Elaeodendron, Jacq. (Celasti.).

ELAEOGENE, Miq. FI. Ind. Bat. Suppl. 460 (1860) ' *GENUS DUBIUM;* Benth. & Hook. f. iii. 256.
sumatrana, *Miq. I. c*—Sumatra.

ELAEOSEIiINXTM. Koch, ex DC. Prod. iv. 215 (1830). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 980.
MARGOTIA, Boiss. Elench. 52 (1838).
Asclepium, *Bertol. Fl. Hal.* iii. 883.—Europ. anstr.
Asclepium, Willk. in Pardo, Ser. Inconf. Arag. 42 - Loscosii.
r*involucratum,* Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx.(187S) 249 ; xxii. (1875) 60.—Marocco.
'oetidum, *Boiss. Elench.* 91.—Enrop. austr.; Afr. bor.
fontanesii, Boiss. Voy. Bot. Espagne.ii. 268=foetidum.
numile, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 479.—Marocco.
Ugascae, *Boiss. Elench.* 50.—Hispan.
laxum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 151.—Alger.
i-oscosii, *Lange, in Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* «i. 26.-Hispan.
meoides, *Koch, ex DC. Prod.* iv. 215.—Reg. Medit. occ.
""llefolium, *Boiss. Elench.* 60.—Hispan.
*"iuifolium, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. Hi. 26 = Lagascae.
thapsoides, *DC. Prod.* iv. 215.—Mexic.

ELAEOSTICTA, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 458 = Conopodium, Koch (Umbellif.).
Klaucescens, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 51.—Persia.
wi/olia, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 458.—Syria; Mesopot.
nodosa, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 51.—Persia.

ELAIS, Linn. Mant. i. 21 (1767) - Elaeis, Jacq. (Palm.).

ELAPHRIUM, Jacq. Enum. PI. Carib. 8 (1760) ; Stirp. Am. i. 106. t. 71 (1763) =Bursera, Jacq. (1763).
Moexylon, Schied. exSchlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 252 = B. Aloëxylon.

ELAPHRIUM :—
ariense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 81 = *capense.*
bicolor, Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 625 = 13. bicolor.
bipinnatum, Schlecht. 1. c. 631-B. bipinnaU.
capense, DC. Prod. i. 724.—Afr. auslr.
copalliferum, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. i. 724 = B. excelsa.
crenatum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 179, sphalm. = B. cnneata.
cuneatum, Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 629=B. cuneata.
excelsum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 30 = B. excelsa.
fagaroides, H. B. & K. 1. c 29 = B. fagaroides.
glabrifolium, H. B. & K. 1. c. 28 = B. penicillata.
glabrum, Jacq. Enum. PI. Carib. 19 - B. glabra.
grandi/olium, Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 249 = B. grandifolia.
graveolens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 81 = B. graveolens.
Hindsianum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 11 = B. Hindsiana.
inaequale, DC. Prod. i. 724-Clausena inaequalis.
integerrimum, Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IIL vi. (1846) 369 = B. gummifera.
Jacquinianum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 23 = B. tomentosa.
jorullense, H. B. & K. 1. c. 28=B. jorullensis.
lancifolium, Schlecht. in linnaea, xvii. (1843) 247 = B. lancifolia.
lanuginosum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 31-B. lanuginosa.
ovali/olium, Schlecht. in Linnaea, xvii. (1848) 248 = B. ovalifolia.
penicillatum, Moç. & Sesse, in DC. Prod. i. 724 = B. penicillata.
pubescens, Schlecht. in Linnaea, xvi. (1842) 627.—Mexic.
rhoifolium, Benth. Bot. Voy. Snlph. 10 ^ B. Hindsiana.
simplicifolium, Schlecht. in Linnaea, xvi. (1842) 532 = B. Schlechterfdalii.
submoniliforme, March, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 65 = B. submoniliformis.
Tacamaco, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. vi. (1846) 368 = B. graveolens.
totnentosum, Jacq. Enun.. PI. Carib. 19 - B. tomentosa.
torulosum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 180.—Mexic.

ELASMATIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 121 (1867) = Goodyera, R. Br. (Orchid.).
repens, Dulac, 1. c. = G. repens.

ELATE, Linn. Mus. Cliff. 12 (1736) = Phoenix, Linn. (Palm.).
humilis, Hort. Angl. ex Pasq. Cat CM. Bot. Nap. 41, nomen = seq. ?
sylvestris, Linn. Sp. PI. 1189 = P. sylvestris.
versicolor, Salisb. Prod. 264 (=praec. ?)—Ins. Borb.

ELATERIOPSIS, Ernst, in Flora, lvi. (1873) 257- Cyclanthera, Schrad. (Cucurb.).
caracasana, Ernst, 1. c. = C. caracasana.
macropoda, Cogn. Diagn. Cucurb. fasc. ii. 84=C. macropoda.

ELATEBIOSPEBMUM, Blume, Bijdr. 620 (1825). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 288.
Tapos, *Blume, 1. c.* 621.—Java.'
Tokbrai, *Blume, I. c*—Malaya.

ELATERISPERMUM, Reichb. Norn. 194 (1841)- praec

ELATEBIUM, Jacq. Stirp. Am. 241 (1763). *CUCURBITACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f.i. 885.
MOMORDICA, Neck. Elem. i. 240 (1790).
RVTIDOSTYLIS, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 424. t. 97 (1841).
amazonicum, *Mart. exCogn.in Mini. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii (1878); *{Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 65).—Bras.
biflorum,\. Dietr. Syn. PI. v. 872 - Cyclanthera ribiflora.
Bigelovii, S. WaU. in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 252 = Echinocystis Bigelovii ?

ELATEBIUM :—
brachystachium, DC. Prod. iii. 310 = Cyclanthera brachystachya.
carthagenense, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 31; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1375.—Am. austr.
ciliatum, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii (1878); *(Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 54).—Guatemala,
cordatum, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 224.—Ins. Galap.
cordifolium, Moench, Meth. 503 = Ecballium Elaterium.
Coulteri, A. Gray, PI. Wright, ii. 61= Echinocystis Coulteri.
filiforme, *Cogn. in Mem. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii (1878); *{Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 63).—Mexic.
gemellum, Moç. *Sc.* Sesse, ex DC. Prod. iii. 310 = Echinocystis gemella.
glabrum, *Cogn. in Bull. Acad. Belg.* Sér. II. xlix. (1880) 199.—N. Granat.
gracile, *Cogn. in Mini. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii (1878) ; *(Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 51).—Mexic.
hastatum, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 120 = Cyclanthera tamnoides.
longiflorum, *Cogn. in Mem. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii (1878); *{Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 54).—Panama,
minimum, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 252 = Echinocystis minimum.
pubescens, Benth. PL Hartw. 15 = Echinocystu pubescens.
quadrifidum, *Mof.* 6" *Sesse, ex DC. Prod.* iii. 310.—Mexic.
quinquefidum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 292 = Luffa operculata.
quinquelobum, *Cogn. in Mim. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii (1U78); *{Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 53'.—Venezuela.
ribiflorum, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 388 = Cyclanthera ribiflora.
tamnoides, Willd. Enum. Hort. Berol. »50^Cyclanihera tamnoides.
torquatum, Mof. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 310 - Echinocystis torquata.
Trianaei, *Cogn. in Mem. Cour. Acad. Belg.* 8vo. xxviii (1878); *{Diagn. Cucurb.* fasc. ii. 57).—N. Uranat.
tri/oliatum.Unn. Mant. i. 123; Spreng. Syst. iii. 47 - Sicyos angulatus.
trilobatum, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 63!). —N. Granat.
Wrightii, A. Gray, PI. Wright, ii. 61 = Echinocystis Wrightii.

ELATINE, Linn. Gen. ed. I. 118 (1737). *ELATINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 162.
BIROLIA, BelL in Mem. Acad. Turin, Ser. I. xviii. (1808) 403. t. 11.
CRYPTA, Nutt in Joum. Acad. Philad. i. (1817) 117. t. 6.
CRYPTINA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192.
ELATINEI.LA, Opiz, Seznam, 39 (1852;.
ELATINOPSIS, Clav. in Act. Linn. Soc Bord. xxxviii. (1884) p. lxx.
HYDROFIPEK, Buxb. ex Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1808) 349.
POTAMOPITYS, Buxb. ex Adans. Fam. ii. 266 (1763).
RIIIZIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 243 (1867).
WILLISELLUS, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 736 (1821).
aistivosa, Wight, Ic. t. 222 -= Bergia aestivosa.
alata, Rostk. *Sc* Schmidt, Fl. Sedin. 179 = Callitriche vema.
Alsinastrnm, *Linn. Sp. PI.* 368.—Europ.; Afr. bor.
ambigua, *Wight, in Hook. Bot. Misc.* ii. (1881) 103.—Ind. or.; Ins. Fiji,
americana, *Arn. in Edinb. Journ. Nat. Geogr. Sc.* i (1830) 431.—Am. bor.; Austral.; N. Zel.
americana, A. Gray, in Hall, PI. Tex. 6 = brachysperma.
americana, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864)58 = triandra.
ammannioides, Wight *Sc* Arn. Prod. 41 = Bergia aromannioides.
brachyspenna, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 361, 868.—Am. bor.
Brochoni, *Clav. in Act. Linn. Soc. Bord.* xxxvii. (18831 p. lxiii.—Gallia.
califomica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 364.—Calif.

ELAT1NE:—
callitrichoides, Rupr. ex Petrow. in Bnll. Soc. Nat. Mow. xlviii. (1874) II. 299-triandra.
camphylosperma, *Sent, in Walp. Rep.* i. 284.—Reg. Mediterr.
chilensis, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 286.—Chili.
Clintoniana, Feck, Rep. N. York. St. 22, 26 =americana.
conjugata, Lam. Fl. Fr. iii. 11 = major.
Fabri, Gren. in Acad. Sc. Besan9. Séances Pnbl. (1838) 124—macropoda.
gratioloides, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. iv. (1840) 26 =americana.
Hardyana, Dum. in Bnll. Soc. Bot. Belg. xi. (1872) 267 - £. Hydropiper.
hexandra, *DC. Fl. Fr.* v. 609; *Ser. Ic. PL Rar.* i. 14. t 43. f. 1.—Europ.
hippuroidea, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125 = £. Alsinastrum.
Hydropiper, *Linn. Sp. PL* 867.—Enrop.
Hydropiper, Schkuhr, Handb. t. 109 a = major.
Lindbergii, *Rohrb. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 821.—Bras.
luxurians, Delile, Fl. Egypte, 216-Bergia verticillata.
macropoda, *Cuss. Fl. Sic. Prod.* i. 475. — Reg. Mediterr.
major, *A. Br. in Syll. Ratisb.* i. (1824) 83.—Europ.
majuseula, Dum. Fl. Belg. Ill-major.
microphylla, *Griseb. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 59.—Peruv.
minima, Fisch. & Mey. in Linnaea, x. (1836) 73 = americana.
nodosa, Am. in Edinb. Joum. Nat. Geogr. Sc. i. (1830) 431 = E. Hydropiper.
orthosperma, Dneb. in Bot. Notiser, i. (1839) 88 - E. Hydropiper.
paludosa, Seub. in Walp. Rep. i. 284 = major, hexandra.
pedicellaris, K. Muell. Fragm. ii. 145-Bergia pedicellaris.
perennis, F. Muell. L c. 146—Bergia perennis.
Sehkuhriana, Hcyne, in Reichb. Fl. Germ. Excurs. 639 " E. Hydropiper.
Serpillifolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 149= E. Hydropiper.
serpyllifolia, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 650 = praec.
siphosperma, Dum. Fl. Belg. 111 = E. Hydropiper.
spathulata, Gorski, in Eichw. Skizze, 173 = E. Hydropiper.
texana, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 678-Bergia texana.
triandra, *Schkuhr, Handb.* i. 346. t. 119. b. f. 2.—Enrop.
tripetala, Sm. Engl. Fl. ii. 248-hexandra.
verticillaris, F. Muell. Fragm. ii. 148 - Bergia pnsilla.
verticillata, Lam. Fl. Fr. iii. 11 = E. Alsinastrum.
verticillata, Wight & Am. Prod. 41 = Bergia verticillata.

ELATINE, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 242 (1742) = Iiinaria, Tourn. (Scrophul.).
cirrhosa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 126 = L. cirrhosa.
Cymbalaria, Moench, Meth. 525 = L. Cymbalaria.
fruticosa, Moench, ex Steud. Norn. ed. II. i. 546 — L. fruticosa.
graeca, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 126=L. graeca.
hastata, Moench, Meth. 624 «=L. Elatine.
lanigera, Moench, ex Steud. Nom. ed. II. i. 546=L. lanigera.
ovata, Moench, Meth. Suppl. 171 = L. spuria.
pilosa, Moench, ex Steud. Nom. ed. II. i. 646 = L. pilosa.
spuria, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 126=L. spuria.
tenuis, Moench, Meth. Suppl. 171-L. cirrhosa.

ELATINELLA, Opiz, Seznam, 39 (1852)= **Elatine**, Linn.
Hydropiper, Opiz, 1. c-Elatine Hydropiper.
Alsinastrum, Opiz, 1. c. = Elatine Alsinastrum.

ELATINOPSIS, Clav. In Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) p. lxx-Xlatine, Linn.
Brochoni, Clav. 1. c.- Elatine Brochoni.

ELATOSEMA, Franch. & Sav. Ennm. PI. Jap. i. 438 (1875)sphalm.=seq.

ELA.TO8WEMA, Forst. Char. Gen. 105. t. 63 (1776).
URT1CACEAB, Benth. & Hook. f. iii. 386.
LANGSVELDIA, Gaudich. in Freyc Voy. Bot 494 (1826).
acuminatnm, *Brongn. Bot. Voy. Cog.* 211.—Ind. or.; Malaya.
affine, Wedd. in Ann. Sc Nat. *Sir.* IV. i. (1864) 188. -sessile.
approximation, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 19U-cuneatum.
Brongniartianum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 190-sessile,
bulbiferum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 104.—Burma,
comutum, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1856-56) 816.—Reg. Himal.
cuneatum, *Wight, Ic.* vi t. 2094. f. 3.—Ind. or.; Malaya.
cuspidatum, Wight, 1. c. 1.1988-sessile.
euspidiferum, Miq. PI. Jungh. 22=sesquifoHum.
cyrtandraefolium, Miq. 1. c. 21 -sessile,
decipiens, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. 176.—Reg. Himal.
delicatulum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Se'r. IV. i. (1854) 190 = obtusum.
densiflorum, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* i. 439. —Japon.
dissectum, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1855-56) 314.—Reg. Himal.
divaricatum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 494, in syn. = Pellionia divaricate.
diversifolium, Wedd. in DC. Prod. xvi. H. 189-surculosum.
ellipticum, *Wedd. 1. c.* 186.—Reg. Himal.
eurhynchum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 244.—Java,
fagifolium, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 498.—Ins. Mascar.
ficoides, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1865-56) 306. —Reg. Himal.
filicoides, *Seem, ex Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 188.—Ins. Fiji.
frutescens, Hassk. Cat. Hort Bog. Alt. 7»-Procris frutescens.
gibbosum, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 104 (= Pileae sp.).—Ind. or.
glaucescens, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1856-66) 326.—Ins. Philipp.
Goudotianum, *Wedd. 1. c.* 319.—Madag.
gracile, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 79.—Java.
grande, Wedd. in DC. Prod. xvi. 1.173 - sessile,
hirsutum, *Miq. FL Ind. Bat.* i. II. 243.—Java.
Hookerianum, W«&2. *in Arch. Mus. Par.* ix. (1855-66) 309.—Reg. Himal.
Humblotii, *Bail!, in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 483—Madag.
incisum, *Wedd. in Arch. Mus.Par.ṁ.* (1855-66) 321. —Madag.
integrifolium, Wedd. in DC. Prod. xvi. 1.179-sesquifolium.
involucratum, *Franch. tf Sav. Enum. PI. Jap.* i. 439. —Japon
japonicum, 'W«M. *in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. i. (1854) 189.—Japon.
Junghuhniannm, *Miq. PI. Jungh.* 18.—Sumatra.
laetum, Wedd. in Ann. Sc. Nat *Sir.* IV. i. (1864) 190 = surcnlosum.
laevigatum, Hassk. Cat. Bog. Alt. 79 = Procris laevigata.
lancifolium, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. i. (1854) 190.—Java,
lepidotulum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 418.—Sumatra.
lineolatum, *Wight, Ic.* 1.1984.—Ind. or.
longifolium, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. i. (1854) 189.—Ins. Philipp.
luddum, Forst. ex Guill. 1. c. Se'r. II. vii. (1837) 184 = Procris Cephalida.
macrophllyum, *Brongn. Bot. Voy. Coq.* 207. t. 45.—Ins. Amboin.
maculatum, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 493.—Java,
madagascariense, *Wedd. in Ann. Se. Nat.* Sér. IV. i. (1864) 189.—Madag.
manitlense, Wedd. 1. c. — rostratum.
Mannii, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 178.—Aft. trop.

ELATO8TEMA:—
Mariannae, C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xx. (1876) 124 = ficoides.
membranaceum, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt 79 = acuminatum.
membranifolium, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 104=acuminatum.
Miquelianum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. i. (1854) 188 = sesquilifoliom.
molle, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1855-66) 298.—Reg. Himal.; Malaya.
montanum, Endl. Prod. Fl. Ins. Norf. 39 = Procris montana.
monticolum, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 216.—Afr. trop.
nemorossm, *Seem. Fl. Vit.* 240.—Ins. Fiji,
nigrescens, *Miq. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 101. —Java.
Novarae, *Kurt, in Journ. As. Sec. Beng.* xlv. (1876) II. 149.—Ins. Nicobar.
obovatum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Se'r. IV. i. (1854) 190.—Ins. Philipp.
obtusum, *Wedd. I. c*—Reg. Himal.
oppositifolium, Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 179-Lecanthus Wightii.
ovatum, Wight, Ic. t. 1985=Lecanthus Wightii.
Paivaeanum, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. 1.178.—Afr. trop.
paludosum, Miq. PI. Jungh. 19=macrophyllum.
papillosum, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1866-56) 327.—Reg. Himal.
parvifolium, Brongn. Bot. Voy. Coq. 210=Urvilleanum.
parvum, *Blume, ex Miq. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 102.—Java.
pedunculatum, Forst. Char. Gen. 106 = Procris Cephalida.
pedunculosum, Miq. PI. Jungh. 21—macrophyllum.
Pellioniana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 494, in syn. = Pellionia elatostemoides.
platyphyllum, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1855-56 > 301.—Reg. Himal.
podophyllum, *Wedd. in Ann. Se. Nat. Sir.* IV. i. (1854) 189.—Ins. Philipp.
polycephalum, Wedd. 1. c. = sessile,
procridioides, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 180.—Reg. Himal.; Burma.
pubescens, Pers. Syn. ii. 557-sessile.
punctatum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Se'r. IV. i. (1854) 189-sessile.
radicans, Wedd. in Arch. Mns. Par. ix. (1856-66) 332 —Procris radicans.
reticulatum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. i. (18641 188.—Austral,
rigidum, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1856-56) 820. —Ins. Philipp.
rostratum, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 79-Pellionia elatostemoides.
rostratum, *Miq. in Zoll Syst. Vert. Ind. Archip.* 102.—Java,
rugosum, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* i. (1838) 215. t 9. f. 5-8.—N. Zel.
rupestre, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1866-66) 304. —Reg. Himal.; Java.
serratum, Forst. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 172 = sessile,
sesquifolium, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 79.—Ind. or.; Malaya.
sessile, *Forst. Char. Gen.* 106.—As. et Afr. trop.
sikkimense, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 124.—Reg. Himal.
sinuatum, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 79.—Java.
spectaUle, Miq. PI. Jungh. 19—macrophyllum.
stipitatum, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. i (1854) 190.—Austral.
Stracheyanum, *Wedd. 1. c.* 188.—Reg. Himal.
strigosum, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 79.—Java,
subincisum, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* ix. (1855-56) 314.-Reg. Himal.
succosum, Miq. PI. Jungh. 28-Procris Cephalida.
snrculosum, *Wight, Ic.* t 2094. f. 4.—Ind. or.
tkibaudiaefolium, Wedd. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. i. (1854) 188-rostratum.
tomentosum, Wedd. 1. c. 189=sessile.
torresiana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 493, in syn. = Procris Cephalida.
trinerve, Hochst. in Flora, zxviii. (184S) 88-Procris Cephalida.
ulmifolium, Miq. PI. Jungh. 21 -sessile.

ELATOSTEMA:—
umbellatum, Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. f. xix= Pellionia nmbellata.
umbrosum, A. Gray, ex Wedd. in DC. Prod. xvi. 1.177 =nemorosum.
Urvilleanum, *Brongn. Bot. Voy. Coq.* 210. t. 46. £ A.—Ins. Molncc.
Webbianum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. *Six.* IV. i. (1854) 190-amentum.
Wightianum, Wedd. 1. c. 188 =Procris laevigata.
Zollingerianum, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Arehip. 101,105-rupestre.
Zollingerianum, Wedd. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. i. (1854) 188 = sesquifolium.

ELATOSTEMMA, Endl. Prod. Fl. Ins. Norf. 39 (1833) =praec.

ELATOSTOMA, Wight, Ic. vi. 35. t. 2091 (1853) = praec.

ELATTOSTACHTS, Radlk. in Sitzb. Math-Phys. Acad.Muench.ix. (1879) 502, 600. *SAPINDACEAE.*
•petala, *Radlk. I. c.* 602.—N. Caled.
Bidwilli, Kadlk. 1. c. 601-Cupania Bidwilli.
dnplicato-serrata, *Radlk. 1.* c—Sumatra t; Celebes 1
falcata, Kadlk. L c. 602 = Cupania falcata.
Jncisa, *Radlk. I. c.* 601.—N. Caled.
nervosa, Radlk. I. c 600•Cupania nervosa.
verrucosa, Radlk. 1. c. 601—Cupania verrncosa.
vitiensis, *Radlk. I. c.* 602.—Ins. Fiji.
**ylocarpa*, Radlk. 1. c. 600 = Cupania xylocarpa.
Zippeliana, *Radlk. I. c.* 601.—N. Guinea.

ELAYUNA, Rafin. Sylya Tellur. 145 (1888) - Bau-Wnia, Linn. (Legumin.).
tiloba, Rafin. 1. c. = B. reticulate.

ELBUNIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 88 (18S6)=Leucas, R. Br. (Labiat.).
"Ha, Rafin. I.e. 89.—Hab.?

ELCAJA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 127 (1775)-TrichiUa, R. Br. (Meliac).
emetica, Forsk. 1. c - T. emetica.

ELCANA, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 584 (1845) = Cerbera, Linn. (Apocyn.).
se>ninuda, Blanco, 1. c. = C. Odollam.

ELEAGNUS, Hill, Hort. Kew. 440 (1769) - Elaeagnus, Toam.

ELECTRA, DC. Prod. v. 630 (1836) = Coreopsis Linn. (Compos.).
Galeotti, A. Gray, PI. Wright, i. 110 = C. Galeottii.
"lexicana, DC. Prod. v. 630 = C. mexicana.

ELECTRA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) •A I. Art. iv. 2-Sapindua, Linn.

ELECTRA, Panz. in Denkschr. Acad. Mnench. (1818) ,299-Scbismus, Beanv. (Gramin.).
orevifolia, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 516=S. brevifolius.
*c<*lycina*, Pritz. Ind. Ic. 394 = S. brevifolius.
-itida, Panz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 516 = S. •narginatus.
°»«««s, Nees, ex Steud. 1. c - S. ovalis.
seekrrima, Nees, ex Steud. 1. c. = S. scaberrimus.

ELECTROSPERMA, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. >• (1855) 23-Eriocaulon, Linn.
"stralasicum, F. Muell. 1. c.=Erioc. australasicum.

ELEGIA, Linn. Mant. ii. 162 (1767). *RESTIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1032.
CHONDROPETALUM, Rottb. Prog. 12 (1772); Desc. et Ic. PI. 10. t. 3 (1773).
LAMPROCAULOS, Mast, in DC. Monog. Phan. i. 849 t- 8 (1878).
acuminate, *Mast, in Journ. Linn.Soc.* xxi. (1885) 580.—Afr. austr.
asperiflora, *Kunth, Enum. PI.* iii. 474.—Afr. anstr.
aullaris, *Labill. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 294.—Austral.
iracteolata, Reicbb. ex Kunth, Enum. PI. iii. 466-Restio erectus.

ELEGIA:—
coleura, *Nees. ex Must, in A. DC. Monog. Phan.* i. 358.—Afr. austr.
cuspidate, *Mart, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 240.—Afr. austr.
deuste, *Kunth, Enum. PI.* iii. 460.—Afr. austr.
Dregeana, Kunth, 1. c. 469 = asperiflora.
equisetacea, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1886) 583.—Afv austr.
filacea, *Mast. 1. c.* 589.—Afr. austr.
fistulosa, *Kunth, Enum. PI.* iii. 467.—Afr. austr.
glauca, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1886) 679.—Afr. austr.
grandis, Kunth, Enum. PI. iii. 475 = Lampracaulos grandis.
juncea, *Linn. Mant.* ii. 297.—Afr. austr.
juncea, Zeyh. ex Kunth, Enum. PL iii. 466 = parviflora.
Kraussi, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 34° = propinqua.
membranacea, Kunth, Enum. PI. iii. 474-juncea.
mucronata, Reichb. ex Kunth, 1. o. 475 = Dovea mucronata.
Neesii, Mast, in Joura. Linn. Soc. x. (1869) 246 = Lamprocaulos Neesii.
nuda, *Endl. Gen.* 122.—Afr. austr.
panicoides, Kunth, Enum. PI. iii. 470 = Dovea mucronata.
paniculata, Pers. Syn. II. 607 -= Cannamois virgata.
parviflora, *Kunth, Enum. PI.* iii. 467.—Afr. austr.
propinqua, *Kunth, I. c.* 473.—Afr. austr.
raeemosa, Pers. Syn. ii. 607 = Dovea tectorum.
racemosa, Reichb. ex Kunth, Enum. PI. iii. 461=-deusla.
rigida, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xxi. ;1886) 587.—Afr. austr.
spathacea, *Mast. I. c.* 588.—Afr. austr.
squamosa, *Mast. I. c.* x. (1869) 244.—Afr. austr.
stipularis, *Mast. 1. c.* xxi. (1885) 587.—Afr. austr.
thyrsi/era, Pers. Syn. ii. 607 - propinquR.
vagioulata, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 586.—Afr. austr.
Verreauxii, *Mast.t. c.* 689.—Afr. austr.
verticillaris, *Kunth, Enum. PI.* iii. 471.—Afr. austr.

ELEIASTIS, Rafin. Sylva Tellur. 165 (1838) - Tetraoera, Linn. (Dillen.).
levis, Rafin. 1. c. = T. laevis.

ELEIOSINA, Rafin. Sylva Tellur. 160 (1888) = Spiraea, Linn. (Rosac).
altaica, Rafin. 1. c. 151 = S. laevigata.
bracteata, Rafin. 1. <x=S. laevigata.
cuneifolia, Rafin. 1. c.-S. laevigata.
levigata, Rafin, 1. c.=S. laevigata.
obovata, Rafin. 1. c.=S. salicifolia.
triloba, Rafin. 1. c - S. trilobate.
virgata, Rafin. 1. c.-S. virgata.

EUBIOTTS.DC. *Mim.* Leg. vii. 348 (1825). *LEGUMINOSAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 523.
monophylla, DC. 1. c. 350-E. Sororia.
Rottleri, Wight & Am. Prod. 231 - Desmodium Rottleri.
Sororia, *DC. Mim. Ltg.* vii. 350.—Ind. or.

ELELIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 92 (1836) = Salvia, Tourn. (Labiat.).
austriaca, Rafin. 1. c. 93=S. austriaca.

ELEMANTHUS, rSchlecht. in] Bot. Zeit. v. (1847) 150 -EILEMANTHUS, Hochst. = Indlgofera, Linn. (Legumin.).

ELEMI, Adans. Faro. ii. 342 (176S)«Amyrls, Linn. (Rutac).

ELEMIFERA, linn. Hort.Cliff. 486 (1787)-praec.

ELEOCARIS, Sanguin. in Atti Ace. Pont. Lincei, Ser. I. v. (1852)498, 516=seq.

ELEOCHABIS, R. Br. Prod. 224 (1810). *CYPERACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1047.
BULBOSTYLIS, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. v. (1818) 365.
CHAETOCYFERUS, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 289.

ELEOCHABIS:—
CLAVULA, Dum. Fl. Belg. 143 (1827), pro pane.
ELEOGENUS, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 294.
LIMNOCHARIS, Kunth, Enum. PI. ii. 158 (1837).
LIMNOCHLOA, Bcauv. ex Lestib. Essai Cyp. 41 (1819).
SEVIPIDIUM, Nees, in Linnaea, ix. (1834, 293.
acicularis, Boj. Hort. Maurit. 384 = E. Chaetaria.
acicularis, *R. Br. Prod.* 224—Reg. bor.; Am. austr.
acuminate, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834) 294.—Am. bor.
acute, *R. Br. Prod.* 224.—Austral.
acutangula, Schult.Mant. is 91-fistulosa.
acutisquamata, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 186'2 (1868) 10-palustris.
affinis, C. A. Mey. ex Claus, in Beitr. Pfl. Russ. Reich. viii.261 = palustris.
afflata, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 76.—China; Java,
albibracteata, *Nees & Meyen, in Linnaea*, ix.(1834) 294, nomen ; *Meyen, Reise, i.* 484, nomen.—Peruv.
albida, *Torr. in Ann. Lye. N. York*, iii. (1836) 804.—Am. bor.; Ind. occ.
albivaginata, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 436 = ochreata.
ambigua, T. Kirk *Sc* Buchanan, in Trans. N. Z. Inst. vi. (1878) 225=acuta.
amphibia, *Dur. in Act. Soc. Linn. Bord.* xxi. (1858) 487. t. 2.—Gallia.
anceps, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II.' ii. (1884` 148.—Afr. trop.
appendieulata, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 85-= palustris.
arcuata, Kunze, ex Knnth, Enum. PI. ii. 147 - maculosa.
arenaria, *Benth. in Hook. Kew Journ.* ii. (1860) 244, in textu.—Bras.
arenicoia, Torr. ex Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 237-montana.
argyrolepis, Kier. in Mem. Sav. Etr. Petersb. vii. (1851) 618 = palustris.
artieulata, Knnth, Enum. PI. ii. 157-interstincta.
atacamensis, *Phil. Fl. Attic.* 53.—Chili,
atricha, *Benth. Fl. Austral*, vii. 295 (sp. diverse).—Austral.
atricha, *R. Br. Prod.* 225.—Austral,
atropurpurea, *Kunth, Enum. PI.* ii. 161.—Reg. temp. et trop.
atropurpurea, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 196-capitata.
Baeothryon, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 284-Scirpus pauciflorus.
Baeothryon, *Schult. Mant.* ii. 92.—Am. bor.
Balansaiana, *Boeck. in Flora*, lxii. (1879) 159.—Am. trop.
Baldwinii, *Chapm. Fl. S. U. St.* 519.—Am. bor.
Baroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1888) 297 •--Hmosi;
Bartoliana, De Not. Ind. Sem. Hort. Genuens. (1848) 24; et in Ann. Sc. Nat. *S6i.* III. xi. (1849) 255—carniolica.
Bartoloniana, Steud. Syn. PI. Cyp. 80, sphalm. = praec.
bicolor, *Chapm. Fl. S. U. St.* 617.—Florida.
biocreata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 294—ochreata.
biseptata, Steud. Syn. PI. Cyp. 82«- sphacelata.
bivaginata, *Steud. I. c.* 77.—Paraguay.
Bolanderi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 392.—Calif,
bonariensis, *Nees, in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 398.—Am. austr.
brizantha, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 79.—Guatemala,
caduca, *Schult. Mant.* ii. 88.—Aegypt; Syria; Sardinia.
caespitosa, Link, Hort. Berol. i. 283 = Scirpus caespitosus.
caespitosissima, Baker, in Joum. linn. Soc. xxi. (1885) 460 = subvivipara.
calva, Torr. Fl. N. York, ii. 346, in obs. = palustris.
calyptrata, Steud. Syn. PI. Cyp. 81 = »ulcata.
cancellate, *S Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 170.—Mexic.
capillacea, *Kunth, Enum. PI.* ii. 189.—Bras,
capitate, *R. Br. Prod.* 226.—Reg. trop.
carniolica, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 853.—Europ. austr.
ceUulosa, *Torr. in Ann. Lyc.N. York*, iii. (1886) 298.—Am. bor.
Chaetaria. *Roem. V Schult. Syst.* ii. 164.—Reg. trop.
chhrocarpa, Boeck. in Flora, fxi. (1878) 34-afflata.

ELEOCHABI8 :—
chrysocarpa, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 134.—Bras.
cognata, Steud. Syn. PI. Cyp. 81=interstincta.
compacta, *R. Br. Prod.* 224.—Anstral.
complanata.Aw;*. *in Flora.lxii.* (1879) 562.—Afr. trap.
compressa, Sullivant, in Am. Joum. Sc. Ser. I. xlii. (1842) 50 = acuminata.
confervoides, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 82.—Madag.
congests, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 41.—Nepal.
eonica, J. *Sc* C. Presl, Delia Prag. 143 = palustris.
consanguinea, Kunth, Enum. PI. ii. 148= nodulosa.
constrict a, Scholt. Mant. ii. 87 « geniculata.
coronata, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 77.—Chili.
costata, J. & C. Presl, Fl. Cecil. 11 - acicularis.
costulala, *Nees V Meyen, in Linnaea,* ix. (1834) 294, nomen.—Chili.
rrassa, C. A. Mey. ex Boeck. in Flora, xli. (1858) 413, in obs. — palustris.
rrassicaulis, Steud. Syn. PI. Cyp. 81«=genicnlata.
Cunninghamii, *Boeck. in Flora,* xli. (1858) 412.—N. Zcl.
cylindrica, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Pkilad.* 1862 (1863) 10.—Texas,
cylindrostachys, *Boeck. in Flora,* lviii. (1875) 108.—Austral.
cyperina, Roem. *Sc* Scbult. Syst. ii. 155 =. Mariscus Jacquinii.
debilis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 143.—Bras.
densa, Benth. PI. Hartw. 27=genicnlata.
densesquamata, Stend. Syn. PI. Cyp. 82 = geniculata.
depauperata, Kunth, Enum. PI. ii. 140 - £. Chaetaria.
diandra, *Wright, in Bull. Torrey Bot. Club,* x. (1888) 101.—Am. bor.
Dietrichiana, *Boeck. in Flora,* lviii. (1876) 107.—Austral,
dispar, *E. Hill, in Coult. Bot. COM.* vii. (1882) 3.—Am. bor.
iJombeyana, *Kunth, Enum. PI-* ii. 145.—Perav.; Mexic.
Dregeana, Stead. Syn. PI. Cyp. 78 - palustris.
dubia, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 77=pachycarpa.
elata, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1871) 151.—Bras.
elegans, Roem. *Sc* Schnlt. Syst. ii. 150 = geniculata.
Elliotti, A. Dietr. Sp. PI. ii. 82 - interstincta.
elliptica, Kunth, Enum. PI. ii. 146-tenuis, montana.
elongata, *Chapm. Fl. S. U. St.* 515.—Florida.
emarginata, Klotzsch, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 443.—Bras.
Engelmanni, Steud. Syn. PI. Cyp. 79—ovata.
equisetina, *% V C. Presl, Set. Haenk.* i. 195.—Ins. Luzon.
equisetoides, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1886) 296 = interstincta.
erratica, Steud. Syn. PI. Cyp. 79 =atropurpuvea.
erythrochlamys, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 300-tetraquetra.
erythropoda, Steud. Syn. PI. Cyp. 76=glaucescens.
exigua, *Roem.* 6" *Schult. Syst.* ii. 164.—N. Granat.
filiculmis, Kunth, Ennm. PI. ii. 144 = sulcata.
filiculmis, Schur, Enum. PI. Transs. 690 = palustris.
filiformis, Kunth, Enum. PI. ii. 146-tenuis.
fistulosa, *Schult. Mant.* ii. 89.—Geront. trop.
fistulosa, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 =variegata.
fluitans. Hook. Brit. Fl. ed. I. 24-Scirpus fluitans.
fusco-sanguinea, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 425.—Chili.
geniculata, *R. Br. Prod.* 224.—Am. bor. et austr.
glauca, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1671) 150.—Bras.
glancescens, *Schult. Mant.* ii. 89.—Am. bor.
Glazioviana, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1871) 150.—Bras.
gracilis, R. Br. Prod. 224.—Austral.
graeilis, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 85 = acuta, Cunninghamii.
gracilis, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 294 = maculosa.
gracillima, *Boeck. in Linnaea, Taxri.* (1869-70) 469 - maculosa.
gracillima, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 745 = Cunninghamii.
Graeffeana, Boeck. in Flora, lviii. (1876) 108 = variegata.
grandis, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 134 (= Fimbristylidissp.V—Bras.
haematolepis, Steud. Syn. PI. Cyp. 79=palustris.

ELEOCHARIS:—
Hildebrandtii, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 34.—Afr. trop.
homonyma, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 79.—Guiana.
Hookeri, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 430.—N. Zel.
incurvata, Schnlt. Mant. ii. 92 = Scirpus articulates,
intermedia, *Schult. 1. c.* 91.—Am. bor.
interstincta, *R. Br. Prod.* 224.—Am, trop.
japonica, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 422.—Japon.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.Bat. ii. 142 = afflata.
Jelskiana, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 876.—Guiana.
juncoides, Schnlt. Mant. ii. 90«=Scirpns debilis.
laetevirens, Steud. Syn. PI. Cyp. 79 •= atropmpurea.
Lechleri, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 422.—Chili.
Lehmanni, Kier. in Mém. Sav. Etr. Ffiersb. vii. (1851) 617" palustris.
leptocaulis, Steud. Syn. PI. Cyp. 77=nana.
leptophylla, Schult. Mant. ii. 88<=Scirpus pungent
Ureschii, Shuttl. in Flora, xx. (1837) 241 = atropurpurea.
lencocarpa, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 132.—Bras.
Licbmanniana, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 439.—Mexic.
limosa, Drège, in Linnaea, xx. (1847) 246=palustris.
limosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 496=marginulata.
limosa, *Schult. Mant.* ii. 87.—Afr. austr.; Madag.
liocarpa, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 653.—Chili,
litoralis, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 77.—Chili.
macro, Kunth, Enum. PI. ii. 142=debilis.
macmntha, *Boeck. in Linnaea,* xxxri. (1869-70) 453.—Syria,
macrorhiza, *Boeck. in Flora,* xli. (1858) 413.—Ins. Falkl.
macrostylis, Spreng. Neue Entdeek. iii. ll = Rynchospora pterocarpa.
maculosa, *R. Br. Prod.* 221.—Am. austr.; Austral,
marginulata, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 78.—Abyss.
media, Schult. Mant. ii. 91-fistulosa.
melanocarpa, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 85 = ochreata.
melanocarpa, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 811.—Am. bor.
melanocephala, *E. Desv. in C, Gay, Fl. Chil.* vi. 175.—Chili.
melanosperma, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 78.—Bras,
mendocina, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873; 558.—Chili.
mexicana, Peyr. in Linnaea, xxx. (1859-60) 14- geniculata.
microcarpa, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 312.—Am. bor. et centr.
micro/ormis, BuckL in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 10 = intermedia,
minima, *Kunth, Enum. PI.* ii. 189.—Bras.
minor, [Pieri?] in Ionios, Anthol. ii. (1834) 460 = palustris ?
mitracarpa, Steud. Syn. PI. Cyp. 77= palustris.
minuta, *Boeck. in EngL Bot. fahrb.* v. (1884) 503.—Madag.
monandra, Hochst. in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 134, nomen; Steud. Syn. PI. Cyp. 75 = atropnrpurea.
montana, *Roem. V Schult. Syst.* ii. 153.—N. Granat.
montevidensis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 144.—Reg. Argent.
mucronulata, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 46=acuta.
Muehlenbergiana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 647.—Am. bor.
multicaulis, *Sm. Engl. Fl.* i. 64.—Europ.
multiflora, Chapm. Fl. S. U. St. 617 = atropurpuiea.
mutata, *R. Br. Prod.* 224.—Am. austr.
mutata, Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849) 134 ~ nodulosa.
nana, *Kunth, Enum. PI.* ii. 140.—Bras.; Mexic.
Naumanniana, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 92.—Afr. trop.
nebrodensis, Parl. Fl. Ital. ii. 68 = palustris.
nigrescens, *Kunth, Enum. PI.* ii. 167.—Hab.t

ELEOCHARIS :—
nodulosa, *Schult. Mant.* ii. 87.—Bras.
obsoleta, Steud. Syn. PI. Cyp. 81=interstincta.
obtusa, Schult. Mant. ii. 89-ovata.
obtusangula, *Kunth, Enum. PI.* ii. 157.—Hab.!
obtusetrigona, Steud. Syn. PI. Cyp. 80=mutata.
ochreata, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 294, nomen.—Am. trop.
ochrostachys, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 452 =affiata.
ochrostachys, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 80.—Java,
olivacea, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 300.—Am. bor.
ovata, *R. Br. Prod.* 224.—Reg. temp, et trop.
oxyoneura, Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 609 = amphibia,
pachycarpa, *E. Desv. in C. Cay, Fl. Chil.* vi. 174.—Chili.
pallida, *Shuttl. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 76.—Am. bor.
palustris, *R. Br. Prod.* 224 —Europ.; Am. bor.
palustris, F. Muell. Fragm. viii. 240 = acuta.
pauciflora, Link, Hort. Berol. i. 284=Scirpus pauciflorus.
pauciflora, *S. Wats, in Bot. Calif,* ii. 221.—Am. bor. occ.
pellucida, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 196.—Ins. Luzon.
piauhitnsis, Steud. Syn. PI. Cyp. 77 = sulcata.
pileata, A. Gray, in Mem. Am. Acad.' N. S. vi. (1858-59) 417 = palustris.
planiculmis, Steud. Syn. PI. Cyp. 80 = fistulosa.
planifolia, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 294=Scirpus planifolius.
plantaginea, *R. Br. Prod.* 224.—Ind. or.; Madag.
plantaginea, F. Muell. Fragm. viii. 238 = sphacelata.
polycaula, Wender. in Marb. Schrift. i. (1823) 132 = palustris.
polymorpha, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 294 = ochreata, etc.
prolifera, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1886) S16.—Am. bor.
punctata, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (18G9) 182.—Bras.
punctata, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 75 = sulcata.
purpurascens, Boeck. in linnaca, xxxvi. (1869-70) 455 =congesta.
pusilla, *R. Br. Prod.* 225.—Austral.
pygmaea, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 313 = Scirpus nanus.
quadrangulata, *R. Br. Prod.* 224.—Am. bor.
Kabenii, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1871) 149.—Bras.
radicans, Kunth, Enum. PI. ii. 142=costulata.
reclinata, Kunth, 1. c. 148=intermedia.
recuryata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 294 - E. Chaetaria.
riparia, Nees, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post 27 — capitata.
rivularis, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 270-acicularis.
Robbinsii, *Oakes, in Am. Gard. Maga**. vii. 178; *et A. Gray, Man.* ed. I. 524.—Am. bor.
rostellata, *Torr. Fl. N. York,* ii. 347.—Am. bor.
Rothiana, *Boeck. in Flora,* xliii. (1860) 3.—Bras.
Salzmanniana, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 78.—Bras.
scariosa, Steud. 1. c 80 = mutata.
Schottiana, Steud. Syn. PI. Cyp. 79 = maculosa.
Schweinfurthiana, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 562 = microcarpa.
Sellowiam, *Kunth, Enum. PI.* ii. 149.—Bras.
septata, Miq. in Linnaea, xvii. (1843) 68 = interstincta.
setacea, R. Br. Prod. 224, in obs. = E. Chaetaria.
setacea, R. Br. 1. c. 225 = capitata.
Sieberi, Kunth, Enum. PI. ii. 153=variegata.
simplex, A. Dietr. Sp. PI. ii. 78=tortilis.
simplex, Kunth, Enum. PI. 143=albida.
singularis, Steud. Syn. PI. Cyp. 81-geniculata.
Sororia, Kunth, Enum. PI. ii. 148=limosa.
sphacelata, *R. Br. Prod.* 224.—Austral,
spiralis, *R. Br. 1. c.* 224.—Ind. or.
stolonifera, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 424.—Mexic.
striata, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 78 = marginulata.
striatula, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 173.—Chili.
stylosa, Steud. Syn. PI. Cyp. 76-sulcata.

BLEOCHAEI8:—
snbarticulata, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 455.—Bras.
submersa, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 225.—Guiana,
subnodulosa, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 81.—Guatemala.
subprolifera, Steud. 1. c. 80 = afflata.
subsphacelata, Stend. 1. c. 317=sphacelata.
subtilis, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 426.—Bras.
subulata, *Boeck. in Flora,* xli. (1868) 412.—Ind. or.
subvivipara, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-7A) 424.—Ind. or.
snlcata, *Nees, in Linnaea,* ix. (18S4) 294.—N. Mexic.
suldculmis, Reichb. ex Kunth, Ennra. PI. ii. 150 = ochreata.
tennis, *Schult. Mant.* ii. 89.—Am. bor. ct auslr.
tenuissima, *Boeck. in Linnaea,* xxxvi. (1869-70) 419.—Bras.
tetraquetra, *Nees, in Wight, Contrib.* 118.—Nepal,
texana, *Brit ton, in Bull. Torrey Bot. Club,* xi. (1884) 87.—Texas.
Thomsoni, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 451 = affiata.
Torreyana, Boeck. 1. c. 440 = microcarpa.
tortilis, *Schult. Mant.* ii. 92.—Am. bor.
triangulata, Sicbcr, ex Presl, in Oken, Isii, xxi. (1828) 268-=Scirpus mucronatns.
trichoides, Knnth, Enum. PI. ii. 141 = acieularis.
tricostata, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* iii. (1886) 310.—Am. bor.
triflora, Boeck. in Flora, lxiiL (1880) 487 = E. Chaetaria.
truncata, Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849) 118 = Dombeyana.
tuberculosa, *R. Br. Prod.* 224.—Am. bor.
tuberosa, *Schult. Mant.* ii. 86.—Ind. or.
tumida, Schult. 1. c — plantaginea.
uniglumis, Schult. 1. c. 88 = palustris.
valdiviana, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 77.—Chili.
valida, Boeck. in Flora, lxv. (1882) 350=genicnlata.
variegata, *Presl, in Oken, /sis,* xxi. (1828) 269; *Kunth, Enum. PI.* ii. 158.—Madag.
vivipara. *Link, Hort. Berol. i.* '283.—Am. bor.
Watsoni, Bab. in Ana & Mag. Nat Hist. *Set.* II. x. (1852) 20 = palustris.
Wichurai, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 448 = tetraquetra.
Widgrenii, *Boeck. in Engi. Bot. Jahrb.* v. (1884) 503.—Bras.
Zanardinii, Parl. Fl. Ital. ii. 67 =atropurpurea.

ELOGENUS, Nees, in Linnaea, ix. (1831) 294=Eleocharlß, K. Br. (Cyperac).
atropurpureus, Nees, in Wight, Contrib. 113 = EleocharU atropurporea.
capitatus, Nees, in Wight, 1. c. 112 = Eleochads capitata.
laetevirens, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 103 = Eleocharis atropurpurea.
nodulosus, Nees, 1. c. 104 = Eleocharis nodolosa.
ochreatus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 294 = Eleocharis ochreata.
evatus, Nees, 1. c. = Eleocharis ovata.
Schottianus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 102 = Eleocharis maculosa.
Sellovianus, Nees, 1. c 10S~ Eleocharis Sellowiana.

EI.EOGITON, Link, Hort. Berol. i. (1827) 298 = Scirpus, Linn. (Cyperac.).
atropurpurea, A. Dietr. Sp. PI. ii. 97-Eleocbaris atropurpurea.
caricoides, A. Dietr. 1. c. 99 = Hemichlaena angustifolia.
cernua, A. Dietr. 1. c. 96=S. cemuus.
cunmla, Nees, in Wight, Contrib. 110 = S. flnitans.
digitata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291; x. (1836) 168=S. flaccifolius.
dissoluta, Nees, 1. c. ix. (1834) 291 = S. flacdfolius.
Ouvalii, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 173 - S. lacustris.
elongantha, A. Dietr. Sp. PI. ii. 96-S. pnmilus.
exigua, A. Dietr. 1. c 98 = Eleocharis acicularis.
faseicularis, Nees, in Linnaea, x. (1886) 165-S. Lindigii.
fluitans, Link, Hort Berol. i. 285 = S. fluitans.
M/ormis, A. Dietr. Sp. PI. ii. 96 = Eleocharis tenuis.

ELEOGITON:—
lacustris, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 173---S. lacnstris.
littoralis, Fonrr. I. c. = S. littoralis.
longifolia, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291; x. (1836) 164 = S. flaccifolius.
monostachya, A. Dietr. Sp. PI. ii. 97 - Fimbristylis schoenoides.
parvula. Link, Hort. Berol. i. 285-S. nanns.
planifolia, A. Dietr. Sp. PI. ii. 98 = S. pUnlfolins.
radicans, A.-Dietr. 1. c. 97 = Eleocharis costulata.
Rothii, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 173 = S. pnngens.
rubicunda, Nees, in Linnaea, x. (1886) 164 = S. Lndwigii.
scabra, A. Dietr. Sp. PI. ii. 99 - Fimbristylis acuminata.
scariosa, A. Dietr. 1. c. 98-Ficink scariosa.
spadicea, A. Dietr. 1. c. 99 = S. spadiceus.
striata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 219; x. (1836) 166-S.capillifolius.
Tabernaemontani, Kourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 173 = S. lacustris.
tenuissima, Nees, in Linnaea, x. (1886) 168 = S. ten«issimus.
triqueter, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 173 = S. triqueter.
verrucutosa, A. Dietr. Sp. PI. ii. 98-=S. verruculosus.

ELEPHANTINA, Bertol. Fl. Ital. vL 279 (1844) = Bhynohocorys, Griseb. (Scrophul.).
probosddea, Bertol. 1. c. 280 = R. Elephas.

ELEPHANTODON, SaMsb. Gen. PI. Fragm. 12 (1866) = DtoBOorea, Linn.
eburnea, Salisb. L c.=D. ebumea.

ELEPHANTOPSIS, A. Dietr. Syn. PI. iv. 1872 (1817) = ELEPHANTOSIS, Less.-seq.

ELEPHANTOPU8, Linn. Gen. ed. t. 249 (1737).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 287.
DISTREPTUS, Cass. in Boll. Soc. Philom. (1817) 66; et in Diet. So. Nat. xiii. 366 (1819).
ELEPHANTOSIS, Less, in Linnaea, iv. (18291 822.
MATAMOKIA, La Llare & Lex. Nov. Veg. Dae. i. 8 (1824).
PSEUDELEPHANTOSUS, Rohr, in Skrift. Nat. Selsk. Kiobenh. ii. (1792) 214.
SFIROCHAETA, Tnrcz. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1.166.
angustifolius, *Sv. Prod. Veg. Ind. Occ.* 115.—Am. trop.
biflorns, *Sch. Bip. in Linnaea,* xx. (1847) 619; *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 1372.—Bras.
carolinensis, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 256, 313 = scaber.
carolinianns, *Willd. Sp. PI.* iii. 2890.—Am. bor.
cernuus, Veil. Fl. Flum. viii. t. 148-scaber.
cervinus, Veil, ex DC. Prod. v. 86, sphalm. =praec.
crispus, D. Dietr. Syn. PI. iv. 18Z2-spicatns.
cuneifolius, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxx. (1883) 186.—Reg. Argent
dubius, Blanco, Fl. FUip. ed. II. 442* spicatus.
tlatus, Bertol. Misc. Bot. xi. 21 = tomentosus.
elongatus, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 426.—Bras.
fiexuosus, Rafin. Fl. Lndov. 73•carolinianns.
hirtiflorns, *DC. Prod.* v. 86.—Bras.
liatroides, Steud. Nom. ed. II. i. 549 - angustifolius.
Martii, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Jonm. (Jan.-March 1830)378=scaber.
micropappus, *Less, in Linnaea,* vL (1881) 689.—Bras.
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 26 = scaber.
nudatus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 47 =• nudicanlis t
nudieaulis. Ell. Sketch, ii. 481=tomentosug.
nudicaulis, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 543.—Am. bor.
nudiflorus, Willd. Sp. PI. iii. 2390; Spreng. Syst iv. 454= angustifolius.
palustris, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 237.-Bras.
paniculatus, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 173 = hirtiflorns.
pratensis, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 75.—Cuba.
quadriflora, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1372=angnstifolius.
racemosus, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 427.—Bras.
Riedelii, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 175.—Bras.

ELEPHANTOPUS:—
riparius, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 425.
scaber, *Linn. Sp. PI.* 814.—Cosmop. trop.
sencgalensis, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop.* iii. 299.—Afr. trop.
sericens, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan.-March 1831) 373.—Ind. occ
serratus, Blanco, FL Filip. ed. I. 685 = mollis.
sinuatus, *Zoll. V Afor. Syst. Vert. Zoll.* 69.—Java.
sordidus, Salisb. Prod. 2*12 = scaber.
spicatus, *Audi. PI. Gui.* ii. 808.—Guian.
strigosus, Willd. ex DC. Prod. v. 87 = spicatus.
tomentosus, *Linn. Sp. PI.* 814.—Am. bor.
vaginatus, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 426.—Bras,
viotaceus, *Sch. Bip. in Linnaea,* xx. (1847) 517.—Am. bor.
virgatus, *Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 52.—(Juian.

EIiEPHAHTOBBHIZA, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 344. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 590.
Burchellii, *Benth. I. c*— Afr. austr.
Burkii, *Benth. I.e.* v. (1846) 81.—Afr. austr.
Petersiana, *Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* ▷.—Afr. trop.

ELEPHANTOSIS, Less, in Unnaea, iv. (1829) 322-Elephantopus, Linn. (Compos.).
angustifolia, DC. Prod. v. 87= Elephantopus angustifolius.
biflora. Less, in Linnaea, iv. (1829) 322-Elephantopus biflorus.
liatroides, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 27 - Elephantopns angustifolius.
quadrifolia, Less, in Linnaea, iv. (1829) 323 = Elephantopus angustifolius.

ELEPHANTUSIA, Willd. Sp. PI. iv. 1156=Phytelephaa, Ruiz & Pav. (Palm.).
macrocarpa, Willd. 1. c. = P. macrocarpa.
microcarpa, Willd. L c. 1157 = P. microcarpa.

ELEPHAS, Toura. ex Adans. Fam. ii. 211 (1763); Guss. El. Sic. Prod. Ii. 155 (1828) = Bhynohooorya, Griseb. (Scrophul.).
Columnar, Guss. 1. c. = R. Elephas.
incurva, G. Don, Gen Syst. iv.610=R. orientalis.
orientalis, Guss. Fl. Sic. Prod, ii, 156, in obs.= R. orientalis.
recta, G. Don, Gen. Syst. iv. 619-R. Elephas.

ELETTARIA, Maton, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 250. *SC1TAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 646.
CARDAMOMUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 282.
alba, *Blume, Enum. PL Jav.* 68.—Java,
anthodioides, *Teijsm.* b* *Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1866) 392.— Java,
atropurpurea, *Teijsm. I? Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 236.—Sumatra.
cannaecarpa, Wight. Ic. t 2007 = Amomnm aculeatum.
Cardamomnm, *Maton, in Trans. Linn. Soc.* x. (1811) 264.—Ind. or.
coccinea, Blume, Enum. PI. Jav. 52=Amomnm coccineum.
costata, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 568-Amomum costatum.
Diepenhorstii, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 236.—Sumatra.
floribunda, Thw. Enum. PI. Zeyl. 319 - Amomum floribundum.
foetens, Blume, Enum. PI. Jav. 52 = Amomnm foctens.
glaberrima, Zoll. & Mor. Syst.Verz. Zoll. 84 = Amomum glaberrimnm.
%emisphaerica, Blume, Enum. PI. Jav. 51 = Alpinia hemisphaerica.
involucrata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 319= Amomum involucratum.
linguiformis, *Schult. Mant.* i. 25.—Ind. or.
macrocephala, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 60S.—Java.
major, Sip. in Rees, Cyclop. xxxlx = E. Cardamomum.
media. Link, ex Horan. Prod. Scitam. 81-costata.
minor, *Blume, Enum. PI. Jav.* 53.—Java,
minuta, *Blume, 1. c.* 62.—Java.
mollis, Blume, 1. c.-Alpinia mollis.
mnsacea, *Horan. Prod. Scitam.* 81.—Ins. Amboina.

ELETTARIA:-
nemoralis, Thw. Enum. Fl. Zeyl. 319 - Amomum nemorale.
pallida, Blnme, Ennm. PI. Jav. 52.—Java,
paludosa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 602.—Java.
Pininga, Miq. 1. c—Alpinia Pininga.
punicea, Schult. Mant. i. 21.—Sumatra.
rosea, Teijsm. & Binn. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 611=Amomum roseum.
rubra, Miq. FL Ind. Bat. iii. 602- Alpinia rubra.
rufescens, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 130 - Amomum rufescens.
Scottiana. *F. MuelL Fragm.* viii. 21.—Austral,
solaris, *Blume, Enum. PI. Jav.* 52.—Java.'
speciosa, *Blume, I. c.* 51.—Java.
tomentosa, Miq. Fl. Ind. Bat. UL 603'Alpinia tomentosa.
villosa, Miq. 1. c—Amomum villosum.
Walang, Miq. 1. c. = Alpinia Walang.

ELEU8INE, Gaertn. Fruct. i. 7. t. 1 (1788). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1172.
ACRACHNE, Wight *St.* Am. in LindL Intiod. Nat. Syst. ed. II. 881 (1836).
DACTYLOCTENIUM, Willd. Enum. Hort. Berol. 1029 (1809).
aegyptiaca, *Desf. Fl. Atlant.* i. 86.—Cosmop. trop. et snbtrop.
arabica, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 211 = flagellifera.
xristaXa, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 657, in syn.—Belnchist.
barbata, *Desv. Opusc.* 101.—Bras,
barcinonensis, *Costa, Ind. Sem. Hort. Barcin.* (1869) ; *et Willt. in Linnaea,* xxx. (1860) 125.—Hispan.
brevifolia, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 211- Eragrostis coelachyrum.
caespitosa, *A. Rich. tent. Fl. Abyss,* ii. 112.—Abyss.
ralycina, Roxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 816*° Leptochloa calycina.
cerealis, *Ehrenb. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 671.—Aegypt.
cerealis, Salisb. Prod. 19 = coracana.
chinensis, F. Muell. Census, 181 = Leptochloa chinensis.
riliata, Rafin. in Desv. Journ. Bot. iv. (1811) 273 = aegyptiaca.
coracana, *Gaertn. Fruct.* i. 8. t. 1.—Am. anstr.; Ind. or.; Aegypt.
cruciata, Lam. Illustr. i. 203—aegyptiaca.
Dagussa, Schimp. in Regel, Gartenfl. (1872) 205- E. Tocussa.
Digitaria, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. 619=Leptochloa Digitaria.
digitata, Spreng. Syst iv. Cur. Post 36 = Leptochloa subdigitata.
distachya, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 519 = indica.
distans, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 61.—Hab. ?
distans, Moench, Meth. 210 -indica.
domingensis, Pers. Syn. i. 87—Leptochloa domingensis.
domingensis, Sieber, ex Schult. Mant. ii. 828 = indica.
dura, Lam. Illustr. i. 208-Poa dura.
elongata.WMd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 519-Leptochloa filiformis.
erythrosperma, Jan, ex Steud. 1. c. = oligostachya.
falcata, Eckl. ex Steud. 1. c. = Michrochloa caffra.
falcata, Spreng. Syst. i. 319 - Harpechloa capensis.
filiformis, Pels. Syn. i. 87 = Leptochloa filiformis.
flagellifera, *Nees, in Linnaea,* xvi. (1812) 220.—As. occ. et Afr. trop.
floccifolia, *Spreng. Syst.* i. 350.—Arabia,
geminata, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.* (1861) 28.—Hispan.
glabra, *Schum. in Schum. tf Thonn. Beskr. Guin. PI.* 58.—Afr. trop.
glaucophylla, *Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix.'(1881) 107.—Afr. trop.
gonantha, *Schrank, in Syll. Ratisb.* i. (1821) 191.—Bras.
Gouini, Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 565-indica.
gracilis, Salisb. Prod. 19-indica.
gracilis, *Spreng. Syst.* i. 350 = Leptochloa gracilis.
inaequalis, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 565-indica.
indica, *Gaertn. Fruct.* i. 8.—Cosmop. trop. et lubtrop.

ELETTSINE:—
indica, Steud. Syn. PI. Gram. 211 = japonica.
japonica, *Steud. 1. c.*—Japon.
juncea, *Boj. Hort. Maurit.* 370.—Madag.
leucosperma, Bernh. ex Steud. Nom. ed. II. i. 519—oligostachya.
Lima, Lam. Illustr. i. 203 - Cynosurus Lima.
macrosperma, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 150 = Cynosurus indicus.
macrostachya, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 107.—Madag.
marginata, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. 319 = indica.
monostachya, Spreng. Syst. i. 319 = Leptochloa monostachya.
mucronata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 65-Leptochloa mucronata.
mucronata, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 160 -aegyptiaca.
muMflora. *Hochst. in Flora,* xxiv. (1811) I. *Intel!.* 20 nomen; *et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 112.—Abyss.
oligostachya, *Link, Hort. Berol.* i. 60.—Bras,
ovalis, *Ehrenb. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 571.—Aegypt.
pectinata, Moench, Meth. Snppl. 68=aegyptiaca.
penieillata, Spreng. Syst. i. 350-Chloris penicillata.
polydactyla, *Steud. Syn. PI. Gram.* 211.—Afr. trop.
polystachya, F. Muell. Fragm. i. 216-Leptochloa subdigitata.
procera, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 619=Uniola racemiflora.
prostrata, Spreng. Syst. i. 850-aegyptiaca.
racemosa, Heyne, in Roth, Nov. Sp. PI. 80 - verticillata.
radulans, R. Br. Prod. 186-aegyptiaca.
rigida, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 36.—Hab.?
rigidifolia, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 565 = indica.
scabra, Foum. ex Hemsl. 1. c = indica.
sparsa, Muhl. Desc. Gram. Uber. 136-Leptochloa filiformis.
sphaerosperma, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 119 - coracana.
stolonifera, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 63-Abyssin.
stricta, *Roxb. Hort. Beng.* 8; *Fl. Ind.* i. 813.—Ind. or.
stricta, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 519 - Leptochloa chinensis.
tenerrima, Homem. Hort. Hafu. i. 79 = Leptochloa chinensis.
Tocussa, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 111.—Abyssin.
tristachia, *Schrank, in Syll. Ratisb.* i. (1821) 191.—Hab.?
tristachya, *Kunth, Rev. Gram.* i. 92.—Reg. Argent.
tristachya. Lam. Illustr. i. 203-indica.
unioloides, Willd. ex Steud, Nom. ed. II. i. 519 = Leptochloa virgata.
verticillata, Roxb. Hort. Beng. 8 ; Fl. Ind, i. 816.—Geront. trop.
virgata, Pers. Syn. i. 87 = Leplochloa virgata.

ELEUTHEBANTHERA, Poit. ex Bosc, in Nouv. Diet. Hist. Nat. ed. I. vii. 198 (1803). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 371.
CHALARIUM, Poit. ex DC. Prod. v. 516, in syn. (1836).
FINGALIA, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1821) 87.
KEGELIA, Sch. Bip. in Linnaea, xxi. (1818) 216.
OGIERA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1818) 32 ; et in Diet. Sc. Nat. xxxv. 115 (1825).
ovata, *Poit. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 619.—Am. trop.
prostrata, Sch. Bip. in Bot Zeit. xxiv. (1866) 239 = ovata.
ruderalis, Sch. Bip. 1. c-ovata.

ELEUTHEHUTE, Herb, in Bot Reg. (1813) t. 67. *IRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 695.
GALATEA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 310, nomen prius.
anomala, *Herb, in Bot. Reg.* (1813) t. 57—Am. trop.
plicata, *Herb. I, c.* sub t. 57.—Ind. occ.

ELEUTHEROCARPUM, Schlecht. in Lechl. Berb. Am. Austr. 69 (1857) = Osteomeles, Lindl. (Rosac).
escalloniaefolium, Schlecht. 1. c—Am. austr.

ELETTTHEBOCOCCirS, Maxim. Prim. Fl. Amur. 132 (1869). *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 911.
senticosus, *Maxim. I. c*—Manchur.

ELEUTHEROPETALUM, H. Wendl. ex Oerst. in Vidensk. Meddel. 1858 (1859) 6 = Chamaedorea, Willd. (Palm.).
Ernesti-Auptsti, Oerst. 1. c. 7-C. Ernesti-Augusti.
Sartorii, Liebm. ex Oerst. Am&ique Centrale, 13. t. 3. f. 1-8-C. Sartorii.

EIiETJTHEBOSPEBMUM, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1812) 365. *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 872.
cicutarium, Boiss. FL Orient. iL 921=grandifolium.
grandifolium, *C. Koch, in Linnaea,* xvii. (1818) 81.—Armenia.
lazicum, *Boiss.* 6" *Bal. ex Boiss. Fl. Orient.* Ii. 921.—As. Min.

ELEUTHEROSTEMON, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1888) 219-Philippia, Klotzsch (Ericac).
galioides, Klotzsch, 1. c-P. galioides.
multiglandulosum, Klotzsch, 1. c. 220-P. viscosa.

ELEUTHRANTHERON, Steud. Nom. ed. II. i. 519 (1810)=Elantheranthera, Poit. (Compos.).

EIiEUTHRAlTTHES, F. Muell. Fragm. iv. 92 (1861). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 112.
opercularina, *F. Muell. I. c*—Austral.

ELIAEA, Cambess. in Ann. Sc. Nat. Se>. I. xx. (1830) 100. t. 18. *HYPERICINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 166.
CUSSONIA, Endl. Gen. 1035, in syn. (1810).
LANIGKROSTEMMA, Chapelier, ex Endl. 1. c. (1810).
articulata, *Cambess. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. xx. (1830) 101.—Madag.

ELICHRYSUM, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 250 (1737[1]; = Heliehrynum, Vaill. (Compos.).

ELICTOTRICHON, Bess, ex Andrz. Rys Botan. i. (1823) 9-Avena, Linn. (Gramin.).
sempervirens, Bess. 1. c-=A. Besseri.

ELIDE, Medic. Phil. Bot. ii. 71 (1791)= Asparagus, Tourn. (Liliac.).

ELIDURANDIA, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (18«2) 450=Pugosia, Juss. fMalvac.).
texana, Buckl. L c. - F. Drummondii.

ELIEA, G. Don, Gen. Syst. i. 613=Eliaea, Cambess. (Hypericin.).

ELIGIA, Dum. Anal. Fam. 62 (1829) =Elegia, Linn. (Restiac).

ELIMUS, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. v. (1798) 11-Elymus, Linn. (Gramin.).

ELIOKARMOS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 21 (1836)-Ornithogalum, Tourn. (Liliac.).
aureum, Rafin. 1. c. — O. arabicum.
caudatum, Rafin. 1. c. = O. caudatum.
coarctatum, Rafin. 1. c—O. coarctatum.
maculatus, Rafin. I.e. iii. 59-0. maculatum.
thyrsoides, Rafin. 1. c. ii. 21=O. thyrsoides.

ELIONHRUS, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 911 (1805) (Elyonuras). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1129.
CALLICHLOEA, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 257 (1810).
argenteus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 96.—Abyss.; Afr. austr.
bilinguis, *Hack, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 308.—Bras.
candidus, *Hack. I. c.* 806.—Am. austr.
dliaris, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 198. t. 63 = tripsacoides.
dliaris, Nees, Agrost Bras. 356 - candidus.
citreus, *Munro, ex Benth. Fl. Austral,* vi 510.—Austral.
dubius, Nees, Agrost. Bras. 358-Andropogon tener.
elegans, *Kunth, Rtv. Gram.* i. 161.—Afr. trop.

ELIONTrRTJS:—
Grisebackii, J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins. 154-E. Royleanus.
hirsutus, *Munro, ex Benth. in Jtmrn. Linn. Soc.* xix. (1881) 68.—Persia.
Utiflorus, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Cram.* 864.—Bias.; Parag.
Nuttallii, Vasey, Cat. Gr. U. St. 25-tripsacoides.
pertusus, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 864 » Andre pogon pertusus.
platypus, *Hach.—Cf. Bolet. Soc. Broter.* iii. (1886) 185.—Afr. trop.
prostratus, Kunth, Enum. PI. i. 480, sphalm.= rostratus.
rostmtus, *Nees, Agnst.Bras.* 857.—Bras.
Royleanus, *Nees, ex A. Kick. Tent. Fl. Abyss,* ii. 474.—Ind. or.; Arab.; Afr. trop.
thymiodorus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 95.—Afr. austr.
tnpsaeoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 192. t 62.—Am. box. et trop.

EUOPIA. Ra6n. Sylva Tellur. 90 (1888) - Heliotropium, Toum. (Borag.).
riparia, Rafin. 1. c.—flab. ?
'errata, Rafin. 1. c = H. indicum.

ELIOTTIA, Steud. Nom. ed. I. 296 (1821)=EUIottla, Mnhl. (Ericac.).

ELLSANTHE, Reichb. Nom. 206 (1841) = Silene, Linn. (CaryophylL).
Bridgesii, Rupr. Fl. Cauc. 200-S. Bridgesii.
Chamissonis, Rupr. 1. c 201 = S. verecunda.
Drummondii, Rupr. 1. c. 200 » S. Scouleri.
Hindsii, Rupr. 1. c. 200.—Calif.
noctiflora, Rupr. Fl. Ingric. i. 161-S. noctiflora.
Scouleri, Rupr. Fl. Cauc 200 = S. Scouleri.
•riscosa, Rupr. 1. c. = S. viscosa.
Zanadskii, Fuss, Fl. Transs. 106 = S. Zawadskii.

ELISARRHENA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 961 (1867). tphalm. ~ Eliaaarhena, Miers.

ELISENA, Herb. Amaryll. 201 (1887). *AMARYLLIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 784.
LIRIOPE, Herb. App. 41 (1821).
LIRIOPSIS, Reichb. Consp. 62 (1828).
longipetala, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 4S.—Peruv.
"uirginata, M. Roem. Syn. Ensat. 63=Nerine marginata.
"ngens, Herb. Amaryll. 201.—Pernv.
sublima, *Herb, in Bot. Mag.* t 8878—Perav.

ELISMA, Buchen. in Pringsh. Jahrb. vii. (1869) 25. *AUSMACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1005.
natans, *Buchen. I. c*—Europ.

ELISSARRHENA, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. HI. xiii. 124 (1864); xx. (1867) 169-Anomo-Bpermuia, Miers (Menispenn.).
'ongipes, Miers, 11. cc. - A. grandifolium.

ElJZABETHA, Schomb. ex Benth in Hook. Joum. *>t ii. (1840) 92. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 677.
coceinea, *Schomb. ex Benth. I. c*—Guiana,
macrostachya, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 214.—Bras.
Princeps, *Schomb. ex Benth. in Hook. Joum. Bot.* ii. (1840) 92 Guiana.

ELIfALDIA, Willk. Strand- u. Steppengeb. Iber. 128 (1852) = Nonnea, Moench (Boragin.).
nonneoides, Willk. 1. c. 129 = N. multicolor.

ELKAJA, M.Room. Sin. Hesper. 116 (1846) = ELCAJA, Forsk.=Triohilla, Juss. (Rutac.).

ELKANIA, Schlecht ex Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 227, in sys. (1869) - Pousolaia, Gandich. (Urticac.).
"ultinervis, Schlecht. ex Wedd. l.c.«=F. cymosa.

ELLEANTHUS, Presl, Rel. Haenk. i. 97 (1827). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 522.
fcVELYNA, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 82. t-56 (1885).
f^ysHnus, *Reichb./. in Walp. AnnM.* 479.—PeniT.
"Pophyllostachys, *Reichb. f. I.* c.-Venezuela.

EXLEAMTHUS:—
aurantiacus, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 482.—Bras,
aureus, *Reichb. f. 1. c.* 484.—Peruv.
Bonplandi, *Reichb. f. 1. c.* 488.—Perav.
bractescens, *Reichb./. I. c.* 475.—Mexic.
brasiliensis, *Reichb./. I.* c.—Bras,
capitatus, *Reichb./. I. c*—Mexic.
Caravata, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 92, in obs.—Guian.
casapensis, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 475.—Peruv.
cephalophorus, *Reichb. /. 1. c.* 476.—Peruv.
columnaris, *Reichb./. I. c.* 483.—N. Granat
conifer, *Reichb. /. I. c.* 474.—Perav.
coriifolius, *Reichb./. 1. c.* 478.—N. Grenat.
crinipes, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 92.—Bras,
cynarocephalus, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 476.—Hab.?
discolor, *Reichb./. 1. c.* 480.—Peruv.
ensatus, *Reichb./. I. c.* 482.—Ecuador,
flavescens, *Reichb./. 1. c.* 479.—Mexic.
fnrfuraceus, *Reichb./. I c.* 480.—Mexic.
gracilis, *Reichb./. 1. c.* 481.—Venezuela,
haematoxanthus, *Reichb./. 1. c.* 485.—N. Granat.
Hallii, *Reichb./. 1. c.* 482.—Perav.
hymenophorus, *Reichb./. I. c.* 480.—Mexic.
kennesinus, *Reichb./. 1. c.* 478.—Venezuela,
lancifolius, *Presl, Rel. Haenk.* 97.—Ecuador,
lepidns, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 92, in obs.—Hab. »
Lindenii, *Reichb./. in Walp. AnnM. 477.*—Venezuela,
linifolius, *Presl, Rel. Haenk.* 97.—Peniv.
lupulinus, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 483.—Mexic.
maculatus, *Reichb./. I.e.* 482.—Ecuador.
Myrosmatis, *Reichb./. I. c.* 473.—Peruv.
oliganthus, *Reichb./. I. c.* 481.—Peruv.
pnrpureus, *Reichb./. I. c.* 478.—Am. trop.
rhodolepis, *Reichb./. I. c.* 482.—Peruv.
robustus, *Reichb./. I. c.* 474.—Peruv.
Ruizii, *Reichb./. in Linnaea,* xxii. (1849) 842.—Peruv.
strobilifer, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 483.—Perav.
Wageneri, *Reichb./. I. c.* 474.—Venezuela,
xanthocomus, *Reichb./. in Bot. Mag.* t. 6016.—Peruv.

ELLEBORUS, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. (1789) 716-Helleborus, Toum. (Ranunc).

ELIiEBTONIA, Wight, Ic. iv. 2. t. 1295 (1848). *APOCYNACEAE,* Bench. & Hook. f. ii. 705.
KAMETTIA, Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl. iii. 1062 (1834), nomen prius.
madagascariensis, Radlk. in Bremen, Abh. viii. (1883) 402-Alyxia erythrocarpa.
Rheedii, *Wight, Ic.* iv. 1.1295.-Ind. or.

ELLIMIA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 125 (18381 = Obgomerifl, Cambess. (Compos.).
ruderalis, Nutt 1. c. = O. subulata.

ELLIOTIA, Spach, Hist. *Vig.* Phan. ix. 448 (1840)-seq.

EIiLIOTTIA, Muhl. ex Nutt. Gen. Am. Add. (1817). *ERICACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 698.
TRIPETALKIA, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii II. (1848) 731. t. 8. f. 2.
Muhlea, Steud. Nom. ed. I. 296=racemosa.
racemosa, *Muhl. ex Ell. Sketch,* i. 448.—Am.bor.

ELIiIPAH'TH.TJS, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 434 (1862;. *CONNARACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f.l. c.
calophyllus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Seng.* xli. (1882) II. 305.—Malaya.
Griffithii, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 56.—Malaya.
Helferi, *Hook./. I. c.* 65.—Burma; Malaya,
monophyllus, *Hook./, in Benth. V Hook./. Gen.* i. 484.—Burma.
Thwaitesii, Hook. f.Fl. Brit. Ind. ii. 55-unifoliolatns.
tomentosus, Kurz, in Journ. As. Soc, Beng. xli. (1872) ii. 306-monophyllus.
unifoliolatus, *Hook. /. in Benth. V Hook. /. Gen.* i. 434.—Zeylan.

ELLIPEIA, Hook. f. *Sc* Thorns. Fl. Ind. i.104 (1855). *ANONACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 23.
cinerascens, *Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* ii. 10.—Sumatra.
coriacea, *Scheff. in Ann. yard. Buitenx.* ii. (1886) 4.—Borneo.

EIIIIIPEIA :—
cuneifolia, *Hook./. V Thorns. Fl. Ind.* i. 104.—Malacca,
ferruginea, *Hook./. If Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 52.—Burma.
gilva, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 9.—Borneo,
glabra, *Hook./. & Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 62.—Malacca.
lalia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 10.—Sumatra,
nervosa, *Hook. /.* b* *Thorns. Fl. Brit. Ind.* i. 62.—Malacca.

ELLISIA, P. Br. Hist Jamaic. 263 (1766) - Duranta. Linn. (Verbenac.).
acuta, Linn. Amoen. Acad. v. 400 - D. Plumieri.

ELLISIA, Linn. Sp. PI. ed. II. 1662 (1763). *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 827.
EUCRYPTA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847; (PI. Gamb.) 158.
MACROCALYX, Trew, in Act. Nat. Cur. ii. (1761) 832.
NYCTBLEA, Scop. Introd. 775 (1777).
ambigua, Nutt. Gen. Am. i. 118 -- E. Nyctelea.
chrysanthemifolia, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 274—Calif,
membranacea, *Benth. I. c*—Calif.
microcalyx, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 191 = Nemophila microcalyx.
Nyctelea, *Linn. Sp.Pl.* ed. II. 1662.—Am. bor.
ranunculacea, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 191=Nemophila microcalyx.
Torreyi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 302.—Am. bor. occ.

ELLISIOPHYIXTJM, Maxim, in Bnll. Acad. Pètersb. xvi. (1871) 223. *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 829.
reptans, *Maxim, I. c.*—Japon.

ELLOBIUM, Lilja, in Linnaea, xv. (1841) 262 - Fuchsia, Linn. (Onagrar.).
/ulgens, Lilja, 1. c.- F. fnlgens.

ELLOBUM, Blume, Bijdr. 746 (1826)«, VandeUla, Linn. (Scrophul.).
montanum, Blume, 1. c. 747 - V. EUobum.

ELMIGERA, Reichb. Consp. 123 (1828) =- Fentstemon, Mitch. (Scrophul.).
barbata, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 550-P. barbatus.

ELODEA, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 21 - Cratozylon, Blume (Hypericin.).
chinensis, Hance, in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 472 = C. polyanthum.
egyptica, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 25, in obs. = Hypericum aegyptiacum.
/ormosa. Jack, 1. c 24 =• C. formosum.
pulchella, Hort. Chels. ex Loud. Hort. Brit Suppl. i. 687 - C. polyanthum.
sumatrana, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 22 — C. sumatranum.

ELODEA, Juss. Gen. 255, in obs. (1789) ; Vent. Tabl. iii. 144 (1799) = Hyperieum, Toum.
axillaris, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. II. v. (1836) 170-H. paludosum.
campanulata, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 879 - H. virginicum.
crassi/olia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 15.—Japon.
Drumondii, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1886) 167 = H. virginicum.
emarginata, Steud. Nom. ed. II. i. 550 = H. virginicum.
floribunda, Spach, in Ann. Sc. Nat. *Sit.* II. v. (1836) 169 — H. paludosum.
Fraseri, Spach, 1. c. 168 = H. virginicum.
jafonica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 16-H. japonicum 1
palustris, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 171 - H. Elodes.
pauciflora, Spach, 1. c. 169 = H. virginicum.
petiolata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 879 - H. palndosum.
Russegeri, Walp. Rep. i. 391 *(^Triadenia Russeggeri).*—Syria.
tubulosa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 879 - H. paludosum.
virginica, Nntt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 167-H. virginicam.

ELODEA. Michz. FL Bor. Am. i. 20 (1808). *HYDROCHARIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 460.
ANACHARIS. Planch, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. i. (1848) 85.
APALANTHE, Planch. 1. c 87 (1848).
DIFLANDRA, Bert in' Merc. Chil. 612; ex Bull. Férussac, xz. (1880) 110.
EGBRIA, Planch, in Ann. Sc. Nat Ser. III. xi (1849) 79.
PHILOTRIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175.
UDORA, Nntt. Gen. Am. ii. 242 (1818).
callitrichoides, *Casp. in Monatsb. Berl. Acad.* (1867) 47.—Am. austr.
canadensis, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 20.—Am. bor.
chilensis, *Casp. in Monatsb. Berl. Acad.* (1857) 47.— Chili.
densa, *Casp. I. c.* 49.—Reg. Argent,
granadensis, *Humb. & Bonpl. PI. Aequin.* ii. 60.—N. Granat.
guianensis, *Rich, in Mém. Instit. Fr.* ii. (1811) 4, 75. —Guiana.
latifolia.Ctsp. in Monatsb. Berl. Acad. (1857) 46 = canadensis.
Naias, *Casp. 1. c.* 49.—Bras,
orinocensis, *Rich, in Mém. Instit. Fr.* ii. (1811) 75.— Venezuela.
Planchonii, *Casp. in Monatsb. Berl. Acad.* (1867) 47.— Am. bor.
SckweinitBii, Casp. 1. c 46=canadensis.

ELODES, Adans. Fam. ii. 444 (1763); Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. It v. (1886) 171 = Hypericum, Tonra.
aegyptiaca, Payer, Organog. 8. t. 1 = H. aegyptiacum.
palustris, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. if. v. (1886) 172-H. Elodes.
petiolata, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 79 = H. paludosnm.
tubulosa, Rafin. 1. c. = H. paludosnm.

ELOPIUM, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1865) 84 = Philodendron, Schott (Aroid.).
surinamense, Schott, L c. 85 = P. snrinamense.

ELPHEGEA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 31; et in Diet. Sc. Nat. xiv. 361 (1819)=Fsiadift, Jacq. (Compos.).
crenata, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiv. 362 = P. balsamica.
dentata, Cass. 1. c. 363-P. dentate.
hirta, Cass. 1. c. 364 = Conyza lithospermifolia.
lanceolata, Cass. 1. c 368=P. linearifolia.
latifolia, Cass. 1. c. 362=P. balsamica.
minor, Cass. 1. c. =P integerrima.
quinquenervia, Cass. 1. c. 363=P. integerrima.

ELPHEGEA, Less. Syn. Comp. 182 (1832)=FeUoia, Cass. (Compos.).
Bergian'a, Less. 1. c-Aster Bergianus.
ciliata. Less, in Linnaea, vi. (1831) 126 = Mairia taxifolia.
microcephala, Less. Syn. Comp. 184 = Mairia microcephala,
reflexa. Less. 1. c.=F. Teflexa.

ELSBOLZIA, Reichb. Consp. 116 (1828) sphalm.-Ekholtala, Willd. (Labiat).

ELSCHOTZIA, Brongn. Ennm. Gen. 68 (184S)-=praec.

ELSHOLTIA, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. *U.* 631 (1837) = praec.

ELSHOLTZIA, Willd. in Roem. *Sc* Usteri, Mag. iv. xi. (1790) 3. *LABI ATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1181.
APHANOCHILUS, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1282 (1829).
CYCLOSTEGIA, Benth. 1. c. (1829).
barbinervia, Miq. Ann. Mas. Bot. Lngd. Bat ii. 104 = Comanthosphace barbinervis.
Beddomei, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 643.—Burma.
blanda, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 162.—As. txop.
cristata, *Willd. in Roem. ff Usteri, Mag.* iv. XI. (1790) 5.—Europ.; As. bor.
densa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 714.—Reg. Himal.
elata, *Zoll. to" Mor. in Nat. en Geneesh. Arch, Ne/rl. Indie*, ii. (1845) 5.—Java,
eriantha, *Benth. in DC. Prod.* xii. 161.—Java.

ELSHOLTZIA:—
eriostachya, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 163.—Reg. Himal.
eriostachya, Hook. f. *Sc* Thorns, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 645=densa.
flava, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 161.—Reg. Himal.
Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 644.—Reg. Himal.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 105 = eriostachya.
incisa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 162.—Reg. Himal.; Burma.
integrifolia, *Benth. I. c.* 714.—China.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. ii. 103 = Comanthosphace japonica.
javanica, Blnme, Bijdr. 825-Plectranthns javaniens.
leptostachya, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 713.—Reg. Himal.
mollissima, *Benth. I. c.* 168.—Java.
odmoides, Pers. Syn. ii. 114 = Geniospornm prostratum.
oppositifolia, Poir. in Diet. Sc. Nat. xiv. 366=Colebrookea oppositifolia.
paniculata, Willd. Sp. PI. iii. 59-Pogostemon paniculatus.
Patrini, Garcke, Fl. Dentschl. ed. IV. 257=cristata.
pilosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 163.—Reg. Himal.
polystachya, *Benth. I. c.* 161.—Reg. Himal.
pubescens, *Benth. I. c.* 162.—Java.
pusilla, Benth. 1. c. 714 = eriostachya.
Schimperi, *Hochst. ex Vatke, in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 325, nomen.—Abyss.
Stauntoni, *Benth. I. c.* 161.—China.
stellipila, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 103 = = Comanthosphace stellipila.
strobilifera, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 163.—Reg. Himal.
sublanceolata, Miq. Ann. Mns. Bot Lugd. Bat. ii. 103 =Comanthosphace sublanceolata.
Thompsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 643.—Ind. or.
villosa, *Roxb. Hort. Beng.* [95]; *Fl. Ind.* iii. 4-= Pogostemon villosus.

ELSHOLZIA, Moench, Meth. 889 (1794)-praec.

ELSHOTZIA, Roxb. Fl. Ind. iii. 4 (1832)=praec.

ELSNERIA, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) (PI. Meyen.) 346. t. 8 -= Bowlesia, Ruiz & Pav. (Umbellif.).
crataegifolia, Walp. 1. c = B. mnltiradiata.

ELSOTA, Adans. Fam. ii. 358 (1768) = Seeuridaea, Linn. (Polygal.).

ELSSHOLZIA, Garcke, Fl. Dentschl. ed. VI. 307 (1863) =Elsholtzia, Willd. (Labiat.).

ELTROPLECTRIS, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 51 (1886) = **Pelezia,** Poit. (Orchid.).
acuminata, Rafin. 1. c. = P. setacea.

ELUTERIA, Steud. Nom. ed. I. 296 (1821) = ELUTHERIA, Linn. =• Croton, Linn. (Enphorb.).

ELUTHERIA, P. Br. Hist. Jamaic. «69 (1756) = UoBohoxylum, A. Jnss. (Meliac).

ELUTHERIA, Linn. Hort. Cliff. 486, 487 (1787)-Croton, Linn. (Enphorb.).

ELUTHERIA, M. Roem. Syn. Hesper. 122 (1846). *MELIACEAE*, Benth. *Sc.* Hook. f. i. 389.
SCHMARDAEA, Karst. Fl. Columb. i. 187. t 93 (1861?).
microphylla, *M. Roem. I. c.; C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 725.—Peruv.

ELVASIA, DC. in Ann. Mns. Par. xvii. (1811) 422. t. 20. *OCHNACEAE*, Benth. & Hook. f. L 318.
HOSTMANNIA, Planch, in Hook. Ic. PI. t. 709 (1848).
calophyllea, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 422. t. 20.—Bras,
essequibensis, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 854.— Am. trop.
Hostmannia, *Planch, in Hook. Land. Journ. Bot.* v. (1846) 648.—Guiana.
qninqueloba, *Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 353.—Am. trop.

ELVINA, Steud. Nom. ed. II. i. 550 (1840)-seq.

ELVIRA, Cass. in Diet. Sc. Nat xxx. 67 (1824). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 843.
DELILIA, Sprang. Syst iii. 867 (1826).
DESMOCEPHALUM, Hook. f. in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 277 ; et Trans. Linn. Soc xx. 208 (1847).
MERATIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxx. 65 (1824).
MICROCOECIA, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xx. (1847) 209.
biflora, DC. Prod. v. 503 = Martyni.
Martyni, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxx. 68.—Mexic.

ELWENDIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. i. (1844) 140 = CaTum, Linn. (Umbell.).
caroides, Boiss. 1. c.-C. Elvendia.

ELWERTIA, Rafin. Sylva Tellur. 163 **(1888)*>Cluala,** Plum. (Gnttifer.).
retusa, Rafin. 1. c = C. rosea.

ELYMTTS, Linn. Hort. Upsal. 22 (1748); Amoen. Acad. iii. (1787) 20. *GRAMINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1206.
CRITHOFSIS, Jaub. & Spach, Illustr. iv. SO. t. 321 (1850).
LEYMUS, Hochst. in Flora, xxxi. (1848) 118, in adnot.
ORTHOSTACHYS, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).
POLYANTHERIX, Nees, in Ann. Nat Hist. Ser. I. i. (1838) 284:
SITANION, Rafin. in Jonrn. Phys. lxxxix. (1819) 103.
SITOSPELOS, Adans. Fam. ii. 86 (1763).
aegypHacus, Sprang. Syst. i. 328 = Delileanns.
agropyroides, *J. (f C. Presl, Rel. Haenk.* i. 265.— Chili
Alberti," *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 581.— Am. centr.
altaicus. Sprang, f. Tent. SuppL 5 = juncens.
andinus, *Trin. in Linnaea*, x. (1886) 304.—Peruv.
angulatns, *J. (f C. Presl, Ret. Haenk.* i. 264.— Peruv.
angustatus, Steud. Nom. ed. II. i. 550, sphalm. = seq.
angustus, *Trin. ex Ledeb. Fl. Alt.* i. 119.—Sibir.
antarctiens, *Hoak.f. Fl. Antarct.* 388.—Reg. Magellan,
aralensis, *Regel, in Bull. Sc. Nat. Mosc.* xii. (1868) II. 285.—Reg. Casp.
arenarius, Georgi, Beschr. Ross. Reich. Nachtr. 267 - dasystachys.
arenarius, S. G. Gmel. Reise, iv. 44 ; ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 332. = giganteus.
arenarius, *Linn. Sp. PI.* 83.—Europ.; Am. bor. occ.
arenarius, Mert. in Linnaea, v. (1830) 61 = mollis?
arenarius, Pall. Reise, i. 243 = sabulosus.
asper, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 349.—Chili.
brachytrichus, Walp. Ann. iii. 786 = Delileanus.
caducus, *Boiss. Fl. Orient*, v. 691.—Afghan,
canadensis, *Linn. Sp. PI.* 83.—Am. bor.
caninus. Linn. Fl. Suec. 39 — Agropyron caninnm.
caninus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 51 = Agropyron repens.
cappadocicus, *Boiss. &" Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 808.—Cappadoc.
Caput-Medusae, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 25 = Cenchrus catharticus.
Caput-Medusae, *Linn. Sp. PI.* 84.—Europ. austr.: Afr. bor.; Oriens.
carolinianus, *Walt. Fl. Carol.* 82.—Am. bor.
chonotiens, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 104.— Chili,
cladostachys, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1866) I. 64.—Sibir. or.
compositus, Stend. Syn. PI. Gram. 348 = europaeus.
condensatus, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 265.— Am. bor. occ.
corralensis, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 303.— Chili.
crinitus, Schreb. Beschr. Graes. 15. t. 24-E. Caput-Medusae.
dahuriens, *Tune, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 105. nomen ; et xxix. I. (1867) 62.—Tauria.
dasystachys, *Trin. ex Ledeb. Fl. Alt.* i. 120.—Sibir-altaic
Delileanns, *Schult. Mant.* ii. 424.-Syria; Aegypt
desertorum, tfar. *VKir. in Bull. Sc. Nat. MoscAU*[1] 867.—Sibir. altaic.
distans, *Desv. Opusc.* 97.—Hab. \
dives, *7. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 265.—Sio»» Nootka.

ELYMUS :—

dumetorum, Hoffm. Dentschl. Fl. ed. II. i. I. 64 = Agropyron repens.
durus, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i 650, 561 = virginicus.
europaeus, *Linn, if ant.* i. 85.—Enrop.; Reg. Cauc.
europaeus, Willd. FL Berol. Prod. 61 = arenarius.
excelsus, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1856) I. 62.—As. bor.
flexuosus, *Tausck, in Flora,* xx. (1887) 120.—Hab. 1
fragilis, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 128 = Hordeum fragile.
Gavanus, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi 467.—Chili.
geniculatus, Curt. Obi. 46 = arenarius.
geniculatus, Delile, Fl. Egypte, 174 = Delileanns.
giganteus, *Vahl, Symi. Bot.* iii. 10.—ROBS. ; Sibir.
glaucifolius, Muhl. in Willd. Enum. Hort. Berol. 181 = canadensis.
glaucus, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 99 = sibiricus.
glaucus, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 585.—Turkestan.
gracilis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 801.—Chili.
hirsutus, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 264.—Sinus Nootka.
hirsutus, Schreb. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 776 = villosus.
hordeiformis, Desf. Tabl. ed. I. 15, nomen; et Cat. Hort. Par. ed. III. 387 = striatns.
nyalauthus, *Rupr. Sert. Tiansch.* 36.—As. centr.
ftystrix, Linn. Sp. PL 560=Asperella Hystrix. Caput-*tntermedius,* Bieb. FL Taur. Cauc. i. 82 - E . Medusae.
interruptus, *Buckl. in Proc. Acad. Soc. Philad.* 1862 . (1868) 99.—Am. bor.
jenisseensis, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. .. (1856) I. 64.—Sibir.
jubatus, Link, Hort. Berol. i. 19 = Hoideum jubatnm.
junceus, *Fisch. in Mem. Soc. Nat. Mosc.* i. (1811) 26. t. 4.—Ross, j As. bor.
Karelini, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1866) I. 64.—Turkestan,
wnuginosus, *Trin. ex Ledeb. Fl. Alt.* i. 121.—Sibir. altaic.
•atiglumU, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 802.—Chili.
Lechleri, Steud. Syn. PI. Gram. 480 = Hordeum jubatnm.
leucostachys, Eversm. ex Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. *«333=sla.Tyntachys Griseb. 1. cdasystachys.
Macounii,*TVasey, Gr. V. St.* 46, nomen.—Am. bor.
macrostachys, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) II. 196 ° giganteus.
""xicanus, Cav. Desc. 314=sabulosus.
»u>Uis, R. Br. ex Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. 732=villosus.
molhs, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 72.- As. bor. or.; Am. bor. occ.
monococcos, *Linn. Syst.* ed. X. 879.—Hab. ?
"Hntanus, Pall, ex Georgi, Beschreib. Russ. Reich. Nachtr. 258-E. Caput-Medusae.
multicaulis, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 868,-Sibir. altaic.
nmticus, *Phil. in Linnaea,* xxxiii. (1864-45) 300.- *hili.
neogaeus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 349.—' Terra-nova.'
tans, Hi... G. rise. . in G vett. Nat ir. (1868) 7-2 R eg. Himal
oit *usus,* kunth, Enum. PI. i. 556-ovatus.
"rcuttianus, *Vasey, in Coult. Bot. Gat.* x. (1885) 258. —Calif.
ovatus, *Trin. ex Ledeb. Fl. Alt. I* 121.—Sibir. altaic.
Paposanus, *Phil. Fl. Atac.* 56.—Chili.
Panciflorus, *Urn. Tabl. Encyc.* i. 2O7.-Hab.l
PMadelphicus, Linn. Cent. PI. i. 6 ; Amoen. Acad.iv. «e6*=canadensis.
*'»'/«•> [Soland. in] Russell, Aleppo ed. II. ii. 244 = Agropyron orientate.
*r't*therus,* Link, Hort. Berol. i. 18 = E. Caput-Medusae.
Praetervisus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 348.—Reg. Ural.
pratensis, P.*.'.'.'.'.' *Linnaea* xxxUi (188*-66) 801 Chili.
Propinquus, *Fresen. Ind. Sem. Hort. Franc.* (1836) ; ** *Steud. Syn. PI. Gram.* 349.—Am. bor.

ELYJU.US :—

Pseudoagropyrum, Trin. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 105; (1856) I. 6S=Triticum Pseudo-agropyrum.
Pseudohystrix, Schult. Mant ii. 427 = Asperella Hystrix.
racemosus, Lam. Tabl. Encyc. i. 207 - sabulosus.
racemosus, Poir. Encyc. Snppl. ii. 546 = sibiricus.
ramosus, Desf. Tabl. ed. I. 15, nomen; Cat. Hort. Par. ed. HI. 887= sibiricus.
rhachitrichus, Hochst. ex Jaub. & Spach, Illustr. iv. 30 = Delileanus.
rigescens, *Trin. in Linnaea,* x. (1836) 304.—Peruv.
sabulosus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 81.—Reg. Caucas.
salsuginosus, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 833 = dasystachys.
Saundersii, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club,* xi. (1884) 126.—Am. bor. occ.
secaliformis, Trin. ex Steud. Norn. ed. II. i. 551 = Hordeum fragile, *Boiss.*
secalinus, Claus, in Goebel, Reise, ii. 319; et ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 330 = praec?
sibiricus, *Linn. Sp. PI.* 88.—As. bor.; Am. bor.
Sitanion, *Schult. Mant.* ii. 426.—Am. bor.
striatus, *Bess. Enum. PI. Volhyn.* 50 (quid?).—Volhynia.
striatus, *Willd. Sp. PI. I* 470.—Am. bor.
subpaniculatus, *Steud. Syn. PI. Gram.* 350.—Austral.
subulatus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 26-Delileanus?
tener, Linn. f. Suppl. 114 •= sibiricus.
triticoides, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Pbilad. 1862 (1863) 99=condensatus.
vaginatus, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 800.—Chili.
Valdiviae, *Steud. Syn. PI. Gram.* 849.—Chili,
villosus, *Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 181.—Am. bor.
virginicus, *Linn. Sp. PI.* 84.—Am. bor.

ELYMUS, Mitchell, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 210, App.=Zisania, Linn. (Gramin.).

ELYNA, Schrad. Fl. Germ. i. 155 (1806)=Kobresia, Willd. (Cyperac.).
Bellardi, Hartm. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1814) 107, et (1818) 164 = K. cariciua.
Bellardi, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 616 = K. scirpina.
capillifolia, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 173. t. 174=K. capillifolia.
capillifolia, Henderson, Yarkand, 339=Carex stenophylla.
caricina, Mertens & Koch, Deutschl. Fl. i. 468 - K. caricina.
filifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxviii. (1855) I. 353 = K. filifolia.
filiformis, Steud. Syn. PI. Cyp. 245.—Am. bor.
humilis, C. A. Mey. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 21-K. schoenoides.
kokanica, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 563 (Kobresiae sp.).—Turkestan.
laxa, Kunth, Enum. Fl. ii. 534 = K. laxa.
schoenoides, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iv. 236-K. schoenoides.
sibirica, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 103; Ledeb. Fl. Ross. iv. 262 = K. schoenoides.
spicata, Boiss. Fl. Orient, v. 394 = K. capillifolia.
spicata, Schrad. FL Germ. i. 165 ^K. scirpina.
stenocarpa, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 526=K. Royleana.
stricta, Hoppe, ex Steud. Nom. ed. II. i. 561 = K. scirpina.

ELYNANTHTTS, Beauv. ex Lestib. Essai Fam. Cyp. 32 (1819). *GENUS DUBIUM* (Cyperac.j.—Cf. Benth, *Sc* Hook. £ iii. 1064.

ELYNANTHUS, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 520; ix. (1835) 298 = Tetraria, Beauv. (Cyperac).
anceps, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 298, nomen.—Afr. austr.
aphyllus, F. Muell. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 211-Schoenus aphyllus.
arenarius, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 298 = T. compar.
aristatus, Boeck. 1. c. xxxviii. (1874) 260 (Tetrariac sp.).—Afr. austr.
auritus, Nees, in Linnaea. ix. (1834) 298 (Tetrariae sp.) —*sylvaticus.*

ELYNANTHUS :—

australis, Nees, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 48 = Cladium elynanlhoides.
bifidus, Nees, 1. c. =Schoenus bifidus.
borbonicus, Sleod. Syn. PL Cyp. 155 (Carpbae sp.).—Ins. Borbon.
capillaceus, Benlh. FL Austral, vii. 377 (Cladii sp.).—Austral.
capitatus, Nees, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 48-Schoenus capitatus.
compar, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 256, partim =*sylvaticus.*
compar, Nees, 1. c. vii. (1832) 520 = T . compar.
cuspidatus, Nees, 1. c. ix. (1834) 298; x. (1886) 188 (Tetrariae sp.). —Afr. austr.
Dregeanus, Boeck. 1. c. xxxviii. (1874) 262 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.
ensifolia, Boeck. 1. c. 264 = Cladium ensifolium.
gracilis, Nees, I.e. x. (1835-86) 189 - *cuspidatus.*
grandiflorus, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. 78 = Schoenus grandiflorus.
Kraussii, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 761 - Macrochaettum Dregei.
ligulatus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 262 I Tetrariae sp.).—Afr. austr.
loreus, Nees, 1. c. ix. (1884) 298 (Tetrariae *sp.)= cuspidatus.*
microstachyus, Boeck. 1. c. xxxviii. (1874) 261 ^ *cuspidatus.*
obtusifolius, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. 78 = Schoenus obtusifolius.
octandrus, Nees, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 48 (alieni gen.).—Austral.
pictus, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 254 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.
revolutus, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. *78=octandrus.*
sculptus, Nees, 1. c 79 = Schoenus sculptus.
spathaceus, Nees, in Linnaea, x. (1835-36) 186 = Schoenus nigricans.
sylvaticus, Nees, 1. c. ix. (1834)298; x. (1835-36) 188 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.
ustulatus, Nees, 1. c. x. (1835-36) 198 (Tetrariae sp.). —Afr. austr.
viscosus, Nees, 1. c. 186 = T. compar.

ELYONORUS, Bartl. Ord. 81 (1830) = seq.

ELYONURUS, Humb. *8c* Bonpl. ex Willd. Sp. PL iv. 941 (1806)=Elionurus, Kunth (Gramin.).
tripsacoides, Humb. & Bonpl. 1. c. = Elionurus tripsacoides.

ELYTHRANTHE, Reichb. Nom. 73 (1841) = LoranthUB, linn.

ELYTHRARIA, D. Dietr. Syn. L 30, 64 (1839). Elytraria, Michx. (Acanth.).

ELYTHROPHORUS, Dum. Anal. Fam. 63 (1829)- Elytrophorus, Beauv. (Gramin.).

ELYTHROSPERMUM, Steud. Nom. ed. II. i. 552 (1840) = ELYTROSPERMUM, C. A. Mey. - Soirpus, Linn. (Cyperac).

ELYTHROSTAMNA, Boj. Hort. Maurit. 230 (1837) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
convolvulacea, Boj. 1. c. = I. pileata.

ELYTRANTHE, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1780 (1830)=Iioranthus, Linn.
albida, Blume, 1. c. = L. albidus.
ampullacea, G. Don, Gen. Syst. iii. 425 = L. ampullaceus.
Arnottiana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 632 = L. Amottianus.
avenis, G. Don, Gen. Syst. iii. 426 = L. avenis.
Carina tula, G. Don, 1. c. = L. ampullaceus.
cochinchinensis, G. Don, 1. c = L. cochinchinensis.
cupulata, G. Don, 1. c. 427—L. cupulatus.
farinosa, G. Don, 1. c. » L. pentandrus.
formosa, G. Don, 1. c. 426 » L. formosus.
gemmiflora, G. Don, 1. c. 427 - L . formosus.
globosa, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1780 = L. globosus.
involucrata, G. Don, Gen. Syst. iii. 427 = L. involucratus.
loniceroides, G. Don, 1. c. 427-*L.* loniceriodes.

ELYTRANTHE :—
obmunita, G. Don, Gen. Syst. iii. 428=Loranthus obmunitus.
oleoides, G. Don, 1. c. 426=L. globosus.
pollens, G. Don, 1. c = L. ampullaceus.
patula, G. Don, I. c. = L. patnlus.
retusa, G. Don, 1. a 425=L. retusus.
rigida, G. Don, 1. c. 427 =L. pentandros.
sphaerocarpa, G. Don, 1. c. 426 = L. globosus.
subglobosa, G. Don, 1. c. =L. globosus.
subumbellata, G. Don, 1. c 427-L. subumbelUtus.
tetragona, G. Don, 1. c.-L. tetragonus.
umiellata, G. Don, 1. c.—L. Scurrnla.
viridiflora, G. Don, 1. a 426=JL globosns.

BIiYTRAHIA, Michx. Fl. Bor. Am. i. 8 (1803); Vahl, Enum. i. 106 (1805). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1073.
amara, Blanco, Fl. Filip. ed. IL 8=crenata.
apargifolia, Nees, in DC. Prod. xi. 65 = tridentata.
bromoides, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 115.—Medc.
carolinensis, Pers. Syn. i. 28=virgata.
caulescent, Ledeb. bid. Sem. Hort. Dorp. (1820) = tridentata.
crenata, *Vahl, Enum.* i. 106.—Reg. trop.
eupressina, Nees, in DC. Prod. xi. 65 = virgata.
fasdculata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 285 = tridentata.
frondosa, H. B. & K. 1. c 116, 234 = tridentata.
herbacea, Michx. ex Nees, in DC. Prod. xi. 63 = virgata.
imbricata, Pers. Syn. i. 23=tridentata.
indica, Pers. 1. c. = crenata.
lyrata, Vahl, Enum. i. 106-= crenata.
marginata, Vahl, Enum. i. 108 = crenata.
microstachya, Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1864) 114 = tridentata.
pachystachya, Oerst. 1. c. 116. t. 3-tridentata.
ramosa, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. ii. 285= tridentata.
scorpioides, *Roem.* b* *Schult. Syst. Mant.* i. 128.—Ins. St. Martha.
tridentata, *Vahl, Enum,* i. 107.—Reg. trop.
Vahliana, Michx. Fl. Bor. Am. i. 9.1.1=virgata.
virgata, *Michx. 1. c.*—Am. trop.
virgata, Nees, in DC. Prod. xi. 63=crenata.

ELYTRIGIA, Desv. in Nonv. Bull. Soc Philom. ii. (1810) 190 = Agropyron, J. Gaertn. (Gramin.).
repens, Desv. 1. c. = A. repens.

ELYTR1GIUM, Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. 130 (1881)-praec.

ELYTROPAPPUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 199. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 328.
ACHYROCOME, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1821-22) 147, 170.
CYATHOFAPPUS, Sen. Bip. in Pollichia, xviii-xix. (1861) 183.
adpressns, *Han. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 274.—Afr. austr.
ambiguus, *DC. Prod.* vi. 256.—Afr. anitr.
canescens, *DC. 1. c.*—Afr. anitr.
cinerascens, DC. 1. c. 281 = glandulosus.
cyathiformis, *DC. I. c. i.* 257.—Afr. austr.
glandulosus, *Less. Syn. Comp.* 343.—Afr. anstr.
Rhinocerotis, *Less. I. c.* 344.—Afr. austr.
spinellosus, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1816) 199.—Afr. austr.
spinulosus, Lets. Syn. Comp. 843=spinellosus.

ELYTROPHORUM, Poir. in Diet. Sc Nat. xiv. 877 (1819) =seq.

ELYTROPHORU8, Beauv. Agrost. 67. t 14. f. 2 (1812V *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1182.
ECHINALYSIUM, Trin. Fund. Agrost. 142 (1820).
articulatus, *Beauv. 1. c.*—Ind. or.

ELYTBOPU8, MuelL Arg. in Bot. Zeit. xviii. (1860) 21. t 1. *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 728.
chilensis, *Muell. Arg. I. c.* 22; *et in Linnaea,* xxx. (1859-60) 440.—Keg. Argent. Chili.

EIiYTROPTJS :—
heterophyllus, Mien, Apocyn. S. Am. 116 « Echites chilensis.
Ptarmica, Miers, 1. c. 115=Echites Ptarmiea.
pubescens, Mien, 1. c. 114 = Echites chilensis.
spectabilis, Miers, 1. e. 116-Echites spectabilis.

ELYTROSPERMUM, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. P&ersb. i. (1830) 200. t. 2 = Bcirpufl, linn. (Cyperac).
californicum, C. A. Mey. 1. c.=S. riparius.

ELYTROSTAMNA, Choisy, in DC. Prod. ix. 865 (1845) =ELYTHROSTAMNA, Boj. = Ipomoea, Linn. (Convolv.).

EMBAMMA, Griff. Notul. iv. 694 (1854) - Pteri-aanthes, Blume (Ampelid.).
caudigerum, Griff. 1. c. 695-P. cissoides.
heteranthum, Griff. 1. c. 694=P. heterantha.

EMBELIA, Burm. f. Fl. Ind. 62. t. 63 (1768). *MYRSINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 644.
CHO&IPETALUM, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1884) 131.
DAHBKIA, Endl. Gen. 1444 (1841).
DAUCERIA, Dennst Schluess. Hort. Malab. 81 (1818).
GHESAEMBILLA, Adans. Fam. il. 449 (1763).
PATTARA, Adans. 1. c. 447 (1763).
PLOTIA, Neck. Elem. ii. 55 (1790).
RIBESIOIDES, Linn. Fl. ZeyL WO (1747).
SAMARA, Linn. Mant. 144, excl. syn. 199 (1771).
abyssinica, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 497.—Afr. trop.
adnata, *Bedd. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 614.—Ind. or.
amentacea, *C. B. Clarke, 1. c.*—Malacca,
angustifolia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 84.—Ins. Borbon.
arborea, *A. DC. 1. c.* 88.—Madag.
Basaal, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 131 = robusta.
bomeënsis, *Scheff. Comm. Myrsin.* 43.—Borneo,
bracteosa, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 866.—Malaya.
Burmanni, Retz. Obs. iv. 28 = E. Ribes *et* Salvadora persica.
canescens, *Jack, ex Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 292.—Malaya.
clusiaefolia, *Miq. PI. Jungh.* 187.—Java,
concinna, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 199. —Madag.
coriacea, *Wall. Cat.* n. 2314 ; *A. DC. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1884) 185.—Malaya,
cyrtobotrya, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 1012.—Java.
das.ytb.yrsa, *Miq. I. c. Suppl.* 573.—Ins. Banco.
dentata, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. snb n. 2804 = E. Ribes.
esculenta, D. Don, Prod. Fl. Nep. 147 = floribunda.
ferruginea. Wall. Cat. n. 2310=robusta.
floribunda, *Wall, in Roxb. Fl. Ind.ed. Carey, a.* 291.—Reg. HimaL; Malaya.
Gamblei, *Kurt, ex C. B. Clarke, in Hook. f. fit. Brit. Ind.* iii. 516.—Reg. Himal.
garciniaefolia, Miq. PI. Jungh. 187-E. Ribes.
Gardneriana, *Wight, Ic.* t. 1208.—Ind. or.
glandulifera, Wight, 1. c. L 1207 =E. Ribes.
Grossularia, Retz. Obs. iv. 24 = Salvadora persica.
guineensis, *Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* iii. 496.—Afr. trop.
indica, J. F. Gmel. Syst. 280=E. Ribes.
javanica, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 84.—Java.
Jussiaeé, *A. DC. I. c*—Madag.
Kraussii, *Han. Thes. Cap.,* il. 17. t. 127.—Afr. austr.
Lampani, *Scheff. Comm. Myrsin.* 37.—Malaya,
lucida, *Wall. Cat.* n. 2815.—Singapore.
macrophylla, Blume, ex Scheff. Comm. Myrsin. 36 = coriacea.
madagascariensis, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvi. (1841) 81.-Madag.
mienntha, *A. DC. I. c*—Ins. Maurit.
microcalyx, *Kurt, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 328.—Ins. Nicobar.
Myrtillus, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 67.—Burma; Malaya.
Nagushia, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 147.—Reg. HimaL

EMBELIA:—
nervosa, *A. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvi. (1841) 81.—Cochinch.
nilotica, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) IOC. t 71.—Afr. trop.
nummulariaefolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 198.—Madag.
nutans, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 290.—Reg. Himal.; Burma.
oblongata, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. 573-coriacea.
ovata, *Scheff. Comm. Myrsin.* 41.—Sumatra,
parviflora, *Wall. Cat.* n. 2807.—Reg. Himal.; Malaya,
pergamacea, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 85.—Java,
philippinensis, *A. DC. I. c.* 83.—Ins. Philipp.
picta, A. DC. in Trans. Linn. Soc xvii. (1884) 130 = robusta.
lacemosa, *Hassk. ex Scheff. Comm. Myrsin.* 35.—Java.
ramosa, *Wall. Cat.* n. 6522 (Urticeae ?).—Ind. or.
reticulata, WalL 1. c. 6521 = robusta.
Ribes, *Burm.f. Fl. Ind.* 62. t. 23.—As. trop.
robusta, *Roxb. Hort. Beng.* 16; *Fl. Ind.* i. 587.—Ind. or.
sarmentosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 198.—Madag.
Schimperi, *Vatke.in Linnaea,* xl. (1876) 206.—Abyss,
sessiliniora, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 66.—Burma.
singalangensis, *Scheff. Comm. Myrsin.* 37.—Sumatra.
sumatrana, Miq. PI. Jungh. 188 = E. Ribes.
Tsjeriam-Cottam, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 131-robusta.
umbellulata, Wall. Cat. n. 2812 = Myrsine capitellata.
urophylla, Wall. I. c. n. 2309 = Parastemon urophyllum.
vestita, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 103 = nutans.
vestita, *Roxb. Fl. Ind.ed. Carey,* ii. 288.—Reg. Himal.
villoša, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 199.—Madag.
villosa, A. DC. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 130 -= robusta t
villosa, Wall. Cat. n. 2313, ex parte-Lampani.
villosa, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 289 = robusta.
viridiflora, *Scheff. Comm. Myrsin.* 46.—Ind. or.; Malaya.

EMBELICA. Boj. Hort. Maurit 279 (1837) =seq.

EMBLICA, Gaertn. Frnct ii. 122. t. 108 (1791) - FhyllanthUB, Linn. (Enphorb.).
annua, Rafin. Sylva Tellur. 91—Agyneia bacciformis.
arborea, Rafin. 1. c— P. Emblica.
grandis, Gaertn. Fruct. ii. 12S=Agyneia bacciformis.
officinalis, Gaertn. 1. c. 122. t 108. f. 2 = P. Emblica.
Palasis, Buch.-Ham. iu Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 507 •= Cleistanthus collinus.
pilosa, Spreng. Syst. iii 20 = P. pilosus.
pisiformis, Buch.-Hain. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 606.—Ind. or.
• *racemosa,* Spreng. Syst. iii. 20=Agyneia bacciformis.

ElfBUNOIA. F. Muell. Fragm. ii 2. t. 11 (1860). *CAPPARIDEAE,* [Benth. & Hook. f. i. 968].
calceoliflora, *F. Muell. I. c.* ii. 8.—Austral.

EMBOTHRIT7M, Forst. Char. Gen. 15. t 8, partim. (1776). *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 183.
CATAS, Domb. ex Lam. Encyc. ii. 354 (1786).
OREOCALLIS, R. BT. in Trans. Linn. Soc x. (1810) 196.
alnifolium, Poepp. ex Mdssn.in DC Prod. xiv. 450 = Lomatia obliqua.
angustifolium, Willd. Sp. PI. i 639, in syn. = Grevillea iinearis.
bipinnatum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. i. 633-= Lomatia ferruginea.
buxifolium, Sm. Spec. Bot. N. Holl. 29.110-Grevillea buxifolia.
Chaparro, Humb. in Mappa Aequin.—Cf. R. Br. in Trans. Linn. Soc x. (1810) 221-Roupala cooiplicata.
cinereum, Thib. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 355, 444 » Grevillea sericea.
coccineum, *Forst. Char. Gen.* 16. t. 8.—Reg. Magell.
cordifolium, Willd. ex Roem. *Sc* Schult Syst. i. 533 = Roupala cordifolia.
critkmifolium, Steud. Nom. ed. II. i. 652-Lomatia silaifolia.

EMBOTHKIUM:—
curvatum, Willd. ez Roem. ft Schnlt. Syst. i. 683-Roupala complicata.
cytisoides, Cav. Ic iv. 60-Grevillea linearis, sericea.
dentatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 62. t. 94 = Lomatia dentata.
emarginatum, Rniz ft Pav. 1. c 62. t. 95 =grandiflorum.
ferrugineum, Cav. Ic. iv. 59-Lomatia ferruginea.
genianthum, Cav. 1. c 60 = Grevillea buifofia.
Gilliesii, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 444.—Reg. Argent.
grandifiorum, Bonpl. ex Meissn. 1. c 446 *("Oreocallis Ruirii).*—Perav.
grandifiorum, *Lam. Encyc.* ii. 864.—Ecuador; Perav.
herbaceum, Cav. Ic. iv. 58-Lomatia silaifolia.
kirsutum. Lam. Encyc. ii. 356=Lomatk obliqua.
ilicifolium, Poir. Encyc Suppl. ii. 651 - Lomatia ificifolia.
lanceolatnm, *Ruit (f Pav. Fl. Per.* i. 62. t. 96.—Chili.
lineare, Andr. Bot. Rep. t 272;-Grevillea linearis.
linearifolium, Cav. Ic. iv. 69 = Grevillea linearis.
longifolium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 651=Lomatia longifolia.
majus, Willd. Sp. PI. i. 639, in syn.=Grevilleae sp.?
minus, Willd. 1. c. = Grevillea pnnicea.
monospermum, Ruiz & Pav. FL Per. i. 63 = Ronpala peruviana.
mucronatum, Willd. ex Roem. ft Schnlt. Syst. i. 683—grandiflorum.
myricoides, Gaertn. f. Fract. lit. 215. t. 218=Lomatia longifolia.
myrtifolium, Poepp. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 425, 444 — Ronpala myrtoidea.
cbliquum, Rniz ft Pav. Fl. Per. i. 68. t. 97 = Ronpala diversifolia.
pinnatum, Rniz& Pav. 1. c=Ronpala diversifolia.
Pinol, Domb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 449, 444 — Lomatia dentata.
polystachyum, Willd. ex Roem. ft Schult. Syst. i. 538 *{^Andriapetalum polystachyum).*—N. Granat
ruiricaule, Giord. Oss. (1887).—Cf. Meissn. in DC. Prod. xiv. 451 = Stenocarpos salignus.
rutale, Domb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 450, 444 -Lomatia obliqua.
salicifolium, Vent. Jard. Cels, 8 = Hakea saligna.
solignum, Andr. Rep. Bot. t. 216 - Hakea saligna.
"riceum, Sm. Spec. Bot N. Holl. 25. t. 9 -Grevillea sericea.
silaifolium, Sm. L c. 23. t. 8 = Lomatia silaifolia.
spathulatum, Cav. Ic. iv. 60-Telopea speciosissima.
speciosissimum, Sm. Spec. Bot. N. Holl. i. 19. t 7 - Telopea speciosissima.
'tttiosum, Salisb. Parad. Lend. t. Ill=Telopea speciosissima.
strobilinum, LabilL Nov. Holl. PI. ii. 116. t. 265-Knightia strobilina.
Wlvaticum, Poepp. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 449 = Lomatia dentata.
tinderium, Labill. Nov. HolL PI. i. 31.148 - Lomatia anctoria.
truncatum, Labill. 1. c. 82. t. 44=Telopea truncata.
"mbellatum, Linn. f. Suppl. 128=seq.
fiHielliferum, Font. Char. 16 = Stenocarpns Forsten.
Wiclchami, *Hill V P. Muell. Fragm.* viii. 164.—Anstral.

EMBOTRIUM, Ruix ft Pav. Prod. 15 (1794) -praec.

EMBRYOGONIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 122, 1862 [1866] = Combretum, Linn.
ecutninata, Blame, 1. c 128-C. acuminatnm.
"roorea, Teijsm. & Binn. in Journ. Bot. Neerl. i. (1861) 865 = Terminalia Chebula.
atifolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 122 - C. latifolium.
lucida, Blume, 1. c. - C. rrifoliatum.

EMBRYOPTERIS, Gaertn. Frnct. i. 146. t 29 (1788)-•UiospyroB, Linn. (Ebenac.).
**iscolor,* G. Don, Gen. Syst iv. 41-D. discolor.
gelatinifera, G. Don, 1. c =D. Embryopteris.
glutinifera, Roxb. PL Corom. i. 49 = D. Embryopteris.
glutinifolia, Hort. ex link, Enum. Hort. Berol. ii. 433 "•praec?
«a*i, G. Don, Gen. Syst iv. 41-D. Kaki.
lanceolata, G. Don, 1. c.=D.Toposia.
Loureiriana, G. Don, I. c—D. dodecandra.
P^'grina, Gaertn. Fract. 1.146 ^D. Embryopteris.
'acemosa, G. Don, Gen. Syst. iv. 41 = D. ToposU.

EMELIA, Wight, Ic. Hi. 11 (1846), sphalm.-= Emilia, Cass. (Compos.).

EMELISTA, Rafin. SylvaTcllnr. 127 (1888)-Cassia, Linn. (Legnmin.).
obtusifolia, Rafin. 1. c. = C. Ton.

EMEOBHIZA, Pohl, in Flora, viii. (1825) 183, nomen. *RUBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 146.
ENDLICHERA, Presl, Symb. Bot. i. 73. t. 49 (1832).
brasiliensis, *Walp. Rep.* ii. 469.—Am. trap.
Pohliana, *Presl, Bit. Bemerk.* 86.—Bras.

EMERICIA, Roem. ft Schult. Syst iv. 88, 401 (1819)-Vallaris, Bnrm. f. (Apocyn.).
divaricata, Roem. & Schnlt. 1. c 401 - Sirophanthes divaricatns.
Pergularia, Roem. ft Schult. La=V, Pergulana.
sinensis, Roem. ft Schnlt. 1. c. 402-V. sinensis.

EMERUS, Tourn. ex Mill. Gard. Diet. ed. VI (1752) = Coronilla, Linn. (Legumin.).
aculeatus, Homem. Hort. Hafn. 696 ~ Sesbania acnleata.
alpestris, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 443 = C. Emerus.
Caesalpina, Medic, in Vorles. Churpf. Pbys. Ges. ii. (1787) 368 «C. Emerns.
fruticosus, Homem. Hort. Hafn. 695 - C. Emerns.
grandiflorus, Homem. 1. c. = Sesbania grandiflora.
herbaceus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = Sesbania occidentalis.
hortensis, Desv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 299 - C. Emerns.
major, Mill. 1. en. 1; Moench, Meth. 167 = C. Emerns.
minor, Mill. 1. c. n. 2 - C. Emerus.
pubeseens, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 354 = Sesbania pubeseens.
Sesban, Hornem. Hort. Hafn. 696=Sesbania aegyptiaca.

EMETIC, Neck. Elem. Bot. ii. 214 (1790). *POLYGONACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 101.
CENTOPODIUM, Burch. Trav. i. 840 (1824).
NIBO, Stend. Norn. ed. I 668 (1821).
PODOCENTRUM, Burch. ex Meissn. in linnaea, xiv. (1840) 489.
VIBO, Medic. Phil. Bot i. 178 (1789).
acuta, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46=Rumex acutus.
australis, *Steinh. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. ix. (1838) 195. t. 7.—Austral.
Centropodium, Meissn. in linnaea, xiv. (1840) 490 = australis.
spinosa, *Campd. Rum.* 68.1.1. f. 1.— Enrop.; Afr. bor.

EMILIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 68; et in Diet. Sc. Nat. xiv. 405 (1819). *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. £ ii. 445.
adscendens, *DC. Prod.* vi. 803.—Madag.
amplexicaulis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 190.—Madag.
angnlata, *DC. Prod.* vi. 808.—Arab.
angustifolia, DC. 1. c.= prenanthoidea.
caesphosa, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxlx. (1878) 100.—Afr. trop.
citrina, *DC. ProdM.* 802.—Madag.
coccinea. Sweet, Hort. Brit. ed. III. 882=sagittate,
flaccida, *Mia. Fl. Ind. Bat.* ii. 102.—Sumatra,
flammea, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xiv. 406.—Ind. or.; Ins. Philipp.
gracilis, *DC. Prod.* vi. 308.—Afr. trop.
graminea, *DC. I. c*—Madag.
humifusa, *DC. I. c.* 802.—Afr. trop.
mucronata, WalL Cat. n. 316 = sonchifolia.
prenanthoidea, *DC. Prod.* vi. 303.—Reg. Himal.
prenanthoidea, Thw. Enum. PI. Zeyl. 167 - zeylanica, Walkeri.
pumila, *DC. Prod.* vi. 802.—Afr. trop.
purpurea, Cass. in Diet. Sc. Nat xxiv. 393=sonchifolia.
rigidula, DC. Prod. vi. 302 - sonchifolia.
sagittata, DC. 1. c.= flammea.
scabra, DC. 1. c. 803-sonchifolia.
sinica, Miq. in Journ. Bot Neerl. i. (1861) 105-sonchifolia.
sonchifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 489 = flammea.
sonchifolia, *DC. Prod.* vi. 802.—As. et Afr. trop.
Walkeri, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 387.—Zeylan.
zeylanica, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 176.—Zeylan.

EMINIUM, Schott, Syn. Aroid. 16 (1866)=Helicophyllum, Schott (Aroid.).
Ledebouri, Schott, 1. c. 17-H. crassifolium.

EMMBKANTHE, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1885) 281. *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 830.
MILTITZIA, A. DC. in DC. Prod. ix. 2»6 (1846).
gUberrima, *Torr. ex S. Wats, in Bot. King's Exp.* 257.—Am. bor. occ.
glandulifera, *Torr. ex S. Wats. I. c*—Am. bor. occ.
lutea, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. x.* (187i) 829.—Am. bor. occ.
parviflora, *A. Gray, in Pad/. Rail. Rep.* vi. 84. t. 15.—Am. bor. occ.
penduliftora, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1835) 281.—Calif.
pusilla, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 87.—Am. bor. occ.

EMMENANTHUS, Hook, ft Am. Bot. Beech. Voy. 217 (1836)=IzonantheB, Jack (Lineae).
chinensis, Hook. *Sc* Am. 1. c.-I. chinensis.

EMHENO8PEBMA, F. Muell. Fragm. iii. 62 (1862). *RHAMNEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 999.
alphitonoides, *F. Muell. I. c.* 63.—Austral.
Cunninghamii, *Benth. Fl. Austral,* i. 415.—Austral.
Pancherianum, *Baill. Adansonia,* xi. (1874)' 269.—N. Caled.

EMMENOSPERMUM, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 249,304 (1883) = Phtheiroupermum, Bnnge (Scrophul.).
PariMi, C. B. Clarke, ex Hook. f. *I* c. 304-P. Parishii.

EMMENOSPERMUM, F. Muell. Census, 60 (1882) = Emmenosperma, F. Muell. (Rhamneae).

EMMEORHIZA, Endl. Gen. 666 (1838)-Emeorhiza, Pohl (Rubiac).

EMMOTIUM, Meissn. Comm. 112 (1838) -seq.

EMMOTTTM, Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ 29 (1825). *OLACINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 352.
POGOPETALUM, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 684. t. 42.
SCHNIZLEINIA, Mart, ex Engl. in Mart Fl. Bras. xii. II. 46 (1872).
acuminctum, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. II. x. (1852) 178.—Bras.
affine, Miers, 1. c. 180=acuminatum.
apogon, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 149.—Reg. Argent,
fkgifolium, *Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 29.—Gniana.
glabrum, *Benth. ex Miers, in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* Ser. III. iv. (1859) 366.-Bras,
nitens, *Miers, I. c.* Ser. II. x. (1852) 180.—Bras,
orbiculatum, *Miers, 1. c.* 178.—Bran

EMOBYA, Torr. in Bot. Mcx. Bound. 121. t. 36 (1858). *LOGANIACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 794.
suaveolens, *Torr. 1. c.*—Am. bor. occ.

EMPEDOCLEA, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. L 19. t. 3 (1826). *DILLENIACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 11.
alnifolia, *A. St. Hil. I. c.* 20.—Bras.

EMPEDOCLIA, Rafin. Caratt. Gen. Sic. 78 (1810) = Sideritifl, Tourn. (Labiat).
montana, Rafin. 1. c. 79=-S. sicula.

EMPETBUM, [Tonre.] Linn. Syst. ed. I (1735). *EMPETKACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 414.
aciculare, Bertol. Misc. Bot. xiii. 20 •= Ceratiola ericoides.
album, linn. Sp. PI. 1022-Corema album.
andinum, Phil, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. i. 26. nigrum.
Conradii,1an. in Ann. Lye. N. York, iv. (1848) 83= Corema Conradii.
crassifolium, Rafin. New Fl. Am. ill. 51=nigrum.

EMPETBUM:—
medium, Carmich. in Trans. Linn. Soc. xii. (1818) 508=nigrum.
nignim, *Linn. Sp. PI.* 1022.—Europ.; As. bor.
pinnatum. Lam. Encyc L 567 =Margyricarpus setosua.
procumbent, Gilib. Kxercit. ii. 893 = nignim.
purpureum, Rafin. New Fl. Am. iii. 60 = nignim.
rubrum, Vahl, ex Willd. Sp. PI. iv. 718 = nigrum.
scoticum, Hook, ex Stead, Norn. ed. II. i. 658 = nignim.
serrulatum, Piitu Ialnd. i. 395, sphalm. = Empleurnm senulatum.

EMPHYSOPUS, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 113-Iiaganophora, Cass. (Compos.).
Gunnii, Hook. f.1. c. 114=L. Emphysopus.

EMPLECTOCLADUS, Ton. in Smithson, Contrib. vi. (1854) (PI. Frémont.) 10. t. 5. *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 614.
fasciculatns, *Terr. I. c.*—Am. bor. occ.

EMPLEUBIDIUM, Sond. & Harv. ex Harv. Thes. Cap. i. 49 (1859). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 291.
juniperinnm, *Sond. If Harv. I. c.*—Afr. austr.

EMPLEUROSMA, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 228 (1847)-Dodonaea, Linn. (Sapind.).
virgata, Bartl. 1. c = D. pinifolia.

EMPLETTRTTM, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 810 (1789). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 291.
Aitoni, J. F. Gmel. Syst. 268=senulatum.
ensatum, Eckl. & Zeyh. Enum. 117=serrulatnm.
serrnlatnm, *[Soland. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I. iii. 340. —Afr. austr.

EMPODIUM, Salisb. Gen. PL Fragm. 43 (1866) = Curculigo, Gaertn. (Amaryll.).
plicatum, Salisb. 1. c. 44=C. plicata.

EMPOQONA, Hook. f. in Hook. Ic PI. t. 1091 (1871). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 94.
Kirkii, *Hook.f. I. c*—Afr. trop.

EMPUSA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 825 (1824)=Liparis, Rich. (Orchid).
paradoxa, Lindl. 1. c = L. odorata.

EMPUSARIA, Reichb. Consp. 69 (1828)=praec.

EMULARIA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 63 (1836)= Justicia, Linn. (Acanth.).

EMULINA, Rafin. FL Tellar. iv. 81 (1886)- Convolvulus, Tonrn.
parviflora, Rafin. 1. c.=C. parviflorus.

EMURTIA, Rafin. Sylva Tellnr. 106 (1838) = Eugenia, Mich. (Myrtac).
emarginata, Rafin. 1. c. = E. emarginata.
guayaquilensis, Rafin. 1. c.-E. guayaquilensis.
mierantha, Rafin. 1. c =E. Maximifiana.
punicifolia, Rafin. 1. c.-E. punicaefolia.

ENAIMON, Rafin. Sylva Teltor. 9 (1838) = Olea, Tonrn.
undulata, Rafin. 1. c. = O. laurifolla.

ENALCIDA, Cass. in Bnll. Soc. Philom. (1819) 31 = Tagetes, Linn. (Compos.).
foeniculifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat. xiv. 448=T. coronopifolia.
pilifera, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 31=T. coronopifolia.

ENANTIA, Falc. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 76 = Babla, Colebr.

ENANTIA, Oliver, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 174. *ANONACEAE,* Benth. *8c* Hook. £ L 958.
chlorantha, *Oliver, 1. c.* 175.—Afr. trop.

ENANTIOSPARTON, C. Koch, Dendrol. i. 34 (1869) -Genista, Linn. (Legumin.).
radiatum, C. Koch, 1. c.=G. radiata.

ENANTIOTRICHUM, £. Mey. ex DC. Prod. vi. 443 (1887)=Euryops, Cass. (Compos.).
Athanasiae, E. Mey. ex DC. 1. c. 444 = Euryops speciosissima.
Serra, E. Mey. ex DC. 1. c. =Euryop& Sena.

ENARGEA, Banks, ex Gaertn. Frnct. i. 283 (1788) = LuBiixiaga, Ruiz & Pav. (1802) (Liliac).
marginata, Gaertn. L c. t. 69=L. marginata.

ENARTEA, Steud. Norn. ed. II. i. 553 (1840), sphalm. = praec.

ENABTHBOCABPTTS, Labill. Ic. PL Syr. Dec. v. 4. t. 2 (1812). *CRUC1FERAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 99.
HUSSONIA, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 46 (1849).
anceps, *Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Midic.)* i. (1853) 412.—Hab.?
arcuatus, *Labill. Ic. PI. Syr. Dec.* v. 4.—Reg. Mediterr.
arcuatus, Loisel. Nouv. Not. 29=clavatn«.
Blaisei, *Castagne, Suppl. Cat. PI. Marseille,* 11.—Gallia.
clavatus, *Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. {Sect. Mldic.)* i. (1863) 412.—Afr. bor.
lyratus, *DC. Syst.* ii. 661.—Graecia; AegypL
pterocarpns, *DC. I. c.*—Aegypt.
pterocarpus, Delile, ex Godr. in Mem. Acad. Montp. (Sect. Medic.) i. (1853) 412=anceps.
recurvus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 357.—Algeria,
strangulatns, *Boiss. Diagn.* Ser.,I. viii. 44.—Aegypt; Arab,
trabalis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 358.—Algeria.

ENARTOCARPUS, Poir. in Diet. Sc. Nat. xiv. 444 (1819)=Enarthrocarpus, Labill. (Crucif.).

ENCEIiIA, Adans. Fam. ii. 128 (1763). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 378.
ARMANIA, Bert, ex DC. Prod. v. 576 (1836).
BARATTIA, A. Gray *8c* Engelm. in Proc. Am. Acad. i. (1848) 48.
EUCALIA, Raensch. Norn. ed. III. 251, 385 (1797).
EUCHELYA, Lem. in Orb. Diet. v. 300 (1849).
GERAEA, Ton. & Gray, in Proc. Am. Acad. i. (1847) 48.
PALLASIA, L'Herit. Diss. (1784) ex Alt Hort. Kew. iii. 498 (1789).
SIMSIA, Pers. Syn. ii. 478 (1807).
albescens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 658.—Mexic.
alternifolia, Raensch. Norn. ed. III. 251=canescens.
amplexicaulis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 188.—Mexic.
argophylla, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 667 =Helianthella argophylla.
califomica, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 857.—Calif,
calva, *A. Gray,-in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 658.—Texas.
canescens, *Cav. Ic.* i. 46. t. 61.—Peruv.
conspersa, Benth. Bot. Voy. Snlph. 26 - halimifolia ?
conspersa, A. Gray, Bot. Mex. Bound. 88 = californica.
cordata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 188.—Mexic.
dentata, Poir. Encyc. Suppl. v. 665 = Verbesina dentata.
eriocephala,/I..*Gray, in.Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 657.—Am. bor. occ.
exaristata, *A. Gray, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 183.—Am. bor. occ.
farinosa, *A. Gray, ex Terr, in Emory, Notes Mil. Reconnois.* 143.—Calif.
foetida, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 183.—Mexic
frutescens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 657.—Am. bor. occ.
Ghiesbreghtii, *A. Gray, I. c.* 658.—Mexic.
grandiflora, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 184.—Nicaragua.
halimifolia, *Cav. Ic.* iii. 6. t. 210.—Mexic.
heterophylla, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 184.—Mexic.
hispida, *Anderss. in Galapag. Veget. Ins.* ii. 186.—Ins. Galapag.
hispida, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 184.—Mexic.
lagascaeformis, *A. Gray, ex Hemsl. 1. c.*—Mexic.

ENCEIiIA:—
limensis, Steud. Norn. ed. II. i. 420, in syn.-canescens.
mexicana, *Mart, ex DC. Prod.* v. 678.—Mexic.
microcephala, A. Gray, in Proc Am. Acad. viii. (1873) 657 = Helianthella microcephala.
microphylla, *A. Gray, I. c.* xv. (1880) 37.—Mexic.
nivea, Benth. Bot. Voy. Snlph. 27 = Viguiera nivea,
nudicaulis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 666 = HeliantheUa nndicaulis.
oblongifolia, *DC. Prod.* v. 667.—Chili,
parvifolia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 206.—Pernv.
polycephala, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 184.—Nicaragua.
sangninea, *Hemsl. 1. c.* 185.—Mexic.
scaposa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1673) 657. —N. Mexic.
sericea, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 186.—Guatemala,
stenophylla, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club,* x. (1883) 41.—Am. bor. occ.
subaristata, *A. Gray, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iL 185.—Mexic
tomentosa, *Walp. in Linnaea,* xiv. (1840) 304.—Peruv.
viscida, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 78.—Calif.

ENCENTRUS, Presl, Bot. Bemerk. 33 (1844); in Abb. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 463-Gymnosporia, Benth. & Hook. f. (Celastrin.).
linearis, Presl, 11. cc (= *Celastrus linearis).*—Afr. austr.

ENCEPHALARTOS, Lehm. PngilL vù 3.1.1 ad 5 (1834). *CYCADACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 445.
ARTHROZAMIA, Reichb. Consp. 40 (1828).
acanthus, *Mast, in Gard. Chron.* (1878) II. 810.—Afr. austr.
Altensteinii, *Lehm. Pugill.* vi. 11. t. 4 et 6.—Afr. austr.
Barteri, *Carruth. ex Miq. in Arch. Neerl.* iii. (1868) 243.—Afr. trop.
brachyphyllus, Lehm. & De Vriese, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. iv. (1837-38) 414 = caffer.
caffet, Hook. Bot. Mag. t. 4903-longifolius.
coffer, Lehm. Pugill. vi. 14 = lanuginosus.
caffer, *Miq. Monogr. Cycad.* 63.—Afr. anstr.
caffrorum, Hort. Sion, ex Yates, in Proc Linn. Soc. ii. (1849) 19=caffer.
cycadifolius, *Lehm. Pugill.* vi. 13.—Afr. austr.
Cycadis> Sweet, Hort. Brit. ed. III. 626=caffer.
Denisonii, F. Muell. in Joum. Pharm. Soc. Viet. ii. 90 = Macrozamia Perowskiana.
Douglasii, F. Muell. Census, 110 = Macrozamia Douglasii.
Dyeri, F. Muell. in Melb. Chemist (June 1885) (=Macrozamiae sp.).—Austral,
elongatus, *Miq. in De Hoev. V De Vriese, Tijdschr.* iv. (1837-38) 419.—Afr. austr.
ferox, *BertoLf. in Mem. Ace. Sc. Bolog.* iii. (1851) 264—Afr. trop.
Fraseri, Miq. in Versl. en Med. Akad. Wetensch. xv. (1863) 368-Macrozamia Fraseri.
Friderid-Guilielmi, Lehm. Pugill. vi. 8 = cycadifolius.
Ghellinckii, *Lem. Illustr. Hortic.* (1868) 79. t. 667.—Afr. austr.
Hildebrandtii, *A. Br. & Bouchl, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1874) 8.—Afr. trop.
horridus, *Lehm. Pugill.* vi. 14.—Afr. trop.
lanuginosus, Hort. ex Miq. in Verh. Kon. Acad. Wetensch. II. iii. (1869) 55 = Macrozamia Pauli-Guilielmi.
lanuginosus, *Lehm. Pugill.* vi. 14.—Afr. austr.
lati/olius, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 626-Zamia latifolia.
latifrons, *Lehm. in Hoev.* b* *De Vriese, Tijdschr.* iv-(1837-38) 424.—Hab.?
Lehmanni, *Lehm. Pugill.* vi. 14.—Afr. austr.
longifolius, *Lehm. 1. c.*—Afr. austr.
Macdonelli, F. Muell. ex Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wet. xv. (1863) 376 - Macrozamia Fraseri.
Mactenii, Hort. ex Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. II. UL (1869) 65-Macrozamia Pauii-Guilielmi

BNCEPHAXAKTO8:—
Marumii, De Vriese, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. T. (1838-39) 187 = Altensteinii.
mauritianus, Miq. Monog. 48 = LehmannL
Miquelii, V. Muell. Fragm. iii. 88 = Macrozamiu Miqnelii.
Moorti, F. Muell. 1. c. xi. 125 (Macrozamiae sp.).—Austral.
nanus, Lehm. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. iv. (1837-38) 421=horridus.
Oldfieldii.Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xv. (1863) 370=Macrozamia Fraseri.
Pauli-Guilitlmi, F. Muell. in Trans. Phann. Soc. Viet. ii. 91 = Macrozamia Pauli-Guilielmi.
Poggei, *Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xx.(1878) p. xxxv.—Afr. trop.
Preissii, F. Muell. in Joum. Phann. Soc. Viet. ii. 90 = Macrozamia Fraseri.
pruniferus, *Sweet, Hort. Brit. ti.* III. 626.—Hal). ?
pumilus, Sweet, 1. c.=Zamia pumila.
pungens, *Lehm. Pugill.* vi. 18.—Afr. austr.
repandus, Sweet, Hort Brit. ed. III. 626 = Zamia repanda.
spinulosus, Lehm. in Hoev. & De Vriese, Tiidschr. iv. (1837-88) 420 = Lehmanni.
spiralis, Lehm. Pugill. vi. 13 = Macrozamia spiralis.
tridentatui, *Lehm. I.e.—Air.* austr.
VanhallU, De Vriese, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. iv. (1887-88) 422 = horridus.
Verschaffelti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) . HI; *Gartenfl.* (1875) 85. t. 822.—Hab. »
villosus, *Lem. Illustr. Hortic.* (1868) *Misc.* 69. t. 657. —Afr. austr.

ENCEPHALLARTES, Endl. Gen. Suppl. ii. Add. 108 (1842) = praec.

ENCHELYA, Lem. in Orb. Diet. v. 300 (1849) = Enoelia, Adaus. (Compos.).

ENCHIDION, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. H. 1256 (1866) -seq.

ENCHIDIUM, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 89 ; reimpr. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1836) 257 -Trigostemon, Blume (Euphorb.).
verticillatum, Jack, 1. c. = T. indicus.

ENCHOLIRION, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 667 (1888) -seq.

ENCHOLIRIUM, Mart, in Schult. f. Syst vii. 68,1288 (1880)-Dyckia, Schult. f. (Bromel.).
Augustae, R. Schomb. in Verh. Preuss. Gartenb. Ver. (1846) 18. t. 2.—Cf. Bot. Zeit. iv. (1846) 454 = Caraguata Augnstae.
ctrallinum, Linden, ninstr. Hortic. xviii. (1871) t. 70 -Tillandsia corallina.
Garreli, Beer, Bromel. 27-D. altissima.
Jonghii, Ubon, in Koch, Allg. Gartenz. (1857) 22=T. Jonghii.
Saundersii, Hort. in Rev. Hortic. (1872) 800 j Andre, in Illustr. Hortic. xx. (1873) t 182=Tillandsia Saundersii.
sfiectaiile. Mart ex Schult. f. Syst vii. II. 1283 (Dyckiae sp.).—Bras.
**ghii,* Can. in Rev. Hortic. (1878) 140.—Hab.?

ENCHYDRA. F. Muell. Fragm. Hi. 139 (1868) sphalm. =Enhydra, Lour. (Compos.).

ENCHYLAENA, R Br. Prod. 407 (1810). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 61.
EUCHYLAENA, Spreng. Gen. i. 228 (1880).
**eyptiaca,* Spreng. Syst. i. 923 = Suaeda baccata.
orysthenis, Spreng. 1. c.=Suaedabacdfera.
"fginata, *Benth. Fl. Austral,* v. 182.—Austral,
nucrantha, *Benth. I. c.* 181.—Austral,
nuciophylla, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 128.—Austral.
Paradoxa, R. Br. Prod. 408=tomentosa.
physophora, Spreng. Syst. i. 923=Suaeda physophora.
pubescens, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 128=tomentosa.
tomentosa, *R. Br. Prod.* 408.—Austral.
"Uosa, *p. Muell. in Trans. Phil.Inst. Viet.* ii. (1858) 76.—Austral.

ENCHYLUS, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789)=Sedum, Tourn. (Crassul.).

ENCHYSIA, Presl, Prod. Monog. Lobel. 40 (1836)-Iiaurentia, Neck. (Campanulac).
Baueri, Presl, 1. c.=Isotoma fluviatilisT
dentata, A. DC. in DC. Prod. vii. 409-L. repens.
erecta, A. DC. 1. c.=L. repens.
erinoides, Presl, Prod. Monog. Lobel. 40, excl. syn.» L. repens.
Gaudichaudii, Presl, L c. 41=Isotoma fluviatilis?
Lessonii, Presl, 1. c. 40 = Isotoma fluviatilis?
repens, Presl, 1. c. = L. repens.
scapigera, Presl, 1. c. 41 - Isotoma scapigera.
secunda, Sond. in Harv.& Sond. Fl. Cap. iii. 551 = L. repens.

ENCILIA, Reichb. Norn. 166 (1841)=Ercflla, A. Juss. (Phytolac.).

ENCKEA, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 690-Piper, Linn.
Amalago, Griseb. Cat PI. Cub. 64-P. cnbense.
Amalago, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 169, partim=P. unguiculatum.
articulata, Griseb. Cat. PI. Cub. 65 = P. tenue.
blattarum, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 696-P. blattarnm.
calif arnica, Kunth, 1. c. 601 = P. califomicum.
calif arnica, Miq. Syst. Pip. 363 = P. triquetrum.
ceanothifolia, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 697 = P. ceanothifolium.
decrescens, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 440=P. decrescens.
discolor; Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 596-P. Berteroanum.
dubia, Kunth, 1. c. 606-P. Poiteanum.
glaucescens, Kunth, 1. c. 593 = P. unguiculatum.
heptandra, Miq. Syst. Pip. 850 = P. heptandrum.
Kunthii, Miq. 1. c. 363 = P. Kunthii.
laevigata, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 602=P. laevigatum.
laevigata, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 440=P. tenue.
lata, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 606-P. latum.
Lessertiana, Miq. Syst. Pip. 849=P. tenue.
Lindenii, Miq. 1. c. 868 = P. Lindenii.
Martiana, Miq. in Linnaea, xx. (1817) 132 =P. Enckea.
miconiaefolia, Benth. Bot. Voy. Sulph. 167-P. miconiaefolium.
orthostackya, Kunth, in Linnaea, xiii. (1889) 601= P. orthostachyum.
plantaginea, Kunth, 1. c. 599 = P. medium.
platyphyUa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 167 = P. platyphyllum.
reticulata, Miq. Syst. Pip. 366=P. reticulatum.
Sehlechtendalii, Miq. 1. c. 362 = P. Schlechtendalianum.
Sieberi, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 170 = P. medium.
Sieberi, Miq. Syst. Pip. 358 = P. Sieberi.
smilacifolia, Kunth, in Linnaea, xiii. (1889) 605= P. smilacifolium.
stipulacea, Kunth, 1. c. 600=P. stipulaceum.
subpanduraeformis, Miq. in Linnaea, xxvi. (1853) 217 =P. panduratum.
Svarttii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 169 = P. medium.
tenuis, Knnth, in Linnaea, xiii. (1839) 608 = P. tenue.
unguiculata, Kunth, 1. c. 592 = P. unguicnlatum.
variifolia, Miq. Syst. Pip. 855-P. variifolium.
vernicea, Miq. 1. c. 359—P. orthostachyum.

ENCKIANTHUS, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 137 (1829)=EnkianthUB, Lour. (Ericac).

ENCKLEIA, Pfeiff. Nom. i. 1199 (1874)-ENKLEIA, Griff.=IiinoBtoma, Wall. (Thymel.).

ENCLIANDRA, Zucc. in Abh. Akad. Muench. ii. (1837) 385—Fuchsia, Linn. (Onagrar.).
parvifiora, Zucc. L c 337 = Y. Encliandra.
thymifolia, Lilja, in Linnaea, xv. (1841) 262 = F. thymifolia.

EXTCOPA, Griseb. Cat. PI. Cub. 184 (1866). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 967.
tenuifolia, *Griseb. 1. c*—Cuba.

ENCOPEA, Presl, Bot. Bemerk. 83 (1844); in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1846) 513 = Faramea, Aubl. (.Rubiac).
umbellifera, Presl, 1. c. ••= F. umbellifera.

ENCOPIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 126-praec

ENCUREA, Walp. Rep. i 414 (1842) = ENOUREA, Aubl. =PaiUUnla, Linn. (Saplndac.).

ENCYANTHUS, Spreng. Syst. ii. 287 (1826)= Enkianthus, Lour. (Ericac).

ENCYCLA, Benth. in DC. Prod. xiv. 10, in syn. (1856) sphalm. = EUCYDA, Nntt.=Eriogonum, Michx. (Polygon.).

ENCYCLIA, Hook. Bot. Mag. t. 2881, 3013 (1828) = Epidendrum, Linn. (Orchid.).
amaionica, A. Brongn. ex Neum. in Rev. Hortic. Sér. II. iv. (1845-46) 137.—Bras.
chloroleuca, Neum. 1. c. 138 = Epid. chloroleucum.
Duboisiana, Neum. 1. c. 187 = tpid. Duboisianum.
Hermentiana, A. Brongn. ex Neum. 1. c. 138.—Venezuela.
maerochyla, Neum. 1. c. 187-Epid. atropurpureum.
mexicana, Hort. Berol. ex Otto & Dielr. Allg. Gartenz. v. (1837) 88, nomen.—Mexic.
patens, Hook. Bot. Mag. t. 3018 = Epid. odoratissimum.
phoenicea, Neum. in Rev. Hortic. Ser. II. iv. (1846-46) 137 = Epid. phoenicenm.
viridifiora, Hook. Bot. Mag. t. 2831.—Bras.

ENCYCLIA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 10 (1838)=Polystachya, Hook. (Orchid.).
macrostachya, Poepp. & Endl. 1. c. 11 = Epidendrum armeniacum.'
nana, Poepp. & Endl. 1. c. 10.—Peruv.
polystachya, Poepp. & Endl. 1. c.—Pemv.

ENCYCLIUM, Neum. In Rev. Hortic. Sér. II. iv. (1845-46) 187 = Epidendrum, Linn. (Orchid.).

ENDALLEX, Rafin. in Ser. Bull Bot. i. (1880) 220 = Phalaris, Linn. (Gramin.).
arundinacea, Rafin. 1. c. = P. arundinacea.

ENDAMMIA, Rafin. New Fl. Am. iii. 49 (1836) = Corema, D. Don (Empetr.).
ericoides, Rafin. 1. c. = C. Conradi.

ENDECARIA, Rafin. Sylva tellur. 102 (1838) = Cuphea, P. Br. (Lythrar.).
coccinea, Rafin. 1. c = C. Llavea.

ENDEISA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 51 (1836)=Dondrobium, Sw. (Orchid.).
fiava, Rafin. 1. c.-D. densiflornm.

ENDEMA, Pritz. Ic. Ind. i. 398 (1865) sphalm. = EUDEMA, Humb. & Bonpl. = Braya, Stemb. & Hoppe (Crucif.).

ENDERA, Regel, Gartenfl. U872) 226. t. 732 = Taocarum, Brongn. (Aroid.).
conophalloidea, Regel, 1 c. = T. cylindricnm.

ENDESFERMUM, Blume, Cat. Gew.Bnitenz. 92 (1823) =Salbergia, Linn. (Legumin.).
diversifolium, Blnme, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 128-D.Sissoo.
pendulifiorum, Zipp. ex Miq. I. c. 183-D. stipulacea.
retusum, Blume, ex Miq. 1. c. 181 = D. tamarindifolia.
scandens, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 92=D. Championii t
eeylanicum. Champ, ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 94 «D. Championii.

ENDIANDBA, R. Br. Prod. 402 (1810). *LAVRINEAE,* Benth. & Hook.f. iii. 154.
DICTYODAPHNE, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 270 (1850).
SILVAEA, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 84 (1864).
SILVIA, Allem. Diss. Rio Janeiro (1846).
Candolleana, Meissn. ex Kurz, For. FL Brit. Burma, ii. 295 = Dehaasia cuneata.
cuneata, *Mtq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 919.—Sumatra,
discolor, *Benth. Fl. Austral,* v. 301.—Austral,
firma, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* ii. 61.—Ind. or.
glauca, *R. Br. Prod.* 402.—Austral,
hypotephra, *F. Muell. Fragm.* v. 166.—Austral.
jamaicensis, Spreng. Syst. i. 176 - Acrodiclidium jamaicense.
Muelleri, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 609.—Austral,
pubens, *Meissn. I. c*—Austral.

ENDIANDBA:—
rubescens, *Blume, ex Miq. PI. Jungh.* 176.—Java.
Sieberi, *Nees, Syst. Laurin.* 194.—Austral,
anmatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* 1.1. 919.—Sumatra,
virens, *F. Muell. Fragm.* ii. 90.—Austral.
viridis, J. Pre»l, Rostl. ii. 63 = Acrodiclidium jamaicense.

ENDIPLUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1811) S56; (1819) 191-Phaoelia, Juss. (HydroplyU-)-
bifidus, Rafin. 1. c. (1811) 356.—Am. bor.
phacelioides, Rafin. in Joura. Phys. lxxxix. (1819) 99 = P. Endiplus.

ENDIUSA, Alef. in Oestr. Bot Zeit. iz. (1859) 869 = Viola, Tourn. (Legumin.).
hirsuta, Alef. 1. c. 360 - V. hiranta.
Loisefeurii, Alef. 1. e. *(=Ervum Loiseleurit).—'Eaiop.*

ENDLICHERA, Presl, Symb. Bot. i. 73. t. 49 (1832)-Emeorhiza, Pohl (Rabiac).
brasiliensis, Presl, 1. c = Emeorhiza brasiliensis.

ENDLICHERIA, Nees, in Linnaea, viii. (1883) 37 = Aydendron, Nees (Lanrin.).
anomala, Nees, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. II. 283 *(= Goeppertia anomala).—Bias,*
hirsuta, Nees, in Linnaea, viii. (1883) 88 = Cryptocarya hirsuta.
sericea, Nees, 1. c. *(= Goeppertia serieea).*—Ind. oce.

ENDOCARPA, Rafin. Sylva Tellnr. 135 (1838) - Cryptocarya, R. Br. (Laurin.).
corymbosa, Rafin. 1. c—C. dubia.

EMTDOCEIiLION, Turcz. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1865; I. 375, in nota. *COMPOS1-TARUM* genus dubium.
boreale, *Turcn. I. c.*—Rossia.

ENDOCODON, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 49 (1886) = Calathea, G. F. W. Mey. (Scitamin.).
webrina, Rafin. 1. c. = C. zebrina.

ENDOCOMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 57 (1836) = Bottionea, Colla (Liliac.).
parviflora, Rafin. 1. c. = B. thysanotoides.
peruviana, Rafin. 1. c - B. thysanotoides.

ENDODACA, [Schlecht. in] Linnaea, ix. (1884) Litt. 98-seq.

ENDODECA, Rafin. Med. Fl. i. 62 (1828)=AriatOlochia, Linn.
Bartonii, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 600-A. Serpentaria.
dodecandra, Rafin. Med. Fl. i. 62-A. Serpentaria?
hastata, Rafin. Fl. Tellur. iv. 99 = A. Serpentaria?
polyrrhisos, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 601-A. Serpentaria.
sempervirens, Rafin. Fl. Tellur. iv. 99 = A. sempervirens.
Serpentaria, Rafin. Med. Fl. i. 62 = A. Serpentaria.

ENDODE8MIA, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 166 (1862). *HYPBRICINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 166.
calophylloides, *Benth. I.* t.—Afr. trop.

ENDODIA, Rafin. Neogenyt 4 (1826)-Leer-la, Sw. (Gramin.).
lenticularis, Rafia. 1. c.-L. lenticnlaris.

ENDOCLES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 51 (1866)-Zigadenus, Michx. (Liliac).
laetum, Salisb. 1. c.-Z. muscaetoxicns.

ENDOGONA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27 (1836)-Antherloum, Linn. (Liliac.).
Adenanthera, Rafin. 1. c. 28-DJanella ensifolia.
ramosa, Rafin. 1. e. = A. ramosum.

ENDOGONIA, Lindl. Veg. Kingd. 656 (1847) - Trigonotia, Stev. (Boragin.).

ENDOISILA, Rafin. Sylva Tellur. 114 (1838; =-Euphorbia, Linn.
ifyrsinites, Rafin. 1. c.-E. Myrsinites.

ENDOLASIA, Tnrcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 579=ManettU) Mutis (Rubiac).
Funckii, Turcz. 1. c. 680.—N. Granat.

ENDOLEPIS, Toir. ex A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. xii. II. (Bot. Stev. Exped.) 47 (1860)-Atriplex, Linn. (Chenop.).
Suckleyi, Torr. 1. c. = A. Endolepis.

ENDOLEUCA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 47; et Diet. Sc. Nat. xiv. 474 = Metalasia, R. Br. (Compos.).
pulehelta, Cass. in Diet. Sc. Nat xiv. 474-M. Cephalotes.
sphaerocephala, Cass. 1. c 475 = M. Cephalotes.

ENDOLOMA, Rafin. Sylva Tellur. 79 (1838)-Bignonla, Linn.
purpurea, Rafin. 1. c 80=B. purpurea.

ENDOMELAS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 67 (1836)=Thunbergia, Linn. f. (Acanth.).
alata, Rafin. 1. c.-T. alata.

ENDONEMA, A. Jnss. in Ann. Sc Nat. *Sir.* III. vi. (1846) 26. t 3. *PENAEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 202.
GLISCHROCOLLA.A. DC. in DC. Prod. xiv. 490 (1856).
retzioides, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1860) 103.—Afr. austr.
Thunbergii, *A. Juss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vi. (1846) 19,26. t 3.—Afr. austr.

ENDOPAPPUS, Sch. Bip. in Bonplandia, viii. (1860) 369^Chrysanthemum, Toura. (Compos.).
macrocarpus, Sch. Bip. 1. c. *(— Pyrethrum macrocarpum).*—Alger.

ENDOPLECTRIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (1836) = Epimedium, Tourn. (Berberid.).
tricolor, Rafin. 1. c. 57=»Epim. macranthum.

ENDOPOGON, Nees, in Wall. PI. As. Rax. iii. 76 (1832) ---Strobilanthes, Blume (Acanth.).
Amomum, Nees, in Wall. 1. c. 99=S. consanguineus.
argutus, Nees, in DC. Prod. xi. 104 =S. viscosus.
capitatus, Wight, Ic. *iv.* t. 1499=S. foliosus.
consanguineus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 99=S. exareolatus.
cuspidatus, Benth. in Linnaea, xxiv. (1851) 646=S. cuspidatus.
decurrens, Nees, in DC. Prod. xi. 106 - S. adnatus.
digitalis, Nees, 1. c. 104=S. viscosus.
foliosus, Wight, Ic iv. t. 1601 - S. foliosus.
Gardnerianus, Nees, in DC. Prod. xi. 723=S. Gardnerianus.
hypoleucus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 99 = S. consanguineus.
integri/olius, DaU.in Hook. Kew Joura. ii. (1860) 842 = S. perfoliatus.
khasyanus, Nees, in DC. Prod. xi. 104=S. adnatus.
macrostegius, Nees, 1. c. = S. macrostegins.
rhamnifolius, Wight, Ic. iv. t 1621 = S. rhamnifolius.
Strobilanthes, Wight, 1. c. t. 1500 - S. Zenkerianns.
versicolor, Wight, 1. c. t. 1497 = S. cuspidatus.
•viscosus, Am. ex Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 313 - S. viscosus.
mtellinus, Nees, in DC. Prod. xi. 728 = Phlogacanthus asperulus.

ENDOPOGOU", Rafin. FL TeUur. ii. 54 (1836). *RUBIACEAE* (Quid!),
pnmilum, *Rafin. 1. c.* 65.—Am. bor.

ENDOPTERA, DC. Prod. vii. 178 (1888)-Crepia, Linn. (Compos.),
aspera, DC. 1. c. = C. aspera.
dichotoma, Boiss. *M* Bal. Diagn. Ser. II. iii. 98 = C. multiflora.
Dioscoridis, DC. Prod. vii. 179 = C. Dioscoridis.
intermedia, Boiss. *8c* BaL Diagn. Ser. II. iii. 99.—Syria.

ENDORIM A, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195 •= Baldwtnia, Nutt. (Compos.).
tnodesta, Rafin. FL Tellur. ii. 91 = B. nniflorat

ENDOSIPHOU, T. Anders, ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 1086 (1876). *ACANTHACEAE.* Benth. *8c* Hook. f. L c.
pumiloides, *T. Antlers. I. c.*—Afr. trop.

EHDOSFEBMTTM, Benth. Fl. Hongk. 304 (1861). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 322.
CAPELLENIA, Teijsm. *8c* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxix. (1866) 239.
bomeense, *Benth. ex Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 469.—Borneo.
chinense, *Benth. Fl. Hongk.* 304.—China; Malaya,
formicarum, *Becc. Malesia,* ii. (1884) 44.—N. Guinea,
malaccense, *Benth. ex Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 469.—Malaya.
moluccanum, *Becc. Malesia,* ii. (1884) 38.—Ins. Amboina.

ENDOSPERMUM, Endl. Gen. 1304 (1841)-ENDESPERMUM, Blume=Dalbergia, Linn. (Legumin.).

ENDOSTELBA, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 675. *TILIACEAE1'* Genus dubium,' Benth. & Hook. f. i. 985.
oppositifolia, *Turct. I. c*—Ins. S. Vincent.

ENDOSTEPHIUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 227 = Oalipea, Aubl. (Rutac).
jasminoides, Turcz. 1. c. = G. multiflora.

ENDOTHECA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 98 (1886) = ENDODECA, Rafin. = Ariatolochia, Linn.

ENDOTIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 21 (1886)-AUium, Tonm. (Liliac).
pyrenaica, Rafin. 1. c.-A. suaveolens.

ENDOTRICHE, Steud. Norn. ed. I. 298 (1821) = Cfentiana, Tonm.
campestris, Steud. L c. = G. campestris.

ENDOTROPIS, Endl. Gen. 591 (1838) = Cynanehum, Linn. (Asclep.).
auriculata, Decne. in DC. Prod. viii. 546 = C. auriculatum.
caudata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 128 = C. Wilfordi.
Jacquemontii, Decne. in DC. Prod. viii. 547 - C. Jacquemontianum.
Meyeri, Decne. 1. c. 546-C. virens.
Roylei, Decne. 1. c. 647=C. Roylei.

ENDOTROPIS. Rafin. Sylva Tellur. 31 (1838) - Bhamnus, Linn.
oleifera, Rafin. 1. c.=R. califomica.

ENDRACHIUM, Juss. Gen. 138 (1789) = Humbertia, Comm. (Convolv.).
madagascariense, J. F. Gmel. Syst 389 = H. madagascariensis.

ENDRESSIA, T, Gay, in Ann. Sc Nat. Sér. I. xxvi. (1832) 223=XigUBtlouin, Linn. (Umbellif.).
pyrenaica, J. Gay, 1. c. 224 •= L. pyrenaicum.

ENDU8A, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat Hist. Ser. II. viii. (1851) 172 (nomen tantum). *OLACINEAE* Benth. & Hook. f. i. 845.

ENDUSIA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 525 (1865)-ENDIUSA, Alef. -• Vioia, Tourn. (Legumin.).

ENDYMION, Dam. FL Belg. 140 (1827) = Soilla, Linn. (Liliac).
amoenulus, Nym. Consp. 781—S. sibirica.
campdnulatus, Parl. Fl. Ital. ii. 478 = S. hispanica.
cedretorus, Pomel, Nouv. Mat. Kl. Atl. 384.—Algeria.
cernuus, Dum. Fl. Belg. 140 = S. festalis.
nonscriptus, Garcke, Fl. Dentschl. ed. I. 322 - S. festalis.
nutans, Dum. Fl. Belg. 140 - S. festalis.
patulus, Dum. 1. c. = S. hispanica.

ENEMION, Rafin. in Jonro. Phys. xci. (1820) 70-Isopyrum, Linn. (Ranunculac).
biternatum, Rafin. 1. c. = 1. bitematum.
Raddeanum, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) II. 61 = I. Raddeanum.

ENEMIUM, Stead. Norn. ed. II. i. 564 (1840)-praec.

ENEMOSYNE, Lehm. PL Preiss. ii. 236 (1847). sphalm. =EremoByne, Endl. (Saxifrag.).

ENEODON, Rafin. FLTellur. iii. 88 (1836) =Leucaa, R. Br. (Labiat,).
uTticifolia, Rafin. 1. c.-L. urticaefolia.

ENOELHAEDTIA, Leschen. ex Blume, Bijdr. 528 (1825); Fl. Jav. fasc. viii. 6 (1828). *JVGLANDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 899.
OREOMUNNEA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 52.
PTERILEMA, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 18.
aceriflora, *Blume, Fl. Jav.* t 2, 5.—Reg. Himal.; Malaya.
chrysolepis, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. XT. (1861) 227-Wallichiana.
Colebrookiana, *Lindl. in Wall. PI. As. Rar.* iii. 4. t. 208.—Reg. Himal.; China.
Oreomunnea, *C. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 36.—Am. centr.
palembanica, Miq. Fl. Ind. Bat.Suppl. 346-serrata.
parrifolia, *C. DC. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 85.—Ins. Fhilipp.
philippinensis,C DC. 1. c.=»picata.
polystachya, *Radlk. in Sittb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 385.—Ind. or.
rigida, *Blume, Bijdr.* 528.—Java.
Roxburghiana, Lindl. in Wall. Cat. n. 4940=spicata.
selanica, Blume, Fl. Jav. Jngl. 8=Shorea selanica.
serrata, *Blume, Fl. Jav.* t. 2, 6.—Malaya,
spicata, *Blume, Bijdr.* 528.—Reg. Himal.; Malaya.
vMosa, Knrz, For. Fl. Brit. Banna, ii. 491= Colebrookiana.
Wallichiana, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 4942.—Malaya.

ENGELIA, Karst ex Nees, in DC. Prod. xi. 721 (1847) = Mendoncia, Veil. (Acanthac).
tovarensis, Klolzch & Karst. ex Nees, 1. c—N. Granat.
villosa, Klotzch ft Karst. ex Nees, 1. c—N. Granat.

ENGELMANNIA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 253 = Croton, Linn. (Enphorb.).
Nuttalliana, Klotzsch, 1. c - C. monathogynas.

ENGELMANNIA, Pfeift in Bot. Zeit. iii. (1846) 678 = Cusouta, Linn. (Convolv.).
migrant, Pfeiff. 1. c. 674=C. racemosa.
suaveolens, Pfeiff. 1. c iv. (1846) 21 = C. racemosa.

ENGELMANNIA, Ton. ft Gray, Fl. N. Am. ii. 288 (1841). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 351.
ANGELANDRA, Endl. Gen. Suppl. iii. 69 (1843).
ENGLEMANNIA, A. Gray, ex Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. vii. (1841) 343.
pinnatifida, *Torr. (f Gray, I. c*—Am. bor. occ.

ENGLEMANNIA, A. Gray, ex. Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 843-praec.

EWHALTTS, Rich, in Mém. Inst. Par. ii. (1811) (Math.-Phys.), 64. *HYDROCHARIDEAE,* Benth. ft Hook, t iii. 464.
acoroides, Rich, ex Chatin, Anat. PI. Aquat. 15. t. 6 = Koenigii.
Koenigii, *Rich, in Mim. Inst. Par.* ii. (1811) *{Math* Phys.),* 78.—Malaya ; Austral.
>**trinus,* Griff. Notul. iii. 178=Koenigii.

ENHYDBA, Lour. Fl. Cochinch. 610 (1790) (Enydra). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 860.
CRYPHIOSPERMUM, Beanv. FL Owar. iL 24. t. 74 (1806).
HINGCHA, Roxb. Hort. Beng. 62 (1814) ; DC. Prod. m v. 636 (1886).
MEYKRA. Schreb. Gen. 570 (1791).
PHYLLIMENA, Blume, ex DC. Prod. v. 636, in syn. (1836).
SOBREYRA, Ruiz ft Pav. Prod. 109. t 23 (1794).
SOBRYA, Pen. Syn. ii. 478 (1807).
TETRACTIS, Endl. Gen. 419, in syn. (1838).
TETRAOTIS. Reinw. in Blume, Bijdr. 982 (1826).
WAHLENBERGIA, Schum. ft Thonn. Beskr. Gain. PL J87 (1827).

ENHYDBA:—
affinis, *Didrichs. Ind. Sent. Hort. Haun.* (1849) 14.—Peruv.
Anagallis, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1848) 409.—Am. austr.
caesulioides, Cass. in Diet. Sc Nat. xiv. 554 = flactnans.
fluctuans, *Lour. Fl. Cochinch.* 511; *ed. Willd.* 625.—Cochinch.
Heloncha, DC. Prod. v. 637=palndosa.
integrifolia, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1848) 410.—Bras.
longifolia, DC. Prod. v. 637=paludosa.
maritima, *DC. I. c*—Peruv.
maritima, Less, in Linnaea, vi. (1831) 169 = sessilis.
oblonga, *DC. Prod.* v. 637.—Peruv.
paludosa, *DC. I. c.*—Ind. or. j Malaya; Austral,
rivularis, *Gardn. in Hook. Land, journ. Bot.* vii. (1848) 410.—Bras.
sessilU,*DC. Prod.* v. 687.—Ind. occ.
Sobreyra, *DC. 1. c.*—Peruv.
subcuneata, DC. Prod. 1. c-seisilis.
Wooilsii, F. Muell. Fragm. iii. 139=paludosa.

ENHYDRIA, Kanitz, in Mart. Fl. Bras. xii. II. 380 (1882)=ENYDRIA, Vell.-Myriophyllum, Ponted. (Halorag.).

ENICO8ANTHUM, Becc in Nuov. Giom. Bot. iii. (1871) 188. *ANONACEAE.*
paradoxum, *Becc. 1. c.* 184.—Borneo.

ENICOSTEMA, Blame, Bijdr. 848 (1826). *GENTIANEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 807.
ADENEMA, G. Don, Gen. Syst. iv. 201 (1837).
HENICOSTEMMA, Endl. Gen. 60S (1838).
HIPPION, Spreng. Syst. i. 605 U828).
LEPINEMA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 26 (1886).
SLEVOGTIA, Reich. Consp. 133 (1828).
littorale, *Blume, I. c*—Reg. trap.

ENICOSTEMMA, Stead. Norn. ed. II. i. 655 (1840). preec.

ENIPEA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 92 (1886)-Salvia, Tourn. (Labiat.).
formosa, Rafin. 1. c—S leonuroides.

ENKEA, Walp. Ann. i. 603 (1848-49) - ENCKEA, Kunth-Piper, Linn.

EBTKIANTHTJS, Lour. Fl. Cochinch. 276 (1790). *ERICACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 688.
MEISTERIA, Sieb. & Zncc in Abh. Akad. Mnench. iv. III. (1846) 127. t. 1.
MELIDORA, Noronha, ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. ii. (1817) 156. partim.
TRITOMODON, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 684.
biflorus, Lour. Fl. Cochinch. 277 - Rhododendron indicum ?
camponulatus, *Nichols. Did. Gard.* i. 610.—Japon.
himalaicus, *Hook.f. (f Thorns, in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 125.—Reg. Himal.
japonicus, *Hook. Bot. Mag.* t. 5822.—Japon.
qninqueflorus, *Lour. Fl. Cochinch.* 277.—China.
reticulatus, Lindl. in Bot. Reg. t 885 = qninqueflorus.
uniflorus, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 489.—China.

ENKLEIA, Griff, in Calc. Journ. Nat Hist. iv. (1844) 234 = Iinostoma, Wall. (Thymel.).
malaccensis, Griff. I. c. 285=L. scandens.
malayana, Griff. Notul. iv. 863 = praec.

ENKYANTHUS, DC. Prod. vii. 732 (1889)-EnkianthuB, Lour. (Ericac).

ENKYLIA, Griff. PL Cantor. 26 (18871) i and in Journ. As. Soc. Beng. xxiiL (1854) 645-OynoBtemma, Blume (Cucurb.).
digyna, Griff. 11. cc. 27, 645 = G. pedatnm.
trigyna, Griff. 11. cc. 27, 646 = G. pedatum.

ENKYLISTA, Benth. ft Hook. f. Gen. ii. 38 (1873), sphalm. = EUKYLISTA, Benth. - ColyoophyUum, DC. (Rubiac).

ENNEAPOGON, Desv. ex Beanv. Agrost. 81 (1812); et Journ. Bot. L (1813) 70=Pappophorum, Schreb. tGramin.).
Desvauxii, Beanv. Agrost. 82, 161-P. nigricans.
gracilis, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 70-P. nigricans.
mollis, Lehm. Pugill. iii. 40=P. molle.
nigricans, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 70-P. nigricans.
pallidus, Desv. 1. _c—P. nigricans.
persicus, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 71 = P. persienm.
phleioides, Roem. ft Schult. Syst. ii. 616 = P. phleioides.
purpurascens, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 70=P. nigricans.
scaber, Lehm. Pugill. iii. 41-P. scabrum.

ENNEPTA, Rafin. Sylva Tellur. 52 (1838) = Hex, Tourn.
atomaria, Rafin. 1. c.=I. lucida.
coriacea, Rafin. 1. c. = 1. lucida.
myricoides, Rafin. 1. c. -L glabra.

ENODIUM, Gaudin, Agrost Helv. i. 145 (1811) = Molinia, Schrank (Gramin.).
atrovirens, Dum. Obs. Gram. Belg. 108=M. caerulea.
caeruleum, Gaudin, Agrost. Helv. i. 145 = M. caerulea.
Morale, Kunth, Ennm. PI. i. 380 = M. caerulea.
sylvaticum, Link, Enum. Hort. BeroL i. 80=M. caerulea.

ENOMEIA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 660 (1841) = EINOMEIA, Rafin.- Ariatoloohla, Linn.

ENOSANTHES, A. Cnnn. ex Schan. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1841) 191 = Homoranthua, A. Conn. (Myrtac).
flavescens, A. Cunn. ex Schau. 1. c. 192 - H. virgatns.
virgata, A. Conn, ex Schau. 1. c. 198 =»H. virgatus.

ENOTHREA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 43 (1836)=Ootomeria, R. Br. (Orchid.).
graminifolia, Rafin. 1. c. 44=0. graminifolia.

ENOUREA, Aubl. PL Gui. i. 587 (1775)-PauUlnla, Linn. (Sapindac).
capreolata, Aubl. 1. c.=P. connarifolia.
faginea, Triana ft Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 879 = P. faginea.

ENR1LA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 709 (1887) - Ventilago, Gaertn. (Rhamn.).
dichotoma, Blanco, 1. c. = V. maderaspatana.

ENSETE, Bruce, Trav. v. App. 86; ex Horan. Prod. Monog. Scitam. 40 (1862) -MuBa, Linn. (Scitam.).
edule, Bruce, ex Horan. 1. c. = M. Ensete.

ENSKIDE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 109 (1836) - Utrioularla, Linn. (Lentib.).
barbata, Rafin. 1. c. = U. barbata.
chrysantha, Rafin. 1. c. = U. chrysantha.
flava, Rafin. 1. c.=U. chrysantha.

ENSLENIA, Nntt. Gen. Am. i. 164 (1818). *ASCLEPIADEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 767.
AMPELAMUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192.
ENSLINIA, Reichb. Consp. 131 (1828).
NEMATURIS, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 254.
albida, *Nutt. Gen. Am. i.* 165.—Am. bor.
cinerea. Sprang. Syst. i. 850=albida.
jamaicensis, Griseb. Fl. Brit W. Ind. 418-Roulinia jamaicensis.
lineulata, *Benth. PL Hartw.* 290.—Mexic.
racemosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 418, 735-Roalinia Jacquinii.
volubilis, *Karst. Fl. Columb.* ii. 117. t. 162.—N. Granat.

ENSLENIA, Rafin. Fl.Ludov. 35 (1817) = NELENSIA, Poir.-Pedieularis?, Tourn. (ScrophnL).
bibracteata, Rafin. 1. c. *(N. bibracteata).*—Am. bor.

ENSOLENANTHE, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 368=Alooaaia, Schott (Aroid.).

ENSTOMA, A. Juss. in Orb. Diet vi. 78 (1849) sphalm. -Euatoma, Salisb. (Gentian.).

EtfFADA, Adans. Fam. ii. 818 (1768). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 689.
ADENOPODIA, Presl, Epim. Bot. 206 (1850).
GIGALOBIUM, P. Br. Hist Jamaic. 362 (1756).
FERIMA, Rafin. Sylva Tellur. 118 (1888).
STREPSILOBUS, Rafin. 1. c. 117 (1838).
abyssinica, *Steud. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 234.—Abyss,
acaciaefolia, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 365.—Am. trop.
Adenanthera, DC. Mém. Lég. 422 - scandens.
africana, *Guill. V Perr. Fl. Seneg. Tent.* 288.—Afr. trop.
aiborea, *Griff. Notul.* iv. 452.—Burma.
ckiliantha, DC. M<m. Lég. 422; Prod. ii. 425 = polystachya.
cirrhosa, Rafin. Sylva Tellur. 119=polystachya.
Dnparquetiana, *Baill. Adansonia,* vi. (1865-66) 210.—Afr. trop.
durissima, Baill. 1. c. 208=Prosopis oblonga.
Gandu, Hoffmgg. Preiss. Vert Pfl. viii. 27 -scandens.
Gigalobium, DC. Mém. Lég. 421; Prod. ii. 424 = scandens.
ingaefolia, Presl, Epim. Bot. 205=PiptadenU inaequalis.
Kirkii. *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 827, in nota.—Afr. trop.
monostachya, DC. Mem Leg. 422. t. SI; Prod. ii. 425 •= scandens.
myriadenia, Benth. in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 133 = Mimosa myriadenia.
natalensis, *Benth. I. c.* iv. (1842) 833.—Afr. anstr.
Parraiia, Spieng. Syst. ii. 325 = scandens.
Plumerii, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 164 = polystachya.
polyphylla, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 133—Guiana,
polystachya, *DC. Mint. Ug.* 422, 134. t. 61, 62; *Prod.* ii. 425.—Am. trop.
Pursaetha, DC. 11. cc. 421; 425=scandens.
Rheedii, Spreng. Syst. ii. 325 = scandens.
Rumphii, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxii. (1871) 412 = scandens.
scandens, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 882.—Am. trop.
sudanica, *Sehveinf. Rel. Kotsch.* (1868) 8. t. 8.—Afr. trop.
fuffruticosa, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 108.—Madag.
Wahlbergia, *Han. in Harv.tfSond. Fl. Cap.* ii. 277.—Afr. austr.
Werbaena, Presl, Epim. Bot. 206=Pentadethra filamentosa.

ENTAGONUM, Poir. in Diet. Sc. Nat. xxix. 523 (1823)=ENTOGANUM, Banks =Melieope, Forst. (Rutac).

ENTASIKON, Rafin. New Fl. Am. iv. 28 (1836) - Trepocarpus, Nutt. (Umbell.).
tenui/olium, Rafin. 1. c. 29=T. Aethusa.
tuberosum, Rafin. L c = praec.?

ENTATICUS, S. F. Gray, Nat Arr. Brit PL ii. 198 (1821) = Habenaria, Willd. (Orchid.).
albidus, S. F. Gray, 1. c 205 = H. albida.
viridis, S. F. Gray, 1. c. 206 = H. viridis.

ENTELEA, R. Br. in Bot Mag. t. 2480 (1824). *TIUACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 234.
arborescens, *R. Br. I. c.*—N. Zel.
australis, Warp. Rep. i. 853 = praec.
palmata, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 66.—Hab.»
pubescens, Sweet, Hort Brit. ed. HI. 85, sphalm.= praec
tloaneoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Muse, xxxvi. fl863) I. 674= arborescens.
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 69.—Ins. Tahiti.

ENTEBOIiOBIUM, Mart, in Flora, xx. (1837) n. Beibl. 117. *LECUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 598.
Blancheti, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iii. (1844) 224~Pitheeolobium Blancheti.
cydocarpum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 226.—Jamaic.
ellipticnm, *Benth. in Hook. Lond. Journ.* iii. (1844) 224.—Bras.
glaueeseens, Mart, in Flora, xx. (1837) H. Beibl. 117. - E . Timboüva.

ENTEROLOBITJM:—
Jamboril, Steud. Nom. ed. II. i. 565, sphalm. = E. Timboüva.
Mongollo, *Mart, in Flora,* xx. (1837) *ll. Beibl.* 117.-Bras.
polycephala, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 123.—Reg. Argent.
Schomburgkii, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 699.—Am. trop.
Tamboril, Mart, in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 117 = E. Timboüva.
Timboüva, *Mart. I. c.* 128.—Bras.

ENTEROPOGON, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 448 (1836). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1165.
leptophylla, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 101.—Madag.
macrostachya, *Munro, ex Benth. 1. c.*—Abyss,
melicoides, *Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 449—Ind. or.
Seychellarum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 101.—Ins. Maurit.

ENTEROSPERMUM, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 92 (1877). *RUBIACEAE.*
littorale, *Hiern, 1. c.* 98.—Afr. trop.

ENTOGANUM, Banks, ex Gaertn. Fruct. i. 331. t. 68 (1788)^Meiieope, Forst. (Rutac).
laevigatum, Gaertn. 1. c. •= M. ternata.

ENTOSIPHON, Bedd. in Madr. Joum. Se. Ser. III. i. (1864) 44 = Parinarium, Jnss. (Rosac).
indicus, Bedd. 1. c 45 = P. indicum.

ENTRECASTEAUXIA, Montr, in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 244. *INCERT. SED.* Benth. & Hook. f. ii. 1124.
elliptica, *Montr. 1. c*—N. Caled.

ENULA, Neck. Elem. i. 4 (1790) - Inula, Linn. (Compos).

ENUREA, J. F. Gmel. Syst. 748 (1791) = ENOUREA, Aubl. = Paullinia, Linn. (Sapindac).

ENYDRA, Lour. Fl. Cochinch.510 (1790)-Enhydra, Lour. ^Compos.).

ENYDRIA, Veil. Fl. Flum. 56 (1825); i. t. 150 = lEyriophyllum, Ponted. (Halorag.).
aquatica, Veil. 1. c. 57 ; i. t. 150 — M. brasiliense.

ENYMONOSPERMUM, Spreng. ex DC. Prod. iv. 244, in syn. (1830) = Pleurospermum, Hofim. (Umbellif.).

EOMECON, Hance, in Jonm. Bot. xxii. (1884) 346. *PAPAVERACEAE.*
chionantba, *Hance, 1. c.*—China.

EOPEPON, Naud. in Ann. Sc Nat. Sir. V. v. (1866) 31 = Triehosanth.es, Linn. (Cucnrb.).
aurantiacus, Nand. in Huber, Cat (1870) Suppl. 6 = T.Kirilowii.
vitifolius, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. V. v. (1866) 32 = T. Kirilowii.

EOPHYLON, A. Gray, in Jonm. Linn. Soc. xi. (1869) 22 = Cotylanthera, Blume (Gentian.).
Lobbii, A. Gray, 1. c. 28.—Java.
tenellum, A. Gray, 1. c—Ins. Pacif.

EOPHYTON, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 808 (1876) -praec.

EPACRIS, Forst. Char. Gen. 19 (1776); Cav. Ic. iv. 25. t. 844, 346 (1797). *EPACRIDEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 615.
acuminata, *Benth. Fl. Austral,* iv. 240.—Austral,
alpina, *Hooh.f. Fl. N. Zel.* i. 166.—N. Zel.
apiculata, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 340.—Austral.
attenuata, Lodd. Bot. Cab. t. 38 = Lysinema pungens.
auriculata, Benth. in Enum. PI. Hueg. 76 = microphylla.

EPACRIS:—
autumnalisx, Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 195.
bicolorx, Paxt. 1. c. xv. (1849) 193.
Calvertiana, *F. Afuell. Fragm.* viii. 52.—Austral.
campanulata, Lodd. Bot. Cab. t. 1925 = impressa.
capitata, Poir. Encyc Suppl. ii. B56=Dracophyllnm capitatum.
.carinata, A. Cunn. ex DC. Prod. vii. 762-rigida.
ceraefiora, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (July 1882) 168 = impressa.
cerinthoid.es, Labill. Nov. HolL PI. i. 48. t. 69 - Prionotes cerinthoides.
ciliata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 555 = Lysinema ciliatum.
coccinea, *Paxt. Mag. Bot.* vi. (1889) 128.—Hab.!
conspicua, Poir. Encyc. Suppl. ii. 556 = Lysinema conspicuum.
coriacea, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vii. 763.—Austral.
corymbiflora. Hook. f. Fl. Tasm. i. 261 = myrlifolia.
crassifolia, *R. Br. Prod.* 651.—Austral.
delicata x, Paxt. Mag. Bot. xv. U849) 194.—Austral.
Cunninghami, Hort. ex Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 19« = *autumnalis.*
densiflora, *Hort. Angl. ex Lem. Illustr. Hortic.* i. (1864) t 19.—Hab.?
diosmaefolia, *Lodd. Bot. Cab.* 1.1634.—Austral.
dubia, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 38 = heteronema!
exserta, *R. Br. Prod.* 551.—Tasman.
fasciculata, Forst. f. Prod. 13 — Leucopogon fasciculatus.
fimbriata, F. Muell. Fragm. iv. 125 — Lysinema fimbriatum.
Franklinii, Hook. f. Fl. Tasman. i. 261. t. 79 - mncronulata.
frondosa, Gaertn. Fruct. ii. 77 — Dracophyllum longifolium.
gracilis, Poir. Encyc. Snppl. ii. 556=Dracophyllnia gracile.
grandifiora, Hort. ex Paxt. Mag. Bot. i. (1841) 52 - seq.l
grandifiora, Willd. Sp. PI. i. 834 = longiflora.
Gunnii, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 272 = microphylla.
heteronema, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 42. t. 56.-Austral.
hirtella, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 271-Archeria hirtella.
Hookeri, *Regel. Gartenfl.* (1856) 331.—Austral,
hyacinthiflora, *W. G. Smith, in Gard. Chron.* (1876) II. 548. t. 105. f. 80, nomen.—Hab. T
impressa, *Labill. Nov. Holl. PI. I* 43. t. 58.—Austral.
juniperina, Forst. Char. Gen. 20 = Cyathodes abietina.
Kinghorniix, Hort. ex Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) t. 175. n. 3.
lanuginosa, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 42. t. 57.—Austral.
lasiantha, Poir. Encyc. Suppl. ii. 566—Lysinema lasianthuni.
latifolia, Banks 8c Soland. ex A. Cnnn. in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 48 = Dracophyllum latifolium.
longiflora, *Cav. Ic.* iv. 25. t. 344.—Austral.
longifolia, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. *it* - Dracophyllum latifolium.
longifolia, Forst. Char. Gen. 20 = Dracophyllnm longifohum.
micranthera, F. Muell. Fragm. vi. 72 = Archeria serpyllifolia.
microphylla, *R. Br. Prod.* 650.—Austral.
microphylla. Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 272-petrophila.
miniata, Lindl. Bot. Reg. (1845) t. 5-longiflora.
mucronulata, *R. Br. Prod.* 552.—Tasman.
mucronulata, Hook. f. Fl. Tasman. i. 268 = acnminata.
Muelleri, Sond. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 252 - rigida.
multiflora, *Lem. Illustr. Hortic.* vii. (1860) t. 266.—Austral,
myrtifolia, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 41. t. 55.—Tasman.
nivalis, Lodd. Bot. Cab. 1.1821 , K. Grah. l Edinb. N. Phil. Joum. (July 1833) 183 = impressa.
nivea, DC. Prod. vii. 762 = impressa.
obtusifolia, *Sm. Exot. Bot.* i. 77. t. 40 —Austral.
odorata, Sm. ex Roem. & Schult Syst. iv. 383 - Lysinema pungens.
onosmaefiora, A. Cunn. hi Field, N. S. Wales, 340» purpurascena,

EPACBIS:—
paludosa, *R. Br. Prod.* 551.—Austral.
panciflora, *A. Rich. Ess. Fl. N. Zel.* 213. t. 29.—N. Zel.
pedicellata, DC. Prod. vii. 761 = microphylla.
pentafietala, Poir. Encyc. Suppl. ii. 655-Lysinema ciliatum.
petrophiU, *Hook.f. Fl. Tasman.* i. 261.—Austral,
pulchella, *Cav. Ic.* iv. 26. t. 845.—Austral.
pulchella, Sims, Bot. Mag. t. 1170 = microphylla.
pumila, Forst. Char. Gen. 20 - Pentachondra pumila.
pungens, Cav. Ic. iv. 26. t. 846 = Lysinema pungens.
pungens, Sims, Bot. Mag. t 844 >?purpurascens.
purpurascens, *R. Br. Prod.* 550.—Austral.
purpurascens, Sieber, ex DC. Prod. vii. 760 - pulchella.
racemosa, *Hook.f. Fl. N.Zel.* i. 166.—N. Zel.
redinata, *A. Cunn. ex Bentk. Fl. Austral,* iv. 234.—Austral.
refutgens, Hort. ex Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 195 = autumnale.
"gjda, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 64.—Austral.
riparia, R. Br. Prod. 650 = pulchella.
"paria, Sieber, ex DC. Prod. vii. 765 - Lysinema pungens.
rnularis, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 64 - •nicrophylla.
fobusta, *Bentk. Fl. Austral,* iv. 287.—Austral.
'•"*sea,* Lodd. Bot. Cab. t. 868 = Lysinema pungens.
nsmarinifolia, Forst. f. Prod. 18 = Dracophyllnm rosmarinifolium.
rubra, Benth. FL Austral, iv. 242, in syn. = pur-[illegible]
[illegible]*ra,* Spreng. Syst. i. 629=Cosmelia rubra.
Tuscifolia, R. Br. Prod. 550=impressa.
""cifolia, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, iv. 234 = redinata.
*»*cunda,* Poir. Encyc. Snppl. ii. 556 = Dracopbyllum secnndum.
«rpjllifolia, *R. Br. Prod.* 551.—Austral.
Stnclairii, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 179.—N. Zel.
*Parsa, *R. Br. Prod.* 551.—Austral.
'puria, Cav. Ic. iv. 27. t. 347 = Leucopogon ericoides.
•qnarrosa, *Hook.f. Fl. Tasman.* i. 259.—Tasman.
'qtarrosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 556 - Dracophyllum aquarrosum, *R. Br.*
""ntoniensisx.Vnt. Fl. Mag. xiv. (1848) t. 195.
toqentosa, Ua.il. in Mitch. Three Exped. ii. 177 = "npressa.
v<**ccinioides,* Lhotzky, ex Sond. in Lehm. PI. Preiss. i. 825^Pentachondra pumila.
*v**riabilis,* Lodd. Bot. Cab.t. 1816-impress*.
wiosa, Cav. Ic. iv. 27. t. 347. f. 2 = Leucopogon juni-...Perinus.
vilmoreana, *Planch. Hort. Donat.* 45.—Austral.
nrgata. Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 271 = exserta.

EPACTITJM, Willd. ex Schult. Mant. iii. 15 (1827). We. *SED.*
"wiarium, *Willd. ex Schult. I. c*—Peruv.

EPAILAQE, DC. Prod. vi. 3 (1837). *COMPOSIJAE,* Benth. & Hook. f. ii. 369.
.HELICTA, Less. Syn. Comp. 221 (18321.
""emifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 102=dentata.
wemonifolia, *DC. Prod.* vi. 4.—Madag.
»tata, *DC. 1. c*—Madag.
"umifusa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 189.
""mma, *Baker, I. c*— Madag.
""Pestris, *DC. Prod.* vi. 4.—Madag.
*Umfolia, DC. 1. c. 8=Sphacophyllum madagas-Mricnse.

BPA1,TES, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 189; et » Diet. Sc. Nat. xv. 6 (1819). *COMPOSITAE,* ^th. & Hook. f. ii. 293.
ETHULIOPSIS, F. Muell. Fragm. ii. 154 (1861).
VNAPHANKS, Steetz, in Peters, Reise Mossamb., Bot. 457 11864).
WTOGYNE, Haiv Thes. Cap. ii. 35. t. 155 (1863).
^ACHYTHELIA, Steetz, in Peters, Reise Mossamb., Bot. 453 (1864).
"«»»«<,, *in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 452.—Arr. trop.
"utralis, DC. Prod. T. 462-Cunninghamii.

EPALTES:—
australis, *Less, in Linnaea,* v. (1831) 148.—Austral,
brasiliensis, *DC. Prod.* v. 461.—Bras.
Cunninghamii, *Benth. Fl. Austral,* iii. 530.—Austral,
divaricate, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1818) 139.—Ind. or.
gariepina, *Steett, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 451.—Afr. trop.
Harrisii, *F. Muell. Fragm.* xi. 101.—Austral,
hirsuta, *Less. Syn. Comp.* 206.—Ind. or.
linearifolia, DC. Prod. v. 461 = divaricata.
littoralis, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 151.—Ind. or.
mexicana. *Less. I. c.* v. (1830) 147.—Mexic.
pleiochaeta, *F. Muell. Fragm.* x. 100.—Austral,
pygmaea, *DC. Prod.* v. 461.—Ind. or.
Tatei, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral,* vi. (1883) 31.—Austral,
nmbelliformis, *Steeti, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 452.—Afr. trop.

EPALTHES, Walp. Rep. ii. 600 (1843)- praec.

EPATITIS, Rafin. New Fl. Am. ii. 17 (1836). *COMPOSITAE.*
obliqua, *Rafin. I. c*—Oregon.

EPERTJA, Aubl. PI. Gui. i. 369. t 142 (1775). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 580.
ADLERIA, Neck. Elem. ii. 542 (1790).
DIMORFHA, Schreb. Gen. 493 (1791).
PANZERA, Willd. Sp. PI. ii. 540 (1799).
PARIVOA, Aubl. PI. Gui. 756. t. 808 (1775).
ROTMANNIA, Neck. Elem. ii. 460 (1790).
[illegible]
'—Bras.
decandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 868-Afzelia bijnga.
falcata, *Aubl. PI. Gui.* i. 369. t. 142.—Guian.
falcata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 369 = Afzelia rhomboidea.
grandiflora, *Benth. & Hook. f. Get.* i. 580; *Baill. Hist. PI.* ii. 110.—Guian.
leucantha, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. It. 225.—Bras.
purpurea, *Benth. I. c.* 226.—'Bras.
rhomboidea, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 260-Afzelia rhomboidea.
rubiginosa, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 12.—Guia

EPETET1ORHIZA, Steud. Nom. ed. II. ii. 328 (1841) = seq.

EPETORHIZA, Steud. Nom. ed. IL i. 556 (1840) = Physalifl, Linn. (Solanac).

EPHAIOLA, Rafin. Sylva Tellur. 124 (1838) = Acnistua, Schott (Solanac.).
odorata, Rafin. 1. c. - A. Plumieri

EPHEBOPOGON, Nees & Meyen, ex Steud. Nom. ed. II. i. 556 (1840). *GRAMINEAE.*
grains, *Nees V Meyen, ex Steud. I. c*—China.

EPHEDBA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 312 (1737). *GNETACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 418.
CHAETOCLADUS, Scnilis, [Nelson] Pin. 161 (1866).
alata, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sii.* I. ii. (1834) 239.—Afr. bor.; Arab.
alata, Schimp. ex Carr. Conif. ed. I. 656 = E. Alte.
Alte, Brand. For. Fl. 501. t. 69 = foliata.
Alte, *C. A. Mey. Monog. Ephedr.* 76. t. S. f. 4.—Syria; Arab.
altissima, Bove^ in Ann. Sc. Nat. S&. II. i. (1834) 162 » alata.
altissima, Buch, Beschr. Phys. Ins. Canar. 159, 168; Tommass. in Flora, xviii. (1835) II. Beibl. 66 = frngilis.
altissima, Delile, Desc. Aegypt. 110 = E. Alte.
altissima, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 371. t. 253.—Afr. bor.
americana, *Humb. V Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 860.—Am. austr.
andina. Poepp. & Endl. Syn. Conif. 255 »= americana.
antisiphylitica, S. Wats. Bot King's Exp. 328-*nevadensis.
antisyphilitica, *Berland. ex C. A. Mey. Monog. Ephedr.* 101.—Am. bor.; Mexic.
aphylla, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 170-E. Alte.
arborea. Lag. ex Bertol. Fl. Ital. x. 894-disUchya.

EPHBDBA:—
arborea, F. Muell. Syst. Arr. PI. Carpentaria, 14 (Calycopepli sp.).—Austral.
asparagoides, Griff. Itin. Notes, 840 = foliata.
aspera, *Engelm. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-88) 167.—Am. bor. occ.
botryoides, Fisch. in C. A. Mey. Monog. Ephedr. 99. t. 6. f. 12-distachya.
bracteata, Miers, Trav. Chili, ii. 531 - americana.
californica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 300.—Calif.
chilensis, *Presl, Bot. Bemerk.* 109.—Chili.
campulopoda, DC. Prod. xvi. II. 356 - fragilis.
chilensis, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xi. (1863) 252=americana.
dliata, Aitch. in Journ. linn. Soc. xix. (1882) 187 •= foliata.
dliata, Fisch. & Mey. in C. A. Mey. Monog. Ephedr. 100 = E. Alte.
Clusii, Dufour, in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 445 - distachya, nebrodensis.
dahurica, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) I. 421.—Dahuria.
dissoluta, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 275 - fragilis.
distachya, Brot Fl. Lusit ii. 6-fragilis.
distachya, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 77 - E. Alte.
distachya. Gaud. Fl. Helv. vi. 804 = helvetica,
distachya, *Linn. Sp. PI.* 1040.—Europ.; As. bor.
distachya, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 816 - nebrodensis.
dubia, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 483 -= distachya.
[illegible]
equisetiformis, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 276 - nebrodensis.
equisetina, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 499.—Sibiria; China,
foeminea, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 219.—Arab,
foliata, *Boiss. If Kotscky, ex Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 101.—Arab.; Persia,
fragilis, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 372—Reg. Mediterr.; Arab.
fragilis, Fresen. inMus. Senckenb. i. (1834) [1833] 73; Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 240 = E. Alte.
fragilis, Lowe, in Journ. linn. Soc. v. (1860) 44 = aidssimaT
fragilis, Moris, Stirp. Sard. Elench. ii. 8 = nebrodensis.
frastillata, *Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. III. xi. (1863) 262.-Patagon.
Gerardiana, Wall. Cat. n. 6048-distachya.
gibraltarica, *Boiss. Fl. Orient,* v. 714, obs.—Gibraltar,
glanca, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 484.—Turkestan.
graeca, C. A. Mey.Monog. Ephedr. 93. t. 5 = nebrodensis.
helvetica, *C. A. Mey. 1. c.* 87. t. 8. f. 10.—Europ.
humilis, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xiiL (1849) 251 = americana.
intermedia, *Schrenk tf C. A. Mey. Monog. Ephedr.* 88.—As. centr.; Himal.; China.
kokanica, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 479 =foliata.
lomatolepis, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1844) 210.—Soongaria.
macrocephala, Bertol. Misc. Bot. xxiii. 17 - distachya.
major, Host, Fl. Austr. ii. 71-nebrodensis.
major, Puller, Ins. Fl. Dalmat. 90 - fragilis.
maritima, St. Lager, Cat. Fl. Rhone = distachya.
media, C. A. Mey. Monog. Ephedr. 80 "distachya.
minor. Host, Fl. Austr. ii. 671 - distachya.
monospcrma, *S. G. Gmel. ex Willd. Sp. PI.* iv. 869.--As. bor.; China.
monostachya, Guss. PI. Rar. Ion. 376, nomen - nebrodensis.
monostachya. Linn. Sp. PI. 1040 - distachya.
monostachya, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (18S4) I. 422-= mouosperma.
monticola, Miers, Contrib. Bot. ii. 166. t. 76 A-americana.
nebrodensis, *Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 638__Ree, Mediterr.; As. bor.
nevadensis, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 298.—Am. bor. occ.
occidentalis, Ton. ex Part, in DC. Prod. xvi. 364 = antisyphilitica.
ochreata, *Miers, Contrib. Bot.* ii. 169. t 77 B.—Reiss. Argent

BPHEDBA:—
pachyclada, *Boiss. Fl. Orient. V* 713.—Persia; Afghan.
peduncularis, Boiss. 1. c. 717=foliata.
pedunculata, Engelm. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 157=antisyphilitica.
pertniana, Bert, ex Carr. Conif. ed. L 549 = americana.
podostylax, Boiss. Fl. Orient, v. 715-distachya.
polygonoides, Fall. Fl. Ross. ii. 87=distachya.
polygonoides, Siev. in Fall. N. Nord. Beitr. vii. 174 — monosperma.
polylejris, Boiss. & Hanssk. ex Boiss. FL Orient v. 716 -foliata.
procera, C. A. Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. x. (1814) 45 •= nebrodensis.
rigida, St. Lager, Cat. PI. Rhone, 687 - helvetica.
rupestris, Benth. PI. Hartw. 258=americana.
scandens, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. III. xl (1868) 261 =Tweediana.
scoparia, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1862) 83 (Pugill. PI. Hisp. 83)-nebrodensis.
stenosperma, Schrenk & C. A. Mey. Monog. Ephedr. 77. t 8. f. 6 = distaehya.
strobilacea, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1851) 499 *{Lehm. Reliq. Bot.* 323).—Persia; As. centr.
subtristachya, C. A. Mey. Monog. Ephedr. 80 - distachya.
Torreyana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 299.—Am. bor. occ.
triandra, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. x. (1858) 125. —Reg. Argent.
trifaria. Parl. in DC Prod. xvi. II. 869, sphalm.=seq.
trifarca, *Terr, in Bot. Emory Sep.* (1848) 152.—Am. bor. occ.
trifurca, Parry, Bot. Obs. S. Utah, 351 = Torreyana.
Tweediana, *C. A. Mey. Monog. Ephedr.* 96. t 5. f. 9.— Reg. Argent.
Villarsii, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 161 =» nebrodensis.
vulgaris, Rich. Conif. 26 - distachya.
vulgaris, Willk. in Flora, xxxv. (1852) 319=nebrodensis.

EPHEMERUM, Reichb. Fl. Germ. Excurs.409 (1831) = XiysimacIiiA, Linn. (Primnlac).
nemorum, Reichb. 1. c.=L. nemornm.
Nummularia, Schur, Enum. PI. Transs. 649 - L. Nummularia.

EPHEMERUM, Tonm. ex Moench, Meth. 237 (1794) - Tradescantia, Linn. (Commelin.).
bicolor. Moench, Meth. Suppl. 78 = Rhoeo discolor.
congestum, Moench, Meth. 288 = Tradescantia virginica.
cristatum, Moench, 1. c.=Cyanotis cristate.
racemosum, Moench, L c — Tinantia ragax.

EPHIALIS, Banks & Soland. ex A. Cnnn. in Ana. Nat. Hist. L (1838) 461=Vitex, Linn. (Verbenac).
pentaphylla, Banks & Soland. ex A. Cnnn. 1. c - V. littoralis, *A. Cunn.*
simplici/olia, Soland. ex Seem, in Joum. Bot. iii. (1865) 258=Gmelina macrophylla.

EPHIELIS, Banks *Sc* Soland. ex Seem. Fl. Vit. 189 (1866)-praec

EPHIELIS, Schreb. Gen. 25S (1791)=Batonia, DC. (Sapindac).
fraxinea, Willd. Sp. PI. ii 328.—Am. anstr.
gujanensis, Pen. Syn. i. *ill* =• *fraxinea.*
Patrisiana, Spreng. Syst. ii. 223.—Guian.
Vouarana, Spreng. 1. c—Gnian.

EPHIPPIAHDRA, Decne. in Ann. Sc Nat. Sér. İV. ix. (1858) 278. t. 7. *MONIMIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. £ iii. 141.
myrtoidea, *Decne. I. c.*—Madag.

EPHIPPIANTHUS, Reichb. f. in F. Schmidt, Reisen Amnrl. 180. t. 5 (1868)-Uparis, Rich. (Orchid.).
sachalinensis, Reichb. f. 1. c—Inns. Sachali.
Schmidtii, Reichb. £ in Flora, Ii. (1868) *S3=sachalinensis.*

BPHIPPIORHYNCHIUM, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.134 (1842)-BynchoBpora, Vahl (Cyperac.).
amoMonicum, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-78) 625 -R. amazonica.
longinatre, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 136=R. fluzoin ca.

EPHIPPIORHYNCHIUM :—
polycephalum, Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 184 = R. cyperoides.
stenocarpum, Nees, 1. c 186 =»R. stenocarpa.
tenuirostre, Nees, 1. c. 135 = R. cyperoides.
trifiorum, Nees, 1. c. 136 - R. triflora.
trispicatum, Nees, 1. c 186-R. triflora.

EPHIPPIUM, Blnme, Bijdr. 308. t. 65 (1825) - Cirrhopetalum, Lindl. (Orchid.).
capitatum, Blnme, 1. c. 809 —C. capitatnm.
eiliatum, Blnme, 1. c. = C. Blnmii.
cornutum, Blnme, 1. c. 310 « C. comutnm.
elongatum, Blame, 1. c. 309 = C. elongatnm.
grandiflorum, Blnme, Rnmphia, iv. 42=C. grandifloruml
Upidum, Blnme, Bijdr. 310.—Java.
nigricans, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 50.—Java.
reclinatum, Teijsm. & Binn. 1. c—Java.
uniflorum, Blame, Bijdr. 309.—Java.

EPHYNES, Rafin. Sylva Tellor. 101 (1838)=Monochaatum, Nand. (Melastom.).
Bonplandii, Rafin. 1. c. = M. Bonplandii.

EPIADENA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 (1886) = 8alvia, Tonm. (Labiat).
bicolor, Rafin. 1. c.=S. bicolor.

EPIANDRA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1066 (1888) sphalm. = seq.

EPIANDRIA, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 270 = Oahnla, Forst. (Cyperac.).
teretifolia, Presl, 1. c. = G. tristis.

EPIBATERIUM, Forst Char. Gen. 107. t. 54 (1776) = CooculUB, DC. (1818) (Menisperm.).
pendulum, Forst. f. 1. c. 108 = C. Epibaterium.
scandens, Raeusch. Nom. ed. III. 276=C. Epibaterinm.
tomentosum, Pers. Syn. ii. 661 =-- *C.* Chondodendram.

EPIBATHERIUM, Raeusch. Nom. ed. III. 275 (1797)° praec.

EPIBIASTRUM, Scop. Introd. 263 (1777)-praec.

EPIBLEMA, R.Br. Prod. 815 (1810). *ORCH1DEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 607.
grandifloram, *X. Br. 1. c.*—Austral.

EPICAMPES, J. & C. Presl, Rel. Haenk.]. 236. t. 89 (1830). *GRAMINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1148. CKYPSINNA, Foam, ex Bentb. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 87.
Berlandieri, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 648.—Mexic.
Bonrgaei, *Fourn. ex Hemsl. 1. c.*—Mexic.
Buchlngeri, *Fourn. ex Hemsl. 1. c.*—Mexic.
coernlea, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 256.—Reg. Argent
distichophylla, *Vasey, Cat. Gram. V. St.* 45.—Am. bor.
expansa, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 548.—Mexic.
gigantea, *Fourn. ex Hemsl. I. c.*—Mexic.
gracilis, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 271.—Mexic.
lanata, *J. (f C. Presl, Rel. Haenk.* L 286.—Mexic.
laxiuscula, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 649.—Mexic.
macroura, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 87. —Mexic.
mntica, *Rupr. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 230. —Mexic.
pnbescens, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 285.—Mexic
rigens, £*»<*. *in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 88.— Mexic
robusta, Fotun. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot iii. 660 =stricta.
stricta, *J. <f C. Presl, Rel. Haenk.* i. 236. t. 89.—Mexic.

EPICARPURA, Hassk. Cat Hort Bog. Alt 74 (1844) > seq.

EPICARPURUS, Blame, Bijdr. 488 (1825) = Streblua, Lour. (Urtic).
asper, Steud. Nom. ed. II. i. 666-S. asper.
Gaudichaudii, Steud. 1. c = S. asper t
involucratus, Zipp. ex Span, in Linnaea, XT. (1841) 844.—Ins. Timor.

EPICARPURUS:—
microphyllus, Raoul, Choix PI. N. Zél. 14.—N. Zel.
orientalis, Blume, Bijdr. 488 - S. asper.
spinosus, Stend. Nom. ed. II. i. 656; Wight, Ic vi. t. 1962 = Phyllochlamys spinosa.
timorensis, Decne. Herb. Timor. 171 "Phyllochlamys spinosa.
teylanica, Thw. in Hook. Kew Joura. iv. (1852) 1- Taxotrophis zeylanica.

EPICHAKI8, Blume, Bijdr. 166 (1825). *MEL1-ACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. L 883.
altissima, Blame, 1. c 167 = Dysoxylnm densiflorum.
Bailloni, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1881) 292. —Cambod.
Balansaeana, Baill. Adansonia, xi. (1874) 267 = Dysoxylum Balanseanum.
cauliflora, Blume, Bijdr. 166 - Dysoxylum ramifloram.
densiflora, Blume, 1. c. 167 — Dysoxylnm densiflorum.
exarillata. Am. ex Wight *Sc* Am. Prod. 120 -Dysoxylum binectariferum.
exarillata, Nimmo, in J. Grab. Cat. Fl. Bomb. t. 31 - Amoora Lawi.
Fraserana, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 506= Dysoxylum Fraserannm.
Gotadhora, M. Roem. Syn. Hesper. 108 = Dysoxylum binectariferum.
juglans, *Hance, in Journ. Bot.* xv. (1877) 830.— China.
Kunthiana, A. Juss. in Mém. Mas. Par. xix. (1830) 229 = Dysoxylum Kunthianum.
Lessertiana, C. DC. in Ball. Soc Bot. Fr. xxii. (1875) 231 = Dysoxylum Lessertianum.
Loureiri, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1881) 291. —Cambodia.
macrocarpa, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 605.—Sumatra.
minutiflora, Baill. Adansonia, xi. (1874) 268 = Dysoxylnm minutiflorum.
mollis, Wall, ex Voigt, Hort Suburb. Calc. 136 = Dysoxylum Hamiltonii.
pachypoda, Baill. Adansonia, xi.(1874) 269 -Dysoxylum pachypodum.
Pancheri, Baill. 1. c. 258 = Dysoxylum Pancheri.
rosea, Baill. 1. c 260 = Dysoxylum roseum.
sericea,Elnme, Bijdr. 166 = Dysoxylum ramifloram.
setosa, Span, in Linnaea, xv. (1841) 182 = Dysoxylum setosum.
sfeciosa, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 229 = Dysoxylum speciosum.

EPICHROCANTHA, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 580 (1857) = O-nldia, Linn. (Thymel.).
bifiora, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. 1. c 588 = G. deenrrens.
debilis, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. 1. c. = G. parviflora.
junipenfolia, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. 1. c 587, 588 = G. juniperifolia, subulata.
ovata, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. L c 686 = G. coriacea.
pungens, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. L c. 687-0-styphelioides.
simplex, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. 1. c. 587, 588-G. juniperifolia, subulata.
villosa, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. 1. c. 587 = 0. Sonderiana.

EPICHYSIANTHUS, Voigt, Hort. Suburb. Calc 523 (1846) = Chonemorpha, G. Don (Apocyn.).
macrophyllus, Voigt, 1. c—C. macrophylla.

EPICLINASTRUM. Boj. ex DC. Prod, vii 1.18 (1888) = Oerbera, Gronov. (Compos.).
Candollei, Boj. ex DC. 1. c. 19=G. CandoUd.
hirsutum, Boj. ex DC. 1. c.-G. Bojeri.

EPICOILA, Rafin. Sylva Tellur. 126 (1838)-Loranthus, Linn.
grandiflora, Rafin. 1. c - L. grandifloms, *Ruii If Pat-*

EPICOSTORUS, Rafin. Atl. Journ. 144 (1832) = Neillia, D. Don (Rosac).
montanus, Rafin. 1. c. - N. Torreyi.

EPICRANTHES, Blume, Bijdr. 306. t. 9 (1825) = Bulbophyllum, Thou. (Orchid.).
barbata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 265=Monomen» barbata.
javanica, Blnme, Bijdr. 806.—Java.

EPICRIANTHES, Blnme, Fl. Jav. Praef. *p.* vii (1828) - EPICRANTHES, Blume = Bulbophyllum, Thou. (Orchid.).

EPIDKNDRON, Linn. Syst ed. I (1786) -seq.

EPIDENDRUM, Linn. Gen. ed. L 272 (1737). *ORCHWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 528.
AMPHIGLOTTIS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 294.
ANACHEILIUM, Hoffmgg. Ven. Orch. 21; ex Linnaea, xvi. (1842) Litt. 229.
ANISTYLIS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
AULIZA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 294.
BARKERIA, Knowles & Westc. Fl. Cab. ii. 7. t. 49 (1888).
CAULARTHRON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 40 (1886).
COILOSTYLIS, Rafin. 1. c iv. 37 (1836).
DIDOTHION, Rafin. 1. c. 39 (1836).
DINKMA, Iindl. Orch. Seel. 16 (1826) ; et Gen. et Sp. Orch. I1l (1881).
DOTHILOPHIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 39 (1836).
DOXOSMA, Rafin. 1. c. 9 (1836).
ENCYCLIA, Hook. Bot Mag. t 2831. 3018 (1828).
EXOPHYA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 68 (1886).
EYDISANTHEMA, Neck. Elem. iii. 133 (1790).
LARNANDRA, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
NANODKS, Lindl. Bot. Reg. t. 1541 (1832).
NYCTOSMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 9 (1836).
OERSTEDELLA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 982.
PHADROSANTHUS, Neck. Elem. iii. 183 (1790).
PHYSINGA, Lindl. Bot. Reg. (1888) t. 88.
P»OSTHECHEA, Knowles & Westc. Fl. Cab. it 111 (1838).
" PSEUDEPIDENDRUM, Reichb. f. in Bot Zeit x. (1852) 733.
PSYCHIIJS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 40 (1836).
SULPITIA, Rafin. 1. c 87 (1836).
TRITELANDRA, Rafin. 1. c. ii. 85 (1836).
«ciculare, *Batem. ex Lindl. Bot. Reg.* (1811) *Misc.* 46—Mexic.
*ac*naciforme,* Pav. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 198 - Oncidium pauciflorum.
ecinacUolium, Noronha,in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 14 (Quid t).—Java.
Acklandiae, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 312 = Cattleya Acklandiae.
tadeatum, Poir. Encyc. Suppl. i. 376 = Eulophia aculeata.
•cuminatum, *Ruit &• Pav. Syst. Veg.* 248.—Pernv.
•cubssimuni, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 46.—N. Granat.
ad^Ocar Ponio LlavetfLex. Nov. Veg. Desc./asc. ii. -(O«A. *Opusc.)* 24.—Mexic.
"enocaulum, *La Have, 1. c.* 22.—Mexic.
•Oenoglossum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 86—Peruv.
ad venum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1872) 1194.- Bras.
«•*»»/»«, Lindl. Bot. Reg. t. 1898 = fragrans.
denies, Raeusch. Nom. ed. III. 266 = Aerides odoratum.
*a***ifolium,* Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 1162 = seq.
^*iforme,* Booth, in Lindl. Bot. Reg. (1846) Misc. ""•Harrisoniae.
^*anthum,* St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 69=£. *FIOZMS.*
Wne, Focke, in Bot. Zeit. xi. (1863) 341-oncidioides. *alnue, Reichb. f. in Bonplandia* (1866) 827.~ Guatemala.
"£*>, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 287-tricatum.
«eathosmicum,fl«<*4./.i$_n$ *Linnaea, ail* (1849) 841. --Venezuela,
•eeregatnm, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 84. —Peruv.
tpwgatam, Roxb. ex Steud. Nom. ed. IL i. 666 =
•Worn, *Batem. Orch. Mexic.* t. 18.—Guatemala.
*a*V*m>* Lindl. Bot Reg. (1847) t 53-ambiguum.
'IK13 "**Lindl- in Benth. Pi. Hartw. 92-trachychilum.
$£'"•'"- n. Flum.* ix. t. 85—Bras,
^""ifnatuni, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) a|/ —Ecuador.
All!3nrpureilm> *Rodrig. Orch. Nov.* i. 61.-Bras.
—ati, *Rtgel> *"" Act,Hort_ PetTI*_* v. (187) 288.—Mix c.
Allemaniaum, Rodrig. Orcb, Nov. ii. 189=AUe" manii.

EPIDENDKTTM:-
Allemanii, *Rodrig. 1. c.* i. 64.—Bras.
aloides, Curt. Bot Mag. t. 387 = Cymbidium pendulum.
aloifolium, Batem. Orch. Mex. & Gnat t. 25-Parkinsonianum.
aloifolium, Linn. Sp. PI. 968 = Cymbidium aloifolium.
alpestre.Svr. Prod. Veg. Ind. Occ. 125 - Pleurothallis alpestris.
alpicolum, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 110. —N. Granat.
alternates, Lindl. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 88 - fimbriatum.
altissimum, Batem. in Bot. Reg. (1838) *Misc.* 88—Ins. Baham.
altissimum, Jacq. Enum. PI. Carib. 80 = Oncidium altissimum.
altum, Poir. Encyc. Suppl. L 374 = Bletia verecunda.
amabile, Linden O" Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1856) 219.—Mexic.
amabile, Linn. Sp. PI. 953-Phalaenopsis amabilis.
ambiguum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 18.—Guatemala.
Amblostoma, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 89 = Amblostoma cemua.
amethy&tinum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1867) 876. —Am. trop.
amethystoglossum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 319 = Cattleya guttata.
amictum, *Linden If Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 219.—Hab.!
ammophilum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 149.—Bras.
amphistomum, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 240 = anceps.
amplexicaule, *Lindl. Fol Orch. Epid.* 51.—Peruv.
anceps, *Jacq. Select. Am.* 224. t. 138.—Am. trop.
anceps, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 121 - bifarium.
angustifolium, *Sw. I. c.* 123.—Jamaic.
angustissimum,£iiî<tf. *Fol. Orch. Epid.* 84.—N. Granat.
anisatum, *La Llave* b* *Lex Nov. Veg. Desc. fasc.* ii. *(Orch. Opusc.)* 27.—Mexic.
ansiferum, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 111.—Venezuela.
antenni/erum, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. i. 98. t. 28 —Trichoceros antennifer.
antennifernm, *Lindl. V Paxt. Flow. Gard.* i. (1850-51) 184.—Mexic.
anthoceros, *Linden (f Rtkhk. f. in Bonplandia,* ii. (1864)281.—N. Granat.
anthropophorum, *Reichb. f. I. c.* iv. (1856) 215.—Hab. 1
aphyllum, Poir. Encyc Suppl. i. 871-Dendrobium Pierardi.
aphyllum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 25 (Quid I).—Bras,
apiculatum, *Reichb. f. in Linnaea,* xlL (1877) 81. —Hab. ?
aquatioum, *Lindl. in Ann. (f Mag. Nat. Hist.* xii. (1843) 398.—Bras,
arachnoglossum, *Reichb. f. ex Andri, in Rev. Hortic.* (1882) 564.—N. Granat.
arachnoideum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 60.—Bras,
arbusculum, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* 93.—Mexic
Aristotelia, Raeusch. Nom. ed. III. 265 = Splnmthes australis.
armeniacum, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1867.—Bras.; Pernv.
Arminii, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 67 — Venezuela.
aromaticum, *Batem. Orch. Mex.* t. 10.—Guatemala.
articulatum, Burm. f. Fl. Ind. 189 (Quid 1).—Ind. or.
articulatum, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 297=tessellatum.
asperum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 6.— Am. trop.
atropurpureum, Hemsl. in Gard. Chron. (1888) II. 42, sphalm.=bifidom.
atropurpureum, *Willd. Sp. PI.* iv. 115.—Mexic.
attenuatum, lindl. Fol. Orch. Epid. 69 = Hookerianum.
attenuatum, *Lindl. 1. c.* 41.—Venezuela,
aurantiacum, *Batem. in Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 8.—Guatemala.
aureum, Lindl. Fol. Orch. Epid. 4—aurantiacum.
Auricula, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 31.—Bras,
auritum, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 4.—Am. centr.
auropurpureum, Lindl. Gen. et Sp.Orch. 99=blfidum.
autumnale, Banks & Soland. ex Hook, *t* Fl. N. Zel. i. 239 = Earina suaveolens.
autumnale, Font f. Prod. 60 - Eanna mucronata.

EPIDEinJBUM:—
avicule, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 86.— Bras.
Baculus, *Reichb. f. in Bonplandia,* iv. (1856) 214.— Hab. 1
bahameue, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 614.—Ins. Baham.
bahiense, *Reichb. f. in Hamb. Gartenm.* xv. (1859) 53. —Bras.
Barbae, *Reichb./. Beitr. Orch. Centr. Am.* 83.—Costa Rica.
Barkeriola, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) II. 616. -Hab. I
Barringtoniae, Sm. Ic Pict. 16-I.ycaste Barringtoniae.
basilare, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xi. (1843) 193 =<Stamfordianum.
belizense,- *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 78— Guian.
Betimianum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 147.—Bras,
bicameratum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1871) 1194. —Mexic.
bicolor, Reichb. *I* in Walp. Ann. vi. 311'Cattleya bkolor.
bicomutum, Hook. Bot. Mag. t. 3332 = Diacrium bicomutum.
bidentatum, Koen. in ReU. Obs. vi. 54 = Limodorum bidentatum.
bidentatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 98 = DUcrium bidentatum.
bifarium, *Sw. in Schrad. Journ.* ii. (1799) 212— Jamaic.
bifidum, *Aubl. PI. Gui.* ii. 824.—Am. austr.
bifidum, *Lindl. ex Reichb. f. in Hamb. Garten:* xv. (1859) 62—Ins. S. Doming.
biflorum, Forst. f. Prod. 60=Dendrobium biflorum.
biflorum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 62.—Bras,
biflorum, *Ruim V Pav. Syst. Veg.* 247.—Peruv.
biforatum, Lindl. in Lodd. Cat. ed. II. n. 666, ex Bot Reg. (1844) Misc. 15 = cucnllatum.
bigibberosum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 346 = Diacrium bigibberosum.
bilammellatum, Reichb. f. 1. c. 845 - Diacrium bilamellatum.
blpapulare,*«VAA./. *in Flora,* xlviii. (1865) 277.—Ind. occ.
Biserra, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 112 (err. typ. 105).—Guian.
bisetum, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 68=polyanthum.
bispicatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 14 (Quid ?)—Java,
bivalve, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 47.—Venezuela,
blepharistes, *Barker, ex Lindl. in Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 20.—Venezuela,
blepbaroclinium, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 87. —Ecuador.
bletioides, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 615.—Jamaic.
Boothianum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 6.—Cuba,
braccigerum, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 114.— Ecuador,
brachiatum, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1846) 20—Mexic.
brachychilum, *Lindl. Orch. Linden.* 9.—Venezuela,
brachycladium, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 60.—Am. austr.
brachyglossum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 83.— Peruv.; N. Granat.
brachypbyllum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 72.—Bolivia.
brachystachyum, Thou. Fl. lies Austr. Afr. t. 84 - Aeonia brachystachya.
bracteatum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 52.—Bras,
bracteatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 16.—Bras.
bracteolatum, Presl, Rel. Haenk. i. 100 = radiatum.
bractescens, Lindl. Bot.Reg.(1840)Misc.68-adculare.
Bradfordii, *Griseb. Fl. W. Ind.* 613.—Ind. occ.
Bnsavolae, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 729— Guatemala.
brevivenium, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 46.—Ecuador,
bronghtonioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 261.—Cuba,
bulbosum, *Veil Fl. Flum.ix.* t. 11.—Bras,
caespitosum, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 1. t 101.—Peruv.
caespitosum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 60.—Bras,
calamarium, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 88—Bras,
calanthum, *Reichb. f. V Warsc. in Bonplandia,* ii. (1854) 111—Peruv.
calcaratum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 8.—Bras.
calceolare, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 32 sSaccolabiuin calceolare.

EPrDENDRTJM :—
***Calceolaria,* Auct.<=seq.**
Calceolariae, Koen. in Retz. Obs. vi. 45 = Cymbiriium Calceolaria.
caldense. *Rodrig. Orck. Nov.* ii. 148__Bras.
caligarinm, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 1110.—Mexic
Calista, Raeusch. Norn. ed. III. 266 (- *Calista amabilis).*—Cochlneh.
calli/erum, Lem. Jard. Fleur. IT. (1854) t. 414, Misc. 65—raniferum.
calocheilum, Hook. Bat. Mag. t. 3898 = alatnm.
campestre, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 17.—Bras,
campylostalyx, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* x. (1862) 730.—Am. centr.
canaliculatum, Poir. Encyc. Snppl. i. 376-Tetremicra rigida.
canaliculatum, *Veil. Ft. Flum.* ix. t. 10.—Bras,
candidum, *Rodrig. Orck. Nov.* ii. 150.—Bras,
candidum, *Veil. Fl. Flum.* ix. 1.19.—Bras.
Candollei, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 55.—Mexic.
caninum, Barm. f. Fl. Ind. 189 (Quid ?>.—Ind. or.
capense, Linn. f. Suppl. 407 — Mystacidium filicorne.
caracasanum, *Regel, Gartenfl.* (1859) 824.—Venezuela,
cardioglossum, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849; 841.—Venezuela.
carinatum, *Lindl. Fol. Oreh. Epid.* 61.—Mexic.
carinatum, Linn. Sp. PI. 95!) = Dendrobium carinatum.
carinatum, *Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix,* 303.—Ins. S. Crux.
carneum, *Lindl. Orch. Linden.* 8.—Venezuela,
carnosum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 87.—Bras.
earolinianum, Lam. Encyc. i. 182-nocturnum.
carpophorum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 148.—Bras.
carthagenense, Jacq. Enum. PI. Carib. 30 — Oncidium carthaginense.
cartilaginiflorum, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 24.—Bolivia,
catenatum, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 14 (= Grammatophylli sp. 1).—**Java.**
***C*tti\us, Reichb. f.VWarsc. in Bonplandia,* ii. (1864)** 112.—N. Granat.
caudatum, Linn. Syst. ed. X. 1246-Brassia caudata.
cauliflorum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 47.—Bras.
cauliflorum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790; ed. I. Art. iv.,14 (Quid ?).—Java,
cearense, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 141.—Bras.
Ceboletta, Jacq. Enum. PI. Carib. 80 = Oncidium Ceboletta.
centradenia, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 1163 - centropetalum.
centropetalum, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 68—viridibrunneum.
centropetalum, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* x. (1852)732.—Veragnay.
cepiforme, Hook. Bot. Mag. t. 8765 - Candollei.
Cera/a, Raeusch. Norn. ed. III. 265 = Dendrobium Ceraja.
ceratistes, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 81.—N. Granat.
cemuum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 353.—N. Granat.
cespitosum, *Lam. Encyc.* i. 187.—Ins. Borbon.
chacaoënse, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 20.—Venezuela,
chionenm, *Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 73.-N. Granat.
chiriquense, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 730.—Am. centr.
Chloë, *Reichb. f. in Bonplandia,* iv. (1856) 827.— Guatemala.
chloranthum, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 25-chloroleucum.
chloranthum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 55.—Bras.
chlorinum, Rodrig, 1. c. ii. 139=chloranthum.
chlorolencum, *Hook. Bot. Mag.* t. 3567.—Guian.
chlorops, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1880) II. 624.—Mexic.
chondylobolbon, *A. Rich, (f Gal. in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. iii. (1845) 20.—Mexic.
Christi, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 112.—Ecuador.
Christyannm, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1884) II. 38.—Bolivia.

EPIDENDRUM:-
chrysostomum,J?ricAA/. *in Otto If Dietr.Allg.Garten:* xxiv. (1856) 98.—Peruv.
cicadarium, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 14 (Quid ?).—Java,
ciliare, *Linn. Syst.* ed. X. 1246; *Jacq. Enum. PI. Carib.* 29.—Am. trop.
cingillum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1882) I. 880.—Hab. 1
cinnabarinum, *Saltm. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 106.—Bras.
cinnamomeum, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat Sir. III. iii. (1845) 19 = pterocarpum.
citrinum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 817 = Cattleya citrina.
citrinum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 63.—Bras.
clavatum, Koen. in Retz. Obs. vi. 60 = Saccolabium clavatum.
clavatum, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1870.—Am. trop.
clavtculatum, Sw. Prodl. Veg. Ind. Occ. 120 = Vanilla claviculata.
Clowesii, *Batem. ex Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 16.—Guatemala.
Clypeolum, Font. f. Prod. 61 = Liparis Clypeolum.
cnemidophorum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 58.—Guatemala.
coccineum, **Jacq.** Enum. PI. Carib. 29 = Ornithidium coccineum.
coccineum, *Reichb.f. in Bonplandia,* iii. (1855) 68.—Venezuela.
cochlearifolium, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 126-Lepanthes cochlcari folia.
eochleatum, Curt. Bot Mag. t. 169-fragrans.
cochleatum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1351.—Am. centr.; Ind. occ.
***cochlMam,Lindl.inAnn. Nat. Hist. iv.* (1840) 382.**—Peruv.
***cotton, Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 60.—Guatemala.**
colorans, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartcnz xix. (1851) 250 = polyanthum.
complanatum, Koen. in Retz. Obs. vi. 50 (=Sarcochili sp.).—Zeylan.
com/i/j'rafwm.Griseb.Cat. Pl.Cub. 262-scalpelligernm.
compositum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 39.—Bras,
compressum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 617.—Ins. Trinit.
conchaechilum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 53.—Bras.
concinnum, Steud. Nom. ed. I. 299, sphalm.>Lepanthes concinna.
concolor, *La Have tf Lex. Nov. Veg. Desc.* fasc. ii. *(Orch. Opusc.)* 25.—Mexic.
concretum, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 30; *Select. Am.* 228.—Am. austr.
counivens, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 44.—Bras,
conopseum, *[R. Br.* 1n] *Ait. Hort. Ken.* ed. II. v. 219.—Am. bor.
conspicuum, *Lem. Illus'tr. Hortic.* xvi. (1869) t 592.—Bras.
Cooperianum, *Batem. in Hook. Bot. Mag.* t. 6654.— Bras,
coordinatum, *Reichb.f. in Linnaea,* xli. (1877)7.—N. Granat.
eorallorhiBon, Poir. Encyc. Suppl. i. 877«»Corallorhiza innata.
cordatum, *Ruit (f Pav. Syst. Veg.* **244.—**Peruv.
cordatum. Veil. Fl. Flum. ix. t. 38 = cordifolium.
cordifolium, *Steud. Nom.* ed. II. i. 657.—Bras.
coriaceum, Parker, ex Hook. Bot Mag. t. 3595 = variegatnm.
coriaceum, Poir. Encyc. Suppl. i. 385»Aërides coriaceum.
coriifolium, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* vi. (1851) 218.—Am. centr.
coriophorum, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 347.—Ecuador.
corniculatum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 128-Pleurothallis emarginata.
cornutum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 86.—Perav.
cornutum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 14 (Quid»).—Java,
coronatum, *Rui* (f Pav. Syst. Veg.* 242.—Peruv.
corymbosum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 61.—Bras.
corymbosum, Ruiz & Pav. 1. c. 246—umbelliferum.
costa-ricense, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1S52) 937.—Costa Rica,
costatum, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 21.—Mexic

EPIDENDBUM:—
Coxianum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1877) II- 358.—Am. trop.
crassifolium, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 107 = ellipticum.
crassilabium, Poepp. *Be* EndL Nov. Gen. et Sp. ii. 1. t 102 =>variegatum.
crenatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t 6.—Bras,
criniferum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1871) MM.— Costa Rica.
crispatum, Forst. f. Prod. 60 — Dendrobium crispatum.
crispatum, Knowles & Westc. Fl. Cab. ii. (1888) 79-adenocarpum.
crispum, Lam. Encyc i. 186-Oncidium carthaginense.
cristatum, *Rui* V Pav. Syst. Veg.* 243.—Peruv.
crithmifolium, *Voigt, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 52.—Hab.!
croceum, *Rui* (f Pav. Syst. Veg.* 246.—Peruv.
cubense, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 17.—Cuba,
cucullatum, *Lindl. I. c.* (1838) *Misc.* 33.—Bras.
cucullatum, Linn. Sp. PI. ed. II. 1850 - Brassavola cucullata.
cuspidatum, Lodd. Bot. Cab. 1.10 = ciliare.
cyclotellum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1880) I. 72.—Mexic
cycnostachys, Benth. in Jonm. Linn. Soc. xviii. (1681) 814=Stamfordianum.
eyenostalix, Reichb. £ in Bot. Zeit x. (1852) 731" Stamford ianum.
cylindraceum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 86.—N. Granat.
cylindrostachys, *Reichb f. &[1] Worse, in Bonplandia,* ii. (1854) 110.-N. Granat.
decipiens, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 70.—N. Granat; Guiana,
delicatissimum, *Reichb.f. in Linnaea,* xli. 11877) 36.—Am. centr.
Dendiobü, Reichb.f. 1. c. xxii. (1849) 841.—Venezuela,
dendrobioides, *Thunb. PI. Bras. Dec.* ii. 17.—Bras,
densiflorum, *Hook. Bot. Mag.* t. 3791.—Mexic; Venezuela.
denticulatum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 143.—Bras.
dichotomum, Lindl. Bot. Reg. (183b) Misc. 7a = corymbosum.
dichotomum, Paxt. ex Steud. Nom. ed. II. i. 557 * Paxtonianum.
dichotomum, *Presl, Rel. Haenk.* i. 101.—Peruv.
dichromum, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 78.—Bras,
difforme, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 29 ; *Select. Am.* 223. t. 136.—Am. trop.
diffusum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 121-Seraphyta multiflora.
diotum, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 65.—Guatemala.
dipterum, Sieber, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxi. (18H5) 498-Cryptopuselatus.
dipus, Lindl. Bot. Reg. (1845) t. 4-nntans.
discoidale, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 54.—Ins. S. Doming-
discolor, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III-iii. (1845) 22 = nocturnum.
distantiflorum, *A. Rich.* 6" *Gal. I. c.* 19. t. 7.—Mexic
distichum, Forst. f. Prod. 92, nomen (Quid ?).—I[ns]-**Societ.**
distichum, Lam. Encyc. i. 189 = Oberonia brevifolia.
diumum, Poir. Encyc. Suppl. i. 375 = Cymbidium diurnum.
dolosum, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 224 - Cattleya dolosa.
domesticum, Linn. Sp. PI. 952 = Vanilla aromatics.
Duboisianum, Brongn. ex A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 239 = atropurpurcum.
Dumunsuttu, Huch.-Ham. ex Lindl. Gen. et Sp. Orcti. 90 = Dendrobium densiflomm.
durum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 87— Bras,
ebumeum, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1867) 404.— Panama.
echinocarpum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 124 =Dicb»e» echinocarpa.
elatius, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 319-CatU«y» guttata.
***eltgaas, Reichb. f. I. c.* 374.—Mexic.**
elegans, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 12.—Bras.
ellipticum, *R. Grah. in Hook. Exot. Fl.* iii. t. 207 ! « ***in Edinb. N. Phil. Journ.* i. (1826) 171.-B.™*-**
elongatum, Jacq. Coll. iii. 260; Ic. PI. Rar. «»• »• 604=secundum.
emarginatum, *Ruiz V Pav. Syst. Veg.* 247.—
Endresii, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1883) I. Costa Rica.

EPIDENDKUM:—
ensatum, *A. Rich, b- Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. iii. (1845) 22.-Mexic.
ensiuaulon, A. Rich. *Sc* Gal. 1. c. 19«venosum.
ensi/olium, Linn. Sp. PI. 954 = Cymbidium ensifolium.
ensiforme, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 2.—Bras.
equitans. Font f. Prod. 60-Oberonia glandulosa.
equitans, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 44.—Mexic.
eqaitans, *RuiM V Pav. Syst. Veg.* 249.—Peruv.
erubescens, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 87. —Mexic.
esculentum, Hort. Kew. ex Lindl. Fol. Orch. Epid. 16 = aciculare.
euosmum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 79.—Bras.
evectum, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6902.—N. Granat
Evelynae, *Reichb./. Xenia Orch.* iii. 28.—Bolivia.
exasperatum,i?etcA£./. *Beitr. Orch. Centr. Am.* 87.—Costa Rica.
excisum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 86.—N. Granat.
expansum, *Reichb./. in Linnaea,* xli. (1877) 115.—N. Granat.
falcatum, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (1840) 382.—Mexic
Wlax, *Lindl. Orch. Linden.* 9.—N. Granat.
JaUiloquum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1885) I. 666. —Hab. t
fasciola, Font. f. Prod. 60 = Vanilla Fasciola.
tastigiatum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 66.—N. Granat.
/astigiatum, Lindl. 1. c. 71-quitensium.
favoris, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1874) II. 98.—Mexic.
fenugineum, *Ruit V Pav. Syst. Veg.* 246.—Peruv.
nlicaule, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 101.-Bras...
fili/orme, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 126=Aeranthus nliformis.
Fimbria, *Reichb. /. in Bonplandia,* it (1854) 282.—Mexic
nmbriatum, *H. B. tr K. Nov. Gen. et Sp.* i. 851.—N. Granat.
fjmbriatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 4.—Bras,
annum, *Reichb./. Beitr. Orch. Centr. Am.* 87.—Costa Rica.
flabellatum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 6.—Mexic.
flabelli/orme, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 123-=Zygopetalum cochleare.
nabellum-Veneris, Koen. in Retz. Obs. vi. 57 (Quid?). —Ind. or.
fiavidum, Lindl. Orch. Linden. 8 = leucochilum.
flavo-virens, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1855) 19; *et m Linnaea,* xxviii. (1856) 371.—Bras,
navo-virens, *Reichb./. Beitr. Orch. Centr. Am.* 85.—Guatemala,
navum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 83.—Bras.
Jkxuosum, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Eraeq. 260-imatophyllum.
Hosibundum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 353. t. 86.—Am. auslr.
nondum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 22.-Bras,
"onjugum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 57.—Bras.
Flos-aeris, Koen. in Retz. Obs. vi. 64 - Aerides lauopetala.
rlos-aeris, I inn. Sp. PI. 952 = Arachnanthe moschifera.
Forbesii, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 816 = Cattleya fcorhesii.
formosum, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. Mi-(1853)201 = alatum.
jfactinexum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 151.—Bra*.
{"Fans, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 123.—Am. trop.
rriderici-Guilielmi, Warsc. ex Reichb. /. in Bonplandia, »• (1854) HO.-Peruv.
gidum, *Linden, ex Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 76. —Venezuela.
faiuntaceum, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 15 (Quid ?).-Java.
fi»Mex, *Reichb./.Xenia Orch. L* 96. t. 97.—Peruv.
tnmcosum, *Pav. ex Lindl. Gen. et Sp. Orck.* 101.—Mexic.
Lindl. Bot. Reg. (1888) *Misc.* 15.-Cuba.
«7, Regel, Ind. Sem. Hort. Turic (1850); ex achweiz. Zeitschr. Gartenb. ix. (1861)202=Skinneri.
Vfns, A. Brongn. in Doperr. Voy. Coq. Bot. 196. t. « = Schombur|kii.
*f*nale,* Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 126 = DendrophyUx runalis.
F?c\u»num, A. Rich, b" Gal. in Ann. Sc. Nat. Sir. I".m.(1845)21.-Mexic

EPLDENDBUM:—
/uni/erum, Morr. in Ann. Soc Gand, iv. (1848) 211. t. 198 - polyanthum.
Funkii, *Reichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 889.—N. Granat,
/urvum, Linn. Sp. PI. ed. II. 13<8=Vanda fnrva.
fuscatum, Sm. Spidl. 21. t. 23=anceps.
fusiforme, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 822.—Hab.?
galeatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 8.—Bras.
Galeola, Raeuach, Nom. ed. III. 265-Cranichis nudifolia.
Galeottianum, *A. Rich, (f Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1846) 21.—Mexic.
gaUopavinum, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1855) 219.—Bras,
gastropodium, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 405. — N. Granat.
geminiflorum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp. i.* 854.—N. Granat.
geniculatum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 146.—Bras.
Ghiesbreghtianum, *A. Rich.* &* *Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. 111. iii. (1846) 19.-Mexic.
giganteum, Hort. ex Planch. Hort. Donat 164=. gravidum 1
giganteum, Poir. Encyc. Suppl. *I* 876 *(-Cyrtopera gigantea).*—Afr. austr.
Gigas, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 20.—Bras,
gilvnm, *Veil. I. c.* t. 83.—Bras.
Giroudlanum, *Reichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856) 827.—Pernv.
gladiatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 106 = anisatum.
glaucospermum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 14. (Quid?).—Java,
glaucum, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 29.—Mexic.
glaucum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 124-Diehaea glauca.
globosum, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 29; *Select. Am.* 222. *t* 133.—Am. trop.
glossaspis, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 37.—Ecuador,
glossoceras, *Reichb./. V Worse, in Bonplandia,* ii. (1854) 110.—Peruv.
glumaceum, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 88.—Bras,
glumibracteum, *Reichb. /. in Hamb. Gartens,* xix. (1863) 11.—Costa Rica.
glutinosum, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xi. (1843) 110 = odoratissimnm.
Goncalvii, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 162.—Bras,
gracile, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1768.—Ins. Baham.
gracilicanle, *Reichb. /. V Warsc. in Bonplandia,* ii. (1864) 111.—Perev.
gracillimnm, *Reichb. /. (f Warsc. in Otto V Dietr. Allg. Gartent.* xxii. (1854) 314.—Peruv.
Grahami, Hook. Bot. Mag. t. 8885=phoeniceum.
gramineum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 103.—Peruv.
gramini/olium, Linn. Sp. PI. ed. II. 1353-Octomeria graminifolia.
gramini/olium, Pav. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 114 - Ponera jnncifolia.
graminoides, Sw. ProtL Veg. Ind. Occ. 126-Dichaea graminoides.
grammatoglossum, *Reichb./. in Linnaea,* xxii, (1849) 837.—Venezuela.
grandiflorum, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aeqnin. i. 94. t. 27 = Stanhopea Bucephalus,
grandiflorum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 86.—Peruv.
grandiflorum, Poir. Encyc. Suppl. 377 *(."Cleistes luted).*—Guiana.
graniticum, Lindl. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 83 » oncidioides.
granulosum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 819-Cattleya granulosa.
gratiosum, *Reichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856) 215. —Am. trop.
gravidum, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* iv. (1849) 114. —Mexic.
guatemalense, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 250- oncidioides.
Guillemianum, Lindl. ex Planch. Hort. Donat. 164 = gravidum ?
guttatum, Linn. Sp. PI. 953 = Oncidium luridum.
guttatnm, *A. Rich,* b* *Gal. in Ann. Sc. Nat. Sit,* III. iii. (1845) 20.—Mexic.
haematochilum, *Reichb./. in Flora,* xliii. (1866) 277. —Ind. occ.
Haenkeanum, *Presl, Rel. Haenk.* i. 100.—Peruv.
Hanburii, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 46-Mexic

EPIDEITORTJM:—
Harrisoniae, *Hook. Bot. Mag.* t. 3209.—Bra*.
Harrisonianum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 817-Cattleya Loddigesii.
Hartwegii, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* 160.—Peruv.
hastatum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 82.—N. Granat
havanense, *Lodd. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 544, nomen.—Cuba.
Helleri, Fenzl, ex Hemsl. in Gard. Chron. (1883) *u.* 204-gracile.
Hemiscleria, Reichb. *I* in Walp. Ann. vi. 383 *(-Hemiscleria nutans).*—Am. trop.
Henschenli, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 147.—Bra*,
herbaceum, *Lodd. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 544, nomen.—Bras,
heterodoxum, *Reichb./. in Bonplandia,* ii. (1864) 20. —Venezuela.
hexadactylum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 66.—Bra*.
hexandrum, Koen. in Retz. Obs. vi. 45 (AppendicuUe sp.).—Ind. or.
Hippium, Buch.-Ham. ex D.Don, Prod. Fl.Nep.82-Rynchostylis retusa.
hircinum, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 236=fucatnm.
hirsutum, Poir. Encyc. Suppl. i. 367=Elleanthns Caravala.
hololeucum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 145.—Bras.
Hookerianum, *Reichb./. in Linnaea,* xli. (1877) 87.—N. Granat.
Huegelianum, Reichb. £ in Walp. Ann. vi. 81 = Cattleya Skinneri.
Humboldtii, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 886 - Schomburgkia Humboldtii.
humile,' Sm. Exot. Bot. ii. 76~Coelngyne humilis.
humile, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 24.—Bras.
hyemale, Poir. Encyc. Suppl. i. 376-Aplectrnm hyemale.
hymenodes, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 58.—N. Granat.
ibaguense, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 107-ybaguense.
imatophyllum, *Lindl. I. c.* 106.—Guian.
imbricatum, *Lam. Encyc.* i. 189.— Gnian.
imbricatum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 110.—Bras.
indsum,'#«VA&./. *If Warsc. in Bonplandia,* ii. (1854) 112.—Peruv.
incisnm, *Veil. Fl. Flum.* ix. 1.18.—Bras.
incomptum, *Reichb./. in Linnaea,* xxv. (1862) 736.—Am. centr.
incumbens, Lindl. Bot. Reg. (1840) Miic. 45-aromaticum.
indicum, Poir. Encyc. Suppl. i. 884-RynchostyIi* retusa.
indivisum, Bradf. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 614 (Diacrii spA—Ins. Trinit.
indusiatum, Klotzsch, in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. xxii. (1864) 177 = lacertinum.
infaustum, *Reichb./. in Hamb. Garten:* xix. (1863) 13. —Bras.
inflexum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 30.—Bras,
insevtiferum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 87.—Bolivia,
insidiosum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 8(1.—Hab.?
intermedium, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 318 - Cattleya intermedia.
invereum, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 85.—Bras,
ionocentrum, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1883). II. 8. —Am. trop.
ionophlebium, *Reichb./. Beitr. Orch. Centr. Am.* 103. —Cosia Rica.
ionosmum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 49.—Guiana.
Isabella, Reichb. f. Walp. Ann. vi. 818-Cattleya Isabella,
isochilnm, *Reichb./. in Bonplandia,* iv. (1866) 826.—Ind. occ.
jajense, *Reichb./.I.e.* ii. (1864) 20.—Venezuela,
jamaicense, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 82.—Jamaica.
Jamiesonis, *Reichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856) 327. —Ecuador.
jejunum, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 12.—Ecuador.
Jenisclbianum, *Reichb. /. in Fl. des Serres,* Sér. I. ix. (1853-64) 98; *et in Bonplandia,* ii. (1854) 89.—Bra*.
jund/olium, linn. Sp. PI. ed. II. 1351 «• Oncidium Ctbolleta.
Kantenii, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 37.—N. Granat.
Karwinckii, *Reichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856) 327. —Mexic.
kermesinum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 31.—Venezuela.

EPIDENDKUM :—
Klotzscheanam. *Reichb.f. in Linnaea,* xxii. (1849) 838. —Venezuela.
Kraenzlinii, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xii. (188S) 116.—Porto Rico.
Krngii, *Bella, I. c. 117.*—Guiana.
labiatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 313 =• Cattleya labiata.
labiatum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 124-Leiochilus cochlearis.
Ubiosnm, *Rich, in Act. Sac. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 112 (err. typ. 105).—Gnian.
lacertinum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 63.—Gnatemala.
laceram, *Lindl. I. c.* (1838) *Misc.* 17.—Cuba.
lactiflorum, A. Rich. & Gal. in Aon. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845)22=falcatum.
lacustre, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 60.—Venezuela.
laeve, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 24 = paniculatum.
lagotis, *Reichb. /. in Banplandia,* iii. (1855) 68.—Venezuela.
Lambda, *Linden, ex Reichb. /. I. c.* ii. (1854) 281.—N. Granat.
lamellatum, Westc. ex Lindl. Bot Reg. (1848) Misc. 46 = stenopetalum.
lamprocaulon, *Reichb.f. in Bat. Zeit.* x. (1852) 732.—Mexic.
Lanceola, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 128 = Pleurothallis Lanceola.
lanceolatum, *Brad/, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 616. —Ins. Trinit.
lancifolium, *Pav. ex lindl. Gen. et Sp. Orch.* 98.—Mexic
lanipes, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 91.—Peruv.
Lansbergii, Regel, Ind. Sem. Hort. Pelrop. (1855) 19 — polyanthum.
Lansbergii, *Reichb. f. in Nederl. Kruidk. Arch.* iv. (1869)316.—Venezuela.
lasiopetalum, Poir. Hncyc SuppL i. 384=Aërides lasiopetala.
latifolium, Reichb. *I* in Walp. Ann. vi.348, sphalm.-falcatum.
latilabrum, *Lindl. Bot. Reg. (\Ul)Misc.* 77.—Am. trop.
laxum, *Poepp.* to" *Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 2.—Peruv.
laxum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 125-Pleurothallis laxa.
Lechleri, *Reichb./. in Linnaea,* xli. (1877) 38.—Peruv.
ledifolium, *A. Rich, if Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 21.—Mexic.
Lehmanni. *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 11.—Ecuador.
leiobolbon, Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 308. t. 10 = varicosum.
Leochilus, *Reichb. /. in Flora,* xlviii. (1865) 277.—Ind. occ.
leopardinnm, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 112. —Ecuador?
leucochilum, Lindl. Orch. Linden. 8 = lacustre.
leucochilum, *Link, Klotasch V Otto, in Otto V Oietr. Allg. Garten:* xi. (1843) 146.—N. Granat.
lencomelanum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 83. —Mexic.
lignosum, *La Llave I? Lex. Nov. Veg. Desc. /use.* ii. *(Orch. Opusc).* 28.—Mexic.
ligulatum, La Llave, 1. c. 26.—Mexic.
ligulatum, Veil. Fl. Flum. ix. t. 15-Oncidium pnmilum.
lilacinnm, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 96, nomen.—N. Granat.
Liliastrum, Salzm. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 177 = Sobralia Liliastrum.
lilii/olium, Koen. in Retz. Obs. vi. 61 (Qnid?).— Ind. or.
Lima, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 67.—Peruv.
limbatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 69.—Guatemala.
Lindbergii, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 01.—Bras.
Lindenianum, A. Rich. *Sc* Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1846) 20=auritnm.
Undenä, Lindl. Bot. Reg. (1845) *Misc.* 48.—Venezuela.
Lindenii, Lindl. in Ann. *Sc* Nat. Hist. xii. (1843) 897 = fallax.
Iindleyanum, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 376.—Costa. Rica.
lineare, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 644=Cleisostoma ionosmum.
lineare, Jacq. Enum. PI. Carib. 29»Isochiluslinearis.
lineare, *Rui** to" *Pav. Syst. Veg.* 249.—Peruv.
linearifolium, Hook. Bot Mag, t 4572=aciculare.

EPIDEITORTTM :—
linearilingue, *Reichb./. in Linnaea,* xli. (1877) 114.—N. Granat.
lineatum, Salisb. Prod. 10 = fragrans.
lineatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 36.—Bras.
Limkianum, *Klottsch, in Otto V Dietr. Allg. Garten*.* vi. (1838) 299.—Mexic.
lividum, Lindl. Bot. Reg. (1888) Misc. 51 = tessellatum.
Llavei, Steud. Norn. ed. II. i. 658-• ligulatum.
Loddigesii, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 316 = Cattleya Loddigesii.
longibulbon, *Lodd. ex W. Baxt. in Lòud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 644, nomen.—Guiana,
longicolle, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 34.—Guiana.
longifolium, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 183.—Bras,
longiflorum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* i 354.—N. Granat.
longiflorum, Koen. in Retz. Obs. vi. 65 (Quid?).—Ind. or.
longihastatum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 59.—Bras,
longipes, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 10.—Ecuador.
longipetalum, lindl. & Paxt Flow. Gard. i. (1850-61) 149. t. 30-alatum.
longipetalum, A. Rich. *Sc* Gal. in Ann. Sc. Nat. &r. III. iii. (1845) 22. t. 17=antenniferum.
longispathum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 66.—Bras,
longovarium, *Rodrig. I. c.* 57.—Bras.
Lunaeanum, A. Rich, ex Lindl. Fol. Orch. Epid. 23 =varicosum.
luteolum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 313 = Cattleya luteola.
luteo-roseum, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. iii. (1845) 19.—Mexic.
luteum, Poir. Encyc. Suppl. i. 874-Chloraea crispa.
lycopodioides, Koen. in Retz. Obs. vi 55=Cymbidium lycopodioides.
lyratum, Veil. Fl. Flum. ix. t. 37=Aspasia lyrata.
macrobotryum, *Lindl.ex Reichb./. in Bonplandia,* iv. (1856) 827.—Guatemala,
macrobulbon, *La Llave (f Lex. Nov. Veg. Desc./asc.* ii. *(Orch. Opusc.)* 42.—Mexic.
macrocarpum, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 112 (err. typ. 105).—Guiana.
macrochilum. Hook. Bot. Mag. t 3534=atropurpureum.
macropodum, *Reichb./. in Bonplandia,* iv. (1856) 827. —Peruv.
macrostachys, Thou. Fl. lies Austr. Afir. t. 88 = Aëonia macros tachya.
macrosUchyum, *Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 70.—N. Granat.
macrothyrsoides, *Reichb./. in Linnaea,* xli. (1877) 113. —N. Granat.
maculatum, *Aubl. PI. Gui.* ii. 825.—Guiana,
maculatum, *Rui** &* *Pav. Syst. Veg.* 243.—Peruv.
Magnoliae, Muhl. Cat. 81=conopseum.
mancum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc* 83.—Peruv.
marginatum, Link, Klotzsch, *Sc* Otto, Ic. PI. Rar. 90. t. 86=radiatum.
margûuLtum, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792) 112 (err. typ. 105).—Guiana,
marmoratum, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 21.—Mexic.
Martianum, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (1840) 382. —Bras.
Mathewsii, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 81.—Peruv.
matutinum, Poir. Encyc Suppl. i. 384 - Aërides matutinum.
matutinum, *Reichb./. in Linnaea,* xxii. (1849) 840.—Venezuela.
maximum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 316-Cattleya maxima.
mayti/olium, Lindl. Fol. Orch. Epid. 98, sphalm.-macrobulbon.
megagastrium, *Lindl. 1. c.* 49.—Peruv.
megalanthum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 51.—Bras,
megalospathum, *Reichb./.in Linnaea,* xli. (1877) 114. —N. Granat.
melanocaulon, *Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 375.—Mexic
meliosmum, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1869) 939.—Mexic.
mesomicron, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 61.—Bolivia,
michuacanum, *La Llave V Lex. Nov. Veg. Desc./asc.* ii. *(Orch. Opusc.)* 26.—Mexic

EPLDENDBUM:—
micranthum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 88.—Peruv.
micranthum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 125=Stelis micrantha*
microbulbon, *Hook. Ic. PI.* t. 847.—Mexic.
microcharis, *Reichb./.in Gard. Chron.* (1870) 1246.—Guatemala,
microdendron, *Reichb./. Beitr. Orch. Cen.tr. Am.* 84.—Costa Rica.
micron, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 41.—Bras,
microphyllum, *Lindl. in Hook. Journ. Bet.* iii. (1841) 85.—Guiana,
micropus, *Reichb./. in Hamb. Gartenz.* xix. (1863) 13. —Hab. ?
microtos, *Reichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856) 326.—Peruv.
Miersii, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 69.—Bras,
minimum, *Aubl. PI. Gui.* ii. 825.—Guiana.
minutum, Aubl. 1. c 824=Polystachya luteola.
miserrimum, *Reichb./. in Bonplandia,* iii. (1866) 220. —Ind. occ.
miserum, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc 37 = Hormidium miserum.
modestum, *Reichb. /.* b* *Worse, in Bonplandia,* ii. (1854) 110.—Peruv.
molle, *Reichb.f. in Linnaea,* xli. (1877) 84.—Bras.
monanthum, Steud. Nom. ed. II. i. 668 =-Hormidium uniflorum.
monile, Thunb. Fl. Jap. SO - Dendrobium catenatum.
moniliforme, Linn. Sp. PI. 954=Dendrobium mooiliforme.
monophyllum, Hook. Exot. Fl. ii. t. 109=Pleurothallis emarginata.
monophyllum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 14.—Bras.
Monroeanum, *Lodd. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 544, nomen.—Guatemala.
montanum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 121=Octadesmia serratifolia.
Moritzii, *Reichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 887.—Bras.
moschatum, [Buch.-Ham. in] Symes, Embassy, ed. II. iii. 316=Dendrobium Calceolaria.
Moseni, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1880) n. 390.—Hab.?
mucranatum, Banks *Sc* Soland. ex Hook, t Fl. N. Zel. i. 239 = Karina mucronata.
multibulbe, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1700) ed. I. Art. IV. 15 (Quid ?).—Java.
muricatum, Poir. Encyc. Suppl. i. 368=Dichaea muricata.
muricatum, *Reichb./. in Bonplandia,* vi. (1856) 827.—Peruv.
musci/erum, Lindl. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 6" anceps.
myodes, *Reichb. /. Beitr. Orch. Centr. Am.* 86.—Costa Rica.
Myosurus, Forst. f. Prod. 60 = Oberonia Myosums.
myrianthum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 59.—Guatemala-
naevosum, *Lindl. 1. c.* 4.—Mexic.
nasutum, *Reichb./. in Hamb. Garten*,* xix. (1868) 281. —Cuba,
naucrates, *Reichb. /. in Bonplandia,* ii. (1854) 20.—Hab.?
nematocaulon, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 288.—Cuba,
nemorale, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 82. —Mexic.
nervosum, *Lam. Encyc.* i. 186.—Ins. Amboina.
nervosum, Thunb. in Trans. Linn. Soc ii. (1794) 387 =Liparis nervosa.
nitens, *Reichb. /. Beitr. Orch. Centr. Am.* 82.—Guatemala,
nocturnum, *Jacq. Enum. Carib.* 29; *Select. Am.* 225. t 139.—Am. trop.
nodosum. Linn. Sp. PI. 958»Brassavola nodosa.
nonchinense, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 324.—Costa Rica,
novo-granatense, *Reichb. /. V Worse, in BonplandiOi* ii. (1854) 111.—N. Granat.
nubium, *Reichb. /. Beitr. Orch. Centr. Am.* 81.—Guatemala.
nudum, *Koen. in Retz. Obs.* vi. 52.—Ind. or.
nutans, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. 245 = Ruizianum.
nutans, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 121.—Jamaica.
oblongatum, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 339" phoeniceum.
obtnriiblium, *Willd. Sp. PL* iv. 118.—Ind. occ

EPIDENDBUM:—
obtusum, *A. DC.* 8«« *Not. yard. Gents.* 17.—Mexlc.
ochraceum, *Undl. Bot. Reg.* (1888) t. 26. *Misc.* 14.—Mexic.
ochranthum, A. Rich. Fl. Cnb. Fanerog. ii. 287 = virens.
ochriodes, *Undl. Fol. Orch. Epid.* 52.—N. Granat.
ochrochlorum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 140.—Bras,
octandrum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 21.—Bras.
odontorhizon, Poir. Encyc. SuppL i. 877=CoralIorrhiza odontorhiza.
odontospathum, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 23.—Bolivia.
odoratissimum, *Undl. Bot. Reg.* t. 1415.—Bras.
odoratum, Poir. Encyc. Suppl. i. S85 = Aerides odoratnm.
Oerstedii, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 937.—Costa Rica.
ollare, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 5.—Bras,
oucidioides, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1623.—Gnian.
ophioglossoides, Jacq. Enum. PL Carib. 29-Stelis ophioglossoides.
Ophrydis, *Keen, in Retz. Obi.* vi. 46.—Ind. or.
Ophrydis, *Raeusch. Norn.* ed. III. '268, nomen.—Jamaica.
oppositi/olium, A. Rich. ft Gal. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. iii. (1845) 21 = Hexisea oppositifolia.
orchideum, Koen. in Retz. Obs. vi. 48 (= *Ceratochilus orchideus).*—Ind. or.
orchidinornm, *Sahm. ex Undl. Gen. et Sp. Orch.* 103.—Bras.
oreonastes, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 22.—Bolivia,
orgyale. *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist.* xv. (1845) 256.-N. Granat.
ornatum, Lem. in Fl. des Series, Ser. I. iv. (1848) 334 b = floribundum.
osmanthum, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 134.—Bras.
Ottonis, *Reichb./. in Hamb. Garten*,* xiv. (1858) 218.—Venezuela.
wale, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 125 = Lepanthes concinna.
ovalifolium, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 104.—Mexic.
ooatum, Linn. Sp. PI. 962 = Dendrobium chlorops.
ovnlum, *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 65.—Mexic.
oxypetalum, *Lindl. Orch. Linden.* 8.—Cuba.
Pachyanthum, *Undl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 31.—Guian.
fachysepalum, Klotzsch, in Otto ft Dietr. Allg. Gartenz. xxiii. (1855) 274=variegatum.
Poleaceum, Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am. 80 = anritnm.
Pajlens, *Reichb. f. 1. c.* 82.—Costa Rica.
paUidiflornm, *Hook. Bot. Mag.* t. 2980.—Ins. S. Doming.
PaUidum, *Court, in Mag. Hort.* i. (1883) 266.—nab. 1
Poimarum, Salzm. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 436-Vanilla palmarum.
*P*lmifolium,* Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 123 =• Maxillaria palmifolia.
Palpigernm, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1879) II. 40.—Mexic.
Pamplonense, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 837.—«. Granat.
Panchrysum, *Reichb. f. V Worse, in Otto V Dietr Allg. Gartenz.* xxii. (1854) 318.—Pernv.
fniculatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 1166= Pnmonais panicaUta
PMUcatum, *Rudr. ft Pav. Syst. Veg.* 24S.-Am. anstr.
Pantherinum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 58.-Bras.
Mei ^ *ReieM>, f, <n Bon*landia>iv-* (1868) 326>~
Papilio, *veil. Fl. Flum.* ix. t. 28.-Bras.
*P*pthonaceum,* Lam. Encyc. i. 179 (Quid?).—Japon.
Papillosum, Batem. in Lindl. Bot Reg. (1888) Misc. 7 = adenocarpum.
rM«nl *banense, Rodrig. Orch. Nov.* ii. 141.—Bras,
Lindl. F'l- Orch. Epid. 34.—N. Granat
Pwanaense, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 139.-Bras.
Pwuithrie, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1862) 732.—Gnatemala.
Wkinsonianum, *Hook. Bot. Mag.* t 3778—Mexic.
^iflornm. *Run* b- *Pav. Syst. Veg.* 245.—Perov.
£"vilabre, *Lindl. in Benth. PI. Hartm.* 15O.-Peruv.
%", ** *Uave V Lex. Nov. Veg. Desc. fasc.* ii. *Opusc.)* 23.-Mexic.

EPIDENDRUM:—
pastoris, Link ft Otto, Ic. PI. Rar. t. 12 = Linkianum.
patens, *Sw. Fl. Ind. Occ.* iii. 1496.—Ind. occ; Guatemala.
pauciflorum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 49.—Bras,
pauper, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 13.—Bras.
Pavonianum, *Reichb./. in Bonplandia,* iv. (1866) 216.—Hab.?
Paxtonianum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 558.—Bras,
pay tense, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1865) 220.—Pemv.
pedicellatum, Poir. Encyc Suppl. i. 376-Eulophia aculeata.
pendulum, Roxb. PL Corom. i. 85. t. 44=—Cymbidium pendulum,
pentadactylum, *Reichb./. in Bonplandia,* ii. (1854) 89.—Peruv.
pentotis, *Reichb. /. in Linnaea,* xii. (1877) 81.—Bras.
Peperomia, *Reichb./. in Bonplandia,* ii. (1854) 20.—Venezuela,
pergameneum, *Reichb. /. Beitr. Orch. Centr. Am.* 86.—Costa Rica.
Philippii, *Reichb. '/. in Linnaea,* xxii. (1849) 840.—Reg. Andin.
phoeniceum, *Undl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 57.—Cuba,
phyllocharis, *Reichb. /. Xenia Orch.* iii. 11. t. 208.—Costa Rica,
phymatoglossnm, *Reichb./. in Bot. Zeit.* x. (1852) 731.—Mexic.
physodes, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1878) 289.—Costa Rica.
piclum, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 32.—Guian.
pileatum, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1856) 68.—Venezuela,
piliferum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 83.—Panama.
piperinum, LindL in Ann. ft Mag. Nat. Hist xv. (1846) 266.—N. Granat.
Pipio, *Reichb. /. in Otto V Dietr. Allg. Garten:* xxiv. (1856) 98.—Bras,
pium, *Reichb. /.* b" *Warm, in Otia Bot. Hamb.* 92.—Bras.
plantaginifolium, Koen. in Retz. Obs. vi. 60 = Cymbidium plantaginifolium.
platyglossum, *Reichb./..'» Linnaea,* xli. (1877) 6.—N. Granat.
platyotis, *Reichb. /. in Nederl. Kruidk. Arch.* iv. (1859) 316.—Venezuela,
platystigma, *Reichb. /. Beitr. Orch. Centr. Am.* 88.—Costa Rica.
plicatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) t. 35.—Cuba.
polyanthemum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 1166, sphalm. = fucatum.
polyanthum, Hort Gall, ex Lindl. Fol. Orch. Epid. 18 =fucatum.
polyanthum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 106.—Mexic.
polybulbon, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 124.—Mexic.; Ind. occ.
polygonatum, *Lindl. in Ann.* b" *Mag. Nat. Hist.* Ser. III. i. (1858) 382.—Cuba,
polyphyllum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 17.—Bras.
polystachys, Thou. Fl. lies Anstr. Afr. t. 82=Aeonia polystachya.
polystachyum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 852.—Peruv.
polystachyum, Pav. ex LindL Gen. et Sp. Orch. 106 = polyanthum.
Porpax, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1866) 220.—Nicaragua.
Porpax, *Reichb. /. in Flora,* xlviii. (1865) 278.—Ind. occ.
porphyreum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 86.—N. Granat.
porphyroglossum, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 33-Cattleya porphyroglossa.
porphyrospilum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 80.—Hab.?
praecox, Sm. Exot. Bot. ii. 73 = Coelogyne praecox.
praemorsum, Roxb. PL Corom. i. 84. t. 43 (Saccolabii sp.).—Ind. or.
praetervisum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 82.—Venezuela,
pratense, *Reichb. /. Beitr. Orch. Centr. Am.* 84.—Guatemala.
primulinum, Batem. ex LindL ft Past. Flow. Gard. i. (1860-51) 161-rufum.

EPIDENDBUM:—
prismatocarpum, *Reichb. /. in Bot. Zeit.* x. (1852) 729.—Am. centr.
proli/erum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 124=Ponera prolifera.
proligerum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 61.—Bras,
propinqnum, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. iii. (1846) 21.—Mexic.
prninosum, *A. Rich,* b* *Gal. 1. c.* 20.—Mexlc.
Pseudepidendrum, *Reichb. /. Xenia Orch.* i. 160. t. 53.—Panama,
pterocarpum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 82.—Mexic.
pugionatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 14. (Quid ?).—Java.
pulchellum, A. Rich. *8c* Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III, iii. (1845) •21 = Hormidium pulchellum.
pulchellum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 125 - Lepanthes pulchella.
pulcherrimum, Klotzsch, in Otto ft Dietr. Allg. Gartenz. xxii. (1854) 233 - eochlidium.
punctatum, Linn. Syst. ed. X. 1246 = Cyrtopodium punctatum.
punctatum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 1166, sphalm. = tripunctatum.
pnnctifernm, *Reichb. /. in Gard. Chron.* (1881) II. 88.—Bras.
punctulatum, *Reichb./. I. c.* (1885) II. 70.—Mexic
puniceum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 323 =* Alamania punicea.
purpurachylum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 49.—Bras.
purpurascens, Focke, in Tijdschr. Nat. Wetensch. iv. (1851) 64^clavatum.
purpnreum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 59.—Bras,
pnrum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 75—Venezuela; N. Granat.
pusillum, Koen. in Retz. Obs. vi. 49 (Sarcochili sp.).—Ind. or.
pusillum, Linn. Sp. PL ed. II. 1362 = Oncidium iridifolium.
pygmaeum. Hook. Journ. Bot. i. (1834) 49-Hormidium uniflorum.
pyriforme, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t. 10.—Cuba.
quadratum, Klotzsch, in Otto ft Dietr. Allg. Gartenz. xviii. (1850) 402-varicosum.
quadrature, *Undl. Fol. Orch. Epid.* 83.—Am. trop.
quitensium, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 392.—Pernv.
racetnifiorum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 125=Pleurothallis oblongifolia.
racemosum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 15. (Quid J).—Java.
radiatum, Hoftingg. Verz. Orch.—Cf. Bot. Zeit. i. (1843) 882=difforme?
radiatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 58.—Mexic
radicans, *Pav. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 104.—Mexic.
ramonense, *Reichb. /. Beitr. Orch. Centr. Am.* 81.—Costa Rica,
ramosum, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 29; *Select. Am.* 221. t. 132.—Am. trop.
raniferum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 109.—Mexic.
raphidophorum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 62.—Venezuela,
recurvatum, *Undl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 77.—Veneznela.
refractum, *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist.* xii. (1843) 398.—Venezuela.
Renanthera, Raeusch. Nom. ed. III. 265 - Renanthera coccinea.
replicatum, *Lindl.* b* *Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 167.—N. Granat.
resectum, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 82.—Panama.
resupinatum, Foist, f. Prod. 61-Microstylis Rheedii.
retusum, Linn. Sp. PL 963 = Rhynchostylis retusa.
revolutum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 55.—Bras.
rhaphidophorum, Reichb. f. in Walp. Ann. vL 1167, sphalm. = raphidophorum.
rhizomaniacum, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 12.—Ecuador.
rhitophorum, Batem. in Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 8-radicans.
rhynchophoium, *A. Rich. IT Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 20.—Mexic.
rigidum, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 29; *Select. Am.* 2M. t. 134.—Am. trop.
rigidum, Lodd. Bot. Cab. t. 1600=ramosum.
PS. *Undl. in Ann. * Nat. Hist.* Ser. III. i. 330.—Cuba.

BPTJDBHDIITJM:—
rostrigenim, *Rrichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 88.—Peniv.
rubrocinctum, Lindl. Bot. Reg. (1848) Misc 9-densiflorum.
rubrum, *Lam. Encyc.* i. 178.—Ins. S. Doming.
Rueckerae, *Reichb. f. in Hamb. Gartent.* xxi. (1865) 885.—Hab.?
rufum, *Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 38.—Ins. Baham.
Ruiziannm, *Steud. Norn.* ed. II. i. 558.—Pernv.
rnpestre, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 84.—Pernv.
ruscifolium, Jacq. Enum. PI. Carib. 29 = Plenrothallis rnscifolia.
saaronicum, Koen. in Retz. Obs. vi. 58 •= Aërides matutiDum.
Sagraeanum, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 285 = fucatum.
sanguineum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 124 = Broughtonia sanguinea.
sarcochilum, *Lindl. V Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 281.—N. Granat.
tarcodes, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 45.—N. Granat.
sarcophyllum, Focke, in Tijdschr. Nat Wetensch. iv. (1851) 67 = microphyllum.
sarcostalix, *Reichb. /. (J Worse, in Bonplandia,* ii (1854) 111.—Peinv.
satyrioides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 128=Ionopsis testiculata.
Saururus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 14. (Quid ?).—Java,
saxatile, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 84.—Bras.
scabnim, *Ruiz (f Pav. Syst. Veg.* 248.—Pernv.
scalpelligerum, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 278.—Ind. occ.
Sceptrum, *Lindl. Orch. Linden.* 8.—Venezuela.
Sckillerianum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 318 = Cattleya Schilleriana.
Schimperi, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 283 = Eulophia Schimperiana.
Schlimii, Lindl. Fol. Orch Epid. 74—socorrense.
Schlimii, *Rrichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 838.—Venezuela.
Schombnrgkii, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 15.—Guian.
Schreineiii, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 142.—Bras,
sderocladium. *Lindl. ex Reichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856 826.—Peruv.
scopulorum, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 23.—Bolivia.
scriptum, Linn. Sp. PI. ed. II. 1351 = Grammatophyllam speciosum.
scriptum, *A. Rich. (? Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 21-Mexic.
scalptum, *Rrichb. /. in Bonplandia,* ii. (1854) 89.—Panama.
Scutella, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 83.—Pernv.
seenndum, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 29 ; *Select. Am.* 224. t. 137.—Am. trop.
tecundum, Sw. Obs. Bot. 825 = anceps.
selligenim, *Batem. ex Lindl. in Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 40.—Mexic.; Guatemala.
Sdlowii, *Reichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 889.—Bras.
seriatum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 59.—Mexic.
serpens, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* 149.—Peruv.
Serronianum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 50.—Bras,
serralatum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 121.—Ind. occ.
sertularioides, Sw. 1. c. 122 = Pleurothallis sertularioides.
sessile, Koen. in Retz. Obs. vi. 60 = Bulbophyllum clandestinum.
sessile, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 122.—Ind. occ.
setiferom, *Lindl. in Ann. Net. Hist.* iv. (1840) 883.—Bras.
simplex, *Spreng. Syst.* iii. 736.—Ins. Mascar.
sinense, Andr. Bot. Rep. iii. t. 216 = Cymbidium sinense.
Sintenisii, *Reichb. f. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iii. (1885) 277.—Porto Rico.
anuosum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 46.—N. Granat.
sisyrinchiifolium, *A. Rich.* to' *Gal. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. iii. (1845) 19.—Mexic.
Skinned, *Batem. in Bot. Reg.* t. 1881.—Guatemala,
smaragdinum, *Lindl. Bot. Reg.* (1838) *Misc.* 82.——Gnian.; Bras,
focorrense, *Reichb. /. V Warsc. in Bonplandia,* ii. (1864) 20, in nota.—N. Granat.

EPIDEUDRUM:—
Sophronitis, *Lindl. (f Reichb. /. in Gard. Chron.* (1857) 655.—Ecuador.
Soratae, *Reichb. f. Xenia Orch.* iii. 24.—Bolivia.
Spatella, *Reichb. f. in Bonplandia,* iv. (1856) 214.—Hab. \
spathaceum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 85.—Peruv.
spathulatum, Linn. Sp. PI. 962=Vanda spathulata.
spectabile, Focke, in Bot Zeit xi. (1858) 229 = oncidioides.
spectabile, *Reichb./. in Walp. Ann.* yi. 375.—Mexic.; Guatemala,
spectatissimum, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1855) 68.—Venezuela,
sphaerostachyum, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. C1877) 115.—Ecuador,
spicatum, *Hook./. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 180.—Ins. Galapag.
spinescens, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 72.—Bras,
spondiadum, *Reichb. /. in Bot. Zeit.* x. (1852) 731.—Costa Rica.
Spruceanum. Lindl. Fol. Orch. Epid. 80 = noctumum.
squalidum, *La Have b" Lex. Nov. Veg. Desc. fasc.* ii. *{Orch. Opusc.)* 24.—Mexic.
squamatum, Poir. Encyc. Suppl. i. 376-Dipodium squamatum.
squamatnm, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 184.—Bras.
Stamfbrdianum, *Batem. Orch. Mex.* t. 11.—Mexic.
Stangeanum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) I. 462.—Panama.
stcllatum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 21.—N. Granat
stenopelalum, *Hook. Bot. Mag.* t. 3410.—Jamaic
stenopetalum, *Knowles V Westc. Fl. Cab.* ii. (1888^ 175.—Mexic.
sterile, Lam. Encyc i. 189 (Bulbophylli sp.).—Ind. or.
stramineum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 33.—N. Granat.
striatum, Thunb. in Trans. Linn. Soc ii. (1794) 327 = Bletia hyacinthina.
strobiliferum, *Rrichb. f. in Nederl. Kruidk. Arch.* iv. (1859) 333.—Ind. occ.
Strophinx, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 78.—Guatemala.
snbadnatnm, *Reichb. f. 1. c.* 6.—N. Granat
subaequale, *Eggers, Fl. Ste-Croix,* 113.—Ins. S. Thorn.
subaquilinum, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 1167, sphalm.•= seq.
subaquilum, *Lindl. Bot. Reg.* (1846) snb t. 64.—Mexic.
subpurum^ *Rrichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 21.—Venezuela,
subulatifolium, *A. Rich.* b" *Gal. in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. iii. (1845) 21.—Mexic.
subulatum, Koen. in Retz. Obs. vi. 51'Aerides cylindricum ?
subulatum, Sw. Prod.Veg.Ind. Occ. 123 (-Brassavolae sp. I).—Ind. occ.
subumbellatum, Hoffmgg. in Linnaea, xvi. (1853-55) 232 = diHbrme.
snlphuroleucum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 66.—Bras.
superbum, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 92 = Cattleya violacea (in Addend.).
syringaeflorum, Warcz. ex Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 110 = laeve.
syrinuothyrsis, *Reichb. /. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 6145.-Bolivia.
tabulare, Poir. Encyc Suppl. i. 376 = Cymbidium tabulare.
tampense, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) sub t. 35.—Florida,
tenax, *Rrichb. /. in Bonplandia,* ii. (1854) 20.—Venezuela.
tenellum, Lindl. Fol. Orch. Epid. 44-Schlimii.
tenue, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 88.—Bras.
tenuiflorum, Hort. ex Lindl. Fol. Orch. Epid. 88 = diffnsuro.
tenui/olium, Linn. Sp. PI. 952=Cymbidium tenuifolium.
teres, *Rrichb. f. in Bonplandia,* iii. (1856) 220.—Mexic.
teres, Thnnb. Fl. Jap. SO^Luisia teres.
teretifolium, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 122.—Ind. occ
ternatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 48.—Bras.
terrestre. Linn. Syst. ed. X. 1246 -= tnberosnm.
tessellatum*, *Batem. in Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 7.—Guatemala.

EPIDEOTDBTTM:—
tessellatum, Roxb. PI. Corom. i. 34=Vanda Roxburghii.
tesseloides, Steud. Norn. ed. II. i. 558 •* Vanda Roxburghii.
tessulatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. (Quid)).—Java.
testaefolium, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 122=Pleurothallis testaefolia.
tetraceros, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 733.—Am. centr.
tetragonum, Thou. FL lies Anstr. Afr. t. 34 = Phajus tetragonus.
tetrapetalum, Jacq. Ennm. PI. Carib. 30 = Oncidium tetrapetalum.
tetrapelalum. *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 29.—Bras.
Thrixspermum, Raeusch. Norn. ed. III. 265 *{^Thrixspermum centipeda).*—Cochinch.
thrombodes, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 79.—Peruv.
tibicinis, Batem. in Lindl. Bot Reg. (1838) Misc. 8 = Schomburgkia tibicinis.
tigrinnm, *Linden, ex Lindl. Orch. Linden.* 9.—Venezuela.
tipuloideum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 32.—Venezuela,
tolimense, *Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 66.—N. Granat.
tomentosum, Koen. in Retz. Obs. vi. 53 (= Eiiae sp.).—Ind. or.
torquatum, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* 149.—N. Gianat.
tovarense, *Reichb./. in Linnaea,* xxii. (1849) 838.-Venezuela; N. Granat.
trachycarpnm, *Lindl. in Benth. Bot.Voy. Sulph.* 172.—Mexic.
trachychilum, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 19.—Mexic.
triangulatum, Griseb. Cat. PI. Cub. 262 = triangu-liferum.
trianguliferum, *Rrichb./. in Flora,* xlviii. (1865) 277.—Ind. occ.
tribuloides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 123 = Pleurothallis tribuloides.
trichocarpum, Sw. 1. c. 124 = Dichaea trichocarpa.
tricrure, *Reichb./. V Warsc. in Bonplandia,* ii. (1851) 112.—Pernv.
tridactylum, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 46" Amblostoma cemuuin.
tridens, *Lodd. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit-Suppl.* iii. 604.—Guian.
tridens, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iL 2. 1.108 nocturnum.
tridentatum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 125 = Lepanthes tridentata.
triflorum, *Ruia b" Pav. Syst. Veg.* 248.—Pernv.
trigonifiorum,Sw/. Prod. Veg. Ind. Occ. 126-Stelis ophioglossoides.
trilabiatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 42.—Bras.
Trinitatis, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 60.—Ins-Trinit.
tripartitum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 7.—Bras.
tripterum, Lindl. in Hook. Jonrn. Bot. iii. (1841) 83-Linkianum.
tripterum, Sin. Ic. Pict 14. t. 14=Coelia Bauerana.
tiipunctatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 66.-Mexic
tripunctatum, Lindl. Fol. Orch. Epid. 41 = punctiferom.
triquetrum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 122 = Oncidium triquetrnm.
triste, Forst. f. Prod. 60 (Luisiae sp.).—Penang i N-Caled.
triste, A. Rich. *Sc* Gal. in Ann. Sc Nat. Sér. III. (1845) 20 = ochracenm.
Trulla, *Rrichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856) 214 ' Hab.?
tuberosum, *Forst./. Prod.* 59.—N. Caled.
tuberosum, Linn. Sp. PI. ed. II. 1352 (sp. delend.)—Ind. or.; Bras,
turbinatum, *La Have* b* *Lex. Nov. Veg. Desc. /asc.* "• *{Orch. Opusc.)* 41.—Mexic.
Tnrialvae, *Reichb. in Gard. Chron.* (1871) 1678" Costa Rica.
umbellatum, Buch.-Ham. ex Lindl. Gen. et Sp. Orc». 222»Saccolahium dasypogon.
umbellatum, Forst f. Prod. 60 = CirrhopeUlW Thouarsii.
umbellatum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 121 - difformne-
umbellatum. Veil. Fl. Flum. ix. t 23 = Cheiropterocepbalus sertuliferus.

EPIDENDRUM:—

umbelli/erum, J. F. Cmel. Syst. 85-diffonne.
undulatum, Sir. Prod. Veg. Ind. Occ. 122 = Oncidinm canhagenense.
uniflerum, Lindl. Bot Reg. (1839) Misc. 15=Hormidiuin unifiorum.
uniflorum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 61.—Bras,
uniflorom, *Veil. Fl. Flum.* ix. t 84.-Bras.
usneoides, D. Don, Prod. FL Nep. S7«Sareochilns usneoides.
utrieularioides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 128 = Ionopsis utrieularioides.
utriculatum, Poir. Encyc. Suppl. i. 376-Govenia utriculata.
vacdnioides, *Reichb. f. ex Linden, in Illustr. Hortic.* xxix. (1882) 51, nomen.—Venezuela,
vandifolium, *Lindl. in Journ. Hart. Soc.* iv. (1849) 269.-Mexic
Vanilla, Linn. Sp. PI. 962 = Vanilla angustifolia, aromatica.
vanillum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125-praec.
Vannerianum, *Reichi. f. in Gard. Chron.* (1885) II. 678.-Hab.?
varicosum, *Batem. in Bot. Reg.* (1838) *Mite.* 80.—Am. centr.
"ariegatnm, *Hoot. Bot. Mag.* t. 8161.—Bras.
variegatum, Koen. in Retz. Obs. vi. 44 (Quid ?)•—Ind. or.
wriegatum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 122=Oncidium variegatum.
»enosum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 99.—Merit
Venlilabium, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 82.—Bras,
ventricosum, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 86—Peruv.
vernixium, *Rrichb. /. tf Warsc. in Bonplandia,* ii. (1854) llO.-Peruv.
verrucosum, Lindl. Bot Reg. (1844) t. 51«-nemorale.
verrocosum, Sw. *Fl. Ind. Occ.* iii. 1497.—Jamaica,
vesicatum, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 80.—Bras.
Vespa, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 27.—Bras.~
»«««<»», Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 124=Omithidium .vestitum.
v'eji, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 220•— Nicaragua.
vtneentinum, *Lindl. in Hook. foum. Bot.* iii. (1841) . 88—Ins. S. Vincent.
yolaceum, *Jacq. Select. Am.* 280.—Am. austr.
nolaceum, Lodd. Bot. Cab. t. 887 = Cattleya .Loddigesii.
™*laceum,* Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 318=Cattleya .violacea (io Addend.).
vtolodora, Gal. ex LindL Fol. Orch. Epid. 10 = .selligeium.
v>*rens,* Hoffmgg. in Linnaea, xvi. (1842) Litt. 238 = lalilabrum.
vir«s, *Lindl. V. Paxt. Flow. Gard.* i. (1860-51) 152. .—Guatemala.
mrescens, Lodd. Bot. Cab. t. 1867=anceps.
"-escens, Poir. Eneyc. Snppl. L 374 = Chloraea ^quichen.
virgatum, *Lindl, in Hook. Mrn. Bot.* ii. (1841) 83.—Me &c.
virgatum, *Veil. Fl. Flum.* ix. t. 40.—Bras,
wide, *Ruia &• p m . Syst. Veg.* 244.—Peruv.
"ndibrunneum, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 368.—N. , Granat.
viridiflorum, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 30.—Bras.
m*di-purpUreum, Hook. Bot. Mag. t 8666 = anceps.
*!f"?«», Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 81-ciliare.
"Mellinum, *Lindl. Gen.et Sp. Orch.* 97.—Mexic.
vivi CSSSSSSS *Lindl, Bot. **** (1841) Uisc, 10* ~ CSSan.
volubile, *Ruit &• Pan. Syst. Veg.* 247.-Perav.
*°*lucre,* Tl«ou. Fl. lies Austr. Afr. t. 81 = Aeonia Aubeni.
vºlutimi, *Lindl. V Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-62) 151.—Am. centr.
Wmiforme, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 124.—Jamaica.
w*K*neri, Klotzsch, in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. w** (1851) 250 = virens.
Walkerianum Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 416 = Caui eya Walkeriana.
w»»isii, *Reichb./. in Gard. Ckren.* (1875) II. 66.—N. Granat.
w»xs»!wiciii, *ReitU./. in Bot. Zeit.* x. (1862) 742.—t-oata Rica.

BPIDENDBXTM:—

Weddelii, *Lindl. Fol. Orch. Epid.* 67.—Bras.
Widgrenii, *Lindl. 1. c.* 89.—Bras.
Wilsonianum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) II. 72 =Cattleya Wilsoniana.
Wrigbtii, *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. III. (1868) 331.—Cuba.
xanthinum, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 18.—Bras,
xantholeucnm, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 839. —Venezuela,
xipheres, *Reichb. f. in Fl. des Serres,* Sér. I. ix. (1853-54) 98.—Peruv.
xylostacbyum, *Lindl. Bot. Reg.* (1845) *Misc.* 70.—N. Granat.
xytriophorum, *Reichb./. (f Warsc. in Bonplandia,* ii. (1854) 112.—Peruv.
ybnguense, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 352.—N. Granat.

EPIPAOUS, Nntt. Gen. Am. ii. 60 (1818). *0X0-BANCHACEAB,* Benth. & Hook. f. ii. 986.
LEPTAMNIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267.
MYLANCHE, Wallr. Orob. 75 (1825).
americaous, *Nutt. I. c.—Am.* bor.
virginianus, Bart. Com. Fl. Philad. ii. 50=americanus.

EPIGAEA, Linn. Diss. Chen. 27 (1751); in Amoen. Acad. iii. 17 (1756). *ERICACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 585.
MEMAECYLUM, Mitch, in Act Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 213, App.
PARAPYROLA, Miq. in Ana. Mus. Lugd. Bat. iii. 191 (1867).
asUtica, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xi. (1867) 481.—Japon.
cordifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 78.—Am. austr.
repens, *Linn. Sp. PI.* 395.—Am. bor.
rubicunda, Steud. Norn. ed. II. i. 659 = repens.

EPIGENIA, Veil. Fl. Flum. 183 (1825) ; iv. t. .187, 188 = Styrax, Tourn.
crenata, Veil. 11. cc 184; iv. t. 138 •= Symplocos lanceolata.
integerrima, Veil. 11. cc 188; iv. t. 137-Styrax glabratum.

EPIGOGIUM, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 693, sphalm. (1837)=Epipogrmn, S. G. Gmel. (Orchid.).

EPIGYNANTHUS, Blume, in Flora, viii. (1826) 679 = Hydrilla, Rich. (Hydrocharid.).
Blumei, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt 63-H. ovalifolia.

EPIGYNIUM, Klotzach, in Linnaea, xxiv. (1852) 49 = Vaoc i um Linn.
Acosta, Klotzsch, 1. c. 53 = V. Acosta.
acuminatum, Klotzsch, 1. c. 52-Corallobotrys acuminata.
affine, Klotzsch, 1. c. 51=V. Donianum.
coriaceum, Klotzsch, 1. c. 52=V. coriaceum.
eunei/olium, Klotzsch, 1. c. «V. cuneifoliam.
Donianum, Klotzsch, 1. c. 51 — V. Donianum.
Dunalianum, Klotzsch, 1. c = V. Dunalianum.
ellipticum, Klotzsch, 1. c. 52 = V. ellipticum.
floribundum, Klotzsch, 1. c. — V. floribundum.
Griffithianum, Klotzsch, I. c. 51 = V. Griffithiannm.
lauri/olium, Klotzsch, 1. c. 62-V. laurifolium.
Leschenaultii, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1852) 50-V. Leschenaultii.
leucobotrys, Nutt ex Hook. Bot. Mag. t. 5103 = V. serratum.
lucidum, Klotach, 1. c. 52 = V. lncidum.
malaccense, Klotzsch, 1. c. 50 = V. malaccense.
myrtoideum, Klotzsch, 1. c. 62 •= V. myrtoides >
neilgkerense, Klotzsch, 1. c. 50=V. neilgherrense.
obovatum, Klotzsch, 1. c. 61=Agapetes obovata.
rotundifolium, Walp. Aon. ii. (1852) 1095 = V. Leschenaultii.
serratum, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1852) S0-V. serratum.
Sprengelii, Klotzsch, 1. c. 61 - V. Doniannm.
varingiae/olium, Klotzsch, 1. c. 62 » V. varingUefolium.
veifosum, Klotzsch, L c. 50 »V. venosum.

EPiaYNTJlC, Wight, Ic t 1308 (1848). *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 717.

EPIGYWTJM:—

LEGOUIXIA, Muell. Arg. in Heurck, PI. Nov. 145 (1871).
Griffithianum, *Wight, Ic.* t. 1308.—Burma,
laevigatum, *Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iii. 666.—Reg. Himal.
Maingayi, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 666.—Malacca,
parvinorum, *Hook./. I. c.*—Ind. or.

EPILASIA, Benth. & Hook. *I* Gen. ii. 682 (1878) *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 532.
Acrolasia, C. B. Clarke, Comp. Ind. 279-Bungei.
ammophila, C. B. Clarke, 1. c-Bungei.
Bungei, C. *B. Clarke, I. c*—As. temp.
cenopleura, C. B. Clarke, L c. = Buugei.
hemilasia, C. B. Clarke, 1. c. = Bungei
intermedia, C. B. Clarke, 1. c. = Bungei.

EPILATORIA, Comm. ex Steud. Norn. ed. II. i. 669 (1840) = ELPHEGEA, Cass. sec. Steud. = Peiadia', facq. (Compos.).

EPILEPIS, Benth. PI. Hartw. 17 (1839) = Coreopsis, Linn. (Compos.).
rudis, Benth. 1. c.-C. rudis.

EPILEPSIS, Lindl. Veg. Kingd. 711 U847)-EPILEP1S, Benth.--Coreopsis, Linn. (Compos.).

EPILINELLA, Pfeiff. in Bat. Zeit. iii. (1846) 673= Cuecuta, Linn. (Convolvnl.).
cuscutoides, I'feiff. 1. c. = C. Epilinum.

EPILITHES, Blume, Bijdr. 734 (1826)-8erpioula, Linn. (Hslorag.).
coccinea, Blume, I. c. *(^Laurembergia coceinea).*—Java.

EPHiOBITJM, Dill, ex Linn. Syst. ed. I (1736). *ONAGRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 787.
CHAMAENEKION, (.Tourn.] Adans. Kara, it 86 (1763).
CROSSUSTIGMA, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. II. iv. (1835) 174.
abortivum, Haussk. Monog. Epilob. 178 - lanceolatnm.
acidulum, Burb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. il879)li>2 = obscurum.
acinifolium, Reichb. ex Schnr, Enum. PI. Transt. 218 = collinum.
acutum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 331 = Duriaei.
adenocaulon, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 119.-Am. bor.
Adi, *Andn. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (18c3) 841, nomen.—Rossia.
adnatum, Griseb. in Bot. Zeit x. (1852) 861-teti.igonum.
affine, Dong. Obs. Vèg. Sitcha, 17'glandulosum.
affine, Maxim, in Ind. Sem. Hort. I'ctrop. (1869) 16-japonicum.
aggregatum, Čelak. in Sitzb.Boehm.Ges. Wiss. (1878) = montanum.
alatum, Hegetschw. Fl. Schw. 357=alsinifolium.
albiflorum, *Andrt. ex Trautv. in Act.-Hort. Petrop.* viii. (1883) 341, nomen.—Rossia.
algidum, *Bieb. Ft. Taur. Cauc.* i. 296.—Reg. Caucas.
atgidum, Bieb. 1. c. iii. 282 = Tourneforlii.
alpestre, Eichw. Skizze, 161 = algidum.
alpestre, Hoppe, ex Murith, Guide Val. 66 = trigonum.
alpestre, Jacq. Obs. Vindob. 35-alpinum ?
alpestre, Schmidt, Fl. Bohem. iv. 81 = aUinifolium.
alpicolum x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 6S— Europ.
alpinum, Griseb. in Bot Zeit. x. (1852) 853 = Homemanni.
alpinum, Huds.Fl. Angl. ed. I. 163-alsinifoliom.
alpinum,*Linn. Sp. PI.* 348.—Europ.; As. bor.et Arct. Keg.
alsinei/olium, Wirtg. ex Haussk. Monog. Epilob. 137 = pnlustre.
alsini/olium . Blytt, Norges Fl. iii. (1876) 1120' Homemanni.
alsinifolinm, *Vill. Prosp.* 45; *Hist. PI. Dauph.* iU. 611. —Enrop.
alsinoides, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* Ui. (1839) 82. —N. Zel.
altemans, Link, ex Haussk. Monog. Epilob. 92-lanceolatum.
ambit-ens, *Haussk. Monog. Epilob.* 178, nomen.-Hab.?

EPILOBIUM:—
ambiguum, Fries, Summa Veg. 177 =obscurum.
americanum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* zxix. (1879) 118.—Am. bor.
amoennm, *Safin. inMed. Repos. N. York,* II. V. (1808) 354, nomen ; *Am. Monthly Mag.* (1818) 266.—Am. bor.
•mphibolum, *Haussk. Monog. Epilob.* 174, nomen.—Hab. ?
amplectens, *Benth. in Wall. Cat.* n. 6880.—Reg. Himal.
amplexicaule, Lam. Fl. Fr. iii. 478-hirsutum.
mmurense, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 65.—Rfg. Amur.
anagallidifolium, Lam. Encyc. ii. 876 = alpinnm.
anatolicum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xzix. (1879) 69.—As. Min.
anceps, Fries, Nov. FL Suec. ii. 20=alsinifolinm.
anceps, Lamotte, Prod. i. 289 -slanceolatum.
andicolum. Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (188S) 809 = pedicellare.
andicolum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 118.—Am. austr.
angusHfolium, Lam. Fl. Fr. iii. 482 = Dodonaei.
angustifolium, *Linn. Sp. PI.* 347.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
angustissimum, 'Weber, PI. Minns Cogn. Dec. 3 = DodonaeL
Antonianum, Anct. ex Pen. Syn. i, 409=angustifolinm.
approximation x, Hanssk. Monog. Epilob. 177, nomen.—Europ.'
mguaticum, Tbuill. Fl. Par. ed. II. 191-hirsntnm.
Arnottianum, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. 809-pednncalare.
Aschersonianumx, Hanssk. Monog. Epilob. 178, nomen.—Enrop.
atriplicifolinm, *A. Cum. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1889) 82.-N. ZeL
attenuatum, Schnr, Enum. PL Transs. 209-parviflorum.
anstrale, *Poepp. tf Haussk. in Haussk. Monog. Epilob.* 269.—Am. austr.
Balansae, Boiss. Fl. Orient, ii. 750 - originifolinm.
Baueri, Endl. in Enum. PI. Hueg. 44 —junceum.
Beckhansii, *Haussk. Monog. Epilob.* 312.—Enrop.
Behnngianum, *Haussk. 1. c.* 277.—As. bor.
biforme, Schnr, ex Hanssk: 1. c. 110 = Lamyi.
Billardierianum, *Ser. in DC. Prod.* iii. 41.—Austral.
Blyttianumx, Hanssk. Monog. Epilob. 177.—Europ.
Boissieri x , Hanssk. 1. c.—Europ. ?
Bojeri, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 90.—Madag.
Bollianum x, Brnegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1888) 67.-Enrop.
hoDgaxdi, Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 57.—Alaska.
Bonplandiannm, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 95.—Reg. Andin.
Borbasianumx, Hanssk. Monog. Epilob. 177.—Europ.
Borderianumx, Hanssk. L c—Europ.
boreale, *Haussk. 1. c.* 279.—Am. bor. occ.
brachiatum, Celak. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1873) =obscnrum.
brachycarpum, Leight. in Ann. Nat. Hist. viii. (1841) 401 = angnstifolium.
brachycarpum, Presl, ReL Haenk. ii. 80-repens.
Brandsai, Floriano, in Magyar. Növént. Lapok, ix. (1886) 127 = alsinifolium.
brasiliense, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 119.—Bras.
brevifolium, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 222.—Reg. Himal.
brevipes, *Hook./. Fl. N. Zel.* ii. 828.—N. Zel.
brevipilum x, Hanssk. Monog. Epilob. 177.—Enrop.
brevistylum, Barb, in Bot. Calif, I. 220=glandulosum.
caesium, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 91.—Am. austr.
caespitosum, *Haussk. Monog. Epilob.* 801.—N. ZeL
californicnm, *Haussk. I. c.* 260.—Calif,
calycinum, *Haussk. 1. c.* 196.—Japon.
canescens, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 134.—Austral.
canescens, White, in Ann. Nat. Hist. i. (1838) 208; et in Proc. Bot. Soc. Lond. i. (1838) 208=Dodonaei.
capense, *Bucking, ex Krauss, in Flora,* xxvii. (1844) 425.—Afr. austr.
carpetanum, Willk. Sert. Fl. Hisp. 60 =• montanum.
delakovskyanum x, Haussk. Monog. Epilob. 177—Karop.

JJlfJJLjOBIUJC:—
cephalostigma, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 67.—Japon.
cernuum, Pall, ex Hanssk. Monog. Epilob. 156 = alpinum.
cerulescens, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* II. v. (1808) 354, nomen.—Am. bor.
chilense, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 118.—Chili.
chionanthum, *Haussk. 1. c.* 149.—N. Zel.
chloraefolium, *Haussk. 1. c.*—N. Zel.
chordorrhitum, Fries, Summa Veg. 177=obscnrum.
ciliatum, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* II. v. (1808) 861.—Am. bor.
cinerenm, *A. Rich. Bot. Voy. Astrol.* i. 830.—N. Zel.
Clarkeanum, *Haussk. Monog. Epilob.* 220.—Reg. Himal.
cochinchinense, Wall. Cat. n. 6834 = hispidum.
collinum, *C. C. Gmel. Fl. Bad.* iv. 265.—Europ.
coloratnm, *Muhl. ex Willd. Enum. Hart. Berol.* 411-; *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 89.—Am. bor.
commutatumx, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Europ.
confertifolium, *Hook./. Ic. PI.* t. 685.—Tasman.
confertum, A. Conn, in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) 34 =junceum.
confine x, Hanssk. Monog. Epilob. 177.—Enrop.
confusum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 161.—Armenia; Reg. Casp.
connexum x, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Europ.
consimile, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 68.—Reg. Cancas.
consociatum x, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Europ.
conspersum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 61.—Ind. or.
cordatum, Bivuna, Andr. Piant. Ined. 9=parviflorum.
cordifolium, D. Don; ex Haussk. Monog. Epilob. 166 — alsinifolium.
cordifolium, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.* 274. t. 60.-Abyss.
corymbosum, Rottb. in Skr.Dansk. Selsk. x. (1770) 440. t. 8. f.28=latifolium.
crassicaule, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 73 - montannm.
crassifolium, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1824) 8, 20 = Dodonaei.
crassum, *Hook. f. Fl. N. Zel.* ii. 328.—N. Zel.
Cnnninghamii, *Haussk. 'in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 118.—Austral,
cnpreum, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. App.* (1873) 2.—Hab. ?
cylindricum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 222-roseum.
dacicum, Borb.in Ertek. ix. (1879) xvi. 9—obscurum.
dasycarpum, Fries, Mant. ii. 21 = alpinum.
davuricum, *Fisch. in Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 44; *et in Spreng. Nov. Prov.* 17.—Dahor.
dedpiens, Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 57-tetragonum.
decumbens, Dum. Fl. Belg. Prod. 89 = obscurum.
decurrens, Hort. Hal. (1812); ex Reichb. Ic Fl. Germ. ii. 89=tetragonum.
deonfdlmm, *Haussk. Monog. Epilob.* 256.—Chili.
densifolium, Kunze, ex Haussk. 1. c. 276—pedicellare.
densum, Rafin. Préc. Découv. 42 ; et in Desv. Journ. Bot. ii. (1814) 271 - lineare.
denticulatum, C. Gay, Fl. Chil. ii. 847 = puberalum.
denticulatum, Rniz & Pav. VL Per. iii. 78-jnncenm, pedicellare.
denticulatum, Wender. Ind. Sem. Hon. Mark (18Ssl) 2-Dodonaei.
difforme, Gilib. Fl. Litnan. ii. 190=angustifolium.
divaricatum, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 354 ; Préc. Découv. 42 -coloratura,
diversifolium, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 151.—Tasmania.
DodonaeL, *Vill.Prosp.* 46; *Hist. PI. Dauph.* iii. 507.—Europ.
doriphyllum. *Haussk. Monog. Epilob.* 257.—Mexic.
dovrense x, Haussk. 1. c. 177.—Europ. bor.
dracunculoides, Ser. ex Gaud. FL Helv. iii. 9-Dodonaei.
Dregeanum, E. Mey. ex Haussk. Monog. Epilob. 102 = tetragon urn.
dubium, Berb. in Ertek. ix. (1879) xvi. 6 = hirsutum t
dubium, Curt. Cat. n. 567 ; ex With. An. Brit PI. ed. II. i. 890-tetngonuml
Dufftiix, Haussk. Monog. Epilob. 178.
Duriaei, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. vi. (1836) 228 (err. typ. 123).—Mont. Pyien.

BPILOBIUM:—
Duthiei, *Haussk. Monog. Epilob.* 206.-Reg. Himal.
ebrodunense, Chaix, ex Haussk. 1. c 87™ collinum.
elatum, Munro, ex Haussk. 1. c. 44-angustifolium.
empetrifolium. Kunze, ex Haussk. 1. c. 156-alpinum.
erosum, *Haussk. Monog. Epilob.* 288.—Tasmania.
erosum, Spachf ex Haussk. 1. c. 290 » junceum.
erroneumx, Hanssk. 1. c 178.—Europ.
erubescens, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 160.—N. Zel.
euphrasioides, Sieber, ex Haussk. Monog. Epilob. 290 =junceum.
Facchini, Hausm. ex Nym. Consp. 248 = alsinifolium.
fallacinumx, Haussk. Monog. Epilob. 177.
fastigiatum, Nutt. exTorr. & Gray, Fl. N. Am. i. 489 <=glandulosum.
Fendleri, *Haussk. Monog. Epilob.* 261.—N. Mexic.
fennicum, Laest. ex Hanssk. 1. c. 120 = obscurum.
finitimum x, Haussk. Monog. Epilob. 177.—Enrop.
fissipetalum,Sleni.n A. Rich. Tent. Fl. Abyss. L 273 -stereophyllum.
flaccidum, Brot. Fl. Lusit ii. 18=Toumefortii.
fiaccidum, Soland. ex Haussk. Monog. Epilob. 800 = rotundifoliam.
flavescens, *E. Mey. ex Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 507.—Afr. austr.
Fleischeri, Hochst. in Flora, ix. (1826) 25-Dodonaei.
fiexuosum, Nutt ex Hanssk. Monog. Epilob. 249 = ŝaUinutum.
foliosum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. IntelL 30= hirsutum.
foliosum, Holl. & Heynh. Fl. Dresd. 297 = parviflorum.
foliosum, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 490» minutum.
fontanum, Chaix, ex Haussk. Monog. Epilob. 166 = alsinifolium.
Franciscanum, *Barbey, in Bot. Calif,* i. 220.—Am. bor. occ.
Freynii, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 881=tetragonum.
frigidum,//a«M*. *in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 61.—As. Min.; Reg. Cancas.
frigidum, Retz. Fl. Scand.Prod. ed. II. 89=Utifolinm.
fruticosum, Lour. Fl. Cochinch. 226 = Jussiaea suffruticosa.
gelidum, Vahl, ex Haussk. Monog. Epilob. 62 « Dodonaei.
gemmascens, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 187 = obscurum.
gemmascens, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 173 - roseum-
gemmiferum, Bor. in Bull. Soc. Agron. Maine-et-Loire (1858) ; ex Nym. Consp. 247 = alsinifolium.
gemmiferum, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. *IS** = obscurum.
Gerardianum, Wall. Cat. n. 6826 = latifolium.
Gesneri, Vill. Prosp. 45=angustifolium.
glabellum, R. Br. ex Haussk. Monog. Epilob. 294 " Billardierianum.
glabellum, *Forst.f. Prod.* 27.—N. ZeL
glaberrimum, *Barbey, in Bot. Calif,* i. 220.—Am. bor. occ.
glabrum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 188 » montanum.
glanduligerum x, K. Knaf, ex Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 882 = Enrop.
glandulosum, *Lehm. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 206.-Am. bor. occ.
glaucinum, Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 51=nralense.
glaucum, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-66) 70-pedicellare.
gorgoneum, *Lowe, ex Haussk. Monog. Epilob.* 68.—Ins. Madera.
gracile, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II- **v' (1882) 70-angustifolium.
grandiflorum, Jacquem. Voy. Bot. 67 = latifolium.
grandiflorum, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. *W* — hirsutum.
Griffithiannm, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* «>*• (1879) 151.—Afghan.
Gunnianum, *Haussk. 1. c.* 149.—Tasmania.
Haenkeanum, *Haussk. I. c.* 148.—Am. anstr.
Halleri, Retz. Fl. Scand. Prod. ed. II. 89 =latifoHnin-haloragifolium, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1 88 ^ 84.—N. Zel.
Haussknechtianumx, Borb. in Oestr. Bot. ZeitscV-xxiž. (1879) 182.—Europ.
Haynaldianumx, Hanssk. Monog. Epilob. 177" Europ.

EPILOBIUM :-
Hectori, *Haussk. Monog. Epilob.* 298.—N. Zel.
Heenanum x, Brnegg. in Jahresb. Natnrf. Ges. Gnub. II. xxiii-xxiv. (1880) 66.—Enrop.
heterocaule, Borb. in Ertek. ix. (1878) XVI. 16-montanum.
[illegible]fophyllum, Hegetschw. FL Schw. 869; Beitr. Crit Aufs. 337= nutans.
[illegible]ophyll[illegible], Nutt ex Haussk. Moaog. Epilob. 276= tetragonum.
junalayense, *Haussk. I. c.* 218.—Reg. Hirnal.
nimalense, Royle, Illnstr. Bot. Himal. i. 211-hirsutum.
[illegible], HudSl F1> Aa[illegible] rf_ r_ 181-parviflornm.
hirsutum, Linn. Sp. PI. 847—Europ.; As. bor.
hirtig^ m . A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. iii. (1889) 83. I. Zel.
Mspidulnm, *Steud. Norn.* ed. II. i. 669.—Chili,
nispidum, *Weinm. in Bull. Soc. If at. Itosc.* xxiiL (1860) I. 543—Kossia.
Hooke[illegible] C_B_ *Clarkt,* [illegible] *Ho*<>*k*- /• «• *Brit. Ind.* ii. 585._Re& Himal.; Japon.
Hornemanni, Bong. Vég.Sitka, in Mém. Acad. Pétersb. vu (1883) 136=roseum.
Hornemanni, Dietr. Fl. Univers. ii. sect. 69. t. 679 - laetiflorum.
Hornemanni, Reichb. It Fl. Gem. ii. 78 - alpinum.
Hornemanni, Schnr, Enum. PI. Transs. 212-nutans.
Huguenini x, Bruegg. in Jahresb. Natnrf. Ges. Graub. U. xxiii-xxiv. (1880) 66.—Europ.
humile, WiUd. ex Stev. in DC. Prod. iii. 40 - latifolium.
Huterix, Borb ex Haussk. Monog. Epilob. 177.—Europ.
hbridum, Schur, Ennm. PI. Transs. 209*=hirsntnm.
Avperidfolium, *Tausch, Hort. Canal, /asc.* 1. n. 7; *in . flora,* vii. (1824) 83.—Bohem.
[illegible] *Cunn, in An[illegible] Nntm* [illegible] 1M9^ 88, Zel.
incanum, Pers. Syn. i. 410-hirsutum.
jndicum, *Haussk. Monog. Epilob.* 199.—Reg. Himal.
wsulare, *Haussk. I. c.* 800.—N. Zel.
[illegible]mediuM, Hegetschw. Fl. Schw. 866; Beitr. Crit. AUK. 841=montanum.
W[illegible]ium, Mérat, Fl., Par. 147=hirsutum.
Wtrmedium, Wormsk. ex Ser. in DC. Prod. iii. 40 - [illegible]gustifolium.
terşitum x, Haussk. Monog. Epilob. 177.
Joponcum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) [illegible]—Japon.
jonanthum, *Haussk. Monog. Epilob.* 281.—Afr. austr.
J»cnndum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 67. —Calif,
jnnceum, *Forst.f. Prod.* 90.-N. Zel.; Am. austr.
*[illegible]*v!t[illegible]»«", Lepech. in Nov. Act Acad. Petrop. xi. [illegible]vl798)370.t6-latifolium.
«(illegible)«», Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 17 = palustre.
[illegible]«!r[illegible] *Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 6«5.—Reg. Himal.
[illegible]fit, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ui. (1875) 661 = parviflorum.
[illegible]rausei, Uechtr. in Bot. Zeit. xxiv. (1874) 240 = Palustte.
[illegible] *Haussk. Monog. Epilob.* 805.—N. Zel.
•aciiflonim, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitsehr.* xxix. (1879) 89.-SuecU.
laetum, Wall. Cat. n. 6329-hirsutum.
Lamo[illegible]tteanumx, Haussk. Monog. Epilob. 178.—turop.
[illegible] *SckultM, in Flora,* xxvii. (1844) 806.—Europ.; vJnens.
*>ceoi[illegible] *Sebasf* [illegible] *Uaurii prod* [illegible] *Fl* [illegible] *Som* [illegible] i. t. 2—Europ.
fyanumx, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Europ.
Pponieum, Bauer, ex Haussk. 1. c. 84=collinum.
Pponicum, Steud. Norn. ed. II. i. 669=palustre.
[illegible]»nbergianum, F. Schultz, Arch. Fl. 273-monUmm.
[illegible]*w»«w x, Haussk. Monog. Epilob. 177.-Europ.
Ufohum, *Linn. Sp. PI.* 347.—Reg. bor. et arct.
latifolium, Mattusch. Fl. Sil. i. 882-angnstifolium.
latifolium, F. W. Schmidt, Fl. Bohem. iv. 76. n. 372 -angustifolium.
[illegible]?". Royle, Ulustr. Bot. Himal. 211 - tetragonum.
^echleri, *PkU. V Haussk. in Monog. Epilob.* 270.-Am. austr.

EPILOBIUM :—
leiophyllum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 62.—Ind. or.
leiospermnm, *Haussk. Monog. Epilob.* 206.—Tibet.
leiostylon, Peterm. Deutschl. FL (1849) 180 = angustifolium.
leptocarpum, *Haussk. Monog. Epilob.* 258.—Am. bor. occ.
leptopbyllum, *Rqfin. in Med. Repos. N. York,* II. v. (1808) 368; *Pric. Dicouv.* 41.—Am. bor.
ligulatum, Baker, in Phytol. N. S. ii. (1867) 20,404 - palustre.
limosum, Schur, Enum. PI. Transs. 212=montannm.
Lindblomianumx, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Europ.
lineare, Fries, Nov. Mant. iii. 185-davuricnm.
lineare, Muhl. Cat. 89 = palustre.
linearifolium, Beorl. ex Haussk. Monog. Epilob. 148 s davuricum.
linifolium, *Bieb. Tabl. Casp.* 68.—Reg. Cancas.
linnaeoides, *Hook./. Fl.Antarct.* 10. t. 6.—Tasman. et N.Zel.
lividum, *Haussk. Monog. Epilob.* 201.—Ind. or.
Lobelii, Vill. Fl. Delph. 36=Dodonaei.
longipes, Hort. Kew. ex Haussk. Monog. Epilob. 308 speduncnlare.
Lorentiianum, Haussk 1. c. 268 = Watsoni.
luteum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 259.—Am. bor. occ.
macranthum. Hook. Ic. PL t. 297=»pallidiflorum.
macrocarpum, Steph. in Ann. Nat. Hist. viii. (1842) 170 - angustifolinm.
macropus, *Hook. Ic. PI.* t. 812.—N. Zel.
madeirense, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitsehr.* xxix. (1879) 90.—Ins. Madera.
magellanicum, *Phil. V Haussk. in Haussk. Monog. Epilob.* 271.—Reg. Magellan.
Mathiaei, F. Schultz, Arch. Fl. 116 =-Dnriaei.
matrense, Borb. in Oestr. Bot Zeitschr. xxix. (1879) 182 - obscuium.
Maximowictii, Haussk. 1. c. 67 = glandulosum.
melanocaulon, *Hook. Ic. PI.* t. 818.—N. Zel.
menthaides, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. il. 63 = parviflorum.
meridense, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 148.—Venezuela.
metallicum, Barbey, ex Haussk. Monog. Epilob. 304 - glabellum.
mexicanum, Moç. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 41 = Bonplandianum.
mexicanum, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 266.—Mexic.
micranthum, Nutt. ex Hanssk. Monog. Epilob. 247 => paniculatum.
micranthum, Pall, ex Haussk. 1. c. 102-tetragonum.
microphyllum, *A. Rich. Bot. Voy. Astrol.* L 825.—N. Zel.
microphyllum. Wall, ex Hanssk. Monog, Epilob. 218 =nepalense.
minntiiorum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 55.—Syria.
minutnm, *Lindl. in Hook. Fl. Bon Am. i.* 207—Am. bor. occ.
mixtum, Simk. in Tennész. Füzetek, i. (1877) 104; et Oestr. Bot. Zeitschr. XXIU. (1877) 158 = tetragonum.
modestum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 55.-Ind. or.
nolle. Lam. Fl. Fr. iii. 479 ^parviflorum.
molle, Torr. Fl. U. St. i. 893-strictnm.
mollissimum, Schur, Enum. PI. Transs. 209 = parviflorum.
montani/orme, K. Knaf, ex Čelak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 882 = montanum.
montanum, Boiss. Fl. Orient, ii. 747-=anatolicnm.
montanum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 212 = lanceolatum.
montanum, Hacq. It. Dae. Carp. i. 178=angustifolium.
montanum, *Linn. Sp. PI.* 348.—Europ.; As. bor.
montanum, Pall, ex Haussk. Monog. Epilob. 127 = roseum.
Mundtii. *Haussk. 1. c.* 286.—Afr. austr.
mutabile, Boiss. & Rent Diagn. Ser. II. ii. 64= lanceolatum.
mutabile, Wender. ex Haussk. Monog. Epilob. 88 = hypericifolium.
natalen'se, *Haussk. I. c.* 286.—Afr. austr.
nebrodensex, Strobl, ex Haussk. 1. c. 178.—Slcil.

EPrLOBTDM:—
neogradiense, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 183-lanceolatum.
nepalensis, *Haussk. I. c.* xxix. (1879) 68.—Reg. Himal.
neriophyllum, *Haussk. Monog. Epilob.* 286.—Afr. austr.
nerterioides, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 32.—Austral.; N.Zel.
neroosum, Boiss. & Bnhse, in Nouv. Mém. Soc Nat. Mosc. xii. (1860) 88=roseum.
new/rum,Pall, ex Haussk. Monog. Epilob. 71*-parviflorum.
nitidum, Host, FL Austr. i. 469 ^ collinum.
nitidum, Sauter, Fl. Salzb. 245 = alsinifolium.
nivale, *Meyen, Reise, i.* 315.—Chili.
norvegicum x, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Norveg.
Novae-Zeylandiae, *Haussk. 1. c.* 305.—N. Zel.
novo-mexicanum, *Haussk. 1. c.* 260.—N. Mexic.
novum, Winterl. Ind. Hort. Pest. 44. f. 17 = tetragonum.
nubigenum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 71.—Chili.
nudum, Schum. in Fl. Dan. t. 1815 = roseum.
nummularifolium, *R. Cunn. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 81.—N. Zel.
nutans, G. Don, Gen. Syst ii. 681=hypericifolimn.
nutans, Hornem. in Fl. Dan. t. 1387 - uctiflorum.
nutans, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 801 -palustre.
nutans, Lej. Rév. Fl. Spa, 76—collinum.
nutans, *F. W. Schmidt, Fl. Bo/m.* iv. 82. n. 380.—Europ.
nutans, Sommerf. FL Lapp. Suppl. 17 = davuricum.
obcordatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 532.—Calif.
obscurum, Boiss. Fl. Orient, ii. 749 - confusum.
obseurum, Eckl. & Zeyh. Enum. 272=capense.
obscurum, Hort. Matr. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 282—Toumefortii.
obscurum, Lowe, Man. FL Madeira, 274-Lamyi.
obscurum, Rcichb. Ic PL Crit. ii. 89-virgatum.
obscurum, F. W. Schmidt,. Fl. Böem. iv. (1794) 81 - tetragonum.
obscurnm, *Schreb. Spicil. Fl. Lips.* 147.—Europ.
obtnsiusculum, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* II. v. (1808) 354, nomen.—Am. bor.
oliganthum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 846.-Madag.
oliganthum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 223 = palustre.
oligodontum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 58.—Japon.
opacum, *Lehm. Pugill.* ii. 14.—Am. bor. occ.
opacum, Peterm. Deutschl. Fl. (1849) 180 = parvifloiuui.
oregonense, *Haussk. Monog. Epilob.* 276.—Am. bor. occ.
origani/olium, Anderss. in Bot. Notiser (1844), 154-Hornemanni.
origani/olium, Boiss. Fl. Orient, ii. 750—anatolicnm.
origani/olium, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 586 = leiophyllum.
origani/olium, Kirschl. Prod. 88 = Duriaei.
origani/olium. Lam. Encyc ii. 876 = alsinifolium.
Otites, Hoffmgg. ex Steud. Norn. ed. II. i. 660-lanceolatum.
ovatum, Phil, ex Hanssk. Monog. Epilob. 272 = chilense.
Ozanonis, *F. Sehultt, Arch. Fl.* 278-montanum.
palatinum, F. Schultz, /. c. 278»Lamyi.
pallidiflornm, *Soland.exA. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 34.—N. Zel.
pallidum, Tausch, ex Haussk. Monog. Epilob. 82-montannm ?
palnstre, *Linn. Sp. PI.* 848.—Reg. bor. temp.
palustre, Ucria, Hort. Panorm. 169 — tetragonum.
palustre, Willd. Sp. PL ii..816-parviflormn.
paniculatum, *Nutt. ex Torr.* 6* *Gray, Fl. N. Am.* i. 490.—Am. bor.
pannosum, *Haussk. Monog. Epilob.* 209.—Ind. or.
parviflorum, *Schreb. Spicil. Fl.Lips.* 146.—Europ.; As. occ
pauriflorum, Dolac, Fl. Hautes-Pyr. 382 = alsinifolium.
paucifiorum, Schrank, in Denkschr. Bot Ges. Reeensb. i. n. (1818) 15 = latifolium.
pedicellare, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 80.—Chili,
pednnculare, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 31.—N. Zel.
pedunculatum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 713.—Chili.

EPHiOBIUM:—
peradnatumx, Borb. in Oestr. Bot Zdtschr. xxix. (1879) 363.—Enrop.
perpusilluin, *Haussk. Monog. Epilob.* 801.—Tasman.
perramosum, Schur, Ennm. PI. Transs. 218 = montannm.
persici/olium, Vill. Hist. Fl. Danph. i. 328-angustifolium.
persicinum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 635 = montanum.
peruvianum, *Haussk. Monog. Epilob.* 268.—Perav.
phyllonema, Knaf, ex Borb. in Ertek. ix. (1879) XVI. 21 = obscurum.
pilosum. Kit. ex Haussk. Monog. Epilob. 128=roseum.
polyclonom, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 150.—N. Zel.
ponticum, *Haussk. Monog. Epilob.* 202.—As. Min.
prionopbyllum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 68.—Armenia.
propinquum, Haussk. Monog. Epilob. 218 = roseum.
pruinosum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr** xxix. (1879) 90.—Am. bor.
Psendo-lineare, *Haussk. I. c* 120.—Calif.
Pseudo-obscurum, *Haussk. I. c.* 53.—Ind. or.
Psendo-scaposum, *Haussk. I. c.* 89.—Unalask.
Pseudo-trigonum, Borb. 1. c. xxvii. (1877) 188 - montanum.
Pseudo-virgatum, F. Schultz, ex Haussk. Monog. Epilob. 109-Lamyi.
ftarmicae/olium, F. Schultz, in Pollichia, xiii. (1855) 27=tetragonum.
pubens, *A. Rich. Bot. Voy. Astrol.* i. 329. t. 36.—N. ZeL
puberulum, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 3O9.^Ins. Chiloe.
pubescens,.Lej. & Court Comp. ii. 52 = montannm.
pubeseens, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 167—parviflornm.
pumiLum, Steud. Nom. ed. I. 801 - alpinum.
purpurascens, Gilib. Fl. Lituan. ii. 189 = obscnrum.
purpuratum, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* 77.—N. Zel.
purpureum. Fries, Fl. Hal. 65 = palustre.
pusillum, GUI. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1888) 309 = alpinum.
pycnoslachyuin, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 150—N. Zel.
pyrenaicum x , Haussk. Monog. Epilob. 177.—Enrop.
pyrricholophnm, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 370.—Japon.
rad.ica.ns, Haussk. Monog. Epilob. 81 = montanum.
ramiflorum, Hcgetschw. Fl. Schw. 359; Beitr. Crit. Aufs. 342-palustre.
ramosissimum, Gren. &• Godr. Fl. Fr. i. 579, in syn.= obscurum.
ramosum. Hods. Fl. Angl. ed. I. 141=hirsutum.
Reichenbachii, Bruegg. in Jahresb. Natnrf. Get. Graub. II. xxiii-xxiv. (lfiSOj 67.-Europ.
repandum, Spach, ex Haussk. Monog. Epilob. 290-jnnceum.
repandum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 560.—Chili.
repens. Hill, Brit. Herbal, 148 = alpinum.
repens, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 267.—Mexic.
retioulatum, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 683.- Reg. Himal.
rhexiiflorum, Fisch. ex Haussk. Monog. Epilob. 194 - latifolium.
rhynchocarpum, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 53-palustre.
rhynchosDermum, *Haussk. Monog. Epilob.* 211.—Reg. Himal.
rigidum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 61.—Am. bor.
riphaeum, Tausch, ex Haussk. Monog. Epilob. 166 = alsinifolium.
rivulare, Hegetschw. Fl. Schw. 855=parviflorum.
rivulare, Kirschl. Fl. Als. 266=hirsutum.
rivulare, Nolte, Fl. Holsat 41-obscurum.
rivulare, Wahlenb. Fl. Upsal. 126 = palustre.
rivulicolum x, Haussk. Monog. Epilob. 177.—Europ.
roseum. DC. Fl. f"r. iv. 422 - trigonum.
roseum. Fries, ex Steud. Nom. ed. II. i. 560 =-montanum.
roseum, Kit. Addit. 274; ex Haussk. Monog. Epilob. 166-alsinifolium.
roseum, *Schreb. Spirit. Fl. Lips.* 147.—Enrop.; As. occ.
roseum, Turcz. in Ledeb. Fl. Ross. ii. 110-Hornemanni.
rosmarinifolium, Haenke, in Jacq. Coll. ii. 50 = Dodonati.
rosmarinifolium, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 259-lineare.

EFHiOBIUM:—
rotundifolium, *Forst.f. Prod.* 27.— N. Zel.
Royleanum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 55.—Reg. Himal.
rubricaule, Soland. ex Haussk. Monog. Epilob. 294 = Billardierianum.
rubrum, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 117 -angustifolium.
salici/olium, Facch. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol, III. iv. (1854) 43-alsinifolium.
salici/olium, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 851-angustifolium.
salignum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 90.—Madag.
Salisianum x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (18bO) 67.—Europ.
SaUmannii, Bobs. & Reut. ex Nym. Consp. 247-Tournefortii.
sarmentaceum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 149.—Tasman.
sarmentosum, Celak. Prod. iv. 882-palustre.
saximontanum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 119.—Am. bor. occ.
scaturiginium, Wimm. ex Uechtr. in Bot Zeit. xxiv. (1874) 241 = palustre.
Schimperianum, *Hochst. ex A. Rich. Tent- Fl. Abyss.* i. 272.—Abyss.
Schmidtianum, Rostk. FL Sedin. 172 -palustre.
Schmidtii, Floerk. ex Haussk. Monog. Epilob. 166 - alsinifolium.
Schulteanum x, Haussk. Monog. Epilob. 177.
semiadnatumx, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 863.—Europ.
semiobscurum x, Borb. 1. c. 183.—Europ.
sericeum, Benth. in Wall. Cat. n. 6329-hirsutnm.
sericeum, *Schum. ex Haussk. Monog. Epilob.* 64.—Ind. or.
serratum, Jacquem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 683 = hirsutum.
serrulatum, Pourr. ex Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hi p. iii 187 = tetragonum.
sertulatum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 52.—Kamtsch.
sikkimense, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 52.—Reg. Himal.
silvaticum, Auct. = *sylvaticum.*
simplex, Tratt. Arehiv, i. 37— palustre.
smyrnaeum, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 52 » roseum.
sparsi/olium, Dum. Fl. Belg. Prod. 89 - lanceolatum.
speciosum, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. iv. 57 = latifolium.
spicatum, Lam. FL Fr. iii. 482; Encyc. ii. 378 = angustifolium.
squamatum, Nutt. Fl. Am. Sept. i. 250 = lineare.
Stefanescui, Floriano, in Magyar, Növe'nt Lapok, ix. (1885) 127 = alsinifolium.
Steigeri x , Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 65.—Europ.
stenophyllum, Borb. in Ertek. ix. (1879) XVI. 11 = parviflorum.
stereophyllnm, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 152.—Abyss.
Steveni, Boiss. Diagn. Ser. II. ii 66-DoddnaeL
Stracheyanum, *Haussk. Monog. Epilob.* 214.—Reg. Himal.
strictum, *Muhl. Cat.* 39; *et ex Spreng.Syst.* ii. 283.—Am. bor.
subalgidum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 59.—Soongar.
subcoriaccum, *Haussk. 1. c.* 56.—China,
subhirsutum, *Gennar.— C/. Linnaea,* xxiv. (1851) 201. —Italia.
sudeticum, Beurl. in Bot Notiser (1851), 185=alpinum.
suffruticosum, *Nutt. ex Torr.* &" *Gray, Fl. N. Am.* i. 488.—Am. bor. occ
sylvaticum, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 239 = montanum.
sylvestre, Dierb. in Geiger, Mag. (Oct. 1826); ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 16 = montanum.
syriacum x, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Syria,
tanguticum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 66.—China.
tasmanicum. *Haussk. Monog. Epilob.* 296.—Tasman.
Tauschii, Knaf, ex Haussk. 1. c. 73 = parviflorum.
tenellum, Rafin. Prlc. Découv. 41-palustre.
tenuipes, Hook. f. Fl. Tasmar. i. 116 ^ confertifolium.
tematnm, *Schur, Enum. PI. Transs.* 209 (sp. dub.).—Transsylv.

EPILOBIUM:—
tetragoni/orme, Simk. Term. Rajzi. (1877) 105 - parviflorum.
tetragonum, *Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 163=palustre.
tetragonum, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 586 = Wallichianum.
tetragonum, Guss. Fl.Sic. Syn. i. 444-Tournefortii.
tetragonum, *Linn. Sp. PI.* 348.—Europ.
tetragonum, Lour. Fl. Cochinch. i. 231-Jussieua suffruticoaa.
tetragonum,Pomch, Hist. PI. Palat. i. 877 = obscurum.
tetrapetalum, Pall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 660« latifolium.
thuringiacum x, Haussk. Monog. Epilob. 177.—Europ.
thymifolium, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 38.—N. Zel.
tibetanum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 53.—Tibet.
tingitanum, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 459 - tetragonum.
tomentosum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 189 = palustre.
tomentosum, Vent Jard. Cels, t. 90-hirsutum.
Tourne/ortii, Freyn, FL Sued. Istr. 97=tetragonum.
Toumefortii, *Michal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1865) 731.—Oriens.
Treuin/elsianum, Ansserd. ex A. Kern. Sched. ii. 41 = palustre.
trichoneurum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 54.-Ind. or.
trichophyUum, *Haussk. I. c.* 58.—Reg. Himal.
trigonum, Boiss. Fl. Orient, ii. 749=algidum.
trigonum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 660=montanum.
trigonum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 111 = prionophyllum.
trigonum, *Schrank, Baier. Fl.* i. 644.—Europ.
udicolumx, Haussk. Monog. Epilob. 178.—Europ.
Uechtritsianum x, Pax, in Deutsche Bot. Monatsscbr. i. (1883) 129.—Europ.
uliginosum, Fries, ex Haussk. Monog. Epilob. 128 = roseum.
umbrosum, Dum. Fl. Belg. Prod. 89= parviflorum.
uralense, Hort. Petrop. ex Haussk. Monog. Epilob. 72 = parviflorum.
uralense, *Rupr. in E. Hoffm. Ural. Bor.* ii. *Suppl.* B, 33.—Reg. Himal.
valdiviense, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 11«.—Chili.
variabile, hud, Topog. Nachr. Oesel, 187= angustifolium.
venustum, Dougl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 560 = latifolium.
verticillatum, Schur, Enum. PI. Transs. 213=montanum.
veriirillatum, Tenore, Fl. Neap. Prod. 23; Fl. Neap- i. 194-angustifolium.
vestitum, Benth. in Wall. Cat. n. 6327 = parviflorum.
villosum, Curt. Fl. Lond. fasc. ii. t 22 - parviflorum.
villosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 75 — hirsutum.
virgatnm, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1839) 33. —N. Zel.
virgatu'm, Koch, Syn. Fl. Germ. 266 = tetragonum.
virgatum, Lam. Encyc. ii. 875 = obscurum.
virgatum, Lamy, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. I"[25] = Lamyi.
vogesiacum, Haussk. Monop. Epilob. 178 - palustre.
Wallichianum, *Haussk. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 54.—Reg. Himal.
Watsoni, *Barbey, in Bot. Calif,* i 219.—Am. bor. occ-
Wattianum, *Haussk. Monog. Epilob.* 204.—Reg-Himal.
weissenburgense.F. Schultz, in Pollichia, xviii-"[19]-(1861) 106=tetragonum.
Wimmeri, F. Schultz, 1. c (1859) 109 = obscurum.
Winkleri, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 1» -alsinifolinm.

EPIMEDIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1785)-*BERBERIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 44.
ENDOPLECTRIS, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 56 (1836).
alpinum, *Linn. Sp. PI.* 117.—Europ.
alpinum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 159 = pubigerum.
concinnum, *Vatke, in Regel, Gartenfl.* (1872) 165.— J»pon.
diphyllum, Lodd. Bot Cab. t. 1858 = Aceranthus <"" phyllus.
datum, *Morr.* b* *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir. V-* [11] (1834) 856.—Reg. Himai

EPIMEDIUM:—

gnndiflmtm, Morr. in Belg. Hortic. ii. (1834) 141. t. «5. *t%* A »inacrftAthoin I
kexandrum, Hook. FL Bor. Am. i. 80 - Vancouver* bexandn.
Hydaspidis, Fait in Proc Urn. Soc. i. (1889) 18 = datum,
rtartso, Siebold, ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868)89-raacranthum»
japonirum. Siebold, ex Miq. Ann. Hoi. Bot Lugd. Bat. ii. 7l=»Aceranthenis diphyllas.
'"^folium, Decne. in Rev. Hortic. Se>. IV. iiL (1864) 286-macranthum?
inacrantlium, *Morr. V Decne. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IL n. (1884) 852.-Japon.
Mnsschianum, *Morr. V Decne. I. c. SSS.*—Japon.
remilderianum, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 187.—Algeria.
Pinnatum, *Fisck. in DC. Syst.* ii. 29.—Persia,
pteroceras, *Morr. in Ann. Soc. Gand,* i. (1845) 145. 1.14.—Reg. Caucas.!
P⁰«K*K, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) •09.—China.
Pobigerum, *Morr. tf Decne. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. <I (1834) 356—Byzant.i Reg. Cane,
mornin, *E. Morr. in Belg. Hortic.* iii. (1888) 38. t 6. —Japon.
•apttatnm, *Baker, in Gard. Chron.* (1880) I. 888.—Japon.
tnense, Siebold, ex Miq. Ann. Mas. Bot. Lagd. Bat. ii. 71«-sagittatum.
**«»W<w, E. Morr. in Belg. Hortic. iv. (1854) 64. t. *W* f. 6 = macranthnm.
***t>laceum,* Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. u- (1884) 854=macranthnm.

EPIMENIDION, Rafin. FL Tellur. ii. 13 (1834)= .8ciUa, Linn. (Liliac.).
nyacinthoides, Rafin. 1. c.=S. hyacinthoidea.
"ndulatum, Rafin. 1. c.-Urginea undulata.

EpIONIX, Rafin. Fl. Teltar. ii. 81 (1888) - Baeottetra, Salisb. (Liliac.).
•*»«, Rafin. 1 c - B. columellaris.
ruira, Rafin. 1. c.= B. colnmellarii.

EPIPACTIS, Adans. Fam. u. 70 (1768): R. Br. in A". Hort. Kew.v. 201 (1813). *ORCHWEAS,* Bentb. *Hook.f.iu'.«19.
"oqrtha, AIL Fl. Pedem. ii. 151 = Limodornm abortivum.
«««, Crantz, Stirp. Anstr.ed.IL fasc. vL460=Cephaliltheraensifolia.
<»*pina,* Schrank, Prim. FL Salisb. S0 = Henninium •'pinum.
"mtricana, Undl. in Ann. Nat. Hist. iv. (1840) 885 = Koyleana.
<"*«oena,* Buch.-Ham. ex Wall.Cat n.7403 =consimilis.
Arachnites, F. W. Schmidt, in Mayer, Phys. Aufs. i. (1791) 24»=Ophrys Arachnites.
"Mensis, Lej. Fl. Spa, ii. 196=microphylla.
"npurpurea, Rafin. Caratteri, 87. n. 208=latifolia.
<"^ylli. S, Rostk- e* s?Kae- Svst- "'• *701-auao-*
»trorubens, *Schult. Oestr. Fl.* ed. II. i. 68 J *Reichb. Fl.* K Germ, Exeurs- !3S.—Europ.; As. occ.
vtManifolia, *Roxb. Hort. Beng* 63, nomen.—Ind. or.
•*"erinata,* Bueh.-Ham.ex Wall. Cat. n. 7363 *{-Cyrto-**** bicarinata).—Kte.* HimaL.
""Mschatea, Sw. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. (WOO) 232=Neottiacamtschatlca.
"naata, Roxb. Hort. Beng. 68 j Fl. Ind. üi. 454 = ^ogonia carinata.
"•*"data,* Poir. Encyc Suppl. ii. 571 - Acianthns •audatns.
'—*densata,* Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 91=latifolia.
""similis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 28 - latifolia.
eonsimilis, *Wall. Cat.* n. 7403.—Persia; Reg. HimaL
""nallarioides, Sw. in Vet Acad. Nya Handl. Stockh. (1800) 232 - Listera convallarioides.
Corallorhha, Crantz, Stirp. Auitr. ed. II. fasc. vi. 464 = Corallorhiza innota.
*«««, All. Kl. Pedem. ii. 152=Listera cordata.
^{lata, Labill. Nov. HoU. PL H. 61. t. 211. f. «- "lochilus autumnalis.
VaUiousiae, Wight, Ic. 1.1723 - latifolia.
«'«««*«, Stokes, Bot. Mat Med. iv. 801 - Spinnthes "weUca.

BPIPACTIS:—

ennfolia, F. W. Schmidt, in Mayer, Phys. Aufs. i. (1791) 251 = Cephalanthera ensifolia.
Epipogium, All. Auct. Fl. Pedem. 32-Epipogum aphyllum.
Epipogum, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc vi. 477-praec.
erecta, Sw. in Schrad. Neues Jonrn. i. (1805) 65 = Cephalanthers pallens.
exserta, Poir. Encyc. Suppl. ii. 671 = Acianthnt exserras.
falcata, Sw. in Schrad. Neues Jonrn. i. (1806) 66-Cephalanthera falcata.
fornicata, Poir. Encyc. Snppl. ii. 571 = Acianthns fomicatns.
gigantea, Dongl. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 202. t 202 = Royleana.
graminifolia, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iiL 466 = Spathoglottis pubescens.
grandiflora, Sm. Engl. Bot. t. 271; Gand. Fl. Helv. v. 469 » Cephalanthera pallens.
grandifolia, All. Fl. Pedem. ii. 152=Cephalanthera ensi/olia.
Helleborine, Crantz, Stirp. Aostr. ed. II. fasc. vi. 467 = latifolia.
herbacea, Lindl. in Royle, IUustr. Bot. Himat. 868 = tatifolia.
intermedia, Schur, Enum. PL Transs. 649 = microphylla.
intrusa, Lindl. in Jonrn. Linn. Soc i. (1857) 175-lalifolia.
Juliana, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 453= 1'ogonia Juliana.
tamtschatica, Lindl. Gen. et Spec. Orch. 458-Neottia camtschatica,
lancifolia, F. W. Schmidt, in Mayer, Phys. Aufe. i. (1791) 252-Cephalanthera pallens.
latifolia, *AIL Fl. Pedem.* ii. 151; *Sw. in Vet. Aiad.* Nya Handl. Stockh. (1800) 232.—Europ.; As. bor.
latifolia, I ess. in Linnaea, ix. (itsW) 156 • atrorubens.
Lessonii, Urv. in *Mim.* Soc Linn. Par. iv. (1826) 605 -Pogonia tetraphylla.
longifolia, All. Fl. Pedem. ii. 152 - palnstris.
longifolia, Blume, Orch. Archip. Ind. 185-Thunbergii.
lutea, Stead. Norn. ed. II. i. 661-Chlonea Gandichandii.
macropodia, Peterm. Fl. Keniti, 31=atrorubens.
macrostachya, Lindl. in Wall. Cat. n. 7404=latifolia.
media. Fries, Mant. ii. 54 =atrorubens.
microphylla, Sieber, ex Nytn. Consp. 688=atrorubens.
microphylla, *Sw. in Vet. Aiad. Nya Handl. Stoctk.* (1800) 232.—As. Min.; Reg. Caucas.
monophylla, F. W. Schmidt, in Mayer, Phys. Anfs. i. (1791) 245 = Microst)lis monophylla.
Monorchis, F. W. Schmidt, 1. c 246 = Herminium Monorchis.
myodes, F. W. Schmidt, 1. c. 248-Ophrys muscifera.
Nidus-avis, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 475; Sw. in Vet Acad. Nya Handl. Stockh. (1800) 232 = Neottia Nidus-avis.
ockroleuca, Baumg. Enum. Stirp. Truss, iii. 174 = Cephalanthera pallens.
ovalifolia. Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 802=Listera ovata.
ovalis, Bab. in Engl. Bot. Snppl. t. 2884 = latifolia.
ovata, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 473 = Listera ovata.
pollens, Sw. in Schrad. Nenes Jonrn. i. (1805) 65 = Cephalanthera pallens.
pallida, Sw. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. (1800) 232-= Cephalanthera pallens.
paludosa, F. W. Schmidt, in Mayer, Phys. Aufe. i. (1791) 245 = Ma!axis paludosa.
palustris, *Cranti, Stirp. Austr.* ed. II. fasc. vL 462.—As. bor.; Am. bor.
papillosa, *Franch. &* Sm. Enum. PI. Jap.* ii. 619.—Japon.
Phyllanthes, G. E. Sm. in Gard. Chron. (1852) 660-latifolia.
Phyltanthus, Lindl. in Jonrn. Linn. Soc. 1. (1867) 175 »praec.
plicata, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 454-Pogonia plicata.
porri/olia, Sw. in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. (1800) 233 = Microtis porrifolia.
pubescens, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 5»1«Pontbieva glandulosa.
purpurata, Sm. Engl. Fl. iv. 41=- latifolia.

KPIPACTI8:—

purpurea, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 467 = Cephalanthera rubra.
pyenostachys, *C. Koch, in Linnaea,* xxii. (1849) 289.—Bithynia.
refiexa, Labill. Nov. HoU. PL ii. 80. t. 211. f. 1-Chiloglottis diphylla.
repens, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 473-Goodyera repens.
Royleana, *Undl. in Royle, IUustr. Bot. Himat.* 368.—Reg. HimaL; Am. bor. occ.
rubiginosa, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 467. 468 = atrorubens.
rubra, F. W. Schmidt, in Mayer, Phys. Aufs. i. (1791 253 = Cephalanthera rubra.
Salassia, 1'ers. Syn. ii. 518 = Liparis pnrpnrascens.
salirta, Schur, Enum. PL Transs. 650=palustris.
scariosa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3739 = Pachysloma senile.
sessilifolia, Peterm. in Flora, xxviL (1844) 370 « latifolia.
spiralis, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 473-Spiranthfis autumnalis.
Thunbergii, *A. Gray, in Perry, Exp. Jap.* ii. 319.-. Japon.
trinervia, *Roxb. Hort. Beng.* [102]; *Fl. Ind.* iii. 455. —Ins. Molucc.
uliginosa, Vest, in Flora, viii. (1825) 493-latifolia.
varians, Crantz, Stirp. Austr. ed. II.,fasc vi.'468, 471 = latifolia.
veratrifolia, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 11 -consimilis.
Violacea, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. 651 = latifolia.
viridans, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. vi. 467, 470 --latifolia.
•*viridiflora,* Reichb. in Mocssl. Handb. ed. II. ii. 1575 «= atrorubens.
viridiflora, Kupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, iv. 83 - latifolia.
xiphophylla, Sw. in Schrad. Nencs Journ. i. (1805) 65 = Cephalanthera ensifolia.

EPIPACT1S, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 277 (1742)-Goodyera, R. Br. (Orchid.).

EPIPACTUM, Ritg. in Marb. Schrift. ii. (1831) 125» Eplpootia, Adans. (Orchid.).

EPIPETRUM, Phil, in Linnaea, xnxiii. (1864-65) 258-Bioscorea, Linn.
humite, Phil. 1. c =D. humilis.

EPIPHANES, Blume, Bijdr. 421. t. 4 (1826)=OMtrodia, R. Br. (Orchid.).
javanica, Blume, 1. c.=G. javanica.

EPIPHANES. Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 295 (1868)-Didymoplezis, Griff. (Orchid.).
micradenia, Keichb. 1. c. •- D. micradenia.
pachystomoides, F. Muell. Fragra. viii. 174-Pogonia pacbystomoides.
pallens, Reichb, f. in Seem. Fl. Vit. 206 ~1>. pallens.

EPIPHEGUS, Spreng. Neue Entdeck. i. 264 (1820). Epifegua, Nutt. ^Orobanch.).

EPIPHEJUS, Walp. Rep. iii. 457 (1845) = praec

EPIPHORA, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 201 (1836)=-Polyntaehya, Hook. (Orchid.).
pubescens, Lindl. 1. c.=P. pubescens.

EFIPHYXiLXTH, Haw. Syn. PL Succ. 197 (1812) partim; PfeirT. Enum. Diagn. Cact. 127 (1887) *CACTEAE.* [Benth. * Hook. f. i. 849].
SCHLUMBF.RGERA, Lem. in Rev. Hortic. Ser. IV. vii. (1858; 253.
Actermanni, Haw. in Phil. Mng. (Aug. 1829) 109-Phyllocactus Ackermanni.
Aitoni, Hort. ex Steud. Norn. ed. II. i. 561 = Cereus splendidus.
alatum, Haw. Suppl. PL Succ. 84; et in Phil. Mag. (Aug. 18291 109 = Khipsalis pachyptera, Swartziana.
Altensteinii, *Pfeiff. Enum. Diagn. Cact.* 128 —Bias.
angulifer, G. Don, ex Loud. Encyc. PL SuppL ii. 1380 = Phyllocactus anguliger.
biformis, G. Don, 1. c. 1878 = Phyllocactus bifonnis.
Bridgesii, Lem. IUustr. Hortic. viii. (1861) Misc. 5-truDcatum.

EPIPHTLLTTM:-
caulorhizum, G. Don, ex Loud. Encyc. FI. Soppl. ii. 1380 = Fhyllocactus caulorhizns.
ciliare, Hort. ex Ffeiff. Enum. Diagn. Cact. 130 = Rhipsalis ramulosa.
eiliatum. Holt, ex Pfeiff. 1. c = Rhipsalis ramolosa.
crenulatum, Hort. ex Pfeiff. 1. c. = Rhipsalis rhombea.
crispatum, Haw. in Phil. Mag. (Feb. 1820) 109 = Rhipsalis crispata.
elegans, Cels, ex Foeist. Handb. Cact. ed. I. 446 = trnncatnm?
Guedneyri, *HmlUt, in Rev. Hortic.* (1875) 280.—Hab.?
Hitchini, Hort. ex Stend. Norn. ed. II. i. 561 = Cerens splendidus.
Hookeri, Haw. in Phil. Mag. (Aug. 1829) 108=Cereus Hookeri.
kybridum, Hort. ex Pfeiff. Ennm. Diagn. Cact. 121 = Cerens speciosissimus.
Jenkinsonii, G. Don, Gen. Syst. iii. 170-Phyllocactus phyllanthoides.
latifrons, Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 125 = Phyllocactus latifrons.
oxypetalum, Haw. in Phil. Mag. (Ang. 1829) 109 = Phyllocactus latifrons.
phyllantoides, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.172 = Phyllocactus phyllanthoides.
Phyllanthus, Haw. Syn. PI. Succ. 197 = Phyllocactus Phyllanthus.
platycarpum, Zucc. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact 131 = Rhipsalis platycarpnm.
ramulosum, Hort. ex Pfeiff. 1. c 130 = Rhiptalii ramulosa.
rhombum, Hort. ex Pfeiff. 1. a-= Rhipsalis rhombea.
Ruckeri, Paxt. Mag. Bot. xii. (1846) 46-truncatum.
Ruckerianum, Hort. ex Lem. Illustr. Hortic viii. (1861) Misc. 5 =tnmcctnm.
Russelianum, *Hook. Bot. Mag.* t. 3717.—Bras.
Smithianum, Mamock, Floricult Mag. viii. t. 13 = truncatum.
speciosum, Haw. Suppl. PL Succ. 84 - Phyllocactus phyllanthoides.
splendens, Hort. ex Ann. Fl. et Pom. (1839) 343 (ex Sched. DC.) = seq.
splendidum, Paxt. Mag. Bot. i. (1841) 49 = Cereus splendidus.
truncatum, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 85.—Bras.
Vandesiix, G. Don, Gen. Syst. iii. 170.
violaceum, Cels, ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 446 = truncatum I

EPIPHYSTIS, Trin. Fund. Agrost. 97 (1820)-Marisctl8, Gaertn. (Cyperac).
ophiuroides, Trin. 1. c. = M. havanensis.

EPIPOGION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144 = seq.

EPIPOGIUM, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 149 = seq.

EPIPOGON, Ledeb. Fl. Ross. iv. 77 (1853)= seq.

EPIPOGUM, S. G. Gmel. FI. Sibir. i. 11. t. 2. f. 2 (1747). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 617.
CERATOPSIS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 383 (1840).
GALERA, Blume, Bijdr. 415. t. 8 (1825).
PODANTH-ERA, Wight, Ic. v. 22. t 1759 (1851).
aphyllnm, *Sw. Summ. Veg. Scand.* (1814) 32; *Sv. Bot.* t 512.—Europ.; As. bor.
Gnulini, Rich, in Mém. Mus. Par. ir. (1818) 68-aphyllum.
Guil/oylii, F. Muell. Fragm. viii. 30-nutans.
nutans, *Reichb. /. in Bonplandia,* v. (1867) 36.—As. et Afr. trop.; Austral.
roseum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1867) 177 = nutans.

EPIPBEMNUM, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45. *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 993.
RAPIDOFHORA, Hassk. Cat Hort. Bog. Alt 68, (1844) partim.
amplissimum, *Engl. in Engl. Bot. Jahrb.* i. (1881) 182.—N. Guinea,
asperatum, *Engl. in Bull. Soc. Tote. Ortic.* iv. (1879) 270.—Ins. Molucc.
Beccarii, EngL 1. c 269-Rhaphidophora Beccari.
elegans, *Engl. 1. c.*—N. Guinea.

EPIPREMNUM:—
giganteum, *Schott, in Bonplandia,* v. (1857) 45.—Ind. or.
magnificum, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 270.—Ins. Celebes.
medium, *Engl. in A. DC. Monog. Phan.* ii. 250.—Java,
mirabile, *Schott, Gen. Aroid.* t 79.—Java,
molnccanum, *Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* i. 130.—Ins. Amboina.
nobilis, *Engl. in A. DC. Monog. Phan.* ii. 250.—Ins. Celebes.
Zippelianum, Engl. in Bot. Jahrb. i. (1881) 182 = asperatum.

EPIPBINUB, Griff. Notul. iv. 487 (1854). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 325.
maUyanus, *Griff. I. c,*—Malacca.

EPIRIXANTHES, Blame, Cat. Gew. Buitenz.25 (1823) Salomonia, Lour. (Polygal.).
cylindrica, Blume, L c. 82=S. aphylla.
elongata, Blume, 1. c.—Java.
linearis, Blume, 1. c—Java.
tenella, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1862) 168 = S. aphylla.

EPIRHIZANTHES, Benth. & Hook. f. Gen. i. 136 (1862) sphalm. = praec.

EPIRHIZANTHUS, Endl. Gen. 728 (1839)=praec.

EPIRIZANTHE, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vii (1828) = praec.

EPISANTHERA, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 208 in syn. (1847) = Paulo-Wilhelmia, Hochst. (Acanthac).

EPISCIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. Hi. 39 (1829). *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1006.
ALSOBIA, Hanst. in Linoaea, xxvi. (1853) 207.
CKNTROSOLENIA, Benth. in Hook. Lond. Joum. v. (1846) 362.
CYRTODEIRA, Hanst in Linnaea, xxvi. (1853) 207.
NAUTILOCALYX, Linden, Cat. ex Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 207.
PARADRYMONIA, Hanst in Linnaea, xxvi. (1853) 207.
PHYSODEIRA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 207.
SKIOPHILA, Hanst. 1. c. (1853).
TRICHODRYMONIA, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skrifi. V. v. (1861) 112 (Gesn. Centr. Am. 38).
bicolor, *Hook. Bot. Mag.* t 4890.—N. Granat.
braetescens, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 351.—Am. trop.
chontalensis, *Hoot. Bot. Mag.* t. 5925.—Nicaragua,
ciliosa, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 403.—Am. trop.
congesta, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1806-66) 847.—Mexic.
cupreata, *Hanst. 1. c.* 340.—Nicaragua,
decumbens, *Mart. Nov. Gen. etSp.* iii. 39. t 216.—Bias,
elongata, *Ann. Ft. et Pom.* (1888) 188 (ex Sched DC).—Hab. ?
erythropus, *Hoot./. Bot. Mag.* t. 6219.—N. Granat.
fulgida, *Hoot./. 1. c.* t. 6136.—N. Granat.
glabra, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 849.—Am. trop.
guadalupensis, *Hanst. I. c.* 345.—Ind. occ.
hirsuta, *Hanst. 1. c.* 351.—Am. trop.
hirtiflora, *Spruce, ex Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 402.—Bras.
hispida, *DC. Prod.* vii. 547.—Am. austr.
Hookeri, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 350.—Am. trop.
lanceolate, *Hanst. I. c.* 346.—Costa Rica,
lilacina, *Hanst. I. c.* 842.—Costa Rica,
longifolia, *Hanst. 1. c.* 847.—Am. trop.
Luciani, *Linden (f Fourn. in Illustr. Hortic.* xxiii. (1876) 43. t 236.—N. Granat
melittifolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii 42.—Ind. occ.; Bras,
mimuloides, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 862.—Guiana,
ochroleuca, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 403.—Afr. trop.
picta, *Hanst. I. c*—Am. trop.
pulchella, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 39.—Ins. Trinit.
punctate, *Hanst. in Linnaea,* xxxir. (1866-661 842.—Am. trop.

EPISCIA:—
reptans, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 39. t. 217.—Bras.
rosea, Mart. & GaL in Bull. Acad. Brux. ix. (1842) reimp. 8=Tetranema mexicana.
splendens, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 341.—N. Granat.
subacaulis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 462.—Ind. occ
tessellata, *Linden, ex Lem. Illustr. Hortic.* xvi. (1869) sub t. 607.—Peruv.
villosa, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 348.—Guian.

EP1SCOPIA, Moritz, ex Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 42 in syn. = Themistoclesia, Klotzsch (Vaccin.).
pendula, Moritz, ex Klotzsch, 1. c. =T. pendnla.

EPISIPHIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 78 (183fl)-Hyperiotun, Linn.
parvi/olia, Rafin. 1. c = H. aegyptiacum.

EPISTEIRA, Rafin. Sylva Tellur. 20 (1838) = Phyllanthus, Linn. (Euphorb.).
coccinea, Rafin. *I.* c = P. coccineus.

EPISTEMUM, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 473 = Amphithalea, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
/errugineum, Walp. 1. c. = A. cuneifolia.

EPISTEPHITT1I, Kunth, Syn. PI. Aequin. i. 340 (1822). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 591.
amplexicaule, *Poepp.* b* *Endl. Nov. 'Gen. et Sp.* i. 52. t. 81.—Peruv.
elatum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. t. 632.—N. Granat
Frederici-Augusti, *Reichb. /. in Bonplandia,* ii. (1864) 97.—N. Granat.
laxiflorum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 173.—Bras,
monanthum, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* 53. t. 92.—Peruv.
parviflorum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 433.—Ind. occ.
Portellianum, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 172.—Bras,
racemosum, *Rodrig. 1. c.*—Bras,
sclerophyllum, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 433.—Bras,
sessiliflorum, *Lindl. Orchid. Linden.* 26.-N. Granat.
smilacifolium, *Reichb./. in Linnaea,* xli. (1877) 65.—N.Caled.
speciosum, *Rodrig. in Rev. de Engenh.* 74.—Bras.
Williamsii, *Hook./, in Bot. Mag.* t. 6485.—Bras.

EPISTYLIUM, Sw. Fl. Ind. Occ: ii. 1095. t. 22 (1800)-Phyllanthus, Linn. (Euphorbiac.).
axillare, Sw. 1. c. 1097 = P. axillaris.
cauliflorum, Sw. 1. c. 1099-P. cauliflorus.
cordi/olium, Baill. Etud. Gén. Euph. 648=P. Baillonianus.
fioribundum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 283=P. cinereus, affinis.
glaucescens, Baill. Etud. Gén. Euph. 648, nomen-P. pulcher.
lati/olium, Thw. Enum. PI. Zeyl. 283 = P. Bailloniauns.
leptocladon, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 229 = P. leptoclados.
montanum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 283 = P. oreophilus.
•phyllanthoides, BaUl. Etud. Gèn. Euph. 648, nomen = P. pulcher.
polyphyHum, Thw. Enum. PI. ZeyL 283=P. anabaptizatus.
pulchrum, Baill. Etud. Gén. Euph. 648-P. pulcher.
Roxburghii, Baill. I. c.=P. Roxburghii.
zeylanicum, Baill. 1. c. =P. anabaptizatus.

EPITHECIA, Knowles & Westc. Fl. Cab. ii. (1888) 187. t 87=Dichaea, Lindl. (Orchid.).
glauca, Knowles *8c* Westc. 1. c. = D. glauca.

EPITHECIUM, Benth. & Hook. f. Gen. 529,1239 (1888) =praec.

EPITHEMA, Blume, Bijdr. 737 (1826). *GESNERA'CEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1017.
AIKINIA, R. Br. in Wall. PI. As. Rar. iii. 66. t-288 (1832).
CARPOCALYMNA, Zipp. in Alg. Konst.- en Letter-Bode, i. (1829) 297.
Benthami, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 180.—Ins. Philipp.

EPITHEMA:—

Branonis, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Nat. Par.* **iii.** (1884)404.—Ins. Timor,
caniosum, *Benth. Scropk. Ind.* 67.—Ind. or.
eeylanieum, Wight, Illustr. 182. t. 159= caniosum.
difforme. Span, in Linnaea, xv. (1841) SSI.—Java.
Horsfieldii, *R. Br. in Wall. PI. As. Rar.* iii. 66.—Java.
Roxbnrghii, *DC. Prod.* ix. 279.—Ins. Molucc.
saxatile, *Blume, Bijdr.* 737.—Java,
tenne, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* **v. 181.**—Air. trop.
triandrnm, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* **ed. III.** *Nov. App.* 150.—Ins. Philipp.
molaceum. Span, in Linnaea, xv. (1841) 880=Branonis.
'eylanicum, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist, vi. (1846) 492-caniosum.

EPITHINIA, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 12= Soyphiphora, Gaertn. (Rnbiac).
malayana, Jack, 1. c. =S. hydrophyllacea.

EPITHYMUM, Opiz, Seznam, 40 (1852) = Cuscuta, Tonrn. (Convolvulac).
cuscutoides, Opiz, 1. c.»C. Epithymnm.

EPITRACHYS, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 896 = Cnicus, Linn. (Compos.).
***adunca,* C. Koch, 1. c. 402** *{-Cirsium fallax).*—Reg. Caucas.
arachnoidea, C. Koch, 1. c. 400=C. arachnoideos.
caucasica, C. Koch, 1. c.=C. horridus.
ciliata, C. Koch, 1. c. 897 = C. ciliatus.
orythrolepU,* C. Koch, 1. c. 398 (=** ***Cirsium erythroUpis). —Reg. Caucas.
Kosmelii, C. Koch, 1. c.=C. lappaceus.
lanceolata, C. Koch, 1. c. 400=C. lanceolatus.
laniflora, C. Koch, L c. = C. laniflorus.
lappaeea, C. Koch, 1. c. 809, in obs. = C. lappaceus.
leucoeephala, C. Koch, 1. c. 401=C. leucocephalns.
longifolia, C. Koch, 1. c—Armenia.
"ucrobotrys, C. Koch, 1. c. 899.—Armenia.
**»crocephala,* C. Koch, 1. c.402=Carbenia benedicta ?
nunita, C. Koch, 1. c. 898-C. munitus.
""noralis, C. Koch, 1. c. 400 = C. lanceolatus.
ossetica, C. Koch, 1. c. 398 = C. fimbriatus.
Penicillata, C. Koch, 1. c. 899=C. lappaceus.
Pontica, C. Koch, 1. c. 398, in obs. (- *Cirsium polyce-* ***phalum).*—Pontus.**
propontiea, C. Koch, 1. c. in obs. = C. eriophorus.
"gida, C. Koch, 1. c. 400-C. arachnoideus.
vrulata, C. Koch, 1. c. 397 = C. serralatus.
***Ssovitsii,* C. Koch, 1. c.** *(=Cirsium Ssovitsii).—Reg.* Caucas.
t'nuiloba, C. Koch, 1. c. 400.—Armenia.
tncholoma,* C. Koch, 1. c. 898 (-** ***Cirsium tricholoma). —Reg. Caucas.
'"ugaris, C. Koch, 1. c 402, in obs.=C. italicus.

EPITRICHE, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) »• 74=>Angianthua, Wendl. (Compos.).
"upidatus, Turcz. 1. c 76 = A demissus.

EPLATEIA, Rafin.Sylva Tellur. 67 (1838) = Withania, p««q. (Solanac).
"rborescens, Rafin. 1. c. = W. arborescens.

EPAIENDA, Rafin.SylvaTellur.l07(1888)-Eugania. MI<*. (Myrtac.).
*sl**mariensis,* Rafin. 1. c.=E. sinemariensis.

EPURGA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 150-Euphorbia, Linn.
I-athyris, Fourr. 1. c. = Euphorbia Lathyris.

ERACLISSA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 208 (1775) = Andrachne, Linn. (Euphorb.).
"xagyna, Forsk. 1. c =A. telephioides.

ERACLYSSA, Scop. Introd. 239 (1777) = praec.

ESAOHOSTI8, Host, Ic. Gram. iv. 14 (1809); Beauv. Agrost 70. t. 14. *f.* 11 (1812). *GRAMINEAE,* Bwth. & Hook. f. iii. 1186.
^OELACHYRUM, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 221.
EKOCHLOE, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
EXAGROSTIS, Steud. Norn. ed. II. i. 622 (1840).

EBAGBOSTI8:—

HARPACHNB, Hochst—Cf.Flora,xxiv.(1841),Intell. 20, nomen; et ex A. Rich. Tent. FL Abyss, ii. 431 (1850).
MACROBLEPHARUS, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 100.
MEGASTACHYA, Beauv. Agrost. 74, 167 (1812).
abortiva, *Steud. Syn. PI. Gram.* 279.—Austral.
abessinica, Link, Hort. Berol.i. 192=Poa abyssinica.
abyssinica, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 460—praec.
acicnlaris, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* **Sér. VI. i.** (1831) 406.—Bras.
acuminata, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 168.—Bras,
acutiflora, *Nees, Agrost. Bras.* 501.—Am. trop.
aegyptiaca, *Delile, Fl. Egypt.* 157. t. 4. f. 2.—Afr. bor.
affinis, Nees & Meyen, ex Steud. Syn. PI. Gram. 265-genicnlata.
affinis, Steud. Norn. ed. II. i. 662=Vahlii.
airoides, *Nees, Agrost. Bras.* 50».—Bras,
alba, *J. V C. Presl, Rel. Haent.* **i. 279.—Calif,**
albescens, *Steud. Syn. PI. Gram.* 269.—Afr. trop.
amabilis, *Wight (f Arn. in Hoot. V Am. Bot. Beech. Voy.* 251.—Ind. or.; Malaya,
amboinensis, *Trin. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 652.—Ins. Amboina.
amoena, *J. (f C. Presl, Rel. Haent.* **i. 276.—Mexic.**
apiculata, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. ill. 146.- Bras.
arabica, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 31=ciliaris.
articulata, *Nees, Agrost. Bras.* 502.—Bras,
aspera, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 408.—Abyss. ; Afr. austr.; Ind. or.
atropurpurea, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 267 = tenuifolia.
atrovirens, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 47=papposa.
atrovirens, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 400.—Afr. austr.
aturensis, *Trin. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 662.—Venezuela.
aulacosperma, Steud. I. c.=papposa.
aurea, Steud. Syn. PI. Gram. 267 -plumosa.
bagdadensis, Boiss. Fl. Orient, v. 681 = pilosa.
bahiensis, *Roem. & Schult. Syst.* **ii.** *Mant.* **318.—Reg.** trop.
barbata, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* **i. (18S6) 70.**—Bras,
bengnelensis, *Peyr. in Sittb. Acad. Wien, Math.-Nat.* xxxviii. (1860) 683.—Afr. trop.
beninensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 562.—Afr. trop.
Bergiana, *Trin. in Bull. Sc. Acad. PJtersb. i.* **(1836)** 70.—Afr. austr.
Berteriana, Steud. Nom. ed. II. it 361, in syn., sphalm. =seq.
Berteroniana, *Steud. I. c.* i. 662.—Ins. S. Doming.
bicolor, Boiss. Fl. Orient, v. 681 = pilosa.
bicolor, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 407.—Afr. austr.
bifaria, *Steud. Syn. PI. Gram.* 264.—Ind. or.
bifaria, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. i. 562 = coromandelina.
biformis, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 668.—Afr. trop.
Boivini, *Steud. Syn. PI. Gram.* 426.—Madag.
Boryana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 662.—Ins. S. Doming.; Borbon.
brasiliana, Nees, Agrost. Bras. 210=elegans.
brasiliensis, Nees, 1. c. 497 = bahiensis, interrupta, *Beauv.,* Neesii.
brevifolU, *Benth. in Hoot. Ic.* sub t. 1368 (p. 51).—Ind. or.
brizantha, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 411.—Afr. austr.
brizoides, *Costa, Suplem. Fl. Catal.* 81.—Hispan.
brizoides, *Nees, in Linnaea,* viL (1832) 828.—Afr. austr.
bri0oides, Roem. & Schult Syst. ii. Mant. 319 = Nuttalliana.
bromoides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 276.—Pcruv.
Brovmeana, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. (1843) 205 = seq.
Brownei, *Nees, ex Steud. Nom.* **ed. II. i. 562 ;** *etNees, Fl. Afr. Austr.* 396, in syn.—Geront. trop. et subtrop.
bulbiltifera, Steud. Syn. PI. Gram. 267 = Brownei.
Caelachyrum, Boiss. H. Orient v. 684 =E. Coelachyrum.
Calotheca, Trin. in Mém. Acad. Pdtersb. Sir. VI. i. (1831) 414 = Briza Lamarckiana.
Cambessediana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 269.—Afr. trop.
campestris, *Trin. in Bull. Sc Acad. Pitersb.* **i. (1836.)** 70.—Am. bor.

EBAGBOSTIB :—

capensis, Trin. in Mdm. Acad. P&ersb. *Sii.* VI. i. (1831) 400-brizoides.
capillaris, *Nees, Agrost. Bras.* 505.—Am. bor.; Ind. occ.
capillaris, *Steud. ex Doell, in Mart. Fl. Bras.* **ii. III.** 139.—Bras.
capillifolia, *Nees,Fl. Afr. Austr.* 403.—Afr. austr.
caudata, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **iii.** 573.—Mexic.
caudata, Nees, Fl. Afr. Austr. 410, adn.-plumosa.
cernua, Steud. Syn. PI. Gram. 266 = Brownei.
chaetophylla, *Steud. Syn. PI. Gram.* 279.—Austral,
chalcantha, *Trin. in Mint. Acad. Pitersb.* **Sér. VI.** i. (1831) 401.—Afr. austr.
Chapellieri, Nees, Fl. Afr. Austr. S92=elongata.
chilensis, Nees, in Nov. Act. **Nat.** Car. xix. Snppl. i. (1843) 464-virescens.
chloromelas, *Steud. Syn. PI. Gram.* 271.—Afr. austr.
ciliaris, *Kunth, Enum. PI.* i. 387. n. 9.—Am. trop.
ciliaris, *Lint, Hort. Berol.* i. 192.—Reg. trop.; Afr. austr.
ciliata, *Nees, Agrost. Bras.* 512, obs. L—Ind. or.
cinnaeformis, *Schrad. in Linnaea,* xii. (1838) 452.—Hab.!
Coelachymm, *Benth. in Hoot. Ic. PI.* t. 1368.—Aegypt.; Arab.
cognata, Steud. Syn. PI. Gram. 278 = pectinacea.
collina, *Trin. in Mtm. Acad. Pitersb.* **Sér. VI. i. (1831)** 413.—Rossia.
compacta, Steud. 1. c. 275-Vahlii.
compta, *Link, Hort. Berol.* i. 193.—Reg. Argent,
concinna, *Steud. Syn. PI. Gram.* 279.—Austral,
condensate, *Steud. I. c.* 278.—Mexic.
conferta, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* **Ser. VI. i.** (1831) 409.—Am. trop.
confinis, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 265» amabilis 1
congesta, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* **xxix. (1875)** 175.—Afr. trop.
contristata, *[Nees, in] Meyen, Rtise,* i. 484, nomen.—Perav.
eoromandelina, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb. Sir.* **VI.** i. (1881) 416.—Ind. or.
cretacea, Nees, in Ann. Nat. Hist. i. (1838) 284-coromandelina.
Cumingii, Steud. Syn. PI. Gram. 266=interrupta, ***Beauv.***
curtipedicellata, *Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad.* **1862** (1868) 97.—Am. bor.
curvula, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 897.—Afr. austr.
cuspidata, Link, Hort. Berol. ii. 29S — inconstans.
cylindrica, Nees, ex Hook, ft Arn. Bot. Beech. Voy. 261-genicnlata.
cylindrica, Steud. Syn. Fl. Gram. 267-ciliata *vel* plumosa.
cylindriflora, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 824.—Abyss.
cynosuroides, *Beauv. Agrost.* 71.—Ind. or.
cyperoides, *Beauv, 1. c.* 70.—Afr. austr.
decidua, *Hochst. in Flora,* xxxviii (1856) 824.—Abyss.
decipiens, Steud. Syn. PI. Gram. 279=Leptochloa chinensis.
dellcatula, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* **Sér. VI.** i. (1831) 70.—Bras,
depauperate, *Anderss. in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 669.—Afr. trop.
deserticola, *Phil. Fl. Atac.* 55.—Chili.
despiciens, Roem. Ac Schult. Syst. Mant. ii. 318-plumosa.
diandra, Roxb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 684, in syn.—interrupta, *Beauv.*
diandra, *Steud. Syn. PI. Gram.* 279.—Austral.
diarrhena, Steud. 1. c. 266 = interrupta, *Beauv.*
diffusa, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 97 = Purshii.
diomedearum, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* **Ser. VI. i.** (1881) 412.—Ins. GaUpag.
diplachnoidi , Steud. Syn. PI. Gram. 268 = interrupta, ***Doell.***
domingensis, *Steud. I. c.* 278.—Ins. S. Doming,
elegans, *Nees, Agrost. Bras.* 510.—Bras.
elegantula, Nees, ex **Miq.** Anal. Bot Ind. ii. 27-Brownei.
elongate, *Jacq. Eclog. Gram.* t. 3.—Ind. or.
elytroblephara, *Steud. Syn. PI. Gram.* **280.**—Ins. Societ. ?

BKAQ-BOBTI8 :—
equitans, *Trin. in Itim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. (1831) 418. - Ins. Sandvic.
eriopoda, *Benth. Fl. Austral,* vii. 648.—Austral.
erytkrogona, Nees, ex Stead. Syn. PI. Gram. 278= Krankii.
Euchroa, *Steud. I. c.* 267—Japon.; Java,
excelsa, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 227.—Mexic.
eximia, *Steud. Syn. PI. Gram.* 279.—Austral.; N. **Zel.**
expansa, *Link, Hart. Berol.* i. 190.—Reg. Argent,
falcata, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 408. t. 25.— Austral,
fascicularis, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. (1831) 408.—Afr. trop.
Fendleriana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 278.—Mexic.
ferroginea, *Beauv. Agrost.* 71.—Japon.
filiformis, *Link, Hort. Berol.* i. 191.—Am. bor.
filiformis, Nees, in Linnaea, vii. (1832) S30 = Thunbergiana.
finna, *Trin. in Bull. Se. Acad. Pitersb.* i. (1836) 70.— Bras.
flavescens, J. & C. Presl, Rel. Haenk. L 278 - poaeoide*.
fiexucsa, Stead. Syn. PI. Gram. 266=minor)
floribunda, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. Mant. 819 = Vahlii.
Frankii, Steud. Syn. PL Gram. 273.—Am. bor.
gangetica. Stead. 1. c. 266 = major I
geniculata, Dor. in Expl. Sc. Algtfr. t. 40. f. 4 = papposa »
geniculata, *Nees V Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 208.—As. trop.
Geyeri, *Steud. Syn. PI. Gram.* 272.—Am. bor.
gigantea, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. (1831) 408.—Ins. S. Doming,
glabrata, *Nees, in Linnaea,* vii. (1882) 882.—Afr. ansfx.
glareosa, Trin. in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. i. (1831) 406-articulata.
glumacea. *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bet.* iii. 578.—Mexic
glntinosa, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VL i. (1831) 397.—Jamaica.
gracilis, *Schrad. in Linnaea,* xii. (1888) 451.—Chili.
guineensis, Trin. in Mém. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 404, in nota = fascicularis ?
gummiflaa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 893.—Afr. anstr.
Haenkei, % &• *C. Presl, Rel. Haenk.* i. 279.— Mexic.
hapalantha, Trin. in Mém. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 409, partim=interrupta, *Beam.*
Hasskarli, *Steud. Syn. PI. Gram.* 265.—Java,
hirsuta, *Nees, Agrost. Bras.* 508.—Am. bor.
hirta, *Fount, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 678. —Mexic.
Hochstetteri, *Steud. Syn. PI. Gram.* 268.—Nubia,
homomalla, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 406.—Afr. austr.
Hornemanniana, *Nees, I. c.* 895.—Afr. trop.
imbeeilla, *Benth. Fl. Austral,* vii 643.—Austral.
imbecilla. Stead. Syn. PL Gram. 279 - Leptochloa chinensis.
inconstans, Nees, Agrost. Bras. 495 = Vahlii.
indica, Link, Hort. Berol. i. 192, in syn. = Poa abyssinica.
indica, Steud. Syn. PL Gram. 264=pilosa.
infirma, Steud. Norn. ed. II. i. 563.—N. Granat.
interrupta, *Beaut. Agrost.* 71.—Afr., As., et Austral. trop.
interrupta, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 157 (sp. diversa).— Bras.
Jacquini, *Schrad. in Linnaea,* xii. (1838) 450.—Hab. ?
japonica, Trin. in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. i. (1831) 405 = plumosa.
Jardinei, *Steud. Syn. PI. Gram.* 269.—Afr. trop. ?
Koenigii, Link, Hort. Berol. ii. 294, in syn. - interrupta, ***Beauv.***
lacunaria, *F. Muell. First Gen. Report* (1863) 20.— Austral.
Lamarckii, *Steud. Syn. PL Gram.* 269.—Afr. trop.
laniflora, *Benth. Fl. Austral,* vii. 648.—Austral.
Lappula, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 412.—Afr. austr.
laxa, *Baker, Fl. Maurit.* 456.—Ins. Mascar.
laxiflora, *Schrad. in Linnaea,* xii. (1838) 451.—Afr. austr.
**leersioides, *Guts. Fl. Sic. Syn.* i. 108; *Steud. Syn. PI. Gram.* 263.—Sidl.

BBAGBO8TIS :—
Lehmanniana, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 402.—Afr. austr.
lepida, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 424 - plumosa.
Leprieurii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 269.—Aiir. trop.
leptantha#7Wn. *in Mém. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. (1831) 405.—Bras.
leptocarpa, *Benth. Fl. Austral,* vii. 644.—Austral,
leptostachya, *Steud. Syn. PI. Gram.* 279.—Austral,
leucosticta, *Nees, ex Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 144.—Bras,
limbata, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 673.—Mexic.
Lindeniana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 278.—N. Granat.
linearis, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 567.—Afr. trop.
linearis, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 568.—China.
Linkii, *Steud. 1. c.* 278.—Am. bor.
lobata, Trin. in Mtfm. Acad. Pétersb. Sir. VL i. (1881) 396=cylindrica.
longeradiata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 272.—Am. bor.
longifolia, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* **23, nomen; *et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii.** 425.—Abyss.
lngens, *Nees, Agrost. Bras.* 607.—Am. trop.
lugens, Rnpr. in Boll. Acad. Brux. ix. (1842) reimp. 9 = capillaris.
lurida, *JF. tf C. Presl, Rel. Haenk.* 276.—Pernv.
luBoniensis, Steud. Syn. PI. Gram. 266 = Brownei.
macilenta, *Steud. I. c.* 268.—Abyss,
madagascariensis, *Steud. 1. c.* 272.—Madag.
major, *Host, Gram.* iv. t. 24.—Reg. trop. et subtrop.
mangalorica, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 26 = plumosa.
Mauritii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 272.—Ins. Mascar.
maxima, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 454. —Madag.
maxima, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Am. Centr. Bot.* iii. 674.—Mexic.
maypurensis. *Steud. Syn. PI. Gram.* 276; *Doell, in *Mart. Fl. Bras.* ii. III. 153.—Am. austr.
megalosperma, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 644.—Austral.
megapotamica, Roem. & Schult. Syst ii. Mant. 617 = pnrpurascens.
megastachya, Link, Hort. Berol. L 187=major.
Meratiana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 276.—Bras,
mexicana, *Link, Hort. Berol.* i. 190.—Mexic.
microstachya, Link, 1. c. ii. 294 =airoides.
milleflora, *Steud. Syn. PI. Gram.* 265.—Ins. Timor.
Millettii, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 252.— China.
minor, *Host, Fl. Austr.* i. 185.—Reg. trop. et temp,
minutiflora, *J. &• C. Presl, Rel. Haenk.* i. 274.—Ind. or.
Montufari, *Steud. Syn. PI. Gram.* 275.—Ecuador.
mossulensis, Steud. 1. c 264 = pilosa, interrupta, ***Doell.***
mucronata, *Roem. (f Schult. Syst.* ii. 577.—Ind. or.
multicaulis, Steud. Syn. PL Gram. 426 = pilosa.
multiflora, Aschers. ex Boiss. Fl. Orient, v. 680—= major.
multiflora, Trin. in Mlm. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1881) 401 = amabilisl
namaquensis, Hochst. ex Stead. Syn. PL Gram. 264 = pilosa.
namaquensis, Nees, ex Schrad. in Liunaea, xii. (1838) 462=interrupta., *Beauv.*
nardoides, Trin. in Mlm. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 415 = coromandelina.
Neesii, *Trin. I. c.* 406.—Bras,
nervosa, *Hochst. in Flora,* xxxviii. (1855) 827.—Abyss.
Newinii, *Hance, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 302.—China,
nigra, *Nees, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 563; *et Syn. PI.* *Gram.* 267.—Afr. trop. j Ind. or. j Austral,
nigricans, *Steud. Nom. 1. c.*—Ecuador,
nindensis, *Ficalho If Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1881) 32.-Afr. trop.
nitida, *Chapm. Fl. S. U. St.* 564.—Florida,
nitida, *Link, Hort. Berol.* i. 198.—Aegypt.
nutans, Boiss. Fl. Orient, v. 583 = interrupta, *Beauv.*
nutans, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 563 = Brownei.
Nuttalliana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 563.—Am. bor.

EKAOBO8TIS:—
obtoia, *Munro, ex Ficalho* b* *Hiern, in Trans. Linn.* *Soc.* Ser. IL ii. (1881) 32.—Afr. trop.
Olmedi, *Steud. Nom.* ed. II. i. 664.—Pernv.
orientalis.Trm. in Mlm. Acad. Pitersb.Sir. VI. iv. n. (1838) Snppl. 73=elongate.
ovina, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 428 = Brownei.
owariensis, Stead. Syn. PI. Gram. 269-beninensis.
oxylepis, *Torr. in Rep. Bot. Whipple Exped.* 166.— Mexic.
Palmeri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882- 83' 182.—Mexic.
panamensis, J..& C. Presl, Rel. Haenk. 277 = maypurensis.
panicifonnis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 268.—Abyss,
panicoides, *Steud. I. c.* 278 (sp. dub.).—Mexic.
paniculata, Steud. 1. c. = aspera.
papposa, *Steud. Nom.* ed. II. i. 664.—Reg. Mediterr.; Oriens.
parvifiora, Trin. in Mlm. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831)411 = pilosa.
parviglumis, Hochst. ex Steud. Syn. PL Gram. 267 = nigra?
parvula, Stead. 1. c.-Parshii.
pastoënsis, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb.* (1836) 70. —N. Granat.
patens, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 175. —Afr. trop.
patùla, *Steud. Nom.* ed. II. i. 664.—Ecuador.
pauciflora, *Trin. fide Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr.* *Am. Bot.* iii. 576.—Am. bor.; Mexic.
pectinacea, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 406 in syn.—Mexic.
pellucida, Steud. Syn. PL Gram. 279 = pilosa.
pensylvanica, *Sckeele, in Flora,* xxvii. (1844) 56.—Am. bor.
perennis, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. **144.—**Bras,
peruviana, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. (1881) 896.—Am. austr.
Petersii, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* i. (1836) 70.—Ins. Tahiti.
Piercii, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 1370.—Belnchist.
pilifera, *Scheele, in Linnaea,* xxil. (1849) 344.—Texas.
pilosa, *Beauv. Agrost.* 71.—Reg. calid.
pilosissima, Link, Hort. Berol. i. 189=articulata.
plana, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 390.—Afr. austr.
planiculmis, *Nees, 1. c.* 391.—Afr. austr.
plumosa, *Link, Hort. Berol.* i. 192.—As. et Afr. trop.
poaeformis, Link, 1. c. 188 - minor.
poaeoides, Beauv. \grost. 71. t. 14=minor.
pogonia, Steud. Syn. PL Gram. 267 = Brownei.
polymorpha, Roem. & Schult. Syst. ii. 576 =• bahiensis.
polymorpha,Stead. Syn. PL Gram. 265-major.
polymorpha, Trin. ex Stead. Nom. ed. i. 564, 662 « amabilis.
polytricha, *Nees, Agrost. Bras.* 507.—Bras,
porosa, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 401.—Afr. austr.
procera, Steud. Syn. PL Gram. 266 = Brownei?
procnmbens, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 886.—Afr. austr.
prolifera, *Steud. Syn. PL Gram.* 177.—Ind. occ.
propinqua, *Steud. I. c.* 271.—Ins. Maurit.
psammodes, *Trin. in Mlm. Acad. Petersb.* Sir. VI. i. (1831) 400.—Bras.
pnberula, *Steud. Syn. PI. Gram.* 268.—Abyss.
pubescens, Stead. 1. c. 279 = Brownei.
pulchella, Parl. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 188 - plumosa.
***•pwuAala.,Link, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 561.—Ind. or.**
purpurascens, *Roem.* b* *Schult. Syst.* ii. *Mant.* 317.—Bras.
Purshii, *Hort. ex Schrad. in Linnaea,* xii. (1838) 451. —Am. bor.
quitensis, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* i. (1836) 70. = Am. austr.
racemose, *Steud. Syn. PI. Gram.* 271.—Afr. anstr.
rachitricha, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 25 *-tremula.
reptans, *Nees, Agrost. Bras.* 514.—Reg. trop.
retinorrhoea, Steud. Syn. PL Gram. 268 - plumosa.
rhachitricha, Hochst ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 26 - tremula.
riparia, Nees, Agrost Bras. 613, adn.=ciliaris.
riparia, Steud. Syn. PL Gram. 265 = plumosa.
Rothii, Link, Hort. Berol. ii. 294 - interrupta, *Beauv.*
rubens, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 26 - elongata.
rubens. Stead. Syn. PI. Gram. 266=amabilis.

EHACHtOSTIS:-
mbiginosa, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VI. i. (1831) 401.—Afr. trop.
ru/escens, Roem. & Schult. Syst Mart. ii. 319-inconstans.
rupestris, Steud. Syn. PL Gram. 265-ciliata.
Saltmanni, Stend. 1. c. 277 = prolifera.
sarmentosa, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. i. (1831) 398.—Afr. austr.
saxatilis, *Hemsl. Bot. Voy. Challenger,* i. II. 90.—Ins. S. Helena.
scabra, *Phil. Fl. Atac.* 55.—Chili.
scaligera, Steud. Syn. PI. Gram. 277 = Vahlii.
Schimperi, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t 1371.—Abyss.
Schultrii, *Benth. Fl. Austral,* vii. 646.—Austral,
sclerantha, *Nees, Ft. Afr. Austr.SS6.-Ab.* austr.
sclerophylla, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VI. i. (1831) 412.—Bras.
secunda, Nees, ex Stend. Syn. PI. Gram. 264 = coromandelina.
secundiflora, *J.* b" *C. Presl, Rel. Haenk.* i. 276 (sp. dub.).-Me1dc.
seminuda, *Trin. in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VI. i. U831) 406.—Bras,
senegalensis, *Nees, Sem. Hort. Vratisl.* (1834).—*Cf. Linnaea,* xii. (1838) 452.—Afr. trop.
sessilispica, Buckl. in Proc. Acad. Sc Phllad. 1862 (1863) 97 - Diplachne rigida.
setifciia, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot ii. (1843) 419 = chaetophylla.
umplidflora, *Steud. Syn. PI. Gram.* 278 (sp. dub.).—Mexic.
solida, Nees, Agrost. Bras. 501=rufesoens.
spartinoides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 265.—Ins. Philipp.
speciosa, Steud. 1. c. 279 = Brownei.
•pectabilis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 664.—Am. bor.
speirostachya, Coss. & Dur. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1860) 47 = papposa.
spinosa, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. i. (1881) 416.—Afr. austr.
squamata, *Steud. Syn. PI. Gram.* 274.—Bras,
stenodada, *J. (T C. Presl, Rel. Haenk.* i. 278.—Peruv.
stenophylla, Hochst ex Miq. Anal. Bot Ind. ii. 27 - Brownei.
stenostachya, *Steud. Syn. PI. Gram.* 279.—Austral.
striata, Nees, Fl. Afr. Austr. 886 = Bergiana.
stricta, Steud. Syn. PI. Gram. 264 = Brownei.
«rigosa, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 659. —Afr. trop.
suaveolens, Becker, ex Clans, in Beitr. Pflanz. Russ. Reich, viii. 266 = collina.
subulata, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 399.—Afr. austr.
sudans, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 227.—Cuba,
superba, *Peyr. in Sitsb. Acad. Wien, Math.-Nat.* xxxviii. (1860) 584.—Afr. trop.
laffzagra, *Steud. Syn. PI. Gram.* 268.—Abyss,
tenax, *Steud. Nom.* ed. II. L 564.—Ecuador.
tenella, Benth. Fl. Hongk. 481 = interrupta, *Beauv.*
tenella, Nees, Fl. Afr. Austr. 405 = pilosa.
tenella, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 576=plumosa.
'enellula, Steud. Syn. PI. Gram. 279 - plumosa.
tenuiflora, *Rupr.ex Steud. I. c.* 268.—Afr. trop.
tenuifolia, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 20, nomen; *et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 425.—Abyss.; Ind. or.
tennis, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* ed. V. 682.—Am. bor.
tenuis, Steud. Syn. PI. Gram. 273=pilosa.
tenuissima, Schrad. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 410 » interrupta, *Beauv.*
wphrosanthos, *Roem.* &• *Schult. Syst. Afant.* ii. 816.—Ins. Martin.
te phrosanthos, Steud Gyn. PI. Gram. 278 =limbata, Pnrahii.
Inunbergiana, *Steud. Nom.* ea. II. i. 564.—Afr. austr.
thyreiflora, *Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* i. 83.—Hispan.
tremula, *Hochst. in Flora,* xxv. (1842) I. *Beibl.* 134, nomen; *et ex Steud. Syn. PI. Gram.* 269.—Geront. trop.
trichophora, Coss. & Dur. in Bull. Soc Bot Fr. ii. (1855) 311-papposat
uchophylla, *Benth. Fl. Austral,* vii, 644.—Austral.
'ricuspis, Trin. in Mém. Acad. Petersb. Ser. VI. i. , .(.WSl) 414=Triodiacuprea.
T'ttcea, *Steud. Nom.* ed. II. i. 664.—SidL

EBAGBO8TIS:-
uninervia, *Steud. Syn. PI. Gram.* 278 (sp. dub.).—Mexic.
Uniolae, *Nees, Agrost. Bras.* 494.—Bras,
unloloides, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 264.—Ins. Banca.
Unionis, Steud. 1. c. 278=pectinacea.
Urvillei, Steud. 1. c 278=Brownei?
Vahlii, *Nees, Agrost. Bras.* 499.—Bras.
variabilis, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 408-wahowensis.
velutina, *Schrad. in Linnaea,* xii. (1838) 451.—Am. bor.
Verae-Crucis,'Rxipt. in Bull. Acad. Brux. ix. (1842) reimp. 9-oxylepis.
verticitlata, Beanv. Agrost. 71; Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 575-pilosa.
verticillata, Coss. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 47-papposa.
villosa, Stend. Syn. PI. Gram. 276-velutina.
villosa, Trin. Fund. Agrost. 137 = ciliaris.
virescens, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 276.—Chili.
Virletii, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 576.—Mexic.
viscosa, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb. Sir.* VI. i. (1831) 897.—As. trop.
vulgaris, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 661 = major ?
wahowensis, *Trin. in Mim. Acad. Petersb.* Sér. VI. i. (1881) 412.—Ins. Sandvic.
Wightiana, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 1381.—Ind. or.
Willdenoviana, Nees, ex Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 252; et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 205 = minor.
WiUdenozoii, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 565 - praec.
ttylanica, Munro, ex Hance, in Joum. Linn. Soc. xiii. (1873) 137= bahien»U.
meylanica, Nees *Be* Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 204 = elongata.

ERANGELIA, Renealm. ex Linn. Sp. PL ed. I. 288 (1753)-GalanthuB, Linn. (Amaryllid.).

EBAMTHEMUM, Linn. Diss. Dass. 1 (1747); Amoen. Acad. i. 384 (1719). *ACANTHACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1097.
PIGAFETTA, Adans. Fam. ii. 223 (1763).
SALFINGANTKA, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iii. (1847) 240.
UPUDALIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 66 (1836).
acanthodes, *Spreng. Syst.* i. 88.—Ins. S. Doming.
acanthophorum, Roem. & Schult. Syst i. Mant. 154 = Haplanthus verticellaris.
adculare, R. Br. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 177 = Anthacanthus jamaicensis.
acuminatissimum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 885.—Java.
affine, Spreng. Syst. i. 89 ~ hypocrateriforme.
alatum, *Nees, in DC. Prod.* xi. 460.—Mexic.
albiflorum, *Hook. Bot. Mag.* t. 4225.—Bras,
album, *Nees, in DC. Prod.* xi. 455.—Burma ; Penang.
ambiguum, Roem. & Schult i. Mant 154 =• Anthacanthus acicularis.
amoenum, Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 420=Daedalacanthus suffruticosus.
Andersoni, *Mast, in Gard. Chron.* (1869) 134, 136.—Malaya.
angustatum, Linn. Mant. 171=Agathelpis angustifolia.
angusti/olium.Mxm. Syst ed. XIII. 65=Agathelpis angustifolia.
armatum, R. Br. ex Roem. *8c* Schult. Syst. i. 176* Anthacanthus armatus.
aspersum, *Hook./. Bot. Mag.* t. 5711.—Ins. Salomon,
atropurpureum, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1875) I. 619. —Polynes.
barlerioides, Roxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 113 — Daedalacanthus suffruticosus.
bicolor, *Schrank, PI. Rar. Hort. Monac.* t. 8.—Ins. Luzon.
bifarium, *Nees, in DC. Prod.* xi. 458.—Burma.
Blumei, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 161=crenulatum.
Blumei, Teijsm. in Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 836-Andersoni.
borneense, *Hook./. Bot.Mag.* t. 6701.—Borneo.
capense. Linn. Sp. PI. 9 = Daedalacanthus montanus.
Carrathersii, *Seem. Fl. Vit.* 185.—Ins. Fiji,
cinnabarinum, *Wall. PI. As. Rar.* i. 20. t. 21.—Burma.

TB'W. A. «.:: HEMUM ;—
coccineum, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iii. (1847) 240 =Thyrsacanthus Lemaireanus.
Cooperi, *Hook. Bot. Mag.* t. 5467.—N. Caled.
corcovadense, *Regel, Petrop. Ind. Sem. Hort.* (1865) 47.—Bras,
cordatum, *Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph.* 147.—Panama.
crenulatum, *Lindl. in Bot. Reg.* t 879.—Reg. Himal.
crenulatum, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 107-malaccense.
crenulatum, Wall. Cat. n. 2491 - malabaricum.
crenulatum, Wall. 1. c D, E=album.
crenulatum. Wall. 1. c. F = palatiferum.
cristatum, *Humb. ty Bonpl. ex Spreng. W Link, Jahrb.* i. HI. 46.—Am. austr.
cubensis, Spreng. ex Nees, in DC. Prod. xi. 726 = Barleriola solanifolia.
cuspidatum, *Nees, in Benth. PI. Hart-m.* 147.—Mexic.
decurrens, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell. i'6,* nomen; *et in DC. Prod.* xi. 453.—Abyss,
detruncatum, *Nees* b* *Mart, in Nov. Act. Acad. Nat Cur.* xi. (1823) 64.—Bras.
diantherum, Blume, Bijdr. 792 = crenulatum.
diantherum, *Roxb. Hort. Beng.* 8 ; *Fl. Ind.* i. 112.—Ins. Molucc.
diversifolium, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iit. 837.—Java.
Ecbolium, T. Anders, in Thw. Enum. PL Zeyl. 285 = Ecbolium Linneanum.
Edgeworthianum, Nees, in DC. Prod. xi. 44 — Daedalacanthus nervosus.
elatum, Kun, in Journ. Bot. x. (1872) 46 - palatiferum.
elegans, *R. Br. ex Roem. (f Schult. Syst.* i. 174.—Afr. trop.
elegans, Mast, in Gard. Chron. (1868) 1234-Andersoni.
emarginatum, *Des/. ex Spreng. V Link, Jahrb.* i. in. 47.—Ins. S. Thomas,
erectum, *Hort. Bogor. ex T. Anders, in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind.N.* S. i. U868) 286.—Hab. t
exaequatum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 158.—Bras.
fasciculatum, Blume, Bijdr. 792-= bicolor.
fasciculatum, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 166.—Am. centr.
/astigiatun, R. Br. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 174 ; Spreng. Syst. i. 89—Daedalacanthus montanus.
fili/orme, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 451 = cuspidatum.
fiavum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 665 •> Rnellia flava.
fiavum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 2 = Barleria flava.
foecundum, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1494.—Bras,
grnciliflorum, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 107.—Penang.
grandifiorum, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 828 = bicolor.
Haenkeanum, *Nees, in DC. Prod.* xi. 457.—Ins. Luzon,
heterophyllum, *Nees, I. c.*—Bras,
hispidulum, *Nees, 1. c.* 450.—Mexic.
hispidum, *Nees, I. c.* 456.—Afr. trop.
hypocrateriforme, *R. Br. ex Roem. V Schult. Syst.* l. 175.—Afr. trop.
hyssopi/olium, Herb. Linn, ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 118 (non Acanthac.).—Hab. ?
igneum, *Linden, in Fl. des Serres,* vii. (1867-68) 19. —Peruv.
indicum, *C. B. Clarke, in Hook, /. Fl. Brit. Ind.* iv. 497.—Reg. Himal.
insularum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861-621 849.—Ins. Fiji.
lanceum, *Nees, in DC. Prod.* xi. 451.—N. Granat.
lapathifolium, *Nees, 1. c.* 454.—Ind. or.
lati/olium, Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xxxix. (1870) II. 79 = palatiferum.
laxiflorum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) S49.-Ins. Fiji.
Leptanthus, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Bnt. Ind.U.* 500.—Reg. Himal.
leptostachyum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 157.— Bras.
leuconeuron, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1856) 291, t. 174 = seq.
leuconeurum, *Hort. Petrop. ex Schlecht. in Linnaea,* xxvii. (1864) 500 ; *Fisch. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 48.—Bras,
longifolium, *Regtl, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 47. —Am. austr.

ERANTHEMTJM :—
longifolinm, *Seem. Fl. Vit.* 185.—N. Caled.
lycioides, *Desf. ex Spreng. tf Link, Jahrb.* i. III. 47.—Ind. occ.
macrophyllum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 157.—Bras.
macrophyllum, WalL Cat. n. 7179 - Daedalacanthua macrophyllus.
macrostachyum, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 286 = Stenandrium serpens.
malabaricum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 497.—Ind. or.
malaccense, *C. B. Clarke, 1. c.* 498.—Malacca,
marmoratnm, *Hart, ex Regel, Ind. Sem. Hart. Petrop.* (1865) 48.—Am. austr.
micranthum, Hort BeroL ex Nees, in DC. Prod. xi. 456=variabile.
microphyllum, R. Br. ex Roem. *8c* Schult. Syst. i. 176 = Anthacanthus microphyllns.
modestum, *Nees, ex Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. I. (1823) 63.—Btas.
montannm, *Hook. Bot. Mag.* t 4031.—Ind. or.
montanum, Roxb. Hort Beng. [80] ; Fl. Ind. i. 100 = Daedalacanthus montanus.
montanum, Russ. ex Nees. in DC. Prod. xi. 449 = Wightianum.
montanum, Wall. Cat. n. 2492 = Daedalacanthns purpurascens.
Moorei, *Hort. ex Gard. Ckron.* (1876) I. 619.—Polynes.
nervosum, R. Br. ex Roem. & Schult. Syst. i. 174-Daedalacanthus nervosus.[1]
nervosum, Dalz. *8c* Gibs. Bomb. Fl. 196 = Daedalacanthus purpurascens.
nigritiannm, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 61.—Afr. trop.
nigrum, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxvii. (1880) t. 404.—Ins. Salomon.
obmatum, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. vii. 462 = Calophanes Persoonii.
palatiferum. Hook. Bot. Mag. t. 6967 «= malaccense, cinnabarinum.
palatiferum, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 108.—Reg. Hiraal.
palatiflorum, Steud. Nom. ed. II. i. 6 =-praec.
Parishii, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 489 «= Daedalacanthus Parishii.
Parishii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 449.—Burma.
paroiflorum, Berg. Desc. PI. Cap. 2 - Agathelpis parvifolia.
parviflornm, *R. Br. ex Spreng. Syst.* i. 88.—Mexic.
parviflorum, Willd. Sp. PI. i. 62=JusHcia salviaeflora.
parvifolium,Unlt, Enum. Hort. Berol. i. 28 = Anthacanthus acicularis.
parvifolium, Linn. Mant. 171 = Agathelpis parvifolia.
pelagicum, *Seem. Fl. Vit.* 185.—Ins. N. Hebrid.
praecox, *Benth. PI. Hart-a.* 291.—Mexic.
pnbescens, *Roth, Nov. PI. Sp.* 1.—Ind. or.
pulchellum, Andr. Bot. Rep. t. 88 = Daedalacanthus nervosus.
pulchellum, Hort. in Gartenmag. (1810) 176. t. 17; ex Nees, in DC. Prod. xi. 456 = bicolor.
pulchellum, Roxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 111 = = Daedalacanthns purpurascena.
punctatum, *Nees, in DC. Prod.* xi. 456.—Ind. or.
purpurascens, Wight, ex Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 106-Daedalacanthus purpurascens.
racemosnm, *Roxb. Hort. Beng.* 8; *Fl. Ind.* L 113.—Ins. Molucc
repandnm, *R. Br. ex Roem.* to" *Schult. Syst.* i. 175.—Ins. Tanna.
reticulatom, *Hort. ex Gard. Chron.* (1876) I. 619.—Polynes.
Riedelianum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 156.—Bras.
roseum, R. Br. Prod. i. 477-Daedalacanthus roseus.
roseum, *Linden* b* *Fourn. in Illustr. Hortic.* xxiil (1876) t. 235.—Bras,
salaccense, *Blume, Bijdr.* 792.—Java.
salsoloides, Linn. f. Suppl. 82 = Campylanthus salsoloides.
sangninolentnm, *Hort. ex Veiteh, in Fl. des Serres, Sir.* II. v. (1865) 157.1.1583.—Madag.
scabrum. Wall, ex T. Anders, in Joura. Linn. Soc. ix. (1867) 487-Daedalacanthus nervosus.

ERANTHEMUM :—
Schomburgckii, Hort. in Illustr. Hortic. xxvi. (1879) t. 349-reticulatum.
semperflorens, *Roth, Nov. PI. Sp.* 2.—Ind. occ.
senense, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 219.—Afr. trop.
serpyllifolium, Willd. ex Roem. *8c* Schult. Mant. i. 145 = Andrographis serpyllifolia.
sessile, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 166.—Bras,
sessiliflorum, *Regel &* Herd. Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1861) 39.—Bras.
sinuatum, R. Br. ex Roem. *8c* Schult Syst. i. 175 = Anthacanthns sinnatns, repandus.
spinosum, R. Br. 1. c. 176 = Anthacanthns spinosus.
spinosum, Lour. Fl. Cochinch. i. 19 = Haplanthus verticillaris.
strictum, Colebr. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 114 = Daedalacanthus strictus.
succisifolium, Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xlv. (1876) II. 142 = cinnabarinum.
suffruticosum, Roxb. Hort Beng. 3 ; Fl. Ind. i. 111 = Daedalacanthus suffruticosus.
Teijsmanni, *T'. Anders, in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind.* N. S. i. (1868) 285.—Malaya,
tenellum, *Benth. Fl. Austral*, iv. 555.—Austral,
tetragonum, *A. Dietr. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 454.—Ind. occ.
tetragonum, Wall. Cat. n. 7180 = Daedalacanthus tetragonns.
tricolor, *Nichols. Diet. Gard. i.* 618.—Polynes.
tubercnlatum, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6405.—Hab. 1
variabile, *R. Br. Prod.* 477.—Austral.
variant, Billb. in Linneska Samfund. i. 1832 (1883) 11 = Daedalacanthus nervosus.
verbenaceum, *Nees, ex Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. I. (1823) 65.—Bras,
versicolor, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1876) I. 619.—Hab.f
verticillatum, Spreng. Syst i. 88 = Haplanthus verticillare.
vincoides, R. Br. ex Roem. & Schult. Syst i. 176= Anthacanthus vincoides.
vUddum, *Blume, Bijdr.* 793.—Java.
Wightianum, Wall. Cat n. 2495-Daedalacanthus montanus.
Zollingerianum, *Nees, in DC. Prod.* xi. 455.—Ins. Philipp.

EBABTHT8, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 303. *RANUNCULACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 7.
HELLEBOROIDES, Adans. Fam. ii. 458 (1763).
KOEIXIA, Biria, Diss. Renonc. 21 (1811).
cilidca, *Schott V Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl.* (1854) 118.—Cilicia.
hyemalis, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807) 304.—Europ.
Keiskei, *Franeh. tf Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 269.—Japon.
longistipitata, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xliii. (1870) I. 244.—As. bor.
pinnatifida, *Maxim, in Bull. Acad. PHersb.* xxii. (1877) 225.—Japon.
sibirica, *DC. Syst.* i. 815.—Sibir.
stellata, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 22.—Manchur.
uncinata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 65.—Sibir.

ERANTHUS, G. Don, Gen. Syit. i. 45 (1831) =praec.

ERASMA, R. Br. in Abel, Narr. Joum. Chin. 874 (1818), nomen (Bmniac).

ERASMIA, Miq. in Inst Versl. en Med. 1842 (1843) 81 - Peperomia, Ruiz *8c* Pav. (Piperac).
floribunda, Miq. 1. c = P. Erasmia.

ERATO, DC. Prod. v. 317 (1836)«Iiiabum, Adans. (Compos.).
polymnioides, DC. 1. c. 318.—Peruv.

ERATOBOTRYS, Fenzl, ex Endl. Gen. Suppl. Ii. 13 (1842) = 8oUla, Linn. (Liliac).
bifolia, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 826 = S. Richardiana.
lilacina, Fenzl, ex Knnth, Enum. PI. iv. 679-S. lilacina.

ERBLICHIA, Seem. Bot. Herald, 130. t. 27 (1853) = Plriqueta, Aubl. (Tumerac).
madagascariensis, O. Hoffm. Sert. Madag. (1881) 19 = P. madagascariensis.
odorata. Seem. Bot. Voy. Herald, 130. t 27 = P. odorata.

ERCILIA, Endl. Gen. 977 (1840)-seq.

EBCHiLA, A. Joss, in Ann. Sc Nat. Ser. I. xxv. (1882) 11. t. 8. *PHYTOLACCACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 84.
APODOSTACHYS, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 577.
BRIDGESIA, Hook. *8c Am.* in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 168.1.102.
ERCILIA, Endl. Gen. 977 (1840).
SURIXNA, Domb. ex Meissn. Gen. Comm. 235 (1841).
spicata, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 35.—Chill
volubilis, *A. Juss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. xxv. (1832) 11. t. 3. f. 1.—Peruv.

EREBENNUS, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 14 = Hibiscus, linn. (Malvac).
canaranus, Alef. I. c. = H. tetraphyllus.

EREBINTHUS, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 210, App. = Tephrosia, Pen. (Legumin.).

ERECHTHITES, Less. Syn. Comp. 396 (1832)= seq.

ERECHTITES, Rafin. Fl. Ludov. 65 (1817). *COMPOSITAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 443.
NEOCEIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1820) 90.
PTILERIS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
ambigua, DC. Prod. vi. 295 •= praealta.
apargiaefolia, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 524 = arguta.
arguta, *DC. Prod.* vi. 296.—Austral; N. Zel.
Atkinsoniae, *F. Muell. Fragm.* v. 88.—Austral.
Bathurstiana, DC. Prod. vi. 297= arguta.
cacalioides, Less. Syn. Comp. 395=praealta.
candicans, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 122 = Seneciogeorgianus.
carduifolia, DC. Prod. v. 294—praealta.
elongata, A. Gray, Syn. FL N. Am. i. II 396 = praealta.
glabrescens, DC. Prod. vi. 296=quadridentata.
glabrescens, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (1877) 650.—N. Zel.
glandulosa, DC. Prod. vi. 295-quadridentata.
glomerata, DC. 1. c 2>7 = arguta!
glossantha, Sond. in Linnaea, xxv. (1862) 624" Senecio brachyglossus.
Gunnii, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 122 = quadridentata.
hieracifolia, Kafin. ex DC. Prod. vi. 294 = praealta.
hispidula, *DC. I. c.* 296.—Austral,
ignobilis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 299.—Bras.
incana, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxiv. (1861) H-85=quadridentata.
lacerata, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 417 = arguta.
minima, *DC. Prod.* vi. 437, in syn.—Austral,
mixta, *DC. I. c.* 297.—Austral.
Muelleri, Lange, Ind. Sem. Hort Haun. (1861) 28" prenanthoides.
organensis, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii-(1848) 420=valerianaefolia.
petiolata, *Benth. PI. Hartw.* 209.—N. Granat.
picridioides, Sond. *8c* Muell. in Linnaea, xxv. (1862) 253 = mixta.
picridioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxrv. (1851) I. 200 = prenanthoides.
praealta, *Rafin. Fl. Ludov.* 65 ; *Less, in Linnaea*, v> (1831) 411—Am. bor. et austr.
prenanthoides, *DC. Prod.* vi. 296.—Austral,
pumila, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii (1881) 38& - N . ZeL
pumila, DC. Prod. vi. 297=arguta T
pyrophila, *Sch. Bip. ex Miq. Fl. Ind. Bat.* B. [96]-~~ Java,
quadridentata, *DC. Prod.* vi. 295.—Austral.

EBECHTTTEB :—
Richardiana, DC. Prod. vi. 2»7=hispidula.
roncinata, *DC. I. c.* 295.—Mexic.
scaborula, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* **157.—N. Zel.**
sonchoides, DC. Prod. vi. 296 - prenanthoides.
sulcata, Gardn. in Hook. Lond. Jonm. Bot. vii. (1818) 419=praealta.
tenuifiora, DC. Prod. vi. 296=quadridentata.
valerianaefolia, *DC. I. e.* 296.—Bras.

EEEMAEA, Lindl. Swan River App. 11 (1839). *UYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 707.
acutifblia, *F. Muell. Fragm.* ii. SO.—Austral,
beanfortioides, *Benth. Fl. Austral,* iii. 182.—Austral,
ebracteata, *F. Muell. Fragm.* ii. 29.—Austral.
ericifolia, Lindl. Swan River App. 11-pilosa.
fimbriata, *Lindl. I. c*—Austral,
pilosa, *Lindl. L c*—Austral,
violacea, *F. Muell. Fragm.* xi. 10.—Austral.

EREMANTHE, Spach, Hist. Veg. Phan. v.421 (1886); et in Ann. Sc. Nat. Sir. IL v. (1886) 363 = Hypericum, Linn.
calycina, Spach, 11. cc. 422; 868 = H. calycinum.
patula, C. Koch, Hort. Dendrol. 65 = H. patulum.

EBEMANTHU8, Less, in Linnaea, iv. (1829) 817. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 285.
CHRESTA, Veil. Fl. Flum. viii. t 150, 151 (1827), nomen prius.
LAXOPETALUM, Pohl, ex Baker, in Mart. FL Bras. vi. II. 168 (1873).
PRESTELIA, Sen. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 286 (1873).
PYCNOCEPHALUM, DC. Prod. v. 83 (1886).
SPHAEROPHORA, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 402.
STACHYANTHUS, DC. Prod. v. 84 (1836).
Mgnstifolius, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 170.—Bras.
tricolor, *Baker, 1. c.* 165.—Bras,
ouctus, *Baker, 1. c.* 162.—Bras.
crotonoides, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 396 — Vernonia crotonoides.
Elaeagnus, *Sch, Bip. 1. c.* xviU-xix. (1861) 168.—Bras,
eriopus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. Jl. 169.—Bras,
exsuccus, *Baker, I. c.* 166.—Bras,
glomerulatus, *Less, in Linnaea,* iv. (1829) 817.—Bras,
goyazensis, *Sch. Bip. in Pollichia,* xvtti-xix. (1861) . 165—Bras.
incanus, *Ltu. in Linnaea,* vi. (1881) 682.—Bras.
Martii, *Baker, in Mart. Fl.Bras.* vi. IL 167.—Bras.
•aolUs, *Sch. Bip. in Pollichia,* xviii-xix. (1861) 166.—Bras.
pallidisetus, Sch. Bip. 1. c 166=glomerulatus.
pandurifolius, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 162.—Bras.
pannosus, *Baker, 1. c.* 164.—Bras.
Plantaginifofius, *Baker, I. c.* 168.—Bras.
Pycnocephalns, *Baker, I. c.* 166.—Bras,
scapigerus, *Baker, I. c.* 168.—Bras,
speciosus, *Baker, 1. c.* 169.—Bras,
sphaerocephalus, *Baker, 1. c.* 167.—Bras.
stellatus, Sch. Bip. in Pollichia, xvtti-xix. (1861) 164 • glomerulatus.
vrtascifolius, Sch. Bip. 1. c. xx-xxL (1868) 897 = Vernonia crotonoides.
WeddellU, Sch. Bip. L e. xviii-xix. (1861) 165 = goyazensis.

EREMIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) iM. *ERICACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 692.
– HEXASTEMON, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 220.
Bartlingiana, *Klottsch, in Linnaea,* xii. (1838) 218.—Afr. austr.
orevifolia, *Benth. in DC. Prod.* vii. 700.—Afr. austr.
»ta, *Benth. I.e.*—Afr. anstr.
Parviaora, *Klotmsch, in Linnaea,* xii. (1838) 498.—Afr. austr.
curvata, *Klotzsch, I. c*—Afr. austr.
a, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* **xvii. (1884)** 156—Afr. austr.
tubercuUris, *Benth. in DC. Prod.* vii. 700.—Afr. austr.

EREMIASTKTJM, A. Gray, in Mem. Am. Acad. «*• II. v. (1855) 320 (PI. Nov. Thurb.). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 270.
Wliolei, *A. Gray, 1. c.* 32L-Calif.

EREMITES, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 52 =seq.

EREMITIS, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. II. 888. t. 48 (1877)=Pariana, Aubl. (Giamin.).
monothalamia, Doell, 1. c.=P. parvinora.

EREMOBIUM, Bolss. Fl. Orient. L 156 (1867) = **Mal**colmla, R. Br. (Crucif.).
lineare, Boiss. L c 167 -= M. aegyptiaca.

EREMOCALLIS, SalisKex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PL ii. 398 (1821)=Erioa, Tourn.
cinerea, S. F. Gray, 1. c - E . cinerea.
glomerata, S. F. Gray, 1. c.=E. Tetralix.

EREMOCABPTJS, Benth. Bot Voy. Sulph. 53. t 26 (1844). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 297.
setigerus, *Benth. I.* c—Calif.

EREMOCARPUS, Lindl. Veg. Kingd. 778 (1847), sphalm. = EREMODAUCOS, Bunge = Traohydium, Lindl. (Umbellif.).

EREMOCHARIS, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral, ii. App. 78 (1849) = Clianthus, Soland. (Legumin.).

EREMOCHARIS, Phil. Fl. Atac. 25. t. 2 B (1861) = Aateriscivun, Cham. (Umbell.).
fiexuosa, Phil. f. Cat PI. Vase. Chil. 103, sphalm. = seq.
fruticosa, PhiL Fl. Atac. 26.—Chili.

EREMOCHLOA, Buese, in Miq. PI. Jungh. 357 (1851-56)=Vosaia?, Wall. (Gramin.).
Horneri, Buese, 1. c.—Sumatra.

EKEMOCHLOE, S. WaU. in Bot. King's Exped. 382. t. 40 (1871). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1177.
Bigelovii, 5. *Wats. 1. c.* 882.—N. Mexic.
Kingii, *S. Wats. 1. c.* t. 40.—Calif.
Tkurberi, & **Wats.** 1. c. f. 1 = Bigelovii.

EREMODAUCUS, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp. (1843). —Ct Linnaea, xviii. (1844) 151=Traohydium, Lindl. (Umbellif.).
Lehmannii Bunge, II. cc. 6 ; et 151.—Turkestan.

EREMODENDRON, DC. ex Meissn. Gen. 292 (1840) = Eremophila, R. Br. (Myoporin.).
Cunninghamii,. DC. ex Meissn. Gen. Comm. 201 = Eremophila oppositifolia.

EREMOGONE, Fenzl, Verbreit. Alsin. IS. tab. ad p. 18 (1833) = Arenaria, Linn. (Caryophyll.).
airaefolia, Fenzl, ex Steud. Norn. ed. II. i. 566 = A. lychnidea.
capillaris, Fenzl, Verbreit. Alsin. 37-A. capillaris.
Cephalotes, Fenzl, L e t ad p. 46-A. Cephalotes.
cucubaloides, Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 401 = A. cucubaloides.
davurica, Fenzl, Verbreit Alsin. 37=A. juncea.
formosa, Fenzl, 1. c. - A. capillaris.
Gmelini, Fenzl, 1. c. t. ad p. 18-Gypsophila Gmelini.
graminea, C. A. Mey. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 7-A. graminea.
graminifolia, Fenzl, Verbreit. Alsin. 87 = A. gramini**folia, *Schrad.***
gypsophiloides, Fenzl, 1. c. t ad p. 67-A. gypsophi**loides.**
Holostea, Rupr. Fl. Caucas. 217=A. Holostea.
juncea, Fenzl, Verbreit. Alsin. 37=A. juncea.
longifolia, Fenzl, 1. c. = A. saxatilis.
lychnidea, Rupr. Fl. Cauc. 219 = A. lychnidea.
micrantha, Schur, Enum. PI. Transs. 912, Index=A. graminifolia, *Schrad.*
nardifolia, Fenzl, Verbreit Alsin. 87 = A. capillaris.
otitoides, Fenzl, 1. c.=A. otitoides.
procera, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 88—A. graminifolia, ***Schrad.***
pungent, Fenzl, Verbreit. Alsin. t ad pp. 67 et 69 = A pungent.
rigida, Fenzl, 1. c t. ad p. 46 = A. rigida.
stenophylla, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 7 •= A. graminifolia, *Schrad.*
subulata, Fenzl, Verbreit. Alsin. 87 = A. subulata.

EBEMOLAENA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1884) 413. ***CHLAENACEAE.***
Humblotiana, *Baill. 1. c.*—Madag.

EBEKOIiSPIB, Griseb. in Goett. Abh. vi. (1854) 124. *LORANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 215.
IXIDIUM, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 130. t. 31 (1868).
punctulata, *Griseb. 1. c.*—Chili,
verrocosa, *Griseb. 1. c.*—Chili.
Wrightii, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 192.—Cuba.

EBBMOPANAX, Baill. Adansonia, xii. (1878) 158. ***ARALIACEAE.***
angustata, *Baill. I. c.* 159.—N. Caled,
Balansae, *Baill. I. c.* 160.—N. Caled.
otopyrena, *Baill. 1. c.* 158.—N. Caled.
Vieillardi, *Baill. 1. c.* 161.—N. Caled.

EBEMOPHILA, R. Br. Prod. 618 (1810). *MYOPORINEAE,* Benth. *to* Hook. £ ii. 1125.
EREMODENDRON, DC. ex Meissn. Gen. 292 (1840).
STENOCHILUS, R. Br. Prod. 517 (1810).
adenotricka, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, v. 15 = Pholidia adenotricha.
albicans, b Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. ii. (1859) 297 = Brownii.
altemifolia, if. *Br. Prod.* 618.—Austral.
arborescens, A. Cunn. ex A. DC. in DC. Prod. xl. 718 = oppositifolia.
Beckeri, F. Muell. Fragm. i. 166-Myoporum Beckeri.
Behriana, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. iii. (1869) 296-Pholidia Behriana.
Berryi, *F. Muell. Fragm.* viii. 228.—Austral,
bignoniflora, ***F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.*** **iii.** (1859) 294.—Austral.
Bowmani, *F. Muell. Fragm.* ii. 139.—Austral.
brevi/olia, F. Muell. Census, 104-Pholidia brevifolia.
Brownii, ***F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.*** **iii. (1859)** 297.—Austral.
Christophori, *F. Muell. Fragm.* ix. 120.—Austral.
Clarkei, *Oldfield (f F. Muell. I. c.* i. 208.—Austral.
crassifolia, F. MuelL in Proc. Roy. Soc. Tasm. iii. (1859) 297 = Pholidia crassifolia.
Cunninghamii, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 84 = oppositifolia.
Dalyana, F. Muell. Fragm. v. 22 = Pholidia Dalyana.
Delisserii, F. Muell. 1 c 108. t. 41 - Pholidia Delisserii.
Dempsteri, *F. Muell. 1. c.* x. 80.—Austral.
densifolia, F. Muell. 1. c. iL 160 = Pholidia densifolia.
denticulata, *F. Muell. 1. c.* i. 126.—Austral.
divaricata, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Tasm. iii. (1869) 293 = Pholidia divaricata.
Drummondi, *F. Muell. Fragm.* vi. 147.—Austral.
Duttoni, ***F. Muell. Rep. Babb. Exped.*** **16.—Austral.**
Elderi, *F. Muell. Fragm.* viii. 228.—Austral,
eriocalyx, *F. Muell. 1. c.* i. 236.—Austral,
exilifolia, *F. Muell. I. c.* x. 88.—Austral.
Forrestii, *F. Muell. I. c.* vii. 49.—Austral.
Fraseri, *F. Muell. I. c.* xi. 61.—Austral.
Freelingii, ***F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.*** **iii.** (1869) 295.—Austral.
gibbosifolia, F. Muell. Rep. Babb. Exped. 18-Pholidia gibbifolia.
Gibsoni, *F. Muell. Fragm.* viii[1]. 227.—Austral.
Gilesii, *F. Muell. I. c.* 49.—Austral.
Goodwinii, ***F. Muell. Rep. Babb. Exped.*** **17.—** Austral.
graciliflora, *F. Muell. Fragm.* i. 208.—Austral.
Grahamii, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. iii. (1859) 297-Brownii.
Hughesii, *F. Muell. Fragm.* viii. 228.—Austral.
imbricata, F. Muell. Census, 10*-Pholidia imbricata.
incana, F. MuelL in Proc. Roy. Soc. Tasm. iii. (1859) 297-Brownii.
Laanii, ***F. Muell. in Melb. Chemist*** **(Jan. 1885).—** Austral,
latifolia, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 428.— Austral.
Latrobei, ***F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.*** **iii. (1859)** 294.—Austral.
leucophylla, *Benth. Fl. Austral,* v. 18.—Austral.
longifolia,/[1]. *Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.* **iii. (1859)** 295.—Austral.
Macdonellii, *F. Muell. Rep. Babb. Exp.* 18.—Austral.

EREMOPHLT.A:-
Mackinlayi, *F. Muell. Fragm.* iv. 80.—Austral,
maculata,^. *Muell. in Proc.Roy. Soc. Tastn.* iii. (1859) 297.—Austral.
Maitlandi, *F. Muell. ex Smth. Ft. Austral,* v; 19.—Austral.
microtheca, F. Muell. ex Benth. 1. c. 14-Pholidia microtheca.
Milchem, Benth.inMitck. Trap. Austral. SI.—Arntoal.
myoporoides, F. Muell. Fragm. v. 23 -• Myoporum laxiflorum.
Oldfieldii, *F. Muell. 1. c.* i. 208.—Austral,
oppositifolia, *R. Br. Prod.* 618.—Austral,
l'aisleyi, *F. Muell. Rep. Babb. Exped.* 17.—Austral.
Pantoni, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 251.—Austral.
platycalyx, *F. Muell. Fragm.* v. 109.—Austral,
polyclada, *F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.* iii. (1859) 294.—Austral.
racemosa, F. Muell. 1. c. 297 -=maculata.
resinosa, F. Muell. 1. c. 296=Pholidia resinosa.
rotundifolia, *F. Muell. Fragm.* i. 207.—Austral.
santalina, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. iii. (1859) 296 = Pholidia santalina.
scoparia, F. Muell. 1. c. 296 = Pholidia scoparia.
strongylophylla, *F. Muell. Fragm.* x. 87.—Austral.
Sturtii, *R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral,* ii. *App.* 85.—Austral.
subfloccosa, *Benth. Fl. Austral* v. 28.—Austral.
tuberculata, F. Muell. in Proc. Roy. Soc Tasm. iii. (1859) 294 = Latrobei.
Turtoni, *F. Muell. Fragm.* x. 87.—Austral,
viscida, *Endl. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 208.—Austral.
viscosa, Steud. Nom. ed. II. i. 566, sphalm. = praec.
Weldii, *F. Muell. Fragm.* vii. 108.—Austral.
Willsii, *F. Muell. I. c.* iii. 21. t. 20.—Austral.
Woollsiana, F. Muell. 1. c. i. 125. t. 7-Pholidia Woollsiana.
Youngii, *F. Muell.I. c.* x. 16,—Austral.

EREMOPYRUM, Jaub. fcSpach, Illnstr. iv. 26 (1850-58) =Agropyron, J. Gaertn. (Gramin.1.
cristatum, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 108 = A. cristatum.
orientate, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 26 = A. orientale.
squarrosum, Jaub. & Spach, 1. c. 28 = A. patulum.

EREMOPYXIS, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 328-Thryptomene, Endl. (Myrtac).
camphorata, Baill. 1. c.829 = T. saxicola.

EREMOSPABTON, Fisch. & Mey. Enum. PI. Schrenk, 75 (1841). *LEGUM1NOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 504.
aphyllum, *Fisch. if Mey. I. c.* 76.—Reg. Casp.
turkestanum, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xv. (1883) 252.—Turkestan.

EBEMOSPATHA, Mann & H. Wendl. in Kerch. Palm. 244 (1878). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 936.
cuspidata, *Mann &• H. Wendl. I. c*—Afr. trap.
Hookeri, *Mann VH. Wendl. 1. c*—Afr. trop.
macrocarpa, *Mann V H. Wendl. I. c.—Ab.* trop.

EREMOSPORUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Se>. II. v. (1836) 355; et Hist. Vég. Phan. v. 375 (1836)= Hypericum, Toum.
Olivierii, Spach, 11. cc = H. Olivieri.

EBEMOSTACHYS, Bunge, in Ledeb. Fl, Alt. ii. 414 (1830). *LABI ATAE,* Benth. & Hook f. ii. 1215.
CLUERIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 87 (1836).
acanthocalyx, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 49.—Beluchist.
sidenaotha, *jaub. b" Spach, Illustr.* iv. 13. t. 412.—Persia,
affinis, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1844) 211.—Soongaria.
aralensis, *Bunge, Lehm. Rel. Bot.* 266.—Turkestan.
Bungei, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 880.—Persia.
discolor, *Bunge, Lab. Persic.* 79.—Persia,
diversifolia, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 380.—Kokania.
fulgens, *Bunge, Lab. Persic.* 80.—Persia.

EBEMOSTACHYS:—
glabra, *Boiss. ex Benth. in DC. Prod.* xii. 648.—Persia,
gymnocalyx, *Schrenk, Enum. PL Nov.* 34.—Turkestan,
hyoscyamoides, *Boiss. b" Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 181.—Persia.
iberica, Vis. Sem. Rar. Patav. (1846) 64; et ex Jaub. & Spach, Illustr. v. 13=laciniata.
iliensis, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 376.—Turkestan.
Kaufmanniana, *Regel, I. c.* 379—Turkestan.
Krauseana, *Regel, 1. c.* 878.—Turkestan,
labiosa, *Bunge, Lab. Persic.* 79.—Persia.
laciniata, Aitch. Cat. PI. Panjab et Scinde, 118 = acanthocalyx.
laciniata, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 416.—As. Min.; Syria.
laevigata, *Bunge, Lab. Persic.* 81.—Persia.
Lehmanniana, *Bunge, I. c.*—Turkestan,
loasaefolia, *Benth. in DC. Prod.* xii. 647.—Afghan.
macrochila, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. v. 13 = laciniata.
macrophylla, *Montbr. 6" Auch. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. vi. (1836)54.—As. occ.
molucelloides, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 415.—Sibir.
napuligera, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. xviii. (1884) 237.—Turkest.
Nerimani, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 50.—Persia.
Olgae, *Regel, PL Nov. Fedsch.* 70.—Turkestan,
paniculata, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 381.—Turkestan,
phlomoides, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 414.—Reg. Caucas.; Sibir.
pulvinaris, *Jaub. & Spach, Illustr.* v. 13.—Persia.
pyramidalis, Jaub. & Spach, 1. c.t. 462 = macrophylla.
rotala, *Schrenk, ex Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. *Suppl.* 8, 11.—Soongaria.
sanguinea, *Jaub. V Spach, Illustr.* v. 18.—Hab. ?
Sewerzovii, *Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1868) I. 392.—Turkestan.
speciosa, *Rupr. Sert. Tiansck.* 68.—As. centr.
Stocksii, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 48 •= loasaefolia.
superba, Bunge, Lehm. Rel. Bot. 265 = Lehmanniana.
superba, *Royle, ex Benth. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 381.—Reg. Himal.
thyrsiflora, *Benth. in DC. Prod.* xii. 548.—Afghan.
Toumefortii, *Jaub. V Spach, Illust.* iv. 12. t. 412.—As. Min.
transoxana, *Bunge, Lehm. Rel. Bot.* 265.—Turkestan,
tuberoba, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 416.—Reg. Caucas.; Sibir.
Vicaryi, *Benth. in Aitch. Cat. PI. Panjab et Scinde,* 119.—Ind. bor. occ.

EREMOSYCE, Steud. Nom. ed. II. i. 666 (1840) -seq.

EBEMOSYNE, Endl. in Enum. PI. Hueg. 53 (1837). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 635.
pectinata, *Endl. I. c*—Austral.

EBEMUBTJB, Bieb. Cent. PI. Ross. t. 61 (1818). *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 787.
AMMOLIRION, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1842) 515.
HENNINGIA, Kar. & Kir.l. c 516 (1842).
SELONIA, Regel, 1. c. xii. (1861) I. 457.
Aitchisoni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 102.—Afghan.
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 668.—As. centr.
albocitrinus, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 17.—Oriens.
altaicus,5tnr. *in Bull. Soc. Nat. Mosc.* iv. (1882) 255.—Soongar.; Sibir.
angustifolius, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 282.—Persia; Afghanist
anisopterus, *Regel, Gartenfl.* (1873) 260.—Oriens.
Aucherianus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 120.—Persia ; Turkest.
aurantiacus. Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 285 = Bungei.
bachtiaricus, *Boiss. Fl. Orient,* v. 323.—Persia,
bucharicus, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 670.—Bokhara.
Bungei, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 17.—Persia,
cappadocicus, *J. Gay, ex Baker,in Journ. Linn. Soc.* XT. (1876) 281.—As. Min.

EBEMTTBU8 :—
Capusi, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xviii. (1884) 260.—Turkestan.
caucasicus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1882) 261=spectabilis.
Griffithii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 283.—Afghan.
himalaicus, *Baker, 1. c.*—Reg. Himal.
inderiensis, *Regel, Gartenfl.* (1873) 259.—Sibir.; Turkestan.
Kaufmanni, *Regel, 1. c.* 260.—Turkestan.
Karolkowi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 116.—Turkestan.
libanoticus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 97 =spectabilis.
luteus, *Baker, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 18.—Persia.
Olgae, *Regel, Gartenfl.* (1873) 260.—Turkestan.
pauciflorus, Baker, in Joum. Bot. xvii. (1879) 18-persicus.
persicns, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 191.—Persia; Afghan.
robustus, *Regel, Gartenfl.* (1873) 267.—Turkestan.
sibiricus, Weinm. Hort. Paulowsk. 167; ex Schult. f. Syst. vii. 483 = spectabilis.
spectabilis, *Bieb. PI. Ross.* 2. t 61.—As. Min.; Persia.
spectabilis, Ledeb. Fl. Alt. ii. 25 = altaicus.
stenophyllus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 281.—Persia.
Stocksii, *Baker, I. c.* 288.—Beluchistan.
Suworowi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (18S4) 672.—As. centr.
tauricus, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* iv. (1882) 253.—Tauria; Persia; Soongar.
tauricus, Weinm. Hort. Paulowsk. 167; ex Schult. f. Syst. vii. 488 = spectabilis.
turkestanicus, *Regel, Gartenfl.* (1873) 260.—Turkestan.
veluttnus, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 217=persicns.

ERESDA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 101 (1889) = Beseda, Linn.
alba, Spach, L c. 102=R. alba.

ERES1MUS, Ra6n. Sylva Tellur. 60 (1888) = Cephalanthus, Linn. (Rubiac).
stellatus, Rafin. 1. c. 61 - C . stellatus.

KRETIA, Stokes, Bot. Mat. Med. i. (1812) 421 = Ehretia, Linn. (Boragin.).

ERHARTA, Juss. Gen. 32 (1789)«Ehrharta, Thunb. (Gramin.).

ERHETIA, Hill, Hort. Kew. 440 (1769)=Ehretia Linn. (Borag.).

EKIA, Lindl. BoL Reg. t. 904 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 509.
AGGEIANTHUS, Wight, Ic. v. 18. t 1737 (1852).
ALVISIA, Lindl. Fol. Orch. (1859).
BRYOBIUM, Lindl. Introd. Nat. Syst ed. II. 446 (1836).
CAIAOSTYLIS. Blurae, Bijdr. 340. t. 74 (1825).
CERATIUM, Blume, I. c. 341. t. 46 (1825).
CONCHIDIUM, Griff. Notul iii. 321. t. 310 (1861).
CYLINDROLOBDS, Blume, Praef. Fl. Jav. 6 (1828).
DENDROLIRIUM, Blume, Bijdr. 343. t. 69 (1825).
ERIOXANTHA, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 247.
EXERIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1836).
LICHENORA, Wight, Ic. v. t. 1788 (1852).
MYCAKANTHES, Blume, Bijdr. 352. t. 57 (1825).
OCTOMERIA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 81 (1825).
PORPAX, Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 68.
PINALIA, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 31, in syn. (1825); Lindl. Orch. Seel. 21 (1826).
TRICHOSIA, Blume, Bijdr. Tabellen, 11 (1825).
TRICHOTOSIA, Blume, Bijdr. 342 (1825).
TYLOSTYLIS, Blume, Praef. Fl. Jav. 6 (1828).
XIPHOSIUM, Griff. Itin. Not 78 (1848).
abbreviata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 68.—Java,
acervata, *Lindl. in Joum. Hort. Soc.* vi. (1861) 57.—Reg. Himal.
aeridostachya, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 803, sphalm. = aëridostachya.
acuminata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 69.—Java,
acutifolia, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 38.—Ind. or.

acutlssima,#«eA*./.i« *Card. Chron.* (1876) I. 567.—Hab. ?
aeridostachya, *Reichb. /. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **iii. (185!)) 48;** *et in Seem. Fl. Vit.* **801.—** Malaya; Ins. Fiji.
affinis, Griff. Notul. iii. 297 = bractescens.
alba, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **67.—Reg. Himal.**
albidotomentosa, *Lindl. 1. c.* 66__Java.
Ambrosia, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 232 (Bulbophylli sp.).—China.
arnica, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 162.—Reg. Himal.
angulata, *Reichb.f. in Flora,* lv. (1872) 275.—Ind. or.
Ania, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 270 = Tainia latifolia.
annulata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 184.- Java.**
annulata, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1858) 57 = rnfinula.
aporoides, *Lindl. in Journ. Linn. Soe.* iii. (1859) 60.—Ins. Philipp.
appendiculata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 69.—Java.
armeniaca, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 88. t. 42= omata.
articulata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 47.—Zeylan.
bambuafolia, *Lindl. I. c.* 61.—Reg. Himal.
barbarossa, *Reichb. f. in Hamb. Garten*,* **xvi. (1860)** 42O.-Hab. J
barbata, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 270.—Reg. Himal.
Barringtoniana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1872) 666.—Borneo.
bicolor, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **65.—Zeylan.**
bicolor, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 58 = Undleyi.
oicornis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 269-Tainia bicornis.
bicristata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 67.—Java,
bifalcis, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 56.—Borneo.
biflora, *Griff. Notul.* iii. 3O2.-Reg. Himal.
biflora, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **iii. (1859) 56.—** Malacca,
bigibba, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) II. 680.—Borneo,
bipnnctata, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 83.—Reg. Himal.
traccata, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 262=reticosa.
braccata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 46.—Zeylan.
l>rachystachya,tf«V*A./. *in Bmplandia,* iii. (1856) 223.—Ins. Philipp.
bractescens, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 18.-Burmaj Malaya,
canaliculata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 184.—** Borneo,
capitellata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1858) 57.—Java,
carinata, *Gibson, in Cnlc. Journ. Nat. Hist. v.* **(1845)** 866.—Reg. Himal.
carinata, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 301 - Thelasis carinata.
Carolettae, *Hance, in Journ. Bot.* xv. (1877) 887.—Cambodia ?
cauligera, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 55 = Phreatia cauligera.
ciliata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 659.—Java.
dadophylax, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 54 (Phreatiae sp.).—Ins. Carol,
davicaulis, *Wall, ex Lindl. Bot. Reg.* **(1840)** *Mite.* 90—Reg. Himal.
clavicaulis, *Wall, ex Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **iii. (1858) 59** *{non Bot. Reg.)—Keg.* **Himal.**
cochleata, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 14.—Ins. Philipp.
compn-sia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 182;** *Reichb. f. in Bonplandia,* **v. (1857) 55.—Java,**
concolor, *Par.* **&•** *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* **xxx.** (18741 148.—Burma,
convallarioides, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 70.-Reg. Himal.
coriacea.tfnVAA./. *in Bonplandia,* v. (1867) 64.—Java.
Corneri, *Reichb. f. in Gard. Chron.* **(1878) H. 106.**—Ins. Formosa.
toronaria, Reichb. f. in Walp. Ann.vi.271-Trichosma suavis.
Curtisii, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (l«80) n. 686.—Borneo.

EBIA:—
cylindripoda, Griff. Notul. iii. 299 = Trichosma suavis.
Dalzelli, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1858) 47.—Ind. or.
dasyphylla, *Par. tf Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* **xxx.** (1874) 147.—Reg. Himal.; Burma,
dasypus, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxii. (1864) 415.—Burma.
Dayana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* **(1877) II. 102.—** Ind. or.
dendrophylax, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 54 (Phreatiae sp.).—Ins. Carol,
densiflora, *[Lodd. Cat. Orch.* **6];** *Lindl. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 688.—Ind. or.
Dillwynia, Hook. Bot. Mag. t. 4163 = bractescens.
discolor, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 61.—Keg. Himal.
ebulbis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **69.—Java,**
ebarnea, *Reichb. f. in Hamb. Garten*,* **xv. (1859) 56.**—Ind. or.
elegant, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 301=Phreatia elegans.
elongata, *Blume, Mus. Bot.- Lugd. Bat.* **ii. 188.—Java.**
elongate, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 49.—Burma.
Elwesii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) I. 404= E. Meirax.
Ephemera, Reichb. f. in Walp. Ann. vi 272 = Lindleyi.
crecta, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **68.—Java,**
eriopsidobulbon, *Par. tf Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 148.—Burma.
excavata, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1974.—Reg. Himal.
extinctoria, *Oliver, in Hook. Bot. Mag.* **t. 5910.—** Burma.
ferox, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 184.—Malaya,**
ferrnginea, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) t. 35.—Reg. Himal.
ferruginea, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. U862) 312.—Java.
filiformis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 268 = Dahelli.
Kitealani, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* **ii.** (1882) 252.—Austral.
flava, Griff. Notul. iii. 301-elongata.
flava, *Lindl. in Wall. Ca'.* n. 1973.—Reg. Himal.
flavescens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 66.—Java,
floribunda, *lindl. in Wall. Cat.* n. 7408.-Malaya,
fragrans, *Reichb./. in Bot. Zeit.* xxii. (1864) 415.—Burma.
fusca, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 183.—Java,**
gladiata, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* **300.—N. Zel.**
graminifolia, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 54.—Reg. Himal.
Griffithii, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 162, 163.—Bnrma.
hemilaena, *Reichb. f. in Hamb. Garten*,* **xix. (1863)** 11.—Java,
hirta, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 184.—Ins.** Celebes.
hologlossa, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 148 (-Tainiaesp.).—Burma,
hyacinthoides, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 68'.—Java,
ignea, *Reichb. /. in Gard. Chron.* **(1881) 1. 782.—** Borneo.
javensis, *Zoll. V Mor. Syst. Vert. Zoll.* **86.—Java.**
Jerdoniana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 267 = £. Lichenora.
hhasiana, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1869) 59 = clavicaulis.
Kingii, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* **ii. (1882)** 71.—Ins. Salomon,
lamorganensis, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 55.—Java.
lanata, Griff. Notul. iii. 301 = flava.
laniceps, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xix. (1863) 10 »= fiva
latifolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 183 = sumatrana.
latifolia, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 55.—**Java.**
laxiflora, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 665-Phieatia laxiflora.
Ieiophylla, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 57.—Borneo.
leucostachya, Lindl. in Jonm. Hort. Soc iii. (1848) p. xv-floribunda.
leucoxantha, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1880) II. 388-Tainia latifolia.

EBIA:—
Lichenora, *Lindl. in Journ. Linn. See.* iii. (1859) 46.—Ind. or.
limenophylax, *Reichb./. in Bonplandia,* v. (1857) 54.—Java.
limenophylax, Reichb. f. Xenia Orch. ii. »7. t. 130 partims Phreatia limenophylax.
Lindleyana, Griff. Notul. iii. 800=obesa.
Lindleyi, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 299.—Zeylan.
lineata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **iii. (1859) 63.—** Java,
lineoligera, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1885) II. 262.—Siam.
littoralis, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 312.—Malaya.
lobata, *Reichb./. in Bonplandia,* v. (1857) 55.—Java,
longicaulis, *Teijsm.* **b"** *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 313.—Malaya,
longilabris, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 38.—Ins. Philipp.
Matthewsi,#«VAA./. *Otia Bot. Hamb.* 55.—Ins.Tahiti.
Meirax, *N. E. Br. in Gard. Chrdn.* (1880) II. 603.—Burma,
merguensis, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **iii. (185!*)** 52.—Bnrma.
raicrantha, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 68.—Java.
microchips, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1869) 47 = Dalzelli.
Microditis, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit 301 = Phreatia Microditis.
microphylla, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 184.—** Java.
minutiflora, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 801=Phreatia minutiflora.
monostachya, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **iii. (1859)** 55.—Java,
mucronata, *Lindl. Bqt. Reg.* (1842) *Misc.* 25.—Ins. Philipp.
multiflora, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 68.—Java,
muscicola, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 47.—Reg. Himal.; Zeylan.
Myosurus, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1867) 54 = Phreatia Myosurus.
Myosurus, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 300 = Oberonia Myosurus.
myristicaeformis, *Hoot. Bot. Mag.* t 5415.—Burma,
mysorensia, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 54.—Ind. or.
nana, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xi. (1842) l'J.—Ind. or.
nutans, *Lindl. Bot. Reg.* **(1840)** *Misc.69.***—Malaya,**
obesa, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1976.—Burma,
obliqua, *Lindl. in Journ. Linn. Soe.* **iii. (1859) 55;** *Reichb./. in Walp. Ann.* **vi. 271—Singapore,**
oblitterata, *Reichb./. in Bonplandia,* v. (1857) 65.—Java,
odoratissima, *Teijsm. tf Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 17.—Sumatra.
oreophylax, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 55 = Phreatia oreophylax.
ornata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **66.—Java,**
ornata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **iii. (1869) 48** *(non Gen. et Sp. Orch.).—Keg.* **Himal.**
ovata, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) sub t. 29.—Ins. Philipp.
pachystachya, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 60.—Java.
paleata, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 87 = Phreatia paleata.
paniculata, *Lindl. in Wall. PI. As. Rar.* **i. 82. t. 36.—** Reg. Himal.
paniculata, Reichb. f. ex Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 55 = monostachya.
pannea, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 64.—Rec. Himal.; Malaya.
Parishii, *Lindl. b" Reichb. /. in Trans. Linn. Soc,* xxx. (1874) 147.—Burma,
pauciflora, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 183.—** Java.
pauciflora, *Wight, Ic.* v. I. 4.1.1686.—Ind. or.
paucifolia, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 270.—Java.
perpusilla, Par. & Reichb. f. in Trans, Linn. Soc. xxx (1874) 148 iPhreatiae sp.j.-Burma.
planicaulis, Wall, ex Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 8 = Agrostophyllum khasiyanum.
Pleurothallis, *Par. W Reichb./. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 147.—Burma.
plexauroides, Reichb. f. in Bonplandia, y. (1857) 54 (Phreatiae sp.).—Ins. Samoa.

EBIA:
polystachya, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xv. (1841) 20. t. 9.—Ind. or.
polystachya, Wight, Ic. v. I. 4. t. 16S4 (sphalm. nomen textu) =pubescens.
polyura, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 55.—Ins. Philipp.
profusa, *Lindl, I. c.* (18421 *Wise.* 2.—Zeylan.?
prorepens, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 54«Phreatia prorepens.
pùbescens, Lindl. in Bot. Reg. sub t. 904 = flava.
pubescens, *Wight, Ic.* v. I. t. 1684 (polystachya).—Ind. or.
pulchella, Griff. Notul. iii. 297 = Griffithii.
pulchella, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7407.—Malaya,
pulvinata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 56.—Burma,
pumila, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 1972.—Reg. Himal.; Burma,
pusilla, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 48.—Reg. Himal.
pusilla, *Teijsm. (f Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (.1*62) 312.—Java.
Reinwardtii, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 55.—Java.
reticosa, *Wight, Ic* v. 1.4. t. 1637.—Ind. or.
reticulata, *Benth. V Hook./. Gen.* iii. 509.—Ind. or.
retroflexa. *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 60.—Ins. Philipp.
retnsa, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 64.—Java,
rhodoptera, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1882) II. 586.—Hab.?
Kichardiana, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 300.—N. Zel.
rigida, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 183.—Borneo.
rigida, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 65 = . pulchella.
Rimanni, *Reichb. f. in Card. Chron.* (1885) II. 712.—Burma,
lingens, *Reichb. f. in Bonplandia,* iii. (1855) 222.—Burma.
robusta, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 69.—Java,
rosea, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 978.—China.
rosea, Wall. Cat. n. 7409—carinata.
rostriflora, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 301.—Ins. Fiji,
rubiginosa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 184.—Borneo,
rnfinnla, *Reichb. f. in Hamb. Gartens,* xix. (1863) 13.—Reg. Himal.
rugosa} Lindl. Gen. et Sp. Orch. 66 = stellate,
scabrilinguis, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 51.—Reg. Himal.
sclerophylla, *Lindl. 1. c.* 56.—Java,
secunda, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 54.—Java.
secundiflora, Griff. Notul. iii. 302=stricta.
sicaria, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii (1859) 50.—Burma.
sinica, *Lindl. I. c.* 48.—China,
sonkaris, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 65.—Java.
speciosa, Reichb. f. in Walp. Ann. vL 269«=Tainia speciosa.
sphaerocarpa, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 301.—Ins. Fiji.
sphaerochila, Lindl. in Joum. Linn. Soc. iii (1859) 54 =excavate.
stachyurus, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 301=Phreatia Myosurus.
stellate, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 904.—Ins. Philip,
stenostachya, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 301.—Ins. Fiji.
stricta, *Lindl. Coll. Bot.* t. 41 R—Reg. Himal.
suavis, Lindl. in Joum. linn. Soc. iii. (1859) 52= Trichosma suavis.
sulcata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 69.—Java,
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 658.—Sumatra,
sumbawensis, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 65.—Java.
tahitensis, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 87; et in Seem. Fl. Vit. 301 (1868) = Phreatia tahitensis.
teretifolia, Griff. Notnl. iii. 298 = pannea.
Thwaitesii, *Trimen, Cat. PI. Ceyl.* 88.—Zeylan.
tomentella, Reichb. f. in Walp. Ann. vL 271-javensis.
tricolor, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 429.—Zeylan.
trilophota, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 54.—Borneo,
truncate, *Lindl. I. c.* 58.—Burma.

ERIA:-
uniftora, Dalz. in Hook. Kew Joum. iv. (1862) 111 = braccata.
ustulata, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 147.—Burma,
vaginata, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 8O3.-Java.
valida, *Lindl. I. c.* iii. (1859) 60.—Java.
veli/era, Wight, ex Lindl. 1. c. 46 = braccata ?
velutina, *Lodd. ex Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 86.—Singapore.
velutina, Thw. Enum. PI. Zeyl. 299 = Thwaitesii.
veslite, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) 79.—Malaya.
Vieillardi, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 86.—N. Caled.
vittata, *Lindl. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 51.—Reg. Himal.
Vrieseana, *Reichb./. in C.Koch, Allg.Gartent.* (1858) 879.—Malaya,
vulpina, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1855) 222.—Ins. Philipp.
Wightii, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 270-Tainia bicomis.
Zollingeri, *Reichb. /. in Bonplandia,* v. (1857) 55.—Java.

EBIACHAEJNIUM, Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1855) 120. *COMPOSITAE,* Benth. *it* Hook. f. ii. 456.
magellanicum, *Sch. Bip. I. c.* 121.—Reg. Magell.

ERIACHNE, R. Br. Prod. 183 (1810). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1155.
ACHNERIA, Beauv. Agrost. 72 (1812).
MEGALACHNE, Thw. Enum. PI. Zeyl. 872 (1864).
agrostidea, *F. Muell. Fragm.* vii. 82.—Austral,
ampla, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 277.—Afr. austr.
aristidea, *F. Muell. Fragm.* v. 205.—Austral.
Armitii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 627 (Armittii.).—Austral.
assimilis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 236.—Afr. anitr.
aurea, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 276.—Afr. austr.
avenacea, *R. Br. Prod.* 184.—Austral.
brem/olia, R. Br. 1. c.=mncronata.
capensis, *Steud. in Flora,* xii (1829) 470.—Afr. austr.
capillaris, *R. Br. Prod.* 184.—Austral.
chinensis, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (18f61) 228 = pallescens.
dliata, *R. Br. Prod.* 184.—Austral.
Ecklonii, *Nees, Fl. A/r. Austr.* 278.—Afr. austr.
festucacea, *F. Muell. Fragm.* v. 205.—Austral,
glauca, *R. Br. Prod.* 184.—Austral,
gracilis, *Brongn. in Duperr. Voy. Bot.* 25.—Ins. Molucc.
Hookeri, Munro, in Joum. Linn. Soc vi. (1862) 42-pallescens.
malouinensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 236.—Reg. Magell.
melicacea, *F. Muell. Fragm.* v. 205.—Austral,
microphylla, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 277.—Afr. austr.
montana, Steud. Norn. ed. II. i. 567, sphalm.=Panicum nubigenum.
mucronata, *R. Br. Prod.* 184.—Austral,
obtusa, *R. Br. 1. c.* 184.—Austral,
ovata, *Nees, in Hoot. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 416.—Austral.
pallescens, *R. Br. Prod.* 184.—Austral,
pallida, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii.681.—Austral.
pallida, *Nees, Ft. A/r. Austr.* 275.—Afr. austr.
Preissiana, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 102 = ovata.
rara. *R. Br. Prod.* 183.—Austral,
scleranthoides. *F. Muell. Fragm.* viii 233.—Austral.
Schulttiana, F. Muell. 1. c. 137-stipacea.
setacea, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 629.—Austral.
squarrosa, *R. Br. Prod.* 183.—Austral.
Steudelii, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 278.—Afr. austr.
stipacea, *F. Muell. Fragm.* v. 206.—Austral,
strieta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 237.—Hab. 1
triseta, *Nees, ex Steud. I. c*—Afr. austr.
tuberculata, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 274.—Afr. austr.

ERIACHNE, PhiL Sert. Mend. Alt. 49 (1871) = Panicum, Linn. (Gramin.).
rigida, Phil. 1. c. 50 = P. Phaeotena.

ERIADENIA, Miers, Apocyn. S. Am. 117 (1878). *APOCYNEAE.*
obovata, *Miers, 1. c.*—Am. austr.

ERIANDRO8TACHYS, Baill. AdansonU, xi. (1874) 289. *SAPINDACEAE.*
Chapelieri, *Baill. I. c*—Madag.

ERIANTHERA, Benth. in Hook. ~*BaL* Misc. iii. (1838) 880-Iiamium, Tourn. (Labiat.).
rhomboidea, Benth. 1. c. = L. rhomboideum.

ERIATHERA, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 77 (1832) =Andrographis, Wall. (Acanthac).
lobelioides, Nees, 1. c. 115 = A. echioides.
Neesiana, Wight & Am. ex Nees, in DC. Prod. xi. 514 =A. serpyllifolia.
serpyllifolia, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 115 = A. serpyllifolia.

ERIANTHUS, Michx. Fl. Bor. Am. i 54 (1803). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1126.
RIPIDIUM, Trin. Fund. Agrost. 169 (1820).
alopecuroides, Ell. Sketch, 38-saccharoides.
angustifolius, Nees, Agrost Bras. ii. 316 = saccharoides.
articulatus, F. Muell. Fragm. viii. lls=PolIinia articulate.
asper, *Nees, Agrost. Bras.* ii. 816.—Bras.; Paraguay.
aureus, Beauv. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 324 = Polllnia aurea.
aureus, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 412-PoIlinia Cumingii.
brasilianus, Anderss. in Ofvers. Vet. Akad. Stockh. (1855) 162 = asper.
brevibarbis, Michx. Fl. Bor. Am. i 55 = saccharoides.
capensis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 98.—Afr. austr.
contortus, Baldw. ex Ell. Sketch, i. 140=saccharoides.
Cumingii, F. Muell. Fragm. viii. 118=Pollinia Cumingii.
cuspidatus, Anderss. in Ofvers. Vet. Akad. Stockh. (1885) 162-asper.
Ecklonii, Nees, Fl. Afr. Austr. 93=capensis.
fastigiatus, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 409.—Ind. or.
filifolius, *Nees, ex Steud. I. c*—Ind. or.
Fischerianus, Rupr. ex Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. III. 258 -- saccharoides.
fioridulus, Anderss. in Ofvers. Vet Akad. Stockh. (1855) 162 = maximus.
fioridulus, Schult. Mant. iii. *56Z = (Miscanthus japonicus).*—Chira; Japon.; Malaya; Polynes.
fulvus, Kunth, Rev. Gram. i. 160=Pollinia Cumingii.
fulvus, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 409.—Reg. Himal.
giganteus, Muhl. Desc. Gram. Uber. 92=saccharoides.
glaums, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 3 (Polliniae sp.).—Java.
hexastachyus, Hochst. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. iv. (1851) (Anal. Bot Ind. ii.) 35-Pollinia argentea.
Hostii, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 648.—Europ. austr.; Oriens.
irritans, Kunth, ReV. Gram. i. 160=Pollinia irritans.
Jacqnemontii, *Munro, ex Duthie, [in Atkins. Gat. N. W. Ind.]* 636.—Ind. or.
jamaicensis, Anderss. in Ofvers. Vet Akad. Stockh. (1855) 16S = Ravennae.
japonicus, Beauv. Agrost. 14 *(—Miscanthus sinensis).*—China,
longesetosus, *Anderss. in Ofvers. Vet. Akad. Stockh.* (1855) 163.—Ind. or.
longisetus, Anderss. ex Benth. in Joum. linn. Soc. xix. (1881)67 = praee.
Mackinlayi, F. Muell. Census, 181-= Pollinia Mackinlayi.
maximus, *Brongn. in Duperr. Voy. Cog. Bot.* 97.—Ins. Polynes.
mollis, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 92.—Reg. Himal.
Monstierii, *Carr. in Rev. Hortic.* (1872) 36.—Olympus,
nepalensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 667.—Reg. Himal.
nudipes, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 92 (Eulaliae sp.).—Ind. or.
orientalis, C. Koch, in' Linnaea, xix. (1847) 5 - Hostii.
pungens, Hochst. ex Krauss, in Flora, xxix. (1846) 117 = capensis.
purpurascens, Anderss. in Ofvers. Vet. Akad. Stockh. (1855) 161 -Ravennae.

EBIANTHUB:—

*R*vegaM,Beauv.Agrost.U.*—Reg. Meditcrr.; Oriens; lad. or.

repens, Beauv. 1. c. (Tricholaenae sp.).—Afr. trop.

Roxburghii, F. Muell. Fragm. viii. 117 - Pollinia argentea.

rufipilus, Griseb. in Goett. Nachr. (1668) 98 = fulvus.

rufus, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 409-Pollinia argentea.

saccharoides, *Afickx. Fl. Bor. Am.* i. 55.—Am. bor. et austr.

saccharoides, Willd. Enum. Hort. Berol. 46 ^ Andro -- pogon saccharoides.

aorghum, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 92.—Afr. austr.

spectosus, Debeaux, in Act. I.imi. Soc Bord. xxxii. (1878) 53 (Polliniaesp.).—China,

strictus, *Baldw. in Ell. Sketch*, i. 89.—Am. bor.

stnctus, Bluff. & Fingerh. Consp. Fl. Germ. ed. II. i. •• 105 = Hostii.

""ctorius, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1880) 384 (Mischanthi sp.).—Japon.

tristachyus, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 241 (Polliniae sp.).—China,

velutinus, *Muttro, ex Duthie, in \Atkins. Ga: N. W.* /«<*.] 636.—Ind. or.

Versicolor, *ffees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 40».—Reg. Himal.

villosus, F. Muell. Fragm. viii. 118-Pollinia Mackin- **leyi.**

»'V/onii, Slend. Nom. ed. II. i. 567=Pollinia villosa.

KRIAXIS,Reichb.f. in Linnaea, xii. (1877) **63=Galeola,** Lour. (Orchid.).

rigida, Reichb. f. 1. c. = G. rigida.

ERICA, [Touni.] Linn. Syst. ed. I (1735). *ERICA-cfAE*, Benth. & Hook. f. ii. 590.

ARSACE, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. - (1869)118-.

CALLISTA, CEKAMIA, CHONA, DASVANTHES, DES-**MIA, ECTASIS, EKtODESMIA, EURYLEPIS, EORY-JOMA, EURYSTEGIA, LAMPROTIS, LOPHANDRA,** OCTOPERA, PACHYSA, SYRINGODEA, D. Don, in _ Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 158-156.

1REMOCALIIS, GYPSOCAIXIS, Salisb: ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 398 (1821).

LOPHARINA, Neck, Elem. i. 215 (1790).

. MICROTREMA, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 499.

ota'tina, Andr. ex G. Don, Gen. Syst iii. 823 = concinna.

"MrtiMa, Berg, Desc. PI. Cap. 105=mammosa.

«kl!. tlna, *Linn*_ S*P*_ *Pl*_ S55_ ~Afr_ austr.

»Orotanoides, *Bttrm.f. Fl. Cap. Prod.* 11.—Afr. austr.

"Oantkioides, Spreng. Syst. ii. 196=scoparia.

"jKinthoides, Linn. Mant. i. 66 = hispidnla.

—Mfe? 01**' E_ Me y- « Klotzsch, in Linnaea, xii. (1*88) 218 = PhilippiaLeeana.

^"modata, *KlotBsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 620.—Afr. austr.

acroph, Fresen. in Flora, xxi. (1888) 604=arborea.

Actaea>^> lino™. Hort. Berol. i. 371=peltata.

Acte". [Forbes] Hort. Eric. Wobum. 1-imbricata.

acu?inata, Andr" Heathery, iii. t. 101 = Massoni.

acu.?a, *Andr. I. c.* i. t. 1—Afr. austr..

*acutangu*s Lodd_ Bot_ Cab_ *• 1868=nigrita.

acutiflora, *Tausch, in Flora*, xxii. (1839) II. 626.—Hab. !

acutifolia, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 651 -purpurea.

*adaequ*** *Tausch, in Elora*, xxiL (1839) "• 6Si~ Hab.!**

adenophora, *Spreng. Syst.* ii. 188.-Afr. austr.

ade Sste *' *Kunae, in LintUKa*> »• 11847) 88.—Afr. asste

**/«««<««, Klotzsch, L c. xii. (1838) 502-Massoni.

adun aen, *?' *Benth_ in DC_ Prod*_ «'• 618.—Afr. austr.

^3^'S, *Benth. 1. c.* 616—Afr. austr.

*TMN *Benth. I. c.* 656.—Afr. austr.

fylfSt"' Roxb_ ex Salisb_ in Tnu>s. Li"11- S00- «•' a11 02) 836-cumuliflora.

Keregata, *Wendl. Eric.* ii. fasc. xm. 11.—Afr. austr.

Aito "'1 Willd_ SP_ P1_ «• 31)8 = E_ Aitocia.

Aitonia, Uasson, in Bot. Mag. t. 429.—Afr. austr.

all*?"""1,1joiA Bot Cab »• 1 « - E. Aitonia.

alt *" ££*". Mant_ "• 231.—Afr. austr.

ens, wunb Prod„PL Cap- 70_Sc ypho gyne incon- »picua?

*ah*bescMi*S) *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 678. 1—Afr. anstr.

«Hida, Thunb! Fl. Cap. ed. Scliult. 847 - albens.

EBICA:—

albiflora, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 674 = mollis.

Alopecias, Tausch, in Flora, xx. (1837) 498=corifolia.

alopecuroides, Lodd. Bot. Cab. t. 874=nudiflora.

alopecuroides, Wendl. Eric. fasc. XX. ii. 119. t. 45 -= iutervallaris.

Alopecurus, *Han. Thes. Cap. i.* 31.—Afr. anstr.

alveiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 366 = gilva.

amabilis, Salisb. 1. c. 385 •= inflata.

ambigua, Wendl. Eric. ii. fast. xvi. 61. t. 2J = Massoni.

amoena, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 829-incamata.

amoena, Wendl. Bot. Beobacht. 48-plumosa.

ampullacea, *Curt. Bot. Mag.* t. 303.—Afr. austr.

ampullacea, Tratt. ex Tausch, in Flora, xvii. (1834) II. 594 = Andre wsiana.

ampullaeformis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 381=ampullacea.

Andrewsiana, *Tausch, in Flora*, xvii. (1834) n. 594.—Hab.!

Andremsii, Klotzsch, in Linnaea, x. (1836) 314 = Massoni.

audromedaeflora, *Andr. Col. Heaths*, iii. t. 146.—Afr. austr.

angustata, *Bartl. in Linnaea*, vii. (1882) 651.—Afr. austr.

angusticollis, Bartl. I. c. 638=Zeyheri.

anthina, Spreng. Syst. ii. 196 = moscbata.

anthura. Link, in Flora, xxviii. (1845) 190-vagans.

aperta, Spreng. Syst. ii. 200 - borboniaefolia.

Aphanes, *Spreng. 1. c.* 196.—Afr. austr.

appressa, *Spreng. 1. c.* iv. *Cur. Post.* 146.—Afr. austr.

approximate^Schlecht. ex Spreng. 1. c. ii. 106 = hispidula.

aprica, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 660-carduifolia.

arachnoidea, Klotzsch, ex Benth. 1. c. 691 = hispidula.

aragonensis, Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 46 = australis.

arborea, Brot. [Fl.Lnsit. ii. 22 t]-lusitanica.

arborea, *Linn. Sp. PI.* 353.—Reg. Mediterr. et Caucas.

arborea, Thnnb. Diss. Eric. 40-strigosa.

Arbuscula, Lodd. Bot. Cab. t. 848-lateralis.

arbutiflora, Wendl. Eric. iii. &sc. xxvi. 10 = triflora.

Archeria, *Andr. Heathery*, i. t. 3.—Afr. austr.

Archeriana, Lodd. Bot. Cab. t. 1466=praec.

arctica, Waitz, Ueschr. Gait. Art. Heid. 189-Phyllodoce taxifolia.

ardens, *Andr. Heathery*, ii. t. 51.—Afr. austr.

argentea, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 686.—Afr. austr.

argentiflora, Andr. Col. Heaths, iv. t. 218 = purpurea.

argutifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 864 = E.Leea.

aristata, *Andr. Col. Heaths*, iii. 147.—Afr. austr.

aristella, *[Forbes] Hort. Eric. Wobum.* 2.—Afr. anstr.

aristifolia, *Niven, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 676.—Afr. austr.

armata, *Klotzsch, ex Benth. 1. c.* 672.—Afr. austr.

armata, Spreng. Syst. ii. 184 = Sparmanni.

artemisioides, K. Mey. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1888) 212 = Salaxis artemisioides.

articularis, Curt. Bot. Mag. t. 423=corifolia.

articularis, *Linn. Mant A.* 65.—Afr. austr.

articularis, Thunb. Diss. Eric. 37=pulchella.

articulata, Thunb. Prod. PI. Cap. 71 *(=Syndesmanthus articulatus).*—Afr. austr.

asiatica, Waitz, Beschr. Gatt. Art. Heid. 157 -Cassiope ericoides.

aspera, Andr. Heathery, iii. t. 104= Sparmanni.

asperi/olia,.S2Msh. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 324 =setacea.

assurgens, Link, Enum. Hort. Berol. i. 872 » persolota.

atroviridis, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 666 = decipiens.

aurea, *Andr. Col. Heaths*, ii. 76.—Afr. austr.

auricularis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 327 - urceolaris.

australis, *Linn. Mant.* ii. 231.—Reg. Mediterr. occ.

axillaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 825-strlgosa.

axillaris, Soland. ex Benth. in DC. Prod. vii. 692 = coarctata.

axillaris, Thunb. Diss. Eric. 16—Salaxis axillaris.

axilliflora, *Bartl. in Linnaea*, vii. (1832) 640.—Afr. austr.

azaleaefiora, Steud. Nom. ed. II. i. 618, in syn.=seq.

ERICA:—

azaleaefolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 384.—Afr. austr.

azorica, *Hockst. ex Smb. Fl. Azor.* 40.—Ins. Azor.

baccaeformis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 852 = baccans.

baccans, *Linn. Mant.* ii. 233.—Afr. austr.

baculiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 848 -Sebana.

Bandonia, Andr. Col. Heaths, iv. 220-Irybana.

Banksia, *Andr. Col. Heaths*, i. 5.—Afr. austr.

Banisiana, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 243 - praec.

Banksii, W illd. Sp. PI. ii. 8U5 = praec.

barbata, *Andr. Heathery*, i. t. 4.—Afr. austr.

barbata, Drege, ex Benlh. in DC. Prod. vii. 671 - perlata.

barbata, Hort. Prag. ex Tausch, in Flora, xvii. (1834) II. 616-leucopelta.

barbigera, *Klotasch, ex benth. in DC.Prod.vii.* 010.—Afr. austr.

barbigera, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 341-Blaeria barbigera.

Bartlingiana, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 656 = affinis.

Bartlingiana, *Klotasch, in Linnaea*, xii. (1838) 521.—Afr. austr.

Bauera, Andr. Col. Heaths, iv. 221 — Bowieana.

Beaumontia, *Andr. 1. c.* 222.—Afr. austr.

Beaumontiana, Rollisson, ex Lodd. Bot. Cab. L 1686 = praec

Behen, E. Mey. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1888) 519 = Savilea, praecox.

bella, Spreng. Syst. ii. 197-seriphiifoIia.

Bergiana, *Linn. Mant.* ii. 235.—Afr. austr.

Bergiana, Wendl. Eric. i. fasc. II. 29=florida.

bibax, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 358-nammea.

bibracteata, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 516 = Massoni.

bicalyculata, *Moench, Meth. Suppl.* 18.—Afr. austr. *1*

bicolor, Andr. Heathery, ii. t. 54 - dichrus.

bicolor, *Thunb. Diss. Eric.* 86.—Afr. austr.

bifiora, Link, Enum. Hort. Berol. i. 867=dianthifolia.

Blaeria, Thunb. Prod. PI. Cap. 72 = Blaeria ericoides.

blanda, *Andr. Heathery*, iii. t. 107.—Afr. austr.

blanda, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 331 -= cornuta.

Blandfordia, *Andr. Col. Heaths*, iii. 153.—Afr. anstr.

Blandfordiana, Ait. Hort. Kcw. e<t. II. ii. 892 ~ praec.

blenna, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 379 = vernix.

Bonplandia, Lodd. Bot. Cab. t. 345 = scq.

Bonplandiana, Sims, Bot. Mag. t. 2126 = E. Muscuri.

borboniaefolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 886.—Afr. austr.

borbonica, Willd. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 220 = Philippia galioide*.

botuli/ormis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 869 = E. Tetralix.

Boucheana, Regel, in Gartenfl. C1852) 73.—Hab. ?

Jiowerii, Donovan, in Nat. Repos. iii. (1824) t. 83, sphalm. — Bowieana.

Bonia, [Forbes], Hort. Eric. Wobum. 4 —Bowieana.

Bowieana, *Lodd. Bot. Cab.* t. 842.—Afr. austr.

brachialis, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 367.—Afr. austr.

brachycentra, *Benth. in DC. Prod.* vii. 688.—Afr. austr.

brachycrossa, *Tausch, in Flora*, xxii. (1839) II. 634.—Hab.!

bracteata, Moench, Meth. 50-=campa.

bracteata, *Thunb. Diss. Eric.* 13.—Afr. austr.

bracteolaris, *Lam. Encyc. i.* 481.—Afr. austr.

brevifolia, *Soland. ex Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 338.—Afr. austr.

brevipes, Battl. in Linnaea, vii. (1832) 643—coarctata.

Broadleyana, *Andr. Col. Heaths*, iii. 154.—Afr. austr.

Bruckenthatii, Spreng. Neuc Entdeck. i. 271 = Bruckenthalia spiculifolia.

bruniades, *Linn. Sp. PI.* 354.—Afr. austr.

bruniaefolia, *Salisb. in Trans.* ***Linn. Soc.*** vi. **(1802) 341.—**Afr. austr.

brunneo-alba, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 632-imbricata.

bryantha, Thunb. Diss. Eric. 15 = Bryanthns Gmelini.

buccinaeformis, *Salisb. Prod.* 294.—Afr. austr.

buccinifiora, Sims, Bot. Mag. t. 2465 = Massoni.

bullaris, Steud. Nom. ed. II. i. 569, sphalm.-seq.

bullularis, Salisb. Prod. 290 = ramentacea.

ERICA:—

Burchellii, *Benth. in DC. Prod.* vii. 632.—Afr. austr.
byssina, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 333 = capitata.
caduca, *Thumb. Prod. PI. Cap.* 71.—Afr. austr.
caducei/era, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 370 = pulchella.
caesia, Salisb. 1. c. 349-imbricata.
caffra, Andr. Col. Heaths, i. 7 — persoluta,
eaffra. Linn. Diss. 9. n. 22; Amoen. Acad. viii. 50, 55 =arborea.
caffra, Linn. Sp. PI. 353 = nrceolaris.
calamiformis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 862 = Massoni.
calathifiora, Salisb. 1. c. 828-bicolor.
caledonica, *Spreng. /. Tent. Suppl. Syst.* **18.—Afr.** austr.
callosa, Wendl. Eric. ii. fasc. xvili. 87. t. 83 = brevifolia.
valostoma, Lodd. Dot. Cab. t. 1759 = Massoni.
ralycanthoid.es, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 539 - patula.
calyciflora, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834; II. 617.—Afr. austr.
calycina, Andr. Col. Heaths, i. 8-corifolia, bracteata.
valycina, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 507.—Afr. austr.
calycina, Thunb. Uiss. Eric. 47 = vespertina.
calycinades, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 4 - glomerala.
calyculata, Wendl. Eric.'i. fasc. IV. 5-penicilliflora.
campanularis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) S30=campanulata.
campanulata, *Andr. Col. Heaths,* i. 9.—Afr. austr.
lampanulaia, F. \V. Schmidt, Neue u. Selt PH. 47 = pyramidalis.
campylophylla, Spreng. Syst. ii. 190 - florida.
cnnaliculata, *Andr. Col. Heaths,* iii. 167.—Afr. austr.
Candida, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 628-E. Leea.
Candida, *Spreng. Pugill.* i. 30.—Hab. ?
canescens, [Dryand. iaj Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 407 = villosa.
canescens, Wendl. Eric. ii. fasc. XXI11.171.1.65 •= pnsilla.
rnntharaeformis, Lodd. Bot Cab. 1. 1961-reflexa.
capax, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 381 - obbata.
capillaris, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) **647.—**Afr. austr.
capillaris, Drège, ex Benth. in DC. Prod. vii. 680 = tennis.
capitata, *Linn. Sp. PI.* 365.—Afr. austr.
capitata, Thunb. Diss. Eric. 17 = bruniadcs.
carbasina, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 333 - bruniades.
carduifolia, *Salisb. 1. c.* 330.—Afr. austr.
carinata, *Klottsch, ex Benth. in DC. Prod.* **vii. 680.—** Afr. austr.
carinata, Lodd. Bot. Cab. t 1071« Massoni.
carinula, Steud. Norn. ed. II. i. 670, sphalm. - inflata.
carnea, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 504.—Europ. austr.
carneola. G. Don, Gen. Syst. iii. 798 - inflata.
carniula, Lodd. Bot. Cab. t. 926 = inflata.
caroliniana, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 685 = varia.
catervaeflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* **vi. (1802)** 372.—Afr. austr.
catervaefolia, Pers. Syn. i. 421, sphalm. - praec.
Celsiana, Lodd. Bot. Cab. t. 177 = Thunbergii.
Cephalotes, *Thunb. Diss. Eric.* 21.—Afr. austr.
Cepkalotes, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 570 = spicata.
cerinthoides, Berg. Desc. PI. Cap. 104 =elongata.
cerinthoides, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 505.—Afr. austr.
cernua, Andr. Col. Heaths, i. 12—verecnnda.
cernua, *Linn./. Suppl.* 222.—Afr. austr.
cernua-lanceolata, Wendl. Eric i. fasc vm. 13 = praec.
cerviciflora, *Salisb. in Trans. Linn. Sec.* **vi. (1802)** 362.—Afr. austr.
Chamaetetralix, Tausch, in Flora, xvii. (1884) II. 616 = strigosa.
Chamissonis, *Klottsch, ex Benth. in DC. Prod.* **vii.** 685.—Afr. austr.
chlamydiflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* **vi. (1802)** 338.—Afr. austr.
chloroloma, *Lindl. Bot. Peg.* (1838) t. 17.—Afr. austr.
chlorosepala, *Benth. in DC. Prod.* vii. 649.—Afr. austr.

ERICA:-

chrysantha, *Klotisch, ex Benth. in DC. Prod.* **vii. 620.** —Afr. austr.
ciliaris, Huds. Fl. Angl. ed. I. 144-Calluna vulgaris.
riliaris, *Linn. Sp. PL* 354.—Europ. austr. occ
ciliciiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 839 -Grisebachia velleriflora.
cinerascens, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* **21.—** Hab. 7
cinerea, *Linn. Sp. PI.* 362.—Enrop.
cistifolin, *Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol.* **i.** 869.—Afr. austr.
clavaeflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* **vi. (1802)** 365.—Afr. austr.
clavata, Andr. Col. Heaths, iii. 159-viridiflora.
Cliffordiana, Lodd. Bot. Cab. t. 34=tenuiflora.
Clowieana, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 648 = pinguis.
coarctata, *Wendl. Eric.* ii. fasc. xix. 99. t. 87.—Afr. austr.
coccinea, *Berg. Desc. PI. Cap.* 92.—Afr. austr.
coccinea, Linn, ex Benth. in DC. Prod. vii. 634 = tubiflora.
coccinea, Linn. Sp. PI. S55 = Sebana.
coccinea, *Thunb. Diss. Eric,* 23.—Afr. austr.
cochleari/ormis, Wendl. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 542-caledonica.
codonodes, Lindl. Bot. Keg. t. 16!!8 >» lusitanica.
coerulea, Willd. Sp. PI. ii. 3i)8 - Bryanthus taxifolius.
Colleter, Spreng. Syst. ii. 192 = hispidula.
colorans, *Andr. Col. Heaths,* iv. 223.—Afr. austr.
comosa, *Linn. Mant.* ii. 234.—Afr. austr.
compacta, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 644-catervaeflora.
complanata, Nois. ex Spreng. Syst. ii. 196—crassifolia.
Comptoniana, Andr. Col. Heaths, iv. 224 = curvifolia.
concava, Lodd. Bot. Cab. t. 184 - bicolor.
condnna, Dreège, ex Benth. in DC. Prod. vii. 629 = cruenta.
concinna, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. I. ii. 23.—** Afr. austr.
condensata, *Benth. in DC. Prod.* vii. 681.—Afr. austr.
conferta, *Andr. Heathery,* ii. t. 59.—Afr. austr.
con/ertiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 570, sphalm.=seq.
con/erti/olia, V/tndl Eric ii. fasc. XX. 121. t. 46-fabrilis.
congesta, Lodd. Bot. Cab. t. 1743-stylaris.
congesta, Wendl. Eric. ii. fasc. XVII. 75. t. 29=persoluta.
conica, *Lodd. Bot. Cab.* 1.1179.—Afr. austr.
conifera, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) II. 632.—Afr. austr.
coniflora, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 655 - pumila.
connivens, Klotzsch, ex Benth. 1. c. 670-filiformis.
conspicua, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. 1. ii. 22.—** Afr. austr.
Constantia, *Nois. ex Benth. in DC. Prod.* **vii. 672.—** Hab.?
copiosa, *Wendl. Eric.* iii. fasc. xxv. 3.1.1.—Hab. t
coralloides, Hort. ex Tausch, in Flora, xvii. (1834) II. 600—mammosa.
cordata, *Andr. Col. Heaths,* iii. 160.—Afr. austr.
corifolia. Berg. Desc. PI. Cap. 108; Thunb. Diss. Eric. 46 = obtecta.
corifolia, Linn, ex Benth. in DC. Prod. vii. 652 = bracteata.
corifolia, *Linn. Sp. PI.* 355.—Afr. austr.
cornuta, *Roxb. ex Salisb. in Trans. Linn. Soc.* **vi.** (1802) 331, in syn.—Afr. austr.
coronata, Andr. Col. Heaths, i. 15 = fascicularis.
coronifera, *Benth. in DC. Prod.* vii. 683.—Afr. austr.
Corsica, DC. Fl. Fr. iii. 677-stricta.
corusca, Iichtst. ex Benth. in DC. Prod. vii. 679 — quadraeflora.
Corydalis, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* **vi. (1802) 334.** —Afr. austr.
corymbosa, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 648—catervaeflora.
corymbosa, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 618.—Afr. austr.
costaefiora, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 363 = E. Leea.
costata, Andr. Col. Heaths, i. 16 = versicolor.
cothurnalis, Salisb. Prod. 297-Sebana.
Coventrya, Andr. Col. Heaths, iv. t. 226 -pavettaeflora.
Coventryana, Lodd. Bot. Cab. t. 423 = praec
crassifolia, *Andr. Col. Heaths,* iv. 227.—Hab.}

ERICA:—

crassifolia, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 669 - latifolia.
crassisepala, *Benth. I. c.* 619.—Afr. austr.
crenata, E. Mey. ex Benth. 1. c. 659 —mncosa.
cretica, Tausch, in Flora, xvii. (1834) II. 604 - verticillata.
crini/olia, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 367 = cerinthoides.
crinita, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1432.—Afr: austr.
cristaeflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 332. —Afr. austr.
crossota, Spreng. Syst. ii. 201—acuta.
cruciformis, Andr. Col. Heaths, iv. 228 = E. Muscari.
cruenta, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. I. ii. 16.—** Afr. austr.
cubica, *Linn. Mant.* ii. 283.—Afr. austr.
cubica, Thunb. Diss. Eric. 81-seriphlifolia.
cubitalis, *Linn. Amoen. Acad.* viii. 51=viscaria1
cucullata, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 615 = nigrita.
culcitaeflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 357 = Massoni.
cumulata, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 690 - variabilis.
cumuliflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 336. —Afr. austr.
cuneiformis, Benth. in DC. Prod. vii. 648 = E. Muscari.
cupressifolia, Wendl. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1888) 213-Philippia Chamissonis.
cupressi/ormis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 854-discolor.
eupressina, [Forbes] Hort. Eiic. Woburn. 7-turrigera.
curviflora, *Linn. Sp. PI.* 354, partim ; *Thunb. Diss. Eric.* 24.—Afr. austr.
curviflora, Linn. Sp. PI. 354, partim = bnccinaeformis.
curvifolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 380. —Afr. austr.
curvirostris, *Salisb. 1. c.* 375.—Afr. austr.
cuspidata, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 615 - polifolia.
cuspidigera, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 358 —ignescens.
cyathiformis, Salisb. I. c. 376—laevis.
cylindrica, Andr. Heathery, ii. t. 60-Massoni.
cylindrica, Thunb. Diss. Eric 24-tenuiflora.
cylindrica, *Wendl. Eric.* i. fasc. XI. 7.—Hab. 1
cylindriflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 356 = serratifolia.
cymosa, *E. Mey. ex Benth. in DC. Prod.* **vii. 670.—** Afr. austr.
cyrillaeflora.Stliib. in Trans. linn. Soc vi. (1802) 357 —palustris.
Dabici, Crantz, Inst. ii. 360-Daboecia polifolia.
Daboecia, Georgi, Beschr. Ru»s. Reich. III. iv. 936 » Bryanthus taxifolius.
Daboecii, Linn. Sp. PI. ed. II. 609-Daboecia polifolia.
daphniflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 384. —Afr. austr.
daphnoides, Lodd. Bot. Cab. t. 154 - praestans.
decipiens, *Spreng. f. Tent. Suppl. Syst.* **13.—Aft-** austr.
decifiiens, St. Amans, Fl. Agen. 169-vagans.
declinata, Lodd. Bot. Cab. t. 1662 - curvirostris.
decolorans, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* "II' nomen.—Hab. ?
decora, *Andr. Col. Heaths,* iii. 162.—Afr. austr.
decora, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (.1802) 354-E. Uhria.
decunata, Steud. Nom. ed. I. 304 -curvirostris.
decurrens, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 632* oblongifolia.
deflexa, *[Forbes] Hort. Eric. Woburn.* **8.—Hab. I**
delecta, *Tausch,* in *Flora,* xxii. (1839) II. **633.—** Hab. ?
deliciosa, *Wendl./. ex Benth. in DC. Prod.* **vii. 666.—** Afr. austr.
demissa, Hort. ex [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 8-socciflora.
demissa, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* **vii. 666.—** Afr. austr.
densa, Andr. Col. Heaths, iii. 163-ventricosa.
densiflora, Bartl. in Linnaea, vii. (1832,632 - imbricj>þ-
densiflora,Vitge,ex Benth. in DC. Prod. vii.-63[9]* discolor.
densi/olia, WiUd. Sp. PI. ii. 359 = E. Uhiia.

ERICA:—
dentata. *Lam. Encyc.* 1. 485.—Afr. austr.
dentata, Thunb. Diss. Eric. 28 -- denticulate.
dentata, Wendl. Eric. ii. fasc. XIX. 101. t. 38-venusta.
denticularis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 884 — seq.
denticulata, *Linn. Mant.* ii. 129.—Afr. anstr.
depressa, Andr. Heathery, i. t. 17 =nana.
depressa, *Linn. Mant.* ii. 230.—Afr. austr.
desmantha, *Bentk. in DC. Prod.* vii. 620.—Afr. austr.
dianthera, Moench, Meth. 50-mnltiflora.
dianthiflora, *Tausch, in Flora,* xvii. Q834) II. 594.—Hab. ?
dianthifolia, *Salisb. in Trans. Linn. See.* vi (1802) 338.—Afr. austr.
diaphana, Spreng. Syst. ii. 178-transparens.
dichromata. Lodd. Bot. Cab. t. 1818 - dichrus.
dichras, *Spreng. Syst.* ii. 179.—Afr. aostr.
Dickensoni, Lodd. Bot. Cab. t. 1798- pallens.
Qicranifolia, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) II. 634.—Hab.?
didyma, Stokes, in With. Bot Arr. ed. II. i. 400 = vagans.
ailatata, *Wendl. f. ex Benth. in DC. Prod.* vii. 656.—Hab. ?
dllecta, Hort. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 521 = fastigiata.
dlosmaefolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 33O.-Afr. austr.
niotaeflora, *Salisb. 1. c.* 342.—Afr. austr.
discolor, *Andr. Col. Heaths,* i. 20.—Afr. austr.
oistans, *Benth. in DC. Prod.* vii. 646.—Afr. anstr.
'tstans, Spieng. f. Tent Suppl. Syst. 13-thymiloha.
diitorta, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) 644.—Afr. austr.
diyaricata, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 8 = tenuis.
"aaricota, Lodd. ex Steud. Nom. ed. I. 805 = calycina.
diyaricata; Wendl. Eric. i. fasc. VII. 5 = imbricata.
Wendl ex Benth. in DC. Prod. vii. 670-nltformis.
Hiformis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 368
Drc ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 501 = cnloroloma.
oroseraefolia, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 600.—Hab.?
droseroides, Lam. Encyc. i. 489 ; Andr. Col. Heaths, i. ^1-glutinosa.
oucalis, *Klottsch, in Linnaea,* x. (1886) 817.—Afr. austr.
dumosa, *Andr. Col. Heaths,* iv. 280.—Afr. austr.
«J"nosa, Salisb. Prod. 296 = Blaeria purpurea.
dura, Hort. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 791 = hirta.
°ysantha, *Benth. in DC. Prod.* vii. 674.—Afr. austr.
'ournea, Hort. ex Benth. 1. c 679 = persoluta.
VA"/™]', Andr. Col. Heaths, iii. 164-=coccinea.
taehnia, *Bonpl. Desc. PI. Rar. Malm.* 43. t. 16.—Afr. austr.
S£«<»,x. Nichols. Diet Gard. 622.
**loniana, *Tausch, in Flora,* xxii. (1889) II. 625.—
f, ta Andr. Col. Heaths, ii. 87 = conspicua.
'Jata, Hoffmgg. & Link, FI. Port. i. 411 -arborea.
•Rans, *Andr. Heathery,* iii. t. 111.—Afr. austr.
ejongata, *Lodd.* Bot. Cab. t. 738.—Afr. austr.
"ona, Rkb. ex G Don, Gen. Syst. iii. 793 - interallaris.
marginafa, Andr. Col. Heaths, iii. 166=nigrita.
"nbolifera, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (lbO2) 840 -Ssimocheilns depressns.
*"**#hrii/blia,* Salisb. L c. 379-Niveni.
npetrifolia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 507.—Afr. austr.
""pelrina, Linn. Syst. ed. X. 1003 = praec. ?
"JWraMa Ad Hh i 19 Af
PWraMa, Andr. Heathery, i. t 19.—Afr. austr.
Hat?
Tausch, in FloTa, xxiL (1889) "• 685 ~"
•Piptera *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 21, nomen. ~Hab. I
'Pistomia, Lodd. Bot. Cab. t. 1186=sacciflora.
'luestris, Klotach, in Linnaea, x. (1836) 850-
""Lysfst'foiia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) *2 = Blaeriapnrpurea.
f,l Wendl. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 636 = bracteata.

ERICA :-
eriantha, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 617 - bruniades.
eriocephala, Andr. Heathery, ii. t. 61=villosa.
eriocephala, Lam. Encyc. i. 489 (- *Syndesmanthus articulatus).*—Afr. austr.
eriopus, *Benth. in DC. Prod.* vii. 650.—Afr. austr.
erosa, Lodd. Bot. Cab. t. 183-Massoni.
erubescens, *Andr. Heathery,* iii. t. 113.—Afr. austr.
Ewerana. [Dryand. in| Hort. Kew. ed. II. ii. 368 = E. Uhria.
excelsa, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 696.—Hab.?
exigua, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 378.—Afr. austr.
exilis, Salisb. 1. c. 340 (=*Syndesmanthus scaber).*—Afr. austr.
eximia, Lodd. Bot. Cab. t. 1105-aristella.
expansa, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 6S6 = patens.
exposita, Lodd. Bot. Cab. 1.1521 = pellucida.
expromta, Spreng. Syst. ii. 196 = Simocheilus depresses,
exquisita, *Carr. in Rev. Hortic.* (1882) 362.—Hab.?
exserens, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 679 = persoluta.
exserta, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 9 ^ peltata.
exserta, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 689 - lasciva.
exsudans, Auct. vide *exudans.*
exsurgens, *Andr. Col. Heaths, i.* 22.—Afr. austr.
exudans, Andr. 1. c iv. 238-pellucida.
fabrilis, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 388.—Afr. austr.
Faireana, *Carr. in Rev. Hortic.* (1880) 467.—Hab. ?
fallax, Salisb. in Trans, linn. Soc. vi. (1802) 871 = parilis.
fascicularis, *Linn./. Suppl.* 219.—Afr. anstr.
fasciculata, Thunb. Prod. PI. Cap. 71= Simocheilus glabellus.
fasciformis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 882 = fastigiata,
fastigiata, Andr. Heathery, ii. t. 62-E. Walkeria.
iastigiata. *Linn. Mant.* i. 66.—Afr. austr.
fastuosa, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 859 = curviflora.
fausta, *Salisb. 1. c.* 326.—Afr. austr.
favosa, Salisb. Prod. 2»8 = spicata.
Fergusoni, *Gentilh. tf Carr. in Rev. Hortic.* (1882) 407.—Hab. ?
ferox, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 324 = Eremia Bartlingiana.
ferrea, Berg. Desc. PI. Cap. 112 = mucosa.
ferruginea, Andr. Col. Heaths, iii. 168 = squarrosa.
festa, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vj. (lbO2) 371 - parilis.
Fibula, Link, Enum. Hort. Berol. i. 868-laternlis.
filamentosa, *Andr. Heathery,* i. t. 22.—Afr. austr.
filifolia, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 29.—Hab.?
filiformis, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 636 = teretiuscula.
filiformis, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 345.—Afr. austr.
filipendula, *Benth. in DC. Prod.* vii. 663.—Afr. austr.
fimbriata, *Andr. Heathery,* ii. t. 63.—Afr. austr.
finitima, *Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 153.—Afr. austr.
fistulaeflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 883=-tenuiflora.
flacca, *E. Mey. ex Benth. in DC. Prod.* vii. 670.—Afr. austr.
flaccida. Link, Enum. Hort. Berol. i. 367-lanata.
flagellaris, Link, I. c. 365 = teretiuscula.
flagelliformis, Andr. Col. Heaths, iv. 284 - teretiuscula.
flammea, *Andr. Heathery,* i. t. 28.—Afr. anstr.
flava, Andr. 1. c. ii. t. 64 = parilis.
/lava, Waitz, Beschr. Gatt. Art. Heid. 198-Petiverii.
flavicans. *Klottsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 681.—Afr. austr.
flavicoma, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) 639.—Afr. anstr.
flavida, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 670 - filiformis.
flexicaulis, *[Dryand.* tn] *Ait. Hort. Kew.* ed. II. ii. 395.—Hab.?
flexilis, Salisb. Prod. 296 - racemosa.

ERICA:—
flexuosa, Andr. Col. Heaths, i. 23-imbricata.
flocciflora, *Benth. in DC. Prod.* vii. b«0.—Afr. austr.
flocciflora, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) II. bill.—Hab.?
floccosa, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) 640.—Afr. austr.
floccosa, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 860 - conspicua.
floribunda, *Lodd. Bot. Cab.* t. 176.—Afr. anstr.
floribunda, Wendl. Eiic. ii. fasc. xiv. 19-nudiflora.
florida,Hott. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. HI. 428»anlhina.
florida, Lodd. Bot. Cab. t. 234 = moschata.
florida, *Thunb. Diss. Eric.* 40.—Afr. austr.
flosculosa, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 340 (= *Syndesmanthus paucifolius).*—Afr. austr.
foliacea, *Andr. Col. Heaths,* iv. 235.—Afr. austr.
foliacea, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 691 - hispidnla.
follicularis, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (18021 348 -Petiverii.
Forbesiana, *Klotzsch, in Linnaea,* x. (1836) 349.—Afr. austr.
formosa, Andr. Heatheiy, iii. 1.114—purpurea.
fonnosa, *Thunb. Diss. Eric.* 49. t. 3.—Afr. austr.
Forskälii, Vitm. Summa PI. ii. 414-vagans.
fragilis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 346 - E. Banksia.
fragrans, *Andr. Col. Heaths,* ii. 95.—Hab. ?
fragrans, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 383 - E. Muscan.
frondosa, Salisb. Prod. 296 - coccinea.
fucata, *Klottsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 667.—Afr. austr.
fucata, Thunb. Diss. Eric. 15—scoparia.
fugax, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 351 - triflora.
fulgens, Klotzsch, in Linnaca, xii. (1838) 607 -» foliacea.
fulgida, *[Forbes'] Hort. Eric. Woburn.* 11.—Afr. auslr.
furcaeflora, Salisb. Prod. 294 = pulchella.
furfurosa, Salisb. in Trans. Liun. Soc. vi. (1802) 848 - monadelpha.
fuscata, ¥. G. Dietr. ex Steud. Norn. ed. I. 305, 306 — lanuginosa.
fusiformis, Salisb. Prod. 297 = Plukeneti.
galliflora, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 643 = floribunda.
galliflora, Salisb. Prod. 296—comosa.
galioides, Klotzsch, ex lienlh. in DC. Prod. vii. 691 = hispidula.
galioides, Poir. Encyc. Suppl. i. 728 - Philippia galioides.
gelida, Andr. Heathery, i. t. 24-gilva.
gemmifera, Lodd. Bot. Cab. t. 457 -Massoni.
genistaefolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 337.—Afr. austr
gibbosa, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* xii. 678.—Afr. austr.
gigantea, *Klottsch, ex Benth. I. c.* 656.—Afr. austr.
Gillii, *Benth. 1. c.* 684.—Air. austr.
gilva, *Wendl. Bot. Beobacht.* 48.—Afr. anstr.
glabella, Thunb. Prod. Fl. Cap. 73 - Simocheilus glabellus.
glabra, Gilib. Fl. Lituan. i. 3 = Callona vulgaris.
glabra, Link, Enum. Hort. Berol. i. 362 = ventricosa.
glabra, Thunb. Prod. PI. Cap. 69-Simocheilus glabcr.
glandulifera, *Klotzsch, in Linnaea,* x. (1836) 383.—Afr. austr.
glandulosa, Andr. Col. Heaths, ii. 97 = flexicaulis.
glandulosa, Thunb. Diss. Eric. 25 = pcllncida.
glandulosa, Wendl. Eric. ii. fasc. XIII. 5-coccinea.
glauca, *Andr. Col. Heaths,* i. 24.—Afr. austr.
glaucescens, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 651 = E. Lcea.
glaucifolia, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 62U —imbricata.
globosa, *Andr. Heathery,* iii. 1.116.—Afr. austr.
globosa, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 11.—Afr. austr.
globosa, *Willd. Sp. PL* ii. 408.—Afr. austr.
globuliflora, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 667 -demissa.
glomerata, *Andr. Col. Heaths,* iv. 237.—Afr. austr.
glomerata, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 11 -ulumosa.
glomerata, Salisb. Prod. 293-E. Tetralix.
glomiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 330 -reflexa.
glumaeflora, *Klotmsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 689.—Afr. austr.

ERICA:—

glutinosa, Ka.it. Col. Heaths, i. 25 = E. Leea, onosmaeflora.
glutinosa, *Berg. Desc. PI. Cap.* 98.—Afr. austr.
glutinosa, Koxb. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 795 = verniciHua.
gnaphaliiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 337 -gnaphalodes.
gnaphalodes, Berg. Desc. PL Cap. 119=calycina.
gnaphalodes, *Thunb. Dim. Eric.* 45.—Afr. austr.
gnaphaloides, *Linn. Sp. PI.* 356 (sp. dub.).—Afr. austr.
gnaphaloides, K. Mey. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 541 = Meyeriana.
gnidiaefolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 336 = vespertina.
Gordonia, Forbes, Hort. Woburn. 81 = nitida.
gorteriaefolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 381-retorta.
gracilis, *Salisb. 1. c.* 375.—Afr. anstr.
gracilis, *Wendl. Bot. Beobacht.* 47.—Afr. austr.
grandiflora, *Linn.f. Suppl.* 223.—Afr. austr.
grandinosa, Lodd. Bot. Cab. t. 627; Andr. Col. Heaths, iv. 238 = formosa.
granulata, Linn. Mant. ii. 231 = ramentacea.
grisea, Klotzsch, ex Benth. in DC. Trod. vii. 674 = hirtiflora.
grossa, Salisb. Prod. 292 - halicacaba.
guttaefiora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 374 = laterali».
haemastoma, *Wendl. Erie.* iii. fasc. XXVI. 18.—Afr. austr.
halicacaba, *Linn. PI. Rar. Afr.* 11; *Mant.* ii. 874.—Afr. austr.
haloealycina, Buek, in DC. Prod. Index, iii. 166 = variabilis.
Hartnellii, Hort. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 510-crinito.
hebecalyx, *Benth. in DC. Prod.* vii. 630.—Afr. austr.
helianthemifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 328-manfolia.
hemisphaerica, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 678=velitaris.
herbacea, Georgi, Beschr. Rnss. Reich. III. iv. 935 = Calluna vulgaris.
herbacea, Linn. Sp. PI. 352—carnea.
Hesscana, *Wendl. ex Klotmsck, in Linnaea,* ix. (1834) 684.—Afr. austr.
Hibbertia, *Andr. Heathery,* iii. t. 118.—Afr. austr.
hibernica, Syme, Kng. Bot. ed. III. vi. 42 = mediterranea.
hirsuta, *Klottsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 669.— Afr. austr.
hirsuta, Lodd. Bot. Cab. t. 754 = perspicua.
hirsuta, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 339 = Grisebachia hispida.
hirsuta, Thunb. Prod. PI. Cap. 72 *(-Acrastemon kirsutus).*—Afr. austr.
hirta, Andr. Col. Heaths, ii. 101-speciosa,
hirta, *Thunb. Diss. Eric.* 36. t. 2.— Afr. austr.
hirta, Wendl. Eric. iii. fasc. XXVI. 16-dilatata.
hirtiflora, *Curt. Bot. Mag.* t. 481.—Afr. austr.
hirtifolia, *Hornem. Hort. Hafn.* i. 370.—Afr. austr.
hispida, Andr. Heathery, ii. t. 69 = racemosa.
hispida, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 11.—Afr. austr.
hispida, Thunb. Diss. Eric. 19-hispidula.
hispidula, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1672.—Afr. austr.
holocalycina, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 690 =variabilis.
hdosericea, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 352 -andromedacflora.
horiBontalis, Audr. Heathery, ii. t. 70 - cnmuliflora.
hottoniaeflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 3Sl = cubica.
Humeana, Lodd. Bot. Cab. t. 389--*fastigiata.
humifusa, *Hibb. ex Salisb: in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 332.—Afr. austr.
humilis, *Benth. in DC. Prod.* vii. 615.—Afr. austr.
humilis, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 182 = cinerea.
humilis, Salisb. in Trans. Linn. Sou. vi. (1802) 820 - deprcssa.
hyadnthoides, Andr. Col. Heaths, iii. 174=praestans.
hyhrida, Hort. .ex Benth. in DC. Prod. vii. 688 = Massoni.
hypocrateriformis, Tausch, in Flora, xx. (1837) 492 = pavettaeflora.
hyssopifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. iv. (1802) 387 = bracteata.
kystriciflora, Salisb. 1. c. 367=Sparmanni.
ignescens, *Andr. Heathery,* i. t. 27.—Afr. anstr.

ERICA:—

ignorata, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 676 - verecunda.
imbecilla, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.258 -gracilis, *Salisb.*
imbellis, Salùb. Prod. 298 = lutea.
imbricata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 503.—Afr. austr.
imperialis, Andr. Col. Heaths, iv. 23!i = fascicularis.
inaperta, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 429-cerviciflora.
incana, Wendl. Eric. ii. fasc. xvm. 89 = pubescens.
incarnata, Andr. Col. Heaths, i. 28=lateralis.
incarnata, *Thunb. Diss. Eric.* 50.—Aiï. austr.
incerta, Klotzsch, in Unnaea, xii. (1838) 621-daphniflora.
inclusa, *Wendl. f. ex Benth. in DC. Prod.* vii. 664.— Afr. austr.
inclyta, Soland.ex Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 3S0 = tubercolaris.
incomu, *Klottsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 690.— Afr. austr.
inconspicua, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) 642.—Afr. austr.
inconspicua, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 71—Afr. austr.
incurva, Andr. Col. Heaths, iii. 175-florida.
incurva, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 188.—Afr. austr.
incurva, Wendl. Bot. Beobacht. 47-stellata.
indica, Waitz, Beschr. Gatt. Art. Heid. 155 = MenzieMa triflora.
indigesta, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 523 = daphniflora.
inermis, Klotzsch, 1. c 505-exigua.
inflata, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 644 = jasminiflora.
inflata, *Thunb. Diss. Eric.* 41.—Afr. austr.
inflexa, Pers. Syn. i. 428 - incurva.
infundibuliformis, Andr. Col. Heaths, iv. 240=pavettaeflora.
infundibuliformis, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 638 =Lawsoniana.
Ingrami x, Hort. ex Morr. Belg. Hortic vii. (1857) 322. t. 52. f. 1.
innocens, *Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr.* ii. 111.—Afr. austr.
insulsa, *[Forbes] Hort. Eric. Woburn.* 12.—Hab. ?
intermedia, *Klotssch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 821. —Afr. austr.
intertexta, Lodd. Bot. Cab. t. 10S4=empetrifolia.
intervallaris, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 375.—Afr. austr.
involucrata, *Klottsch,ex Benth. in DC. Prod.* vii. 617. —Afr. austr.
involvens, *Benth. 1. c.* 619.—Afr. anstr.
Irbyana, *Andr. Col. Heaths,* iii. 176.—Afr. austr.
irregularis, *Benth. in DC. Prod.* vii. 680.—Afr. austr.
ixanthera, *Benth. 1. c.* 660.—Afr. austr.
Jacksoniix, Paxt. Mag. Bot. viii. (1841) 149.
jasminiflora, *Andr. Col. Heaths,*\.*1'i.* t. 26.—Afr. austr.
jasminiflora, *Salisb. Prod.* 293.—Afr. austr.
jasminoides, *Carr. in Rev. Hortic.* (1882) 362.—Hab. ?
jubata, Lodd. ex Spreng. Syst. ii. 198 = melanthera.
Juliana, Lodd. Bot. Cab. t. 799 = E. Walkeria.
juncea, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 648=regerminans.
juniperifolia, *Salisb. Prod.* 296.—Afr. austr.
Kennedyana, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 506 = lactiflora.
***H.n-aswjia.,Klotasch,ex Wolp. Rep.* ii. 728.—Afr. austr.**
labialis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (16U2) 840 = Sympieza capitellata.
Lachnaea, *Andr. Heathery,* iii.t. 120.—Afr. austr.
lachnaeoides, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 795.—Afr. austr.
lachneaefolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 335 = E. Lachnaea.
lactea, Less, ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 506-lactiflora.
lactiflora, *Lodd. Bot. Cab.* t. 990.—Hab. ?
lacunaeflora, Salisb. Prod. 297 = Bergiana.
laeta, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) 648.—Afr. austr.
laevigata, *Bartl. I. c.* 638.—Afr. austr.
laevis, *Andr. Col. Heaths,* iii. 182.—Afr. austr.
laevis, *Spreng. Pugill.* i. 30.—Hab. I
lagenaeformis, Salisb. in Trans. linn. Soc. vi. (1802) 382 -jasminiflora.
Lambertia, Andr. Col. Heaths, ii. 104 = physodes.
lamellaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 327 = urceolaris.
lamprotes, *Klottsck, in Linnaea,* xii. (1838) 536.—Afr. austr.
lanata, *Andr. Heathery,* iii. 1.121.—Afr. austr.

ERICA:—

lanata, Wendl. Bot. Beobacht. 45 = conspicua.
lanceolaris, Steud. Norn. ed. I. 806, sphalm. = hirta.
lanceolata, *Pers. Syn.* i. 424.—Hab. ?
laniflora, F. W. Schmidt, Neue u. Sell. Pfl. 44-= ignescens.
laniflora, Wendl. Eric. i. fasc. II. 23-conspicua.
lanuginosa, *Andr. Heathery,* iii. t. 122.—Afr. austr.
laricea, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 11.—Afr. austr.
larieifolia. Lam. Encyc. i. 487— imbricata.
laricina. Berg. Desc. PI. Cap. 94-nigrita.
laricina, *Spreng. f. Tent. Suppl. Syst.* 12.—Afr. austr.
lasciva, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 34U.~ Afr. austr.
lasiandra, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 677 = rubens.
lasiocephala, Klotzsch, ex Benth. 1. c. 617=brunia(Ies.
lasiophylla, Spreng. Syst. ii. 195=strigosa.
lateralis, *Willd. Sp. PI.* ii. 880.—Afr. austr.
latifolia, *Andr. Heathery,* ii. t 72.—Afr. austr.
lavandulaefolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 382.—Afr. austr.
Lawsoni, Sims, Bot. Mag. t. 1720 = E. Lawsonia.
Lawsonia, *Andr. Col. Heaths,* iv. 242.—Afr. austr.
laxa, *Andr. Heathery,* ii. t. 73.—Afr. austr.
laxa, Lam. Encyc. i. 480 = mammosal
laxa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 18a.—Afr. austr.
laxiflora, *Buek, in DC. Prod. Index,* iii. 167.—Afr. austr.
Leea, *Andr. ex Willd. Sp. PI.* ii. 400, *et Col. Heaths,* i. 81.—Afr. austr.
Leeana, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 37« = praec.
Lehmanni, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 618. —Afr. austr.
leiuphylla, *Benth. 1. c.* 684.—Afr. austr.
lentiformis, Salisb. Prod. 294-umbellata.
lepidota, *Rach, in Linnaea,* xxvi. (1858) [1855] 786.—Afr. austr.
leptocarpha, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 13 = E. Lawsonia.
leptocephala, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 620 — imbricata.
leptoclada, *Heurck* 6* *Muell. Arg. in Heurck, Obs.* *Bot.* 34.^Afr. austr.
leptophylla, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 620 — tiaraeflora.
leptopus, *Benth. 1. c.* 680.—Afr. austr.
leucantha,G. Don, Gen. Syst. iii. 792-regerminans.
leucantha, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 871.—Afr. austr.
leucanthera, Andr. Heathery, i. t. 28-praec.
leucanthera, *Linn.f. Suppl.* 223.—Afr. austr.
leucodesmia, *Benth. in DC. Prod.* vii. 681.—Afr. austr.
leucopelta, *Tausch,inFlora,x\ii.{lS3i)ll.616.*—Hab.?
leucophylla, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 607 - modesta.
leucosepala, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. *669* =glumaeflora
leuco*toma, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 596." Hab.?
Lichtensteinii, Klolzsch, in Linnaea, xii. (1838) 504 » rcgerminans.
lilacina, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 657 - gnaphalodes.
lineata, *Benth. I. e.* 622.—Afr. austr.
linifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 386* tenuifolia.
Linnaea, Andr. Heathery, ii. t. 75=perspicua.
Linnaeana, Ait. Hort. Kew. cd. II. ii. 375 = perspicua.
linnaeoides, Andr. Col. Heaths, ii. 107 = perspicua.
litoralis, *Regel, Cat. PL Hort. Aksakov.* 55, nomen.— HabJ
lituiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 356 = perspicua.
longiaristata, *Benth. in DC. Prod.* vii. 663.—Afr. austr.
longifissa, Klotzsch, ex Benth. 1. c. 680-tennis.
longiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 359* conspicua.
longifolia, *Donn, Hort. Cantab,* ed. I. 42 ; *ex Will* *Sp. PI.* ii. 398.—Afr. austr.
longipedicellata, Hoffmgg. Verz. Pfl. 59 - longipedunculata.
longipedunculata, Lodd. Bot Cab. t. 108-dumosa.
longipedunculata, *Wender. 'ex Steud. Norn.* ed. U- " 575.—Hab.«
langipes, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 643 = coarct»«
Iongipes, *Klotssch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 684.-' Afr. austr.

ERICA:—

lucida, *Salisi. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 887; *Andr. Col. Heaths,* ii. 109.—Afr. austr.
lugubris, Salisb. Prod. 295 = carnea.
luutanica, *Rudolph, in Schrad. Journ.* ii. (1799) 286. —Europ. occ.
lutea, *Berg. Desc. PI. Cap.* 115; *Linn. It ant.* ii. 231. —Afr. austr.
luteo-alia, [Forbes] Hort. Eric. Wobura. 14=leucantha.
lutescens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 138 = Calluna valgaiis.
lychnidea, *Wendl. ex Steud. Norn.* ed. I. 807, nomen.—Hab. ?
Ï-ycopodiastram, *Lam. Tail. Encyc.*it. 428.—Hab.?
tycopodiifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 361 = Massoni.
lycopodioides,#or»*m. *Hort.Hafn.* i. 874.—Afr. anstr.
'ycopodioides, *Lodd. Cat. ex Benth. in DC. Prod.* vii. 61a._Hab.?.
lycopodioides, Waitz, Beschr. Gatt. Art. Heid. 166 = Cassiope lycopodioides.
lyrigera, Salisb. in Trans. Unn. Soc. vi. (1802) 836- mgrita.
'ysimaehiaefiora, Salisb. I. c. 3S2=meIanthera.
Miukaiana, Bab. in Mackay, Fl. Hibern. 181 = E. Tettalix.
Mackaii, Hook, in Comp. Hot. Mag. i. (1835) 158-- praec.
Macnabianax, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 125.
macroloma, *Benth. in DC. Prod.* vii. 661.—Afr. austr.
macrophylla, *KlotBsch, ex Benth. I. c.* 669.—Afr. austr.
macrostoma, Klotzsch, ex Benth. 1. c. 688 - floribunda.
"aculosa, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) II. 629.—Hab. ?
""guifica, Andr. Col. Heaths, iv. 244 - Massoni.
malleolaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) a/O^empetrifolia.
mammosa, *Linn. Mant.* ii. 284.—Afr. austr.
mammosa, Thunb. Diss. Eric. 42-blanda.
""""upuliflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) B44 =verticillata.
•nafgaritacea, *[Soland.* »»] *Ait. Hort. Kev.* ed. I. ii. 20. ^ Aiat, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 637 = "toledonica.
mar P»ata, Benth. in DC. Prod, vii 887, sphalm.- ni gnta.
•mollia, *[Soland.* 1n] *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 15.—Afr. austr.
marioides, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 678- -nidularia.
Mvtinesii, Lag. ex Benth. 1. c. 665 = E. Tetralix.
Massoni, *Linn./. Suppl.* 221.—Afr. austr.
"assonia, Andr. Col. Heaths, i. 86=praec.
"•«"rcto«,Vo, Linn. Syst. ed. X. 1002=pelviformis.
me ai», *KlotBsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 682.—Afr. austr.
^ *'oliflor* Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) - ^T hunbergii.
•neaiterranea, *Linn. Mant.* ii. 229.—Europ. austr.
* TM.'.w«««««, Reichb. ex Nym. Consp. 489 = cainea.
""dtterranea, Sieber, ex Tausch, in Horn, xvii. (1831) ¥l.604=verticillata.
™e anthera, *Linn. Mant.* ii. 232.—Afr. austr.
"""thera, Thunb. Prod. PI. Cap. 69 = cristaeflora.
mela"»"». Andr. Col. Heaths, i. 37 = PetiveriL
*me"f*ra,* Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 370-turgida.
*"rt/#««, Salisb. Prod. 293=crnenta.
"£», Klotzsch, in Linnaea, ix. (1834) 644 = fnlgida.
«tensiana, *Wendl. ex Klottsch, I. c.* 659.-Hab.?
*m""tefl, *Curt. Bot. Mag. t 622-Massoni.
*mel*r<h Klotzsch, in Linnaea, xiii (1838) 502 = Meuroni.
Meuroni, *Benth. in DC. Prod.* vii. 636.-Afr. austr.
Meyeriana, *Klotzsch, in Linnaea,* xii. (1838) 641.- Afr. austr.
calyx, *Hook. Ic. Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 29.
microstoma, Berg. Desc. PI. Cap. 97 - nudiflora.
*millefl*r Berg. 1. c. 9« - paniculata.
"""«'«, Klotzsch, ex Benth. in IDC. Prod. vii. 691- h «pidula.
m aeflora, Andr. Col. Heaths, iv. 245 = coarctata.
nutissima, *KlotBsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 691. —A'.r - austr.
M'ttsch, ex Benth. I. c. 680.-Afr. austr.

ERICA:—

mirabilis, Andr. Col. Heaths, iv. 246 - praestans.
mitraeformis, Salisb. in Trans. linn. Soc. vi. (1802) 872-hirtiflora.
modesta, [Forbes] Hort. Eric. Wobum. 15-mollis.
modesta, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi.(1802) 852.— Afr. austr.
mollearis, Pers. Syn. i. 422, sphalm.-empetrifolia.
mollis, *Andr. Col. Heaths,* iv. 247—Afr. austr.
moUissima, *Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 150.—Hab.?
monadelpha, Curt. Bot. Mag. t. 1370 = E. Banksia.
monadclphia, *Andr. Col. Heaths,* i. 88.—Afr. austr.
moniliformis, Salisb. Prod. 293=baccans.
Monsoniana, *Linn./. Suppl.* 228.—Afr. austr.
montana, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 15 = fabrilis.
monticola, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. (384 = lavandulaefolia.
Mooreana x, Lem. Jard. Flettr. iii. (1852) t 259.
moschata, *Andr. Col. Heaths,* iv. 248.—Afr. austr.
moschata, Lodd. Bot. Cab. t. 614 - E. Muscari.
mucosa, *Linn. Mant.* ii. 282.—Afr. austr.
mucosoides, Lodd. ex [Forbes,] Hort. Eric. Wobum. 15 ; Bot. Cab. t. 1202-mucosa.
mucronata, *Andr. Col. Heaths,* iii. 186.—Afr. austr.
multicaulis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi (1802) 869 —stricta.
multiflora, Bivona, Sic. PI. Cent. i. 83 = peduncularis.
multiflora, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1885) 853 = verticillata.
multiflora, Huds. Fl. Angl. ed. II. 168 = vagans.
multiflora, *Linn. Sp. PI.* 355—Reg. Mediterr.
multiglandulosa, Willd. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1888) 220=Philippia viscosa.
multiumbellata, Benth. in DC. Prod. vii. 658, sphahn. = ramentacea.
multumbelli/era, Berg. Desc. Fl. Cap. 110=ramentacea.
multumbelli/era, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 679 - pelviformis.
multumbellifera, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) II. 628. —Hab. ?
multumbraculata, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) II. 635.—Hab. ?
munda, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 837 = nigrita.
Mundtiana, Klotzsch, e < Benth. in DC. Prod. vii. 684 = melanthera.
mundula, Andr. Col. Heaths, iv. 249 = fastigiata.
muricata, Wendl. £ ex Benth. in DC. Prod. vii. 685 =varia.
murina, Klotzsch, ex Benth. 1. c. 679 - distorta.
Muscari, *Andr. Col. Heaths,* i. 40.—Afr. austr.
muscicapa, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 595.—Hab.?
mutabilis, Andr. Col. Heaths, iii. 187-cruenta.
mutabilis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 369- cinerea.
mutica, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 597.—Hab. ?
myriantha, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 633-imbricata.
naematodes, Nym. in Bot Notiser (1851), 133 = verticillata.
nana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 138-Calluna vulgaris.
nana, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 355.— Afr. austr.
neglecta, G. Don, Gen. Syst. iii. 792=.gracilis, *Wendl.*
Neillii x, Hort. ex Paxt. Mag. Bot. ix. (1842) 195.
nemorosa, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 688 = floribunda.
nidicularia, G. Don, Gen. Syst. iii. 799, sphalm.= nidularia.
nidiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 883 = E. Muscari.
nidularia, *Lodd. Bot. Cab.* t. 764.—Hab. ?
nigricans, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort Brit. 151 =seq.
nigrita, *Linn. Mant.* i. 15.—Afr. austr.
nitens, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 6?2 = lucida.
nitens, *[Forbes] Hort. Eric. Woburn.* 16.—Hab. ?
nitens, Lee, ex Stcnd. Norn. ed. II. i. 576 - Bergiana.
nitida, *Andr. Heathery,* iii. t. 181. - Afr. austr.
nitidula, Hort. ex benth. in DC. Prod. vii. 687 = nigrita.
nivalis, *Andr. Col. Heaths,* iv. 250.—Afr. austr.
nivca, *[Forbes] Hort. Eric. Woburn.* 16.—Afr. austr.
Nivenia, *Andr. Heathery,* ii. t. 76.—Afr. austr.

ERICA:—

nodiflora, *Klotasch, in Linnaea,* xii, (1838) 539.—Afr. austr.
nodiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 340= Grisebachia plumosa.
nolaeflora, Salisb. 1. c. 371 = plumosa.
notabilis, Wendl. ex Spreng. Syst ii. 184=Eremia tubercularis.
nudicaulis, Berg. Desc. PI. Cap. 118-pilulifera.
nudiflora, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 678- nidularia.
nudiflora, *Linn. Mant.* ii. 229.—Afr. austr.
nutatis, G. Don, Gen. Syst. iii. 796^rubens.
nutans, *Wendl. Eric, i./asc.* m. 5.—Hab. ?
obbata, *Andr. Heathery,* i. t. 32.—Afr. austr.
obcordata, [Forbes] Hort. Eric. Wobum. 17 = bracteata.
obesa, Salisb. Prod. 294 = margaritacea.
obesa, *Tausch, in Flora,* xxii. (1889) II. 628,—Hab. ?
obliqna, *Ait. Exot. PI.* t. 3; *Thunb. Diss. Eric.* 44.— Afr. austr.
oblonga, [Forbes] Hort. Eric. Wobum. 17-Massoni.
oblongiflora, *Benth. in DC. Prod.* vii. 632.—Afr. austr.
oblongi/olia, Steud. Norn. ed. II. i. 577, sphalm.— praec.
obpyramidalis, Salisb. Prod. 298 - pyramidalis.
obtecta, *Tausch, in Flora,* xxii. (183!)) II. 638.—Afr. austr.
obtusa, Lodd. Bot. Cab. t. 1027=brevifolia.
obtusata, *Klotmch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 613.— —Afr. austr.
obvdllaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 386 = bracteata.
ochroleuca, Wendl. f. ex Benth. in DC. Prod. vii. 687 - nigrita.
octogona, *Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 147.—Hab. ?
octophylla, Thunb. Diss. Eric. 44-fascicularis.
odorata, *Andr. Col. Heaths,* iii. 191.—Afr. austr.
odorata, Spreng. Neue Entdeck. i. 271 = laevis.
ollula, Andr. Col. Heaths, iv. 251 -> inflate.
olympiaca, Sibth. ex Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 324 = Bruckenthalia spicnlifolia.
onosmaeflora, *Salisb. 1. c.* 303.—Afr. austr.
oophylla, *Benth. in DC. Prod.* vii. 672.—Afr. austr.
oppositi/olia, Andr. Col. Heaths, iii. 192-lutea.
opulenta, *Wendl. ex Klottsch, in Linnaea,* xii. (1838) 499.—Afr. austr.
orbicularis, Lodd. Bot. Cab. t. 153 - Blaeria- ericoides.
ornata, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod, vii: 620 = imbricata.
ostrina, Lodd. Bot. Cab. t. 1218=coccinea.
ovata, Lodd. 1. c. t. 417 -hirtiflora.
ovata, Wendl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 577-versicolor.
ovina, *Klotasch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 674,— Afr. austr.
oxycoccifolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 324.—Afr. austr.
Pabsti, *Regel, Gartenfl.* (1858) 50.—Hab. ?
pachycephala, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 689 = lasciva.
pachyphylla, Spreng. Syst. ii. 199 = brevifolia.
padibunda, Pers. Syn. i. 431, sphalm.—nutans.
paleacea, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 620 = imbricata.
paleacea, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 341 ***(^Syndesmanthus articulatus).*—Afr. austr.**
pallens, *Andr. Col. Heaths,* iii. 194.—Hab. ?
pallens, *Spreng. Pugill.* i. 30.—Hab. ?
pallescens, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 541 — Meyeriana.
pallida, Lodd. Bot Cab. t. 1355 - Massoni.
pallida, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 326 = pubescens.
pallida, Wendl. Eric. iii. fasc XXV. 11. t. 5 cpalliiflora.
pallidiflora, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 679 — persoluta.
pallido-purpurea, Linn. Sp. PL 854=vagans.
palliiflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) **351.** —Afr. austr.
paludosa, Salisb. Prod. 293 = condnna.
palustris, *Andr. Heathery,* ii. t. 77.—Afr. anstr.
paniculata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 608.—Afr. austr.
paniculata, Lodd. Bot Cab. t. 1194-gnaphalodes.
paniculata, Thunb. Prod. PI. Cap. 72=SiinocheiIus ouovatus.

EKICA:—
paniculata, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 577 = persoluta.
pannosa, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 339 = barbate.
parilis, *Salisb. I. c.* 371.—Afr. austr.
Parmentierii, Lodd. Hot. Cab. t. 197 — praestans.
parvifloia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 506.—Afr. austr.
l'asserinae, *Linn. f. Suppl.* 221; *Thunb. Diss. Eric.* 18.—Afr. austr.
*pas*erinaefolia,* Salisb. in Trans. Linn. Sue. vi. (1802) SI52 = E. Passerinae.
patens, *Andr. Col. Heaths,* ii. 115.—Hub.
Patersonia, Thunb. Prod. PI. Cup. 189; Andr. Col. Heaths, i. 43=abietina.
patersonioides, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 18 = Massoni.
patula, *Klotasch, in Linnaea,* xii. (1838) 588.—Afr. austr.
patula, £. Mey. ex Benth. in DC. Prod. vii. 680 = Ieptopus.
pavettaeflora, *Salisb. Prod.* 297.—Afr. austr.
Paxtoni, *Gentilh. V Carr. in Rev. Hortic.* (1882) 407.—Hab.»
peetinata, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 647 = Eremia totta.
peetinata, *Klotzsch, in Linnaea,* xii. (1838) 509.—Afr. austr.
pectinifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 367-erubescens.
pedicellata, *Klotasch, in Linnaea,* xii. (1838) 625.—Afr. austr.
peduncularis, J. & C. Presl. Delic. Prag. 89-= molliflora.
]ieduncularis, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (lfcOi) 329.—Afr. austr.
pedunculata, Andr. Col. Heaths, iv. 252 - pilulifera.
pedunculata, Wendl. Eric. ii. fast xxm. 173. t. 66 = lateralis.
pelluciila,^»irfr. *Col. Heaths,* hi. 197.—Afr. austr.
pellucida, Salisb. in Trans. linn. Soc. vi. (1802) 384, ex parte = venusta.
pellucidioides, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 18-pellucida.
peltata, *Andr. Col. Heaths,* iv. 254.—Afr. austr.
pelvifonnis, *Salisb. Prod.* 298.—Afr.' austr.
pendula, Lodd. Bot. Cab. t. 902 = rubens.
penduln, Wendl. Bot. Beobaeht. 48 = stricta.
penicillala, *Andr. Col. Heaths,* ii. 116.—Afr. austr.
penicillata, Lodd. Bot. Cab. t. 1918 = Plukeneti.
penicilliflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 348.—Afr. austr.
penicilliformis, Salisb. Prod. 297 = priiec. ?
pentaphylla, Linn. Sp. PI. ed. II. 506 - urceolaris.
periplocaeflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 337.—Afr. austr.
perlata, *[Forbes] Hort. Eric. Woburn.* 18.—Afr. anstr.
perlata, Lee, ex Benth. in DC. Prod. vii. 672 = globosa.
persoluta. Curt. Bot. Mag. t. 342 = pelvifonnis.
persoluta, *Linn. Mont.* ii. 230.—Afr. austr.
perspicua, Andr. Col. Heaths, iv. 255 = perspicua, *Wendl.V*
perspicua, {Forbes] Hort. Eric Wobum. 18-Massoni.
perspicua, *Wendl. Bot. Beobaeht.* 45.—Afr. austr.
persbicuoides, [Forbes] Hort. Eric. Woburn. 18 = Massoni.
pelioiaris, *Lam. Encyc.* i. 487.—Afr. anstr.
petiolaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802; 334 = petiolata.
peliolata, *Thunb. Diss. Eric.* 15.—Afr. austr.
Petiveri, Linn. Mar.t. ii. 235 = Sebana.
Petiveriana, Andr. Col. Heaths, i. 44 = seq.
Petiverii, *Willd. Sp. PI.* ii. 884.—Afr. austr.
petraea, *Benth. in DC. Prod.* vii. 668.—Afr. austr.
Peaiaa, Lodd. Bot. Cab. t. 265 = nivalis.
pharetraeformis, Salisb. Prod. 295=exsurgens.
phylicaefolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 364 —purpurea.
phylicoides, Willd. Sp. PI. ii. 361 = pulchella.
physantha, *Benth. in DC. Prod.* vii. 619.—Afr. austr.
physodes, *Linn. Syst.* ed. X. 1002.—Afr. austr.
physophylla, *Benth. in DC. Prod.* vii. 682.—Afr. austr.
picta, [Forbes] Hort. Eric. Wobnrn. 19=vestiflua.
pilifera, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 505-tncho-phora.
pilifera, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 188.—Afr. austr.
pilosa, Lodd. Bot Cab. t. 606 = villosa.
pilulae/ormis, Benth. in DC. Prod, vii, 680, sphalm = pilulifera.

EBICA:—
pilularis, Berg. Desc. PI. Cap. 111 = ramentacea.
pilularis, Lodd. Bot. Cab. t. 1568 = mucosa.
pilulifera, Andr. Heathery, t. 278 = mucosa.
pilulifera, *Linn. Sp. PI.* 355.—Afr. austr.
pilulifera, Wendl. Eric. ii. fasc. xix. 107. t. 41-strigosa.
pituliformis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 378-pilulifera.
pinea, Andr. Col. Heaths, t. 46 = longifolia.
pinea, *Thunb. Diss. Eric.* 23.—Afr. austr.
pinea, Wendl. Eric. i. fasc. i. 11 = E. Leea.
pinguis, *Klotzsch, in Linnaea,* x. (1836) 351.—Afr. austr.
pinifolia, Andr. Col. Heaths, ii. 119 -= longifolia.
pinifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 362 = vestita.
piniformis, Wendl. ex Klotzsch, in Linnaea, ix. (1834) 626=longifolia.
pistillaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 368 =australis.
pityophylla, Spreng. Syst. ii. 181 - longifolia.
placentaeflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 348-tiaraeflora.
planifolia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 508.—Afr. austr.
planifolia, Wendl. Eric ii. fasc. xn. 59 = thymifolia.
Plukeneti, *Linn. Sp. PI.* 356.—Afr. austr.
Plukenetiana, Ait. Exot. PI. t. 9 = praec.
Plukenetii, Berg. Desc. PI. Cap. 91 = Sebana.
plumigerafiaiA. in Linnaea, vii. (1832) 636 - chlamydi-flora.
plumosa, *Andr. Heathery,* i. t. 36.—Afr. austr.
plumosa, Thunb. Prod. PL Cap. 73 = Grisebachia ciliaris.
plumosa, Wendl. Eric. i. fasc. XII. 5 = serratifolia.
podophylla, *Benth. in DC. Prod.* vii. 681.—Afr. austr.
pogonanthera, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) 634.—Afr. austr.
Pohlmanni, Lodd. Bot. Cab. t. 1852 = E. Lachnaea.
polifolia, *Salisb. ex Benth. in DC. Prod.* vii. 615.—Afr. austr.
polyantha, *Klotasch, ex Benth. 1. c.* 688.—Afr. austr.
polycodon, *Benth. 1. c.*—Afr. austr.
polycoma, *Benth. 1. c.* 655.—Afr. anstr.
polygalaeflora, *Klotasch, in Linnaea,* xii. (1838) 537.—Afr. austr.
polytricha, Sweet, Hort. Brit ed. II. 338 = speciosa.
polytrichifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 329=lusitanica.
pomifera, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 654 = andromedaeflora.
porrigens, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 638 = imbricata.
praecox, *Klotasch, in Linnaea,* xii. (1838) 517.—Afr. austr.
praecox, Lodd. Bot. Cab. t. 1413-strigosa.
praegnans, Andr. Col. Heaths, iii. '202 — ventricosa.
praenitens, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 596.—Hab. *t*
praestans, *Andr. Col. Heaths,* iv. 257.—Afr. austr.
praeusta, bartl. in Linnaea, vii. (1832) 645—pubigera.
primuloides, Andr. Col. Heaths, iii. t. 203 = fastigiata.
Princeps, Andr. 1. c. ii. 121—Massoni,
procera, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 328 = arborea.
procera, Wendl. Bot. Beobaeht 45 =ignescens.
procumbens, *Lodd. Bot. Cab.* 1.1993.—Hab. ?
prolifera, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 376.-= persoluta.
propendens, *Andr. Col. Heaths,* ii. 122.—Afr. austr.
prostrata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 138 = Calluna vulgaris.
protrudens, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 872.—Afr. austr.
protrusa, Salisb. Prod. 293=australis.
Pseudovestita, Benth. in Maund, Botanist, iii. t. 104 - Massoni ?
puberula, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 644=hirtiflora.
pnbernla, *Klotasch, I. c.* ix. (1834) 629.—Afr. austr.
pubescens, Andr. Col. Heaths, i. t. 48=hirtiflora.
pubescens. Curt. Bot. Mag. t. 480 - parviflora.
pubescens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 506.—Afr. austr.
pubescens, Sieber, ex Benth..in DC. Prod. vii. 674 = mollis.
pnbigera, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 872.—Afr. austr.
pudibunda, Salisb. 1. e. 345—nutans.
pugionifolia, Salisb. 1. c. 387=tetragona.

ERICA:—
pulchella, *Houtt. Handleid.* iv. 504; *Andr. Col. Heaths,* i. 49.—Afr. austr.
pulchella, Thunb. Diss. Eric. 22-E. Leea.
pulchella, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 578-onos-maeflora.
pulcherrima, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 434 =jasminiflora.
pulchra, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 384 = E. Walkeria.
pulverulenta, *[Forbes] Hort. Eric. Woburn.* 20—Afr. austr.
pulviniformis, Salisb. Prod. 295 = coccinea.
pumila, *Andr. Col. Heaths,* iv. 258.—Afr. austr.
punctata, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 646=cordata.
pura, Andr. ex Benth. in DC. Prod. vii. 626 - E. Leea.
pura, Lodd. Bot. Cab. t. 72 = pubescens.
purialis, Host, ex [Forbes] Hort. Eric. Wobum. 20 = pubescens.
purpurascens, Lam. Encyc. i. 488=multiflora.
purpurascens. Linn. Sp. PI. ed. II. 5l'8 = mediterranea.
purpurea, *Andr. Col. Heaths, i.* 50.—Afr. austr.
purpurea, Thunb. Prod. PI. Cap. 71 = Blaeria purpurea.
pusilla, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 374.—Afr. austr.
pusilla, Thunb. Prod. PI. Cap. 70-Blaeria pusilla.
pyenantha, *Benth. in DC. Prod.* vii. 653.—Afr. austr.
pygmaea, Andr. Col. Heaths, iv. 259=sicaefolia.
pyramidalis,i4«. *Hort. Kew.* ed. I. iii. 4M1.—Afr. austr.
pyramidalis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 34»—imbricata.
pyramidiformis, *Wendl. Eric.* ii. fasc. xxiv. 181.—Hab.?
pyrolaeflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 851 = triflora.
pyxidiflora, Salisb. 1. c. 871 = empetroides.
quadraeflora, *Salisb. 1. c.* 375.—Afr. austr.
quadrangularis, Andr. Col. Heaths, iv. 260=Massoni.
quadrangularis, Salisb. Prod. 297=denticulata.
quadrata, Lodd. Bot. Cab. t. rJ43=formosa.
quadriflora, Andr. Heathery, i. t. 41 = Bergiana.
quadriflora, Klotzsch, in Linnaea, ix (1834) 665-dichrus.
quadriflora, *Willd. Sp. PI.* ii. 879.—Afr. austr.
quadrifolia, Pritz.·Ic. Ind. i. 421, sphalm. vide *quadriflora,* Andr.
quadrifossa, Salisb. Prod. 298=»mammosa.
quinquangularis, Berg. Desc. PI. Cap. 117 = imbricata.
racemifera, Andr. Col. Heaths, iii. 204=regerminans.
racemosa, *Thunb. Diss. Eric.* 31.—Afr. austr.
Rachii, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 80.—Hab. I
radiata, Andr. Col. Heaths, i. 52 = Massoni.
radiiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 360*= fascicularis.
ramentacea, *Linn. Mant.* ii. 232.—Afr. austr.
ramosissima, Kunth, ex Klotzsch, in Linnaea, *"• (1838) 220 = Philippia galioides.
ramosissima, Roxb. ex Steud. Nom. ed. I. 809-sal»*-
ramosissima, Wendl. Eric, it fasc. xvm. 98. t. 360[5] mollis.
ramulosa, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 632 = imbri<*»-
ramulosa, Viv. Ann. Bot. i. II. 169 = stricta.
Rastellum, Spreng. Syst. ii. 196—penicilliflora.
reenrvata, *Andr. Col. Heaths,* iv. 262.—Afr. austr.
reflexa, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 871.—Afr. austr.
refulgens, Andr. Col. Heaths, iv. 264 = versicolor.
regerminans, Andr. 1. c. 265 = pelvifonnis.
regerminans, Hort. ex Benth. in DC. Prod, vii 679 * persoluta.
regerminans, *Linn. Mant.* ii. 232.—Afr. austr.
regia, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) 680.—Afr. anstr.
Reginae, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 13[8] " Calluna vulgaris.
resinosa, Sims, Bot. Mag. t 1139-E. Vemix.
retorta, *Linn.f. Suppl.* 220.—Afr. austr.
retroflexa, Wendl. Eric. i. fasc. vm. 7 = pulchella.
retusa, *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 598.—Hab. ?
revolvens, Bartl. in Linnaea, vii. (1882) 631 = P' nk eneti.
rigens, Benth. in DC. Prod, vii 687, sphalm. = l*ga.
rigescens, Bartl. in Linnaea, vii. (1882) 685 = la*[1]-
rigida, Lodd. Bot. Cab. 11286=Massoni. , ...
rigidifolia, Wendl. Eric. ii. fasc. XX. 126. t. 48-tad"*
rigidiuscula, Wendl. ex Klotzsch, in Linnaea, >* (1834) 647-purpurea.
Rinzii, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) «.—*'" austr. *1*

EBICA:—

RollissonU, *[Forbes], Hart. Eric. Woburn.* **21.—Afr.** austr.

ro«a, Andr. Heathery, ii. t. 82=ves«ta.

rosea, Iichtenst. ex Klotzsch, in Linnaea, in. (1888) 504 = regerminans t.

rostella, [Forbes], Hort. Eric. Wobum. 21«=penicilliflora.

rostrata, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 632 =penidlliflora.

Roxburghii, *Benth. in DC. Prod.* vii. 682.—Afr. austr.

rubella, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 2165=glomerata.

rubens, *Andr. Heathery,* i. t. 43.—Afr. austr.

rubens, Thunb. Diss. Eric. 49=peduncularis.

rubercalyx, Andr. Col. Heaths, iv. 266-Massoni?

rubicunda, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 540 = teretiuscula.

rubida, Lodd. Bot. Cab. t. 1166-Massoni.

rubrocalyx, Gentilh. & Carr. in Rev. Hortic. (1882) 806, sphalm.=Massoni.

rubrosepala, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 339 = Massoni.

***nfeuxZ^Klofsch, in Linnaea,* x. (1836) 332.-Afr.** austr.

rugosa, Andr. Col. Heaths, iv. 267=Massoni.

rupestris, Andr. 1. c. ii. 128 = depressa.

rupestris, Salisb. in Trans. Unn. Soc. vi. (1802) 353 = halicacabft.

mpicola, *Klotisch, in Linnaea,* xii. (1838) 504.—Afr. austr.

Russeliana, *Andr. Col. Heaths,* iv. 269.—Hab.?

Russelliana, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1018.—Hab.?

sacciflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 855. —Afr. austr.

sagittata, ***Klotisch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 681.—** Afr. austr.

sagittifolia, Stokes, Bot Mat. Med. ii. 370-Calluna vulgaris.

Sainsburyana, Andr. Col. Heaths, iv. 270-inflate,

salax, ***Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 886.-** Afr. anstr.

Salisburia, Andr. Col. Heaths, iv. 271=purpurea.

sanguinea, *Lodd. Bot. Cab.* t. 86.—Afr. austr.

sanguinolenta, Lodd. 1. c. t. 468 = sicaefolia.

saturejaefolia, *Tausch, in Flora,* xxii. (.1839) II. 636.—Hab.?

Savilea, *Andr. Heathery,* t. 288.—Afr. austr.

Savileana, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 261 = praec.

Savileia, Andr. Col. Heaths, iii. t. 205=praec.

Savilliae, Lodd. Bot. Cab. t. 96 = praec.

saxatilis, Salisb. Prod. 295=camca.

scabra, F. W. Schmidt, Nene u. Selt. Pfl. 42 - hispida.

scabra,* Thunb. Prod. PI. Cap. 72** ***(=Syndesmanthus scaber).—Afr. austr.

scabriuscula, Drege, ex Benth. in DC. Prod. vn. 678 = strigosa

wabrinscuia, *Link.Enum. Hort. Berol.* i. 872.—Hab.?

scabriuscula, *Lodd. Bot. Cab.* t. 617.—Afr. austt.

scariosa, Berg. Desc. PI. Cap. 102=-spumosa,

scariosa, Lodd. Bot. Cab. t. 477-acuta.

scariosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 188=capillans.

x'ptriformis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1WI-; <)65=spicata.

Scholliana, Lodd. Bot. Cab. t. 538-plumosa.

scoliostoma, Klotzsch, in Linnaea, x. (1836) Bi-- E Mi a'

>*cop'ariaTc!'Kodi,* in Linnaea, xxiii. (1850) 624 = arborea.

scoparia, *Linn. Sp. PI.* 353.—Reg. Mediterr. occ.

sfoparia, Thunb. Diss. Eric. *»=arborea.

Sebana, ***Donn, Hort. Cantab.* 45; *ex Willd. Sp. PI-*** «• 395.—Afr. austr.

"cundiftora, Tausch, in Flora, xvii. (1884) II. 617 •= decora.

selaginifolia, ***Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802)** 338.—Afr. austr.

"misulcata, Drege, ex Benth. in DC. Prod. vu. 680 = depressa.

«i»«is, *Klotisch, ex Benth. 1. c.* 617.—Afr. anstr.

sequax, Salisb. Prod. 298 = physodes.

scriphiifolia, *Salisb. I. c.* 297.—Afr. austr.

"rpyllifolia, Andr. Heathery, vi. 289; Lodi Bot. Cab. t. 744-hispidula.

serrata, Thnnb. Prod. PI. Cap. 69=hispidula.

senatifolia, *Andr. Col. Heaths, i.* 58.—Hab. ?

serrulata, [Forbes], Hort. Eric. Woburn. 23 = diotmaefolia.

ERICA:—

sertiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 842 = nudiflora.

sessiliflora, Andr. Heathery, ii. t. 86'clavaeflora.

sessiliftora, Linn. f. Suppl. 222=spicata.

sessiliflora, Wendl. Eric. ii. fasc. XXII. 149 t. 66= genistaefolia.

setacea, *Andr. Col. Heaths,* i. 69.—Afr. anstr.

setacea, Drege, ex Benth. in DC. Prod. vii. 679=persoluta.

setifera, *Klotisch, ex Benth. 1. c.* 616.—Afr. austr.

setosa, *Bartl. in Linnaea,* viL (1832) 646.—Afr. anstr.

setula, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 689 = glumaenora.

setulosa, *Benth. I. c.* 682.—Afr. austr.

sexfaria, *Ait. Exot. PI* 1.11.—Afr. auatr.

Shalliana, Hort. Berol. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1888) 498 = Eremia parviflora.

Shannonea, ***Andr. Col. Heaths,* iv. 273; *Heathery,* t.** 239.—Afr. austr.

Shannoneana, Spreng. Syst. ii. 185-= praec.

Shannoni, Lodd. Bot. Cab. t. 168 =-praec.

Shannoniae, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 261-praec.

Shannoniana, Benth. in DC. Prod. vii. 644-praec.

sicaefolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 326. —Afr. austr.

simla, Gnss. Adnot. Cat. PI. Boccad. 6=Pentapera sicula.

Sieberiana, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 673 - catervaeflora.

simplieiflora, Willd. Sp. PI. ii. 402=curviflora et buccinaeformis.

simplidfolia, Steud. Norn, ed. I. 309=-praec.

sitiens, *Klotisch, in Linnaea,* xii. (1838) 505.—Afr. austr.

Smithiana, Lodd. Bot. Cab. t. 1614-regerminans.

socciflora, *Salisb, in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 347. —Afr. austr.

sodalis, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 690 = paniculata.

Solandra, *Andr. Heathery,* ii. t. 89.—Afr. austr.

Solandriana, Benth. in DC. Prod. vii. 658=praec.

solandroides, Andr. Col. Heaths, iv. 274 - stellata.

sordida, Andr. 1. c i. 60=*conspicua.

sordida, Drège, ex Benth. in DC. Prod. vii. 634 = tubiflora.

Sparmanni, ***Linn. f. in Vet. Acad. Handl. Stocth.*** (1772) 24. t. 2.—Afr. austr.

sparsa, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 620 = imbricata.

sparsa, Lodd. Bot. Cab. 1.1467 - floribunda.

speciosa, *Andr. Col. Heaths,* ii. 138.—Afr. austr.

speciosa, Schneev. Ic. PI. Rar. 3 = mammosa.

speciosissima, Klotzsch, in Linnaea, ix. (1834) 645 = fulgida.

spectabilis, ***Klotesch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 659.** —Afr. austr.

spectabilis, Waitz, Beschr. Gatt. Art. Heid. 220 = grandiflora.

sphaerantha, Link, ex Steud. Nom. ed. II. i. 580 = tenera.

sphaerantha, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 146.—Afr. austr.

sphaerocephala, ***Wendl. ex Benth. in DC. Prod.* vii.** 668.—Hab.?

sphenanthera, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) II. 626.—Hab.?

spicata, *Thunb. Diss. Eric.* 43. t. 4.—Afr. austr.

spiculifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 324 = Bruckenthalia spiculifolia.

spiraeaeflora, Salisb. 1. c. 850 = leucanthera.

spiralis, ***Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 158,** nomen.—Hab.!

spirans, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 28 = odorata.

spissifolia, Salisb. Prod. 293 = abietina.

splendens, Andr. Col. Heaths, iv. 275-tumida.

splendens, Wendl. Eric. i. fasc. vm. 5 = conspicua.

splendida, ***Mackay, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 146,** nomen.—Hab. ?

Sprengelii, Endl. in Halting. Parad. Vindob. t. 67. f. 2 =aristata.

Sprengelii,S'ne&, ex Steud. Nom. ed. II. i. 680-lacti- spumosa, *Linn. PI. Rar. Afr.* 11; *Mant.* it. 376.—Afr. anstr.

spumosa, Thunb. Diss. Eric 17 =• sexfaria.

spumosa, Wendl. Eric. ii. fasc. XVI. 51.1.19-triceps.

spuria, Andr. Col. Heaths, i. 62-Massoni.

ERICA:—

squamaeflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 849 - imbricata.

squamosa, *Andr. Heathery,* ii. t 91.—Afr. austr.

squarrosa, ***Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (lbU2) 880.** —Afr. anstr.

stagnalis, Salisb. 1. c. 359 - sulphurea.

staminea, *Andr. Cdl. Heaths,* iii. 208.—Afr. anstr.

Steinbergiana, ***Wendl. f. ex Klotisch, in Linnaea,* xii.** (1838) 581.—Afr. austr.

stellaris, Nois. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 827=seq.

stellata, *Lodd. Bot. Cab.* t. 893.—Afr. austr.

Stelleriana, Willd. Sp. PI. ii. 387-Cnssiope Stelleriana.

stellifera, Andr. Col. Heaths, iv. 276-Massoni.

stenantha, ***Klotisch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 685.—** Afr. austr.

stenantha, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 840 - tenuiflora.

stenoma, *Tausch, in Flora,* xxii. (1839) li. 6*3.—Hab.?

stenophylla, *Benth. in DC. Prod.* vii. 679.—Afr. austr.

stricta, ***Donn, Hort. Cantab.* 45; *ex Willd. Sp. PL* ii.** 866.—Eiirop. austr.

strictiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 580, sphalm. = seq.

strictifolia, Klotzsch, in Linnaea, ix. (1834) 646 = grandiflora.

strigiliflora, Stend. Nom. ed. II. i. 580, sphalm. = seq.

strigilifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 3«7 —elongata, erubeacens.

strigosa, ***[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 17.—** Afr. austr.

strigosa, Wendl. Eric. i. fasc. II. 25=perioluta.

struthiolaeflora, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 148 = seq.?

stTuthiolaefolia, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 63ti ~ teretiuscula.

strutiaefolia, Steud. Nom. ed. II. i. S80, sphalm.= praec praec

stylaris, *Spreng. Syst.* ii. 198.—Afr. austr.

siylosa, Rudolph, in Schrad. Journ. (1800) II. 229-- arborea.

stylosa, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 330 = imbricata.

snaveolens, *Andr. Col. Heaths,* iv. 277.—Afr. austr.

suaveolens, Lodd. Bot. Cab. t. 24 ~ latifolia.

suavis, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 6-ll=cornut.i.

subdivaricata, Berg. Desc PI. Cap. 114 = persoluta.

subterminalis, ***Klotesch, ex Benth. in DC. Prod.* vii.** 670.—Afr. austr.

snbulata, *Wendl. Eric,* it fasc. XX. 123. t. 47-—Afr. austr.

suffulta, ***Wendl. ex Benth. in DC. Prod.* vii. 619.—** Afr. austr.

sulcata, *Benth. I. c.* 632.—Afr. austr.

sulcata, *Hornem. Hort. Hafn.* i. 371.—Afr. anstr.

sulphurea, *Andr. Col. Heaths,* iv. 278.—Afr. nustr.

superba, ***Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* iii. 35.—Hab. ?**

superba, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 340 = purpurea?

Svainsonia, Andr. Col. Heaths, iii. 209 •= Massoni.

Syndriana, ***Hort. ex Gentilh.* b* *Carr. in Rev. Hortic.*** (1882) 3Q6.-Hab.?

tardiflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 373 =parviflora.

taxifolia, ***[Dryand. in] Ait. Exot. PI.* t. 19; *Wendl. Bot. Beobacht.*** 44.—Afr. austr.

tegulaefolia, Salisb. in Trans. Unn. Soc. vi. (1802) 351 —squamosa.

Templea, Lee, ex Andr. Col. Heaths, iv. 280 = Massoni?

tenella, *Andr. Heathery,* ii. t. 94.—Hab.?

tenera, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 677 = gracilis.

tenera, *Steud. Nom.* ed. II. i. 680.—Hab.?

tenuicaulis, ***Klotisch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 669.** —Afr. austr.

tenuiflora, *Andr. Heathery,* Iii. 1.146.—Afr. austr.

tenuifolia, Hort. ex Salisb. in Trans. Line. Soc. vi. (1802) 8SL-campanulata.

tenuifolia, *Linn. Syst.* ed. X. 1002.—Afr. austr.

tenuis, ***Atoench, Meth. Suppl.* 17.—Hab.?**

tennis, ***Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 329.—** **Afr. austr.**

ttnuissima, Wendl. Eric. i. fasc. VI. 9 = gracilis.

teretiuscula, *Wendl. I. c.* ii. fasc xxi. 141.—Afr. austr.

terminals, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 509 = curvifolia.

ERICA:—
terminalis, *Salisb. Prod.* 296.— Ins. Corsica,
tetragona, *Linn.f. Suppl.* 223; *Thunb.Diss.Erir.* 14.—Afr. austr.
Tetialix, *Linn. Sp. PI.* 3B8.—Europ.
ietraloba, Roxb. ex Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) S37=genistaefolia.
tetrathecoides, *Benth. in DC. Prod.* vii. 683.—Afr. austr.
teuciiifolia, *Spreng. Pttgill.* i. 31.—Afr. austr.
thalictriflora, Lodd. Hot. Cab. 1.1294--staminea.
thimifolia, *Wendl. Bot. Beobacht.* 48.—Hab.?
Thomsoniix, Lem. Jard. Fleur, iii. (185-2) t. 259.
Thunbergii, *Linn.f. Suppl.* 220.—Afr. austr.
thymifolia, *Andr. Col. Heaths,* ii. 186.—Afr. austr.
thymoides, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 670 « tiacca.
thyrsoidea, Tausch, in Flora, xvii. (1834) II. 619 = curvirostris.
liaraeflora, *Andr. Col. Heaths,* iii. 213.—Afr. austr.
togata, Sims, Tiot. Mag. t. 1626-= borbuniaefolia.
togatoides, Forbes, Hort. Woburn. 86-= bracteata.
tomentosa, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 327.—Afr. anstr.
torosa, *Munich, Meth. Suppl.* 18.—Hab. ?
torluosa, *Lodd. ex C. Don, in Loud. Hort. Brit.* 158, nomen.—Hab. ?
lotto, IJartl. in Linnaea, vii. (1382) 647 = Eremia Bartlingiana.
tntta, Thunb. Diss. Eric. 18 = Kremh totta.
Iragulifera, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 374 -nitida.
translucens, Andr. Heathery, t. 2ft5 = Massoni?
translucens, *Wendl. ex Spreng. Syst.* ii. 186, in syn ; *Tausch, in Flora,* xvii. (1834) II. 596.—Afr. austr. ?
transparent *Andr. Col. Heaths,* iv. 283.—Afr. austr.
transparens, Berg. Desc. PI. Cap. 108=comosa.
traasparens, Thunb. Prod. PI. Cap. 71 = elongate.
transsylvanica, Willd. ex Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 217 = Bruckenthalia spiculifolia.
t-rassula, Klotzsch. 1. c. 515, vide *trossula.*
triceps, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 371.—Afr. austr.
trichophora, *Benth. in DC. Prod.* vii. 673.—Afr. anstr.
trichophylla, *Benth. 1. c.* 679.—Afr. austr.
trichroma, *Benth. I. c.* 642.—Afr. austr.
tricolor, Niven, ex Benth. 1. c. = trichroma.
tricolor, Spreng. Syst. ii. 193=cuinuliflora.
trifaria, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 620 - imbricata.
triflora. *Linn. Sp. PI.* 854.—Afr. austr.
triphylla, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 860.—Afr. austr.
tristis, *Bartl. in Linnaea,* vii. (1832) **643.—**Afr. austr.
tristis, Klotzsch, 1. c. xii. (1888) 519 -= Savilea.
triumphans, Lodd. Bot. Cab. t. 257 =andromedaeflora.
trivialis, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 666 = dccipiens.
trossula, Lodd. Bot. Cab. t 668 = E. Muscari.
tubercularis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 330 = Eremia tubercularis.
tubiflora. Linn. Sp. PI. ed. II. 605 = ignescens.
tubiflora, Thunb. Diss. Eric. 25 = buccinaefonnis.
tubiflora, *Willd. Sp. PI.* ii. 403.—Afr. austr.
tubiuscula, Bedf. Hort. Eric. Wobum. 26; Lodd. Bot. Cab. t. 1157 = parviflora.
tubulosa, Sm. ex Steud. Norn. ed. I. 810=tubiflora.
tubulosa, Wendl. Eric, ii.fasc.xvi. 57, t. 22-Massoni.
tumida, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 65.—Afr. austr.
tunicata, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 686=corifolia.
turbinata, *Andr. Heathery,* vi. 297.—Afr. austr.
lurbiniflora, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 377.—Afr. austr.
turgida, Link, Enum. Hort Berol. i. 865=taxifolia.
turgida, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802; 345.— Afr. austr.
turmalis, *Salisb. 1. c.* 342.—Afr. austr.
turrigera, *Salisb. 1. c.* 377.—Hab. ?
Uhria, *Andr. Col. Heaths,* ii. 141.—Afr. austr.
umbellata, Asso, Syn. Arag. 49 — australis.
umbellata, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 647 « deliciosa.
umbellata, *Lint. Sp. PI.* 352.—Reg. Mediterr. occ.
ttmbelli/era, Loisel. in Desv. Joura. Bot. ii. (1809) 287 = multiflora.
umbelli/era, Wendl. Eric. iii. fasc. xxv. 13. t. 6 = **tenelfa.**

ERICA:—
umbelliflora, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 659.—Afr. austr.
umbelliflora, C. Koch, Dendrol. ii. II. 377. Ind. sphalm. — multiflora.
uncifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 869 » regcnnioiuis.
undulata, Andr. Col. Heaths, iv. t. 288; Lodd. Bot. Cab. t. 1792 = Massoni?
unibracteata, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 692.—Afr. austr.
unica, Spreng. Syst. ii. 188-= pilulifera.
unicolor, Wendl. Eric. iii. fasc. xxv. 7. t 3 = virescens.
uniflora, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 11.—Afr. austr.
unilateralis, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 667-—Afr. austr.
urceolaris, *Berg. Desc. PI. Cap.* 107.—Afr. austr.
urceolaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 326 =hirta.
urceolaris, Sibth. & Sm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 581 -vagans.
urs'ina, *Lee, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 268, nomen.—Hab.?
vaga, Benth. in DC. Prod. vii. 667 = verticillata.
vaga, Salisb. Prod. 294-vagans.
vagans, Desf. Fl. Atlant. i. 329; DC. Fl. Fr. iii. 679 = multiflora.
vagans, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 548 = verticillata.
vagans, *Linn. Mant.* ii. 230.—Reg. Mediterr.
Vanheurokii, *Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 36.— Afr. eusti.
vaiia, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1325.—Afr. austr.
variabilis, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.* vii. 690.— Afr. austr.
variifolia, Salisb. Prod. 298 = Monsoniana.
velitaris, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (.1802) 357. —Afr. austr.
velleriflora, Salisb. 1. c. SS3»bruniades.
velutina, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 645 = tomentosa.
venosa, *Gentilh. &" Carr. in Rev. Hortic.* (1882) 406.— Hab.?
ventricosa, *Thunb. Diss. Eric.* 27.—Afr. anstr.
ventrosa, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 841.—Afr. austr. ?
venusta, *[Forbes] Hort. Eric. Woburn.* 27 ; *Benth. in DC. Prod.* vii. 647.—Afr. austr.
venusta, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. '647 = denticulata.
venusta, Klotzsch, in Linnaea, ix. (1834) 695 = elongara.
venusta, Salisb. Prod. 297 = ventricosa.
verecunda, Lodd. Bot. Cab. t. 1827 = Menroni.
verecunda, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802'; 879. —Afr. austr.
vernalis, Lodd. Bot. Cab. t. 1608=pyramidalis.
vemiciflua, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 835. —Afr. austr.
***Vemix, Andr. Col. Heaths,* iii. t. 214.—Afr. austr.**
Vemoni, *Gentilh.* b* *Carr. in Rev. Hortic.* (1882) 408. —Hab.?
versicolor, *Andr. Col. Heaths, i.* 67.—Afr. austr.
vertidllaris, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (.1802) 360—conspicua.
verticillata, Andr. Col. Heaths, i. 66=mammosa.
verticillata, Berg. Desc. PI. Cap. 99 = concinna.
verticillata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 210.—Reg. Mediterr. or.
vesicaria, Soland. ex Salisb. in Trans. Linn. Soc vi. (1802) 830-glomiflora.
vcsicularis, *Salisb. 1. c.* 835.—Hab. ?
vespertina, *Linn. f. Suppl.* 221.—Afr. austr.
vestiflua, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* vi (1802) 346.— Afr. austr.
vestita, Drege, ex Benth. in DC. Prod. vii. 625 = longifolia.
vestita, *Thunb. Diss. Eric.* 22.—Afr. anstr.
vestitoides, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 30. -Hab.!
villosa,i4n<*r. *Col. Heaths,* iii. 216.—Afr. austr.
villosa, Wendl. Eric ii. fasc. XVI. 55. t. 21=bruniades.
villosiuscula, Lodd. Bot. Cab. t. 1844=pusilla.
viminalis, Salisb. Prod. 298>albens.
violacea, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 620-= imbricata.
virescens, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 359.—Afr. austr.
virescens, Thunb. Diss. Eric. 37 — pelviformis.
virgata, *Berg. Desc. PI. Cap.* 97.—Afr. austr.

ERICA:—
virgata, Thunb. Diss. Eric. 18 = hispidula.
virgata, *Wendl. ex Spreng. Syst.* ii. 197.—Afr. austr.
virginalis, *Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod.vii.* 653.— Afr. austr.
virgularis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 824 -hispidula.
virgulata, Wendl. Eric. ii. fasc. XXI. 131. t. 49-= acoparia.
viridescens, Lodd. Bot. Cab. t. 283=virescens.
viridiflora, *Andr. Col. Heaths,* iv. 287.—Afr. austr.
viridipurpurea, Gouan, Hort. Reg. Monsp. 195 = cinerea.
viridipurpurea, Linn. Sp. PI. 353=pelviformis.
viridis, Andr. Col. Heaths, ii. 140 = E. Leca.
viscaria, Ait. Exot. PI. t. 1= decora.
viscaria, Bory, ex Benth. in DC. Prod. vii. 6»6 =-Philippia viscosa.
viscaria, *Linn. Mant.* ii. 231.—Afr. austr.
viscida, Salisb. in Trans. Linn. Sou. vi. (1802) 372 = viscaria.
viscida, Wendl. Eric. ii. fasc. xm. 7 = onosmaeflora.
viscosa, Steud. Nom. ed. I. 311, sphalm.—praec.
volutaeflora, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi.(1802) 335 = nigrita.
vulgaris. Linn. Sp. PI. 852 = Calluna vnlgaris.
Walkeria, *Andr. Col. Heaths,* i. 72.—Afr. austr.
Walkeriana, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 341-praec.
Watsonix, Benth. in DC. Prod. vii. 665.—Anglia.
Wendlandiana, *Klotzsch, in Linnaea,* ix. (1834) 652. —Afr. austr.
westphalingia, Hort. ex Benth. in DC. Prod. vii. 639 - Massoni?
Willmorei x, Knowles & Westc. Fl. Cab. ii. (18381115.
xeranthemifolia, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 339 = Eremia lanata.
Zeyheri, Bartl. in Linnaea, vii. (1832) 635-affinis.
Zeyheri, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 12.—Afr. austr.

ERICALA, Renealm. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 335 (1821) = GentIana, Toum.
acuta, G. Don, Gen. Syst. iv. 190 - G. Amarella.
aestiva, U. Don, 1. c. = G. verna.
alpina, G. Don, 1. c. 189 — G. acaulis.
altaica, G. Don, 1. c. = G. altaica.
angulosa, G. Don, 1. c. 191 = G. verna.
angustifolia, G. Don, 1. c. 190—G. angustifolia.
aquatica, G. Don, 1. c. 192 = G. aqnatica.
argentea, G. Don, 1. c. = G. argentea.
bavarica, S. F. Gray, Nat Arr. Brit PI. ii. 836-G. bavarica.
canaliculata, Steud. Nom. ed. II. i. 582=Jaeschkea latisepala.
capitata, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst iv. 193 = G. capitata.
carinata, D. Don, ex G. Don, 1. c. 189 = G. carinata.
carpathica, G. Don, 1. c. MO = G. nivalis.
coronata, D. Don, ex G. Don, 1. c. 193 - G. coronata.
cruciata, G. Don, 1. c. 191 - G. cruciata.
decemfida, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 614 » G. decemfida.
depressa, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 189^0. depressa.
Douglasiana, G. Don,l. c. = G. Douglasiana.
flava, G. Don, 1. c »G. Amarella.
humilis, G. Don, 1. c. 198 - G. humilis.
imbricata, G. Don, 1. c. 190 = G. imbricata.
linearis, G. Don, 1. c. 190 - G. linearis.
Loureiri, G. Don, 1. c. 192 = G. indica.
marginata, D. Don, ex G. Don, 1. c. 192 = G. carinata-
nivalis, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit PI. ii. 386-1'-nivalis.
nutans, G. Don, Gen. Syst. iv. 192 = G. prostrate.
orbiculata, G. Don, 1. c. 193 = G. qnadri&ria.
pedicellate, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 514 = G. quadrifaria.
procumbens, G. Don, Gen. Syst iv. 192 - G. quadri-faria.
prostrata, G. Don, 1. c 190-G. prostrata.
pumila, G. Don, 1. c. 189 -- G. pumila.
pyrenaica, G. Don, 1. c—G. pyrenaica.
quadrifaria, G. Don, 1. c 190 = G. quadrifaria.
Royleana, G. Don, 1. c. 191 = G. decemfida.
sedifolia, G. Don, 1. c. 189 = G. sedifolia.
ipathacea, G. Don, 1. c. 191 - G. spathacea.
squarrosa, G. Don, 1. c = G. squarrosa.
Thunbergii, G. Don, 1. c 192 = G. Thunbergii.
tubiflora, G. Don, 1. c. 189 = G. tubiflora.

ERICALA :—
utriculosa, G. Don, Gen. Syst iv. 191 = Gentiana utriculosa.
tenusta, G. Don, 1. c. 189=G. venusta.
vena, S. F. Gray, Nat. AIT. Br. PI. ii. 335 = G. vena.

ERICAMERIA, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (18111 318-Aplopappus, Cass. (Compos.).
diffusum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 23 = Bigelovia diffusa.
trecta, Klatt, in Abh. Natnrf. Ges. Halle, xv. (1882) 326-A. Bloomeri.
microphylla, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. viL ll»41)S19 = A.ericoides.
nana, Nutt. 1. c. - A. nanus.
resinosa, Nntt. 1. c.=A. nanus.

ERICAULON, Lour. Fl.Cochinch. i. 60 (1790) sphalm. = Etlocaulon, Linn.

ERICILLA, Steud. Norn, ed. II. i. 582 (1840)-ErollU, Juss. (Phytolae.).

ERICINEIIIIA, Klotzsch, in Linnaea,rii. (1838) 222. *ERICACEAE,* Benth. & Hook. £ ii. 591.
pacilis, *Benth. in DC. Prod.* vii. 697.—Afr. anstr.
Mannii, *Hook./, in Joum. Linn. Soc.* vi. (1862) 16.—Afr. trop.
multiflora, *KlotMsch, in Linnaea,* xii. (1838) 223—Afr. anstr.
passerinoides, *Bolus, in Journ.Linn. Soc.* xviii. (1881) 893.—Afr. anstr.

ERICOILA, Renealm. ex Borckh. in Roem. Arch. i. i. 23 (1796)-OentUna, Toum.
"estiva, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gentian. 15=G. vema.
"Itaica, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 27-G. altaiea.
ongulosa, BcnhL & Presl, Rostl. i. Gentian. 15=G. vema.
"ouaiica, Borckh. in Roem. Arch. i. i. 27=G. aqnatiei.
f *urea,* Bercht. & Presl, Rostl. i. GenUan. 14=G. aurea.
'avarica, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 27 = G. oavarica.
Avojta, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gentian. 14-awertia Chirata.
cruciata, Borckh. in Roem. Arch. *i.* I. 27 = G. crociata.
"»«/«, Bercht. & Presl, Rostl. L Gentian. 16 = G. humilU.
'mbricata, Bercht. & Presl, 1. c. 15-G. imbricate.
Ztraseiii, Borckh. in Roem. Arch. 1.1. 27 = G. verna.
"Hopkylla, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gentian. 14 = G. macrophylla.
nivalis, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 27-G. nivalis.
prostrata, Borckh. 1. c-G. prostrata.
Pumila, Borekh. 1. c.-G. pumila.
Pyrenaica, Borckh. 1. c.-6. pyrenaica.
mnqueflora, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gentian. 14 = O. quinqneflora.
umbellata, Bercht. & Presl, 1. c-G. aurea.
"trtculosa, Borckh. in Roem. Arch. i. L 27 = G. utricnlosa.
" " H Borckh. 1. c*=G. vema.
»«-«oHafa, Borckh. 1. c=Enicostema littorale.

ERICOMA, Vasey, in U. St. Dep. Agr. Rep. (1881-82) 247 - ERIOCOMA, Nutt. = Oryaopslfl, Michx. (Gramin.).

ERAoMYRTUS» Tun* in BolL Soc. Nat. Mosc. xx. -V.W47) i. 154=Baeckea, Linn. (Myrtac).
"rumondii. Tuna. I c 155 = B. pulchella.

ERIGENIA, Nntt. Gen. Am. i. 187 (1818). *UM-"ELUFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 886.
ERIGONIA, A. JUSS. in Orb. Diet. ix. 86 (1849).
ttlbosa, *Nutt. I.* f.-Am. bor.

ERwjEBOIT, Linn. Hort. Cliff. 407 (1737). *COM-POSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 279.
ASTRADELPHUS, Remy, in Ann. Sc Nat. Sér. III. x»i. (1848) 185.
CAENOTUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 50 (1886).
LOKYZELLA, Rupr. in Mem. Acad. Petersb. Sér. VII. «v. (1869) n. 4 (Sen. Tiansch. 51).

BRIOEBON :—
DIPLEMIUM, Ra6n. Fl. Tellur. ii. 50 (1836).
GUSMANIA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 12 (1849).
HETEROCHAETA, DC. Prod. v. 282 (1886).
LEPTILON, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
LEPTOSTELMA, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Card. Ser. II. t. 38 (1830;.
PANIOS, Adans. Fam. ii. 124 (1763).
PAPPOCHROMA. Rafin. Fl. Tellur. ii. 48 (1836).
PHALACROLOMA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxue. 404 (1826).
POLYACTIDIUM, DC. Prod. v. 281 (1836).
POLYACTIS, Less. Syn. Comp. 188 (1832).
STENACTIS, Cass. in Diet Sc. Nat xxxvii. 462 (1825); 1. 483 (1827 V
TANAXION, Rafin. Fl. Tellur. ii. 51 (1886).
TERRANEA, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1835) 11. t. 28.
TESSENIA, Bnbani, in Nnov. Giorn. Bot It. v. (1873) 318.
TRIMORPHA, Cass. in Diet. Sc. Nat. iii. Suppl. 65 (1816).
WOODVILLEA, DC. Prod. v. 318 (1836).
abyssinicus, Sch. Bip. ex Schweinf. & Aschers. in Beitr. Fl. Aethiop. 284-Conyza abyssinica.
aeris, C. B. Clarke, Comp. Ind. 52-alpinus.
aeris, *Linn. Sp. PI.* 658.—Reg. bor. temp,
adscendens, *TUTCB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxir. (1851) II. 68.—Am. bor.
aegyptiacus, Kurz, in Toum. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) II. 193=asteroides.
aegyptiacus, *Linn. Mant.* i. 112.—Afr. bor.
affinis, *DC. Prod.* v. 289.—Mexic.
alatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 171 —Laggera alata.
albidus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 319 = bonariensis.
alpestris, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. iv. (1845) 123-maximus.
alpestris, Hoppe, ex Nym. Consp. 388 = alpinus.
alpinus, Lam. Fl. Fr. ii. 140 = acris.
alpinus, Ledeb. Fl. Alt. iv. 90=glabratus.
alpinus, Less, in Linnaea, vi. (1831) 126-= pulchellus.
alpinns, *Linn. Sp. PI.* 864.-Reg. bor. et arct.
alpinus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 582 = uniflorus.
ambiguus, *F. Muell. in Trans. Phil. Jnst. Viet.* iii. (.1859) 58.—Austral.
ambiguus, Nutt Gen. Am. ii. 147-strigosus.
ambiguus, Sch. Bip. in Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. ii. 208=linifolius.
amorphoglossus, *Boiss, Diagn.* Ser. I. vi. 80.—Persia.
amphibolus, Ledeb. Fl. Ross. ii. 486=pnlcheIIus.
amplexicaulis, *Hort. ex Pair. Encyc. Suppl.* v. 164; *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 401.—Am. bor.
amplexicaulis, Ton. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 171s philadelphicus.
Andersonii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 540=Aster Andersoni.
andicola, *DC. Prod.* v. 287.—Chili,
andinus, *Phil, in Linnaea.* xxviii. (1856) 722—Chili,
andryaloides, *Benth. ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 52.—Reg. Himal.
angulosus, Gaudin, Fl. Helv. v. 265 = acris.
angustatus, Fries, ex Nym. Consp. 38U-acris.
angustatus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i s. III. (1885) 88—inomatus.
angustissimus, *Lindl. ex DC. Prod.* v. 286.—Ind. or.
annuos, *Pers. Syn.* ii. 431.—Am. bor.
anomalus, DC. Prod. v. 293 - Brachyactis menthodora.
apenninianus, Georgi, Reise, i. 280; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 490 = uniflorus.
apiculatus, *Benth. PI. Hartm.* 204.—N. Granat.
apurensis, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 365.—Ind. occ.
argentatus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 649.—Am. bor. occ.
arizonicus, *A. Gray, I. c.* xix. (1883) 2.—Arizona.
Armenus, Boiss. *8c* Huet, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 164 -pulchellus.
armerifolius, *Turn, ex DC. Prod.* v. 291.—Sibir.; Am. bor. occ.
artemisiaefolius, *Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 81.—Bolivia.
asper, Nntt Gen. Am. ii. 147-glabellus.
asperuginens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 91.—Am. bor. occ.

ERIOEBON :—
asperulus, *Fisch. &* Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* vi. 18, nomen.—Chili *1*
asteroides, Andrz. ex Bess. Enum. PI. Volh. 83 = acris.
asteroides, Hoppe, ex Nym. Consp. 388-alpinus.
asteroides, *Hort. Angl. ex Link, Enum. Hort. Berot.* ii. 824—Hab.?
asteroides, *Roxb. Hort. Beng.* 61; *Fl. Ind.* iii. 432.—Ind. or.
asteroides, Wall. Cat. n. 2975 B = Blumea amplectens.
atticus, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 237 = Villarsii.
Ancheri, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 170.—Syria; Persia,
aurantiacus, *Regel, Gartenft.* (1879) 28U; *et in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 305.—Turkestan.
australis, Hornem. ex Spreng. Syst. iii. 517 =strigosus.
australis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 488.—Chili.
bahamensis, *Seep. Del. Insub.* iii. 14.—Ins. Baham.
bellidiastroides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 149.—Cuba.
Bellidiastrum, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 307—Am. bor.
bellidifolius, *Muhl. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1958.—Am. bor.
bellidioides, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 281.—Reg. Himal.
bellidioides, Spenn. Fl. Friburg. ii. 536 = annuus.
bellioides, *DC. Prod.* v. 288.—Porto Rico.
Berterianus, *DC. I. c.* 286.—Chili.
Beyrichii, Hort. Berol. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 176 = strigosus.
biflorus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 488.—Chili.
Bigelovii, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 78.—Am. bor. occ.
Blanchetii, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 36 = Conyza Blanchetii.
Bloomeri, i4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1865) 540.—Calif.
bonariensis, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 323 = linifolius.
bonariensis, *Linn. Sp. PI.* 863.—Am. austr.
Bovei, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 168.—Aegypt.; Arab.
Brandegei, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 210.—Am. bor. occ.
bratoinsis, Buckl. in Proc. Acad. Sc Philad. 1861 (1862) 456=tennis.
Breweri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1866) 541.—Calif.
Bungci, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 164.—Afghan,
caespitosus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 307—Am. bor. occ.
camphoratus, Linn. Sp. PL 864- Pluchea camphorata.
camporum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 24=Aster camporum.
eanadensis. Brot Fl. Lusit. i. 359 —rufescens.
canadensis, *Linn. Sp. PI.* 863.—Amphig.
eanadensis, Tenore, Syll. Fl. Neap. 428 = linifolius.
Candollei, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, iii. 4U9 = Minuria denticnlata, integerrima.
canescens, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mac. ii. (1836) 50 = stenophyllus.
canescens, Parry, in Jones, Exped. n. 139 ; ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 213 = ochroleucus.
canescens, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.
canescens, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 179 = caespitosus.
canescens, *Willd. Sp. PI.* iii. 1903—Hab. ?
canus, *A. Gray, PI. Ftndl.* 67.—N. Mexic.
capensis, Houtt Handleid. x. 629=Vernonia pinifolia.
cardaminifolius, Wedd. Chlor. And. i. 198, in obs.= Conyza cardaminifolia.
carolinensis, Crantz, Inst i. 311- seq.
carolinianus, Linn. Sp. PI. 863 - Solidago tenuifolia.
carpaticus, Griseb. & Schenk, in \\iegm. Archiv, xviii. (1852) I. 336=Villarsii.
eaucasicus, Stev. in Mem. Soc Nat. Mosc. iv. (1813) 63-pulchellus.
chilensis, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 343 = Conyza chilensis.
ckinensis, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 30. t. 303» apurensis.
chinensis, Siebold, ex DC. Prod. v. 449^Laggera aurita.
chionophilus, *Bout. Fl. Orient,* iii. 168.—Persia,
chionophilus, *Wedd. Chlor. And. i.* 191.—N. Granat.

ERIGERON:—
Chrysocoma, Walp. Rep. iv. 896, sphalm. = Chrysocoma Coma-anrea.
Chrysopsidis, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 210.—Am. bor. occ.
ciliaris, *Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 170.—Japon.
ciliaris, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 722.—Chili.
ciliatus, Ledeb. Fl. Alt. iv. 92 = Aster angustns.
cilicicus, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 285 = uniflorus.
cilicius, Boiss. Fl. Orient, iii. 165, in syn.=seq.
cinerascens, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 54, nomen.—Chili.
cinereus, A. Gray, Fl. Fendl. 68-divergens.
cinerens, *Hook. V Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 50.—Patagon.
clematideus, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 958-Nidorella mespilifolia.
cochinchinensis, *Lour. Fl Cochinch.* 500, in obs.—Cochinch.
cochinchinensis, Spreng. ex DC. Prod. v. 446-Blumea aromatica.
collinns, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 536, nomen.—Bolivia.
Coma-aurea, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 670 = Chrysocoma Coma-aurea.
compositns, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 585.—Am. bor.; Keg. arct.
eonchophyllum, Walp. Rep. ii. 583, sphalm. = armerifolins.
concinnus, *Torr. (f Gray, Fl. N. AM.* ii. 174.—Am. bor. occ.
contortus, Desf.Tabl. ed. I. 102, nomen; Pen. Syn. ii. 432 = linifolius.
conyzoides, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 105.—Austral.
coronopifolius, Clem, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 34-linifolius.
coronopi(o\ius,Schrani,inDenkschr. Bot.Ges Regensb. ii. (1822) 69.—Afr. austr.
corymbosus, *Nittt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 308.—Am. bor. occ.
corymbosus, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 272; et in Linnaea, xiv. (1840) 642=acris.
Coulteri, *Porter V Coulter, Fl. Colorad.* 61.—Am. bor. occ.
Coxi, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 134.—Chili,
crassicaulis, *Sch. Bip. I. c.* xxxiv. (1865-66) 534, nomen.—Bolivia.
crispus, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 818 = linifolius.
crocifolius, Wedd. Chlor. And. i. 191=Aster crocifolius.
cuneifolius, DC. Prod. v. 288 - Aster jamaicensis.
cuspidatus, Spreng. ex DC. 1. c. 444 = Blutnea oxyodonta.
cymosus, *Walt. Fl. Carol.* 206.—Carolina.
Darrellianus, *Hemsl. in Journ. Bot.* xxi. (1883) 104.—Ins. Bermuda.
decumbens, Benlh. PI. Hartw. 316*= foliosus.
deenmbens, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N, S. vii. (1841) 80S.—Am. bor. occ.
decurrens, DC. Prod. v. 293 = Pterigeron decurrens.
decurrens, Vahl, Symb. Bot. i. 72 = Conyza arabica.
delphinifolius, A. Gray, PI. Wright, ii. 77=neomexicanus.
delphinifolius, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 873 — Mexic.
dentatus, Bnrm. f. Fl. Cap. Prod. 26 = Conyta scabrida !
denticulatus, *Burm.f. Fl. Ind.* 180.—Ind. or.
dianthifolius, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 174.—Reg. Argent,
diaphanns, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 534, nomen.—Bolivia.
diffusus, Pers. Syn. ii. 481 = Leucopsis diffusa.
dijilopnppoides, *Schau. in Linnaea,* xix. (1847) 722.—Mexic.
discoideus, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1873) 55 = Conyza Coulteri.
divaricatus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 123.—Am. bor.
divaricatus, Nutt. fn Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 311-divergens.
divergent, Hook, iu Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 242 = nagellaris.
divergens, *Torr.* &" *Gray, Fl. N. Am.* ii. 175.—Am. bor. occ. et trop.

ERIOEBON:—
diversifolius, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 88 = Conyza Gouani.
diversifolius, Rich, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 289 oannuus.
Douglasii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 177 = foliosus.
droebachensis, O. Muell. in Fl. Dan. t 874-acris.
dryophyllus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 210.—Mexic.
dubius, Spreng. Syst. iii. 519 = Hysterionica montevidensis.
Eatoni.A *Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 91.—Am. bor. occ.
echioides, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop 146=Conyza tigrensis.
elbrnsensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 1.—Persia.
Ellisii, *Hook. Ic. PI.* t. 1447.—Reg. HimaL
elongatus, Ledeb. Fl. Alt. iv. 91 = acris.
elongatus, Moench, Meth. Suppl. 247 = Villarsii.
engadensisx., Bruegg. in Jahresb. Natnrf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 105.
eriocephalus, *Regel b" Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 613.—Turkestan.
eriocephalus, J. Vahl, in Fl. Dan. t 2299=uniflorus.
eriophyllns, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 77.—Mexic.
Ervendbergii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 650.—Mexic.
expansus, Poepp. ex Spreng. Syst. iii. 518=Aster inconspicuus.
exstipulatus, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 387 = Conyza dentata.
faetidus, Burro, f. Fl. Cap. Prod. 26 = Nidorella foliosa.
falcatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 172=Laggera flava.
fasdculatus, Colla, in Mem. Ace Tor. xxxviii. (1885) 27 - spiculosus.
fastigiatus, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 971.—Hab. ?
ferrugineus, *Wedd. Chlor. And.* i. 195.—Bolivia,
filifolins, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 308.—Am. bor. occ.
filiformis, Spreng. Syst. iii. 520 = Hysterionica pinifolia.
fiagellaris, Boiss. & Hanssk. ex Boiss. Fl. Orient iii. 172 = Lachnophyllum Noëanum.
flagellaris, *A. Gray, PI. Fendl.* 68.—N. Mexic.
floribundus, Sch. Bip. in Bull. Soc. Pit. Fr. xii. (1865) 81; etin Linnaea, xxxiv. (1865-66) 584=bonariensis.
florifer, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 20 = Townsendia florifera.
foetidus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1218 = Nidorella foliosa.
foliosus, Don, ex Steud. Nom. ed. II. i. 583, sphalm. =Conyza falcata.
foliosus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 309.—Am. bor. occ.
fragrans, *Spreng. Syst.* iii. 518.—Hab. ?
frigidus, Boiss. & Buhse, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 164 = pulchellus.
frigidus, *Boiss. in DC. Prod.* vii. 274.—Hispan.
frigidus, *Wedd. Chlor. And.* i. 231.—Bolivia,
frutescens, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 184.—Chili.
fraticosus, *DC. Prod.* v. 288.—Ins. J. Feroand.
Funkii, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 888 = alpinus.
Gaudichaudii, *DC. Prod.* vii. 274.-Peruv.
Gayanus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 25.—Chili,
glabellus, *Nutt. Gen. Am.* ii. 147.—Am. bor.
glaber, Hoppe, ex Nym. Consp. 388 = alpinus.
glaberrimus, Scheele, ex Nym. 1. c. 389 = aciis.
glabratus, Endr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 33 =alpinus.
glabratus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 18=acris.
glabratus, *Hoppe & Hornsch, ex Bluff* b" *Fingerh. Comp. Fl. Germ.* ii. 864.—Helvet.
glabrifolius, *DC. Prod.* vi. 287.—Chili.
glacialis, Fisch. ex 'Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1865) I. 889 = uniriorus.
glandulosus, Poir. Encvc. viii. 487 = Chrysopsis graminifolia,
glandulosus, *Porter tf Coulter, Fl. Colorad.* 60.—Am. bor. occ.
glareosusx, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 105.
glaucus, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* 1.10.—Am. bor. occ.
glomeratus, Salisb. Prod. 195 • Conyza Gouani.
glomeratus, Spreng. ex DC. Prod. v. 487 = Blnmea Wightiana.

ERIGERON:—
glutinosus, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 174 = Psiadia glutinosa.
glutinosus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1212 = Juonia glutinosa.
gnaphalioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 88. t. 331.—Mexic.
Gouani, Jacq. Hort. Vindob. iii. 43. t. 79= Conyza aegyptiaca.
Gouani, Linn. Mant. ii. 469=Conyza Gouani.
gramineus, Falk,, Beitr. ii. 240=annerifolius.
gramineus, Linn. Sp. PI. 864 *{-Arctogeron gramineum).*—Sibir.
graminifolius, Pall, ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1865) I. 388 *(=Arctogeron gramineum).*—ôibir.
graminifolius, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 723.—Chili.
graminosus, Russ. ex DC. Prod. v. 444 = Blumea oxyodonta.
grandiflorus, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 18. t. 123.—Am. bor. occ.
grandiflorus, Hoppe, ex DC. Prod. v. 291 =alpinus.
grandiflorus, Nutt. in Journ. Aead. Philad. vii. (1884) 31 = macranthus.
grandiflorus, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 519 = pulchellus.
Grantii, *Oliver & Hiern, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1874) 93.—Afr. trop.
graveolens, Linn. Cent. i. n. 80 ; Amoen. Acad. iv. 290 = Inula graveolens.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasman. i. 188 «pappochroma.
Hegetschweileri, *Bruegg. in Berlepsch, Schmeiz,* 109.—Helvetia.
helveticus x, Bruegg. in Jahresb. Natnrf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (18S0) 105.—Europ.
heterophyllus, *Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1845) 11.—Mexic.
heterophyllus, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1956 = annuus.
hieracifolius, D. Don, Prod. Fl. Nep. 172 = Blumea hieracifolia.
hieracifolius, Poir. Encyc viii. 491 = Podocoma hieracifolia.
hieracioides, *Wedd. Chlor. And.* i. 194.—Pemv.
hirsutus, Hoppe, ex DC. Prod. v. 291 = alpinus.
hirsutus, *Lour. Fl. Cochinch.* 500.—China.
hirsutus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 742 —- pumilus.
hirsutus, Wall. Cat. n. 2976=asteroides.
hirtellus, *DC. Prod.* v. 290.—Chili.
hirtus, Thunb. Prod. PI. Cap. 158 = Conyza incisa.
hispidus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 29." Bras.
hispidus, DC. in Wight, Contrib. 9=asteroides.
hispidus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 810=glaucus.
Hochstetteri, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 147 = Conyza Hochstetterii.
Howellii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 209.—Am. bor. occ.
Huelsenii, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 346.—Europ.
humilis, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Oct--Dec. 1828) 175.—Am. arct.
humilis, Spreng. ex DC. Prod. v. 287=monticolus.
hyemalis, *Rafin. Fl. Ludov.* 65.—Am. bor.
hyoseroides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 149.—Cuba.
hypoleucus, Sch. Bip. ex Schweinf. & Aschers. in Beitr. Fl. Aethiop. 284 -= Conyza hypoleucus.
hypsophilus./'A.V. *in Anal. Univ. Chil.* (1873) 487.—Chili.
hyssopifolius, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 123.—Am. bor.
hyssopifolius, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 670 * Nidorella foliosa.
incanus, VaM, Symb. Bot. i. 72=Conyza incana.
incisus, Sieber, ex DC. Prod. v. 321 = trilobus ?
incisus, Thunb. Prod. PI. Cap. 153 = Conyza incisa.
incomptus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i.* II. 218.—Calif.
indicus, *Burnt, f. Ft. Ind.* 180.—Java.
inomatus,i4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 88-—Am. bor. occ.
integrifolius, Bertol. Misc. Bot. vi. t. 3=nudicaulis.
integrifolius, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 802 »strigosus.
intermedius, Reichb. ex Nym. Consp. 388 = Villarsii.
intermedius, Schleich. ex Nym. 1. c. 38!) =acris.
intermedius, Trachi. ex Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 12° => *Trachseli.*

ERIGERON:—
inuloides, Poir. Encyc. Suppl. v. 464 = Pulicaria inuloides.
involucratus, *Link, ex Sweet, Hart. Brit.* ed. II. 294, nomen.—Bras.
ivaefolius, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 670 = Conyza ivaefolia.
jamaicensis, Linn. Syst. ed. X. 1213 = Aster jamaicensis.
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 312 = Conyza japonica.
javanicus, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 120, nomen; *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 30.—Malaya.
Jussievi, Sprang. Syst. iii. S19 = Conyza melastomoides.
kamtsehaticus, DC. Prod. v. 290 = acris.
Karvinskianus, *DC. 1. c.* 285.—Merit
fchorassanicus, *Boiss. Fl. Orient*, iii. 170.—Persia.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 82 = Aucheri.
Kraussii, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 968 = Nidorella auriculata.
laevigatus, *Rich, in Act. Soc. Mist. Nat. Par. i.* (1792) 112 (err. typ. 105).—Guian.
lanatus, *Hoot. Fl. Bor. Am.* ii. 17. t. 121.—Am. bor. occ.
lanceolatus, *Wedd. Chlor. And.* L 193.—Bolivia.
Landbecki, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 133.—Chili
lancifol'ius, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 208.—Ins. Galnpag.
latisquamatus, Maxim. Prim. Fl. Amnr. 478 = Aster angustus.
latisquamus, *Boiss. Fl. Orient*, iii. 167.—Persia,
laxiflorus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 31.—Bras.
Lechleri, *Sch. Bip. in Flora*, zxxviii. (1855) 114.—Chili.
Lehmanni, *Boiss. Fl. Orient*, iii. 171.—Turkestan.
Lehmanni, *Spreng. Syst.* iii. 517.—Aegypt.
leiomerus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 211.—Am. bor. occ.
I<emmoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 2.—Arizona.
I'pidotus, Less, in Linnaea, vi. (1881) 602 (=Tetramolopii sp.).—Ins. Sandvic.
leptopetalus, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 186.—Chili.
leptorhizon, *DC. Prod.* v. 288.—Am. anstr.
{•eschenaultii, DC. 1. c. 292 = alpinns.
leucanthemifolius, *Schau. in Linnaea*, xix. (1847) 723.—Mexic.
'eucanthus,' D. Don, Prod. Fl. Nep. 171 = Blumea leucanthema.
leucophyllus. *Boiss. Fl. Orient*, iii. 171.—Turkestan.
"atroides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 172>Pterigeronliatroides.
"mnophilus, *Sch. Bip. in Bull. Soc, Bot. Fr.* xii. (1865) 8 I. - B 0 W
l>nearifolitis,CiLv. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 89 = Imifolius.
"nearis, Spreng. ex DC. Prod. v. 474 = Vicoa auriculata.
*li*ifolius*, Bert, ex DC. Prod. v. 254-Aster subulatus.
linifolius, *Willd. Sp. PI.* iii. 1955.,-Reg. calid.
j-tnosyris, [Clairv.] Man. Herb. 243-Aster Linosyris.
'onchaphyUus, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 18 = armenifolius.
*o*gifolius*, Baill. Hist. PI. viii. 36 = chilensis ?
'ongifolius, Bronss. ex Webb & Berth. Phyt. Canat. ii. *U8, in obs.-Conyza Gouani.
'ongifolius, Desf. Tabl. ed. I. 102, nomen; Cat. Hort. Par. ed. III. 400 = Jasonia longifolia.
jongipes, *DC. Prod.* v. 285.—Mexic.
'yratus, *Rafin. AH. Journ.* 147.-Am. bor.
macranthus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vn. (1841) 810.—Am. bor. occ.
""cropkyllus, Herbich, Stirp. Rar. Bucov. 57 = Slabratus.
macrorrhizus, *Sck. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 147, nomen.—Afr. bor.
Mandonii, *Sch. Bip, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xu. (1865) 81, nomen.—Bolivia.
"faritimus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. U841) 310 = glaucus.
maximus, *Otto, ex DC. Prod.* v. 284.—Mexic.
"•espilifolius, Sch. Bip. tx Walp. Rep. ii. 958 = Nidorella mespilifolia.
»iicrocephalus,5cA. *Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 584, nomen.—Bolivia.

ERIGERON:—
microspermus, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 120, nomen.—Java,
minurioides, *Benth. Fl. Austral*, iii. 495.—Austral,
miser, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xiii. (1878) 372.—Calif.
tnixtusx, Arvet.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) Bibl. 89.—Europ.
modestus, *A. Gray, PI. Fendl.* 68.—Texas.
mollis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 172 = Blumea Wightiana.
monocepkalus, Schur, Enum. PI. Tronss. 809=uniflorns.
Monorchis, *Grisei. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 176.—Bras.
montevidensis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 80.—Uruguay.
montevidensis, Spreng. Syst. iii. 519 = Hysterionica montevidensis.
monticolns, *Wall. Cat.* n. 2977.—Reg. Himal.
mucronatos, *DC. Prod.* v. 285.—Mexic.
Muelleri, Lund, ex Nym. Consp. S89 = acris.
Muirii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 210.—Alaska.
multicaulis, Wall. Cat. n. 3286=alpinns.
multflorus, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 87 = Aster xilis.
mnltiradiatus, *Benth. &" Hook. f. Gen.* ii. 281.—Reg. Himal.
muralis, Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Pyr. 188-acris.
Myototis, *Pers. Syn.* ii. 481.—Reg. Magell.
Myósotis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chit.* iv. 26.—Chili.
myosotoides, Juss. ex l'ers. Syn. ii. 431 «•£. Myosotis, *Pers.*
nanus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 308=radicatus.
nanus, Sch. Bip. ex Schweinf. & Aschers. in Beitr. Fl. Aethiop. 284 •- Conyza nana.
nanus, Schur, Enum. PI. Transs. 309 = alpinns.
natalensis, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 958 - Nidorella mespilifolia.
neglectus, Kern, ex Nym. Consp. 388=alpinus.
neo-mexicanus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 2.—N. Mexic.
nervosus, Willd. Sp. PI. iii. 1958-Chrysopsis graminifolia.
nevadensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 649.—Am. bor. occ.
nevadensis, *Wedd. Chlor. And.* i. 194.—Venezuela.
nigromontanus, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 114 = Aucheri.
nivalis, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 82=chionophilns.
nivalis, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 311.—Am. bor.
niveus, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1866-66) 534, nomen.—Bolivia.
Novae-Zealondiae, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 287.—N. Zel.
nudatus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 297.—Am. bor. occ.
nudicaulis, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 124 (err. typ. 224).—Am. bor.
nudiflorus, Buckl. in Proc. Acad. So. Philad. 1861 (1862) 456 •= divergent
nudiscapus, Sch. Bip. in Linnaea, xxii. (1849) 671 = Aster camporum.
obliquus, Linn. Mant. ii. 573=Blumea amplectens.
obovatus, *Boiss. Fl. Orient*, iii. 167.—Kurdistan.
obovatus, Spreng. ex DC. Prod. v. 439-Laggera flava.
occidentals, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. U841) 311.—Am. bor. occ.
ochroleucus, Eaton, in Bot. King's Exped. 152 = Eatoni.
ochroleucus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 80!).—Am. bor. occ.
Olgae, *Regel Vf Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 44.—As. centr.
olympicus, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 280 = alpinus.
oolepis, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 536, nomen.—Bolivia.
Oreades, *Fisch. if Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. *Suppl.* 17.—Soongaria.
oreganus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 2.—Am. bor. occ.
orientalis, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 7-acris.
orizabensis, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina*, xx. (1884) 91.—Mexic.
othonnaefolius, *Hook, tf Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii.* (1836)50.—Chili.

ERIGERON:—
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 32.—Mexic.
palustris, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 123 - maximns.
paniculatus, Lam. Fl. Fr. ii. 141 = canadensis.
paniculatus, Meig. & Wenig. Syst. Verz. 101=acris.
paposanns, *Phil. Fl. Atac.* 29.—Chili,
pappochroma, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 47. t. 193.—Austral.
paradoxus x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub, II. xxiii-xxiv. (lsaO) 105.—Europ.
Parishii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 212.—Calif.
pauciflorus, Hook.& Am. Bot. Beech. Voy. 87 = Vitt.idenia Chamissonis.
paucifolius, Less, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. in. 34 = Conyza notobellidiastrnm.
pazcnsis, *Sck. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 80, nomen.—Bolivia.
pectinatus, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 147 = Conyza pectinata.
pedatus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. 11841) 808 = composite.
pellitus, Wedd. Chlor. And. i. 190-Aster pellitus.
perramosus, *Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (I860) 207.—Europ.
persicaefolius, Benth. in Hook. Niger Fl. 430 - Conyza persicaefolia.
persicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 81.—Persia,
peucephyllus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 89.—Am. bor. occ.
*Philadelphia^*, Bart. Veg. Mat. Med. t. 20= stiigosus.
philadelphicus, *Linn. Sp. PI.* 863.—Am. bor.
*Philadelphia^*, Lour. Fl. Cochinch. 500 = cochineliinensis.
philadelphicus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 123 = qucrcifolius.
philadelphicus, Willd. Sp. PI. iii. 19S7 =-acris.
Philippii, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 192.—Chill.
phlogotrickus, Spreng. Syst. iii. 520=pappochroma.
pilosus, *Pers. Syn.* ii. 431.—Hab. 1
pilosus. Wall. Fl. Carol. 206 = Chrysopsis gossypina.
pinifolius, Poir. Encyc. viii. 490 = Hysterionica pinifolia.
pinnatifidus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 172 = Conyza stricta.
pinnatifidus, Thunb. Prod. Fl. Cap. 153= Conyza pinnsitifida.
pinnatus, Linn. f. Suppl. 868 •» Conyza pinnatilobata.
pinnatus, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* -xxiv. (1651) I. 178.—Peruv.
Pisonis, *Burnt, f. Fl. Ind.* 180.—Bras.
podolicus, Bess. Enum. PI. Volh. 7B = acris.
Poeppigii, *DC. Prod.* v. 287.—Chili,
poliospermus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 210.—Am. bor. occ
politus, *Fries, Summa Veg. Scand.* 3,184.—Enrop.bor.
polymorphus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 162 = alpinus.
polyphyllus, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 135.—Chili.
Prantlii, *Dalla Torre, At!. Alpenfl.* 124.—Europ.
primulaefolius, Juss. ex Cass. in Diet. Sc. Nat. xlii. 61 = Podocoma primulaefolia.
Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 210.—Arizona.
Pseudo-acris, Schur, Enum. PI. Transs. 308 — acris.
pubescens, *H. B. &" K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 88.—Mexic.
pulchellus, *DC. Prod.* v. 287.—Oriensj As. bor.
pulchellus,Hook. Fl. Bor. Am. ii. lt),partim-- glabcllus.
pulchellus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 124 = bellidifolius.
pulchellus, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. (1838) 94 = uniflorus.
pulcher,fA»7.»»^«a/. *Univ. Chil.* (1873) 487.—Chili,
pnlvinatus, *Wedd. Chlor. And.* i. 194.—Bolivia.
pumilus, Hook. Lond. Joum. Bot vi. (1847) 242 partim = ochroleucus.
pumilus, *Nutt. Gen. Am.* ii. 147.—Am. bor. occ.
/>«r/>Kr««.Ait.Hort.Kew. ed. I. iii.186 = philadelphicus.
pusillus, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1823) 8; Pugill. i. 18 = Lehmanni, *Spreng.*
pusillus, Nutt. Gen. Am. ii. 148-canadensis.
pyenotrichus, Schott & Kotschy, ex Tchihat. Asic Min. Bot. ii. 234 = uniflorus.
pyrifolius, Benth. Fl. Hongk. 176-Microglossa volubilis.
pyrrhopappus, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop 147 = Conyza pyrrhopappa.
quercifolius, DC. Frbd. v. 285 = tenuis.

EBIGEBON:—
quercifolius, *Lam. Tail. Encyc.* iii. 258.—Am. bor.
quercifolius, Fuish, Fl. Am. Sept. ii. 583 = philadelphicus.
racemosus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. vii. (1841) 812-annerffblius.
ndicatns, *Hook. Ft. Bor. Am.* ii. 17. t. 123.—Am. bor.
radiosus, Spreng. ex DC. Prod. v. 299 - multiradiatus
ramosus, Rafin. Fl. Ludov. ()6=divaricatus1
Regnellii, Sch. Bip. in Iinnaea, xxii. (1849) 571 = Aster Regnellii.
Remyanus, *Wedd. Chlor. And.* i. 195.—Chili,
repens, *A. Gray, Syn. Ft. N. Am.* i. II. 217.—Texas.
repens, Wedd. Chlor. And. i. 191—Aster repens.
resinosum, Spreng. Syst. iii. 519=Hysterionica montevidensis.
retroflexus, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 464__Am. bor.
rhaeticus x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (lt>80) 105.—Enrop.
rigidus, *Fries, Afant.* iii. 107.—Norveg.
rivularis, Spreng. ex DC. Prod. v. 288 = bellioides.
rivularis, *Sw. in Prod. Veg. Ind. Occ.* 118.—Ind. occ.
rosulatus, *Wedd. Chlor. And.* i. 193.—Bolivia.
Rottleri, *Spreng. Syst.* iii. 518.—Ind. or.
Roylri, DC. Prod. v. 292-alpinus J
rubricanlis, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 636, nomen.—Bolivia. ,
ruderalis, Salisb. Prod. 195 = canadensis.
rufescens, *Link, ex Steud. Norn.* ed. I. 812.— Lusitan.
runcinatus, Bert, ex DC. Prod. v. 288 = rivularis.
rupestris, Hoppe, ex DC. 1. c. 291 = alpinus.
npestris, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 16.—Europ.
rupicolus, *Phil, in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 644.—Ins. J. Fercand.
Rnsbyi, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 217.—N. Mexic
rutilus, Poir. Encyc Suppl. v. 464 = Conjza calocephala, sericea.
salsuginosus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 98.—Am. bor. occ
scaber, Pers. Syn. ii. 431=Conyza melastomoides.
tcaber, Thunb. Prod. PI. Cap. 153 - Pulicaria capensis.
scaber, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 517=acris.
scaberrimus, Gardn. in Hook. Loud. Journ. Bot. vii. (1848) 80-maxiraus.
scandcns, *Thunb. Fl. Jap.* 313.—Japon.
scandinavicus, Scheefe, ex Nym. Consp. 889=politus.
scaposus, *DC. Prod.* v. 287.—Mexic.
scaposus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 170 = repeni.
scariosus, Moench, Meth. Suppl. 247=Conyza Gouani.
Schiedeanus, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 145.—Mexic.
Schimperi, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 147=Conyza stricta.
Schuechtii, Sch. Bip. in Linnaea, xxii. (1849) 571 = maximus.
Schultzii, *Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 120, 127.—Java,
scorzonerifolius, *Remy, in C. Gay, Ft. Chit.* iv. 26.—Chili.
semiamplexicaulis, *Meyen, Reise,* i. 311.—Chili.
semibarbatus, DC Prod. v. 292 = alpinus.
Senecio, AucL Am. ex Steud. Nom. ed. L 312 = canadensis.
Senecio, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. il. 818 = Senecio vulgaris.
senecioides, *Wedd. Chlor. And.* i. 198.—Peruv.
sericeus, *Rets. Obs.* v. 28.—Java.
serotinus, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 239 = acris.
serpentaritu. Banks, ex Steud. Nom. ed. I. 312 = bellidifolins.
serratus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 148 = acgyptiacus.
sessilifolius, *F. Muell. Fragm.* xi. 100.—Austral.
siculus, Linn. Sp. PI. 864 = Pulicaria sicula.
solidaginoides, *Schlecht. in Linnaea,* xxv. (1852) 218.—Canada.
sordidus, Gill, ex Hook. & Am. Comp. Bot. Mag. ii (1836) 254 = bonariensis.
spathulatns, *Schum- (f Thonn. Beskr. Guin. PI.* 385.—Afr. bop.
spathulatus, *Vahl, in West, Bidr. Ste- Croix,* 303.—Ins. Antigua.
spathulatus, *Wedd. Chlor. And.* i. 197.—Ecuador,
speciosus, *DC. Prod.* v. 284.—Am. bor. occ.
spiciformis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 171.—Reg. Argent,
spiculosus, *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* i. 32.—Chili.

EBIGEBON:—
spinosus, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. FL Aethiop. 148, nomen = Conyza spinosa.
spinulosus, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 13 = spiculosus.
Sprengelii, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* ii. 958.—Afr. austr.
squarrosus, [Clairv.] Man. Herb. 243=Inula sqnarrosa.
squarrosus, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 44 = glaucus?
squarrosus, Walt. FL Carol. 206=Chrysopsis gossypina.
stenophyllus, Eaton, in Bot. King's Exp. 152. t. 17 = Aster arenarioides.
stenophyllus, *A. Gray, in Pad/. Rail. Rep.* iv. 98.—Am. bor. occ
stenophyllus, *Hook.* V *Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 49.—Chili.
stenophyllus, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 176=foliosus.
Steudelii, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 148 « Conyza Steudelii.
stipulatus, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL 385 = Laggera aurita.
Stocksianus, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 8.—Afghan.
strictissimus, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. (1825); ex Literaturb. Flora, iii. (1833) 237 - Conyza chilensis.
strictus, DC. Prod. v. 289=canadensis.
strictus, *Hook.* to" *Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1886) 49.—Chili.
strigosus, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 302 = annuus.
strigosus, *Muhl. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1956.—Am. bor.
subandinus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 723.—Chili.
subdecurrens, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 97 = Conyza Coulteri.
subdecurrens, *Sch. Bip. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i.* II. 220.—Arizona.
sublyratus, Roxb. ex DC. in Wight, Coutrib. 9=asteroides.
subspicatus, *Benth. in Oerst. Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 82.—Costa Rica.
sulcatus, DC. Prod. y. 284 = maximus.
sulcatus, Meyen, Reise, i. 311 = Conyza chilensis.
sulcatus, Nees, in Pr. Neuwied, Reise Nord. Am. ii. 439=pumilus.
Sulivani, *Hook./. Fl. Antarct.* 306.—Chili,
sumatrensis, *Retx. Obs.* v. 28.—Sumatra,
supplex, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 353.—Calif,
sylvaticus, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 728.—Chili.
tasmanicus, Hook. f. Fl. Tasm. i. 183. t. 46=pappochromus.
tenellus, *DC. Prod.* v. 288.—Mexic.
tenellus, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Most xxxviii. (1865) I. 39S=armerifolius.
tener, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 91.—Calif,
tenuifolius, *Hook. /. in Trans. Linn. Soc* xx. (1847) 207.—Ins. Galap.
tenuifolius, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 670=-Chrysocoma tenuifolia.
tenuis, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* ii. 175.—Am. bor.
thrincioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 148.—Cuba.
Thnnbergii, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-59) 895.—Japon.
Trachseli x, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 125.—Europ.
transsilvanicus, Schur, Enum. PI. Transs. 307 = linifolius.
tricholepis, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 536, nomen.—Bolivia.
tricuneatus, Linn. f. Suppl. 368 = Baccharis conferta.
tridadylus, DC. Prod. v. 290 = Vittadinia trifurcata.
trifidus, Hook. Fl. Bor, Am. ii. 17=compositus.
trifidus, *Schlecht. in Linnaea,* xxvii. (l'b54) 518.—N. Granat
tri/urcatus. Gill. *8c* Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1836) 49 = Vittadinia trifurcata.
trilobus, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 168.—Arabia.
trilobus, Sond. in Hamb. Gartenz. xii. (1856) 78 = Vittadinia australis.
triplinervis, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. in. 33 = Conyza triplinervia.

EBIGEBON:—
tripolioides, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 135.—Chili.
trisulcus, D. Don, Prod. Fl.Nep. 171=Conyza stricta.
tuberosus, Linn. Sp. PI. 864 =Jasonia tuberosa.
Turcaaninowii, Wedd. Chlor. And. i. 198=pinnatns.
Tweediei, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 50 = Leucopsis Tweediei.
uliginosus, *Benth. PI. Hart-m.* 204.—N. Granat
uliginosus, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 489-armerifolius.
umbellatus, Gilib. Fl. Lituan. i. 215 (err. lyp. 125) = acris.
undulatus, Moench, Meth. 698 = bonariensis.
uniflorus, *Linn. Sp. PI.* 864.—Reg. bor. et arct.
uniflorus, Sm. Engl. Fl. iii. 428=alpinus.
uni/olius, err. typ. p. 607, col. 1, sub *Conyza ambigua,* lege ' linifolius.'
uralensis. Less, in Linnaea, ix. (1834) 154-acris.
ursinus, *Eaton, in Bet. King's Exp.* 148.—Am. bor. occ.
utahensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (18811 89.—Am. bor. occ.
Vahlii, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. v. (1825) 103.—Ins. Falkland.
variegatus, Sch. Bip. ex Schweinf. *8c* Aschers. in Beitr. Fl. Aethiop. 285 = Conyza variegata.
varius, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 134.—Ins. Cap. Verd.
velutipes, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 434.—Mexic.
vernus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 176=nudicaulis.
Villarsii, *Bell. Apt. Fl. Pedem.* 88. t. 7.—Europ.
Villarsii, Willd. Sp. PI. iii. 1958-acris.
villosus, Steud. Nom. ed. I. 812=Aster villosus.
virens, Russ. ex DC. Prod. v. 439 = Blumea virens.
virgatns, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 491 (quid ≤).—Ross, austr.
viscosus, Desf. Tabl. ed. I. 102=Psiadia glutinosa.
viscosus. Linn. Sp. PI. 863 = lnula viscosa.
Vittadinia, F. Muell. Fragm. v. 87 = Vittadinia scabra.
vulgaris, Scheele, ex Nym. Consp. 389=acris.
Wightianus, Wall. Cat. n. 3284-Pulicaria Wightiana.
Wightii, DC. Prod. v. 286=alpinus.
eerdanus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 82 = amorphoglossus.
Zollingeri, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 120, nomen; *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 31.—Java.

ERIGERUM, Linn. Gen. ed. I. 254 (17S7)«=Erigeron, Linn. (Compos.).

ERIGONE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 115 (1866) = Crinum, Linn. (Amaryllid.).
Govenica, Salisb. 1. c. 116 = C. longifolinm?
longifiora, Salisb. 1. c. - C. longiflorum.
longi/olia, Salisb. 1. c—C. longifolium.
revoluta, Salisb. 1. c. = C. lmeare.
riparia, Salisb. 1. c.=C. longifolium.
viridifiora, Salisb. 1. c.=C. Commelyni.

ERIGONIA, A. Juss. in Orb. Diet. ix. 95 (1849) = Erigonia, Nutt. (Umbellif.).

ERIMATALIA, Roem. & Schnlt. Syst. v. 27 (1819) - Eryoibe, Roxb. (Convolv.).
Rheedii, Roem. &Schult. 1. c. S81 = Eryc. paniculata.

EBINACEA, [Toum.] Adans. Fam. ii. 321 (1763). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 483.
pungens, *Boiss. Voy. Sot. Espagne,* 145.—Hispan.

ERINGIUM, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 188 (1768)-Eryngium, Toum. (Umbell.).

ERINIA, Noulet, Fl. Sous-Pyr. 407 (1837) - Campanula, Toum.
Campanula, Noulet, 1. c = C. Erinus.

ERINWA, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 266. *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 805.
gilliesioides, *Phil. I. c*—Chili.

EBINOCARPUS, Nimmo, ex J. Gmh. Cat. Bomb. PI. 21 (1839). *TILIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. »• 234.
Knimoni, Hassk. Retzia, i. 187 = Nimmonii.
Nimmoanus, Mast, in Hook. f.Fl. Brit. Ind. i. 394-seq.
Nimmonii, *J. Grah. Cat. Bomb. PL* 21.—Ind. or.

ERINOSMA, Herb. Amaryll. 830 (1837)=Leucojum, Linn. (Amaryllid.).
carpathica, Herb, in Bot. Mag. t. 1993 —L. vernum.
verna, Herb. Amaryll. 381 =>L. vernum.

ERINTJB, Linn. Hort. Cliff. 320 (1737). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 961.
AGERATUM, Tourn.ex Adans. Fam. ii. 210 (1763).
aethiopicus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 102.—Afr. austr.
africanus. Linn. Sp.Pl. 630-Zaluzianskya villosa.
alpinus, *Linn. 1. c.*—Europ.
americanus, Mill. Gard. Dieted. VIII. n.S^Buchnera americana.
bilabiatus, Roxb. Hort. Beng. 47; Fl. Ind. iii. 92-Adenosma capitatum.
campanulata, Nym. Consp. 481 = Campanula Erinus.
capensis. Linn. Mant. ii. 252 = Zaluzianskya capensis.
/ragrans, Ait Hort. Kew. ed. I. ii. 357 = Zaluzianskya lychnidea.
/rutescens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=Capraria saxifrageaefolia.
glabratus, Nym. Consp. 544-alpinns.
gracilis, *Lehm. in Linnaea,* x. (1836) *Litt.* 76.—Afr. austr.
hispanicus, Pers. Syn. ii. 147-alpinus.
incisus, Thunb. Prod. PI. Cap. 108.—Afr. austr.
laciniatus, Linn. Sp. PI. 630 = Verbena erinoides.
lanceolatus, Kitt. Taschenb. ed. II. 336=alpinus.
lychnideus, Lam. Encyc. Suppl. ii. 806 - Zaluzianskya lychnidea.
lychnideus, Linn. f. Suppl. 287 - Zalnzianskya capensis.
lychnideus, Thunb. Prod. PI. Cap. 102 = Lyperia fragrans.
maritimus. Linn. f. Snppl. 287—Zaluzianskya maritima.
Patens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 102.—Afr. austr.
peruvianus, Linn. Sp. PI. 630-Verbena chamaedrifolia.
frocumbens, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 6 = Herpestis chamaedryoides.
'elaginoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 102 = Zaluzianskya selaginoides.
simplex, *Thunb. I.e.—Mr.* austr.
tomentosus, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 2.—Vera Crux.
tomentosus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 108.—Afr. austr.
tnstis, *Linn. /. Suppl.* 287.—Afr. austr.
vertidllatus, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 5 - Stemodia parviflora.
nllosus, Thunb. Prod. PI. Cap. 102 - Zaluzianskya villosa.
viscosus, Salisb. Prod. 94 = Sphenandra viscosa.

ERIOBOTRYA, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 102. *ROSA CEAE* [Benth. & Hook. f. i. 627].
anjustissima, *Hook. /. Fl. Brit. Ind.* ii. 872.—Reg. Himal.
bengalensis, *Hook. /. I. c.* 871.—Reg. Himal.; Malaya.
ciinensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 603=Crataegus chinensU.
cordata, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xilL (1822) 102 = Osteomeles latifolia.
cuneata, D. Dietr. Syn. PI. iii. 168 (*-Hesperomeles cuneata).—Temv.*
<Wbia, *Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Sér. I. x. (1874) 145.-Reg. Himal.
e">ptica, *Lindl. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 102. f -Reg. Himai.
"agrans, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* «. (1857) 80.—Hongkong.
giabrata, Steud. Nom. ed. II. i. 585=Osteomeles giabrata.
heteropbylla(*Li»dl. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 102.—Peruv.
"ookeriana, *Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par.* Sér. I. «• (1874) 146—Reg. Himal.
'"tegri/oli*ai* Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 304 = Photinia Notoniana.
Japomca, *Lindl. in Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 102. ~J?Pon. i China.
•atifolia, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. S70.-Burma.
J°npfolia, *Hoot./. I. c*—Reg. Himal.
•nacrocatpa, *Kur», in Journ. As. Soc. Beng.* xll (1872) •I. 306.—Burma.
"*Manga,* D. Dietr. Syn. PI. iii. 163 (=*Hesperomeles* ^lon>)—*gX.* Granat.
asifolia, DC. Prod. ii. 682 = Osteomeles giabrata.
Petiolata, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 370—Reg. Himal.

ERIOCACHRYS, DC. Prod. iv. 241, in syn. (1830) = HagydarlB, Koch (Umbellif.).

ERIOCALIA, Sm. Exot. Bot. 87. t. 78, 79 (1806) = Aotinotus, Labill. (Umbellif.).
Uucocephala, Heynh. Nom. ii. 229 = A. leucocephala.
major, Sm. Exot. Bot. ii. 37-A. Helianthi.
minor, Sm. 1. c. 89-A. minor.

ERIOCALYX, Endl. Gen. 1264, in syn. (1840) - ERIOCYLAX, Neck. = Aspolathus, Linn. (Legumin.).

ERIOCARPAEA, Bertol. in NOT. Comm. Acad. Bonon. vi. (1848) 234; (Misc. Bot ii. 20) = Onobryehis, Gaertn. (Legumin.).
pinnata, Bertol. 1L cc. = O.'Gaillardoti.

ERIOCARPHA, Cass. in Diet. Sc Nat lix. 236 (1829) = JUontanoa, La Llave (Compos.).

ERIOCARPHA, Lag. ex DC. Prod.vi.88 (1837) - Lasiospermum, Lag. (Compos.).
peduncularis, Lag. ex DC. 1. c.-L. pedunculare.

ERIOCARPUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 320-Aplopappus, Cass. (Compos.).
grindelioides, Nutt. 1. c.=A. Nuttallii.

EBIOCATTLON, Linn. Gen. ed. II. 35 (1742). *ERIOCAULEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1020.
CKAETODISCUS, Steud. Syn. PI. Cm, 261 (1855).
ELECTROSPERMA, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1854) 23.
LASIOLEFIS, Boeck. in Flora, lvi. (1873) 90.
LEUCOCEPHALA, Roxb. Fl. Ind. iii. 612 (1832).
NASMYTHIA, Huds. Fl. Angl. ed. I. 414 (1762).
RANDALIA, Beauv. ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828) 47. t. 5.
SPHAEROCHLOA, Beauv. ex Desv. 1. c. (1828).
SYMPHACHNE, Beauv. ex Desv. 1. c. (1828).
abyssinicum, *Hochst. in Flora,* xxviii. (1845) 841.—Abyss.
Achiton, Koern. in Linnaea, xxvii. (1854) 680-nigricans.
adphyllum. Bong, in Mém. Acad. Pltersb. Sér. VI. i. (1831) 636 = Paepalanthus aciphyllus.
aciphyllum, Reichb. ex Koem. in Mart Fl. Bras. iii. I. 358 = Paepalanthus subtilis.
acrotrichum, Steud. Syn. PI. Cyp. 277 = Paepalanthus Schraderi.
affine. Bong, in Mim. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 621=Paepalanthus affinis.
africanum, *Hochst. in Flora,* xxviii. (1845) 340.—Afr. austr.
Afzelianum, *Wikstr. ex Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 680.—Afr. trap.
albidum, Steud. Syn. PI. Cyp. ii. 278= Paepalanthus albidus.
alpestre, *Hook./. V Thorns, ex Koem. in Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 163.—Ind. or.
amoenum. Bong, in Mim. Acad. Pétersb. Sè>. VI. i. (1881) 637 = Paepalanthus amoenus.
amplexicaule, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hrfn. i. (1778) 272 - Tonina fluviatilis.
anceps, Walt Fl. Carol. 88=Lachnocaulon Michauxii.
angustifolium, *Koern. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 495.—Bras.
anthemiflorum. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 686 = Paepalanthus anthemidiflorus.
aquaticum, Sagot, ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 498 - melanocephalum.
aquatile, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 600, noinen ; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 495.—Bras.
arctotiflorum, Steud. Syn. PI. Cyp. 282 = Paepalanthus anthemidiflorus.
arenarium, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot i. (1842) 442 - Paepalanthus arenarius.
arenarium, Salzm. ex Koern. in Mart Fl. Bras. iii. I. 358 = Paepalanthus subtilis
argenteum. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. *Sit.* VI. i. (1831) 631-Paepalanthus argenteos.
argenteum. Mart, in Wall. PL As. Rar. Iii. 28=quin> quangulare.
argyraeum, Steud. Syn. PI. Cyp. 271 = quinquangulare.
atratum, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 610.—Zeylan.
atrocepha'um, Steud. Syn. PI. Cyp. 276 = Paepalanthus tortilis.

EBIOCAULON :-
australasicnm, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 616.—Austral.
australe, *R. Br. Prod.* 254.—Austral.
bahiense, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sèr. VI. i. (1381) 622-Paepalanthus bahiensis.
Benthami, *Kunth, Enum. PI.* iii. 545.—Mexic.
Benthami, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 221.—Panama.
Benthamii, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 434 = Ehrenbergianum.
bifidum, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 468=Paepalanthus Schraderi.
bifistulosum, *Heurck V Muell. Arg. in Heurck, Ob.i. Bot.* 105.—Afr. trop.
bisumbellatum, Steud. Syn. PI. Cyp. 275 = Paepalanthus Steudelianus.
blepharopkoron. Bong, in Mem. Acad. Petersb. Ser. VI.i.(1831) 626.1.16 = Paepalanthusblepharophorus.
Blumei, *Koern. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 240.—Java.
Bongardii, St. Hil. Voy. Distr. Diam. ii. 444 = Paepalanthus Hilairei.
Bonplandianum, Steud. Syn. PI. Cyp. 275=Paepalanthus Humboldtii.
borbonicum, Willd. ex Kunth, Enum. PI. iii. 560 = striatum.
brachypeplon, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 665.—N. Irlandia 1
brachyphyllum, Willd. ex Kunth, Enum. PI. iii. 634 = Paepalanthus tenuis.
brachypus. Bong, in Mem. Acad. Petersb. Ser. VI. i. (1831) 622, 646 - Paepalanthus brachypus.
brachypus, *Heurck tf Muell. Arg. in Heurck, Obx. Bot.* 96.—Peruv.
bracteosum, Steud. Syn. PI. Cyp. 272 - robustum.
brasiliense, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 36 = Paepalanthus brasiliensis.
brevifolium, *Klottsch, in Schomb. Faun. V Fl. Brit. Gui.* 1116, nomen; *et Koern. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 496.—Guian.
brevifolium, Mart, ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 485=Sellowianum.
breviscapum, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 676.—Ind. or.
briioides, Steud. Syn. PI. Cyp. 281 = Paepalanthus gracilis.
Brownianum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 25.—Ind. or.
bryoides, Ried. ex Bong, in Mem. Acad. Petersb. Sér. VI. i. (1831) 624-Paepalanthus bryoides.
Buergerianum, *Koern. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 168.—Japon.
caesium, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 626.—Ind. oce.
caespitosum, Poepp. ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 361-Paepalanthus Schraderi.
caespitosum, Wikstr. in. Vet. Acad. Handl. Stockh. (1820) 78. t 4-Paepalanthus caespitosus.
calocephalum, Bong, in Mem. Acad. Petersb. Sér. VI-i. (1881) 628 = Paepalanthus cnrvifolius.
canescens, Bong. 1. c. 623. t. 60 - Paepalanthus canescens.
cantoniense, *Hook,* b* *Am. Bot. Beech. Voy.* 219.—China.
capillare, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 625. t. 48-Paepalanthus cnpillaris.
carici/olium, Steud. Syn. PI. Cyp. 281 = Paepalanthus laricifolius.
caulescens, Hook. f. & Thorns, ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 341= atratum.
caulescens, Poir. Encyc. Suppl. iii. 162-- Paepalanthus caulescens.
caulescens, Willd. ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 368 = Paepalanthus dendroides.
centauroides. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sèr. VI. i. (1831) 635. t. 45-Paepalanthus centauroides.
Cephalotes, Poir. Encyc. Suppl. iii. 161, in obs.» gnaphalodes.
ceylanicum, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 667.—Zeylan.
chrysanthemiflorum, Schnizl. Ic. t 46. f. 3=Paepalanthus anthemidiflorus.
chrysanthum, Bong, in Mim. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881) 628=Paepalanthus chrysanthus.
ciliatum, Bong. 1. c. 622 = Paepalanthus ciliatus.
ciliiflorum, F. Muell. Fragm. i. 95 = cinereum.
cinereum, *R. Br. Prod.* 254.—Austral.
cinereum, Buch.-Ham. ex Mart, in Wall. PI. As. Rar. iii. 29 = Hamiltonianum.

EBIOCAULON:—
circinnatum, Boug. in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831) 633-Paepalanthus circinnatus.
cladocaulon. Stead. Syn. PI. Cyp. 276=Paepalanthus Gardnerianas.
Claussenianum, Steud. 1. c. 279=>Paepalanthns rufulus.
compaction, Steod. 1. c. 274 — Paepalanthus compactus.
compressum, *Lam. Encyc.* iii. 276.—Am. bor.
coneretnm, *F. Muell. Fragm.* i. 92.—Austral.
congestum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 252 = Paepalanthus fasdculatns.
consanguineum, Kunth, Enum. PI. iii. 6G6-Wallichianum.
curymbosum, Bong, in Mem. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. ,lb31) 629 = Paepalanthns corymbosus.
crassifolium, Bong. 1. c. 684 = Paepalanthus crassifolius.
urassiscapnm, *Bong. 1. c.* 628.—Bras.
cristatum, Mart, ex Koem. in Linnaea, xxvii. (1854) 607-miserum.
cristatum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 28.—Ind. or.
curvifolium. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 627 = Paepalanthus curvifolius.
cuspidatum, *Dale, in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 281.—Ind. or.
cuyabense, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 634. t. 10-Philodice cuyabcnsis.
Dalzellii, *Koem. in Linnaea*, xxvii. (1854) 6O5.-r-Ind. or.
decangulare, Hope, in Phil. Trans, lix. (1770) 248. t 12 = septangulare.
decangulare, *Linn. Sp. PI.* 87.—Am. bor.
decangulare, Walt. Fl. Carol. 83 = compressum.
decangulare, Willd. ex Kunth, Enum. PI. iii. 544 = Hum bold tii.
decemangulare, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 254 = Humboldtii.
decumbens, Steod. Syn. PI. Cyp. 276=Paepalanthus Bongardi.
dendroides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 252 = Paepalanthus dendioides.
depressum, *R. Br. Prod.* 255.—Austral,
deustum, *R. Br. 1. c.*—Austral,
dictyophyllum, *Koem. in Linnaea*, xxvii. (18.14) 600, nomen; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 486.—bras.
distichophyllum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 86 = Paepalanthus distichophrllus.
divaricatum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. '1831) 621, 641 - Paepalanthus divaricatus.
Dregei, *Hochst. in Flora*, xxviii. (1845) 341.—Afr. aubtv.
echinospermum, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 162.—Cuba,
echinulatum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 29.—Ind. or.
Ehrenbergianum, *Klotzsch, ex Koem. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 491.—Mexic.
datum. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 631. t. 63 = Paepalanthus ela'us.
Electrospermum, F. Muell. Census, 128-australasicum.
elegans, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 635 = Paepalanthus elegans.
elichrysoides, *Bong. 1. c.* 631.—Bras.
elichrysoides, Kunth, Enum. PI. iii. 546 - Knnthii.
elongatum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 630. t. 41 = Paepalanthus Wichrysoides.
ensifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 254. t. 70 = Paepalanthus ensifolins.
erythropodum, Miq. ex Koern. in Linnaea, xxvii. (1854) 642 = quinquangulare.
eurypeplon, *Koem. 1. c.* 685.—Ind. or.
exiguum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881)627-1. 59=Paepalantbus exiguus.
falcatum, *Bong. I. c.* 630.—Bras.
falcatum, Mart, ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 423 — Paepalanthus flavescens.
fasciculate, Weigelt, ex Kunth, Enum. PI. iii. 506 = Paepalanthus congestus.
fasciculatum. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 624 = Paepalanthus Schraderi.
fasciculatum. Lam. Encyc. iii. 276»Paepalanthus Lamarckii.
fasciculatum, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 271 -Paepalanthus congestus.
fastigiatum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 624. t. 60 = raepalaathus fastigiatus.

EBIOCATJIiON:—
fenestratum, *Boj. ex Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 671.-Madag.
filiforme, Bong, in Mém. Acad. Petersb. Sir. VI. i,. (1831) 634. t. 53 = Paepalanthus nitens.
filiforme, *Rafin. AH. Journ.* 121.—Am. bor.
Fischerianum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI., i. (1831) 627. t. 29 = Paepalanthus Fischerianus.
fistulosum, *R. Br. Prod.* 255.—Austral.
flaccidum, Bong, in Mém. Acad. Petersb. Sir. VI. i. (1831) 636 = Paepalanthus flaccidus.
flagellare, Guill. in Deless. Ic. Sel. iij. 60. L 98 = Paepalanthus flagellaris.
flavescens, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 628 = Paepalanthus flavescens.
flavidulum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 166 = Paepalanthus flavidulus.
flavidum, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 489= Paepalanthus flavidulus.
fluitans, Baker, in Journ. Linn. Soc xx. (1883) 277 = melanocephalum.
fluviatile, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 270.—Zeylan.
Freyreysii, Thunb. PI. Bras. Dec. i. 7. t 1. f. 2 = Paepalanthus paludosus.
fuliginosum, *Griseb, Cat. PI. Cub.* 226.—Cuba.
Gardneri, Steud. Syn. PI. Cyp. 274=Paepalanthus polyanthus.
geniculatum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881) 625 - Paepalanthus geniculatus.
geralnse, Steud. Syn. PI. Cyp. 276=Paepalanthus caulescens.
gibbosum, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 600, nomen; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 489.—Bras.
giganteum, Afzel. ex Koem. in Iinnaca, xxvii. (1854) 578 = Mesanthemum radicans.
glabrum, Steud. Syn. PI. Cyp. 281 = Paepalanthus gracilis.
glareosum. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881) 625 = Paepalanthus glareosus.
glaucum, *Griff. Notul.* iii. 113.—Burma.
gnaphalodes. Ell. Sketch, ii. 565=decangulare.
gnaphalodes, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 165 = compressum.
gomphrenoides, *Kunth, Enum. PI.* iii. 548.—Bras.
gracile. Bong, in Mém. Acad. Pétersh. Sér. VI. i. (1881) 684. t. 46-Paepalanthus gracilis.
gracile, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 29.—Ind. or.
gramineum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 627 = Paepalanthus gramineus.
gregatum, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 606.—Ind. or.
griseum, *Koern. in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 479.—Bras.
guineense, Steud. Syn. PI. Cyp. 278 = Mesanthemum radicans'
gujanense, D.-Dietr. Syn. PI. v. 263 = Humboldtii.
guyanense, *Koern. I. c.* 478.—Guian.
Hamiltonianum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 29.—Ind. or.
helichrysoides, Steud. Syn. PI. Cyp. 283 = Paepalanthus helichrysoides.
heteranthum, Benth. Ft. Hongk. 382 - dnereum.
heterochiton, *Koern. in Miq. Ann Afus. Bot. Lugd. Bat.* iii 240.—Madag.
heterogynum, F. Muell. Fragm. i. 98 = depressum.
heterolepis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 271.—Ind. or.
heteromallum, *Bong, in Mém. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. (1831) 626. t. 3».—Bras.
hirsutum, Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1820) 79. t. -4 = Paepalanthus hirsutus.
hirtellum, Steud. Syn. PI. Cyp. 28U = Paepalanthus gracilis.
homomallum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831) 626-Paepalanthus bomomallus.
Hostmanni, Steud. Syn. PI. Cyp. 281 — Paepalanthus simplex.
Humboldtii, *Kunth, Enum. PI.* iii. 544.—Guian.
incanum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831) 623. t. 61 = Paepalanthus incanus.
infirmum, Steud. Syn. PI. Cyp. 271 = gracile.
intermedium, Koern. in Linnaea, xxvii. (1854) 601 = setaceum.
iridifolium, Stend. Syn. Fl. Cyp. 278 = Paepalanthus monticolus.
ithyphyllum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 36 = Paepalanthus ithyphyllus.
japonicum, *Koern. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 162.—Japon.

BEIOCAULON:—
juniperinum, Stend. Syn. PI. Cyp. 282 - Paepalanthns flaccidus.
Koernickiannm, *Heurch* b" *Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 101.—Texas.
Kummerianum, Mart, ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 865 = Paepalanthus caespititius.
Knnthii, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 599, nomen; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 482.—Bras.
Lamarckii, Steud. Syn. PI. Cyp. 276 - Paepalanthns. Lamarckii.
lonceolatnm, *Miq. ex Steud. 1. c.* 271.—Ind. or.
Langsdorffii, Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. i. (1831) 632. t. 51 = Paepalanthus Langsdorffii.
lanuginosum, Bong. 1. c. 627 = Paepalanthus lanuginosns.
latifolium, Bong. 1. c. 631. t. 64 = Paepalanthns latifolius.
laxifolium, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 600, nomen ; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 494.—Bras,
leptophyllum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 549.—Bras.
Ieucocephalum, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 272.—Ins. Borbon.
leucomelas, Steud. Nom. ed. II. i. 585 = melalencnm.
Lhotskyi, Steud. Syn. PI. Cyp. 270 = Smithii.
lingulatum. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1881) 626-Paepalanthus lingulatus.
linearifolium, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 601, nomen; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 498.—Bras,
lividum, *F. Muell. Fragm.* i. 92.—Austral,
longifolium, *Nees, ex Kunth, Enum. PI.* iii. 567.—As. trop.; Madag.
longipes, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 35= Paepalanthus amoenus.
luiulaefolium, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 28.—Ind. or.
macrobolax, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 599, nomen; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 484.—Bras.
macrocephalum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831) 630-Paepalanthus macrocephalus.
macrorrhizon, Bong. 1. c. 681 — Paepalanthus macrorrhizus.
Martianum, Wall. Cat. n. 7279—quinquangulare.
Maximiliani, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831) 620 = Paepalanthus Hilairei.
Maximiliani, Mart, in Herb. Fl. Bras. n. 897-Paepalanthus nitens.
Maximiliani, Schrad. in Schult. Mant. ii. 470 = Paepalanthus ramosus.
melaleucum. Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 629 = Paepalanthus melaleucus.
melaleucum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 29.—Ind. or.
melanocephalum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 549.—Bras.
MetBianum, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 1171, sphalm. = lanceolatum.
microcephalum, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 43=Schiedeanum.
microcephalum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 311 = Benthami, *Seem.*
microcephalum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 258.—Ecuador.
microphyllum, Guill. in Deless. Ic Sel. iii. 58. t. 96 = Paepalanthus microphyllus.
minimum, *Lam. Encyc.* iii. 275.—Zeylan.
minutulum, Steud. Syn. PL Cyp. 270=Paepalanthus pusillus.
Miqoeliannm, *Koern. in Miq. Ann, Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 162.—Japon.
miseram, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 607.—Ind. or.
modestum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 547.—Bras.
molle, Mart, ex Koem. in Mart. FL Bras. iii. I. 487* crassiscapum.
molle, Steud.Syn. PI. Cyp. 282=Paepalanthus plumosus.
monoscapum, *F. Muell. Fragm.* i. 94.—Austral.
monticolum, Steud. Syn. PL Cyp. 278 = Paepalanthus monticolus.
mprulum, Steud. 1. c 281-Paepalanthus chrysanthus.
mucronatum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831; 626. t. 19 = Paepalanthus mucronatus.
myocephalum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 60 = Paepalanthus myocephalus.
nanum, *R. Br. Prod.* 254.—Austral.
nardifolium, Steud. Syn. PL Cyp. 281-Paepalanthus Fischerianus.
Neerianum, *Koern. in Linnaea*, xxvii. (1854) 628.—Zeylan.

EHIOCAUIiON:—
nepalense, *Bong, in Mini. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. U831) 610.—Nepal.
nepalense, Kunth, Enum. PI. iii. 554=viride.
nigrescens, D. Dietr. Syn. PI. v. 265=melaleucnm.
nigricans, *R. Br. Prod.* 254.—Austral.
nigroniveum, St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 392 = Paepalanthus tortilis.
nilagirense, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 271.—Ind. or.
nitens, Bong., in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. i. (1881) 633 = Paepalanthus nitens.
nitidum, Bong, in Mim. Acad. Petersb. Sér. VI. i. (1831) 636-Paepalanthus nitidus.
nitidum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6073 = sexangulare.
niveum, Bong, in Mém. Aead. Pétersb. Sir. VI. i. (1831)635. t. 37=Paepalanthus nivens.
niveum, Hoflmgg. ex Koem. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 304=Philodice Hoflmannseggii.
nubigenum, Steud. Syn. PI. Cyp. 281 = Paepalanthus nubigenus.
oitusi/olium, Steud. 1. c. 277 = Paepalanthus obtusifolins.
odoratum, *Dolt, in Hook. Ken Journ.* iii. (1851) 280.—Ind. or.
omcinale, *Koern.in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.480, in nota. -China,
oryzetorum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 28.—Ind. or.
Pallidum, *R. Br. Prod.* 254.—Austral.
paludosum. Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 625 = Paepalanthus plantagineus.
Palustre, *Salem, ex Steud. Syn. Pl.Cyp.* 280.—Am. trop.
Papillosum, *Koem. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.489.—Bras,
paraguayense, *Koern. I. c.* 49'.—Paraguay.
Pardinum, D. Dietr. Syn. PI. v. 263-elicbrysoides.
Parvura, *Koern. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 1 6 3-Uapon.
Pedunculatum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. >• (1831) 630=Paepalanthus falcatus.
Pellucidum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 166 = leptangulare.
wrpusiUum, Steud. Syn. PI. Cyp. 277 = Paepalanthus tortilis.
P'l'ferum, Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. i. (1831) 631 = Paepalanthus pilifer.
Pilosum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 251-Paepalanthas pilosus.
Planifolium, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 629 = Paepalanthus monticolus.
Wantaginella, Crantz, Inst i. 360 - Paepalanthus tnangularis.
P'antagineum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sir. VI. .'• (1&31) 625= Paepalanthus zosteraefolius.
t'antaginioides, Desv. in Ham. Prod. PL Ind. Occ. 16 = Paepalanthus plantaginoides.
#«mosum, Bong, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 682. t. 82-Paepalanthus plumosus.
wyanthum, Bong. 1. c. 622 = Paepalanthus polyanthus.
fo'ynthum, Mart, in Flora, xxiv. ;1841) II. Beibl. 35 = Paepalanthus Claussenianus.
Po'yphyllum, Salzm. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 277 = Paepalanthus tortilis.
volytrichoides, Steud. 1. c. 275 = Paepalanthus polytrichoides.
**?*cottianum*, Bong, in Mim. Acad. Pétersb. Sir. VI. '• (1831) 635. t 86=Mesanthemum Prescottianum.
P'olifemm, Bong. 1. c 682. t. 28 = Paepalanthus Prolifer.
*t'ff*rum*, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 277 = '*epalanthus viviparus.
f«l*"*J"">Ste»d. Syn. PI. Cyp. 280 = modestum.
P"besce n.| *Urn. Encyc.* iii. 276.-Madag.
publ n t ^ m > Bon e- ^ *Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VI. i. Du '-k- }) 628 - '• «.-Bras.
P«lchd lum) *Koern .in unnaea,* xxvii. (1854) 622.-A- f- trop.
Pamilum, *Afzcl. ex Koern. I. c.* 621.-Afr. trop.
Pusill">R af'n. Atl. Journ. 121 = scptangulare ?
Pusillum• Bon B- in *Kim*_ Acad - Pet"50? - Ser . VI. i. (18ol^634> '• 29= Paepalanthus pusillus.
Pusillum , R . B Prod Prod . 254—Austral.
Pusill ««"•• Poepp. ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. '"5-Pacpalanthns tortilis. '
'''"!('»»• Willd. ex Kunth, Enum. PI. iii. 548 - "Hcrocephalum.
Pygnaeum, Dalz. in Hook. Kew Jonm. iii (1851) 381 = E. Xeranthemnm?
Py»maeum, *Koern. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.477.—Bras.

EBIOCAULON :-
pygmaeum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) H. Beibl. 60 = Paepalanthus Schraderi.
quadrangulare, *Lour. Fl. Cochinch.* 60.—Cochinch.
quinquangulare, Boj. Hort. Mauri t. 361» Paepalanthus repens.
quinquangulare, Heyne, ex Mart, in Wall. PI. As. Rar. iii. 29=melaleucum.
quicquSngulare, *Linn. Sp. PI.* 87.—Ind. or.; Austral.
quinquangulare. Mart, ex Koem. ill Linnaea, xxvii. (1854) 645=trilobum.
radians, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 547.—Afr. trop.
ramosum, Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1820) 76. t 3 = Paepalanthus ramosus.
Ravenelii, *Chapm. Fl. S. V. St.* 508.—Carolina.
repens, Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. i. (1831) 628, 648. t. 7 = Paepalanthus Bongardi.
repens. Lam. Encyc. iii. 275. t. 50. f. 2 = Paepalanthus repens.
Riedelianum, Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sér. VI. i. (1831) 630. t. 34 = Paepalanthus Vauthierianus.
rigidulum, Steud. Syn. PI. Cyp. 278= Paepalanthus rigidulus.
rigidum, Bong, in Mim. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 621 = Paepalanthus rigidus.
rigidum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 35 - Paepalanthus falcifolius.
rivulare, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 280 =Dalzellii.
rivulare, *G. Don, ex henth. in Hook, Niger Fl.* 547.—Afr. trop.
robustum, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 271.—Ind. or.
rosulatum, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1864) 600, nomen; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 487.—Bras.
Rouxianum, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 270.—Ind. or.
rufulum, St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 891=Paepalanthus rufulus.
rupestre, Steud. Syn. Fl. Cyp. 278 = Paepalanthus rupestris.
saxatile, Bang, in Mim. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 625. t. 30 = Paepalanthus saxatilis.
Scabiosa, Crantz, Inst. i. 860 = quinquangulare.
scariosum, *R. Br. Prod.* 255.—Austral.
Schiedeanum, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 600, nomen; *et in Mart. Fl. Brrs.* iii. I. 492.—Mexic.
Schultzii, *Benth. Fl. Austral,* vii. 195.—Austral,
scirpoides, *Griseb. Cat. P',. Cub.* 226.—Cuba.
selaginoides, Benth. PI. Hartw. 260—Paepalanthus selaginoides.
Sellowianum, *Kunth, Enum. PI.* iii. 545.—Bras.
separatum, Steud. Syn. PI. Cyp. 280 = Paepalanthus hirsutus.
septangulare, *With. Bot. Arr.* ed. III. ii. 184.—Reg. Brit.; Am. bor.
sericans, Mart, in Wall. PI. As. Rar. iii. 29 = Wightianum.
serotinum, Walt Fl. Carol. 88*°decangnlare.
sessiliflorum. Mart in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 60 = Paepalanthus sessiliflorns.
setaceum, Heyne, ex WalL Cat. n. 6073=sexangulare.
setaceum, *Linn. Sp. PI.* 87.—As. trop.; Austral,
setaceum, *Lour. Fl. Cochinch.* 60.—Cochinch.
sexangulare. *Linn. Sp. PI.* 87.—Ind. or.; Madag.
Sieboldianum, Sieb. & Zucc. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 272 (Sieboldtianum) = sexangulare.
sigmuideum, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 163.—Cuba.
simillimum, Steud. Syn. PI. Cyp. 277 - Paepalanthus caulescens.
simplex, Steud. 1. c. 280 = Paepalanthus simplex,
sinicum, *Miq. in Journ. Bot. Nierl.* i. (1861) 87.—China.
Smithii, *R. Br. Prod.* 254.—Austral.
Sollyanum, Royle, Illustr. Bot Himal. 409. t. 97. f. 1 = trilobum.
Sondenanum, *Koem. in Linnaea,* xxvii. (1854) 669.—Afr. austr.
spadiceum, Lam. Encyc. iii, 277 = Scirpus spadiceus.
sparganioides, *Bong, in Mem. Acad. Petersb.* Sir. VI. i. >x18S1; 637. t. 68.—Bras.
spathaceum, *Rafin. Atl. Journ.* 121 (Quid?).—Am.bor.
speciosum, Bong, in Mem. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1881) 636. t. 67 = Paepalanthus speciosus.
spectabile, *F. Muell. Fragm.* i. 95.—Austral.
sphacelatum, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 206 (= *Bulbostylis paradoxa).*—Bras,
sphaerospermum, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 162 (sperospermum).—Cuba.
sphagnoides, Poepp. *rx* Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 302=Torima fluviatilis.

ERIOCATTLON:-
spirale, Bong, in Mim. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 634. t. 45 = Paepalanthus spiralis.
Spixianum, Steud. Nom. ed. II. i. 586-Paepalanthus Spixianus.
splendens, Bong, in Mim. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 633. t. 66=Paepalanthus caulescens.
Spruceanum,*Koern. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.488.—Bras.
Statices, Crantz, Inst. i. 860=decangulare.
stellare, Guill. in Deless. Ic. Sel. iii. 59 -Paepalanthus plumosus.
stcllulatum, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 620. Ind. or.
stramineum, *Koern. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.478.—Bras,
striatum, *Lam. Encyc.* iii. 275.—Ins. Borbon.
subalatum, Boj. ex Koern. in Linnaea, xxvii. (1654) 645= trilobum.
subtile, Steud. Syn. PI. Cyp. 281 = Paepalanthus subtilis.
subuncinatum, Steud. 1. c. 277 = Paepalanthus caulescens.
supinum, Herb. Vind. ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 852 = Paepalanthus supinus.
surinamense, Steud. Syn. PI. Cyp. 275 = Paepalanthus caulescens.
tenue, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6073 = sexangulare.
tenue, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 253 = l'aepalanthus tenuis.
tenue, Poepp. ex Koern. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 35!) =• Paepalanthus polytrichoides.
tenuifolium, *Klottsch, in Schomb. Faun. V Fl. Brit. Gui.* 1116, nomen; *et Koern. in Mart. Ft. Bras.* iii. I. 496.—Guiana.
texense,Koern.in Linnaea, xxvii. (1854) 694.—Am. bor.
Thunbergii, *Wikstr. ex Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 677.—Afr. trop.
Thwaitesii, *Koern. I. c.* 627.—Zeylan.
tortile, Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 624. t 49-Paepalanthus tortilis.
tortile, Steud. Syn. PI. Cyp. 276 - Paepalanthus flaccidus.
tortuosum, *F. Muell. Fragm.* i. 91.—Austral.
triangulare, Linn. Sp. Pi. ed. II. 128 = Paepalanthus triangularis.
trichophyllum, Bong, in Mim. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 636. t. 54 = Paepalanthus trichophyllus.
trichosepalum, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 161.—Cuba.
trilabum,Buch-Ham.ex Walt. Cat. n. 6072 D.—Ind. or.
Trinianum, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 58 = Paepalanthus rufulus.
truncatum, *Buch.-Ham. ex Mart, in Walt. PI. As. Rar.* iii. 29.—Ind. or.
tuberosum, Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 629 = Paepalanthus tuberosus.
umbellatum, Bong. L c. 683 = Paepalanthus helminthorrhizus.
umbellatum, H. B. *8c K.* Nov. Gen. et Sp. i. 252=— Paepalanthus Humboldtii.
umbellatum, Lam. Encyc. iii. 277 — Paepalanthus umbellatus.
umbrosum, Salzm. ex Koem. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 357 = Paepalanthus myocephalus.
uncinatum, Steud. Syn. PI. Cyp. 281 •Paepalanthus uncinatus.
ussuriense, *Koern. ex Regel, Tent. Fl. Ussur.* 157.—Manchur.
vaginatum, *Koern. in Linnaea,* xxvii. (1854) 599, nomen; *et in Mart. Fl. Bras.* iii. I. 483.—Bras.
Vanheurckii, *Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot.* 88.—Ind. or.
Vautherianus, Guill. in Deless. Ic. Sel. iii. 57 = Paepalanthus Vauthierianus.
vernonioides, Steud. Syn. PI. Cyp. 280=Paepalanthus vernonioides.
verticillatum, Bong, in Mém. Acad. Pitersb. Sir. VI. i. (1831) 638 = Paepalanthus verticillatus.
villosum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 1«6 =• Lachnocaulon MLhauxii.
villosum, Salzm. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 277-Paepalanthus Schraderi.
villosum, Willd. ex Koern. in Linnaea, xxvii. (1854) 596-decangulare.
viride, *Koern. 1. c.* 637.—Ind. or.
viviparum, Bong, in Mim. Acad. Pétersb. Sir. VI. i. (1831) 6S2. t. 23-Paepalanthns viviparus.
Wahlbergii, Wikstr. ex Koern. in Mart. M. Bras. iii. I. 459 = Paepalanthus Wahlbergii.
Wallichiiinum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 26. t. 219.—Ind. or.

EBIOCATTLON:—
Walliekianum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 341=sexangulare.
Wightianum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 28.—Ind. or.
xeranthemoidcs, Bong, in Mém. Acid. Pitersb. Sér. VI. i. (1831) 635 = Paepalanthusxeranthemoides.
xeranthemoides, *Heurck &*[1] *Muell. Arg. in Heurct, Obs. Bot.* 103.—Afr. trap.
Xeranthemum, *Mart, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 29.—Ind. OT.
yutcaefolium, Mertens, ex Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 60 = Paepalanthus tortilis.
Zollingcrianum, *Koern. in l-innaea,* xxvii. (1854) 682.—Java,
zosterifolius, Stead. Syn. PI. Cyp. 277 = Paepalanthus zosteraefolius.

EBIOCEPHALUS, Linn. Gen. cd. I. 265 (1737). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 416.
BRACHVGY.NE, MICROGYNE, SIPHONOGYNE, STENOGYNE, Cass. in Diet. Sc. Nat. 1. 4'JS (1827).
CRYPTOGYNE, Cass. 1. c 491 (1827).
MONOCHLAENA, Cass. 1. c 496 (1827).
affinis, DC. Prod. vi. 147=racemosus.
africanus, Bunn. f. Prod. Fl. Cap. 25 = sericens.
africanus, *Linn. Sp. PI.* 926.—Afr. austr.
africanus, Sieber, ex DC. Prod. vi. 147 = umbellulatus.
aspalathoides, *DC. Prod.* vi. 148.—Afr. austr.
capitellatus, *DC. 1. c.* 146—Afr. austr.
coryvibosus, Moench, Mcth. 590=africanus.
decussatus, Burch. Trav. i. 272-= glaber.
eximius, *DC. Prod.* vi. 147.—Afr. austr.
frutescens, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 180 = africanus.
glaber, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 168.—Afr. austr.
tarirnus, DC. Prod. vi. 148-glaber.
microcephalus, *DC. 1. c.*—Afr. austr.
microphyllus, DC. 1. c.=glaber.
paniculatus, Cass. in Diet. Sc Nat. 1.498=umbellulatus.
pectinifolius, Linn. Syst. ed. XII. 679-Iiippia frutescens.
pedicellaris, DC. Prod. vi. 146-pnnctulatus.
pteronioides, *DC. I. c.*—Afr. austr.
pteronoides, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 676-punctulatus.
pteropbiloides, *DC. Prod.* vi. 146.—Afr. austr.
pubescens, *DC. 1. c.* 148.—Afr. austr.
punctulatus, *DC. I. c.* 146.—Afr. austr.
purpureus, Burch. ex G. Don, in Loud. Hort Brit. 365 = glaber.
racemosus, Gaertn. Fruct. ii. 1.168=umbellulatus.
racemosus, *Linn. PI. Rar. Afr.* 26.—Afr. austr.
racemosus, Zeyh. ex Steud. Nom. ed. II. i. 586 — Elytropappus glandulosus.
scariosus, *DC. Prod.* vi. 147.—Afr. austr.
septifer, Cass. in Diet. Sc. Nat. 1. 494 = africanus.
septulifer, *DC. Prod.* vi. 125.—Afr. austr.
sericeus, *Gaudich. ex DC. I.* c—Afr. austr.
sessiliflorus, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 204 = glaber.
simplicifolius, Salisb. Prod. 211—racemosus.
spicatus, Bnrm. ex DC. Prod. vi. 147 = racemosus.
spmescens, *Burch. Trav.* i. 272.—Afr. austr.
tenuifolius, *DC. Prod.* vi. 146.—Afr. austr.
tuberculosus, *DC. 1. c.* 146.—Afr. austr.
•umbetlatus, Auct.-seq.
umbellulatus, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* 1. 493.—Afr. austr.
variifolius, Salisb. Prod. 211—africanus.

ERIOCHAENIUM, C. Muell. in Walp. Ann. v. 349 (1858) = Eriachaenium, Sch. Bip. (Compos.).

F.RIOCHAETA, Fig. & De Not. in Mem. Ace. Torin. Ser. II. xiv. (1854) 374 - Pennisetum, Rich. (Gramin.).
densiflora, Fig. *8c* De Not. 1. c. 376.—Nubia.
reversa. Fig. & De Not. 1. c. 878.—Nubia.
secundiflora, Fig. & De Not. 1. c. 375.—Nubia.

KRIOCHAETA, Torr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 586 (1840) = Bynchospora, Vabl (Cyperac.).

ERIOCHILOS, Spreng. Syst. iii. 714 (1826) -seq.

ERIOCHILUM, Ritg. in Marb. Schrift. ii. (1831) 121 = seq.

EBIOCHILTJS, R. Br. Prod. 323 (1810). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 611.
autumnalis, *R. Br. 1. c.* —Austral.

EBIOCHHiUS:—
cucullatus, Keichb. f. Beitr. Syst. Pfl.- 27 - autumnalis.
dilatatus, *Lindl. Swan River App.* 53.—Austral,
fimbriatus, *F: Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 152.—Austral.
latifolins, *Lindl. Swan River App.* 53.—Austral.
Lindleyi, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 10=scaber.
multiflorus, *Lindl. Swan River App.* 53.—Austral,
scaber, *Lindl. I.* c—Austral,
tenuis, *Lindl..'.* r.—Austral.

ERIC-CHITON, F. Muell. 2nd Gen. Report, 15 (1854), nomen-Chenolea, Thunb. (Cheuopod.).
sclerolaenoides, F. Muell. 1. c.=C. sclerolaenoides.

ERIOCHLAENA, Spreng. Syst iii. 128 (1826)=Eriolaena, DC. (Sterculiac.).

EBIOCHLAMYS, Sond. et F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 4b8. *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 317.
Behrii, *Sond. V F. Muell. I.* c—Austral.
Knappii, *F. Muell. in Melb. Chemist* (May 1888).—Austral.

EBIOCHLOA, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 94. t. 30,31 (1815). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1099.
AGLYCIA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 87 (1840).
ALYCIA. Willd. ex Steud. 1. c. 66 (1840).
HELOPUS, Trin. Fund. Agrost. 103 (1820).
MONACHNE, Beauv. Agrost 49. t 10 (1812), nomen prius.
OEDIPACHNE, Link, Hort. Berol. i. 51 (1827).
acuminata, Kunth, Enum. PI. i. 72 = polystachya.
annulata, *Kunth, Rh. Gram.* i. 80.—Keg. trop.
brasiliensis, Spreng. Syst. i. 249-Paspalum dissitiflornm.
distachya, *H. B. V K. Nov. Gen. el Sp.* i. 95.—Bras.
globosa, Kunth, Rèv. Gram. i. 30=Milium globosum.
grandiflora, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 39.—Am. trop.
grandiflora, Vasey, Gr. U. St. ll=Lemmoni.
Kunthii, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 47—Am. austr.
Lemmoni, *Vasey V Scribner, in Coult. Bot. GOB.* ix. (1883) 185.—Arizona.
mollis, Kunth, Rév. Gram. i. SO-punctata.
polystachya, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 95.—Mexic.
pulchella, Kunth, Rév. Gram. i. 30=Panicum pulchellum.
punctata, *Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 5.—As. trop.; Austral.
punctata, Hochit ex Stead. Syn. PI. Gram. 101 = polystachya.
purpuraseens, Hochst. in Flora, xxir. (1841) I. Intell. ltf = Panicum gossypinum, *A. Rich.*
sericea, *Munro, ex Vasey, Gr. U. St.* 11, nomen.—Texas.
succincta, *Kunth, Enum. PI.* i. 73.—Rossja.
sundaica, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 606.—Ing. Banca.
trichopus, *Hochst. ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 39.—Afr. trop.
vestita, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 97.—Ins. Socotra.
villosa, *Kunth, Rrv. Gram.* i. 203. t 13.—As. or.

ERIOCHRYSIS, Beauv. Agrost. 8. t. 4. f. 11 (1812)-Saccharum, Linn. (Gramin.).
attenuata, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 411 = S. fusenm.
cayanensis, Beauv. Agrost. 8. t. 4. f. 11 = S. cayennense.
fusca, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Se>. VI. ii. (1833) 815=S. fuscum.
longifolia, Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc xix. (1881) 66.—Ind. or.
Narenga. Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 411 = S. Narenga.
pallida, Munro, in Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 440.—Afr. austr.
pulchra, Beauv. Agrost 162 = S. cayennense.
porphyrocoma, Hancc, in Joum. Bot xiv. (1876) 294.—China.

ERIOCHYLUS, Steud. Nom. ed. II. i. 586 (1840) = Eriochilus, R. Br. (Orchid.).

ERIOCLADIUM, Lindl. Swan River App. 24 (1839)-Angianthua, Wendl. (Compos.).
pyramidatum, Lindl. 1. c. = A. Cunninghamii.

ERIOCLEPIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii.(1869) 95 = EKI0LEPIS,Cass. = Cni0UB, Linn. (Compos.).

ERIOCLINE, Cass. in Diet. Sc. Nat. xr. 191 (1819) = OBteospermum, Linn. (Compos.).
obovata, Cass. L c.; et xxx. 883—O. spinosum.

EBIOCNEMA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 144. *MELASTOMACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 736.
acaulis, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 23. t. l.f. 2-HiIariana.
aenea, Naud. in Rev. Hortic.Sér. III. it. (1848) 381 = Bertolonia marmorata.
fulva, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 144.—Bras.
Hilariana, *Naud. I. c.* 145.—Bras.
marmorata, Naud. in Rev. Hortic. Sér. HI. ii. (1848) 381 — Bertolonia marmorata.

ERIOCOCCUS, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1848) 143-Phyllanthus, Linn. (Euphorb.).
caudatus, Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 173.—Java.
glaucescens, Zoll. 1. c. — P. pulcher.
gracitis, Hassk. in Hoev. *8c* De Vriese, Tijdschr. *• (1843) 143-P. gracilipes.

EBIOCOEIiUM, Hook. f. in Benth. *8c* Hook. f. Gen. i. 400 (1862). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook, f-I.e.
paniculatum, *Baker, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* i. 428.—Afr. trop.
racemosum, *Baker, 1. c.* 427.—Afr. trop.

ERIOCOMA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 267- '• 896 (1820) = Montanoa, La Llave (Compos.).
arborescens, Alam. ex DC. Prod. v. 566- M.arborescens.
floribunda, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 267. t. 396 — M. floribunda.
fragrans, D. Don, in Sweet, Brit Flow. Gard. Ser. IL t. 44 — M. tomentosa.
frutescens, Alam. ex DC. Prod. v. 566-M. frutescens.
grandiflora, Alam. ex DC. 1. c. = M. grandiflora.
heterophylla, Schrad. Sera. Hort. Gotting. (1833) 8 «= M. tomentosa.

ERIOCOMA, Nutt. Gen. Am. i. 40 (1818) - Oryzopsis, Michx. (Gramin.).
cuspidata, Nutt. 1. c - O. cuspidata.
membranacea, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 586.—Am. bor.
WeMeH, Thurb. in S. Wats. Bot. Calif, ii. 288~*O.* Webberi.

ERIOCORYNA,Steud. Nom. ed. II. i. 586 (1840)-seq.

ERIOCORYNE, Wall, ex DC. Prod. vi. 541 (1887) - Saussurea, DC. (Compos.).
nidularis. Wall, ex DC. 1. c - S. gossypiphora.

ERIOCYCLA, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 232 (1835)=Plturanth08, Viv. (Umbellif.).
nuda, Lindl. 1. c =P. nuda.

ERIOCYCLAX, Neck. Elem. iii. 25 (1790) = Aspslathus, Linn. (Legumin.).

ERIODAPHUS, Spach,.Hist Vég. Phan. vi. 286 (1888) - ERIUDAPHUS, Nees, = SoolopU, Schreb. (Bixin.).

EBIODEIfDBOM", DC. Prod. i. 479 (1824). *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 210.
CAMPYLANTHERA, Schott & Endl. Melet. 35 (183*)-CEIUA, Medic. Malv. 15 (1787) J Gaertn. Fruct. »• 244. t 133 (1791).
ERIONE, Schott & Endl. Melet 34 (1832).
GOSSAMPINUS, Buch.-H'am. in Trans. Linn. Soc. *v-(1826) 126.
aesculifolium, *DC. Prod.* i. 479.—Mexic.
anfractuosum. *DC. 1. c.*—As. et Afr. trop.
caribaeum, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 292- anfr*c' tuosum.

EBIODENDBON :—
guineense, G. Don, in Lond. Hort. Brit. 292-anfractuosum.
jasminiodorum, `*St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 265.—Bias.
leiantheram, *DC. Prod.* i. 479.—Bras,
occidental, *G. Don, Gen. Syst.* i. 618.—Mexic.
orientate, KoateL Allg. Med.-Phann. Fl. v. 1875-anfractuosum.
pentandrum, Knrz, in Jonrn. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 118 = anfractuosum.
pubiflorum, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 266.—Bras,
phaeosanthom, *Decne. ex Riviire, in Journ. Soc. Uortic. Fr.* Ser. II. iv. (1870) 90 -Bras. 1
Rivieri, *Decne. in Fl. des Serres,* Ser. IL xii. (1877) 167.—Bras.
Samauma, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 91.—Bras,
tnschistandrnm, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 182—Peruv.J

ERIODESMIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 156-Erica, Toùra.
capitata, D. Don, 1. c. 158-Erica capitate.

EHIODICTYOTT, Benth. Bot. Voy. Sulph. 85 (1844). *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 881.
ERIODYCTION, Benth. in DC. Prod. x. 188 (1846).
ancnstifolinm, *Nutt. in Journ. Acad. Philad,* N. S. i. (1847) 181.—Am. bor. occ.
califomicum, Decne. Bot. Voy. Vénus, 22-crassifoliom.
crassifolium, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 36.—Calif.
glutinosum. *Benth. I. c.* 86.—Califf
Lobbii, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 202—Calif.
«Wilifolinm, *Greene, 1. c.* 201.—Calif,
tomentosnm, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 86.—Calif.

ERIODRYS, Rafin. Alsog. Am. 80 (1888)»QuerouB, Tonrn. (Cupulit).
lanata, Rafin. 1. c 80-Q. lanuginosa!

ERIODYCTION, Benth. in DC. Prod. x. 188 (1846)-Erfodictyon, Benth. (Hydrophyll.).

ERIOGENIA, Steud. Norn. ed. II. i. 587 (1840)-ERIOGYNIA, Hook.-Spiraea, Linn. (Rosac).

8HIOOI.OSST7M, Blnme, Bijdr. 229 (1829). *SAPINOACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 896.
MOUUNSIA, Cambess. in Mem. Mas. Par. xviii. „ (1829) 27. t. 2.
f ANCOVIA, Willd. Sp. PI. ii. 285 (1799).
UITENIA, Noronha, in Verh. Bat Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 4.
"Uacenm, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 181.—Ins. Timor,
cauliflorum. *Guill. &• Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 118. t. 28—Afr. trop.
Mule, *Btume, Bijdr.* 229.—As. trop.
nembranifolinm, *Radii, in Act. Cotter. Bot. Amst.* }W7 (187&) 125.—Malaya.
rut, ginosum, Brand. For. FL 108-edule.

ERIOOONTTM, Michx. Fl. Bor. Am. i. 246. t 24 (1803). *POLYGONACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 92.
Er INOSA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14 (1816).
EUCYCLA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. 166

STENOGONUM, Nutt 1. c. 170 (1847).
Ah IS, neiurain> *Torr,* »» *Bt- Emory Rep.* 150.—N. Mexic.
acaule, *Nut. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 160—Am. bor. occ.
a<**toseltoides,* Torr. ex Benth. in DC. Prod. xiv. 16 = ecile. Fracl.
°*fne,* Benth. 1. c lS-mulum.
aiatum, *Torr. in Sitgr. Rep.* 168. t. 8.—Am. bor. occ.
•"*«"», Nutt. in Jou?n. Acad. Philad. N. S. i. (1847) I64=dichotonram.
•Ipinum» *Engelm. in Coult. Bot. Gat.* vii. (1882) 6—Apl. bor.
° "-*»«« , Nutt. in Jonrn. Acad. Philad. N. S. i. (1847) UfOocaespitosum.
"*tfrosaceum,* Benth. in DC. Prod. xiv. 9-caespilosum.

EHIOaONTJMC:—
angalosum, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1887) 406.—Am. bor. occ.
angustifolium, Nutt. in Jonrn. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 164-heracleoides.
annuum, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* v. (1837) 164.—Am. bor. occ.
apiculatnm, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 378.—Am. bor.
arachnoideum, Esch. in Mém. Acad. P&ersb. (1821-22) 287-=latifoUum.
arachnoideum, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 158 = nudum.
arborescens, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i.1. (1884) 11.—Am. bor. occ.
atrorubens, *Engelm. PI. Wislit.* 24.—N. Mexic.
aureum, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xiv. 8 = flavum.
auriculatum, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 412—nudum.
Baileyi, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 848.—Am. bor. occ.
brachypodum, *Torr. tf Gray, 1. c.* viii. (1870) 180.—Calif.
brevicaule, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 168.—Am. bor. occ.
caespitosum, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.vii.* (1884) 60. t. 8. f. 2.—Am. bor. occ
californicum, *A. Murr. Oreg. Circ.* 1.—Am. bor. occ.
campanulatum, Nutt. in Jonrn. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 163 = brevicaule.
cetnuum, *Nutt. 1. c.* 162.—Am. bor. occ.
chrysocephalum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 101.—Am. bor. occ.
cfflatum, *Torr. ex Benth. in DC. Prod.* xiv. 20.—N. Mexic.
cinereum. *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 45.—Calif,
compositom, *Dougl. ex Benth. in Bot. Reg.* t. 1774 (1836).—Am. bor. occ.
confertiflorum, Benth. in DC. Prod. xiv. 17-mlcrothecum.
cordatum, Torr. ex Benth. 1. c. 21=inflatum.
corymbosum, *Benth. 1. c.* 17.—Am. bor. occ.
crassifolium, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 408 = flavum.
cymosum, Benth. in DC. Prod. xiv. 19-annuum.
dasyanthemum, *Torr.* fc" *Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 177—Calif.
decumbens, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 416 = niveum.
deflexum, *Torr. in Ives, Rep. Colorado River, Bot.* 24.—Am. bor. occ.
delicatulum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 379.—Am. bor.
denudatum, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 161—Calif,
dichotomum, *Dougl. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1887) 415.—Am. boi. occ
dioicum, *Rafin. New. Fl. Am.* iv. 63.—Am. bor.
divaricatum, *Hook. Kew Journ.* v. (1853) 265.—Am. bor. occ.
Douglasii, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 9.—Am. bor. occ.
effusum, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 164=microthecum.
datum, *Dougl. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1887) 413.—Am. bor. occ.
ellipticum, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 161=umbellatnm.
elongatum, *Benth. Bot. Sulph. Voy.* 45.—Calif.
elongatum, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xiv. 10-ovaMfolium.
elongatum, Nutt. in Jonm. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 166-virgatnm.
tricaefolium, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 170=fasciculatum.
fasdculatum, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 411.—Am. bor. occ.
flavum, *Nutt. in Fras. Cat.; Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1887) 408.—Am. bor. occ.
foliosum, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (18S6) 871.—Calif.
Fremonti, Torr. ex Benth. in DC. Prod. xiv. 18 -brevicaule.
geniculatum, Dnr. & Hilg. in Joum. Acad. Nat Sc. Philad. Ser. II. iii. (1866) 45 = Heermanni.
geniculatum, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 162-spbaerocephalum,

EBIOGOITOM :—
gigantemn, J. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 371.—Calif,
glandulosum, *Nutt. ex Benth. in DC. Prod.* xiv. 21.—Am. bor. occ
gnaphalodes, Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1853) 263-multiceps.
Gordonii, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 20.—Am. bor. occ.
gossypinum, *Curran, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 274—Calif.
gracile, *Benth. Bot. Voy. Sulpk.* 46.—Calif,
gracillimum, 5. *Wats, in Bot. Calif,* ii. 480.—Calif.
Greenei, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii (1877) 8 3-dichotomum.
Greggii, *Torr. &• Gray, 1. c.* viii (1870) 187.—Mexic.
gyrophyllum, Nutt in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 163-beracleoides.
Havard!,S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-88) 194—Am. bor.
Heermanni, *Dur. V Hilg. in Pacif. Rail. Rep.* v. 14. t. 17.—Am. bor. occ.
helianthemifolium, Benth. in DC. Prod. xiv. 15 = polycladon, Wrightii.
hemipterum, Torr. ex Torr. *Sc* Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 154=hieracifolium.
heracleoides, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 49.—Am. bor. occ.
hieracifolium, *Benth. in DC. Prod* xiv. 6.—N. Mexic.
hirtifloram, *A. Gray, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 259.—Calif.
Hookeri, S. *Wats. 1. c.* xiv. (1879) 295.—Am. bor. occ.
incanum, *Torr. If Gray, 1. c.* viii. (1870) 161.—Calif,
inflatum, *Torr. in Frimont, Rep.* ii. 317.—Am. bor. occ.
insigne, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 295.—Am. bor. occ.
intricatum, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 46. t. 22.—Calif.
Jamesil, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 7.—Am. bor. occ.
Kelloggii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 293.—Calif.
Kennedyi, *Porter, ex S. Wats. 1. c.* xii. (1877) 263.—Am. bor. occ
Kingii, *Torr. <f Gray, I. c.* viii. (1870) 165.—Am. bor. occ.
lachnogynnm, *Torr. ex Benth. in DC. Prod.* xiv. 8.—Am. bor, occ.
lateriflorura, *Rafin. New Fl. Am.* Iv. 53.—Am. bor.
latifolinm, *Sm. in Rees, Cycl.* xiii. n. 3.—Calif.
laxiflorum, Nutt ex Benth. in DC. Prod. xiv. 18 s microthecum.
Lemmoni, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 266.—Am. bor. occ.
Uptocladon, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 129 =microthecum.
leucocladon, Benth. PI. Hartw, 333-gracile.
Lindheimerianum, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 149-annuum.
Lobbii, *Torr. &• Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 162.—Calif.
lonchophyllnm, *A. Gray, 1. c.* 173.—Am. bor.
longifolium, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* v. (1837) 164—Florida,
marifolium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 161.—Calif.
micranthum, Nutt. in Jonm. Acad. Philad. i. (1847) 164-brevicaule.
microthecum, *Nutt. I. c.* 162.—Am. bor. occ.
mohavense, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 266.—Calif.
molestum, *S. Wats. I. c.* xvii. (1881-82) 379.—Am. bor.
multiceps, *Nees, in Pr. Neuwied, Reise Nord-Amer.* ii. 446.—Am. bor. occ.
multiflorum, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 413.—Texas.
niveum, *Dougl. ex Benth. I. c.* 414.—Am. bor. occ
nudum, *Dougl. ex Benth. 1. c.* 413.—Calif,
nntans, *Torr. V Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 181.—Am. bor. occ.
Nuttalli, Gamb. ex Nutt. in Jonm. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 166 = ovalifoUum.
oblongifolium, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii (1837) 412 = latifolium.
ottusum, Benth. in DC. Prod. xiv. 15=racemosuro.
ochrocephalum, 5. *Wats, in Bot. Calif.* 0. 480.—Calif.

ERIOOOKTUM :—
Orcuttianum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) **371.—Calif.**
***orthocladon*, Torr. ex Berth, in DC. Prod. xlv. 15 - lacemosnm.**
***ovalifolium*, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) 409 = Douglasii.**
OTalifolinm, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) **50. t 8. f. 1.—Am. bor. occ.**
Palmeri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 267. —Am. bor. occ.
panduratum, *S. Wats, in Bot. Calif*, ii. 480.—Calif.
Parishii, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 379.—Am. bor.
Parryi, *A. Gray, I. c.* x. (187.4) 77.—Utah.
***parviflorum*, Nutt. Gen. Am. i. 261 = pauciflorum.**
parvifolium, *Sm. in Rets, Cycl.* xiii. n. 2.—Calif,
pauciflornm, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 735.—Am. bor. occ.
pharnaceoides, *Torr. in Sitgr. Rep.* 167. t. 11.— N. Mexic.
***platyphyllum*, Torr. ex Benth. in DC. Prod. xiv. 20 = tenellnm.**
Plumatella, *Dur. V Hilg. in Pacif. Rail. Rep.* v. 14. t. **16.—Am. bor. occ.**
***polifolium*, Benth. in DC. Prod. xiv. 12=fasciculatum.**
***polyanthum*, Benth. 1. c. - umbellatum.**
***polyceps*, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 165, nota = ovalifolium.**
polycladon, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 16.—N. Mexic.
Pratteniannm, *Dur. in Journ. Acad. Philad.* Ser. II. **iii. (1855) 100.—Am. bor.**
***proliferum*, Ton. & Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 164-ovalifolium.**
puberulum, *S. Wats. I. c.* xiv. (1879) 295.—Am. bor. occ.
***purpureum*, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xiv. 10 = ovalifolium.**
pusillum, *Torr. (f Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. **(1870) 184.—Am. bor. occ.**
pyrolaefolium, *Hook, ex A. Murr. Oreg. Circ.* 2; *et in Kew Journ.* **v. (1853) 395. t. 10.—Calif,**
racemosum, *Nutt. in journ. Acad. Philad.* N. S. i. **(1847) 161.—Am. bor. occ.**
reniforme, *Torr. ex Benth. in DC. Prod.* xiv. 21.—Am. bor. **occ.**
robustum, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. III. (1885) **126.—Am. bor. occ.**
***roseum*, Dur. & Hilg. in Pacif. Rail. Rep. v. 14 = virgatum.**
***rosmarinifolium*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 164-fasciculatum.**
rotundifolium, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 21 — N. Mexic.
salsuginosum, *Hook. Kew Journ.* v. (1853) 264.—Am. bor. occ.
saxatile, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 267. —Calif.
scalare, 5. *Wats. 1. c.* 261.—Calif.
***sericeum*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 277 = flavum.**
***sericeum*, Torr. *Sc* Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 155 = Jamesii.**
shastense, *A. Murr. Oreg. Circ.* 2.—Calif.
Shockleyi, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 194.—Am. bor. occ.
***Simpsonii*, Benth. in DC. Prod. xiv. 18 = microrhecnm, annuum.**
spathulatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) **76.—Am. bor.**
spergulinnm, *A. Gray, I. c.* vii. (1868) 389.—Calif,
sphaerocephalum, *Dougl. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* **xvii. (1837) 407.—Am. bor. occ.**
***statidfolium*, Hook, in Kew Joum. v. (1853) 1.10 = pyrolaefolium.**
***stellajtum*, Benth. in Tram. Linn. Soc. xvii. (1837) 409 •= umbellatum.**
strictuxn, *Benth. I. c* 414.—Am. bor. occ.
subreniforme, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 260.—Am. bor. occ.
suffruticosum, *S. Wats. I. c.* xx. (1885) 370.—Texas,
sulcatum, *S. Wats. 1. c.* xiv. (1879) 296.—Am. bor.
tenellum, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. **(1847) 165.—Am. bor. occ.**
***tenellum*, Torr. in Ann. Lye. Nat. Hilt. N. York, ii. (1828) 241-ovalifolium.**
***texanum*, Scheele, in Liaaaca, xxii. (1849) 150= longifolium.**

ERIOGONUM :—
Thomasii, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. **864.—**Am. bor. **occ.**
Thompsonae, 5. *Wats, in Am. Natural*, vii. (1873) 302.—Am. bor.
Thurberi, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 176.—Am. bor. occ.
thymoides, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 9.—Am. bor. occ.
***Tolmieanum*, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 134 - umbellatum.**
tomentosum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 246. t. 24.—Am. bor. occ.
Torreyanum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 158.—Calif.
***trachygonum*, Torr. ex Benth. in DC. Prod. xiv. 15 = Wrightii.**
trichopes, *Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois.* 150. **—Am. bor. occ.**
***trichopodum*, Benth. in DC. Prod. xiv. 20=trichopes.**
triste, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1876) 347.— **Am. bor. occ.**
truncatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) **173.—Calif.**
***umbellatum*, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 410 - heracleoides.**
umbellatum, *Torr. in Ann. Lye. Nat. Hist. N. York*, **ii. (1828) 241.—Am. bor. occ.**
undulatum, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 7.-Mexic.
ursinum, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 847.— **Calif.**
vagans, 5. *Wats. I. c.* xx. (1886) 370.—Am. bor.
***verticillatum*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 165 = virgatum.**
villiflorum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1872) 630.—Am. bor. occ.
vimineum, *Dougl. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii.[1] **(1887) 416.—Am. bor. occ.**
virgatum, *Benth. in DC. Prod.* xiv. 16.—Calif.
Watsonii, *Torr. &• Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. **(1870) 182.—Calif.**
Wrightii, *Torr. ex Benth. in DC. Prod.* xiv. 15.—Am. **bor. occ.**

ERIOGYNIA, Hook. Fl. Bor. Am. i. 255. t. 88 (1833) = Spiraea, Linn. (Rosac).
***pectinata*, Hook. 1. c.=S. pectinata.**

EHIOLAENA, DC. in Mlm. Mas. Par. x. (1823) 102. t. 5. *STERCULIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 220.
ERIOCHLAENA, Spreng. Syst. iii. 123 (1826).
GUMSIA, Buch.-Ham. ex Wall. Cat sab n. 1173 (1832).
JACKIA, Spreng. Syst. iii. 85 (1826).
MICKOCHLAENA, Wight & Am. Prod. 70 (1834).
MICROLAENA, WalL Cat. n. 1173 (1832).
SCHILLERA, Reichb. Consp. 204 (1828).
WALLICHIA, DC. in Mem. Mus. Par. x. (1828) 104. t. 6.
Candollei, *Wall. PI. As. Rar.* i. 67.—Ind. or.
Hookeriana, *Wight V Arn. Prod.* 70.—Ind. or.
quinquelocnlaris, *Wight, Ic.* t. 882.—Ind. or.
***Roxburghii*, Spreng. Syst. iii. 123 = Prerospermnm semisagittatum.**
spectabilis, *Planch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* 1.872.— **Reg. Himal.**
Stocksii, *Hook.f. (f Thorns, ex Mast, in Fl. Brit. Ind.* **i. 370.—Ind. or.**
Wallichii, *DC. in Mem. Mus. Par.* x. (1828) 102.- Ind. or.

ERIOLEPIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xii. 881 (1825) = Cnioua, Linn. (Compos.).
***echinata*, Cass. 1. c. 1. 470-C. echinatus.**
***ferox*, Cass. 1. c = C. ferox.**
***italica*, Cass. 1. c = C. italicus.**
***lanceolata*, Cass. 1. c. xii. 831-•C. lanceolatus.**
***laniflora*, Cass. L c. 1. 470=C. laniflorus.**
***lanigera*, Cass. 1. c. = C. cynaroides.**

ERIOLITHIS, Gaertn. Fruct ii. 277 (1791). *ROSACEAE.*
mirabilis, *Gaertn. I. c.*—Peruv.

ERIOLOBUS, M. Roem. Syn. Rosifl. 104, 216 (1847) - PyniB, Tourn. (Rosac.).
***trilobatus*, M. Roem. 1. c. 216 « P. trilobata.**

ERIOLYTRUM, Desv. ex Kunth, Rév. Gram. i. 219 (1829)-=Panlcum, Linn. (Gramin.).
***junceum*, Desv. ex Kunth, 1. c.=P. racemosum.**

ERIONE, Schott & Endl. Melet 84 (1882)-Eriodendron, DC. (Malvac).
***jasminiodora*, Schott & Endl. 1. c. = Eriodendron jasminiodorum.**

ERIONIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 2, nomen (Gen. ignot).

ERIOPAPPUS, Am. in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 443 (1880)-Ijayia, Hook. (Compos.).
***glandulosus*, Arn. 1. c = L. glandulosa.**

ERIOPAPPUS, Hort. ex Lond. Encyc. PI. 688 (1839) = Eupatorium, Tourn. (Compos.).
***paniculatus*, Hort. ex Loud. 1. c. = Eupatorium paniculatum.**

ERIOFE, Humb. & Bonpl. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 142 (1833). *LABIATAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1178.
alpestris, *Mart, ex Benth. 1. c.* 145.—Bras,
complicata, *Mart, ex Benth. 1. c.* 144.—Bras,
crassifolia, *Mart, ex Benth. I. c.* 143.—Bras,
crasslpes, *Benth. I. c.* 144.—Bras,
filifolia, *Benth. in DC. Prod.* xii. 141.—Bras,
foetida, *St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 145.—Bras,
hypenioides, *Mart, ex Benth. 1. c.* 142 —Bras,
macrostachya, *Mart, ex Benth. 1. c.* 145.—Bras,
micrantha, *Benth. in DC. Prod.* xii. 141.—Bras,
monticola, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* **148.—Bras,**
nndiflora, *Humb. (f Bonpl. ex Benth. 1. c.* **148.—**Am. **trop.**
obtusata, *Benth. I. c.* 140__Bras.
pallens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 148.—Bras.
***parviflora*, Steud. Nom. ed. II. i. 587=seq.**
parvifolia, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* **144.— Bras.**
polyphylla, *Mart, ex Benth. 1. c.* 143.—Bras,
stricta, *Benth. in DC. Prod.* xii. 142.—Bras,
teucrioides, *St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 144.— **Bras.**

ERIOPETALUM, Wight, Contrib. 35 (1834)-Brachy-Btelma, R. Br. (Asclepiad.).
***attenuatum*, Wight, 1. c.=B. attenuatum.**
***laevigatum*, Wight, 1. c.-B. laevigatum.**
***parviflorum*, Wight, 1. c. = B. parviflorum.**

ERIOPHA, Hill, Hort. Kew. 69 (1769)=Centaurea, Linn. (Compos.).
***Eriopha*, Hill, 1. c. = C. eriophora.**

ERIOPHILA, Reichb. in Moessl. Handb. ii. 1127 (1828) =Erophila, DC. (Crucif.).

ERIOPHORUM, Linn. Syst. ed. I (1735). *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1052 (partim).
LEUCOMA, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).
LINAGROSTIS, Adans. Fam. ii. 41 (1763).
TRICHOPHORDM, Pers. Syn. i. 69 (1805).
***alpicolum*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natunr. >•• (1853) 78=angustifolium.**
alpinum, *Linn. Sp. PI.* 58.—Europ.; Am. bor.
***alpinum*, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 184=Scheuchzeri.**
angustifolinm, *Roth, N. Beitr.* i. 94.—Reg. bor. temp- et frig.
arundinaceum*, Nees, in Wight, Contrib. 110 * cotnosmn
***brachyantherum*, Traotv. *Sc* Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 98)=vaginatum.**
***caespitosum*, Host, Gram. Austr. i. 30. t. 39 = vaginatum-**
***callithrix*, Lange, in Fl. Dan. buppl. t. 122 =• vaginatum.**
calUtrix, *C. A. Mey. in Mem. Sav. Etr. PJtersb.* **(1881) 203. t. 2.—Ins. S. Laurent.**
***capitatum*, Host, Gram. Austr. i. 30. t. 88 = Schench*''.**
Chamissonis, *C. A. Mey. in Mem. Sav. Etr. PAerst.* »• **(1881) 204. t. 3.—Sibir. alt.**
comosum, *Nees, in Wight, Contrib.* **110;** *{Wall- C'* **n. 3446).—Ind. or.**
***comosum*, Nees, 1. c. partim = microstachynm.**
***cyperinum*, Linn. Sp. PI. ed. II. 77-Scirpus & phorum.**
***dubium*, Hegetschw. Fl. Schw. 52=angnstifoHum.**
dubium, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 128.—Hab. ?
***filamentosum*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 506 (Mapaniae sp.).—Malacca.**

EHIOPHOKXTM :—
gracile, *Koch, in Roth, Catal.* ii. (1799) *Addend.* 259. —Reg. bor. temp.
Facile, Sm. Engl. Bot. t. 2402 - angustifolinm.
"<*ffiii, F. Nylander, in Act. Soc. Sc. Fenn. iii. (1849) --«J. t. 2=gracile.
Hudsonianum. Michx. Fl. Bor. Am. i. 34 = alpinnm.
«»«/. Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1888) 108 = Scheuchzeri.
intermedium, Bast, in Dew. Jonrn. Bot Ui. (1814) 19 . =angustifolium.
intermedium Cham, ex C. A. Mey. in Mem. Saw Etr. 1 *M*?*- '• <[1881]> 204=Chamissonis.
lafafohum, *Hoppe, Taschenb.* (1800) 108—Reg. bor. «mp. etftig.
'eueocephalum, Boeck. in Flora, xli. (1858) 419 = Lockhar ti, *Steud. Norn.* ed. II. i. 587.-Ins. Trinit.
"•«'«>*, Anderss. in Bot. Notiser (1857), 62 - acoeuchzeri.
aicrostachynm, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 399. -tad. or.
""folium. Dalla TonB, AtL Alpcnfl> 218 " ""Ensti-
«««ostaeAien, Groschke, in Keyserl. & Dersch. Beschr. "ov. Kurl. 116-angnstifolium.
nortnidense, Link, Hort. Berol. i. 331 - Androtrichnm pa ycephalum.
p {'1<f»»„Nee», in Linnaea, ix. (1834) 293-gTadle.
p ogstachion, *Linn. Sp. PL* 52.—Reg. bor. temp, et g.
polystachion, Sm. Engl. Fl. i. 67-angustifblium.
pubescens, Sm. 1. c. 68 =latifolium.
rufescens, ^ erss. in Bot> Notiser (1857), 79 = Scheuchzeri.
£•?*">'«», Fries, Novit. ManL iii. 67-Schenchzeri.
"cneuchzeri, *Hoppe, Taschenb.* (1800) 104. *App.* t. 7.— f 8-bor. temp, et frig.
^«*cephalum,* Wnlfen, Fl. Norica, 62-Scheuch-
»(?„<»» R- Br. in Richards. App. Frankl. Journ. 8 = Mufolium.
'/nellum, Nntt Gen. Am. 2. Addit=cradle.
'"luetrum, Hoppe, Taschenb. (1800) 106-gracile.
*g*natum,* Curt. Fl. Lond. fast ii. t. ll=ScSeuchzeri.
gwatnm, *Linn. Sp. PI.* 62.—Reg. bor. temp, et frig.
Vaillanti, 1 Poit * Tnrp- n* Paii>> t- 62_anensti, roiid
£f nicum. «««. *Sp. Pi.* 62.-Am. bor.
*» »-W.-p m. Syn. i. 70, ktifolium.
«J-*«i,Steud. Nom.ed.II.i.588 [sphalm. =*Eriosema)* = RhychosUZeyheri.

ERIOPHORUS, Vaill. « DC. FL Fr. iv. 36 (1805)-Andryala, Linn. (Compos.).

ERIOPHYLLUM, u & Gen_* Sp_Nov_M (1816). *COMPOSITAE* [Bentff. & Hook. *f.* ii. 408. J
ambiguum, A. Gray in Prec A>»-Acad «* (1883) 26.—Calif.
caespitosum, Dougl. * LindL BoU Rt*_*• 1167, Am. bor. occ.
confertiflorum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 25.—Calif.
gracil f" ^ ' ^ " ^ '• *• 26.-Am. bor. occ.
lanat m, Forbes» Hort. Wobam. 183 = caespitosnm.
lanosu A 1 """*' '* ^w_Am_Acad_ xix" (1883> 2 5. —Am. bor. occ.
multicaule, A. Gray, 1. c. 24—Am. bor. occ.
Nevinii, A. Gray, * in. Fl. N. Am. ii. 1. -« 2.—Calif.
nubigenum, Gr A. Gray, in Proc. M, Acad xix. (1883) 2K3tt
oppositifolium, Heynh. Norn. i. 810-Bahia oppositi-
^ e i, ^. *Gray, i» proc. Am. Acad.* xix. (1888) 25. A">, bor. occ,
st aechadif troU^ omm, ^f» G»-rf * «••* 28.-Cali£*
W ^ Jium, ag. 1. c. = Bahia trolliifolia.
S£ i, A. Gr V, *in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 25. W:: bor. occ.
«ts Gray, /. „2«._Am. bor. occ

ERIOPHYTON, Benth. in Wall. PI. As. Rar. i. 63 (1829). *LAB^TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1215.
Wallichian m fi M t ^ ^ '*Himal*

ERIOPODIUM, Hochst in Flora, xxix. (1846) 115, in obs. = Andro PO? on, Lmn- (Gramin.).
Kraussii, Hochst. 1. c. = A. eucomus.

EBIOFSIS, Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 18. *ORCHL DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 645.
PSEUOERIOFSIS, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 852.
biloba, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) 118.—Perav.
rhytidobulbon, Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) Misc. 77-seq.
rntidobnlbon, *Hook. Bot. Mag.* t. 4487.—Perav.
Sceptnim, *Reichb. f. V Warsc. in Bonplandia,* ii. (1854) 98.—Peruv.
Schomborgkii, *Reichb. f. 1. c.* iii. (1855) 67.—Perav.

ERIORHAPHE, Miq. PI. Jnngh. 289 (1851-55)-Fentapetes, Linn. (Sterculiac).
punicea, Miq. 1. c.=P. phoenicea.

EEIOKEMA, DC. [Prod.ii. 388 (1825)]; Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 421 (sphalm. Euriosma).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. L 543.
MUXIRIA, Welw. Apont. 578 (1858).
PYRRHOTRICHIA, Wight *Sc* Am. Prod. 238 (1834).
Afzelii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 225.—Afr. trop*
ambiguum, Meissn. ex Kranss, in Flora, xxvii. (1844) 367 = Rhynchosia Ecklonei.
argenteum, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 422—Argyrolobinm sericeum.
harbatum, Desv. 1. c.-crinitum.
Benthamianum, *Mart, ex Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 521.—Bras.
Bojeri, *Benth. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 188.—Madag.
Bojeriana,.az>tt. *in Bull. Soc. Linn. Par. I* (1883) S88. —Madag.
Bnrkei, *Benth. ex Han. V Sand. Fl. Cap.* ii. 260.—Afr. austr.
cajanoides, *Hook. f. ex Hook. Niger Fl.* 314.—Afr. trop.
campestre, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 212 — Bras.
capitatum, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. i. 180-Psoralea tomentosa.
chinense, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl. i.* (1848) 31.—China.
chrysopostum, E. Mey. .x Steud. Norn. ed. II. i. 588 = Rhynchosia chrysoposta.
congestnm, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 214.— Bras.
cmsanguineum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. BoL 82-parviflorum.
cordatum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* i. 128.— Afr. austr.
cordifolinm, *Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 520.— Bras,
cordifolium, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 227.—Abyss,
crinitnm, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 62.— Am. trop.
crinitnm, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 848.—Mexic.
defoliatum, *Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 624.— Bras.
diffnsom, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 847.—Am. trop.
Dregei, Meissn. ex Kranss, in Flora, xxvii. (1844) 357 =parviflorum.
Dregei, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 129 = SQUAITOSUDI*
ellipticnm, *Wel-a. ex Baker, in Oliver, Ft. Trap. Afr.* ii. 227.—Afr. trop.
elongatum, Baill. Adansonia, vi (1856-66) 227 - glomeratnm.
flaviflornm, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 673.— Goian.
flemingioides, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 229. —Afr. trop.
fioribondnm, *Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 524.— Bras.
fioribundum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 88 = cajanoides.
glabrnm, *Mart, ex Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 622.—Bras,
glomeratnm, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 813.—Afr. trop.
gracile, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 84-glomeratum.
grandiflornm, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 347 i *Seem. Bot. Voy. Herald,* 345.—Mexic.

EHIOSEMA:—
griseum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 228.—Afr. trop.
Gnienzii, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1840) 84.—Afr. austr.
heterophyllum, *Benth. I. c.* 620.—Afr. trop.
incanum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 35 -cajanoides.
insignis, *O.Hoffm. in Linnaea,* xliii. (1880-82) 128.— Afr. trop.
Kranssiannm, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* il. (1848) 91.—Afr. austr.
lagoense, *Micheli, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1876) 93.—Bras,
lanceolatum, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 62.—Am. trop.
lancifolium, Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 813 — simplicifolium.
longepedunculatum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 226.— Abyss.
longiflorum, Benth. in Linnaea, xxii. (1849) 423 = Riedelii.
longifolinm, *Benth. 1. c.* 619.—Bias.
macrophyllum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 34 " cajanoides.
Muxiria, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 229.—Afr. trop.
oblongmn, *Benth. ex Hare, tf Sond. Fl. Cap.* ii. 259. —Afr. austr.
obovatnm, *Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. I. 324.— Bras,
parviflorum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 180.— Afr. anstr.
paudflornm, *Klotmsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 31 Afr. trop.
platycarpon, *Micheli, in Mtm. Soc. Phys. Genhv.* xxviii. (1883) n. VII. 84.—Paraguay ?
podostachyum, Hook. f. ex Hook. Niger Fl. 314 = parviflorum.
polystachynm, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 225. —Afr. trop.
polystachyura, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 130 - cajanoides.
populifolium, *Benth. ex Hani, tf Sond. Fl. Cap.* ii. 259.—Afr. anstr.
procumbens, *Benth. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 134.—Madag.
prorepens, *Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 524.— Bras.
psoraleoides, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 348.—Madag.
psoraleides, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 337 = praec.
puberulum, Eckl. & Zeyh. Ennm. 256-Rhynchosia pnberula, *Steud.*
pnlchellum, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 346; *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 62.—Mexic.
pyenanthum, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 212.— Bras,
pygmaeum, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 225.—Afr. trop.
radicosnm, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 228.—Abyss.
reticulatum, *Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 521 Bras.
reticulatum, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 129 = Rhynchosia Ecklonei.
rhynchosioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 94.—Afr. trop.
Riedelii, *Benth. in Linnaea,* xxii. (1849) 523.— Bras.
rigidom, *Benth. 1. c.* 622.—Bras,
robnstum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 229.— Afr. trop.
rotnndifolinm, *Micheli, in Mem. Soc. Pkys. Genhu.* xxviii. (1883) n. vn. 85.—Paraguay.
rufum, Baill. Adansonia, vi. (1866) 226=glomeratum.
rufum, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 347; *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 62.—Am. trop.
saügnum, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 129.— Afr. anstr.
sericeum, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii 226.— Afr. trop.
sericeum, Eckl. *Sc* Zeyh. Enura. 266-Rhynchosia Orthodanum.
sessiliflorum, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. ix. (1826) 422.—Pernv.
simplicifolium, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 848.—Panama,
speciosum, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 230.—Afr. trop.

EBIOSEMA:—
spicatum, Hook. f. in Hook. Niger FL 318 —parviflorum.
sqnarrosnm, *Wai p. in Lintuua,* xiii. (1839) 536.—Afr. anstr.
stipulare, *Benth. I. c.* xxii. (1849) S19.—Bras,
stnctum, *Benth. I. e.* 520.—Bras,
trinerre, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 130.—Afr. austr.
tuberosum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 227.—Abyss,
vennlosnm, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 211.— Bras,
**violaceom, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 847; *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (18401 62.—Am. trap,
volubile, *Micheli, in Mem. Soc. Phys. Geniv.* xxviiL (1888) n. vn. 86.—Paraguay.
Zeyheri, E. Mey. Comm. PL Afr. Anstr. 129 = sqnarrosum.

ERIOSERMUM, Thnnb. Fl. Cap. ii. 294 (1818), sphalm. —EriоBpennum, Jacq. (LUiac.).

ERIOSOLENA, Blume, Bijdr. 651 (1825) - **Daphne,** Linn. (Thymel.).
affinis, ZolL Syst. Verz. Ind. Archip. 116 (Rnbiacea). —Malaya.
montana, Blume, Bijdr. 651 — D. pendula.
viridifiora, Zoll. & Mor. in Nat. Geneesk. Arch. Ne6rl. Indie, i. (1844) 61S = Wikstroemia Candolleana.
Wallichii, Meissn. in DC. Prod. xiv. II. 540 = D. involserata.

ERIOSOLENIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 190 (1880) =praec

EBIOSPERMTJM, Jacq, Coll. *v.* Suppl. 72 (1796). *LIL1ACEAE,* Benth. *8c* Hook. *f.* iii. 786.
PHYLLOGLOTTIS, Salisb. Gen. PL Fragm. 15 (1866). THAUMAZA, Salisb. 1. c. (1866).
abyssinicum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 263.—Afr. trop.
albucoides, *Baker, in Gard. Chron.* (1876) I. 716.—Afr. austr.
andongense, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Set.* II. i. (1878) 261.—Afr. trop.
Bellendeni, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 420.—Afr. austr.
Bowieanum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 267.—Afr. austr.
brevipe*. *Baker, I. c.* 268.—Afr. austr.
calcaratnm, *Baker, in Gard. Chron.* (1875) I. 716.—Afr. austr.
eapense, Thnnb. Fl. Cap. ii. 294 = latifolinm.
Cooperi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 266. —Afr. austr.
corymbosum, *Baker, I. c.* 266.—Afr. anstr.
Drègeanum, Pred, Bot. Bemerk. 113 = parvifolium.
flexnosnm, *Welw. in Baker, in Trans. Linn Soc. Set.* II. i. (1878) 261.—Afr. trop.
folioliferum, *Andr. Bot. Rep.* t. 521.—Afr. anstr.
folioliferum, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 796-proliferum.
Kirkii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 267.— Afr. trop.
lanceaefohum, *Jacq. Coll.* v. *Suppl.* 72.—Afr. austr.
lanuginosum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 7. t. 265.—Afr. austr.
ladfolinm, *Jacq. Call.* v. *Suppl.* 83—Afr. austr.
latifolium, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1382 = Bellendeni.
Mackenii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 266. —Afr. austr.
ophioglossoides, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Set.* II. L (1878) 262.—Afr. austr.
oroithogaloides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 266.— Afr. austr.
palndosum, *Baker, in Trans. Linn. Soc. Set.* II. L (1878) 261.—Afr. trop.
paradoxum, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* sub t. 1382.—Afr. anstr.
parvifolinm, *Jacq. Coll.* v. *Suppl.* 74.—Afr. anstr.
prolifemm, *Baker, in Journ. Linn. Soc* xv. (1876) 267.—Afr. austr.
pubescent, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 8. t. 264.—Afr. austr.
spirale, *Berg, ex Schult.f. Syst.* vii. 1696.—Afr. anstr.
stenophyllnm, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Sex. IL i. (1878) 261.—Afr. trap.

ERIOSPHAERA,' F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 221 (1817) - Lasiospermum, Lag. (Compos.).
multifida, F. G. Dietr. 1. c. = L. pedunculate.

£BIOBPHA£BA, Less. Syn. Comp. 270 (1832). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 821.
apiculata, DC. Prod. vi. 166 - Helichrysnm marifolium.
catipes, DC. 1. c. 167 —Helichrysnm catipes.
coriacea, DC. L c = Helichrysum rotundatum.
dubia, DC. 1. c. = Leontonyx squarrosaf
Oculus-cati, DC. 1. c. 166 — Helichrysum marifolium.
Oculus-cati, *Less. Syn. Comp.* 270.—Afr. austr.
rotundifolia, DC. Prod. vi. 166 = Helichrysum rotundatum.
umbellata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1651) II. 79 = Helichrysnm umbellatum.

ERIOSPOBA, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii.,608 (1850). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 1070.
CATAGYNA, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 26 (1819), nomen prius.
abyssinica, *Hochst. ex A. Rich. I. c*—Abyss,
pilosa, *Benth. in Hook. 1c. PI.* xiv. 30. t. 1482. —Afr. trop.

ERIOSTAX, Rafin. Fl. Teller, iv. 25 (1836)-**Aechmes,** Rniz *BL* Pav. (Bromel.)-
glauca, Rafin. 1. c. = A. bromeliaefolia.

ERIOSTEMON, Less. Syn. Comp. 12 (1832) = **Saussuraa,** DC. (Compos.).
taraxacifolium. Less. 1. c. = S. Eriostemon.

EBIOSTEMON, Sm. in Trans. Linn. Soc. Iv. (1798) 221. *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 292.
alpinus, F. Muell. Fragm. i. 108-Fhebalinm squamulosum
ambiens,' *F. Muell. 1. c.* vi. 166.—Austral.
amblycarpus, F. Muell. 1. c. i. 102—Fhebalinm amblycarpum.
amplifolius, *Muell. in Melt. Chemist* (Dec. 1884). —Austral.
anceps, *F. Muell. Fragm.* v. 102.—Austral.
anceps, Spreng. Syst. ii. 822 =Phebalium argentenm.
australasius, Sm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 588 = salicifolius.
Balstoni, Pritz. Ic. Ind. ii. 119, sphalm. —Phebalium Ralstoni.
Banksii, *A. Cunn. ex Endl. in Enum. PI. Hueg.* 16.— Austral.
Beckleri, *F. Muell. Fragm.* ix. 109.—Austral.
Benthamii, *F. Muell. I. c.* 108.—Austral.
bilobus, F. Muell. L c. iv. 102 = Phebalium rude.
brevifolius, A. Cunn. ex Endl. in Enum. PL Hueg. 16 = difformis.
Brucei, *F. Muell. Fragm.* vii. 88.—Austral,
buxifolius, *Sm. in Rees, Cycl.* xiii. n. 2.-F<-Austral.
calydnus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 14 = nodifloras.
eapense, Pers. Syn. i. 465 — Adenandra uniflora.
capitatus, F. Muell. Fragm. i. 106—Microcybe pauciflora.
correi/olius, F. Muell. 1. c 105-Asterolasia correifolU, Mueller!,
corymbosus, *Labill. Sert. Austro-Caled.* t. 68.—N. Caled.
Coxii, *F. Muell. in Melb. Chemist* (Dec 1884).— Austral.
Crowei, F. MneU. Viet. PI. i. 119-Crowea exaltata, saligna.
Cnnninghami, *F. Muell. Fragm.* ix. 107.—Austral.
cuspidatus, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 831-myoporoides.
dentatus, Colla, Hort. RipnL 52. t 30=>Elaeocarpus dentatus.
difformis, *A. Cunn. ex Endl. in Enum. PI. Hueg.* 15. —Austral.
Drummondii, F. Muell. Fragm. i. 105 ^Asterolasia phebaloides.
ebracteatus, Endl. in Enum. PI. Hneg. 15 = spicatus.
effusus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 14-spicatus.

EBIO8TEMON.—
elaeagnifolius, Baill. Hist. PI. iv. 388 - Phebalium squamulosum.
elatior, F. MuelL Fragm. i. 181-Phebalium Billardierii.
eridfolins, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* i. 835.— Anstral.
filifolius, *F. Muell. Fragm.* ix. 108.—Austral.
Gelesnowii, F. Maell. 1. c. i. Ip7-Geleznowia verrucosa.
glaucescens, *Ait. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 766 (Quid!)—Austral,
gracile, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* xvi. (1884) 175.—Austral.
grandiflorus, F. Muell. Fragm. i. 105—Asterolasia grandiflora.
halmaturorum, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 376 = linearis.
Hillebrandii, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1865) 10 = Phebalium bilobum.
hispidulus, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 164. —Austral.
Hookeri, F. Mnell. Fragm. L 104 = Asterolasia squamuligera.
intermedius, Hook. Bot. Mag. t. 4489 = myoporoides.
Kendack, *Montr, in Mem. Acad. Lyon, x.* (1860) 191.—N. Caled.
lamprophyllus, *F. Muell. in Journ. Pharm. Soc. Viet.* ii. (1858) 43-Phebalium lamprophyllum.
lanceolatus, Gaertn. 1 Fruct. iii. 154. t. 210-salicifolius.
landfolius, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. L (1865) 32 = myoporoides.
Leichhardtii, *F. Muell. Fragm.* v. 5.—Austral.
tepidotus, Spreng. Syst. ii. 322 —Phebalium squamulosum.
linearifolius, DC. Prod. i. 720-Geijera parviflora.
linearis, *A. Cunn. ex Endl. in Enum. PI. Hueg.* 16. —AustraL
marginatus, Sm. in Rees, CycL xiii. n. 6 —Adenandra marginata.
Maxwelli, *F. Muell. Fragm.* ix. 108.—AustraL
microphyllus, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* (1855) 99.—AustraL
mollis, F. Muell. Census, 11 = Asterolasia mollis.
montanus, F. MuelL PL Viet. i. 129 - Phebalium montanum.
Mortoni, *F. Muell. Fragm.* ix. 108.—Austral,
myoporoides, *DC. Prod.* i. 720.—AustraL
neriifolium, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 164 = myoporoides.
nodiflorum, *Lindl. Swan River App.* 17.—Austral.
Nottii, *F. Muell. Fragm.* vi. 22.—Austral.
obcordatum, A. Cunn. ex Hook. Journ. Bot i. (1834) 254-obovalis.
oblongifolium, Steud. Nom. ed. II. i. 688 = Acronycbia laevis.
obovalis, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 3S1— AurtraL
Oldfieldii, F. Muell. Fragm. i. 8 = Phebalium OW" fieldii.
ovati/olius, F. Muell. 1. c. 108 = Phebalium ovatifolinm.
OBothamnoides, F. Muell. 1. c. - Phebalium ozothamnoides.
pallidus, F. MuelL Censns, 11 - Asterolasia pallida.
paradoxus, Sm. in Rees, Cycl. xiii. n. 6 = Boronia 1«"' folia,
parvifolins, *R. Br. ex Benth. Fl. AustraL* i. 836.— Austral.
phylicifolius, F. MueU. Fragm. L 105-Phebalium phyCcifolinm.
phylicoides, F. Muell. 1. c. 107-= Phebalium diosmeum-
pleurandroides, F. Muell. 1. c. 106 - Asterolasia pie"' randroides.
pulchellumx, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) t. 396.
pungens, **Lindl. in Mitch. Three** Exped. ii. (1839) l»
—Phebalium pungens.
racemosum, **Endl. in Ennm. PL Hueg. 15 - spicatus.**
Ralstoni, F. MueU. Fragm. ii. 101. t. 14 = Phebalw'' Ralstonl.
rhombeus, lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 293 difformis.
rotundifolius, A. Cunn. ex Endl. in Ennm. PI-16 — Phebalium rottmdifolium.
salicifolius, *Sm. in Rees, Cycl.* xiii. n. 1.—Austral.
salignum, BailL Hist, PL ir. 387 -Crowea saligiia-

EHIOSTEltON:—
salsolifolius, Sm. in Rees, Cycl. xiii. n. 8 - Phllotheea australis.
Sand/ordii, F. Muell. Fragm. i. 107 - Geleznowia cafycina.
•caber, *A. DC. Not.* 10"" *Jard. Bot. Geniv.* 8.—H:
scabet'Lrf. *Mag. Bot.* xiii. (1847) ia7.-Au,triJ.
sedifilrus, F. Muell. Fragm. i. 102 = Phebalium gUndulosum.
serrulatus, F. Muell. 1. c. 4=Phebalium bilobum.
Smithianus, W. Hill, ex Benth. Fl. Austral, i. 886-diffonois.
spicatus, *A. Rich. Sert. Astrol.* «• 76. t. 27.—[illegible]
souls', Labill. Nov. HoU. PI. i. 111. t. 141=Phebalium Billardierii.
trachyphyllus, *F. Muell. in Trans. Phil. Soe. Viet.* i. (1855) 99.—Austral.
trinervis' *Hook.Joum. Bot.* i. (1884) 254.-Tasman.
trymalioides, ¥. Muell. Fragm. i. 106; \ict PI. i. 184 - Asterolasia trymalioides.
tuberculosus, F. Muell. PL Viet. i. 180-Phebalium tuberculosum.
Tu[illegible]Maninowii, F. MuelL 1. c. 120=Conea angusti-
umbeUatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) H.15 = Phebalium dentatum.
uniflorus, Sm. in ReeB, CycL xiii. n. 4=Adenandra unlflora,.
verrucosus, A. Rich. Sert. Astrolab. ii. 74. t 28 = obovalis.
virgatus, *A. Cunn. ex Hook.f. in Hook, fourn. Bot.* ii. (1840) 417.—Austral.

ERIOSTEMUM, Colla, ex Steud. Nom. ed. II. i. 588 (1840) - Elaeoearpus, Burm. (Tiliac.).
dentatum, ColU, ex Steud. 1. c. = Elaeocarpus cyanens.

ERIOSTEMUM, Poir. in Diet. Sc. Nat. xv. (1819) 198= Eriostemon, Sm. (RuUc.).

ERIOSTEMUM, Steud. Nom. ed. II. L 588 (1840)-seq.

ERIOSTOMUM, Hoffmgg. *Sc* Link, Fl. Port. i. 106. t 7 (1809) = StaehyB, Toum. (Labiat.).
Ipinum, Hrffagg?& Link, ex Steud. Nom. ed. 1.806, c• [illegible] Link, Fl. Port. i. 105, in obs.=
S. CTGuC&i
germanicum, Hoffmgg. & Link, 1. C.-S. germanica.
lanatum, Hoffmgg. ft Link, 1. C.-S. lanata.
lusitanicum, Hoffmgg. ft Link, 1. c. = S. germanica.
Polystachyum, Presl?Fl. SicuL 87 =S. germanica.
salviaefolium, Presl, L c. =S. itaUca.

ERIOSYCE, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 721. *CACTACEAE.*
Sandillon, *Phil. I. c.*—Chili.

ERIOSYNAPHE, DC. Prod. iv. 175 (1830) = Ferula, Tourn. (Umbellif.).
Kotschyana, Fenzl, in Tchihat Asie Mm. Bot. i. 483-Johrenia selinoides.
longifMa, DC. Prod. iv. 175=F.'l»fff[illegible]
tortdosa, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. v. ss - Johrenia fnngosa.

ERIOTHECA, Schott *Sc* EndL Melet. 85 (1882) - Bombax, Lin (1 al
glabrescens) A^St^'. & Naud. in Ann. Sc Nat Ser. IL xviii. (1842) 211 = B. glabrescens.
Parviflora, Schott *Sc* Endl. Melet. 35 - B. parviflora.
P«6escens, Schott & Endl. 1. c = B. pubescens·
tomentosa, A. St. HiL *Sc* Naud. in Ann. Sc Nat. er. II. xviii (1842) 211-B. tomentosa.

EB.IOTHBEK, Cass. in Bull. Soc. Philom. 0817) 32 (Eriotrixj. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. L ii. 448.
inniperifoUa, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xv. 200.-Ins. Bortvm.
lycopodioides, DC. Prod. vi. 293 - juniperifolU.

ERIOTHYMUS, J. A Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viU' 171.132 (1858)«Xeithia, Benth. (Labial.).
fubiaceus, J. A. Schmidt, L c—Bras.

ERIOTRICHIUM, Lem. in Orb. Diet. v. 406 (1849) - EritrJobium, Schrad. (Boragin.).

ERIOXANTHA, Rafin. in Loud. Card. Mag. viii. (1832) 247-Eria.Lindl. (Orchid.).

ERIPHU, P. Br. Hist. Jamaic 270 (1766).Besleria, Linn. (Acanth.).
jamaieensis, Koem. & Schult. Syxt iii. 887 - B. lutea.
lutea, Rafin. Sylva Tellur. 77 - B. lutea.
pallida, Rafin. 1. c. = praec.

ERIPHILEMA, Herb, in Undl. Bot. Reg. (1843) Misc. 85 = Blflyrlnohluin, Linn. (Ind.).
grandiflora. Herb. I. c = S. grandiflorum.

ERIPHLEMA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 115 - ERIPHILEMA, Herb. = Siayrinchluin, Linn. (Irid.).

ERISIMUM, Neck. Delia Gallo-Belg. i. 280 (1768) - Erysimum, Linn. (Crucif.).

ERIBMA, Rudge, PI. Gui. Rar. i. 7. t. 1 (1805). *VOCHYSIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 976.
DEB&AEA, Roem. & Schult, Syst i. 4 (1817).
DITMARIA, Spreng. Anleit. ii. II. 704 (1818); et Syst i. 4 (1825;.
calcaratum, *Warm, in Mart. Fl. Bras.* xiii. II. 111.—Am. trop.
floribundum, *Rudge, PI. Gui. Rar.* i. 7, 8. t. 1.—Guiana.
Japura, *Spruce, ex Warm, in Mart. Ft. Bras.* xiii. H. 109.—Bras.
laurifolium, *Warm. 1. c.*—Am. trop.
malifonne. *Link, ex Warm. I. c.* 114.—Bras.
micranthum, *Spruce, ex Warm. I. c.* 112.—Am. trop.
nitidum, *DC. Prod.* iii. 30.—Guian.
niveum, *Link, ex Warm, in Mart. Fl. Bras.* xiii. n. 114.—Bras.
nncinatum, *Warm. 1. c.* 110.—Bras,
violaceum, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 137.—Bras.

EBISHAMTHTTS, Wall. Cat n. 8011 (1846). *EU. PHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 325.
obliquus, *Wall. I. c.*—Ins. Penang.

ERITHALIA, Bunge, ex Steud. Nom. ed. II. i. 671, in syn. (1840) = Qentiana, Toura.

EBJTHAIiIS, P. Br. Hist Jamaic. 165 (1766). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 105.
HERRERA, Adons. Fam. ii. 158 (1763).
angustifolia, *DC. Prod.* iv. 465.—Cuba.
elliptica, Rafin. Sylva Tellur. 123>fruticosa.
fruticosa, *Linn. Syst.* ed. X. 980.—Ind. occ.
inodora, Jacq. Select Am. 78; Roem. & Schult. Syst v. 268= fruticosa.
odorata, Pers. Syn. i. 200-fruticosa.
odori/erajacq. Select. Am. 72. t 173. f. 23-fruticosa.
parviflora, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 134.—Cuba,
pentagonia, *DC. Prod.* iv. 465.—Cuba.
procutnbens, Rafin. Sylva Tellur. 123-fruticosa t
rotundata, *Griseb. inMem.Am.Acad.H.S.vm.* (1862) 607.—Ind. occ.
uniflora, Gaertn. f. Frnct iii. 93.1.196 (=*Polyphragman minus).*—Hab. t
vacciniifolia, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 105—Cuba.

ERITHALIS, Forst. f. Prod. 17 (1786)-Timonlus, Rumph. (Rubiac).
cymosa, Forst f. ex DC. Prod. iv. 465 - T. Forsteri
obovata, Forst.f. Prod.98, sphalm. -seq.
polygama, Forst. f. 1. c. f. 17=T. Forsteri.
polygama, Willd. Sp. PI. i. 997, partim =T. Rumphii.
Timon, Spreng. Pugill. i. 18 - T. Rumphii.

ERITHEIS, S. F. Gray, Nat. Am. Brit PI. it 464 (1821) - Inula, Linn. (Compos.).
maritima, S. F. Gray, 1. c - I. crithmoides.

ERITHRAEA, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) SO-Erythraea, DC. (Gentian.).

ERITRICHIUM, Schrad. in Comm. Gotting. iv. (1820) 186, in obs. (Eritrichum) (Comm. Asperif. 16). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 850.

EBITBICHIUH:—
ANOPLOCARYUM, Ledcb. Fl. Ross. iii. 154 (1847).
CRYPTANTHA, Lehm. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 85 (1836).
MEGASTOMA, COSS. *SC* Dur. ex Benth. *Sc* Hook. *i.* Gen. ii. 851 (1876).
albiflorum, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 131.—Reg. Magell.
alyssoides, A. DC. in DC. Prod. x. 131=Krynitzkia alyssoides.
angustifolium, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 165=Krynitzkia micromeris.
angustifolium, Ton. in Pacif. Rail. Rep. v. 863-Krynitzkia angustifolia.
angustifolium, S. Wats. Bot. King's Exped. 241 = Krynitzkia ambigua.
apricum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 190.—Chili.
aretioides, DC. Prod. x. 125-=nannm.
asperum, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 16.—Chili.
australasicum, *DC- Prod.* x. 134.—Austral.
barbigerum, A. Gray, Syn. Kl. N. Am. ii. 1. 194 = Krynitzkia barbigera.
basifixum, C. *B. Clarke, in Hook, f. Fl. Brit. Ind.* iv. 165.—Ind. or.
brevipes, Maxim, in Bnll. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 446 =Trigonotis brevipea.
californicum, DC. Prod. x. 130 = Krynitzkia califomica.
calycinum, *Phil. Fl. Atac.* 88.—Chili.
caneseens, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 57 « Plagiobothrys caneseens.
capituliflomm, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 487.-Chili.
chaetocalyx, *Phil. Fl. Atac.* 89.—Chili.
Chamissonis, DC. Prod. x. 125=nanum.
Chorisianum, DC.l. c. 130 «• Krynitzkia Choritiana.
chrysanthum,/>A>7.in *Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 191.—Chili.
ciliatum, DC. Prod. x. 127 >pectinatnm.
circumsdssum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 58 = Krynitzkia circumsd&sa.
clandestinum, A. DC. in DC. Prod. x. 129 = Krynitzkia clandestine
collinum, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 17.—Chili.
congestum, *DC. Prod.* x. 132.—Chili.
connati/olium, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 163-Krynitzkia Chorisiana.
Cooperi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1888) 89-Krynitzkia Cooperi.
crassisepalum, Ton. & *Oda,* in Pacif. Rail. Rep. ii. 171-Krynitzkia crassisepSla,
cryptanthum, *A. DC. in DcTProd.* x. 129.—Chili,
cynoglossoides, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 16.—Chili.
Czekanowskii, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 88.—Sibiria.
diffusnm, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 191.—Chili.
dimorphnm, *Phil. t. c.* xxix. (1857-58) 16.—Chili.
elongatum, A. DC. in DC. Prod. x. 124=Mertensia elongata.
felcatum, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Ctrdota,* iv. (1881) 64—Reg. Argent
Fetisowi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 840.—Turkestan.
filiforme, *Phil. Fl. Atac.* 39.—Chili.
floribundum, Ton. in Bot. Mex. Bound. 140-Krynitzkia floribunda.
Chili.
fruticosum, Phil. in Linnaea [illegible] Reisc, Chili strictum.
fidvocanescens, A. Gray, in Proc Am. Acad. x. (1874) 61=Krynitzkia fulvocanescens.
fulvocanescens, S. Wats. L c xviii. (1883) 121 = Krynitzkia Jamesii.
fulvum, DC. Prod. x. 132-Plagiobothrys rufescens.
fulvum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 57 = Plagiobothrys nothofulvus.
G<nyinum,Wedd. Chlor. And.ii. 88.—Peruv.
Gilliesl, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 617.—Chili,
glareosum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 189.—Chili.
globuliferam, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 464.—Chili.

ERITRICHIUM:—
glomeratum, DC. Prod. x. 131 = Krynitzkia glomerata.
glomeratum, A. Gray, in Am. Journ. Sc Ser. II. xzxiv. (1862) 255=Krynitzkia virgata.
gnaphaloides, *A. DC. in DC. Prod.* x. 131.—Chili.
Guilielmi, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 408= radicans.
Hacquetii, Koch, Syn. FL Germ. ed. I. 607-nannm.
heliotropioides, Ton. in Bot. Mex. Bound. 140 = Krynitzkia heliotropioides.
hhpidum, Buckl. in Proc Acad. Sc Philad. 1861 (1862) 462-Krynitzkia ramosa.
hispidnm, *Phil. Fl. Atac.* 88.—Chili.
holopterum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 81 = Krynitzkia holoptera.
hnmile, *DC. Prod.* x. 133.—Peruv.
iucanum, A. PC. in DC. 1. c. 127 - pectinatnm.
intermedium, A. Gray, in Proc Am. Acad. xvii. (1881-82) 226 - Krynitzkia intermedia,
involucratum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) E17.—Chili.
Jacquemontii, Decne. in Jacqnem. Voy. Bot. 122. t. 127-strictum.
Jamesii, Ton. in Marcy, Rep. 294 - Krynitzkia Jamesii.
japonicum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 96 - Trigonotis peduncularis.
jenisseense, *Tun: ex DC. Prod.* x. 126.—Sibir. alt.
Kingii, S. Wats, in Bot. King's Exped. 243. t. 23 = Plagiobothrys Kingii.
latifolium, *Kar. (f Kir. in Bull. Soc. Nat. Afosc.* xv. (1842) 407.—Soongarja.
latifolium, Rupr. Beitr. Pfl. Rossi, ii. 50=villosum.
leiocarpum, S. Wats, in Bot. King's Exped. 244 - Krynitzkia Torreyana.
leucophaeum, A. DC. in DC. Prod. x. 129-Krynitzkia lencophaea.
limense, *A. DC. 1. c.* 183.—Peruv.
linrare, DC. 1. c. 181 = Krynitzkia linearis.
««««/oKiw», Wedd. Chlor. And. ii. 89=Krynitzkia linifolia.
longifolium, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 124. 1.129—strictum.
longisetum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 189.—Chili.
Maackii, *Maxim. Prim. Ft. Amur.* 20'2.—Mandshuria.
Mandonii, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 51.—Bolivia.
micranthum, *Phil. Ft. Atac.* 38.—Chili.
micranthum, Torr. in Bot. Mex. Bound. 141 = Krynitzkia micrantha.
microcarpum, DC. Prod. x. 123 = Trigonotis micrccarpa.
micromeris, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 90 -Krynitzkia. micromeris.
minutiflomm, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 190.—Chili.
molle, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (188S) 89 = Krynitzkia mollis.
multicaule, DC. Prod. x. 123 - Trigonotis multicaulis.
multicaule, Torr. in Bot. Mex. Bound. 140 - Krynitzkia Jamesii.
Munroi, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 165.—Ind. or.
muricatum, *A. DC. in DC. Prod.* x. 132.—Chili.
muriculatum, A. DC. 1. c. 132 — Krynitzkia muriculata.
muriculatum, Ton. in Bot U. St. ExpL Exped. ii. 416. 1.13 - Krynitzkia ambigua.
myosotideum, Maxim. Prim. Fl. Amur. 203-Trigonotis myosotidea.
nanum, *Schrad. in Comm. Getting,* iv. (1820) 186, in obs.; *Asperifol.* 16.—Keg. bor. et frigid.
nemorosum, DC. Prod. x. 123 — Mertensia racemosa.
nothofulvum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82; 227 = Plagiobothrys nothofulvus.
obovatum, *DC. Prod.* x. 128—Krynitzkia obovata,
ovalifolium, DC. 1. c 123-Trigonotis ovalifolia.
oxycaryum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 58—Krynitzkia oxycarya.
oxygonum, A. Gray, 1. c. xix. (1883) 89 - Krynitzkia oxygona.
pachnophilun, *Wedd. Chlor. And.* ii. 87.—Reg. And in.
parviflornm, *Phil. Fl. Atac.* 89.—Chili.
patens, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 125 — strictum.
pauctflorum, DC. Prod. x. 127 =rupestre.
pectinatnm, *DC. Prod.* x. 127.—Sibir. altaic
pedunculate, DC. 1. c. 128•Trigonotis peduncularis.

EBITBICHIUIC:—
persicum, *Boiss.* Diagn. Ser. I. xi. 123.—Orient,
phaceloides, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 468.—Chili.
plebeium, A. DC. in DC. Prod. X. 183 - Krynitzkia plebeia.
plebeium, Torr. in Pacif. RaiL Rep. iv. 124 - Krynitzkiu Scouleri.
pratense,/>Ai7.fn *Linnaea,XEuii.* (1864-65) 192.—ChilL
primuloides, Deche. in Jacquem. Voy. Bot. 124. t 128—Mertensia primuloides.
procumbens, DC. Prod. x. 183=Plagiobothrys procnmbens.
pteracaryum, Torr. in Bot Mex. Bound. 142-Krynitzkia pterocarya.
pusillum, Torr. & Gray, In Pad! Rail. Rep. ii. 171 - Krynitzkia pusilla.
pustulosum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 164.—Reg. Himal.
pygmaeum, *C. B. Clarke, 1. c.* 165.—Reg. Himal.
pygmaeum, Wedd. Chlor. And. ii. 89 = Krynitzkia linifolia.
racemosum, S. Wats, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 226-Krynitzkia ramosissima.
radicans, DC. Prod. x. 128 = Trigonotis radicans.
ramosum, A. DC. in DC. 1. c. 132 —.Krynitzkia ramosa.
rotundifolium, DC. L c. 123 - Trigonotis rotondifolia.
nipestre,£i«igv, *Verm.Suppl. Fl. AIKU.*—Sibir. altaic.
Scouleri, A. DC. in DC. Prod. x. ISO-Krynitzkia Scouleri.
secundifiorum, DC. 1. c 124 = Mertensia echioides.
sericeum, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 178 - strictum.
sericeum, *DC. Prod.* x. 126.—Sibir. baicaL
sessiliflorom, *DC. 1. c.* 133.—Am. austr.
setosissimum, A. Gray, in Proc Am. Acad. xii. (1877) 80-Krynitzkia setosissima.
•pathulatum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* iv. 164.—Ind. or.
strictum, *Decne. in Jacquem. Voy. Bot.* 125.—Ind. or.
strictum, *Phil. Fl. Atac.* 89.—Chili,
subamplexicaule, *Phil. I. c*—Chili.
tenellum, A. Gray, in Proc Am. Acad. x. (1874). 57 - Plagiobothrys tenellus.
tenuicaule, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 18.—Chili.
tenuifolium, Schlecht ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 267 = Krynitzkia tenuifolia.
terglouense, A. Kern. Sched. Fl. Exsicc. i. 52—seq.
tergloviense, *Endl. ex Putterl. in T. Nees, Gen. PI. Fl. Germ.* n. 59*./arc. xvii. f. 27-32-nanum.
texanum, A. DC. in DC. Prod. x. 130 - Krynitzkia texana.
tibeticum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 166.—Tibet.
tinctorium, DC. Prod. x. 182-Plagiobothrys tinctorius.
Torreyi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 58 = Plagiobolhrys Torreyi.
turkestanicum, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VL xviii. (1883) 216.—Turkestan,
uliginosum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.,(W3)* 519.—Chili,
verrucosum, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 17.—Chili.
villosum, *Bunge, Vert. Suppl. Ft. Alt.* 14.—Rossiaarct.
villosum, DC. Prod. x. 128 - basi&xum.
virgatum, Porter, in Hayden,Geol. Rep. (1870) 479 - Krynitzkia virgata.
Volckmanni, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1861) 1.54; *et Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 188.—Chili.
Walpersii, *Wedd. Chlor. And.* ii. 90.—Peruv.

ERITRONIUM, Scop. Fl. Cam. ed. I. 285 (1760), sphalm.=XS^rtliroiiiliiii, Linn. (Liliac).

ERIUDAPHUS, Nees, in Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 271 (1836) = 8oolopia, Schreb. (Bixin.).
Clossianus, BailL. Adansonia, i. (1860-61) 121.—Hab.?
Ecklonii, Nees, in Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 271 (=/>Aeberos *Ecklonii).*— Afr. austr.
Afundii, Nees, 1. c. 272 *(^Phoberos Mundii).—Ah.* austr.
serratus, Harv. Gen. S. Afr. PI. 417.—Afr. austr.
Zeyheri, Nees, in Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 271 *{-Phoberos Zeyheri).—A&.* austr.

EBLAlfOEA, Sch. Bip. in Flora, xxxvi. (1853) 84. *COMPOSITAE,* Benin. *8c* Hook. f. ii. 225.
JAROINIA, Sch. Bip. in Flora, xxxvi. (1853) 34, in syn.
plnmosa, *Sch. Bip:* A c—Afr. trop.

ERMANIA, Cham, in Linnaea, vi. (1831) 638-Parrya, R. Br. (Crncif.).
parryoides, Cham. 1. c - P. EnnanL

ERMANNIA, EndL Gen. 865, in syn. (1839)«praec.

ERNDELIA, Neck. Elem. ii. 235 (1790)-Famiflora, Linn.
reflexifiora, Rafin. FL Tellur. iv. 104-P. reflexiflora.

ERNDLIA, Giseke, Prael. Linn. 199, 209 (1792)-Curouma, Linn. (Scitamin.).
Ztrumbet, Giseke, 11. cc-C. Zedoaria.

EBIffEBTIA, DC. Prod. iii. 121 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 740.
DICHAETANORA, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. III. xiii. (1849) 31.
cordifolia, *Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 36. t. 2. f. 23 b.—Am. austr.
Goudotii, *Triana, 1. c*—N. Granat.
quadriseta, *Berg, ex Triana, I. JC.* 35. t 2. f. 23 c.—Peruv.
teneila, *DC. Prod.* iii. 121.—N. Granat

EKNODEA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 29 (1788). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 142.
KNOXIA, P. Br. Hist. Jamaic 140 (1756).
calabrica, Link, Enum. Hort. Berol. i. 188-Putoria calabrica.
litoralis, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 29.—Ind. occ.
montana, Sibth. *Sc* Sm. FL Graec Prod. i. 98 = Putoria calabrica.
nepalensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 40-Knoxia corymbosai
pedunculata, Poir. Encyc. SuppL ii. 581 - Isidorea amoena.
pungens, Lam. Tabl Encyc. i. 276-Isidorea amoena.

ERNST1NGIA, Scop. Introd. 322 (1777) = Katoni», DC. (Sapindac).

EROBATHOS, Spach, Hist. Veg. Phan. vii. 301 (1889) -XTigella, Tourn. (Ranunculac).
coarctatum, Spach, 1. c. 804=N. coarctata.
damascenum, Spach, 1. c. 302=N. damascena.

EROBATOS, Reichb. Handb.277 (1837)=praec.

EROCHLOA, Steud. Syn. PI. Gram. 373 (1856) = f«q.

EROCHLOE, Rafin. Neogenyt. 4 (1825)-Eragroetia> Beauv. (Gramin.).
amabilis, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. 221 - E. amabilis.
spectabilis, Rafin. 1. c. = E. amabilis.

ERODENDRON, Meissn. in DC. Prod. xiv. 280, in V»-(1866) -seq.

ERODENDRUM, Salisb. Parad. Lond. t. 67 (1807)-Frotea, Linn.
acuifolium, Knight, Prot 49 - P. rosacea.
amplexicaule, Salisb. Parad. Lond. t 67 = P. amplexicaulis.
angustum, Knight, Prot. 89=P. grandiflora.
bombydnum, Knight, 1. c 88; Salisb. ex Roem. * Schult. Syst iii. Mant. 263 = P. longiflora.
caespitosum, Knight, Prot. 43 = P. turbiniflora.
eoronarium, Knight, 1. c. 41.—Afr. austr.
cynaraeflorum, Knight, 1. c 43 - P. cynaroides.
eximium, Knight, 1. c. 41 = P. latifolia.
foetidum, Knight, 1. c. 46 = P. tenax.
formosum, Saiisb. Parad. Lond. t. 76 = P. formosa.
glaucophyllum, Knight, Prot. 47-P. glaucophyll*.
grandiflorum. Knight, 1. c. 42 = P. grandiflora.
halimifolium, Knight, 1. c. 49.—Afr. austr.
holosericeum. Knight, 1. c 40—P. speciosa.
incompium, Knight,L c. 37-P. incompta.
ligulaefolium, Knight, 1. c. 36 = P. longifolia.
limonii/olium, Knight, 1. c. 47 =P. acaulis.
longifolium, Knight, 1. c. 46=P. laevis.

ERODENDRUM:—
longipenne, Knight, Prot B5 = Protea longifolia.
lorifolium, Knight, 1. c 41.—Afr. austr.
magnificum, Knight, 1. c. 37 = P. speciosa.
mellifluum. Knight, 1. c 34 = P. mellifera.
mucronifolium, Knight, 1. c 48 = P. mucranifolia.
neriifolium, Knight, 1. c. 40-P. Lepidocarpon.
oitusum, Knight, 1. c. 38 = P. speciosa.
oemulum, Knight, 1. c—Afr. austr.
paeoniflorum, Knight, 1. c. 46 = P. canaliculata.
Pinifolium, Knight, 1. c. 45.—Afr. austr.
pulchellum, Knight, 1. c. 36 = P. pulchella.
radulaefolium, Knight, 1. c 44-P. Radulat
restionifolium, Knight, 1. c. 45.—Afr. austr.
tt°lofiendriifolium, Knight, 1. c. 43=P. Scolopendriutn?
scolymiflorum, Knight, 1. c. 48 =P. Scolymus.
*scor*OHeraefolium,* Knight, 1. c. 44 = P. xepens.
**pedosum,* Knight, 1. c. 89 = P. speciosa.
staticifolium, Knight, 1. c. 45 = P. staticefolia!
tenax, Salisb. Parad. t. 70 = P. tenax.
turbiniflorum, Salisb. 1. c. L 108 = P. turbiniilora.
"mbonale. Knight, ProL 35=P. longifolia.
umbonale, Salisb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 589 ~ P. longiflora.

ERODION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) .125«Erodium, L'Hérit. (Geran.).
ootrydium, St. Lag. 1. c-Erodium Botrys.
"udachoideum, St. Lag. 1. c; et viii. (1881) 183 = £rodium malachoides.

ERODIOPHYLLUM, F. Muell. Fragm. ix. 119 (1875). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1282.
Elderi, *F. Muell. 1. c.* 120.—Austral.

ERODIUM, L'Hérft Geran. t. 1 ad 6 (1787). *GERANIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 272.
ERODION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. ,(1880) 125.
MYRRHINA, Rupr. in Mem. Acad. Pe"tersb. Sir. VII. «. n. n. (1669) Fl. Cauc. 277.
SCOLOPACIUM, Eckl. & Zeyh. Enntn. 59 (1885).
<">*inthoides,* Sibth. & Sm. FL Graec. t. 652=chry»anthum.
absinthoides, *Willd. Sp. PI.* iii. 627.-Macedon.j As. MlQ.
ae STC*iacuin, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 111.—Aegypt.; Syria.
"Mne, Fend, ex Slend. Nom. ed. II. i. 589-Friedrichsthalianum.
"%?*. TTMore> ^ Sen>- Hort. Neap. (1830) 13; ex Fl. Neap. iv. 95-laciniatum.
ndum, Picard, in Mém. Soc Agric. Boulogne, Sir. U. i. (1837) 111-cicutarium.
florum, Moris, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1886) 29 = alnifolium.
"'exandrinum, *Delile, Fl. Aeg. Illustr.* 68.—Aegypt.
"Uotrichum, Stend. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 116 - fcicntarium.
"toifolinm, *Guss. Fl. Sic. Prod.* ii. 807.—Sidl.
"Ptnum, Hort. Par. [Desf. Tabl. ed. II. 166!]« - rpmanum.
aipmum, *L'Hérit. Geran.* t. 8.—Graecia; Ital.
arpinum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 653=hirtum.
alsiniflorum, *Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp.* (1847) (1, *et in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. x. (1848) 329.—nab. t
al acoite Jord. Pngill. PI. Nov. (1852) 43 = ""lacoides.
a a.^ m *Boiss* - *" Kottchy, in Boiss. Fl. Orient, i.* —Sria.
ambiguum, *Pon teli Nguv Mat Fl AtL* 388—Alger.
angu «<«», Pomel, 1. c. 841=malachoides.
an he jmidifolium, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 131.—Reg. Cancas.
'^*hemidifolium,* Tenore, Syll. 3S0 = alpinum.
"Penninum, Tenore, Syll. App. iv. 35 ^alpinum.
ar<**cum, Decne. i$_n$ Ann. Si. Nat. Ser. II. iii. (1835) -*«»« alnifolium.
"borescens, *Willd. Sp. PI.* iii. 838.—Afr. bor.
"duuium, *Willd. 1. c.* 637.—Afr. austr.
"renanum, Jord. Pugill. PI. Nuv. (1862) 44 = cicntarium.
ar *enarium,* Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. S40=laciniatum.

EBODITTM:-
arenarium, Pourr. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 132=Jacquinianum.
asplenioides, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 123 = Boissieri.
asplenioides, *Willd. Sp. PI.* iii. 635.—Afr. bor.
astragaloides, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* (1852) 130.—Hispan.
atlanticum, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 56; xx. (1873) 243.—Marocc.
atomarium, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Me'dic.) i. (1883) 423 = cicutarium.
australe, Salzm. ex Nym. Consp. 189 = moschatum.
Barrandonianum, Loret, in Loret 3c Barrand. Fl. Monsp. i. 123, in obi = romannm.
bipinnatum, Willd. Sp. PI. iii. 628 -= cicntarium.
Bocconi, Stend. Nom. ed. II. i. 589 = chamaedryoides.
Bocconi, Viv. Prod. Fl. Core. App. 5=maritimum.
Boissieri, *Coss. ex Ball, in Jomrn. Linn. Soc.* xvi. (1878) 884.—Hispan.
Boraeanum, Jord. Pugill. 47 — cicutarium.
Botrys, *Berfol. Amoen. Ital.* 85.—Reg. Mediterr.
Botrys, Hohen. in BuU. Soc. Nat. Most (1838) 895 - oxyrhinchnm.
Botrys, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 209 = laciniatum.
Bourgaei, Boiss. Fl. Orient, i. 892 = tmoleum.
Bovei. Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1838) [6]; ex Linnaea, xiii. (1839) Litt. 104 - alnifolium.
Bovei, Stead. Nom. ed. II. i. 589 - praec.
brevicaule, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. vi. (1844) 229. t. 9. f. 2 = ciconium.
bryoniaefolium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 61.—Aegypt.; Persia.
cadmaeum, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 107. t. 189 = lencanthum.
Camtosianum, Coss. ex Willk. *Be* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 535= astragaloides.
Carioti, Jord. Pugill. PI. Nov. (1852) 49=romanum.
carneum, Jord. 1. c. 47 = cicutarium.
carvifolium, *Boiss.* b* *Reut. Diagn. PI. Nov. Hisp.* 9. —Hispan.
caucalifolium, Sweet, Geran. t. 6-romanum.
Cavanillesii, *Willk. PI. Halofik.* 111.—Hispan.
cedrorum, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* iv. (1854) 201.—Cilicia.
Chaerophyllum, Steud. Nom. ed. I. 314; Coss. Notes Crit. ii. 82 = cicutarium.
chamaedryoides, *L'Hirit. Geran.* t. 6.—Ins. Balear.; Corsica.
cheilanthifolium, Boiss. Elench. 27 =trichomanefolium.
Mum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 657 = laciniatum.
chium, *Willd. Phyt.* 10.—Reg. Mediterr.
chrysanthum, *L'Hérit. ex DC. Prod.* i. 645.—Graecia.
chumbalense, Munro, ex Wight, Ic. t. 1074 = Monsonia senegalensU.
ciconium, Janlca, ex Nym. Consp. 189 = E. Botrys.
ciconium, *Willd. Sp. PI.* iii. 629.—Reg. Mediterr.; Oriens.
cicutaefolium, Salisb. Prod. 811-cicutarium.
cicutarium, *L'Hirit. ex Ait. Hort. Kev.* ed. I. ii. 414. —Keg. Mediterr.; As. med.
cinerascens, Moris, in Mem. Ace Torin. xxxviii. (1835) 33 - laciniatum.
cinereum, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. Viii. 118— As. Min.
coeruleum, Steud. Nom. ed. II. i. 689, sphalm.= *Enodium coeruleum.*
commixtum, Jord. ex Schulte. Arch. Fl. Fr.et Allem. 164=cicutarium.
commutatum, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1868) 85=malachoides.
corsicum, *Leman, in DC. Fl. Fr.* iv. 842.—Corsic.; Sardin.
crassifolium, *Ait. Hort. Kew.* ii. 414.—Afr. bor.; Cyprus.
crassifolium, DC. Prod. i. 646=hirtum.
crassum, Steud. Nom. ed. I. 314 = crassifolium.
crenatum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. AU. 341 = alnifolium.
crispum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 394-petraeum.
cuneatum, Viv. Prod. Fl. Con. App. 5 = chium.
cygnorum, *Nees, in Lehm. PI. Preist.* i. 162.—Austral.
daucoides, *Boiss. Elench.* 28.—Hispan.
decipiens, Delile, ex Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1SS8) 18; et FL Neap. iv.95=laciniatum.
dentatum, Dum. in BuU. Soc Bot. Belg. iv. (1865) 345 53 QlOSCuEtUDli
dryadifolium, Salisb. Prod. 811-chamaedryoides.
elongatum, Todaro,ex Parl. FL ItaL v. 246=alnifolium.

EBODIUM:—
fallax, Jord. Cat. Gr.Rec. Gren. (1849) 14 = romanum, filicinum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Att.* 339.—Alger.
foetidum, L'He'rit. ex DC. Prod. iv. 645 = petraeum.
Friedrichsthalianum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 589.— Graecia.
fumarioides, Stev. in Mém. Soc. Nat. Most iv. (1813) 49= absinthoides.
Gaillardoti, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 41.—Syria.
Gasparrinii, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 301 = E. Botrys.
geifolium, Desf. Tabl. ed. II. 166 = hymenodes.
geifolium, *Munby, Fl. Algir.* 71.—Algeria,
geoides, *St. Hit. Fl. Bras. Mer.* i. 80.—Am.anstr.
glabellum, *Delile, ex Steud. Nom.* ed. I. 314—Aegypt.
glabrum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 342=glaucophyllum ?
glandulosum, Pum. in B,ull. Soc. Bot Belg. iv. (1865) 345 -. sabulicola.
glandulosum, Willd. Sp. PI. iii. 628=macradenum.
glaucophyllum, *Ait. Hort. Ken.* ed. I. ii. 416.—Afr. bor.; Arab.
glaucophyllum, Bov<5, ex Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser. IL iii. (1885) 285 = Monsonia nivea.
glanco-virens, *Lojac. in Natural. Sicil.* i. (1882) 105. —Sidl.
glutinosum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr- 288 = malachoides.
glutinosum, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iv. (1865) 345=cicutarium.
graveolens, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 390=macradenum.
gruinum, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 415.— Europ. austr.; Oriens.
gruinum, Tenore, Prod. Fl. Nap. 89 = laciniatum.
Guicciardii, *Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 40.— Graecia.
Gussoni, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* 89.—Ital.
guttatum, Ledeb. Fl. Ross. i. 47b = oxyrhinchum.
guttatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 636.—Reg. Mediterr. occ.
heliotropioides, *Willd. Sj>. PI.* iii. 638.—Hab.i
himalayanum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 150-cicutarium?
hirsutum, Schnr, in Verh. Natnrf. Ver. Brucnn, xv. n. (1877) 164 = cicutarium.
hirtum, Jacq. Eclog. i. 82. t. 58 = Jacquini.inum.
hirtum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 589 = moranense.
hirtum, *Willd. Sp. PI.* iii. 682.—Afr. bor.; Arab.; Syria.
hispidum, Presl, Fl. Sic. 208 = laciniatum.
Hoefftianum, *C. A. Mey. in Mlm. Acad. Pitersb.* Sr'r. VI. Sc. Nat. vii. (1855) 8.—Sibiria.
Hohenackeri, Ledeb. Fl. Ross. i. 478 = oxyrhinchum.
Hussoni, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 119.—Aegypt.; Arabia.
hymenodes, *L'Hirit. Geran.* t. 4.—Alger.
incamatum, *L'Hérit. I. c.* t. 5.—Afr. austr.
involucratum, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 740 = laciniatum.
Jacquinianum, *Fisck. Mey. b" Avi-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. *Suppl.* 11.—Europ. austr.; Persia.
Kotschyanum, Boiss. Fl. Orient, i. 889 = cedrorum.
Kotschyanum, Koechel, ex Boiss. 1. c. 896 = bryoniaefolium.
laciniatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 633.—Reg. Mediterr.; Persia.
Lebelii, *Jord. Pugill. PI. Nov.* (1852) 48.—Gallia.
leucanthum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 60.—As. Min.
leucophyllum, Presl, Bot. Bemerk. 26-laciniatum.
litoreum, Badaro, in Morctti, Bot. Ital. 26=chium.
littoreum, *Léman, ex DC. Fl. Fr.* iv. 843.—Keg. Mediterr. occ.
longicaule, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1868) 85 = alnifolium.
lucidum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 894 = petraeum.
macradenum, *L'Hirit. Geran.* 1.1.—Mont. Pyren.
macTophyllum, *Hook,* to" *Arn. Bot. Beech. Voy.* 327.— Am. bor. occ.
maculatum. Salon, ex Presl, Bot. Bemerk. 26 = cicutarium.
malachoides, Bove, ex Decne. in Ann. Sc Nat. Ser. II iii. (1885) 286 = alnifolium.
malachoides, *Willd. Phyt.* 10.—Reg. Mediterr.; Oriens.
malacitanum, Amo, Fl. Iber. vi. 65-Jacquinianum.
malopoides, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 88 = corsicum.
malopoides, Willd. Sp. PL iii. 640-alnifolium.
malvaceum, Jord. ex Loret & Barrand. Fl. Monip. 122 -malachoides.
Manescavi, *Coss. in Ann. Sc Nat.* Ser. III. vii. (1847) 205.1.11.—Mont. Pyren.

EKODIUM:—
Marcnccii, *Part. Fl. Hal.* v. 208.—Italia.
maritimum, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 59—Pelargonium chamaedrifolium.
maritimum, 5m. *Ft. Brit-* ii. 728.—Enrop.
mauritanicum, *Coss. V Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1865) 309.—Afr. bor.
medeenw, *Battand. in Bull. See. Bot. Fr.* xxx. (1883) 264.—Alger.
melanostigma, Mart, ex Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1838); ex Linnaea, xiii. (1839) Litt. 104 = cicutarium.
micropetalum, *Boiss.* to* *Haussk. in Boiss. Fl. Orient.* i. 889.—As. Min.
microphyllum, *Pomel, Noun. Mat. Fl. Atl.* 839.—Alger.
millefolium, *Willd. ex H. B.* to* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 228.—Ecuador.
minutiflorum, Godr. in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xix. (1875) 173-cicutarium.
monsonwides, Steud. ex Boiss. Fl. Orient, i. 892 = gruinum.
montanum, *Coss. if Dur. in Bull. Soe. Bot. Fr.* iii. (1856) 737—Algeria,
moranense, *Willd. ex H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 228.—Mexic.
moschatum, *L'Hirit. ex Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 414.—Reg. Mediterr.; Oriens.
*nu/fYoiK/f,Link,Enum. Hort. Berol.ii. 184 = serotinum.
Muabyanum, *Boiss. ex Munby, in Bull. Soc. Sot. Fr.* ii. (1855) 283.—Alger.
murcicum, Willd. Sp. PI. iii. 6S6 = chium.
narbonense, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1836); ex Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 286 -chium.
Neilreichii, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xvii. (1867) 101-E. Botrys.
nervulosnm, *L'Hirit. ex DC. Prod.* i. 648.—Sicil.
neuradaefolium, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 425 = aegyptiacum.
nilagiricum, Schlecht. ex Hook. f. FL Brit. Ind. i. 435 = Pelargonium ossularioides.
niveum, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835) 285 ~ Monsonia nivea.
numidicum, Salzm. ex Godr. in Mlm. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 421 - scandicinum.
obliquifolium, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13; ex Fl. Neap. iv. 95 = alnifolium.
obtusilobum, Karel. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 477-oxyrhinchum.
olympicum, Clem. Sertul. Or. 17—absinthoides.
oxyrhinchum, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii. 133.—Oriens; Turkestan,
pachyrhizum, *Coss.* to* *Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 482.—Alger.
pallidiflorum, Jord. Cat. Gr. Réc Gren. (1849) 2 = cicutarium.
parviflorum, Jord. 1. e. (1849) 15—cicutarium.
pauciflorom, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 419.—Chili,
pelargoniflorum, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 119.—Oriens.
pentalobum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 237-cicutarium.
peristeroides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1863) I. 592.-N. Zel.
petraeum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 651 = absinthoides.
petraeum, Tenore, ex Nym. Consp. 141 =alpinum.
petraeum, *Willd. Sp. PI.* iii. 625.—Reg. Mediterr. occ.
Petroselinum, L'Heŕit. ex DC. Prod. i. 647 = cicutarium.
pilosum, *Menyh. Kalocsa Vidlk. Novlny.* 58 (= seq. ?).—Hungar.
pilosum, Steud. Nom. ed. I. 314-cicutarium.
pilosum, Walp. Rep. i. 446 - laciniatum.
pimpinellae/olium, Sibth. Fl. Oxon. 211 - cicnlarium.
pimpinellifolium, Willd. Sp. PI. iii. 680-praec.
praecox, Willd. Sp. PI. iii. 631=cicutarium.
praetermissum, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 131=cicutarium.
primulaceum, *Welw. ex Lange, Ind. Sem. Hort. Bot. Haun.* (1855) *U.-Cf. Linnaea*, xxviii. (1856) 359.—Hispan.
provinciate, Jord. Pngill. PI. Nov. (1852) 51 - romanum.
pulchellum, Karel. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 476 = laciniatum.
pulchrum, Salisb. Prod. 311 •> incarnatnm.
pulverulentum, Willd. Sp. PI., iii. 632 = laciniatum.
punctatum, Stead. Nom. ed. II. i. 679, in syn. sphalm.—Pelargonium punctatum.

EKODITTM:—
pyramidum, PresI, Bot. Bemerk. 26—laciniatum.
radicatum, Lapeyr. Fl. Pyr. 1.1 1 = macradenum.
reflexum, *Delile, Fl. Aeg. Illustr.* 68.—Aegypt.; Arab.
Reichardi, DC. Prod. i. 649 = chamaedryoides.
ribifolium, Jacq. Coll. Snppl. 121-malachoides.
Robertianum, C. A. Mey. ex Nym. Consp. 140 = moschatum.
romanum, *Willd. Sp. PL* iii. 630.—Europ. austr.; Syria.
rupestre, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 533—supracanum.
rnpicolum, *Boiss. Voy. Bot. Espagne*, ii. 724.—Hispan.
ruthenicum, Bieb. PI. Rar. Cent. 1.1 48—serotinum.
sabulicolum, Jord. ex Nym. Consp. 140 = cicutarium.
sabulicolum, *Lange, in Willk.* to" *Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 637.—Hispan.
Salzmanni, Boiss. *Sc* Reut. ex Nym. L c. 140 = primulaceum.
Salemanni, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1838) 6.—Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 104=cicutarium.
scandicinum, *Delile, ex Godr. in Mini. Acad. Montp. {Sect. Midic)*. i. (1853) 421.—Hispan.
sebaceum, *Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp.* (1838) 6.—*Cf. Linnaea*, xiii. (1830) *Litt.* 105.—Gallia.
Semenovii, *Jiegel & Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) I. 553.—As. centr.
Sempervivum, Roxb. in Beatson, St. Helena Tracts, 808 = Pelargonium Cotyledonis.
serotinum, *Stev. in Mém. Acad. Pétersb.* iii. (1809-10) 297. t. 15. f. 2.—Reg. Caucas.
Sibthorpianum, Boiss. Diagn. Ser. L i. 60-absinthoides.
soluntinum, Todaro, Ind. Sem. Hoit. Panorm. (1868) 86=laciniatum.
speciosum, Salisb. Prod. 312 — Monsonia speciosa.
staphylinum, Bertol. Fl. Ital. vii. 185-Jacquinianum.
stellatum, Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp. (1838) 6.—Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 104 = primulaceum.
Stephanianum, *Willd. Sp. PI.* iii. 625.—Reg. Himal.; As. bor.
Steveni, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 132.—Reg. Cancas.
stipaceum, *Edgew.* to" *Hook. f. in Fl. Brit. Ind.* i. 435.—Reg. Himal.
stipulaceum, Duf. ex Nym. Consp. 139—malachoides.
strigosum, Karel. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 475 ~ laciniatum.
stylatum, *Uman, ex DC. Prod.* i. 646.—Hab. ?
subalbidum, Jord. Pugill. PI. Nov. (1852) 45 - cicutarium.
subtrilobum, Jord. L c. 42—malachoides.
supracanum, *L'Hirit. Geran.* t. 2.—Hispan.
tataricum, *Willd. Sp. PI.* iii. 625.—Sibir.
tenuisectum, Godr. & Gren. in Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. i. 811=Jacquinianum.
tenuisectum, Large, in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1865) 182 = cicutarium.
texanum, *A. Gray, Gen. Illustr.* ii. 130.—Am. bor. occ.
tibetanum, *Edgew. V Hook. f. in Fl. Brit. Ind.* i. 434.—Reg. Himal.
tmoleum, *Reut. ex Boiss. Fl. Orient*, i. 892.—As. Min.
tolosanum, Jord. Pugill. PL Nov. (1852) 50 = roroanum.
tordilioides, Viv. Fl. Lib. Spec. 39 = gruimim.
tordylioides, *L'Hérit. ex DC. Prod.* i. 647.—Alger.
Touchyanum, *Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Medic)*, i. (1853) 423.—Hab. ?
trichomanaefolium, boiss. Voy. Bot. Espagne, 120. t. 37=seq.
trichomanefolium, *L'Hérit. ex DC. Prod.* i. 645.—Syria.
trifolium, Cav. Desc 150-Geranium trifolium.
trilobatum, Jacq. Coll. iv. 200 = hymenodes.
trilobatum, Jord. ex Nym. Consp. 139-malachoides.
triviale, Jord. Pugill. PL Nov. (1852) 43-cicutarium.
tuberosum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 118=hirtum.
tunetanum, *G. Don, Gen. Syst.* i. 723.—Afr. bor.
undulatum, Salisb. Prod. 311-Monsonia emarginata.
valentinum, Boiss. *Sc* Reut. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 633 = petraeum.
verbenaefolium, *Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp.* (1847) 7; *et in Ann. Sc. Nat.* Seŕ. III. x. (1848) 329.—Hab.?
violaefolium, *Turcz. in Bull. Soe. Nat. Mose.* xxxvi, (1863) I. 692.—Ind. or.
viscosum, Salzm. ex Delile, in Linnaea, xiii. (1839) 104—cicutarium.
viscosum, *Steud. Nom.* ed. I. 316.—Hab.?

ERONEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 126 (1836) -Cuacutft, Tourn. (Convolv.).
Robinsoni, Rafin. 1. c—Hab. *1*

EROPHACA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 176 (1840) -Astragalus, Tonrn. (Legumin.).
boetica, Boiss. 1. c. 177-A. lusitanicus.

EBOPHELA, DC. Syst. ii. 356 (1821). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. j. 75.
GANSBLUM, Adans. Fam. ii. 420 (1768)
affinis, ambigens, andegavensis, Bardini, brevifolia, brevipila, breviscapa, cabillonensis, campestris, chlorotica, cinerea, clavi/ormis, confinis, cuneifolia, curtipes, decipiens, dentata, fallacina, furcipila, lepida, leptophylla, lucida, lugdunensis, medioxima, micrantha, muricola, oblongata, obovata, occidentalis, Ozanoni, patula, procerula, psilocarpa, pyrenaica, Revelieri, rigidula, rubella, rubrinaeva, rurivaga, ser rat a, sparsipila, spathulaefolia, subintegra, subnitens, subtilis, tenuis, vestita, vires. cens, vivariensis, Jord. Diagn. 207-244, omncs — vulgaris.
americana, DC. Syst. ii. 356-vulgaris.
Boerhaavii, Dum. Fl. Belg. 120=vulgaris.
brachycarpa, Jord. Pugill. 9 = vulgaris.
Draba, Schimp. *Sc* Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 955—vulgaris.
glabrescens, Jord. Pugill. 10-= vulgaris.
hirta, Jord. ex Nym. Consp. 54 = vulgaris.
hirtella, Jord. Pugill. 10-vulgaris.
inflata, H. C. Wats, ex Hook. f. Stud. Fl. ed. III. 35 =vulgaris.
Krockeri, Andrz. ex Nym. Consp. 54=vulgaris.
macrocarpa, *Boiss. Fl. Orient*, i. 304.—As. Min.
majuscula, Jord. Pugill. 11 = vulgaris.
minima, *C.A.Mey. Vert. Pfl. Cauc.* 184__Reg. Casp.; Syria.
minutissima, DC. Syst. ii. 357-praecox.
muscosa, DC. Syst. ii. 358 = Draba muscosa.
praecox, *DC. 1. c.* 357.—Europ.; Oriens.
propinqua, Jord. ex Perard, in Bull. Soc. Bot. Fr. xviii. (1871) 320= vulgaris.
setulosa, *Boiss.* to' *Blanche, Diagn.* Ser. II. v. 31.—Syria.
siliquosa, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 28, in syn. =macrocarpa.
spathulata, Opiz, Seznam, 41-vulgaris.
stenocarpa, Jord. Pugill. 11-vulgaris.
verna, E. Mey. ex Garcke, Fl. Deutschl. cd. IV. 35 » vulgaris.
vulgaris, *DC. Syst.* iL 356.—Europ.; Oriens.

EROSMA, Booth, Cat. 113; ex Endl. Suppl. iv. II. 34, in syn. (1847)=PicUB, Tourn. (Urtic).

EROSMIA, A. Juss. in Orb. Diet. xi. 254 (1849), sphalm. -Euosmia, H. B. *8c* K. (Rubiac).

EROTEUM, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 85 (1788)-Freziera, Sw. (1799) (Ternstroem.).
theaeoides, Sw. 1. cdeyera theoides.
undulatum, Sw. 1. c. = F. undulata.

ERPETINA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 299-Medlnilla, Gaudicli. (Melastom.).
radicans, Naud. 1. c. = M. Erpetina.

ERPETION, DC. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. ii. t. 170 (1826)-Viola, Toum.
Cymbalariae, DC. ex Sweet, 1. c. —V. hederacea.
hederacea, G. Don, Gen. Syst. i. 835-V. hederacea.
petiolaris, G. Don, 1. c. = V. hederacea.
reniformis Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 170 = V. hederacea.
spathulata, G. Don, Gen. Syst. i. 335-V. hederacea.

ERRAZURIZIA,Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 689-Dalea, Linn. (Legumin.).
glandulifera, Phil. 1. c. = D. multifoliolata.

ERTELA, Adans. Fam. ii. 358 (1768)=Monnleri»i Linn. (Rutac.).

ERTELIA, Steud. Nom. ed. II. i. 590 (1840)-praec.

EBTTOA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 418 (1763). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 84. „.
EUZOMUH, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 174 (1S22)'
VELLEEUCA, Pomel, Mat H. Atl. 12 (I860).

EHTJCA:—
alba, Nonlet, Fl. Sons-Pyr. 83-Brassica alba.
aquaiica, Moench, ex Steud. Norn. ed. I. 315, 783 = Nasturtium amphibiam.
orvensis, Noulet.Fl. Sous-Pyr.M = Moricandia arvensis.
aspera, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=Brassica Erucastrnm.
Barbarea, Lam. Fl. Fr. ii. 497 •= Barbarea vulgaris.
oellidis-folia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = Diplotaxis viminea.
brevirostris, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 226.—Alger.
cappadocica, *Reut. Cat. Hart. Genes.* (1857).—As. Min.
decumbens, Moench, Meth. 257 = Diplotaxis muralis.
deserli, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* "226.—Alger.
elong-ata.'Ba.-amg. Ennm. Stirp. Transs. ii. 264-Erassica elongata.
erecta, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20=Brassica Toumefortii.
Erucastrum, Gaertn. Mey. fcScherb. Fl. Wett. ii. 458 =Brassica Erucastrnm.
foetida, Moench, Meth. 256-saliva.
glabreseens, Jord. Diagn. i. 193-• sativa.
gjandiflora, Cav. Desc. 426^satira.
hispida, Car. 1. c. 425 = Brassica valentina.
hispida, DC. Syst. ii. 638 = sativa.
JMiceolata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 867.—Alger.
lativalvis, *Boiss. Fl. Orient*, i. 386.—Persia,
'ongiroslris. •£/«;*&•. j« *Oestr. Bot. Zeitschr.* (1874) 133._Hispan.
longistyla, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Atl.* 868.—Alger.
muralis, Bess. Enum. PI. Volh. 27 - Diplotaxis muralis.
muralis, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 459 = Diplotaxis tennifolia.
orthosepala, *Lange, Ind. Sent. Hort. Haun.* **(1857;** 28—*Cf. Linnaea*, xxix. (1867-58) 786.—Ilispan.
perennis. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = Diplotaxis tenuifolia.
Pamixta, lord. Diagn. i. 193=saliva.
Pwnatifida, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 867.-Alger.
Ruchella, Stend. Norn. ed. II. i. 690, sphalm. = seq.
fucketta, Spach, Hist. Veg. Phan. vi. 355-sativa.
sativa,*MM. Gard. Did.* ed. VIII. n. 1.—Reg. Mediterr.; As. occ.
wtulosa, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 26.—Algeria.
stenocarpa, Boiss. & Keut. Pugill. PI. Nov. 8 = sativa.
**ylvestris*, Lam. Fl. Fr.ii. 497 = Brassica Erncastrom,
^nacetifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 (tenaceti-folia) -Sisymbrium tanacetifolium.
'enuifolia, Moench, Meth. 257 = Diplotaxis tenuifolia.
vesicaria, *Cav. Desc.* 426.—Hispan.
'*&*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 (viminia; = Diplotaxis viminea.

EKUCAGO, Toum.ex Adans. Fam. ii. 423 (1763) = Bunias, Linn. (Crucif.).
"mentis, Foum. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvu (1868) 336 = B. Erucago.
fpera, Homem. Hort. Ham. ii. 592 = B. Erucago.
'"•achyptera, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. «u (1868) 386-B. Erucago.
""npestris, Desv. Journ. Bot iii. (1814) 168 = B. Erucago.
dentata, Moench, Meth. 278-B. Erucago.
*g'andulosa;*Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. 355; ex Koch, Syn- Fl. Germ. ed. I. 77 = B. Erucago.
»><tcroptera, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. xvi: (1888) 336 =.-K Erucago.
vonopeliaca, Janme St. Hil. Expos, i. 510 = B. **tracago.**
"wnspeliensis, Cav. Desc. 418 = B. Erucago.
*r*ncinata*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 592=B. Erncago.

ERUCAHIA, Cerv. in La Naturaleza (1870), 847. *JRAM1NEAE.*
glabra, Cerv. 1. c. 350 = Bouteloua racemosa.
elandulosa, *Cerv. I. c.* 347.—Mexic.
nusuta, *Cerv. I. c.* 348.—Mexic.
Jongifolia, *Cerv. 1. c.* 350.—Mexic.
lutescens, *Cerv. 1. c.* 349.—Mexic.
monostachia, *Cerv. I.* c—Mexic.
Wrastachia, *Cerv. l.c.ven.* typ. tretistachia).—Mexjc. «"osa,Cm;./.f.848.-Mexic.

ERUCARIA, Gaertn. Fruct. ii. 298. t. 143. f. 9 (1781). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 100.
PACHILA, Kafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1882) 246.
REBOUDIA, COSS. & Dnr. in Bull. Soc. BoL Fr. iii. (1856) 704.
Aegieeras, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient, i. 36,7 (-#«*• *sonia* ***uncata).***—Arab.
aleppica, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 451 = Brassica adpressa.
aleppica, *Gaertn. Fruct.* ii. 298.—Graecia; Arab.; Oriens.
crassifolia, *Delile, Fl. Egypte*, 244.—Aegypt.
erucarioides, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 178.—Alger.
grandiflora, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 13.—Persia.
hypogaea, Viv. *t'\.* Core. Sp. Nov. 11 = Morisia hypogaea.
hyrcanicft, DC. Syst. ii. 676 = Brassica adpressa.
latifolia, DC. 1. c. 676=aleppica.
lineariloba, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 390.—Persia,
microcarpa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 47.—Aegypt.; Arab.
Oliverii, *Spreng. Syst.* ii. 915.—Mesopotam.
persica, Goiter, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 219 - Brassica adpressa.
persica, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 633 «Brassica incana.
tenuifolia, *DC. Syst.* ii. 675.—Hispan.
uncata, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 47, in syn. *(=Hussonia uncata)*.—Arab.

ERUCASTRUM, Presl, Fl. Sic. i. 92 (1826) = Brassica, Toum. (Crucif.).
arabicum, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sera. Hort. Petrop. v. 35-B. Schimperi.
boeticum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 79 = B. boetica.
canariense, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 81.—Ins. Canav.
cheiranthiflorum, Link, Handb. ii. 317 = B. Cheiranthos.
Cheiranthus, Link, 1. c.-B. Cheiranthos.
Cossonianum, Rent. Cat. Hort. Genev. (1854) - B. Cossoniana.
Decandollii, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 947 = Moricandia arvensis.
elongatum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 694 = B. elongata.
fruticulosum, Presl, Fl. Sic. i. 92-B. fruticulosa.
Gmelini, Schimp. *Sc* Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 947 -B. Erucastrum ?
heterophyllum, Nym. Syll. 197 = B. adpressa.
incanum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 66=-B. **adpressa.**
inodorum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 693 - B. Erucastrum •
intermedium, Jord. Diagn. i. 191—B. Erucastrum.
Lamarkii, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 947 = B. Erucastrum.
lasiocalycinum, Boiss. Fl. Orient, i. 389.—Cilicia.
leucanthum, Coss. *St.* Dur. in Bull. Soe. Fr. ii. (1855) 807.—Alger.
longirostre, Nym. Consp. 48 =B. longirostris.
monetise, Link, Handb. ii. 317 = B. monensis.
montanum, Hegetschw. Fl. Schw. 656—B. Cheiranthos.
obtusangulum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 693 = B. Erucastrum.
oleraceum, Presl, Fl. Sic* i. 98 -=B. laevigata?
palustre, Vis.—Cf. Linnaea, xxviii. (1866) 865 = B. elongata ?
Pollichii, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 946 = B. Erucastrum.
Pseudosinapis, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 79.—Hispan.
pubescens, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 861.—Hispan.
Rickerii, Link, Handb. it 317-B. Richerii.
sabularia, Link, 1. c. = B. sabularia.
subbipinnatifidum, Nym. Consp. 48.—Hispan.
Tournefortii, Link, Handb. ii. 317 ** B. Toumefortii.
varium, Dur. Expl. Sc. Alger. t. 75 =B. varia.
virgatum, Presl, Fl. Sic. i. 94 = B. boetica.
Zanonii, Ball, in Bull. Soc. BoL Fr. vii. (1860) 252.—Italia.

ERVILIA, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 240 (1822)-Vioia, Tourn, (Lcgumin.).
caesarea, Alet in BonpUndia, ix. (1861) 126- V. **caesarea.**
cassubica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853)19=V.cassubica.
hirsuta, Opiz, Seznam, 41—V. hirsuta.
monanthos, Opiz, 1. c. = V. monanthos.
Orobos, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1863) 19 = V. cassubica.
pisiformis, Schur, 1. c. = V. pisiformis.
sativa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 240 -V. Errilia.
sylvatica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 19-V. sylvatica.
tetrasperma, Opiz, Seznam, 41=V. gcmella.
vulgaris, Godr. Fl. Lorr. i. 178 — V. hirsuta.

ERVUM, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 217 (1737)-Vioia, Tourn. (Legumin.).
agrigentinum, Guss. ex Ser. in DC. Prod. ii. 367 - V. Bivonea.
alpestre, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 50 = V. alpestris.
amoenum, Trautv. 1. c. 58 = V. amoena.
aristatum, Rafin. Prec. Decouv. 38-V. gracilis, *Loisel.*
aurantium, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. (1875; 66 = V. aurantia.
australe, Veil. Fl. Flum. 816; vii. 1.**141** (Uthyri sp.).—Bras.
Biebersteini, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 445-V. pubescens.
Boissieri, Hort. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 598>ort>n-*tale.*
fo/caratwm, Trautv. in Hort. Act. Petrop. iii. (1875) 45 = V. calcarata.
camelorum, Spreng. in Schrad, Joum. (1800) II. 197-Lens esculenta.
capreolatum, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 199 •= V. capreolata.
capricornium, Veil. Fl. Flum. 315; vii. t. 140 (Viciae sp.).—Bras.
cassubicum. Peterm. Fl. Lips. 552 - V. cassubica.
chilense, Fisch. & Mey. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 40.—Chili.
cirrkosum, Veil. Fl. Flum. 316; vii. t. 142 (Lathyri sp.).—Bras.
cochinchinense, *Ten.* Syn. ii. 309.— Cochinchina.
ccrsicum, Nym. Syll. 310-V. Corsica.
costatum, Trautv. in Act. Hort Petrop. iii. (1875) 52 - V. costata.
Cracca, Trantv. I.e. 49 - V. Cracca.
cyaneum, Boiss. *Sc* Hohen. Diagn. Ser. T. ix. 116.—Persia.
dalmaticum, Presl, in Weitenw. Beitr. ii. (1887) 31.—Dalmat.
diphyllum, Bess. Cat. Jard. Volh. Suppl. (1812) 15, ex Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) App. i. 11.—Volhynia.
dispermum, Roxb. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 766 = Lens esculenta.
emarginatum, Engelm. ex Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 363-V. micrantha.
erectum, Walt. Fl. Carol. 187 = Galac.:a sessiliflora.
Emilia, Linn. Sp. PI. 788-V. Ervilia.
filiforme, Koxb. in Wall. Cat. n. 6956 - V. hirsuta.
glabrum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 107-V. gemella.
gracile, DC. Cat. Hort. Monsp. 109 - V. gracilis, *Loisel.*
gracile, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) u. 156 = V. pubescens.
himalayense, A. Br. & Bouche, id Ind. Sem. Hort. Berol. (1852) App. 3.—Ind. or.
hirsutum, Linn. Sp. PI. 738 = V. hirsuta.
kirsutum, Lour. 1-1. Cnchinch. *Kl=cochinchinense.*
Hokenackeri, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. iv. 36= Lens Lenticula.
Kotsckyanum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 48 - V. Montbreti.
kurdistanum, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 364.—Kurdistan.
Lens, Linn. Sp. PI. 738-Lens esculentu.
Lens, Wall. Cat. n. 5954 C-V. hirsuta.
Lenticula, Schrcb. ex Sturm, Deutschl. Fl. Heft 32 = -Lens Lenticnla.
lenticulosum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 125 = praec.
lentoides, Tenore, I'.od. Fl. Nap. 70-Lens nigricans.

ERVUM :—
Loiseleurii, Bieb. FL Taur. Cane. iii. 475 - Vicia pubescens.
Loiseleurii, C. A. Mey. Verz. M. Cane. 148- V. Meyeri.
longifolium, Tenore, Prod. Fl. Nap. 42 - V. gracilis, *Loisel.*
lunatum, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 98 - V. lunata.
macrocarpum, Presl, 1-1. Sic. p. xxiii.—SicilU.
mastichinum, Hort. ex Steud. Nom. ed. IL i. 691 = Phaseolus ferrugineus.
mediterraneum, Veil. FL Flnra. 315; vii. t. 138 (VicUe sp.).-Bras.
megalotropis, Traotv. in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 61—V. megalotropis.
Meyeri, Trautv. 1. c. 46 = V. Meyeri.
micranthum, Alet. in Oestr. Bot. Zeitschr. U. (1859) 384 = V. Loweana.
monanthon, Schrank, Baier. Fl. ii. 264 = *monanthos,* Linn.
monanthos, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1171 — V. gemella.
monanthos, Linn. Sp. PI. 788 = V. monanthos.
multiflorum, Purah, FI. Am. Sept. ii. 789 = Astragalus multiflonis.
nigricans, Alef. in Oestr. Bot. Zeitachr. ix. (1859) 364 = V. nigricans.
nigricans, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 164 — Lens nigricans.
nigrum, Hort. ex Heynh. Nom. i. 312, nomen=praec. ?
ochroleucum, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 365-Lathyrus ochroleucus.
orientate, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 115.—Persia.
Orobus, Kitt. Taschcnb. ed. II. 1163 = V. Orobus.
parviflorum, Bertol. Amoen. Ital. 88 = V. disperma.
paudjugum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 76.—Transcaucasus.
pendulum, Rolh, Nov. PI. Sp. 351.—Hab. ?
pictum, Alef. in Oestr. Bot Zeitschr. ix. (1859) 365 - V. biennis.
pilosissimum, Schur, Enum. PI. Transs. 172= Lens esculenta.
pilosum, Engelm. ex Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 363-V. ludoviciana.
pisiforme, Peterm. Fl. Lips. 552 = V. pisiformis.
plicatum, Moench, Meth. 147 = V. Ervilia.
Pseudo-Orobus, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 53 = V. Pseudo-Orobus.
pubescens, DC. Cat. Hort. Monsp. 109 •= V. pubescens.
punctatum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 591 - V. Ervilia.
Salisii, J. Gay, ex Salis-Marsch. in Flora, xvii. (1834) II. Beibl. 6 1 - V. pubescens.
sardoum, Moris, ex Spreng. Syst iv. Cur. Post. 346 = V.hirsnta.
silvaticum, Peterm. Fl. Lips. 552 = V. sylvatica.
soloniense, Linn. Cent. PI. ii. 28; Amoen. Acad. iv. 326-V. lathyroides.
soloniense, Thuill. Fl. Par. ed. II. 371 = V. gemella.
soloniense, Wulf. ex Schrank, PI. Rar. Hort. Monac. t. 48-Lens Lenticula.
stipulaceum, Bast, in Desv. Jonm. Bot iii. (1814) 18-V. monanthos.
subglobosum, Reichb. Sel. Sem. Hort. Dresd. (1839) ; ex Linnaea, xiv. (1840) Liu. 122.—Hab.?
sylvaticum, Auct. plur. vide *silvaticum.*
sylvaticum, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1808) 116 = Lens nigricans.
Tenorii, Steud. Nom. ed. IL i. 591, sphalm. vide *Terronii.*
tenuifolium, Lag. Gen. et Sp. Nov. 22 = V. gracilis, *Loisel.*
tenuifolium, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 50 = V. tenuifolia.
tenuissimum, Bieb. Casp. 185 = V. gemella.
tenuissimum, Pers. Syn. ii, 309 = V. gracilis, *Loisel.*
Terronii, Tenore, Fl. Neap. Prod. A pp. v. 22=V. hirsuta.
tetragonum, Hoefft Cat. Koursk. 47 = V. gemella.
tetraphyllum. Veil. Fl. Flum. 315; vii. t 139 (Lathyri sp.).—Bras.
telraspermum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. it 164-V. pubescens.
tetraspermum. Linn. Sp. PI. 788=V. gemella.
tridentatum. Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 363 - V. ludoviciana.
trijugum, Alet in Bonplandia, ix. (1861) 212-V. trijuga.

ERVUM:—
unifiorum, Tenore, Fl. Nap. v. 121.1.172. f. 2= Lens Lenticula.
unijugum, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 365 = Vicia unijuga.
varium, Brot Fl. Lusit ii. 162-V. gracilis, *Loisel.*
venosum, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 55 = V. venosa.
venulosum, Met in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 364 - V. venulosa.
miciaeforme, Spreng. Syst. iii. 270-=seq.
vicioides, Desf. Fl. Atlant. ii. 168.1.198 - V. erviformis.
villosum, Pomel, Nouv. Mat. FL Atl: 194—Alger.
villosum, Trautv. in Act Hort. Petrop. iii. (1876) 47-V. villosa.
volubile, Walt. Fl. Carol. 187-Galactia glabella.

ERXLEBENIA, Opiz, Seznam, 41 (1852)= Pyrola, Toum. (Ericac).
rosea, Opiz, 1. c.= P. minor.

ERXLEBIA, Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 494 = Commelina, Linn.
fusiformis, Medic. 1. c = C. tuberosa.

ERYBATHOS, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 326=EROBATHOS, Spach-ITIgella, Moench (Ranunc).

EETCIBE, Roxb. PI. Corom. ii. 31. t. 159 (1798). *CONVOLVULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 868.
CATONIA, Vahl, in Skrivt. Nat. Hist. Selsk. Kiobenh. vi. (1810) 98.
ERIMATALIA, Roem. & Schult. Syst. v. 27 (1819).
camptobotrya, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 578-Francei.
citriniflora, Griff. Notul. iv. 284-glomerata.
coriacea, *Wall. Cat.* n. 1337.—Reg. Himal.
expansa, *Wall. 1. c.* n. 1331.—Burma.
ferruginosa. Griff. Notul. iv. 283-expansa.
fragrans, Wall. Cat. n. 1336 - coriacea.
glaucescens. *Wall. 1. c.* n. 1834.—Ind. or.; China,
glomerata, *Blume, Bijdr.* 1047.—Java.
glomerata, Wall. Cat. n. 1338 (-praec. >).—Burma.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 182.—Burma.
laevigata, *Wall. Cat. a.* 1333.—Reg. Himal
Maingayi, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 182.—Malacca.
malaccensis, *C. B. Clarke, I. c*—Burma; Malacc.
obtusifolia, *Benth. Fl. Hongk.* 236.—China,
paniculata, *Roxb. PI. Corom.* ii. 31. t. 159.—As. et Austral, trop.
Princei, *Wall. Cat.* n. 1335.—Malaya.
Rheedii, Blume, Bijdr. 1047 = paniculata.
subspicata, *Wall. Cat.* n. 1332.—Reg. Himal.; Burma,
tomentosa, *Blume, Bijdr.* 1048.—Java.
Wightiana, J. Grah. Cat PI. Bomb. 137 - paniculata.

EBYCIWA, IindL Fol. Orch. (1853). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 565.
echinata, *Lindl. I. e.*—Mexic. •

ERYUQIUM, [Toum.] Linn. Syst ed. I (1735). *UMBELUFERAE,* Benth. *ic* Hook. f. i. 878.
KLONION, Rafin. New Fl. Am. iv. 35 U«8fl).
LESSONIA, Bert, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 862, in syn.; et in Deless. Ic. Sel. iii. 45. t. 78 (1837).
STREBLANTHUS, Rafin. Atl. Jeum. 149 (1832).
agavifolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 155.—Reg. Argent.
i^lbovillosum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. xiii, nomen. •^ —Ins. Melita.
aloifolinm, *Mart, ex Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 309.—Bras.
alpinum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 137 - Bourgati.
alpinum, *Linn. Sp. PI.* 233.—Europ.
americanum, Walt. Fl. Carol. 102 = prostratum t
amethystinum, Lam. Fl. Fr. iii. 401 - Bourgati.
amethystinum, *Linn. Sp. PI.* 288.—Europ.
amethystinum, Salzm. ex DC. Prod. i. 88 =dilatatum.
Andersonii, *Lag. ex Loud. Hort. Brit.* 101, nomen.—Hab.?
angusti/olium, DC. Prod. iv. 95 •= rostratum.
anomalum, *Hook, (f Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 850.—Chili.
antihystericum, Rottl. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 288-foetidum.
aquaticum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 142 = petiolatum.

EKYNOIXJM:—
aquaticum, Linn. Sp. PI. 232=yuccaefolium.
aquaticum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 168=praealtum.
aquaticum, Veil. Fl. Flum. 126; iii. t. 99 = floribundum.
aquifolium, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 32.—Hispan.
aromaticum, *Baldw. in Ell. Sketch,* i. 844.—Florida.
articulatum, Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 232 = petiolatum.
arvense, *Phil, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 190.—Chili.
arvense, Veil. Fl. Flum. 125; iii. t. 98-elegans.
asperifolium, Delar. Eryng. 36. t. ll=giganteum.
australe, Wulf. & West, ex Schult. Sy»t vi. 334-amethystinum.
axilliflorum, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) 1.172.—Mexic
Baldwini, *Spreng. Syst.* i. 870.—Am. bor.
Barrelieri, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 125. -Reg. Mediterr. or.
Beecheyanum, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 294.—Mexic.
bellidifolium, Decne. in Bull. Soc. Bot Fr. xx. (1873) 26=nudicaule.
Billardieri, *Delar. Eryng.* 25. t. 2.—As. occ.
Billardieri, Heldr. ex Boiss. Diagn. Ser. I. x. 20-Heldreichii.
bithynicum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i..(1844) 123.—As. Min.
Bocconi, Lam. Encyc iv. 754=tricuspidatum.
Bonplandi, *Delar. Eryng.* 52. t. 22.—Mexic.
Bonplandianum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 31 = praec.
Bourgati, *Gouan, Illustr. 1.*1. 3.—Hispan.; Marocc.
Bourgati, Vahl, Symb. Bot. ii. 48 = dilatatum.
Bovei, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 124.—Alger.
bracteosum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 146.—Reg. Argent.
bromeliaefolium, *Delar. Eryng.* 60. t 28.—Mexic.
Bungei, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 824.—Peruv.
bupleuroides, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 352.—Ins. Juan Fernandez.
caerulescens, Jacquem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 670 = Billardieri.
caernleum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 200.—As. occ.
caeruleum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 3 = planum.
caeruleum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 261-amethystinum.
campestre, *Linn. Sp. PI.* 288.—Europ.
canaliculatum, *Cham. VSchlecht. in Linnaea, i.* (1826) 238 (err. typ. 838).—Bras.
Cardesii, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 113.—Chili.
Carlinae, *Delar. Eryng.* 53. t. 23.—Mexic.
carlinoides, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 825.—Afghan,
carthamoides, 5m. *in Rees, Cycl.* xiii.—Mauritan.
cancasicum, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. I. 816, nomen.—Caucas.
caucasicum, Trautv. in Act Hort. Petrop. i. (1871) 28—caeruleum.
Cervantesii, Chapm. Fl. S U. St. l«0 - Baldwini.
Cervantesii, *Delar. Eryng.* 47. t. 18. f. 1.—Mexic.
Chamissonis, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. L 315—Bras,
ciliatum, *Cham. V Schleckt. in Linnaea,* i. (1826) 349 (err. typ. 249).—Bras.
ciliatum, Veil. Fl. plum. 126; iii. t. 100 = canaliculatum.
eomotum, *Delar. Eryng.* 30. t. 7.—Mexic.
coquimbanum, *Phil, ex Urban, in Mart. Fl. Bras.* *•• I. 306, in obs.—Chili.
cornicnlatuin, *Lam. Encyc.* iv. 758.—Hispan.
cornutum, Donn, Hort. Cantab, ed. IV. 56 = praec.
coronatum, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* ii>-(1833) 850.—Reg. Argent.
coronatum, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 604 = Hookeri.
coronopifolium, *Decne. in Bull. Soc. Sot. Fr.* >*• (1873) 27.—Reg. Argent,
crantzioides, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 123—Chili.
creticum, Jan, ex Guss. Fl. Sic. Prod. L Add. 7 = triquetrum.
creticum, *Lam. Encyc.* iv. 754.—Reg. Mediterr. or.
creticum, Webb, Iter Hisp. 45=glaciate.
crinitum, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 32 = aquifolium.
crinitum, Presl, Delia Prag. 189-dilatatum.

ERYNGIUM:—

ryanrum, Sibth. & Sm. Fl. Graec Prod. *I* 175 = CTCtHiUm.
cylindraceum, Willd. ex Spreng. Syst i. 872-Phytenmae.
cymosnm, *Delar. Eryng.* 68. t. 81.—Mexic
Decaisneanum, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 816.—Bras.
Deppeanum, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 207,—Mexic.
depressnm, *Hook. tf Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 361.—Chili,
dichotomum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 226. t 65.—Reg. Mediterr.
diffusum, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* ii. (1828) 206.—Am. bor.
dttatatum, Guss. Fl. Sic. Syn. i. S02-amethystinum.
ailatatum, *Lam. Eneyc.* iv. 755.—Reg. Mediterr. occ.
discolor, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-88) 198.—Arizona,
divaricatum, *Hook. tf Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1888) 350.—Reg. Argent,
dnbinm, *Trait. Archiv,* 1.188.—Hab.t
"unaeanum, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. ix. (1848) 155.-Hispan.
Duriaei, J. Gay, 1. c. 156=praec.
ebracteatam, *Lam. Encyc.* iv. 759.—Bras,
eoumeum, *Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 23.—Bras.
echinatum, *Urban, in Matt. Fl. Bras.* xi. I. 805.—Bras.
degans, *Cham. tf Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 348 (err. typ. 248).—Bras,
enophorum, *Cham. tf Schlecht. 1. c.* 342 (err. typ. 242).—Bras,
expansnm, *F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.* iii. (1859) 2S6.-AnstraL
lalcatum, *Delar. Eryng.* 40. t 18.—Syria.
JUiforme, Shuttl. ex A. Gray, PI. Wright, i. 78-"aldwini.
naccidum, *Hook. tf Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 350.—Reg. Argent
nonbundum, *Cham. tf Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 845 (err. typ. 246).—Bras,
nominense, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 326.—Bras.
foetidum, Forsk. FL Aegypt Arab. p. xxiii-dilatatum.
foetidum, Florida, *Linn, Sp, PL* 2S2> partim-Ind> occ:
foetidum, Linn. Sp. PI. 282, partim-yuccaefolium.
/"rtirfaw, Walt. Fl. Carol. 112-virginianum ?
folioe Bras, *TM Scheele>* *"' *Linnaea>* xviL ^184S) 3S9-~
fruteacens, Moris, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1835) 45-bupleuroides.
gaUoides, *Lam. Encyc* iv. 757.—Lnsitan.
t-hiesbreghtii, *Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1878) .**•—Mexic..
8}ganteum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 201.—Armen.
fc'aciale, *Boiss. Elench.* 44.—Hispan.
Zioucum, Hoffm. Hort. Mosq. (1808) n. 1809 = gi-..gantenm.
^'aJioviannm, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 325.—was.
elomeratum, Anch. ex Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. IIL -V- U846) 238-Cardopatium orientale.
Pomeratnm, *Lam. Encyc.* iv. 755,-As. Min.; Syria.
^. Baldw. in Ell. Sketch, i. 345 - Baldwini.
Delar. Eryng. 64. t 24.-Mexic.
gramineum, *Delar. 1. c.* 60. t 27.—Mexic.
gruinm, *Hornem. Enum. PI. Hort. Hafn.* (1807) 16.—nab.!
h.'mnocephalum, Steud. Nom. ed. latum.
Haenkei, />,«/, *ex DC. Prod.* iv. 94.—Mexic.
"*nessii, *Curran, in Bull. Calif. Acad.* i. n. III. (1885) 163.-Calif.
"eldreichii, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 20.—Syria,
"ennsphaericum, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 824.—Bras.
netero,h,i,Ilnn> *Engelm. in Wisli: Tour North Hookeri, Mi Sup. Rep.* ii. 388.—Am. bor. occ.
Jmnoides, *DC. Prod.* iv. 94.-Mexic.
""nboldtianum, H. a & K. Nov. Gen. et Sp. v. 27 = Panicnlatnm.
"vmboldtii, Delar. Eryng. 61. t 29 = paniculatnm.

ERYNGIUM:—

hami/anm, *Clos, in C. Cay, Fl. Chil.* iii. 112.—Chili,
hnmile, *Cm. in Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 115.—Peruv.
ilicifolium, Brot. Fl. Lusit. i. 419-Duriaeanum.
ilicifolinm. *Lam. Encyc.* iv. 757.—Reg. Mediterr. occ.
integrifolium, Walt. Fl. Carol. 112 - prostratum *1*
intermedium, Weinm. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1637) n. VII. 69=planum.
jnncenm, *Cham. tf Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 341 (err. typ. 241).—Bras.
juncifolium, Mart, ex Urban, in Mart. FL Bras. xi. I. 385 = junceum.
Koehneannm, *Urban, I. c.* 823.—Bras.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 97 - Billardieri.
lacustre, *Pohl.ex Urban, in Mart. Fl. Bras,* xi I. 818.—Bras,
laeve, *Brouss. ex Schult. Syst.* vt. 337, nomen.—Hab.?
Lassauxii, *Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 22.—Reg. Argent
lateriflorum, Lam. Encyc. iv. 756 — Agriophyllnm lateriflorum.
latifolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 3=planum.
latifolium, Hoffmgg. & Link, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. HUp. iii. 13=campestre?
Leavenworthii, *Torr.* b* *Gray, Fl. N. Am.* L 604.—Mexic.
leucacanthum, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125=E.Spinalba.
lineare, Pohl, ex Urban, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 835 = junceum.
lineare, Veil. Fl. Flum. 126; iii. t 102=canaliculatum.
Lingua-Tucani, Mart Reise, i. 291 - E . Pristis.
longifolinm, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 133.—Mexic.
longinmenm, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) 1.171.—Mexic.
luzulaefolium, *Cham. V Schlecht. in Linnaea, i.* (1826) 340 (err. typ. 240).—Bras,
macrocalyx, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 60.—Soongaria.
marginatum, *Pohl, ex Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 821.—Bras.
maritimum, *Linn. Sp. PI.* 233.—Enrop.; As. Min.
mauritanicum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 138.—Alger.
Mettaueri, *Wood, Cl. Book,* 379.—Am. bor.
micrctcephalnm, *Sieber, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 692, nomen.—Dalmatia.
microcephalnm, *Willd. ex Spreng. Syst.* i. 871.—Am. trop.
monocephalnm, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 116.—Mexic.
multifidum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 175-amethystinum.
nasturtiifolinm, *Juss. ex Delar. Eryng.* 46.1.17.—Am. bor.
nigromontanum, Boiss. *Sc* Bnhse, in Nonv. *Uim.* Soc. Xat Mosc. xii. (I860) 95 - Billardieri.
Noëonum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 72.—Persia,
nndicanle, *Lam. Encyc.* iv. 759.—Reg. Afgent
nudifiorum, Willd. ex Spreng. Syst i. 869-ebractcatum.
nudum, *Gill. & Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 834.—Chili.
odoratum, Hort. Par. ex DC. Prod. iv. 92=corniculatntn.
odoratum, Lam. Encyc. iv. 756=pusillum. ' 4t
oligodon, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 146.—Reg. Argent
Oliverianom, *Delar. Eryng.* 37. t. 12 *(PL hybrid.* !).—Oriens.
orientale, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 - amethy. stinum?
ovalifolium, Michx. Fl. Bor. Am. i. 163 - virgatnm.
ovinum, A. Cunn. iu. Field, N. S. Wales, 858 - rostratum.
pallescens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = amethystinum.
palmatum, *Pant, (f Vis. in Mem. 1st. Venet.* xv. (1870) 20.-Serbia.
Palmito, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 21.—Graecia.
palustre, Hort. Madr. ex DC Prod. iv. 92 - coriiiculatum.

ERYNGIUM:—

pandanifolium, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea, L* (1826) 336 (err. typ. 236-).—Bras,
paniculatum, *Cav. tf Dombey, ex Delar. Eryng.* 69. t. 26«••" Chili•
parviflorum, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 176=glomeratum.
paucifiorum, Hoffmgg. *Sc* Link, Fl. Port. ii. 379-galioides.
pectinatnm, *Presl, ex DC. Prod.* iv. 96.—Mexic.
pentanthum, *Lini, ex Steud. Nom.* ed. I. 316, nomen.—Hab.?
pentechinum, Sieber, ex DC. Prod. iv. 89 = glomeratum.
petiolatum, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 259.—Am. bor. occ.
Phytenmae, *Delar. Eryng.* 51. t. 21.—Mexic
phyteumatos, Benth. PI. Hartw. 88=praec.
pinnatifidum, Bunge, in Lehm. PI. Preiss. i. 293-rostratum.
planifolium, Pall. Reise, iii. 816=planum.
planUgineum, *F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm.* iii. (1859) 235.—Austral.
planum, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 137 - Bourgati.
planum, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 232 = caeruleum.
planum, *Linn. Sp. PI.* 238.—Europ.; As. bor.
platyphyllum, Decne. in Bull. Soc. Bot Fr. xx. (1873) 24 = E. Serra.
Plukenetii, EU. Sketch, i. 582-virginiannm.
Pohlianum, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 836.—Bras.
polyrhiznm, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 116.—Chili,
poterioides, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 155.—Reg. Argent
praealtum, *A. Gray, in Bast. Journ. Nat. Hist.* vL (1850) 210.—Am. bor. occ.
pratense, *Phil, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 189.—Chili.
Pristis, *Cham. V Schlecht. 1. c.* i. (1826) 837 (err. typ. 237).—Bras.
prostratum, James, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 421-diffusnm.
prostratum, *Nutt. ex DC. Prod.* iv. 92.—Am. bor.
prostratum, Wood, Cl. Book, 878 = Baldwini,
proteaeflorum, *Delar. Eryng.* 62. t. 80.—Mexic.
Pseudojunceum, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 114 Chili.
pnlchellnm, *Phil. Fl. Atac.* 25.—Chili.
pulchellum, Wedd. Chlor. And. ii. 201-hnmile.
pumilum, Gilib. Chor. Grodn. 20-planum.
purpuratum, Sm. in Rees, Cycl. xiii—dilatatum.
pusillutn, Boiss. in Ann.Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 125—viviparum.
pusillutn, Delar. Eryng. 44.1.16 = galioides.
pusillum, Desf. Fl. Atlant. i. 223 = Barrelieri.
pusillum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 6=planum.
pusillum, *Linn. Sp. PI.* 233.—Europ. anttr.; Afr. bor.
pyramidale, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 829.—Persia.
radiatum, Willd. ex Spreng. Syst i. 871 =Carlinae.
radiciflorum, *Trait. Archiv.* t. 764 ; *ex DC. Prod.* iv. 93.—N. Granat
ranuncnloides, *Benth. PI. Hartw.* 88.—Mexic.
ranunculoides, Willd.ex Spreng. Syst. i. 871-humile.
Ra vend Iii, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 209.—Mexic.
reptans, Willd. ex Spreng. Syst. i. 870-Baldwini.
rigidum, *Lam. Encyc.* iv. 752.—Europ.
rostratum, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 118.—Austral. ; Chili.
Sanguisorba, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* i. (182S) S89 (err. typ. 239).—Bras,
sarcophyllum. *Hook. If Am. in Hoot. Bot. Misc.* iii. (1833) 352.—Ins. Juan Fernand.
scaposum, *Turci. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) I. 172.-Mexic.
scariosum, Delar. Eryng. 28. t. 5 = glomeratum.
Schiedeamim, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 206.—Mexic
scirpinum, *Cham. 1. c.* vilL (1838) 324.—Bras,
serbicum, *Pant, in Verk. Zool.-Bot. Ges. Wien,* vi. (1856) 520.—Serbia.
Serra, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 346 (err. typ. 246).—Bras,
serratum, COT. in *Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 132.—Mexic.
serratum, St Lng. in Ann. Soc. Bot Lyon, viii. (1881) 203 = E. Serra.
sparganoides, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 118.—Chill.

ERYNGIUM :—
Spina-alba, **Auct.—seq.**
Spinalba, ***Vill. Prosp.*** **26;** ***Hist. PI. Daufh.*** **ii. 660.—** Europ.
stellatum.iMWlj, *ex Delar. Eryng.* 65. t. 25.—Am. austr.
stenophyllum, *Urban, in Mart. FL Bras.* xi. I. 830.—Bras.
suaveoltns, Brouss. ex Desf. Tabl. ed. L 122 - comicnlatum.
subacaule, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 116.—Mexic.
subulatum, Veil. FL Flnm. 126; iii. t. 101=panicnlatoni.
syriacum, Lam. Encyc iv. 759 = creticura.
tenue, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 298 = Wrightii.
tenue, *Lam. Encyc.* iv. 755.—Keg. Mediterr. occ.
teinatum, *Pair. Encyc. Suppl.* iv. 295.—Ins. Creta.
tetracephalum, Buoge, In Lehm. Fl. Preiss. i. 293-rostratum.
thoraefolium, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Seη III. i. (1844) 122.—As. Min.
thyrsoideum, *Boiss. I. c.* 121.—Persia; Armen.
Tournefortianum, Sternb. in Syll. Ralisb. i. (1824) 32 -ternatum.
tricuspidatum, Domb. ex DC. Prod. iv. 82=Asteri. scium chilense.
tricuspidatum, *Linn. Amoen. Acad.* iii. 405.—Reg. Mediterr.
tricuspidatum, FanS. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vi. (1856) 520 = palmatum.
trifidum. Linn. Diss. Demons, in Amoen. Acad. iii. 406 = campestre.
tripartitcm, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. **III. 405—**Hab. ?
triquetnun, *Vahl, Symb. Bot.* il. 46.—Afr. bor.; Sleil.
tnberosnm, *Safin. Fl. Ludov.* 60.—Am. bor.
Tucano, Veil. Fl. Flam. 126; iii. t. 103 = E. Pristis.
uncinatum, Cham. & Schlecht. in linnaaa, L (1826) 347 (err. typ. 247) -elegans.
nnifultum, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 115.—Chili,
variifolium, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 59. —Marocc.
vesiculosum, *Labill. Nov. Holl. PL* i. 73. t. 98.—Austral.; N. ZeL
virens. Link, in Linnaea, ix. (1834) 570—campestre.
virgatum, *Lam. Encyc.* iv. 757.—Am. bor.
virginianum, £11. Sketch, i. 843 = praealtum.
virginiannm, *Lam. Encyc.* iv. 759.—Am. bor.
viviparum, Cerv. ex Delar. Eryng. 47 = Cervantesii.
vivipamm, *J. Gay, in Ann. Sc.Nat.* Seτ. III. ix. (1848) lfl.-Gall. occ.
vulgare, Lam. Fl. Fr. iii. 401 = campestre.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* i. 78.—Texas,
yuccaefoliam, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 164.—Am. bor.
Zanonii, Lam. Encyc iv. 75 4=tricuspidatum.

ERYOCYCLA, Pritst. It Ind. 421 (1855), err. typ. = EKIOCYCLA, Lindl. = Plturanthos, Viv. (Umbell.).

ERYSIBE, G. Don, Gen. Syst. iv. 374,392 (1837) sphalm. **-Eryclbe,** Roxb. (Convolv.).

ERYSIMASTRUM, Rnpr. Fl. Cauc. 76 (1869)=Ery-**aimiiTrij Touro. (Crncir.).**
anceps, Rnpr. Fl. Cauc. 83-Erysimum anceps.
andinum, Knpr. 1. c. 82, in textu=Erysimum leptophyllum.
aureum, Rupr. I. c. 76 = Erysimum aureum.
4owafe.Trautv.in Act. Hort. Petrop. viii. (188S) 105 = Erysimum boreale.
brachycarpum, Trautv. I. c ~ Erysimum brachycarpum.
Cheiranthus, Trautv. 1. c. - Erysimum cheiranthoides.
cretaceum, Trautv. 1. c. 106 « Erysimum cretaceum.
gelidum, Trauv. 1. c. = Erysimum gelidum.
ibericum, Rupr. Fl. Cauc. 77 = Erysimum ibericum.
macrocarpum, Trautv. in Act Hort. Petrop. viii. (1883) 106 = Erysimum ibericum.
Meyerianum, Rupr. Fl. Cauc. 82 <= Erysimum Meyerianum.
substrigosum.'RupT. I. c. 80 = Erysimum leptophyllum.

ERYSIMUM, lToum.]Linn. Syst. ed.I (1735); Gen. ed. I. 198 (1787). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. ***I. i.*** **79.**
CHEIRINIA, Link. Ennm. Hort Berol. ii. 170 (1822).
CUSPIDARIA, Link, Handb. ii. 315 (1831).
ERYSIMASTRUM, Rupr. Fl. Cauc. 76 (1869).

ERYSIMUM :—
STROPHADES, Boiss. in Ann. Sc **Nat.** *Sir.* II. xvii. (1842) 82.
accedens, Jord. Diagn. i. 176-ochroleucum.
aciphyllum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 80.—As. Min.
adcumbrns, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient i. 202= alpestre.
adpressum, Mann, ex Opiz, Natural. xL (1826) **423** - hieracifolium.
adscendens, **Nym. Syll. Suppl.** ***Si^ascendens.***
alliaceum, Salisb. Prod. 270 - Sisymbrium Alliaria.
Alliaria, Linn. Sp. PI. 660-Sisymbrium Alliaria.
alpestre, Jord. Diagn. i. 171 = lanceolatum.
alpestre, ***Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,*** **i. 202.—As.** Min.
alpinum, Fries, Summ. Veg. Scand. 29-hieracifolium.
alpinum, Pers. Syn. ii. 200=lanceolatum.
alpinum, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 282-Arabis brassicaefonnis.
altaicum, ***C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.*** **iii. 158.—Reg.** Caucas.; Sibiria.
altissimum, Lej. FL Spa, ii. 70—hieracifolium.
alyssoides, ***Franch. in Nouv. Arch. Afus. Par. Sit.*** II. v. (1884) 189.—As. or.
amplexicaule, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 20.—Abyss,
anceps, ***Stev. ex Ledeb. Fl. Ross.*** **i. 187.—Reg.** Caucas.
Andrteiovscianum, Bess. Enum. PL Volh. 27 — canescens.
angulatum, Royle. ex Hook. f. *Sc* Thorns, in Joura. Linn. Soc. v. C1861) 166 = hieradifolium.
angustifolium, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 262 = pannonienm.
angustifolium, *Ehrh. Beitr.* vii. 155.—Hungar.
angustifolium, *Rafin. Atl. Journ.* 153.—Am. bor.
arcuatum, Opiz, ex J. *Sc* C. Presl, Fl. Čech. 138 = Barbarea arcuata.
arkansanum, NutL ex Torr. *Sc* **Gray,** Fl. N. Am. i. 95 =asperum.
armeniacum, Boiss. Fl. Orient, i. 202 = gelidum.
armeniacum, J. Gay, Erysim. Nov. 4= ibericum.
arvense, Thore, Chlor. Land. 284 = Brassica Cheiranthos.
ascen'dens, Jord. Diagn. i. 180=ochroleucum.
asperulum, *Boiss. If Heldr. Diagn.* Ser. II. vL 11.—Graecia.
asperum, *DC. Syst.* ii. 505.—Am. bor.
atticum, Heldr. *Sc* Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. i. 25 = Boryanum.
Aucheri, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Seτ. II. xvii. (1842) 78.—Persia.
Aucherianum, J. Gay, Erysim. Nov. 9 = Gayanum.
aurantiacum, *Leyb. in Flora,* xxxviii. (1855) 388.—Tyrolia.
aureum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 117.—Reg. Caucas.
aurigeranum, Jeanb. *Sc* Timb. in Bull. Soc. Sc. Fhys. &Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 565 ~ cheiranthoides.
aurosicum, Jord. Diagn. i. 169—montosicolum.
australe, *J. Gay, Erysim. Nov.* 6.—Hispan.; Marocc.
australe, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, i. 192-Raulini.
austriacum, Roth, Tent. Fl. Germ. L 282 = Conringia austriaca.
autareticum, *Verl. Cat. Jard. Grenob.* (1867) 94.—Gallia.
Barbarea, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 116-Barbarea arcuata.
Barbarea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxix-Nasturtium palustre.
Barbarea, Linn. Sp. PL 660 = Barbarea vulgaris.
Barbarea, Pall. Tabl. Taur. 54'Barbarea arcuata.
Baumgartenianum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. v. (1859) 166 = crepidifolium.
bicolor, *DC. Syst.* ii. 509.—Helvetia.
bicorne, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii 394 = Notoceras canariense.
blennodioides, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 367 —Blennodia lasiocarpa.
Bocconi, Pers. Syn. ii. 200 = canescens, ochroleucum.
Boisseri, Walp. Rep. i. 164—Sisymbrium perfoliatum.
Bonannianum, Presl, Fl. Sic. i. 78 = lanceolatum.
boreale, C. ***A. Mey. ex Rupr. Fl. Cauc.*** **76.—Sibir.**
Boryanum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 71.—Graecia.
Bourgeauianum, Coss. ex Nym. Consp. 41 = australe.
brachycarpon, *Spreng. Syst.* ii. 908.—Keg. Caucas.
brachycarpum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 196.—Armenia; Persia.
Brassica, Crantz, Inst. ii. 101-» Conringia oricntalis.

EKYSIOTTM :—
brayoides, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. U. (1822) 57 - Braya alpina.
brevicaule, Jord. Diagn. i. 172—lanceolatum.
brevipes, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1862) 367-Blennodia brevipes.
brevirostre, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 408.—Hab.?
caespitosum, *DC. Syst.* ii. 497.—Persia,
calycinum, ***Griseb. • Spicil. Fl. Rumel.*** **i. 260.—** Macedon.
campestre, Scop. FL Cam. ed. II.il. 27-Conringia orientals.
canescens, Bory *Sc* Chaub. FL Fêlop. 45—graecum.
canescens, DC. Syst. ii. 501=australe.
canescens, Moench, Meth. Suppl. 86—cinereum.
canescens, *Roth, Catalecta,* i. 76.—Europ. austr.; Reg. Caucas.
capscllinum, ***F. Muell. Native PI. Viet.*** **i. 35.—** Austral.
cardamineides, F. Muell. Fragm. xi. 59= Sisymbrium cardaminoides.
carium, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Seτ. II. xvii. (1842) 77.—As. Min.
carniolicum, Dollin. in Flora, x. (1827) 254; Host, Fl. Austr. ii. 276 — pannonicum.
carniolicum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 143=crepidifolium.
caucasicum, ***Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xli.** (1868) I. 460.—Reg. Caucas.
cheiranthifolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 58-cheiranthoides.
cheiranthoides, Crantz, Siirp. Austr. fasc i. 20 = lanceolatum.
cheiranthoides, *Linn. Sp. PI.* 661.—Europ.; Am. bor.
Cheiranthus, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 261 — pannonicum.
Cheiranthus, J. *Sc C.* Presl, FL Čech. 138=crepidifolium.
Cheiranthus, Roth, Tent Fl. Germ. i. 282-lanceolatum.
Cheiri, Crantz, Class. Crucif. 116 - Cheirantbus Cheiri.
cheiriflorum, Boiss. Diagn. II. v. 24 - E. Pseudocheiri.
cheiriflorum, Wallr. Sched. Crit. 367 - pannonicum.
chidopodum, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 408.—Hab.?
chrysanthum, Pane, ex Nym. Consp. 41-pannonicum.
cinerascens, Jord. Diagn. i. 168—canescens.
cinereum, *Moench, Meth.* 255.—Europ.
clavatum, Walp. Rep. i. 169 = Conringia clavata.
coUinum, *Andre, in DC. Prod.* i. 198.—Reg. Caucas.
collisparsum, Jord. Diagn. i. 165-canescens.
Comperianum, ***Cmern. ex Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** xxvii. (1854) II. 304.—Soongar.
confertum, Jord. Diag. i. 161—virgatum.
*confine,.*Jord. 1. c. 162-canescens.
consimile, Jord. 1. c- 177 •» ochroleucum.
cordi/olium. Pall. Tabl. Taur. 54; Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 458—Sisymbrium Alliaria.
cornutum, Pall. Reise, iii. t. Mm = Malcolmia torulosa.
cornutum, Pers. Syn. ii. 200 = Syrenia cessiliflora.
crassicaule, *Boiss. Fl. Orient,* i. 199.—Persia,
crassipes, ***Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.*** **l. 27.** —As. Min.; Pers.
crassistylum, *Presl, Fl. Sic.* i. 77.—Sicilia.
crepidifolium, Griseb. Spicil. FL Kumel. ii. 268-smyrnaeum.
crepidifolium, *Reichb. Ic. Fl. Germ.* i. 8.—Europ.
cretaceum, *Rupr. Fl. Cauc.* 76.—Keg. Caucas.
creticum, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. II. i. 26.—Ins. Creta.
Cunninghamii, F. Muell. Census, 5 =» Blennodia Cunninghamii.
curvifoiium, Jord. Diagn. i. 164-canescens.
curvipes, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 368-= Blennodia curvipes.
cuspidattun, *DC. Syst.* ii. 493.—Graec.; As. Min. i Persia.
CtetBianum, Schur, Enum. PI. Transs. 57-crepidifolium ?
decumbent, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 346" ochroleucum.
deflexum, ***Hook. f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.*** •• (1861) 165.—Keg. Himal.
delphinense, Jord. Diagn. i. 155-virgatum.
densisiliquum, Jord. 1. c. 154—virgatum.
denticulatum, *J. V C. Presl, Fl. Čech.* 139.—Bohem.
diffusum, Ehrh. Beitr. vii. 157 - canescens.

EBYSmiTM:—
divaricatnm, *Cum. ex TUTCB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 304.-Soongaria.
divaricatum, *Wallr. Beitr. Fl. Hereyn.* 233.—Europ.
dubinm, *DC. Syst.* ii. 504.—Hab. *1*
Duriaei, *Boiss. Diagn.* Ser. II. L 26.—Hispan.
durum, J. & C. Presl, Delic. Prag. 226 - viigatnm.
elatum, Nutt. ex Torr. ft Gray, Fl. N. Am. i. 95=-asperum.
elatum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 369.—Algeria.
elatum, Schum. Ennm. Fl. Transs. 58 = Marschallianum.
elbrnsense, *Boiss. Fl. Orient.* L 202.—Persia,
erucastrifolium, *Rupr. Fl. Cauc.* 89.— Reg. Caucas.
Erucastrum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 27-Brassica Erucastrum.
etnense, Jord. Diagn. i. 161-cheiranthoides.
exaltatum, Andra. in Bess. Enum. Fl. Volh. 71, 83 = hieracifolium.
exasperatum, Gmel. ex DC. Syst. ii. 497-caespitosum.
filifolium, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 368 = Blennodia filifolia.
firmum, Sweet, Hoit. Brit. ed. I. 25=virgatum.
Fischerianum, Presc. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 188 = altaicnm.
foliosum, Koyle, ex Hook. f. ft Thorns, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 166-hieracifolium.
fruticulosum, J. Gay, Erysim. Nov. 5—caespitosum.
faniculosum, *Hook./. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 165.—Keg. Himal.
Fussianum, SchTii, Enum. PI. Transs. 68-Marschallianum.
Gayanum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 196.—Persia,
gelidum, *Bunge, ex Tchihat. AsieMin. Bot.* i. 386.—Armenia.
glaberrimum, Hook. St Am. Bot. Beech. Voy. 322-Sisymbrium linifolinm ?
glabrum, *Presl, Fl. Sic.* i. 76.—SicilU.
glareosum, Jord. Diagn. i. 178 =ochroleucum.
glastifolium, Crantz, Class. Crucif. 117 - Arabis perfoliata.
glaucum, Moench, Meth. 255 = Conringia orientals,
goniocaulon, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 28.—As. Min.; Syria.
gracile, DC. Syst. ii. 604*>-versicolor.
gracile, J. Gay, Erysim. Nov. 9 = hieracifoUum.
graecum, *Boiss.* b[1] *Heldr. Diagn.* Ser. II. i. 27.—Graecia.
gramineum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 371.—Algeria.
grandiflorum, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 117-leptostylum.
grandiflorum, Czem. ex J. Gay, Erysim. Nov. 3 = ncranicum.
grandiflorum, Desf. Fl. Atlant. ii. 85=longifolium.
grandiflorum, Nutt. ex Torr. ft Gray, Fl. N. Am. i. 96 = Cheiranthus asper.
grandiflorum, Walp. Ann. ii. 49-Conringia grandiflora.
Griffithiannm, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 28.—Persia; Afghan ist.
Griffitl,ii, Hook. f. ft T. Anders, in Fl. Brit. Ind. L 153-Griffithianum.
Iveticum, Cut. Fl. Madrit. 128 = australe.
kelveticum, DC. Fl. Fr. iv. 658 « ochroleucum.
neheticum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 269-olyrapicum?
Hesperis, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 28 -lanceolatum.
eracifolium, Jacq. Fl. Austr. t. 73 = pannonieum.
pieracifolium, *Linn. Cent. PI.* i. 18—Europ.
neracifolium, Pall. Tabl. Taur. 54 = cuspidatum.
Awan/ortum, Schleich. ex DC. Syst. ii. 496 - virgatum.
Hieracifolium, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) .337=smymaeum.
*«««*KI», Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 168-Sisym- brium run dnatum.
Hookeri, *Boiss. Fl. Orient,* i. 203.—Afghanist.
*«««/«, Pers. Syn. ii. 200 = lanceolatum.
ybndum, *Grauer, Dec.* 6'.—Holsat.
lericum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvli. (1842) .. [8]}.= Gayanum.
wencum, *DC. Syst.* ii. 498.—Reg. Caucas.
incam Kun Flor (18 46) 752.—Hispan.
pifolium, *Tenore, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 394.—ab.?

EBTBIMT7H:—
jugicolum, Jord. Diagn. L 173-pnmiInm.
juneeum, Willd. Sp. PI. iii. 618-Sisymbriumjunceum.
Kotschyanum, *J. Gay, Erysim. Nov.* 6.—As. Min.
Kunieanum, Boiss. ft Keut. Dugn. Ser. II. i. 27 - incanmn.
laciniatum, Boiss. 1. c. Ser. I. i. 71 - rupestre.
lanceolatum, [*#. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 116.—Europ.
lanceolatum, Cham, ft Schlecht in Linnaea, i. (1826) 29-Redowskii.
lanceolatum, Colm. Apunt. Fl. Cast. 28-australe.
lanceolatum, Eichw..Casp. Cauc. 31-hieracifolium.
lanceolatum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 64 - parviflorum.
lanceolatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 69-asperum.
lanceolatum, Reichb. ex Nym. Consp. 41-=panno- Diciioi*
lanceolatum, Willk. in Willk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 808—ochroleucum.
laxiflorum, y. *Gay, Erysim. Nov.* 4.—Persia,
lazistanicum, *Rupr. Fl. Cauc.* 76.—Reg. Cancas.
leptocarpum, *Y. Gay, Erysim. Nov.* 4.—Armenia.
leptopetalum, C. Koch, in Linnaea, «x. (1847) 62 = cuspidatum.
leptophyllum, *Andrt. in DC. Prod.* i. 193.—Reg. Caucas.
leptostachyum, Hohen. ex Boiss. Fl. Orient, i. 203= leptophyllum.
leptostylum, *DC. Syst.* ii. 494.—Reg. Caucas.
leucophaeum, Jon!. Diagn. i. 167 - canescens.
linariaefolium, Tausch, in Flora, xiv. (18S1) 212-lanceolatnm.
lineare, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 24-oleaefolium.
linearifolium,Moench, Meth. Suppl. 85—ochroleucum.
linifolium, *J. Gay, Erysim. Nov. S.*—Hispan.
longiflorum, Royle, ex Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 166-hieracifolium.
longifolinm, *DC. Syst.* ii. 504.—Afr. bor.
longirostre, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 408.—Hab.?
longisiliquosum, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 680.—Helv. austr.
longisiliquum, *Hoot. f.* b* *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 166.—Rej. Himal.
longisiliquum, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. III. 14 - virgatum.
Lucae, F. Muell. Fragm. xi. 59=Sisymbrium Locae.
lucidum, Salisb. Prod. 270-Barbarea valgaris.
lyratum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 69~ Barbarca vulgaris.
lyrifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 469-Barbarea vulgaris.
macilentum, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pitersb.* ii. (1885) 80.—China.
maclovianum, C. Gay, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 243—Arabis macloviana.
macradenium, *J. Gay, Erysim. Nov.* 8.—Mexic.
macranthum, *Tausch, in Flora,* xix. (1886) -409.—Austria.
macrocarpum, Rupr. Fl. Cauc. 75, nomen—ibericum.
macrostigma, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit. II.* xvii. (1842) 81.—Persia.
Marschallianum, *Andrt. in Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 441.—Podol.; Sibir.
Meyerianum, *Rupr. Fl. Cauc.* 76, nomen.—Reg. Caucas.
micranthum, Tausch, ex Willk. ft Lange, Prod. Fl. Hisp. Hi. 808-ochroleucum.
minus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Hab. ?
montanum, Crantz, Class. Crucif. 116 = hieracifolium.
montosicolum, *Jord. in Billot, Ann. Fl. Fr. All.* 123.—Gallia.
murale, Cut. Fl. Madrit. 128-australe.
murale, DC. ex Nym. Consp. 41 = lanceolatum.
murale, *Desf. Tabl.* ed. I. 129.—Euiop.
murale, Lam. Fl. Fr. ii. 514 = Cheiranthus Cheiri.
mutabile, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 24.—Graecia.
myriophyllum, *Lange, in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1881) 102.—Hispan.
nanum, *Boiss. V Hohen. Diagn.* Ser. I. viii. 23.—Persia.
Nasturtium, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 368 - Blennodia nasturtioides.
nemorale, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 370.—Algeria,
nervosum, *Pomel, 1. c.*—Algeria.
nevadense, Reut. Cat. Jard. Genev. (1855) 4.—Cf Linnaea, xxyiii. (1856) 355-australe.

ERYSIMUM:—
obtusangulum, [Clairv.] Man. Herb. 219-Sisymbrium obtusangulum.
ochroleucum, *DC. Fl. Fr.* iv. 658.—Hispan.
ochroleucum, Zawad. ex Niessl. in Verh. Natnrf. Ver. Bmenn, viii. I. (1870) 59-crepidifolium.
odoratum, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 262 = crepidifoliuin.
odoratum, Earn. Beitr. vii. 157—pannonieum.
officinale, Linn. Sp. PI. 660 = Sisymbrium oflicinale.
oleaefolium, *J. Gay, Erysim. Nov.* 6.—Persia,
olympicum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 191.—Thessalia.
oreites, Jord. Diagn. i. 175 = pumilum.
orientate, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 ; [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 117 - Conringia oricntalis.
pachycarpum, *Hook. f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 187.—Reg. Himal.
pollens, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 716-anstrale.
pollens, Pers. Syn. ii. 200; Koch, Syn. Fl. Germ.ed. I. 53 = ochroleucum.
pollens, Wallr. Sched. Crit. 363=crepidifolium.
pallescens, *Herbich, Stirp. Rar. Bucov.* 49.—Eutop.
pallidum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 207.—Lycia.
pannonieum, *Crania, Stirp. Austr.* ed. I. fasc. i. 30.—Europ.
Parnassi, Nym. Consp. 40<=Boryanum.
parviflorum, *Nutt.ex Torr. V,Gray, Fl. N. Am.* i. 95.—Am. bor.
parviflorum, Pers. Syn. ii. 199=eheiranthoides.
parvulum, Jord. Diagn. i. 172 =• pumilum.
passgalense, *Boiss. Fl. Orient, i.* 198.—Persia.
patens, J. Gay, Erysim. Nov. 9-hieradfolium.
patisiliquosum, Wender. Del. Sem. Hort. Mart). (1858) 4.—Cf. Linnaea, xxvi. (1853) 751-Conringia planisiliqua.
patisiliquum. Wender. 1. c. (1856) 8.—Cf. Linnaea, xxix. (1857-58) 727-praec.
patulum, *Harnem. Hort. Hafn. Suppl.* 73.—Hab. 1
pectinatum, *Bory V Chaub. Fl. Pilop.* 48. t. 26.—Graecia.
perfoliatum, Crantz, Stirp. Anstr. ed. I. fasc. i. 27 - Conringia orientalis.
Perofskiannm, *Fisch.* b* *Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* iv. 86.—Reg. Caucas.; Afghanist.
persepolitanum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 11.—Persia.
persicum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvil (1842) 79-subulatum.
petrophilum, Jord. Diagn. i. 166 - canescens.
pinnatum, Walt. FL Carol. 174-Sisymbrium canescens.
planisiliquum, Steud. Norn. ed. II. i. 594; Ledeb. Fl. Ross. i. 192 = Conringia planisiliqua.
platyphyllum, Schur, Enum. PI. Transs. 56 = canescens.
polyceratium. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 168= Sisymbrium polyceratium.
polyceratum, Pall. Reise, iii. 741 - Malcolmia airicana, torulosa.
praecox. Sin. Fl. Brit. ii. 707 =-Barbarea praecox.
Pseudooheiri, *Boiss. Fl. Orient,* i. 201.—Armenia.
Pseudo-odoratum, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. n. (1877) 84-*hieracifolium?
pulchellum, J. Gay, Erysim. Nov. 10 = rupestre.
fulvinatum, J. Gay, 1. c 5=Aucheri.
pumilum, *DC. Syst.* ii. 510.—Helvetia.
pumilum, Gaud. Fl. Helv. iv. 365= lanceolatum.
pumilum, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 95—Am. bor.
pumilum, Schur, In Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 22 -crepidifolium.
pnrpureum, *Auch. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 82.-Armenia; Syria,
pusillum, *Bory* b* *Chaub. in Bory, Moree,* t. 23.—Graecia.
pusillum, *Gill, in Hoot. Bot. Misc.* iii. (1833) 140.—Chili.
pycnopkyllum, J. Gay, Erysim. Nov. 3 =thyrsoidenm.
pygmaeum. J. Gay, 1. c. 4 = Cheiranthns pygmaeus.
pyrenaicum, Jord. Diagn. i. 176 = ochroleucum.
pyrenaicum, Vill. Piosp. 39 - SUymbrium austriacum.
quadrangulum, Desf. Tabl. ed. I. 12A - Syrenia sessiliflora.
quadricome, Steph. ex Willd. Sp. PI. iii. 614 = Tetracme quadricornis.
radicate, Pall, ex DC. Syst. ii. 511 - Leptalenm filifolium.
ramosissimum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 31; ed. II. 29=rcpandum.

ERYBIMUM :-
rarifolium, C. Koch, in Limaea, lix. (1847) 52 = cuspidatum.
Raulini, *Boiss. Fl. Orient-* i. 192.—Ins. Creta.
Redowskii, *Weinnu Cat. Hart. Dorp.* (1810) 65.—Sibir.
repandum, *Linn. Amoen. Acad.* iii. 415.—Enrop.; Afr. bor.; As. occ.
repandum, Lose. *Sc* Pard. Ser. Inc. ed. II. 21=incanum.
retrofraetum, 'Von. in Bot U. St. Expl. Exped. ii. 230 =Sisymbrium reflexnm.
rhaeticutn, DC. Syst. ii. 503—ochroleucum.
rkaeticum, Kunze, ex Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 806=australe.
Richardsii, F. Muell. Fragm. x. 105=-Sisymbrium Kichardsii.
rigens, Jord. Diagn. i. 168=canescens.
rigidum, DC. Syst. ii. 505 = repandum.
robustum, D. Don, Prod. Fl.'Nep. 202=hieracifolium.
rubellum, *Rets, in Hoffm. Phyt. Blaett.* i. (1803) 42.—fcurop.
runeinatum, Gilib. Fl. Litnan. ii. 58-Sisymbrium officinale.
runeinatum. Link, Handb. ii. 313 — Sisymbrium rundnatum.
rupestre, Bory & Chanb. Fl. Pelop. t 25 - Boryanum.
rupestre, *DC. Syst.* ii. 494.—As. Min.
rupico/a, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. WochenbL (,1865) 145 = Kotschyanum.
ruscinonense, Jord. Diagn. i. 162=canescens.
sabulosnm, *Fisch. ex Sweet, Hart. Brit.* ed. III. 37.—Sibir.
scabrosum, Banks, ex DC. Syst. ii. 603-Brasaica strigosa.
scabrum, *DC. 1. c.* 505.—Syria.
Schaererianum, *Wallr. Sched. Crit.* 363, in obs.—Helvetia.
Schultesii, Schrad. Cat. Hort. Gotting. (1831).—Cf. Linnaea, viii. (1833) Litt. 23 =Syrenia sessiliflora.
segusianum, Jord. Diagn. i. 158=cheiranthoides.
sessilifiorum, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 116—Syrenia sessiliflora.
siculum, Heldr. ex Nym. Consp. 41 — lanceolatum.
siculum, *Spring. Neue Entdeck.* iii. 51.—Sicilia.
siliculosum, DC. Syst. ii. 491 = Syrenia siliculosa.
sisymbrioides, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iii. 150.—As. Min.; Persia; Turkest.
smymaeum, *Boiss.* &• *Bal. Diagn.* Ser. II. v. 23.—As. Min.
stenophyllum, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient, i. 204 - aciphyllum.
stigmatosum, *Franch. PI. Davidian.* i. (1884) 38.—China.
Stocksiannm, *Boiss. Fl. Orient,* i. 199.—Beluchist
stoechadifolium, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 409.—Sicilia.
strictissimum, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 77, in syn. = hleracifoUum.
strietum, DC. Prod. i. 197 -pannonicum.
strátum, Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. Fl. Wett. ii. 451 - hieracifolinm.
strietum, J. Gay, ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr, iv. (1857) 484 = incanum.
strigosnm, *DC. Syst.* ii. 506.—Sibir.
strophades, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 24.—Mesopotam.
subhastatum, Horaem. Enum. PI. Hort. Hafh. (1807) 37 = Sisymbrium orientale.
snbstrigosum, *Rupr. Fl. Caue.* 75, nomen.—Reg. Caucas.
subnlatum, *7. Gay, Erysim. Nov.* 8.—Persia.
mecicum, Jord. Diagn. i. 152-virgatum.
suffruticosum, Spreng. Nov. Prov. 17 = murale.
sulphureum, Schrank, Baier. Fl. ii. 203-Sterigma sulphnreom.
supinum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 168—Sisymbrium Bupinum.
sylvaticnm, *Bieh. Ft. Taur. Caue.* iii. 441.—Ucrania.
syhestre, Desf. Tabl. ed. II. 163-lanceolatum.
sylvestre, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 28-canescens.
Szowitsianum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 198.—Lac. Ourmah.
tanacetifblium, [Clairv.] Man. Herb. 219 =Sisymbrium tanacetifblium.
tenellum, *DC. Syst.* ii. 500.—Cappadoc.
tenuifolium, [Clairv.] Man. Herb. 220-Diplotaxis tenuifolia.
tenuifolium, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 460-Barbarea praecox.

ERYBIMOTkt :—
tenuissimum, *7. Gay, Erysim. Nov.* 7.—Armenia.
Thalianum, Kitt. Taschenb. ed. II. 899-Sisymbrium Thalianum.
Thomsoni, *Hooi.f. in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 165.—Keg. Himal.
thyrsoidenm, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 79.—As. Min.
Tilimi, *J. Gay, Erysim. Nov.* 10.—Am. bor.
transsilvanieum, Schnr, Enum. PI. Transs. 57 = ochroleocum.
tuberosum, Domb. ex DC. Syst. ii. 254-Cardamine tuberosa.
turritum, Lam. FL Fr. ii. 514=lanceolatum, cheiranthoides.
vcranicum, *J. Gay, Erysim. Nov.* 8.—Oriens.
uncinatifolium, *Boiss. V Huet, Diagn.* Ser. IL v; 23.—Armenia; Syria.
Urvillaeanum, J. Gay, ex Nym. Consp. 41-smyrnaeum.
vernum, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 3-Barbara praecox.
verracosum, *Boiss. V Gaill. Diagn.* Ser. II. vi. 12.—Syria,
versicolor, *Andrt. ex DC. Prod.* i. 198.—Reg. Caucas.; Turkest
violaceum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 202-Cardamine violacea. „
virgatum, DC. Prod. i. 197=hieracifolium.
virgatum, Lej. Fl. Spa, ii. 71=murale.
virgatum, *Roth, Catalect.* fasc. i. 75.—Europ.
virgatum, Schleich. ex DC. Ic Gall. Rar. t. 86 - longisiliqnosum.
vulgare, Rupr. FL Caue 91 = Sisymbrium officinale.
Wheeleri, *Rothr. in Wheeler, Rep. Bot. U. St. Geogr. Sum.* vi. 64.—Am. bor.
Witmanni, Zawadsk. Enum. 194 - crepidifolium.

ERYSSIMUM, Opiz, Natural, xi. (1826) 422, sphalm.= Erysimum, Tourn. (Crucif.).

EKYTHALIA, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 80 (1800), sphalm.=EVRYTHAUA, Kenealm. = Qentiana, Tourn.

ERYTHAEA, Pfeiff. Norn. i. 1256 (1874), sphalm.= Erythraea, Borck. fGentian.).

ERYTHEA, S. Wats. Bot. Cali£ ii. 211 (1880).
PALMEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 927.
armata, *S. Wats, 1. c.* 212.—Calif,
edulis, 5. *Wats. I. e.*—Calif.

ERYTHEREMIA, Endl. Gen. Suppl. ii. 50 (1842) = ERYTHREMIA, Nutt^Lygodesmia, D. Don (Compos.).

ERYTHRACANTHUS, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 (]832) = Ebermaiera, Nees (Acanth.).
acutangulus, Presl, Bot. Bemerk. 97.—Bras.
ealycinus, Presl, 1. c.—Bras. *1*
coccineus, Presl, I. c. = Ruellia coccinea.
elongatus, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 184 = Eberm. zeylanica.
elongatus, Nees, in DC. Prod. xi. 78 = Eber. elongata.
elongatus, Presl, Bot Bemerk. 97.—Bras.
Griffithianus, Nees, in DC. Prod. xi. 78 - Eberm. Grifnthiana.
obtusus, Nees, 1. c. = Eberm. obtusa.
obtusus, Wight, Ic. 1.1291-Eberm. Grifnthiana.
peduneulosus, Presl, Bot. Bemerk. 97.—Bras.?
pilosus, Presl, 1. c. = Ruellia pilosa.
Pohlianus, Presl, 1. c—Bras. ?
racemosus, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 80 = Eberm. racemosa.
ruber, Presl, Bot Bemerk. 97-RneIlia rubra.

ERYTHRAEA, Renealm. ex Borck. in Roem. Arch, i. I. (1796) 28; Rich, in Pers. Syn. i. 283 (1805).
GENT1ANEAE, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 809.
CENTAURELLA, Delarb. Fl. Auv. ed. II. '28 (1800).
CENTAUREUM, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 22 (1745).
CF.NTAURIUM, Gilib. Fl. Lituan. i. 35 (1781); Moench, Meth. 449 (1794).
GYRANDRA, Griseb. in DC. Prod. ix. 44 (1845).
HIPPOCENTAUREA, J. A. Schultes, Oestr. Fl. ed. TI. i. 388 (18141.
SCHEKKIA, Griseb. in Bonplandia. 1. (1863) 226.
XANTHAEA, Reichb. Norn. 132 (1841).

ERYTHRAEA :—
acutitiora, *Schott, in Oken, Isis* (1818), 821.—Am. austr.
aggregata, *Sweet, Brit. Flow. Card.* Ser. L ii. t. 137 (=seq.1).—Hab.J
aggregata, Thouin, ex Mert. & Koch, Deutscbi FL ii. 234 = linarifolia.
albiflora, *Kit. in Linnaea.xxai.* (1863) 431.—Hungar.
alopecuroides, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 205.—Hab. ?
altaiea, Griseb. in DC. Prod. ix. 57-Meyeri.
anatolica, C. Koch, in linnaea, xix. (1847) 27 - ramosissima.
angustifolia, Wallr. Sched. Crit. 604=linarifolia
arenaria, Presl, Delic. Prag. 88=ramosissima.
australis, *R. Br. Prod.* 451.—Austral,
babylonica, *Griseb. in DC. Prod.* xi. 60.—Persia; Ind. or.
Barrelieri, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1660) 861 = major.
Beyrichii, *Torr. in Many, Rep.* 291.1.13.—Am. bor. occ.
Boissieri, Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 48 =grandiflora.
Cachanlahuen, Roem. *Sc* Schult Syst. iv. 167 - chilensis.
caespitosa, Hoffmgg. & link, FL Port. L 352.166 = conferta.
calycosa, Buckl. in Proć. Acad. Sc Philad. 1862 (1863) *7*=chironioides.
Candollii, *Des Afoul, in Act. Linn. Soc. Bord.* xx. (1855) 597.—Europ.
capitata, Willd. ex Roem. *Sc* Sennit Syst. iv. 168 = E. Centaurium.
caspica, Fisch. in Griseb. Gen. et Sp. Gent 145 — ramosissima.
centaurioides, Voigt, Hort Suburb. Calc. 520 = Roxburghii.
Centaurium, Borck. in Roem. Arch. i. 1.30 = Muehlenbergii.
Centaurium, *Pers. Syn. i.* 283.—Europ.
centauroides, Hort. Gotting. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent 141—ramosissima.
chilensis, Benth. PI. Hartw. 87-quitensis.
chilensis, *Pers. Syn.* i. 283.—Chili,
chironioides, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 479.—Mexic.
chironioides, Ton. in Bot. Mex. Bound. 156=venusta.
cklcodes, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 481 = conferta.
chloraefolia, Lehm. PL Preiss. ii 239 = Sebaea ovata.
cochinchinensis, *Spreng. Syst.* i. 580.—Cochinch.
compar, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64.—Abyss.
compressa, Hayne, in Kunth, Fl. Berol. 65=linarifolia.
conferta, *Pers. Syn.* i. 283.—Hispan.
corymbosa, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 453 = E. Centaurium.
corymbosa, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 596.—Barbaria.
diffusa, Woods, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) •271 = Massoni.
divaricata, Schafln. ex Schlecht in Bot, Zeit. xiii. (1855) 920 = quitensis.
Douglasii, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 180.—Am. bor. occ
elata, Nutt.ex A. Gray, L c=Douglasii.
Elodes, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 172.—Mont. Pyren.
emarginata, Waldst. *Sc* Kit. PL Rar. Hung. iii. 305. t. 275-ramosissima.
exaltata, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 811, in nota, snb Cicendia =• Douglasii.
fastigiata, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 186.—Europ.
floribunda, *Benth. PI. Hartv.* 822.—Calif.
Gerardi, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 171-ramosissima.
germanica, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 851 E. Centanrium.
glomerata, *Wittr. in Bot. Notiser* (1881), 115.—Scand.
graciliflora, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ail.* 13.—Algeria-
gracilis, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 16.—Helvet.
grandiflora, *Bivona, Sic. Cent.* 3.—Lusitan.
gypsicola, *Boiss.* b* *Reut. ex Boiss. Diagn.* Ser. I. *• 89.-Hispan.
helodes, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viL (1880) 12» - E . Elodes.
inaperta, Schlecht. Fl. Berol. 1. 181 = ramosissima.
intermedia, Pollini, Viagg. 16 = ramosissima.
jorulensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 177* Schultesia stenophylla.
latifolia, Sm. Engl. Fl. i. 322 = E. Centaurium.
linariaefolia, Wittr. in Bot. Notiser (1881), 112 " linarifolia.

EBYTHRAEA:—
linarifMa, C. B. Clarke, in Jonm. Linn. Soc xir. (1875) 428-babylonica.
linarifolia, Griseb. SpiciL Fl. Rumel. ii. 62 - £. Ceatanrium.
linarifolia, *Pers. Syn.* i. 288.—Enrop.
linarifolia, Willk. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 662 = major.
Hnearifolia, Boiss. FL Orient, iv. 68 - E. Centanrinm.
littoralis, Fries, Nov. Fl. Suec 30 = linarifolia.
Uttaralis, S. K. Gray, Nat Arr. Brit PL ii. 838; Sm. EngLFl. i. 320=confertal
longiflora, Nntt. ex S. Wat*. Bot. King's Exped. 277 -Nnttallii.
lutea, Roem. & Schult Syst. iv. 171=maritime.
luteola, Pers. Syn. i. 283 = Cicendk pusilla.
macrantha, *Hook,* b" *Am. Bot. Beech. Voy.* 438.—Mexic.
madrensis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 346.—Mexic.
major, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 412=grandiflora.
major, *Hoffmgg. V Link, FL Port. I* 849. t. 65.—Lusitan.
maritima, *Pers. Syn.* i. 283.—Reg. Mediterr.
maritima, Stend. Norn. ed. II. i. 696 = Massoni.
Massoni, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 363; *H. C. Wats. in Hoot. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 595.—Ins. Azoi.
nexicana, Griseb. ex Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 802=macrantha.
Meyeri, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* i. 220.—As. centr.; Ind. or.
microcalyx, *Boiss. V Sent. Diagn.* Ser. II. iii. 121.—Lusitan.
microphylla, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 811, in nota sub Cicenrlia=Sebaea khasiana.
Muehlenbergii, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 146.—Am. bor. occ.
Muehlenbergii, Griseb. 1. c, partim= ramosissima.
Mussoni, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 664, in syn. sphalra. —Massoni.
nana, Hegetschw. Fl. Schw. 202 -ramosissima.
nudicauUs, *Engelm. in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 222.—Arizona.
nummulariaefolia, Steud. Norn. ed. II. i. 696 = Massoni.
Nuttallii, S[1]. *Wats, in Bot. King's Exped.* 276. t. 29, partim.—Am. bor. occ.
Nuttallii, S. Wats. 1. c. partim - Donglasii.
occidentalis, Roem. & Schult. Syst. iv. 171 = maritima.
Pallidà, Willd. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 138 -chilensis.
Poludosa, Schrad. ex Griseb. 1. c. 144=linarifoHa.
Palustris, Schrad. ex Griseb. 1. c. 143 = linarifolia.
Paposana, *Phil.Fl. Atac.* 35.—Chili,
pauciflora, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I- (1844) 878.—Mexic.
rickeringii, Oakes, in Hovey, Mag. ex A. Gray, Syn. H ii. 1.118-spicata.
Plumieri, H. B. & K. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 118 = Eustoma silenifolium.
*portensis,*Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 851-Massoni.
pulchella, Coss. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 661 = ramosissima.
Pulchella, A. Gray, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 60" Muehlenbergii.
Pulchella, Hornem. in Fl. Dan. t. 1637 = ramosissima.
Pumila, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachlr. »i. 248 = ramosissima.
Pyrenaica, Rich, ex Pers. Syn. i. 283=ramosissima.
Smtensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 178.—Ecuador.
**mosissima,* C. B. Clarke, in Jonm. Linn. Soc. xiv. (1875) 428-Roxburghii, babylonica.
<"nosissima, Griseb. in DC. Prod. ix. 57 = Meyeri.
'amosissima, *Pers. Syn.* i. 283.—Europ.i As. temp.
hodensis, Boiss. *Sc* Rent. Diagn. Ser. II. vi. 121 = E. - Centaurinm.
Koxburghii, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 206.—Ind. or.
«abaeoides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1866) 41. —Ins. Sandvic.
"guinea, Mabille, Rech. PI. Corse, fasc. ii. 45 =major.
**Upides,* Chanb. ex Puel, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1860) 502- Massoui.
sMacea, Benth. Bot Voy. Sulph. 128.—Mexic.
Parsiflora, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 50=ramosissima.
•Peciosa, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 479.—Mexic.

EEYTHRAEA:—
spicau, *Pers. Syn. i.* 288.—Reg. Mediterr.; Oriens.
***Hrictt,Schlecht. in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 918.—Mexic**
suffruticosa, Stend. ex Griseb. in DC. Prod. ix. 58 = grandiflora.
sylvatica, *Kanita, in Kit. Add. Ft. Hungar.* 127. —Hungar.
szegzardensis, *Menyh. Kalocsa, Vidèk-Növiny.* 117, nomen.—Hungar.
tenella, Nutt. ex A. Gray, in Bot. Calif. 1. 480 = Donglasii.
tenuiflora, Hoffmgg. *Sc* Link, Fl. Port. i. 354. t. 67 = ramosissima.
tenuifolia, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 143 = linarifolia.
tenuifolia, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 372.—Mexic
tettamera, *Schlecht. in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 919.—Peruv.
texensis, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 189.—Texas.
trichantha, Dnrand, in Pacif. Rail. Rep. v. t. 9 - venusla.
trichantha, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 146.—Calif.
triphylla, W. L. E. Schmidt, Diss. t. 1 = tenuifolia.
uliginosa, W. L. E. Schmidt, 1. c 27 = E. Elodes.
uliginosa, Waldst. *Sc* Kit. PL Rar. Hung. iii. t 258 = linarifolia.
uniflora, Hook. *Sc* Am. in Hook. Jonm. Bot. i. **(1834)** 285 — Zygostigma uniflorum.
rariabilis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. ir. (1853) 50 - ramosissima.
venusta, *A. Gray, in Bot. Calif, i.* 479.—Calif,
virescens, *Willd. ex Steud. Nom.* ed. II. L 596.—Crete,
viridensis, *C. Bolle, in Bonplandia,* ix. 1,1861) *11*.—Ins. Cap. Verd.
vulgaris, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 337 = E. Centanrium.

ERYTHRANTHE, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 812 (1840)=Minralus, Linn. (Scrophularin.).
cardinalis, Spach, 1. c. 818 = M. cardinalis.

ERYTHRANTHUS, Oerst ex Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 216, nomen; et in Vidensk. Selsk. -Skr. V. v. (1861) 120 (Gesn. Centr. Am. 46. t. **8) - Allo**pleotua, Mart. (Gesner.).
coriaceus, Oerst U. cc. 215,120 = A. coriaceus.

ERYTHREMIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841)446=**Lygodesmia,** D. Don (Compos.).
aphylla, Nutt. 1. c. 446 = 1. aphylla.
grandiflora, Nutt. 1. c. 445-L. grandiflora.

ERYTHBINA, Linn. Gen. ed. I. 216 (1787).
LEGUM1NOSAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 531.
CHIROCALYX, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 97.
CORAIXODENDRON, Tourn. ex Rupp. Fl. Jen. ed. HalL 257 (1745).
DuCHASSAlNGlA.Walp. in Linnaea, xxiii. (1850)741.
HYPAPHORUS, Hassk. Hort. Bogor. Desc 197 (1858).
MACKOCYMBIUM, Walp. in Flora, xxxvi. (1858) 149.
MICROPTERYX, Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 789.
MOURICOU, Adans. Fam. ii. 326 (1763).
STENOTROPIS, Hassk. Retzia, i. 188 (1855).
XYPHANTHUS, Rafin. FL Ludov. 103 (1817).
abyssinica, *Lam. Encyc.* ii. 892.—Abyss,
acanthocarpa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 151.—Aft. anstr.
acanthophora, Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 609, sphalm. = praec.
aculeatissima, *Desf. Tabl.* ed. 1.191, nomen.—Hab. J
alba, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 281=suberosa.
Amasisa, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 202. —Peruv.
americana, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5=camea.
arborescens, *Roxb. Hort. Beng.* 53; *Ft. Ind.* iii. 286.—Reg. Himal.
argentea, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 207-ovalifolia.
Bidmlliix, Lindl. Bot. Reg. (1847) r. 9.
biloba, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1856) 2 1 - Vespertilio.
bisetosa, *Griff. Notul.* iv. 441.—Burma,
bracteata, *Presl, Symb. Bot.* i. 70.—Am. austr.
brcviflora, *if of. &* Sesse, ex DC. Prod.* ii. 413.—Mexic.
Brncei, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 653.—Afr. trap.
caffra, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 394-ovalifolia.
caffra, Ker-Gawl. in Bot. **Reg.** t. 796 > Humeana.

EBYTHBINA:—
caffra, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 121.—Afr. anstr.
carnea, Blanco, FL Filip. ed. I. 564 - indict,
camea, *{Dryand. in] Ait. Hort. Kev.* ed. I. iii. 8.— Am. austr.
compacta, Bull, Cat. (1871) 4 ; Rev. Hortic. (1882) 848 = E.Crista-galli?
corallifera, Salisb. Prod. 335 =E. Corallodendron.
Corallodendron, Herb. Madr. ex WalL Cat. n. 5959 = suberosa.
Corallodendron, Lam. Encyc. ii. 390-indica.
Corallodendron, *Linn. Sp. PI.* 706:—Am. bor.; Ind. occ.
Corallodendron,Loui. Fl. Cochinch. ii. 427^Looreirii.
coralloides, *Mof. & Sesse, ex DC. Prod.* ii. 413.— Mexic.
cordifolia, Jnss. ex DC. I. c. 414=Rudolphiavolubilis.
Crista-galli, *Linn. Mant.* i. 99.—Bras,
cnbensis, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 26.—Cuba.
cuneata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5967 = indica.
divaricate, *Mof. tf Sesse, ex DC. Prod.* ii. **414.—**Mexic.
eimeandra, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 109.—Hab.!
erythrostachia, *Morr. in Ann. Soc. Gand,* v. (1849) 457—Hab.T
excelsa, *Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 183.—Afr. trop.
falcata, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 172.—Bras.
fasciculata, Benth. in Linnaea, xxii. (1849) 518 - E. Crista-galli.
fissa, *Presl, Symb. Bot.* i. 69.—Hab. ?
fulgens, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 120, nomen.—Ind. or.
fusca, *Lour. Fl. Cochinch.* 427.—Cochinch.
glanca, *Willd. in Ges. Naturf. Freunde Neue Schr.* iii. (1801) 428.—Venezuela.
Graefferi, Tineo, Cat. PL Hort. Panorm. (1827) 278 = speciosa.
guineensis, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 371-srnegalensia.
Hamiltoniana, Stend. Nom. ed. II. i. 596 — snberosa.
hastifblia, Bertol. f. in Mem. Ace. Sc. Bolog. ii. (1850) 568 = Humeana.
hederarfolia, Spreng. Syst. iii. 244 "herbacea.
herbacea. *Linn. Sp. PI.* 706.—Am. bor.; Ind. occ.
holosericea, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiii. (187S) H. 69.—Burma.
horrida, *Mof. tf Sesse, ex DC. Prod.* ii. 413.—Mexic.
huillensis, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 188.—Afr. trop.
Humeana, *Spreng. Syst.* iii. 243.—Afr. austr.
Humei, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 150=praec.
humilis, Salisb. Prod. 836=herbacea.
incana, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 50, nomen. —Am. austr.
indica, *Lam. Encyc* ii. 891.—As. trop. „• Austral.
indica, Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. liul. iii. (1848) 61-lobulata.
inermis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 760.—Guinn.
inermis, Mill. Gard. Diet ed VIII. n. 6-mitis.
insignis, *Tod. Nuovi Gen. e Sp.* 66.—Hab. ?
isopetala.lam. Encyc. ii. 392=Camptosema erythrin. oides.
***eti,Dehnh. Cat.PI.Hort. Camald.* ed. II. 2O.-Hib.?**
latifdia, Schnm. *Sc* Thonn. Bcskr. Guin. PL 333. senegalensis.
latissima, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 151=tontntosa.
laurifolia, Jac<]. Obs. Bot. iii. 1 •• = E. Crista-galli.
leptorrhiza, *Mof. VSesse, ex DC. Prod.* ii. 413.—Mexic.
lithosperma, *Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 209.— Burma; Malaya.
Livingstoniana, *Baker, in Oliver, FL Trop. Afr.* ii. 182.—Afr. trop.
lobulata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 208.—Java,
longipes, *Mof. (f Sesse, ex DC. Prod.* ii. 418.—Mexic.
Loureirii, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 872.—Cochinch.
macrophylla, *DC. Prod.* ii. 411.—Hab. *1*
marmorata, *Veitch, ex Planch, in Fl. des Serres,* xxiii. (1880)21.—Hab.?
maxima, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 261 = suberosa.
mediterranea, *Veil. Fl. Flum.* 305 ; vii. t. 103 Bras.
micropteryx, *Poepp. ex Walp. in Linnaea,* xxiii. (1850) 740.—Pernv.
mitis, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 47. t. 216.—Venezuela,
monosperma, *Gaudieh. in Freyc. Voy. Bot.* ISO. t. 114, —Ins. Sandvic.
monosperma, Lam. Encyc. Ii. 391-Butea frondosa.
Moori, *Tod. Hort'. Bot. Panorm.* ii. 7. t. 26.—Ind. or. ?
Mulungn, *Mart, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. 1. 173.—Bras.

EBYTHBINA:—
JVaAa»<*a,Buch.-Ham.ex Wall. Cat. n. 596G=suberosa.
nerrosa, *DC. Prod.* ii. 113.—Bras.
orientals, Murr. in Comm. Gotting. viii. (1787) 35. t. 1—indica.
ovalifolia, *Roxb. Hart. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 254.—Ind. or.; Malaya.
ovalis, *Wall, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 596.—Ind. or.
panduraeformis, Blumc, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 209
Faicellii, *Hort. •Bull, in Gard. Ckrtm.* (1874) II. 392. *i.* 82.—Ins. Pacif.
patens, *Moç.* b* *Sesse, ex DC. Prod.* ii. 411.—Mexic
pelligera, Feozl, in Flora, xxvii. (1844) 812<=tomentosa.
picta, Linn. Sp. PI. ed. II. 993 = indica?
picta, Wall. Cat. n. 5»60 = ovalifolia.
piscidioides, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 120; DC. Prod. ii. 114-«eq.l
Piscipula, Linn. Sp. PI. 707 = Piscidia Erythrina.
planisiliqua, Linn. Syst. ed. X. 1156 = Rudolphia peltata.
poianthes, *Brot. in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1824) 342.—Am. austr.
polysperma, Pritz. Ic. Ind. i. 436, sphalm.—monosperma.
portoricensis, Desf. Tabl. ed. I. 191 - Rudolphia volubilis.
Princeps, *A. Dietr. in Otto* b[1] *Dietr. Allg. Garten, ii.** (1881) 305.—Mexic.
pulcherrima, *Tod. Nuovi Gen. e Sp.* 70.—Hab. ?
Raja, Mdssn. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1843) 96 =-Humeana.
reniformis, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5968-suberosa.
resupinata, Mor. Syst. Verz. Zoll. l = Iobnlata.
resupinata, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 267.—Ind. or.
reticulata, *Prtsl, Symb. Bot.* ii. 22. t. 68.—Mexic.
rosen, *A. Dietr. in Otto* b* *Dietr. Allg. Garten, ii.** (1831) 263.—Mexic.
rubicunda, *Jacq. Fragm.* 75.—Hab.!
rubrinervia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 131.—N. Granat.
Sandersoni, Harv. Thes. Cap. i. 89 = tomentosa.
secondiflora, *Brot. in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1821) 846.1.12.—Bras.
secundiflora, Hassk. PI. Jav. Rar. 378=lithosperma.
senegalensis, *DC. Prod.* ii. 413.—Afr.trop.
senegalensis, A- Rich. Tent Fl. Abyss, i. 213 = Brucei.
setosa, *Mart,* b" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1848) 194.—Mexic.
spathacea, *DC. Prod.* ii. 412.—Ins. S. Doming.
spatkacea, Wall. Cat n. 5965-indica.
speciosa, *Andr. Bot. Rep.* t. 443.—Ind. occ.
speciosa. Tod. Ind. Sent. Hort. Panorm. (1860) 11 = E. Crista-galli.
spinosa, MU1. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3-E. Corallodendron.
spinosa, *Voigt, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 56.—Hab. ?
stricta, *Roxb. Hort. Beng.* 63; *Fl. Ind.* iii. 251.— Ind. or.
suberifera, *Welv. ex Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 183.—Afr. trop.
suberosa, *Roxb. Hort. Beng.* 53; *Fl. Ind.* iii. 253.— Ind. or.
sublobata, Roxb. 11. cc. [98], 254 = snberosa.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 804.—Malaya,
tahitensie, • *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 80.—Ins. Tahiti,
tomentosa, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. 65, nomen; *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 213.—Abyss.
tomentosa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5964 = suberosa.
triacantha, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 50, nomen.—Hab. ?
umbrosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 484.—Am. anstr.
variegata, Linn. Diss. Herb. Amb. in Amoen. Acad. iv. 122 - indica.
velutina, Jacq. Hort. Schoenb. iv. t 466—enneandra.
velutina, *Willd. in Ges. Naturf. Freunde Neue Schr.* iii. (1801) 426.—Venezuela,
verna. *Veil. Fl. Flum.* 304; vii. 1.102.—Bras,
versicolor, *Boj. Hort. Maurit.* 110, nomen.—Madag.
Vsspertilio, *Bentk. in Mitch. Vmrn. Trop. Austral.* 218.—Austral.

EBYTHRINA:—
viarnm, *Tod. Nuovi Gen. e Sp.* 62.—Hab. ?
Vogelii, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 307-senegalcnsis.
Zeyheri, *Harv. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 233.— Afr. austr.

ERYTHROCARPUS, Blume, Bijdr. 604 (1825) -**Gtelonium**, Roxb. (Enphorb.).
glomerulatus, Blume, 1. c. 605=G. bifarinm.
spicatus, Blume, 1. c. = G. spicatum.

ERYTHROCARPUS, M. Roem. Syn. Pepon. 204 (1846) = Modecca, Lam. (Passiflor.).
populifolius, M. Roem. 1. a—M. populifolia.

EBYTHROCEPHAXUM, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 188 (1878). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
longifolium, *Benth. ex Oliver, in Trans. Soc. Linn.* xxix. (1873) 102.—Afr. trop.
minus, *Oliver, 1. c.* 103.—Afr. trop.
nutans, *Benth. ex Oliver, 1. c.* 102.—Afr. trop.
zambesianum, *Oliver tSHiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 441.—Afr. trop.

ERYTHROCHAETE, Sieb. & Zucc in Abh. Acad. Muench. iv. HI. (1846) 188 (Fam. Nat. Fl. Jap. ii 64) -**Senedo,** Tourn. (Compos.).
dentata, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1868-59) 395 isp. dub.).—Japon.
palmatifida, Sieb. *8c* Zucc. in Abh. Acad. Muench. iv. III. (1846) 188 = S. japoniens.

ERYTHROCHILUS, Reinw. ex Flora, viii (1825) I. 108 = Claoxylon, A. Juss. (Euphorbiac.).
indicus, Reinw. 1. c. 615-C. indicum.
longifalius, Blume, Bijdr. 616=C. longifolium.
minor, Blume, 1. c - C. indicum.
mollis, Blume, 1. c. 615 = C. indicum.
tnultifiorus, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 349.—Ins. Timor.

ERYTHROCHITON, Griff, in Proc. Linn. Soc. i. (1816) 282-TernBtroemia, Linn.
Wallichianum, Griff. I. c. = T. penangiana.

EBYTHBOCHITON, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 151, 165. *RUTACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 284.
PENTAMORPHA, Scheidw. in Bull. Acad. Brux. ix. I. (1842) 20.
TOXOSIFHON, Baill. Adanaonia, x. (1872) 311.
brasiliensis, *Nees* b" *Mart. 1. c.* 170. t. 25.—Bros,
hypophyllanthus, *Planch,* b[1] *Linden, in Ann. Sc.* *Nat.* Ser. III. xix. (1853) 76.—N. Granat.
Lindeni, *Planch. V Linden, Hort. Lind.* 25. t. 13; *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 166.—Mexic.
macrophyllum, Malcoy, ex Hook. Bot. Mag. t. 4948 = Cusparia microphylla.

ERYTHROCHYLUS, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 110, nomen (1828) - ERYTHOCHILUS, Reinw.-**Claoxylon,** A. Juss. (Euphorbiac.) (1844).

EBYTHROCOCCA, Benth. in Hook. Niger Fl. 606 (1849). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 308.
aculeata, *Benth. I.* c—Afr. trop.

ERYTHRODANUM, Thou. Fl. Tristan d'Acugn. 11 (1811)=Mertera, Banks & Soland. (Rubiac.).
alsinaeforme, Thou. L c. 42 = N. depressa.
majus, Thou. L c. 1.11=N. depressa.

ERYTHRODES. Blume, Bijdr. 410. t 72 (1825)-Physurus, Rich. (Orchid.).
latifolia, Blume, 1. c. 411 = P. latifoliug.

ERYTHROGYNE, Vis. in Gasp. Riceroh. Caprif. e Fie. 86 (1845) = PIOUS, Tourn. (Urticac).
lutescens, Vis. 1. c. = F. diversifolius.

ERYTHROLAENA, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. 1.184 (1825) = Cnlcufl, Linn. (Compos.).
conspicua, Sweet, I. c.=C. conspicuus.

EBYTHBOMTOM, Linn. Syst. ed. I (1785). *LIU A CEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 819.
DENS-CANIS, Toum. ex Kupp. Fl. Jen. ed. Hall. 197 (1745).
MITHRYDATIUM, Adans. Fam. ii. 48 (1763).
albidum, *Nutt. Gen. Am.* i. 223.—Am. bor.
altaicum, Bess, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 297 = E. Dens-canis.
americanum, *Ker-Gawl. in Sims, Bot. Mag.* t 1118.— Am. bor.
angustatum, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. v. (1808) 354 = E. Dens-canis.
aquatile, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 331 = americanum.
aureum, Hort. Angl. ex Loisel. Herb. Amat. i. snb t. 61; Link, Enuin. Hort Berol. i 323—americanum.
bifidum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. B97 = E. Denscanis.
bracteatum, Bigel. in Beck, Bot. 365-albidum.
bulbosum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 70 = E. Dens-canis.
caninum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 113-E. Denscanis.
carolinianum, Walt Fl. Carol. 122 = americanum.
Dens-canis, *Linn. Sp. PI.* 805.—Enrop.; As. bor.
Dens-canis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 198-americanum.
flavescens, Loisel. Herb. Amat. i. 51—americanum.
flavum, Sm. in Rees, Cyclop, xiii. n. 2 = americanum.
giganteum, Lindl. Bot. Reg. 1.1786—grandiRorum.
grandiflorum, Benth. PI. Hartw. 339 = Hartwegi.
grandiflorum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 231.—Am. bor. occ.
Hartwegi, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (187«) 261.—Am. bor. occ.
indicum, Rottl. ex Spreng. Syst. ii. 97 = Scilla indica.
japonicum, Poit in Rev. Hort. Ser. IV. iii. (1854) 284-grandiflornm.
lanceolatum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 230=americanum.
lati/olium, Schur, Enum. PI. Transs. 663 - E. Denscanis.
longifolium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2»E-Denscanis.
maculatum, DC. Fl. Fr. iii. 197-E. Dens-canis.
maculosum, Lam. Fl. Kr. iii. 286-E. Dens-canis.
maximum, Dougl. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xK (1874) 298-grandiflorum.
Nuttallianum, Schult f. Syst. vii. 1681 - am"canum.
obtusifiorum, Opiz, Seznam, 42—E. Dens-canis T
ovatifolium, Poir. Encyc. viii. 660-E. Dens-canis.
propullans, *A. Gray, in Am. Natural,* v. (1871) 80"-t. 74.—Am. bor.
purpurascens, A *Wats, in Proc. Am. Acad.* xil. (187') 277.—Calif.
revolutum, Baker, in Gard. Chron. (1876) I. 138 = purpurascens.
revolutum, Sm. in Rees, Cyclop, xiii. n. 3-grandiflornm.
speciosum, Nutt ex Baker, in Jonra. Linn. Soc. *(1874) 298-grandiflorum.
vernale, Salisb. Prod. 288 - E. Dens-canis.

ERYTHROPALLA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt W[1] (1841) - Erythropalum, Blume (Olacin.).

ERYTHBOPAIiUM, Blume, Bijdr. 921 (1826).
OLACINEAE, Benth. & Hook. f. i. 347.
BALINGAYUM, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.187 (1837).
DACTYLIUM, Griff, in Proc. Linn. Soc ii. (1853) 25.*
DECASTROPHIA, Griff. Notul. iv. 737 (1854): to Asiat tt. 613, 614.
ERYTHROROPALUM, Blume, FL Jav. praeE P> (1828).
MACKAYA, Am. in Jard. Mag. Zool. & Bot (1838) 550.
MODECCOPSIS, Griff, in Proc. Linn. Soc. i. *0-*171
populifoiium, *Mast, in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* «•578>
^—Ind. or.
scandens, *Blume, Bijdr.* 922.—Reg. Himal.; Mal ya.
vagum, *Mast, in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* i. 678.— Himal. j Malaya.

ERYTHROPHILA, Am. in Hook. Jonm. Bot. (1841) **268, sphalm.-BrytlirophyBB, E. Mey. (Sap**

ERYTHROPHLAEUM, Reichh_ Cons P- W (1828)~ seq.

ERYTHROPHLEUM, Afcel. ex R. Br. in Tuckey, Congo, 430 (1818). LBGVAImoSAB> ***• * Hook. f. i. 588.

FILLAEA, oniU_ * P « - n. Seneg. Tent. i. 242. t. 55 (1830).

LABOUC ERIA, F_ Mne11_ in J°°m_ **»»• Soc iii. (1.ODK) 158.

MAVIA Bertotf, in Mem„AcCp Bolo6, „ (1850) 570. t w.

chlorostachys, Baill. Hist. PI. iL 150-Uboucherii.

Commingo, Bat ". Afa*sonia,* x. (1871) 105.—Madag.

Fordii, Oliver, in Hook. Ic_ « t. 14O9.-China.

guineense, jF' a' ' ' G** $ * • "• 424.—Afr. trap,

judiciale Procter> "» * " • Jo<™. Pharm. xviii. (1852)

**bouchera, /?. *Muell. ex Btnth. Fl. Austral,* ii. 297. "-Austral.

ordal an- '1 Bolle « in Petos> * « * Mossamb. Bot. i. 10 = gnmeense.

^ ^ f HBOPHY8A, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 188 £?*»>,• « « Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 287 (1860).

J^WDACEAE.Bea&.Sc Hook. f. i. 897.

Mada*' 5<2,W> ***"**+ «• (W78-76) 289.-g.

, *E. M* * ' ' - *Zwei b* c u m _ 1 8 S : *et ex Harv. Sond. Fl.* Capt u 288.—Afr. austr.

ER hS IR 2 POGON, DC_ P"*1_ •*• 2M 0887)-**Heta-***imbricatum*. DC L c. 255 = M. uniflora.

umbellatum, DC. 1. c. = M. nmbellata.

ER VT m HR0PSIS, Lindl_ in Bnind_ J0™"- Sc. (Sept. 1827) 12.raobs.=Sterculia,Linn.

Koxbur ehiana, Schott& Endl. Melet. S3=S. alata.

ER FIRORCHIS> Rlnme Rnmphia, i. 200. t. 70 (183S) I ? ^ 1 ^ , Lonr_ (Orchid.).

alt...ma,* Blume 1. c. = G. altissima.

aphylla, F. Muell. Fnem_ "• 167=G, cassythoides.

foliata, F. M e b ... uwL Uc> „ G foliata.

Kuhlii > Reichb. f. Xenia Orch. ii. 78 - G . Knhlii.

ER H nI « R0RH1ZA > Mi<**. n- Bor. Am. ii. 84. t. 86

"'-'•lta, Michx. 1. c. 35 = G. aphylla.

ERYTHROSPERMUM. Lam. Tabl. Encyc. ii. 407. t. 274 -1791 *BIXINBAE,* Benth. & Hook. f. i. 127.

PEC 5) Glle rtn. Fruct. ii. 186. t. 111. f. 3 (1791).

ample ?/ ule DC_ PIM"1_ '• 258 = verticillatum.

ame... 1S?-{ m> Thon_ y ee- Hes Anstr. Afr. t. 21. £ 2 = 'erhallatnm.

co J ^ i «'- •'» ^4n». 5& ATar. Ser. V. ix. (1868) Madar

cunei folium> B" J- Hort- *Maurit.* 19.—Ins. Maurit.

ellipticum, Poir_ ^eyc- ^PP1- "• 585=verticilUtnm.

erythroxyloides Bcj. H°rt. Ma»rit. 19=verticillatum.

lanceol W ..... So_ '_ '• '--Ins- Manrit

2M prw> Clos_ ta Ann_ s=_ Nat- S«. IV. ™L (1887) um.

lea...arpum, Clos, l. c. = DenhamU obscnra.

lo W « % w , Boj. Hort. Manrit. 19-verticillatum.

macrophy "Um, Poir" Encyc- SuppL "" 586=lrertici|_ Utnm,

mauritanum' Baker. PL M«nrit ll=verticillatum.

monticol w> Thon_ V^S- "e* Austr_ Afr- 67 = verticillatum.

paniculatum, Poir, Encyc. Supp. L ii- 585=TetriU-

pauciflorum, Thou. Veg. Iles Austr. Afr. t. 21. f. 1 = verticillatum

phytolacco des,' *Gardn. in Cole. Jaurn. Nat. Hist.* vii. (1847) *51 —Zeylan.

polyandru Samoa. Ill oll'er, ff* »» / W L 1888Ins

polymor " w ' Clos, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. viii. (W 7; 258-vertidllatum.

pyr tCh Um_ Tabl- Encyc- »' 407-verticillatum.

ver "eilUtum, *Um. I. c.-ltL* Mascar.

ER KTH R?ST APHYLE, Hance, in Joura. Bot. xi. (1873) 266=lodes, Blume (Olacin.).

vitiginea. Hance, 1. c. = I. vitiginea.

ERYTHROSTEMON, Klotzsch, in Link, Klotzsch, *Sc* Otto, Ic. PI. i. 97. t. 39 (1841) = CaeaaIpinla, Linn. (Legumin.).

Gilliesii, Klotzsch, 1. c 98=C. Gilliesii.

ERYTHROSTICTUS, Sehlecht. in Linnaea, i. (1826) 90 - Androcymbium, Willd. (Liliac).

europaeus, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 69=A. punctatum.

gramineus, Schtecht. in Linnaea, L (1826) 90-A. punctatum.

palestinus, Boiss. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvii (1879) 445-A. palaestinnm.

punctatus, Sehlecht. in Linnaea, i. (1826) 90-A. pQDCfttlini•

ERYTHROSTIGMA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 45 = Connaru8, Linn.

diversifolia, Hassk. I. c.—Malaya.

ellipticum, Zoll. in Tijdschr. NederL Ind. xiv. (1857) 174.—Malaya.

macrophyllum, Zoll. I. c.—Malaya.

obliquum, Zoll. 1. c—Malaya.

millosum, Zoll. 1. c. 175.—Malaya.

ERYTHROTIS. Hook. f. Bot. Mag. t. 6150 (1876) = Cyanotds, D. Don (Commelin.).

Beddomei, Hook. f. 1. c.=C. kewensis.

ERYTHROXYLON, Linn. Syst. ed. X. 1035 (175»)- seq.

EBYTHROXYIiTJM, P. Br. Hist. Jamaic. 278 (1756). *L/NEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 244.

ROELANA, Comm. ex DC. Prod. i. 575 (1824).

SETHIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 175 (1821).

STEUDELIA, Spreng. Neue Entdeck. iii. 59 (1822).

aenminatum, Ruis V Pav. Fl. Per. iv. t. 399.—Peruv.

acuminatum, Walp. Rep. i. 407=lucidum, *Moon.*

acutifolium, *Steud. ex Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. l. 166.—Bras.

affine, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 258-obovatum.

affine, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 97 = Kunthianum, *A. St. Hil.*

alatcmifolium, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 256.—Cuba,

amazonicum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.167.—Bras.

ambignum,/V)>r. *in Mart.Fl. Bras.* xii. 1.142.—Bras,

americanum, *Fisch. ex Steud. Norn.* ed. I. 319, nomen. —Hab.J

amplum, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* ii. (1843) 372.—Bras,

angirifugum, *Mart, in Flora,* xxi. (1888) II. *Beibl.* 84. —Bras.

areolatum, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 186, in nota = Bumelia ferox.

areolatum, *Linn. Syst.* ed. X. 10S5.—Ind. occ.

areolatum, Poepp. ex Griseb. Fl. Brit. W. lad. 113 = obtusum.

areolatum, Veil. Fl. Flum. 194; iv. t. 175 = snberosum.

aristigerum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.157.—Bras,

australe, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. (1859) 22.—Austral.

bahiense, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 160.—Bras,

betulaceum, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 339.—Am. austr.

Bongardianum, *Meyer, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 145.—Bras.

brevipedatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 125 = brevipes.

brevipes, *DC. Prod.* i. 578.—Ind. occ.

burmanicum, *Griff. Notul.* iv. 468.—Burma; Malaya,

buxifolium, *Lam. Encyc.* ii. 894.—Madag.

Buxus, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.187.—Bras.

eaffrum, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850; 22-emarginatum?

campestre, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 97.—Bras.

carthagenense, Jacq. Enum. PI. Carib. 21-areolatnm.

cassinoides, *Planch. V Linden, ex Triana if Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xviii. (1882) 340.—N. Granat.

eatanctarum. *Spruce, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xiL I. 149.—Bras,

cindnnatum, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 867.—Bras,

citrifolium, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 94.—Bras.

EKYTHROXTIiTJK :—

Coca, *Lam. Encyc.* ii. 398.—Peruv.

coelophlebinm, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 396.—Bras,

columbinum, *Mart. I. c.* 879.—Bras,

compressum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 163.—Bras.

concinnatum, Pritz. Ic. Ind. i. 436, err. typ. =cincinnatum.

cornutum, Steud. ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xii. 1.174 -mucronatum.

• *cotinifolium,* A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 98 = campestrc.

cumanense, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 177.—Venezuela.

cuneatum, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlili. (1874) II. 135 - burmanicum.

cuspidifolium, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 359.—Bras.

Daphnites, *Mart. 1. c.* 863.—Bras.

dedduum, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 95=nitidum.

discolor, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 184.-Madag.

distortnm, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 346.— Bras,

divaricatum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 146.—Bras,

ectinocalyx, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. it. (1840) 355.—Bras,

ellipticum, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 284.—Austral,

ellipticum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 145.—Bras,

emarginatum, *Thonn. in Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 224.—Afr. trop.

eugenifolium. Mart, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 150 = Kunthianum, *A. St. Hil.*

exaltatum, *Bong, ex Peyr. I. c.* 161.—Bras,

ferrugineum, *Cav. Diss.* 404.—Madag..

ficifolium, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xiL I. 169.—Bras.

fimbriatum, *Peyr. 1. c.* 162.—Bras,

firmum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xxi. (1884) 327. —Madag.

flaeddum, *Salim. ex Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 141.—Bras,

floribundum, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 898.—Bras.

floribundum. Seem. Bot. Voy. Herald, 90-macrophyllum.

frangulaefolium, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iL 99.—Bras.

Gaudichaudii, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 169.—Bras.

Gerrardi, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 109. —Madag.

glaucocladum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.164.—Bras.

gomphioides. *Planch,* to" *Linden, ex Triana* 6* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xviii. (1862) 841.—N. Granat.

gracilipes, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 169.—Bras,

grandifolium, *Peyr. I. c.* 161.—Bras.

Grisebachii, *Peyr. I. c.*—Bras.

havanense, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. v. 177 - obtusum.

havanense, Jacq. Enum. PI. Carib. 21 = ovatum.

havanense, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 267 - squamatum.

hondense, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 176.—N. Granat.

hypericifolium, *Lam. Encyc.* ii. 394.—Ins. Mascar.

indicum, Bedd. Fl. Sylvat. t. 81-monogynum.

intermedium, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.151.—Bras.

jossinioides, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 184.—Madag.

Kapplerianum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 159.—Bras.

Kunthianum, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xii (1872) II. 294.—Ind. or.; Burma.

Kunthianum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 96.—Bras.

lanceolatum, *Walp. Rep.* i. 407.—Ind. or.

laneeum, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviU. (184!) 185.—Ins. Comoro,

lancifolium, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 144.—Bras,

laurifolium. *Lam. Encyc.* iL 394__Ins. Mascar.

EEYTHEOXYLDM :—

laurinum. *Planch. V Triana, in' Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862)341.—N. Granat.
ligustrimim, *DC. Prod.* i. 574.—Guiana.
lineolattim, *DC. I. c.* 575.—Guiana.
longifolium. Lam. Encyc. ii. 394 = laurifolium.
lucidum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 179.—N. Granat.
lucidam, *Moon, Cat. PI. Ceyl.* 36.—Zeylan.
macrocalyx, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 384.—Bras,
macrochaetum, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 708.—Bras,
macrocnemium, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 402.—Peruv.
macrophyllum, *Cav. Diss.* 401. t. 227.—Guiana.
macrophyllum, Mart, in Abh. Akad. Muench. iii. II. (1840) 369<=Martii.
magnoliaefolium, *A. St. Hit. Ft. Bras. Mer.* ii. 93; *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 400.—Bras.
Mamacova, *Mart. 1. c.* 365.—Peruv.
Manglilla, Poepp. ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 165«* citrifolium.
Mannii, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 274.—Afr. trop.
Martii, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 160.—Bras.
mauritianum, Rottl. ex Wall. Cat. n. 6851—laurifolium.
mexicanum, *H. B.* b- *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 178.—Mexic.
micranthum. *Bong, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 164.—Bras,
microphyllum, *A. St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 100.—Bras.
Mikanii, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 138.—Bras,
minutifolium, *Griseb. Cat. Fl. Cub.* 41.—Cuba,
monogynum, *Roxb. PI. Coram.* i. 61. t. 88.—Ind. or.; China,
mucronatum, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bat.* ii. (1843) 872.—Guiana.
Myrsinites, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 345.—Bras,
myrtoides, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 185.—Madag.
nanum, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 97 -nitidum.
nitidulum. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 110.—Madag.
nitidum, *Spreng. Syst.* ii. 390.—Bras.
Nummularia, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 13S.—Bras.
obovatum, *Mac fad. Fl. Jamaic.* i. 143.—Jamaic
obtusifolinm, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 415.—Zeylan.
obtusum, *DC. Prod.* i. 574.—Cuba,
ochranthum, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 371.—Bras,
orinocense, *H.* y*. b* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 178.—Venezuela,
ovalifolium, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 135.—Bras.
ovatum, *Cav. Diss.* 404. t. 233.—Ind. occ
panamense, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 58L—Panama.
paraënse, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 164.—Bras,
paivistipulatum, *Peyr. 1. c.* 186.—Bras,
passerinum, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 386.—Bras.
PeUeterianum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 100.1.102.—Bras,
peruvianum, *Mitchel.* b* *Pascal, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 598.—Peruv.
petiolatum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 153.—Bras,
pictum, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 183, nomen ; *Han.* b" *Sond. Fl. Cap.* i. 234.—Afr. anstr.
platyclados, *Boj. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 186.—Madag.
polygonoides, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 360.—Bras,
popayanense, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 179.—N. Granat.
pulchmm, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 94.—Bras,
pyrifolium, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 109.—Madag.
retusum, Bauer, ex Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxix. (1867) 254 = burmanicum.
revolutum, *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840)851.—Bras,
rigululum, *DC. Prod.* i. 575.—N. Granat.

ERYTHHOXYIitTM :—

Roraimae, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui. 1096-rufum.
rufum, *Cav. Diss.* 404. t 232.—Ind. occ.
Ruizii, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 152.—Bras.
Schomburgkii, *Peyr. I. c.* 148.—Bras.
sempervirens, Salzm. ex Peyr. 1. c. 154 *= passerinum.
sideroxyloides, Lam. Encyc. ii. 398 = laurifolium.
sideroxyloides, Roxb. Fl. Ind. ii. 449 = monogynum *1*
spinescens, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 255.—Cuba.
Spruceannm, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 160.—Bras,
squamatum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 75 ; *Vahl, Symb. Bot.* iii. 60. t. 63.—Guiana,
strobilaceum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. 140.—Bras,
subcordatum, *Bert, ex DC. Prod.* i. 575.—Ins. S. Doming.
suberosum, *A. St. Hil. PI. Us. Bras.* t. 69.—Bras.
subglaucescens, Mart, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 144—virgultosum.
subracemosum, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 390.—Bras.
subrotundum, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 99.—Bras.
sumatranum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 512 = burmanicum.
surinamense, *Miq. in Hoev.* b" *De Vriese, Tijdschr.* x. (1843) 86.—Guiana.
testaceum, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 170.—Bras,
tortuosum. *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 399.—Bras,
utile, *Said, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xix. (1874) 212.—Bras,
vaccinifoliam. *Mart, in Abh. Akad. Muench.* iii. II. (1840) 387.—Bras,
virgultosum, *Mart. 1. c.* 389.—Bras.
Warmingii, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 140.—Bras.

ERYTROCHILUS, Blnmé, Bijdr, 614 (1826) = ERYTHROCHILUS, Reinw. - Claoxylon, A. Juss. (Euphorb.).

ERYTROCHITON, [Schlecht. in] Bot. Zeit. iv. (1846) 656 = ERYTHROCHITON, Grill. - Ternstroemia. Linn.

ERYTRONIUM, Scop. Fl. Cam. ed. I. 285 (1780) = Brythroniusa, Linn. (Liliac).

EBCAIiLONIA, Mutis, ex Linn. f. Suppl. 21 (1781).
SAXIFRAGEAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 644.
STEREOXYLOH, Ruiz & Fav. Prod. 38. t. 6 (1794).
VIGIERA, Veil. Fl. Flum. ii. t. 73, 74 (1827).
affinis, Rupr. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 664 = revoluta.
alpina, *Poepp.* b* *Endl. Nov. Gen. et Sp.* i. 8.1.13.—fchili.
angustifolia, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-06) 85 = virgata.
angustifolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 47.—Peruv.
araucana, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 690.—Chili,
areuta, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 48. t. 68.—.Chili,
bellidifolia, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 724.—Chili,
berberifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 296.—Ecnador.
Berteriana, DC. Prod. iv. 665 - pulverulenta.
bicolor. Mart, ex Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 566 = chlorophylla.
bifida, Link & Otto, ex Engl. in Mart. FL Bras. xiv. II. 186 = montevidensis.
Callcottiae, *Hook,* b* *Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 342.—Ins. J. Fernand.
Candida, *Lem. yard. Fleur.* iv. (1854) t. 403. *Misc.* 57.—Bras.
canescens, A. St. Hil. in Guill. Arch. Bot. ii. (1883) 227 =* chlorophylla.
caracasana, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 297 = floribunda.
carmelita, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 344-seq.
carmelitana, *Meyen, Reise,* i. 313.—Chili,
chlorophylla, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 642.—Bras.
chonotica, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 690.—Chili.
ciliata, Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 3S9 = Micromyrtus microphylla.

ESCAU.OOTA :-

Claussenii, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 484.—Bras.
commutata, Kegel, Gartenfl. (1857) 159-rubra ?
concinna, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1861) 1. 61; *et in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 86.—Chili,
coquimbensis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 61.—Chili.
corymbosa, *Pers. Syn.* i. 284.—Peruv.
crenulata, Roem. *Sc* Schult. Syst. v. S29 = Baeckea crenulata.
cuneifolia, Roem. & Schult. 1. c. 328= discolor ?
cupularis. Gill, ex Hook. & Am. in Bot. Misc. iii. (1833) 343-illinita.
densa, *Planch,* b* *Linden, Cat.* n. ix. (1864) 3.—N. Granat.
discolor, *Vent. Choix,* 64. t. 54.—N. Granat.
dumetorum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 86.—Chili.
duplicato-serrata, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 58 « macrantha, *Hook. V Am.*
farinacea, *A. St. Hil. in Guill. Arch. Bot.* ii. (1833) 225.—Bras.
farinosa, Steud. Nom. ed. II. i. 698, sphalm. = praec.
fernandenaña, Phil, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 644-Callcottiae.
flavescens, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 48.—Chili; Peruv.
floribunda, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 297.—N. Granat.
floribunda, Reichb. Hort. Bot. t. 202 = montevidensis.
florida, *Poepp.* b" *Endl. Nov. Gen. et Sp.* i. 8. t. 14.—Chili.
Fonki, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 692.—Chili,
glabrata, *Phil. I. c.* xxxiii. (1864-65) 87.—Chili.
glandulosa, Lodd. Bot. Cab. t. 1291-rubra.
glandulosa, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. iv. t. 81 [illegible] ana.
Grahamiana, *Gill, ex Hook. & Am. in Bot. Misc.* iii. (1833) 343.—Chili.
grandiflora, Hort. Berol. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xiv. II. 134 - Claussenii.
hirsuta, *Presl, Bot. Bemerk.* 73.—Chili.
kirta, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 329 - discolor.
humilis, A. St. Hil. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 225 = Claussenii ?
illinita, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 49. t. 59.—Chili,
lencantha, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 53.—Chili,
littoralis, *Phil, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 189.—Chili,
longidens, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 724.—Chili,
macrantha, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* [illegible] (1888) 341.—Ins. Chiloe.
macrantha, *Wedd. CM or. And.* ii. 312.—Peruv.
megapotamica, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 94 = Sellowiana.
Mertensiana, Rupr. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl-Exped. i. 664-illinita.
microcarpa, Gill, ex Hook. & Am. in Bot. Misc. [illegible] (1838) 842-arguta.
millegrana, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 141<—Reg. Argent.
mollis, Phil, in Linnaea. xxviii. (1856) 692 = robra.
montana, *Phil. I. c.* xxxiii. (1864-65) 87.—Chili,
montevidensis, *DC. Prod.* iv. 4.—Reg. Argent.
multiflora, Presl, Rel. Haenk. ii. 48 = resinosa.
myrtilloides, *Linn. f. Suppl.* 156.—N. Granat.
myrtoides, Bert, ex DC. Prod. iv. 665; GilL ex Hook-8c Am. in Bot. Misc. iii. (1833) 342-arguta.
obtusissima, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 91.—Bras,
organensis, *Gardn. in Hook. Ic. PI.* t. 614.—Bras,
paniculata, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 691—Chili.
paniculata, Roem. & Schult. Syst. v. 328 = floribonda.
pendula, *Pers. Syn.* i. 285.—Peruv. ; N. Granat.
Philippiana, Engl. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) S71 >' Mast, in Gard. Chron. (1873) 947 = virgata.
Poeppigiana, DC. Prod. iv. 3 = rubra.
polifolia, *Hook. Ic. PI.* t. 114.—Peruv.
pterocladon, *Hook. Bot. Mag.* t. 4827.—Patagon.
pulverulenta, *Pers. Syn. i.* 235.—Chili.
punctata, DC. Prod. Iv. 3 - macrantha, *Hook.* [illegible] *Arn.*
reflexa, Gill, ex Hook. & Am. in Bot Misc. iii. (1*[3S]) 342=arguta.
resiniflua, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Siipp[1]-i. (1843) 343 = pulverulenta.
resinosa, *Pers. Syn.* i. 235. - Peruv.

ESCALLONIA:-
rnoluta, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 698 - pulverulenta.
revolnta, *Pers. Syn. i.* 235.—Chili.
[illegible] "AJ™1-m Linnaea, xxviii. (1866) 692 (-praee[illegible]).
"-*bra.* Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 698=illinita.
rubra, *Pers. Syn.* ii. 235.—Chili.
rubricaulis, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 79=Callcotrlae.
ynpestris, *Phil, in Linnaea*, xxviii. (1866) 693.—ChiU.
[illegible] *(Sm.* Hort Veitch e3t Miuit- "> G»rf. Chron. (1872) 947 = maeranlha.
Sellowiana, ZJC. *Prod.* iv. 4.—Bras,
serrata, Sw. /c. *Ined.* 2. L 81.—Patagon.
spectabilis Hort. Monac. ex DC. Prod. iv. 4 - montevidensis.
[illegible] th. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xiv. H. 140=pulverulenta.
'hrgoides, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 88 = Sellowiana.
stenopetala Kunie, in Linnaea, xx. (1847) 44=illinita.
stricta, Rem[illegible], « C. Gay, Fl. Chil. iii. 63-virgata.
[illegible] CAV. xiii. 616 j £ A[illegible]
[illegible] xx. (1830) 111.—Chili.
[illegible] S [illegible] *KNwG en. & lp.* ii. 295.—
Tu [illegible]
va bar, Mntis, ex Humb, Tabl. Nat. i. 113=discolor.
[illegible] 87.—Bras.
[illegible] A?!*' *Forbe*[illegible] *Hort. Woburn.* 231, nomen. *(Link. V "tto, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 698).—Chili.

ESCHP[illegible]BACHIA, Moench, Meth. 573 (1794) - [illegible] (Compos.).
amoigua, Moris, Fl. Sard. 372-Erigeron linifolins.
globosa, Moench, Meth. 678=C. aegyptiaca.

ESCHE[illegible]eel. in Flora, xxxii. (1849) 179, in syn. [illegible]. L'HWt. (Gesnerac.).
gloxiniaefolia, Regel, 1. c. = G. macnlata.

ESCHHOLTZIA, Reiehb. Consp. 187 (1828) «seq.

ESCHHOLZIA [illegible] (1820) = seq.

ESCHOLTZIA, Dnm. Anal. Fam. 62 (1829) =seq.

ESCHSCHOLTZIA, Bemh. in Linnaea, viii. (1838) 464 = seq.

ESCHSCHOLTZIA, Cham, in Nees, Hor. Phys. Berol. 73 (1820) *PAPAVERACEAE, Btntii. &* Hook. f. i. 64.
CHRYSBLs, LindL BoL Reg. 1.1677 (1825) et t. 1948 (1829),
OMONOIA Rafin. Fl. Tellur. «92 (1836).
Austina[illegible] *ene, in Bull. Ca[illegible]* n. III. (1885) 6».
Cat[illegible] Californica in Trans. Hort. Soc Ser. II. i. (1836) 408 = californica.
californica «Kees, *Hor. Phys. Berol.* 74.-Calif£
compacta, Steui Nom. ed. H- 598=californica.
crocea, Be[illegible] i? Tlans- Hort„ Soc* Ser- II-1- (1888) 407 = «?!fornica.
Douglasii [illegible] th. Pl. Hartw. 296=californica.
elegans, Greene [illegible] *alif. Acad.* n. IV. (1885) 182.—Calif.
fumariaefolia, Heynh. Nom. 316-Huimemannia fumariaefolia.
[illegible] *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. n. III. Avi[illegible]—Calif.
408–S[illegible] Soc. Ser. II. i. (1835)
[illegible] *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. n. in. (1885)
[illegible] *Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 122.
Pa[illegible] (1885)
[illegible] 68 Csif
pentamularis, [illegible] (1886)
rhombipetala, Hort.—Green[illegible] 71.-Calif.
rosea, Hort.
foraica. Ct Gd> Chron (1888) 1886=cali„
tenuifolia, Benth. in Trans. Hort. Soc. Ser 406 = californica.

ESCHSHOLZIA, DC. Prod. iii. 344-praec.

ESCHWEILERA, Mart, in DC. Prod. iii. 298 (1828) = Lecythia, Linn. (Myrtac).
acuminata, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 272 = L. ovata.
acuminatissima, Miers, 1. c. 278—L. acnminatissima.
albiflora, Miers, 1. c. 268 - L. albiflora.
amara, Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 493 = L* tDrbinata.
augustifolia, Mart, in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 89 - L. angnstifolia.
Blanchetiana, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 255 = L. Blanchetiana.
bracteosa, Miers, L c. 274=L. bracteosa.
comfressa, Miers, 1. c. 248—L. angustifolia.
cordata, Miers, 1. c. 270=L. cordata.
coriacea, Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 491 = L. coriacea.
corrugata, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 258 =L. corrugata.
elegans, Miers, 1. c. 268 = L. elegans.
Fendleriana, Miers, 1. c. 250.—Venezuela.
flaccida, Miers, L c. 264.—Guiana.
gracilis, Miers, I.e. 272 = L. ovata.
grandiflora, Miers, 1. c. 237, sphalm. = seq.
grandifolia, Mart, ex DC. Prod. iii. 293-L. grandifolia.
guanabarica, Miers, in Trans. Linn. Soc xxx. (1874) 251.—Bras.
Idatimon, Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 498 = L. ovata.
idati'monoides, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 252 = L. idatimonoides.
laemfolia, Miers, 1. c. 266 -=L. laevifolia.
laurifolia, Miers, 1. c. 272 = L. ovata.
longipes, Miers, 1. c. 258-L. longipes.
lurida, Miers, 1. c 262.—Bras.
Lusehnatii, Miers, 1. c. 258-Ii Luschnathii.
lutea, Miers, 1. c. 264 = L. lutea.
macrophylla, Miers, 1. c. 263=L. macrophylla.
micrantha, Miers, 1. c. 260 = L. micrantha.
Aforittiana, Miers, 1. c. 271.—Venezuela.
nana, Miers, 1. c. 261 = L. r.ana.
obversa, Miers, L c 267 = L. obversa.
odora, Miers, 1. c. 273 - L. odora.
ovata, Mart, ex Miers, I.e. 257-L. ovata.
pachysepala, Mart, ex Berg, in Mart. Y\. Bras. xiv. I. 494 = L. pachysepala.
pallida, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 267 — Gnian.
paniculata, Miers, 1. c. 265 = L. paniculata.
parviflora, Miers, I.e. 260 = L. parviflora, *Aubl.*
parvtfolia, Mart, ex DC. Prod. iii. 293 - L. parvifolia.
pilosa, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 274 =L. pilosa.
platycarpa, Miers, 1. c. 258 - L. platycarpa.
Riedeliana, Miers, 1. c. 269=L. Riedeliana.
rigida, Miers, L c. 249.—Venezuela.
Sagotiana, Miers, 1. c. 262 = L. parviflora, *Sagot.*
serrulata, Miers, 1. c. 250.—Bras.
Siberiana, Miers, 1. c. 261 = L. Siberiana.
simplex, Miers, 1. c. 264.—Gnian.
subglandulosa, Miers, 1. c. 266—L. subglandulosa.
tenax, Miers, L c. 270 = L. tenax.
tenuifolia. Mien, 1. c. 266=L. tenuifolia.
trochifbrmis, Miers, 1. c. 269.—Bras.
verruculosa, Miers, 1. c. 256-L. verruculosa.

ESCLERONA, Rafin.SylvaTellur.l20(1838)=Aoaeia, Willd. (Legumin.).
montana, Rafin. 1. c - A. xylocarpa.

ESCOBEDIA, Ruiz *8c* Pav. Prod. Fl. Per. 91. t. 18 (1794). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 965.
SILVIA, Veil. Fl. Flum. 55 (1825).
Iaevis, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea*, v. (1830) 108. —Mexic.
linearis, Schlecht. 1. c. viii. (1833) 246-Iaevis.
scabrifolia, *Rui* V Pav. Syst. Veg.* 159.—Am. trop.
Silvia, Steud. Nom. ed. II. i. 698=scabrifolia.
strieta, Zucc. in Flora, xv. (1832) II. Beibl. 100-laevis.

ESCULUS, Linn. Gen. ed. I. 109 (1787)-AesouluB, Linn. (Sapindac).

ESDRA.Salisb. Gen. PL Fragm. 60 (1866) •= Trillium. Linn. (Liliac).
sessilis, Salisb. 1. c - T. sessile.

ESEMBECKIA, Barb.-Rodr. in Rev. Engenh. v. (28 Jul. 1883)=Eaenbeokia, H. B. & K. (Rutac).

ESENBECKIA, Blume, Bijdr. 118 (1825) = Neesia, Blume (Malvac.).
altissima, Blame, 1. c. 119-N. altissima.

ESENBECKIA, H. B. *St* K. Nov. Gen. et Sp. vii. 246. t. 655 (1825). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 299.
COLYTHRUM, Schott, Rutac. 13. t. 7 (1834).
KUALA, Karst & Triana, in Linnaea, xxviii. (1856) 428.
METRODOREA, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 81. t. 16 (1825).
POLEMBRYUM, A. Toss, in Mem. Mus. Par. xii. (1825) 619 (Mem. Rut. 136).
alata, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xiv. (1872) 306.—N. Granat.
attenuata, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 135.—Ins. Trinit.
Berlandieri, *Baill. Adansonia*, x. (1871) 161.—Mexic.
castanocarpa, Griseb. FL Brit. W. Ind. 135=pilocarpoides.
choisyoides, *Schlecht. in Linnaea*, xxvii. (1864) 62». —Hab.?
cornuta, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 148.—Peruv.
fasciculate, *Barb.-Rodr. in Rev. Engenh.* v. (28 Jul. 1883).—Bras,
febrifuga, *A. fuss, in Mim. If us. Par.* xii. (1825) 486, in obs.—Bras.
grandiflora, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 85.—Bras,
intermedia, *Mart. Syst. Mat. Med. Bras.* 39.—Bras.; Chili.
latifolia, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 84 = pnmila.
leiocarpa. *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 145.—Bras.; Chili.
leucophylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 440 = pnmila.
maurioides, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 82«pilocarpoides.
mollis, *Miq. in Linnaea*, xxiii. (1849) 796.—Bras,
pentaphylla, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 135.—Jamaica,
pilocarpoides, *H. B. &* K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 248.—Am. trop.
pumila, *Pohl, PI. Bras.* ii. 44.—Bras.
Riedeliana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 142.—Bras.
Warscewiczii, *Engl. 1. c.* 148.—Peruv.

ESERA, Neck. Elem. ii. 160 (1790) - Droaera, Linn.

ESMARCHIA, Reiehb. Fl. Germ. Excurs. 793 (1832) - Cer&stium, Dill. (Carophyll.).
cerastoides, Reiehb. 1. c. = C. tetrandrum.

ESMERALDA, Reiehb. f. Xenia Orch. ii. 38 (1874) = Araohnanthe, Blume (Orchid.).
Cathcarti, Reiehb. f. 1. c. 39 = A. Cathcarti.
Sanderiana, Reiehb. f. in Gard. Chron. (1882) I. 588 - Vanda Sanderiana.

ESMERALDIA, Fourn. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xiv. (1882) 367. *ASCLEPIADEAE.*
strieta, *Fourn. I. c.* 368.—Venezuela.

ESOPON, Rafin. Fl. Lndov. 149 (1817) = Prenanthes, Linn. (Compos.).
glaucum, Rafin. 1. *c-=P. glauca* (nomen delendum). —Am. bor.

ESPADAEA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 147 (1863). *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1148.
AKMENIASTRUM, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) Misc. 76.
amoena, *A. Rich. I. c.* 148.—Cuba,
apiculata. *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1870) 194.-Cnba.

ESPEJOA, DC. Prod. v. 660 (1836) = Jaumea, Pers. (Compos.).
mexicana, DC. 1. c - J. mexicana.

ESPELETIA, Mutis, ex Humb. & Bonpl. PI. Aequin. ii. 10. t. 70-72 (1809). *COMPOSITAE*, Benth. ft Hook. f. ii. 347.
LIBANOTIIAMNUS, Ernst, in Vargasia (1870), 186
argentea *Humb. V Bonpl. 1. c.* 14. t. 71.—N. Granat.

Tilfl P'M.r.THTTA ;—
banksiaefolia, *ScA. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 67.-Venezuela.
coiymbosa, *Humb. If Bonpl. PI. Aei/uin.* ii. 16.—N. Graiiiat.
torymbosa, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 68-Schultzii.
Fnnckii, *Sch. Bip. ex Wedd. I. e.* 64.—N. Granat.
grandiflora, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* ii. 11. t. 70.—N. Granat
Hartwegiana, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. Aud- i 62-gT&ndifloTa.
Lindenii, *Sch. Bip. ex Wedd. 1. c.* 67.—Venezuela.
Moritziana, *Sch. Bip. ex Wedd. I. c.* 66.—Venezuela,
neriifolia, *Sch. Bip. ex Wedd. I. c.* 67.—Venezuela.
nivea, Moritz, ex Wedd. 1. c. 65—argentea.
oppositifolia, Sch. Bip. ex Wedd. 1. c 62-grandiflora, Moritziana.
platylepis, Sch. Bip. ex Wedd. 1. c. 64 «corymbosa.
rigida, Humb. & BonpLPl. Aequin. t. 72=corymbosa.
Schultzii, *Wedd. Chlor. And.* i. 63.—Venezuela,
spicata, *Sch. Bip. ex Wedd. 1. c.* 66.—Venezuela.
Weddelii, *Sch. Bip. ex Wedd. 1. c.* 66.—Venezuela.

ESPELETIA, Nutt in Journ. Acad. Philad. viL (1884) 37. t. 4-Balsamorhiza, Hook. (Compos.).
amplexicaulis, Nutt. 1. c 38—Wyethia amplexicaulis.
helianthoides, Nntt. 1. c.39=-B. sagittata.
sagittata, Nutt. 1. c 39-B. sagittata.

ESPELETIOPSIS, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 414 (1873)-Helanlum, Linn. (Compos.).

ESPERA, Willd. in Ges. Naturf. Freunde Neue Schr. iii. (1801) 449-Berria, Roxb. (Tiliac).
cordifolia, Willd. 1. c. 460-B. Ammomilla.

ESPINOSA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14 (1816)- Eriogonum, Michx. (Polygon.).
verticillata, Lag.. 1. c. = Eriog. tomentosum.

ESSENHARDTIA, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 764 (1839) -Eyaenhardtia, H. B. & K. (Legumin.).

ESTERHAZIA, Bartl. Ord. 186 (1830)-seq.

ESTERHAZYA, Mikan. Del. Faun, et FL Bras. t. 5 (1820). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 972.
LASIOSTEMON, Schott, ex Endl. Gen. 690, in syn. (1839).
alpestris, Spix, ex Mart. Reise Bras. i. 397 •= Gerardia brachyphylla.
campestris, Spix, ex Mart. 1. c.=splendida.
macrodonta, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* viii. (1833) 26.—Bras.
montana, Spix, ex Mart. Reise Bras. i. 397 = splendida.
nervosa, *Benth. in DC. Prod.* x. 614.—Bras,
splendida, *Mikan. Del. Faun, et Fl. Bras.* t. 5.—Bras.

ESULA, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 271 (1746); Haw. Syn. PI. Succ 153 (1812)-Euphorbia, Linn.
aleppica, Fourr. in Ann. Soc linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 149-E. aleppica.
amygdaloides, Haw. Syn. PI. Succ. 154—E. amygdaloides.
angusti/olia, Haw. 1. c. 156=E. Esula.
ararica, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160-E. Esula.
biumbellata. Haw. Syn. PI. Succ. 156-E. biumbellata.
Characias, Haw. 1. c 153-E. Characias.
cupressina, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 269-E. Cyparissias.
Cyparissias, Haw. Syn. PI. Succ 155 = E. Cyparissias.
Dalechampii, Haw. L c.=E. Esula.
dendroides, Haw. 1. c. 153 = E. dendroides.
diffusa, Haw. 1. c. 158=E. exigua.
exigua, Haw. 1. c = E. exigua.
falcata, Haw. 1. c. 159-E. falcala.
Cerardiana, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 150 = E. Gerardiana.
juncoides, Haw. Syn. PI. Succ 157 = E. aleppica.
minima, Haw. 1. c. 168 = E. Peplus.
multicorymbosa, Haw. 1. c. 166-E. multicorymbosa.
nicaetnsis, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160 = E. nicaeënsis.
obscura, Fonrr. 1. c. — E. falcata.
Paralias, Fourr. 1. c. - E. Paralias.
peploides, Fourr. 1. c - E. peploidei.

ESULA:—
Peplus, Haw. Syn. PI. Succ 158 - Euphorbia Peplus.
pinea, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 150 = E. pinea.
Pithyusa, Fourr. 1. c - E. Pithynsa.
portlandica, Haw. Syn. PI. Succ 164 - E. portlandica.
provincialis. Haw. 1. c 167 —E. Terracina.
Pseudo-cyparissias, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. & xvii. (1869) 150-E. Esula.
retusa, Fourr. 1. c. 149-E, exigua I
riparia, Fonrr. 1. c. 150=E. Esula.
rotundifolia, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PL ii. 257 = E. Peplus.
salicetorum, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 150 = E. androsaemifolia.
segetalis. Haw. Syn. PI. Succ 156 - E. segetalis.
sulcata, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160 = E. sulcata.
sylvatica, Haw. Syn. PI. Succ. 153 = E. sylvatica.
taurinensis, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160=K taurinensis.
tenuifolia, Fourr. 1. c - E. tenuifolia.
Terracina, Fourr. 1.c-E. Terracina.
tricuspidata, Fourr. L c. 149=E. exigua.
valentina, Haw. Syn. PI. Succ 157 - E. Terracina.
•uirgata, Haw. 1. c. 155 » E. virgata.
vulgaris, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 150 = E. Esula.

ETABALLIA, Benth. in Hook. Joura. Bot. ii. (1840) 99 -InocarpuB, Forst. (Legumin.).
guianensis, Benth. 1. c—Guian.
macrophylla, Benth. 1. c - I. ednlis.

ETAERIA, Blame, Bijdr. 409. t. 14 (1826)-Hetaerla, Blume (Orchid.).

ETERI8CITJ8, Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 28 (1826). *RUBIACEAE*\
parasiticns, *Desv. I. c.*—Guiana.

ETERISCUS, Stend. Nom, ed. II. *I* 599 (1840) -praec.

ETHANIUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 281 crBenealmla, Linn. f. (Scitamin.).
racemosum, Salisb. 1. c = R. raccmosa.

ETHEIRANTHUS, Kostel. Ind. Hort Prag. 56 (1844) =I(UBCarl, Tourn. (Liliac).
constrictus, Kostel. 1. c =M. constrictum.
Jacquini, KosteL L c. = M. racemosum?
maritimus, Kostel. 1. c. = M. maritimum.
Mitteri, Kostel. 1. c. = M. comosum ?

ETHEOSANTHES, Rafin. Neogenyt. 3 (1826) - Tradescantia, Linn. (Commelin.).
dliata, Rafin. 1. c - T. ciliata.

ETHESIA. Rafin. Fl. Tellur. UL 60 (1886) = Ornithogalum, Tourn. (liliac).
prasina, Rafin. 1. c -O. prasinum.

ETHESIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 63 (1836)=Jacobinla, Moric. (Acanthac).
cornea, Rafin. 1. c 64-J. Pohliana.

ETHIONEMA, Brongn. Enum. Gen. 92 (1843) - Aethionema, R. Br. (Crucif.).

ETHDXIA, Linn. Sp. PI. ed. II. 1171 (1763). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 224.
KAHIRIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab, 158 (1776).
LEIGHIA, Scop. Introd. 128 (1777).
PIRARDIA, Adans. Fam. ii. 499 (1768).
ageratoides, Spreng. Syst. iii. 458=Alomia ageratoides.
alata, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 60.—Afr. austr.
angustifolia, Boj. ex DC. Prod. v. 12 =conyzoides.
aquatica, Roxb. ex DC. 1. c. 114=Adenostemma viscosum.
auriculata, Thnnb, Prod. PL Cap. 141-Dichrocephala latifolia.
bechioides, *Ktatt, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xviii. (1873) 361.—Ins. Comor.
Bidentis, Linn. Mant i. 110 =- Flaveria Contrayerba.
br^siliensis, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 310.—Bras.
conyMoides, Boj. ex DC. Prod. v. 69 *-Vernonia madagascariensis.
conymoides. Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 3039-Laggera alata.

ETHULIA:—
conyzoides, *Linn. Sp. PI.* ed. IL 1171.—As. et Afr. trop.
Cunninghami, Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral. 62 — Epaltes Cunninghamii.
divaricata. Linn. Mant. i. 110=Epaltes divaricata.
divaricata, Wall. Cat. n. 2988—Brachycome assamica.
divergens, Russ. ex Wall. 1. c. 3038=Laggera alata.
gariepina, DC. Prod. v. 13-Epaltes Iraricpina.
glomerata, Spreng. ex DC. Prod. v. 372=Dichrocephala latifolia!
gracilis, Delile, in Caill. Voy. Metoë, t. 64-conyzoides.
integrifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 182-Dichrocephala latifolia.
involuerata, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 3 = Oiospermum involucratnm.
Kraussii, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* ii. 945.—Afr. austr.
megacepkala, Sch. Bip. ex Miq. FL Ind. Bat ii. 8-conyzoides.
megapolitana, Sch. Bip. ex De Vriese, PL Ind. Bat. Reinw. 128-conyzoides.
nepalensis, Spreng. ex DC. Prod. vi. 141-Cotnla hemisphaerica.
paniculata, Houtt. Handleid. x. 661-Hippia integrifolia.
paniculata, Schknhr, Handb. iii. 67. t 235-Dichrocephala latifolia.
pamnora, *Klatt, in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 507 — Madag.
ramoia, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 413= conyzoides.
repanda, Nees, ex DC. Prod. v. 662-Cephalaphora glanca.
Rueppellii, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 372 = Gntenbergia RueppelliL
sinapifolia, Steud. Nom. ed II. i. 599-DichrocephaU Utilolia.
sparganophora, Linn. Sp. PL ed. II. 1171=Sparganophorus Vaillantii.
Struchium, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 111-Sparganophorus Vaillantii.
tomentosa, *Linn. Mant.* i. 110.—China.
uniflora, Walt. Fl. Carol. 195-Sclerolepis verticillata.

ETHULIOPSIS, F. Muell. Fragm. ii. 154 (1861)-Epaltea, Cass. (Compos.).
dioica, Y. Muell. 1. c 165 - Epaltes Cunninghamii.

ETHUSA, Linn. Syst ed. I (1735); Gen. ed. I. 78 (1737)=Aethufla, linn. (Umbellif.).

ETLINGERA, Giseke, Prael. Linn. 199, 209. (1792) - Amomum, Linn. (Scitamin.).
littoralis, Gieseke, 1. c - A. littorale.

ETORLOBA, Rafin. Sylva Tellur. 79 (1888) «Jao«v randa, Juss. (Bignoniac).
caerulea, Rafin. L c - J. caroliniana.

ETTLINGERA, Raeusch. Nom. ed. IIL 1 (1797>* ETLINGERA, Giseke.

ETUBILA, Rafin. Sylva Tellur. 125 (1838) - Lora&tbul, Linn.
brasiliensis, Rafin. Lc.=L. brasiliensis.
dichotoma, Rafin. 1. c — L. dichotomus.
ferruginea, Rafin. 1. c. 159 =L. ferrugineus.
longiflora, Rafin. 1. c. 125=L. longiflorus.
maculata, Rafin. L c 159—L. maculatus.

ETUSA, Roy. ex Steud. Nom. ed. IL i. 599 (1840)-Aethusa, Linn. (Umbellif.).

EUACER, Opiz, Seznam, 42 (1862)-Acer, Tourn. (Sapind.).
acutifolium, Opiz, 1. c.-=A. platanoidest
affine, austriacum, campestre, eriocarpon, etytkrO' carpon, kablihianum, leiocarpon, macrocarpv> microcarpon, molle, obtusilobum, orthopteroiti pollens, palmatisectum, polyearpon, quinquttf batum, rubescens, stenopteron, subquinquelobat"'', Opiz, Seznam, 42 = A, campestre.
barbinerve, Opiz, 1. c. = A. barbinerve.
laevifolium, Opiz, L c.-A. oblongum.
platanoides, Opiz, L c - A. platanoides.
rubrotinctum, Opiz, in Lotos, iii. (1863) 68—*-campestre I
seharkense, Opiz, 1. c. = A. campestre i
tataricum, Opiz, 1. c = A. tataricum.

EUADENIA, Oliver> in ... Hook, G... (1867). *CAPPARIDEAE*, Benth. & Hook. f. 1. 8
eminens, Hook. ... ag. t. «W8-Afr. trap.
Kirkii, Oliver, ... Afr. i- »1.-Afr. trop.
trifoliata, Benth. ... Gen. »«9—Afr. trop.
trifoliolata, Oliver. Fl. Trip. Afr. i. 91 -trifoliate.

EUALCIDA, Hemsl. Biol. C... A... ii. 222 (1881) sphalm.
Linn. (Compos.). "ENALCIDA... Cass. = Tagetes,

EU... T... CARPUS, Endl... (1847) sphdm.
Bruurthrooarpua, Labill. (Crucif.).

EUARTHRONIA, Nutt. ex A. Gray, in P... Am. Acad. iv. (1860)... = Cephalanthus, Foist. (Rubiac.).
foliosa, Nntt ex A. Gray, 1. c. - C. foliosa.

EU... (?S.) Salisb. Prod. 68 (1796) = Aucuba, Thunb.
diehotoma', Salisb, I. c.=A. japonic*

EUBOTRYS Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 269 ... Don (Ericac.).
bracteata, N...
racemosa, Nntt. 1. c - L. racemosa.

EUBRACHION> Hook. f. FL A-taict 291 (1846).
Araottu, *Hook.f. I.* c-Urnguay.
brasihense, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* v. H. 138,-Bras.

EUCALIA, Raeusch. ... (1797)
Encolia ↑ Adans. ... Rafn. Hort. Kiim. iv. 2

EUCALLIAS, ... 5 (1886) =
Billbor...
versicolor, Rafin. 1. c = B. zebrina.

EUCALYPTON ... W- * Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 125 = Eucalyptus, L'Hérit. (Myrtacf).

EUCALYPTUS, *VHitit Sen...* L 18 (1788)
WKTACBAE, Benth. & Hook. f. i. 707.
AROMALD... Andr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 184 (1840).
AROMADENDRUM, Andr. ex Steud. l. c. 599 in syn. (1840).
EUDESMIA, R. Br. in Flind. Voy.ii. 599. t. 3 (1814).
SYMPHYOMYRTUS> SchaUp..., Lehm> Pl< Preis!..., 126 aW4).
Abergiana... *Muell. Fragm.* xi. 41.-Anstral.
acervul... Hook. £, FL Tasm. i. 185-Stuartiana.
ac... Miq. in NederL Kruidk. Arch. iv. (1859) 187 "•macrorliyncha.
ac... Sie... =piperita.
«n>«ioides, ...A<i«.., *Walp. Sep.* ii. 924.-Austral.
"...aro, Hook, in Mitch. Jonro. Trop. Austral. 890. "rostrata.
•cutangnU, *Turn, in Bull. Phys.-Matk. Acad. PHersb.* ...
..., (1862) 888 Anst»l-
AutoS.TM... *Blume*> *Mi*- 1M1.—Ini. Timor.; *Nederl. Kruidk. Arch.* iv. (1859) 188.
albicans, F... MuelU F... V... «.-Anstial.
alpina, Lindl. ... *UUch... Trees Exped.* ii. 175.—Austral.
ambigua, Dc- Prod, iii 219=amygdalina.
amygdalin ... *Pl.* ii. 14. t. 154.—Austral.
amygdal... ...Schan...ta Lehm- PL Prela...L m= lanceolata!
androsemaefolia, Hoffmgg. Vers. Pfl. Nachtr. ii. 113.—Austral.
angulosa, Schau. in Walp. Rep. ii. 925 = incrassata.
angustifolia, Desf. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 30.—Austral.
angustifolia, Turcs. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. x. (1852) 887.—Austral.
angustissima, F. Muell. Fragm. iv. 25.-Austral.
annulata, Benth. Fl. Austral. iii. 234.-Anstral.
aspera, F. Muell. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 95.—Austral.
aurantiaca, F...
Baileyana, F...
Baueria... Jl/... 87.-An9traL
137 = 2*... Kraidk. Arch. iv. (1859) otnartiana.

EUCAIiTFTUS:—
Baueriana, Schan. in Walp. Rep. ii. 924<=polyanthemos.
Baxteri, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, iii. 207 -santalifolia.
Behriana,^. *Muell.'in Trans. Viet. Inst.* i. (185S) 84.—Austral,
bicolor, *A. Cunn. ex Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral.* 390.—Austral.
bigalerita, F. MueU. in Joum. Lino. Soc. ilk (1869) 96 xplatyphylla.
botryoides,.Sf».in *Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 28&—Austral.
Bownuni, *F. MueU. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 219.—Austral,
brachyaodra, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* iii. (1859) 97.—Austral.
brachypoda, Benth. Fl. Anstnl. iii. 228, partim -microtheca.
brachypoda, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 21.—Austral.
breoifolia, ¥. Muell. in Journ. Lion. Soc. iii. (1869)81 -microtheca.
buprestium, *F. Muell. Fragm.* iii. 67.—Austral,
caesia, *Benth. Fl. Austral,* iii. 227.—Austral.
Cajuputea,¥. Muell.«x Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1869) 126=odorata.
calophylla, *g. Br. in Journ. Geog. Soc.* i. 1881 (1833) 20, Domen; *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 72.—Austral,
calycegona, *Turn in Bull. Phys.-Math. Acad. Pltersb.* x. (1862) 838.—Austral,
camaldulensis, *Dehnh. Cat. PL Hort. Camald.* ed. II. 20.—Austral.
capitellata, *Sm. Bot. N. Holl.* 42:—Austral,
celastroides, *Turct. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 888.—Austral,
cinerea, *F. MueU. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 239.—Anstral.
citriodora, *Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 285.—Austral.
tfadocalyx, F. Muell in linnaea, .xxv. (1852) 388 = coiynocalyx.
clavigera, *A. Cunn. ex Srhau. in Walp. Rep.* ii. 926.—Austral.
Cloeziana, *F. Muell Fragm.* xi. 44.—Austral,
cneortfolia, *DC. Prod.* iii. 220.—Austral,
coccifera, *Hook. f. in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847)177.—Tasman.
colossea; F. Muell. Fragm. vii..42=diversicolor.
concolor, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 129.—Austral.
eon/ertiflara, Kipp. ex F. Mnell. in Journ. linn. Soc. iii. (1869)96 = iemiginea.
connata, *Dum.-Cours. Bot. Cult** ed. II. vii. 280.—AustraL
conoidea, *Benth. Fl. Austral,* iii. 227.—AustraL
Cooperiana, *F. Muell. Fragm.* xi. 83.—AustraL
cordate, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 13. t. 162.—Tasmania.
cordata, Lodd. Bot. Cab. t. 328=p«lverulenta.
coriacea, A. Cunn. ex Schau. in Walp. Rep. ii. 925 = pauciflora.
comute, *Labill. Voy.* i. 40Sv t. 20 ; *Nov. Holl. PL* ii. 121.—AustraL
corymbosa, *Sm. Bot. N. Holl.* 48; *et in Trans^Linn. Soc.* iii. (1797) 287—AustraL
corynocalyx, *F. MueU. Fragm.* ii. 43k—Austral,
cosmophylla, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* (1855) S2.—Austral.
costata, F. Mnell. 1. c. 83=incrassata.
crebra, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 87.—Austral.
Cunninghami, Sweet, Hort Brit. ed. IL 209 = stricta.
curvula, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 196.—Austral.
cuspidata, Tares, in BulL Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 21—incrassate.
daphnoides, Miq. in NederL Kruidk. Arch. iv. (1859) 133-coccifera.
dealbata, *A. Cunn. ex Schau. in Walp. Rep.* it 924.-Austral.
Decaisneana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 83.—Ins. Timor.
decipiens, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 49.—Austral,
decurva, *F. Muell. Fragm.* iii. 130.—Austral,
deglupta, *Blume, Mus. Bet. Lugd. Bat.* i. 83.—Ins. Celebes; Timor.

EUCALYPTUS:—
dichromophloia, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 89.—AustraL
discolor, *Desf. Tabl.* ed. II. 198, nomeii; *Cat. Hort. Par.* ed. III. 408.—Austral,
diversicolor, *F. MueU. Fragm.* iii. 181.—Austral.
diversifolia, Bonpl. Desc. PI. Jard. Malm. 85. t. 13 -viminalis.
dives, *Schau. in Walp. Rep.* ii. 926.—Austral,
doratoxylon, *F. MueU. Fragm.* ii. 65.—Austral,
drepanophylla, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 221.—Austral.
Drummondii, *Benth. I. c.* 237.—Anstral.
dumosa, *A. Cunn. ex Schau- in Walp. Rep.* it 925.—Austral.
elaeophora, F. Muell. Fragm. iv. 52=goniocalyx.
elata, Dehnh. Cat. PL Hort. Camald. 26=viminalis.
elongate, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 30.—Austral.
enenifolia, Walp. Rep., ii. 164, sphalm.» cneorifolia.
erythrocalyx, V. Muell. Fragm. ii. 32 - pynformis.
erythiocorys, *F. MueU. 1. c.* 38.—Austral,
erythronema, *Turct. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 887.—AustraL
eudesmoides, *F. Muell. Fragm.* ii. 85.—Austral.
eagenioides,&Vfer,«r *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 195.—Austral.
eximia, *Schau. in Walp. Rep.* ii. 925.—AustraL
exserta, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1869) 86.—Austral.
fabrorum, Schlecht. in Linnaeii, xx. (1847) 657 - viminalis.
falcata, *Tun: in BulL Soc. Nat. Mosc* xx. (1847) I. 163.—Austral.
falcifelia, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 136-obliqua.
fasciculosa, F. Muell. in Trans. Viet Inst. i. (1856) 84 B paniculate.
ferruginea, *Schau. in Walp. Rep.* ii. 926.—Austral.
fibrosa, F. MueU. in Journ. Lino. Soc. iii. (1859) 87 - siderophloia.
ficifolia, *F. Muell. Fragm.* ii. 85.—Austral,
flexilis, *Regrl, Gartenfl.* (1858) 284.—Austral.
floribunda, Hueg. in Knum. PL Hueg. 42=marginata.
fioribunda, F. Muell. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 96=ferrnginea«
foecunda, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* L ISO.—Anstral.
Foelscheana, *F. MueU. in Melbourne Chem. V Drugg.* (Nov. 1882).—AustraU
fruticetorum, F. MueU. ex Miq. in Nederl. Kraidk. Arch. iv. (1869) 131 = gracilis.
gamophylla, *F. Muell. Fragm.* xi. *M.*—Anstral.
gigantea, *Dehnh. Cat. PI. Hort. Camald.* ed. II. 20.—Austral.
gigantea, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 479 -obliquai
glandulosa, *Desf.Cat. Hort. Par.* ed. III. 408.—Austral,
glauca, *DC. Prod.* iii. 221.—Austral,
glaucophylla, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 113.—Austral.
globularis, Hort. ex DC. Prod. iii. 219-amygdalina.
glebulosus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125 -seq.
Globulus, *Labill. Voy.* i. 153. t 13; *Nov. Holl. PI.* ii. 121.—Austral.
gneorifoliafi. Don, Gen. Syst it 820, sphalm. - cneorifolia.
gomphocephala, *DC. Pood.* iii. 220.—Austral,
goniantba, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) I. 163.—Austral.
goniocalyx, *F. Muell. Fragm.* ii. 48.—Austral.
graciUs, *F. MueU. in Trans. Viet. Inst.* i. (1856) 35.—Astral.
gracilis, Sieber, a Benth. Fl. Austral, iii. 222-crebra.
grandifolia, *R. Br. ex Benth. I. c.* 250.—Austral.
granularis, Sieber, ex Benth. 1. c. 240= viminalis.
grossa, *F. Muell. ex Benth. 1. c.* 232.—Austral.
Uunnii, *Hook.f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iii. (1844) 499.—Austral.
Gunnii, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. Iv. (1859) 126—viminalis.
Gunnii, F. MueU. Fragm. ii. 62-Stuartiana.
haemastoma, Miq. in NederL Kraidk. Arch. iv. (1869) 130—bicolor.
haemastoma, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 286.—Austral.
kemilampra, F. MueU. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 85=resinifera.
hemiphloia, *F. Muell. Fragm.* ii. 62.—Austral.

EUCALYPTUS :—
lu-teropkylla, Miq. in Nederl. Krnidk. Arch. iv. (1859) 141-obliqua.
hirsuta, Link, EDIUO. Hort. Berol. ii. 31 — Angophora cordifolia.
Hookeri, F. Muell. in Journ. Linn. Soc. iii. (1869) 90-lesselaris.
Howittiana, *F. Muell. in Wing, South Sc Record,* ii. (1882) 171.—Austral.
hypericifolia, R. Br. «x Benth. Fl. AustraL UL 203 = amygdalina.
hypericifolia, *Dum.-Covrs. Bot. Cult.* ed. II. vii. 279.—Austral.
hypoleuca, Schao. in .Lehm. PI. Freiss. i. 181-marginata.
incrassata, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 12. t 150.—Austral.
incrasspta, Sieber, in DC. Prod. iii. 217 -pilularis.
lamprocarpa, V. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 129=dumosa.
largiflorens, F. Muell..in Trans. Viet. Inst.i. (1856) 31 » bicolor.
latifoUa, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859)95.—Austral.
Lehmanni, *Preiss, ex Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 127.—Austral,
leptophleba, *F. MuelL in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 86.—Austral.
leptophylla, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 123—uncinata.
leptopoda, *Benth. Fl. Austral,* iii. 238.—Austral.
Leucadendron, *Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Reims.* 03.—Ins. Timor,
leucoxylon, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 33.—Austral.
ligustrina, DC. Prod. iii. 219-amygdalina.
ligustrina, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 134=Gunnii.
Lindleyana, DC. Prod. iii. 219 = amygdalina.
linearis, *Dehnh. Cat. PI. Hort. Camald.* ed. II. 20.—Austral.
longifolia, Lindl. in Bot Keg. t. 947 •=•amygdalina.
longifolia, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 29.—Austral.
iongirostris, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 125-rostrata.
loxophleba, *Benth. Fl. Austral,* iii. 252.—Austral.
Luehmanniana. *F. Muell. Fragm.* xi. 38.—Austral,
macrandra, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 235.—Austral.
macrocalyx, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 339=pyriformis.
macrocarpa. *Hook. Ic. PI.* t. 405-407.—Austral.
macrocera, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 20 = Lehmanni.
macrorhyncha, *F. Muell. First Gen. Rep.* 12 ; *Benth. Fl. Austral,* iii. 207.—Austral,
maculala, *Hook. Ic. -PI.* t. 619.—Austral.
Mahagoni, F. Muell. Fragm. ii. 41 —marginata.
mannifera, A. Cnnn. ex Benth. FL Austral, iii. 240 = viminalis.
mannifera, *Mudie, in Trans. Med. Bot. Soc.* 1832-33 (1834), 24.—Austral,
marginata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 302.—Austral.
media, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. SO.—Austral,
megacarpa, *F. Muell. Fragm.* ii. 70.—Austral,
melanophloia, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 93.—Austral,
melissiodora, *Lindl. in Mitch. Journ. Trap. Austral.* 235.—Austral.
melissiodora, F. Muell. in Journ. Linn. Soc iii. (1859) 95=peltata.
melliodora, *A. Cunn. ex Schau. in Walp. Rep.* ii. 924.—Anstral.
micrantha, DC. Prod. iii. 217-haemastoma.
micranthera, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 218.—Austral.
microcorys, *F. Muell. Fragm.* ii. 60.—Anstral.
microphylla, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 850 = stellulata, stricta.
microphylla, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 515.—Austral,
microtheca, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1868) 87.—Austral,
miniata, *A. Cunn. ex Schau. in Walp. Rep.* ii. 925.—Austral.
moluccana,.ffoxA. *Hort. Beng.* [92]; *Fl. Ind.* ii. 198.—Ins. Molucc.
mucronata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 80.—Anstral.

EUCALYPTUS :—
Muelleri, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 130 = incrassata.
multiftora, Poir. Encyc. Suppl. ii. 594 = resinifera ?
multiñora, *Rich, ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exp.* 554.—Ins. Philipp.
myrtifolia, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 30.—Austral.
n'ervosa, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 139 ^obliqua.
nitida, Hook. f. FL Tasm. i. 137. t. 29 = amygdalina.
nutans, *F. Muell. Fragm.* iii. 152 = platypus,
obcordata, *Turc*. in Bull. Phys.-Math. Acad. P/tersb.* x. (1852) 337.—Austral.
obliqua, Decne. in Nouv. Ann. Mas. Par. iii. (1834) 454 — Decaisneana.
obliqua, *L'Hérit. Sert. AngU* 18. t. 20.—Austral,
oblonga, *DC. Prod.* iii. 217.—Austral.
obtusiSora, *DC. I. c.* 220.—Austral.
obtusifolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 820, sphalm.-obtusiflora.
occidentalis, *Endl. in Enum. Pi. Hueg.* 49.—Austral,
ochrophloia, *F. Muell. Fragm.* xi. 86.—Austral,
odontocarpa, *F. Muell. in Journ. Linn* Soc.* iii. (1859) 98.—Austral.
odorata, *Behr, in Linnaea,* xx. (1847) 857.—Austral.
Oldfieldii, *F. Muell. Fragm.* ii. 87.—Austral,
oleosa, *F. Muell. I c* 56.—Austral.
oleosa, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 127 = uncinata.
oligantha, *Schau. in Walp. Sep.* ii. 926.—Austral.
oppositifolia, Desf. Tabl. ed. I. 222 •= purpurescens.
orblfolia, *F. Muell. Fragm.* v. 50.—AustraL
ornata, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, iii. 208 = pilularis.
ovata, Labill. Nov. Holl. PL ii. 13. t. 158-brachypoda?
pachyloma, *Benth. Fl. Austral.* Iii. 237.—AustraL
pachyphylla, *A. Cunn. ex F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 98, nomen, in nota.—Austral,
pachyphylla, *F. Muell. 1. c.*—Austral,
pachypoda, *F. Muell. Fragm.* vii. 41.—AuBtral.
pallens, *DC. Prod.* iii. 219.—AustraL
pallidifolia, *F. Muell. Fragm.* iii. 131.—Anstral.
paniculata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 287.—AustraL
papuana, *F. Muell. Papuan PI.* i. 8.—N. Guinea.
parviflora, F. MnelL in Joum. Linn. Soc iii. (1859) 90 = bioolor.
patcllaris, *F. Muell. I. c.* 84.—Austral,
patens, *Benth. Fl. Austral,* iii. 247.—Austral.
patentiflora, F. MuelL ex Miq. in Nederl. Krnidk. Arch. iv. (1869) 126 = melliodora.
patentiflora, F. MuelL Fragm. ii. 64, in syn.= viminalis.
pauciflora, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 195.—Austral.
pellita, *F. Muell. Fragm.* iv. 169.—Austral,
peltata, *Benth. Ft. Austral,* iii. 254.—AustraL
pendula. Page, ex Steud. Norn. ed. II. f. 600-bicolor.
penicillata, Hort. ex DC. Prod. iii. 218 —• piperita.
perfoliata, *R. Br. ex Benth. Fl. AustraL* iii. 253.—AustraL
perfoliata, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 408.—Austral.
persicifolia, DC. Prod. iii. 217 = pilnlaris, siderophloia.
persicifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 501 = viminalis.
persicifolia, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. fv. (1859) 187 = Stuartiana.
phlebophylla, F. MnelL ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 140 = pauciflora.
phoenicea, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 91.—Anstral.
pilularis, DC. Prod. iii. 218-viminalis.
pilnlaris, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 284.—AustraL
piperata. Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 69-piperita.
piperita, Hort. ex DC. Prod. iii. 221-viminalis.
piperita, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 286.—Austral.
piperita. Sm. in White, Joum. Voy. N. S. Wales, 228 = capitellata.
Planchoniana, *F. Muell. Fragm.* xi. 43.—AnstraL
platyphylla, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 93.—Austral.
platypodos, Cav. Ic. iv. 23. t. 341 -botryoides.
platypus, *Hook. Ic. PI.* t. 849.—Austral.
pleurocarpa, Schau. in Lehm. PL Preiss. i. 132 — tetragona.
plurilocularis, F. Muell. Fragm. ii. 70-Preisnàna.

EUCALYPTUS:—
polyanthemos, *Schau. in Walp. Rep.* ii. 924.—Austral.
polycarpa, F. Muell. in Journ. Linn. Soc. iii. (1869) 88 — terminalis.
polysciada, F. MuelL 1. c. 98-clavigera.
populifolia, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 408.—Hab.t
populifolia. Hook. Ic PL t. 879-populnea.
populifolia, Hook, in Mitch. Joum. Trop. AnstraL 204 = platyphylla ?
populnea, *F. Muell. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 98.—Austral.
porosa, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1869) 181-odorata.
Preissiana, *Schau. in Lehm. PI. Preiss.* i. 131.—AustraL
procera, *Dehnh. Cat. PI. Hort. Camald.* ed. II. 20.—Austral.
pruinosa, *Schau. in Walp. Rep.* ii. 926.—Austral.
pruinosa, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xxii. (1849) II. 23—pyriformis.
ptyehocarpa, *F. MuelL in Journ, Linn. Soc.* iii. (1859) 90.—Austral,
pulchella, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 408.—Austral.
pulverulenta, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 31 «• glauca.
pulverulenta, *Sims, Bot. Mag.* t. 2087.—Austral.
pulvigera, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 350 = pulverulenta.
punctata, *DC. Prod.* iii. 217.—Austral,
purpurascens, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 31.—**Austral.**
pyriformis, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 22.—AustraL
pyrophora, *Benth. Fl. Austral,* iii. 257.—Austral,
racemosa, *Cav. Ic.* iv. 24.—Austral.
radiata, Sieber, ex DC. Prod. iii. 218 —amygdalina.
Rameliana, *F. Muell. Fragm.* x. 84.—AustraL
Kaveretiana, *F. Muell. 1. c.* 99.—Austral,
redunca, *Schau. in Lehm. PL Preiss.* i. 127.—Austral,
regnans, *F. Muell. in Rep. Acclim. Soc. Viet.* (1870) 20.—Anstral.
resinifera, *Sm. in White, Journ. Voy. N. S. Wales,* 281.—Austral.
reticulata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 29.—Austral,
rigida, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 114.—Austral.
rigida, Sieber, ex Benth. FL Anstral. iii. 205 = obtusiflora.
Risdoni, *Hook. f. in Hook. Load. Joum. Bot.* vi. (1847) 477.—Tasmania,
robusta, *Sm. in Bot. N. Holl.* 39 ; *et in Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 283.—Austral.
rostrata, Cav. Ic. iv. 23 = robusta.
rostrata, *Schlecht. in Linnaea,* xx. (1847) 655.—Austral,
rnbricaulis, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III.. 408.—Austral.
rudis, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 49.—AustraL
salicifolia, *Cav. Ic.* iv. 24.—Austral,
saligna, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 285.—Austral.
salmonophloia, *F. Muell. Fragm.* xi. 11.—AustraL
salubris, *F. Muell. 1. c.* 54.—Austral.
santalifolia, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 183 —dumosa.
santalifolia. *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 35.—Austral.
santalifolia, F. Muell. 1. c. partim = cneorifolia.
Sarassa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 84.—!«• Molucc.
scabra, Dum.-Coure. Bot. Cult. ed. IL vii. 280* piperita.
semicorticata, F. MnelL in Jpnrn. Linn. Soc. »'• (1859) 81-pilularis.
sepulcralis, *F. Muell. Eucalypt. Decad.* viii. (1882).—AustraL
setosa, *Schau. in Walp. Rep.* ii. 926.—Austral,
siderophloia, *Benth. Fl. Austral,* iii. 220.—Austral.
sideroxylon, A. Cunn. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 339 — leucoxylon.
Sieberiana, F. Muell. Eucalypt. Decad. ii. (1879)" virc&ts.
signata, F. Muell. in Journ. Linn. Soc iii. (1869) 85* hftcmutoniA*
socialis, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. "• (1869) 182 = oleosa.

EUCALYPTUS:—
spathnlata, *Hook. 1c. PI.* t. 611.—Austral.
spectabilis, F. Muell. Fragm. v. 45=pellita.
Stuartiana, *F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch.* v. (1859) 131.—Austral.
suimultiplinervis, Miq. 1. c. 188=pauciflora.
subulata, A. Cunn. ex Schau. in Walp. Rep. ii. 924=. tereticornis.
sylvicultrix, F. Muell. ex Berth. Fl. Austral, iii. 201 = pauciflora.
tntifica, F. Muell. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) 92 = alba.
tereticornis, *Sm. Bot. N. Holl.* **41;** *et. in Trans. Linn. Soc.* iii. (1797) 284.-Austral.
terminate, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* **iii. (1859)** 89.—Austral.
"rminalis, Sieber, ex Benth. Fl. .Anstral. iii. 211 = Paniculata.
tessellaris, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* **iii. (1859)** 88.—Austral.
tetragona, *F. Muell. Fragm.* iv. 51.—Austral,
retraptera. *Tune, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxii. (1849)** "•M—Aurttal.
tetrodonta, *F. Muell. in Joum. Linn. Soc.* **iii. (1869)** 97.—Austral.
Toddiana, *F. Muell. in Trans. Philos. Inst. Victoria* (1882) 171.—Austral.
trachyphloia, *F. Muell. Fragm.* x. 106.—Austral.
triantha, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 30-capitellata.
uberculata, Parm. ex DC. Prod. iii. 221.-Austral.
tvrbnnt a Bth. & F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. nn^Sl (1859) 187-oleosa.
"nihellata, *Dum.-Cours. Bat. Cult.* ed. II. vii. 279.—Austral.
Unthanata, *Turcz. in Bull. Soc. If at. Mosc.* **xxii. (1849)** II. 28.—Austral.
"ndulata, F. Muell. in Joum. Linn. Soc. iii. (1859) »5 = ferruginea.
"reigera, *Hook.f. in Hook. Land. Joum. Bot.* **vi. (1847)** *77—Tasmania.
vari"la, F. Muell. in Joum. Linn. Soc. iii. (1869) 88 maculata.
vernicosa, *Lond. Journ. Bot.* **vi. (1847)** *78—Tasmania.
versicolor *Blume* **Moluce.** *Mus. Bot. Lugd. Bat.* **i. 84—Ins.**
*vi>*inalis,* **Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral. 157**
vimina-tesselaris.
viminalis, *Uiu. Nov. Holl. Pl.* **ii. 12. t. 151.—** Austral.
vJ&\Sieber, ex DC. Prod. **iii. 217.—Austral.**
Woollsiana, *F. Muell. Fragm.* x. 98.-Austial.
Woollsii,". F. Muell. 1. c. ii.50=longifolia.
xanthoclada, (1847) i. 163=redunca.
Youngiana, *Fragm.* x. 6.—Austnd.

EUCALYPTOPHLEUM, Rafin. n. Tellur. iii. 74 (1886)-Nicotiana-reptans, Rafin. I c-N. reptanda.

EUCALYPTUS, Bemh. **Linnaea. viii. (18S8) 468 = Dxcentra, Bemh. (Papav.).**
"ntus, **Bemh. 1. c. - D. eximia.**
Zwintzii, Bemh. L C. = D. formosa.
(1840) 72; & Lucc. Akad Muench spectabil

EUCARPHA, Spach, Hist. Vég. **02 (1841) = Knightia, R. Br. (Proteac.).**

EUCARYA, Mitch. Three Exped. Austral, ii. 100 **R. &. (Santalac.).**
"rrayana, **Mitch. L c.=F. persicarius J**

EUCENTRUS, Endl. Gen. Snppl. v. 82 (1850) = ENCENTRUS, Presl=Celaatrus, Linn.

EUCEPHALUS, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 298 = Aster, Tourn. (Compos.).
albus, Nutt. 1. c 299=A. ptarmicoides.
elegans, Nutt. 1. c. 298=A. elegans.'
ericoides, Nutt. 1. c. 299 = A. ericoides.
glaucus, Nutt. 1. c.=A. glaucus.

EUCEHAEA, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 90. t. 238 (1829). *SAMYDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 797.
nitida, *Mart. 1. c.*—Bras.

KUCHAETIS, Bartl. & Wendl. f. Diosm. 15. t. A (1824). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 289.
abietina, Eckl. & Zeyh. Enum. 104=glomerata.
dubia, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 873 = Macrostylis dubia.
elata, *Eckl. &" Zeyh. Enum.* 104.—Afr. austr.
flexilis, *Eckl. V Zeyh. 1. c.* 105.—Afr. austr.
glomerata, *Bartl. V Wendl. f. Diosm.* 16.—Afr. austr.
glomerata, Eckl. & Zeyh. Enum. 104 = linearis.
Taevigata, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxi. (1858)** I. 438.—Afr. austr.
linearis, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* **i. 872.—** Afr. austr.

EUCHAIUDnTM, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 86 (1835). *ONAGRAR1EAE,* Benth..& Hook. f. i. 790.
Breweri, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* **vi. (1864-65)** 532.—Calif,
concinnnm, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* **ii.** 87.—Calif,
grandiflorum, *Fisch. V Mey. I. c.* vii. 48.—Calif.

EUCHABIS, Planch. & Linden, Cat n. viii. (1853) 3; et in Fl. des Serres, Sér. I. viii. (1852-53) 107.
AMARYLLIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 781.
MATHIEUA, Klotzich, in Otto *Sc* Dietr. Allg. Garten*, xxi. (1853) 337.
amatonica, Linden, in.Illn.str. Hortic. xxviii. (1881) 30 =grandiflora.
Candida, *Planch. V Linden, Cat.* n. viii. (1853) 3 ; *et in Fl. des Serres,* Sér. I. viii. (1862-53) 107—N. Granat.
galanthoides, *Planch, (f Linden, Cat.* xvii. I. (1862) 4.—Bras,
grandiflora, *Planck. & Linden, in Fl. des Serres,* **Sér.** I. ix. (1858-54) 255.—N. Granat.
Hartwegiana, Nichols. Diet. Gard. i. 536=Caliphruria Hartwegiana.
Mastersii, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6881.—Hab.1
paradoxa, T. Moore, in Gard. Chron. (1876) I. 242 = subedentata.
Sanderii, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6676.—N. Granat.
subedentata, *Benth. V Hook. f. Gen.* **iii.** 731; in nota sub Caliphruria (subedentula).—N. Granat.

EUCHIIiOPSIS,.F. Muell. in Melbourne ChemUt, June (1882); ex Census, 37. *LEGUMINOSAE.*
linearis, *F. Muell. I. c*—Austral.

EUCHIDIUM. Endl. Gen. Suppl. v. 92 (I860) = **ENCHID1UM, Jack = TrigonoBtemon, Blume** (Euphorb.).

EUCHILOS, Spreng. Gen. i. 866 (1830) = seq.

EUCH1LUS, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 17 (1811)-Pultenaea, Sm. (Legumin.).
calycinus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 276 = P. calycina.
crinipodus, F. Muell. Fragm. i. 145 = P. rotundifolia.
cuspidatus, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. ii. (1868) 68^ P. ternata.
linearis, Benth. in Enum. PI. Hneg. 104-Sphaerolobium Erichilus.
obcordatus, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. IL iii. 17 - P. obcordata.
burpureus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 276-P. conferta?
rotundi/olius, Tnrcz. 1. c. 277 = P. rotundifolia.
spinulosus, Turcx. 1. c. 275 = P. spinulosa.

EUCHITON, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvi. 214 (18281 = **OnaphaUum,** Linn. (Compos).
collinus, Cass. 1. c. 216 =»G. collinum.
decipiens, Cass. 1. c. 217 - G. decipiens.
Forsteri, Cass. 1. c. 216 =• G. japonicum.
pulchellus, Cass. 1. c. 215=G. japonicum.

EUCHLAEHA, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gottine. (1832).—Cf. Linnaea, viii. (1833) Litt. 26. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook f. iii. 1114.
REAKA, Brign. Ind. Sem. Hort. Moden. (1849).—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (184'J) 365.
Bourgaei, *Fount, in Bull. Soc. Bot. Belg.* **xv. (187ti) 468.—**Mexic.
Giovanninii, Foum. 1. c. = mexicana.
luxuriant, Durieu & Aschers. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1877) 107 = mexicana.
mexicana, *Schrad. Ind. Sem. Hori. Gotting.* **£1832).—** *Cf. Linnaea,* viii. (1833) *Litt.* 26.—Mexicf

ETJCHXORA, Eckl. & Zeyh. Enum. 171 (1836). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 475.
MICROTROPIS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 65 (1835).
serpens, *Eckl. tf Zeyh. I. c.—Ah.* **austr,**

EUCHLORIS, D. Don, in Mem. Wem. Soc. v. (1826) 548-HelichiyBum, Vaill. (Compos.).
nudifolia, D. Don. 1. c. = H. nudifolium.

EUCHHESTA, Benn. PI. Jav. Rar. 148. t. 31 (1838). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 550.
Horsfieldii, *Benn. 1. c.*—Java.
japonica, *Benth. ex Oliver, in Jdurn. Linn. Soc.* **ix.** (1867) 164.—Japon.

EUCHROMA, Nutt. Gen. Am. ii. 54 (1818) = Caatil-**leja,** Linn. (Scrophular.).
angustifolia, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 46 = C. parviflora.
Bradburii, Nutt. 1. c. 47 = G. parviflora.
-coccinea, Nutt. Gen. Am. ii. 65 = C. coccinea.
grandiflora, Nutt 1. c = C. sessiliflora.
integrifolia, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. x. 532 = C. miniata.
pallescens, Nutt. ex A. Gray, Syn. Fl. .N. Am. ii. i. 299 = Orthocarpus pallescens.
purpurea, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 180=C. purpurea.

EUCHYLAENA, Spreng, Gen. i. 228 (1830)=«Enohy. laena, R. Br. (Chenop.).

EUCHYLIA, Dnlac. Fl. Hautes-Pyr. 463 (1867) = Iionioera, Linn. (Caprifbl.).
alpigena, Dulac, 1. c. = L. alpigena.
caerulea, Dnlac, 1. c. = L. caerulta.
nigra, Dulac, 1. c. = L. nigra.
pyrenaica, Dulac, 1. c = L. pyrenaica.
verticillata, Dulac, 1. c. 464 = L. Periclvmennm.
villosa, Dulac, 1. c.-L. Xylosteum.

EUCHYLUS, Poir. in Diet. Sc. Nat. xv, (1819) 516-EUCHILUS, R. Br.=Pultenaea, Sm. (Ugumin.).

EUCLADUS, Nntt. ex Hook. Ic. PI. t. 650 (1844) = Sohledea, Cham. & Schlecht. (Caryophyll.).
suffruticosus, Nutt. ex Hook. 1. c.=S. Nuttallii.

EUCLEA, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 747 (1774). *EBENACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 664.
BRACHYCHEILA, Harv. in Linnaea, xx. (1847) 192.
DIPLONEMA, G. Don, Gen. Syst. iv. 42 (1837).
KELLAUA, A. DC. in Ann. Sc. Nat Sér. II. xvi. (1841) 96.
RVMIA, Endl. **Gen. 743 (1889).**
acutifolia, *E. Mey. in Drlge, Zwei Pfi. Docum.* **184.—** Afr. austr
angustifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 441 = E. Pseudebenus.
Balfourii, *Hiem, ex Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 4O6.-Ins. Socotra.
bilocularis, *Hiem. in Trans. Camb. Phil. Soc.* **xii.** (1873) 102.-Afr. trop.
coriacea, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 216.—Afr. austr.
daphnoides, *Hiem, in Trans. Camb. Phil. Soc.* **xii. i.** (1873) 102.—Afr. austr.

ET7CLEA :—
desertorum, Eckl. & Zeyh. in Linnaea, xx. (1847) 192 = lanceolata-
divinorum, *Hiern, in Trans. Comb. Phil. Soc.* xii. (1873) 99.—Afr. austr.
Dregeana, A. DC. m DC. Prod. viii. 218 - polyandra.
elliptica, A. DC. 1. c. = polyandra.
ferruginea, Berah. in Flora, xxvii. (1844) 825- polyandra.
froctuosa, *Hiern,in Trans. Camb.Phil.Soe.Tii.* (1873) 101.—Afr. trop.
herbacea, Lour. Fl. Cochinch. ii. 629 (Enphorbiacea). —China.
humilis, Eckl. *8c* Zeyh. in Linnaea, xx. (1847) 192 = nndolata.
Kellan. *Hochst. in Flora,* xxvi. (1843) 83.—Abyss.
Kraussiana, Berah. in Flora, xxvii. (1844) 824- tomentosa.
lancea, *Thunb. Pred.Pl. Cap.* 85.—Afr. austr.
lanceolata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184. —Afr. austr.
laurina, *Hiern, ex Balf.f. in PJOC. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 406.—Ins. Socotr.
linearis, *Zeyh. in Linnaea,* xx. (1847) 192.—Afr. austr.
macrophylla, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 184 = natalensis.
multiflora, *Hiern, in Trans. Camb. PhiL Soc.* xii. (1873) 100.—Afr. austr.
myrtina, Burch. Trav. Afr. ii. 588-undulate,
natalensis, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 218.—Afr. austr.
ochrocarpa, E. Mey. in Drège, Zwei PA. Docum. 184 = lanceolata.
ovata, *Burch. Trav. Afr.* i. 387—Afr. austr.
pilosa. Lour. Fl. Cochinch. ii. 629 = Diospyros pitosa.
polyandra, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184. —Afr. austr.
Pseudebenus, *E. Mey. 1. c.*—Afr. austr.
pubescens, Eckl. & Zeyh. in Linnaea, xx. (1847) 192 = polyandia,
racemose, *Murr. Syst. Veg.* ed. XIIL 747.—Afr. austr.
rigida, E. Mey. in Drége, Zwei Pfl. Docum. 184 = lancea.
rufescens, E. Mey. 1. c=ovata.
tomentosa, *E. Mey. I.* c—Afr. austr.
nndulata, *Thunb. Nov. Gen. PI.* v. (1784) 86.—Afr. austr.

EUCLIANDRA, Steud. Nom. ed. II. i. 600 (1840) = ENCLIANDRA, Zucc. = Fuchsia, Linn. (Onagrar.).

ETTCIiIDTTTtt, R. Br.in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 74 (1812). *CRt/CIFERAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 97.
ORNITHORYNCHIUM, Roehl. Deutschl. Fl. ed. II. 356 (1812-13).
SORIA, Adans. Fam. ii. 421 (1768).
aegyptiacum, Andrz. ex DC. Syst ii. 428=Ochthodiam aegyptiacum.
syriacum, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 74.—Reg.Casp.; Afghan,
tataricum, *DC. Syst.* ii. 422.—Europ. or.; Oriens.

EUCNEMIA, Reichb. Nom. 53 (1841) - seq.

EUCNEMIS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 161 (1838)- Govenia, Lindl. (Orchid.).
brevilabris, Lindl. 1. c = G. brevilabris.

EUCNIDE, Zucc. Del.Sem. Monac.—Cf. Linnaea, xviii. (1844) 508; et in Abh. Akad. Muench. iv. I. (1845) t. l = Menteelia, Linn. (Loasac).
bartonioides, Zucc. 11. cc. = M. gronoviaefolia.
floribunda, S. Wats, in Proc Am. Acad. xvii. (1881-82) 358.-Calif.
lobata, A. Gray, PI. Lindh. 192-M. lobata.
urens, Parry, in Am. Natural, ix. (1875) 144 - M. nrens.

EUCODONIA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1863) 201 = Aohimenes, P. Br. (Gesnerac).
Ehrenbergii, Hanst. I. c. 201=A. lanata.
lilaeinella, Van Houtte, H. des Series, xvîi. (1867-68) 79. t. 1757-58.—Hab. ?

EUCODONOPSIS, Van Houtte, in Fl. des Serres. xvi. (1865) t. 1608-AohimeneB, P. Br (Gesnerac.).
naegelioidesx, Van Houtte, I. c

EUCOLUM, Salisb. Prod. 98 (1796) - Gloxinia, L'Hérit. (Gesner.).
crassifolium, Salisb. 1. c.—G. macnlata.

EUCOMEA, Soland. ex Salisb. Prod. 218 (1796) = Eucomis, L'HériL (Liliac.).
elata, Salisb. I.e. = Eucomis punctata.
humilis, Salisb. Lc Eucomis nana.
regalis, Salisb. 1. c. = Eucomis regia.

EUCOMIS, L'Hérit. Sert. Angl. 17. t. 18 (1788). *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 813.
BASILAEA, JUSS. ex Lam. Encye. i. 362 (1783); et Gen. 62 (1789).
EUCOMEA, Soland. ex Salisb. Prod. 218 (1796).
amaryllidifolia, *Baker, in Gard. Chron.* (1878) II. 492. —Afr. austr.
bicolor, *Baker, 1. c.*—Afr. austr.
bi/olia, Jacq. Coll. iv. 215 = WhitheadU latifolia.
clavata, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 238=regia.
nana, *L'Mirit. Sert. Angl.* 17.—Afr. austr.
macrophylla, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. riii. (1878) 225=tegia.
punctate, *VHhrit. Sert. Angl.* 18.—Afr. austr.
purpureo-caulis, Andr. Bot. Rep. t. 869 = nana.
regia, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 433.—Afr. austr.
regia, L'Hérit. Sert. Angl 17=undulata.
striata, Donn, Hort. Cantab, ed. II. 40-punctata.
undulate, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. 433.—Air. austr.

ETJCOSIA, Blume, Bijdr. 415. 1.18 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 605.
carnea, *Blume, I. c*—Java.

ETTCmNTTM, Nutt ex Lindl. Veg. Kingd. 204 (1847), nomen. *ULIACEAE.*

EUCRIPHIA, Pen. Syn. ii. 92 (1807)=Eucryphia, Cav.

ET7CBOSIA, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 207 (1817). *AMARYLUDEAF.,* Benth. & Hook. f. iii. 730.
bicolor, *Ker-Gawl. I.* c—Am. austr.

ETJCRYPHIA, Cav. Ic. iv. 48. t. 872 (1797). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 615.
CARPODONTOS, Labill. Voy. ii. 16. t. 18 (1798).
PELLINIA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 160 (1810).
Billardieri, *Spach, Hist. Vig. Phan.* v. 345.—Austral,
cordifolia, *Cav. Ic.* iv. 49. t 372.—Chili.
Milliganii, Hook.f. Fl. Tasm. i. 54 = Billardieri.
Moorei, *F. Muell. Fragm.* iv. 2.—Austral
pinnatifolia, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 358. t. 8.—Chili.

EUCRYPTA, NutUn Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 158-Ellisia, Linn. (HydrophylL).
chrysanthemifolia, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. IV. (1885) 200 = EUisia chrysanthemifolia.
foliosa, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 159 = Ellisia chrysanthemifolia.
paniculata, Nutt. 1. a — Ellisia chrysanthemifolia.

EUCYCLA, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 166=Eriogonum, Michx. (Polygonac).
ovalifolia, Nutt. 1. c. = Eriogonum ovalifolium.
purpurea, Nutt. 1. e. = Eriogonnm ovalifdlinm.

EUDEMA, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. ii. 133. t. 125 (1809)=Braya, Stemb. & Hoppe (Crucifer.).
grandiflora, Planch, in .Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 620. t 22 —Am. austr.
nubigena, Humb. *8c* Bonpl. PI. Aequin. ii. 136.1.124. —Ecuador.
rupestris, Humb. *8c* Bonpl. 1. c. 133. t. 123=Eutrema Hnmboldtii.
thlaspiforme, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 675.— Chili.

EUDESMIA, R. Br. in Flind. Voy. ii. 699.1 3 (1814) = Eucalyptus, L'Hérit. (Myrtac).
erythrocorys, F. Muell. Fragm. ii. 88 •= Eucalyptus erythrocorys.
eucalyptoides, F. Muell. L c 35 =» Eucalyptus eudesmoides.
tetragona, R. Br. in Flind. Voy. ii. 599 - Eucalyptus tetragona.

EUDESMIS, Ra6n. Fl. Telhr. iii. 80 (1886) = Colchlcum, Linn. (liliac).
fascicularis, Rafin. 1. c = C. montanum.

EUDIANTHE, Reichb. Nom. 206 (1841)-Lychnis, Linn. (CaryophylL;.
Coeli-rosea, Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 55. t. 303=L. Coeli-rosea.
conica, Reichb. ex Willk. Icet Desc. PI. Hlsp. i. 29 - L. Corsica.
laeta, Reichb. ex Willk. 1. e. = Silene laeta.
oculata, A. Braum. Del. Sem. Hort Friburg. (1849) 2 = L. Coeli-rosa.

EUDIPETALA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 68 (1836) = Commelina, Linn.
deficiens, Rafin. 1. c. «• C. virginica.

EUDISTEMON, Rafin. Med. Fl. ii. 219 (1830) - Senebiera, DC. (Crncif.).

EUDODECA, Stend. Nom. ed. II. i. 601 (1840) - ENDODECA, Rafin.=Arlstoloohla, Linn.

EUDOLON, Salisb. Gen. PI. Fragm. 127 (1866) = Strumaria, Jacq. (Amaryllid.).
undulata, Salisb. 1. c = S. nndulata.

EUDORUS, Cats, in Bull. Soc. Philom. (1818) 165; -et in Diet. Sc Nat. xv. 625 (1819)-Seneeio, Linn. (Compos.).
senecioides, Cass. II. cc.=S. Eodorus.

EUDOXIA, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 202 (1836) = Oentiana> Toum.
formosissima, D. Don, ex G. Don, 1. c—Peruv.
pendula, D. Don, ex G. Don, 1. c—Peruv.

EUFORBIA, Tenore, Fl. Nap. i. 258 (1811-15)- Euphorbia, Linn.

EUFRAGIA, Griseb. Spicil. FL Rumel. ii. 13 (1844)- Bartsia, Linn. (Scrophul.).
atroviolacea, Dor. ex Gnss. Enum. PL Inar. 243- B. latifolia.
latifolia, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 14 = B. latifolia.
viscosa, Benth. in DC. Prod. x. 548 = B. viseosa.
Vivianii, Coss. in Bnll. Soc Bot Fr. xii. (1865) 279, 282 - B. latifolia.

EUGEISBOITA, Griff, in Calc Joum. Nat. Hist. v. (1845) 101. *PALUAE,* Benth. & Hook. £ iii. 934.
minor, *Becc. in Nuov. Giorn. Bot.* iii. (1871) 18.— Borneo.
insignia, *Becc. 1. c.* 22.—Borneo,
triste, *Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist.* v. (1846) 101- —Malaya.
ntilis, *Becc. in Nuov. Giorn. Bot.* iii. (1871) 26.— Borneo.

EUGENIA, Mich, ex Linn. Syst ed. 1(1736). *MYRTACEAE,* Benth. *8c* Hook, *i* i. 718.
ACMENA, DC. in Diet. Class. Hist. Nat. xi. 401 (1826).
AMYRSIA, Rafin. Sytva Tellur. 106 (1838).
CALWHYLLOIDES, Smeathm. ex DC. Prod. iii. 272 (1828).
CALYPTRANTHUS, Blume, Bijdr. 1089 (1826).
CARYOPHYLLUS, Linn. Syst. ed. I (1735).
CATINGA, Aubl. PI. Gui. 511. t. 203 (1775).
CEROCARPUS, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl- 36 ; Cat. Hort. Bog. Alt. 262 (1844).
GLAVIMYRTUS, Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat i. H[3>] t. 49 U849).
CLEISTOCALYX, Blume, 1. c. 84. t. 56 (1849).
CuMKIEA, Rafin. Sylva Tellur. 106 (1838).
EMUKTIA, Rafin. 1. c. (1838).
EPLEIENDA, Rafin. 1. c 107 (1838).
GELPKEA, BInme, Mus. Bot Lugd. Bat i. 88. t. 3» (1849).
GXEGGIA, Gaertn. Fruct. i. 168. t. 33 (1788).
GUAPURIUM, Juss. Gen. 324 (1789).
HEXACHLAMYS, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864; 345.
JAMBOLIFERA, Houtt. Handleid. ii. 272 (1774).
JAMBOS, Adans. Fam. ii. 88 (J768).
JOSSINIA, Comm. ex DC. Prod. iii. 237 (err. 9F- 337) (1828).
LOMASTELMA, Rafin. Sylva Tellur. 107 (1838).
MACROMYKTUS, Miq. Fl. Ind. Bat L I. 439 (185$)-

EUGENIA.:—

MALIDRA, Rafin. Sylva Tellnr. 107 (18881.
MICROJAMBOSA, Blume, Mm. Bot. Lugd. Bat. i. 117

MYRCIARIA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 820.
OLYNTHIA, Lindl. Collect. 19, in obs. (1826).
OPA, Lour. Fl. Cochinch. 308 (1790).
OPANEA, Rafin. Sylva Tellnr. 108 (1838).
PHYUOCALYX, Berg, in Unnaea, xxvil. (1854) 806.
PUMA, Plnm. ex Linn. Syst ed. I (1785).
ROGENtA, Neck. Elem. ii. 78 (1790).
SIPHONEUGENIA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 841.
STENOCALYX, Berg, I. c. 309 (1884).
STRONGYLOCALYX, Blume, Mm. Bot. Lugd. Bat L - 89. t. 54 (1849).
SUARDA, Nocca, ex Stend. Nom. ed. II. ii. 651 (1841).
SYLLYSIUM, Meyen & Schau. in Nov. Act. Nat.Cnr. xix.Snppl. i.<1848)384.
SYZYGIUM, Gaertn. Fruct. i. 166. t. 38 (1788).

Mapulcensis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 601.—Mexic
Acca, Berg, in Unnaea, xxvii. (1864) 788, sphalm., est nomen generis.
•cetosans, *Pair. Etuyc. Suppl.* Hi. 125.—Gnian.
Aeka, Z>C. *Prod,* iii. 277.-^Peruv.
•WS, *Wight V Am. Prod.* 331.—Ind. or.
"oophylla. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 675.—Bras.
"cuminata, Unk, Enum. Holt Berol. ii. 28-Myrtn» sencea.
•cuminata, *Roxb. Hort. Beng.* [37]; *Fl. Ind.* ii 492.—Ins. Molncc.
acuminatissiina, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 815.—Bras.
fdissima, Km, in Joum. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) n. 67; For. Fl. Burma, i. 487=E. Thumra.
""*tminatissima,* Miq. in Linnaea, xix. (1847) 440 *(-Blepharocalyx acuminatissima).*—Bras.
"™» P«i Unn. Sp. PI. 471-Barringtonia acutangula.
?™*ia> *•?• *in Linnata,* xxii. (1849) 5S5.-Bras.
««tiloba, *DC. Prod.* iii. 281.-Jamaic..
adamantium, *Camtess. in St. HL ft. Bras. Her.* ii. 848.—Bras.
*jenocalyx. *DC. Prod.* iil. 271.—Gnian.
•lnocarpa, *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. I. 569.-Joras.
Miqm Anal. Bot. Ind. i. 22.—Malaya.
aerugmea, *DC. Prod.* iii. 288.—Am. trop.
affinis, *DC* ;.f;272._Ind.occ.
Hook_Bot_MiM_ (1833) 811 — Hookeri.
h?f£}j?li> *Benth. ex Berg, in Unnaea,* xxvii. o,<185*) 249.-N. Granat
"»a, Roxb. Hon. Beng. [37]; Fl. Ind. ii. 498--J»vanica.
"banensis, *Sand, in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 522.-
«R ? A. *•«*• " B^B.in Linnaea, xxx. (1859-60) JS.3-Calypt,anthes cuprea.
N•CEZ"6_ V BO»*I-P'- *Aeayin.* ii. 107.1118.-at.
albiflora, *Dutkie, ex Kurs, For. Fl. Burma,* i. 491.—Burma.
albo-tomentosa, *Combess* in St_Hil_ „,Bras_Mtr_ ii. 369.—Bras.
alpigena, *DC- Prod. Hi.* 265.-Bras.
alpina *Willd. Sp. PI.* ii. 961.-Jamaic.
alterni::f vf?»«» Bcsh. PI. Hartw. 175=alatemifolia.
alternifolia, *Wi* ght, h, *. 537; 1Uuilr, „, 1 6.—Ind. of.
amazonica, Berg< •'" Uari_m_Brat_xiT_ 1. 822.—Bras.
ambigua, *Berg, l. c.*241._Bras.
amdoinensis, Hort. ex DC. Prod. iii. 224 - Metrosidero» vera.
am S^"1?'"' Noi*_ <* "»*. *Enum. Hort. Berol.* ii.
e ^ Amboin.
T.? «; ^Hort_Mako y.« E-Morr_™W» Hortic_
x„ (1880) t. ad p. 95-mexicanat
ang ™»..A. *Bray, Bot. V. St. Expl.Exped. I* 524. t
"oeaa' -7W £ *Pl. 2* ^. iu._Zeylan.

BUOEH1A:—

amplexicaolU, *Roxb. Hort. Beng.* [87]; *Fl. Ind.* ii. 483.—Ind. or.; Burma.
amptexicaulis, Veil. Fl. Flsm. 210; v. t 44 *{=Gomidesia amplexieaulis).*—Bras,
anaetomosans, *DC. Prod.* iii. 269.—Gnian.
anceps, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 260.—Bras,
andina. *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 274.—Pernv.
androsaemoides, Bedd. Fl. Sylv. Anal. Gen. p. cvii=-cordifolia.
androsaemoides, *DC. Prod.* iii. 284.—Ind. or.
androsaemoides, Herb. Wight, ex Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 491 - operculata.
angophoroides, *F. Muell. Fragm.* v. 33.—Austral.
angustifolia, Blame, in Flora, vii. (1824) 291 = Blumei.
angustifolia, *Lam. Encyc.* Iii. 208.—Ins. S. Doming.
angustifolia, Roxb. Hort. Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 490—polypetala.
angustifolia, Spreng. Nov. Frov. 18-Sprengelii.
angostissima, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 669.—Bras,
anisosepala, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 481.—Malacca,
aphthosa, *Vieill. ex Brongn. tf Cris, in Butt. Sot. Bot. Fr.* xiii. (1866) 469—*S.* Caled.
apicnlata, *DC. Prod.* iii. 278.—Chili,
apiocarpa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 284.—Bras.
aprica, *Berg, 1. c.* 218.—Reg. Argent.
• aqnea, *Burnt, f. Fl. Ind.* 114.—Burma; Zeylan.
aranjoana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 219.—Bras.
Arayan, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 125.—N. Granat.
arbutifolia, *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. 1.306.—Bras,
arctostaphyloides, *Berg, I. c.* 217.—Bras,
arenaria, *Cambess. in St. Hil. Fl.Bras.Mer.* ii. 349.—Bras,
areolata, *Duthie, in Hoot. /. Fl. Brit. Ind.* ii. 490.—Reg. Himal.
argentea, *Bedd. Ft. Sylv. Anal. Gen.* p. cix.—Ind. 01.
Arivoa, *Aubl. PI. Gui.* i. 61O.-Giian.
armeniaca, *Sagot, in Ann. Se. Nat. Sit.* VI. xx. (1886) 190.—Goiara.
Armstrong!!, *Benth. Fl. Austral,* iil. 286.—Austral.
Arnottiana, *Wight, Ic.* t 999 j *Illustr.* ii. 17.—Ind. or.
aromatiea, Baitl. Hist. Pl.vi. 311,345=caryophyllata.
aromatica, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 268.—Venezuela.
Arrabidae, *Berg, I. e.* 802.—Bras.
arvemis, Veil. FL Flum. 209; v. 187-oxyphylla.
asperifolia, *Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 674.—Ind. oca
assimilis, *Bedd. For. Man. Bot.* 107.—Zeylan.
astringens, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Ater.* ii. 861.—Bras.
atropnnctata, *Steud. in Flora,* xxvi. (1843) 762.—Guian.
asrata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.278.—Bras.
australis, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxi. (1827) 123. t. 8»Berteriana.
australis. WendL ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 28 - myrtifolia, *Sims.*
anstro-caledonica, *Seem. Fl. Vit.* 78.—N. Caled.
axillaris. Veil. FL Flum. 209; v. t. 41 - sopra-axillaris.
axillaris, Willd. Sp. PL ii. 960 = monticola.
auirensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 224.—Bras.
badia,-ff«y, *I. e.* 266.—Bras,
bagensii, *Berg, 1. c.* 281.—Reg. Argent,
bahiensis, *DC. Prod.* iii. 271.—Bras.
Balbislana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 268.—Ind. occ.
Balfourii, *Baker, Fl. Mount.* 116.—Ins. Mascar.
balsamea, *Wight, Illustr.* B. 16.—Reg. Himal.; Burma.
balsamica, *Jacq. Fragm.* 40. t 46.*1* 2.—Jamaic
Barneoudi, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 268= HookerL
barrerenaii. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 818.—Bras.
baruensis, Bal. ex Berg, 1. c. xxix. (1857-68) 238-insnlaris.
baruensis, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 214-procera.

JSVQiENlA. :—

baroensis, *Jaeq. Coll.* iii. 183; *le. Rar.* t 486.-Ins. S. Doming.
batnearyensis, *Berg, I. e.* 262.—Reg. Argent.
Bauanguica, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 418=laeta.
Beddomei, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 476.—Ind. or.
bella, *Cambess. in St. Hil. Ft. Bras. Her.* ii. 862.—Bras.
bella, Phil, in Linnaea, xxviii. (1866) 641=pnlchra.
Benthamiana, Wight, ex Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 484-Arnottiana.
Benthamii, *Berg, in Unnaea,* xxvii. (1854) 164.—Gnian.
Bergiana, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 182.-Cnba.
berlynensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 468.—Gnian.
Berteriana, *Spreng. Syst.* ii. 487.—N. Granat.
bicolor, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 282.—Bras.
Ufaria, Coleb. in WalL Cat n. 3606=Wallichiana.
\>ihrii,Wall. PI. As. gar. ii. 47.1.161.—Reg. Himal.
biflora, *DC. Prod.* iii. 276.-Jamaic
bimarginata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 291.—Bras.
bimarginata, DC. Prod. iii. 271=dicrossa.
Blanchetiana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 273.—Bras.
Blnmei, *Steud. Nom.* ed. II. i. 601.—Java.
Boieri, *Baker, Fl. Mount.* 115__Ins. Mascar.
boliviensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1. 221.—Am. trop.
BonpUndiana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 228.—N. Granat
bomeensis, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 24.—Borneo,
brachiata, *Roxb. Hort. Beng.* [37] ; *Fl. Ind.* ii. 488.—Ins. Amboin.
brachybotrya, *DC. Prod.* iii. 277.—Gnian.
brachynema, *F. Muell. Fragm.* iv. 69.—AnstraL
brachypoda, *DC. Prod.* iii. 274.—Gnian.
brachystachys. *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 301.—Ins. Guadelup.
Brackenridgei, *A. Gray, Bot. V. St. Exfil. Bxfed.* i. 621. t. 61.—Ins. Fiji.
braeteata, Raensch. ex DC. Prod. iii. 264-Myrcia bracteata.
braeteata, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat Par. i. (1792) HO^Myrcia lanceolala.
bracteata, *Roxb. Hort. Beng.* [87); *fl. Ind.* ii. 490.-Ind. or.
bracteata, Veil. FL Flum. 209; v. t 40-involncrata.
bracteolaris. Urn. ex DC. Prod. iii. 267=brasiliensis.
bracteolata, *Wight, Ic.* t. 531; *Illustr.* ii. 15.—Burma; Malaya.
bracteosa, *DC. Prod.* iii. 27«.—Bras,
brasiliana, *Aubl. PI. Gui. i.* 611.—Guian.
brasiliensis, *Lam. Encyc.* iii. 203.—Bras,
brevifolia, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. SSL-Ins. Samoa,
brevipes, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 584 j *et ex Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 676.—Ind. occ.
Bridgesii, *Hook. W Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 322.—Chili.
Bullockii, *Hance, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 227__China.
buxifolia, Lam. Encyc iii. 202-coriacea.
buxifolia, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1866) 640.—Chili.
buxifolia, Spreng. ex DC. Prod. Ui. 275-guadalupensis.
buxifolia, *Willd. Sp. PI.* ii. 960.—Am. bor.; Iod. occ
cabanisiana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 236.—Florida,
cachoëirensis, *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. 1. 266.—Bras.
calcadensis, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 110.—Ind. or.
callophylla, Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat Reinw. 69—aquea.
calophylfifulia, *Wight, Ic* 1.1000.—Ind. or.
CalophyUoides, *DC. Prod.* iii. 272.—Afr. trop.
calycina, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 358.—Afr. trop.
calycina, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 352.—Bras.
calycolpoides, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 238.—Ind. occ.
calycorectoides, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1867-58) 236.—Mexic.
calycosema. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 276.—Bras.

EUGENIA:—
calyculata, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 271.-Poito Rico.
calyptrata, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 829=E. Jambolana.
camarioca, *Wright, in Satn. Fl. Cub.* 42.—Cuba.
Cambessedeana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.230.—Reg. Argent.
campestris, *DC. Prod.* iii. 274.—Bras,
campestris, *Veil. Fl. Flum.* 208; v. t. 35.—Bras,
cana, *DC. Prod.* iii. 264.—Bras.
Candolleana, *DC. I. c.* 281.—Bras,
canelonensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 282.—Reg. Argent,
canescens, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 289.—Ind. occ.
capensis, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* 416 ; *et in Fl. Cap.* ii. 522.—Afr. austr.
capitellata, Am. in NOT. Act Nat. Cnr. xviii. (1836) 335 = Memecylon Arnottiannm.
capitulifera, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 263.—Bras,
capparidifolia, *DC. Prod.* iii. 281.—Bras.
Capuli, *Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 560.—Mexic.
carissoides, *F. Muell. Fragm.* iii. 130.—Austral,
cartagensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 240.—Costa Rica.
carthagenensis, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 28.—N. Gianat.
taryophylla, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126 = E. rseudo-caryophyllus.
caryophyllaea, *Wight, Ic.* t. 540 J *Illustr.* ii. 15.—Ind. or.; Malaya.
caryophyllata, *Thunb. Diss.* 1.—Ins. Molncc.
caryophylli/olia, Lam. Encyc. iii. 198 = E. Jambolana.
caryophylloides, Benth. in Hook. Niger Fl. 359 = calophylloides.
Casaretteana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 520.—Bras.
casearioides, *DC. Prod.* iii. 275.—Venezuela,
cassapensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 296.—Peruv.
cassinoides, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 286.—Bras.
cassinoides, *Lam. Encyc.* iii. 205.—Madag.
Catharinae, *Berg, in Mart. Fl. Bras.jZ*.* I. 259.—Bras.
Catinga, *Bail!. Hist. PI.* vi. 344.—Gnian.
catingiflora, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 89.—Cuba,
cauliflora, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 268.—Bras.
cauliflora, DC. Prod. iii. 273-edulis.
cauliflora, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 537 *(-Myreiaria trunciflora).*—Bras.
cerasiflora, Knrz, in Joura. As. Soc. Beng. xlii. (1873) H. 233 = Kurdi.
cerasiflora, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 793.—Bras,
cerasiformis, *DC. Prod.* iii. 274.—Java.
cerasoides, Roxb. Hort Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 488-operculata.
Chekan, DC. Prod. iii. 278=seq.
Cheqnen, *Molina, Sagg. Chile,* ed. II. 148.—Chili,
chinensis, *Regel, Cat. PL Hort. Aksakov.* 57.—China,
chiqnitensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 519.—Bras,
chlorantha, *Duthie, in Hoot./. Fl. Brit. Ind.* ii. 487.—Malaya,
chlorocarpa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 220.—Bras. *
chlorophylla, *Berg, I. c.* 588.—Bras,
chrysantha, *Berg, 1. c.* 272.—Bras,
chrysobalanoides, *DC. Prod.* iii. 285—Ind. occ.
chrysocarpa, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 168.—Chili.
chrysophylloides, *DC. Prod.* iii. 278.—Gnian.
Chrysophyllum, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 129.—Gnian.
chrystaënsis, Berg, in Mart FL Bras. xiv. 1.1 4. f. 75 =cristaënsis.
ciarensis, *Berg, I. c.* 235.—Bras,
ciljolata, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 344.—Bras,
cincta, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 182.—Cuba,
cinerascens, *Gardn. in Hook. Lend. Journ. Bot.* iv. (1845) 102.—Bras.
cinerea, Knrz, in Pegu For. Rep. Append. B. 50.« brachiata.
cinnamomea, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 178.—Ins. Philipp.
cisplatensis, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 342—Bras.

EUGENIA :-
citrifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 129.—Guian.
claviflora, *Roxb. Hort. Beng.* [37]; *Fl. Ind.* ii. 488.—As. trop.
clinocarpa, *DC. Prod.* iii. 267.—Bras,
clusiaefolia, *A. Gray,Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 528.—Ins. Samoa,
dusioides, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 180.-N.Caled.
coaetanea, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 220.—Bras,
coarensis, *DC. Prod.* iii. 267.—Bras,
coccifera, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 278.—Bras,
codyensis, *Afunro, ex Wight, Illustr.* ii. 13.—Ind. or.
coffeaefolia, *DC. Prod.* iii. 272.—Guian.
colchaguensis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 72.—Chili,
colipensis, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 243.—Mexic.
collina, *DC. Prod.* iii. 281.—Bras,
colorata, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 492.—Malacca,
columbiensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 469.—Venezuela.
Comete, Aubl. PI. Guin. t. 196 <= Coumeta Myrcia.
commutata, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 174.—Jamaic.
comosa, Wall. Cat n. 8666 D=oblata.
compactiflora, *Spring, ex Mart, in Flora,* xx. (1837) *Beibl.* II. 81.—Bras,
complanata, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1848) 353.—Bras,
complicata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1. 313.—Bras.
compressa, *DC. Prod.* iii. 276.—Peruv.
compta. *Rich, ex Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 677.—Ind. occ.
concinna, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 640.—Chili.
concinna, Thw. Enum. PI. Zeyl. 416 = Thwaitesii.
condensata, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 112.—Madag.
confertifolia, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 523. t. 61.—Ins. Fiji.
confnsa, *DC. Prod.* iii. 279.—Ind. occ.
conglomerata, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 497.—Malaya.
contracta, Poir. Encyc. Suppl. iii. 125=caryophyllaea.
contracta, Wall. Cat. n. 8602-pellucida.
cordaia, *DC. Prod.* iii. 272.—Ind. occ.
cordata, *Lavs, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 438.—Afr. trop.
cordifolia, *Wight, Ic.* t 544; *Illustr.* ii. 16.—Zeylan.
coriacea, *F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr.* iii. 263.—Ins. Maurit.
cormiflora, *F. Muell. Fragm.* v. 23.—Austral,
coronata, *Schum. (f Thonn. Beskr. Guin. PI.* 230.—Afr. trop.
coronata, *Vahl, ex DC. Prod.* iii. 271.—Afr. trop.
corralensis, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 72.—Chili.
Correae, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 277.—Bras,
correaefolia, *Hook,* b* *Am. in Hook. Bop. Misc.* iii. (1833) 819 *(=Myrceugenia correaefolia).*—Chili.
corticosa, Lour. Fl. Cochinch. 308 = E. Jambolana.
corymbosa, *Berg, in Linnaea,* xxxi. (1861-62) 256.—Peruv.
corymbosa, Lam. Encyc. iii. 199=caryophyllaea.
corymbosa, Roxb. Hort. Beng. [37]; Fl. Ind. ii. 497-densiflora.
corymbosa, Wall. Cat n. 3566 F=lineata.
corynantha, *F. Muell. Fragm.* ix. 145.—Austral,
corynocarpa, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 526.—Ins. Fiji,
costaricensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 218.—Costa Rica,
costata, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 272.—Porto Rica
costata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 577.—Bras,
costata, *Brongn.* to" *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1866) 178.—N. Caled.
costata, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 359.—Bras,
cotinifolia, *Jacq. Obs. Bot.* iii. 3; *Lam. Encyc.* ii. 204.—Ins. Mascar
Coumeta, DC. Prod. iii. 245 -seq.
Coumete, Aubl. PI. Gni. i. 497 = Myrcia Coumeta.
crassifolia, *DC. Prod.* iii. 266.—Bras,
crassifolia, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 439.—Bras.

EUGENIA:—
crassifolia, *Vieill. ex Brongn. tf Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 469.—N. Caled.
crenata. *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 226.—Jamaic.
crenata, Veil. Fl. Flum. 209 ; v. t. 89-Velloziana.
crenulata, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 490.—Malacca.
crenulata, *Willd. Sp. PI.* ii. 961.—Ins. S. Doming,
cristaënsis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 222.—Bras.
cristata, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 41.—Cuba.
Cruclcshanksii, *Hook.* CT *Am. in Hoot. Bot. Misc.* iii. (1883) 321.—Chili.
cryptophlebia, *F. Muell. Fragm.* ix. 144.—Austral.
Cumingiana, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 173.—Ins. Philipp.
Cumingii, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 319.—Ins. Chiloe.
cuneata, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 495.—Reg. Himal.
cuneata, Wall. Cat. n. 3625 = E. Jossinia.
cuneifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 144.—Madag.
cuspidate, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 286.—Bras.
cuspidata. Wall. Cat. n. 8627 = Decaspermum paniculatum.
cuspidifolia, *DC. Prod.* iii. 279.—Bras,
cyclophylla, *Baker, in Joum. Bot.* xx. (1882) 111.—Madag.
cyclophylla, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 287.—Bras,
cyclophylla, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 404.—Zeylan.
cydoniaefolia, *Berg, in Mart. fl. Bras.* xiv. I. 229.—Bras.
cylindrica, *Wight, Ic.* t. 527; *Illustr.* ii. 14.—Zeylan.
cymatodes, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 578.—Bras.
cymosa, *Lam. Encyc.* iii. 199.—Ins. Maurit.
cymosa, Roxb. Hort. Beng. [37]; Fl. Ind. ii. 492-grandis.
cymosa, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274 = mascarensis.
cyphophloea, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 87.—Cuba.
Dallachyana, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 267—Austral.
Darwinii, *Hook./. Fl. Antarct.* 277.—Chili,
dasyantha, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 572.—N. Granat.
decora, Salisb. Prod. 353 = E. Jambos.
decora, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 115.—Zeylan.
decora, Wall. Cat. n. 3608=javanica.
decorticans, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 240.—Bras,
decumbens, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii-339,-Bras.
defiexa, Poir. Encyc. Snppl. iii. 124 = Myrcia dellcxa.
delicatula, *DC. Prod.* iii. 273.—Bras,
densiflora, *DC. 1. c.* 287.—Malaya.
densiflora, Willd. ex Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 247-foliosa.
depauperata, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* »• 366.—Bras.
deserti, *Cambess. I. c.* 343.—Bras.
Desvauxiana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 198.—Ind. occ
diantha, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 239.—Bras,
dichotomy *DC. Prod.* iii. 378.—Am. bor.; Ind. occ.
dichroma, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 290.—Bras,
dicrana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 259.—Florida.
dicrossa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 291.—Bra«-
dictyophleba, *Berg, 1. c.* 226.—Bras,
dimorpha, *Berg, 1. c.* 264.—Reg. Argent,
diospyrifolia, *Wall. Cat.* n. 8617.—Reg. Himal.
dipoda, DC. Prod. iii. 268=punicaefolia.
discolor, *DC. I. c.* 277.—Reg. Andin.
discolorans, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 41.—Cuba,
disperma, *Veil. Fl. Flum.* 209 ; v. t. 38.—Bras,
distans, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 263.—Bras,
disticha, *DC. Prod.* iii. 274.—Jamaic.
distoma, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 155.—Bras,
dittocrepis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 292--^ Bras.
divaricata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (18*0) [s19], —Guian.
divaricata, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 257.—Chili.

EUGENIA:—

diyaricata, Lam. Encyc. iii. 202 = Myrcia divaricate.
anaricata, Willd. ex Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 199 = baruensis.
aiversiflora, *Berg, 1. c. xxx.* (1859-60) 675.—Bras.'
aiverarfolia, *Brongn. (f Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1866) 180.—N. Caled.
"Jouat, *Perr. in Mem. Soc. Linn. Par.* üi. (1825) 116. -Ins. Philipp.
dodoneaefolia, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 364—Bras.
Uombeyana, *DC. Prod.* iii. 276.—Peruv.
domestica, Bull. Hist. PI. vi. 345 = malaccensis.
nonungensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 296.—Ind. occ.
Qoniana, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 643, Index - Myrcia Doniana t
Uuaitiana, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 348. —Bras.
'uchassaingian^ *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 225. --Ind. occ.
°«en, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 256.—Bras,
annietonim, *DC. Prod.* iii. 284.—Cochinch.
Jamosa, *DC. I. c.* 276.-Am. calid.
"opontu, *Baker, Fl. Maurit.* 116.—Ins. Mascar.
"Wantha, *Benth. PI. Hartv.* 175.—N. Granat.
oysentenca, *DC. Prod.* iii. 268.-Bras.
«»>*. *Benth. &• Hook. f. ex Griseb. in Goett. Abh.* *gy. (1879) 126.—Ree. Argent.
Veil. Fl. Flum. 208; £1 34.-Br.s.
Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 524.—Ins. Pacific
he. Prod. iii. 281.—Bras,
bergiana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 158.—Ind. occ.
Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 232.—Reg. Argent.
&*>/*<>*oi. b- Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) •Uruguay.
^a, Lam. Encyc. iii. 206=cotinifolia.
Phil, in Anal. Univ. Chil. (1866) H. 315.—
Ptica, Sieber, ex Presl, in Oken, IsU. xxi. (1828)
S Wall. Cat. n. 8587=valdevenosa.
280.-Venezuela.
Ind. occ.
W«*. «rfr. *Ste-Croix,* 290.-
145. *in Journ. Linn. Soc.* (1883)
27O.-N. Granat.
i. 84g—Bras.
582.—Bras.
in Linnaea, xxvii. (1854) 275>~InS*
Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 250.-Bras.
55.-AustraI.
I. 233—Bras.
(1854) 275>~
(1859-60) 687.-
Ind. occ.
277.—Bras.
312—Bras.
269.-Bias.
260—Bras.
Penang.
(1837) Beibl. II. 84.—Bras.
278.—Peruv.
= Myreuf illax.
1 Act Soc Hist> Nat Par- L (1792) 110
588.—Cuba.
3622 = bracteata.
233.—Guian.
288.-Bras.
2«6—Bras.
S23.-Bras.
C. Gay, Fl. Chil. ii. 392 = Myrtus fernandeziana.
Bras. xiv. I. 286.-Bras.

EUGENIA:—

ferrnginea, *Hook.VAm.in Hook. Bot. Misc.*iii. (1838) 819.—Chili.
ferruginea, Poir. Encyc. Suppl. iii. 124—Myrcia ferrnginea.
ferroginea, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 591.—Cuba.
ferruginea, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274 = Psidium ferrugineum.
ferruginea, Wight, Ic. t. 564 = E. Thumra.
fetida, Poir. Encyc. Suppl. iii. 129=foetida.
fidfolia. WalL ex Duthie, in Hook. *t.* Fl. Brit. Ind. ii. 476— grandis.
Fieldingii, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 242.—Mexic.
filiformis, *Macfad. Ft. Jamaic.* ii. 116.—Jamaic.
filiformU, *Wall, ex Duthie, in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 478.—Malaya.
fimbriata, *DC. Prod.* iii. 278.—Peruv.
firma, DC. Prod. iii. 282,partim-capparidifolia.
firma, Wall. Cat. n. 8608 = grandis.
flamingensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 676.—Bras.
flava, *Berg, 1. c.* 278.—Bras,
flavescens, *DC. Prod.* iii. 272.—Bras,
flavo-nigra, *Rich, ex- Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 691.—Ind. occ.
flavo-virens, *Berg, I. c.* xxvii. (1864) 184.—Ind. occ.
floccifera, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* 115.—Zeylan.
floccosa, *Bedd. Fl. Sylv.* i. t. 200.—Ind. or.
floribunda, Spreng. ex DC. Prod. iii. 279 = confnsa.
floribunda, *West, Bidr. Ste-Croix,* 216; *ex Willd. Sp. PI.* ii. 960.—Ins. S. Crncis.
florida, *DC. Prod.* iii. 283.-Bras,
fluminensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 265.—Bras.
foetida, *Pers. Syn.* ii. 29.—Guian.
foliosa, *DC. Prod.* iii. 277.—Am. trap,
formosa, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 354.—Bras,
formosa. *Wall. PI. As. Rar.* ii. 6. t. 108.—Ind. or.; Burma.
Forateri, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 241.—Bras.
fortis, F. MueU. Fragm. v. 13 = grandis.
foveolata, *Berg, in Mart. SI. Bras.* xiv. I. 261.—Bras,
fragrans, *Willd. Sp. PI.* ii. 964.—Ind. occ.
Francavilleana, *Berg, m Linnaea,* xxx. (1859-60) 686. —Bras,
franciscensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 233. - Bras.
Freireana, *Berg, 1. c.* 305.—Bras.
Friedrichsthalii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 410. —Guatemala.
frondosa, *Wall. Cat.* sub n. 3890.—Reg. Himal.
frondosa, Wall. Cat n. 3660 G=E. Jambolana.
fruticosa, *Roxb. Hart. Beng.* [87]; *Fl. Ind.* ii. 487.—Reg. Himal.; Burma,
fruticulosa, *DC. Prod.* iii. 270.—Bras,
fuliginea, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 238.—Bras,
fulva, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 116.—Zeylan.
fulvescens, *Mart, ex DC. Prod.* iii. 288.—Bras,
fnlvipes, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xx. (1885) 189.—Guian.
Fnnkiana, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 228.—Am. austr.
fusca, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 290.—Bras.
fusiformU, *Duthie, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 479.—Malaya.
Gacognei, *Montr, in Mém. Acad. Lyon,* x. (1860) 208. - N. Caled.
Gardneri, *Bedd. For. Man. Bot.* 108.—Ind. or.
Gardner!, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 85 = Cumlngiana.
Gardneriana, *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. I. 316.—Bras.
Gaudichaudiana, *Berg, I. c.* 228.—Bras.
Gayana, *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 390.—Chili,
geminiflora. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 228.—Bras.
Gilliesii, *Hook, tf Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1893) 320.—Chili.
glabrata, *DC. Prod.* iii. 274.—Ins. S. Doming.
glandulifera, Roxb. Hort. Beng. [37]; Fl. Ind. ii. 496 = zeylanica.
glandulosa. *Blanco, Ft. Filip.* ed. I. 417.—Ins. Philipp.
glandulosa, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 352.—Bras.

EUGENIA:—

glareosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 579.—Bras,
glaucescens, *Cambess. in St. Hil. Ft. Bras. Mer.* ii. 868.—Bras.
glomerata, *Lam. Encyc* iii. 199.—Ins. Mascar.
glomerata, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274 =—Calyptranthes Syzygium.
glomerata, *Spring, ex Mart, in Flora,* xx. (1837) *Beibl.* II. 82.—Bras.
Gomesiana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 254.—Bras,
gracilenta, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1886) 7.—China,
gracilipes, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 613.—Ins. Fiji.
gracilis, Bedd. in Madr. Jouro. Sc Ser. III. i. (1864) 46 = Mooniana.
gracilis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 222.—Bras,
grandiflora, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 226.—Venezuela,
grandifolia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 824.—Bras.
grandis, *Wight, Illustr.* ii. 17 —As. et Austral, trop.
granulate, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 260.—Cuba.
grata, *Wight, Illustr.* ii. 15.—Ind. or.; Burma.
Grayi, *Seem. Miss. Vit.* 486; *Fl. Vit.* 79.—Ins. Fiji.
Greggii, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 126; *DC. Prod.* Ui. 280—Ind. occ.
Griffithii, *Duthie, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* ii. 481.—Malacca.
Grijsii, *Hance, in Journ. Bot.* ix. (1871) 5.—China.
Guabiju, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 251.—Reg. Argent.
guadahipensis, *DC. Prod.* iii. 276.-Ind. occ.
Guapurium, *DC. I. c.* 273.—Peruv.
Guayabillo, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 690.—Cuba,
guayaquilensis, *DC. Prod.* iii. 275.—Ecuador.
Guayavillo, *Benth. PL Hartw.* 174.—N. Granat.
Gudilla, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 896.—Chili.
Gueinzii, *Sond. in Han. & Sond. Ft. Cap.* ii. 623.—Afr. austr.
guianensis, *Aubl. PI. Gut.* i. 606.—Guian.
Haeckeliana, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 207.—Zeylan.
Hallii, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 250.—Ecuador.
Heckelii, *Panch. tf Sebert, Not. Bois Nouv. Calid.* 269.—N. Caled.
Helferl, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 480.—Burma; Malaya.
hemilampra, *F. MueU. Fragm.* ix. 45.—Austral,
hemispherica, *Wight, Illustr.* ii. 14.—Ind. or.
Henryi, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 7.—China,
herbacea. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 570.—Bras.
Heritieriana, Steud. Norn. ed. II. i. 603 = L'Heritieriana.
heteroclita, *Tuss. Fl. Antill.* i. 98.—Ind. occ.
heterophylla, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 586.—Cuba.
Heyneana, *Duthie, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 500.—Ind. or.
HUariana, *DC. Prod.* ill. 269.—Bras,
hirsute, *Ruit tr Pav. Fl. Per.* iv. t. 417.—Peruv.
hirta, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 674.—Bras.
Hodgkinsoniae, *F. MueU. Fragm.* ix. 145.—Austral.
HoRmannseggii, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 815 —Bras.
Homei, *Seem. Fl. Vit.* 76.—N. Caled.
Hookeri, *Steud. Norn.* ed. II. i. 603.—Chili,
horizontalis, *Panch. ex Brongn. b" Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 179.—N. Caled.
humifusa.Phil. in Linnaea, xxviii. (1866) 689 *{-Myrteola humifusa).*—Chili,
humilis, *Phil. I. c.* 689.—Chili.
humilis, Veil. Fl. Flum. 210; v. t. 43=hypericifolia.
hyemalis, *Cambess. in St. Hil. /'I. Bras. Mer.* ii. 860. —Bras,
hypericifolia, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 864.—Bras.
hypoleuca, Thw. ex Bedd. For. Man. Bot. 112 •= cotinifolia.
hypospodia, F. MueU. Fragm. v. 16-carissoi4es.
ibitipocensis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer,* ii. 866.—Bras.
ilhensis. Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. [. 288-inaxitinuia
imbricate, *Berg, 1. c.* 686.—Bras,
impunctata, *Berg, I. c.* 289.—Bras.

EUGENIA:—
inaequiloba, *DC. Prod.* iii". 282.—Guiana,
incnnescens, *Benth. in Hoot. Journ. Bat.* ii. (1840) 821.—Golan.
inocarpa, *DC. Prod.* iii. 264.—Bras,
inophylla, *Roxb. Hort. Seng.* [87]; *Fl. Ind.* ii. 496.—Ins. Molucc.
inophylloides, *A. Gray, Bat. U. St. Espl. Exped.* i. S21.—Ins. Samoa.
insignia, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* 418.—Zeylan.
insipida, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 860.—Bras.
insipida. Mart, in Flora, zx. (1837) II. BeibL 86 = prasina.
insularii, *Berg, in Linnaea,* mix. (1857-58) 238.—Ind. occ.
intermedia, *Berg, I. e.* xxviL (1864) 288.—Ini. S. Doming.
innndata. *DC. Prod.* iii. 280.—Bras,
involucrata, *DC. I. c.* 264.—Bras,
iraznensis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* L 410.—Costa Rica.
irirensU, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 586.—Bras,
ischnosceles, *Berg, I. c.* 309.—Bras,
itacolnmensis, *Berg, 1. c.* 258.—Bras,
itahypensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 580.—Bras,
itajnrensis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 340.—Bras.
itapemirimensis, *Cambess. 1. e.* 846.—Bras,
jamaicensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 287.—Jamaic.
jamboides, *Wender. ex Steud. Nam.* ed. IL L 603.—Hab.!
Jambolana, *Lam. Encyc.* iiL 198.—As. et Austral. trop.
Jambolana, Willd. ex Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 98=Myrciafallax.
jambolifera, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 829-E. Jambolana.
Jamboo, Roxb. Hort. Beng. [37], nomen=E. Jambos.
Jambos, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 416-malaccensis.
Jambos, *Linn. Sp. PI.* 470.—As. trop.
jambosa, Cranti, lust ii. 201=E. Jambos.
jambosoides, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 89.—Cuba,
janeirensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras,* xiv.- I. 678.—Bras.
javanica, *Lam. Encyc.* iii. 200.—Malaya.
javanica. Lam. 1. c. partim=aqnea.
jiquitinhonhensis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 858.—Bras.
Jossinia, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 500.—Ind. or.
jucnnda, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 281.—Austral.
Tunghuhniana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 441.—Java,
kalahiensis, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. "23.—Borneo.
Karsteniana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 277.—Venezuela.
Karwinskyana, *Berg, I. c.* xxix. (1857-68) 244.—Mexic.
khasiana, *Duthie, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 491.—Reg. Himal.
Klotzschiana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 266.—Bras.
Kochiana, *DC Prod.* iii. 268.—Bras.
Korthalsiana, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 25.—Borneo.
Knnthiana, *DC. Prod.* iii. 264.—Bras.
Kurzii, *Duthie, ex Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlvL (1877) II. 68.—Reg. Himal.; Burma,
laeta, *Buch.-Ham. in Mem. Went. Sac.* v. (1826) 188.—Ind. or.
laevicaulis. *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 492.—Malacca.
laevigata.DC.Vrod. iiL 283 *{=Eugeniopsis laevigata).* —Bras.
Jaevigata, *Miq. Anal. Bot. Ind.* L 25.—Borneo,
laevis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 177.—Ins. S. Doming.
Lambertiana, *DC. Prod.* iii. 270.—Ind. occ.
lancea, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 128.—Ins. S. Thomas.
lanceaefolia, Roxb. Hort. Beng [37] ; Fl. Ind. ii. 494 -Wallichii.
lanceolaria, *Roxb. II.* cf.—Ind. or.
lanceolata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 276.—Bras.
lanceolata, Lam. Encyc. iii. 200 = Wightiana.

EUGENIA:—
lancifolu, *Miq. Anal. Bot. Ind.* L 17.—Borneo.
Langsdorflii, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 568.—Bras.
Laruotteana, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 850.—Bras.
lateriflota, *Willd. Sp. PI.* ii. 749.—Ins. S. Crucis.
laterifolia, Pen. ex DC. Prod. iii. 273-sessiliflora.
latifolia, *Aubl. PI. Gut.* i. 502. t. 199.—Guian.
latifolia, Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 294 eplatyphylla.
latifolia, Spreng. ex DC. Prod. iii. 266«=baruensis.
laurifolia, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 367.—Bras.
laurifolia, Roxb. Hort Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 489 = bifaria.
laurifolia. Spring, ex Mart, in Flora, xx. (1837) H. Beibl. 82=Spnngiana.
laurina, Willd. Sp. PI. ii. 967 -Symplocos spieata.
laxa, *DC. Prod.* iii. 263.—Bras.
laxiflara, Poir. Enoyc. Suppl. iiL 123 = Myrcia splendens.
Leandraeana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 811.—Bras,
lepidocarpa, *Wall. Cat.* n. 3618, partim.—Burma; Malaya,
lepidota, *Berg, in Linnaea.* xxvii. (1854) 226.—Costa Rica,
leptantha, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 3S1.—Guian.
leptantha, *Wight, Ic.* t 528 ; *Illustr.* ii. 15.—Malaya; Austral,
leptoclada, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 248.—Bras,
leptosperma, *Roxb. Hort. Beng.* [92] ; *Fl. Ind.* ii. 495.—' Ins. Romoa.'
leptospermaides, Bam. in C. Gay, Fl. Chil. ii. 386 = parvifolia.
leptospermoides, *DC. Prod.* iiL 266.—Chili,
leptostemon, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 442.—Borneo.
Lencadendron, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 202.—Costa Rica,
lencanthera, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1. 277.—Bras.
lencoxylon, *Miq. Anal. Bat. Ind.* i. 26.—Borneo.
L'Heritieriana, *DC. Prod.* iii. 272.—Ind. occ.
Lhotzkyana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 806.—Bras.
ligustrina, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 264, partim -myitifolia, *Cambess.*
ligustrina, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 532.—Bras,
ligustrina. *Willd. Sp. PI.* ii. 962.—Ind. occ.
limbata, *DC. Prod.* Iii. 278.—Pernv.
limbosa, *Berg, in Linnaea,* xxviL (1854) 294.—Pernv.
lindbergiana, *Berg, 1. c.* xxx. (1869-60) 685.—Bras.
Lindeniana, *Berg, 1. c.* xxix. (1857-58) 240.—Bras.
Lindleyana, *DC. Prod.* iii. 278.—Am. austr.
linearifolia. *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. I. 230.—Bras,
linearis, *Duthie, in Hook. f. FL Brit. Ind.* ii. 486.—Ind. or.
linearis, *Rich, ex Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 673.—Ind. occ.
lineata, *DC. Prod.* iii. 273.—Ind. occ.
lineata, *Duthie, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 487.—Malaya.
Lingua, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 266.—Bras,
linguaeformis. *Berg, I. c.* 268.—Bras,
lissophylla, *Bedd. For. Man. Bot.* 108.—Ind. or.
littoralis, *Panch. ex Brongn. et Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 178.—N. Caled.
livida. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 684.—Bras,
loiseleurioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxL (1884) 341.—Madag.
lonchophylla, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 49 = lanceolaria.
longifolia, *DC. Prod.* iiL 268.—Bras,
longipes, *Berg, in Linnaea,* xxviL (1864) 160.—Florida.
lucida, *Banks, ex Gaertn. Fruct.* i. 167.—Hab.»
lucida, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 366.—Bras.
lucida, Lam. Encyc. iii. 208=cotinifolia.
lucidula, Miq. Fl. Ind. Bot i. I. 444=polyantha.
ludibunda, *Bert, ex DC. Prod.* iii. 280.—Ins. S. Doming.

EUGENIA:—
lngens, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 299.—Pernv.
Luma, Berg, I. c. 261=apiculata.
Lumilla, Phil, in Bot. Zeit xiv. (1856) 643-Myrtus fernandeziana.
Luschnathiana, *Klottsch, ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 383.—Bras,
lutescens, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 841.—Bras.
mabaeoides, *Wight, Illustr.* il. 18.—Zeylan.
macahensU,' *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 589.—Bras,
macaiensis. *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 283.—Venezuela,
macrantha, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 301.—Bras.
maurocalyx, *Mart, ex Berg, 1. c.* 388.—Bras.
macrocarpa, Cham. & Schlecht in Linnaea, xiii. (1839) 417=mexicana.
macrocarpa, *Roxb. Hort. Beng.* [37] ; *Fl. Ind.* ii. 497.—Ind.or.; Malaya,
macrocarpa, *Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 660.—Mexic.
macroclada, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1. 243.—Bras.
macrophylla, *Berg, 1. c.* 268.—Bras.
macrophylla, Lam. Encyc. Iii. 196 ^malaccensis.
macrorhyncha, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 21.—Borneo,
macrosepala, *Duthie, in HooKf. Fl. Brit. Ind.* «• 501.—led. or.
macrosperma, *DC. Prod.* iii. 277.—Bras,
macrostemon, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 188.—Cuba,
maculata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 297.—Bras,
magnifies, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bat. Fr.* xii. (1865) 178.—N. Caled.
magnifies. *Spring, ex Mart, in Flora,* xx. (1837) II. *Beibl.* 86.—Bras.
Maingayi, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 484.—Malacca.
Maire, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1889) 114.—N. Zel.
malabarica, *Bedd. Fl. Sylv.* i. t. 199.—Ind. or.
malaccensis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 415 = E. Jambos.
malaccensis, *Linn. Sp. PI.* 470.—As. trop.
malaccensis, Lour. Fl. Cochinch. S06 = aquea.
malaccensis, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 96=javanioa.
maleolens, Pens. Syn. it 29=foetida.
malpighioides, *DC. Prod. HI* 276.—Bras.
Mananquil, Blanco, FL Filip. ed. II. 290-javanica.
mandioccensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 586.—Bras.
mangifolia, *Wall. Cat.* n. 3619.—Reg. Himal.
Mansoni, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 223.—Bras.
mararhaoënsis, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 854.—Bras.
Marchiana, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 238.—Ind. occ-
marginata, *Pers. Syn.* ii. 17.—Ins. S. Doming,
mariquitensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 267.—N. Granat
maritima, *Bam. in C. Gay, Fl. Chil.* tt. 390.—Chili-
maritime, *DC. Prod.* iii. 271—Bras.
maritima, DC. 1. c. 282 = acapnlcensis.
marowynensis. *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 39.—Guian.
Martini, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 280.—I'''' occ.
Martiusiana, *DC. Prod.* iii. 269.—Bras,
mascarensis, *Presl, in Oken, Isis,* xxi. (1828) 27*.—' Ins. Maurit
maschalantha, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 278.—Reg. Argent,
matanzensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 285.—Cuba.
Mato, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 12&—»* Argent
Maximiliana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. »0-Bras.
Maximiliana, *DC. Prod.* iii. 270.—Bras.
maynensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. »'• Bras.
megalopetala, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 89.—Cuba.
Melinonis, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. >»• (1885) 194.—Guian.
membranacea, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. »• 6[89]- Bras.
memecyloides, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 369.—* trop.

EUGENIA :—

"nwpiloides, *Lam. Encyc.* ii. 203.—Ins. Maurit.

meacana, *Sttud. Norn.* ed. II. i. 603.—Mexic.

Mickelii, Lam. Encyc. iii. 203-uniflore.

mjcrantha, *Bertol. Fl. Guatimal.* 22.—Guatemala.

» trantha, *DC. Prod.* iii. 282.-N. Granat

microcarpos, Lam. Encyc. iii. 201 = Myrcia Mini, .•plendens.

microphylla, Abel> NaiT_ J own_China> 364 = pyxo-phylla †

microphylla, *A. Rich. E*". *Fl- Cub.* 684.-Cnba.

Mikaniana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. i. 297.—Bras.

Mikaniana 283-Myrcia Mikaniana.

Mini, Mart Mini.

Mi, Willd. ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 315 - Hoffmanneggii.

minima, *Blum**, Cair. G«,. *™fc«. 76.-Jaya.

»ode8ta, Z)c. ft,«rf. HJ. 279.—Bras.

monosperma, Veil. Fl. Hum. 20»; v. t. 42-=compacti-flora.

montana, monK V t. 1060.—Ind. or.

Mooniana, *Wight, Illustr.* ii. 13.—Zeylan.

moonioia, *Mo*^~ *Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.262.—Bras.

Moritziana, *Venezuela*

multiflora, *Hook. & Arn.* :» *Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 322.—Chili.

multiflora, Lam. multiflora, *Rich.* 110.—Guian.

Munroii, Miq. Anal. Bot.

Munronii, *Wight. Illu* * ii- 14.-Ind. or.

muricata, *DC.* 28S.-Bras.

mutabilis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 311.—Bras-

myrcinifolia, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) China.

myrcioides, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* —Bras.

myriophylla, *Casaretti, Dec.* 77,-BTM.

ETJOENIA:—

myriostigma, *Sagot, in Ann. Sc. Ifat. Sit.* VI. xx. (1885) 194.—Guian.

myrobalana, *DC. Prod.* iii. 277.—Bras,

myrtifolia, *Cambess. in St. Nil. Fl. Bras. Mer.* ii. 867. —Bras,

myrtifolia, *Xoxb. Hort. Beng.* [37] ; *Fl. Ind.* ii. 490.—Ind. or.; Malaya.

myrtifolia, Salisb. Prod. 853 = uniflora,

myrtifolia, Aims, *Bot. Mag.* t. 2230.—Austral,

myrtillifolia, *DC. Prod.* iii. 265.—Bras,

myrtioides, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. FT.* xii. (1865) 180.—N. Caled.

myrtoides, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 854.—Afr. trop.

myrtoides, Poir. Encyc. Snppl. iii. 126-buxifolia, *Willd.*

nana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 244.—Bias,

natalitia, *Sond. in Hani, if Sond. Fl. Cap** ii. 622.—Afr. austr.

Neesiana, *Wight, Illustr.* ii. 15.—Zeylan.

neglecta, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. *y.* 820.—Bras.

nemoralis, *DC. Prod.* iii. 267.—Bras.

nenosa, Bedd. For. Man. Bot. 106-onerculata.

nervosa, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 808.—Cochinch.

Nhanica, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii.* 362.—Bras.

nigra, *DC. Prtd.* iii. 268.—Bras.

nigrescens, Poir. Encyc. Snppl. ill. 123=cymosa.

nitens, *DC. Prod.* iii. 285.—Ins. Maurit.

nitida, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* ii (1840) 822.—Guian.

nitida, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 849.—Bras,

nitida, *Duthie, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* ii. 496.—Malacca.

nitida, Veil. Fl. Flum. 208; v. t. 86 *(=*Gomidesia Chamissolana).*—Bras.

nodiflora, Aubl. PI. Guh U. II. 140=aqu«a ?

nummularia, *Baker, Ft. Maurit.* 118.—Ins. Maurit.

nummularia, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 86.—Cnba.

nutans, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. *I.* 299.—Bras,

oaxacana, *Berg, in Linnaea*, xxx. (1869-60) 683.—Mexic.

obcordata, *Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ii. (1844) 122.—N. Zrf.

oblata, *Roxb. Hort. Beng.* [37]; *Fl. Ind.* ii. 493.—Ind. or.; Malaya,

oblongata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv.. I. 302.—Bras,

oblongifolia, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 491. —Malacca.

obovata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 289.—Bras,

obovata, *Poir. Encyc. Suppl* iii. 124.—Ins. Maurit.

obovata, Wall, ex Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 491, sphalm. pro *Sytygiutn obóvatum)* (Wall. Cat. 8552) = operculata.

obscnra, *DC. Prod.* iii. 265.—Bras,

obtusa, *DC. I. c.* iii. 266.—Perúv.

obtusata, *Willd. ex Berg, in Linnaea*, javii. (1864) 182.—Jamaic.

obtusifolia, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bros. Mer.* ii. 868. —Bras.

obtusifolia, Roxb. Hort Beng. [37]; *Fl. Ind.* iL 485 = K. Jambolana.

obtusissima, Steud. Norn. ed. II. i. 608--javanica.

obversa, *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. *I.* 295.—Bras.

obversa, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 18.—Borneo,

ocanensis, *Linden, ex Regel, Cat. Hort. Aksakov.* 57. —N. Granat.

ocdusa, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xiv. (Iá76) II. 130.-Malaya.

ochra, *Berg, in Linnaea*, xxvii. (1854) 216.—Guian.

octopetala, Buch.-Ham. ex Duthie, in Hook. f. Fl. Brit Ind. ii. 482-E. Thumra.

odorata. *Berg, in Linnaea*, xxvii. (1854) 171.—Ins. S. Doming.

odorata, Wight, Illustr. ii. 16-brachiata.

oeidocarpa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 270.—Bras.

Oerstediana, *Berg, in Linnaea*, xxvii. (1864) 285.—Costa Rica.

oletefolia, *DC. Prod.* iii. 270.—Am. trop.

oleina, Wight, IUustr. iL 16 - myrtifolia.

EUGENIA :—

oleoides, *Planck, tf Linden, Cat.* ix. (1864); *ex Bot. Zeit.* xii. (1854) 364.—Hab.1

oleosa, *F. Muell. Fragm.* v. 15.—Austral,

oligantha, *Bedd. For. Man. Bot.* 108.—Ind. or.

oligoneura, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. S2L-~ Bras,

oligophylla, *Rich, ex Berg, in Linnaea*, xxx. (1859-60) 685.—Guian.

olivacea, *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. I. 803.—Bras,

olivifolia, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 496.—Zeylan.

opaca, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 278.—Reg. Argent,

operculata, *Roxb. Hort. Beng.* [87]; *Fl. Ind.* il. 486. —As. trop.

orbicularis, *Berg, in Linnaea*, xxx. (1859-60) 678.— Ind. oca

orbiculata, Lam. Encyc iii. 202-*cotinifolia.

Orbignyana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 314.—Bras,

oreinoma, *Berg, in Linnaea*, xxviL (1854) 158.—Costa Rica.

origanoides, *Berg, 1. c.* xxix. (1857-68) 229.—Mexic

orthostemon, *Berg, 1. c.* xxvii. (1854) 179.—N. Granat.

Ottonis, *Berg, 1. c.* 298.—Venezuela,

ovalifolia, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 850. —Bras,

ovalis, *Berg, in Linnaea*, xxvii. (1854) 156.—Ecuador,

ovata, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1888) 319.—Chili,

ovigera, *Brongn.* b* *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 179.—N. Caled.

owariensis, *Beauv. Fl. Omar.* ii. 20. t. 70.—Afr. trop.

oxyphylla, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 251.—Bras.

pachnantha, *Berg, 1. c.* 686.—Bras,

pachyphylla, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 2S2.-Burma; Malaya,

pacifica, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 98.—Ins. Cocos.

pallens, *DC. Prod.* Ui. 284.—Amer.

pollens, Poir. Encyc. Suppl. iii. 122 •» Calyptnntb.es Chytraculia.

pallida, *Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. I. 281.—Reg. Argent,

paludosa, *Panch. ex Brongn.* b* *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1866) 178.—N. Cal«d.

pamatensis, *Miq. Anal. Bot. Ind.* L 22.—Borneo.

Pancheri, *Brongn. (f Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1866) 180.—N. Caled.

Paniala, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 489 _ operculata.

paniculaeflora, Steud. in Flora, xxvi. (1848) 762-Myrcia Kegeliana.

paaiculata, *Banks, ex Gaertn. Fruct.* i. 167; *Lam. Encyc.* iii. 199.—Ins. Borbon.

paaiculata, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 271.—Porto Rico.

paniculata, Cambess. in St. HiL Fl. Bras. Mer. ii. 388 (= *Eugeniopsis paniculata).—Baa.*

paniculata, Hilsenb. & Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274-Myrcia ferruginea.

paniculata, Jacq. Coll. ii. 108 = fragrans.

pantagensis. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 246.—Bras,

papillosa, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 495.—Malacca,

paracatuana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 688.—Bras.

paraënsis, *Berg, 1. c.* 801.—Bras,

paranahybensis, *Berg, I. c.* 587.—Bran,

pardensis, *Berg, I. c.* 683.—Bras.

Parkeri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 144.—Madag.

Parkeriana, *DC. Prod.* iii. 271.—Ins. Trinit.

parviflora, *Lam. Encyc.* iii. 200.—Java,

parvifolia, *DC. Prod.* Ui. 266.—Peruv.

patagonica, i AtV. *in Linnaea*, xxxiii. (1864-66) 72.—Patagon.

patens, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 124.—Guian.

Patrisii, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 85.—Guian.

patula, *DC. Prod.* iii. 284.—Bras,

pauciflora, *DC. 1. c.* 269.—Bras.

paucifiora, Wight, Illustr. ii. 14-laeta.

pellucida. *Duthie, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 485.—Burma.

EUGENIA :—
pellucida, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 85=cinnaraomea.
penangiana, *Duthie, in Hook.f. Ft. Brit* **Ind.** ii. 486. —Ing. Penang.
pendens, *Duthie, I. c.* 475.—Malacca,
pendnla, *DC. Prod.* iii. 284.—Java,
perforata, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 236.—Bras.
periplocifolia, Jacq. Coll. ii. 108 = Myrcia splendens.
persicifolia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 226.—Bras.
phaea, Berg, 1. c. 303-disperma.
Philippii, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 145.—Bras.
phillyraeoiJes, Willd. ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 238 =vaga.
phillyreaefolia, *Baker, in fount. Linn. Sac.xx.* (1883) 145.—Madag.
phillyreoides, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 207.—Zeylan.
phyllireaefolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 685.—Cuba,
pia, *DC- Prod.* iii. 263.—Bras,
piauhiensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 285.—Bras,
piloesis, *Cambess. in St. Mil. Fl. Bras. Mer.* ii. 357.—Bras.
Pimenta, DC. Prod. iii. 286=Pimenta offidnalis.
pinifolia, *Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.375.—Bras.
Piresiana, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 841.—Bras.
pisiformis, *Cambess. I. c.* 856.—Bras.
Pisonia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 228.—Bras,
pistaciaefolia, *DC. Prod.* iii. 270.—Bras.
Pitra, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864; 264.—Chili,
planipes, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1838) 323.-Ins.Chiloe.
planiramea, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. J. 284.—Bras.
platyclada, *Berg, 1. c.* 257.—Bras,
platyphylla, *Berg, I. c* 284.—Bras,
platysema, *Berg, 1. c.* 276.—Bras,
pleurantha. *Berg, 1. c.* 280.—Bras,
plicato-costata, *Berg, I. c.* 575.—Bras,
plicatulá, *Wright, in Sawn. Fl. Cub.* 40.—Cuba,
plurifloia, *DC. Prod.* iii. 270.—Bras.
pluriflora, Mart, in Flora, xx. (1887) a. Beibl. 83=rotundifolia.
Poeppigiana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 232.—Bras.
Pohliana, *DC. Prod.* iii. 264.—Bras.
Poiretii, *DC. I. c.* 274.—Ins. S. Doming.
I'oiteani, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 161.—Gnian.
polita, Wall. Cat. sub n. 3606 - Wallichii.
polyadema, *Berg, in Linnaea,* xxxL (1661-62) 258.—Peruv.
polyantha, *PAH. in Linnaea,* xxviii. (1856) 689.—Chili.
polyantha, Wall. Cat. sab n. 3603-gnndis.
polyantha, *Wight, Illustr.* ii. 17.—Burma ; Java,
polycarpa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 281.—Reg. Argent.
polycephala, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 19.—Borneo.
polygama, Roxb. Hort. Beng. [92]; FL Ind. ii. 491 « Decaspermum paniculatnm.
polypetala, *Wall. Cat. a.* 3616.—Reg. Himal.
polyphylla, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 240.—Bras,
polystachya. *Rich, in Act. Sec. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 110.—Gnian.
pomatensis, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 22. t. 4.—Borneo,
populifolia, *Baker, Fl. Maurit.* 118.—Ins. Maurit.
porphyroclada, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 266.—Chili ; Peruv.
portoricensis, *DC. Prod.* iii. 266.—Porto Rico.
praecox, Roxb. Hort Beng. [92] ; FL Ind. ii. 488 - Wallichii.
prasina, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 225.—Bras.
Priauri, *Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 681.—Gnian.
Prienrei, *Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. xx. (1885) 188.—GoUa.
proba, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1867-58) 225.—Chili,
procera, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 129.—Am. DOT.; Ind. occ.
producto, *DC. Prod.* Iii. 256.—Gnian.

EUGENIA:—
prominens, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.285.—Bras,
prosonenra, *Berg, in Linnaea,* xxxi. (1861-62) 255.—Bras.
piotracta, *Berg, I. c.* 254.—Bras.
protracta, Steud. in Florà, xxvi. (1843) 762 - Salzmanni.
pruniformis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 340.—Bras.
Pseudocaryophyllus, *DC. Prod.* iii. 282.—Bras.
Pseudomalaccensis, Hort. Par. ex Linden, in Fl. des Serres, Sér. I. v. (1849) 429 - malaccensis.
Pseudo-Mini, Steud. *Horn.* ed. II. i. 604-Myrcia Pseudo-Mini.
Pseodopsidium, *Jacq. Enum. PI. Carib* 23.—Ins. Martinic.
psidiiflora. *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 223.—Bras.
psidioides, *DC. Prod.* iii. 268.—Guian.
psychotrioides, *Mart, ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 281.—Bras.
pterocarpa, *Baill. Hist. PI.* vi. 838.—N. Caied.
pterocaulis, Miq. Anal. Bot. Ind. i. 18 = Memecylon appendiculatum.
pubescens, *DC. Prod.* iii. 288.—Venezuela,
pnlchella. *Roxb. Hort. Beng.* [37]; *Fl. Ind.* ii. 496.—Ins. Molucc.
pnlchra, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 224.—Chili,
pnmila, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 102.—Bras.
punctata, Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix, 289 •= Myrcia pnnctata.
pungens, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 224.—Bras,
punicaefolia, *DC. Prod.* iii. 267.—Venezuela.
purpurascens, Baill. Hist. PI. vi. 345 = malaccensis.
purpurea, Roxb. Hort. Beng. [37] i Fl. Ind. ii. 483 - malaccensis.
postulate, *Duthie, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 495.—Malacca.
pycnacantha, *Benth. PI. Hartw.* 174.—N. Granat.
pyramidalis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 236.—Bras.
pyriflora, *Berg, I. c.* 299.—Bras,
pyrifolia, *Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 44.—Guian.
pyrifolia, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 487.—Singapore.
pyriformis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 336.—Bras,
pyrroclada, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 165.—Bras,
pyxophylla, *Hance, in Journ. Bot.* ix. (1871) 6.—China,
quadrangularis, *Duch. ex Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 214.—Guadelup.
quadrangulata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 511.—Ins. Fiji,
quatemifolia, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 368.—Bras,
quitarensis, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 322.—Guian.
racemifera, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 322.—Bras,
racemifera, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xx. (1885) 196.—Guian.
racemiflora, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 232.—Peruv.
racemosa, *DC. Prod.* iii. 281.—Bras.
racemosa, Linn. Sp. PI. 471 = Barringtonia racemosa.
racemulosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 304.—Bras,
ramiaora, *Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 43.—Guian.
ramifiora, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 636 = sphenophylla.
ramosissima, *Wall. Cat.* n. 3604.—Reg. Himal.
rampans. *Baker, Fl. Maurit.* 116.—Ins. Maurit.
Raran, *Bern, in C. Gay, Ft. Chit.* ii. 888.—Chili,
rariflora, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 221.—Ins. Fiji.
recurvata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 319.—Bras.
Regeliana, *Berg, 1. c.* 573.—Bras.
Regnelliana, *Berg, I. c.* 245.—Bras.
Reinvardtiana, *DC. Prod.* iii. 267.—Ins. Molucc.
repanda, *Berg, in Mart. FL Bras.* xiv. .i. 304.—Bras,
reticularis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 170.—Bras.

EUGENIA.—
reticulata, Wight, Ic t 541; Illustr. ii. 16 = mangifolia.
retinadenia, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 48.—Cuba,
retivenia, *Wright, 1. c.* 44.—Cuba,
revoluta, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 224.—Cuba.
revoluta, *Wight, Ic.* t. 684; *Illustr.* ii. 17.—Ind. or.
revoluta, Willd. ex Berg, in Unnaea, xxvii. (1854) 184 =tuberculata.
rhododendrifolia, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 19.—Borneo.
rhodomelea, Comm. ex DC. Prod. iii. 269-cymosa.
rhombocarpa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 289.—Bras.
rhopaloides, *DC. Prod.* iii. 278.—Peruv.
Ribeireana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 807.—Reg. Argent.
Kichardiana, *Berg, in Linnaea,* xxx. (1869-60) 694.—Ins. Antigua.
Richii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 510.—Ins. Pacific.
Riedeliana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 261.—Bras.
rigida, *DC. Prod.* Hi. 278.—Bras,
rigidifolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 585; *et ex Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 679.—Cuba,
rimosa, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 40.—Cuba.
riparia, A. Cunn. ex Hook. Bot. Mag. sub t. 4138 •» Backhousia myrtifolia.
riparia, *DC. Prod.* iii. 288.—Bras,
rivularis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 337.—Bras,
rivularis, *Seem. Viti,* 436, nomen; *Fl. Vit.* 80.—Ins. Fiji.
rivulorum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 115.—Zeylan.
robusta, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 298=caparidifolia.
romana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 264.—Bras,
roraimana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 219.—Guian.
rosea, *DC. Prod.* iii. 264.—Bras,
rosmarinifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 129.—Ind. occ.
rostrata, Bedd. ex Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 482=cymosa.
rostrata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 282.—Bras.
Rottleriana, *Wight & Am. Prod.* 331.—Ind. or.
rotundifolia, *Casaretti, Dec. Stirp. Nov. Bras,* (iv.) 40'—Bras.
rotundifoUa,.W»;g*f, *Illustr.* ii. 17.—Zeylan.
Roxburghiana, WalL Cat. sub n. 3608 = javanica.
Roxburghii, DC. Prod. iii. 271 - bracteata.
rubens, *Roxb. Hort. Beng.* [92]; *Fl. Ind.* ii. 4'Jti.—Ind. or.; Burma,
rubescens, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 525.—Ins. Pacific.
rubicunda, *Wight, Ic.* t. 538; *Illustr.* ii. 15.—Ind. or.
rubiginosa, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. S8> (= *Engeniopsis rubiginosa).* —Bras.
rubra, Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat Reinw. 7» (= *Nelitris rubra).*—Malaya,
tubricaulis, *Duthie, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* u. 487.—Burma; Malaya,
rubrocincta, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 291.—Bras.
rufa, Bam. in C. Gar, Fl. Chil. ii. 887=ferruginea,
nifeacens, *DC. Prod.* iii. 279.—Bras,
rufo-fulva, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 416.—Zeylan.
rugosa, Ruii & Pav. ex DC. Prod. iii. 280 ^poT stachya.
Ruiziana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 167.—Guian.
rupestris, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 570.—Bra*-
ruscifolia, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 123.—Am. austr.
rutidocarpa, *Ruit If Pav. Fl. Per.* iv. t. 416.—Pef»
sabulosa, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii- S*"—Bras.
Sagraea, *Berg, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 690.—Bras,
salicifolia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. SI[2]-" Bras.
salicifolia, Buch.-Ham. ex Duthie, in Hook. f. Fl. Bri'-Ind. ii. 472=polypetala.
salicifolia, *DC. Prod.* iii. 278.—N. Granat.
salicifolia, *Lavs, in Oliver, fl. Trop. Afr.* ii. Afr. trop.
salicifolia, Wight, Illustr. ii. 16 - Heyneana.
Salzmannii, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii- (1840) 3"" —Bras.

ETTGENXA. :—
samarangensis, Berg, in Mart. Fl. Bus. xiv. I. 646, Index =javanica.
sancta, *DC. Prod.* Hi. 267.—Bras.
Mndwicensis, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 619. —Ins. Sandvic.
savaiensis, *A. Gray, I. c.* 680.—Ins. Navigat.
scabrida, Wall. Cat. n. 8564 D = grata,
scandens, *Baker, Fl. Maurit.* 118.—Ins. Maurit.
scapnephylla, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 41.-Cuba.
achaneiana, *Miq. Stirp. Sum. Sel.* 41.—Guian.
."schiedeana, *Schlecht. in Linnaea,* xiii. (1889) 418.—Mexic.
ScUechtendaliana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.821. —Bras.
Schombnrgkii, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) Sc8[illegible]—Guian.
Sc[illegible]ana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 286.—Bras.
Sdioechiana, *Berg, 1. c.* 258.—Bras.
sclerophylU, *Bedd. For. Man. Bot.* 108.—Zeylan.
wopana, *Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 489.—Singapore.
Wcheflarum, *Baker, in Proc. Roy. Irish Acad.* Ser. II. ~ &. u, (1875-77) 160.—Ins. Seychelles,
iselkirkii, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1888) 318—Ins. J. Feraand.
Se^Hori_e* B<"g,»« *Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 327.—
Sellowiana, *DC. Prod.* iii. 262.—Bras,
sencea, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 280.—Bras,
senciflora, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 98.—N. Granat
sessiliflora, *Vahl, in West, Bidr. Ste- Croix,* 290.-ins. S. Doming,
sessilifolia, *DC. Prod.* iii. 283,-Bras.
Shepherdi, F_ Mue11_ Frag"- «• "8 = Myrtns Shep" herdi.
? ebes ? a . *DC. Prod.* iii. 277.—Ins. Trinit.
anemanensis, *Aubl. PI. Gui.* i. 501.1.198.—Guian.
smgampattiana, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 65.—Ind. or.
skio P(^ *D[illegible]k f, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 486.—
smaragdina, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 218.—Guadelup.
Smithii, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 126.—Austral.
^"Bttii, Spreng. ex Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 191 .= W.olia, *Willd.,* monticola.
•oumoensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 293.—Bras.
^fj^an».^V,/.e.270.-Bras.
S[illegible]C, *Prod.* iii. 268,-Bras.
[illegible] *Berg, in Mart, Fl. Bras.* *iv> h 241.—Bra?
spathul («*>, Bedd. For. Man. Bot. 108-olivifolia.
spathulata Bras. ' *BeTg< in MaTt_* W_ *Bras_* "V- '* 24B"~
speciosa, *Cambess_in st_ Hil.* Bras.
spectabilis, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 689.-Chili.
sphaerosperma, *DC. Prod.* iii. 279.—Bras.
sph[illegible]ides, *Btrg ,in Mart_H_Bras_*xiv_ '•m~ Bf.
Rhenophyiu, *Berg, I. c.* 288-Bras.
SMY' f[illegible]llch.-Ham_ ex Wall. Cat n. 3621 = bracteau.
Srtrffib' [illegible]Um_Enc y c- «'• 201 = zeylanica.
(1824)' 5^ [illegible] *Mart_ in No*_ Act_ Nat_ Curm* Bras.
jfe'"!?; *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 226.—Bras.
Swta- ^ [illegible] *DC_ Prod_* Hi- 276.-Bras.
s S [illegible] *Berg> Bras.* xiv. *1.*299,-Bras.
^Pniceana, *Berg, I. c.* 257 .—Bras.
[illegible] Willd . ex *Berg, in Linnaea,* ixv (18M)17
[illegible] aticola.
stenophyl *in Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 322—Ins. Chiloe.
Stephan[illegible] *Berg, in M*• -«• *'«• *iv- '• 242.-Bras.
stictopeiala, *Mart.* « Z)C. *Prod.* iii. 27O.-Bras.
stigmatosa, *DC.* [illegible] 268.-Bras.
stipula[illegible] *Wig* [illegible] *hie> in Hook_f_m_ Bri*_lnd_ H_ 498_~
strel[illegible]
stric[illegible] *Fl- Bras.* xiv. I. 256,-Bras.
«a, *Panch. ex Brongn. (f Gris, in Bull. Soc. Bot.* [illegible] *Berg> in M*[illegible] *rt.Fl. Bras.* xiv. I. 268.—Bras.
[illegible], R,ch. ex Berg, in Linnaea, xxx. (1M9-60) 699 = Caly[illegible]

ETJOENIA:-
suaveolens, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bros. Mer.* ii. 839. —Bras,
snbaltema, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 320. —Guian.
subamplexicaulis, *DC. Prod.* iii. 277.—Bras,
subavenia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 571.—Bras,
subavenis, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 489.—Zeylan.
subcordata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1. 800.—Bras.
subcordata, *Wight V Am. Prod.* 831.—Ind. or.
subcorymbosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 295.—Bras,
subdecussata, *Duthie, in Hook./. Fl.Brit. Ind.* ii. 491. —Malaya,
suberosa, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 864. —Bras,
subobliqna, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 322.—Guian.
snborbicularis, *Benth. Fl. Austral,* ii. 285.—Austral,
subterminalis, *DC. Prod.* iii. 263.—Bras,
snbverticillaris, *Berg, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 284.—Am. centr.
suffruticosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 242.—Bras,
sulcata, *Spring, ex Mart, in Flora,* xx. (1837) H. *Beibl.* 85.—Bras.
supraaxillaris, *Spring, I. c.* 88.—Bras,
surinamensis, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1814) 743; *et* xxvii. (1854) 182.—Guian.
sylvatiea, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* il. 837. —Bras.
sylvatiea, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. it (1843) 352 (= *Eugeniopsis sylvatiea).*—Bras,
sylvestris, *Moon, ex Wight, Ic.* t. 582; *Illustr.* ii. 15.—Zeylan.
sylvicola, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 41.—Cuba.
Tabasco.G. Don, Gen. Syst. ii.866=Pimentaorncinalis.
tanatensis, *Baker, in Joum. Bot.* xx. (1882) 111.—Madag.
tapacumensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 222.—Guian.
teffensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 256.—Bras.
Temu, *Hook. &Arn. Bot. Beech. Voy.* 66.—Chili,
tenella, *DC. Prod.* iii. 272.—Bras,
tenells, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 532.—Bras,
tenuifolia, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 249.—Bras.; 'Venezuela.
tenuiramis, Miq. Stirp. Surin. Sel. S9 = egensis.
tennis, *Duthie, in Hook./. Ft. Brit. Ind.* ii. 600.—Ind. or.
tephrodes, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 7.—China,
tematifolia, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 336.—Bras,
ternifolia, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 246.—Venezuela.
ternifolia, Roxb. Hort. Beng. [37] J Fl. Ind. ii. 489 = Formosa.
terpnophylla, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* 114,-TZeylan.
tetraedra, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 476.—Malaya.
tetragona, *Wight, Illustr.* ii. 16.—Reg. Himal.; Burma,
tetrasperma, *Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 271.—Porto Rico,
tetrasticha, *Poepp. ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 824.—Bras.
Teyu-iba, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* vii. (1879) 116; *Contrib.* 126.—Reg. Argent,
thalassaia, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 179.—Chili.
thomasiana, *Berg, 1. c.* 183.—Ins. S. Thomas.
Thnmra, *Roxb. Hort. Beng.* [92] ; *Fl. Ind.* ii. 495.—Burma.
Thwaitesii, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 5u6. —Zeylan.
Tierneyana, *F. Muell. Fragm.* iv. 14.—Austral,
tinguyensis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 868. —Bras.
tini/olia, Lam. Encyc. iii. 202 - mespiloides.
tocaiana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 269.—Bras,
toddalioides, *Wight, Ic.* t. 542 ; *Illustr.* ii. 16.—Reg. Himal.; Burma.
tomentosa, Aubl. PI. Gui. i. 504 - Myrcia tomentosa.
tomentosa, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 353. -Bras.

EUGENIA:—
trichocarpa, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 688.—Chili.
triflora, *Ham. Prod. Fl. Ind. Occ.* 44.—N. Granat.
trifiora, Willd. ex Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. I. 462 =Campomanesia triflora.
trinervia, DC. Prod. iii. 279 «= Rhodamnia trinervia.
trinervia, Vahl, Eclog. Am. ii. 36-Vahlii.
Trinitatis, *DC. Prod.* iii. 280.—Ins. Trinit
triphylla, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 243.—Bras.
triplinervia, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 190 = buxifolia *Willd.,* monticola.
triquetra, *Berg, 1. c.* 141.—N. Granat.
tristis, *Kurt, in Joum. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 233.—Burma; Ind. or.
truncate, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 167.—Costa Rica.
trunciflora, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 867.—Mexic.
tnberculata, *DC. Prod.* iii. 278.—Cuba,
tumida, *Duthie, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* ii. 487.—Malacca.
turbinata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 218.—Bras,
tutuilensis, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 529.—Ins. Navigat.
Tweediei, *Hook, (f Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 328.—Uruguay,
ubensis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 351.—Bras.
Ugni, Hook. *8c* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 318taMyrtusUgni.
umbellaris. Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1.292 = dicrossa.
umbellata, DC. Prod. iii. 273 - dicrossa.
umbellata,Sjxtag. NeueEntdeck. ii. 169 = erythrocarpa.
umbelliflora, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 290.—Bras.
umbrosa, Bedd. For. Man. Bot. 108 = subavenis.
nmbrosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 682.—Bras,
undulata, *Aubl. PI. Gui.* i. 608. t. 202.—Guiana.
unedi/olia, Spreng. ex Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 192-buxifolia, *Willd.,* monticola.
uniflora, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 216.—Bras,
uniflora, *Linn. Sp. PI.* 470.—Am. trap,
uruguayensis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 862.—Bras.
Uvalha, *Cambess. 1. c.* 867.—Bras,
vacciniifolia, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 146—Madag.
vaga, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 238•• pnnicaefolia.
Vahlii, *DC. Prod.* iii. 279.—Guian.
valdevenosa, *Duthie, in Hook./. Fl.* flrtr./«rf.ii. '489 —Malaya.
Valenzuelana, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* i. 593.—Cuba,
variabilis, *Baill. Hist. PI.* vi. 341.—Bras,
varians, *Miq. Anal. Bot. Ind.* i. 21.—Malaya.
Vauthiereana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 217.—Bras.
Velloriana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 302.—Bras.
Vellorii, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 255.—Bras,
velutina, *Berg, I. c.* 817.—Bias,
venezuelensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 188.—Venezuel.
venosa, *Lam. Encyc* iii. 200.—Ins. Mascar.
Ventenatii, *Benth. Ft. Austral,* iii. 283.—Austral,
venulosa, *Duthie, in Hook./. Fl.Brit. Ind.* ii. 490.—Malaya,
venusta, *Roxb. Hort. Beng.* [37]; *Fl. Ind.* ii. 431.—Burma,
verecunda, *Duthie, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 496. —Malaya.
vernicosa, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 274.—Bras.
verrncosa, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 589.—Cuba.
verrucosula, Steud. Nom. ed. II. i. 605=seq.
vemiculosa, *DC. Prod.* iii. 284.—Bras,
verticillaris, *Berg, in Mart. 1<1. Bras.* xiv. 1.581.—Bras
vetnla, *DC. Prod.* iii. 271.—Bras,
vicozensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 279.—Bras.
Vieillardi, *brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii (1866) 180.—N. Caled.
villosa, Poir. Encyc. Snppl. iii. 124 = Monimia rotundifolia.
viminalis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 587.—Bras.
vincaefolia, *Berg, I. c.* 270.—Brat,
violacea, *Lam. Encyc.* iii. 200.—Ins. Mascar.
violascens, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 581.—Bras.

EUGENIA:—
rirgata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 102.—Bras.
virgata, *Macfad. Ft. Jamaic.* tt. 121.—Jamaic.
virgultosa, *DC. Prod.* iii. 280.—Ind. occ.
viridiflora, *Cambess. in St. Hit. FL Bras. Mer.* ii. 344.—Bras.
viridis, *Berg, in Linnaea,* xxvil. (1854) 302.—Bias,
vismeaeiolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 320.—Guian.
vismioides, *DC. Prod.* iii. 267.- Ins. Molncc
Vitis-idaea, Kaoul, in Ann. *He.* Nat. Sér. III. ii. (1844) 122 = Myrtus pedunculata.
Vitis-idaea, *Wright, in Sauv. Ft. Cub.* 42.—Cuba.
vulgaris, Baill. Hist PI. vi. 845 - E . Jamboi.
Wallenii, *Macfad. Ft. Jamaic.* ii. 118.—Jamaic.
Wallichii, *Wight, Ic.* t. 636; *Illuitr.* ii. 17.—Reg. Himal.; Burma.
Warszewiczii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 411.—Panama.
Widgrenii, *Sond. ex Berg, in Mart. Ft. Bras.* xiv. I. 227.-Bras.
Wightiana, *Wight, let.* 629; *Illustr.* ii 16.—Ind. or.
Wightii, Bedd. For. Man. Bot. 109~laeta.
Willdenowii, DC. Prod. iii. 265=uniflora.
mildenowii, Wight, Illustr. ii. lS^bracteata.
Wilsonii, *F. MuelL Fragm.* v. 12.—Austral.
Wrightii, *Baker, in Proc. Irish Acad.* Ser. II. *Sc.* ii. (1S75-77) 160.—Ins. Seychell.
wynadensis, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1864)47.—Ind. or.
xalapensis, *DC. Prod.* iii. 277.—Mexic.
xanthocarpa, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 31, 62 = Campomanesia xanthocarpa.
xanthocarpa, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 416.—Zeylan.
xanthoclora, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 216.—Bras,
xanthoxyloides, *Camiess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 366.—Bras.
xylopifolia, *DC. Prod.* iii. 179.—Guiana,
xystophyllum, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 196.—Cuba.
Ybaviyn, *Parodi,* tat *Anal. Soc. Cient. Argent,* fit. (1879) 69 ; *Contrib.* 119.—Reg. Argent,
ypanemensis, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. L 816.—Bras.
yrirensis, Berg, I.e. 647, Index*=irirensis.
yumnryensis, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 234.—Cuba.
Zeyheri, *Haro. Gen. S. Afr. PI.* 41C; *et in Ft. Cap.* il. 623.—Afr. anstr.
teylanica, Roxb. Hort Beng. [92] ; Fl. Ind. it 490 = bracteata.
zeylanica, *Wight, Ic.* i. 73; *Iltustr.* ii. 16.—Ind. or.; Malaya.
zeylanica, Willd. Sp. PL ii. 968 -uniflora.
Zuccarinii, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. 1.257.—Bras.

EUGENIOIDES, Linn. Fl. Zeyl. 192 (1747) - Symplooos, Linn. (Styrac).

EUGENIOPSIS, Berg, in linnaea, xxvii. (1854) 80 - Marlieria, Cambess. (Myrtac).
acuminatissima, Berg, ia Mart. Fl. Bras. xiv. 1.144.—Bras.
affinis, Berg, 1. c 149.—Bras.
angustifolia. Berg, 1. c 143.—Bras.
cannaefMa, Berg, 1. c. 148.—Bras.
Clausseniana, Berg, 1. c 146.—Bras.
Gardneriana, Berg. 1. c—Bras.
Gaudichaudiana,liKt%, 1. c. 147.—Bras.
grandifolia, Berg, I.e. 149.—Bras.?
laevigata, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 81.—Bras.
Luschnathiana, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 147.—Bras.
avata, Berg, 1. c. 146.—Bras.
paniculata, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 82.—Bras.
polygama, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 147.—Bras.
Richardiana, Berg, in Linnaea, xxx. (1869-60) 666.—Ind. occ.
Riedeliana, Berg, in Mart Fl. Bras. xiv. I. 561.—Bras.
rubiginosa, Berg, in Linnaea, xxvii. (1864) 82.—Bras.
Schottiana, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 148.—Bras.
sylvatica, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 81.—Bras.
Teuscheriana, Berg, 1. a xxxi. (1861-42) 249.—Bras.

EUGONE, Salisb. Prod. 238 - Qlorloaa, Linn. (Liliac).
superba, Salisb. 1. c.=G. superb*.

EUILUS, Stev. in Ball. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 149 <= Astragalus, Toum. (Legumin.).
reduncus, Stev. L c. =A. rednncus.

EUKLASTAXON, Stead, in Flora, xxxiii (1850) 229, nomen; Syn. PL Gram. 412 (1855) = Andropogon, Linn. (Gramin.).
tenuifolius, Steud.ll. cc = A. leucostachys.

EUKRANIA, Ra6n. Alsog. Amer. 69 (1838) - Cornua, Toum.
canadensis, Rafin. 1. c = C . canadensis.
cyananthes, Rafin. 1. c. 63 = C. cyananthes.
mascula, Rafin. 1. c. 69 «C. Mas.
suecica, Rafin. 1. c. = C. suecica.

EUKYLISTA, Benth. in Hook. Kewjoom. v. (1853) 230-Calyoophyttam, DC. (Rnbiac).
Spruceana, Benth. 1. c. 231.—Peruv.

EULALIA, Kunth, Rév. Gram. i. 160. t. 98 (1829) = Pollinia, Trin. (Gramin.).
argentea, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot 92-- P. argentea.
aurea, Kunth, ReY Gram. i. 160 = P. anrea.
capensis, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 117 - P. nuda.
concinna, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 412 = P. artieulata.
glabrata, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 98 • P. glabrata.
mexicana, Steud. Syn. PI. Gram. 412 - Andropogon saccharatns ?
villosa, Nees, Fl. Afr. Anstr. 91 - P. villosa.

EULALIA, Trin. in *Mim.* Acad. B&ersb. *Sir.* VI. fi. (1833) 332, partim - Mlsohanthua, Anderss. (Gramio.).
cotuli/era, Munro, ex Miq. Ann. Mas. Bat. Lugd. BatiL189-M. cotulifer.
densa, Munro, in Seem. Bot. Voy. Herald, 424 - M. japonicus.
japonica, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. S&. VL ii. (1833) 388=M. sinensis.
nepalensis, Trin. 1. c—Reg. Himal.

EULEUCUM, Rafin. Fl. Tellur. iii. 56 (1836) = Corona, D. Don (Empetrac).
album, Rafin. 1. c. = C. album.

ETJZiOBTTS, Nutt. ex Ton. *tc* Gray, Fl. N. Am. i. 514 (1838-40). *ONAGRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 789.
califomicus, *Nutt. L c.* 515.—Am. bor. 0CC4

ETJLOPHIA, R. Br. [ex LindL] in Boţ. Reg. t 686 (1823). *ORCHIDEAE,* Benth. &' Hook. i. iii. 636.
CYRTOPEKA, Lindl. in WalL Cat. n. 7362-64 (1831 ≤); et Gen. et Sp. Orch. 189 (1833).
ORTHOCHILUS, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 284 t. 82 (1861).
abyssinica, *Reichb.f. in Linnaea, xxä.* (1849) 866.—Abyss.
aculeata, *Spreng. Syst.* iii. 720.—Afr. anstr.
adenoglossa, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 60.—Afr. trop.
albiflora, Edgew. ex Lindl. in. Journ. linn. Soc. iii. (1859)24=herbacea.
alismatophylla, *Reichb.f. in Flora,* lxviii. (1886) 643.—Afr. austr.
aloifolia, *Welw. ex Reichb. f. 1. c.* 1. (1867) 104.—Afr. trop.
andamanensis, *Reichb.f. I. c.* lv. (1872) 276.—Burma,
artieulata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 181.—Afr. trop.
Arundinae, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 854.—Bras,
atrovirens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 183.—Ins. Maurit.
baginsensis, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 66.—Afr. trop.
barbata, *Spreng. Syst.* iii. 720.—Afr. anstr.

ETJliOPHIA:—
beravensis, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxxix. (1881) 449; *Otia Bot. Hamb.* 74.—Madag.
bicolor, Blume, Orch. Archip. Sid. 181-Cyrtopodium bicolor.
bicolor, Dalz. in Hook. Kew Jonm. iii. (1851) 343 = nuda.
bicolor, *Reichb.f. (f Sond. ex Reichb.f. in Flora,* xlviii. (1865) 186.—Afr. austr.
brachypetala, Lindl. in Jouru. Linn. Soc. iii. (1859) 24 • herbacea.
bracteosa, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7366.—Reg. Himal.; Burma,
caffra, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1866) 186.—Afr. anstr.
callichroma, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 116.—Afr. austr.
campestris, *Wall. Cat.* n. 7867.—Ind. or.
capensis. Bolus, in Journ. Linn. Sac. xix. (1882) 386 =• aculeata.
carinata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 183 = virens.
carunculifera, *Reichb. f. in Flora,* lxiv. (1881) 329.—Afr. austr.
celebica, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 182.—Ins. Celebes.
ciliata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 647=gracilis.
clamicornis, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii-(1836) 202-hians.
cochlearis, *Lindl. I. c.*—Afr. austr.
cochlearis, Steud. Norn. ed. II. i. 605=Zygopetalum cochleare,
comosa, *Sand, in Linnaea,* xix. (1847) 72.—Afr. austr.
concolor, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 181.—Ins. Borbon.
Cooped, *Reichb. f. in Flora,* lxiv. (1881) 830.—Afr. austr.
cordylinophylla, *Reichb. f. I.* e.lxviii. (1885) 541.—Ins-Comoro.
crinUa, G. Don, in Loud. Hort. Brit Snppl. i. 588-Zygopetalnm crinitnm.
cristau, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 185.—Afr. trop.
cucullata, Lindl. 1. c. *= Polystachya grandiflora.
Cnllenii, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 182, in obs.—Ind. or.; China.
dedpiens, Kurz, in Journ. As. Soc Beng. xiv. (1876) II. 166=graminea.
densifiora, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 25-—Reg. Himal.
dilatata, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist x. (1842) 184-BIetiasecunda.
dipodiifonnis, *Reichb.f. in Bonplandia,* v. (1857) »[8]-—Malaya.
Dregeana, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 202.—Afr. anstr.
elongata, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 182.—Sumatra-
emarginata, *Blume, I. c.* 180.—Sumatra.
emarginata, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. (lbS6) 202 = Mans.
ensata, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1147.—Afr. anstr.
englossa, *Reichb. f. in Bot. Mag.* t. 6561.—A-trop.
exaltata, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 88.—Java,
explanata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 180.—R* Hiroal.
filicaulis, *Lindl. in Ann. V Mag. Nat. Hist.* x. (1843) 184.—Mexic.
Fitzalani, *F. Muell. Fragm.* viii. 30; *ex Benth. & Austral,* vi 300.—Austral,
foliosa, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 337." Afr. austr.
fusca, Blume, Orch. Archip. Ind. 182, in obs.=nod*,
galbana, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 4[69],—Madag.
gracilis, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 742.—Afr. trop.
graminea, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7372.-Ind. »• Malaya.
grandiflora, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 181=bracte[owl]-
guineensis, *[Lindl. in] Bot. Reg.* t. 686.—Afr. trop'
hastata, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) (Tainiae sp.).—Reg. Himal.
helleborina. Hook. f. Bot. Mag. t 5875 - Habena"* helleborina.
hemileuca, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1869) campestris.
herbacea, *Lindl. Gen. tt Sp. Orch.* 182.—Ind. or.
hians, *Spreng. Syst.* iii. 720.—Afr. austr.
inconspicua, Griff. Notul. iii. 349—graminea.

EIO.OPHIA:—
lamellata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **184.**—Afr. austr.
leontoglossa, *Reichb. /. in Flora,* lxir. (1881) 829.—Afr. anstr.
Le chenaultii, *Blunu, Oreh_ Arch* ***p_ *Ind.* 182.** Java.
«i.«a, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 185 = Govenia uliacea.
lisa /^Al J/"TM' *Lindl_ in Hook. Comp. Bot. Mag_* a_ . (1886) 203.—Afr. austr.
lonchophyll_a> *Reichb. /. in Flora,* lxviii. (1886) 542.—ins. Comoro.
longicollis, *Lindl. injourn. Linn. Soc.* vi. (1862) 132.—Afr. trop.
longicornis, Spreng_ Syst ::'. 720 " MysUcidium filicorne.
lurida, Linn *Jen. et Sp. Orch.* **182.—Afr. trop.**
lutea, Blume> °«*- *Archip. Ind.* **181.—Java.**
h»ea. Afr. trop.
Mackai Mackaii. ™ LindL Bot> ***. tg 1*83=z ye°Petalnm
macrophi m ! ! *Blume, Orch. Archip. Ind.* **183.—Java,**
"•crostachya, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 188.—Ind. or.
"wnlata, *Reichb./. in Walp. Ann.* vi. 647.-Bras.
madagascariensis, *Kr—nta. in Bremen, Ath.* **vii. (1882) 255.—Ma** dag.
™°*illaris, G. Don, in Lond. Hort Brit. Suppt i. 588 - Zygopetalum maxillare.
m tetraphylla, *Reid,,,.* **£** *iH Gard. Ckron,* **(1885) i.** '°<; *et in Flora,* lxviii. (1885) 378.—Ins. Comoro, wwagns. *Reichb. ff. in Linnaea,* xx. **(1047) 683.**—Air. austr.
Mi Ulantha, *Lindl. Gen. etSp.Orch.* 184.—Afr. anstr.
micr P' *Reichb f- Otia Bot. Hamb.* **116.—Afr. trop.**
top. *Reihb f. in Flara,* ' ' <1867) 106 6 Afr_
monoph lla los. Mascar. *S. Moore, in Baker, Ft. Mount.* **860.—**
"ucronata, *Blume, Orch. Archip. ltd.* **182—Java.**
™*?ayana, Steud. Nom. ed. II. i. 605-Zygopetalum Mun-ayannm.
nata ML™8«8' *Reichb -f- in Flora,* xlviii. (1865) 186.—Afr. trop.
"II?"> ^«*-»» *Wall. Cat.* n. 7371.-Ind. or.
nitens, Sond "'" *Linnaea*> xix_ **(1847) 78.** Afr. austr.
ochreata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc-* iiL (1859) 2 *,~ **Ind. or.**
odontoglossa, Reichb. f. in Linnaea, xix. (1847) 378 = aculeata.
ovalis, Lu -barbata. "'"" Hook> Comp,Bt>t„ Ml* **ii. (1836) 202**
parvila S *Jndl.* '• c 201,-Afr. anstr.
pediceliata, Spren e- Syst. iii. 720 = aculeata.
Petersii, *Rei* c** *f in Flora*> rim ' C1865) **186.—Afr. trop.**
pileata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* **xxi.** (1886) "8>"" Madag.
platypetala, *Lindl_ in "ook Camp. Bot. Mag.* **ii.** (1836) 202—Afr. austr.
plicata, Bolus, in Jonra_ Linn_ Soc_ **xix. (1882)** 8S6> excl. *yn. pro parte = aculeata.
pratensis, *Lin . . in Journ. Linn Soc_* **iii. (1859) 25.—Ind. or.**
promen «. Lindl. in Wall. Cat.n. 7865 (Tainiae sp.).— Burma.
protea Afr. T" *Reichb.* .. .' w(.. ,. 1867) ..— -1[82]—Ins. Borbon.
pulchra, -p" *l. Gen. et Sp. Orch* —
Quar iana, *A. Rich. Tent. Fl.* Al ss.
ra **"ra<: «. LindL in Wall. Cat. n. 7S7O = campestris.
ra, tac »idl. '" *"*. """. 5^ "*. (1886) 47O,~
ran^T "" Wi Kht. ^ t-1666 =• pratensis.
Madi /
reticulata, *Ridl. l*
rostrata, Steud. **Nom. edTll. i. 605 = Zygopetalnm rostratum.**
rupestris, c'ndl_ ta Wall_ C*n_78M **-campestris.**
rupestris, *Reichb -f-'« Linnaea,* **xx. (1847) 682.-Afr. austr.**
rupincola, Reichb. f. in Bon Plandill, v_ <1867) M„ rupestris.
Rutenbergiana, *Kraenz. in Bremen, Abh.* **vii. (1882) 255.—Madag.**
Saundersian a, J *Reichb. f. in Bot. Za* V. xxiv. (1866) 878. —Afr. trop. T

EULOPHIA:—
Schimperiana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 283.—Abyss,
sclerophylla, *Reichb./. in Flora,* Ixviii. (1886) 542.—Afr. austr.
scripta, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 182.—Ins. Mascar.
sinensis, *Miq. in Journ. Bot. Nierl.* i. (1861) SI.— China,
sphaerocarpa, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 74.—Afr. austr.
sqnalida, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 77.—Malaya,
stachyodes, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 66.—Afr. trop.
stenochila, Steud. Nom. ed. II. i. 605 = Zygopetalum crinitum.
stenopetala, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* iii. (1859) 26.—Reg. Himal.
streptopetala, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1002.—Afr. austr.
stricta, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 186=Bletia stricta.
tenella, *Reichb. /. in Linnaea,* xx. (1847) 681.—Afr. austr.
tristis, *Spreng. Syst.* iii. 720.—Afr. austr.
vaginata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 467.—Madag.
venosa, *Reichb. /. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 300; *et Xenia Orch.* ii. 198.—Austral.
venulosa, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 116.—Afr. trop.
violacea, *Reichb./. in Linnaea,* xx. (1847) 688.—Afr. austr.
virens, *Spreng. Syst.* iii. 720.—Ind. or.
virens, Stocks, ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 26»pratensis.
mridiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 605 = virens.
virilis, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 132.— Afr trop.
Zeyheriana, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 78.—Afr. austr.

EULOPHUS, R. Br. in Bot. Reg. sub t. 573 (1821) = Eulophia, R. Br. (Orchid.).
carinatus, R. Br. 1. c = Eulophia virens.
virens, R. Br. 1. c. = Eulophia virens.

ETTLOPHUS, Nutt. ex DC. Coll. Mém. v. 69 (1829); et Prod. Iv. 248 (1830). *UMBELLIFERAE,* Benth. ft Hook. f. i. 885.
PERIDERIDIA, Reichb. Handb. 219 (1837).
americanus, *Nutt. II. cc.*—Am. bor.
peucedanoides, *Benth. V Hook. /. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 566.—Mexic.
texanus, *Benth. V Hook./. Gen.* i. 885.—Am. bor.

EULOPHUS, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 27=Peuoedanum, Tourn. (Umbell.).
ambigutis, Nutt 1. c.=P. ambiguum.
triternatus, Nutt. 1. c.=P. tritematum.

ETJLTCHHXA, Phil. Fl. Atac. 28. t. 11 A (1861). *CACTEAE,* Benth. & Hook, *i-* i-1«<>[8]-
acida, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 80.—Chili,
breviflora, *Phil. Fl. Atac.* 24.—Chili,
castanea, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 80.—Chili.

EUMACHIA. DC. Prod. iv. 178 (1830)=IxOPa, Linn. (Rubiac,).
carnea, DC. 1. c. 479 = I. camea.

EUMECANTHUS, Klotzsch *8c* Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 248=Euphorbia, Linn.
arenarius, Klotzsch & Garcke, I. c. 249-Euph. arenaria.
ariensis, Klotzsch & Garcke, 1. c. = Euph. ariensis.
Benthamianus, Klotzsch & Garcke, 1. c. - Euph. ariensis.
triphyllus, Klotzsch & Garcke, 1. c -Euph. scabrella.

EUMOLPE, Decne. ex Jacques & Hérincq, Man. Gén. PI. ii. 576 (1849!)-Gloxinia, L'Hérit. (Gesnerac.).
fimbriata, Decne. 1. c. =G. glabrata.

EUMORPHA, Eckl. & Zeyh. Enum. 77 (1885) - Pelargonium, L'Hérit (Geraniac).
cataractae, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 78 - P. patulum.
elegans, Eckl. & Zeyh. 1. c 77-P. elegans.
grandifiora, Eckl. & Zeyh. 1. c. 78=P. grandiflorum.
laevigata, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c - P. laevigatum.
marmorata, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c - E. patulum.
nobilis, Eckl. & Zeyh. 1. c. 77 »F. nobilis.

EUMORPHA:—
tabularis, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 77=Pelargonium tabulare.
tenuiloba, Eckl. *8c* Zeyh. 1. c. 78 = P. patulum.
variegata, Eckl. ft Zeyh. 1. c.=P. patulum.

ETJMOBPHIA, DC. Prod. vi. 2 (1887). *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 418.
Dregeana, *DC. I. c.* 3.—Afr. austr.

EUNANUS, Benth. in DC. Prod. x. 374 (1846) = MimulUB, Linn. (Scrophul.).
angustatus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. in. (1885) 99.—Calif.
bicolor, A. Gray, in Proc. Am. Acad. TU. (1868) 381.—Calif.
Bigelovii, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 121 - M. Bigelovii.
Bolanderi, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. in. (1885) 105 = M. Bolanderi.
brevipes, Greene, 1. c = M. brevipes.
Bremeri, Greene, 1. c 101 = M. rubellus.
Coulteri, Harv. ft A. Gray, ex Benth. PI. Hartw. 329 — M. tricolor.
Douglasii, Benth. in DC. Prod. x. 874 = M. atro-**purpureus.**
Douglasii,* Benth. PI. Hartw. 329, *purtim=Kelloggii.
Douglasii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 96, partim=M. Douglasii.
Fremonti, Benth. in DC. Prod. x. 374 = M. Fremonti.
Fremonti, S. Wats. Bot. King's Exped. 226 = M. nanui. ***Hook, b-Am.***
Kelloggii, Curran, ex Greene, in Bull. Calif. Acad. i. i II. (1886) 100.—Calif.
lati/olius, Greene, 1. c. 99 = M. latifolius.
Layneae, Greene, 1. c. 104 - M. leptaleus.
leptaleus, Greene, 1. c. 101 = M. leptaleus.
fnephitieus, Greene, 1. c. 102-=M. mephiticus.
mohavensis, Greene, 1. c 106 *M. mohavensis.
Parryi, Greene, 1. c. 104-M. Parryi.
pictus, Greene, 1. a 106.—Calif.
Rattani, Greene, 1. c. 105 - M. Rattani.
Tolmiaei, Benth. in DC. Prod. x. 874 = M. nanus. ***Hook. V Am.***
Torreyi, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. III. (1886) 104 = M. Torreyi.
tricolor, Greene, 1. c. 99 = M. tricolor.

EUNOMIA, DC. Syst. ii. 565 (1821)-Aethionema, R. Br. (Crucif.).
Bourgaei, Boiss. Fl. Orient, i. 344 = A. Bourgaei.
chloraefolia, DC. Syst. ii. 656=A. chloraefolium.
cochlearina, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1862) 369 = Thlaspi cochlearinum.
cordata, DC. Syst. ii. 557 = A. cordatum.
cordata, Pinard, ex Boiss. Diagn. Ser. 1 v. 88 *- A. Moricandianum.
iberidea, Boiss. in Ann. Se. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 191=A. iberideum.
Montbretii, Jaub. ft Spach, IUustr. i. 101-A. iberideum.
Moricandiana, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 88 = A. Moricandianum.
opposiH/olia, DC. Syst. ii. 556-A. oppositifolium.
orbiculata, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 282 *{=Crenularia orbiculata).*—**Macedon.**
rotundi/olia, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 194 - A. rotundifolium.
rubescens, Schott ft Kotschy, ex Tchihat. Asie Min. Bot. i. 839=A. rubescens.
subulata, Boiss. ft Heidi. Diagn. Ser. I. viii. 42= A. subulatum.

EUNOXIS. Rafin. New Fl. Am. iv. 84 (1836) - Laotucat Tonrn. ^Compos.).
amabilis, Rafin. 1. c—Am. bor.

EUODIA, Font Char. Gen. IS (1776) =**Erodia,** Font, (Rutac.).

EUODIA, Canto. Fructt. iL 1.108 (1791) - EVODIA Gaertn. = Ravensara, Sonner. (Laurin.).

EUONTMU8, Linn. Hort. Cliff. 89 (1737>. *CELASTRINEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 360.
EVONYMUS, Tonrn. ex Linn. Gen. ed. I. 29 (1787).
MELANOCARYA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1858) • 458.
VYENOM Presl, m Abh. Bosha. G Edgr
iii. (18 462.

EUONYMUS :—

acuminatus, *Benth. PI. Hartw.* 69.—Mexic
acuminatus, *Safin. New Fl. Am.* iii. 59.-Am. bor.; Sibir.
acutangulus, Wight, Illustr. i. 178=angulatns.
alatus, Rnpr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iv. 1856 (1857) 135. in obs.-Thunbergianns.
alterni/olius, Moench, Meth. 71=americanus.
americanus, *Linn. Sp. PI.* 197.—Am. bor.
angulatus, *Wight, le.* t 1053.—Ind. or.
angusti/olius, Gilib. Fl. Lituan. ii. 128; VilL Hist. PI. Dauph. ii. 640*= europaeus.
angustifolius, Pnrah, Fl. Am. Sept. i. 168=americanus.
atropurpureus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 119 = occidentals.
atropurpureus, *Jacq. Hort. Vindoh.* ii. 55.—Am. bor.
atropurpureus, Roxb. Hort. Beng. 18 ; Fl. Ind. i. 627 = Hamiltoniamis.
attenuatus, *Wall. Cat.* n. 1298.—Reg. Himal.
australianus, *F. Muell. Fragm.* iv. 118.—Austral,
bancanus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 513.—Ins. Banca.
bullatus, *Wall. Cat.* n. 4299.—Reg. Himal.
Bungeanus, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 470.—Reg. Amur,
calocarpus, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* **xli. (1872)** II. 299.—Burma.
capillaceus, Wall. Cat. n. 7270 = Microtropis bivalvis.
caroliniensis, Marsh. Arbust. Am. 43=atropurpurea.
chinensis, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vi. (1826) 74.—China.
chinensis, Lour. Fl. Cochincb. 156 (alien, gen.).—China,
dnereus, *Lavs, in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.i.* **611__Reg.** Himal.
Colpoon, Lam. Encyc ii. 674=Colpoon compressnm.
Colpoon, Linn. Mant. ii. 210=Cassine capensis.
crenulatus, *Wall. Cat.* n. 4297.—Ind. or.
cuneatus, *Safin. New Fl. Am.* iii. 69.—Am. bor.
cuneifolius, *Wright, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi». (1861) 171.—Cuba,
dichotomus, *Heyne, ex Wall, in Soxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 410.—Ind. or.
echinatus. *Wall. 1.* f.—Reg. Himal.
effusus, *Vis. in Act. 1st. Ven. Sc.* Ser. III. iv. (1858-59) 141.—Hab. ?
europaeus, *Linn. Sp. PI.* 197.—Europ.; As. Min.
ñbrifliferus, *Fisch. V Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 338.—Reg. Caucas.
filiformis, Wall. Cat. n. 4295 = Microtropis bivalvis.
fimbriatus, *Wall, in Soxb. Fl. Ind. ed. Carey,* **ii. 408.—** Reg. Himal.
fioribundus, Stev. in Bull. Sue. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 122 - europaeus.
Forbesii, Hance, in Journ. Bot. xviii. (1880) 259 = Bungeanus.
frieidus, *Wall, in Soxb. Fl. Ind. ed. Carey,* **ii. 409.—** Reg. Himal.
garcinifblius, Roxb. Hort. Beng. 18; Fl. Ind. i. 628 - Microtropis discolor.
gibber, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 77.—China.
gibbiflora, Maack, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 187, sphalm.=Lonicera chrysantha.
glaber, *Soxb. Hort. Beng.* **86; *Fl. Ind.* i. 628.—Reg.** Himal.
glaucus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 599 = angulatus.
Goughii, Wight, Ic. t. 216=indicus.
gracilis, Sieber. **Cat.** PI. Jap. et Chin. (1863) 33 = radicans.
grandiflorus, *Wall, in Soxb. Fl. Ind. ed. Carey,* **ii.** 404.—Reg. Himal.
grandis, *Pall. Seise Statth. Suss. Reich,* **i. 317.—** Astrakh.
Griffithii, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* **xli. (1872)** II. 73.—Burma.
grossus, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. **408** = Elaeodendron glaucum
Hamiltonianus, *Wall. 1. c.* 408.—Reg. Himal.
hederaceus, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 333.—Hongkong.
heterophylus, *Safin. New Fl. Am.* iii. 59.—Am. bor.
Horsfieldii, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxvi.** (1863) I. 598.—Java,
indicus, *Heyne, ex Wall, in Soxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 409.—Ind. or.
inermis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 204 - Ochna Wightiana.

EUONYMUB:—

japonicus, *Linn./. Suppl.* **164; *Thunb. Fl. yap.* 100.** —China; Japon.
japonicus, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 406- pendulus.
javanicus, *Blume, Bijdr.* 1146.—Burma; Malaya.
lacerus, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. FL Nep. 191 = grandiflozua.
laetus, Wall. Cat. n. 4294 ^ Microtropis bivalvis.
latifolius, S. G. Gmel. Reise, i. 180; Gilib. Fl. Lituan. ii. 129 = europaeus.
latifolius, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1857) 384 = oxyphyllus.
latifolius, Marsh. Arbust Am. 44=atropurpureus.
latifolius. *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—Europ.; As. Min.
laxiflorus, Blume, ex Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 86=oxyphyllus.
laxiflorus, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* **iii.** (1861) 333.—China.
leiophloeus, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (18S6) II. 1*22-latifolius.
leucocarpos, *Boj. Hort. Maurit.* 68, nomen.—Maurit.
longifolius, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 332.—Hongkong,
longifolius, *Medic. Beobacht.* (1782) 311.—Hab. J
lucidus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 191-pendulus.
Maackii, *Supr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* xv. (1857) 858.—Reg. Amur,
macropterus, *Supr. I. c.* 359.—Reg. Amur.
Majumi, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 49 =Sieboldianus.
Marschallianus, *Andr: ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1888) 188, nomen.—Podol.
raedius, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 641.—Hungar.
melananthus, *Franch. b" Sav. Enum. PI. Jap.* **ii 312.** —Japon.
mexicanus, *Benth. PI. Hartw.* 36.—Mexic.
micranthus, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 14 = Bungeanus.
micranthus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 191 - fimbriatua.
multiflorus, Opiz, ex Bercht Oek.-Techn. Fl. Boehm. ii. 163=europaeus.
muricatus, Rafin. New Fl. Am. iii. 59-americanus.
myrtoides, *Boj. Hort. Maurit.* 68, nomen.—Borbon.
nanus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 160.—Reg. Caucas.; As. temp,
nipponicus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxvii.** (1881) 447.-Japon.
nitidus, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 483—chinensis.
obovatus, Nutt. Gen. Am. i. 165—americanus.
occidentals, *Nutt. ex Torr. in Pact/. Sail. Sep.* **iv. 74.** —Am. bor. occ.
ovatus. Wall. Cat. n. 4800=ñmbriatus.
oxyphyllus, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 86.— Japon.**
paniculatns, *Wight, ex Laws, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 609.—Ind. or.
parviflorus, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 6.—Nicaragua,
pauciflorus, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 74.—Reg. Amur,
pendulus, *Wall, in Soxb. Ft. Ind. ed. Carey,* **ii. 406,** in textu.—Reg. Himal.
pinnatus, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 4-Trichilia hirta.
Przewalskii, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxvii.** (1881) 461.—China.
pterocladus, Hohen. ex Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 610=angnlatus.
pubescens, Stev. in Bull. Soc. **Nat** Mosc. xxix. (1856) II. 121, in textu—europaeus.
punctatus, Wall. Cat. n. 4286=nitidus.
quadrigonus, Gueldenst ex Ledeb. Fl. Ross. i. 497 = europaeus.
recurvans, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 613.—Sumatra,
revolutus, *Wight, Illustr.* i. 178.—Zeylan.
rigidus, Walp. Rep. i. 682, sphalm. = Gymnosporia Wallichiana.
rosmarinifolius, *Vis. in Act. 1st. Ven. Sc.* Ser. III. iv. (1838-39) 141.—Hab. t
saehalinensis, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* **xxvii.** (1881) 446.—As. or.
sarmentosus, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 84; et Gen. Syst. ii. 6=americanus.
scandens, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. (Jan.-Mar. 1827) 886-echinatus.

EUONYMUS :—

scandens, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 84 •= americanus.
schensianus, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* **xxvii.** (1881) 444.—China.
Schottii, *Ettingsh. ex Vis. in Act. 1st. Ven. Sc.* **Ser. III.** iv. (1838-39) 140.—Hab. *1*
sclerocarpus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) II. 299=Glyptopetalnm sclerocarpum.
Semenovii, *'Segel tf Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) I. 557.—As. centr.
sempervirens, Marsh. Arbust. Am. 44=americanus.
sempervirens, *Supr. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 10.—Reg. Caucas.
serratifolius, *Bedd. For. Man. Bot.* p. lxiv.—Ind. or.
serrulatus, Wall. Cat. n. 4296=glaber.
Sieboldianus, *Blume, Bijdr.* 1147.—Japon.
sphaerocarpus, Hassk. Cat. Hort. **Bog.** Alt. 229 = javanicus.
subtriflorus, Blume, Bijdr. 1147=Thunbergianus.
sumatranus, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 589-javanicus.
theaefolius, *Wall. Cat.* n. 4293.-Reg. Himal.
Thunbergianns, *Blume, Bijdr.* 1147.—As. or.
Thwaitesii, *Laws, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* **i. 608.—** Zeylan.
timorensis, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 186 —javaniens.
Tina, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4292 = Elaeodendron glaucum.
tingens, *Wall, in Soxb. Fl. Ind. ed. Carey,* **ii. 406.'** Reg. Himal.
Tobira, Thunb. Fl. Jap. 99=Pittosporum Tobira.
tristis, Salisb. Prod. 142=atropurpureus.
usuriensis, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* **xxvii.** (1881) 449.—Mandshuria.
vagans, Wall. Cat. n. 4284, partim- echinatus.
vagans, *Wall, in Soxb. Fl. Ind. ed. Carey,* **ii. 412.—** Reg. Himal.
velntinus, *Fisch. V Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc-* (1838) 337.—Reg. Caucas.
verrucosus, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 166.—Europ. or.; As. Min.
Vidalii, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* **ii. 812.-** Japon.
vulgaris, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 1 - europaeus.
Walkerii, *Wight, Illustr. i.* 178.—Zeylan.
reylanicus, Moon, Cat. PI. Ceyl. 17 = Walkerii.

EUOPIS, Bartl. Ord. 143 (1830) = EVOPIS, Cass.- Berkheya, Ehrh. (Compos.).

EUOSMA, Andr. Bot Rep. t. 520 (1811)=Log*ni»> R. Br.
albiflora, Andr. 1. c.-L. floribunda.

EUOSMA, Willd. ex Sennit. Mant. iii. 8, 128 (1827) =seq.

EUO8MIA, Humb. & Bonpl. PI. Aequin. ii. 1«[3] (1818) (Evosmia). *SUBIACEAE,* Benth. & Hoe*-f. ii. 71.
aggregata, Spreng. Syst. i. 417 (non genens).--Feruv.
caripensis, *Humb. If Bonpl. PI. Aequin.* **ii. I*[5]-"** Venezuela.
corymbosa, Benth. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841)21" -Bothriospora corymbosa.
***obovata,* Spreng. Syst. i. 417 (^*Higginsia obovata*)-"** Peruv.
***verticillata,* Spreng. 1. c {= *Higginsia verticill**"'** —Peruv.

EUOSMUS,Nutt Gen. Am. i. 268 (1818)=Linde*»' Thunb. (Laurin.).
aestivalis, Nutt. 1. c 259 = L. Benzoin.
albida, Nutt. 1. a=Sassafras albidum.
Benmoin, Nutt. 1. c = L. Benzoin.
Diospyros, Nutt 1. c. = L. melissaefolia.
geniculata, Nutt. 1. c.=L. geniculata.
Sassafras, Nutt. 1. c.=Sassafras officinale.

EUOTHONAEA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1862/ *I*[7*2] **=Hexiaea,** Lindl. (Orchid.).
imbricata, Reichb. f. 1. c.=H. imbricata.
oppositi/olia, Reichb. f. 1. c - H . oppositifolia.

EUPARAEA, Steud. Norn. ed. II. i. 606 (1840)=**)-

EUPAREA, Banks & Soland. ex Gaertn. Fruct. i. 280. t. 50 (1788)=Anagallis, Toum. (Primul.)
amoena, Gaertn. Frnct. i. 280. t. 50 = A. alteraifolia.
tractealis, Baudo, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xx. (1843) 8*6-A. tenella.
'Mentis, Baudo, 1. c.=A. alteraifolia.
'farina, Baudo, 1. c. = A. altemifolia.
parvul, Baudo, l.c. = A. altemifolia.

EUPATORIUM, [Toura.] Linn. Syst. ed. I (1785); «'n- ed. I. 247 (1737). *COMPOSITAE,* Beoth. & Hook. f. ii. 245.
AGERATIOPSIS, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. u. 246 (1878).
BATSCHIA, Moench, Meth. 667 (1794).
WLBosTYLis, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 467.
^AMPULOCLINIUM, DC. Prod. v. 136 (1836).
JHROMOLAENA, DC. 1. C. 138 (1836).
LHRONB, Dulae, Fl. Hautes-Pyr. 612 (1867).
J^ONocumuM, DC. Prod. v. 135 (1836).
CRITONIA, DC. 1. c. 140 (1836).
DISYNAPHIA, DC. 1. c. vii. 267 (1888).
JIRIOPAPPUS, Hort. ex Loud. Encyc. PI. 688 (1829).
WPTis, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 189; «. in Diet. Sc. Nat xvi. 10 (1820); xx. 177 (1821); U821).
HA «??RLEA_PoW» « Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. u. ** 341 (1876).
JJEBECLINIUM, DC. Prod. v. 186 (1886).
"ETEROLAENA, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. -»• 245 (1878).
KVRSTENIA, Neck. Elem. i. 81 (1790).
OOCLIBIUM, DC. Prod. v. 188 (1886).
*JSMIA, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1866)251.
GRAXELIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliii. 261 (1826).
HA THES, Wallr. Sched. Crit. L m> in nota (1822).
WIKSTROEMIA, Spren. Syst. iH m (1826).
acu *, D. Don Prod fL N «P- W0-Vemoni*
di^nsT
ac^minatum. Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. "a 6-»• (1885) 241=serrulatum.
acu matum *?Grana.
acum, natum, Sprang, ex DC. Prod. T. 33 = Vemonia sal na.
acuminatum, Wall. ex DC. 1. c. 82-Vernonia arborea?
adamantium, Gardn. in Haok Lond. 7<mTn. Bot v# (1846) 477.—Bras.
adenachenium, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 75.—Mexic.
adeni wwthum, *DC. Prod.* v. 164.-Bras.
ade ,,**!«», Gardn. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ad e *!*=Trichogonia Gardneri.
noenaetum, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am.* Bot. u. 91. Mexic
adenolo, 8, Sch. Bip. " *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. nod ** ial,—Bras,
ade, fuS??»"t Hort. Berol. ex Kunth, Ind. Sem. Hort ^erol. fiAAT (1859) 13=trapraoideum.
^oMoriMB, Spreng. Syst. iii. 420=glandulosum.
asperippTn C>& *JHA «*^ <*»..•• tint v**w t4tTaL£* affine *•J" "*exic.
(1836) 240=conyzoides.
affine, *H. B. & K. Nov.* G** ei S P- " 12«-Pe™y.
affine Mair. ex DC Prod vU> 66 Pere2ia hebe, CuSa,
affi e. *Welder. Ind. Sem. Hort. Mart.* (1841); *et in* f 1 " " " vi (1842) f «. 111.—Hab t
a ricanu ?OM ^ ^ ^B *OlveT> FL TrOp Afr.*
iii. 80 .
ageratifo nin, ^c /_,na T- 178._Am. bor.; Ind. occ.
ageratoides, Bert. ex DC^ Proi T„ 178 = agera i- folium.
ageratoides, *Linn./. Suppl.* 855.—Am. bor.
albescens, Gardn. in Hook. Lond. Joura. Bot. vL (1847) «5—monardifolium.
all cauie *S* «*• B t- ex Hemsl Biel Ctntr Am Bot ii no "—Mexic.
album, *Hemsl. i* c*—Mexic
album, *Linn. Mant. i.* 111.—Am. bor.
album. Thunb ™ ..«JU, rl. jap, 308—cannabinum.
alpest ^. Gardn. in Hook. Lond. Joura. Bot. iv. (1845) 116 serratum.
alternans, DC. Prod. v. 144»laevigatum.

ETJPATOKIUM:—
alternifolium, Ard. Animad. ii. 40-Kuhnia enpatorioides.
alternifolium, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 333.—Bras.
altisrimum, *Linn. Sp. PI.* 887.—Am. bor.
altissimum, Linn. Syst. ed. XII. 587; et ex Mnrr. ed. XIII. 618 = ageratoides.
amarum, Vahl, Symb. Bot. iii. 93 = Mikania amara.
ambiguum, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 96-serotinum, semiserratum.
amblyolaenum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 832 = bupleurifolium.
amoenum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 514 = purpnreum.
amphidyctium, *DC. Prod.* v. 163.—Bras,
amplifolium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 28.—Mexic.
amplum, *Benth. PI. Hartm.* 200.—N. Granat
amygdalinum, *Lam. Encyc.* ii. 408.—Am. trop.
anastomosans, Steud. Norn. ed. II. i. 606, sphalm.—aromatisans.
anethifolium, *DC. Prod. v.* 182.—Bras.
Angosturae, *Polak. in Linnaea,* xli. (1877) 576.—Costa Rica,
angulicanle, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 287.—Bras.
angustifolium, *Spreng. Syst.* iii. 415.—N. Granat.
angustissimnm, *Spreng. ex Baker, in Mart. Ft. Bras.* yi. II. 325.—Bras,
apicnlatum, *Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot.* v. (1846) 476.—Bras.
appendiculatum, Less, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 865 = hecatanthum.
araliaefolium, *Less, in Linnaea,* vL (1831) 408.—Mexic.
arboreum, *H. B. &*[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 131.—Ecuador.
arboreum, Reinw. ex De Vriese, PL Ind. Bat. Reinw. 129 = Vernonia cinerea.
arbutifolium, *Benth. PI. Hartm.* 199.—N. Granat.
Arechavaletae, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 78.—Reg. Argent.
areolare, *DC. Prod.* v. 169.—Mexic.
areolatum, *Perr. ex DC. I. c.* 12-Ethulia conyzoldes.
argenteum, Wall. Cat. n. 3166-cannabinum.
argutum, *H. B. &K.* .Vov. *Gen.etSp.* iv. 121.—Mexic.
Armani, Balb. PI. Rar. Hort. Taur. (1810) 27. t 6-Clibadium rotnndifolium.
Amottianum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 167.—Reg. Argent.
Araottii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 823.—Bras,
aromaticum, *Linn. Sp. PL* 889.—Am. bor.
aromaticum, Sieber, ex Steud. Norn. ed. II. i. 606 = Brickellia diffusa.
aromatisans, *DC. Prod.* v. 150.—Ind. occ.
arrayanum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 489.—Bras.
artemisifolium, *Griseb. in Goett. Abh. xriv.* (1879) 171.—Reg. Argent.
ascendens, Mart, ex Baker, In Mart. Fl. Bras. vi. II. 344-deenmbens.
ascendens, *Sch. Bip. ex Baker, 1. c.* 296.—Bras.
Aschenbomianum, *Schau. in Linnaea,* xix. (1847) 720.—Mexic
asclepiadeum, DC. Prod. v. 148=buplenrifolium.
asperifolium, Sch. Bip. in Linnaea, xxx. (1859-60) 182—monardifolium.
asperrimum, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 292.—Bras.
asperulaceum, *Baker, I. c.* 342.—Bras.
asperum, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 416-Vemonia Roxburghii.
atriplicifolium, Hort. ex Lam. Encyc. ii. 407-repandum.
atriplicifolium, *Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix,* 302; *Symb. Bot.* iii. 96.—Ind. occ.
auriculatum, Hort. ex Lam. Encyc. ii. 411=Senecio deltoideus.
auriculatum, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 95.—Bras.
australe, BartL Ind. Sem. Hort. Gotting. (1837); et in Linnaea, xii. (1838) Litt. 81-Bartlinglanum.
australe, Thunb. PL Bras. Dec ii. 26-laevigatum.
axillare, [Ma?. *Sc* Sesse,] ex DC. Prod. v. 138 = Brickellia califomica.
axilliflorum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 169.—Reg. Argent.
Ayapana, Vent Jard. Malm. 3. t. 8=triplinerve.
•yapanoides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 146.—Coba.

BTJPATOBITJM:—
azangaroënse, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 64, nomen.—Peruv.
aznreum, *DC. Prod.* v. 168.—Mexic.
baccharifolium, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 116.—Bras,
baccharoides, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 132.—N. Granat.
Bacleannm, *DC. Prod.* v. 167.—Bras.
Ballii, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t 1462.—Peruv.
ballotaefolium, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 121.—Bras.; N. Granat
Barclayanum, Benth. Bot Voy. Sulph. 112-amygdalinum.
Bartlingianum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 606.—Chili,
bartsiaefolium, *DC. Proa.* v. 147.—Bras.
bartsioides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. II. 295—praec.
bellidifolium, *Benth. PI. Hartw.* 43.—Mexic.
Benthamii, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 90.—Mexic.
Berlandieri, DC. Prod. v. 167-ageratifolimn.
Berlandieri, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 76 = occidentale.
Berterianum, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxiii. (1829) 180=guadalupense.
Bertholdii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 299.—Mexic.
betonicaefolium, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Mexic.
betonicaeforme. *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 362.—Bras,
betonicum, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* ii. 93.—Am. bor. occ.
bicolor, Lam. ex DC. Prod. vi. 326 = Gynoxis bnxifolia.
Bigelovii, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 75.—Mexic.
Billbergianum, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stock/,.* 1854 (1856) 134.—Panama.
birmanicum, DC. Prod. v. 179 = cannabinum.
Blanchetii, *Sch. Bip. in Flora,* xxxiii. (1850) 30.—Bras,
blepharilepis, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 8OO.-Mexic.
bogotense, *DC. Prod.* v. 181.—N. Granat.
brachiatum, Sw. ex Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1827) 71=odoratum.
bracteatum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 472.—Bras.
bracteatum, Hook. *8c* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 239=tozziacfolium.
brasiliense, Spreng. Syst. iii. 417—Brickellia pinifolia.
Braunii, *Polak. in Linnaea,* xli. (1877) 676.—Costa Rica.
brevipes, *DC. Prod.* v. 168.—Mexic.
brevipetiolatum, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 90.—Mexic.
brevipetiolatum, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 835, in obs.—Bras,
brevisetum, *DC. Prod.* v. 169.—Mexic.
Brickellia, DC. 1. c 182 = Brickellia cordifolia.
Bruneri, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 96.—Am. bor. occ.
brunneolum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 288.—Bras.
buddleaefolium, *Benth. PI. Hartw.* 135.—Peruv.
buniifolium, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 240 = pinnatifidum.
bupleurifolinm, *DC. Prod.* v. 149.—Bras.
BnrcheUii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 356.—Bras.
Bustamenta, *DC. Prod.* v. 168.—Mexic.
cacalioides, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 130.—Ecuador.
caducisetum, *DC. Prod.* v. 165.—N. Granat.
calaminthaefolium, *H. B. (f K. Nov. Gen. et St.* iv. 129. t. 348.—Mexic.
callilepis, *Srh. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 285.—Bras.
calocephalum, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 286 =ivaefolium.
calycinum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras, vi. II. 326-seq.
calyculatum, *Hook. V Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1885) 242.-Bras.
campestre, *DC. Prod.* v. 152.—Bras.
candicans, Wall. Cat. n. 2999-Leucomeris spectabilis.

ETJPATOHITJM: -.—
Candolleannm, *Hook. V Am. in Hook. Com*. Bot. Mag.* i. (1835) 248.—Bras.
Candolleanutn, Hook. & Am. 1. c. partim—betonicaeforme.
canescens, Orteg. Hort. Matr. Dec. 84 — Kuhnia rosnuirinifolia.
canescens, Vahl, in West, Bidr. Ste-Croix, 302; Symb. Bot. iii. 95 = sinuatnm.
cannabifolium, Salisb. Prod. 1S7 —seq.
cannabinnm, *Linn. Sp. PI.* 838.—Europ.; As. bor.
cannabis-folium, Giiib. Fl. Lituan. i. 172 —praec.
capense, Spreng. f. Tent. Suppl. 22 = Vemonia mespilifolia.
capillare, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 341.—Bras.
capillare, Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 51-Brickellia diffasa.
capillipes, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 79-guadalupense.
carolinianum, *Hort. Vind. ex Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1866) II. 372.—Hab.!
cassinaefolium, Bertol. Misc. Bot. v. 17. t. 6. f. a = cnneifolium.
caucasicum, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1858) II. 371.—Reg. Caucas.
ceanothi/olium, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1755 = aromaticum.
ceanothi/olium, Spreng. Syst. iii. 418-triste.
ceiebicum, Blume, Bijdr. 903 — Vernonia arborea.
celtidifolium. *Lam. Encyc.* ii. 406.—Ind. occ; N. Granat.
cerasifoliiim, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 308 — Bras,
ceratophyllum, *Hook. V Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 240.—Brag.; Reg. Argent,
chamaedrifolium, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 113. —Peruv.
chenopodifolium, Poir. Encyc. Snppl. ii. 606 = Mikania scandens.
Chilca, *H. B. W K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 125.—Pernv.
chilense, *Bert, in Merc. Chil.* (1829); *ex Am. Journ. Sc.* xx. (1831) 260.—Chili.
chilense, Molina, Sagg. Chile, 142, 354 = Flaveria Contrayerba.
chlnense, *Linn. Sp. PI.* 837.—China; Japon.
chlorolepis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 357.—Bras.
Christieanum. *Baker, I. c.* 298.—Bras.
cicatricosum, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 326 —angustissimum.
ciliatum, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 240-conyzoides.
ciliatum, *Less, in Linnaea,* vi. (18311 404.—Mexic.
dnerascens, Wall. Cat. n. 3066 = Microglossa albescens.
cinereo-viride, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 294.—Bras,
cinereum, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 226.—Bras.
cinereum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 359.—Ind. occ
cinereum. Linn. f. Sappl. 854 = Pteronia incana.
cinereum, *Rafin. New Ft. Am.* iv. 80.—Am. bor.
cinereum. Wall, ex Stend. Nom. ed. II. i. 606 = Microglossa albescens.
Claussenii, Gardn. in Hook. Lond. Jonm. Bot. vi. (1847) 445 = stachyophyllum.
clavnlatnm, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 16&— Reg. Argent,
clematideum, *Griseb. I. c.* xxiv. (1879) 172.—Reg. Argent.
clematideum. Less, ex Baker, in Mart FL Bias. vi. II. 256 = Mikania phaeoclados.
clematideum, Sch. Bip. in Pollichla, xxil.-xxiv. (1866) 258 = Reevesii.
Clematitis, DC. Prod. v. 144-conyzoides.
coahnilense, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii, (1881-82) 205.—Mexic.
coelestinnm, *Linn. Sp. PI.* 838.—Am. bor.: Ind. occ.
cognatum, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1847) 13.—Mexic.
collinnm, *DC. Prod.* v. 164.—Mexic.
coloratum, Spreng. ex DC. Prod. v. 348 —Microglossa albescens.
coloratum, Willd. Sp. PI. iii. 1768 - Vemonia senegalensis.
compactnm, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 112.—Pernv.
compositi/olium, Walt. Fl. Carol. 199 •= coronopifolium.

EnPATOKIUM:—
eompressum, Gardn. in Hook. Lond. Jonm. Bot. v. (1846) 473— Syniphyopappus polystachyus.
comptoniaefolium, DC. Prod. v. 148 = serratum.
concinnum, *DC. I. c.* 156.—Bras.
concinnum. Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1836) 239 = ivaefolium.
condensatum, Reichb. ex Less, in Linnnea. iv. (1829) 337 — Oliganthes condensata.
confertifolium, *Xlatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 324.—N. Granat.
con/ertum, Gardn. in Hook. Lond. Toum. Bot. iv. (1845) 116-serratum.
congestion, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 239-tozziaefolium.
conglobatum, *DC. Prod.* v. 165.—Bras.
connatum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 99 = perfoliatum.
conoclinioides, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 475—Trichogonia podocarpa.
conBangnineum, *DC. Prod.* v. 166.—Bras,
conspicnum, *Kunth b*[1] *Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1847) 13.—Mexic.
conytoides. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 14 = Vemonia arborescens.
conyzoides, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 96.—Am. bor. et trop.
cordatum, Bonn. f. Fl. Ind. 176 = Mikania scandens.
cordatum, Walt. Fl. Carol. 199 » aromaticum ?
cordifolium, *Sic. Prod. Veg. Ind. Occ.* 111.—Jamaica.
cordiforme, Poir. Encyc. Snppl. ii. 600—aromaticum.
coriaceum, *Scheele, in Linnaea,* xviii. (1844) 457.—Bras.
coriacenm, *Spreng. Syst.* iii. 410.—Ins. S. Doming.
coriaceum, Vahl, Symb. Bot. iii. 94 *{^Decaneurum fimbrilli/erum).*—Ins. Borbon.
cornifolium, Willd. ex Less, in Linnaea, iv. (1829) 337 (— *Odontoloma acuminatum).*—Venezuela,
coronopifolium, *Willd. Sp. PI.* iii. 1760.—Am. bor.; Ind. occ
corsicum, Req. ex Loisel. in Mem. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 428 = cannabinnm.
corylifolinm, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 361.—Jamaica.
corymbosum, *Audi. PI. Gut.* ii. 799.—Guian.
cotinifolium, *Willd. Phyt.* 11. t. 7. f. 1.—Ins. Martinic.
crassifolium, Rafin. Fl. Ludov. 62 (sp. falsa).
crassifolium, Shnttl. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 97 — mikanioides.
crenatum, DC,Prod. v. 191-Mikania stipulacea.
crenatum, Gardn. in Hook. Lund. Journ. Bot. vi. (1847) 441 - squalidum.
crenatum, Gomez, in Mem. Ac. Lisboa, iii. (1812) Mem. Corresp. 23 — Mikania cordifolia.
crenulatum, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 474 - Trichogonia hirtiflora.
crithmirolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 169.—Reg. Argent.
crithmifolium. Less, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. i|. 262 = Mikania verticillata.
critonioides, *Steeta, in Seem. Bot. Voy. Herald,* 145.—Venezuela,
cryptanthum, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 296.—Bras.
cubense, DC. Prod. v. 172 = villoraml
cubense, Pen. Syn. ii. 402 — Kuhnia rosmarinifolia.
cuneatum, DC. Prod. v. 149 = Symphyopappus cuneatus.
cuneatum, Engelm. in TOTT. & Gray, Fl. N. Am. ii. 88 = perfoliatum.
cuneifolium, DC. Prod. v. 177 = semiserratum.
cnneifolium, *Willd. Sp. PI.* iii. 1763.—Am. bor.
cuspidatum, Pav. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 206-Barroetea Pavonii.
cuspidatum, Spreng. ex DC. Prod. v. 82—Vemonia acuminata.
cuspidatum, Willd. ex Less, in linnaea, iv. (1829) 316 — Oliganthes discolor.
cydmiaefolium, Willd. ex Less. 1. c. 269 — Vemonia dichocarpa.
cylindrocephalnm, *Sch. Bip. in Flora,* xxxiii. (1860) 80, nomen; *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 283.—Bras.
cynanchifolium, *DC. Prod.* v. 172.—Cuba.
Dalea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 106 (-* *Critonia Pseudodalea).*—Cuba.
Dalea, *Linn. Syst.* ed. X. 1204.—Jamaic; Cuba,
daleoides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 94.—Mexic.

ETTPATOBrrjM:—
decemflorum, *DC. Prod.* v. 154.—Peruv.
decipiens. *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 347.—Bras.
decipiens. Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i-(1885) 240 -- Ophryosporus triangularis.
decumbens. *Baker, in Mart. FL Bras.* vi. II. 344.—Bras.
decussatum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 607 =• cordifolium.
deltijblium, Rafin. ex DC. Prod. v. 136 = coelestinum.
deltoideum, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 68. t. 869.—Mexic
deltoideum, Foepp. ex Spreng. Syst. iii. 415 = Poeppigii.
deltoideum, Steud. Nom. ed. II. i. 607, sphalnv coelestinum.
dendroides, *Spreng. Syst.* iii. 415.—Am. austr.
densifolium, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. n. 281 = multifloscnlosum.
densum, *Benth. PI. Hartw.* 200.—N. Granat.
dentatnm, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 448.—Bras.
denticulatum, Vahl, Symb. Bot. iii. 93 = Mikania scandens.
dichotomum, Sch. Bip. ex Miq. Stirp, Surin. Sel. 184 » squalidum.
dicline, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 63 - cannabinuni.
diffusum, Vahl, Symb. Bot iii. 94 •= Brickellia diffusa.
dimorpholepis, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. II. 831.-' Bras.
discolor, *DC. Prod.* v. 161.—Bras.
discolor, Spreng. Syst. iii. 412-Vemonia discolor.
dispalatum, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. >v-(1845) 117-pyrifolium.
dUsectum, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 113.—Mexic.
dissectum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 100 = Greggii.
dissolvens, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 808<— Bras.
divaricatum. Berg. Desc. PI. Cap. 229; Thunb. Prod. PI. Cap. 142-Pteronia divaricata.
divaricatum, Sch. Bip. in Linnaea, xxii. (1849) 571* guadalupense.
divergens. Less. 1. c. v. (1880) 138= conyzoides.
divergens, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii 414*> Vemonia divergens.
diversifolium, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1829) = pycnocephalum.
dodoneaefolium, DC. Prod. v. 161-amygdalinum.
dodoneaefolium. *Hook,* to" *Am. in Hook. Comp. Bet-Mag.* ii. (1836) 44.—Reg. Argent.
Dombeyanum, *DC. Prod.* v. 167.—Am. austr.
domingense, *Spreng. Syst.* iii. 412.—Ins. S. Doming-
Donianum, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag-i. (1835) 243 = macrocephalum, leptolepis.
dryadeum, DC. Prod. vii. 269 = macrophyllum.
dubium, Poir. Encyc Suppl. ii. 606 = purpureum.
dumosum, *Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. *(IB?*[0]; 81; *et in Linnaea,* xxxiv. (1865-68) 535.—Bolivia.
duodecimiflorum. Sch. Bip. ex Baker, in Mart. *'• Bras. yi. II. 318 = orgyale.
dyctiophyllnm, *DC. Prod.* v. 158.—Bras.
Ehrenbergii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. »*•" Mexic.
elaeagni/olium, Hort. Calc. ex DC. Prod. v. 22* Vernonia elaeagnifolia.
datum, Salisb. Prod. 187 - altissimum.
elatum, *Steett, in Seem. Bot. Voy. Herald,* 148.—Panama.
elegans, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 467 — amygdalinum.
elegans, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iv. «*— Ecuador.
elegans, Stend. Nom. ed. II. i. 607 = Liatris elegans-
ellipticum, *DC. Prod.* v. 166.—Ins. Penang.
ellipticum, *Hook, tr Am. in Hook. Comp. Bot. Mag-* • (1836) 240.—Reg. Argent
elongatum, Hook. *Sc* Am. 1. c. 241 - oblongifoUum-
Engelmannianum, Regel.—Cf. Torr. *Sc* Gray, ' '• Am. ii. 602 - aromaticum. -n —
ensifolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) "•" Reg. Argent. .OK.—
epilobioides, *H. B. ty X. Nov. Gen. et Sp.* i»- »*"• N. Granat.
ericoides, *DC. Prod.* v. 150.—Bras.
erigeroides, DC. 1. c. 171 = steviaefolium.

ETTPATOKITTM :—
erodiifolium, *DC. Prod.* v. 158.—Bras,
erythrolepis, *Sch. Bip. i» Linnaea,* xxxiv. (1865-66) «35, nomen.—Boliv.
exac wrf«, G. Don, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 154 = Icthyothere Cunabi.
exserto-ve 7V«ov ^1082) 324.—Peruv.
«««-«««, Klotzsch, ex Steetz, in Seem. Bot Voy, ^Herald, 145 = iresinoides.
(184?) 440.—Bras.
fascicatum, Michx. Fl. Bcrr. Am. ii. 99 — purpureum.
fasciculare, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 64.—Peruv.
Mexic
fenestratum, MSS? G<"<ln. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 442. Bras.
ferrugineum, Lam, Encyc y ^i, Faujasia flexnosa.
floribundum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 118 = conyzoides.
foliosum, Rafin ex Torr. & Gray, fl. N. Am. ii. 86
fraternum, DC. *Prod. v.* 163.—Am. anstr.
fruticosum, Linn. Sp. ed. I. 98-Kuhnia fruticosa.
fruticosum, Linn. Sp. ed. x. 1204.—Hab.?
fuligino Am.
fulvum, Hook. & Am. in Hook. Comp. Eot. Mag. i. (1835)
fulvum, Rafin. New Fl. Am. iv. 80 (sp. falsa).
furcatum, Lam. Enc. ii. 407.—Ind. occ.
fuscorul Walt. Fl. Carol. 199 = purpureum.
gaudichaudianum, DC. *Prod.* v. 148.—Bras.
Gayanum, wedd. Chlor. And. i. 216.—Peruv.
glaberrimum. DC. Prod. v. 144.—Mexic
glabratum, Hort. Berol. (1832); ex Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 18 = modestum.
glabratum, H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp. iv. 127.—Mexic.
gland, Wall. *Cat.* n. 8288.—Ind. or.
glandulosum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 122.—Jamaic.; Mexic.
glandulosum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 98—album.
glandulosum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 314 = amygdalinum.
glastifolium, Bertol. Misc. Bot. v. 16. f. 4 = Trilisa odoratissima.
glaucescens Ell. Sketch, ii. 297 = cnneifoliuta.
glaucum, Sch (188?) 80.—Mexic.
Bras.
glomaefolium, Moç. ex DC. *Prod* v> 159 = Sickellia veronicaefolia.

EUPATOHIUM :—
glechonophyllnm, *Less, in Linnaea,* vi. (1881) 105.—Chili.
Glehni, F. Schmidt, ex Trantv. in Act Hort. Petrop. viii. (1883) 432 = japonicum}
glomeratum, DC. Prod. v. 154 - pallescens.
glumacenm, *DC. I. c.* 181.—Cuba,
glutinosum, *Lam. Encyc.* ii. 408.—Ecuador,
gnidioides, *DC. Prod.* v. 150.—Bras,
gonocladum, *DC. 1. c.* 171.—Mexic.
Gouani, Hort. ex Spreng. Nov. Prov. 28=Salmea Kupatoria.
gracile,T). Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1635) 248 ^glechonophyllnm.
gradle, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 124.—N. Granat.
graciliflorum, *DC. Prod.* v. 145.—Mexic.
grande, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 347.—Bras.
grandiceps, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 76.—Cuba,
grandidentatum, *DC. Prod.* v. 167.—Mexic.
grandiflorum, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 26 = Brickellia grandiflora.
grandifolium, *Regel, in Gartenfi.* i. (1852) 102. t. 12.—Guatemala.
Greggii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 102.—Am. bor.; Mexic.
griseo-viride, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II, 353 - adamantium.
guadalnpense, *Spreng. Syst.* iii. 414.—Ins. Guadalup.
guapulense, *Klatt,in Leopoldina,xx»(lt8i)* 90.—Mexic
guatemalense, *Regel, Ind. Sem. Hort. Turie.* (1860) 4 *Adnot.; ex Walp. Ann.* ii. 816.—Guatemala,
gynoxoides, *Wedd. Chlor. And.* i. 216.—N. Granat.
Haageanum, *Regel V Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857)40.—Hab.?
Haenkeanum, *DC. Prod.* v. 158.—Mexic.
halimifolium, *DC. 1. c.* 150.—Bras.
Hartwegi, *Benth. PI. Hartw.* 19.—Mexic.
hastatum, Linn. Syst. ed. X. 1204 = Mikania hastata.
hastile, *Schau. in Linnaea,* xiv. (1847) 719.—Mexic.
havanense, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 128.—Cuba,
hebebotrya, *Hemsl. Bid. Cetitr. Am. Bot.* ii. 95.—Mexic.
hebedadum, *DC. Prod.* v. 164.—Bras,
hecatanthum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 365.—Bras.
hecatanthum, Sch. Bip. in Linnaea, xxx. (1859-60) 182 - macrocephalum.
hederaefolium, *A. Gray, PI. Fendl.* 65.—Mexic.
helianthifolium, *H. B. V K. Nov. Gen. etSp.* iv. 127.—Peruv.
hemisphaericnm, *DC. Prod.* v. 158.—Bras,
heptanthum, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 54, nomen.—Peruv.
heteroclinium, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 358.—Jamaic.
heterolaenum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. II. 328 = serratum.
heterophyllum, DC. Prod. v. 180 = cannabinum.
heterophyllum, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 39.—Cuba.
hexanthum, DC. Prod. v. 148 = bartsiaefoMum.
hirsutissimum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 311.—Bras.
hirsutum, *Baker, L c.* 859.—Bras,
hirsutum, *DC. Prod.* v. 170.—Mexic.
hirsutum, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 239 -bartsiaefolium.
hirtum,Lest. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. u. 260 = Mikania hirsutissima.
hispidum, *Pers. Syn.* ii. 402—Air. trap.
Hookerianum, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 166 -conyzoides.
horminoides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 300.—Bras.
Horsfieldii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 27.—Java.
Houstonianum, Linn. Sp. PI. 836-Mikania Houstonis.
Houstonis, Hort. ex DC. Prod. v. 493-Salmea Eupatoria.
Houstonis, Linn. Syst ed. X. 1204 - Mikania Houstonis.
Houstonis, Sw. Obs. Bot. 300 - Mikania Swartziana.
hypericifolium, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 118.—N. Granat
hypoleucum, *Griseb. in Mem. Am. Aead.* N. S. viii. (1868) 512.—Ind. occ.
hyrcanicum, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1866) u. 871.—Reg. Caucas.

ETTPATOBIUM :—
hyssopifolium, *Linn. Sp. PI.* 836.—Am. bor.
hyssopinum, *A. Gray, in Proc. Am. Aead.* xv. (1880) 28.—Mexic.
ianthinum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 96.—Mexic.
impetiolare, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 357.—Ins. Dominic.
inamoenum. Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. n. 213 = Trichogonia villosa.
incanum, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 827 = halimifolium.
incarnatum, *Walt. Fl. Carol.* 200.—Am. bor.; Mexic.
incasicum, *Wedd. Chlor. And.* i. 217.—Boliv.
incisum, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 112 (err. typ. 106).—Guiana,
incomptum, *DC. Prod.* v. 173.—Mexic.
inconspicuum, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 535.—Boliv.
Indigofera, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1877) 89.—Paraguay.
innumerosum, *DC. Prod.* v. 164 —Am. austr.
integerrimum, Spreng. ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi. II. 324 ••velutinum.
integrifolium, *Bert, ex Spreng. Syst. HI* 410.—Ins. Guadalup.
intermedium, *DC. Prod.* v. 148.—Bras,
inulaefolium, *//„ B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 109.—Am. trop.
involucratum, Sch. Bip. in Linnaea, xxii. (1849) 572 - coriaceum.
iresinoides, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 106. t 340.—Am. trop.
itacolumiense, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 310.—Bras,
ivaefolinm, *Linn. Syst.* ed. X. 1205.—Am. bor.; Ind. occ.
ixiocladon, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 77.—Am. centr.
ixodes, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 41 - amygdalinum.
Jamesonii, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 169.—Peruv.
japonicum, *Thunb. Fl. Jap.* 808.—Japon.
javanicum, Blume, Bijdr. 908 = Vernonia arborea.
Karwinskiannm, *DC. Prod.* v. 163 —Mexic.
Kirilowii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vn. 163-Lindleyanum.
kleinioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 120.— *N.* Granat; Bras.; Peruv.
Kuhnia, Crantz, Inst. i. 264 = Kuhnia eupatorioides.
laetevirens, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1886) 240 = steviaefolioni.
laeve, *DC. Prod.* v. 169.—Bras,
laevigatum, *Ijim. Encyc.* ii. 408.—Am. trop.
laevigatum, Torr. Cat. PI. N. York, 92 =- purpureum.
Ullavei, *Baill. Hist. PI.* viii. 290.—Mexic.
Lambertianum, Wall. Cat. n. 3287 — cannabinum.
laroiifolium, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 113.—Ecuador.
lamiifolium. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 306 = sordescens.
lanatum, Spreng. ex DC. Prod. v. 469-Inula Cappa.
lanceolatum, Muhl. ex Willd. Sp. l'l. iii. 1752 = teueii folium,
lanigerum, *Hook. V Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 242.—Bras,
lantanifolium, *Griseb. in Mem. Am. Aead.* N. S. viii; (1863) Sll.-Ind. occ.
lasioneuron, *Hook. If Arn. Bot. Beech. Voy.* 297.—Mexic
lasiophthalmum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 167.—Reg. Argent.
latifolium, Less, ex Baker, in Mart Fl. Bras. vi.)i. 257 —Mikania Argyreiae.
latipes, *Benth. PI. Hartw.* 200.—N. Granat.
lavandulaefolium, *DC. Prod.* v. 164.— Peruv.
laxum, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 476=guadalupense.
leiophyllum, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 402.—Mexic.
leptocephalum, *DC. Prod.* v. 148.—Peruv.
leptolepis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 359.—Bras.
leptophyllum, DC. Prod. v. 176 = foeniculaceum.
leptopodum, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot v. (1846) 478 = Brickellia diffusa.
leucanthum, Klotzsch, ex Walp. Kep. vi. 183=Conyza modesta, *Kunth.*
leucocephalum, *Benth. PL Hartw.* 86.—Mexic.

EUPATOBIUM:—
leucolepis, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 84.—Am. bor.
leucophyllum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 116.—Peruv.
leucotrichium, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii.292=verbenaceum.
liatrideum, *DC. Prod.* v. 142.—Bras,
libanoticum, *Sch. Bip. in Journ. Bot.* i. (1863) 284.—Cuba.
Liebmannii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 96.—Mexic.
Liebmannii, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 75.—Mexic.
ligulaefolium, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 242=gnidioides.
ligustrinum, DC. Prod. v. 181 = micranthum.
Lindeniannm,^. *Rich. Ft. Cub. Fanerog.* ii. 42.—Cuba.
Lindheimerianum,SduxLe, inIinnaea,xxi. (1848) 699 = ageratifolium.
Lindleyanum, *DC. Prod.* v. 180.—China.
Lindleyanum, F. Mnell. Fragm. v. 62=cannabinum.
linearifolium, Michx. Fl. BOT. Am. ii. 97, partim= leucolepis.
linearifolium, Walt. Fl. Carol. 199 = hyssopifolium.
lineatom, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 386.—Bras.
linifolium, DC. Prod. v. 149 = bupleurifolium.
longepetiolatum, *Sch. Bip. in Iinnaea,* xxxiv. (1865-66) 535, nomen.—Bolivia,
longicanle, *DC. Prod.* v. 178 (sp. dab.).—Nepal.
longicaule, Wall. Cat. n. 3169=Vemonia saligna.
longipes, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 26.—Mexic.
longipetiolatum, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 217=Trichogonia salviaefolia.
loniceroides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 116 = amygdalinum.
lncidum, *Orteg. Hort. Matr. Dee.* 36.—Mexic.
ludovicianum, *DC. Prod.* v. 188.—Am. bor.
Lundianum, *DC. 1. c.* 170.—Bras,
lupnlinnm, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. n. 301.—Bras.
luteum, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 861 (sp. falsa).
lusoniense, Llanos, Fragm. 88>=triplinerve.
macranthum, *Sw. Fl. Ind. Occ.* iii. 1816.—Ind. occ.
macrocepbalnm, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 136.—Bras.
macrodon, DC. Prod. v. 145=laevigatnm.
macrophyllum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1175.—Am. trop.
macropodum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 279.—Gniana.
maeulatum, Linn. Cent. PI. i. 27; Amoen. Acad. iv. 288 = purparenm.
Mairetiannm, *DC. Prod.* v. 167.—Mexic.
malvaefolium, *DC. 1. c.* 160.—Mexic.
Mandonii, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 533, nomen.—Boliv.
marginatum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 54.—Peruv.
Marrubium, Walt. Fl. Carol. 199 = rotnndifolium.
Martii, Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 88-seq.
Martiusii, DC. Prod. vii. 269=squalidum.
Maximiliani, Schrad. ex DC. 1. c. v. 148=conyzoides.
megacephalum, *Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 854.—Bras,
megalophyllum, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 90.—Mexic.
megaphyllum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 322.—Bras.
megapotamicnm, *Spreng. Syst.* iii. 420.—Bras,
melanadeninm, *Nance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 825.—China,
melanolepis, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 97.—Mexic.
melUsaefolium, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 1894.—Mexic.
melissaefolium, Lam. Encyc. ii. 411 *(= Nothites melissaefolia).*—Peruv.
melissoides, WiMA. Sp. PI. iii. 1754=aromaticum.
Mendezii, *DC. Prod.* v. 160.—Mexic.
menthaefoliom, *Poepp. ex Spreng. Syst.* iii. 412.—Cuba.
menthaefolium, Wall, ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 18 = Vemonia chinensis.
micrachaenium, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 819 = steviaefolium.
micranthon, J. F. Gmel. Syst. 1198=Mikania amara.
micranthum, Lag. Gen. et Sp. PI. Nov. 25 = Ageratum corymbosum.
micranthum, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 138.—Mexic.

EUPATOHIUM:—
microcephalum, *Hegel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1860) 35.—N. Granat.
microphyllum, *Linn./. Suppl.* 855.—N. Granat.
microstemon, Cass. in Diet. Sc Nat.xxv. 432-guadalupense.
mikanioides, *Chapm. Fl. S. U. St.* 196.—Am. bor.
Milled, *Steud. Norn.* ed. II. i. 608.—Mexic.
modestum, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1847) 18.—Mexic.
molle, Bert, ex DC. Prod. v. 172=puberulum.
molle, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 109.—N. Granat
molle, Sw. Prod. Fl. Ind. Occ. lll=macrophyllum.
mollissimum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* n. II. 831.—Bras,
monanthum, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 299.—Mexic.
monardaefolium, *Walp. in Linnaea,* xiv. (1840) 506.—Bras.
montanum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 111.—Jamaic
montevidense, *Spreng. Syst.* iii. 417.—Keg. Argent,
morifbliom, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 10.—Mexic.
Morisii, *Vis. Ort. Bot. Padov.* (1842) 80.—Hab.?
mucronatum, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 440=conyzoides.
Muelleri, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 90.—Mexic.
multicrenulatum, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 835.—Bras.
multifidum, DC. Prod. v. 182=anethifolium.
multiflorum, Less, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 231 = Mikania buddleiaefolia, nodulosa.
multiflorum. Mart, ex Baker, I. c. 361=organense.
multiflosculosum, *DC. Prod.* v. 141.—Bras.
multinerve, Benth. PI. Hartw. 76 =• pycnocephalum.
multiserratum, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 301.—Mexic.
mygindaefolium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 101.—Mexic.
myosotifolium, *Jacq. Ic. PI. Rar.* iii. 15. t. 582; *Coll.* ii. 341.—Am. austr.
myriadenium, *Schau. in Linnaea,* xix. (1847) 721.—Mexic.
myrianthum, Less, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 280 = Mikania myriocephala.
myriocephalum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 442.—Bras,
myrtilloides, *DC. Prod.* v. 165.—Bras.
mysorense, Heyne, ex DC. 1. c. 451 = Plnchea tomentosa.
Neaeanum, *DC. I. c.* v. 160.—Mexic.
nemorense, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 535, nomen; Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 804 = Vauthierianum.
nepalense, Spreng. Syst. iii. 412 = Vemonia divergens?
nepetaefolium, *H. B.* 6" *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 112.—Mexic.
nepetaefolium, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1868)219.—Hab.?
nepetoides, Iindl. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 360 - ballotaefolium.
nentosum, Sieber, ex DC. Prod. v. S99=Baccharis nervosa,
nervosum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 111.—Ind. occ.
neurolepis, Torr. ex Torr. & Gray, FL N. Am. ii. 81 = ivaefolium.
neurophyllum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 321 = dendroides.
nigrescens, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 297 = collinum.
Digram, *Baill. Hist. PI.* viii. 81.—Hab. 1
nitidalum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 351.—Bras.
nitidum, DC. Prod. v. 180-Kanimia nitida.
niveum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 116. t. 342.—N. Granat
nodiflorum, Wall. Cat n. 8166 =cannabinum.
nubigenum, *Benth. PI. Hartw.* 85.—Guatemala,
nudiflorum, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 41.—Cuba.
nudum, Gardn. in Hook. Lond. Joura. Bot. v. (1846) 476 = Ageratum melissaefolium.
Nummularia, *Hook, tf Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (18351 241.—Bras.
nutans, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 106 = Brickellia secundiflora.
oaxacannm, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 324.—Mexic.

BUPATOBIUM:—
oblongifoliam, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 333.—Bras.
obovatum, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 859-rotondifolinmf
obovatum, Willd. ex Less, in Linnaea, iv. (1829) 271-Vemonia scabra,
obscurum, DC. Prod. v. 142=ivaefolium.
obtusifolium, Wjlld. Sp. PI. iii. 1768 = Vemonia pnnctata.
obtusissimum, *DC. Prod.* v. 173.—Ins. S. Doming,
occidentale, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 806.—Am. bor. occ.
odoratum, *Linn. Syst.* ed. X. 1206, partim.—Am. trop.
odoratum, Linn. 1. c, partim = conyzoides.
odoratum, Walt. Fl. Carol. 200=ageratoides?
Oerstedianum, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 74.—Am. centr.
officinale, Baill. Diet ii. 748 -= Mikania officinalis.
oliganthes, Less, in Linnaea, v. (1880) 137 - Brickellia oliganthes.
oligocephalum, *DC. Prod.* v. 166.—Mexic.
oligolepis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 98.—Mexic.
omphaliaefolium, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1844) *Adnot.* n. 13; *ex Walp. Rep.* vi. 113—Mexic.
opiferum, Baill. Diet. ii. 748=Mikania cordifolia.
oppositifolium, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* iii. 36.—Am. bor.
orbiculatum, *DC. Prod.* v. 172.—Bras.
Orbignyanum, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* (1882) 324.—Reg. Argent.
oregonum, NutL in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii-(1841) 286 = occidentale.
organense, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* (.1845) 117.—Bras,
orgyale, *DC. Prod.* v. 174.—Bras,
origanoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 114.—N-Granat.
origanoides, *Meyen (f Walp. in Nov. Act. Nat. Cur-*xix. *Suppl.* i. (1843) 257.—Peruv.
Orizabae, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* 98.—Mexic.
orf>haliaefolium,'Rege\,Gtulena. (1853) 4, sphalm." omphaliaefolium.
Ossaeanum, *DC. Prod.* v. 144.—Ind. occ.
Osseanum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. FL Bras. " II. 287=laevigatum.
ovaliflorum, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy. W?-~~* Mexic.
ovatum, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 296 = rotundifoliam.
oxychlaenum, DC. Prod. v. 162-amygdalinum.
oxyhedrum. *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 369i obs.—Bras.
oxylepis, *DC. Prod. v.* 145.—Bras.
oxylepis, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. FL Bras. « " ' 839 = Warmingii.
Pabstii, *Sega, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xU. (W* 375.—Hab.?
palaeforme, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 7&" Mexic
pallescens, *DC. Prod. v.* 154.—Bras.
pallidum, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag- •• (1835) 241 = steviaefolium, pallescens.
palmare, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* 294.—Bras.
palustre, *Baker, I. c* 368.—Bras,
pandurifolium, *Baker, I. c.* 310.—Bras.
paniculatum, Lindl. ex DC. Prod. v. 28-Vernoi»» Doniana.
paniculatum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. D. *It*"* Verae-crucis.
paniculatum, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (I 2; ex Linnaea, viii. (1833) Litt. 26=guadalupe»
papantlense, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) * Mexic.
paradoxum, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot i»"* i. (1835) 240-Ophryospoms paradoxus.
paranense, *Hook. V Arn. I. c.* 241.—Reg. Argent.
parietariaefolium, *Scheele, in Linnaea,* xviiL C 458.—Mexic.
Parryi, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound-* Mexic.
parviftorum, Aubl. PL Gni. ii. 797=Mikania ama*
parviflorum, £11. Sketch, ii. 299 = semiserraturo-
parvifloram, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 111.—
patagonicum, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges.* «» " ' (1882) 324.—Patagon.

EUPATORIUM:—

pa ^:*J/toi_ v Arn_in Hooi_ Comp_ Bot_ Ma*e- ' ·
1885) 242.-Reg. Argent.

Patens, *Phil. Sett. Mend. Alt.* **21.-ChilL**

pauciflorum, *H. B. & K. Nov. Gen.et Sp.* **iv. 120—**
«. Granat. t

Pandflormn, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 80.—Am. bor.

paulinum, Wall_ e* DC- Prod_ T- 16=Vemonia

paulinum, flc. *1. c.* 158,-Bras.

pauperum, *H. B. & K.*
<82-squalidum.

^ftlf¹™. A. Gray, *in Proc. Am. Acad.* **xvii.**
· (1881-8-2) 205. AAUona.

pazcuarense, Meric.

Pectinatum, *Rafin. Atl. Journ.* 17.-Am.bor.

-dale, *Sch.*
295.—Bras.

pedunculosum, A_ Gray» P1- Wright, i. 86=longipes.

pedunculosum, *Hook. V Arn. in Comp. Bot. Mag.* **i. (1885)** 240.—Reg. Argent.

pellucidum, *H. B. (y K. Nov. Gen. et Sp.* **iv. 108.**
—« Granat.

pend. «, Schrad. Ind. Sem. Hort Getting. (1880); ex unnaea, vi. (1831) Litt. 72-Brickellia pendula.

dendroides.

Pentlandianum, *DC. Prod.* v. 157.—Am. anstr.

perfoliatum, *Linn. Sp. PI.* 838.—Am. bor.

perforatum *«ker, in Mart. Fl. Bras.* **vi.**
—Bras.

peron < Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 90 = Hebmannii, *Hemsl.*

Perrinianum, *Spreng. Syst.* iii. 412.—Am. austr.

persicifo *Hum, H. B: &• K. Nov. Gen. et Sp.* **iv. ISO.—**
Ecuador.

ntasites, *Griseb. Ind. Sem. Hort. Gotting.* **(1877) 8.—**
Am. centr.

petiolare [*Mor. & Ses*".] «*DC. Prod.y.* 166—Mexic.

phlogifolium *DC. I. c.* 147—Bras.

piauhyen Hook. Lond. Jonrn. Bot. v. **(1846)** 472=dendroid«.

pichinchense, *. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* **iv. 122.—**
Ecuador.

pictum, *Gardn. in Lond. Journ. Bot.* **vi. (1847)**
443.—Bras.

pilosum, Walt• **Fl. Carol. 199 = teucrifolium ?**

pinnatifidum, i DC. Prod. v. 149=pinnatisectum.

pinnatifidum, *Ell. Sketch,* **ii. 295.- Am. bor.**

pinnatifissum*, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. v -
pinnatisectum.

P'nnatipanitum.SfA. *Bip. in Linnaea,* **xxii. 572,**
nomen i *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 838.-
Bras.

pinnatisecTM. *Steud. Norn.* ed. II. i. 608.—Am. austr.

piptol *Sift* **= pyrifoli m.**

pip.opappum, *Sch_ Bip_ in Bull. Soc. Bot. Fr.* **xii.**
(1865) 83; *e in Linnaea,* **xxxiv.** (1865-66} 535,
nomen.—Bolivia.

piquerioides, DC. Prod = **Ophryosporus piqueri-**
oides.

platylepis, *Baker,* in Mart. Fl. Bras. vi. II. 355.-Bras.

plectranthifolium, *Benth_ ex On_ in Kunth_ Vidensi_*
Meddel. (1852) 76.-Costk Rica.

pluchcoid
(1868) fn .—Cuba.

ex Baker, in Mart. Fl. Bras.

Poeppigii *Spreng.* = Cuba.

polyanthes, Less. ex Baker. >n Mart. Fl. Bras. vi. II.
258 = **Mikania** callineura.

polyanthes, Spren B- Syst. iii. 485 = Vemonia polyanthes.

polyanthum, Sch_ Bip_ Baker, in Mart. Fl. Bras. vi.
erianthum.

polyanthum, Wa U- Cat. n. 8171-Vernonia divergent

polystachyum, DC. Prod. v. 149 ** Symphyopappns polystachyus.

polystachyum, Willd. ex Less, in Linnaea, iv. (1829) 283 - Vernonia mollis.

pomaderriiblimn, *Benth. PI. Hartw.* 199.—N. Granat

ponticum, Pall, ex Georgi, Beschr. Kuss. Reich, viii. 306 ^^ cannabiniim.

popocatapetlense, Schlecht. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 99, nomen.—Mexic.

populifolium, Hook. *8c* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 242 = hecatanthum.

populifolium, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 111.—Mexic.

populifolium, Mart, in Flora, xx. (1887) u. Beibl. 105 =macrophyllnm.

porphyranthemura, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 27.—Mexic.

porphyrolepis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 260.—Bras.

poterioides, Sch. Bip. in Linnaea, xxii. (1849) 57 - sphaerocephalnm.

prasiifolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 167.—Reg. Argent.

propinquum, DC. Prod. v. 146=Iaevigatum.

prunellaefolinm, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 123. —Mexic.

prunifolium, *H. B. V K. I. c.* 182.—Peniv.

Pseudochilca, *Benth. PI. Hartv.* 198.—N. Granat.

Psendoperfoliatnm, *Sch. Bip. in Leopoldina,* xx. (1884) 75.—Mexic.

psiadiaefolium, DC. Prod. v. 146 =- laevigatum.

puberulum, *DC. 1. c.* 172.—Ins. S. Doming.

pubescens, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1755 - rotundi- . folium.

pubescens, Wall, ex DC. Prod. vi. 281 = Carpesium cerauum.

pulchellum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 119. t. 345.—Mexic.

pulchrum, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 444=stachyophyllum.

pumilum, *Wender. ex Steud. Norn.* ed. II.-i. 608, nomen.—Hab. ?

punctatum, *Lam. Encyc.* ii. 408.—Ind. occ.

punctatum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 11-Milleri.

punctatum, Mkj. in Linnaea, xvii. (1848) 66 = laevigatum.

punctatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 853 <• purpureum.

punctnlatum, *DC. Prod.* v. 147.—Bras.

punduanum, Wall. Cat. n. 3170=cannabinum.

pungens, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 474 = oxylepis.

purpurascens, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxx. (1859-60) **182, nomen; *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 356.** —Bras.

purpureum, *Linn. Sp. PI.* 838.—Am. bor.

purpureum, Lour. Fl. Cochinch. 487=quatemum.

pycnocephalum, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 404.— Am. bor.; Mexic.

pyramidale, D. Don, Prod. Fl Nep. 170 = Vemonia Roxburghii.

pyramidale, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 324.—Bolivia,

pyrifolium, *DC. Prod.* v. 158.—Bras,

quadrangulare, *DC. 1. c.* 150.^-Mcxic.

quatemum, *DC. 1. c.* 183.—Cochinch.

quinquesetosum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 90, sphalm. -= Fleischmannià rhodostylis.

quinnuesetum, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1862) 79.- Nicaragua.

quintuplinerve, Less, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 240-Mikania laevis.

racemosum, Bertol. Misc. Bot vi. 26.1.1 ▪ coronopifolium.

racemosum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 339-bracteatum.

ramosissimum, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 441-squalidum.

ramosum, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 13.—Am. bor.

Reevesii, *Wall. Cat.* n. 3168.—China.

reflexum, Moench, Meth. Suppl. 284= Blomea chinensis.

Regnellii, Sch. Bip. in Linnaea, xxx. (1859-60) 182 - Ophryosporus Regnellii.

remoHfolium, DC. Prod. v. 165 = E. Vitalbae.

Remyanum, *Phil. Fl. Atac.* 29.—Chili.

repandum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1767.—Ind. occ.

resinosnm, *Poepp. V End!. Nov. Gen. et Sp.* iii. 54.—
Peruv.

resinosnm, *Torr. ex DC. Prod.* v. 176.—Am. bor.

reticulatnm, *Desv. in Ham. Prod. PL Ind. Occ.* 51.—
Jamaic.

retiAdatum, Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 29 = E. Salvia.

reticnlatum, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 39.—Cuba.

retifolium, Sch. Bip. in Flora, xxxiii. (1850) 80, nomen ^Mikania sessilifolia.

retrofractum, Thunb. Prod. PI. Cap. 142-Ipbiona polygalifolia.

revolutum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 444.—Bras.

revolutum, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 814 =amygdalinnm.

rhinanthaceum, *DC. Prod.* v. 146.—Bras.

rhodanthum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 314-amygdalinum.

rhodochlamydeum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 26.—Mexic.

rhomboideum, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 127.—
Mexic.

Riedelianum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 478.—Bras.

Riedelii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. n. 355.—Bras,

rigidulum, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 167.—
Japon.

rigidum, Benth. PI. Hartw. 88=Brickellia Hartwegi.

rigidum, 5ai. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 111.—Jamaic.

rigidum, Wall. Cat. n. 2925-Vemonia teres.

riparinm, *Reg-el, Gartenfl.* xv. (1866) 324. t 525.— Mexic.

Rosalesia, DC. Prod. v. 183 = Brickellia Rosalesia.

roseum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 106.—Bras.

rosmarinifolium, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 38 = Helichrysum rosmarinifolium.

rosmarinifolium, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 319 = steviaefolium.

Rothrockii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 102.— Arizona.

rotundifolium, *Linn. Sp. PL* 837.—Am. bor.

rubricaule, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 124 = guadalupense.

rufescens, *Lund, ex DC. Prod.* v. 168.—Bras,

ruñdulum, *Hook. &" Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 243.—Bras.

rufum, Spreng. ex DC. Prod. v. 33 = Vemonia extensa.

rugosum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 114.—
Ecuador.

rugosum, Schrad. ex DC. Prod. v. 174=Schraderi.

rugosum, Spreng. Ncue Entdeck. iii. 39 = Sprengelianum.

rnpestre, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 474—Bras.

rupestre, Rafin. Atl. Joum. 17=altissimnm.

Sabeanum, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 456-conyzoides.

sagittatnm, *A. Gray, PL Wright,* i. 88.—Am. bor. occ.

salicinum, *Lam. Encyc.* ii 409.—Ecuador.

Salvia, *Colla, in Mem. Ace. Tor.* xxxviii. (1835) 8.— Chili.

salviaefolium, *H. B.* 6" *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 181 Ecuador.

salviaefolium, Sims, Bot. Mag. t. 2010 = perfoliatum.

salvifolium, *Balb. ex Spreng. Neue Entdeck.* iii. 40.—
Hab.?

salvifolium, Bert, ex Spreng. Syst. iii. 412 = puberulum.

Salzmannianum, DC. Prod. v. 159 = amygdalinum.

satureiaefolium, Lam. Encyc. ii. 411 = Stevia satureiaefolia.

scaberrimum, *Walp. in Linnaea,* xiv. (1840) 605. Bras.

scabridum, £11. Sketch, ii. 299 = rotundifolinm.

scabrum, *Linn.f. Suppl.* 354.—N. Granat.

scandens, Hook. *8c* Arn. Comp. Bot. Mae. i. (18351 242-Mikanialagoensis.

scandens, Link, Enum. Hort Berol. ii. 307 - Sececio deltoideus.

scandens, Linn. Sp. PI. 8S6 = Mikania scandens.

scandens, Thunb. Prod. PI. Cap. 142 = Mikania canensis.

scariosum, Wallr. ex DC. Prod. v. 188- Brickellia pendnla.

EUPATORITJM:—
Schaffneri, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 100, nomen.—Mexic.
schiedeanoides, Sch. Bip. ex A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 76 =seq.
Schiedeanum, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gottiag. (18S2) 3 =• pycnocephalum.
ScbimperiaDum, *Scheele, in Linnaea,* xviii. (1844) 458., Arabia.
achizanthnm, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 361.—Jamaic.
Sehlechtendalii, DC. Prod. vii. 269 = sordescens.
Schoniburgkii, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. il840) 41.—Guiana.
Schraderi, *DC. Prod.* v. 174.—Am. austr.
Schultzii, *Sch. Bip. in Zeitschr. Gartenb. Darmst.* (1857) 6.—Mexic.
scopuloram, *Wedd. Chlor. And.* i. 216.—Bolivia,
scorodonioides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 27.—Mexic.
secundiflorum, Bert, ex DC. Prod. v. 48 = Vcrnonia arborescens.
secundiflorum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 = Brickellia secundiflora.
Selloi, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. Ii. 361.—Bras,
setnialalum, *Benth. PI. Hartw.* 76.—Mexic.
semiserratum, *DC. Prod.* v. 177.—Am. bor.
semistriatum, *Baker, in Mart. t'l. Bras.* vi. II. 318.—Bras.
senecionideum, *Baker, I. c.* 335.—Bras,
septuplinervium, *Klatt, in Leopoldina,* xz. (1884) 90.—Mexic.
sericeum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 110—N. Granat.
serotinum, *Michx. FL Bor. Am.* ii. 100.—Am. bor. ; Mexic.
serratifolium, *DC. Prod.* v. 181.—N. Granat.
serratuloides, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 117.—Ecuador.
serratum, *Spreng. Syst.* ffi. 415.—Bras,
serrulatum, *DC. Prod.* v. 147—Bras,
sessilifolium, *Linn. Sp. PI.* 837.—Am. bor.
seti/erum, Fav. ex A. Gray, in Proc Am. Acad. xvii. (1881-82) 206 =- Barroetea Pavonii.
Sideritidis, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 77.—Costa Rica.
Sieberianum, DC. Prod. v. 181 = iresinoides.
silenifolium, Mart, ex Baker, in Mart. FI. Brat. vi. II. 215 = Trichogonia campestris.
silphU/olium, Mart, in Flora, xx. (18S7) n. Beibl. 105 = pallescens.
Simonsii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 32 = cannabinum.
Sinclairii, Benth. «x Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 79 = guadalupense.
sinense, J. F. Umel. Syst. 1198 = chinense.
sinuatum, *Lam. Encyc.* ii. 407.—Ind. occ.
sinuatum, Lour. H. Cochinch. 487 = hispidum.
smilacinum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 111.—N. Granat.
Soleirolii, Loisel. in Mem. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 428 = cannabinum.
solidaginifolium. ,4. *Gray, PI. Wright.* L 87.—Am. bor. occ.
solidaginoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 126.—Ecuador.
Sonderi, Sch. Bip. in Linnaea, xxii. (1849) 571 = bnpleurifolinm.
Sonorae, A. Gray, PI. Wright, ii. 74 = pycnocephalum.
sophiaefolium, *Linn. Sp. PI.* 1175.—Ind. occ.
sophioides, *DC. Prod.* v. 170.—Ins. S. Doming.
Soratae, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 585, nomen.—Bolivia.
sordescens, *DC. Prod.* v. 167.—Bra«.
sordidum, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 403.—Mexic.
spaihulatum, Hook. *8c* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 242-halimifolium.
speciosum, Vent. Jard. Cels, 79 = Liatris elegans.
spectabile, Spreng. Syst. iii. 410 = Leucomeris spectabilis.
sphaerocephalum, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 182, nomen; *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. II. 317.—Bras.
spicatum, *Lam. Encyc.* ii. 409.—Reg. Argent,
jpinaciaefolinm, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 75, nota.—Mexic.
spineaefoiium, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 101, nomen.—Mexic.
splendent, *Klotmsch, ex Palak. in Linnaea,* xli. (1877) 575.—Cost* Rica.

BTXPATOKITTM:—
Sprengelianum, *DC. Prod.* v. 184.—Ind. occ.
squalidum, *DC. 1. c.* 142.—Bras.
squamosum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 170 = Keevesii.
squarrosum, Cav. Ic. i. 66 = Brickellia Cavanillesii.
squarrulosum. Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 239 = liatrideum.
itachyophyllum, *Spreng. Syst.* iii. 420.—Bras,
stenolepis, *Steetz, in Seem. Bot. Voy. Herald,* 148.—N. Granat.
Stembergianum, *DC. Prod.* v. 167.—Peruv.
steviaefolium, *DC. 1. c.* 158.—Bras.
stigmatosum, Bertol. Misc. Bot. v. 15. t. 5-album.
stigmatosum, Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) -257 = conyzoides.
stillingiaefolium, *DC. Prod.* v. 160.—Mexic.
stipulaceum, Vahl, Symb. Bot. iii. 94 - Mikania stipulacea.
stoechadifolium, *Linn./. Suppl.* 855.— N. Granat.
stoechadosmum, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xviii. (1862) 22'2__China.
stramineum, *DC. Prod.* v. 150.—Peruv.
strobilanthum, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 300 —horminoides.
suaveolens, Chapm. in Coult Bot. Gaz. iii. (1878) 5 = aromaticnm.
suaveoleni, *H. B. V K Vov. Gen. et Sp.* iv. 109.—Am. austr.
suaveolens, Wall. Cat. n. 3290 = cannabinum.
subaltemifolium, *DC. Prod.* v. 152.—Bras,
subcordatum, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 77.—Am. centr.
subdentatum, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 478=adamantium.
subhastatum. Hook. *8c* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 239 = bartsiaefolium.
subinclusum, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 75.—Mexic.
subobtusum, DC. Prod. v. 161 =- amygdalinum.
subpenninervium, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 89.—Mexic.
subplumosum, D. Don, ex Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 242 - erodiiiblium.
subserratum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 440.—Bras.
subtetragonum, Miq. in Joum. Bot. Neerl. i. (1861) 99 = Lindle yanum.
subtriplinerve, Sch. Bip. in Linnaea, xxx. (1859-60) 182 = rufescens.
subtruncatnm, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 443.—Bras.
subuligerum. A. Gray, PI. Wright, i. 86 = Barroetea subuligera.
subvelutinum, DC. Prod. vii. 268 = squalidum.
subverticillatum, Less, ex Baker, in Mart. FI. Bras. vi. II. 225- Mikania subverticillata.
sulcatum, Hook. *8c* Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 243 = Mikania pentstemonoides.
surinamense, Sch. Bip. ex Miq. Stirp. Surin. Sel. 186 samygdalinum.
syriacum, Jacq. Ic. PI. Rar. i. 17. L 170 ; Misc. ii. 319 s cannabinum.
syriacnm, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (.1856) II. 372.—Syria,
syringaefolium, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. fl851) I. 169.—Peruv.
tanacetifolium. Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 242-erodiifolium.
tectum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 117.—Bras,
tenuifolinm, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 107.—Venezuel.
tcpicanum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 10L—Mexic.
ternifolium, £11. Sketch, ii. 306 = porpureum.
tetragonum, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Getting.* (1880); *ex Linnaea,* vi. (1831) *Litt.* 72.—Mexic.
tetranthum, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 360.—Jamaic.
tetranthum, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 337 —dentatum.
teucrifolium, *Willd. Sp. PI.* iii. 1753.—Am. bor.
teucriifolium, D. Don, ex Hook. *8c* Am. in Hook. Comp. Bor. Mag. i. (1835) 239 = bartsiaefolium.
theaefotium, *Benth. PI. Hartw.* 199.—N. Granat.
thespesiaefolium, *DC. Prod.* v. 164.—Mexic.
thyrsoideum, *Mof. ex DC. I. c.* 150.—Mexic.
tinifolium, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 183.—N. Granat.

EUPATOKITJM:—
tomentellum, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Gutting.* (1883) 3. t 3.—Mexic.
tomentosum, Lam. Encyc. ii. 410«Senecio penicillatus.
tomentosum, Steud. Nom. ed. II. i. 609, sphalm.-tomentellum.
Torreyanum, Short, ex Torr. *Si.* Gray, Fl. N. Am. ii. 84 = hyssopifolium.
tortifolium, Chapm. in Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 5 = hyssopifolium.
tozziaefolium, *DC. Prod. r.* 146.—Bras,
trapezoideum, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berl.* (1847) 18.— Mexic. 1
tremulum. Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 241 = dendroides.
triangulare, Mof. ex DC. Prod. v. 166 = deltoideum.
triangulare, Poir. Encyc. Suppl. ii. 604 = atriplicifohum.
triangulatum, *Alam. ex DC. Prod. r.* 172.—Mexic.
tricephalotcs, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 322.—Bras,
trichobaais, *Baker, 1. c.* 364.—Bras.
trichophorum, DC. Prod. T. 147 = bartsiaefolium.
trichosanthum, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 41.—Cuba.
trichotomum, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 535, nomen; Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 806 - Vauthierianum.
trindum, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 94.—Ind. occ.
triflorum, AubL PI. Gui. ii. 795. t. 314 = Piptocarpa triflora.
trifoliatum, Hort. Dorp, ex Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 871 — cannabinum.
trifoliatum. Linn. Sp. PI. 837 = purpnreum.
trifoliatum. Luce,' Topog. Nachr. Oesel, 270 = cannabinum.
trigonocarpum, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 359.—In»-Dominic,
trigonum, *Garan. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 446.—Bras,
trinervum, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 300.—Mexic.
triplinerve, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 97.—Am. trop.
trisectum, *Hook, b" Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* •• (1885) 242.—Chili,
triste, *DC. Prod.* v. 166.—Jamaic.
trixoides. *Mart, ex Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. "• 811.—Bras.
truncation, Ell. Sketch, ii. 298 = sessilifolium.
truncatum, Mnhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1751-perfoliatum.
tubiflorum, *Benth. PI. Hartw.* 76.—Mexic.
Tuerckheimii, *Klatt, in Leopoldina,* xx. (1884) 96.—Mexic.
tulanum, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 324.—Mexic.
turbinatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 26.—Mexic.
Tweedieanum, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 242 — steviaefolium.
umbellulatum, Spreng. Syst iv. App. 409-Pip^to" carpha umbellulata.
umbrosnm, *Benth. PI. Hartw.* 198.—Peruv.
urticaefolium, *Linn.f. Suppl.* 354.—N. Granat.
urticaefolium, Reich. Syst. iii. 719 = ageratoides.
urtidfolium, Banks, ex Griseb. FL Brit. W. Ind. 362 - guadalnpense.
vacciniaefolium, *Benth. PI. Hartw.* 200.—N. Grana'-
vagans, Wall. Cat. sub n. 3040 = Vernonia scandens.
vagum, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (184S; 477 = Gaudichaudianum.
vallincola, *DC. Prod.* v. 168.—Peruv.
•vanillosmoides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Brasvi. II. 346 = pyrifolium.
Vargasianum, *DC. Prod.* v. 166.—Venezuel.
variifolinm, *Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1840; • *ex Linnaea,* xv. (1841) *Litt.* 93.—Am. bor.
Vauthierianum, *DC. Prod.* v. 169.—Bras,
velutinum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* »• (1846) 473.—Bras.
venosum, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bias. vi. »• ĵ ß i =squalidum.
Verae-cracis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 609.—Mexic.
verbenaceum, *DC. Prod.* v. 146.—Bras.
verbenaefolium, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 98-tencnfolium.
vemale. *Vatke If Kurtz. Ind. Sent. Hort. Berol.* (»'*' *App.* 2 ; *etin Gartenfl.* (1873) 86.—Mexic.

EUPATOBITJM:—
wmoniopsis, *Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 384.—Bras.
™*onicae/olium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 112. t. 841-Brickellia veronicaefolia.
iierstcolor, Wall. Cat. n. 3167 - Vernonia divergent
vestitum, *Pc*», Lam. Encyc. ii. 405 = purpureum.
Peruv. «**. b* AW/. V/S. n.«', Y.** iii. 5.1.—
**stitum*, Spreng. Syst. iii. 416-Salmea hirsntt.
vibumoides, *DC. Prod.* v. 171.—Mexic.
"..osum, Bert, ex DC. Prod. v. 178=obtusissimum.
™|<*am,Sw..*Prod. Veg. Ind. Occ.* 111.—Am. bor.j Ind. occ.
vincaefolium, L.-m. Encyc. ii. 410-Mikania amara.
Vindex, *DC. Prod.* v. 16O.-Bras.
™*laceum*, Bert, ex Spreng. Syst. iii. 414 =guadalupense.
ylaceum, Rafin. *Iff* Ludovf 62 (sp. falsa).
"..glan«. D. Don, ex Hook. &*c* Am. in. Hook. Comp. Bot. Mag. I. (1835) 241 = pinnatifidum.
virgatum, Schirad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1829); ex v. 1Ei; Prod - v- 159=pycnocephalum.
vwdiflorum, *Baker, in Mart.Fl. Bras.* vi. II. 809.- was.
*Hook_v Arn_in Hook_ Comp_ Bot_*
(1836) 241. Reg. Argent,
viscosum, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 129.- Ecuador.
»w«Mam, Wall. Cat. n. 8287=cannabinnm.
Vitalbae, *DC. Prod.* v. 163,-Bras.
vit... *Klatt> in Uo poldina>* xx_ (18M) 90_"~
Volckmanni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1881) 51.- Chili.
volk«'neriaefolium, WaU. Cat. sub n. 8001-Vemonia
Vo lanaemfolia.
«««»»/, Vahl, Symb. Bot. iii. 93 = Mikania scandens.
vulcaaicum, *Benth. ex Oerst. in Kjotb. Videnst.* **«?del. (1852) 78.-Am. centr.
Wall M*i, DC. Prod. v. 17»-=iaponicum.
Warningii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 889.—Bras.
Warming 1l Sch- Bip- ex Bake> L c- 84 o n d i c t y O *
phyllum.
Weinmannianum Petrop. 1857), Regel & Koera. Ind. Sem. Hort.
Wrightii, *A. Gray, Pl. Wright.* 2. 41 n i g r a n t h u m.
xalapense, *H. B. & K. Nov. Ge* 87 _N_ Mexic.
Mexic.
xerolepis, Sch. Bip- e* Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 823 = patens, *Hook_ v Arn_*
xylophyllo ides, DC. Prod. v. 149 - dendroides.
xylorhizum naea, „ . (1859-60) 182,
i ScA- *Bip in Lin*
Bonen; *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. II. 292.-
zeylanicum, Linn. Sp. PL 837-Vernonia zeylanica.

EUPETALUM « Lind l- I°trod- Nat. Syst. ed. II. 440 (1836) = Begonia, linn.
Gaudichaud Klotesch. in Monatsb. Bert. Acad. (1854) 121 = 8. Gaudichaudii.
geraniifolia», Klotzsch, 1. c.-B. geraniifolia.
2.V3* Klotzsch, 1. c.-B. Gaudichaudii.
***leyanum*, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 50 -B. Jrtudwhandii.
lodes, Lindl.
talodes.
tube ... , K1<*«ch. in Monatsb. Berl. Acad. (1854) 121 *B. geraniifolia.

EUP (5°C, ARPUS - Anders, ex Steud. Nom. ed. II. i. 422, «09 (1840) = Correa, Sm. (Rutac.).

EUP -HOEBE, Blnme, ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 58,
"* " syn- (1884)=AlBeddapluie,Nees (Laurin.).
"nescens, Blume, ex Meissn. 1. c. 59 (- *Nothaphoebe*
kl"""'«")—Sumatra.
"Wa cea, Blnme, ex Meissn. 1. c 58 *{'Nothaphoebe chartacea*).- J a v t
cuneata, Blnme. « Meissn. 1. c. *(-Nothaphoebe cuneata*)-Malaya.
fa ata Blnme, ex Meis»- L c- 69 *(= Nothaphoebe*
im falcata).—Sumatra.
" ^ A W/ c*, Blume, ex Meissn. 1. e. (=*Nothaphoebe*
"..ophylla)-Ml a.y*.
superba, Blume, ex Meissn. 1. e. (= *Nothaphoebe superba*).—Malaya.
umbe / ^ a > Blume> « MdMn - L c « (- *Nothaphoebe*
im eeUiflora).~ MaUya.

EUPHORA, Griff. Notul. iv. 647 (1854) = Aglala, LOOT. (Meliac).
exstipularis, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 616 = A. ouuiitiforft.
exstipulatis, Griff. Notul. iv. 547-A. minutiflora.

EUPHORBION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 125=Euphorbia, Linn.
anacampserum, St. Lag. 1. c. 126=Euphorbia Anacampseros.
opium, St. Lag. 1. c—Euphorbia Apios.
dendroideum, St. Lag. 1. c. = Euphorbia dendroides.
esulum, St. Lag. 1. c. = Euphorbia Esula.
helioseopium, St. Lag. 1. c. = Euphorbia Helioscopia.
lathyrum, St. Lag. 1. c. = Euphorbia Lathyris.
myrsinitum, St. Lag. 1. c. = Euphorbia Myrsinites.
paralium, St. Lag. 1. c. = Euphorbia Paralias.
peplum, St. Lag. 1. c. 125 - Euphorbia Peplus.

EUPHORBIA, Linn. Gen. ed. I. 152 (1737).
EVPHORBIACEAE, Benth. *&c* Hook. f. iii. 258.
ADENOPETALUM, ARTKROTHAMNUS, DICHROPHYLLUM, EUMECANTHUS, EUPHORBIASTRUM, LEPTOPUS, STERIGMANTHE, TITHYMALOPSIS, TRICHEROSTIGMA, Klotzsch *&c* Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 248-252.
ADENORIMA, AGALOMA, AKLEMA, ALLOBIA, CTATHOPHORA, DESMONEMA, KANOPIKON, KERASELMA, LEPADENA, LOPHOBIOS, MURTEKIAS, NLSOMENES, PYTHIUS, TLRUCALXA, TORFOSIDIS, TUMALIS, VALLARIS, XAMESIKE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 112-117 (1886).
ALECTOROCTONVM, Schlecht in Linnaea, xix. (1847) 252.
ANISOPHYLLUM, Haw. Syn. PL Succ. 169 (1812).
ANTHACANTHA, Lem. Illustr. Hortic v. (1868) Misc. 64.
APLARINA, Rafin. New Fl. Am. iv. 99 (1886).
ATHYMALUS, Neck. Elem. ii. 858 (1790).
CHAMAESYCE, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI. ii. 260 (1821).
CHARACIAS, S. F. Gray, 1. c 259 (1821).
CHYLOGALA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 150.
DACTYLANTHUS, Haw. Syn. PI. Succ. 132 (1812).
DITRITRA, ENDOISILA, PECCANA, Rafin. Sylva Tellur. 114-115 (1838).
EPURGA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 150.
ESULA, Rupp. Fl. Jen. ed. HalL 271 (1745); Haw. Syn. PI. Succ. 158 (1812).
GELARHOEUS, Haw. 1. c. 143 (1812).
KERASELMA, Neck. Elem. ii. 368 (1790).
LACANTHIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 94 (1836).
LYCIOPSIS, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 37 (1867).
MEDUSEA, Haw. Syn. PI. Succ. 133 (1812).
PETALANDRA, F. Mnell. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 27 in syn. (1862).
PETALOMA, Rafin. ex Boiss. L c. 63 (1862).
PLBURADENIA, Rafin. Atl. Joum. 182 (1833).
POINSETTIA, R. Grab, in Edinb. N. Phil. Journ. xx. (1886) 412.
TITHYMALUS, Tourn. ex Hall. Enum. SUrp. Helv. i. 189 (1742).
TRKISIA, Haw. Syn. PI. Succ. 181 (1812).
ZALITEA, Rafin. New Fl. Am. iv. 98 (1836).
abortive, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. cxii, nomen.—Arabia,
abyssinica, *J. F. Gmel. Syst.* 759 ; *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 239.—Abyss.
acalyphoides,//ocAtf. *ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 98.—Nubia,
acanthothamnos, *Heldr. ex Sort, in Boiss. Diagn. Set.* II. iv. 86.—Graecia.
acaulis, Roxb. Hort. Beng. [36]; Fl. Ind. ii 472 = fosiformis.
acerensis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 65.—Boliv.
achanocarpa, Spreng. Syst. iii. 797, sphalm. = akenocarpa.
aculeata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 94.—Arab.
aculeata, E. Mey. in Ditge, Zwei Pfl. Docum. 184-sclerophylla.
acuminata, Lam. Encyc. ii. 426=falcata.
acnta, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 189.—Texas,
adenochlora, *E. Morr. V Decne. in Bull. Acad. Brux.* iii. (1886)174.—Japon.?
adenophylla, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. IL L 609, nomen.—Hab.f

EUPHORBIA:—
adenopoda, *Baill. Adansonia*, i. (1860-61) 141.—Madag.
adenoptera, *Bertol. Misc. Bot.* iii. 20. t. 23.—Am. trop.
adiantholdes, *Lam. Encyc.* ii. 428.—Perav.
Adriana, *St. Hil. ex Klotssch V Garcke, in Abh. Akad. Berl.* (1860) 73.—Bras,
aegyptiaca, *Boiss. Cent. Euph.* 18.—Aegypt
affinis, Boiss. 1. c. 12 =• Balbisii.
affinis, DC. Fl. Fr. vi. 863 - E . Terracina.
agowensis, *Hochst. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 70.—Abyss,
agraria, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* i. 375.—Enrop. austr.; Reg. Caucas.
agrorum, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 679 = agraria.
akenocarpa, *Guss. Adnot. Cat. PI. Boccad.* (1821) 7.—Reg. Mediterr. occ.
akenocarpa, Ronx & Blaise, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 119»cybirensis.
alata, *Hook. Ic. PI.* t 700.—Jamaic.
alatavica, *Boiss. Cent. Euph.* 88.—Soongaria.
albomarginata, *Torr. V Gray, in Pad/. Rail. Rep.* ii. 174—N. Mexic.
aleppica, *Linn. Sp. PI.* 458.—Europ. austr.; Oriens.
alexandrina, Defile, Fl. Egypte, 284. t. 30=E. Terracina.
algeriensis, *Boiss. Diagn. Set.* II. iv. 85.—Alger.
alpigena, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xvi. (1866) 337 = dulcis.
alpina, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 186.—Sibir.
alsinaeflora, *Baill. Adansonia*, vi. (1866) 288.—Austral.
alsinaefolia, *Boiss. Cent. Euph.* 16.—Bras,
alsinoides, *Miq. in Linnaea*, xxvi. (1858) 222.—Ind. or.
altaica, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 190.—Sibir.
altissima, *Boiss. Diagn. Set.* L v. 62.—As. Min.; Syria.
ambigua, Waldst & Kit. Ic. PI. Hung. ii. 144.1.136-carniolica.
ammanioides, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 55.—Panama; Mexic.
ammatotricha, *Boiss. Cent. Euph.* 10.—Mexic.
amoena, *Klotzsch, in Schomb. Faun*, b* *Fl. Brit. Gut.* 1184, nomen.—Guian.
ampla, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 20.—Afr. trop.
amplexicaulis, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 183.—Ins. Galapag.
amplexicaulis, Ledeb. Fl. Ross. iii. 567-condylocarpa.
amygdaloides, Lam. Encyc. ii. 489-nicaeensis.
amygdaloides, *Linn. Sp. PI.* 463.—Eu.op.; Oriens.
anacampseroid.es, Lam. Encyc. ii. 420 = Pedilanthus padifblius.
Anacampseros, Bal. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 174 =denticulate.
Anacampseros, *Boiss. Diagn. Set.* I. v. 66.—As. Min.
anacantha, *Ait. Hort. Km.* ed. I. ii. 186.—Afr. austr.
anceps, Benth. Bot. Voy. Sulph. 162 = adenoptera.
andina, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857) 41.—Chili.
andrachnoides, Schrenk, in Bull. Phys.-Matb. Acad. P&ersb. iL (1844) 197-subcordata.
androsaemifolia, Presl, Delic. Prag. 57 = Preslii.
androsaemifolia, *[Schousb.] Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 27.—Lusitan.
androsaemifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 610=*ludda.
androsaemoides, DennsL Schluess. Hort Malab. 36 = hypericifolia.
angularis, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 250, nomen; et in Peters, Reise Mossamb. Bot. 92 = abyssinica.
angulata, *Jacq. Coll.* iL 809 ; *Ic. PI. Rar.* iii. 5. t. 481.—Enrop. med.
angusta, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 189.—Texas,
angnstifolia, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Net.* 62—Nipal.
angusti/olia, Lockh. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 73 = heteVophylla.
angustifolia, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent*, xi. (1881)49.—Reg. Argent.
angusti/olia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 857 = E. Esnla.
anomala, Salzm. ex Boiss. in DC. Prod. xv. n. 69 = insnlana.
antiguorum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 9S«=E. Cactus.

EUPHORBIA:—
antiquorum, *Linn. Sp. PI.* **460.—Ind.** or.
antiquorum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 184 = cerviconis.
antiquorum. Wall. Cat. n. 7688 = E. Nivulia.
antiiiphylitica, *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1829-30) 292.—Mexic
anychioides, *Boiss. Cent. Euph.* 12.—Mexic.
aphylla, *Brouss. in Willd. Enum. Hort. Berol.* **601.—** Teneriffa.
apiculata, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1856) 234.—Ins. Galapag.
Apios, *Linn. Sp. PL* 457.—Graecia; As. Min.
apocynoides, *Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald,* **99.** —Panama,
arabica, *Hoehst. & Steud. ex Boiss. in DC. Prod.* **xv.** II. 33.—Arabia; Abyss.
aragonensis, Lose. *Sc* Paid. Ser. Inconf. Arag. 96=-nevadensis.
ararica, Jord. in Billot, Annot 27 = E. Esula.
arborea, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 109, sphalm. — Tuckeyana.
ariorescens, Hort. Angl. ez Salm-Dyck, Hort. Dyck. 104=grandidens.
arborescens, Hort. Par. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 82 = macroglypha.
arborescens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 184 = Synadenium arborescens.
arborescens, Roxb. Hort. Beng. [36]; FI. Ind. ii. 468 = antiquorum?
arborescens, C. Sm. in Tuckey, Congo, 261 = Tuckeyana.
Arbnscola, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* **xii. (1884)** 93.—Ins. Socotra.
arceuthobioides, *Boiss. Cent. Euph.* 20.—Afr. austr.
arenaria, Kngelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 260-zygophylloides.
arenaria, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 67.—N.** Granat.
arenaria, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 171 = petaloidea.
arenaria, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 570= falcata.
arguta, *[Soland. in] Suss. Aleppo,* **ed. II. ii. 253.—** Graecia; Syria.
ariensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. etSp.* ii. 57.—Mexic.
arillata, Edgew. in Joura. As. Soc. Beng. xvi. (1847) 1218-grannlata.
arizonica, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* **186.—** N. Mexic.
arkansana, Engelm. & Gray, in Bost. Jonm. Nat. Hist. v. (1845) 261-dictyosperma.
armata, Thunb. Prod. PI. Cap. 86 = E. Hystrix.
armena, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 1268 = petrophila.
armeniaca, Boiss. Fl. Orient, iv. 1118'petrophila.
Armstrongiana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 47.-- Anstral.
Artaudiana, DC. Fl. Fr. vi. 360=pinea.
articnlata, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 286.—Ins. Galapag.
articulata, Aubl. PI. Gni. i. 480=linearis.
articulata, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 20 = E. Atoto.
arvalis, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. xiL 116.—As. Min.; Persia.
arvensis, Schleich. ez Steud. Nom. ed. I. 323 = falcata.
ascendens, Willd. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 81 = orbiculata.
aspera, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 377.—Reg. Cancas.
asperifolia, Engelm. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 74 —strigosa.
astrachanica, C. A. Mey. ex Clans, in Beitr. Pfl. Ross. Reich, viii. 254 - leptocaula.
astroites, *Pisch. V Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* **x. 44.** —Mexic.
astyla, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* **xv. II. 40.—** Mexic.
atlantica, *Coss. ex Boiss. I. c.* 130.—Algeria.
atlantica, Pers. Syn. ii. 18 = bupleuroides.
Atoto, *Forst. f. Prod.* 36.—As. et Austral, trop.; Ins. Pacif.
Atoto, Guill. in Ann Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 187«=taitensis.
atropurpurea, *Brouss. Elench. PI. Hort. Bot. Monsp.* **(1805) 24, nomen;** *Willd. Enum. Hort. Berol.* **601.** —Teneriffa.
atrorubens, Engelm. ez Boiss. in DC. Prod. xv. II. 101 = E. Ipecacuanha.

EUPHOBBIA:—
atrosanguinea, Poepp. ex Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (I860) 70=portulacoides.
Aubryana, *Baill. Adansonia*, ii. (1861-62) 212.—N. Caled.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 94.—Persia,
aulacosperma, *Boiss. 1. c.* xii. 117.—Syria.
auricularia, Boiss. Cent. Euph. 17=rosea?
australis, *Boiss. I. c.* 16.—Austral.
avenia, Thibaut, ex Pers. Syn. ii. 15 •= imbricata.
asorica, Hoehst. in Seub. FI. Azor. 27—pinea.
atorica, Welw. ex Boiss. in DC. Prod. xv. n. 144 - medicaginea.
baetica, vide boetica.
bahiensis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 24.—Bras.
BaiUoni, Boiss. ex Baill. Adansonia, i. (1860-61) 142 = Bossieri.
Balbiiii, *Boiss. Cent. Euph.* 11.—Ins. Baham.
balearica, Poir. ex Klotzsch *Sc* Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 73=imbricata.
balsamifera, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 137.—Ins. Canar.
bancana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 463.—Ins. Banca.
barbellata, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* **190.—** Mexic
Barrelieri, *Savi, Bot. Etrusc.* i. 145.—Ital.
Baselicis, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxix = Barrelieri.
Baueri, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* **xv. II. 27.—** Austral.
Beaumierana, *Hook. /. b* Coss. in Bull. Sec. Bot. Fr.* xxi. (1874) 164.—Marocc.
begoniaefolia, *Lehm. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 610, nomen.—Hab. 1
bejariensis, DC. in Atti Reun. Second. Sc. Ital. Tor. (1841) 157 = marginata.
belgradica, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 211.—Byzant.
Berteriana, *Balb. ex Spreng. Syst.* iii. 794.—Ind. occ
Bertheloti, *Bolle, ex Boiss. in DC. Prod.* **xv. IL 109.** —Ins. Canar.
Berythea, *Boiss. & Blanch. Diagn.* Ser. II. iv. 82.— Syria.
Besseri, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 42.—Chili.
bialata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 13 = pterococca.
bicephala, Bertol. Misc. Bot. iii. 20=Berteriana.
bicolor, *Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (.1845) 233.—Texas.
bifida, *Hook. &" Am. Bot. Beech. Voy.* **218.—China.**
bifida, Thw. Enum. PI. Zeyl. 269 = E. Atoto.
biformis, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 151.—Mexic.
bifurcata, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* **190.—** N. Mexic
biglandulosa, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 165 = nicaeënsis.
biglandulosa, *Desf. in Ann. Mus. Par.* xii. (1808) 114. —Graecia; As. Min.
biglandulosa, Willd. Enum. Hort. Berol. Snppl. 27*° pendula?
bilobata, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* **190.—** N. Mexic
bimensis, Miq. FI. Ind. Bat. i. II. 420-congenera.
biumbellata, *Poir. Voy. Barb.* ii. 174.—Afr. bor.
biumbellata, Un. Itin. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 149=Cupani.
Bivonae, *Steud. Nom.* ed. II. i. 610.—Afr. bor.; Sicil.
Blancheti, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 797 = brasiliensis.
blepharophylla, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* **iv. 188.** —Soongaria.
boerrhavifolia, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 54.—Am. centr.
boetica, *Boiss. Cent. Euph.* 36.—Hispan.
Boissieri, *Baill. Adansonia*, i. (1860-61) 142.— Madag.
Boivini, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 77.—Madag.
Bojeri, *Hook. Bot. Mag.* t. 3527.—Madag.
bombensis, Jacq. Enum. PI. Carib. 22=ammanioides.
bongensis, *Kotschy & Peyr. PI. Tinn.* 40. t. 19.—Afr. trop.
bonifaciensis, Requien, ez Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 86 - E. Pithyusa.
Bonplandii, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 466 =• torrida.
borbonica, *Boiss. in DC. Prod.* zv. II. 156.—Ins. Borbon.
bothriosperma, *Boiss. (f Kotschy, in Boiss. Cent. Euph.* 36.—Armenia.

EUPHORBIA:—
botryoides, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* **v. (1790)** ed. I. **Art.** IV. 14 (Quid?).—Java.
Bottae, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 96.—Arabia,
bounophila, *Boiss. 1. c.* 154.—Persia.
Bourgaeana, *J. Gay, ex Boiss. I. c.* 108.—Ins. Teneriff.
brachiata, Jan, Elench. 7 - palustris.
brachiata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* **184,** nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 74.—Afr. austr.
brachycera, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* **192.** —N. Mexic
bracteata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 14. t. 276- Pedilanthus bracteatus.
bracteolaris, Boiss. Cent. Euph. 8 •"hypericifolia.
brasiliensis, *Lam. Encyc.* ii. 423.—Am. trop.
Breoni, Ann. Fl. & Pom. (1833) 189 = Bojeri. .
Bridgesii, Bert, ex Boiss. in DC. Prod. zv. II. 103- portulacoides.
Brittingeri, Opiz, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 757 = vemicosa.
Broteri, Daveau, iu Bol. Soc. Broter. iii. (1885) 33 = nicaeënsis.
Broussoneti, Willd. ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 168 = obtusifolia.
Brownii, *Baill. Adansonia,-n.*• (1866) 290.—Austral,
bubalina, *Boiss. Cent. Euph.* 26.—Afr. anstr.
buchtormensis, *C.A* Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* **iv. 189.—** Sibir.
Buhsei, *Baits, in DC. Prod.* xv. II. 167.—Persia.
Bungei, *Boiss. L c.* 115.—Persia,
bupleurifolia, *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 56. t. 106.— Afr. austr.
bupleurifolia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 184 =oxystegia.
bupleuroides, *Desf. Fl. Atlant.* i. 387. t. 108.—Afr. bor.
bupleuroides, Willd. ex Boiss. in DC. Prod. zv. II. 159 =leptocaula.
bupleuroides, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 571 - tenuifolia.
Burchelli, *Muell. Arg~ in Mart. Fl. Bras.* **xi. II. 680.** —Bras.
Burmanni, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* **184,** nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 75.—Afr. austr.
Burmanniana,]. Gay, in Webb & Berth. Phyt. Canar. ilL239 = th.ymifolia.
buxifolia, *Lam. Encyc.* ii. 421.—Ind. occ
Cactus, *Ehrenb. ex Boiss. in DC* Prod.* **xv. II. 82.—** Arabia.
caecorum, *Mart, ex Boiss. 1. c.* 51.—Bras,
caeladenia, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 81.—Beluchist.
caerulescens, Haw. in Phil. Mag. (1826) 276=virosa.
caesaraugustana, *Auct. ex Willk. V Lange, Prod. Fl-* Hisp. iii. 505, nomen.—Hispan.
caesia, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc (1841) 743i = E. Esula.
caespitosa, vide cespitosa.
caespitosa, Tenore, Fl. Nap. iv. L 261. t. 143 « pinea.
Cajogala, Ehrh. in Hannov. Mag. 14tes Stück (1788) 215; Beitr. ii. 102 = Gerardiana.
calcarea, Coss. *8c* Dur. ex Coss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 227= pinea.
calendulaefolia, Delile, Fl. Egypte, 233. t 30. f. 1* **arguta.**
californica, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 49. t. 238.— CaUf.
californica, Boiss. Cent. Euph. 6 = Deppeaoa.
calliadena, Engelm. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 3" =hispida.
callitrichoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. M- prostrata.
callitrichoides, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 727 = adenoptera.
calyculata, *H. B. &• K. Nov. Gm. et Sp.* U. 59.— Mexic.
calyptrata, *Coss. b" Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* (1867) 472, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* zv. »• 112.—Algeria,
campestris, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* **v. (1830J** 84.—Mexic
canaliculata, Lam. Encyc ii. 417-=E. Clava.
canaliculata, Lodd. Bot. Cab. t. 727 = Pedilanthus lithymaloides.
canaliculata, Pers. Syn. ii. 13-graminea.
canariensis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cMi" polyacantha?

EUPHORBIA:—
cauariensis, *Linn. Sp. PI.* 460.—Ins. Canar.
'"*nariensis,* Thnnb. Fl. Cap. ed. Schnlt. 408 =
??"'*»sw,* Trfmant, Voy. Sondan Orient. Atlas, tt. 18, U « E. Candelabrum.
Mitchamm, *Trfmaut, ex Kotschy, in Mittheil. Ge.* if *Gesells. Wien,* i. (1857) *189.*—Afr. trop.
Oata, Linn. Sp. PI. ed. II. 652-E. Chamaesyce.
^-anuti, *pOrl. Fl. Hal.* iv. 462.—Alp. marit.
P>tata, Bncb--Ham. ex Wall. Cat. n. 7708 Aciistau.
pitata, Urn. Encyc. ii. 422-pilulifera.
wnnellata *Engelm.* in *Torr. Bot. Mex. Bound.* 188.—Mexic.
"Pitulata, *Reickb. Fl. Germ. Excurs.* 878.—Thessal.; Craecia,
Capnt-Medusae, *Linn. Sp. PI.* 462.—Afr. austr.
caid.oph.yl *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. xii. 107.—Lycia.
Muell. Fragm. xi. 84.—Anstral.
rtnata, Donn, Hort. Cantab, ed. VI. 181 = Pedi'anthns tithymaloides.
inthiaca, Trannf. ex Boiss. in DC Prod. xv. II. 116 = P'losa.
carniolica, Brot. Fl. Lusit. ii. 817=boelica.
carnioli«, DC. Fl. Fr. iii. 842 = flavicoma.
«n»phca, *Jacq. Fl. Austr.* v. 84. t 14.-Tyrol.
T^f^> Wey- Hist. Abr. PI. Pyr. 272 - nyberoa.
"pasus, Ehrenb. ex Boiss. in DC. Prod. xv. n. 98 - cuneata.
Oleaefolia, Royle, Illustr. Bot. Himal. 829. t. 82 - a, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 108.-Syria.
s, Vnsl, Bot. Bemerk. 109=hypericifolia.
»ythoides, *Boiu. Cent. Euph.* 20.—Cuba.
ttjmifolia Ell. in Wight, 1c. t. 1993 = tiigona.
falcata, Boiss. * HaUSSk> in DC„ ?rod„ XV, „, 1867 = falcata.
caudiculosa, Boiu. in DC. Prod. X7. II. 154.-Syria.
cebr ?? Ho<*st. ex Klousch & Garcke, in Abh. Akad. B. d- (1860)86 = cerebrina.
cesk»«-, Opiz, Seznam, 42 = pilosa.
celastro ^ *BoisSm „ Dc Prodi „ „ U*.-Ins. Sandvic.
centumculoides, H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp. iL 51.-Cuba.
ceratocarpa Tenor,, Fl. Nap. 1. 268. t. 48—Sicil.
cerebrina. Hockst. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 146.—Abyss.
cereiformis, Linn. Sp. PI. 451.—Afr. anstr.
cerinthifolia, Fisch. ex Boiss. in DC. Prod. xv. 11.128 = alpina.
cernua, Coss. & Dur. ex Boiss. I. c. 138.-Algeria.
cervicornis, Boiss. Cent. Euph. 27.—Afr. austr.
cespitosa> Lam. Encyc. ii. 421.—Reg. Argent.
cestrifol *Nov_ Gen_ „ Spm* fl„ 59.—Peruv.
*Chaixia^* Thnb_ Mem. Acad. Toul. Ser. IV. vi. (1856) 152=amygdaloides.
Chama ebuxns, *Bernard, ex Gren. tf Godr. Prosp. Fl.* Ch„ Mount. Pyren. *Gaill. Diagn. Ser. II. iv. 88.*—
Chamaerrhodos, Boiss. Cent. Euph. 8.—Bras.
Chamaesyce, Benth. Fl. Austral, vi. 48, sphalm.-*E. Chamae.* ^,, Baill.
Chamaesyce, Roxb. Hort. Beng. [86]; Fl. Ind. ii. 473 = microphylUl
Chamissonis, Boiss. in DC. Prod. xv. H. 1*.-Ins. Fiji.
Characias, Host> Fl- Anstr. ii. S68 = Wulfenii.
Characias> Linn_ SP- PI- «3.—Reg. Mediterr. oca
Charac Sibth. *Sm_ F1> GTMC- Prod> L* 332 = Sibth. pil.
cheiradenia, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. xii. 112.—Persia.
cheirolepis, Fisch. V Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1839) 171, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 70.-Trcoman.

ETTPHOBBIA:—
chenopodifolia, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 1264.—Bolivia.
Chesneyi, *Boiss. 1. c.* 152.—Assyria.
chilensis, Echeg. Symb. 352. n. 79 = SchickendanUii.
chilensis, C. Gay, Fl. Chil. v. 335 - portulacoides.
chrysophylla, *Klotasch, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 104.—Bras.
ciliata, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 42.-Hab.?
dlicica, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 88-denticulata.
dnerascens, Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound. 186 = tnelanadenia.
clandestina, *Jacq. Hort. Schoehb.* iv. 43. t. 484.—Afr. austr.
Clava, *Jacq. Ic. PI. Rar.* i. 9. t. 86; *Coll.* i. 104.—Afr. austr.
clavarioides, *Boiss. Cent. Euph.* 26.—Afr. austr.
clavata, Salisb. Prod. 389 = E. Clava.
Clementei, *Boiss. Blench.* 82.—Hispan.
Clementei, Bourg. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 181-rupicola.
Cleopatra, *Baill. Adansonia,* ii. (1861-62) 218.—N. Caled.
dusiaefolu, *Hook. & Am. Bot. Beech. Voy.* 96.—Ins. Sandvie
coccinea, *Roth, Nov. PI. Sp.* 228 —Ind. or.
coccinea, Willd. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 71 = pulcberrima.
Coderiana, DC. Fl. Fr. vi. 365=platyphylla.
coecorum, Muell. Arg. in Mart. FL Bras. xi. II. 675 = caecorum.
coeladenia, vide caeladenia.
coerulescens, vide caerulescens.
cognata, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 120 = piloaa.
colletioides, *Benth. Bot. Sulph. Voy.* 163.—Mexic.
collina, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 41.—Chili.
collina, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 573-nicaeensis.
colorata, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 190.—Mexic.
Commelini, DC. Cat. Hort. Monsp. 110-E. Caput-Medusae.
commutata, *Engelm. ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* ed. II. 389.—Am. bor.
comosa, *Veil. Fl. Flum.* 202 ; v. 1.15.—Bras,
compressa, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 41.—Venezuela.
Conceptionis, Rupr. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 102 =portulacoides.
condensata, Fisch. ex Bieb. Fl. Tgur. Cauc. iii. 822 = aleppica.
condylocarpa, *Bieb. 1. c. i.* 377.—Armenia.
confusa, Blume, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 30 = homifusa.
congenera, *Blume, Bijdr.* 684.—Malaya.
congesta, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 28 = pinea.
conifera, Steph. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 123 = pachyrrbiza.
coniosperma, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 196.—Persia,
connata, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 112.—Persia.
consanguinea, Engelm. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 43-serpylllfolia.
cmsanguinea, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 114-piloso.
consanguinea, *Schrenk, Enum. PI. Nov. i.* 88.—Sibir.
convolvuloides, *Hochst. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 46.—Afr. trop.
copiapina, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857) 42.—Chili.
coralloides, *Linn. Sp. PI.* 460.—Italia.
coralloides, Sprun. ex Nym. Consp. 649 =oblongata.
coralloides, Thunb. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 168 = Sieboldiana.
cordata, *Mey en, Reise,* ii. 150.—Ins. Sandvic.
cordata, Schrank, Baier. Fl. i. 747 -*dulcis.
cordellata, Haw. Misc. 185 = Pedilanthus cordatus.
cordifolia, *Ell. Sketch,* ii. 656.—Am. bor.
cordifolia, C. A. Mey. ex Boiss. Cent Euph. 40 = rumicifolia.
coriacea, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 730-megalantha.
coriariaefolia, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 12 = Hookeri.
corifolia, *Lam. Encyc.* iL 421.—Afr. anstr.
cornigera, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 122 =pilosa.

ETJFHOBBIA.—
comuta, *Pers. Syn.* iL 17.—Aegypt j Arabia,
corollata, *Linn. Sp.Pl.* 459.—Am. bor.
coronata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 86.—Afr. austr.
eorrentina, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* xi. (1881) 49.—Reg. Argent
corrigioloides, *Boiss. Cent. Euph.* 11.—Ind. or.
Corsica, *Requien, in Ann. Sc. Nat.* Ser. 1. v. (1825) 884.—Ins. Conic.
cosinosperma, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 8 «= pinea.
Cossoniana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 185.—Alger.
costata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1862) 122; iv. (1853) 66=pilosa.
cotinifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 46 = caracasana.
cotinifolia, *Linn. Sp. PI.* 453.—Ind. occ
cotinoides, *Miq. in Linnaea,* xxi. (1848) 473; *Stir p. Surin. Sel.* 96.—Guian.
cotylifera, Steud. Norn. ed. I. 824, sphalm.=seq.
cotylophora, *Spreng. in Schrad. Journ.* (1800) 11. 197.-Hab.?
craspedia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 95.—Syria.
crenulata, Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound. 192 - leptocera.
cretica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 28 = E. Characias.
crispata, Homem. Hort. Ham. Suppl. 68 = pubescens.
crispata, hem. Illustr. Hortic. iv. (1857) Misc. 71 = Lemaireana.
cristata, D. Dietr. Syn. PI. v. 321=denticnlata.
cristata, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 226.*—Ind. or.
crotonoides, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 98.—Nubia.
cruenta, Steud. Nom. ed. II. i. 611=seq T
cruentata, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Oct. 1832) 361.—Am. bor.
cubensis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1265.—Cuba,
cucumerina, *Willd. Sp. PI.* ii. 886.—Afr. austr.
Cumbrae, *Boiss. Cent. Euph.* 16.—Mexic
cuneata, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 68.—Arabia,
cuneifolia, *Guss. PI. Rar.* 190. t. 88.—Reg. Mediterr.
cunei/olia, Roxb. Hort. Beng. [91]; Fl. Ind. ii. 471 - prolifera.
Cupani, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 648—Ins. Sicil. et Sardin.
Cupani, Schultz, ex Gren. *8c* Godr. Fl. Fr. iii. 86 - E. Pithyusa.
cuphosperma, *Boiss. in DC. Prod.* xv. n. 73.—N. Mexic.
cupularis, Boiss. Cent Euph. 28 => Synadenium arborescens.
curtifolia, Chaub. Nonv. Fl. Pilop. S0=E.Myninites.
Curtisii, *Engelm. in Chapm. Fl. S. U. St.* 401.—Am. bor.
cuspidata, Bemh. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 86=striata.
cuspidata, Bertol. Misc. Bot. ii. 9; iii. 17=hypericifolia.
cyanogala, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 21.—Cuba.
cyathophora, Murr. in Comm. Gotting. vii. (1786) 81—heterophylla.
cybirensis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 89.—Reg. Mediterr. or.
cymosa, Poir. Encyc. Suppl. it 611= nudiflora.
Cyparissias, *Linn. Sp. PI.* 461.—Europ.
cypria, *Boiu. in DC. Prod.* xv. II. 116.—Ins. Cyprus.
Dallachyana, Baill. Adansonia, vi. (1866; 285 = Drummondii.
dalmatica, Vis. Fl. Dalmat. iii. 228-graeca.
damascena, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 118 = tinctoria.
daphnoides, *Balf.f. in Journ. Linn. Sec.* xvi. (1877) 21.—Ins. Mascar.
Darlingtonii, *A. Gray,Man. Bot. N. U. St.* cd.1.404.—Am. bor.
dasycarpa, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 67, nomen.—Marocc.
decipiens, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 197.—Persia.
deeumbens, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 27 - hypericifolia.
decussate, *E. Mey. in Drège, Znei Pft. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 74.—Afr. austr.
decussata, Salisb. Prod. 389-E. Lathyris.
deflexa, *Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 828—Graecia.
delicatula, *Boiss. Cent. Euph.* 19.—Mexic.
Delorti, Timb. ex Nym. Consp. 653= E. Terracina.
deltoidea, *Engelm. ex Chapm. Fl. S. U. St. Suppl.* 647.—Am. bor.

EUPHORBIA:—
dendroides, *Linn.Sp. PI.* 482.—Reg. Mediterr.
densa, Schott *8c* Kotschjr, ex Tchihat. Arte Min. Bot. i. 167 = Schottiana.
densa, *Schrenk, in Bull. Phys -Math. Acad. Pitersb.* iii. (1846) 308.—Persia,
densiflora, *Klotmsch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 94, in obs.—Mexic.
densifolia, *C. Koch,in Linnaea*, xxi. 1848 [1849] 722.—Reg. Caucas.
dentata, *Miehx. Fl. Bar: Am.* ii. 211.—Am. bor.
denticulate, *Lam. Encyc.* ii. 481.—As. Min.; Syria.
denudata, Bertol. Fl. Iul. v. 91-coralloides.
depauperata, *Hochst. in Flora*, xxlv. (1841) I. *Intel!.* **22, nomen; *A. Rich. Tent. Ft. Abyss,* ii. 241.—** Abyss.
Deppeana, *Boiss. Cent. Euph.* 6.—'Calif.'
depressa, C. Gay, Fl. Chil. y. 886 = Engelmannl.
depressa, Phil, ex Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (18601 26 = ovalifolia.
depressa, Torr. ex Spreng. Syst. iii. 794 = maculata.
Deseglisei, Bor. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 128 = angulata.
deserticola, F. Mnell. in Linnaea, xxv. (1862) 440 = eremophila.
desertorum, *Weinm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. VII. 78—Kossia.
dichotoma, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 93.—Egypt.
dichotomy Roxb. Hort. Brag. [91]; FL Ind. ii. 471 = elegans \
dictyosperma, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 37.—Am. bor.
diffusa, Dnfour, in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 446 — rnpicola.
diffusa, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 184. —Ina. Galapag.
diffusa, Jacq. Misc. ii. 811 = exigua.
dilatata, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* Ii. 240. —Abyss.
dilatata, £. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 184 - Meyeri.
dilatata, Torr. *8c* Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 176 = **alata.**
dioeca, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 58 = adenoptera.
dioica, *Hieron. Ic. PI. Argent.* 46.—Reg. Argent,
dioscoreoides, *Boiss. Cent. Euph.* 22.—Mexic.
discoidalis, *Chapm. Fl. S. U. St.* 401.—Florida.
discolor, Bertol. Misc. Bot. x. 37 = corollata.
discolor, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 64.—Am. centr.
discolor, Klotzsch, ex Boiss. in DC. 1. c. 104-elodes.
discolor, Ledeb. Fl. Ross. iii. 677 - E. Esula.
discolor, Shnttlew. ex Boiss. in DC. Prod..xv. II. 119 - Darlingtonii.
disticha, Engelm. ex Boiss. 1. c 32 —corrigioloides.
distineta, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853)66 = pilosa.
distineta, Stschegl. in Bnll. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1864) I. 196=subcordata.
distinguenda, Schur, in Verh, Siebenb. **Ver.** Naturw. iii. (1862) 122 = pilosa.
divaricata, A. Conn, ex Benth. Fl. Austral, vi. 50 = Wheeled.
divaricata, Jacq. Ic PI. Rir. i. 9. t 87 = dendroides.
divergens, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 114 = Rothiana.
diversifolia, Hochst. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 146 **= pinea.**
diversifolia, Poir. Encyc Snppl. ii. 618 ; Wlild. Ennm. Hort. Berol. Snppl. 27 •= E. Terradna.
diversifolia, Schrad. ex Steud. Nom. ed. I. 324 = bn-pleuroides.
diversifolia, Willd. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 71 = pulcherrima.
djimilensis, *Boiss. Fl. Orient*, iv. 1104.—As. Min.
domingensis, Spreng. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 24 -brasiliensis.
dracunculoides, *Lam. Encyc.* ii. 428.—As. et Afr. trop.
drastica, Sievers, in Pall. N. Nord. Keitr. vii. 236-alpina.
Dregeana, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184; nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 95.—Afr. anstr.
Drummondii, *Boiss. Cent. Euph.* 14.—Anstral.
drupifera, *Thonn. in Schum. &• Thonn. Beskr. Gum. PI.* 260.—Afr. trop.
dubia, Dierb. Fl. Heidelb. ii. 127-stricta.
dulcit, Asm, Syn. Stirp. Arag. 69 = isatidifolia.
dulds, Bertol. Fl. Ital. v. 60 - verrucosa.
dulcis, *Linn. Sp. PL* 467.—Europ.

EUPHORBIA:—
dulds, Ruegel, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 130 = ruscinonensis.
dulcis, Sibth. & Sm. Fl. Graec. v. 60. t. 464-thamnoides.
dumetorum, Coss. *tc* Dnr. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 131 = rupicola.
dumosa, Boiss. Diagn. Ser. II. xii. 110 = thamnoides.
dumosa, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 168.—Afr. austr.
dumosa, A. Rich. Fl.Cub.Fanerog.ii. 198-trichotoma.
Dnvalii, *Lecoa V Lamotte, Cat. PI. Vase. Fr.* 827.— Gallia.
echinata, Salm-Dyck, Hort. Dyclc. S42-=cereiformis.
echinocarpa, *Brot. Cat. Hort. Ajuda ; ex Bot. Zeit.* i. (1843) 661, nomen.—Hab. t
echinocarpa, Sieber, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 119 = cybirensis.
Echinns, *Hook.f. V Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxi. (1874) 164.—Marocc.
Edgewortbii, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 120.—Reg. **Himal.**
edulis, *Lour. Fl. Cockinch.* 298.—Cochinch.
effusa, Ehrenb. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 71 = agowensis.
Ehrenbergii, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 456 - E. Terracina.
Eichleri, *Muell. Arg. in Journ. Bot. xii.* (1874) 282.— Reg. Argent.
elegans, Heyne. in Wall. Cat. n. 7718 = longistyla.
elegans, *Spreng. Syst.* iii. 794.—Ind. or.
elliptica, Boiss. Cent. Euph. 18 = saccharata.
elliptica, Lam. Encyc. ii. 425=genicnlata.
elliptica, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 86.—Afr. austr.
elodes, *Boiss. Cent. Euph.* 29.—Bras.
elongata, Poir. Encyc. Snppl. ii. 621 — bupleuroides.
emarginata, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 145—hyberaa.
emarginaU, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 32—Bras.
emarginata. Lam. Encyc. ii, 426 = myrtillifolia.
emimensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 251. —Madag.
Engelmanni, Boiss. Cent. Euph. 15 = ovalifolia.
enneagona, Haw. Misc. 184 = cereiformis.
enopla, *Boiss. Cent. Euph.* 27.—Afr. austr.
ensifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 251. —Madag.
ephedroides, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 76.—Afr. austr.
epicyparissias, Krauss, ex Boiss. 1. c 168 =» involucrata.
epicyparissias, E. Mey. ex Klotzsch & Garcke, in Abli. Akad. Berl. (1860) 88 = Wahlbergii.
epicyparissias, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen ; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 168.—Afr. austr.
epiphylloides, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1878) II. 247.—Ins. Andam.
epithymoides, All. Fl. Pedem. i. 284=verrucosa.
epithymoides, Bab. FL Bath, 44-pilosa.
epithymoides, Brot. Fl. Lusit. ii. 311 =lusitanica.
epithymoides, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 656; *Jacq. Fl. Austr.* iv. 28. t. 844.—Europ.
eremophila, *A. Cunn. ex Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 348.—Austral.
eriantha, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 51—Calif.
ericetoram, *Zumag. Fl. Ped.* ii. 183.—Italia.
ericoides. *Lam. Encyc.* ii. 430.—Afr. austr.
erinaeea, *Boiss. &• Kotschy, Diagn.* Ser. II. iv. 87—Syria.
eriocarpa, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Sc. Bonon. iii. (1889) 174 - E . Characias.
erioclada, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 88-oblongata.
erioclada, Salt, ex Nym. Consp. 649—pnbescens.
eriophora, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 51.—As. Min.; Pers.
eriophylla, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat. Mosc (1841) 744 = subcordata.
erosa, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl. 27-cereifonnis.
erubescens, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 90 = macrostegia.
enibescens, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 116—Afr. austr.
erythradenia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 92—Persia.
erythrantha, F. Mnell. Fragm. ii. 152 =anstralis.
erythrina, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 12.—Afr. anstr.
erythrocarpa, *Klotmsch, in Schomb. Faun. (? Fl. Brit. Gut.* 848, nomen.—Guiana.
erythrodada, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 26.—Ind. or.
erythrodon, *Boiss. tr Heldr. in Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. **114.**—As. Min.

ETJPHOttBIA :—
erythrophylla, BertoL Fl. Gnat. 19. t. 6 = pulcherrima.
erythrorhiza, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 103—Bras.
erythroxyloides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 262.—Madag.
Esula, Bieb. Kl. Taur. Cauc. i. 374=virgata.
Esula, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 94 = Schimperiana.
Esula, Kotschy, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 160-virgata.
Esula, *Linn. Sp. PI.* 461.—Europ.
Esula, Pollich, Hist. PI. Palat. ii. 18 = Gerardiana.
Esula, Tenore, Fl. Nap. i. 273 -=E. Cyparissias.
esulaeformis, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 729 = campestris.
esuloides, Tenore, Syll. Fl. Neap. 288-E. Cyparissias.
exdusa, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 150.—Mexic.
exigua, *Linn. Sp. PI.* 466.—Europ.
expansa, Janka, in Linnaea, xxx. (1869-60) 600 = carniolica.
exstipulata, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 18S). —Texas.
falcata, *Linn. Sp. PI.* 466.—Keg. Mediterr.; As. calid.
fasciculata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 86.—Afr. austr.
Fendleri, *Torr. &• Gray, in Pacif. Rail. Rep.* ii. 175.— N. Mexic.
Ferdinandi, Baill. Adansonia, vi. (1866) 284 = Drummondii.
fidjiana, *Boiss.in DC. Prod.xw.* II. 110.—Ins. Fiji,
filicina, *Portenschl. Enum. PI. Dalm.* 16. L 8.— Dalmat.
filipes, *Benth. Fl. Austral*, vi. 51.—Austral.
flmbriata, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 227 =cristata.
flmbriata, Hort. Par. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 81 *SB* Lemaireana.
flmbriata, Scop. Delic. Insub. iii. 8 - Scopoliana.
flmSriata, Wall, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 1266 - khasyana.
fimbrilligera. Mart, in Linnaea, xix. (1847) 407-ocymoidea.
firma, Ledeb. Fl. Ross. iii. 56B = Gerardiana.
Fischeriana, Steud. Nom. ed. II. i. 611-Pallasii.
flabellaris, *Anders, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 17.— Ins. Galapag.
flagelliformis, *Engelm. in Hayden, Bull. GeA. Geogt. Sun.* ii. (1876) 243.—Am. bor. occ
flavicoma, *DC. Fl. Fr.* vi. 364.—Hispan.
flavo-purpurea, Willk. in Oestr. Bot. Zeitachr. xxv. (1875) 112 = platyphylla.
Fleuroti, Jord. in Billot, Annot. 27 - E . Esnla.
flexicaulis, Schecle, in Linnaea, xxii. (1849) 153 = scrpens.
flexuosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 = bnxifolia.
floribunda, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. &• —Mexic.
florida, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Sound.* 189.-- Mexic
floridana, Chapm. Fl. S. U. St. 401 = sphaerospenna.
foetida, Hoppe, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 724" stricta.
foetida, Schult. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 766[s] platyphyllos.
foliata, Buch.-Ham. ex Dillw. Rev. Hort. Malab 52 « thymifolia.
foliolosa, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 24.—Am. trop.
Fontanesii, Steud. Nom. ed. II. i. 611-dentata.
Forskalei, Bourg. ex Boiss. in DC Prod. xv. II. «•" prostrata.
Forskalii, J. Gay, in Webb & Berth. Phyt Canar. •» 240 = granulata, aegyptiaca.
fossulata, Boiss. *8c* Gaill. Diagn. Ser. II. iv. 87' aulacosperma.
**fragifera, *Jan, ex Link, Enum. Hort. Berol.* ii. "•" Italia.
fragifera, Schur, Enum. PI. Transs. 593 = epithymoirt»
fragilis, Decue. in Ann.Sc Nat. Sér. II. ii. (1834) »" = granulata.
Francoana, *Boiss. Cent. Euph.* 22.—Hispan.
frangulaefolia, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. ii. ** geniculata.
Fraseri, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 55.—Ecuador.
Friderichsthalii. *Boiss. I. c.* 61.—Guatemala.
Fructus-Pini, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. *V>"'~* Caput-Medusae.
fruticosa, Bivona, Sic. PL Cent.i. 35 =Bivonae.
fruticosa, Edgew. in Jonrn. As. Soc. Beng. xvi. (It** 1219 = cuneata.
fruticosa, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 94.—Arab.

EUPHORBIA :—
fruticulosa, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. 11. 38.
fulgens, *Karo, ex Klottsch, in Otto V Dietr. Allg.*
fulva, *Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 116 = falcate.*
galioides, *Boiss. Cent. Euph.* 14 - microphylla.
garcini, *Chapm. Fl. S. U. St. Suppl.*
garnepina, *Boiss. Cent. Euph.* 28.—Afr. austr.
Garkeana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 38.—Ins. S.
Gasparrini, *Boiss. I. c.* 125.—Sidlia.
Gayi, Salis, Corsic.
geminiBpina, *Haw. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 612. —Mexic.
geniculata, *Orteg. Hort. Matr. Dec.* 18.—Am. trop.
genistoides, *Berg. Desc. PI. Cap.* 146; *Linn. Mont.* ii. 564.—Afr. austr.
Gerardiana, *Jacq. Fl. Austr.* v. 17. t. 436.—Europ.
Germaini, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-68) 40. —Chili.
Gey, *Vrfw. Cray, Bast. Journ. Nat.* (1845) 260.-Am: bor.
glabrata, *Klottsch, in Seem. Bot. Herald*, 276. —Mexic.
glabra, Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 726 = iteophylla.
glabra, Prod. Occ. 76=buxifolia.
glabra, Pubescens?
glariosa, Orirak.
glauca, Ehrenb. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 140 = iracnnculoides.
glauca, *nrst. f. Prod.* 88.-N. Zel.
glauca, 478 = Rothiana.
glaucescens, Willd. in Ges. Natnrf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 183 = Gerardiana.
glaucophylla, *Poir.* «O"- *Suppl.* iii. 613.-Afr. trop.
globosa, *Sims, Bot. Mag. S.* 2624.—Afr. austr.
globulifera, B. K. Nov. Gen. e, Sp. ii. 56 - pilulifera.
globosa, Boiss. in DC Prod. xv. H. 189=globosa.
gracilior, *Forsk. Kegyptiaco*, A>4. « *steud. Norn.* ed. I. 825, nomen.-Reg. Cancas.
Gyptospenna, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 186. —Mexic
Gmelini, Steud. «n- ed- H. i. 612=virgata.
Goerkeana, Steod. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 80 = hulalinea.
Goliana, *Lam. Encye-* «• 423.—Ins. Borbon.
Gollmerian, «»«"**, *ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 65.—Venezuela.
Granatum, *Boiu, Ic.* 106.—N. Granat
Greenwayi, A««. 28.-Bras.
gregaria, Bail. Adansonia, L (1860-61) 140 = pyrifolia.
gracilis, Crem. (1816) 66 = E. Esuta.
gracilis, EH. Sketch, ii. 657-E. Ipecacuanha.
gracilis, Louel. Fl. Gall. ed. I. 728 = tennifolia.
gracilis, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 269 = Amaral-thns -need atus.
gracilis, *Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. v. 53.*—Graec.; Lancea, *Jacq. Select. Am.* 151.-Am. centr.
graminea, ex Boiss DC Prod rv 1M* Sessilana.
graminea, Sehlecht. & Cham, in Linnaea, v. (1830) 83 = scabrella.
graminifolia, Michx. Bor- Am. ii. 210=granulata.
graminifolia, Vill. Fl. Delphin. 47 =tenuifolia.
grandidens, *PM- "V-* (1826) austr.
grandifolia, Haw Syn. Pl. Succ. 180-drnpifera.
grandis, *Illustr. Hortic. iv.* (1847) Milc. 101 -aoyssmica.

ETTPHOBBIA :—
Grantii, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 144. —Afr. trop.
granulata, *Forst. Fl. Aegypt. Arab.* 94.—Afr. et As. trop.
Greggii, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 147.—Mexic.
grisea, *Engelm, ex Boiss. 1, c.* 41.—Mexic.
Guachanca, *Azara, Voy.* ii. 497.—Pernv.
Gueinzii, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 71.—Afr. anstr.
Guilielmi, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-9) 406 = Sieboldiana.
gnineensis, *Brot. Cat. Hort. Ajuda, ex Bot. Zeit.* i. (1843) 661, nomen.—Afr. trop.
gummifera, *Boiss. Cent. Euph.* 26.—Air. anstr.
Guyoniana, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 169.—Algeria.
gymnoclada, *Boiss. Cent. Euph.* 20.—Bras.
gymnoclada, Engelm. in Proa Am. Acad. v. (1861) 171 = Xanti.
haematantha, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 68.—Ecuador.
haematodes, *Boiss. I. c.* 179.—Hab. ?
halophila, Miq. Anal. Bet Ind. iii. 16=E. Atoto.
hamata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 597.—Afr. austr.
Hartwegiana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 31.—Mexic.
Haussknechtii, Boiss. 1. c. 1267 - B . helioscopia.
havanensis, Willd. ex Boiss. 1. c. 73 =helerophylla.
Haworthii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 36«=E. Clava.
Haworthii, Sweet, 1. c. 367=spinosa.
hebecarpa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 90.—Persia.
Heldreichii, *Orph. ex Boiss. 1. c.* Ser. II. iv. 90.—Graecia.
helicotkele, Lem. Illu.tr. Hortic. iv. (1857) Misc. 100 -KNivulia.
helioscopia. Haussk. ex DC. Prod. xv. II. 1267 - Haussknechtii.
helioscopia, *Linn. Sp. PI.* 459.—Europ. et As. bor.
helioscopioides. Lose & Paid. Ser. Inconf. Arag. 93 = helioscopia.
heptagona, *Linn. Sp. PI.* 450.—Afr. anstr.
Hermentiana, *Lem. Illustr. Hortic.* v. (1858) *Misc.* 63. —Afr. trop.
herniariaefolia, *WilULSp. PI.* ii. 902.—As. Min.
herniaroides, Nntt. in Tnns. Am. Phil. Soc. v. (1887) 171=serpens.
Herronii, Kiddell, S;a. Fl. W. St. 82=dentata.
heteradena, Boiss. & Buhse, in Nonv. Mem. Soc. Nat Mosc xii. (1860) 198^erythradenU.
heteradena, Jaub. & Spach, IUvstr. ii. 42. t. 131 = mcgfllflnthii.
heterantha, Nurt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 171 = hexagona.
heterodoxa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. u. 701. —Bras.
heterophylla, Desf. Fl. Atlant. i. 385. t. 102 - E. Terracina.
heterophylla, *Linn.Sp. PI.* 458.—Am. bor.
hexagona, *Nutt. ex Spreng. Syst.* iii. 7»1.—Texas.
Heyneana, Boiss. in DC. Prod, xv II. 36, pardm - microphylla ?
Heyniana, Spreng. Syst. iii. 791 = microphylla.
hiberna, Lepech. It i. 231 = dnlds.
hiberna, Welw.ex Nym. Consp. 64»=Welwitschiu.
hibernica, Spreng. Syst. iii. 800 •= hyberna.
hieroglyphics, *Coss.* b* *Dur. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 144.—Algeria.
hierosolymitana, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 110 = thamnoides.
himalayensis, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 113-seq..?
himalayensis, *Klottsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 115.—Reg. Himal.
Hindsiana, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 61. t. 24.—Calif.
hirsuta, Kit. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 116 = pilosa.
hirsuta, Schur, in' Verb. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853) 66-E.EssIa.
hirta, Linn. Sp. PI. 454-pilnlifera,
hirtella, *Boiss. Cent. Euph.* 7.—Bras,
hirtnla, *Engelm. ex S. Wats, in Bot. Calif*, ii. 74.—Calif.
hispida, *Boiss. Cent. Euph.* 8.—Reg. Himal.
Hoffmanniana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 99.—Costa Rica.
Hohenackeri, Hochst ex Boiss. 1. c. 167 - Gerardiana.
Hohenacheri, Orph. ex. Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 89 = Orphanidis.
homophylla, Lange, ex Boiss. in DC. Prod. xv. n. 167 = Gerardiana.

EUPHORBIA :-
Hookeri, *Steud. Nom.* ed. II. i. 612.—Ins. Sandvic.
horrida, *Boiss. Cent. Euph.* 27.—Afr. austr.
hortensis, Engelm. ex Boiss. 1. c. 15 = Engelmanni.
huachanhana, *Rut*, ex Klotssch (f Garcke, in Abh. Atad. Berl.* 1860) 71.—Peruv.; Boliv.
huanchahana, Boiss. in DC. Prod.xv. II. 103=ptaec.
Humboldtii, Willd. Enum. Hort. Berol. 608 - graminea.
humifusa, Hort. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 42= Engelmanni.
hnmifusa, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 27.—Sibir.
humilis, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 185.—Sibir.
humilis, Koyle, Illustr. Bot. Himal. 829. t. 82.. f. 2-Aisiformis.
humistrata, *Engelm. ex A. Gray, Man. Bot. N. V. St.* ed. II. 386.—Am. bor.
hyberaa, *Linn. Sp. PI.* 462.—Europ.
hybèrna, Viv. Fl. Core. 7.- insularis.
Hydnorae, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 95.—Afr. anstr.
hypericifolia, Auct. Plur. ex Boiss. 1. c. 23 = Preslii.
hypericifolia, Hochst. ex Boiss. 1. c. 22=indica.
hypericifolia, *Linn. Sp. PI.* 454.—Amphig. trop.
hypericifolia, Phil, ex Klotzsch & Garuke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 34 = rhytisperma.
hyssopifolia. Linn. Syst. ed. X. 1048-brasiliensis.
Hystrix, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 43. t. 207.—Afr. anstr.
iberica, *Boiss. Cent. Euph.* 38.—Reg. Cancas.
illirica, Lam. Encyc. ii. 435=pilosa.
imbricate, *Vahl, Symb.Bot.* ii. 64.—Lusitania.
imperfoliata, Vis. Fl. Dalmat. iii. 327 = filicina.
inaequilatera, Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound, 187 = serpyllifolia.
inaequilatera, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 105 = sanguinea.
incana, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 127 -salicifolia.
incisa, *Engelm. in Ives, Rep. Colorado River Bot.* 27. —Arizona.
inclinata, Hort. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 42' Engelmanni.
incompta, Cesati, in Bibl. Ital. xd. (1888) 348 -dulcis.
incompicua, *Ball, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 205.—Marocc.
inderiensis. Less, ex Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 448 = pygmaea.
indica, Lam. Encyc. ii. 423=hypericifolia.
indica, Wall. Cat.n. 7710 C-rosea.
inermis, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIU. n. 13.—Hab.»
inermis, Pane, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 1266-fragifera.1
ingens, *E. Mey. in Drige, Zwei Pft. Docum.* 184, nomen ; *Boiss. 1. c.* 87.—Afr. austr.
insulana. *Veil. Fl. Flum.* 202 ; v. t. 14.—Bras,
insularis, *Boiss. Cent. Euph.* 32.—Corsica.
intermedia, Bréb. Fl. Normand. *td.* III. 271 « E. Esula.
intermedia, Fisch. *Be* Mey. ex Bobs, in DC. Prod. xv. II. 163 = iberica.
intermedia, Hochst. ex Boiss. 1. c 85 = sangninea.
innndata, *Torr. ex Chapm. Ft. S. U. St.* 402.—Florida.
involucrate, *E-Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod-* xv. II. 168.—Air. austr.
involucrate, *Wall. Cat.* n. 7696.—Reg. Himal.
Ipecacuanha, *Linn-Sp. PI.* 456.—Am. bor.
Uatidifolia, *Lam. Eucyc.* ii. 430.—Hispan.
Jsatis, Yen. Syn. ii. 16 = praec
ispahanica, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 91=megalantha.
italica, *Urn. Encyc.* ii. 434.—Italia,
italica, Salzm. ex Boiss. Voy. Bot Espagne, ii. 670 = medicaginea.
italica, Tineo, Syn. Hort. Palerm. (1802) 18-E. Terracina.
iteophylla, *Boiss. Cent. Euph.* 39.—Reg. Cancas.
Jacquemontii, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 113.—Rep. Himal.
Jacquini, *Fentl, ex-Boiss. I. c.* 186.—Hab. I
jacquiniatjiora, Hook. Bot Mag. t. 3873=fnlgem.
Jamesoni, *Boiss. Cent. Euph.* 11.—Ecuador,
japonica, *Siebold, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1266, ex parte.—Japon.
japonica, Zoll. ex Boiss. 1. c. 187=helioscopia.
japygica, Tenore, Fl. Nap. iv. 266 ^ nicaeënsis.
javanica, *Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Netrl. Ind.* ii. (1845) 44.—Java.
Jolkini, *Boiss. Cent. Euph.* 82.—Japon.

EUPHORBIA:—
juncea. Ait Hort. Kew. ed. I. ii. 142 •= aleppica.
juncoides, Stend. Norn. ed. II. i. 612 = praec.
juniperifolia. Rich, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 164, 1267 = pauciflora.
kahirensis, Rausch. Nom. ed. III. 140=comuta.
Kaleniczenkii, Czern. ex Trautv. in Act. Hort Petrop. ix. (1884) 169, nomen = E. Cyparissias.
kanalensis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1265.—N. Caled.
kanaorica, *Boiss. I. c.* 154.—Reg. Hirnal.
Karwinskyi, *Boiss. Cent. Euph.* 6.—Mexic.
kaschgsirica, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 401.—Turkestan.
Keraeri, *Huter, ex A. Kern. Sched. Fl. Exsicc.* ii. 48.—Enrop. austr.
khasyana, *Boiss. in DC. Prod.* xr. II. 120.—Reg. Himal.
KlotBschiana, Miq. in Nat. Verh. Wet Haarl. vii. (1851) (Stirp. Surin. Sel.) 95 - brasiliensis.
Kotschyana, *Fetal, Pugill, PL Nov. Syr.* 7.—As. Min.
Kraussiana, Berah. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 87=-erubescens.
Kunzei, Lehm. ex Ind. Sent. Hort. Hamb. (1830) 4; Linnaea, v. (1830) 875=Lagascae.
knrdica, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. FL Orient,* iv. 1121.—Persia.
lacera, *Boiss. Euph. Cent.* 22.—Mexic.
lactea, *Haw. Syn. PI Succ.* 127.—Ind. or.
lactea, *Roxb. Hort. Beng.* [36] *i Fl. Ind.* ii. 468.—Ins. Molncc.
lactiflua, *Phil. Fl. Atac.* 48.—Chili.
laeta. Ait. Hort *Kew.* ed. I. ii. 141-dendroides.
laeta, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 230 = Rothiana.
laevigata, *Lam. Encyc.* ît 421.—Bras.
laemgata, Vahl, Symb. Bot ii. 54=E. Atoto.
laevis, vide levis.
Lagascae, *Spreng. Neue Entdeek.* ii. 115.—Sardinia.
Lagascae, Spran. ex Nym. Consp. 654 -graeca.
Lamareiii, Sweet, Hort Suburb. Lond. 107 = obtusifolia.
lanata, *Sieber, ex Spreng. Syst.* iii. 792.—Syria; Persia.
laneeolaria, Herb. Heyne, ex Wall. Cat. n. 7691 = Rothiana.
lanceolata, Spreag. Fl. Hal. Mant. 41-dracuncnloides.
lancifolia, *Schlecht. in Linnaea,* vii. (1882) 148.—Mexic.
lanifera, *Haw. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 612, nomen.—Mexic
lanuginosa, Lam. Encyc. ii. 48«=coralloides.
lanuginosa, Thaill. Fl. Par. ed. II. 238 = platyphylla.
larica, *Boiss. Cent. Euph.* 24.—Persia,
lasiocarua, *Klotiseh, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Snppl. i. (184S) 414.—Ind. occ ; Mexic
lasiocarpa, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 721 = eriophora.
lasiocaula, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 1266—pekinensis.
lata, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 188.—Texas.
Latazi, *H. B.* 6* *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 58.—N. Granat.
lateriflora, Janb. & Spach, Illnstr. ii. 41=osyridea.
lateriflora, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 252.—Afr. trop.
Lathyris, Georgi, Beachr. Rnss. Reich. III. iv. 993 - Pallasii.
Lathyris, *Linn. Sp. PI.* 457 (Lathyrus).—Enrop. anstr.
latifolia, *Gueldenst. ex Ledei. Fl. Ross.* iii. 579 (quid ?).—Rossia.
latifolia, [Hohen.] Boiss. Cent. Euph. 39-iberica.
latifolia, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 183,—Sibir.
latifolia, Salzm. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 570 - medicaginea.
lanrifolia, *Lam. Encyc.* ii. 418.—Peruv.
Ledebonrii, *Boiss. Cent. Euph.* 35.—Tauria.
leiosperma, Boiss. 1. c 5=obliqua.
leiosperma, SiMh. ft Sin. Fl. Graec. v. 51. t. 465 = E. Terracina.
Lemaireana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 81.—Afr. trop.
leptalea, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 728»graminea.
leptocaula, *Boiss. in DC. Prod.* xv. n. 169.—Rossia.

EUPHORBIA:—
leptoceca, *Engelm. ex Torr, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 135.—Am. bor. occ
leptoclada, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 410.—Ins. Socotr.
leptophylla, Vill. Hist. PL Dauph. iii. 825 =tenuifolia.
leucantha, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 42.—Mexic
leucoloma, Rafin. Herb. (1833) 22; Atl. Joum. 177 = marginata.
leuconeura, *Boiss. in DC Prod.* xv. ft. 78.—Madag.
leucophylla, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 50.—Calif.
leucotricha, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 565.1.160 = pubescens.
levis, Poir. Encyc Snppl. it. 612 = E. Atoro.
ligularia, Roxb. Hort. Beng. [86]; Fl. Ind. ii. 465 = neriifolia.
ligulata, Chanb. in Ann, Sc Obs. iv. t. 6 = araygdaloides.
ligustrina, *Boiss. Cent. Euph.* 21.—Hispan.
Linaria, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 158 <*E. Terracina.
linariaefolia, Desf. Tabl. ed. I. 204=E. Terracina.
linariaefolia, Lam. Encyc. ii. 437 =Gerardiana.
Ii71arioid.es, Poir. Encyc Suppl. ii. 611-=spinosa.
Lindeniana, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 197 = adenoptera.
Lindheimeriana, Engelm. ex Boiss. in DC. Prod. xv. H. 142=longicroris.
linearifolia, *Roth, Nov. PI. Sp.* 224.—Ind. or.
linearifolia, Willd. Sp. FL ii. 893=spinosa.
linearis, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 225-=linearifolia.
linearis, Heyne, in Wall. Cat n. 7712 =linearifolia.
linearis, *Reft. Obs.* iii. 82.—Ind. occ.
linearis, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. vi. 1816-17 (1820) 181-cornuta.
lingulata, Heuff. in Verh. Zoel.-Bot Ges. Wien, viii. (1858) 192=epithymoides.
limfolia, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 14.—Afr. austr.
linifolia, Herb. Ross, ex Wall. Cat n. 7691 - Rothiana.
linifolia, Jacq. ColL L 136<-spinosa.
linifolia, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxix=pinea.
linifolia, Vahl, Sym. Bot ii. 63 = restiacea.
linifolia. Wall, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 157 = prolifera.
literata, Jacq. Coll. ii. 840=platyphyllos.
litoralis, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. ii. 54 = buxifoUa.
litoralis, No*[1], ex Nym. Consp. 654=»pinea.
littorea, Miq. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 102 = portulacoides.
livida, *C. A. Mey. in Drlge, Zwei Pfl. Docum.* 184 nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. H. 14.—Afr. anstr.
Lockharti, Stend. Nom. ed. II. i. 613=heterophylla.
longetuberculata, Boiss. L c 1264-seq.
longetuberculosa, *Hochst. ex Boiss. L c.* 85.—Abyss.
longibracteata, DC. ¥1 Fr. vi. 859-segetalis.
longicroris, *Scheele, in Linnaea,* xzii. (1849) 152.—Texas.
longifolia, Baill. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 78 = Boissieri.
longifolia, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 162.—Reg. Himal.
longifolia, Gueldenst. Reise, i. 192=leptocaula.
longifolia, Lam. Encyc ii. 417=mellifera.
longiradiata, *Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Pyr.* 65.—Mont Pyren.
lougistyla, *Boiss. Cent. Euph.* 9.—Ind. or.
lophogona, *Lam. Encyc.* ii. 417.—Madag.
Lorentii, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 344 = tinctoria.
Lorentzii, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 231.—Reg. Argent.
Loreyei, Jard. in Billot, Annot. 26 - E. Esnla.
loricata, Lam. Encyc. ii. 416—E. Hystrix.
lucida, And. Gall, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 162 • androsaemifolia.
lucida, *Waldst. (f Kit. PL Rar. Hung. L* 64. t 54.—Moravia,
lucornm, *Rupr. in Maxim. Prim. Fl. Amur.* 239.—Reg. Amur.
ludoviciana, Rafin. Fl. Ludov. lll=cordifolia.
lunnlata, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.* 59.—China,
lupulina, *Boiss. Cent. Euph.* 23.—N. Granat.
lurida, *Engelm, in hes, Rep. Colorado River Bot.* 26.—Calif,
lusitanica, *Steud. Nom.* ed. IL L 613.—Lusitan.

EUPHOBBIA:—
lutea, Alam. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 72=-pulcherrima.
luteola, *Cass. (f Dur. ex Boiss. 1. c.* 150.—Algeria,
lutescens, *C. A. Mey. in Ledeb. FL Alt.* iv. 194.—Sibir.
lycia, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 172.—Lycia.
lycioides, *Boiss. Cent. Euph.* 29.—Bras.
Maackii, *Meinshaus. Nachr. Wilni-Geb.* 204; *ex Trautv. Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 160.—Sibir.
Macgillivrayi, *Boiss. in DC Prod.* xv. II. 26.—Austral,
macrocarpa, *Boiss. If Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 197.—Persia,
macroceras, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 36.—Reg. Caucas.
macroclada, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 54=tinctoria.
macroglypha, *Lem. Illustr. Hortic.* iv. (1867) *Misc.* 72.—Madag.
macropns, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 52.—Mexic.
raacrorhiza, *C. A. Mey. in Ledeb. FL Alt.* iv. 191.—Sibir.
macrorhiea. Pall, ex Ledeb. FL Ross. iii. 565 = Pallasii.
macrostegia, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 171.—Persia.
maculata, Anderss. in Vet Akad. Handl. Stockh. 1858 (1855) 238=flabellaris.
maculata, Aubl. PI. Gui. i. 479=thymifolia.
maculata, Lechl. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 42 =• Meyeniana.
maculata, *Linn. Sp. PL* 455.—Am. bor.
madagascariensis, Comm. ex Lam. Encyc it. 417» lophogona.
Maddeni, *Boiss. in DC. Prod.* xv. IL 141.—Reg. Himal.
Magdalenae, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 50.—Calif.
magnidens, Haw. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 105 - grandidens.
magnimamma, *Haw. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 613.—Mexic.
malacophylla, Clarke, Trav. ii. 354 = lanata.
malleata, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 15'2.—Persia,
mamillosa, *Lem. Illustr. HorHc.* ii. (1«55) *Misc.* 69.—Hab.?
mammillaris, *Linn. Sp. PL* 451.—Afr. austr.
mammillaris, Trémant, Voy. Soudan, Orient. Atlas. tt. 13,14'Veoefica.
Mandoniana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 12<S4.—Bolivia.
mandshurica, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxix. (1683) 203.—Mandshuria.
marginata, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. ii. 61= torrida.
marginata, *Pursh, FL Am. Sept.* ii. 607.—Am. bor.
mariolensis, *Rouy, in BulL Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 127.—Hispan.
maritima, Willd. ex Boiss. in DC, Prod. xv. II. 28 - ammanioides.
Marschalliana, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 94.—As. Mio- • Persia,
Marschalliana, Kotschy, ex Boiss. in DC. Prod. xr. !<• 173 = E. Myisinites.
Martiusiana, Steud. Nom. ed. II. i. 618 - Lagascae.
Masafuerae, Phil, in Bot. Zeit xiv. (1856) 647[s] Wahlenbergia tuberosa.
massiliensis, DC. Fl. Fr. vi. 357 = E. Chamaesyce.
matritensis, *Boiss. Cent. Euph.* 35__Hispan.
mauritanica, Lam. Encyc ii. 418 = obtusifolia.
maurilanica, *Linn. Sp. PL* 452.—Afr. austr.
mauritanica, Webb, Floral. Lancerott 31; ex VVCDD ft Berth. Phyt. Canar. iii. 250 = E. Regis-Jubae.
medicaginea, *Boiss. Elenck.* 82.—Reg. Mediterr. occ.
Medusae, *Thunb. Prod. PL Cap.* 86.—Afr. austr.
megalallantica, *Ball, in Journ. Bot.* xiiL (1875) 205.- Marocc.
megalantha, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 95.—Persia.
mehadiensis, Kit. in Rochel, PL Banat. Rar. 26, nomen • et Linnaea, xxxii. (1868) 665 > epithymoides.
melanadenia, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 135--' Calif
melanocarpa, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 4f- Ecuador.
melanosticta, *E. Mey. in Drlge, Zwei Pfl. Docum.* "> nomen; *et ex Boiss. in DC. Prod.xx.* II. 96.—*"' anstr.
melapetala, *Gasparr. Ind. Sem. Hort. Boccad. Q&® 3 ; ex Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* 152.—Sicil.
melilensis. Part. Fl. ltd. iv. 478 = spinosa.
mellifera, *Ait. Hort. Kern.ti.* I. iii. 498.—Ins. Mader*
mellifera, Seub. Fl. Azor. 27=stygiana.

ETJPHOKBIA '—
melofonnis, *Ait. Hart. Kew.ed.* I. ii. 185.—Afr. austr.
meloniformis, Lem. Jard. Flenr. iv. (1854) Misc. 65 = praec.
Menderii, *Boiss. Cent. Euph.* 15.—Mexic.
mercnrialina, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 212.—Am. bor.
Mercurialis, Pers. Syn. ii. 18 = praec.
nesembrianthemifolia, Jacq. Enum. PI. Carib. 22; Select. Am. 160=buxiiblia.
Meyeniana, *Klotzsch, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. - *Suppl.* i. (1843) 414.—Bolivia.
Meyeri,*Boiss. Cent. Euph.* 85.—Afr. austr.
Meyeri, Steud. Nom. ed. II. i. 618=rupestris.
micans, Scheele, in Linnaea, xvii. (1848) 848=amygdaloides.
mfcracantha, *Boiss. Cent. Euph.* 25.—Aft. austr.
micractina, *Boiss. in DC. Prod.* xv. n. 127.—Reg. Himal.
micradenia, *Boiss. I. c.* 77.—Austrai.
nicrantha, Steph. ex Willd. Sp. PI. ii. 905-stricta.
"Wcrocephala, *Boiss. in DC. Prod.* xv. *n.* 1262 — Bolivia.
micromera, *Bain. I. c.* 44.—N. Mexic.
microphylla, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 229.—Ind. or.
nicrophylla, Lam. Encyc, ii. 423 = thymifolia.
"tacrosciadia, Hows. Diagn. Ser. I. vii. 89=stTiatella.
nucrosphaera.^OTM. *I. c.* 87.-Mesopot.
Milti, DesmouL ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 79 = splendent.
minima, Hort. ex Link, Enum. Hort. BeroL ii. 12 = Peploides.
m«n«te, Lose. & Paid. Ser. Inconf. Arag. 96 = Pauciflora.
minutifolia, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II 1268.—Austral.
»jnutula, *Boiss. I. c*—Cuba.
n>»era, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 51.—Calif,
mssourica, *Safin. Atl. Joum.* 14t».—An. bor.
Mitchelliana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. u. 25.-Austral.
V>odesta, Boiss. Cent. Euph. 34=E. Terracina.
«oenchiana, *Steud. Nom.* ed. IL i. 613.-Hab.?
"'"*lu*S*merae* Boiss. in DC. Prod. xv. II. 118 = microsphaera.
«•«««> C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 880 -pilosa.
""Manilla, *Wright, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 55.—Cuba,
"""tana, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 192.-N. Mexic.
^onteiri, *Hook. Bot. Mag. t.* 5534—Afr. Irop.
"Hntevidensis, Casar. ex Boiss. in DC. Prod. xv. IL 43 "ovalifolia.
•"entevidensis, Klotzsch, ex Boiss. 1. c. 105-papillosa.
""nHcola, Boiss. Diagn. Ser- L vii. 93 = bounophila.
monticola, *Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss,* ii. 2.—Abyss.
M<>ri«>niana, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 100 =neterophylla, barbellata-
£*—*. Lej. Fl. Spa, i. 218 = E. Esula.
moiambicensis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. u. 86.-Afr. tropl
^icronata, *Clarke, Trav.* ii. 260,-As. Min.
2*Ucr*onata, Lam. Encyc. ii. 427 = falcata.
"'"'a ,^Pepy Hist. Abr. PI. Pyr. 271=E. Myrrhynsa.
mu*—Me* *<***• •'» *DC. Prod.* xv. ii. 27.-Austral. 191.
muiti« x|", ThuUl. Fl. Par. ed. II. 238=nicaeensis.
^fcorymbosa, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 357.-Hab.!
«««tura, Willd. ex Klotzsch & Garcke, in Abh. Brid. 2^ Berl (1888) 31-adenoptera.
""WtformU, *Gaudich.in Freyc. Voy. Bot.* 100. nomen; *Hook, b- Am. Bot. Beech. Voy.* 95.—Ins. Sandvic.
??'•&•»"> Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 65-pilMa.
**i«eta, *Benth. PI. Hartw.* 51,-Mexic.
™«"«ila, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. S78 = aspera.
*Z*f*aia*< Sm. Engl. Fl. iv. 65, in textu-akenocarpa.
*«ncaia, Th*b. Prod. PI. Cap. 86 = brachiata.
Myrsi"i"*"' Brot - Fl. Lusit. ii. 317 = nicaeënsis.
Myrsinites, Unn. Sp. PI. 462.—Europ. austr. or.
%»nites, Pall. &d. Taur. ex Ledeb. Fl. Ross. *m.* Marshallina.
"Xftffia, Hook. *Si* Am. Hot. Beech. Voy. 95 = Hookeri.

EUPHORBIA :-
myrtifolia, Lam. Encyc. ii. 419»Pedilanthus tithymaloides.
myrtifolia, Linn. Sp. PI, ed. IL 658 - myrtillifolia.
myrtifolia, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 184 • sclerophylla.
myrtillifolia, *Linn. Syst. ed.* X. 1048.—Jamaic.
myrtilloides, Schlecht. ex Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 85 = buxifolia.
myrtoides, *Boiss. in DC. Prod.* xv. IL 15 Austral.
Nagleri, *Boiss. 1. c.* 26.—Java.
nana, Klotzsch, ex Boiss. Cent. Euph. 8 = E. Chatnaerrhodos.
nana, Royle, Ulustr, Bot Himal. 329. t. 82 = fosiformis.
natalensis, *Bernh. ex Krauss, in Flora,* xxviii. (1846) 86.—Afr. austr.
neapolitana, Tenore, Fl. Nap. it 266 = E. Terracina.
nemoralis, Darling. Fl. Cesbr. ed. IL 518 •> Darlingtonii.
nemoralis, *Kit. in Rochel, PI. Banat. Rar.* 26, nomen. —Europ.
nemoralis, Salisb. Prod. 390-amygdaloides.
neo-caledonica, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1268.—N. Caled.
nepalensis, Boi»s. 1 c. 157=prolifera.
nereifolia, Koxb. Hort Beng. 36; Fl. Ind. ii. 467-K. Nivulia.
neriifolia, *Linn.Sp. PI.* 451.—Ind. or.; Malaya.
nervosa, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 659=rugosa.
nevadensis, *Boiss. V Rent. Pugill. PI. Nov.* 110.—Hispan.
nicaeënsis, *All. Fl. Pedem.* i. 285. t. 69.—Reg. Mediterr.
nicaeensis, Coss. ex Willk. & Lange, Prod. El. Uisp. iii. SOl^matritensis.
nicaeënsis, St. Am. Fl. Agen. 192 = E. Esula.
nicaelnsis, Sebast. ft Maur. Fl. Rom. Prod. 164 •= E. Terracina.
nilagirica, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 17 =sangninea.
nitens, Trevir. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii, (1816) 149*>agraria.
Nivulia, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc.* xiv. (1825) 286.—Ind. or.
nodiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 613=pilulifera.
Notana, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 166 = tinctoria.
norfolkiana, *Boiss. I. c.* 110.—Ins. Norfolk.
notadatnia, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. xii. 111 a orien talis.
notata, Engelm, ex Boiss. DC. Prod. xv. II. 48 = serpyllifolta.
notoptera, *Boiss. in I. c.* 26.—Ind. or.
nuda, Pers. Syn. ii. 13, in syn. - graminea.
nudicaulis, *Chapm. Fl. S. U. St.* 402.—Florida,
nudicaulis, *Perr. in Mem. Soc. Linn. Par.* iii. (1825) 116.—Malaya.
nudiflora, *Jacq. Coll.* iii. 180.—Jamaic.
nudiftora. Lam. Encyc. ii. 426 »graminea.
Nummularia, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1861) 183.—Ins. Galapag.
nummulariaefolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 503-imbricata.
nutans, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17=Ereslii.
obconica, *Boj. Hort. Maurit.* 287.—Afr. occ.
obcordata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edini.* xii. (1884) 98.—Ins. Socotr.
oblanccolata, *Balf.f. I. c*—Ins. Socotr.
obliqoa, *Endl. Prod. Fl. Norf.* 86.—Ins. Norfolk.
obliquata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 93«=E. Terracina.
obliquifolia, Kunze.ex Boiss. Cent Euph. 16=ovalifolia.
obliteraia, Jacq. Enum. PI. Carib. 22 » pilulifera.
oblongata, *Griseb. Spicil.. Fl. Rumel.* i. 186.—Byzant.
otlongata, C. Koch, in Linaoeaj xix. (1847) 17 = stricta.
oblongifolia, C Koch, 1. c. xxi. (1848) 726 = amygdaloides.
obovalifolia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 239.—Abyss,
obovata, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir.* IL ii. (1834) 241.-Arab.
obscura, Lang, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 762 = virgata.
obscura, Loisel. in Desv. Joum. Bot. ii. (1809) 332= falcata.
obtusata, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 606.—Am. bor.
obtusifolia, Lam. Encyc. ii. 480=E. Terracina.
obtusifolia, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 609.—Ins. Tenerih.
obtusifolia, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 66.—Transsylv.
occulta, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 277-antUyphilitiu.

ETTPHOBBIA :—
ocellata, *Durand* b* *Hilgard, in Joum. Acad. Nat. Sc. Pkilad.* Ser. II. iii. (1855) 46; *et Padf. Rail. Rep.* v. 15.—Am. bor.
octogona, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 613, nomen. -Hab.1
ocymoidea, *Linn. Sp. PI.* 453.—Mexic.
orymoides. Hook. *He* Am. Bot Beech. Voy. 310= adenoptera.
odontadenia, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 148.—N. Mexic.
odontophylla, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 82»Stockiana.
odontophylla, Willd. Enum. Hort. BeroL Suppl. 28 = cereiformis.
Oerstediana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 69.—Am. centr.
officinalis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 94 = ofneinarum ?
officinalis, Jackson, Ace. Marocc. ed. 1IL 184 = resinifera.
officinarum, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 84 = Beaumierana.
officinarum, Hochst. ex Boiss. 1. c 96=Schimperi.
officinarum, *Linn. Sp. PI.* 451.—Afr. bor.
ohiotica, Steud. *Sc* Hochst. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 142>=commntata.
oleaefolia, Gouan, Herbor. 29 »nicaeënsis.
oleaefolia, 'Sot, ex Nym. Consp. 652 = lucida.
oleracea, Pers. Syn. ii. 14 = E. Peplus.
oligantha,. Boiss. in DC. Prod. xv. II. 19 •= pyenostegia.
Onoei, *Franch. V Sm. Enum. PI. Jap.* ii. 486.—Japon.
opaca, Lang, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 762 - virgata.
ophthalmica, Pers. Syn. ii. 13 = pilulifera.
oraria, F. Muell. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 12 - E. Atoto.
orbiculata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 62.—N. Granat.
orbiculata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 421 = micropbylla.
oreophila, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 17 - Rothiana.
orientalis, Bertol. Fl. Ital. v. 76=ceratocarpa.
orientalis, *Linn. Sp. PI.* 460.—Armen.; Persia.
origanoides, Bert, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 21 = Berteriana.
origanoides, *Linn. Sp. PI.* 453.—Ins. Adscensc.
Orizabae, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 147.-Mexic.
omithopus, *Jacq. Fragm. Bot.* 76.1.120.—Afr. austr.
Orphamdis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 89.—Graecia.
osyridea, *Boiss. I. c.* Ser. I, vii. 87.—Persia,
ovalifolia, *Engelm. ex Klotisch V Garcke, in Abh. Akad. Berl.* (1860) 26, in syn.—Chili.
ovalifolia, Kostel. Allg. Med.-Pharm- Fl. v. 1724 = hypericifolia.
ovata, *E.Mey. in Drige, Zwei Pft,. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 167.—Afr. anstr.
oxycoccoides, *Boiss. Cent..Euph.* 14.—Madag.
oxyodonta, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1207.—Syria ; Mesopot
oxyphylla, *Boiss. 1. c.* 1268.—Hispan.
oxystegia, *Boiss. Cent. Euph.* 27.—Air. anstr.
pachyrhiza, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Most.* (1841) 745.—Soongaria.
Pallasii, *Turca. I. c.* xxviL (1854) *u* 358.—Dahuria.
pallens, Dillw. Rev. Hort. Malab. 54 = E. Atoto.
pallida, Willd. Sp. Pl. ii. 923 = salicifolia, lucida.
Palmeri, *Engelm. ex S. Wats. in Bot. Calif.* ii. 75.—Calif.
palustris, *Linn. Sp. PI.* 462.—Europ.
panacea, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 247 - F. Terracina.
Pancheri, *Baill. Adansonia,* ii. (1861-62) 211.—N. Caled.
paniculata, Benth. Cat. PI. Pyrén. 78=sera-comans.
paniculata, Des£ Fl. Atlant. i. 3d6=algeriensis.
paniculata, Ell. Sketch, ii. 660 ~ corollata.
paniculata, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i.345-pilosa.
paniculata, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. lxviii - platyphyllos.
pannonica. Host, Fl. Anstr. ii. 566-glareoia.
papillaris, Jan, Elench. 7 -Bivonae.
papilligera, Boiss. Cent. Euph. 8 - hypericifolia.
papillosa, *St. Hil. PI. Us. Bras.* t. 18.—Reg. Argent.
papillosa, Ponzolz, Cat. PI. Card. 18-Duvalii.
paradoxa, Schur, Enum. PI. Transs. 596 = E. Esula.
paraguayiensis, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent.* xi. (1881) 60.—Paraguay.

EUPHORBIA:—
Paralias, *Linn. Sp. PI.* 458.—Europ. occ; Reg. Mediterr.
parannaquensis, Blanco, Fl. Fillp. cd. II. 286—serrnlata.
parasitica,Pa.v. ex Boiss. in DC. Prod. XT. II. 5-Pedilanthus ramosissimus.
Parryi, *Engelm. in Am. Natural,* ix. (1875) 850.—Am. bor. occ.
paniflora. Lam. Encyc. ii. 424 = rosea.
parviflora, Linn. Syst. ed. X. 1047—hyperidifolia.
panrifolia, *B. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 84.—Air. austr.
paivimamma, *Boiss. 1. c.* 86.—Afr. austr.
parvula, *Dtlile, Fl. Egypte,* 285. t. 30. f. 4.—Aegypt.
parvula, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 731 - arvalis.
patagonica, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cordova,* iii. (1879} 837.—Patagon.
patens, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1883) 558.—Enron.
patula. Mill. Gard. pict. ed. VIII. n. 11-anacantha.
pauciflora, *Dufour, in Bull. Soc. Bot. Fr.* vii. (1860) 442.—Hispan.
panciflora. *Hill, Veg. Syst.* x. 57 (Quid ?).—Ind. or.
pauciflora, *Nutt. ex Seen. Ft. Vit.* 216.—Ins. Sandvic.
paucifolia, Klotzsch, in Leriin. PL Pieiss. i. 174 = Calycopeplns ephedroides.
pedicnhfera, *Engelm. in Torr. Bat. Mex. Bound.* 186.—Mexic
pedunculata, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 277 = strigosa.
pedunculosa, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 198 - graminea.
peganoides, *Boiss. Cent. Eupk.* SI.—Mexic.
pekinensis, *Rupr. in Maxim. Prim. Ft. Amur.* 289; *Boiss. I. e.* 31.—China,
peltata, *Roxb. Hart. Beng.* [36] ; *Fl. Ind.* ii. 474.—Ind. or.
peltigera, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* XT. II. 91.—Afr. austr.
pendula, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 10 ; *Boiss. I. c.* 76.—Hab. *1*
pentadactyla, *Griseb. in Coett. Abh.* xxiv. (1878) 68.—Reg. Argent.
pentagona, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 418-neriifolia.
pentagona. *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 137.—Afr. austr.
pentagona, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 14—neriifolia.
pentagona, Royle, Illustr. Bot Himal. 329-Royleana.
Pentlandi, *Boiss. in DC. Prod.* XT. II. 69.— Bolivia,
peperomioides, *Boiss. Cent. Euph.* 17.—Bras.
Peplidion, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 191.—Texas.
Peplis, *Linn. Sp. PI.* 455.—Europ. occ; Reg. Mediterr.
peploides, *Gouan, Fl. Monsp.* 174.—Enrop.; Afr. bor.
peploides, Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. i. 138-K. Peplus.
peploides, E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum. 184 = phylloclada.
peploides, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1887) 172 = longieruris.
Peplus, *Linn. Sp. PI.* 456.—Enrop.; As, bor.
pereskiaefolia, *Houllet, ex Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 106.—Afr. trop.
perforafa, Guss. Fl. Sic. Prod. i. B40=proatrata.
Perrottetii, Jaub. & Spach, Illustr. v. 72. t. 464 = cuneata.
persepolitana, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 92-striatelIa.
persica, C. A. Mey. ex Boiss. in DC. Prod. xv. u. Ill = megalantha.
persica, Stev. ex Boiss. I. c 160—virgata.
Pervilleana, *Baill. Adansonia,* i. (1860-61) 141.—Hab.<
Pestalozzae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 114.—Lycia.
petaloidea, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 185.—Am. bor.
petiolaris, *Sims, Bot. Mag.* t. 883.—Ins. S. Thomas,
petiolau, *[Soland. in] Russ. Aleppo,* ed. II. ii. 253.—Syria.
Petitiana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 241 = cerebrina.
petrophila, *C. A. Mey. in MJm. Sc. Pitersb.* Sér. VI. *Sc. Nat.* vii. (1856) 9.—Tanria.
Philippiana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 117.—Chili.
philippina, J. Gay, ex Boiss. 1. c. 47 -thymifolia.
phosphorea, *Mart. Seise Bras.* ii. 612, 726.—Bras.
phyllanthoides, Boiss. Cent. Euph. 4-obliqua.
phylloclada, *Boiss. in DC. Prod.* XT. II. 66.—Afr. austr.

EUPHOHBIA :—
pbymatoclada, *Boiss. Cent. Euph.* 24.—Afr. anstr.
phymatosperma, *Boiss. (f Gaill. Diagn.* Ser. II. iv. 83.—Syria.
physalifolia, *Boiss. Cent. Euph.* 19.—Mexic.
physoclada, *Boiss. I. e.* 24.—Madag.
picta, Jacq. Coll. iiL 178-graminea.
pilosa, Brot. Fl. Lusit. ii. 815-pnbescens.
pilosa, Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 31 = oblongata.
pilosa, D. Don, ex Bab. in Engl. Bot. Suppl. t. 2787.—palustris.
pilosa, *Linn. Sp. PI.* 460.—Europ.; As. bor.
pilosa, Pursh, FL Am. Sept. it 607 - Darlingtonii.
pilosa, Vill. Hist. PL Dauph. iii. 832 = flavicoraa.
pilosula, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* XT. II. 89.—Mexic
pilulifera, Linn, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 20 = parvifiora.
pilulifera, *Linn. Sp. PI.* 454.—Amphig. trop.
pinea, *Linn. Syst.* ed. XII. 883.—Reg. Mediterr.
pined, Texid. Apnnt. 66, ex Willk. & Lange, Prod. Kl. Hisp. iii. 500 = portlandica.
pini/olia, DC. Fl. Fr. ii. 361 = E. Esula.
pint/olio, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 28 = aleppica.
piscatoria, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 137.—Ins. Mader.
piscatoria. Link, in Bnch, Beschr. Canar. Ins. 158 = E. Regis-Jubae.
plstiaefolia, *Boiss. in DC. Prod.* XT. II. 98.—Afr. austr.
Pithyosa, *Linn. Sp. PI.* 468.—Reg. Mediterr.
platycarpos, Fritz. Ic Ind. 446, sphalm. = platyphyllos.
platylepis, Decne. in Jacqnem. Voy. Bot. 166. t. 157 = elegans.
platyphyllos, *Linn. Sp. PI.* 460.—Europ.; Afr. bor.
piatysperma, *Engelm. ex S. Wats, in Bot. Calif,* ii. 482.—Calif.
plebeia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 93.—Persia austr.
plumerioides, *Teijsm. ex Hassk. Hort. Bog* i. 29.—Java,
podadenia, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 40.—Mexic.
Poeppigii, *Boiss. I. c.* 56.—Pernv.
Poinsettiana, Buist, ex R. Grab, in Edinb. N. Phil. Joum. xx. (1886) 412 — pulcherrima.
polyacantha, *Boiss. Cent. Euph.* 26.—Abyss,
polycarpa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 60.—Calif.
polycaula, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. xii. 112 - dedpiens.
polychroma. Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1876) 395 = epithymoides.
polyclada, *Boiss. Cent. Euph.* 10.—Texas,
polycnemoides, *Hochst. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 46.—Abyss,
polygalaefolia, *Boiss.* b* *Rtut. in Boiss. Cent. Euph.* 84.—Hispan.
polygona, *Haw. Misc.* 184.—Afr. anstr.
polygona, Lodd. Bot. Cab. t. 1344-cereiformis.
polygonifolia, Forak. Fl. Aegypt. Arab. p. xxiii = E. Peplis.
polygonifolia. Hook. Fl. Bor. Am. ii. 140 = glyptospenna.
polygonifolia, Jacq. Coll. v. t. 13. f. 3 =• macnlata.
polygonifolia. Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 158 = rubescens.
polygonifolia, *Linn. Sp. PI.* 465.—Am. bor.
polygonifolia, Michx. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 101 "=E. Ipecacuanha.
polygonifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 211 = Curtisii.
polygonisperma, Uren. & Godr. Fl. Fr. iii. 75 = huinifusa.
pomiformis, Thunb. Prod. PI. Cap. 86-melofonnis.
portlandica, *Linn. Sp. PI.* 458.—Europ. occ.
portlandica, Sails, in Flora, xviL (1884) II. Beibl. 5 = pinea.
portlandica, Sibth. *Be* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 327 - E. Terracina.
portulacoides, Linn. Herb, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 102 - E. Ipecacuanha, helioscopia.
portulacoides, *Linn. Sp. PI.* 466, partim; *Spreng. Syst.* iii. 792.—Chili.
Postii, *Boiss. Fl. Orient.* IT. 1089.—Syria,
potentilloides, *Boiss. Cent. Euph.* 8.—Bras.
praecox, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 65 =- leptocaula.
pratensis, *Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 162, nomen.—Ross.
Preslii, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. 639.—Am. bor.
Preslii, Sprun. ex Nym. Consp. 664-=graeca.
Prieuriana, BailL AdansonU, i. (1860-61) 61 - conTOlvuloides.

EUPHORBIA:—
primulaefolia, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xriii. (1881) 278.—Madag. >
procera, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 378-pilosa.
procumbens, DC Cat. Hort. Monsp. 111-pilulifera.
procumbens, Hort. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 43" ovalifolia.
procumbens, Meerburg, PL Rar. t. 65 -stellata.
procumbeBs, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 12.—Afr. austr.
prolifera, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 62.—Reg. Himal.
prolifera, Ehrenb. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 16-obovata.
propinqna, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* p. lxv, nomen.—Abyss.
prostrata. *Ait. Hort. Ken.* ed. I. ii. 189.—Am. trop.
prostrata, Burchell, ex Hemsl. Bot. Challeng. i. II. 82—E. Chamaesyce.
prostrata,]. Grab. Cat. PL Bomb. 179 = thymifolia.
proteifolia, *Boiss. in DC. Prod.* XT. II. 92.—Afr. austr.
provindalis, Noe, ex Nym. Consp. 658 = glareosa.
provincialis, Willd. Sp. PL ii. 914 - E. Terracina.
prunifolia, Jacq. Hort. Schoenb. Lij. 15 =geniculata.
Pseudochamaesyce, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 78 — numifusa.
Pseudocyparissias, Jord. in Billot, Annot. 28 = E. Esula.
PseudoEsula, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturwiv. (1858) 66 = E. Cyparissias.
Pseudo-ludda, Schur, 1. c. iii. (1862) 124-lucida.
pterococca, *Brot. Fl. Lusit.* ii. 312.—Reg. Mediterr.
pnbentissima, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 212.—Am. bor.
pubera, Blume, Bijdr. 655-indica.
pubescens, *Vahl, Symb. Bot.* ii 55.—Reg. Mediterr.
pubigera, Friwald. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 126-E. Apios.
pugniformis, Boiss. 1. c. 92 = procumbens.
pulchella, Brouss. in DC. Cat. Hort. Monsp. III imbricata.
pulchella, Hort. « Poir. Encyc. Suppl. ii. 615 = nummulariaefolia.
pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 56" brasiliensis.
pulchella, *Lag. V Rodr. in Anal. Cienc. Nat.* (1802) 71.—Hab.!
pulcherrima, *Willd. ex Klottsch, in Otto V Diet'-Allg. Garten*,* ii. (1834) 27— Mexic
pulverulenta, Kit. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 762" glareosa.
pumila. Pall. Ind. Taur. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 573-nicaeëusis.
pumila, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec Prod. i. 324 " hemiariaefolia.
punctata, *Delile, Fl. Egypte,* 234. t. 30. f. 8.—Afr. bor.
punctata, *Krock. Fl. Sites,* ii. I. 97.—Enrop.
punctulata, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. StocU*-1853 (1855) 235.—Ins. Galapag.
pungens, Lam. Encyc. ii. 431 = spinosa.
pungens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 184 "* striata.
pungens, *{Soland.* in] *Russ. Aleppo,* ed. II. ii. 268.--Cilicia.
punicea, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 76.—Jamaic.
purpurascens, Salzm. ex Ball, in Jonrn. Linn. Soc. xvi (1878) 660 = E. Terracina.
purpurascens, *Schousb. in Hornem. Hort. Hafn.* 60S —Marocc.
purpurascens, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PI- = indica.
purpuroia, Thuill. PL Par. ed. IL 235'dulcis.
pusilla, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 17.—Hispan.
pyenanthema, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* «"• —Mexic.
fycnophylla, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) herniariaefolia.
pyenostegia, *Boiss. Cent. Euph.* 9 Ind. or.
pygmaea, *Fisch. V Mey. in Butt. Soc. Nat.* (1839) 171, nomen ; *Boiss. in DC. Prod.* XT. I'- "" —Persia; Soongaria.
pygmaea, Ledeb. FL Ross. iii. 569=Ledebourli.
pygmaea, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) Philippiana.
pyrenaica, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) *>7" E. Charnaebuxus.
pyrifolia, *Lam. Encyc.* ii. 419.—Ins. Maurit
Pythiusa, Friwald. ex Nym. Consp. 6S4 = deflexa.
quitensis, *Boiss. in DC. Prod.* XT. n. 48.—Ecuador-

EITPHOBBIA:—
racemosa, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomenj *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 75.—Air. austr.
racemosa, Tansch, ex Keichb. FL Germ. Excurs. 761 = K. Esula.
radians, *Benth. PI. Hartw.* 8.—Mexic.
radiata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 90.—Afr. austr.
"adiata, Thunb. Prod. PI. Cap. 86-stellata.
'adicans, Moric. ex Klotzsch & Gareke, in Abh. Akad. Merl. (1860) 24 = serpens.
radioloides, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 45.—Mexie.
ragusana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 873-pinea.
mmosissima, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 14 = Spamnanni.
ramosissima, *Hook. if Am. in Bot. Beech. Voy.* 69.—Ins. Pacif.
ramosissima, Loisel. in Mém. Soc. Liun. Par. vi. (1827) 415 = E. Terracina.
rapulum, *Kar. if Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 448.—Soongaria.
Katuni, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 372. —Calif.
rectа, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 277-colletioides.
recurva, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 182. —Ins. Galapag.
"dexa, *Spreng. Syst.* iii. 802.—Hab.!
rtfracta, Lowe, in Trans. Camb. PhiL Soc. vi. (1838) reimp. ll = Preslii.
^egis-Jnbae, *Webb if Berth. Phyt. Canar.* iii. 250.—ins. Teneriff.
*R*ichenbachiana,* Willie, in Flora, xxxv. (1852) 310 = pilosa.
R'inwardtiana, Steud. Nom. ed. II. i. 614=serrulata.
R<™yi,-4. Gray, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 1262.—Ins. Sandvic.
reniformis, *Blume, Bijdr.* 634.—Java,
repada, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1. 356.—Ind. or.
repens, C. *Koch, in Linnaea,* xxi. (1848) 728.-Onens.
repetita, *Hochst, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 240.—Abyss.
resinifera, *Berg, in Berg if C. Schmidt, Offi: G—*. t. 34 d verso.—Marocc.
r«tiacea, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 162.—Mexic.
•"t'sa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 371=exigua.
"*«sa, Cav. Ic. i. 21 - sulcata.
r*tusa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 93=cornuta.
Keuteriina, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xii. 115.—Syria,
'evoluta, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 186.—, Texas.
™abdodes, *Boiss. Cent. Euph.* 30.—Bras.
""psaloides, Lem. Illustr. Hortic. iv. (1857) Misc. 72 ,-E.TirucaUi.
••kombea, Willd. ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 158-E. Terracina.
'S * * . *Boiss. Cent. Euph.* 19^-Afr. austr.
'lytidosperma, *Boiss. if Bal. Diagn.* Ser. II. iv. 84.-Ulicia.
"•ytisperma, *Engelm. ex Klotisch if Gareke, in Abh. 4*arf. *Berl.* (1860) 34, in syn.—Chili.
*«*ara\-ana, Baill. Adansonia, i. (1800-61) 105 = abyssinica.
^•edeUana, *Boiss. Cent. Euph.* 30.—Bras.
yens, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 455 = spinosa.
'£'*»• Keb. Fl. Taur. Cauc. i. 375=biglandulosa.
'«"*,, l.oisel in M^m ,Soc ,Limu Par• vi• (1827) 414 "Corsica.
rig"**'"' Steud_ Nom, ed- II- '• 614-spinosa.
nmarum, *Coss. (f Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. U8.3) 261.-Marocc
kn△'21 Jord_in BiUot_Annot_27 "^ Esula_.. .gr..—Japon™'1 *Fr„nch_V Sm>_EnUm, Pl, JaP,* "" Rocmeriana, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 151.—Texas.
Roxeri, Orph. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 173 = Heldreichii.
rosea, *Retz. Obs.* iv. 26.—Ind. or.
rossa, Rottb. in Ges. Naturf. Fr.Neue Schr. iv. (1803) 188 —» glaucescens. r.
'"Ma, Roxb. m Beatson, St. Hel. TracU, 808-E. Rothiana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 419 - javanica.
Rothiana, *Spreng. Syst.* ffi. 796.—Ind. or.

EUPHORBIA:—
Rothiana, Wight, let. 1864 = oreophila.
rotundata, Hochst. in Lorent, Wanderangen, 344 = denticulata.
rotundifolia, *Hoot, if Am. Bot. Beech. Voy.* 44.—Chili.
rotundifolia, Loisel. in Desv. Joura. Bot. ii. (1809) 331=peploides.
rotundifolia, Phil, ex Klotzsch & Gareke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 26 = ovalifolia.
Royleana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 83__Reg. Himal.
rubescens, link, in Bach, Beschr. Canar. Ins. 158" E. Peplis.
rubicunda, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 78^thymifolia.
rubra, Cav. Ic. i. 21. t. 34. f. 2=falcata.
rubra, DC. FL Fr. vi. 359-exigaa.
rubra, *Pall. Tail. Taur. Sh—Cf. Ledeb. FL Ross.* iii. 580 (sp. dub.).—Tanria.
rubricauiis, Kegel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 37 =rupicola.
mderalis, *Dum. Fl. Belg.* 87 (Quid *f).*—Europ.
ruderalis, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 343 = arvalis.
Ruegeliana, Shuttlew. ex Boiss. in DC. Prod. xv. 11.67 =Curtisii.
rugosa, *Kit. in Rochel, PI. Rar. Banat.* 26, nomen.—
Ruiziana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 31.—Peruv.
rumicifolia, *Boiss. Cent. Euph.* 39.—As. Min.
rupestris, Friwald. ex Boiss. in DC. Prod. xv. n. 165-Barrelieri.
rupestris, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 190.—Sibir.
rupicola, *Boiss. Blench.* 81.—Reg. Mediterr. occ.
rupicola, Scheele, in linnaea, xxii. (1849) 153-Fendleri.
ruscinonensis, *Boiss. Cent. Euph.* 33.—Mont. Pyren.
sabulicola, *Boiss. I. c.* 6.—Bras,
saccharata, *Boiss. 1. c.* 18.—Mexic.
Sagraeana, A. Rich, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 105 atrichotoma.
salicetorum, Jord. Pugill. PI. Nov. 138-androsaemifolia.
salicifolia, DC. Fl. Fr. vi. 363 = E. Esula.
salicifolia, *Host, Syn. Fl. Austr.* 267.—Europ.
salina, Willd. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 15-buxifolia.
Sampsoni, Hance, in Ann. Sc. Nat. *Sit.,* V. v. (1866) U40 = pekinensis.
sanguinea, *Hochst. V Steud. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 35.—Afr. trop.
sanguinea, Hort. Berol. ex Klotzsch *Sc* Gareke, in Abh. Akad. Berl. (1860) 39=haematodes.
Sarati, *Ardoino, Fl. Alp. Marit.* 335.—Europ. austr.
sarawschanica, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 78.—Turkestan,
sarcodes, *Boiss. Cent. Euph.* 29.—Bras,
sareptana, *Becker, in Bull.. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (185b) I. 13; *Boiss. in DC. Prod.* xv. a. 15!).—Rossia.
satureioides. Lam. Kncyc ii. 424-rosea.
Sauliana, *Bor. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1286. —Lydia.
saxatilis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 919-pctrophila.
saxatilis, *Georgi, Beschr. Russ. Reich.* III. iv. 995 (sp. dub.).—Rossia.
saxatilis, *Jacq. Fl. Austr.* iv. 23. t. 845.—Austria.
saxatilis, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 842-Gerardiana.
scandens, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* it. 58.—Mexic.
scabrella, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 55.—Mexic.
scabrifolia, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) H. 247.—Burma.
scepiformis, Buek, in DC. Prod. Ind. iv. 148, sphalm. sscopiformis.
Schickendantzii, *Hieron. in Bol. Acad. Nat. Cordova,* iv. (1881) 17.—Reg. Argent.
Schimperi, *Presl, Sot. Bemerk.* 108.—Arabia.
Schimperiana, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 242.—Abyss.
schimadenia, Boiss. & Hoheo. ex Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 113-cheiradenia.
schiMoceras, Boiss. 1, c v. 55=tinctoria.
schizolepis, *F. Muell. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. ll. 20.—Austral.

EUPHORBIA:—
schiBoloba, Engelm. in Proc. Am. Acad. v. (1862) 173 =incisa.
Schlechtendalü, *Boiss. Cent. Euph.* 18.—Mexic.
Scbottiana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 85.—Cilicia.
Schultzii, *Benth. H. Austral,* vi. 47.—Austral.
Schweinfurthii, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 410.—Ins. Socotr.
sciadophila, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 57.—Bras,
sclerophylla, *Boiss. Cent. Euph.* 37.—Afr. austr.
scolopendria, Donn, Cat. Hort. Cantab, ed. HI. 88 = uncinata.
scopiformis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1289.—Afr. austr.
Scopoliana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 615.—Cilicia.
scordifolia, *Jacq. Coll.* v. 118.—Afr. trop.
Scotauum, *Schkcht. in Linnaea,* xix. (1847) 250.—Mexic.
Seemanni, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 276 = campestris.
segetalis, J. Grah. Cat PI. Bomb. 179=Rothiana?
segetalis, *Linn. Sp. PI.* 458.—Europ.
segetalis, Pall. Reise, i. 154-E. Esula.
segetalis, Pall. Tabl. Taur. 51=agraria.
segetalis, Raul. Crète, 549 = E. Terracina.
segoviensis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 58.—Mexic.
Seguieri,Nym. Coup. 653=nicaeensis.
Seguieriana, Neck, in Act. Akad. Theod. Pal. ii. (1770) 498 =Gerardiana.
Sequierii, All. Fl. Pedem. i. 288=piaec.
Selloi, Boisb. Cent. Euph. 30=elodes.
Selloi, *KlotBsch, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. ll. 50.—Bras.
semiperfoliata, *Viv. Fl. Cars. Sp. Nov.* 7'—Sardin.
sera-comans, *Bubani, in Num. Ann. Sc. Nat. Bolog.* ix. (1848) 95.—Mont. Pyrcn.
serotina. Host, Fl. Austr. ii. 562«=nicaeensis.
serpens, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 211 - neocaledonica.
serpens, Balb. ex Boiss. Cent. Euph. 12->Balbisii.
serpens, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 62.—Am. bor.
serpiformis, Boiss. in DC. Prod. xv. II. 75, sphalm. - scopiformis.
serpyllifolia, Balb. ex Boiss. 1. c 49=adenopten.
serpyllifolia, *Boj. Hort. Maurit.* 288.—Ins. Galega.
serpyllifolia, *Pers. Syn.* ii. 14.—Am. bor.
serrata, S. G. Gmel. It ii. 257-pilosa *1*
serrata, *Linn. Sp. PI.* 459.—Lnsitania.
serrula, *Engelm. in Torr. Bot. M'x. Bound.* 188.—N. Mexic.
serrulata, *Reinv. ex Blume, Bijdr.* 635.—Malaya; China.
serrulata, Thuill. Fl. Par. ed. II. 237-stricta.
serrulata, Veil. Fl. Fkm. 208; v. t. 17 =brasiliensis.
sessiliflora, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. v. 62-oblongata.
sessiliJlora.'E.tAey. in Drige,Zwei Pfl. Docum. 184 - gummifera.
sessiliflora, *Roxb. Hort. Beng.* [86]; *fl. Ind.* ii. 471.—Burma,
sessilifolia, *Klottsch, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 64. —Bras.
seticornis, Poir. Voy. Barb. ii. 173 = E. Terracina.
setigera, E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum. 184 - sanguinea.
setiloba, *Engelm. ex Torr. in Pacif. Rail. Rep.* v. 864. —Calif.
setosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 672.—Bras.
sexangularis, Henckcl, Adumbr. 7-glauca.
skarkoinsis, Baill. Adansonia, vi. (1866) 287 = myrtoides.
sibirica, Fisch. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 123-alpina.
Sibthorpii, *Boiss. Cent. Euph.* 39.—Graecia.
Sieboldiana, *Morr. b* Decne. in Bull. Acad. Brux.* iii. (1886) 174.—Japon.
sikkimensis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 113.—*Rts.* Himal.
silenifolia. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 454=elliptica.
simplex, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 730 * segetalis.
sinaica, Hochst ex Boiss. in DC. Prod. xv. n. 142 « E. Chamaepeplus.
Sinclairiana, *Benth. Bot. Sulph. Voy.* 168.—In*. Gorgon.
socialis, Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie, i. (1844) 484= javanica.

EUPHORBIA:—
socotrana, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 98.—Ins. Socotr.
soliflora, Vis. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 133 = capitulate.
solisequa, Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 756-dulcis.
soongarica, *Boiss. Centr. Euph.* 32.—Sibir.
sordida, Klotzsch, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 21 = Berteriana.
sororia, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1845) 308.—Persia.
Sparrmanni, *Boiss. Cent. Euph.* 5.—Austral,
spartioides, *Hornem. ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 48.—Hab. ?
spartioides, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 44 = Cupani.
spatbulaefolia, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 599.—Ind. or.
spathnlata, *Lam. Encyc.* ii. 428.—Bras.
sphaerococca, Salzm. ex Coss. Notes Crit 45 = akenocarpa.
sphaerorhiza, *Benth. PI. Hartw.* 8.—Mexic.
sphaerospenna, *Shuttlew. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 102.—Florida.
spicata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 184, nomen; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 97.—Afr. austr.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 457.—Europ. austr.
spinosa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. v. 49. t. 463 = acanthothamnos.
spinosa, Viv. Fl. Lib. Spec. 26 = Bivonae.
spiralis, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 410.—Ins. Socotr.
splendens, *Boj. ex Hook, in Bot. Mag.* t. 2902. — Madag.
spongiosa, Ledeb. ex Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 214 = E. Lathyris.
Spruceana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 53.—Peruv.
squamigera, Loisel. Fi. Gall. ed. II. i. 345=.rupicola.
squamosa, Willd. Sp. PI. ii. 918 = aspera.
•quarrosa, *Haw. in Phil. Mag.* (1826) 276.—Afr. austr.
stapelioides, *Boiss. Cent. Euph.* 26.—Afr. austr.
stellaespina, *Haw. in Phil. Mag.* (1826) 275.—Afr. austr.
stellata, *Willd. Sp. PI.* ii. 886.—Afr. austr.
stellulata, Salzm. ex Loisel. in Mem. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 415-cuneifolia.
stellulata, Salzm. in Flora, iv. (1821) 110«=pterococca.
stenophylla, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 104.—Bras.
stenophylla, Schur, Enum. PI. Transs. 595 = £. Cyparissias.
stictospora, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 187. —N. Mexic.
stipulacea, Engelm. ex Boiss. in DC. Prod. xv. it. 30 = alboxnarginata.
Stocksiana, *Boiss. Centr. Euph.* 34.—Beluchist.
Stracheyi, *Boiss. in DC. Prod.* xv. n. 114.—Reg. Himal.
striata, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 91 = striatella.
striata, Eckl. & Zeyh. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 169 = E. Erythrina.
striata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 86.—Afr. austr.
striatella, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 152.—Persia,
stricta, *Linn. Syst.* ed. X. 1049.—Europ. med.
stricta, Tenore, Ad. FI. Neap. Syll. App. iv. 18 = platyphyllos.
strigosa, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 310.—Mexic.
strobilifera, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 229 =elegans.
stygiana, *H. C. Wats, in Hook. Land. Journ. Bot.* iii. (1844) 605.—Ins. Azor.
subamplexicaulis, *Kar. &" Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 744.—Soongaria.
subciliata, Pers. Syn. ii. 18 = platyphylla.
subcordata, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 184.— Soongaria.
subcordata, Schur, Enum. PL Transs. 594-pilosa.
subhastata, Vis. *Sc* Panč, in Mem. IsL Venet. x. (1861) 444=agraria.
subserrata, Engelm. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 43 = serpyllifolia.
subtuberculata, *C. A. Mey. ex Boiss. I. c.* 118.—Persia.
subumbellata, Steud. ex Boiss. 1. c. 103 = Copiapina.
suffruticosa, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* p. xxvi.—Ins. Rhodos.
suffruticulosa, Lecoq & Lamotte, Cat. PI. Vase. Fr. 827-flavi coma,
sulcata, *De Lens, ex Loisel. Fl. Gall.* ed. II. i. 339.— Alger.
sulcata, Lem. ex Boiss. in DC. Prod. xv. H. 176-pereskiaefolia.
sumbawensis, *Boiss. I. c.* 26.—Ins. Sumbawa.
supina, Rafin. ex Boiss. 1. c 47 = maculata.

EUPHORBIA:—
sylvatica. Linn. Sp. PI. 463; **Jacq.** FL Austr. iv. 39. t. 875—amygdaloides.
Synadenia, Baill. Adansonia, ill (1862-63) 142 = Synadenium arborescens.
syriaca, Spreng. Syst. iii. 792-lanata.
syrmiensis. *Kit. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 179, nomen.—Banat.
syspirensis, C. Koch, in linnaea, xxi. (1848) 727 = tinctoria.
systyla, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1847) II. 1218—Aiab.
Szovitsii, *Fisch.* b* *Mey. Ind. Sent. Hort. Petrop.* i. 27. —As. Min.; Pers.
taitensis, *Boiss. Cent. Euph.* 5.—Ins. Taiti.
talyschensis, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 196 = aspera.
tamanduana, *Boiss. Cent. Euph.* 4.—Bras.
tanaicensis, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 547-Cupani.
tannensis, Hort. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 133 = platyphylla.
tannensis, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 42.—Ins. Tanna.
tatarica, Jacquem.ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 114 = tibetioa.
taurica, Bess, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 14 = segetalis.
taurinensis, *All. Fl. Pedem.* i. 287.—Europ. austr.
taxifolia, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 14.—Afr. austr.
teheranica, *Boiss. Cent. Euph.* 36.—Persia,
telephioides, *Chapm. Fl. S. U. St.* 402.—Florida.
tenella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 58 = prostrata.
tenera, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 150.—Mexic.
tenuifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 372-leptocaula.
tenuifolia, *Lam. Encyc.* ii. 428.—Gallia.
tenuis, *Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 62.— Nepal.
Terracina, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 139-graeca.
Terracina, Lag. Elench. Hort. Matrit. (1816) 7 = Lagascae.
Terracina, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 654.—Reg. Mediterr.
Terracina, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 759 = taurinensis.
tetraceras, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 127 = portlandica.
tetraceras, Szowits, ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 166 = tinctoria.
tetragona, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 89.—Afr. austr.
tetragona, *Haw. in Phil. Mag.* (1826) 276.—Afr. austr.
tetragona, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 288 = polyacantha.
tetrapora, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound.* 191.— Texas,
tetraptera, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 440.—Madag.
tettensis, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 94 ; *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 49.—Afr. trop.
texana, *Boiss. Cent. Euph.* 30.—Texas,
thamnoides, *Boiss. 1. c.* 33.—As. Min.; Syria.
thelesperma, Hochst. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 98 =acalyphoides.
Thi, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. .Wien,* xviii. (1868) 660.—Afr. trop.
thinophila, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 537.—Chili
Thomsoniana, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 113.—Reg. Himal.
Thuarsiana, *Baill. Adansonia*, i. (186C-61) 139.—Madag.
thymifolia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 94 = scordifolia.
thymifolia, *Linn. Sp. PI.* 454 ; *Burnt, f. Fl. Ind.* 112. —Amphig. trop.
thymifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 606 - maculata.
thymifolia, Thunb. Fl. Jap. 196 = humifusa.
thymifolia, Wall. Cat. n. 7710 D = rosea.
thymifolia, Wall. 1. c. E=granulata.
thyrsifiora, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 143 = **agraria.**
thyrsoidea, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. **164.—**Reg. Himal.
tibetica, *Boiss. 1. c.* **114.—**Reg. Himal.
tigridis, Boiss. 1. c. 34 = turcomanica.
tinctoria, *Boiss. (f Huet, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. H. 166.—Persia.
Tirucalli, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxii = Schimperi.
Tirecalli, *Linn. Sp. PI.* 452.—Afr. or.; Ind. or.
Tirucalli, Thunb. Fl. Cap. 405=Burmanni.
tithymaloides, Linn. bp. PI. **453** = Pedilanthus tithymaloides.

EUPHORBIA:—
tomentella, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 3º. —Mexic.
tomentella, *Zipp. ex Span, in Linnaea*, xv. (1341) 350, nomen.—Ins. Timor.
tomentosa, Pers. Syn. ii. 13 = scordifolia.
Tommasiniana, Bertol. Fl. Ital. v. 78 = virgata.
torrida, *DC. in Atti Reun. Second. Sc. Ital. Tor.* (1841) 158.—Mexic.
tortilis, *Rottl. ex Wight, Ic.* t. 898.—Ind. or.
tovarensis, *Boiss. Cent. Euph.* 18.—Venezuela.
toxicaria, Afzel. ex Steud. Norn. ed. II. i. 615 =• drupifera.
toxicaria, *Noisette, ex Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 10> nomen.—Hab. ?
trachyphylla, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 198-heterophylla.
trachysperma, *Engelm. in Torr. Bot. Mex. Bound-* 18!).—Mexic.
transsihanica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturtv- iii. (1852) 124 = agraria.
transtagana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 88.—Lusifan.
trapezoidalis, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 1268.—Afr. trop.
trapeBoidalis, Viv. Fl. Lib. Spec. 25. t. 4. f. 1 = *E.* Terracina.
triacantha, *Ehrenb. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 85. —Abyss.
triaculeata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 94.—Arab,
triangularis, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 839.—Hab. ?
tribuloides, Lam. Encyc. ii. 415 = canariensis.
trichogona, Bertol. Misc. Bot. iii. 20. t. 6. f. 3 = prostrata.
trichophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 250.—Madag.
trichotoma, *H. B.* &" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 60.—Florida; Cuba.
tricuspidata, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 271^exi«u».
tridentata, Lam. Encyc. ii. 416 = anacantha.
triflora, *Schott, Nyman,V Kotschy, Analect. Bot.* <• —Dalmatia.
trigona, *Haw. Syn. PI. Succ.* 127.—Ind. or. j Malaya.
trigona, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8-antiquorum,
trigona, *Roxb. Hort. Beng.* [36]; *Fl. Ind.* ii. 468.— Ins. Molucc.
trigonocarpa, Fisch. Ind. Sem. Hort Petrop. vii. 48 * pilosa.
trinervia, Boiss. Elench. 82 = boetica.
trinervia, *Schum.* to" *Thonn. Beskr. PI. Guin.* 253— Afr. trop.
trinervis, Bertol. Fl. Ital. v. 37 -= Preslii.
triphylla, Willd. ex Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 249=scabrella.
tristis, Bess. Ind. Hort. Crem. (1811) Suppl. iv. 27" E. Esula.
Triumfetti, Bertol. Fl. Ital. v. 85 = E. Esula.
tuberculata, *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 43. t. 208.—A'" austr.
tuberosa, *Linn. Sp. PI.* 466.—Afr. austr.
Tuckeyana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 615.—Ins. t»P-Verd.
turcomanica, *Boiss. Cent. Euph.* 18.—Turcoman.
Turczaninowii, *Kar. «J" Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 447.—Turkest.
turkestanica, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sir.* VI. x (1884) 248.—Turkestan.
turkestanica, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 78.—TuTkest.
Turpini, *Boiss. Cent. Euph.* 12.—Ins. S. Doming,
ucrainica, *Andrn. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* (1884j 168, nomen.—Ucrania.
uliginosa, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1 125 = flavicoma.
uliginosa, *Welw. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. « Lusitan.
umbellulata,£«^/»i. * *Boiss. I. c.* 40.—Mexic.
umbrosa, *Bert, ex Spreng. Syst.* iii. 791.-Doming.
uncinata, *DC. PI. Grass*, t. 151.—Afr. austr.
undulata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 871.—Reg- Sibir.
undulata, Schweigg. Enum. PI. Hort. Regiom- salicifolia.
undulata, Willd. Enum. Hort Berol. Suppl- pubescens.
uniflora, Dalz. &Gibs. Bomb. Fl. 227 = microphy
uniflora, *G. Don, in Land. Hort. Brit. Suppl-* —Am. **austr.**

EUPHORBIA :-

nmflora, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 360.—Am. bor.

uniflora, *Roxb. Hort. Beng.* [86]; *Fl. Ind.* ii. 473.—Ind. or.

«<«/»n«s, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 14 = gata.

urceolc, *Anal. Soc.* &<«* *Argent,* xi. (188 T) 50.—Reg. Argent.

Vacca ?, Baill< Adansonia, vi. (1-S66) 286 - australis.

Vache'ln, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 218 = serrulata,

vaginulata, ***Griseb. Fl. Brit.* W. Insrf. 52.-Ins. am.**

Vahi, Willd. ex Klotzsch & Garcke, in Abh. Akad. Bel - (1860)37 = lineari8.

valentin H ?. Orte 8 Hort Matr 12 7; wiUd Ennm, Hort. Berol. 504 = E. Terracina.

Valerianae, Pers. Syn. ii. 18 = seq.

valerianaefolia, Lam. Encyc. ii. 435 - cybirensis.

variabilis, *Cesati, in Bibl. Ital.* xci. (1838) 348.—Reg. Mediterr.

variegatus, Haw. Syn. PI. Sncc 180 = E. Nivulia.

elegans. Heyne, ex Roth, Nov pl Sp 225=

varie ?, Sims, Bot Ma S- 1747 = marginata.

Vaut f ? nanai„5<"« *Cent. Euph.* 12.-Bras.

velleri TM A > * »» « #C. i W . xv. II. 4O.-Mexic.

velligera, *Schau.* * *Linnaea* > xx (1847) 728~ Mexic.

Ve^'tschii, Boiss. & Rent. PngiU. PI. Nov. 108 = "elwitschii.

venefica, *TrJmaux, ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 178. Afr. trop.

venenata, Schlecht ln Linnaea, xix. (1847) 250-**E. Scolanum.**

veneta, £ ? Ore, Fl Mei Unlv 394 = E. Characias.

veneta, e Ennm Hort Berol 507 = Wulfenii.

verna, ex B" in Jonm- Lu>n- Soc. xvi. (1878) 660 Terr »<:ina.

verrucosa, Bertol. Fl. Ital. v. 46 - akenocarpa.

verrucosa, Desf. Fl. Atlant. i. 383 = atlantica.

verrucosa, Gorg Beschr RnaSl Reich> IIL iv> 994 ~ **dulcis.**

verrucosa, Guss FL Sic Syn. i. 342 - Gasparrinii.

verrucosa, La m. £BC J" « 481.-Europ.

verrucosa, **Linn.** Mant « 393 = cybirensis.

verrucosa, **Linn.** Sp pl 459=pubescens.

verrucosa, **Pall.** T B 1 Taur 5 = pilosa.

versicolor, Greene, in Coult. B.—Am. bor.

verticillata, Fisch » MAn. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 81 = **Pallasii.**

verticillata, **Orph. ex Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 90 = Heldreichii.**

verticillata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 611=petiolaris.

verticillata Veil. Fl. Flum. 202; v. t. 16=pilulifera.

vestita, *Boiss. Cent. Euph.* 7.—Mexic

Vieillardi, *Baill. Adanson* to, tl. (1861-62) 212.—N. Caled.

villifera, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 153.—Texas.

villosa, Friwald. ex Boiss. in DC. Prod. xv. II. 125 = epithymoides.

villosa, Waldst. & Kit. ex WiUd Sp Fl "909= **pilosa.**

villosissi =Sell0T KlotzJch, ex Boiss in DC Prod xv "51

viminali 1, B"ra- f. Fl, Cap. Prod. 14 = Bnrmanni.

viminali * Linn Sp pl 452 = Sarcostemma viminale.

viminalis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = E. Tirucalli.

viminea, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 184.—Ins. Galapag.

virgata, cf. £ Tabl. ed. I. 204 = **obtusifolia.**

virgata, Nouv. ex Nym. Consp. 652 = **lucida.**

—Eur[illegible]. ^ *-** W- *ar- ^"V- **H. 176.1.162.**

S j f Waldst. & Kit. 1. c. iii. 309-dulcis.

Bell* t?*Z', ex K'ot*^h *tf Garcke, in Abh. Akad.

viscoide Bo Sp PL iL 882,-Afr. anstr.

itetlhT' Tosc C*'- £"M- 4 —Bra*- **Wfolia!'"** & Pard Ser Inconf ATM 8- 98 isotidi-

^I**bergia,** *Boiss. in DC. Prod.* xv. IF. 169—Afr.

Wa"ic'hi anai Boiss. 1. c. 30=microphylla.

EUPHORBIA:—

Welwitschii, *Boiss. if Rent. Pugill. Pl. Nov.* 108 (Velwitschii); *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 130—Lusit.

Wheeled, *Baill. Adansmia,* vi. (1866) 286.- Austral.

Wightiana, Boiss. Cent. Euph. 87 = Rothiana.

Wittmanni, *Boiss. I. c.* 31.—Keg. Caucas.

Wrightii, *Ton. &" Gray, in Pad/. Rail. Rep.* ii. 174.—Texas.

Wulfeni, Heldr. ex Nym. Consp. 651=Sibthorpii.

Wulfenii, *Hoppe, in Flora,*\i.* (1829)159.—Dalmatia.

xalapensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 61.—Mexic.

Xanti, *Engelm. ex Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 62.—Calif,

xylophylloides, *Brongn. ex Lent, in Illustr. Hortic.* iv. (1857) *Misc.* 72.—Madag.

yemenica, *Boiss. Cent. Euph.* 37.—Arab,

zambesiana, *Benth. in Hook. Ic. Pl.* t. 1305.—Afr. trop

zierioides, *Boiss. in DC. Prod.* xv. II. 58.—Mexic.

zonosperma, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 696.—Bras.

zornioides, *Bniss. in DC. Prod.* xv. II. 19.—Ind. or.

zygophylloides, *Boiss. Cent. Euph.* 10.—Texas.

EUPHORBIASTRUM, Klotzsch & Garcke, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 252 = Euphorbia, Linn.

Hoffmannianum, Klotzsch & Garcke, 1. c.=Euphorbia Hoffmanniana.

EUPHORIA, Comm. ex Juss. Gen. 248 (1789), partim. *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 406.

annularis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 285=Ratonia montana.

attenuata, Planch, ex Hiem, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 684=Sapindusattennatus.

chrysea, Korth. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 554= Nephelium chrysenm.

cinerea, *Radlk. in Siteb. Phys.-Math. Acad. Muench.* viii. (1878) 299.—Ins. Philipp.

crinita, Poir. Encyc. Suppl. iii. 478 = Nephelinm Iappaceum.

Cubili, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 287 = Cubilia Rumphii.

Danura, Wall. Cat. n. 8051 = Sapindus Danura.

didyma, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 288 - Nephelium glabrum.

elongata, *Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 95.—Borneo.

fitscata, Bemh. & Hook. f. Gen. i. 406 = Glenniea zeylanica.

Gardneri, Benth. & Hook. 1. c.; Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 67=Nephelium Gardneri.

glabra, Blume, Bijdr. 233 = Nephelium glabrum.

informis, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 478.—Cochinch.

Leichardtii, *Benth. Fl. Austral,* i. 468.—Austral.

Litchi, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 285=Nephelium Longana.

Litchi, Juss. Gen. 248 ; Desf. Tabl. ed. I. 135=Nephelium Litchi.

Litchi, Wall. Cat. n. 8048 G, H = Nephelium rubescens.

Long-ana, Blume, Bijdr. 238=Nephelium mutabile.

Longana, Lam. Encyc. iii. 574 = Nephelium Longana.

malaiensis, *Radlk. in Act. Congr. Bot. Amst.* 1877 (1879) 95.—Malacca.

Nephelium, DC. Prod. i. 612 = Nephelium Iappaceum.

Nephelium, Wall. Cat. n. 8053 B, partim = Mallotus subpeltatus.

Noronhiana, Blume, Eijdr. 234=XerospermumNoronhianum.

pinnata, Poir. Encyc. Suppl. iii. 479=Schmidelia pinnata.

Pometia, Steud. Nom. ed. II. i. 616=praec.

punicea, Lam. Encyc. iii. 573 = Nephelium Litchi.

pupillum, Steud. Nom. ed. II. ii. 192, in syn. = Nephelium Longana.

rubra, Royle, Illustr. Bot. Himal. 138=Sapindus attenuatus.

sinensis, J. F. Gmel. Syst. 611 = Nephelium Litchi, Longana.

stellulata, *Radlk. in Siteb. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 308.—Ins. Philipp.

undulata. Herb. Heyne, ex Wall. Cat. n. 8049=Nephelium Longana.

verruculosa, Salisb. Prod. 280 = Nephelium Longana.

EUPHORIA :-

verticillata, Lindl. Bot. Reg. t. 1059 = Sapindus Danura.

xerocarpa, Blume, Bijdr. 234=Xerospermum Noronhianum.

EUPHORIOPSIS, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. viii. (1878) 301, 802. *SAPINDACEAE.*

longifolia, *Radii. II. cc.*—Ind. or.

EUPHORONA, Steud. Nom. ed. II. i. 616 (1840) = Euphrona, Veil. (Quid ?).

EUPHRASIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 976.

agrestis, Arrond. Cat. Pl. Morb. 76=officinalis.

alpina, *R. Br. Prod.* 436.—Austral.

alpina, Lam. Encyc. ii. 400=officinalis.

also, F. Muell. in Trans. PhiL Soc Viet. i. (1855) 107 = antarctica.

andicola, *Benth. in DC. Prod.* x. 554.—Chili,

antarctica, *Benth. I. c.* 555.—Austral.; Reg. Magell.

arctica, Lange, in Fl. Dan. t. 2910=officinalis.

arguta, *R. Br. Prod.* 436.—Austral.

arguta, A. Kem. Sched. Fl. Exsicc. i. 40=officinalis.

aromatica, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 15 (Quid ?).— Java.

aspera, Brot. Fl. Lusit i. 185 = Bartsia aspera.

aspera, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 776 = Stnga aspera.

asperrima, Link, ex Spreng. 1. c. 777 = Bartsia aspera ?

azorica, H. C. Wats, in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1841) 598=grandiflora.

Biancae, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 841 = Bocconi.

Bocconi, *Guss. Adnot. Cat. Pl. Boccad.* (1821) 8.—Sicilia.

Brownii, F. Muell. Fragm. v. 88 = speciosa, collina, alpina, striata.

caerulea, Tau&ch, in Flora, xvii. (1834) 445 = officinalis.

campestris, Jord. Pugill. 13.1 — officinalis.

capensis, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 16.—Afr. austr.

carniolica, A. Kem. Sched. Fl. Exsicc. ii. 117 = officinalis.

cebennensis, Martin, in Billot, Annot. Fl. Fr. Allem. 147 = officinalis.

chrysantha, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* i. (1861) 66.—Chili.

coerulea,* Auct. vide *caerulea.

collina, *R. Br. Prod.* 436.—Austral.

condensata, Jord. Pugill. 135 = officinalis.

Coris, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. iv. 298 = Bartsia lutea.

coromandelina, Rottl. ex Spreng. Pugill. i. 43 = Sopubia delphinifolia.

Corsica, Loisel. Fl. Gall. ii. 367 = Bartsia Odontites.

cuneata, *Forst.f. Prod.* 43.—N. Zel.

cuprea, Jord. Pugill. 136 = officinalis.

cuspidata. *Hook./. Fl. Tasman.* i. 298.—Tasman.

cuspidata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1680) 126 = officinalis.

cuspidatissima, St. Lag. 1. c. = officinalis.

cyienaica, *Pacho, Voy. Marm.* t. 98.—Cyren.

danica, T. Gliem. Geogr. Beschr. Isl. 144.—Cf. Bab. in Journ. Linn. Soc. xi. (1870) 320= officinalis.

depauperata, Benth. in Wall. Cat. n. 8886 = officinalis.

diemenica, Spreng. Syst. ii. 777 ~ alpina.

disperma, Hook, f. in Ic. Pl. 1.1283 = longiflora, *T. Kirk,*

divergent, Jord. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 191 = Bartsia Odontites.

ericetorum, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 494 — officinalis.

exigua, Reut. in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1854-56) 123 = officinalis.

fili/olia, Link, ex Steud. Nom. ed. II. i. 616 = officinalis.

flava, *Poir. Voy. Barb.* ii. 191.—Afr. bor.

frutescens, Weber, ex Benth. in DC. Prod. x. 551 = Bocconi.

glandulosa, Benth. in DC. 1. c. 655-Phtheirospermum glandulosum.

glutinosa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 70.—Tauria.

gracilis, Fries, Mant. iii. 62=officinalis.

grandiflora, *Hochst. in Scub. Fl.* **Ator.** 39. t. 8.—Ins. Azores,

helminthospermum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 15 (Quid ?).—**Java.**

EUPHRASIA:—
hirsuta, *T. Gliem. Geogr. Beschr. Island; ex Bab. in Journ. Linn. Soc.* xi. (1870) 820.—Island.
hirtella, Jord. ez Reut. in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1851-56) 120 = officinalis.
hispida, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 776-Bartsia melampyroides.
Holliana, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 20 = Bartsia scordifolia.
imbricata, Pers. Syn. ii. 149=officinalis.
imbricata, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1865) ii. 381.—Chili.
Jaubertiana, Bor. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 254 = Bartsia Odontites.
kalifolia. POUT, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 617-seq.
kaliformis, Ponrr. ex Willd. Ennm. PI. Hort. Berol. 685, 636-Bartsia pnrpurea.
Koehii, F. Schultz, Arch. Fl. 315-Bartsia Odontites.
lactucina, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 14 (Quid ?).—Java.
laevis, Cater. Fl. Montaub. Ill - Bartsia lutea.
lanceolata, Gaud. Fl. Helv. iv. 116 = Bartsia lutea.
Lapeyrousii, Soyer-Willem. Obs. PI. Fr. 106 officinalis.
latifolia, Linn. Sp. PI. 604 - Bartsia latifolia.
latifolia, Punh, Fl. Am. Sept. ii. 480 - officinalis.
latifolia, Schnr, Ennm. PI. Transs. 610-Bartsia Odontites.
lepontiea x, Bruegg. in Jahresb. Natnrf. Ges. Granb. II. xxiii-xxiv. (1880) 101.—Europ.
linifolia, Lam. Fl. Fr. ii. 349 = Bartsia viscosa.
lint/alia. Linn. Sp. PI. 604-Bartsia lntea.
linifolia, Schonsb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 602=Bartsia pnrpnrea.
litoralis, *Fries, Mant.* iii. 196.—Europ.
longiflora, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* x. (1878) 440.—N. Zel.
longiflora, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 78.—Hispan.
lutea, Dnbois, Fl. Orl. 341-Bartsia Odontites.
lutea, Linn. Sp. PI. 604-Bartsia lntea.
maeulata, Gilib. H. Lituan. i. 126 -= officinalis.
maialis, Jord. I'ugill. 134 = officinalis.
meiantha, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* v. 147.—Chili.
melampyroides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 833 = Bartsia melampyroides.
mfcrantha, *Brenn. in Meddel. Soc. Faun, et Fl. Fenn.* v. (1880) 77.—Finland.
micrantha, Keichb. Fl. Germ. Excurs. 3S8 = officinalis.
minima. Jacq. ex DC. Fl. Fr. iii. 473 = officinalis.
minor, Link, Handb. i. 514 = officinalis.
mollis, Ledeb. ex Benth. in DC. Prod. x. 653 = officinalis.
montana, Jord. Pngill. 132 -= officinalis.
multicaulis, Benth. in DC. Prod. x. 553 = collina.
Mnnroi, *Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.* 220.—N. Zel.
muscosa, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 528.—Chili.
mutica, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 833 = Bartsia mutica.
nemorosa, Pen. Syn. ii. 149=officinalis.
nitidula, Reut. in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1864-56) 122= officinalis.
nivalis, Beck, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, (1888) 225-officinalis.
Odontites, Linn. Sp. PI. 604 = Bartsia Odontites.
officinalis, *Linn. I. c.*—Reg. bor. temp, et arct.
paludosa, R. Br. Prod. 436=collina.
parviflora, Fries, Snmma Veg. Scand. 195=officinalis.
pectinata, Tenore, FL Nap. i. Prod. 36 -= officinalis.
perpnsilla, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 28.—Chili.
picta, *Phil. 1. c.* xxxiii. (1864-65) 213.—Chili.
picta, Wimm. Fl. Schles. ed. III. (1857) 407=officinalis.
pinifolia, *Pair. Voy. Barb.* ii. 193.—Afr. bor.
praecox, Lam. Fl. Fr. ii. 351.= Bartsia latifolia.
pratensis, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 859 - officinalis.
pratensis, Sebast & Mauri, FL Rom. Prod. 199 = Bartsia viscosa.
puberula, Jord. Pngill. 138 = officinalis.
pubescens, *Benth. in DC. Prod.* x. 566.—Pernv.
pulchella, A. Kern. Sched. Fl. Exsicc. i. 48 = officinalis.
pumila, A. Kern. 1. c. 48 - officinalis.

ETTPHBASIA:—
pnrpurea, Desf. Fl. Atlant. ii. 36-Bartsia purpurea.
pygmaea, C. Koch, in Linnaea. xxii. (1849) 686=officinalis.
ramosa, Pers. Syn. ii. 149 -officinalis.
ramosissima, Rent, in Compt.-Rend. Soc. Hallér. (1854-56) 119 = tricnspidata.
repens, *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 199.—N. Zel.
repens, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 14 (Quid 1).—Java.
revoluta, *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 199.—N. Zel.
rigidifolia, *Biiiona, ex Spreng. Syst.* ii. 776.—Sicilia.
rigidifolia, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. x. 560 *(=Odontites Aucheri).*—Graeciaj Oriens.
rigidifolia, Link, ex Nym. Consp. 650 (= *Odontites Linkii).*—Graecia.
rigidula, Jord. Pugill. 134 = officinalis.
rosmarinifolia, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. L Art. iv. 15 (Quid ?).—Java.
Rostkoviana, Hayne, Arzneigew. ix. t. 7-officinalis.
rubra, Hoppe, Bot. Taschenb. (1791) 215; J. F. Gmel. Syst. 923-Bartsia Odontites.
satisburgensis, Funk, ex Hoppe, 1. c. (1794) 190 = officinalis.
santolinaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 333. 1.166 = Bartsia santolinaefolia.
saxatilis, Schur, Enum. PI. Transs. 610-officinalis.
scabra, *R. Br. Prod.* 437.—Austral.
serotina, Lam. Fl. Fr. ii. 850 = Bartsia Odontites.
simplex, D. Don, Prod. Fl. Nep. 95 = officinalis.
Soyeri, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. V. vi. (1862) 36. t. 6 = officinalis.
speciosa, *R. Br. Prod.* 437.—Anstral.
speciosa, A. Kem. in Oestr. Bot. Zcitschr. xxiv. (1874) 115 = officinalis.
spectabilis, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* i. (1861) 66.—Chili.
spiralis, Pourr. ex Poir. Encyc. Suppl. ii. 596 — tenuifolia.
squamsa, Salzm. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 360 = Bartsia purpurea.
striata, *R. Br. Prod.* 486.—Austral.
stricta. Host, Fl. Austr. ii. 185-officinalis.
stricta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. PI. ii. 338 = Bartsia stricta.
stricta, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 16 = officinalis ?
subalpina, Schur, Enum. PI. Transs. 510-officinalis.
SQbexserta, *Benth. in DC. Prod.* x. 555.—Chili.
tatarica, Fisch. ex Spreng. Syst. ii. 777 = officinalis.
tenuifolia, *Pers. Syn.* ii. 150.—Lusitan.
tetragona, R. Pr. Prod. 436--collina.
tctraquetra, Arrond. in Bull. Soc. Pelym. (1862) 96 ; ex Cat. PI. Morb. 76-officinalis.
tricuspidata, *Linn. Sp. PI.* 604.—Tyrol.
trifida, *Poepp. ex Benth. in DC. Prod.* x. 554.—Chili.
Trixago, Vis. Fl. Dalmat. ii. 175-Bartsia Trixago.
UecMrittiana, Jung. & Engl. ex Jung, in Oestr. Bot. Zeitschr. xvii. (1867) 141=officinalis.
uliginosa, Ducom. ex Rent, in Coinpt.-Rend. Soc. Hallér. (1854-66) 121 = officinalis.
verecunda, Salisb. Prod. 95 = Bartsia Odontites.
verna, Bell, in Mém. Acad. Turin, v. 1790-91 (1793) 239. t 6 = Bartsia Odontites.
versicolor,A. Kern. Sched. Fl. Exsicc. i. 47 - officinalis.
violacea, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 14 (Quid ?).—Java.
virgata, Link, ex Stend. Norn. ed. II. i. 616 = tenuifolia.
viscidula, Dnm. Fl. Belg. S2-seq. »
viscosa, Linn. Mant. 86-Bartsia purpurea.
viscosa, FalL Ind. Taur. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 70 =glutinosa.
viscosa, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 616 = Bartsia viscosa.
vulgaris, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 263-officinalis.
Willkommii, Freyn, in Flora, lxi. (1884) 681 = officinalis.

EUPHROBOSCIS, Wight, Ic. v. 1.1732 (1862), sphalm. - EUPROBOSCIS, Griff. = Thelasis, Blnme (Orchid.).

ETJPHBONA, Veil. Fl. Flnm. 177 j iv. t. 107 (1825) (Quid t).
ternata, *Veil. II.* re—Bras.

EUPHBOBXA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 121. t. 73 (1824). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 616.
hirtelloides, *Mart. I. c*—Bras.

EUPHROSINE, Allem. in Nov. Act. Nat. Cur. iv. (1770) 98 (Quid!).

EUPHROSINE, Endl. Gen. Suppl. i. 1381 (1841) = seq.

EUPHROSINIA, Reichb. Nom. 100 (1841)=seq.

EUPHROSYNE, DC. Prod. v. 530 (1886) = Iva, Linn. (Compos.).
ambrosiaefolia, A. Gray, PI. Wright, i. 102 = 1. ambrosiaefolia.
parthenifolia, DC. Prod. v. 530.—Mexic.
xanthiifolia, A. Gray, PI. Wright, ii. 85=1. xanthiifolia.

EUPHYLEIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 16 (1836) = Cordyline, Royen (Liliac).
odorata, Rafin. 1. c. 17 = C. Baueri J

EUPLA8SA, Salisb. in Knight, Prot. 101 (1809). *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 177.
ADBNOSTEPHANUS, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 51.
DICNECKERIA, Veil. Fl. Flum. 41 (1825).
DIDYMANTHUS, Klotzsch, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 436 (1867 ?).
meridionalis, *Salisb. I. c*—Guiana.

EUPLOCA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. v. (1837) 189-HeUotropium, Toura. (Borag.).
convolvulacea, Nutt. 1. c. 190 = H. convolvulaceum.
grandiflora, Ton. in Emory, Milit. Reconnois. 146 -* H. convolvulaceum.

EUPODIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 29 (1836) = Chironia. Linn. (Gentian.).
purpurea, Rafin. 1. c.-C. peduncularis.

EUPOGON, Desv. Opusc. 67, in obs. (1831)=Andropogon, Linn. (Gramin.).

EUPOMATIA, R. Br. App. Flind. Voy. ii. 697. t. 2 (1814). *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 29.
Bennettii, *F. Muell. Fragm.* i. 45.—Austral,
laurina, *R. Br. App. Flind. Voy.* ii. 697. t. 2.—Anstral.
laurina, Hook, in Bot Mag. t. 4348 = Bennettii.

EUPREPIA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 268= Astragalus, Toura. (Legumin.).

EUPROBOSCIS. Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist. »• (1845) 371. t. 26 = TheUsis, Blume (Orchid.).
Griffithii, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 87 = T-carinata.
pygmaea, Griff, in Calc. Journ. Nat. Hut. v. (184S) 372. t. 26 = T. pygmaea.

ETTPTELEA, Sieb. *St.* Zucc. Fl. Jap. i. 133. t. 72 (18S5)-*MAGNOL1ACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 954.
Davidiana, *Baill. Adansonia,* xi. (1873-76) 305 — Tibet
pleiosperma, *Hook.f.* b" *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 243.—Reg. Himal.
polyandra, *Sieb. b" Zucc. Fl. Jap.* i. 134.—Japon.

EUPTERON, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.762 (1855) = Polyscias, Forst. 'Araliac).
acuminatum, Miq. 1. c. — P. acuminata.
nodosum, Miq. 1. c. = P. nodosa.

EUPTILIA, Rafin. Fl. Tellur. iv.95(1836)-Scabiosa. Tourn. (Dipsac).
cretica, Rafin. 1. c - S . papposa.

EUPYRENA, Wight *Sc* Am. Prod. 422 (1834)=Tin>°-n^^, Rumph. (Rubiac).
glabra, *Wight* b* *Am. I. c.* 423-T. Jambosella.
hexasperma, Wight & Am. ex Walp. Rep. ii. 4S8 -1 • Rumphii ?

EURANTHEMUM, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. «• «lfi (1840), sphalm. = Eranthemum, Linn. (Acanth-)-

EURAPHIS, Trin. ex Lindl. Veg. Kingd. 115 (1847)* Fappophorum, Schreb. (Gramin.;.

EUKEIANDRA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 825 (1867). *CUCURBJTACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.
Balfonrii, *Cogn. V Bal/.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xu. (1884) 404.—Ins. bocotr.
formosa, *Hook.f. in Benth. V Hook. f. Gen.* i. 825.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Cogn. in DC. Monog. Pkan.* iii. 41ft.—Afr. trop.

KURHAPHIS, Trin. ex Stend. Nom. ed. II. i. 616 (1840) -Pappophorum, Schreb. (Gramin.).

KURHOTIA, Neck. Elem. i. 207 (1790) = Cephaëlis, Sw. (Rubiac).

EURIOSMA, Desv. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* I. ix. (1826) 421, sphalm. = Erio8ema, DC. (Legumin.).

EURIPLES> Rafin • F1. Tellur. iii. 94 (1836) = Salvia, foum. (Labiat.).
rugosa, Rafin. 1. c - S. virgata.

Bttt»OSCHINTJ8, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. 422 (1862). *ANACARDIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. l. c.
«eRans, *EngL in Bqt* y ^ j i. (1881) 424.—N. v-aled.
wlcatns, *Hook. f. in Benth. V Hook. f. Gen.* i. 422.—Austral,
obtensifolius, *Engl. in Bot. Jahrb.* i. (1881). 424.—N.
^ncosus, *Engl* • j r f • _ N • Caled-
vieillardi, *Engl. I. c.*—*N.* Caled.

EU££STORHIZA, G. Don, ex Stend. Nom. ed. II. i. 617 (1840)-Physalis, Linn. (Solanac).

KUROSTORHIZA, Stend. Syn. PI. Cyp. 285 (1855) - Caurtis, R. Br. (Cyperac).
Vitllea, Steud. L a-Gpentandra.

EUROSTORRHIZA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1067 U883)-prae c.

EtJB?TlA> Ad«ns- *"«». ii. 260 (1768). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. *f.* iii. 55.
CKRATOSPERMUM, Pen. Syn. ii. 651 (1807).
DIOTIS, Schreb. Gen. 683 (1791).
WJEIDENSTAEDTIA, Neck. Elem. ii. 204 (1790).
KHANIKOFA, Rafin. Princ. Somiol. 30 (1814).
A.RASCHENINNIKOVIA, Gneldenst. in Nov. Comm. Petrop. xvi. (17721 548.1.17.
capensis, E. Mey. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 807 = ^V^oma capensis.
«£toides, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iv. 239.- aurop; As. bor.; Am. bor. occ.
»ersmanniana, *Stschtgl. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* i.. (1884) 127, nomen.—Sibir.
f *f"nfO> BoisSl *"• Orient, iv. 918, in syn.=cera-
wlka, E. Mey.. ex Mey. in DC. Prod. xiii. II. 308 = aencocoma pnngens.
ian tz, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 184 = cera-tSdes.
lanata> *Moq. Chenop. Enum.* 81.—Mexic.

EURYA, Thunb. Nov. Gen. 67 (1783). *TERNSTROEMIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 183.
GERRIA, Blume, Bijdr. 124 (1825).
acuminata, *DC. Mim.Temstr.* 26; *Prod.* i. 525.- Kefi- Himal. j Malaya.
q^.*Inata*, w»u- Cat- "• "64, partim-symplocina.
^P". *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 111.- Java.
angustifolia, Miq. ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit Ind. i. 29; i- Camellia theifera.
"£<>>»», Wall. Cat. n. 1465-wuminata.
TMgu«tifolia, *Walp. Rep.* i. 369.—Java.
attnuata, Blume, Mus. Bot Lngd. Bat. ii. 105 = fTrenaria attennata.
ta" ' ' WalL C"l"- 3721-acuminata.
"nmeana, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* 119.—Java.
canescens, Blnme, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 106 = Freziera cuiescens.
celebi?! Reinw. ex Korth. Verb. Nat. Gesch. Bot. 118 "obovata.

ETJRTA:—
ceylanica, *Wight, lllustr.* i. 98.—Zeylan.
chinensis, *R. Br. in Abel, Journ.* 879.—China.
chinensis, Hook. f. & Thorns, ex Dyer, in Fl. Brit. Ind. i. 286 = acuminata.
chrysophylla, Blame, Mns. Bot. Lugd. Bat. ii. 105- Freziera sericea.
clandestine, *Blume, I. c.* 121.—Java.
coneocarpa, Korth. Veìn. Nat. Gesch. Bot. 115 = japonica.
confinis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 119.—Java.
crispa, Siebold, ex Blume, 1. c 106 = japonica.
dioica, Blume, 1. c. 105 = Elaeodendron dioicnm.
elliptiea, Gardn. in Calc Joum. Nat. Hist vii. (1847) 448- japonica.
euprista, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 118 = acuminata.
fasciculata, Bnch-Ham. in Wall. Cat. n. 1463 = acuminata.
fasciculata, Wall. Cat. n. 3662 = japonica.
glabra, Blume, Mns. Bot. Lugd. Hat. ii. 199 = obovnta.
grandis, *Choisy, in Zall. Syst. Vert. Ind. Archip.* 147.—Java.
Hasseltii, *Blume, Mm. Bot. Lugd. Bat.* ii. 112.—Java.
hirsutula, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 477.—Sumatra.
hortensis, Sieb. *Sc* Zucc in Abh. Akad. Muench. iv. n. (1848) 168-japonica.
Humboldtiana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 105 = Freziera reticnlata.
integri/olia, Blume, I. c. = Cleyera integrifolia.
Jacquemartii, *Carr. in Rev. HOT tic.* (186S) 369.—Japon.
japonica, *Thunb. Nov. Gen.* 67.—Japon.
lasiopetala, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist vii. (1847) 446-Adinandra lasiopetala.
latifolia, Hort. ex G. Koch, Dcndrol. i. 490- japonica.
littoralis, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. 11.(1843) 163 = chinensis.
lucida. Wall. Cat. n. 1462^acuminata.
Macartneyi, *Champ, in Proc. Linn. Soc.* ii. (1850) 99.—Hongkong.
membranacea, Gardn. in Calc. Journ. Nat Hist. vii. (1847) 444 = acuminata.
microphylla, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. 11.(1843) 168=japonica.
numtana, Sieb. *Sc* Zucc. L c. -japonic*.
multifiora, DC. Mém. Tcrnstx. 26; Prod. i. 523- acuminata.
multiflora, Siebold, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 106= japonica.
jnyrtifolia, *Blume, I. e.* 118.—Java.
nervosa, Blume, 1. c. 105 — Freziera nervosa.
nitida, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 115. t. 7 = japonica.
obovata, *Korth. I. e.* 118.—Java.
parvifolia, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 445=chinensis.
phyllanthoides, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 110 = japonica.
Pickeringii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Efped.* 211.—Ins. Navigat
pumita, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 14=japonica.
pusilla, Siebold, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. il. 107 ••japonica.
reticulata, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* 118.— . Sumatra.
Richii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* 212.—Ins. Samoa,
rigida, *Choisy, in Mém. Soc. Phys. Geniv.* xiv. (1865) 126.—Java,
rostrata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 119.—Sumatra.
Roxburghii, Wall. Cat. n. 1465= japonica.
salicifolia, Blnme, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 118- acuminata.
salicifolia, *Choisy, in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 143, 146.—Java,
sandwichensis, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* 209.—Ins. Sandvic.
sericea, Blume, Mns. Bot Lugd. Bat. ii. 106-Freziera sericea.
serrata, Walp. Rep. i. 869 ^acuminata.
symplocina, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 114.—Keg. Himal.; Java.

EUBYA:—
systyla, Miq. ex Dyer, in Hook. f. Fl. Biit. Ind. i. 84 =japonica.
tematana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 105.—Ins. Temat.
theoides, Blnme, Mus. Bot Lugd. Bat ii. 105 - Cleyera theoides.
timorensis,£i>i. *ex Span, in Linnaea*, xv. (1841) 177, nomen.—Ins. Timor,
trichocarpa, *Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot.* 114.—Ins. Amboin.
trichogyna, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 114 = praec.
tristyla, Wight *Sc* Am. Prod. 86-japonica.
undulata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 105 = Freziera undulata.
unijlora, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. II. (1843) 163-japonica.
virens, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 112.—Sumatra.
vitiensis, A. Gray, riot. U. St. Expl. Exped. 20!) = japonica.
Wallichiana, Planch, ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 28$-symplocina.
Wallichiana, Steud. Nom. ed. II. i. 617-acuminata.
Wightiana, Wall. Cat. n. 3662= japonica.
aeylanica, Walp. Rep. i. 869 = ceylanica.
Zollingeri, *Choisy, in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 148,147.-Java.

ETIBYAIiE, Salisb. in Kon. *Sc* Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 78. *NYMPHAEACEAE*, Benth. *8c* Hook. f. i. 47.
ANNESLEA, Roxb. ex Andn Bot. Rep. t. 618 (1804); Roxb. Fl. Ind ii. 573 (1832).
amoMonica, Poepp. in Froriep, Notizen, xxxv. (1832) 181=Victoria regia.
brasiliana, Steud. Nom. ed. II. i. 617 - Victoria regia?
Crutiana, Orb. ex'Walp. Ann. i. 22-Victoria regia.
ferox, *Salisb. in Kon.* b* *Sims, Ann. Bot.* ii. 74.—Ind. or.; China.
indica, Planch, in Ann. Sc Nat. Sér. III. xix. (18S3) 29=ferox.

EURYALES, Steud. Nom. ed. II. i. 440, in syn. (1840) sphalm.=Eurycles, Salisb. (Amaryll.).

EURYANDRA, Font. Char. Gen. 81 (1776) = Tetraoera. Linn. (Dillen.).
scandens, Forst. 1. c. = T. Eoryandra.

EURYANDRA, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii 533 (1871)-=Eurelandra, Hook. f. (Cucurb.).

EURYANGIUM, Kanffm. in Nouv. Mém. Soc. Nut. Mosc. xiii. (1871) 258-Ferula, Town. (Umbdlif.).
Sumbul, Kanffm. *1.* c. = F. Sumbul.

EURYANTHE, Cham. *Sc* Schlecht in Lianaea, v. (1830) 224-Amoreuxla, Moç. *Sc* Sesse (Bixin.).
Schiedeana, Cham. *8c* Schlecht. 1. c 225 - A, palmatifida.

EURYBIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvi. 46 (1820)-Olearia, Moench (Compos.).
aculeata, DC. Prod. v. 270-=O. ranwlosa.
adenophora, F. Muell. Kragm. i. 111=0. adenophora.
affinis, Steetz, in Lehm. PL Preiss. L 421-0. heltophila.
albida, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 118 = 0. albida.
alpicola, F. Muell. in Proc. Roy. Soc Tasm. iii. (185!)) 229-O. alpicola.
alpina, Hook. f. in Hook. Loud. Joum. Bot. vi. (1847) 106-O. personioides.
alpina, Lindl. *8c* Paxt Flow. Card. ii. (1851-52) 84-O. nitida.
argophylta, Cass. in Diet. Sc Nat xxxvii. 487-O. argophylla.
artemisioides, Sond. *Sc* F. Mnell. in Linnaea. xxv. (1852) 466=O.tubnliflora..
aspera, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 420 = 0. strigosa
asterotricha, F. Muell. Fragm. i. lll=O. asterotricha!
avicenniaefolia, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 120-O. avicenniaefolta.
axillaris, DC. Prod. v. 266 = O. axillaris.
Beckleri, F. Mnell. Veg. Chath. Id. 21-0. cytloniaefolia.

EURYBIA:—
brachyglossa, DC. Prod. v. 265 = Olearia axillaris.
brachyphylla, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 455=O. lepidophylla?
candidissima, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 418 = 0. axillaris.
capitellata, DC. Prod. v. 266 = O. axillaris.
cardiophylla, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 398 = O. pannosa.
chrysopkylla, DC. Prod. v. 266 = 0. chrysophylla.
ckrysotrycha, Tenore, ex Lindl. Bot. Keg. (1841) Misc. 19.—Austral.
ciliata, Benth. in Enum. PI. Hueg. 58-O. dliata.
Colensoi, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 22 - O. Colensoi.
collina, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 465 — 0. ramulosa.
commixta, Nees, Gen. et Sp. Aster. 142=Aster Herveyi.
conocephala, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. i. (1865) 36 = 0. conocephala.
corymbosa, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxvii. 487 = Aster corymbosa.
cuneifolia, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 816 = 0. pimelioides.
Cunninghamii, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 117. t. 80 = O. Cunninghamii.
cydoniaefolia, DC. Prod. v. 267 — O. cydoniaefolia.
Dampieri, DC. 1. c. 266 = O. axillaris.
decurrens, DC. 1. c. 269 — O. decurrens.
dentata, Hook. f. Fl. N. Zel. 118 = O. ilicifolia.
elaeophila, DC. Prod. v. 269 = 0. heleophila.
epileia, DC. L c. 270 = 0. ramulosa.
ericoides, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 363 = O. Hookeri.
ericoides, F. MuelL ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 464 = 0. floribnnda.
ericoides, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 423-0. ramulosa.
erubescent, DC. Prod. v. 267 = 0. myrainoides.
Ferresii, F. Muell. Fragm. iii. 18. t. 18 = O. Ferresii.
floribunda, Hook. f. in Hook. Lond. Joutn. Bot. vi. (1847) 109=0. floribunda.
Forsteri, Hook. f. Fl. N. Zel. 119=0. Forsteri.
fulgida, Steud. Nom. ed. II. i. 616, sphalm. = seq.
fultiida, Cass. in Diet. Sc. Nat xvi. 48=O. stellulata.
furfuracea, DC. Prod. v. 267=O. furfuracea.
glandulosa, DC. 1. c. 269=0. glandulosa.
glomerata, Bemh. ex Nees, Gen. et Sp. Aster. 189 = Aster macrophyllus.
glutescens, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 462=0. decurrens.
glutescens, Sond. 1. c. — O. glutinosa..
glutinosa, Lindl. Bot. Keg. (1839) Misc. 68 = O. glutinosa.
gracilis, Benth. in Enum. PI. Hueg. 68.—Austral.
Gunniana, DC. Prod. v. 268 = O. stellulata.
Hookeri, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 463 = O. Hookeri.
hygropkila, DC. Prod. v. 269 - O. hygrophila.
illita, F. Muell. Fragm. i. 16-O. elliptica.
imbricata, Turcz. in Bull. Sue. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 61 = O. imbricata.
iodochroa, F. Muell. Fragm. ii. 110=0. iodochroa.
Jussieui, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxvii. 487—Aster Herveyi.
lamprophylla, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 459 = O. myrsinoides.
ledifolia, DC. Prod. v. 269 = O. ledifolia.
Lehmanniana, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 422 = O. heleophila.
lepidophylln, DC. Prod. v. 270 - O. lepidophylla.
leptophylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 171.- Austral.
linearifolia, DC. Prod. v. 266 = 0. axillaris.
linifolia. Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 109 = 0. glutinosa.
lirata, DC. Prod. v. 267 = 0. stellulata.
Lyallii, Hook. f. Fl. Antarct. Suppl. 543-0. Lyallii
macrophylla, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxvii. 487=Aster macrophyllus.
megalophylla, F. Muell. in Proa Roy. Soc. Tasm. iii. (1859) 228 = 0. megalophylla.
microphylla, DC. Prod. v. 270=0. ramulosa.
Muelleri, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 459 = 0. Muelleri.
muricata, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 423 = O. muricata.
myrsinoides, Nees, Gen. et Sp. Aster. 146—0. myrsinoides.

EURYBIA :—
nitida, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 117-Olearia nitida.
nummularifolia, Hook. f. 1. c. 118 = 0. nummulatifolia.
obcordata, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 108=0. oboordata.
oligantha, DC. Prod. v. 266 = O. axillaris.
operina, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 22 = 0. operina.
oppositifolia, F. Muell. Fragm. ii. 88 = O. chrysophylln.
paniculata, Steetz, in Lehm. FL Preiss. i. 422 = O. heleophila.
pannosa, F. Muell. PI. Viet t. 82 = O. pannosa.
paucidentata, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 420 = O. paucidentata.
persoonioides, DC. Prod. v. 267=O. persoonioides.
picridifolia, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 397-O. picridifolia.
pimeleoides, DC. Prod. v. 268 = O. pimeleoides.
pinifolia, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847)108 = 0. pinifolia.
propinqua, DC. Prod. v. 270—O. ramulosa.
quercifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvi. 47=0. stellulata.
ramosissima, DC. Prod. v. 270 = 0. ramosissima.
ramulosa, DC. 1. c. = 0. ramulosa.
rosmarinifolia, DC. 1. c. 268 = O. rosmarinifolia.
rudis, Benth. in Enum. PI. Hueg. 58 = O. rudis.
rugosa, F. Muell. in Jonrn. Linn. Soc. v. (1861) 22 = O. stellulata.
scabra, Benth. in Enum. PI. Hueg. 58 = 0. rudis.
Schreberi, Nees, Gen. et Sp. Aster. 13 8=Aster macrophyllus.
semidentaia, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 21=0. semidentata.
seriocarpa, F. Mnell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 459 — O. pimeleoides.
Solandri, Hook. f. Fl. N. Zel. 119 = 0. Solandri.
strigosa, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 419 = O. strigosa.
Stuartii, F. MuelL Fragm. i. 202-O. Stuartii.
subrepanda, DC. Prod. v. 268-0. stellulata.
subspicata, Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austral. 293 = O. subspicata.
tenuifolia, DC. Prod. v. 269 = 0. tenuifolia.
teretifolia, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 464-O. teretifolia.
Traversii, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 19.—Ins. Chath.
tubuliflora, Sond. & F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 455-O. tubuliflora.
virgata, Hook. f. Fl. N. Zel. 110 = O. virgata.
viscidula, F. Muell. Fragm. i. 50-O. viscidula.
viscosa, Cass. in Diet. Sc Nat. xxxvii. 487 — O. viscosa.
xerophila, F. Muell. Fragm. i. 61=O. xerophila.

EURYBIA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 464 (1821) = Aster, Tourn. (Compos.).
maritima, S. F. Gray, 1. c. = A. Tripolinm.

EURYBIOPSIS, DC. Prod. v. 260 (1886)=Vittadtnia, A. Rich. (Compos.).
australis, Hook. f. Fl. N. Zel. 125--V. australis.
gracilis, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bat. vi. (1-847) 110 = V. australis.
Hookeri, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 453 = V. anstralis.
intricata, F. Muell. 1. c. 396 = Minuria Cunninghami.
macrorrhita, DC. Prod. v. 260 - V. macrorhiza.
scabrida. Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 110=V. australis.

EURYCHAENIA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 258 (1860); et in Goett. Abh. ix. (1861) 46=Miconla, Ruiz & Pav. (Melastom.).
ferruginea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 259, 738=M. ferraginea.
fulva, Griseb. 1. c. 259 *M. dolichorrhyncha.
punctata, Griseb. 1. c; et in Goett Abh. ix. (1861) 46 - M. fulva.

EURYCHAN-ES, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 52. t. 3 (1847)=Ruellia, Plum. (Acanthac).
verbasciformis, Nees, 1. c. 53.—Bras.

EURYCHITON, Nimmo, in J. Grah. Cat. PL Bomb. Addend. (1889) = Statiee, Linn. (Plumbag.).
adensis, Nimmo, 1. c.=S. axillaris ?

ETJRYCLES, Salisb. in Trans. Hort Soc i. (1812) 837. *AMARYLLIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 735.
PROIPHTS, Herb. App. 42 (1821).
STEMONIX, Rafin. Atl. Joum. 165 (1833).
alata. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 406=sylvestris.
amboinensis, [Lindl. in] Loud. Encyc.Pl. 242=sylvestris.
australasica, [Lindl. in] Loud. 1. c.=sylvestris.
australis, Schult f. Syst vii. 911-sylvestris.
coronata, Sweet, Hort. Brit ed. I. 406=sylvestris.
Cunninghamii, *Ait. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* i. 588. —Austral.
javanica, M. Roem. Syn. Ensat. 157 = sylvestris.
nervosa, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 117 = nuda.
nuda, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 406.—Ind. or.
rotundifolia, M. Roem. Syn. Ensat. 156—sylvestris.
sylvestris, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 337. —Malaya; Austral.

ETTBYCOMA, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) VII. 44. *SIMARUBEAE,* Benth. & Hook. f. i. 812.
apiculata, *A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 522.—Penang.
longifolia, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 45.—Burma; Malaya.
merguensis, Planch, in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 584=longifolia.
tavoyana, Wall. Cat. n. 8523 = longifolia.

ETTRYGANIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 26. *VACCINIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 668.
angustifolia, *Klotzsch, I. c.*—Peruv.
ardisiaefolia, *Klottsch, I. c.*—N. Granat
biflora, *Benth.* &" *Hook.f. Gen.* ii. 568.—Peruv.
melliflora, *Benth.* b* *Hook.f. Gen.* ii. 668.—Peruv.
multiflora, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 27" seq.
ovata, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6803.—Peruv.
parvifolia, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 568.—N. Granat.
phillyreaefolia, *Benth. (f Hook.f. I. c*—Peruv.
polyantha, *Benth. If Hook.f. I. c*—Peruv.

EURYLEPIS, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 154-Erica, Tourn.
aliens, D. Don, 1. a = Erica albens.
azaleaeflora, Steud. Nom. ed. II. i. 618=seq.
aealeaefolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 808-Erica azaleaefolia.
bracteata, G. Don, 1. c. = Erica bracteata.
crossata, G. Don, I.e. — Erica acuta.
diosmaefolia.G. Don, I. c. 809 = Erica diosmaefolia.
fragrans, G. Don, 1. c. 808 = Erica fragrans,
glabra, G. Don, 1. c. = Erica, ventricosa.
halicacaba, D. Don. in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 154=Erica halicacaba.
Massoni, D. Don, 1. c. = Erica Massoni.
Monsoniae, G. Don, Gen. Syst. iii. 809 = Erica Monsoniana.
mucronata, G. Don, 1. c. 808 = Erica mucronata.
obcordata, G. Don, 1. c. = Erica bracteata.
pachyphylla, G. Don, 1. c 809 = Erica brevifolia.
pallida,Steud. Nom. ed. II. i. 618 = seq.
palliiflora, G. Don, 1. c.=Erica palliiflora.
petiolata, G. Don, Gen. Syst. iii. 808 = Erica petiolata.
pyrolaeflora, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 154 = Erica triflora.
rigidifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 809 = Erica lucida.
sexfaria, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1884) 154 = Erica sexfaria.
tetragona, G. Don, Gen. Syst. iii. 808= Erica tetragona.
Thunbergii, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 154-Erica Thunbergii.
triflora, D. Don, 1. c-Erica triflora.

EURYLOBIUM, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 228. *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1188.
serrulatum, *Hochst. I. c.*—Afr. austr.

EURYLOMA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Tourn. xvii. (1834) 155=Erica, Tourn.
Aitoni, D. Don, 1. c. = Erica Aitonia.
ampullacea, G. Don, Gen. Syst. iii. 816 - Erica ampullacea.
ampullaceoides, G. Don, 1. c. 817-Erica Forbesiana.
aristata, G. Don, I. c. = Erica aristata.
aristella, G. Don, 1. c-.Erica aristella.
capax, G. Don, 1. c = Erica obbata.
crinita, G. Don, 1. c. - Erica crinita.

EURYLOMA :—
curvifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 816 = Erica curvifolia.
Hartnelli, G. Don, 1. c. = Erica crinita.
imperialis, G. Don, 1. c. -* Erica fascicularis.
Irbyana, G. Don, 1. c. 817 = Erica Irbyana.
jasminiflora, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 155-Erica jasminiflora.
mirabilis, G. Don, Gen. Syst. iii. 816=Erica praestans.
notabilis, G. Don, 1. c. = Eremia tubercularis.
obbata, G. Don, 1. c. 817 - Erica obbata.
oblonga, G. Don, 1. c.» Erica Massoni.
Princeps, G. Don, 1. c. = Erica Massoni.
recurvata, G. Don, 1. c.=Erica recurvata.
retorta, G. Don, 1. c. = Erica retorta.
Shannoneana, G. Don, 1. c. 816 = Erica Shannonea.
squarrosa, G. Don, 1. c. 817 = Erica squarrosa.
tricolor, G. Don, 1. c. 816 = Erica aristata.

EURYLOMA, Rafin. FL Tellur. iv. 75 (1836) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
grandiflora, Rafin. L c.-I. Bona-nox.
latiflora, Rafin. 1. c. = I. Bona-nox.
leucantha, Rafin. 1. c. = I. leucantha.

EURYNEMA, Endl. Gen. Suppt. ii. 93 (1842) = Hermannia, Linn. (Sterculiac).

EURYNOMA, Steud. Nom. ed. II. i. 618 (1840)=seq.

EURYNOME, DC. Prod. iv. 475 (1830) = Coprosma, Forst. (Rubiac.).
canthioides, DC. 1. c.-C. Billardieri.

EURYOMYRTUS, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 239-Baeckea, Linn. (Myrtac).
"Ipina, Schau. 1. c.=B. diffusa.
diffusa, Schau. 1. c. = B. diffusa.
Pamiflora, F. Muell.ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arcn. iv. (1859) 149 = B. diffusa.
Stuartiana, F. Muell. ex Miq. 1. c. - B. diflnsa.
thmifolia, Schau. in Linnaea, xvn. (1843) 289 =• B. diffusa.

ET7RTOPS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1838) 140.
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 452.
ENANTIOTRICHUM, E. Mey. ex DC. Prod. n. 443 (1887).
HERTIA, Neck. Elem. i. 8 (1790).
abrotanifolius, *DC. Prod.* vi. 443.—Afr. austr.
algoensis, *DC. 1. c.* 445.—Afr. anstr.
arabicus, *Steud. ex Jaub. V Spach, lllustr.* iv. 88. t. 355.—Arab.
asparagoides, *Less. Syn. Comp.* 894.—Afr. austr.
Athanasiae, D.C.Prod. vi. 444-abrotanifolius.
Athanasiae, *Less. Syn. Comp.* 394.—Afr. austr.
calvescens, *DC. Prod.* vi. 445.—Afr. austr.
Candollei, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* m. 412.—Afr. austr.
carnosus, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvi. 52-tenuissirous.
comosus, Cass. 1. c. S3 - abrotanifolius.
densifolius, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. m. 416 = sulcatus.
diversifolius, *Ham. in Ham. V Sond. 1. c.* 415.—Afr. austr.
Dregeanus, *Sch. Bip. in Flora,* xxviii. (1845) 51.—Afr. austr.
empetrifolins, *DC. Prod.* vi. 446.—Afr. austr.
flabelliformis, Cass. in Diet. Sc. Nat. vi. 31-virgineus.
imbricatus, DC. Prod. vi. 446=Candollei.
imbricatus, Less. Syn. Comp. 894 =lateriflorus.
intermedius, DC. Prod. vi. 444 - abrotanifolius.
lateriflorus, *Less. Syn. Comp.* 394.—Afr. austr.
linearis, *Ham. Thes. Cap.* ii. 34.—Afr. austr.
linifolius, *DC. Prod.* vi. 446.—Afr. austr.
longipes, *DC. I. c.* 445.—Afr. austr.
multifidug, *DC. 1. c.* 444.—Afr. austr.
oligoglossus, *DC. 1. c.* 446.—Afr. austr.
Pectinatus, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xvl. 51.—Air. austr.
Pinifolia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 445. t. 60.-Afr. trop.
punctatus, *DC. Prod.* vi. 445.—Afr. austr.
ncemosus, DC. 1. c. 446 = oligoglossus.
Sena, *DC. 1. c.* 444.—Afr. austr.
socotranus, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edxnb.* xi. (1882) 841.—Ins. Socotra.

ETJRYOP8:—
spathaceus, *DC. Prod.* vi. 446.—Afr. austr.
speciosissimus, DC. 1. c. 444=Athanasiae.
strictus, DC. 1. c. 447 — tenuissimus.
subcarnosus, *DC. 1. c.* 445.—Afr. austr.
iulcatus, *Less. Syn. Comp.* 394; *Han. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 416.—Afr. austr.
subsesbilis, *Sch. Bip. in Flora,* xxviii. (1845) 52.—Afr. austr.
tenuissimus, *Less. Syn. Comp.* 394.—Afr. austr.
trifidus, *Less. 1. c.*—Afr. austr.
trifurcatus, *Cass. in Diet. Sc.'Nat.* xvi. 62.—Afr. austr.
trilobus, *Hani, in Ham. & Sond. Fl. Cap.* iii. 411.—Afr. auslr.
triqueter, Less, ex Harv. & Sond. 1. c. 414 = oligo-'ossur
virlineus^nis. *Syn. Comp.* 394; *DC. Prod.* vi. 445.—Afr. austr.

EURYOSMA, Walp. Rep. i. 785 (1842) - Eriosema, DC. (Legumin.).

EURYPTERA, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 629 (•18401=Peucedanum, Linn. (UmbeÜit.).
S, Nutt ex Torr. & Gray, 1. c.-P. Euryptera.

EURYSPERMUM, Salisb. Parad. Lond. t 75 (1807) = Leuoadendron, R. Br. (1810) (Proteac).
aemulum. Knight, Prot. 21 = L. aemulum.
aethereum, Knight, 1, c. 19.-Afr. austr.
argenteum, Knight, 1. c. 22 = L. argenteum.
concolor, Knight, 1. c. 24 - L. concolor.
ZldifliZ. Knight, 1. c. SO-L. stnetum.
c. 24 — L. decorum.
c. 28.—Afr. austr.
fros ism, Knight, l. c. 19 = L. adscendens.
gra orum, Salisb. Parad. Lond. t. 105 = L. grandiflorum.
humifrsum, Knight, Prot. 19 = L. adscendens.
rZoZThal'um, Knight. U 18 .Afr · austr.
nidiflorum, Knight, 1. c. 20.-Afr. austr.
5 = L. strictum.
salignum, Knight, Prot. 22 — L. saligiinm.
sJZum. Knight, 1. c. aii L sericeu-n.
spissifolium, Knight, 1. c. 23.-Hab.?
Sliginosum; Knight, 1. c. 21 =L. < ^ w >·
volutaefolium, Knight, 1. c. 2S.-A&. austr.

EURYSTEGIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834)154=Erica, Tourn.
androLdiflora, D. Don, 1. c. = Erica andromedaeflora.
Coiydalis, G. Don, Gen. Syst. iii. 810 = Erica Corydalis.
elegans, G. Don, 1. c. 809 = tnca glaca.
. xvi, (1834) 154 = Erica glauca.
lachneaeflora, G. Don. O- Syst. iii. SO^Erica Lachnaea.
lanuginosa, G. Don, l. c. = Erica lanuginosa.
marginata, Benth. in DC. Prod. vii. 687, sphalm. = Erica nigrita.
pannosa, G. Don, l. c. 810 = Erica barbata.
pomifera, D. Don, in IMIIUO. «. *u», Journ. xvii. (1834) 154 —Erica andromedaeflora.
tegulaefolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 809= Erica squamosa.
triceps, G. Don, I. c. - Erica triceps.
triumphans, G. Don, 1. c.^ Erica andromedaeflora.

EURY8TYLE8, Wawra, in Oestr. Bot Zeitscht xiii. (1863) 223. *SCITAMINEAE.*
Cotyledon, *Wawra, I.* c—Bras.

EURYSTYLUS, Bouché, in Linnaea, xviii. (1844) 485 = Canna, Linn. (Scitam.).
flaccidus,Boachi, 1. c.-C. flaccida.
Reewesii, Bouche, 1. c.=C. Reevesii.

ETJRYTAENIA., Torr. *Sc* Gray, FL N. Am. i. 633 (1838-40). *UMBELUFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 907.
matrophylla, Buckl. in Proc Acad. Sc Philad. 1861 (1862) 456^texana.
texana, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* i. 633.—Am. bor. occ

EURYTALIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 119 = EYRYTHALJA, Renealm.~Oentiana, Toum.

EURYTENIA, Buckl. in Proc. Acad. Soc. Philad. 1861 (1862) 455 = Eurytaenia, Torr. *Sc* Gray (Umbellif.).

EURYTHALIA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 515 •= EYRYTHALIA, Rcnealm. = Crentiana, Tourn.

EUSARCOPS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 11 (1886)-Hippeastrum, Herb. (Amaryllid.).
reticulata, Rafin. 1. c = II. reticulatum.

EUSCAPHIS, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 124. t. 67 (1835). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 412.
HEDOKIA, Rafin. Alsog. Am. 47 (1838).
simplicifolia, *Sieb. tf Zucc. I. c.* 189, in obs.—Japon.
staphyleoides, *Sieb. (f Zucc. 1. c.* 124.—Japon.

ETTSlDEROXYTiON, Teijsm. *Sc* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 2U2. *LA UR1NEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 155.
BIHANIA, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 96 (1864).
SALGAUA, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 221 (1845)
Zwageii, *Teijsm. V Binn. 1. c.*—Borneo.

EUSIPHO, Salisb. Gen. PI. Fragm. 139 (1866) = Cyrtanthus, Ait. (Amaryllid.).
angustifolia, Salisb. 1. c. = C. angustifolius.
odora, Salisb. 1. c. = C. odorus.

EUSMIA, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aequin. ii. t. 134 (180'J) =Euosmia, H. B. *Sc* K. (Rubiac).

EUSOLENANTHE, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 975 (1883), sphalm. = ENSOLENANTHE, Schott = Alocasia, Neck. (Aroid.).

EUSTACHIA, Rafin. Cat. 14 (1824) = seq.

EUSTACHYA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (181U) 190=Veronica, Tourn. (Scrophul.).
alba, Rafin. Cat. 14 = V. virginica.
coerulea, Rafin. ex DC. Prod. x. 464-V. virginica.
japonica, Rafin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 618 = V. virginica.
oppositifolia, Rafin. New Fl. Am. ii. 21.—Am. bor.
purpurea, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 190 = V. virginica.

EUSTACHYS, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 188-Ghloris, Sw. (Gramin.).
distichophylla, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 418 = C. distiuhophylla.
floridana, Chapm. Fl. S. U. St. 557 - C. floridana.
glauca, Chapm. 1. c = C. glauca.
petraeus, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 189 = C. petraea.
polystachya, Kunth, Rev. Gram. i. 88=C. inermis.
submutica, Koem. & Schult. Syst. ii. 614 = C. BUbmutica.

EUSTACHYS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 33 (1866) = Ornithogalum, Tourn. (Liliac.1.
latifolia, Salisb. 1. c. = O. latifolium.
pyramidale, Salisb. 1. c.-O. pyramidale.

EUSTATHES,Spreng. Syst. ii. 219 (1825)=Eystathee, Lour. (Sapindac).

EUSTAXIA, Rafin. Fl. Tellur. 56 (1836) = Veronica, Toum. (Scrophul.).
alba, Rafin. 1. c. ^ V. virginica.
japonica, Rafin. 1. c. =V7 virginica?
oppositifolia, Rafin. 1. c. = V. spicata.
purpurea, Rafin. 1. c.-V. virginica.
sibirica, Rafin. 1. c. = V. virginica.
villosa, Rafin. 1. c = V. longifolia.

EU8TEGIA, R. Br. in Mem. Wera. Soc. i. (1809) 51. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 765.
filiformis, *Roem. & Schult. Syst.* vi. 120.—Afr. austr.
hastate, *R. Br. in Mem. Wen. Soc.* i. (1809) 51.—Afr. austr.
hastata, Sieber, ex Decne. in DC. Prod. viii. 511-= Microloma sagittatum.
humilis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 221.—Afr. austr.
Lonchitis, *E. Mey. I. c*—Afr. austr.

EUSTEGIA, Rafin. Sylva Tellur. 95 (1888) ? (Melastom.).
Mutisi, Ra6n. 1. c.=-Centronia Matisii.
pulverulenta, Rafin. 1. c.-Pogonanthera pulverulenta.
tomentosa, Rafin. 1. c.=Miconia tomentosa.

EUSTEPHIA, Cav. Ic. iii. 20. t. 238 (1794). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 782.
brevituba, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1175=. Hippeastrum bicolor.
cocdnea, *Cav. Ic.* iii. 20.—Am. austr.
eorusca, D. Dietrl Syn. PI. ii. 1175 = Hippeastrum bicolor.
cyrtantkoides, D. Dietr. 1. c = Hippeastrum bicolor.
Herbertiana, D. Dietr. 1. c.»Hippeastrum Herbertianum.
ignea, D. Dietr. 1. c. =• Hippeastrum bicolor.
Macleaniea, Herb, in Bot. Mag. sub t. 8865, nomen = Hippeastrum adveuum.

EUSTERALIS, Rafin. Fl. TeUur. ii. 95 (1836)-ByBO, phylla, Blume (Labiat.).
pumila, Rafin. 1. c.-D. verticillata.

EtTSXIOMA, Gardn. & Champ, in Hook. Kew Tourn. i. (1819) 312. *HAMAMEUDEAE*, Benth. & Hook, f. i. 668.
oblongifolium, *Gardn. V Champ. I. c.*—China.

EtTSTOMA, Salisb. Farad. Lond. t 34 (1806). *GENTIANEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 812.
ARENBERGIA, Mart. *Be* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 378.
ENSTOMA, A. JUSS. in Orb. Diet. vi. 78 (1849).
URANANTHUS, Benth. PI. Hartw. 46 (1840).
chironioides, Griseb. in DC. Prod. ix. 51 = silenifolium.
exaltatum, Salisb. Parad. Lond. nib t. 31 = silenifolitun.
gracile, Engelm. in Fl. Calif, i. 621 = Rnssellianum.
lacteum, Liebm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1847), ex Sond. in E. Otto, AUg. Gartenz. iv. (1848) 369 = silenifolium.
maculatum, Benth. PI. Hartw. 292-SabbaUa maculata.
Russellianum, *G. Don, in Sweet, hort. Brit.* ed. III. 473.—Texas; Mexic.
silenifolium, *Salisb. Parad. Lond.* t. 34.—Am. bor.

EUSTREPHIA, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1175 (1840) = Eustephia, Cav. (Amaryll.).

ETJ8TEEPHUS, R. Be. Prod. 281 (1810). *LIUACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 768.
SPIRANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 31 (1836).
angustifolius, R. Br. 1. c-latifolius.
Brtmnii, F. Muell. Fragm. vii. 73 = latifolius.
celebicus, D. Dieti. Syn. PI. ii. 1117 = Dianella celebica.
javanicus, D. Dietr. 1. c —Dianella nemorosa.
latifolius, *R. Br. Prod.* 281.—Austral.
leueantkus, Hassk. PI. Jav. Rat. 115-latifolius.
timorensis, *Ridl. in Forbes, Nat. Wand. East. Archip.* 520.—Ins. Timor.
Watsmianus, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 84 = latifolius.

EUSTYLIS, Engelm. & Gray, in Bost. Jonm. Nat. Hist, v. (1847) 236 (PI. Lindh. 27, 28)-=Nemastylis, Nutt. (Irid.).
purpurea, Engelm. & Gray, 1. c. = N. purpureus.

EUSTYLIS, Hook. f. Fl. N. Zel. t. 19 (ANISOTOME in textu, p. 90)= Angelica, Riv. (Umbell.).
geniculata, Hook. f. L c-A. geniculata.

EUSTYLUS, Baker, in Joura. Linn. Soc. xvi. (1877) 102 = EUSTYUS, Engelm. *Sc* Gray = Hemastylis, Nutt. (tad.).

EUSYNAXIS, Griff. Notul. iv. 560. t. 603 (1854) = Pyrenarla, Blume (Temstroem.).
barringtonifolia. Griff. 1. c. 560, 561= P. barringtoniaefolia.

EUSYNETRA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 57 (1836)-Co-Vumnea, Plum. (Gesnerac).
bicolor, Rafin. 1. c-C. bieolor (in Addend.).

EUTACTA, Link, in Linnaea, xv. (1841) 543=Araucaria, Juss. (Conif.).
Cookii, Can. Conif. ed. II. 612-A. Cookii.
Cunninghamii, Link, in Linnaea, xv. (1841) 545-A. Cunninghamii.
excelsa, Link, 1. c. 544 = A. excelsa.
humilis, Carr. Conif. ed. II. 616=A. Cookii.
minor, Carr. 1. c. 614-A. Cookii.
Muelleri, Carr. in Rev. Hortic. (1866) 392-A. Muelleri.
Pancherii, Carr. Conif. ed. 11.315 = A. Cookii.
Rulei, Carr. in Rev. Hortic. (1866) 279-A. Rulei.
subulate, Carr. Conif. ed. II. 614-A. Cookii.

EUTASSA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 816 =Araucaria, Juss. (Conif.).
Cunninghamii, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 628—A. Cunninghami.
heterophylla, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 316^ A. exceUa.

EUTAX1A, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 16 (1811). *LEGUMJNOSAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 471.
SCLEROTHAMNUS, R. Br. in Ait Hort. Kew. ed. II. iii. 16 (1811).
Baxteri, Knowl. «c Weste. Flor. Cab. i. (1837) 89 (non Eutaxia).—Austral.
cuneata, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 65.—Austral,
densifolia, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc* xxvi. (1853) I. 271.—Austral.
diffusa, F. Muell. Fragm. i. 7=empetrifolia.
dillwynioides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 63.—Austral.
divarieata, Turcz. in BnlL Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 270-Dillwynia divaricata.
empetrifolia, *Schlecht. in Linnaea*, xx. (1847) 667.—Austral,
epacridioides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 63.—Austral.
ericoides, Meissn. L c. 64=virgata.
leptophylla, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1858) I. 268 «empetrifolia.
myrtifolia, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 16.—Austral.
.obovata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1863) I. 271 = parvifolia.
parvifolia, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 34.—Austral.
patula, V. Muell. in D. N. F. Dietr. Fl. Univ. N. S. t. 17=Dillwynia patula.
punctata, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 272»Gastrolobium reticulatum.
pungens, Sweet, Fl. Austral, t. 28-Dillwynia pungens.
reticulata, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 65 = Gastrolobium reticulatum.
sparsiflora, *F. Muell. in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 42=Dillwynia patula.
Strangeana, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvi. (1853) l.270 = Pultenaea prostrata?
uncinata, Turcz. 1. c. 269=Dillwynia patula.
virgata, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 34.—Austral.

EUTELIA, R. Br. ex DC. Prod. iii. 76, in syn. (1828)-Anunannia, Linn. (Lythrar.).
ammannioides, R. Br. ex DC. 1. c = A. pentandra.

EUTELINE, Rafin. Sylva Tellur. 24 (1838)-Genista, Linn. (Legnmin.).
decumbens, Rafin. 1. c.=Cytisus deenmbens.
germanica, Rafin. L c = G. germanica.
sagittalis, Rafin. 1. c =G. sagittaGs.

EUTEREIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 12 (1836)-Draoontiunt, Linn. (Aroid.).
nigricans, Rafin. 1. c.=D. polyphyllum.

EUTERPE, Gaertn. Fruct. i. 24 (1788). *PALMAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 896.
aculeata. Sprang. Syst. ii. 140-Martiuezia Aiphanes.
acuminata, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 244.—Hab. ?
andicola, *Brongn. ex Mart. Palmet. Orb.* 8. t. 2. f. 2.—Bolivia.
antioquensis, Linden, Illustr. Hortic. xxviii. (1881) 31—montana.
brevivaginata, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 309.—Ind. occ.
Caatinga, Spruce, in Joura. linn Soc. xi. (1869) 137 = E. Catinga.
caribaea, Spreng. Syst ii. 140 = Oreodoxa oleracea.
Catinga, *Wallace. Palm-Trees, Ama*. 'ii.* t. viii.—Bras,
decurrens, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 244, nomen.—Hab.?
disticha, *H. Wendl. ex Linden, Cat.* n. 23 (1868).—N. Granat.
edulis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 33. t. 32.—Am. trop.
elegans, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 81.—N. Granat.
ensiformis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 82. t. 31.—Perav.
filamentosa, Blume, ex Kunth, Enum. PI. iii. 185* Oncosperma filamentosa.
globosa, Gaertn. Fruct. i. 21 = edulis.
gracilis, *Linden, Cat.* n. 17 (1862).—Bras.
Haenkeana, *Brongn. ex Mart. Palmet. Orb.* 9. t 2. f. 8.—Bolivia.
Karsteniana, *Engel, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 670.—N. Granat.
longepetiolata, *Oerst. in Kjoeb. Videnst. Meddel.* (1858) 31.—Costa Rica,
longevaginata, *Mart. Palmet. Orb.* 11. t. 12. f. 1.—Bolivia,
longibrocteata, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 17—Bras.
macrospadiK, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858; 31.—Nicaragua.
Manaë'le, *Griseb. b" H. Wendl. ex Griseb. in Mem-Acad. Am.* N. S. viii. (1862) 530.—Ind. occ.
Manihot, Lodd. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 240 (Quid?).—Hab.?
Mentiesii, PriU. Ic Ind. 450, sphalm-futon *Menriesii*.
mollissima, Barb.-Rodrig. Enum. Palm. Nov. 16-E. Catinga.
mollissima, Spruce, in Joura. Linn. Soc xi. (1869) 139 —precatoria.
montana, *R. Grah. in Bot. Mag.* t. 3874 (? Prestoeae sp.).—Ins. Grenat.
oleracea, *Engel, in Linnaea*, xxxiii. (1861-65) 671—N. Granat
oleracea, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 29. tt. 29, SO.—Bras.
pisifera, *Gaertn. Fruct.* i. 24.—Hab. ?
Praga, *Mart. Gen. Palm.* (1821) 21; *Spreng. Syst.* »• 112.—Venezuela.
precaloria, *Mart. Palmet. Orb.* lO.t8. f. 2.—Bolivia,
purpurea, *Engel.in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 669.—N. Granat.
puruensis, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 32—Bras.
•tinifera. Mart. Hist. Nat. Palm. i. t. z. II. f. 18, 19 = Gaossia vinifera.
Zamora, Hort. Linden, ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 215, nomen (Quid?).—Hab.?

ETXTETBA8, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 89. *COMPOSITAE*.
Palmeri, *A. Gray, 1. c.* 40.—Mexic

EUTHALES, R. Br. Prod. 579 (1810)-Velleia, Sm. (Goodenov.).
filiformis, De Vrieie, in Lehm. PI. Preiss. i. 414-V. trinervis.
macrophylla, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 54=v-macrophylla.
pilosella, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 411-V. trinervis?
trinervis, R. Br. Prod. 579=V. trinervis.

EUTHALES, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nacbtr-iii. 307 (1817)-Tovomita, Aubl. (Guttif.).
fructipendula, Steud. Norn. ed. II. i. 619-T. fructipendula.
peruviana, F. G. Dietr. Vollst Lexik. Gaertn. Nacbtr. iii. 807-T. fructipendula.

kUTHALIA, Rnpr. Fl. Cane. 220 (1869) = **Areaaria,** Rnpp. (Caryophyll.).
rotundifolia, Rupr. 1. a - A . rotnndifolia.
serPyllifolia, Rnpr. 1. c - A . serpyllifolU.

EUTHALIS, Banks * Solander ex Hook. f. Fl. Antarct. 854 (1847) = Maytenus, Molina (Celastrin.).
lucida. Banks & Soland. ex Hook. f. 1. c.=M. magellanicus.

EUTHAMIA, Ell. Sketch, ii. 381, in syn. (1824) = Solidago, Vaill. (Compos.).
graminifolia, Ell. 1. c. = S. lanceolata.
occidental Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vli. (1841) 326 = S. occidentalis.
tenuifolia, Ell. Sketch, ii. 392, in syn. - S . tenuifolia.

EUTHEMIS, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) v. 15. *OCHNACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 319.
"egantissima. Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 805 = Gomphia snmatrana ?
'eucocarpa, *Jack, in Malay. Misc.* i. (1820) V. 16.—Malaya.
minor, *Jacq. 1. c.* 18—Malaya.
obtnsifolia, *Hoot./, in Tram. linn. Soc.* xxiii. (1862) 168.—Borneo.
pulcherrima, Wall. Cat. n. 2S18- Gomphia snmatrana.
Wbusta, *Hoot. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 163—Borneo.

EUTHEOPHRON, Griff. Notul. 8*. *• «8 (1854)- •Pottala, Hook. & Am. (Apocyn.).
Paniculate, Griff. 1. c. =P . cantonensis.

EUTHRIX, Don, in Trans. Linn. So". *«• (1830) 27 = Chaetanthera, Ruiz. & Pav. (Compos.).
"Mms, D. Don, in Phil. Mag. (1832) 391; Guill. Arch. Botii. (1838) 467 = C. linearis.
salicifolia, Don, in Trans. Linn. Soc xvL (1830) 259 »C.linifolia.

EUTHYRA, Saligb. Gen. pl. **Fragm. 61 (1866) = Paris,** •unn. (Liliac.).

EUTACHTS, A. DC. in DC. Prod. xii. 606 (1848). *VERBENACEAE* > Benth. & Hook. f. ex Britton, Bull. Torrey Club, xvi. (1889) 1138.
^breviata, ^. z«7. /. r.-Afr. austr.

EUTAMON» Rafin. All. JoDtn. 177 (1833)= Talinum? Adans. (Portulac.).
*nd P'for*ne,* Rafin. 1. c = T . teretifolium ?

EUTAXA, R. Br. in App. Frankl. Voy. 764. t 27 (1828) «iaeelia, Jnss. (Hydrophyll.).
acerosa, Kth. Nov. Gen. & Sp. (ed. 4to) 5 (1821) 276 «rt. & Gal. in Mull. Acad. Brux. xii. II. 245) 276—Mexic
albin ra, Hemsl. Nutt. in Jonrn. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 15 viscida.
Andrieuxii, DC. in DC. Prod. iii. 329 (1828) P'*- «• P'- pinellioides.
"Tr Uoides, Hook. & Art. Bot. Btech. Voy. 874 = ^onanthnsaretioides.
*tr «*yloba,* Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 7 brachyloba.
"'n/o/ia, Spreng. Syst. i. 56«.—Mexic.
conferta, Don, ex Loud. Hort. Brit. ed. 2, 518 (1839) 18—Am. bor.
Cumingii, **Benth. in Trans. Linn Soc. 3tvii. (1837) 276.—Chili.**
divaricata Benth. 1. c. 278 = P. divaricata.
Douglasii Benth. 1. c. >78-P- Dooglasii.
echioides M, Dongl. ex A. DC. in DC. Prod. ix. 294 - Mem!^^!.
Fraseri linii, R. Br. App. Frankl. Voy. t. 27; et in fJj^- L'nn. Soc. xvii. (1837) 277-P. Franklinii.
glauca, Pursh, Fl. Am. Sept. 37.-Chili.
(1845) 2p Am. bor.
***l<*ndulosa, Nutt. in Hook. Kew Joum. Hi. (1851) 293**
• P. B'Mdnlosa, W««.
*** I^«'«».Dougl. ex A. DC. in DC. Prod. ix. 294-P. tiesii.**
S. (1825) 276—Mexic.

EUTOCA >-
grandiflora, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 278 = P. grandiflora.
heterophylla, Torr. in Stansbory, Exped. Utah, 393 = P. Menziesii.
hirsuta, Engelm. *8c* Gray, in Boat Jonrn. Nat Hist. v. (1845) 226 = P. parviflora ?
loasaefolia, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 277 = P. loasaefolia.
lutea, Hook. & Am. Hot. Beech. Voy. Suppl. 374 = Emmenanthe lutea.
Menziesii, R. Br. in App. Frankl. Voy. 764= P. Menziesii.
mexicana, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 277 -=P. pimpinelloides.
mexicana, Hort. ex C. A. Mey. in Finch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 74 = P. divaricata.
multifiora, Dougl. ex Lehm. Pngill. ii. 19 = P. Menziesii.
Ortgiesiana, Heer, in Regel, Gartenfl. (1861) 309.—Mexic.
parviflora, R. Br. App. Frankl. Voy. ii. 61-= P. parviflora.
patuliflora, Engelm. & A. Gray, in Bost Jonrn. Nat. Hist. v. (18451253-P. patuliflora.
***feduncnlosa,* Phil, in Anal. Univ. Chil.** (1884) reimpr. 7.—Chili.
phacelioides, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 27»-P. circinatiformis.
pimpinelloides, Spreng. Syst. i. 669-P. pimpinelloides.
pinnatifida, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1870) II. 189. —Chili.
pulchella, Lehm. Pugill. ii. 18 = P. sericea.
pusilla, Phil, in Linnaea, xxxiiL (1864-65) 186.—Chili.
sericea, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Jonrn. (Apr.-June 1830) 172=P. sericea.
speciosa, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 158 • P. grandiflora.
strictiflora, Engelm. *8c* Gray, in Bost. Joum. Nat. Hist. v. (1845) 253-P. strictiflora.
viscida, Benth.in Bot. Reg. t. 1808-P. viscida.
viscosa, Hook. Bot. Mug. t. 8572=praec.
Wrangeliana, Fisch. *8c* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 87 = P. divaricata.

EUTRALIA, Rafin. Fl. Tellnr. Hi. 46 (1836) - **Bumex,** Tourn. (Polygon.).
luxurians, Rafin. 1. c.=R. luxnrians.

ET7TBEMLA, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 267. t. A (1824). *CRUC1FERAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 78.
alpestre, *Ledeb. Fl. Ross.* i. 198.-Sibir.
arenicola, Richards, ex Hook Fl. Bor. Am. i. 67 = Parrya arenicola.
Bonplandii,* Spreng. Syst ii. *660=Eudema nubigena.
cordifolium, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mote.* xv.(1842) 283.—Sibir. baical.
Edwardsii, *R. Br. in Parry, 1st Voy. App.* 9. t A.— Am. arct
hederaefolia, *Franch. tf Sav. Enum. PI. Jap.* ii 283. —Japon.
himalaicnm. *Hook./. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 164.—Reg. Himal.
Hnmboldtii, *Spreng. Syst.* ii. 880.—Ecuador,
integrifolium, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp.* (1839) 8. _Hab.t
intermedium, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xv. (1842) 283=Edwardsii.
Iabradoricum, *Turct. 1. c.* xxvii. (1854) II. 806.—Am. arct.
parviflorum, Turcz. 1. c. xv. (1842) 288 = Edwardsii.
piliferum, Turcz. 1. c 253-Parrya microcarpa.
primulaefolium, *Hook. /. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 164.—Reg. Himal.
Rossii, Spreng. Syst. ii. 880=Cochlearia oflficinalis.
septigerum, *Bunge, Vern. Suppl. Fl. Alt.* 73.— Sibir.
Wasabi, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviil. (1878) 288.—Japon.

EUTRIANA, Trin. Fund. Agrost. 161 (1820)-Bouteloua, Lag. (Gramin.).
abyssinica, R. Br. ex Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1887) 142.~Abyss.

EUTRIANA :—
affinis, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 174 = Bouteloua racemosa.
A-ntillarum, Steud. Syn. PI. Gram. 217.—Ind. occ.
aristidoides, Trin. Gram. Unifl. 242; Knnth, Rév. Gram. i. 95 = B. aristidoides.
barbata, Kunth, 1. c. 96=B. barbate.
bromoides, Trin. Fund. Agrost. 161; et in Gram. Unifl. 241 = B. bromoides.
chloridea, Kunth, Enum. PI. i. 280.—Mexic
cristata, Kunth, 1. c. 281.—Mexic.
cristata, Trin. Gram. Unifl. 241 = B. ovata.
curtipendula, Trin. Fund. Agrost. 161 - B. racemosa.
Enteropogon, Stend. Syn. PI. Gram. 216 = Enteropogon melicoiries.
gradlis. Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 175. —Ins. Galapag.
gradlis, Trin. Gram. Unifl. 240 = B. oligostachya.
Heterostega, Trin. 1. c. 242 - B . bromoides.
hirsuta, Kunth, Enum. PI. i. 280.—Peruv.
hirta, Trin. Gram. Unifl. 240 = B. hirsuta.
humilis, Trin. 1. c. 239 - B . prostrata.
juncea, Trin. 1. c. 238 = B. juncifolia.
junci/olia, Kunth, Rev. Gram. L 95 = B. juncifolia.
Karminskiana, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 620 (Quid?).—Mexic.
Lagascae, Kunth, Rév. Gram. i. 95=B. juncifolia.
Ledebourii, Trin. Gram. Unifl. 238.—Louisiana; Ins. S. Doming.
multiseta, Nees, Agrost. Bras. 413 - B . multiseta.
oligostachya, Kunth, Rév. Gram. i. 96 = B. oligostachya.
Pentarrhaphis, Trin. Grain. Unifl. 239.—Mexic.
pilosa. Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 173.— Ins. Galapag.
Polyodon, Trin. Gram. Unifl. 242 - a disticha.
repens, Trin. 1. c. 241; Kunth, Rév. Gram. i. 95 = B. bromoides.
tenuis, Trin. 1. c. 240 = B. tennis.
Triaena, Trin. 1. c. 239 = B. Triathera.
villosa, Steud. Nom. ed. II. i. 620.—Bras.

EUTROPIA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 196=Croton, Linn. (Euphorbiac..
brasiliensis, Klotzsch, 1. c—C. brasiliensis.
obovata, Klotzsch, 1. c «C. brasiliensis.

EUTROPIS, Falc. in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 15 - Fentatropla, R. Br. (P. oicrophylla) (Asclepiad.).

EUXENIA, Cham, in Nees, Hor. Phys. Berol. 75. t. 16 (18'J0) = Podanthu8, Lag. (Compos.).
grata, Cham. 1. c. -= P. ovatifolius.
Mitiqui, DC. Prod. v. 601-P. Mitiqui.
radiata, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. **(1824) 7 *(= Gymnopsis euxenioides).*—Bras.**

EUXOLUS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 42 (1836) - **Amu**rantus, Linn.
Blitum, Gren. Fl. Ch. Jurass. 652= A. Blitnm.
caudatus, Moq. in DC. I'rod. xiii. II. 274 •» A. viridis.
crassipes, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdova, iv. (1881) 13 = A. polygonoides.
crispus, Less, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 656.— Am. bor.
deflexus, Rafin. Fl. Tellur. iii. 42 = A. deflexus.
emarginatus, A. Br. & Bouchtf, Ind. Sem. Hort. Berol. (1851) 13-A. viridis.
enervis, Y. Muell. Fragm. i. 140=A. enervis.
interruptus, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 275 - A . interruptus.
lineatus, Moq. 1. c. 276-A. interruptus.
lividus, Moq. 1. c. 273=A. Blitum.
macrocarpus, F. Muell. Census. 29=A. macrocarpus.
Mitchellii, F. Muell. in Giles, Geogr. Trav. Centr. Anstr. 214 = A. Mitchelli.
muricatus, Moq. in DC. Prod. xiii. n. 276-A. muricatus.
oleraceus, Moq. 1. c. 278 = A. Blitum.
paraguayensis, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent, v. (Ib78) 276; Contrib. 81.—Paraguay.
polygamus, Moq. in DC. Prod. xiii. u. 272-A. poly gamus.
polygonoides, Thw. Enum. PI. Zeyl. 248-A. polygamus.
polystachyus, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 1086-A. polystachyus.

EUXOLUS:—
pumilus, Chapm. Fl. S.U.St 881 = Amarantus pnmiltu.
rhombeus, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 275 = A. interruptas.
scleranthoides, Anderas. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1665) 163.—Ins. Galapag.
undutatus, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 272 = A. interruptus.
viride, Moq. 1. c. 273=A. viridis.

EUZOMODEMDHON, Coss. Not. PI. Espagne, 144 (1852); et in Webb, Otia Hisp. 47. t. 43 (1853). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 85.
Bourgeannm, *Coss. II. cc.*—Hispan.

EUZOMUM, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 175 (err. typ. 174) (1822)^Eruoa, Toorn. (Crucif.).
acre, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 17 = Diplotaxis Sieberi.
erucoides, Spach, Hist. Veg. Phan. vi. 882 = Diplotaxis erucoides.
hesperidiflorum, Spach, ex Steud. Kom. ed. II. i. 620 = Diplotaxis Sieberi.
hispidum, Link, Handb. ii. 319 = Eruca sativa.
sativum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 175 (err. typ. 174)-=Eruca sativa.
vesicarium, Link, Handb. ii. S19 = Eruca vesicaria.

EVACIDIUM, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 287 (1875). *COMPOS1TAE.*
atlanticum, *Pomel, I. c.* 288.—Afr. bor.

EVACOPSIS, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 41 (1874) = Evax, (Inertn. (Compos.).
discolor, l'omel, 1. c. 43-- Evax discolor.
exigua, Pomel, 1. c. 41 = Evax exigua.
Heldreichii, Pomel, 1. c. 42 = Evax Heldreichii.
montana, Pomel, 1. c—Afr. bor.
polycephala, Pomel, 1. c. 43.—Afr. bor.

EVAIEZOA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 70 (18S6) = Saxifraga, Tourn.
aitoides, Rafin. 1. c. =S. aizoides.
ajugifolia, Rafin. 1. c.—S. ajugifolia.
androsacea, Rafin. 1. c. 71—S. androsacea.
bifiora, Rafin. 1. c. 70 »S. biflora.
•*bulbifera,* Rafin. 1. c. = S. bulbifera.
Burseriana, Rafin. 1. c. 71 =S. Burseriana.
callosa, Rafin. 1. c. —S. longifolia.
cesia, Rafin. 1. c. i' 0~S. caesia.
cespitosa, Rafin. 1. c. = S. caespitosa.
cuneata, Rafin. 1. c.=S. enneata.
diapensoides, Rafin. 1. c. 71 = S. diapensoides.
erosa, Rafin. 1. c. = S. erosa.
Esholtti, Rafin. 1. c.=S. serpyllifolia.
exarata, Rafin. 1. c. = S. exarata.
exilis, Rafin. 1. c. =S. exilis.
geranioides, Rafin. 1. c. 70=S. geranioides.
granulata, Rafin. 1. c.=S. grannlata.
hieracifolia, Rafin. 1. c. 71 =S. hieracifolia.
hirta, Rafin. 1. c. 70 = S. hypnoides.
ladanifera, Rafin. 1. c. = S. pedatifida.
Laurentiana, Rafin. 1. c. 71 =S. rivularis.
mutata, Rafin. 1. c. — S. mutata.
nutans, Rafin. 1. c = Romanzoffia unalaschcensis,
oppositifolia, Rafin. 1. c. 70 - S. oppositifolia.
palmata, Rafin. 1. c - S. geranioides.
pedatifida, Rafin. 1. c.=S. pedatifida.
pensylvanica, Rafin. 1. c. 71 —S. pensylvanica.
punctata, Rafin. 1. c. 70 = S. punctata.
pungens, Rafin. 1. c. 71 =S. Vandelli.
retusa, Ralin. L c. 70 = S. retnsa.
rivularis, Rafin. 1. c. = S. rivularis.
serpyllifolia, Rafin. 1. c. 71-S. serpyllifolia.
sileniflora, Rafin. 1. c. = S. sileniflora.
trichodes, Rafin. 1. C.-S. sedoides.
trifurcata, Rafin. 1. c. 70~S. trifnrcata.
venosa, Rafin. 1. c. 71=S. venosa.

EVALLARIA, Neck. Elem. iii. 189 (1790) = Polygonatum, Adans.' (Liliac.).
polygonata, Neck. 1. c.=P. officinale.
verticillata, Neck. 1. c = P. verticillatum.

EVALTHE, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 77 (1836) - Chironia. Linn. (Gentian.).
jasminoides, Rafin. 1. c. • C. jasminoides.

BVANDRA, R. Br. Prod. 289 (1810) *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1067.
aristata, *R. Br. I. c*—Austral,
pauciflora, *R. Br. I. c.*—Austral.

EVANESCA, Rafin. Sylva Tellnr. 105 (1838)»Mjrtus, Tourn.
crassifolia, Rafin. 1. c = M. dioica.

EVANSIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 303 - Iris, Tourn.
chinensis, Salisb. 1. c. = 1. japonics.
cristata, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 373 = I.cristata.
dichotoma, Decne. in Ball. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 302 = 1. dichotoma.
fimbriata, Decne. 1. c. = 1. japonica.
gracilipes, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882)373=1. gracilipes.
japonica, Klatt, 1. c. = I. japonica.
lacustris, Klatt, 1. c. -.1 . lacustris.
nepalensis, Klatt, 1. c. = I. nepalense.
speculatkrix, Klatt, 1. c. = I. speculatrix.
syrtica, Klatt, 1. c. = I. Sisyrinchium.
tectorum, Klatt, 1. c. = 1. tectorum.
vespertina, Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1878) 802. —Mongol.

EVAX, Gaertn. Fruct. ii. 393. t. 165 (1791). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 296.
CALYMMANDKA, Torr. *Sc* Gray, KI. N. Am. ii. 262 (1841).
DIAPERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. vii. (1841) 387.
EVACOPSIS, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 41 (1874).
FILACINOPSIS, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 262 (1841).
FILAGO. Loefl. in Linn. Gen. ed. V. 397 (1754).
HESPEREVAX, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 356, in obs.
anatoliea, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 2.—As. Min.
argentea, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 41.—Alger.
astcrisciflora, *Pers. Syn.* ii. 422.—Keg. Mediterr.
Candida, *A. Cray, Syn. Fl. N. Am. i.* II. 230.—Texas,
carpetana, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 69.—Hispan.
caulescens, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 101.—Calif.
contracta, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 3.—Syria; Persia.
Crocidion, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 40.—Alger.
desertorum, *Pomel, 1. c.*—Alger.
discolor, *DC. Prod.* v. 459.—Sicilia.
ericoides, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. 1821-2-2 (1824) 172 - Helichrysum teretifolium.
eriosphaera, *Boiss. & Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 3.—As. Min.
exigua, *DC. Prod.* v. 458.—Archip. Grace.; Persia,
filaginoides, */Car. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 879.—Soongaria.
Funkii, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 395=asterisciflora.
Heldreichii, *Part, in Giorn. Tosc. Sc. Med. fits, e Nat.* i. (1840) 183.—Reg. Mediterr. occ.
indica, Buch.- Ham. ex Wall. Cat. n. 2955 - Gnaphalium pulvinatum.
involucrata, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. 1821-22 (1824) 171 = Petalacta coronata.
lasiocarpa, Lange, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 65 = carpetana.
mareotica, DC. Prod. v. 459—Filago mareotica.
micropodioides, *Willk. in Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 65.—Hispan.
multicaulis, *DC. Prod.* v. 459.—Mexic.
nevadensis, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 245, in nota.—Hispan.
palaestina, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 2 = anatoliea.
perpusilla, *Boiss. V Heldr. 1. c.* Ser. II. iv. 18.—Graecia.
prolifera, *Nutt. ex DC. Prod.* v. 459.—Am. bor. occ.
pygmaea, Brot. Fl. Lusit. i. 363 - umbellata.
rotundata, *Moris, in Atti Terea Ruin. Sc.Ital.* 481.—Corsic. j Sardin.
spathulata, Pers. Syn. ii. 422 — Gnaphalium braeteatnm.
tenuifolia, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 460.—Sicil.
umbellata, *Gaertn. Fruct.* ii. 393.—Reg. Mediterr.
verna, Rafin. Atl. Journ. 178=multicaulis.

EVEA, Aubl. PI. Gui. i. 100. t. 39 (1775) = Cephadlis, Sw. (Rubiac).
brasiliensis, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, ix. (1884) 287=Salzmannia nitida.
guianensis, Aubl. PI. Gui. i. 100 - C . Evea.
paleacea, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 198.—Guian.

EVELTRIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 30 (1886) - Orthrosanthus, Sweet (Irid.).
multiflora, Rafin. I. c. = O. mnlliflorus.

EVELEYNA, Steud. Nom. ed. II. i. 620 (1840)-scq.

EVELYNA, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 32. t. 66(1835)=Elleanthus, Presl (Orchid.).
amethystina, Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia, ii. (1854) 118-Ell. amethystinus.
arpophyllostachys, Reichb. f. 1. c. 21 = Ell. arpophyllostachys.
aurantiaca, Lindl. in Benth. PI. Hartw. 149 = EH. aurantiacus.
aurea, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. 38. t. 57 - Ell. auieus.
Bonplandii, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 711 - Ell. Bonplandi.
bractescens, Lindl. Orch. Linden. 10 = Ell. bractescens.
brasiliensis, Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 661 = Ell. brasiliensis.
capitata, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 82. t. 66 - Ell. capitatus.
Caravata, Lindl. in Fl. des Serres, xiv. (1861) 85. t. 1427 - Ell. Caravata.
casapensis, Reichb. f. in Bot. Zeit. (1852) 709-EU-casapensis.
cephalophora, Reichb. f. 1. c. = E11. cephalophorus.
columnaris, Lindl. Orch. Linden. 11. = Ell. columnaris.
conifera, Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia, ii. (18541 113 = Ell. conifer.
coriifolia, Reichb. f. ex Linden, Illnstr. Hortic. xxix. (1882) 51-Ell. coriifohns.
crinipes, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 92, in obs.-Ell-crinipes.
cynarocephala, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 216 - Ell. cynarocephala.
discolor, Reichb. f. & Warn, in Bonplandia, ii. (1854) 118-Ell. discolor.
ensata, Lindl. Orch. Linden. 11. —Ell. ensatus.
flavescens, Lindl. 1. c. —Ell. flavescens.
furfuracea, Lindl. 1. c. 12 = Ell. furfuracens.
gracilis, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 842 = EH-gracilis.
graminifolia, Poepp. *Sc* Endl. ex Linden, Ulustr. Honic xxix. (18b2) 16.—Peruv.
haematoxantha, Reichb. f. ex Linden, 1. c. - £•'• haematoxanthus.
Hallii, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1862) 711 - E11-Hallii.
Hookeriana, Rodrig. Orch. Nov. ii. 166.—Bras.
hymenophora, Reiinb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 710 s Ell. hymenophorus.
kermesina, Lindl. Orch. Linden. 11 = Ell. kermesinui-
lepida, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xv. (1859) 56 = Ell. lepidus.
Lindenii, Reichb. f. ex Linden, Illustr. Hortic. «'• (1882) 15 = Ell. Lindenii.
lupulina, Lindl. Orch. Linden. 11=- Ell. lnpulinus.
maculata, Lindl. in Benth. PI. Hartw. 149 =• E»-maculatns.
Myrosmatis, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 708-Ell. Myrosmatis.
oeconomica, Reichb. f. & Warsz. in Bonplandia, "• (1854) 113.—N. Granat.
oligantha, Poepp. *Sc* Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 38. '• 57 = Ell. oliganthus.
purpurea, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 710-£"• purpureus.
rhodolepis, Reichb. f. 1. c. 711 = Ell. rhodolepis.
robusta, Reichb. f. 1. c. 708-Ell. robustus
Ruitii, Reicbb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 84S«» Ruizii.
simplex, Reichb. f. ex Linden, Illustr. Hortic. **'*• (1882) 15.—N. Granat.
strobili/era, Poepp. *8c* Endl. Nov. Gen. et Sp. 32-K"' strobilifer.
Wageneri, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854)21-*-"-Wageneri.

EVELYNA, Rafin. Sylva TeUur. 164 (1838) -Idndflra, Thunb. (Laurin.).

KVERION, Rafin. Sylva TeUur. 124 (1888)=Alter-.nanthera, Forsk. (Amaiant.).
nterrupta, Rafin. 1. c.-A. procumbens.

EVERSMAIOIIA, Bunge, in Goebel, Reise, ii. 267. t. 6 (1888). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 610.
astragaloides, *Regel* to" *Schmalh. PI. Nov. Fedseh.* 18. —Turkestan.
nedysaroides, *Bunge, in Goebel, Reise* ii. 267. t. 6.—Reg. Casp.

Ev"IA, Comm. ex Juss. Gen. 878 (1789) = Spondiae, Linn. (Anacard.).
onda, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 284=S. dulcis.
amara, Comm. ex Blume, 1. c.-S. mangifera.
dulcis, Comm. ex Blume, 1. c. 238-S. dulcis.

EVODEA, Kunth, Syn. PI. iii. 827 (1824) = seq.

EVODIA, Forst. Char. Gen. 13. t. 7 (1776) (Euodia). *RUTACEAE,* Beniin. & Hook. f. i. 296.
ATITARA, Marcgr. ex Jnss. in Diet. Sc. Nat. iii. 277(1816).
BOVMIA, A. Juss. in Mem. Mus. Par. xii. (1825)' 507 (Mem. Rut. 124).
LEPTA, Lour. Fl. Cochinch. 82 (1790).
MEGABOTRYA, Hance, in Walp. Ann. ii. 259 (1851).
PHILAGONIA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 20 (1828); Bijdr. 250 (1825).
TETRADIUM, Lour. Fl. Cochinch. 91 (1790).
wcedens, *Blume, Bijdr.* 246.—Java,
acronychioides, *F. Afuell. Fragm.* iv. 117.—Austral.
al«a, *F. Muell. 1. c.* vii. 142.—Austral.
afb». *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 166. —Borneo.
"*romatica,* Blume, Bijdr. 246-glabra.
Aubertia, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 296.—Ins. Borbon.
Baudouini, *Baill. Adansonia, x.* (1871-72) 826.-N. -i~aled.
E"'<<*<>, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 50=latifolU.
:"onwickii, *F. A/uell. Fragm.* v. 56.—Austral,
oracteata, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 76.—Ins. Tahiti.
B"*ombyana,* F. Muell. Fragm. v. 4 = Brombya platynema.
^lastracea, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1888) 11', — Madag.
Bnape Mad"6"' *Baillm Adansonia*> *• 08^1-72) 826.—ag.
eo"*termina,* F. Muell. Fragm. vii. 144 - Melicope contermina.
Cu*ninghamii, F. Muell. 1. c. iii. 2 = Medicosma <-unninghamii.
densiflora, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) j. 11'.—Madag.
an«*nicata,* Poepp. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. dnf '9 " Protiu>n divaricatum.,
orupacea, *Labill. Serf. Austr. Caled.* 73. t. 76.-N. • Caled.
gaeodendroides, *Baker, Fl. Mount.* 89.—Ins. Mascar.
,"'?«». *F. Muell. Fragm.* T.4.—Austral.
"*ythrococca,* F. Muell. 1. c. i. 26 - Melicope erytnrococca.
e«neura, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 243.—Sumatra.
Fatcuna, *F_ MuM_ Fr «F*- «•* 101.-Austral.
febrifuga, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1828) 129-fra ^ p K U febrifuga.
«n.folia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 49O.-Reg. ."•mal.; Malaya•
gjabra, *Blume, Bijdr.* 245.—Java.
gtouca, Miq. Ani. Mus. Bot. Lugd. Bat iiL 23 = *g*•aeliaefolia.
!?^\knta.'» Jo™. As. Soc. Beng. xl. (1871) H. «= triphylla.
naplophy a, *F. Muell. Fra*
hortensis, *Forst. Char_ Gr*» 13_ «• '•_ Ins_ N> Hebrid_
incerta, Blume, Bijdr. 245=Acronychia Minahassae.
Lamarckiana, Benth. Fl. Hongk. 69=triphylla.
lasi« cura, *Ba*M , *j4dansonia,* " '• <1874> 179.—N. cSed.
latifolia, *DC_ Prod_l* 724—Malaya.
Utto™, Norfolk.*"*' *PtOd_ FL* **"*• 86" Bl " 6 _~l as.

BVODIA:—
longifolia, *A. Rich. Bot. Voy. Astral,* ii. 61.—N. Guinea,
lucida, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* Hi. 244.—Sumatra.
macrophylla, Blume, Bijdr. 246 = accedens.
macrophylla, Wall. Cat. n. 1220=Roxburghiana.
madagascariensis, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 48. —Madag.
Marumbong, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 244 = Roxburghiana.
meliaelblia, *Benth. Fl. Hongk.* 58.—China,
micrococca, *F. Muell. Fragm.* i. 144.—Austral.
Minahassae, Teijsm. *8c* Burn, in Tijdschr. Nederl. Ind. xxix. (1867) 255 = Acroiiychia Minahassae.
neurococca, F. Muell. Fragm. i. 28-Melicope neurococca.
obtusifolia, *DC. Prod.* i. 724.—Ins. Mascar.
octandra, F. Muell. Fragm. ii. 102-Melicope australasica.
pedunculosa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 489.—Singapor.
pentacocca, F. Muell. Fragm. iii. 41 = Bosistoa sapindiformis.
polybotrya, *C. Moore* &" *F. Muell. in F. Muell. I. c.* vii. 143.—Austral,
pomaderrifolia, *Baill. Adansonia,* xi. (1875) 306.—N. Caled.
ramiflora, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-59) 388.—Japon.
robusta, *Hook./. Fl. Brit. Ind. i.* 488.—Malaya.
Roxburghiana, *Benth. Fl. Hongk.* 59.—As. trop.
rutaecarpa, *Hook.f. V Thorns, in Fl. Brit. Ind.* i. 490. —Reg. Himal.; China; Japon.
sarcococca, *Baill. Adansonia,* xi. (1875) 301.—N. Caled.
speciosa, *Reichb. f. V Zoll. ex Teijsm.* b" *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (Ifc67) 255.—Java,
suavcolens, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent. i.* (1876) 11.—N. Guinea,
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 77.—Ins. Tahiti.
triphylla, Bedd. FL Sylv. Anal. Gen. xii. t. 6. f. 2-Roxburghiana.
triphylla, *DC. Prod.* i. 724.—Burma; Malaya.
Vieillardi, *Baill. Adansonia,* xi. (1874) 179.—N. Caled.
viticina, *Wall. Cat.* n. 1219.—Ind. or.
vitiflora, *F. Muell. Fragm.* vii. 144.— Austral,
xanthoxyloides, *F. Muell. 1. c.* iv. 155.—Austral.

EVODIA, Gaertn. Frjict. ii. 100 [t. 103] (1791) = Ravensara, Sonner. (Laurin.).
aromatica, Pers. Syn. ii. 1 = R: aromatica.
Ravensarae, Gaertn. Frnct. ii. 101-R. aromatica.

EVODIANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 194 (1857)-Carludovica, Ruiz *8c* Pav. (Cyclanth.).
angustifolius, Oerst. 1. c. 195-C. Oerstedii.

EVOISTA, Rafin. Sylva Tellur. 56 (1838) = Iiycium, Linn. (Solan.).
caroliniana, Rafin. 1. c. = L. carolinianum.
spinosa, Rafin. 1. C.-L. tetrandrum.

EVOLVOLUS, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 55 (1788) = seq.

EVOLVULTX8, Linn. Sp. PI. ed. II. 391 (1763). *CONVOLVULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 875.
CAMDENIA, Scop. Introd. 190 (1777).
CLADOSTYLKS, Humb. *Sc* Bonpl. PI. Aequin. i. 202. t. 57 (1808).
LEUCOMALLA, Phil. Sert. Mcndoc Alt. 31 (1871).
MERIANA, Veil. Fl. Hum. 128 (1825).
PLESILIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 55 (1836); Fl. Tellur. iv. 83 (1836).
acapulccnsis, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* vi. l'J9. —Mexic.
agrestis, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 92.—Afr. trop.
albiflorus, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 259.—Mexic.
albiflorus, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1863-65) 654. —N. Granat.
olopecuroides, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 96 j *et ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 384.—Am. trop.
alsinoides, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. '1842) 586 — pnsillus.

BVOI1VUI1TJ8:—
alsinoides, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 392.—Amphig. trop.
alsinoides, Wall. Cat. n. 1317, partim =. Breweria evolvuloides.
alsinoides, Willd. Sp. PI. i. 1517, partim - mucronatus•
anagalloides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 848.—Am. trop.
angustifolius, Roxb. Hort. Beng. [84]; Fl. Ind. ii. 107-alsinoides.
angustissimus, H. B. *8c* K.Nov. Gen. etSp. iii. 116-incanus.
anomalus, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 853.—Am. trop.
araucanus, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 618.—Chil.
Arbuscula, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 459.—Ins. S. Doming.
argenteus, R. Br. Prod. 489-alsinoides.
argenteus, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 187—Am. bor. occ.
argyreus, *Choisy, Com). Rar.* 153.—Ecuador,
arizonicus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 218.—N. Mexic.
aurigenius, *Mart, in* /7ora.xxiv. (1841) II. *Beibl.* 100. —Bras.
aeureus, Vahl, ex Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 166-villosus.
barbatns, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 351.—Am. trop.
brevipedicellatus, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1153, nomen.—Guiana,
canescens, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 350.—Bras.
canus, Mart, ex Meissn. 1. c. 887 = helichrysoides.
canus, Spreng. ex Choisy, Conv. Rar. 151 = Arbuscula.
capensis, *E. Mey. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 444.—Afr. austr.
capitatus, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 80.—Bras.
capreolatus. Mart, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 445 — alsinoides.
cardiophyllus, *Schlecht. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 653.—N. Granat.
Chamaepitys, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 98.—Am. trop.
chinensis, Choisy, Conv. Rar. 155 — alsinoides.
chrysotrichos, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 351.—Am. trop.
columbianus, *Meissn. 1. c.* 347.—Am. trop.
Commersonii, Steud. Nona. ed. II. i. 620 = incanus.
cordatus, Choisy, in DC. Prod. ix. 447 = anagalloides.
cordatus, *Moric. PI. Nouv. Am.* 137. t. 82.—Bras.
cressoides, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 100 -incanus.
cuneifolius, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 82.—Hab. ?
cuspidatus, H. B. *8c* K. Nov. Gen. ct Sp. iii. 116-incanus.
daphnoides, *Moric. PI. Nouv. Am.* 59. t. 40.—Bras.
debilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. U5»alsinoides.
decumbens, R. Br. Prod. 4S9 = alsinoides.
desertorum, Mart, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 442-Martii.
dichondroides, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 117.—Afr. trop.
diffusus, Chapm. ¥1 S. U. St. 345 - alsinoides.
diosmoides, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 97. —Am. trop.
discolor, Benth. PI, Hartw. 6 « holosericeus.
distichophyllus, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 101 —holosericeus.
domingensis, Spreng. ex Choisy, Conv. Rar. 160-alsinoides.
echioides, *Moric. PI. Nouv. Am.* 55. t. 37.—Bras,
elegans, *Moric. I. c.* t. 36.—Bras.
emarginatus, Burm. f. Fl. Ind. 77 - Ipomoea reniformis.
ericae/olius, Mart, ex Schrai.k, I'l. Rar. Hort. Monac. t. 94 = gypsophiloides.
ericoides, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 97 = glomeratus.
cxUis, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 342.—Am. trop.
falcatus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 229.—Reg. Argent.
ferrugineus, Wall. Cat. n. 1316 - Convolvulus pluricaulis.
filiformis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 620 - alsinoides.
Wipes, *Mart, in Flora,* xxiv. (3844) II. *Beibl.* 100.—Am. trop.
frankenioides, *Moric. PI. Nouv. Am.* 49. t. S3.—Bras.

EVOliVUi/tTS :—
fugacissimus. Hochst. in Flora, zxiv. (1841) I. Intell. 25 = alsinoides.
niscus, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 339.—Am. txop.
gangeticus. *Linn. Sp. PI.* ed. II. 891.—Ind. or.
glaber, Sprcng. Syst. i. 862 = mucronatus.
glabriusculus, Choisy, Conv. Rar. 156 = mucronatns.
Glechoma, *Welw. Apont.* 689.—Afr. trap.
glomeratus, Choisy, Conv. Kar. 148 — MartiL
glomeratus, *Ntes t? Mart, in* Nov. *Act. Nat. Cur.* xi. I. (1S23) 81.—Bras.
Knaphaloides, *Moric. PI. Noun. Am.* 61. t. 41.—Bras,
gracillimus, *Miq. Ft. Ind. Bat.* ii. 629.—Sumatra,
grandiflorus, *Parodi, Contrib.* 30.—Paragnay.
guianensis, *Klotmsch, in Schomb. Faun, et Fl. Cui.* 1153, nomen. —Guiana,
gypsophiloides, *Moric. PI. Nouv. Am.* 62. t. 35.—Bras.
hrderaceus. Burn), f. Fl. Ind. 77 - Convolvulus flavus.
helianthemoides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 345. —Am. trop.
helichrysoides, *Moric. PI. Noun. Am.* 134. t. 80.—Am. trop.
heterophyllus, Labill. Sert. Austr. Caled. 24. t. 29 = alsinoides.
hirsutulus, Herb. Brit. M us. ex Choisy, Conv. Rar. 154 = alsinoides.
kirsutus, Lam. Encyc. iii. 588 = alsinoides.
holosericeus, *H. B. V K. Nov. Gen. etSp.* iii. 116.—N. Granat.
holosericeus, Torr. Bot. Mex. Bound. 150 = arizonicus, incanns.
imbricatus. Mart, ex Choisy, Conv. Rar. 150 = rufus.
incanus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 117 = argyraeus.
incanus. *Pen. Syn.* i. 288.—Am. trop.
jacobinus, *Moric. PI. Nouv. Am.* 135. t. 81.—Am. trop.
javanicus, Blume, Bijdr. 724 = alsinoides.
kramerioides. *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 98.—Am. trop.
laetns, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 228.—Arizona,
lagonodioides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 333.—Bras.
lagopus, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 96.—Bras.
lanceaefolius. Span, in Linnaea, xv. (1841) 341 = alsinoides.
lanceolatus, Poir. Encyc. Snppl. iii. 459 = villosus.
latifolius, *KerGawl. in Bot. Reg.* t. 401.—Bras,
linarioides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 343.—Bras.
lini/olius, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 355=filipes.
lini/olius. Linn. Sp. PI. ed. II. 392-alsinoideB.
linuides, Moric. PI. Nonv. Am. 139. t. 83 = alsinoides.
Hthoapermoides, *Mart, in Flora,* xxiv. (.1841) II. *Beibl.* 99.—Bras.
longifolius, *Choisy, Conv. Rar.* 159.—Am. austr.
macroblepharis. *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 101.—Am. austr.
macrophyllus, Willd. ex Roetn. & Schult. Syst. vi. 199 = Convolvulus Horibundns.
madagascariensis, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 522.—Madag.
Martii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 337.—Am. trop.
Maximilian], *Mart, ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 444.—Am. trop.
microphyllus. Mart. *8c* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. 0845) 257 = alsinoides.
modestus, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 448.—Bras.
modestus, Hance, in Wai p. Ann. iii. 116 = alsinoides.
mucronatus, *Sw. ex Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stocth.* (1827) 61__Am. trop.
Muehlenbergii. Spreng. Pugill. i. 27 (non ordinis?.—Am. bor.
nanus, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 346.—Am. trop.
natalensis, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 80.—Air. austr.
niveus, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) ii. *Beibl.* 97 i *et ex* Meissn. *in Mart. Fl. Bras.* vii. 332.—Am. trop.
nummularius. Linn. Sp. PI. ed. II. 391 = alsinoides.
nummularius, Nutt. Gen. Am. i. 174 «= mucronatus ?
Nuttallianus, Roem. & Schult. Syst. vi. 198 = argentens.
mali/olius, Torr. in Bot. Mex. Bound. 160 = Breweria ovalifolia.

EVOliVTJIiTJB :_
• paniculatus, *Spreng. Syst.* i. 862.—N. Granat.
passerinoides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 355.—Bras.
phylicoides, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 98 - diosmoides.
phylicoides, Scbrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 707 = glomeratus.
phyllanthoides, *Moric. PI. Nouv. Am.* 82. t. 54.—Bras.
pilosissimus. Mart. *8c* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845)257-- alsinoides.
pilosus, Nutt. Gen. Am. i. 174 = argenteus.
pilosus, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. ii. 106 = Convolvulus pluricauhs.
pimulus, Span, in Linnaea, xv. (1841) 341, sphahn. = pnmilus.
Fohlii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 344.—Am. trop.
procumbens, *Montr, in Mem. Acad. J-yon,* X. (1860) 288.—N. Caled.
Pseudo-incanus, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 341, nomen.—Ins. Timor.
pterocaulon, *Moric. PI. Nouv. Am.* 140. t. 84.—Bras,
pterygophyllus, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 96.—Bras.
pudicus, Hance, in Walp. Ann. iii. 116=alsinoides.
pulchellus, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 341.—Am. trop.
pumilus. *Span, in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 348, nomen.—Ins. Timor.
purpuro-coeruleus, *Hook. Bot. Mag.* t. 4202.—Jamaic.
pusillns, *Choisy, Conv. Rarv.* 155.—Bras.
ramijlorus, Boj. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 447 = alsinoides.
reniformis, Salzm. ex Choisy, Conv. Rar. 150 -= alsinoides.
Riedelii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 351.—Bras.
rufus, *St. Hil. Voy. Brls.* i. 877,138.—Bras.
Rutenbergianus, *Vatke, in Bremen, Abh.* ix. (1885) 128. —Madng.
saxifragus, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 99. —Bras.
scoparioides, *Mart. 1. c.* 337.—Bras.
sericeus, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. v. (1846) 355 = holosericeus.
sericeus, Leand. ex Choisy, Conv. Rar. 147 -latifolius.
sericeus, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 66 = incanus.
sericeus. Wall. Cat. n. 1315 = alsinoides.
serpylloides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 845.—Am. trop.
serpylloides, *Wright, in Sauv. Ft. Cub.* 108.—Cuba.
Sherardi, Choisy, Conv. Rar. 160 = Convolvulus micranthus.
simplex, *Anderss. Calap. Oa'nes Veget.* 211.—Ins. Galapag.
sinicus, Miq. in Jonm. Bot. Neerl. i. (1861) 112-alsinoides.
speciosus, *Moric. PI. Nouv. Am.* 50. t. 34.—Bras,
strictus, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 354.—Guian.
tenuis. *Mart, ex Choisy, Conv. Rar.* 166.—Bras.
thymiflorus, *Choisy, 1. c.* 147.—Bras.
tridentatus, Linn. Sp. PI. ed. II. 3»2 = Ipomaea tridendata.
veronicae/olius, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 117. t. 215 = alsinoides.
villosus, R. Br. Prod. 489 = alsinoides.
villosus. *Ruin V Pav. Fl. Per.* iii. 30. t 253. f. b.—Am. austr.
virgatus, Choisy, in DC. Prod. ix. 446 = Convolvulus chondiilloides.
virgatus, Willd. ex Spreng. Syst. i. 862 = incanos.

EVONIMUS, Neck, in Act. Acad. Theod. Palat ii. (1770) 4Sf0=Euonymua, Linn. (Celastr.).

EVONYMODAPHNE, Nees, Syst. Lanrin. 263 (1826) - Ocotea, Anbl. v Laurin.).
armeniaca, Hort. Berol. ex Meissn. in DC. Prod. xv. I. 138 *(= Oreodaphne leptobotra).—Perav.*
armeniaca, Nees, Syst. Laurin. 264 *(= Oreodaphne Evonymodaphne).*—Peruv.

EVONYMOIDES, Isnard, ex Medic. Phil. Bot. i. 173 (1789) = Celaatrus, Linn.
buxifolia, Moench, Meth. 70-C. bniifolius.
excelsa, Soland. ex DC. Prod. L 617 — Alectryon excelsum.
scandens, Medic. Phil. Bot. i. 173 »C. scandens.

EVONYMUS, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 29 (1737) =Euonymua, Linn. (Celastr.).

EVONYXIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 29; iv. 27 (1836)-Melanthium, Linn. (Liliac).
glauca, Rarin. 1. c. <- Zygadtiiius Fremonti.
hybrida, Rafin. 1. c. = M. virginicum.
monoica, Rafin. 1. c. — M. virginicum.
undulata, Rafin. 1. c. (quid?).—Hab.?
virginica, Rafin. 1. c. = M. virginicum.

EVOPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 82 ; et in Diet Sc Nat. xvi. 65 (1820) = Berkheya,Ehrh. (Compos.).
heterophylla, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvi. 06-B. cynaroides.

EVOSMA, Steud. Norn. ed. I. 330 (1821) - EUOSMA, Andr. -Logania, R. Br.

EVOSMIA, Kunth, Syn. iii. 66 (1824) = Euoomla, Humu. & Bonpl. (Rubiac.).

EVOSMUS, Rafin. Sylva Tellur. 133 (1888) - EUOSMUS. Basil. -Iiindera, Thonb. (Laurin.).

EVOTROCHIS, Rafin. hi. Tellur. ii. 76 (1886)=-Primula, Linn.
involucrata, Rafin. 1. c. = P. verticillata.
odorata, Rafin. 1. c. = P. verticillata.

EVRARDIA, Adans. Fam. ii. 342 (1763) =PlBtaoi»? Linn. (Anacard.).

EWALDIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 123; et in Abh. Akad. Berl. (1864) 53. *X.* 8 C =Begonia, Linn.
ferruginea, Klotzsch, 11. cc. = B. multinervia.
lobata, Klotzsch, 11. cc. 123, S4-B. multinervia.

EWYCKIA, Blume, in Flora, xiv. (1831) 524 = Pternandra, Jack (Melastom.).
capitellata, Walp. Rep. v. 724 = P. capitellata.
caerulea, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 261= P. caeiulescens.
cordata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 255-'• cordata.
cyanea, Blume, in Flora, xiv. (1831) 525 = P. caerulescens.
echinata, Walp. Rep. v. 724 = Kibessia pubescens.
galeata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 254. t. «' (= *Rectomitra galeata").*—Borneo.
Jackiana, Walp. Rep. v. 724 = P. caerulescen*.
Korthalsiana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 321 = P. Korthalsiana.
latifolia, Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. i. 6=P. panicalau.
medinilli/ormis,Na.ud. in Ann. Sc. Nat. Sér. Ill- *v>ii-(1852) 261 = P. capitellata.
paniculata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 321 - P- caernlescens.
tuberculata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 255 ** Kibessia tuberculata.

EXACON, Adans. Fam. ii. 503 (1763) = seq.

EXACTTM, Linn. Diss. Dass. 6 (1747) ; Amoen. Ac»* i. 116 (174!)). *GENT1ANEAE,* Benth. & Hook, t ii. bOS.
CHONDROPIS, Rafin. FL Tellur. iii. 29 (1836).
FLOYERIA, Neck. Elem. i. 386 (1790).
FAKACELSEA, Zoll. 8c Mor. in Nat. en GeneesK. Arch. Neerl. Indie, ii. (1845) 18.
affine, *Balf.f. in Regel, Gartenfl.* (1883) 34.1.1108.—Ins. Socotra.
alatum, Heyne, in Roth, Nov. PI. Sp. 8S-Canscor» perfoliata.
albens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 58=tetragonum.
albens. Linn. *I.* Suppl. 123-Sebaea albens.
amplexi/olium, D. Dietr. Syn. PI. i. 440 = nervosnm.
anamallayanuro, *Bedd. 1c. PI. Ind. Or.* L 33.—In°- *• aphyUum, Willd. Sp. PI. i. «38-Voyria aphylla-
arenarium, Schult. ex Griseb. in DC. Prod. «• *" Coutoubea racemosa.
atropurpureum. *Bedd. Jc. PI. Ind. Or.* i. 24.—Ind. or.
aureum, Linn. f. Suppl. 123 —Scbaea aurea.
axillare, *Th-m. Enum. PI. Zeyl.* 208.—Ind. or.
Beddomn, C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc »v-(Ife75) 427 = atropurpureum.

EXACUM:—
bellum, Hance, in Hook. Lond. Jonm. Bot. vii. (1848) 472=tetragonum.
tricolor, *Roxb. Hort. Seng.* 83 ; *Fl. Ind.* i. 887.—Ind. or.
orachiaium, Spix, in Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 897 = Curtia diffusa.
bnlbillifernm, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1888) 2O9.-Madag.
<aerulenm, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) tO.—Ins. Socotra.
CandolUi, Bast. Fl. Maine-et-Loire, SoppL 22 = Cicendia pnsilla.
carinaium, Roxb. Hort. Beng. [10] ; Fl. Ind. i. 399 = petiolare.
'hilense, Bert, in Merc. Chil. (1829); ex Bull. Fe"russac, xx. (1880) 111 = Microcala quadrangularis.
thironioides, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 109-tetragonum.
Chulasiuma, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4356 = tttrngonum.
'oncinnum, Miq Anal. Bot. Ind. iii. 10; et ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 100 = Hoppea fastigiata.
'ordatum. Linn. f. Suppl. 124 = Belmonlia cordata.
•wutallense, *Am. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xi. (1839) 175.—ind. or.
'"tense, Poepp. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 128 = 'oriwltesia stenophylla.
d"hotomum, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 4859 = Pedunculatum.
dlffusum, Willd. Sp. PI. i. 637 - Canscora diffusa.
"rectum, Roth, Nov. PI. Sp. 83 = Canscora diffusa.
«»bescens, Spreng. Syst. iv. Cor. Post. 41 = pallescens.
Jostigiatum, Am. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 158-Hoppca fastigiata.
fi'tformr, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 84= Microg, loadranga laris
foliose, Willd. Sp. PI. i. 688 = Microcala filiformis.
«, Griseb. in DC. Prod. IX> 45 . waikeri, "ightianum.
«'"«cum, Bast, ex Roem. & Schalt. Syst. Mant. iii. 97 - Clc
ewciLpes, *Balf.f. inPr0C. Roy. Soc. Edinb.xii.* (1884) <>0.–Ins. Socotr.
I'andiflorum, Gaertn. Fruct. ii. 158. t. 114. f. 5 = aebaea capitata.
l".ndiflorum, Wall. Cat. n. 4358 = bicolor.
gtianense, Anbl. PI. Gui. i. 68 = Schultesia sieno-•Phylla.
"awt/temf, G. Don, Gen. Syst. iv. 212-tetragonnm.
herrocliiptm aldt Sp_ PL '• 8 89 = Canscora sessili„ flow
ors, e W„„„„„1 Miq„ F1> Ind„ Bat* „' 656=tetra„ gon um.
i j l * ^ A « , Willd. Sp. PI. i. 640 = Enicostema . "ttorale.
'"£?'«««. Hook. & Arn. in Hook. Jonrn. Bot. i. (1834) L Microcala quadrangularis.
l'f- *B. Clark*> •» *Hook.-f.* Fl_ Brit_ Ind_ iv_fl8_ "'"no. 6f.
„„cra„»^erum, Miq. Anal. Bot Ind. iii. 10 = sessile.
macra 1?«"""". Am. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xi. (1839) *Iftl* Jl»nicum.
B2 Hohen. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. *minus* Roem_ &«Stmit_ bicolor.
W Toubea spicata.
<W *»*«*• 5yrf. iv. Car. />orf. 41, 338.-Bras.
ovata. bilL Nov_ HolL PK '• M> l> 52, Sebaea
^t^l'f^"^^*- "• Cur. Post. 41,338—Bras.
,h?-> Griseb. Gen. et Sp. Gent. 139 = Erynraea quitensis.
pea Ann. Sc. Nat. Ser. II. xi. (1889) seq.
pec.unc «»«• *St. PI.* I12.-Ind. or.
perfolia Dirtr. Syn. PI. i. 44O = pallescens.
Perrottet Griseb_ « ^C. Pr«rf. ix. 45.-Ind. or.
petiolare, «.-Ind. or.
pteranthum Ca/. n. 4360.—Burma.
pulchellum, Am- ^P 100„Cicendia pulchella.
pumilum, Gri»- «n OC. />n>rf. ix. 46.-Ind. or.
punctatum, Linn. f.
purpureum, Lam. 6*7 = Schultesia stenophylla.

EXACITM:—
pusillum, DC. Fl. Fr. iii. 663 = Cicendia pnsilla.
quadrangulare, Willd. Sp. PI. i. 636 - Microcala quadrangularis.
quinquenervium, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 112.—Madag.
quitense, Spreng. Syst. i. 425 = Erythraea qnitensis.
racemosum, Roem. *Si* Schult. Syst. iii. Mant. 'J9 = Coutoubea ramosti.
ramosum, Vahl, Symb. Bot. iii. 17 a Coutoubea rncemosa.
rivulare, Kdgew. in Joum. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 175 - pednnculatum.
roseum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 27&-tetragonum.
rosnlatam, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1683) 210.—Madag.
sessile, C. B. Clarke, in Jonm. Linn. Soc. xiv. (1875) 427-Lawii.
sessile, *Linn. Sp. PI.* 112.—Ind. or.
spnthulatum, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 210.—Madag.
spieatum, Vahl, Symb. Bot. iii. 17 = Coutoubea spicata.
stellatum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 435'J = pednnculatum.
strictum, Willd. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 132 = Coatoubra spicata.
stylosum, Wall. Cat. n. 4355 = tetragonum.
sulcatum, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 425•tetragonum.
sulcatum, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 400 = pedoncnlatum.
sulcatum, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Drit. Ind. iv. 96 = bicolor.
tenellum, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 4362 = Canscora diffusa.
tenuifolium, *Aubl. PI. Gui.* i. 70.—Guian.
tcres, *Wall. Cat.* n. 4354.—Reg. Himal.
ternifolium, Roem. & Schult. Syst. iii. lo'J- Coutoubea spicata.
tetragonum, *Roxb. Hort. Beng.* [10] [*Fl. Ind.* i. 398.—Ind. or.; Bui ma; China.
tetrapterum, Meyen, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 561 = tetragonum.
travancoricum, Bedd. Ic. Ind. Or. i. "24 = courtallense.
tricolor, Zoll. *Sc* Mor. Syst. Verz. Zoll. 56 -» sulcatum.
vaginale, Labill- Nov. Holl. PI. i. 37. t. 51 = Lo_cania Tatifolia.
verticillatum, Willd. Sp. PI. i. 640-Enicostema littorale.
violaceum, Lam. Encyc. ii. 647 (=• *Apophragma tenuifolium).*—(iuiana.
viscosum, Sm. Ic. Pict; 18=Ixanthns viseosns.
Walkeri, *Am. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 110.—Zeylan.
Wightianum, *Arn. in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xi. (1839) 176.—Ind. or.
zeylanicum, *Roxb. Hort. Beng.* 83; *Fl. Ind.* i. 3!)8.—Zeylan.
eeylanisum, Wall. Cat. n. 4357 A = Wightianum.

EXADENUS, Griseb. Obs. Gentian. 36 (1806) - Halenia, Borckh. ^Gentian.).
alatus, Mart. & Gal. in Hull. Acad. Brux. xi. I. il844) 372 = H. alata.
brevicornis, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 823 = H. brevicornis.
parviflorus, Griseb. 1. c. 322-= H, pnrviflora.
parvifolius, Walp. Rep. vi. 508, sphalm. -scq.
paucifolius. Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 372= II. paucifolia.

EXAGROSTIS, Steud. Norn. ed. II. i. 62*2 (1840) sphalm. =Eragroatls, Host (Gramin.).

EXALLOSIS, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 83 (1886) - Convolvulus, Tourn.
biflora, Rafin. 1. c = C. biflorus.

EXARRHENA, R. Br. Prod. 495 (1810)-Myosotis, Linn. (Boragin.).
Lyallii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 196.-M. Lyallii.
macrantha. Hook. f. 1. c—N. Zei.
petiolata, Hook. f. 1. c.~M. petiolala.
saxosa. Hook. f. 1. c. 196 »M. saxosa.
tuaveolens, R. Br. Prod. 495 - M. scaveolens.

EXCOBCABIA, Linn. Syst. ed. X. 1288 (1759).
EUPHORBIACEAE, Bemh. *Sc* Hook, f iii. 837.
COMMIA, Lour. Fl. Cochinch. 605 (17H0).
SCT.KROCROTON, Hochst. in Flora, xxviii, (1845) 85.
SriRosTACHYS, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 10(i.
TAENIOSAI'IUM, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1200 (1866).
abyssinica, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 217.—Abyss,
acerifolia, *F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857) 129.—Reg. Himal.
aerea, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1207-Sapium aereum.
affinis, Endl. Prod. Fl. Norf. 88 - E. Agallocha.
affinis, Griff. Notul. iv. 486»Sapium baccatum.
africana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 123.—Afr. austr.
Agallocha, *Linn. Syst.* ed. X. 1288.—As. trop.; Malaya; Ins. Piicif.
albicans, Griseb. in Goctt. Nachr. (1865) 179-Sebastiania Griscbachiana.
arputa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 614.—Bras.
baccata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1211 - Sapium baccatum.
bantamensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 124.—Ins. Bantam.
bicalcarnta, *Muell. Arg. 1. c.* 125.—Bras,
bicolor, *Hassk. Rettia,* i. 158.—Malaya.
biglandulosa, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. It. 1204 - Sapium aucuparinm.
cochinchinensis, *lour. Fl. Cochinch.ii.*612[1].—Cochinch.
cochinchinensis, Muell. Arg. in DC Prod. xv. II. 1215 — crenulata.
Colliguaya, liaill. Hist. PI. v. 134 = Adenopelds Colliguaya.
concolor, *Spreng. Syst.* iii. 24.—Bras,
crenulata, *Wight, Ic.* t. 1865.—Ind. or.
cubensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 122.—Cuba.
cuneata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1208 = Sapium cuneaHim.
Dallauhyana, *Benth. Fl. Austral,* vi. 153.—Austral,
diandra, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 615.—Bras.
discolor, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1210 = Sapium discolor.
discolor, *Spreng. Syst.* iii. 24.—Bras,
diversifolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.'xr.* II. 1211.—Sumatra,
eglandulata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 628.—Bras.
eglandulosa, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1209-Bouania adenodon.
emarginata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1212.—Cuba.
brachyandra, Muell. Arg. 1. c. 122'4=Actinostemon concolor.
brachypoda, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 178 = Actinostemon caribaeus.
brasiliensis, Spreng. Neue Entdeck. ii. 117 *(= Dactylostemon brasiliensis).*—Bras.
Briilgcsii, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 124.—Bolivia.
Camettia, Willd. Sp. PI. iv. 864 = E. Agallocha.
eanjoerensis, *Dennst. Schluess. Hort. Malab.* 31.—Ind. or.
caribaea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 51 = Actinostemon caribaeus.
Chamelaea, Baill. Adansonla, vi. (1865-66) 323 = Sebastiania Chamelaea.
erythrosperma, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 161 - Bonania erythrosperma.
farinosa, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 169^ Cymnanthes hypolcuca.
glandulosa, SOT. *Fl. Ind. Occ.* ii. 1124.—Am. trop.
glauca, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* xi. (1881) 54.—Reg. Argent.
Goudotiann, *Muell. Arg.in Linnaea,* xxxii. (1863) 122—Madag.
guianensis, BailL Hist PL v. 133 - Maprounea guianen»is.
guineensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 123.—Afr. trop.
haematosperma, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1209 — Sapiu.n haematospermum.
herbertiacfolia, *Jacq. in Urn. Hort. Univ.* (1844) 289.—Austral.

EXCOECARIA :—
himalayensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 122 = acerifolia.
hippophaefolia, *Griscb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 61. —Reg. Argent.
Hochstetteriana, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 122-reticulata.
holophylla, *KUTB, in Journ. As. Sac. Beng.* xlii. (1873) II. 247.—Burma.
ilicifolia, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 117.—Bras.
indica, Muell. Arg in Linnaea, xxxii. (1863) 123-Sapium indicum.
insignis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1212-= Sapium insigne.
integerrima, Muell. Arg. 1. c. 918 =reticulata.
integrifolia, *Roxb. Hort. Beng.* [106]; *Fl. Ind.* iii. 757. —Ins. Molucc.
japonica, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 123. —Japon.
Klotsschii, Baill. Hist. PI. v. 135 (- *Dactylostemon Klottschii).*—Bras.
laevis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 768=Homalanthus populifolius.
lanceolaria, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1221.— Ins. Penang.
Lastellei, *Muell. Arg. 1. c.* 1218.—Madag.
Laurocerasus, Muell. Arg. 1. c. 1202 — Sapium Laurocerasus.
leucogyna, Muell. Arg. 1. c. lz08 - Sapium leucogynum.
leucosperma, Muell. Arg. 1. c. 12U9 = Sapium leucospermum.
Louieiroana, *Muell. Arg. 1. c.* 1217.—Cochinch.
lucida, So,. *Fl. Ind. Occ.* ii. 1121.—Jamaic.
macrocarpa, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1207 - Sapium macrocarpura.
•nadagascariensis, *Muell. Arg 1. c.* 1219.—Madag.
Manniana, *Muell. Arg. in Khra,* xlvii. (1864) 483.— Afr. trop.
marginata, *Griseb. in Goett,'Abh.* xix. (1874) 97.— Reg. Argent.
marginata, Kunze, ex Baill, Stud. Gén. Euph. 532 = Adenopeltis Colliguaya.
marginata, Muell. Axg. in DC. Prod. xv. II. 1208 - Sapium marginatum.
Martii,*Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 614.—Bras,
melanosticta, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 122.—Madag.
myrieifolia, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 178 = fionania myrieifolia.
oblongiiblia, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* ii. (1864) 337.—Afr. trop.
obovata, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1203 = Sapium obovatum.
obtusifolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 125. —Peruv.
oitusiloba, Muell. Arg. in DC Prod. xv. II. 1208^= Sapium obtusilobum.
oceidentalis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 615. —Bras,
oppositifolia, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* iv. (1844) 886.-Reg. Himal.
oppositifolia, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1219 = srenulata.
ovalis, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 83 = E. Agallocha.
motifolia, Noronha, in Verh. Balav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 14=Cerbera Odollam.
pollens, Griseb. in Mem. Am. Acad. *N.* S. viii. (1861) 181 = Gymnanthes pallens.
pallida, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 623.— Bras,
parvifolia, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 433.— Austral.
polyandra, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 180 = Gymnanthes polyandra.
potamophila, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 627.—Bras,
quadrangulaiis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 124.—Malaya,
rectinervis, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) II. 148.—Ins. Nicobar.
reticulata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1213.— Afr. austr.
riparia, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 386 = Gymnanthes riparia.
Sagraei, *Muell. Arg. 1. c.* xxxii. (1863) 121.—Cuba.
salpingadenia, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1209 = Sapium salpingadenium.
sebifera, Muell. Arg. 1. c. 1210 = Sapinm sebiferum.

EXCOECABIA :-
serrata, [R. Br. in] AiL Hort. Kew. ed. II. v. 418-. Adenopeltis Colliguaya.
serrulata, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 446.—Bras.
sicca, Blanco, *b* 1. Filip. ed. 1.787'=Homolanthus populifolius.
stylaris, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. n. 1204 = Sapium stylare.
suberosa, Muell. Arg. 1. c. 1202=Sapium suberosum.
subsessilis, *Muell. Arg. 1. c.* 1223.—Bras.
subulata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 627.— Bras.
tenax, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 179-Gymnanthes pallens.
Thouarsiana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1218.— Madag.
tijneensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 616. —Bras.
tinifolia, *Sw. Fl. Ind.OccM.* 1119.—Jamaic.
tristis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 615.— Bras.
venulosa, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 169 = Sebastiania Grisebachiana.
virgata, Zoll. & Mor. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 416 (Sapii sp.).—Java.
Warmingii, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 626. —Bras.

EXCREMIS, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 354 in nota (1830). *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 7»1.
coarctata. Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 320 -ramosa.
ramosa, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 354 in sjn.— Am. trop.

EXERIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1836) - Eria, Lindl. (Orchid.).

EXITELES, Miera, in Joum. Linn. Soc. xvii. (187») 336 = seq.

EXITELIA, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vii (1838) •= Parinarium, Juss. (Rosac).
corymbosa, Blume, I. c = P. Maranthes.
tnultifiora, Walp. Rep. v. 115 = P. Griflithianum.

EXOACANTHA, Labill. Ic. PI. Syr. i. 10. t. 2 (1791). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. •J27.
heterophylla, *Labill. I. c*—Syria.

EXOCABPUS, Labill. Voy. i. 155. t. 14 (1798) (Exocarpos); Pers. Syn. ii. 561 (1807). *SANTALACEAE.* Benth. & Hook. f. iii. 230.
CANOPUS, Presl, Epim. Bot. 248 (1849).
SARCOCALYX, Zipp. ex Mackl. in Bijdr. Wet. v. 179 (1830).
XYNOPHYLLA, Montr, in Mem. Acad. Lyon, x. (1860) 250.
aphyllus, *R. Br. Prod.* 857.—Austral.
Bidwillii, *Hook./. Fl. N. Zel.* 223. t. 52.—N. Zel.
Casuarinae, *Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 109.— Ins. Sandvic.
ceramicus, *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 691.—Malaya.
ceramicus, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. t. 317 = Muehlenbeckia platyclada.
cupressiformis, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 95 — Gaudichaudii.
cupressiformis, *Labill. Voy.* i. 155.1.11.—Austral.
dasystachyus, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 580 = aphyllus.
Gaudichaudii, *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 690.—Ins. Sandvic.
glandulaceus, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 619 = sparteus.
homaeocladus, *C. Moore V F. Muell. in F. Muell. Fragm.* viii. 9.—Austral,
humifusus, *R. Br. Prod.* 357—Ins. Tasman.
humi/usus, Hook. f. Fl. Tasm. i. 336—nanns.
latifolius, *R. Br. Prod.* 356.—Austral.
leptomerioides,?. Muell. Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 108=aphyllus.
lutonensis, Presl, Epim. Bot. 248 = latifolius.
miniatus, Zipp. in Bull. Férussac, xviii. (18) 92 - latifolius.
nanus, *Hook.f in Hoot. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 281.—Ins. Tasman.
odoratns, *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 689.—Austral.
mains, Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. i. 181 = latifolius.

EXOCABPUS :—
pendulus, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. i. (1856) 42 = sparteus.
phyllanthoides, *Endl. Prod. Fl. Norfolk.* 46.—Ins. Norfolk.
sandvicensis, *Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 109.— Ins. Sandvic.
sparteus, *R. Br. Prod.* 366.—Austral.
spicatus, A. DC. in DC. Prod. xiv. 689 -sparteus.
slrictus, *R. Br. Prod.* 857.—Austial.
strictus, Sieber, ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 692 (Casuarinae sp.).—Austral.
xylophylloides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 249.—Madag.

EXOCABTA, Benth. in Hook. Ic. Fl. t. 1206 (1877)- *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1056.
sclerioides, *Benth. 1. c.*—Austral.

EXOCHAENIUM, Griseb. in DC. Prod. ix. 55 (1845) - Belmontia, E. Mey. (Gentian.).
debile, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 48.— Afr. trop.
grande, Griseb. in DC. Prod. ix. 55 - B. grandis.
primulaeflorum, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 47.-Afr. trop.

EXOCHOH.DA, Lindl. in Gard. Chron. (1868) 925. *ROSACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 612.
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 696. —As. centr.
Davidiana, Baill. Adansonia, ix. (1868-70) 149 *> Nuttallia Davidiana.
grandifloia, *Lindl. in Gard. Chron.* (1858) 925.- China.
Korolkowi, *Lavall. Arbor. Segret.* 89.—Soongar.1
serratifolia, 5. *Moore, in Hook. Ic. PI.* t. 1256.— China.

EXOCROA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 80 (1886) = Convolvulus, Linn.
egyptiaca, Rafin. 1. c. = C. althaeoides.

EXODECONUS, Rafin. Sylva Tellur. 57 (1888) -¥hysalis, Linn. (Solan.).
prostratus, Rafin. 1. c. = P. prostrata.

EXODICLIS, Rafin. Sylva Tellur. 97 (1838) = Aoisanthera, P. Br. (Melast.).
angustifolia, Rafin. 1. a 98 = A. brevifolia.
latifolia, Rafin. 1. c. = A. brevifolia.

EXOGONIUM, Choisy, in *Mim.* Soc. Phys. Geniv. vi. (1833) 443 (Conv. Or. 61)-Ipomoea, Linn. (Convolv.).
arenarium, Choisy, Conv. Rar. 129. t l « l »[re,] naria.
bracteatum, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genév. vi. (1833)443-1. bracteata.
curaiflorum, M09. *8c* Sesse, ex Choisy, in DC. P"*[1]- ix. 886, 347-1. coccinea.
dumosum, Benth. PI. Hartw. 46-1. Purga.
eriospermum, Choisy, Conv. Rar. 180 * I. D*[1]" rousseauxii.
filiforme, Choisy, L c. 129-1. filiformis.
Olivae, Bireena, Viaje Cav. Cacahuam. 29 = 1. bracteata.
pedatum, Choisy, Conv. Rar. 130 - 1 . pedata.
Purga, Lindl. Bot. Reg. (1847) t. 49 = 1. Purga.
racemosum, Choisy, Conv. Rar. 128 = I. reganda.
repandum, Choisy, 1. c. ~1 . bracteata.
spicatum, Choisy, 1. c. ~1 . bracteata.
umbellatum, Mof. & Sesse, ex Choisy, in DC. *?«#•* ix. 836, 847-1. peduncularis.

EXOLEPTA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 1M-Cassandra, D. Don (Ericac).
calyculata, Rafin. 1. c. = C. calyculata.

EXOIiOBUS, Fount, in Mart. Fl. Bras. vi. iv. »[18] (1885). *ASCLEPIADEAE.*
grandiflorus, *Fourn. 1. c.* 319.—Bras,
patens, *Fourn. 1. c.* 318.—Bras,
rotatus, *Fourn. 1. c.* 320.—Bras.
Selloanus, *Fourn. 1. c.* 319.—Bras,
itenolobus, *Fourn. I. c*— Bras.

EXOMIS, Fenil, ex Moq. Chenop. Enum. 49 (1840). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. Hi. 63.
albicans, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 89 =-atriplicioides.
atriplicoides, *Moq. Chenop. Enum.* 49.—Afr. austr.
wyrioides, *Fetal, ex Moq. 1. c*—Afr. anstr.

KXOPHYA, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 63 (1836) = Epidendrum, Linn. (Orchid.).
fuscata, Rafin. 1. c =E. patens.

EXOBBHIZA, Becc. in Ann. Jaid. Buitenj. ii. (1886) 128. *PALMAE.*
Wendlandiana, *Becc. I. c*—Ins. Fiji.

KXOSTEG1A, Boj. ex Decne. in DC. Prod. viii. 628, 530, in syn. (1844) = Cynanohum, Linn. (Asclep.).
filicaulis, Boj. ex Decne. 1. c. 630 (_=*Cynoctonnm repanduni).*—Madag.
aevigata, Boj. ex Decne. 1. c. 528 (= *Cynoetonum*

EXOSTEMMA, Rich, ex Hnmb. & Bonpl. 11. Aeqnin. •• 131. t. 38 (1808) (Exosteraa). *RUBIACEAE*, Uenth. & Hook. f. ii. 42.
angostifolimn, *Roetn. V Schult. Syst.* v. 19.—Ins. &. Doming.
australe, *St. Hil. PI. Us. Bras.* i. t. 8.—Bras, ...
bicolor, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* m. 32.- Peruv.
•"achycarpum, *Soem. If Schult. Syst.* v. 19.—Jamaic.
eanescens, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 359.—Mexic.
capitatum, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 143.—Am. austr.
earibaeum, *Roem. (f Schult. Syst.* v. 18.—Ind. occ.
conacenm, *Roem. V Schult. 1. c.* 20.—Ins. S. Doming.
Mrymbifernm, *Roem. V Schult. 1. c*—Ins. Pacif.
cprymbosum, *Spreng. Syst.* i. 706.—Peruv.
<-onlteri, *Hook. f. ex Hemsl. Diag. PI. Nov.* 32.—Mexic.
Mspidatnm, *St. Hil. PI. Us. Bras.* i. t. 8.—Bras,
aasimiliflorum, *Roem. tf Schult. Syst.* v. 17.—Am. austr.
cllipticum, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. - (1863) 5O4.-Ind. occ.
«onbundum, *Roem. V Schult. Syst.* v. 19.—Ind v°™-.
'ormosum, *Cham. V Schlecht. in Linnaea*, iv. 1,1829) 179.—Braj.
grandifloram, *Hort. ex Regel, Cat. PI. Hart. Aksain.* M—Hab.?
imeatum. *Roem. V Schult. Syst.* v. 18.-Ins. S. doming,
kngicuspe, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 48.—Costa Rica.
'ongifloium, *Roem. V Schult. Syst.* v. 18.—Ins. S. doming'
»ocne*m*i*a*, G. Don, Gen. Syst iii. 482-Remija Macrocnemia.
»ynense, *poepp.* &• *Endl. Nov. Gen. et Sp.* in. 31. »• 237,-Bras
mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 180. ~Mexic.
y.oriim, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 125.-Cu
»>x.olium, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 125.-Cuba. Cuba.
nemifolium, *A. Rich. Fl. Cub. Faneiog.* it. 1- f- Rustia
nemifolium, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 104
°ccidentalis.
parvifl*orum* *Humb. V Bonpl. PI- Aeqmn. i.* W2.—Ind. occ.
PJianum, *Humb. V Bonpl. I. c.* 183.—Peruv.
f"l}Pfiicum, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 113 = Hymenocalycm excelsum.
pontip
Phi
parpureum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 125.-Cuba.
rot ondatuni, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. vm. U868) 504.—Ind occ.
sal ciflium, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 125.-Ind. occ.
Souza
trifl
Va orum, G. *Don, Gen. Syst.* iii. 481.—Jamaic.
bnBulae, A. Rich. Fl. Cub. Faneiog. t. 48 =
t^rviflornm.
^assorii, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 323.-Ins. S. Doming.

^fTYLEB, Schott, ex Spreng. Syst iv. Cur. Post- i 560 1827 *LEGVMINOSAE*, Benth. & Hook. f.
glabra, *Vog. i» Linnaea*, xi. (1837) 898.-Bras.
venusta, *Schoti sp' ex . reng.* &*. iy_Cur_Post Bras. 406.—

EXOSTYLIS, G. Don, Gen. Syst. ii. 454 (1832)=praec

EXOTANTHEBA, Turez. in Roll. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 842. *V/OLARIEAE1*—Cf. Benth. & Hook. *f.* i. 970.
racemosa, *Turct. 1. c.*—Madag.

EXOTHAMNUS, D Don, ex Hook. Comp. Bot Mag. ii. 1.1836) 46- Aster, Toorn. (Compos.).
ilicifolius, D. Don, 1. *c(=Diplopappus ilicifolius).*—Reg. Argent.

EXOTHEA, Macfad. Fl. Jamaic. i. 232 (1887)- Hypelate, P. Br. (Sapindac).
oblongifolia, Macfad. 1. c. = H. paniculata.
paniculata, Walp. Rep. v. 366, in syn. = H. panicnlata.

EXOTHECA, Anderss. in Nov. Act Upsal. Ser. III. ii. (1856) 253=Anthistiria, Lien. (Gramin.).
abyssinica, Anderss. 1. c. = A. abyssinica.

EXOTHOSTEMON. G. Don, Gen. Syst. iv. 82 (1836)-. Prestonia, R. Br. (Apocyn.).
bracteatum, G. Don, Gen. Syst. iv. 82 = Echites bracteata.
contortum, Miers, Apocyn. S. Am. 241 = P. contorta.
gracile, G. Don, Gen. Syst. iv. 82 = Echites gracilis.
javitense, G. Don, 1. c. = Echites javitensis.
macrophyllum, G. Don, 1. c. = Echitei macrophylla.
mollissimum, G. Don, 1. c. = Echites mollissima.
paludasum, G. Don, 1. c. 83-Echites paludosa.
sericeum, Miers, Apocyn. S. Am. 241 = F. sericea.
speciosum, G. Don, Gen. Syst. iv. 82 -= Echites speciosa.

EXPHALOSCHOENUS, Nees, in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 3H8, sphalm. = CEHHALOSCHOENUS, Nees ••Kyachospora, Vahl (Cyperac).

EXTELMA, Dum. Anal. Fam. 26 (1828) = Oxystelmai R. Br. (Asclep.).

EXYDRA, Endl. Fl. Poson. 119 (1830) = Glyceria, R. Br. (Gramin.).
aquatica, Endl. 1. c. = G. oquatica.

EYDISANTHEMA, Neck. Elem. iii. 138 (1790) = Epldendrum, Linn. (Orchid.).

EYDOUXIA, Gaudich. Bot Voy. Bonite, 1.18 (1844-52) -PandanuB, Linn.
Delessertii, Gaudich. 1. c. t. 17. ff. 7, 8-P. oduratissimus.
mixcrocarpa, Gaudich. . c. 1.18. ft*. 1-6 = P. Eydouxia.

EYREA, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 381-Turpinia, Vent. (Sapindac).
vernalis, Champ, ex Benth. 1. c = T. arguta.

EYREA, F. Mnell. in Linnaea, xxv. (1852) 403 = Pluohea, Cass. (Compos.).
rubeliiflora, F. Mnell. 1. e.«P. Eyrea.

EYRYTHALIA, Renealm. ex Borckh. in Roem. Arch, i. I. 28 (,1796)-Qentlana, Tourn.
Amarella, Borckh. 1. c-G. Amarella.
angustifolia, D. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 471 = G. angnstifolia.
auriculata, G. Don, Gen. Syst iv. 187 = G. anriculata.
campestris, Borckh. in Roem. Arch. i. i. 28 =G. campestris.
canaliculata. D. Don, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 96- G. Moorcroftiana.
carinata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 516 = G. carinata.
carinthiaca, Bercht. *tc* Presl, Rostl. i. Gent. 18 = Pleurogyne carinthiaca.
caucasica, Bercht. & Presl, 1. c. «= G. caucasica.
conferta, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 471 = G. conferta.
coronata, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 515 =G. coronata.
dichotoma, Bercht. ft Presl, Rostl. i. Gent. 18»G. dichotoma.
fioribunda, G. Don, Gen. Syst iv. 187-Swertia Chirata.
Gebleri, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 471 =• G. decumbens.

EYRYTHALIA:—
Gebleria, Steud. Norn. ed. II. i. 618=pracc.
germanica, Schrank, PI. Rar. Hort. Monac t. 278 = Gentiana germanica.
glacialis, Bercht. *8c* Presl, Rostl. i. Gent. 18=G. tcnella.
lancifolia, Bercht. & Presl, 1. c - G. Amarella.
nana, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 28 = G. tenella.
obtusifolia, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gent. 18 - G. obtusifolia.
pedunculata, I). Don, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 616-G. tenella.
pratensis, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gent. 18 = G. Amarella.
pulchella, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 336 = G. Amarella.
rotata, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gent. 19 = Pleurogyne carinthiaca.
septemfida, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 28 = fi. septemfida.
sulcata, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gent. 19 = Plenrogyne carinthiaca.
tenella, Buek, DC. Prod. Index, iii. 182 =G. tenella.
uliginosa, Bercht. *Be* Presl, Rostl. i. Gent. 17 » G. Amarella.
umbellata, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 187 - G. aurea.
uniftora, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gent 17 - O. germanica.

EYSELIA, Neck. Elem. i. 199 (1790)=-Galiiun, Linn. (Rubiac).

EYSELIA, Reichb. Iconog. Exot, iii. 16. t. 242 (1830) = Egletes, Cass. (Compos.).
bellidiflora, Reichb. 1. c-Egletes bellidiflora.

EYBENHABDTIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 48». t. 592 (1823). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 492.
VARENNEA, DC. Prod. ii. 622 (1825).
VIBORQUIA, Orteg. Hort. Matr. Dec. 66. t. 9 (1798), nomen prins.
adenostylis, *Baill. Adansonia*, ix. (1870) 239.—Guatemala,
amorphoides, *H. B. ty K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 489.—Mexic.
Drummondii, Tore. & Gray, Fl. N. Am. i. 6»0 - amorphoides.
orthocarpa, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 33!) = amorphoides.
spinosa, *Engelm. ex A. Gray, in Bost. Joum. Nat. Hist.* vi. (1850) 174.—Texas.
texana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 462-amorphoides.

ETSTATHE8, Lour. Fl. Cochinch. 234 (1/90). *INC. SED.—Ci.* Benth. & Hook. f. i. 392.
sylvestris, *Lour. I. e.* 285.—Cochinch.

F

FABA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735)= Viola, Linn. (Legurnin.).
angustifolia, Bernh. Syst. Verz. Erf. 260 - V. sativ.i.
bengalensis, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 435, in obs. * Strychnoj Ignatii ?
Bona, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1797) 860=V. narbonensis.
equina, Medic. 1. c. = V. narbonensis.
major, Desf. Tabl. ed. I. 196=V. Faba.
minor, Roxb. Fl. Ind. iii. 323, in obs. = V. I aba.
narbonensis, Schur, in Verh. \»turf. Ver. Bruenn. xv. II. (1877) 192 = V. narbonensis.
sativa, Bemh. Syst. Verz. Erf. 250 - V. Faba.
sepium, Bernh. 1. c.=V. sepinm.
serratifolia, Fuss, Fl. Transs. 179=V. narbonensis.
vulgaris, Moench, Meth. 160=V. Faba.

FABAGO, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 507 (1763;* Zygophyllum, Linn.
alata, Moench, Meth. Suppl. 90-Z. Fabago.
major. Sweet, Brit. Flow. Gard. vi. t. 226=Z. Fabngo.
fiortulacaefolius. Medic, in Vorlcs. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 218 - Z. simplex.

FABERA, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cnr. xxi. (1845) 12» = Hypochoeris, Linn. (Compos.).
ereiensis, Sch. Bip. 1. c. 186 = H. cretensis.
hispida, Sch. Bip. 1. c. 131 - H. cretensis.

FABIANA, Ruiz & Pav. Prod. 22. t. 81 (1794). *SOLAN ACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 905.
biflora, *Reiny, in C. Gay, Fl. Chit.* v. 41.—Chili,
bryoides, *Phil. Fl. Atac.* 40.—Chili,
cordifolia, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 590.—Chili,
densa, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 227.—N. Grnnat.
denudata, *Miers, in Huok. Land. Journ. Hot.* v. (1840) 168.—Chili.
ericoides, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 590.—Chili,
grandiflora, *Dun. I. c.* 591.—Chili,
heterophylla, *Dun. 1. c.* 598.—Urns.
Hieronymi, *Niederl. in Roca, Exped. Rio-Negro,* ii. 258.— Patagon.
imbricate, *Ruis V Pav. Fl. Per.* ii. 12.1.122.—Pernv.
lanuginosa, *Hook. If Am. Bot. Beech. Voy.* 35.—Chili,
l'eckii, *Niederl. in Roca., Exped. Rio-Negro,* ii. 258.— Patagon.
petunioides, *Griseb. in Coett. Abh.* xxiv. (1879) 242.— Reg. Argent.
Sellowiana, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 592.—Bras,
squamuligera, *Dun. I. c.* 591.—Chili.
thymifolia, St. Hit. in Mem. Mus. Par. xii. (1825) 317 -Petunia thymifolia.
viscosa, *Hook, (f Am. Hot. Seech. Voy.* 36.—Chili.

FABRENIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1700) ed. I. Art. iv. 2=Anacardium? Linn.

FABKTA, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 185, nomcn (1843) -Ruellia, Linn. (Acanth.).
cordifolia, Nees, in DC. Prod. xi. 114 = R. ovata.
pilosa, Nees, 1. c = R. pilosa. *Linn*,
rigida, E. Mey. Zwei Pfl. Docum. 185 « K. pilosa, ***Linn.***

FABRICIA, Adans. Fam. ii. 188 (1763) - Xavandula, Toorn. (Labiat.).

FABRICIA, Gaertn. Fruct. L 175. t. 35. f. 4 (1788) = Leptospermum, Forst. (Myrtac).
angustifolia, *Otto, ex DC. Prod.* iii. 226 = Agonis marginata.
bracteata, Koxb. Hort. Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 476.— Ins. Molucc.
coriacea, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 147 = L. laevigatum.
incana, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 387 = L. pubescens.
laevigata, Gaertn. Fruct. i. 175. t. 35 « L. laevigatum.
minor, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 387 = L. pubescens.
myrtifolia, Gaertn. Fruct. i. 175. t. 35 = L. Fabricia.
myrtifolia, Hort. Angl. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vii. 278 = L. pubescens.
myrtifolia, Hort. ex Heynh. Nom. ii. 70 — Agonis marginata.
myrtifolia, Sicber, ex Benth. Fl. Austral, iii. 103- L. laevigatum.
pubescens, Hort. ex Schaa. in Linnaea, xv. (1841) 422 =L. pubescens.
sericea, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 155 =L. pubescens.
stricta, Lodd. Bot. Cab. t. 1219 = Agonis marginata.

FABRICIA, Scop. Introd. 307 (1777) = Alystcarpus, Neck. (Legum.).

FABRICIA, Thunb. in J. C. Fabric. Reise naoh Norw. 23 (m9) = Cureuligo, Gaertn. (Amaryllid.;.
alba, Thunb. 1. c. 26- Hypoxis alba.
amoena, Salisb. Prod. 244 = Veltheima viridifolia.
glauca, Salisb. 1. c. 245 = Veltheimia glauca.
minuta, Thunb. in J. C. Fabric. Reise nach Norw. 25 — Pauridia hypoxidioides.
plicata, Thunb. 1. c 29-C. plicata.
serrata, Thunb. 1. c. = Hypoxis serrata.
stellata, Thunb. 1. c. 27-Hypoxis stellata.
lillosa, Thunb. 1. c. 31-Hypoxis villosa.

FABRITIA.Medic. in Staatsw. Vorks. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 280 - FABRICIA, Adans. = Lavan**dula,** Toum. (Labiat.}.

FACCHINIA, Reichb. Ic. Fl. Germ. xv. 29 (1841) = Arenaria, Rupp. (Caryophyll.).
lanceolata, Rekhb. I. c. = A. lanoeolata.

FACELIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 94; et in Diet. Sc Nat. xvL 104 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 304.
LEPTALF.A, D. Don, ex Hook. & Am. mComp. L'ot. Mag. i. (1885) 102.
PTEROI-OGON, Fenzl, in Flora, xxii. (1889) II. 727.
apiculata, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xvi. 104.—Am. austr.
plumosa, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 632, nomen.—Boliv.
retusa, *Sch. Hip. 1. c*, nomen.—Boliv.

FAPGENIA. Ijnrll. Veg. Kingd. 295 (1847), sphatei.- FADYENIA, Endi.-Garrya, Dougl. (Comae.).

FADOGIA, Schweinf. Rel. Kotsch. 47. t. 32 (1868). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook; f. ii. 111.
PACKVSTIGMA, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 234.
agrestis, *Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 154.—Afr. trop.
ancylantha, *Schweinf. 1. c.* IDS.—Afr. trop.
Cienkowskii, *Schweinf. Rel. Kotsch.* 47.—Afr. trop.
fuchsioides, *Schweinf. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) 85. t. 50.—Afr. trop.
glaberrima, *Welw. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 155.—Afr. trop.
lactiflora, *Welw. ex Hiern, I. c.* 156.—Afr. trop.
leucophloea, *Hiern, 1. c.* 153.—Afr. trop.
stenophylla, *Wet™, ex Hiern, 1. c.* 155.—Afr. trop.
Zcyheri, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1860) 66.—Afr. austr.

FADVKNIA, End). Gen. Suppl. ii.80(1842)=Garrya, Dougl. Cornac).
Hooieri, Endl. 1. c. Suppl. iv. 38 = G. Fadyena.
laurifolia, Endl. 1. C.--G. laurifolia.
macrophylla, Endl. 1. c. = G. maorophylla.
oblonga, Endl. 1. c. = G. oblonga.
ovata, Endl. 1. c:=G. ovata.

FAENICULUM, Hill, Hort. Kew. 103 (1769)«Foeniculum, Tourn. (Umbell.).

FAETIDIA, Comm. ex Juss. Gen. 325 (1789)-Foetidia, J. F. Gmel. (Myrtac.).

FAGARA, Linn. Syst. ed. X. 897 (1759)-Zanthoxylum, Linn. (Rutac).
acuminata, Sw. Prod. Veg. Inl Occ. 33 = Z. acuminatum.
affinis, Schult. Mant. iii. 224 = Z. affine.
alata, Eckl. & Zeyh. Enum. 118=Z. alatum, *Steud.*
Ariscorina, Roxb. Horl. Beng. 11.—Ind. or.
armata, Thunb. Prod. PI. Cap. 28-Z. Thunbergii.
australis, Cunn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 623 - '/.. australc.
Avicennae, Lara. Encyc ii. 445 — Z. Avicennae.
Budrunga, Roxb. Hort Beng. 11; Fl. Ind. i. 417 - Z. Budrunga.
capensis, Thunb. Diss. Med. Afric. 6 (*Elaphrium capense).*—Afr. austr.
decandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 66 = Bnchanania florida.
dubia, Willd. ex Schult. Mant. iii. 228 = Fraxinns Schicdeanii.
dumosa, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 170 = Z. dumosum.
Elaphrium, Willd. Sp. PI. i. 668 = Canarium mauritianum.
emarginata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 33 = Z. emarginatum.
Evodia, Linn. f. Suppl. 125 = Evodia hortensis.
fraxinifolia, Lam. Illustr. i. 334 = Z. Clava-Herculis.
glabra, Blume, Cat. Gew. Buitcnz. 40 — Evodia glabra.
gracilis, (iriseb. Cat. PI. Cub. 48 - Z. gracile.
guianensis, Lam. Encyc. ii. 446 =-Z. hermaphroditum.
heterophylla, Lam. 1. c. 445-Z. helerophyllum.
horrida, Thunb. in Trans. Linn. Soc ii. (1794) 329 = Z. horridum *(vel* Gleditsia japonica).
inermis, Willd. ex Schult. Mant. iii. 227 = Z. Culantrilo.
lentiscifolia, Humb. *8c* Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 165 = Z. Pterota.

FAGARA:—
Lunu-Ankenda, Gaertn. Fruct i. 331 •= Evodia Roxburghiana.
martinicensis, Lam. Illustr. i.334=Zanthoxylummartinicense.
mierophylla, Desf. Tabl. ed. I. 200-Z. tragodes.
monophylla, Lam. Illustr. i. 331 = Z. ochroxylum.
nitida, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 419 = Z. nitidum.
obtusifolia, Schult. Mant. iii. 222= Evodia obtusifolia.
octandra, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 64 - Mellcope tcrnata.
octandra, Linn. Mant. i. 10-Bursera tomentosa.
pentandra, Aubl. PI. Gui. i. 78=Z. hermaphroditnm.
peruviana, Willd. ex Schult. Mant. iii. 228 = Z. affine.
phylloptera, Griseb. Cat. PI. Cub. 48-Z. phylloptcrum.
pimpinelloides. Lam. Illustr. i. 834 = Z. pimpinelloides.
piperita, Blanco, Fl. Hlip. ed. I. 64 = Z. oxyphyllum.
piperita. Linn. Syst. ed. X. 897 =Z. pimpinelloides.
piperita. Lour. Fl. Cochinch. i. 101-Z. nitidum.
Ptertta, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 66 = Z. Avicennae.
Pterota, *Linn. Syst.* ed. X. 897-Z. Pterota.
Rhetsa, Roxb. Hort. Beng. 11; FL Ind. i. 417 = Z. Rhetsa.
schinifolia, Salisb. Prod. 67=Z. tragodes.
spinifex, Jacq. Fragm. 10 = Z. spinifex.
spinosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 33 = Z. spinosum.
stenoptera, Griseb. Cat. PI. Cub. 48 = Z. stenopterum.
tragodes, Jacq. Enum. PI. Carib. 12 = Z. tragodes.
***trifoliata*, Prod. Veg. Ind. Occ. 83 = Z. ternatum.**
triphylla, Lam. Encyc. ii. 447 « Evodia triphylla.
triphylla, Lour. Fl. Cochinch. 82.—Cochinch.
triphylla, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. **416**- Evodia Roxburghiana?
lanthoxylaides, Lam. Encyc ii. 446 = Z. senegalense.
leylanica, J. F. Gmel. Syst. 258- Evodia Roxburghiana.

FAGARASTRUM, G. Don, Gen. Syst. ii. 87 (1832)- Clausena, Uurm. f. (Rutac).
anisatum, G. Don, Gen. Syst. ii. 87=C. anisata.
capense, G. Don, 1. c. = Zanthoxylum capense.
inaequale, G. Don, 1. c.=C. inequalis.
natalense, Walp. Rep. iv. 113, Index=Cnestis natalensis.
Thunbergii, G. Don, Gen. Syst. ii. 87 = Zanthoxylum Thunbergii.

FAGELIA, Neck. Elem. iii. 11 (1790). *LEGUMINOS AE*, Benth. & Hook. f. i. 511.
bituminosa, *DC. Prod.* ii. 889.—Afr. austr.
flexuosa, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 98 = bituminosa.
pubescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 257 - Rhynchosia viscidula.
resinosa, Hochst in Flora, xxiv. (1811) I. Intell. 32« Rhynchosia resinosa.
viscida, Eckl. & Zeyh. Enum. 257 = Rhyncbosia viscidula.

FAGELIA, Schwencke, in Verh. Bat. Gen. Roterd. i. (1774) 474.1.13 = Calceolaria, Linn. (Scrophul.).
flavicans, J. F. Gmel. Syst. 40-C. pinnata.

FAGOIDES, Banks *Sc* Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist ii. (1839) 210 - Alseuosmia, A. Cunn. (Caprifol.).
triloba. Banks & Soland. ex A. Cunn. 1. c. = A. Banksii.

FAGONIA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I (1785). *ZYGOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 267.
acerosa, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 124 = cretica.
arabica, Linn. Sp. PI. 386 = creticn.
armata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64-cretica.
aspera, *C. Gay, Fl. Chit.* i. 470—Chili.
Aucheri, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 62"—cretica.
Bruguieri, DC. Prod. i. 704 = cretica.
californica, Benth. Bot. Voy. Sulph. 10 = crctica.
chilensis, Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. i»- (1833) 165 ^cretica.
cistoides, Dclile, ex T. Anders, in Joum. Linn. Soc. v. Suppl. i. (1860) 11-cretica.
cretica, *Linn. Sp. PI.* 386.—Europ. austi.; Oriens; Afr. bor.; Am. bor. et austr.
deflexa, Moench, Meth. Suppl. 82=cretica.

FAGONIA:—
diversifolia, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 112 = cretica.
nhinella, Boiss. 1. c. Ser. I. viii. 123-cretica.
Ehrenbergii, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot Ges. Wien, xviii. (1868) 659-cretica.
elongata, Salisb. Prod. 819 -cretica.
erecta. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1-cretica,
Porskilii, Pfund, in Flora, lvii. (1874) 414-cretica.
fruticans, Coss. ex T. Anders, in Joum. Linn. Soc. v. Soppl. i. (i860) 12-cretica.
g'tula, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 338-cretiea.
glutinosa, Delile, Fl. Egypte, 230. t. 28. f. 2-cretica.
grandiflora, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 121 = cretica.
t'spanica, Linn. Sp. PI. 386-cretica.
ndica, Bum. f. Fl. Ind. 102-cretica.
tahirina, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 122-cretica.
latifolia, Delile, Fl. Egypte, 230. t. 28.f. 3-cretica.
Mayana, Schlecht. in Hot. Zeit. ix. (1851) 844 = cretica.
microphylla, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 888 = cretica.
mollis, Delile, Fl. Egypte. 220. t. 28. f. 3 = cretica.
montana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 596 - Azima tetracantha.
nyriacantha, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 123= cretica.
"ysorensis, Heyne, ex Roth, Nov. Sp. PI. 215 - cretica.
Oliverii, DC. Prod. i. 704-cretica.
onenulis, *Presl, Delic. Prag.* 23.—Oriens.
Porviflora, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 124-cretica.
Persica, DC. Prod. i. 704-cretica.
scabra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 88-cretica.
^chimperi, Presl, Bot. Bemerk. 80 = cretica.
«»a»Va, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 61=cretica.
svlnnermis, Boiss. 1. c. 62-cretica.
""m/ofta, Steud. & Hochst. ex Boiss. Fl. Orient, i. 909 .. -cretica.
"tebaica, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 121=cretica.
vir'ns, Coss. ex T. Anders, in Joum. Linn. Soc. v. Suppl. i-(I860) 12=cretica.
*vis*crfa, Presl, Bot. Bemerk. 80-cretica.
viscosa, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient, i. 904=cretica.

FAGOPYRUM, Toum. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 2(1742). *POLYGONACEAE*, Benth. & Hook. f. **in. 99.**
FAGOTRITICUM, Linn, in Vet. Acad. Handl.(1744) - *17. t. 4.
KUNOKALE, Rafin. Fl. Tellur. iii. 12 (1836).
"iEGOPYRUM, Peterm. Fl. Bienito, 92 (1841).
*c<*rinatum*, Moench, Meth. 290 = Polygonum Convolvulus.
c??al'> Ra6n. Fl. Tellur. Hi. 10=esculentum.
"*??' Rafin. 1. c.=cymosum!
"assifolium, *Rafin. I.* c.-Hab. ?
cymosum, *Meissn. in Wall. PI. As. Rar.* iii. 63.—Reg. Himal.; China.
dentatu«, Moench, Meth. 290=tataiicum.
Dryandri, Hort.ex Fend, in Linnaea, xxiv. (1851)282 = esculentum.
dumetorum, dumetorum. Schreb- sPicil- F1'iPs- 42 = Polygonum
emarginatum, lentum. Moench> **Methl Supp** L 10o = escu..
esculentum, *Moench, Metk.* 290.—Europ.; As. bor.
membranaceum, Moench, l. c. = Polygonum dumetorum.
fe^H^afwn, Rafin. Fl. Tellur. iii. 10=Polygonum Penolıatum?
TM»»*zra«, Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) M 1,7-tataricum.
safr'tatum> Gil'b- Exercit. ii. 485 -esculentum.
«,AJ "•"•• Dum- H- Belg. Prod. 18-esculentum.
suR??'"'*"1' Gilib. Exercit. ii. 486-esculentnm?
Sc S Sm. osum, P Sckmidt, *Reis* Amurl 17o Ins tataricum, As. bor.
triangular *Gaertn. Fruct.* ii. 182.1.119. f. 6.—Europ.; **cymosum.** Meissn **Gilib. Exercit.** Wall. PI As. Rar. iii. 63 = volubi ut »5=Polygonum Convolvu
'*'*"'• T- Nees, Gen. PI. Monochl. 68-esculentum.

GOTRITICUM, Linn, in Vet Acad. Handl. Stockh. (1744) 117. t. 4 -**Fagopyrum,** Toum. (Polygonac).

FAGI ^ ^ T h n n b . in Vet Acad. Handl.Stockh. (1782) 125 ti. **** A 0T> Gen- ** *WW- LOGANIACEAE,* Ben th. ft Hootf.fi. 794.

FAOBAEA:—
CYRTOPHYLLUM, Reinw. ex Blume, Cat Gew. Buitenz. 47 (1823); et Bijdr. 1022 (1826).
KENTIA, Stend. Norn. ed. II. i. 845 (1840).
KUHLIA, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Buitenz. 51 (1823).
PICROPHLOEUS, Blame, Bijdr. 1019 (1826).
UTANIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 663 (1837).
amboinensis, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 166.— Ins. Amboin.
appendiculata, Blume, 1. c. 169-morindaefolia.
auricularia, Benth. in Joum. Linn. Soc i. (1857) 98 = seq.
auriculaU, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 82. —Burma; Malaya.
Berteriana, *A. Gray, ex Benth. in Journ. linn. Soc.* i. (1857) 98.—Ins. Pacific.
Bluniri, G.Don, Gen. Syst. ir. 69=obovata.
borneensis, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 21.—Borneo,
camosa, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 81.—rlunna; Malaya,
ceilanica, *Thunb. in Vet. Aiad. Handl. Stocth.* (1782) 182 ; *Nov. Gen.* 85.—Zeylan.
celebica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 167=obovata.
coarctata, Blume, Rumphia, ii. 33=racemo3a.
congesta, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 168.— Sumatra.
cordifolia, *Blume, Rumphia*, ii. 88.—Ins. Molucc.
coromandelina, Wight, Ic. iv. t. 1316 - obovata.
crassi/olia, Blume, Rumphia, ii. 31. t. 78. f. 1 = obovata.
crassipes, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1867) 99— Borneo,
crenulata, *Maingay, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 83.—Malacca.
cuspidata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 170 - morindaefolia.
dubia. Wall. Cat. n. 4456 - Tenutroemia penangiana.
elliptica, *Roxb. Hort. Seng.* 84; *Fl. Ind.* i. 462.—Ins. Molucc.
euneura, *Scheff. in Flora,* Iii. (1868) 808; *et in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1S70) 20.—Ins. Molucc.
fastigiata, *Blume, Rumphia*, ii. 29, in obs. t. 76.—Ins. Sunda.
Forstenii, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 168—Ins. Celebes,
fragrans, *Roxb. Hort. Beng.* 84; *Fl. Ind.* i. 461.— Burma; Malaya,
fuscescens, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 168.— Sumatra.
Gardner!, Thw. Enum. PI. Zeyl. 200 = obovata.
globosa, Wall. Cat. n. 1598-obovata.
gracilipes, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1868-59) 823.—Ins. Pacific,
grandis, *Panch. V Sebert, Not. Bois Nouv. Calid.* 184. —N. Caled.
heterophylla, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 168.— Borneo.
imperialis, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 872 - auriculata.
khasiana, *Benth. in Journ. Linn. Soc. i.* (1857) 09.— Reg. HiraaL
Kimangu, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 178__ Java.
lanceolata, *Blume, Bijdr.* 1021.—Java.
lanceolata, Wall. Cat n. 1599-Wallichiana.
latifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 869.-Sumatra.
Leschenaultii, *Blume, Rumphia*, ii. 80, in obs.—Java,
ligustrina, *Blume, I. c.* 83.—Malaya,
litoralis, *Blume, Bijdr.* 1021.—Java.
litoralis, Korth. ex Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 168 -heterophylla.
Maingayi, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind. iv.* 84.—Malaya.
malabarica, Blume, Rumphia, ii. 29-obovata.
malabarica, *Wight, Ic. 1.*1317.—Ind. or.
malayana, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 91.—Malaya,
minor, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 1021.—Java,
monantha, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 378—Sumatra,
morindaefolia, *Blume, Rumphia*,ii.32. t 78.—Malaya; Austral.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral*, iv. 388.—Austral.
obovata, Griff. Notul. iv. 36-malabarica.
obovata. *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 38.— Ind. or.; Malaya.
obovata-javana, Blume, Rumphia, ii. 29=praec.
oxyphylk, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 371.—Malaya.

FAOHAEA:—
peregrina, Blume, Rumphia, ii. 84. t. 80-fragrans.
picrophloea, *Blume, I. c.* 36.—Borneo,
plumeriaeflora, *DC. Prod.* ix. 29.—Ins. Philipp.
pluneriaefolia, Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1867) 98 — praec.
racemosa, *Jack, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 35.— Malaya.
robusta, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat i. 170 = morindaefolia.
rostrata, *Blume, Rumphia*, ii. 81. t. 76. f. 2.—N. Guinea.
scholaris, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 93=cordifolia.
spedosa, *Blume, Rumphia*, ii. 35. t. 81.—Java,
splendens, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 168.— Borneo.
subreticulata, *Blume, 1. c.* 171.—Java,
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 877.—Sumatra,
teraatana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 217.— Ins. Teraate.
tetragons, *Span, in Linnaea*, xv. (1841) 326.—Ins. Timor.
Thwaitesii, F. Muell. Fragm. ii. 137 = morindaefolia.
truncata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 166.—Ins. Celebes.
tubulosa, *Blume, 1. c.* 167.—Sumatra,
valida, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 376.—Sumatra.
m'ridiflora. Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 259 — gracilipes.
vitiensis, Seem. Viti, 439, nomen-Oleavitiensii.
volubilis, Jack, iu Roxb. Fl. Ind. ed. **Carey,** ii. 36 - racemosa.
Wallichiana, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* i. (1867) 98. —Ins. Penang.
teylandica. Seem. Fl. Vit. 165, in obs.—seq.
Beylanica, Murr. Syst. Veg. ed. XIV. 198 = ceilanica.

FAGTTETIA, March. Rev. Anacard. 174. t. 2 (1869) ***ANACARDIACEAE.***
falcata, *March. I. c.* 175.—Madag.

FAOUS, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735). *CUPULIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 410.
CALUCECHINUS, Hombr. *8c* Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 19 (1853).
CALUSPARASSUS, Hombr. & Jacquinot. ex Decne. L c. 20 (1868).
LOPHOZONIA, Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mote. (1858) i. 896.
MVRTILLOIDES, Banks & Soland. ex Hook. Ic. PI. t. 639 (1844).
NOTHOFAGUS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 307 (1850).
PHEGOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 183.
aenea, Dum.-Cours. Bot Cult. ed. II. vi. 415 = sylvatica.
alba. Rafin. Fl. Ludov. 134; New Sylva, 80 - ferrugmea.
alpina, *Poepp.* CT *Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 69.1.196, 198 A.—Patagon.
alpina, Poepp. ex A. DC. Prod. xvi. II. 120=antarctica.
americana. Sweet, Hort. Brit. ed. L 870—ferruginea.
antarctica, *Forst.f. in Comm. Gotting.* ix. (1789) 24.—Reg. Magellan,
apiculata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 386.—N. Zel.
argentea, Blume, in Flora, vii. (1824) 291-Castanoplisargentea.
aspleni/olia, Dnm.-Cours. Bot Cult ed. II. vi. 416; Rafin. New Fl. Am. iii. 82=sylvatlca.
betuloides, *Mirb. in Mim. Mus. Par.* xiv. (1827) 469. t 25.—Reg. Magellan.
Blairii, 7. *Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1886) 297 ; 806.—N. Zel.
Carronii, C. Moore, ex Benth. Fl. Austral, vi. 211 — Moorei.
Costarica, Linn. Sp. PI. 997 -Castanea sativa.
clifibrtioides, *Hook.f. in Hook. Ic. PL* t. 678 & t 816, —N. Zel.
cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. 571=Castanea chinensis.
comptonii/olia, Desf. Tabl. ed. II. 269-sylvatica.
crenata, Blume, Mug. Bot Lugd. Bat. i. 307=. Sieboldii.
cristata, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 415 a sylvatica.

FACTS:—
Cunninghamii, *Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 152. t 7.—Austral.
cuprea, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvL II. 119 = sylvatica.
Dombeyi, *Mirb. in Mim. Mus. Par.* xiv. (1827) 467. t. 24.-Chili.
dubia, Mirb. 1. c. 471. t. 26=betuloides.
echinata, Gilib. Exercit. ii. 896—sylvatica.
ferruginea, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 362.—Am. bor.
ferruginea, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 25=Sieboldii.
Forsteri, Hook. Jonra. Bot. ii. (1840) 156=betuloides.
fusca, *Hoot. f. in Hook. Ic. PI.* t. 630, 681.—N. Zel.
glauca, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 43.—Chili,
glutinosa, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 68. t. 194.—Chili.
grandifolia, Ehrh. Beitr. 22=ferruginea.
Gnnnii, *Hook./, in Hook. Ic. PI.* t. 881__Tasman.
heterophylla, Rafin. Herb. 22=ferraginea.
javanica, Blnme, in Flora, vii. (1824) 295 = Castanopsis javanica.
laciniaia, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. H. 119-sylvatica.
latifolia, L'Heirit. ex Stead. Norn. ed. II. i. 624 = ferruginea.
lutea, Molina, ex C. Gay, Fl. CbiL i. 483=Zanthoxylum Maya.
Menziesii, *Hook.f. in Hook. Ic. PI.* t. 652.—N. Zel.
Montagnii, *Hombr. V Jacquinot, Bot. Voy. Pole Sud,* t. 8?f. 11.—Chili.
Moorei, *F. M-uell. Fragm.* v. 109.— Austral.
nana, Doroi, ex Steud. Norn. ed. II. i. 624=Castanea pumila.
nervosa, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 43.—Chili.
nigra, Rafin. Herb. 22; New Fl. Am. iii. 81=ferruginea.
niÜdaJ°A>/- ;» « *Linnaea,* xxix. (1857-58) 44.—Chili,
obliqna, *Mirb. in Mim. Mus. Par.* xiv. (1827) 465. t.28.—Chili.
pendula, Dum.-Conre. Bot. Cult. ed. II. vi. 415=. sylvatica.
philippensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 603 - Castanopsis sumatrana.
procera, Phil, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 120= obliqua.
procera, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 69.1.197.—Chili.
procera, Salisb. Prod. 391=Castanea gativa.
pumila. Linn. Sp. PI. 998 =Castanea pumila.
Pumilio, Poepp. *Sc* EndL Nov. Gen. et Sp. ii. 68. t 195-antarctica.
purpurea, Desf. Tabl. ed. I. 214-femiginea.
purpurea, Dum.-Conn. Bot. Cnlt. ed. II. vi. 415-sylvatica.
rotundifolia, Rafin. Herb. 22; AtL Jonrn. 177 = ferrnginclt*
salidfolia, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 119—sylvatica.
Sieboldii, *Endl. Gen. Suppl.* iv. II. (1847) 29.—Japon.
Sofandri, *Hook. f. in Hook. Ic. PI.* t. 699 et t. 816.—N.Zel.
sylvatica, *Linn. Sp. PI.* 998.—Enrop.
sylvestris, Gaertn. Frnct. i. 182=praec.
sylvestris, Michx. Hist. Arbr. Am. Sept. ii. 170 - ferruginea.
uliginosa, Phil, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 120= antarctica.
valdiviana, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 286 = obliqua.
variegata, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 119 = sylvatica.
virginiana, Hort. ex Wesmael, in Boll. Congr. Bot. Brux. (1864) 261=ferruginea.

FAHRENHEITIA, Reichb. f. *Sc* ZoU. in Linnaea, xxyiii. (1856) 600-Ostodes, Blnme (Euphorb.).
collina, Reichb. f. & ZoU. 1. c—Java.

FAKELOBA, Rafin. Sylva Tellnr. 69 (1838) - Anthyllis, Linn. (Legnmin.).
cretica, Rafin. 1. c.=A. Hermanniae.

FALCABIA, Riv. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 279 (1745); Host, Fl. Austr. I. 381 (1827). *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 892.
CRITAMUS, Bess. Enum. PL Volh. 93 (1821).
DRBPANOPHYLLUM, Hoffm. Gen. Umb. ed. I. 109 (1814), partim.
PRIONITIS, Adans. Fam. ii. 499 (176S).
carvifolia, C. *A. Mey. Beitr. Pfl. Russl.* i. 14.—Rossia.
dahurica, DC. Prod. iv. 110-Apium lineare.
diversifolia, DC. L c. = Carum diversifolium.
glauca, Dulac, FL Hautes-Pyr. 851=vulgaris.
Javanica, *DC. Prod.* iv. 110.—Java,
laciniata, *DC. I. c*—Java.
latifolia, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 313=Carum latifolium.
pastinadfolia, Reichb. f. Ic Fl. Germ. xxxi. 12. t. 1863=Carum latifolium.
Rivini, Host, Fl. Austr. L 381 = vnlgaris.
Saxifraga, Reichb. f. Ic FL Germ. xxxi. 12-Carum Bunius.
sioides, Aschers. Fl. Brandenb. 241=vnlgaris.
vulgaris, *Bemh. Syst. Vert. Erf.* 176.—Europ.; Oriens.

FALCATA, J. F. Gmel. Syst. 1181 (1791)=Amphicarpaea, £11. (Legumin.).
caroliniana, J. F. Gmel. 1. c.=A. monoica.

FALCATULA, Brot. Phyt Lnsit 160. t 68 (1801) •= Trlgonella, Linn. (Legnmin.).
falsotrifolium, Brot. 1. c. = T. omithopodiodes.
monspeliaea, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 360 - T. monspeliaea.

FALCKIA. Thunb. Nov. Gen. 17 (1781) - Falkia, Linn. f. (Convolv.).

FALCONERA, Salisb. Gen. PL Fragm. 36 (1866) = Albuca, Linn. (Liliac.)-
fastigiata, Salisb. 1. c - A. fastigiata.
spiralis, Salisb. 1. c.=A. spiralis.
viseosa, Salisb. 1. c A. viscosa.

FALCONERA, Wight, Ic. v. 20 (1852) «= FALCONERIA, Royle=Sapiiun, P. Br. (Euphorb.).

FALCONEHIA, Hook. £ Ic PI. t 1438 (1883). *SCROPHULARINEAE.*
himalaica, *Hook. f. I. c*—Reg. HimaL

FALCONERIA, Royle, Illnstr. Bot. Himal. 854. t. 84 a (1839)-8apium, P. Br. (Euphorb.).
insignis, Royle, 1. a=»S. insigne.
malabarica, Wight, Ic. t. 1866 - S. insigne.
Walliehiana, Royle, Illnstr. Bot Himal. 854 = S. insigne.

FALDERMANNIA, Tnutv. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. vi. (1840) 186-Ziaiphora, Linn. (Rnbiac).
parmftora, Trautv. 1. c. vii. (1841) 21 - Z. tenuior.
taurica, Trautv. L c. vi, (1840) 186 = Z. tanrica,

FALIMIRIA, Bess, ex Reichb. Consp. 54 (1828) = Oaudinia, Beauv. (Gramin.).
bronwides, Bess, ex Steud. Norn. ed. II. i. 625=G. geminiflora.
coarctata, Bess, ex Steud. 1. c = G. geminiflora.

FALKEA, Koen. ex Steud. Norn. ed. II. i. 625, 194 (1840)=Begonia, Linn.
tenera, Koen. ex Stend. 1. c - B. tenera.

PALKEA, Linn. f. Suppl. 80 (1781). *CONVOLVULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 878.
FALCKIA, Tbunb. Nov. Gen. 17 (1781).
oblonga, *Bernh. in Flora,* xxvU. (1844) 830.—Afir. austr.
repens, *Linn.f. Suppl.* 211.—Afr. austr.

FALLOPIA, Adans. Fam. ii 274, 277 (1763) ^ Brunnichla, Banks (Polygon.).

FALLOPIA, Lour. FL Cochinch. 335 (1790) - Orewia, Linn. (TUiac).
nervosa, Lour. 1. c 836=G. microcos.

PALLUOIA, Endl. Gen. 1246 (1840). *ROSACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 618.
mexicana, Walp. Rep. ii. 46=paradoxa.
paradoxa, *Endl. Gen.* 1246.—N. Mexic.

FALONA, Adans. Fam. ii. 496 (1768) = Cynosurus, Linn. (Gramin.).

FALOPIA, Stend. Norn. ed. I. 333 (1821) = FALLOPIA, Adans.-Brvmniohia, Banks (Polygon.).

FAMAREA, Vitm. Summa, i. 357 (1790), sphalm. " Faramea, Anbl. (Rnbiac).

FAmmriA, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 235 (1868). *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Se* Hook. f. ii-760.
caloglossa, *Harv. 1. c.*—Afr. austr.

PABADATA, F. Muell. Fragm. v. 21 (1865). *VERBENACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1154.
amicorum. Seem, in Journ. Bot. iii. (1865) 258=Clerodendron amicorum.
ovalifolia, *Seem. I.* c—Ins. Fiji,
papuana, *Scheff. in Ann. Jard. Buiten**. i. (1876) 42.—N. Guinea.
splendida, *F. Muell. Fragm.* v. 21.—Austral,
vitiensis, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 258.—Ins-FijL

PABAMEA, Aubl. PI. Gui. i. 102. t. 40 (1775)-*RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 121.
ANTONIANA, TUSS. Fl. Antill. ii. «2. t. 16 (1818).
DARLUCA, Rafin. in Ann. Gen. Sc. Phys. vi. (1820) 87.
ENCOPEA, Presl, in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 513 (Bot. Bemerk. 83).
FAMAREA, Vitm. Summa, i. 357 (1790).
HOMALOCLADOS, Hook. f. in Benin. *Sc* Hook. f. Genii. 122 (1873).
NELEIXA, Rafin. New Fl. Am. iv. 55 (1836).
OMALOCLADOS, Hook. f. Ic PL t 1128 (1873).
POTIMA, Hedw. f. Gen. 143 (1806).
TETRAMERIUM, Gaertn. f. Fruct. iii. 90. t I[96] (1805).
acuminatissima, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 471.—Bras.
affinis, *Muell. Arg. 1. c.* 469.—Bras.
albescens, DC. Prod. iv. 498 = Coussarea albescens.
albescens. Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 72[s] Coussarea ilheotica.
amazonica, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 470.—Bras,
angustifolia, *Spruce, ex Benth.* &• *Hook.f. Gen.* ii-1*[1?] *Muell. Arg. I. c.* 471.—Bras,
anisocalyx, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. *W-"* Peruv.
anisodonta, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 472-Bras.
apodantha, *Muell. Arg. I. c.* 471.—Bras,
aristata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 460.—Bras,
australis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 47J-" Bras.
axUHflora, *DC. Prod.* iv. 497.—Bras.
axUlifiora, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 72" Ixora bahiensis.
bahiensis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 47*-" Bras.
Blanchetiana, *Muell. Arg. I. c.* 471.—Bras,
brachyloba, *Muell. Arg. I. e.* 470.—Bras,
bracteata, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 452.' Bras.
calyciflora, *A. Rich, in Mim. Soc. Hist. Nat. P"-T*[1] (1834) 176.—Guian.
campanella, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 469—Bras.
campanularis, *Muell. Arg. 1. c.* 470.—Bras,
capillipes, *Muell. Arg. I. c.* 474.—Bras.
capitata, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 450=*<-.[oB]-sarea capitata.
castellana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) *I*[1?] Bras.
caodata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv- (1845) 108.—Bras.
coarioensis, *Muell. Arg. in Mart. Ft. Bras.* vi. V- [133.] —Bras,
coerulea, *DC. Prod.* iv. 497.—Bras.

FARAMEA:—
flora, BeDrh, fa Linnaea, (1860) *52=calyd-
con (S) a, Walp. in Nov. Act. 351 = Coussarea contr
cornifolia, Benth. in Linnaea, Coussarea cornifolia.
coronata, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 470.-Bras.
corymbosa, *Aubl. Pl. Gui.* 102.-Gniana.
corymbo, Bentl1 in Hook J°nm Bo'- (*41) 233 = Coussarea violacea.
corymbosa, er, ex DC. Prod. iv. 463 = Myonima multiflora. Sib
crassifolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 233.—Guian.
cuspidata, *Benth. Pl. Hartw.* 194 N Granat.
cyanea, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 473.—Bras.
diversifolia, *Muell. A Mart. Fl. Bras.* vi. v. 136.—Bras.
egen Kora, lviii (1875) 470.-Bras.
Efchfe Mari m 109
- Bras.
erythrocarpa, *Griseb.* Ca/ Pl Cub W4=Cnba.
erythropoda, *Mi* Linnaea> xvW (1844) Guiana.
fallax, *Muell. Arg. in Flora* lviii (1876) Bras.
filamentosa, *Muell. Arg. in* 156. —Bras.
filipes, Mart. ex Benth. in Linnaea> xxiii (1850) 454 = coerulea.
glanduloso, *Poepp. & Endl. Nov.* Peruv.
Glaziovii, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 472.—Bras.
Godetiana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 153. —Bras.
graciliflora, Mart. in Flora, xxiv. (1841) H. Beibl. 72 = Coussarea graeliflora.
guayaquilensis, *DC. Prod.* iv. 497.—Ecuador.
herbacea, *A. Rich. in Mem. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1884) 176.—Guiana.
heterocalyx, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 158. —Bras.
heteromera, *Muell. Arg.* in *Flora,* lviii. (1875) 469.—Bras.
heterophylla, *Muell. A Mart. Fl. Bras.* vi. v. 131.—Bras.
hyacinthina, *Mart. in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 73.—Bras.
hydrangeaefolia, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 461 = Coussarea hy
includens, *Muell. Arg.* a, lviii. (1875) 489.-Bras.
intercedens, *Muell. Arg. l. c.* 470.—Bras.
involucellata, *Muell. A in Mart FL Bras.* vi. v. 157.—Bras.
jasminoides, *DC.* Pnd iv N Granat.
lagoënsis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 474.-Bras.
latifolia, *DC. Prod.* iv.
leptoloba, Benth. Hook< f> Gen, a, 121 = Coussarea leptoloba.
leucocalyx, *Muell. A*y. *Flora,* lviii. (1875) 474.—Bras.
longiflora, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 74 = Coussarea longiflora.
longifolia, *Benth.* 284.—Guian.
Muell. Arg. Flora> 1^ (1876) 474
macra, fiVTf- L c *72 Br
macroc «Mvi) Mart in Flora, xxiv. (1841) H. Beibl. 75
macrocarpa, Mowrophylla
macrocana, Mowrophylla
pachyantha.
marginata, *Cham.* *afa,* ix. (1884) 221.—Bra*.
marginata, Mart. ta Flora> TMT (1841) II. W 74 =
Martiana.
Martiana, *Muell. A* *Flora,* lviii. (1875) 472.—Bras.
M v ini
^"yn'mri', ?" Prod iv 498-Coussarea Martini,
nointo T" ^ Bent & 121,
129.—Bras.
micrantha, *Muell. Arg.* 126.-Br»s.

PABAMEA:—
monantha, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 475.—Bras.
montevidensis, *DC. Prod.* iv. 497.—Reg. Argent.
Moritziana, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 451.—N. Granat.
Morsoniana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii (1876) 473.—Bras,
multiflora, *A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 176.—Gnian.
nemoralis, Mart in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 72= Coussarea nemoralis.
Nettoana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 473.—Bras,
nigrescens, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 73.—Bras.
nitida, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 454.—Bras.
nodosa, Benth. 1. c. 449-Coussarea nodosa.
obtusifolia, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 472.—Bras.
occidentalis, *Muell. Arg. I. c.* 474.—Bras.
occidental^, A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 176 = odoratissima.
odoratissima, *DC. Prod.* iv. 496.—Am. austr.
oligantha, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 474.—Bras.
oxyclada, *Muell. Arg. I. c*—Bras,
pachyantha, *Muell. Arg. 1. c.* 470.—Bras,
pachydictyon, *Muell Arg. I. c.* 471.—Bras,
panicnlata, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 451.—Guian.
panurensis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 470.—Bras.
parviflora, *Muell. Arg. I. c*—Bras,
pedicellaris, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 126.—Bras,
pendnla, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 29.—Bras,
petiolaris, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 460.—N. Granat.
platyclada, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 136.—Bras,
platyneura, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 470.—Bras.
platypoda, *Muell. Arg. 1. c.* 472.—Bras.
Fohliana, *Muell. Arg. I. c*—Bras,
porophylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 116.—Bras,
pulchella, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 121; *et ex Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 475.—Bras.
Purdiaeana, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 453.—N. Granat.
quinqneflora, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 28. t. 234.—Pcrnv.
Riedeliana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 471.—Bias.
rivularis, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 108.—Bras.
salicifolia, *Presl, Symb. Bot.* ii. 24. t. 70.—Bras.
Schomburgkiana, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 450 = Coussarea violacea.
Sellowiana, *Benth. I. c.* 453.—Bras,
sertulifera, *DC. Prod.* iv. 496.—Ind. occ.
sessiliflora, *Aubl. Pl. Gui.* i. 104.—Guian.
sessilifolia, *DC. Prod.* iv. 497.—Venezuela,
stenantha, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 473.—Bras,
stenopetala, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 73.—Bras.
stipulacea, *DC. Prod.* iv. 497.—Bras,
suaveolens, *Duchass. ex Griseb. in Bonplandia,* vi. (1858) 8.—Panama,
subbasilaris, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 473.—Bras.
Tamberlikiana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 134.—Bras,
tenuiflora, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 474.—Bras.
tetragona, *Muell. Arg. 1. c.* 472.—Bras,
tinguana, *Muell. Arg. 1. c.* 471.—Bras,
torquata, *Muell. Arg. I. c*—Bras,
trancata, *DC. Prod.* iv. 497.—Guiana,
troncata, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 473.—Bns.
umbellifera, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 134.—Bras.
nrophylU, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 469.—Bras.

FARAMEA:—
vaginata, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 454-Ixora pubescens.
vaginata, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 184.—Cuba,
vidensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 113.—Bras.
Warmingiana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 472.—Bras,
xanthina, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 461.—Bras.

FAREINHETI/, Baill. Etud. Gen. Euph. 652 (1858)-FAHRENHEITIA, Reicbb. f. & Zoll.-Oatodes, Blume (Euphorb.).

FARFARA, Gilib. Fl. Lituan. i. 177 (1781) = TUB. silago, Linn. (Compos.).
radiata, Gilib. L c.=T. Farfara.

FARFUGIUM, Lindl. in Gard. Chron. (1867) 4 - Senecio, Toura. (Compos.).
grande, Lindl. 1. c.-S. Kaempferi.
Kaempferi, Benth. Fl. Hongk. 191 «S. Kaempferi.

FARNESIA, Gasp. Desc. Nuov. Gen. (1888)=Acacia, Willd. 96 (Legumin.).
odora. Gasp. 1. c.=A. Farnesiana.

FABOA, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxviL (1869) 46. 1.17. *GENTIANEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 806.
salutaris, *Welw. I. c.* 46.—Afr. trop.

FAROBAEA, Schrank, ex Colla, Hort. Ripnl. App. iii. 86, in nota (1829); et iv. 19. t. 9 (1881) - Beneolo, Toum. (Compos.).
nrmorensis, Schrank, ex Colla, 11. cc. 36 et 21.—Hab.?
tropica, Colla, 1. c. 36.—Hab. >

FARQUHARIA, Hilsenb. & Boj. ex Boj. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1848) 67 *° Crataeva, Linn. (Capparid.).
excelsa, Hilsenb. Ac Boj. ex Boj. 1. c—C. excelsa.

FARSETIA, Turra, Farset Nov. Gen. 6. t. 1 (1766).
CRUCIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 72.
ACUSTON, Rafin. Sylva Tellur. 131 (1838).
CYCLOCARPAEA, DC. in Mem. Mas. Par. vii (1821) 232.
FIBICIA, Medic. Pflanzeng. L 90 (1792).
aegyptia, *Turra, Farset. Nov. Gen.* 6.1.1.—Aegypt.
aegyptiaca, Desv. Journ. Bot iii. (1814) 287 - praec.
Boivini, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 56.—Afr. trop.; Arab.; Ind. or.
Burtonae, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* 1.1810.—Arab.
cheiranthifolia, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 173 = dypeata.
cheiranthoides, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 96 = aegyptia.
clypeata, *[Ji. Br.] I. c*—Europ. austr.; Oriens.
dalmatica, Vis. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 16; et in Fl. Dalmat. iii. 119. t. 32. f. 3 =• triquetra.
deltoidea, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 97 - Anbrietia deltoidea.
depress*, *Kotschy, in Sitzb. Acad. Wien, Math. Nat.* Iii. i. (1866) 261.—Arab.
diffusa, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 173-Heliophila difiusa.
Edgeworthii, Hook. f. *Sc* Thorns, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 147-aegyptia.
elongata, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 173 - Heliophila pectinata.
eriocarpa, *DC. Syst.* ii. 288.—As. Min.; Syria,
grandiflora, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 55.—Afr. trop.
Guenteriana, Andrz. ex DC. Syst ii. 292=Alyssum mutabile.
Hamiltonii, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 71.—Afr. bor.; Arab.; Ind. or.
incana, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 97 - Alyssum incanum.
Jacquemontii, *Hook./. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* v. (1861) 148.—Ind. bor. occ; Afghan.
libyca, Spreng. Syst. il. 871-Alyssum libycum.
linearis, Decne. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 150 = Hamiltonii.

FARBETIA :—
linifolia, Andrz. ex DC. Syst. ii. 325=Alyssum linifolinm.
longisiliqna, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. iv. (1885) 6U.—Aegypt
lnnarioides, *(R. Br. in] Ait. Hort. Kern.* ed. II. iv. 96; —Archip. Graec.
macrocarpa, *Beta, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 89.—Cappadoc.
macroptera, *Kotschy V Boiss. ex Fourn. in Bull. Sec. Bat. Fr.* xi. (1884) 60.—As. Min.
mnlticaulis, *Boiss. & Hohen. Diagn.* Ser. I. viii. 31.—Persia.
mutabilis, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 96 = Alyssum mutabile.
obliqua, Spreng. Syst ii. 870=Alyssum mutabile.
oblongata, *Presl, Bot. Bemerk.* 8.—Aegypt.
obovata, *Boiss. & Kotschy, Diagn.* Ser. II. v. 27.—Syria.
orbiculata, Spreng. Syst. ii. 870 •= Alyssum orbiculatum.
ovalis, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 32=aegyptia.
parviflora, Spreng. Syst. ii. 871-Savignya aegyptiaca.
pendula, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 89.—Persia.
Perumana,Spieng.Syst.n.671(.=Berteroaperumana). —Peruv.
pinnata, Desv. Jonrn. Bot. iii. (1814) 178 = Heliophila Peltaria.
prostrata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 500.—Ins. Socotr.
ramosissima, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *lntell.* 42.—Afr. trop.
rostrata, *Schenk, PI. Sj>. Aegypt.* 42.—Egypt.; Syria.
sinuata, Roth, ex Steud. Norn. ed. II. i. 625 = Alyssum sinuatum.
spathulata, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 149.—Soongaria.
stenoptera, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *lntell.* 42.—Abyss,
stylosa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* v. *Suppl.* i. (1860) l.-Arab.
stylosa, *R. Br. in Denh. & Clapp. Trav. App.* 12.—Afr. trop.
suffruticosa, *DC. Syst.* ii. 287.—Persia,
triquetra, *DC. I. c.* 290.—Dalmat.
umbellate, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 18.—Persia.

FARTIS, Adans. Fam. ii. 37 (1763)=Ziaania, Linn. (Gramin.).

FASCICULUS, Dnlac. Fl. Hautes-Pyr. 245 (1867) = Spergularia, J. & C. Presl (Caryophyll.).
ruber, Dulac, 1. c. = S. robra.

FATERNA, Noronha, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 327 (1844) = Landolphia, Beauv. (Apocyn.).
elastica, Sieber, ex A. DC. 1. c. *{-^Vahea madagascariensis).*—Madag.

FA1IOA, DC. Prod. iii. 88 (1828)-Lagerstroemia, Linn. (Lythrar.).
napaulensis, DC. 1. *a* 89 = L. parviflora.

FATOTTA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 609 (1826). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 858.
aspera, Gaudich. I. c. 510=pilosa.
cordata, Gandich. 1. c.=pilosa.
globulifera, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 807-pilosa.
japonica, Blnme, Mus. Bot. Lugd. Bat. it t. 88 = pilosa.
lanceolata, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 492-pilosa.
pilosa, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 509.—As. or.; Ins. Malay, et Pacif.
scabra, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 807 = pilosa.
subcordata, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 84. f. 2 - pilosa.

FATRAEA, Thou. Obs. PI. Afr. 19 (1811); Juss. in Diet. Sc. Nat xvL 206 (1820)«TerminaHa, Linn. (Combret).

FATREA, Juss. in Ann. Mus. Par. v. (1804) 228-praec.

FATSIA, Decne. & Planch, in Rev. Horde. (1854) 105. *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 989.
ECHINOPANAX, Decne. & Planch, in Rev. Hortic. (1854) 105.
OFLOPANAX, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 16 (1863).
RicINOPHYLLUM, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 875 (1844-46).
TETRAPANAX, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1859) 871.
horrida, *Benth. &• Hook.f. Gen.* i. 939.—Am. bor. occ.
japonica, *Decne. V Planch, in Rev. Hortic.* (1854) 105.—Japon.
Mitsde, De Vriese, ex C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1859) 871*°Dendropanax japonicum.
papyrifera, *Benth. & Hook.f. Gen. i.* 939.—China.

FAUCIBARBA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 402 (1867) = Calamintha, Moench (Labiat).
Acinos, Dulac, 1. c. 403 - C. Acinos.
alpina, Dulac, 1. c. = C. alpina.
Clinopodium, Dulac, I. c. =C. Clinopodium.
grandiflora, Dulac, 1. c. 402 =• C. grandiflora.
officinalis, Dulac, 1. c.=C. officinalis.
parviflora, Dulac, 1. c 408 = C. Nepeta.
umbrosa, Dulac, 1. c. 402-C. officinalis.

FATJJA8IA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 80. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 443.
fcxuaiA,Benth.brHook.f. Gen. ii.443.—Ins. Mascar.
pinifolia, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1819) 80.—Ins. Mascar.
reticnlata, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 443.—Ins. Mascar.

FAULIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 84 (1836) •= Iiigustrum, Tourn. (Oleac).
odorata, Rafin. 1. c.=L. nepalense.
verrucosa, Rafin. 1. c. = L. nepalense.

FATJREA, Harv. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. vi. (1847) 873. t. 15. *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 170.
discolor, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 64.—Afr. trop.
forficuliflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 243.—Madag.
saligna, *Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 373.1.15.—Afr. austr.
speciosa, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 63.—Afr. trop.

FAUSTULA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 140; et in Diet Sc. Nat. xvi. 251 (1820) - Heliohrysum, Vaill. (Compos.).
reticulata, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvi. 251 = H. reticulatum.

FAVONIUM, Gaertn. Fract. ii. 431. t. 174 (1791) = Didelta, L'Hérit (Compos.).
spinosum, Gaertn. 1. c.=D. splnosa.

FAWCETTIA, F. Muell. Fragm. x. 93 (1877). *MEN1SPERMACEAE.*
tinasporoides, *F. Muell. I. c*—Austral.

FAYA, Neck. Elem. ii. 102 (1790)-Crenea, Aubl. (Lythrar.).

FAYA, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 272 (1836-50) =Myriea, Linn.
fragifera, Webb & Berth. 1. c.=>M. Faya.

FAYANA, Rafin. Alsog. Am. 12 (1838) = Myrica, Linn.
oMorica, Rafin. 1. c.=M. Faya.

FEAEA, Spreng. Syst. iii. 862 (1826)-8elloa, H. B. & K. (Compos.).
linearis, Spreng. 1. c. 581-S. linearis.
plantaginea, Spreng. I. e.=S. plantaginea.

FEDIA, Adans. Fam. ii. 162 (1763)-Patrinia, Juss. (Valer.).
intermedia, Hornem. Hort. Hafn.i. 48=P. intermedia.
rupestris, Vahl, Enum. ii. 22=P. rupestris.
ruthenica, Mirb. in Hist. Nat. PI. ed. II. xiiL (1804) 804-P. intermedia.

FEDIA:—
scabiosaefolia, Trev. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 165 = P. scabiosaefolia.
serratulaefolia, Trev. Ind. Sem. Hort. Wratisl. (1820) = P. scabiosaefolia.
sibirica, Gaertn. Fruct ii. 37 = P. sibirica.
villosa, Mirb. in Hist Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 304 = P. villosa.

FEDIA, Gaertn. Fract. ii. 36. t. 86. f. 3 (1791), partim; Moench, Meth. 493 (1794). *VALERIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 155.
MITROPHORA, Neck. Elem. i. 123 (1790).
Comucopiae, *Gaertn. 1. c.* 37. t. 86.*1.* 8, partim.—Reg-Mediterr.
graciliflora, Fisch. *Sc* Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 60 - F . Comucopiae.
graeca, Dufr. Hist. Valér. 56 = F. Comucopiae.
incrassata, Moench, Meth. 486 = F. Comucopiae.
scorpioides, Dufr. Hist. Valér. 55.1.1 = F. Comucopiae.

FEDIA, Gaertn. Fruct. ii. 86. t 86. f. 3, (1791) partim * Valerianella, Toum.
acaulis, Stev. in Mém. Soc. Nat Mosc. iii. (1812) 251; v. (1817) 364 = Hohenackeria bupleurifolia.
Amarella, Lindh. ex Engelm. in A. Gray, inBost. Joum. Nat. Hist. vi. (1850) 217 = V. Amarella.
Auricula, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 400=V. rimosa.
brachystephana, Tenore, Rel. Viagg. 48 = V. bm >y Stephana.
brevifolia, Rafin. Atl. Journ. 177.—Am. bor.
caerulea, Aikin, ex Eaton & Wright, N. Am. Bot 469 = V. olitoria.
campanulata, Steud. Norn. ed. I. 838; Presl, Fl. Sic. 28 = V. eriocarpa.
Caput-bovis, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 72.—Alger.
carinata, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 3" = V. carinata.
carnosa, Mirb. in Hist Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 304 = Valeriana carnosa.
cephalophora, Ehrenb. ex Krok, in Vet Akad. Handl. Stockh. v. (1864) n. I. 79 = V. coronata.
chenopodifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 727 = V. chenopodifolia.
ciliata, Woods, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1887) * 371 430 - V . hirsutissima.
ciliolata, Rafin. New Fl. Am. iv. 68.—Am. bor.
coronata, Gaertn. Fruct. ii. 37 = V. discoidea.
coronata, Vahl, Enum. ii. 20=V. coronata.
costata, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 344 - V. costata.
dasycarpa, Stev. 1. c. ii. (1809) 178; v. (1817) 348-= »• dentata.
decipiens, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 78.—Alger.
dentata, Mirb. in Hist. Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 30* = V. dentata.
dentata, Sieber, ex Betcke, Animadv. Bot. Valer. ** = V. truncata.
discoidea, Mirb. in Hist. Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 805 = V. discoidea.
discoidea, Reichb. PI. Crit i. 54. t 67-V. platylob".
ecalyculata, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 98 = V. olitoria.
echinata, Mirb. in Hist. Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 804 = V. echinata.
eriocarpa, Roem. & Schult. Syst. i. 864 = V. eriocarpa.
eriocarpa, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (H* 349 = V. truncata.
exscapa, Roem. *Sc* Schult Syst i. 866 - Hohenacken bupleurifolia.
Fagopyrum, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 51-V. chenopodifolia.
gibbosa, Guss. Fl. Sic. Prod. i.-28 = V. costata.
grandiflora, Wall, ex DC. Prod. iv. 624 = Nardostachys Jatamansi.
hamata, Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 862 = V. coronata.
hemiodes, Rafin. New Fl. Am. iv. 68.—Am. bor.
heterocarpa, Pomel, Nonv. Mat. Fl. Atl 7L—Alg*'
Jatamansi,, Wall, ex DC. Prod. iv. 680 = NardostacW" Jatamansi.
lasiocarpa, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. Q*"> 350 = V. lasiocarpa.
lasiocephala, Betcke, ex Woods, in Trans. Linn. &"" xvii. (1837) 431 = V. coronata.
laxiflora, Roem. *Sc* Schult Syst. i. 360 = V. rimosa-
ligulata, Rafin. New Fl. Am. iv. 68=V. longiflora!
Locusta, Reichb. Ic. Fl. Germ. i. 48=V. olitoria.

FEDIA:—
longiflora, Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. SI = valerianella longiflora.
«««««, Roem. *Sc* Schnlt. Syst. i. 366 = Veronica maxima (= Veronica melissaefolia.)
"ucrocarpa, Reichb. Ic. PI. Crit. ii. 6. t. 114 = V. dentata.
minuta, S
mixta, v*hl, Enum. ii. 21 = V. dentata.
Morisonii, Sprang. Pngill. i. 4 - V. dentata.
muricata, Stev. ex Roem. *Sc* Schult. SysL i. 366 = V. truncata.
""vote, Hochst. & Stend. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 112 =V. obtnsiloba.
Nuttallii, Torr. & Gray. Fl. N. Am. ii. 51 = V. lii.
olitoria, Gaertn. Fruct.ii. 36 = V. rimosa.
olitoria, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. ii. (1809) 178 = V. turgida.
"JL.Aj'" Van1,Enum -»• 19 - v - olitoria.
orientalis; SchleCht, ,,, Linnaea> xvii* (1843) 1M = V.
paniculata, Colla, Hort. Ripii. App. iii. 36 = V. olhorfa.
P"ui-a ,SnlliVl ex A_ Gr »y» Man. Bot. U. St. 188 - V. Woodsiana.
^"fv/oio, Roem. & Schult. SysL i. 865 = V. platyloba.
pentachlaena, Mirb. in Hist. Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 804 = valerianopsis polystachya.
pterocarpa, Stev. ex Steud. Nom. ed. II. i. 626=V. Pteroloba.
pubescens, Bertol. in Guss. Pl. Rar. Sic. (1826) 15 = V. tamaulipana.
pumila, Mirb. in Hist. Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 805 = membranacea.
quadrangularis, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 626 = V. carnata.
radiata, Chx. Fl. Bor. Am. i 18; Vahl, Enum. ii. 205 = V. radiata.
radiata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 35 = V. chenopodifolia.
rotata, Reichb. Ic. Fl. Germ. i. 93-V. platyloba.
rugulosa, Steud. ex Nomencl. 2« = V. dentata.
rugulosa, Spreng. Pugill. ii. 2 = V. eriocarpa.
samolifolia, Bert, in 'Merc. Chil. (1829);' ex Bull, Férussac, xx. (1830) 111 = V. samolii'olia.
serideus, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 626 = V. tyrrhynchia.
sicyoides, FL Sic. Prod. i. 25-V. discoidea.
sterzoCarpa, Guss. Lc. 28-V. membranacea.
»£"*"' Eeelai. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. «riaia * (1850) 216 V. stenocarpa.
V. SifwU. Mem. Soc. Nat. Mosc. (1808) 17?
sulcata, Pomel. Nouv. Mat. Fl. Atl. 72.—Alger.
trichocarpa, D. Dietr. Syn. PI. i. 159 = V. turgida.
tricarpa, Cheho. Ic. PI. Crit. f. 131 = V. rimosa.
178 et (1817) 846 = V. membranacea.
turgida, Benth. Stev. in Mem. Soc. Nat. Most ii. (1809) 178 et (1817) 846 = V. membranacea.
triquetra, Hochst. & Steud. ex Shuttlew. in Flora, xx. (1837) 211 = V. chenopodiifolia.
<fcJ^'a'J^ichb. Ic. Fif Germ. ii. 7-V. truneaU.
Zv^ Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 345
umbellicata, Sulliv. in Am. Journ. Sc. xlii. (1842) 50 = V. Woodsiana.
uncinata Willd. Enum. Hort. Berol. 61 (1809) = V. uncinata
urticifolia, Mirb. in Hist. Nat. PI. ed. II. xiii. (1804) 805 = V. carnata.
Woodsiana, Torr. & Gray. Fl. N. Am. ii. 52 = V. Woodsiana.

FEDIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 224 (1818) = Astrephia, Dufr.
chamaedrifolia, S Sffi^ Ha & K. 1. c. - A. chaerophylla.
«*«. Hook.'& Am. Bot. Beech. Voy. 28=A. laxa.

FEDTSCHENKOA, Regel, (1882). *CRUCIFERAE.*
turkestanica, Regel & Schmalh. ex Regel, /.^.-Turkest.

FEEL, A. Gmn. ^ e ™ - Hort. Hafn. i. 47 (1813) = FEDIA, Valerianelte, Toura. (Valerian.).

FEIDANTHUS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 148=Astragalus, Toum. (Lcgumin.).
triatellus, Stev. 1. c.-*A. striatellus.

FE1JOA, Berg, in Linnaea, xxix. (18S8) 258. *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 712.
ORTHOSTEMON, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 440.
obovata, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 616.—Bras:
Sellowiana, *Berg, I. c.* 615.—Bras.

FELICIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. 165 (1818); et in Diet. Sc Nat. xvi. 314 (1820). *COMPOSITAE,* Bentb. *Sc* Hook. f. ii. 274.
AGATACHA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1815) 175.
ACATHAEA, Cass. in Diet. Sc. Nat. i. Snppl. 77. t 89 (1816).
ASTEROSPERMA, Less. Syn. Comp. 389 (1832).
COLLOMIA, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. L 898 (1840).
DETRIUIUM, Nees, Gen. et Sp. Ast. 255 (1833).
DETRIS, Adans. Fam. ii. 131 (1763), nomen prius.
ELPHEGEA, Less. Syn. Comp. 182 (1832).
MUNVCHIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxvii. 462 (1826).
POLYARRHENA, Cass. 1. c. lvi. 172 (1826).
ab)ssinica, *Sch. Bip. ex A. Kick. Tent. Fl. Abyss, i.* 383.—Afr. trop.
a'dfinis, *Nees, Gen. et Sp. Ast.* 209.—Afr. austr.
angustifolia, *Nees, I. e.* 213.—Afr. austr.
brachyglossa, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 97 = Aster Cymbalariae.
caffrorum, *Nees, Gen. et Sp. Ast.* 214.—Afr. austr.
cana, DC. Prod. v. 220-angustifolia.
ciliaris, DC. 1. c. 221«=Gymnostcphium ciliare.
cotuloides, DC, 1. c. 219 - fragilis.
Dregei, DC. 1. c. 221 = Aster Dregei.
dubia, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvi. 815 = Aster Candollii.
echinata, *Nees, Gen. et Sp. Ast.* 216.—Afr. austr.
erigeroides, DC. Prod. v. 219=Aster erigeroides.
fascicularis, DC. 1. c. 220 = muricata.
ficoidea, DC. 1. c. 221=Aster ficoldea.
fragilis, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xvi. 315.—Afr. austr.
fnticosa, Nichols. Diet. Gard. ii. 4-Aster fruticosus.
hirsuta, DC. Prod. v. 220 = Aster confusns (in addend.).
hyssopifolia, Nees, Gen. et Sp. Ast. 211-angustifolia.
imbricata, DC. Prod.-v. 221» Aster imbricatns.
Kraussii, *Sch. Bip. ex Walp. Rep.* ii. 956.—Afr. austr.
lasiocarpa, DC. Prod. v. 221 = Aster lasiocarpus.
macrorrhiia, DC. 1. c. 219 - Aster macrorrhizus.
microsperma, DC. 1. c.-Aster microspermus.
muricata, *Nees, Gen. et Sp. Ast.* 210.—Afr. austr.
natalensis, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 956 - Aster erigeroides.
Paralia, DC. Prod. v. 222 = echinata.
Reevesii, *Nees, Ind. Sent. Hort. Vratisl.* (1850).—*Cf. Linnaea,* xxiv. (1851) 235.—Hab. ?
reflexa, *DC. Prod.* v. 222.—Afr. austr.
retorta, DC. 1. c. 221 = caffrorum.
Richardi, *Vatke, in Linnaea,* xxxix. (1875) 481.—Abyss.
rigidula, DC. Prod. v. 220 = angustifolia.
Schimperi, *Steud. V Hochst. ex Jaub. If Spach, Illustr.* iv. 86. t. 354.—Arabia.
tenella, Nees, Gen. et Sp. Ast. 208=fragilis.
trinervia, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxiv. (1851) II. 60 = Aster erigeroides.
Zeyheri, *Nees, Gen. et Sp. Ast.* 215.—Afr. austr.

FELICIANA, Benth. *Sc* Hook. £ Gen. i. 717 (1866) sphalm.—seq.

FELICIANEA.Cambess.inSt. Hil.Fl. Bras. Mer. ii. 375. 1.157 (1829) = Mypphinium, Schott (Myrtac).
rubrifiora, Cambess. 1. c. 376 - M. atropurpureuin.

FENDIiERA.Engelm. *Sc* Gray, in Smithson. Contrib. iii. (1862) (PI. Wright i.) 77. t. 5. *SAXIFRAGEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. *I* 643.
rupicola, *A. Gray, I. c*—Texas.

FENDLERIA, Stend. Syn. PI. Gram. i. 419 (1855) = Oryzopsis, Michx. (Gramin.).
rhynchelytroides, Steud. 1. c. 420.—N. Mexic.

FENELONIA, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832) = Ornithogalum, Toum. (Liliac).
bracteata, Rafin. 1. c.-O. longibracteatum.

FENICULUM, Gilib. Exerdt. i. 220 (1792) = Foeniculum, Toura. (Umbell.).

FENTZLIA, Reichb. Handb. 194 (1837)-FENZLIA, Benth. = Oilia, Ruiz *Sc* Pav. (Polemon.).

FENUGRAECUM, Adans. Fam. ii. 822 (1763) = Trigonella, Linn. (Legum.).

FENZLIA, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622 (1833) = Gilia, Ruiz *Sc* Pav. (Polemon.).
concinna, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 157 = G. dianthoides.
dianthiflora, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622 = G. dianthoides.
speciosa, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. a i. (1847) 167 = G. dianthoides.

PENZIiIA, Endl. Atakt. 19. tt. 17, 18 (1833). *MYRTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 715.
obtusa, *Endl. I. c.* 19.1.17.—Austral,
retusa, *Endl. 1. c.* 20.1.18.—Austral.

FERBERIA, Scop. Introd. 281 (1777)=Althaea, Toum. (Malvac.).

FERDINANDA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1047 (1876) = FERDINANDIA, Welw. = Heterophragma, DC. (Eignon.).

FERDINANDA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 31 (1816) » Zalusania, Pens. (Compos.).
angusta, Lag. 1. c. 31. t. 2=Z. angusta.
eminens, Lag. 1. c-Podachaeninm panicuktum.
integrifolia, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 356 - Z. angusta 1
Lindenii, Sch. Bip. ex C. Koch, in Allg. Gartenz. (1858) 179.—Am. trop.
lutescens, DC. Prod. v. 553 = Z. angusta.
montagnaefolia, Sch. Bip. ex C. Koch, in Allg. Gartenz. (1858) 179-Z. montagnaefolia.
oppositifolia, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 803 = Calea scabrifolia.
velutina, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvi. 430 = Z. angusta.

FERDINANDEA, PohL in Flora, x. (1827) 158-Perdlnandusa, Pohl (Rubiac).
elliptica, Pohl, 1. c. = Ferdinandusa elllptica.
vvalis, Pohl, 1. c. - Ferdinandusa ovalis.
speciosa, Pohl, 1. c. 154 •» Ferdinandusa speciosa.

FERDINANDIA, Welw. ex Seem. Joum. Bot. iii. (1865) 380. t. 88 = seq.
superba, Welw. ex Seem. 1. c. (** *Ferdinandoa superba).* —Afr. trop.

FERDINANDOA, Seem. Joum. Bot. viii. (1870) 280 = Heterophragma, DC. (Bignon.).
magnifica. Seem. I c—Afr. trop.
superba, Seem. 1. c.—Afr. trop.

FEBDINANDUSA, Pohl, PI. Bras. Ic. ii. 8. t. 106 ad 108 (1831). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 40.
ASPIDANTHEKA, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 217.
FERDINANDEA, Pohl, in Flora, x. (1827) 153.
GOMPHOSIA, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sèr. III. x. (1848) 14 (Mon. Cinch. 95. t. 26 B).
andina, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. i. (1854) 78.—Reg. Andin.
angustata, Wright, ex Griseb. Cat. PL Cub. 127 (Ferdinandea) (Rondeletiae sp.).—Cuba.
brachycarfia, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 005 (Ferdinandea) (Rondeletiae sp.).—Cuba.
elliptica, Pohl, PI. Bras. Ic. ii. 9. t. 106=ovalu.
ovalis, *Pohl, I. c* 10.1107.—Bras,
pubescens, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. i. (1854) 78.—Bras.
rudgeoides, *Wedd. I. c.*—Guiana,
speciosa, *Pohl, PI. Bras.* ii. 12.1.108.—Bras.
stellata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1868) 505 (Ferdinandea) (Rondeletiae sp.).—Cuba.

FERECUPPA, Dnlac, FL Hautes-Pyr. 873 (1867) - Tozzia, Linn. (Scrophularin.).
drupacea, Dolac, 1. c.=T. alpina.

FEREIRA, Reichb. Consp. 183 (1828) =seq.

FEREIRIA, Veil, ex Vand. FL Lnsit. 21. 1.1.18 (1788); et in Roem. Script. 98. t. 6 = HUlia, Jacq. (Rnbiac.).
Velloeouna, Schult. f. Syst viL 83 - H. longiflora.

FEBETIA, Delile, in Ann. Sc NaL Sér. II. xx. (1843) 92. t. 1. f. 4. *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 95.
apodanthera, *Delile, 1. c.*—Abyss,
canthioides, *Hiern, in Oliver, ft. Trop. Afr.* iii. 116.—Afr. trop.

FEKOTTBOHXA, Hook. f. in Hook. Ic. PI. 11124 (1872). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 138.
tetracocca, Baill. Hist. PI. vii. 413=zeylanica.
Thwaitesii, Hook. f. in Hook. Ic. PI. xii. 23 - zeylanica.
zeylanica, *Hook.f. I. c.* 1.1124.—Ind. or.

FERNANDEZIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 207 (1833) = Lockhartia, Hook. (Orchid.).
acuta, Lindl. Bot. Reg. t. 1806 =L. acuta.
elegans, Lodd. Bot. Cab. 1.1214 = L. elegans.
longifolia, lindl. Orch. Linden. 13.—Venezuela.
lunifera, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 91 - L. lunifera.
obtusa, Lindl. ex Linden, Illnstr. Hortic. xxix. (1882) 61 =L. obtusa.
parthenocomos, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 639 = L. parthenocomos.
roiusta, Batem. in BoL Mag. t. 6592 = L. verrucosa.
robusta, Klotzsch, ex Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 821 —L. lunifera.

FERNANDEZIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. Fl. Per. et Chil. 123. t. 27 (17»4) = Centropetalum, Lindl. et Dichaea, Lindl. (Orchid.).
conferta, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. 241.—Peruv.
denticulate, Ruiz & Pav. 1. c. 240.—Peruv.
graminifolia, Ruiz *Sc* Pav. 1. c. 241.—Peruv.
haemathodes, Ruiz *Sc* Pav. 1. c. 240.—Peruv.
laxa, Ruiz *Sc* Pav. 1. c.«= Dichaea laxa.
puneiata, Ruiz *Sc* Pav. 1. c 289.—Peruv.
subbiflora, Ruiz & Pav. I. c. 240.—Peruv.

FERNANDOA, Welw. ex Seem. Journ. Bot. iv. (1866) 123 = FERDINANDOA, Seem. = Heterophragma, DC. (Bignon.).

FEKtfELIA, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 452 (1786); Juss. Gen. 199 (1789). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 92.
axillaris, Steud. Nom. ed. I. 334=Manettia Lygistum.
biflora, Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. 187=Manettia Lygistum.
buxifolia, Gaertn. f. Fruct. iii. 68—obovata.
buxifolia, *Lam. Encyc.* ii. 452.—Ins. Maurit.
mauritiana, J. F. Gmel. Syst. 244-buxifolia.
obovata, Gaertn. f. Fruct. iii. 62. t. 191 = buxifolia.
obovata, *Lam. Illustr.* i. 287.—Ins. Maurit.
mata, Ayres, ex Baker, Fl. Manrit. 142=buxifolia.
pedunculata, Gaertn. f. Fruct 3. t. 191. f. 8=buxifolia.
uniflora, Roem. *Sc* Schult Syst. iii. 187=obovata.

FEROLIA, Aubl Fl. Got. Suppl. 7 (1775)- Parinariiim, Juss. (Rosac).
guianensis, Aubl. 1. c.—Guiao.
variegata, Lam. Encyc. Ii. 452 = *guianensis.*

FEBONTA, Correa, in Trans. linn. Soc. v. (1800) 224. *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 305.
JERONIA, Pritz. Ic. Ind. i. 579 (1855), sphalm.
Balanghas, Steud. Nom. ed. II. *I* 627 -Sterculia Balanghas.
elephantum, *Correa, in Trans. Linn. Sec.* v. (1800) 225.—Ind. or.
lucida, *Teijsm. (f Binn. Cat. Hort. Bog.* 390; *et exScheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 19. —Java,
pefludda, Roth, Nov. Sp. PL 384-Aegle Marmelos.
ternata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 252 = Aegle decandra.

FERRANDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 477 (1826) OoooulUB, DC. (Menisperm.).
oleifera, Gaudich. 1. c - C. Femndianqs.

FEBRABIA, Linn. Sp. PL ed. II. 1853 (1768). *IRIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 692.
angustifolia. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 896 » F. Ferrariola.
antherosa, Ker-Gawl. in Bot Mag. t. 751 - F. Ferrariola.
atrata, *Lodd. Bot. Cab.* 1.1366.—Afr. asstr.
blanda, Salisb. Prod. 42 = Moraea iridioides.
cathartica, Mart. Reise Bras. i. 548 *(~Lansbergia eathartiea).*—Bras.
crocea, Salisb. Prod. 41 = Belamcanda punctata.
divaricata, *Sweet, Brit. Flow. Card.* t. 192.—Afr. austr.
elegans, Salisb. Prod. 42 = Marica Northiana.
elongata, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-June 1880) 173.-Reg. Argent
Ferrariola, *Willd. Sp. PI.* iii. 581.—Afr. austr.
ixioides, Willd. I. c. 682=Libertia ixioides.
lugubris, Salisb. Prod. 42=Moraeaplumaria.
lurida, SalUb. 1. c 41=Trimezia lurida.
major, *Eckl. Vert.* 18.—Afr. austr.
minor, Pets. Syn. i. 60=F. Ferrariola.
obtusifolia, *Sweet, Brit. Flow. Gard.* t 148.—Afr. austr.
ocellaris, Salisb. Prod. 41 = Moraea tricuspis.
ochroleuca, Salisb. 1. c. 42 = Sisyrinchium striatnm.
Parnflora, Salisb. 1. c. 43 = Eleutherine plicata.
Pavonia, Linn. f. Suppl. 407 =Tigridia Pavonia.
pulchella,Salisb. Prod. 42—Sisyrinchium angustifolium.
punctata, Pers. Syn. i. 50—undulata.
purgans, Mart. Reise Bras. i. 547 (•> *Lansbergia purgans).*—Bras.
pusilla, Link & Otto, Ic PL Select. 125. t 59 = Cypella pusilla.
Tigridia, Sims, Bot. Mag. t. 532-Tigridia Pavonia.
tricuspis, Willd. Enum. Hort Berol. 691 (= *Vieusseuxia aristata, glaucopis).*—Afr. austr.
tristis, Salisb. Prod. 42 = Moraea tristis.
undnata, *Sweet, Brit. Flow. Gard.* 1.161.—Afr. austr.
undulata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1353.—Afr. austr.
violacea, Salisb. Prod. 42 •= Sisyrinchium Bermudianum.
viridifiora, Andr. Bot. Rep. t. 285 = F. Ferrariola.

FEHREIHEA.Allem.in Trab. Soc. Veil. 26 (1845?). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 558.
spectabilis, *Allem. I. c*—Bras.

FERREOLA, Koen. ex Roxb. PL Corom. i. 85. t. 45 (1795)=Maba, Forst. (Ebenac.).
buxifolia, Roxb. 1. c - M. buxifolia.
Ebenus,StoVn, Bot. Mat. Mtd. iv. 556 = M. buxifolia.
ellipticifolia, Stokes, 1. c. = M. elliptica.
guineensis, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PL 448 = M. buxifolia,

FERRETIA, Pritz. Ic. Ind. i. 455 (1855), sphalm. = Peretia, Delile (Rnbiac.).

FERRIOLA, Roxb. Fl. Ind. iii. 790 (1832) - FERREOLA, Koen.

FERRUM-EQUINUM, Toum. ex Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 370-Hippocrepis, Linn. (Legumin.).
multifiorum, Moench, Meth. 119 = H. multisiliquosa.
multisUiquosum, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 371 = H. multisiliquosa.
uniflorum, Moench, Meth. 119-H. unisiliquosa.
unisiliquosum, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 371-H. unisiliquosa.

ITEKTJIiA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 75 (1737). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 917.
ERIOSYNAPHE, DC. ColL Mem. v. 50 (1829); et Prod. iv. 175 (1830).
EURYANGIUM, Kauffm. in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. xiii. (1871) 258.
FERULAGO, Koch, in Nov. Act. Nat Cur. xii. I. (1824) 97.
HAHMATOCADLIS, Tausch, in Flora, xvii. 347 (1834).
NARTHEX, Falc. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 285.
SCORODOSMA, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Acad. Pétersb. vii. (1854) 309.
SORANTHUS, Ledeb. Ic. PL Ross. i. 20 (1829); FL Alt. i. 344 (1829).

FERULA:—
SUMBULUS, H. Reinsch. in Jahrb. Pract Pharm. xiii. (1846) 69.
ULOPTBRA, Fenzl, in Flora, xxvi. (1848) 460.
XANTHOGALDM, Av^-Lall. in Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 73 (1842).
abyssinica, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 826. —Abyssin.
adphylla, Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 808-caspica.
affinis, *Bess. Cat. Hort. Crem.* (1816) 57.—Tauria.
alliacea, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 995.—Persia,
anatolica, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 817.—As. Min.
angulata, *Schlecht. in Linnaea,* xvii. (1843) 125.-Kurdistan.
arenaria, *Siev. in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 295.—Rossia.
arenosa, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 808»caspica.
armena, *DC. Prod.* iv. 174.—Annen.
annena, *C. Koch, in Linnaea,* rvi. (1842) 858.—Aiuieu.
Asa-foetida, Spreng. in Neue Schr. Halle, ii. (1813) *U* =Assa-foeOda.
Assa-foetida, Boiss. *Sc* Bnhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 100-alliacea.
Assa-foetida, *Linn. Sp. PI.* 248.—Persia; Afghan.
Assa-foetida, Martyn, in Mill. Gard. Diet ed. IX. n. *9* -persica.
aurea. Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 152=Peucedauum aureum.
austriaca, Sprang, in Neue Schr. Halle, ii. (1818) M -Pencedanum austriacum.
Barrelieri, Tenore, Fl. Neap. t. 183=sulcata.
Besseriana, Spreng. ex DC. Prod. iv. 177 =Peucedaunn> ruthenicum.
Blanchei, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 987.—Syria,
brachyloba, *Boiss. V Rent, in Boiss. Voy. Bot. Espagne,* 738.—Hispan.
brevifolia, *Link, ex Schult. Syst.* vi. 592.—Lusitan.
cachroides, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) *ii"* caspica.
californica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 348.—Am. bor. occ.
campestris, Bess. Enum. PL Volh. 44 = F. Ferulago.
canadensis, Linn. Sp. PL 247 — Ligusticnm actaeifolium.
Candelabrum, Heldr. *Sc* Salt, in Boiss. Diagn. Ser. H-vi. 83=glauca.
canescens, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 802.—Soongaria.
capillaris, *Link, in Spreng. Umbell. Sp.* 85.—L^u' sitan.
capilli/olia, Steud. Nom. ed. II. i. 627=praec
capillifolu, *Stscheg. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1854) >-168.—Soongaria.
carvifolia, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 348 * Pencedanum carvifolinm.
caspica, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* i. 220.—Reg. Cup-Ural.
caspica, Spreng. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 303-nuda.
ceratophylla, *Regel (f Schmalh. in Act. Hort. Petrof-* v. (1877) 596.—Turkistan.
communis, Gouan, Hort. Monsp. 140-glauca.
communis, Heuff. in Flora, xxxvi. (1853) 628" Heuffelii.
communis, *Linn. Sp. PI.* 246.—Reg. Mediterr.
desertorum, *Ledeb. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 25°' nomen.—Sibir.
dissecta, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) '** —dissoluta.
dissecta, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 301.—Sibir. altaic.
dissoluta, *S. Wats. Bot. Calif,* i. 271.—Calif,
diversivittata, *Regel* b[1] *Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 598.—Turkestan.
Drummondii, Hook. *Sc* Am. in Hook. Comp. t>°i'. Mag. i. (1835) 47=Polytaenia Nuttallii.
elegans, Spreng. in Neue Schr. Halle, ii. (1813) 1* * Peucedanum austriacum.
erubescens,Bois&. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. 1. (1844) 31« — galbaniflua, rubricaulis.
Ferulago, *Linn. Sp. PI.* 247.—Europ. austr.; B*»" Caucas.
foeniculacea, Hook. Fl. Bor. Am. i. 268 = Peucedanu"[1] foeniculaceam, millefolium, macrocarpum.
foeniculacea, Nutt. Gen. Am. i. 183 - Peucedanu"[1] foeniculaceum.
foetida, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) (sphalm. 590).—Turkestan.

FERULA:—

foetida, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 70 «F. Assa-foetida.

/oetidissima, Regel & Schmalh. L c. 693 = Taeschkeana.

galbanifera, MilL Gatd. Diet. ed. VIII. n 2.=F. Ferulago.

galbaniflua, *Boiss. tf Buhse, in Noun. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (I860) 99.—Persia.

Stnuulata, Bory & Chaub. Nonv. Fl. Pelop. 20 = nodosa.

eeniçuUta, C««. *Fl. Sic. Prod.* i. 366.—Italia,

glauea, itn». 5>. «. 247.—Enrop. austr.

eracilis, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 304.—Sibiria.

fiwnatensis, *Steud. Worn.* ed. IL i. 627.-Hispan.

Panis *Siev. in Pall. N. Nord. Beitr.* viiT295.-Rosaa.

gravmlens, Spreng. in Nene Schr. Halle, ii. (1818) 14 =*«ucedanum graveolens.

Hunuosa, Boiss. Diagn. Ser. JL ii. 92=galbaniflua.

ttermonis, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 985.—Syria.

Mo[a]^[Griseb] *ex Heu*[ff]- »* *&"«. »"". (1853) 048.—Europ. anstr.

™telja, A,IJ[S. W. Or›Vf›># u› 998._Persia.

?Bpida, *Frivald. in Flora,* xviii. (1835) 338.—Tnrcia.

Hausknechtiana, Vatke, San. Hort. Berol. (1876) *App.* 2. Tnrkestan.

Karelinii, Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 594.-Turkestan.

Karelinii, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Petersb.* vii. (1861) 306.—Persia, Turkestan.

koki*nSS*^ *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 593.—Turkestan.

j^Tigata, *Spreng. Umbell. Sp.* 88.—Afr. austr.

wncerotensis. *Part, ex Hartung, Geogn. Verh. Ins. l-anar. Fuerit.* 145.—Ins. Canar.

^elmanni, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 992.—Reg. Casp.; lurkestan.

"nearis, *Cerv. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 591, Hohen.—Mexic.

Linkii, *Webb & Berth. Phyt. Canar.* ii„ 160„~Ins_ Canar.

Lobeliana, Vis. in Nuov. Giom. Bot. Ital. ii. (1870) 215 =com nun s.

longifoli*a, Fisch. Cat. Hort. Gorenk.* (1812) 46.—Rossia.

*lon** Spreng. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 800-tatarica.

longifolia , WiUd> ex Ledebl L c- 243=Trinia Kiui_ besil

lophoptera, *Benth- VHook.f. Gen.* i. 817.-Persia.

lycia, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 984.—Lycia.

macr ocar/te, Hook. & Am. BoL Beech. Voy. 848- reucedanum macrocarpum.

!£?!S=[ole]». *Boiss. Fl. Orient,* ii. 984.-Persia.

•narathrophylla, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *ajffi*' '•(1W8) 347—China,

mrifr-' *Boiss*- &• *Orient,* ii. 986.—Syria.

M S[p]M[1] ^ *" Z^*- £ »«««- 348.-Afr. anstr.

« ^ j-es' £""•• *• «• 247—Reg. Byzant.

"7?*». Schonsb. ex Ball, in Joum. Linn. Sec xvi. Me,,,,, 8) *[79] = EUeoselinum meoides.

307.—fi WB^(,B^^ Sftir *Etf pitersbm* »»•(185i)" As_centr_

microcolea, *Boiss.* m'

*£?£*_*Beis&1*_'- 889.—Persia,

yivd luca." Bieb" ** Schur, Enum* PL TnulBS_ 268= " Fuced an Spreng. in Nene Schr. Halle, ii. (1813) 14 = monticola, Neilr_ N*[1]*^ 199-sylvatica.

monticola, *Nym. S*;"«[5]»A»'- 26.-Graecia.

multifida, *A. Gray, in* PTM_ *Am_ Acad_* vi i. (1868) 348.—Am. bor. o c.

myriophylla, Bieb- « Bess. Enum. PI. Volh. 44 = sylvatica.

Narthex, *Boiss. Fl. Or** «'. '• 994.-Ballisthan.

neapolitana, Teno re, Fl. Nap. iii. 840. t. 182=glauea.

Newberryi, *S_ Wats_* '* ^- ^«- *Acad.* xi. (1876) 145.—Am. bor_

nodiflora, Jac^* FK Austr_ APP- t. 5- F. Ferulago.

nodiflor, }r mnS P- P1- 247-communis.

nodiflora, Pan. Reile, iL 7S5=Meyeri.

nodiflora, R och . PI. Rar. Banat. 63 = sylvatica.

nodosa, *Benth. V Hook l- Gen_l* 918.-Knrop.

nodosa, Pall. " Ledeb_ «. Ross. ii. 307 = longifolia.

nida, *Spreng_ UmMl_ Sl-* 8L '• 7- f- 15-T"rkestan.

*ata, Pall_ ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 30S = caspica.

nudicaul"» Nutt. Gen. Am. i. 182 = Peucedanum nudicaule.

FERXJJiA.:—

nudicaulis, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 149.—Ins. SiciL

Nuttallii, DC. Prod. iv. 174 = Peucedanum nudicaule.

Nuttallii,\\a\p. Rep. ii. 411 = Peucedanumtriternatum.

obtusifolia, Spreng. Syst. i. 914 = Malabaila obtnsifolia.

Olgae, *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 590, nomen; *Fl. Nov. Fedsch.* 86.—Turkestan.

oopoda, *Boiss. Fl. Orient.* iL 984.—Persia; Beluchist.

Opoponax, Spreng. Umbell. Sp. 77 = Opoponax hispidum.

orientalis, Eichw. Skizze, 15tf - caspica.

orientalis, *Linn. Sp. PI.* 247.—As. Min.

orientalis, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 300- Utarica.

ovina, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 986.—Persia; Beluchist.

pachyloba, Awl, *Pugill. PI. Nov. Syr.* i. 18.—Cilicia.

Palmella, Hook. Fl. Bor. Am. i. 268-Cymopterus glomeratns.

paniculata, Ledeb. FL Rots. ii. 305=reiinosa.

parmfolia. Hook. & Am. Bot Beech. Voy. 348 = Peucedanum parvifolinm.

panciflora, *C. Koch, in Linnaea,* xvi. (1842) 358.—Armenia.

paucijuga, DC. Prod. iv. 171=Johrenia Candollei.

penninervis, *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 691.—Turkestan.

persica, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 806 = Lehmannit

persica, Simi, Bot. Mag. t. 2096=galbaniflua, rubricaulis.

persica, *Willd. Sp. PI.* i. 1413.—Reg. Caucas.; Persia.

petiolaris, DC. Prod. iv. 173 — Peucedanum petiolare.

peucedanifolia, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc (1839) li. 155 ; xv. (1842) I. 365 - Karelini.

peucedanifolia, Willd. ex Schult Syst. vi. 592- Meyeri.

puberula, Boiss. *tc* Buhse, in Nonv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 98 = persica.

puberula, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) I. 323.—As. temp.

pubescens, Pall, ex Schult. Syst vi. 598=Cachrys odontalgica.

pumila, Pall, ex SchuU. 1. c.=nuda.

rablensis, Wulf. in Jacq. Coll. iv. 812 - Pencedanum anstriacum.

raeemi/era, Szov. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 26~Dorema glabrum.

resinosa, *Sievers, in Pall. N. Nord. Beitr.* vii. 260.—Sibir.

rigida, *Tenore, Fl. Neap. App.* iv. 16.—Italia,

rigidula, *Fisch. ex DC. Prod.* Iv. 172.—Reg. Caucas.; Persia.

rubricaulis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. ii. 92.—Persia.

rupestris, Boiss. & BaL 1. c. Ser. II. vi. 86, in syn.= orientalis.

ruthenica, Spreng. Pugill. i. 26=Peucedanum ruthenicum.

Sadleriana, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 30, in nota.—Hungar.

salsa, Ledeb. Fl. Alt. i. 344, in nota=Pencedanum redivivum.

sancta, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 39 =tingitana.

scabra. Fend, in Flora, xxvi. (1843) 461=Hippomarathrum scabrum.

Schair, *Borsic*. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VII. iii. (1861) 8, 87. t. 7.—Turkestan.

Schlechtendalii, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 985.—Kurdistan.

Schtschurowskiana, *Regel V Schmalh. ex Regel, PI. •Nov. Fedsch.* 34.—Turkestan.

Scorodosma, Bentley & Trim. Med. PI. t. 131 = foetida.

seseloides, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 126 = Peucedanum paucifolium.

sibirica, Sadl. Fl. Com. Pest.i. 228=SadIeiiana.

sibirica, Schang. in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 111 = soongarica.

sibirica, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 307-longifolia.

sibirica, Willd. Sp. PI. i. 1411 = Meyeri.

sinaica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 40.—Arab,

soongarica, *Pall, ex Schult. Syst.* vi. 593.—Sibir. altaic

stenocarpa, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 990.—Persia.

stricta, *Spreng. ex Schult. Syst.* vi. 592.—Afr. austr.

sulcata, *Desf. Fl. Atlant.* i. 852. t. 67.—Reg. Mediten.

sulcata, Ledeb. Fl. Ross. ii. 299-F. Ferulago.

Sumbul, *Hoot./. Bot. Mag.* t. 6196.—Turkestan.

FEBUIiA:—

sylvatica, *Bess. Enum. PI. Volh.* 44.—Enrop. or.; Reg. Caucas.

sylvatica, Orph. ex Nym. Consp. 284 = monticola, *Nym.*

sylvatica, Szov. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 999-pauciflora.

Szowitziana, *DC. Prod.* iv. 173.—Armen.; Persia.

taUrica, *Fisch. ex Spreng. Pugill.* i. 27.—Ross, austr.

teterrima, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 863.—Soongaria.

Thomsoni, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 708.—Reg. Himal.

thyrsiflora, *Sibth.* b* *Sm. Fl. Grate. Prod.* i. 191 Ins.Creta.

tingitana, *Linn. Sp. PI.* 247.—Syria; Afr. bor.

toluccensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 12. t. 418 = Pencedanum toluccensis.

Tschiurowskiana, Regel *Be* Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 593 - Schtschurowskiana.

tortuosa, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 161 = Foeniculum tortuosum.

varia, Trautv. ex Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxix. (1666) I. 325 = Peucedanum varium.

verticillata, *Maerkl. in Ann. Ges. Wetter,* ii. (1811) 249 (Quid T).—Europ.

villosa, Walt. Fl. Carol. 115-Archangelica hirsuta.

wolgensis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 303-nuda.

FERULAGO, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (1824) 97 = Ferula, Linn. (Umbellif.).

angulata, Boiss. Fl. Orient, ii. 1005 = Ferula angulata.

asparagifolia, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 321,-As. Min.

athoa, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 202. —Enrop.

Aucherii, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. III. 1. (1844) 823.—As. Min.

Barrelieri, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 364, in obs.- Ferula sulcata.

biumbellata, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 142.—Alger.

Bourgaei, Boiss. Fl. Orient, ii. 1000—Ferula armena, *DC.*

brachyloba, Boiss. & Reutex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 733-Ferula brachyloba.

bracteata, Boiss. *8c* Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 1008.—Syria.

carduchorum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. 1. c. 1005 Assyria.

Cassia, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 38.—As. Min.; Syria.

cinerea, Boiss. 1. c. vi. 60.—Persia.

communis, Pett. ex Nym. Consp. 284-= Ferula sulcata.

contracta, Boiss. *8c* Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 1007.—Persia.

crassicosta, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 148.—Alger.

Dodonaei, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora, iv. 1158- Ferula Ferulago.

/rigida, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 89.—Syria.

galbanifera, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 802 = Ferula Ferulago.

geniculata, Boiss. in Ann. Sc. Nat Ser. III. i. (1844) 324 — Ferula geniculata.

geniculata, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 354 - Ferula rigida.

granatensis, Boiss. Elench. 48 — Ferula granatensis.

humilis, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. III. i. (1844) 822. —As. Min.

leptocarpa, Pomel, Nonv. Mat. Fl. Atl. 143 Alger.

lineari/olia, Bobs, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 819 = Ferula angulata.

longistylis, Boiss. 1. c. 821.—Cappadoc.

lophoptera, Boiss. I. c. 325-Ferula lophoptera.

macrocarpa, Boiss. Fl. Orient, ii. 1003.—Mesopot.

macrosciadea, Boiss. *8z* Bal. Diagn. Ser. II. vi. 82. Phrygia.

meoides, Boiss. Fl. Orient, ii. 1004-Ferula meoides.

monticola, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 91 = Ferula monticola.

monticola, Nym. Consp. 284, sub n. 7-Ferula sylvatica.

nodiflora, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (18241 98 = Ferula sulcata.

nodosa, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 37 = Ferula nodosa.

Orphanidis, Boiss. & Heldr. 1. c. Ser. II. ii. 91 => Ferula monticola.

oxyptera, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (18441 320- Ferula sylvatiea.

pachyloba, Boiss. F'.. Orient, ii. 1006 - Ferula pachyloba,

pani/olia, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 311.—Alger.

FERULAGO:—
pauciflora, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1812) 358 = Ferula panciflora.
pauciradiata, Boiss. *8c* Heldr. Diagn. Ser. I. x. 87.—As. Min.
platycarpa, Boiss. *8c* Bal. 1. c. II. vi. 82-Ferula annena, *DC.*
Sadleri, Griseb. ex Nym. Consp. 284 = Ferula Sadleriana.
Sartorii, Boiss. Fl. Orient, ii. 999.—Ins. Cyclad.
scabra, Fenzl, in Flora, xxvi. (1813) 401.—Mesopot.
scaira, Fomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 118.—Alger.
setifolia, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 358-Ferula panciflora.
silaifolia, Boiss. Fl. Orient, ii. 1004.—Bithynia.
stellata, Boias. in Ann. Sc. Nat Sér. III. i. (1844) 823.—Persia.
sulcata, Ledeb.Fl. Ross. ii. 299 = Ferula sulcata.
sylvatica, Reichb. PL Crit iv. *L* 556- Ferula sylvatica.
syhatica, Szov. ex C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 368-Ferula pauciflora.
syriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 38.—Syria.
77k»r«ma,* Boiss. Fl. Orient, ii. 1004.—Anatolia.
thyrsiflora, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (1824) 98=Ferula thyrsiflora.
trachycarpa, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 319.—As. Min.
transsilvanica, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 30-Ferula sylvatica.
trifida, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 318.—Persia.

FESTUCA, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735). *GRAMINEAE,* Uenth. & Hook. f. iii. 1198.
AMPHIGENES, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 61».
CASTELLIA, Tineo, PI. Rar. Sic. 17 (1817).
CATAPODIUM, Link, Hort. Berol. i. 44 (1827).
CHLOAMMA, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).
DISTOMISCHUS, Dulac, FL Hautes-Pyr. 91 (1867).
DRYMONAETES, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).
FESTUCARIA, Link, in Linnaea, xvii. (1843) 398.
GOUINIA, Fourn. ex Benth. *8c* Hook, £ Gem iii. 1178 (1883).
HELLERIA, Foum. 1. c. 1199 (1883).
LORETIA, Duval-Touv. in Rev. Sc. Nat. Sér. II. ii. [1880] 38.
MICROPYRUM, Link, in Linnaea, xvii. (1843) 397.
MVGALURUS, Link, Enum. Hort. BeroL i. 92 (1821!.
NARDURUS, Reichb. Norn. 39 (1841).—Cf. ej. Fl. Germ. Excurs. 19, in obs.
PROSPHVSIS, Dolac, Fl. Hautes-Pyr. 67 (1867).
SCHEDONORUS, Beauv.- Agrost. 99.1.19. f. 2 (1812), partim.
SCLEROCHLOA, Reichb. Ic Fl. Germ, i 23. t. 68 (1884).
SCLEROPOA, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 431 (1844).
SYNAPHE, Dulac. Fl. Hautes-Pyr. 90 (1867).
VULPIA, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 8 (1806).
ZERNA, Panz. in Denkschr. Akad. Muench. 1813 (1814) 296, partim.
abbreviata, *Link, ex Fleisch. Syst. Vert. Ostsee-Prov. Phanerog.* 22.—Rossia bait,
abyssinica, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 20, nomen; *et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 432.—Abyss,
acanthophylla, *E. Den. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 434.—Chili.
acerosa, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 6**punctoria.
acuminata, Gaud. Agrost. Helv. ii. 287-varia.
acutiflora, *Bigel. Fl. Bost.* ed. III. 89.—Am. bor.
adscendens, ReU. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1769) 245 *"loliacea.*
aequipaleata, *Foum. ex Hemsl. Biol. Centr.Am. Bot.* iii. 581.—Mexic.
aetnensis, PresL Cyp. et Gram. Sic 85=Poa violacea.
aetnensis, Walp. Ann. i. 943-ciliata.
affinis, Boiss. *8c* Heldr. Diagn. Ser.IL iv. 187-spectabilis.
agrestis, Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 87-= bromoides.
agrestis, Wulf. ex Steud. Norn. ed. II. i. 628=ovina.
agrostidea, *La Pilaye, in Mim. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 421.—'Terra Nova.*
airoidts, Lam. Encyc. ii. 464 - Poa nemoralis.
aUida, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 313=membranacea.

FE8TUCA:—
albida, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 10.—Ins. Madera.
aleppica, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram.* 302.—Syria; Persia.
aliena, *Spreng. Syst.* i. 356.—Hab. ?
alopecuroides, Savi, Cose Bot. 68 = F. Alopecuros.
alopecuroides, Tenore, FL Nap. iv. 16 = F. Myuros.
Alopecuros, *Schousb. Vext. Marokko,* 40.—Reg. Mediterr. occ.
Alopecurus, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. 82=<F. Arundo.
alpestris, Roem. *Sc* Schult. Systii. 722 = varia.
alpestris, Wulf. Fl. Norie. Phan. ed. Fenzl *8c* Graf, 151 = rubra.
alpigena, Hoppe, in Flora, i. (1818) 329-rubra.
alpina, Host, Gram. Austr. iv. 36. t 63-varia.
alpina, Suter, Fl. Helv. i. 55=ovina.
altaica, *Trin. in Ledeb. Fl. Alt.* i. 109.—Sibiria.
altissima, All. Auct. Fl. Pedem. 43-sylvàtica.
altissima, Boiss. Elench. 92 = montana.
ambigua, Le Gall, Fl. Morbihan, 731 = F. Myuros.
americana, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 832 = poaeoides.
americana, Michx. ex Beauv. Agrost. 162=Diarrhena amerieana.
amethystea, Ponrr. ex Nym. Consp. 827-rnbra.
amethystina, All. Fl. Pedem. Ii. 253-varia.
amethystina, Delarb. Fl. Auvergne, iL 694 = rubra.
amethystina, Host, Gram. Austr. ii. 63-ovina.
amethystina, *Linn. Sp. PI.* 74.—Europ. austr.: As. Min.
ammophyla, *Dum. Obs. Gram. Belg.* 105.—Belgium,
ampla, *Hack. Cat. Gram. Portugal,* 26.—Hispan.
amplifiora, Doell, in Mart. FL Bras, it III. 116 = amplis6ima.
amplissima, *Rupr. in Bull. Acad. Brux.* ix. II. (1842) 236.—Mexic
anceps, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 314.—Hunger,
andicola, *//. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 153.—Ecuador,
angustata, *Griseb. in Goett. Aih.* xxiv. (1879) 288.—Reg. Argent,
anomala, *Hochst. in Flbra,* xxxviii. (1855) 880.—Abyss.
antarctica, *Kunth, Rév. Gram.* i. 132.—Ins. Falkl.
antarctica, Spreng. Pugill. ii. 23 = flabellata.
anthoxanthia, Sra. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 115—spadicea.
antneensis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 804.—Chili.
apennina, De Not. Prosp. Fl. Ligust. 56=elatior.
aquatica, Bosc, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 615-Diplachne fascicularis.
arabica, Hort. ex Link, in Linnaea, xvii. (1847) 402 (= *Vulpia subciliata).—Giaecii.*
arctica, Schur, Enum. PL Transs. 799-elatior.
arduenna, Dum. Obs. Gram. Belg. 108 — ovina.
arenaria, Kit. ex Steud. Norn. ed. II. i. 628=ovina.
arenaria. *Lam. Tabl. Encyc.* i. 191.—Reg. Magellan.
arenaria, Retz. Diss. Suppl. Fl. Scand. (1805) 4 = rubra.
argaea, Boiss. & Bal ex Boiss. Fl. Orient, v. 609—Poa violacea.
argentea, Savi, in Usteri, Ann. xxiv. (1800) 49—Sesleria cylindrica.
aristata, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 412 - gigantea.
articulata, De Not ex Part. Fl. ItaL i. 455-eiatior.
arundinacea, IMytU. Sv. FL ed. II. 47 ; ed. III. 70= Graphephorum arundinaceum.
arundinacea, Schreb. Spicil. Fl. Lips. 57-elatior.
arundinacea, *Vill. Prosp.* 17; *Hist. PI. Dauph.* i. 262.—Europ.
Arundo, *Hook./. Fl. Antarct.* 381.—Reg. Magellan.
Askelofiana, Schult. Mant. ii. 894-rubra.
aspera, Mert *8c* Koch, DeutschL FL i. 672-Bromus asper.
aspera, Poir. Encyc. Suppl. ii. 685-scabra.
aspera, Willd. ex Sleud. Norn. ed. II. i. 628-tolucensis.
asperata, *Phil, in Linnaea,* xxniiL (1864-65) 296.—Chili.
asperrima, Hornem. ex Steud. Nom. ed. Il.i. 628—Poa nemoralis.
asperrima, Link, Hart. Berol. ii. 270 (an Fectucae sp. ?).—Tauria.
atro-rubens, Wulf. FL Norie. Phan. ed. Fenzl & Graf. 151=pulchella.
attenuata, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 886.—Ital.

FESTTJCA:—
aurata, Gaud. Agrost. Helv. i. 234-rubra.
aurata, Steud. Nom. ed. II. i. 624 -seq.
aurea, Lam. Fl. Fr. iii. 598-spadicea.
australis, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 304=tenelU.
australis, Schnr, Enum. PL Transs. 798 =• elation
austriaca, Hack, in Oestr. Bot Zeitschr. xxviii. (1878) 849=amethystina.
balearica, Guatt ex Zuccagni, in Roem. Collect 125 = rubra*.
baltica, Homann, ex Mert. *8c* Koch, DeutschL Fl. i. 664; FL Pomm. i. 66-rubra.
barbata, Linn. Diss. Dem. in Amoen. Acad. iii. 400 = Schismus marginatus.
barbata, Moench,Meth. Suppl. 68; Broil Phyt. ii. 62 = F. Alopecuros.
barbata, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 46=rubra.
Barrelieri, Tenore, Prod. FL Nap. p. '« = Triticum Barrelieri.
Bartherei, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iv. (1870) 183-rnbra.
Baumgarteniana, Schur, Enum. PL Transs. 787 = ovina.
Becieri, Hack, in Bot. Centralb! viii. (1881) 405 = ovina.
Bellardi, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. i. 628 = varia.
bellula, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 594.—Turkestan.
Berteroniana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 31L—Chili.
biaristata, Ehrh. ex Boiss. Fl. Orient, v. 630 = inops.
bicornis, Schreb. ex Steud. Nom. ed. IL i. 628 — Glyceria acutiflora.
biflora, *Steud. Syn. PI. Gram.* 428.—Reg. Magellan.
Billardieri, Sleud. 1. c 804 - Agropyrum scabrum.
blepharophora, Roem. & Schult. Syst. ii. 728 = Centotheca lappacea.
Boissieri, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 841=montana.
bonariensis. Lam. Tabl. Encyc i. 192 = Poa bonariensis.
borbonica, *Spreng. Syst.* i. 352.—Ins. Mascar.
Borderii, Hack, in Bot. Centralbl. viii. (1881) 406 = ovina.
borealis, Mert. & Koch, DeutschL Fl. i. 664-Graphephorum arundinaceum.
Barrert, Bab. in Trans. Linn. Soc. xvii. C1837) *W>~* Glyceria Borreri.
bosniaca, Kumm. & Sendtn. in Flora, xxxii. (1849) 756-varia.
brachyphylla, Schult. Mant ii. 646-ovina.
bracteata, DC. Cat. Hort. Monsp. Ill (gen. dub.).—Hab.?
breunia, Face, in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. iv- (1854) 11= Poa violacea.
brevifolia, R. Br. in Parry, 1st Voy. Suppl. p. cclxxxix—ovina.
brevifolia, Muhl. Desc. Gram. 167 = Diarrhena americana.
brenseta, Steud. Syn. PL Gram. 817 - Triticuni brevisetum.
Brinkmanni x, A. Br. Ind. Sem. Hort Berol. (1861; App. 11.
briioides, Spreng. Syst. i. 353 - Briza erecta.
briioides, Wulf. Fl. Noric. Phan. ed. Fenzl & Graf, I*[1] -varia.
bromiformis, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 17. nomen.—Helvet.
bromoides, *Linn. Sp. PI.* 75*.—Reg. temp.
bromoides, Michx. Fl. Bor. Am. i.66=tenella.
Broteri, Nym. Syll. 418-hybrida.
Broteri, Steud. Syn. PL Gram. 304 = F. Myuros.
Bromniana, Steud. Syn. PL Gram. 804=Agropyw[n] scabrum.
Brownii, F. Muell. Fragm. viii. 129 = Diplachne pa"'' flora.
bulbosa, Bivona, Stirp. Rar. Sic. Manip. iv. 7=caerulescens.
cacuminis, HemsL ex Ball, in Joura. Linn. See. »"• (1886) 62, nomen-livida.
caerulans, Schur, Enum. PI. Transs. 789=amethystina.
caerulea, DC. FL Fr. iii. 46=Molinia caerulea.
caerulescens, Boiss. ex Hack. Monog. Festuc. 167 [s] spadicea.
caerulescens, *Deaf. Fl. Atlant. i.* 87.—Reg. Mediterr.
caerulescens, Tenore, Fl. Nap. iii. 81=elatior.
caesia, Sm. Engl. Bot. 1.1917 - ovina.
caespitosa, Desf. Fl. Atlant. i. 91 - Brachypodiuo[1] ramosum.

FESTUCA :—

«<j>rt<u, Roem. & Sehult. Syst. ii. 782 = flabellata.
Intosa, Willd. ex Sprang. Syst. i. 352-borbonica.
(1869) 128 =ovina.
U877) n. 461 j *Hack. Monog. Fest.* 190.—Italia.
Sm. Fl. Brit. i. 121=sylvatica.
Çaldasii, ATKXM, *A». Gram. i.* 182.—Ecuador.
wwinca, Huds. Fl. Ahgl. ed. II. i. 46-rubra.
Host, Fl. Austr. i. 155=laxa.
Preng. Syst. i. 352 = Lasiochloa ciliaris.
"piUaris, Wulf. Fl. Nor. Phan. ed. Fenzl & Graf. 144 = oTina.
Willd. ex Spreng. Syst. i. 856=aliena.
Roem- * Schult. Syst. ii. 735 =
ex Spreng. Syst. iv. Cor. Post. 86 - Dactylis capitata.
Steud. Syn. Pl. Gram. 812.—Carolina.
Lex'* Gaertn. Nachtr.
*7°*rn. Linn. Soc.* xxii. (1885)
ex Boiss. Orient- v. 626 - sibirica.
(1864-66) 297.—
Chili.
ed. II. i. 242-pulchella.
Oouan, Hort. Monsp. 48, 647 = Brachypodium distachyum.
in Schrad. Journ. it (1798)315; Brot.Fl. Lusit. i. 115 = F. Alopecuros.
ed. II. i. 629, sphalm.=«7i«m.
51-rnbra.
Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 288.—Reg. Argent.
Muhl. Desc. Gram. 162.—Am. bor.
Meth. 190.—Reg. Mediterr. occ.
Boiss. Elenc. ii. 90.—Hispan.
Steud. Syn. Pl. Gram. 312.—Chili.
Schur, Enum. Pl. Transs. 7S8 = ovina.
Spreng. Syst. i. 353 - Briza subarisUU.
Steud. Syn. Pl. Gram. 804.—Chili.
[Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 243. —Syria.
DC. Fl. Fr. vi. 263 = spadicea.
Linnaea, xixu. (1863) 811.-Hungar.
Muhl. Desc. Gram. 162.—Am. bor.
Meth. 190.—Reg. Mediterr. occ.
Boiss. Elenc. ii. 90.—Hispan.
Steud. Syn. Pl. Gram. 312.—Chili.
Schur, Enum. Pl. Transs. 7S8 = ovina.
Spreng. Syst. i. 353 - Briza subarisUU.
Steud. Syn. Pl. Gram. 804.—Chili.
[Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 243. —Syria.
DC. Fl. Fr. vi. 263 = spadicea.
Linnaea, xixu. (1863) 811.-Hungar.
Bull. Soc. Hist. Nat. Tool. Hi. (1869) 18 =Padicea.
Knnth, R^v. Gram. i. 129 = Glyceria distans.
ex Steud. Nom. ed. II. i. 629-ovina.
Sm. Fl. Brit. i. 121=sylvatica.
Tansch, ex Stend. Nom. ed. II. i. 628 = ovina.
Caldasii, ATKXM, *A». Gram. i.* 182.—Ecuador.
<-«.yp«a, Loefl. IterHisp. ll«=Schismus marginatus.
wwinca, Huds. Fl. Ahgl. ed. II. i. 46-rubra.
»«, Kit. ex Stead. Norn. ed. II. i. 629=ovina.
Host, Fl. Austr. i. 155=laxa.
i Reichb. It Fl. Gem. i. 26. t. 1541-ovina.
Preng. Syst. i. 352 = Lasiochloa ciliaris.
distans L. Lilleb. Uk. Suec. IL 48 = Glyceria
Willd. ex Spreng. Syst. i. 856=aliena.
Roem- * Schult. Syst. ii. 735 = scaberrima »
ex Spreng. Syst. iv. Cor. Post. 86 - Dactylis capitata.
ex Boiss. Orient- v. 626 - sibirica.
(1864-66) 297.—
Chili.
ed. II. i. 242-pulchella.
Oouan, Hort. Monsp. 48, 647 = Brachypodium distachyum.
in Schrad. Journ. it (1798)315; Brot.Fl. Lusit. i. 115 = F. Alopecuros.
ed. II. i. 629, sphalm.=«7i«m.
51-rnbra.
Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 288.—Reg. Argent.
Muhl. Desc. Gram. 162.—Am. bor.
Meth. 190.—Reg. Mediterr. occ.
Boiss. Elenc. ii. 90.—Hispan.
Steud. Syn. Pl. Gram. 312.—Chili.
Schur, Enum. Pl. Transs. 7S8 = ovina.
Spreng. Syst. i. 353 - Briza subarisUU.
Steud. Syn. Pl. Gram. 804.—Chili.
[Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 243. —Syria.
DC. Fl. Fr. vi. 263 = spadicea.
Linnaea, xixu. (1863) 811.-Hungar.
Bull. Soc. Hist. Nat. Tool. Hi. (1869) 18 =Padicea.
Knnth, R^v. Gram. i. 129 = Glyceria distans.
ex Stend. Nom. ed. II. i. 629-ovina.
Sm. Fl. Brit. i. 121=sylvatica.
Tansch, ex Stend. Nom. ed. II. i. 628 = ovina.
Caldasii, ATKXM, *A». Gram. i.* 182.—Ecuador.
<-«.yp«a, Loefl. IterHisp. ll«=Schismus marginatus.
wwinca, Huds. Fl. Ahgl. ed. II. i. 46-rubra.
»«, Kit. ex Stead. Norn. ed. II. i. 629=ovina.
Host, Fl. Austr. i. 155=laxa.
i Reichb. It Fl. Gem. i. 26. t. 1541-ovina.
Preng. Syst. i. 352 = Lasiochloa ciliaris.
"piUaris, Wulf. Fl. Nor. Phan. ed. Fenzl & Graf. 144 = oTina.

FESTTTCA :—
gradlenta. Buck], in Proc Acad. Sc. Philad. 1883 (1868) 97-microstachys.
graeilis, Berah. Syst. Verz. Erf. 46 = Brachypodium pinnatnm f
gracilis, *Kunth,* /We. *Gram.* i. 129.—Gallia mend. ≺
graeilis, Moeneh, Meth. 191 = Brachypodium sylvaticum.
gracillima, *Hook. f. Fl. Ant arct.* 383.—Calif.; Keg. Magellan.
granatensis, *Boiss. Blench.* 93.—Hispan.
granatensis, Willk. in Linnaea, **xxv.** (1862) 66 => caerulescens.
grandifiora, Lam. Tabl. Encyc i. 191 = Arnndinaria macrosperma.
grandifiora, Sprang, ex Steud. Norn. ed. II. i. 630 = Glyceiia acutiflora.
grandifiora, Steud. Syn. PI. Gram. 311 = livid*.
guestfalica. Booming, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140»=ovina.
guestpkalica, Schor, Enum. PI. Transs. 79O = amethystina.
Gussonis, Trin. ex Steud. Norn. ed. II. i. 630 = sicnla.
gypsophila, *Hack, in Oestr. Bat. Zeitsehr.* **xxvii. (1877)** 47.—Hispan.
Haenkei, *Kunth, Enum. PI.* i. 408.—Peruv.
Halleri, All. Fl. Pedem. ii. 263=ovina.
HaUeri, Puce in Parl. Giorn. Bot ItaL i. I. (1844) 121-rubra.
halUrioides, Schur, Ennm. PI. Transs. 790=ovina.
kalmyris, Mabille, in Act. Linn. Soc. Bord. xxv. (1864) 611-rubra.
hemipoa, *Delile, ex Spreng. Syst.* **IT.** *Cur. Post.* **36.—** Europ. austr.; Afr. bor.
Henriqnezii, *Hack, in Bet. Centralb.* viii. (1881) 406, nomen ; *Monog. Fest.* 126.—Lnsitan.
bepbaestophila, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* **310.—** Mexic
keptantha, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 410 = Poa persica.
keteromalla, Ponrr. in Mém. Acad. Toul. lit. (1788) 819=elatior.
heterophylla. Lam. FL Fr. iii. 600; Haenk. in Jacq. Coll. ii. 98-rubra.
heterophylla, Wahlenb. Veg. Helv. 18=ovina.
hirsuta, DC. Fl. Fr. iii. 53-Koeleria hireuta.
hirsuta, Hornem. in Fl. Dan. t. 1627 = rubra.
hirsuta, Host, Gram. Austr. ii. 61. t. 85 = ovina.
hirsuta, *Moeneh, Meth. Suppl.* **62.—Hab. t**
hirta, Seenus, Keise Istrien, 59 = Bromus erectus.
kispmica, Kunth, Rev. Gram. i. 129 = tenuiflora.
hispida, Savi, Fl. Pis. i. 117 = Koeleria hispida.
Hookeriana, *F. Muell. ex Hook. Fl. Tasm.* **ii. 127. t** 165.—Austral.
hordeiformis, Wolf, ex Stend. Norn. ed. I. 337 - bromoides.
Hostii, Kunth, Re>. Gram. i. 129 = Glyceria festucaeformis.
Hostii, Schott, ex Roem. *Sc* Schnlt. Syst. ii. 722-varia.
humilior, *[Nees, in] Mèyen, Seise,* i. 466, nomen; ***et in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 166.** —Peruv.
hybrida, *Brot. Fl. Lusit.* i. 115.—Hispan.
Hystrix, *Boiss. Blench.* 89.—Hispan.
inarmata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 177 = amethystina.
incrassata, *Salam. ex Loisel. Fl. Gall.* ed. II. i. 85.—Italia.
indica, Retz. Obs. iv. 21=Diplachne indica.
indigesta, Boiss. Elench. 91= ovina.
inermis, DC. Fl. Fr. iii. 49 - Bromus inermis,
iniopoda, Schur, Enum. PI. Transs. 798=rubra.
inops, *Delile, ex Steud. Nom.* ed. I. 337, nomen; ***Boiss. Fl. Orient,* v. 630.—Aegypt.**
inops, De Not Repert. Fl. Ligust. ii. 500=ovina.
insularis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 812.—Chili.
intermedia, Roem. *Sc* Schult Syst. ii. 716 = ovina.
interrupta, Desf. Fl. Atlant. i. 89=elatior.
involuta, Moeneh, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 720-ovina.
irritans, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 59 = Triodia irritans.
Jonesii, *Vasty, Gram. U. St.* 48, nomen.—Am. bor. **occ.**
jubata, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* **vi. (1838)** reimp. 8.—Ins. Azor.

FESTUCA :—
juncea, Moencb, Meth. 190»Agropyron jnnceum.
jund/olia, St. Am. Fl. Agen. 40 = rubra.
jurana, Gren. ex Nym. Consp. 826 - pulchella.
kerguelensis, *Hook. f. in Phil. Trans,* clxviii. (1879) 14.—Ins. Kerguel.
Kingiana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 316.—Ins. Norfolk.
Kirelowü, *Steud. I. c.* 306.—Soongar.
Kitaibeliana, Schult. Mant. ii. 398-rubra.
Krausei, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* **vii. (1880) 594.** —Turkestan.
Lachenalii, Spenn. Fl. Friburg. iii. 1050 - F . Poa.
laevigata. Gaud, in Alpina; iii. (1808) 60=ovina.
laevis, Hack, in Bot. Centralb. viii. (1881) 405-ovina.
laevis, *Kit. in Unnaea,* xxxii. (1863) 313.—Hungar.
laevis, Spreng. Syst. i. 355 - Lasiochloa laevis.
Lagascae, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. i. 630 = varia.
lanata, Spreng. Syst. i. 858 = Poa lanuginosa.
lanceolata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 22-Cntandia lanceolata.
lanuginosa, Scheele, in Flora, xxvii. (1844) 63 = rubra.
lasiantha, Schur, Ennm. PI. Transs. 788-ovina.
latifolia, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 111.—Hab.?
latifotia, Dulac, Fl. Haules-Pyr. 98 = elatior.
latifolia, Host, Fl. Austr. i. 152 = sylvatica.
latifolia, Kotb, Nov. PL Sp. 75 = Centotheca lappfrCCft.
latispicea, F. Muell. Fragm. viii. 127 •= Glycerin latispicea.
laxa, Gaud. Agrost. Helv. i. 261 = elatior.
laxa, *Host, Gram. Austr.* ii. 58.—Europ. or.
laxa, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 630 = varia.
laxiflora, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 98.—Chili.
laxiflora, *A. Rick, Fl. Cub. Fanerog.* ii. 318.—Cuba.
Lechleriana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 428.—Keg. Magellan.
Lemanii, Bast. Ess. Fl. Maine-et-Loire, 86 - ovina.
leptothrix, *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 630, nomen ; ***Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 115.—Bras.**
leucantha, Schur, Enum. PI. Transs. 916, sphalm., vide ***lasiantha.***
Leysseri, Moeneh, Enum. PI. Hass. 41 = Bromus inermis.
Liebmanni, *Fount, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* **iii.** 582.—Mexic.
ligustica, *Bertol- Amoen. Hal.* 8.—Italia.
linearis, Gilib. Exercit. ii. 534 = F. Myuros.
Linneana, Steud. Syn. PI. Gram. 803=bromoides.
lithuanica, Aschers. in Bot. Zeit. xxv. (1867) 160 = montana ?
litorea, Hack. Monog. Fest. 153, sphalm. =elatior.
littoralis, *Labill. Nov. Holt. PI.* i. 22. t. 27.—Austral.
littoralis, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 61; FL Graec. t. 80 = Aeluropus laevis.
littoralis, Steud. Syn. PL Gram. 317 = Brachypodium ramosum.
littoralis, Wahlenb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. viii. (1821)211, 233-elatior.
livida, Schur, Enum. PI. Transs. 787 = ovina.
livida, *Willd. ex Spreng. Syst.* i. 353.—Mexic.
loliaceax, Huds. Fl. Angl. ed. I. 88.—Europ.
loliacea, Lam. Encyc ii. 462 = elatior.
loliiformis, F. Muell. Fragm. viii 128 = Diplachne loliiformis.
lolioides, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 630=tenuiflora.
Lolium, *Balansa, ex Coss. (f Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1865) 811.—Alger.
longearistata, Walp. Ann. i. 948 - Agropyron longearistatum.
longifolia, Hegetschw. Fl. Schw. 91=rubra.
longifolia, Viv. in Ann. Bot i. II. (1804) 145 ; Thuill. Fl. Par. ed. II. 50=ovina.
longiseta, Brot. Fl. Lusit. i. 116 = bromoides.
longiseta, Hegetschw. Fl. Schw. 92 = rubra.
lubrica, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 44 = varia.
lucorum, Schur, Ennm. PI. Transs. 797 = montana.
macrophylla, *Hockst. ex A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* **ii. 434.—Abyssin.**
macrostachya, *Desf. Tabl.* ed. I. 218, nomen.—Hab. ?
madritensis, Desf. FL Atlant i. 91=bromoides.
magellanica, *Lam. Encyc.* ii. 461; *Tabl.* i. 189.—Reg. Magellan.
maritima, DC. Fl. Fr. iii. 47 = Cutandia maritima.

FE8TTJCA :—
maritima, Linn. Sp. PI. 75=tenuiflora.
maritima, C. Sm. ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 139-Smithii.
media, *Kit. in Unnaea,* xxxii. (1863) 314.—Hungar.
megalura, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. & i. (1847) 188 = F. Myuros.
megaphylla, Schur, Enum. PI. Transs. 789=ovina.
megastackys, Hegetschw. Fl. Schw. 92 = rubra.
melangaea, Spreng. Syst. i. 352 = Lasiochloa hispida.
membranacea, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 313.—Hungar.
memphitica, Boiss. ex Coss. Notes Crit. 183 = Cotandia scleropoides.
mexicana, Roem. & Schult Syst. it 782'Brachypodium mexicanum.
mexicana, Willd. ex. Spreng. Syst. i. 856 = Willdenowiana.
Michelii, Kunth, Enum. PL L S97=Avellinia Michelii.
microstachya, F. Muell. Veg. Chath. Isl. 60 = Triodis microstachya.
microstachys, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* **N. S. i-** (1847) 187.—Am. bor. occ.
minima, *A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* ii. 436.—Abyssin.
minor, Schur, Enum. PI. Trans?. 795 »varia.
minuta, Hoflm. in Comm. Soc. Phys. Mosc i. (1808) 43; ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 404-Schismua minutus.
misera, *Tkunb. Fl. Jap.* 52.—Japon.
modesta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 316.—Nepal,
mollis, *Kunth, Rev. Gram.* i. 132.—Ecuador.
monandra, Ell. ex Steud. Nom. ed. II. i. 631 = F. Myuros.
monostaehia, Poir. Voy. Barb. ii. 98 = Brachypodium distachyum.
montana, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 75.—Enrop.; As. Min.
montana, Savi, Fl. Pis. i. 118 = Bromus erectus.
montana, Sternb. &. Hoppe, in Denkschr. Bot. Ges-Kegensb. i. II. (1818) 95= Poa hybrida.
montana^ *Steud. Syn. PI. Gram.* 302.—Hispan.
monticola, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* **(1873) 576.—** Chili.
Montis-aurei, Delarb. Fl. Auvergne, ed. II. 696 = »" pina,
Montis-celtici, Delarb. 1. c. = rubra.
jMorisiana, *Parl. Giorn. Bot. Hal.* ii. (1844) S77—.Sardinia,
mucronata, *Arvet V Dupuy, in Bull. Soc. Bot. Fr-* xxix. (1882).—*Cf. Bibl.* 48.—Gallia.
mucronata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 22 = Aeluropu' arabiens.
mucronata, C. Muell. in Walp. Ann. vi. 1039 " Brachypodium mucronatnm.
multiculmis, Steud. Syn. PI. Gram. 310 -= toiv censis.
multiflora, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. 1.50 =rubr»-
multifiora, Presl, Cyp. et Gram. Sic 87-elatior.
multiflora, Suter, Fl. Helv. L 56 = ovina.
multiflora, Walt. Fl. Carol. 81 = Diplachne fasciularis.
muralis, *Kunth, Syn. PI.* i. 218.—Mexic.
muricata, Dur. ex Parl. Fl. Ital.i. 480=tuberculos»<
mutica, Schleich. ex Hack. Monog. Fest. 123 -» Diethystina.
mutica, Wnlf. Fl. None. Phan. ed. Fenzl *Sc* Graf, - ovina.
mysorensis, Heyne, ex Roem. & Schult Syst ii. 60° Tripogon bromoides.
Myuros, Gouan, Hort. Monsp. 49-ciliata.
Myuros, *Linn. Sp. PI.* 74.—Europ.; Am. et As. bor.
Myuros, Soyer-Willem. Obs. PL Fr. 132 = F. Alopeuros.
Myurus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 155 = muli»
Myurus, Moeneh, Meth. Suppl. 62 = bromoides.
Myurus, Muhl. Desc. Gram. 160=quadriflora.
nana, Steud. Syn. PI. Gram. 428 -= dichotoma.
nardifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 2e°- Reg. Argent.
nebrodensis, Jan, Elench. 2 - Poa violacea.
Neesiana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 631.—Afr. austr.
nemorosa, Latour. Chlor. Lugd. 3 = rubra.
nemorum, Leyss. in Abh. Naturf. Ges. Halle, i- (1768) 368-rubra.
neogaea, *Steud. Syn. PI. Gram.* 813.—' Terra n.
nepalensis, Steud. 1. c. 816 = Brachypodium neP*i?"
nervosa, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 251 = Poa steiiaD'"^
nevadensis, Hack, in Bot. Centralb. viii. (1C81) rubra.

MSSTTTCA :—
nigra, Gilib. Exercit. ii. 583-ovina.
nigrescens. Lam. Encyc. ii. 460=rubra.
nigrescens, Steud. Syn. PL Gram. Sll=rigesceni.
nitida. Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 289 - rubra.
•inbigena, *Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Nterl. Indie,* ii. (1846) 51.—Java.
nubila, Steud. Syn. PL Gram. 815-praec.
nuda, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturm.* u>. (1852) 91.—Transsylv.
nutans, Host, Gram. Austr. iv. 35. t. 61-pulchelU.
nutans, Moench, Meth. 191-Agropyron caninum.
nutans, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 34; *MM. Desc. Gram.* 165.—AmTW.
nutans, Wahlenb. Fl. Carp. Princip. 28-carpathica.
NuttaUiana, Kunth, Rev. Gram. i. 129 = Glyceria distant.
obovata,/ft,. in *Linnaea,* xxxii. (18631 S18.-Hungar.
obtusa, Spreng. Fl. Hal. Mant. 84 ~nutans.
oktusata, Michx. ex Beauv. Agrost. 168-Reboulea gracilis.
obtusiflora, Willd. ex Spreng. Syit. i. 866- Diplachne dubia.
"btusifolia. Lag. ex Unk, Enum. Hort. Berol. i. 95 = Brachypodium ramosum.
occidentalis, Hook. FL Bor. Am. ii. 249 = pauciflora,..
ochroleuca, Timb. in Bull. Soc. Hist Nat. Toul. in. (1868) 129=ovina.
octoflora, Walt. Fl. Carol. 81-tenella.
oetandica, Hack, ex Nym. Consp. 827 - rubra.
oligosantha, Schur, Enum. PI. Transs. 784= ovina.
Onurus, Willd.ex Spreng. Syst. i. 364-muralis.
oranensis, Steud. Syn. PL Gram. 3)3=caeruleiicens.
<"•«•», Dum. Obs. Gram. Belg. 105 = rnbra.
oregona, *Vasey, in Coult. Bot. Go*,* ii. (1877) 126.—Am. bor. occ.
«$yalis, *Willd. ex Spreng. Syst.* i. 351, in syn.—Mexic.
'rientalit, Kem. ex Hack. Monog. Fest. 154 - elatior.
oryetorum, Pollini, Veron. PL Nov. 3-elatior.
ourtana, Lej. FL Spa,i. 57-ovina.
ovina, Brot. Fl. Lusit. i. 114-ampla.
°«na, *Linn. Sp. PI.* 78.—Reg. temp, ej arct.
pallens, Host, Gram. Austr. ii. 63-ovina.
Pollida, Gaud, in Alpina, iii. (1808) 56-rubra.
Poludosa, Gaud. Agrost. Helv. i.229=ovina.
Polustris, Seenus, Reise Istrien, 72-Glyceria distans.
Ponnonica, Wolf, ex Host, Gram. Austr. iv. 36. t *Oi* ovina.
Ponormitana, Guss. FL Sic. Syn. ii. 886 - bromoides.
P»radoxa, *Desv. Opusc.* 106.—Hab.!
paradoxa, Ehrh. ex Steud. Nom. ed. H. i- 681- •padicea.
parviflora, *Ell. Sketch, i.* 170.—Carolina.
Pxrvigluma, Steud. Syn. PL Gram. 305 - pauciflora.
Parvula, *Kunth, Rri. Gram. i.* 129.—Oriens.
Patens, Sleud. Syn. PL Gram. 428 - pectinella.
PMula, *Desf. Fl. Atlant.* i. 86.—Afr. hor
^"n/fora/Schleich. Cat. PL Helv. ed. IV. "-ovina.
Paueiflora, *Thunb. Fl. Jap.* 52.-Japon.; Am. bor. occ.
pKtinata, Labill. Nov. Holl. PL i. 21. t. 25 - Agropyron pectinatum.
Pectinella. *Mile, Ind, Sem. Hort. Monsp.* (1836) 24, *ex Coss. b- Dur. Expl. Algir.* 179.-AegyP«-
Pendulina, Spreng. Syrt. i. 866 = Bromus dliatus.
Pentastachya. PreO, Fl. Sic. p. xlv= Bromus penU stachyus.
persica, C. Koch, in Unnaea, xxi. (1848) 410-Poa persica.
Pf ™ea, G«tf „. „ w. *Fl. AKT.* 20--1"5, ^• .
Phalarioides, Lam. Tabl. Encyc. i. 190 - Dactylis glomerata, Koeleriaphleoides.
Mttrfow, Steud. Syn. H Gram. 428 -Cutandia philistaea.
PHeoides, Vill. Fl. Delph. 7 ; Hist. PI. Dauph. ii. 96
2 £ £ Wftedem. H- » - Brachypodium ramosum.
Phoenicoides, Unn. Mant. i. 33 - Brachypodium pinn&um
*P>»*nico\des,* Rouille, ex Roem. & Schnlt. Syst. ii. 699 = rubra.
£W*/Thuill. Fl. P«r. ed. II. i. M-W*^ «?< Hud»-
»n.»>, Vill. Prosp. 17; Hist. PL D»»P^- »• elatior.
^'>'a, J. F. Gmel, Syst. 187 -Panicum Crus-galli T

FE8TTJCA:—
picta, Kit. in SchulL Oestr. Fl. ed. II. i. 286=rubra.
pilosa, Hall. f. ex Gaud, in Alpina, iii. (1808) 64 - Poa riolacea.
pilosa, Wiltd. ex Spreng. Syst. L 356 - Kragrostis maypurensis.
pinnata, Moench, Meth. 191; Hud.. Fl. Angl. ed. II. i. 48=Brachypodium pinnatum.
platyphylla, *Steud. Syn. PI. Gram.* 428.—Keg. Magellan.
plebeia, R. Br. Prod. i. 178 - bromoides.
plicata, *Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvii. (1877) 48. —Hispan.
pluriflora, SchulL Mant. ii. 402 -elatior.
Poa, *Kunth, Riv. Gram.* i. 129.—Enrop. austr.
poaeformis. Host, Gram. Austr. ii. 68<>Poa violacea.
poaeformis, Pen. Syn. i. 94 = Bromus inermis.
poaeoides, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 67.—Am. bor.
poaeoides, Thuill. FL Par. ed. II. 61 •'Bromus inermis.
poeeilantka, C. Koch, in Unnaea, xxi. (1848) 411 > Glyceria distant.
poliens, *Steud. Syn. PI. Gram.* 817.—Hab. ?
palyantha, HalL f. ex Steud. Nom. ed. I. 338 - rubra.
polychroa, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 485 -Poa violacea.
polygama, C. Koch, in Linnaea, xxi. (184S) 409 - Poa persica.
pohstachya, Michx. FL Bor. Am. i. 66-Diplachne fascicuhris.
Forcii, *Hack, in Bot. Centralb.* viii. (1881) 407, nomen; *Monog. Fest.* 147.—Transsylv.
prasina, DunuObs. Gram. Belg. 102=ovina<
pratensis, [Honck.] Ven. AUer *dew.* Teutsohl. 2C8 = ovina.
pratensis, Hads. Fl. AngL ed. I. 37 = elatior.
pratensis, Schreb. Spicil. FL Ups. 67 - rubra.
procera, *H. B. br K. Not. Gen. et Sp.* i. 154.—Ecuador.
procumbens, Kunth, Riv. Gram. i. 129 - Glyceria procumbens.
procumbens, Muhl. Deac Gram. 160 = Diplachne fascicularis.
prostrata, Gmel. ex Steud. Nom. ed. II. i. 632- Aeluropus laevis.
Pseudistachya, Koel. Deac. Gram. 270 = Brachypodium distachynm.
Pseudo-dura, St»ud. Syn. PL Gram. 806 = ovina.
Pseudo-dnriutcula, *Steud. 1. c.* 312.—Texas.
Pseudoeskia, *Boiss. Elench.* 91.—Hispan.
Pseudo-laxa, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 22-carpathica.
Pseudo-loliacea, Hack. Monog. Fest. 151, in syn.» elatior.
Pseudomyuros, Soyer-Willem. in Ann. Sc. Nat. Ser. I vii. (1828) 445 = F. Myuros.
Pseudo-nemorum, Schur, Enum. PI. Transs. 794 - rubra.
Pseudo-nutans, Schur, 1. c. 796-pulchella.
Pseudo-rubra, Schur, 1. c. 794-rubra.
Pseudovina, Hack, ex Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (18U0) 126 = ovina.
pubescent, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 6 = rubra.
pubescens, Zea, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. Ii. 728 «F.' Alopecnros.
Puccinellii, Parl. Fl. Ital. i. 440=rabra.
Puccinellii, ran. n. >uu. .. .—Europ.
polchella, *Schrad. Fl. Germ.* i. 836. t. 5 ovina.
pulthra, Schur, Enum. PL Transs. 785-ovina.
pumila, Chaix, in Vill. Hist Dauph. i 316; ii. 102 varia.
pumila, Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 66-ovina.
punctoria, *Sibth. tfSm. Fl. Grate. Prod.* i. 60.—Bithyn.
pungens, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 287 = varia.
pungens, Lam. FL Fr. iii. 596=Brachypodium pinnatum.
pungens, Vahl, Symb. Bot. i. 10. t. 2»Aeluropus arabicus.
purpurascens, *Banks V Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct.* 388. t. 140.—Reg. Magellan.
purpurea, F. Muell. Set. PI. Indust.Cult.88-Triplasis purpurea.
purpurea, Schreb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 682 - Triodia cuprea.
pusilla. Banks *Sc* Soland. ex Hook. f. FL Antarct. 880 = Triodia antarctica.
pusilla, Buckl. in I'roc. Acad. Sc. Philad. 1868 (1863) »8«microstachys.

FESTUCA:—
pyramidata, Link, in Schrad. Joum. ii. (1799) 315- bromoides.
pyrenaica, Rent Cat. Sem. Hort. Genev. (1861) 4 - rubra.
quadridens, Poir. Encyc. Suppl. ii. 640 - Triodia cuprea.
quadridentaU, *H. B. tr K. Nov. Gen. et Sp.* L 164.—Ecuador.
quadriflora, [Honck]. Verz. Aller Gew. Teuttchl. 268-varia.
quadriflora, *Walt. Fl. Carol.* 81.—Am. bor.
Quartiniana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 486.—Abytsin.
quitensis, Spreng. Syst. i. 866 -Bromus unioloidet.
quitensis, Willd. ex Kunth, Enum. PL i. 407=Caldasii.
racemifera, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 682 - teneua.
racemosa. *Kit. in Unnaea,* xxxii. (1868) 818.—Hungar.
racemosa, Willd. ex Spreng. Syst. i. 362 = andicola.
radicans, Steud. Syn. PL Gram. 309 = elatior.
ramosa, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 110'Brachypodium pinnatum.
ramosa, Roth, Nov. PL Sp. 76 = Brachypodium ramosum.
rectisrta, Walp. Ann. i. 948 = Agropyron scabrum.
refiexa, Buckl. in Proa Acad. Sc Philad. 1862 (1868) 98=microstachys.
refracta, *Krock. Fl. Sites. Suppl.* i. 172.—Europ.
remota, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 813.—Hungar.
remotiftora, Steud. Syn. PL Gram. 815 - pauciflora 1
repent, Knapp. Gram. Brit. t. 119 •= rubra.
repenSj *Trin. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 682.—Hab. <
reptatrix, Linn. Sp. PL 108-Diplachne fusca.
restituta, Steud. Syn. PL Gram. 814-Schimperiana.
rhachiantha, Steud. 1. c. 802 = Demazeria castellana.
rhoetica, Snter. FL Helv. i. 66-Poa violacea.
rhomboidea, Kit. in Unnaea, xxxii. (1868) 814 = puichella.
Richardsoni, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 250.—Am. arct.
rigens, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 632^rigida.
rigeseens. *Kunth, Enum. PL i.* 403.—Peruv.
rigescens, Trin. ex Boiss. Fl. Orient, v. 638 = rigida.
rigida, Guss. ex Steud. Nom. ed. II. i. 682-Brachypodium dwtachyum.
rigida, *Kunth, Rev. Gram.* i. 129.—Europ. austr.; Afr. bor.
rigida, Roth, Catalect. faac. i. 12-Triticum asperum.
rigido-aspera, Steud. Syn. PI. Gram. 817 - praec
rigidula, *Steud. I. c.* 314.—Abyssin.
rigurosa, Schur, Ennm. PL Transs. 790-ovina.
rivularis, Boiss. Elench. 90-rubra.
robusta, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1867-68) 98.—Chili.
Rochelii, Kit. 1. c. xxxii. (1863) 818-laevis.
Rochelii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 682.—Bannatus.
RohUsiana, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xix. (1872) 83. —Afr. bor.
Rottboella, DC. ex Steud. Nom. ed. II. i. 682-Demazeria loliacea.
rottboellim'des, Kunth, Rev. Gram. i. 129 = Demaaeria loliacea.
rubens. Pen. Syn. i. 94 - Bromus rnbens.
rubra, *Linn. Sp. PI.* 74.—Keg. bor. temp, et arct.
rubra, With. Arr. Brit. PL ed. III. il. 168-ovina.
rupestris, *Otto, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 672, nomen. —Hab. ?
rupestris, Roth, Enum. PL Phaen. Germ. i. I. 811 - Brachypodium pinnatum.
rupicola, Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1868) 233 =ovina.
sabulicola, Dufour, in Ann. Sc Nat. Ser. I. v. (1826) 86-rubra.
Salzmanni, *Boiss. ex Coss. Notes Crit.* 181.—Hispan.
sancta, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 250 —Brachypodium sanctum.
Savii, Tenore, Fl. Nap. iv. 15 = F. Alopecuros.
saxatilis, Schur, Enum. Fl. Transs. 791 -ovina.
scaberrima, *Lange, in Kjoet. Vidensk. Meddel.* (1860) 51.—Hispan.
scaberrima, *Steud. Syn. PI. Gram.* 316 Ind. or.
scabra. Labill. Nov. Holl. PL i. 22. t. 46 = Agropyrum scabrum.
scabra. Lag. Gen. et Sp. Nov. 4 - Brachypodium mexicanuin.
scabra, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 21.—Afr. austr.
scabra, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 632 - procera.
scabrella, *Torr. ex Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 262.—Am bor. occ
scabriflora, *Steud. Syn. Pi. Gram.* 314.—Ins. Canar.

FE8TTJCA:—
scabrinscnla, *Phil, in Linnaea.* xxix. (1867-68) 98.—Chili.
Scheuchmeri, Gand. in Alpina, iii. (1808) 70 = pulchelk.
scheuchmeriformis, Schur, Ennm. PI. Trans*. 796 - pnlchella.
Schimperi, Steud. Syn. PI. Gram. 318 - Triticum Schimperi.
Schimpeñana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 433.—Abyssin.
Sehlickumi x, Grantz. Fl. Uckerm. 340.—Europ.
sciaphila, Schnr, Ennm. PI. Traoss. 787-ovina.
seirpifolia, *Kunth, Enum. PI. i.* 403.—Pernv.
scirpoidea, *F. Muell. Fragm.* viii. 129.—Austral.
sciurea, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 117 — F. Myuros.
sciuroides, Roth, Bot. Abh. 48 = F. Myuros.
sclerophylla, Boiss. ex Bisch. Del. Sem. Hort. Heidelb. (1849) 4; Diagn. Ser. I. xiii. 59 = spectabilis.
scoparia, *Hook. f. Fl. Antarct.* 98.—N. Zel.; Ins. Antarct.
scoparia. Kern, ex Nym. Consp. 826 = varia.
segetum, Savi, Fl. Pis. i. 116=Trisetum parviflorum.
septiftora, LHonck.] Verz. AUer Gew. Teutschl. 268 = rnbnu
serotina, Linn. Sp. PI. ed. II. 111 = Diplachne serotina.
serrata, Spreng. Syst. i. 355 = Lasiochloa serrata.
setaeea, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 83—Thomasiana.
setacea, Poir. Encyc. Snppl. ii. 638-tenella.
setifolia, *Steud. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 66.—Peruv.
sibirica, *Hack, ex Boiss. Ft.* ***Orient,*** v. 626.—Reg. Caucas.; As. bor.
sicula, *Presl, Cyp. et Gram. Sic.* 36.—Sicil.; Sard.
sicula, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 682=davata.
Sieberi, Tausch, in Flora, xx. (1837) 127-spectabilis.
simensis, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 433.—Abyssin.
simplex, Boiss. ft Bal. Diagn. Ser. II. iv. 138=elatior.
simplex, Homem. ex Steud. Nom. ed. II. i. 632 = incrassata.
siracusana, Jan, ex Stend. 1. c. = ovina.
Smithii, *Kunth, Rev. Gram.* i. 138.—In*. Canar.
spadicea, Genera. Fl. Scepus. n. 90; ex Roem. & Schult. Syst. ii. 719= varia,
spadicea, *Linn. Syst.* ed. XII. 732.—Europ. austr.; Keg. Himol.
spadicea, Mielich. in Hoppe, Taschenb. (1801) 184-pulchella.
spadicea, Moench, Meth. 160=elatior.
spedosa, Schreb. Spicil. Fl. Lips. 59 = Bromus inermis.
spectabilis, Gren. ft Godr. Fl. Fr. iii. 579 -spadicea.
spectabilis, Guss. ex Hack. Monog. Fest 191=calabrica.
spectabilis, *Yan, Elench.* 2.—Europ. austr.; Persia.
spectabilis, Schur, Enum. PI. Transs. 796 = dimorpha.
Sphenopus, Trin. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 22 = - Sphenopus Gouani.
spicata, *Pursk, Fl. Am. Sept.* i. 83.—Am. bor.
spiciformis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 94 = ovina.
spinosa, Linn. f. Snppl. 111 = Eragrostis spinosa.
splendens, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 319 —Koeleria setacea.
stenantha, Nym. Consp. 828=ovina.
stipoides, Desf. Fl. Atlant i. 90-davate.
stolonifera, Miègev. in Bull. Soc. Bot Fr. x. (1863) 87 = rubra.
stricta. Host, Gram. Aostr. ii. 62. t. 86-ovina.
stricta, I'oir. Encyc. Snppl. ii. 636-Bromus strictus.
stricta, Schleich. ex Gaud, in Alpina, iii. (1808) 89 - rabra.
strictifolia, Opiz, Natural, n. IX. (1825) 126 = ovina.
Stuarbana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 3U4.—Ins. Tasman.
subciliata, *Steud. I.* c—Graecia ; Arabia.
subracemosa, Scbur, Ennm. PI. Transs. 786=rubra.
subtilis, *Steud. Syn. PI. Gram.* 317.—Hab.?
subulata. Bong. Veg. Sitcha, 66-MeIica acuminata.
subulifolia, *Benth. PI. Hartw.* 262.—N. Granat.
sudetica, Tausch, ex Steud. Nom. ed. II. i. 633 - varia.
sulcata, Hack, in Bot, Centralb. viii. (1881) 405 = ovina.
supina, Schnr, Enum. PI. Transs. 784 = ovina.
sylvatica, Host, Gram. Austr. ii. 56. t. 78»montana.
sylvatica, Hudt. Fl. Angl. ed. I. 38 = Brachypodinm sylvaticnm.

PESTUCA:—
sylvatica, *Vill. Hist. PI. Dauph.* ii. 106.—Europ.; As.Min.
syrtica, F. Muell. Fragm. viii. 120-Glyceria stricta.
taurica, Kem. ex Hack. Monog. Fest. 104-ovina.
Tanschii, *Steud. Syn. PL Gram.* 317.—Hab. ?
tenax, Hort. ex Link, Enum. Hort Berol. i. 87 - elatior.
tewtfa.Chaub. ex Steud. Nom. ed. II. i. 683= F. Poa.
tenella, *Moench, Meth. Suppl.* 63.—Hab. ?
tenella, *Willd. Sp. PI. i.* 419.—Am. bor.
Teneriffae. *Roth, Nov. PI. Sp.* 78.—Ins. Teneriff.
Tenoriana, Steud. Syn. PL. Gram. 817 = Triticum Barrelieri.
tenuicuia, Link, Hort. Berol. i. 146 - F . Poa.
tenuicula, Nym. Syll. 418 = Avellinia tenulcnla.
tenuiflora, *Schrad. Fl. Germ.* i. 346.—Reg. Mediterr.
tenuifolia, Sibth. Fl. Oxon. 44-ovina.
tenuis, *Kitt. Taschenb.* ed. II. 100.—Europ.
tenuis, *Nym. Syll.* 418; *Steud. Syn. PI. Gram.* 305.—Italia.
tertia, *Steud. I. c.* 316—Japon.
texana, *Steud. 1. c.* 310.—Texas.
thalassica, Kunth, Rév. Gram. i. 129 •= Glyceria maritima.
tbermaram, *Phil. in. Anal. Univ. Chil.* ii. (1862) 385.—Chili.
Thomasiana, *J. Gay, ex Mutel, Fl. Fr.* iv. 92.—Reg. Mediterr.
Thouini, *Steud. Syn. PI. Gram.* 311.—Ind. occ.
Thunbergii, *Kunth, Rev. Gram.* i. 138.—Japon.
Thurberi, Vasey, in Rothr. Rep. Bot. U. St. Surv. vi. 292 = scabrella.
Tilingii, *Regel V Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xi. (1859) 125.—As. or.
tolucensis, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 153.—Mexic.
tolucensis, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 236 = hephaestophila.
transsilvanica, Schnr, Enum. PI. Transs. 796-rubra.
trichodes, Schult. Mant. ii. 650 — Eragrostis maypurensis.
trichophylla, Ducros, ex Gaud. Fl. Helv. i. 288 = rubra.
triflora, *Desf. Fl. Atlant.* i. 87.—Reg. Mediterr. occ.
triflora, Sm. EngL Bot. t. 1918=gigantea.
triloba, D. Dietr. Syn. PI. i. 877 = triflora.
triticea, Kunth, Enum. PI. i. 325, sphalm. = seq.
triticoides, Lam. Tabl. Encyc. i. 191 - Distichlis maritima.
triticoides, Stend. Syn. PI. Gram. 316 = littoralis.
tuberculata, Benth. in Joum. Linn. Soc. xix. (1881) 128, sphalm.—seq.
tubercnlosa, *Coss.* b" *Dur. Expl. Scient. Alg.* 189. t 41.—Alger.
tunicate, *E. Desv. in C. Gay, Fl. Chil.* vi. 434.—Chili.
turfosa, Schur, Enum. PI. Transs. 793 = rubra.
tnrkestanica, *Franch. in* ***Ann.*** *Sc. Nat. Sit.* VI. xviii. (1884) 273.—Turkestan.
Uechtrittiana, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 218 = elatior.
uliginosa, Schur, Enum. PL Transs. 798=gigantea.
nlochaeta, *Steud. Syn. PI. Gram.* 306.—Bras,
umbrosa, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 314, nomen.—Hungar.
uniferia, *Dum. Obs. Gram. Belg.* 104.—Belgium.
uniglumis, Soland. in Ait. Hort Kew. ed. I. i. 108 = bromoides.
unilateralis, Schrad. Cat. Hort. Getting. (1814)-tenuiflor*.
unioloides, Kunth, Rév. Gram. i. 129.= Demaieria sicula.
unioloides, Willd. Hort. Berol. i. 3. t. 3 = Bromus onioloidcs*
Urii, *Bishop, in Loud. Gard. Mag.* xiii. (1837) 333.—Hab. ?
Urvilleana, *Steud. Syn. PI. Gram.* 312.—Ins. Falkland.
vaginata, Rochel, PI. Banat. Rar. Ind. •= Rochelii.
vaginata, Waldst. *He* Kit. ex Willd Enum. Hort. Berol. 116 = ovina.
valesiaca, Reichb. Ic. FL Germ. i. 27. t. 1547 ~ amethystina.
valesiaca, Schleich. ex Gaud. Agrost. Helv. i. 242 = ovina.
varia, *Haenke, in Jacq. Coll.* ii. 94.—Europ. med.; As.Min.

FEBTUCA:—
versicolor, Presl, ex Knnth, Enum. PI. i. 402 = rubra.
versicolor, Tansch, in Flora, iv. (1821) 559-varia.
vestita, W'alp. Ann. iii. 776—dichotoma.
villiflora, *Steud. Syn. PI. Gram.* 318.—Labrador.
villosa, Schweigg. in Hagen, Chlor. Boruss. 35 — rubra.
villosa, Spreng. Syst. i. 556 •= Lasiochloa villosa.
violacea, |_ClairvJ Man. Herb. 24.—Europ.
violacea, Mert. ft Koch, Fl. Deutsehl. i. 646=ovina.
violacea, Ser. ex Gaud, in Alpina, iii. (1808) 57 = rubra.
virgata, Heyne, ex Steud. Nom. ed. II. L 638 — Centotheca lappacea.
virgata, Lam. Tabl. Encyc. i. 189 - Leptochloa virgata.
viridis, Panz. ex Schult. Mant ii. 397, in obs. 2 = rubra.
viscida, F. Muell. Veg. Chath. 1st. 69 = Triodia pungens.
vivipara, Sm. Brit. Fl. i. 114 = ovina.
vulpioides, Schur, in Verh. Siebtnb. Ver. Naturw. iv. (1853) 89 = rubra.
vulpioides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 806.—Afr. austr.
Wightiana, *Steud. 1. c.* 316.—Ind. or.
Willdenowiana, *Schult. Mant.* ii. 660.—Mexic.
Willemetii, Savi, Cose Bot. 53=bromoides.
xanthina, Roem. ft Schnlt. Syst. ii. 721 = varia.

FESTUCARIA, Heist. Syst. 12 (1748) - Festuca, Linn. (Gramin.).
Heisteri, Fabr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 833=Glyceria fluitans.
psilantha, Link, in Linnaea, xvii. (1843) 398-Festnca tenuiflora.
tenuicaulis, Link, 1. c. = Festnca Poa.

FEUILLAEA, Gled. Syst. 268 (1764)=seq.

FEUILLEA, Gled. in Mém. Acad. Berl. v. (1749) 132 = seq.

FEVILIiEA, Linn. Gen. ed. I. 362 (1737). *CVCURBITACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 840.
HYPANTHERA, Silva Manso, Catbart. Bras. 37 (1836).
NHANDIROBA, Plum, ex Adans. Fam. ii. 139 (1736).
albiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 118 — Bras.
cordifolia, *Linn. Sp. PI.* 1013.—Ind. occ.
cordifolia. Veil. Fl. Flum. x. t. 102 = trilobate,
deltoidea, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 119.—Bras.
hederacea, Poir. in Lam. Encyc. iv. 419-cordifolia.
Javilla, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. ii. 124-cordifolia.
Karstenii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 943.—Venezuela.
Marcgravii, Guib. Hist. Nat. Drag. Simpl. ed. IV. iii-244 = trilobate.
monosperma, Veil. Fl. Flum. x. t. 108 = Sicydium mouospermnm.
Moorei, *Hook./. BoU Mag.* t. 6356.—Guiana.
Passiflora, Veil. Fl. Hum. x. t. 104 - Anisospenn* Passiflora.
pedata, Sm. ex Sims, Bot. Mag. t. 2681 = Telfairia pedata.
punctata, Poir. in Lam. Enc>c. iv. 418 -cordifolia.
scandens, Linn. Sp. PI. ed. II. 1457 = cordifoli*. trilobate.
tamni/olia, H: B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vii. 176- '• 640 = Sicydium tamnifolium.
tomentosa, Gardn. in Hook. Loud. Joum. Bot. •• (1843) 355-trilobate.
triangularis, M. Roem. Syn. Pepon. 114 = trilobatn.
trilobate, *Linn. Sp. PI.* 1014.—Am. trap.
trilobata, Reich. Syst. iv. 258 = cordifolia.
triphylla, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) IS[6]* Alsomitra brasiliensii.

FIALARIS, Rafin. Sylva Tellur. 166 (1838) = Myrsio«> Linn.
umbellata, Rafin. I. c.=»M. urceolate.

FIBICHIA, Keel. Cram. Gall, et Germ. 308 (1602)* Cynodon, Pen. (1805) (Gramin.).
umbellata, Koel. 1. c.-C. Daclylon.

FIBIGIA, Medic. Pflanzeng. i. 90 (1792) - FarseUa, Tana (Crucif.).
clypeata, Medic. 1. c.; Moench, Metb. 261 = Farsetia clypeata.
**riocarpa*, Boiss. Fl. Orient, i. 258-Farsetia eriocarpa.
lunarioides, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Grace, vi. 625 = Farsetia lunarioides.
macrocarpa, Boiss. Fl. Orient i. 258 = Fanetia macrocarpa.
macroptera, Boiss. L c. 257 - Farsetia macrocarpa.
•*nulticaulis*, Boiss. *Sc* Hohen. ex Boiss. 1. c 259 = Farsetia multicaulis.
ooovata, Boiss 1. c 258 = Farsetia obovata.
pendula, Boiss. 1. c. 260= Farsetia pendula.
rosirata, Boiss. 1. c. 257 «= Farsetia rostrata.
suffruticosa, Sweet, Hoit. Brit. ed. I. 467 = Farsetia suffruticosa.
"*>nbellato*, Boiss. Fl. Orient, i. 259 - Farsetia **ran**bellata.

FIBRAUBEA, Lour. Fl. Cochinch. 626 (17S0). *MEMSPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 89, »60.
chloroleuca, Miers, Contrib. iii. 42 = tinctoria.
fasciculata, Miers, 1. c. 41 = tinctoria.
"*aematocarpus*. Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i. 204 - Haematocarpns Thomson!.
••»», *Miers, Contrib.* iii. 43.—Borneo.
«:isa, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. Ill—Cochinch.
tinctoria, *Lour. Fl. Cochinch.* 626.-Malaya.
"*nqsporoides*, F. Muell. Fragm. i. 93 = Fawcettia tmosporoides.

ICARIA, [Dill.] HaU. Enum. Stirp. Helv. i. 821 W,42)= Ranunculus, Linn.
**noigua*, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. HI. ii. 20 = R. Ficaria.
"*perta*, Schnr, in Verb. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (W77) 31 = R. Ficaria.
Boryi, Heldr. ex Nym. Consp. 7-*peloponnesiaca*.
caltkaefolia, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 718 - R. Ficaria.
conmunis, Dum.-Cours. Bot Cult. ed. II. iv. 445 = R. Ficaria
fascicularis, C. Koch, in Linnaea, XT. (1841) 249-R. edulis.
glacialis, Fisch. ex DC. Prod. i. 44 = Oxygraphis glacialis.
ei-andifiora, Robert, Cat. Toulon, 57, 112 = R. Ficaria.
toluiyi, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. U877) 82 = R. Ficaria.
**termedia*, Schur, Enum. PI. Transs. 14 = R. Ficana.
*"*dicaulis*, Kem. in Oestr. Bot Zeitschr. xiii. (1863) 188 = R. Ficaria.
r*«>*ponnesiaca*, Nym. Syll. 179.—Graecia.
Po'ypetala, Gilib. Fl. Lituan. ii. 258- R. Ticaria.
"""nculoides, Moench, Meth. 215-R. Ficaria.
Xoberti, F. Schultz, Arch. Fl. 846=R. Ficaria.
tundifolia, Schur, in Verh. Natur£ Ver. Bruenn, xv. "• (1»77) 82-R. Ficaria.
ssilvanica,SdmT, Enum.PUTranss. 14-R. Ficana.
*"»«. Huds. Fl. Angl. ed. I. 214 = R. Ficaria.

FICI *?7 > Liimaea, x. U 255 = WcroBeria, D. Don (Compos.).
**Pl>igii*, Sch. Bip. 1. c-Chili.

FICINDICA, St. Lag. in Ann. Soc. BotLyon, vii. (1880) 70 = Opuntia, Tourn. (Cact.).

FICOIDEA, Schrad. in Comm. Gotting. vii. (1832) 143; (Anal. Fl. Cap. 48. t. 2. f. 3). *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1052.
ACROLEPIS, Schrad. in Comm. Gotting. vii. (1832) 1*2 ; (Anal. Fl. Cap. 42. t. 2. f. 5).
"-HAMAEXIPHIUM, Hochst. in Flora, xxvu. (1844) 102.
HYPOLEPIS, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 38 (1819).
HYPOPHIALIUM, Nees. in Linnaea, vii. (1882) 580.
MKLANCRANIS, Vahl, Enum. it 239 (180B).
^LEURACHNE, Schrad. in Comm. Gottiiig.vu. (183ii) 1*7-1. 4. f. 8 ; (Anal. Fl. Cap. 47).
JCHOENID1UM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291.
MCKMANNIA, Nees, 1. c. 292 (1834).
•*w««ara, Kunth, Enum. PI. ii. 256 = elongata, ^unthiana.
acuminata, *Nees, in Linnaea*, ix Afr. austr.
albicans, *Nees, I. c. x.* (1836) 175.—Afr. austr.

FICINIA:—
ambigua, *Steud. Syn. PI. Cyp*, 125.—N. Zel.
anceps, *Nees, in linnaea*, x. (1836) 179.—Afr. austr.
anomala, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 125—N. Zel.
antarctica, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 292=Scirpus diabolicus.
aphylla, Nees, in Endl. Atact.3.1.12 = lateralii.
argyropns, *Nees, in Linnaea*, x. (1836) 177.—Afr. austr.
atrata, Nees, I. c. 167 - setiformis.
Bergiana, *Kunth, Enum. PI.* ii. 254.—Afr. anstr.
Bolusii, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. T. (1884) 506 = lithospermo.
bracteata, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 83.—Afr. anstr.
brevifolia, *Nees, I. c.* ix. (1884) **292.**—Afr. aostr.
bulbosa, *Nees, 1. c.* viii (1833) 91.—Afr. anstr.
Capitellum, *Nees, 1. c.* x. (1836) 168.—Afr. austr.
ciliata, *Boeck. in Bremen, Abh.* vii. (1880) 38.-Afr. austr.
clandestine, *Boeck, in Linnaea*, xxxvii. (1871-78) 82.—Abyssin.
commutata, *Kunth, Enum. PL* ii. 268.—Afr. austr.
comparbergensis, Drege, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 124 = seq.
compasbergensis. *Drige, in E. Mey. Zttei Pfi. Decum.* 185.—Afr. austr.
composita, *Nees, in Linnaea*, x. (1836)172.—Afr. austr.
conifera, Nees, 1. c. 181=scariosa.
contexta, *Nees, I. c.* 292.—Afr. austr.
Dregeana, Kunth, Enum. PI. ii. 259 = laevis.
Kcklonea, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834) 292.—Aft. austr.
elongata, *Boeck. I. c.* xxxvii. (1871-73) 65.—Abyssin.
fascicularis, *Nees, I. c. x.* (1836) 178.-Afr. austr.
fastigiata, *Nees, I. c.* 170.—Afr. austr.
filamentosa, Nees, 1. c. ix. (1834) 292 - tenuifolia.
filiformis, Nees, in Linnaea, x. (1886) 173, partim = stolonifera.
filiformis, *Schrad. Anal. Cap. Cyp.* 46—Afr. austr.
giacilis, *Schrad. 1. c.* 44.—Afr. avistr.
guttata, *Endl. Prod.Fl.Ins.Nor/olk.2i.—lns.Hor(oik.*
involucrata, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834) 292; x. (1836) 174.—Afr. austr.
involuta, *Nees, II. cc.*—Afr. anstr.
ixioides, *Nees, II. cc.* 292,18O.-Afr. austr.
Kunthiana, *Boeck. 1. c.* xixvii. (1871-73) 67.—Afr. austr.
laciniata, *Nees, 1. c.* x. (1836) 177.—Afr. austr.
laevis, *Nees, 1. c.* ix. (1834) 292; x. (1836) 171.-Afr. austr.
lateralis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 264.—Afr. anstr.
lciocarpa, *Nees, in Linnaea*, x. (1836) 171.—Afr. austr.
lithosperma, *Boeck. 1. c.* xxxvii. (1871-78) 72.—Afr. austr.
Lndwigii, *Boeck. in Flora*, Ixv. (1882) 16.—Afr. austr.
membranacea, *Kunth, Enum. PI.* ii. 262.—Afr. austr.
monticola, *Kunth, I. c.* 2A1.—Afr. anstr.
nuda, *Boeck. in Linnaea*, xxxviii. (1874) 383.—Afr. austr.
pollens, Nees, 1. c x. (1836) 169 - setiformis.
pallida, Nees, 1. c.ix. (1834) 292=setiformis.
paradoxa, *Nees, 1. c.* x. (1836) 178.—Afr. austr.
paradoxa, Steud. Syn. PI. Cyp. 125=ambigua.
Poiretii, *Kunth, Enum. PL* ii. 256.—Afr. austr.
praemorsa, *Nees, in Linnaea*, x. (1886) 167.—Afr. austr.
praeusta, Nees, 1. c. ix. (1834) 292-laevis.
pulchella, Kunth, Enum. PI. ii. 261=Scirpus pulchellus.
punctata, *Hochst. in Flora*, xxviii. (1846) 758.—Afr. austr.
pygmaea, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 82.—Afr. aostr.
quinquangularis, *Boeck. L e.* 63.—Afr. austr.
radiata, *Kunth, Snum. PL* ii. 260.—Afr. austr,
ramosissima, *Kunth, 1. c.* 262.—Afr. austr.'
repens, *Kunth, 1. c.* 255.—Afr. austr.
scariosa, *Nees, in Linnaea*, ix. (1884) 292; x. (1886) 182.—Afr. austr.
secunda, *Kunth, Enum. PL* ii. 262.—Afr. austr.
semibracteata, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 292 = leiocarpa.
setiformis, *Schrad. Anal. Fl. Cap.* 45.—Afr. austr.
Steudelii, Nees, ex Kunth, Enum. PI. ii. 236- Ecklonea.
stolonifera, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 60.—Afr. anstr.
striata, Kunth, Enum. Fl. ii. 257 - setiformis, brevifolia.
sylvatica, *Kunth, 1. c.* 254.—Afr. austr.

FICINTA:—
tenuifolia, *Kunth, Enum. PI.* ii. 267.—Afr. aostr.
tribracteata, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-78) 62.—Afr. austr.
trichodes, *Benth. V Hook. f. Gen.* iii. 1068.—Afr. austr.
tristacbya, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834)292; X.C1836) 175.—Afr. austr.
trnncata, *Schrad. Anal. Cap. Cyp.* 43. t. 2. f. 3.—Afr. austr.
Zeyheri, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 58.- - Afr. ansti.

FICOIDES, [Tourn.] Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 164 (1745)=Mesembryanthemum, Linn. (Ficoid.).

FICULA, Heist Syst. 8 (1748) - Mesembryanthemum, Linn. (Ficoid.).

FICUS, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *URT1CACEAE*, Benth. ft Hook. f. iii. 367, 1224.
CAPRIFICUS, Gasp. Nov. Gen. Fie. 6 (1844).
COVELLIA, Gasp. 1. e. 10 (1844).
CYSTOGYNE, Gasp, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. iii. (1845) 345.
EROSHA, Booth, Cat. 113; ex Endl. Suppl. iv. n. 84, in syn. (1849).
ERYTHROCYNE, Vis. in Gasp. Ricerch. Caprif. 86 (1846).
GALOGLYCHIA, Gasp. Nov. Gen. Fie. 10 (1844),
GONOSUKE, Rafin. Sylva Tellur. 58 (1838).
MACROPHTHALMA, Gasp. Ricerch. Caprif. 88, t. 7 (1845).
MASTOSUKE, NECALISTIS, OLUNTOS, PF.RULA, Rafin. Sylva Tellur. 68, 59 (1838).
PHARMACOSYCEA, Miq. in Hook. Lond. Journ Bot. vii. (1848) 64.
PLAGIOSTIGMA, ZUCC. in Abh. Akad. Mucnch. iv. I. (1845) 154.
POGONOTROPHE, Miq. in Hook. Lond. Journ. Uol. vii. (1848) 72.
REFHESIS, Rafin. Sylva Tellur. 69 (1888).
SYCOMORPHE, Miq. in Ann. Sc. Nat Ser. III. i. (1844) 85.
SYCOMORUS, Gasp. Ricerch. Caprif. 86 (1845).
SYNOECIA, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (18481 109.
TENOREA, Gasp. Nov. Gen. Fie. 6 (1844).
TREMOTIS, Rafin. Sylva Tellur. 69 (1838).
UROSTIGMA, Gasp. Nov. Gen. Fie. 7 (1844).
VARINGA, Rafin. Sylva Tellur. 58 (1838).
VISIANIA, Gasp. Nov. Gen. Fie. 9 (1844).
abbreviata, *Wall. Cat.* n. 4673.—Singapore.
Abelii, Miq. Ann. Mas. Bot Lugd. Bat. UL 281 = pyriformis.
abutilifolia, *Miq. L c.* 288.—Abyss.; Afr. anstr.
acamptophylla, *Miq. I. c.* 264.—Malaya,
acrocarpa, *Steud. ex Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vi. (1847) 657, in syn.—Abyssin.
aculeata, *A. Cunn. ex Miq. I. c.* vii. (1848) 426.—Austral.
acuminata, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4476 = parietalis.
acuminata, Kunth *Sc* Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 21 = rostrata.
acuminata, Roxb. Hort. Beng. [108] ; Fl. Ind. iii. 638—subulata.
acuminatissima, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot vii. (1848) 233-pisifera.
acutiloba, Miq. 1. c. 227. t. 5 a=heterophylla.
adenosperma, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 233.—Ins. Celebes.
adhaerens, Miq. PI. Jungh. i. 56 = ramentacca.
adhatodaefolia, *Schott, ex Spreng. Syst.* iv. *App.* 400.—Bras.
adnascens, Wall. Cat. n. 4678 B - recurva.
aegrophylla, Hort. Schoenb. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 287 - Arnottiana 1
affimor, Griff. Notul. iv.392; Ic. PI. As. t. 553- religiosa.
affinis. Blame, ex Steud. Norn. ed. II. i. 635' Blumei.
affinis, Wall. Cat. n. 4524-glabella.
Afielii, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 416, nomen.—Afr. trop.
Afmelii, Hort. Berol. ex Kunth *Sc* Bouche, Ind. Sem Hort Berol. (18«6) 14 - eriobotryoides.

FICUB:—
africarta, Hort. Berol. ex Miq. Ann. Mus. Bot Lued. Bat. iii. 289-ovate.
aggregata, Hort. ex Miq. 1. c 298 -arbutifolia.
aggregate, *Vahl, Enum.* ii. 191.—Ind. or.
alba, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 476.—Malaya,
albescens, *Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 228.—Reg. Mediterr.
albinervia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i.H. 815.—Ins. Bali.
Allamecraloo, Wight, Ic t. 660, sphalm.=gibbo»a.
alnifolia, Miq. PI. Jungh. i. 51-obtusa.
alpestris, Walp. Ann. i. 696, *aphsdm. ^sylvestris.*
altemans, *Wall. Cat.* n. 4555.—Siam.
Altimeraloo, Roxb. ex Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. yii. (1848) 485 = gibbosa.
altissima. *Blume, Bijdr.* 455.—Reg. Himal.; As. trop.; Malaya.
alutacea, *Blume, Bijdr.* 457 (allutacea).—Java.
amara, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 15=hispida.
amazonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298. —Bras.
omblyphylla, Miq. 1. c. 288=ietusa.
amboinensis, Kostel. Allg. Med.-Phann. Fl. ii. 408 - variegata.
ainericana, *Aubl. PI. Gut.* ii. 852.—Guian.
Amherstiana, Steud. Norn, ed.II.i. 635 = Eiythroxylum bnrmanicum.
Ampelos, *Burnt./. Fl. Ind.* 226.—Ind. or.
Ampelos, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. [108] ; Fl. Ind. iii. 558—gibbosa.
ampla, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 18=infectoria.
amplissima, Miq. Ann. Mus. Bot Lngd. Bat. iii. 297, sphalm. = F. Arpazusa.
amplissima, Sm. in Rees, Cycl. xiv. n. 1 = F. Tsiela.
ampullacea, Wight, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 229-qnercifolia.
anabatos, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 286-scandens.
anacardiifolia, *Kunth &• Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 15.—Hab.?
anastomosans, Wall. Cat. n. 4513=qnercifolia.
ancolana, Miq. PI. Jungh. i. 62 = »ubulata.
angulata, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 434-gibbosa.
angulidens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 810=rostrate,
angustata, *Miq. in Hoot. lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 484—Ind. or.
angustifolia, Blume, Bijdr. 463-cuspidate,
angustifolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298. —Guian.
angustifolia, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 554=glaberrima.
annulate, *Blume, Bijdr.* 448.—Burma; Malaya.
anonaefolia, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 273-pisifera.
anthelminthica, *Mart. Syst. Mat. Med. Bras.* 88; *Heise,* iii. 1128.—Bras.
anthelminthica, Raensch. Norn. ed. III. 302-septica.
anthelminthica, Rich, in DC. Ess. Méd. PI. 267 - F. Radnla.
antithetophylla, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 272.—Abyssin.
aperta, *Wall. Cat.* n. 4652.—Sum.
apiculata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.— Ind. or.
apiculata, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 92, 98 -fulva, *Reinw.*
apiocarpa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 288.— Malaya.
apocyneoidea, *Griff. Notul.* iv. 399.—Reg. Himal.
apodocephala, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 445.—Madag.
aquatica, Koen. ex Willd. Sp. PI. iv. 1138 - heterophylla.
arboricida, Schult. Mant i. 331-dendridda.
arbntifolia, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 450.—Bras.
arbutifolia, Pen. Syn. ii. 610=pertusa.
argentea, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 681 « F. Ribes.
argentea, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 220.— Afr. trop.
arguta. Wall. Cat. n. 4489 = chrysocarpa.
Arnottiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 387. —Ind. or.
Arpazusa, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* 15.—Bras.
asinina, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 138'tomentosa.

FICUS:—
aspera, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.676-hirta.
aspera, *Forst.f. PI. Escul.* 86.—Ins. N. Hebiid.
aspera, Hort. ex Steud. Nona. ed. II. L 635-exasperate.
asperi/olia, Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 427-pisifera.
asperifolia, *Miq. 1. c.* 281.—Afr. trop.
asperior, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 291.— Ins. Amboin.
asperiuscula, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 21-obscure.
asperrima, *Roxb. Hort. Beng.* [108]; *Fl. Ind.* Ui. 554. —Ind. or.
asperrima, *Teijsm. (f Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1855) 402.—Java,
asperala, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xir. (L872) 281.-N. Caled.
assamica, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot vii. (1848) 226~heterophylla.
ataktophylla, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 227 =pedunculosa.
atrovirens, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 19-tristis.
atrovirens, Schott, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 300-oblongata.
atrox, *Mart, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 550, in syn.—Bras.
Attimeeraloo, Roxb. ex Wight, Ic. ii. text. 650 « gibbosa.
aurantiaca, *Griff. Notul.* iv. 8»4; *Ic. PI. As.* t. 554. f. 11.—Malacca.
aurantiaca, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 17 - sapotaefolia.
aurantiaca, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 293 - glandulifera.
aurantiaca, Noronha, in Verh. Bat Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 16=obscura.
aurantiaca. Wall. Cat. n. 4666-glaberrima.
aurata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat iii. 291 = chrysocarpa.
aurea, *Nutt. Sylva,* ii. 4; ed. II. i. 154.—Florida.
auriculata, Ixnir. Fl. Cochinch. ii. 666-F. Cunia.
aurita, *Blume, Bijdr.* 462.—Ins. Amboin.
australis, Willd. Sp. PI. iv. 1138-rubiginosa.
austro-caledonica, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xiv. (1872) 267.—N. Caled.
Avi-Avi, *Blume, Bijdr.* 446.—Java.
Avi-Avi, *Chapelier, ex Boj. Hort. Maurit.* 291.— Madag.
Ayresii, *Baker, Ft. Maurit.* 284.—Ins. Maurit.
baccate, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299.— Mexic.
Backhousii, *Miq. 1. c.* 288.—Austral.
Balansaeana, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xiv. (1872) 262.—N. Caled.
balica, *Miq. Ft. Ind. Bat. i.* II. 314.—Malaya,
bambusaefolia, *Seem. Fl. Vit.* 250.—Ins. Fiji.
bandana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 801=F. Ampelos.
barbata, Wall. Cat. n. 4576-villosa.
Barclayana, *Miq. Ann. Mus. Bof. Lugd. Bat.* iii. 296. —Ins. Fiji.
Barclayi, Seem. Fl. Vit. 250-praec
Baroni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 262.— Madag.
basidentula, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 314.—Archip. Malay.
Beckleri, Miq. in Jnum. Bot. Néed. (1861) 241 = orbicularis.
Beecheyana, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 271 = erecte.
benghalensis, *Linn. Sp. PL* 1069.—Ind. or.; Afr. trop.
Benjamina, *Linn. Mant.* 129.—As. trop.; Malaya.
Benjamina, Wall. Cat. n. 4503-F. Tsiela.
Benjamina, Willd. Sp. PI. iv. 1148=retusa.
Benjaminea, Salzm. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 101 — Salzraanniana.
Bcnnettii, *Seem. Fl. Vit.* 250.—Ins. Fiji,
bibracteata, *Hort. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 220.—Hab.*
iicolor. Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 465-alba.
biglandula, Blume, Bijdr. 475-quercifolia.
biglandulosa, Steud. Norn. ed. II. i. 635 - quercifolia.
biglandulosa, Wall. Cat. n. 4480 - diadena.
binata, Wall. 1. c. n. 4564 = uemoralis.
Binnendijkii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 288. -Java.

FICUS:—
bistipulata. Griff. Notul. iv. 398=glaberritna.
blanda, *Kunth If Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 16.—Hab. ?
Blumei, *Steud. Norn.* ed. II. i. 635 (sp. dub.).—Java.
A n'n', Zipp. in Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. iii. 275 =subulate.
Bojeri, *Baker, Fl. Maurit.* 286.—Ins. Seychelles.
Bonplandiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* Ui. 298.—Mexic.
Booshiana, *Miq. I. c.* 220.—Bras,
botryapioides, *Kunth O" Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 15.—Mexic.
botryocarpa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd, Bat.* iii. 233. —Ins. Celebes,
brachyclada, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 269.—Madag.
brackypoda, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. iii. 287-eugenioides.
bracteata, *Wall. Cat.* n. 4498.—Malaya.
brasiliensis, Cels, ex Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 412 -Princeps.
brasiliensis, Hort. Mon. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 298 = longifolia.
brasiliensis, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 449.—Bras.
Brassii, *R. Br. ex SaMne, in Trans. Hort. Soc.* v. (1824) 448.—Afr. trop.
Brassii, Hort. Berol. ex Knnth *8c* Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 14 « Princepa.
brevicuspis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 315.—Java,
brevifolia, *Nutt. Sylva,* ii. 3; ed. [II. I] i. 153.— Florida.
brevipes, Miq. PI. Jungh. 59-obscnra.
bulbosa, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 17-sapotaefolia.
buUata, Roxb. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat iii. 286=nervosa.
Kurkei, *Miq. I. c.* 289.—Afr. austr.
caffra, Miq. 1. c. 288-lutea.
callicarpa, Auct. = kallicarpa.
callophylla, *Blume, Bijdr.* 445.—Java,
callosa, *Willd. in Mem. Acad. Bert.* (1798) 102.— As. trop.
caloneura, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 106.—Burma.
calycisperma, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. L Art. iv. 15-Rumphii.
calyculata, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 11.—Mexic.
calyptrata, *Vahl, Enum.* ii. 186.—Afr. trop.
calyptroceras, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* »'• 297.—Bras.
cannabina, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 668.—Cochinch.
capensis, Hort. Berol. ex Kunth *8c* Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 19-cordate,
capensis, *Thunb. Diss. Fie.* 13.—Afr. austr.
capreaefolia, Delile, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 94= antithetophylla.
Caprificus, *Risso, Fl. Nice,* 434; *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 290.—Europ.
caribaea, *Jacq. Obs. Bot.* ii. 30.—Ind. occ.
Carica, *Linn. Sp. PI.* 1059.—Europ.; Oriens; Afr. bor. et austr.
caricoides, Roxb. Hort. Beng. 66 i Fl. Ind. iii. 629 » palmate.
carophylla. Hort. Leyden. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1847) 428=radicans.
casapiensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298- —Peruv.
cascaria, *F. Muell. ex Benth. Ft. Austral,* vi. 177.— Austral.
castaneaefolia, *Roth, Nov. PI. Sp.* 389.—Ind. or.
castaneaefolia, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugo-Bat, iii. 280-ramentacea.
catappaefolia, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 14.—Ins. Martinic.
cataracterum, *Vieill. ex Bur. in Ann. Sc. Nat. Sit.* *•• xiv. (1872) 256.—N. Caled.
Catesbaei, *Steud. Norn.* ed. II. i. 635.—Ind. occ.
caudate, *Griff. Notul.* iv. 396.—Assam.
caudata. Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 358 « religion.
caudata, Wall. Cat. n. 4493=davate.
caudiculata, *Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 243--' Zeylan.
caulobolrya, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii- 237- —Ind. or.
caulocarpa, Miq. 1. c. 235-F. Tsjakela.
Canei, Home, ex Baker, in Joum. Linn. Soc.xx. (1883) 371-Storckii.

FICU8:-
celebica, *Blume, Bijdr.* 471.—Malaya,
cerasifolia, *Kunth & BouchJ, Ind. Sem. Hort. Berol.* (18«)16.-Hab.?
tnaaformis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 413-panetalis.
"rifera, Blame, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. iv. (1855) 388 = variegata.
"Tiflua, Jungh. PI. Jav. i. 489=variegata.
eettrifolia, *Sehott, ex Spreng. Syst.* iv. *Add.* 409.—Bras.
tylanica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 298 = laevis.
Champiori,, Benth. in Hook. Kew Joum. vi. (1854) 76 -vasculosa.
Chanai, *Forsk. Ft. Atgypt. Arab.* 219.—Arabia.
cJttrtacea, *Wall. Cat.* n. 4580.—Burma; Malaya.
(•hincha, Roxb. Hort. Beng. [108] ; Fl. Ind. iii. 634-clavata.
Chiriquiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.—Panama
CMttagonga, Miq. I. c. 228-glomerata.
cUorocarpa, Benth. Fl. Hongk. 8S0=variegata.
ehlorocarpa, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) , M4=fnlva, *Reinw.*
mloroleuca, Miq. Fl. Ind, Bat. i. JI. 294 = fulva, *Reinw.*
WWcarpa, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 475.—Burma; Malaya.
'krysocoma. Blame, Bijdr. 443 = pilosa.
•atysolepis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 215-, -Ins. Celebes.
<.™ysophthalma, *Miq. 1. e.* 285.—Ind. or.
"holosa, Hort. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 17 ? - consanguinea.
cltolosa, Hort. Berol. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot vi. (1847) 559 = terebrata?
ei'iolosa, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 450.—Hab. ?
*c*erascens,* Thw. Enum. PI. Zeyl. 266 = callow,
aneraseens, *Wall. Cat.* n. 4535.—Burma,
ratharexifolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 232. —Africa?
citrifolU, *Hort. ex Urn. Encyc.* ii. 494,-Mexic.
"trifolia, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 10=Calesbaei.
"tri/olia, Willd. Sp. PI. iv. 1137 = mysorensis.
d«wyloid«si *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) «0—Madag.
davata, *Wall. Cat.* n. 4495.—As. trop.; Malaya,
ethraefolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1142.—Venezuela.
"uaaefolia, Hort. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 17 ? = consanguinea.
'luaaefolia, H. B. ft K. ex Walp. Ann. i. 678 = obtnsifolial
cluna- »lia. ! *S ch o t t t in spreng Syst.* iv- *Add* m
dusioides, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.-'»». Philipp!
'occtnella, Zipp. ex Miq. 1. c. 280-ramentacea.
«ocwlobifolia, *Lodd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 635 (Quid?)._Hab.?
™ombra. *Gasp. Ricerch. Capri/.* 77.—Italia,
wlosaea, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 168—Austral.
"lumiarum, HochsL^x Krauss, in Flora, xxviu. (1845) «8 = natalensis.
°>raninaris, *F. Muell. &• C. Moore, in Proc. Acclitn. **• Viet.* iii. (1874) 71.—Austral.
°°mmunis, Um. FL Fr. iii. 652 = F. Carica.
2"""«. Roxb. PI. Corom. ii. 14.1.125 «=F. Benja»ina-wmpiiea, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp. &• 48.*-Mexic.
compressicaulis, *Blume, Bijdr.* 439.-Java.
concentrica, Van Hass. in Miq. Choix PI. Buitenz. t. ll = parietalis.
°°*ciliorum,* Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4484 = Rumphii.
cordata, Miq Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 286 = tfabdla
°°*daravio,* Buch.-«am. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) iol = retusa.
°°6esta, **„*. ffort. Beng.* 66; *Fl. Ind.* iii. 560.-«w. Amboin.
°™f *planurat* <*> Roxb. 11. cc. 66, 859 = F. Cunia,
°°JJa»6ata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 222.-va.
°°ns»ngninea, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 17.-Mexic
con!!?-11,,1 *Baier*> *Fl- Mount.* 28«.—Ins. Mwcar.
^•ociata, *Blume, Bijdr.* 447.-Malaya.

PICU8:—
Cooperi, *Hort. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 89.—Am. trop.
eopiosa, Steud. from. ed. II. i. 636 = F. Ribes.
cordata, Hort. Betol. ex Kunth & BonduS, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 14,16 =*lastica, syringaefolia.
cordata, *Thunb. Diss. Fie.* 8.—Afr. austr.
cordifolia, *Blume, Bijdr.* 488.- Java.
cordi/olia, Roxb. Hort Beng. 66; Fl. Ind. iii. 548 - Rumphii.
coriacea, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 452.—Ind. or.
coiaifolia, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 19.—Java.
eoronata, Reinw. ex Blame, Bijdr. 470«obscDra.
coronata. Spin, ex Colla, Hort. Ripul. 56. t. 8 = exasperata, nlmifolia.
coronulata, *Miq. in Journ.-Bot. Neerl.* (1861) 242.—Austral,
costaricana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ill. 268.—Costa Rica,
costata, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 458.—Ins. Nicobar.
costigera, *Miq. Ann. Mus. Bot, Lugd. Bat.* iii. 296.—Ind. or.
cotinifolia, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. ft Sp.* ii. 49.—Mexic.
cotoneaefolia, Hort ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii.-29a-infectoria.
cotoneaefolia, Vahl, Enum. ii. 188 « mysorensis.
cotonifolia. Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 355=praec.
courtallensis, Baill. Hist. PI. vi. 176 = Amottiana.
coybana, *Miq. Ann. Mus. Sot. Lugd. Bat.* iii. 300.—Panama,
crassinervla, *Desf. Cat Hort. Par.* ed. III. 418.—Jamaic.
crassinervia, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) = benghalensis.
crassiramea, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 286= procera.
crenulata, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 76.—Java?
crininervia, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 432.—Reg. Himal.; Malaya,
crocata, *Mart, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 94, in syn.—Bras.
Crustacea, Wall. Cat. n. 4501 - scandens.
Cumingii.il/iV. .« *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 236.—Ins. Philipp.
cunea, Steud. Nom. ed. II. I 685 = F. Cunia.
cuneata, Blume, Bijdr. 468 > gibbosa.
cuneata, *Hoffmgg. Ver: Pfi. Nachtr.* ii. 118.—Bras,
cuneata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 2H7.—Ins. Philipp.
cuneata, Wall. Cat. n. 4534 •= Erythroxylum burmanicum.
cuneifolia. Hook, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 297<*lcpiuarpa.
Cunia, *Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng.* 66 ; *Fl. Ind.* iii. 661.—As. trop.
Cunninghamii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.—Austral.
cuspidata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 413 = F. Benjamina.
cuspidata, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 464.—Malaya.
cuspidata, Zoll. & Mor. Syst. Verz. 77 = rostrata.
cuspidifera, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 434.—Ind. or.
cydophylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 297.—Bras.
cyrtophylla, Wall. Cat. n. 4532 = obscure,
cystopoda, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 297.—Bias.
Daemona, [Koen.] Vahl, Enum. ii. 198-hispida.
Daemonum, Zoll. *Sc* Mor. Syst; Verz. 77 = obscure.
Vatuo,Delile, in Ann. Sc Not. Sir. II. xx. (1843) 94,' —Abyssin.
Dalhousiae, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 285.—Ind. or.
daphniphylla, *Miq. L c.* 300.—Bras.
dealbata, Hort. ex Hlrincq, L'Hortic. Franc. (1869) 246; Linden, lllustr. Hortic. xvii.(WO) t. 4 = Couisapoa dealbata.
Decaisneana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 812=seq.
Decaisnei, *Steud. Nom.* ed. II. i. 636.—Ins. Timor,
decipiens, *Reinw. -ex Blume, Bijdr.* 479.—Java.
Dekdekena, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 268.—Abyssin.
deleteria, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art iv. 16 *.alutacea.

PICTTB:—
deliciosa, *Gasp. Ricerch. Capri/.* 78.—Italia.
deltoidea, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) vn. 71 = divenifolia.
dendrocida, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* it 46.—N. Granat.
dendroctona, Spreng. Syst. iii. 780-praec.
densa, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 463 = nemoralis.
densifolU, J/íj- *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 218.—Ins. Borbon.
densiserra, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 428 = chrysocarpa.
denticulata, Vahl, Symb. Bot. i. 83=heterophylla.
denticulata, *Willd. Sp. PI.* iv. 118-2.—Sumatra,
depressa, *Benth. Fl. Austral,* vi. 172.—Austral.
depressa, Blume, Bijdr. 450 =• pruniformis.
diadena, *Steud. Nom.* ed. II. i. 686.—China.
dicarpa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 682 = F. Benjtmina.
dichrotrix, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 272, adn. = obscura.
dietyophleba, *F. Muell. in Benth'. Fl. Austral,* vi. 170. —Austral.
dictyophylla, Wall.Cat. n. 4502 A, B, D •= F. Benjamins.
difformis, Benth. Fl. Hongk. 827-gibbosa.
difformis, *Lam. Encyc.* ii. 500.—Malaya.
dilatata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 218 - retusa.
dimidiata, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 161.—Jamaic.
dimidiata, Wall. Cat. n. 4575 - aurantiaca.
diospyrifolia, *Kunth* b* *Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 16.—Hab. ?
diphylla, Wall. Cat. n. 4643 - fistulosa.
discolor, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 221.—Borneo.
dissocarpa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. Ii. 268 o F. Dekdekena.
disticha, *Blume, Bijdr.* 458.—Java.
disticha, Thw. Enum. PI. Zeyl. 266-Thwaitesii.
divenifolia, *Blume, Bijdr.* 456,—Malaya.
diversi/olia, Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 293-rostrata.
diversi/ormis, Miq, in Hook, Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 441= Thwaitesii.
Dives, Miq. Choix PI. Buitenz. t. 12=villosa.
dodonaefolia, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 292-gibbosa.
doliaria, *Mart. Syst. Mat. Med. Bras.* 88.—Bras.
domestica, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 282=variegata.
dottata. *Gasp. Ricerch. Capri/.* 77.—Italia,
drupacea, *Thunb. Diss. Fie.* 11.—Ind. or.
dubia, *Wall. Cat.* n. 4661.—Malaya,
dyctiophlebn, *F. Muell. in Miq. Ann. Mus. Sot. Lugd. Bat.* iii. 218.—Austral.
eburaea, *Hort.—C/. Gard. Chron.* (1869) 687.—Ind. or.
edulis, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Se>. V. xiv. (1872) 271.—N. Calcd.
ehretioides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 171.—Austral,
elastica, *Roxb. Hort. Seng.* 65; *Fl. Ind.* iii. 541.—As. trop.
elegans, Hassk. Cat. Hort. Hog. Alt. 76 = toxicaria.
elegans, Hort. Berol. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 299 = sororia.
elegans, *Miq. I. c.* 288.—Afr. trop.
elegans, Steud. Nom. ed. II. i. 636 = foveolata.
ellipsoidea, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 230 = Decaisnei.
ellipsoidea, ¥. Muell. ex Benth. Fl. Austral, vi. 164 - pilosa.
elliptiea, Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 682-retusa?
elliptiea, *H, B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 46.—N. Granat
elliptiea, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot vii. (1848; 440-disticha.
elongata, Miq. 1. c. 231-heterophylla.
Emodi, Wall. Cat. n. 4515 = laevis.
enormis, *Mart, ex Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot* vi. (1847) 544.—Bras.
erecta, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat iii. 294-foveolata.
erecta, *Thunb. Diss. Fic.9.—Rtg.* I limal.; China; Japon.
eriobotryoides, *Kunth (f Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 16.—Hab. ?
erythrosperma, *Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat.* iii. 226.—Ins. Celebes,
erythrosticta, *Miq. I. c.* 298.—Guian.

FICtTB:—
eugeniaefolia, *Hems!. Bid. Centr. Am. Bot.* iii. 144.—Costa Rica,
eugenioides, *F. Uuell. ex Miq. Ann. Atus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.—Austral
euomphala, *Miq. I. c.* 299.—Bras,
euphylla, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 446.—Burma; Malaya,
euryaefolia, *Hort. Berol. ex Kunth tf Bouehi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 21.—Ins. Philipp.
exasperata, Hort Kew. ex Miq. Ann. Mug. Bot. Lagd. Bat. iii. 291 -aspera.
exasperata, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 555 - pisifera.
exasperata, *Vahl, Enum.* ii. 197.—Afr. trap,
excelsa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.—Java.
excelsa, Vahl, Enum. ii. 195—gibbosa.
eximia, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 410.—Bras,
exsculpta, *[Mast.] in Card. Ckron.* (1878) II. p. viii (cf.84).-Hab.«.
Fadyeni, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 219.—Jamaic.
fagifolia, *Miq. I. e.* 299.—Bras,
faginea, *Kunth V Bouehi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 20.—Am. bor.
falcata, Thunb. Diss. Fie. 8 =punctata.
fallax, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 308=cuspidata.
fasciculata, *F. Muelt. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 177.—Austral,
fazokelenris, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 288.—Afr. trop.
fecunda, Blame, Cat. Gew. Buitenz. 36-hispida.
fenuginea, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 412.—Am. bor.
ferruginea, Hort. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 98-=rnbiginosa.
Fieldingii, Miq. in Hook. Lond. Joura. Bot. vii. (1848; 439-nemoralis.
filiformis, *Blume, Bijdr.* 442.—Java.
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 4553 = pyriformis.
ftrma, Wall. 1. c n. 4564 A, B=globosa, Blame.
firmula, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 224-Decaisnei.
fistulosa, *Reinw.ex Blume, Bijdr.* 470.—Reg. Himal.; Malaya.
Kitzalani, *Miq. Journ. Bot. Nierl.* i. (1861) 242.—Austral.
flavescens, Blume, Bijdr. 449 = annnlata.
foecunda, Auct. "*fecunda.*
Fontanesii, *Steud. Norn.* ed. II. i. 636.—Hab. ?
formosana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* 27 (1881) 546.—China.
Forskålaei, *Vahl, Enum.* ii. 196.—Arab.
Forstenii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 214.—Ins. Celebes,
ibveolata, *Wall. Cat.* n. 4498.—Reg. Himal.; Burma; China.
foveolata, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 293=aurantiaca.
frangulina, *Kunth* b* *Bouchl, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846)39.—Hab.?
Fraserii, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 235 - Cnnninghamii.
fraterna, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 217-glaberrima.
frigida, *Linden, ex Miq. I. e.* 221.—N. Granat.
fructicosa, Roxb. Hort. Beng. [103] ; Fl. Ind. iii. 538 = senndens..
fufoa,Hort. BeroL ex Kunth & Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 14 -ferruginea.
fulva, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 478.—Burma; Malaya,
falva, *Spreng. Syst.* iii. 779.—Bras,
fuscescens, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.—Mexic
galactophora, *Tenore, in Atti Ace. Sc. Nap.* vi. (1851) 157 ; *et ex Gasp. Ricerck. Capri/.* 85, in »yn.—Am. austr.
garciniaefolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. -Bat.* iii. 218.—Ins. Timor.
gardeniaefolia, Hort. Berol. ex Miq. 1. c 299. hirsuta.
gardeniaefolia, Hort. Lips, ex Miq. I. c. = onyrtifolia.
Gardneriana, *Miq. 1. c.* 297.—Bras.
Gasparriniana, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 436.—Ind. or.

PICTTS:-
Gelderii, Miq. Ann. Mas. Bot Lugd. Bat. iii. 216 - indica.
gemella, Wall. Cat. n. 4676-=nemoralis.
gemina, *Ruit, ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 98, in syn.—Peruv.
geminifolia, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 98, 99= fistulosa.
geniculata, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 105—As. trop.; Malaya.
geocarpa,7Vinm. *in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 231.—Ins. Celebes.
genniifolia, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 225.—Persia.
gibbosa, *Blume, Bijdr.* 466.—As. trop.; Malaya,
gigantea, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 48.— N. Granat.
gigantea, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art iv. 15 = balica.
Gilapong, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 426.—Sumatra,
glabella, *Blume, Bijdr.* 452.—Reg. Himal.; Burma,
glaberrima, *Blume, L c.* 451.—As. trop.; Malaya.
glaberrima, Hort. Bogor. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 342 = Binnendijckii.
glabra, *Griff. Notul.* iv. 390.—Assam.
glabra, Veil. Kl. Flum. si. t. 50-eximia.
glabrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 47 =anthelmintica.
glandulifera, *Wall. Cat.* n. 4487.—Burma; Malaya.
glandulosa, Hort. ex G. Don, in *Loud.* Hort. Brit. 416 = exasperata.
glauca, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 357 -= cordata.
glauca, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299.—Mexic.
glaucescens, *Miq. 1. c.* 800.—Mexic.
glaucophylla, Desf. Tabl. ed. I. 209-cordata.
globosa, *Blume, Bijdr.* 449.—Burma; Malaya,
globosa, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bôt.* vii. (1848) 224.—Ital.
glomerata, Hort. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 298= frangulina.
glomerata, *Roxb. PI. Corom.* ii. 13. t. 128.—.Ind. or.; Burma.
glumosa, *Delile, Cent. PI. Méroi,* 63.—Abyssin.
glycicarpa, *Miq. Ann. Mus. Sot. Lugd. Bat.* iii. 297.—Mexic.
gnaphalocarpa, *Steud. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 113.—Abyssin.
Gomelleira, *Hort. Monac. ex Kunth tf Bouehi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 18.—Bras.
Gonia, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1826) 137 — mysorensis.
Goolereea, Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 538 = glomerata.
gossypina, Wall. Cat. n. 4488=alba.
gracilis, Wall. 1. c. n. 4572 (non Ficus).—Ind. or.
Granatum, *Forst.f. PI. Escul.* 37.—Ins. N. Hebrid.
grandaeva, *Mart, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 70.—Bras,
grandifolia, *Kunth b" Bouehi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 18.—Hab. ?
grandifolia, Wall. Cat. n. 4525 = parietalis.
gremiaefolia, Blume, Bijdr. 476 - pisilera.
greviaefolia, Hort. Berol. ex Kunth *Sc* Bouehi, Ind. Sem. Hort Berol. (1846) 21 = obscura.
grewiaefolia, Zoll. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 280 —ramentacea.
Griffithii, *Miq. 1. c.* 297.—Ind. or.
giisea, *Vahl, Enum.* ii. 194.—Hab. >.
grisea, *Wall. Cat.* n. 4544.—Burma,
grossivenis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 227.—Borneo.
Grossularia, Buch-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4614 =nervosa.
grossularioides, Burm. f. Fl. Ind. 227 = heterophylla.
Guapoi, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* v. (1878) 87 ; *Contrib.* 85.—Reg. Argent,
guatemalana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.—Guatemala,
guianensis, *Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 62.—Guian.
gummifera, *Bertol. Misc. Bot.* xx. 16.—Guatemala,
gummifera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* Hi. 297.—Gnayaquil.
gummift.ua, Miq. 1. c. 296-variegata.
haematocarpa, Blume, ex Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 494 - F . Benjamins.

PICtTS:-
Hamiltoniana, Wall. Cat. n. 4545 A = pomifera.
Hampelos, Steud. Nom. ed. II. i. 636 = trichocarpa.
Hanceana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 553.—China,
hapalophylla. *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 461.—Ind. or.
Harlandi, *Benth. Fl. Hongk.* 330.—China.
Hartwegii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299.—N. Granat.
Harveyi, *Seem. Fl. Vit.* 250.—Ins. Fiji.
Hauili, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 684=leucantatoma.
hederacea, Roxb. Hort. Beng. [108]; Fl. Ind. iii. 588 = scandens.
Henneana, *Miq. Ann.Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 216—Austral.
Heraandezii, *Miq. I. c.* 300.—Mexic.
heterophylla, *Linn. f. Suppl.* 442; *Lam. Encyc.* «• 499.—As. trop.
heteropleura, Blume, Bijdr. 466 = rostrata.
heteropoda, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 232.—Ins. Molucc.
heteroselis. *Bur. in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. xiv. (1872) 277.—N. Caled.
hibiscifolia, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1{>54) 77 = hirta.
hirsuta, Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Joura. vii. (1848) 451-villosa.
hirsuta, Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 528 = hirta.
hirsuta. *Veil. Fl. Flum.* xi. t. 49; *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 414.—Bras,
hirta, *Vahl, Enum.* ii. 201.—As. trop.; Malaya,
hispida, *Linn.f. Suppl.* 442.—As. et Austral, trop.
hispida, Roxb. ex Wall. Cat. n. 4491^ hirta.
hispidissima, Wight, ex Miq. in Hook. Lond. Journ Bot. vii. (1848) 229=asperrima, *Roxb.*
Hochstetteri, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii 267.—Abyssin.
holosericea, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 410—Bras.
Hookeri, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 216.—Reg. Himal.
Hookeri, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 362.—Ind. occ.
Huegelii, Kunth & Bouehi, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 15 = macrophylla.
humilis, Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i 292 = F. Ampelos.
humilis, Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. iii. 536-quercifolia.
Hunteri, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot vii. (1848) 225 = alba.
hypoleuca, *Gasp. Ricerch. Caprif.* 79.—Italia.
hypsophila, Miq. PI. Jungh. 60 = pisifera.
ichnopoda, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 28>-294-pyriformis.
ilicina, *Sond. in Miq. 1. c.* 289 —Afr. austr.
impressa, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. (1854) 76=foveolata.
incisa, *Wall. Cat. a.* 4490.—Burma.
inclinata, Buch.-Ham. in Wall. 1. c. n. 4486 A-Iep carpa.
inclinata, *Buch.-Ham. I. c.* 4486 B.- Silhet
inconstans, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 232—quercifolia.
inconstantissima, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 4S1--" Sumatra.
indecora, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. *(1»* 426-orbicularis.
indecora, Miq. in Joum. Bot. Néerl. (1861) 242-opposita.
indiana, Hocbstex A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 265-populifolia.
indica, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.681-saxophila.
indica, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 179-- salicifolia-
indica, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 391 = retusa.
indica, Hochst. ex Walp. Ann. iii. 419 = F. Dahro.
indica, Linn. Sp. PL ed. II. 1514; Lam. Encyc. —mysorensis.
indica, *Linn. 1. c.* ed. I. 1060.—As. trop.; Malay*-
indica, Willd. Sp. PI. iv. 1146 = F. Tsiela.
infectoria, *Roxb. Hort. Beng.* 66; *Fl. Ind.* iii- 6& As. trop.; Malaya.
infectoria, Willd. Sp. PI. iv. 1137 = F. Tjakela.
ingens, Miq. Ann. Mus. Bot. Logd. Bat. iii. Schimperiana.
insignis, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 106.—Burma.

FICUS:—

*»fi>da, Willd. Sp. PI. iv. 1143-anthelmintica.
"WnUns, *Mi,. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) . *85—Ins. Loo Choo.
l*rTMed.i». *Delile, Cent. PI. Mirol,* 64—Aegypt
ntermedia, *Griff. Notul.* iv. 395.-Ind. or.
IntTMmarginalis, *Mi,. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 297.—Costa Rica.
invol• W Uwata> *Blume> Bi Jrdr_* "'--Java.
**«crata,* Urn. Encyc. ii. 497 -rubra.
•nvoluta, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.— i Nicaragua.
•"egularis, *Miq. I. c.* 224.—Ins. Celebes.
;" Wans, Steud. Nom. ed. II. i. 636=gibbosa.
>x*nopoda, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat iii. 229 = - Pynformis.
£"£'Pritz, Ic, Ind_459« sphalm. = F. Tsiela.
Tv —sM 1- Ann- Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 815 = , ucifolia.
Jteophyu> *Mi,. I. c.* 218.-A&. trop.
Jioquinaefolia, *A. Rich. fl. Cub. Fanerog.* ii. 221.—
j»maicensis, *Liebm. ex Mi,. Ann. Mus. Bot. Lugd. fat.* ,,,.8OO.-Jamaic
TT.'.'' «Bi me, Bi dr- «0=erecta.
Bat "Hort„ BeroL « Mi< l- Ann- Mni "«*• L"^-
javani.>u.294-erecta.
javensis£«»• *ex Steud. Nom.* ed.II. i. 636.-Java.
232 = . Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1648) heterophylla.
jT»«ann«, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 96 = F. Carica.
*£***"• Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 298-
Yavoponensis.
fcd!!**"*"I„„„M,q-Pljnngh.56-parieUlis.
£arP"-M<y. *Ann. Mus. Bot.. Lugd. Bat.* iii. 268, *o»—Malaya.
Karet
Konk'BaiU- Hist- "• *• 176-mysorensis.
•""thalin, *Mi,. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 215. —Borneo.
yana, *Miq. l. c.* 288.—Arab.
i, *Miq. l. c.* 298.—Bras.
Blan. H- Filip. ed. I. 678 = leucantatoma.
lacc.»?, Roxb. Hort Beng. 66 j Fl. Ind. iii. 545 = al isama.
lachnocaulon, Miq_Ann_Mrs_ Bot. Lugd. Bat. m. 287 = platypoda.
Laco>. Buch.-H«m. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 150 nfectoria.
««,-Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 495
laZ ? ? U ^ °«fen<a
laev ata VM, £ »»»»- H. 188.-Ind. occ Mi,.
laev.?»;
land f(ume, Bridr- 487.—As. trop.; Malaya; Jiava, £*»». Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 414 = sapotndd a T ^'rhana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. BaL m. 286 »wfectoria.
la ?J?°f«- Hardw. ex Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. •• m. 581 = saemocarpa.
Lamponga. Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 431 = lepidosa.
lanata, Blume, *Bijdr.* 441.—Java.
lanata, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 168 = leucotricha.
lanceo1 *Ind.* «?. *Buck-Ham, ex Roxb. Hort. Beng.* 66 j *Fl.*
lanci r a, " ak Wall- B* Bnh h °y- SSO.-Mexic.
lancif ia, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 452 = celebica.
lancifolia, Moench, Meth. 347 = indic-i.
lanigera, Wall. Cat. n. 4577=crininervia.
lanuginosa, *Cafar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* 48.—Bras.
lapathifo• M « r 'Miq, Ann, Mu*, Bet Lugd~ Bat~iiL m,
lasiocarpa, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 429.—Sumatra.
lasiophleba, Mic. JIOAL II. il-c. 427=lasiocarpa.
Csif "a, LTM, Ennm- Hort BeroL ii.*«-benCha-
lateriflora, *Vahl, Enum.* ii. 197.—Ins. Mascar.
latifolia, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché. Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 18 = grandifolia.
latifolia, Ait. Hort. Kew. iii. 476 = Carica.
laurifolia, Hort* '* Um- Efl<yc- ii- 495.—Ind. occ.
laurifolia Hort- BeroL ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. B8*' (1846) 16=diospyrifolia.
Leichhardtii, Miq, AnlL Mn». W- Bat iii. 287 = platypoda.
lentiginosa, *Vahl, Enum.* ii. 183.-Ind. occ.
Leopoldi V Fi 9S2 *OT,W,,, .* -^'V- *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 220.—Am. anstr.

PICUS:—

lepicarpa, *Blume, Bijdr.* 459.—Malaya.
lepidosa, *Wall. Cat.* n. 4541.—Ind. or.
Leprienrii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 219. —Afr. trop.
Uptocarpa, Steud. Nom. ed. II. i. 636 = ramentacea.
leptodada, *Benth. Fl. Austral,* vi. 172.—Austral,
leucantatoma, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 654.—Malaya.
leucatoma, Roem. & Schult. Syst. i. 501,sphalm." praec.
leucocarpa, Gasp. Ricerch. Caprif. 77 =• K. Carica.
leucocarpa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 285 - infectoria.
leucocoma, Miq. PI. Jungh. 54 = tricolor.
leucopleura, Blume, Bijdr. 448 = leucantatoma.
leucoptera, *Miq. PI. Jungh.* 62.—Ins. Celebes,
lencosticta, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 297. Guian.
leucosticta, Spreng. Syst. iii. 779 — leucantatoma.
leucotoma, Miq. in Hook. Lond. Journ. vii. (1848) 468, in syn., sphalm. = leucantatoma.
leucotricha, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 285. —Austral.
leucoxylon, Miq. PI. Jungh. 61 - pisifera.
Ucktensteinii, Link, Enum. Hort. Derol. ii. 451 = capensis.
Liebmanniana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.—Panama,
ligustrina, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 16.—Mexic.
Lima, Royen, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 282 = hispida.
littoralis, Blume, Bijdr. 455=retusa.
Lobbii, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot vii. (1848) 233 = rostrata.
Loddigesii, Heynh.Nom. ii. 244 = quercifolia.
Logani, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 607, nomen.—Venezuela.
longifolia, Bach.-Ham. in Wall. Cat. n. 4570, partim « indica.
longifolia, Buch.-Ham. 1. c 4570 A, B-obtusifolia.
longifolia, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Add.* 409.—Bras,
longipes, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 259. —Madag.
longipes, *Griff. Notul.* iv. 397.—Assam.
longipes. *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 207. —Mexic.
lucescens, Blume, Bijdr. 444=infectoria.
lucescens, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 264, obs Sumatra.
lucida, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kern.* ed. I. iii. 451.— Ind. or.
lucida, Hort. Berol. ex Kunth *Be* BoucU, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846)'l6-nitida.
ludens, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 224.—Afr. trop.
ludens, Wall. Cat. n. 4579 = foveolata.
Luducca, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 534 = foveolata.
Luschnathiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.—Bras.
lutea, *Vahl, Enum.* ii. 185.—Afr. trop.
lutescens, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 413=diversifolia.
macrocalyx, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 217 = involucrata.
macrocarpa, Blume, Bijdr. 459=punctata.
macrocarpa, Gasp. Ricerch. Caprif. 78 = F. Carica.
macrocarpa, Hueg. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 287 = macrophylla.
macrocarpa, *Wight, ex Mi,, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 74.—Ind. or.
macrophylla, *Desf. Tabl.* ed. I. 209.—Austral.
macrophylla, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 15 = anacardiifolia.
macrophylla. Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 556 = Roxburghii.
macropoda, *Kurs, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) II. 150.—Ins. Andaman,
macropoda, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 442.—Ins. Philipp.
maculata, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1515.—Ins. S. Doming.; Cochinch.
madurensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 222. —Java.
magnifolia, *F. Muell. Fragm.* iv. 50.—Austral.
magnoliaefolia, Blume, Bijdr. 448=retusa.
malabirica, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 457—Ind. or.

FICUS:—

mangiferifolu, *Griff. Notul.* iv. 895.—Assam.
Manok, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 261 = globosa, *Blume.*
Mappan, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 425=alba.
marginalis, Buch.-Ham. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 293 = rostrata.
marginalis, Hunter, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 429 - urophylla.
marmorata, *Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 257.—Madag.
martabanica, Wall. Cat n. 4551=lepidosa.
martinicensis, Hort Berol. ex Walp. Ann. i. 676 — Kunthii.
martinicensis, Willd. Sp. PI. iv. 1137-laurifolia.
Martinii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 219.— Guian.
Masoni, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 871.—Ins. Fiji.
Mathewsii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298. —Peruv.
mauritiana, *Lam. Encyc.* il. 499.—Ins. Mascar.
maxima. Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 6 = laurifblia.
Maximiliana, *Mart, ex Mi,, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 529, in syn.—Bras,
megapoda, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 444.—Madag.
melinocarpa, *Blume, Bijdr.* 460.—Java.
Melleri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 258. —Madag.
membranacea, *Wright, i.f Sauv. Fl. Cub.* 149.—Cuba,
menadana, *Miq. Ann. Mus. Bat. Lugd. Bat.* iii. 238. —Ins. Celebes.
mexicana, *Miq. I. c.* 299, 300.—Mexic.
micracantha, Miq. 1. c. 221 = aculeata.
microcarpa, Blume, Bijdr. 442 = ramentacea.
microcarpa, Hort. Berol. ex Walp. Ann. i. 877 — cestrifolia.
microcarpa, Linn. f. Snppl. 442 — retusa.
microcarpa, *Vahl, Enum.* ii. 188.—Afr. trop.
microphylla, *Salim. ex Miq. in Mart. Fl. Bras.* iv. i. 93.—Bras.
microstoma, *Wall. Cat.* n. 4566.—Malaya.
microtus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 428 - pisifera.
Millesii, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 438=seq.
Milletii, Miq. Ann. Mtu. Bot. Lugd. Bat. iii. 281 - pyriformis.
millingtonifolia, *Griff. Notul.* iv. 366.—Assam.
Minahassae, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iiL 231. —Ins. Celebes.
minima, Hort. ex Gard. Chron. (1880) II. 716 - pumila.
modesta, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 263 ~ nervosa.
mollior, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 173.— Austral.
mollis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 288 - glomerata.
mollis, Vahl, Symb. Bot. i. 82 = tomentosa.
mollis, Willd. in M<m Acad. Berl. (1798) 103 - hispida.
montana. Burnt, f. Fl. Ind. 226-quercifolia.
montana, Roxb.in Wall. Catn. 4574=nervosa.
monticola, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 216. —Ind. or.
Mooniana, *King, ex Trim. Cat. PL Ceyl.* 84.— Zeylan.
Moorei, *Seem.Fl. Vit.* 249.—Ins. Pacif.
morifolia, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 179 = ForskSlaei.
morifolia, Husson, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 1155 - palmata.
morifolia. Lam. Encyc ii. 499 = lateriRora.
morifolia, *Vahl, Enum.* ii. 203.—Ind. or.
Motleyana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 228. —Borneo.
Muelleri, *Miq. I. c.* 287.—Au»tial.
Muntia, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 450.—Austral.
muriculata, Miq. in Zoll. Syst Verz. Ind. Archip. 93, 98 - F Ribes.
Murrayana, Hort. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 95 = Princeps.
mutabilis, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Sir. V. xiv. (1872) 259.—N. Caled.
myriocarpa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iiL 230. —Ins. Amboin.
myrtifolia, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 450.—Hab. ?
mysorensis, *Heyne, tx Roth, Nov. PI. Sp.* 390 Ind. or.

FICUS:—
myxaefolia, *Kunih tf Bmuhi, Jnd. Sem. Hort. Beroi.* (1846) 18.—Mexic.
natalensis, *Hochst. in Flora,* xxviii. (1849) 88.—Aft. austr.
nautanim, *Baker, Fl. Maurit.* 285.—Ins. Seychelles,
neapolitana, *Miq. in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1848) 223.—Italia.
neglecta, Decne. in Nonv. Aim. Mus. Par. iii. (1834) 494 = F. Benjamina.
nemoralis, *Wall. Cat.* n. 4517.—Reg. Himal.
nefalensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 474 = F. Benjamina.
nepalensis, Spreng. Syst. iii. 779 — foveolata.
nerei/olia, Hort. ex Walp. Ann. i. 070 = Konthii.
neriifolia, *Reinw. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 637.—Java.
neriifolia, *A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* ii. 267.—Abyss,
nervosa, *Heyne, ex Roth, Nov. Sp. PI.* 388.—As trop.; Malaya.
nesophila, F. Moell. ex Miq. Ann. Mas. Lugd. Bat. iii. 286=glabella.
Neumanni, *Cels, ex Kunth fJ Bouché, Jnd. Sem. Hort. Berol.* (1846)14.—Hab.»
nimphaei-folia, Cerv. in Supl. Gaz. Lit. Mexico (2 Jul. 1794), 4 = nymphaeaefolia.
nipponiea, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. i. 436 - foveolata.
nitida, *Blume, Bijdr.* 455.—Java.
nitida, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 387 = F. Benjamina.
nitida, Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Hot. vi. (1847) 582 = Hookeri, *Sweet,*
nitida, Thunb. Diss. Fie. 10 = retosa.
nitidifolia, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xiv. (1872) 266.—N. Caled.
nivea, BInme, Bijdr. 476=alba.
nodosa, *Teijsm. V Finn, in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 245.—Ins. Amboin.
noduhsa, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 293=obtusa.
Noronhae, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1222.—Ins. Femand. Noronh.
Notobor, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. snb n. 4502 - F. Benjamina.
Novae-Guineae, *Zipp. in Flora,* xii. (1829) 282, nomen. —N. Guin.
nuda. Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 288 •= K. Benjamina.
nymphaeaefolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 9.—Am. trop.
nymphoides, *Thunb. Diss. Fie.* 7.—Am. austr.
obliqua, *Forst.f. Prod.* 77.—Ins. Pacif.
oitiqua, Miq. in ZoU. Syst. Verz. Ind. Arehip. 92,98 = melinocarpa.
oblongata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 449.—Afr. austr.
oblongifolia, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 61.—Nepal,
obovata, *Griff. Notul.* iv. 890 ; *Jc. PI. As. t.* 502. f. 1. —Assam.
obovata, Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 579 = glabella.
obsenra, *Blume, Bijdr.* 474.—Rep. Himal.; Malaya.
obtecta. Wall. Cat. n. 4505=villosa.
obtusa, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 75.—Malaya,
obtusata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 450.—Hab. ?
obtusidens, Miq. PI. Jnngh. 59=rostrata.
obtusifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 49-Bonplandiana.
obtnsifolia, *Roxb. Hort. Beng.* [103]; *Fl. Ind.* iii. 546.- Reg. Himal.; Malaya,
obtusiuscula, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 300. —Bras.
ochroleuca, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 151.—Jamaic.
Oerstediana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299. —Panama.
Oldhami, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. v. (1866) 242.—Ins. Formosa.
oligodon, Miq. Ann. Mus. Bot, Logd. Bat. iii. 234 = pomifera.
oligoneura, *Miq. I. c.* 288.—Snmatra.
oligosperma, Miq. PI. Jungh. 65 =ramentacea.
onusta, Wall. Cat. n. 4563=globosa, *Blume.*
opposiU, *Miq. in Hook. Lend. Journ. Bot.* vii. (1848) 426. -Austral.
oppositifolia, Willd. Sp. PI. iv. 1151 •= hispida.
orbicularis, *A, Cunn. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 426.—Austral.

FICUS :-
organecsis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299. —Bras.
ottoniaefolia, *Miq. I. c.* 288.—Afr. trop.
ovalis, *Miq. I. c.* 298.—Costa Rica.
mata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 61 = scamlens«
ovata, *Vahl, Enum.* ii. 185.—Afr. trop.
ovoidea, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) VII. 71 «• diversifolia.
ovoidea, *Kunth tf Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 20.-Ind. or.
oxyphylla, Miq. in Zoll.Syst. Verz. Ind. Arehip. 93 = crecta.
pachycarpa, Gasp. Ricerch. Caprif. 78 < F. Carica.
Padana, Hurra f. Fl. Ind. 226 - toxicaria.
padifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 47.—Mexic.
pallescens, Steud. Nom. ed. II. i. 637 =retusn.
pallida, *Vahl, Enum.* ii. 174.—N. Granat.
pallida. Wall. Cat. n. 4567 = retusa.
palmata, *Forth. Fl. Aegypt. Arab.* 179.—Afr. trop.; Arab.; Ind. or.
palmata, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 529 = alba,
paludosa, *Pen. in Mem. Soc. Linn. Par.* iii. (1825) 117.—Java.
palustris, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 15 - anacardiifolia.
Pancheriana, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xiv. (1872) 274.—N. Caled.
panduraefolia, Hort. Par. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 546=hirsuta.
panduraeformis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 299-heterophylla.
pandurata, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xviii. (1862)229.—China,
panifica, *Delile, 1. c.* Ser II. xx. (1843) 94.—Abyss.
papyri/era, Griff. Notul. iv. 394 ; Ic. PI. As. t. 554 = F. Benjamina.
paradoxa, Blume, Bijdr. 467=gibbosa.
paraënsis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.- Braft.
parasitica, *Koen. ex Willd. in Mem. Acad. Berl.* 17»8 U801) 102-gibbosa.
l'arcelli, *Veitch, ex Cogn- V Marchal, PI. Ontem.* iii. vl874) t. 47.-Ins. Pacific
parietalis, *Blume, Bijdr.* 462.—Malaya.
parietaria, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. An. iv. 15=heterophylla1
Parkeri, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 300.—Guian.
parvi/olia, Miq. 1. c. 286-glabella.
Payapa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. tj83 = retusa.
pedicellata, Wall. Cat. n. 4486, parlim = laevis.
peduncularis, *Wall. 1. c. a.* 4528.—Burma,
peduncnlata, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 450.—Ind. occ.
pedunculata, *Miq. in Hook. Land. Journ. Bot.* vii. (1848* 224.—Italia.
pedunculosa, *Miq. in Hook. I. c.* 442.—Ins. Philipp.
Peepul, Griff. Notul. iv. 393 = religiosa.
peguensis, Buch.Ham. ex Wall. Cat. n. 4560-altissima.
pellucida-punctata, Griff. Notul. iv. 494 = indica.
peltata, *Blume, Bijdr.* 438.—Java.
pendula. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 450 = F. Benjamina.
peracuta, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 306, Index = pruniformis.
Pereng, Steud. Nom. ed. II. i. 637=gibbosa.
perforata. Linn. PI. Surin. n. 146; Amoen. Acad. viii. 265-retusa.
perforata, *'Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 300.—Bras.
pergamenea, Got. *ex Miq. I. c.* 221.—Mexic.
periplocaefolia, *Kunth If Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 16.—Am. trop.!
persica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 97.—Persia.
pertusa, Bory, ex Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 6{8=terebrata.
pertusa, *Linn./. Suppl.* 442.—Gnian.
pervia, Miq. in Hook. Lond. Joorn. Bot. vii. (1848) 433-gibbosa.
petiolaris, *H. B.* to" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 49.—Mexic.
petiolata, Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 287 -superba.

FICUS:-
Petitiana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 271.—Abyss.
petrophila, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 76 = saxophila.
phaeopoda, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 293-—Java.
philippense,//ort. *ex Hirincq, L'HortU. Franç.* (1869) 244.—Ins. Pbilipp.
philippinensis, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848J 435 -Decaisnei.
phlebophytla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 430 = parietali».
phyllosperma, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* *• (1790) ed. I. Art. iv. 15.-Java.
phytolaccaefolia, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 413.—Hab.!
picta, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (17»0) ed. I-Art. IV. 15 = F. Benjamina.
pilosa, *Herb. Russ. in Wall. Cat.* n. 4538=hispida.
pilosa, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 446.—Burma; Malaya; Austral.
Pinkiana, *F. Muell. in Wing, South. Sc. Record,* >• (1882) 273.—Austral.
piperifolia, Miq. Ann. Mus. Bot. I^igd. Bat. iii. 293" obtusa.
pisifera. Hook, ex Miq. in Hook, l.ond. Joum. B0,1 vi. (1847) 581=retusa.
pisifera, *Wall. Cat.* n. 4504.—Malaya.
pisiformis, Hort. Btrol. ex Miq. in Hook. Low'-Joum. Bot. vii. (1848) 453 = lutescens.
pisucarpa, *Blume, Bijdr.* 454.—Malaya.
planico>tata, *Kunth tr Bouchl, Ind. Sem. Hort. 1Berol.* (18*6) 16.—Hab.!
platycaula, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 318-obtusa.
platyphylla, *Delile, Cent. PI. Meroi,* 62.—Aegypt.
platypoda, *A. Cunn. ex Miq. in Hook. Land. Jour»-Bot.* vi. U847) 561, in syn.—Austral,
pleurocarpa, *F. Muell. Fragm.* viii. 246.—Austral,
podophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (le85J 444.—Madag.
Pohliana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.-' Bras.
polita, Hort. in Miq. Ann. Mns. Lugd. Hot. Bat. >'" 2'Jft = myrtifolia.
polita, *Vahl, Enum.* ii. 182.—Afr. trop.
politoria, Lam. Kncyc. ii. 500 = F. Ampelot.
politoria, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 667.—Couhinch.
politoria. Moon, Cat. Ceyl. PI. 74 = asperriroa, *Ro*'-
polycarpa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4545 apo"11, fera.
polycarpa, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 55** F. Kibes.
polycarpos, *Jacq. Obs. Bot.* ii. 2i>.—Venezula.
polymorpha, *Gasp. Ricerch. Caprif.* 77.—Italia.
polyphlebia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (168*/ 262.—Madag.
polypus, Schiede, ex Miq. in Versl. en Med. Kan. Ak*', Wetensch. xiii. (1862) 412. = arbntifolia.
pomifera, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlii. (IS'8; II. 108=kallicarpa.
pomifera, *Wall. Cat.* n. 4547.—Reg. Himal.; MaW*
Populeaster, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 412 * Amottiana?
populifolia, Desf. Tabl. ed. I. 209-populnea.
populifolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 82.—Arab.
populifolia, Wall. Cat. n. 4485 A, C - Amottiana.
puputiformis, Schott, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lug0, Bat. iii. 287 = Amottiana *1*
populnea, Decne. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 260-saxophila.
populnea, Kunth & Bouché, in Ann. Sc. Nat. Ser. Ill-vii. (1847) 236 = Amottiana?
populnea, *Willd. Sp. PI.* iv. 1141.—Am. austr.
Porteana, *Regel, Gartenfl.* (1862) 280.—Mexic.
praecox, Gasp, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 880 * *V* Carica. *A*
Princeps, *Kunth br Bouchi, Ind. Sem. Hort. B**' (1846) 14.-Bras.
prinoides, Cham, *ic* Schlecht. in Linnaea, vi. (' »• 357-ligustrina. *MJ*
prinoides, *Hutnb. V Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* !»• —N. Granat.
Pritchardii, *Seem. Fl. fit.* 252.—Ins. Fiji,
procera, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 445.—Java.
procera, Salisb Prod. 16 = benghalensis.
prolixa, *Forst.f. Prod.* 77.—Ins. Societal
pnlixa, Vieill. & Deplanche, li»s. Nouv. Caled. l* retusa.

FICTJ8 :_

Prominens, Wall. Cat. n. 4637 = hispida.
Pronayana, Hort. Schoenb. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 29!)-sapotaefolia.
Prostrata, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat.* n. 4536. partim. —Reg. Himal.
Prostrata, Wall. 1. c, partim = F. Ribes.
protensa, *Hemsl. Biol. Centr. Am.* iii. 147.—Panama.
Prote MO.—N. Cale
Pruniformia, *Bluriu, Bijdr.* 451.—Malaya.
formis, Hort. Bogor. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. si 7 = variabilis.
Pseudo-Benjamina, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 286 = F. Tsiela.
Pseudo-Carica, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 225.—Abyss.
Pseudo- *Bot. l.ugd. Bat.* iii. — *SM*—Mexic.
pseudo-rubra, *Afiq. I. e.* 264.—Java.
VXH-Sycomorus, Decne in Ann. Sc. Nat Ser. II. ii. 242 = Palmata.
Ps Ca/. *PI. Ceyl.* 84.—Zeylan.
psycho *tiliifolia,* Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 286 = put-unnmgnamii.
ffl"la> K»nth & Bouche', Ind. Sem. Hort. Berol. rsuta.
puberula, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 287.— Austral.
pubescens, Hey tomentosa.
pubigera, *Kurz, Burma*> "•46o (*P- dub-) — Burma.
pubigera, Wall. Cat. "• «18-foveolata.
pubinervi «3.-Java.
pubinerv Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 4.6 " Deeaisnei.
pulchella *Spreng. Syst.* iv. 410.—Bras.
pulchra, Wall Cat. "• 457* (non Fi(li »P->—Singapore.
pumila, *Linn.* I060.-Japon.; China.
pumila, Thunb. DUs. Fie. 9 = erecta.
punctat Cat. n. 45«9 = infectoria.
tun 495 = aggregata.
Pun«1 *Thunb* M4 aya.
punctula
punctata, Steud. Nom. ed. II. i. 637, sphalm. = aggregata.
pungens, «#/««*, 5i>rfr. 478.—Java.
purpurascens, *Desf. C* 412.— Hab.?
pyrifolia, f. Fl. In 226=erecta.
pyrifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 413 = Fontanesii.
pyrifolia, Lam. E.,cyc. ii. 495=rub,a.
pyrifolia, Sal Benjamina.
pyriformis
Reg. H Benjamina.
pyrrhoc
II. 10 saemocarpa.
pyrrhopoda, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 293 = obtusa.
quercifolia, Blume, Bijdr. 468 = rostniU.
quercifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 65 ; fV. /»rf. iii. 534.- Burma ; Malaya.
racem
racem 867 d.
racemosa »60 = hispida ?
racemosa, all. Cat. n. «40 =glomerata.
racemosa Wlld. Sp. Pl. iv. 1146-infectoria.
radiata, 494 = Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 515 = K, Patsa. (1841)
radicans, Cas tatoma.
radica
radii Pa«sa.
Z Par.* ed. III. 413.—Hab.?
radula, Willd. Sp. Pl. i»- 1144,-Veneiuela.
ramea, Wall. Cat. 556-rubra.
ramentacea, *Roxb.* 548.—
rapiformi ; M
raridens, Miq. in Moo Lond. Journ. Bot. vii. 848) 430 = rostrata.
reclinata, *Desf. C* ed. III. 414 —Hab.?

FICUS :—

recurva, *Blume, Bijdr.* 457.—Malaya.
rrflexa, Bnch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4523 = retusa.
reflexa, *Thunb. Diss. Fie.* 11.—Ind. or.
regia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 230= Roxbnrghii, pomifera.
Regina, Hort. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 223 - F . Carica.
Xeinwardtit, Link & Otto, lc. Pl. Kar. i. 6. t. 31 = fulva, *Reinw.*
religiosa, Decne. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 287 - Rumphii.
religiosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 180 => populifolia.
religiosa, *Linn. Sp. Pl.* 1059.—Ind. or.
Remblas, Miq. Pl. Jnngh. 60-pisifera.
renitens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 11. 316 - variabilis.
repens, Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 465'hispida.
repens, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1880) II. 716 = pumila.
repens, Hort. Miss, ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 229=quercifolia.
repens, *Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 208.—Ind. or.
repens, Willcl. Sp. Pl. iv. 1149=heterophylla.
reticulata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 294 = foveolata.
reticulata, *Thunb. Diss. Fie.* 12.—Ind. or.
reticulosa, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (18481 435-gibbosa.
retusa, *Linn. Mant.* 121).—As. trop.; Malaya.
retusa, Wall. Cat. n. 4530 = diversifolia.
rhizocarpa, *Teijsm. V De Vriese, Cat. Hort. Bog.* 83, nomen.—Malaya.
rhododendrifolia, Kunth & Bouche', Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 16 = Kunthii.
rhododendrifolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.—Reg. Himal.
rhomboidalis. *Vahl, Enum.* ii. 19!).—Ind. or.
rhynchophylla, Steud. Nom. ed. II. i. 687 *= religiosa.
Ribes, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 463.—Burma; Malaya.
ribesioides. Wall. Cat. n. 4522 » recurva.
Riedelii, *Teijsm. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 223.-Malay*
rigescens, Miq. 1. c. 278 - ramentarea.
ritfida, Blume, Bijdr. 465=gibbosa.
rigida, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4527, 4335 = infectoria.
rigida, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 412--Neumanni.
rigida, *Jack, in Afalpy. Misc.* ii. (1822) VII. 72.—Malaya,
rigida, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.—Penang; Perah.
rigidifolia, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xiv. (1872) 265.—N. Caled.
riparia, *Hochst. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. U848) 114.—Abyss.
Rolandri, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.—Am. trop.
rostrata, Hort. Bogor. ex Miq. 1. c. 278 «radicans.
rostrata, *Lam. Encye.* ii. 498.—Reg. Himal.; Malaya,
rotundifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 1.103]; *Fl. Ind.* iii. 555.—Ind.' or.
Roxburghii, Miq. in Hook. Lonil. Journ. Bot. vii. (1848) 456 = hirta.
Koxburghii, *Wall. Cat.* n. 4508.—Reg. Himal.; liurma.
rubescens, Blume, Bijdr. 458-indica.
rubescens. Hort. Bogor. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 352 = annulata.
rubicunda, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 289. —Afr. trop.
rubifolia, Griff. Notul. iv. 899=heterophyll«.
rubiginosa, *Desf. Tabl.* ed. I. 209.—Austral.
rubra, Blume, Bijdr. 458 = F. Pseudo-rubra.
rubra. Roth, Nov. Sp. 891 ---retusa.
rubra, *Vahl, Enum.* ii. 191.—Ind. or.
rubrieaulis, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 4!>6 = F. Ampelos.
rubrinervis, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 448.—Bras,
rudis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 222.—Ins. Celebes.
rudis, Pen. Syn. ii. 609 - F. Ampelos.
rufa, *Sckott, in Spreng. Syst.* iv. *Add.* 410.—Bras.
ru/escens, Vahl, Enum. 203 -heterophylla.

PIOUS :—

rufipila, Miq. Pl. Jongh. 57 - parietalis.
ruyosa, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 416, nomen.—Afr. trop.
rugosa, *Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 224,-Iul.
Rumphii, *Blume, Bijdr.* 437.—Reg. Himal.; Malaya,
rupestris, *Blume, 1. c.* 447—Java.
rupestris, Iiuch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 13!) = mysorensis.
saemocarpa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 232. —Reg. Himal.
sagittata, *Vahl, Symb. Bot.* i. 83.—Ind. or.
salicifolia, Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 481=sikkimensis.
salicifolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 82.—Arab.
salicina, K. Muell. Fragm. iv. 49 -coronulata.
saligna, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Ab)ss. ii. 268 =acrocarpa.
Salzmauniana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299.—Bras.
Sancti-Cruuis, *Miq. I. c*—Mexic.
sapida, *Miq. I. c.* 298.—Costa Rica,
sapotaefolia, *Kunth & Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 17.—Hab.»
sapotoides, *Baker, Fl. Maurit.* 284.—Ins. Mascar.
sarmentosa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4533 = scandens.
Saussureana, *DC. in Mini. Soc. Phys. Genfv.* ix. (1841) 65.—Am. austr.
saxatilis, Blume, Bijdr. 460 =• rostrata.
saxatilis, Miq. in Zoll. Syst. Verz. 92. n. (76 *= pisifera.
saxophila, *Blume, Bijdr.* 437.—Java ; Timor.
scaberrima, blume, I.e. 474 = obscura.
scabra, *Forst.f. Prod.* 76.—N. Hebrid.
scabra, Hort. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Uat. iii. 291~ulmifolia.
scabra, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 86 =hispida.
scabra, Willd. in Mém. Acad. Berl. (1798) t. 2 = cxasperata.
scabrella, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 532 = hetero]>h)lla.
scabrifolia, *A. Rich. Sert. Astrol.* t. 17.—Austral.
scandens, Bucli.-Mam. in Trans. Linn. Soc. xv. (1826) 149 = infectoria.
scandens, Hort. Van Houtte, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 300 - volubilis.
scandens. Lam. Encyc. ii. 498-pumila.
scandens, *Roxb. Hart. Beng.* 65; *Fl. Ind.* iii. 536 — Reg. Himal.; Burma.
Schimperi, Hochst. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847! 555-IIochstctteri.
Schimperiana, *Hochst. ex Miq. 1. c.* 654, in syn.—Abyss.
Schottii, Hort. Berol. ex Kunth & Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 14-catappaefolia.
Schumacheri, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 151.—Ind. occ.
Schweinfurthii, *Miq. ex Schveinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 686.—Afr. trop.
sclerocarpa. Griff. Notul. iv. 397 = Roxburghii.
sclerocoma, *Miq. PI. Jungh.* 58.—Java.
sclerophylla, Roxb. Fl. Ind. iii. 546-gibbosa.
scleroptera. Griff. Ic. I'l. As. t. 558 = sclerocarpa, Roxburghii.
scleroptera, Miq Pl. Jungh. 83-calIosa.
scobina, *Benth. Fl. Austral,* vi. 176.—Austral.
Segoviae, *Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat.* iii. 300.— Nicaragua.
semicordata, *Miq. 1. c.* 226.—Ins. Celebes,
senegalensis, *Miq. I. e.* 230.—Afr. trop.
septica, Burm. f. Fl. Ind. 226 = leucantatoma';
septica. *Forst.f. Prod.* 76.—N. Hebrid.
septica. Hook, ex Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 436 = insularis.
septica, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 667.—Cochinch.
septica, Royen, ex Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. iii. 275 = callosa.
serpyllifolia, *Blume, Bijdr.* 443.—Java,
serraria, *Miq. Fl. hid. Bat. Suppl.* 428.—Sumatra,
serrata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 179 (-seq.!).— Arab.
serrata, *Linn. Syst.* cd. X. 1315.—Arab,
setacea, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1138.—' India.'
setifera, Steud. Nom. ed. II. i. 638 =hirta.
setosa, Blume, Bijdr. 477 = hirto.
setoia, *Hook, tr Afn. Bot. Beech. Voy.* 216. t. 49.— China.
sideroxyli/olia, Griff. Notul. i». 389 "dWenifolia.

FICTJB:—
Sieboldi, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. ii. 193 = erecta.
sikkimensis, *Miq. I. e.* iii. 225.—Reg. Himal.
silhetensis. *Miq. I. c.* 223.—Keg. Himal.
silvestris, Kisso, Fl. Mice, 434 - F. Carica ?
simphytifolia, Lam. Encyc. ii. 498»hispida.
rimplicissima, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 667.—Cocbinch.
sinnata, *Thunb. Diss. Fie.* 12.—Ind. or.
sinuosa, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vhV (1848) 232=quercifolia.
Smithii, *Home, ex Baker, in Joum. Linn. Soc.* xx. (1883) 372.—Ins. Fiji.
socotrana, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 96.—Ins. Socotr.
sondana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 305.—Malaya.
Sonderi, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 295.—Malaya,
soroceoides, *Baker, in Joum. Linn. Soc. xx.* (.1888) 258.—Madag.
•ororia, *Kunth* to[1] *Bouchi, Ind. Sem. Hart. Berol.* (1846) 16.—Hab.»
Spanogheana, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 451 = recurva.
spathulata, Miq. 1. c. 441 - diveisifolia.
speciosa, [Fisch.] Hort Gorenk. ed. I. (1808) 22, nomen = salicifolia.
spectabilis, Kunth & Bouché, in Ann. Sc Nat. Sir. III. vii. (1847) 235 = ovata.
sphaeridiophora, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat-* iii. 298.—Guian.
iphaerophylla, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xxi. (1885) 448.—Madag.
tplendens, *Kunth tf Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 14.—Hab.}
squamellosa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 287 - macrophylla.
squamosa, Roxb. Hort. Beng. [103] ; Fl. Ind. iii. 531 =saemocarpa.
itenocarpa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 174.—Austral.
stictocarpa, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Hat. iii. 284 - leucantatoma.
stipulacea, Noronha, in Verh. Batav.. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 15 = pumila!
stipulata, Moon, Cat. Ceyl. PI. 6 = Thwaitesii.
stipulata, Thunb. Diss. Fie. 8=pumila.
stipulata, Wall. Cat. n. 4574=punctata.
stipulosa, Miq. Ann. Mns. Bot. Lngd. Bat. iii. 287 = infectoria.
Storckii, *Seem. Fl. Vit.* 251.—Ins. Fiji.
striata, Roth, Nov. Sp. Fl. 387 - F. Benjamina.
stricta, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 266.—Java.
strigosa, Blume, Bijdr. 441 = recurva.
strigosa, Hort. Bogor. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 318 = obtusa.
stnpenda, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.—Java.
subapiculata, *Miq. 1. c.* 288.—Bras.
subcalyptrata, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 15 = lucescens.
subcordata, *Blume, Bijdr.* 440.—Java.
subcordata, Hort. Bogor. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 295 = callosa.
subciuieata, *Miq. I. c.* 235.—Ins. Ceram.
tubdenticulata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 323-*obscura.
subglabra, *F. Muell. Fragm. ix.* 152.—Austral,
subnymphaeifolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299.—Hab.?
subobliqua, Miq. 1. e. 225=gibbosa.
subopaca, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 320-variegata.
suborbicularis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 425 =fulva, *Reinw.*
suiorna, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 4557 = elastica.
subpanduraeformis, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 285-heterophylla.
subpedunculata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 217-glabella.
subpyriformis, Miq. 1. c. 229-pyriformis.
subracemosa, Blume, Bijdr. 469 = variegata.
subrepanda, *Wall. Cat.* n. 4568 B.—Reg. Himal.
tubrigida, Miq. Fl. Ind. Bat Suppl. 43S=iamenta«a.
subsubulata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 225.—Borneo,
snbtriplinervia, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 67.—Bras,
subulata, *Blume, Bijdr.* 460.—Malaya; China.

PICTTB:—
suffocans, *Banks, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 150.—Jamaic.
sulcipes, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298.—Mexic.
sumatrana, *Miq. 1. c.* 287.—Sumatra.
sundaica, Blume, Bijdr. 460=indica.
superba, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 200.—Java; Japon.
superstitiosa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 449-religiosa.
Sur, *Forsk. Fl. Aegypt.Arab.* 180.—Arabia,
surinamensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 219.—Guiana.
Suringari, *Carr. in Rev. Hortic.* (1866) 338.-Ins. Amboin.
sycomoroides, Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat. iii. 230 = variegata.
Sycomorus, *Linn. Sp. PI.* 1059.—Afr. bor.
sylvatica, Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov. 58=seq. *1*
sylvestris, Hort. Berol. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 587-splendent
symphytifolia, Spreng. Syst. iii. 784-hispida.
syringaefolia, *Kunth* b* *Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 35.—Venezuela.
Taaf, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 219.—Arabia.
Tabing, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 430 = parietalis.
Tadjam, Miq. PI. Jungh. 62 = pisifera.
Taeda, Hort. Berol. ex Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 14 = elastica.
Tampang, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 425.—Sumatra,
tecolutensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 2H9.—Mexic.
tenax, *Blume, Bijdr.* 440.—Java.
tengerensis, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 283 = fistulosa.
tenuiramis, Kunth *Sc* Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846)21 = cuspidata.
terebrata, Hort. Berol. ex Walp. Ann. i. 677— cestrifolia.
terebrata,Unk, Enum. Hort. Berol. ii. 450 = arbutifolia.
terebrata, *Willd. Sp. PI.* iv. 1145.—Ins. Mascar.
terminalioides. Griff. Notul. iv. 393 = infectoria.
terminalis, Heyne, ex Roth, Nov. PL Sp. SM2=gibl>osa.
tematana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 296.—Ins. Temate.
terragena, Coram. ex Bory, Voy. ii. 143=mauritiana.
Tetangis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 432=apiocarpa.
Teysmanniana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 319 =* alutacea.
theophrastoides, *Seem. Fl. Vit.* 252.—Ins. Fiji.
Thomaea, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 299.—Hab.!
Thomsoni, Miq. 1. c. 215-glaberrima.
Thonningiana, *Miq. in Hook. Niger Fl.* 522.—Afr. trop.
Thonningii, b'.ume, Rumphia, ii. 18 = microcarpa.
Thunbergii, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 552=foveolata.
Thwaitesii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 229.—Zeylan.
tiliaefolia. *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xxi. (18S5) 443.—Madag.
timorensis, Decne. in Nouv. Ann. Mus.-Par. iii. (1881) 495=superba.
timorensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 286.—Ins. Timor.
tinctoria, *Forst.f. Prod.* 76.—Ins. SocieL
Tjaela, Hochst. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 558-F. Dekdekena.
Tjakela, Hook, ex Miq. Fl. lad. Bat. i. II. 339-rigida.
Tjakela, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 2b7 = F. Tsjakela.
Tjiela, Miq. 1. c. 286 = F. Tsiela.
Toka, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 219.—Arabia,
tomentosa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 297.—Bras.
tomentosa, *Roxb. ex Willd. Sp. PI.* iv. 1136.—Ind. or.
tomentosa, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 4499 - mysorensis.
Tondana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 805=pisifera.
tonsa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 235.—Ins. Celebes.
Torteana, Miq. 1. c. 292 -= heterophylla.
torulosa. Wall. Cat. n. 4550=chartacea.
toxica, Thunb. Diss. Fie. 14.—toxicaria.
toxicaria. Herb. Madr. ex Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 461-hispida.

PICUS:—
toxicaria, *Linn. Mant.* 305.—Malaya.
trachycarpa, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. (1848) 480 = clavata.
trachycoma, Miq. in Zoll. Syst. Vcrz. Ind. Archip. 92 * glaberrima.
trachyleia, *Bur. in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. xiv. (1872) 263.-N. Caled.
trachyphylla,*Fenil, in Flora,* xxvii. (1844), 811, nomen.—Afr. trop.
trematocarpa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 224 = Decaisnei.
Tremblas, Miq. PI. Jungh. 61, partim-pisifera.
trichocarpa, *Blume, Bijdr.* 448.—Java ; Ins. Timor.
trickocarpa, Herb. Par. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lagd-Bat.iii.28S=glomerata.
trichocarpa, Zipp. ex Miq. 1. c. 2S3 = obtusa.
trichophlebia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 445.—Madag.
trichopoda, *Baker, 1. c. xx.* (1883) 261.—Madag.
trichosphaera. *Baker, I. c*—Madag.
tricolor, *Miq. PI. Jungh.* 53.—Java,
tridentata, *Fensl, in Flora,* xxvii. (1844) 311, nomen.—Afr. trop.
trigona, *Linn.f. Suppl.* 441.—Guian.
trigonata, *Linn. PI. Surin.* n. 145; *Atnoen. Acad.* vi. 265 (- praec!).—Guian.
trilepis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 228" nemoralis.
triloba, Buch.-Ham. ex Wall Cat. n. 4491-hirta.
Trimeni, *King, ex Trim, in Journ. Bot.* xxiii. 1,1885) 242.—Zeylan.
trinervia, Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Ba< iii. 265-glabella.
triplinervis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4533[s] scandens.
tristis, *Kunth V Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1» 19.—Hab.}
trnncata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 262-' Borneo.
truncata, Vahl, Symb. Bot. i. 83 = heterophylla.
trymatocarpa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii- — *trematocarpa.*
Tsiela, *Roxb. Hort. Beng.* 66; *Fl. Ind.* iii. 549-^ Ind. or.
Tsjakela, *Burn. f. Fl. Ind.* 227.—Ind. or.
tuberculata, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. in syn. — fistulosa.
tuberculata, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. » 554-gibbosa.
tuberculata, Wall. Cat. n. 4539 = saemocarpa.
turbinata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298-Mexic.
turbinata, Willd. Sp. PI. iv. 1141 = scabra.
Tweediana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* —Bras.
tylophylla, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 75.-Hab.
ulmifolia, Hort. Bogor. ex Miq. Fl. Ind. Bat i. « = brevicnspis.
ulmifolia, *Lam. Encyc.* ii. 499.—Malaya,
umbellata, *Vahl, Enum.* ii. 182.—Afr. trop.
umbonata, *Xrinw. ex Blume, Bijdr.* 454.—MaW Ind. or.
umbonata, Wall. Cat. n. 4548-silhetensis.
umbrifera, Kunth *Sc* Bonché, Ind. Sem. Hort. (1846) 18-F. Awi-Awi, *Blume.*
umbrosa, Salisb. Prod. 16 = indica.
undulata, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. x». C 133=nervosa.
undulata, *Desf. Tabl.* ed. II. 289, nomen.—Ind.
uniglandulosa, Wall. Cat. n. 4479=rostrata.
umigera, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip- —recurva.
urophylla, *Wall. Cat.* n. 4483.—Reg. Himal.; H?
urticifolia, *Roxb. Hort. Beng.* [103]; *Fl. !*** —Bengal.
vagans, Koxb. 11. cc 66; 5S7 = laevis.
vagans, Wall. Cat. n. 4562 = ramentacea.
valida, Blume, Bijdr. 449 = annulata.
validinervis, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* « —Austral.
Vallis-Chondae, *Delile, in Ann. Sc. Nat. Sir-*1»-(1843) 94.—Abyss.
Varenga, Buch.-Ham. ex Wall. Cat n. 4560 = »
variabilis, *Miq. Fl. Ind. Bat. I* II. 310.—J
variegata, *Blume, Bijdr.* 459.—Reg. Him«-
variolosa, *Lindl. ex Benth. in Hook. Lond-Bot.* i. (1842) 492.—China; Malaya.

vasculosa, *Wall. Cat.* n. 4482.—Bnrma; China j Malays
**asta,* Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 179 =• popnlifolia.
velutina, *Humb. V BonpU ex Willd. Sp. PI.* iv. 11*1. —N. Granat.
fenosa, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. Ui. 461 - F. Tsjakela.
venosa, Wall. Cat n. 4515 D, F-infectoria.
venosa, Willd. Hort. BeroL 86. t. 86 - leucantatoma.
venusta, *Kunth (f Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 16.—Cuba. ... ...
Wnifnga, *Miq. Ann. Mus. Bat. Lugd. Bat. m.* SOO. —Bras.
[illegible]. *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 148.—Nicaragua.
***rrucosa,* Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat iii. 295 = nemoralis.
verrucosa, Vahl, Ennm. ii. 192 = septica.
wrsicolor. *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xiv. (1872) 256.—N. Caled.
*"««, F. Muell. ex Miq. in Journ. Bot. Neerl. (1861) 248=glomerata. ...
»««fo, Desf. Cat Hort. Par. ed. III. 846, 413-pamila.
'estita, *Wall. Cat.* n. 4500.—Ind. or. . .
Vieillardiana, *Bur. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xiv. (.1872) 258.-N. Caled. .. „..„.
-*Uipes,* Miq. in Hook. Lond. joum. Bot. vii. (1848) [illegible]
[illegible], *Bijdr.* 441.—Malaya.
*"*ens,* [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 451 = laurifolia.
•'>«'«, Rcinw. ex Blume, Bijdr. 454 -subulata.
'>*rgata,* Roxb. Hort. Beng. 65; Fl. Ind. in. 580 = Palmata.
virginiana, Hort. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. [illegible]
"i. asm = terruginea.
"'"Ma, Hort. Berol. ex Kunth * Boucbe, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 20-diversifolia. ...
»'«««. Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. m. 2i8 •= Puberula.
wttenais, *Seem. Fl. Vit.* 25O.-Ins. Fiji. ...
'ogehana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* m. 295. ~~Afr. trop.
'o gelii, *Miq. 1. c.* 288.—Afr. trop.
'i V5 [illegible], Wall. Cat. n. 4542 -lepicarpa.
»WM», *Van Houtte, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.* [illegible]
Wa[illegible]iaii, *Miq. 1. c.* 298.-Guatemala. ...
T*"> Roxb - "ort. Beng. 65; Fl. Ind. m. 539 alformis.
[illegible]ebbiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 297.
[illegible]r*'- Caled.
[illegible]tta»a, Benth. Fl. Hongk. 327=glabella.
[illegible]*, Wall. Cat. n. 4540=infeotoria.
[illegible]&«», Benth. Fl. Hongk. 324 = foveolata.
*»tto»rtw«, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. [illegible]ib^S. obtusa.
*»nrtff*j.tta, Steud, ex Miq. in Hook. Lond Journ. Bot. vi\(1847) 554-lutea.
xiphocu[illegible] Soc. xx. [illegible] 260.—
xyloph[illegible]a>a^«« Ca[illegible] »• 4558.-Ma[illegible]a.
yoponen[illegible] Desv •". ^«« & Vol. ^ II. xviii. U42) 81O._Venezuela.
zeyl[illegible]«»«a, Trim. Cat PI. Ceyl. 84 = laevis.
Zol[illegible]*ngeriana, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. m. 264 -obscura.

FIDELIA, Sch.Bip. in Flora, xvii. (1834) 482=Leontodon, Linn. (Compos.).
kalbfussioide>, Sch. Bip. 1. c. - L. hispidulum.
Reboui"a««, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 269.-Alger.
trivial»i Pomel, 1. c. 270=L. hUpidulum.

FIEBERA, Opiz, Seznam, 44 (1852) = Chaerophyllum, Linn. (Umbellif.).
nodosa, Opiz, l. c. = C. nodosum.

FIEDLERIA, Reichb. Nom. 206 (1841); *U.* Fl. Germ. xvi. 42. t. 2". (i««) " Tunioa> icop. (Caryophyll.).
illyrica, Reichb. Ic. pi. Germ. xvi. 42. t. 24« = T. illyrica.

FZBLDIA, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 363. t. 2 (1825). *GESNERACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 1012.
BASILEOPHYTA, F. Muell. First Gen. Rep. 16 (1863).
australis, *A. Cunn. I. c.* 364.—Austral.

FIELDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 424. t 36 (1826)-StftUropuis, Reichb. (Orchid.).
giganiea, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 39 = S. gigantea.
lissochiloides, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 424. t. 36 -Vanda Batemanni.

FIERAUERA, Reichb. Consp. 86 (1828), sphalm. - Fibraurea, Lour. (Menisp.).

FIGARAEA, Viv. PI. Aegypt Dec. 11 (1830) = Neurada, Linn. (Rosac).
aegyptiaca, Viv. 1. c. 12-N. procumbens.

PIGTJIEKEA, Montr, in Mem. Acad. Lyon, x. (1860) 220. *INC. SED.,* Benth. * Hook. f. ii. 29.
fragrans, *Montr. 1. c.*—N. Caled.

FILAGINELLA, Opiz, Seznam, 44 (1852) = Qnev phallum, Linn. (Compos.).
luteo-alba, Opiz, 1. c = G. luteo-album.
nuda, Opiz, 1. c = G. uliginosum.
uliginosa, Opiz, 1. c ^G. uliginosum.

FILAGINOPSIS, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 268 (1841)=Evax, Gaertn. (Compos.).
Drummondi, Torr. ft Gray, 1. c. = E. multicaulis.
multicaulis, Torr. ft Gray, 1. c. = E. multicaulis.

FILAOO, Linn. Syst ed. I (.1735); Sp. PI. ed. I. 927 (1768), ex parte, et auct. plur. *COMPOSITAB,* Benth. ft Hook. f. ii. 299.
ACHARTIERIUM, Bluff & Fingeih. Comp. Fl. Germ. ii. 345 (1825).
GIFOLA, Cass. in Bull. Soc. Philotn. (1819) 142.
IMPIA, Bluff ft Fingeih. Comp. Fl. Germ. ii. 3*2 (1826).
LOGFIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 143.
OGWFA, Cass. 1: u. (1819).
XEROTIUM, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ii. 843 (1825).
abyssinica, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 432.—Abyssin.
acaulis, Krock. Fl. Siles. ii. 468. t. 41=>Gnaphalium supinum.
affinis, Tineo, ex Nym. Consp. 88* - spathulata.
alpestris, Presl, Delic. Prag. 1U0 = arvensis.
angustifolia, Schur, Enum. PI. Transs. 917, Index = arvensis.
apiculata, G. E. Sm. in Phytolog. (1846) 576 -germanica.
arizonica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 652.-Calif.
arvensis, *Linn. Sp. Fl. Add.*—Europ.; As. bor.
arvensis, Wahlenb. Fl. Suec. 560-minima.
caespitosa, Rafin. ex DC.-Prod. vi. 247=germanica.
ealifomica, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vti. (1841) 405.—Am. bor. occ.
Candolleana, ParL in Giom. Tosc. Sc. Med. Fis. Nat. i. (1840) 180=spathulata.
canescens, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 202 = gennanica.
cephaloidea, Link, ex Steud. Nom. ed. II. i. 638 = Gnaphalium japonicum.
Clementei, Willk. in Bot Zeit v. (1847) 869 - mareotica.
cossyrensis, *Tenore, ex Lpjac. in Natural. Sicil,* iv. (1885) 108.—Sicil.
Cupaniana, *Part, in Giom. Tosc. Sc. Med. Fis. Nat.* if (18*0) 182.-Sicil.
dasycarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879 185.—Reg. Argent.
depressa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1S83) 3. —Calif.
desertorum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 46.—Alger.
dichotoma, Gilib. Fl. Lituan. i. 181 •arvensis.
Duriaei, *Coss. ex Lange, in Kjotb. Videnst. Meddel.* (1861) 70.—Afr. bor.
eriocepkala, Gnss. PI. Rar. Sie. t. 69-gennanica.
filiformis. Lam. Fl. Fr. ii. 61-gallica.
fioribunda, Coss. ft Krai, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 247 «• mareotica.
fnseescens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **.—Alger.
gallica, *Linn. Sp. PI. Add.*—Europ.; As. bor.; Oriens.
germanica, *Linn. I. c.* ed. II. 1311.—Europ.; Oriens.
heterantha, Rafin. Giom. ii. fesc. xii. 170; Gnss. Fl. Sic. ii. 864 = Cupaniana.
iodolepis, *Brib. Fl. Norm.* ed. IV. 163.—Gallia.
Jussiaei, Coss. ft Germ, in Ann. Sc. Nat Ser. II. xx. (1843) 284.1.13. fig. C. 1-3-spathulaU.
Kaltenbachii, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 384 = germanica.
Lagopus, Steph. ex Willd. Sp. PI. iii. 1897 = arvensis.
lanuginosa, Requien, ex DC. Prod. vi. 2*7 — germanica.
lasiocarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (187*) 180.—Reg. Argent*
leontopodioides, Willd. Phyt. 12 = Leontopodium sibiricum.
Leontopodium, linn. Sp. PI. 1312 = Leontopodium alpinum.
Leohtopodium, Pall. Reise, iii. 265 = Leontopodium sibiricnm
lutexens, jord. Obs. PI. Crit iii. (18*6) 201 - germanica.
mareotica, *Detile, Fl. Egypt.* 27*.—Aegypt.
maritima, Hill, Veg. Syst iii. 1*1 = Diotis candidissima.
microcephala, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Atl.* 45.—Alger.
micropodioides, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 71.—Hispan.; Ins. Sicil.
minima, *Fries, Novit. Fl. Suec.* 268.—Europ.
mixta, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 262=germanica.
montana, DC. Prod. vi. 248-minima.
montana, Linn.Sp. PI. add. - arvensis.
multicaulis, Lam. Fl. Fr. ii. 69 = Micropus erectus.
neglecta, *DC. Prod.* vi. 248.—Europ.
obovata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 45.—Alger.
paniculata, Gilib. Fl. Lituan. i. 181; Moench, Meth. 577 = arvensis.
parvula, Torr. ft Gray, Fl. N. Am. ii. 482 = califomica.
pilularis, Link, Handb. i. 720 - Gnaphalium uliginosum.
prolifera, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 47.—Alger.
prostrata, DC. in Wight, Contrib. 22 - Gnaphalium pulvinatum.
prostrata, Parl. PI. Nov. 11-ipathulata.
pygmaea. Linn. Sp. PI. 927 = Evax umbellata.
pyramidata, *Linn. Sp. PI.* 1199.—Hispan.; Oriens.
pyramidata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 78 - germanica.
pyramidata, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 194=spathulata.
ramosissima, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1855) 2*
recta, Link, Handb. i. 720=Gnaphalium sylvaticum.
repens, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 164 (an generis 1).—Texas.
robusta, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 45.—Alger.
rotundata, Moench, Meth. 677 •= germanica.
spathulata, *Pred, Delic. Prog.* 99.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
stellata, Lam. Fl. Fr. ii. 68 - Leontopodium alpinum.
aubspicata, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. 11. n. 1057-germanica.
supina. Lam. Fl. Fr. ii. 60->Micropui suplnus.
syhatica, Link, Handb. i. 7'20-Gnaphalium sylvaticum.
tenuifolia, Rrts, Delic. Prag. 101-gallica.
texana, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 16* (nn generis!).—Texas.
uliginosa, Link, Handb. i. 720 - Gnaphalium sylvaticmn.
vulgaris, Lam. Fl. Fr. il. 61 = germanica.

FILAGO, Luefl. in Linn. Gen. ed. V. 397 (176*) = Evax, Gaertn. (Compos.).
acaulis, Linn. Syst. ed. XII. 680 = E. umbellata.
atlantica, Ball, in Journ. Bot xi. (1878) 36* ~ E. Heldreichii.
congesta, Gnss. ex DC. Prod. vi. 248-E. exigua.
discolor, Guss. 1. c. v. 459 = E. discolor.
exigua, Sibth. ft Sm. Fl. Grace, t. 922-E. exigua.
pygmaea, Cav. Ic. i. 23. t. 86 = E. exigua.

FIZiETIA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 822 (1856). *ACAtf-THACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1101.
costulata, *Miq. 1. c.* 828.—Sumatra.

FILICIRNA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 37 (lS36)~Drosera, I.inn.
Jili/ormis, Kafin. 1. c.«R. filiformis.
leionema, Kafin. I. c. = I), leionema.
tenuifolia, Rafin. 1. c.» D. filiformis.

FILICIUM, Thw. Enum. PI. Zcyl. 408 (1864).
• *BURSERACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 325.
PTERIDOPHYLLUM, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 66. t. 1.
decipiens, *Thw. I. c.*—Ind. or.

FILIPENDULA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 145 (1737) **-Spiraea,** Linn. (Kosac).
angustiloba, Maxim, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 250 = S. angustiloba.
hexapetala, Gilib. Fl. Lituan. ii. 237 = S. Filipendula.
kamtsckatica, Maxim, in Act. Hort. Petrop. vi. (187!*) 248 - S . camtschatica.
lobata, Maxim. 1. c. 261 =S lobata.
multijuga, Maxim. 1. c. 247.—Japon.
palmata, Maxim. 1. c. 250 = S. palmata. *Pall*,
pubcscevs, Fourr. in Ann. Soc. Linn. I-yon, N. S. xvi. (1868) 370 - S . Filipendula.
purpurea, Maxim, in Act. Hort. Petiop. vi. (1879) 248—S. palmata, *Thunb*.
Ultnaria. Maxim. 1. c. 251-S. Ulmaria.
vestita, Maxim. 1. c 248 - S . vestita.
vulgar is, Moench, Meih. 663 = S. Filipendula.

FILLAEA, Guill. *Sc Pen.* Fl. Seneg. Tent. i. 242. t. 55 (18S3)=Erythrophloeum, Afzel. (Lcgumin.).
Brucei, Fresen. in Flora, xxii. (1839) 54-. Pterolobium lacerans.
suaveolens, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 242. t. 55 = E. guineense.

FIMBRIARIA, A. Jnss. in St. Hil. Fl.Bras. Mer. iii. 68. t. 173 (1833) = Schwannia, Endi. (Matpig.).
cujabensis, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 189 - S. elegans.
elegans, A. Jnss. in St. Hil. Fl. **Bras. Mer.** iii. 63.1.173 = S. elegans.
Janusioides, A. Joss, in Walp. Rep. v. 353-Janusia amazonica.
muricata, A. Juss. 1. c. 854—Janusia muricftta.

FIMBRILLARIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 31; et in Diet. Sc. Nat. xvii. 54 (lb20) = Conyaa, Linn. (Compos.).
bacekanides, Cass. in Diet. Sc. Nat. xvii. 54 = C. ivaefolia, *Less*,
tubifera, Cass. 1. c. 55 = C. laurifolia.

PIMBEISTEMMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) II. 820. *ASCLEPIADEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 768.
CALLAEOLEPIUM, Karst. Fl. Colutnb. i. 123. t. 165 U858>.
gonoloboides, *Turct. I. c.*—N. Granat.
Warscewiczii, ***Benth. (f Hook.f. ex Hemsl. Biol. Centr.*** *Am. Bot.* it 338.—Guatemala.

FIMBRISTILIS, Ritg. in Marb. Schrift. ii. (1881) 120 = **FimbristyUs,** Vahl (Cyperac).

FIMBRISTIMA, Rafin. Fl.Tellur ii. 46 (1836) **-Aster,** Tonm. (Compos.).
flexuosa, Rafin. 1. c. = A. tenuifolius.
maritima, Rafin. 1. c = A. Tripolium'
sparsijlora, Rafin. 1. c = A. tenuifolius?
squamosa, Rafin. 1. c.—Hab. ?

FIMBRISTYLES, Schult. Mant. ii. 2 (1824) -seq.

FIMBBISTYIiIS, Vahl, Enum. ii. 285 (1806).
CYPERACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1048.
ABILGAARDIA, Vahl, Enum. ii. 296 (1806).
BULBOSTYLIS, Kunth, Enum. PI. ii. 205 (1887).
CAMPYLOSTACHYS, E. Mey. Zwei Pfl. Docnm. 83 **(.1843).**

FIMBBISTYliI8 :—
ECHINOI.YTRUM, Desv. Journ. Bot. i. (180S) 20. t. 1.
GMSSONEA, Presl, Rel. Haenk. i. 183. t. 33 (1828).
IXIA, Hedw. f. Gen. 360 (1806).
MISCHOSPORA, Boeck. in Mora, xliii. (18601 113.
ONCOSTYLIS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 80 (1842).
POGUNUSTYLIS, Bertul. Fl. Iul. i. 312 (1833).
PSEUDO-CYPERUS, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; Syn. PI. Cyp. 108, in nota (1855).
TRICHKLOSTYLIS, Lestib. Ess. Fam. Cyp. 40 (1819).
abbreviate Boeck. in Flora, xli. (1858) 601-junciformis.
abjiciens, Steud. Syn. PI. Cyp. 107 - tetiagona.
abort iva, *Steud. I. c.* 111.—Madag.
acictdaris, K. Br. Prod. 226 = acuminata.
acuminata, F. Muell. Fragm. viii. 274 = rhyticarpa.
acuminata, *Vahl, Enum.* ii. 285.—Ind. or.; China; Austral,
adventitia, *Ces. in Linnaea*, xxxii. (1863) 281. t. 2.—Italia,
aestivalis, *Vahl, Enum.* ii. 288.—As. Austral, et Am. trop.
affinis. Hook. * Arn. Bot. Beech. Voy. 72 -diph>Ila.
albescens, Steud. Syn. PI. Cyp. 107-polytiichoides.
albicans, *Nees, in Wight, Contrib.* 100.—Ind. or.
ambigua, Steud. Syn. PI. Cyp. 117 = diphylla.
amblyphylla, Steud. Syn. PI. Cyp. 116=complanata.
anceps, Steud. I.e. 112 = complanata.
andamandica, Kurz, Andaman Rep. App. B 21 ~ ferniginea.
andongensis, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 158.—Afr. trop.
androgyna, *R. Br. Prod.* 226.—Austral,
angularis, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 289.—Ind. or.
annua, *Link, Handb.* i. 103, in obs.—Europ. aus.tr.
annua, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 95-diphylla.
anomala, *Boeck. in Flora*, xliii. (1860) 240.—Texas.
aphylla, F. Muell. Fragm. ix. 9 =• Arthrostylis aphylla.
aphylla, Steud. Syn. PI. Cyp. 114 » quinquangularis.
aphyllanthoides, ***Welw. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc.*** Ser. II. ii. (1884) 151.—Afr. trop.
apus, S. Wats, in But. Calif, ii. 224- Vahlii.
areoaria, *Nees, in Linnaea*, x. (1836) 146.—Afr. austr.
argentea, *Vahl, Enum.* ii. 294.—Ind. or.
Arnottiana, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 28.—Ind. or.
Arnottii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 348 - tetragons.
arvrnsis, Vahl, Enum. it 291 = ferruginea.
aspera, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 29.—Bras.
aspera, Nees, 1. c. ix. (1834) 29O=diphylla.
asperrima, *Boeck. 1. c.* xxxvii. (1871-73) 40.—Ind. or.; Malaya.
australica, Boeck. 1. c. xxxviii. (1874) 384 = acuminata.
autumnalis, *Roem.* 6" *Schult. Syst.* ii. 97.—Am. bor. et austr.
bahiensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 108.—Bras.
Baldwiniana, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1886) 344-diphylla.
barbata, *Benth. Fl. Austral*, vii. 321.—Austral.
Barteri, *Boeck. in Linnaea*, xxxvii. (1871-73). 83.—Afr. trop.
bengkalensis, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 94 = miliaeea.
biflora, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 893 — cyperoides.
bispicaU, ***Nees*** **b*** ***Meyen, in Wight, Contrib.*** **97.—** Ind. or.; China.
biumbellulata, Boeck. in Flora, xli. (1858) 603 - spathacea.
Boeckeleri, Steud. Syn. PI. Cyp. 113 = quinquangularis, complanata.
Boiviniana, Steud. 1. c. 110 = diphylla.
borbonica, *Steud. 1. c.* 107.—Ins. Borbon.
brachylaena, F. Muell. Fragm. i. 199 = caespitosa.
brachyphylla, J. *Sc* C. Presl, Rel. Haenk. i. 351-junciformis.
brachyphylla, Schult. Mant. iii. 580=diphylla.
breviculmis, Boeck. in Flora, xli. (1858) 643-Vahlii.
brevi/olia, R. Br. Prod. 228 = ferruginea.
brevi/olia, J. Si C. Presl, Rel. Haenk. i. 192 - junciformis.
brevi/olia. Wall, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. Mant ii. 54 =diphylla.
britoides, Sm. ex Nees *Sc* Meyen, in Nov. Act. Nat Cur. xix. Suppl. i. (1843) 78-diphylla.
bromeliaefolia, Spreag. f. Tent. 3 - Diplasia karataefolia.

PIMBBISTYLIS :—
Brownii, Benth. Fl. Austral, vii. 308-leptoclada.
Buergeri, ***Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **ii. 144.—Japon.**
Burchellii, ***Ficalho V Hiern, in Trans. Linn. Soc.*** **Ser.** II. ii. (1881) 28.—Afr. austr.
bursifolia, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 14, 156 - setacea.
caesia, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 315.—Java,
caespitosa, *R. Br. Prod.* 228.—Austral.
calocarpa, Steud. Syn. PI. Cyp. 117 = diphylla.
Candelabrum, Link, Jahrb. i. III. 80-diphylla.
eapillacea, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 111-capillaris.
capillaris, *A. Gray, A/an. Bot.* A/. *U. St.* ed. V. 567-^ Am. bor.
eapitata, *R. Br. Prod.* 228.—Austral.
capitata, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 ***{^Isolepis rigescens).*—Ins. Maurit.**
capitata.ZoW. Syst. Verz. Ind. Archip. ii. 61 = spathacea.
cardiocarpa, *F. Muell. Fragm.* i. 194.—Austral,
cardiocarpa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (18t>4) 154.—Afr. trop.
carinata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290=dichotomy
caripensis, Steud. Syn. PI. Cyp. 112= diphylla.
castanea, *Vahl. Enum.* ii. 292.—Am. bor.
cephalophora, F. Muell. Fragm. i. 196 = capitata.
Cephalotes, *Steud. Syn. PL Cyp.* 120.—Bras.
chaetorrhita, Ksnth, Enum. PI. ii. 240 = junciformis.
chaetorrhiMa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 849, parfun" asperrima.
dliolata, Steud. Syn. PI. Cyp. 109 - spathacea.
cincta, Nees, in Wight, Contrib. 98—diphylla.
cinerea, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 335-~ Madag.
ciitnamometorum, Hance, 1. c. xiii. (1872) 132" fusca.
cinnamometorum, Kunth, Enum. PI. ii. 22!) = cyperoides.
Cioniana, *Savi, in Mem. Valdarnes.* iii. (1842) 98.-ttalia.
circinnata, Steud. Syn. PI. Cyp. 116 = diphylla.
coaretata, *Schwein. in Beck, Fl. U. St.* 428 = capillary
coleotricha, ***Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.*** **»•** 503.—Abyssin.
collina, ***Ridl. in Trans. Linn. Soc.*** **Ser. II. ii. (1884)** 154.—**Afr.** trop.
comata, *Nees, in Wight, Contrib.* 102-squarrosa.
communis, Kunth, Enum. PI. ii. 234—diphylla.
communis. Seem. Fl. Vit. 318 = complanata.
complanata, Benth. Fl. Hongk. 393 = Thomsonii.
complanata, *Link, Hort. Berol.* i. 292.—Amphig. trop-
compressa, *Boeck. in Linnaea*, xxxviii. (1874) 387-" Ind. or.
compressa, Roem. *Sc* Schult Syst. ii. 100 - fermgines-
compressa, ***F. Villar, in Blanco, Ft. Philipp.*** **ea-** *Nov. App.* 307.—Ins. Philipp.
confeita, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 291.—Cuba.
confinis, Steud. Syn. PI. Cyp. 115-diphylla.
congesta, Torr. in Ann. N. York, iii. (1836) 345 " Vahlii.
connectens, Thw. Enum. PI. Zeyl. 849 = complanat*.
conifera, Reichb. ex Kunth, Enum. PI. ii. 206 C ***holepis conifera').*—Guian.**
consanguinea, Kunth, Enum. PI. ii. 228 = complanata.
contexta, *Kunth, I. c.* 245.—Afr. austr.
corynocarya, *F. Muell. Fragm.* i. 197.—Austral,
crassipes, *Boeck. in Flora*, xli. (1858) 602.—Ind. <•
crassipes, *Boeck. in Linnaea*, xxxviii. (1874) »-- Mexic.
curvifolia, Steud. Syn. PI. Cyp. 116-diphylla.
tylindrica, Vahl, Enum. ii. 298 - spadicea.
cylindrocarpa, Kunth, Enum. PI. ii. 222 = tetragon*-
cylindrostachya, Steud. Syn. PI. Cyp. 119 = compl»n»* ferruginea.
cymosa, *R. Br. Prod.* 228.—Austral.; Polynes.
cyperoides, *R. Br. I. c.* 229.—As. et Austral, trop-
cyperoides, ¥. Muell. Fragm. ix. 11 = compl*"* microcarya.
cyrtophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 325 • ferruRine*-
Dallachyi, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, vii. disticha.
dasyphylla, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 327-sericea.
debilis, /'. *Muell. Fragm.* i. 198.—Austral.
debilis, Steud. Syn. PI. Cyp. 109-diphylla.
decora, Nees *Sc* Meyen, in Wight, Contrib. sericea.
decumbent, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 110 -set*

FI MBHIsrsn.IB :—
"enudata, *R. Br. Prod.* 227.—Austral.
"'*pauperata,* R. Br. 1. c.-diphylla.
'''*Pwperata,* Nees, in Linnaea, ix. (1634) 290 - Neesii.
iichotoma, Hook. f. Handb N. Zeal. Fl. 308-velata.
wchotoma, ^aA/,£»«m.ii.287.—Europ.austr.; Afr.bor.
"Wnchsenii, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 505. —China.
ffusula, Stend. Syn. PI. Cyp. 116 = diphylla.
S"ata, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 35.—Ind. or.
Pnylla, *Vahl, Enum.* ii. 2(j».—Amphig. trop. et temp,
"ipsacea, *Benth.* to* *Hook. f. Gen.* Hi. 1049.—Ind. or.; Afr. trop.
"usticha, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 893.-Ind. or.jCochinch.
"ivancata, *Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 14.—l'orto Rico.
Dregeana, Kunth, Enum. 1>1. ii. 282 = diphylla.
Drummondii, Boeck. in Flora, xli. (1«58) 608 = castanea.
Dr""Hondii, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-78) 21 anomala.
«»«««, Nees, in Linnaea, ix. ;1884) 290; x. (1836) 145 = arrosa.
foliata, Stend. Syn. PI. Cyp. 109 = globulosa.
"«*, R. Br. Prod. 227=demidata.
Hongata, R. Br. 1. c. 228 = diphvlla.
Siel>er. ex Presl, in Oken, Isis, xxi. ri828) »<d = pilosa.
*'2**rginata,* Wight, in Wall. Cat. n. 3500 - miliacea.
fcagrostis, *Hance, in Journ. Linn. Soc.* xiii. (1873) t'hina.
gua, Boeck. in Engl. Hot. Jahrb. v. (1884". 506 = Syspiis cerunns.
Boem. & Schult. Syst. 98 ~Ab trop; Austr.
falcata, Knnth, Enum. PI. ii. 289 = inncifonnis.
Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 25—
*Hook ** Arn Bot Betch Vay* 812
Enum. ii. 291.—Amphig. trop.
Boeci i«"*»«w, xxxvii. (1871-73) 32.-
Knnth, Knom P1 »•" 221=-pauciflora.
Thonl ex Kunth, 1. c. 267 = Upocarpha
Steud Svn PI- Cyp. 111-autumnaKs.
Steud. I.e. 113 = miliacea.
Zoll Syst Verz Ind Archip i- 61 „ miliacea.
Ridl. i» Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 155.—Afr. trop.
Link Hort Berol- i. 2S8 = diphylla.
Steud Syn PI- 111 -autumnalis.
Enum. PI. Zeyl. 4S4.-Zeylan.
Prod 228.—Austral.
Steud Svn PI- Cyp. 112-diphylla.
le«d. Nom. ed. II. i. 610 = diphylla.
oides, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58 = semisubterraneus.
i Kunth, Enum. PI. ii. 247-autumnalis.
Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 111-tenera.
%ahl> Enum «• 288-diphylla.
Malaya, *XUHtht Enum pl I* 231.—Ind. or.; China.
Nees-'» Linnaea, ix. (1884) 290 = spathacea.
a> Stend sy- PI- CyP- 118 = diphylla.
ranc'> in Journ. Bot. vi. (1868) 89.-
Kilis, Arn. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 388 -Compressa
S ^ . is . Br. Prod. 227 = dl pylla.
GrimJl'Trim Cat «• *Ctyl.* 102.—Zeylan.
Grim,V on Z- Ste»d- Syn. PI. Cyp. 110=aestivalis.
HaZ4 Boeck, in «««. xliii. (1860) 241 = aestivalis.
Hamil A Wetr. Syst. ii. 161 =junciformis.
H Smith & «• «. 6>^. 119.-PortoRica
^duir, *Boeck in Li*- ("74)894 =
Heynei ^«d» *Boeck in Flora*. xliii. (1860) 244-diphylla.
155-exilii
hirsuta, H ud. Syn. Fl. Cyp. 116 = Psilocarya his a.
hirta, R S- n& Schnli. Syst. ii. 99 - squarrosa.
hirtella, Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 14 = Hamiltonii.

FIMBBISTTZJIS :—
hirtella, Vahl, Knum. ii. 286 = diphylla.
hispidula, Kunth, Enum. PI. ii. 227 =exilis.
Hookeriana, *Boeci. in Linnaea,* xxxvii. (1871-78) 22. —Ind. or.
huillensis, Ridl. in Trans. Linn. Soc Ser. II. ii. (1884) 154 Burchellii.
Humboldtii, J. & C. Tresl, Rel. Haenk. i. 190-Hiphylla.
hybrida, Rich, ex Steud. Nom. ed. II. i. 640 ^ diphylla.
inconstant, Steud. Syn. PI. Cyp. 107=castanea.
iiisignis, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 349.—Zeylan.; Malaya ; China.
Jacobinae, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 11].—Am. anslr.
japmica, Sieb. & Zucc. ex Steud. 1. c. 107 = subbispicata.
Juncea, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (lt71-73) 4-polytrichoides.
inncen, *. *Br. ex Koem. V Schult. Syst.* ii. 102.—Ins. Pacif.
juncifolia,).& C. Presl, Rel. Haenk. i. 190=diphylla.
junciformis, *A'unth, Enum. PI.* ii. 239.—Ind. or. ; Matlag.; Ins. Philipp.
junciformis, Munro, in Seem. Bot. Voy. Herald, 422 = spathacea.
juncocephala, *Boeck. in Flora,* xli. (1858) 600.—Bras.
Kamphoeveneri, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 505.—Ins. Nicobar.
Kielmaieri. Slcxid. Syn. PI. Cyp. 113-complanattt.
A'raussiana, Hnehst. in Flora, xxviii. (1845; 757 = complanata.
Kunthiana, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 151.—Afr trop.
laevissima, Steud. Syn. 1*1. Cyp. 117= spathacea.
Unata, *Roem.* b* *Schult. Syst.* ii. 92.—Venezuela.
latifolia, Knnth, Enum. PI. ii. 239 = junciformis.
laxa, Vahl, Enum. ii. 292 = diphylla.
leiocarpa, Maxim. Prim. Fl. Amur. 801 = aestivalis.
leiocarpa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 144 = schoenoides.
leptoclada. *Benth. Fl. Hongk.* Stl8.—Hongkong; Borneo; Zeylan.
leptostachya, Stend. Syn. PI. Cyp. 118 = automnalis.
lencocolea, *Benth. Fl. Austral,* vii. 304.—Austral,
leucostachya, *Boeci. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 885.—Austral.
leucostachya, *Roen.. br Schult. Syst.* ii. 92.—Venezuela,
Lichtensteiniana, *Hemsl. Bot. Voy. Challenger,* i. 11. 86.—Ins. S. Helena,
limosa, *Poepp. b" A'unth, in Kunth, Enum. PI.* ii. 225.—Am. anstr.
Lioniana, Steud. Syn. PI. Cyp. 112, sphalm. = exilis.
littoralis, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 413-miliacca.
lomentocarpa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 504 = ferruginea.
longiculmis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 110.—Afr. trop.; Madag.
longispica, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 118.—China; Japon.
Lud-wigii, Steud. in Flora, xii. (1829) 189=Scirpus Ludwigii.
macassarensis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 109.—Malaya,
macra, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 150.—Afr. trop.
macrontha, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 888 = monostachya.
macrostachya, *Boeck. I. e.* 386.—Austral,
madagascariensis, *Boeck.* in *Bremen, Abh.* vii. (1880) 88.—Madag.
malaccana, Boeck. in Flora, xli. (1858) 597 = paucirtora.
marginata, Labill. Sort. Austro-Caled. t. 16 = fcmiginea.
marguesana, Steud. Syn. PI. Cyp. 107 = juncea.
mariana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 413 — diphylla, cymosa.
Martii, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-78) 24-= bahiensis.
mauritiana, Nees, ex Kunth, Enum. PI. ii. 235 - diphylla.
mauritiana, Tausch, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = fenuginea.
megastachyc, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 156.—Afr. trop.
melanocephala, *Ridl. L c.* 151.—Afr. trop.
melanostachys, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. 188 = Kleocharis melanostachys.
Mettii, Steud. Syn. PI. Cyp. 117-diphylla.
metostachya, Link, Hort. Berol. i. 290 = diphylla.

FIMBRISTYIiIS :—
Mieheliana, Keichb. Fl. Germ. Excnrs. 75 -- Scirpus Michelianus.
Michrlii, Bubani, Dodecanth. 34 — squarrosa.
microcarya, *F. Muell. Fragm.* i. 200.—Austral.
microstachya, Steud. Syn. PI. Cyp. 113-autumnaIis.
miliacea, *Vahl, Enum.* ii. 287.—Amphig. trop.
mollis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 246.—Reg. Himal.
munandra, *F. Muell. Fragm.* i. 195.—Austral.
monandra, Koem. & Schult. Syst. Mant. ii. S9 -- barbata.
Uonini, Steud. Syn. PI. Cyp. 120 = obtusifolia.
nionostachya, *Hassk. PI. Jan. Rar.* 61.—Amphig. trop.
monticola, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 111.— Ind. or.
mucronata, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-78) 41 •= Bartrri.
mucronata, Vahl, Enum. ii. 293-Scirpus littoralis.
multifolia, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 397 - cymosa.
multistriata, Boeck. in Flora, xliii. (1860) 243 — castanea.
muricatula, Steud. Syn. PI. Cyp. 113-tenera.
muriculata, Benth. ex Hook. Niger Fl. 554 = tenera.
nana, Roth, Nov. PI. Sp. 25 = squarrosa.
neglecta, *Hems!. Bot. Voy. Challenger, i.* II. 86.— Ins. S. Helena.
Neeiii, *Kunth, Enum. PI.* ii. 247, nomen.—Hab.!
Ncilsoni, *F. Muell. Fragm.* ix. 79.—Austral,
nesiotis, *Hemsl. Bot. Voy. Challenger,* i. II. 180.—Ins. S. Trinit.
nigrescens, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 118.—Guiana,
nigro-bronnea, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 434.—Ind. or.
nitidula, Roem. & Schult. Syst. Mant. ii. 81— diphylla.
Novae-Britanniac, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. ;1884; 93.—N. Britannia.
nuda, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 110-aetacea.
nutahiwensis, Steud. Syn. PI. Cyp. 117-diphylla.
nutans, *Vahl, Enum.* ii. 285.—As. ct Austral, trop.
abtusangula, F. Muell. Fragm. i. 198-rara.
obtusifolia, *Kunth, Enum. PI.* ii. 240.—Afr. et Am. trop.
obtusifolia, Nees, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = diphylla.
ochreata, Boeck. in Flora, xli. (1858) 599 - fenuginea.
oligostachys, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 503 -exilis.
oritrephes, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 155.—Afr. trop.
ovalis, Nees, in Wight, Contrib. »8 = diphylla.
oxylepis, Steud. Syn. PI. Cyp. 110-tenera.
oxyrhachis, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 601 — polytrichoides.
oxystachya, *F. Muell. Fragm.* i. 195.—Austral.
pallescens. Link, Hort. Berol. i. 2> 1 -diphylla.
pa/lescens. Nee*, in Wight, Contrib. 101 = dichotomy
parva, *Ridl. in Trans. Linn. Sor.* Ser. II. ii. 1,1884) 163.—Afr. trop.
parviflora, R. Br. Prod. 227 = diphylla.
pauciriora, *R. Br. 1. c.* 22S.—As. ct Austral, trop.
paucispicata, F. Muell. Fragm. i. 197 = ferruginea.
paupcrcula, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 3U6.— Ind. or.
pentaptera, *Kunth, Enum. PI.* ii. 229.—Zeylan.
pentastachya, Boeck. in Flora, xl. (1857) 36 = diphylla.
philippica, Steud. Syn. PI. Cyp. 116-diphylla.
Pierotii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 145.— Ind. or.; Japon.
pilosa, *Vahl, Enum.* ii. 290.—Afr. trop. ,
planieulmis, Boeck. I. c. 391-Arthrostylis aphylla.
planifolia, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 118.—Ins. Carolin.
ptatystachys, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 390 = Schultzii.
podocarpa. *Nees, in Nov. Act. Hat. Cur.* xix. *Supbl.* i. (1843)77.—As. trop.
Pohliana, Steud. Syn. PI. Cyp. 119-diphylla.
polymorpha, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (18091 141-diphylla.
polytrichoides, *R. Br. Prod.* 226.—Geront. trop.
Preslii, Kunth, Enum. PI. ii. 228-exilis.
prolifera, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 120.—Guiana.
propinqua, R. Br. Prod. 227 - squarrosa.
pterigosperma, *R. Br. I. c.* 226.—Austral.
puberula, Vahl, Enum. ii. 289 - diphylla.
pubcsiens, l.mk, Jahrb. i. in. 80.- diphylla.

FIMBBISTYLIS:—
pubigera, Link, Hort. Berol. i. 289=dichotoma.
pulchella, *Trim. Cat. PL Ctyl.* 102.—Zeylan.
pumila, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot ii. (1848) 239 - panciflora.
punctata, A'. *Br. Prod.* 226.—Austral,
pnncticolata, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 90, nomen.—Hab. 1
pusilla, *Hochst. a. A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 506.—Abyssin.
pyenostachya, Hance, in Joorn. Bot. xv. (1877) 338 = nigrobnmnea.
pygmaea, Vahl, Enum. ii. 285-Scirpus cemnus.
quadrangular^, A. Dietr. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 114 — miliacea.
quaternella, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 162.—Afr. trop.
quinquangularis, Benth. Fl. Austral, vii. 317 = corynocarya.
quinquangularis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 229.—Getont. trop.
rara, Benth. Fl. Austral, vii. 316 = salbundia, quinquangularis.
rara, *R. Br. Prod.* 227.—Austral.
retusa, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 349=leptoclada.
Reunionis, Steud. Syn. PI. Cyp. 114-spathacea.
rhyticarya, *F. Muell. Fragm.* i. 215.—Austral.
Riehleana, Steud. Syn. PL Cyp. 114 = castanea.
rigida, *Kunth, Enum. PI.* ii. 231 - spathacea.
rigidula, *Nees, in Wight, Contrib.* 99.—Ind. or.; China.
rigidula, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 150-obtusifolia.
Roxburghii, A. Dietr. Sp. PI. ii. 162 = ferruginea.
Royeniana, Nees, in Wight. Contrib. 99-diphylla.
Rudgeana, Stend. Syn. PI. Cyp. 115—complanata.
tufa, Boeck. in Engl. Bot Jahrb. v. (1884) 93 = rara.
salbundia, *Kunth, Enum. PI.* ii. 280.—Ind. or. et Austral.
salbundia, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 349=pentaptera.
sansibariensis, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 437 - longiculmis.
scaberrima, *Nees, in Wight, Contrib.* 102.—Ind. or.
teabra, Knnth, Ennm. PI. ii. 245-complanata.
scabra, Roem. *Sc* Schult. Syst. Mant. ii. 59 = acuminata.
scabrida, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PL* 32.—Afr. trop.
Scherardi, Bubani, Dodecanth. =diphylla.
Schimperiana, *Boeck. in Flora,* xli. (1858) 600.—Abyssin.
schoenoides, *Vahl, Enum.* ii. 286.—As. et Austral. trop.
Schomburgkiana, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 111.—Guiana.
Schultzii, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 391.—AustraL
Schweinfcrthiana, *Boeck. in Flora,* lxii. (1879) 565.—Afr. trop.
seehelUnsis, Baker, Fl. Maurit. 418-diphylla.
auparanda, *Steud. ex yard, in Mém. Soc. Se. Nat. Cherb.* v. (1857) 299, nomen.—Ins. Marquesas,
sericea, *R. Br. Prod.* 228.—As. et Austral, trop.
serrulata, Vahl, Enum. ii. 285-diphylla.
setecea, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 539.—Malaya j Austral,
setifolia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 607.—Abyssin.
Sieberiana, Knnth, Enum. PI. ii. 237 — ferruginea.
Sieboldi, *Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat.* 118, nomen.—Japon.
similis, Stend. Syn. PI. Cyp. 112 - diphylla.
lolidifolia, *F. Muell. Fragm.* i. 198.—Austral.
sororia, Kunth, Enum. PI. ii. 246-diphylla.
spadicea, *Vahl, Enum.* ii. 294.—Am. austr.
Spartium, *Ham. Prod. PL Ind. Occ.* 14.—Porto Rico.
spathacea, *Roth, Nov. PI. Sp.* 24.—Amphig. hop.
speciosa, Rohde, ex Spreng. Pugill. i. 6 = spadicea.
sphaerocephala, Benth. H. Austral, vii. 306=monandra.
spiralis, *R. Br. Prod.* 226.—Austral.
spirostachya, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, vii. 811 -diphylla.
squamulosa, Hochs. ex Boeck. in T.inntfa, xxxvii. (1871-72) 15-diphylla.
aqnarrosa, *Vahl, Enum.* ii. 289.—Amphig. temp, et trop.

PIMBBISTYMS:-
squarrulosa, *F. Muell. Fragm.* i. 216.—Austral.
starts. Rich, ex Spreng. Pugill. i. 6 = ferruginea.
Stauntoni, *Debeaux b" Franch. in Act. Linn. Soc. Bord.* xxxi. (1877) t. 3; et xxxii. (1878) 38.—China.
sterilis, Nees, in Linnaea, ix. {1834) 290 =• spadicea.
striata, Labill. Sert. Austro-Caled. t. 16. f. 2-diphylla.
stricta, R. Br. Prod. 228= diphylla.
strictior, Stend. Syn. PI. Cyp. 119=Schomburgkiana.
subaphylla, *Boeck. in Flora,* lxii. (1879) 665.—Afr., trop.
subaristata, *Benth. Fl. Austral,* vii. 314.—Austral,
subbispicata, *Nees, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 75.—As. trop.
subbulbosa, Benth. Fl. Austral, vii. 306-schoenoides.
subbulbosa, Boeck. in Flora, xli. (1858) 698=polytrichoides.
sublateralis, Stend. Syn. PI. Cyp. 114=castanea.
subtetrastachya, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-78) 60=nigrubrunnea.
subtristachya, Stend. Syn. PI. Cyp. 109 = diphylla.
sulcata, Roem. & Schult. Syst. Mant. ii. 52 - Eleocharis (ulcata.
tenella, Schult L c. 59.—Bras,
tenera, *Roem. b* Schult. Syst. Mant.* ii. 57.—Geront. trop.
tenuicula, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 386.—Ind. or.
tenuifolia, Thw. Enum. PI. Zeyl. 434-monticola.
tenuis, *Roem. tf Schult. Syst.* ii. 94.—Venezuela.
tenuissima, Steud. Syn. PI. Cyp. 109 =barbate.
tertia, Steud. ex Jard. in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. v. (1857) 299, nomen-diphylla.
tetragona, *R. Br. Prod.* 226.—As. et Austral, trop.
tetragona, A. Dietr. Sp. PI. ii. 152 - miliacea.
tetragona, Reinw. ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Kcinw. 141 =quadrangularis.
textUis, Roxb. in Beatson, St. Hel. Tracts, 309 = Scirpns nodosus.
thermalis, *S. Wats, in Bot. King's Exped.* 860.—Calif.
Thomsoni, *Boeck. in Linnaea,* xxxvii. (1871-78) 37.—Ind. or.; China.
Thonningiana,5«>ci./.c. xxxviii.(1874)395.—Afr.trop.
Thmaitesii, Boeck. 1. c. xxxvii. (1871-73) 34 = insignis.
tomentosa, Vahl, Enum. ii. 290 = diphylla.
Tortesiana, Gandich. in Freyc. Voy. Bot 413 = globulosa.
torta, Kunth, Ennm. PI. ii. 241 — junciformis.
trachycarya, F. Muell. Fragm. i. 199-salbundia.
tricholepis, Miq. FL Ind. Bat. iii. S19=aestivalis.
trifida. *Trim. Cat. PI. Ceyl.* 102.—Zeylan.
trifulca, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 290= diphylla.
trifurca, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 74 = diphylla.
trigastrocarya, *F. Muell. Fragm.* i. 194.—Austral.
trispicata, Steud. Syn. PL Cyp. 107=ferruginea.
tristachya, R. Br. Prod. 227= ferruginea.
tristachya, Nees, ex Knnch, Enum. PI. ii. 235, partim —quinquangularis.
tristachya, *Thw. Enum. PL Zeyl.* 434.—Ind. or.; Afr. trop.
uliginosa, *Hochst. ex Steud. Syn. PL Cyp.* 109.—Ind. or.
umbellaria, Vahl, Enum. ii. 291=globulosa.
umbellata, Schrad. ex Nees, in Mart FL Bras. ii. I. 73 — spadicea.
umbellato-capitata, Steud. Syn. PL Cyp. 120 = obtusifolia.
Urvilleana, *Steud. 1. c.* 112.—Hab.?
Vahlii, *Link, Hort. Berol.* i. 287.—Am. trop.
variabilis, R. Br. Prod. 228-diphylla.
velaia, R. Br. 1. c. 227-squarrosa.
velutina, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 88 = sericea.
verrucosa, J. *Sc* C. PresI, Rel. Haenk. i. 190 = diphylla.
vestita, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* 460.—Mexic.
vestita, Steud. Syn. PL Cyp. 112 = exilis.
vexata, Stend. 1. c. 318 = Ficinia angustifolia.
villosa, Roem. *Sc* Schult Syst. ii. 98 = diphylla.
villosissima, *Steud. Syn. PL Cyp.* 119.—Bras.
Vincentii, Stend. 1. c. 109-Vahlii.
Wightiana, Nees, in Wight, Contrib. 99=spathacea.
Xyridis, *R. Br. Prod.* 226.—Austral.
xyrioides. Am. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 348 - tetragona.

FIMBROLINA, Rafin. Sylva Tellur. 71 (1888) - Bealeria, Linn. (Acanthac).
incarnata, Rafin. 1. e. = B. incamata.

FIMBRYSTYLIS, D. Dietr. Syn. PI. i. 129 (1839) = FJmbristylis, Vahl (Cyperac).

FINCKEA, Klotzsch, in Linnaea, xii (1838) 237 = GriMbaehia, Klotzsch (Ericac).
bruniades, Klotzsch, 1. c. 238 = G. brnniades.
eriocephala, Klotzsch, 1. c - G. eriocephala.

FINDLAYA, Bowdich, Madeira, 258 (1825) (an Primulac. ?).
alba, Bowdich, 1. c.—Ins. Madera.

FINDLAYA, Hook. f. in Benth. & Hook f. Gen. ii. 569 (1876). *VACCINIACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c
apophysata, *Hook./. I. c*—Ind. occ.

FINGALIA, Schrank, in Syll. Ratisb. *I* (1824) 87 - Eleutherantha, Poit. (Compos.).
hexagona, Schrank, 1. c. = E. ovate.

I"Hf GEEHtrTHIA, Nees, ex Lehm. Cat Sem. Hort. Hamb. (18S4!.-Cf. Linnaea, x. (1836) lift. 112. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1182.
LASIOTRICHOS, Lehm. Cat. Sem. Hort. Hamb. (1834). —Cf. Linnaea, x. (1886) Litt 113.
affghanica, *Boiss. Fl. Orient,* v. 569.—Afghan.
africana, Aitch. in Jonm. Linn. Soc. xix. (1882) 193 = affghanica.
africana, *Lehm. Cat. Sem. Hort. Hamb.* (1834).—Afr. austr.
cafiensis, Nees, ex Lehm. 1. c. (1835) =-- africana.
ciliata, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 136 = africana.
sesleriaeformis, *Nees, 1. c.*—Afr. austr.

riNLAYSONIA, Wall. PL As. Rar. ii. 48. t. 1«? '1881). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. "•
GURUA, Buch.-Ham. ex Wight, Contrib. 65 (1884).
obovata, *Wall. 1. c.*—Ind. or.; Malaya.

PINTELMANNIA, Kunth, Ennm. PI. ii. 862 (1837)-*CYPERACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1068.
restioides, *Kunth, 1. c.* 363.—Bras,
setifera, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) S37—Madag.

FIORINIA, Parl. Fl. Ital. i. 232 (1848)-Aira, Linn. (Gramin.).
pulchella, Parl. 1. c. 233-A. intermedia.

FIRENSIA, Scop. Introd. 157 (1777) = Cordla, Linn. (Boragin.)-
fusca, Rafin. Sylva Tellur. 40.—Hab. ?
hirsuta, Rafin. 1. c. = C. nodosa.
lutea, Rafin. 1. c. = C. rotundifolia.

FIRENZIA, DC. Prod. ix. 471 (1845)-praec.

FIRKEA, Rafin. Sylva Tellur. 163 (1888) = ClUBi». Linn. (Gnttif.).
pedunculate, Rafin. 1. c. 164=C. pedicellate »
rosea, Rafin. 1. c. 163=C. rosea.
sessilis, Rafin. 1. c 164=C. sessilis.
venosa, Rafin. 1. c. 168 = C. venosa.

FIRMIANA, Marsigli, in Saggi Padov. i. (1786) 1°6' cum ic. = Stereulia, Linn.
chinensis, Medic, ex Steud. Norn. ed. I. 814, in syn. S. platanifolia.
colorata, R. Br. in Benn. PL Jav. Rar. 2 = S. colorata.
diversi/olia, A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped. i. 185 = S. diversifolia, *Seem.*
heterophylla, Pasq. Cat. Orto Bot Nap. 46 heterophylla.
platanifolia, Schott & Endl. Melet 33 = S. platanifol"1-

FISCHERA, Spreng. PL Umb. Prod. 27 (in Neoe Scb£ Naturf. Ges. Halle, ii.) (1813)=Platy8aoe, B"'"8 (Umbellif.).
caespiiosa, Spreng. I.e.- Azorella caespitosa.
compressa, Spreng. L c (= *Siebera comfrtssaj-* Austral.

FISCHERA:-
lanceolata, Sm. in Rees, Cyclop, xxxiz.n. 1 *{=Siebera Billardiera).—Awtia\.*
lanceolota, Spreng. PI. Umb. Prod. 27=-Trachymene lanceolata.
Hnarifolia, SpreDg. 1. c. = Tracbymene linearis.
linearis, Sm. in Rees, Cycl. SuppL *(=.Siebera linearifolia).*-Austral.
ovata, Sprang. PI. Umb. Prod. 27 =Trachymene ovalis.

FISCHERA, Sw. in M<lm. Soc. Nat Mosc. v. (1817) 14. t l = LeiophyUum, Hedw. f. (Umbellif.).
»«/o«a, Sw. 1. c. 17-L. bnjtifolium.

FISCHEHIA, DC. Cat. Hort. Monsp. 112 (1813). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 750.
acuminata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 600.—Bras,
adenophylla, *Fount, in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 301.—Bras.
ealycina, *Decne. in DC. Prod.* viii. 600.—Am. trap.
nneta, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 421 = Gonolobus cinctus.
havanensis, *Decne. in DC. Prod.* viii. 601.—Cuba,
neterophylla, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 320.—Nicaragua.
Hilanana, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 299.—Bras,
macrocarpa, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 68.
t. 2/6.—Peruv.
Martiana, *Decne. in DC. Prod.* viii. 601.-Nicaragua,
multiflora, *Decne. I. c*—Bras.
Peraviana, *Decne. I. c*—Peruv.
polytncha, *Decne. 1. c.* 600.—Bras.
P/°P^in^qu«, *Decne. I. c*—Bras.
Kiedelii, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 299.—Bras,
rotundifolia, *Decne. in DC. Prod.* viii. 601.—Bras,
scandens, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 112.—Am. trap. ?
«e"ata, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 30L—Bras,
wanmngii, *Fount. 1. c.* 299,-Bras.

FISQUETIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 4, 5 (1844-52) = Pandanu8, Unn.
mauroa, Gandich. 1. c. t. 4 = P. foetidus.
"utoaris, Gaudich. 1. c. t. 6 = P. militaris.
ornata, Gaudich. 1. c. t. 5-P. oraatus.
°»«"«, Gaudich. 1. c. t. 4=P. ovatus.

FISSENIA, R. fir. ex Endl. Gen. Suppl. ii. 76 (1842) sphalm.-Ki88onla, R. Br. (LoasacT).
arf, iqR. Br. ex Presl, Bot. Bemerk. 73 = K. spathulata.
capensis, R. Br. ex Walp. Rep. ii. 228 - K. spathulata.
mentiMdes, R. Br. ex Harv. Thes. Cap. i. 61=K. ^Pathulata.

FISSICALYX, B?n*- »» Journ. Linn. Soc. v. 81) 79. *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i.
F«dleri, *Benth. I. c*—Venezuela.

FISSILIA, *Cotam-* ex J«s- Gen. 260 (1789) = Olax, Linn.
psittacorum 1 BlanCo, Fl> HUp, ed, L M = O. imbricata.
psittacorum > Lam< IUnstr- Gen i- 102> t- 28 = O. scandens.

FISSISTIGMA, Griff- Noinl- »• 7°6 (1854) = Melodorum, Dnn- (Anonac.).
scandens. Griff. 1. c. = M. Griffithii.

FITC (1 2? f' Hoolc- f- >n Hook. Lond. Journ. Bot. iv. f. ii. 505*o " 28< *COMpOSITAE,* Berth. *Sc* Hook.
nutans, *F00*-/- '• '—Int. Elizabeth.
tahitei *Nadeaud< Enum- PU Tahiti,* 49--Ins-
Tan?i.

FITCHIA, Meissn. in Hook. Kew Joum. vii. (1865) 75 = Grevillea, R. Br. (Proteac).

FITTONIA> E-Coem-» Fl- des Serres, xv. (1865) 185. *ACANTHACEAE*> Ben*- * Hook- f-M« U17-
argyroneura1 E- Coem- l- c- xyi- (1865-67) 108.-Peruv.
gigantea, *Li><*««, in Rev. Hortic.* (1869) 186—Peruv.
Verschaffelt u> E-Coem-in Fl-des s,rres>xv- (1862-65) 186.—Peruv.

FITZALANIA, F. Muell. Fragm. iv. 33 (1863) = TJvaria, Linn. (Anonac).
heteropetala, F. Muell. 1. c. 34=U. heteropelala.

FITZOSBAUDIA, F. Muell. Fragm. vi. 1 (1867). *ANONACEAE.*
mitrastigma, /". *Muell. I. c*—Austral.

FITZGERALDIA, F. Muell. in Wing, South Sc. Record (1882), 56, in oba.-Iiyperanthus, R. Br. (Orchid.).
Forrestii, F. Muell. 1. c. - L. Forrestii.

FITZROYA, Hook. f. In Journ. Hort. Soc. vi. (1851) 264. *CONIFEKAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 425.
CUPRESSTELLATA, Senilis, [Nelson] Pinaceae, 60 (1866).
DISELMA, Hook. f. Fl. Tasman. i. 353. t. 98 (1859).
Archeri, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 426.—Tasman.
patagonica, *Hook.f. exLindl. in Journ. Hort. Soc.* vi. (1851) 264.—Reg. Magellan.

FIVA, Steud. Nom. ed. II. i. 642 (1840) = FIWA, J. F. Gmel.=Iiitaea, Lam. (Laurin.).

FIVALDIA, Walp. Rep. ii. 587, sphalm. (1843) = FRIWALDIA, EndL-Microglossa, DC. (Compos.).

FIWA, J. F. Gmel. Syst. 745 (1791)=LitBea, Lam. (Laurin.).
japonica, J. F. Gmel. 1. c. - L. japonica.

FLABELLABIA, Cav. Diss. 486. t. 264 (1790). *MALPIGHIACBAE,* Benth. & Hook. f. i. 259.
paniculata, *Cav. 1. c.*—Afr. trap.

FLACOUBTIA, [Comm.] L'Herit. Stirp. Nov. 69 (1785). *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 128.
RHAMNOPSIS, Keichb. Consp. 188 (1828).
STIGMAHOTA, Lour. Fl. Cochinch. 633 (1790).
amara, Span, in linnaea, xv. (1841) 166 = Xylosma fragrans?
aulakocarpa, *Hassh. in Versl. en Med. Akad. Wetensch.* iv. (1855) 188.—Java.
Benthami, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. vii. (1847) 291=Xylosma jJenthami.
calophylla, Benth. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 446=Xylosma calophyllum.
Campbelliana, *Roxb. Hort. Beng.* 73, nomen—Sumatra,
camptoceras, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 888.—Sumatra.
cataphracta, Blume, Bijdr. 55 = F. Rukam.
cataphracta, *Roxb. ex Willd. Sp. PI.* iv. 830.—Ind. or.; Malaya.
cataphracta, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 11 - Hilsenbergii?
cataphracta, Wall. Cat. n. 6774 C » Xylosma controversum.
celastrina, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 239-Xylosma nitidum.
chinensis, Clos, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. viii. (1867) 219=Xylosma racemosum.
cinerea, H. B. & K. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot i. 67 = Xylosma cinereum.
cordata, *H. B.* 6* *K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 241.—Peruv.
cordi/olia, Roxb. Hort. Beng. 78, nomen=sepiaria.
corollata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 559 = Scolopia rhinanthera.
crenata, Wall. Cat. n. 6679 = Scolopia crenata.
digyna, Benth. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 447 = Xylosma digynum.
edulis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 450 = flavescens.
elegans, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vii. (1847) 294.—N. Granat.
ferox, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 84.- Xylosma longifolium.
flavescens, *Willd. Sp. PI.* iv. 880.—Afr. trop.
fiexuosa, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vii. 239 = Xylosma flexuosum.
Gambecola, *Clos, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 219.—Afr. trop.
heterophylla, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 331.—Java.
Hilsenbergii, *Presl, Bot. Bemerk.* 11.—Ins. Maurit

XTiACOUBTIA :—
hirtiuscula, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 121.—Afr. trop.
inermis, Miq. ex Hook. f. *Sc* Thorns, in Fl. Brit Ind. i. 192—montana, *J. Grah.*
inermis, *Roxb. Hort. Beng.* 73; *Fl. Ind.* 833.—Ins. Molucc.
inermis, Wall. Cat. n. 6673 G, H-Scolopia rhinanthera.
Jangomas, Steud. Nom. ed. I. 343 = cataphracta.
japonica, Hort. ex LavalL Arbor. Segrez. 41 = Idesia polycarpa.
japonica, Walp. Rep. i. 205 = Xylosma racemosa.
lucida, Salisb. Prod. 366 = F. Ramontchi.
mollis, *Hook.f. V Thorns, in Fl. Brit. Ind. i.* 192,—Burma.
montana, *J. Grah. Cat. Bomb. PI.* 10.—Ind. or.
montana, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 166, nomen.—Ins. Timor.
nitida, Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 119 = Xylosma Bfinthami.
nivea, Moon, Cat. Ceyl. PI. 70 = Fluggea Leucopyrus.
obcordata, Roxb. Hort. Beng. [106] ; Fl. Ind. iii. 835 -sepiaria.
obtusa, Hochst. ex Clos, in Ann. Sc. Nat Sér. IV. viii. (1857) 236=Aberia abyssinica.
obtusata, Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss, i. 84 = Aberia abyssinica.
parviflora, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 560-Scolopia Dasyanthera.
Perrottetiana, Clos, in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. viii. (1857) 218 = F. Ramontchi.
prunifolia, Benth. PI. Hartw. 160=Xylosma Benthami.
prunifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 240. t. 654.—N. Granat.
quintuplinervis, Turcz. in Ball. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 553-inermis.
racemosa, *Presl, Rel. Haeni.* ii. 93.—Calif.
racemosa, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 169. t. 88 - Xylosma racemosum.
Ramontchi, *VHirit. Stirp. Nov.* 59. t 80.—Ind. or.; Malaya; Madag.
rhamnoides, Burch. ex DC. Prod. i. 256-Dovyalis zizyphoides.
rotundifolia, *Clos, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. viii. (1857) 218.—Java.
rotundifolia, Roxb. Hort. Beng. 73-sepiaria.
Kukam, *Zoll. V Mor. Syst. Vert. Zoll.* 33.—Malaya.
sapida, Roxb. PI. Corom. i. 49. t. 69 = F. Ramontchi.
sapida. Wall. Cat. n. 6675=Scolopia crenata.
sepiaria, *Roxb. PI. Corom.* i. 48. t. 68.—Ind. or.; Malaya,
spiculifera, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. vii. (1847) 292 (spiclifera).—N. Granat
stigmarota, Wall. Cat. n. 6678, partim - Scolopia Roxburghii.
sumatrana, *Planch, ex Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 192.—Burma; Malaya.
timorensis, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 166 = Xylosma fragrans 1
tomentella, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 105.—Sumatra.
tomentosa, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 93.—Am. trop.
velutina, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. vii. (1847) 295.—N. Granat
Vogelii, *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* 220.—Afr. trop.
Wightiana, Wall. Cat. n. 6672 (Scepae sp.).—Ind. or.

FLACURTIA, Juss. Gen. 291 (1789)=Plaoourtia, Comm. (Bixin.).

FLADERMANNIA, Endl. Gen. Suppl. 1. 1400 (1841)-FALDERMANNIA, Trautv. - Zizdphora, Linn. (Rubiac).

FLAGELLARIA, Linn. Diss. Dass. 13 (1747); Amoen. Acad. i. 396 (1749). *FLAGELLARIEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 860.
angustifolia, *Wall. Cat.* n. 6199.—Geront. trop.
aranriflora, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art iv. 16 *{= Drymispermum urensX).*—Java.
ascendens, *Seem. Fl. Vit.* 315.—Ins. Fiji,
elegans, *Seem. I. c*—Ins. Fiji,
gigantea, *Hook.f. in Hook. Ic. PI.* 1.1429.—Ins. Fiji.

FLUGGEA:—
sinensis, Baill. Etud. Gén. Enph. 592, nomen-microcarpa.
suffruticosa, Baill. 1. c.=Securinega nuniflora.
trichogynis, Baill. 1. c 593-Securinega trichogynis.
virosa, Baill. 1. c=microcarpa.
virosa, Bach.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7928 B-microcarpa.
virosa, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 286 = F. Leucopyrus.
Wallichiana, Baill. Etud. Gén. Eoph. 592 = F. Leucopynis.
xerocarpa, A. Juss. Tent Euph. 106=F. Leucopynis.

FLUMINIA, Fries, Summa Veg. Scand. 247 (1846) = Graphephorum, Desv. (Gramin.).
arundinacea, Fries, 1. c.=G. arundinaceum.

FLUNDULA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 96 (1836) = Hosaokia, Dougl. (Legumin.).
comosa, Rafin. L c—H. bicolor.

FLUSTULA, Rafin. Sylva Tellur. 116 (1838) = Vernonia, Schreb. (Compos.).
tomentosa, Rafin. 1. c. - V. arborea.

FLUVIALIS, Micb. ex Adans. Fam. ii. 472 (1763)-Naias, Linn.
fiexilis. Vets. Syn. ii. B30=N. fleiilis.
indica, Pen. 1. c.=N. indica.
minor, Pers. 1. c. = N. fleiilis.

FOCXEA, Endl. Iconog. t. 91 (1838) ; Nov. Stirp. Dec. 17 (1839). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 778.
CHYMOCORMUS, Harv. in Hook. Lond Joum. Bot. i. (1842) 23.
capensis, *Endl. II. cc.*—Afr. austr.
glabra, *Decne. in DC. Prod.* viii. 545.—Afr. austr.

FOENTCUIiUM, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1736). *UMBELLIFERAE*, Benth. *8c* Hook. *i. i.* 902.
OZODIA, Wight & Am. Prod. 375 (1884).
atoricum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3-vulgare.
capense, DC. Prod. iv. 142 = Carum capense.
capillaceum, Gilib. Fl. Litaan. ii. 40=vnlgare.
Carvi, Link, Enum. Hort. Berol. i. 284 = Carum Carvi.
divaricatum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. l. 358 - piperitum.
dulce, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2=vulgare.
Kraussianum, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 532-Pimpinella caffra.
luteum, *Fisch. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 247, nomen. —Persia.
multiradiatum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 38 (certe non Foeniculum).—As. Min.
officinale, All. Fl. Pedem. ii. 25-vulgare.
Panmorium, DC. Prod. iv. 142-vulgare.
peucedanoides, Benth. & Hook. f. Gen. i. 9«2=Silaus carrifolius.
piperitum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 187.—Europ. austr.
rigidum, Brot. ex Stead. Norn. ed. II. i. 643 = vulgare.
segetum, Presl, Fl. Sic. Prod. i. 26 = Ridolphia segetum.
tortuosum, *Benth.* b**Hook./. Gen.* i. 902.—Ins. Canar.
virescens, Benth. & Hook. f. Gen. i. 902 = Silaus carvifolius.
vulgare, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 1.—Europ.

FOENUM-GRAECUM, [Tonra.] Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 268 (1745)-TrlgoneUa, Linn. (Legum.).
officinale, Moench, Meth. 142 = T. Foenum-graecum.
prostratum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. £>. xvi. (1868) 860 =T. prostrata.
sativum, Medic, in Vorlcs. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 883 = T. Foenum-graecum.

FOERSTERIA, Scop. Introd. 98 (1777)=Breynia, Forst. (Euphorb.).

FOETATAXUS, Senilis [Nelson], Pinaceae, 167 (1866) = Torreya, Arn. (Conif.).
montana, [Nelson,] 1. c - T. taxifolia.
Myristica, [Nelson,] 1. c. 168 - T. californica.
nucifera, [Nelson,] 1. c.=T. nucifera.
taxifolia, C Koch, Dendrol. ii. II. 100 = T. taxifolia.

FOETIDIA, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 467 (1786). *MYRTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 724.
borbonica, J. F. GmeL Syst. 798—manritiana.
manritiana, *Lam. Encyc.* ii. 457; *Illustr.* t. 419.—Ins. Maurit.
obliqna, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 146.—Madag.
retusa, *Blume, I. c.* 144.—Madag.

FOLIANTHERA, Rafin. Sylva Teller. 120 (1838) = Stryphnodendron, Mart. (Legumin.).
guianensis, Rafin. 1. c. = S. gaianense.

FOLIS.Dulac, FL Hautes-Pyr.'190 (1867)«Teesdalia, R. Br. (Crucif.).
nudicaulis, Dulac, 1. c.=T. nudicanlis.

FOLLICULIGERA.Pasq.Cat. Ort. Bot. Nap. 46 (1867) = Trigonella, Linn. (Legumin.).
coerulea, Pasq. 1. c.=T. coerulea.
graveolens, Pasq. 1. c. 47=T. Foenum-graecum.
procumbens, Pasq. 1. c.=T. prostrata.

FULOMFIS, Rafin. Sylva Tellur. 97 (1838) = Miconia, Ruiz & Pair. (Melastom.).
fragilis, Rafin. Lc.=M. Acinodendrum.

FOMETICA, Rafin. Sylva Tellur. 76 (1888)=Heritiera, Dryand. (Sterculiac).
punctata, Rafin. L c. — H. Fomes.

FONKIA, Phil, in Linnaea, xxx. (1869-60) 198 - Gratiola, Rupp. (Scrophularin.).
uliginosa, Phil. 1. c. 199 = G. peruvianat

FONNA, Adans. Fam. ii. 214 (1763)-Phlox, linn. (Polemon.).

FONTAXNEA, Heckel, Thèse Inaug. Montpell. (1870). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 301.
Pancheri, *Heckel, 1. c*—N. Caled.

FONTANELLA, Kluk, ex Bess. Prim. Fl. Galic ii. 863 (1808)-lBopyrum, Linn. (Ranunc).
tertiaria, Kink, ex Bess. 1. c.-I. thahctroides.

FONTAKESIA, Labill. PI. Syr. Dec. i. 9.11 (1791). *OLEACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 676.
DESFONTAINESIA, Hoflmgg. Ven. Pfl. 56 (1824).
chinensis, *Hance, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 186.—China.
Fortune,, Carr. in Rev. Hortic. *Sir.* IV. viii. (1869) 48 = phillyraeoides.
phillyraeoides, *Labill. PI. Syr. Dei.* i. 9. t. 1.—Sicil.; As. Min.; Syria.

FONTENELLA, Walp. Rep. i. 524 (1842) -seq.

FONTENELLEA, St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xvii. (1842) 141. t. 7<=QuiIlaja, Molina (Rosac).
brasiliensis, St. Hil. *8c* Tul. 1. c. = Q. Sellowiana.

FOQUIERA, HemsL Biol. Centr. Am. Bot. i. 81 (1879) - Pouquieria, H. B. & K. (Tamarisc.).

FORBESIA, Eckl. Verz.4(1827) = Curoullgo, Gaeitn. (Amaryllid.).
angustifolia, Eckl. 1. c. 6-C. plicata.
plicata, Eckl. L c 4=C. plicata.

POBCHHAMMEBIA, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 98. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook./.iii. 278.
apiocarpa, *Radlk. Meth. Bot. Syst.* (1883) 54.—Mexic.
pallida, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 94. —Mexic

FORESTLEKA, Poir. Encyc. Suppl. i. 132 (1810); ii. 664 (1811). *OLEACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 676.
ADELIA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 223. t 48 (1803).
BIGELOVIA, Sm. in Rees, Cycl. xxxix (1819).
BORYA, Willd. Sp. PI. iv. 711 (1805).
PIPTOLEPIS, Benth. PL Hartw. 29 (1840).
acuminata, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 664.—Am. bor.
angustifolia, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 168.—Am. bor. occ.
autumnalis, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 7 = ligustrina.

POHE8TIEKA:—
cassinoides, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 665.—Ind. occ.
cuneifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 91 -ligustrina ?
disticha, Rafin. I.e. 90=Bnckleya distichophylla.
glauca, Rafin. 1. c.=ligustrina?
heterophyla, Rafin. L c. = Buckleya distichophylla.
Jacquiniana, Didr. ex Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1858).—Cf. Linnaea, xxix. (1867-58) 737-porulosa.
ligustrina, A. Gray, Man. N. U. St. Bot. ed. II. 858 — acuminata.
ligustrina, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 664.—Am. bor.
neo-mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 63.—N. Mexic.
nitida, Rafin. New Fl. Am. iii. 91=acuminata.
phillyreoides, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 167.—Mexic.
ponilosa, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 664.—Ind. occ.
prinoides, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 92.—Am. bor.
pubescens, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) m=lignstrina.
reticulata, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 168.—Texas,
retusa, *Rafin. New Fl. Am.* iii. 92.—Am. bor.
rhamnifolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 169.—Cuba,
sphaerocarpa, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 168.—Texas.
verrucosa, Rafin. New Fl. Am. iii. 90 = ligustrina ?

FORFICAHXA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 362 (1838,). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 631.
graminifolia, *Lindl. 1. c.*—Afr. austr.

FORGEROUXA, Neck. Elem. ii. 124 (1790) = Rhamnus, Linn.
repens, Rafin. Sylva Tellur. 32 = R. pumila.

FORGEROUXIA, Steud. Norn. ed. II. i. 643 (1840) = praec.

FORGERUXIA, Rafin. Sylva Tellur. 32 (18S8)-prarc.

FORGESIA, Comm. ex Juss. Gen. 164 (1789). *SAXIFRAGE AE.* Bentb. *8c* Hook. f. i. 648.
DEFFORGIA, Lam. Illustr. ii. 71.1.125 (1793).
borbonica, Pers. Syn. i. 194 » racemosa.
racemosa, *J. F. Gmel. Syst.* 368.—Ins. Borbon.

FORGETINA, Bocquill. ex Baill. Adansonia, vii. (1866; 49 =81oanea, Linn. (Tiliac).
guianensis, BocquilL ex Baill. 1. c.=S. cuneifolia?

FORNASINIA, Bertol. Misc. Bot. viii. 18.1.1 (1849) = MlUetia, Wight *8c* Arn. (Legumin.).
ebenifera, Bertol. 1. c. 19.—Abyssin.

FORNELIA, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 179, sphalm. = TORNELIA, Gutier.= Monatera, Adans. (Aroid.).

FORNEA, Steud. Norn. ed. II. i. 644 (1840) = seq.

FORNEUM, Adans. Fam. ii. 112 (1763) - Andryala, Linn. (Compos.).

FORNICARIA, Rafin. Sylva Tellur. 116 (1838) = Salmea, DC. (Compos.).
scandens, Rafin. I. c - S. Eupatoria.

FORNICIUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 98; et in Diet. Sc. Nat. xvii. 249 (1820) - Centaurea, Linn. (Compos.).
rhaponticoides, Cass. 11. cc. 93 ; 250-C. salina.

FORRESTIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, II. (1806) 422-Ceanothus, Linn. (Rhamn.)
thyrsoides, Rafin. l.c.=C. thyrsiflorus J

FORRESTIA, A. Rich. Sert. Astral. 1. t. 1 (1834)-*COMMELINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 850.
AMISCHOTOLYPE, Hassk. in Flora, xlvi. (1863) 3«1-glabrata, *Hassk. in Flora*, xlvii. (1864) 68O.-Ind. or.
Griffithii, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* iii. 23«—Malacca.
hispida, Hook. Bot. Mag. t. 5425 = Hookeri.
hispida,i4. *Rich. Sert. Astrol.* 2.11.—N. Guinea.
Hookeri, *Hassk. in Flora*, xlvii. (1864) 62K.—Ind. or.
marginata, *Hassk. 1. c.* 630.—Java,
mollis, *Hassk. 1. c.* 628.—Singapore.
nigricans, Steud. Nom. ed. II. i. 644=hispida.
rostrata, Hassk. in Flora, xlvii. (1864) 631 = ginata.

FORSAKHLIA, Ball, in Jonrn. Linn. Soe. xvi. 288 (1877), err. typ.-Forukohlea, Linn. (Urtic).

FORSGARDIA, VelL Fl. Flum. 152 (1825); iv. t. 18= Combretum, Linn.
loevis, VeiL 11. cc.—Bras.

FO*SHOHLEA, Batsch, Tab. t. 178 (1802), sphalm.; ^SKAELEA, Scop. Introd. 251 (1771); FORS-[illegible]ILEA, Agardh, Aphor. 204 (1825); FORS-KÅ
(1836-50); FORSKALEA, Juss. Gen. 408 (1789); FORSKOEHLEA, Reich. Gen. 238 (1778); FORSKOELJiA, Brongn. Ennm. Gen. 99 (1848)=seq.

FORSKOHLEA, Linn. Mant. i. 78 (1767). *URTICACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 893.
CAIDBEJA, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 83 (1775).
•nguslifolia, *RetB. Obs.* Hi. 81.—Ins. Teneriff.
=jndida, *Linn./. Suppl.* 245.—A/r. anstr.
^*ossoniana*, Webb, Otia Hisp. 49. t. 45=tenacissima.
*J"*ticosa*, Willd. Ennm. Hort. Berol. 950-angnstifolia.
'"*tifoli**. Retz. Obs. iii. 81-tenacissima.
Procndifolia, *Webb, in Hook. Niger Fl.* i. 179.—Afr. trop.
««4r(2) Retz. Obs. iii. 81=Candida.
"Macissima, *Linn. Mant.* 72.—Geront. trop.
**rttcoides*, Wight, It 11982 = Droguetia diffusa.
*"™ij, *Ehrenb. ex Desf. Cat. Hort. Par.* ed. IIL 347.—Arab.

FoS?K0LEA, *Una*- Di's-Opob. (1764); FORSKOLIA, J'ght, Ic. vi. 11 (1853); FORSSKALEA, Linn. Amoen. Acad. vii. 72 (1769)=praec.

FORSTERA, Linn. f. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. iii. (1780) 184. t. 9. *STYLIDIEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 535.
ATHECIA, Gaertn. Frnct. i. 141 (1788).
*QRSTERu, Neck. Elem.iii. 184 (1790).
ar™«'«/o««a, Hombr. *Sc* Jacquinot, Bot. Voy. Astral. hM-fZ (Dicot. Phan.). '• 16-Phyllachne davigera.
K?i••..!f?lia> Hook- *to- PI-* r. 851.—Ins. Tasman.
fbdwillu, *Hook./. Fl. N. Zel.* i. 165.-N. Zel.
"*amgera*. Hook. f. Fl. Antarct 38. t. 28-Phyllachne clavigera.
""?> Gaertn. Frnct. j. 141. t. 28. f. 6 =sedifolia.
?**/«««, WiUd. Sp. PI. iv. 148 = Phyllachne uliginosa.
*«. *Linn./. Suppl.* 407.-N. Zel.
tenella, *Hook. /jn. W.Zel.* i. 154.-N. Zel.
uligi nosa, Hombr. & Jacquinot, Bot. Voy. Astrol. et Zel. (Dicot. Phan.) t. 16 = Phyllachne uliginosa.

FORSTERIA, Neck. Elem. «': 184 (1790)=Porstera, Linn. f. (Stylid.).

FORSTERIA [illegible] -FOERSTERIA-»» aicuu. nom. ea. i. o»* \xooxj -*
F[illegible] i Scop.-Breynia, Forst. (Euphorb.).
F[illegible]f,?a^BONIA, G F. W. Mey. Prim. FL Esseq. 138
[illegible] APo*CYNACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 710.
[illegible]A, Mart, ex Reichb. Consp. 134 (1828).
THYESANTHUS, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 245.
Acouci, *A. DC.*.n Z)C. 7V«*. viii. 439,-Gman.
acutifolia, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 99.—Bras.
adenobasis, *Af*ue(L A rg., ,» £f-B naea, XVL (1859-60) 412.—Guian.
affinis, it [illegible] Mart m BraS -Bral.
A!Sv[illegible]i Griseb- ^ *Brit. W. Ind.* 412.-Ind. occ.
B^ [illegible] rgnMart.Fl. Bras. vi. I. 108.-Benthamiana, *Muell.* Ar S- '• *• 106.-BTU.
bracteata, *Mu*fB Ar «- ' '—Bras.
brasiliensis, *A*- flC- *in DC. Pnd*- viii «6.-Bras.
corylifolia. *Griseb. Cat. PI. Cub.* 172.^-Cuba.
rf#UD<sa .G.A. *W.Mey.Prim. Fl. Esseq.* 134.-Guian.
*ZZ!S, A, D C -'" DC. Prod. viii. 487=Trachelodiosspermum difforme.
41 Gui.....
divaricata. *Miers*, Apocyn. *S. Am.* 247.—Bras.
embelioides, *Muell. Arg. in Mart. Ft. Bras.* vi. I. 9,"-—Bras.
floribund«. *0. F. W. Mey. Prim. Ft. Esseq.* 136, in obs. > *Oecne. in DC. Prod.* viii. 487.—Jamaic.

FORSTEBONIA:-
floribunda, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. L 96.—Bras.
Gardneri, *Muell. Arg. I. e.* 100.—Bras,
glabreseens, *Muell. Arg. 1. c.* 102.—Bras,
gracilis, *Muell. Arg. 1. c.* 101, in nota.—Guian.
gnyanensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 414.-Guian.
lagoënsis, *Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 108.—Bras.
laurifolia. *A. DC. in DC. Prod.* viii. 488.—Am. trop.
leptocarpa, A. DC. 1. c.=brasiliensis.
linearis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. 1.107.—Bras.
Luschnathii, *Muell. Arg. 1. c.* 98__Bras.
macrophylla, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 411.—Guian.
meridionalis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 98.—Bras.
minstiflora, *Muell. Arg. I. c.* 99.—Bras,
montana, *Muell. Arg. I. c.* 101.—Bras,
multinervia, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 437.—Bras,
obtusiloba, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxx. (185U-60) 418.—Guian.
ovalifolia, *Miers, Apocyn. S. Am.* 248.—Ind. occ
Pavonii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 488.—Am. trop. ?
pilosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. *M.*—Bras.
protensa, *Miers, Apocyn. S. Am.* 246.—Bras,
pubescens, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 436.—Bras,
refracta, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 97.—Bras.
Riedelii, *Muell. Arg. I. c.* 103.—Bras,
rotundinscula, *Miers, Apocyn. S. Am.* 248.—Bras,
rufa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 100.—Bras.
Schombnrgkii, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 438.—Guian.
Sellowii, *Muell. Arg. in Mart. Ft. Bras.* vi. 1. 101.—Bras.
spicata, *G. F. W.Mey. Prim.Fl. Esseq.* 183.—Guian.
thyreoidea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. I. 105.—Bras.

FORSTEROPSIS, Sond. in Lehm. PI. Preiss. i. 303 (1845)-StyUdiiur., Svr.
Preissii, Sond. L c = S. Preissii.

FORSYTHIA, Vahl, Enum. i. 89 (1805). *OLEACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 675.
RANGIUM, JUSS. in Diet Sc. Nat xxiv. 200 (1822).
Fortuni, Lindl. in Gard.Chron. (1864) 412 = snspensa.
Mala-Elengi, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 = Linooiera cotinifolia.
suspensa, *Vahl, Enum.* i. 89.—Japon.; China,
viridissima, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* i. (1846) 226.-China.

FORSYTHIA, Walt. Fl. Carol. 154 (1788)=Decumaria, Linn. (Saxifrag.).
scandens, Walt 1. c. = D. barbara.

FOR8YTHIOP8I8, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1888) 218. *ACANTHACEAE*.
Baroni, *Baker, I. c.* 219.—Madag.

I'ORTUNAEA, Lindl. in Joum. Hort. Soc. i. (1846) 150 = Piatyoarya, Sieb. *Sc* Zucc. (Jugland.).
chinensis, Lindl. 1. c.-P. strobilacea.

FOUTUNEA, Poit. in Rev. Hortic. Sér. II. v. (1846) 282 = praec.

FORTlTjrMTA, Shuttl. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 379; xvii. (1842) 177. *CRUC1-FERAE*, Bcnlh. *Sc* Hook f. i. 100.
Aucheri, *Shuttl. II. cc* 379, 178.—Persia.
Bungei, *Boiss. Fl. Orient*, i. 402.—Persia; Afghan.
Garcini, *Shuttl. ex Boiss. inAnn.Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 178.—Persia.

FORYSTHIA, French. *Sc* Sav. Enum. PI. Jap. L 812 (1875), sphalm.-Forsythia, Vahl (Oleac.).

FOSCARENA, Hedw.f. Gen. 368 (1808)-seq.

FOSCARENIA, Veil, ex Vand. Fl. Lusit. 7 (1788); in Roem. Script 78 (1796) = Bandla, Honst. (Rubiac.).
spinosa, Roem. *Sc* Schult Syst. iii. 99«-R. armata.

FOSSELINA, Medic, in Usteri, Ann. Bot viii. (1794) 37-seq.

FOSSELINIA, Scop. Introd. 318 (1777) = Clypeola, Linn. (Crncif.).
Jonthlaspi, All. Fl. Pedem. i. 246 = C. Jonthlaspi.

FOTERGHILLIA, Dum. Anal. Fam. 35 (1829), sphalm-=Fothergilla, Murr. (Hamamel.).

FOTHERGILLA, Aubl. PI. Gui. i. 440. t. 176 (1775)-Miconia, Ruiz *Sc* Pav. (Melast).
mirabilis, Aubl. 1. c. = M. Fothergilla.

FOTHEROILLA, Mnrr. Syst. Veg. ed. XIII. 418 (1774). *HAMAMELIDEAE*, Benth. & Hook. *I.* i. 666.
ABROFHA£S, Rafin. Sylva Tellnr. 99 (J888).
alnifolia, Linn. *f.* Suppl. 267 — Gardeni.
Gardeni, *Murr. Syst. Veg.* ed. XIII. 418.—Am. bor.
involucrata, Falc. in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 18-Parrottia Jacquemontiana.
latifolia, *Prite. Ic. Ind. Bot. Suppl.* 125 (ic. inert.) (Quid i).
major, Lodd. Bot. Cab. 1.1520-Gardeni.

FOTHERGILLIA, Spreng. Gen. i. 445 (1830) - praec.

FOUGERIA, Moeach, Meth. Suppl. 243 (1802) - Baltixnora, Linn, (Compos.).
tetragona, Moench, 1. c. = B. recta.

FOUGEROUXIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. llv. 461 (1829) = Baltlmora, Linn. (Compos.).
alba, DC. Prod. v. 610 = B. recta.
recta, DC. 1. c.=B. recta.

FOUHA, Pomel, Mat Fl. Atl. 2 (1860) = Colohlcum, Toarn. (Liliac).
bulbecodioides, Pomel, 1. c.— C. montanum.

FOUILLOYA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 950 (1883), sphalm.—seq.

FOULLIOYA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t 26 (1844!) —Fandanus, Linn.
graminifolia, Hort. ex Wendl. Ind. Palm. Cydanth. Pand. Cycad. (1854) 47=P. pygmaeus.
maritima, Gaudich. Bot. Voy. Bomite, t. 26 = P. Vandermeeschi.
racemosa, Gaudich. 1. c. = P. racemosns.

FOUQUIERA, Spreng. Syst ii. 568 (1825) -seq.

FOTJQ.TJIERIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 81. t. 527 (1823). *TAMARISCINEAE*, Benth. *Sc* Hook, f. i. 161.
BRONNIA, H. B. *SC* K. NOV. Gen. et Sp. vi. 83. t. 528 (1823).
PHUETAERIA, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1861) 283.
formosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 88. t. 527.—Mexic.
spinosa, *Tort, in Emory, Notes Mil. Reconnois.* 147. t. 8.—Mexic
splendens, *Engelm. in Wisliz. Tour North Mexic.* 98. '-N. Mexic.

FOURCROEA, Haw. Suppl. PI. Sncc. 42 (1819)-Furcraea, Vent. (Amaryllid.).

FOURCROYA, 6preng. Anleitii. I. 238 (1817)-praec.

FOVEOLARIA, Meissn. PI. Gen. Comm. 28 (1836)-Sloanea, Linn. (Tiliac).

FOVHOTiARIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. 67. t. 9 (1794), partim; A. DC. in DC. Prod. viii. 271 '1844). *STYRACEAE*, [Benth. *Sc* Hook. f. ii. 669, 670].
cordata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 99-Styrax cordatum.
crocea, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iv. t. 393«Styrax oblongum.
ferruginea, *Ruit & Pav. Syst. Veg.* 100.—Peruv.
oblonga, Ruiz ft Pav. 1. c. = Styrax oblongum, Pavonii.
ovata, Ruiz & Pav. 1. c-Styrax ovatum.

FOXIA. Parl. Nuov. Gen. e Sp. 17 (1864)=Hyacinthus, Toum. (Liliac).
spicata, Parl. 1. c 18 = H. spicatus.

KRACASTORA. Adans. Far*, ii. 605 (1763) = Sideritis, Tourn. (LabiaL).

FRADINIA, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 51 *.1874) = Kecomisohiu, Coss. (Compos.).
Ceilini, Pomel. 1. c. 52 = M. Geslioi.
pedunculata, Pomel, 1. c. 61 — Anacydus pedunculatus.

KRAGA, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 287 (1813) - Potentilla, Linn. (Rosac).
micrantha, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1863) 370-= P. Fragariastrum.
sterilis, Lapcyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 287 = P. Fragariastrum.
Vaillantii, Lapeyr. 1. c. — P. splendens.

FBAOABIA, [Tonra.] Linn. Syit. ed. I (1735).
ROSACEAE, Beniñ. & Hook. f. i. 620.
DUCHESNKA, Sm. in Trans Linn. Soc. x. (1811) 372.
ainormis, Tratt. Rosac. Monog. iii. 166 = vesca.
abortiva, Dnchesne, in Lam. Kncyc. ii. 534 = collina.
alba, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 19; ed. II. 78 -Potentilla alba.
aliena, *Weihe, in Flora,* xi. (1828) 80.—Hab. t
alpina, Stead. Norn. ed. I. 344 = vesca.
Ananassa, Duchesne, Hist. Nat. Frais. 190 - chiloëns is, grandiflora.
Anserina, Crantz, Stirp. Aostr. ed. I. fasc. ii. 9 ; ed. II. 71 - Potentilla Anserina.
argentea, Crantz, Inst. ii. 177 —Potentilla argentea.
argute, lindl. in Wall. Cat. n. 1237 = indica.
aurea, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 17 ; ed. II. 77 - Potentilla aurea.
hi/era, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 634=collina.
bifurca, Crantz, Inst. ii. 177 = Potentilla bifurca.
tonariensis, Pers. Syn. ii. 53 = chiloensis»
botryformis, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 632 = vesca.
breslingea, Ser. in DC. Prod. ii. 570 =collina.
breviscapa, Tratt. Kosac. Monog. iii. 188 = Potentilla micrantha.
californica, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 20.—Calif.
californica, Newberry, in Padf. Railr. Rep. vi. 7 3 - chiloensis.
calycina, Loisel. Fl. Gall. i. 299 = collina 7
calyculata, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 588 —- chiloënsis.
campestris, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxix. (1856) II. 176 — collina.
canadensis, Crantz, Inst. ii. 178 = Potentilla canadensis.
canadensis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 299 = virginiana.
caroliniensis, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 639 — chiloënsis.
caulescens, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 20; ed. II. 78 = Potentilla Clusiana.
eerino-alba, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 13 = collina.
chilensis, Molina, Sagg. Chile, 134 = seq.
chiloensis *Duchesne, Hist. Nat. Frais.* 165; *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 4.—Am. bor.
chiloensis, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1033 - collina.
chrysanlha, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 7-indica.
collina, *Ehrk. Beitr.* vii. 26.—Eorop.; As. bor.
collina, Maxim. Prim. Fl. Amur. 99 = elatior.
collivaga, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 14 = collina.
consobrina. Jour. *Sc* Fonrr. 1. c. 13 = collina.
Cranttii, Crantz, Inst. ii. 178 = Potentilla verna.
Daltoniana, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat.* SérIV.viii.(1857) 204.—Keg. Himal.
dioica, Steud. Norn. ed. I. 344-elatior.
drymophila, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 15 - collina.
dubia, Crantz, Stirp. Austr. cd. I. fasc. ii. 24 ; ed. II. 81 — Potentilla norvegica T
dubia, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 534 = collina.
dulcis, Sommerf. ex Homem. in Fl Dan. t. 1389 = collina.
dumetorum, Jord. ex Nym. Consp. 222—collina.

FBAOABIA :—
eflagellis, Duchesne, Hist. Nat Frais. 119= vesca.
elatior, *Ehrk. Beitr.* vii. 23.—Europ.
elatior, Wight *8c* Am. Prod. 800 - nilgerrensis.
fragarioides, Crantz, Inst. ii. 177 = Potentilla fragarioides.
fruticosa, Crantz, 1. c. 176 — Potentilla fruticosa.
grandiflora, Crantz, 1. c. 179; Lam. Fl. Fr. iii. 112 - Potemilla grandiflora.
grandiflora, *Ehrh. Beitr.* vii. 25.—Guian.
grandiflora, Thuill. Fl. Par. ed. II. 264 - collina J
Grayana, Vilm. ex J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (.1867) 202 - virginiana.
grossa, Salisb. Prod. 863 - chiloënsis.
Hagenbachiana, Lange, ex Koch, in Flora, xxv. (1842) 632 = collina.
hirta, Crantz, Inst. ii. 177 " Potentilla hirta.
hispida, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 635— collina.
hortensis, Duchesne, Hist. Nat. Frais. 113= vesca.
hybrida, Duchesne, in Lam. Encyc ii. 540— virginiana.
incana, Lam. Fl. Fr. iii. 112 = Potentilla subacaulis.
indica, *Andr. Bet. Rep.* t. 479.—Ind. or.; Malaya; China,
t"*ndica.* Wall. Cat. n. 1286, partim- Potentilla axilliflora.
lucida, Vilm. ex J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 201-californica.
ludoviciana, *Rafin. Fl. Ludov.* 150.—Am. bor.
magna, Thuill. Fl. Par. ed. II. 264-elatior.
majau/ea, Ser. in DC. Prod. ii. 670 = collina.
malayana, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 520 = indica.
media, Schur, Ennm. PI. Transs. 186—collina.
mexicana, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 265 = vesca.
micrantha, Tratt. Rosac Monog. iii. 169 - Potentilla micrantha.
minor, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 681 —vesca.
monophylla, Duchesne, Hist. Nat. Krais. 124 -vesca.
monspeliensis, Crantz, Inst. ii. 179 = Potentilla norvegica.
moschata, Duchesne, Hist. Nat. Frais. 145 = elatior.
multifida, Crantz, Inst. ii. 176 = Potentilla multifida.
multiplex, Duchesne, in Lam. Encyc ii. 532 = vesca.
muricata, Linn. Sp. PI. 495 = elatior, vesca.
neglecta. *Linden, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxviii. (1865) II. 220.—Ross, austr.
nemoralis, Salisb. Prod. 363 = vesca.
nigra, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 535 = collina.
nigra, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 65 (Rnbi sp. ?). —Ross.
nilagirica, Zenlc. PI. Ind. Dec. i. 7 — indica.
nilgerrensis, *Schlecht. ex J. Gay, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 206.—Ind. or.
nitida, Crantz, Inst. ii. 179 = Potentilla nitida.
nivea, Crantz, 1. c. =- Potentilla nivea.
norvegica, Crantz, 1. c. = Potentilla norvegica.
nubicola, Lindl. in Wall. Cat. n. 1238-vesca.
nuda, Pers. in Linn. Syst. ed. XV. 611, in obs. = vesca.
odora, Salisb. Prod. 363 = virginiana.
opaca, Crantz, Inst. ii. 178 - Potentilla opaca.
palustris, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 11; ed. II. 73 - Potentilla palustris.
parviflora, Lam. Fl. Fr. iii. 113 ≐ Potentilla norvegica.
pendula, Dnchesne, in Lam. Encyc. ii. 635 = collina.
pentaphyllum, Crantz, Inst. ii. 179 = Potentilla reptans.
pimpinelloides, Crantz, 1. c. 177 — Potentilla pimpinelloides.
pinnati/olia. Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 149-Potentilla palustris.
platanoides, *Ser. ex DC. Prod.* ii. 570.—Am. bor. 7
praecox, *Kit. ex Schult. Oester. Fl.* ed. II. ii. 82.—Hungar.
praecox, Salisb. Prod. 363 - Potentilla Fragariastrum.
pratensis, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 636 = elatior.
recta, Crantz, Stirp. Auslr. ed. I. fasc ii. 22 ; ed. II. 79 — elatior, vesca.
reptans, Crantz, Inst. ii. 179 — Potentilla reptans.
revena, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863; 695.—Hungar.
roseiflora, *Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvili. (1871) 82.—Europ.
Roxburghii, Wight *Be* Am. Prod. 300 = indica.
rubens, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 14; ed. II. 75 = Potentilla opaca t
rubricaulis, Jord. *Be* Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 15 = collina.

FRAGARIA :—
rupestris, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 10; ed. II. 72 = Potentilla rupestris.
scaira, Schur, Enum. PI. Transs. 186-elatior.
semperfiorens, Duchesne, Hist. Nat. Frais. 49-vesca.
sempervirens, Duchesne, ex Steud. Nom. ed. I. 344 =« vesca.
sericea, Crantz, Inst. ii. 176 = Potentilla sericea.
sericea, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 185 = chiloënsis.
serotina, Rafin. Atl. Journ. 162 = virginiana 7
sicca, Gilib. Fl. Lituan. ii. 248 = Potentilla Fragariastrum.
sikiimensis, Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xliv. (1876), II. 206 = Daltoniana.
silvestris, Duchesne, Hist. Nat. Frais. 61 — vesca.
Soyeriana, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 16 - collina.
sterilis, Bieb. Fl. Tanr. Cane. i. 403—Potentilla micrantha.
sterilis. Linn. Sp. PI. 496 - Potentilla Fragariastrum.
stipularis, Crantz, Inst. ii. 178 = Potentilla stipularis.
subacaulis, Crantz, I. c. 180 = Potentilla subacaulis.
succulenta, Gilib. Fl. Lituan. ii. 247 = vesca.
suecica, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 18» collina.
sundaica, Blume, Bijdr. 1106-Potentilla Kleiniana.
supina, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc ii. 10 ; ed. H. 78 = Potentilla supina.
sylvestris, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 531, vide *silvestris.*
sylvulicola, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. L 14 = collina,
Thomasiana, Jord. *8c* Fourr. 1. c.—collina.
tincta, Duchesne, in Lam. Encyc. ii. 539 = chiloënsis.
Tormentilla, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 28; ed. II. 80-Potentilla Tormentilla.
umbelliformis, F. Schultz, ex Nym. Consp. 222 = collina.
unifolia, Steud. Nom. ed. I. 345 = vesca.
valderia, Crantz, Inst. ii. 179 = Potentilla valderia.
verna, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 12; ed. H. 74 = Potentilla vema.
vesca, Benth. PI. Hartw. 309 = californica.
vesca, *Linn. Sp. PI.* 494.—Reg. temp.
vesca. Lour. Fl. Cochinch. 325 = elatior.
vesca, Walt. Fl. Carol. 150-virginiana.
villosa, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 75. t. 1. f. 2 = Potentilla rubens.
virginiana, *Duchesne, Hist. Nat. Frais.* 204; *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—Am. bor.
viridis, Duchesne, 1. c. 135 = collina.
vulgaris, Ehrh. Beitr. vii. 21 = vesca.

FRAGARIASTRUM, Heist. Syst. 7 (1748); Schur, Enum. PI. Transs. 187 (1866) = Potentilla, Linn. (Rosac).
album, Schnr, 1. c. = P. alba.
caulescens, Schur, 1. c. 188 = P. caulescens.
Clusianum, Schur, 1. c 187 = P. Clusiana.
micranthum, Schur, 1. c. = P. micrantha.
petiolatum, Schnr, 1. c 188 = P. caulescens.
sterile, Schur, 1. c. 187 = P. Fragariastrum.

FRAGARIOPSIS, A. St. Hil. Morphol. 426 (1840)- Plukenetia, Linn. (Euphorh.).
discolor, Baill. Etud. Gén. Euph. *49S = scandens.*
polyandra, Baill. 1. c. —- *scandens.*
scandens, A. St. Hil. Morphol. 426.—Bras.
Warmingii, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. *38- —Bras.

FRAGERIA, Delile, ex Steud. Nom. ed. II. i- 64S (1840)-Xieuceria, Lag. (Compos.).

FRAGMOSA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 60 (1836) = Cony** ' Linn. (Compos.).
alpina, Rafin. 1. c—Hab. t
aspera, Rafin. 1. c. = C. melastomoides T
glabella, Rafin. 1. c—Hab. 7
nudicaulis, Rafin. 1. c.—Hab. 7
pumila, Rafin. 1. c. — C. pumila.
uniflora, Rafin. 1. c. => C. uniflora.

FRAGOSA, Ruiz *8c* Pav. Prod. 43. t. 34 (1794) ' Azorella, Lam. (Umbellif.).
aretioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 27. t. 42* * A. aretioides.

FRAGOSA :-
Wo*a, Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1856) 478.—Peruv.
dadorrhiza, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iii. 27. t. 249-Azorella dadorrhiza.
corymbosa, Ruiz & Pav. 1. c. t. 250-A. corymbosa.
crenata, Ruiz & Pav. 1. c. t 249 = A. crenata.
nultifida, Ruiz & Pav. 1. c.=A. multifida.
"'nifarmis, Ruiz *8c* Pav. 1. c. 26. t 249-A. reniformis.
'Pinosa, Ruiz & Pav. 1. c. iii. 27 = A. spinosa.

KRAGROSA, Hedw. f. Gen. 191 (1808) - praec.

FRAgCA , Mich_ ex Adans_ F*m_ »•• 2« (l?M) = *rankenia, Linn.
'orymbosa. Vis. in Mem. Ist. Venet. xvi. (1871) 158 = ."ank. hirsuta.
^*yi/olia,* Vis. l.c- Frank, ericifolia.
fruttculosa, Vis. 1. c. = Frank, pauciflora.
1"ptda, Vis. 1. c. = Frank, hirsuta.
'«««*, Vis. 1. c. = Frank, hirsute.
«««ophylla, Vis. 1. c. = Frank, microphylla.
mol:. Vis. 1. c. = Cressa cretica.
*nodiflor**. Vis. 1. c. = Frank, nodiflora.
Noth«««, Vis. 1. c. = Frank, hirsuta.
pauciflora. Vis. 1. c-Frank, pauciflora.
Pulverulenta, Vis. 1. c. = Frank, pulverulenta.
*revol*uta> Vis. 1. c. = Frank, hirsute.
"trapetala, Vis. 1. c. = Frank, tetrapetala.
"•ynufolia, Vis. L c. = Frank, hirsuta.
v'uttna, Vis. 1. c-Frank, hirsute.

FRAN TMCASTORA> Steud_ Non)_ «'• "• »•• 580>in >y- U841) = FRACASTORA, Adans. = Sideritia, Tourn. (Ubiat.).

PaANCHETIA> Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. sni 1885 i77_ *EUPHORBIACEAE.*
•Phaerantha, *Baill. I.* r._Madag.

FRANCISCEA, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 1. t. 1 ad 7 (1827) - Brunfelsia, Linn. ^Solanac).
a<*"»»«<«, Pohl, 1. c. 4 = B. acuminate.
augusta, Reeel> Cat*P1- Hoit Aksakov_ 69>nomen_— Hab. ?
australis, Miers, Illustr. ii. 74 = B. Hopeana.
b z·*
c! Z ! ' Miers 1. c. = B. bahiensis.
cat?" ,,, Hook" Bot_ Ma 6- »• «83 = B. pauciflora.
cTt·-·"* Miers> Illus·r_ »• 73 = B- capitate.
Co Vfrutflora, T. Moore, Gard. Mag. Bot. ii. (1851) 73 -n. pauciflora.
confer fiora, Pohl, II. Bras. Ic. i. 6. t. 5-B.ramc- ·"ssima.
a>v«rieata, Pohl, n. Bras. Ic. i. 6. t. 6 = B. ramoawima.
eli in S> »Re8e1, Cat- Pl„ Hort> Aksakov_ 59> nomen_— Sab.
'•*»*«««, Lem. Jari Fl eur. jjj_ fl882-53) t. 249 - *VTantha.*
eximia, S=heidw- ex Moore *Sc* Ayres, Gard. Mag. Bot. i. (185%18: "• "7.—Bra.
gracilis, W. Baxt_ in Lond_ Hort_ Brit_ STP1- "•• 551, nomen—Hab.?
*grandiflor?*1 Miers. I»»str. ii. 74-B. grandiflora.
Hopeana, Hook_ Mot- Mag. t. 2!>29 = B. Hopeana.
*hydrangeaeform***, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 7 = H. M™1" geaeformis.
latifolia, Pohl-1 c. 3. t. 2-B. latifolia.
Lindenia —Bras"„ PlanChl „ Belgl HoltlC„ XI„ (1868) 10o„
macrantha, **»>• J"rd. Fleur. iii. (1858) t. 249.-Bras.
macrophylla, Cham. & Schlecht. in linnaea, ii. (1827) 601 = B. macrophylla.
maritima Miers> 111 u-tr. ii. 74 = B. maritima.
mutabr's, H°It CX Regel, in Gartenfl< (1864) 154 = B. acuminata.
obova t, Miers> "I"'*'- ii 74 = B. obovata.
paurit 60 "'"D' Cham_ & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) P*uci1ora.
Pohliana, HSn- ex J- A- Schmidt, in Mart. FJ. Bras. viii. 260 = "• ramosissima.
ramosissima, PHI „ Pl. Bras. Ic. i. 5. t. 4 = R. ramosissima.
uniflor«, Pohl, 1. c. 2. t. !. B. Hopeana.

FRAN Rud? ^ ' Endl_ Gen_ 1226 (1840) = Darwinia, yrtac.

FBANCOA, Cav. in AnaL Cienc. Nat. iv. (1801) 236. *SAXIFRAGEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 640.
appendiculata, Cav. 1. c 237.—Chili.
appendiculata, A. Joss, in Ann. So. Nat. Sér. I. iii„ (1824) 195=-sonchifolia.
glabrata, DC. Prod. vii. 778-ramosa.
ramosa, *D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.* (Oct.-Dec. 1828) 52.—Chili.
ruptstris, Poepp. ex Kunze, in Flora, xiv. (1831) 874 —sonchifolia.
sonchifolia, *Cav. Ie.* vi. 77, in nota.—Chili.
sonc/iifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 1864 •= appendiculata.

FRANCOEURIA.Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 44 (1825) =Pulioaria, Gaertn. (Compos.).
erispa, Cass. 1. c. xxxviii. 374 = P. crispa.
diffusa, Shuttl. ex Brunn. in Flora, xxiii. (1840) I. Beibl. 72-P. crispa.
ladnata, Cots. & Dur. in BulL Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 181.—Algeria.

FRANGULA, Toum. ex Hall. Ennm. Helv. i. 164 (1742); et Mill. Gard. Diet. ed. VI. (1762)» XUuurwus, Linn.
Alnus, Mill. !. c. ed. VIII. n. 1 = R. Frangula.
americana, Mill. 1. c. n. 4 = R. alnifolia.
calif arnica, A. Gray, Gen. Illustr. ii. 178 - R. californica.
caroliniana, A. Gray, 1. c. = R. caroliniana.
chrysophylla, Reissek, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 91.—Bras.
crenata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 82 = R. crenata.
fragilis, Rafin. Fl. Ludov. 97 -= R. caroliniana.
latifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-R. alpina.
pentapetala, Gilib. Exercit. i. 260 = R. Frangula.
polymorpha, Reissek, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 81 = R. sectipetala.
Purshiana, Cooper, in Pacif. Rail. Rep. xli. 29, 57 ~ R. Purshiana.
rotundifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = R. pumila.
rupestris, Schur, £num. PI. Transs. 142-R. rupestris.
saxatilis, Cramer, Diip. Syst. PI. 41 = R. saxatilis.
sphaerocarpa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. »» - R. sphaerospermus.
vulgaris, Reichb. Fl. Germ. Excurs. *iii* » R. Frangula.
Wulfenii, Reichb. 1. c - R. rupestris.

FRANKA, Stead. Norn. ed. II. i. 645, in syn. (1840) -=seq.

FBANKENIA, Linn. Gen. ed. I. 129 (1737). *FRANKENIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 141.
BEATSONIA, Roxb. in Beats. St. Hel. App. 300 (1816).
FRANCA, Mich, ex Adans. Fam. ii. 255 (1763).
HYFERICOI-SIS, Hoiss. Diagn. Ser. I. vi. (1845) 25.
MENETHO, Rafin. Fl. Tellur. ii. 93 (1836).
NOTHRIA, Berg. Desc. PI. Cap. 171 (1767).
STREPTIMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 93 (1836).
aspera, *Phil. Fl. Atac.* 10.—Chili.
Aucheri, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 105. t. 187-hirsuta.
Beatsonia, Schult. f. Syst. vii. 70=portulacaefolia.
Berteroana, *C. Gay, Ft. Chil.* i. 247.—Chili.
Boissieri, *Reut. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 7*21.—Hispan.
bracteata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. 11864) II. 368—Austral,
campestris, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i.(lb431480.—Chili.
canescens, Presl, Delic. Prag. 61 - pulverulenta.
canescens, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 68 = hirsuta.
capitata, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 131-hirsuta.
cespitosa, *Lowe, in Trans. Comb. Phil. Soc.* vi. (1838) reimp. 28.—Madera.
chilensis, *Presl, in Schult. f. Syst.* vii. 1618.—Chili,
cinerea, *A. DC. in Linnaea,* xxv. (1852) 675.—Austral.
corymbosa, Desf. Fl. Atlant. i. 315. t. 93-hirsuta.
cymbifolia, Hook. Ic. PI. t. 265 = Wilsonia hnmilis.
Drummondii, *Benth. Ft. Austral,* i. 152.—Austral,
erecta, C. *Gay, Ft. Chil. i.* 246.—Chili.
ericaefolia, Salisb. Prod. 214 -^ hirsuta.

FRABKENU :-
ericifolia, C. *Sm. in Buch, Beschr. Canar. Ins.* 154, nomen ; *DC. Prod.* i. 360.—Ins. Canar.
ericoides, Pen. Syn. i. 393= hirsuta.
farinosa, *Remy, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. viii. (1847) 238.—Chili.
floribnnda, *Pomel, Nmv. Mat. Fl. Atl.* 348.—Alger.
florida, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 676=-chilensis.
fruticulosa, DC. Prod. i. 850 = pauciflora.
glabrata, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 677.—Chili
glomerate, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1864) II. 368.—Austral.
glomerulata, Coss. Notes Crit. ii. 30 - Boissieri.
grandifolia, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 35.—Am. bor. occ.
hirsuta, *Linn. Sp. PI.* 331.—Europ.; Orient; Afr. austr.
hirsuta, Sieber, ex Schult. f. Syst. vii. 67-strigosa.
hispida, DC. Prod. i. 340 = hirsuta.
intermedia, Costa, Fl. Catal. 31 = pulverulenta.
intermedia, DC. Prod. i. 349 = hirsuta.
Jamesii, *Ton. V Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 622.—Am. bor. occ.
Krebsii, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 3«-hirsuta.
laevis, Habl. Taur. 153; ex Bieb. Fl. Tanr. Cauc. i. 287 ™ pulverulenta.
laevis, Linn. Sp. PI. 831-hirsuta.
laevis, F. Muell. PI. Viet. i. 82 = pauciflora.
latifolia, Presl, in Schult. f. Syst. vii. 1620 = gramlifoha.
micrantha, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 247.—Chili,
microphylla, *Cav. Ic.* vi. 76.—Am. austr.
mollis, Biel>. Kl. Taur. Cauc. iii. 276 = Cressa cretica.
ncglecta, *Schult. f. Syst.* vii. 1618.—Orient.
Nicolitiana, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 248.—Chili,
nodiflora, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 396.—Afr. austr.
AWAn'a.Thunb. Prod. PI. Cap. 58 = hirsuta.
pallida, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 61 = hirsuta.
I'almeri.S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 124.—Calif,
parvula, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (18S4) II. 868.—Austral.
pauciflora, *DC. Prod.* i. 860.—Austral,
persica, *Jaub. tf Spach, Illustr.* ii. 106.—Persia.
pilosa, Pall. Reise, iii. 317-hirsuta.
portulacaefolia, *Spreng. Syst.* ii. 184.—Ins. St. Helena,
pulverulenta, *Linn. Sp. PI.* 832.—Reg. Meditm.; Oriens; Ind. or.
punctate, *Tuns, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 867.—Austral.
Reuteri, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 60 -= hirsuta.
revoluta, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 75=hirsute.
scabra, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 305 ~ pauciflora.
serpyllifolia, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 805 = pauciflora.
strigosa, *Presl, Fl. Sic.* i. 141.—Crete; Aegypt.
tetrapetala, *Labill. Nov. Holt. PI.* i. 88. t. 114.—Austral.
thymifolia, Desf. Fl. Atlant. i. 816 - hirsuta.
triandra, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Ser. HI. viii. (1847, 237.—Bolivia.
velutina, Brouss. ex DC. Prod. i. 350-hirsuta.
Vidali, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1*75) 187—Chili.
virens, Desf. Tabl. ed. I. 186, nomen; Cat. Hort. Par. ed. III. 407 = pauciflora.
Webbii, Boiss. *Sc* Reut PugilL PI. Nov. 16-hirsuta.

FRANKIA, Bert ex Stead. Norn. ed. II. i. 646 (1840) =Phyllanthus, Linn. {Euphorb.).
ramiflora, Bert, ex Steud. 1. c. - P. Cicca.

FRANKIA, Steud. ex Steud. Kom. ed. II. i. 646 (1840) -Oymnarrhena, Desf. (Compos.}.
Schimperi, Steud. 1. c. = G. mifrantha.

FBANKLANDIA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 157. *PROTEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 174.
fucifolia, *R. Br. I. c*—Austral.
semifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 646, sphalm. - praec.
trianstata, *Benth. Fl. Austral,* v. 377.—Austral.

FRANKLINA, J. F. Gmel. Sjnt 810 (1791) -seq.

FRANKLINIA, Bartr. ex Marsh. Arbust Am. 48 (1785) = Gk>rdonia, Ellis (Temstroem.).
Alatama, Rafin. AtL Journ. 79 -> G. pubescens.
Alatamaha, Marsh. Arbnst. Am. 49 = G. pubescens.
americana, Marsh, ex Pen. Syn. ii. 269 = G. pubescens.

FKANKOA, Reichb. Handb. 230 (1837) - Pranooa, Cav. (Saxifrag.).

FRANKOERIA, Stend. Norn. ed. II. i. 646 (1840)- = FRANCOEURIA, Cass. = Fulioaria, Gaertn. (Compos).

FRANQUEVILLEA, ZolL ex Miq. FI. Ind. Bat. iii. 586 (' 1855') = HypoxlB, Linn. (Amaryllid.).

FRANQUEVILLIA, Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 338 (1821)=3£icrocala, Hoffmgg. & Link (Gentian.).
minima, S. F. Gray, 1. c - M . filiformis.

PHAlfSERIA, Cav. Ic. ii. 78. t. 200 (1793). *COMPOSITAB*, Benth. & Hook, ft ii. 354.
GAERTNERIA, Medic. Phil. Bot. i. 45 (1789).
HEMIAMBROSIA, Delpino, Studi sopra Artemis. 57 (1871).
HEMIXANTHIDIUM, Delpino, 1. c. 60 (1871).
XANTHIDIUM, Delpino, 1. c 62 (1871).
albicaulis, Torr. PI. Frèmont 16-dumosa.
ambrosioides, *Cav. Ic.* ii. 79. t. 200.—Am. bor. occ.
artemisioides, *Willd. Sp. PI.* iv. 374.—Peruv.
bipinnatifida, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 115 = camphorata.
bipinnatifida, *Nutt. in Trims. Am. Phil. Soc.tf.* S.vii. (1841) 344.—Am. bor. occ
camphorata, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 192.—Calif.
Chamissonis, *Less, in Linnaea*, vi (1881) 507.—Am. bor. occ.
chenopodiifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 26.—Calif,
cordifolia, *A. Gray, Syn. PI. N. Am. i.* II. 445.—Arizona.
runei/olia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 845 = Chamissonis.
deltoidea, *Torr. PI. Frémont.* 15.—Arizona; Calif,
discolor, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 345.—Am. bor. ecc.
dumosa, *A. Gray, in Rep. Frim. ind Exped.* 316.—Am. bor. occ.
eriocentra, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 355.—Am. bor. occ.
rlexuosa, *A. Gray, 1. c.* xx. (1885) 298.—Calif,
hispida, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 25.—Calif.
Hookeriana, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 845.—Am. bor. occ.
ilicifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 77.—Am. bor. occ.
Lessingii, Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 268 = bipinnatifidu.
Meyeniana, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 54-= Ambrosia artemisioides.
montana, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 345 = Hookeriana.
pumila, Nutt. 1. c. 844=Ambrosia pumila.
tacorensis, *Meyen &" Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 268.—Peruv.
tenuifolia, *Harv. (f Gray, in A. Gray, PI. Fendl.* 80.—Am. bor. occ.
tomentosa, *A. Gray, 1. c.*—Am. bor. occ.

FRAPPIERIA, Cordem. in Baill. Adansonia, x. (1871) 24=Puiadia, Jacq. (Compos.).
littoralis, Cordem. in Baill. 1. c. 25.—Ins. Borb.
montana, Cordem. in Baill. 1. c. 26.—Ins. Borb.
thermalis, Cordem. in Baill. 1. c 27.—Ins. Borb.

FHASEBA, Walt ·FI. Carol. 87 (1788). *GENTIANEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 817.
TESSARANTHIUM, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1862) 142.
albicaulis, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 330.—Am. bor. occ.
albomarginata, *S. Wats, in Bot. King's Exped.* 280.—Am. bor. occ.
carolinensis, Hook. FI. Bor. Am. ii. 66 = thyrsiflora.
caroliniensis, *Walt. FI. Carol.* 88.—Am. bor.
nitida, *Benth. PI. Hartv.* 822.—Am. bor. occ.

FAA8JBKA:—
panicnlata, *Torr. in Pact/. Sail. Hep.* iv. 126.—Am. bor. occ.
Parryi, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 156.—Am. bor. occ.
speciosa, *Dougl. ex Hook. FI. Bor. Am.* ii. 66.1168.—Am. bor. occ.
thyrsiflora, *Hook, in Kewjourn.m.*" (1851) 288.—Am. bor. occ.
verticillata, *Rafin. Med. FI.* i. 196.—Am. bor.
Walteri, Michx. FI. Bor. Am. i. 97 - caroliniensis.

FRATJITHOFEBA, Mart Nov. Gen. et Sp. iii. 85. t. 235 (1829). *CELASTRINEAE*, Benth. *tc* Hook. f. i. 866.
mnltiflora, *Mart. I. c.* 86.—Bras.

FRAXIMA, Rafin. FI. Tellur. iv. 83(1836) = Ipomoea, Linn. (Convolv.).
ebracteata, Rafin. 1. c.-I. ebracteata,
mindanensis, Rafin. 1. c. = Jacquemontia hirsuta.
quinquefolia, Rafin. 1. c.—I. quinquefolia.
sagittifolia, Rafin. 1. c. = I. sagittata.
Sherardi, Rafin. 1. c—Convolvulus hirsutus.
tridentata, Rafin. 1. c. = I. tridentata.
umbellata, Rafin. 1. c = I . umbellata.

FRAXINELLA, [Town.] Rupp. FI. Jen. ed. Hall. 291 (1745)=Diotamnus, Linn. (Rutac).
alba, Gaertn. Fruct. i. t. 69 - D. albus.
Dictamnus, Moench, Meth. 68 - D . albus.

FRAXINOIDES, Medic, in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys^Oek. Ges. i. (1791) 198; Phil. Bot ii. 38 (1791) -Jfraxtnua, Tourn. (Oleac).
alba. Medic. Pfl. Anat. 899 = Fraxinus americana.
nigra. Medic. 1. c. = Fraxinus nigra.

PRAXINTTS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1785). *OLEACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 676.
APILIA, Rafin. Alsog. Am. 89 (1838).
APLILIA, Rafin. New FI. Am. iii. 93 (1836).
CALYCOMELIA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. FI. iii. 1003 (1834).
FRASINOIDES, Medic, in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 198; Phil. Bot. ii. 88 (1791).
LEPTALIX, Rafin. New FI. Am. iii. 93 (1836).
MANNAPHORUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818J 175.
MELIOPSIS, Reichb. Norn. 135 (1841).
ORNANTHES, Rafin. New. FI. Am. iii. 93 (1836).
ORNUS, Neck. Elem. ii. 375 (1790).
SAMARPSES, Rafin. New FI. Am. iii. 98 (1836).
acuminata. Lam. Encyc. ii. 547=aroericana.
alba, Marsh. Arbust. Am. 51; Bosc, in Mfra. Instit. Fr. ix. 1808 (1811) 207 = americana.
albicans, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 4 >americana.
americana. *Linn. Sp. PI.* 1057.—Am. bor.
angustifolia, Rent, ex Nym. Consp. 495= excelsior,
angustitolia, *Vahl, Enum.* i. 52.—Tauria.
anomala, *Torr. ex S. Wats, in Bot. King's Exped.* 283.—Utah.
apetala. Lam. FI. Fr. ii. 525=excelsior.
appendiculata. Pen. Syn. ii. 605 = excelsior.
argentea, Loisel. FI. Gall. iii. 697 - F . Ornus.
atra, Hort ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. ii. 585 = excelsior.
atrovirens, Desf. Hist. Arb. i. 104= excelsior.
aurea, Willd. Enum. Hort. Berol. 1059=excelsior.
australis, J. Gay, ex C. Koch, Dendrol. ii. I. 247 = excelsior.
australis, Mont ex Gren. & Godr. FI. Fr. ii. 472 = oxyphylla.
Berlandieriana, A. DC. in DC. Prod. viii. 278 = viridis.
biloba, Gren. & Godr. FI. Fr. ii. 472 = oxyphylla.
Boscii, G. Don, Gen. Syst. iv. 55=excelsior.
Bungeana, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 275.—China.
canadensis, Gaertn. Fruct. i. 222-americana.
canaliculata, *Rafin. Alsog. Am.* 85. (Quid?).—Am. bor.
cappadocica, Juss. ex Bosc, in Mém. Inst Fr. ix. 1808 (1811) 214 - F . Ornus.
caroliniana, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 6; Lam. Encyc. ii. 548=platycarpa.
caroliniana, Wangenh. ex DC. Prod. viii. 273 = americana.

PKAXHTUB :—
caroliniana, Willd. ex Pursh, FI. Am. Sept. i. 9-viridis.
ceratifolia, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 29-» pubescens.
ckinensis, Roxb. FI. Ind. ed. Carey, i. 160- xanthoxyloides.
cinerea, *Bosc, in Mém. Instit. Fr.* ix. 1808 (1811) 207-—Am. bor.
concolor, Muhl. Cat. PI. Am. Sept. iii. 115. t. 11[s] viridis.
cordata, *Rafin. Alsog. Am.* 84 (Quid ?).—Am. bor.
coriacea, S. Wats, in Am. Natural, vii. (1873) 302" pistaciaefolia, americana.
coriariaefolia, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 350 = excelsior.
crispa, Bosc, in Mém. Inst Fr. ix. 1808 (1811), 214 - excelsior.
cubensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 170.—Cuba.
Curtissi, Vasey, Cat. Trees U. St. 20-americana.
curvidens, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 118 = pl«[t]y carpa.
cuspidata, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 166.—N. Mexic.
dentata, *Tausch.in Flora*, xxi. (1838) 751 (Quid?).—Sicilia.
dimorpha, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. »• (1855) 367 = xanthoxyloides.
dipetala, *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 362. t. 87.—Calif.
discolor, Muhl. Cat. PI. Am. Sept. Ill-americana.
diversifolia, Ait. Hort. Kew. iii. 445 = excelsior.
diversifolia, Rochel, ex Boiss. FI. Orient, iv. 89 = *• Ornus.
elliptica, Bosc, in Mém. Instit. Fr. ix. 1808 (1811) 2W—pubescens.
epiptera, Michx. FI. Bor. Am. ii. 256-americana.
erosa, Pers. Syn. i. 604 - excelsior.
excelsa, Thunb. FI. Jap. 23—excelsior.
excelsior, Boiss. Voy. Bot Espagne, 408 = angusf" folia.
excelsior, Bové, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 276=oxyphylla.
excelsior, *Linn. Sp. PI.* 1057.—Europ.; As. bor.' Oriens; Reg. Himal.
excelsior, Walt. FI. Carol. 254=platycarpa?
expansa, WUld. Berl. Wilde Baumz. ed. II. *l6°"* viridis.
floribunda, Bunge, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 275" Bungeana.
floribunda, *Wall. Cat.* n. 2836; *et in Roxb. FI. Ind. #>• Carey*, i. 150.—Reg. Himal.
florifera, Scop. FI. Cam. ed. II. ii. 282=F. Ornus.
fungosa, Lodd. Cat. (1886) - excelsior.
fusca, *Bosc, in. Mim. Instit. Fr.* ix. 1808 (1811) *>•• —Am. bor.
glauca, *Rafin. Alsog. Am.* 33 (Quid ?).—Am. bor.
grandifolia, *Rafin. 1. c.* 88.—Am. bor.
Greggii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) «» —Am. bor. occ.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook. f. FI. Brit. 1*4-* 605.— Reg. Himal.
halepensis, Auct. ex Steud. Norn. ed. II. i. •*/ rotnndifolia.
heterophylla, Vahl, Enum. i. 68=excelsior.
Hookeri, Wenzig, in Engl. Bot. Jahrb. iv. (1883) I excelsior.
horisontalis, Dum.-Cours. Bot. Cult ed. II. ii. 57»' excelsior.
implicata, Dum.-Cours. 1. c. 577 = excelsior.
integrifolia, Moench, Verz. Ausl. Baeume, excelsior.
japonica, Buerger, ex Wenzig, in Engl. Bot. JaW"- (Ifc83) 170 = Bungeana.
jaspidea, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. ii. »«' excelsior.
juglandifolia. Lam. Encyc. ii. 548 = americana.
lacerata, Rafin. FI. Ludov. 88 (Quid ?).—Am. bor.
lacerata, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. IL excelsior.
lancea, Bosc, in Mém. Instit. Fr. ix. 1808 (1811) *"» pubescens.
lanceolata, Borkh. Handb. Forstb. L 826 = americana.
lancifolia, Rafin. Alsog. Am. 35-praec. ?
latifolia, Benth. Bot. Voy. Sulph. 33 = oregona.
lentiscifolia, Desf. Tabl. ed. I. 52 ; Hist Arb. 1- oxyphylla.
longicuspis, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad- M*. iv. III. (1846) 169.—Japon.

FRAXINUS:—

longifid, Bosc, in Mim. Instit. Fr. ix. 1808 (1811)209 =pubescens.

"UKrophylla, Hoffmgg. Vert Pfl. Nachtr. ii. 120 = americana.

mammifera, Stend. Nom. ed. 1.846, sphalm.=seq.

mandshurica, Supr. in Bull. Sc. Phys.-Math. Acad. Petersb. xv. (1857) 871.—Manchuria.

man"'/»«, Hort. ex Stend. Nom. ed. IL i. 647-F. Ornus.

Marjesi, i, *Hook.f. Bot. Mag.* t 6678.—China.

™TQI», Safin. Alsog. Am. 86 (Quid ?).—Am. bor.

""ftwcano. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 351 =cuspidata.

microphylla, Willd. Ennm. Hort< BeroK ^PP1- 69= oxyphylla.

millo^ aquy . C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1860) 697 •=*.Omns.

mixta, B in Mém. Instit Fr»ix»1808 (1811) 218 = paivif<7°.

mollis, Rafin. Alsog. Am. 84 (Quid ?).—Am. bor.

monophylla, Desf. Hist. Arb. i. 102=excelsior.

Montagnei, Nym. Consp. 495 = oxyphylla.

montana, Salisb.Prod. 14 = F. Ornus.

Moorcroftiana, Brand. For. Fl. 304-xanthoxyloides.

Moorcroftiana, Wall. Cat. n. 2884=excelgior,

multifolia, Rafin. Alsog. Am. 37 (Quid ?).—Am. bor.

nana, Pers. Syn. 605-excelsior.

Bra, *Bosc, in Mim. Instit. Fr.* ix. 1808 (1811) 203. ». bor.

nigra Mar

»£»•«,' Pott*"' ArbUS^Ao» 61^sambncifolia in Duroi, Harbk. Baumz. ed. II. i. 398 = pubescens.

nigrescens, Buckl. in Proc. Acad. *Sc* Philad. 1862 (1863) 10=platycarpa.

Novae Angliae, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 5 = pubescens.

Nova A~ *Anglise, Waugenh.* ic DC. Prod. VIII. 277-americana.

Nuttalliana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 oiC^^platycarpa.

«bloW Pansd> in Flora, xvii. (1834) 521 - oxyphylla.

<Acc'rd> Buckl. Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (lar«? = pubescens.

ob -a, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 311 = Bungeana.

oregona, Nutt. Am. Sylva, iii. 59. t. 99-Am. bor. occ.

Ornus, Linn. Sp. Pl. 1057.—Reg. Mediten.; Oriens.

Ornus, Pall. ex Bieb. FL Tanr> Cauc. 4S1=ox y-PhyUa.

Ornus, Scop. ?L Cam. «* 281=excelsior.

ovalis, Willd. Quum. Hort. Trio1 Spond 69 = seq.

ovata, Bosc, in Mém. Inst t. 1800 (1811) 204 = pubescens.

oxycarpa, Willd. Sp. PI. iv. 1100-oxyphylla.

oxyphylla, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 450.—Tauria.

oxyphylla, Bourg. ex Nym. Consp. 495 = excelsior.

pallida, Bosc, in Mém. Instit. Fr. ix. 1808 (1811) 201 = platycarpa.

palustris, *Rafin. Alsog. Am.* 35 (Quid ?).—Am. bor.

paniculata, «1. Gard. Diet. ed. VIII. n.4 = F.Ornus.

Pan>iiu' V ?'• ** *Spreng. Syst.* i. 95.—Am. bor.

parviflora, Tenore, Syll. Fl. Neap. 11 = rotundifolia.

parvifolia, Lam. Encyc. ii. 546.—Calabr.; Sicil.

pauciflora, Willd. Sp. PI. iv. 1101-excelsior.

pauciflora, Nu Am* Sylva> 61- *• 10o " platy, carpa.

*1*ndu Z-> u>>yana. u , Kew. ed. I. iii. 445 = excelsior. i] Ait. Hort.

pensylvanica, Marsh. Arbnst. Am. 61 = pubescens.

persica, Boiss. Ser. L xi. 78-oxyphylla.

petiolulata, Boiss. I. Ser. n. H9=excelsior.

pist ia, E. Hall ex A. Gray. Syn. Fl. N. Am. Inst aciarf americana.

Am. bor. occ.

platycarpa, Mx Fl. Bor. Am. ii. 256.—Am. bor.

platyphylla, offm K- Ven. Pfl. Nachtr. ii. 29 = pubescens.

pleurodes, Rafin. Alsog. Am. 85 (Qoid >)•—Am. bor.

polemonifolia, Poir. » Dnham. Arb. ed. Nov. iv. 66 = excelsior.

polycarpa, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 69, nomen.—Am. bor.

porosa, Rafin. Alsog. Am. 84 (Quid?).-Am. bor.

potamophila, H Bull. ^ AW ^ *soc.* xli. (1868) I. 66.—Am. bor.

FRAXXNTJ8:—

Pseudo-Ornus, Steud. Nom. ed. II. i. 647 «= F. Ornus.

pubescens, *Lam. Encyc.* ii. 648; *Walt. Fl. Carol.* 254. —Am. bor.

pubescens, Lam. ex3osc, in *i/iim.* Instit. Fr. ix. 1808 (1811) 210 = platycarpa.

pubinervis. Blame, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 311 = Bungeana.

pulverulenta, *Bosc, in Mim. Instit. Fr.* ix. 1808(1811) 212.—Am. bor.

purpurascens, C. Koch, Dendrol. ii. i. 241=excelsior.

quadrangularis, Lodd. Cat. (1836) = seq.

quadrangulata, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 255.—Am. bor.

raibocarpa, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 685.—Turkestan.

repanda, *Rafin. Alsog. Am.* 37 (Quid?).—Am. bor.

reticulata, *Rafin. 1. c.* 84 (Quid ?).—Am. bor.

retusa, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1862) 330.—Hongkong.

retusa, *Rafin. Alsog. Am.* 34 (Quid?).—Am. bor.

rhynchophylla, Hance, in Joum. Bot. vii. (1869) 164 = chinensis.

Richardi, *Bosc, in Mim. Instit. Fr.* ix. 1808 (1811) 207.—Am bor.

rostrata, Guss. PI. Rar. 874. t. 63 = oxyphylla.

rotundifolia, Lam. Encyc. ii. 646 = F. Ornus.

rotundifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VHI.n. 2.—Italia; Graec.; As. Min.

rubicunda, *Bosc, in Mim. Instit. Fr.* ix. 1808 (1811) 212.—Am. bor.

rnfa, *Bosc, 1. c.* 208.—Am. bor.

salicifolia, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 647 = excelsior.

sambucifolia, *Lam. Encyc.* ii. 649.—Am. bor.

Schiedeana, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* vi. (1881) 891.—Mexic.

serrati/olia, Michx. ex Steud. Nom. ed. II. i. 647-platycarpa.

Sieboldiana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 811.—Japon.

simplicifolia, Willd. Berl. Wilde Baumz. 121-excelsior,

sogdiana, *Bunge, in Mim. Sou. Etr. Pitersb.* vii. (1861) 390.—Turkestan.

Steudelii, Medic. Brobacht. (1782) 201-excelsior.

striata, Dum.-Cours. Bot Cult. ed. II. ii. 577 - excelsior.

striata, Spreng. Syst. i. 96-seq.

strigata, *Bosc, in Mém. Instit. Fr.* ix. 1808 (1811) 217.—Oriens.

subpubescens, Pers. Syn. ii. 605 = pubescens.

subvillosa, Bosc, ex Pers. 1. c. 604 »pubescens.

sylvatica, Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 11, nomen-excelsior?

syriaca, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 77 = oxyphylla.

tamariscifolia, Vahl, Enum. i. 62 - oxyphylla.

teres, *Rafin. Alsog. Am.* 36 (Quid ?).—Am. bor.

tetragona, Hort. Par. ex Duham. Arb. ed. Nov. iv. 64 —quadrangulata.

Theophrasti, Duham. ex Steud. Nom. ed. I. 846 = F. Ornus.

thrysantha, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126 = F. Omus.

tomentosa, Michx. Arb. Am. Sept. iii. 112 = pubescens.

trialata, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad. 1S62 (1863) 5 = viridis.

triptera, Nutt. Gen. Am. ii. 232 - platycarpa.

undulata, *Rafin. Fl. Ludov.* 38 (Quid?).—Am. bor.

urophylla, Wall. Cat. n. 2885 = floribunda.

velutina, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 149 —pistaciaefolia.

verrucosa, Pers. Syn. ii. 604; Dnm.-Cours. Bot. Cult. ed. II. ii. 677 = excelsior.

mllosa, Hort ex Dum.-Cours. 1. c. 682=americana.

viridis, Boa, *in Mém. Instit. Fr.* ix. 1808 (1811) 209. —Am. bor.

viridis, *Michx./. Sylv. Am.* t. 120.—Am.bor.

xanthoxyloides, *Wall. Cat.* n. 2833.— Reg. Himal.

FREDERICIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 227 (1887)-Prideriola, Mart. (Bignon.).

FREDOLIA, Coss. *8c* Dur. ex Moq. *Sc* Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 301-Anabasis, Linn. (Chenopod).

aretioidss, Coss. *Sc* Dor. ex Bunge, Anabas. Rev. 85 = A. aretioides.

FREEMANIA, Boj. ex DC. Prod. vi. 218 (1837)-HeUehrysum, Vaill. (Compos.).

hypnoidea, Boj. ex. DC. 1. c. \-*Aphelexis hypnoides).* —Madag.

hypnoides, Steud. Nom. ed. II. i. 647—praec.

FREEMANNIA,Steud.Nom.ed.II. i.647 (1840) = praec.

FREESEA, Eckl. Verz. 30 (1827) - Ma, Linn. etc. (Irid.).

costata, Eckl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 160—Acidanthera tubulosa.

crispa, Eckl. Verz. 30=Tritonia crispa.

fiava, Eckl. 1. c. = Tritonia flava.

longiftora, Eckl. 1. c.=>I. paniculata, *Detar.*

mineato-lateritia, Eckl. 1. c. = Tritonia crocata.

secunda, Eckl. 1. c.—Tritonia secunda.

FREESIA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 704 (1883)-praec

FKBESIA, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 672. *ISIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 704.

Leichtlini, *Klatt, in Segel, Cartenfl.* (1874) 289.—Afr. austr.

odorata, Eckl. ex Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 672 = refracta.

refracta, *Klatt, I.e.* 673.—Afr. austr.

xanthospila, *Klatt, I. c*—Afr. austr.

FHEGEA, Reichb. f. in Bot. Zeit x. (1852) 712. *ORCHIDEAE* [Henth. *Sc* Hook. f. iii. 690].

amabilis, *Reichb. f. 1. c.*—Panama.

FREGIRARDIA, Dun. Ind. Sem. Monsp. (1849).—Cf, Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 36B = Braohlstus, Miers (Solanac).

angustifolia, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 506.—Ecuador.

ciliata. Dun. 1. c. 605 = B. ciliatus.

dumetorum. Dun. 1. c 604—B. dumetoinm.

Dunaliana, Wedd. Chlor. And. ii. 100.—Peruv.

eriolarynx, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 603.—Bolivia.

leptoclada, Dun. 1. c. 506.—Bras.

ligustrina, Dun. 1. c. 507.—Mexic

/.indent, Dun. L c. 603.—Venezuela.

luteiflora, Dun. in Jnd. Sem. Hort. Monsp. (1842).—Am. austr.

mollis. Dun. in DC. Prod. xiii. I. 605 = B. mollis.

rhomboidea. Dun. 1. c. 504 =-B. rhomboideus.

riparia. Dun. 1. c. 503 = B. riparius.

Spina-alba, Dun. 1. c. 507.—Bras.

Vargasii, Dun. 1. c.—Venezuela.

FREIRA, C. Gay, Fl. Chil. v. 366 (1849), sphalm. -seq.

FREIREA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 602 (1826)-Farietaria, Toum. (Urtic).

alsinaefolia, Gaudich. I. c. •= P. alsinefolia.

alsinefolia, Schimp. ex Blame, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 266 = P. debilis.

australis, Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 688 - P. debilis.

erecta, Phil. FL Atac. 49 ~ P. debilis.

fernandetiana, Wedd. in DC. Prod. xvi. I. 235", in syn.-P. debilis.

humifusa, C. Gay, Fl. Chil. v. 386 = P. debilis.

ocymifolia, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 502 = P. mauritanica.

Steudelii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 252 - P. debilis.

FREIREODENDRON, Mucll. Arg. in DC. Prod. xv. u. 244 (1866)=Drypetes, Vahl tEuphorb.).

sessilifiorum, Muell. Arg. 1. c. 245 = D. sessiliflora.

FREMONTEA, Lindl. Veg. Kingd. 513 (1847) = seq.

FREMONTIA, Torr. in Emory, Rep. 95,817. t. 8 (1846) = 8arcobatus, Nees (Chenop.).

vermicularis, Torr. 1. c. «=S. Maximiliani.

FREMONTIA, Torr. in Smithson, Contrib. vi. (PI Fnimont.) 5. t. 2 (1854). *STESCULIACEAE,* Benth.' & Hook. f. i. 212, 982.

califomica, *Torr. I. c.* 6.—Calif.

FREMYA, Brongn. *Sc* Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 372-Xanthostemon, F. Mucll. (Myrtac).

aurantiaca, Brongn. *Sc* Gris, 1. c. 373.— N. Caled.

ciliata, Brongn. *Sc* Gris, I.e. 874.—N. Caled.

FREMYA :—
Deplanchei, Erongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot Fr. x. (1863) 873.—N. Caled.
elegans, Brongn. & Gris, 1. c. 374.—N. Caled.
flava, Brongn. & Gris, 1. c. 373.—N. Caled.
myrtifolia, Brongn. & Gris, 1. c. 299.—N. Caled.
Pancheri, Brongn. & Gris, 1. c. 373=X. Pancheri.
pubescens, Brongn. & Gris, 1. c.—N. Caled.
rubra, Brongn. & Gris, 1. c. 372 = X. rnbrum.
speciosa, Brongn. & Gris, 1. c. 299.—N. Caled.
Virillardi, Brongn. & Gris, 1. c. 878.—N. Caled.

FRENELA, Mirb. in Mém. Mus. Far. xiii. (182G) 30, parting Callitris, Vent. (Conif.).
Actinostrobus, F. Muell. Sel. PI. Indust. Colt. 94 = Actinostrobns pyrmidalis.
arenosa, Hort. ex Endl. Syn. Conif. 38-=C. rhomboidra.
attenuata, A. Cnnn. ex Benth. Fl. Austral, vi. 288 = C. rhomboidea.
australis, R. Br. ex Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74 = C. oblonga.
australis, Endl. Syn. Conif. 87 = C. rhomboidea.
Balansae, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 327.—N. Caled.
calcarata, A. Cunn. ex Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74-C. calcarata.
canescens, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 448-C. robuata.
columellaris, F. Muell. Fragm. v. 198 = C. robusta.
crassivalvis, Miq. Stirp. Nov. Holl. Muell. Collect. 1 -- C. robusta.
Drummondii, Parl. in Joum. Bot. i. (186S) 35 = C. Drummondiu
Endlicheri, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 449 = C. calcarata.
ericoides, Hort. ex Endl. Syn. Conif. S8-C. calcarata.
Fontanesii, Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74-C. quadrivalvis.
Fothergilli, Hort. ex Endl. Syn. Conif. 38=C. Gnnnii.
fruticosa, Endl. 1. c. 36 = C. calcarata.
glauca, Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74 = C. robusta.
Gulielmi, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 449 »C. robusta.
Gunnii, Endl. Syn. Conif. 88 =C. oblonga.
Hugelii, Hort. ex Carr. Conif. 73 = C: Huegelii.
intratropica, F. Muell. ex Benth. FL Austral, vi. 237 = C. robusta.
juniperoides.PaA. in DC. Prod. xvi. II. 451 = C. arborea.
Maeleyana, Parl. 1. c. 446 = C. Macleayana.
macrostachya, Knight, ex Gord. Pinet. 85-C. oblonga.
microcarpa, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, vi. 237 = C. robusta.
Moorei, Parl. in DC. Prod. xvi. n. 449=C. robusta.
Muelleri, Parl. 1. c. 450 = C. Muelleri.
Parlatorei, F. Muell. Fragm. v. 186--C. Parlatorei.
propinqua, A. Cunn. ex Mirb. in M&n. Mus. Par. xiii. (1825) 74=C. robusta.
pyramidalis, [A. Cunn.] Sweet, Hort. Brit. ed. II. 473 = C. calcarata.
rhomboidea, Endl. Syn. Conif. 36 = C. rhomboidea.
rhomboidea, Hort. ex Parl. in DC. Prod. xvi. n. 449 = C. calcarata.
rigida, Hort. ex Endl. Syn. Conif. 38.—Austral.
robusta, A. Cunn. ex Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74 = C. robusta.
Roei, Endl. Syn. Conif. 36-=C. Roei.
subcordata, ParL Enum. Sem. Hort. Flor. (1862) 24 = C. Roei.
subumbellata, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 447.—N. Caled.
sulcata, Parl. Enum. Sem. Hort. Flor. (1862) 23.—Hab.?
triquetra, Spach, Hist. Veg. Phan. xi. 345 - C. rhomboidea.
tuberculata, Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74 = C. robusta.
variabilis, Carr. Conif. ed. I. 75—C. rhomboidea.
VenUnatii, Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 74-C. rhomboidea.
verrucosa, A. Cunn. ex Mirb. 1. c. = C. robusta.

FREREA, Dalz. in Joum. Linn. Soc. viii. (1865) 10. t. 3. *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 783.
indica, *Dalz. I. c.*—Ind. or.

FRESETJIA, DC. Prod. v. 328 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 258.
fasciculate, *Bolus, in Hook. Ic. PI.* 1.1108.—Afr. austr.

FRESENIA:—
leptophylla, *DC. Prod.* v. 328.—Afr. austr.
scaposa, *DC. I. c.*—Afr. austr.
stuposa, Steud. Nom. ed. II. i. 647, sphalm. = praec.

FRESIERA, Mirb. in Bull. Soc. Philom. (1813) 381 - FREZIERA, Sw. (Ternstr.).

FRESNELIA, Steud. Nom. ed. II. i. 648 (1840) - FRENELA.Mirb.-Callitris, Vent. (Conif.).

FREUCHENIA, Eckl. Verz. 14 (1827) - **Xoraea,** Mill. (Irid.).
bulbifera, Eckl. I. c. = M. ramosa.

FREYCINETIA, Gaudich. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iii. (1824) 609. *PANDANEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 951.
JEZABEL, Banks, ex Salisb. Gen. PI. Fragm. 5 (1866).
VlCTORirERREA, Gaudich. ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 83 (1845).
angnstifolia, *Blume, Rumphia, i.* 159. t. 43.—Sumatra.
angustifolia, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 134 = lnzonensis, pycnophylla.
arborea, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* **431. t. 41.—Ins.** Sandvic.
Amottii, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* **t. 35, 86.—** Ins. Sandvic.
Banksii, *A. Cunn. in Hoot. Comp. Bot. Mag.* **ii. (1836)** 377.-N. Zel.
Baueriana, *Endl. Prod. FT. Norfolk.* 25.—Ins. Norfolk.
Beccarii, *Solms, in Ann. Jard. Buitenz.* **iii. (1883)** 100.—N. Guin.
Bennettii, Miq. PI. Jungh. 167 = javanica.
Brunoniana, Wall. Cat. n. 3660 = angustifolia.
celebica, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 108.—Ins. Celebes.
Cumingiana, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* **t. 38 et t 60.** —Hab.?
cylindracea, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 97.—N. Caled.
Debregasiana, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 37 -= angustifolia.
demissa, *Benn. PI. Jav. Rar.* i. 32.—Ins. Tahiti.
De Vriesei, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79; 96.—Ins. Celebes.
excelsa, *F. Muell. Fragm.* v. 39.—Austral.
Gaudichaudii, *Benn. PI. Jav. Rar.* 31. t. 9.—Malaya; Austral.
graminea, *Blume, Rumphia,* i. 159.—Java,
graminifolia, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 90.—N. Caled.
imbricata, *Blume, Rumphia,* i. 157. t 40.—Ins. Philipp.
inclinans, *Benn. PI. Jav. Rar.* 82.—N. Zel.
insignis, *Blume, Rumphia,* i. 158. t. 42.—Ins. Philipp.
javanica, *Blume, 1. c.* 157. t. 41.—Java.
leucacantha, Miq. Ind. Sem. Hort. Amstelod. (1853) 4 =Pandanus pygmaeus.
luzonensis, *Presl, Epim. Bot.* 238.—Ins. Philipp.
marginata, *Blume, Rumphia,* i. 158.—N. Guinea.
Milnei, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 260, nomen; *Fl. Vit.* 288. t. 86.—Ins. Fiji.
nitida, Miq. Ind. Sem. Hort. Amstelod. (1853) 4 « Pandanus stenophyllus.
Pritchardii, *Seem. Fl. Vit.* 288.—Ins. Fiji,
pycnophylla, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 91.—**Zeylan.**
radicans, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* **432. t. 43**__ Ins. Sandvic.
scandens, *Gaudich. I. c.* t. 42.—Ins. Molucc.
scandens, *Hook, b" Am. Bot. Beech. Voy.* **97.—Ins.** Sandvic.
Schefferi, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 98.—Java.
spectabilis, *Solms, 1. c.* 88.—N. Caled.
sphaerocephala, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* **t 52.—** Hab. I
Storckii. *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 260, nomen; *Fl. Vit.* 283. t. 85.—Ins. Fiji,
strobilacea, *Blume, Rumphia, i.* 156. t. 39.—Ins. Amboin.
tenuis, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 87.—Snmatra.
Urvilleana, *Hombr. V Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zil.* 83.—Ins. Timor.
Victoriperrea, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 103. —Ins. Tahiti

FBETCINETIA :—
vitiensis. *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 260, nomen; *Fl. Vit.* 282. t. 83.—Ins. Fiji.
Walkeri, *Solms, in Linnaea,* xiii. (1878-79) 92.—Zeylan.
Webbiana, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite,* **t. 27.—Hab.«**

FREYERA, Reichb. Handb. 291 (1887) - Chaerophyllum, Linn. (Umbell.).
Biasolettiana,* Reichb. 1. c. (=*Biasolettia tuberosa). —Europ.
congesta, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 88 **(- *Biasolettia congesta).*—Graec.**
cretica, Boiss. & Heldr. 1. c. ii. 101 = C. creticum.
cynapioides, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 366 (*= *Biasolettia tuberosa).*—Ital.; Dalmat.
divaricata, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. ii. 102 **(—*Biasolettia divaricata).*—Graec.**
macrocarpa, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 101 (=*Biasolettia* ***macrocarpa).*—Graec.**
pamassica, Boiss. & Heldr. 1. c. 102 (=*Biasolettia* ***parnassica).*—Graec.**
pumila, Boiss. Fl. Orient, ii. 897.—Graec.
stylosa, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 101.—Graec.
tuberosa,* Reichb. Handb. 291 (= *Biasolettia tuberosa). —Europ.

FREYERIA, Scop. Introd. 208 (1777)=Linocierft, Sw. (Oleac).

FREYLENIA, Brongn. Enum. Gen. 60 (1843) =seq.

FREYIiINIA, Colla, Hort. Ripul. 56 (1S23). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 937-
cestroides, *Colla, I. c*—Afr. austr.
densiflora, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* **ii. (1830.** 55.—Afr. austr.
lanceolata, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 52 — cestroides.
longiflora, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* **ii. (1836)** 55.—Afr. austr.
oppositifolia, Colla, Hort. Ripul. 57 - cestroides.
rigida, G. Don, Gen. Syst. iv. 617—undulata.
undulata, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* **ii. (1838)** 55.—Afr. austr.

FREZIERA, Sw. ex Willd. Sp. PI. ii. 1179 (1799); f Fl. Ind. Occ. 971. t. 19 (1800). *TERNSTROEMIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 183.
EROTEUM, SW. [Soland.] Prod. Veg. Ind. Occ. » (1788).—Cf. Fl. Ind. Occ. ii. 971.
LETTSOMIA, Ruiz & Pav. Prod. 77. t. 14 (1794V
angulosa, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. (18«> 832.—Bolivia,
arbutifolia, *Planch. V Triana, I. c.* Sér. IV. xviu- (1862) 262.—N. Granat.
attenuata, Wall. Cat. n. 1451 - Pyrenaria attenuata.
Bonplandiana, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* **M-** (1847) 335.—N. Granat.
calophylla, *Triana V Planch. I. c.* Sér. IV. *(1862) 261.—N. Granat.
candicans, *Tul. 1. c.* Sér. III. viii. (1847) 328.—> Granat.
canescens, *Humb.* &" *Bonpl. PI. Aequin.* i. 27. « Peruv.
cemua, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* **Sér. III. viii. 0**" 388.—Mexic.
chrysophylta, Humb. & Bonpl. Pi. Aequin. i. 31- — sencea.
cordata, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. viii. (1847) 834.—N. Granat.
dioica, Macfad. Fl. Jamaic. i. 115 = Elaeodendrw dioicum.
dioica, Poepp. ex Tul. in Ann. Sc Nat. Sc&r. I"- * (1849) 161 =Quiina Poeppigiana.
Dombeyana, *Tul. I. c.* viii. (1847) 829.—N. Grao"
elegans, Tul. 1. c. 336 -Cleyera elegans.
florida, Poepp. ex Tul. 1. c. xi. (1849) 167 « florida.
hirsuta, Seem. Bot. Voy. Herald, 87 -sericea.
hirsuta, *Sm. in Rees, Cyclop,* xv. n. 4.—Ins. S.
ilicioides, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. I 837.—Jamaica.
integrifolia, Benth. PI. Hartw. 6-Cleyera u> **folia**
lanata] Tul. in Ann. Sc Nat. Se>. III. viii. (1847) in obs.—canescens.
longipes, *Tul. 1. c.* 827.—N. Granat.
macrophylla, *Tul. 1. c.* 380.—Mexic.

F&EZIERA:—
nervosa, *Hutnb. V Bonpl. PI. Aequin.* i. 31. t. 9.—reruv.
Nimanimae, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 838.—Cuba.
gnnoides, Wall. Cat. sub n. 1460 = Cleyera ochnacea.
lerrottetiana, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 332.—Ins. Guadelonn.
rettelinita, *Humb. & Bonpl. Pl. Aequin.* i. 31. t. 9.—Pe v.
foraimensis, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. v.1847) 339.—Guiana.
salic n?1,,, Choisv> in M«m. Soc. Phv3. GeneT. xiv. (1855) 124-hirsuta.
"""Pea, *Humb. &• Bonpl. PI. Aequin.* i. 29. t. ?.—•Ecuador.
kU^lrosa. *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 330.—N. Granat.
the ??v. Sw. Fl. Ind. Occ. ": 972=Cleyera theoides.
undulata, *Willd. Sp. PI.* ii. 1179; *Sw. I. c.* 9744.-«d. occ.
}ungasia, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. viii. (1847) 333.—Bolivia.

FRIDERICIA, Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1827) Pref. 7. tt. A, B. *BJGNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. "•1032-
t V i ? t'U.Riel*ma> Mart. ,. c. 13.—Bras.
"Peciosa, *Mart. /.* f.—

FRIEPB?CHSTHALIA, A. DC. Prod. x. 173 (1846) = RIEDRICHSTHAL1A, Fenzl-Triehodeama, &. (Borag.).

FRIEDERICIA, Reichb. Consp. 125 (1828) = Fridericia, Mart. (Bignon.).

FRIED ANDIA f m k. Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. *allfl*78t8 = **Diplusodon, Pohl (Lythrar.).**
fora- **Mart. ex DC. Prod. iii. 94(") = D. virgatus.**
"m, ?ham, & Schlecht in Linnaea, ii. (1827) 350 -U. virgatus.
*anF"st**ifolia*, Mart, ex DC. Prod. iii. 94(*) = D. "ttander.
b
"£/?"> dam. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) E*-"?1buxifoUus.
art. in DC. Prod. iii. 94(") = D. *glaucescens* e.
II. 322 = < Mart.exKoehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. Cgglaucescens.
helianthem?,?,?1 **Mart. ex DC Prod. iii. 94(*) = D.** *helianthemifolius*.
hexandra, **Mart.** ex DC. L <> 9*«-D. hexander.
hirsuta, **Cham.** & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 852 = D. hirsutus.
hirtel a, Cham. & Schlecht. L C.-D. microphyllus.
leucat, k II. *VIA*"' Mart. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii.
lythroides, Mart. ex DC. Prod. iii. 94(*) = D. lythroides.
m£ «?? "' Mart. ex DC. 1 - =• 94(»WD. Myrsinites.
*ni«** jITS K- virgatus.
nummular ex DC. Prod. "•9*(d) = D. n't>dns.
xiii. II. 3 £ = DW. gwscens.
parvifolia, Mart. ex DC. Prod. "• 94(°) = D. Pam.
rotund folius.
serpyllif Wha> Mart. ex DC. L <> 94(0 = D. rotundifolius.
334 - £ "' DC. ex Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. II.
stachyot ~P • serpyllifolius.
358 - n ~ "' Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827)
thymi?r ?Uosissimus.
fol VI. Mart Dc Prod 94 ^b) = D serpyllifolius.
vacci Mart. L C. = D. bnxifolius.
verbenaefo Mart. <> 94(«) = D. hirsutus.
villosula, Ma«. 1. c. - D. microphyllus.

FRIE ICHSTHALIA, Fend in Al. NoT. Stirp. 3 (1839) = TrichodeBima, R. Br. (Borag.).
"""MM, Bunge, De. System. Hort> Dorp- (1M3). 7 = canum.
phy T ^ f c ?>nri. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 53-
tr Oldes.
7 = forme.

FRIESEA, Reichb. Norn. 209 (1841)=seq.

FRIESIA, DC. Prod. i. 620 (1824) = Aristotelia. L'Hirit. (Tiliac).
chinensis, Gardn. *Sc* Champ, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 243-=Elaeocarpus chinensis.
fruticosa, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. IV. ii. (1888) 46 = A. fruticosa.
peduncularis, DC. Prod. i. 520 = A. peduncularis.
racemosa, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist iv. (1840) 24 = A. racemosa.

FRIESIA, Spreng. Anleit. ii. II. 885 (1818)=Crotonopsia, Michx. (Euphorb.).
argentea, Spreng. Syst iii. 850=C. linearis.

FKISCA, Spach, Hist. Veg. Phan. x. 460 (1841) = Theaium, Linn. (Santal.).

FBITILLABIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *ULIACEAE*, Benth.& Hook, t iii. 817.
AMBLIRION, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 102.
CORONA, Fisch. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xxi. (1836) 157.
IMPERIALIS, Adans. Fam. ii. 48 (1763) ; TUBS. Gen. 49 (1789).
KOROLKOWIA, Rcgel, Gartenfl. (1878) 161. t. 760.
LILIORHIZA, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 46.
LYPERIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 56 (1866).
MELORIMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 53 (1836).
MONOCODON, Salisb. Gen. PI. Fragm. 56 (1866).
PETILIUM, Linn. Syst. ed. I (1735) ; Hort. Cliff. 119 (1737).
RHINOPETALUM, Fisch. ex Alex, in Edinb. N. Phil. Joura. viii. (1830) 19.
SUSIANA, Linn. Syst. ed. I (1735).
THERESIA, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 232.
TOZZETTIA, Parl. Nuov. Gen. e Sp. 11 (1854).
acmopetala. Baker, in Bot. Mag. t. 6321 = Elwesii.
acmopetala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 104.—Syria.
alba, Kellogg, in Proc Acad. Calif, i. (1873) 45 = liliacea.
alba, *Nutt. Gen. Am.* i. 222.—Am. bor.
altaica. Lam. ex Schult. f. Syst. vii. 397 = verticillata.
aquitanica. Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 2 = pyrenaica.
armena, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 106.—Armenia,
assyriaca, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 265. —Mesopotam.
atropurpurea, *Nutt. in. Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 54.—Am. bor. occ.'
aurea, Schott, in Oesterr. Bot. Wochenbl. iv. (1854) 137=lutea.
autumnalis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 10 = Eucomis undulata.
barbata, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. i. 288 - Calochortus flavus.
biflora, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1663.—Calif,
bithynica, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874)264. —Bithyn.
Boissieri, *Costa, Suplem. Fl. Catal.* 72.—Hispan.
bucharica, *Rcgel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 652. —Bokhara.
Burnett, Hort. Backh. ex Card. Chron. (1879) I. 685 = tubaeformis.
cainschatcensis, *Ker-Gawl. in Bot, Mag.* sub t. 121(5.— As. or.
camtschatcensis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 427=praec.
cantoniensis, Lour. Fl. Cochinch. i. 206 = Disporum pullum.
caucasiea, Adam, in Web. *Sc* Mohr, Beitr. i. 51 = tulipiflora.
caussolensis, Goaty *Sc* Pons, ex Ardoino, Fl. Alp. Marit. S76 = tenelk.
chamarensis, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 148-dagana.
chia, Boiss. ex Nym. Consp. 722 = Pinardi.
cirrhosa, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 51.—Reg. Himal.
collicola, Hance, in Joum. Bot. viii. (1870) 76 = verticillata.
collina, Adam, in Web. *Sc* Mohr, Beitr. i. 50 = lutea.
conica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 105.—Graecia.
comnta, *Hort. Gorenk. ex Schult. f. Syst.* vii. 399, nomen=seq. ? '
Cornuti, *Hort. Dorpat. ex Schult. f. I. c.* nomen.— Hab.?

FBITILLABIA:—
coussolensis, Goaty *Sc* Pons, ex Nym. Consp. 722 — tenella.
crassifolia, *Boiss. V Huet, Diagn.* Ser. II. iv. 108.— As. Min.
cuprea, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Jan. 1836) 192.—Mexic?
dagana, *Tuna, in Flora*, xvii. (1834) I. *Beibl.* 25.— Sibiria.
dasyphylla, *Baker, in Gard. Chron.* (1876) 653.— Lycia.
delphinensis, Gren. ÎL Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. iii 180-tubaeformis.
Ednardi, *Hegel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 653. t. 2.—Bokhara.
Ehrharti, *Boiss. V Orph. Diagn.* Ser. II. iv. 105.— Archip. Graec.
Elwesii, *Boiss. Fl. Orient*, v. 181.—Lycia.
esculenta, Adam, in Web. *Sc* Mohr, Beitr. i. 52=lutea.
esculenta, Nutt. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1874)271°lanceolata.
Fleischeri, Steud. *Sc* Hochst. ex Kunth, Enum. PI. iv. 248=seq.
Fleischeriana, *Steud. (X Hochst. ex Schult. f. Syst.* vii. 888.—As. Min.
Forbesii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 264. —Lycia.
Gardneriana, *Wall. Cat.* n. 5080.—Reg. Himal.
Gemleri, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. v. 110-tenella.
gibbosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 107.—Persia; Afghan.
glaucescens, Willd. in Hort. Berol. (1818).—Cf. Kunth, Enum. PI. iv. 250»lutea.
graeca, *Boiss. & Sprun. Diagn.* Ser. I. vii. 104.— Graecia.
graminifolia. Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 235 - F. Meleagris.
Grayana, Keichb. f. & Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878; 263 - biflora.
Guicciardii, Heldr. *Sc* Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 102-graeca.
Gulielmi-Waldetnarii, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 52 = Roylei.
Hermontis, Fenzl, ex Klatt, in I Iamb. Gartenz. xvi. (1860) 442-crassifolia.
heterophylla, Soland. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1874) 258 =ruthenica.
hispanica, Boiss. *Sc* Reut. Diagn. Ser. II. iv. 101 - lusitanica.
Hookeri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. **(1874)** 269-Lilium Hookeri.
Imperialis, *Linn. Sp. PI.* 303.—Persia; Reg. Himal.
involucrata, *All. Auct. Fl. Pedem.* 34.—Italia.
involucrata, Reichb. Ic. Fl. Germ. x. 8 = tenella.
italica, Schult. f. Syst. vii. 393, in syn.- latifolia.
japonica, *Miq. Ann- Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 158.— Japon.
iamtschatcensis. Fisch. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 181 ^ camtschatcensis.
iamtschatcensis, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 146 = biflora.
Karelini, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1874) 268 - gibbosa.
Kotschyana, Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 43 = latifolia.
kurdica, *Boiss. V Noe, Diagn.* Ser. II. iv. 103.— Kurdistan.
lanceolata, *Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 230.—Am. bor. occ.
lanceolata, Torr. Bot. Mex. Bound, t. 61-biflora
latifolia, Frivsild. ex Nym. Consp. 722 — graeca.
latifolia, *Willd. Sp. PL* ii. 92.—Keg. Caucas.; Persia.
leucantha, Fisch. ex Schult. f. Syst. vii. 897 - veiticillata.
libanotica, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 270. —Syria.
liliacea, *Lindl. Bot. Reg.* sub t 1663.—Calif.
linophylla, Doumenjou, ex Nym. Consp. 721 - pyrenaica.
longifolia. Hill, Vcg. Syst. xiii. 63 = Eucomis undulata.
longifolic Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 146 = meleagroides.
lurida, Salisb. Prod. 287 = pyrenaica.
lusitanica, *Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1821) 862.—Lusitan.
lutea, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 4 ; *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 269.—As. Min.; Reg. Caucas.
lutea, Reichb. Ic. Fl. Germ. 10. t. 975 -=F. Meleagris.
lycia, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. I. xiii. 20 - acmopetala.

IFRWTLLA-RIA...

macrandra, Baker, in Gard. Chron. (1875) I. 715 = Ehrharti.
macTophylla, D. Don, Prod. Fl. Nep. 61 = Lilinm roseum.
major. Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xiv. (1874) 254 = F. Meleagris.
Meleagris, Ambros. Fl. Tyr. Austr. i. 580 = tubaefonnis.
Meleagris, Bivona, PI. Sic. ii. 26=messanensis.
Meleagris, Brot. Fl. Ltuit. i. 620 - lusitanica.
Meleagris, Falk, Beitr. ii. 158=meleagroides.
Meleagris, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 188 - pyrenaica.
Meleagris, *Linn. Sp. PI.* 304.—Enrop.; Reg. Caucas.
Meleagris, Pall, ex Schult. f. Syst. vii. 391 = racemosa.
Meleagris, Tenore, Fl. Nap. iii. 369-tenella.
meleagroides, *Patrin, ex Schult. f. Syst.* vii. 895.—Sibir.
messanensis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 610 = lusitanica.
messanensis, *Safin, in Desv. Journ. Bot.* iv. (1814) 272.—Reg. Mediterr.
minor, Ledeb. Fl. Alt. ii. 84= meleagroides.
minota, *Boiss. (f Not, Diagn.* Ser. II. iv. 104.—Kurdist
Moggridgei, Hort ex Flor. Mag. N. S. t. 405=tubaeformis.
montana, Hoppe, in Flora, xv. (1832) II. 476=tenella.
montana, Sang, in Atti Acad. Pont. Lincei, Ser. I. xv. (1862) 29 = F. Meleagris.
multiflora, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. (1855) 57 = parviflora.
multiscapidea, Kellogg, L c. 46 = Erythroninm porpurascens.
Munbyi, *Baker, in Card. Chron.* (1877) I. 45.—Algeria.
tnutica, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1668 = lanceolata.
nana, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 9 = Encomia nana.
neglecta, Parl. Fl. Ital. ii. 416= lusitanica.
nervosa, Unio Itin. (1829) ; ex Baker, in Jonrn. Linn. Soc xiv. (1874) 261 = lusitanica.
nervosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 864—pyrenaica.
nigra, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = pyrenaica.
nobilis, Salisb. Prod. 236—persica.
obliqua, *Ker-Gaal. in Bot. Mag.* t. 857.—Graecia.
Olivieri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 261.—Persia.
olympica, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 282 = pontica.
oranensis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 253; *Poit, in Rev. Hortic.* (1881) 80.—Algeria.
orientalis, Adam, in Web. & Mohr, Beitr. i. 50 - tenella.
orientalis, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 145-lutea.
Orsiniana, Parl. Fl. Ital. ii. 411=tenella.
oxypetala, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* i. 888.—Reg. Himal.
pallida, Salisb. Prod. 237=F. Meleagris?
pallidiflora, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 5.—Sibir.
parviflora, Mart. Hort. Monac (1888).—Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 102=tulipifolia ?
parviflora, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 146.—Calif.
persica, S. G. Gmel. It. i. 66 - rnthenica.
persica, *Linn. Sp. PI.* 304.—Armenia.
persica, Pall, ex Knnth, Ennm. PI. iv. 250 - latifolia.
Pinardi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 106.—As. Min.
plantaginea, Pers. Syn. i. 859—seq.
plantaginifolia, *Lam. Bncyc.* ii. 550.—Oriens.
plnriflora, *Torr. ex Benth. PI. Hart™.* 838.—Calif,
pontica, *Wahlenb. in Bergg. Resor,* ii. *Bihang,* 27.—Byzant.; As. Min.
praecox, Hort. ex C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 10 = F. Meleagris.
praecox, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 426.—Europ. anstr.
Przewalskii, *Maxim, in Trautv. Regel, Maxim, et Winkl. Dec. PI. Nov.* 9.—As. or.
pterocarpa. Stocks, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 180 =gibbosa.
pudica, *Spreng. Syst.* ii. 64.—Am. bor. occ.
punctata, J. F. Gmel. Syst. 545 = Eucomis punc'tata.
purpurea.O. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 288 = Calochortus Bonplandianus.
pyrenaea, Gren. in Acad. Sc. Beganc. Séances Pnbl. (1838) 147= pyrenaica.
pyrenaica, Georgi, Beschr. Rnss. Reich. III. iv. 900 = meleagroides.
Pyrenaica, Gu«s. Cat. (1821) 26=messanensis.
pyrenaica, Host, Fl. Ansti. i. 126= tenella.

FRITHJIIARIA :—

pyrenaica, *Linn. Sp. PI.* 804.—Mont. Pyren.
pyrenaica, Pall. Reise.i. 147 =ruthenica.
pyrenaica, Sibth. *Sc* Sm. FL Graec. L 828=graeca.
pyrenaica, Urv. in Me"m. Soc. Linn. Par. i. (1822) 294 • pontica.
pyrenaica, Webb, ex Nym. Consp. 722 •» lnsitanica.
racemosa, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 952-tenella.
racemosa, Kunth, Enum. PI. iv. 249, ex parte = pyrenaica.
racemosa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7=tnl!pifolia.
racemosa, *Sm. in Rees, Cycl.* xv. n. 6 ; *Schult. f. Syst.* vii. 891.—Reg. Caucas.
recurva, *Benth. PI. Hartvj.* 340.—Am. bor. occ.
regia, tinn. Sp. PI. 808 = Eucomis nana.
Reuteri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. v. 57.—Persia.
Reygassii, Boiss. & Blanche, ex Boiss. Fl. Orient, v. 180 = acmopetala.
rhodocanakis, *Orph. in Atti Congr. Bot. Mr.* 1874 (1876) 214, nomen; *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 323.—Archip. Graec.
Roylei, *Hook. 1c. PI.* t 860.—Reg. Himal.
ruthenica, *Wikst. in Vet.Akad. Handl. Stockh.* (1821) 358.—Reg. Caucas.
scandens, Fisch. ex Schult. £ Syst. vii. 397 = verticillata.
Schliemanni, *Sintenis, in Illustr. Hortic.* xxxi. (1884) 106.—As. Min.
serotina, Schult. f. Syst. vii. 895, in syn.=pyrenaica.
Sewerzowi, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xli. (1868) I. 443.—As. centr.
Sibthorpiana, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 275.—Graecia.
stenophylla, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iv. 100 = lusitanica.
tardiflora, Lehm. ex Schult. f. Syst. vii. 399 = pyrenaica ?
tenella, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 269.—Europ.; Reg. Caucas.
tenella, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 102.—Europ.
tenella, Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1821) 856 = racemosa.
tesselata, Salisb. Prod. 236 = F. Meleagris.
thessalica, Sprun. ex Nym. Consp. 722=graeca.
Thomsoniana, D. Don, in Royle, Illustr. Bot. Himal. i. 388 = Lilium Thomsonianum.
Thunbergii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 157 = verticillata.
tristis, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 104 = obliqua.
tubaeformis, *Gren. (f Godr. in Mem. Soc. Emul. Doubs* (1854); *ex ear. Fl. Fr.* iii. 180.—Europ. austr.
tulipaefolia, Sprun. ex Nym. Consp. 722-graeca.
tulipifolia, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 270.—Rig. Caucas.
tulipifolia, Bory *Sc* Chanb. Fl. Pélop. 98=conica.
umbellate, Mill. Gard. Diet, ed VIII. n. 5 = pyrenaica.
usuriensis, *Maxim, in Trautv. Regel, Maxim, et Winkl. Dec. PI. Nov.* 9.—Reg. Amur.
verticillata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i 268= ruthenica.
verticillata, Wall. Cat. n. 5079 A=cirrhosa.
verticillata, *Willd. Sp. PI.* ii. 91.—Sibir.
viridia, Kellogg, in Proa Calif. Acad. ii. (1863) 9 = lanceolata.
Waldemari, Pritz. Ic Ind. ii. 126=Gulielmia Waldemarii.
Walnjewi, *Regel, Gartenfl.* (1879) 353.—Turkestan.
Woluewi, Regel, 1. c t. 993=praec.

FRITTILLARIA, Scop. Introd. 83 (1777)-praec.

FRITSCHIA, Walp. Rep. ii. 126 (1843) = seq.

FBITZSCHIA, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 897. *MELASTOMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ i. 748.
anisostemon, *Cham. 1. c.* 399.—Bras.
erecta, *Cham. 1. c.*—Bras,
integrifolia, *Cham. I. c.* 398.—Bras.
punctulata, Naud. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xii. (1849) 279=erecta.

FRIVALDIA, EndL Gen. 384 (1838)=Mieroglossa, DC. (Compos.).
volubilis, Zoll. *Sc* MOT. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 231=M. volubilis.

FRIVALDZKIA, Reichb. Nom. 86 (1841)=praec

FROEBELIA, Regel, Gartenfl. i. (1852) 164. t. 18 = Aorotriohe, K. Br. (Epacrid.).
fasciculiflora, Regel, 1. c = A. fasciculiflora.

FROEHLICHIA, D. Dietr. Syn. PI. i. 419,454 (1839) - FROELICHIA, Vahl = Couasarea, Aubl. (Rosac).

FROEHLICHIA, EndLEnch. 185 (1841)=Froeliehia, Moench (Amarant.).

FROEHLICHIA, Pfeiff. Nom. i. 1378 (1874) -FROELICHIA, Wulf. = Kobresia, Willd. (Cyperac).

FBOEIiICHIA, Moench, Meth. 50 (1794). *AMARANTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 41.
HOPLOTHECA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 52 (1826).
LOPHOCARPUS, Link, Diss. Bot. Siierin. (1795) 62.
NINANGA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 76 (1836), partim.
OPLOTHECA, Nutt. Gen. Am. ii. 78 0.818).
Drummondii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 421.—Am. bor.
fioridana, *Moq. 1. c.* 420.—Am. bor.; Ind. occ.
gracilis, *Moq. I. c.*—Am. bor.
Humboldriana, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 166.—Bras.
interrupta, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 421=lanata.
lactea, Heynh. Nom. ii. 248=Aervasanguinolenta.
lanata, *Moench, Meth.* 50.—Mexic.
lanata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 422 = Humbol'ltiana.
Moritaiana, Klotzsch, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. i. 166 = tomentosa.
nudicaulis, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 192.—Ins. Galapag.
sericea, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 422.—Bras,
tomentosa, *Moq. in DC. 1. c.* 421.—Bras.

FROELICHIA, Vahl, Eclog. Am. Praef. 3 (17»6)« Cousaarea, Aubl. (Rubiac).
paniculata, Vahl, 1. c. = C. Froelichia.
uniflora, Spreng. Syst. ii. 406 = Myonima multiflora.
violacea, Spreng. 1. c.=Loranthus tetrandrus.

FROELICHIA, Wulf. ex Roem. & Schult. Syst. ft I?[6]' in syn. (1817); Fl. Nor. 729 (1858)-Kobreai*. Willd. (Cyperac).
caricoides, Wulf. ex Roem. & Schult. 1. c. = K. scirp"[1]*[1]

FROLOVIA, Ledeb. ex DC. Prod. vi. 538 (1887) = Sauasurea, DC. (Compos.).
lytata, Ledeb. ex DC. 1. c - S. Frolovii.

FBOPIERA, Bouton, ex Hook. f. in Joum. Linn. *Soc-* v. (1861) 2. t 1. *MYRTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. '• i. 725.
PSILOXYLON, Thou, ex TuL in Ann. Sc Nat. *Sit-* IV. vi. (1856) 188.
mauritiana, *Bouton, ex Hook.f. in Journ. Linn. Soc-* v. (1861) 2.—Ins. Maurit.

FRORIEPIA, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 362 * Carum, Rupp. (Umbellif.).
nuda, C. Koch, 1. c — C. segetum.
subpinnata, Baill. Hist. PL vii. 220=C. segetum.

FROSCULA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 44 (1836) =Dendrobium, Sw. (Orchid.\
hispida, Rafin. 1. c = D. longicomu.

FROSTIA, Bert, ex Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. !'• "• (1834) 19 = Apodanthes, Poit. (Cytin.).
Berterii, KarsL in Nov. Act. Nat. Cur. xxvi. (1858) 922 = A. Berterii.
Blanchetii, Karst. 1. c.»A. Blanchetii.
Calliandrae,K<int. 1. c. 921 = A. Calliandra.
parasitica, Bert, ex Steud. Nom. ed. II. i. 648 = "' Berterii.

FRUCTESCA, DC. in Meissn. Gen. 259; Corom- J* (1839) = Qaertnera, Lam. (Loganiac).

FRUTESCA, DC. ex A. DC. in Prod. ix. 32 (1845) * praec.

FUCHSIA, [Plnm.] Linn. Syst. ed. I (1735); ed. I. 27 (1737). *ONAGRARIEAE,* Benth. & t ti. 790.
BREBISSONIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. J* (1835) 175 ; Hist. *Vig.* Phan. iv. 401 (1885).
DORVALLA, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 565 (17»
ELLOBIUM, Lilia, in Linnaea, xv. (1841) 262.
ENCMANDRA, Zucc. in Abh. Akad. MueneB- (1887) 335.
KIRSCHLEGERIA, Reichb. Handb. 246 (1837)-

FUCHSIA:—
LYCIOPSIS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser.II. iv. (1835) 176.
MYRINIA, Lilja, Fl. Sveriges, Suppl. i. 25 (1840).
NAHUSIA, Schneev. Ic. 21 (1798).
QUELUSIA, Vand. Fl. Lusit. 28. f. 10 (1788); Roem. Script. Hist Lusit. 101 (1796).
SCHUFIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. iv. (1835) 177.
SKINNERA, Forst Char. Gen. 57. t 29 (1776).
MACHIA, Lilja, Traedgardtidning (1840) 62; ex Linnaea, xv. (1841) 262.
THILEUM, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 146 (1810).
ILCO, Adans. Fam. ii. 498 (1763).
"eyni/olia, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. (1847) 226 = parviflora.
Wnis, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 274 = integrifolia.
alpestris, *Gardn. in Sot. Mag.* t. 8999.—Bras.
arborescens, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod, iii 87= tnymifolia.
TZ°V^ Hort ex DC - *«*>• >• c = arborescens.
»"npliata, *Bentk. PI. Hartw.* 178.-N. Granat.
[a]Petala. *«,-8 & Pav. m Per 'm 89 t 32-2.* Peruv.
"borescens, *Sims, Bot. Mag.* t 2620.—Mexic.
ayavacensis, *H. B. v. K. N<» to". »*. Sp.* **vi. 107.-** Peruv.
wicllaris, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1480.—Chili,
ooiiviana, *Carr. in Rev. Hortic.* (1876) 150.—Bolivia.
WMscens, *Bentk. PI. Hartw.* 179.-N. Granat
caracasana, *Field, (f Gardn. Sert. PI.* t. 29.—Venezuela.
chonotii, Chili. *011, Pha, in Linnaea, XX¥ia- (1858> 687-~*
coccinea, Curt. Bot. Mag. t. 97 - macrostemma.
coccinea, *^Soland- •»] Ait- H»rt. Kew.* **ed. I. ii. 8.—** Bras.
^ ? S . ? « « I . / . *Handb. N. Zeal. Fl.* 728.—N. Zel.
wwertifoba, *Field. & Gardn. Sert. PI.* t. 28.—Peruv.
corallodendron, *Lindl Bot Reg- *• 1062 = macrostemma. X > Hort ex Paxt Mag Bot Gard Orh Ion. (1883) II 604
cordifolia, *f ehtH. Hari~-* **74.-Mexic.**
corollata, *Ben*. 1. c.* **179=petiolaris.**
corymbiflora, *Ruin &• Pav. fl. Per.* **iii. 87. t. 325.—** Peruv.
corymbosa, Pritz. Ic Ind. i. 469, sphalm.=praec.
cuneiflora *Benth Pl- *«*•• W.-Peruv.*
cylindracea, *Lindl Bot Regl (1888) Misc- 64* = Parviflora
*2|!"a/«. R- Grah. in Edinb. Bhil. Joum. xi. (1824) *«o, 401 = macrostemma.
decussata *iw*.1 **"* ^'"•m_Per_ai_88>'•823-f-b-~*
denticulata, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* **iii. 87. t. 325.—** Peruv.
dependens, «*,*. /c. w . , . 65.—N. **Granat.**
discolor *Undl> ^^ Re8- *• 1805=macrostemma.*
Domeyana, *nlTf"1"*, Hort ex Fl des S61TM- S"- L* **x.** (1854-55) 95. t 1004.
elegans, *5" 1'' Paxt- ex* **Steud. Nom. ed. II. L 649 =** elobosa.
Enfl(|wiSaliso- Ic. Stirp. Ic. Rar. 18=coccinea.
exoniensis, *Stntd. Nom.* **ed. IL i. 649.—Mexic.**
exoniensis, *»»»«-/- S«A»%* **217.-N. Zel.**
fascicularis, *lino?*** Paxt Magr Bot x- (W3) 15S=coral,*
fulgens, *Moç. & Ses*** S9.—Mexic.
globosa, *Lindl. Bot.* je.y. t. 1556.-Mexic.
gracilis, Lindl. l. c. 847=macro.temma.
gracilis, [Moç. & Sesse,] ex DC. *Prod iU 37 = micr0*
Hartwegii, *Benth. Pl. Hartw.* **179.—N. Granat**
hirsuta, *Hemsl. in Journ. Bot.* **xiv. (1876)** *69>—Perav>*
hirtella, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* Granat. *"• 107-~N-*
insignis, Ecuad *emsL in 7<mrH, Sot_xiv,, (1876) 69 ~,,*
integrifolia 278. *Cambess in st m m Bras Mer* **iL**
interme B, *Kirkit, ** emsL DC & P'- If"-1*—* **Mexic.**
(1868) 9 *--Kiri> in Trans_N_z_lHSt l*
Lenneana, (1852) 293.—Boliv *OHo ,, Dietr, Mlg, Garteaz,*
longiflora, *Benth. Pl. Hartw.*
loxensis, *H. B. & K. Nov. Gen. Peruv.* —Ecuador.

PTTCHSIA:—
lydoides, Andr. Bot. Rep. t. 120 = rosea.
macrantha, /^oo*. ^a<. Afiz^. t. 4233.—N. Granat.
macropetala, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 28.—Peruv.
macrostemma, *Ruit V Pav. Fl. Per.* iii. 88. t. 324. f. 6.—Chili; Fuegia.
macrostigma, *Benth. PI. Hartw.* 129.—N. Granat
magellanica. Lam. Encyc. ii. 564=macrostemma.
membranacea, *Hemsl. in Joum. Bot.* xiv. (1876) 70. —Venezuela,
microphylla, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* **vi. 103.—** Mexic.
miniata, *Planch. V linden, in Fl. des Serres,* **Sér. I.** viii. (1852-63) 7.—N. Granat.
minimiflora, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 14.—Mexic.
minotiflora, *Hemsl. 1. c.* 15.—Mexic.
mixta, *Hemsl. 1. c.*—Mexic.
montana, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* **ii. 275.—** Bras.
multifiora, Murr. Syst. ed. XIII. 299 »macrostemma.
nigricans, *Linden, in Fl. des S*rres, Sit.* **I. v. (1849)** t. 481.—Venezuela.
Notarisii, *lehm. in Hamb. Garten*, viii. (1852) 459.—Hab.?
ovalis, *Ruiz* b[1] *Pav. Fl. Per.* iii. 87. t. 323. £ a.—Perav.
ovata, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. iii. 87-parviflora?
panieulata, Lindl. in Gard. Chron. (1856) 801 - arboresccns.
parviflora, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1048.—Mexic.
parviflora, Zucc. in Abh. Akad. Mnench. ii. (1831-86) 337 = F. Eucliandra.
pendula, Salisb. Prod- 279 = macrostemma *vel* coccinea.
pendulaeflorax, Hort—Cf. Gard. Chron. (1877) I. 521.
petiolaris, *//. B. Cf* K. NOV. Gen. et Sp.* vi. 104.—Bras.
pilosa, Field. *Be* Gardn. Sert. PI. t 27=ovalia.
proenmbens, *R. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* **iii. (1839)** 31.-N. Zel.
prostrata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1880) 270, nomen=praec. ?
pubescens, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* **ii. 275.** —Bras.
pyrifolia, Presl, Symb. Bot. ii. 19 = integrifolia.
quinduensis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* **vi. 105.—** Peruv.
racemosa, *Lam. Encyc.* ii. 565.—Ins. S. Doming.
radicans, Miers, ex Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 78 = integrifolia.
recurvata, Niven, ex Hook. Bot. Mag. sub t. 3521-- macrostemma.
Riccartoni, Hort. ex Tillery, in Flor. et Pom. (1871) 217=macrostemma ?
robusta x, Tengbergen, in Tuinb. Fl. ii. (1855) 84S, cum tab.
rosea, *Ruii V Pav. Fl. Per.* iii. 88.—Chili,
salidfolia, *Hemsl. in Joum. Bot.* xiv. (1876) 70.—N. Granat.
scabriuscula, *Benth. PI. Hartw.* 177.—N'. Granat.
serratifolia, *Ruii V Pav. Fl. Per.* iii. 86. t. 323.—Peruv.
sessilifolia, *Benth. PI. Hartw.* 176.—N. Granat.
simplicicanlis, *Ruiz V Pav. Fly Per.* iii. 89. t. 322.—Peruv.
spectators, *Hooh. Bot. Mag.* t. 4375,-^Ecuador.
spinosa, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 26. t. 51.—Chili.
splendens, Benth. PI. Hartw. 61 = intermedia,
splendens, *Zucc. in Flora,* xv. (1832) II: *Beibl.* 102.—Mexic.
Standishiix, Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 33.
sylvatica, *Benth. PI. Hartw.* 176.—N. Granat.
syringaeflora, Carr. in Rev. Hortic. (1873) 311-arborescens.
tenella, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 156 - macrostemma.
tetradactyla, lindl. in Journ. Hort. Soc. i. (1846) 804 = F. Eucliandra.
thymifolia, *H. B. h" K. Nov. Gen. et Sp.* **vi. 104.—** Mexic.
triphylla, *Linn. Sp. PI.* **1191;** *H. B.tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 104.—Mexic.
umbrosa, *Benth. PI. Hartw.* 176.—N. Granat.
venuita, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **vi. 105.—N.** Granat
verrucosa, *Hartw. ex Benth. PI. Hartw.* **178.—Peruv.**
virgata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. 1. 485, nomen.—Mexic

FUCHSIA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 62 (1788) - Bchradera, Vahl (RubiacO-
involucrata, Sw. 1. c.=S. Cephalotes.

FTTEBITBOHBIA, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 356. Gen. dub. *VMBELL.—CI.* Benth. & Hook. f. i. 872.
selifolia, *C. Koch, I. c*—Oriens.

FU0O8IA, Juss. Gen. 274 (1789). *MALVACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 208.
ALOGYNE, Alef. in Oestr. Bot Zeitschr. xiii. (1868) 12.
BOMBYCOSPERMUM, Picsl, Rel. Haenk. ii. 137. t. 71 (1831).
CIENFOGOSIA, Cav. Diss. 174. t. 72. f. 2 (1786).
ELIDURANDIA, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 450.
REDOUTEA, Vent. Hort. Cels, t. 11 (1300).
affinis, A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 253 - phlomidifolia.
australis, *Benth. Fl. Austral,* i. 220.—Austral,
campestris, *Benth. in Hoot. Journ. Bot.* **iv. (1842)** 120.—Guian.
cuneata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 68.—Ecuador,
cuneiformis, *Benth. Fl. Austral,* i. 219.—Austral,
digitata, *Pers. Syn.* ii. 240.—Afr. trop.
Drummondii, *A. Gray, PI. Wright,* i. 23.—Texas,
flaviflora, *F. Muell. Fragm.* v. 44.—Austral.
Gerrardii, *Harv. in Harv. (7 Sond. Fl. Cap.* **iL 688.—** Afr. austr.
hakeaefolia, *Hook. Bot. Mag.* t. 4261.—Austral,
heterophylla, *Spach, Hist. Vig. Phan.* iii. 397.—Am. anstr.
latifolia, *Benth. Fl. Austral, i.* 221.—Austral.
lilacinus, G. Don, ex Loud. Encyc. PI. Suppl. ii. 1426- hakeaefolia.
phlomidifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 253.—Bras.
populifolia, *Benth. Fl. Austral* i. 221.—Austral,
punctata, *Benth. 1. c.* 220.—Austral,
punctata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxl. (1858)** I. 196.—Bras.
retusa, *Turcz. 1. c.* 197.—Venezuela.
Robinsoni, F. Muell. Fragm. ix, 126 = Gossypium Robinsoni.
sulfarea, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 252.—Brat,
thespesioides, *Benth. Fl. Austral, i.* 220.—Austral,
tripartite, *Steud. Nom.* ed. II. i. 649.—Am. austr.
triphylla, *Hani, in Harv. & Sond. Fl. Cap.* **ii. 688.—** Afr. austr.

FULCALDEA, Pbir. Encyc. Suppl. v. 375 (1827)=-Barnadesia, Mutis (Compos.).
laurifolia, Poir. 1. c.—Peruv.
tomentosa, Less, in Linnaea, v. (1830) 248 = Vernonia Monosis.

FUIRENA, Rottb. Desc et Ic. PI. 70. t. 19 (1773). *CYPERACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1053.
VAGINARIA, Pen. Syn. i. 70 (1806).
arenosa, R. Br. Prod. 220—glomerata.
aristulata, Steud. Syn. PI. Cyp. 127 = simplex.
bahiensis, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 288-robusta.
canescens, Vahl, Euum. ii. 385 — umbellata.
capitata, Willd. ex Kunth, Euum. PI. ii. 186- umbellata.
Cephalotes, Schrad. in Goett Anz. (1821) III. 2071 = hirta.
chlorocarpa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 159.—Afr. trop.
ciliaris, Nees, in Wight, Contrib. 93 •= uncinata.
dliaris, Roxb. Hort. Beng. 81; Fl. Ind. i. 180- glomerata.
ciliata, Lepr. ex Steud. Syn.. PL Cyp. 126 •= glomerata.
cinerascens, *Boj. ex Ridl.in Trans. Linn. Soc.* **Ser. 11.** ii. (1884) 161.—Afr. trop.; Madag.
coerulescens, *Steud. in Flora,* xii. (1829) 153.—Afr. anstr.
complotricha, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 177-umbellate.
cuspidata, Ecklonii, *Nees, in Linnaea,* x. (1836) 143.—Afr. austr.
erioloma, Nees, 1. c ix. (1884) 288 = hirta.
filifolia, Reichb. ex Kunth, Enum. PI. ii. 809 *(-Elynanthus cuspidatus).*—**Afr. anstr.**
glabra, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 650-hirta.

FUIKENA:—
glabra, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 757 = microlepis.
glabra, *Kunth, Enum. PI.* ii. 182.—Afr. austr.
glabrata, Stead. Syn. PI. Cyp. 127 = robusta.
glomerata, Boj. Hort. Maurit. 282=umbeUata.
glomerata. *Lam. Illustr.* i. 150.—Geront. trop.
gracilis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 181.—Bras.
gracilis, Spreng. Nov. Prov. 46 = Rynchospoia tenuis.
guianensis, Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Brit. Gni. 895, 1061, 1111 = umbellata.
haemaglottis, Stend. Syn. PI. Cyp. 126 = umbellata.
hexachaeta, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 69 = incomplcta.
Hildebrandtii, Boeck. in Flora, lxv. (1S82) 15 = glomerata.
hirta, *Vahl, Enum.* ii. 387.—Afr. austr.
hispida, £11. Sketch, i. 579 = simplex,
incompleta, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 107.—Brae.
intermedia, Kunth, Enum. PI. ii. 181 = hirta.
latifolia, Steud. Syn. PI. Cyp. 126 = robusta.
leptostachya, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 168.—Afr. trap.
macrostachy a, Boeck. in Engl. Bot.Jahrb. v. (1884) 507 = pachyrrhiza.
mauritiana, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 288 = umbellata.
microlepis, *Kunth, Enum. PI.* ii. 182, partim = gracilis.
microstachya, *Boeck. in Linnaea*, xxxviii. (1874) 398.—Guian.
mollicula, Kunth, Enum. PI. ii. 182 = cocrulescens, Ecklonii.
nana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 497.—Abyssin.
obtusiflora, Vahl, Eclog. Am. ii. 8 = simplex.
ochreata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 288 = glomerata.
pachyrrhiza, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 161.—Afr. trop.
paniculata, Linn. f. Suppl. 105 = umbellata.
pentagona, *Schum. in Schum.* &• *Thonn. Beskr. Guin. PI.* 42.—Afr. trop.
pentagona, Wight & Arn. Contrib. 93 = umbellata.
pubescens, *Kunth, Enum. PI.* ii. 182.—Afr.; Corsica.
pumila, Spreng. Syst. i. 237=squarrosa.
pygmaea, *Welw. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 160.—Afr. trop.
quinguangularis, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 3 = umbellata.
rivularis, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 288 - umbellata.
robusta, *Kunth, Enum. PI.* ii. 185.—Bras.
Rottboellii, Nees, in Wight, Contrib. 94=glomerata.
rubiginosa, Spreng. Fl. Hal. Mant. 29 = Cladium glomeratum.
Schiedeana, Kunth, Ennm. PI. ii. 183=simplex.
schizophylla, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 178 = robusta.
Schweinfurthiana, Boeck. in Flora, lxiii. (l«80) 438 = leptostachya.
scirpoidea, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 38.—Am. bor.
simplex, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 8.—Am. austr.
squarrosa, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 37.—Am. bor.
striata. Llanos, Fragm. 21=glomerata.
stricta, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 128.—Afr. trop.
tereticulmis, Presl, Rel. Haenk. i. 186=umbellata.
Thouarsiana, Kunth, Enum. PI. ii. 186 = umbellata.
Torreyana, Beck, Bot. N. & M. St. 42!)»squarrosa.
umbellata, *Rottb. Desc. et Ic. PI.* 70. t. 19. £ 8.—Amphig. trop. et subtrop.
uncinata, *Kunth, Enum. PI.* ii. 184.—Ind. or.
uncinata, Wall. Cat. n. 3534 ; et ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 347= umbellata.
verticillata, Spreng. Nov. Prov. 47=Lagenocarpus rigidus.
WaUichiana, *Kunth, Enum. PI.* ii. 182.—Ind. or.
Weigelti, Spreng. t Tent. Suppl. Syst. Veg. 4 = umbellata.
Welwitschii, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1884) 161.—Afr. trap.

FULCHIRONIA, Leseh. in Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 29 (1829) = Phoenix, Lin. (Palm.).
senegalensis, Lesch. 1. c.-R. spinosa.

FULLARTONIA, DC. Prod. v. 281 (1836) = **Doronicum**, Linn. (Compos.).
kumaonensis, DC. 1. c. = D. Roylei.

FUMANA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. IL vi. (1888) 359 = Helisnthemum, Tourn. (Cistin.).
aciphyUa, Boiss. Fl. Orient, i. **449.**—As. Min.

FUMANA :—
arabica, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 359 = H. arabicum.
Arbuscula, Ball, in Joum. Bot. xi. (1878) 300 - H. calycinum.
calycina, Clauson, ex Ball, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 349 = H. calycinum.
canariensis, Kafin. Sylva Tellur. 132 - H. canariense.
ericifolia, Wallr. Beitr. Fl. Heroyn. 214 = H. Fumana?
ferruginea, Rafin. Sylva Tellur. 132.—Hab. ?
Fontanesii, Clauson, ex Pomel, Mat. Fl. Atl. 10 = H. Fontanesii.
glutinosa, Boiss. Fl. Orient, i. 449 - H. glutinosum.
grandiflora, Janb. *Sc* Spach, Illustr. iii. 73 = H. vulgare ?
hispidula. Lose. & Pard. Ser. Inc. PI. Arag.ed. 1.12 = H. hirtum ?
laevipes, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. vi. (1836) 359 - H. laevipes.
minor, Nym. Consp. 76 = H. procumbens.
minor, Rafin. Sylva Tellur. 132 = H. Fumana.
montana, Pomel, Mat. Fl. Atl. 10 = H. montanum.
oligosperma, Boiss. *Sc* Kotschy, in Boiss. Fl. Orient, i. **448.**—Syria.
pinifolia, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 213.—Europ.
polifolia, Rafin. Sylva Tellur. 132 = H. polifolium.
procumbens, Gren. *Sc* Godr. Fl. ,Fr. i. 173 = H. procumbens.
scoparia, Pomel, Mat. Fl. Atl. 10.—Alger.
Spachii, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. i. 174 = H. .Fumana.
viscida, Spach, in Ann. Sc Nat. Se'r. II. vi. (1836) 859 = H. glutinosum.
vulgaris, Spach, 1. c. = H. Fumana.

FUMANOPSIS, Pomel, Mat. Fl. Atl. 9 (1860) = Helianthemum, Tourn. (Cistin.).
glutinosus, Pomel, 1. c. = H. glutinosum.
laevipes, Pomel, 1. c. = H. laevipes.
thymifolia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1668) 840 = H. glutinosum.

FUMARIA, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
PAPAVERACEAE,.Benth. *Sc* Hook. f. i. 56.
DISCOCAPNOS, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 569.
PLATYCAPNOS, Bcrnh. in Linnaea, viii. (1833) 471.
RUPICAFNOS, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 (1860).
abyssinica, *Hammar, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* Ser. III. ii. (1856-58) 275.—Abyssin.
acaulis, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 208 = Corydalis ochroleuca.
acrocarpa, Peterm. ex Hammar, in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. Ser. III. ii. (1856^8) 270 = Schleicheri.
aegyptiaca, Steinh. in Guill. Arch. Bot. i. (1883) 416 = densiflora.
affinis, Griff. Notul. iv. 719 = parviflora.
affinis, Hammar, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. III. ii. (1856-58) 295 = media,
africana, *Lam. Encyc.* ii. 569.—Afr. bor.
agraria, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. i. 67 =major.
agraria, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 21.—Reg. Mediterr.
alba, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = Corydalis lntea.
albiflora, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 491=Corydalis albiflora.
alexandrina, Ehrenb. ex V. Tenore, in Bull. Ace. Asp. Nat. i. (1842) 24=judaica.
alexandrina, Gasp, iu Rendic. Ace. Sc. Napoli, i. (1842)51=capreolata.
altaica, Ledeb. in Mém. Acad. Sc Pétersb. v. (1812) 551 = Corydalis pauciflora.
amarysia, *Boiss. If Heldr. er Boiss. Fl. Orient*, i. 138.—Graecia.
ambigua. Pall, ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 558 = Corydalis ambigua.
anatolica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 14.—Europ. austr.; As. Min.
angustifolia, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 14 6=Corydalis angustifolia.
angustifolia, Gilib. Fl. Lituan. ii. 113 = officinalis.
apiculata, Hammar, in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. Ser. III. ii. (1856-58) 287=muralis.
apiculata, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1854) 23; in Ann. Sc Nat. Sir. IV. ii. (1854) 371 = media.
aquilegifolia, Pair, ex DC. Syst. ii. 116 = Corydalis pauciflora.
arundana, *Boiss. ex Wiltk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 880.—Hispan.

FUMARIA:—
asepala, *Boiss. Fl. Orient*, i. 135.—As. Min.
atlantica, *Coss. V* **Dur.** *in Willk.* b" *Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 888, nomen.—Afr. bor.
aurea, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 740 -Corydalis aurea.
Bastardi, Bor. in Duch. Rev. Bot. ii. (1847) 359 = media.
biaurita, Vahl, ex Steud. Norn. ed. II. i. 650 = Dicentra formosa.
bicalcarata. Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 9 = Dicentra Cucullaria.
biternata, Pall, ex Steud. Norn. ed. II. i. 650 = Corydalis pauciflora.
Boissieri, *Haussk. in Flora*, lvi. (1873) 424.—Mesopotam.
Boron, Jord. Cat. Jard. Bot. Grenoble (1849), 15 - media.
bracteata, Heldr. *a.* Boiss. Fl. Orient, i. 137 = pikermiana.
bracteata, Steph. ex Willd. Sp. PI. iii. 858=Corydali* bracteata.
bracteosa, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 239.—Alger.
bulbosa, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 99 = Corydalis caucasica.
bulbosa, Linn. Sp. PI. 099 = Corydalis tnberosa, fabacea.
bulbosa, Thnnb. Fl. Jap. 277=Corydalis decumbens.
Burchelli, DC. ex Steud. Norn. ed. II. i. 650 =» officinalis.
caespitosa, *Lose, ex Willk.* &* *Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 884.—Hispan.
calycina, Bab. in Trans. Bot. Soc. Edinb. i. (1841?) 34 =densiflora.
eapnoides, Linn. Sp. PI. 700=Corydalis lutea.
capreolata, Anch. ex ParL Giorn. Bot. Ital. i. I. **(1844)** 143=macrocarpa.
capreolata. Curt. Fl. Lond. ii. 145 = media.
capreolata, Delile, ex Parl. Giom. Bot. Ital. L I. (1844) 145=agraria.
capreolata, Leight. Fl. Shropsh. 344=muralis.
capreolata. *Linn. Sp. PL* 701.—Europ.; Afr. bor.
carinata, Schur, Enum. PI. Transs. 88 = Schleicheri.
caucasica, Hoffm. Hort Mosq. (1808) n. 1394; Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 458=Corydalis angiistifolis-
caudata, Lam. Encyc. ii. 569 =. Corydalis longiflora.
cava. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7 = Corydal» tuberosa.
Chavini, Reut. Cat. PI. Vase. Gen. ed. II. 10 - Vaillantii.
cilicica, *Haussk. in Flora*, lvi. (1873) 423.—Armenia.
drrhata, Rohde, ex DC. Syst. ii. 134 = media.
clavicu/ata, Linn. Sp. PI. 701 = Corydalis claviculata.
confusa, Jard. Cat. Jard. Dijon (1848), 18=media.
corymbosa, Desf. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (17») 26. t. 6 «= africana.
crassifolia, Desf. Fl. Atlant. ii. 126 = Sarcocapno crassifolia.
Cucullaria, Linn. Sp. PI. 699 = Dicentra Cucullaria.
Cucullaria, Steller, in Pall. N. Nord. Beitr. ii. 300 •* Dicentra lachenaliaeflora.
cucullata, Linn.Syst. ed. X. 1158 -Dicontra CucuH*"*-
decumbens, Thunb. in Nov. Act. Petrop. xii. (18<W 102 » Corydalis decumbens.
deflexa, Heuft in Flora, xxxvi. (1853) 619-anatolw»> parviflora.
densiflora, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 113.—Gallia.
densiflora, DC. Syst. ii. 137 = parviflora.
densiflora, Delile, ex Nym. Consp. 27=officinalis.
diffusa, Am. ex Parl. Giorn. Bot. Ital. i. I. (1844) 1» = officinalis.
diffusa, Moench, Meth. Suppl. 215=parviflora.
digitata, Lej. Fl. Spa, ii. 89 = Corydalis bulbosa.
disjunct a, Jord. ex Nym. Consp. 27 = media.
Eckloniana, Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. officinalis.
elegans, Jord. ex Nym. Consp. 27 —capreolata.
enneaphylla. Linn. Sp. PI. 700 -= Sarcocapnos eni»e»' phylla.
eximia, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 50 = Dicentra exim
fabacea, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 145 - Cory<J»" caucasica.
fabacea, ReU. Prod. Fl. Scand. ed. IL 167-CorjW»"» fabacea.
flabellata, *Gasp, in Rend. Ace. Sc. Napoli*, i. **(1842)**» —Europ. austr.
flavula, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) = Corydalis aurea.

FUMARIA:—
fleischeri, Sond. ex Hammar, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. III. ii. (1856-68) 801 = macrocarpa.
formosa, Andr. Bot. Rep. t. 398 - Dicentra formosa.
formosa, Poir. Encyc. Suppl. vi. 684 = Dicentra eximia.
fungosa, Ait. Hort. Kew. iii. 1-Adlumia cirrhosa.
gaditana, *Hausst. in Flora,* lvi. (1878) 547.—Hispan.
tiaiUardoti, *Boiss. Fl. Orient,* i. 189.—Syria.
Gasfiarinii, Bab. in Trans. Bot. Soc. Edinb. i. (1841 ?) 86 = officinalis.
glauca, Curt. Bot. Mag. 1.179 - Corydalis glauca.
glauca, Jord. Pngill. PI. Nov. 8-parviflora.
Gussonii, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 18=media.
HaUeri, Willd. Prod. Fl. Berl. 229 = Corydalis bulbosa.
Heldreickii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 16-Thnreti.
'npatiens, Pall. Reise, iii. 286 = Corydalis sibirica.
"•era, Thunb. in Nov. Act. Petrop. xii. (1801) 104-. Corydalis incisa.
intermedia, Ehrh. Beitr. vi. 146 = Corydilis fabacea.
intermedia, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 99 = - Corydalis caucasica.
Jankae, *Haussk. in Flora,* lvi. (1878) 491.—Hungar.
fordani, Guss. Enum. PI. Inar. 12. t. 2 = media,
jnaaica, *Bain. Diagn.* Ser. I. viii. 15.—Syria ; Aegypt.
Kraliki, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 19=anatolica.
tfggeri, Janka, ex Nym. Consp. 28 = Schleicheri.
faggeri, Jord. Pngill. PI. Nov. 7 - Vaillantii.
"nensis. Pall, ex DC. Syst. ii. 122 = Corydalis , paeoniaefolia.
'"uantha, Viv. Fl. Core. Sp. Nov. 12 = parviflora.
t-ichtensteinii, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 568 = officinalis.
*li forali*s, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) - 361 = densiflora.
**obelii, *Tausch, in Flora,* xxii. (1889) 495.—Austria.
"mpftora, Willd. Sp. PI. iii. 860 = Corydalis longiflora.
lonejpes. *Coss. &• Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) S05.-Algeria.
'"tea, Linn. Mant. ii. 258 - Corydalis lutea.
'"tea, Thunb. Fl. Jap. 277-Corydalis pallida.
"nacrocarpa, *Part. PI. Nov.* 6.—Graecia; Syria.
m«««osepala, *Boiss. Elench.* 8.—Hispan.; Afr. bor.
»><>*crosepala,* Schur, Enum. PL Transs. 88 - densiflora.
major *Badaro, in Brugnat. Oiorn. Fis.* II. ix. (1826) '2.—Europ. austr.
maJor, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 800 = Corydalis tuberosa.
"•"*jor,* V. Tenore, in Bull. Ace. Asp. Nat..i. (1842) 24 = media.
"Montana, Haussk. in Flora, lvi. (1878) 548 = - gaditana.
"'rschalliana, Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1797) 815 = Corydalis Marschalliana.
"•"«««. DC. Syst. ii. 134-major,
•""""a, Fries, ex Nym. Consp. 27-muralis.
***«, Ledeb. Fl. Ross. i. 105=densiflora.
""«««>, *Loisel. in Desv. Journ. Bot.* ii. (1809) 857.-***«P; Reg. Mediterr.
"•«««. Montague, ex Parl. Glom. Bot. Ital. i. I. (1844) "? = capreolata.
"""*;«• Ortm. ex Nym. Consp. 28-Schleicheri.
"™«o. Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 697 = Wirtgeni.
fgalocarpa, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. i. 68 = - ttacrocarpa.
"eyen, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1856) I. «««, in textu.—Reg. Caucas.
micra „„I„, U K - Gen - « Sp- Nov. 21-densiflora.
microcarpa, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 16, in obs.—Armenia.
microstachys, *Kralik, ex Haussk. in Flora,* lvi. (1878) 'oi—Aegypt
minor, Roth, Tent n„ Gen< *' 8 0 o = Colydalis bulbosa.
m Z^\'y- A- *Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd. Ins.* 63.-Ins-c sp. Ver(J.
mu£°**ulata,* Schur, Enum. PI. Transs. 88=densi-
Munby.
Mun dtn, *spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 264.-Afr. anstr.
*mur*tfSiV?"""' Clavaud, in Actes Linn. Soc Bord. xxxv. (1881) 278-medla.
muralis, Gren_ & Godr_ Fl. Fr. i. 67 - media.
muralis, 'W *ex Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 1017.-

FUMARIA:—
neapolitana, Vaill. ex Parl. Giorn. Bot. ItaL i. I. (1844) 149 = capreolata.
nemorosa, *Lojac. in Natural. Sicil.* ii. (1883) 298.—Sicil.
nobilis, Linn. Syst. ed. XII. 469 = Corydalis nobilis.
numidica, *Coss. (f Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 306.—Afr. bor.
officinalis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 20-Corydalis vesicaria.
officinalis, Chaub. Nouv. Fl. Pe'lop. 45 - densiflora.
officinalis, Hohen. in Ball. Soc. Nat. Mosc vi. (1838) 247-Vaillantii.
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 700.—Geront. temp.
officinalis, Schimp. ex Hammar, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. IIL ii. (1856-58) 275 - abyssinica.
officinalis, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 63=capreolata.
officinarum, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 298-officinalis.
oxyloba, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 14 - macrocarpa.
paeoniaefolia,, Steph. ex Willd. Sp. PI. iii. 859-Corydalis paeoniaefolia.
pallida, Salisb. Prod. 877 = Dicentra Cucullaria.
pallida, Thnnb. in Nov. Act. Petrop. xii. (1801) 103? Corydalis pallida,
pallidiflora, Jord. in Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 805 -capreolata.
Parlatoriana, Kralik, ex Boiss. Fl. Orient, i. 186 = densiflora.
parviflora, *Lam. Encyc.* ii. 567.—Geront. temp.
parviflora, Stbth. & Sm. Fl. Graec. Prod. il. 50.=densiflora.
parviflora, Wight & Arn. Prod. 18 = Vaillantii.
pauciflpra, Steph. ex Willd. Sp. PI. iii. 861 = Corydalis pauciflora.
peregrina, Rudolph, in Mém. Acad. Sc. Pétersb. i. (1803-6) 379-1. 19-Dicentra lachenaliaeflora.
Petteri, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 435-muralis.
Petteri, Reichb. Ic. FL Germ. iii. 1 = media.
Petteri, V. Tenore, in Bull. Ace Asp. Nat. i. (1842) 25 — officinalis.
pikermiana, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 9.—Graecia.
plntycalyx, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 239.—Alger.
prehensilis, Ascher. in Verh. Bot. Ver. Brand, v. (1863) 228 = capreolata.
prehensilis, Kit. Ind. PI. Hort. Pesth. (1812) 10; et in Linnaea, xxxii. (1868) 498 = densiflora.
pulchella, Kralik, ex Walp. Ann. ii. 28 - anatolica.
pulchella, Salisb. Prod. 877 - officinalis.
pumila, Host, Fl. Austr. ii. 304 -Corydalis pumila.
racemosa, Thunb. in Nov. Act. Petrop. xii. (1801) 103 = Corydalis racemosa.
recognita, *Lacroix, in Bull. Soc. Bot. Fr.* vi. U859) 551.—Europ.
recta, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 51-Adlumia cirrhosa.
Reuteri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 13.—Hispania.
Reuteri, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 65 — parviflora.
rosea, Sieud. Nom. ed. I. 848 - Corydalis rosea, *Zeyh.*
rostellata, Knaf, in Flora, xxix. (1846) 290^densiflora..
rupestris, Boiss. *Sc* Reut. Pngill. PI. Nov. *A* - agraria.
rupestris, Nym. Consp. 27-gaditana.
ruti/olia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 49-Corydalis rutaefolia.
sarcocapnoides, *Coss. V Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 806.—Algeria.
sativa, Scop, ex bteud. Nom. ed. II. i. 650 = Corydalis nobilis.
saxatilis, *Clem, ex Lange, in Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 886, in obs.—Hispan.
saxicola, *Nym. Consp.* 28.—Hispan.
scandens. E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 186 - Mundtii.
Schangini, Pall, in Ac). Petrop. vi. (1779) 267.1.14-Corydalis longiflora.
Schleicheri, *Soyer-Willem. Obs.* 17.—Europ.
Schrammii, Nym. Consp. 28 = Vaillantii.
sempervirens, Linn. Sp. PI. 700 - Corydalis bnlbosa.
septum, Boiss. *Sc* Reut. Dingn. Ser. II. i. 16 ^ media.
serotina, Guss. in Parl. Giom. Bot. Ital. i. I. (1844) 150-media.
sibirica, Linn. f. Suppl. 314-Corydalis sibirica.
sicula, Pison. Cat. Hort. Panorm. (1816) = parviflora.
solida, Ehrh. Beitr, vi. 146-Corydalis bulbosa.
speciosa, Jord. Grain. Jard. Grenoble (1P49) 16 - capreolata.

FTTMARIA:—
spectabilis, Bisch. Del. Sem. Hort. Heidelb. (1849) 4 -agraria.
spectabilis, Linn. Sp. PI. 699-Dicentra spectabilis.
spicata, Balb. ex Parl. Giorn. Ital. i. t. (1844) 141 - Vaillantii.
spicata, Bert, ex Parl. 1. c. 145-agraria.
spicata, Gorter, Fl. Prov. Belg. 188-parviflora.
spicata, *Linn. Sp. PI.* 985.—Lnsitan.
Sturmii, Opiz, Natural, x. (182ā) 267-densiflora.
supina, *Janka, in Termes**. *Fiiziek,* i. (1877) 30.—Transsyl.
tenuiflora, Fries, in Bot. Notiser (1857), 51-Wirtgeni.
fenuiflora, Janka, ex Nym. Consp. 28-Vaillantii.
tenuifolia, Pers. Syn. ii. 270-Dicentra lachenaliaeflora.
tenuifolia, *Roth, Catalecta, fasc.* ii. 82.—Europ.
tenuifolia, Symons, Syn. PI. Brit. 200; Gaertn. Mey. *8c* Scherb. Fl. Wett. iii. 14 = parviflora.
tenuisecta, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 297 ; *et in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 816.—Marocco.
tenuisecta, Syme, Eng. Bot. ed. III. i. 118 = Vaillantii, parviflora.
tetragona, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 8-Corydalis lutea.
Thureti, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 15.—Graecia; Syria.
transsilvanica, Schur, Enum. PI. Transs. 88-densiflora.
turbinata, *Sm. ex DC. Syst.* ii. 182.—Orient,
uniflora, Sieber, Reise Kreta, ii. 820 - Corydalis rutaefolia.
vagans, Jord. Grain. Jard. Grenoble (1849), 15 - media.
Vaillantii, *Loisel. in Desv. Journ. Bot.* ii. (1809) 3f,8. —Geront. temp.
Vaillantii, Tenore, Fl. Nap. ii. 119-capreolata.
vesicaria, Linn. Sp. PI. 701 - Corydalis vesicaria.
Wirtgeni, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 1018.—Europ.

FUNASTRUM, Fourn. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xiv. (1882) 388. *ASCLEP1ADEAE.*
angustissimum, *Fourn. I. c.*—Ins. Galap.
suflrutescens, *Fourn. I. c.* 389.—Bras.

FUNCKIA, Dcnnst. Schlness. Hort Malab. 32 (1818)-Iiumnitzera, Willd. (Combretac).
Karakandel, Dennst. 1. c.-L. racemosa.

FUNCKIA, Dum. Anal. Fam. 60 (a829) = Funkia, Spreng. (Liliac).

FUNCKIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 19 - Astella, Banks *Sc* Soland. (Liliac).
magellanica, Willd. 1. c - A. pumila.

PTJNIFERA, Leandr. ex C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1848) 357. *THYMELAEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 195.
BOSCA, Veil. Fl. Flum. 150 (1825).
NEESIA, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. C7 (1855).
fasciculate, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* v. i. 68.—Bras,
latifolia, *Fisch. V Mey. ex C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb.* i. (1843) 857,nomen.—Hab.l
utilis, *Leandr. ex C..A. Mey. 1. c.*—Bras.

FUNIUM, Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1798) 2tS = Pureroea. Vent. (Amaryllid.).
piliferum, Willem. 1. c-Furcroea gigantea.

FUNKIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 781 (1883'-FUNCKIA, Willd.-Astelia, Banks *Sc* Soland. (Liliac).

FUNKIA, Endl. Gen. 1182, in sp. (1841)-FUNCKIA, Dennst.-Iiumnitsera, Willd. (Combretac).

FUNKIA, Spreng. Anleit. ii. I. 246 (1817); Syst. ii. 40 (825). *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 774.
BRYOCLBS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812, 385.
HOSTA, Tratt. Arch. Gew. i. 55 (1812).
LIBERTIA, Dum. Comm. Bot. 9 (1822).
NIOBE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 335.
SAUSSUREA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807, 11.

FUNKIA:—
alba. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 109=subcordata.
albomarginata. Hook. Bot. Mag. t. 8657-=lancifolia.
coerulea, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 109-ovate.
cordata, Siebold, ex Stend. Norn. ed. II. i. 651 - Sieboldiana.
curullata, Siebold, ex Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. II. iii. (1869) 304=glauca.
Fortunei, *Baker, in Gard. Chron.* vi. (1876) 36.—Japon.
glauca, *Siebold, ex Miq. in Verh. Kon. Aiad. Wetensch.* II. iii. (1869) 803 ; *et in Arch. Nierl.* iv. (.1869) 228.—Japon.
grandiflora, Sieb. & Zucc. in Fl. des Serres, Sir. I. ii. (1816) 1.168, 169 = subcordata.
japonica, Hort. ex Regd, Cat. PI. Hort. Aksakov. 61 -grandiflora.
lanceaefolia. Dens, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 589 = lancifolia.
lanceolata, Siebold, ex Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. II. iii. (1869) 300 = ovata.
kncifolia, *Spreng. Syst.* ii. 41.—Japon.
longipes, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 529.—Japon.
maculata, Siebold, ex Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. II. iii. (1869) SOS=Sieboldiana.
marginata, Siebold, ex Miq. 1. c. 302-ovata.
ovata, *Spreng. Syst.* ii. 10.—Japon.
Sieboldiana, *Hook. Bot. Mag.* t. 3663.—Japon.
Sieboldii, Lindl. in Bot Reg. (1839) t. B0 = praec.
sinensis, Siebold, ex Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetemch. II. iii. (18691 303 - Sieboldiana.
spathulata, Siebold, ex Miq. 1. c. 300—ovata.
subcordata, *Spreng. Syst.* ii. 11.—Japon.
umbellata, Hort.^Cf. Gard. Chron. (1868) 1010 = Sieboldiana ?
undulata, Otto & Dietr. Allg. Garten;, i. (1883) 119 = lancifolia.
univittata, Siebold, ex Miq. in Verh. Kon. Akad. Wetensch. II. iii. (1869) 802 = Sieboldiana.
viridi-marginata, Siebold, ex Miq. 1. c. 299 = ovata.
viridis, Siebold, ex Miq. 1. c. 801=Sieboldiana.

FURCARIA.Boiv. ex Baill. Etud. Gén..Enph.56(1858) = Croton, Linn. (Euphorb.).
Boiviniana, Baill. 1. c.=C. Boivinianus.

FURCARIA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora, r. 1856 (1836) = Hibiscus, Linn. (Malvac).
Cavanillesii, Kostel. 1. c 1857, in obs. =H. cannabinus.
Roxburghii, Kostel. 1. c. 1856 = H. rârcatus.
surattensis, Kostel. 1. c.-H. surattensis.

FUHCRAEA, Vent, in Bull. Soc. Philom. i. (1793) 65; reimpr. in Usteri, Ann. Bot. xix. (1796) 51.
AMARYLLIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 739.
FOUKCROEA, Haw. Syn. PI. Succ. 73 (1812).
FOURCROYA, Spreng. Anleit. ii. I. 238 (1817).
FUNIUM, Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1798) 26.
Fu&CROEA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 739 (1883).
FVRCROYA, Rafin. Princ Somiol. 31 (1811); Endl. Gen. 181 (1841).
agavephylla, Brot. ex Schult. Syst. vi. 731 <= cubensis.
Aitoni, Jacobi, in Abh. Schles. Ges. (1869) 175 - cnbensis.
aspera, M. Roem. Syn. Ensat. 293-cubensis.
atroviridis, Jacobi & Goeff. in Jacobi, Vers. Syst. Ord. Agav. 273 = gigantea.
australis, Haw. Syn. PI. Sncc. 71 = Doryantbes excelsa.
Karilletti, *Jacobi, in Abh. Schles. Ges.* (1869) 166.—Hab.?
Bedinghansii, *C. Koch, Wochenschr.* vi. (1863) 231; *Belg. Hortic.* (1863) t. 19.—Am. austr.
cantula, Haw. Syn. PL Succ. Suppl. 12 = Agave vivipara.
Commelyni, *Kunth, Enum. PI.* v. 812.—Am. trop.
cubensis, *Vent, in Bull. Soc. Philom.* i. (1793) 66; *Haw. Syn. PI. Succ.* 72.—Am. trop.
Demouliniana, *Jacobi, Vers. Syst. Ord. Agav.* 287.—Mexic.
depauperate, *Jacobi, 1. c.* 298.—Hab. ?
elegans, *Tod. Hort. Panorm.* 13. t. 1.—Mexic.
flavo-viridis, *Hook. Bot. Mag.* t. 5163.—Mexic
foetida, Haw. Syn. PI. Succ. 73-gigantea.

FURCHAEA:—
geminispina, *Jacobi, Vers. Syst. Ord. Agav.* 282.—Hab.?
gigantea, *Vent, in Bull. Soc. Philom.* i. (1798) 65.—Am. trop.
Lindeni, *Jacobi.—Cf. Gard. Chron.* (1869) 387; *et in Illustr. Hortic.* xxi. (1871) t. 186.—N. Granat.
lipsiensis, *Jacobi, in Abh. Schles. Ges.* (1869) 169.—Hab.?
longaeva, *Karw. &* Zucc. in Nov. Act. Nat. Cur.* xvi. II. (1833) 666.1.18.—Mexic.
macro, Hort Par. ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxii. (1866) 112=depauperate.
madagascariensis, *Haw. Syn. PI. Succ. Suppl.* 12.—Madag.
pubescens, *Tod. Ind. Sent. Hort. Panorm.* (1877) 88 ; *Nuov. Sp. Fourcroya,* 9.—Hab. >
rigida, Haw. Syn. Fl. Succ. 71=Agave rigida.
rigida, Laudry, ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxiii. (1867) 314 = Demouliniana.
Selloa, *C. Koch, Wochenschr.* iii. (1860) 22.—Am. austr.
sobolifera, Cels, ex Jacobi, in Hamb. Gartenz. xxiii. (1867) 314 •= Demouliniana.
spinosa, Targ. Tozz. Obs. Bot. n. 16=tuberosa.
stricta, *Jacobi, in Abh. Schles. Ges.* (1869) 171.—Am. trop.
tuberosa, *Ait. Hort. Kev.* ed. II. ii. 803.—Am. austr.
tubiflora, Kunth & Bouch<5, in Linnaea, xix. (1817) 881 = Beschorneria tubiflora.
undulata, *Jacobi, in Abh. Schles. Ges.* (1869) 170.—Mexic.
valleculata, Jacobi, 1. c. 175-> cubensis.
viridis, HemsL Biol. Centr. Am. Bot. iii. 353 = gigantea.

FURCROYA, Rafin. Princ. Somiol. 81 (1811); Endl. Gen. 181 (1811) = praec

FURERA, Adans. Fam. ii. 193 (1763) - Batureia, Tonm. (Labiat).

FURNROHRIA, Lindl. Veg. Kingd. 778 (1817) = Fuernrohria, C. Koch (Umbellif.).

FUSAMTTS, R. Br. Prod. 855 (1810). *SANTALACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 225.
EUCARYA, Mitch. Three Exped. Austral, ii. 100 (1839).
LAGENULA, Lour. Fl. Cochinch. 88 (1790).
MIDA, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 876.
acuminatns, *R. Br. Prod.* 355.—Austral,
altemifolios, *X. Br. in Salt, Abyss. App.* 63, nomen. —Abyss.
compressus, Lam. TàbL Encyc. iii. 135. t. 812 = Osyris compressa.
crassifolius, *R. Br. Prod.'* 355.—Austral.
diversifolius, Miq. in Lehm. PI. Preiss. i. 617=persicarius?
emarginatns, *Miq. I. c.*—Austral.
glaucus, Gaudich. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 686 = crassifolius.
parasitus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 53 - Viscum orientate.
pedatus, *Spreng. Syst.* i. 190.—Cochinch.
persicarius, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 216. —Austral,
spicatus, *R. Br. Prod.* 355.—Austral.

FUSANUS, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 765 (1774) = Colpoon, Berg. (Santal.).
compressus, Murr. 1. c. = C. compressum.

FUSIFILUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27 (1836) = Urginea, Steinh. (Liliac).
coarctatum, Rafin. 1. c=Excremis ramosa.
pkysodes, Rafin, 1. c*=U. physodes.
pusillum, Rafin. 1. c = U. pusilla.

FUSSIA, Schur, Enum. PL Transs. 751 (1866) - Aira, Linn. (GraminO.
capillaris, Schur, Lc.=A. capillaris.
caryophyllea, Schur, 1. c. = A. caryophyllea.
praecox, Schnr, 1. c. «= A. praecox.

FUSTICUS, Rafin. New Fl. Am. iii. 43 (1836) = Madura, Nutt (Urticac).
glabra, Tataiba, tinctoria, vera, xanthoxylon, Rafin. 1. c. iii. 11,15 -= M. tinctoria.

G

GABERTIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 125 (1826) " Grammatophyllum Blnme (Orchid.).
scripta, Gaudich. 1. c. = Grammat speciosnm.

GABILA, Baill. Adansonia, x. (1871) 155. *MENISPERMACEAE.*
longifolia, *Baill. 1. c.* 156.—Ins Timor.

GAERDTIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maer* 1851) 123; et Abh. Akad. Berl. (1851) 19. t. 3 A = Begonia, Linn.
argentea, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maer? 1854) 123-B. maculata.
Kttnthiana, Klotzsch, 1. c.=B. Kunthiana.
maculata, Klotzsch, 1. c = B. maculate.
stenobotrys, Klotzsch, 1. c. nomen. = B. undulata.
undulata, Klotzsch, 1. c. = B. undulate.

GAERTITERA, Lam. Illustr. ii. 273. t. 167 (1791). *LOGANIACEAE,* Benth. & Hook.-f. ii. 798.
ANDERSONIA, Schlecht. in Roem. & Schult. Syst. v. 21 (1819).
FRUCTESCA, DC. in Meissn. Gen. 259; Comm. 168 (1889).
PKISTIDIA, Thw. Enum. PI. Zeyl. 119 (1859).
SYKESIA, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 351.
acuminata, Benth. in Journ. Linn. Soc i. (1857) 1» «= Koenigii.
Aetheonoma, Steud. Nom. ed. II. i. 651=calycina:
arenaria, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 209. —Madag.
bifida, Boj. Hort. Maurit. 217—psychotrioides.
caerulea, Boj. 1. c. = Chasalia grandifolia.
calycina, *Boj. I. c.*—Ins. Maurit.
capitate, *Boj. I. c.* 216.—Ins. Maurit.
cardiocarpa, *Boiv. ex Baill. Adansonia,* xii. (1879) 238.— Madag.
coerulea, A. DC. in DC. Prod. ix. 85=Chasalia grandtflora.
coriacea, Steud. Nom. ed. II. ii. 410, in syn. - edentate.
crassiflora, *Boj. Hort. Maurit.* 216.—Ins. Maurit.
cuneifolia, Boj. 1. c. = Chasalia divaricate?
cymifiora, Boj. 1. c. 218 = Chasalia Boryana.
divaricata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 125 = Koenigii-edentate, *Boj. Hort. Maurit.* 216.—Ins Manrit.
Gardneri, Thw. Enum. PL Zeyl. 202 = Walkeri.
grisea. *Hook. f. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit-Ind.* iv. 92.—Singapore.
hongkongensis, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 881.—Chin*-
incarnata, Boiv. ex Boj. Hort. Maurit. 217 = Chasali* divaricate,
inflexa, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 237.- Madag.
Junghuhniana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 883 = KoenigH-
Koenigii, *Wight, 1c.* iv. t. 181b.—Ind. or.; Malaya-
lanceolata, *Bouton, ex DC. Prod.* ix. 83.—Ins. Ma»-
longiflora, Gaertn. f. Fruct. iii. 58=vaginata.
longifolia, *Boj. Hort. Maurit.* 216.—Ins. Manrit.
macrobotrys, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (18 208.—Madag.
macrostipula, *Baker, I. c.* 207.—Madag.
obesa, *Hook.f. ex C. B. Clarke, in Hook. f. fl-Ind.* iv. 92.—Singapore.
obovate, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) i Madag.
occidentalis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i-* (1880) 235.—Afr.lrop.
oxyphylla, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* i. (186'9) ** —Singapore.
paniculate, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 469.—* trop.
parviflora, Boj. Hort. Maurit. 217=psychotrioldes.
pendula, *Boj. I. c*—Ins. Maurit.
phanerophlebia, *Baker, in Journ. Linn. Soc-* (1885) 125.—Madag.
phyllosepala, *Baker, 1. c.* xx. (1888) 207.—Madag-
phyllostachya, *Baker, 1. c.* xxi. (1885) 425.—
psychotrioides, *Baker, Fl. Maurit.* 281.—Ins- **»
quadriseta, A. DC. Prod. ix. 34 = psychotrioides.
rosea, *Thw. ex Benth. in Journ. Linn. Soe.* !• I 111— Zeylan.
rotundifolia, *Boj. Hort. Maurit.* 216.—Ins. Maofll-

OAERTNERA:—
Sieleri, Presl, Bot. Bemerk, 77=calydna?
spb 0^001?*1 *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) *"8. —>Madag.
temifolia, Thw. Enum. PI. Zeyl. 202.—Zeylan.
Throuarsii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1879) Z09—Madag.
»yrsiflora, Blume, Mns. Bot Lugd. Bat. i. 174 = Koenigii.
truncata, A. DC. in DC. Prod. ix. 84=edentate.
?ae\nata, Boj. Hort. Maurit 216 - psychotrioides.
»aginata, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 223 t. 167; *Pair. Encyc. Suppl.* v. 685.—Ins. Maurit.
*l?g*nata,* Sieber, ex DC. Prod. ix. 86 = calycina.
*Tminea, Hook.f. ex C.B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit I*d.* iv. 91,-Singapore.
walken, *Wight, Illustr.* ii. t 156. b.-Zeylan.
««Ungeriana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 382—Sumatra.

GAERTNERA, Retz. Obs. vi. 24 (1791) = Sphenoclea, ^»aertn. (Campanulac.).
"*Sati,* Retz. L c,=S. zeylanica.

GAERTNERA. Schreb. Gen. i. 290 (1789)=Hiptage, (Malpighiac.).
inaif «i j. F. Gmel. Syst 685 = H. Madablota.
lau»/««««,* Wall. Catn. 7365 = H. parvifolia.
obtusifolia, Roxb. Hort. Beng. 82; FL Ind. 869=H. obtusifolia.
«cemosa, Roxb. PL Corom. i. 19.118 = H. Madablota.

GAERTNERIA, Medic. Phil. Bot. i. 45 (1789)=Ppaaseria, Cav. (Compos.).

GAERTNERIA, Neck. Elem. 15 (W90) - Gentians, Tourn.

GAGEA, Salisb. Kon- & Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 80—ULIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 819.
5"?ILLAMA» cc- "> Abh. Akad. Muench. iii. (1848) 229.1.2.
"°M«UHGIA, Bemh fa Flora> ^jjj (1840)892.
»NITHOXANTHUM, Link, Handb. L 161 (1829).
«cosTiGMA, Turcz. in Trantv. PI. Imag. Fl. Ross. 1 . 2 (1844).
SOLENARIUM, Clad. Fl. Hantes-Pyr. 112 (1867).
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 512. —China.
alexandrina, Boiss. FL Orient, v. 2O8=retieularis.
amblyopetala, F. Schultz, in Flora, xlv. (1862) 459 = *andegavensis,* pygmaea.
anisanthos, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 230 = Liotardi.
arvensis, Belg. 140; Schnlt. f. Syst. vii. 647, 1708 stellaria.
arvensis, Kbm ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 188 = pusilla.
asperula, C. Koch, in Linnaea, xxiii (1M9) 229=amplopetala.
Baumgarteniana, Schnr. Enum. Pl. Transs. 667 = minima.
bellidifolia, Boiss. Fl. Orient, v. 208=reticularis.
Bohemica, Chaub. & Godr. Fl. Fr. iii. 195 = saxatilis.
bohemica, Schult. f. Syst. vii. 549, 1705 = pygmaea.
bonariensis, Schult. f. L. c. 559 = Nothoscordum Poiretii.
bracteata, Schultz. = 642 =Lloydia alpina.
bracteolaris (1806) 56 (err. typ. 856).—Enrop.; Reg. Mediterr.
bulbifera, 657.—Europ. or.; As. trop.
busambarensis = foliosa?
callosa, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 107=minima.
calloso, Schult. f. Syst. 664.—Reg. Caucas.
campestris, Denkschr. Acad. Wien, L (1886) 6 anscanc.
capitata, Haussk. ex Boiss. Fl. Orient, v. 209-damascena.
chlorantha, Ledeb. ex Schult. f. Syst. vii. 651.—Orient.
Clusiana, Lood. Hort Brit 184-retieularis.
communata, C. Koch, in Linnaea, (1849) 227 = reticularis.
composita, Opiz, Seznam, 45=bracteolaris?
Corsica, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 68 = saxatilis.
Corsica, Toosch, ex F, Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 18 = foliosa.
damascena, *Boiss. V Gaill. Diagn.* Ser. II. iv. 105.—Syria,
divaricata, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 510. —Turkestan.
dschnngarica, *Regel, I. c.* 518.—Turkestan.
Durieui, *Part. Fl. Hal.* ii. 426, in textu.—Algeria.
elegans, Wall. Cat. n. 5065 - fescicularis.
emarginata, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 861.—Sibir. alt.
equitans, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 195; et in Linnaea, xiv. (1840) B65 = bracteolaris.
erubescens, Schult. f. Syst. vii. 545 = Liotardi.
fascicularis, *Salisb. in Kon. V Sims, Ann. Bot.* ii. (1806) 555.—Europ.; As. bor.
fibrosa, *Schult./. Syst.* vii. 652.—Afr. bor.
filiibrmis, *Kunth, Enum. PI.* iv. 237.—Sibir.
filiformis, Merckl. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvii. (1864) II. 286 •= rnfescens.
fistulosa, Ker-Gawl. in [Quart] Joum. Roy. Inst i. (1816) 180; Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 467=Liotardi.
foliosa, Parl. Fl. Palerm. L 876 (err. typ. 275)-chrysantha.
foliosa, *Schult. f. Syst.* vii. 1708.—Enrop. or.; As. Min.
glacialis, *C. Koch, in Linnaea,* xxii. (1849) 228.—Oriens.
glauca. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 418 - bracteolaris.
gracilis, Welvr. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. x. 18 = stellaris.
Granatelli, Boiss. Fl. Orient, v. 208 -reticularis.
Granatelli, *Parl. Fl. Palerm.* i. 876 (err. typ. 276).—Sicil.
grandiflora, *Boiss. tf Huet, ex Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 534, nomen.—Armenia,
granulosa, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 112, in textu.—Sibir. occ.
Guicciardii, Heldr. ex Nym. Consp. 725-stellaris.
kybrida, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1858) 75.—Transsylv.
intermedia, Scblecht. ex Reichb. It Fl. Germ. x. 18 =-Liotardi.
Liotardi, *Schult. f. Syst.* vii. 545, 1704.—Enrop.; Oriens.
Liottardi, Bourg. ex Nym. Consp. 726-foliosa.
lutea, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1200=fascicularis.
luteoides, *Staff, in Denischr, Acad. Wien,* 1. (1885) 80.—Mesopotam. .
mauritanica, Dur. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 50=foliosa.
minima, *Ker-Gawl. in [Quart.] Journ. Roy. Inst.* i. (1816) 180.—Europ. j As. Bor.
minutiflora, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 292.—Turkestan.
monticola, Payne, Palest. Exp. Soc. 124; ex Boiss. Fl. Orient, v. 209 •= damascena.
Moorcrqftiana, Wall. Cat. n. 5068 =fascicnlaris.
nebrodensis, *Nym. Syll.* 872.—Sicil.
nevadensis, Boiss. Elench. 86 = foliosa.
nivalis, Huet, ex Nym. Consp. 726=foliosa.
Olgae, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. II. (1875) 292. —Turkestan.
Ova, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1886) 16.—Persia,
paociflora, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1864) II. 113.—Dahuria.
fieduncularis, Wall. Cat. n. 5086=reticularis.
persica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 108.—As. occ. j Reg. Himal.
fiodolica, Schnlt. f. Syst. vii. 845=pusilla J
tolvmorpha, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii.611-foliosa.
$%Zrpha, F. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 17 = bracteolaris.
polyphylla, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) II. 83.—Tauria.
pratensis, Dum. Fl. Belg. 140 J Schnlt. £ Syst vii. 536, 1702=bracteolaris.
pnichella, Wall. Cat. n. 5064 = Lloydia alpina.
pusilla, Schult. f. Syst. vii. 549, 1705.—Europ.
pygmaea, Salisb. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 5i7.—Enrop.; As. Min.
tygmaea, Schnlt. f. Syst vii. 547, 1705-follosa.
reftxa, C*m. ex Reichb. Ic Fl.Germ.ic. 18-pasilla?
reticularis, Salisb. in Kon. V Sims, Ann. Bot. ii. (1806) 557.—Oriens; As. oec.
reticulata, Schult. f. Syst. vii. 542 = praec.
rigida, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. vii. 108 = reticularis.
rubiconda, *Meinsh. Fl. Ingr.* 362.—Ingria.
rubrowridis, Boiss. *8c* Kotschy, Diagn. Ser. II. iv. 106 =Lloydia rubro-viridis.
rufescens, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1862) 28.—Hab.1
saeculifera, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 510. —Turkestan.
sarmentosa, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 230 = reticularis.
saxatilis, Bor. ex Nym, Consp. 725 - pygmaea.
saxatilis, Part. Fl. Ital. ii. 429, partim=nebrodensis.
saxatilis, *Schult. f. Syst.* vii. 549, 1705.—Bohemia.
Schreberi, Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 107 = bracteolaris.
serotina, Ker-Gawl. iff [Quart.] Joum. Roy. Inst. i. (1816) 180=Lloydia alpina.
setifolia, *Baker, in Jowrn. Linn. Soc.* xviii. (1880) 101.—Afghan.
Soleirolii, Mutel, Fl. Fr. iii. 298 - foliosa.
spathacea, *Salisb. in Kon. V Sims, Ann. Bot.* ii. (1806) 556 (err. typ. 356).—Europ.
stellaris, *Salisb. I. c*—Europ.; As. Min.
stenopetala, Reichb. FL Germ. Excurs. 107—bracteolaris.
Sternbergii, Loud. Hort. Brit. 184 = minima.
stipitata, Merckl. ex Bunge, in Me'm. Sav. Etr. P&ersb. vii. (1851) 512=persica.
striata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 418 = Lloydia alpina.
succedanea, *Griseb. V Schenk, in Wiegm. Archiv,* xviii. (1852) 858.—Banat.
sylvatica, Loud. Hort Brit. 134—fascicularis.
Seovitsii, Bess, ex Schult f. Syst. vii. 550 = pygmaea.
taurica, Stev. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxx. (1857) n. 83-reticularis.
tauricola, *Schott tf Kotschy, ex Tchihat. Asie Min. Bot.* ii. 534, nomen.—Cilicia.
Theobaldix, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 119.—Europ.
thesioides, C. A. Mey. ex Boiss. Fl. Orient, v. 210 = persica.
transbaicalensis, *TUTCB. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 652. —Sibir. baical.
transsilvanica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853) 75-fascicularis.
transversalis, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) II. 81-bracteolaris.
triflora, Schult. f. Syst. vii. 561 = Lloydia triflora.
triphylla, C. Koch, in Linoaea, xxii. (1849) 229-reticnlaris.
unifiora, Schult f. Syst. vii. 658-Tulipa nniflora.
villosa, Duby, Bot Gall. ed. II. i. 467=stellarw.

GAGERNIA, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui. 1189 (1848), absque desc. *OCHNACEAE.*
essiquiboënsis,.A7otocA, /. *c*—Guiana.

GAGIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. 176, 203 (1881) = Gagea, Salisb. (Liliac).

GAGNEBINA, Neck. Elem. ii. 458 (1790); DC. Mém. Lèg. 428. t. 64. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 591.
axillaris, DC. Prod. ii. 482 = tamarisdna.
pterocarpa, Bail), in Boll. Soc. Linn. Par. i. (1883) 354=tamariscina.
tamarisdna, *DC. Prod.* ii. 432.—Ins. Maurit.

GAGNEBINIA, Spreng. Gen. i. 351 (1830) = praec.

GAHNTA, Forst. Char. Gen. 61. t. 26 (1776). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1066.
DIDYMONEMA, Presl, Diagn. Nov. PL Gen. (1829) : Symb. Bot. i. 5. t 3 (1830).
EPIANORIA, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 270.
HEXALEFIS, Boeck. in Flora, lviii. (1876) 118.
LAMPOCARYA, R. Br. Prod. 238 (1810).
MELACHNE, Schrad. ex Nees, in Linnaea, ix. (18841 801.
MORELOTIA, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 416. t 28 (1826).
FHACELLANTHUS, Steud. in Zoll. Syst Verz. Ind. Archip. 61 (1854).

OAHNIA :—
PSITTACOSCHOENUS, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 87 (1846), in obs.
SYZICANTHUS, Stend. Syn. Pl. Cyp. 153 (1855).
nffinis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 164 = Gaudichaudii.
ancistrophylla, *Benth. Fl. Austral,* vii. 416.—Austral.
arenaria, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 306 = Gaudichaudii.
aristata, *Benth. Fl. Austral,* vii. 416.—Austral,
aspera, *Spreng. Syst.* ii. 114.—Austral.; Ins. Pacif.
Beecheyi, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 210.—Ins. Sandvic.
congesta, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 353 = globosa.
decomposite, Benth. Fl. Austral, vii. 417-Preisiii.
deiibta, *Benth. I. c.* 416.—Austral.
erythrocarpa, R. Br. Prod. 239 = psittacorum.
Gaudichaudii, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 164.—N. Zel.; Ins. Sandvic.
globosa, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 210.—Ins. Sandvic.
gonyocarpa, Steud. Syn. Pl. Cyp. 164 <- psittacorum.
Hectori, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 551 = pauciflora.
javanica, *Mar. Syst. Vert. Zoll. Arch. Ind.* 98.—Malaya; Ins. Pacif.
lacera, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 164—N. Zel.
lanigera, *Benth. Fl. Austral,* vii. 415.—Austral,
leptostachya, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 364.—Ins. Sandvic.
leucocarpa, K. Br. Prod. 239 = psittacorum.
leucosperma, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 801 = psittacorum.
melanocurpa, *R. Br. Prod.* 239.—Austral.
melanocarpa, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 97 - G. Radula.
microstachya, *Benth. Fl. Austral,* vii. 414.—Austral.
mucronata, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 342 = globosa.
paucirtora, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* i. (1868) 94.—N. Zel.
polyphylla, *Benth. Fl. Austral,* vii. 415.—Austral.
Prcisii, *Nees, in Lehm. Pl. Preiss.* ii. 87.—Austral,
proccra, *Forst. Char. Gen.* 52.—N. Zel.
psilocaulon, Boeck. in Linnaea, xxrviii. (1874) 345 = psittacorum.
psittacorum, *Labill.Nov.Holl.Pl.* i. 89.1.115.—Austral.
psittacorum, Nees, ex Benth. Fl. Austral, vii. 414 = Sieberi.
psittacorum, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 270=tristis.
Radula, *Benth. Fl. Austral,* vii. 417.—Austral.
rawacensis, Steud. Syn. Pl. Cyp. 164 = aspera.
rigida, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (1877) 551.—N. Zel.
schoenoides, *Forst. f. Prod.* 26.—Ins. Societ.
setifolia, *Steud. Syn. PL Cyp.* 164.—N. Zel.
Sieberi, *Boeck. in Linnaea,* xxxviii. (1874) 343.—Austral.
Sieberiana, *Kunth, Enum. Pl.* ii. 332•psittacorum.
tetragonocarpa, *Boeck. 1. c.* 347.—Austral,
trifida, *Labill. Nov. Holt. Pl.* i. 89. t. 116.—Austral,
tiistis, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 801, nomen.—China; Malaya.
Urvilleana, Kunth, Enum. Pl. ii. 332 = psittacorum.
Wichurai, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 348-tristis.
xanthocarpa, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 306.—N. Zel.

GAIADENDRON, G. Don, Gen. Syst. iii. 431 (1834)-LoranthuB, Linn.
eugenioides, G. Don, 1. c. = L. eugenioides.
laurifolium, G. Don, 1. c -L. laurifolius.
nitidum, G. Don, 1. c. 432 = L. nitidus.
punctatum, G. Don, 1. c. = L. punctatus.
puracense, G. Don, 1. c. = L. puracensis.
Tagua, G. Don, 1. c. 431 =L. Tagua.

GAIDENDRON, Endl. Ench. 399 (1841) = praec.

GAILLARDA, St Lag. in Ann. Soc Bot Lyon, vii. (18S0) 176=seq.

OAIUiABDIA, Fouger. in Mém. Acad. Sc. Par. 1786 (1788) 6. t. 1, 2. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 414.
AGASSIZIA, A. Gray & Engelm. in Journ. Bost. Soc. Nat. Hist. vi. ',1867) 229.

GAILIiARDIA :—
CALONNEA, Buchoz, Ic. (1786) 1.126.
CERCOSTYLOS, Less. Syn. Comp. 239 (1832).
GALARDIA, Lam. Encyc. ii. 590 (1786).
GUENTHKRIA, Spreng. Syst. iii. 356 (1826).
OTIIAKB, Rafin. New Fl. Am. iv. 73 (1836).
POLATHERUS, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
POLYPTERIS, Less, in Linnaea, vi. (1831) 518.
VIRGILIA, L'Herit. Digs. [1788 ?].
acaulis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 78.—Am. bor. occ.
acaulis, Pursh, Fl. Am. Sept', ii. 74S = Actinella acaulis.
alternifolia, Steud. Norn. ed. II. i. 652, sphalm. vide *Galordia alternifolia.*
amara, Rafin. Fl. Ludov. 69 = pulchella.
amblyodon, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xii. (1839) 62.—Texas.
aristata, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 678.—Am. bor.
arizonica, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 353.—Arizona.
aromatica, Baill. Hist Pl. viii. 307 = Cephalophora aromatica.
bicolor, Ell. Sketch, ii. 449 = lanceolata.
bicolor, Lam. Encyc. ii. 590 ; Illnstr.t. 708 -pulchella.
bicolor, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 672 ; Hook. Fl. Bor. Am. i. 315 = aristata.
comosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 109 ; xix. (1883) 84.—Mexic.
Drummondii, DC. Prod. v. 652 - pulchella.
fimbriata, Michx. FL Bor. Am. ii. 142 = Helenium fimbriatum.
glauca, Baill. Hist. Pl. viii. 307 - Cephalophora glauca.
lanceolata, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 142.—Am. bor.
lobata, Bnckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. It61 (1862) 459 = pulchella.
megapotamica, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 276.—Bras,
mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 109.—Mexic.
odorata, *Lindh. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 280.—Am. bor. occ.
picta. Sweet, Brit Flow. Gard. N. S. iii. t. 267 = pulchella.
pinnatifida, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* ii. (1828) 214.—Am. bor. occ.
pulchella, *Fouger. in Mtm. Acad. Sc. Par.* 1786 (1788) 5.—Am. bor.
Roemeriana, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 161 = Actinella scaposa.
Roezli, *Regel, Gartenfl.* (1875) 289.—Calif.
rustica, Cass. in Diet. Sc. Nat' xviii. 20-aristata.
scabiosoides, Griseb. in Goett Abh. xxiv. (1879) 199 = megapotamica.
wairosa.Buckl.inPro;:. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 459 =• amblyodon.
simplex, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 160.—Am. bor. occ.
spathulata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 59.—Am. bor. occ.
tontalensis, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cdrdova,* iv. (1881) 40.—Reg. Argent.
tuberculata, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 349 —simplex.

GAILLIONIA, Endl. Gen. 529 (1838)-seq.

OAILLONIA, A. Rich, in M£m. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 153. t. 15. f. 8. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 144.
CHOULETTIA, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 81 (1874).
JAUBERTIA, Guill. in Ann. Sc Nat Se>. II. xvi. (1841) 60.
Aucheri, y«ui. *(f Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xx. (1843)87.—Arab.; Persia.
Bruguierii, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 153.—Persia,
calycoptera, *Jaub. V Spach, Illustr.* i. 147. t 80.—Arab.; Nubia.
crucianelloides, *Jaub. tf Spach, 1. c.* 149.181.—Persia,
eriantha, *Jaub. V Spach, 1. c.* 145. t. 78.—Persia; Afghan.
humifusa, Jaub. & Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. IL xx. (1848) 85'hymenostephana.
hymenostephana, *Jaub. (f Spach, Illustr.* i. 146. t 79.—Arab.; Beluchist
incana, Jaub. & Spach, 1. c. 143. t. 76-Brnguieri.

GAILLONIA:—
Olivieri, *A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* *• (1834) 153.—Persia,
puberula, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 836.—Ins. Socotr.
Reboudiana, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 250.—Alger.
Richardiana, Jaub. & Spach, Illustr. i. 142. t. 75' Bruguieri.
rigida, *Rich, in Mém. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 299. 1.15.—Hab.1
Szowitzii, *DC. Prod.* iv. 574 (Sowitzii).—Armenia; Persia,
thymoides, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 837.—Ins. Socotr.
tinctoria, *Balf.f. I. c.* 836.—Ins. Socotr.

GAIMARDA, Juss. in Diet. Sc. Nat. xlv. 272 (1827) - seq.

GAIMARDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 418. t. 30 (1826). *CENTROLEPIDEAE,* Benth. * Hook. f. iii. 1026.
ALEPYRUM, Hieron. Centrolep. 103 (1873).
australis, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 419. t. 2. f. 1.-" Reg. Magellan.
ciliata, *Hook.f. Fl. Antarct.* 85.—Ins. Antarct.
pallida, *Hook.f. 1. c.* 86.—Ins. Antarct.
setacea, *Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 267.—N. Zel.

GAIODENDRON, Endl. Gen. 801, in syn. (1839) = GAIADENDRON, G. Don=Loranthus, Linn.

GAISSENIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 351-TrolliUB, Linn. (Ranunc).
verna, Rafin. 1. c. = T. americanus.

GAJATI, Adans. Fam. ii. 328 (1768) = AeBchynomene, Linn. (Legumin.).

GAKENIA, Heist. Syst. 9 (1748) (Quid?).

GALACTANTHUS, Leu. in Orb, Diet v. 763 (1849) - Oalanthus, Linn. (Amaryll.).

GALACTEA, Wight, Ic. ii. 6 (1841) = aalaetia, P. Br- (Legumin.).

GALACTELLA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 44 (1836) - GALA-TELLA, Cass. = Aster, Tourn. (Compos.).

OAIiACTIA, P. Br. HUtJamaic. 298 (1756). LEGU-*MINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 585.
BETENCOURTIA, St. Hil. Voy. Bres. i. 876 (1838)-.
COLLAEA, DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. I. iv. (1825) 9»c
HETEROCARPAEA, Scheele, in Linnaea, xxi. (184^ 467.
LEUcoDlCTYON.Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (185°) 264.
OOONIA, Bertol. Lucub. Herb. 35 (1822).
SWEETIA, DC. Prod. ii. 381 (1825).
angustifolia, Kunth, Mimos. t. 56-Jussiaeana.
angustifolia, Spreng. Syst. iii. 257 - Martii.
argentifolia, J. *Moore, in Journ. Bot.* xv. (1877) 29 - Afr. trop.
Benthamiana, *Micheli, in Kjoeb. Vidensk. Meddti-* (1875) 81.—Bras.
Berteriana, DC. Prod. ii. 238=tenuiflora.
brachyodon, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. » (1861) 178.—Ind. occ.
brachypoda, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 288.—Am-
brachystachys, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (. 126.—Mexic.
brevistyla, Schlecht in Linnaea, xii. (1838) 28» tenuiflora.
canescens, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) & —Texas.
coriacea, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (182*) Camptosema coriaceum.
cubensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 42».-* occ.
cuspidata, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl-* xxvii. (1864) 57.—Ins. Molucc.
debilis, Hassk. in Hoev. *Sc* De Vriese, Tijdscnr. (1848) 148=Shuteria vestita.
diversifolia, Boj. Hort. Maurit. 92-Teramnus
dubia, *DC. Prod.* ii. 238.—Cosmop. trop.

GALACTIA :-
dumetorum, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 127. —Bras.
EUiottii, *Nutt. Gen. Am.* ii. 117.—Am. bor.
emarginata, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Se>. I. ix. (1826) 414.-lnd. occ.
filiformis, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 127. —Am. trop.
filiformis, Wall. Cat. nn. 5510, 6519=tenniflonu
"aviflora, *Micheli, in Mim. Soc. Phys. Ceniv.* xxviii. (1883) n. VII. 24.—Reg. Argent,
"oridana, *Torr. V Gray, Fl. N. Am. i.* 288.—Florida,
glabella, *Uichx. Fl. Bor. Am.* ii. 62.—Am. bor.
glaucescens, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 428. —Ecuador,
gracillima, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. 1.142.—Am. austr.
graminea, Heyne, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 192=tenuiflora.
neterophylla, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) I71.-Texas.
h'rta, *Mart, if Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. H. (1843) 190.—Mexic.
hispidula, Benth. in Linnaea, xxii. (1849) 514 - Calopogonium galactoides.
Jnssiaeana, *Kunth, Mimos.* 196. t. 65.—Venezuela,
latisiliqna, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. ix. (1826) 414.—Am. anstr.
łcucocarpa, *Desv. I. c*—Ins. S. Doming,
^ockharti, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 194—Ind. occ.
'ongiflora, *Am. in Wight V Arn. Prod.* 206.—Ind. occ.
longifolia, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 127; *Wight, 1c.* t. 482.—Ind. or.
A-orentzii, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 124.—Reg. Argent.
'«««*«, R. Grab, in Wall. Cat. n. 5611-tenuiflora.
Macreii, M. A. Curt, in Bost. Journ. Nat. Hist. i. (1837) 120=mollis.
marginalis, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 126. —Mexic.
Martii, *DC. Prod.* ii. 288.—Bras.
me galophylla, F. Muell. Fragm. ix. 67=Lamprolobium megalophyllum.
"Mxicana, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 283—Cologania angustifolia.
mo"is, *Miehx. Fl. Bor. Am.* ii. 61.—Am. bor.
monophylla, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 75.—Cuba.
nucronata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. <8—tenuiflora.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral*, ii. 255.—Austral.
Neesii, *DC. Prod.* ii. 238.-Bras.
obcordata, Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883) 382=Teramnus obcordatus.
uaonia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 75.-Cuba.
oxyphylla, *Benth. in Miq. PI. Jungh.* 288.—Bnrma.
Parvifolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 414.—Cuba.
Pauciflora, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 127. —Austral.
Pendula, *Pers. Syn.* ii. 302.—Am. trop.
^erteriana, Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. I. 143, **sphalm. ~*Berteriana.***
Ptiosa, Nutt. Gen. Am. ii. 116 = mollis.
r\nn$_a$ta, Muhl. Cat. 67 = EUiottii.
Ptnnata, Pers. Syn. ii. 302 = Barbieria polyphylla.
Prostoata, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 127. —Austral.
PHlchella, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 282 = Cologania pulchella.
Pv-rpurea, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. H. U844) 190=Cologania pnlchella.
*r*rshii*, Desv. in Ann. St Nat. Ser. I. ix. (1826) 418 —Elabella.
"Wicata, *DC. Prod.* ii. 2S8.-Mexic.
"otundifolia, Blume, ex Mlq. Fl. Ind. Bat. i. I. 221 - onuteria rotundifolia.
**foti*, Duch. & Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 739 = flora.
sericea, Boj. Hort. Maurit. 92-Teramnus labialis.
sericea, *Pers. Syn.* ii. 802.—Ins. Mascar.
sessiliflora, *Torr. &• Gray, Fl. N. Am.i.* **288.—Am. bor.**
*#"/<>«<», Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 20 ? "Gro"a Dalasllii.
nplti/li, S. ***. iv. Cur. Post. 282 = Cologa**aprocumW**
spi? toms> *Torr* ** ^*ay, Fl. N. Am.* i. 287.-Am. bor.**
sterIU « *Hook* & *">• *in Hook. Bot. Misc.* in. (1**) 182.—Am. austr.**

GALACTIA:—
tenuiflora, Willd ex Wight *8c* Am. Prod. 206-dubia.
tephrodes, *A. Gray, PI. Wright*, ii. 34.—N. Mexic.
terminiflora, Blanco, VI. Filip. ed. II. 411-Millctia splendens.
texana, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 170.—Am. bor. occ.
tomentosa, *Spreng. Syst.* iii. 257.—Bras,
tuberosa, *DC. Prod.* ii. 288.—Mexic.
tuberosa, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 416 = Calopogonium galactoides.
velutina, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* iii. (1639) 437.—Guian.
viciaeformis, *Spreng. Syst.* iii. 257.—Bras.
villosa, Eaton *8c* Wright, N. Am. Bot. 248 =mollis.
villosa, Wight *8c* Arn. Prod. 207 = tenuiflora.
Weddelliana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 142.—Bras.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright*, i. 44.—Mexic.

GALACTION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126=praec.
sericeum, St. 1 Jig. 1. c. = Galactia sericea.

GALACTITES, Moench, Meth. 568 (1794). *COMPOS1TAE*, Benth. &. Hook. f. ii. 470.
LUPSIA, Neck. Elem. i. 71 (1790), nomen prius.
australis, *Sweet, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 653 (Quid ?). —Austral.
Dnriaei, *Spach, in Duch. Rev. Bot.* i. (1845) 868.—Hispan.
elegans, Nym. Consp. 411-tomentosa.
flavo-spinosa, *Klatt, in Nov. Act. Nat. Cur.* xli. II. (1880) 402.—Ind. or.
mutabilis, *Dur. in Duch. Rev. Bot. i.* (1845) 362.—Algeria.
pyracantha, Dur. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 200-Dnriaei.
tomentosa, *Moench, Meth.* 558 ; *DC. Fl. Fr.* iii. 110.—Reg. Mediterr.

GALACTODENDRON, Reichb. Consp. 83 (1828) - seq.

GALACTODENDRUM, Kunth, ex Humb. Relat. Hist. ii. 108, in nota (lH19) = Brosimum, Sw. (Urticac).
chrysophyllifolium. Ham. ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1843) 812—Ficns anthelmintica.
ovalifolium. Ham. ex Desv. 1. c = Ficus anthelmintica.
utile, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 186 = B. Galactodendron.

GALACTOGLYCHIA, Miq. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 526 = GALOGLYCHIA, Gasp.^ncus, Toum. (Urticac).

GALANGA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2; ed. II. 65 (1827) - **Alpinia,** Linn. (Scitamin.).
officinalis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 281 = A. Galanga.

GALANTHUS, Linn. Syst. ed. I (1735). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 719.
ACROCORION, Adans. Fam. ii. 57 (1768\
KRANGELIA, Renealm. ex Linn. Sp. PI. ed. I. 288 (1763).
GALACTANTHUS, Lem. in Orb. Diet. v. 763 (1849).
NIVARIA, Heist. Syst. 5, 19 (1748).
autumnalis, All. Anct. FL Pedem. 83-Leucojum hyemale.
Clusii, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. i. 65S=nivali3.
Elwesii, *Hoot./. Bot. Mag.* t. 6166.—As. Min.
graecus, *Orph. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 145.—Ins. Chios.
Imperati, *Bertol. Fl. Ital.* iv. 5.—Italia,
latifolius, *Salisb. Gen. PI. Fragm.* 96 ; *Rupr. in Regel,* *Gartenfi.* (1868) 180. t. 678.—Reg. Caucas.
montanus, Schur, Enum. PI. Transs. 658—nivalis.
nivalis, Falk, Beitr. ii. 156-plicatus.
nivalis, *Linn. Sp. PI.* 288.—Europ.
Olgae, *Orph. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 146.—Graecia.
plicatus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* 255.—Reg. Caucas.
plicatus, Guss. PI. **Rar.** 140=Imperati.
plicatus, Hohen. Enum. PL Elisabethpol. 228 - nivalis.

GALANTHUS :-
Redoutei, Rupr. in Regel, Gartenfl. (1863) 177, in textu = nivalis.
reflexus, Herb, ex Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 35 - nivalis.
vernus, All. Fl. Pedem. ii. 156—Leucojum vernum.

GALAPAGOA, Hook. f. in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 277; et Trans. Linn. Soc. xx. (1817) 196 = Coldenia, linn. (Boragin.).
Darwinii, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. U847) 196-C. dichotoma.
fusca. Hook. f. 1. c. 197.—Ins. Galapag.

GALARDIA, Lam. Encyc. ii. 690 (1786) = Gatllardia, Fouger. (Compos.).

GALARHAEUS, Baill. Etud. Gén. Euph. 284 (1858! sphalm. = seq.

GALARHOEUS, Haw. Syn. PL Succ. 143 (1812) - Euphorbia, Linn.
aleppicus, Haw. 1. c. 151 = E. aleppica.
androsemi/olius, Haw. 1. c. 146 = E. lucida.
Apios, Haw. 1. c. 149 = E. Apios.
carniolicus. Haw. 1. c. 148 »= E. camiolica.
coralloides, Haw. 1. c. 146 - E. coralloides.
corollatus, Haw. 1. c. •• E. corollata.
creticus, Haw. 1. c. 149 = E. Characias.
decussatus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 256 = E. Lathyris.
dulcis, Haw. Syn. PL Succ. 147 =E. dulcis.
emarginatus, Haw. 1. c. 146— E. hyberna.
epithymoides. Haw. 1. c. 147 - E. epithymoides.
fiavicomus, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 149 = E. flavicoma.
genistoides, Haw. Syn. PL Succ. 144 - E . genistoidc-.
helioscopius, Haw. 1. c. 152 = E. helioscopia.
hybernus, Haw. 1. c. 146 - E. hybema.
imbricatus. Haw. 1. c. = E. imbricata.
junceus, Haw. 1. c. 160 - E. aleppica.
Lathyris, Haw. 1. c. 148 - E . Lathyris.
linifolius. Haw. 1. c. 160 = E. spinosa.
literatus, Haw. 1. c. 151 = E. platyphyllos.
micranthus. Haw. 1. c. 152 = E. stricta.
Myrsinites, Haw. 1. c 144 - E . Myrsinites.
nicaetnsis, Haw. 1. c. = E. nicaeensis.
orientalis, Haw. 1. c. 148-K. orientalis.
palustris, Haw. 1. c 146 - E. palustris.
Paralias, Haw. 1. c. 144 = E. Paralias.
pilosus, Haw. 1. c. 148 -= E. pilosa.
Pithyusa, Haw. 1. c. 147 =E. Pithyusa.
platyphyllus, Haw. 1. c. 161-E. platyphyllos.
pubescens, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 149 = E. pubescens.
rigidus, Haw. Syn. PL Succ. 150 - E . spinosa.
salicifolius. Haw. 1. c. 148 - E . salicifoha.
serratus, Haw. 1. c. 149=E. serrata.
spathulaefolius, Haw 1. c. 146 = E. spathulaefolia.
spinosus. Haw. 1. c. 149—E. spinosa.
strictus, Haw. 1. c. 161 - E . platyphyllos.
verrucosus, Haw. I. c. 148 —E. pubescens.

GALARRHAEUS, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N*. S. xvii. (1869) 149-praec.

GALARRHOEUS, Reichb. B i. Germ. Excurs. 765 (1882) -praec.

GALASIA, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 426 (1837) - GELASIA, Cass.-Soorzonera, Linn. (Compos.).

GALASIA, Sch. Bip. in Pollichia, xxii-xxiv. (1868) 310 -MicroseriB, D. Don (Cnmpos.).
borealis, Sch. Bip. 1. c.=Leontodon borealis.
lanceolata, Sch. Bip. 1. *c* - M. lanceolata.
scapigera, Sch. Bip. 1. c. = M. scapigera.

GALATEA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1818) 165; et in Diet. Sc. Nat. xviii. 56 (1820) = **Aster,** Tourn. (Compos.).
albiflora, Cass. in Diet. Sc. Nat. xviii. 68 - A . **acri*.**
canescens, Cass. 1. c. 57=A. canus.
intermedia, Cass. 1. c. 68=A. acris.
pauciflora, Cass.!. c. 66=-A. dracuncnloides.
punctata, Cass. 1. c. 67 = A. acris.
rigida, Cass. 1. c. 68-A. trinervis.

GALATEA, Herb, in Bot. Mag. sub t. 2113 (1820) = Nerine, Herb. (Amaryll.).
rosea, Herb. 1. c. = N. sarniensis.
sarniensis, Herb, ex Stend. Nom. ed. II. i. 684=N. sarniensis.

GALATEA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 810, absqoe char. = Eleutherine, Herb, (Md.).
plicata. Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 101 — £. plicata.
vespertina, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 310 - E . plicata.

G ALATELLA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxvii. 163 (1825) = Aster, Tourn. (Compos.),
arm, Nees, Gen. et Sp. Aster. 171 = A. trinervis.
acris, F. Schultz, Arch. Fl. 310 = A. acris.
albiflora, DC. Prod. v. 255-A. acris.
aragonensis, Nees, Gen. et Sp. Aster. 167 = A. aragonensis.
armena, Boiss. Fl. Orient, iii. 161.—Armenia.
asperrima, Nees, Gen. et Sp. Aster. 173 = A. trinervins.
biflora, Nees, L c. 159=A. dracnnculoides.
cana, Nees, 1. c. 168.= A. canus.
canescens, DC. Prod. v. 256=A. canus.
dahurica, DC. 1. c—A. dahuricus.
desertorum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Most xv. (1842) 876= A. dracunculoides.
dracunculoides, Nees, Gen. et Sp. Aster. 164; DC. Prod. v. 256 = A. dracnnculoides.
fastigiata, Nees, Gen. et Sp. Aster. 169 = A. Hauptii.
glandulosa, Nees, 1. c. 174=Olearia glandulosa.
graminifolia, Hook. Fl. Bor. Am. it 15 = Erigeron hyssopifolius.
Hauptii, Lindl. ex DC. Prod. v. 256 = A. Hauptii.
hyssopifolia, Nees, Gen. et Sp. Aster. 160=A. acris.
insculpta, Nees, 1. c. 162-A. acris.
intermedia, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. 104 = A. acris.
juncea, Lindl. ex DC. Prod. v. 257= A. altaicus.
leptophylla. Nees, Gen. et Sp. Aster. 167 = A. leptophyllus, *Desf.*
linifolia, Nees, 1. c. 170 = A. acris.
Linosyris, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xvi. 8 = A. Linosyris.
lusitanica, Nees, Gen. et Sp. Aster. 165 = A. aragonensis.
Meyendorffii, Regel & Maack, in Regel, Tent. Fl. Ussur. 81 = Heteropappns hispidus.
nemoralis, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 16 = Erigeron hyssopifolius.
nemoralis, Nees, Gen. et Sp. Aster. 173 = A. nemoralis.
nudiflora, Lindl. ex DC. Prod. v. 257 = A. Hauptii 1
obtusifolia, Lehra. Del. Sem.. Hort. Hamb. (1837); ex Linnaea, xii. (1838) Litt 83.=Sericocarpus solidagineus.
pauciflora, Nees, Gen. et Sp. Aster. 164, in syn.-A. dracunculoides.
platylepis, Nees, ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. 103 = Sericocarpus rigidus.
punctata, Nees, Gen. et Sp. Aster. 161=A. acris.
rigida, DC. Prod. v. 256= A. trinervis.
Sorrentini, Tod. Ind. Sem. Hort Panorm. (1857) 42; Linnaea, xxix. (1867-58) 744.—Sicilia.
squamosa, DC. Prod. v. 257= A. Hauptii.
strigosa, Weinm. in Bull. Soc Nat Mosc. xxiii. (1860) I. 546.—Rossia.
tenuifolia, Lindl. ex DC. Prod. v. 257=A. Hauptii.
villosa, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xvi. 8 (=*Linosyris villosa).*—Europ.; Caucas.; Sibir.

GALATHEA, Liebm.. Ind. Sem. Hort. Haun. (1855) 26. —Cf. Linnaea, xxviii. (1856) 362=J£arica, Ker-Gawl. (Irid.).
coerulea, Liebm. 1. c.-=M. coerulea.
speciosa, Liebm. L c.—Bras.

GALATHEA, Steud. Nom. ed. II. i. 654 (1840) = GALATEA, Herb. = Nerine, Herb. (Amaryll.).

GALATHEA, Stead. Nom. ed. II. i. 654 (1840) = GALATEA, Salisb.-Eleutherine, Herb. (Irid.).

GALATHENIUM, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. vii. (1841) 442=Lactuca, Toum. (Compos.).
elongatum, Nutt. 1. c. 443 - L . canadensis.
floridanum, Nutt. 1. c—L. hirsuta, floridana.
graminifolium, Nutt. 1. c - L . graminifolia.
integrifolium, Nutt. 1. c = L . integrifolia.
ludovicianum, Nutt. 1. c. 444 = L. ludoviciana.
macrophyllum, Nutt. 1. c.443 = L. macrophylla.
multiflorum, Nutt. 1. C.-L. leucophaea.
salicifolium, Nutt. 1. c.-L. integrifolia, graminifolia.
ianguineum, Nutt. 1. c. 444—L. hirsuta.

GALAX, Linn. Sp. PI. ed. L 200 (1753). *D1APENSIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 620.
BELVEDERE, Clayt. ex Gronov. Fl. Virgin. 25 (1739).
BLANDFORDIA, Andr. Bot. Rep. t 343 (1804).
ERYTHRORHIZA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 34. t. 86 (1808).
SOLENANDRIA, Beauv. ex Vent. Jard. Malm. t. 69 (1803).
aphylla, *Linn. Sp. PI.* 200.—Am. bor.
rotundifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 446 = aphylla.

QAIiAXTA, Thunb. Nov. Gen. 50 (1782). *IRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 693.
aurea, *Nois. ex Srhult. Mant.* i. 326, nomen.—Hab. ?
ciliata, Pers. Syn. i. 41 = ovata.
graminea, *Thunb. Nov. Gen.* 51.—Afr. austr.
graminifolia, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* ed. II. 876.—Afr. austr.
grandiflora, Andr. Bot. Rep. t. 164—ovata.
ixiaeflora, [DC. in] Red. Lil. i. t. 41 = Ixia monadelpha.
magellanica, Steud. Nom. ed. I. 349 = Tapeinia magellanica.
minuta, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 241 = Pauridia hypoxidioides.
mucronularis, Salisb. in Trans. Hort.. Soc i. (1812) 315-ovata.
multiflora, Spreng. Neue Entdeck. i. 251—ovata.
narcissoides, Willd. Sp. PI. iii. 683 = Solenomelus biflorus.
obscura, Cav. Diss. 341 = Tapeinia magellanica.
obtusa, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 315-ovata.
ovata, *Thunb. Nov. Gen.* 51.—Afr. austr.
plicata, Jacq. Ic. PI. Rar. ii. 8. t. 292; Coll. Suppl. 30 =Lapeyrousia fasciculata.
purpurea, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 385=ovata.
ratnosa, [DC. in] Red. Lil. i. sub t 41 = Ixia monadelpha.
versicolor, Salisb. in Trans. Hon. Soc. i. (1812) 815 = ovata.
violacea, Eckl. Verz. 17=ovata.

GALBANON, Adans. Fam. ii. 499 (1763)=Polylophium, Boiss. (1844) (Umbellif.).

GALBANOPHORA, Neck. Elem. i. 175 (1790) = BeaeU, Linn. (Umbellif.).

GALBANUM, D. Don, in Phil. Mag. ix. (1881) 46; et in Trans. linn. Soc. xvi. (1833) 603=Polylophium, Boiss. (1844) (Umbellif.).
officinale, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1833) 603. —Oriens.

GALE, Toum. ex Adans. Fam. ii. 345 (1763) = Myrica, Linn.
belgica, Dum. Fl. Belg. 10 =M. Gale.

GALEANA, La Llave, in La Have & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 12 (1824). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 406.
hastata, *La Llave, 1. c.*—Mexic

GALEANDHA, Lindl. in Bauer, Illustr. Orcb. PI. Gen. t. 8 (1882 ?). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 686.
CORYDANDRA, Reichb. Nom. 63 (1841).
angomensis, Reichb. f. in Linnaea, xx. (1847) 680, sphalm.=seq.
anjoanensis, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 650.—Ins. Comor.

GALEANDBA :—
barbata, *Lem. Illustr. Hortic.* iii. (1856) *Misc.* 86, 89. —Bras.
Baueri, *Lindl. in Bauer, Illustr. Orch. PI. Gen.* t. 8. —Guiana; Mexic.
Beyrichii, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 854.—Venezuela.
Bouliawongo, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 935.—Afr. trop.
cristata, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 72=dives,
curvifolia, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 86.—Bras.
Devoniana, *Schomb. ex Lindl. Serf. Orch.* t. 87.—Am. austr.
dives, *Reichb. f.* b* *Warsc. in Bonplandia,* ii. (1854) 98.—N. Granat.
euglossa, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 935 = Eulophia euglossa.
extinctoria, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 187= Eulophia gracilis.
gracilis, Lindl. 1. c = Eulophia gracilis.
graminoides, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 88.—Bras.
Harveyana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1883) II. 716. —Hab. ?
hysterantha, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 86.—Bras,
juncea, *Lindl. Sert. Orch.* sub t. 87.—Guiana; Bras,
junceaoides, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 87.—Bras,
lacustris, *Rodrig. 1. c.* 86.—Bras,
lagoënsis, *Reichb. f. (f Warm, in Otia Bot. Hamb-* 88.—Bras,
longibracteata, *Lindl. in Joum. Linn. Soo.* vi. (1862) 133 (err. typ. 831).—Afr. trop.
minax, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1874) I. 786.—Hab.?
montana, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 175.—Bras,
nivalis, *[Mast.] in Gard. Chron.* (1882) 1.637.—Am. trop.
Petersii, Reichb. f. in Linnaea, xx. (1847) 679[s] Eulophia Petersii.
Quartiniana, Reichb. f. in Walp. Ann. iii. 552" Eulophia Quartiniana.
Stangeana, *Reichb. f. in Bonplandia,* iv. (1856) 323. —Bras.
villosa, *Rodrig. Orch. Nov. i.* 85.—Bras,
viridis, *Rodrig. 1. c.* ii. 176.—Bras.

GALEARIA, Heist. Syst. 7 (1748) (Quid!).

GALEARIA, Presl, Symb.Bot.i..49(18S0)-Trifollui», Tourn. (Legumin.).
Bonanni, Presl, 1. c. 60=T. Bonanni.
Cupani, Presl, 1. c.=T. physodes.
fragifera, Presl, 1. c. = T. fragifera.
resupinata, Presl, 1. c.=T.resupinata.
tomentosa, Presl, 1. c.=T. tumens.
tutnens, Presl, L c « T . tumens.

GALEABIA, Zoll. *Sc* Mor. Syst. Verz. Zoll. 19 (16*5-46). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. «•• 287.
BENNETTIA, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 249. t. 5° (1852).
CREMOSTACHYS, Tul. in Ann. Sc Nat. Sér. III. xv- (1851) 259.
affinis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 430.—Malaya,
angustifolia, *Miq. 1. c. Suppl.* 470.—Sumatra,
aristifera, *Miq. I. c.* 471.—Sumatra,
elliptica, *Miq. 1. c.* 469.—Sumatra.
Finlaysoni, *Miq. I. c.* i. II. 429.—Malaya,
fulva, *Miq. I. c.* 430.—Malaya.
Jackiana, *Miq. 1. c.*—Malaya,
pedicellate, *Zoll. (? Mor. Syst. Vert. Zoll.* W-" Malaya.
phlebocarpa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 429.—Malaya,
sessilis, *Zoll.* &• *Mor. Syst. Vert. Zoll.* 19.—Malaya,
splendens, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 469.—Sumatra,
sumatrana, *Miq. I.* c—Sumatra.
Wallichii, *Kurt, For. Fl. Brit. Burnt,* ii. 407.—Burma.

GALEARIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 39 (1886) = Habenarla, Willd. (Orchid.).
biflora, Rafin. 1. c. = H. bifolia ?
spectabilis, Rafin. I. c. -Orchis spectabilis.

GALEATA, Wendl. Bot. Beobacht. 36 (1798) (Quid ?).
ferruginea, Wendl. 1. c.—Ind. or.

GALEDRAGON, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI-" »• i7i (1821) ^Dipeacufl, Linn.
pilosus, S. F. Gray, 1. c - D . pilosus.

CALEDUPA, Lam. Encyc ii. 594 (1786)=Pongamia, Vent. (Leguxnin.).
arborea, Roxb. Hort Beng. 68 = P. glabrai
°'*Juga*, Roxb. 1. c—Hab.»
'Uiptica, Roxb. 1. c. 53; Fl. Ind. iii. 242 = Denis elliptica.
frutescens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 559 = Denis scandens.
grandiflora, Herb. Juss. ex Vent. Jard. Malm, sub t.28 . ~P. grandiflora.
"idica, Lam. Encyc. ii. 694 = P. glabra.
"lacrocarpa, Roxb. Hort. Beng. 53=Mucuna macrocarpa?
'naculata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 559 = P. glabra.
"larginata, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 241 = Derris cuneifolia.
"xgasperma, Roxb. Hort. Beng. [98], nomen-Mucuna niacrocarpa?
Piscidia, Roxb. 1. c. 63; Fl. Ind. iii. 240 = Millettia Rscidia.
Pongam, Raeusch. Nom. ed. III. 208 = P. glabra.
Pung$_{am}$, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 658= Gliricidia maculata?
Putgum, J. F. Gmel. Syst. 1086 = P. glabra.
"'tginosa, Roxb. Hort. Beng. 58; Fl. Ind. iii. 248 = •Uerns uliginosa.

GALE$_{A>}$ Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 220 (1787). *LEGUM1NOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 436.
ACCOROMBONA, Endl. Gen. PI. Suppl. i. 1427 (1841).
CALIOTKOPIS,G. Don. Gen. Syst. ii. 228 (1882).
"fncana. Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 2 = officinalis.
ambigua, M. A. Curt, in Bost. Joum. Nat .Hist. i. (1S37) 121-Tephrosia ambigua.
"Pollinea, Delile, Fl. Aegypt. 288. t. 88 = Tephrosia apollinea. *TM
"rhorescens, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 5627 - lephrosia Candida.
argentea, Lam. Encyc. ii. 599-= Tephrosia villosa.
"stragaloides, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, ii 208 = lephrosia astragaloides.
"fba-Jovis, Burm. f. Fl. Ind. 172=Tephrosia villosa.
*" "i", Spreng. ex DC. Prod. ii. 263 = Poitaeagale- gwdes.
Dtc$_{o}$lor, *Boiss. tf Haussk. ex Regel, Ind. Sent. Hort. Pftrop.* (1867) 37; *Boiss. Fl. Orient*, ii: 191.—Mesopot
"flora, Poir. Encyc Snppl. ii. 699 = Tephrosia biflora.
biloba, Sweet, Hort. Brit ed. I 124 = officinalis.
»"iata, Spreng. ex Steud. Norn. ed. II. L 654 =Lathyrus 'omentosus.
*ca*P**sis*, Jacq. Coll. ii. 292; Thunb. Prod. PI. Cap. 134 * Tephrosia capensis.
">ntaea, Jacq. Select. Am. 212 = Tephrosia caribaea.
cl"yiophylla, Steud. Norn. ed. I. 850=Tephrosia chry- wphylla. *Pursh.*
TM*erea*, Linn. Syst. ed. X. 1172 = Tephrosia cinerea.
*c<*ruU$_{at}$* Li$_{nn}$• f's upp. 335 = Dalea Mutisii.
*c<*mlea*, Rottl. ex Wight & Am. Prod. 213 - Tephrosia Purpurea.
Coom$_{f}$"1 Buch-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 547 = Tephrosia purpurea.
Colute Cr uted, Burm. f. Fl. Ind. 172 = Indigofera viscosa.
«/•»' WiUd_Sp_PL iij_ 12«-Tephrosia villosa.
coronillae$_{fl}$ia, Desf. Tabl. ed. I. 194 = Tephrosia
crocea, R. Br. ex Benth. Fl. Austrah "• 205 = Tephrosia crocea.
rf«*«r,<r$_{o}$,Pa$_{i}$L R$_{UL 742}$=Astragalus dahuricus.
"%•««, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 387 = lephrosia purpurea.
d$_{o}$"£"gensis, Willd. Sp. PI. iii. 1249 = Tephrosia pur- 1 rea.
d' ia, ?"lb_ex DC. Prod. ii. 238 = Galactia dubia.
e£"l Jwq. Coll. ii. 182=Lessertia diffusa.
-uenta. RattL '* *Spreng. Nachr.* i. *Bot. Cart.* «
falca-Z 3 Quid?).—Hab.t
filifolia, Thunb. Prod_Pl_C«P- 134-Tephrosia falcata.
filifolia, Thunb. FL Ca P- m= Argyrolobium fill- forme.
filiformis, Jacq. Coll. iL 348 - Galactia dubia.
filiformis, Thnnb_pro<j_pi_ cap-iM •>waw_Sp_pl_ iii. 12 |? = Argyrolobium filiforme.
florida, F$_{n}$ G- &>** Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. IU. 400
frit =Te P^{hr}o sia chrysophylla, *Pursh.*
*?'"". Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = Tephro- Ma'f«e»cens?

GALEGA:—
fruticosa, Linn. Syst. ed. X. 1172-Tephrosia senticosa.
genistoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 133 = Cyclopia genistoides.
grandiflora, Vahl, Symb. Bot. ii. 84 = Tephrosia grandiflora.
Haynii, Willd. Enum. Hort Beroli Suppl. 61 • Tephrosia tinctoria.
heterophylla, Fisch. ex DC. Prod.-ii. 253 = Tephrosia tinctoria.
Heyneana, Roxb. Hort. Beng. 57; *VI* Ind. iii. 384 = Tephrosia tinctoria.
Heynii, Steud. Nom. ed II. i. 655 = Tephrosia tinctoria.
hirta, Buch.-Ham. in Trans. Linn, Soc. xiii. (1822) 546 = Tephrosia Hookeriana.
hispidula, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 68 = Tephrosia hispidula.
humilis, Thunb. Prod. PI. Cap. 134 - Tephrosia pallens.
incana, Roxb. Hort. Beng. 57; *'l. Ind. iii. 386- Tephrosia villosa.
juncea, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, ii. 208 » Tephrosia juncea.
lancaefolia. Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 886 = Tephrosia purpurea.
lanceolata, Hornem. ex Steud. Nom. ed. II. i. 655 •= Tephrosia senticosa.
linearis, Willd. Sp. PI. ii. 1249 «= Tephrosia linearis.
littoralis, Forst. f. Prod. 52-Tephrosia purpurea.
littoralis, Linn. Syst. ed. XII. 565=Tephrosia cinerea.
longifolia, Jacq. Coll. ii. 849 = Galactia tenuiflora.
lupinifolia, Burch. ex DC. Prod, ii, 255 = Tephrosia lupinifolia.
maxima, Linn. Syst. ed. X. 1172 = Tephrosia purpurea.
mimosoides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1249-Tephrosia mimosoides.
montana, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1181; Schult. Obs. Bot. 154 = orientalis.
mucronata, Thunb. Prod. PI. Cap. 134 - Lessertia mucronata.
nervosa, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 423-Tephrosia tinctoria.
oblongata, R. Br. ex Benth. FL Austral, ii. 205 = Tephrosia oblongata.
ochroleuca, Jacq. Coll. i. 79 = Vicia ochroleuca:
ochroleuca, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) 11,197 = praec.!
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 714.—Europ.; As. occ.
orientalis, *Lam. Encyc.* ii. 596.—Reg. Caucas.
pallens, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 70 •= Tephrosia pallens.
parviflora, Salisb. Prod. 338 - Tephrosia stricta.
patula, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1866) II. 140.—Tauria.
paucifolia, M, A. Curt, in Bost. Joum. Nat. Hist. i. (1837) 122-Tephrosia spicata.
pentaphylla, Roxb, Hort. Beng. 57 ; Fl: Ind. iii. 384 = Tephrosia senticosa..
Perriniana, Spreng. Neue Entdeck. ii. 161-Tephrosia Perriniana.
persica, Pers. Syn. it 828 = officinalis.
pinnata, Thunb. Prod. PI. Cap. 134 = Rhynchosia ferulaefolia.
piscatoria, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 71 = Tephrosia purpurea.
porrecta, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, ii. 206 •= Tephrosia porrecta.
procumbens, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 547-Tephrosia purpurea.
prostrata, Koen. ex Wight & Am. Prod. 213-Tephrosia purpurea.
prostrata, Wendl. Bot. Beobacht. 56=praec. ?
pubescens, Lam. Encyc. ii. 597 = Vicia ochroleuca.
pulckella. Scop. Dellc. Insub. i. 3=Tephrosia stricta.
pumila, Lam. Encyc. ii. 599=Tephrosia purpurea.
purpurea, Linn. Sp. PI. 1172-Tephrosia purpurea.
pusilla, Thunb. Prod. PI. Cap. 133 - Tephrosia pusilla.
reticulata, R. Br. ex Benth. Fl. Austral., ii. 205 = Tephrosia reticulata.
rosea. Lam..Encyc. ii. 599-Tephrosia grandiflora.
senticosa, Linn. Sp. PI. ed. II. 1068 = Tephrosia senticosa.
sericea, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 545 —Tephrosia purpurea.
sericea, Lam. Encyc. ii. 596=seq. I
sericta, Thunb. Prod. PI. Cap. 184 - Argyrolobium pumilum.

OAXEGA:—
Singapou, Buchoz, Hist. Règ. Vég. x. t. 4 - Tephrosia toxicaria,
spicata, Walt. Fl. Carol. 188-Tephrosia spicata.
spinosa, Linn. f. Suppl. 335 = Tephrosia spinosa.
striata, Thunb. Prod. PI. Cap. 184 = Lessertia pulchra.
stricta, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 70 - Tephrosia stricta.
ternata, Thunb. Prod. PI. Cap. 134-Aspalathus ferruginea.
tinctoria, Lam. Encyc. ii. 698 ; Roxb. Fl. Ind. iii. 386 =• Tephrosia purpurea.
tinctoria, Linn. Syst. ed. X. 1172 = Tephrosia tinctoria.
tomentosa, Vahl, Symb. Bot. ii. 84—Tephrosia tomentosa.
totta, Thunb. Prod. PI. Cap. 134 - Tephrosia totta.
toxicaria, Sw. Prod. Veg. Ind. Oce. 108 •= Tephrosia toxicaria.
trapeeicarpa, Steud. Nom. ed. I. 350=Indigofera senegalensis.
tricolor, Hook. Exot. Fl. t. 1S5-officinalis.
trifoliata, Thunb. Erod. PI. Cap. 184 - Argyrolobium sericeum.
uniflora, Steud. Nom. ed. I. 350=Tephrosia uniflora.
villosa, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 547 = Tephrosia Hookeriana.
villosa, Linn. Syst. ed. X. 1172 = Tephrosia villosa.
villosa, Michx. FL Bor. Am. ii. 67 - Tephrosia spicata.
virginiana, linn. Syst ed. X. 1172 = Tephrosia virginiana.
virginica, J. F. Gme.1. Syst. 1552, Ind.-praec.
vulgans. Lam. FL Fr. ii. 6C4 - officinalis.

GALENA,St-Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 177 =seq.

GALENIA, Linn. Syst. ed. I (1786). *FICOIDEAE*, Benth. & Hook. £ i. 854.
KOLLERIA, Presl, Symb. Bot. ii. 24. t.14 (1830).
SIALODES, Eckl. & Zeyh. Enum. 829 (1837).
TEPHRAS, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 477 (1862).
affinis, *Sond. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 476.—Afr. austr.
africana, *Linn. Sp. PI.* 359.—Afr. trop.
asiatica; Burm. f. Fl. Ind. 88 = Salvadora persica.
celosioides, Spreng. Nov. Prov. 18 = Microtea maypurensis.
collina, *Walp. Rep.* ii. 282.—Afr. austr.
crystallina, *Fenil, ex Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* ii. 477. —Afr. austr.
Dregeana, *Fenil, ex Harv. (f Sond. I. c.—Att.* austr.
Ecklonis, Walp. Rep. ii. 282 = glauca.
fruticosa, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 477.—Afr. austr.
glauca, *Walp. Rep.* ii. 282.—Afr. austr.
halimifolia, Fenrl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 478 —africana.
hemiariaefolia, *Walp. Rep.* ii. 232.—Afr. austr.
heteropkylla, Fenzl, ex Harv. *8c* Sond. FL Cap. ii. 475--spathulata.
hispidissima, *Fentl, ex Harv. V Sond. I. c.* 478.—Afr. austr.
humifusa, Fenzl, ex Harv. & Sond. 1. c. 476- collina.
linearis, Thunb. Prod. PI. Cap. 77 = africana.
pallens, *Walp. Rep.* ii. 232.—Afr. austr.
papulosa, Kcnzl, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. il. 477- pruinosa.
papulosa, *Sond. 1. c.* 476.—Afr. austr.
portulacacea, *Fentl. ex Harv. V Sond. 1. c.*—Afr. austr.
procumbens, *Linn./. Suppl.* 227.—Afr. austr.
pruinosa, *Sond. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 477.—Afr. austr.
salsoloides, Fenzl, ex Harv. & Sond. L c 478 = fruticflai
sarcophylla, *Fentl, ex Harv.* b* *Sond. 1. c.* 476.—Afr. austr.
secunda, *Sond. I. c.* 474.—Afr. austr.
sericea, Fenzl, ex Harv. & Sond. 1. c 478 - fruticosa.
spathulata, *Fentl, ex Harv. tf Sond. I. c.* 475.—Afr. austr.
squamulosa, *Fentl, ex Harv. tf Sond. 1. c.* 477.—Afr. austr.
tenuifolia, Salisb. Prod. 283=africana.

GALEOBDOLON, Adans. F«m. ii. 190 (1768) = Lamium, Tourn. (Labiat.).
amplexicaule, Moench, Meth. 394 - L. amplexicaule.
Galeopsis, Curt. Fl. Lond. faic. iv. t. 40 = L. Galeobdolon.
luteum, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 258 =L. Galeobdolon.
montanum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 860 = L. Galeobdolon.
umbrosum, W'ibel, Prim. Fl. Werth. 139 = L. Galeobdolon.
rulgare, Pers. Syn. ii. 122 =L. Galeobdolon.

GALEOGLOSSUM, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 31 - Prescottia, Lindl. (Orchid.).
prescottioides, A. Rich. & Gal. 1. c. 31-P. Galeottii.

OAIiEOIiA, Lour. Fl. Cochinch. ii. 620 (1790). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 689.
CVRTOSIA, Blume, Bijdr. 396. t. 6 (1825).
Km AX is, Reichb. f. in Linnaea, xli. (18/7) 63.
KRYTHRORCHIS, Blume, Rumphia, i. 200. t. 70 (1835).
HAEMATORCHIS, Blame, 1. c. iv. t. 200 B (1848).
LEDCERIA, F. MuelL Fragm. i. 238 (1869).
POGOCHILUS, Falc. in Hook. Jonm. Bot iv. (1842) 73.
altissima, *Reichb. /. Xenia Orck.* ii. 77.—Malaya,
cassythoides, *Reichb. f. I. c*—Austral,
foliata, *F. Muell. Fragm.* viii. 31.—Austral.
Humblotii, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1886) 378.—Ins. Comor.
Hydra, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 77.—Reg. Himal.; Malaya.
javanica, *Benth. (f Hook./. Gen.* iii. 690.—Malaya.
Kuhlii, *Reichb./. Xenia Orch.* ii. 78.—Malaya.
1-cdgeri, *F. Muell. in Fitgg. Austral. Orch.* ii. (1886) II.—Austral.
Lindleyana, *Reichb./. Xenia Orck.* ii. 78.—Reg. Himal.
nudifolia, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 520 (Cranichis nudifolia, *Pers.).*—Cochinch.
rigida, *Benth. if Hook./. Gen.* iii. 690.—N. Caled.
septentrionalis, *Reichb. /. Xenia Orch.* ii. 78.—Japon.

GALEOPSIS, Linn. Syst. ed. I (1735). *LABI A TAE* IScnth. & Hook. f. ii. 1209.
LADANUM, Dill, ex Linn. Syst. ed. I (1735).
TETRAHIT, Adans. Fara. ii. 190 (1763).
abyssinka, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 665 = Plectranthus punctatus.
acuminata, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 323 - G. Tetrahit.
alpicola, Nym. Consp. 576 = G. Tetrahit.
angusti/olia, Ehrh. ex Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. II. 8 —G. Ladanum.
arvatica, Jord. in Billot, Ann. Fl. Fr. Allem. 130=G. ladanum.
arvensis, Salisb. Prod. 82 = G. Ladanum.
Herteti, Perrier, ex Nym. Consp. 576 = G. Ladanum.
bifida, Boenn. Prod. Fl. Monast. 178=G. Tetrahit.
calcarea, Schoenh. ex Steud. Nom. ed. II. i. 655—G. Ladanum.
canescens, Schult Obs. Bot. 108 — G. Ladanum.
cannabina, Pollich, Hist. PI. Palat. ii. 148-ochroleuca.
cannabina, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 254-versicolor.
cannabina, Willd. Sp. PI. iii. 93 = G. Tetrahit.
carpetana, *Willk. in Flora,* xxxv. 1,1862) 282.—Hispan.
dubia, Leers, Fl. Herborn. 183 - ochroleuca.
elegans, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 526, in obs. •= ochroleuca
Filholiana, Timb. in Ball. Soc. Bot. Fr. i. (1854) 214 = G. Ladanum.
Gacognei, Nym. Consp. 576 - G. Tetrahit.
Galeobdolon, Linn. Sp. PI. ed. I. 680 = Lamium Galeobdolon.
glabra, Des Etangs, in Ball. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) 204 -angustifoliaJ
glandulosa, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 681-G. Ladanum.
glaucescens, *Reut. ex Ardoino, Fl. Alpes Mar.* 299.—Europ. austr.
grandiflora, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 461 = G. Ladanum.
grandiflora. Roth, Tent. Fl. Germ. i. 254 - ochroleuca.
grandiflora, Suter, Fl. Helv. ii. 13=G. Tetrahit.

GALEOPSIS :-
hirsuta. Linn. Sp. PI. 580=Stachys hirta.
hispanica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6=Stachys hirta.
hispida, Thunb. Prod. PI. Cap. 96 - Stachys Thunbergii.
intermedia, Vill. Prosp. 21 = G. Ladanum.
Ladanum, *Linn. Sp. PI.* 579. —Europ.; Reg. Caucas.
Laramberguei, Martr. Fl. Tam. 566 «G. Tetrahit.
lati/olia, Hoffm. Deutschl. Fl. ii. 8 = G. Ladanum.
leucantha, Nym. Consp. 576 = G. Tetrahit.
lutea, Gilib. Chlor. Grodn. 28=Lamium Galeobdolon.
maculosa, Lam. Encyc. ii. 601—Plectranthus punctatus.
magnifolia, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* V. (1790) ed. I. Art. IV. 16 (Quid ?).—Java.
Michelianae, Tuna, Fl. Ital. Prod. 66-G. Tetrahit?
micrantha, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 784 <• G. Ladanum ?
moutana, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 21.—Am. bor.
neglecta, *Schult. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 655.—Hab.?
nepetaefolia, *Timb. in Billotia,* i. (1864) 19.—Mont. I'yrtn.
nodosum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 378 = G. Tetrahit.
ochroleuca, *Lam. Encyc.* ii. 600.—Europ.
orientalis. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5-Stachys spinulosa.
parviflora, Lam. Encyc. ii. 600 - G. Tetrahit.
Poolii x, Brnegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1860) 102.—Europ.
praecox, Jord. in Billot, Ann. Fl. Fr. Allem. 21 - G. Tetrahit.
prostrata, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 888 = ochroleuca.
pubescent, Bess. Prim. Fl. Galic. it 27=-G. Tetrahit. -
pubescens, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 135 = veraicolor.
pyrenaica, *Bartl. Ind. Sent. Hort. Gotting.* (1848).—Enrop. austr.
Reichenbachii, Reut. in Compt.-Rend. Soc. Hallér. (1853-54) 27=G. Tetrahit.
Reuterii, Reichb. f. Ic Fl. Germ, xxviii. 17 = G. Ladanum.
segetum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 377 = G. Ladanum.
segetum, Reich. Fl. Moeno-Franc. ii. 8-ochroleuca.
speciosa. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = versicolor.
subalpina, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1863) 69-veraicolor.
sulphurea, Jord. Cat Jard. Dijon (1848), 19 = versicolor.
Tetrahit, *Linn. Sp. PI.* 679.—Enrop.; As. bor.
unicolor, Fries, Summ. Veg. Scand. 14-versicolor.
urticaefolia, Salisb. Prod. 82; Tausch, in Lotos, ii. (1852) 69 - G. Tetrahit.
Verloti, Jord. in Billot, n. 1946.—Cf. Bull. Soc Bot. Fr. vii. (1860) 606 - G. Tetrahit.
versicolor, *Curt. Fl. Lond. /asc.* vi. t. 38.—Europ.; Reg. Caucas.
versicolor, Spenn. Fl. Frib. ii. 394-G. Tetrahit.
villosa, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 266 ^ ochroleuca.
Walteriana Schlecht. Fl. Berol. i. 820-G. Tetrahit.

GALEOPSIS, Moench, Meth. 397 (1794)= Stachys, Tourn. (Labiat.).
/usca, Moench, 1. c =S. alpina.

GALEOTTIA, Nees, in DC. Prod. xi. 311 (1847) = Glockeria, Nees (Acanth.1.
gracilis, Nees, 1. c-Glockeria gracilis.

GALEOTTIA, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 25-Zygopetalum, Hook. (Orchid/,.
Beaumontii, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 12.—Bras.
grandiflora, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat, Sér. III. iii. (1845) 25 - Z. grandiflorum.

GALEOTTIA, Rupr. ex Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1844) 247-Zeugites, P. Br. (Gramin.).

GALERA, Blume, Bijdr. 415. t. 8. (1825) - Epipogum, S. G. Gmel. (Orchid.).
nutans, Blume, 1. c = E. nutans.
rosea, Blume, Mns. Bot. Lugd. Bat. ii. 188 = E. nutans.

GALIANTHE, Griseb. ex Lorentz, Veget. Nord. Entre-Rios, 72 (1878), nomen; et in Goett. Abh. xxiv. (1879) 156 ~8permacooe, Dill. (Rubiac).
clidemioides, Griseb. 11. cc 72; 157 *(*>Borreria centranthoides).*—Bras.
/astigiata, Griseb 11. cc. 72 ; 156.—Reg. Argent.
verbenoides, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879; 167 (= *Borreria verbenoides).*—Bras.

GALIASTRUM, Heist, ex Fabric. Hort. Helmst. cd. I. 108 (1769) = Mollugo?, Linn. (Ficoid.).

GALILEA, Parl. Fl. Palerm. i. 297 (1845) = Cyperus, Mich.
mucronata, Parb. 1. c. 299=C. schoenoides.

GALIMBIA, Endl. Ench. 379 (1841) sphalm. = PALIMBIA, Bess. •= Feucedanum, Tourn. (Umbellif.).

GALINIERA, Delile, in Ann. Sc Nat. Sér. II. xx. (1843) 92. t. 1. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f-ii. 91.
PTYCHOSTIGMA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 1.23.
caffeoides, *Delile, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. *xx.* (1843) 92.—Abyss.

GALINSOGA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 110. t. 21 (1794). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 390.
VARGASIA, DC. Prod. v. 676 (1836).
VIGOLINA, Poir. Encyc viii. 613 (1808.
WIBORGIA, Roth, Catalect. fasc. ii. 112 (1800).
allaeocarpa, Spreng. Syst. iii. 579—caracasana.
angusti/olia, Spreng. Neue Entdeck. ii. 138 = Calea angustifolia.
balbisioides, Steud. Nom. ed. II. i. 666 = Tridax balbisioides.
brachiata, Spreng. Syst. iii. 679-Calea brachiata.
brachystephana, *Regel, Ind. Sem. Hort. Turic.* U«46) 2.—Hab.?
calva, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 529, nomen = parviflora, Jaegeria hirta.
caracasana.Sc*. *Bip. 1. c; et in Butt. Soc. Bot. Fr.* xii-(1865) 80.—Am. austr.
dentata, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 656-Tridax trilobata ?
discolor, Spreng. Nov. Prov. 19; et Syst. iii. 577 •" Montanoa arborescens.
filiformis, *Hemsl. Diag. PI. Nov.* 84.—Mexic.
hispida, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 119.—Mexic.
laciniata, *Reta. in Hoffm. Phytogr. Blaetter,* i. (1803; 46.-Hab.?
lineari/olia, Spreng. Syst. iii. 579 = Gutierrezia linear!-folia.
Mandonii, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 5*1, nomen=Jaegeria hirta.
megapotamica, *Spreng. Syst.* iii. 580.—Bras,
oblongifolia, *DC. Prod.* v. 677.—Peruv.
Pacajugo, *Ruiz, ex Roem. Hort. Turic. fide Steud. Norn-*ed. II. i. 656.—Peruv. ?
parviflora, *Cav. Ic.* iii. 41. t. 281.—Am. austr.
quadriradiata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 198 = parvinu'8-
quinqueradiata, Ruiz & Pav. 1. c = parviflora.
resinosa, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. i. " Gutierrezia linearifolia.
serrata, Spreng. Syst. iii. 579=Calea axillaris.
trilobata, Cav. Ic. iii. 42. t. 282 -Tridax trilobata.
uniflora, *Spreng. Syst.* iii. 680.—Reg. Argent.
unxioides, *Griseb. in Goett. Abk.* xxiv. (1879) 1JB> —Reg. Argent.
urticaefolia, Benth. Bot. Voy. Snlph. 119 - Sabazi» urticaefolia.

GALINSOGEA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. «» 252-t. 386 (1820)-Tridax, Linn. (Compos.).
balbisioides, H. R & K. 1. c. 253. t. 386 = T. «» bisioides.

GALINSOGEA, Willd. Sp. PI. iii. 2228 (1808) = Galinsoga, Ruiz & Pav. (Compos.).

GALINSOGAEA, Zucc. in Flora, iv. (1821) 612-pf»eC-

GALINSOGEOPSIS,Sch. Bip. in Seem. Bot. HeraW, S<>6 (1857?) =Perloome, A. Gray (Compos.).
spilanthoides, Sch. Bip. 1. c. 307= P. spilanthoid*'-

GALINSOJA, Roth, CaUlect. fasc. iii. 78 (1°°fl) * GalinBoga, Ruiz & Pav. (Compos.)-

GAUNZOGA, Dum. Fl. Belg. 72 (1827) - praec.

GALION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 113,126 = Gafium, Linn. (Rubiac).
aparinum, St Lag. 1. c. = G. Aparine.
nolluginum, St. Lag. 1. c. - G. Mollugo.

GALIOPSIS, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 398 ~ Asperula, Linn. (Rubiac.).
glauca, Fourr. 1. c. - A. galioides.

GALIOPS1S, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (U80) 79-Qaleopeis, Linn. (Labiat.).

GALIPEA, Anbl. PI. Gui. ii. 662. t. 269 (1775).
RUTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 285.
COSTA, Veil. Fl. Hum. 19 (1825); i. t. 48 (1827).
tNDosTEPHiUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 227.
SCIUMS, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 150, 163.
TICOREA, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1828) 182.
aromatica, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 91.—Guian.
Anabidae, *Steud. Norn.* ed. II. i. 656.—Bras,
^racteata, *Schult. Mant.* i. *Add.* I. 195.—Bras.
Candolleana, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 132-Cusparia Candolleana.
"rymbosa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 91 = Cusparia febrifuga.
c<»irifoli„, St. Hil. ex DC. Prod. i. 731 = Cusparia cuneifolia.
Cusparia, st, Hil. ex 1. c = Cusparia febrifnga.
"fgans, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 90 - Cusparia elegans.
"fsa, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 64.-Guian.
'•ontanesiana, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 132 - » Cusparia Fontanesiana.
u»udichaudiana, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 89 = Cusparia Gaudichaudiana.
erandifolia, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. H. 98.—Bras.
heteropkylla, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 131 - Cusparia heterophylla.
*J*sminiflora,* Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. H. 97 = muUiflora.
*•«««<«<«»«», St. Hil. ex DC. Prod. i. 781-Cusparia iilvcstris.
'axiflora, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 99.—Bras.
lo»gifolia, *St. Hil. in Bull. Soc. Philom.* (1823) 181.—Bras.
m<*rophyll„, St. Hil. in Mem. Mus. Par. x. (1823) 282 Cusparia macrophylla.
M tand> St- Hil- Fl. Bras. Mer. i. 90 - Cusparia Mmiinna,S
Bras. t. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 131.
multiflora, *Schult. Mant.* i. *Add.* I. 194.—Bras.
od Z at,ssima> Undl- Bot- Re8- *• 1420 " Cusparia odoratissima.
° T^H8' *Hancock, in Trans. Med. Bot. Soc. Land.* i. (1829) 25.-Am. austr.
P P os? 'dolia, *Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. 105—Bras.
°«o»a, DC. in Mem. Mus. Par. ix. (1822) 149. t. 10 *1* aputia Ossana.
"/*• St- Hil. & Tul. in Ann. Sc Nat. Ser. II. xvii. (1842) 139 - Cusparia ovata.
*Pentagy*nai St- Hi, ;n M£m Mus. par- x. (i82S) 281 6. * usparia pentagyna.
fntandra, St. Hil in Bull. Soc. PhUom. (1828) 132 *»w sparia Pentandra.
fatapkylla, Macfad. Fl. Jamaic. i. 196-Esenbeckia Pentaphylla.
Isora> Sprace, ex Engl. in Mart. Fl. Bras xii. II. *^ Cusparia ramiflora.
Rich. St, HU> ex DC Prodl 73
ruf«eUaaa' **&> *Gartenfl.* (1866) 358.-Bras.
Turcg- » BuU- s<- Nat- Mosc* 1863) i. 596.—Bras,
uT A P ruce' « Engl- m Mart. Fl. Bras. xii. II. Cus Paria toxicaria.
Aubl. PI. Gut. ii. 662. t. 269.—Guian.
NGEA, Willd. Sp. PI. iii. 2228 (1800) = Otalin-Ruiz & pav. (Compos.).

OAIiITTM, Linn. Gen. ed. 1.24 (1787). *RVB1ACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 149.
APARINE, [Toura.] Linn. Gen. ed. I. 24 (1737).
ASFERA, Moench, Meth. 641 (1794).
CRUCIATA, Toura. ex Adans. Fam. ii. 144 (1763).
EYSELIA, Neck. Elem. i. 19U (1790\
MICROPHYSA, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. ii. (1844) 115.
KUBEOLA, Toum. ex Adans. Fam. ii. 144 (1763).
TRICHOGALIDM, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 896.
abruptorum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 76.—Alger.
aciphyllum, Willk. & Cost, in linnaea, xxx. (1859-60) 101 •= fruticescens.
aculeatissimum, *Kit. ex Kanite, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xiii. (1863) 548.—Hungar.
acuminatum, *Ball, in journ. Bot.* xi. (1873) 334.—Marocc.
acutissmum, A. Gray, in Proc Am. Acad. vii. (1868) 350 - stellatum.
acutum, *Edgea. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 61.—Reg. Himal.
adhaerens, *Boiss. V Bal. Diagn.* Ser. II. v. 106.—Cilic.; Syria.
adhaerens, Gilib. Fl. Lituan. i. 13-G. Aparine.
adhaerens, Hort. Vindob. ex DC. Prod. iv. 608 = spurium.
aetnense, Presl, Delic. Prag. 120 = seq.
aetnicum, Bivona, Slirp. Rar. Sicil. iv. 21 - corrudaefolium ?
affine, Roth, Enum. PI. Fhaen. Germ. i. I. 474 - vernmt
affine, Schult. Mant. iii. 172=-lucidum.
aggtomeratum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 690 = glomcratum.
agreste, Wallr. Sched. Crit. 59 = G. Aparine.
albescens, *Hook. f. in Hook. Land. Journ. Bot.* vi. (1847) 462 [bisj.—Tasman.
albo-lutescens, Gilib. Fl. Lituan. i. 8 = uliginosum.
album, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. xx-eiectum *vel* G. Mollugo.
album, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7-=G. Mollugo.
album, Willd. Sp. PI. i. 598 = brevifolium, *Sibth. V Sm.1*
aleppicum, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 60 = nigricans.
alpestre, Gaud, ex Roem. & Schult Syst, iii. 225 = anisophyllum.
alpestre, Stev. ex Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 43 = brachyphyllum.
alpicola,lori.Obs. PI. Crit. iii. (1846) 131»obliquum.
alpinum, *Scheele, in Linnaea,* xvii. (1843) 341 Helvet
alpinum, Schur, Enum. PI. Transs. 288 = vemum.
altissimum, Gilib. Fl. Lituan. i. 11 - Asperula galioides.
Amani, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 54 = erectum.
amatymbicum, *Edl. V Zeyh. Enum.* 870.—Afr. austr.
ambiguum x, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 20.—Gallia.
amblyophyllum, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 58.—Sibir. alt.
andinum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 98.—Chili.
Andrewsii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 537.—Am. bor. occ.
anglicum, Huds. F). Angl. ed. II. 69=parisiense.
angulosum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 74.—Calif,
angustifolium, *Nutt. ex Torr. tr Gray, Fl. N. Am.* ii. 22.-Calif.
anisophyllon, *Vill. Prosp.* 20; *Hist. PI. Dauph.* ii. 817 [bis].—Europ.
anomaium, Hort. ex Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xvii. 80 = Asperula molluginoides.
antarcticum, *Hook. f. Fl. Antarct.* 303 [bis].—Reg. Magell.
Aparine, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 167 = tricome.
Aparine, *Linn. Sp. PI.* 108.—Reg. bor. temp, et Magell.
Aparine, Wall. Cat. n. 6213 = hirtiflorum, G. Mollugo.
aparinella, Lange, Ind. Sem. Hort. Hauu. (1854) 24 = spurium.
aparinoides, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 30.—Arab.
aparinoides, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1848) 83-° spurium.

GAIIUM:—
aphyllum, *[Pieri*] in Ionios Anthol.* iv. 940.—Ins. Corcyra.
apiculatum, Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. 222 = leucocarpum.
apiculatum, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 91.—Graecia.
apiculatum, Sprun. ex Nym. Consp. 328-aureum.
approximatumx,- Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 20.—Gallia.
apricum, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 90.—Archip. Graec.
apricum, Sieber, ex Steud. Norn. ed. II. i. 657 -= Asperula humifusa.
apricum, Veil. Fl. Flum. 43; i. t. Ill ^radicosum.
aquaticum, Willd. ex Schult. Mant. iii. 168 = uliginosum.
arenarium, *Ltisel. Fl. Gall.* 86; ed. II. l. 110.—Gallia.
aretioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 42.—vAs. Min.
argenteum, Reichb. ex Nym. Consp. 327 - anisophyllum.
argenteum, Vill. Prosp. 20; Hist. PI. Dauph. ii. 318 [bis] = sylvestre.
aristatum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 162.—Europ.
aristatum, Sm. Eng. Fl. i. 203-erectum.
arkansanum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 80.—Am. bor. occ.
articulatum, Lam. Tabl. Encyc. i. 260-rubioides.
articulatum, *Roem. &* Schult. Syst.* iii. 260.—Oriens.
ascendens, Willd. ex Spreng. Syst. i. 390 - mexicanum.
Aschenbornii, 5. *Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 701.—Mexic
asparagifolium, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 91-aureuni.
asparagifolium, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xx.(1870) 327 ~ ochroleucum.
asperifolium, Wall. In Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 881 = G. Mollugo.
aspeirimum, *A. Gray, PI. Fendl.* 60.—Am. bor. occ.
asperuloides, Edgcw. in Trans. Linn. Soc xx. (1846) 61 — triflorum.
asperum, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 423-G. Aparine 1
asperum, Schreb. Spicil. Fl. lips. 3*>sylvestre.
asperum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 80.—Afr. austr.
asprellum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 78.—Am. bor.
atherodes, *Spreng. Syst.* iv. *Cur Post.* 89.—Bras.
atlanticum. Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 334 - sylvestre.
atlanticum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 76.—Alger.
atrovirens, Lapeyr. Suppl. Hist PI. Pyr. 22 « sylvaticum.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 40.—Persia,
aureum, *Vis. in Orto Bot. Padov.* (1842) 134, in not.; *Fl. Dalmat.* iii. 6.- Europ. oc.
auriense, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 810 - boreale.
australe, *DC. Prod.* iv. 608.—Austral.
austriacum, Jacq. Fl. Austr. i. 51 = sylvestre.
axifiorum, F. Muell. ex Mi^. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1869) 113-Gaudichaudi.
axillare, Presl, ex Guss. Fl. Sic. Prod. i. 178 - paribiense.
baidense, Spreng. Pugill. i. 10—helveticum.
Barrelieri, Sahm. in Flora, iv. (1821) 107 = ellipticum.
Bauhini, Roem. & Schult. Syst. iii. 218 = vemum.
beilanense, Kotschy, ex Boiss. M. Orient, iii. 54-erectum.
Benthamianum, Walp. Rep. vi. 17 - Relbunium tuberculosum.
bericum, Turra, in Giom. ItaL Ven«. i. (1766) 119 = aristatum.
bermudense. Linn. Sp. PI. 105 = pilosum.
bermudianum, Linn. Syst. ed. XII. 117 = seq.
Bemardi, *Gren. V Godr. Fl. Fr.* ii. 23.—Corsica.
Biafrae, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 245.—Afr. trop.
bicolor, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 17=sylvestre.
Bielzii, Schur, Enum. PI. Transs. 285-erectum.
biflorum, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 69 = spurium.
bifolium, *S. Wats, in Bot. King's Exped.* 134. t. 14.—Am. bor. occ.
bigeminum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 160.—Reg. Argent.
blepharophoron, Roem. & Schult. Syst. iii. 249 = Valantia hispida.

GALIUM:—

Bloomeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. \d. (1864-5) 538 = multiflornm.
Bocconi, All. FL Pedem. i. 6=anisophyllum.
Bocconi, DC. Frod. iv. 594 =Bylvestre.
Bocconi, J. F. Gmel. Syst. 288 = anisophyllnm ?
Bocconi, Teuore, ex Steud. Norn. ed. II. i. 657 = erectum.
Bolanderi, *A. Gray, in Prec. Am. Acad.* vii. (1868) 350.—Calif.
boreale, Lapeyr. ex DC. Prod. iy. 596 = G. Mollngo.
boreale, *Linn. Sp. PI.* 108.—Keg. bor. temp.
boreale, Walt. Fl. Carol. 85=circaezans.
Boryanum, *Walp. Rep.* ii. 454.—Graecia.
Bourgaeanam, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 60, oomen.—Afr. bor.
Bovei, *Btriss. (f Rent. Pugill. PI. Nov.* 50.—Algeria.
brackiatum, Muhl. Cat. i. 15 = drcaezans.
brachiatum, Pursh. Fl. Am. Sept. i. 103=trinorum.
brachycarpon, Steud. Nom. ed. II. i. 657, sphalm. vide *trachycarpum.*
brachyphyllnm, *Schult. Mant.* iii. 180.—Reg. Cancas.
brachypodum, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 130 = obliquum.
brachypodum, *Maxim, in Bull. Acad. PHersb.* xix. (1874) 280.—Manchuria.
bracteatum, *Bciss. Diagn.* Ser. I. iii. 51.—Mesopot.
Brandegei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 58.—N. Mexic.
brasiliense, *Veil. Fl. Flum.* 43 ; i. t 109.—Bras,
brasiliense, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 216.—Bras.
Brebissonii, Le Jolis, ex Nym. Consp. 328 = vernum.
brevifollum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 98.—Chili,
brevifolium, *Sibth.* b[1] 5m. *Fl. Grace. Prod.* i. 95.—As. Min.
brevifolium, Stev. in Mem. Soc. Nat. Most iii. (1812) 253 = brachyphyllum.
Broterianum, *Boiss. (f Reut. Diagn. PI. Nov. Hisp.* 15.—Hispan.
brunneum, *Munby, Ft. Alg/r.* 16.—Algeria.
bryophyllum, Goldb. ex DC. Prod. iv. 602-triflorum.
Bungei, Steud. Nom. ed. II. i. 657 =gracile.
caespitosum, Auct. vide cespitosum.
califomicum, *Hook.* b" *Am. Bot. Beech. Voy.* 349.—Calif.
caminianum, Schult. Mant. iii. 186—recurvnm.
campanulatum, Vill. Prosp. 19; Hist. PI. Dauph. ii. 326 = Asperula galioides.
rampestre, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 248=Soleirolii.
campestre, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient iii. 69 - spurium.
campestre, Schousb. ex Willd. Enum. Hort Berol. 152 =glomeratum.
camporum, Pohl, ex DC. Prod. iv. 604 (ReUunH sp.).—Bras,
canescens, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 386.—Ecuador.
canum, *Req. ex DC. Prod,* iv.-602.—Syria,
capense, *Thunb. Prod. PL Cap.* 80.—Afr. austr.
capillare, Cav. Ic. ii. 73. t. 191; Sibth. *8c* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 94 = setaceum.
capillare, Decne. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. ii. (1884) 269 = Decaisnei.
capillipes, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 847=silvaticum.
capitatnm, *Bory* b* *Chaub. Nouv. Fl. Pilop.* 10.—Graecia.
cappadocicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 43.—Cappadoc.; Syria,
capsiriense, *Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Pkys. et Nat. Toul.* vi. (1888-84) 155.—Europ.
caripense, *H. B.* b[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 337.—Venezuela,
carium, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 107.—As. Min.
carolinianum, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 429 = hispidulum.
caspicum, *Stev. in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mac.* i. (1829) 276.—Persia,
cassium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 68.—As. 'Min.; Syria.
caucasicum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9 = verum.
caudatum, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 48 = brevifolium, *Sibth. V Sm.*
ceratocarpon, *Boiss. 1. c.* 35.—Cappadoc.
ceratophylloides./foe*./. *Fl. Brit. Ind.* iii. 309.—Reg. Himal.

GALIUM:—

ceratopodum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 45.—Arab.; Assyr.
cespitosum. Lam. Tabl. Encyc. i. 262 - pusillum.
cespitosom, *Ram. in Mim. Mus. Par.* xiii. (1825) 266.—Mont. Pyren.
chaetophorum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 160.—Reg. Argent.
chamaeaparina, Willk. *8c* Cost, in Linnaea, xxx. (1859-60) 102=parisiense.
Chamissonis, *Hook,* b* *Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 863.—Chili.
chersonense, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 250 = G. Cruciata.
chilense, Hook. f. Fl. Antarct. 302 [bis]=chonoense.
chinense, *Spreng.f. Tent. Suppl.* 7.—Mongol.
chloranthum, Brot. Fl. Lusit. i. 149 = pedemontanum.
chloroleucnm, *Fisch.* b" *Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 27.—Persia.
chlorophyllum, Baill. *8c* Timb. in Mem. Acad. Toul. Sér. V. vi. (1862) 235 = sylvestre.
chonoense, *Hook.f. Fl. Antarct.* 308 [bis].—Chili,
ciliare, *Hook. f. in Hook. bond. Journ. Bot.* vi. (1847) 461 |bis].—Tasman.
ciliatum, D. Don, Prod. Fl. Nep. lS3=hirtiflorum.
dliatum,Vo\m. ex Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 310"=ellipticum.
ciliatum, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 59«=Relbuninm ciliatum.
ciliatum, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 51 = sylvestre.
ciliclcum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 105.—Cilicia.
cinereum, *All. Fl. Pedem.* i. 6. t. 77.—Europ. austr.
drcaeoides, Roem. *8c* Schuft. Syst. iii. 256 = drcaezans.
circaezans, *Michx.Fl. Bor. Am.* i. 80.—Am. bor.
citraceum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 69=aureum.
Clausonis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 77.—Alger.
Claytoni, Michx. H. Bor. Am. i. 78=trinidum.
Closianum, Timb. in Bull. Soc Bot. Fr. ix. (1862) 613—Jordani.
collinum, Jord. Obs. PI. Crit. Hi. (1846) 135=Jordani.
Columella, *Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 81.—Aegypt.
cometerhizon, Lapeyr. Suppl. Hist PI. Pyr. 154 = megalospermum.
commutatum, Jord. Obs. PI. Crit iii. (1846) 149 = sylvestre.
concatenatum, Cow. *Notes PI. Crit.* 38.—Fret. Hercul.
concinnum. Boiss. Fl. Orient, iii. 65 = G. Lycium.
concinnum, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 23.—Am. bor.
confertum, *Royle, ex Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 206.—Reg. Himal.
congestum, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 172 = constrictum.
conglobatum, Schonsb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 486 -concatenatum.
consanguineum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 69=verunK
constrictum, *Chaub. in St. Am. Fragm. Voy. Pyren.* 208 ; *Fl. Agen.* 67.—Europ.
cordatum, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 259-articulatum.
coriaceum, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* i 186.—Sibir. altaic
comigernm, *Boiss.* b* *Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 67.—As. Min.
coronatum, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 90.—Graecia; Oriens.
corrudaefolium, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 466 = aureum.
corrudaefolium, *Vill. Prosp.* 20; *Hist. PI. Dauph.* ii. 520.—Europ. anstr.
corrudaefolium, Willk. in Flora, xxxy. (1852) 540 = erectum.
corsicum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 39=Soleirolii.
corsicum, *Tausch, in Flora,* xiv. (1881) 221.—Corsica.
corymbosum, Rniz *8c* **Pav.** Fl. Per. i. 59 = Rubia corymbosa.
cotinoides, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 227.—Chili.
Crespianum, *Rodr. in* ***Anal.*** *Soc. Esp. Hist. Nat.* viii. (1879) 55.—Ins. Balear.
creticum, Boiss. *8c* Heldr. Diagn. Ser. I. x. 66 = **constrictum.**
crispulo-pilosum, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 57 = orientale.
cristatum, jaub.& Spach, IUnstr. ii. 115 =Mericarpaea vaillantioides.

GAXIUM:—

croceum, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 59—Rnbia crocea.
*CmaàX3.,Scop. Fl. Cam.*ed. II. i. 100__Europ.; As. bor.
cruciatum, Sm. Engl. Bot. t. 143'praec.
cryptanthum, *Hemsl. in Hook. Ic. PI.* 1.1469.—Reg. Himal.
Cucullaria, Roem. & Schult. Syst. iii. 259 = Callipeltfc Cucullaria.
curtum, *Hook.f. in Hook.Lend. Journ. Bot.*vi. **(1847)** 462 [bis].—Tasman.
cuspidatum, Muhl. Cat. ed. I (1813), 16 ; ed. II. 15 ex Ell. Sketch, i. 197 = triflorum.
cuspidatum, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 852, nomen.—Am. bor.
cuspidulatum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 840.—Java,
cyllenium, *Boiss.* b" *Heldr. Diagn.* Ser. II. ii. 117.—•Graecia.
cynanchicum, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 101=Asperula cynanchica.
dahuricum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xviii-(1845) i.312=asprellum.
dasycarpon, *Kunie, ex Walp. in Nov. Act Nat. Cur.* xix. *Suppl.* I. (1848) 857, nomen.—Pernv.
dasycarpum, *Hochst. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop-* 135.—Afr. trop.
dasycarpum, *Nets, in Neuwied, Reise Nord-Am.* 487.—Am. bor. oec.
debile, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. 303 [bis] - antarctfcum.
debile, Desv. Obs. PI. Angers, 134 - constrictum.
debile, *Hoffmgg.* b" *Link, Fl. Port.* ii. 48.—Lusitan.
Decaisnei, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 69.—Syria ; Persia.
decipiens, Ehrh. Beitr. v. 177=rotandifoDum.
dedpiens, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 178 - parisiense.
dedpiens, Roth, Enum. PI. Phaen. Germ. L I. 478* sylvestre.
decoloransx, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 19.—Europ.
delicatulum, *Boiss.* b* *Hohen. Diagn.* Ser. I. x. 65." Persia.
demissum, *Boiss. I. c.* iii. 40.—Graecia.
densiflorum, *Ledeb. Ft. Alt.* i. 137.—Sibir. altaic.
densum, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot (1847) 461 [bis>australe.
denticulatum, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 612.—Mexic.
dichotomum, *Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb.* (1823) *!*—Hab.?
diffusum, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 180.—Chili-
diffusum, D. Don, in Hook. Fl. Scot. i. 52=erectun>-
diffusum, Gilib. Fl. Lituan. i. 7 = palustre.
diffusum, Schrad. ex Link, Enum. Hort. Berol. >•134 = boreale.
digeneumx, Kem. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi-(1876) 118.—Europ.
diploprion, *Boiss.* b" *Hohen. Diagn.* Ser. I. x. 60-"" Persia.
divaricatum, *Lam. Encyc.* ii. 580.—Reg. Mediterr.
divaricatum, Pall, ex Ledeb. FL Ross. ii. *16" coronatum.
dumetorum, Jord. Pugill. PI. Nov. 78 = G. Mollngo-
dnmosum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 44.—As. Min-
Dregeanum, *Sond. in Harv.* b" *Sond. Fl. Cap.* i>> *0-—Afr. austr.
tffusum, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 35 = longifolium.
Ehrenbergii, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 58.—Syria.
datum, J. F. Gmel. Syst. 238 = sylvestre.
elatum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 76 = G. Mollngo.
elegant, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 8 rotnndifolium.
ellipticum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl-* nomen; *Hornem. Suppl. Hort. Hafn- ll*—Mediterr. occ.
elongatum, *Presl, Delic. Prog.* 119.—Enrop.; bor.; Oriens.
eminensx, Gren. *8c* Godr. Fl. de Fr. ii. 19-—Eur??
ephedroides, *Willk. in Linnaea,* xxv. (1852) 3«-Hispan.; Afr. bor.
erectum, Don, ex Schult. Mant. iii. 172-aristatniB-
erectum, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. I. 72-sylre?
erectum, *Huds. Fl. Angl.* ed. I. 56.—Europ.; Afr.
ericoides, *Lam. Encyc.* ii. 683.—Am. austr.
eriocarpum, *BartL ex DC. Prod.* iv. 600.—Chili,
eriospermum, Chaix, ex Schult. Mant iii. setaceum.
erythrocaulon, *Colenso, in Trans. N. Z.* /«« (1884) 332.—N. Zel.
erythrorrhizon, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* Hispan.

GALIUM :—
"ythrorrhiBum, F. Mnell. ex Miq. in Nederl. Kraidk. Arch. iv. (1869) 118 = australe.
e*ue, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 207.—Reg. Himal.
"-*on»m, Thunb. Prod. PI. Cap. 80=-capense.
^endleri, *A. Gray, PI. Fendl.* 60.—N. Mexic.
Wicanle, *Willd. exSchult. Uant.* iii. 172.—Carolina,
nillorme, *Roem. V Schult. Syst.* iii. 262.—Ins. Teneriffa.
Mtfpmie, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iL 418-tenuissunum.
firmum, Tansch, in Flora, xiv. (1831) 222-aureum.
flaccidum, Salisb. Prod. 58 = G. Mollugo.
"•vescens, *Barb, in Aiad. KOBI.* xi. 7 (1874) 266; *ex - Kern. Sched.* iii. 106—Transsylv.
fl'vum Wallr. Beta. Fl. Hercyn. 178 i et in Linnaea, w . (1840) *U8=ochroleucum,* Wolf.
Fleura Jordan; ^Ord> Gra»n„ ^aid> Grenoble> (1849) 15 =
fioribundura, Boiy & Chaub. Nouv. Fl. Pilop. 10 = aureum.
flo $ *undum,* Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. avd = acutum.
floribundum, *Sibth. b" Sm. Fl. Graec. Prod. I* 94.—(•raec; As. Min.
flo i *dum* , Unr_ln *Uim_* Soc_ *LiaD_* p «- • (*822) «12(*72=setaceum.
£*"» Salisb. Prod. 58-verum.
nniiinense, *Veil. Fl. Flum.* 48 ; j. t. 110.—Bras.
"josum, *Munby, ex Burnat b' Barbey, Voy. Bot.* = *Balrares,* 28—Alger.
fontii S'anum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 75.—Alger.
n.. *le,* Cl Koch « m Linnaea, xxiv. (1851) 469 = *lustre.*
fragile, *Kroc k,Fl. Sites. Suppl.* i. 210.—Europ.
fp "*ile* Pourr. Chlor. Hisp. 612; ex DC. Prod. iv. 610
Mu ra e-
&scens, *Cav. Ic.* iii. 3. t. 206.—Hispan.
"•"•*cosum,* Sieber, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 60 = eonbtrictum.
•nwicosum, *Willd. Sp. PI. i.* 585.-Ins. Creta.
lu ee«anum. *Hook. f. Fl. Antarct.* 302 [bis].—Reg. Magellan.
fusco m> *Mart_* & *Gal* -»» *Bull. Acad. Brux.* xi.(1844) 128.—Mexic.
Galeot„anum, *Wat P- R*P-* vi- 17-—Mexic.
G dneri, *Wa* A'.c.-bras.
gnpense, So„*. ,-„ *Harv. b" Sond. Fl. Cap.* iii. 37.—*Ir. austr.
Gaudic audii_oC_ ^^ iv- 607.-Ao.tnU.
gemir flora, ionw, »n *Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1«« ^ ri p m 19 Ins- Madera.
geni...nnum, *Mart_ v Gal* -» *Bull. Acad. Brux.* xi. 44) 126.—Mexic.
ge?»°'folmm, *F.Muell. in Trans. Viet. Inst.* (1865) 17 T Au8tral-
yet-
G^,CU J?'U'"> Roem. & Schult. Syst. iii. 215-rubioides.
eZ?-dl icum, Vill Pros P-i 19=erectum.
63-Pmif. fly>/> " *Dettksckr_Acad_ Wien, V* <1885)
gibraltaricum
Gbrlu« ' **"• '" *oken> IsiSt* *"' (U 28) 821 —
tlie ii, *I if* *VArn in Hooh Bot Misc* iL (1888) 364!—Ctil.
g abe " " 1 ? ' *Hernsl* - n<*g«- PI-* M»» 53.-Mexic.
giabru *M, HoSm* syl sta, Deutschl. Fl. ed. II. i. I. 72 =
glab, dm
glabrum, > Roeh I- ex Stend. Nom. ed. 1.858=vernnm.
glaucum, *T hunb* Jp PL 107 Ap Prod. PI. Cap. 80—Afr. austr.
glaucum, ned I > Fl.Dan.t. 609 = sylvaticum.
glaucum, Suter> Fl. Helv. i. 91 = aristatum.
glomeratum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 128. t. 40.—Reg. Mediterr. occ.
glomeratum, Vi11 ex Roem & Schult. Syst. iii. 216 = palustre.
G el:
Tn ? ' [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 425
Gold * *l*—Europ.
podac hlcu m-
Goldlachicum, DC> Prod iv< 610, sphalm. = podlachicum.
gracile, *Bunge En* m w c*»«- *Bor* 3S.-Cbina.
gracile, Wallr Sched Crit 57-parisiense.
gracilentum, ? ' J old -ex Billot, AnnoL 218 = Jordani.
graecum, *L* '"• •*[<"»'- >• 38.—Graec.; As. Min.
granadense, *mild* '* *Schult. Afant.* iii. 186.-Hispan.
grandiflorum, t Clalf V 0 Maa Herb P galioides.

OA1IUM :-
grandiflorum, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 52 = Pestalozzae.
grandiflorum, Gilib. Fl. Lituan. i. 7=uliginosiim.
granulatum, Roem. & Schult. Syst. iii. 249-saccharatum.
gratum, Wall. Cat. n. 6211 = triflornm.
grusinum, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 461.—Reg. Caucas.
Haenkeannm, *Kndl. ex Waif. Rep.* ii. 450.—Chili.
Halleri. Roem. & Schult. Syst. iii. 218 = vemum.
Halleri, Suter, Fl. Helv. i. 88=AspernIa galioides.
hamatum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 845.—Abyss.
Hamiltonii, Sprang. Syst iv. Cur. Post. 39=rotundifolium.
Hanryi, F. Schultz, Arch. FL 309=-Jordani.
harcynicum, Weigel, Obs. 26, sphalm. *v\Ac-=hercynicum.*
helodes, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 47 - uliginosum.
helveticnm, *Weigel, Obs.* 24.—Europ.
hercynicum, Weigel, 1. c. 25=saxatile.
hierosolymitannm, *Linn. Amoen. Acad.* iv. 451.—Syria.
hierosolymitanum, Thore, Chlor. Land. 40=arenarium.
hitnalayense, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 88 = acutum.
kirsutum, Gilib. Fl. Litnan. i. 10 = nliginosum.
hirsutum,L&ptyr. Suppl. Hist. PI. Pyr. 25=papillosum.
hirsutum, Nees, Hor. Phys. Berol. 113. t 22 = Neesianmm.
hirsntum, *Ruit b" Pav. Fl. Per.* i. 59.—Pernv.
hirtiflorum, *Req. ex DC. Prod.* iv. 600.—Reg. Himal.
hirtum, Hegetschw. Fl. Schw. 125 = rubruin.
hirtum, *Lam. Encyc.* ii. 583.—Bras,
hispidulum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 79.—Am. bor.
hispidum, Gaertn. Fruct. i. 109. t. 24. f. 1 =« Valnntia hispida.
hispidum, Pourr. ex Nym. Consp. 330 - parisiense.
hispidum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 104 = hispidulum.
hispidum, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 184 = spurium.
hispidum, Schrad. Spicil. Fl. Germ. 14 = sylvestrc.
hispidum, Willd. Enura. Hort. Berol. 154 - G. Aparine.
Hoffmanni, Fl. Nicro. Danb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 668-sylvestre.
horridum, Eckl. & Zeyh. Entim. 370 = G. Aparine.
horridum, *Thunb. in Hoffmgg. Phytog. Blaetter,* i. (1803) 16.—Afr. austr.
humifusum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 104-^Asperula humifusa.
humile, *Cham.* Cr *Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 226.—Bras.
hungaricum x, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 119.—Europ.
Huterix, Kern. 1. c.—Europ.
hypadenium, *S. Schau. in Linnaea,* xx. (1847) 700.—Mexic.
hypnoides, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 188.—Chili,
hypnoides, *ViU. Hist. PI. Dauph.* ii. 323.—Europ.
hypotrichium, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 538-multiflorum.
hyrcanicum, *C. A. Mey. Vert. Pft. Cauc.* 58.—Reg. Caucas.
hyssopifolium, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. i. 71 •aboreale.
ibericum, D. Dietr. Syn. PI. i. 464 = G. Mollugo.
ibicinum, *Boiss. V Haussk. in Boiss. Fl. Orient,* iii. 70.—Persia.
implexum, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 141 = Jordani.
incanum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 91 = orientalc.
incarnatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 8 = palustre.
inconspicunm, *Phil, in Linnaea.* xxxiii. (1864-65) 99. -Chili.
incurvum, Fleischer, ex Tausch, in Flora, xviii. (1835) 354=tenuissimum.
incurvum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 92 =• anreom.
indicum, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 6214.—Ind. or.
in/estum, Waldst. ft Kit. PI. Rar. Hung. iii. 224 = spnnum.
inflatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 11 = sylvaticum.
innocuum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 341.—Java.
insubricum, Gaud. Fl. Helv. i. 421 = G. Mollugo.
intercedens x, Kem. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 326.—Europ.
intermedium, Eichw. Skizze, 153-sylvaticum.
intermedium, Mérat, Fl. Par. ed. III. ii. 255-G. Aparine.

OAIiItTM :—
intermedium, *Schult. Obs. Bot.* 22.—Europ.
intertextum, Jord. Obs. PL Crit. iii. (1846) 142« Jordani.
intricatum, Endl. ex Walp. Rep. ii. 459 — latoramosum.
intricatum, *Lowe, Man. Fl. Mad.* i. 898.—Ins. Cap. Verd.
intricatum, *Reut. in Mim. Soc. Phys. Geniv.* viii. (1839) 304.—Graecia.
involucratum, H. B. *it* K. Nov. Gen. et Sp. iiL 835 - Kelbunium ciliatum.
jalapense, *Schlecht. in Linnaea,* ix. (1834) 591.—Mexic.
javanicum, Blume, Bijdr. 943-rotundifolium.
jemense, *Kotschy, in Sitib. Acad. Wien, Math -Nat.* Iii. *Abth.* I. (1866) 257.-Arab,
jesoense, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 112.—Japon.
Jordani, *Loret V Barr. Fl. Montp.* 801.—Gallia.
judaicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 69.—Syria.
junceum, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 60-constrictum.
junceum, Schreb. in Nov. Act. Nat. Cur. iii. (1767) 478 = giaccum.
junceum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 91 « fruticosum.
jungermannioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 43.—Syria.
Junghuhnianum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 340.—Java.
Jussiaei, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 63 •= sylvestre.
Jussiei, ViU. Prosp. 20; Hist. PI. Dauph. ii. 323-tenue.
kamtschaticum, *Stetler, ex Schult. Mant.* iii. 186.—Kamtschat.; Am. bor.
khorasanense, *Griff. Notul.* iv. 252.—Afghan.
Kitaibelianum, Schult. Mant. iii. 163 - sylvaticum.
Kotschyanum, Boiss. Fl. Orient, iii. 51-lciophyllum.
Kuetaingii, Boiss. *Ic* buhse, in Nouv. *Mim.* Soc. Nat. Mosc. xli. (1860) 109-verum.
kurdicum, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. iii. 37.—Persia.
laconicum, *Boiss.* b* *Heldr. 1. c.* vi. 66.—Graecia.
laetum, Jord. Obs. PL Crit. iii. (1846) 133 » obliquum.
laeve, Thuill. FL Par. ed. II. 77 - sylvestre.
laevigatum, Bartl. ex DC. Prod. iv. 591 - Relbnninm larvigatum.
laevigatum, Linn.Sp. PI. ed. II. 1667 = aristatum.
lanceolatum, *Torr. Fl. V. St.* 168.—Am. bor.
lanuginosum, *Lam. Tabl. Encyc. i.* 261.—Ind. or.
Lapeyrousianum, Jord. Obs. PL Crit. iii. (1846) 154-sylvestre.
lappaceum, *Ruit b" Pav. Fl. Per.* i. 69.—Peruv.
lappaceum, Salisb. Prod. 5J = G. Aparine.
lasiocarpum, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 42 - orientale.
asiocarpum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 99. —Chili.
latifolium, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. FL Nep. 133 = rotundifolium.
latifolium, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 79—Carolin.
latoramosum, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 187.—Chili,
leiophyllum, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. iii. 36.—As. Min.; Persia.
leucocarpum, *DC. Prod.* iv. 612.—Peruv.
leucophaeum, Gren. *8c* Godr. Fl. Fr. ii. 28-obliquum.
leucotrichum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 53.—Mexic.
Linckii, J. F. Gmel. Syst. 240 = rotundifolium.
linearifolium, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1837) n. VII. 162.—China.
linifolium. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8; Lam. bncyc. ii. 578 = aristatum.
linifolium, Rochel, PI. Banat. Rar. Ind.-sylvaticum '
lithospermifolium, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 669, nomen.—Kowia.
litigiosum, DC. Fl. Fr. iv. 263 -parisiense.
Morale, *Guss. Fl. Sic. Prod.* i. J.7A—Sicilia.
Littelli, Oakes, in Hovey, Mag. Horde, vii. (1341) 179 •- kamtschaticum.
lividum, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 207 = G. Mollugo.
longicaule, Rnfin. Fl. Ludov. 75 =triflorum.
longiflorum, Gueldst. Reise, i. 427-Asperula molluginoides.
longifolium, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 157.—Uyzant.; As. Min.
lucidum. All. Fl. Pedem. i. 6=corrudaefolium.
lucidum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 104-G. Mollugo.
lucidum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 333 - erectum.

GALIUM:—
luteocruciatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126 = G. Cruciata.
luteolum, Jard. Obs. PI. Brit. iii. (1846) 128=obliquum.
luteoverticillatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126 = vernm.
Inteum, Lam. Fl. Fr. iii. 881 = verum.
Lycium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 71.—As. Min.
magellanicum, *Hook. f. Fl. Antarct.* 302 [bis].—Reg. Magell.
niagellense, Tenore, Kelag. Viagg. Abruzz. 48 = pusillum.
Marchandi, Koem. & Schult. Syst. iii. 528 = papillosum.
margaricoccum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xiii. (1878) 371 = Bolanderi.
margaritaceum, *A. Kern, in Zeitschr. Ferdinand. Tirol.* 111. xv. (1870) 252.—Europ. austr.
maritimum, *Linn. Mant.* i. 38.—Europ.; Oricns.
maritimum, Thunb. Prod. PI. Cap. 30 = tomentosum.
matrisylva, Wigg. Prim. Fl. Holsat. 13-Asperula odorata.
Matthewsii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 80.—Am. bor. occ
maximum, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 55 « elongatum.
mediterranean, DC. Prod. iv. 596 = Soleirolii.
megalanthum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 67 — leiophyllum.
megalospcrmum, *All. Fl. Pedem.* i. 9; *Via. Hist. PI. Dauph.* ii. 319 [bis].—Gallia.
megalospermum, DC. Fl. Fr. iv. 249, partim = arenarium.
megapotamicum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 39 = hirtrnn.
melanantherum, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 68 = aureum.
mexicanum, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 887.—Mexic.
micranthum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 108=asprellum?
micranthum, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. l. (1822) 272 = recurvum.
microcarpon, Frivald. ex Griscb. Spicil. Fl. Kumel. ii. 162 = intricatum.
microcarpum, Vahl, Symb. Bot ii. 30 = setaceum.
microphyllum, *A. Gray, PI. Wright*, i. 80.—Am. bor. occ.
mictospeimum, *Des/.Fl.Atlant.i.* 130.—Alger.; Sardin.
miltorrhieum, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 114 = gracile.
minimum, Gilib. Fl. Litnan. i. 10 = verum.
minimum, Roem. & Schult. Syst. iii. 262=murale.
minus, Gilib. Fl. Lituan. i. 9=uliginosum.
minutifiorum, Brot. Fl. Lusit. i. 151. parisiense.
minutulnm, *Jord. Obs. PI. Crit.* iii. (1846) 182.—Gallia.
minutum, *Linn. Sp. PI.* 106.—Kossia.
mite, *Boiss. V Hohen. Diagn.* Ser. I. iii. 37.—As. Min.
molle, Gilib. Exercit. i. 22 - G. Mollugo.
Mollugo, *Linn. Sp. PI.* 107.—Europ.; As. temp.
Monachinii, *Boiss. if Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 67.—Graecia.
monanthon, Bartl. ex DC. Prod. iv. 591 - Rubia monantha.
montanum, Huds. Fl. Angl. ed. I. 56 = saxatile.
montanum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 155.—Gallia.
montanum, Pollich, Hist. PI. Palat. i. 154 - Asperula galioides.
montanum, Steud. Norn. ed. II. i. 659, sphalm.-vide *monanthon?*
montanum, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 817 [bis] = sylvestre.
montanum. With. Bot. An. Brit. PI. ed. III. ii. 187 = palustre.
monticolum, *Sond. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* iii. 36.—Afr. austr.
montium, J. F. Gmel. Syst. 237, *spha\m.* = *montanum*, Huds.
Morisii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 388=rubrum.
mucronatum. Lam. Encyc. ii. 681 *= obliquum, rubrum.
mucronatum, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 87 = mncroniferum.
mucronatum, Kuiz& Pav. Fl. Per. i. 60=leucocarpum.
mucronatum, Thnnb. Prod. PI. Cap. 30 = capense.
mucroniferum, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 37.—Afr. austr.
multicaule. Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853) 33 = anisophyllum.
multicaule, Wallr. Sched. Crit. 63 - sylvestre.
multiflorum, *Kellogg, in Proc. Calif.Acad.* ii. (1863) 97. t 27.—Am. bor. occ.

GALIUM:—
Mungieri, Boiss. & Heldr. in Boiss. Fl. Orient, iii. 72 = divaricatum.
murale, *All.Fl. Pedem.* i. 8. t. 77. f. 1.—Reg. Mediterr.
murale, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 105=veiticillatum.
murcicum, *Boiss.* to" *Reut. Diagn.* Ser. II. ii. 114.—Hispan.
musci/orme, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 44 = canum.
muscoides. Lam. Encyc. ii. 680 = pyrenaicum.
mutabile, *Bess. Enum. PI. Volh.* 42.—Ross, austr.
myrianthum, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 120 = obliquum.
namaquense, Eckl. & Zeyh. Ennm. 369 = capense.
nebulosum, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 49 = floribundum.
Neesianum, *Req. ex DC. Prod.* iv. 600.—Ins. Teneriff.
neglcctum, Le Gall, ex Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 22 = G. Mollugo.
nemorosum, Wierszb. ex Nym. Consp. 324 = G. Mollngo.
nervosum, Lam. Fl. Fr. iii. 878 = boreale.
nevadense, Boiss. & Rent. Diagn. Ser. II. ii. 115 = sylvestre?
Niewerthi, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* it. 393.—Japon.
nigricans, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 48 Syria; Persia.
nigricans, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 188.—Chili.
nitidulum, Thuill. Fl. Par. ed. II. 76 = sylvestre.
nitidum, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 659 = corrudaefolium.
nitidum, Willd. ex Schult. Mant. iii. 163=sylvaticum.
nolitangcre, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 335.—Marocc.
Nouletianum, Baill. & Timb. in Me'm. Acad. Toul. Sér. V. vi. (1862) 288 - papillosum.
nudiflorum, Viv. Fl. Core. Prod. App. ii. 8=Soleirolii.
numidicum, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. All.* 293.—Alger.
nutans, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 20 = virgatum.
Nuttallii, *A. Gray, PI. Wright*, i. 80.—Calif,
obliquum, *Vill. Prosp.* 19; *Hist. PI. Dauph.* ii. 320 [bis].—Gallia.
obliquum, Wulf. ex Nym. Consp. 329 = rubrum.
oblongifoiium, Heldr. ex Nym. 1. c. 328 = aureum.
obovatum, *H. B. tf. K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 334.—Am. austr.
obovatum, Schlecht. & Cham, in Linnaea, v. (1830) 164 = jalapense.
obscurum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 86 = sylvestre.
obstipum, *Schlecht. in Linnaea*, ix. (1834) 592.—Mexic.
obtnsifolium, *Wallr. Britr. Fl. Hercyn.* 178 ; *et in Linnaea*, xiv. (1840) 548.—Europ.
obtusum, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 55 = trifidum.
ochroleucum, *Kit. ex Schult. Oestr. Fl.* ed. II. i. 305.—Hungar.
ochroleucum, Rochel, PI. Banat. Rar. Ind. = vemra.
ochroleucum x, Wolf, ex Schweigg. & Koert. Fl. Erlang. 86.—Europ.
odoratum. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 105-Asperula odorata.
oligotrichum, *Borb. in Magyar Növlnt. Lapok*, viii. (1884) 122.—Europ.
olympicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 41.—Europ. or.
opacum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 93-sylvestre.
orientale, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 88.—Graec.; As. Min.
orinocense, Spreng. Syst. i. 397 = Rubia orinocensis.
orizabense, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 54.—Mexic.
ovale, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 59 = Rubia ovalis.
ovalifolium, Schott f. ex Schult. Mant. iii. 182 = ellipticum.
ovatum, Moench, Meth. 485 = saxatile.
palatinum, F. Schultz, ex Nym. Consp. 328 = *decolorans.*
pollens, Thuill. Fl. Par. ed. II. 77 = obliquum.
pallescens, Jan, Elench. 2. n. 70=erectum.
pallidiflorum, Schur, Enum. PI. Transs. 281 = vernum.
pallidulum, Jord. Pugill. PI. Nov. 80 = corrudaefolium?
pallidum, Presl, Delia Prag. 121 - cinereum.
palustre, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 108 = elongatnm.
palustre, *Linn. Sp. PI.* 105.—Europ.; As. bor.
palustre, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod, Fl. Hisp. ii. 322-constrictum.
pamphylicum, *Boiss.* &" *Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 69.—As. Min.

QALIUM:—
panduanum, Steud. Nom. ed. II. i. 659, sphalm. vide *punduanum.*
Panterianum, Schult. Mant. iii. 172 = filicaule.
papillosum, Heuff. in Flora, xl. (1857) 663 = aristatum.
papillosum, *Lapeyr. Hist. Abr. Pi'. Pyr.* 66.—Mont. Pyren.
paradoxum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 281.—Reg. Himal.; Japon.
paratyense, *Veil. Fl. Flum.* 44 ; i. t. 112.—Bras.
paridifolium, Eschsch. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 412 = obovatum.
parisiense, *Linn. Sp. PI.* 108.—Enrop.; Oriens.
parisiense, Pall. Tabl. Taur. 46 = Asperula humifusa.
parviflorum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 183 = G. Mollugo.
parviflorum, Maxim. Prim, *i* I. Amur. 472 = G. Aparine.
parviflorum, Moench, Meth. 486 - gracile.
parviflorum, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 360 = concinnum?
parvifolium, Gaud, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 246 = parisiense.
paschale, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 208.—Turc.
pauciflorum, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 35 * G. Aparine.
pauciflorum, Kotschy, Ins. Cyp. 260 •> recurvum.
pauciflorum, Willd. ex DC. Prod. iv. 592 = Rubia orinocensis.
Paulianum, F. Schultz, Arch. Fl. 158 = G. Mollugo.
pedemontanum, *All. Auct. Ft. Pedem.* 2.—Europ. austr.; Oriens.
penduliflorum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 46.—Graecia.
penicillatum, Boiss. 1. c. x. 68 = nigricans.
pennsylvanicum, Bart. Comp. Fl. Philad. i- 83 = triflorum.
pennsylvanicum, Muhl. Cat. 15; ex Schult. Mant. iu. 183-asprellum.
pentandrum, Gilib. Fl. Lituan. i. 10 = verum.
peplidifolium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 46.—As. Mm.
peregrinum, *Franch. Fl. Cher-et-Loire*, 260.—Gallia.
Perralderii, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 172.—Algeria.
persicum, DC. Prod. iv. 605 = coronatum.
Pestalozzae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 65.—Syria.
Petrae, *[Oliver,'] ex Hart, in Trans. Roy. Irish Acai-* xxviii. (1885) 483.—Palaestin.
petraeum, *Coss. V Dur. ex Munby, Cat. PI. Algtr-* nomen.—Algeria.
petreum, Schur, Enum. PI. Transs. 284 = erectum.
petrosum, Schur, 1. c. = lucidum.
philistaeum, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 71 = bierosol)-mitanum.
physocarpum, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 410.—Rossia.
piliferum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 337.—N. Granat.
pilosum, *Ait. Hort. Ken.* ed. I. i. 145.—Am. bor.
pisiferum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 67.—Syria.
plebeium, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii- sylvestre.
podlachicum, *Bess. Prim. Fl. Gal.* ii. 8S7.-Galicia.
pogonanthum, Franch. & Savat. Enum. PI. Jap- ii. 893-gracile.
Poiretianum, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 484.—Marocc.
poligamum, Gilib. Fl. Lituan. i. 18-vemum.
polycarpum, Less, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 402 = Aspe humifusa.
polymorphum, *Knaf, in Flora*, xxix. (1846) Bohem.
pratense, *Scheele, in Linnaea*, xvii. (1848) German.
procumbens, Stokes, in With. Bot. Arr. Brit. PL «* i. 151 = saxatile.
productum, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* (1833) 29.—Ins. Madera.
proliferum.A *Gray, PI. Wright.* U. 67.—Am. (1839)
propinquum, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. » 205 = nmbrosum.
Prostii, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 123
prostratum, Hall. f. ex Roem. & Schult. Syst m- = helveticum.
provinciate, Lam. Encyc. ii. 581=erectum.
pruinosum, *Boiss. Elench.* 57.—Hispan.
prusense, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851; aureum.
Pseudoaparine, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) ** Reg. Magellan.
Pseudo-aristatum, Schur, Enum. PI. Transs. *w* vaticum.

GALIUM :—

Pseudo-cinereum, Schur, Enum. PI. Transs. 286 = petreum.
Pseudo-rubioides, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853)32=rubioides.
Pseudo-verum, Schur, Enum. PI. Transs. 281 = verum.
Pubens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1866) 850—Calif.
pubescens, Req. ex DC. Prod. iv. 595 - pusillum.
Pubescens, Schleich. ex DC. 1. c. 696 ~ sylvestre.
Pubescens, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 210 = erectam.
pulchellum, Salisb.Prod. 58 = saxatile.
pulchellnm, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 1U6.—Persia.
pulvinatum, *Boiss. Elench.* 57.—Hispan.
Pumilum, Lam. Encyc. ii. 580 -= pusillum.
Pumilum, Murr. Prod. Gotting. 44=sylvestre.
Punctatum, Pers. Syn. i. 128-pilosum.
Puncticulosum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 80 = pilosum.
Punduanum, Wall. Cat. n. 7291 = rotundifolium.
Purpureum, DC. Fl. Fr. iv. 251=rubrum.
Purpureum, *Linn. Sp. PI.* 107.—Europ. austr.
Purpureum, Walt. Fl. Carol. 87 = pilosum.
Pusillum, *Endl. ex Walp. Rep.* ii. 459.—Chili.
Pnsillnm, *Linn. Sp. PI.* 106.—Gall, austr.
Pusillum, Sm. Engl. Bot t. 74 = sylvestre.
Pusvllum, Vill. Hist. PI. Daupt. ii. 324. t. 8 = helveticum.
Pycnophyllum, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 64 = apiculatum.
Pygmaeum, DC. Prod. iv. 606=articulatum.
Pyrenaicum, *Gouan, Illustr.* 5. t.-1. f. 4.—Mont. Pyren.
Pyrenaieum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. »2 = olympicum.
inqueb
qU Podor[illegible] *Cl||Um, Andr,, Rys, Botan, ,, ,,* (1880) 8 4* ~
Kiicosum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 660.—Bras.
[illegible]ecurvum, *Req. ex DC. Prod.* iv. 609.—Archip. Graec.
[illegible]*flexum* Pohli ex DC- i [illegible],604 = hirtum.
[illegible]t*"'* Presli Delic. Prag. 123 = pedemon tanum.
[illegible]n, *Clos, in C. Gay, Ft. Chil.* iii. 186.-Chili.
Requienianum, Wight & Am. Prod.443 = rotundifolium.
[illegible]' ^C< P[illegible]- ^V- 605-pedemontanum.
rio^Sarui anum> *Endl. ex Wal*P- R P- »•• 469.—Chili.
neid<m, *Mt .Hgrt Kew* ^ j . . i44._in,. Azores.
rigidum, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 819-erectum.
rivale, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 166-Asperula Aparine.
rivu[illegible] DS *Boiss. (f Reut. Diagn. PI. Nov. Hisp.* 15.—ispan.
r[illegible]selu[illegible]n *Boiss_ V Reui_ PugiU_ PL Nav,* S2 ~
Hu[illegible]n
Ko[illegible]h[illegible]C k«. *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-rJ 2 2[illegible]—Am. bor. occ.
"undatum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 157 - Asperuu laevigata.
"^*ifolium,* Herb. Linn, ex DC. Prod. iv. 582 = [illegible]A^mla laevigata.
[illegible]nd folium_ *Li*»»- *Sp. PI.* I08.-Europ.; As. temp.
[illegible]> Thunb_ F1- JaP- 59=gracile.
[illegible]*«.7-J"' Jord_ Obs- PI. Crit. iii. (1846) 121= rubrum.
[illegible] Brot. Kl. Lusit. i. 148 - Broterianum.
[illegible]*Linn_ Sp- Pl- -105.—Europ. j As. bor.
[illegible]?** Poll'ch, Hist. PI. Palat i. 150 = boreale.
[illegible]" ?uter> F1_ Helv_ *• 88 = vemum.
[illegible] vi Udg ex Ledeb_ F1- RoSS„ U> 611 = valantioide?'
[illegible]w> Hi11, Ve 6- syst- "i. 21-rnbioides.
[illegible]*• Sp- Pl- 107.—Europ. austr.
[illegible]1, Pollich_ His*- Pl.Palat. i. 155 = parisiense.
[illegible] Sco P* F1- Cam. ed. II. i. 103 = purpnreum
[illegible] DC_ ex w_ Baxt_» *La*** Hort_ B i t S uppl. il. 65., nomen.—Hab.?
[illegible] DC„ Prod_iv_ 608=.aureum.
[illegible] faF1 ora, xii. (1829) * & g, 5 = As perula scutellaris.
[illegible] *Walp. Rep.* vi. 17.—Bras.
[illegible]i Bertol. Fl. Ital. ii. 108=helveticum.
[illegible]"", Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 306-palustre.
[illegible]. *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ail.* 74.—Alger.
[illegible]. Jord. Pugill. PI. Nov. 81 -parisiense.
[illegible] Wnd. Sp. PI. i. 597 = verum.
[illegible] *Fl. Pedem.* i. 9—Reg. Mediterr.
[illegible]T1' F"vald. ex Hampe, in Flora, xx. (1837)
*Mar[illegible] Pyrenilici„n_
vii *n tf J!um< Trevi*- i» Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. V1815) 146-elongatum.

GALIUM :—

saxatile, Herb. Johann. ex Vest, in Flora, iv. (1821) 637 = Vestianum.
saxatile, *Linn. Sp. PI.* 106.—Europ.
scaberrimum, Vahl, ex Hornem. Hort. Ham. i. 135 = G. Aparine.
scabridum, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 136 = Jordani.
scabridum, Willk. in Flora, xxxv. (1852) 541=sylvestre.
scabrum, Jacq. Fl. Austr. v. 10=sylvestre.
scabrum, *Linn. Sp. PI.* 108.—Europ. austr.
scabrum, Spreng. Fl. Halens. 52 = parisiense.
scabrum, With. Bot. Arr. Brit. PI. ed. III. ii. 190 = G. Moliugo.
scandens, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 731.—Chili.
Schlumbergeri, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 51.—Syria.
Schultesii, Vest, in Flora, iv. (1821) 530 = aristatum.
Scopoli, Vill. Hist. PI. Dauph. i. 304 = vernum.
segetum, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 33 = spurium.
Sellowianum, *Walp. Rep.* ii. 45!).—Bras.
septentrionale,Roem. & Schult. Syst. iii. 263 = boreale.
serotinum, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 71.—As. Min.
serotinum, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 284.—Algeria,
serpylloides, *Royle, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 207.—Reg. Himal.
sessiliflorum, Willd. ex Schult. Mant. iii. 179 = Relbunium ciliatum.
setaceum, *Lam. Encyc.* ii. 584.—Reg. Mediterr.; As. temp.
Sibthorpii, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 244 = setaceum.
Sieberi, *Tausch, in Flora,* xviii. (1835) 356.—CorsAa.
silvivagum, Baill. *Si* Timb. in Mem. Acad. Toul. Scr. V. vi. (1862) 28» -sylvestre.
simense, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1887) 165 = spurium.
simense, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 344.—Abyss.
sinaicum, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 68.—Arab.
Smithii, G. Don, Gen. 3ysL iii. 660 = verticillatum.
Soleirolii, *Loisel. in Mem. Soc. Linn. Par.* vi. (1827) 399.—Ins. Corska.
songaricum, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 57—Sibir. altaic.
sororinm, Hance, in Walp. Ann. il. 734 = G. Aparine.
spinulosum, Meral, Nouv. Fl. Par. 58=uliginosum.
spinulosum, Rafin. Prec. Decouv. (1814) 40 = asprellum.
splendent, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 17=erectum.
Spruneri, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 116 = aureum.
spurium, All. Fl. Pedem. i. 5 = parisiense.
spurium, Huds. Fl. Angl. ed. I. 57 = tricome.
spurium, *Linn. Sp. PI.* 106.—Europ.; Oriens.
spurium, Spreng. Fl. Halens. 52 = uliginosum.
squatidum, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. 1,1847) 462 [bis] -australe.
stellariaefolium, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 392 = paradoxum.
stellatum, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863) 97. f. 26.—Am. bor. occ
stenophyllum, Schur, Enum. PI. Trans. 283-aristatum.
Sternbergii, KnaC ex Nym. Consp. 324 - *ochroleucum.*
stoloniferum, C. Koch, in Iinnaca, xix. (1847) 82 = orientale.
strictum, Ton. Cat. PI. N. York, 23 = boreale.
strigosum, *Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vii. (1815) 141.—Japon.
suaveolens, Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Pyr. 23-megalospermum.
suaveolens, Wahlb. Fl. Lapp. 48=triflorum.
suberosum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 161 = Asperuln involucrata.
suberosum, *Sibth. If Sm. Fl. Graec. Prod. i.* 91.—Ins. Creta.
sublutaeum, Gilib. H. Lituan. i. 10-verum.
subtnfidum, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 944.—Java.
subvelutinum, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1861) 465 deiophyllum.
subvillosum, *Sond. in Han.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 38.—Afr. austr.
sudeticum, Tausch, in Flora, xviii. (1886) 847=anisophyllum.

GALrCM :—

suffruticosum, *Hook.* &• *Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 363.—Chili.
suffruticosum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 21 = Nuttallii.
supinutn, Lam. Fl. Fr. iii. 379 = sylvestre.
sylvaticum, Hess. Prim.Fl. Galic. i. 219 = aristatum.
sylvaticum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 165.—Europ.
sylvestre, *Pollich, Hist. PI. Palat.* i. 151.—Europ.
syriacum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 47.—Syria.
tarmense, Spreng. Syst. i. 387 = leucocarpum.
tataricum, *Trevir. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* vii. (1815) 146.—Astracan.
tauricum, Roem. *Be* Schult. Syst. iii. 250 = coronatum.
taurinum, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 101 — Asperula taurina.
Tendae, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xvii. 97. t. 1194 - hdveticum.
tcnellum, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 188.—Chili,
tenellum, *Jord. Obs. PI. Crit.* iii. (1846) 180.—Europ
tenerrimum, Schur, Enum. PI. Transs. 279 - ti. Aparine.
tenerum, Pers. Syn. i. 128 = parisiense.
tenerum, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 18; Caud. Fl. Helv. i. 442 = spuiium.
tenue, *Vill. Prosp.* 20; *Hist. PI. Dauph.* ii. 322.—Europ.
tenuicaule, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 206.—N. Zel.
tenuicaule, Jord. Pugill. PI. Nov. 81 = divaricatum.
tenuicaule, Krock. Fl. Sites. Suppl. i. 214 -saxatile?
tenuifolium, All. Fl. Pedem. i. 6 = corrudaefolium.
tenuissimum, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* i. 104.—Oriens; Reg. Himal.
tetragonum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 161.—Reg. Argent.
texanum, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 597 - virgatum.
texense, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 80.—Texas.
Thunbergianum, EM. & Zeyh. Ennm. 369 » rotundifolium.
thymifolium, *Boiss.* 6[1] *Heldr.* Ser. I. vi. 67.—Graec.
Timeroyi, Jord. Obs. PI. Crit. iii. (1846) 188 = Jordani.
tinctorium, Linn. Sp. PI. lOtS^trifidum.
tinctorium, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 101 = Asperula tinctoria.
tmoleum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iii. 89.—Lydia.
tolosianum, M s , *V Kotschy, in Boiss. Fl. Orient,* iii. 53.—As. Min.
tomentosum, *Thunb. Fl. Cap.* i. 551.—Afr. austr.
Torreyi, Bigel. Fl. Bost. id. II. 56 = lanceolatum.
trachyanthum, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. iii. 50 = hierosolymitanum.
trachycarpum, Clarke, Trav. ii. 260—aparinoides ?
trachyspermum, A. Gray, in Perry, Jap. Exp. il. 313 — gracile.
transcaucasicum, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 52.—Reg. Caucas.
transsilvanicum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 33 = aristatum.
triandrum, Roem. & Schult. Syst. iii. 269, in syn. sphalm. — Asperula tinctoria.
trichocarpon, Willd. ex Spreng. Syst. i. 392-canes. cens.
trichocarpum, *DC. Prod.* iv. 600.—Chili.
trichophorum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 161=, intricatum.
trichophorum, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 372.—Sibir. altaic.
trichophyllum, All. Auct. Fl. Pedem. 1-pusillum.
trichophyllum, Wulf. in Roem. Arch. iii. 319 (err. typ. 329)'verum.
tricorne, *Stokes, in With. Bot. Arr. Brit. PI.* cd. II. i. 153.—Europ.; Oriens.
trifidum, *Linn. Sp. PI.* 105.—Reg. bor. temp.
trifidum, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 612 = antarcticum.
triflorum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 80.—Reg. bor. temp.
triflorum, Rochel, ex Steud. Nom. cd. I. 355 = tricorne.
trinacrium, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 238 = aetnicum.
trinerve, Moench, Metb. 486 = boreale.
trinervium, Gilib. Fl. Lituan. i. 12 = boreale.
trinioides, *Pomel, Nouv. Mat Fl. All.* 77.—Alger.
Tsukinanats, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 106 - strigosum 1

GAUDM:—
tuberculatum, Presl, Delic Prag. 120 = verum.
tuberosum, *Lour. Fl. Cochinch.* 79.—China.
tunetanum, Bourg. ex Nym. Consp. 328 = verum.
tunetanum, *Lam. Encyc.* ii. 683.—Afr. bor. occ.
tyrdense, Willd. Ennm. Hort Berol. 16S=erectum.
nliginosum, *Linn. Sp. PI.* 106.—Europ.; As. bor.
uliginosum, Pall, ex Bieb. FL Tanr. Cauc. i. 102 = Asperula Aparine.
uliginosum, Thunb. Fl. Jap. 58 = strigosum.
umbellatum, Lam. Encyc. ii. 579 =• sylvestre.
umbrosum, *Soland. ex Forst. /. Prod.* 89, nomen.—N. **Zel.**
uncinatum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 484 = G. Aparine.
uncinatum, Lichtenst. ex Bartl. & Wendl. f. Beitr. ii. 12=glabrum.
iincinulatum, *DC. Prod.* iv. 600.—Mexic.
undnulatum, A. Gray, in Bost. Joum. Nat. Hist. vi. (1857) 215=texense.
undulatum, Steud. Norn. ed. II. i. 661, sphalm. vide *uncinatum,* Lichtenst.
uniflornm, *Mickx. Fl. Bor. Am.* i. 79.—Am. bor.
uropetalmn, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 66.—Mexic.
l/rvillei, Req. ex DC. Prod. iv. 607-setaceum.
vagans, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 461 [bis] = Gaudichaudi.
Vaillantii, DC. Fl. Fr. iv. 263 = G. Aparine.
Valantia, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. i. 188 = G. Cruciata.
Valantia, [Web. in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 12-tricorne.
valantioides, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 102.—Reg. Caucas.
valdiviannm, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 655.—Chili.
valentinnm, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1881) 96.-Hispan.
venustum, *Jord. Obs. PI. Crit.* Hi. (1846) 117.—Ins. **Corsica.**
vernum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 209 = cryptanthum.
vernum, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 9». t. 2.—Enrop.; As. temp.
vernum, Sieber, ex Tausch, in Flora, xviii. (1836) 356 « Sieberi.
verosimile, Roem. & Schult. Syst. iii. 234=verum.
verrucosum, Sm. Engl. Fl. i. 204 =• saccharatum.
verticillatum, *Danth. ex Lam. Encyc.* ii. 685.—Enrop. anstr.; Oriens.
verticilliflorum, Pourr. ex Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Pyr. 24=verticillatnm.
verum, *Linn. Sp. PI.* 107.—Enrop.; As. temp.
Vestianum, *Schult. Mant.* iii. 164.—Europ.
vestitnm, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 183.—Reg. Himal.
vexans, *Reichb. f. 1c. Fl. Germ.* xvii. 92- Valantia muralis.
Villarsii, Gaud, ex Roem. & Schult Syst iii. 220 = sylvestre ?
Villarsii, Req. ex Gner. Vaud. ed. II. 250; ex DC. Fl. Fr. vi. 497=megalosrjermum.
villosum, Lam. Encyc. ii. 583 = maritimum.
virgatum, *Nutt. ex Torr. b" Gray, Fl. N. Am.* ii. 20.—Am. bor.
virgultorom, *Lamotte, Prod.* ii. 360.—Gallia.
viridiflorum, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 51.—Hispan.
viridulum, Jord. Pugill. PI. Nov. 79 = corrndaefolium.
viscosum, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 29.—Afr. bor.
vulcanicum, Boiss. *8c* Hohen. Diagn. Ser. I. x. 70—nigricans.
vulgare, S. F. Gray, Nat. Arr. Bot. PI. ii. 483=G. Mollngo.
Walteri, J. F. Gmel. Syst. 237 =circaezans.
Wirtgenii, F. Schultz, Arch. Fl. 201=verum.
Witheringii, Sm. Fl. Brit. 174=palustre.
wittbergense, *Sond. in Han. b" Sond. Fl. Cap.* iii. 37-—Afr. austr.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* i. 80.—Am. bor. occ.
xylorrhitum, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. ii. 115-Ieiophyllum.
zacynthium, Reut. in Mem. Soc. Phys. Genev. viii. (1839) 304 = intricatum.

GALIZIOLA, Rafin. Sylva TeUur. 167 (1838)-Ar**diala,** Sw. (Myrsin.).

GALLAPAGOA, Pritz. Ic. Ind. ii. 129 (1866) = GALAPAGOA, Hook. f.^Coldenla, Linn. (Borag.).

GALLARIA, Schrank, ex Endl. Gen. 1217 (1841) - Medinella, Gaudich. (Melastom.).

GALLASIA, Mart, ex DC. Prod. iii. 182 (1828) «Mioonla, Ruiz & Pav. (Melastom.).
pepericarpa, Mart ex DC. 1. c. = M. pepericarpa.

GALIiESIA, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 43 (1842). *PHYTOLACCACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 83.
Gorazema, Moq. in DC. Prod. xiii. H. 8-G. Scorododendrum.
.Scorododendrum, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* 44. —Bras.

GALLESIOA, M. Roem. Syn. Hesper. 33, 45 (1846) - Clauaena, Burm. f. (Rutac).
graveolens, M. Roem. 1. c. 45 - C. excavata.
pentaphylla, M. Roem. 1. c.=C. pentaphylla.

GALLINSOGAJaume St. Hil. Expos, i. 417 (1805)-**GaUnsoga,** Ruiz *8c* Pav. (Compos.).

GALLITRICHUM, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 134-Salvia, Toum. (Labiat.).
anglicum, Jord. & Fourr. Ic PI. Eur. ii. 19 = S. Verbenaca.
arvale, Jord. & Fourr. 1. c. 18=S. Verbenaca.
Candollei, Timb. in Mem. Acad. Toul. Sér. VII. ii. (1870) 238 =»S. Candollei.
clandestinum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 134 = 8. Verbenaca.
Clusii, limb, in Mem. Acad. Toul. Sér. VII. ii. (1870) 237 = S. pratensis.
dichroanthum, Jord. *8c* Fonrr. Ic. PI. Eur. ii. 18=S. Verbenaca.
Fuschii, Timb. in M<5m. Acad. Toul. Sér. VII. ii. (1870) 243 - S . Fuschii.
Hermanni x, Timb. 1. c. 244.—Gallia.
horminioides, Timb. 1. c. 241 = S. Verbenaca.
maculatum, Jord. *8c* Fourr. Ic. PI. Eur. ii. 19=S. Verbenaca.
pallidiflorum, Jord. *8c* Fourr. 1. c. 18=S. Verbenaca.
pratense, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 134=S. pratensis.
ptychophyllum, Jord. *8c* Fourr. Ic. PI. Eur. ii. 17 - S . Verbenaca.
rosulaium, Jord. & Fourr. 1. c. = S. Verbenaca.
rubellum, Jord. & Fourr. 1. c. 20 = S. Verbenaca.
stereocaulon, Jord. & Fourr. 1. c. 19=S. Verbenaca.
verbenacum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869; 184 = S. Verbenaca.
virgatum, Jord. & Fourr. Ic. PI. Eur. ii. 18=S. Verbenaca.

GALLIUM, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735) - Galium, Linn. (Rubiac).

GALLOA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 172 (1844) = Cocculua, DC. (Menisperm.).
trinervis, Hassk. 1. c. = C. laurifolius.

GALOGLVCHIA, Gasp. Nov. Gen. Fie. 10 (1844) = Pious, Toum. (Urtic).
martinicensis, Gasp. 1. c.-F. laurifolia.
Saussureana, Gasp. 1. c. = F. Saussureana.
Tenoreana, Gasp. 1. c.—Hab. ?

GALOPHTHALMUM, Nees *8c* Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 7. t. 2 = Blainvillea, Cass. (Compos.).
brasiliensis, Nees *8c* Mart. 1. c = B . bahiensis.

OAIiOFINA, Thunb. Nov. Gen. i. 3 (1781). *RUB1ACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 189.
OXY?PKRMUM, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 364 (1837).
aspera, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 26 = G. Oxyspermum.
circaeoides, *Thunb. Nov. Gen.* i. 3.—Afr. austr.
hirsuta, E. Mey. ex Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. iii. 26 = G. Oxyspermum.
Oxyspermum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 662.—Afr. austr.
tomentosa, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 655 = G. Oxyspermum.

GALORDIA, Raeusch. Norn. ed. III. 251 (1797) = Gaillardia, Fouger. (Compos.).
alternifolia, Raeusch. 1. c-Gaillardia pulchella.

GALORHOEUS, Endl. Gen. 1108 (1841) •= GALARHOEUS, Haw.-Euphorbia, Linn.

GALPHIMIA, Cav. Ic. v. 61. t. 489 (1799). *UALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 254.
THRYALLIS, Linn. Sp. PI. ed. II. 664 (1762\
angustifolia, *Benth. Bot. Voy. Sulpk.* 9.—Am. bor. occ.
biglandulosa, Poir. Encyc. Suppl. iv. 7-glandnlosa.
brasiliensis, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Met.* iii. 71-—Bras.
Cauca, Spreng. Syst. it 885 - Caucanthus arabicus.
chrysophylla, Spreng. Syst. ii. 385 - Byrsonima chrysophylla.
glandulosa, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* i. (1799) 87.-Mexic.
glandulosa, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 172-t 462 - G. Humboldtiana.
glauca, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* i. (1799) 37.-Mexic. -
glauca, Hort. ex Bartl. in Linnaea, xiii (1839) 552 **seq.**
gracilis, *Bartl. I. c*—Mexic.
grandiflora, *Bartl. 1. c.* 554.—Mexic.
hirsuta, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* i. (1799) 37.—Mexic
Humboldtiana, *Bartl. in Linnaea,* xiii. (1839) 555.-Mexic.
latdfolia, *Bartl. 1. c.* 553.—Mexic.
linifolia, A. Gray, Gen. IUustr. ii. 196. t. 173 - angustifolia.
longifolia, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. **173**-Lophanthera Kunthiana.
mollis, Hort ex Bartl. in Linnaea, xiii. (1839; 558-hirsuta.
mollis, H. B. *8c K.* Nov. Gen. et Sp. v. 173 = Tetrapter)* Cotoneaster.
multicaulis, *A.* JIM*, *in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) S**-—Mexic.
paniculata, *Bartl. in Linnaea,* xiii. (1839) 556.—Mexic.
splendens, Mackoy, ex A. Juss. in Walp. Rep. v. »• =gracilis.

GALPHlNfA.Poir. in Diet. Se. Nat. xviii. 116 (1820)* praec.

GALSTRONEMA, Steud. Nom. ed. II. i. 662 (1840) = GASTRONEMA, Herb. = Cyrtanthufl, A"' (Amaryllid.).

GALTONIA, Decne. in Fl. des Serres, xxiii. («8<)) 82. *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 809.
candicans, *Decne. I. c.* 33.—Afr. austr.
clavata, *[Mast. :«] Gard. Chron.* (1884) II. 40L-Afr. austr.
Princeps, *Decne. in Fl. des Serres,* xxiii. (1880) *>•' Afr. austr.

GALUMPITA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii- 7Sm 1862 [185.6] = Qironniera, Gaudich. (Urtic).
cuspidata, Blume, 1. c.-Gironn. reticulata.

GALURUS, Spreng. Anleit. ii. II. 364 (181?) * Acalypha, Linn. (Euphorb.).
spidflorus, Spreng. Syst.i. 362 = A. spiciflora.

GALVANIA, Vand. Fl. Lusit. 15. t. 1. *i. 1 (}J*iS*> ' Psyehotria, Linn. (Rubiac). UtsCr
Vandellii, Spreng. Neue Entdeck. ii. 151 = P- *v **gravii.** jj.
***Vellosii,* Roem. & Schult Syst. v. 193-P. Marcg*"**

GALVESIA, J. F. Gmel. Syst. 987 (1791) = Galvesia, Domb. (Scrophul.).

GALVESIA, Pens. Syn. i. 445 (1805) = GALVEZIA, Ruiz *8c* Pav.=Pitavia, Molina (Rutac).

GAIiVEZIA, Domb. ex Juss. Gen. 119 ..((|7 "|£.' *SCROPHULARINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. «• * jl AGASSIZIA, Chav. Monog. Antirrh. 180- **(1830).** jj.
SACCULARIA, Kellogg, in Proc. CaUf. Ac*4- (1863) 17.
fruticosa, *J. F. Gmel. Syst.* 937.—Peruv. lgQ *
limensis, Domb. ex Chav. Monog. Antirrn-fruticosa.
punctate, *Ruit & Pav. Fl. Per.* iv. t. 344.—Peruv.

GALVEZIA, Ruiz & Psv. Syst Veg. 97 (1794) = Fitavia, Molina (Rutac).
punctata, Ruiz & Pav. 1. c.~P. ɹunctata.
tieata, Bert.'Merc. Chil. 642/—Cf. Bull. Fé'russac, xx. (1880) 111 = Ercilla volubilis.

GAMA, La Llave, in La Naturaleza, vii. (1885) Apénd. 71=Matrioaria? Lion. (Compos.).
"ngulata, La Llave, 1. c—Mexic.

f'AMANTHUS, Bnnge, Anabas. Rev. 76 (Mém. Acad. Petersb. Sér. VI. iv. (1862) n. 11) = Halanthium, C. Koch (Chenop.).
barbellatus, Bunge, in Act Hort. Petrop. vi. (1879) 448.—Turkestan.
'ommixtus, Bunge, Anabas. Rev. 76.—Afghan.
gamocarpus, Bnnge, 1. c. 77.1.1. f. 14.—Afghan.
•minus, Bunge, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 447.—Turkestan.
pilostu, Bunge, Anabas. Rev. 79.t.1.—Reg. Casp.

GAMARIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1886)-Disa, Sw. (Orchid.).
'ontuta, Rafin. 1. c - D . comuta.

GAMAZYGIS, Pritz. Ic. Ind. i. 47S (1886) - GAMOZYGIS, Turcz. "Angianthus, Wendl. (Compos.).

GAMBELIA, Nutt. in Joura. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 149-.Antirrhinum, Linn. (Scrophul.).
"peciosa, Nutt. 1. c - A . speciosum.

GAM..BIJEA, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. »; 789 (1879). *ARALIACEAE.*
al>ata, *C. B. Clarke, 1. c.* 740.—Reg. Himal.

^AMELYTHRUM, Nees, in Hook. Lond. Joum. BoL »' (1843) 415=Amphipogon, R. Br. (Gramin.).
tenudatum, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. 101=A. Wrbinatus.
ttrtinatum, Nees, in Hook. Lond. Joura. Bot. ii. (1848) 415-A. turbinatus.

UAJ?ELYTRUM, Steud. Syn. PI. Gram. 198 (1854) = WVMELYTHRUM, Nees-Amphipogon, R. Br. wramin).

GAMOCARPHA, DC. Prod. v. 2 (1836) = Boopts, Juss. (Calycer.).
angust[illegible]ia, Phil in AnaU Univ- Chil. ii. (1862) 879.
—€ h ^
de"/.«'«. Phil. 1. c. (1872) 7S5—Chili.
Gi«««««, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. i;M18«0) 281.-Chili.
li;uiata, Miers, 1. c. 282.-Chili.
Poeppig[illegible]-Prod. w. 2=B. alpina.
polyceph a«a>Phil. in Anal. Univ. Chil. (1856) H. 829. —Chili.
puJS.'?. Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. vi. (i860) 282.—Chili.

GAMoCIiAETA. Wedd. Chlor. And. i. 151 (1866) = «aaphalium, Linn. (Compos.).
[illegible]Wedd- e.-Gn. purpureum
[illegible]Wedd- !• «• 158 = Gn capitatum t
humilis,'Wedd- 1- t-Bolivia.
serpyllifolia, Wedd. 1. c. 162 = Gn. serpyllifolium.
sylvatica, Fourr- in Ann. Soc Una. Lyon. N. S. xvii. (1869) 93=.Gn.sylvaticum.

GAMOCHILUM, Wilp. in Linnaea, xiii. (1839) 509 = Arum, Lyw Wum, Kckl. & Zeyh. (Legnmin).
ob[illegible]P-=• 510 = A. obcordatum.
M^/J)"™«lp. 1. c. = A. sericeum.
[illegible]am, Walp. I.e. 509-A. umbellatum.

GAMOCHLUS, *Leaib.* in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xv. (184n*l = Hedychium, Koen. (Scitamin.).
[illegible], Lestib. 1. c.=H. Gardnerianum.

GAM[illegible]AMYS- a*". * G«rf- Chron- (1876) 164
heter*ndra, [illegible]O>eum, Schott (Aroid.).
Baket, L c„os< hetenLndlum-

GAMOGYNE (1882) 195. *AROIDEAE,* Benth. & Hook. C ui. 985.
Burbidgei, *If. E. Br. 1. c.* 196.—Borneo.

OAMOIiEPIS, Less. Syn. Comp. 251 (1832). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. £ ii. 452.
JACQUEMONTIA, Belang. Voy. Ic. t. 10 (1836).
PSILOTHAMNUS, DC. Prod. vi. 41 (1837).
PSILOTHONNA. E. Mey. ex DC. Prod. vi. 40 (1867).
annua, *Less. Syn. Comp.* 251.—Afr. auştr.
brachypoda, *DC. Prod.* vL 40.—Afr. austr.
chrysanthemoides, *DC. I. c*—Afr. austr.
debilis, *Han. in Harv. V Sond. Ft. Cap.* iii. 157.—Afr. austr.
ericoides. *Less. Syn. Comp.* 251.—Afr. austr.
euriopoides, *DC. Prod.* vi. 41.—Afr. austr.
hebecarpa, *DC. I. c.*—Afr. austr.
laxa, *Harv. in Hani, (f Sond. Fl. Cap. m.* 158.—Afr. austr.
leiocnrpa, *Harv. I. c.* 608.—Afr. austr.
munita, *Less. Syn. Comp.* 251.—Afr. austr.
pectinata, *Less. 1. c.*—Afr. austr.
pinnatipartita, *Harv. in' Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 607.—Afr. austr.
polytrichioides, *Harv. 1. c.*—Afr. austr.
Tagetes, DC. Prod. vi. 40-annua.
tagetis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126=praec.
trifurcata, *Less. Syn. Comp.* 251.—Afr. austr.

GAMOPLEXIS, Falc. in Proc. Linn. Soc. i. (1847) 320; et in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 293. t. 13= Gastrodia, R. Br. (Orchid.).
orobanchoides, Falc. 11. cc—Reg. Himal.

GAMOZYGIS, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1861) II. 75=Angianthua, Wendl. (Compos.).
flexuosa, Turcz. 1. c. 76=A. amplexicaulis.

GAMPSOCERAS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) I. 541, in textu^ Ranunculus, Toum.
Pinardi, Stev. 1. c. 542 = R. Fiaardu

GANDOLA, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 224 (1849). Ullucus, Lozan. (Chenop.).
peruviana, Moq. 1. c. 225 «-U. tuberosus.
tuberosa, Moq. 1. c. 224=U. tuberosus.

GANDOLA, Rumph. ex Linn. Sp. PI. ed. II. 890 (1782) =Basella, Rheede (Chenop.).
nigra, Rafin. Sylm Tellur. 60-B. rubra.

GANDRILOA, Steud. Nora. ed. II. 1. 662 (1840) = Chenopodium, Linn.
atriplicoides, Steud. 1. c =C. polyspermum.

GANGILA, Bernh. in Linnaea, xvi. (1842) 42 - Seaamum, Linn. (Pedalin.).
pentaphylla, Bemh. 1. c.—Afr. austr.

GANITRUS, Gaertn. Frnct ii 271. t. 139 (1791) = Elaeocarpus, Linn. (Tiliac).
obtusus, Rafin. Sylva Tellur. 69 (Ganitrum) - E. integer.
Roxburghii, Wight, IUustr. 88 ~E. Ganitrus.
sphaerica, Gaertn. Fruct. ii. 271. t. 139-E. Ganitrus.

GANJA, Reichb. Handb. 803 (1837) - Corohorus, Linn. (Tiliac).

QAITOPHYIJIIUM, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 280 (1850). *BURSERACEAE,* Benth; & Hook. f. i, 326.
faicatum, *Blume, I. c*—Malacca.

GANOSMA, Decne. in DC. Prod. viii. 626 (1844), sphalm.=AganoBma,D. Don (Apocyn.).

GANSBLUM, Adant Fam. ii. 420 (17«8)=Brophila, DC. (Crucif.).

GANYMEDES, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 368 -Naroissus, Toum. (Amaryll.).
albus, Haw. Narciss. Monog. 5 -= N. triondrus.
capax, Herb. Amaryll. 308-N. triandrus.
cernuus, Haw. Suppl. PI. Sncc 130 = N. Pseudonarcissus.
cernuus, Salisb. in Trans. Hor'- Soc. 1. (1812) 858=N. triandrns.
cencolor. Haw. Suppl. PI. Succ. 181 - N . triandrus.
fffusus, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 354 -N. triandrus.
Unnaei, Kunth, Enum. PL v. 719=N. triandrus.

GANYMEDES:—
nutans, Haw. Suppl. PI. Succ. 131=Narcissus triandrus.
ochroleucus, Haw. 1. c. 206 = N. triandrus.
pulchellus, Salisb. in Trans. Hon. Soc. i. (1812) 84 = N. triandrus.
reflexus, Herb. Amaryll. 808=N. triandrus.
striatulus, Haw. Suppl. PI. Succ. 132-N. triandrus.
triandrus, Haw. 1. c. 130=N. triandrus.

GARACIUM, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 827, in syn. (1850)=Lactuoa, Toum. (Compos.).
alpinum, Gren. 8c Godr: 1: c. = L. alpina.

GARALEUM, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 951 (1843), sphalm. = Qaruleum, Cass. (.Compos.).

GARAPAT1CA, Karst. Fl. Colomb. i. 57. t. 28 (18S8) =Alibertia, A. Rich. (Rubiac).
edulis, Karst 1. c.=A, edulb.

OABBEBIA, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. (1879) 879. *COMPOSITAE.*
fruticosa, *A. Gray, I. c*—Florida.

GARCIA, Rohr, in Skriv. Nat. Hist, Selsk. Kjobenh. ii. (1792) 217. t. 9. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. hi. 292.
nutans, *Rohr, I. c.*—Mexic.

GARCIANA, Lour. Fl. Cochinch. 14 (1790)-Philydrunij Banks.
cochinchinensis, Lour. 1. c. 16 = P. lanuginosunv.

GARCHIASBA, Poepp. & Endl, Nov. Gen. et Sp. iii. 46. t. 251 (1842). *COMPOSITAE,* Benth. *Si* Hook, f. ii. 382.
rivularis, *Poepp. V Endl. I. c.* 46.—Peruv.

GARCINIA, Linn. Gen. ed. I. 843 (1737). *GUTTIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 174.
BIWALDIA, Scop. Introd. 282 (1777).
BRINDONIA, Thou, in Diet. Sc. Nat. v. 339 (1804).
CAMBOGIA, Linn. PL Mart. Burs. (1745); Diss. Dass. 18 (1747); Amoen. Acad. i. 171, 402 (1749).
CLUSIANTKEMUM, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1866) 338.
CODDAMPULI, Adans. Fam. ii. 445 (1763).
DISCOSTIGMA. Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 33.
HEBRADENBRON, R. Grah. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 199. t. 27.
MANGOSTANA, Gaertn. Kruct. ii. 105.1.105 (1791).
OXYCARPUS, Lour. Fl. Cochinch. 647 (1790).
RHINOSTIGMA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 4!!5 (1860).
TERFNOPHYLLVM, Thw. in Hook. Kew Joum. vi. (1854) 70. t. 2 C.
acuminata, Hort. Bogor. ex Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. v. 36 =calophylla.
acuminata, Planch. 8c Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 365-G. Morella.
acuminata, Wall. Cat. n. 4871 A = Temitroemi«penangiana (B=Anonac. sp.).
affinis, Wall. Cat. n. 4864 •• anomala, cornea.
affinis, Wight *Sc* Am. Prod. 101 = G. Cambogia.
amioinensis, Spreng. Syst. ii. 448-cochinchinensis.
amplexicaulis, *Vieill. ex Pierre, FL For. Cochinch. fasc.* v. 20.—N. Cal«d.
Anderson!, *Hoot./, ex T. Anders.in Hook. f. Fl.Brit. Ind.* \. 270.—Malacca,
anomala, *Planch. W Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiv. (1860) 829.—Ind. or.
apetala, *Pierre, JQ. For. Cochinch. fasc.* v. 36.—Borneo.
Arthurgordoni, Home, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xx. (1883) 361 = Gardenria Gordoni.
atroviridis, *Griff, ex T. Anders, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 266.—Assam,
australis, *Montr, in Mim. Acad. Lyon, X.* (1860) 188. -N.Caled.
Baillonii, *Pierre, Ft. For. Cochinch. fasc.* v. 18.—Borneo.
Balansae, *Pierre, I. c.fasc.* 'vi.' 7__N. Caled.
balica, *Miq. Ann. Mus. Bot. lugd. Sat.* i. 209.—Ins. Bali.
bancana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 494.—Malaya.
Barteri, *Oliver, Fl. Trap. Afr.* i. 166.—Afr. trop.

GABCINIA:—
bassacensis, *Pierre, Fl. For. Cochinek.* t. 58.— Cochinch.
Beccarii, *Pierre, I. c.fasc.* v. 26.—Borneo.
Benthami, *Pierre, I. c.* t. 55.—Cochinch.
Bhumicowa, Roxb. ex Wall. Cat n. 4858= paniculata.
Binnendijkii, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 7.— Malaya.
Binucao, *Choisy, Guttif. Ind.* 34.—Ind. or.
Blancoi, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 15.— As. or.
Blumei, *Pierre, I. c.* 32.—Cambodia.
Bobee-cowa, Choisy, Guttif. Ind. 35 - panicnlata.
Boerlagii, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 86.— Malaya.
bomeënsis, *Pierre, 1. c.* 27.—Borneo,
brasiliensis, *Marl, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 34. —Bras,
brevipes, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 8.— Borneo.
brevirostris, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 353 ; et in Flora, liii. (1870) 241 = eugenifolia.
Calleryi, *Pierre, fl. For. Cochinek. fasc.* v. 15.—Ins.
calophylfa, *Pierre. I. c.* 86.—Malacca; Java ?
calycina, *fairs, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 824.— Ins. Nicobar.
Cambogia, *Desr. in Lam. Encyc.* iii. 701.—Ind. or.
Cambogia, Roxb. Hort. Beng. 42 ; Fl. Ind. ii.621-G. Cowa.
cambogioides, Royle, **Mat.** Med. Ind. ed. III. 839 - G. Morella.
celebica, Desr. in Lam. Encyc. iii. 700 = indica.
celetica. Linn. Syst ed. XII. 326 = cornea.
Choisyiana, *Wall. Cat.* n. 1870.—Malaya,
cladostigma, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 30.— Java!
cochinchinensis, *Choisy, in DC. Prod.* i. 561.—China,
collina, *Vieill. ex Panch. Zf Sebert, Not. Bois Nouv. CaUd.HS.*—N. Caled.
conicarpa, Wight, Ic. i. t. 121; Illuslr. i. 126-G. Cambogia.
corallina, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* ix. (1865) 338.—N. Caled.
cornea, *Linn, in Murr. Syst.* ed. XIII. '368.—Ind. or.; Malaya.
cornea, Roxb. ex Sm. in. Rees, Cyclop, xv. n. 5 = G. Cowa.
corymbosa, *Wall. Cat.* n. 4859.—Ind. or.
Cowa, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 622.— Ind. or.
Cumingiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 11.— Ins. Philipp.
cuneifolia, *Pierre, 1. c.* 35.—Borneo,
eymulosa, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 208.— Malaya,
daedalanthera, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 40.— Ins. Celebes.
Delpyana, *Pierre, 1. c.* t. 65.—Cambodia,
densiflora, *Pierre, I. c.fasc.* v. 25.—N. Caled.
Desrousseauxii, *Pierre, 1. c.* 34.—Borneo,
dioica, *Blume, Bijdr.* 215.—Java.
dioica, Herb. Lugd. Bot. ex Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. v. 36 = calophylla.
dioica, Sm. in Rees, Cycl. xv. n. 6 = G. Cowa.
diospyrifolia, *Pierre, Fl. For. Cochinek. fasc.* v. 87.— Borneo.
dives, *Pierre, 1. c.* 35.—Ins. Fhilipp.
dryobalanoides, *Pierre, 1. c.* 7.—Borneo,
dnlcis, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliii. (1874) II. 88.—Ins. Andaman,
duodecandra, *Pierre, Fl. For. Cochinek. fasc.* v. 28.— Ins. Philipp.
echinocarpa, *Thw. in Hook. Kern Journ.* vi. (1854) 71. —Zeylan.
elliptica, *Choisy, in DC. Prod.* i. 561.—Malaya.
elliptica. Wall. Cat. n. 4869 - G. Morella.
eugenifolia, *Wall. 1. c.* 4878.—Malaya,
fabrilis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 496.—Sumatra.
fascicularis, *Wall. Cat. n.* 4863 Ind. or.
ferrea, *Pierre, PI. For. Cochinch.* t. 57.—Cochinch.
floribonda, *Miq. Stip.Surin. Sel.* 39.—Guian.
fulva, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 6.—Malacca.
fusca, *Pierre, I. c.* t. 67.—Siam.
Qaudichaudii, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (I860) 357 - G. Morella.
Gerrardi, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* ed. II. 26.—Afr. flustr.

GASCINIA:-
gracilis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 63.—Cochinch.
Grahami, *Pierre, I. cfasc.* v. 32.—Borneo,
grandifolia, *Pierre, 1. c.* 7.—Malaya!
Griffithii, *T. Anders, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 266. —Malaya.
Gutta, Roxb. Hort. Beng. 42; Wall. Cat. n. 4866 = G. Cambogia.
Gutta, Wight, Illustr. i. 126 = G. Morella.
Hanbnryi, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 485.—Malaya.
***Hannandii, Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 60.—Cambodia.**
Hasskarlii, *Pierre, 1. c. fasc.* v. 8.—Sumatra,
heterandra, *Wall. Cat.* n. 4856.—Burma.
Hombroniana, *Pierre, Fl. For. Cochinch.fasc.* v. 12.— Singapore.
Hookeri, *Pierre, 1. c.* 27.—Malacca.
Horsfieldiana, *Pierre, 1. c.* 23.—Java,
huillensis, *Welw. in Oliver, Fl. Trop.Afr.i.* 167.—Afr. trop.
indica, *Choisy, in DC. Prod.* i. 561.—Ind. or.
javanica, *Blume, Bijdr.* 215.—Java.
javanica, Hort. Bogor. ex Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. v. 30 = cladostigma.
Jawoera, *Pierre, 1. c.* 87.—Java.
Jelinckii, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xiv. (1876) II. 118.—Ins. Nicobar.
Keenania, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 8.— Ind. or.
Keenaniana, Pierre, 1. e. t. 92. f. G = praec
Klabang, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 493.—Ins. Banca.
Kola, Heckel.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. (1883) Bibl. 150 = Cola acuminata.
Korthalsii, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 89.— Borneo.
Krawang, *Pierre, 1. c.* 37.—Borneo.
Kurzii, *Pierre, 1. c.* 14.—Ins. Andaman.
Kydia, Roxb. Fl. Ind. ii. 623=G. Cowa.
Kydiana, Roxb. Hort. Beng. 42=G. Cowa.
Lampong, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 494.—Sumatra,
lanceaefolia, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 623. —Reg. Himal.
Lanessanii, *Pierre, Fl. For. Cochinch;* t. 70.—Cambodia.
lateriflora, Blume, Bijdr. 214=G. Morella.
latissima, *Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat.* i. 209.— Java,
leucandra, *Pierre, Fl. For. Cochinek. fasc.* v. 27.— Sumatra.
linearis, *Pierre, 1. c.* 8.—Borneo.
Livingstonei, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 268.—Afr. trop.
lobulosa, Wall. Cat. n. 4868 A = G. Cowa, G. Morella.
longifolia, *Blume, Bijdr.* 214.—Java,
loniceroides, *T. Anders, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 264.—Ind. or.
Loureiri, *Pierre, Fl. For. Cochinek.* t. 66.—Cochinch.
lucens *Pierre, I. c.fasc.* v. 87—Borneo.
macropkylla, T. Anders, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 270 = Andersoni.
macrophylla, Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 35 = Rheedii.
macrophylla, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 208. —Sumatra,
madagascariensis, *Baill. ex Pierre, Fl. For. Cochinch.* *fasc.* v. 6.—Madag.
Maingayi, *Hook. f. ex T. Anders, in Hoak.f. Fl. Brit.* *Ind.* i. 267.—Malaya.
malabarica, Desr. in Lam. Encyc. ílll 701 = Diospyros Embryopteris.
malaccengis, *Hook. f. ex T. Anders, in Hook. f. Fl.* *Brit. Ind.* i. 261.—Malacca.
Mangostana, *Linn. Sp. PI.* 448.—Ins. Molncc
Mannii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 167.—Afr. trop.
Massoniana, Klotzsch, ex Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. xiv. (1860) 826=cornea.
Melleri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 92.— Madag.
mcrguensis, *Wight, Ic.* 1.116; *Illustr.* i. 124.—Burma; Malaya,
microcarpa, *Pierre, Fl. For. Cochinek. fuse.* v. 89.— Borneo,
microstigma, *Kurt, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 324.— Ins. Nicobar.
***minahassensit, Pierre, Fl. For. Cockinck. fasc. V.* 39.—** Ins. Celebes.
Miqneli, *Pierre, 1. c.* 26 Borneo.
monosperma, *Berg (f C. F. Schmidt, Offis. Gew.* iv. t. S3 d.—Ind, or.

OABCINTA :—
Morella, *Desr. in Lam. Encyc.* iii. 701.—Ind. or.; Malaya.
Moselleyana, *Pierre, FL For. Cochinch. fasc.* v. 10.— Ins. Philipp.
Mottleyana, *Pierre, 1. c.* 80.—Borneo,
multiflora, *Champ, ex Bentk. in Hook. Ken Journ.* Kilns. (1851) 810.—Ins. Hongkong.
Mungotia, *Deplanch. ex Pierre, Fl. For. Cochinch.* *fasc.* v. 25.—N. Caled.
myristicaefolia, *Pierre, 1. c.* 26.—Borneo,
neglecta, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* ix- (1865) 837.—N. Caled.
nervosa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 208 = Andersoni.
nigricans, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 30.— Borneo,
nigro-linczta, *Planck, ex T. Anders, in Hook. f. fl-* *Brit. Ind,* i. 263.—Malacca.
nitida, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 18.—Borneo,
oblongifolia, *Champ, ex Bentk. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 311.—Ins. Hongkong.
Oliveri, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 64.—Cambodia.
ovalifolia, Hook. f. ex T. Anders, in Hook. f. Fl. Brit-Ind. i. 269=spicata.
ovalifolia, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 166.—Afr. trop.
oxyedra, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 494.—Sumatra,
oxyphylla, *Miq. 1. c.* 495.—Sumatra.
oxyphylla. Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sef. IV xiv. (1860) 842=lanceaefolia.
Pancheri, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 26.—N- Caled.
paniculata, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 626.' Reg. Himal.
Papilla, Wight, Ic. tt. 960, 961 = G. Cambogia.
parviflora, *Bentk. in Hook. Land. Journ. Bot.* (1843) 370.—Guiana,
parvifolia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 208 Malaya,
pauciflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 9 —Madag.
pedicellata, *Seem. Viti,* 433 ; *Fl. Vit.* 11.—Ins. Fiji-
pedunculata, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 625.— Reg. Himal.
penangiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 87— Ins. Penang.
petiolaris, *Pierre, 1. c.* 3.—Borneo,
picrorhiza, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 209.— Ins. Ceram.
pictoria, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 627 = Morella.
Planchoni, *Pierre, Fl. For. Cochinek.* t. 61.—Cochin-
polyantha, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 166.—Afr. trop.
porrecta, Laness. Mem. Gen. Garcin. 21 = cornea.
Pseudo-guttifera, *Seem. Fl. Vit.* 11.—Ins. Fiji,
punctata, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 167.—Afr. trop.
purpurea, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 824-indica.
purpurea, Wall. Cat. n. 4862=lanceaefolia.
quadrifaria, *Baill. ex Pierre, Fl. For. Cockinck.* v. 4.—Afr. trop.
quaesita, *Pierre, I. c.* 22.—Zeylan.
Rheedii, *Pierre, I. c.* 34.—Borneo.
Rkumicoma, Choisy, Guttif. Ind. 35 - paniculata.
Riedeliana, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 12.—I Celebes.
rigida, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 498.—Sumatra,
rostrata, *Hassk. ex Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* (1875) 485.—Burma; Malaya.
Roxburghii, Wight, Illustr. i. 125 = G. Cowa.
Rumphii, *Pierre, Fl. For. Cochinek. fasc.* v- 13— Banca.
salakensis, *Pierre, 1. c.* 86.—Java,
sarawhensis, *Pierre, 1. c.* 6.—Borneo.
Schefferi, *Pierre, I. c.* t. 59.—Cambodia.
Schomburgkiana, *Pierre, I. c.fase.* v. 28.—Guian.
sessilis, *Seem. Viti,* 433 ; *Fl. Vit.* 10.—Ins. Fiji-
sizygiifolia, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v- Borneo.
Smeathmanni, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 168.—Afr.
speciosa, *Wall. PI. As. Rar.* iii. 87; *Cat.* Burma.
spectabilis, Hook. f. Fl. Brit Ind. i. 261, speciosa.
spectabilis, *Pierre, Fl. For. Cockinck. fasc.*
spicata, *Hooi.f. in Journ. Linn. Soc.* xiv. (187*) —Malaya.

GARCINIA:—

stigmacantha, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 29.—**Borneo,**

"ipulata, *T. Anders, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 267. **-Reg. Himal.**

wbtilinervis, *F. Muell. Papuan PI.* i. 85.—N. Guinea,

wiccifolia, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) **H. 293.—Burma.**

***ulcata,* Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 11 = G. Cambogia.**

terpnophylla, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 406.—Zeylan.

tetrandra, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 20.—Ins. **., Philipp.**

leysmanniana, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent.* i. **(1876) 7.-N. Guinea.**

Thorelii, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* t. 62.—Cambodia,

'.nwaitesii, *Pierre, I. c.fasc.* v. 4.—Zeylan.

"morensis, *Zipp. Ic.* 24; *ex Span, in Linnaea,* xv. **, (1841) 178.-Ins. Timor,**

"avancorica, *Bedd. FL Sylv.* t. 173.—Ind. or.

trechostigma, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 31.— **, Malaya.**

Treubii, *Pierre, 1. c. 7*—Sumatra.

Inanii, *Pierre, 1. c.* 18.—Borneo.

"mbellifera, Wall. Cat. n. 4864=G. Cowa.

venulosa, *Choisy, Guttif. Ind.* 34.-Ind. or.

Vieillardii, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 12.—N. Cale **v,**

Vilersiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) ·?48; *Fl. For. Cochinch.* t. 71.—Siam.

yj*[len]sis, *Seem. Fl. Vit.* 10.—Ins. Fiji.

'rilichiana, Klotzsch, ex Planch. & Triana, in Ann. W.Sc. Nat. Ser, IV. xiv. (1860) 356-G. Morella.

?;[l, chii, *Cho*n, y>»» *Mem. Soc.Phys. Genh,.* xii. (1851) **VV-]** ^*- Cow «-

Wightii, *T. Anders, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 265.— **.. hd. or.**

Aanthochymus, *Hook.f. ex T. Anders. 1. c.* 269.—Ind. or.; Malaya,

"yiospenna, *Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc.* v. 89.— **^s. Celebes.**

***"ylanica,* Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 621 = ^- Cambogia.**

GARDENA, Adans. Fam. iL p. (20)=seq.

GARDENIA, Ellis, in Phil. Trans. Ii. II. (1761) 935.

"£BIACEAE, Benth. *8c* Hook. f. ii. 89.

"ERGKIAS, Sonner. Voy. 48. t. 17 (1776).

^AQUIPIRIA, J. F. Gmel. Syst. 651 (1791).

"VPERACANTHUS, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docurn. 198 (1843).

"RINGA, Juss. in Mem. Mus. Par. vi. (1820) 899.

KOTHMANNIA, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. „ 6[5] (1776), cum ic.

£«.HBERGIA, Neck. Elem. i. 262 (1790).

Ahk^*, [GA?A, Rai] i'>- Sylva Teilur. 20 (1888).

A»beok[n]tae, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 104. **—Afr. trop.**

"'rteata, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 295-Kandia aculeata.

•""minata, G. Don, Gen. Syst. iii. 499 = Randia acuminata.

aC^[n]a«a, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. H. **(1861) 192.-Boraeo.**

africa [n]1' l*««l> c**- *PI- n<"*- Aksakov.* 62, nomen **(Quid?).—Afr·trop.**

amoe.

arW,"?[1] £i"". *Bot. Mag.* t. 19O4.-China.

a«i-1'/[olia]> ^ ^ ^ *Bot. Cab.* t. 612.-Ind. or.?

""•sophylla, Jack, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 461 = Kandia aniso h, ll

anisoph la *Wal1 Cat* "• 8399.-Ind. or.

Annae, £- ri18, f. *Wri*eht, *in Trans. Roy. Irish Acad.* xnv. **—Ins. Seychell.; Afr. trop.**

^iculata. Stokes, Bot. Mat. Med. i. 494 = G. inunbergia.

Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 708 = gwnmifera,

a mata, Bartl. ex DC. Prod. iv. 387 = Randia tetra-'cantha.

a, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 51 = Randia ata.

artensis, *Montr. in Mem* (1860) 215.— N. Caled.

assimilis, *Afs*W. *ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 102.—Afr. trop.

atrosperma (Quid1).—Hab.? *Regel> Cat_PL Hort_Aksakov_62> nomen*

OABDENIA:—

Aubryi, *Vmil. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xvi. (1861) 65.-N. Caled.

austraKs, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 62, nomen **(Quid?).—Hab.1**

***Benthamiana,* F. Muell. Fragm. ix. 180 = Randia Bentbamiana.**

***bignoniaeflora,* Welw. Apont. 585. n. 18-= Amaralia bignoniaeflora.**

bispinosa, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 62, nomen **(Quid?).—Hab.»**

***Blumeana,* DC. Prod. iv. 388 - campanulata.**

brasiliensis, *Spreng. Syst.* i. 763.—Bras.

Brighamii, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) **171.—Ins. Saodvic.**

***buffalina,* Poir. Encyc. Suppl. ii. 708 = Genipa buflalina.**

bullata, *Veil. Fl. Flum.* 103; iii. t. 12.—Bras.

***Burha,* Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8298-Wendlandia paniculata.**

***calycina,* G. Don, Gen. Syst. iii. 497 = Sherboumia foliosa.**

***calyculata,* Roxb. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. i. 704= latifolia!**

***campanulata, Roxb. II. cc.* 15, 710.—Reg. Himal.; Burma.**

***carinata,* Griff. Notul. iv. 261 •= coronaria.**

***carinata,* Thw. Enum. PI. Zeyl. 159 = coronaria 1**

carinata, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 560.— **Malaya.**

chartacea, *F. Muell. PI. Fitmalan.* 12.—Austral,

chinensis, *Carey, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 379 **(=seq.!).—China.**

***chinensis,* Spreng. Syst. i. 762 - Randia sinensis.**

***citriodora.* Hook. Bot. Mag. t.. 4087 - Mitriostigma axillare.**

***clusiae/olia,* Jacq. Coll. App. 37. t. 4. f. 3-Genipa clusiifolia.**

***coccinea,* G. Don, in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 343 — Mussaenda elegans.**

concolor, D. Dietr. Syn. PI. i. 797 *(-Gardeniola concolor).—'Bias.*

comifolia, *DC. Prod.* iv. 384.—N. Granat.

coronaria, *Buch.-Ham. in Syme, Embassy Ava,* iii. **ed. II. 307—Burma.**

***corymbosa,* Reichb. Hort. Bot. ii. 2. t. 106 - Olostyla corymbosa.**

***costata,* Roxb. Hirt. Beng. 15; Fl. Ind. *I* 704 = coronaria.**

***crassicaulis,* Salisb. Parad. Lond. t. 46 = G. Thunbergia.**

criiiita, *Afzel. Stirp. Guin. Medic. Sp. Nov.* (1829) 13. **n. 6.—Afr. trop.**

cruciata, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 62, nomen **(Quid?\—Hab.?**

***cuneata,* R. Br.in Wall. Cat. n. 8263 »turgida.**

cuneata, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 41.—Burma,

curvata, *Teijsm. &* Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* **iii. (1855) 404.—Ins. Bantam.**

***daphnoides,* Hance, in Walp. Ann. ii. 796 = Diplospora viridiflora.**

dasycarpa, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 42.—Burma.

***dasycarpa,* Kurz, in Joorn. As. Soc. Beng. xli. (1872) n. 312 = Randia tomentosa.**

***densa.* Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 669-Randia tetrasperma.**

Devoniana, *Lindl. in Gard. Chron.* (1846) 663.—Afr. trop.

***Donia,* Buch.-Haro. in Wall. Cat. n. 8292=turgida.**

***dumetorum,* Retz. Obs. ii. 14-Randia dumetorum.**

***dumosa,* Salisb. Prod. 65 = praec.**

edulis, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* I. (1860) 216.— **N. Caled.**

edulis, *F. Muell. Fragm.* i. 64.—Austral.

***edulis,* Poir. Encyc. Suppl. iL 708-Alibertia edulis.**

edulis, *Vieill. in Ann. Sc. Nat.* SO. IV. xvi. (1861) 66.—N. Caled.

***enneandra,* Koen. ex Roxb. Fl. lad. ed. Carey, ii. 552 = latifolia 1**

erythroclada, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. **(1872) II. 311.—Burma.**

***esculenta,* Stokes, Bot. Mat. Med. i. 495; Poir. Encyc. Suppl. ii. 708 = Randia edulis.**

fagifolia, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 245.— **Am. austr.**

***fasciculata,* Roxb. Hort. Beng. 15; Spreng. Sy«t. iv. Cur. Post. 84 = Randia fasciculata.**

femandensis, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 105. **—Afr. trop.**

GARDENIA:—

***ferox,* Cham. & Schlecht in Linnaea, iv. (1829) 198 - Randia ferox.**

ferrea, *Veil. Fl. Flum.* 103; iii. t: 113.—Bras.

Fitzalani, *F. Muell. Rep. Burdk. Exp.* 12.—Austral.

***flava,* Poir. Encyc. Suppl. ii. 708= Genipa flava.**

***fioribunda,* Roxb. Hort. Beng. 15 — Randia dumetorum.**

***florida,* Linn. Sp. PI. ed. II. 305 — jasminoides.**

***foliolosa.* Herb. Madr. ex Wight & Am. Prod. 399-Randia latifolia.**

formosa, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* iv. (1829) 200. **—Bras.**

Forsteniana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 236. **—Ins. Celebes.**

***fragrans,* Roxb. PI. Corom. ii. 19. t. 187 = Randia malabarica.**

***frondosa,* Lam. Encyc. ii. 608 - Mussaenda frondosa.**

fucata, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 410.— **Austral.**

***Genipa,* Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 61 - Genipa americana.**

Gerrardiana, *Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 6.—Afr. austr.

***glabra,* R. Br. in Wall. Cat. n. 8258-Randia dumetorum.**

globosa, *Hochst. in Flora,* xxv. (1842) 237.—Afr. austr.

***glutinosa,* Teijsm. *Ic* Binn. Cat. Hort. Bog. 119-tubifera.**

Gordoni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 361. **—Ins. Fiji.**

Gorriei, *Home, ex Baker, 1. c.* 862.—Ins. Fiji,

grandiflora, *Lour. Fl. Cochinch.* 147.—Cochinch.

***grandiflora,* Siebold, ex Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 66. n. 604 = jasminoides.**

grandis, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1861) **192.—Borneo.**

Grievei, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. **(1883) 361.—Ins. Fiji.**

Griffithii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. I18.-Malacca.

gummifera, *Linn.f. Suppl.* 164.—Ind. or.

***heteroclyta,* Koen. ex Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 164-Fagraea ceilanica.**

heterophylla, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) **216.—N. Caled.**

hexagona, *Urn. Illustr. Hortic.* xvi. (1869) *Misc.* 92.— **Bras,**

hexandra, *Willd. in Roem. V Schult. Syst.* v. **243.— Am. austr.**

Hillii, *Home, ex Baker, in Journ, Linn. Soc.* xx, **(1S83) 862.—Ins. Fiji,**

hirta, *F. Muell. Fragm.* vii. 46.—Austral.

***horrida,* Spreng. Syst. i. 762 = Randia horrida.**

***Humboldtiana,* Roem. *8c* Schult. Syst. v. 243-Randia Humboldtiana.**

hygrophila, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) **II. 312.—Burma.**

***inermis,* F. G. Dietr. Vollst. Lexlk. Gaertn. iv. 285 - gummifera.**

ixoraefolia, *R. Br. in Wall.Cat. a.* 8262.—Burma,

jamaicensis, *Spreng. Syst.* i. 761.—Jamaic.

Jardinei, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 410.'— **Austral.**

***jasminiflora,* D. Dietr. Syn. PI. i. 797 — Heinsia jasminiflora.**

***jasminiflora,* Zipp. Ic. t 4; ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 315-Randia maculaU.**

jasminoides, *Ellis, in Phil. Trans.* Ii. II. (1761) 935.— China.

***jasminoides,* Retz. Obi. ii. 13-scandens.**

Jovis-tonantis, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. **101.—Afr. trop.**

Kalbreyeri, *Hiern, in Journ. Bot.* xii. (1878) 97.— Afr. trop.

konguensis, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 104.— **Afr. trop.**

***latifolia,* Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit, Ind. iii. 110-Randia dumetorum.**

latifolia, *'Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 294.— **Ind. or.**

***Leschenaultii,* D, Dietr. Syn. PI. i. 797 = Plectronia Leschenaultii.**

***longiflora,* [Dryand. in] Alt. Hort. Kew. ed. II. i. 368 -Randia macrantha.**

***longiflora,* Ruiz *tc* Pav. Fl. Per. ii. 67-Randia Ruiziana.**

longifolia, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 499.—Afr. trop.

GARDENIA:—

longispina, Roxb. -Hort. Beng. 15, nomen= Randia dumetorum.
longispina, Wall. Cat. n. 8277 D-campanulata, Randia tetrasperma.
longistyla. Hook. Bot. Mag. t. 4822 = Macrosphyra longistyla.
Incens, *Punch.* to" *Sebert, Not. Bois Nouv. Caled.* 182. - N . Caled.
lucida, *Roxb. Hart. Beng.* 16; *Fl. Ind.* i. 707.—Ind. or.; Barma.
lntea, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 167.— Abyssin.
Macgillivraei, *Bentk. Fl. Austral,* iii. 409.—Austral.
macrantha, Koem. & Schult. Syst. v. 237/=Randia macrantha.
macrocarpa, Carey, ex Voigt, Hort. Snburb. Calc. 379 = G. Thnnbergia.
macroptera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 236. —Borneo.
madagascariensis, Lam. Encyc. ii. 608 = Randia madagascariensis.
mallei/era, Hook. Bot Mag. t. 4307 = Randia malleifera.
Manganjae, *Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 102.— Afr. trop.
maritima, Vahl, ex DC. Prod. iv. 388 = Randia Mussaendae.
Maruba, Siebold, in Blume, Bijdr. 1015 = jasminoides.
medicinalis, Vahl, ex Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Fl. 148 = G. Thnnbergia.
megasperma, *F. Muell. Fragm.* i. 54.—Austral.
Merianae, Poir. Encyc. Suppl. ii. 708 = Genipa Merianae.
micrantha, Thunb. Diss. Gard. 17 = Randia parriflora.
microcarpa, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 384.—Ins. Philipp.
microcarpa, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 237 •= Randia rudis.
mitis, Steud. Norn. ed. I. 856 = Randia latifolia.
montana, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 709– turgida.
multiflora, Willd. Sp. PI. i. 1231-Randia longiflora.
Mussaenda, Linn. f. Suppl. 168 = Randia Mussaenda.
mutabilis, *Reinw. ex Blume, Bijdr.* 1016.—Ins. Celebes.
Naum-papata, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 426=- Plectronia didyma.
Neuberia, *Eckl. (f Ztyh. Enum.* 360.—Afr. anstr.
nitida, *Hook. Bot. Mag.* t 4343.—Afr. trop.
nutans, Roxb. Hort. Beng. 15; Wall. Cat. n. 8290 = Randia dumetorum.
oblongifolia, Poir. Encyc. Suppl. ii. 708 = Genipa oblongifolia.
obovata, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Nachtr. iii. 441 = Randia obovata.
obovata, Spreng. Syst. i. 761 = Randia pubescens.
obscura, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 18, 119.— Ins. Philipp.
obtusifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 15,.nomen.—Burma,
ochreata, *F. Muell. Fragm.* I. 55.—Austral.
octomera, Hook. Bot. Mag. t. 5410 =• Randia octomera.
oxycarpa, R. Br. in Wall. Cat. n. 8261=sessiliflora.
paleacea, *A. Rich, in Mim. Soe. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 241.—Afr. trop.
pallida, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1952.—Am. trop.
Pandaeakai, J. F. Gmel. Syst. 434 = Kandia malabarica.
Pandaii, Vahl, ex DC. Prod. iv. 377=praec.
pannea, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1952.—Am. anstr.
parvifiora, H. B. & X. NOT. Gen. et Sp. iii. 408. t 293 = Randia tetrandia.
parvifiora, Poir. Encyc. ii. 708 = Plectronia didyma.
parvifiora, Smeathtn. ex DC. Prod. iv. 89S=Pouchetia africana.
parvifiora, *Veil. Fl. Flum.* 103; iii. t. 14.—Bras.
parvifiora, Wall. Cat. n. 8256=Randia fasciculata.
parvifolia, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 441 ^Catesbaea parvifolia.
patula, Horsf. ex Willd. in Roem. & Scbnlt. Syst. v. 244 = Randia macrantha.
Pavetta, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 401-Srylocoryne Webera.
pentagonioides, *Seem. Fl. Vit.* 122.—Ins. Fiji.
pictorum, Hasskl. in Flora, xxviii. (1845) 234 = jasminoides.
**platixylon, *Vieill. ex Panch. (f Sebert, Not. Bois Nouv. Calid.* 183.—N. Caled.
pomifera. Wall. Cat. n. 8296=Randia nliginosa.
propinqua, R. Br. in Wall. 1. c. 8260=Rindia dumetorum.

GARDENIA:—

propinqua,*Lindl. Bot. Reg.* t.975.—Ind. or.}
Psendopsidium, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 497.—Ins. Philipp.
pubescens, Roth, Nov. PI. Sp. 151 (non Gardenia).—Ind. or.
pulchella, G. Don, in Edinb. Phil. Joum. xi. (1824) 343 = Heinsia jasminiflora.
pulcherrima, Kurz, in Journ. As. Soc Beng. xii. (1872) II. 812 = Randia exaltata.
pyriformis, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 409. —Austral,
racemulosa, *Korth. in Nederl. Kruidh. Arch.* ii. II. (1851) 192.—Borneo.
radieans, Thunb. Fl. Jap. 109. t. 20 ; Diss. Gard. 12. t. 1. f. 1 = jasminoides.
Randia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 61 - Randia acnleata.
Reinwardtiana, *Blume, Bijdr.* 1913.—Malaya.
Remyi, *H. Mann, in Proc.Am. Acad.* vii. (1867) 171. —Ins. Sandvic.
resinifera, Korth. in Nederl. Kniidk. Arch. ii. II. (1851) 191-tubifera.
resinifera, Roth, Nov. PI. Sp. 150=lucida.
resiniflua, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 102.— Afr. trop.
resinosa, *F. Muell. Fragm.* i. 54.—Austral.
rigida, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 138 **(- *Menestoria rigida).*—Nepal.**
rigida, Wall. Cat. n. 8257 = Plectronia parvifolia.
rigida, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 570 = Randia fasciculata.
Rothmannia, *Linn.f. Suppl.* 165.—Afr. austr.
***rotunda,!).* Dietr. Syn. PI. i. 797 *(-Scepseothamnus rotunda).*—Bras.**
rotundifolia, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 422 = Randia rotundifolia.
Sagraeana, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 10 = Scolosanthus crucifer.
scandens, *Thunb. Diss. Gard.* 17. t 2. f. 6.—China.
Schiedeana, *Cham, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 633 (Quid?).—Mexic.
Schoemannii, *Teijsm.* b* *Binn. in Nederl. Kruidk. Arch.* iii. (1855) 403.—Java; Ins. Batam.
Sellowiana, *Cham. V Schleeht. in Linnaea, iv.* (1829) 197.—Bras,
**sessiliflora, *Wall. Cat.* n. 8291 ; *C. B. Clark*, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 161.—Burma.
sessilis, F. Muell. Fragm. vii. 47 = Randia sessilis.
sessilis, *Veil. Fl. Flum.* 102 ; iii. 111.—Bras.
Sherbourniae, Hook. Bot. Mag. t. 4044 - Sherboumia foliosa.
Sonneratii, Spreng. Syst. i. 762=Randia parvifiora.
speciosa, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 117.—Singapore.
speciosa, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 422 = Guettarda speciosa.
speciosa, Salisb. Prod. 68 = G. Thnnbergia.
spinosa, Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. HandL Stockh. 1854 (1856) 132 = Randia nitida.
spinosa, Linn. f. Suppl. 164 = Randia dumetorum.
spinosa, Thunb. Diss. Gard 16 = Randia fasciculata, dumetorum.
Stanleyana, Hook, ex Lindl. Bot. Reg. (1845) t. 47; Hook. Bot. Mag. t. 4185 = Randia maculata.
stellaris, Salisb. Prod. 64-Randia latifolia.
stipularis, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Nene Schr. iv. (1803) 182 = Randia dumetorum.
stipulosa, F. Muell. Fragm. vii 47 -Randia stipulosa.
stipulosa, *Zoll. & Mor. Syst. Vert. Zoll.* 60.—Java.
Storckii, *Oliver, in Hook.Ic. PI.* t. 1448.—Ins. Fiji,
suaveolens, *Veil. Fl. Flum.* 102; iii. t. 9.—Bras.
suavis, Wall. Cat. n. 8274 = obtusifolia.
suffraticosa, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 410.— Austral.
sulcata, *Gaertn. f. Fruct.* iii. 79. t. 194.—Hab. ?
taitensis, DC. Prod. iv. 380 = Randia tahitensis t
tentaculata, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 119.—Malacca.
ternifolia, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pi. 147 - G. Thnnbergia.
tetnuantha, Lam. Encyc. ii. 609=Randia arrnata.
tetracantha, Willd. ex Roem. & Schult Syst. v. 244 - Randia Humboldtiana.
tetrandra, Bedd Ic. PI. Ind. Or. i. 4. t 20=Byrsophyllum •tetrandrum.
tetrasperma, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 709- Randia tetrasperma.
Thunbergia, *Linn.f. Suppl.* 1(2.—Afr. austr.
Tinneae, Kotschy & Heuglin, in Bot.Zeit. xxiii. (1865) 178 = G. Thnnbergia.

GARDENIA:—

tomentosa, blume, ex DC. Prod. ir. 879 = Randia tomentosa.
triacantha, DC. 1. c 382 - G . Thunbergia.
trichoclada, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 281.—Malaya.
trintrvis, Veil. Fl. Flum. 102; iii. t. 10 = Strychnos triplinervia.
tubifera, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 562.— Malaya.
tubiftora, Andr. Bot. Rep. t. 183 = Oxyanthus tubiflorus.
turgida, *Roxb. Hort. Beng.* 15; *Fl. Ind.* i. 711.—I™i- or.; Burma.
uliginosa, Retz. Obs. ii. 14=Randia nliginosa.
urcelliformis, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* Hi. 104. —Afr. trop.
Urvillei, *Montr, in Mint. Acad. Lyon,* x. (1860) 214. - N . Caled.
verticillata, Lam. Encyc. ii. 607 = G. Thunbergia.
vinosa, D. Dietr. Syn. PI. i. 797 (=*Scepseothom**** ***rotunda).*—Bras,**
vitiensis, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 256; *• (1862) 36; *Fl.* TO.12i.-Ins. Padf.
Vogelii, *Hook.f. in Hook. Ic. PI.* t. 782-3.—Afr. trop.
volubilis, *Lour. Fl. Cochinch.* **148.—**China.
Whitfieldii, Lindl. Bot. Reg. (1845) snbt. 47= **Randia** malleifera.
umguebarica, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. I"[8]- —Afr. trop.

GARDENIOLA, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 247 = Alibertia, A. Rich. (Rubiac).
concolor, Cham. 1. c.—Bras.

GARDENIOPSIS, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd-Bat. iv. 250, 262 (1868;. *RUBIACEAE,* Benth. * Hook. f. ii. 116.
longifolia, *Miq. I. c*—Sumatra.

GARDINIA, Bert, in Merc. Chil. (1829).—Cf. Bull. Fe'russac, xx. (1830) 111; et Am. Journ. Sc. XXIII. (1883) 81=Brodiaea, Sm. (Liliac).
***purpurascens,* Bert. 11. cc. *(-Milla molacea).*—** Chili.
violacea, Bert, ex Steud. Nom.ed. IL i. 664=praec

GARDNERA, Wall, in Roxb. Fl.Ind. ed. Carey, ii- »[18] (1824)-seq.

GARDNERIA, WalL ex Roxb. Fl. Ind. ed Carey, i. 400 (1820). *LOGANIACEAE,* Benth. & Hook- •• ii. 798.
angustifolia, *Wall. 1. c.* 318; *et Cat.* n. 817.—R* Himal.; Japon.
fagraeacea, F. Muell. Fragm. vi. 180 = Fagr«» Muelleri.
glabra, Wall, ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 182 -angnstifelia.
nutans, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv- [III>] (1846) 165 = angustifolia.
ovata, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* i. 400; *Cat-* n. 816.—Ind. or. *
Wallichii, Wight, ex Wall. PI. As. Rar. iii. 49. t. 2»* =ovata.

GARDOQUIA, Ruiz & Pav. Prod. 86. t. 17 (1794). *LABI ATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1189.
DIODEILIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 82 (1836).
RAFINESQWA, Rafin. 1. c. ii. 96 (1886).
RIZOA, Cav. in Anal. Cienc Nat. iii. (1800) 1»8-
acutifolia, *Benth. in DC. Prod.* xii. 236.—?** 11030,
affinis, *Benth. in Linnaea,* xi. (1887) 342, nn. 11032.—Hab.?
argentea, *H. B. if K. Nov. Gen. et Sp.* SIB.—
betonicoides, Lindl. Bot. Reg. (1888) Misc. 86 Cedronella mexicana.
breviflora, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 401.—Peruv. Cunila
capitata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 225 » fascicnlata. Voy.
chilensis, Benth. in Hook. & Am. Bot Beech. 58 = Gilliesii. $12.—
discolor, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* N. Granat.
elegans, *H. B. tf K. 1. c.* 815.—Peruv.
elliptica, *RuiiV Pav. Syst. Veg.* 149.—Peru*-
fasciculata, *Benth. PI. Hartv.* 248.—N. **Oran«-**
foliolosa, *Benth. in DC. Prod.* xii. 238.-N anat.

OARDOQUIA :—
Gilliesii, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* **(July-Sept. 1831) 377.—Chili,**
glabrate, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 313.—Ecnador.**
grandiflora, *H. B. V K. 1. c.* **814.—Ecuador.**
Helleri, *Peyr. in Linnaea,* **xxx. (1859-60) 34.—Mexic.**
Hookeri, **Benth. Lab. Gen. et Sp. 401=Calamintha coccinea.**
ineana, **Herb. Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1887) 381=grandiflora.**
ineana, *RuiB V Pav. Syst. Veg.* **148.—Peruv.**
Jamesoni, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* **404.—Peruv.**
mexieana, *Benth. PI. Hartw.* **50.—Mexic.**
micromerioides, *Hemsl. £iol. Centr. Am. Bot.* **ii. 550.—Mexic.**
microphylla, *H. B.* **b"** *K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 811.—Ecuador.**
multiflora, *Ruit &• Pav. Syst. Veg.* **149.—Chili,**
obovata, *Ruit V Pav. I. c.* **150.—Perav.**
obovata, **Spreng. ex Benth. in DC. Prod. xu. 239 = Brunfelsia ramosissima.**
origanoides, **Reichb. ex Benth. 1. c. (Verbenacea).—Ins. Trinit.**
pilosa.X. *Gray, in Proc. Am. Acad.* **v. (1861-62) 341.—Ins. Fiji,**
pnlchella, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 315.—Ecuador.**
Witensis, **Herb. Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 832-grandiflora.**
racemosa, **Sprang, ex J. A. Schmidt, in Mart. FL Bras. viii. 170= Hedeoma multiflora.**
revoluta, *RuiB V Pav. Syst. Veg.* **149.—Pernv.**
n>ljosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* **399.—Peruv.**
wlviaefolia, *Colla, in Mem. Ace. Turin,* **xxxix. (1836) 2.t. 48.—Chili,**
•ericea, *Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* **402.—Peruv.**
«peciosa, *Regel, Cat. PI. Hort. Atsakov.* **62.—Hab.?.**
spicata, **Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 225 - Cunila spicata.**
"Matt, *RuiB V Pav. Syst. Veg.* **148.—Peruv,**
toifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 312.—N. Granat.**
wymoides, *H. B. &• K. I. e.* **314.—Ecnador.**
tomentosa, *H. B. (f K. I. c*—Ecuador.

GAREILASSA, Walp. Rep. ii. 601 (« «), sphalm.= OarcUaasa, Poepp. & Endl. (Compos.).

GARHADIOLUS, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. in. 119- t. 284,285 (1849) - Bhagadiolus, Jnss. (Compos.).
engulosus, **Jaub. & Spach, 1. c. 122 = R. ,H«£yP^n0.ls> ...**
lamosus, **Boiss.** *Sc* **Hanssk. ex Boiss. FL Orient, in.**
^ S ^ J a u b . & Spach, IUustr. iii 120 =R. Hedypiloìs,
P-Pposus, **Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. Soc Nat. Mosc. xii. (I860) 136.—Annen.; Afghan.**

GARIDÈLIA, Spreng. Anleit ii. H. 785 (1818)=seq.

GARIDELLA, Toum. ex Linn. Gen. ed. L 181 (1737) "Nlgella, Linn. (Ranunc).
'"ethifolia, **Salisb. Prod. 374=N. Nigellastrum.**
***geUaeformis,** **St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126 - seq.**
Nigellastrum, **Linn. Sp. PI. 425 - N. Nigellastrum. ...**
^Velli/ormis, **St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vui. (1881) 208-praec.**
***guicularis,Um.** **Illustr. ii. 600.[t. 379.1 2].—Syna.**

GAlUnERIA, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. B* Jr. xvii. (i871) 189, *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f- 'I 176.
•Pathulaefolia, *Brongn. V Gris, I. c—V.* **Caled.**

GARFOTIA, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 132. t. 21 (1829). *GRAM*INE** *** & Hook. f. iii. ÜÜ.
JKROHAUSIA, Endl. Gen. SuppL jii- W ($^{18}f^{8}$)'c, MI^UEUA Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xu. Suppl. i. (18 courtallen . 863.—Ind. or.
drymeU, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 238. China.
***^<ata,** **Thw. Enum. PI. Zeyl. 863.-Zeylan.**
micrantha, 7A«. /. c—Zeylan.

QABNOTIA :-
patula, *Munro, ex Benth. Fl. Hongk.* **416.—China,**
polypogonoides, *Munro, ex Oliver, in Hook. Ic. PL* **1.1481.—Ind. or.**
scoparia, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* **863__Zeylan.**
stricta, *Brongn. in Duperr. Voy. Cog. Bot.* **133. t. 21.—Jns. Hongkong.**

GAROSMUS, Mitch, in Act Phys.-Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) 211, App. tQuidi).

GABRBTIA, Welw. Apont 687 (1858). *MEUACEAE.*
anthoteca, Welw. 1. c—Air. trop.

GARRIELIA, Gandich. Bot. Voy. Bonite, t. 115 (1844-52)-Dyckia, Schult. (Bromeliac).
encholiriioides, **Gaudich. 1. c = D . altissima.**

GrAERYA, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. 1.1686 (1834). *CORNACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 951.
FADYBNIA, Endl. Gen. Suppl. ii. 80 (1842).
buxifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **vii. (1868) 349.—Calif,**
elliptic*, *Dougl. ex Lindl. Bot. Reg.* **t. 1686.—Am. bor. occ.**
Fadyena, *Hook. Ic. PI.* **t. 338.—Jamaic.**
flavescens, *S. Wats, in Am. Natural,* **vii. (1873) 301.—Am. bor. occ.**
Fremontii, *Torr. in Pad/. Rail. Rep.* **iv. 136.—Am. bor. occ.**
laurifolia, *Benth. PI. Hartw.* **14.—Mexic.**
Lindheimeri, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* **iv. 136.—Texas.**
Lindleyana, **Hartw. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. I. 487 - laurifolia.**
Lindleyana, *A. Murr. Oreg. Circ.* **1.—Am. bor. occ.**
macrophylla, *Benth. PI. Hartw.* **50.—Mexic.**
oblonga, *Benth. I. c.* **51.—Mexic.**
ovata, *Benth. I. c.* **14.—Mexic.**
Veatchil, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* **v. (1873) 40.—Calit**
Wrightii, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* **iv. 186.—Am. bor. occ.**

QABTTGtA, Roxb. Hort Beng. 88 (1814); PI. Corom. iii. 6. t. 208 (1819); Fl. Ind. ii. 400 (1832). *BURSERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 323.
KUNTHIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 80 (1818).
floribunda, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* **iii. (1884) 477.—IM. Timor.**
gigantea, **Engl. in Mart. Fl. Bras. xli. II. 288 = Thyrsodium giganteum.**
guianensis, **Engl. 1. t=Thyrsodium gnianense.**
javanica, *Blume, Bijdr.* **1165.—Java.**
Kenghar, **Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 191 <= pinnate.**
Khamar, *Buch.-Ham. 1. c.*—Ind. or.
madagascariensis, *DC Prod.* **ii. 81.—Madag.**
mollis, *Turct.* **an** *Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxi. (1858) I. 475.—Ins. Philipp.**
Pharhad, **Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 191 = pinnate,**
pinnate, *Roxb. Hort. Beng.* **33;** *PI. Corom.* **iii. 6. t 208 ;** *FL Ind.* **ii. 400.—Ind. or.; Malaya.**
Schomburgkiana, **Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 287 ••Thyrsodium Schomburgkianum.**
Spruceana, **Engl. 1. c. 286=Thyrsodium Spruceanum.**

GAKUGANDItA, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 96. *ANA CA RDIA CEAE.*
amorphoides, *Griseb. I. c*—Reg. Argent

GABUIiETTM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 172; et in Diet. Sc. Nat. xviii. 162 (1820). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 263.
album, 5. *Moore, in Journ. Bot.* **xvi. (1878) 138.—Afr. austr.**
bipinnatum, *Less. Syn. Comp.* **194.—Afr. austr.**
coeruleum, **Steud. Norn. cd. II. ii. 236, in syn.-viscosum.**
latifolium, *Horn, in Han.* **b*** *Send. Fl. Cap.* **iii. 92.—Afr. austr.**
pinnatifidum, **DC. Prod. v. 809 => viscomm.**
viscosum, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* **(1819) 172;** *et in Diet. Sc. Nat.* **xviii. 163.—Afr. austr.**

GARULIUM, Bartl. Ord. 143 (1880)=praec.

GARUMBIUM, Blume, in Flora, viii. (1825) 1. 103 err. typ. = CARUMBIUM, Reinw. - HomalanthuB, A.Juss. (Euphorb.).

GASLONDIA, VieilL in BnlL Soc. Linn. Normand. x. (1866) 96. *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 1006.
amphoricarpa, *Vieill. 1. e.* **97.—N. Caled.**

GASOUB, Adans. Fam. ii. 248 (1763) = Mesembryanthemum, Linn. (Ficoid.).

GASPARINIA, Bertol. Fl. IUl. iii. 614 (1839) = Silaua, Bernh. (Umbell.).
virescens, **Bertol. 1. c. 615 = S. carvifolins.**

GASPARINIA, Endl. Gen. 1408 (1841)=Aeginetia, Linn. (Orobanch.).
mirabilis, **Zoll.** *Sc* **Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 7 - A . Centronia.**

GASSOLOMA, D. Dietr. Syn. PI. ii. 793 (1840)= Deis-Boloma, Lindl. (Penaeac).

GASTERANTHOPSIS, Oerst in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 12» (Gesn. Centr. Am. 55. t. 10. f. 1)« Besleria, Linn. (Gesnerac).
glabra, **Oerst. 11. cc. = B. glabra.**
hirsuta, **Oerst. 11. cc. - B. hirsute.**

GASTERANTHUS, Benth. PI. Hartw. 283 (1846)-Besleria, I'lum. (Gesner.).
pendulus, **Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 216. t. 2. f. 68 = B. pendula.**
pilosus, **Benth. PI. Hartw. 233 - B . calcarata.**
quitensis, **Benth. 1. c.-B. quitensis.**

GASTEBIA, Duval, PI. Succ. Hort. Alenç. 6 (1809); Haw. Syn. PI. Succ. 85 (1812). *LIUACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f iii. 775.
adnacifolia, *Haw. Suppl. PI. Succ.* **49.—Afr. austr.**
angulata, **Duval, PI. Succ. Hort Alenc. 6; Haw. Syn. PI. Succ. 88 = disticha.**
angustifolia, **Haw. 1. c.-disticna.**
apicroides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1880) 197.—Afr. austr.**
Bayfieldii, *Baker, I. c.—Afi.* **austr.**
bicolor, *Haw. in Phil. Mag.* **(1826) 276.—Afr. austr.**
brevifolia, *Haw. Syn. PI. Succ.* **89.—Afr. austr.**
candicans, *Haw. in Phil. Mag.* **(1827) 360.—Afr. austr.**
carinate, *Duval, PI. Succ. Hort. Alenc.* **6;** *Haw. Syn. PI. Succ.* **87.—Afr. anstr.**
cheilophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1880) 189.—Afr. austr.**
colubrina, *N. E. Br. in Gard. Chron.* **(1877) II. 88.—Afr. austr.**
conspurcata, **Haw. in Phil. Mag. (1827) 352~disticha.**
crassifolia, **Haw. 1. c. 350-nigricans.**
Croucheri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1880) 196.—Afr. austr.**
decipiens, *Haw. in Phil. Mag.* **(1827) 856.—Afr. austr.**
denticulata, **Haw. Suppl. PI. Succ. 60 = disticha.**
dicta, TV. *E. Br. in Gard. Chron.* **(1876) II. 68.—Afr. austr.**
disticha, *Haw. in Phil. Mag.* **(1827) 351.—Afr. austr.**
ensifolia, **Haw. 1. c (1825) 282=acinacifolia.**
excavate, *Haw. 1. c.* **(1827) 253.—Afr. austr.**
excelsa. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1880) 195.—Afr. austr.**
fasciata, **Haw. in Phil. Mag. (1827) 349-nigricans.**
formosa, **Haw. L c^picta.**
fuscopunctete, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1880) 195.—Afr. austr.**
glabra, *Haw. Syn. PI. Succ.* **87.—Afr. austr.**
gracilis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1880) 193.—Afr. austr.**
intermedia, **Haw. Syn. PI. Succ. 89=vermcosa.**
laetepunctete, *Haw. in Phil. Mag.* **(1827) 356.—Afr. ausu.**
laevis, **Haw. I. c. 854 - Aloë laevis.**
latifolia, **Haw. Syn. PL Succ. 87 > excavate.**
latifdia, **Hort. Kew. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 186-nigricans.**
Lingua, **Link, Handb. i. 191-Aloè' Lingua,** *Willd.*
linita, **Haw. in Phil. Mag. (1827) 360-candicans.**
longifolia, **Duval, PL Succ. Hort. Alenç. 6; Haw. Syn. PL Succ. 88 = disticha.**

GASTEKIA:—
maculata, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 848.—Afr. austr.
mannorata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1860) 194.—Hab.J
marmorata, Haw. in Phil. Mag. (1827) 350 = Aloë formosa.
mollis, *Haw. Rev. PI. Succ* 46, 208—Afr. austr.
nigricans, *Duval, PI. Succ. Hart. Alenç.* 6; *Haw. Syn. PI. Succ.* 86.—Afr. austr.
nitens, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 48 = acinacifolia.
nitida, *Haw. in Phil. Mag.* (1627) 358.—Afr. anstr.
obliqua, Duval, H. Succ. Hort. Alenç. 6; Haw. Syn. PI. Succ. 85 = maculata.
obtusa, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 358.—Atr. austr.
obtusifolia, *Ham. I. c.* 350.—Afr. austr.
pallescens, *-Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) ISO.—Afr. austr.
pan/a, Haw. in Phil. Mag. (1827) 85=carinata.
parvifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 193.—Afr. austr.
Peacockii, *Baker, I. c.* 195.—Afr. austr.
pethamensis x, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 193.
picta, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 348.—Afr. austr.
planifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1830) 188.—Afr. austr.
platypkylla, Baker, 1. c. 186=nigricans.
pluripunctata, Haw. in Phil. Mag. (1827) 359 = acinacifolia.
porphyrophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 190.—Afr. austr.
pulchra, *Haw. Syn. PI. Succ.* 86.—Afr. aostr.
repcns, *Haw. Rev. PI. Succ.* 48.—Afr. austr.
ictata, *Haw. in Phil. Mag.* (1827) 350.—Afr. austr.
rttusifolla, Haw. 1. c. 351, in nota — obtusifolia.
spiralis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 189.—Afr. austr.
squarrosa, *Baker, 1. c.* 197.—Afr. austr.
strigata, Haw. in Phil. Mag. (1827) 356=carinata.
iirigosa, Hort. Peacock, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 193-subcarinata.
subcaiinata, *Hav>. Suppl. PI. Succ.* 49; *et in Phil. Mag.* (1827) 357.—Afr. anstr.
suhmgricans, Haw. in Phil. Mag. (1827) 368 = nigricans.
snbveirucosa, *Haw. I. c.* 354.—Afr. austr.
sulcita, *Haw. I. c.* 353.—Afr. austr.
trigona, *Haw. 1. c.* 358.—Afr. austr.
undata, Haw. 1. c. 357 — subcarinata.
variolosa, *Baker, in Saund. Refug. Bot.* t. 347.—Afr. austr.
venusta, Haw. in Phil. Mag. (1827) 359=acinacifolia.
verrucosa, *Duval, PI. Succ. Hort. Alenç.* 6; *Haw. Syn. PI. Succ.* 89.—Afr. austr.
Zeyheri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 190.—Afr. austr.

GASTEROLYCHNIS, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich, ii. 24 (1845)=Lychnis, Toum. (Caryophyll.).
albiflora, Rupr. 1. c. vii. 30- L. apetala ?
angustiflora, Rupr. 1. c. ii. 24.—Reg. Ural.
involucrata, Rupr. 1. c.—Reg. Ural.
macropetala, Rupr. I. c. Tii. 80 = L. apetala?
tristis, Rupr. 1. c. 81 = L. tristis.
uralensis, Rupr. 1. c. 80.—Reg. Ural.
Vahlii, Rnpr. 1. c. ii. 24 = L. affinis.

GASTERONEMA, Locld. ex Steud. Nom. ed. II. i. 665 (1840) = GASTRONEMA, Herb. - Cyrtanthua, Ait (Liliac).
pallidum, Lodd. ex Steud. 1. c. = C. pallidus.

GASTONIA, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 610 (1786); Juss. Gen. 217 (1789). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook, £ i. 941.
aculeata, Hort. ex Seem, in Journ. Bot. ii. (1864) 246 = Euphocarpus aculeatus.
Candullei, Hort. ex Seem. 1. c. - Brassaiopsis speciosa.
cutispongia, *Lam. Encyc.* ii. 610.—Ins. Maurit.
dentata, Hort. ex Seem, in Jouin. Bot. ii. (1864) 246 = Brassaiopsis speciosa.
duplicata, *Thou, ex Baill. Adansonia*, xii. (1878) 166.—Madag.
emirnensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 350.—Madag.
cnpterohoides, *Teijsm. V Sinn, in Tiidschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 416.—Malaya.

GABTONIA:—
lleptapleuium, *Baill. Adansonia*, xii. (1878) 166.—Madag.
longifolia, Hort. ex Seem, in Joum. Bot ii. (1864) 246 = Brassaiopsis speciosa.
Naluga, Lam. Encyc. ii. 611 = Leea sambucina.
Nalugu, Spreng. Syst. ii. 440=praec.
oakuensis, A. Gray, Bot. U. St. JJxpl. Exped. i. 726 = Triplasandra oahuensis.
palmata, Roxb. Hort. Beng. 33; Fl. Ind. ii. 407 => Trevesia palmata.
paniculata, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1628=Polyscias paniculata.
papuana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 5.—N. Guin.
repanda, D. Dietr. S)n. PI. ii. 1628 = Polyscias repanda.
saururoides, Roeper, in Bot. Zeit. vi. (1848) 257. t 1. -Cf. Seem. Heder. 103 (Polysriadis sp.).—Hab.t
saur'uroides, Roxb. Hort. Beng. 90; Fl. Ind. ii. 408 = Trevesia palmata.
simplicifolia, Seem, in Joum. Bot. iii. (1865) 75 = Otunoxylon amboinense.
spongiosa, Pers. Syn. ii. 23=cutispongia.
sundaica, Baill. Hist PI. vii. 161-Trevesia sundaica.

GASTRANTHTJ8, Moritz, ex Benth. *8c* Hook. f. Gen. ii. 1107 (1076). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. 1. c.
Schlechtcndahi, *Moritz, I. c; et in Hoot. 1c. PI.* 1.1210.—Venezuela.

GASTRANTHUS, F. Muell. Fragm. vi. 130 (1868) = Farsonsia, R. Br. (Apocyn.).
ventricosa, F. Muell. 1. c. = P. ventricosa.

GASTBIDITTM:, Beauv. Agrost. 21. t. 6. f. 6 (1812). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1151.
australe, *Beauv. 1. c.*—Europ.; Reg. Mediterr.
laxum, Boiss. & Reut Pugill. PI. Nov. 126 - australe.
Itndigerum, Gaud. Fl. Helv. i. 176 -= australe.
lit tor ale, Dur. ex Parl. Fl. Ilal. i. 178 = Triplachne nitens.
muticum, *Guenth. in Spreng. Nov. Prov.* 20.—Reg. Mediterr.
nitens, Coss. *8c* Dur. ex Coss. in Ann. Sc. Nat Sir. IV. i. (1854) 229=Triplachne nitens.
scabrum, Presl, Fl. Sicul. p. xliv, nomen=muticum.
siculum, Trin. Gram. Unifl. 169 = muticum.
triaristatum, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1846) 424 =Triplachne nitens.
vestitum, Spreng. Neue Entdeck. ii. 36 = australe.

GASTRIDIUM, Blume, Fl. Jav. Praef. p. vii (1828) -GRASTIDIUM, Blume = Dendrobium, Sw. (Orchid.).

GASTRILIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 105 (1836) = Thymelaea, Endl. (Thymel.).
geminata, Rafin. 1. c =T. dioica.
umbellata, Rafin. 1. c. - Daphnopsis Swartzii.

GASTROCARPHA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 231=Moscharia, Ruiz & Pav. (Compos.).
rundnata, D. Don, 1. c. 282 = M. pinnatifida.

GASTROCHILUS, D. Don, Prod. Fl. Nep. 32 (1825) = Saccolabium, Blume (Orchid.).
calceolaris, D. Don, 1. c.-S. calceolare.

OASTBOCHILT7B, Wall. PI. As. kar. i. 22. t. 24, 25 (1829). *SC1TAM1NEAE*, Benth. *8c* Hook. f. iii. 642.
affinis, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 572, nomen.—Assam.
Jenkinsii, Wall. 1. c. = longiflora.
longiflora, *Wall. PI. As. Rar.* i. 22. t. 25.—Reg. Himal.; Malaya.
parvula, *Wall. Cat.* n. 6590.—Burma,
pulcherrima, *Wall. PI. As. Rar.* i. 22. t. 24.—Burma; Penang.

OASTBOCOTYIiE.Bunge, in M&n. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1847) 405 (Rel.Lehm. 229). *BORACINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 853.
hispida, *Bunge, II. cc*—Reg. Aral.

GASTRODIA, R. Br. Prod. 330 (1810). *ORCH1-DEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 617.
EPIFHANES, Blume, Bijdr. 421. t. 4 (1825).
GAMOPLEXIS, Falc. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 293.1.13.
antennifera, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 174' Cunninghamii.
Cunninghamii, *Hook./, Fl. N. Zel.* i. 251.—N. Zel.
data, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 174.—Reg. Himal.; As. or.
gracilis, *Blume, I. c.*—Japon.
Hasseltii, *Blume, I. c.* 175.—Malaya,
javanica, *Endl. Gen.* 212.—Java.
orobanchoides, F. Muell. Phyt. New Hebr. 22 - Cunninghamii ?
pallens, F. Muell. 1. cDidymoplexis pallens.
sesamoides, *Benth. (f Hook. f. Gen.* iii. 617.—R* Himal.
sesamoides, *R. Br. Prod.* 83.—Austral,
verrucosa, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 175.—Sumatra.

GASTROGLOTTIS, Blume, Bijdr. 397 (1825) = Liparis, Rich. (Orchid.).
montana, Blume, 1. c.—Java.

GASTEOLOBIUM, R. Br. in Ait.'Hort Kew. ed. II. iii. 16 £811). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 470.
acutum, Benth. in Lindl. Swan River App. 14 » Oxylobium acutum.
axillare, Meissn. in Bot. Zeit xiii. (1855) 29=Oxylobium reticulatum.
bidens, *Meissn. I. c.*—Austral,
bilobum, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 16.—Austral.
Brownii, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 71.—Austral.
Callistachys, #<•»«». /. *c.* ii 216.—Austral,
calycinum, *Benth. in Lindl. Swan River App. 13.*—Austral.
cordatum, Benth. I. c=Oxylobium spectabile.
corymbosum, Turcz. In Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 272 = bilobum.
crassifolium, *Benth. Fl. Austral*, ii. 105.—Austral.
crenulatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat Most xxvi. (1853) I. 273-pyramidale.
cuneatum, Henfr. in Gard. Comp. i. (1852) 49 = velutinum ?
Drummondii, Meissn. In Lehm. PI. Preiss. i. 69=oxyloboides.
elachistum, *F. Muell. fragm.* ix. 67.—Austral.
emarginatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1H53) I. 273=velutinum.
epacridioides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 72—Austral.
grandiflorum, *F. Muell. Fragm.* iii. 17.—Austral,
hamulosum, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 218.-" Austral.
Henfreyi, Lem. Jard. Fleur. iii. (1853) in nota »<1 t. 324 ^ ovalifolium.
Hookeri, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 71 = Brownii.
Huegelii, Henfr. in Moore & Ayres, Gard. Mag. Bot. •• (1850) 161" Pultenaea teraata.
ilicifolium, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. W-"" Austral.
Lehmanni, *Meissn. 1. c.* 70.—Austral.
lineare, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1865) 30 = G. Call>-stachys.
microc'arpum, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 70—Austral.
obovatum, *Benth. in Lindl. Swan River App.* —Austral,
ovalifolium, *Henfr. in Gardn. Comp. i.* (1852) —Austral.
ovalifolium, Lem. Jard. Fleur. iii. (1S53) t. S2* pyramidale.
oxylobioides, *Benth. in Lindl. Swan River App.* —Austral.
parvifolium, *Benth. I. c.*—Austral.
plicatum, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) 1.274.—Austral.
polycephalum, Turcz. 1. c = pyramidale.
polystachyum, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 81/•" Austral.
Preissii, Meissn. 1. c. i. 68—spinosnm.
pulchellum, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc* (1863) i. 274.—Austral.
pycnostachyum, *Benth. Fl. Austral*, ii. 103.—Austr*'-

OASTKOLOBIUM:—
pyram, ale. T. **- Moore, in Proc. Linn. Soc. ii. (1852)** 202—Austral,
'eticulatum, *Benth. Fl. Austral*, ii. 99.—Austral.
retusum, Lindl. Bot. Reg. 1.1647 = Oxylobium retnsum.
rotundifolium, *Meissn. in Lehm. PI. Prriss.* ii. 216.— Austral.
«eorsifolium, *F. Muell. Fragm.* x. 35.—Austral.
Pathulatum, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 14. —Austral.
'pmosum, *Benth. 1. c.* 18.—Austral.
""Opnyllum, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1868) i. 275—Austral,
"tipulare, *Meissn. in Lehm. PI. Prriss.* ii. 218.— Austral.
Wcuspidatum, *Meissn. 1. c.* i. 66.—Austral,
wilobum, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 14.— Austral.
ffuncatum, *Benth. Fl. Austral*, ii. 99.—Austral.
"Utinum, *Lindl. If Paxt. Flow. Gard.* iii. (1852-58) J.6 -. f-270—Anstral.
Ver. t)nllatum, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 25 - "icifolium.
villosum, *Benth. in Lindl. Swan River App.* 13.— Austral.

GASTROLYCHNIS, Fenzl, ex Reichb. Nom. 206 (1841) =-«jychnis, Toum. (Caryophyll.).

GASTROMERIA, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. DhT:i":?ub "' n (1830) = Melasma, Berg. (Scro- ...ariu.).
physalodes,i D. Don, 1. c. = M. bispidum.

GASTRONEMA, Herb. App. 80 (1821)» Cyrtanthue, Ait. (Liliac.).
clavatum, Herb. M. Roem. 1. c. =C. uniflorus.
helictum, - Syn. Ensat. 62-C. helicms.
pallid ?*' LoAi - Bot. Cab. 1.1808 = C. pallidus.
sangu inrum Lin <U- injoura. Hort. Soc. iii. (1848) 315 - ^"gnineus.
vAra. ***!. & Zeyh. ex Kunth, Enum. PI. v. 637 = C. spirali
uni.or um, Salisb. Gen. PI. Fragm. 189=C. uniflorus.

CASTR OR^9(1>0DruM> Llnd - » Ann. Nat. Hist. Ser. L xv. 2>-07=Diothonea, Lindl. (Orchid.).
...aceu. Lindl. 1. c.-N. Granat.

GASTROSTYLUM, Sch. Bip. in Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. ii. 277, in nota (1845?)=seq.

GASTROSULUM, Sch. Bip. Tanacet 29 (1844) - Matricaria, Linn. (Compos.).
annuum, Sch. Bip. 1. c. 31.—Afr. austr.
aichotomum, Sch. Bip. 1. c. — M. dichotoma.
praecox, Sch. Bip. 1. c. 30 = M. praecox.
tenellum, Sch. Bip. 1. c = M. tenella.

GATESIA, Bertol. Misc. Bot vii. 30. t. 1 (1848) = Petalostemon,
alabamensis, Bertol. I. c. = P. corymbosns.

GATEO... A 365 *J?A- Gny.* in-Proc. Am. Acad. xiii. (1878) i *A. Gray. 1. c.*—**Am. bor.**

GATTEN:**HOFFIA**, Neck. Elem. .. 89 **(1790) = Dimorphotheca,** Moench (Compos.).

GATTENHOFIA, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat vi. Phys. (1790) 418 = Iris, Tourn.
verna, Medic. l. c. = I. verna.

GATYONA, Ca, in l 1 - Soc. Philom. C 1816) 168 ,< et in Dict. Sc. Natxviii - 18* (1820)=Crepis, Vaill. (Compos.).
Bergeri, Sch. Bip. in Flora, xxii. (1839) 24 = C. Bergesi.
Dioscoridis, Dum. Excurs. 254 = C. Dioscoridis.
globulifera, Cass. Dioscoridis. "* "* Sc. Nat. xyiil 185 „ C
leiocarpa, Sch. Bip. «ora, xxii. (1889) 21=C. leiocarpa.
Pantocsekii, Vis. M«n- 1st- Venet. Hi. (1880-82) 527.—Europ.

GAUDICHAUDIA, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. v. 156. t 445 (1821). *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 261.
TRITOMOFTERIS, JUSS. ex Steud. Nom. ed. IL i. 665 (1840), in syn.
acuminata, *A. juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 597.—Mexic.
albida, *Cham. If Schlecht. in Linnaea*, v. (1880) 217. -Mexic.
Arnottiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 594.—Mexic.
brevipes, *A. Juss. I. c.* 597.—Mexic.
congestiflora, *A. Juss. 1. c.* 590.—Mexic.
cynanchoides, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 156. t. 456.—Mexic.
discolor, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 187=Camarea discolor.
Enrico-Martinezii, *Bdrcena, Desc. Nuev. PI. Mexic.* (1878) 4.-Mexic.
filipendula, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 594.—Mexic.
guaranitiea, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 132 = Janusia guaranitiea.
humilis, Benth. Fl. Hartw. 6 - Aspicarpa Hartwegiana.
Karwinskiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 692.—Mexic.
linearifolia, St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 132 = Camarea juncea.
mollis, *Benth. PI. Hartw.* 6.—Mexic.
mucronata, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 596 -filipendula.
oxyota, *A. Juss. 1. c.*—Mexic.
pentandra, *A. Juss. I. c.* 593.—Mexic.
podocarpa, *A. Juss. 1. c.* 596.—Mexic.
Schiediana, *A. Vuss. 1. c.* 591.—Mexic.
sericea, St. Hit; in Bull. Soc. Philom. (1823) 132 = Camarea pulchella.
suffruticosa, Mohl, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 597 = Camareaxillaris.
triphylla, Mohl, ex A. Juss. 1. c. = Camarea triphylla.
Webbiana, *A. Juss. I. c.* 695.—Mexic.

GAUDINA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 172-seq.

OAUSINIA, Beau/. Agrost. 96(1812), partim. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1160.
ARTHROSTACHYA, Link, Hort. Berol. i. 151 (1827).
CYLICHNIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 68 (1867).
FALIMIRIA, Bess, ex Reichb. Consp. 54 (1828).
avenacea, Beauv. Agrost. Expl. Planches, 18 = fragilis.
Biebersteinii, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pltersb. i. (1836) 67-Ventenata macra.
fragilis, *Beauv. Agrost.* 95.—Reg. Mediterr.
fragilis, Szovits, ex Ledeb. FL Ross. iv. 416 = Ventenata macra.
geminiflora, *J. Gay, ex Kunth, Enum. PI.* i. 803, in syn.—Hab. ?
planiculmis, Beauv. Agrost. 96»Avena planiculmis.
tenuis, Trin. in Bull. Sc. Acad. Petersb. i. (1836) 67 = Ventenata avenacea.

GAUDTNIA, J. Guy, in Bull. Fernssac, xviii. (1829) 412 —Limeum, Linn. (Ficoid.).
diffusa, J. Gay, 1. c = L. Hniflorum.
Perrottetii, J. Gay, 1. c. =L. liniflorum.
viscosa, J. Gay, 1. c. = L. viscosum.

GAULTERIA, Adans. Fam. ii. 165 (1763)=seq.

OAUIiTHEKIA, Kalm, ex Linn.Diss.Chen. 20(1761); in Amoen. Acad. iii. 14 (1756). *ERICACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 582.
BROSSAEA, [Plum.J Linn. Gen. ed. I. 836 (1737).
SHALLONIUM, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266.
Acosta, *Steud. Nom.* ed. II. i. 665.—Cocbinch.
acuminata, *Cham. V Schlecht, in Linnaea*, v. (1830) 126.—Mexic.
adenothrix, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. (1873) 44.—Japon.
alpina, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 160-Pemettya myrtilloides.
anastomosans, *H. B. &* K. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 286.—Am. austr.
641-nitida.
lanceolata, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (18475 267.—Tasman.
lanigera, *Hook. 1c. PI.* t. 66—Am. austr.
lati/olia, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie, ii. (1845) 9-Diplycosia laiifolia.

OAULTHERIA:—
antarctica, Hook. f. Fl. Antarct. ii. t. 116 - microphylla.
antipoda, *Forst. f. Prod.* 84. n. 1S6.—Tasman.; N. Zel.
bandongensis, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 1055 = leucocarpa.
brachybotrys, *DC. Prod.* vii. 595.—Peruv.
bracteata, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 840.—Ecuador,
buxifolia, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 422.—Venezuela,
caespitosa, *Poepp. (f End!. Nov. Gen. et Sp.* i. 25. t. 87. —Chili.
Candida, *DC. Prod.* vii. 697.—Bras.
ciliata, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (18301 128-Pemettya ciliaris.
coccinea, *H. B. &" K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 281.—Venezuela.
Colensoi, Hook. Fl. N. Zcl. i. 162-nrpestris.
conferta, *Benth. PI. Hartw.* 219.—N. Granat.
cordata, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iv. (1848) 312-Macleania cordata.
cordata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Unix. ix. (1812) 540**hiitiflora.
cordifolia, *H. B. &" K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 285. t. 261.—N. Granat.
cordifolia, Raeusch. Nom. ed- III. 124 — Epigaea cordifolia.
crenulata, *Kurt, in Journ. Bot.* xi. (1873) 195.—Ind. or.
Cumingiana, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 184.— Ins. 1'hilipp.
depressa, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot vi. (1847) 267-anlipoda.
discolor, Nutt. ex Hook. Bot. Mag. t. 5034 = Diplycosia discolor,
elliptica, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea*, viii. (1833) 602.—Bras,
cpigeoides, *Domb. ex Wedd. Chlor. And.* ii. 173.— Ecuador.
ereeta, Banks *Sc* Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. 161 = antipoda.
crecta, *Vent. Hort. Cels*, t. 5.—Perav.
eriophylla, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 151= ferruginea.
fagifolia, *Hook./. Fl. N. Zel.* i. 162 —N. Zel.
ferruginea, *Cham. If Schlecht. in linnaea*, i. (1826) 624.—Bras.
fluTiiatilis, A. Cunn. ex DC. Prod. vii. 591 - antipoda.
ibliolosa, *Benth. PL Hartw.* 148.—Peruv.
ibrmosa, *Remy, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. viii. (1847) 231.—Chili.
fragrans, D. Don, Prod. Fl. Nep. 151 - fragrantinima.
fragrantissima, *Wall, in As. Res.* xiii. (1820) 897.—Ind. or.; Malaya.
furiens. Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot. i. (1884) 281 = Arbutus furiens.
glabra, *DC. Prod.* vii. 596.—Peruv.
glaucifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 281.— Mexic.
Griffithiana, *Wight, in. Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 176.—Reg. Himal.
heterophylla, Zoll. *Sc* Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie, ii. (1846) 9 - Diplycosia heterophylla.
hirsuta, Gardn. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 468 = fragrantissima.
hirsuta, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Belg. ix. (1842) 640 = Perneltya pilosa.
hirtiflora, *Benth. PI. Hartw.* 66.—Mexic.
hispida, *R. Br. Prod.* 558.—Austral.; N. Zcl.
hispida, Spreng. Syst. ii. 288 - Gaylussacia Pseodo-Gaultheria.
hispidula, Muhl. Cat. 44-Chiogenes serpyllifolia.
Hookeri, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 458.—Reg. Himal.
humilis, Salisb. Prod. 289 - procumbens.
ignescens, Lem. Jard. Fleur. iii. (1852-63) t. 265-ferruginea.
insipida, *Benth. PI. Hartw.* 225.—Mexic.
Itatiaiae, Wawra, in Oestr. Bot. Zcitschr. xxxi. (1881) 280-Agarista Itatiaiae.
laevigata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brnx. ix. (1842)

GAXTLTHERIA:—
Leschenaultii, DC. Prod. vii. 593 = fragrantissima.
leucocarpa, *Blume, Bijdr.* 866.—Java.
leucocarpa, Kunze, ex DC. Prod. vii. 597 =Pernettya leucocarpa.
Lindeniana, *Planch, in Fl. des Serves, Sir.* I. v. (1849) 501 d.—Venezuela.
lineari/olia, DC. Prod. vii. 597 - Gaylnssacia pinifolia.
longiflora, *Morr. in Ann. Sac. Hart. Gand*, i. (1845) t. 43.—Mexic?
Lowii, *Revel, Ind. Sent. Hart. Petrop.* (1856) 80.—Hab.?
loxensis, *Benth. PI. Hartv.* 143.—Peruv.
luzonica, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 824.—Ins. Philipp.
microphylla, *Hook. f. Fl. Antarct.* ii. 327 (t. 116 *antarctica)*.—Keg. Magellan.
mucronata, Hook. & Am. in Hook. Jonrn. Bot. i. (1834) 281«Pemettyarigida.
mucronata, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-56) 12.—Chili,
mucronata, *Remy, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. viii. (1847) 232.—Bolivia.
Myrsinites, *Hook. Ft. Bor. Am.* ii. 35.—Am. bor. occ.
myrsinoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 288 = Pernettya myrsinoides.
myrtilloides, *Hook*, b* *Arn. in Hook. Journ. Bot.* i. (1884) 281.—Chili.
myrtilloides, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 25. t. 41 = Poeppigii.
myrtilloides, Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 523 = Pernettya myrtilloides.
nitida, Benth. ex Seem. Bot. Voy. Herald, 816« glancifolia.
nitida, *Benth. PL Hartv.* 45.—Mexic.
Nummulariae, DC. Prod. vii. 592-nummularioides.
nammularioides, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 150.—Keg. Himal.; Java,
odorata, *Witld. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 425.—Am. trap,
oppositifolia, *Hoot. f. Fl. N. Zel.* i. 162. t. 43,—N. Zel.
organensis, *Afeissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 153.—Bras.
ovali/olia, Wall. Cat. n. 1523 - fragrantissima.
ovata, *DC. Prod.* vii. 526.—Mexic.
ovatifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 85.—Am. bor. occ.
petraea, *Wedd. Chlor. And.* ii. 174.—N. Granat.
pichinchensis, *Benth. PI. Hartv.* 225.—Ecuador.
pilosa, Zoll. & Mor. in Nat! en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 9 = Diplycosia pilosa.
Poeppigii, *DC. Prod.* vii. 698.—Chili,
procnmbens, *Linn. Sp. PI.* 895.—Am. bor.
punctata, Blume, Bijdr. 856 = fragrantissima.
punctata. Hook. *Sc* Am. in Hook. Journ. Bot. i. (1884) 281 -vemalis.
purpurascens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 282.—N. Granat.
pyrolaefolia, *Hook. f. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 457.—Keg. Himal.
pyroloides, Hook. f. *Sc* Thorn, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat i. 30=praec.
ramosissima, *Benth. PI. Hartv.* 220.—N. Granat.
Kengifoana, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1854) reimp. 6.—Chili.
repens, Blume, Bijdr. 857 = nummalarioides.
repens, Rafin. Med. Fl. i. 202 •= procumbens.
reticulata. *H. B. V X. Nov. Gen. et Sp.* iii. 284.—Ecuador.
rigida, *H. B.* b* *K. I. c.* 286.—Venezuela.
Koraimae, *Klottsch, ex Afeissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 153.—Guian.
rufescens, *DC. Prod.* viL 595.—Perav.
rupestris, *R. Br. Prod.* 559.—N. Zel.
saxicola, *Wedd. Chlor. And.* ii. 174.—Bolivia.
scabra, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 424=odorata.
secunda, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Se>. III. viii. (1847) 281.—N. Granat
serpyllifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 288 = Chiogenes serpyllifolia.
Shallon, *Pursh, I. c.* 283. 1.12.—Am. bor. occ.
sphagnicola, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i (1792) 109-Epigaeacordifolia.
Sprengelii, G. Don, Gen. Syst. iii. 840-Gaylussacia Pseudo-Gaultheria.
strigosa, *Benth. PI. Hartv.* 221.—N. Granat.

GAUI.THERIA:—
tolimensis, *Wedd. Chlor. And.* ii. 173.—N. Granat
tomentosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 287.—Ecuador.
trichocalycina, *DC. Prod.* vii. 595.—Mexic.
trichophylla, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 260. t. 63. f. 8.—Reg. Himal.
triquetra, *Sieb. if Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. III. (1846) 129.—Japon.
vaccinoides, *Griseb. ex Wedd. Chlor. And.* ii. 176.—Peruv.
venusta, *DC. Prod.* vii. 597.—Bras,
vemalis, *Kunse, ex DC. I. c.* 594.—Chili,
vestita, *Benth. PI. Hartv.* 224.—N. Granat.

GAULTHIERA, Reichb. Handb. 206 (1887)=praec.

GAULTHIERIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 17 = praec.

GAURA, Lam. Illustr. t. 281. f. 3 (1793?)= Leches, Kalm (Cistin.).
racemulcsa, Lam. Tabl. ii. 423 = L. racemulosa.

GATJRA, Linn. Diss. Chen. 47 (1751); Amoen. Acad. iii. 26 (1756). *ONAGRARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 792.
GAURIOIUM, Spach, Hist. Veg. Phan. iv. 379 (1835).
SCHIZOCARYA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 170, 283.
STENOSIPHON, Spach, 1. c 170 (1835).
angustifolia, Herb. Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 666=coccinea.
angustifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 226.—Am. bor.
australis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 180.—Reg. Argent.
biennis, *Linn. Sp. PI.* 347.—Am. bor.
biennis, Walt. Fl. Carol. 128=angustifolia.
bracteata, *Ser. in DC. Prod.* iii. 45.—Mexic.
canescens, Hort. ex Ser. 1. c.=mutabilis!
chinensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 225.—China.
coccinea, Bertol. Misc. Bot. ii. 17=filipes.
coccinea, *Nutt. in Fraser, Cat.* (1813) ; *et Gen. Am.* i. 249.—Am. bor.
crispa, *D. Dietr. Syn. PI.* i. 1298.—Mexic.
decorticans, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 343 = Oenothera gauraeflora.
Drummondii, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* i. 519.—Am. bor.
epilobia, *\Moç. V Sesse,] ex Ser. in DC. Prod.* iii. 45.—Mexic.
epilobioides, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 93 = coccinea.
exaltata, Engelm. *Sc* Gray, in Bost. Joum. Nat. Hût. v. (1845) 44-longiflora.
filipes, *Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par.* iv. (1886) 379.—Am. bor.
fruticosa, Jacq. Coll. i. 142=angustifolia.
fruticulosa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 15.—Calif.
glabra, Lehm. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 209 = coccinea.
heterandra, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 87- Heterogaura californica.
hexandra, Orteg. Hort. Matr. Dec. 14 = tripetala.
hirsuta, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 580 = Lindheimeri J
hispida, *Benth. PI. Hartv.* 288.—Mexic.
humilis, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1297 = Gayophytum hnmile.
laxa, Loefl. It. Hispan. 248 = Combretum Loeflingii.
leucocarpa, *Comien, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 666.—Texas.
Lindheimerl, *Engelm. b" Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 217.—Texas.
linifolia, Nutt. in James, Exped. Rock. Mount, ii. 355 = Stenosiphon virgatus.
longiflora, *Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par.* iv. (1835) 380.—Am. bor.
macrocarpa, *Rothrock, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 353.—Am. bor.
marginata, Lehm. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 208 = coccinea.
Michauxii, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 379=filipes.
micrantha, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1297 = parviflora.
mollis, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 93. t. 529.—Mexic.
mollis, Nutt. ex Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 200 -• parviflora.

GAT7BA :—
multicaulis, *Rafin. Atl. Journ.* 146.—Am. bor.
mutabilis, *Cav. Ic.* iii. 30. t. 285.—Mexic.
odorata, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 14.—Mexic.
oenotheriflora, Zuccagni, in Roem. Collect. 140= mutabilis 1
parviflora, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 208.—Am. bor. occ.
panifolia, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1823) 201 = coccinea.
Pitcheri, Picker, ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 517- biennis.
primiveris, *A. Gray, PI. Wright*, ii. 58.—Mexic.
Roemeriana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 579- Drummondii.
sinuata, [Moç. *Sc* Sesse] ex Ser. in DC. Prod. iii. 45 = bracteata.
sinuata, *Nutt. ex Ser. I. c.* 44.—Am. bor. occ.
spicata, [Moç. & Sesse] 1. c.=bracteata.
suffrutescens, [Moc. *Sc* Sesse] 1. c=coccinea.
suffulta, *Engelm. in A. Gray, in Bost. Joum. Nat-Hist.* vi. (1850) 190.—Am. bor. occ.
triangulata, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1882) 454=tripetala.
tripetala, *Cav. Ic.* iv. 66. t. 396.—Mexic.
tripetala, Herb. Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 66* = coccinea.
undulata, Desf. Tabl. ed. II. 196 = angustifolia.
villosa, *Torr. in Ann. Lye. N. York*, ii. (1828) 200.—Am. bor. occ.

GAUREA, Reichb. Gen. 193 (1778) = Guarea, Allen- (Meliac).

GAURIDIUM, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 879 (1835)* Gaura, Linn. (.Onagrar.).
Kunthii, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1839; 375 = Gaura mollis.
nolle, Spach, Hist. Ve'g. Phan. iv. 380 - Gaura mc-H'-
mutabile, Spach, in Nonv. Ann. Mns. Par. iv. (1885) 874 = Gaura mutabilis.

GATJROPSIS, Presl, Epim. Bot 219 (1849). *ONAGRARIEAE.*
lancifolia, *Presl, I. c*—Mexic.

GATTBSIA, H. Wendl. in Goett. Nachr. (1865) 327- *PALMAE*, Benth. *St.* Hook. f. iii. 912.
Ghiesbreghti, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 245.—Ind. occ.
portoricensis, *H. Wendl. I. c.* 245, nomen.—Ind. occ
Princeps, *H. Wendl. in Goett. Nachr.* (1865) 328.—Cuba.
vinifera, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 245.—Bo- occ.

GAUTIERA, Rafin. Med. Fl. i. 202 (1828) = Gaultheria, Kalm (Ericac).

OAVABBETIA, Bull. Adansonia, i. 185. t. 7 (1861). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. 316.
terminalis, *Baill. I. c.* 186.—Bras.

GAVESIA, Walp. Ann. ii. 960 (1852) = GATESlA' Bertol. - Petalostemon, Michx. (Legumin.).

GAVILLEA, Poepp. & Endl. ex Steud. Nom. ed. « 666 (1840) = Chloraea, Lindl. (Orchid.).

GAVNIA, Scop. Introd. 76 (1777) spha1m.=Oahni» Forst. (Cyperac.).

GAYA, Gaud. Fl. Helv. ii. 389 (1828)=LIfcT« Linn. (Umbellif.).
multicaulis, Schur, Enum. PI. Trans. 259 -«L. simplex.
pyrenaica, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 250, partim = Seseli granatense.
Pyrenaica, Gaud. Fl. Helv. ii. 390, in obs.= Seseli nanum.
simplex, Gand. 1. c. 389 =L. simplex.

GAYA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 266. t. 475. (1821). *MALVACEAE*, Benth. & Hook. f. »
affinis, *A. Rich. Sss. Fl. Cub.* 157.—Cuba,
aurea, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 193.—Bras-
canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 269 Cflndicftns*

OAYA:-
disticha, *Pnsl, Rel. Haenk.* i. 466.—Mexie.
J»audichaudiana, *St. Hil. Fl.Bras. Mer.* i. 192.—Bras,
nermannioides, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* v. 268, t 475.—Mexic.
**utans*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 64; Tnrcz. in Bull, Soc. Nat Mosc. xxxi. (1858) I. 201-Sida nutans.
occidentalis. Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 79=affinis.
occidentalU, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 64= subtriloba.
subtnloba, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* v. 270. t. 476. —Mexic.

GA.YA, Sprang. Syst i. 6S5 (1825) = 8eringia, J. Gay (Stercul.).
Parviflora, Sprang, ex DC. Prod. ix. 15 - Strycbnos . brasiliensis.
Piatyphylla, Spreng. Syit i. 971-Ser. platyphylla.

GA.TLtTSSACIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. "> 275. t. 257 (1818). *VACCINIACEAE*, Benih. & Hook. f. ii. 572.
DECACHAENA, Ton. & Gray, ex Lindl. Veg. Kingd. 768 (1847).
DKCAMERHJM, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. »iii. (1843) 259.
LUSSACiA, Spreng. Syst. ii. 294 (1825).
*aciculari*s, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 147 . =pmifolia.
Menochaeta, *DC. Prod.* vii. 559.—Bras.
"finis, Mart, ex Meissn. in Mart. FL Bras. vii. 147 = pallida.
*an*noena, *Cham, in Linnaea,* vlii. (1833) 501.—Bras.
">*Kna*, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras, vii 184-G. Vitis-Idaea.
angulat g a , *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) Ml.—Bras.
•ngistifolia, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 499.—Was.
angustifolia, Donal, ex Meissn. in Mart Fl. Bras. vii. - U4»thymelaeoides.
faccota, C. Koch, Dendrol. ii. I. 98=resinosa.
*ora*chycera, *Torr.* Cf *Gray, ex A. Gray, Chlor. Bor.* 4w. 54.—Am. bor.
w»cteata, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 130.—Bras.
br«iliensis, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 129.- Bras.
*tu**ifolia, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 528 f"aecipens.
*b*ttUbia, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 276. t. 257. ~N. Granat.
canescens, Meissn. in Mart. Ft. Bras. vii. 148.—Bras, racasap *DC. Prod.* vii. 559.— Veneznela.
*car*ainalis, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 136 .-sPiifo.lU.
^amissonis, *Meissn. 1. c.* 146.—Bras.
« j »n. *in Mart. Fl. Bras.* vii. 146.—Bras.
cZir"' Hemsl_Bio l- Centr. Am. Bot. ii. 174=seq.
cre»«laia, Mart ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 133 TPulchra.
decipiens, Cham, in Linnaea, viii. (1838) 500.-Bras.
*densa, Cham_L c_* *»»•—Bras.
dense, G_Do"< *Gen. Syst.* iii. 859—Peruv.
dumo S 657 Bra 657—Bras.
ellipti?.« Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. NeSrl. Indii, <1845) 9*Vaccinium ellipticnm.
*fascicula*ta (184«) I31.-Bras.
ferrug»nensis.
foliosa, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. X63 = Gaul.
*gaultheri*oides, *Torr.* b- *Gray, ex Torr. Ft. N. York,* i. 449.
Gardneri, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 137.—Bras.
hispida, Gray, ex Torr. Fl. N. York, i. 448. 559.- Bras.
imbricata, Pohl, PI. Bras. Ic. ii. 40. t. 126=brasiliensis.

OAYLUSSACIA:-
incana, Cham, in Linnaea, i. (1826) 536 - thyme-Ueoides.
incurvata, Griff. Notul. iv. 300; Ic PI. As. t. 606 = Pentapterygium rugosum.
lanceolata, Blume, Bijdr. 861—Vaccininm acuminatissimum.
ledifolia, *Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 145.—Bras.
leptobotrys, *Dunal, in DC. Prod.* vii. 660.—Bras.
tnacradenia, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 142=reticulata.
Martii, *Meissn. 1. c.* 138.—Bras,
microphylla, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 869.—Peruv.
montana, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 145 -hispida.
myrti/olia, Cham, in Linnaea, viii. (1838) 494-brasiliensis.
myrtifolia, Mart, ex Meissn. in Mart Fl. Bras. vii. 133 = pulchra.
myrtilloides, Cham, in Linnaea, viii. (1833) 498 = hispida.
nitida, *Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 134.—Bras.
obscura, DC. Prod. vii. 669-pallida.
octosperma, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 180.—Bras.
oleaefolia, *Dunal, in DC. Prod.* vii. 559.—Bras,
pallida, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 499.—Bras.
pallida, Dunal, ex DC. Prod. vii. 668-virgata.
parvifolia, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 130.—Bras,
pinifolia, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 586. —Bras.
Pseudo-Gaultheria, *Cham.* to" *Schlecht. 1. c.* 636.—Bras.
Pseudo-Vaccinium, *Cham, (f Schlecht• 1. c.* 620.—Bras.
Pseudo-Vaccinium, Dunal, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 136=salicifolia.
Pseudo-Vaccinium, Dunal, in DC. Prod. vii. 657 ~ Vauthieri.
pulchra, Miq. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 160 - Leucothoë revolata.
pulchra, *Pohl, PI. Bras. Ic.* ii. 41. t. 127.—Bras,
resinosa, *Torr. tf Gray, ex A. Gray, Chlor. Bor. Am.* 160.—Am. bor.
reticulata, *Mart, ex Meissn. m Mart. Fl. Bras.* vii. 142.—Bras.
retusa, *Mart, ex Meissn. 1. c.* 132.—Bras.
rhodendra, St. Lag. in Ann. Sc. Nat. Lyon, vii. (1880) 126-seq.
Rhododendron, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 538.—Bras,
Riedelii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 139.—Bras,
rigida, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Decad.* iv. 40.—Bras,
rugosa, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 634. —Bras.
salicifolia, *Cham. V Schlecht. 1. c.* 532.-Bras.
Sellowiana, Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 131 = brasiliensis.
serrata, Griff. Itin. Not. 37; Notul. iv. 300 = Pentapterygium rugosum.
serrata, Lindl. in Koyle, Illustr. Bot. Himal. 257. t. 79 => Vaccininm serratum.
subcordata, *Dunal, in DC. Prod.* vii. 627.—Peruv.
thymelaeoides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 144.—Bras,
ursina, *Torr. tf Gray, in A. Gray, Chlor. Bor. Am.* 49. t. 10.—Am. bor.
Vaccinium, Steud. Nom. ed. II. i. 666=G. Pseudo-Vaccinium.
Vautbieri, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 138.—Bras.
venusta, Mart, ex Meissn. L c. 131-- brasiliensis.
villosa, *Gardn. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) ISO.—Bras,
virgata, *Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 141. —Bras.
Vitis-Idaea, *Mart, ex Meissn. 1. c.* 134.—Bras.

(JAYOPHYTTTM, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. xxv. (1832) 18. t. 4. *ONACRARIEAE*, Benth. *Sc* Hook, f. i. 789.
caesium, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 514-racemosum.
diffusum, *Torr. tf Gray, 1. c.* 513.—Am. bor. occ.
humile, *Juss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* I. xxv. (1882) 18. —Chili.
micranthum, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1883) 311 = humile.

GAYOPHYTUM:—
minutum, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 687.—Chili.
Nuttallii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 614 = racemosum.
pumilum, S. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 193.—Am. bor. occ.
racemosum, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 614.—Am, bor. occ.
ramosissimum, *Torr. V Gray, I. c.* 613.—Am. bor. occ.
strictum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 340 = Oenothera Torreyi.

GAYTANIA, Muent. in Bot. Zeit. i. (1843) 730-Fimpinella, Riv. (Umbellif.).
Chesneyana, Muent. 1. c =P . eriocarpos.
daucoides, Boiss. Fl. Orient, ii. 867, in syn. = P. eriocarpos.

OAZANIA, Gaertn. Fruct. ii. 451. t. 173 (1791). *COMPOS1TAE*, Benth. & Hook. f. ii. 469.
MELANCHRYSUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 12.
MERIDIANA, Hill, Veg. Syst. ii. 121** (1761).
MOEHNIA, Neck. Elem. i. 9 (1790).
MussiNlA, Willd. Sp. PI. iii. 2263 (1803).
araneosa, DC. Prod. vi. 612 - Lichtensteinii.
orctotoides. *Less. Syn. Camp.* 48.—Afr. austr.
arminioides, *DC. Prod.* 511.—Afr. austr.
Burchellii, *DC. 1. c.* vi. 614.—Afr. austr.
caespitosa, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 398.—Afr. austr.
canescens, *Harv. in Ham.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 478.—Afr. austr.
ciliaris, DC. Prod. vi. 513-pinnata.
coronopifolia, *DC. 1. c.* 611.—Afr. austr.
diffusa, Spreng. Syst. iii. 606 •= Gorteria diffnsa.
Forbesiana, DC. Prod. vi. 608 = Cryptostemma, Forbcsianum.
grandis, DC. 1. c. 609=pinnata,
heterochaeta, *DC. I. c.* 511.—Air. austr.
heterophylla, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 667 (Quid?).—Afr. austr.
hirtella, DC. Prod. vi. 611 - G . Pavonia.
humilis, E. Mey. ex DC. 1. c. 613-various.
integrifolia, Spreng. Syst iii. 606 — Hirpicium integrifolium.
intrusa, £. Mey. ex DC. Prod. vi. 511 = othonnites.
jurineaefolia, *DC. 1. c.* 611.—Afr. austr.
Kraussii, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 777.—Afr. austr.
Krebsiana, *Less. Syn. Comp.* 44.—Afr. austr.
leptophylla, *DC. Prod.* vi. 612.—Afr. austr.
leucolaena, DC. 1. c. 609>=uniflora.
Lichtensteinii, *Less. Syn. Comp.* 60.—Afr. austr.
linearilobа, *DC. Prod.* vi. 612.—Afr. austr.
longifolia, *Less. Syn. Comp.* 48.—Afr. austr.
longiscapa, *DC. Prod.* vi. 613.—Afr. austr.
mucronata, *DC. I. c*—Afr. austr.
multijuga, *DC. 1. c.* 609.—Afr. austr.
nivea. *Less. Syn. Comp.* 49.—Afr. austr.
othonnites, *Less. 1. c.* 45.—Afr. austr.
othonnitis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126»praec.
oxyloba, *DC. Prod.* vi. 613.—Afr. austr.
l'avonia, *[R. Br. in] Ait. Hort. Km.* ed. II. v. 140.—Afr. austr.
pectinata, Spreng. Syst. iii. 607=pinnata.
pinnata, DC. Prod. vi. 509-G. Pavonia.
pinnata, *Less. Syn. Comp.* 43.—Afr. austr.
pygmaea, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1860) 69.—Air. austr.
rigens, *Moench, Meth. Suppl.* 209.—Afr. austr.
scabra, DC. Prod. vi. 609 = pinnata.
serrata, DC. 1. c. 510-pinnata.
serrulate, *DC. 1. c.* 512.—Afr. austr.
spedosa, Less. Syn. Comp. 4 -I—pinnata.
splendens x, Hort. Angl. ex Illustr. Bouu. ii. t. 29 : - Lem. Illustr. Hortic. vii. (I860) t. 235.
stenophylla, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1883) II. 77-longi»capa.
subbipinnata, *DC. Prod.* vi. 608.—Afr. austr.
subulata, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kn>.* ed. II. v. 140.—Afr. austr.
subulata, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 777 - Kraussii, longiscnpa.
tenuifolia, *Less. Syn. Comp.* 60 —Afr. austr.
uniflora, *Sims, Bot. Mag.* t. 2270 Afr. austr.
varians, *DC. Prod.* vi. 613.—Afr. austr.

GEANTHIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 350^-WeldeniaJSchult. f. (Commelinac).
colchicoides, Rafin. 1. c. = W. Candida ?

GEANTHU8, Phil. Desc. Fl. Nuev. ChiL (1884) reimpr. 7. *LIU ACEAE.*
humilis, *Phil. 1. c.* 8.—Chili.

GEANTHUS, Reinw. in Blume, Cat. Gew. Buitenz. 29 (1823); et in Syll. Ratisb. ii. (1828) 5=Amomiun, Linn. (Scitamin.).
roccineus, Reinw. in Blnme, 1. c. = A. coccinea.
minor, Reinw. 1. c. (=*Donacodes minor).*—Java.
Piningi, Reinw. 1. c. = Alpinia Pininga.
speciosus, Reinw. L cElettaria speciosa.

GEABUM, N. E. Br. in Journ. Bot. xx. (1882) 196. t. 231. f. 1. *AROWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 987.
brasiliense, *N. E. Br. I. c*—Bras.

GEBLERA, Andrz. ex Bess, in Flora, xvii. (1834) I. Beibl. 18 = Crepis, Vaill. (Compos.).
prenanthoid.es, Andrz. 1. c.=C. baicalensis.

GEBLERA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. (1885) 28 = Securinega, Juss. (Euphoibiac).
suffruticosa, Fisch. & Mey. 1. c.-S. ramiflora.
iungariensis, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pe'tersb. xv. (1867) 357.—As. centr.

GEBOSCON, Rafin. Cat. 14 (1824)=AUium, Tonm. (Liliac.).
obiiquum, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 19 = A. obliqnum.
striatum, Rafin. Cat. 14=Nothoscordum striatum.

GEERIA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 13 (1823); et Bijdr. 124 (1825)=Eurya, Thunb. (Ternstroem.).
angustifolia, Blume, Bijdr. 125=E. angustifolia.
glabra, Blume, I. c. »E. japonica.
obovata, Blume, 1. c.=E. obovata.
serrata, Blnme, Cat. Gew. Buitenz. Ill; et Bijdr. 124 • E. acnminata.

GEERIA, Neck. Elem. ii. 241 (1790) = PauHinia, Linn. (Sapindac).

GEIGERA, Less. Syn. Comp. 199 (1832) = Geigeria, Griessel. (Compos.).

GEIGERA, Lindl. Veg. Kingd. 471 (1847) - Getfera, Schott (Rutac.).

GEIGERIA, Griessel. in Linnaea, v. (1830) 411. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 837.
ARASCHCOOLIA, Sen. Bip. ex Flora, xxiv. (1841) Intell. 144.
DIPLOSTEMMA, Steud. & Hochst. in DC. Prod. vii. 75 (1888).
DIZONIUM, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 411, in nota.
GEIGERA, Less. Syn. Comp. 199 (1882).
ZEYHERIA, Spreng. f. Tent. Suppl. 26 (1828).
acaulis, *Benth. (f Hook. f. ex Vatke, in Oestr. Bot. Zritschr.* xxv. (1875) 327.—Afr. trop.
africana, *Griessel, in Linnaea,* v. (1830) 411.—Afr. austr.
alata, *Benth. tf Hook. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 368.—Afr. trop.
aspera, *Hare, in Ham. V Sond. Fl. Cap.* iii. 126.—Afr. austr.
hrevifolia, *Hart. 1. c.*—Afr. anstr.
Burkei, *Ham. I.* c—Afr. austr.
passerinoides, *Ham. I. c.* 125.—Afr. austr.
pectidea, *Ham. I. c.* 127.—Afr. austr.
protensa, *Ham. 1. c.* 125.—Afr. austr.
Zeyheri, *Ham. 1. c.* 126.—Afr. austr.

GEUERA, Schott, Rutac. 7. t. 4 (1884). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 298.
COATESIA, F. Muell. Fragm. iii. 26 (1862).
cauliflora, *Baill. Adansonia,* x. (1871-72) 321.—N. Caled.
latifolia, Lindl. in Mitch. Journ. Trap. Austral. 286 = salicifolia.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* i. 364.—Austral,
parviflora, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 102.—Austral.
pendula, Lindl. 1. c. 251-- parviflora.
aahcifolia, *Schott, Rutac.* 7. t. 4.—Austral.

GEISARINA, Rafin. Alsog. Am. 6 (1838) = Myrica? Linn.
verrucosa, Rafin. 1. c—Am. bor.

GEISELERIA, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 254 = Croton, Linn. (Euphorbia^).
chamaedryfolia, Klotzsch, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 47=C. chamaedryfolius.
corckorifolia, Klotzsch, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 418=C. glandulosus.
glandulosa, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 254 = C. glandulosus.

GEISELERIA, Kunth, in Abh. Berl. Akad. (1842) 3 = ANTICLEA, Kunth •= Zygadenus, Michx. (Liliac.).

GEISENIA, Endl. Gen. 848, in syn. (18?9)-GAISSENIA, Rafin.-Trolliua, Linn. (Ranunc).

GEISOLOMA, Lindl. Veg. Kingd. 578 (1847) = Oeissoloma, Lindl. (Penaeac.).

GEISORRHIZA, Reichb. Norn. 44 (1841) -= Geissofhiza, Ker-Gawl. (Irid.).

GEISSANTHU8, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 642 (1876). *MYRSINEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.

GEISSAPSIS, Baker, in Hook. f. Fl. Brit Ind. ii. 141 (1876), sphalm.=seq.

GEISSASFIS, Wight & Am. Prod. 217 (1834). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 516.
cristata, *Wight V Am. 1. c.* 218.—Ind. or.
lupulina, *Planch, ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 155.—Afr. trop.
tenella, *Benth. in Flora,* xxxii. (1849) 559.—Ind. or.

GEIS8OIS, Labill. Sert. Austro-Caled. 50. t. 60 (1825). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 650.
Benthami, *F. Muell. Fragm.* v. 180.—Austral.
Biagiana, F. Muell. 1. c. 16 »= Weinmannia Biagiana.
Denhami, *Seem. Fl. Vit.* 109.—N. Hebrides,
hirsuta, *Brongn. (f Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 71.—N. Caled.
montana, *Vieill. ex Brongn. V Gris, I. c.* 71.—N. Caled.
pnrinosa, *Brongn. b" Gris, 1. c.* 70.—N. Caled.
racemosa, *Labill. Sert. Austro-Caled.* 50. t. 50.—N. Caled.
ruin'folia, F. Muell. Fragm. ii. 82=Weinmannia rubifolia.
terriata, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* L 679. t. 86.—Ins. Fiji.

GEISSOLOMA, Lindl. ex Kunth, in Linnaea, v. (1830) 678. *PENAEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 203.
lateriflorum, Kunth, 1. c.; Drège, ex A. DC. in Prod. xiv. 491, 492 = Endonerna Thunbergii.
marginatum, *Kunth, I. c*—Afr. austr.
tomentosum, *Kunth, I.* c—Afr. anstr.

GEISSOMEKIA, Lindl. Bot. Reg. t. 1045 (1827). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1103.
POECILOCNEMIS, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 286 (1847).
SALPIXANTHA, Hook. Bot. Mag. t. 4158 (1845).
bracteosa, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 88.—Bras,
cestrifolia, *Nees, I. c.* 80.—Bras,
cincinnata, *Nees, 1. c.* 81.—Bras,
coccinea, 7*. *Anders, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 454.—Ind. occ.
distans, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. A3.—Bras,
fulgida. *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 420.-*-Ind. occ.
longiflora, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1045.—Bras.
longiflora, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 287 = macrophylla.
macrophylla, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 80.—Bras,
nitida, *Nees, I. c.*—Bras,
pnbescens, *Nees, 1. c.* 82.—Bras.
Schottiana, *Nees,-I.* c—Bra*.

GEISSOPAPPUS, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. ii. (1840) 44. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f. ii. 396.
SCHOMBURGKIA, DC. Prod. vii. 298 (1838).
TRINCHINETTIA, Endl. Gen. 1383 (1841).
caleoides, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 44.—Gnian.
gentianoides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ill. 279.—Bras,
polycephalus, *Baker, I. c*—Bras.

GEI88OEHIZA, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 672 (1803). *IRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 703.
ROCHEA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 822.
WEIHEA, Eckl. Vetz. 22 (1827).
abyssinica, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = Lapeyrousia abyssinica.
abyssinica, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 718*" Hesperantha Petitiana.
albens, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docnm. 187 Gladiolus debilis.
alpina, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 223—Afr. trop.
anemonaeflora, Klatt, in 'Linnaea, xxxiv. (1865-66) 657 = Ixia anemonaeflora.
arenaria, Eckl. Top. Verz. 21 = imbricata.
aurea, Eckl. 1. c.=humilis.
Bojeri, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 239.—Madag.
bracteata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* (1882) 391.—Afr. austr.
Brehmii, Eckl. Top. Verz. 21=humilis.
Candida, *Eckl. I. c.* nomen.—Afr. austr.
ciliaris, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* sub t. 672.—A austr.
corrugata, *Klatt, in Abh. 'Naturf. Ges. Halle,* ** (1882) 891.—Afr. anstr.
cyanea, *Eckl. Top. Vert.* 20.—Afr. austr.
erecta, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 288.—A austr.
excisa, *Ker-Gaml. in Kon. tf Sims, Ann. Bot* (1805) 224.—Afr. austr.
filifolia, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 238.—* austr.
flava, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1 392.—Afr. austr.
foliosa, *Klatt, in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 658.—Afr. austr.
furva, *Ker-Gawl. in Kon. tf Sims, Ann. Bot.* (1805) 224.—Afr. austr.
geminata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl.. Docum.* W Afr. austr.
grandis, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5877.—Afr. austr.
hirta, *Ker-Gawl. in Bot. Mag-* sub t. 672.—Afr. austr-
humilis, *Ker-Gawl. I. c*— Afr. austr.
imbricata, *Ker-Ga-ml. 1. c.*—Afr. austr.
imbricata, E. Mey. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. (1877)98=secunda.
inflexa, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* sub t. 672.—* austr.
juncea, *A. Dietr. Sp. PI.* ii. 587.—Afr. austr.
Larochei, Loud. Hort. Brit. 16 = Rochensis.
latifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) »* —Afr. austr.
longituba, Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867-68; S8» Hesperantha longituba.
lutea, *Eckl. Top. Vert.* 21.—Afr. austr.
minima, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) —Afr. austr.
monantha, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 503 = Rochensis.
monanthos, *Eckl. Top. Vert.* 21.—Afr. anstr.
nana, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. 891.—Afr. austr.
nigro-montana, *Eckl. Vert.* 21.—Afr. austr.
obtusata, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 672.—Afr.
ornithogaloides, *Klatt, in Linnaea,* xxxiv. (loo 656.—Afr. austr.
purpureo-lutea, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. —Afr. austr.
quadrangula, *Ker-Gawl. Irid. Gen.* 88.—Afr. »V iv.
quinquangularis, Eckl. ex Klatt, in Linnaea, (1B65-66) 654 =dliaris.
radians, Ker-Gawl. ex Steud. Nom. ed. II- Rochensis.
ramosa, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* sub t. *OH-* austr.
ramosa, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) secunida.

GEISSOBHIZA :—
recuroifolia, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 655 =setacea.
Rocheana, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 399 = seq.
Rochensis, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 672.-A&. anstr.
romuleoides, Eckl. Top. Verz. 21=»omithogaloides.
"wea. Eckl. 1. c. 20=ciliaris.
sabnlosa, *Klatt, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* iii. (1885) 208.—Afr. austr.
sullaris, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* sub t. 672.—Afr. austr.
secunda, Hontt. Handleid. xil. t. 78. f. 1- Rochensis.
wcunda, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* sub t. 672.—Afr. austr.
setacea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 95.—Afr. austr.
sttacea, Ker-Gawl. in Bot Mag. sub t. 672 = Rochensis.
setifolia, Eckl. Top. Verz. 22-secunda.
"tuata, *Eckl. 1. c.* 21.—Afr. austr.
suolutea, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 672 = Romulea sublutea.
tenui.. *Eckl. Top. Vert.* 22.—Afr. austr.
wuptfera, *Klatt, in 'Abh. Naturf. Ges. Nolle,* xii. (1882) 390.—Afr. austr.
"'fnata, Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 188-inflexa.
'w J'ghtii *Bker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 238.—Afr. austr.

GEISSORIZA, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. HaUe, xii. (1882) 390 = praec!

GEISSORRHIZA, D. Dietr. Syn. PL i. 126 (1889) = Praec.

GEI8SOSPERMTTM, Allem. Diss. (1845), cum ic. -*APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 707.
-"***, Miers, Apocyn. S. Am. 84 = Vellosii.
"Wiannm, *Miers, I.* f.-Bras.
i•"toflorum, Miers, 1. c. 85 = Aspidospermum ramiflorum.
? ' 5: *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 707.—Guiana.
So landri, *Miers, Apocyn. S. Am.* 85—Bras.
ve Uosu, *Allem. Diss.* (1845), cum ic—Bras.

GEITONOPLESIUM, A. Cunn. in Bot. Mag. t. 3131 (1882). *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 768.
CALCOA, Salisb. Gen. PL Fragm. 67 (1865). Luz, *Mem. Hort.* 281 (1810).
ang ?a *M*>"*, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Bcrol. (1855)—App. 10-cymosum.
asperum, A. Cunn. in Bot. Mag. t. 3181=cymosum.
cyn *OT'i A. Cunn. I.* c.-Austral.; Ins. Pacif.
hun "'*' Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 81 (Asparagi
m P-J—Japon.
"•?"»«, Kunth, Enum. PI. v. 118 = cymosum.
^"". Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 81 (Asparagi
P0—Japon.

GELA, Lour. Fl. Cochinch. 282 (1790) = Acronyohia, Forst. (Rutac.).
lanceolata, Lour. 1. a - A. laurifolia.
oblongifolia, A. Cunn. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 91 = Xanthunenia oblongifolia.

GELASIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 33 - Scorzonera i Tourn. (Compos.).
desertorum, dracuncul . in Linnaea, ix. (1834) 184=Aster
Jac Cass. in Dwt. Sc. Nat xxv. 82 = S. hirsuta.
pau 1834) 1 er
dra & & fa
villosa, Cass. in Diet Sc. Nat. xviii. 286 - S. villosa.

GELASINE, Herb. in ** Mag. L S779 (1840).
Benth. & Hook f m 695
«rea, *Herb. I. c.*—Bras
tHr^V" Herb. L c sub t. 3779 (Nemastylidis sp.).
°^Jf"*«, Herb, in Benth. PL Hartw. 88-Sphenoi d2" Herb »patha.
punctata Herb. ! In Bot. Mag. sub *. 8779 " c*y doni c.=Nemastylis multiflora.
purpurea, Herb. L c (Nemastylidis sp.).-Peruv.
texana, Herb. 1. e.-Calydorea texkna.

GELEZNOVIA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 298 (1862), sphalm. =seq.

OELEZNOWIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 12. *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 298.
SANFORDIA, J. Drumm. in Hook. Kew Joiirn. vii. (1855) 58.
calycina, *Benth. Ft. Austral:* i. 348.—Austral,
macrocarpa, *Benth. 1. c.* 847.—Austral,
verrucosa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 18.—Austral.

QELONIUM, Roxb. in Willd. Sp. PL iv. 881 (1805). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 824.
CERATOPHORUS, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 120.
ERYTHROCARPUS, Blame, Bijdr. 604 (1825).
SUREGADA, [Roxb.] ' Jones' ex Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 206, nomen prius.
adenophorum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1128. —Madag.
aequoreum, *Hance, in Journ. Bot.* iv. (1866) 173.—Ins. Formosa,
africanum, *Muell. Arg. in DC Prod.* xv. II. 1129.—Afr. austr.
angustifolium, Muell. Arg. 1. c. 1128=lanceolatum.
bifarium, *Roxb. ex Willd. Sp. PI.* iv. 831.—Malaya.
Boivinianum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1129.—Madag.
fasciculatum, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 832 —multiflorum.
glomerulatum, Hassk. Cat. Hort Bog. Alt. 237 = bifarium.
lanceolatum, *Willd. Sp. PI.* iv. 882.—Ind. or.
laurinum, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1129.—Madag.
multiflorum, *A. Juss. Tent. Euph.* 111. t. 10.—Ind. or.; Malaya.
obtusum, Miq. Fl, Ind. Bat. Suppl. 452=bifarium.
oxyphyllum, *Miq. 1. c.*—Sumatra,
spicatum, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 287.—Java,
zanzibariense, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1130. —Afr. trop.

GELONIUM, Gaeitn. Fruct. ii. 271. t 139 (1791) = Batonia, DC. (Sapindac.)-
cupanioides, Gaertn. 1. c. 272=Cupania enpanioides.

GELPKEA, Blume, Mn». Bot Lugd. Bat. i. 88. t. 35 (1849) = Eugenia, Linn. (Myrtac).
pendula, Blume, 1. c. = E. pendula.
stipularis, Blume, 1. c.=E. stipularis.

GELSEMINUM, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 184 (1814) = seq.

GELSEMITrM, Juss. Gen. 160 (1789). *LOG ANIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 789.
JEFFERSONIA, Brick, in Med. Rep. N. York, i. (1800) 555.
LEPTOPTERIS, Blume, Mus. Bot. Lngd'. Bat. i. 240. t. 34 (1849).
MEDICI A, Gardn. in Hook. Kcw Joum. i. (1849) 824.
elegacs, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 90.—China.
lucidum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 714 = sempervirens.
nitidum, Michx. *il.* Bor. Am. i. 120 = sempervirens.
sempeivirens, *Ait. Hort. Kern.* ed. II. ii. 64.—Am. bar.

GEMBANGA, Blume, in Flora, viii. (1825) 580, 678 = Corypha, Linn. (Palm.).
rotundifolia, Blume, 1. c. = C. umbraculifera.

GEMELLA, Hill, Veg. Syst. ii. 70** (1781) = Coreopsis t Linn. (Compos.).

GEMELLA, Lour. Fl. Cochinch. 648 (1790) = Bohmidelia, Linn. (Sapindac).
trifoliata, Lour. 1. c. 649 = S. Gemella.

GEMEL-LARIA, Pinell, ex Antoine, Bromel. 44 (1884) -K.arataa, Mill. (Bromeliac).
Innocent ii, Pinell, 1. c. = K. Innocentii.

GEMINARIA, Rafin. Cat. 14 (1824)=PhyUanthUB, Linn. (Euphorbiac).
obovata, Rafin. 1. c. — P. carolinensis.

GEMMARIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2=Conyza ? Linn. (Compos.).

GEMMARIA, Salisb. Gen. PL Fragm. 127 (1866) = Heasea, Herb. (Amaryllid.).
gemmata, Salisb. 1. c = H. gemmata.

GENDARUSSA, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 76 (1832)- Justioia, Linn. (Acanthac).
abyssinica, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 730=J. glabra.
Adhadota, Steud. Nom. ed. II. i. 668 = Adhatoda Vasica.
arenaria, Steud. 1. c. = J. trinervia.
argyrostachya, Steud. 1. C.-J. argyrostachya.
Betonica, Nees, ex Steud. 1. c. = J. Betonica.
bifaria, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 104-Eranthemum bifarium.
capensis, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 668; et in Linnaea, xv. (1841) 366-J. capensis.
cordata, Hochst. ex Necs, in DC. Prod. xi. 379 = J. cordata.
cuneata, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 668; et in Linnaea, xv. (1841) 367=J. cuneata.
debilis, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 302 = J. debilis.
decussata, Nees, in WalL PL As. Rar. iii. 104-J. decussata.
densiflora, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 71.—Afr. austr.
dichotoma, Hochst. ex Nees, in DC. Prod, xi, 600-J. glabra.
diosmophylla, Nees, 1. c. 731 = Adhatoda dibsmophylla.
diversiformis, Nees, 1. c. 399, 731 = J. glauca.
foliolosa, Prcsl, Bot. Bemerk. 95 = Adhatoda cuneata.
furcata, Necs, in Wall. PL As. Rar. iii. 105 = J. furcata.
hyssopifolia, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 159-J. hyssopifolia.
incana, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 367= Adhatoda incana.
leptantha, Nees, 1. c. 872-Adhatoda leptantha.
Linaria, Nees, ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 42-J. Linaria.
litkospermifolia, Presl, Bot. Bemerk. 95-Adhato.la lithospermifolia.
micrantha, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc 489 = J. micrantha.
mollis, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 71 (Adhatodae sp.).—Afr. austr.
mollis, Presl, Bot. Bemerk. 95-J. mollis.
Neesiana, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 105=J. Neesiana.
nilgerrhensis, Steud. Nom. ed. II. i. 668 = J. nilgerrhensis.
odora, Nees, ex Steud. 1. c; Presl, Bot. Bemerk. 95 = J. odora.
orchioides, Nees, ex Steud. 1. c.; et in Linnaea, xv. (1841) 869-J. orchioides.
orixensis, Nees, in Wall. PL As. Kar. iii. 104-J. glauca.
palustris, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 43 = J. palustris?
patula, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 367-Adhatoda patula.
pedunculosa, Presl, Bot. Bemerk. 95 = Dianthera americana.
petiolaris, Presl, 1. c.=J. petiolaris.
prostrata, Steud. Nom. ed. II. i. 668, sphalm. =seq.
protracta, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 371 = Adhatoda protracta.
prunellaefolia, Hochst. in flora, xxviii. (1845) 71 (Adhatodae sp. 1).—Afr. austr.
pygmaea, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 869-Adhatoda pygm:<;a.
guadrifariaiNees, in WalL PI. As. Rar. iii. 105-J. quadrifaria.
ramosissima, Steud. Nom. ed. II. i. 668-J. Petonica.
Schimperiana, Hochst. in Flora, rxiv. (1841) I. Intell. 24-Adhatuda Schimperiana.
sessilis, Presl, Bot. Bemerk. 96 = Dianthera scssilis.
sumatrana, Miq H. Ind. lal. ii. 832-J. ptychustoma.

GENDARUSSA :—
tranquebariensis, Nees, in Wall. Fl. As. Rar. iii. 106 =-Jasticia tranqnebariensis.
tridentata, Presl, Bot. Bemerk. 96 = Ramusia tridentata.
trinervia, Nees, ex Stead. Norn. ed. II. i. 668=J. trinervia.
variegata, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 885 •= Adhatoda variegata.
vasculosa, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 104 = J. vascnlosa.
ventricosa, Nees, in Wall. 1. c = J. ventricosa.
virgata, Wall. Cat. n. 7176=Dianthera virgata.
•oulgaris, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 104 = J. Gendarnssa.
wineadensis, D. Dietr. Syn. PI. i. 69, sphaltn. = seq.
vynaadensis, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 104 = J. wynaadensis.

GENERSICHIA, Henff. in Flora, xxvii. (1844) II. 528 = Carex, Linn. (Cyperac).
obtusata, Heuff. 1. c = C. obtusata.

GENESIPHYLA, Rafin. Sylva Tellur. 92 (18SS) = seq.

GENESIPHYLLA, L'H<5rit. Sert. Angl. 29 (1788) = Phyllanthus, Linn. (Euphorb.).
aspleni/olia, L'Herit. 1. c. = P. latifolius.
spcciosa, Rafin. Sylva Tellur. 92 = P. spedosus.

GENETYLLIS, DC. Prod. iii. 209 (1828)=Darwinia, Rndge (Myrtac).
affinis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) I. 156 «=D. diosmoides.
agathosmoides, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 822-D. vestita.
alpestris, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 178 = Lhotskya genetylloides.
citriodora, Endl. in Enum. PL Hueg. 47 = D. citriodora,
diosmoides, DC. Prod. iii. 209 = D. diosmoides.
Drummondii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) I. 155=D. Drummondii.
fimbriata, Kipp. in Joum. Linn. Soc. i. (1867) 49 « D. fimbriata.
fuchsioides, Hort. ex Lescuy. in Hen'na, Hortic. Franc. (1864) t. 15 = D. Hookeriana.
helichrysoides, Meissn. in Joum. Linn. Soc. i. (1857) 87 = D. helichrysoides.
Hookeriana, Meissn. 1. c = D. Hookeriana.
hypericifolia, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pltersb. x. (1852) 828= D. Hookeriana.
lejostyla, Turcz. 1. C.--D. Meissneri ?
macrostegia, Hook. Bot. Mag. t. 4860 - D. Hookeriana.
macrostegia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxii. (1849) II. 18 = D. macrostegia.
Mrisneri, Kipp. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 49 = D. Meissneri.
micropetala, F. Muell. Fragm. i. 12 = D. micropetala.
oederioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxii. (1849) II. 18 = D. oederoides.
oxyUpis, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 284 = D. Meissneri.
pauriflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 17-Chamaelaucium ciliatum.
pimeloides, F. Muell. Fragm. ii. 169-D. citriodora.
pinifolia, Schau. Monog. Myrt. Xerocarp. i. 34 = D. pinifolia.
purpurea, Schau. 1. c. 27=D. purpurea.
sanguinea, Meissn. in Joum. Linn. Soc i. (1857) 88 •= D. sanguinea.
Sckuermanni, F. Muell. Fragm. i. 12 = D. Schuermanni.
speciosa, Meissn. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 36 = D. speciosa.
squarrosa, Tnrcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 823 = D. fimbriata.
thymoides, Schau. Monog. Myrt. Xerocarp. i. 83 = D. thymoides.
tulipifera, Schau. ex Hook. Bot. Mag. t. 4858-D. macrostegia.
vestita, Endl. in Enum. PI. Hueg. 47 - D. vestita.
virescens, Meissn. in Joum. Linn. Soc. i. (1867; 88 = D. virescen*.

GENIANTHUS, Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 15 (1883). *ASCLEPIADEAE.*
crassifolins, *Hoot./. I. e.* 18.—Silhet.
laurifolius, *Hoot./. 1. e.*—Ind. or.
Maingayi, *Hoot./. 1. c.*—Singapore.

GENIO8PORUM, Wall, ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1800 (1880). *LAB/ATAE,* Benth. & Hook.f. ii. 1172.
axillare, Benth. in Wall. PI. As. Rar. ii. 18=Melissa parviflora.
elongatum, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 21.—Ind. or.
gracile, Benth. 1. c. — prostratum.
holochilum, *Hance, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 13.—China.
madagascariense, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 20.—Madag.
Palisoti, *Benth. I. c.* 22.—Afr. trop.
parviflorum, Benth. in Wall. PI. As. Rar. ii. 18; et Cat. n. 2750 = Mesona Wallichiana.
prostratum, *Benth. in Bot. Reg.* snb t 1300; *et in Wall. PI. As. Rar.* ii. 18.—Ind. or.
strobiliferum, *Wall. PI. As. Rar.* ii. 18.—Reg. Himal.
thymifolium, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 21.—Madag.

GENTOSTEMON, Engelm. & Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 104. *GENTIANEAE.*
Conlteri, *Engelm.* b" *Gray, I. c*—Mexic.
Schaffneri, *Engelm.* &" *Gray, I. c*—Mexic.

GENIOSTEPHANUS, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 812, absqne desc. - Trichilia, Linn. (Meliac.).
tomentosus, Fenzl, 1. c. = T. emetica.

GENIOBTOMA, Forst. Char. Gen. 24. t. 12 (1776). *LOGANIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 791.
ANASSER, JUSS. Gen. 150 (1789).
ASPILOBIUM, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat Hist. i. (Sept. 1838) 45.
HAEMOSPERMUM, Reinw. in Blume, Bijdr. 1018 (1826).
LASIOSTOMUM, Zipp. ex Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. (1850) 239.
acuminatum, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 316 — Urophyllum streptopodium.
angusti/olium, Bouton, ex DC. Prod. ix. 28 = borbonicum ?
astylum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 821. —Ins. Societ.
australianum, *F. Muell. fragm.* v. 19.—Austral.
Balansaeanum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 248.—N. Caled.
borbonicum, *Spreng. Syst.* i. 5?8.—Ins. Mascar.
brasiliense, Spreng. 1. c. = Haynaldia thapsoidea.
celastrineum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 247.—N. Caled.
cordifolium, *Boj. Hort. Maurit.* 215.—Ins. Maurit.
crassifolium, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 96. —Ins. Philipp.
Cumingianum, *Benth. 1. c.* 97.—Ins. Philipp.
Cyrtandrae, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 239.—Ins, Sandvic.
densiflora, *Baill. I. c.* 264.—N. Caled.
erythrosperina, *Baill. 1. c.* 283.—N. Caled.
fagraeoides, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 96. —Mexic.
/ebri/ugum, Spreng. Syst. i. 588 =• Strychnos Psendo-Quina.
foetens, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 247. —N. Caled.
Haemospermum, Steud. Nom. ed. II. i. 669=rupestre.
lanceolatum, Boj. Hort Maurit. 215 = borbonicum.
Lasiostemon, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 239.—Sumatra,
ligustrifolium, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* ii. (1839) 47.—N. Zel.
micranthum, *DC. Prod.* ix. 27.—Ins. Marian,
microphyllum, *Seem, in Bonplandia,* x. (1862) 37, nomen ; *et Fl. Vit.* 164.—Ins. Fiji,
montannm, *Zoll. V Mor. Syst. Vera. Zoll.* 58.—Java.
Novae-Caledoniae, *Vieill. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 268.—N. Caled.
obovatum, Boj. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 96 = borbonicum.
ovatum, Boj. Hort Maurit. 216 = borbonicum.
Pancheri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 264. —N. Caled.
parvifolium, Boj. Hort Maurit. 215=pedunculatnm.
pedunculatnm, *Boj. I. c.*—Ins. Maurit.
petiolosum, C. *Moore If F. Muell. Fragm.* vii. 28: ix. 193. —Ins. Dom. Howe.

OENIOSTOMA:—
phyllanthoides, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 264.—N. Caled.
Remyana, *Baill. I. c.* 240.—Ins. Sandvic.
reticulata, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 239.—Java,
rupestre, *Forst. Char. Gen.* 24.1.12.—N. Hebrid.
rupestre, A. Rich. & Less. Voy. Astral. Bot. 207 •= ligustrifolium.
spinescens, *Spreng. Syst.* i. 588.—Bras,
thymeleacea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1880) 263.—N. Caled.
vestitum, *Baill. I. c.* 248.—N. Caled.
Vieillardi, *Baill. 1. c.* 264.—N. Caled.

OEKTPA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 90.
THEVENOTIA et THEVETIA, linn. Gen. ed. L 380 (1737).
americana, *Linn. Syst.* ed. X. 931.—Am. anstr.
artorea, Baill. Hist. PI. vii. 874 = Gardenia gummifera.
barbata, *Presl, Symb. Bot.* ii. 13. t. 60.—Bras,
brasiliana, *A. Rich, in Mim. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 244.—Bras.
brasiliensis, Baill. Hist PI. vii. 374-Gardenia brasiliensis.
buffalina, *Lour. Fl. Cochinch.* 149.—Cochinch.
campanulata, Baill. Hist. PI. vii. 371 = Garden* campanulata.
capensis, Baill. I. c. 379, 888 = Burchellia capensis.
Ctknto.H.B.tfK.Nov. Gen. etSp. iii. 407.—Am. austr.
clusiifolia, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 317.-Ind. occ.
dumetorum, Baill. Hist. Fl. vii. »72 = Randia dumetomm.
edulis, Rich, in Act. Soc. Hist Nat. Par. i. (1792) 107 = Alibertia edulis.
esculenta, Lour. Fl. Cochinch. 149 = Randia edulis.
flava, *Lour. 1. c.*—China.
ftorida, Baill. Hist. Fl. vii. 307, 379 = Gardenia jw minoides.
grandiflora, Baill. 1. c. 874 = Gardenia grandiflon.
grandi/olia, Pers. Syn. i. 198 = americana.
gummifera, Baill. Hist PI. vii. 879 = Gardenia gumnufera.
humilis, *Veil. Fl. Flum.* 94; ii. 1142.—Bras.
Jovis-tonantis, Baill. Hist. PI. vii. 380 •> Gardenia Jovis-tonantis.
labiata, Smeathm. ex DC. Prod. iv. 391 =-Bertiera Pomatium.
longiflora, Baill. Hist. PI. vii. 879 = Randia longiflora-
mallei/era, Baill. I. c. <= Randia malleifera.
Merianae, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1703J 107.—Guian.
Mussaendae, Baill. Hist. PI. vii. 379 = Randia Mussaendae.
oblongifolia, *Rui* V Pav. Fl. Per. et Chil.* ii- "• t§ 220.—Feruv.
Pavetta, Baill. Hist. PI. vii. 379-Stylocoryne Weberapubescens, *DC. Prod.* iv. 379.—Cuba.
radicans, Baill. Hist PL vii. 379 - Gardenia)«9, minoides.
resini/era, Baill. I. c 380 = Gardenia lucida.
Rothmannia, Baill. 1. c. 879 = Gardenia RothmanM>r.
Rutenbergiana, *Baill. ex Vatte, in Bremen, Abh.* »• (1885) 118.—Afr. trop.
striiflora, *DC. Prod.* iv. 878.—Bras.
Thunbergia, Baill. Hist. PL vii. 308 = Gardenia Thn"" bergia.

GENIPELLA, Rich, ex DC. Prod. iv. 443 (1830) " Alibertia, Rich. (Rubiac).

GENISTA, Linn. Syst. ed. I (1785). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 482.
ARGELASIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ^> xvi. (1868) 357.
ASTEROCYTISUS, Schur, ex Fuss, Fl. Transs. >•" (1866).
AVORNELA, Rafin. Sylva Tellur. 24 (1838).
BOELIA, Webb, Otia Hisp. 20. tt. 15, 16 (1858;.
CHAMAESPARTIUM, Adans. Fam. ii. 321 (1763);
CORNIOLA, Presl, in Abh. Boehm.Ges. Wiss. •» (1845) 566 [Bot. Bemerk. 136 (1844)].
COROTHAMNUS, Presl, 1. c. (1845) 667 [1- (W44)].
DENDROSPARTUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Set. iii. (1845) 152.
DRYMOSPARTUM, Presl, in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 567 [Bot. Bemerk. 138 *{ISU)1-*

GENISTA:-

ECHINOSPARTON, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 858.
EUTELINE, Rafin. Sylva Tellur. 24 (1838).
GENJSTELLA, Tonm. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 26ft (1746).
GENISTOIDES, Moench, Meth. 132 (1794).
GoNocYTisus, Spach, in Ann. Sc Nat Ser. IIL iii, - (1846) 158.
"STERA, Adans. Fam. ii. 321 (1763).
LUGAION, Rafin. Sylva Tellur. 22 (1838".
tYCOS, Adans. Fam. ii. 321 (1768).
Part. Lyon. Ann. Soc. Linn. Lyon
N. S. xvii. (1869) 195.
fTEROsPAHn-M, Willk. in Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. - Hisp. iii. 440 (1880).
KETAMA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 148 (1839)
SALTZWEDELIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett - «. 480 (1800).
SCORPIUS, Moench, Meth. 184 (1794).
|rARTiDiUM, Pomel, Nonv. Mat. FL Atl. 178 (1874).
WARTHJM, Spach, in Ann. Sc. Nat Se>. II. xix. - (1843) 285. t. 16.
S>YSPONE, Griseb. Spicil. FL Rumel. i. 5 (1843V
(1800) A* Gaertn. Mey. & Scherb. FL Wett. ii. 480
acanthoclada, *IOC. Mim. Ug.* vi. 208.—Graec; As. Min.
ac ??? ?. Sp"ch> in Ann- Sc- Nat_Wr_ln_ **(1845)**
a« Spartinm jTMcenm.
a«k yPilaca> sP*nt*V' *Nov. Prov.* 20—Aegypt.
a«nnensis, *DC. Prod.* ii. 15O.-Aetna.
f t u " ' Encyc. ii. 628-Cytisus albus.
ulhw £*" Enum- Pl- Voln- 28-tinctoria.
at WiUd P- «• «i- 942,-Ross.; As. Min.
ali"- nsis> Brot. Fl- Lusit ii. 89 = hirsuta.
a:P|re/a; Schur, Enum. PL Transs. 145 = tinctoria.
plna sPMh. in Ann Sc. Nat. Str. III. ii. (1844) 247
7* PMh. in Ann S Nt Sl III ii (1844)
anthocladc.
a:pina, Spach> l< - i»- **(W45)** 157-Labumum alpinum?
Am a elin, et tist p rov. R uss. R f h iH 4 2.—
Rossia.
a"57'Va »« Spach, in Ann. Sc. Nat. *Sit.* III. iii. (1845)
J" " • =>Partium junceum.
, 2 * 5 A"=t. vide anxandca.
and ">ra> *<*** *Diagn.* Ser. I. ii. Nat. As. Min., Syria.
JSsatsa* * *st- Nat *ni-*
anticola, *Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc.* **iii. (1833) 178.—Chili.**
anglica, *Linn. Sp. Pl.* 710--Enrop.
angulata, am. Encyc. 624-parviflora.
augulata FPoir **Encyc.** SuppL v. 888; DC. Prod. ii. 162 **= Cytisus scoparius.**
antiochia, Boiss. Di «gn- Ser. I. ix. 4 = patula.
anxantica: Griteb Spicil. Fl. Rumel. L 3«=elatior.
anxantica, «! 7>nore, ^- M»A *Prod.* 41.-Ital.
apetala, ^g«A.»» .4»n. *Sc. Nat.* Sér. IIL iii. (1846) **157. ab.**
aphylla, DC. Prod. il. 149=Eremosparton aphyllum.
aprutia, Presl Bot. Bemerk. 186 = Michelii.
arborea, Spreng-Syst. iii. 220 = Cytisus arborens.
arbn. sce iK^WSf; Mill, ex Spach, in Ann. Sc Nat Sér. III. **154 =** Brya Ebenus.
arcuata. <tri?e-/~ I?"M vn- Germ. ed. I. 154=sylvestris.
Santos, Noulet, Fl. Bass, Sous-Pyr. 146; et in Ann. Linnaeu **Nat. Sér.** IL (1838) 120 = Argyrolobium **m.**
aristata, Presl. *Delic. Prag.* 34.—Sicilia,
armata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 721 = Wiborgia spinescens.
armeniaca, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 118 = albida.
palath
^PalMh^f"' B- v- Bot Espagne. 141=baetica.
Liatho,des, *Urn. Encyc.* **ii. 620 («Lalatoides).-Afr.**
tica, Spach, in Ann. Sc. « « • ^r. HI. ii. (1844) **Marocc.**
A»cheri, **Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 7.—Cappadoc.**
Spach, in Ann (1845) 118.—Hispan.
bala , Pourr. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.
lil"'ade,f"'i''.«-.-«^.74.-Alger.
G. wells, in mem. Acad. Cien. *Madr.* ii. **(1859) 461.—Hispan.**
berberidea, Lange, Pl. Nov. H»*. *Fasc,* **i. 1. t. 1.—**
Hi,; pan.

GENISTA:—

bifiora, Poir. Encyc. Suppl. ii. 717; DC. Prod. ii. 146 = Cytisus Fontanesii.
Bivonae, *Presl, Delic. Prag.* 38.—SiciL
Boissieri, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 253.—Hispan.
Bourgaei, Spach, ex Nym. Consp. 152 > florida.
bracteolata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 224 (-Cytisi sp.).—Hab.!
bracteolata, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 176 = stylosa.
britannica, Hort ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 521 •= anglica.
Broteri, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 720.—Lusitan.
Brugnieri, Spach, in Ann. Sc. Nat Ser. III. ii. (1844) 248=acanthoclada.
'•uxifolia, Bunn. f. Fl. Cap. Prod. 21 - Cyclopia latifolia.
cacspitosa, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 60 = lydia.
calcicola, Schur, in Verh. Naturf. Vcr. Bruenn, xv. u. (1877) 166 * tinctoria.
campestris, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 562 a tinctoria.
canariensis, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pelop. 46 B Cytisus candicans.
canariensis, DC. Prod. ii. 145-Cytisns monspessulanus.
canariensis. Linn. Sp. PI. 709 = Cytisus canariensis.
candicans. Linn. Cent, t 22 ; Amoen. Acad. iv. 284 •» Cytisus candicans.
cantabrica, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 149=tridentata.
capensis, Spach, I. c. 155 = Rafnia opposita.
capitata, Spach, 1. c. 157-clavata.
capitellata, *Coss.* **b* *Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii.** (1856) 672.—Alger.
cappadocica, *Spach, in Ann. Sc. Nat. Sit.* **III. ii.** (1844) 242.—Cappadocin.
carinalis, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* **i. 8.—Graec;** Macedon.
carpetana, *Lerescke, ex Lange, in Kj'oeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 287.—Hispan.
Cassia, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 3 = anatolica.
cephalantha, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (1844) 254.—Alijer.
cinerascens, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 168 (Pugill. 3B8) = seq.
cinerea, *DC. Fl. Fr.* iv. 494.—Europ. austr. occ.
cinerea, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 521 =Villars.
cinerea, Willk. ex Coss. Notes Crit. 158 = florlda.
cirtensis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* **177.—Alger.**
davata, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 717.—Marocc.
commixta, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 132 = humifusa.
congesta, *Guss. Adnot. Cat. PI. Boccad.* **9.-Sicilia.**
cuspidata, Spach, in Ann. Sc Nat *Sit.* III. iii. (1816) 157=hirsuta.
cuspidata, Steud. Nom. ed. II. i. 669 = seq.
cuspidosa, DC. Prod. ii. 147 - Lebeckia psiloloba.
cytisoides, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. iii. (1845) 155 » Lebeckia cytisoides.
dalmatica, Bartl. & Wendl. f. Bcitr. ii. 74 « aristata.
dalmatica, Tenore, Syll. Fl. Neap. 344 = Michelii.
dasycarpa, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (lfc>78) 898. —Marocc.
decipiens, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. it. (1844) 270 *• Tourncfortii.
decumbens, Durande, Fl. Bonrg. i. 299 = Cytisus decumbens.
decumbens, Willd. Sp. PL iii. 941 = Cytisns procumbens.
defoliata, Lam. Fl. Fr. ii. 619 - monosperma.
Delarbrei, Lecoq & Lam. Cat. Fl. Cent. Fr. 125 = tinctoria.

GENISTA:—

delphinensis, Vcrl. in Bull. Soc. Stat.-Isère, xiv. 11872) 77-=sagittalis.
densa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 721 = Lebeckia densa.
depressa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* **4(iO.—Tauria.**
depressa, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 2 ~ Friwaldskyi.
depressa, Tenore, KI. Nap. v. 96. t. 171. f. 2-humilis.
desiderata, DC. Prod. ii. 152 = Anarthrophyllum desideratum.
diffusa, Tenure, Fl. Nap. ii. 129-humilis.
diffusa, Willd. Sp. PL iii. !)4-2-Cytisus decumbens.
discolor, *Webb, ex Lowe, Man. Fl. Mad.* **1. 12B.—Ins.** Canar.
disperma, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. 171. iii. (1845) 155=Cytisus albus.
divaricata. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 224 = Adenmcarpus intcrmedius.
dracunculeides, Spach, in Ann. Sc Nat Ser. III. iii. (1845) 18'J = patula.
Duriaei, *Spach, 1. c.* ii. (1844) 271.—Algeria.
Echinus, Spach, 1. c 249 - acanthoclada.
Echinus, Willd. ex Spreng. Syst iii. 221 = aspalathoides.
elata, Wender. in Linnaea, xv. (1841) Litt. 100 = tinctoria.
elatior, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 441—Europ. austr. or.
elegans, Gill, ex Hook. *Sc* Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 178. t. 103 - Anarthrophyllum elegans.
elliptica, Kit. in Linnaea, xxxii. (1803) 8Utf=Cytiius procumbens.
elliptica, *Steud. Nom.* ed. IT. i. 669.—Hispan.
ephedrifolia, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 484-cinerea.
cphedroidei, *DC. Mim. Ug.* vi. 210. t. 36.—Iis. Sardin.
equisetiformis, *Spach, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. iii. (1845) 148.—Hispan.
ericetorum, HofTmgg. ex Spreng. Syit. iii. 221 » triacanthos.
erinacea, Gilib. Bot. Prat. ii. 289; ex DC. Prod. ii. 146-horrida.
eriocarpa, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 737»Cytuus Kunzeanus.
erioclada, *Spach, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ii. (1844) 264.—Alger.
exaltata, Link, ex DC. Prod. ii. 151=polygalaefolia.
falcata, *Brot. Phyt. Lusit.* 183. t. 65.—Lusitan.
fasselata, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sit.* **II. iv. (1833)** 860.—Syria.
ferox, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 708.—Afr. bor.
filifolia, Licht. ex Walp. in Linnaea, xv. (1889) 460-Viminaria denudata.
nliramca, *Pomel, Nouv. Mat. Ft. Atl.* 318.—Alger.
fiorida, Asso, Syn. PL Arag. 94 = cinerea.
florida, *Linn. Syst.* ed. X. 1157—Keg. Mediterr. occ.
foliolosa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 224-Adenocarpus anagyrus.
fragrans, Spach, in Ann. Sc. Nat Ser. III. iii. (1845) 165 = Cytisus fragrans.
friedrichsthaliana, Presl, Bot. Bemerk. 136=acanthoclada.
Friwaldskyi, *Boiss. Fl. Or.tnt.* ii. 45.—Rumelia.
frutescens, Schloss. & Vukot Syll. Fl. Croat. 124 = tinctoria.
Gasparini, Presl, Fl. Sic. Pracf. p. xix = cphedroidei.
Guyana, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Expcd. i. 397 (=Anarthrophylli sp.).—Chili.
genuensis, Pers. Syn. ii. 287 - triangularis.
germanica, Brot. Kl. Lusit. ii. 'J0=Tournefortii.
germanica, *Linn. Sp. PI.* 710.—Europ.
gibraltarica, *DC. Prod.* ii. 148.—Fret. Hercul.
gibraltarica, Lowe, in Jouro. Linn. Soc. v. (1860) 87 = tridens.
glabra, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. III. iii. (1845) 157 =» Cytisus scopnrius.
Godetii, Spach, 1. c. U8~albida.
gracilis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 715=virgata, *DC.*
gracilis, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. HI. ii. (1814) 256 = carinalis.
grandiflora, Spach, 1. c. iii. (1845) 155 - Cytisus grandiflorus.
gymnoptera, Duby, ex Nym. Consp. 152 - aspalathoides.
Haensleri, Roiss. Flench. 80=Cytisns Haensleri.
Halleri, Reyn. ex DC. Prod. ii. 162 -• Cytisus decumbens.

GENISTA:—
herbacea. Lam. FI. Fr. ii. (U6 = sagittalis.
heteroacantha, Schloss. & Vukot. Syll. FI. Croat. 125 = germanica.
heteraphylla, DC. Prod. ii. 152-Cytisus heterophyllus.
hirsiUa, Moench, Meth. 144 = Cytisus scoparius.
hirsuta, Spach. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 155 = Cytisus Milleri.
hirsuta, Tenore, H. Nap. ii. 180 = Michelii.
hirstita, Tineo, ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 260 = aristata.
hirsuta, *Vahl, Symb. Bot.* i. 51.—Hispan.
kispanica. Host [FI. Austr. ii. 813 ?]; ex Nym. Consp. 151 = aristata.
hispanica, *Linn. Sp. PI.* 711.—Europ. occ.
hispanica, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 165 = sylvestris.
holopetala, Reichb. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Stir. III. ii. (1844) 241 = radiata.
horrida, Boiss. ex Spach, 1. c. 258 = Boissieri.
horrida, *DC. FI. Fr.* iv. 500.—Kurop. occ.
humifnsa. Bout, ex Willk. *Sc.* Lange, Prod. FI. Hisp. iii. 487 = micrantha.
humifusa, Dicks, ex Nym. Consp. 158 = tinctoria.
humifusa, *Linn. Syst.* ed. X. 1167.—Europ.; As. Min.
humifusa, Thore, Chlor. Land. 298 = pilosa.
humifusa, Vill. Prosp. 41 = Villari,ii.
humifusa, Willd. Sp. PI. iii. 942 = albida.
humifusa, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 169 = Cytisns decumbens.
humilis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 721 = Lebeckia humilis.
huinilis, *Tenore, Syll- FI. Neap.* 845.—Europ. austr.
h-ungarica, Kern.'in Oestr. Bot. Zeitschr. (.1863) 140 = tinctoria.
Hystrix, *Lange, PL Nov. Hisp. fasc. i.* 1. t 2.—Hispan.
incerta, Frivald. ex Griseb. Spicil. FI. Rumel. i. 3 = carinalis.
incubacea, Schur, Enum. PI. Transs. 145 «tinctoria.
inermis, Gilib. FI. Lituan. ii. 77 = tinctoria.
infesta, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 150.—Sicilia.
inops, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 42 - Jaubertii.
interrupta, Steud. Nom. ed. II. i. 670 »triacanthos.
involucrata, *Spack, in Ann. Sc. Nat.* Sel. III. iii. (1845) 120.—As. Min.
ischnoclada, *Pomel, Nouv. Mat. FI. Atl.* 318.—Alger.
ilalica, *Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 280.—Italia.
januensis, Viv. Elench. PI. Hort. Dinegro, 19 - triangularis.
Jaubertii, *Spack, in Ann. Sc. Nat.* Sel. III. ii. (1844) 242.—As. Min.
Juasi, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. FI. Nep. 247 - Alhagi maurorum.
juncea, Scop. FI. Cam. ed. II. ii. 50 = Spartinm junceum.
juniperina, Meyen, Reise, i. 815 — Anarthrophyllum juniperinum.
juniperina, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sel. III. ii. (1844) 275.—Marocc.
lamprophylla, Spach, 1. c. iii. (1845) 126 = lydia.
lanigera, Spach, I. c. 155 = Calycotome villosa.
lanuginosa, Spach, 1. c. ii. (1844) 264-hirsuta.
laricifolia, Burm. f. FI. Cap. Prod. 21 (Quid ?).—Afr. austr.
lasiantha, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. iii. (1845) 147 = tridentata.
lasiocarpa, Spach, 1. c. 185 = mantica.
leptoclada, J. Gay, 1. c. Sér. II. vi. (1886) 129 = florida.
leptophylla, *Spach, 1. c.* Sér. III. iii. (1845) 127.—Bithyn.
libanotica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 3.—Syria.
linifolia, Linn. Sp. PI. ed. II. 405 = Cytisus linifolius.
limfolia, Vill. FI. Delph. 74-cinerea.
liparioides, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 6=Cytisus orientalis.
Lobelii, DC. FI. Fr. iv. 499=aspalathoides.
Lobelii, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 841 = acanthoclada.
lucida, *Cambess. in Mini. A/us. Par.* xiv. (1827) 231. t. 14.—Ins. Balear.
lugdunensis, Jord. Pugill. 52 = horrida.
lusitanica, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 140 - Boissieri.
lusitanica, Desf. Tabl. ed. I. 184, fide DC. FI. Fr. iv. 500 = horrida.
lusitanica. *Linn. Sp. PI.* 711.—Lusitan.
luiitanica, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 105 = Cytisus grandiflorus.

GENISTA:—
lyilia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 8.—Europ. or.; As. Min.
madagascariensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx,. (1883) 125.—Madag.
mailerensis, *Lowe, Man. Ft. Mad.* i. 123.—Ins. Madera.
mantica, *Pollini, Cat. Sent. Vernon.* (1814) 18; *Spreng,. Pugill.* ii. 73.—Ital.
marginata, Bess, ex Ledeb. FI. Ross. i. 617=tincloria.
Mayeri, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 41 = ovata.
melia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 2.—Archip. Graec.
Michelii, *Spach, in Ann. Sc. Nat.* Sel. III. ii. (1844) 259.—Europ. austr.
micrantha, Frivald. ex Griseb. Spicil. FI. Rumel. i. 3 = carinalis.
micrantha, *Or teg. Hort.Matr. Des.* 68. t. 10.—Hispan.
microcephala, *Coss. &* Dur. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. iv. (1855) 248.—Algeria,
microphylla, *DC. Prod.* ii. 146.—Ins. Canar.
microphylla, Moris, Stirp. Sard. Elench. 13 = Morisii.
microphylla, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 42 - congesta.
minor, Guillon, ex Verl. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. 1,1676) p. lxxx=sagittalis.
minor, Lam. FI. Fr. ii. 615 = anglica.
mollis, *DC. Prod.* ii. 145.—Marocc.
monosperma, Delile, FI. Aegypt. 21 = G. Raetam.
monosperma, *Lam. Encyc.* ii. 610.—Reg. Mediterr. occ.
monosperma, Link, in Bach, Beschr. Canar. Ins. 156; Lindl. Bot. Keg. t. l'.US = rhodorhizoides.
Montbretii, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. III. iii. (1845) 119=albida.
Morisii, *Colla, Herb. Pedem.* ii. 65.—Ins. Sardin.
multibracteata, *Tausch, in Flora,* xxi. (1838) I. *Beibl.* 78.—Hab.!
multicaulis, *Lam. Encyc.* ii. 617.—Ins. Balear.
multiflora, [Hort. Petrop.] Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 155 = Cytisus albus.
murcica, *Coss. Notes Crit.* 101.—Hispan.
myriantha, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 803.—Marocc.
myrtifolia, Burm. f. FI. Cap. Prod. 21 (Quid ?).—Afr. austr.
nervata, Hoppe, ex Griseb. Spicil. FI. Rumel. i. 4 = anxantica.
nervata, Kit. ex DC. Prod. ii. 151 = ovata.
nervosa, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 605 = ovata.
nitens, *Steud. Nom.* ed. II. i. 670.—Ins. TenerifT.
nodosa, *Tausch, in Flora,* xxi. (1838) 748.—Austria.
nubigena, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 156 = Cytisus fragrans.
nuda, *Steud. Nom.* ed. II. i. 670.—Mauritia.
numidica, *Spach, in Ann. Sc. Nat. Sit.* III. ii. (1844) 244.—Algeria,
obtusiramea, *J. Gay, 1. c.* Sér. II. vi. (1836) 344.—Hispan.
odorata, Moench, Meth. 144 = Spartium junceum.
odoratissima, Pourr. in Willk. & Lange, I'rod. FI. Hisp. iii. 437 = micrantha.
odoratissima, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. III. iii. (1845) 155 = Spartium junceum.
Oliverii, Spach, 1. c. ii. (1844) 266=anatolica.
oretana, Webb, ex Willk. & Lange, Prod. FI. Hisp. iii. 434 = florida.
orientalis, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 2t>7-=anatolica.
osmarensis, *Coss, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 245.—Alger.
ovata, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. III. iii. (1845) 156 =Kafnia cuneifolia.
ovata, *Waldst.* b" *Kit. PI. Par. Hung.* i. 86. t. 84.—Europ. or.
oxycediina, *Pomel, Nouv. Mat. FI. Atl.* 319.—Alger.
Paivae, *Lowe, Man. FI. Mad.* i. 125.—Ins. Mader.
parviflora. Brat. FI. Lusit. ii. 87 = Broteri.
parviflora, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 715 J *DC. Prod.* ii. 145.—As. Min.
parvifolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 150 = Morisii.
patens, DC. Prod. ii. 145-Cytisus patens,
patula, *Bieb. FI. Taur. Cauc.* ii. 148.—As. Min.
pedunculata, L'Hefit Stirp. Nov. 184 = Cytisus decumbens.
peloponnesiaca, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér III. ii. (1844) 249-acanthoclada.

GENISTA:—
pendulina, Lam. Encyc. ii. 623; Poir. Voy. Barb, ii. 208 = Cytisus arboreus.
Perrymondi, Loisel. FI. Gall. ed. II. ii. 105=-mantica.
persica, Poir. Encyc. Suppl. ii. 720 = Crotalaria furfuracea.
Pestalozzae, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 4 = albida.
Philippi, Lindl. in Gard. Chron. (1841) 3S5 - canariensis.
pilocarpa, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 223.—Hab. ?
pilosa, Ledeb. FI. Koss. i. 618=albida.
pilosa, *Linn. Sp. PI.* 710.—Europ. austr.
pinastrifolia, Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. III. iii- (1845) 156 = Lebeckia sepiaria.
Pollinii, Spreng. ex Pollini, FI. Veron. ii. 458 « mantica.
polyanthus, *De Roem. ex Willk. in Linnaea,* xiv. (1852) 20.—Hispan.
polygalaefolia, *DC. Prod.* ii. 151.—Lositan.
potygalaephylla, Brot FI. Lusit. 86=praec.
polytricha, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. III. iii. (1845) 132=ptilophylla.
Pomeli, *Marls V Vigin. Cat. PI. BaUar.* 70.—Ins. Balear.
pontica, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 127 = lydia.
pratensis, Pollini, FI. Veron. ii. 457=tinctoria.
procera, Poir. Encyc. Suppl. v. 688 = Cytisus procerus.
procumbens, Frivald. ex Griseb. Spicil. FI. Rumel. i< S = Friwaldskyi.
procumbens, Waldst. & Kit. ex Willd. Sp. PI. iii. 94" = Cytisus procumbens, *Spreng.*
prostrata, Lam. Encyc. ii. 618 = Cytisus decumbens.
pseudopilosa, COM. *Notes Crit.* 102.—Reg. Mediterr. occ.
pteroclada, *Boiss. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir.* I"- iii. (1845) 154.—Syria,
ptilophylla, *Spach, I. c.* 131.—Bithyn.
pubescens, Frivald. ex Griseb. Spicil. FI. Rumel. 4 = anxantica.
pubescens, Lange, ex Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. IU- iii. (1845) 137 = tinctoria.
pulchella, Vis. in Flora, xiii. (1880) 51 = Villarsii.
pulverulenta, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. Ill- iv. (1845) 36. t. l = albida.
pungens, Poir. Encyc. Suppl. ii. 720 = LebecM* pungens.
purgans. Linn. Syst. ed. X. 1157; Lam. FI. Fr. ii. = Cytisus purgans.
quadriflora, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1S5M 288.—Alger.
radiata, DC. FI. Fr. iv. 500, in syn. - horrida.
radiata, Friedr. ex Presl, Bot. Beraerk. 136 - acanthoclada.
radiata, *Scop. FI. Cam.* ed. II. ii. 51.—Europ- austr.
Raetam, *Forsk. FI. Aegypt. Arab.* 214.—Reg. Mediterr. or.
ramosissima, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 142-cineiea- ramosissima, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 715.—Alger.
repens. Lam. FI. Fr. ii. 618 = pilosa.
Retama, Nichols. Diet Gard. ii. 59 = G. Raetam.
retamoides, *Spach, ex Coss. Notes Crit.* 1 Hispan.
rhodophon, Webb, ex Delile, Cat. Sem. Hort. Monsp- (1836) 25 = seq.
rhodopnoa, Webb *Sc* Berth. Phyt. Canar. Cytisus canariensis.
rhodorhuoides, *Webb V Berth. 1. c.* 64.—Ins. Canar.
rigens, *Presl, Delic. Prag.* 34.—Sicilia.
rigida, Gill, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. *Hue.* (1833) 178 = Anarthrophyllum rigidum.
rostrata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 719 = triacanthos.
rupestris, Schur, Enum. PI. Transs. 145=tincton»-
sagittalis, *Linn. Sp. PI.* 710.—Europ.
Saharae, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) W- Alger.
Sakellariadis, *Boiss. b[1] Orph. in Boiss. Diagn.* Ser. vi. 42.—Graecia.
salditana, *Pomel, Nouv. Mat. FI. Ml.* 320.—MB
Salzmanni, DC. Mém. Leg. vi. 211-aspalathoides.
sarotes, *Pomel, Nouv. Mat. FI. Atl.* 174.—Algef-
scandens, Lour. FI. Cochinch. ii. 428 = Butea L<>
scariosa, Viv. Ann. Bot. i. 175 = triangularis.
scolopendria, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. U'- (1845) 148=tridentatt.

GENISTA :—
xolopendrina, Willk. in Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 469 = praec.
scoparia, Lam. Fl. Fr. ii. 619 = Cytisus scoparius.
scoparia, Vill. Hist Pl. Dauph. iii. 420 = cinerea.
scorpia, St. Ug. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 203–G. Scorpius.
'corpioides, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 2/6-triacanthos.
'tvrpionia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126=seq.
ncorpim, *DC. Fl. Fr.* iv. 498.—Reg. Mediterr.
corpitu, Georgi, Reise, ii. 778 (Quid?).—Rossia.
eorpius, Sibth. & Sin. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 41 = melia.
Hpiaria, Lam. Encyc.ii. 619 = Lcbeckia sepiaria.
sericea, Alsch. Fl. Jadr. 169, partim - Villarsii.
rtcea, l'oir. Encyc. Suppl. ii. 721 » Lebeckia sericea.
**icea, *Wulf. in Jacq. Coll.* ii. 167.—Austria,
ilifolia, *DC. Mém. Ug.* vi. 208.—As. Min.
ri, Falk, Beitr. ii. 223-tinctoria.
stanca, Hohen. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 44 = Patula.
Sibirica, *Linn. Mant.* it 571.—Sibiria.
£w-ia, Fuss, Fl. Transs. 149=tinctoria.
orpides, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) = Hypocalyptus obcordatus.
Spachi
Canda
Partioides, *Spack, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. H. (1844) 03—Afr austr.
iVhulata, & Berth. *I. c.* 39.-Ins. Canar.
Phlla, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. (1877) 166=tinctoria.
fontera, Spach, in Ann. Sc. Nat Sir. III. iii. (1845) tndentata.
stylosa, *G Don Gen. Syst.* ii. I51.-Lusitan.
subcapitata riadis, Pau CT um DSP 158 = Sakella
subsecunda, Schur, Enum. Pl. Transs. 144 = Cytisus procumbens.
suprania, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 156 = Cytisus fragrans.
sylvestris, *Scop. Fl Carn.* ed. II. ii. 5S.-Austna.
syriaca, Boiss. & Blanche, pu. et
syriacus. D U S . II.ii.8-Cyhsus
Tchihatchewi, Boiss. in Tchihat Asie Min Bot. i. 6 = sessilifolia.
tenella, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 426 = micrantha.
Tenorii, Stend Nom «i n. i. 671=hnmilis.
tenuifolia, ^"I- *Not.* 169.-Europ.
tereli Li Wm » » m , «»v. (1851) 617.-Hur an.
terniflora, Lag. Gen. et Sp. Nov. 22 = Anthyllis Genistae.
tetragona, «« Enum. Pl. Volh. ii. 78 = depressa.
tetragon, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel: I. 3 = cariosa.
tetragona, Vill. ex Verl. in Bul L Soft stat> Isire> xiv, (1872) 77 = sagittalis.
thebaica, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. III. Hi. (1845) 156 = Crotala Attatata.
tinctoria, *Linn.-Sp- Pl.* 710.-Europ.; Reg Xaucas.
tomentella, Boi & No6> Diagn Ser- II. 9 albida.
tomentosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 719 = Cytisus patens.
Tournefortii, Spteh> » *Ann. S* (1844) 269—Lusitan.
transsilvanica Schur, E"010 Pl TraMS< 144 = lydia.

GENISTAt—
triacanthos, *Brot. Fl. Lusit.* ii. 89; *Phyt.* 130. t. 54. —Reg. Mediterr. occ.
triangularis, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 320 = lydia.
triangularis, Hort. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) 747=versiflora.
triangularis, *Willd. Sp. Pl.* iii. 939.—Banatns.
tricuspidata, *Dcsf. Fl. Atlant.* ii. 138. t. 183.—Afr. bur. occ.
tricuspidata, Salzm. ex Spach, in Ann. Sc. Nat Sér. III. ii. (1844) 274 = gibraltarica.
tridens, *Cat. in Anal. Cienc. Nat.* iv. (1801) 69.—Marocc.
tridentata, *Linn. Sp. Pl.* 710.—Reg. Mediterr. occ.
tnfoliata, *Jania, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 248.—Europ.
triquctra, *Lam. Encyc.* ii. 622.—Hispan. ?
triquetra, *L'Hérit. Stirp. Nov.* 183. t. 88.—Corsic.
triquctra, Schur, ex Nym. Consp. 153 = lydia.
triquetra, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 165.1.153 = triangularis.
trisperma, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 156=aethnensis.
ulicina, *Spach, 1. c.* ii. (1844) 268.—Afr. bor.
umbellata, Clos, in C. Gay, Fl. ChiL ii. 56 = Anarthrophyllum umbcllatnm.
umbellata, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 715.—Afr. bor.; Corsic.
umbellata, Salzm. ex DC. Prod. ii. 147 = aspalathoides.
umbellata, Webb, It. Hisp. 53~equisetiformi9.
nndulata, *Link, Handb.* ii. 150.—Lusit.; Air. bor.
valentina, *Steud. Nom.* ed. II. i. 671—Hispan.
Vepres, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 319.—Alger.
versicolor, Boiss. ex Steud. Nom. cd. II. i. 671 = aspalathoidcs.
versicolor, Wall. Cat. n. 5922=Caragana pygmaea.
versiflora, *Tausch, in Flora,* xxi. (1888) 746.—Hab. ?
Villarsiana, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 86 = seq.
Villarsii, *Clementi, in Atti Tena Riun. Sc. Hal.* 517. —Dalmat.
villosa, Lam. Fl. Fr. ii. 616=germanica, hispanica.
villosa, Spach, in Ann. Sc Nat. Ser. III. iii. (1845) 156 = Calycotome villosa.
virgata, Biasolctto, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 519, in obs. = sibirica)
virgata, Hoppe, ex Reichb. 1. c. 520, in obs.-ovata.
virgata, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 228; *DC. Prod.* ii. 149.—Ins. Mader.
virgata, Lam. Encyc. ii. 616 - Eremosparton aphyllum.
virgata, Willd. Bcrl. Baumz. 159-elatior.
viscosa, Willd. Sp. Pl. iii. 987 = Adenocarpus anagyrus.
vulgaris, S. F. Gray, Nat. An. Brit. Pl. ii. 605 = scoparia.
Webbii, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 252 =monosperma.
Welwitschii, *Spach, I. c.* 262.—Lusitan.
Winkleri, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 236.—Hispan.

GENISTELLA, Toum. ex Rnpp. Fl. Jen. Hall. 266 (1745) = Genista, Linn. (Legumin.).
flarelliformis, Pourr. ex Colm. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 435 = Genista norida.
florida, Pourr. ex Colm. 1. c. 436 = Genista florida.
polymorpha, Pourr. ex Colm. 1. c. 438 = Genista ramosissima.
racemosa, Mocnch, Meth. 188 = Genista sagittalis.
ramosissima, Pourr. ex Colm. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 433 = Genista ramosissima.
verticillata, Pourr. ex Colm. 1. c. 434 = Genista cincrca.

GENISTOIDES, Moench, Meth. 132 (1794) = Genista, Linn, iLegumin.).
data, Mocnch, 1. c = Genista sibirica.
linifolia, Mocnch, Meth. Suppl. 44"Cytisus linifolius.
tinctoria, Moench, Meth. 188 = Genista tinctoria.
tuberrulata, Moench, 1. c=Genista pilosa.

GENLISEA, Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 701 (1888) = GENLISIA, Reichb.-Arlstea, Ait. (Irid.).

GENXISEA, A. St. Hit. Voy. Distr. Diam. ii. 4JS (1833). *LENTIBULARIEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 988.
DORRIENIA, Endl. Gen. Suppl. ii. 65, in syn. (1842).
atiicana, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 115. —Afr. trop.
aurca, *A. St. Hit. Voy. Distr. Diam.* ii. 429.—Bras,
biloba, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 254.—Bras,
filiformis, *A. St. Hit. Voy. Distr. Diam.* ii. 430.—Bras.
luteo-viridis, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 90.—Cuba,
minor, *A. St. Hil. Voy. Distr. Diam.* ii. 480.—Uras.
ornata, *Mart, ex Benj. in Mart. Fl. Bras. x.* 252. t. 21, f. 2.—Bras,
pusilla, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1874) 11. —Bras.
pygmaca, *A. St. Hil. Voy. Distr. Diam.* ii. 481.—Bras,
rcflexa, *Benj. in Mart. Fl. Bras.* x. 254.—Bras,
repens, *Benj. I. c.* 253.—Bras,
violacca, *St. Hil. Voy. Distr. Diam.* ii. 429.—Bras.

GENLISIA, Reichb. Consp. 60 (1828) = Aristea, Ait. (Irid.).
corymbosa, Reichb. Fl. Exot. t. 24 - A. corymbosa (in Addend.).

GENNARIA.Parl. Fl.Ital. iii. 404 (1858) - Habenaria, Willd. (Orchid.).
diphylla, Parl. 1. c. 406 - H. cordata.

GENOPLESIUM, R. Br. Prod. 319 (1810) = Fraaophyllum, R. Br. (Orchid.)
Baueri, R. Br. 1. c. = l\ rufum.

GENORIA, Pers. Syn. ii. 9 (1807) - Oinora, Linn. f. (Lythrar.1.

GENOSIRIS, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 18. t. 9 (1804)- Patersonia, R. Br. (Irid.).
fragilis, Labill. 1. c. =P. glauca.
glabrata, F. Mucll. Fragm. vii. 35 = P. glabrata.
juncea, F. Mnell. 1. c. 33 = P. juncea.
lanata, F. Mnell. 1. c. 35 - P. lanata.
longi/olia, V. Muell. 1. c. = P. longifolia.
Maxwelli, V. Muell. 1. c. 34 = P.-Maxwelli.
occidentalis, V. Muell. 1. c. SI - P. occidentalig.
pygmaea, F. Muell. 1. c 38 = P. pygmaea.
rudis, F. Mucll. 1. c 35 = P. rudis.
sericea, V. Muell. 1. c. ^P. sericea.
umbrosa, F. Mnell. 1. c. 32 = P. umbrosa.
xanthina, F. Muell. 1. c 38 = P. xanthina.

GENTIANA, Tonrn. ex Linn. Syst ed. I (1735 ;. *CENTIANEAE,* Kcnth. *Sc* Hook. f.ii. 815.
ALOITIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 21 (1836).
AMARELLA, Rafin. 1. c. 20 (1886).
ANTHOPOGON, Neck. Elem. ii. 12 (1790).
ASTERIAS, liorckh. in Roem. Archiv, i. 1.25 (1796).
BILAMISTA, Rafin. New Fl. Am. iv. »2 (1836).
CALATHIANA, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 28 (1800).
CHAEI.OTHILUS, Neck. Elem. ii. 14 (1790).
CiuoniiLA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 23 (183IS).
CIMINALIS, Adans. Fam. ii. 504 (1763).
COILANTHA, Borckh. in Kocm. Archiv, i. I. 25 (1796).
CROSSOPKTALON, Adans. Fam. ii. 224 (1768).
CROSSOI'ETALUM, Roth, Enum. Pl. 1'hacn. Germ. i. I. 515 (1827).
CRI'CIATA, Gilib. Fl. Lituan. i. 86 (1781).
CUTTERA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352.
DASISTEPHA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 19 (1836).
DASYSTKIMIANA, Adans. Fam. ii. 502 (1763); Borckh. in Roem. Archiv, i. I. 25 (1796).
DENCKEA, Rafin. in Mcd. Kepos. N. York, v. (1808; 352.
DicARDlOTis, Rafin. Fl. Tellur. iii. 31 (1836).
DIPLOMA, Rafin. 1. c. 19 (1836).
ERICOILA, Rencalm. ex Borckh. in Roem. Archiv, i. I. 26 (1796).
EUDOXIA, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 202 (1836).
EVRYTIIALIA, Kenealm. ex Borckh. in Roera. Archiv, i. I. 28 (1796).
GAKRTNERIA, Neck. Elem. il. 15 (1790).
GENTIANELLA, Mocnch, Meth. 482 (1794).

GENTIANA:—
GI.YI'HOSVERMUM, G. Don, Gen. Syst iv. 196 (1836).
GONIPIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 23 (1886).
HKTEROCUTA, Rafin. 1. c. 27 (1836).
HIPPION, *V.* W. Schmidt, in Roem. Archiv, i. I. 9. t. 2 ad 5 (17!)6).
LF.HMANNA, Casscb. & Theob. Fl. Wett. ed. II. 32 (1847).
LEIMANISA, Rafin. New Fl. Am. iv. 93 (1836).
LExiPYREniM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. **'> (1807).
MONOSTERIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 49 (1836).
OPSANTHA, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 30 (1800).
PNEUMONANTHE, Gleditsch. in Mem. Acad. Berl. v. (1751) 180.
POGOBLEPHIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 26 (1836).
FSALINA, Rafin. 1. c. 25 (1836).
RASSIA, Neck. Elem. ii. 12 (1790).
RICUILA, Renealm. ex Rafin. Fl. Tellur. iii. 23 (1836).
SEBEOKIA, Neck. Elcm. ii. IS (1790).
SELATIUM, G. Don, Gen. Syst iv. 196 (1836).
SPIRAGYNE, Neck. Elem. ii. 14(1790).
TETKORHIZA, Renealm. ex Rafin. Fl. Tellur. iii. 25 (1836).
THYLACITIS, Renealm. ex Adans. Fam. ii. **504,639** (1763).
THYROPHORA, Neck. Elem. ii. 13 (1790).
TRETORMIZA, Adans. Fam. ii. 503 (1768).
ULOSTOMA, G. Don, Gen. Syst. iv. 196 (1886).
VARASIA, Phil. Fl. Atac. 85. t. 5 (1860).
XOLEMIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 22 (1836).
abscondita, Zenker, PI. Ind. 11. t. 13=quadrifaria.
a'jaulis, *Linn. Sp. PI.* 228.—Europ.; As. bor.
acaulis, Patrin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 183=vema.
achalensis. ***Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cirdova,*** **iv.** (1881) 373.—Reg. Argent
acuta, Michx. Fl. Bor. Am. i. 177-G. Amarella.
acutiflora, Schult. Syst. vi. 156, in syn. — vema.
adscendens, Pall. Fl. Ross. i. n. 106. t. 94 = decumbens.
adsurgens, ***Cerv. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent.*** **286.—** Mexic.
aestiva, Schult. Syst. vi. 156 = vema.
affinis, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 289.—Am. bor. occ.
aggregate Bunge, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 100 = G. Amarella.
alba, *Muhl. Cat.* ed. II. 29.—Am. **bor.**
aliens, Thunb. Prod. PI. Cap. 48 = Sebaea aurea.
albescens, ***Favre, in Bull. Soc. Afurith.*** **v. (1875) 145,** 251.—Europ.
albiflora, Lam. Tabl. Encyc. i. 483 = frigida.
albiflora, ***Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturm.*** **iii.** (1852) 88.—Transsylv.
aleutica, Cham. *8c* Schlccht. in Iinnaea, i. (1826) 175 =aurea.
algida, Pall. Fl. Ross.i u. 107. t. 95 = frigida.
algida, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 249 = gelida.
alopecuroides, Lam. Encyc. ii. 643 = Erythraea alopecuroides.
alpina, Adam, in Hoffmgg. Hort. Mosq. (1808) n. 1487 =gelida.
alpina, Vill. Prosp. 22; Hist. PI. Dauph. ii. 526 = acaulis.
alsinoides, ***Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.*** **xxxi. (1884)** 374.—China,
altaica, ***Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop.*** **xviii.** (1774)526.—Sibir.
Amarella, All. Fl. Pedem. i. 97 = campestris.
Amarella, Froel. Gent. Diss. 86=germanica.
Amarella, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 42 — austriaca.
Amarella, *Linn. Sp. PI.* 230.—Amphig. bor.
Amarella, Pall. Fl. Ross. i. II. 104=caucasica.
Amarella, Sm. in Sibth. *8c* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 174 = obtusifolia.
amarelloides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 175 =quinqueflora.
ambigens, Gaud, in Ebel, Man. Voy.; et in Fl. Helv. ii. 290 = obtusifolia.
timoena, ***C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.*** **iv.** 115.—Reg. Himal.
amoena, *Wedd. Chlor.And.* ii. 70.—Ecuador.
Andersoni, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1876) 486=-capitate.
Andrcwsii, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 287.—Am. bor.
angulosa, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. i. 197=vema.
angustifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 177.—Am. bor.
angustifolia, Sturm, Deutsch. Fl. Heft 54 = Kroelichii.
angustifolia, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 526 = acaulis.
aparta, ***Maxim, in Bull. Acad. Petersb.*** **xxvii. (1881)** 500.—China.

GENTIANA :-
aphylla, Jacq. Enum. PI. Carib. 17 = Voyria aphylla.
aprica, Decne. in Jacquem. Voy. Bot 112. t. 118 = decemfida.
aquatica, Froel. Gent. Diss. 77-= prostrata, squarrosa.
aquatica, *Linn. Sp. PI.* '229.—Reg. bor. et arct.
aquatica, Lom. Fl. Cochinch. 172-indica.
aquatica, Pall. Fl. Ross. i. II. 109. t. 97-humilis.
aquatica, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 425—nivalis.
aquatica, Stev. in Mem. Soc. Nat Mosc. iii. (1812) 258=squarrosa.
aquatica, Thunb. Fl. **Jap.** 116=Thunbergii.
araratica, Adam, ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 285 = gelida.
arctophila, *Griseb. 1. c.* 251.—Am. arct
arcuata, Griseb. 1. c. 232-= Jamesoni.
argentca, ***Royle, ex D. Don, in Trans. Linn. Soc.*** **xvii.** (1837) 613.—Keg. Himal.; China,
aristata, ***Maxim, in Bull. Acad. Petersb.*** **xxvi. (1880)** 497.—China,
armerioides, ***Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr.*** **58.—** Peruv.
arvernensis, ***Hort. Backh. ex Gard. Chron.*** **(1883) II.** 40.—Hab.?
ascendens, Poir. ex Stend. Nom. ed. II. i. 672=decumbens.
asclepiadea, *Linn. Sp. PI.* 227.—Europ. austr.; Reg. Caucas.
aspera, Hegetschw. Fl. Schw. 210 = obtusifolia.
strata, ***Bunge, ex Griseb. in DC. Prod.*** **ix. 98.—Sibir.**
attenuata, *Griseb. 1. c.* 93.—Peruv.
aurea, *Linn. Syst.* ed. X. 951.—Amphig. bor.
aurea, Thunb. Fl. Cap. ii. 171=Sebaea aurea.
auriculata, *Pall. Fl. Ross.* i. II. 102. t. 92.—Sibir. or. ; Ins. Aleut,
austriaca, ***A. V J. Kern. Sched. Fl. Exsicc.*** **ii. 123.—** Austria.
autumnalis, Prey. *Be* Zirk. ex Bab. in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 318 = G. Amarella?
axillaris, *Rafin. Med. Fl.* i. 218.—Am. bor.
axillaris, Reichb. PL Crit. ii. 18.1.130 - G. Amarella.
aaurea, Bange, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 230-aurea.
Baconi, Edgew. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) t. 20=capitata.
barbata, Froel. Gen. Diss. 114—detonsa.
barbellata, ***Bngelnu in Trans. Acad. Sc. St. Louis,*** **ii.** (1863; 216. t. 2. -Am. bor. occ
bavarica, *Linn. Sp. PI.* 229.—Europ.
bavarica. Pall. Fl. Ross. ii. 110 = veraa.
bavarica, Zoëga, Fl. Island. 235 = detonsa.
bellidifolia, Hook.f. in Hook. Ic. Pl.t. 6S5 = montana.
bicolor, *Wedd. Chlor. And.* ii. 310—Peruv.
Biebersteinii, Bunge, in Nouv. Mem. Soc. Nat Mosc. i. (182») 247. t. 10. f. 1 = obtusifolia.
Bigelovii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 86. —N. Mexic.
biloba x, DC. Fl. Fr. iii. 668.—Gallia.
Boissieri, ***Schott V Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,*** **iv.** 75.—As. Min.
borealis, ***Bunge, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. i.*** (1829) 251.1.10. f. 2.—Reg. Himal.; Am. bor. occ.
borneensis, *Hook./. Ic. PI.* t. 1440 B.—Borneo.
Boryi, *Boiss. Elench.* 65.—Hispan.
brachypetala, Bunge, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 225-detonsa.
brachyphylla, ***Vill. Prosp.*** **23;** ***Hist. PI. Dauph.*** **ii.** 528.—Helvet.
brevidens, ***Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.*** **i. 825.—** Japon.
bromifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 208.— Regi Argent
bucovinensis, Herbich, Select. PI. Rar.. Galic. Eucov. 10=utriculosa.
Buergeri, ***Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*** **iii. 124—** Japon.
Buixii,'Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. **132.—Mont, Pyren.**
Burseri-punctata, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 301-Burseri.
Cachalahuen, Molina, Sagg. Chile, 147=Erythraea chilensis.
cachemirica, ***Decne. in Jacquem. Voy. Bot.*** **111. 1.117.** —Reg. Himal.
caerulea, **Auct. vide -** ***coerulea.***
caerulescens, Gill, ex Wedd. Chlor. And. ii. 66, in obs. = diffusa?
caespitosa, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (July-Sept 1830) 867 «-glauca.

GENTIANA;—
caespitosa, ***Mart. <f Gal. in Bull. Acad. Brux.*** **xi. I.** (1844) 370.—Mexic.
calycina, ***Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.*** **Iv.** 75.—As. Min.
calycina, Lam. Encyc. ii. 688 •= Sabbatia calycosa.
calycosa, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. vi. 86=Newberryi.
calycosa, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 292.—Am. bor. occ.
calyculata, ***Lex. in La Have*** **b*** ***Lex. Nov. Veg. Desc-*** fasc. i. 18 (caliculata).—Mexic.
campanata, [Clairv.] Man. Herb. 74 = acaulis.
campanulata, Jacq. Fl. Austr. v. 43—punctata.
campanulata, Reyn. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent 212 ***—hybrida.***
*campanuloides,V)*illd. ex Schult. Syst vi. 184=rup> cola.
Campbelli, ***Hombr. V Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy-Astrol. et Zil.*** 22.—Ins. Auckl.
campestris, All.'Kl. Pedem. i. 97<=germanlca.
campestris, Geners. Elench. 234 — G. Amarella.
campestris, *Linn. Sp. PI.* 231.—Europ.
canaliculata, Royle, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 182=* Jaeschkea latisepala.
Canchalagua, Palau, Pant. Pract Bot. viii. 22; e* Mem. Acad. Med. Madr. i. (1797) 403 = C. ***Cachalahuen***
capitata, ***Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.*** **136.** —Reg. Himal.
carinata, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 304.—Reg. Him*'-
carinthiaca, Froel. Gent. Diss. 103-=Pleurogyne carinthiaca.
carnica, Welw. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 865* Froelichii.
carpathica. Kit in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 443[s] nivalis.
Catesbaei, Andr. Bot. Rep. t. 418 •» Andrews!!.
Catesbaei, Walt. Fl. Carol. 109=G. Saponaria.
caucasica, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 198.—Keg. Caucus-
caulescens. Lam. Encyc. ii. 638 = acaulis.
Centaurium, Kalm, Fl. Fennic. n. 152 ; ex Ledeb. *'• Ross. iii. 50 = Erythraea linarifolia.
Centaurium, Linn. Sp. PI. 2*29 - Erythraea ramosissun"
Cephalotes, Edgew. in Hook. Lond. Journ. Bot. >- U345) 687 = capitata.
cerastioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. I*[9]" Peruv.
cerina, *Hook.f. Fl. Antarct.* 54. t. 36.—Ins. Auckland
cemua, *H. B. V K. Nov. Gen. etSp.* iii. 170.—Ecuador-
cespitosa, Willd. ex Schult. Syst. vi. 185-sedifolia-
Charpentieriix, Thorn, ex Hegetschw. Fl. Schw.20*-988.—Europ.
chelonoides, Willd. ex Schult. Syst vi. 185 = d:U>' thoides.
chimboracensis, Willd. ex Schult. 1. c. = sedifolia.
Chirayita, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) !»' s-SwertiaChirata.
chloodes, Brot. Fl. Lusit. i. 276 - Erythraea conferta-
chloraefoliax, Nees, in Nov. Act. Nat Cur. ix. (1[815]; 171.—Europ.
ciliata. Gunner, Fl. Norveg. ii. 88; Pall. Fl. Ross. >• 101=detonsa.
ciliata, *Linn. Sp. PI.* 231.—Europ.; As. Min.
ciliata, Moc. & Sesse, ex G. Don, Gen. Syst iv. 1 macrantha.
cistifiora, Willd. ex Schult. Syst. vi. 184 = cerastioi*'-
clausa, Rafin. Med. Fl. i. 210 = Andrewsii.
clavata, Steud. Nom. cd II. i. 678 = ochrolcuca.
Clusii, Perr. *8c* Song, in Bull. Soc. Hist. Nat Savo"-1858 [1854?] 185-acaulis.
coarctata, Willd. ex Schult. Syst. vi. 184 = foliosa.
coccinea, ***Ruiw (f Pav. ex G. Don, Gen. Syst.*** **»** —Peruv.
coerulea, M09. & Sesse, ex Griseb. in DC. Prod, i*--Sessaei.
coerulea, Ruiz *8c* Pav. ex Griseb. Gen. et Sp- 235 = liniflora.
collina, Adam, ex Griseb. 1. c. 245-caucasica.
collina, With. Bot AIT. Brit. PI. ed. III. «• Campanula glomerata.
Collinsiana, *Rafin. Med. Fl.* i. 213.—Am. bor.
Columnae, Tenore, Fl. Nap. iii. 248 = G. AmarelW-
compacta, Hegetschw. Fl. Schw. 210=germanica-
concinna, *Hook. f. Fl. Antarct.* 53. t. 35.^ Auckl.
conferta, ***Fisch. ex Sweet, Hort. Brit.*** **ed. II-** Sibir. altaic.

GENTIANA:—
congesta, Willd. ex Schult Syst vi. 184 = corymbosa.
connata, Willd. ex Schult. 1. c.~Eustoma silenifolium.
consobrina, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 71=aurea.
contorta, Falc. ex C. B. Clarke, in Jonm. Linn. Soc. «v. (1875) 438 = depressa.
eontorta, *Royle, Illustr. Bot. HimaU* 278. t. 69.—Reg. xlimal.
corrdi/olia, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 685-septemfida.
coronata, *Royle, Jllustr. Bot. Himal.* 278. t. 68. f. 1.—Reg. Hima].
corymbosa, *H. B. & K. Nov. Gen. it Sp.* iii. 171.—N. Granat.
wsmantha, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 209.—Reg. Argent,
erassa, *Kura, in Journ. As. Soc. Beng.* xiii. (1878) II. J35.—Burma,
ttassulaefolia, *Griseb. Gen. tt Sp. Gent.* 227.—Am. bor.
«inita, *Froel. Gent. Diss.* 112.—Am. bor.
"'spata, Vis. in Flora, xiii. (1830)50; Fl. Dalmat. ii.258 = obtusifolia.
«*«><*, Ehrh. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 244 - germanica.
«<>ssolaema, *Wedd. Chlor. And.* ii. 65.—Peruv.
^'uciata, *linn. Sp. PL* 231.—Europ.; As. bor.
cuspidate, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 224.-Peruv.
c**pidata. Wall, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. Xv. (1875) 436=quadrifaria.
a"*"""<*. Rsch. in Mém. Soc. Nat. Mosc iii. (1812) 103 = decumbens.
&t vid. FT«TMh- *PI- Davidian.* i. (1884) 211.—China.
«ecemfidai *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 127.—Reo Arger
decumb^,s^^ *Suppl.* 174.-Reg. Himal.; Sibir.
Di Si *Franch.in, Bill. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 377.—China.
delicata *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 324.—Chtai.
<ie *Pressa,* Bonjo. ex Nvm. Consp. 499 - G. Pneu-nonanthe.
d% ressa, % Don< Prod- «• Ne P- M^-Reg. Himal.
d'.ressa, Schnr, >» Verb. Siebenb. Ver. Naturw. »v. 89
det^863)*9 = phlogifolia.
aet t.wa? *Rottb. in Kiob. Selsi. Sir.* x. (1770) 485. diand ides, Amphie. bor.
Nov. Gen. et Sp. iii. 170.—Per^v,
%ho *toma,* Pall. Fl. Ross. i. II. 110-tenella.
diffus*"*'' Griseb. Gen. et Sp. Gent. 224-montana.
Ecua dor. B, V K- **<»• Gen- et S>- '". 172>~
d f c- Vah1, Svmo- Bo*-iH- 47=Canscora diffusa.
folia?, Grise Gen# rt Sp< Gent* 222 = Primulae„
fonia? TIIIta- ta Bnl1- Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849)
*n'.«og = Swertia diluta.
discolor, Hoffm Bg-« Reichb. Fl. Germ. Excors. 865-verna.
dishimil ?*"*.w^Ip. Ann. iii. 85, vide *dshimilensis.*
dissitifolia, G n'«*, G'»- " * G^- 229.-Peruv.
djimilensi *Boiss- Fl- On""-iv- TM>vide *dshimilensis.*
dodeca? a'a' Griseb- °en- et Sp. Gent. 125 = Sabba«a chloroides.
Do ? naW«*M- *Chlor. And.* ii. 62.-Peruv.
Dou'"' <?•«*.»« Z)C. Proi. ix. 98.—Peruv.
Ku as 156.— Tm- 'or. 0cc. 5 ang. "*>. Aead- *Pitersb* iL (1883)
dek.ur * S!«' R *eel. in Act. Hart. Petrop.* vi. (1879) 334. TTrurk estan.
dshimiensis, C- Koch, ^ Linn!leB> "ii. (1850) 583 = pyrenaica.
dubia, *Thunb.* Prod.P *t. Cap.* 48.—Afr. *a.nstt.*
Dumoulini x> Steill) ex Dalla Torre (AU. Alpenfl. 171.—Europ.
Eli i
Hi 12 «* ^ », *Med. m.* i. 212 (Quid !).-Am. bor.
*ion** S"*"- M- S- *V. St.* 366—Am. bor.
Elw c i% H enk. in Jacq. Coll. ii. 88 = bavarica. 115. —Reg. H CS? *Hook f Fl Brit Jnd* "•
ericoides, *Griseb.* Gen- * Sp- *Gent.* 281.-Peruv.
exacoides, Linn. Sp. PI. ed.ll.332 = Belmontia cordata.
exaltat 'U "** 1. c. 331-Eustoma exaltatum.
excisa, resl, in Flora, »• (1828) 268=acanlis.
falcata I Mrc*- .* *«»!. *V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 4O4.-Sibir.

GENTIANA:—
Falconeri, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1876) 488-Moorcroftiana.
fastigiata, *Benth. PI. Hartw.* 144.—Peruv.
fastigiata, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 378.—China.
Fetisowi, *Regel V Winkler, in Gartenfl.* (1882) 3 Turkestan.
./firtunncfo, Schur,Ennm. PI. Transs. 457 = phlogifolia.
filamentosa, *Griseb. in DC. Prod.* ix. 94.—Peruv.
Jili/ormis, Linn. Sp. PI. 231=Microcala filiformis.
JUiformis, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 659=Cicendia pusilla.
jimbriaeplica, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1860) 584 = septemfida.
fimbriata, Andr. Bot Rep. t. 509=crinita.
fimbriata, Vahl, Symb. Bot iii. 46 - G. Saponaria.
fimbriata, Vitm. Summa PI. ii. 117 •= tenella.
fimbriata, Willd. ex Schult. Syst. vi. 175-ciliata.
firma, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 50 — acanlis.
flava, Mayer, ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 445 = *G.* Amarella.
flava, Merat, ex Loisel. in Mem. Soc. Linn. Par. vi. (1837) 403<=germanica.
fiavescens, Schur, Enum. PI. Transs. 461 = G. Amarella.
flavescens, Vis. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent 244 -germanica.
flavida, A. Gray, in Am. Jonm. Sc Ser. II. i. (1846) 80-alba.
floribunda, D. Don, Prod. Fl. Nep. 127' Swerlia Chirata.
floribunda, Willd. ex Schult. Syst. vi. 185 = liniflora.
florida, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (187») 236.—*Reg.* Argent.
foliosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 170.—Peruv.
Fortuni, Hook. Bot. Mag. t. 4776 = scabra.
Forwoodii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 86.—Am. bor. occ
Fremont ii, Torr. in Frém. Rep. 94=humilis.
frigida, *Haenke, in Jacq. Coll.* ii. 13.—Europ. or.; As. bor.; Am. bor. occ.
Froelichit, *Jan, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 865.—Camiol.
fruticulosa, *Domb. ex Wedd. Chlor. And.* ii. 71.—Peruv.
Galandeii, *Hiero.i. in Bol. Acad. Nac. Cirdova,* iv. (1881) 873.—Reg. Argent
Gaudinix, Thorn, ex Hegetschw. Fl. Schw. 205 (= seq.t).—Europ.
Gaudiniana x, Thorn, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 560.—Europ.
Gayi, Griseb. in DC. Prod. ix. 106=sedifolia.
Gebleri, Ledeb. ex Bunge, in Nouv. Mem. Soc. Nat Mosc. i. (1829) 211. t. 8^decumbens.
gelida, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 196.—As. Min.
Gerardi, F. W. Schmidt, in Mayer, Samml. l'hys. Aufs. i. (1791) 192 = Erythraea Centaurium.
germanica, Neilr. FL Wien, 819=austriaca.
germanica, *Willd. Sp. PI. i.* 1846.—Europ.; Reg. Caucas.
glacialis,Thom. ex Vill. Hist. PI. Danph. ii.632 - tenella.
glauca. *Pall. Fl. Ross.* i. II. 104. t 93. f. 2.—Sibir.; Am. bor. occ.
gracilis, Cham. & Schlecht In Linnaea, i. (1826) 176, in nota-propinqua.
gracilis, *H. B.* b^ *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 168.—Ecuador.
gracilis, New, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818) 176 = G. Amarella.
gracillima,Bato\. in Misc. Bot. xv. 19—Apteria sctacea.
graminea, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 101).—Peruv.
grandiflora, Lam. Fl. Fr. ii. 296=acaulis.
grandifiara, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xviii. (1774) 526. t. 6. f. 1 -altaica.
Grisebachii, Hook. f. in Hook. Ic. PI. t. 686 = montana.
euayaquilensis, *Griseb. in DC. Prod* ix. 93.—Ecuador, fiartwegi, *Benth. PL Hartw.* 47.—Mexic.
Herrediana, *Raimondi, ex Wedd. Chlor. And.* ii. 309.—Peruv.
heteroclita, Linn. Mant. ii. 560 = Canscor.i sessiliflora.
heterophylla, Kami. Med. Kl. 211 = ochroleuca.
heterosepala, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1863) 215. t. 8.—Am. bor. occ.
hexamera, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 510.—Chili.
Hirculus, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 218.—Ecuador.

QENTIANA:—
Hladnikiana, Host, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 488 = Froelichii.
holosteoides, Schott *8c* Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 71—aurea.
Hookeri, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 840.—N. Zcl.
Hookeri, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 362.—Ecuador.
Hugelii, *Griseb. in DC. Prod.* ix. 108.—Reg. Himal.
humilis, Rochel, PI. Banat. Rar. 61. f. 47=nivalis.
humilis, Salisb. Prod. 187-acaulis.
humilis, *Stev. in Af/tn, Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 258.—As. et Am. bor.
bybrida, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 353, nomen.—Am. bor.
hybrida, *Schleich. ex DC. Fl. Fr.* iii. 651.—Europ.
hybrida, Vill. in Roem. Collect. lS'J = Burseri.
hyssopifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 172.—Ecuador.
hyssopifolia, Linn, ex Spreng. Syst. i. 589 •> Enicostema littorale.
imberbis. *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 209.—Keg. Argent.
imbricata, *Froel. Gent. Diss.* 74 Europ.
imbricata, Schleich. ex DC. Fl. Fr. vi. 427"bavarica.
imbricata, Willk. ex Nym. Consp. 49'J = pumila.
immaculata, Pare. Syn. i. 284 «= punctata.
incarnata, Sims, Bot. Mag. t. 1856-ochroleuca.
incurva, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 228.—Peiuv.
indica, *Steud. Norn.* ed. II. i. 674.—China,
infelix, *C. B. Clarke, in Hook./. FL Brit. Ind.* iv. 111.—Keg. Himal.
inflata, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 232.—Ecuador.
intermedia, Sims, Bot. Mag. t 2303 =• ochroleuca.
involucrata, Rottb. in Kiob. Skr. Sclsk. x. (1770) 434 -aurea.
islandica, J. F. Gmel. Syst. 463 - Pleurogyne rotata.
islandica, Herb. Joannei, ex Schult. Syst. vi. 171= tenella.
Jacschkei, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 241 (sphalm. 7W«-Ai«)=Jaeschkea gentianoide*.
jakutensis, Bunge, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 118 » macrophylla.
Jamesoni, *Hook. 1c. PL t.* 61.—Ecuador.
Jamesonii, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 219-Hookeri, *Griseb.*
japonica, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xx. (1876) 438.—Japon.
japonica, Schult. Syst. vi. 174 =Swertia diluta.
Jirasekii, F. W. Schmidt, in Mayer, Samml. Phys. Aufs. i. (1791) 195= verna.
Karelini, Griseb. in DC. Prod. ix. 106 - aquaticn.
KaufTmanniana, *Regel* b* *Schmalh. in Act. Hurt. Petrop.* vi. (1879) 881.—Turkestan.
kentukensis, Pen. Syn. i. 286 = quinqueflora.
Kesselrinei, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 648.—Turkestan.
Kochiana, Perr. *Sc* Song, in Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie, 1853 [1854 ?i, 180~acau]is.
Koenigii, Gunner, Fl. Norv. ii. 102-tenella.
Kurroo, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 278. t. 68. f. 2.—Reg. Himal.
Laengstii, Hausm. in Verh. Zool.-Bot Ges. Wien, viii. (1868) 878 = *Charpenf.eri.*
lacvigata, *Mart,* b" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 369.—Mexic.
(ancenlata, *Griseb. in DC. Prod.'ix.* 102.—Mexic.
lancifolia, Rafn, Danm. og Hoist. Fl. ii. 217 = G. Amarella.
lasiopoda, Schur, Enum. PI. Transs. 457 — phlogifolia.
laxicaulis, Zoll. *Sc* Mor. in Nat. en Genecsk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1845) 568 = quadrifaria.
Ledebourii, Reichb. il. Germ. Excurs. 425-aquatica.
leptina, *Rafin. ex Steud. Norn.* ed. I. 862, nomen.—Hab.J
lignosa, Murr. ex Steud. 1. c cd. II. i. 874—Enicostema littorale.
limoselloides, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 167.—Ecum'or.
linariaefolia, Lam. Encyc. ii. 641=Erythraea linnrifolia.
linearifolia, Lam. Fl. Fr. ii. 298-G. Pneumonanthe.
linearis, *Froel. Gent. Diss.* 37.—Am. bor.
lineolata, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 375.—China.
lingulata, Agardh, In Phys. Sällsk. Arsh. (1824) 27.-G. Amarella.

QENTIANA:—

liniflora, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 171.— Peiuv.
linifolia, Salisb. Prod. 137—G. Pneumonanthe.
lini/olia, Willd. ex Schult. Syst. vi. 184-graminea.
livonica, Eschh. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 241 = G. Amarella.
Loderi, *Hook./. 1c. PI.* 1.1440 A.—Reg. Himal.
longiflora, Lam. Tabl. Encyc. i. 485 = altaica.
Loureirii, Griseb. in DC. Prod. ix. 108 ** indica.
In tea, Krock. Fl. Siles. i. 885=asclepiadea.
lutea, *Linn. Sp. PI.* 227.—Europ.; As. Min.
lutea, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 181 = peduncnlaris.
macrantha, *Griseb. in DC. Prod.* ix. 102.—Mexic.
niacrocalyx, *Lex. in La Lime V Lex. Nov. Veg. Desc.* fasc i. 18.—Mexic.
macrocarpophora, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 126 = G. Pneumonanthe.
macrophylla, Bertol. Fl. Ital. iii. 79=Burseri.
macrophylla, *Pall. Fl. Ross.* i. II. 108. t 96.—Sibir.
magcllanica, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 449.—Keg. Magell.
marginata, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 276=carinata.
marginata, Turcz. ex Bess, in Flora, xvii. (1834) I. Beibl. iy=aurea.
marginata, Wall. Cat. n. 4391-capitata.
maritima, La Pylaie, ex Griseb. in DC. Prod, ix 101 =detonsa.
maritima, Linn. Mant. i. 55 = Erythraea maritima
Mcnziesii, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 292.—Calif,
mexicana, *Griseb. I. c.* 243.—Mexic.
Meyeniana, *Griseb. I. c.* 217.—I'eruv.
Meyenii, Griseb. in Nor. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (184S) 48-praec
micans, *C. B. Clarke, in hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 112. —Keg. Himal.
micrantha, *Aitch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1S82) 177.—Afghan,
rnicrocalyx, *Lemmon, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 322.—Am. bor. occ.
microphylla, Griseb. in DC. Prod. ix. 105-sedifolia.
minima, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 18.—Chili.
minima, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 528=nivalit.
niinatissima, *Boiss. Fl. Orient*, iv. 71.—Afghan.
Mitznofana, *Schult. Syst.* vi. 186.—Japon.
modesta, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 109.—Chili.
monnierioides, Benth. PI. Hartw. 227=nummularifolia.
montana, *Forst./. Prod.* 21.—Austral.
montana, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818) 170 = obtusifolia.
Moorcro/tiana, Griseb. in DC. Prod. ix. 96, pro parte —Jaeschkea latisepala.
Moorcroftiana, *Wall. Cat.* n. 4390.—Reg. Himal.
multicaulis, *Gill, ex Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 225.— Chili,
multiflora, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 236.—Keg. Argent.
Naegeli x, Brcegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 108.—Europ.
nana, Wulf. in Jacq. Misc. i. 161. t. 18. f. 3 = tenella.
Newberryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 84.—Am. bor. occ.
nigrescens*, Schur, Enum. PL Transs. *i62°=chlorae-/olia.
nigricans, *Lam. Encyc.* ii. 645.—Hab. ?
nikoensis, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. i. 322; ii. 449-frigida.
nitida, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 216.—Peruv.
nivalis, *Linn. Sp. PI.* 229.—Reg. bor. et arct.
nivalis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 733 = tenella.
Norae-Zelandiae, *Armst. in Trans. N. Z. Inst.* iv. (1872) 291.—N. Zel.
nnbigena, *Edgex. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 85. —Reg. Himal.
nudicaulis, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 235.—Reg. Himal.; Burma.
nummulariaefolia, Benth. PI. Hartw. 228=selaginifolia.
nummularifolia, *Griseb. Gen. ft Sp. Gent.* 228.— Ecuador.
nutans, Bunge, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc i. (1829) 232 = prostrata.
obtiqua, Nees, in Nov. Act. Nat. Car. ix. (1818) 166 = geimanica.

GENTIANA:—

obtusifolia, Fries, Nor. Fl. Suec. 76-G. Amarella.
obtnsifolia, *Willd. Sp. PI.* i. 1847.—Europ. med.; As. Min.
ochroleuca, *Froel. Gent. Diss.* 85.—Am. bor.
ochroleuca, Sims, Bot. Mag. t. 1651=alba.
octoflora. Vital. Summa PI. ii. 114 = Enicostema littorale.
Oederi, Soland. ex Bab. in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 318-tenella.
Olgae, *Regel, ex Schmalh. in Regel, PI. Nov. Fedsch.* 65.—Turkestan.
oligosperma, Griseb. in DC. Prod. ix. 94=Jaeschkea gentianoides.
Olivieri, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 278=decumbens.
oppositifolia, Zawad. ex Griseb. L c. 245-caucasica.
orbicularis, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 88-bavarica.
orbiculata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4395-quadrifaria.
orcgana, *Engelm. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 122.—Am. bor. occ.
omata, *Wall. Cat.* n. 4386.—Reg. Himal.
Ottonis, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (lb64-65) 177.—Chili,
ovalis, *Mart,* b* *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 869.—Mexic.
ovata, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 458=Sebaea ovata.
pollens, Thunb. Mus. Acad. Ups. xi. (1792) 180, nomen (Sebaeae sp.).—Hab. ?
palustris, All. Fl. Pedem. i. 100=Swertia perennis.
palustris, Lam. Tabl. Encyc. i. 486 = Erythraea ramosissima.
paniculata, Lam. Fl. Fr. ii. 290=Swertia perennis.
pannonica, Schleich. Cat. (1821); ex Gaud. Fl. Helv. **ii. 275 = *Gaudiniana.***
pannonica, *Scop. Fl. Cam.* ed. II. i. 182.—Europ.
papillosa, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 374.—China.
Parryi, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1863) 218. t. 10.—Am. bor. occ.
patagonica, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 237.—Reg. Magell.
Pavonii, *Griseb. in DC. Prod.* ix. 94.—Pernv.
Fearcei, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* i. (1861) 65.— Chili.
pedicellata, Wall. Cat. n. 4894=qnadrifaria.
peduncularis, *D. Don, ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 181.— Peruv.
peduncularis, Willd. ex Schult Syst. vi. 185 - limoselloides.
pedunculate, Domb. ex Griseb'. in DC. Prod. ix. 92 = dissitifolia.
pedunculata, Royle, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 182 = tenella.
pendula, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 232.—Ecuador,
pensylvanica. *Hill, Veg. Syst.* viii. 59 (Quid!).—Am. bor.
per/oliata, Linn. Sp. PI. 282-Chlora perfoliata.
pernviana, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1874; 236.—Reg. Argent.
peruviana, Lam. Encyc. ii. 642 = Erythraea chilensis.
phlogifolia, *Schott (f Kotschy, in Bot. Zeit.* ix. (1851) 151.—Transsylv.
phyllocalyx, *C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iv. 116.—Keg. Himal.; China.
Piasezkii, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxvi. (1880) 498.—China,
pinifolia, *Ruiz V Pav. ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 182. —Peruv.
platypetala, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 291.—Ins. Sitcha.
plebeja, Cham, in Linnaea, i. (1826) 181=G. Amarella.
pleurogynoides, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 236 = montana.
plicata, Willd. ex Schnlt Syst. vi. 184 = spathacea.
Pneumonanthe, *Linn. Sp. PI.* 228.—Europ.; As. bor.
Pneumonanthe, Michx. Fl. Bor. Am. i. 176 = linearis.
pneummanthoides, Schur, Enum. PI. Transs. 457=G. Pneumonanthe.
pneumonanthoides, *Wender. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 675, nomen.—Hab. ?
podocarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 210.—Am. austr.
po'yantha, Fisch. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 311 = Pleurogyne carinthiaca.

GENTIANA:—

Porphyrio, J. F. Gmel. Syst. 462=angustifolia.
portensis, Brot. Fl. Lusit. i. 278 = Erythraea Massoni.
pratensis, Froel. Gent. Diss. 88 = G. Amarella.
primulaeflora, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 375.—China.
primulaefolia, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 221.—Peruv.
procumbens, Steud. Norn. ed. H. i. 768, in syn.= prostrata.
propinqua, *Richards, in Frankl. Narr. 1st. JourH.* 734.—Sibir.; Am. bor.
prostrata, *Haenke, in Jacq. Coll.* ii. 66. t. 17.—Reg. bor. et austr.
prostrata, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. *rt.* (1842) 403=aquatica.
prostrata, Schleich. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 184 = verna.
prostrata, Wahlenb. Veg. Helv. 47=bavarica.
Przewalskii, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxvii. (1881) 602.—China.
Pseud-Amarella, Stev. ex Herd, in Act. Hort. Petrop-i. (1872) 487- aurea.
Pseudo-Pneumonanthe, Schult. Syst. vi. 146 = Hncaris.
puberula, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 176.—Am. bor.
pndica, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxvi. (1880) 497.—China.
pulchella, Salisb. Prod. 137 = G. Amarella.
pulchella, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1783) 84. t 8. ff. 8, 9 - Erythraea ramosissima.
pulla, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 209.—Reg-Argent.
Pulmonaria, Turcz. in Flora (1834) I. Beibl. !»• nomen; et in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) "• 317 = tenella.
pumila, Gouan, Fl. Monsp. 473 - Erythraea marl-tima.
pumila, Griff. Ic. PI. Asiat. t. 384 = quadrifaria.
pumila, *Jacq. Enum. Vindob.* 41,215.—Europ.
pumila, Suter, Fl. Helv. i. 142=verna.
punctata, Georgi, Reise. i. 203=frigida.
punctata, Jacq. Obs. Bot. ii. 17—pannonica.
punctata, *Linn. Sp. PI.* 227.—Europ. med.
punctata, Pall. Reise, iii. 817 "=decumbens.
punctata, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 522-Buiseri.
punicea, *Wedd. Chlor. And.* ii. 70.—Peruv.; Bolivia.
purpurascens x, Buek, Ind. ad DC. Prod. iii. 19fc "" Europ.
purpurea, *Linn. Sp. PI.* 227.—Europ.
purpurea, Schrank, Baier. Fl. i. 509-- pannonica.
purpurea, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 523 - punctata.
purpurea, Wall. Fl. Carol. 109=angustifolia.
pusilla, Lam. Encyc. ii. 645=Cicendia pusilla.
pygmaea, *C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* 111.—Reg. Himal.
pygmaea, *Regel* &• *Schmalh. in Regel, PI.* *Fedsch.* 64.—Kokan.
Pyramidalis.Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. U. (181 164-obtusifolia.
pyramidalis, WUld. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 2 •=G. Amarella.
pyrenaica, *Linn. Mant.* L 55.—Europ.; As. Mm.
quadrangularis, Lam. Encyc. ii. 645 - Micnoca Qpadrangularis.
quadrifaria, *Blume, Bijdr.* 847.—Ind. or.; Malaya; China.
quadri/olia, Linn. Sp. PI. ed. IL 1671 = Chlora quadri-folia.
quinquefiora, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 1 partim = Wrightii.
quinqueflora, *Hill, Veg. Syst.* viii. 57; *Lam. Encyc.* 643.—Am. bor.
quinquefolia, Linn. Sp. PI. 280=quinqueflora.
quinque/olia, Oeder, in Fl. Dan. t. 344-aurea.
quinquepartita, Domb. ex Griseb. in DC. Prod. =cuspidata.
radicata, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 229.—Peruv.
Raimondiana, *Wedd. Chlor. And.* ii. 810.—Pemv.
ramosissima, Brot. Fl. Lusit. i. 276-Erythraea te floiA*
ramosissima, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1878) 6U- Chili.
ramosissima, Vill. Fl. Delph. 23 ; Hist Pl. Dauph. ii. 530—Erythraea ramosissima.
ramulosa, *Tissiire, in Bull. Soc. Murith.* i. I. (1868) 28. —Europ.
rapunculoides, Willd. ex Schult. Syst. vi. 185 = diffusa.

GENTIANA :—
rscurvata, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 110.—Reg. Himal.; China.
Renardi, *Regel, in Trautv. Regel, Maxim, (f Winkl. Decas. PI. Nov.* 7.—Tnrkest.
rhaetica, *A. (f J. Kern. Sched. FL Exsicc.* ii. 124.—Europ.
figida, *Rafin. Med. Fl.* i. 212.—Am. bor.
Wma, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 181.—Perav.
riparia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4392-decemfida.
riparia, Kar. & Kir. in Bull. Soc Nat. Mosc. (1841) 706 [bis]-aquatica.
rivularis, Thnnb. Mus. Acad. Ups. xi. (1792) 180, nomen (Sebaeae sp.).—Hab. t
robusta, *King, ex Hook. f. Ic. PI.* t. 1439.—Reg. Himal.
Romanzovii, Ledeb. ex Bnnge, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 215 = frigida.
Rostani, Rent in BuU. Soc Danph. (1877) 119 - bavarica.
rotata, Domb. ex Wedd. Chlor. And. ii. 63=Dombeyana.
rotata, Froel. Gent. Dire. 105-Pleurogyne rotata.
rofata, WiUd. Sp. PI. i. 1351 = Pleurogyne carinthiaca.
rotundifolia, Hoppe, ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 265 "bavarica.
Royleana, Wall. Cat. n. 4393=decemnda.
mbicunda, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 873 China.
*>*bra,* [Clairv.] Man. Herb. *7S "hyirida.*
ruira, Uspenski, Desc. Jekatheriaenb. 77 (Erythraeae *P-»)—Sibir. ural.
rubricaulis, Schwein. in Long, Exped. Winnep. ii. 384=ochroleuca.
Rui ai, *Griseb. in DC. Prod.* ix. 96.—Pernv.
rupicola, Benth. PL Hartw. 228 - cerastioides.
rupicola, Griseb. ex Wedd. Chlor. And. ii. 53 - primulaefolia.
^Picola, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 167.—Ecuador.
"urikiana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 176 = propinqua.
«bauda, Boiss. & Rent ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xvii. 101. t. 1200=acaulis.
PPx, *Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 44.-Mexic
Saponaria, Froel. Gent. Diss. 32 = Andrewsii.
Saponaria, *Linn. Sp. PI.* 228.—Am. bor.
*<*ponaria,* Walt Fl. Carol. 109 = ochroleuca.
ponarifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 51 =G. Saponaria.
««icola, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 216.—Pernv.
^ragoides, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* III. 168.—Peruv.
*, Forst. f. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxxviii. W77)184=montana.
*c*c*ra, *Bunge, Vert. Alt.* 21.—As. or.
%*ndens, Lour. Fl. Cochinch. 171=Paedena foetida.
=eptrum, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 293.—Am. bor.
C Koch in (1850) 665 =
del Unn. £ Suppl. 175-Erythraea Massoni.
*9P» orum, *Wedd. Chlor. And.* ii. 67.-Bohm.
sedifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* m. 173.—Ecuador.
Wnifolia, *Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 42.-«. Granat.
'*"»"'. *Griseb. in DC. Prod.* ix. 93.-Peruv.
»"»*nfida,* Hoffmge. ex Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 428 "Pannonica.
septemfida, *Pall. FI. Ross.* i. n. 101. t. 92. f. 3.-As. bor.
Serra Rafin - Ann. Nat 13 = ochroleuca.
Lam. Encyc. ii. 640=bavarica.
. *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 376.—China.
Gun. Fl. Fr. ii. 294 = verna-detonsa.
Lam. Fl. Fr. ii. 294 = verna, bavarica.
Lam. Sp. PL 231 (= *Chlora sessilis*).—**&-Argent.
.Bunge, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. 1. 142 = propinquft.
A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 84.—Calif.
Schultl Syst «156» obs.=verna.
"loruana, *Rafin. Med. Fl.* i. 2U.-Am. bor.

GENTIANA :—
sikkimensis, C. 5. *Clarke, in Hook./. Fl.Srit. Ind.* iv. 114.—Reg. Himal.; China,
simplex, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* v. 87. t 16 Am. bor. occ
spathacea, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 178.—Mexic.
spathulata, Bartl. ex Reichb. PL Crit. i. 78 = obtusifolia.
spathulata, *Pintger, Krit. Vergl. Gouv. Mosk. Wild-•wachs. Pfl.* 15. t. 11. f. 3.-Rossia.
spicata, Linn. Sp. PI. 230=Erythraea spicata.
spuria, Lebert, ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 801-*Gaudiniana.*
squarrosa, *Ledeb. in Mim. Acad. Pitersb.* v. (1812) 527.—Reg. Himal.; As. bor.
stellarioides, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 225.—Perny.
Stelleriana, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 188 = Pleurogyne carinthiaca.
stipitata, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 84 = cachemirica.
Stolictka, Knrz, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc xiv. (1875) 433-aurea.
straminea, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 502.—China,
striata, *Maxim. I. c*—China.
stricta, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 90 = detonsa.
stricta, WiUd. ex Schult. Syst. vi. 185=-diffusa.
Sturmiana, *A. & J. Kern. Sched. Fl. Exsicc.* ii. 122.—Austria,
stylophora, C. *B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 118.—Reg. Himal.; China.
subulata, Domb. ex Wedd. Chlor. And. ii. 71 = fruticulosa.
sulcata, Willd. Sp. PI. i. 1351 ^ Pleurogyne rotata.
swertioides, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 288 - diffusa.
sylveslris, Bray, ex Griseb. 1. c. 241 = G. Amarella.
Taeschkei, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 241 - *Jaeschkei.*
Tamitani, *Atara, Voy.* ii. 491.—Am. austr.
tenella, *Rottb. in Kiob. Skr. Selsk.* x. (.1770) 486.—Reg. bor. ct arct.
tenuiflora, Jan, ex Nyi.T. Consp. 600 = G. Amarella.
tenuis, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 250 = G. Amarella.
terglouensis, Haiq. PI. Cam. 9. t. 2. f. 6-imbricata.
ternifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 377.—China.
tetragona, Mayer, Samml. Phys. Aufs. i. (1791) 194 = G. Amarella.
tetragona, Roth, Tint. Fl. Germ. ii. I. 290; Lam. Tabl. Encyc. i. 488=tenella.
Thomasiana, Gaud, ex Nym. Consp. 498, sphalm. -• seq.
Tkomasii, Gillaboz, ex Vill. in Roem. Collect. 189 = *hybrida.*
Thomson!, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 109.—Reg. Himal.
Thunbergii, *Griseb. in DC. Prod.* ix. 108.—As. or.
Thunbergii, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 34 = Zollingerii.
thyrsoidea, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 227.—Perav.
tianschanica, *Rupr. Sert. Tiansch.* 61.—As. ccntr.
tibetica, *King, ex Hook. f. Ic. PI.* t. 1441.—Reg. Himal.; China.
Torreyana, *Rafin. Med. Fl.* 212.—Am. bor.
trichostemma, *Wedd. Chlor. And.* ii. S6.—Ecuador,
triflora, *Pall. Fl. Ross.* i. II. 105.—Sibir. or.
tristriata, Turcz. in Flora, (1834) I. Beibl. 19 = tenella.
tubiflora, *Wall. Cat.* n. 4388.—Reg. Himal.
uliginosa, Willd. Sp. PI. i. 1347 = G. Amarella.
umbellata, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 188-aurea.
umbellata, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 187 = Ruizii.
unalaceensis, Cham, ex Bunge, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 240=seq.
unalaschcensis, Cham, in Linnaea, i. (1826) 176, in nota=»aurea.
uniflora, Georgi, Reise. i. 203=verna.
unifiora, Willd. Sp. PL i. 1340=germanica.
utriculosa, *Linn. Sp. PI.* 229.—Europ. med.
utriculosa, Wahlenb. Veg. Helv. 48=verna.
vaginalis, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 459 « Logania latifolia.
vaginalis, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 216.—Peruv.

QENTIANA :—
vaginalis, Griseb. ex Wedd. Chlor. And. ii. 53 — primulaefolia.
Vaillantii, *F. W. Schmidt, in Mayer, Samml. Phys. Aufs. i.* (1791) 191.—Europ.
variabilis, *Rupr. Sert. Tiansch.* 60.—As. centr.
ventricosa, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 259.—Canada,
venusta, *Walt. Cat.* n. 4389.—Reg. Himal.
verna, *Linn. Sp. PI.* 228.—Europ.; Reg. Caucns.
vertidllaris, Retz. Obs. ii. 15 = Enicostema lit torn le.
vertidllata, Linn. Syst. ed. X. 952 — Enicostema littorale.
verticillata, *Wedd. Chlor. And.* ii. 309.—Peruv.
villosa. Linn. Sp. PI. 228 - ochroleuca.
violacea, *Ruiz V Pav. ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 19S, in syn.—Peruv.
viridis, *Griseb. in Linnaea,* xxii. (1849) 43.—Venezuela.
viscosa, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 321 - Ixanthus viscosus.
volubilis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 126=Crawfurdia japonica.
Wagiana, *Andrz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 20, nomen.—Rossis.
Walujewi, *Regel V Schmalh. 1. c.* vi. (1879) 334.—Turkest.
Weschniakowi, *Regel, 1. c.* viii. (1884) 687.—Tnrkest.
WUizenii, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1863) 215. t. 7.—Arizona.
Wrightii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. 118.—Arizona,
yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. (1884) 876.—China.
zeylanica, Griseb. Gen. et Sp. Gent 274 = quailrifaria.
Zollingerii, *Favcett, in Journ. Bot.* xxi. (1883; 183.—China; Japon.

GENTIANELLA, Moench, Meth. 482 (1794) - Gontiana, Tourn.
barbata, Bercht. & Presl, RostL i. Gentian. 22 =. Gentiana detonsa.
ciliata, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 29 *= Gentiana ciliata.
crinita, Bercht. *8c* Presl, Rostl. i. Gentian. 21 = Gentiana detonsa.
Cruciata, Moench, Meth. Suppl. 183 = Gentiana Cruciate.
dentosa, Bercht. & Presl, Rostl. i. Gentinn. 22, sphalm. -=seq.
detonsa, G. Don, Gen. Syst. iv. 179 =• Gentiana dcton*a.
fimbriata, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 81 = Gentiana ciliata.
macrantha, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 17'J« Gentiana macrantha.
macrophylla, G. Don, ex Steud. Norn. ed. II. i. 676 = Gentiana macrantha.
serrata, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 29 = Gentiana detonsa.
tetrandra, Moench, Meth. 482 = Gentiana campestris.

GEOBINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 49 (1836) - Ooodyera, R. Br. (Orchid.).

GEOCALLIS, Horan. Prod. Monog. Scitam. 33 (1SO2> - Amomum, Linn. (Scit.imin. i.
fasciculata, Horan. 1. c. ^A. iasciculatum.

GEOCARVUM, Coss. Notes Crit. 112 (1851)-Carum, Rupp. (Umhellif.).
capillifolium, Coss. 1. c 113 - C . tenuifolium.
pumilum, Nym. Syll. 166 *{Biasolettia pumila).*—Graccia.
tenuifolium, Coss. in Bourg. in Bull. Soc. Hot. Fr. ii. (1856) 643 - C . tenuifolium.

GBOCHORDA, Cham. *8c* Sr.hlccht. in linnaea, iii. (1828) 11. *SCROPHULARINEAE,* Berth. & Hook, f. ii. 952.
cuneata, *Cham,* b* *Schlecht. I.* c—Bras.

GEOCOCCUS, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 52. *CRUCIFERAE,* Beuth. & Hook. f. i. 83.
pusillus, *J. Drumm. ex Harv. 1. c.*—Austral.

GEODOB.LTM, Jacks. inAndr. Hot. Rep. t. 626 (1810).
ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 638.
Cisi ELLA, Blume, Bijdr. 298. t. 55 (1825).
ORTMANNIA, Opiz, in Flora, xvii. (1831) 582.
OTANDRA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 298, absque char,
appendiculatum, *Griff, in Cole. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 357—Assam,
attenuatum, *Griff. I. c.* 358.—Burma.
bicolor, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 628 « Eulophia herbacea.
bracteatum, Voigt, 1. c. 629= Eulophia bracteosa?
candidum, Wall. Cat. n. 7874 = paUidum.
citrinum, *Jacks, in Andr. Bot. Rep.* t. 626.—Ind. or.
dilatatum, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 207.—Ind. or.
Duperreanum, *Pierre, in Rev. Hortic.* (1882) SOI.—Cochinch.
fucatum, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1687.—Zeylan.
javanicum, *Lindl. Fol. Orch. Geod.* 2.—Java,
laxiflorum, *Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 356.—Assam.
longifolium, Voigt, Hort. Suburb. Calc 628 = Cymbidium cyperifolium.
pallidum, *D. Don, Prod. PI. Nep.* 31.—Reg. Himal.
pictnm, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 175.—Austral.
pictum, Link, Ic. PI. Hort. Reg. Berol. i. 14=Eulophia maculata.
plicatum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 629 = Fhaius callosus.
purpureum, *R. Br. in Ait. Hort. Ken.* ed. II. v. 207.—Ind. or.
ramentaceum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 628 =• Eulophia campeslris.
rariflorum, *Lindl. Fol. Orch. Geod.* 2.—Assam,
semicristatum, *Lindl. 1. c.*—Malaya.

GEOFPRAEA, Linn. Sp. PI. ed. II. 1043 (1763).
LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 551.
UMARI, Adans. Fam. ii. 842 (1763).
acutifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 46-Andira inermis.
Bredemeyeri, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. vi. 379 = superba.
discolor, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 69.—Bras.
inermis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 106 = Andira inermis.
ootusifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 46 = Andira retusa.
pubescens, Rich, in Act. Soc. Hist Nat. Par. i. (1702) 121 -Andira retusa.
racemosa, Poir. Encyc. viii. 188=Andira excelsa.
retusa, Poir. 1. c 182 - Andira retusa.
Sieberi, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* ir. *Suppl.* (1860) 124.—Ins. Trinitat.
spinosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 28 ; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1043.—Ind. occ.
spinulosa. Mart. Reise Bras. ii. 788=Andira vcrmifuga.
superba, *Humb.* b* *Bonpl. PI. Aequin.* ii. 69. t. 100.—Am. austr.
surnamensis, Bondt, Cort Geoff. Surinam, 9"Andira retusa.
tomentosa, *Poir. Encyc.* viii. 182.—Afr. trop.
vermifuga, Mart. ReiSe Bras. ii. 788 = Andira vermifuga.
violacea, *Pers. Syn.* ii. 278.—Guiana.

GEOFFROEA, Jacq. Enum. PI. Carib. 7 (1763)=Geoffraea, Linn. (Legumin.).

GEOFFROYA, Murr. Syst. ed. XIII. 856 (1774) - Geoffraea, Linn. (Legumin.).

GEOHERPUM, Willd. ex Schult Mant iii. 18, 350 (1827)=Mitchella, Linn. (Rubiac).
alsinefolium, Willd. ex Schult 1. c. 350=M.ovata.

GEOLOBUS, Rafin.New FL. Am. i. 81 (18S6)-Voandzeia, Thou. (Legumin.).
flavus, Rafin. 1. c 85=V. subterranea.

GEOMTTRA, Becc. Malesia, j. (1878) 250. tt 10, 11.
BURMANNIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 459.
dávigera, *Becc. 1. c.* 251.—Malaya,
episcopalis, *Becc. I. c.* 260.—Malaya.

GEONOMA, Willd. in Mém. Acad. BerL (1804) 37.
PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 913.
GYKKSTUM, Poit in Mem. Mm. Par. ix. (1822) 387.
VOUAY, Aubl. PI. Gui. ii. App. 99 (1775), nomen prius.

GEONOMA :—
acaulis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 18. tt. 4, 19.—Bras.
acutiflora, Mart. 1. c 10. t. 9 — baculifera.
amazonica, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 245. -Bras,
ambigua, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 111.—Am. trop.
antioqoensis, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 245, nomen.—N. Granat
Appuniana, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 106.—Am. trop.
Aricauga, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. Prot. App. 40-Schottiana.
arundinacea, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 17. t. 18.—Fluv. Amazon,
aspidiifolia, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 112.—Am. trop.
baculifera, *Kunth, Enum. PI.* iii. 233.—Guiana,
barbigera, *Barb.-Rodr. Palmiers*, 45.—Bras.
Barthii, *Engel, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 688.—N. Granat.
bifurca, *Drude V H. Wendl. in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 604.—Bras.
bijugata, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 10.—Bras,
binervia, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1858) S3.—Costa Rica.
Blanchetiana, *H. Wendl. ex Drude, in Mart. FL Bras.* iii. II. 494.—Bras.
Bluntii, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1881) I. 766.—Hab.J
brachyioliata, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 10.—Bras.
brevispatha; *Barb.-Rodr. I. c. Prot. App.* 41.—Bras.
Brongniartii, *Mart. Palmet. Orb.* 24. t. 15. f. 2.—Bolivia,
caespitosa, *H. Wendl. ex Drude, in Mart. Ft. Bras.* iii. II. 600.—Bras.
calophyta, *Barb.-Rodr. Palmiers*, 48.—Bras,
camana, *Trail, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 824.—Bras.
Capanema, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 9.—Bras.
Carderi, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1877) I. 43.—N. Granat
candescens, *H. Wendl. ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 604.—Bras,
chelidonura, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) III, 117.—Am. trop.
compacta, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31, nomen.—Venezuela,
congesta, *H. Wendl. ex Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xL (1871) 112.—Costa Rica.
corallifera. Hook, ex Morr. in Belg. Hortic. v. (1855) 168-Chamaedorea Emesti-Augusti.
cuneata, *H. Wendl. ex Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 104.—Costa Rica.
Demarastei, Pritz. Ind. Ic. 488, sphalm. = Desmarestii.
densa, *H. Wendl. in Linnaea*, xxviii. (1856) 833.—N. Granat.
densiflora, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871; 112.—Am. trop.
Desmarestii, *Mart. Palmet. Orb.* 23. t. 11. f. 2.—Bras,
deversa, *Kunth, Enum. PI.* iii. 231.—Guian.
discolor, Spruce, in Journ. linn. Soc xi. (1871) 110= multiflora.
dulcis, Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub. 222 (Calyptrogynes sp.).—Cuba,
edulis, *H. Wendl. ex Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 100.—Costa Rica,
elegans, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 144. t 18 *A*—Bras.
erythrospadice, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. ed. II. Prot. App. 41 = trinervis.
faleata, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 10.—Bras.
Fendleriana, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 108.—Am. trop.
fenestrata, H. Wendl. in Kerch. Palm. 245 = Malortiea gracilis.
ferruginea, *H. Wendl. ex Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 110.—Costa Rica,
fiscellaria, *Mart, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 486.—Bras,
flaccida, *H. Wendl. ex Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 108.—Costa Rica,
frigida, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31.—N. Granat.
furcifolia, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 11.—Bras.
furcifrons, Drude, in Mart. Fl. Bras. iii. II. 502-praec.
Gastoniana, *Glas. ex Drude, I. c.* 496.—Bras.

GEONOMA :—
Ghiesbreghtiana, Lindl. & H. Wendl. in Linnaea, xxviii. (1856) 843—Calyptrogyne Ghiesbrechtiana.
glauca, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. MeddeL (1858) 86 - Calyptrogyne glauca.
gracilis, Linden & André, Illustr. Hortic. xxi. (1874) t. 169»Riedeliana.
gracilis, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 245.—Costa Rica.
hexasticha. Spruce, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) U° = multiflora.
Hoifmanniana, *H. Wendl. ex Spruce, 1. c.* 106.—Am. trop.
imperialis, *Linden, Illustr. Hortic.* xxvii. (1881) 31.—N. Granat.
interrupts *Mart. Hist. Nat. Palm.* Ii. 8. t. 7.—Bras.
Iraze, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31.—Venezuela.
Jussieuana, *Mart. Palmet. Orb.* 24.1.15. f. 1.—Bolivia,
lacerata, *Hort. ex Floral Mag.* viii. (1869) t. 446.—Am. centr.
laxiflora, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 12.1.11.—Bras,
leptospadix, *Trail, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 327—Bras.
Lindeniana, *H. Wendl. in Linnaea*, xxviii. (1856) 331—N. Granat
linearifolia, *Karst. 1. c.* 411.—N. Granat.
longepetiolata, *Oerst. in Kjôeb. Vidensk. Meddel.* (1858) 36.—Costa Rica,
longe-vaginata, *H. Wendl. ex Spruce, in Journ. Linn-Soc.* xi. (1871) 109.—Costa Rica,
longipes, *Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 245, nomen.—Hab. T
macrodona, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 486.—
macrospatha, Spruce, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 105 = baculifera.
macrostachys, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 19. t. 20.—Bras,
magnifica, *Linden tf H. Wendl. in Linnaea*, XXVIII-(1856) 335.—Mexic.
margaritioides, Engel, in Linnaea, xxxiii. (1864-60) 682-undata.
MargyrafHa, *Engel, I. c.* 685.—N. Granat.
Martiana, *H. Wendl. in Linnaea*, xxviii. (1856) 842.—Bras.
martinicensis, *Mart. Palmet. Orb.* 28.—Ins. Martinic
maxima, *Kunth, Enum. PI.* iii. 229.—Guiana,
membranacea, *H. Wendl. ex Spruce, in Joum. Li*** Soc.* xi. (1871) 106.—Guatemala,
metensis, *Karst. in Linnaea*, xxviii. (1856) 409.—Venezuela,
mexicana, *Liebm. ex Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 316.—Mexic
microspadix, *H- Wendl. ex Spruce, in Journ. I*** Soc.* xi. (1871) 110.—Costa Rica,
microspatha, *Spruce, 1. c.* 108.—Bras,
multiflora, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 7. tt 4-6.—A* austr.
multiflora, Wallace, Palm-trees Amaz. 63. t. xxiii' maxima.
negrensis, Spruce, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) —multiflora.
obovata, *H. Wendl. ex Spruce, 1. c.* 104.—Costa R".
Olfersiana, *Klotzsch, ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* «'• H. 506.—Bras,
oligodona, *Trail, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 325.—Bras.
Orbigniana, *Mart. Palmet. Orb.* 22.1.11. f. 1.—Boll*-
oxycarpa, *Mart. I. c.* 30.—Ins. S. Doming,
palustns, *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 11.—
paniculigera, *Mart, Hist. Nat. Palm.* ii. 11. '• Bras.
paraënsis, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) —multiflora.
paraguaënsis, *Karst. in Linnaea*, xxviii. (1858) 41<> Paraguay.
pauciflora, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 12. t. *W-rrJtf.*
personata, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871; >• —Am. trop.
pilosa, *Barb.-Rodr. Palmiers*, 43.—Bras,
pinnatifrons, *Willd. Sp. PI.* iv. 598.—Am. trop.
platycaula, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. "• Bras.
Pleeana, *Mart. Palmet. Orb.* 88.—Venezuela.
Humeriana, *Liebm. ex H. Wendl. in Kerch,* 246.—Ins. S. Doming.
Plumeriana, *Mart. Palmet. Orb.* 34.—Ins. S. Doming.

GEONOMA :—
Poeppigiana, *Mart. Palmet. Orb.* 35.—Pernv.
Pohliana, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 142. t. 6 A.—Bras.
Foiteauana, *Kuntk, Enum. PI.* iii. 288.—Guiana.
Porteana, *H. Wendl. in Linnaea,* xxviii. (1856) 840.—B
"jeeps, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii, (1881) 81.—Pernv.
Procnmbens, *H. Wendl. ex Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 105.—Costa Rica.
PWchella, *Hort. ex H. Wendl. Cycl. Pand. Cycad.* 28 ; *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (.1881) 31.—N. Granat.
Palchra, *Engel, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 686.—N. Granat.
*P*fchra,* H. Wendl. ex Spruce, in Jonrn. Linn. Soc. xi. (1871) 105-Pholidostachys pulchra.
Pnjula, *H. Wendl. in Linnaea,* xxviii. (1866) 331.—N., Granat.
rurdieana, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) *09.—N. Granat.
Pycaostachys, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 16. t. 17•—Am. trop.
***»». *Engel, in Linnaea,* xxxiii. (1864-66) 684.—TM< Granat.
"ctifolia, *Wallace, Palm Trees Amaz.* 67. t. xxv.—Bras.
"JJdeluuia, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 245.—Bras.!
"Weiensis, *Barb.-Kodr. Palmiers,* 42.—Bras,
rnoescens, *H. Wendl. ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* •»• H. 491._Bras.
™Pestris, *Barb.-Rodr. Palmiers,* 47.—Bras.
S*"ga,* Spruce, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 109 - vaga.
S*°»l>urgkiana, *^ruce, 1. c.* lll.-Am. trop.
°chottiana, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 143. t. 11 A.—Bras.
Seemanni, *Hort. ex Floral Mag.* viii. (1869) t. 428.—Am. cenir,
sim*Vicifrons,* Herb. **Kew.** ex Spruce, in Journ. Linn. S**r »• (1871) 107 (Quidt).—Am. austr.
simp*rons, Willd. Sp. PI.* iv. 594.—Venezuela; Bras.
speciosa. *Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov.* 9.—Bras.
**P*>ngera.* C. Koch, Wochenschr (1858) 244 = - yalyptrogyne spidgera.
Guiana, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 15. t. 15, 16.-Am. austr.
spruc*ana, Trail, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 828.—Bras.
stricta>, Knnth, Enum. PI. iii. 282=pycnostachys.
Swartzii. *Griseb. Cat. PI. Cub.* 222.—Cuba.
synanther*i, Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 13.1.18.—Peruv.
Tam dna, *Trail, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 323.—Br
***lat?**otens"< **'Trail, 1. c. 824=acaulis.**
onientosa, *BbRd , fi. 44*
tri entosa *Barb.-Rodr. Palmiers,* 44.—Bras.
sT*ta'. *Oerst. in Kjoeb. Vidensi. Meddel.* (1868) —Nicaragua.
trigonostyla, *Barb.-Rodr. Palmiers,* 46.-Bras.
trijugata, Barb.-Rodr. Enum. Palm. Nov. 12=paniculigera.
trinervis, *Drude & H. Wendl. in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 492 -
tn r u" a^«<*. »« >«'•»• ««"•*Soc_xi_(1871) . Bras,
nnSU°Sa> Bar°--Rodr. Enum. Palm. Nov. ll.-Bras.N.
& a f °tWch, in Linnaea > «• ^847) m_
v*8». Grf»j. *v H. Wmdl in FL* **Mi.** *W.* **ind. 517.**
v~7.«4 occ.
^"josa, *Engel, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 688.
V, -N. Granat.
Wugo, *Linden. Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31.—N. Granat
%*2ff'lti, Hort. Linden, ex H. Wendl. in Kerch, versif 246> nomen = Acanthophoenix crinita?
eJtformis, tf. *Wendl. ex.Spruce, in Journ. Lxnn. Waut-l' (1871> I09.-Costa1lica. Palm. 246, nomen J.—N. Granat.
Weddell iii. II. 494.—Bras. *iin<fe», ^- WV"<</_,„ Kerck, ana, H. Wendl. ex Drude, in Mart. Fl. Bras.*
Wendlandii, *Hort.—Cj'. Gard. Chron.* (1878) I. 440.—Hab.?
Willdenowii, Klotzsch, in Bot. Zeit. iv. (1846) 112 = simplicifrons.
Wittigiana, *Glas. ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. H. 409.—F
zamor *ten> ex Hi Wendt in Kerch.* **Pa*• 246.—Ecuador.**

GEOPHILA, Berger, Fl. Basses-Pyren. ii. 184 (1808) - **Merendera,** Ram. (Liliac).
pyrenaica, Berger. 1. c. = M. Bulbocodium.

OEOPHTLA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 186 (1825). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 127.
Afzelii, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 221.—Afr. trop.
cordata, *Betto, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 282.—Porto Rico.
cordata, Miq. in Linnaea, xvii. (1848) 72 (=*Mapouria cordata').*—Bras.; Guian.
cordifolia, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 176.—Guian.
dichondraefolia, A. Conn, in Ann. Nat. Hist. ii. **(1889)** 208=Nertera gracilis, dichondraefolia.
diversifolia, DC. Prod. iv. 687-renifonnis.
Gerrardi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 413.—Madag.
gracilis, *DC. Prod.* iv. 537.—Peruv.
hirsuta, *Benth. in Hoot. Niger Fl.* 422.—Afr. trop.
hirta, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1861) 247.—Borneo.
Hastmanniana, Miq. Stirp. Surin. Sel. 176 = cordifolia.
hydrocotyloid.es, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 319**reniformis.
involucrata, *Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 222.—Afr. trop.
lancistipula, *Hiern, I. c.* 221.—Afr. trop.
macropoda, *DC. Prod.* iv. 587.—Peruv.
obvallata, *F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 186.—Afr. trop.
reniformis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 187 = Psychotria herbacea.
reniformis, *D. Don, Prod. FL Nep.* 186.—Cosmop. trop.
uniflora, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 221.—Afr. trop.
uniflora, Span, in Linnaea, xv. (1841) 818—reniformis.
violacea, *DC. Prod.* iv. 537.—Am. austr.
violaefolia, *DC. I. c*—N. Granat.
Zollingeriana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 312.—Java ?

GEORCHIS, Lindl. in Wall. Cat. n. 7379 (1831); in Bot. Reg. sub t. 1618 (1833); et Gen. et Sp. Orch. 496 (1840)-Ooodyera, R. Br. (Orchid.).
bifida, Reichb. '. in Bonplandia, v. (1S57) 35 = Goodyera bifida.
biflora, Lindl. in Wall. Cat. n. 7879.—Reg. Himal.
calva, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 184.—**Java.**
cordata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 496= Goodyera cordata.
foliosa, Lindl. 1. c.—Ind. or.
rubicunda, Reichb. f. in Bonplandia, v, (1857) 35 = Goodyera rubicunda.
Schlechtendaliana, Reichb. f. 1. c. 36 = Goodyera Schlcchtendaliana.
subregularis, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 61.—N. Caled.
viridiflora, F. Muell. Fragm. viii. 25 = Goodyera viridiflora.
vittata, Lindl. iii Journ. Linn. Soc. i. (18S7) 184.—Ind. or.

GEORGIA, Spreng. Anleit. ii. n. 567 (1818)-Dahlia, Cav. (Compos.).
bipinnata, Spreng. Syst. iii. 611—Cosmus bipinnatus.
variabilis, Spreng. 1. c. 610 = D. variabilis.

GEORGINA, Willd. Sp. PI. iii. 2124 (1803)= Dahlia, Cav. (Compos.).
astrantiaeflora. Sweet, Hort. Brit ed. II. 310-D. astrantiaeflora.
Cervantesii, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser II. i. t.22 = D. coccinea.
cocdnea, Willd. Sp. PL iii. 2124 = D. coccinea.
crocata, Sweet, Brit. Flow. Gard. t 282-D. coccinea.
frustranea.VC. in Ann. Mus. Par. xv. (1810)810 = - D. coccinea.
purpurea, Willd. Sp. PI. iii. 2124 - D. variabilis.
rosea, Willd. 1. c - D. varaibilis.
scapigera, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. ^888) 197 = D. scapigera.
superfiua, DC. in Ann. Mus. Far. xv. (1810) 310 = D. variabilis.
variabilis, Willd. Hort. Berol. i. 98 - D. variabiiis.

GERACIUM, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1867 (1828) = **Crepis,** Vaill. (Compos.).
aureum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 259 = C. aurea.
chondrilloides, Reichb. 1. c. 260 = C. Jacquinl.
croaticum, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1368 = C. succisaefolia.
cydoniaefolium, Reichb. 1. c. 1869 = Hieracium cydoniaefolium.
incarnatum, Reichb. 1. c. 1867 = C. incarnata.
lapsanoides, Reichb. 1. c. 1367, in nota-C. lampsanoides.
molle, Schur, Enum. PI. Transs. 877 - C. succisaefolia.
paludosum, Reichb. in Moessl. Handb. ed. IL ii. 1368 •=C. paludosa.
parviflorum, Reichb. 1. c 1367 =C. incarnata.
praemorsum, Reichb. 1. c = C. praemorsa.
prenanthoides, Reichb. I. c. 1369 » Hieracium prenanthoides.
succisaefolium, Reichb. 1. c. 1368 = C. succisaefolia.
tingitanum, Reichb. 1. c. 1367, in nota =• C. tingitana)
viscidulum, Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, xviii. (1862) I. 349-C. viscidula.

GERAEA, Torr. *Sc* Gray, in Proc. Am. Acad. i. (1847 i 48 = Enoelia, Adans. (Compos.).
canescens, Torr. & Gray, 1. c. 4J = E. eriocephala.

GERANION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vh. (1880) 126 = seq.

OEHANIUM, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735). *GERANIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 272.
RAMPHOCARPUS, Neck. Elem. ii. 438 (.1790}.
ROBERTIUM, Picard, in Mem. Soc. Agric. Boulogne, Sér. II. i. (1837) 99.
abortivum, De Not. ex Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1888) 349 - molle.
abrotanifolium. Linn. f. Suppl. 804 - Pelargonium abrotanifolium.
absinthoides, Poir. Encyc. Suppl. ii. 741 » Eroilium absintboides.
acaule, DC. Prod. i. 649, in syn.^ Pelargonium longifolium.
acaule, Linn. Syst. ed. X. 1143»Erodium romanum.
acaule, Thunb. Prod. PI. Cap. 116 => I'elargonium acaule.
acaule, *Willd. ex H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 231.—Ecuador.
acerifolium, Cav. Diss. 243 — Pelargonium acerifolium.
acetosum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. lti « Pelargonium scandens.
acetosum, Linn. Sp. PI. 678 - Pelargonium acetosum.
Acknerianum, *Schur, Enum. PI. Transs.* 186.— Transylv. (cult.).
aconitifolium, Eichw. Skizze, 170 - pratensU >.
aconitifolium, Knaf, ex Nym. Consp. 137 =sylvaticum.
aconitifolium, L'Hirit. Gerau. t. 40-rivulare.
acrocarphum, *Ledeb. Fl. Ross. i.* 471.—Soongaria.
aculeatum, J. F. Gmel. Syst. 1024 <= Pelargonium aculeatum.
aculeolatum, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 291.—Afr. trop.
acuminatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 116 » Pelargonium acuminatum.
adulterinum, Thunb. 1. c. 115 «• Pelargonium adulterinum.
aethiopicum, Lam. Encyc. ii. 662 <= Erodium cicutarium.
affine, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 229.—Sibir. altaic.
affine, Poir. Encyc. Snppl. ii. 767 = Pelargonium spathulatum.
affine, Wight & Am. Prod. 133-nepalense.
africanum, Cav. Diss. 242 - Pelargonium odoratissimum.
agavacense, *Willd. ex H. B. It K. Nov. Gen. et Sp.* v. 231.—Peruv.
albanum, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii. 137.—Reg. Caucus.; Persia.
albicans, *St. Hit. Fl. Bras. Mer.* i. 103.—Bras.
albiflorum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 116. t. 40 - Richardsoni.
albiflorum, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 230.—Sibiria.
album, Picard, in Mém. Soc. Agric. Boulogne, Sir. II. i. (1837) 129 = molle.
alceoides, Burm. f. Spec. Geran. 82 — Pelargonium grossularioides.

GERANIUM:—

alchemilloides, Linn. Sp. PI. 678 = Pelargonium alchemilloides.
alnifolium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 768 = Pelargonium alnifolium.
alpestrc, Schur, Enum. PI. Transs. 185=sylvaticnm.
alpinum, Burm. f. Spec. Geran. 30 = Erodium alpinum.
alpinum, ***Kit. ex Kaniti, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,*** xiii. (1863) 531.—Hnngar.
altaicum, ***Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.*** **276,** nomen.—Sibir. altaic.
a!tertians, Poir. Encyc. Suppl. ii. 766 =• Pelargonium alternans.
altkaeoides. Linn. Sp. PI. 679 = Pelargonium althaeoides.
amethystinum, Ledeb. ex Norclm. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. ii. (1887) 314 = ibericum.
anceps, Poir. Encyc. Suppl. ii. 748 — Pelargonium anceps.
anemonaefolium, *L'Hirit. Geran.* t. 36.—Ins. Fortunat.
anrmonoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 112 = Monsonia filia.
angelina, *Nois. ex Steud. Nom.* ed. I. 864, nomen.—Hal,.?
angulatum, *Curt. Bot. Mag.* t. 203.—Thracia.
angulosum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 22 = Pelargonium acerifolium.
angustifolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 176=dissectum.
angustifolium, Thunb. Prod. PI. Cap. 118-Pelargoniiim angustifolium.
anthem ifajiuvi, Poir. Encyc. Suppl. ii. 742 = Erodium anthemidifolium.
aphanoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 113 = Pelargonium aphanoides.
apiifolium, Andr. Geran. ii.=Pelargonium apioides.
appendiculatum, Linn. f. Suppl. 304 = Pelargonium appendiculatum.
apricum, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 676.—Chili.
arabicum, ***Forsk. Fl. Aegypt. Arab.*** **124.—Arab,**
arachnoideum. *St. Hit. Fl. Bras. Mer.* i. 102.—Bras.
arborcscens, Desf. Fl. Atlant. ii. 110 — Erodium arborcscens.
arboreum, ***A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.*** **i. 315.** t. 31.—Ins. Sandvic.
ardens, Andr. Geran. i.—Pelargonium ardens.
ardescens, *Andr. I. c.* ii.—Hab. ?
ardjnnense, ***Zoll.*** **b*** ***Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. NeM. Indie,*** ii. (1845) 585.—Java.
arduinum, Linn. Sp. PI. ed. II. 952 =• Erodium arduinum.
arenarium, Burm. f. Spec. Geran. 43 = Pelargonium arenarium.
arenicolum, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856[1]) 439.—Reg. Magellan.
argenteum, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pe'lop. 44 = subcaulescens.
argenteum, Gcners. Elench. Scepus. n. 643; ex Wahlenb. Fl. Carpat. 208 = sylvaticum.
argenteum, *Linn. Cent.* ii. 26; *Amoen. Acad.* iv. 324.—Europ.
argenteum, Luce, Fl. Osil. 286 = molle.
armenum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 878.—Armenia.
Arnottianum, Steud. Nom. ed. II. i. 677 = nepalense.
articulatum, Cav. Diss. 252 — Pelargonium articulatnm.
asperi/olium, Andr. Geran. l =^ Pelargonium aspcrifolium.
asperum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 759 = Pelargonium quercifolium.
aspkodeloides, Bory & Chaub. Nonv. Fl. Pélop. 44 = peloponnesiacum.
asphodeloides, *Burm. f. Spec. Geran.* 28.—Ital.; Graec.; As. Min.
asphodeloides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 40" subcaulescens.
asplenioides, Desf. Fl. Atlant. ii. 109 = Erodium asplenioides.
astragalifolium, Cav. Diss. 257 = Pelargonium astragalifolium.
atlanticum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 59.—Algeria.
atrum, Moench, Meth. 285-carolinianum.
atrum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 746 -= Pelargonium atrum.
aurieulatum, Poir. 1. c. 745 = Pelargonium longifolium.
auritum, linn. Sp. PI. 679 = Pelargonium aurltum.

GERANIUM:—

australe, Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 162—dissectum.
australe, Poir. Encyc. Suppl. ii. 764—Pelargonium australe.
ayavacense, Steud. Nom. ed. II. i. 677=agavacense.
Backhousianum, Regel, in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 432-Grevilleannm.
baicalense, Turcz. ex Bess, in Flora, xvii. (1834) I. Beibl. 9 = albiflorum.
balsameum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 754 = Pelargonium scabrum.
barbatum, Andr. Bot. *Rep.* t. 303 = Pelargonium aristatum, setigerum.
barbatum, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. II. iv. 142 = davuricum.
Barringtonii,Poir. Encyc. Suppl. ii. 751 = Pelargonium Barringtonii.
batrachioides, Cav. Diss. 211 — sylvaticum.
batrachyoides, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. i. 677=Endressi.
Baumgartenianum, Schur, Enum. PI. Transs. 138 = pusillum.
Beaufortiae, *Andr. Geran.* i.—Hab. ?
Beaufortianum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 748 = Pelargonium Beaufortianum.
Berterianum, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* xxxvii. (1834) 45.—Chili.
betonicum, Burm. f. Spec. Geran. 32 = Pelargonium myrrhifolium.
betulinum, Linn. Sp. PI. 679 = Pelargonium betulinum.
bicolor, Jacq. Hort. Vindob. iii. 23 = Pelargonium bicolor.
bicolor, Koyle, Illustr. Bot. Himal. 149 = ocellatum.
biflorum, *Cav. Diss.* 251.—Afr. austr.
bifolium, Burm. f. Spec. Geran. 52 = Pelargonium bifolium.
bifolium, Maxim. Prim. Fl. Amur. 467=dahuricum.
bifolium, Patrin, ex DC. Prod. i. 642 = Fseudosibiricum.
Bigosa, *Nois. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 677, nomen.—Hab.?
bipinnatum, Cav. Diss. 273-Erodium cicutarium.
Blandfordium, Andr. Geran. ii. - Pelargonium Blandfordianum.
blattarium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 748=Pelargonium ovale.
bohemicum, Krock. Fl. Siles. ii. n. 120 = divaricatum.
bohemicum, ***Linn. Cent.*** **ii. 26;** ***Amoen. Acad.*** **iv.** 323.—Bohemia.
Botrys, Cav. Diss. 218-Erodium Botrys.
brasiliense, *Prog, in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 522.—Bras.
brevieaute, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 252 = sessiliflornm.
brevipes, L'Hérit. ex DC. Prod. i. 639-sessiliflorum.
Briceanum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 74, nomen » Robertianum ?
Broadleyae, Andr. Geran. i=Pelargonium Broadleyae.
brutium, ***Gasp, in Rendic. Ace. Nap.*** **i. (1842) 49.—** Calabria.
bubonifolium, Andr. Bot. Rep. t. 328 = Pelargonium bubonifolium.
bulbosuro, *Opis, ex Steud. Nom.* ed. I1-i. 677, nomen.—Hab.?
caeruleatum, Schur, Enum. PI. Transs. 136 = pratense.
caeruleo-purpureum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 176 = sylvaticum.
caeruleum, Gilib. 1. c. 174= pratense.
caeruleum, Moench, Meth. 284 = bohemicum.
caeruleum, Patrin, ex DC. Prod. i. 642 = Pseudosibiricum.
caespitosum, ***James, ex Torr. in Ann. Lye. N. York,*** ii. (1828) 173.—N. Mexic.
caespitosum, ***Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.*** **xix.** ***Suppl.*** i. (18431 315.—Peruv.
caffrum, *Edl. &* Zeyh. Enum.* 58.—Afr. austr.
campestre, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 112 - Pseudo-sibiricum.
canariense, Poir. Encyc. Suppl. ii. 762—Pelargonium canariense.
canariense. *Rent.—Cf. Linnaea,* xxix. (1867-58) 722.—Teneriffa.
canescens, *L'Hirit. Geran.* t. 38.—Afr. austr.
canescens, *Wedd. Chlor. And.* ii. 286.—Peruv.
capillare, Cav. Diss. 258 = Pelargonium capillare.
capitatum, Linn. Sp. PI. 678 = Pelargonium capitatum.
carnosum, Linn. Cent. ii. 20-Pelargonium camosum.
caroliniannm, *Linn. Sp. PI.* 682.—Am. bor.

GERANIUM :-

carolinum, Crantz, Inst. ii. 156 = praec.
cataractarum, *Coss. Notes Crit.* 99.—Hispan.
caucalifolium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 750 = Pelargonium caucalifolium.
ceratophyllum, Poir. 1. c. 766 = Pelargonium ceratophyllum.
chaerophyllum, Cav. Diss. 226 = Erodium cicutarium.
chamaedrifolium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 747 = Pelargonium chamaedrifolium.
chamaedrioides, Cav. Diss. 197 = Erodium chamaedryoides.
Chelidonium, Hontt. Handleid.x. 8. t. 61.1. 1=Pelargonium Chelidonium.
chilloënse, ***Willd. ex H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.*** **v.** 231.—Ecuador.
chium, Burm. f. Spec. Geran. 82 = Erodium chium.
choorense, Koyle, Illustr. Bot. Himal. 150 = ocellatum.
ciconium, Linn. Cent. i. 21 — Erodinm ciconium.
cicutarium, Linn. Sp. PI. 680 = Erodium cicutarium.
ciliatum, Andr. Bot. Rep. t. 247—Pelargonium concavifolium.
ciliatum, Cav. Diss. 234 = Pelargonium pamassioides.
ciliatum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 71 = cucullatum.
cineraceum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 894 = cinereum.
cinereum, Boiss. & Reut. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 525 = subargenteum.
cinereum, *Cav. Diss.* 204. t. 89. f. 1.—Mont. Pyren.
circinatum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 570.—Hungar.
dtriodorum, Cav. Ic. i. 6= Pelargonium acerifolium.
coelestinum, Schur, Enum. PI. Transs. 186 — pratense.
collinum, *Steph. ex Willd. Sp. PI.* iii. 705.—Europ. or. i As. bor.
columbinum, *Linn. Sp. PI.* 682.—Europ.; As. bor.
commutatum, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 439.—Chili.
compar, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65, nomen ** simense.
concavifolium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 752 = Pelargonium concavifolium.
condensatum, Poir. 1. c. 757 = Pelargonium condensatum.
conduplicatum, Poir. 1. c. 761 - Pelargonium condupU'catum.
consanguineum, Poir. 1. c 759 = Pelargonium cons»nguineum.
contortum, Eckl. & Zeyh. Enum. 59 = omithopodum.
cordifolium, Andr. Geran. i. = Pelargonium condupB'catum.
cordifolium, Cav. Diss. 240=Pelargonium cordatum-
Core, Kostel. Allg. Med. Pharm. Flora, v. 1900 = rotondifolium.
Core-Core, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 438=p»e/-
coriandrifolium, Linn. Sp. PI. ed. II. 949 = ?**" gonium myrrhifolium.
coronillaefolium, Andr. Bot. Rep.t. 305 = PelargonH"[11] coronillaefolium.
coronopifolium, Andr. 1. c. t. 338 = Pelargonium *eoro*nopifolium.
corsicum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 743 = Erodn"" corsicum.
cortusaefolium, Andr. Bot. Rep. t. 121 - Pelargon""[0] cortnsaefolium.
Cotyledonis, Linn. Mant. ii. 569=Pelargonium Cotyledonis.
crassicaule, Poir. Encyc. Suppl. ii. 752-Pelargon""[1] crassicaule.
crassifolium, Cav. Diss. 219-Erodium alnifolinni;.
crassifolium, Desf. Fl. Atlant. ii. 111 = ErodH"" hirtnm.
crassifolium, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 123=Erod»"[1] glaucophyllum.
crassipes, Hook, ex A. Gray, in Bot. U. St Expl. Exped. i. 309 = sessiliflorum.
crassum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 741 = Erodium crassifolium.
crataegifolium, Roth, Bot. Abh. 50. t. 9 = PelargoW» glutinosum.
crataegifolium, Thunb. Prod. PI. Cap. 115 - Feuil. gonium crataegifolium.
crenatum, Andr. Geran. ii - Pelargonium crenatS?'gJ)
crenatum, A[1]. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (188[1]884—Mexic.
crenopkilum, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 117 = asphodeloides.

GERANIUM:—
crispum, Berg. Desc. PI. Cap. 176 = Pelargonium crispum.
"•istatum, Stev. in Me'm. Soc. Nat. Mosc. iv.(1813) SO = albanum.
crithmifolium,'Patt. Encyc.Suppl.ii.756=Pelargonium crithmifolium.
cucullatum, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 231.—Am. austr.
cucullatum, linn. Sp. PI. 677=Pelargonium eucullatum.
cuneatum, *Hook. Ic. PI.* 1.198.—Ins. Sandvic.
cynosbatifolium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 758-Pelargonium malvaefolium.
dahuricmn, *DC. Prod.* i. 642.—Dahuria.
aaucifolium, Murr. in Comm. Gotting. (1780) 18 = Pelargonium flavum.
daucifolium, Thunb. Prod. PI. Cap. 116-Pelargonium daucifolium.
declinatum, *Moench, Meth. Suppl.* 97.—Hab.»
decumbent, Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) App. i. 11 . = Pelargonium triste.
aehcatulum, *Tenon V Guss. ex Tenore, Fl. Nap.* v. P. xii._Italia.
«phini/olium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 752 = Pelargonium delphinifolium.
tentatum, Andr. Geran. i. = Pelargonium dentatum.
"enticulatum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 755 - Pelargonium denticulatum.
uiHusum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 230.—Peruv.
'fffsum, Picard, in Mem. Soc. Agric. Boulogne, oer. II. i. (i837) 121 = columbinum.
"petalum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 744 = Pelargonium d'petalum.
**phyllum,* L'Herit. ex DC. Prod. i. 646-Erodium laciniatum.
O'ssectum, *Linn. Cent.* i. 21.—Europ. J As. bor.; Austral,
"varicatum, *Ehrh. Beitr.* vii. 164.—Europ.; As. bor. etocc.
Waricatum, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 91-bohemic.
officatum, Thunb. Prod.PI. Cap. 116-Pelargonium aivaricatum.
"'versifolium.Yau. Encyc. Suppl. ii. 750 = Pelargonium glaucum.
"onianum, Hook. f. & Thorns, in Hook. f. Fl. Brit. ind. i. 481-polyanthes.
"onianum, Sweet, Geran. iv. sub t 388-coUinum.
*«*i«», Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. i. 327 = pusillum.
»pUcatum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 567.-Wungar.
"hinatum, Andr. Bot. Rep. 1.158-Pelargonium saepenorum.
tonatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 114 = Pelargonium aculeatum.
«<«»,, Picard> In M6n- So& Agric. Boulogne, Ser. II. (1837) 133 = pusillum.
"fgans, Andr. Bot. Rep. t. 28-Pelargonium elegans.
gans, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. »=Pelargonium betulinum.
pticum, Thunb Fl. Cap. ed. Schult. 625 - Pelargonium ellipticum.
*£*gatum,* Cav. Diss. 283 = Pelargonium tabulare.
ngatum, Salisb. Prod. 810 = incanum.
\£?*rginat,"*> Linn. f. Suppl. 806-Monsonia ovata.
emmense, *HiU. V Boj. ex Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* End ?• (1862) «.: vil (1864) 185.-Madag. (1832)
&T~30 in Ann. Sc. N ur L xxv
'"satum, TfoinbTpJod. PI. Cap. 113 = Pelargonium ensatum.
wiaiithum,flc. *Prod.* i. 641.—Sibiria ; Am. bor. occ.
K0?"' und.- •• Bot. Reg. (1841) Misc. 44 j (1842)
D. Don, Prod. Fl. Nep. 208 = Grevilleanum.
, *Fisch. ex DC. Prod.* i..641.-Dahuna.
Poir. Encyc- ^PP1- "• 759-Pelargonium
**sum,* Thunb. Prod. PI. Cap. 112-Pelargonium expansum.
'Mhulatum, Cav. Diss. 253 = Pelargonium exstipulatum.
, Auct. = *foetidum.*
, Pseud. in Flora, xxxix. (1856) 489.—Peruv.
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vi. (1856) 4»2._Servu.

GEBANIUM:—
fastigiatum, Gliem. ex Bab. in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 800-sylvaticum.
favosum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 1 7. —Abyssin.
ferulaceum, Burm. f. Spec. Geran. 52-Pelargonium ferulaceum.
Ficaria, Poir. Encyc. Suppl. ii. 745 = Pelargonium Ficaria.
fimbriatum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 18 - Pelargonium cucullatum.
fissifolium, Andr. Bot. Rep. t. 878 = Pelargonium fissifolium.
flavum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 19 = Pelargonium flavum.
flexuosum, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docnm. 1B7 ornithopodon.
flexuosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 116—Pelargonium flexuosum,
floribundum, Andr. Bot. Rep. 1. 420 = Pelargonium floribundum.
foetidum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 178 = Robertianum.
formosum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 748 Pelargonium formosissiinum.
fragile, Andr. Bot. Rep. t. 37 = Pelargonium trip.trtitum.
fragrans, Foir. Encyc. Suppl. ii. 751-Pelargonium fragrans.
Fremontii, *Torr. ex A. Gray, PI. Fendl.* 26.—Am. bor. occ.
Freyeri, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 126-nodosum.
frigidum, *Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.* 116. —Abyssin.
fruticosum, Cav. Diss. 268—Pelargonium fruticosum.
fulgidum. Linn. Sp. PI. 676 = Pelargonium fulgidum.
furcatum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 567 - duplicatum.
furcatum, Schnr, Enum. PI. Transs. 138=dissectum.
fuscatum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 763—Pelargonium saniculaefoliuin.
fuscuni, Linn. Mant. i. 97 = phaeum.
geifolium, Desf. Fl. Atlant. ii. 108-Erodium hymcnodes.
gibbosum, Linn. Sp. PI. 677 -Pelargonium gibbosum.
glaberrimum, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 116. —As. Min.
glandulosum, Civ. Diss. 271-Erodium macradenum.
glandulosum, Lehm. ex Eckl. & Zeyh. Enum. 68 canescens.
glaucoides, Andr. Geran. i = Pelargonium glaucum.
glaucophyllum, Linn. Sp. PI. 679-Krodium glaucophyllum.
glaucum, Burm. f. Spec. Geran. 47 - Pelargonium glaucum.
glaucum, Cav. Diss. 237 - Pelargonium ovale.
glomeratum, Andr. Geran. ii Pelargonium australe.
glutinosum, Jacq. Coll. i. 85 = Pelargonium glutinosum.
gracile, *Engelm. in A. Gray, PI. Fendl.* 27.—Mexic.
gracile, *Ledeb. ex Nor dm. in Bull. Sc. Acad. Pitenb.* ii. (1837) 314.—Reg. Caucas.
gracile, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. ili. (1845) 308 = Schrcnkianum.
eracilipes, *Triana* fa" *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. xvii. (1S78) 118.—N. (Jranat.
grandiflorum, Andr. Bot. Rep. t. 12-Pelargonium grandiflorum.
grandiflorum, Cav. Diss. 194-Monsonia tenuifolia.
grandiflorum, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 42 = palustre!
grandiflorum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 174 = sanguineum.
grandiflorum, Gueldenst. Rsise, i. 426 = ibericum.
grandiflorum, Linn. Sp. PI. 683 = Grielum tenuifolium.
gratissimum, *Nois. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 678, nomen.—Hab. ?
gratum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 768 - Pelargonium gratum.
graveolens, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 495-Robertianum.
Grenvilleae, Andr. Geran. i, cum ic. = Pelargonium conspicuum.
Grevilleanum, *Wall. PI. As. Rar.* iii. 4.-Reg. Himal.
grossularioides. Linn. Sp. PI. 679 = Pelargonium grossularioides.
gruinum, Linn. 1. c. 680-Erodium gruinum.
guttatum, Desf. FL Atlant. ii. 118 - Erodium oxyrhinchum.
gymnocaulon, DC. Prod. i. 641 = ibericum.

GERANIUM:—
haemanthum, VV'illd. ex Sprang. Syst iii. 74 = asphodeloides.
hederaefulium, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 22» Pelargonium saniculacfolium.
hederinum, Andr. Geran. i — Pelargonium lateripes.
heliotropioides, Cav. Diss. 220 — Monsonia heliotropioides.
hermanniaefolium. Berg. Desc. PI. Cap. 177 - Pelargonium crispum.
hennannioides, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 19.—Afr. austr.
Hemandesii, *Moc. V Sesse, ex DC. Prod.* i.640.—Mexic.
heterogamum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 747 = Pelargonium heterogamum.
heterophyllum, Andr. Geran. ii Pelargonium Andrewsii.
heterophyllum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 746 Pelargonium heterophyllum.
heterophyllum, Thunb. Prod. PI. Cap. 113-Pelargonium variifolium.
hctcrotriuhon, *Sm. ex Royle, Jllustr. Bot. liimal.* ISO, numen.—Rug. Himal.
himalayense, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldcin. Keisc, 132 = pratense.
hirsutum, Burm. f. Spec. Geran. 50 = Pelargonium atruin.
hirtum, Burin, f. 1. c. 48 — Pelargonium tenuifolium.
hirtum, Forsk. Fl. Acgypt. Arab. 123 = Erodium hirtum.
hirtum, Willd. ex Sprang. Syst. iii. 72-Henaiulciii, muxicanum.
hispidum, Linn. f. Suppl. 304 Pelargonium hispidum.
holosericeum, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 72.—Am. austr.
Homeanum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mot>. (1808)1. 5!)l = dissectum.
Hookerianum, Walp. Kcp. i. 45U Kichardsoni.
Humboldtii, *Spreng. Syst.* iii. 70.—Am. austr.
humile, Cav. Diss. 202 pusillum.
hybridum, Linn. Mant. i. 97 Pelargonium hybridum.
hymenudes, Andr. Hot. Rep. t. 413 — Kroilium hymenodes.
hypoleucum, Itenth. PI. Hartw. 186-acaule.
ibericum, Cav. *Diss.* 209. t. 124. f. 1.—Reg. Caucas.
ignescens, Andr. Geran. i Pelargonium ignuicens.
impar, Steud. Nom. ed. II. i. 678, sphalm. vide *compar.*
incanum, *Burm.f. Spec. Geran.* 28.—Afr. austr.
incanum, E. Mey. in Drege, Zwei l'fl. Docuin. Ifc7 - sericeum, *Han.*
incarnatum, Linn. Syst. ed. X. 1142 — Erodium incarnatum.
incisum, Andr. Bot. Rep. t. 67 — Pelargonium incisum.
incibum, *Nutt. ex Torr. b" Gray, Fl. N. Am.* i. 20.— Am. bor. occ.
incrassatum, Andr. Bot. Rep. t. 246 = Pelargonium incrassatum.
inodorum, G. Don, Gen. Syst. i. 721 = Robertianum.
inodarum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 752 - Pelargonium australe.
inquinans, Linn. Sp. PI. 676 — Pelargonium inquinans
intermedium, *Colla, in Mem. Ace. Torin.* (1834) 46.-Chili.
Irbyanum, *Andr. Geran.* i.—Hab. T
japonicum, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 305.— Japon.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 30.—Persia.
Kramcri, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 306 Japon.
lacerum, *Andr. Geran.* ii.—Hab.?
lacerum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 749 Pelargonium myrrhifohum.
laciniatum, Andr. Bot. Rep. tt. 131,269-Pelargonium longifolium, penniforme.
laciniatum, Cav. Diss. 228 = Erodium laciniatum.
laetum, Ledeb. Fl. Alt. iii. 228 = dahuricum t
laevigntum, Burm. ex DC. Prod. i. 640 - anemonacfolium.
laevigatum, Linn. f. Suppl. 306-Pelargonium laevigatum.
laevigatum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 150 -- lucidum.
Lamberti, Sweet, Geran. iv. t. 338 - Grevilleanum!
lanatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 114 - Pelargonium cordatum.

GERANIUM: :—
lancastriense. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 » sanguineum.
lanceolatum, Cav. Diss. 285=Pelargonium glaucum.
lanuginosum, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 8=carolinianum.
lanuginosum, *Lam. Encyc.* ii. 666.—Nnmidia.
lasiopus, *Boiss. ff Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 117—As. Min.
lateripes, Poir. Encyc. Suppl. ii. 763 = Pelargonium lateripes.
latistipnlatum, *Hochst. ex A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* i. 117.—Abyssin.
Lamianum, Nimmo, in J. Grah. Cat. PI. Bomb. Add. post Ind. - Monsonia senegalensis.
Lebelii, Bor. Fl. Cent. FT. i. 324=Robertianum.
teiocaulon, Ledeb. Fl. Ross. i. 470 = molle.
lenticulum, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 84.—Am. bor.
leucanthum, *Andrz. ex Trautv. in Ad. Hort. Petrop.* viii. (1883) 177, nomen.—Rossia.
leucanthum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 103.—Reg. Argent,
libanoticnm, *Boiss. V Blanche, in Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 78.—Syria.
libanoticum, Schenk, PI. Sp. Aegypt. 39 = tuberosum.
Lindenianum, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Afosc.* xxxi. (1858) I. 418.—Venezuela.
Lindleyanum, Royle, Ulustr. Bot Himal. 150 = Robertianum.
lineare, Andr. Bot. Rep. t. 198=Pelargonium lineare.
linearilobum, DC. Fl. Fr. vi. 629, in nota=tuberosum.
littoreum, Cav. Diss. 222 = Erodium maritimum.
littoreum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 744 = Eiodium littoreum.
lividum, L'Herit. Geran. t 39 = phaeum.
lobatum, Burm. f. Spec. Geran. 44 — Pelargonium atrum, carneum, lobatum.
Londesii, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 196 = collinum.
Londetii, Fisch. ex Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 67-=praec.
longicaule, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 116.—Afr. austr.
longiflorum, Poir. Encyc Suppl. ii. 746—Pelargonium longifolium.
longifolium, Burm. *f.* Spec Geran. 60=Pelargonium longifolium.
longipedatum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126=»eq.
longipes, DC. in Mem. Soc. Phys. Genev. i. (1822) 442 = collinum.
lucanum, Gasp, ex Nyra. Consp. 138=molle.
lucidum, *Linn. Sp. PI.* 682.—Europ.; As. bor.
ludovicianum, *Rafin. Ft. Ludov.* 89.—Am. bor.
lugubre, Salisb. Prod. 309 = macrorrhizum.
lupinoides, *Burm.f. Spec. Geran.* 48.—Afr. austr.
luteum, Andr. Eot Rep. t. 423= Pelargonium luteum.
macrorrhizum, *Linn. Sp. PI.* 680.—Europ. or.
ntacrostylum, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 68=tuberosum.
maculatum, *Linn. Sp. PI.* 681.—Am. bor.
magellanicum, *Hook. f. Fl. Antarct.* 251.—Reg. Magellan.
malacoides, Linn. Sp. PI. 680 = Erodium malachoides.
malapoides, Desf. Fl. Atlant. ii. 112 = Erodium alnifolium.
malvaceum, Wahlenb. Fl. Suec. 452=rotundifolium.
malvaeflorum, *Boiss. V Rent. Pugill. PI. Nov.* 27.— Hispan.; Marocc.
malvaefolium, Schleich. Cat. 25 ; ex DC. Fl. Fr. v. 850 = molle.
malvaefolium, Scop. Fl. Cam. ed. II. it 37 = **pusillum.**
marginatum, Cav. Diss. 230 — Pelargonium marginatum.
maritimum, Burm. f. Spec. Geran. 46 = Erodium maritimum.
maritimum, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 287= Erodium ladniatum.
mascatense, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 69.—Arabia.
Maximowiczii, *Regel V Maack, in Xegel, Tent. Fl. Ussur.* 39.—Sibir. or.
mediterraneum, Jord. Pugill. PI. Nov. 40 = Robertianuin.
melananthon, Foir. Encyc. Suppl. ii. **747** = Pelargonium atrum.
melananthum, Andr. Bot. Rep. t. 209=Pelargonium atrum.
nunthaeodorum, Nocca, ex Steud. Nom. ed. I. 364, 602 = Pelargonium tomentosum.

GERANIUM :—
mexicanum, Hort. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 74=nepalense.
mexicanum, *H. B. &* K. Nov. Gen. et Sp.* v. 230.—Mexic.
microphyllum, *Hook.f. Fl. Antarct.* 8. t. 6.—N. Zel.
Minaae, Tin. PI. Rar. Sicil. (1846) 25-pyrenaicum.
miniatum, Andr. Geran. ii=Pelargonium hybridum.
minimum, Cav. Diss. 260=Pelargonium minimum.
minimum, Picard, in Mem. Soc. Agric Boulogne, Sér. II. i. (1837) 122-dissectum.
minutifiorum, Jord. Cat Dijon (1848); ex ej. Pugill. PI. Nov. 89 = Robertianum.
modestum, Jord. Gr. Jard. Bot. Grenoble (1849) 16; ex Walp. Ann. ii. 234=Robertianum.
molle, Gaertn. Meyer & Scherb. Fl. Wett. ii. 489 = pyrenaicum.
molle, *Linn. Sp. PI.* 682.—Europ.; As. bor.; Oriens.
Monsonia, Thunb. Prod. PI. Cap. 112 — Monsonia pilosa.
monstrum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 769 = Pelargonium in onsTm *ux* *
montanum, *J. F. Gmel. Syst.* 1016.—Sibir.
montanum, Koen. ex O. Muell. in Nov. Act. Nat. Cur. iv. (1770) 209, nomen = phaeum.
moschatum, Burm. f. Spec. Geran. 29 = Erodium moschatum.
mosquense, Gold, in Mem. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 133 = Robertianum.
multicaule, Poir. Encyc. Suppl. ii. 749—Pelargonium multicaule.
multiceps, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 417.—Venezuela.
multifidum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 207 = collinum.
multifidum, Jacq. ex Steud. Nom. ed. II. i. 678 = Pelargonium multicaule.
multifidum, Patrin, ex DC. Prod. i. 645 = Erodium Stephanianum.
multifidum, *Sweet, Geran.* iii. t. 246.—Afr. austr.
multiflorum, *A. Gray, Bot. U. St. Expl.Exped.i.* 811. —Ins. Sandvic.
multipartitum, *Benth. PI. Hartw.* 166.—Ecuador.
murcicum, Cav. Diss. 272=Erodium chium.
myrrhifolium, Linn. Sp. PI. 677 = Pelargonium myrrhifolium.
napellifolium, Schur, Enum. PI. Transs. 186 = pratense.
neapolitanum, Nym. Consp. Index, 949 = pratense.
nemorosum, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. lxx—asphodeloides.
nepalense, *Sweet, Geran.* i. t. 12.—Ind. or.; China.
nervifolium, Poir. Encyc Suppl. ii. 747 = Pelargonium nervifolium.
nobile, Walp. Rep. i. 458, in syn. sphalm. = Pelargonium nobile.
nodosum, *Linn. Sp. PI.* 681.—Europ. austr.
notatum, *Andr. Geran.* ii.—Hab.?
nothum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 758 = Pelargonium nuthum.
nmum, Winterl, Ind. Hort. Pest. f. 2; ex Roth, Catalect. ii. 78=divaricatum.
numidicum, Poir. Voy. Barb. ii. 201 = Erodium cicutarium.
obtusilobum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 769=Pelargoninm obtusilobum.
ocellatum, *Jacquem. Voy. Bot.* 83. t. 88.—Reg. Himal.
Ochsenii, *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1656) 676.—Chili.
odoratissimum, Linn. Sp. PI. 679 «= Pelargonium odoratissimum.
odoratum, Thunb. Prod. PI. Cap. 114 = praec.
Oenotherae, Linn. f. Suppl. 306= Pelargonium Oenotherae.
omphalodeum, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1865) *'11* =trilophum.
omphalodeum, Lange, 1. c. (1867) App. 3 = favosum.
Onaei, *Franco,* b* *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 303.— Japon.
Oreades, Parte Elench. Cma-Gora, 17 = asphodeloides.
orientate, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 13=aspbodeloides.
ornithopodum, *Ectl. If Zeyh. Enum.* 69.—Afr. austr.
male, Burm. t. Fl. Cap. Prod. 19; Thunb. Prod. PI. Cap. 113=Pelargonium ovale.
ovatifolium, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 314. —Ins. Sandvic.

GERANIUM :—
ovatum, Cav. Diss. 388 — Pelargonium ovale, carinatum.
ovatum, Jacq. Coll. ii. 355 -= Pelargonium Oenotherae.
oxalidifolium, Andr. Bot. Rep. t. 300=Pelargonium oxalidifolium.
oxaloides, Burm. f. Spec. Geran. 51 = Pelargonium oxaloides.
oxoniense, *Andr. Geran.* i__Hab. ?
oxyrhinchum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 743—Erodium oxyrhinchum.
pollens, Andr. Geran. ii-Pelargonium stipulaceum.
pollens, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 188 - Asphodeloides.
pallidum, Poir. Encyc Suppl. ii. 759 = Pelargonium pallidum.
pallidum, Royle, ex Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 431=nepalense.
pallidum, Salisb. Prod. 310=columbinum.
pallidum, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. i. 679 * eriostemon.
palmatisectum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 240'Robertianum.
palmatum, Cav. Diss. 216=anemonaefolium.
palmatum, Picard, in Mem. Soc. Agric. Boulogne, Sér. II. i. (1837) 122=dissectum.
palustre, *Linn. Cent.* ii. 25 ; *Amoen. Acad.* iv. 823.—Europ.; As. bor.
papilionaceum, Linn. Sp. PI. 676 = Pelargonium papilionaceum.
partitum, Willd. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 231=agavacense.
parviflorum, Andr. Geran. ii — Pelargonium parviflorum.
parviflorum, Curt. Fl. Lond. fasc vi. t. 46 = Pumillum.
parviflorum, Willd. Enum. Hort. Berol. 716=dissectum.
parvulum. Scop. Delic. Insub. i. 8 = Erodium chamaedryoides.
pastinacaefolium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 37-Pelargonium triste.
patagonicum, *Hook.f. Fl. Antarct.* 252 = dissectum.
patens, Royle, ex Edgew. *8c* Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 431=nepalense.
patulum, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 371=phaeum.
pedatum, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 34.—Am. bor.
pedunculare, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 71 =^potentillaefolium.
pedunculatum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 150, nomen. —Reg. Himal.
peloponesiacum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 11O*~ Graecia.
peltatum, Linn. Sp. PI. 678 = Pelargonium peltatum.
penicillatum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 758=Pelargonium betnlinum.
penniforme, Poir. 1. c 757 —Pelargonium penniforme.
pentagynum, Engelm. in Wisliz. Tour N. Mexic. 9» =Richardsoni.
pentandrum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 178 = Erodm* cicutarium.
perenne, Huds. Fl. Angl. ed. I. 266 = pyrenaicum.
¥emymoni\,Shuttlew.ex Barb, in Bull. Soc. Daup»- (1881) 824.—Europ.
petraeum, Gouan, Illustr. 45. t. 21. f. 1-Erodiun[1] petraeum.
Petroselinum, L'H&it. ex Webb & Berth. **Phyt.** Canar. i. 22 = Erodium cicutarium.
phaeum, *Linn. Sp. PI.* 681.—Europ.
phaeum, Sebast. & Maur. Fl. Rom. Prod. 225 = «" Aexum.
phaeum, Siev. in N. Nord. Beitr. vii. 229=eriostemO»-
philonotum, DC. Prod. i. 639=dissectum.
pictum, Andr. Bot. Rep. t. 168=Pelargonium Pol-chellum.
pilesum, Cav. Diss. 278 J Andr. Bot. Rep. t. aow-Pelargonium pilosum.
pilosum, Foist, f. Prod. 91 = dissectum.
pilosum, 'Th.' ex Nym. Consp. 140=Erodium «cutarium.
***pimpinellaefolium,* Moench, Meth. 282 = Erodium** cicntarium.
pingue, Thunb. Prod. PL Cap. 116 = PelargonM"[1] pingue.
pinnatifidum, Burm. f. Spec. Geran. 50-PelargonW"[1] cameum.
pinnatifidum, Moench, Meth. 282 = Erodium r°" roanum.

GERANIUM:—
pinnatifidum, Murr. ex Stend. Nom. ed. II. i. 679 = Pelargonium quercifolium.
pinnatifidum, Picard, in Mém. Soc. Agric. Boulogne, Sér. II. i. (1837) 125 = rotnndifolium.
pinnatum, Cav. Diss. 267 — Pelargonium pinnatum.
pinnatum, Linn. Sp. PI. 677 = Pelargonium astragalifolium.
platypetalum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 26 «= ibericum.
plica turn, Thunb. Prod. PI. Cap. 116 = Pelargoninm plicatum.
Polyanthes, *Edgew. b[1] Hook. f. in Fl. Brit. Ind.* L 481.—Reg. Himal.
Potentillaefolinm, *DC. Prod.* i. 639.—Mexie.
potentilloides, Bonpl. ex Wedd. Chlor. And. ii. 284= acanle.
potentilloides.Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 123 = rotundifolium.
Potentilloides, L'Hérit. ex DC. Prod. i. 639 =dissectum.
potentilloides, Willd. ex Sprang. Syst. Hi. 70 = Humboldtii.
praecox, Cav. Diss. 272 = Erodium primulaceum.
Praemorsum, Andr. Bot. Rep. t. 150 = Pelargonium quinatum.
Pretense, *Linn. Sp. PI.* 681.—Europ.; As. bor.
Procumbent, Andr. Bot. Rep. t. 254 = Pelargonium procumbens.
Proliferum, Burm. f. Spec. Geran. 51 = Pelargoninm barbatum.
Pfolifimm, Linn. Sp. PI. ed. II. 949 = Pelargonium astragalifolium.
Propinquum, Salisb. Prod. 310=rotnndifolium.
Prostratum, Cav. Diss. 196-sangnineum.
Proximum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 679.—Chili,
"eudo-molle, *Pantol. Adnot. Fl. Hercegov.* 121.—Europ.
*[p]*fudo-pusillum,* Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xviu. (1868) 817 = pusillum.
*[p]*evdo-sibiricum,* Maxim. Prim. Fl. Amur. 71 = uahuricum.
Pscudo-sibiricum, *J. Mayer, in Boehm. Abh.* (1786) 288.—Japon.
*[p]*eudo-villosum,* Schur, Enum. PI. Transs. 921 = villosum.
Psilostemon, Ledeb. Fl. Ross. i. 465=armenum.
Pobescens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 113.—Afr. austr.
Pvbescens, Willd. ex H. B. *St.* K. Nov. Gen. et Sp. v. 281-chilloënse.
*P*lckellum,* Poir. Encyc. Snppl. ii. 758 = Pelargonium Pulchellum.
P"lverulentum, Cav. Diss. 272 = Erodium Cavanillesii.
Pulverulentum, Desf. Fl. Atlant. iL 111-Erodium laciniatum.
PHmilum, Picard, in *Mini.* Soc. Agric. Boulogne, Ser. "•i. (1837) 181=pyrenaicum.
*P*milum,* Poir. Encyc. Suppl. ii. 751 - Pelargonium "eandens.
Punctatum, Andr. Bot. Rep. t. 60 = Pelargonium punctatum.
*P*nctatum,* Cav. ex Stcud. Nom. ed. 1.866 = Erodium "icarnatum.
P"ngens, Poir. Encyc. Snppl. ii. 759=Pelargonium spinosum.
*P*rpurascens,* Poir. 1. c. 7fi7 = Pelargonium longifolium.
torpureo-caeruleum, Ledeb. FL Koss. i. 465, sphalm. -sylvaticum.
P"'Pureum, Gilib. FL Lituan. ii. 175=palustre.
^ « w « w , Vill. Fl. Delphin. 72; Hist. PI. Dauph. l. nnffi? ! "'• [874] - Robeftianum.
P°allum, *Burm. f. Spec. Geran.* 27.—Europ.; Reg. p Caucas. et Himil.
^ " w u m , *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. U880) 452, 466—China.
Pyteo I«ii.CUm, *Burm.* - *f-* [S]*f-* *Geran* - 27.—Europ.; As.
quercifolium, folium. Linn. f. Snppl. 306-Pelargonium querd-
quinatum, quin atum. Poir. Encyc. Suppl. ii. 768 = Pelargonium
"}»quelobum, Lam. Encyc. ii. 671 = Pelargonium "eterogamum.
2"yquelobum, *Wedd. Chlor. And.* ii. 286.-Ecuador.
^"ouevulnerum, Andr. Bot. Rep. t. 114-Pelargonium quinquevulnerum.
"*<rt»i», Andr. 1. c. t. 222 = Pelargonium radiatum.
"*'cans,* DC. Prod. i. 689=nepalense.

GERANIUM:—
radicatum, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 184-tuberosum.
radicatum, Lapeyr. Hist Abr. PI. Pyr. 8»0, in syn.= Erodium macradennm.
Radula, Cav. Diss. 262 - Pelargonium Radula.
Radula, Roth, Bot. Abh. 51. t. 10 - Pelargonium asperifolium.
Raii, Lindl. Syn. Brit. FL C7=lucidum.
ramosissimum, Cav. Diss. 260=Pelargonium ramosissimum.
ranunculi/Mum, Schur, ex Nym. Consp. 187 —sylvaticum.
ranunculoides, *ifarm./. Spec. Geran.* 17.—Africa.
rapaceum, Linn. Syst. ed. X. 1141 = Pelargonium rapaceum.
rapulum, *St. Hit.* 6" *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xviii. (1842) 25.—Bras,
rectum, *Trautv. in Hull. Soc. Nat. Mosc.* xxxiii. (1860) I. 459.—Soongar.; Reg. Himal.
reflexum, Andr. Bot Rep. t. 224=Pelargonium reflexum.
reflexum, *Linn. Mant.* ii. 257.—Italia,
refractum, *Edgew. V Hook.f. in Fl. Brit. Ind.* i. 428.—Reg. Himal.
refulgens, *Andr. Geran.* ii.—Hab. ?
Reichardii, Murr. in Comm. Gotting. (1780) 11. t. 3 ^Erodium chamacdryoides.
Reinii, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 304.—Jappn.
Renardi,'7Va«fv. *in Trautv. Regel, Maxim. & Winil. Decas. PI. Nov.* 5.—Reg. Caucas.
reniforme, Andr. Bot. Rep. t. 108 — Pelargonium reniforme.
reticulatum, Nocca, PL Select, t. 6= Pelargonium denticulatum.
retrorsum, L'Hérit. ex DC. Prod. i. 644 •= dissectum.
revolutum, Andr. Bot Rep. t. 364 = Pelargonium rcvolutum.
revolutum, Jacq. Coll. i. 84 - Pelargonium Radula.
ribifolium, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 19 = Pelargonium zonale.
ribifolium, Poir. Encyc. Suppl. ii. 764 = Pelargonium ribifolium.
Richaidsonii, *Fisch. tf Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 87.—Am. bor. occ.
rigidum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 755 = Pelargonium crispum.
rivale, Vill. Hist. PL Dauph. t. 40=seq.
rivulare, *Vill. Prosp.* 40; *Hist. PI. Dauph.* iu. 372.—Europ.
Robeitianum, *Linn. Sp. PI.* 681.—Reg. bor. temp.
romanum, Burm. f. Spec Geran. 30 = Erodium romanum.
Rosa, Hort. ex DC. Prod. i. 674=Pelargonium capitatum.
roseo-caeruleum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 176*=columbinum.
roseum, Andr. Bot. Rep. t. 178 = Pelargonium condensatnm.
roseum, *L'Hérit. ex Steud. Nom.* ed. I. 366, nomen.—Hab.?
rotundifolium, Ledeb. Fl. Alt. iii. 232 - acrocarpum.
rotundifolium, *Linn. Sp. PI.* 683.—Europ.; As. bor.
rotundifolium, Pollicb, Hist. PI. Palat. ii. 265 = pusillum.
rubellum, *Moench, Meth. Suppl.* 95.—Hab. ?
rubens, *Andr. Geran.* ii.—Hab. *1*
rubens, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 118.—Afr. anstr.
rubifolium, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 67-pratense.
rugosum, Andr. Geran. ii = Pelargonium rugosum.
rupestre, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 319 = Erodium supracanum.
rupicolum, *Wedd. Chlor. And.* ii. 285.—Bolivia.
ruthenicum, Uechtritz, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 335 = sibiricum.
rutilans, Ehrh. Beitr. vii. 164=anemonaefolium.
sanguineum, *Linn. Sp. PI.* 683.—Europ.; Reg. Caucas.
saxatile, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 177.—Sibir. altaic.
scabrum. Linn. Amoen. Acad. iv. 281—Pelargonium scabrum.
scandens, Poir. Encyc. Suppl. ii. 750=Pelargonium scandens.
Schiedeanum, *Schlecht. in Linnaea,* x. (1836) 263.—Mexic.
Schrenkianum, *Trautv. ex Becker, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* lvii. (1882) 1. 68.—Soongar.
scopulicolum, Jord. ex Nym. Consp. 138 = Robntianum.

OEBANIUM:—
Seemanni, *Peyr. in Linnaea,* xxx. (1869-60) 66.—Mexlc.
selinum, Andr. Bot. Rep. t. 289 = Pelargonium rapaceum.
semiglabrum, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 130 = Robertianum.
semiorbiculare, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 679 — rotundifolium.
semiirilobum, Poir. Encyc. Snppl. ii. 756—Pelargonium semitrilobum.
senecioides, Poir. I. c. 749= Pelargonium senecioides.
sericeum, *Harv. in Hani.* 6* *Sond. Fl. Cap.* i. 257.—Afr. austr.
sericeum, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 70.—Peruv.
serratum, Thunb. Prod. PL Cap. 113-Pelargonium serratum.
sessiliflorum, *Cav. Diss.* 198. t. 77. f. 2.—Austral.; Chili.
setosum, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 617=Pelargoninm setiferum.
sibbaldioides, Benth. PL Hartw. 166 = cucullatum.
sibiricum, *Linn. Sp. PI.* 683.—Europ. or.; As. bor.
sidaefolium, Thunb. Prod. PL Cap. 114-Pelargonium sidoides.
Sieboldi, *Maxim, in Bull. Acad. Pttersb.* xxvi. (1880; 452, 458.—Japon.; Manchuria,
simense, *Hockst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 116.—Abyssin.
simile, Jord. ex Nym. Coup. 188 - Robertianum.
Sonderianum, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 485, sphalm. — Lindenianum.
spathulatum, Andr. Bot. Rep. t. 162—Pelargonium spathulatum.
spedosum, Stend. Nom. ed. II. i. 679, sphalm.-*spinosum.*
spedosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 112— Monsonia speciosa.
spinosum, Burm. f. Spec. Geran. 16—Sarcocanlon Burmanni.
splendens, Poir. Encyc. Suppl. ii. 769 — Pelargoninm ignescens.
spurium, Poir. 1. c. 758=Pelargonium spurium.
stenopetalum, Andr. Geran. ii= Pelargonium leptopetalum.
stenopetalum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 750=Pelargonium zonale.
Stephanianum.Voir. 1. c. 741 — Erodium Stephanianum.
Steveni, Poir. 1. c. 742 = Erodium Steveni.
stipulaceum. Linn. f. Suppl. 306 = Pelargonium stipulaceum.
stipulate, Kuntze, in Flora, xxix. (1846) 698 = molle.
strnmineum, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvii. (1873) 112.—N. Granat.
striatum, [Clairv.] Man. Herb. 168-rivnlare.
striatum, *Linn. Amoen. Acad.* iv. 282.—Europ. austr.
strictum, Picard, in Mém. Soc. Agric. lloulogne, Se>. II. i. (1887) 124-rotundifolium.
strigosum, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 19.—Afr. austr.
suaveolens, Poir. Encyc. Snppl. ii. 747 = Pelargoninm suaveolens.
subargenteum, *Zange, in Willk.* b* *Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 625.—Hispan.
subcaulescens, *VHlrit. ex DC. Prod.* i. 640.—Europ. or.; As. Min.
subcoeruUum, Schleich. Cat. 26; ex DC. Prod. i. 641 = phaeum.
subdivaricatum, Schur, in Vcrh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (1877) 160-divaricatnm.
submolle, *Steud. in Flora,* xxxix. (1856) 488.—Chili,
subnudicaule, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 418.—Venezuela.
subrotundum, Ehrh. ex Hofiin. Deutschl. Fl. cd. II. i. II. 65 = rotnndifolium.
sylvaticum, *Linn. Sp. PI.* 681.—Europ.; As. bor.
sylvaticum, Saulcy, Cat. PL Palest. 5 •= libanoticum.
sylvaticum, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 287 -- striatum.
sylvestre, Olaf. & Pov. ex Bab. in Joum. Linn. Sou. xi. (1871) 800-sylvaticum t
tabulate, Burm. f. Spec. Geran. 37 —Pelargonium saniculaefolium.
tabulate, Linn. Sp. PL ed. II. 947 - Pelargonium tabulare.
tataricum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 741 - Erodium tataricum.
tauricum, *Rupr. Fl. Cauc.* 268, in textu.—Tauria.
tectum, Thunb. Trod. PL Cap. 116 - Pelargonium fulgidum.

GERAUTTJM::—
tenellum, Andr. Geran. ii = Pelargonium tenellum.
tenuifolium, Foir. Encyc. Snppl. ii. 767 = Pelargonium tenuifolium.
terebinthinaceum, Ait. ex Murr. in Comm. Gotting. vii. (1786) 88. t. 4 = Pelargonium quercifolium.
terebinthinaceum, Cav. Diss. 250 » Pelargonium graveolens.
ternatum. Linn. f. Suppl. 806= Pelargonium ternatum.
tetragonum, Linn. f. 1. c. 805 = Pelargonium tetragomim.
Thunbergii, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 28 = nepalensis.
tomentosum, Andr. Bot. Rep. t. 115—Pelargonium canum.
tomentosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 116=Pelargonium tomentellum.
tordylioides, Desf. Fl. Atlant. ii. 107 = Erodium tordylioides.
tottum, Thunb. Prod. PI. Cap. 115 «* Pelargonium tottum.
Traversii, ***Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.*** **726.—N. Zel.**
triangulate, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 123 = Erodium reflexum.
trichostomum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 759 = Pelargonium ovale.
tricolor, Andr. Geran. i=Pelargonium tricolor,
tricuspidatum, *Andr. I. c.* ii.—Hab. ?
tricuspidatum, Lam. Encyc. ii. 671 (Pelargonii sp.).—Afr. austr. ?
trifidum, Burm. f. Spec. Geran. 52 = Pelargonium trifidum.
trifolium, *Cav. Diss.* 223.—Afr. bor.
*trigonum,Scop.*Delic,Insub. i. 12'Pelargonium tetragonum.
trilobatum, Steud. Norn. ed. II. i. 680 = Erodium hymen odes.
trilobum, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 716 - gracile, *Ledeb.*
trilobum, Thunb. Prod. PI. Cap. 114 - Pelargonium trilobum.
trilophum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 80.—Persia.
triphyllum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 746 = Pelargonium triphyllum.
triste, Linn. Sp. PI. 676=Pelargonium triste.
Tubcraria, *Jacquem. Voy. Bot.* 83. t. 87.—Keg. Himal.
tuberosum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 119=malvaccflorum.
tuberosum, *Linn. Sp. PI.* 680.—Keg. Mediterr.; As. Min.; Persia.
Ulassovianum, Fisch. ex Reichb. Hort. Bot. i. 19, vide Wlassoviannm.
umbrosum, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 131 = pyrcnaicum.
undulatum, Andr. Bot. Rep. t. 292-Pelargonium ovalifolium, undulatum.
undulatum, Andr. 1. c. t. 817 = Pelargonium longifolium.
uniflorum, *Pacho, Voy.* t. 96.—Afr. bor.
valde-pilosum, Schur, ex Nym. Consp. 137 — pratense.
variabile, Moench, Meth. 288=sibiricum.
variegatum, Linn. f. Suppl. 305 = Pclargoniom variegatum.
variegatum, ***{Vender. Sem. Hort. Marb.*** **(1824);** ***ex Steud. Norn.*** ed. II. i. 680.—Hab. »
varium, L'Heŕit. Geran. t. 87 = einereum.
velutinnnv ***Tuns, in Bull. Soc. Linn. Nat. Mosc.*** **xxxi.** (1858) I. 417.—Venezuela.
venosum, Pers. Syn. ii. 235=angulatum.
verbasciflorum, Andr. Geran. ii - Pelargonium ovale.
verbascifolium, Steud. Nom. ed. II. i. 680 = praec.
versicolor, Linn. Cent. PI. i. 21 = striatum.
Villarsianum, Jord. in Cât. Gren. (1849); exej. Pugill. PI. Nov. 38*=Robertianum.
villosum, *Andr. Geran.* ii.—Hab. ?
villosum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 38 = Pelargonium triste.
villosum, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. lxi=inolle.
villosum, Thunb. Prod. PL Cap. 116 = Pelargonium villiferum.
mrgineum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 757 - Pelargonium longifolium.
visddulum, Fries, Novit. Fl. Suec. ed. II. 216 = rotundifolium.
viscosissimum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 18 = incisum.
viscosum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 177 = rotundifolium.

GERANIUM:—
viscosum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 20 = Erodium viscosum.
viscosum, Scop. Delic. Insub. ii. 27 - Pelargonium glutinosum.
vitifolium, Linn. Sp. PI. 678=Pelargonium vitifolium.
vulgare, *Gueldenst. Reise,* i. 56 (quid?).—Ross.
Wallichianum, *D. Don, in Sweet, Geran.* i. t. 90.—Reg. Himal.
Wilfordi, ***Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.*** **xxvi. (18S0)** 453.—Manchuria.
Winterli, Roth, Catalcct. fàsc. ii. 78 = divaricatum.
Wlassovianum, ***Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol.*** **ii.** 197.—Sibir.
yedoënse, ***Franch.*** **b" *Sav. Enum. PI. yap.* ii. 805.—Japon.**
zonale, Linn. Sp. PI. 678 = Pelargonium zonale.

GERAKDA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. 176 (1881) = seq.

GERABJDIA, Linn. Gen. ed. I. 181 (1737). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 972.
AGALINIS, Rafin. New Fl. Am. ii. 61 (1836).
DASISTOMA, Rafin. in Joum. Phys. lxxxix. (1819) 99.
OTOPHYLLA, Benth. in DC. Prod. x. 512 (1846).
PAGESIA, Rafin. Fl. Ludov. 49 (1817), an hue referenda ?
PANCTENIS, Rafin. New Fl. Am. ii. 60 (1836).
TOMANTHERA, Rafin. 1. c. 65 (1836).
VIRGULARIA, Ruiz & Pav. Prod. 92.1.19 (1794).
Afielia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 20»Seymeria tenuifolia.
angustifolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 12. t. 206:—Bras.
aphylla, *Nutt. Gen. Am.* ii. 47.—Am. bor.
araucana, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1884) reimpr. 8.—Chili,
aspera, ***Dougl. ex Benth. in DC. Prod.*** **x. 617.— Am.** bor.
auriculata, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 48.—Am. bor.
brachyphylla, ***Cham, (f Schlecht. in Linnaea,*** **iii.** (1828) 16.—Bras.
brasiliensis, Spreng. Syst. ii. 806 = Brunfelsia ramosissima.
caesarea, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 17 = Esterhazya splendida.
cassioides, Pers. Syn. ii. 154 = Seymeria tenuifolia.
communis, ***Cham, if Schlecht. in Linnaea,*** **iii. (1828)** 12.—Bras.
Chytra, *Steud. Nom.* ed. II. i. 680.—Hab.?
crinita, Eddy, ex Spreng. Syst. ii. 807 =maritima.
cuneifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 422»Herpestis nigrescens.
dasyantha, ***Cham. V Schlecht. in Linnaea,*** **v. (1830)** 104.—Mexic.
Dasysioma, Steud. Nom. ed. II. i. 680=flava.
delphinifolia, Linn. Cent. PI. ii. 21=Sopubia delphinifolia.
densiflora, ***Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.*** **i. (1835)** 206.—Am. bor. occ.
Digitalis, *Benth. I.* r.—Bras,
digitate, *Spreng. Syst.* ii. 808.—Bras,
divaricata, *Chapm. Fl. S. V. St.* 299.—Florida,
domingensis, *Spreng. Syst.* ii. 807.—Ins. S. Doming.
Dregeana, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 240 - Sopubia Dregeana.
erecta, Walt. Fl. Carol. 170=tenuifolia.
fasciculata, Ell. Sketch, ii. 115=purpurea.
filicaulis, *Chapm. Fl. S. V. St.* 299.—Am. bor.
filifolia, *Nutt. Gen. Am. i.* 48.—Am. bor.
filiformis, Rafin. ex Benth. in DC. Prod. x. 518 = tenuifolia.
filiformis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 272 = Sopubia filiformis.
flava. Herb. Linn, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I. 291~quercifolia.
flava, *Linn. Sp. PI.* 610.—Am. bor.
fruticosa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 423. t. 18 = Pentstemon Menziesii.
genistifolia, ***Cham, (f Schlecht. in Linnaea,*** **iii. (1828)** 15.—Bras.
glauca, Eddy, Cat. ex Spreng. Syst. ii. 8O7=quercifolia.
glutinosajBxmge, Enum. PI. Chin. Bor. 49 ^Rehmannia chinensis.
glutinosa, Linn. Sp. PI. 611-Adenosmagrandiflorum.

G-EBAKDIA:—
gnidioides, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 16 = Esterhazya splendida.
grandiflora, ***Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.*** **i. (1836)** 206.—Am. bor.
Greggii, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 131.—N. Mexic.
heterophylla, ***Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.*** **v. (1887)** 180.—Texas.
Heyneana, Benth. in Wall. Cat. n. 8891 = Sopubia delphinifolia.
hispidula, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 18. t. 207.—Bras.
iniegrifolia, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 807 - laevigata.
intermedia, Porter, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. » I. 293 = purpurea.
japonica, *Thunb. Fl.Jap.* 251.—Japon.
laciniata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. U-(1845) 26 = Seymeria virgata.
laevigata, *Rafin. Ann. Nat.* (1820) 13.—Am. bor.
lanceolata, ***Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.*** **i. (1835)** 207.—Peruv.
leucanthera, *Safin. Fl. Ludov.* 50. (sp. dub.).—Am. bor.
linarioides, *Cham,* b" *Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 12.—Bras.
linifolia, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 209 = PIukenetii.
linifolia, *Nutt. Gen. Am.* ii. 47.—Am. bor.
longifolia, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 208 = aspera.
longifolia, ***Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.*** **v. (1837)** 180.—Am. bor. occ.
macrodonta, ***Cham, b" Schlecht. in Linnaea,*** **viii.** (1833) 26.—Bras.
macrophylla, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. (1885) 205 = Seymeria macrophylla.
maritima, ***Rafin. in Med. Kepos. N. York,*** **v. (1808)** 361.—Am. bor.
Mettaueri, Wood, Class-Book (1861) 580 = divaricata.
nigrina, Linn. f. Suppl. 278 = Melasma scabrum.
nigrina, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 106.—Afr. austr.
nuda, Wood, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I. 295* filicaulis.
obtusi/olia, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. (1835) 211 = Harveya obtusifolia.
orobanchoides, Lam. Encyc. ii. 690 = Alectra capensis-
parviflora, Benth. in Wall. Cat. n. 3888=Leptorhabdos Benthamiana.
parvifolia, Chapm. Fl. S. U. St. 800 - Sklnneriana.
patula, ***Chapm. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.*** **»** 291.—Am. bor.
pectinata, Torr. ex Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag-i. (1835) 206-G. Pedicularia.
Pedicularia, *Linn. Sp. PL* 611.—Am. bor.
peduncularis, ***Benth. in Hook. Comp. Sot. Mag-*** (1885) 209.—Peruv.
Plukenetii, *Ell. Sketch,* ii. 114.—Am. centr.
prostrata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 3**5* Silvia prostrata.
purpurea, Bert, ex Mart. Nov. Gen. ct Sp. iii. 16" domingensis.
purpurea, *Linn. Sp. PI.* 610.—Am. bor.
quercifolia, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 423. t. 19.—Amber.
ramosissima, Benth. in DC. Prod, x. 515 " linarioides.
rigida, ***Gill, ex Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag-*** i. (1885) 206.—Chili.
rupestris, Rafin. Atl. Joum. 158 = Stenandnum rupestre.
scabra, Linn. f. Suppl. 279 = Graderia scabra.
scabra, Wall. Cat. n. 8889 = Sopubia trifida.
scabrosa, Rafin. Fl. Tellur. iv. 67 = Stenandnom scabrosum.
serpyllifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 343 - Silvia serpyllifolia.
serrata, Torr. ex Benth. in DC. Prod. x. 521 = grain'" flora.
sessiliflora, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 79.—Afr. austr.
setacea, *Walt. Fl. Carol.* 170.—Am. bor.
Skinneriana, ***Wood, Class-Book*** **(1847);** ***ex A. Cray-Syn. Fl. N. Am.*** ii. I. 294.—Am. bor.
Sopubia, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1845) 210 ^ Sopubia trifida.
spidflora, Engdm. in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 227 = aspera.

GERARDIA:—
'temodiaefolia, Walp. in Nov. Act, Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 899 = Alonsoa incisifolia.
stricta, Benth. Scroph. Ind. 49 = Sopubia stricta, *G. Don.*
strictiflora, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 294.—Am. bor. occ.
strictifolia, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 209.—Texas.
tennifolia, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 79.—Am. bor.
•uberosa, Linn. Sp. PI. 601 = Stenandrinm nipestre.
'ubulosa, Linn. I. Suppl. 279 => Rhampbicarpa tubulosa.
rtllosa, Mnhl. ex Rafin. New Fl. Am. ii. 59=flava.
virgata, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. 11835) ‧205 = Seymeria decurva.
•'•'•*gala,* H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. ii. 344=Seymeria virgata.
WalHMana, Stead. Nom. ed. II. i. 880 - Sopubia
"'"*ghtii, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 118.-N. Mexic

(•E**RARDIANELLA,** Klotach, inPeters, Reise Mossamb. fqt. 229. t 36 (1861) = Micrargeria, Benth. \ocrophularin.).
**°piformis,* Klotach, 1. c-Afr. trop.

GE**RASCANTHOS,** Stend. Nom. ed. II. i. 681 (1840) -seq.

GER**ASCANTHUS,** P. Br. Hist. Jamaic. 170. t. 29. C 3 U756).-=Cordia, Linn. (Boragin.).
* ,« , Mart, in Flora, an. (1838) 11. Beibl. 86 -=C. insignia.
' « * « , Mart. 1. c.=C. cxcelsa.
rata, Mart. 1. c. 87 = C. glabrata.
sc«bra, Rafin. Sylva Tellur. 40=C. scabra.
v"utina, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 5=C. cujabensis,
" "Wii, Mart, in Flora, xxi. (1888) H. Beibl. 86 = «-. Gerascanthus.

G**ERASCHANTHUS,** Lindl. Veg. Kingd. 629 (1847) = P»ec.

G**ERBERA,** J. F. Gmel. Syst. 652 (1791) = GERBERIA, « o p.= = Q u a a r b O j A n b] . (Ma i Tac.).

GERB**EHA,** Gronov. in Linn. Cor. Gen. 16 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 497.
ANANDRIA, Siegesb ex Linn Amoen. Acad. i. 243. t 11 (1745).
AP»VU.OCAULON, Lag. Amen. Nat. i. 38 (1811).
ATASITES, Neck. Elem. i. 7 (1790).
BERNIERA, DC. Prod. vii. 18 (1838).
CHAPTAUA, Royle, IUustr. Bot. Himal. t. 59. f. 2 (1839).
CU. FARTHIN , Kunze, in Bot. Zeit. ix. (1851) 350.
EPICLINASTRUM, Boj. ex DC. Prod. vii. 18 (1888).
IDICIUM, Neck. Elem. i. 28 (1790).
J SPUS, Cassi in Bull. Soc. Philom. (1817) 182.
LEtBNmu, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 420 (1822).
«*TICA, E. Mey. ex DC. Prod. vii. 16 (1838).
KSOSEMS DC. 11 c. 17 (1888).
PERDICIUM, Linn. PL Afr. Rar. 22 (1762).
PARWSIUM, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 26 (1768).
abyssin' a. *Sch. Bip. ex Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) : *1*tell.* 27, nomen.—Abyssin.
ai'*'i'i'«, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* S13» Chaptalia albicans.
2 f « . Hance, in Walp. Ann. «• M7-pUo»dl»**
'"'"", *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 780.—Afr. austr.
Anandria, *f*ch- *Bi*P- '• '• 782,-Sibir.; Japon'
araneosa . Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 813 = Chapt. aliaaraneosa.
asplenifolia, Spreng. Syst. iii. 576.-A6". austr.
aurantiaca, Sch. Bip. in ora, xxvii. (1844) 781.-Afr. austr.
Bel'*iA*'*um,* Kmtn- »' Toom. Linn. Soc xiii. (1873) hi..o' J' "G- Anandria.
N.J *Sch- Bi*s*- •« s' «»' *Bt. Voy. Herald,* 313.-B F Granat,
Bojeri, &A - *Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 780.-Madag.
*bracteata, Sc*e*' Bip, in Seem Bot. Voy. Herald,* 313.-Reg. A r
brevipes, ^*Bip.l* . c-Bras.
Burmanni, *Cass. in Diet. Se. Nat.* xviii. 461.-Afr. austr.

QERBERA:—
Candollei, *Seh. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 780.—Madag.
chilensis, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,*- 318.—Chili.
cordata, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 297__Afr. austr.
coriacea, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 780 = ambigua.
coronopifolia, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xvili. 461.—Afr. austr.
crenata, [Ker-Gawl.] in Bot. Reg. t. 855 = Mairia crenata.
dentata, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald. 313 a Chaptalia dentata.
discolor, *Sond. in Han. if Sond. Fl. Cap.* iii. 622.—Afr. austr.
Ehrenbergii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 313 = Chaptalia Ehrenbergii.
ferroginea, *DC. Prod.* vii. 15.—Afr. austr.
hirsuta, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 298.—Arab.; China.
hirsuta, Spreng. ex DC. Prod. vii. 16 =tomentosa.
humilis, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 779 = piloselloides.
hypochaeridoides, *Baker, in Journ. Lin*. Soc. xx.* (1883) M3.—Madag.
intcgralis, *Sond. in Hart. V Sond. Fl. Cap.* iii. 520.—Afr. austr.
integrifolia, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 313 =Chaptalia integrifolia.
kokanica, *Regel V Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 53.—Kokan.
Kraussii, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 781.—Afr. austr.
Kunzeana, *A.Br. VAschers. in Cat. Sent. Hort. Berol.* (1871) *App.* 3.—Reg. Himal.
Lagascae, *Cass. in Did. Sc. Nat.* xviii. 462 (sp. dub.). —Hab. ?
lanuginosa, *Sck. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 780.—Reg. Himal.
leiocarpa, *Sck. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 318.—Cuba,
leucothrix, *Harv. in Han.* 6* *Sond. Fl. Cap.* iii. 621—Afr. austr.
Linnaei, Cass. in Diet. Sc. Nat. xviii. 460 = asplcnifolia.
lyrata, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 318 = Chaptalia lyrata.
macrocephala, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 295.—Afr. austr.
macrophylla, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 391 = nepalensis.
microcephala, Less, in Linnaea, v. (1830) 293 = tomentosa t "
natalensis, *Sck. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 778.—Afr. austr.
nepalensis, *Sch. Bip. 1. c.* 780.—Reg. Himal.
nervosa, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 70.—Afr. austr.
nivca, C. B. Clarke, Comp. Ind. 249-Kunzeana.
nivea, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 780.—Reg. Himal.
nutans, Sch. Bip. in Seem. Bot Voy. Herald, 313 = Chaptalia nutans.
oblonga, Sch. Bip. 1. c = Chaptalia oblonga.
aualifolia, DC. Prod. vii. 17-piloselloides.
ovalis, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 313 = Chaptalia ovalis.
piloselloides, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xviii. 461.—Afr. austr.
plantaginea, *Han. in Han. & Sond. Fl. Cap.* iii. 522. —Afr. austr.
podophylla, *Baiter, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 272.—Madag.
pnmila, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 313.—Ind. occ.
pusilla, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 780 - lanuginosa.
rotundifolia, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 313 - Chaptalia rotundifolia.
Schimperi, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 27=piloselloides.
Seemannii, Sch. Bip. 1. c.=Chaptalia sinnata.
Selloi, Sch. Hip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 813 = Chaptalia Seemaanii.
semiflosculnaris, *Benth. b*l *Hooi.f. Gen.* ii. 497.—Afr. austr.
sinuota, Less, in Linnaea, v. (1830) 292 » ferroginea.
sinuata, Spreng. Syst. iii 756 = Burmanni.

OERBERA:-
spathulata, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 813 — Chaptalia spathulata.
tomentosa, *DC. Prod.* vii. 16.—Afr. austr.
viridiftora, Walp. Rep. vi. 315-scq.
viridifolia, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 780.—Afr. austr.
Walteri, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 313 - Chaptalia tomentosa.
Wrightii, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* Ui. 521.—Afr. austr.

GERBERIA, Linn. Phil. Bot. 29 (1751)»Oerbera, Gronov. (Compos.).

GERBERIA, Scop. Introd. 286 (1777) - Quararibea, Aubl. (M.ilvac).
recentior, J. F. Gmel. Syst. 622=Q. gnianensis.

GERBERIA, Stell. ex Choisy,in DC. Prod. xii. 24 (1848) =Lagotis, Gaertn. (Scrophul.).
Stelleri, Lam, ex Choisy, I. c. 25-L. glauca.

GERDARIA, Presl, [Hot. Bemerk. 91 (1844)1, in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 521-Sopubia, Buch.-Ham. (Scrophularin.).
Dregeana, Presl, 11. cc.=S. Dregeana.

GERMAINEA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 1136 (18S3) -seq.

GERMAINIA, Balansa & Poitrass. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. vii. (1873) 344 - Anthistiria, Linn. f. (Gramin.).
capitata, Balansa *Sc* Poitrass. 1. c.—Cochinch.

GERMANEA, Lam. Encyc. ii. 690 (1786) - Plectranthus, L'Hérit. (Iabiat.).
crassifolia, Poir. Encyc. ii. 764-Coleus spicatust
Forskohlei, Poir. 1. c.=Coleus barbatus.
galeata, Poir. 1. c. 763=Coleus galeatus.
maculvsa, Lam. Encyc. ii. 6!>1-P. punctatus.
nudiflora, Poir. Encyc. ii. 768 -• Coleus scutellarinMes.
paniflora, Poir. 1. c 784-P. parviAorus.
punctata, Poir. I. c. 768 = P. punctatus.
rotundifolia, Poir. 1. c. = P. rotundifolius.
urticifolia, Lam. Encyc. ii. 682-P. fruticosus.

GERMANIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 625(1885)-GERMANEA, Lam. - Pleotranthus, L'Hnit. (Labial.).

GERMARIA, Presl, Epim. Bot. 221 (1849)-Pygeum, Gaertn. (Rosac.).
latifolia, Presl, 1. c.=P. latifolium.

GERONTOGEA, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 164 =Oldenlandia, Linn. (Rubiad.
biflora, Cham. 8c Schltcht. 1. c. 156^0. corymbosa.
capensis, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c. 154—0. capensis.
corymbosa, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c. = 0. corymbosa.
Defipeana, Cham. *Sc* Schlecht I.e. v. (1830) 169 = O. Deppeana.
foetida, Cham. & Schlecht. 1. c. Iv. (1829) 154 - O. foetida.
herbacea, Cham. & Schlecht. 1. c.-O. corymbosa.
lactea, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c. <=• O. lactea.
microtheca, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c. v. (1830) 169 - O. microtheca.
racemosa, Cham. *Sc* Schlecht. 1. c. iv. (182D) 154 - O. paniculata.
umbellata, Cham. *Sc* Schlecht 1. c.^0. umbellata.

GEROPOGON, Linn. Sp. PI. ed. II. 1109 (1763) •= Tragopogon, Tourn. (Compos.).
australc, Spreng. Syst. iii. 661 -T. crocifolium.
calyeutatum, Jacq. Hort. Schoenb. t 106-Scononcra hirsuta.
glabrum. Linn. Sp. PI. ed. II. 1109-T. crocifollus.
hirsutum, All. ex Sm. in Recs, Cyclop, xvi; DC. Prod. vii. 124 = .Scorzonera hirsuta.
hirsutum, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iv. 1202 = T. floccosus.
hirsutum, Linn. Sp. PI. ed. II. 1109-T. crocifolius.
hirsutum, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. i. (1822) 854 --T. porrifnlius.
hybridum, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 472-T. hybridum.

GEROSTEMUM, Steud. Norn. ed. II. i. 702 (1840) = GONOSTEMUM, Haw. = StapeUa, Linn. (Asclepiad.).
divaricatum, Stend. 1. c. =S. divaricata.

GKERBARDANTHUS, Harv. ex Bcntb. *Sc* Hook. Gen. i. 840 (1867). *CUCURBITACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c.
macrorhiza, *Harv. ex Bentk. V Hook. f. 1. c.*—Afr. austr.
megarhiia, Decne. *Sc* Harv. in Gen. S. Afr. PI. ed. II. 127 = macrorhiza.
parviflora, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 986.—Afr. trap.
portentosa, Naud. ex Dur. Cat. Sem. Hort. Bord. (1868) (1867) 26 = macrorhiza.
tomentosa, *Hook. f. Sot. Mag.* t. 6694.—Afr. austr.
Trimenii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 937.—Afr. trop.

GKERBARDIANA, Oliver, in Hook. Ic. PI. t. 1075 (1870). *SAMYDACEAE.*
foliosa, *Oliver, 1. c.*—Afr. austr.

GERSINIA, Neraud, in Gaudich. Freyc. Voy. Bot. 27 (1826) = Bulbophyllum, Thou. (Orchid.).

GU3RTJDEA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 62 (1775). *INC. SED.—Ct.* Benth. & Hook. f. i. 887.
alba, *Forsk. I. c.*—Arab.
subtriloba, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 182 = Melochia corchorifolia.

GERYONIA, Schrank, ex Hoppe, in Flora, i. (1818) 229 = Saxifraga, Linn.
cordifolia, Schrank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 681 = S. cordifolia.
crassifolia, Schrank, ex Hoppe, in Flora, i. (1818) 229 —S. crassifolia.

GESNERA, Plum, ex Adans. Fam. ii. 157 (1768); Schreb. Gen. ii. 404 (1791)«-Oesneria, Linn.

OESTTEBIA, Linn. Gen. ed. I. 179 (1737), partitn; Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 27 (1829) (Gesnera) [Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1008].
AI.AGOPHYLLA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 33 (1836).
CORYTHOLOMA, Decne. in Rev. Hortic. (1848) 466.
DIRCAEA, Decne. 1. c. (1848).
OROBANCHE, Veil. Fl. Flum. 254 (1825); vi. tt. 60-79 (1827), partim.
RECHSTEINERIA, Regel, in Flora, xxxi. (1848) 247.
acaulis, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 357 = tuberosa.
acaulis. Linn. Syst. ed. X. 1110 = Pentarhaphia Sloanei.
acaulis, Moç. *Sc* Sesse, in DC. Prod. viii. II. 536 = Achimenes tenella.
adenantha, Fisch. ex Hanst. in Linnaea, xxix. (1867-58) 541 = Seemannia ternifolia.
affinis, Hort. Petrop. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 379 = bulbosa.
aggregata, *[JCer-GawlJ] in Bot. Reg.* t. 329.—Bras,
afiagophylla. *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 36.—Bras.
atrosanguinea, Ann. Fl. (1836) 275, ex DC. Prod. vii. 529 = Lindleyi.
anrantiaca, *Hanst. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1861) *App.* 8.—N. Granat.
barbata, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. I. (1823) 18 = Ligeria barbata.
betanicaefolia, Hort. ex Hanst. in Mart Fl. Bras. viii. 355 = aHagophylla.
bibracteata, *D. Cameron, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* ii. 637, nomen.—Hab. ?
Blassii, *Regel, in Schweii. Zeit. Gaertn.* iv. (1846) 159.—Bras.
breviflora, Lindl. in Journ. Hort. Soc iii. (1848' 165 = Isoloma breviflornm.
bulbosa. Hook. Dot. Mag. t 3886 = magnifica.
bulbosa, *_Ker-Gawl.~\ in Bot. Reg.* t. 343.—Bras.
calycina, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 680, 200 = Besleria lutea.
calydna, Sw. Prod. Vcg. Ind. Occ. 90 = Pentarhaphia calycina.

GH3SN13SIA —
canescens, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 36.—Bras,
caracasana, *Otto V Dietr. Allg. Gartens,* vi. (1838) 346.—Venezuela,
cardinalis, *Lehm. in E. Otto, Hamb. Gartenz.* vi. (1850) 464.—Hab. ?
chelonioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 892.—N. Granat.
chilensis, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 140 = MHraria coccinea ?
cinnabarina, Linden, in Belg. Hortic. vii. (1857) 197; Hook. Bot. Mag. t. 5036 = Naegelia cinnabarina.
Clausseniana, *Brongn. ex Decne. in Rev. Hortic.* Sir. III. i. (1847) 363.—Bras.
coccinea, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 873 = rutila.
cochlearis, *Hook. Bot. Mag.* t. 3787.—Bras,
confertifolia, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 360.—Bras.
Cooperi, *Paxt. Mag. Bot.* i. (1835) 224.—Bras.
Cooperiana, Hort. Woburn. ex Lehm. in Otto, Hamb. Gartenz. vi. (1850) 454 = praec.?
cordata, *W. Baxt. ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 554, nomen.—Hab. ?
cornscans, *Paxt. Mag. Bot.* xvi. (1849) 194.—Am. austr.
corymbosa, Balb. *Sc* Bert, ex DC. Prod. vii. 525 = Pentarhaphia exserta.
corymbosa, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 681 = Episcia melittifolia.
corymbosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 89.—Jamaic.
Craniolaria, Sw. 1. c.=Pentarhaphia Craniolaria.
crenulata, A. DC. in DC. Prod. vii. 524 = Rhytidophylhim crenulatum.
cuneifolia, Mo;. & Sesse, in DC. 1. c. 526 - Pentarhaphia cuneifolia.
cynocephala, *De Von, ex Morr. Hortic. Belg.* iii. (1886) 320.—Bras,
dentata, *Hornsch. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* ii. (1884) 354.—Hab. ?
Deppeana, Schlecht. *Sc* Cham, in Linnaea, v. (1830) 110 = Isoloma Deppeanum.
discolor, *Lindl. Bot. Reg.* (.1841) t. 63. *Misc.* 45.—Bras.
Donkelaeriana, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) t. 382 = seq.
Donklarii, *Hort. ex Hook. Bot. Mag.* t. 6070.—N. Granat. 1
Douglasii, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vii. (1826) 62. —Bras.
Douglasii, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 33 = maculata.
egregia, Hort. ex Lem. Illustr." Hortic. iv. (1857) 129 = Heppiella naegelioides.
elatior, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 393.—Mexic.
elliptica, *Hook. Bot. Mag.* t. 4242.—N. Granat.
elongata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 396 \= *Brachyloma elongatum).*—Ecuador.
elongata, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. II. (1842) 32 = Isoloma Deppeanum.
eriantha, Benth. PI. Hartw. 228 - Isoloma erianthum.
erubescens, *Hanst. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1861) *App.* 8.—N. Granat.
exogonia, [Moç. *Sc* Sesse,] ex DC. Prod. vii. 625 = Pentarhaphia pedunculosa.
exoniensisx, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1868) 1038; Nichols. Diet. Gard. ii. 66.
exserta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 90 = Pentarhaphia exserta.
fascialis, Houc Bot. Mag. t 3659 = seq.
foucialis, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1785.—Bras.
flmbriata. Lam. Encyc. ii. 703 = Pentarhaphia Craniolaria.
flacourtifolia, Hort. ex Hahst. in Mart Fl. Bras. viii. 855=aHagophylla.
flavescens, *Hanst. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1861) *App.* 8.—Hab.?
fragilis, Poepp. Sc Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 7 = G. Sceptrum.
Gardneri, Hook. Bot. Mag. t. 4121 = Houttea leptopus.
Gerardiana, Hort ex Lem. in Fl. des Serres, Se>. I. ii. (Ayr. 1846) t. 4 = Naegelia Geroltiana.
Geroltiana, Kunth & BoucW, Ind. Sem. Hort. Berol. (1844) _ Naegelia Ceroltiana.
GoUmeriana, *Hanst. 1. c.* (1861) *App.* 7.—Venezuela.

GESITERIA :—
gracilis, Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 272 = punctata.
grandis, Hort. ex Hanst in Mart. Fl. Bras. viii. 856 — aHagophylla.
grandis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 89 = Rytidophyllum grande, Plumerianum.
guaznmaefolia, *Benth. PI. Hartw.* 147.—N. Granat.
guianensis, Benth. in Hook. Lond. Tourn. Bot. v. (1846) 860 = Schomb«gkiana.
Herbertiana, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. ii. (Avr. 1846) t. 4 = Naegelia Geroltiana.
hirsuta, Hort. Berol. ex Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 12-rubricaulis.
hirsuta, H. B. *Be* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 394 •• Isoloma hirsutum.
hondensis, H. B. *Sc* K. 1. c. 395 — Isoloma hondense.
hondensis, Morr. in Ann. Soc. Hort. Gand, ii. (1846) t. 84— Pentarhaphia libanensis.
Hookeri, Decne. in Fl. des .Serres, S«»r. I. vii. (1851-52) 167 = maculata.
Hookeri, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1866-66) 27(S— N. Granat.
Houttei, De Von, ex Morr. in Hortic. Belg. iii. (1888) 320 ; Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 874 = splendens.
Houttei, Dum. in Bull. Acad. Brux. iii. (1836) 362- magnifica.
humilis, Linn. Sp. PI. 612 = Pentarhaphia humilis.
ignoraia, Kunth & Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 18 = Isoloma ignoratum.
inaequalis, Benth. PI. Hartw. 280 = Isoloma inaequalc
incurva, Benth. Bot. Voy. Sulph. 131 = Isoloma Incurvura.
lasiantha, Zucc. PI. Nov. fasc. i. 300. n. 6-Isoloma Deppeanum.
lateritia, *Lindl. Bot. Reg.* t. I960.—Bras.
lateritia, Paxt. Mag. Bot. ix. (1842) 245 - cardinalis.
latifolia. *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 35.—Bras.
Leopoldi, *Scheidw. ex Planch, in Fl. des Serres,* Se"r. I. vii. (1851-52) 167, 704.—Bras.
leptopus, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (18») 129 = Houttea leptopus.
libanensis, Morr. in Ann. Soc. Hort. Gand, ii. (1846; 361 = Pentarhaphia libanensis.
Lindeniana, Brongn. in Rev. Hortic. Sir. IIL i. (18«> 363 "Chelonioides.
Lindleyi, *Hook. Bot. Mag.* t. 8602.—Bras.
Liniiana, Kunth *Sc* Bouche, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 13 = Isoloma Linkianum.
lobulata, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 377 " ixi&crorniz&.
longiflora, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. B. S96 " Isoloma longipes.
longiflora, [Moç, *Sc* Sesse] ex DC. Prod. vii. 531)- Achimenes longiflora.
longifolia, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 92 = Isoloma longifolium.
longipes, Benth. PI. Hartw. 229 = Isoloma longipes.
longirostris. Mart, ex Hanst. in Mart. Fl. Bras, viu- 380 = magnifica.
macrantha, Hort. Berol. ex Walp. Ann. ii. 1068 - cardinalis.
macrantha, *Spreng. Syst.* ii. 839 (sp. dub.).—Bras-
macrorrhiza, *Dum. in Bull. Acad. Brux.* iii- (1B1W 861.—Bras.
macrostachya, Lindl. Bot. Reg. t. 1202 =• latifolia.
maculata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. t. SI* — Bras.
maculata„ *Moç. V Sesse, in DC. Prod.* vii. 532 i,Quia',i- —Mexic.
magnifica, *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* i. (1888) —Bras.
Marchii, *Wailes, ex Hook. Bot. Mag.* t. 37**- — Bras.
melittifolia, *Brongn. in Jiev. Hortic.* Sér. III. i- (1847; 368.—Mexic.
Merckii, Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) *l« Marchii•
Merckii, *Wendl.f. in Otto (f Dietr. Allg. Garten*- (1838) 49.—Bras.
mollis, Hort. Berol. ex Kunth, Ind. Sem. Hort. >x (1848) 14 = Isoloma ignoratum.
Jllis, H. B. & K. Nofcen. et Sp. ii. 39 molle. 5 = Isoloma ... 455 s*
nitida, Hort. ex Hanst. in Mart. FL Bras. viu. *» aHagophylla.
oblongata, Hort. Berol. ex Hanst. in Linnaea, " (1865-66) 285 = Moussonia Deppeana.

QE8NEHIA :—
oblongata, Hort. Young, ex Hook. Bot. Mag. sub t. 3725; Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 108=elongata.
organa, Hort. ex Hanst in Mart. FL Bras. viii. 894 = Houttea leptopus.
•wyphylla, *DC. Prod.* vii. 581.—Am. austr.
Palustris, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 355 = allagophylla.
palustris, Hort. ex Regel, Gartenfl. iv. (1855) 247=G., Sceptrum.
Paluviensis, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras, viii. 855-allagophylla.
Pardina, Hook. Bot. Mag. t. 4848 = Houttea pardina.
Pendulina, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1032.—Bras.
Peholaris, Benth. Bot. Voy. Sulph. 181 = Isoloma Petiolare.
Picta, Hook. Bot. Mag. t. 4431 = Isoloma pictum.
P'losa, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iii. (1847) 223 = Columnea aureonitens.
Polyantha, *DC. Prod.* vii. 528.—Bras.
Polyantha, Hook. Bot. Mag. t 3995-discolor.
prasinata, DC. Prod. vii. 532-Paliavana prasinata.
Praşinata, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 428 = Rhytidopnyllum. prasinatum.
Prasinata, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 87 - Paliavana sericiflora.
Putchella, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 355 = allagophylla.
Pulchella, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 90 = Achimenes coccinea.
PHmila, Sw. 1. c.=Pentarhaphia pumila.
Pinctata, *Hort. ex Ann. Fl. et Pom.* (1837) 254.—N. Granat ?
PfrPurea, Hort. ex Lindl. *Sc* Paxt. Flow. Card. ii. (1852-53) 17= maculate, *Mart.*
Wadriflora, Lamb, ex Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. ᵛ'- (1846) 102 = Pentarhaphia parviflora.
tyffii/olia, Warcz. ex Hanst. in Linnaea, xxix. \ᵇ57-68) 541-Seemannia terniflora.
ᵍ"aterni/olia, Moç. ex DC. Prod. vii. 528 = Isoloma Peppeanum.
reng , *Knou<l. &" Westc.Fl. Cab.* ii. (1888) 65. t 67.—i.
ᴿ°geliana, Warscz. ex Planch, in Fl. des Serres, Sér. L .« (1858-54) 218=Sdadocalyx Warscewiesii.
*T*ynchocarpa,* Benth. Bot. Voy. Sulph. 131 - Isoloma *.rpcha ..rpum.
rub "«««««*, Kunth *Sc* Bouche-, Ind. Sem. Hort. Berol. U847) 12 = Isoloma rubricaule.
rugia *Jkeid. in Otto ff Dietr. Allg. Cartenz.* xv. «A ~47) 228 (ᵀP- dub.).—Mexic
"*Pestris,* Mart, ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Joum. J? ᴵV, Cᶠ888) 193 = tnberosa.
[illegible] *Mart. Nov. Gen. et Sp.* hi. 80. t. 213.-Bras.
rutil , *Lindl. Bot. Reg.* t. U6 9 B Bras.
saiv [illegible] *Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. Sa U845) 129 = Houttea salvifolia.
[illegible] *Liebm Ind Sem Hort Sem. Hort.* naun (1863) 20
scabra, Sw. P ʳ>d" Veg" Ind, oÇC" 89 = Pentarhaphia scabra.
!Ce J'i?ides, *Hanst. in lnd. Sem. Hort. Berol.* (1861) Sc A 7 N G at- [illegible] *MaTt Nm Gen et Sp* 32—Bras.
Sch a H k B ot.M t. 4152 - Isoloma [illegible] edeannm
Shpn urgkian, *Kunth V Bouche,' Ind. Sem. Hort. Berol.* Ç«44).-Guiana.
Seemannii, Bot. Mag. t. 4504 = Isoloma Seemannii.
Selloi, Hanst. in Lmnnea, xxxiv. (1865-66) 260 = Sellovii.
Selloi, 527 -Hw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. laterit'
Sellov ? *Mar *^Xov. Gen. et Sp.* iii. 36.-Bras.
silvat V videide sylvatica.
spicat aH. t ex Hul st. in Mart. Fl. Bras. viii. 355 =
*Picat ' 5 Ort n Hans t- L c- 371 = stricta.
&i B.CrK Aro Gen et & 3 93
splende masp icatum
viii. 87 l.—Bras. Van Houtte Hanst Mart F l- Bras
splendidissima, Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov. 63 = praec.
stachydifolia, Benth pl- "«**>• 230.-N. Granat.
stachyfolia, Hanst "» Linnaea, xxxiv. (1865-66) 264, sphalm. = praec.

GESNERIA :—
stricta, *Hook. V Arn. in Hook. Journ. Bot. i.* (1884) 280.—Bras.
Suttoni, *Booth, in Lindl. Bot. Reg.* I.1687.—Bras,
sylvatica, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 393.—Bras.
tenella, Hort. ex Hanst in Mart. Fl. Bras. viii. 866 - aggregata.
tenella. Moç. *Sc* Sesse, in DC. Prod. vii. 536 - Achimenes tenella.
tetraphylla, Hort. ex Hanst in Mart. Fl. Bras. viii. 359 =Leopoldi.
tomentosa, Bert, ex DC. Prod. vii. 524 = Rbytidophyllnm petiolare.
tomentosa, Jacq. Select. Am. 179. t. 175=Rhytidophyllum crenulatum.
tomentosa, Linn. Sp. PI. 612 = Rhytidophyllum tomentosum.
tomentosa, Moç. ex DC. Prod. vii. 528 = Isoloma Deppeanum.
Trianaei, Hlrincq, L'Horticult. Franc. (1863) 80 = Isoloma Trianaei.
tribracteata, *Otto tf Dietr. Allg. Gartens,* ii. (1884) 194.—Bras.
triflora. Hook. Bot. Mag. t. 4342= Isoloma triflornm.
triflora, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. (1842) reimpr. 2.—Mexic.
trifoliata, *Martens, in Linnaea,* xviiL (1844) 165.—Bras,
tuberose, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 29. t 212.—Bras.
tubiflora, Cav. Ic. vi. 61. t. 684 = Isoloma tubiflorum.
tubiflora, Endl. in Harting. Farad. Vindob. t. 64.1. 11 *(-Dolichodeira tubiflora).*—Bras,
tubiflora, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 263.—Reg. Argent.
Tweediana, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bns. viii. 896 = Paliavana prasinata.
ulmifolia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 394 = Heppiella ulmifolia.
umbellata, *Decne. in Fl. des Serres,* Sér. I. vii. (1861-62) 167.—Bras,
mniflora, *Moç.* CT *Sesse, ex DC. Prod.* vii. 532 (sp. dub.).—Mexic.
Vargasii, *DC. Prod.* vii. 527.—Venezuela.
Vauthieri, *DC. 1. c.* 580.—Bras.
velutina, Poepp. ix Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 290 = Moussonia purpurea.
velutina, Willd. ex DC. Prod. ix. 538 *{-Brachyloma elongatum).*—Ecuador.
ventricosa, Hort. Berol. ex Hanst. in Linnaea, xxix. (1857-58)529 *(= Brachylomaventricosum).—Hab.* ?
ventricosa, Sw. Prod."Veg. Ind. Occ. 89 - Pentarhaphia longiflora.
Verdi, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 396 - Paliavana prasinata.
verticillata, *Cav. Ic.* vi. 62. t 685.—Pernv.
verticillata, Hook. Bot. Mag. t. 2776-macuIata.
verticillata, Hort. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 366 =aggregata.
vestita, Benth. in Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 19 = Isoloma vestitum.
Warmingii, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 90.—Bras.
Warszewiczii, *Hanst. in Linnaea,* xxvi. (1853) 214.—Mexic.
xanthophylla, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 7.—Peruv.
,ebrina, Paxt. Mag. Bot. viii. (1841) 96 = Naegeha zebrina.

GE8NOUIN1A, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 502 (1826). *URTICACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 392.
arborea, *Gaudich. I. c*—Ins. Canar.
boehmerioides, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 194 = Phenax vulgaris.
Mamentosa, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. i. (1854) 207.—Ins. Canar.

ᶜ1ESNOUISIA, Steud. Nom. ed. II. i. 682 (1840), sphalm. = praec.

ᶜiESSNERIA, Dum. Comm. Bot 57 (1822) = OeBneria. Linn.

GESTKOA, Becc Malesia, i. (1877) 184. *VIOLARIAE.*
Candida, *Becc. I. c*—Malaya.

GETHOSYNE, Salisb. Gen. PI. Fragrn. 72 (18661 = Asphodelus, Linn. (Liliac.\
acaulis, Salisb. 1. c. = A. acaulis.

GETHYIiIiIS, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 181 (1787). *AMARYLLIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 782.
ABAPUS, Adans. Kam. ii. 57 (1763).
PAPIRIA, Thunb. in Phys. Sallsk. Handl. i. (1776 > 110.
acaulis, Blanco, Fl. Filip. ed. 1.260 -Hypoxis Franquevillei.
afra, *Linn. Sp. PI.* 442.—Afr. austr.
Britteniana, *Baker, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 227.—Afr. austr.
ciliaris, *Linn./. Suppt.* 198.—Afr. austr.
lanceolata. Linn. f. 1. c. = Apodolirion lan'ceolatum.
latifolia, *Masson, ex Baker, in Journ. Bot.* xxiii. (1885'. 228.—Afr. austr.
longistyla. *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881' 896.—Afr. austr.
pilosa, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Gnin. PI. 172 -= Curculigo gallabatensis.
plicata, Jacq. Hort. Schoenb. i. 42 = Curculigo plicata.
rosea, Eckl. Top. Verz. 4«=spiralis.
spiralis, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 437=afra.
spiralis, *Linn./. Suppl.* 198.—Afr. austr.
undulata, *Herb. Amaryll.* 186. t. 25. f. 5.—Afr. austr.
verticillata, *R. Br. Prod.* 290.—Afr. austr.
villosa, *Linn./. Suppl.* 198.—Afr. austr.

GETHYRA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812)282 = Renealmia, Linn. (Scitamin.).
Cardamomum-medium, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 890 •= Amomum costatum.
lingui/ormis, Sweet, 1. c. = Elettaria linguiformis.
occidental, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 282 = Renealmia jamaicensis.
punicea. Sweet, Hort. Brit. ed. 1.890 - Elettaria pnnicca.
tubulata, Sweet, 1. c.—Alpinia tubulata.

GETHYUM, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) f>4>. *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 806.
atropurpureum, *Phil. I. c.*—Chili.

GETONIA, Banks *Sc* Soland. ex Benn. PI. Jav. Rar. 12-2 (1838) = Cyrtandra, Font. (Gesner.).

GETONIA, Roxb. PI. Corom. i. 61. t. 87 (17U5)-Calyoopteris, Lam. (Combret).
floribunda, Roxb. 1. c.=C. floribunda.
nitida, Roth, Nov. PI. Sp. 217 - C. floribunda.
nutans, Roxb. Hort. Bcng. 33; Fl. Ind. ii. 428 •- C. floribunda.

GETUONIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 20 (1836) - Alllum, Tourn. (Liliac.).
vinealis, Rafin. 1. c.=A. vincale.

GEUM, Linn. Syst. ed. I (1735). *ROSACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 619.
ADAMSIA, Kisch. ex Ser. in DC. Prod. ii. 553 (1825).
CARYOPHYLLATA, Tourn. ex Hall. Enum. Helv. i. 335 (1742).
SIEVERSIA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. 398 (1811).
STYLIPUS, Rafin. Neogenyt. 8 (1826).
adnatum, Wall. Cat. n. 712-elatum.
agrimonioides, C. A. Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 29 = album!
agrimonoides, Punh, FL Am. Sept. i. 351=Potentilla arguta.
albiflorum, Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. vi. 58, sphalm. - parviflorum.
album, *J. F. Gmel. Syst.* 861.—Am. bor.
aleppicum, Jacq. Coll. i. 88 - strictum.
alpinum, Hornem. ex Kisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 38«brachypetaium.
alpinum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 —montanum.
ambiguum, Schur, Enum. PI. Transs. 183 = arbanum.
anemoncides, *Willd. Sp. PL* ii. 1117.—As. bor.; Am. arct.; Kamtachat.
antarcticum. Herb, ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (.1870) n. vi. 36 -involucramm.
atlanticum, Desf. Fl. Atlant. i. 402-sylvaticum.
aurantiacum, *Fries, ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vii. II. (1870) n. vi. 80.—Am. occ. *1*
Besseri, Fisch. ex Walp. Rep. ii. 47 = strictum.
Besserianum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 190=strictum.

OEUM:-
biflorum, Brot. Fl. Lusit. ii. 353 = sylvaticum.
brachypetalum, *Ser. in Mini. Soc. Phys. Geniv.* ii. (1824) 139.—Hab. ?
bulgaricum, *Panl. Elem. Fl. Bulg.* 26.—Bulgaria,
calthifolinm, *Sm. in Rees, Cycl.* v. n. 13.—Am. arct.
camtschaticum, Aurt. vide *kamtschaticum.*
camtschaticum. Pall, ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 425-calthifoUum.
canadense, Jacq. Hott. Vindob. ii. 82 = album.
canadense, Murr. in Comm. Gotting. v. (1783) 33. t. 4 B =strictum.
capense, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 91.—Afr. austr.
camlinianum, Walt. Fl. Carol. 150—album.
Caryophyllata, Gilib. Fl. Litnan. ii. 258 – urbannm.
caryophyllatum, Pers. Syn. ii. 57 = urbanum.
caucasicum, Hart, ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 31=urbanum.
cercocarpoides, DC. Prod. ii. 554 - Fallugia paradoxa.
chamaedryfolium, Crantz, Stiip. Austr. ed. I. fasc. ii. 7 — Dryas octopetala.
chiloënse, *Balb. ex Ser. in DC. Prod.* ii. 551.—Chili.
ciliatum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 352~ triflorum.
eoccineum, Lindl. Bot. Reg. 1.1088 = chiloënse.
coccioeum, *Sibth. &• Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 354 j *Fl. Grace,* t. 485.—Graecia; As. Min.
diversifolium, Hort. ex Schentz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. VI. 29-strictum.
dryadoides, DC. Prod. ii. 554 = Cowania mexicana.
Dryas, Crantz, Inst. ii. 175=anemonoides.
dubium, Hornem. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 88—*intermedium-*
elatum, *Wall. Cat.* n. 711.—Reg. Himal.
elegans, Poepp. ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. VI. 19=chiloënse.
Fischeri, Bess, ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 36 — strictum.
Franckii, *Steud. Norn.* ed. II. i. 682.—Am. bor.
geniculatum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 300.—Am. bor.
glaciale, *Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* ii. (1809) 187. 1.11. f. 20.—Sibir. et Am. arct.
glutinosum, Pursh, ex Lehm. Pugill. iii. 25-Potentilla arguta.
Grahami, Steud. Norn. ed. II. i. 682-triflorum.
grandiflorum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 43~ eoccineum.
grandiflorum, Steud. Norn. ed. II. i. 682=chiloënse.
hederaefolium, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 460 = urbanum.
helveiicum, Schleich. ex Tratt. Rosac Monog. iii. praef. p. viii (Quid ?).—Europ.
heterocarpum, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* 201. t. 63 — Reg. Mediterr.
heterophyllum, Desf. Cat. Hort: Par. ed. III. 294' virginianum.
heterophyllum, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 65 » strictum.
hirsutum, Muhl. Cat. ed. I. (1813) 61-virginianum.
hirtum, Wahlenb. Fl. Gothob. 60 = urbanum.
hispidum, Auct Germ, ex Scheutz, in Nov. Act Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. VI. 29 -strictum.
hispidum, *Fries, Fl. Holland.* 90.—Suec.; Hisp.
humile, Steud. Nom. ed. II. i. 682-Rossii.
hybridum, Wulf. in Jacq. Misc. ii. 33-rivaJe.
hyrcanum, *C. A. Mey. ex Fisch. b" Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. 32.—Rg. Caucas.
ibericum, Bess, ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. VI. 26=urbannm.
incisum, Dum. Fl. Belg. Prod. 97 = rivale?
inclinatum, *Schleich. Cat. PI. Helv.* 46.—Helvetia.
inclinatum, Timb. ex Nym. Consp. 229 - sylvaticum.
intermedium, Bess, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 411 = strictum.
intermedium x, Ehrh. Beitr. vi. 143.—Europ.
intermedium, Tenore, exNym. Consp. 280 = molle.
intermedium, Willd. Hort. Berol. i. 69 = urbanum.
involucratum, *Juss. ex Pers. Syn.* ii. 57.—Am. austr.
japonicum, Hort. ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal vii. II. (1870) n. vi. 29 = strictum.
japonicum, *Thunb. Fl. Jap.* 220.—Japon.
kamtschaticum, Lam. ex Poir. Encyc. Suppl. i. 618 - anemonoides.
karatavicum, *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 577.—Turkestan.
Klattianum, Peterm. Fl. Lips. Excurs. 382=urbannm.
kokanikum, *Regel* b* *Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 24.—Turkestan.
laciniatum, Murr. in Comm. Gotting. v. (1783) 30. t. 2 —virginiannm I *vel* Potentilla arguta J

GEUM:—
laciniosum, Murr. in Comm. Gotting. v. (1783) 36 = album ?
Laxmanni, *Gaertn. Fruct.* i. 352. t. 74.—Sibir.
Lechlerianum.ScAfccM. *in Linnaea,* xxviii. (1856) 465. —Chili,
lyratum, *Hort. Vind. ex Scheutt, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* vii. II. (1870) n. vi. 26. obs. 4.—Hab. ?
macedonicum, Griseb. Reise Rumel. ii. 166, nomen = eoccineum.
macrophyllum. Hook. Bot. Beech. Voy. 113=strictum.
macrophyllum, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 657.— Am. bor. occ.
magellanicum, Comm. ex Pers. Syn. ii. 57 -urbanum.
magellanicum, Lechler, ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. vi. 35-parviftorum.
micropetalum, *Gasp. Notit. Ale. Piante,* 11.—Ital.
molle, *Vis. &• Panl. in Mem. 1st. Venet.* x. (1861) 429.—Serbia.
montanum, Gouan, ex Steud. Nom. ed. II. i. 682 — sylvaticum.
montanum, *Linn. Sp. PI.* 501.—Europ. austr.
Mulleri. *Reyck, ex Gal. in Journ. Hort. Prat. Stt.* II. i. 122. t. 12. f. 2.—Hab.?
nutans, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 70 ; Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 344=rivale.
nutans, *Hort. Par. ex Lam. Encyc.* i. 399.—Hab. ?
obliquum, Steud. Nom. ed. I. 366; ed. II. i. 682 = Waldsteinia Moenchii.
ochrolencum, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 354, nom n (Quid?).—Am. bor.
pallidum, *Fisch. V Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. 49.-:iab.1
paradoxun, Steud. Nom. ed. II. i. 682 = Fallugia paradoxa.
parviflorum. *Sm. in Rees, Cycl.* v. n. 12.—Reg. Antarct.
parviflorum, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. i. 68J = Franckii.
Peckii, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 352 = radiatum.
pictum, Hort. ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. vi, 38 = rivale.
pinnatifidum, *Rafin. in Med. Repos. N. York,* v. (1808) 354, nomen (Quid?).—Am. bor.
plumosum, Moc. *Sc* Sesse, ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1833) 576••Fallugia paradoxa.
ponticum, Pall, ex Lehm. l'ugill. ix. 38 = Potentilla geoides.
Portenschlagianum, *Tratt. Ros.* iii. 116.—Europ. ?
potentilloides, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 219 >= Laxmanni.
potentilloides.VaXL Ind. Taur. 52, nomen = Potentilla geoides.
Pseudo-molle, Pant, in Verh. Ver. Natnr- u. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 121 = molle.
pubescens, Hook. Fl. Bor. Am. i. 175 — triflorum.
pyrenaicum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 209 — inclinaium.
pyrenaicum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 3 ; *Willd. Sp. PI.* ii. 1115.—Mont. Pyren.
pyrenaicum, Ram. in Bull. Soc. Philom. ii. (1800) 140. t. 10 = sylvaticum.
Quellyon, Hort Edinb. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1348 = chiloënse.
radiatum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 300.—Am. bor.
radiatum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 352 = calthifolium.
Rafinesqueanum, Steud. Nom. ed. II. i. 683=rivale.
ranunculoides, Ser. in Mem. Soc Phys. Geniv. ii. (1824) 138-strictum.
renifolium, *K Muell. in Hook. Kew Journ.* ix. (1857) 300.—Tasmania.
reptans, *Linn. Sp. PI.* 601.—Europ.
rhaeticum x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 56.—Europ.
rivale, Bourg.ex Nym. Consp. 230—inclinatum.
rivale, *Linn. Sp. PI.* 501.—Reg. bor. temp.
rivale, Tenore, Syli. in Add. et Emend. 528 = micro-petalum.
rivalimontanum, R»'chb. Fl. Germ. Excurs. 698-*intermedium.*
robustum, Schur, Enum. PI. Transs. 183-urbanum.
Rossii, *Ser. in DC. Prod.* ii. 553.—Reg. arct
rotundifolium, Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. U80U) 187 = calthifolium.
Roylei, Wall. Cat. n. 713=urbanum.
Tubellum, *Fisch.* to" *Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* xi. 45.—Hab.?
rubifolium, Lej. in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 150; et Rev. Fl. Spa, 103-urbanum.

GEUM:—
rubifolium, Schur, Enum. PI. Transs. 184=inclinatum.
rugosum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 409-strictum.
Sadleri, Frivald. in Flora, xviii. (1885) 332 - eoccineum.
Sieboldii, Hort. ex Scheutz, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. II. (1870) n. VI. 32. obs. 3-japonicum.
Sieversii, Hort. ex Scheutz, 1. c 60=elatum.
sordidum, Salisb. Prod. 363-urbanum.
spurium, *Fisch. If Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* *'• *Suppl.* 28.—Hab.?
strictum, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 217.— Reg. bor. temp.
sudeticum, Tausch, Hort Canal. Enum. 90 - Jndi-naturo.
sylvaticum, *Pourr. in Mém. Acad. Tout.* iii. (1788) 319.—Lusit an.; Afr. bor.
Thomasianum, Ser. in Mlm. Soc. Phys. Geniev. ii. (1824) 140—inclinatum.
tirolensex, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xvii. (1867) 105.—Europ.
Tournefortii, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 292 - pyrenaicum.
triflorum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 736.—Am. bor.
triflorum, Torr. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 195-Rossii.
umbrosum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, Suppl. 728 = heterocarpum.
umbrosum, Dum. Fl. Belg. Prod. 97 —urbanum ?
uniflorum, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* ii. (1870) 88.—N. Zel.
urbanum, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. IV. p. *»' -album,
urbanum, *Linn. Sp. PI.* 601.—Reg. temp. bor. i Austral.; N. Zel.
vernum, *Torr. V Gray, Fl. N. Am. i.* 422.—Am. bor.
vicanum, Schur, Enum. PI. Transs. 183 = urbanum.
Vidalii, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 835.- Japon.
virginianum, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iv. 1088-strictum.
virginianum, *Linn. Sp. PI.* 600.—Am. bor.
virginianum, Murr. in Comm. Gotting. v. (1788) t. 3-album.
virginianum, Spreng. Sysl. ii. 542= geniculatum.
Waldsteinia, Bull. Hist. PI. i. 377 - WaldsteU»» fragarioides.
Willdenoaiix, Fisch. &Mey. Ind. Sem. HortPetroP-xi. Suppl. 43 = *intermedium.*

GEUM, Toum. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 122 (1745) = Saxifraga, Toum.
erectum, Moench, Meth. 64 = S. Geum.
rotundifolium, Moench, 1. c — S. rotundifolia.
umbrosum, Moench, 1. c. 63 ~ S. umbrosa.

GETJITSIA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 11, 48 (1823); et Bijdr. 819 (1826). *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1160.

Cumingiana, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 815.—Ins. Philipp.
farinosa, *Blume, Cat. Gew. Buiiena.* 48; *et BiJ* 819.—Java.
fastuosa, Rafin. Fl. Tellur. iv. 61 = Hypo** fastuosa.

GEUNSIA, Moc. & Sesse, ex DC. Prod. iii. 358 (1828)* Cal&ndrlnia, H. B. & K. (Portiil.).
rosea, MQC. & Sesse, L c. 359 = C. caulescens.

GEUNSIA, Neck. Elem. i. 831 (1790)=Dio[1]iP** Juss. *vel* Justicia, Linn. (Acanth.).

GEUNZIA, Neck. Elem. ii. 440 (1790) = Sanyda. Linn.

GEVUHTA, Molina, Sagg. Chil. 184 (1782)- *TEACEAE,* [Benth. & Hook. f. iii. 177.]
QUADRIA, Ruiz & Pav. Fl. Per. et Chil. Prod. * • 83 (1794).
Avellana, *Molina, 1. c.*—Chili.

GHESAEMBILLA, Adans. Fam. ii. 449 (1763) = Embelia, Juss. (Myrsin.).

GHIESBRECHTIA, lindl. Veg. Kingd. 182 = GH1ESBREGHTIA, Rich. & GaL - Calft» Br. (Orchid.).

OHIESBIUBOHTIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. y»i. (1873) 629. *SCROPHULARINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 926.
grandiflora, *A. Gray, 1. c.* 630.—Mexic.

GHIESBREGHTIA, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat Sfr. III. iii. (1845)28 = Calanthe, R. Br. (Orchid.;.
"Hanthoides, A. Rich. & Gal. 1. c. = C. mexicana

GHIESEBREGHTIA, Lindl. Fol. Orch. (1854j=praec.

GHINIA, Schreb. Gen. 19 (1789)=Tamonea, Aubl. vverbenac).
mutica, Sw. Prod. Fl. Ind. Occ. 94 j Willd. Sp. PI. i. ll* = T.spicata.
sfrnosa, Willd. 1. c. = T. curassavica.
*'*monea,* J. F. Gmel. Syst. 87 =T. spicata.
verbenacea, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 1089 = T. curassavica.

GIBASIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 16 (1886) = Tradeeoantia, Linn. (Commel.).
Mchella, Rafin. 1. c. = T. pulchella.

GIBBARIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 139; et "> Dlct. Sc. Nat. xviii. 526 (1820) = Osteoapermum, .L*n. (Compos.).
mcolor, Cass. in Diet. Sc. Nat. xviii. 527.-Afr. austr.

GIBSONIA, Stocks, in Proc. Linn. Soc. i. (1848) 867 = Calligonum, Linn. iPolygonac.)

GIESEKI[illegible], Aeardh> Aphor- 218 (1825) = 01aokla, Uh. (Ficoid.).

GIESECKIA, Rdchb. Norn. 166 (1841) = praec.

GILIA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. Fl. Per. 25. t. 4 (1794). *POLEMONIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii.822.
AEGOCHLOA, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622 (1833).
BATANTHES, Rafin. Atl. Journ. 146 (1832).
BRICKELLIA, Rafin. in Med. Kepos. N. York. v. (1808) 352.
DACTYLOPHYLLUM, Spach, Hist. *Vig.* Phan. ix. 108 (1840).
FENZLIA, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622 (1833).
HUGELIA, Benth. 1. c (1833).
IPOMERIA, Nutt. Gen. Am. i. 124 (1818).
IFOMOPSIS, Michx. Fl. Bor. Am. i. 141 (1803).
LEPTODACTYLON, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 369. t. 89 (1841).
LEPTOSIPHON, Benth. in Bot. Reg. snb 1.1622 (1833).
LINANTHUS, Benth. 1. c. (1833).
NAVARRETIA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 20 (1794).
ROSSMAESSLERA, Reichb. Nom. 118 (1841).
WELWITSCHIA, Rejchb. Handb. 194 (1840).
achilleaefolia, *Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1622.—Calif.
achilleaefolia, Lindl. in Bot. Reg. 1.1682 - multicaulis.
aggregata, *Spreng. Syst.* i. 626.—Am. bor. occ.
andicola, *Phil. Fl. Atac.* 36.—Chili,
androaacra, *Steud. Nom.* ed. II. i. 683.—Calif,
arcuata, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cdrdova,* iii. (1879) 367.—Reg. Argent.
arenaria, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622 - inconspicua.
atractyloides, *Steud. Nom.* ed. II. i. 683.—Calif,
aurea, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 156.—Am. bor. occ.
bella, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 301.—Calif.
Berterii, *DC. Not.* 5™ *PI. Rar. Hort. Geniv.* 20. t. 5.—Chili.
Beyrichiana, Bouché, in Linnaea, xiii. (1839) 81 - coronopifolia.
Bigelovii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 265.—Am. bor. occ.
Bolanderi, *A. Gray, I. c.* 268.—Calif.
Brandegei, *A. Gray, I. c.* xi. (1876) 86.—Am. bor. occ.
brevicula, *A. Gray, 1. c.* xii. (1877) 79.—Calif.
Breweri, *A. Gray, I. c.* viii. (1870) 269.—Am. bor. occ.
caespitosa, *A. Gray, 1. c.* xii. (1877) 80.—Am. bor. occ.
California, *Benth. in DC. Prod.* ix. 316.—Calif.
-.alyptrata, Rivers, in Baill. Adansonia, x. (1872) 241 - Anthodiscus peruanus.
campanulata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 279.—Am. bor. occ.
capillaris, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* v. (1873) 46.—Am. bor. occ.
capitata, *Sims, Bot. Mag.* t. 2698.—Am. bor. occ.
ciliata, *Benth. PI. Hartw.* 325.—Am. bor. occ.
congesta, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 76.—Am. bor. occ.
coronopifolia, *Pers. Syn.* i. 187.—Am. bor.
COtnlaefolia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 683.—Calif,
crassifolia, *Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1622.—Chili.
crebrifolia, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N.S. i. (1847) 156 = congesta.
dactylophylla, *Torr. in Ives, Rep. Colorado River,* [illegible] 22.—Am. bor.
debilis,5. *Wats, in Am. Natural,* vii. (1873)302.—Am. bor. occ.
demissa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 263.—Am. bor. occ.
densiflora, *Benth. in DC. Prod.* ix. 310.—Calif,
densifolia, *Benth. I. c.* 811.—Am. bor. occ.
depressa, *M.E. Jones, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 106.—Am. bor. occ.
dianthiflora, Benth. in DC. Prod. ix. 314, in syn.-sea.
dianthoides, *Endl. Atakt. Bot.* t. 29.—Calif,
dichotoma, *Benth. in DC. Prod.* ix. 814.—Am. bor. occ.
diffusa, *Phil, in Linnaea,* xxx. (1859-60) 197.—Chili.
divaricata, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 155 = Collomia gilioides.

GIGLIOLIA, Rodrig. Orch. Nov. i. 25 (1877). *ORQH/DEAE.*
geraensis, *Rodrig. 1. c.* 26.—Bras,
fithophila, *Rodrig. 1. c.*—Bras.

GILBERTA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1.192 =MyrlooephalUB, Benth. (.Compos.).
tenuifolia, Turcz. 1. c. 193 - M. gracilis.

GILESIA, F. Muell. Fragm. ix. 41 (1875) = Her· Twa-Tiffa, Linn. (Stercul.).
biniftora, F. Muell. 1. c. 42 = H. Gilesii.

GILIA:—
divaricata, *Torr. ex A. Gray, in. Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 270.—Calif.
Douglassii, Gill, ex Benth. in DC. Prod. ix. 810 = gossipifera.
Dnnnn, Kellogg, in Bull. Calif. Acad. i. 11.(1885) 142.—Calif.
elongata, Steud. Norn. ed. II. i. 683-densifolia.
erecta, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cirdova,* iii. (1879) 868.—Reg. Argent.
eryngioides, Lehm. in Flora, xvi. (1833) 13*2 ** G. Navarettia.
Fentlia, Steud. Norn. ed. II. i. 683 = dianthoides.
filicaulis, *Torr. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 27O.-Calif.
filifolia, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 150.—Am. bor. occ.
filiformis, *Parry, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 75.—Am. bor. occ.
filipes, Benth. PI. Hartw. 325 - pusilla.
floccosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 272.—Am. bor. occ.
floribunda, *A. Gray, 1. c.* 267.—Am. bor. occ.
fioridana, G. Don, Gen. Syst. iv. 245 - coronopifolia.
foetida, *Gill, ex Benth. in DC. Prod.* ix. 313.—Chili.
Gayana, *Wedd. Chlor. And.* ii. 82.—Chili.
glandulosa, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 763 - rigidula.
glomeriflora, Juss. in Ann. Mus. Par. iii. (1804) 119 - Collomia Cavanillesiana.
glomeriflora, *Spreng. Syst.* i. 626.—Am. austr.
glutinosa, *Phil, in Linnaea,* xxx. (U59-60) 196.—Chili,
gossipifera, *Gill, ex Benth. in DC. Prod.* ix. 310.—Reg. Argent.
gracilis, Hook. Bot. Mag. t. 2924 - Collomia gracilis.
grandiflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 223.—Calif.
grandiflora, Steud. Nom. ed. II. i. (183 « densiflora.
Gunnisonl, *Torr. V Gray, in Pacif. Rail. Rep.* ii. 129. t. 9.—Am. bor. occ.
Harknessii, *Curran, in Bull. Calif. Acad. i.* (1884) 12.—Am. bor. occ.
Haydeni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 85.—Am. bor. occ.
heterodoxa, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. I. (1884) 10 = viscidula.
heterophylla, *Dougl. ex Hook. Bot. Mag.* t. 2895.—Am. bor. occ.
Hooierii, Benth. in DC. Prod. ix. 316 = pungens.
Hugelia, Steud. Nom. ed. II. i. 683-densifolia.
iberidifolia, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 291.—Am. bor. occ.
incisa, *Benth. in DC. Prod.* ix. 312.—Texas.
inconspicua, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 286 - parviflora.
intermedia, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 181.—Chili.
intertexta, *Steud. Nom.* ed. II. i. 683.—Am. bor. occ.
Kennedyi, Porter, in Coull. Bot. Gaz. ii. (1877) 73 - Parryae.
laciniata, *Ruim V Pav. Fl. Per.* ii. 17.—Peruv.; Chili.
lanata, *Walp. Ann.* i. 519__Mexic.
lanuginosa, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 14.—Chili.
Larseni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 84.—Calif.
latiflora, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* it I. 147.—Calif,
latifolia, 5. *Wats, in Am. Natural,* ix. (1875) 347.—Am. bor. occ.
Lemmoni, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 894.—Calif,
leptomeria, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 278.—Am. bor. occ.
Leptosiphon, Steud. Nom. ed. II. i. 681 = densiflora.
leptotes, A *Gray, in Proc. Am. Acadi* xvii. (1882)223.—Am. bor. occ.
leucocephala, *A. Gray, I. c.* viii. (1870) 270.—Calif.
Linanthus, Steud. Nom. ed. II. i. 681 •= clichotomn.
Lindheimeriana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 753 = incisa.
linearis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 223.—Calif.
liniflora, *Benth. in Bot. Reg.* subt. 1622.—Am. bor. occ.
longifiora, G. Don, Gen. Syst. iv. 245 = Collomia longiflora.
longituba, Benth. PI. Hartw. 824 = mlcrantha.
lutea, Steud. Nom. ed. II. i. 681 — micrantha.
lutescens, *Steud. I. c*—Calif.

GILIA:-
Macombii, *Torr. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 301.—Arizona.
micrantha, *Steud. Norn.* ed. II. i. 684.—Calif,
micromeria, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 279.—Am. bor. occ.
millefoliata, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Fetrop. v. 35 = multicaulis.
minima, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 269. —Am. bor. occ.
minutiflora, *Benth. in DC. Prod.* ix. 315.—Am. bor. occ.
mucronata, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1832; = G. Navarettia.
mnlticaulis, *Benth. in Bot. Reg.* snb t. 1622.—Calif,
mnltiflora, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. L (1847) 154.—N. Mexic; Calif.
multiflora, Torr. Bot. Mex. Bound. 146, partim = Macombii.
Navarettia, *Steud. Norn.* ed. II. i. 684.—Chili,
nudicaiilis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 266.—Am. bor. occ.
Nuttallii, *A. Gray, I. c.* 267.—Am. bor. occ.
Orcuttii, *A. Gray, ex Parry, in Proc. Davenp. Acad.* iv. (1884) 40.—Calif.
Parryae,^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 76.—Calif.
parviflora, *Spreng. Syst.* i. 626.—Am. bor. occ.
pharnaceoides, Benth in Bot. Reg. sub t. 1622 = liniflora.
pinnatifida, *Nutt. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 276.— Am. bor. occ.
polycladon, *Torr. in Hot. Mex. Bound.* 147.—Texas,
prostrata./l. *Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 228.— Calif.
pubescens, *Steud. Norn.* ed. II. i. 684.—Calif.
pulchella, Dougl. ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622 - aggregate,
pumila, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 156.—Texas.
pungens, *Benth. in DC. Prod.* ix. 316.—Am. bor. occ.
pungens, Dougl. ex Hook, in Bot. Mag. t. 2977 = squarrosa.
pnsilla, *Benth. in Bot. Reg.* snbt. 1622.—Calif.; Chili,
rigidula, *Benth. in DC. Prod.* ix. 312.—Am. bor. occ.
Schottii, *A. Gray, in Bot. King's Exped.* 267.—Am. bor. occ.
scopulorum, *M. E. Jones, in Bull. Torrey Bot. Club,* viii. (18S1) 70.—Utah.
Sessei, G. Don, Uen. Syst. iv. 246 - heterophylla.
setosissima, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 271.—Calif.
sinuata, Dougl. ex Benth. in DC. Prod. ix. 813=parviflora.
spieata, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 156.—Am. bor. occ.
squarrosa. *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 151.—Am. bor. occ.
stenothyrsa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (18701 276.—Am. bor. occ.
stricta, *Liebm. Ind. Sem. Hort. Haun.* (1853) 21.—Hab.i
stricta,Schee\e, in Linnaea, xxi. (1848) 765 - multicaulis.
subnuda, *Torr. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 276.—Am. bor. occ.
tenella, *Benth. PL Hartw.* 825.—Am. bor. occ.
tenerrima, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 277.—Am. bor. occ.
tenuiflora, *Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1622.—Calif.
Thurberi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 228.—Arizona.
tinctoria, Kellogg, in Bnll. Calif. Acad. i. 1)1. (1885) 142 = linearis.
tomentosa, *Mart,* b" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 273.—Mcxic.
tricolor, *Benth. in Bot. Reg.* sub t. 1622.—Calif,
trifida, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 291.—Am. bor.
trifida, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 156 = spieata.
vaWiviensis.Grisei.iw *Goett. Abh.-n.(\l5i)* 181.—Chili.
Veatchii, *Parry, ex Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 198.—Calif.
virgata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 684.—Calif,
viscidula,^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870) 271. —Calif.
Watsoni, *A. Gray, 1. c.* 267.—Am. bor. occ.
Wrightii, *A. Gray, 1. c.* 273.—Texas.

GILTBERTA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. 171 (1881)-seq.

GILIBERTIAJ. F. Gmel. Syst. 682 (1791)=Quivisia, Comm. (Meliac.).
decandra, J. F. Gmel. 1. c. = Q. decandra.
heterophylla,]. F. Gmel. 1. c. = Q. heterophylla.
oppositifolia, J. F. Gmel. 1. c. = Q. oppositifolia.
ovata, J. F. Gmel. 1. c. = Q. ovata.
rutilans, Sm. in Rees, Cycl. xvi. n. 4 = Q. ovata.

GILIBERTIA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 50. t. 8 (1794\ *ARALIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 944.
GINANHIA, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. iv. 367 (1804).
WANGENHKMIA, F. G. Dietr. 1. c. x. 536 (1810).
affinis, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 251.—Bras,
brasiliensis, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 175.—Bras,
cuneata, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 250.—Bras.
dichrostachya, Boj. Hort. Maurit. 162 = Polyscias dichroostachya.
heterophylla, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 246.—Bras.
Langcana, *March, in Bull- Acad. Belg.* Se>. II. xlvii. (1879) 79.—Mexic.
Langsdorfii, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 248.—Bras.
monogyna, *March. I. c.* 247.—Bras.
Nalugu, DC. Prod. iv. 256 = Leea sambucina.
palmata, DC. 1. c. = Trevesia palmata.
paniculata, DC. 1. c — Polyscias paniculata.
Pavoni. *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 248.—Bras,
populifolia, *March, in Bull. Acad. Belg.* Sér. II. xlvii. (1879) 77.—Mexic.
repanda, DC. Prod. iv. 256 — Polyscias repanda.
resinosa, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 249.—Bras.
sanrnroides, *DC. Prod.* iv. 256.—Ins. Molucc.
triloba, *March, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 247.—Bras,
umbellate, *Rui* (f Pav. Fl. Per.* iii. 75. t. 312.—Peruv.

GILIPUS, Rafin. Sylva Tellur. 61 (1888) = Cephalanthus, Linn. (Rubiac).
montanus, Rafin. 1. c = C. montanus.

OILLBEEA, F. Muell. Fragm. v. 17 (1865). *SAX1-FRAGEAE.*
adenopetala, *F. Muell. I. c*—Austral.

GILLENA, Adans. Fam. ii. 166 (1763) = Clethra, Linn. (Ericac).

GILLENIA, Moench, Meth. Suppl. 286 (1802). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 613.
stipulacea, *Nutt. Gen. Am. i.* 307.—Am. bor.
triloliata, *Moench, Meth. Suppl.* 286.—Am. bor.

GILLENIA, Steud. Norn. ed. II. i. 684 (1840), sphalm. = GILLENA, Adans. =• Clethra, Linn. (Ericac).

GILLIA, Endl. Gen. Suppl. i. 1403 (1841), sphalm.-Oilia, Ruiz & Pav. (Polem.).

GILEIESIA, Lindl. in Bot. Reg. t. 992 (1826). *ULIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 804.
Gaudichaudiana, *Kunth, Enum. PI.* iv. 491.—Chili,
graminea, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 992.—Chili,
montana, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 27. t. 188.—Chili.

GILLONIA, A. Juss. in Orb. Diet. xi. 200 (1849), sphalm. = Gillenia, Moench (Rosac).

GIMBERNATEA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 138. t. 86 (1794)-Terminalia, Linn. (Combret).
Calamansanay, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 266 = T. bialata.
oblonga, Rniz & Pav. Syst. Veg. 275 = T. oblonga.
obovata, Ruiz & Pav. 1. c. 274 = T. obovata.

GINAIiLOA, Korth. in Verh. Batav. Gen. xvii. (1839; 260 (Loranth. 64). *LORANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 215.
andamanica, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xii. (1872) II. 309.—Ins. Andaman.

GINALLOA :—
Arnottiana, *Korth. in Verh. Batav. Gen.* xvii. (18S!O 260 (Loranth. 64).—Malaya.
Cumingiana, *Benth. (f Hook. f. Gen.* iii. 215.—I"s-Philipp.
Helferi, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 64.—Burma,
spathulifolia, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* vii. *(186*1* 103.—Zeylan.

G1NANNIA, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. iv. 3S7 (1804) = Gilibertia, Rniz *8c* Pav. (Araliac).
umbellata, ¥. G. Dietr. 1. c. Nachtr. iii. 483 = Gi>" bertia nmbellata.

GINANNIA, Scop. Introd. 300 (1777) = Palovea, Aubl. (Legumin.\
gujanensis, J. F. Gmel. Syst. 653 = P. guianensis.

GINGIDIUM, Forst. Char. Gen. 41. t. 21 (1770)* Angelica, Kiv. (Umbellif.).
montanum, Forst. 1. c. 42 = A. Gingidinm.

GINGIDIUM, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet-i. (1855) 10S = Aciphylla, Forst. (Umbellif.).
antipodum, F. Muell. Veg.Chath. Isl. 18 *{=AnisototM antipoda).-Ins.* Chath.
Dieffenbachii, F. Muell. 1. c. 17.—Ins. Chath.
glaciate, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 103=A. glacialis.
Monroi, F. Muell. Fragm. i. 16 = A. Monroi.
procumbens, F. Muell. 1 c. 15 = A. procumbens.
simplidfolium, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. '• (1855) 104 = A. simplicifolia.
squarrosum, F. Mnell. Veg. Chath. Isl. 18, nomen-**1 squarrosa.
Traversii, F. Muell. 1. c. = A. Traversii.

GINGINS1A, DC. Prod. iii. 362 (1828) = Pharnace«DJ, Linn. (Ficoid.).
albens, DC. 1. c. 868 = P. albens.
aurantia, DC. 1. c. = P. reflexum.
brevicaulis, DC. 1. c.» P. dichotomum.
conferta, DC. 1. c. = P. incannm.
elongata, DC. 1. c.-P. incanum.
microphylla, DC. 1. c. = P. microphyllum.
pruinosa, G. Don, Gen. Syst. iii. 83 = P. pniinosuW-
teretifolia, DC. Prod. iii. 363 - P. teretifolium.

GINKGO, Linn. Mant. ii. 813 (1771). *CONIFERAE.*
Benth. & Hook. f. iii. 432.
PTEROFHYLLUS, Senilis [Nelson,] Pinaceae, (1866). 168
SALISBURIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 330.
biloba, *Linn. 1. c.*—Japon.
macrophylla, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. «• biloba.

GINNANIA, M. Roem. Syn. Hesper. 79, 90 (1840)* Quivisia, Comm. (Meliac).
oppositifolia, M. Roem. 1. c. 90 = Q. oppositifoW-
racemosa, M. Roem. 1. c.=Q. decandra.

GINOBA, Linn. Sp.PI.ed. II. 642 (1762). *LYTH&I' RIEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 780.
americana, *Linn. I. c*— Ind. occ.
curvispina, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* iii. (1882) 349.—Cuba.
Diplusodon, *Koehne, I. c.* 350.—Cuba,
glabra, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 106.—Cnba.
nudiflora, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. iii. = Antherylium nudiflornm..
Rohrii, Koehne, 1. c. = Antherylium Rohrii.
spinosa, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 106.—Cuba.

GINORIA, Jacq. Enum. PI. Carib. 5 (1760)- Linn. (Lythrar.). Ginora.
americana, Jacq. 1. c. = Ginora americana.

GINORIA, [M09. 8c Sesse,] ex DC. Prod. iii. 8» -Heimia, Link & Otto (Lythrar.). (1828)
flava, [M09. & Sesse,] ex DC. 1. c - H. salicifolia.
syphilitica, [M09. & Sesse,] ex DC. 1. c - H. syphilitica.

GINSA, Steud. Nom. cd. II. ii. 249, in syn. (1841) sphalm. = seq.

GINSEN, Adans. Fam. ii. 102 (1768) = Panax, Linn. (Aralia).

GIRARDINIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 498 (1826). *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 384.
adoensis, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. xviii. (1852) 203 = condensata.
«rmata, Knnth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1846) 11 =palmata.
bulbifera, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Mr. m. XTiii. (1852) 203.—Abyss.
condensata, Wedd. in Archm Mus. Pari. iii. (1855-56) 169.—Abyss.
cuspidata, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. 1. 108.—China.
?•«««, Decne. in Jacqnem. Voy. Bot. 151=pnlmata.
furialis, Blume, MUS. Bot. Lue4Brtl. 169=Obetia *floral*.
hirsuta, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. i. (1854) 81 = palmata.
hirtella, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. i. (1854) 81 = palmata.
Jungh. 81=palmata.
Lechenaultiana, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 152 = Palmata.
Malaya, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. *98.—Ind. or.; Palmata.
Moritoji, Blnme, Mus. Bot. Lngd. Bat. ii. 158 = Palmata.
Nivalifolia, Wedd. in Ann. Sc Nat. Se>. IV. i. (1854) 181 Palmata.
Wonka, Decne. in Jacqnem. Voy. Bot. 152 = palmata.

GIRGENSOHNIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 195; Abh. Akad. Berl. 1864, 84. 7 c= Beam. Linn.
acutifolia, klotzsch, 1. c - B. hydrocotylifolia.
Baueri, Klotzsch, 1. c = B. Barker!.
cardiocarpa, Klotzsch, 1. c. = B. cardiocarpa.
caroliniaefolia, Klotzsch, 1. c. = B. caroliniaefolia.
carpinifolia, Klotzsch, 1. c. = B. carpinifolia.
conchaefolia, Klotzsch, 1. c. = B. conchaefolia.
crassicaulis, Klotzsch, 1. c.-B. crassicaulis.
denticulata, Klotzsch, 1. c. nomen.-Veragua.
hydrocotylifolia, Klotzsch. 1. c. = B. hydrocotylifolia.
involucrata, Klotzsch, 1. c = B. hydrocotylifolia.
S* Klotzsch, 1. c - B. involucrata.
B. Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1856) 85 = *lacinata*.
Lindleyana, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Matrz, 1854) 195 = B. Lindleyan.
lobulata, Klotzsch, 1. c. = B. lobulata.
macrophylla, Klotzsch, 1. c. = B. macrophylla.
manicata, Klotzsch, 1. c. = B. manicata.
multinervia, Klotzsch, 1. c. = B. multinervia.
nelumbiifolia, Klotzsch, 1. c = B. nelumbiifolia.
Ottoniana, Gartenfl. (1859) 1B. Ottoniana.
pilifera, Kjotzsch, in Monatsb. Berl. Aead. (Maerz, 1854 ra.
plebeja, Klotzsch, 1. C.-B. plebeja.
proinata, Klotzsch, 1. c = fi. proinata.
punctata, Klotzsch, 1. c - B. heracleifolia.
rhizophylla, Klotzsch, in Abh. Akad. B*. (1855) 84 = B. caroliniaefolia.
sarcophylla, Klotzsch, 1. c. 88 = B. sarcophylla.
scabrella, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 125 = B. manicata.
sericoneura, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 89 = B. sericoneura.
setosa, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 125, nomen = B. setosa.
setulosa, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 91 = B. setulosa.
squarrosa, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 125 = squarrosa.
stigmosa, Klotzsch, 1. c. = B. stigmosa.
strigillosa, Klotzsch, 1. c. = B. strigillosa.
urophylla, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 92 = B. urophylla.
vitifolia, Klotzsch, 1. c. 87 = B. vitifolia.
xv. i. Hort. Berol. ex A. DC. in DC. Prod. 388 = B. conchaefolia.

GIROENSOHNTA, Bunge, Rel. Lehm. Bot. 302; in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1847) 478. *CHENOPODIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 72.
diptera, *Bunge, II. ec.* 308 et 479.—Turkestan,
fmticnlosa, *Bunge, Anabas. Rev.* 30.—Cappadocia.
gypsophiloid.es, Bunge, in Kel. Lehm. Bot. 303 = oppositiflora.
keteroptera, Bunge, 1. c.=oppositiflora.
imbricata, *Bunge, Anabas. Rev.* 32.—Persia,
oppositiflora, *Fenzl, in Ledeb. ft. Ross.* iii. 835.—Persia; Afghan.
Pallasii, Bunge, in Rel. Lehm. Bot. 803-oppositifloia.

GIROA, Steud. Norn. ed. 1.867 (1821), sphalm. = Ouioa, Cav.

GIRONNIERA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 85 (1844-66). *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 856.
DICERA, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 67, 74 (1858) [1856J.
GALUMPITA, Blume, 1. c. 73 (1863) [1856].
HELMINTHOSPERMUM, Thw. in Hook. Kew Journ. vi. (lb&4) 301. t. 9.
NEMATOSTIGMA, Planch, in Ann. Sc. Nat. S&. III. x. (1848) 2t>5.
celtidifolia, *Gaudich. Bot. Voy. Bonite*, t. 85.—Ins. Philipp.
chinensis, *Benth. Ft. Hongk.* 325.—China.
costata, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 88.—subaequalis.
euspidata, Kurz, For. Fl. Burma, ii. 470-reticulata.
lucida, *Kun, 1. c.*—Ins. Andaman,
nervosa, *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sét.* HI. x. (1848) 338.—Malaya.
nitida, *Benth. JFl. Hongk.* 325.—China,
parvifolia, *Planch. inAnn.Sc. Nat. Sir.* III.x. (1848) 338.—Malaya,
reticulata, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* i. 268.—Ind. or.; Malaya.
reticulosa, Planch, in DC. Prod. xvii. 207, sphalm. = praec.
rbamnifolia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 74.—N. Guinea,
subaequalis, *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. x. (1848) 839.—Im'. or.; Malaya.

GIRTANNERIA, Neck. Elcm. ii. 121 (1790) - Khamnus, Tourn.
alnifolia, Kafin. Sylva Tellur. 28-R. alnifolius.'
franguloides, Ratin. 1. c. = R. Humboldtianus ?

GISECHIA, Linn. Mant. ii. 562 (1771), err. typ.= Oisekio, Linn. (Kicoid.).

GISECKIA, Willd. Sp.Pl. i. 1547 (1797) -seq.

GISEKIA, Linn. Mant. ii. 554 (1771). *FICOIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 859.
KOILKEUTERA, Murr. in Nov. Comm. Gotting. iii. (1778) 67. t. 2. f. 1.
MILTUS, Lour. Fl. Cochinch. 302 (1790).
aspera, *Klotisch, in Peters, Reise Mossantt. Bot.* 136. —Afr. trop.
Burchellii, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 28 = pentadecandra.
congesta, *Moq. I- c*—Afr. trop.
linearifolia, Fenzl, ex Moq. 1. c. 27 = rubella.
linearifolia, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 167 = pharnacioides.
Miltus, *Fenil, Nov. Stirp. Dec. Vind.* x. 86.—Afr. trop.
molluginoides, Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 162-pharnacioides.
occulta, Schult. Syst. vi. 785 = pharnacioides.
pentadecandra, *E. Mey. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 28.—Afr. austr.
pharnacioides, *Linn. Mant.* ii. 662.—Ind. or.
lubella, *Hochst. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 27.—Afr. trop.

GISSANTHE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 279 = Co8tUfl, Linn. (Scitamin.).
spiralis, Salisb. 1. c. = C. spiralis.

GISSIPIUM, Medic Beobacht. (1788) 198-GosBypium, Linn. (Malvac).

GISSONIA, Salisb. in Knight, Prot. 32 (1809) = Leuoadendron, K. Br. (Proteac).
collina, Knight, Prot. 33-L. plumosum.
riparia, Knight, 1. c.—Afr. austr.
sericea, Knight, 1. c.—Afr. austr.

GITHAGO, Adans. Fam. ii. 255 (1768) = Lychnis, Linn. (Caryophyll.).
gracilis, Buiss. Fl. Orient, i. 661.—As. Min.
nicaeensis, link, Diss. Bot. Suerin, (1795) 62.-L. Githago.
segetalis, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 119 = L. Githago.
segetum, Link, Diss. Bot. Suerin, (1796) 62; Degf. Tabl. ed. I. 159=L. Githago.

GITHOP8I8, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1648) 258. *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 569.
calycina, Benth. PI. Hartw. 321 = specularioides.
diffusa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 221.—Calif.
pulchella, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 714 = specularioides.
specularioides, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. viii. (1843) 258.—Am. bor. occ.

OIVOTIA, Griff, in Calc. Journ. Nat. Hist. iv. (1844) 388. *EUPHORBIACEAE*, Uenth.& Hook. f. iii. 297-GOVANIA, Wall. Cat. n. 7851 (1847?).
rottleriformis, *Griff. I. c.* 14.—Ind. or.

GLABKARIA, Linn. Mant. ii. 156 (1771); Miq, Fl. Ind. Bat. i. I. 940 (1857)-Iiitsea, Lam. (Laurin.).
cuneata, Miq. 1. c. 943 *("=Tetranthcra cuneata).*—Malaya.
litoralis, Miq. 1. C.-L. sebifera.
mollis, Miq. 1. c. 941 (-- *Tetranthera mollis).*—Java.
nitens, Miq. I.e. 943 *(-Tetranthera nitens).*—Java.
tersa, Linn. Mant. ii. 276 = L. sebifera.
vestita, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. »41=L. tomentosa, *Blume.*

GLADIOLUS, Gaertn. Fruct. i. 81.1.11. f. 4 (1788) - Antholyza, Linn. (Irid.).

GLADIOLUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *IRIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 709.
BALLOSPORUM, HVPTISSA, OI'HIOI.YZA, KANISJ.% SYMrHYDOLON, Salisb. Gen. PI. Fragm. 142 (1866;. SPHAEROBPORA, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 501 (183U).
abbreviatus, Andr. Bot. Rep. t. 166 - Antholyza quadrangularis.
abyssinicus, *Brongn. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 306.—Abyssin.
adenandriflorus, *Eckl. Top. Vert.* 88.—Afr. austr.
aequinoctialis, Herb, in Lindl. Bot. Keg. (1842; Misc. 85 = Acidanthera aequinoctialis.
aethiopicus, *Drapiet, in Diet. Sc. Nat.* v. (1863; 129 (Quid ?).—Afr. trop.
affinis, Pen. Syn. i. 46>=cuspidatus.
aghullensis, *Eckl. Top. Vert.* 41.—Afr. austr.
alatus, Jacq. Ic ii. 2. t. 259 - ordutdiflorus.
alatus, *Linn. PI. Rar. Afr.* 8; *Amoen. Acad.* vi. 2.—Afr. austr.
albidus, Jacq. Ic. ii. 5. t. 256; Coll. Suppl. 21 - blandus.
aleppicus, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 18 = atroviulaceus.
aletroides, Vahl, JCnum. ii. 96 = \\'atsonia alctroides.
algoensis, Sweet, Hort. Krit.cd. 1. 397 = alatus.
alopecuroides, Linn. Cent. PI. ii. 6 ; Amoen. Acad. iv. 301 = Watsonia plantaginea.
alopecuroides, Pcrs. Syn. i. 46 = Watsonia spicata.
alpigenus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 685 - illyricus ?
amabilis, Salisb. Prod. 41°<L.ipeyrousia juncea.
ambiguus, Koem. & Schult. Syst. i. 446<*hirsutus.
amoenus, Lhih. ex Koem. & Schult. 1. c 435 = Tritonia rosea.
amoenus, Herb. Banks, ex Roem. & Sennit. 1. c. 409 *= brevifolius.
amoenus, Salisb. Prod. 39 = Watsonia Meriana.
anceps, Linn, ex liaker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877; lStJ"Lapeyrousia Fabricii.
anceps, Linn. f. Suppl. 94, partim = Ijipeyiousia compressa.
andongensis, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 269.—Afr. trop.

GLADIOLUS:—

Andrewsii, *Klatt, in Abh. Naturf. Ces. Halle,* **xii.** 11882) 840.—Afr. austr.
angolensis, *Welto. ex Hater, in Trans. Linn. Soc.* **Ser.** II. i. (1878) 269.—Afr. trop.
angustifolius, Lam. Illustr. i. 119—Babiana tubiflora.
angnstifolius, *Regel, Ind. Sent. Hart. Petrop.* **(1863)** SO.—Hab. ?
angustifolius, Salisb. Prod. 40 = angustus.
angustus. Herb. Linn, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 175, 176 •= blandus, undulatus.
angustus, Jacq. ex Thunb. Fl. Cap. i. 182 = hastatus.
angustus, *Linn. Sp. PI.* 37.—Afr. anstr.
angustus, Thunb. Diss. Glad. 19= undulatus.
Antholyza, Poir. Encyc. Suppl. ii. 795 = Antholyza nervosa.
aphyllus, Ker-Gawl. Irid. Gen. 134 = brevifolius.
arcuatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* **xii.** llS82) 338.—Afr. austr.
arenarius, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 178. —Afr. auslr.
aristatus, *Schrank, in Denkschr. Bat. Ges. Regensb.* ii. (.1822) 206.—Afr. austr.
atropurpureus, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 835. **—Afric.**
atroviolaceus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 14.—Syiia; Persia,
aur&ntiacus, *Klatt, in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 378.—Afr. austr.
benguellensis, *Baker, in Trans. Linn. Soe.* Ser. II. i. (1878) 268.—Afr. trop.
bicolor, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xvi. (1877) 178.** —Afr. austr.
bicolor, Thunb. Diss. Glad. 16 = Synnotia bicolor.
biflorus, *Klatt, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* **iii. II.** (1885) 197.—Afr. austr.
biflorus, Koem. *8c* Schult. Syst. i. 416 - hirsutus.
biflorus, Thunb. Diss. Glad. 10 = Solenomenus biflorus.
bimaculatus. Lam. Encyc. ii. 727 — involntus.
binervis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 397—grandis.
blandus, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. I. i. 64.—** Afr. austr
bockveldensis, *Herb, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 601, nomen.—Afr. austr.
Borneti, Ardoino, Fl. Alpes Marit. 363=segetum.
Boucheanus, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 488-palustris.
Bmneanusx, Hort.—Cf. Card. Chron. (1866) 1197, 1247.
brauhyandrus. *Baker, in Bot. Mag.* t. 8463.—Afr. trop.
bracteatus, Thunb. Prod. Fl. Cap. 186 = Lapeyrousia fissifolia.
hracteolatus, Lam. Encyc. ii. 725 = Watsonia punctate.
brenchleyensis x , Hort. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xvi. (1877) 177.
brevicaulis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* **Ser. II. i.** (1878) 267.—Afr. trop.
brevicollis, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* **xii.** (1882) 839.—Afr. austr.
brevifolius, *Jacq. Coll.* iv. 156.—Afr. austr.
Breynianus, Ker-Gawl. Irid. Gen. 135 = recurvus.
Burmanni, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 204-Ixia Burmanni.
byzantinus, Bieb. H. Taur. Cauc. iii. 40—segetnm.
byzantinus, Coss. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 674 = illyricus.
byzantinus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 3.—Reg. Mediterr.
caerulescens, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* **Ser. II. i.** (1878) 267.—Afr. trop.
campanulatus, Andr. Bot. Rep. t. 188 = blandus.
candidus x, Hort. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xvi. (1877) 177.
capitatus. Linn. Sp. PI. 37 = Aristea capitata.
cardinalis, *Curt. Bot. Mag.* t. 135.—Afr. austr.
cardinal!s. Red. ex Steud. Norn. ed. II. i. 685 = Tritonia crocata.
carinatus, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 64 = recurvus.
carneus, Andr. Bot. Rep. t. 240 = brevifolius.
carneus, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 2.—Afr. austr.
carneus, Delar. Diss. SO = blandus.
carneus, Herb. Banks, ex Roem. *8c* Schnlt. Fvst. i. 415 = hirsutus.
carneus, Jacq. Coll. ii. 370=cuspidatus.
carneus, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 722 =- Eckloni.

GLADIOLUS :—

caryophyllaceus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 795 = Watsonia humilis.
caryophylleus, Houtt. ex Roem. *8c* Schult. Syst. i. 431, in syn. = Watsonia brevifolia.
caucasicus, Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 65 = segetum.
citrinus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 340 = trichonemifolius.
coccineus, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 197 — Ixia speciosa, patens.
cochleatus, Baker, in Journ. Bot. xir. (1876) 333 = unguiculatus.
cochleatus, *Sweet, Brit. Flow. Gard.* Ser. II. t. 140.—Afr. austr.
coerulescens, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 174, *vide* caerulescens.
collinus, Salisb. Prod. 40= comznunis.
Colvillii x, Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 155.
communis, Cav. Desc. 295 — illyricus.
communis, Krock. Fl. Siles. i. 50 — imbricatus.
communis, *Linn. Sp. PI.* 36, partim.—Europ.; Oriens.
communis. Linn. 1. c. partim = segetum.
cammunis, Thunb. Prod. PI. Cap. 8—carneus.
communis, Vahl, Enum. ii. 30, partim = byzantinus.
commutatus, Bouche, in Linnaea, xii. (1838) 484-segetum.
concolor, Salisb. Parad. Lond. t. 8 = tristis.
Cooperi, Baker, in Hook. f. Bot. Mag. t. 6202-psittacinus.
cordatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 185-angustus.
corneus, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* **xxix. (1876) 165.** —Afr. trop.
corymbosus, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 2.—Afr. austr.
costatus, *Eckl. Top. Vert.* 88.—Afr. austr.
crassifolius, *Baker, in Journ. Bot.* xiv.(1876) 834.—Afr. ausir.
crispiflorus. Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 65 = imbricatus.
crispus. Linn. f. Suppl. 94 = Tritonia crispa.
cristatus, Trew, PI. Rar. 7. t. 24. f. 1 (Tiitoniae sp.). —Afr. austr. ?
crocatus, Pers. Syn. i. 44= Tritonia crocata.
cruentas, *T. Moore, in Gard. Chron.* (1868) 1138.—Afr. austr.
Cunonia, Gaertn. Fruct. i. 31 = Antholyza Cunonia.
cuspidatus, *Jacq. 1c.* ii. 5. t. 257*; Coll. Suppl.* 17.—Afr. austr.
Daleni, *Van.-Geel, Serf. Bot.* ii. (1829) t. 18.—Afr. austr.
dalmaticus, Tansch,ex Reichb. Fl. Germ. Excuis. Add. p. ix. n. 576 B = segetum.
debilis, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 2585.—Afr. austr.
decoratus, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 833.—Afr. trop.
denticulatus. Lam. IUustr. 118; Encyc. ii. 728 = Lapeyrousia Fabricii.
dichotomus, Thunb. Diss. Glad. 10 — permeabilis.
discolor, *Schrank, in Denkschr. Bot. Regensb.* **ii. (1822** 207.—Afr. austr.
distich-us, Roem. & Schult. Syst. i. 440-Babiana disticha.
dracocephalus, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5884 —Afr. austr.
Dregei, *Klatt, in Linnaea,* xxxii. (18B3) 693.—Afr. austr.
•iubins, *Eckl. Top. Ver**. 41, nomen.—Afr. austr.
dubtus, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 8-illyricus.
dubius, Farl. Fl. Panorm. i. 44 — spathaceus.
Eoklonii, *Lehm. in Del. S.-m. Hort. Hamb.* **(1835) ;** *Ann. Sc. Nat.* Ser. II. vi. (1836) 107.—Afr. austr.
edulis, *Burch. ex Ker-Gawl. in Bot. Reg.* **t. 16».—Afr.** austr.
elatus, *Balb. Cat. Hort. Taurin.* (1813) 38.—Afr. austr.
elongatus, Salisb. Prod. 40 = Babiana tnbiflora.
elongatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 185= **grandis.**
equitans, Thunb. 1. c. 186-alatus.
excelsus, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1666 = blandus.
excisus, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 46 — Lapeyrousia juncea.
expallescens, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 210.—Afr. austr.
exscapus, Thnnb. Prod. PI. Cap. 184=-Acidanthera tubulosa.
Fabricii, Thunb. 1. c. 186-Lapeyrousia Fabricii.
falcatus. Linn. f. Suppl. 96 = Lapeyrousia Fabricii.
fasciatus, Roem. *8c* Schult. Syst. i. 429= vittatus.
festivus. Herb, in Bot. Reg. (1844) Misc. 89-brevifolius.

GLADIOLUS :—

fissifolius, Jacq. Coll. iv. 164 — Lapeyrousia fissifolia.
fistulosus, Jacq. Hort. Schoenb. l. 8 — Watsonia spicata.
flabellifer, *Tausch, in Flora,* xix. (1836) 421.—Afr. austr.
flavus, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 65 = Tritonia flava.
flexuosus, Linn. f. Suppl. 96 = Acidanthera tubulosa.
flexuosus, Thunb. Prod. Fl. Cap. 8 - Acidanthera flexuosa.
floribundus, Hort. Batav. ex Tausch, in Flora, xix-(1836) 422 = flabellifer.
floribondus, *Jacq. Coll.* iv. 162.—Afr. austr.
formosus, *Klatt, in Linnaea,* xxxii. (1863) 692.—Afr. austr.
formosus, Pers. Syn. i. 44=striatus.
fragransx. Herb, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 177.
fragrans, Jacq. Hort. Schoenb. i. 7-Babiana plicata.
galeatus, Burin, f. Fl. Cap. Prod. 2 = alatus.
galeatus, Jacq. Coll. iv. 167 = Synnotia galeata.
galiciensis, Bess. Prim. Fl. Galic i. 51-imbricates.
gandavensis x, Vm Houtte, Cat. (1844); et Fl.de* Serres (1846), t. 1.
Gandavi, Herb, in Joum. Hort. Soc. ii. (1847) 89= praec.
Gamicri, *Klatt. in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 611 •— Madag.
Gawleri, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* **xii-** (1882) 841.—Afr. austr.
j-fcmAratt,Thunb.Prod.Pl. Cap. 186 -Watsonia rosea-
gracilis, *Jacq. Coll. iv.* 169.—Afr. austr.
gradlis, Lichtst. ex Schult. ManL i. 290 = scaber.
gramineus. Linn. f. Suppl. 95 ; Thunb. Diss. Glad. *• = Melasphaerula graminea.
grandiflorus, Andr. Bot. Rep. t. 118 — floribundus.
grandis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 185.—Afr. austr.
gregarius, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. &*•* II. i. (1878) 288.—Afr. trop.
Gueinni, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 14-blandus.
Guepini, Koch, in Flora, xxiii. (1840) 466= segetum.
halophilus, *Boiss. &• Heldr. Diagn.* Ser. I. xiii. I*-"" Graecia.
hastatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 185.—Afr. austr.
Haylockianus x, Herb, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 177.
Herbertianus x, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. J 1-666.
hirsutus, *Jacq. Coll.* iv. 161.—Afr. austr.
hirtus, Steud. Nom. ed. II. i. 686, in syn. sphalm-"* **praec**
***immiln.'Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 8**[1]**-**—Mesopot.
hyalinus, *Jacq. Ic. Rar.* ii. 4. t. 242.—Afr. austr.
hygrophilus, Boiss. *8c* Huet, ex Baker, in Journ. I-Soc. xvi. (1877) 171 -imbricatus.
ignescens, *Boj. ex Baker, in Journ. Bot.* **xiv. (VII** 334.—Madag.
illyricus, *Koch, ex Sturm, Deutschl. Fl.* **Heft 83; et *J*"** *Fl. Germ.* ed. II. ii. 806.—Reg. Mediterr. et Cauc**
imbricatus, *Linn. Sp. PI.* 37.—Europ.; Oriens.
imbricatus, Reut. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. *B'r* i. 140 = illyricus.
inarimensis, Guss. Enum. PI. Inar. 326. t. segetum.
incarnatus x , Hort. ex Baker, in Joum. Linn. w> xvi. (1877) 177.
inclinatus.rDC. in] Red. Lil.i. t.44 = Babiana tubinw'
indicia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 = Ferr»n undulata.
infestus, Bianca, in Att. Ace. Gioen. xix. (1842) segetum.
inflatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 185.—Afr. austr.
infundibuliformis, Schrank, in Denkschr. Bot. u-Regensb. ii. (18-22) 198 = Watsonia Meriana.
insignis x, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 223.
involutus, *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 2.—Afr. austr.
iridifolius, Jacq. Coll. iv. 151 - Watsonia Meriana-
italic-us. Gaud. Fl. Helvet. i. 96 =. segetum.
italicus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-comro"
ixioides, Thunb. Fl. Cap. 208 = Tritonia rosea.
ixioides, Thunb. 1. c. ed. II. 52 = Ixia paniculata, y,
Jacquini, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Reg"*>
(1822) 195.—Afr. austr.
junceus, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 2 ; Linn, f- S«PP- — Lapeyrousia juncea. v
Kotschyanus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. IS.—
laccatus, Jacq. Coll. iv. 167 = Watsonia humUis-

GLADIOLUS :-
laccatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 186=villosus.
laceratus. Barm. f. Fl. Cap. Prod. 2 = Tritonia crispa.
laevis, Thunb. Prod. PI. Cap. 184=grandis.
Lamarcki, Roem. & Schult. Syst. i. 445 ^-villosus.
Lambda, *Klatt, in Linnaea*, xxxii. (1863) 70S.—Afr. austr.
latifolius, Lam. Illustr.i. 49 = Babiana obtusifolia.
laxiflorus, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 268.—Afr. trap.
laxus, Thuob. Fl. Cap. ed. Schnlt. 50 *(=Meristostigma laxa).*—Afr. austr.
Lemonia, Pourr. ex Steud. Norn. ed. I. 869 ; II. i. 686 —blandus.
leucantkus, Bouche", in Linnaea, xii. (1888) 483-segetum ?
libanoticus, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iv. 92 = imbricatus.
Uliaceus, Houtt. Handleid. xii. 55 = angustus, gracilis.
Hneatus, Salisb. Prod. 43*=Trilonia lineata.
Lomenia,]. F. GmeL Syst. 112 *(=Lomenia borbtmica).* —Ins. Borbon.
'ongicollis, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 182 = . Acidanthera platypetala.
;ongiflorus, Andr. Bot. Rep. t. 5 ^Babiana tubata.
longiflorus, Herb. Linn, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 160 = Acidanthera tubulosa.
'ongiflorus, Jacq. Ic. Rar. t. 262=Tritonia pallida.
'ongiflorus, Linn. f. Suppl. 96; Thunb. Diss. Glad. 19=Ixia paniculata.
i-udovicae, Jan, ex Bertol. in Nov. Comm. Bonon. i. (1834) 74, in obs.- segetnm.
Ludwigii, *Pappe, ex Baker, in Joum. Linn. Soc.* xvi. , (W78) *17S.-AS*$_T$. anstr.
lunulatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ces. Halle,* xii. , (W82) 842.-Afr. anstr.
luridus, Homem. Hort. Hafn. Suppl. 118-trichonemi-, folius?
raridus, *Wel*>. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. >• (1878) 267.—Afr. trap,
luteolus, *Klatt, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 515.— . Afr. trop.
'"teus, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 694, partim = . tricolor.
'"Jens, *Lam. Encyc.* ii. 725.—Madag.
M«c-Ow$_{ab}$ianus, Klatt, in Trans. S. Afr. Soc. in. (1885) 199 = angustus.
"uuvlatus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 897-reeurvus.
m«rginatus, Linn. f. Snppl. 95 = Watsonia margmata, nnmilis.
narnuratus, Lam. Encyc. ii. 727 = Lapeyronsia juncea.
""rmoratus, Tausch, in Flora, xix. (1836) 421.—Afr. austr.
t^a*rschallii*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 789 = imbricatus•
U^ii, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 334.-Afr. trop.
*M*rianellus*, Thunb. Diss. Glad. 14 - Antholyza ` Merianella.
*Merianu^* j$_{acq.\ Coli.\ iv.}$ iso=WatsonU Meriana. '
."frklatua, ThVinb. Prod. Fl. Cap. 7 = Watsonia aetroides.
Mrileri, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 632.—Afr. austr.
"'"oiatus, *Ecil. Top. Vert.* 40.-A&. austr.
*ni*T)*tiflorus*, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. M. (1822) 198=Watsonia plantaginea.
nttrtamiensis x, Herb, ex Baker, in Journ. Linn. Soc «>• (1877) 177.
**^{oll}'s, *Vahl, Enum.* ii. 119,-Afr. austr.
m•onostachyus, Roem. & Schult. Syst. i. 418, adnot.= tndiastatus etc.
Montanus, Linn. *f Suppl* 96.—Afr. austr.
Mortonianus, Steud. Norn. ed. II. i. 686 = seq.
Mortonius, Herb, in Bot. Mag. t. 3680 - blandus.
""gronatus, [DC. in] Red. Iiliac. iii- t. 142 = .. Babiana stricta.
™ucronatus, Jacq. Coll. iv. 162-Babiana mucronata.
S 2 "a' » «, Lam. Illustr.i. 119-hirsutns.
*"Tc,-;"' *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. 1. (1878) 269.—Afr, trop,
**»>«quensis*. Ker-Gawl. in Bot Mag. t 592-alatus.
"«»«««, Andr. Bot. Rep. t. 187 = Babiana nana.
*nd*f«lensis*, [Reinw.] Hort. Lugd. Bat ex Lodd. Bot. ^Cab.1. 1756 = psittacinus.
-glectus, Schult. Obs. Bot. 14 = palustris.
nervosus• Lam. Encyc. ii. 724 = Babiana stricta.
Newii, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 338.—Afr. trop.
Notarisii, ParL Fl. Ital. Hi. 259-commnnis.

GLADIOLUS:—
ochroleucus, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 182.—Afr. austr.
odorus, Salisb. Prod. 40-recurvus.
odor us, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb ii. (1822) 206-Ixia fragrans.
oppositiflorus, *Herb, in Bot. Reg.* (1842) *Misr.* 98.—Madag.
orchidiflorus, *Andr. Bot. Rep.* t. 241.—Afr. austr.
orchidiflorus, Pers. Syn. i. 44=arenarins.
ornatus, Klatt, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. iii. (1885) 198-inflatns.
Orcbanche, [DC. in] Red. Lil. t. 125=brevifolius.
paleaceus, *Vahl, Enum.* ii. 118.—Afr. austr.
pallidus, Bouche, in Ijnnaea, xii. (.1838) 482-segetum t
palustris, *7aud. Fl. f.'elv.* i. 97.—Enrop.
panirulatus, Pets. Syn. i. '5 = Lapeyrousia juncea.
Papilio, *Ilook.f. Bot. Mag.* t. ">166.—Afr. austr.
papilionaceus, Lichtst ex Roem. & Schult. Syst. i. 408 -alatus.
papilionaceus, Salisb. Prod. 41=Antholyza Cunonia.
parviflorus, Jacq. Obs. Bot. iv. 2. t. 78=inontanus.
parviflorus, Schur, ex Nym. Consp. 70S = imbricatus.
parviflorus, Vahl, Enum. ii. 79= Watsonia Lamarkii.
pauciflorus, Berdau, Fl. Cracoy. 341-imbricatus.
pectinatus, Soland. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 168=Tritonia crispa.
pendulns, *Mund. Eckl. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 687 (Quid?).—Afr. austr.
permeabilis, *Burnt./. Fl. Cap. Prod.* 2 ; *Delar. Diss.* 27. t. 2.—Afr. austr.
persicus, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 102.—Persia.
petraeus, Boiss. & Huet, ex Boiss. Fl. Orient, v. 142 =• atroviolaceus.
pictus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 397 = blandus.
pilosus, Eckl. Top. Verz. 38 = villosus.
plantagineus, Pers. Syn. i. 46 = Watsonia plantaginea.
plicatus, Jacq. Ic. 2. t. 237 = Babiana disticha.
plicatus, Linn. Sp. PI. ed. II. 63 - Babiana stricta.
plicatus, Thunb. Diss. Glad. 20-Babiana plicata.
pofystachyus, Andr. Bot. Rep. t. 66 =• Lapeyrousia juncea.
polystachyus, Thunb. Diss. Glad. 24 = Babiana plicata.
Pottsii, McNab, ex Baker, in Card. Chron. (1877) H. 424 = Tritonia?ottsii.
praecox, Andr. Hot. Rep. t. 38 = Antholyza rcvolutnm.
pratensis, A. Dietr. Fl. Boruss. i. 43 = palustris.
propinquus x, Herb, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 177.
psittacinus, *Hook. Bot. Mag.* t. 3032.—Afr. austr.
pterophyllus, Pers. Syn. i. 43-grandis.
pubescens, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 333.—Afr. austr.
*pudibundus*x, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 176.
pulchellus, *Klatt, in Linnaea,* xxxii. (1863) 693.—Afr. austr.
pulchellus, *Salisb. Prod.* 39.—Hab. 1
punctatus, Jacq. Coll. iv. 160=recurvu&.
punctatus, Roem. & ScbulL Syst. i. 425=Watsonia punctate.
punctatus, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult.* 44.—Afr. austr.
punctulatus, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 216=villosus?
puniceus, Lam. Encyc. ii. 727-villosus!
puniceus, Vahl, Enum. ii. 114 = Babiana itricta.
jiurpureo-auratus, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5944.—Afr. austr.
purpureus, Vahl, Enum. ii. 114 = Babiana villosa.
pygmaeus, Roem. & Schult. Syst. i. 441, adnot.= Babiana sulphurea.
pyramidalis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 2-Antholyza aethiopica.
iyramidrlis, Lam. Illustr. i. 118; Encyc. ii. 726 = ` Watsonia iridifolia.
pyramidatus, Andr. Bot. Rep. t. 335 - Watsonia rosea.
quadrangularis, Ker-Gawl in Bot. Mag. t. 667 = Antholyza quadrangularis.
Quarlinianus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 806.—Abyss,
rachidifloras, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (188-2) 889.— Afr. austr.
Raddeanus, Trautv. in Act Hort. Petrop. iii. II. (1875) 273 = imbricatus.
ramosus, Linn. Sp. PI. 37 ^Melasphaerula graminea.
ramosus, Murr. Syst. ed. XIV. 86 = Moraea ramosa.

GLADIOLUS:—
ramosus x, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 99.
recurvatus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 96. (err. typ.) =recurvns.
recurvus, Houtt. Handleid. xii. 49. t. 79. f. 1 = Antholyza revoluta.
recurvus, *Linn. Mant.* i. 28.—Afr. austr.
recurvus, Thunb. Diss. Glad. 9 - Hesperantha radiata.
recurvus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 4-gracilis.
reflexus, Lichtst. ex Roem. & Schult. Syst. i. 439 = Babiana plicata.
refractus, Jacq. Ic. ii. 4. t.241; Coll. Suppl. 26-Freesia refracta.
resupinatus, Pers. Syn. i. 45 -Freesia refracta.
Reuteri, Boiss. Pugill. I'l. Kar. H2 = illyricus.
rigidusx, Herb, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1879) 177.
ringens, Andr. Bot. Rep. t. 27. et t. 227'recurvus.
ringens, Eckl. Top. Verz. 37 =inflatus.
ringens, Thunb. Prod. PI. Cap. 186 = Babiana mucronata, sulphurea.
roseo-albus, Jacq. Hort Schoenb. i. 7 — Watsonia Meriana.
roseus, Andr. Bot. Rep. t. 11—hirsutus.
roseus, Jacq. Ic ii. 5. t. 261; Coll. Suppl. 22 = Tritonia rosea. •
roseus, Willd. Enum. Hort. Berol. 60-Ixia amoena.
rossicus, Pers. Syn. i. 46—imbricatus.
rubens, Vahl, Enum. ii. 98 = Watsonia punctata.
rubrocyanus, Vahl, 1. c. = Babiana stricta.
rubromarginatus, Schrad. ex Roem. *St* Schult. Syst. i. 415=hirsutus.
rudis, *Lichtst. ex Roem. V Schult. I. c.* 408.—Afr. austr.
sagittifer, Salisb. Prod." 41 ~blandus T
saltatorum, Baker, in Tians. Linn. Soc. xxix. (1876) 165 = Quartinianus ?
sambucinus, Jacq. Hort. Schoenb. i. 7 - Babiana sambucina.
Saundersii, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6878.—Afr. austr.
scaber, *Spreng. V Link, Jahrb.* i. III. 70.—Afr. austr.
Schimperianus, Steud. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 176=Quartinianus.
secundus, Thunb. Prod. PI. Cap. 186 - Babiana secunda.
securiger, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 65-Tritonia securigera.
segetalis, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880; 126 -seq.
segetum, *KerGawl. in Bot. Mag.* t. 719.—Reg. Mediterr.
sericeo-villosus, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6427.—Afr. austr.
serotinus, Welw. ex Boiss. & Rent. I'ngill. PI. Nov. U3=illyricus.
setifolius, Eckl. Top. Verz. 87 -gracilis.
seti/olius, Linn. f. Suppl. 96-=].apeyrousia juncea.
silenoides, Jacq. Coll. iv. 168 = Lapeyrousia silenoides.
similis, *Eckl. Top. Vert.* 40.—Afr. austr.
Sparmanni, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 49-Freesia refracta.
spathaceus, Linn. f. Suppl. 96-Babiana spathacea.
spathacens, *Part. Fl. Ital.* iii. 262.—Ital.
speciosus, Eckl. Top. Verz. 41 = cardinalis.
speciosus, Thunb. Fl. Cap. 196 = nlatus.
spicatus, *Klatt, in Linnaea,* xxxv. (1867-68) 877.—Afr. trop.
spicatus, Lam. Illustr. i. 120 - Watsonia Lamarkii.
spicatus, Linn. Sp. PI. 87-Watsonia spicata.
spilanthus, Spreng. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 178-gracilis.
spiralis, Pen. Syn. i. 48=tristis.
splcndens. *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 383.—Afr. austr.
splendens, Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1848) Misc. 46 — Antholyza caflra.
splendens, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 268 = Welwiischii.
spofforthianus x , Herb, ex Raker, in Joum. Linn Soc. xvi. (1879) 177.
Sprengelianus, Schult. Mant. i. 296-Watsonia itricta.
stenophyllus, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (:S22) 212 = Babiana plicata.
stoloniferus, Salisb. Prod. 41 - Antholyza aethiopica.
striatus, Andr. Bot. Rep. t. 111-undulatus.
striatus, Herb. Banks, ex Roem. *it* Schult. Syst i. 435 — Watsonia rosea.
striatus, *Jacq. Ic.* ii. 6. t. 260; *Coll. Suppl.* 28.—Afr. austr.
striatus, Soland ex Baker, in Joum. Bot. xiv. (1876^ 337 = Tritonia Bakeri.

GLADIOLUS:—
strictiflorus, [Delile, in] Red. Liliac. vii. t. 899- Watsonia humilis.
strictus, Jacq. Coll. iv. 170 = hyalinus.
strictus, *Jacq. Ic.* t. 260.—Afr. anstr.
strictus, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 63- Babiana stricta.
suaveolens, Ker-Gawl. Irid. Gen. 186-recurvus?
subbiflorus, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 519 = linbnic&tns.
subulatus, Vahl, Enum. ii. 97 - Watsonia punctata.
sulcatus, Lam. Illustr. {. 119 = mollis.
sulphureus, Jacq. Coll. iii. 258 •= Babiana stricta.
superbus, *Fisch. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 687.—Hab.?
tabularis, *Eckl. Top. Vern.* 38.—Afr. anstr.
tabularis, Pers. Syn. i. 44 —montanns.
telifer, Stokes, Bot Comment, i. 217 = angustus.
Templemanii, Klatt, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. iii. (1885) 196-bicolor.
tenellns, *Jacq. Coll.* iii. 255.—Afr. austr.
tenuiflorus, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 636 = illyricns.
tennis, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 386.—Afr. austr.
tenuis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 29 = knbricatus.
tenuis, Salzm. ex Nym. Consp. 704 = palustris.
testaceus, Vahl, Enum. ii. 105 = Watsonia brevifolia.
Thomsoni, *Baker, in Journ. Bot.* xix. (1881) 179.—Afr. trop.
Tkunbergi, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iii. 494 = Addantheratubulosa.
Thunbergii,.Eckl Top. Verz. 37 = hastatns.
tigrinus, Eckl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 178 = hastatus.
trichonemifolius, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 1488.—Afr. austr.
tricolor, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien, I* (1885) 82.—As. Min.
trimaculatus, Lam. Encyc. ii. 727 — angustus.
triphyllos, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod. i.* 25; *Fl. Grace,* i. 28. t. 38.—Ins. Cyprus.
triphyllus, Bertol. Mant Fl. Alp. Apnan. 5-palustris.
tristis, Herb. Linn, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 172=grandis.
tristis, *Linn. Sp. PL* ed. II. 58.—Afr. anitr.
tristis, Thunb. Diss. Glad. ll=tenellus, etc.
triticeus, Thunb. Fl. Cap. 164 - Watsonia plantaginea.
tubatus, Jacq. Ic. ii. 6. t. 264; Coll. Suppl. 18 = Babiana tnbata.
tubiflorus, Linn. f. Suppl. 96=Babiana tubiflora.
tubulosus, Barm. f. H. Cap. Prod. 2 = Watsonia spicata.
tubulosus, Jacq. Coll. iv. 153 = Watsonia aletroides.
nmbellatus, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 202.—Afr. austr.
undulatus, *Jacq. Coll.* iii. 256.—Afr. austr.
undulatus. Linn. Mant. 27, partim = cuspidatus.
undulatus, Schneev. Ic. t 19= vittatus.
unguiculatus. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 178.—Afr. trop.
uniflorus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 337-aUtus.
venosus, Willd. Enum. Hort. Berol. i. 68-Tritonia lineata.
ventricosus, Lam. Encyc. ii. 727 = enspidatns.
versicolor, Andr. Bot. Rep. t. 19-grandis.
villosiusculus, Soland. ex Baker, in Journ. linn. Soc. xvi. (1877) 174-TiUoius.
villosulus, Roem. & Schult SysL i. 444 = Babiana stricta.
villosus, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 2=Synnotia bicolor.
villosus, *Ker-Gawl. Irid. Gen.* 183.—Afr. austr.
villosus, Vahl, Enum. ii. 145=Babiana stricta.
vinulus, Klatt, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. iii. (1886) 199=vittatus.
violaceus, Pers. Syn. i. 43=recnrvns.
viperatus, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 688 - orehidiflorus.
virescens, Thunb. Fl. Cap. 196 = orchidiflorus.
viridis, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 481 = Tritonia viridis.
vittatus, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 950.—Afr. austr.
vittatus, Znccagni, in Roem. Collect. 121 = undulatns.
vomercnlus, *Ker-Gawl. Irid. Gen.* 142.—Afr. trop.
watsonioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 405.—Afr. trop.

GLADIOLUS.—
Watsonius, Thunb. Diss. Glad. 14 = Antholyza revoluta.
Welwitschii, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. i. (1878) 268.—Afr. trop.
Willmoreanusx, Hort. Fl. des Serres, t. 639.
xanthospilus, [DC. in] Red. Liliac. iii. t. 124 = Freesia refracta.
Zeyheri, *Eckl. Top. Vert.* 38, nomen.—Afr. austr.

GLAMDOHTIA, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 23 (1858). *MALPIGHIAÇEAE,* Benth. & Hook. f. i. 252.
macrocarpa, *Griseb. I.* c—Bras.

GLANDULA, Medic, in Vorles. Chnrpf. Phys. Ges. ii. (1787) 374=ABtragalus, Tonm. (Legumin.).
leontina, Medic. I. c. = A. leontinus.

GLANDULARIA, J. F. Gmel. Syst 920 (1791) = Verboxia, Linn.
hipinnatifida, Nutt. in Joum. Acad. Sc. Pbilad. ii. (1821) 123 - V. bipinnatifida.
carolinensis, J. F. Gmel. Syst. 920=V. Aubletia.

GLANDULIFOLIA, Wendl. Collect 35.1.10 (1808) = Adenandra, Willd. (Rutac).
umbellata, Wendl. 1. c. 37. t. 10-A. umbellate.
unifiora, Wendl. 1. c. 89. t. 38-A. uniflora.

GLAPHIRIA, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 106 (1835) = seq.

GLAPHYRIA, Jack, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1823) 128=LeptoBpennum, Font (Myrtac).
nitida, Jack, 1. c—Malaya.
sericea, Jack, 1. c. 129.—Sumatra.

GLASTARIA, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xvi. (1841) 382-Texiera, Jaub. *Sc* Spach (Crucif.).
deftexa, Boiss. 1. c = T. glastifolia.

GLASTUM, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 63 (1745)=Iaatia, Linn. (Crucif.).

GLAUCENA, Vitm. Snmma, ii. 441 (17,89) = Clausena, Burm. f. (Rutac.).

GLAUCIDIUM, Sieb. & Zncc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1845) 184 (Fam. Nat. Fl. Jap. i. 76. t. 1). *RANUNCULÁCEAE,* Benth. & Hook. f. i. 7.
palmatum, *Sieb. V Zucc. II. cc.*—Japon.

GLAUCIUM, Tonm, ex Hall. Enum. Heir. i. 304 (1742). *PAPAVERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 58.
aleppicum, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* i. 122.—Cilida.
arabicum, *Fresen. in Mus. Senckenb.* i. (1838) 174. 1.10.—Arab.
aurantiacum, Martr. in Flora, xxxix. (1856) 171 = corniculatum.
aureum, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 49 = corniculatum.
calycinum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xvi. (1841) 875.—Persia.
cappadocicum, *Boiss. I. c.*—Cappadoc.
contortuplicatum, *Boiss. 1. c.* 376.—Persia,
corniculatum, *Curt. Fl. Lend.* vi. t. 32.—Europ.; Reg. Mediterr.
elegans, *Fisch. (f Mey. Ind. Sem. Hort. Petr op.* i. (1885) 29.—Persia,
fimbrilligernm, *Boiss. Fl. Orient,* i. 120.—Turkest.; Afghan.
Fischeri, *Bernh. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 687.—Persia,
flavum, *Crantt, Stirp. Austr.* ed. I. fasc. ii. 131; ed. II. 133.—Europ.; Reg. Mediterr.
fulvum, Sm. Exot Bot. i. 11. t 7 = flavum.
glaucum, Moench, Meth. 249=flavum.
grandiflorum, *Boiss. tf Huet, Diagn.* Ser. II. v. 15.—As. Min.; Persia.
hybridum, Dnm.-Cours. Bot. Cult ed. II. iv. 472 = Roemeria violacea.
intermedium, link, in Bach, Beschr. Canar. Ins. 152 -corniculatum.
leiocarpum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 122.—As. Min.; Persia.

GLAUCIUM:—
leptopodum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. U877) 310.—China.
iittorale, Salisb. Prod. 877 = flavum.
luteum. Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 869-flavum.
mesopotamicum, Spreng. Syst. ii. 570 = Roemeria violacea.
oxylobum, *Boiss.* to* *Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat-Mosc.* xii. (1860) 12. t. 5.—Persia.
persicum, Bnnge, in Mém. Sav. Etr. Pitersb. vii. (1847) 192 = fimbrilligerum.
persicum, *DC. Syst.* ii. 97.—Persia.
phoeniceum, Crantz, Stirp. Anstr. ed. I. fasc. ii. 133; ed. II. 141-corniculatum.
pumilum, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 374 - elegans.
refractum, J. Gay, ex Boiss. Fl. Orient, i. 122 " aleppicum.
refractum, Stev. ex DC. Syst. ii. 93 = RoemW* refracta.
rubrum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 857-=comiculatum.
Serpieri, *Heldr. in Regel, Gartenfl.* (1878) 323.—Graecia.
spurium,Stev. ex DC. Syst. ii. 93-Roemeria violacea.
squamigerum, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pe"tersb. vu. (1847) 192 = elegans.
squamigerum, *Kar. If Kir. in Bull. Soc. Nat. J»osc-* xv. (1842) 141.—As. centr.
tenue, *Regel &• Schmalh. ex Regel, PL Nov. Fedsch. I-*—Turkest.
tricolor, Bemh. ex Spreng. Syst. App. 203=»corwculatum.
tricolor, Godr. in Mim. Acad. Montp. (Sect. Medic) i. (1853) 411 = luteum.
involve, Moench, Meth. 249 = Roemeria violacea.
violaceum, Jnss. Gen. 286-Roemeria violacea.
vitellinum, *Boiss.* b" *Buhse, in Nouv. Mém. Soc.* «»• *Mosc.* xii. (1860) 11. t. 4.—Persia.

GLAUCOIDES, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 20 (1746)' Glaux, Toum. (Primul.).

GLAUX, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 376=Astragalus, Toum. (Legumin.).
astragaloides, Medic. 1. c 377 = A. Cicer.

GLAUX, [Toura.] Linn. Syst. ed. I (1735). *PRlM^V, LACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 637.
GLAUCOIDES, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 20 (1745J-
atacamenris, *Phil. Fl. Atac.* 35.—Chili,
maritima. *Linn. Sp. PL* 207.—Reg. bor. temp.

GLAYPHYRIA,G.Don,Gen.Syst.ii. 871 (1831) sphaH"-=GLAPHYRIA, Jack=Leptospermum, *°rst- (Myrtac).

GLAZIOSTELMA, Foum. in Mart. Fl. Bras. •• <^v 227 (1885). *ASCLEPIADEAE.*
ovalifolium, *Fount. 1. c.*—Bras.

GLAZIOVA, Bur. in Adansonia, viii. (1868) s8o, *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1088.
GLAZIOVIA, Benth. & Hook. f. ii. 1038 (1876).

GLAZIOVA, Mart, ex H. Wendl. in Flor. & poBi, (1871) 116=COOOB, Linn. (Palm.).
elegantissima, Hort. ex H. Wendl. 1. c. = C. Wed^06 liana.
insignis, Hort. ex Drude, in Mart. Fl. Bras. IU-^IU* =• C. insignis.
Martiana, Glaz. ex Drude, 1. c. 897=C. WeddelU*"

GLAZIOVIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1038 (1876)
Glaziova, Bur. (Bignon.).

GLEBIONIS, CasB. in Diet. Sc. Nat. xii. 41 (1826)
Chiysanthemum, Toum. (Compos.).
Roxburghii, Cass. 1. c.=«C. coronarium.
segetum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N.s> (1869) 90=C. segetum.

GLECHOMA,LiDn. Systed. I (17S5)=Nepeta.1JI"1, (LabUt.).
arvensis, Linn. Sp. PI. 578=Stachys arvensis.
belgica. Linn. 1. c = Stachys arvensis.
borealis, Salisb. Prod. 81=N. Glechoma.
erecta, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort Beng. 44; " iii.7=N.rudenlis.

GLECHOMA :—
grandiflora, DC. Fl. Fr. iii. 538=Stachys Corsica.
hederacea, Linn. Sp. PI. 578 = Nepeta Glechoma.
heterophylla, Opiz, Natural, vii. (1824) 61 =.N. Glechoma.
Mndostana, Heyne, ex Roth, Nov. Sp. PI. 258 = N. ruderalis.
hirsuta, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 124.1.119 "N. Glechoma.
indica, Sprang. Syst. ii. 727-=N. rnderalis.
intermedia, Schrad. ex Benth. in DC. Prod. xii. 891 = , N. Glechoma.
'amiifolia, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. , (1858) 58 =N. Glechoma.
lohulata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 484 = N. Glechoma ?
longicaulis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 400 =N. Glechoma.
waj-no, Mérat, Fl. Par. 225=N. Glechoma.
Marrubiastrum, Vill. Hist. PL Dauph. ii. 871 - Stachys arvensis.
"ucrantha, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 816 .=N. Glechoma.
"tvalis, Jacquem. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 787 =N. thibetica.
*'*pens,* Gilib. Fl. Lituan. i. 77=N. Glechoma.
T>g>da, Kem. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 215 = N. Glechoma.
"otundifolia, Rafin. Atl. Jonm. 177 =N. Glechoma.
'nibetica, Jacquem. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 787 = N - thibetica.

GLECHON, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 227 (1827). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1192.
Candida, Benth. in DC. Prod. xii. 250=marifolia.
'anescens, St Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 407 = ..marifolia.
«««a, *Benth. I. e.* 4O8.-Bras.
"Wnfolia, *Benth. I. c.* 407—Bras.
wyrtoides, *St. Hil. ex Benth. I. c.* 409.—Bras,
onganifolia, *Benth. 1. c.* 408.—Bias,
"ngras, *Benth. 1. c.* 409.—Bras.
s"toMfMa, St. Hil. ex Benth. 1. c. 407-=marifolia.
spathulata, *Benth. I. c.* 4O6.-Bras.
squarrpsa, *Benth. I. c.* 408.—Bras,
wymoides, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 227-—Bras.

GL^HONION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. ^880) 126 = ITepetf, Linn.
""teraceum, St. Lag. 1. c.-N. Glechoma.

GLECOMA, Linn. Sp.Pl. 578 (1758) = GLECHOMA, ^""n^Nopeta, Linn. iLabiat).

GLEDITSCHIA, Clayton, ex Linn. Gen. ed. II. 480 (1742) [G]leditsia); Scop. Introd. 295 (1777). *LEGUMINOSAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 568.
MELILOBUS, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. <ur. viii. (174$_8$) 215 App.
*am,***> Welw. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1866) 8O4.-Afr. trop.
a ..., marsn. Arbust. Am. 95 = monosperma.
brachycarpa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 221 = triacanthos.
Bujotii, Neumann, in Rev. Hortic. Sér. II. iv. (1845-46) 205 = triacanthos!
caroliniensis, Lam. Encyc. il. 461 = monosperma.
caspica, *Desf. Hist. Arb.* ii. 247.—Reg. Casp.
chinensis, Anct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 688 = sinensis.
elegans, Salish. Prod. 828=triacanthos.
ferox, Desf. Hist. Arb. ii. 247 = macracantha ?
flava, - Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 9=triacanthos.
Font ««<>i,Spach,Hist. Vég.Phan. i. 95 = macracantha.
heterophylla, Bunge, in Mem. Sao. Etr. Petersb. n. (1835) 195.—China.
heterophylla, Rafin. Fl. Ludov. 99=triacanthos.
horrida IIM IIM Sp. PI. iv. 1098 = sinensis.
indica V^ra> ^ »• 82S = sinensis.
inermis, Linn. Syst. ed. X. 1313 = Gallandra Houstond. Gard. Dict. VIII. n. 2=monosperma. . . . .ed.
japonica «. Lodd. Cat. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit.
jap^P^Ui:/88=sinensi..
Ja^J' *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 54.—
javanica Lam. Encyc. ii. 466 = Acacia javanica.
laevis, "ort. Par. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 413 =tm Manthos.
latisiliqua Wo , Lodd Cat ex G Don, l & 4U „ triaCan,
[a]««acantha, /)„/. Wrf. *Arb,* U. 246.-China.

OLEDITSCHIA :—
meliloba, Walt. Fl. Carol. 254 «triacanthos.
monosperma, *Walt. I. c.*—Am. bor.
orientalis, Bosc, ex DC. Prod. ii. 479=macracantha.
polysperma. Stokes, Bot. Mat. Med. i. 228 - triacanthos.
sinensis, *Lam. Encyc.* ii. 465.—China.
spinosa, Marsh. Arbust. Am. 94 = triacanthos.
triacantha, Gaertn. Frnct. ii. t. 146 = monosperma.
triacanthos, *Linn. Sp. PI.* 1056 (excl. var.)—Am. bor.
xylocarpa, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 366 = sinensis.

GLEDITSIA, Linn. Gen. ed. II. 480 (1742) = praec.

GLEDITZIAJaume St. Hil. Expos, ii. 202 (1805) =- praec.

GLEHNIA, F. Schmidt, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lngd. Bat. iii. 61 (1867)=Phellopterus, Benth. (UmbeUif.).
littoralis, F. Schmidt, 1. c.=P. littoralis.

GHEJUTHIEA, Hook. f. in Benth. *8c* Hook. f. Gen. i. 404 (1862). *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
unijuga, *Hook.f. 1. e.*—Zeylan.
teylaniea, Hook. f. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 408 = unijuga.

GLIA, Sond. in Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. ii. 547 (1861-62) =Annesorhiaa, Cham. *8c* Schlecht. (Umbellif.).
gummifera, Sond. 1. c. 648.—Afr. austr.

GLICIRRHIZA, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. v. (1793) 53 = Grlycyrrhiaa, Toum. (Legumin.).

GLINUS, Linn. It. Loefl. 145 (1758) = Mollugo, Linn.
Astrolasion, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 207, nomen.—Ins. Timor.
Cambessidesii, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. i. (1836)358 — M. Spergula.
chrystallinus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 95 = Aizoon canariense.
crystallinus, Auct. vide *chrystallinus.*
denticulatus, Fenzl, la Ann. Wien. Mus. i. (1836) 361 = M. Spergula.
dictamnoides, Burm. f. Fl. Ind. 113; Lam. Encyc. ii. 729=M. hirta.
lothoides, Crantz, Inst. i. 139 =seq.
lotoides, Loefl. It. Hisp. 145; Linn. Sp. PI. ed. II. 663 - M. hirta.
micranthus, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 11=M. hirta.
Miltus, Raeusch. Notn. ed. III. 141-^Gisekia Miltus.
Mollugo, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 859 -= M. Spergula.
moMambicensis, Spreng. Syst. ii. 467 = Gisekia Miltus.
mucronatus, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 570. t. 25 - Orygia decumbens.
ononoides, Burm. f. Fl. Ind. 113. t. 86. f. 2.—Ind. or.
orygioides, F. Muell. PI. Viet. i. 203 - M. orygioides.
parvifiorus. Wall. Cat n. 1619 = M. hirta.
Pauli-Wilhelmi, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beibl. 4 - M. Panli-Wilhelmi.
radiatus, Rohrb. in Mart Fl. Bras. xiv. II. 238=M. radiata.
setiflorus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 95 = M. hirta.
Spergula, Stend. Nom. ed. II. i. 688-M. Spergula.
trianthemoides, Heyne, in Roth, Nov. PI. Sp. 231 - Orygia decumbens.

QIJRICIDIA, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 893, in nota (1823). *LEGUMINOSAE,* Benth. *8c* Hook, f. i. 499.
cubensis, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 26.—Cuba,
latifolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 70.—Cuba.
macnlaU, *H. B. b[1] X. Nov. Gen. et Sp.* vi. 898, in nota. —Guatemala.
platycarpa, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 70.—Cuba.
sepium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 393, in nota ? = Lonchocarpus sepium.

GLISCHROCARYON, Endl. in Ann. Wien. MM. ii. (1839) 209 *Loudonia, Lindl. (Halong.).
RoH, Endl. 1. c. 210 = L. Roëi.

GLISCHROCOLLA, A. DC. in DC. Prod, xiv. 490 (1856)-Endonema, A. Juss. (Penaeac).
Lessertiana, A. DC. 1. c.—Afr. austr. *1*

GLISSANTHE, Steud. Nom. ed. II. i. 688 (1840)-GISSANTHE, Salisb. = Costus, Linn. (Scitam.).

GLOBBA, Linn. Mant. ii. 148. n. 12S7 (1771), partim.
SCITAM1NEAE, Benth. *8c* Hook. f. iii. 640.
CERATANTHERA, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 341.
COLEBROOKIA, D. Don, ex Lestib. 1. c. (1841).
HURA, Koen. in Retz. Obs. iii. 49 (1783).
MANITIA, Giseke, Prael. Linn. 209 (1792).
SPHAEROCARPOS, J. F. Gmel. Syst. 9 (1791).
alba, *Zipp. ex Span, in Linnaea, xv.* (1841) 479. nomen.—Ins. Timor,
albo-bracteata, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1882) n. 71.—Sumatra.
aphylla, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 614.—Sumatra,
arracanensis, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 88.—Ind. or.
atrosanguinea, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 22.—Borneo,
aurantiaca, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 613.—Sumatra.
bracteata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 6532 =- marantin.n. bulbifera.
bracteolata, Horan. Prod. Scitam. 20, in obs. (Quid ?). —Hab.?
braeteosa, Horan. 1. c. = bulbifera.
bulbifera, *Roxb. in As. Res. xi.* (1810) 358.—Ind. or.; Malaya.
Careyana, Roxb. Hort. Beng. 2; Fl. Ind. i. 80 - sessiliflora.
ciliata, *Jack, in Malay. Misc.* Ii. (1822) n. VII. p. 5.— Malaya.
coerinea, Hort. Veitch.—Cf. Gard. Chron. (1882) u. 74=albo-bracteata.
crispa, *Ret*. Obs.* iii. 60=Amomum echinatum.
cuspidata, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act Nat. Cur. 'xi. (1823) 28 (Quid?).—Bras.
dubia, Horan. Prod. Scitam. 20 (Quid t).—Hab. ?
erecta, [DC. in] Red. Lil.t. 174=Alpinia calcarala.
expansa. Wall. Cat. n. 6536-versicolor, bracteolata.
Finlaysoniana, *Wall. I. c.* n. 6588.—Ind. or.
Hasseltii, *Boerl. in Hasselt If Boerl. Bijdr. Midd. Sum.* 34.—Sumatra.
Hura, Roxb. in As. Res. xi. (1810) 859-versicoIor.
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 23.—Japon.
Koenigiana, Spreng. Syst. iv. Cnr. Post. 8 = versicolor.
lencantha, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 612.—Sumatra.
maculata, Blume, Ennm. PI. Jav. 68-pendula?
mantifera, Sims, Bot. Mag. sub t. 1320=Mantisia saltatoria.
mantiformis, Horan. Prod. Scitam. 20, sphalm. — praec.
marantina, *Linn. Mant.* ii. 170.—Ins. Molucc.
marantinoides, Wight, Ic. vi. 15. t. 2001-bulbifera.
monti/era, Steud. Nom. ed. II. i. 688, sphalm.- *mantifera.*
multiflora, *Wall. Cat.* n. 6587.—Ind. or.
multiflora, Wall. 1. c. partim-pendula.
nutans, Linn. Mant. ii. 170=Alpinia nutans.
oligantha, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 618.—Sumatra,
ophioglossa, *Wight, Ic.* vi. 16. t. 2002.—Ind. or.
orixensis, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 358. t 6. —Ind. or.
orixensis. Wall. Cat. n. 6fi85=racemosa, ophioglossa, sessiliflora.
panicoides, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 614.—Sumatra,
parviflora, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 115.—Ins. Luzon,
patens. *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 613.—Sumatra,
pendula, *Roxb. in As. Res.* xi. (1810) 859.—Ind. or.
purpurea, Andr. Bot. Rep. t. 117-Mantisia saltatoria.
racemosn, *Sm. Exot. Bot.* ii. 115. t. 117.—Reg. HimaL
radicalis. Roxb. in As. Res. xi. (1810) S59=Manti>in saltatoria.
saltatoria, Rose. Mon. PI. Ii. t. 16; Scit t. 112 - Mantisia saltatoria.
Schomburgkii, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6298.—Siam.
secunda, Horan. Prod. Scitam. 20 (Quid ?).—Hab. ?
sessiliflora, *Sims, Bot. Mag.* t. 1428.—Ind. or.
spathulata, Roxb. Hort. Beng. 2; Fl. Ind. L 83 •= Mantisia spathulata.
strobilifera, Zoll. *8c* Mor. Syst Veil. Zoll. 84 - marantina.
subsessilis, Nees *8c* Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 29 (Quid').—Bras.
subulata, Roxb. Hort Beng. 2; Fl. Ind. i. 81 = Mantisia saltatoria.

GLOBBA:—
uliginosa, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 613.—Ins. Banca.
uviformis. Linn. Mant. ii. 171—Alpinia uviformis.
velutina, Horan. Prod. Scitam. 20-multiflora.
venicolor, *Sm. Exot. Bot.* 1117.—Ind. or.; Malaya.

GLOBERIA, Rafin. Med. Fl. ii. 84 (1880)=Iiiriope, Lour. (Haemodor.).
autumnalis, Rafin. Fl. Tellur. iv. 18 = L. spicata.
spicata, Rafin. Med. Fl. ii. 84 - L. spicata.

GLOBER1S, Rafin. Fl. Tellur. ir. 18 (1836)-praec.

GLOBIFERA, J. F. Gmd. Syst. 32 (1791) - Micranthemum, Michx. (Scrophul.).
umbrosa, J. F. Gmel. 1. c = M. orbiculatum.

OIIOBUIIABIA, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 358 (1737). *SELAGWEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1130.
ABOLARIA, Neck. Elem. i. 105 (1790).
CARKADORIA, A. DC Prod. xii. 610 (184tf.
alpinu, Salisb. Prod. 52=nudicaulis.
Alypa, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 126 = G. Alypum.
Alypum, Delile, Fl. Egypt. 5 = arabica.
Alypum, *Linn. Sp. PI.* 95.—Reg. Mediterr.
amygdalifolia, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 133.—Ins. Cap. Verd.
Apkyllanthes, Crantz, Inst. i. 350=vulgaris?
arabica, *Jaub. V Spach, Illustr.* iii. 75. t. 260.—Arab.; Egypt.
bellidifolia, Salisb. Prod. 52-spinosa.
bellidifolia, Tenore. Prod. Fl. Nap. p. xi=nana.
Bisnagarica, Linn. Sp. PI. 96—vulgaris.
caespitosa, Orteg. ex A. DC. in DC. Prod. xii. 612= vulgaris.
collina, Salisb. Prod. 52 = vulgaris.
cordifolia. *Linn. Sp. PI.* 96.—Europ. austr.; Tauria.
elongata, Hegetschw. Fl. Schw. 114~ vulgaris.
eriocephala, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 111.—Alger.
glauca, Balb. ex Steud. Norn. ed. II. i. 688 — incanescens.
ilicifolia, Willk. Rech. Glob. 24-spinosa.
incanescens, *Viv. Fl. Ital. Fragm.* I. 2. t. 3.—Europ. austr.
linifolia, Lam. Encyc, ii. 781—vnlgaris.
Linnaei, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1882) 850 = vulgaris.
longifolia. Ait. Hort. Kew. i. 180=salicina.
macrantha, C. Koch, ex Walp. Rep. iv. 175 = trichosantha.
minima, Vill. Hist. PI. Dauph. ii. 298-cordifolia.
multicaulis, Tenore, ex Nym. Consp. 608 = vulgaris.
nana, *Lam. Encyc.* ii. 731.—As. or.
nudicaulis. Herb. Linn, ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 342=vulgaris.
nudicaulis. *Linn. Sp. PI.* 97.—Europ.
orientalis, *Linn. 1. c.*—As. Min.
pallida, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 654 = trichosantha.
procera, Salisb. Prod 52=salicina.
punctata, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyren. 57 = incanescens.
pungens, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 384-vulgaris.
repens, Lam. Fl. Fr. ii. 325-nana.
saiidna, *Lam. Encyc. i).* 732.—Ins. Mader.
saxatilis, Salisb. Prod. 52-cordifolia.
spinosa, Lam. Encyc. ii. 731 = vulgaris.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 96.—Hispan.
stygia, *Orph. in Boiss. Diagn.* Ser. II. iv. 60.—Graecia.
tenella, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1863) 1.—Hispan.
trichocalyx, Stead. Norn. ed. II. i. 689 -arabica.
trichosantha, *Fisch. (f Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* v. 36.—As. Min.; Syria.
Turbith, Willk. Rech. Glob. 26, in syn. ~ G. Alypum.
valentina, Willk. 1. c. 21 -vulgaris.
virgata, Salisb. Prod. 52 - G. Alypum.
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 96.—Europ. austr.; Reg. Caucas.
Willkommii, Nym. Syll. 140=vulgaris.

GLOBULEA, Haw. Syn. PI. Succ. 60 (1812) - Crassula, Dill.
atropurpurea, Haw. in Phil. Mag. (Sept. 1824) 189 = C. portulacea.
canescens. Haw. Syn. PI. Succ. 61 - C. canescens.
capitata, Haw. Rev. PI. Succ. 17-C. capiuta.
clavifolia, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 360 = C. davifolia.
cultrata. Haw. Syn. PI. Succ. 60-C. cultrata.
hispida, Haw. in Phil. Mag. (Sept. 1824) 191-C. hispida.
impressa, Haw. 1. c. 188 = C. impressa, *D. Dietr.*
Lingua, Haw. 1. c. 190 =-C. Lingua.
Lingula, Haw. 1. c.-C. Lingnla.
mesembryanthemoides, Haw. 1. c. 189-C. mesembryanthemoides.
mollis, Haw. 1. c. 191 = C. mollis.
nudicaulis. Haw. Syn. PI. Succ. 61 = C. nndicaulis.
obvallata. Haw. 1. c. 60 - C. obvallata.
paniculata, Haw. in Phil. Mag. (1825) 29 = C. paniculata.
radicans, Haw. 1. c. (1824) 189; (1825) 27 - C. radicans.
subincana, Haw. 1. c. (Sept 1824) 190-C. subincana.
sulcata, Haw. Rev. PI. Succ. 18 = C. sulcata.

GLOCHERIA, Pritz. Ic. Ind. ii. 184 (1856), err. typ.= Glockeria, Nees. (Acanthac).

GLOCHIDINOPSIS, Steud. Nom. ed. II. i. 689 (1840; = GLOCH1DIONOPSIS, Blume=seq.

GLOCHIDION, Forst. Char. Gen. 113. t. 57 (1776). *EUPHORBIACEAE,* [Benth. *St.* Hook. f. iii. 272.]
BRADLEIA, Cav. Ic. iv. 48. t. 871 (1797).
BRADLEJA, Banks, ex Gaertn. Fruct ii. 127. t. 109 (1791).
GLOCHIDIONOFSIS, Blume, Bijdr. 588 (1825).
GLOCHISANDRA, Wight, Ic v. n. 28. t. 1905 (1852).
GYNOON, A. JOSS, in Mém. Mus. Par. x. (1828) 335; et Euph. Tent. 17. t. 3 (1824).
LOBOCARFUS, Wight & Arn. Prod. 7 (1834).
acuminatum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 68.—Reg. Himal.
aeneum, *Muell. Arg. I. c.* 59.—N. Caled.
andamanicum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 288.—Ins. Andaman,
arborescens, *Blume, Bijdr.* 584.—Java,
arboreum, *Wight, Ic.* t. 1907.—Ind. or.
Amottianum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 60.—China.
asperum, *Bidd. Forest. Man. Bot.* 193.—Ind. or.
baladense, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 59.—N. Caled.
bancanum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 450 - zeylanicum.
Billardieri, *Baill. Adansonia,* ii. (1861-62) 241.—N. Caled.
Blumeanum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 65 = glaucum, *Blume.*
Bourgeoisii, *Muell. Arg. 1. c.* 70.—N. Caled.
brachylobum, *Muell. Arg. I. c.* 62.—Zeylan.
bupleuroides, *Muell. Arg. I. c.* 59.—N. Caled.
cacuminum, *Muell. Arg. 1. c.* 60.—Java,
caledonicum, *Muell. Arg. 1. c.* 62.—N. Caled.
calocarpum, *Kurt, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 330.—Ins. Nicob.; Andaman.
canarum, Bedd. Forest. Man. Bot. 192 = zeylanicum.
canloniense, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. v. (1866) 241.—China,
cataractarum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1868) 70.—N. Caled.
Charoaecerasus, *Muell. Arg. I. c*—N. Caled.
cinerascens, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 451.—Sumatra,
coccineum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 60.—Burma,
compressicaule, *Kurt, ex Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 45.—Java,
concolor, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 62.—Polynes.
cordatum, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 259, nomen.—Ins. Fiji.
coriaceum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 285.—Zeylan.
coriaceum, Thw. 1. c. partim-brachylobum.
cornutum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 71.—N. Caled.
Cumingii, *Muell. Arg. I. c.* 61.—Ing. Philipp.

GLOCHIDION:—
cyrtophyllum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. If. 378.—Sumatra.
cyrtostylum, *Miq. 1. c.*—Java.
Daltoni, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 344.—Reg. Himal.
dasyanthum, *Kurt, ex Teijsm. b" Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 47.—Java.
dasyphyllum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 461 " superbum.
dasystylum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii-(1878) II. 237.—Burma,
distichum, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xviii. (1862) 228.—China.
diversi/olium, Bedd. Forest. Man. Bot. 193 = ellipUcnm.
eleutherostylnm, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 69.—Ins. Philipp.
ellipticum, *Wight, Ic.* t. 1606.—Ind. or.
eriocarpum, *Champ, ex Benth. in Hook. Ken Journal.* (1854) 6.—Ins. Hongkong,
eriocarpum, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 346, nomen.—Ins. Timor.
fagifolium, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 193.—Ind. or.
Fagueti, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1868) 59.—N. Caled.
flavidnm, *Kurt, ex Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 46.—Java,
flexuosum, *F. Muell. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugo-Bat,* iii. 128.—Japon.
Fortuni. Hance, in Ann. Sc. Nat. Sen IV. xviii. (1862) 228-sinicum.
frondosum, Baill. Etud. Gin. Euph. 637, nomen » Phyllanthus frondosus.
fulvirameum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 376.—Java.
Gardneri, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 286.—Zeylan.
glaucifolium, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-88; 65.—Burma.
glaucogynum, Bedd. Forest. Man. Bot. 195-Moonii.
glaucum, *Blume, Bijdr.* 687.—Java,
glaucum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 62." N. Caled.
heterolobum, Muell. Arg. 1. c. 63-Billardieri.
Heyneanum, *Wight, Ic.* t 1908 Ind. or.
hirsutum, *Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 153; *Muell-Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 61.—Ind. or.
Hohenackeri, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 193.—Ind. or.
hongkongense, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (186»; 60.—Ins. Hongkong.
insulanum, *Muell. Arg. I. c.* 67.—Ins. Molucc.
Jussieuanum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 285-rigiduTB.
kanalense, *Baill. Adansonia,* ii. (1861-82) 241.—N. Caled.
Lambertianum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 60.—Ins. Molucc
lanceolarium, *Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 153 ; *If Gibs. Bomb. Fl.* 285.—Ind. or.
laurifolium, *Heynh. Nom.* ii. 266.—Hab. ?
leiostylum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (18/W II. 237.—Burma.
Lenormandi, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1868) »»—N. Caled.
leptogynum, Bedd. Forest. Man. Bot. 185-Gardner!,
leucogynum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 876.—Java.
lit tor ale, Benth. Fl. Hongk. 314 = hongkongense.
littorale, *Blume, Bijdr.* 585.—Ind. or.; China.
Llanosi, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) «»—Ins. Philipp.
lucidum, *Blume, Bijdr.* 584.—Java,
lutescens, *Blume, I. c.* 585.—Java,
macrocarpum, *Blume, I. c.* 584.—Java,
macrochorion, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 59.—N. Caled.
macrophyllum, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* (1842) 491.—China.
macrophyllum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 61.—N. Caled.
majus, Baill. Etud. Gén. Euph. 637, nomen-taiten
malabaricom, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 194.—Ina-
Manono, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 687, nomen.—Tahiti.
marianum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1808; —Ins. Marian.
microphyllum, *Muell. Arg. I. e.* 69.—Guian.
molle, *Blume, Bijdr.* 586.—Java.
molle, Hook. *Sc, Am.* Bot. Beech. Voy. 210 * Arnot. tianmc.
moluccanum, *Blume, Bijdr.* 587.—In*. Molucc

QLOCHIDION :—
montanum, *Thv. Enum. PI. Zeyl.* 286.—Zeylan.
Moonii, *Thw. I. c*—Zeylan.
multilocnlare, *Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 152; *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 69.—Ind. or.
neilgherrense, *Wight, Ic.* t 1907.—Ind. or.
nemorale, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 286.—Zeylan.
nepalense, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 344.—Burma.
nitidum. Voigt, Hort. Suburb. Calc. 153 j Dak. & Gibs. Bomb. FI. 235 - zeylanicnm.
obliquum, Decne. in Nouv. Ann. Mas. Par. iii. (1834) 481 = zeylanicum.
obovatum, *Sieb. V Zuec. in Abh. Akad. Muench.* iv. II. (1843) 143.-Japon.
obscurum, *Blume, Bijdr.* 586.—Ind. or.; Malaya; China,
oraatum, *Kurt, ex Teijsm.* &• *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 46.—Sumatra,
ovalifolium, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 346, nomen.—Ins. Timor,
ovatum, *Muell. Arg. I. c.* xxxii. (1868) 71.—Ins. Martinic.
Pancherianum, *Muell. Arg. I. c*—N. Caled.
Perrottetianum, Bedd. forest. Man. Bot. 194-neilgherrense.
philippense, *Benth. Fl. Hongk.* 814.—Ins. Philipp.
Einnatum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 153 <= obscurum.
Foeppigianum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 71.—Bras.
Pnbescens, *Zipp. ex Span. 1. c.* xv. (1841) 846, nomen. —Ins. Timor.
Pycnocarpum, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 194.—Zeylan.
lamiflorum, *Forst. Char. Gen.* 114.—Ins. Pacif.
"Pdum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (18B8) 67.— Zeylan.
*X°*burghianum,* Muell. Arg. 1. c. 61=obscurum.
Quorum, *Blume, Bijdr.* 586.—Malaya; Ins. Philipp.
Mlicifolium, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1868) 59. „ —N. Caled.
aeemanni, *Muell. Arg. 1. c.* 68.—Ins. Fiji,
senceum, *Zoll. V Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nelrl. Indie,* ii. (1845) 585.—Malaya.
Mmcum, *Hook. V Arn. Bot. Beech. Voy.* 210.—China,
sphaerogynum, *Kurg, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 846.— Reg. Himal.
stellatum, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 194.—Ind. or.
subscandens, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma,* ii. 844.— Burma,
snbscandens, *Zoll. V Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nelrl. Indie,* ii. (1845) 684.—Java; Sumatra.
SHmatranvm, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 450= subscandens, *Zoll. V Mor.*
'operbum, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 688.—Burma; Malaya.
Vnplocoides, Bedd. Forest Man. Bot. 195 = montanum.
tutense, *Baill. Etud. Gen. Euph.* 637, nomen.—Ins. Tahiti.
*T**aitesii,* Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 66 = "gidum.
tometitosum, *Dalz. in Hook. Kew Journ.* ii. (1851) 38. "—Ind. or.
Wchogynum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) W—Ins. Philipp.
*Un*ftorum,* T. F/Gmel. Syst. 1555, sphalm.-raminorum.
^ociniifolium, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 68.-Guian.
»»rians, *Mi,. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 45O.-Sumatra.
rfutmum, *Wight, Ic.* t. 1907/2.—Ind. or- , *oilo-* KO
*Ves*P=rtilio, *Afuell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 59. „.*rN. Caled.
*)*Uardi,* Muell. Arg. l.c.70=Pancherianum.
^Mjichianum, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) W.'T"Ins- Penang.
zeylan. *Blume, Bijdr. Fl. Hongk.* 818.—China. Mala'ya
Zollingeri; *Miq , Fl , Jnd , Bat L n.* 686.-Java.

GL2r^n>IONOPSIS, Blume, Bijdr. 588 (1825) - Wooh Wlon, Forst (Euphorb.).
Mala" *Blume> 1- "• \-P «yllanthus* *netu *>'~ ya.

GLOCHIDOTHECA Fenrf m'Russe BB- f ^ ! (' II. 970, in obs. (1843) = Cauoali B, Linn. (Umbellif.)- *foeniculacea.* Fend, 1. c.-Oriens.

GLOCHISANDRA, Wight, Ic. v. II. 28. t. 1905 (1854) =Gloohidion, Forst (Euphorb.).
acuminata, Wight, L c.=Glochidion lanceolarium.

GLOCKERIA. Nees, in DC. Prod. xi. 728 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1106.
GALEOTTIA, Nees, in DC. Prod. xi. 811 (1847).
glandulosa, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 141.—Mexic.
gracilis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 728.—*Cf.* 311.—Mexic.
haematodes, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 141. t. 6.f. 21.—Mexic.
sessilifolia, *Oerst. I. c*—Costa Rica.

OIiOEOSPEBMTJM, Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 128. *VIOLARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 119.
Martii, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 389.—Bras,
sphaerocarpum, *Triana &* Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. xvii. (1862) 129.—N. Granat.
Sprucei, *Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 390.—Bras.

GLOIOSPERMUM, Triana *&c* Planch, ex Benth. & Hook, f. Gen. i. 119 (1862), sphalm. = praec.

OLOMEBA, Blume, Bijdr. 872. t. 68 (1826). *ORCH1-DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 616.
brasiliensis, *Rodr. Orch. Nov. i.* 147.—Bras,
erythrosraa, *Blume, Bijdr.* 372. t. 68.—Java,
montana, *Reichb.f. ex Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 260; *et in Linnaea,* xli. (1877) 77.—Ins. Fiji.

GLOMERAR1A, Cav. Desc. 819 (1802)=Amaranthus, Linn.
bicolor, Cav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 262 = A. melancholicus.
deflexa, Cav. Desc. 319=A. deflexus.
viridis, Cav. 1. c. = A. viridis.

GLONERIA, Andri, Illustr. Hortic. xviii. (1871) 76. t. 60 = Psychotria, Linn. (Rubiac).
jasminiflora, André, 1. c.=P. jasminiflora.

OLOBIOSA, Linn. Syst. ed. I (1785). *IILIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 830.
CLINOSTVLIS, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 26.
MENDONI, Ai'.ans. Fam. ii. 48, 576 (1763).
METHONICA, JUSS. Gen. 48 (1789).
abyssinica,^. *Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 322.—Abyssin.
angulata, Schum. in Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 171=superba.
caerulea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-simplex.
cirrhifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 237 =superba.
Doniana, Schult. f. Syst vii. 366 = superba.
nepalensis, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 131 -superba.
Plantii, Loud. Encyc. PI. 1544"simplex.
simplex, D. Don, Prod. Fl. Nep. 51-superba.
simplex, *Linn. Mant.* i. 62.—Afr. trop.
superba. *Linn. Sp. PI.* 805.—As. trop.
virescens, Lindl. Bot Mag. t. 2539=simplex.

GLOSOCOMIA, D. Don, Prod. Fl. Nep. 158 (1825) ~ Codonopsls, Wall. (Campan.).
clematidea, Fisch. Mey. & Ave-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. x. 46 - C. ovata.
kortensis, Rupr. in Bull. Phys.-Math.Acad. Pe'tersb. xv. (1857) 209=C. lanceolata.
' *lanceolata,* Rupr. 1. c. 223 =Campanumoea japonica.
ovata, Lindl. Bot. Reg. (1842) t. 8 = C. ovata.
purpurea, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pjtersb. xv. (1857) 210 "C. purpurea.
rotundifolia, Rupr. 1. c=C, rotundifolia.
tenera, D. Don, Prod. Fl. Nep. 158 = C. thalictrifolia.
thalictrifolia, Wall. Cat. n. 1297=C. thalictrifolia.
ussuriensis, Maxim, in Boll. Phys.-Math. Acad. Pcteisb. xv. (1857) 209-C. lanceolata?
viridis, Rupr. 1. c. 210-C. viridis.

GLOSSANTHUS, Klein, ex Benth. Scroph. Ind. 57 (1885) = Klugrla, Schlecht. (Gesnerac).
grandiflorus, Benth. in Wall. Cat. n. 6395 = Stauranthera grandiflora.
malabaricus, Klein, ex Benth. Scroph. Ind. 57-K. Notoniana.
mexicanus, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 121 = K. azurea.
Notonianus, R- Br. 1. c. = K. Notoniana.
teylanicus, R. Br. 1. c = K. zeylanica.

GLOSSARRHEN, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 21 (1824); et ex Ging. in DC. Prod. i. 290 (1824; - Schweiggeria, Spreng. (Violar.).
floribundus, Mart. 11. cc. 22, 291-S. fruticosa.
mexicanus, Steud. Nom. ed. II. i. 689 = S. mexicana.
parviflonts, Mart, ex Ging. in DC. Prod. i. 291 = seq.
pauciflorus, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 28 = S. fruticosa.

GLOSSASPIS, Spreng. Syst. iii. 675, 694 (1826) - Gloasula, Lindl. (OrcMdA
antennifera, Reichb. f. in Linnaea, xxv. (1852) 225 = Glossula tentaculata.
tentaculata, Spreng. Syst. iii. 6A4 — Glossula tentaculata.

OLOSSOCALYX, Benth. in Hook. I:. PI. t. 1301 (1880). *MONIMIACEAE,* Benth. & Hook.f. iii. 144.
brevipes, *Benth. 1. c.* t. 1302.—Afr. trop.
longicuspis, *Benth. I. c.* t 1301.—Afr. trop.

GLOSSOCAKDIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 138; et in Diet. Sc. Nat. xix. 62 (1821). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 884.
Bosvallia, DC. in Wight, Contrib. 19 = linearifolia.
linearifolia, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xix. 62.—Ind. or.

GliOSSOCAKTA, Wall. Cat. n. 1741 (1831). *VLBBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1168.
hemiderma, *Benth. If Hook.f. Gen.* ii. 1158.—Austral.
Linnaei, *Benth. if Hook. f. I. c.; Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxiii. (1877) 890.—Zeylan.
raollis. *Wall. Cat.* n. 1741.—Burma.
pinnatifida, Steud. Nom.ed. II. i. 419, in syn. sphalm. — Glossogyne pinnatifida.

GLOSSOCENTRUM, Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 111 = Mloonia, Ruiz & Pav. (Melast).
collinum, Crucg. 1. c. = M. minutiflora.

GLOSSOCHIIiUS, Nees, in DC. Prod.xi. 83 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1092.
Burchellii, *Nees, 1. c*—Afr. austr.

GLOSSOCOMA, Endl. Gen. 799, in syn. (1839)-GLOSSOMA, Schrcb. - Votomita, Aubl. (Inc. ted.).

GLOSSOCOMIA, Reichb. Consp. 114 (1828) =• Codonopsis, Wall. (Campan.).

GIiOSSODIA, R. Br. Prod. 325 (1810). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 618.
Brunonii, *Endl. Nov. Stirp. Dec.* 16.—Austral,
emarginata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 424.—Austral,
intermedia, *Fiteg. in Gard. Chron.* (1882) I. 462.— Austral.
major, *R. Br. Prod.* 826.—Austral,
minor, *R. Br. I. c.*—Austral.

GLOSBOGY1TE, Cass. in Diet. Sc. Nat. Ii. 475 (1827). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 388.
DIODONTIUM, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 19.
GVNACTIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. Ii. 476 (1827).
bidentidea, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 402 - tenuifolia.
brasiliensis, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot vii. (1848) 408 = Isostigma microcephalum.
chinensis, Less. Syn. Comp. 212 = Bldens pilosa.
filifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 544.— Austral.
Kennedyi, *R. Br. ter. in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 259.—N. Zel.
pedunculosa, DC. Prod. v. 632=tenuifolia.
pinnatifida, *DC. in Wight, Contrib.* 19.—Ind. or. ; Malaya.
retroflexa, *F. Muell. Fragm. i.* 51.—Austral,
tenuifolia, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* Ii. 476.—Malaya; Austral.
tridentata,' *Benth. (f Houk. f. Gen.* ii. 889.—Ins. Philipp.

GLOSSOLOMA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 209 = Allopleotus, Mart. (Gesnerac).
tetragonum, Hanst 1. c. 209, 216. t. 2. f. 49 - A. tetragonus.

GLOSSOMA, Schreb. Gen. ii. 792 (1791)=Votomita, Aubl. (Inc. sed.).
acuminatum. Wall, ex Benn. PL Jav. Rar. 196-Polyosma integrifolia.
arborescens, Willd. Sp. PI. i. 664=V. guianensis.
Votomita,Koem. Sc Schult. Syst. iii. 318 = V. guianensis.

GLOSSONEMA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. ix. (1838) 835. t. 12. *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 748.
CONOMITRA, Fenzl, in Endl. Nov. Stirp. Dec 65 (1839).
MASTOSTIGMA, Stocks, in Hook. Ic. PI. t. 863 (18521.
Boveanum, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 335. t. 12. f. D.—Arab.
Boveanum, Hochst. *Sc* Steud. ex Decne. in DC. Prod. viii. 555.—nubicum.
lineare, *Decne. in DC. Prod.* viii. 555.—Afr. trop.
nubicum, *Decne. 1. c.*—Afr. bor.
Revoili, *Franch. in Rivoil, Comali,* 40.—Afr. trop.
varians, *Benth. ex Hook. f. Ft. Brit. Ind.* iv. 16.—Persia; Scindia.

GLOSSOPAPPUS, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 748 = Chrysanthemum, linn. (Compos.).
chrysanthemoides, Kunze, 1. c. = C. macrotum.

GLOB8OPETALON, A. Gray, PI. Wright, ii. 29. t. 12 B (1853). *CELASTRINEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. i. 368.
nevadense, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 78.—Am. bor. oca
spinescens, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 29.—Am. bor. oca

GLOSSOPETALUM, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. L 368 (1862) = praec.

GLOSSOPETALUM, Schreb. Gen. L 205 (1789) = Qoupia, Aubl. (Celastr.).
glabrum, J. F. Gmel. Syst. 510; Willd. Sp. PI. i. 1521-G.glabra.
tomentosum, J. F. Gmel. 1. c.; Willd. 1. c. 1522 - G. tomentosa.

GLOSSOPHYLLUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, xvi. (1868) 825-Ranunculus, Tourn.
ophioglossi/olium, Fourr. 1. c. = R. ophioglossifolius.

GLOSSOSCHIMA, Walp. Rep. i. 375 (1842)=CLO. SASCHIMA, Korth.=Laplacea, H. B. & K. (Ternstroem.).

GLOSSOSPERMUM, Wall. Cat. n. 1153 (1831) = Helochia, Linn. (Sterculac).
cordatum. Wall. 1. c n. 1155 = M. velutina.
quinquealatum, Wall. 1. c. n. 1154 = Columbia floribunda.
velutinum, Wall. 1. c. n. 1153 = M. velutina.

GLO88O8TEMOM", Desf. in Mém. Mus. Par. iiL (1817) 238. t. 11. *STERCUUACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 224.
Brugnieri, *Desf. 1. c.* 239.—Persia.

GLOSSOSTEMUM, Steud. Nom. ed. I. 373 (1821) = praec.

GLOSBOBTEPHANTTS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 217 (1837). *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 759.
ONCINEMA, Am. in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 261.
linearis, £. *Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 218.—Afr. austr.

GLO88OBTIGKA, Wight 8c Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 355. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 958.
PELTIMELA, Rafin. All. Joum. 199 (1833), nomen prius.
TRICHOLOMA, Benth. in DC. Prod. x. 426 (1846).
Drummondi, *Benth. in DC. Prod.* x. 426.—Austral
elatinoides, *Benth. ex Hook. f. Fl. N. Zel.* L 189.—Austral.; N. Zel.
spathulatum, *Wight* &" *Am. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836) 365.—Ind. or.

GLOSSOSTYLIS, Cham. *Sc* Schlecht in Linnaea, iii. (1828) 22=-Alectra, Thunb. (Scrophul.).
abyssinica, Hochst. ex A. DC. in DC. Prod. x. 545, in nota=Bartsia Trixago.
amensis, Benth. Scroph. Ind. 49 = A. indica.
aspera, Cham. *Sc* Schlecht in linnaea, iii. (1828) 22 = A. brasiliensis.
asperrima, Hochst ex Benth. in DC. Prod. x. 340=A. asperrima.

GLOSSOSTYLIS:—
capensis, Benth. Scroph. Ind. 50 = Alectra melampyroides.
cordata, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. x. 889 = A. indica.
parasitica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 117 =A. parasitica.

OLLiOBStTLA, Lindl. Bot. Reg. t. 862 (1824). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 629.
GLOSSASPIS, Spreng. Syst. iii. 675, 694 (1826).
tentaculata, *Lindl. I. c.* (Cf. Habenaria lacertifera).—China.

GLOSSULA, Reichb. Handb. 173 (1837)-Arfstolochia, Linn.

GLOTTES, Medic. Phil. Bot. i. 210 (1789)=GLOTTIS, Medic. = Astragalus, Toum. (Legumin.).

GLOTTIDIUM, Desv. Jonm. Bot. i. (1813) 119. t. 1« Sesbania, Pers. (Legumin.).
floridanum, DC. Prod. ii. 266 - S. platycarpa.

GLOTTIS, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 377= Astragalus, Tourn. (Legumin.).
echinata, Medic. 1. c. = A. pentaglottis.
epiglottis, Medic 1. c.=A. epiglottis.
pentaglottis, Medic. Phil. Bot. i. 210 = A. pentaglottis.

GLOXINIA, L'Hérit. Stirp. Nov. 149 (1785). *GESNERACEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ ii. 998.
ALMANA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 68 (1886).
ESCHERIA, Regel, in Flora, xxxiL (1849) 179, in syn.
EUCOLUM, Salisb. Prod. 98 (1796).
EUMOLPE, Decne. ex Jacques & Hennecq, Man. Gén. PI. ii. 575 (1849 ?).
ORTHANTHE, Lem. in Illustr. Hortic. iii. (1856) sub t. 81.
PLECTOPOMA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853-65) 201.
SALISIA, Regel, in Bot. Zeit. ix. (1851) **894.**
Antirrhina, DC. Prod. vii. 584 = Achimenes foliosa.
attenuate, *Hanst. in Linnaea,* xxviL (1854) 716.—Bras.
arborea, *Colla, Hort. Ripul.* 61.—Hab. I
bicolor, Poepp. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 419 = maculata.
calycina, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 690 = Pentarhaphia calycina.
caulescens, lindl. Bot Reg. t. 1127 - Sinningia speciosa.
digitalirlora, *Paxt. Mag. Bot.* x. (1843) 198.—Am. austr.J
discolor, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 814 *{=Ligeria discolor).—Has.*
dubia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 649.—Mexic.
fimbriata, *Brongn. in Rev. Hortic.* Sen. III. i. (1847) 364.—Mexic.
fimbriata, Hook. Bot. Mag. t. 4480-glabrata.
floribunda, Walp. Ann. ii. 1067 = Sinningia floribunda.
fruticosa, *Dehnh. Mem. Sopr. Ale. Piante,* 3; *ex Walp. Rep.* ii. 720.—Bras.
Fyfianax, Hort. Angl. ex Lem. in Fl. des Serres, Sén I. iv. (1848) 311.
gesnerioidesx, Lem. 1. c. ii. *(Fiv.* 1846) t 3.
glabrata, *Zucc. in Flora,* xv. (1832) II. *Beibl.* 99.—Mexic.
gloxiniflora, Walp. Ann. i. 473 = Sinningia gloxiniflora.
gracilis, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 64. t. 226 (=*Ligeria gracilis).*—Bras.
guttata. Mart. 1. c« Sinningia guttata.
gymnostoma, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 227.—Reg. Argent
Helleri, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 64=Sinningia Helleri.
heterophylla, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iiL 9 = maculata.
hirsuta, Lindl. Bot. Reg. t 1004; Lodd. Bot Cab. t. 1296 *(^Ligeria hirsuta).*—Bras,
hypocyrtiflora, *Hook. f. Bot. Mag.* t 5665.—Reg. Argent.
ichthyostoma, Gardn. in Hook. Ic. PI. t. 472-Achimenes ichthyostonuu

GLOXINIA:—
immaculata, Mart, ex Hanst. in Mart. Fl. Bras, viii. 389 = Sinningia speciosa.
Lindleyi, Steud. Nom. ed. II. i. 690-Pentarhaphia calycina.
macrophylla, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 66 (= *Ligeria macrophylla).—Tins.*
maculata, *L'Hérit. Stirp. Nov.* 149.—Am. austr.
Menziesiana, Young, ex Otto & Dietr. Allg. Gartens. v. (1887) 281 = Sinningia speciosa.
Merkii, E. Otto, in Otto *Sc* Dietr. 1. c. xvi. (1848) 242 =Sinningia speciosa.
micrantha, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* ix. "• (1842) 85.—Mexic.
Mielliezii, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 64.—Hab. ?
multiflora, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. !>• (1842) 36=Naegelia multiflora.
pallidiflora, *Hook. Bot. Mag.* t. 4218.—N. Granat.
Passinghamii, Paxt. Mag. Bot. xii. (1846) 267 = Sinningia speciosa.
picta, Vis. in Atti Ottava Riun. Sc. Ital. 559=Tydgea picta.
punctate, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. "• (1842) 34 = Naegelia zebrina.
rubra, Paxt Mag. Bot. vii. (1840) 271=Sinningia speciosa.
Sarmentiana, *Gardn. ex Hook. Ic. PI.* t. 378.—Bras.
Schottii, Mikan, Del. Fl. Bras. [21] = Sinning* Helleri.
sinningiaeflora, Walp. Ann. ii. 1066, sphalm. " Sinningia gloxiniflora.
speciosa, Lodd. Bot. Cab. t. 28=Sinningia speciosa.
snaveolens, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. III. ii- (18*[8]; 468.—Guiana.
Teichleri x , Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. >•• (1847) 220.
Teuchleri x, Lem. 1. c. t. 245, verso.
tigridia, Ohlend. in Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. tf- (1845) 376 = Campanea grandiflora.
trichotoma, Moench, Meth. Suppl. 194=maculata.
trichantha, Miq. in Linnaea, xxii (1849) 473** maculata.
tubiflora, Hook. Bot **Mag.** t 3971 *(**Dolichodeir' tubiflora).*—Bras.
variabilis, *Carr. in Rev. Hortic.* (1877) 70.—Hab.? .
velutina, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 64=Sinnmg>* velutina.
vertidllata, Mart & Gal. in Bull. Acad. Brux. >•• II. (1842) 86 = Achimenes Andrieuxii.
villosa, Mart Nov. Gen. et Sp. iii. 64=Sinning[13] villosa.
Youngeana,Vfsip. Rep. vi. 401=*Sinningia Youngta*"'*

GLUMOSIA, Herb, in lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 85 ^Sisyrinchium, Linn. (Ind.).
palmifolium, Herb. 1. c = S. palmifolium.

OLTTTA, Linn. Mant. ii. 293 (1771). *ANACA& DIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 421.
STAGMARIA, Jack, Desc. Mai. PI. III. 12 (18231)- ..
SYNDBSMIS, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, »• 314 (1824).
Benghas, Knrz, in Pegu Rep. A. 41—tavoyana.
Benghas, *Linn. Mant.* ii. 293.—Java.
coarctata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 22=velutina.
elegans, *Hook./. 1. c.*—Ins. Penang.
longipetiolata, *Kurs, in Pegu Rep.* A. 41; *et in Ja»*[rn]' *As. Soc. Beng.* xlv. (1876) 210.—Ins. Andaman.
orgyalis, Blanco, FL Filip. ed. II. 451 (Cleistanthi sp-> —Ins. Philipp.
tavoyana, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 22.—Burma.
Tourtour, March. Rev. Anac. 187 = G. Benghas.
travancorica, *Bedd. Fl. Sylv.* i. t. 60.—Ind. or.
velutina, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. [181]; Malaya.

GLUTAGO, Comm. ex Poir. in Diet. Sc. Nat. «*• *' (1821)=LoranthuB, Linn.
spicata, Rafin. Sylva Tellur. 126 = L. spicatus.

GLUTINARIA, Rafin. Fl. Tellur. ML 93 (1836) = Salvia, Tourn. (Labiat.).
glutinosa, Rafin. 1. c = S. glutinosa.

GLYASPERMUM, Zoll. *Sc* Mor. in Nat. en Genj£ Arch. Ne&l. Indie, ii. (1845) ll = Plttosp«[ru]^ Soland.
ramiflorum, Zoll. *Sc* Mor. 1. c. 12.—Malaya.

ULYCANTHES, Rafin. Sylva Tcllnr. 83 (1838) = Columnea, Linn. (GesnerA
scandtns, Rafin. 1. c - C . scandem.

GLYCE, Lindl. Syn. Brit. Fl. 26 (1829)=Alys8um, Tourn. (Crncif.).
maritima, Lindl. 1. c. — A. maritimum.

GLYCERIA, R. Br. Prod. 179 (1810). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1197.
ATROPIS, Rnpr. Fl. Samoj. «1 (1845).
DEVAUXIA, Beauv. ex Kunth, Enum. PI. i. 367, in syn. (1833).
DIACHROA, Nutt ex Stend. Nom. ed. II. i. 497 -. (1838).
1«YDRA, Endl. Fl. Poson. 119 (1880).
HYDROCHLOA, Hartm. Gram. Skand. 8 (1819).
PoRROTERANTHE,Steud.Syn.Pl. Gram. 287 (1854).
PUCCINELLIA, Parl. Fl. Ital. i. 866 (1850).
'Kuminata, Schnr, Enum. PI. Transs. 781 = fluitans.
acutiflora, Torr. ex Trin. in Bull. Sc. Acad. Piiersb. .>• (1836) 68.—Am. bor.
"inides, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 18«2 .(1803) 336-distans.
"roides, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1827 - . Catabrosa aquatica.
airoides, *Steud. Syn. PI. Gram.* 287.—Japon.
a'gida, Hartm. Handb. ed. V. 294 = Phippsia algida.
angustata, *T. Fries, in Ofvers. Vet. Akad.* SteM.xxvi. (^869) 189.-Reg. arct.
"ouatica, J. & C. Presl, Fl. Cech. 25 - Catabrosa aquatica.
aquatice, *Wahlenb. Fl. Goth.* 18; *Sm. Engl. Fl.* i. 116. .^Reg- bor. temp.
ar«»ca. Hook. Fl. Bor. Am.i. 248.—Am. arct.
"Tndinacea, Kunth, Rev. Gram. i. 118-remote,
australasica, *Steud. Syn. PI. Gram.* 286.-Austral.
""mgarteniana, Schur, Enum. PI. Transs. 781 R (sp. defend.).
forreri, *Bab. in Suppl. Engl. Bot.* t. 2797.—Europ.
"tvifolia, Schult. Mant ii. 387 = Diarrhena americana.
bulbosa, *Bucil. in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1862 (1863) 95—Am. bor.
'Wadensis, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Ser. VI. i. (1831) 366.-Am. bor.
^"bayi, *Scribner, in Bull. Torrey Bot. Club,* x. (1883) ;!—Am. bor.
«P'llaris, Wahlenb. Fl. Goth. 17-distans.
*Ca*Pta,* Trin. in Bull. Sc. Acad. Petersb. i. (1836) 68 = aquatica.
*c c2 »t. ii. 10-Borreri.
*J*Muta,* Fries, 1. c. iii. 176 = distans.
*V'nata . Brib. Fl. Norm. ed. III. 854 = fluitans.
*d!%.
disticulata, Dum. Obs. Gram. Belg. 107-Huitans.
*dive? 36.-Europ.
Austral 659.
elongata, Trin. in Bull. Sc. Acad. Pitersb. i. (1836) 68.—Am. bor.
exp fls«a\ Cour. Acad. Belg. xviii. 8vo
*festi, 209.-Europ
festucaeformis Reichb. Fl. Germ. Excurs. t t a a p l. Transs. 780 = mari-
Fo!!ans, Br. Prod. 179.—Reg. bor. temp.; Austral.
fT2??: Fragm. viii. 130.—Austral.
glaucescens 6- Scand. 244 -Poa fulva. 116.—Cliff *PI. Ross.* iv. 892.—Sibir. or.
*glumari?! Nym. Syll. 422 = distans.
*Gusso 2 361 - Catabrosa humilis.
*hbru 2? Trans. Bot Soc. Edinb. iv. (1853) fluitans.
integra, Obs. Gram. Belg. 107 = flnitans.
intermedia, Klinggraeff, «• P«"ss- 491 -distans.
intricata, Crép. in Mim. Cour. Acad. Belg. xviii. 8vc (1866), 237 -diitans?
*ischyroneu? l. Syn. PI. Gram. 427 - aquatica.
*japonica, —Japon.
Kjellmanni, densk. Vetensk. Iaktt. i. 273, 314.-Sibir.
Picea, *F. MueU. Fragm.* viii. 127.-Austral.

QLYCEKIA:—
Lemmoni, *Vasey, Gram. U. St.* 43, nomen.—Am. bor. occ.
leptophylla, Steud. Syn. PI. Gram. 286-distans.
leptostarhya, Buekl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 95-aquatica.
loliacea, Godr. Fl. Lorr. iii. 168 - fluitans.
magellanica, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1881) 116.—Reg. Magell.
maritime, *Itert. If Koch, Deutschl. Fl.* i. 588.—Reg. bor. temp.
maritima, Roep. ex Nym. Consp. 831-Borreri.
Michauxii, Kunth, Rev. Gram. L 118, 343. t 85 = nervata.
micrantha, Steud. Syn. PI. Gram. 287=Eragrostis interrupta.
microtheca, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 96-aquatica.
minuta, Steud. Syn. PI. Gram. 287-Festuca parvula.
montana, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1868) 96=distans.
multiflora,»«««*. *Syn. PI. Gram.* 285.—Chili
Neesii, Steud. 1. c. 286-distans.
nemoralis, *Uechtr. V Koern. in Bot. Zeit.* xxiv. (1666) 121.—Ross.
neogaea, *Steud. Syn. PI. Gram.* 285.—'Terra Nova.'
nervata, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb. Sir.* VI. i. (1881) 365.—Am. bor.
norvegica, Sommer. in Vet Acad. Handl. Stockh. (1837) 254=remote.
obtusa, Trin. in M£m. Acad. PAersb. Sdr. VI. i. (1831) 366-Poaobtusa.
ochroleuca, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 100 - Catabrosa aquatica.
pallida, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pitersb.* i. (1836) 68. —Am. bor.
palustris, Lange, in Fl. Dan. t. 2582 = arctica.
pauciflora, *J. b" C. Presl, Rel. Haenk.* i. 257.—Sinus Nootka.
pedicellata. Towns, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. v. (1850) 105-fluitans.
pendulina, Laestad. ex Wahlenb. Fl. Suec. 1088-Poa Laestadii.
pensylvanica, Heynh. Nom. i. 361 - Eatonia obtusata.
permixta, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 99 -Borreri.
plicata, Fries, Mant. iii. 176-fluitans.
procumbens, *Dum. Obs. Gram. Belg.* 145.—Europ.; Mesopot.
Pseudo-distans, Clip, in Mém. Cour. Acad. Belg. xviii. 8vo (1866) 239-distans.
ramigera, *F. MueU.' Fragm.* viii. 131; *ex Benth. Fl. Austral,* vii. 659.—Austral.
remota, *Fries, Mant.* ii. 5.—Europ. bor.; Reg. Caucas.
rigida, Sm. Engl. Fl. i. 119-Festuca rigida.
scabenima, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 287.—Ind. or.
songarica, Schrenk, Enum. PI. Nov. 1 = Poa soongarice
spectabiiis, Mert & Koch, Deutschl. Fl. i. 686 - aquatica.
Sphenopus, Steud. Syn. PI. Gram. 287 - Sphenopus Gooani.
stieata, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 784 = fluitans.
stticta, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 95 = Sporobolus asper.
stricta, *Hook./. Fl. N. Zel.* 304.—Austral.; N. Zel.
subfastigiata, *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 392.—Sibir. altaic.
subspicata, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1680) 624. —Turkestan,
tenella, *Lange, ex Kjellm. in Nordensk. Vega-Exped. Vetensk. Iaktt.* i. 813.—N. Zembla.
tenuiflora, *Steud. Syn. PI Gram.* 286.—Sibir.
tenuifolia, Boiss. & Reot. Pugill. PI. Nov. 127 = distans.
tenuifolia, Steud. Syn. PI. Gram. 286 - Catabrosa tenuifolia.
„»»<tf.Va, Steud. l.c. 285-strict*?
tonelensis, *C. B. Clarke.* «» *Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 119.—Reg. Himal.
transsilvanica, Schur, Ennm. PI. Transs. 780 - maritima.
vaeinata, *Lange, in Fl. Dan.* t. 2583.—Groenl.
Vahliana, *T. Fries, in Ofver. Vet. Akad. Stockh.* xxvi. (1869) 140.—Reg. arct.
vilfoidea, *T. Fries, I. c.* 189.-Groenl.
mridula, Heynh. Nom. i. 361-Aua vindula.

GLYCERIA, Nutt. Gen. Am. i. 177 (1818) - Hydrocotyle, Linn. (Umbel!.).
asiatica, Nutt 1. c. = H. asiaticn.
repanda, Nntt. 1. c. - H. repanda.
triflora, Nutt. 1. c - H . asiatica.

GLYCIA, Lion. Syst. ed. I (1735) -Astragalus,Tonrn. (Legum.).

GLYCICARPUS, Benth. & Hook. f. Gen. i. 425 (1862) = GLYCYCARPUS, Dalz. = Nothopegia, blume, (Anacard.).

GLYCIDERAS, DC. Prod. vii. 257 (1838) = Olyoyderas, Cass. (Compos.).

GLYCrNE, Linn. Gen. ed. I. 849 (1737). *LEGVMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 530.
BujACIA.E.Mey.Comm. PLAfr. Austr. i. 127(1835)
JOHNIA, Wight & Am. Prod. 449 (1884).
KENNEDYNELLA, Steud. Nom. ed. II. i. 845 (1840)
LEPTOCYAMUS, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1839) 209, adnot.
LEPTOLOBIUM, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (183S) 124.
NOTONIA, Wight *Sc* Am. Prod. 207 (1834).
SOJA, Moench, Meth. 153 (1794).
TRIENDILIX, Rafin. New Fl. Am. i. 85 (1S36).
Abrus, Linn. Sp. PI. 753 - Abrus precatoria.
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 212 — Teramnus kbialh.
abyssinica, Juss. ex DC. Prod. ii. 386 - Rhynchosia pubescens.
ambigua, *Jacq. Fragm.* 84 (sp. dub.).—Hab. ?
americana, *Tenore, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 691 (Quid <). —Hab.T
andongensis, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 179.— Afr. trop.
angulata, Desv. Joum. Bot. i. (1814) 78-Teramnus uncinatus.
angulosa, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1056-PhaseoIus diversifolius.
angustifolia, Jacq. Hort Schoenb. ii. 55 - Rhynchosia calycina.
anonychia, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 532 - Teramnus labjalis.
Apios, Linn. Sp. PI. 753-Apios tuberosa.
arborea, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 70, nomcn. —Hab. ?
argentea, Thunb. Prod. PI. Cap. 131 = Rhynchojia argentea.
atomaria, *Willd. ex Spring. Syst.* iii. 196.—Am. austr.
atrorubra, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 65.—Hab. ?
aurea, Willd. in Ges. NaturC Fr. Nene Schr. iv. (1803) 218 — Rhynchosia aurea.
axilliflora, Kotschy, in Sitzb. Acad. Wien, Math.-Nat. Ii. Abth. II. (1865) 366 = Teramnus labialis.
Backhousiana, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 65.— Hab. ?
biflora, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 346.—Afr. trop.
biloba, *Lindl. Bot. Reg.* t 1418.—Mexic.
bimaculata, Curt. Bot. Mag. t. 263 = Hnrdenbergia monophylla.
bimaculata, *Moench, Meth. Suppl.* 46.—Hab. ?
bituminosa, Linn. Sp. PI. 764 = Fagelia bituminosa.
Borianii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 180.— Afr. trop.
Botrydium, Walp. Rep. i. 760 = Teramnus uncinatus.
brachybotria, *Hort. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap.* 41), nomen.—Hab.!
bracteata, Linn. Sp. PI. 764 = Amphicarpaea monoica.
Bujacia, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 126 -- javanica.
caerulea, Salisb. Prod. 335 * Wistaria speciosa.
cajanoides, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 824.—Ins. Philipp.
cana, Willd. Sp. PI. iii. 1063 = Rhynchosia cnna.
capital.i,H.tyne, in Roth, Nov. PI. Sp. 346 = Rhynchosia aurea.
caribaea, Jacq. Coll. i. 67 = Rhynchosia phaseoloides ?
caroliniana, Spreng. Syst. iii. 197 = Rhynchosia tomentosa, *Hook,* b* Am.
chinensis, Sims, Bot. Mag. t. 2083 - Wistaria chinensis.
clandestine, *Wendl. Beobacht.* 54.—Austral.
coccinea, Curt. Bot. Mag. t. 270 ^ Kennedya prostrate.
comosa, Linn. Sp. PI. 764 = Amphicarpaea monoica.

OLYCHTB:—
Comptoniana, Andr. Bot. Rep. t. 602 = Hardenbergia Cotnptoniann.
corallina, SalUb. Prod. 334 = Rhynchosia phaseoloides.
crinita, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 421 = Eriosema crinitam.
cylindriflora, Wall. Cat. n. 5516 = Shuteria ferraginea.
dalbergioides, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 190, nomen.—Ins. Timor.
debilis, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 54 = Teramnus labialis.
densiflora. Roth, Nov. PI. Sp. 348= Rhynchosia densiflora.
dentata, *Vahl, ex Schum.* to" *Thonn. Beskr. Guin. PL* 848.—Afr, trop.
diffusa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 420. t. 572 = Eriosema diffusum.
discolor, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brax. x. II. (1843) 190 — Teramnus uncinatus.
discolor, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 196.—Ind. or.
dolichoides, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. ix. ^826) 415.—Ins. Timor.
dubia, *Colla, Hort. Ripul. App.* iii. 37.—Ins. Gnadelonp.
elegant, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 42 = Rhynchosia elegans.
elliptica. Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 190-Teramnus uncinatus.
elliptica, Sm. in Abbot, Hist. Nat. Georgia, t. 21 = Amphicarpaea monoica.
elongata, Roth, Nov. PI. Sp. 347 = Rhynchosia aurea.
emarginata, Desv. Journ. Bot. i. (1814) 78 = Galactia emarginata.
erecta, Nutt. Gen. Am. ii. 114 = Rhynchosia tomentosa.
erecta, Thunb. Prod. PI. Cap. 131 = Rhynchosia Chrysoscias.
falcata;, *Benth. Fl. Austral,* ii. 243.—Austral.
ferfugînea, R. Grab., in Wall. Cat. n. 5514 = Shuteria ttrruginea.
filiformis, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. ix. (1826) • 415.—Hab.?
filiformis. Wall. Cat. n. 5510=Teramnus labialis.
filosa, Hornem. Hort. Hath. ii. 682= Amphicarpaea monoica.
flaccida, Wall. Cat. n. 5517=Argyrolobium flaccidum.
fiexilis, R. Gran, in Wall. 1. c. n. 5521-Teramnus flexilis.
floribunda, Willd. Sp. PL iii. 1066 =? Wistaria chinensis.
Fridericiana, Weinm. in Flora, iv. (1821) 29 - Rhynchosia Fridericiana.
frutescens. Linn. Sp. PI. 753 = Wisteria speciosa.
Galactia, Linn. Syst. ed. X. 1173 = Galactia pendula.
galactioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 427 = Calopogonium galactioides.
gampsonychia, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 533 - Teramnus labialis.
glabra, Spreng. Neue Entdeck. iii. 64 = Rhynchosia glandulosa.
glabrata, Steud. Norn. ed. II. i. 691=Shuteria vestita.
glandulosa, Thunb. Prod. PI. Cap. 181 = Rhynchosia glandulosa.
Grahamii, Wall. Cat. n. 5513 = Grona Grahami.
hedysaroides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1062.—Afr. trop.
helvola, EH. in Journ. Acad. Sc. Philad. i. (1818) 326 = Phaseolns helvolus.
heterocarpa, Hegetschw. Comm. Bot. 9. t. 5 — Amphicarpaea monoica.
keterophylla, Thunb. Prod. PI. Cap. 131-Rhynchosia glandulcsa.
hispida, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. (1873) 398; *Franck.* 6" *Sav. Enum. PI. Jap.* i. 108.—Japon.
humifusa, Willd. Enum. Hort. Berol. 756=Rothia trifoliata.
involucrata,\\'*a*\\. PI. As. Rar. iii. 22 = Shuteria vestita.
ixosperma, *Hoffmgg. Vert. Pfi. Nochtr.* ii. 128.—Bras,
jamaicensis, *Guss. ex Colla, Hort. Ripul. App.* iii. 37.—Jamaic.
javanica, *Linn. Sp. PI.* 754.—As. et Afr. trop.
j'avanica, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 340, partim = G. Soja.
labialis, Linn. f. Suppl. 825= Teramnus labialis.
Lagascana, DC. Prod. ii. 241 —Calopogonium galactoides.
Lamarckii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 424 ~ Rhynchosia minima.
lamprocarpa, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, ii. 202 = Lamproiobium fruticosnm.
lancifolia, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 24.—Ins. Canar.

OLYCINE:—
Lantzii, *Baill. in Bull. Soc. Linn Par.* i. (1888) 382. —Madag.
Latrobeana, *Benth. Fl. Austral,* ii. 244.—Austral.
leptocarpa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5515 = Rothia trifoliata.
leucosperma, Desv. Journ. Bot. i. (1814) 78 = Galactia dubia.
lignosa, Turpin, ex Pers. Syn. ii. SOI—Sweetia lignosa.
lineata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 5578 = Atylosia lincata.
littoralis, Vahl, ex DC. Prod. ii. 885-Rhynchosia minima.
longicauda, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 658.—Afr. trop.
lucida, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 578 = Dolichos Lablab.
lucida, Forst. f. Prod. 51-Strongylodon ruber.
lucida, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6511 - Galactia tenuiflora.
Lyallii, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 266. —Madag.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 426 - Rhynchosia reticulata.
macrophylla, *Thonn. in Schum.* to" *Thonn. Beskr. Guin. PI.* 348.—'Afr. trop.
malacophylla, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 270-Rhynchosia phaseoloides.
marmorata, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, ii. 263-Atylosia marmorata.
Memnonia, DC. Prod. ii. 886 = Rhynchosia Memnonia.
menispermoides, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 270 = Rhynchosia menispermoides.
Meyeri, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 126 = Teramnus labialis.
micans, *Welw. V Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 179.—Afr. trop.
micrantha, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 32 =javanica.
microptera, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 195 = Rhynchosia minima.
minima, Willd. Enum. Hort Berol. 766-cIandestina.
mollis. Hook. Exot. Fl. iii. 1201 = Rhynchosia phaseoloides?
mollis, Wight & Arn. Prod. 208 = Teramnus labialis.
mollis, Willd. Sp. PI. iii. 1062-Rhynchosia mollis.
mollissitaa, Ell. Sketch,ii.234 = Rhynchosia mollissima, *Shuttlew.*
monantha, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 190, nomen.—Ins. Timor.
moniliforme, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 211=javanica.
Monniera, *DC. Prod.* ii. 242.—Afr. austr.
monoica, Linn. Sp. PI. ed. II. 1023 - Amphicarpaea monoica.
monoica, Schkuhr, in Usteri, Ann. Bot xii. (1794) 20. t. 2—Amphicarpaea monoica.
monophylla, Burm. f. Fl. Ind. 161 = Eleiotis cordata.
monophylla, Linn. Mant. i. 101 = Hallia cordata.
monophylla, Nutt. Gen. Am. ii. 115 = Rhynchosia tomentosa, *Hook, (f Arn.*
monosperma, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 196 - Rhynchosia rufescens.
montana, *Rafin. Atl. Journ.* 153 (sp dub.).—Am. bor.
moringaeflora, *Delile, in Caill. Voy. Miroi (Cent. PI. Miroi,* 87).—Aegypt.
multijuga, Clemen, in Rev. Hortic. (1874) 800—Wisteria chinensis.
Nummularia, Linn. Mant. i. 671 = Rhynchosia Nummularia.
oblonga, Benth. Bot. Voy. Sulph. 84 = Teramnus volubilis.
oxyphylla, R. Grah. in WalL Cat n. 5522 - Galactia oxyphylla.
pollens, R. Grah.l. c. n. 5518-Teramnus labialis.
parvifiora, Lam. Encyc. ii. 788-Teramnus labialis.
parviflora, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 227 = Dumasia glaucescens.
peduncularis, Muhl. Cat. 64 = Phaseolns helvolus.
pedunculosa, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 360—Phaseolus diversifolius.
pentandra, Spreng. in Schrad. Joum. (1800) II. 197 = Teramnus labialis.
pentandra, Spreng. Syst. iii. 235-hedysaroides.
pentaphylla, *Dais, in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 344.—Ind. or.
Petitions., Schweinf. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 179.—Afr. trop.

GIiYCUTE:—
phaseoloides, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 105 = Rhynchosia pbaseoloides.
picta, Vahl, Symb. Bot. ii. 81 = Eriosema violaceum.
pondicheriensis, Spreng. Syst. iii. 196 - Rhynchosia rufescens.
precatoria, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 765 — Rhynchosia phaseoloides.
procumbens,, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 691 = Rhynchosia diffusa.
prostrata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 21 (Quid 1).—Afr. austr.
pubescens, Balb. ex DC. Prod. ii. 886 =• Rhynchosia pubescens.
pubescens, Bert, ex DC. 1. c 243-Chaetocalyx pubescens.
pugiunculus, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 414 = Centrosema virginianum.
pulchella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 422=Eriosema pulchellum.
pulcherrima, Willd. ex Spreng. Syst iii. 246 = Robinia ftturcusis.
punctata, Willd. Sp. PI. iii. 1066 = Poiretia pnnctata-
reflexa, Nutt. Gen. Am. ii. 115 = Rhynchosia minima.
reniformis, Pursh, FL Am. Sept. ii. 86 - Rhynchosia tomentosa.
repanda, *Spreng. Fl. Hal. Mant.* 47.—Hab. ?
reticulata, Svr. Prod. Veg. Ind. Occ 105 - Rhynchosia reticulata.
retusa, Soland. ex Benth. Fl. Austral, ii. 247 = Hardenbergia retusa.
rhombea, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 846 •• Rhynchosia minima.
rhombifolia. Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 5492 « Rhynchosia densiflora.
rhombifolia, Willd. Sp. PL iii. 1065 (err. typ. 1605)-Rhynchosia minima.
rosea, Forst. f. Prod. 50=Canavalia obtnsiflora.
rubicunda, Schneev. Ic. PI. Rar. t. 28-Kennedy* rubicunda.
rufa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 428 - Eriosema rufum.
rufa, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 344 •= Enosema glomeratum.
rufescens, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv- (1808) 222 = Rhynchosia rufescens.
sagittata, Humb. *Sc* Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 757 - Centrosetna hastatum.
sarmentosa, Roth, Catalect. fasc. ii. 87 = Amphicarpaea monoica.
Schimperi, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. H. >• 691 = Rhynchosia Schimperi.
secunda, Thunb. Prod. PL Cap. 131- RhynchoM* secunda.
senegalensis, DC. Prod. ii. 242 ."Teramnus labialis-
sericea, *Benth. Fl. Austral,* ii. 245.—Austral,
sericea, *Willd. Sp. PI.* iii. 1059.—Afr. trop.
simplicifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 419 <= Eriosema simplicifolium.
sinensis, Lindl. in Bot. Reg. t 650=Wistaria chinensis-
Soja, *Sieb. V Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. «• (1848) 119.—As. trop.
striata, *Jacq. Hort. Vindob.* i. 32.—Am. trop.
stricta, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 22=GaUe»» sessiliflora.
suaveolens, Linn. f. Suppl. 326 = Rhynchosia suaveou"*' Rhynchosia phaseoloides.
sublobata, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL 8*" " subtenanea.
subterranea, Linn. Sp. PL ed. II. 1023-Voano**'* suffulta, WalL Cat. n. 5507-Shuteria suffulta.
tabacina, *Benth. Fl. Austral,* ii. 244.—Austral.
tenerrima, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5520-=Tera»nUS labialis.
tenuiflora, Klein, in Willd. Sp. PL iii. 1059=Gala*0* tenuiflora.
tomentosa, *Benth. Fl. Austral,* ii. 245.—Austral.
tomentosa, Linn. Sp. PL 754 = Rhynchosia tomentof-
totta, Thunb. Prod. PL Cap. 131 = Rhynchosia Tot»v.
triloba, Burm. f. Fl. Ind. 162; Murr. Syst. Veg. «"' XIII. 549 = Phaseolus trilobus.
tuberosa, Salisb. Prod. 335 = Apios tuberosa.
umbellata, Muhl. ex Willd. Sp. PL iii. 1058 - Phaseolus helvolus.
uniflora, Dalz. in Joum. Linn. Soc. xiii. (1878) 1*" Dolichos biflorus.
ussuriensis, *Regel* b* *Maack, in Tent. Fl. Ussur.* »v- As. bor. or.

GLYCI —
wlutina, Bert, ex DC. Prod. ii. 2S9 = Odonia tomentosa.
vestita, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5512 - Shateria vestita.
•oiflosa, Thunb. Fl. Jap. 283 = Dunbaria subrhombea.
"incentina, [Ker-Gawl.] in Bot. Reg. t. 7!)»=Chae-.tocalyxvincentina.
volacea, Schneev. Ic. PI. Rar. t. 29 = Hardenbergia ·•nonophylla.
"'»..Soland. ex Sleud. Nom. ed. II. i. 893-Harden- Dergia monophylla.
"g'nica, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) II. 198 = Phaseolus diveraifolius.
njlZis (1803) 209 = Psendarthria viscida.
•nscosa, Moench, Meth. Suppl. 46 = Fagelia bituminosa.
viscosa. Roth, Nov. PI. Sp. 849 = Rhynctiosia viscosa.
"2*' Dalz. in Hook. Kew joum. iii. (1851) 210 -Terammis labialis.

GLYCIPHYLLA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) = Chfogenee, Salisb. (Vacciniac).
puiula, Rafin. 1. c. = C. serpyllifolia.

""^X^pSMA, Nntt. ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 639 = MyrrhiB, Scop. (Umbellif.).
T'f«"«. A. Gray, in Proc Am. Acad. viii. (1872) bor. occ
deri, A. Gray, 1. e. = M. Bolanderi.
ttale, Nutt. ex Torr. *Be* Gray, Fl. N. Am. i. 639 = M. occidentalis.

i Correa, in Ann. Mm. Par. vi. (1805) «*. *RUTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 308.
to Mskay- MfG- ii- (1822)
PE, M. Roem. Syn. Hesper. 33, 45 (1846).
ERMUM, M. Roem. Syn. Hesper. 31, 40
africana, Hook. f. ex Benth. in Hook. Icer Fl. 256. —Afr trop.
americana, Sagot, ex Oliver, in Tonrn. Linn. Soc v. Suppl. ii: (1881) S7=pent.phylla.
angustifolia, LiDdl. in Cat. 6S78 pentaphylla.
bite P Prod 538-pentaphylla.
chyiocarpa, Syn. Fl. Cat. POT/. 162.—Java.
cinerea, Prod 9S = pentaphylla.
elata, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 72 = pentaphylla.
T W in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1868) cyakoo. Mui Ta ya crennlata.
«JOoT ,1 •*'»"•• S>j*". iv. Car. ZW. 161.—Java.
heterophylla, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 231=.penUphylla.
macrocarpa, Wight 109 = pentaphylla.
macrophylla, Lind pentaphylla.
macrophylla, Miq. Ft. Ind. Bat. i. II. 522.—Java.
madagascariensis, Madag.?
melanocarpus, Dehnh. Cat. Pl. Hort. Camald. ed. II. 20.—Hab.?
nitida, Wight & Am. Prod. 93 = pentaphylla.
obtusa Ann Mus Bot Lugd Bat 211 ~
Java.
pentaphylla, Correa. in Ann. Mus. Par.vi. (1805)386. —As trop; Austral.
puberula, Lam. in Wall. Cat. n. 6376.—Malaya.
pyrifolia, Lamp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 178, notmen.—Ins. Timor.
quinquefolia, Griff. Notnl. iv."495-pentaphylla.
^PJndoidBi 7?m Syn H«Pe 41 = pentaphylla.
"Plieif-? *Wall. Cat.* n. 6376.—Malaya.
sinensis, Syst. iv. *Cur. Post.* 162.—Java, Asiam. Bot xiv (1876) a7~~
subvelutina, F. Muell. Fragm. i. 26 = Micromelum pubescens.
subopposita, Miq. Fl.Ind. Bat. Suppl. 5O1.-Sumatra.
trifoliata, Spreng. Java.
triphylla, Wight, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 298 = pentaphylla.

GLYCYCARPUS, Dalz. in Jonra. Roy. As. Soc. Bombay, iiL (1849) 69 - Hothopegia, Blume (Anacard.).
edulis, Dalz. 1. c 70-N. Colebrookiaaa.
racemosa, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 39 = N. Colebrookiana.

GKLYCYDEBAB, Cass. in Diet. Sc. Nat. lix. 74 (1829). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 269.
GLVPHIA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1818) 141.
lucida, *Cass. ex DC. Prod.* vii. 257.—Madag.

GLYCYPHYLLA, Spach, Hist Veg. Fhan. ix. 443 (1840) = GLYCIPHYLLA, Rafin. - Chiogenes, Salisb. (Vaccin.).

GLYCYPHYLLA, Stev. in Bull. Soc Nat. Mosc. iv. 268 (1832)-Astragalus, Tonrn. (Legum.).
galegiformis, Stev. 1. c. — A. galegiformis.
glycyphylloides, Stev. 1. c.-A. glycyphylloides.
labradoricus, Stev. 1. c — A. secundus.
stipularis, Stev. 1. c - A. stipulatus.

GLYCYKBHIZA, Tourn. ex Linn. Cor. Gen. 13 (1737). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 508.
CUDANTHERA, R. Br. in Start, Exped. Centr. Austral, ii. App. 73 (1849V
GI.YCVRRHIZOPSIS, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 82 (1856).
LIQUIRITIA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 367.
MERISTOTROPIS, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 96 (1843).
aculeata, Yank. Fl. Aegypt. Arab. 135 - Guilandina Bonduc.
aspera, Pall. Reise, i. 499 — asperrima.
asperrima. *Linn./. Suppl.* 330.—RossU; As. centr.
astragalina, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iiL (1833) 183. —Chill.
brachycarpa, Boiss. Diagn. Ser I. ii. 38-glabra.
buchariua, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 697.—As. centr.
Dioschoridis, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 3S7 = echinata
dubia, Bernh. ex Steud. Nom. ed. II. i. 692 = foetidissima.
echinata, Lepech. Reise, L 214-glabra.
echinata, *Linn. Sp. PI.* 741.—Europ. austr.; Oriens.
flavescens, *Boiss. Diagn.* Ser. L vi. 33.—Cilicia; Syria.
foetida, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 170.1.199.—Afr. bor.
foetida, Jacq. Eclog. t! 51 = foetidissima.
foetidissima, *Tausch, in Flora,* xiv. (1831) 210.—Hab.?
Frearitis, Orph. ex Nym. Consp. 188 = echinata.
glabra, *Linn. Sp. PI.* 742.—Reg. Mediterr.; Oriens.
gtabra, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 408 = lepidota.
glanduli/era, Waldst. ft Kit. PI. Rar. Hung. i. 20. t. 21 = glabra.
glutinosa, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 298-lepidota.
grandiflora, *Tausch, in Flora,* xiv. (1831) 209.—Hab.?
hirsuta, Hort. Prag. ex Tausch, 1. c —praec.
hirsuta, Linn. Sp. PI. 742=glabra.
hispida, Pall. Reise, ili. 764 = asperrima.
hybrida, *Gueldtnst. Reise,* i. 195.—Rossia.
Kansoo, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 68 = Cassia Tora.
laevis, Pall. Reise, i. 370 -glabra.
lepidota, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 480.—Am. bor.
macedonica, *Boiss. V Orph. in Bull. Congr. Bot. Pitersb.* 1869 (1870) 136.—Graecia.
mediterranea, Veil. Fl. Flum. 317 i vii. t. 145 = Periandra dulcis.
muricata, Georgi, Bescbr. Russ. Reich. Nachtr. 294 = echinata.
officinalis, Lepech. Reise, L 235-glabra.
pallida, Boiss. Diagn. II. ii. 22-glabra.
pallidiflora, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 79—Reg. Amur.
paucifoliolata, *Hance, in Joum. Bot.* xx. (1882) 259. —China.
psoraleoides, *Benth. Fl. Austral,* ii. 226.—Austral,
spinesceni, *Sieber, tx Reickb. Fl. Germ. Excurs.* 613. —Europ.

OLYCYRHHIZA :—
iquamulosa, *Franch. Fl. David,* i. (1884; 93.—China,
tnphylla, *Fisch.* &• *Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 29. —Reg. Casp.; Persia; Soongar.
undulata, *Ruii b- Pav. ex G. Don, Gen. Sjrst.* ii. 227. —Peruv.
uralensis, *Fisch. ex DC. Prod.* ii. 248.—Sibir.
violacea, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 28 — glabra.
viscida, *Turcm. ex Bess, in Flora,* xvii. (1834) *l.Beibl.* 10.—Sibir. baical.
viscosa, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 565 = glabra.
vulgaris, Gueldenst. ex Ledeb. 1. c.=glabra.

GLYCYRRHIZOPSIS, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 82 (1856) = aiycyrrhiza, Tourn. (Legum.).
flavescens, Boiss. 1. c. = Glycyrriiza flavescens.

GLYPHA, Lour, ex Endl. Gen. 606, in syn. (1838) = Scaevola, Linn. (Goodeniac).

OLYFHAEA, Hook. f. in Hook. Ic. PI. t. 760 (18481. *TJLIACEAE,* Benth. *8c* Hook.f. i. 237.
grewioides, *Hook.f. 1. c.*—Afr. trop.
Monteiroi, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 5810.—Afr. trop.
tomentosa, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 267.—Afr. trop.

GLYPHIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 141-GHyoyderae, Cass. (Compos.).
lucida, Cass. 1. c. = Glycyderas lucida.

OLTPHOSPERMA, S. Watt, in Proc. Am. Acad. xviii. (1882-83) 164. *LILJACEAE.*
Palmeri, 5. *Wats. I. c*—Mexic.

GLYPHOSPERMUM, G. Don, Gen. Syst. iv. 195 (1836) = Oentlana, Toum.
ornatum, G. Don, 1. c.—Peruv.
violaceum, G. Don, 1. c>=Gent. violacea.

GUiYFTOFETAIiTJM, Thw. in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 267. t. 7 B. *CELASTRINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 361.
grandiflorum, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 21.— Zeylan.
sclerocarpum, *M. Lams, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 613.—Burma.
zeylanicum, *Thw. in Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 268.—Zeylan.

GLYPTOPIiETTRA, Eaton, in Bot. King's Exped. 207. t. 20 (1871). *COMPOSITAE,* Benth. & HOOK. f. ii. 623.
marginata, *Eaton, I. c.*—Utah.
Ktulou, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 431.—Utah.

GLYPTOSTROBUS, Endl. Syn. Conif. 69 (1847) = Taxodium, Rich. (Conif.).
heterophyllus, Endl. 1. c 70 —T. heterophyllnm.
Horsfieldii, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 677-Podocarpus cupressina.
pendulus, Endl. Syn. Conif. 71 - T. distichum.
pensilis, *C. Koch, Dendrol.* ii. II. 191-T. heterophyllnm.

GLYSCOSMIS, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1872 (1840), sphalni. -Qlycosmis, Correa (Rutac).

OMETLUTA, Linn. Gen. ed. II. 628 (1742). *VERBENACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. Ii. 1153.
arborea, *Roxb. Hort. Beng.* 46 ; *Fl. Ind.* iii. 84.—Ind. or.; Malaya.
aUatica, *Linn. Sp. PI.* 626.—Ind. or.
asiatica, Wall. Cat. n. 1818, partim—villosa.
chlnensis, *Benth. Fl. Hongk.* 272.—China.
coromandelina, Buim. f. Fl. Ind. 132 — asiatica.
elliptica, Sm. in Rees, Cyclop, xvi. n. 2 = villosa.
fasciculiflora, *Benth. Fl. Austral,* v. 65.—Austral.
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 6317 = G. Hystrix.
Hystrix, *Schult. ex Kura, in Journ. As. Soc. Seng.* xxxix. '1870) II. 81.—As. trop. or.
indica, *Burm.f. Fl. Ind.* 182.—Java.
inermis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 493 = villosa.
Leichardtii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 66 Austral,
lepidota, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent.* i. (1876) 41. —N. Guinea.
lobata, Gaertn. Frurt. i. 268-asiatica.
macrophylla, *Benth. Fl. Austral,* v. 85.—Austral.

GMELINA:—
macrophylla, *Wall. Cat.* n. 1819.—Ind.or.
oblongifolia, *Roxb. Hort. Bung.* [95]; *Fl. Ind.* iii. 83. —Ind. or.
parriflora, Pen. Syn. ii. 143, sphalm.=seq.
parvi/olia, Roxb. PI. Corom. if. 82. t. 162 = asiatica.
philippensis, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 109.— Ins. Philipp.
Rheedii, Hook. Bot. Mag. t. 4395 = arborea.
sinuata, *Hart. Herrenh. ex Link, Enum. Hort. Btrol.* ii. 128.—Ind. or. J
speciosissima, D. Don, Prod. Fl. Nep. 104 = Wightia gigantea.
Tacabushia, Buch. Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 105 = Wightia gigantea.
vestita, *Wall. Cat.* n. 1820 (sp. dub.).—led. or.
villosa, *Roxb. Hort. Beng.* 46; *Fl. Ind.* iii. 86.—Ind. or.; Malaya.
vitiensis. Seem. Viti, 440 = Vitex vitiensis.

GMELINIA, Spreng. Gen. ii. 481 (1831) - praec.

GNAPHALION, St. Lag. in. Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127-OnaphaHum, Linn. (Compos.).
dysodum, St. Lag. 1. c.— Gnaphalium dysodes.

GNAPHALITTM, Linn. Gen. ed. I. 250 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 305.
BELLOA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 336. t. 38 (1849).
EUCHITON, Cass. in Diet Sc. Nat. lvi. 215 (1828).
FILAGINEI.I.A, Opiz, Seznam, 44 (1852).
GAMOCHAETA, Wedd. Chlor. And. i. 151 C1855J.
MEROPE, Wedd. Chlor. And. i. 160. t. 24 (1855).
OMAI.OTHECA, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvi. 218 (1828).
abyssinicum, Sch. Bip. in Bot. Zcit. iii. (1845) 174 — Helichrysum abyssinienm.
acaule, Sieber, ex Fisch. & Mey. in t>C. Prod. vi. 245 = supinnm.
Achilleae, Sieber, ex DC. 1. c. 267 — Petalacte coronata.
achilleoides. Lam. Encyc. ii. 753 = Helichrysum declinatum.
achilleoides, Sieber, ex DC. Prod. vi. 170 = Helichrysum expansum.
acilepis, DC. Prod. vi. 229 = repens.
acuminatissimum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 1711 = Helichrysum oxyphyllum.
acuminatum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 312.—Afr. austr.
acutatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171- Helichrysum acutatum.
adenocarpuM, Sch. Bip. 1. c. 170 — Helichrysum adenocarpnm.
adhaerens, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 244.—N. Zel.
adnatum. Wall. Cat. n. 2948 = Anaphalis adnata.
adnatum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 469 — Helichrysum odoratissimum.
adoensis. Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 538, Index = Achyrocline Schimperi.
adscendens, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 — Helichrysum adscendens.
aegyptiacum, Pers. Syn. it 421 — Ifloga Fontanesii.
affine, D. Don, Prod. Fl. Nep. 173 = luteo-album.
affine, *Urv. in Mim. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 610.— Reg. Magell.
a/ricanum, Hoflingg. Verz. PH. 83 = Helichrysum orientale.
alatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 79-= Achyrocline alata.
alausense, V iUd. ex Spreng. Syst. iii. 475 = Achyrocline alata.
albescens, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 112.—Ind. occ.
albo-luteum, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 425 = luteo-album.
aldnnateoides, *Remy, in C. Gay, M. Chil.* iv. 232.— Chili.
alienum. Hook. *Sc* Arn. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 329 = Antennaria Geyeri.
allioides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum allioides.
alpigenum, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 354 = sylvaticum.
alpigenum, *F. Muell. ex Hoot./. Fl. Tasman.* i. 217. t. 62 A.—Austral.
alpinum, Asso, ex DC. Prod. vi. 270 = Antennaria dioica.

GUTAPHAXITJM :—
alpinum, Lightf. Fl. Scot. 470. t. 20. f. 2 = supinum.
alpinum. Linn. Sp. PI. 856 — Antennaria alpina.
alpinum, Willd. Sp. PI. iii. 1888 - Antennaria carpathica.
alsinoides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 = Helichrysum alsinoides.
afoeolatum, Sch. Bip. 1. c. 171 = Helichrysum trilineatum.
ambiguum, Guss. ex Tenore. Ind. Sem. Hort. Neap. (1630) 14 = Helichrysum rupestre.
ambiguum, Pers. Syn. ii. 417 = Helichrysnm Lamarckii.
americanum, Mill. Gird. Diet. ed. VIII. n. 17-purpQTCuni•
ammopkilum. Wall. Cat. n. 2943 = Ifloga Fontanesii.
amoyense, Hance, in Joum. Bot vi. (1868) 174 = = hypoleucum.
angusti/olium, Lam. Encyc. ii. 746 — Helichrysum littoreum.
angusti/olium, Loisel. FI. Gall. ed. II. ii. 224 = Helichrysum angustifolium.
angustissimum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = Helichrysum angustifolium.
antarcticum, *Hoot./. Fl. Antarct.* ii. 310. t. 98.—Ins. Falkland.
antennarioides, *DC. Prod.* vi. 224.—Peruv.
aphelexioides, Boj. ex DC. 1. c. 207 - Helichrysum aphelexioides.
apiculatum, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 48. t. 188 = Helichrysum apiculatum.
appendiculatum, Schrank, ex DC. Prod. vi. 175 = Helichrysum grandiflorum.
appendiculatum, Thunb. Prod. PL Cap. 149 = Helichrysum appendiculatum.
apricum, *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 101.—Bras.
aquaticum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5 = nliginosnm.
arabicum, *J. F. Gmel. Syst.* 1216.—Arab.
araneosum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 169 = Helichrysum filagineum.
araucanum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 502.— Chili.
arborescens, unn. Amoen. Acad. vi. 98 — Anaxeton arboreum.
arboreum, Linn. Sp. Fl. ed. II. 1191-praec
arenarium, Aubry, ex DC. Prod. vi. 1B2 = Helichrysum Stoechas.
arenarium. Linn. Sp. PI. 854 — Helichrysnm arenarium.
arenarium, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 45. t. 859 = Helichrysum graveolens.
arenarium, Thunb. Fl. Jap. 312- luteo-album.
argenteum, Mill. Gard. Diet: ed. VIII. n. 14-Helichrysum foetidnm.
argenteum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 802-Helichrysum yuccaefolium.
argenteum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 170-Helichrysum argenteum.
Argyrocoma, Sch. Bip. 1. c 169 — Helichrysum ericoides.
argyrophyllum, Sch. Bip. 1. c. 171 - Helichrysum argyrophyllum.
argyrosphaerum, Sch. Bip. 1. c 170 = Helichrysum argyrosphaerum.
aristatum, DC. in Wight, Contrib. 21-Anaphalis aristata.
arizonicum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 3.—Arizona.
armenium, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 183 — Helichrysum armenium.
arnicoides, Lam. Encyc. ii. 762 = luteo-album.
arvense. Linn. Sp. PI. 866-FiIago arvensis.
ascendens, Spreng. Syst. iii. 474 = Helichrysum adscendens.
asperam, *Pers. Syn.* ii. 420.—Peruv.
asperum, Thunb. Prod. PI. Cap. 147 = Anaxeton asperum, hirsutum.
asterisciflorum, Lam. Encyc ii. 760-Evaz asteriscinora.
asteroides, Balb. Cat. Hort. Taur. (1818) 88-japonicum.
asteroides, Sch. Bip. in Bot Zeit. iii. (1845) 171 = Ixiolaena viscosa.
attenuatum, *DC. Prod.* vi. 228.—Mexic.
aurantiacum, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 105-Helichrysum lavandulaefolinm.
aureo-/ulvum, Berg. Desc. PI. Cap. 257-Helichrysum odoratissimum.

GWAPHAIiITTM :—
aureum, Gilib. Fl. Lituan. i. 179 = Helichrysum arenariuni.
aureum, Hort. ex Spreng. Nov. Prov. 20 = Helichrysum apiculatum.
aureum, Houtt. Handleid. x. 590. t. 67. f. S = Helichrysum fulgidum.
auriculatum, Lam. Encyc. ii. 754 = Helichrysum crispum.
auriculatum, *A. Rick. Tent. Ft. Abyss,* i. 480.—Abys*
auriculatum, *Schrant, in Denkschr. Atad. Muench-* viii. (1824) 156 = Helichrysum stellatum.
auriculatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 161 = Helichrysm" auriculatum.
auronitens, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 173 - Helichrysum auronitens.
australe, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. 693 (Quid')-—Austral.
axillare, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 230.—Chili-
badium, *Wedd. Chlor. And.* i. 145.—Bolivia.
balearicum, Pourr. ex DC. Prod. vi. 182 = Helichiys Lamarckii.
Bantsii, Sch. Bip. in Bot Zeit. iii. (1845) 1 Helichrysum bracteatum.
Baxteri, Sch. Bip. 1. c. = Helichrysnm Baxteri.
Belangerianum, Sch. Bip. 1. c. - Helichrysum cepinalum.
bellidiftorum, Viv. Fl. Ital. Fragm. 16. t. 19 " Helichrysum frigidum.
bellidioides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) " Helichrysum bellidioides.
Berlandieri, *DC. Prod.* vi. 223.—Mexic.
Berterianum, DC. 1. c. 233 — purpureum. tr.ii-
bia/ranum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 306-W chrysum biafranum.
bicolor, Sch. Bip. in Bot Zeit iii. (1845) Helichrysum bracteatum. 107--
Billofrli, *F. Schultt, Arch. Fl. Fr. et Allem.* Europ.
bogotense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. Achyrocline bogotensU.
Bojerianum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii- (1845) - Helichrysnm Bojerianum.
boreale, Salisb. Prod. 192 - Anaphalis
boreale, Turcz. ex DC. Prodf vi. 870-Antdioica.
Bourgovii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* 3.—Mexic.
brachypterum, *DC. Prod.* vi. 226.—Mexic.
bracteatum. Lam. Encyc. ii. 851 = Helichrysum rutilans.
bracteatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1892.—Reg.
brasiliense, Steud. Norn. ed. II. i. 22, in syn. villea bahiensis.
brevicilium, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. Helichrysum semipapposum.
brevi/olium, Lam. Encyc. ii. 744 = Metalasia lata.
brevi/olium, Thw. Enum. PI. Zeyl. brevifolia.
Buchingeri, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. 285 = Helichrysum foetidum.
buchtormense, Sch. Bip. in Bot. Zeit ill- Helichrysum arenarium.
buddleioides, Sch. Bip.I.e.-Helichrysnm
Burchellii, Sch. Bip. 1. c = Helichrysum
Burmanni, Sch. Bip. 1. c. 170 = Helichrysum latum.
£«n<a, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Anaphalis araneosa.
caespitosum Lam. vide *eespitosum.*
caespitosum, J. & C. Presl, Delic Pragsum eespitosum.
calabrum, Tenore, Fl. Nep. v. 22S Filag
calicinum, Poir. Encyc. Suppl. stolonifera.
cali/ornicum, DC. Prod. vi. 22 vi.
callichrysum, Fisch. & Mey. ex DC. Helichrysum callichrysum.
callunoides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. Helichrysum callunoides.
calydnum, Auct vide *calicinum.*
campestre, Schrank, ex DC. Prod. canorw»»»,Willd.exSpreng.Syst.ia.470(-= *obtusifolia;—Ins.* Canar.
Candelabrim, Homem. ex Steud. Nomsphalm 1 = *calabrum 1*

°NAPHAI.IUM:-
cndicans, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 79 = Achyrocline salureoides.
candidissimum, Bieb. Tabl. Prov. Casp. 200-Helichrysum candidissimum.
randidisiimum, *Lam. Encyc.* ii. 754.—Afr. austr.
Landolleanum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 169 = Ixiolaena leptolepis.
omescens, *DC. Prod.* vi. 228.—Mexic.
canum, Wall. Cat. n. 2942 = Anaphalis Royleana.
opillaceum, Thunb. Prod. PI. Cap. 162 = Helichrysnm capillaceum.
rapitatum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 186.—Keg. Argent.
*r<*pitatum,* Lam. Encyc. ii. 744 = Metalasia capitata.
ca P,tatum, Thnnb. Prod. PI. Cap. 148 = Metalasia t-ephalotes.
capUellatum, Thunb. 1. c. 150 = Helichrysum capitcl-latum.
c «rinatum, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 196=Helichrysum Bnrchellii.
*c*rneum,* Lam. Encyc. ii. 741 = Metalasia Cephalotes,
*e*rneum,* Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viu. (1824) 149 = Helichrysum stellatum.
Car"iolicum, Bernh. ex Steud. Nom. ed. II. L 693 (Quid?). Europ.
caroense, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viu. U824) 159 = candidissimum.
""•pathicum, Wahlenb. Fl.' Suec. ii. 535-Antennaria •arpathica.
""•Petanum, Boiss. & Reut. ex Willk. & Lange, Prod. *1. Hisp. ii. 62 = sylvaticum.
c"rroense, Steud. Nom. ed. II. i. 693=*carolnse.*
*ca*taneum,* Gilib. Fl. Lituan. i. 179 -= uliginosum.
'''•' •', DC. Prod. vi. 236 = Raoulia catipes.
forum, Desf. Fl. Atlant. ii. 267 ∽ Ifloga Fontanesu.
'«**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 78. t. 29 = Achyrocline celosioides.
"Phaloideum, Willd. Enum. Hort. Berol. 868 = Japonicum.
*<-*phalotes,* Thunb. Prod. PI. Cap. 147 = Metalasia Cephalotes.
*c*rastoides,* Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. 0845) 169 = "ellch'ysnm cerastoides.
""nuum, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 = Helichrysum Parviflorum.
*Ce*pitosum,* Lam. Encyc. ii. 742 = Helichrysum ces-PUosum.
J-missonis, DC. Prod. vi. 233 = purpureum.
?"'ian*«'«»/o/(«i«,Pers.Syn.ii.41» = cheiranthifolium.
*en**ranthifoli um,* j^ /x DC ,p10d. vi. 225 = Jiymatoides.
chi i Ph -ifolium, Urn. Encyc ii. 752.-Reg. Argent.
chilense. Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 31; Sch.Bip. in Bot. ^ "• (1845) 171 = Helichrysum chilense.
*chu eHSe, Spren*S- Syst. iii. 480=Sprengelii.
*chionanth *1"S ^p g-" oCProd. 218 k hllllS* Royleanr
chionospha^ usm. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 169 = Helic ar ysum chionosphaemm.
c^.ystum, Sch. Bip. L c. 170 = Helichrysum eA*Woro<:hrysum.
teT*im.TM'Sch_ Bip-1" c- 171 = Helichl y sum brac"
chrysocephalum, Sch_ Bip- '• c- *17i* = Helichrysum cymosum.
Chrysocoma, Poir_ ^cyc- Suppl. ii. 807-Moga spicata.
Chrysocoma, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 174 = Helichrysu m cymosum.
chrysocomum, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 9 = Helicar ysum angustifolium.
Afcaus^' *VaU, in Hornem_ HorU Hafn_* "• 801-~'
* ' & • Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = cin.^-"nr sun> semipapposum.
(1851) II. Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. 12—Austral.
cinereum, F- Gmel. Syst. 1216.—Arab.
ZB6 A •"• Sen- BiP- *ex* Hook. f. FL Brit. Ind. w.
rinnaZ Ana phal » marcescens.
·BSS"'"'"' WalL Cat n - 29«-An»Phalis dnn'''
C"u8»n'S"l> Hilsel>b- & Boj. ex Less, in Linnaea, vi.
cir.i.1 ~) 224 = Helichrysum mutisiaefolium.
cirrhosum, Boj. ex DC. Prod. vi. 198 ^ Helichrysum cirrhosum.
citrinum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 31 = cheiranthifolium.

ONAPHAIiIUM:—
citrinum, Lam. Fl. Fr. ii. 62 = Helichrysum Stoechas.
citrinum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (lf)24) 152^Helichrysum parvifolium.
coarctatum, Willd. Sp. PL iii. 1886 - spicatum.
cochinchinense. Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum cochinchinense.
cocUeariforme, Sch. Bip. 1. c. 171 = Helichrysum cochlcariformc.
Colensoi, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 154.—N. Zel.
collinum, *Labill. Nov. Noll. PI.* ii. 44. t. 389.—Austral.
collinum, Salisb. Prod. 192 = Helichrysum Stoechas.
Commersonii, Spreng. Syst. iii. 472=Lucilia acutifolia.
comosum, Sch. Bip. in Bot Zeit. iii. (1845) 173 = Helichrysum ericacfolium.
compressum, Poir. Encyc. Suppl. ii. *801{=Schimgyne obtusifolia).*—Ins. Canar.
concinnum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 34.—Mexic.
concolorum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum erosum.
confertum, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 488=hypoleucum.
confine, *Harv. in Harv.* &" *Sond. Fl. Cap.* iii. 263.—Afr. austr.
confusum,VC. Prod. vi. 222 = luteo-album.
congeitum, Lam. Encyc. ii. 741 = Helichrysum felinum.
canglobatum, Lam. Jl. Fr. ii. 64 = luteo-album.
conglobatum, Viv. Fl. Lib. Spec. 55. t. 8. t 6 = Helichrysum Fontanesii.
conicum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 57.—Europ. austr.
connatum, Spreng. in Flora, xii. (1829) 7 = Leontonyx squarrosus.
conoideum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 85.—Mexic.
conoideum, Lam. Encyc. ii. 755-obtusifolium,
consanguineum, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat. Sir.* I. v. (1825) 103.—Ins. Sandvic
consanguineum, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 40=affine.
contortum, Ham. ex Spreng. Syst. iii. 479-Anaphalis contorta.
conyzoides, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 148.—Afr. austr.
conytoideum, Lam. Fl. Fr. ii. 63 = Phagnalon sordidum.
coquimbense, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-68) 5.—Chili.
cordatum, Sch. ilip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 170-Helichrysum cordatum.
cordi/olium, Boj. ex DC. Prod. vi. 208 = Helichrysum cordifolium.
coriaceum, E. Mey. ex DC. 1. c 167 - Helichrysum rotundatum.
coronatum, Linn. Syst. ea. X. 1210 - Petalacte coronata.
crassifolium, Guss. ex Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 14 = Helichrysnm Fontanesii.
crassifolium; Lam. Encyc. ii. 746 = Helichrysum Lamarckii.
crassifolium. Linn. Mant. i. 112 = Helichrysum crassifolium.
crassifolium, Lowe, ex DC. Prod.vL 181=Helichrysum obconicum.
crassifolium, Willd. Sp. PI. iii. 1865 = Helichrysum revolutnm.
crassinerve, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum Krebsianum.
crispatulum, C. B. Clarke, Comp. Ind. 115 = pulvinatuiri.
crispatulum, *Delile, Fl. Egyptei* 267. t. 44. f. 3.—Aegypt.; Ind. or.
crispum, Lam. Encyc. ii. 760 - Helichrysum revolutu m
crispu"m", Linn. Sp. PL ed. II. 1197 = Helichrysum crispum.
c. psum, Linn. f. Suppl. 36S = Helichrysuni undatum.
CVfsp um, Pers. ex DC. Prod. vi. 197 ~ Achyrocline ffimnacca.
crispum, Pourr. ex DC. I. c. 182 = Helichrysum cesc« £ um Wall, ex DC. 1. c. 270 = Anaphalis trl-pune s.
cuneifoSm, *J. F. Gmel. Syst.* 1216.—Arab.
Zneifolium, Wall. Cat n. 2934 - Anaphalis cuneifo^ ' i kam DC. Prod. vi. 235 = japonicum.
Cu um, Guss. ex DC. 1. cT 249 - Filago arvenxis.

GrNAFHAIiITTM:—
cylindricum, L'Hérit. ex DC. Prod. vi. 268 — Anaxeton recurvum.
cylindricum, Linn. Sp. PI. ed. II. 1194 = Helichrysum cylindrienm.
cylindriflorum, Linn. PL Rar. Afr. 19 = praec.
cylindrostachyum, Wall. Cat n. 3931 = Pterocaulon cylindrostachyum.
cymatoides, *Kunze, ex DC. Prod.* vi. 225,—Chili.
cymosum, Linn. Sp. PI. 855 = Helichrysum cymosum.
cynoglossoides, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 291 = Helichrysum buddlcioides.
cynoglossoides, Trevir. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. 1. (1826) 200 -Anaphalis triplinervis.
dasinnthum, Steud. Nom. ed. II. i. 693, sphalm. = seq.
dasyanthum, Willd. Enum. Hort. Berol. M65=Helichrysum maritimum.
dealbatum, Forst. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 138 =keriense?
dealbatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum dealbatum.
dealbatum,Thnnb. Prod. PL Cap. 149=candidissimum.
debile, Thunb. 1. c. = prostratum.
decipiens, *DC. Prod.* vi. 286.—Hab. ?
declinatum, Linn. f. Suppl. 365 = Helichrysum declinatum.
decorum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum decorum.
decumbens. Lag. Gen. et Sp. Nov. 28. n. 357 = Helichrysum decumbens.
decumbens, Thunb. Prod. PL Cap. 148 *(= Trichogyne decumbens).*—Afr. austr.
decurrens, Buch.-Hara. in Wall. Cat. n. 2939--Anaphalis araneosa.
decurrens, *Ives, in Am. Joum. Sc.* i. (1819) 380.—Am. bor.
decurrem, Linn. Syst. ed. X. 1211=*Conyza decurrens.
decurrens, Schrank, PL Rar. Hort. Monac. t. 84 = Pterocaulon virgatum.
dejectum, Jacq. Fragm. 85—Helichrysum capitellatum ?
densum, Lam. Encyc. ii. 744—Metalasia fasciculate, Cephalotes.
dentatum, Linn. Sp. PL 854 = Pentzia flabelliformis.
denudatum, Linn. f. Suppl. 364 = Helichrysum capillaceum ?
depressum, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 405.—Am. austr.
depressum, Koxb. Hort. Beng. 61; FL Ind. iii. 426-pulvinatum.
depressum, Steud. Nom. ed. I. 875=luteo-album.
dichotomum, Salisb. Prod. 193 = Filago germanica.
dichotomum, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 473.—Venezuela.
diffusum, Boj. ex DC. Prod. vi. 207 = Helichrysum emimense.
diffusum, E. Mey. ex DC. 1. c. 175 - Helichrysum diffusum.
Dillenii, Schult. ex Steud. Nom. ed. II. i. 698-purpureum.
diminutivum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 167.—Chili.
dimorphum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. vii. (1841) 405 = Antcnnaria dimorpha.
dioicum, Linn. Sp. PL 850 = Antennaria dioica.
dioiecium, Hill, Herb. Brit. i. 36 = praec.
diosmaefolium. Vent. Jard. Malm. 74 = Helichrysum diosmaefolium.
diotoides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172-Helichrysum diotoides.
discolor, Sch. Bip. L c 171—Helichrysum appendiculatum.
discolor, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 83.—Peruv.
discolorum, Linn. Sp. PL ed. II. 1191 = Helichrysum imbricatum.
discolorum, Thunb. Prod. PI. Cap. 149 - Helichrysum stellatum.
discolorum, Willd. Sp. PL iii. 1856 = Helichrysum felinum.
distans, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824' 160=Metalasia distans.
Disynanthus, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 196 = Antennaria plantaginea.
divaricatum, Berg. Desc. PI. Cap. 260 = Helichrysum crispum.
diver gens, Thunb. Prod. PI. Cap. 148 = Metalasia divergens.
Dombeyanum, *DC. Prod.* vi. 225.—Am. austr.

GNAPHALrtJM :—

domingense, *Lam. Encyc.* ii. 748.—Ins. S. Doming.
Dmianum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1846) 172- Ariaphalis cuneifolia.
dorsteniaeflorum, Burch. ex DC. Prod. vi. 188 = Helichrysum umbraculigerum.
drabaeforme, Schrank, in Denkschr. Akad. Mnench. viii. (1824) 162 = Helichrysum expansum.
dysodes, Spreng. Syst. iv. 776=cheiranthifolium.
Ecklonianum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1846) 171 = Helichrysnm cephaloideum.
Ehrenbergianum, *Sch. Bip. ex Klatt, in Linnaea*, xlii. (1878-79) 127.—Mexic.
Einseleanum, F. Schnltz, in Arch. Fl. 311 - sylvaticum.
elatum, Lam. Encyc. ii. 742 = Helichrysum nndatum.
datum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 - Helichrysum elatum.
elegant, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. iv. 81 = domingense.
elegans, Presl, Fl. Sicnl. p. xxix—pulchrum.
elegant, Salisb. Prod. 192 = Helichrysum orientale.
elegantissimum, Sch. Bip. in Bot Zeit iii. (1846) 170 = Helichrysum elegantissimum.
elichrysoides, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 485 = antennarioides.
Elichrysum, Pall. Reise, iii. 587 = Helichrysum arenarium.
ettipticum, DC. in Wight, Contrib. 21=Anaphalis oblonga.
elongatum, Hornem. Hort. Hafn. ii. 801 — Helichrysum orientale.
elongatum, Lam. Encyc. ii. 741 — Helichrysum felinum.
emirnense, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845; 171 = Helichrysum emimense.
endeavourense, Sch. Bip. 1. c. 171 - Helichrysum collinnm.
erectnm, *Veil. Fl. Flum.* viii. 98.—Bras.
ericaefolium, Salisb. Prod. 192 = Helichrysum ericaefolium.
ericoides, Lam. Encyc. ii. 746 = Helichrysnm teretifolium.
ericoides. Linn. PI. Rar. Afr. 19; Amoen. Acad. vi. 99 = Helichrysum ericaefolium.
Ernestianum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 169 = Helichrysum Emestianum.
erythractis, *Griseb. inAbh. Goett.* xriv. (1879) 186.—Reg. Argent.
evaciforme, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 169 = Helichrysum sessile,
evacoides, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856) 54, nomen.—Perav.
excisum, Thunb. Prod. PI. Cap. 151-Helichrysum exdsuni.
eximium. Linn. Mam. ii. 678 * Helipterum eximium.
expansum, Thunb. Prod. PI. Cap. 149-Helichrysnm expansum.
faetidum. Barm. f. Fl. Cap. Prod. 26, vide *fottidum*.
falcatum, Lam. Encyc. ii. 758=purpureum.
fasciculatum, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (1677) 529.—N. Zel.
fasciculatum, Lam. Encyc. ii. 745 - Metalasia muricata.
fasciculatum, Thunb. Prod. PI. **Cap.** 148 = Metalasia fasciculata.
fastigiatum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 148 - Helichrysum felinum.
fastigiatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 148 = Metalasia muricata.
felinum, Thunb. 1. c 149 — Helichrysum felinum.
femandeziana, *Phil, in Anal. Univ. ChiL* (1856) 167. **—Ins. J. Fernand.**
ferrugineum, Pen. Syn. ii. 420 — Achyiocline rufescens.
filaginenm, *DC. Prod.* vi. 284.—Am. anstr.
filaginoides, Boj. ex DC. Prod. vi. 219=Stenocline filaginoides.
filaginoides, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 359 - Filago califomica.
Filago, Gneldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 617'Filago minims,
filicaule, *Hook. f. Handb. If. Zeal. Fl.* 158.— N. Zel.
filiforme, Liljebl. Svensk. Fl. ed. II. 359; ex Wahlenb. Fl. Lapp. 204-supinum.
flaccidum, *Kurt, ex C. B. Clarke, Camp. Ind.* 290.— Ind. or.; Burma.

GNAPHAJCIUM :—

flaccidum, Weinm. in Flora, iii. (1820) 610=Achyro dine satureioides.
flavissimum, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, iii. 624- Helichrysum apiculatum.
flexuosum, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 204 = Helichrysnm maritimum.
floccosum, DC. 1. c 234 — indicum.
floridum, Poir. Encyc Suppl. ii. 807 = Anaxeton arboreum.
foetidum, Linn. Sp. PI. 851 - Helichrysum foelidum.
foliosum, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-66) 163.— Chili.
foliosum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 804 = Helichrysum cespitosum.
folliculatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 171= Helichrysum appendiculatum.
formosissimum, Sch. Bip. 1. c. 173 = Helichrysum elegantissimum.
Forskalii, J. F. Gmel. Syst. 1214; Raeusch. Norn. ed. III. 288=kurniense.
fragrans, Sieber, ex DC. Prod. vi. 174« Helichrysum stellatnm.
frigidum, Poepp. ex Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 51-LucUiachilensu.
frigidum, Sen. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1846) 169- Helichrysum frigidum.
frigidum, *Wedd. Chlor. And.* i. 147.—Peruv.
fruticans, Linn. Mant ii. 282 - Helichrysum frnticans.
fruticans, Schrank, in Denkschr. Akad. Mnench. viii. (1824) 154-Helichrysum foetidum.
fruticans, Willd. Sp. PI. iii. 1851 - Helichrysum grandiflorum.
fruticosum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 218 - Helichrysum cymosum.
fruticosum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 20-Helichrysum oiientale.
fulgidum, Zuccagni, in Roem. Collect. 153=Helichrysum fulgidum.
fulvescens, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1846) 172- Helichrysum fulvescens.
fulvo-aureum, Sch. Bip. 1. c=Helichrysum microcephalum.
fulvum. Lam. Encyc. ii. 743 - Helichrysum stellatnm.
fuscatum, Pers. Syn. ii. 421 - norvegicum.
fuscatum, Schur, Ennm. PI. Transs. S19=sylvaticnm.
fuscum, Lam. Encyc. ii. 767 = norvegicum.
fuscum, Oed. in Fl. Dan. t. 254 = sylvaticum.
fuscum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 162 — supinum.
fuscum, Vis. ex Nym. Consp. 383 = Hoi**speanum.**
gallicum, Linn. Sp. PI. 857=- Filago gal**lica.**
gallicum, Woult Fl. Hal.' SuppF. 162 - Filago montana.
gariepinum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169- Helichrysum gariepinum.
Gaudichaudianum, *DC. Prod.* vi. 226.—Bras.
Gayanum, *Remy, in C. Gay, Fl. Chit.* iv. 226.— ChUi.
Georgii, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 170= Helichrysum gradle.
gerberaefolium, Sch. Bip. I. c 174 •= Helichrysum gerberaefolium.
germanicum, Linn. Sp. PL 857 = Filago germanica.
glabratum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171= Helichrysum bracteatum.
glabrescens, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 148 = Metalasia divergens.
glabrum, Eckl. ex DC. Prod. vi. 200-Helichrysum nudifolium.
glanduliferum, *Griseb. in Goett. Abk.* xxiv. (1879) 186. —Reg. Argent.
glanduliferum, Sch. Bip. in Bot Zeit. iii. (1845) 173 = Helichrysum glanduliferum.
glandulosum, *Klatt, in Linnaea*, xlii. (1878) 129.— Peruv.
globosnm, *De'sf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 399.— Austral.
globosum, Homem. Hort. Had. 971-japonicum.
globosum, Sch. Bip. in Bot Zeit iii. (1845) 174- H l i' h l b **osum.** Helichrysum glo
globuliferum, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 173 = Helichrysum serpyllifolium.
glomeratum, Hort. ex DC. 1. c 236=japonicnm.
glomeratum, Linn. PI. Rar. Afr. 20; Amoen. Acad. vi. 99 = Leontonyx glomeratns.
glomerulatum, *Sond. in Ham. (f Sond. Fl. Cap.* iii. 262.—Afr. anstr.

GNAPHAIilTTH:—

glumaceum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 Achyrocline gluroacea.
glutinosum, Tenore, Cat. Sem. Hort. Neap. (1880) 14 = Helichrysum rupestre.
gossypinum, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii- (1841) 403-palustre.
gradle, Blume, Bijdr. 900—luteo-album.
gracile, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 83L— Mexic
gracillimum, *Perr. ex DC. Prod.* vi. 232.—Afr. trop.
grandiceps, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 154.—N- Zel.
grandiflorum, Linn. Sp. PI. 850 = Helichrysnm grandiflorum.
grandiflorum, Willd. Sp. PI. iii. 1851=Helichrysum fruticans.
graveolens, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 299 = Helichrysum graveolens.
graveolens, Fend, ex Sch. Bip. in Webb *Sc* Berth- Phyt. Canar. ii. 316 = Helichrysum orientale.
graveolens, Henning, in Mem. Soc. Nat. Mosc. v- (1823) 79 = Helichrysum arenarium.
graveolens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 81 cheiranthifolium.
Gunnianum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172- Helichrysum scorpioides.
gymnocephalum, DC. Prod. vi. 236—collinnm.
gymnocomum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171- Helichrysum gymnocomum.
Hamiltonii, Wall. Cat n. 2938-Blumea hieracifolia-.
hamulosum, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 192-Hell- chrysuzn haxnulosnzn.
haplostephioides, Mart, ex Baker, in Mart. Fl. Bras, ti- III. 129 = Chionolaena Arbuscula.
hebelepis, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = **Heli-** chrysum hebelepis.
heliantkemifolium, Burm. f. Prod. FL Cap. 25 " Helichrysum serpyllifolium.
helianthemifolium, *Linn. Sp. PI.* 851.—Afr. trop.
helianthemifolium, E. Mey. ex DC Prod. vi. 206 - Helichrysum capitellatum.
helianthemifolium, Thunb. Fl. Cap. 650 - Helichrysum stellatum.
helichrysoides, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 364.- Marocc.
helichrysoides, *Wedd. Chlor. And.* i. 146.—Perav.
heliotropifolium, Lam. Encyc ii. 743 - Helichry^01 heliotropifolinm.
hemisphaericum, Homem. Hort. Hafn. ii. 802 " japonicum.
hemisphaericum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 1< ss Helichrysum hemisphaericuin.
herniarioides, Sch. Bip. L c. 169 - Helicbryso10 hemiarioides.
***heteranthum*, Rafin. Specc. ii. 170; ex Bertol. Fl. ix. 163 - Filago Cupaniana.**
heteroides, *Klatt, in Linnaea*, xlii. (1878-79) Mexic
***keterophyllum*, Thunb. Prod. PL Cap. 149 => H* chrysnm teretifolium.**
beterotricbum, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-68) Chili.
***hirsutum*, Thunb. Prod. PL Cap. 148 = Ana** tiisntuni.**
hirsutum. *Veil. Fl. Flum.* viii. t. 99.—Bras.
hirtum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 82.—*Me"*
hispidum, Thunb. Prod. PL Cap. 148-ElytropaPP1* spinellosus.
Hochstetteri, Sch. Bip. in Bot Zeit. iii. (1845) " Achyrocline Hochstetteri.
Hookerianum, Sch. Bip. 1. c. 171 = **Helichrysum** buddleioides.
Hoppeanum, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. IL 899.— Europ.
horridum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii (1845) **178** Helichrysum horridum.
humifusum, Paill. ex Nym. Consp. S83 = u**liginosum.**
humile, Thnnb. Prod. PL Cap. 151 = **Helichrysum** appendiculatum.
humillimum, Spreng. Syst. iii. 476 -nanum.
hurdwaricum, Wall. Cat. n. 2961=Filago **ermanica.**
hyberboreum, Winch, ex DC. Prod. **vi. 270** Antennaria dioica.
hyemale, Walt. Fl. Carol. 203 = purpureum.
hypoleucum, *DC. in Wight, Contrib.* 21.—Af- ^ l i
hypophaeum, Spreng. ex DC. Prod. vi. 271 cinn&momea.

GNAPHALIUM:—
ignescens, Linn. Sp. PI. 854 = Helichrysura arenarium.
illa pelim , Phil. inLinnaea.xxxiii. (1864-66).—Chili.
»U>ricatum, linn. Sp. PI. 855 = Helichrysum imbri- . catnm.
ncanum, Burnt, /. Fl. Cap. Prod. 25.—Afr. anstr.
tncanum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 80- _ Knnthianum.
tncarnatum, Bory, ex DC. Prod. vi. 173 - Helichrysum . yuccaefolium.
tncarnatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = . Helichrysum rubellum.
wdicnm, *Linn. Sp. PI.* 852.—Geront. trop.
ndtcum, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 168 - Anaphalis . oblonga.
ndntum, Hoot. f. in Hook. Land. Journ. Bot. vi. . (1847) I21.-Austral.
nominatum, Wall, ex DC. Prod. vi. 273 = Anaphalis . Notoniana.
Wornatum, *DC. Prod.* vi. 225.—Mexic.
uuulare, *Phil, in Bot. Zeit.* xiv. (1866) 645.—Im. J. . *emand.
tormedium, Sch. Bip. 1. c. iii. (1845) 170 = . Wehchrysum panicnlatum.
intermedium, Wall. Cat. n. 2936 = Anaphalis nubi- . gna.
«tncatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = . Hehchrysum intricatum.
ynolucratum, Font. f. Prod. 291 = japonicum.
Wucratum, Lam. Encyc. ii. 761 = bracteatnm.
italicu in— S[1] Roth>m Roem_ * Ust_ M * i v _ x _ (1790) [ls] - Helichrysum angustifolium.
[lti][TM]iii, Sch. Bip.exHochst. in Flora,* xxiv. (1841) . «• Intell. 27.-Abyssin.
JaPonicum, *Thunb. Fl. Jap.* 811.—Cosmop.
jwantcum, Reinw. ex Blume, Biidr. 899 = Antennaria . javanica.
[3]C>anum> DC_ Prod_ vi_ 222 = luteo-albnm.
JMjgnuhnianum, *tliq. Fl. Ind. Bat.* ii. 91.—Java.
[h]«iense, *A. Cunn. ex Hook./. Fl. N. Zel.* i. 138.—N. Zel.
*[Kr]»***ii,* Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 178-Heli- --c[h]/sum Kraussii.
"'gsianum, Sch. Bip. L c. 172 - Helichrysum [K] Krebsianum.
»nth[la]num, Steud. Norn. ed. II. i. 994.—Pernv.
> ' * . *Mart, in Denkschr. Akad. Muench.* vi.]- (1820) 198.-Arab.
•wenin, *Meyen b- Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *i[def]tW* {_ (1848) 276.-Pernv.
>snmum, Schnr, Enum. PI. Transs. 319 - uh- ginosum.
Lagopus, Steph. eX WUld_ Sp< PL "i. 1897 = Filago arvensis.
Lamarckii, Sch. B"P. in Bot. Zeit. iii. (1845) 170 — "-alich- sum Lamarckii.
Iolr..
"Woerrianaw, Sch. Bip. 1. c 171 - Helichrysum *la* Lambertianum.
"o2"..6 Font f. Prod. 55 = japonicum.
lancifolin[ws] S-R. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169- Helich[?su] lancifolinm.
Landbeck[U>/>*'7] - "« *Linnaea,* xxxiii. (1864-66)165.— Chili.
lanuginosum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 84.— Peruv.
lasiocaulon' [U«k> *Enum. Hort. Berol.* ii. 317.-Afr. austr.
latifolium latifoiia 1Thunb, Prod_n_Cap>152 = Helichiy*nm
lavandulaceum, DC. Prod. vi. 227 = Chionolaena lavandulifolia.
lavandulaefolium, Willd. Sp. PL iii. J868-Heli- chrysum lavandula
lavanduloides, Boj. ex DC. Prod. v 2 o 7 Helichrysum lavanduloides.
laxum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 = Helichrysum ericaefolium.
legitimum, Gaertn. candidissima. Fructt iL 891 * DiOtii
leiolepis, Sch. Bip. in chrysum revolutum.
leiopodium, Sch. Bip. 1. c- Helichrysum leiopodium.
Leontonyx, Sch. Bip. 1. c. 169-Helichrysum Leontonyx.
leontopodinum, *** ex DC_ *Fmi*_ "•• [2]W^lnte0" album. Willd - Sp. PI. iii. 1893=Leontopodium sibiricum.

GNAPHALUJM:—
leontopodium, Linn. Sp. PI. 855 = I^ontopodium alpinum.
Leontopodium, Stead. Norn. ed. II. i. 694 = Leontopodium sibiricum.
leptolepis, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Ixiolaena leptolepis.
leptophyllum, *DC. Prod.* vi. 226.—Mexic
leptorhintm, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169- Helichrysum leptorhizum.
leucocephalum, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 99.—Am. bor. occ.
leucocephalum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 166.—Chili.
leucophyllum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 = Helichrysum erassifolium.
leucopilinum, *Schott br Kotschy, ex Boiss. H. Orient.* iii. 227.—As. Min.
leucopsideum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum leucopsideum.
leysserioides, Desf. Fl. Atlant. ii. 267 -Leyssera capillifolia.
lineare, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169- Helichrysum ericaefolium.
littorale, Banks & Soland.ex Hook. f. Fl.Antarct. 310 = purpureum.
longifolium, Blume, Bijdr. 900 = Anaphalis longifolia.
longifolium, Sch. Bip. in Bot Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum longifolium.
Lorentii, Sch. Bip. 1. c. 174 = Helichrysum armenlum.
loxense, Willd. ex Sprang. Syst. iii. 470=Achyrocline celosioides.
lupulaceum, Lam. Encyc. ii. 752 — Helichrysum appendiculatum.
lnteo-album, *Linn. Sp. PI.* 851.—Cosmop.
luteo-fuscum, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 143.—Ins. Cap. Verd.
luzulaefolium, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171- Helichrysum luzulaefolium.
lutuloides, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 149=Achyrocline luzuloides.
Lyallii, *Hook./. Fl N. Zel.* 187.—N. Zel.
lycopodioides, Urv. in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 610 = Chevreulia lycopodioides.
Lycopodium, *Pers. Syr.,* ii. 422.—Reg. Magellan.
Macella, *Veil. Fl. Mum.* viii. t 96.—Bras.
macilentum, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 229=candidissinmin.
macranthum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171- Helichrysum bracteatum.
macrocephalum, Sch. Bip. 1. c. — Helichrysum bracteatum.
maculatum, Thunb. Prod.PI.Cap. 149 — candidissimum.
madagascariense, Poir. Encyc. Suppl. ii. 804-Helichiysnm madajnscaricnse.
magellanicum, *Sch. Bip. in Flora,* xxzviii. (1856) 117. —Keg. Magellan.
Mandonii, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 682, nomcn.—Bolivia.
marcescens, Wight, Ic. 1.1116 = Anaphalis marcescens.
margaritaceum, Linn. Sp. PI. 850 - Anaphalis margaritacea.
marginatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 170 = Helichrysum marginatum.
marifolium, Sch. Bip. 1. c 171 - Helichrysum marifolium.
maritimum, linn. Mant. ii. 263 = Helichrysum maritimnm.
maritimum, Schrank, in Denkschr. Akad. Mnench. viii. (1824) 153 = Helichrysum odoratissimnm.
martabanicum, Wall. Cat. n. 2950 = luteo-album.
medium, Viii. Prosp. 31=norvegicnm.
melanacme, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum melanacme.
melanophthalmum, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 29 = Helichrysum melanophthalmum.
melanosphaeroides, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 54, nomen.—Peruv.
melaoosphaerum, *Sch. Bip. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i.* 431.—Abyssin.
mendocinum, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1870) 184 = cheiranthifolium.
metalasioides, Sch. Bip. in Bot Zeit. iii. (1845) 169 = Helichrysum ericaefolium.
miconiae/olium, Sch. Bip. 1. c. 171-Helichrysum micomaefolium.
micranthum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 149.—Afr. austr.
microcephalum, A. Gray, PL Wright, i. 124 ; ii. 99- Wrightii.

ONAPHALIUM:—
microcephalum, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1641) 404.—Am. bor. occ
microlepis, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum semipapposum.
microphyllum, Willd. Sp. PL iii. 1868 = Helichrysum angustifolium.
micropoides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 - Helichrysum micropoides.
milleflorum, Herb. Willd. ex DC. Prod. vi. 190- Helichrysum cylindricum.
milleflorum, linn. f. Suppl. 362 - Helipterum phlomoides.
minimum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 301 = Filago arvensis.
minimum, Sm. Fl. Brit. ii. 878 » Filago minima.
modestum. Hook. Bot. Mag. t. 2710- Helipterum gnaphaloides.
molle, Salisb. Prod. 192-luteo-albnm.
molle, Sch. Bip. in Bot. Zeil. iii. (1845) 171 = Helipterum incanum.
molle, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 - Helichrysum maritimum.
monanthon, Willd. ex DC. Prod. vi. 269 - Antennaria alpina.
monanthon, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 470=-Helichrysum callichrysum ?
monocephalum, Carp, ex Torn *8c* Gray, Fl. N. Am. ii. 310—Antennaria plantaginea.
montanum, Huds. Fl. Angl. ed. II. ii. 362 ^> Filago minima.
montanum, Una. Sp. PI. 857 ; Hill, Veg. Syst. iii. 142 = Filago arvensis.
montanum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum splendidum.
montevidense, Spreng. Syst. iii. 475—cheiranthifolium.
moschatum, A. Cunn. in DC. Prod. vi. 236 = Helipterum moschatum.
mucronatum, Berg. Desc. PL Cap. 269; Linn. Mant. ii. 283 - Helichrysum mucronatum.
multicaule. Lam. Encyc. ii. 743-Helichrysum yuccaefolium.
multicaule, Willd. Sp. PI. iii. 1888 = indicum.
multiceps, Wall. Cat n. 2949 = luteo-album.
multiflorum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 803 *(=Schi»ogyne obtusi/olia).*—Ins. Canar.
multiflorum, Willd. Sp. PI. iii. 1900 = Helichrysum crispum.
multinerve, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum quinquenerve.
muricatum, Linn. Sp. PI. 852 =- Metalasia adunca.
muricatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 148 — Metalasia muricata.
muscoides, Desf. Fl. Atlant. ii. 267-Lasiopogon lanatum.
mutabile, Rochel, PI. fianat Rar. Ind.-sylvaticum, supinum.
nanum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 84.—Pemv.
nanum, Willd. Sp. PI. iii. 1898 = Leontonyx pusillus.
natalitium, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 171- Helichrysum natalitium.
neelgerryanum, DC. in Wight, Contrib. 21 = Anaphalis neclgerryana.
neglectum, Soyer-Willem. in Mem. Soc. Nanc. (1835) 45 = Filago neglecta.
nepalense, Hort ex DC. Prod. vi. 270-Anaphalis triplinervis.
nevadense, *Kellogg, in Proc. Calx/. Acad.* v. (1873) 45. —Calif.
nilagiricum. Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 287 — Anaphalis neclgerryana.
niliacum, Raddi, ex Spreng. Syst. iii. 480—indicum.
nitens, Willd. ex Spreng. 1. c.=roseum.
nitidulum, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 154 = Raoulia Planchoni ?
nitidum, *Hornem, Enum. PI. Hort. Ha/n.* (1807) 18. -Hab.?
nivale, Tenore, Prod. Fl. Nap. 48 — Leontopodium alpinum.
niveum Juss. fide Cass. in DC. Prod, vl 436=Seneciu Aspelina.
niveum, Linn. Sp. PI. 852 = Helichrysum parviflorum.
niveum, Poir. Encyc Suppl. ii. 808 = Helichrysum dealbatum.
niveum, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 •= Helichrysum anomalum.
nodiflorum, Lam. Encyc. ii. 764 = Helichrysum nodiflorum.

GNAPHALIUM:—
norvegicum, *Gunn. Fl. Norv.* ii. 105.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
norvegicum, Ketz. Fl. Scand. Prod. 156 — sylvaticum.
notatum, Thunb. I'rod. l'l. Cap. 150 = Helichrysum expansum.
notatum, Willd. ex DC. Trod. vi. 190 = Helichrysum cylindricum.
Notonianum, Wall. Cat. n. 2952 - Anaphalis Notoniana.
Novae-Zeelandiae, Sell. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum micranthum.
nubicum, Sch. Bip. ex Scliweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 149 - G. Unionis.
nubigenum, Wall. Cat. n. 2985 = Anaphalis mibigena.
nudifolium, Linn. PI. Rar. Afr. l'J •= Helichrysum nudifolium.
uudum, Hoffm. ex J. F. Gmel. Syst. 1217-uliginosum.
abconicum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 170-Helichrysum obconicum.
nblongum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 422 = Anaphalis oblonga.
obmatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 170 = Helichrysum obovatum.
obtusifolium, *Linn. Sp. PI.* 851.—Am. bor.
obtusifolium, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 478 — purpureum.
obvallatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 = Helichrysum obvallatum.
Qculus, Thunb. I'rod. PI. Cap. 161-seq.
Oculus-cati, Linn. f. Suppl. 864 - Eriosphaera Oculus-cati.
odoratissimum, Linn. Sp. PI. 855 = Helichrysum odoratissimum.
odoratum, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 - Helichrysum rutilans.
odorum, Salisb. Prod. 192 = Helichrysum odoratissimum.
odorum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171-Helichrysum apiculatum.
oliganthum, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 167.—Chili.
oligocephalum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum armenium.
olympicum, Sibth. ex Spreng. Syst. iii. 477 = Helichrysum Billardieri.
orbiculare, Thunb. Prod. PI. Cap. 152 = Helichrysum serpyllifolium.
orientate, Linn. Sp. PI. 853 — Helichrysum oricntale.
orixense, Koxb. Hort. Beng. [101]; Fl. Ind. iii. 425-luteo-album.
imatum, Desf. Tabl. ed. I. 96 = Helichrysum hemisphaericum.
oxybelium, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 = Helichrysum oxybelium.
oxyphyllum, *DC. Prod.* vi. 225.—Mexic.
oxyphyllum, Steetz, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 880, partim=doiningense.
Pallasii, Spreng. Syst. iii. 470 = Helichrysum callichrysum.
pollens, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171-Helichrysum undatum.
pallidum, Lam. Encyc. ii. 750 = luteo-album.
palustre, ***Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.*** **N. S. vii.** (1841) 403.—Am. bor. oce.
panaetioides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171-Leptorhynchus panaetioides.
panduraefolium, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 169 = Helichrysum auriculatum.
paniculatum, hag. Desc. PI. Cap. 256 = Helichrysum expansum.
paniculatum, Colla, in Mem. Ace. Tor. xxxviii. (18SS) 17 "• cheiranthifolium.
paniculatum, Thunb. Fl. Cap. 647 = Helichrysum cylindicum.
pannosum, ***A. Cray, in Proc. Am. Acad.*** **zix. (1888) 8.** —Mexic.
pannosum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum pannosum.
papillosum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 808 » Helichrysum bracteatum.
paronychioides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1846) 169 = Helichrysum paronychioides.
parviflorum, ***Colenso, in Trans. N. Z. Inst.*** **xvi. (1884)** 888.—N. Zel.
parviflorum. Lam. Encyc. ii. ;'48 = Helichrysum parviflorum.

ON **APHALIUM**:—
parvulum, ***Harv. in Harv. b" Sond. Fl. Cap.*** **iii. 262.** —Afr. austr.
patulum. Berg. Desc. PI. Cap. 249 = Helichrysum auriculatum.
patulum, Linn. Sp. PI. 855 = Helichrysum patulum.
patulum, Thunb. Prod. PI. Cap. 151 = micranthum, spathulatum.
pauciflornm, *DC. Prod.* vi. 229.—Afr. nnstr.
pedunculare, Linn. Mant. ii. 288 - Helichrysum rupestre.
peduncularc, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1880) 14 — Filago arvensis.
pcdunculatum, ***Benth. & Hoot. f. ex Klatt, in Linnaea,*** xlii. (1878-79) 142.—Chili ?
pellitum, Hort. Gotting. ex DC. Prod. vi. 225 = Schraderi.
pellitum, ***H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.*** **iv. 80.—** Peruv.
pendulum, Presl, Delic. Prag. 97 = Helichrysum rupestre.
pensylvanicum, Willd. Enum. Hort. BeroL 867-purpureum.
pentsioides, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum penlzioides.
perfoliatum, Wall. Cat. n. 2987 = Anaphalis triplinervis.
perpusillum, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 6.—Chili.
peruvianum, Spreng. Syst. iii. 478=aspernm.
petiolatum, Linn. Sp. PI. 854 = Helichrysum peliolatum.
petiolatum, Thunb. Prod. PL Cap. 152 = Helichrysum fruticans.
Petitianum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. 429.—Abyssin.
phaeolepis, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 168.—Chili.
phlomoides, Lam. Encyc. ii. 740 = Helipterum phlomoides.
phylieaefolium, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 «= Helichrysum phylieaefolium.
pilosellum, Linn. f. Suppl. 364 •> Helichrysum pedunculare.
pilulare, Wahlenb. Fl. Lapp. 205. t. 18 - uliginosum.
piluliferum, Hort. ex DC. Prod. vi. 166 = Helichrysum diosmifolium.
piptolepis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1870) 186.—Keg. Argent.
Piravira, Less, in Linnaea, vi. (1831) 227 = G. Viravira.
Planchmii, Hook. f. Fl. Tasman. i. 217. t 62 = Raoulia Planchoni.
planifolium, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169-Helichrysum argenteum ?
plantagineum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 25 = Helichrysum latifolium.
plantagineum, Linn. Syst. ed. XII. 645 = Antennaria plantaginea.
plantaginifolium, Linn. Sp. PI. 860-praec.
Plantago, Boj. ex DC. Prod. vi. 200 — Helichrysum Plantago.
platypterum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum platypterum.
plebeium, Sch. Bip. 1. c 172 = Helichrysum plebeium.
plenum, Burm. *I.* Fl. Cap. Prod. 25 — Helichrysum stellatum.
plicatum, Fisch. & Mey. in Bull. Soe. Nat. Mnsc. (1838) 287 = Helichrysum plicatum.
pluricaule, Poir. Encyc. Suppl. ii. 807 - indicum.
Poeppigianum, Benth. PI. Hartw. 207=domingense.
Poeppigianum, *DC. Prod.* vi. 227.—Peruv.
poli/olium, Thunb. Prod. PI. Cap. 161-Helichrysum serpyllifolium.
Polium, *Wedd. Chlor. And.* i. 147.—Peruv.
polyanthos, Thunb. Prod. PI. Cap. 147 - Metalasia muricata, octoflora.
po!yanthos,Thanb. 1. c. 161 — Helichrysum crispum.
polycaulon, Pers. Syn. ii. 421 (policaulon) = indicum.
polycephalum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 127-obtusifolium.
polycephalum, Spreng. ex DC. Prod. vi. 228—domingense.
polycephalum. Wall, ex DC. 1. c. v. 455 - Pterocaulon cylindrostachyum.
polycephalum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 478 = Helichrysum nodiflorum.
pompejanum, Tenore, Cat. PI. Hort. Neap. (1819) App. ii. 78-luteo-album.

GNAPHALIUM:—
populifolium, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 170= Helichrysum populifolium.
pratense, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 166.—Chili.
prostratum, Hook. f. FL N. Zel. 187 -Helichrysum prostratum.
prostratum, Huet, ex Nym. Consp. 382 = uliginosum.
prostratum, Patrin, ex DC. Prod. vi. 184 = Helichrysum arenarium.
prostratum, Roxb. in Wall. Cat. n. 2955 = pulvinatmn-prostratum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 150.—Afr. austr.
proteaecolorum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench-viii. (1824) 155 = Helichrysum paniculatum.
proteiforme, DC. Prod. vi. 227 = Helichrysum proteiforine.
proteoides, Lam. Encyc. ii. 742 = Helichrysum paniculatum.
proteoides, Sieber, ex DC. Prod. vi. 178 = Helichrysum yuccaefolium.
psilophyllum, ***Meyen V Walp. in Nov. Act. Nat-Cur,*** xix. *Suppl.* i. (1843) 275.—Chili.
pterocaultfn, Franch. & Sav. Enum. Fl. Jap. ii. 405 * Anaphalis pterocaulon.
puberulum, *DC. Prod.* vi. 224.—Chili.
pulchellum, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 190 •= Helichrysun" pulchellum.
pulchellum, Wall. Cat. n. 2945 - Leontopodium alpinum.
pulchrum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 695.—Sicilia.
pulverulentum, Bove, ex DC. Prod. vi. 231 * pulvinatum.
pulvinatum, *Delile, Fl. Egypte*, 266. t. 44.—Aegyp'- '• Arab.; Ind. or.
pumilum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 67" Helichrysum teretifolinm.
purpurascens, *DC. Prod.* vi. 225.—Mexic.
purpureum, *Linn. Sp. PI.* 854.—Keg. trop. et su«-trop.
pusillum, Haenke, in Jirasek, Beob. Riesengeb. (1791' 93 = supinum.
pusillum, Thunb. Prod. PI. Cap. 149=Leontony* pusillus.
pusillum, Vand. Fasc. PI. 19 = sylvaticum ?
pygmaeum, Lam. Encyc. ii. 761 •= Evax pygmnea.
pygmaeum, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 - Helichrys"[111] declinatum.
pyramidale, Berg. Desc. PI. Cap. 255 =• Helichrys*[01] stellatum.
pyramidale, ***Thou. Fl. Tristan D'Acugn.*** **40.—**** Tristan d'Acugn.
pyramidatum, Willd. Sp. PI. iii. 1895 = Filago g[er] manica.
quinquenerve, Thunb. Prod. PI. Cap. 162 = Helichrysa"[1] nudifolium.
quintuplinerve, Buch.-Ham. ex DC. Prod. vi. 27" * Anaphalis triplinervis.
racemosum, *Bogusl. in Erman, Archiv*, vi. (1848) °*' —Kossia.
racemosum, Schrank, ex DC. Prod. vi. 178 ** chrysum mucronatum.
radians, *Benth. PI. Hartw.* 207.—N. Granat.
radiatum, J. F. Gmel. Syst. 1217 = Petalacte corona"-
radicans, *Burm./. Fl. Cap. Prod.* 25.—Afr. austr.
ramigerum, DC. Prod. vi. 222 = luteo-album.
ramosissimum, ***Nutt. in Journ. Acad. Philad.*** **»•** (1847) 173.—Calif.
ramosissimum, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (I" nomen.—Peruv.
ramosum. Lam. Fl. Fr. ii. 65= uliginosum. —i—
ramosum, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) "*- Chili.
ramosum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. **(1845)** Helichrysum ramosum.
ramulosum, Sch. Bip. 1. c 169 - HeUehrysum » losum.
rectum, C. A. Mey. Verz. PH. Cauc 77- n- supinum.
rectum, Sm. Engl. Bot. t. 124 = sylvaticum.
recurvatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) Helichrysum recurvatum.
recurvum, Lam. Encyc. ii. 746 = Anaxeton reenrv"
redolens, **Forst. f. Prod. 91** ***(-MonentelesredoW*** N. Caled.
Regnellii, Sch. Bip. in Unnaea, xxx. (1859-«°) cheiranthifolium.
Reinwardtianum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii- 91 album.

GNAPHALIUM:—
repandum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum scabrum.
repens, Hontt. Handleid. vi. 67. t. 81. f. 1 (= *Trichogyne refiexa).*—Afr. austr.
repens, *Linn. Mant.* ii. 288.—Afr. anstr.
rcsedacfolium, *Tausch, in Flora,* xvi. (1888) 123.—Chili.
mticulatum, Sprang. Syst. iii. 471 - Hclichrysnm reticulatnm.
retortum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 - Hclichrysum retortum.
retrorsum, Boj. ex DC. Prod. vi. 207 = Helichrysum retrorsum.
retusum, Lam. Encyc. ii. 768 - Facelis apiculata.
retusum, Poepp. ex DC. Prod. vi. •284=purpureum.
revolutum, Thunb. Prod. PI. Cap. ISO = Helichrysum revolatum.
rhodanthum, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 810.—Mexic.
Kedelianum, Klatt, in Linnaea, xlii. (1878-79) 115 = cheiranthifolium.
"igidulum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum rigidulnm.
rlgidum, Salisb. Prod. 1U2 = Anaxeton arborcum, Metalasia adunca.
ngidum, Stead. Nom. ed. II. i. 695 = Helichrysum striatum.
rivularc, *Phil, ex Klatt, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) W121Cpiii. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 102-Hoppeanum.
roseo-ru/escens, Steud. Nom. ed. II. i. 695—pnrpureum.
roseum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 81.—Mcxic.
"osmarinifolium, Salzm. ex Nym. Comp. 382 - Hclichrysnm angustifolium.
••*osmarinifolium,* Sieber, ex Spreng. Syst iii. 472 "• Helichrysnm diosmifolium.
rosum, Berg. Desc. PI. Cap. 260 - Helichrysum rosum.
rotundifolium, Thunb. Prod. PI. Cap. 152 = Helichrysum rotundifolium.
Roxburghianum, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 421 = luteo-album.
rubellum, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 - Helichrysnm rubellum.
'"*fescens,* H. B. & K. Novt Gen. et Sp. iv. 78 = Achyrocline rufescens.
mfescens, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 802.—Hispan.
r"/*um,* Willd. ex Less, in Linnaea, vii. (1832) 230-Achyrocline satureioides.
"*gulosum,* Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1846) 172 = Helichrysum rugulosum.
r-*pest,e,* Boiy, ex DC. Prod. vi. 173 - Helichrysum cespitosum.
'"*pestre,* Poir. ex Nym. Consp. 881 = Helichrysum decumbens.
r»*pestre,* Rafin. Prec. Decouv. 41 = Helichrysum mpestre.
T"*picol„* Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171-Helichrysum rnplcolum.
Ru*Ppelli,* Frescn. in Mus. Senckenb. i. (1833) 79. t. 4. •• 1 = Ifloga Fontanesii.
r«*tidolepis, Sch.* Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum rutidolepis.
r«*tilans,* Linn. Sp. PI. 854 = Helichrysum rutilans.
•va«o/o«»«, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum salicifolium.
ran<lwicensium, *Caudich. in Freyc. Voy. Bot.* 466.—Jns. Sandvic.
"*QHguineum,* Linn. Cent. PI. i. 27; Amoen. Acad. iv. '•"•Helichrysnm sanguineum.
s"*t«reioides,* Lam. Encyc. ii. 747 - Achyrocline satufeoides.
""'"*ejoefolium,* Berg, ex Moench, Meth. Suppl. 286-Metalasia muricata ?
"*turejaefolium,* Poepp. ex DC. Prod. vi. 220-Achyrocline satureioides.
St*atil„* Blume, Biidr. 899 = Antennarin saxatilis.
""*xatile.* Linn. Sp. PI. 867 = Phagnalon saxatile
scabrum. Linn. 1. c. 855 = Leontonyx tomentosus.
'«*»•«», Thnnb. Prod. PI. Cap. 150-Helichrysum Scahrum.
scandem, Sieber, ex DC. Prod. vi. 182 = Helichrysnm cnlnm.
Sch<*mperi,* Sch. Bip. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 341 or A«hyrocline Schimpcri.
ftchomlnirRkii, *Seh. Bip. in Schomb. Faun. V Fl. Cut.* "37, nomen.—Guian.

GNAFHALITTM:—
Schraderi, *DC. Prod.* vi. 225.—Am. ?
sclerochlaenum, Sch. Bip. ex Schwcinf. Beitr. Fl. Aethiop. 149. n. 778 - Achyrocline sclerochlacna.
scoparium, Schrank, in Denkschr. Akad. Mnench. viii. (1824) 160 = Helichrysum terelifolium.
scorpioides, Poir. Encyc. Suppl. ii. 808 = Helichrysum scorpioides.
sedoides, *Klatt, in Linnaea,* xlii. (1878-79) 135.—Peruv.
Seemanni, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 809 = Chionolaena corymbosa.
selaginifolium, Boj. ex DC. Prod. vi. 217 *{ = Aphclexis selaginifolia).*—Madag.
semiamplexicaule, *DC. Prod.* vi. 228.—Mexic.
semidecurrens, Wall. Cat. n. 2947=Aniphalis araneosa.
semipapposum, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 42. t. 187 = Helichrysum semipnpposum.
sericeum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moso. xxiv. (1851) II. 83 = indutum.
seriphioides, Berg. Dcsc. PI. Cap. 267 (= *Trichogyne seriphioides).*—*Mr.* austr.
serotinura, *Reichb.f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 30. t. 952.—Europ.
serpillifolium; Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 158 = se(1.?
serpyllifolium, Berg. Dcsc. Cap. PI. 250 = Helichrysum serpyllifoHum.
serpyllifolitun./Pemy, *in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 283.—Ins. J. Fernand.
serratum, Linn. PI. Rar. Afr. 19; Amoen. Aead. vi. U8 = Helichrysum cymosum, maritimiim.
serratum, Thunb. Prod. PI. Cap. 149 = Helichrysum felinum.
sessile, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 25 •> Helichrysum expansum.
siculum, Spreng. Syst. iii. 476 = Helichryium cespitosum.
siculum, Tcnorc, Syll. Fl. Neap. 425 - Helichrysnm Stoechas.
siculum, Tineo, Cat.]'l. Hort. Panorm. 278 = Helichrysum angustifolium.
Sieboldianum, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. i. 241-Leontopodium japonicum.
simillimum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172-Hclichrysum simil'imum.
simplex, Boenn. Prod. Fl. Monast. 249 = Filago arvensis.
simplex, A. Rich. & Less. Fl. Nov. Zel. 237=collinum.
simplicicaule, Wall. Cat. n. 2946 = Anaphalis contorta.
simplicicaule, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 481.— Venezuela.
Sinclairii, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 153.—N. Zel.
sinuatum, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 497.-^-Cochinch.
solidaginoides, Poir. Encyc. Suppl. ii. 805-Blumea solidaginoides.
Sophiae, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 226 = sylvaticum.
serdescens, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 = Helichcysum snrdescens.
sordidutn, Linn. Sp. PI. 853 - Phagnalon sordidnm.
sfadiceum, Gilib. Fl. Litnan, i. 180 - lylvaticum.
spadiceum, Lam. Encyc. ii.763 = Helichrysum rubellum.
spathulatum, Delile, Kl. Egypte,26(J. t. 44-^indicum.
spathulatum, Lam. Encyc. ii. 759 — pnrpurcum.
spathulatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 161 •> Leontonyx spatholatus.
spatulattim, Burm. f. Fl.. Cap. Prod. 25-Helichrysum crispum.
sphacilatum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 66 .-purpurenm.
sphacricum, Pcrr. ex DC. Prod. vi. 230 = luteo-album.
sphacricum, Willd. Enum. Hort. Berol. ii. 867 - japonicum
spicatum, Lam. Encyc. ii. 757*purpureum.
spicatum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 24-Ptero-caulon viruatum.
spicatum, Vahl, Syrab. Bot. i. 70"Ifloga Fontanesii.
spiciforme, Sch. hip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 16a ^ Hclichrysiim spiciforme.
spiciforme, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1865) 116.—Keg. Magellan.
spinosum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1S46) 178 = Helichrysum citrispinum.
splendens, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 476 « viscosum.
splendidum, Thunb. Prod. PI. Cop. 149 = Helichrysnm Bplenditlum.

GNAPHALIUM ;-
Sprcngelii, *Hook, b" Am. Bot. Beech. Voy.* 150.—Am. bor. occ.
squamosum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845)171-Helichrysum squainosum.
squarrosum, Linn. Sp. PI. ed. II. 1196-I.eontonjtx tomentosus.
squarrulosum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum semipapposum.
stachidifolium, Lam. Encyc. ii. 757—purpureum.
Staechas, Auct. vide *Stoechas.*
staehelinoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 = Helichrysum lucilioides.
stellatum, Linn. PI. Rar. Afr. 19; Amoen. Acad. vi. 98 - Helichrysum stellatum.
stenocladum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 161 = Anaxeton arboreum.
stenophyllum, *Oliver (f Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 844.—Afr. trop.
stenopterum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = Helichrysum stenopterum.
Steudelii, *Srh. Bip. ex Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 27.-Abyss.
Stewartii, *C. B. Clarke, ex Hook./. Fl. Brit. Ind* iii. 289.—Keg. Himal.
stipitatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 = — Helichrysum elalum.
Stoechas, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 25 - Helichrysum terelifolium ?
Stoechas, Linn. Sp. PI. 853 ~ Helichrysum Stoechas.
Stoechas, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 44. t. 857 - Helichrysum angustifolium.
Stoechas, Thunb. Kl. Cap. 647-Helichrysum rosum.
stoloniferum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 169 « Helichrysum stoloniferum.
stramincum, *//. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 85.—Mexic.
striatum, Sch. Bip. in Bol. Zeit. iii. (1845) 170-Helichrysum striatum.
strictum, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 110.—Am. bor. occ.
strictum,L&m. Encyc. ii. 747 = Helichrysum splendidum.
strictum, Moench, Meth. 576 = sylvaticum.
strictum, Koxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 424 - indicum.
strictum, Zeyh. ex DC. Prod. vi. 204 = Helichrysum anomalum.
strigosum, Thunb. Prod. PI. Cap. 150 - Helichrysum odoratissimum.
suaveolens, Veil. Fl. Flnm. viii. t. 100-Pluchea Quitoc.
subacaule, Krock, Fl. Siles. Suppl. ii. 802-supinum ?
subdecurrens, DC. in Wight, Contrib. 21 — Anaphalw oblonga.
subdecurrens, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum subdecurrens.
subghmeratum, Scb. Bip. 1. c. 171-Helichrysum subglomeratum.
subrigidum, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 245.—N, Zel.
subttndulatum, Sch. Dip. in Bat. Zeit. iii. (1845) 171 — Helichrysum acuminatum.
suffruticosum, *Phil, in Linnaea,* xxxiit. (1864-65) 165.—Chili.
supinum, Hoppe, in Sturm, Peutschl. Fl. Heft 38 «G. Hoppeanum.
supinum, *Linn. Syst.* ed. XII. 234.—Keg. bor. temp, et arct.
supracanum, Sibth. & Sm.]•"'. Graec. ix. 47. t. 861 — Ifloga Fontanesii.
sylvaticum, *Linn. Sp. PI.* 856.—Europ.; As. bor.
sylvaticum, Sm. Engl. Bot. t. 918-=iiorvegicum.
tenellum, Wall. Cat. n. 21141 = Anaphalis contorta.
Teneriffae, Spreng. Syst. iii. 468 *(= Schizogyne obtusifolia).*—*lia.* Cannr.
tenne, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 83.—Mexic.
tenuieulum, Sch. Dip. in Hot. Zeit. iii. (1845) 172 =• Helichrysum tenuieulum.
tenuifolium, Salisb. Prod. 193-Filago gallicn.
tenuifolium, *Vahl, ex Spreng. Syst.* iii. 470.—Madag.
tephrodes, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 817-Helichrysum tcretifolium.
teretifolium, Linn. Sp. Fl. 854 - Helichrysum teretifolium.
Thomsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 290.—Kec. Himal.
Thuarsii, Spreng. Syst. iii. 478 - pyramidale.
Timmua, Huch.-Hain. ex Spreng. 1. c. 478 = Anaphalis cinnamomea.

OBTAPHAHUM:—
tincium, Thunb. Prod. PI. Cap. 151 = Leontonyx tomentosus.
tomenlosum, Hoffm. ex J. F. Gmel. Syst. 1217 = uliginosom.
Traversii, *Hoot. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 154.—Austral.; N. Zel.
tricostatum, Sieber, ex DC. Prod. vi. 202=Helichrysnm cymosum.
tricostatum, Thonb. Prod. PI. Cap. 151 - Helichrysum tricostatnm.
trifidum, Thunb. 1. c. 150=luteo-album.
trilineatum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 171 = Helichrysum trilineatum.
trinerve, *Forst. f. Prod.* 55; *DC. Prod.* vi. 286.—N.Zel.
triplinerve, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 172 = Helichrysum triplinerve.
uliginosum, C. B. Clarke, Comp. Tnd. 115 = Thorosoni.
uliginosum, *Linn. Sp. PI.* 856.—Europ.; As. bor.
uliginosum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 431 =Unionis.
ulophyllum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 31 = cymatodes.
ulophyllum, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 197 - Helichrysum Zeyheri.
umbellatum, Linn. f. Suppl. 363 — Erythropogon umbellatum.
umbellatum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 161 = Metalasiamuricata.
umbellatum, Willd. Sp. PI. iii. 1861 - Helichrysum teretifolium.
umbraculigerum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1846) 171 — Helichrysum umbraculigemm.
undatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 151 - Helichrysum undatum.
undulaefolium, Reichb. ex DC. Prod. vi. 202 — Helichrysum odoratissimum.
undulatum, *Linn. Sp. PI.* 852.—Afr. austr.
undulatum, Pers. Syn. ii. 418 = bracliypterum.
undulatum, Walt. Fl.Carol. 203 = Pterocaulon pyenostachyum.
uniflorum, *Lam. Encyc.* ii. 752.—Peruv.
uniftorum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 = Phagnalon saxatile.
uniflorum. Pall, ex DC. Prod. vi. 269=Antennaria alpina.
uniflorum. Pall, ex Willd. in Spreng. Syst. iii. 470 = Helichrysum callichrysum.
Unionis, *Sch. Bip. ex Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) I. *Intel!.* 27, nomen; *A. Rick. Tent. Fl. Abyss*, i. 431.—Abyss.
ustulatum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 404 = purpureum.
valdivianum, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 6.—Chili,
valdiviense, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen.—Chili,
valparadiseum, *Phil, in Linnaea*, xxix. (1857-58) 5.—Chili.
Vauthierianum, Sch. Bip. in Linnaea, xxx. (1859-60) 180=-Achyrocline alata.
velutinum, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 468.—Hab.»
verbascifolium, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 150 = Helichrysum grandiflorum.
verticillatum, Linn. f. Suppl. 364 (= *Trichogyne veriicillata).*—Afr. austr.
vestitum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 172 = Helichrysum vestitum.
vestitum, Thunb. Piod. PI Cap. 14S=repens.
Dillosissima, D. Don, Prod. Fl. Nep. 175 = Anaphalis araneosa.
Vira-Vira, *Molina, Sagg. Chil.* 149, 854.—Chili.
virgatum. Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. 189 =japonicum.
virgatum, Linn. Amoen. Acad. v. 405 — Pterocaulon virgatum.
virgineum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 46 = Helichrysum Billardieri.
viscidum, Blume, Bijdr. 900 = Anaphalis viscida.
viscosum, *H. B. b"K. Nov. Gen.et Sp.* iv. 82.—Mexic.
viscosum, Poepp. ex DC. Prod. vi. 223 = cheiranthifolium.
Wahlenbergii, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 696 = Antennaria carpathica.
Webbii, Sch. Bip. in Webb. & Berth. Phyt Canar. ii. 313 - Helichrysnm gossypinum.
Wightianum, DC. in Wight, Contrib. 21 - Anaphalis Wightiana.

GNAPHAIiITJM:—
Wightianum, Thw. Ennm. PI. Zel. 166=Anaphalis cinnamomea.
Wightii, Thw. 1. c 165•Anaphalis Thwaitesii.
Willdenomi, Dietr. ex DC. Prod. vi. 236»japonicum.
Willdenowii, Spreng. Syst. v. 314, Index •= bracteatum.
Wirtgeni, Nym. Consp. 382 = uliginosum.
Wrightii, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 214.—Am. bor. occ.
xanthinum, Sch. Bip. in Bot. Zeit. iii. (1845) 171 » Helichrysum splendidum.
xerantkemoides, Sch. Bip. 1. c. 169 — Helichrysum lancifolium.
xerochrysum, Sch. Bip. 1. c. 171 — Helichrysum xerochrysum.
yedoënse, *Franch. &" Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 404.—Japon.
Youngii, *Hoot./. Handb. N. Zeal. Fl.* 152.-N. Zel.
yuccaefolium, Lam. Encyc. ii. 742 = Helichrysum yuccaefolium.
Zeyheri, Sch. Bip. in Bot. Zeit. Hi. (1845) 171 = Helichrysum Zeyheri.
Zollingeri, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 82 Java.

GNAPHALODES, A. Gray, in Hook. Kew Jonm. iv. (1852) 228. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 321.
condensatnm, *A. Gray, 1. c.*—Austral.
evacinum, Sond. in Linnaea, xxv. (.1852) 520 = uliginosum.
filifolium, *Benth. Fl. Austral*, iii. 678.—Austral,
uliginosnm, *A. Gray, in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 228.—Austral.

GNAPHALODES, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 118 (1768) -XCicropus, Linn. (Compos.).
dentata, Moench, Meth. 569 = M. supinus.
erect a, Moench, 1. c. = M. erectus.

GNAPHALON, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 438 (1858) = Phagnalon, Cass. (Compos.).
calycinum, Lowe, 1. c. 441=P. rupestre.
rupestre, Lowe, 1. c. 439 = P. rupestre.
saxatile, Lowe, 1. c. 438-= P. saxatile.

GNAPHALOPSIS, DC. Prod. vii. 258 (1838) = Hymenatherum, Cass. (Compos.).
micropoides, DC. L c H . Gnaphalopsis.

GNEORUM, G. Don, Gen. Syst. ii. 62 (1832) en. typ.= Cneorum, Linn. (Simarnb.).

GNEFHOSIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1820) 48; Diet. Sc. Nat. xix. 128 (1821). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 320.
CROSSOLEPIS, Less. Syn. Comp. 270 (1832); A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 175.
CYATHOPAPPUS, F. Muell. Fragm. ii. 157 (1861).
LEPTOTRICHE, Turcz. in Bnll. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 78..
NEMATOPUS, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iii. (1651) 150.
TRICHANTHODIUM, Sond. et F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 489.
acicularis, *Benth. Fl. Austral*, iii. 672.—Austral,
arachnoidea, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 1.189.—Austral.
brevifolia, *Benth. Fl. Austral*, iii. 572.—Austral.
Burkittii, *Benth. 1. c.* 670.—Austral.
codonopappus, F. Muell. Fragm. ix. 2 = Angianthus codonopappus.
cyathopappa, *Benth. Fl. Austral*, iii. 571.—Austral,
eriocarpa, *Benth. 1. c.* 570.—Austral,
eriocephala, *Benth. 1. c.* 673.—Austral,
leptoclada, *Benth. 1. c.* 571.—Austral,
macrocephala, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 190.—Austral.
pygmaea, *Benth. Fl. Austral*, iii. 572.—Austral,
skirrophora, *Benth. 1. c.* 570.—Austral,
tenuissima, *Cass. in Bull. Soc. Philom.* (1820) 43 ; *in Diet. Sc. Nat.* xix. 128.—Austral.

GNETTTM, Linn. Mant. i. 18. n. 1278 (1767). *GNETACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 419.
ABUTUA, Lour. Fl. Cochinch. 680 (1790).
ARTHOSTEMA. Neck. Elem. ii. 280 (1790).
THOA, Aubl. PI. Gui. ii. 874. t. 386 (1775).

GKETUM.—
acutatum, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 588.—Sumatra,
africanum, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 73.—Afr. trop.
amazonicum, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. x. (1868) 116.—Am. trop.
apiculatum, Grin. Notul. iv. 30=neglectum.
Brunonianum, Griff, in Lindl. Vcg. Kingd. 233. f. 164 i et in Notul. iv. 30 - G. Gnemon.
cuspidatum, *Blume, Rumphia*, iv. 5.—Sumatra.
dioicum, Leyb. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. x. (1858) 115,116^Leyboldi, amazonicum.
edule, Blume, in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. i. (1834) 161 = scandens.
funiculare, *Blume, 1. c.* 162.—Java.
funiculare, Wight, Ic t. 1955-scandens.
Gnemon, *Linn. Mant.* i. 125.—Malaya.
gnemonoides, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. 12 " scandens.
Griffithii, Part, in DC. Prod. xvi. II. 349 - G. Gnemon.
latifolium, *Blume, in Hoev. &" De Vriese, Tijdschr.* (1884) 162.—Java,
latifolium, Parl. in DC. Prod. xvi. II. 350-scandens.
leptostachyum, *Blume, Rumphia*, iv. 5.—Borneo.
Leyboldi, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. x. (1858) H»—Am. austr.
macrocarpum, *Becc. Malesia.* i. (1877) 182.—Borneo,
macropodum, *Kurt, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 381—Ins. Nicobar.
microcarpum, Blume, Rumphia, iv. 7=neglectum.
microstachyum, *Spruce V Benth. ex Parl. in DC. Prod'* xvi. II. 362.—Bras.
neglectnm.j*Slume, Rumphia*, iv. 6.1.175. f. 2.—Burma; Malaya.
nigrum, *Carr. Conif.* ed. I. 545.—Ind. occ.
nodiflorum, *Brongn. in Duperr. Voy. Bot.* i. 18—Guiana.
malifolium, Poir. Encyc Snppl. ii. 810 = G. Gnemon.
paniculatum, *Spruce, ex Benth. in Hook. Ken Journ-* viii. (1856) 357.—Bras.
polystachyum, Reinw. in Blume, Cat. Hort. Buitent 106 = G. Gnemon.
pyrifolium, Miq. ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 850 * scandens.
Rumphianum, *Becc. Malesia*, i. (1877) 182.—Malaya,
scandens, *Roxb. Hort. Beng.* 66; *Fl. Ind.* iii. 518.-Ind. or.; Malaya.
sylvestre, Brongn. in Duperr. Voy. Bot 12 * G. Gnemon.
Thoa, *R. Br. in King, Narr. Sun. Austral*, ii. 555.—Guian.
Ula, Brongn. in Duperr. Voy. Bot. 12=scandens.
urens, *Blume, in Hoev. V De Vriese, Tijdschr.* i. (1834) 162.—Guian.
venosum, *Spruce ex Benth. in Hook. Kew Journ.* vW-(1856) 358.—Bras.

CHODIA, Linn. PhiL Bot 33 (1751). *THYMELAEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 197.
CANALIA, F. W. Schmidt, Neue u. Selt. Pfl. 3« (1793).
DESSENIA, Adans. Fam. ii. 285 (1763).
EPICHROXANTHA, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. in *V-* Prod. xiv. 580 (1856-57).
NECTANDRA, Berg. Desc. PI. Cap. 131 (1767)-
STRUTHIA, Royen, ex Linn. Gen. ed. II. 164 (1763)-
THYMELINA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 198 (1824).
acerosa, J. F. Gmel. Syst. 633 «juniperifolia.
acutifolia, *Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stock*-(1818) 315.—Afr. anstr.
albicans, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 684.—Afr. austr.
andromedaefolia, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. 1. c. 585» caniflora.
anomala, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 485.—Afr. austr.
argentea, Eckl. & Meissn. in DC. Prod. xiv. 581 anomala.
argentea, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 76.—Afr. austr.
argentea, Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 604 " Lasiosiphon Meissnerianus.
aurea, Steud. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) juniperifolia.
asurea, Burch. ex Meissn. 1. c. 485 =sericea.
biflora, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 76.—Afr. austr.
bifiora, Wikstr. in Vet. Acad. Hanoi Stockh. (W 814 = subulata.
Burmanni, *Eckl. (f Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod-* 588.—Afr. austr.

QWIDIA i—
caespitosa, Eckl. *Sc* Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. «v. 684-nodiflora.
caffra, Eckl. * Zeyh. ex Meissn. 1. c. = strigiUosa.
caffra, Meissn. 1. c. 592 —Laaiosiphon caner.
caniflora, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 440.—Afr. austr.
capitata, Linn. f. Suppl. 224 - Lasiosiphon linifolins.
carinata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 76.—Afr. austr.
Cephalotes, *Lichtenst. ex Meissn. in DC. Prod.* xiv. 581.—Afr. austr.
chrysophylU, *Meissn. I. c.* 584.—Afr. austr.
coeruiea, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. 1. c. 590 - tlusnoides.
coriacea, *Meissn. in, Linnaea*, xiv. (1840) 454.—Afr. austr.
cuneata, Meissn. 1. c. 427 = Lasiosiphon Meissnerianm.
cyanea, *Burch. Trav.* i. 255, 257, nomen.—Afr. austr.
daphnaefolia, Boj. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 149 = Lasiosiphon Bojerianus.
daphnaefolia. Linn. f. Suppl. 225 = Lasiosiphon pubescens, madagascariensis.
daphnoides, Boj. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 696 = praec
decurrens, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 451.—Afr. austr.
denudata, *Lindl. Bot. Reg.* t. 757.—Afr. anstr.
Dregeana, Meissn. in Linnaea, xiv. *(ISIW)* 426 = Lasiosiphon Dregeanus.
tlongata, Eckl. *8c* Zeyh. ex Meissn. in.DC. Prod. xiv. 681 = scabrida.
eriocephala, Meissn. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. Ui. (1841) 292-Lasiosiphon eriocephalus.
filamentosa, *Linn./. Suppl.* 224.—Afr. anstr.
flava, *Lindl. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 697, nomen.—Afr. austr.
fulgens, *Wel-n. Apont.* 548.—Afr. trop.
geminiflora, *E. Mey. ex Meissn. in Linnaea,* xiv. (1840) 441.—Afr. austr.
genistae/olia, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 574 = Cryptadeniaflicaulis.
glandulosa, Hayne, ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 439 = tomentosa.
glauca, Stcud. Nom. ed. II. i. 697 = filamentosa.
grandiflora, Me\ss.u. in DC. Prod. xiv. 582-Cepnalotes.
grandiflora, *Willd. En-urn. Hort. Berol. Suppl.* 21. nomen.—Afr. austr.
grandis, Hort. ex Sims, Bot. Mag. t. 1668 = filamentosa.
Harveyana, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 437.—
Hugelii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 592 = Lasiosiphon eriocephalus.
humilis, *Meissn. 1. c.* 686.—Afr. austr.
imberbis, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew.ed. Π. 11.412 = carinata.
imbricata, *Linn./. Suppl.* 226,-Afr.. austr.
incana, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. . 586 = imbricata.
•nconspicua, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 4S3. *in«Jan* "cardn. in Calc. Jonrn. Nat. Hist. vii. (1847) 456 = Lasiosiphon eriocephalus.
"nolucrata, *Steud. ex A. Hick. Tent. Fl. Abyss.* «. 234—Abyssin.
Juniperifolia, *Lam. Encyc.* ii. 765.—Afr. austr.
* '' « « , Meisso.i? Hook. Lond • Journ. Bot. n (1843) 552 (err. typ. 452) - Lasiosiphon Known.
hevigata, Thunb. PrSd. PL Cap. 7 6 - o P P < > 2 ^ g8
Iinceolata, Lichtenst. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 688 = parviflora.
latifolia, Hort. ex Meissn. in Linnaea. xiv. (1840) 432 = opposititolia.
linoides, *Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockk.* (1818) 816.—Afr. austr.
cropetala, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. (1843) 553 (err. typ. 453) = Lasiosiphon macro-
M *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 448.—Afr.
microce'phala, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 689.-Afr. austr.
»icrophylla, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 482 = Lasiosiphon miciophyllus.
nticolor, Miq. in Flora, xxxii. (1849) 557 = Lanosiphon eriocephalus.
"nnltiflora, *Bartl. ex Meissn. in Linnaea,* xiv. (1B4U, 462.—Afr. austr.

nana, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 583 —sericea.
nana, *Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stacth.* (1818) 316.—Afr. austr.
nodiflora, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 458.—Afr. ausO.
oitusi/alia, Bartl. ex Meissn. 1. c 461 = obtnsissima.
obtusissima, *Meissn. 1. c.* 432.—Afr. anstr.
occideotalis, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 65, nomen. —Hab.?
ochroleuca, Lodd. Bot. Cab. t. 1184 = pinifolia.
oppositifdia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 299-philippinica.
oppositlfolia. *Linn. Sp. PI.* 358.—Afr. austr.
oppositi/olia, Thunb. Prod. PI. Cap. 76 = sericea.
oralifolia, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 466.—Afr. austr.
pachyphylla, Spreng. ex Meissn. 1. c 405 = Cryptadcnia grandiflora.
llida, *Meissn. l. c.* 442.—Afr. austr.
rviflora, *Meissn. l. c.* 458.—Afr. austr.
nicillata, *Lichtenst. ex Meissn. l. c.* 448.—Afr.
penTndra, Thunb. Diss. FrucUf. Sect. Pr. 19 = Lonchostoma obtusiflorum.
phiUppinica, *Meissn. in DC. Prod.* xv. 692.-Ins.
$%8. Eckl. *Be* Zeyh. ex Mehsn. 1. c. 588 = sericea.
pinifolia, *Linn. Sp. PI.* 556.—Afr. austr.
pinifolia, Linn. f. **Suppl. 225 = juniperifolia.**
pinifolia, Wendl. Bot. Beobacht. 15. t. . , ... carinata.
polygalaefolia, Lichtenst. ex Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 463 = parviflora.
polystachya, Berg. Desc. Pl. Cap. 123 = carinata.
priestleyaefolia, Eckl. & Zeyh. ex Meisan. in DC. Prod.
iSS^L **Pl. Cap. 124 = tomentosa.**
linnaea, xiv. (1840) 425 =
Lasiosiphon pulchellug.
punctata, Lm. Encyc. ii. 765= tomentosa, austr.
racei **eobacht. 15.**
radi.
t. 2 f 12 = pinifolia.
scab ***Pl. Cap.* 76.—Afr. austr.**
scab ***Linnaea*, xiv. (1840) 448.—Afr.**
se ***Syst.* ed. XII. 272.—Afr. austr.**
se ***in Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1818)**
315.—Afr. austr.
simplex, Andr. Bot. Rep. t. 70 = carinata.
5m*«« Linn. Mant. i. 67 = juniperifolia, subulate.
fl8471 457-Lasiosiphon eriocephalus.
Soideriana, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 687—Afr.
SpTrfmanni, Martyn, in Mill. Gaxd. Diet. ed. K. n.
sp 2 ! j S ^ «« * - . * . »«—h »v. (1840)
id **462.—A . . UOli** 1. c. 428-Lasioaiphonsplendens.
splendens, Me
stricta, Eckl. *8c* Zeyh. ex Meusn. in DC. Prod. x.v. **590 = setosa.**
stricta, *Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* (1818)
315.—Afr. austr.
strigillosa, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 459.-Afr.
a tr
stypifelioides, *Meissn. I. c.* 453.-A&. anstr.
sufforaau *Meissn. I. c.* 4S0.-Afr. au.tr.
™bula?a,ia».5»rv<Aa.765f^-Afr.austr.
su
<o»>Uta, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv.
i l ' can Me Hook. Lond. Toum. Bot. ii. (1848)
554 (err. typ. 45
tenuiflora, Eckl. & eisan. in DC. Prod. xiv.
577, 579 = Lachnaea Burchellii, dicamoides.
thesioides, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 457.—Afr.
aust
tomen U EckL ex Meissn in Unnaea, xiv. **(1840) 393** =Lasiosiphonanthylloides.
tomentosa EckL* Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. **584 = al icans.**
tomentosa Hook. Mag. t. 2761 =denudata.
tomentosa, *Linn. Sp. PI.* xiv. (1840) 429 =
triplinervis, Meissn. in
Lasiosiphon triplinervis.

ONISIA:—
vesiculosa, Eckl. *8c* Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 559 = Arthrosolen oraatns.
villosa, Meissn. L *c* 594-Lasiosiphon Burchellii.
virescem. Eckl. *8c* Zeyh. ex Meissn. 1. c. 585-denuaata.
virescens, *Wikstr. in Vet. Acad. HandL Stockh.* (1818) 317.—Afr. austr.
Tiridis, Berg. Desc. PI. Cap. 125-juniperifolia.
Wickstroemiana, *Meissn. in Linnaea*, xiv. (1840) 434. —Afr. austr.

GNIDIUM, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 107 (I8S0) sphalm.-CNIDIUM, Cuss. = 8elinvun, Linn. (Urn-**bSlit).**

GNOTEKIS, Rafin. Sylva TeUur. 76 (1838) = Hyptis, Jacq. (Labiat.).
cordata, Kafin. 1. c. = H. suaveolens.
villosa, Rafin. 1. c = H. suaveolens.

GOCHNATEA, Stead. Nom. ed. II. i. 697 (1840) **-seq.**

aOCHNATIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 19. t. 309 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. *8c* Hook. f. ii. 490.
1'ENTAPHORUS, *D.* Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 296.
cinerea, *Griseb.. in Goett. Abh.* xix. (1874) 195.—Keg Argent.
cordata, *Less, in Linnaea*, v. (1830) '263.—Bras,
corymbosa. *Less. I. c.* = Onoseris corymbosa.
discolor, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 350.—Bras,
fascicularis, *D. Don, ex Hook. &* Am. in Hook. Comp. *Bot. Mag.* i. (1835) 108.—Chili.
foliolosa, D. Don, ex Hook. *8c* Am. 1. c. in textu — rigidat
genistoides, Hook. & Am. 1. c. 109 s Cyclolepis genistoides.
glomeriflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 57.—Mexic.
glutinosa, *D. Don, ex Hook. & Am. in Hook. Comp,* *Bot. Mag.* i. (1835) 108.—Chili,
glutinosa, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 334.—Fernv.
hypoleuca, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 67.—Texas.
ilici/olia, Less, in Linnaea, v. (1880) 261 - Anastraphia ilicifolia.
polymorpha, Herb. Berol. ex DC. Prod. vii. 23 = Moquinia polymorpha.
pyrifolia, *D. Don, ex Hook, tf Arn. in Hook. Comp* *Bot. Mag.* i. (1835) 108.—Chili.
revoluta, D. Don, ex Hook. & Am. 1. c. 109-Nardophyllnm revolutum.
rigida, *D. Don, ex Hook, tf Arn. 1. c.* 108.—Chili,
rotundifolia, *Less. Syn. Comp.* 102.—Bras.
spectabilis. Less, in Linnaea, v. (1830) 261 = Leicomeris spectabilis.
vemonioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 20.- Bras.

GODETIA, Spach, Hist. Veg. Phan. iv. 386 (1835) = Oenothera, Linn. (Onagrar.).
albescens, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 61-Oe. albescens.
ambigua, PhiL in Anal. Univ. Chil. ii. (1865) 327.-Chili.
amoena, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. HI. 287 ; Iilja, in Linnaea, xv. (1841) 265 = Oe. amoena.
Arnottii, Walp. Rep. ii. 88 = Oe. decumbens.
biloba, S. Wats, in Bot. Calif, i. 231 = Oe. biloba.
Bottae, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 393 = Oe. Bottae.
Cavanilleai, Spach, Hist. Veg. Phan. iv. 890 - Oe. tenella.
dasycarpa, Phil, in Linnaea, xxx. (1859-60) 187.—**Chili.**
decumbens, Spacb, Hist. Veg. Phan. iv. 388 « Oe. decumbens.
epilobioides, S. Wats, in Bot Calif, i. 231-Oe. epilobioides.
Gayana, Spach, in Nouv. Ann. Mas. Par. iv. (1835) 391 = Oe. Gayana.
grandiflora, Lindl. Bot Reg. (1841) Misc. 61-Oe Whitneyi.
kispidula, S. Wats, in Bot. Calif, i. 231 = Oe. liispidula

GODETIA :—
Lehmanniana, Spnch, Hist. Vég. Phan. iv. 391 = Oenothera amoena.
lepida, Lindl. Hot. Reg. t. 1849 = Oe. decumbens.
Lindleyana, Spacb, Hist. Vég. Phan. iv. 392 =Oe. amoena.
macrantka, Lilja, Tradg. Tidning. (1840); ex cod. in Linnaea, xv.! 1841) 265 = Oe. amoena.
Nivertiana, Gouj. in Rev. Hortic. (1872) 431 = Oe. amoena.
purjmrea, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 237 ; et S. Wats, in Bot. Calif, i. 229 = Oe. purpurea.
quadrivulnera, Spacb, Hist. Vég. Phan. iv. 389 =Oe. quadrivulnera.
Komantowii, Spach, 1. c. 390=Oe. Romanzowii
rubicunda, Lindl. Bot Reg. t. 1856 = Oe. amoena.
sulfurea, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 712.—ChiU.
tenella, Steud. Nom. ed. II. i. 6»7; et S. Wats, in Bot. Calif, i. 280 = 0. tenella.
tenuifolia, Spach, in Nouv. Ann. Mas. Par. iv. (1835) 390 = Oe. tenuifolia.
viminea, Spach, Hist. Veg. Phan. iv. 388 = Oe. viminea.
vinosa, Lindl. Bot. Reg. 1.1880 = Oe. amoena.
Whitneyi x, Hort.—Cf. Flor. Mag. N. S. t. 227.
Whitneyi, T. Moqre, in Flor. & Pomol. (1871) 101 = Oe. Whitneyi.
Willdenowiana, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 387=Oe. purpnrea.
Williamsoni, Dnr. & Hilg. in Pacif. Rail. Rep. v. 7-Oe. Williamsoni.

GODIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 607, in syn. (1841), sphalm. = GOLIA, Adans. = Soldanella, Linn. (Primulac.).

GODIAEUM, Boj. Hort. Mouut. 282 (1837), sphalm. = Codiaeum, Rumph. (Euphorb.).

GODINELLA, Lestib. f. Bot. Belg. ii. 194 (1827) = IiyBimadiia, Linn. (Primal.).

GODMANIA, Hemsl. Diagn. PI. Nov. 35 (1879). *BIGNONIACEAE.*
macrocarpa, *Hemsl. I. c.*—Panama.

GODOVIA, Pers. Syn. i. 467 (1805)=seq.

GODOYA, Ruiz *8c* Pav. Prod. 68. t. 11 (1794). *OCHNACEAE,* Benth. &-Hook. f. i. 319.
antioquiensis, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 5«8.—N. Granat.
gemmifiora. Mart Nov. Gen. et Sp. i. 119 = Blastemanthus gemmiflcrus.
oblonga, Ruiz *8c* Pav. Prod. 58 =obovata.
obovata, *Ruit* Cr *Pav. Syst. Veg.* 101.—Peruv.
spathnlata, *Ruiz if Pav. Prod.* 58.—Peruv.
splendida, *Planch, in Hook. Lond. Jowrn. Bot.* v. (1846) 599.—N. Granat.

GODWINIA, Seem, in Joum. Bot. (1869) 314. t. 96, 97 =Dracontium, Linn. (Aroid.).
Gigas, Seem. L c. 315. t. 96, 97=D. Gigas.

GOEBELIA, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, ii 628 (1872) = Sophora, Linn. (Legumin.).
alopecuroides, Bunge, ex Boiss. 1. c. 628, 629 = S. alopecuroides.
pachycarpa, Bunge, ex Boiss. L c. 629 =S. pachycarpa.

GOEPPEHTIA, Griseb. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 141. *GENTIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 808.
gracilis, *Wright, ex Griseb. Cat. PL Cub.* 180.—Cuba,
volubilis, *Griseb. in Journ. Linn. Soc.* vi. (186-2) 141.—Cuba.

GOEPPERTIA, Nees, in Linnaea, vi. (1831) 337 (genus spurium\
bicolor, Nees, 1. c. = Maranta bicolor.
blanda, Nees, 1. c—Calathea blanda.
spicata, Nees, 1. c. =Ischnosiphon spicatus.
zebrina, Nees, 1. c.=Calathea zebrina.

GOEPPERTIA, Nees, Syst. Laurin. S65 (1886)-Aydendron, Nees (Laurin.).
anomala, Nees, 1. c. 370.—Bras.
argentea, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 174 = A. argenteumi

GOEPPERTIA :—
oantagallana, Meissn. in DC. Prod. xv. 1.173.—Bras.
caudata, Meissn. 1. c. 175.—Bras.
chrysophylla, Meissn. 1. c. 174.—Bras.
dysodantha, Nees, in Linnaea, xxi. (1848) 514.—Peruv.
geminiflora, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 175.—Bras.
hirsuta, Nees, Syst. Laurin. 366 = Cryptocarya hirsuta.
longifolia, Nees, 1. c. 368.—Peruv.
macrocalyx, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 174.—Bras.
multiflora, Miq. Stirp Surin. Sel. 203=Ampelodaphne dasyantha.
panicularis, Nees, Syst. Laurin. 368.—Bras.
polyantha, Meissn. in DC. Prod. xv. 1.175.—Bras.
reflectens, Nees, in Linnaea, xxl (1848) 514.—Guian.
sericea, Nees, Syst Laurin. 369»Aydendron sericcum.
Sprucei, Meissn. in DC. Prod. xv. 1.172.—Bras.

GOETHEA, Nees, in Flora, iv. (1821) 304; Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 91. t. 8. *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 206.
SCHOUWIA, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) 717.
alnifolia, *Garcke, in Eichl. Jahrb. Berl.* i. (1881) 222, in syn.—Bras.
cauliflora, *Nees, in Flora,* iv. (1821) 804.—Bras.
Mackoyana, *Hook.f. Bot. Mag.* t. 6427.—Bras.
semperflorens, Nees *8c* Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 92=Pavonia semperflorens.
strictiflora, *Hook. Bot. Mag.* t. 4677.—Bras.

GOETZEA, Reichb. Consp. 204 (1828)=Bothia, Pers. (Legumin.).

GOETZEA, Wydl. in Linnaea, v. (1830) 423. t. 8. *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1244.
amoena, Griseb. Cat PL Cub. 191, partim=Espadea amoena.
elegans, *Wydl. in Linnaea,* v. (1830) 423. t. 8.—Ins. Porto Rico.

GOETZIA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1870) 192 -praec.

GOHORIA, Neck. Elem. i. 172 (1790)=Ammi.Toum. (Umbellif.).

GOLDBACHIA, DC. Syst. ii. 576 (1821). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 101.
laevigata, *DC. I. c.*577.— As. Min.; Persia; Ind. or.
tetragona, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1822) 9; Fl. Ross. i. 215=laevigata.
torulosa, DC. Syst. ii. 577 = laevigata.

GOLDBACHIA, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 81 (1821)=Anindinella, Raddi (Gramin.).
Mikani, Trin. 1. c.=A. brasiliensis.

GOLDENIA,Raeusch. Nom. ed. III. 43(1797), sphalm. = Coldenia, Linn. (Boragin.).

GOLDFUSSIA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75, 87 (1832)=-Strobilanthfl8, Blume (Acanth.).
anisophylla, Nees, 1. c. 88 = S. anisophyllus.
bibracteata, Nees, in DC. Prod. xi. 174=S. bibracteatu.
biceps, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 88; et Cat. n. 7161 = S. capitatus.
bracteata, Nees, 1. c. 88=S. quadrangularis.
capitata, Nees, 1. c. = S. capitatus.
colorata, Mor. Syst. Verz. Zoll. 47 = Ruellia colorata.
colorata, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 89 •= S. coloratus.
crinita, Nees, in DC. Prod. xi. 176=S. coloratus.
Cusia, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 88=S. flaccidifolius.
Dalhousiana, Nees, in DC. Prod. xi. 174-S. Dalhousianus.
decurrens, Wight, Ic. t. 1522=S. decurrens.
discolor, Nees, in DC. Prod. xi. 172-S. discolor.
divaricata, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 89-S. divaricatus.
Edgeworthiana, Nees, in DC. Prod. xi. 173 - S. angustifrons ?
exttnsa, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 88=S. extensus.
fili/ormis, Nees, in DC. Prod. xi. 176 = S. filiformis.
flexuosa, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 88 = S. pentstemonoides.
glomerata, Nees, 1. c.=S. glomeratus.

GOLDFUSSIA:—
isophylla, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 88; et Cat. n. 7162 = StrobilantheS isophyllus.
lamii/olia, Nees, 1. c. 88 = S. lamiifolius.
Leschenaultiana, Nees, in DC. Prod. xi. 172 = S. foliosus, Zenkerianus.
Myrtinia, Nees, 1. c. 174 = S. lanceolatus.
nutans, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 88 = S. nutans.
paniculata, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. (1836) 813 = S. alatus, *Blume.*
pentastemonoides, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 88 -S. pentstemonoides.
sessilis, Nees, in DC. Prod. xi. 172-S. rhombifolius.
Tkomsoni, Hook. Bot. Mag. t. 5119 =S. Wallichii.
tristis, Wight, Ic. t. 1508 = S. tristis.
Zenkeriana, Nees, in DC. Prod. xi. 172 = S. Zenkerianus.
Zenkeriana, Wight, Ic. 1.1517=S. efflatus?

GOLIA, Adans. Fam. ii. 281 (1763) = Boldanello, Toum. (Primnl.).

GOLOWNINIA, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. iv. (1862) 25-2 = Crawfurdia, Wall. (Gentian.).
japonica, Maxim. 1. c = C. fasciculata.

GOMARA, Adans. Fam. ii. 248 (1763)=Craasula, Dill-

GOMABA, Ruiz *8c* Pav. Prod. 93. t 19 (1794)-*SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 941.
racemosa, *Ruiz & Pav. Syst. Veg.* 162.—Peruv.

COM ARIA, Spreng. Gen. ii. 487 (1831)=praec.

GOMESA, R. Br. in Bot. Mag. t. 1748 (1815). *ORCHIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 565.
MATURNA, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 99 (1836).
chrysostoma, *Hoffmgg. Verz. Orch.—Cf. Bot. Zeit.* (1843) 832.—Bras,
crispa, *Klottsck, ex Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 772.—Bras.
Fischeri, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 21 i *et in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. vi. (1856) 376.—Hab. ?
foliosa, *KlotBsch, ex Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 772.—Bras,
intermedia, *Hoffmgg. Vere. Orch.—Cf. Bot. Zeit.* (1843) 832.—Bras.
laxiflora, Klotzsch, ex Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1862) 772 = chrysostoma.
pauciflora, *Hoffmgg. Vert. Orch.—Cf. Bot. Zeit-* (1843) 832.—Bras,
planifolia, *Klotzsch, ex Reichb. f. in Bot. Zeit.* *-(1852) 772.—Bras,
reclinata, *Hoffmgg. Vert. Orch.—Cf. Bot. Zeit.* (1843) 832.—Bras.
recurva, *R. Br. in Bot. Mag.* t. 1748.—Bras.
recurva, Lodd. Bot. Cab. t. 660 = planifolia.
sessilis, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 143.—Bras.
stricta, Spreng. Syst. iii. 730=Rodriguezia stricta.
tenuiflora, Lodd. Bot. Cab. t. 806 = Notylia punctate,
undulata, *Hoffmgg. Verz. Orch.—Cf. Bot. Zeit.* (1843) 833.—Bras,
virescens, *Hoffmgg. II. cc.*—Bras.

GOMESIA, La Llave, Reg. Trin. Mex. (1882) 40; <* DC. Prod. vii. I. 2B2 (1838), nomen (Compos.) (Quid ?).—Cf. Benth. & Hook. f. ii. 223.

GOMESIA, Spreng. Syst. iii. 729 (1826)= Gomes* R. Br. (Orchid.).

GOMEZA, Lindl. Orch. Seel. 15 (1826)-praec.

GOMEZIA, Bartl. Ord. Nat. 58 (1830)=praec.

GOMEZIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 223 (1873)-GOMESIA, La Llave (Compos.).

GOMIDESIA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) «-Myrcia, DC. (Myrtac).
amplexicaulis, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 13 = amplexicaulis.
anacardiaefolia, Berg, 1. c. 15 »M. anacardiaefoli»-
Aubletiana, Berg, 1. c. 27.—Bras.
banisteriaefolia, Berg, 1. c. 23-M. banisteriaefolw-
Beyrichiana, Berg, 1. c. 25.—Bras.

GOMIDESIA:—
Blanchetiana, Berg, in Mart. Fl. Bra*, xw..1.14.-Bras.
Brown'iana, Berg, 1. c. 18=Myrcia Browmana.
Cambessedeana, Berg, 1. c. 24.—Bras.
Candolleana, Berg. 1. c. 17.—Bras.
Casaretleana, Berg, 1. c 20.—Bras.
Chamissoeana, Berg, 1. c. 11.—Bras.
Clauseniana, Berg, 1. c. 23.—Bras.
crocea, Berg, 1. c. 583.—Bras.
eriocalyx, Berg, 1. c. 25 = M. eriocalyx.
Fentliana, Berg, 1. c. 20.—Bras.
Freyreissiana, Berg, 1. c. 19.—Bras.
Gardneriana, Berg, 1. c 22.—Bras.
Caudichaudiana.Berg, 1. c. 27.—Bras.
Haenkeana, Berg, 1. c 515.—Bras.
Hartwegiana, Beig, L c. 22.—Bras.
hebepetala, Berg, 1. c. 18.—Bras.
Hilariana, Berg, 1. c. 26.—Bras.
Hookeriana, Berg, 1. c. 18.—Bras.
Jacquiniana, Berg, 1. c. 17.—Bras.
KlotBschiana, Berg, 1. c. 634.—Bras.
Kunthiana, Berg, 1. c. 23 = M. Kunthianal
Ungsdorffii, Berg, 1. c. 5S1.-Bras.
Undeniana, Berg, in Linnaea, xxix. (1857-68) SOB.—Cuba.
Linkiana, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 16 - M. Linkiana.
magnifolia, Berg, 1. c. 531.—Bras.
Martiana, Berg, 1. c. 12.—Bras.
Mikaniana, Berg, 1. c. 21.—Bras.
Miqueliana, Berg, 1. s. 24.—Bras.
Poeppigiana, Berg, 1. c. 14.—Bras.
Pohliana, Berg, 1. c. 16.—Bras.
Raddiana, Berg, 1. c. 26.—Bras.
Regeliana, Berg, 1. c 535.—Bras.
reticulata. Berg, 1. c.*16 = M. reticulate? *Cambess.*
Riedeliana, Berg, 1. c. 532.—Bras.
Schaueriana, Berg, 1. c. 18.—Bras.
Sellowiana, Berg, 1. c. 21.—Bras.
Sonderiana, Berg, 1. c. 533.—Bras.
spectabilis, Berg, 1. c. 12-M. spectabilis.
Sprengeliana, Berg, 1. c. 21.—Bras.
Springiana, Berg, 1. c. 18.—Bras.
Spruceana, Berg, 1. c. 534.—Bras.
Widgreniana, Berg, 1. c. 26.—Bras.
Willdenowiana, Berg, 1. c 19.—Bras.

GOMIDEZIA, Benth. *Sc* Hook. £ Gen. i. 716 (1865) = praec.

GOMOKTBOA, Ruiz & Pav. Prod. FL Per. 62- »• (1794). *INC. SED.*, Benth. & Hook. f. ui. 149.
ADENOSTEMUM, Pers. Syn. i. 467 (18°5)-
KEULIA, Molina, Sagg. Chil. ed.lL 1»
nitida, Jhii b" Pa*. «. /»«•. iv. t. 397; *Syst. Veg.* "»• —Peruv.

GOMOSIA, Lam. Encyc. ii. 789 (1786) = GOMOZIA, Mntis-Nortera, Banks *Sc* Soland. (Rubiac).

GOMOTRICHE, Turcz. in Bnll. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 37=Trichinium, R. Br. (Amaiant.).
tomentosa, Turcz. 1. c.-T. obovatum.

WJMOZIA, Mutis, ex Linn. £ Suppl. 17 (1781)-Hertera, Banks Sc Soland. (Rn bia
«»«««„„;Mtib. in Hist. Nat. PL xui. [1805]384-K.
Mutis, ex Linn. £ Suppl. 1»-N. depressa.

QOMPHANDBA, Wall. Cat. nn. 8718,7204 (IMMil; «t in Lindl. Nat. Syst. ed. II. 439 (1B36> OL.1:
C1NEAE, Benth. & Hook. f. i. !»•
STEMONURUS, Blume. Bijdr 648 P825), partim.
affini ;(/xst. in _ #*. /. *Fl. Bnt. Ind.* i. 586.—
ai i , A *«,«. Z>*. *Intercol. Exhib.* 38; *Fragm.* vi. 3, 253.—Austral.
WiUaris, W[1«. *Cat.* n. 3718-Jnd. or.
«pitulata. *Becc. Malesia*, i. (1877) lll.-Malaya.
'oriacea, Wight, Illustr. i. 103=polymorprja.
«««pes, Jltar.' m /to*. /. *Fl. Bnt. Ind.* 1 6B7'— Burma.
Cuningiana *o, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 46.—Ins. Philipp.
laxiflora, kVrf«/, Wian. *Cuming. PhihpP-* 25, 103.— Ins. Philipp.

GOMPHANDKA:—
penangiana, *Wall. Cat.* n. 7204.—Burma; Malaya,
polymorpha, *Wight, Ic.* t. 958.—Ind. or.
prasina, *Becc. Malesia*, i. (1877) 110.—Malaya,
tomentella, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 587.—fiiirnuu

OOMPHIA, Schreb. Gen. i. 291 (1789). *OCHNACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 318.
CITTORHINCHUS, Willd. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 14 (1823).
CORREIA, Veil, in Roeffl. Script. 106. t. 6 (1796).
JABOTAPITA, Adans. Fam. ii. 364 (1763).
MEESIA, Gaertn. Frnct. i. 344 (1788).
OURATEA, Aubl. PL Gui. i. 897. t. 152 (1775), nomen prius.
PHILOMEUA, Noronha, ex Thou. Gen. Mod. 17 (1806).
URATBA, J. F. Gmel. Syst. 677 (1791).
WOLKENSTEINIA, Regel, Gartenfl. xiv. (1865) 131. t. 471.
acuminate, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 419.—Bras.
aemula, Pool, PI. Bras. Desc. ii. 120 » cuspidata.
affinis, *Hook.f. in Hook. Niger Fl.* 274.—Afr. Hop.
alaternifolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 339.—Cuba,
amplexicaulis, *O. Hoffm. Serf. Madag.* 9.—Madag.
anceps, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (18841 330. —Madag.
angulata, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 415.—Madag.
angustifolia, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 49.—lnd. or.; Malaya,
aquatica, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 14.—Venezuela,
arguta, *Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1099, nomen.—Guian.
atropurpurea, *Schniil. Ic.* iv. t. 248.—Hab. ?
australiana, F. Muell. Fragm. v. 29 = Brackenridgia anstraliana.
axillaris, *Oliver, Fl. Trop. Aft.* i. 322.—Afr. trop.
Blanchetiana, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 19.—Am. austr.
brachyandra, Planch. 1. c. 18=parvifolia.
bracteosa, Wawra, Bet. Ergeb. Maxim. Bras. 29 = parviflora.
calophylla, *Hook. /. in Hook. Niger Ft.* 274.—Afr. trop.
Candollei, Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 4=guyannensis.
caracasana, *Planch. I. c.* 9.—Venezuela,
cardiosperma, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 421.—Guian.
cassinefolia, *DC. I. c.*—Bras,
castaneaefolia, *DC. 1. c.* 417.—Bras.
ceylanica, Spreng. Syst. ii. 818 = angustifolia.
Claussenii, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 16.—Bras,
coccinea, *Mart, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 811.—Bras.
conduplicata, *Klotosch, ex Engl. 1. c.* 344.—Bras,
confertiflora, *Pohl, PI. Bras. Desc.* ii. 117.—Bras,
congest!, *Oliver, Ft. Trop. Afr.* i. 322.—Afr. trop.
crassifolia, *Pohl, PI. Bras. Desc.* ii. 128.—Bras.
crenata, Spruce, ex Engl. in Mart. FL Bras. xii. II. 319 = acuminate.
curvata, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 68.—Bias,
cuspidate, *St. Hil. 1. c.* 67—Bras,
decora, *Hort. in Rev. Hortic.* (1879) 311.—Bras.
decorans, Lem. Jard. Fleur. iv. t. 415 = olivaeformis.
deltoidea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 265.—Madag.
densiflora, Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bias. xii. n. 319 "acuminate,
dependens, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 415.—Madag.
divaricata, Pohl, ex Engl in Mart. Fl. Bras. xii. II. 309 " castaneaefolia.
divaricata, Pohl, ex Engl. 1. c. 324=semiserrata.
Duparquetiana, *Baill. Adansonia*, ix. (1868-70) 77.—Afr. trop.
dura, *Klotesch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1099, nomen.—Guian.
elliptica, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 340.—Abyssin.
elongate, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 821.—Afr. trop.
erythrocalyx, Spruce, ex Engl. in Man. FL Bias. xii. II. 336"inundate.
Fieldingiana, *Gardn. in Field, (r Gardn. Sert. PI.* t 35.—Brai.

GOMPHIA:—
Finlaysoniana, *Wall. Cat.* n. 6392.—lnd. or.
flava, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL 216-ieticulata.
floribunda, *St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 64 Bras.
gigantophyUa, *Erhard, in Flora*, xxxii. (1849) 250.—Bras.
glaberrima, *Beauv. Fl. Owar.* ii. 22. t. 71.—Afr. Uop.
glaucescens, *St. Hil. Ft. Bras. Mer.* i. 68.—Bras,
glomerate, *J-'ohl, PI. Bras. Desc.* ii. 122.—Bras,
grandiflora, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 420.—Bras,
grandifolia, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 4.—Bras.
guianensis, Auct. vide guyannensis.
Guildingi, Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 12=nitida.
guyannensis, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 108.—Am. trop.
hexaspenna, *St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 61.—Bras.
Hookeri, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 3.—Ins. Penang.
humilis, Mart, ex Engl. in Mart. Fl. Bias. xii. n. 330 =spectabilis.
humilis, *St. Hil. Ft. Bras. Mer.* i. 66.—Bras,
ilicifolia, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 418.—Ins. S. Doming,
inundate, *Spruce, ex Engl. in Mart. Ft. Bras.* xii. II. 836.—Bras.
isophylla, *Garcke, in linnaea.xm.* (1849)57.—Guian.
iteodes, Erhard, in Flora, xxxii. (1849) 251->stipulacea.
Jabotapita, *Sw. Fl. lnd. Occ.* ii. 740.—Am. trop.
jamaicensis, Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 11 = guyannensis.
Jurgensenii, *Planck. I. c.*—Mexic.
laevigata, Vahl, Symb. Bot. ii. 49=obtusifolia,
lanceolate, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 330.—Madag.
lanceolate, *Pohl, PI. Bras. Desc.* ii. 117.—Bras.
latifolia, Erhard, in Flora, xxxii. (1849) 243 = Fieldingiana.
laurifolia, *Sw. Ft. lnd. Occ.* ii. 741.—lnd. occ.
linearis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 359. t. 41 = wtipulacea!
longifolia, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 417.—lnd. occ.
lncens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* viL 249.—N. Granat.
lucidula, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxii. (1859) I. 275.—Bras.
macranthos, Erhard, In Flora, xxxiL (1849) 248-cassinefolia.
macrocarpa, Hook. £ in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 2=reticulata.
macrophylla, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 821=reticulata.
macrostachys, Mart, ex Erhaid, in Flora, xxxii. (1849) 246=Fieldingiana.
Magdalenae, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat,* Ser. IV. xviii. (1862) 273.—N. Granat.
magnoliaefolia, *Zipp. ex Span, in Iinnaea*, xv. (1841) 186, nomen Ins. Timor.
malabarica, DC. in Ann. Mus. Par. xvii. (1811) 416-angustifolia.
Mannii, *Oliver, Ft. Trop. Afr. i.* 321.—Afr. trop.
membranacea, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 274.—N. Granat.
mexicana, *Humb.* b" *Bonpl. PI. Aequin.* ii. 21. t. 74.—Mexic,
micrantha, Hook. £ in Joum. Linn. Soc. vi. (1862) 8-reticulata.
microdonta, *Benth. in Hook. Kev Journ.* iii. (1851) 871.—Bras.
Miersii, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 5.—Bras.
multiflora, *Pohl, PI. Bras. Desc.* ii. 121.—Bras.
multiflora, Walp. Ann. i. 181-Ochna multiflora.
nana, *St. Hil. Ft. Bras. Mer.* i. 66.—Bran,
nervosa, *St. Hil. I. c.* 62.—Bras.
nitida, DC. in Ann. Mus. Par. xvii. (1811) 419 = guyannensis.
nitida, Herb. Madr. ex Wall. Cat sub n. 2802-angustifolia.
obtusifolia, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 416.-Madag.
odora, *Poepp. ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 334. —Bras.
oleaefolia, *St. Hil. PI. Rem. Bris.* i. 124.—Bras,
olivaeformis, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 67.—Bras.

GOMPHIA:—
ovalis, *Pohl, PI. Bras. Desc.* ii. 118.—Bras.
ovata, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Ft. Gut.* 1189, nomen.—Gnian.
parviflora, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 420.—Bras.
. *parviflora.* Herb. Berol. ex Walp. Ann. i. 183 = SeHowii.
parvifolia, *St. Nil. Ft. Bras. tier.* i. 65.—Bras,
pendula, *Poepp. ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 389.—Bras,
perseaefolia, *Baker, in Journ. Linn. Sec.* xxi. (1884) 830.—Madag.
persist ens, St Hil. Fl. Bras. Mer. i. 62<-semiserrata.
pinetorum, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 87.—Ind. occ.
Pohlii, Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 6=multiflora.
polita, *Presl, Bot. Bemerk.* 82.—Bras,
polyantha, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* S«£r. IV. xviii. (1862) 274.—N. Granat.
pubescens, *St. Hil. & Tul. I. c.* Sér. II. xvii. (1842) 187.—Bras,
pnlchella, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 7.—Bras,
pycnostachys, *Mart, ex Erhard, in Flora,* xxxii. (1849) 246.—Bras,
pyrifolia, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 105.—Ins. Trinit.
racemosa, Stend. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 344 = olivaeformis.
reticulata, *Beauv. Fl. Omar.* ii. 22. t. 72.—Afr. trap,
revoluta, *Wright, ex Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 166.—Cuba.
rotundifolia. *Field, b" Gardn. Serf. PI.* t. 84.—Bras.
ruflduta, Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 20 — Blanchetiana.
rnpununiensis, *Klotssch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1189, nomen ; *et ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 318.—Guian.
salicifolia, *St. Hil. V Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 137—Bras.
Schoenleiniana, Klotzsch, in Abb. Berl. Acad. (1857) 288=reticulata.
Schomburgkii, *Planch, in Hoot. Land- Journ. Bot.* vi. (1847) 21.—Guian.
Sellowii, *Planch. I. c.* 8.—Bras,
semiserrata, *Mart, tf Nees, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1824) 41.—Bras.
sepiaria, Mart, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 345 =cuspidata.
serratula, Pohl, PI. Bras. Desc. ii. 119-hexasperma.
spectabilis, *Mart, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 380— Bras,
squamosa, *DC. in Ann. Mus. Par.* xvii. (1811) 418.—Ind. occ.
stipulacea, *Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 6.—Bras.
stipulata, Planch. 1. c—praec.
suaveolens, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 68.—Bras,
subscandens, *Planch, in Hoot. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 14.—Bras.
subvelutina, Planch. 1. c. 17 - oleaefolia.
subverticillata, Erhard, in Flora, xxxii. (1849) 254 = verti cilia ta.
suffrnticosa, *Bqj. Hort. Maurit.* 67.—Madag.
sumatrana, *Jack, in Malay. Misc.* i. (1820) n. v. 29.—Malaya.
surinamensis, Planch, in Hook. Lond.- Joura. Bot. vi. (1847) 13=subscandens.
Theophrasta, Planch, in Linden, Cat. n. 14 (1859) 8 = gigantophylla.
tomentella, Pohl, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 325=oleaefolia.
Turnerae, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 273=reticnlata.
umbellate, *Hoot./. exA.W. Benn. in Hoot./. Fl. Brit. Ind.* i. 526, nomen.—Ins. Penang.
vaccinioides, *St. Hil.* b" *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvii. (1842) 187.—Bras.
Vasivae, *Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 386.—Bras.
venosa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 163=nervosa.
veiticillata, *Planch, in Hoot. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 21.—Bras.
Vogelii, *Hoot./, in Hoot. Niger Fl.* 272.—Afr. trop.
aeylanica, DC. in Ann. Mus. Par. xvii. (1811) 415 • angustifolia.

GOMPHICHIS, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 446 (1840). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 594.
goodyeroides, *Lindl. I. c.* 447.—Peruv.
valida, *Reichb./. Xenia Orch.* iii. 20.—Bolivia.

GOMPHIMA, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 10 (1836)-Monochoria, Presl (Ponteder.).
vaginalis, Rafin. 1. c.=M. vaginalis.

GOMPHIPUS, Rafin. FL Tellnr. iv. 76 (1836) = Stemodia t, Linn. (Scrophul.).

GOMFHOCAHPUS, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 87. *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 763.
ACERATES, Ell. Sketch, i 816 (1817).
KREBSIA, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 238 (1868).
PACHVCARFUS, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 209 (1837).
POLYOTUS, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 199.
abyssinicus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 557.—Abyssin.
abyssinicus, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 101 = frnticosus.
albens, *Decne. in DC. Prod.* vii. 559.—Afr. austr.
angustifolius, *Link, Enum. Hort. Berol.* L 251.—Mexic.
appendiculatus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 562.—Afr. austr.
arachnoidens, *Fount, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiv. (1867) 250.—Mexic.
arborescens, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 38.—Afr. austr.
asper, *Decne. in DC. Prod.* viii. 561.—Afr. austr.
asperifolius, *Meissn. in Hoot. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 443.—Afr. anstr.
brasiliensis, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 203.—Bras.
brevicusois, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 900.—Afr. austr.
campanulatus, *Harv. Thes. Cap.* i. 61.—Afr. austr.
chironioides, Decne. in DC. Prod. viii. 562=lisianthoides.
concolor, *Decne. 1. c.* 563.—Afr. austr.
cordifolius, *Benth. ex A. Gray, in Bot. Calif,* i. 477.—Calif.
corniculatus, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 901.—Afr. austr.
cornutus, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 824.—Madag.
coronarius, *Decne. in DC. Prod.* viii. 562.—Afr. austr.
crinitns, *BertoLf. in Mem. Acad. Sc. Bolog.* iii. (1851) 253.—Afr. trap,
crispus. *R. Br. in Mem. Wern. Soc. i.* (1809) 38.—Afr. austr.
cristatus, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1888) 325.—Afr. austr.
dealbatus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 563.—Afr. austr.
diploglossus, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) I. 228.—Afr. austr.
drepanostephanus, Hochst. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 110-robustus.
eminens, *Harv. Thes. Cap.* ii. 60. t. 195.—Afr. austr.
eustegioides, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 901.—Afr. anstr.
expansus, *D. Dietr. 1. c*—Afr. austr.
flliformis,T>. Dietr. 1. c. 900 = Asclepias filiformis (in Addend.).
flexuosus, *D. Dietr. 1. c.* 901—Afr. austr.
frnticosus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 88.—Reg. Mediterr.
Gerrardi, *Harv. Thes. Cap.* ii. 59. t. 192.—Afr. austr.
gibbus, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 900.—Afr. austr.
glaberrimus, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 110.—Afr. trop.
gracilis, D. Dietr. Syn. PI. ii. 901 (- *Lagarinthus gracilis).*—Afr. austr.
grandiflorus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 562.—Afr. austr.
hastatus, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 201.—Afr. austr.
humilis, *Decne. in DC. Prod.* viii. 561.—Afr. austr.
hypoleucus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 222.—Arizona.
interruptus, D. Dietr. Syn. PI. ii. 901-Schizoglossnm interruptum.
involucratus, D. Dietr. 1. c. 900 -• Xysmalobium involucratum.
laevigatus, Buch-Ham. ex Decne. in DC. Prod. viii. 563, 646 = Brachystema laevigatum.
lanatus, E. Mey. Comm. PL Afr. Anstr. 202=tomentosus, *Burch.*

OOMPHOCARPTTS:—
linearis, *D. Dietr. Syn. PI. ii.* 901__Afr. austr.
lineolatus, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 826.—Afr. trop.
lisianthoides, *Decne. 1. c.* 825.—Afr. trop.
longifolius, *Spreng. Syst.* i. 849.—Am. bor.
longipes, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 111. t. 75, sphalm.=- Asclepias macrantha.
macer,T>. Dietr. Syn. Pl.ii. 901 (=*Lagarinthus macer).*—Afr. austr.
macroglossus, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) I. 259.—Afr. austr.
M'Kenii, *Harv. Thes. Cap.* ii. 60. t. 198.—Afr. austr.
marginatus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 560.—Afr. austr.
multicaulis, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 901.—Afr. austr.
mnltiflorus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 560.—Afr. austr.
navicnlaris, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 901.—Afr. austr.
niveus, Boj. ex Baker, FL Maurit 228 = cornutus.
nutans, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 275-—Afr. trop.
oxytropis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) I. 259.—Afr. austr.
padifolius, Baker, in Sannd. Refng. Bot. t. 254 (Xysmalobii sp.).—Afr. austr.
pauciflorus, Hochst. & Steud. ex Stead. Nom. ed. II. i. 698 = Glossonema Boveanum.
pauciflorus, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 276 = Asclepias macrantha.
pedunculatus, Decne. in DC. Prod. viii. 558 « Asclepias macrantha.
peltigerus, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 901.—Afr. austr.
physocarpus, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 202.—Afr. austr.
pulchellus, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1838) 825.—Afr. trop.
purpurascens, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 76=Schizonotus purpurascens.
purpurascens, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 38.—Abyssin.
reflectens, *Decne. in DC. Prod.* viii. 563.—Afr. anstr.
revolutus, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 901.—Afr. austr.
rigidus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 568.—Afr. austr.
robustus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 40.—Abyssin.
rubioides, *Kotschy tf Peyr. PI. Tinn.* 29.—Afr. trop.
scaber, *Harv. Thes. Cap.* ii. 58. t. 192.—Afr. austr.
Schimperi, Presl, Bot. Bemerk. 103 = fruticosus.
semilunatus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 89=physocarpus.
sessilis, Decne. in Ann. Sc Nat. Ser. II. ix. (1838) 325-Xysmalobium sessile,
setosus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 38.—Arab.
setosus. Hochst. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 110-fruticosus.
sinaicus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 80=fruticosus.
stenophyllus, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 110.—Afr. trop.
tenuis, D. Dietr. Syn. PI. ii. 900 *(-Lagarinthus tenuis).*—Afr. austr.
tomentosus, *Burch. Trav.* i. 543.—Afr. anstr.
tomentosus, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 477.—Calif,
truncatus, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 901.—Afr. austr.
truncatus, Harv. Thes. Cap. i. 42. t. 67=peltigeros.
nndulatus, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) I. 259.—Afr. austr.
verticillatus, *TurcB. 1. c.* 258.—Abyssin.
virgatus, D. Dietr. Syn. PI. ii. 901 (= *Lagarinthus virgatus).*—Afr. austr.
viridiflorus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 561.—Afr. anstr,
viridiflorus, Spreng. Syst. i. 849 *(=Acerates viridi[1], flora).—Am.* bor.
viridis, Spreng. 1. c. = Asclepiodora viridis.
volutilis, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 2* = Holostemma Rheedianum.

GOMPHOGYNE, Grift". PI. Cantor. 26. t. 4 (18370-*CUCURB1TACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 838.
TRICEROS, Griff. Notul. iv. 606 (1854).
cissifonnis. *Griff. PI. Cantor.* 26. t. 4.—Reg. Him"[1]-.
heterosperma, */Curs, in Journ. As. Soc. Beng-* *"' (1871) II. 68.—Burma.

GOJHPHOIiOBIUM, Sm. in Trans. Linn. Soc. *• (1798) 220. *LEGVM1NOSAE,* Benth. & Hook. *I.* '• 468.
aciculare, Reichb. Ic. Exot. t. 243 =tomentosum.
amplexicaule, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i-* [3e]-'"' Austral.

GOMPHOLOBIUIC :—
aristatum, *Benth. in Enum. PL Hueg.* 29.—Austral.
aspalathoides, A. Cnnn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii.(1888)72=virgatum.
barbigerum, DC. Prod. ii. 105=latifolium.
Raxteri, *Benth. FL Austral,* ii. 48.—Austral,
burtonioides, ***Meissn. in Lehm. PL Preiss.*** **i. 37.—** Austral,
capitatum, ***A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg.*** **t. 1568.—** Austral.
Drummondii, Meissn. in Bot Zeit xiii. (1855) 25 - aristatum.
elliptieum, Labill. Nov. Holl. PI. i. 106. t. 135 = Oxylobium elliptieum.
ericaefolium, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 73 = Burtonia conferta.
fimbriatum, Sm. Exot. Bot i. 113-latifolium.
faliolosum, Benth. in Mitch. Joum. Trop. Austral. 848 = Burtonia foliolosa.
furcellatum, Bonpl. Jard. Malm. 30. t ll^Tacksonia furcellata.
Blabratum, *DC. Prod.* ii. 106.—Austral.
glaucescens, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 346 - grandiflonim.
grandiflorum, Andr. Bot. Rep. t. 642-polymorphum.
grandiflorum, *Sm. Exot. Sot.* i. 7.—Austral.
Hendersonii, Paxt. Mag. Bot.xi. (1844) 103 = Burtonia Hendersonii.
heterophyllum, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Sjrst. ii. 118 * Knightianum.
hirsutum, *Paxt. Mag. Bot.* xvi. (1849) 36.—Austral.
Huegelii, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 29.—Austral.
Jv-mghtianum, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1468.—Austral.
lanatum, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 118» tomentosum.
latifolium, Labill. Nov. Holl. PI. i. 105 = Huegelii.
latifolium, ***Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bet.*** **i. 11805)** 505.—Austral.
naeulatum, Andr. Bot. Rep. t. 427=*grandiflorum.
marginatum, *R. Br. in Ait. Hort. Kem.* ed. II. iii. 11. —Austral,
"ninus, ***Sm. in Kon. &• Sims, Ann. Bot.*** **i. (1805) 505.** —Austral,
nitidnm, ***Soland. ex Benth. Fl, Austral,*** **ii. 48.—** Austral,
obcordatum, ***TurcM. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xxvi.** (1858) I. 268.—Austral.
ovalum, ***Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i.*** **35.—Austral.**
Pedunculate, DC. Prod. ii. 105 - polymorphum.
Pedunculare, Lodd. Bot. Cab. t. 1639 = Huegelii.
pinnatum, ***Sm. in Kon. &• Sims, Ann. Bot.*** **i. (1805)** 505.—Austral.
Polymorphum, *R. Br. in Ait. Hort. Kem.* ed. II. Hi. 11—Austral.
Polymorphum, Sieber, ex Benth. Fl. Austral, ii. 48 = glabratum.
polyzygum, F. Muell. Fragm. iii. 29 = Burtonia Polyzyga.
TOissii, ***Meissn. in Lehm. PI. Preiss.*** **i. 40.—Austral.**
Psoraleae/olium, Salisb. Parad. Lond. t. 6-latifolium.
scabrum, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 250 = Burtonia scabra.
"Hfolium, Sieber, ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 72-grandiflorum.
hhuttleworthii, ***Meissn. in Lehm. PL Preiss.*** **i. 39.—** Austral.
'Parsum, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 72 = polymorphum.
sP>nosum, Labill. Novf Holl. PI. 1. 107. t 136=Jack- *>nia spinosa.
stenophyllum, F. Muell. Fragm. iii. 30 = Burtonia subulata.
sviulata, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 72 = Burtonia subulate.
«»«««<?, Lindl. Bot.Reg. 1.1615-polymorphum.
'rtrathecoides, Sieber, ex DC. Prod. ii. 106 = minus,
tomentosnm, *Labill. Nov. Holl. PL* i. 106. t 134.— Austral,
incinatum, ***A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus.*** >•• (1838) 72.-Austral.
vtf nulosum, Lindl. Bot. Reg. t 1574 = polymorphum.
^outturn, *R. Br. in Ait. Hort Kn>* «!. n. iU. 12._ Austral.
*Ver *color,* Lindl. Bot. Reg. (1839) t. 43. Misc. 45 - Polymorphum.
'irgatum, *Sieber, ex DC. Prod.* ii. 105.—Austral.
v"cidulum, ***Meissn. in Lehm. PL Preiss.*** **i. 89.-** Austral.

GOMPHOPETALUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1841) 537=Angelica, Linn. (Umbell.).
albiflorum, Turcz. L e. 540.—Sibiria.
Maximowictii, F. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. Amur. 126=A. Maximowiczii.
mindifiorum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xvii. (1844) 741.—Sibir. baical.

GOMPHOSIA, Wedd. in Ann. Sc. Nat Se>. III. x. (1848) 14 (Monog. Cinch. 95. t. 26 B) = Ferdinandusa, Pohl (Rubiac).
chlorantha, Wedd. in Ann. Sc. Nat Sir. III. x. (1848) 14.—Peruv.
Goudotiana, Wedd. 1. e.—N. Granat.
laxiflora, Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1853) 232 = ***chlorantha.***
longiflora, Benth. 1. c—Bras.

GOMPHOSTEMA, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 133 (1844) = seq.

GOMPHOSTEMMA, Wall. Cat. n. 2151 (18301); et PI. As. Kar. ii. 12 (1831). *LABIATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1216.
GOMPHOSTEGIA, Reichb. Handb. 189 (1837).
acaule, ***KUTB, ex Hook. /. Fl. Brit. Ind.*** **iv. 696.—** Burma.
chinense, *Oliver, in Hoot. Ic. PL* t. 1468.—China,
crinitum, *Wall. Cat.* n. 2159.—Burma; Malaya,
dichotomum, ***Zoll. if Mor. Syst. Vert. Zoll.*** **54.—Java,**
eriocarpum, ***Benth. in Wall. PL As. Kar.*** **ii. 12.—** Ind. or.
flavescens, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 987 = Cymaria acuminata.
Heyneanum, Wall. **Cat.** n. 2152-strobilinnm.
insuave, *Hance, in Journ. Bot.* xxii. (1884) 231.— China.
javanicum, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 650.—Java,
lucidum, *Wall. Cat.* n. 2166.—Reg. Himal.
macrophyllum, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 9»8 = Leonurus oblongifolius.
Mastersii, ***Benth. ex Hoot./. FL Brit. Ind.*** **iv. 699.—** Reg. Himal.
melissaefolinm, *Wall. Cat.* n. 2157.—Reg. Himal.
melissaefolium, Wall.'.. c. partim - Mastersii.
membranifolium, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 988 = Phlomis rugosa.
multiflorum, Benth. in DC. Prod. iii. 552=parviflorum.
nivenm, *Hoot./. Fl. Brit. Ind.* iv. 697.—Bengal,
nutans, *Hoot. 1. c.*—Reg. Himal.
oblongum, *Wall. Cat.* n. 2154.—Burma.
oblongum, Wight, Ic. t. 1457 = eriocarpum.
ovatum, *Wall. Cat.* n. 2155.—Reg. Himal.
parviflorum, *Wall. 1. c.* n. 2158.—Reg. Himal.; Malaya,
pedunculatum, ***Benth.' ex Hook./. Fl. Brit. Ind.*** **iv. 696.** —Reg. Himal.
petiolare, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 987 = Leonurus javanicus.
philippinarum, *Benth. in DC. Prod.* xii. 551.—Ins. Philipp.
phlomoides, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 649.—Java,
strobilinum, *Wall. Cat.* n. 2151.—Ind. or.; Burma.
Thomsoni, ***Benth. ex Hoot./. Fl. Brit. Ind.*** **iv. 698.—** Reg. Himal.
velutinum, ***Benth. in Wall. PL As. Rar.*** **ii. 13.—Reg.** Himal.
viride. Wall. Cat. n. 2153=strobilinum.

GrOMPHOSTIGMA, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xvi. (1843) 53. *LOGANIACEAE,* Benth. *Si* Hook. £ ii. 792.
incanum, *Oliver, in Hook. Ic. PL* t. 1472.—Afr. austr.
scoparioides, ***Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xvi. (1843)** 53.—Afr. austr.

GOMPHOSTYLIS. Rafin. Fl. Tellur. ii. 80 (1836)- Zygadenus, Michx. (Liliac).
bracteata, Rafin. 1. c = Z. glaucus.
/uscata, Rafin. 1. c.-Z. fuscatus.
paniculata, Rafin. 1. c = Z. paniculatus.

GOMPHOSTYLIS, Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 43 (1830)«Coelogyne, Lindl. (Orchid.).
Candida, Wall, ex Lindl. 1. c.=C. maculata.

GOMPHOTIS, Rafin. Sylva Tellur. 108 (1838) - Thryptomene, Endl. (Myrtac.).
saxicola, Rafin. 1. C.-T. saxicola.

GOMPHRAENA, Jacq. Select. Am. 88 (1768)-**seq.**

GOMPHKEITA, Linn. Gen. ed. I. 69 (1737). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 40.
BRACANTIA, Vand. Fasc. PI. Nov. 6 (1771).
CHNOANTHUS, Phil, in Anal. Univ. Chili (1862), II. 406.
COLUPPA, Adans. Fam. ii. 268 (1763).
NINANGA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 76 (1836).
SCHULTKSIA, Schrad. in Goett Gel. Anz. i. (1821) 708.
WADAPUS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 77 (1886).
XEROSIPHON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 55.
acaulis, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Set. III. vi. (1846) 350. —Bolivia,
affinis, ***F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,*** **v. 264.—** Austral.
aggregata, Hort. Monsp. ex Moq. in DC. Prod. xiii. u. 414 = perennis.
aggregata, Willd. Enum. Hort. Berol. 294 - Philoxerus aggregatus.
agrcstis, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 13. t. 114.—Bras,
albiflora, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 892.-Venezuela.
amaranthoides. Roth, Nov. PI. Sp. 182 = Iresine amarantoides.
angustiflora. *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 19. t 121.— Bras.
angustifolia, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 46.—Ind. or.
aphylla, *Pohl, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. **416.—** Bras.
arborescens, Balb. ex Moq. 1. c. 352 - Altemanthera argentata.
arborescens, *Linn./. Suppl.* 173.—Bras.
argentea, Hort ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 410 = decumbens.
argentina, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 208.—Bras.
bicolor, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 410 = decumbens.
bicolor, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiii. (1826) 300. —Peruv.
Blanchetii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 413.—Bras,
boliviana, *Moq. 1. c.* 401.—Bolivia.
bonariensis, Gill, ex Moq. 1. c. 406 = pulchella.
brachiata, ***Humb. V Bonpl. ex Roem. b" Schult. Syst.*** v. 542.—Venezuela.
brachystylis, *F. Muell. Fragm.* iii. 124.—Austral.
brasiliana. Linn. Cent. PI. ii. 13; Amoen. Acad. iv. 10 — Mogiphanes straminea.
brasiliensis, Hort. Aven. ex Moq. in DC. Prod. xiii. u. 864=Telanthera polygonoides.
brasilunsis, Jacq. Coll. ii. 278=Telanthera dentata.
brasiliensis, Lam. Illustr. ii. 289. t. 180. f. 1 «= ***brasiliana.***
brasiliensis, Linn. Syst. ed. X. 949 - Mophiganes straminea.
breviflora, F. Muell. Fragm. iii. 125-conica.
Brownii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 397.—Auitral.
caespitosa, ***Torr. in • Bot. Mex. Bound.*** **181.—N.** Mexic.
callosa, *Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 571.—Am. austr.
canescens, *R. Br. Prod.* i. 416.—Austral,
celosioides, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiii. (1826) 301.—Bras.
cinerea, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 390 (Pfaffiae sp.). —Hab.?
Claussenii, *Moq. I. c.* 396.—Bras,
coccinea, *Loud. Encyc. PL* 1542.—Mexic.
conferta, *Benth. FL Austral,* v. 267.—Austral,
conica, *Spreng. Syst.* i. 824.—Austral,
correntina, ***Parodi, in Anal. Soc. Client. Argent,*** **vi.** (1878) 39; *Contrib.* 91.—Reg. Argent.
crassi/olia, Spreng. Syst. i. 824-Iresine crassifolia.
Cruds, Vahl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. u. 862 = Telanthera Crucis.
cylindrica, ***Schum. V Thonn Bestr. Guin. PL*** **158.—** Afr. trop.
debilis, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 7.1107.—Bras,
decipiens, *Seub. in Mart. FL Bras.* v. I. 211.—Bras,
decumbens, *Jacq. Hort. Schoenbr.* t 482.—Mexic.
decumbens. Lag. Elench. (1803) 17-boliviana.
demissa, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 4.—Bras.
dentata, Moench, Meth. Suppl. 273 - Telanthera dentata.
denudata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 388 (Pfaffiae sp.).—Bras.
desertorum, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 3. t. 103.— Bras.

GOMPHBENA:—
diffusa, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. It. 410-decumbens.
diffusa, *Spreng. Syst.* i. 824.—Austral.
Dunaliana, *Moq. in DC. Prod.* xiiL II. **384.—**Bolivia,
durinscula, *Moq. I. c.* 404.—Bras.
elata, A. Cunn. ex Moq. 1. c. 282-PtiIotns eonieus.
elegans, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 17. t. 119.—Bras.
elongata, Willd. in Roem. & Schult. Syst. v. S42 = Telanthera elongata.
eriantha, Moq. in DC. Prod. xiii. II. S86 - Hebanthe virgata.
eriophylla, *Mart. Nov. Gen. ei Sp.* ii. 9.1.109.—Bras.
eriopoda. Gill, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 410 = globosa.
exaltata, Delile, ex Moq. 1. c. 420 •= Froelichia floridana.
exaltata, Hort. Par. ex Moq. 1. c. 418-Froelichia floridana ?
exaltata, Hort. Tolos. ex Moq. 1. c. 414 = perennis.
fallax, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 220.—Bras.
ficoidea, Jacq. Select. Am. 88 = Altemanthera frutescens.
ficoidea. Linn. Sp. PI. 225=Telanthera ficoidea.
filaginoides, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1843) 350.—Mexic.
firma, 7. Muell. Fragm. Hi. 123 =flaccida.
flaccida, *R. Br. Prod.* i. **416.—**Austral.
fiaccida, Spreng. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 417 — angustifolia.
flava, *Linn. Sp. PI.* 224.—Mexic.
flava, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 410 = decnmbens.
floridana, Spreng. Syst. i. 824 = Froelichia floridana.
fruticosa, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 377 = Telanthera porrigens.
fulgens, Hort. ex Moq. in DC. 1. c. = Telanthera porrigens.
fusca, Mart, ex Moq. 1. c. 406»scapigera.
Gardneri, *Moq. I. c-* 404.—Bras.
glabrata, Moq. 1. c. 388 = Pfaffia glabrata.
glauca, Moq. 1. c. 884 = Pfaffia glauca.
globosa, *Linn. Sp. PI.* 224.—Geront. trop.
gnaphaloides, Vahl, in Roem. & Schult. Syst. v. 542 = Pfaffia gnaphaloides.
gnaphiotricha, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 34. —Reg. Argent.
gracilis, Mart. *Sc* Gal. in Ball. Acad. Brux. x. (1843) 850 = Telanthera gracilis.
graminea, *Moq. in DC. Prod.* xiii. H. 416.—Bras.
Haageana, *Klottsck, in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* xxi. (1853) 297.—Mexic.
Haenkeana, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiii. (1826) 299.—Perav.
kelichrysoides, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 391 (Pfaffiae sp.).—Bras.
Hilariana, *Moq. I. c.* 393.—Bras.
hirsutissima, Mart, ex Moq. 1. c 406=scapigera.
hirtula, Moq. 1. c. 388-Pfaffia hirtula.
hispida, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 326.—Ind. or.
holosericea, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 886 — Hebanthe holosericea.
Humboldtiana, Roem. & Scbnlt. Syst. v. 540 « Froelichia Humboldtiana.
humilis, *R. Br. Prod.* i. 416.—Austral,
hygrophila, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. Beibl. 66. —Bias.
incana, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 11. t. 112.—Bras.
interrupta, Linn. Sp. PI. 224 = Froelichia lanata.
iresinoides, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 888.—Bras.
jubata, Moq. 1. c. 389 = Pfaffia jubata.
lactea, DC. Cat. Hort., Monsp. 113 = Aerva sanguinolenta.
lanata, R. Br. Prod. 416=Brownii.
lanata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 202 = Froelichia Humboldtiana.
lanata, Poir. Encyc. Suppl. i. 316=Pfaffia tomentosa.
lancifolia, *Pav. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. H. 394.—N. Granat.
lanigera, *Pohl, ex Moq. 1. c.* 406.—Bras,
lanuginosa, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 346.—Ins. Timor,
latifolia, *Mart.* 6" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1843) 849 = Iresine latifolia.
leptoclada, *Benth. Fl. Austral,* v. 255.—Austral,
leucocephala, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 10.1.110.—Bras,
ligulata, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 80.—Reg. Argent.

GOMPHRENA:—
Lundii, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. **403.—**Bras,
luzulaeflora, *Moq. 1. c.* 384.—Bras,
macrocephala, *St. Nil. PI. Us. Bras.* t. 32.—Bras,
macrorhiza, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 6. t. 106.—Bras.
marginata, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 209.—Bras.
Maitlandi, *F. Muell. Fragm.* iii. 124. t. 23.—Austral.
Martians, *Gill, ex Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 400.—Chili.
Martinsiana, Steud. Nom. ed. II. i. 699-angustiflora.
Meyeniana, *Walt, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1848) 404.—Perav.
microcephala, *Moq. in DC. Prod.* xii. H. 894.—Bras.
minima, Pav. ex Moq. 1. c. 414 = leucocephala.
minutissima, Mart, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 211=scapigera.
mollis, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 11. t. 111.—Bras.
Moquini, *Seub. I. c.* 209.—Bras,
mucronata, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 413.—Bras,
nigricans, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 12. tt. 113, 115. f. 1.—Bras,
nitida, *Rothr. in Wheeler, Rep. But. Geogr. Surv.* vi. 283.—Mexic.
officinalis, Mart. Reise Bras. i. 280=arborescens.
oligocephala, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. vi. (1846) 350.—Bolivia.
paniculata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 885 = Hebanthe **paniculata, *Benth. V Hook./.***
parviflora, *Benth. Fl. Austral,* v. 257.—Austral.
patula, Wendl. Bot Beobacht. 43 = Mogiphanes straminea.
Pearcei, *Oliver, in Hook. lc. PI.* t. 1073.—Peruv.
perennis, *Linn. Sp. PI.* 224.—Reg. Argent,
phagnaloides, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 82.—Reg. Argent.
pilosa, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 395.—Mexic.
Pohlii, *Moq. 1. c.* 403.—Bras.
Poiretiana, Roem. & Schult. Syst. v. 541=Pfaffia tomentosa.
polygonoides, Linn. Sp. PI. 225= Telanthera polygonoides.
polypogon, Moq. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 196 =jubata.
procumbens, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 370 = Telanthera obovata.
procumbens, Zuccagni, in Roem. Collect. 184-Alternanthera procumbens.
prostrata, Desf. Tabl. ed. I. 219=decumbens.
prostrata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 5. t. 105.—Bras,
pulchella, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiii. (1826) 302.—Bras.; Reg. Argent.
pulverulenta, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 386 = Hebanthe pulverulenta, *Benth.* to" *Hook./,*
pulverulenta, Moq. 1. c. partim = Hebanthe Hookeriana.
pumila, *Gill, ex Moq. 1. c.* 400.—Reg. Argent,
pungens, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 201.—Bras.
purpurea, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. n. 877 = Telanthera porrigens.
pusilla, *Benth. Fl. Austral,* v. 256.—Austral.
Kegeliana, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 216.—Bras,
reticulata, *Seub. 1. c.* 194.—Bras.
Riedelii, *Seub. I. c.* 212.—Bras,
rodantha, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. **414.—**Bras,
rosea, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 80.—Reg. Argent.
rubra, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 409 = globosa.
rudis, *Moq. I. c.* 402.—Bras.
rupestris, *Nees, in Flora,* iv. (1821) 296, 327—Bras,
scapigera, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 14. tt. 116, 117. f. 1.—Bras.
Schlechtendaliana, *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xiii. (1826) 299.—Bras.
Schultesia, Mart. 1. c. 802=rupestris.
Selloi, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 104=seq.
Sellowiana, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 15. t. 117.—Bras.
sericantha, *Mart. I. c.* 8. t. 108.—Bras.
sericea, Hoffmgg. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 542 = Froelichia sericea.
sericea, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 885.—Ecuador.
sericea, Spreng. Syst i. 823 = Pfaffia sericea.
serrata, *Linn. Sp. PI.* 224.—Am. austr.
serrata, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 410 = decumbens.
sessilis, Linn. Sp. PL 225 = Altemanthera sessilis.

GOMPHRENA:—
Sonorae, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 181.—N. Mexic.
spicata, Lam. Encyc. i. 120 — Froelichia lanata.
spicata, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 887 = Hebanlhe spicata.
stenophylla, Spreng. Syst. i. 823 = Pfaffia glauca.
strigosa, */serf, ex Roem. V Schult. Syst.* v. 542.— Afr. trop.
suffruticosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 33.—Reg. Argent
tenella, *Benth. Fl. Austral,* v. 256.—Austral.
tomentosa, Pohl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 391 = Pfaffia gnaphaloides.
trichotoma, Hort. ex Moq. 1. c. 877 - Telanthera porrigens.
trispicata, Pav. ex Moq. 1. c. 410 = decumbens.
tnberifera, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 181.—N. Mexic.
tuberosa, Spreng. Syst. i. 823 = Pfaffia sericea.
tumida, Seidl, ex Opiz, Natural, n. ix. (1825) *iii"* decumbens j
umbellata, *Remy, in Ann. Sc. Nat.* Sef. III. vi. (1846) 349.—Bolivia.
vaga, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 17. t 120 = Hebanthe vaga.
velutina, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 389 = Pfaffia velutina.
vermicularis, Linn. Sp. PI. 224=Philoxerus vermicnlaris.
villosa, Mart, in Nov. Act Nat. Cur. xiii. (1826) 308 = perennis.
virgata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 16. t. 118.—Bras.
volubilis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 199 = Anredera spicata.
Wallichii, *Hort. Monsp. ex Moq. in DC. Prod.* xiii. »• 418, nomen.—Hab.!

GOMUTUS, Correa, in Ann. Mus. Par. ix. (1807)288. t. 24. f. l = Arenga, Labill. (Palm.).
obtusifolius, Blume, Rumphia, ii. 131, in syn. = A-obtusifolia.
Rumphii, Correa, in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 288 = A. saccharifera.
saccharifer, Spreng. Syst. ii. 624 = A. saccharifera.

GONATANDRA, Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 65» = Campelia, Rich. (.Commelin.).
tradescantioides, Schlecht. 1. c. = C. Zanonia.

GONATANTHTJS. KloUsch, in Link, Klotzsch * Otto, la PI. Rar. i. 33. t. 14 (1840). *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. **974.**
cupreus, Hort. ex C. Koch, Wochenschr. iv. (1861) 141 — Alocasia cuprea.
Griffithii, Schott, Prod. Aroid. 143=Steudnera colocasiaefolia.
omatus, *Schott, in Oestr. Sot. Zeitschr.* (1858) 121 •— Keg. Himal.
peltatus, Hort. ex Van Houtte, in Fl. des Serres, « (1875) 83-Steudnera colocasiaefolia.
sarmentosus, *KloUsch, in Link, Klottsch (f Otto, U-PL Rar.* i. 83.—Reg. Himal.

GONATIA, Nutt. ex DC. Prod. x. 595 (1846)-Gratiola, Rupp. (Scrophul.).
gratioloides, Nutt. 1. c.=Grat. ebracteata.

GONATOCARPUS, Schreb. Gen. i. 86 (1789) * **Haloragis,** Font.
micranthus, Willd. Sp. PI. i. 690 = H. micrantha.

GONATOGYNE, Klotzsch, ex Muell. Arg. in Mart. Fl-Bras. xi. II. 18 (1878) = Savia, Willd. (Euphorb.)-
brasiliensis, Muell. Arg. 1. c. 14.—Bras.
lucens, Klotzsch, ex Baill. Adansonia, v. (1865) 345* praec.

GONATOPUS, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 208 (1879) = Zamioculcas, Schott (Aroid.).
Boivini, Engl. 1. c. 209=Z. Boivini.

GONATOSTEMON, Regel, Gartenfl. xv. (1866) 353-Chirita, Buch.-Ham. (Gesnerac.).
Boucheanum, Regel, 1. c. « C. urticaefolia.

GONEMA, Rafin. Sylva Tellur. 96 **(1888)=OB8«e[a]**-DC. (Melastom.).
divaricata, Rafin. 1. c. = Anplectrum divaricatum-*scabrosa,* Rafin. L c » O . scabrosa.

OOXTGORA, Ruiz & Pav. Prod. 117. t 25 (1794). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 549.
ACROPERA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 172 (1833).
anneniaca, *Reiehb.f. Xenia Orch.* i. 52.—Nicaragua,
aromatica, *Reiehb.f. in Otto &" Dietr. Allg. Garten*.* xxii. ^1854) 281.—Nicaragua,
atropurpurca, *Hook. Exot. Fl.* 1.178.—Ins. Trinit.
Koothiana, *Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch.* i. 54 = odotatissima.
bufonia, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) t. 2.—Bras.
bufonia, Lindl. 1. c (1847) t. 17, partim = quinquenervis.
cassidea, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxii. (1864) 298.—Guatemala.
Charontis, *Reiehb.f. in Linnaea,* xli. (1877) 110.—N. Granat.
Donckelaariana, Walp. Ann. iii. 546 = trnncata.
fulva, Lindl. Dot. Reg. (1839) t. 61=quinquenervis.
galeata, *Reiehb.f. Xenia Orch.* i. 51.—Mexic.
Galeottiana, *A. Rich, b" Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 25.—Mexic.
gratulabunda, *Reiehb.f. in Bot. Zeit.* xv. (1857) 157.—N. Granat.
grossa, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) 1. 781.—Ecuador.
Heisterii, Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 54 = atropurpurea.
histiionica, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1851) 92.—Hab. 1
irrorata, Hoffmgg. Verz. Orch. (1848) 68.—Cf. Bot. Zeit. i. (1848) 833 = bufonia.
7enischii, Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 54 = odoratissima.
leucochila, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. i. (1845) 87. t. 87 = quinquenervis.
macrantha, Hook. Bot. Misc. ii. (1881) 151 = Coryanthes macrantha.
maculata, Lindl. Bot. Reg. t 1616=quinquenervis.
minax, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxiv. (1886) 385.—Am. austr.
nigrita, *Lindl. in Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 59.—Guian.
odoratissima, *Lem. in Fl. des Serres,* Sir. I. ii. (1847) 229.—N. Granat.
philippica, Llanos, in Mem. Acad. Cjenc. Madr. ii. (1859) 498 = Renanthera coccinea ?
pleiochroma, *Reiehb.f. in Hamb. Garten*,* xvi. (1860) 421.—N. Granat.?
I'ortentosa, *Linden V Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 892.—N. Granat.!
ouadricornis, Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 54 = odoratissima.
quinquenervis, *Ruit* b" *Pav. Syst. Veg.* 227.—Peruv.
retrorsa, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 19.—Venezuela.
toccata, Reichb. f. Xenia Orch. i. 52 = Cirrhaea saccata.
ocaphephorus,' *Reichb. f. V Warscw. in Bonplandia,* _, ii. (1854) 98.—Peruv.
Seideliana, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 687.—Hab.?
Shepherdii, Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. i. 64 = odoratissima.
similis, *Reiehb.f. in Gard. Chron.* (1881) II. 812.—N. Granat. ?
speciosa, Hook. Bot. Mag. t. 2755 = Coryanthes speciosa.
Menoglossa, *Reiehb.f. in Bonplandia,* ii. (1854) 93.—Hab.?
fnperflua, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 169.—Ecuador,
tncolor, *Reichb. f. in Bonplandia,* ii. (1854) 93.—Peruv.
truncate, *Lindl. Bot. Reg.* (1848) *Misc.* 42.—Mexic.
mridipurpurea, Hook, in Bot. Mag. t. 2978 = Cirrhaea Loddigesii.
•oiMlina, Hort. ex Reichb. *i.* Xenia Orch. i. 54 = odoratissima.

°ONGRODISCUS, Radlk. in Sitzb. Math-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 603, 607. *SAPINOACEAE.*
Pwyifolius, *Radlk. I. c.* 607.—N. Caled.
sufferrugineus, *Radlk. l.c.—N.* Caled.

O:Na$_{Koira}$**j**$_{MA}$, Decne. in DC. Prod. viii. 624 (18441. *ASCLEP1ADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 770.
"Wenuatum, *Decne. I. c.* 625.—Ind or.
columnare, Decne. 1. c. 624 - nepalense.
f a ? ' 0 1 r i . *Decne. I.c.* 625.—Siarn.
-atifoiiuiu, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 456.—Air trop.

QONGHOffEMA :—
micradenia, *Benth. (f Hook. f. ex F. Muell. Census,* 94.—Austral.
nepalense, *Decne. in DC. Prod.* viii. 624.—Reg. Himal.
recurvifolium, *Walp. Ann.* iii. 62.—N. Guinea.
sagittatum, Decne. in DC. Prod. viii. 624 = nepalense.
ventricosum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 34.—Keg. Himal.
Wallichii, *Decne. in DC. Prod.* viii. 624.—Malaya.

GONGROTHAMNTJS, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 336 (1862). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 487.
divaricatus, *Steetz, 1. c.* 342.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Oliver* b* *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 401.—Afr. trop.
solidaginifolius, *Oliver (f Hiern, I. c.*—Afr. trop.

GOITGYIiOCAHPUS, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 657. *ONAGRARIEAE,* Benth. & Hook, f. i. 793.
rnbricaulis, *Cham. V Schlecht. I. c.* 558.—Mexic.

GONGYLOLEPIS, Schomb. in Linnaea, xx. (1847) 759 = Stifltia, Mikan (Compos.).
Benthamiana, Schomb. 1. c. 760=S. Benthamiana.

GONIANTHES, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 19 (1823) = Buwnannia, Linn.
Candida, Blume, 1. c. 20.—Malaya.
nepalensis, Miers, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 637. t. 88.—Reg. Himal.; China.
pusilla, Miers, 1. c. = B. pusilla.
Wallichii, Miers, 1. c—China.

GONIANTHES, A. Rich, in Fl. Cub. Fanerog. ii. 10 (1853). *RUBIACEAE.*
Lindeniana, *A. Rich. 1. c.*—Cuba.
Sagraeana, *A. Rich. 1. c.* 11.—Cuba.

GONIATICUM, Stokes, Bot. Mat. Med. ü. 338 (1812) = Polygonum, Linn.
solitarium, Stokes, 1. c. = P. orientate.

GONIOCARPUS, Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805)546 = Haloragia, Forst.
citriodorus, A. C-<m. in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) 30 = H. micrantha.
cordiger, Endl. ex Nees, in Lehfh. PI. Preiss. ii. 225 = H. cordigera.
depressus, A. Conn, in Ann. Nat. Hist. iii. (1839) 30 • H. depressa.
micranthus, Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 546 = H. micxantha.
microcarpus, Thibaud, ex DC. Prod. iii. 66 = H. micrantha.
mucronatus, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 225 = H. mucronata.
nodulosus, Nees, 1. c. i. 158 = H. nodulosa.
pithyoides, Nees, 1. c. ii. 225 = H. pithyoides.
rubricaulis, Griff. Notul. iv. 688 = H. macrantha.
salsoloides, Reichb. ex Benth. Fl. Austral, ii. 485 = H. salsoloides.
scaber, Kon. *Sc* Sims, Ann. Bot. i. (1805) 547. t. 12. f. 6 = H. tetragyna.
serfyllifolius, Hook. f. in Hook.Ic PI. t. 290, 311 = H. depressa.
tenellus, DC. Prod. iii. 66 - H. tetragyna.
tetragynus, Lahill. Nov. Holl. PI. t. 53 = H. tetragyna.
teucrioides, DC. Prod. iii. 66 ^ H. teacroides.
trifidus, Nees, in Lehm. PI. Preiss. i. 159 = H. trifida.
vernicosus, Hook. f. in Hook. Ic. PI. tt 290, 311 = H. depressa.

GONIOCAULON, Cass. in Boll. Soc. Philom. (1817) 34. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 472.
glabruin, Caw. *t. c.; et in Did. Sc. Nat.* xirt. 201.—Ind. or.
indicum, C. B.Clarke, Comp. Ind. 236—glabrum.

GONIOCHETON, Blume, Bijdr. 176 (1825)=Dyw>-xylum, Blume (Meliac).
arboreseens, Blume, 1. c. 177 - D. arborescens.

GONIOCHITON, Reichb. Handb. 818 (1837) -praec.

GONIODIUM, Knnze, ex Reichb. Consp. 82 (1828), nomen (Thymel. ?).

GONIOGYNA, DC. in Ann. Sc. Nat. Sir. I. iv. (1825) 91 = Heylandia, DC. (Legnmin.).
hebecarpa, DC. 1. c. 92 = H. latebrosa.
latebrosa, DC. 1. c. = H. latebrosa.
leiocarpa, DC. 1. c.-H. latebrosa.

GONIOGYNE, Benth. & Hook. f. Gen. i. 479 (1865) = praec.

GOB1OMA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 188 (1837). *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 703.
Kamassi, *E. Mey. 1. c.*—Afr. austr.

GONIOPOGON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 173 = Calotte, R. Br. (Compos.).
multicaule, Turcz. 1. c. 174 = C. plumulifera.

GONIOSCHETON, G. Don, Gen. Syst. i. 683 (1831) = GONIOCHETON, Blume •=Dysoxylum. Blume (Meliac).

GONIOSCYPHA, Baker, in Joum. Linn. Soc. xiv. (1875) 581. t. 19. *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 773.
eucomoides, *Baker, I. c.*—Reg. Himal.

GONIOSTEMMA, Wight, Contrib. 62 (1834) = Toxo-oarpus, Wight & Am. (Asclep.).
acuminata, Wight, 1. c = T. acuminatus.

GONIOLIMON, Boiss. in DC. Prod. xii. 632 (1848)-Btatice, Toum. (Plumbag.).
Beckerianum, Janka, in Termész. Füzetek, vi. (1882) 169=S. tatarica?
Besserianum, Nym. Consp. 613 - S. tatarica.
callic'omum, Boiss. in DC. Prod. xii. 633 = S. callicoma.
collinum, Boiss. 1. c. = S. collina.
dalmaticum, Reichb. Ic. Fl. Germ. xvii. 61. t. 149 = S. dalmatica.
elatum, Boiss. in DC. Prod. xli. 634 = S. elata.
eximium, Boiss. 1. c. = S. eximia.
graminifolium, Boiss. 1. c. 633 = S. graminifolia.
orthocladum, Rupr. Sert. Tiansch. 69.—Turkestan.
Sartorii, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 67 - S. Sartorii.
serbicum, Vis. in Mem. 1st. Venet, x. (1861) 440-S. serbica.
Sewermovii, Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) I. 396 -S. Sewerzowi.
speciosum, Boiss. in DC. Prod. xii. 684=S. speciosa
tataricum, Boiss. 1. c. 632-S. tatarica.

GONIOTHAIiAlCUS, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i. 105 (1855). *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 26.
aruënsis, *Scheff. in Ann. Jard. Buitenz.* ii. (1885) 26.—Malaya,
brevicuspis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 38.—Ins. Celebes.
caloneurus, *Miq. I. c.* 34.—N. Guinea,
cardiopetalus, *Hook.f. (f Thorns. Fl. Ind.* 108.—Ind. or.
ceramensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 38.—Ins. Ceram.
costulatus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 872.—Sumatra,
dispermns, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 34.—Borneo.
eunenrus, *Miq. I. c.* 83.—Ins. Celebes,
fulvus, *Hook.f. & Thorns, in Hook.f. Fl. Brit. hid.* i. 76.—Malacca.
Gardneri, *Hook. f. V Thorns. Fl. Ind.* i. 107.—Zeylan.
giganteus, *Hook.f. V Thorns. I. c.* 109.—Malaya.
Griffithii, *Hook.f. (f Thorns. I. e.* 110.—Burma.
Hookeri, *T)tw Enum. PI. Zeyl.* 6.—Zeylan.
imbricatus, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent.* ii. (1885) 27.—N. Guinea,
lanceolatus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 373.—Sumatra,
longirostris, *Scheff.* ***in Ann. Jard. Buitenz.*** *i.* (1876) 4.—N. Guinea,
macrophyllus, *Hook.f.* b* *Thorns, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. i.* 74.—Malacca.
macrophyllus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 28.—Java,
malayanus, *Hook. f.* b* *Thorns. Fl. Ind.* i. 107.—Malaya.
oxycarpus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 372 *(-Guatteria oxyearpa).*—Sumatra,
reticulatus, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 7, 398.—Zeylan.

QONIOTHALAHT78 :—
lufus, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 85.—Borneo.
salicinus, *Hook.f.* O" *Thorns. FL Ind.* L 106.—Zeylan.
sesquipedalis, *Hock. f. & Thorns. I. c.* 108.—Reg. Himal.; Burma.
Simonsii, *Hook./. V Thorns. I. c*—Reg. Himal.
Slingerlandtianus, *Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxxi. (1870) 341.—Malaya,
sumatranus. *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 871.—Sumatra.
Tapis, *Miq. I.* r.—Sumatra.
Thomsoni, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 7.—Zeylan.
Thwaitesii, *Hoot. f. V Thorns. Fl. Ind.* i 106.—Zeylan.
Walkeri, *Hook.f. V Thorns. 1. c.* 109.—Zeylan.
Wightii, *Hook.f. V Thorns. I. c.* 106.—Ind. or.
wynaadensis, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. IS. t. 61.—Ind. or.

GONIOTRICHE, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mote. xxv. (1852) II. 181=Trichinium, R. Br. (Amarant.).

GONIPIA, Rafin. Fl. TeUur. iii. 23 (1836) - Gentiana, Toum.
tricolor, Rafin. 1. c. 24.—Hab. ?
linearis, Rafin. I. c. = Gent. linearis.
paucifolia, Rafin. 1. c. 23.—Hab. ?
pulchella, Rafin. 1. c 24 - Erythraea ramosissima.
pumila, Rafin. I. c = Gent. pumila.
rotundifolia, Rafin. 1. c. = Gent. bavarica.
sicula, Rafin. 1. c 28 (Quid ?).—Sicil.
tenuiflora, Rafin. 1. c. 24-Gent. Amarella?

GONISTUM, Rafin. Sylva TeUur. 85 (1838) - Piper, Linn.
unguiculatum, Rafin. 1. c - P. unguiculatum.

GONISTYLUS, Baill. Hist PI. vi. 123 (1875) = Gonystylus, Teijsm. & Bins. (TbymeL).

GONIURUS, Presl, £pim. Bot 244 (1849)-PotliO8, Unn. (Aroid.).
lutonensis, Presl, 1. c. = P. lozonensis.

GONOCALYX, Planch. & Linden, ex Gard. Chron. (1856) 152-Ceratostemma), juss. (Vacciniac.).
pulcher. Planch. & Linden, 1. c.; et in Belg. Hortic. vi. (1856) 232.—N. Granat.

GONOCARPUS, Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 39 (1825) => Combretum, Linn.
Jacquini, Ham. L c = C. alterniiblinm,

GONOCARPUS, Thunb, Nov. Gen. 55 (1783)-Halorogia, Forst
micranthus, Thunb. 1. c.-H. micrantha.

aONOOARYVV., Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 343 (1860). *INC. SED.—Ct.* Benth. & Hook. f. *i* 845.
affine, *Becc. Malesia,* i. (1878) 256.—N. Guinea,
gracile, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 343.—Sumatra.
Griffithianum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Seng.* xliv. (1875) II. 155.—Burma.
macrocarpnm, *Scheff. in Ann. Jard. Buitenz.* i. (1876) 102, in obs.—Ins. Lepar.
pyriforme, *Scheff. I. c.* 100.—tins. Molucc.
selehicnm, *Becc. Malesia,* i. (1877) 124.—Ins. Celebes.
Teysmannianum, *Scheff. in Ann. yard. Buitenn.* i. (1876) 98.—Malaya.

GONOCITBTJ8, Kurz, in Jonrn. As. Soc. Beng. xlii. (1873) u. 228. *RUTACEAE.*
angulatus, *Kurt, 1. c.*—Ind. or.

GONOCYTISUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 153-Oenista, linn. (Legumin.).
angulatus, Spach, 1, c. 153, 154 = Gen. parviflora.
pterocladus, Spach, 1. c, 164-Gen. pteroelada.

GONOGONA, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 369 (1822) "Goodyepa, R. Br. (Orchid.).
discolor, Link, 1. e.- Good, discolor.
repens, Link, 1. c. -Good, repens.

GONOHORIA, G. Don, Gen. Syst. i. 840 (1831), sphalm. = CONOHORIA, Anbl. = Alsodeia, Thou. (Violar.).

GONOKEROS, Rafin. FL TeUur. iv. 96 (1836) = Scabiosa, Toum. (Dipsac).
hungaricus, Rafin. 1. c. (Quid?).—Hangar.

GONOLOBIUM, Hedw. f. Gen. 132 (1806)-Gonolobus, Michx. (Asdep.).

OOKTOLOBUS, Michx. FJ fior. Am. i. 119 (1803). *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 766.
CHTHAMALM, Decne. in DC. Prod. viii. 605 (1844).
albus, Poir. Encyc. Suppl. ii. 815-Sarcostemma Dombeyanum.
altissimus. *Schult. Syst.* vi. 65.—N. Granat.
aristolochioides, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 208.—Venezuela.
asper, *Decne. in DC. Prod.* viii. 595.—Mexic.
Baldwynianus, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 360.—Am. bor.
barbatos, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 209. t. 239. " -Mexic
bifidus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 330.—Mexic.
bifloras, *Nutt. ex Torr. Bot. Mex. Bound.* 165.—Am. bor. occ.
biflorus, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 58.—Am. bor.
Billbergianus, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1856) 138.—Panama,
carolinensis, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 35.—Am. bor.
carolinensis, Nutt. Gen. Am. i. 163 = Baldwynianus.
chloranthns, *Schlecht in Linnaea,* viii. (1833) 520.—Mexic.
cinctus, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 750, in nota sub Fischeria.—Jamaic.
congestus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 597.—Mexic.
crispiflorus, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 35 = Fischeria scandens.
cnbensis, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 98.—Cuba.
Cundurango, Triana, in Comp. Rend. Par. lxxiv. (1872) 883 = Marsdenia Cnndurango.
cynanchoides, *Engelm. V Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 251.—Am. bor. occ.
diadematus, *Ker-Gawl. Bot. Reg.* t. 252.—Mexic.
discolor, Schult Syst. vi. 63-obliquus.
edulls, *Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 331.—Guatemala.
erianthus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 592.—Mexic.
eriodadon, *Benth. PI. Hartw.* 216.—N. Granat.
eriopetalus, Moric ex Decne. in DC. Prod. viii. 541-Sarcostemma elegans.
filiformis, Schult. Syst. vi. 65 = Sarcostemma Jacquini.
flavidulus, Chapm. in Coulter, Bot. Gaz. iii. (1878) 12 = hirsutus.
floccowu, *Bertol. in Opusc. Scient.* iv. (1823) 225.—Ins. Guadaloup.
foetidus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 208.—Reg. Argent,
fraternns, *Schlecht. in Linnaea,* viii. (1833) 521.—Mexic.
fuscos, *Decne. in DC. Prod.* viii. 592.—Mexic.
ganglinosus, *Decne. 1. c.* 597.—Bras,
geminiflorus, *Decne. I. c.* 595.—Bras.
glaber, *Decne. I. c.* 594.—Guian.
glaberrimus, *Klotesck, in Sckomb. Faun, et Fl. Gui.* 955, nomen.—Guian.
glandnlosa, *Poepp. ex Decne. in DC. Prod.* viii. 598.—Peruv.
Glaziovii, *Fourn, in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 315.—Bras.
gracilis, *Decne. in DC. Prod.* viii. 596.—Mexic.
grandiflorus, Benth. PI. Hartw. 24-erianthus.
grandiflorus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 35.—Am. austr.
grandiflorus, Undl. Bot. Reg. t. 1053—chloranthus.
granulatus, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 759 = laevis.
granulatus, Torr. Bot. Mex. Bound. 165-reticulatus.
guianensis, Spreng. Syst i. 845=viridiflorns.
hastulatus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 78.—Calif.
hirsutus, Lodd. Bot Cab. t. 865=Baldwynianus 1
hinutus, *Michx. FL Bor. Am.* i. 119.—Am. bor.
hirsutus, Purah, Fl. Am. Sept i. 179 ; Nutt. Gen. Am. i. 168=obliquns.
hirtus, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 85=obliquns.
hirtus, *Griseb. in Goett. Abh.* xziv. (1879) 2S4.-Reg. Argent.

GOtfOLOBUB :—
hispidus, *Hook, tf Am. in Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 296.—Am. anstr.
Hystrix, *Decne. in DC. Prod.* viii. 693.—Bras,
laevis, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 119.—Am. bor.
lanatns, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 235.—Reg-Argent.
lanceolatns, *Decne. in DC. Prod.* viii. 598.—Mexic.
lasiostomus, *Decne. I. c.* 593.—N. Granat
ligustrinns, *Decne. I. c.* 598.-Bras,
littoralis, *Decne. I. c.* 596.—Mexic.
lnridus, *Decne. 1. c.* 592.—Mexic.
luteolus, *Decne. I. c.* 598.—Mexic.
macranthns, *Kunie, in Linnaea,* xx. (1847) 27.—Mexic.
macrocarpns, *Gasparr. in Ann. Civ.* iii. (1819) 122.—Hab.?
macrophyllus, Chapm. Fl. S. U. St. i. 368-=snberosus.
macrophyllus, Decne. in DC. Prod. viii. 696 = obliquus.
macrophyllus, Ell. Sketch, i. 827 = hirsutus.
macrophyllus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 119-laevis.
maritimus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 35.—N. Granat.
Martianus, Hook. Bot Mag. t 4472 = Fischeria Martiana.
martinicensis, *Decne. in DC. Prod.* viii. 595.—Ind. occ.
micranthus, *Hook. f. ex Hemsl. Bot. Voy. Challenger,* i. II. 18.—Ins. Femando-Noronha.
mollis, *Regel, Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1856) 26 ; *et* » *Gartenfl.* (1857) 362.—Bras.
mucronatus, Sweet, Hort. Brit ed. II. 360 « Tylophora asthmatica ?
nemorosus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 596.—Mexic.
niger, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 36.—**Mexic.**
nigrescens, *Schlecht. in Linnaea,* viii. (1833) 522.—Mexic.
nummularius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii 332.—Mexic.
Nuttallianus, Spreng. Syst. i. 845=laevis.
Nuttallii, Decne. in DC. Prod. viii. 598 - laevis.
obliquifolius, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1835) 123. t. 37-Oxypetalum saxatile.
obliquus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 85.—Am. bor.
obtusiflorus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 594.—Bras,
oblusifolius, *Schult. Syst.* vi. 66.—Hab. ?
orthosioides, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 815.—Bras.
Ottonis, *C. Koch & Bouché, Ind. Sent. Hort. Berol.* (1855) 13; *ex Walp. Ann.* v. 502.—Cuba,
oxyanthus, *Turcss. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 318.—Venezuela.
parviflorus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 597.—Peruv.
parvjflorus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 79.—Am. bor. occ.
parrifolius, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 166.—Am. bor. occ.
patens, *Decne. in DC. Prod.* viii. 694.—Bras,
pauciflorus, *Spreng. Syst, i.* 846.—Ins. S. Doming,
pedunculatus., *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 332.—Mexic.
picturatus, *Hemsl. I.* c—Guatemala,
pilosus, *Benth. PI. Hartw.* 289.—Mexic.
planiflorus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc. i.* (1809) 85.—N. Granat.
pogonanthus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot ii. 333, pro parte=Pherotrichis villosa.
productus, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 165.—Am. bor-occ.
prostratus, Baldw. in £11. Sketch, i. 329 - pubiflonU-
prostratus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc. I* (1809) 85.—Mexic.
pubescens, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 420.—Jamaic.
pubiflorus, *Engelm. if Gray, in Bost. Journ. Na>-Hist.* v. (1845) 252, in textu.—Am. bor. occ.
pyrrhobichus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 594.—Bras.
racemosus, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 35' Roulinia Jacquini.
reflexus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ri. 333.—Nicaragua,
'reticulatus, *Engelm. ex A. Gray, in Proc. Am. Acaa-*xii. (1877) 75.—Am. bor. occ.
retusus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 594.—Bras,
rhamnifolius, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 420.—Jam*;
riparins, *H. B. VK. Nov. Gen. etSp.* iii. 208.—N. Grantf-
rostratus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 36.—Ind. occ.

OONOLOBTJB t-
rotatus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 593.—Bras,
sagittifolins, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 77.—Texas.
Salvinii, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* ii 384—Guatemala.
Schaffneri, *A. Gray, ex Hemsl. 1. c*—Mexic.
setosus, *Bentk. PI. Hartw.* 216.—N. Granat.
Shortii, *A. Gray, in Coult. Bot. Gat.* viii. (1888) 191.—Am. bor.
sidaefolios, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 867.—Mexic.
stellatus, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 420.—Jamaica,
stelliflorus, *Fount, in Mart. FL Bras.* vi. IV. 317—Bras.
stenolobus, Decne. in DC. Prod. viii. 695=Exolobus stendlobns.
stephanotrichus, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 177 Cuba.
striatus, *Mart,* b" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 865.—Mexic.
suberosus, Bertol. Elench. 5 = floccosus.
suberosus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 35.—Am. bor.
tetragonus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 594.—Bras,
tigrinus, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1868) 520—Cuba.
Hliaefolius, Decne. in DC. Prod. viii. 596=Uevis.
tingens, *Decne. I. c.* 592.—Mexic.
trifiorus, *Mart.* to" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. l. (1844) 365—Mexic.
tristis, *Decne. in DC. Prod,* viii, 596.—Mexic.
undulatus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 35—N. Granat.
unifarius, Scheele, in Iinnaea, xxi. (1848) 760 = Roulinia unifaria.
unfflorus, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 207. t. 288. -Mexic.
velutinus, *Schlecht. in Linnaea.* viii. (1838) 521—Mexic.
virescens, *Decne. in DC. Prod.* viii. 596.—Mexic.
tiridiflorus, Nutt. Gen. Am. i. 163-laevis.
viridiflorus, *Sckult. Syst.* vi. 61 Bras.
•*niridiflorus*, *Ton.* in Ann. Lyo. N. York, ii. (1828) 219 " Philibertia cynancboides.
viridis, Targ. in Mem. Mod. xx. (1829) 295=viridifiorus.
Voquicilla, Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1885) 124. t. 38=Oxypctalum saxatile.

GONOLOMA, Rafin. Sylva Tellnr. 86 (1838)=Vitis, Tonrn.
data, Rafin. 1. c. = V. rhombifolu.

GONONCUS, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 16 (1836) - Polygonum, Toum.
**ndulatus*, Rafin. 1. c. - P. alpinnm.

GONOPTERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xx. (1847) 1.150-Bulnesia, C. Gay (Zygophyll.).
thilensis, Turcz. 1. c 151 =B. chilensis.

GONOPYRUM, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in MjSm. Acad. Pétersb. Sèr. VI. vi. (1840) 144 =FolygonelIa, Michx. (Polygon.).
""uricanum, Fisch. *Sc* Mey. 1. c - P. ericoides.

GONOSPERMUM, Less. Syn. Comp. 268 (1882). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc.* Hook. f. ii 417.
HYMENOLEPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 138, partim.
LUGOA, DC. Prod. vi. 14 (1837).
<*nariense, *Less. Syn. Comp.* 268.—Ins. Canar.
"egatzs, DC. Prod. vi. 84 = canariense.
fruHcosum, DC. L c.=canariense.
frnticosum, *Less. Syn. Comp.* 263—Ins- Canar.
Gomerae, *C. Bolle, in Bonplandia,* vu. (1859) 296.—Ins. Canar.
"ultiflorum, DC. Prod. vi. 84, excl. syn.=fruticosum.
fevolutum.ScA. *Bip.in Webb VBerth. Phyt.Canar.* u. 292. t 88—Ins. Canar.

GONOSTEGIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xix. (1846) II. 509-PouaoMa, Gandich. (Urticac).
dternifolia, Turcz. 1. c. 510—Ins. Luzon.
«<*Hbigua*, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iv. 303 = P. Wightii,
"quatica, Miq. 1. c. - P. pentandra.
eracteata, Miq. 1. c. = P. caudata.

GONOSTEGIA :—
caudata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 808= Pouzolzia caudata.
concinna, Miq. 1. c.-P. Wightii.
gracilis, Miq. 1. c—Ind. or.
hirta, Miq. 1. c.=P. hirta.
integrifolia, Miq. 1. c. - P. integrifolitt.
nilghirensis, Miq. 1. c. = P. Wightii.
oppositifolia, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc. *xix.* (1846) II. 510 » P. pentandra.
parvifolia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 303 - P. parvifolia.
pentandra, Miq. 1. c. 802=P. pentandra.
quinquenervis, Miq. 1. c. 808 » P. hirta.
scabra, Miq. 1. c = P. scabra.
triandra, Miq. 1. C-=P. parvifolia.

GONOSTEMMA, Spieng. Gen. i. 208 (1830) «seq.

GONOSTEMON, Haw. Syn. PI. Succ 27 (1812) - Stapelia, Linn. (Asdep.).
divaricatus, Haw. 1. c.=S. divaricata.
pallidus, G. Don, Gen. Syst iv. 117 - S. pallida.
strictus, Haw. Suppl. PI. Succ. 12=S. stricta.

GONOSUKE, Rafin. Sylva Tellnr. 58 (1888) = Tlona, Toum. (Urtic).
demonum, hispida, scaber, Rafin. U. - F. bispida.

GONOTHECA, Blume, ex DC. Prod. iv. 429 (1880) = Oldenlandla, Linn. (Rubiac).
Blumei, DC. 1. c.=O. alata.

GONOTHECA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 - Tetpagonotheca, Dill. (Compos.).
helianthoides, Rafin. 1. c. = T. helianthoides.

GONTARELLA, Gilib. ex Steud. Nom.ed. 1.380 (1821) = IsopyTum, Linn. (Ranunc).
tertiaria, Gilib. ex Steud. 1. c - I. thallctroides.

GONUFAS, Rafin. Sylva Tellur. 124 (1888) = Celosia, Linn. (Amarant).
paniculata, Rafin. 1. c - C. paniculata.

GONUS, Lour. Fl. Cochinch. 658 (1790) = Bruoea, J. S. Mill. (Simarub.).
amarissimus, Lour. 1. c = B. sumatrana.

OONYAKERA, Kortb. inNederl. Kroidk. Arch. ii. ir. (1851) 183. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 715.
glauca, *Xbrth. I.* c—Sumatra.

GONYANTHES, Nees, in Ann. Sc. Nat. Sèr. I. iii. (1834) 369-GONIANTHES, Blame=Bnnnaniila, Linn.

GONYCLISIA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 191 (1867) = Cochlearia, Linn. (Cradf.).
saxatilis, Dulac, 1. c.-C. saxatilis.

(JONTSTYLUS, Teijsm. & Binn. in Bot. Zeit. xx. (1862) 265. *THYMELAEACBAE*, Bentb. & Hook, f. iii. 201.
bancanus, Baill. Hist. PI. vi. 123 = Miqielianus.
MiquelUnus, *Teijsm. V Binn. in Bot. Zeit.* xx.(1862) 265.—Malaya.

GONZALAGUNEA, Reichb. Norn. 77 (1841)-seq.

GONZALAGUNIA, Rniz Sc Pav. Prod. 12 (1794) = Oonzalea, Pers. (Rubiac.).
C«:coo'/'«/«'».Cbam.& Schlecht. in Linnaea, iv. (1820) 193 s Gonzalea Coccocypselum.
dependens, Rniz & Pav. Fl. Per. i. 56«Gonzalea pendola.
dicocca, Cham. & Schlecht in Linnaea, iv. (1829) 194 = Gonzalea dicocca.
panifiora, Schlecht. & Cham, in Linnaea, vi. (1831) 414-= Gonzalea parvifiora.

GONZALEA, Pers. Syn. i. 182 (1805). *RUBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 65.
BUENA, Cav. in Anal. Hist. Nat. it (1800) 278; Ic. vi. 50. t 571 (1801).
DUGGENA, Vahl, in West, Bidr. Sle-Croix, 269 (1793) nomen prius.
GONZALAGUNIA, Ruiz *tc* Pav. Prod. 12. t. 3 (1794).
brachyantha, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 16.—Cuba.
Coccocypselum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 791.—Porto Rico.

GONZAIŁEA:-
comifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 416.—N. Granat.
dicocca, *Steud. Nom.* ed. II. 1. 701.—Bias,
incanescens, *DC. Prod.* iv. 487.—Ins. Tobag.
leptantha, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 16.—Cnba.
Lygistum, Schult. Mant. iii 182=Manettia Lygistum.
nivea, *Bart I. ex DC. Prod.* iv. 486.—Mexic.
panamensis, *Pers. Syn.* i. 138.—Panama; Mexic.
panamensis, Spreng. Syst. i. 417 = spicata.
panamensis, Wydler, ex Cham. *Se* Schlecht in linnaea, iv. (1829) 196-G. Coccocypselum.
parviñora, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 537—Mexic.
pendula, *Pers. Syn. i.* 132.—Pernv.
Petesia, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viU. (1868) 504—Jamaic.
pulverulenta, *Numb, (f Bonpl. PI. Aequin.* i. 228—Pctuv.
secunda, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. l. (1844) 235—Mexic.
sessiliflora, *Presl, Bot. Bemerk.* 80.—Bras,
spicata, *DC. Prod.* iv. 487.—Am. austr.
tomentosa, *Numb,* b[1] *Bonpl. PI. Aequin.* i. 225. t. 64. —Peiuv.

OOODAIiLIA, Benth. in Hook. Land. Journ. Bot. iv. (1845) 683. *THYMELASACEAE*, Benth. *Sc* Hook, f. iii. 194.
guianensis, *Benth. I. c.*~Gnian.

GOODEMXA, Sm. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 846
GOODENOVEAE, Benth. & Hook. f. ii. 638.
AILLYA, De Vriese, in Verb. Haarl. x. (1854) 75. t. 13.
BOUTONIA, Hort. Erfurt, ex Steud. Nom. ed. II. i. 219 (1840).
COLLKMA, Anders, ex DC. Prod. vii. 512 (1839).
MoNOCHiLA,Spach,Hist. Vég. Phan. ix. 227 (184O\
PICROPHYTA, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 421.
STEKHOVIA, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 166. t. 32.
TETRAPHYLAX, De Vriese, 1. c. 164 (1854).
acuminata, R. Br. Prod. 576 = ovata.
affinis, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 137 = geniculata.
albida, Sm. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 348 - Scaevola microcarpa.
albiflora, *Schlecht. in Linnaea*, xx. (1847) 699—Austral,
amplexans, *F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* ii. (1858) 70.—Austral.
appendiculata, Jacq. Fragm. 62-grandinora.
armeriaefolia, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 412 = Diaspasis filifolia.
armeriaefolia, Sieber, ex DC. Prod. vii. 513 - stelligera.
Armitiana, *F. Muell. Fragm.* x. 110.—Austral.
Armstrongiana. *De Vriese, in Verh. Haarl.* x. (1854) 138. t 24—AnstraL
arthrotricha,K *Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 62—Austral.
auriculata, *Benth. t. c.* 72.—Austral,
azurea, *F. Muell. Fragm.* i. 117.—Austral,
barbata, *R. Br. Prod.* 576.—Austral.
Barilletii, F. Muell. Fragm. iii. 140 - caerulea.
beUidifolu,5ffi. *in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 349—Austral.
Berardiana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 460-Calogync Berardiana.
bicolor, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 80—Austral.
Bonneyana, *F. Muell. Fragm.* vi. 226.—Austral,
caernlea, *R. Br. Prod.* 678—Austral,
calcarata, *F. Muell. Fragm.* vi 14.—Austral.
calendulacea, Andr. Bot. Rep. t. 22=Scaevola suaveolens.
Chambcrsii, *F. Muell. Fragm.* i. 204.—Austral.
cistifolia, A. Cunn. ex DC. Prod. viii. 516-barbata.
claytoniacea, *F. Muell. Census,* 89 vCf. *Laytoniana).* —A astral,
concinna, *Benth. Fl. Austral,* iv. 76.—Austral.
coronopifolia, *R. Br. Prod.* 576 Austral.
corynocarpa, *F. Muell. Fragm.* ii. 16.—Austral.
cyanea, F. Muell. 1. c. i. 165 » pterigosperma.
cydoptera, *R. Br. in Sturt, Sxped. Centr. Austral,* ii. *App.* 83.—Austral.
decunens, *R. Br. Prod.* 576.—Austral,
disperma, *F. Muell. Fragm.* i. 113.—Austral.

GOODEUIA:—

dubia, Spreng. Syst i. 721-Calogyne pilosa.
Eatoniana, *F. Muell. Fragm.* viii. 186.—Austral.
elongata, De Vriese, in Lehm. PI. Pieiss. i. 412 - filiformis.
elongata, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 62. t. 75.—Austral.
exigua, F. Muell. Fragm. iii. 142 = Selliera exigua.
filiformis, *R. Br. Prod.* 578.—Austral.
fiagelli/era, De Vriese, in Mitch. Journ. Trop. Austral. 378=glabra.
ftexuosa, De Vriese, in Verb. Haarl. x. (1854) 126 = paniculata.
geniculata, *R. Br. Prod.* 577.—Austral.
geniculata, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 413 = Anthotium humile.
genuflexa, Be Vriese, 1. c. ii. 244=Anthotium humile.
glabra, *R. Br. Prod.* 677.—Austral.
glandtdifera, De Vriese in Verh. Haarl. x. (1864) 129=Diaspasisnifolia.
glauea, *F. Muell in Trans. Viet. Inst.* L (1855) 40.— Austral.
gracilis, *R. Br. Prod.* 575.—Austral.
graminifolia, Hook. f. in Hook. Lond. Toum. JBot. vi. (1847) 265 = humilis.
grandiflora, *Sims, Bot. Mag.* t. 890.—Austral.
Hassallii, *F. Muell. Fragm.* vi. 10. t. 51.—Austral,
hederacea, *Sm. in Trans. Linn. Sac.* ii. (17*4) 849.—Austral,
herpystica, *Schlecht. in Linnaea*, xx. (1847) 598.—Austral.
heterochila, *F. Muell. Fragm.* iii. 142.—Austral,
heteromera, *F. Muell. I. c. i.* 115.—Austral,
heterophylla, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 849.—Austral.
heteroptera, *F. Muell. Fragm.* x. 48.—Austral,
hireuta, *F. Muell. I. c.* iii. 35.—Austral,
hispida, *R. Br. Prod.* 577.—Anstral.
humilis, *R. Br. I. c.* 575.—Austral,
incana, *R. Br. 1. c.* 578.—Austral.
intermedia, Gaertn. f. Fruct. iii. 165 = rotundifolia ?
junciformis, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 413 = Anthotium humile.
laevigata, Curt. Bot. Mag. t. 287-Scaevola microcarpa.
laevis, *Bentk. Fl. Austral*, iv. 61.—Austral,
lnmprosperma, *F. Muell. Fragm.* i. 116.—Austral,
lanata, *R. Br. Prod.* 577.—Austral.
lanceolata, Hort. ex Stead. Nom. ed. II. i. 701=paniculata.
latifolia, *Hort. ex Steud. I. c*—Austral.
Laytoniana, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, iv. 79, sphalm.—Cf. claytoniacea.
leptoclada, *Benth. Fl. Austral*, iv. 67.—Austral.
leptotheca, F. Muell. Fragm. vi. 13=xanthotricha.
litioralis, R. Br. in Flind. Voy. ii. 5Bl=Selliera radicans,
longifolia, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 127 = stelligera.
Macmillanii, *F. Muell. Fragm.* i. 119. t. 5.—Austral.
macrophylla, F. Muell. L, c. vi. 11-Velleia macrophylla.
marginala, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 143.—Austral.
melanoptera, F. Mnell. Fragm. i. 115=heterochila.
microptera, *F. Muell. I. e.* iii. 84.—Austral,
minutiflora, *F. Muell. 1. c.* viii. 244.—Austral.
minutifolia, F. Muell. 1. c. be. 196, sphalm. ^praec.
Mitchellii, *Benth. Fl. Austral*, iv. 71.—Austral.
mollis, R. Br. Prod. 577=grandiflora.
mollissima, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, i. 73.— Austral.
Mueckeana, *F. Muell. Fragm.* viii. 56.—Austral.
nana, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 132 = humilis.
NicoUoni, *F. Muell. Fragm.* i. 203. t. 4.—Austral,
ovata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 847.—Austral.
paniculata, *Sm. I. c.* 348.—Austral,
phylicoides, *F. Muell. Fragm.* i. 206.—Austral,
pinifolia, *De Vriese, in Verh. Haarl.* x. (1854) 157. t. 30. f. 1-14.—Austral,
pinnatifida, *Scklecht. in Linnaea*, xxi. (1848) 450.—Austral.
primulacea, Schlecht 1. c. xx. (1847) 601 — geniculata.
pterigosperma, *R. Br. Prod.* 578.—Austral.
pterygosperma, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 153-caerulea.

GOODENIA:—

pubescens, JSieber, ex DC. Prod. vii. 614=Scaevola microcarpa.
pulchella, Benth. in Enum. PL Hueg. 71 — filiformis.
pumila, *R. Br. Prod.* 678.—Austral,
purpurascens, *R. Br. I. c.* 678.—Anstral.
pusilla, De Vriese in Verh. Haarl. x. (1854) 131 - tenella.
pygmaea, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 413 = Anthotium humile.
quadrilocularis, *R. Br. Prod.* 578.—Austral,
racemosa, *F. Muell. Fragm.* i. 114.—Austral.
radicans. Pen. Syn. i. 195=Selliera radicans.
Ramelii, *F. Muell. Fragm.* iii. 20. t. 17.—Austral.
ramosissima, Sm. in Trans. Linn. Soc ii. (1794) 349 = Scaevola hispida.
repens, Labill. Nov. HolL PI. i. 53. t. 76 -Selliera radicans.
rigida, Benth. in Enum. PI. Hueg. 71 =caerulea.
rotundifolia, *R. Br. Prod.* 676.—Austral,
scaevolina, *P. Muell. Fragm.* i. 118.—Austral,
scapigera, *R. Br. Prod.* 578.—Austral,
sepalosa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iv. 72.— Austral.
sessiliflora, F. Muell. Fragm. iv. 145-disperma.
spathulata, De Vriese, ia Verh. Haarl. x. (1854) 123 = bellidifolia.
spicata, *F.* Muell. Fragm. iii. 35-viscida.
squarrosa, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 418 = Scaevola faseiculata.
stelligera, *R. Br. Prod.* 575.—Austral.
stenophylla, F. Muell. Fragm. i. 113=Scaevola stenophylla.
Stobbsiana, *F. Muell. I. e.* xi. 49.—Austral.
stolonifera, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 135 = tenella J
Stxangfordii, *F. Muell. Fragm.* vi. 11. t. 52.—Austral.
stricta, Sm. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 349 = Daiupiera stricta.
strongylophylla, *F. Muell. Fragm.* vi. 12.—Austral,
strophiolata, *F. Muell. 1. c.* i. 119.—Austral.
Taylori, F. Muell. 1. c. iii. 141=quadrilocularis.
tenella, Andr. Bot. Rep. t. 466 = Velleia trinervis.
tenella, *R. Br. Prod.* 577.—AustraL
tenella, F. Muell. Fragm. ii. 111 = claytoniacea.
tenuiloba, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* (Feb. 1885) 25.—Austral.
teretifolia, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 130 = caerulea.
teucriifolia, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet. ii. (1858) 70=heterophylla.
trichophylla, *De Vriese, ex Benth. Fl. Austral*, iv. 67. —Austral.
varia, *R. Br. Prod.* 576.—Austral.
Vilmoriniae, *F. Muell. Fragm.* iii. 19. t. 16.—Austral,
viscida, *R. Br. Prod.* 578.—Austral,
xanthosperma, *F. Muell. Fragm. x.* 12.—Austral,
xanthotricha, *De Vriese, in Verh. Haarl.* x. (1854) 165.—Austral.

OOODIA, Salisb. Parad. Lond. t. 41 (1806). *LEGUM1NOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 474.
lotifolia, Hort. in Rev. Hortic (1876) 200 «• Argyiolobium Andrewsianum.
lotifolia, *Salisb. Parad. Lond.* t. 41.—Austral.
medicaginea, F. Muell. Second Gen. Rep. 11 = lotifolia.
polysperma, DC. in Mém. Soc. Phys. Genev. ii. n. 133; exej. Prod. ii. 117 = Argyrolobium Andrewsianum.
pubescens, *Sims, Bot. Mag.* 1.1810.—Austral.
retusa, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.110, nomen. «* lotifolia ?
simplicifolia, Spreng. Syst. iv. Cur: Post. 267 = Hovea elliptica.
subpubescens. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 126, nomen= lotifolia?

GOODIERA, Koch, Syn. Fl. Germ, ed, II. 802 (1844) =seq.

GOODYERA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 197 (1813). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 602.
CIONISACCUS, Breda, Orch. Kuhl & Hass. (1827 ?).
CORDYLESTYLIS, Falc. in Hook. Joum. Bot. iv. (1842; 74.
ELASMATIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 121 (1867).
EFIFACTIS, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 277 (1742).
GEOBINA, Rafin. FL Tellur. iv. 49 (1836).

GOODYEBA:—

GEORCHIS, Lindl. in Wall. Cat. n. 7379 (1881); Bot. Reg. xix. (1853) t. 1618.
GONOGONA, Link, Enum. Hort Berol. ii. 369 (1822).
GOOUIERA, Koch. Syn. Fl. Germ. ed. II. 802 (1844).
LEUCOSTACHYS, Hoffm. Preisv.Orch. (1842) 26.—Cf. Linnaea, xvi. (1842) Litt 234.
PKRAMIUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 301.
TUSSACA, Kafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 261.
bifida, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 40.—Java.
carnea, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 80 = procera.
coloraia, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 37.—Java,
cordata, *Nichols. Diet, Gard.* ii. 81.—Reg. Himal.
Dawsonii, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp-* ed. III. *Nov. App.* 248.—Ins. Philipp.
discolor, Ker-GawL Bot. Reg. t. 271 = Haemaria discolor.
elongata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 494-Hetaeria elongata.
fiabellata, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 79 =Cheirostylis fiabellata.
fumata, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 314.—Zeylan.
fusca, *Lindl. in Wall. Cat. a.* 7395.—Reg. Himal.
guyanensis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 494 = Spiranthes Hostmanni.
hirsuta, Griff. Notul. iii. 393 = Physurus hirsutus.
hispida, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 183.— Reg. Himal.
japonica, Blume, Orch. Archip. Ind. 38 = Schlecntendaliana.
lancifolia, *Franch. (f Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 520.— Japon.
macrantha, *Maxim, in Fl. des Serres. Sit.* IL (1867-68) 113.—Japon.
macrophylla, *Love, in Trans. Catnb. Phil. Soc-* (1831) 13.—Ins. Madera.
marginata, Lindl. in Wall. Cat. n. 7894-repens.
Maurevertii, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 42.—Java.
Menziesii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 402—Am. bor.
neglecta, *Ernst, Fl. Venez.* (1877) 259.—Venezuela,
nuda, *Thou. Orch. Isles Austr. Afr.* t. 29.—Ius. Mascar.
occulta, Thou. L c. 28 » Platylepis goodyeroides.
Ordeana, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp-* ed. III. *Nov. App.* 248.—Ins. Philipp.
ovalifolia, Wight, Ic. t. 1730 = Hetaeria ovalifolia.
parviflora, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 34. t. 22.— Malaya,
picta, *Boxall if Naves, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III- *Nov. App.* 248.—Ins. Philipp.
polygonoides, *F. Muell. Fragm.* viii. 29.—AustraL
procera, *Hook. Exot. Fl.* t 39.—Ind. or.; China; Malaya,
pubescens, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 198.—Am. bor.
pusilla, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 86.—Java.
quercicola, Chapm. Fl. S. U. St. 468 - Physurns querceticola.
recurva, *Lindl. in Joum. linn. Soc. i,* (1857) 183— Reg. Himal.
repens, *R. Br. in Ait. Hort. Ken.* ed. II. v. 198.—Re6-bor. temp.
reticulata, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 35. t. 9b.—Java-
rubens, *Blume, 1. c.* 43.—Java,
rubicunda, *Lindl. in Bot. Reg.* (1889) *Misc.* 6L— Malaya,
rnbrovena, *Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. PhihPP-* ed. III. *Nov. App.* 248.—Ins. Philipp.
Schlechtendaliana, *Reichb. f. in Linnaea*, xxii. (18W 861.—Japon.
***secundifiora,* Griff. Notul. iii. 393 *{Georchis folios')*—** Ind. or.
secundifiora, *Lindl. in Journ. Linn. Soc. i.* (1857) 1»* —Reg. Himal.
similis, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 89.—Japon.
striata, *Reichb. f. in Linnaea*, xviii. (1844) 40K—Mexic.
tesselata, Lodd. Bot. Cab. t. 952 = pubescens.
velutina, *Maxim.in Regel, Gartenfl.* (1867)36.—JJP0"':
viridiflora, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 41.—J»' Austral.
viscosa, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 61.—* Borbon.
Waitziana, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 42.—Java.
Wrightii, *Reichb. f. in Flora*, xlviii. (1865) 274-Ind. occ.
Zollingeri, *Xeichb. f. in Bonplandia*, v. (1857) »•• **Java.**

GORCEIXIA, Baker, in Jonm. Bot xx. (1882) 225. *COMPOSITAE.*
decnrtens, *Baker, I. c*—Bra*.

OOBDONIA, Ellis, in Phil. Trans, lx. (1770) 518. t. 11. *TERNSTROEMIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 186.
ANTHEEISCHIMA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 137. t. 27 (1840).
CARRIA, Gardn. in Calc. Tourn. Nat. Hist. vii. (1847) 7.
DIPTEROSPERMUM, Griff. Notul. IT. 564 (1854).
FKANKLINIA, Bartr. ex Marsh. Arbust. Am. 48 (1785).
LACATHEA, Salisb. Parad. Lond. t. 56 (1806).
LASIANTHUS, Linn. Syst. ed. I (1735).
POLYSPORA, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 61 (1826).
"cuminata, Wall. Cat. n. 8664=Pyrenaria acuminata; Adinandra acnminata.
acuminate, *Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 144, 148.—Java,
anomala, *Spreng. Syst.* iii. 126.—China.
"xillaris, **D. Dietr.** Syn. PI. iv. 868 - anomala.
batbinarvis, **Wpl.** p. Rep. i. 375 = Laplacea barbinervis.
brevifolia, Hooi.f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 162.—Borneo.
Chilaunea, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 226 -Schima Wallichii.
decandra, Roxb. Fl. Ind. ii. 578 = Ixonanthes reticulata.
dipterosperma, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. , f!876) II. 119.—Ind. or.
elliptica, *Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist.* vii. (1847) 448.—Zeylan.
ucelsa, *Blume, Bijdr.* 180.—Reg. Himal.; Malaya.
Jjoribunda, Wall. Cat. n. 1456 = Schima crenata.
Frantlini, L'Herit. Stirp. Nov. 156=pubescens.
grandis, *Andri, in Must. Hortic.* xxvii. (1880) 60.—Hab.?
"aematoxylon, Sw. Fl. Ind. Occ ii. 1199 = Laplacea Haematoxylon.
""egerrima, *Teijsm. &" Binn. Cat. Hort. Bog.* 204—Java.
>**tegrifoli„* Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. ii. 572 = Schima Wallichii.
J«wnum, RolUson, ex Hook. Bot. Mag. t. 4589 -achima Noronhae.
f-asianthns, *Linn. Mant.* ii. 570.—Am. bor.
L°M>ii,*Hooi.f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 162.—Borneo.
M»ingayi, *Dyer, in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* i. 291.—Malacca,
marginata, *Endl. in Walp. Rep.* v. 184.—Borneo.
""/Us, Wall. Cat. n. 1458-Schima mollis.
"Uta, Roxb. Hort. Beng. 93 j Fl. Ind. ii. 572 = Schima crenata.
obtusa, *Wall. Cat.* n. 1459.-Ind. or.
"M««/o«a, Wight, Illustr. i. 99 = obtusa.
ov»l«, *Korth. in Walp. Rep.* v. 184.-Sumatra.
totviflora, Hemsl> D£g. p£ Noy. Mex. 4 = Symplocos «occinea.
***ifiUia,* Wight, Illnstr. i. 99 - obtusa.
teduncularis, Wall. Cat. n. 4409 - Ixonanthes 'cosandra.
Wpperma, Blanco, FL Filip. ed. I. 549 = Homalium •oetidum.
Pobescens, *L'Hirit. Stirp. Nm.* 156.—Am. bor.
Wfrnidalis, SalUb. Prod. 886 = G. Lasianthus.
""*Wata,* Wall. Cat. n. 86«8 bis, et n. 7070 -/Winandra integerrima.
Bta. "1, *Spr"*. S***. "• *Cur_ Polt* 260 408.—
'«e?poriana,VlM .Cat .n. 1457=excelsa.
'Peaosa, *Choisy, in Mém. Soc. Phys. Geniv.* xiv. (1855) 132
M.* V *Thw-* E^um. *PI. Zeyl.* 40.—Zeylan.
ttt£»*a, Hook. f. *Sc* Thomi; ex Dyer, in Hook. f. FL , "ru- ^d. i. 289 ^ Schima khasiana.
tonentosa, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 260 = Laplacea villosa.
W• »?' Macfad- n. Jamaic i. 117=Uplacea villosa.
•Uirhii, DC. Prod. i. 628 = Schima vfallichii.
eylanica, *Wight, Illustr. i.* 99.-Zeylan.

^ PYRIUM, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Bat. tg 288 (1863)_ *AR0IDEAE>* Bwlth„ & Hook. f. m. 988.
mil»bile, *Schott, I.* f.—Archip. Ind.

GORINKIA, J. & C. PresL Fl. Čech. 140 (1819) = Conringia, Heist. (Crudf.).
*campestris,}. Sc*C.Presl, 1.c. 141 -Brassicacampestris.
orientalis, J. *Sc* C. Presl, 1. c.=C. orientalis.

GOROSTEMUM, Steud. Norn. ed. II. i. 631, in syn. (1840), sphalm. - GONOSTEMON, Haw. = Stapelia, Linn.

GORSKIA, Bolle, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 15. t. 3 (1861)-Copaifera, Linn. (Legumin.).
conjugata, Bolle, 1. C.-C. Gorskiana.

GORTERA, Hill, Veg. Syst. ii. 81 (1761) = Gorteria, Linn. (Compos.).

GORTERIA, linn. Sp. PI. ed. II. 1282 (1768), pro parte; Lam. Illustr. t. 702 (1789t)=Berkheya, Ehrh. (Compos.).
*acaulis,*Hort—Cf. Gard. Chron. (1888) I. 78 = Haplocarpha Leichtlinii.
arachnoidea, Hort. Angl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 702 (=seq. ?).—Afr. austr.
araneosa, Meerb. Afbeel. Gew. t. 40=Didelta ceraua.
asteroides. Linn. f. Suppl. 881 = B. fruticosa.
asteroites, Steud. Nom. ed. II. i. 702=praec.
barbata, Linn. f. Suppl. 882=B. carlinoides.
carthamoides, Lam. Encyc. iii. 3 = B. grandiflora.
cernua, Linn. f. Suppl. 883 = Didelta cemua.
ciliaris, Unn. Sp. I'l. ed. II. 1284= Cullumia ciliaris.
dliata, Thunb. Prod. PI. Cap. 163-Cullumia patnla.
crudata, Houtt. Nat. Hist. ii. t. 70 j ex DC. Prod. vi. 606 = B. cruciata.
echinata, [Dryand. in] Ait Hort. Kew. ed. I. iii. 254 --Didelta cemua.
fruticosa, linn. Sp. PI. ed. II. 1284 = B. grandiflora.
herbacea, Linn, t Suppl. 881 = B. cynaroides.
heterophylla, Willd. Hort. Berol. ii. 98=Gazaniarigens]
hispida, Lichtst ex Less. Syn. Comp. 65 = Gazania Bur. chellii.
hispida. Linn. f. Suppl. 882=Cullumia hispida.
ilicifolia, Lam. Encyc. iii. 3 = B. fruticosa?
incisa, Thunb. Prod. PL Cap. 162 = Gazania pinnata.
integrifolia, Thunb. 1. c. 163 = Hirpicium integrifolium.
linearis, Thunb. 1. c. 162 = Gazania subulata.
Lourmiana, DC. Prod. "i. 501 (sp. dub.).—China.
lyrato-pinnatifida, Poir. Encyc. Suppl. ii. 819 - Gazania pinnata.
mitis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 28 = Heterolepis mitis.
ottositifolia, Lam. Encyc iii. 4 = B. obovata.
othonnites, Thunb. Prod. PL Cap. 163 - Gazania othonnites.
ovata, Vahl, ex Less. Syn. Comp. 875 = Relhania rotundifolia.
Pavonia, Andr. Bot. Rep. t. 628 = Gazania Pavonia.
pecHnata, Thunb. Prod. PL Cap. 162 - Gazania pinnata.
personata, E. Mey. ex DC. Prod. vii. 36 = Dicoma capensis.
pinnata, Lam. Encyc. in. l = sea,. ?
pinnata, Thunb. Prod. PL Cap. 162=Gazania pinnata.
rigens, Linn. PI. Afr. Rar. 23; Amoen. Acad. vi. 105 - Gazania rigens.
rigens, Thunb. Fl. Cap. 698-= Gazania Pavonia.
rigida, Banks, ex DC. Prod. vi. 522 = Gazania rigens, pinnata.
setosa, Linn. Mant. ii. 287=Cullumia setosa.
setosa, Lour. Fl. Cochinch. 507 = *Loureiriana.*
speciosa, Poir. Encyc. Suppl. ii. 818 = Gazania pinnata.
spectabilis, Salisb. Prod. 207 = Gazania rigens.
spinosa, Jacq. Hort. Schoenb.iii. 64. t. 371=CuUumia sulc&ta.
spinosa. Linn, t Suppl. 381 = R> obovata.
squarrosa, Berg. Desc. PL Cap. 801 = Cullumia SQUAXTOSa*
squarrosa. Linn. PL Rar. Afr. 23 j Amoen. Acad. vi. 105 = Cullumia decurrens.
uniflora, Linn. f. Snppl. 382 = Gazania uniflora.

OOBTBRIA, Linn. Syst. ed. X. 1229 (1759). *COMPOSITAE,* Benth. &. Hook. f. ii. 469.
ICTINUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 142; et in Diet. Sc. Nat. xxii. 559 (1821).
PERSONARIA, Lam. Illustr. t. 716 (1789).
afflnis, DC. Prod. vi. 601 = diffusa.
calendulacea, *DC. I. c*—Afr. austr.
corymbosa, *DC. I. c*—Afr. austr.
difTusa, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 162.-A&. austr.
Ictinus, Cass. in Diet. Sc. Nat xxxiii. 456 = diffusa.
personata, Hill, Veg. Syst ii. 81-Gazania rigens personata, *Linn. Syst.* ed. X. 1229.—Afr. austr.

OOSELA, Choisy, in DC. Prod. xii. 22 (1848). *SBLA GINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1129.
Eckloniana, *Choisy. 1. c.*—Afr. austr.

GOSSAMPINUS, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xv. (1826) 126=Eriodendron, DC. (Malvac.).
alba, Buch.-Ham. 1. c « E . anfractuosum.
rubra, Buch.-Ham. I. c. 128 — Bombax malabaricum.
Rumphii, Schott & Endl. Meletem. 35-E. anfractuosura.

GOSSANIA, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Snppl. i. (1843) 823 = Gouania, Jacq. (Rhamn.).

GO8SYPIANTH0S, Hook. Ic. PL t. 251 (1840). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 39.
australis, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 8 - Gnilleminea australis.
lanuginosus, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 337^ Guilleminea lanuginosa.
rigidiflorus, *Hook. Ic. PI.* t. 251.—Am. bor. occ.
tenuiflorus, *Hoot. 1. c.* sob t. 251.—Am. bor. occ.
tomentosus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 35 - Gomphrena demissa.

GOSSYPIUM, Linn. Syst. ed. I (1735). *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 209.
STURTIA, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral, ii. App. 68 (1849).
THURBERIA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1854) (PL Thurb.) 808
XYLON, Toura. ex Medic. Malv. 43 (1787).
acuminatum, Roxb. Hort. Beng. 51; Fl. Ind. iii. 186 =barbadense.
albescens, amblospermum, asiaticum, aureum, bicolor, cambayense, cinereum, convexum, Cunninghamii, decurrens, divaricatum, fuscum, guyanense, isabelum, macrospermum, Nankin, niveum, pollens purpureum, Rohrianum, rupestre, sarmentosum speciosum, teleium, tenax, trichospermum, virens. virgatum, Rafin. Sylva Tellur. 14-18, omnes formae cultae G. herbacei, barbadensis, arborei, etc.
albiflorum. Tod. Oss. Sp. Cotone, 26 = roseum.
album, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 494=herbaceum1
anomalum, *Wavra & Peyr. in Sert. Benguel.* 21.—Afr. trop.
arboreum, *Linn. Sp. PI.* 693.—Reg. trop.
arboreum, Parl. Sp. Cot. 23. t. 1, partim=neglectum.
arboreum. Veil. FL Flum. vii. t. 29 = brasiliense.
australe, F. Muell. Fragm. i. 46 = Fugosia australis.
australiense, Tod. Oss. Sp. Cotone, 19 = Sturtii.
barbadense, *Linn. Sp. PI.* 693.—Reg. trop.
brasiliense, *Mac/ad. Fl. Jamaic.* i. 72.—Am. trop.
caespitosum, *Tod. Oss. Sp. Cotone,* 64.—Hab.
Cavanillesianum, *Tod. 1. c.* 63.—Am. trop.
cernuum, *Tod. 1. c.* 31.—Hab. ?
chinense, Fisch. *Sc* Otto, ex Steud. Nom. ed. II. i. 70-2 = herbaceum.
costulatum, Tod. Prod. Gossyp. 7 = Fugosia latifolia.
croceum, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 494 =herbaceum.
Cunninghamii, ToiProd.Gossyp. 7 = Fagosiapnnctata, *Benth.*
Davidsoni, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* v. (1873) 82. —Am. bor. occ.
drynarioides, *Seem. Fl. Vit.* 22.—Ins. Sandvic
eglandulosum, Cav. Diss. vi. 364 = herbaceum.
datum, Salisb. Prod. 385-herbaceum.
Figarei, *Tod. in Att. Soc. Agric. Sicil.* iv; *ex Tod. Rel. Cot. Colt.* 12.—Hab.»
flaviflorum, F. Muell. Fragm. ix. 127=Fugosia flaviflora.
frutescens, Lasteyr. Cot. 65. t. 2; ex Tod. Rel. Cot. Colt. 240 = barbadense.
frutieulosum, *Tod. Prod. Gossyp.* 9.—Mexic.
fuscum, Roxb. ex Wight *Sc* Arn. Prod. 448=-barbadense.
glabratum, *Tod. Oss. Sp. Cotone,* 69.—Hab. I
glabrum, Lam. Encyc. ii. 185 = barbadense.
glandulosum, Steud. Nom. ed. I. 881, sphalm.-*eglandulosum.*
gracile, Salisb. Prod. 885-arboreum.
herbaceum, *Linn. Sp. PI.* 693.—As. trop.
kirsutum, Cav. Diss. vi. 812. t. 167 = Cavanillesianum.
hirsutum, Linn. Sp. PL ed. II. 975-herbaceum.
indicum. Lam. Encyc. ii. 134 = herbaceum.
intermedium, *Tod. Oss. Sp. Cotone,* 41.—As. or.

GO8SYPITTM :—
jamaicense, Macfad. Fl. Jamaic. i. 78 - barbadense ?
janiphaefolium, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 242.—Porto Rico.
javanicum, Blume, Bijdr. 74 *• barbadense.
javanicum, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1884) 483.-Ins. Molncc.
Kirkii, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 214.—Afr. trap.
TUatzacbimum, Anders, in Vet. Atad. Handl. Stockk.* 1853 (1855) 228.—Ins. Galapag.
Labillarderianum, *Tod. Prod. Gossyp.* 11.—Ins. Waigion.
lanceolatnm, *Tod. I. c.* 9.—Mexic.
latifolium, Mnrr. in Comm. Gotting. (1776) 82. 1.1 = herbaceom.
leoninum, Medic. Beobacht. (1783) 199 = herbaceum.
macedonicum, Murr. in Comm. Gotting. (1776) 82 •= herbaceuin.
macranthutn, *Tod. Prod. Gossyp.* 11.—Aegypt.
maritimum, Tod. Oss. Sp. Cotone, 83~ barbadense.
mexicanam, *Tod. Ind. Sent. Hart. Panorm.* (1867) 20, 31; *Prod. Gossyp.* 9.—Mexic.
micranthum, Cav. Din. vi. 811; DC. Prod. L 466 = herbaceum.
microcarpnm. *Tod. in Att. Soc. Agric. Sidl.* iv; *exej. Rel. Cot. Colt.* 15.—Mexic.
molle, Mauri, ex Tenore, Cat. Hort. Nap. (1845) 86 — herbaceum.
Nanking, Meyen, Reise, ii. 828—herbacenm.
neglectum, *Tod. Oss. Sp. Cotone,* 85.—Hab. ?
nigrutn, Bnch.-Ham. in Trans. Linn. Soc xiii. (1822) 494 = barbadense, arborenm.
ebtusifolium, Roxb. Hort. Beng. 51; Fl. Ind. iii. 183 = herbacenm.
oliqospermum, Macfad. Fl. Jamaic. i. 74 = barbadense?
pallidnm, *Montr, in Mém. Acad. Lyon,* x. (1860) 181. - N . Caled.
paniculatum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 539 - herbaceum?
parvifolium, Nutt. ex Seem. FL Vit. 22=tomentosum.
perenne, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 587 = barbadense ?
peruvianum, Cav. Diss. vi. 313. t. 168"barbadense.
populifolium, F. MuelL Fragm. ix. 127 - Fugosia populifolia.
prostratum, *Schum. (f Thonn. Besir. Guin. PI.* 311. —Afr. trop.
puberulum, *Klotssch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 128.—Afr. trop.
pubescens, *Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848) 834.—Gnian.
punctatum, Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 62 - herbacenm.
punctatum, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 309 - barbadense.
puniceum, Fenzl, in Jacq. Eclog. ii. 7. t. 184=sangnineum.
purpurascens, Poir. Encyc. Suppl. ii. 369=arborenm.
racemosum, Poir. L c. 870 — barbadense.
religiosum. Linn. Syst. ed. XII. 642-herbaceum.
religiosum, Parl. Sp. Cotoni Firenz. (1866) 64. t. 4 = barbadense.
Rhorii, *Tod. Prod. Gossyp.* 10.—Hab. ?
Robinsoni, *F. Muell. Fragm.* ix. 126.—Austral,
rosenm, *Tod. Oss. Sp. Cotone,* 22.—Hab. ?
Roxburghii, Tod. 1. c. 45 = neglectum.
Royleanum, Tod. 1. c. 40,41 = intermedium.
rubicundum, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 55 = arboreum.
rubrum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 88 = arboreum.
rufum, *Scop. Delic. Insub.* iii. 70.—China.
sandvicense, Parl. Sp. Cotoni Firenz. (1866) 87. t. 6 = tomentosum.
sangnineum, *Hassk. in Horn. & De Vriese, Tijdschr.* xii. (1845) 98.—Java)
senarense, Fenzl, ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 211 — anomalum.
siamense, Tenore, in Att. 1st. Incorr. Nap. vi. (1840 ?) 139-herbacenm.
sinense, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. 56, nomen = herbaceum.
Stocksii, *Mast, in Hook. f. FL Brit. Ind.* i. 346.—Sindh.
strictum, Medic. Beobacht. (1788) 195-herbaceum.
Sturtii, *F. Muell. Fragm.* iii. 6.—Austral,
suffruticosum, *Bertol. Diss. PI. Nov. et Byss. Antiq.* 6. —Ind. or.

GOSSTPIUM :—
taitense, *Parl. Sp. Cotoni Firent.* (1866) 89. t. 6. f. A.—Ins. Tahiti.
thespesioides, F. Muell. Fragm. ix. 27 - Fugosia thespesioides.
Thurberi, *Tod. Prod. Gossyp.* 7.—Mexic.
tomentosum, *Nutt. ex Seem. Fl. Vit.* 22.—Ins. Sandvic.
tricuspidatum, Lam. Encyc. ii. 186=herbaceum.
mitifolium. Lam. 1. c. 185 = barbadense.
vitifolium, Roxb. Hort. Beng. 51; Fl. Ind. iii. 186- um.
Walckottianum, Tod. Rel. Cot Colt. 119-SturtiiI
Wightianum, *Tod. Oss. Sp. Cotone,* 47.—Ind. or.

GOTHOFREDA, Vent. Choix, 36. t. 60 (1803) = Oxypetalum, R. Br. (1809) (Asclepiad.).
cordifolia, Vent 1. c—O. riparium.

GOUANA, Linn. Sp. PI. ed. II. 1663 (1763) -seq.

GOUANIA, Jacq. Stirp. Select Am. 263 (1763;.
RHAMNEAE, Benth. & Hook. f. i. 385.
NABGELIA, Zoll. & Mor. Verz. 20 (1846).
RETINARIA, Gaertn. Fruct. ii. 187 (1791).
acalyphoides, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 108.—Bras.
alnifolia, *Reiss. 1. c.* 106.—Peruv.
aphrodes, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sir. IV. viiL (1867) 132.—Madag.
aptera, *DC. Prod.* ii. 39.—Am. trop.
aptera, Poepp. ex Reiss. in Mart FL Bras. xi. 1.106 = alnifolia.
australiana, *F. Muell. Fragm.* iv. 144.—Austral,
bancana, *Teijsm. If Binn. Cat. Hort. Bog.* 221, nomen. —Ins. Banca.
Blanchetiana, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 797.—Am. trop.
Brandisi, Hassk. in Flora, liv. (1871) 280, in nota = microcarpa.
brasiliensis, *Hoffmgg. Vert. Pfi. Nachtr.* ii. 126.—Bras,
canescens. *Rich, ex Poir. Encyc. Suppl.* ii. 820.—Guian.
chrysciphylla, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 108.—Bras.
colurnaefolia, *Reiss. 1. c.* 107.—Bras.
cordifolia, Raddi, in Mem. Mod. xviK. Fis. (1820) 395 = Reissekia smilacina.
comifolia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 107.—Bras.
corylifolia, *Raddi, in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 394.—Bras.
crenata, *Lam. Encyc.* iii. 5.—Am. austr.
cyclocarpa, 5m. *in Rees, Cycl.* xvi. n. 8.—Ind. occ.
dasyantha, *Miq. Anal. Bot. Ind.* iii. 6.—Ind. or.
denticulata, *Sm. in Rees, Cycl.* xvL n. 4.—Ind. or.
discolor, *Benth. in Hook. Km Journ.* iv. (1852) 12.—Bras.
domingensis, Aubl. PL Gni. ii. 804=striata.
domingensis, Blanco, Fl. Filip. ed. L 196 — microcarpa.
domingensis, *Linn. Sp. PL* ed. II. 1668.—Ind. occ.
eriocarpa, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 133.—Ins. Comor.
frangnlaefolia, *Radii, in Sit»b. Math.-Phys. Acad. Muench.* viii. (1878) 393.—Venezuela.
frangulaefolia, Willd. ex Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. I. 105 = Blanchetiana.
glabra, Jacq. Select. Am. 264-domingensis.
glabriuscula. Stokes, Bot. Mat. Med. i. 436-domingensis.
glandulosa, *Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 129.—Madag.
Hilliі, *F. Muell. Fragm.* viii. 163.—Austral.
hypochroa, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 106 Bras.
indsa, Vahl, Symb. Bot. iii. 101-mauritiana.
inomata, *Reiss. in Mart. Fl. Bras-* xi. I. 109.—Bras.
integrifolia, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xl. (1871) II. 49—microcarpa.
integrifolia, *Lam. Encyc.* iii. 6.—Hab. t
integrifolia, Meyen, Reise, ii. 160 — Meyeni.
javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 649.—Java.
lanceolata, Wall. Cat. n. 4273 = Helinus lanceolatus.
latifoUa, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 103.—Bras,
laxiflora, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1867) 130.—Malacca,
leptostachya, *DC. Prod.* ii. 40.—Ind. or.; Malaya.

OOTTANIA:—
leptostachya, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. HI. Nov. App. 49 = microcarpa.
lineata, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. viii. (1867) 131.—Madag.
longipetala, *Hemsl. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 383.—Afr. trop.
madagascariensis, Rich, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 129 = glandulosa.
martinicensis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 820 = pubescens.
mauritiana, *Lam. Encyc.* iii. 4.—Ins. Mascar.
Meyeni, *Steud. Norn.* ed. II. L 703.—Ins. Sandvic.
microcarpa, *DC. Prod.* ii. 40.—Ind. or.; Malaya,
mollis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 104.—Bras,
myriocarpa, *Tul. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. viii. (1857) 132.—Madag.
napalensis, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 417-—Reg. Himal.
obtusifolia, *Vent, ex Brongn. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. x. (1827) 379.—Am. austr.
orbicularis, Walp. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl- i. (1843) 823 = Meyeni.
paniculate, *Spring. Neue Entdeck.* iii. 49.—Ins-S. Doming,
pannigera, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 134=speciosa.
petiolaris, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 108.—Bras,
pubescens, *Lam. Illustr.* t. 845. f. 1; ex Poir. Encyc. SuppL ii. 819.—Ind. or.
pyrifolia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 110.—Bras.
Retinaria, DC. Prod. ii. 40=tiliaefolia.
Richii, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 282.—Ins. Fiji.
riparia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi.*. 104.—Bras,
rumicina, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. xvi. (1872) 382.—N. Granat.
sericea, Hilsenb. ex Presl, Bot. Bemerk. 89 = speciosa-
Sieberiana, Schlecht. ex Presl, 1. c =tiliaefoUa *1*
smilacina, Sm. in Rees, Cycl. xvi. n. 8 =-Reissekm smilacina.
Stadtmanni, Soyer-Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii-(1796) 68-tiliaefolia.
stipularis, *[Mof. (f Sesse,] ex DC. Prod.* ii. 39.—Mexic
striata, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (17W 118.—Guian.
sulcata, *Bflj. Hort. Maurit.* 71.—Madag.
tiliaefolia, *Lam. Encyc.* iii. 4.—Ins. Mascar.
tiliaefolia, Rottb. ex DC. Prod. ii. 40 = microcarpa.
tiliaefolia, Roxb. PL Corom. i. 67. t. 98 - leptostachya.
timorensis, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) —Ins. Timor.
tomentosa, *Jacq. Select. Am.* 263.—Ind. occ.
trichodonta, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 108.—Peruv.
nlmifolia, *Hook. &• Am. in Hook. Bot. Misc.* iii- (1853) 174.—Chili.
nlmifolia, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V-xvi. (1872) 382.—N. Granat
urticaefolia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. Bras.
velutina, *Reiss. I. c.* 105.—Guian.
virgata, *Reiss. 1. c.* 104.—Bras.
vitifolia, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i- (1853) Ins. Sandvic.

GOUAREA, Hedw. f. Gen. 274 (1806) = Ou»tf« Allem. (Meliac).

GOUDENIA, Vent Tabl. ii. 473 (1799)-Gooden»-Sm.

GOUDOTIA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. Ill- (1846) 84. t. 4=Distichia, Nees (Juncac).
tolimensis, Decne. 1. c. 85 = D. tolimensis.

GOUFFEIA, Robil. & Cast, ex DC. Fl. Fr. vi. ## (1815)*=Arenaria, Rupp. (Caryophyll.).
arenarioides, Robil. & Cast. 1. c. = A. Gouffeia.
crassiuscula, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. t. A. holosteoides.
kolosteoides, C. A. Mey. Verz. *Vi.* Cauc. holosteoides!
stricta, Fenzl, Verbr. Alsin. Ub. ad p. 57 = Buffonia brachyphylla.

GOUGHIA, Wight, Ic v. 22. t. 1878, 1879 (1852) = Daphaiphyllum, Blnme (Euphorb.).
Griffithiana, Wight, 1. c. = D. laurinum.
Mmalensis, Benth. in Hook. Kew Joum. vi. (1854) 9 — D. himalayense.
lauTitta, Benth. 1. c. = D. laurinum.
"Ugheriensis, Wight, Ic. v. t 1878, 1879 - D. glaucescens.

GOUINIA, Fonm. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1178 (1883) = Peatuoa, Toum. (Gramin.).
Polyganut, Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 581—F. Foumieriana.

GOULDIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. Iv. (1860) 810. *RUBIACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 77.
aullarts, *Wawra, in Flora,* lvii. (1874) 297.—Ins. Sandvic.
Komanzoffiensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 810.—Ins. Sandvic
Wndwicensis, *A. Cray, I. c*—Ins. Sandvic.

°OTTPIA, AubL PL Gui. i. 295. t. 116 (1776). *CELASTRINEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 869.
OUMSOPETALUM, Schreb. Gen. i. 206 (1789).
GVFIA, Jaume St Hil. Expos, ii. 267 (1805).
glabra, *Aubl. PI. Gui.* i. 296.1.116.—Guiana.
«n>entosa, *Aubl. I. c*— Guiana.

GOURLIEA, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii (1883) ?07. t. 106. *LEGUMINOSAE,* Benth. ft Hook. f. ' 555.
eWlensis, *Clas. in C. Gay, Fl. Chil.* ii. 21ft—Chili.
Oecorticans, *Gill, ex Hook. Bot. Misc.* iii. (1883) 208. —Chili.

GoVANA, All. Misc. Tanr. v. 93 (1773)=Gouania, J»cq. (Rhamn.).

GOVANIA, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 394, 395 = praec.

C:oVANIA, Wall. Cat. n. 7851, nomen (18471) = ?*votia, Griff. (Euphorb.).
"'"*», Wall. 1. c. = Givotia rottleriformis.

GO 09 (1831).
OgCHIDEAE, Benth. ft Hook. f. iii. 548.
EUCNEMIS, LindL Gen. et Sp. Orch. 181 (1833).
alba, (1846) 25,-Mexic.
^neuxii, *Reichb.f. in Bot. Zeit.* x. (1862) 835.— Mexic.
"irbata, *Poepp. &• Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 5.— remv.
bf evilabris, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* UL 249.- Mexic.
debilis*ata, Lindl. Bot. Reg.* sub t1786.—Mexic. 836.—
MexT-1 *RHMh f, in Bot, ZeiU* (18M)
**?*« *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 70.- "jinezuela.
U» ?. *Hcok_ Bot_ M «8-* »• 866O.-Bras.
Lindl. Bot. Reg. (1839) *Misc.* 46.- Mexic.
liliacea, *Lindl. l. c.* sub t. 1795; *et* (1838) t. 12.— Mexic.
limbata, Grise - Fl. Brit W. Ind. 628 (sp. delend.).
nutica, Mexic.
pauciflora, *Ann. & Mag.* (1842) 184.—Mexic.
quadriplicata, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 75.— Costa Rica.
pburea, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1895) 7i— Paraguay.
superba, *Hort.* in *Mtt. Bot. Cab.* t. 1709.—Mexic.
tingens, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* ii. 5.— Peruv.
utricul«a, *Lindl. Bot. Reg.* (1839) *Misc.* 47, in obs.— Ind. o<*.; Mexic.

GOVINDOOIA, Wi- Ic. vi. 1853) = Tropidia, ^ V«hid.).
nervosa, Wight, L c.—Ind. or.

GOVINDOVIA, C. (1861) = praec.

OBABOW8KIA, Schlecht. in Linnaea, vii. (1882) 71. *SOLANACEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 899.
PUKAXTHUS, Rafin. Sylva Tellur. 53 (1838).
boerhaaviaefolia, Lindl. Bot. Reg. t. 1985 = Lindleyi.
boerhaaviaefolia, *Schlecht. in Linnaea,* vii. (1882) 72. —Peruv.
cuneifolu, *Dunal, in DC. Prod.* xiii. I. 20.—Bras,
disticha, *Walp. Rep.* üi. 118.—Peruv.
duplicate, *Am. in Linnaea,* xi. (1837) 485.—Bras.
Lindleyi, *Sendt. in Mart. ft. Bras.* x. 157.—Bras.
Meyeniana, *Walp. Rep.* iii 113.—Peruv.
obseura, Dunal, in DC. Prod. xiil. I. 20, sphalm.=seq.
obtusa, *Am. in Linnaea,* xi. (1837) 486.—Peruv.
Schlechtendalii, *Sendt. in Mart. ft. Bras.* x. 156.— Bras.

GRABOWSKYA, Endl. Gen. 645 (1839) = praec.

GRACILEA, Koen. ex Rottl. in Ges. Nat. Fr. NeueSchr. iv. (1803) 218 = FommereuIa, Unn, f. (Gramin.).
nutans, Koen. L c.=P. monoeca.

OBAJOEBIA, Benth. in DC. Prod. x. 621 (1846). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 970.
BOPUSIA, Presl, Bot. Bemerk. 91 (1844), nomen prius.
fruticosa, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 84,-Ins. Socotra.
scabra, *Benth. in DC. Prod.* x. 621.—Air. austr.

GBAEPPEA, Seem. Fl. Vit. 27. t. 6 (1866). *TILIACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 986.
calyculata, *Seem. I. c*—Ins. Fiji.

GRAEFFENRIEDA, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1375, 1431 (1840) - Graffenrieda, DC. (Melast.).

OBAEIiIiBIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. xvii. (1842) 172. *CRUCIFERAE,* Benth. ft Hook. f. i. 72.
saxifragaefolia, *Boiss. I. c.* 173.—Persia.

GRAEMIA, Hook. Exot. FL t. 189 (1827)-Cephalophora, Cav. (Compos.).
aromatica, Hook. L c - C. aromatica.
aromatica, Poepp. ex DC. Prod. v. 601.= Podanthus Mitiqui.

GRAEVIA, Neck. Elem. ii. 253 (1790) - Grewia, Linn. rTiliac.).

GBAPFENKLEDA, DC. Prod. iii. 105 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 750.
CVCNOPODIUM, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. iv. (1845) 62.
anomala, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 71.—N. Granat.
brachycentra, Griseb. in Mem. An,. Acad. N. S. viii. (1861) 186=Tetrazygia brachycentra.
caryophyllea, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 69.—Bras.
chrysandra, *Triana, I. c.* 70.—Cuba,
conostegioides, *Triana, 1. c.* 69.—N. Granat.
emarginata, *Triana, I. c.* 71.—Peruv.; N. Granat
excelsa, DC. Prod. iii. 106 = Centronia excelsa.
floribunda, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 71.—Peruv.
intermedia, *Triana, 1. c.*—Peruv.
jucunda, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 145. t 276- Miconia jucunda.
latifolia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 71.—Am. trop.
laurina, *Triana, 1. c.* 70.—Bras,
limbata, *Triana, 1. c.*—Peruv.
miconioides, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IIL xviii. (1852) 118.—Bras.
Moritziana, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 70.—Venezuela.
obliqua, *Triana, I. c.* 71.—Guian.
obtusa, Griseb. Cat. PI. Cub. 103, partim = Miconia obtusa.
ovalifolia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 117. t.6.f. 4-Weddellii.
patens, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 70. —Bras.
rotundifolia, *DC. Prod.* iii. 106.—Venezuela,
•essilifolia, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 70.—Guian.
Weddellii, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IIL xvili. (1862) 117.—Bras.

GRAFFENRIEDERA, Reichb. Consp. 174 (1828)- praec.

GRAFFENRIEDIA, Spreng. Gen. i. 841 (1830)- praec.

GRAFIA, Reichb. Handb. 219 (1837) - Pleuro-Bpermum, Hoffm. (Umbellif.).

GRAHAUIA, Gill, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 831. *PORTULACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 157.
XERANTHUS, Miers, Trav. Chil. ii. 629 (1826), nomen.
bracteata, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 332.— Chili.

GRAHAMIA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 297, 299 = Cephalophora, Cav. (Compos.).
aromatica, Spreng. 1. c. 299 - C. aromatica.

OBAMEKItTM, Desv. Opusc. 61 (1831). *GRAMIN EAE.*
convolutnm, *Desv. 1. c.*—Chili.

QBAHMADENIA, Benth. PI. Hartw. 218 (1846). *MYRSINEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 644.
lineata, *Benth. I. c.*—Guiana,
marginata, *Benth. 1. c.*—N. Granat.
parasitic-*, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 393.—Ind. occ.

QKAMMAWQIS, Reichb. f. in Harab. Gartenz. xvi. (1860) 520; et Xenia Orch. ii. 17 (1873))- *ORCHIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 637.
Ellisii, *Reichb.f. II.* «.—Madag.
falcigera, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1885) 641.— Madag. ?
Huttoni, Benth. ft Hook. *I* Gen. iii. 588 - Cymbidium Huttoni.
pardalina, *Reichb. f. in Flora,* lxviii. (1885) 641.— Madag. ?

GRAJOCAOTFHES, DC. Prod. iii. 892 (1828). *CRASSVLACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 658.
VAUANTHES, Haw. Revis. PI. Succ. 18 (1821), nomen prius.
caesia, E. Mey. ex Harv. ft Sond. Fl. Cap. ii. 331 = gentianoides.
chloraefiora, DC. Prod. iii. 892=geniinnoides.
chloraefolia, Steud. Norn. ed. II. i. 70S = praec.
depressa, Eckl. & Zeyh. Enum. 308-gentianoides.
filiformis, Eckl. ft Zeyh. 1. c =• gentianoides.
fiava, E. Mey. ex Harv. ft Sond. Fl. Cap. ii. 831-= gentianoides.
gentianoides, *DC. Prod.* iii. 393.—Afr. austr.
retroflexa. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 - gentianoides.
sebaeoides, Eckl. ft Zeyh. Enum. 308-gentianoides.

GRAMMARTHEON, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1508 (1828)- seq.

GRAMMARTHRON, Cass. In Bull. Soc. Philom. (1817) 32=Doronicum, linn. (Compos.).
biligulatum, Cass. in Diet. Sc. Nat. xix. 295 = D. Clusii.
oppositifolium, Cass. I.e. 296 = Arnica nudicaulis.
scorpioides, Cass. 1. c. 294.—D. grandiflorum.

GRAMHATOCABPUS, Presl, Symb. Bot. i. 59. t. 88 (1831). *LOASEAE,* Benth. ft Hook. £ i. 806.
SCYPHANTHUS, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. 1.1. 288 (1828), nomen prius.
Cumingii, *Presl, Epim. Bot.* 246.—Chili,
volubilis, *Presl, Symb. Bot.* i. 60.—Chili.

OP.AMTffATOPHYIJ.UM, Blume, Bijdr. 377. t. 20 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 639.
GABERTIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 425 (1826).
PATTONIA, Wight, Ic. 1.1750 (1851).
Atgua, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) II. 776.— Ins. Pacif.
elegans, Walp. Ann. in. 1028 ind., sphalm.-Cyperorchis elegans.
Ellisii, Lindl. in Bot. Mag. t. 6179-Grammangu Ellisii.

CHtAMltATOPHYIiIiUM :—
fastuosum, Lindl. & Paxt Flow. Gard. ii. (1851-52) 159=speciosum.
Fenzlianum, *Reichb. f. Xenia Orch.* ii. 16.—Ins. Amboin.
Finlaysonianum, Lindl. in Wall. Cat. n. 7561 = Brombeadia palustris.
giganteum, Blume. ex Reichb. f. in Linnæa, xli. (1877) 107, in obs. sphalm.?-speciosum.
macranthum, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 16 = speciosum.
multiflorum, *Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 46.—Ins. Philipp.
paludosum Griff. Notul. iii. 344=Dipodium paludosnm. ,
pantherinum, *Rnchb. f. in Gard. Ckron.* (1878) I. 788.-N. Guinea.
pantherinum, Zipp. ex Blume, Rumphia, iv. 50 = Vanda lissochiloides.
pubescens, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 6S0, sphalm. = seq.
pulchrum, Span, in Linnaea, xv. (1841) 477, nomen = Vanda insignis.
Roemplerianum, *Reichb. f. in Gard. Ckron.* (1877) I. 240.—Madag.
Rumpbianum, *Miq. Ann. Mus. Bet. Lugd. Bat.* iv. 219.—Ins. Molucc.
scandens, Griff". Notul. iii. 845-=Dipodium pictum.
scriptum, Blume, Rumphia, iv. 48 = speciosum.
speciosum, *Blume, Bijdr.* 378.— Malaya.
Wallisii, *Reichb. f. in linnaea*, xli. (1877) 107.—Ins. Philipp.

GRAMMATOTHECA, Presl, Prod. Monog. Lobel. 43 (1836)= Lobelia, Linn. (Campan.).
Bergiana, Presl, 1. c. 44 —L. Bergiana.
Dregeana, Presl, 1. c.=L. Bergiana.
Eciloniana, Presl, 1. c. = L. Bergiana.
erinoides, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 532 - L. Bergiana.
Meyeriana, Presl, Prod. Monog. Lobel. 44 — L. Bergiana.
Mundtiana, Presl, 1. e.«=L. Bergiana.

GRAMMICA, Lour. Fl. Cochinch. 170 (1790) - Cuscuta, Linn. (Convolv.).
americana, Des Moul. in Bull. Soc Bot. Fr. i. (1854) 298 = C. americana.
aphylla, Lour. Fl. Cochinch. 171 = C. chinensis.
arabica, Des Moul. in BuU. Soc. Bot. Fr. i. (1854) 298 =C. arabica.
Chrysocoma, Des Moul. 1. c.=C. australis.
obtusiflora, Berthiot, in Billotia, i. (1864) 15 = C. australis.
suaveolens, Des Moul. in Bull. Soc. Bot. Fr. i. (1854) 298-C. racemosa.

GRAMMOCARPUS, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 18 - TrigoneUa, Linn. (Legumin.).
caeruleus, Schur, 1. c » T. caeralea.
procumbent, Schur, Enum. PL Transs. 152 = T. Besseriona.

5RAMMOPETALUM, C. A. Mey. ex Meinsh. in linnaea, xxx. (1859-60) 514 = Trlnia, Hoffm. (Umbellif.).
Ledebourii, C. A. Mey. I. c.-T. Kitaibelii.

3RAMM0SCIADIUM, DC. Coll. Mém. v. 62 (1829); et Prod. iv. 232 (1830j = ChaerophyUum, Linn. (Umbellif.).
Aucheri, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. III. ii. (1844) 67. —Armen.
daucoides, DC. Coll. Mém. v. 62. t. 2. f. K.—As. Min.
Hausssknechtii, Boiss. Fl. Orient, ii. 901.—Syria.
Kotschyi, Bourg. ex Boiss. 1. c. 899 = *daucoides.*
longilobum, Boiss. & Haussk. ez Boiss. 1. c. 900.—Persia.
macrodon, Boiss. in Ann.Sc Nat Sér. HI. ii. (1844) 67.—Armen.
meoides, DC. Coll. Me'm. v. 63 = C. macrospermum.
platycarpum, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient ii. 901.—Persia.
pterocarpum, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. III. ii. (1844) 68.—As. Min.
scabridum, Boiss. 1. c. 66.—Armenia.
Stowitsii, Boiss. 1. c. 67=*daucoides.*

GRANADILLA, [Toura.]. Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 166 (1745)-Paasfflora, Linn.
capsularis, Medic. Malv. 96=P. capsularis.
coerulea, Medic. 1. c.=P. coerulea.
foetida, Gaertn. Fruct i. 289. t. 60 = P. foetida.
Hondala, Gaertn. 1. c ii. 480 - Modecca palmata.
incarnata, Medic. Malv. 96 = P. incarnata.
laurifolia. Medic. 1. c 97=P. laurifolia.
lutea, Medic. I.e. 96=P. lntea.
normalis, Gaertn. Fruct. ii. 479= P. perfoliata.
quadrangularis, Medic. Malv. 97 = P. quadrangularis.
rubra, Moench.Meth. SuppL 15 = P. rubra.
serratifolia, Medic. Malv. 97 = P. serratifolia.
suberosa, Gaertn. Fruct. ii. 480 = P. suberosa.
Vespertilio, Moench, Meth. SuppL 14 = P. Vespertilio.

GRANATUM, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 132 = Punica, Toum. (Lythrar.).
punicum, St. Lag. 1. a—P. Granatum.

GBANDLDIERA, Jaub. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 467. *BIXINEAE*, Benth. & Hook. £ i. 971.
Boivini, *Jaub. 1. c.*—Afr. trop.

OBANGKBA, Adans. Fam. ii. 121 (1768). *COMPOSITE E*, Benth. & Hook. f. ii. 261.
PYRARDA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xli. 120 (1886).
Adansonii, Cass. in Diet. Sc Nat. xix. 304 = maderaspatana.
aegyptiaca, DC. Prod. v. 373 =maderaspatana.
bicolor, Loud. Hort. Brit. 354 = Dichrocephala latifolia.
ceruanoides, Cass. in Diet. Sc. Nat xix. 307 = maderaspatana.
chinensis, Loud. Hort. Brit. 354 = Centipeda orbicularis.
cinerea, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 344-Cotula cinerea.
cuneifolia, Poir. Encyc Suppl. ii. 825 =• Centipeda orbicularis.
decumbens, Desf. Tabl. ed. 1.95 = Centipeda orbicularis.
dissecta, Boj. ex DC. Prod. v. 372 = Dichrocephala latifolia.
galamensis, Cass. in Diet. Sc. Nat. xix. 807=maderaspatana t
lanceolata, Poir. Encyc. Suppl. ii. 826 = Eclipta erecta.
latifolia, Lam. ex Poir. 1. c=Dichrocephala latifolia.
madagascariensis, *Vatke, in Bremen, Abh.* ix. (1885) 120.—Madag.
maderaspatana, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 825.—As. et Afr. trop.
minima, Poir. I. c.-Centipeda orbicularis.
minima, *Zipp. ex Span, in Linnaea*, xv. (1841) 322, nomen.—Ins. Timor.
minuta, Poir. Encyc. Suppl. ii. 825=Centipeda orbicularis.
mucronata, Bnch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 3236-Cotula hemisphaerica.
procumbens, DC. Prod. v. 373-maderaspatana.
sonchifolia, Loud. Hort. Brit. 354 = Dichrocephala latifolia.
Sphaeranthus, C. Koch, in Bot. Zeit. i. (1843) 41, in obs.—maderaspatana.

GRANGERIA, Comm. ex Juss. Gen. 340 (1789). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 607.
borbonica, *Lam. Encyc.* iii. 21.—Ins. Mascar.
brasiliensis, Hoffmgg. ex Mart. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1829-30) 878 = Hirtella ciliata.
buxi/olia, Sm. in Rees, Cyclop, xvi. n. 1 —borbonica.
madagascariensis, *O. Hoffmgg. Serf. Madag.* 15.—Madag.
porosa, *Boiv. ex Baill. Adansonia*, viii. (1868) 200.—Madag.

GRANIERA, Mand. *Sc* Wedd. ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 799 (1867)=Abatia, Ruiz & Pav. (Samyd.).

GBANTIA, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 79 (1845). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 332.
PERRALDERIA, COSS. in Bull. Soc Bot. Fr. vi. (1859) 394 ; et in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 209. t 12.
arachnoidea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 79.—Persia.
Aucherii, *Boiss. 1. c.*—Persia.
coronopifolia, *Benth. (f Hook.f. Gen.* ii. 332.—Algeria,
discoidea, *Bunge, ex Boiss. FL Orient*, iii. 214.—Persia.

GRANTIA, Griff, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 692 (1845) ; et Notul. iii. 228 (1851)=Wolffla, Horkel (Lemnac).
globosa, Griff. 11. cc. 229, 692 - W. Michelii.
microscopica,<itifi. 11. oc. = W. microscopica.

GRAPHEPHORUM, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 189. *GRAMINEAE*, Benth. « Hook. f. Ui. 1197.
DUPOKTIA, R. Br. in Parry, 1st Voy. Suppl. 290. (err. typ. 190) (1824).
FLUMINIA, Fries, Summ. Veg. Scand. 247 (1646).
SCOLOCHLOA, Mert. *Sc* Koch, in Roehl. Dentschl. Fli. 874, 528 (1828).
altijngum, *Fount, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877; 182.-Mexic.
arandinaceum, *Aschers. Fl. Brandenb.* 852.—Enrop. ,
densiflorum, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877; 182.—Mexic.
Elliottii, *Kunth, Rev. Gram.* i. 80.—Am. bor.
festucaceum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1862; 191.—Europ.; Am. bor.
Fischeri, *A. Gray, 1. c*—Reg. Arct.
flexnosum, *Thurb. in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1ow (1864) 78.—Am. bor. occ.
fulvum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1862) W*—*Europ. \ Am. bor.
melicoides, Beauv. Agrost. 77. t. 15. f. 8 = seq.
melicoideum, *Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom.* »• (1810) 189.—Am. bor.
pendulinum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (186JJ 191.—Europ.; Am. bor.
psilosanthum, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* *xfv- (1877) 182.—Europ. bor.
Wolfii, *Coult. Man. Rocky Mount. Bot.* 428.—Am-bor. occ.

GRAPHIOSA, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 128* Lathyrus, Toum. (Legumin.).
inconspicua, Alef. 1. c.=L. inconspicuus.

GKAPHI8TEMMA, Champ, ex Benth. & Hook. <• Gen. ii. 760 (1876). *ASCLEP1ADEAE*, Benth. » Hook.f. 1. c.
pictum, *Champ, (in Herb. Kew.)*.—China.

ORAPTOPHYIiLirM, Nees, in Wall. PI. As. R«; iii. 76, 102 (1832). *ACANTHACEAE*, Benth. * Hook. f. ii. 1118.
EARLIA, F. Muell. Fragm. iii. 159 (1863).
MARAMA, Rafin. Fl. Teller, iv. 62 (1836).
Earlii, *F. Muell. Fragm.* vi. 87.—Austral,
hortense, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* jii. 102.—As. tf°P-
ilicifolinm, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iv. 658^ Austral.
mediauratum, Linden *Sc* Andrć, ex Linden, Cat n. (1871) 4=Aphelandra mediaurata.
pictum. Griff. Notul. iv. 139 = hortense.
siphonostenum, *F. Muell. Fragm.* vi. 87, in obs.—J" Fiji,
spinigerum, *F. Muell. 1. c.* xi. 17.—Austral.

GRASTIDIUM, Blume, Bijdr. 333 (1825) » D*"' drobium, Sw. (Orchid.).
acuminatissimum, Blume, 1. c. = D. acuminatissmU"'
rugosum, Blume, 1. c. = D. rngosum.
salaccense, Blume, 1. c.-D. salaccense.

QHATIOLA, [Rupp.] Linn. Gen. ed. I. 338 (17»7)-*SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. »• »"
DERLINIA, Neraud, in Freyc. Voy. Bot 28 (182«;-
FONKIA, Phil, in Linnaea, xxx. (1859-60) 198.
GONATIA, Nutt. ex DC. Prod. x. 596 (1846).
NIBORA. Rafin. Fl. Ludov. 36 (1817). cvst.
SOPHRONANTHE, Benth. in Lindl. Introd. Nat. =/ ed. II. 445 (1836).
acuminata, Franck. ex Benth. in DC. Prod. *• *"" virginiana.
acuminata, Vahl, Enum. i. 92 = sphaerocarpá.
acuminata, Walt. FL Carol. 61-Herpestis "'g
alata, Koxb. Hort. Beng. [80]; Fl. Ind. l. Torenia alata.
amara, Roxb. U. cc. 4,185=Cnranga amara.
anagallidea, Michx. FL Bor. Am. i. SH gratioloides.
Anegallis, BeyT. ex Benth. in DC. Prod. *• *" viscosa.
angustifolia, GUib. FL Utuan. i. 123 - offional*

GBATIOLA:—
aphylla, Roth, Nov. PI. Sp. 7 = Dopatrium nudicaule.
aromatlca, Pers. Syn. i. 14 = Limnophila gratissima.
aspera, Roth, Nov. PI. Sp. 11-Vandellia Crustacea.
attenuata, Spreng. Syst. i. 89 = Ilysanthes gratioloides.
anrea, *Muhl. Cat.* ed. I. (1813); *Le Conte, in Ann. Lye. N. York,* i. (18241 106.—Am. bor.
betonidfolia, J. F. Gmel. Syst. 1557, sphalm.=*veronicifolia.*
brachycarpa, Walp. Rep. iv. 440 (Index) sphalm. = Ilysanthes capensis.
brevifolia, *Rafin. Atl. Journ.* 176 (Quid ?).—Am. bor.
Broteri, Nym. Consp. 536-officinalis.
caroliniensis, Le Conte, in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 105-sphaerocarpa.
caroliniensis, Push, Fl. Am. Sept. i. 12, in syn.= virginiana.
cataracta, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1811) 356, nomen (Quid ?).—Am. bor.
chamaedrifolia, Lam. Encyc. iii. 27 = Limnophila gratissima.
Chamaedrys, *Roth, Nov. PL Sp.* 10.—Ind. or.
dliata, Colsm. Prod. Desc. Grat. 14-Bonnaya veronicaefolia.
dliata, Koen. ex Vahl, Enum. i. 97 — Bonnaya reptans.
cordifolia, Colsm. Prod. Desc. Grat. 15; Vahl, Enum. i. 97-Vandellia pedunculata.
crassifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. l=linifolia.
cuneifolia, Roxb. Hort. Beng. 80; Fl. Ind. i. 142 = Dopatrium nudicaule.
debilis, Heyne, in Wall. Cat. n. 3946 = Ilysanthes rotundifolia.
dilatata, Muhl. Cat. ex Spreng. Syst. i. 39 = Ilysanthes gratioloides.
domingensis, Gaertn. f. Fruct. iii. 189 = Ilysanthes gratioloides.
Drummondii, *Benth. in DC. Prod. x.* 405.—Am. bor.
<*iubia,* Linn. Sp. PL 17 - Ilysanthes gratioloides.
[illegible]*bracteata, Benth. ex A. DC. in DC. Prod.* x. 595.— [illegible] 1839. Bor. occ. ii. (1834)
[illegible] *Am. bor.*
glabra, Walp. Rep. in *Joum. Acad. Philad.* y [illegible] ii. 287, sphalm. = peruviana.
glandulifera, *Colenso, in Trans. N. Z* [illegible] vii. (1885) 245.—N. Zel.
gooden[illegible]folia, Hornem. Enum. PI. Hort. Hafn. (1807) i» = Mazus rugosus.
SnnlK, Benth. in DC. Prod. x. 402—Texas.
eran[illegible]ftflora, Retz. Obs. iv. 8 ; Roxb. PI. Corom. ii. 42. «. 179=Bonnaya veronicaefolia.
srsndtflora, Willd. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 537-C Bonnaya braehiata.
hS -i, [illegible] *Hook* -*f*- ^ *Brit. Ind.* iv. 273.—Assam.
[illegible]Kpidula, *Comm. ex Vahl, Enum.* i. 94.—Java.
[illegible] «;«, Walp. Rep. iii. 286 = Stemodia lobelioides.
«m<#,/y,oi Salisb, Prod. 105-Ilysanthes hyssopioides.
"yssoptotdes, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 11 = Bonnaya reptans.
[illegible] *Uaa, Mant,,* iK 174 ~ IlTsanthes hvss0_ piofdes.
bssopioides, Low. Fl. Cochinch. 22 = Morgania nyssopioides.
"Vxopioides, Roxb. PI. Corom. ii. 16. t 128-Dopatnnm lobeUoides.
[illegible]»«*?«o/w, Walt Fl. Carol. 61 = Herpestis nigrescens.
[illegible] *anfolia,* Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 187 = [illegible] Wall[illegible]» erecta.
[illegible] [illegible] Kitex SP^e- Pngill. i. 1 - Vandellia erecta.
«*ofcn-ata, Roxb. Hort Beng. [80]; Fl. Ind. i. 137-Epi.themaRoxburghii.
[illegible] Ronica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* Ii. 117.—Japon.
[illegible] Roxb. PI. Corom. ii. 16. t 129=Dopatrinm JWiceum.
[illegible] R- Br. Prod. 435-peruviana.
[illegible] *nfoli,* Herb. Madr. ex Wall. Cat sub n. 8862 = [illegible] a tenuifolia.
[illegible] Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 225. t. 31-[illegible]
linifolia, *Vahl, Enum.* i. 89.—Lnsitan.
lobelioides, Retz. Obs. iv. 7-Dopatrium lobelioides.
lucida, [illegible], ex Wall. Cat. sub n. 3935-Limnophila conferta.
lucida, WilW. Sp. PI. i. 103-Vandellia Crustacea.
[illegible] *fin. in Med. Repos. N. York, III. ii. (1811) 359 11.
^88-officinalis.
[illegible] *ginata,* Colsm. Prod. Desc. Grat. 11 = Bonnaya veronicaefolia.

OBATIOI^:—
megalocarpa, Ell. Sketch, i. 16 (sp. falsa).
micrantha, *Franch. V Sav. Enum. PI. jap.* ii. 456 — Japon.
micrantha, Nutt. in Am. Joum. Sc. v. (1822) 287-Scoparia dulcis.
minima. Roth Nov. PI. Sp. 8=Bonnaya oppositifnlia.
missouriana, Beck, in Am. Joum. Sc. x. (1826) 258 - virginiana.
Monnieri, Linn. Syst. ed. X. 861 = seq.
Monnieria, Linn. Cent. PI. ii. n. 120; Amoen. Acad. iv. 306 — Herpestis Monnieria.
montana, Rottl. ex DC. Prod. ix. 268 = Didymocarpus Rottlerianus.
nana, *Benth. in DC. Prod.* x. 404.—Austral.
neglecta, Torr. Cat. PI. N. York, 89= virginiana.
Nibora, *Steud. Norn.* ed. II. i. 704.-Am. bor.
nudicaulis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1808) 198 = Dopatrium nndicanle.
nummularifolia, *Thou, ex Link, Jahrb.* i. m. 51, nomen.—Hab. ?
ocymifolia, Vahl, Enum. i. 96-Vandellia erecta *vel* multiflora.
officinalis, Brot. Fl. Lnsit. i. 15 =linifolia.
officinalis. *Linn. Sp. PI.* 17.—Europ.
officinalis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 6 = virginiana.
oppositifolia, Retz. Obs. iv. 8; Roxb. PI. Corom. ii. 30. t. 155 = Bonnaya oppositifolia.
oppositifolia, Willd. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 537 = Bonnaya braehiata.
origanifolia, Vahl, Enum. i. 99-Vandellia diflusa.
parviflora, Roxb. PI. Corom. iii. S=Ilysanthes parviflora.
parviflora, Willd. ex Schlecht. & Cham, in linnaea, v. (1880) 107 = Herpestes obovata.
pednncnlata, *R. Br. Prod.* 485.—Austral,
peruviana, *Linn. Sp. PL* 17.—Am. trop.; Austral.; N. Zel.
peruviana, Walt. Fl. Carol. 62=pilosa.
pilosa, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 7.—Am. bor.
portulacacea, Weinm. in Syll. Ratisb. i. (1824) 222 > Herpestis Monnieria.
pubescens, R. Br. Prod. 485=peruviana.
pulegiifolia, Vahl, Enum. i. 98=Bonnaya veronicaefolia.
pumila, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 431 = peruviana.
punctata, Colsm. Prod. Desc. Grat. 7'Limnophila serrata.
pusilla, *Torr. ex Benth. in DC. Prod. x.* 402.—Am. bor.
pusilla, Willd. Sp. PI. i. 105 = Vandellia scabra.
quadridentata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 6=ramosa.
racemosa, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. i. 188; Roth, Nov. PI. Sp. 9-Bonnaya veronicaefolia.
ramosa, Herb. Madr. ex WalL Cat. snb n. 3867-Ilysanthes parviflora.
ramosa, *Walt. Fl. Carol.* 61.—Am. bor.
repens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 14 - Herpestis repens.
repens, Sweet, ex Stend. Nom. ed. II. i. 704-micranthemnm Nuttallii.
repens, Willd. ex Schlecht. *Sc* Cham, in Linnaea, v. (1830) 107 = Herpestes obovata.
reptans, Roxb. Hort. Beng. 4; FL Ind. i. 140 = Bonnaya reptans.
rigida, *Rafin. Atl. Journ.* 176 (Quid ?).—Am. bor.
riparia, Rafin. ex Benth. in DC Prod. x. 419-Ilysanthes gratioloides.
rostrata, *Thou, ex Link, Jahrb.* i. III. 50, nomen.—Hab.!
rotundifolia, Linn. Mant. 174 - Ilysanthes rotundifolia.
Roxburghiana, Roem.& Schult Syst i. 123-Bonnaya veronicaefolia.
ruelloides, Colsm. Prod. Desc. Grat. 12 - Bonnaya reptans.
rugosa, *Lour. Fl. Cochinch.* 23.—Cochinch.
salmantica, Lag. Gen. et Sp. Nov. 1-linifolia.
serrata, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 140 = Bonnaya braehiata.
sexdendata, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. i.* (1838) 459.—Austral.; N. Zel.
sphaerocarpa, *Ell. Sketch,* i. 14.—Am. bor.
stricta, *Lour. Fl. Cochinch.* 23.—Cochinch.
strigosa, *Roth, Nm. PL Sp.* 12.—Ind. or.
subulata, *Baldw. ex Benth. in DC. Prod.* x. 405.—Am. bor.
tenuifolia, Colsm. Prod. Desc. Grat. 8 - Bonnaya tenuifoha.

GRATIOLA :-
tftragona, EH. Sketch, i. 15 = Ilysanthes gratioloides.
tetragona, Hook. Bot Mag. t. 3184 = Stemodia lobelioides.
tetrandra, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 86 - Herpestis Monnieria.
trifida, Willd. Sp. PI. i. 104-Limnophila gratioloides.
nliginosa, *Phil.?. Cat. PI. Vase. Chil.* 239.—Chili.
verbenaefolia, Colsm. Prod. Detc. Grat. 9-Bonnaya veronicaefolia.
veronicifolia, Retz. Obs. Iv. 8-Bonnaya veronicaefolia.
violacea, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xx. (1875) 440.—Japon.
virginiana, *Linn. Sp. PL* 17 (Planta virginiana).—Am. bor.
•*virginiana.* Linn. 1. c. partim=Limnophila gratioloides.
virginiana, Walt. Fl. Carol. 62—sphaerocarpa.
virginica, Ell. Sketch, i. 12-viscosa.
virginica, Lam. Encyc. iii. 27=ramosa.
virginica. Linn. Syst. ed. XII. 62 * sphaerocarpa.
viscosa, Hornem. Enum. PI. Hort. Hafn. (1807) 19 = Vandellia hirsuta.
viscosa, *Schwein. ex Le Conte. in Ann. Lye. N. York,* i. (1824) 106.—Am. bor.

GRAUMUELLERA, Reichb. Consp. 43 (1828)-Cymodocea, Kon. (Naiad.).
• *antarctica,* Reichb. 1. c.=C. antarctica.

GRAVENHORSTIA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 439 11836) = Lonchostoma, Wiksti. (Bruniac).
fastigiata, Nees, L c.=L. monostylis.

GHAVESIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sir. III. xv. (1851) 333. *MELASTOMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. Hook. f. i. 755.
bertolonioides, *Naud. I. c*—Madag.
guttata, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 78. —Madag.
pedunculata, *Triana, I. c*—Madag.

GRAVIA, Steud. Nom. ed. II. i. 705 (1840)-GRAFIA, Reichb. -Fleurospermum, Hoffin. (Umbellif.).

GRAYA, Am. ex Steud. Nom. ed.' II. i. 705 (1840) = Andropogon, Linn. (Gramin.).
teylanica, Am. 1. c - A. Pseudograya.

GRAYA, EndL Gen. Snppl. i. 1376 (1841)-Crrayia. Hook. *Sc* Arn. (Chenop.).

GRAYA, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 119 (1854) = Isachne, R. Br. (Gramin.).
elegans, Nees, 1. c.-I. pulchella.

GRATIA, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 887 (1841) *CHENOPOblACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 54.
Brandegii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (lt>7«) 101.—Am. bor. occ.
polygaloides, *Hook. V Arn. Bot. Beech. Voy.* 387.—Am. bor. occ.
spinosa, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 119 = poly};a-Uoides.

GREENEA, Wight *Sc* Am. Prod. 403 (1X34). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 61.
RHOMBOSPORA, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 114.
Jackii, *Wight V Am. Prod.* 404.—Malaya,
latifolia, *Teijsm. ff Binn. Cat. Hort. Bog.* 116.—Int. Amboin.
macrophylla, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 248.—Ins Molucc.
tetrandra, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 167-Hedyotis macrophylla.
Wightiana, *Wight <f Arn. Prod.* 404 — Burma.

OREENELIiA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881)81. *COMPOSITAE.*
arizonica, *A. Gray, 1. c.* 82.—Arizona,
discoidea, *A. Gray, I. c.* xix. (1888) 2.—Calif.

GREENIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1887) M2 -Thurberia, Benth. (Gramin.).
arkansana, Nutt. 1. c. = T. arkansana.

GREENOVIA, Webb, in Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 198. t. 36 (1836-40)-Bempervlvum, Rupp. (Crassulac).
Aieoon, Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 242.—Ins. Canar.
aurea, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 199 = S. anrenm.
diplocyda, Webb, ex Bolle, in BonpUndia, vii. (1859) 242.—Ins. Canar.
dodrantalis, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 200 = S. dodrantale.
gracilis, Bolle, in Bonplandia, vii. (1859) 242.—Ins. Canar.

GREENWAYA, Giseke, Prael. Linn. 199,206 (1792) = Amomum, Linn. (StitamùO.
Letmurus, Giseke, 11. cc.=A. Leonnrus.
scyphiferus, Giseke, 11. cc.=A. scyphiferum.

GREEVESIA, F. Mnell. in Hook. Kew Journ. vUi. (1856) 8=Pavonia, Cav. (Malvac.)
cleisoealyx, F. Mnell. L c-P. hastate.

GREGGIA, Engelm. in Wisliz. Tour N. Mexic. 114 (1848) = Cowania, D. Don (Rosac.).
purpurea, Engelm. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 374-C. plicate.
rupestris, Engelm. in Wisliz. Tour N. Mexic. 114 — Fallugia paradoxa.

GREGGIA, Gaertn. Fnict. i. 168. t 33 (1788)=Eugenia, Linn. (Myrtac).
aromatica, Gaertn. 1. c. — E. Greggia.

GBEGGIA, A. Gray, in Smithson. Contrib. iii. (PI. Wright, i.) 8.1.1 (1852). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 80.
camporum, *A. Cray, I. c.* 9.—Am. bor. occ.
linearifolia, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xviiL (1882-83) 191.—Am. bor. occ.
tntmtana, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 72 = Draba greggoides.

GREGIA, Carr. in Rev. Hortic. (1880) 255, sphalm. = Greigia, Regel (Bromel.).

GREGORIA, Duby [Bot. Gall. i. 383 (1828); et] in DC. Prod. viii. 45 (1844) - Dionysla, Fenzl (Primnlac).
aretioides, Duby, 1. c. 46 = D. aretioides.
Aucherii, Dnby,l. c.-D. odora.
caespitosa, Duby, 1. c. = D. caespitosa.
lutea, S. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 144 = Douglasia Vitaliana.
Michauxii, Duby, in DC. Prod. viii. 46 - Dionysla Michanxii.
Vitaliana, Duby, Bot. GalL i. 383 = Donglasia Vitaliana.

OHEIGIA, Reg. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1864) 13; et Gartenfl. xiv. (1865) 137. t. 474. *BROiiÉUACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 660.
Landbecki, *Phil./. Cat. PI. Vase. Chil.* 278.—Chili,
sphacelate, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1864) 13; *et Gartenfl.* xiv. (1865) 137.—Chili.

GRENIERA, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Sér. III. iv. (1845) 27-Arenaria, Rupp. (Caryophyll.).
Douglasii, J. Gay, 1. c. =A. Donglasii.
tenella, J. Gay, 1. c=A. tenella.

GRENVILLEA, Sweet, Geran. snb t 262 (1825) = Pelargonium, L'Hént, (Geraniac.).
conspicua, Sweet, 1. c.=P. conspicuum.

GRESLANIA, Balansa, in Bull. Soc. Bot. Fr. xix. (1872) 819. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1213.
circinnata, *Balansa, I. c.* 820.—N. Caled.
montana, *Balansa, I. c.*—N. Caled.
rivularis, *Balansa, I. c.*—N. Caled.

GREUIA, Stokes, Bot. Mat Med. iii. 204 (1812) = Grewia, Linn. (Tiliac.).

GBEVEA, BailL in Boll. Soc. Linn. Par. i. (1884) 420. *SAXIFRAGACEAE*\
madagascariensis, *Baill. I. c.*—Madag.

GREVIA. Linn. Hort. Upsal. 279 (1748) - Grewia, Linn. (Tiliac.).

GBEVXLLEA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 167. *PROTEACEAE*, Benth. 8c Hook. f. iii. 180.
ANADENIA, R. Br. in Trans. linn. Soc. x. (1810) 166.
FITCHIA, Meissn. in Hook. Kew Joum. vii. (1856) 76.
LVSANTHE, Salisb. in Knight, Prot. 116 (1809).
LYSSANTHE, Endl. Gen. 340 (1837).
MANCLESIA, Endl. Nov. Stirp. Dec. 25 (1889).
MOLLOYA, Meissn. in Hook. Kew Joum. vii. (1865) 382.
PLAGIOFODA, Spach, Hist. Veg. Phan. x. 402 (1841).
PTYCHOCARPA, Spach, 1. c. (1841).
STRANCEA, Meissn. in Hook. Kew Joum. vii (1865) 66.
STYLURUS, Salisb. in Knight, Prot 115 (1809).
acanthifolia, *A. Cunn. in field, N. S. Wales*, 828.—Austral.
acerosa, *F. Muell. Fragm.* i. 136.—Austral.
acicularis, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. sir. 864 -divaricate.
acicularis, Schult. Mant. iii. 278 = juniperina.
acifolia, Sieber, ex Spreng. Syst iv. Cur. Post. 46 = juniperina.
aciphylla, Sieber, ex Benth. FL Austral, v. 469 = juniperina.
acrobotrya, *Meissn. in Hook. Kew Joum.* vii. (1855) 74.—Austral,
acuaria, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, v. 462.—Austral.
acuminata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 173 = mucronulata.
acuminata, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 858 =cinerea.
agrifolia, *A. Cunn. ex R. Br. Prot. Nov.* 24.—Austral.
alpestris, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 187 = alpina.
Alphonsiaiia, *F. Muell. 1. c.* ix. (1857) 22.—Austral,
alpina, *Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral*, ii. 179.—Austral,
amplexans, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, v. 488.—Austral.
amplifica, F. Muell. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 365 -australis.
anethifolia, *R. Br. Prot. Nov.* 21.—Austral,
angulata, *R. Br. 1. c.* 34.—Austral.
anfrustata, R. Br. 1. c 24=polystachya.
annulifera, *F. Muell. Fragm.* iv. 85.—Austral,
apiciloba, *F. Muell. 1. c.* x. 45.—Austral.
Aquifolium, *Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral*, ii. 178.—Austral.
Aquifolium, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 61 = monticola.
arenaria, *R. Br. in Trans, linn. Soc.* x. (1810) 172.—Austral,
argyrophylla, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 75.—Austral.
armigera, *Meissn. 1. c.* ir. (1862) 186.—Austral,
asparagoldes, *Meissn. I. c.*—Austral,
aspera, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 172.—Austral,
asplenifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 175.—Austral,
aspleniifolia, *Knight & Salisb. Prot.* 120 (-praec?).—Austral.
attenuata, A. Cunn. ex Meissn. in DC Prod. xiv. 358 — cinerea.
australis, *R. Br. in Trans. Linn. Soc* x. (1810) 171.—Austral.
autumnalis, LhoUk. ex Benth. Fl. Austral, v. 440 - [illegible].
Banksii, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 176.—Austral.
Barklyana, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, v. 436.-Austral.
Baueri, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 173.—Austral.
Baxteri, *R. Br. Prot. Nov.* 22.—Austral.
Behrii, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 586-illcifolia,
berberifolia, *Sweet, Hart. Brit.* ed. II. 446, nomen.—AustraL
biformis, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 2S8-stenocarpa.
bipinnatifida, *R. Br. Prot. Nov.* 23.—Austral,
bitemata, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 649.—Austral.

QBEVHIIIEA:—
Bleasdolei, F. Mnell. Fragm. v. 90 - Roupala Bleasdalei.
blechnifolia, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, v. 486-Caleyi.
brachyantha, Lindl. Swan River App. 81 - querdfolia,
brachystacbya, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 254.-Austral.
brachystylis, *Meissn. I. c.* i. 538.—Austral,
bracteosa, *Meissn. I. c*—Austral,
brevicuspis, *Meissn. I. c.* 266.—Austral,
brevifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, v. 467.-Austral.
Brownei, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 537.-Austral.
buxifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 17*—Austral.
Caleyi, *R. Br. Prot. Nov.* 22.—Austral.
callipteris, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1862. 187-Dryandri.
Candolleana, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 641.-Austral.
canescens, R. Br. Prot. Nov. 18-arenaria.
capillaris, Meissn. in DC. Prod. xiv. 886-didymobotrya.
capitellata, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1862. 187.—Austral.
carduifolia, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, v. 456 * Cunningh&zni.
ceratophylla, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 17 -refracta.
Chrysodendron, Auct.=seq.
Chrysodendrum, *R. Br. 1. c.* 176.—Austral.
chrysophaea, F. Muell. First Gen. Rep. 17 = floribunds
cinerea, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 173.-Austral.
cinerea, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 329 = arenaria.
cinerea, Lodd. Bot. Cab. t. 857=mucronulata.
cirsiifolia, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 253.' Austral.
coccinea, Meissn. in Hook. Kew Joum. vii. (1865) 7< =• concinna.
collina. Knight, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. **6 " buxifolia.
commutata, *F. Muell. Fragm.* vi. 207.—Austral,
concinna, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 172--* Austral,
confertifolia, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet-* (1855) 22.—Austral.
crithmifolia, *R. Br. Prot. Nov.* 23.—Austral.
ctenophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. (1862, 186 = pectinate.
Cunninghaini, *R. Br. Prot. Nov.* 28.—Austral.
cynanchicarpa, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (I 75.—Austral.
Dallachiana, F. Muell. First Gen. Rep. 17 - alpina.
daphnoides, Sieber, ex Schult. Mant. iii. 281-Bauen.
deflexa, *F. Muell. Census*, 140, nomen.—AustraL
depauperata, R. Br. Prot. Nov. 21-Brownii.
Deplanchei, *Brongn. (f Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* *»• (1865) 39.—N. Caled.
didymobotrya, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1862) 186.—Austral.
diffusa, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 850 capitellata.
diffusa, Sieber, ex Meissn. 1. c. 355-sericea.
dimidiate, *F. Muell. Fragm.* iii. 146.—Austral.
dimorpha, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. (1855)21=oleoides.
disjuncta, *F. Muell. Fragm.* vi. 206.—Austral,
divaricate, *R. Br. Prot. Nov.* 20.—Austral.
diversifolU, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* Austral.
Drummondii, *Meissn. I. c.* 636.—Austral.
Dryandri, *. *Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (18W) » " —Austral.
dubia, R. Br. 1. c. 169=sericea.
dumetorum, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. 187 = ilicifolia.
Edelfeltii, *F. Muell. Papuan. PI.* ii. 9.—N. GuiB
Endlicheriana, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i- » Austral.
erectiloba, *F. Muell. Fragm.* x. 44.—Austral,
ericifolia, *R. Br. Prot. Nov.* 20.—Austral.
erinacea, *Meissn. in Hook. Kew Joum.* vii. (18W —AustraL

GREVILLEA :—
eriobotrya, *F. Muell. Fragm.* x. 44—Austral,
enostachya, *Lindl. Swan River App.* 36.—Austral,
eryngioides, *Benth. Fl. Austral,* v. 476.—Austral,
txul, *Lindl. in Journ. Hart. Soc.* vi. (1861) 278.—N. Caled.
fasdculata, *R. Br. Prot. Nov.* 20.—Austral.
ferruginea, R. Grab, in Maund, Botanist, t. 158-floribnnda.
ferruginea, Sieber, ex Schult Mant iii. 280-montana.
fiufolu, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 647.—Austral,
nexuosa, *Meisn. 1. c.* 668.—Austral.
Flihdereii, *A. Cunn. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 705.—Austral.
floribunda, *R. Br. Prot. Nov.* 19.—Austral.
Forsteri, *Hort.—Cf. Gard. Ckron.* (1874) 60; (1881) II. 836.—Hab.?
Gaudichaudii, *R. Br. ex Caudich. in Frew. Voy. Sot.* 448. t. 46.—Austral.
gJbbosa, *R. Br. in Trans. Linn. Soe.* x. (1810) 177.—Austral.
Gillivrayi, *Hook, in Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 858.—N. Caled.
glabella, R. Br. Prot Nov. 20=divaricate,
gtabrata, *Meissn. in Lehm. PL Preiss.* i. 549.—Austral.
glauca, Knight, Prot. 121=gibbosa.
Goodii, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 174,—Austral.
T™*keoiAei,Meissn.in Lekm. PI. Preiss.* ii. 252.-Austral.
*<*umaturina,* Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral, vi. (1888)42 = parviflora.
"aplantha, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 461,—Austral,
"eliosperma, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 176.—Austral,
neterochroma, *Brongn. in Bull. Soc. Bot. FT.* XU. (1865) 40—N. Caled.
kteropkylla, A. Cunn. ex R. Br. Prot. Nov. 24 = refracta.
newardiana, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 186 = concinna.
Hilliana, *F. Muell. in Trans. Pkil. Inst. Viet.* ii. (1868) 72—Austral.
Hopkeriana, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 546.—Austral.
Hugelii, *Meissn. I. e.* 548.-Anstral.
*k**nifusa,* A. Cnnn. ex Benth. Fl. Austral, v. 486 = Uurifolia.
ilicifolia, *R. Br. Prot. Nov.* 21.—AttstraL
utctfolia, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 880= angulata.
\nduta, F. Muell. Fiisl Gen. Rep. 17=G. Aquifolium.
""Wgnis, *Kippist, ex Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 76.—Austral.
jntegnfolU, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 885.-Austral,
intricate, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 74.—Austral.
*l"*cea,* R. Br. in Stnrt, Exped. Centr. Austral, ii. App. 87, sphalm. —seq.
J»ucu*olia, *Hook, in Mitch. Journ. Trap. Austral.* 841. rAmtraL
Jnniperina, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 174.—Austral.
la»»Eera, *A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod.* xiv. 868.—Austral.
^•"*trobei,* Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 539 = ericifolia.
Un nf°lia, *Sieber, ex Meissn. in DC. Prod.* xiv. 852.—Austral.
'^jndulacea, *Schlecht. in Linnaea,* xx. (1847) 586.-Austral.
^wrenciana, *Hort. ex Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.*, .«—Austral.
"aophylU, *F. Muell. ex Benth. Ft. Austral,* v. 471.—Austral.
*Lem**niana,* Meissn. in Hook. Kew Joum. v. (1852) 1(1/=concinna.
ie Ptobotrys, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 266.—Austral,
^cadendron, *A. Cunn. ex R. Br. Prot. Nov.* 25.—Austral.
»eptt.pteris, *Afeissn. in Hook. Kew Joum.* vtt. (1855) .'»—Austral.
L,'^*leyana.* Meissn. in Lehm. PI. Prdss. i. 642 - "ilsoni.
i ia, *R.-Br.* :« *Trans. Linn* (1810) 170.—stral.
li"fan*, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 866 - nparia.

OBUVlIiLEA :—
lineata, R. Br. in Start, Exped. Centr. Austral, ii. App„ 87=striata.
lobata, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 22 = ilicifolia.
longifolia, R. Br. Prot Nov. 22 = asplenifolia.
longiloba, F. Muell. Fragm. i. 136 = G. Leucadendron.
longistyla. *Hook, in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 843.—Austral.
lorea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 177 = Hakea lorea.
macrostachya, *Brongn.* b* *Cris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1866) 88.-N. Caled.
macrostylis, *F. Muell. Fragm.* i. 187.—Austral.
Manglesii, Hort. ex Benth. Fl. Austral, v. 486 = glabrata.
manglesioides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 647.—Austral.
Martinii, F. Muell. Fragm. iv. 129=polybotrya.
Meissneri, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 248.—N. Caled.
Meissneriana, F. Muell. in Linnaea, xxvL (1858-55) 357'fasciculate.
micrantha, Meissn. 1. c. 858 -= parviflora.
mimosoides, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 177.—Austral.
Miqueliana, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 182.—Austral.
Mitchelli, Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral. 265 = G. Chrysodendrum.
montana, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 172.—Austral.
monticola,Jlfeiun. *in Lehm. Pl.Preiss.* ii.259.—AustraL
mucronifolia, *A. Cunn. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 70S.—Austral,
mucronulata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 173.—Austral.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* v. 479.—Austral.
myrtacea, Sieber, ex Schult. Mant. iii. 280 = mucronulata.
myrtillifolia, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, v. 444 -Baueri.
neglecta, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral, ii. App. 87=venusta.
nematophylla, *F. Muell. Fragm.* i. 136.—Austral,
nudiflora, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 186.—AustraL
nutans, Meissn. 1. c. 187=divaricata.
obliqua.'S.. Br. Prot Nov. 25 = G. Leucadendron.
obtusiflora, *R. Br, 1. c.* 19.—Austral,
obtusifolia, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 187.—Austral,
occidentals, *R. Br.'in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 173.—Austral,
oleoides, *Sieber, ex Schult. Mant.* iii 277—Austral.
eligantha, F. Muell. Fragm. vi. 206 = paudflora.
oreophila, F. Muell. First Gen. Rep. 17-alpina.
omithopoda, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 256—Austral.
oxystigma, *Meissn. I. c.* i. 640.—Austral,
paniculata, *Meissn. 1. c.* 550.—AustraL
paradoxa, *F. Muell. Fragm.* vi. 246.—Austral.
parallela. Knight, Prot 121 = polystachya.
parviflora, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 171.—Austral.
parviflora, F. Muell. First Gen. Rep. 17 = micrantha.
patentiloba, *F. Muell. Fragm.* i. 137.—Austral,
pauciflora, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 171.—Austral.
pectinate, *R. Br. Prot. Nov.* 23.—AustraL
pedunculosa, F. Muell. Fragm. i. 185=nudiflora.
petrophiloides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 257.—AustraL
phylicoides, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 174. i-Austral.
phylicoides, A. Cunn. ex Meiun. in DC. Prod. xiv. 369 =sphacelate.
Pinaster, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 76.—Austral.
pinifolia, Hook, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 383 > G. Chrysodendrum.
pinifolia, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 186.—Austral,
pinnatisecta, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 473.—Austral.
pityophylla, F. Muell. Fragm. vi. 208 = eriostachya.
planifolia, Lodd. Bot. Cab. 11787 = sericea.

OREVILLEA:—
platypoda, *F. Muell. Fragm.* vi. 205.—Austral,
plurijuga, *F. Muell. 1. c.* iv. 84.—Austral.
podalyriae/olia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 446-mucronulata.
podocarpifolia, *Sweet, 1. c.* nomen.—Austral,
polybotrya, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 185.—Austral.
polybotrya, F. Muell. 1. c. b. (1857) 23 = polystachya.
polystachya, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 177.—Austral.
Preissei, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 548.—Austral.
pteridi/olia. Knight, Prot. 121-G. Chrysodendrum.
pterosperma, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.* i. (1855) 22.—Austral,
pubescens, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* i. (1826) 172.—Austral.
pubescens, Hook. Exot. Fl. t. 216 = Baneri.
puIchella,Afei««. *in Lehm. PI. Preiss.* i. 553.—Austral,
pungens, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 175.—Austral.
punicea, *R. Br. I. c.* 169.—Austral,
pyramidalis, *A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod.* xiv. 381.—Austral.
pyriformis, Hort ex Meissn. 1. c. 398, 422 = Xylomelum pyriforuie.
quereifolia, *R. Br. Prot. Nov.* 23—AustraL
ramosissima, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 388.—Austral.
ramulosa, F. Muell. 1. c. 862 = la\andulacea.
refracta, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 176.—Austral,
repens, *F. Muell. in Linnaea,* xxvi. (1853-65) 355.—Austral.
rigens, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 374 - Dryandri.
rigidissima, F. Muell. ex Meissn. 1. c. SB0 = Hugelii.
riparia, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 170 = linearis.
riparia, Sieber, ex Schult. Mant. iii. 378 = rosmarinifolia
robusta,/!. *Cunn. in R. Br. Prot. Nov.* 24.—Austral.
rosea, Lindl. in Paxt. Flow. Gard. ii. (1852) 91. n. 38tS. t. 56 = lavandulaceat
rosmarinifolia, *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* 328.—Austral,
rnbiginosa, *Brongn.* b* *Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 40.—N. Caled.
rudis, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 73.—Austral.
saccate, *Benth. Fl. Austral.* V. 450.—Austral,
scabra, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 641.—Austral.
scabrella, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) W =ericifolia.
segmentosa, F. Muell. Fragm. iii. 145=leucopteris.
sericea, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 170—Austral.
sericea, Lhotsky, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 369 = sphacelate.
sericea, Lodd. Bot. Cab. t. 880 = punicea.
sericostachya, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 186 = pterosperma.
Seymouriae, Sweet, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 364 =oleoides.
Shuttleworthiana, *Meissn. in Lehm. PI. Preias.* ii. 258.—Austral.
silaui/olia, Donn, Hort. Cantab, ed. IV. 26 = Lomatia silaifolia.
singuliflora, *F. Muell. Fragm.* vi. 92.—Austral,
sinuate, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 40.—N. Caled.
sparsiflora, *F. Muell. Fragm.* vi. 206.—Austral,
sphacelate, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 174.—Austral.
sphacelata, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, v. 440 = floribunda.
stenobotrya, *F. Muell. Fragm.* ix. 3.—Austral,
stenocarpa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* v. 485.—Austral.
stenomera, *F. Muell. Fragm.* iv. 85.—Austral.
Sternbergiana, Hort. ex Benth. Fl. Austral, v. 477 ^ crithir.sfolia.
Strangea, *Benth. I. c.* 453.—Austral,
striata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* s. (1810) 177—Austral.
strieta, R. Br. 1. c. 170-linearis.
Stuartii, Meissn. in Linnaea, xxvi. (1858) 357 «. uustralis.
Sturtii, R. Br. in Sturt, Exped. Cento. Austral, ii. App. 86-juncifolia. **

QBE VHXEA:—
Sturtii, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xv. 879 = ilicifolia.
stylosa, Knight *8c* Salisb. ex Loud. Encyc. PI. ed. I. 84 = cinereal
sulphurta, A. Conn, in Field, N. S. Wales, 829 = juniperina.
Synapheae, *R. Br. Prot. Nov.* 28.—Austral,
tenniflora, ***Meissn. in Uhm. PI. Preiss.*** **i. 654.—** Austral.
tenuifolia, R. Br. in Trans. linn. Soc. x. (1810) 171 = anstralis.
teretifolU, ***Meissn. in Uhm. PI. Preiss.*** **ii. 255.—** Austral.
tetragonoloba, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1862) 186 = Hookeriana.
Tkelemanniana. R. Br. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 373 = Wilsoni.
Thelemanniana, ***Hueg. in Endl. Nov. Stirb. Decad.*** **i.** 6.—Austral,
thyrsoides, ***Melssn. in Hook. Kew Joum.*** **vii. (1855)** 77.-Austral.
trachytheca, *F. Muell. Fragm.* vi. 207.—Austral.
Treveriana, *F. Muell. 1. c.* ix. 128.—AustraL
tridentifera, ***Meissn. in Uhm. PL Preiss.*** **i. 549.—** Austral.
trifida, *Meissn. I. c.* 553.—Austral,
trifarcata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 440, nomen.— Austral,
triloba, ***Meissn. in Hook. Kew Journ.*** **vii. (1855) 74.—** Austral.
trinervis, *R. Br. Prot. Nov.* 18.—Austral.
trineura, F. Muell. Fragm. iii. 146 = Hakea trineura.
tripartita, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 186. —Austral.
trisecta, F. Muell. First Gen. Rep. 17 = Hakea purpurea.
tritemata, *R. Br. Prot. Nov.* 21.—Austral,
umbellulata, ***Meissn. in Uhm. PL Preiss.*** **ii. 252.—** Austral.
umbratica, A. Conn, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 381 = robusta.
uniflora, *A. Cunn. ex Meissn. I. c.* 858.—Austral.
variabilis, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral, ii. 179 = G. AquifoHum.
velulina, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, v. 458 = refracta.
vennsta, ***R. Br.in Trans. Linn. Soc.*** **x. (1810) 175.—** Austral.
vennsta, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 381 = robusta.
vestita, ***Meissn. in Lehm. PI. Preiss.*** **i. 548.—Austral.**
Victoriae, ***F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet.*** **i.** (1855) 107.—Austral.
Vieillardi, ***Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bat. Fr.*** **xii.** (1866) 41.—N. Caled.
Wickhamii, ***Meissn. in Hook. Kew Journ.*** **iv. (1852)** 187.—Austral.
Wilsoni, ***A. Cunn. in Wilson, Voy. Round World*** (1835) 273.—Austral.

GREVILLIA, Knight, Prot. 120 (1809)-praec.

GKBWIA, Linn. Syst. ed. I. (1735). *TILIACEAE,* Benth. & Hoqk. f. i. 283.
ARSIS, Lour. Fl. Cochinch. 385 (1790).
BALMEDA, Nocca, Hort. Ticin.'21 (1804).
CHADARA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 105 (1776).
FALLOPIA, Lour. Fl. Cochinch. 835 (1790).
GRAEVIA, Neck. Elem. ii. 253 (1790).
MALLOCOCCA, Forst. Char. Gen. 77. t. 89 (1776).
MICROCOS, Burin, ex Linn. Diss. Dass. 20 (174.7); Amoen. Acad. i. 130 (1749).
OMPHACARPUS, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 192. t. 42 (1847 ?).
SASALI, Adans. Fam. ii. 305 (1763).
TRIDERMIA, Rafin. Sylva Tellur. 145 (1838).
VINCBNTIA, Boj. in Hook. Bot. Misc. i. (1830) 293. t. 62.
VINTICENA, Steud. Norn. ed. II. ii. 769 (1841).
VITICENA, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 67.
abutilifolia, ***Vent, ex Juss. in Ann. Mus. Par.*** **iv.** (1804)92.—Ind. or.; Malaya,
acuminata, ***Bedd. in Madr. Journ. Sc.*** **Ser. III. i.** (1864) 38.—Ind. or.
acuminata, Jnss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 91 = scabrida.

(JBEWIA:—
afflnis, Hassle. Cat. Hort. Bog. Alt. 207=panicnlata.
affinis, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 265 = G. Microcos.
africana, ***Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*** **i. 253.—Afr.** trap.
africana. Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 2=mollis ?
Amicorum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 706.—Ins. Amicor.
ancolana, *Miq. PI. Jungh.* 801.—Sumatra,
angolensis, ***Welw. ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*** **i.** 251.—Afr. trop.
angustifolia, Wall. Cat. n. 1106 = polygama.
apetala, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 93. t. 49. f. 3.—Java.
Araria, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6808 =salvifolia.
arborea. Lam. Encyc. iii. 45=excelsa.
arborea, Roxb. ex Rottl. in Ges. Nat Fr. Nene Schr. iv. (1803) 205=tiliaefolia.
arbutifolia, Pers. Syn. ii. 66 = abutilifolia.
asiatica, *Linn. Mant.* i. 122.—Ind. or.
asiatica, Wall. Cat. n. 1089 partim- abutilifolia.
aspera, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 691 = abutilifolia.
begonifolia, *Roxb. II. cc.* [93] ; 592.—Ins. Amboin.
begonifolia, Wall. Cat. p. 237 n. 1098-G. Microcos.
betulaefolia, Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 92 = populifolia.
bicolor, Juss. 1. c. 90 = salvifolia.
bicolor, Roth, Nov. PI. Sp. 240=excdsa.
biflora, G. Don, Gen. Syst. i. 548 = carpinifolia.
bttoba, *G. Don, I. c.* 540.—China.
biloba, Wall. Cat. n. 1107 -polygama.
bilocularis, ***Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.*** **xi.** (1882) 604.—Ins. Socotra.
bipartita, Wall. Cat. p. 237 n. 1113 B = pilosa.
Blumei, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xii. (1845) 130=paniculate.
Blumei, *Steud. Norn.* ed. II. i. 706.—Java.
bracteata, Miq. ex Mast in Hook. £ FL Brit. Ind. i. 883=columnaris.
bracteata, *Roth, Nov. PI. Sp.* 248.—Ind. or.
breviflora, *Benth. Fl. Austral,* i. 270.—AustraL
brideliaefolia, ***Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.*** **i. (1885)** 644.—Madag.
caffra, ***Meissn. in Hook. Land. Journ. Bot.*** **ii. (1843)** 68.—Afr. austr.
calophylla, ***Kurt, in Andaman Report App.*** **B. iii.; *ex Mast, in Hooi.f. Fl. Brit. Ind.*** **i. 392.—Ins. Andaman,**
calvata, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 48.— Madag.
cana, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 20.—Afr. austr.
canescens, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 86.—Abyss,
carpinifolia, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 91. t. 61. f. 1.—Ind. or.; Afr. trop.
carpinifolia, Roth, Nov. PI. Sp. 245, partim=emarginata.
carpinifolia, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 587 = pilosa.
carpinifolia, WalL Cat. n. 1093=columnaris.
Carrea, Buch.-Ham. in Wall. 1. c n. 1095 B=scabrophylla.
caudata. Wall. I. c. n. lO99=Leptosychia glabra.
celtidifolia, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 93.— **Java.**
Chadara, Lam. Encyc. iii. 44= populifolia.
dnerea, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 86 = salvifolia.
columnaris, *Sm. in Rees, Cyclop,* xvii. n. 5.—Ind. or.; Malaya ; Afr. trop.
commutata, DC. Prod. i. 511 = pilosa.
coriacea, Garcke, ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. S88 = multiflora.
coriacea, ***Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*** **i. 252.—Afr.** trop.
corylifolia, A. Rich, in GuilL & Perr. Fl. Seneg. Tent. 95. t. 20 = villosa.
crenata, Hochst. ex Mast in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 246-populifolia.
cubensis, ***TurcM. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xxxi. (1858)** I. 232.—Cuba.
Cumingiana, *Turct. I. c.* 231.—Ins. Philipp.
cuneifolia, ***Baker, in Journ. Linn. Soc.*** **xxL (1884)** 826.—Madag.
cuneifolia, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 90.— Madag.
cyclopetala, ***Wawra V Peyr. in 5*7*4. Acad. Wien, Math. Nat.*** xxxviii. (1860) 658.—Afr. **trop.**

OREWIA:—
/famine, Gaertn. Fruct. ii. 113 = laevigala, salvifolia, Alangium Lamarekii.
denticulata, ***Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.*** **128,** nomen.—Ind. or.
didyma, Roxb. Hort. Beng. [98].; Fl. Ind. ii. 691 = laevigata.
diplocarpa, *Thw. Enum. PL Zeyl.* 31.—Zeylan.
discolor, Fresen. in Mus. Scnckenb. ii. (1837) 159 = salvifolia.
disperma, Rottl. ex Spreng. Syst. ii. 579=laevigata.
echinulata, Delile, Cent PI. Méroé, 82=villosa.
ectasicarpa, *S. Moore, in Journ. Bot.* xv. (1877) 67.— Afr. trop.
elastica, Royle, Illustr. Bot. Himal. 104. t. 22-asiatica.
emarginata, *Wight &" Am. Prod.* 79.—Ind. or.
eriocarpa, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 93.— Java,
eriopoda, ***Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **xxxi. (1858)** I. 231.-Ins. Philipp.
Erythraea, ***Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,*** xviii. (1868) 671.—Afr. trop.
excelsa, *Vahl, Symb. Bot.* 35.—As. et Afr. trop.
ferruginea, Hochst in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 29, nomen; et ex A. Rich. Tent. M. Abyss, i. 87 = scabrida.
fibrocarpa, ***Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** **i. 391.—** Malacca.
flava, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 118.—Afr. austr.
flavescens, Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (18U4) 91 pilosa.
floribunda, ***Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*** **i. 252.—** Afr. trop.
floribunda, WalL ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 128 * Columbia floribunda.
florida, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 405.—Sumatra.
Forbesii, ***Hani, ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*** **»•** 250.—Afr. trop.
furfuracea, Salisb. Prod. 367 = orientalis.
glabra, Blume, Bijdr. 115 = laevigata.
glabra. Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 393, in syn. sphalm. = G. Microcos.
glabrescens, *Benth. Fl. Hongk.* 42.—Ins. Hongkong,
glandulosa, *Vahl, Symb. Bot.* i. 34.—Ins. Maurit.
globulifera, ***Mast, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.*** **i. 391.—** Malacca.
Grandidieri, ***Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.*** **i. (1885)** 544.—Madag.
grandiflora, *Baker, in Joum. Bot.* xx. (1882) 47—Madag.
Grevei, ***Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.*** **i. (1885) 543.** —Madag.
guazumaefolia, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 89. t. 48. f. 3.—Java.
helicterifolia, Wall. Cat n. 1090 C=hirsuta.
helicterifolia, WalL L c n. 1090, partim - **polygama.**
hennannioides, ***Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.*** **i.** 226.—Afr. austr.
heteroclita, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 590 = Leptonychia glabra.
heterophylla, ***A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i.*** **90.—** Abyssin.
heterotricha, ***Mast, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.*** **i. 386.—** Ind. or.
Heynei, Steud. Norn. ed. II. i. 706=villifera.
hirsuta, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 587-helicterifolia.
hirsuta, Sm. in Rees, Cycl. xvii. n. 9=tomentosa.
hirsuta, *Vahl, Symb. Bot.* i. 34.—As. trop.
hirsuta, Wall. Cat. p. 237. n. 1090 C = polygama.
hispida, ***Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.*** **i. 5;26.—Afr.** anstr.
humilis, *Wall. Cat.* n. 1110.—Burma.
inaequalis, Blume, Bijdr. 115=tiliaefolia.
inaequilatera, ***Garcke, in Peters, Reise Mossamb. Bot-*** 134.—Afr. trop.
involucrata, *Blume, Bijdr.* 116.—Java.
involucrata, Wight, in Wall. Cat p. 287, n. 1098 C-emarginata, pilosa.
lactea, *Delile, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 706.—A»-trop.
laevigata, Heyne, ex Steud. 1. c.=excelsa.
laevigata, *Vahl, Symb. Bot.* i. 34.—As. et Afr. trop.
Lalpeta, Buch.-Ham. in Wall. Cat p. 237. n. 1086 = laevigata.
lancaefolia, J. Grah. Cat. PI. Bomb. 21 =polyg«n»-

OHEWIA:—
lanceaefolia, Roxb. Hort Beng. [93] ; FL Ind. ii. **686** - -polygama.
"nceofata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 104. —Madag.
lanceolata, Herb. Heyne, ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit - Ind. i. 391 = polygama.
lanceolate, *Miq. Anal. Bot. Ind.* iii. 4.—Ind. or.
lasiocarpa, *E. Mey. in Drige, Z-aei Pfl. Docum.* 181, nomen; *et Ham. & Sond. Fl. Cap.* i. 226—Afr. austr.
Jateriflora, *G. Don, Gen. Syst. i.* 649.—Afr. trop.
latifolia, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 392— Malacca,
latifolia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 271— Austral,
laurifolia, *Hook, ex Mast, in Hook.f. Fl. Brit. Ind,* i. 392—Malaya,
lepidopetala, *Garcke, in Peters, Reise Mossamb.* *Bot.* 135.—Afr. trop.
longifnlia, Buch.-Ham. in WalL Cat n. 1090 E= hirsuta.
macrophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 326—Madag.
macrophylla, G. Don, Gen. Syst. i. 549=abutilifolia.
malacocarpa, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* Ii. 258— Afr. trop.
Mallococa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 310 = laevigata.
Malococca, *Linn.f. Suppl.* 409—Ins. Amicor.
manillensis, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* (1843) 310—Ins. Philipp.
megalocarpa, *Beauv.Fl. Ov>.* ii. 69. t 102.—Afr. trop.
membranacea, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 90-populifolia.
mexicana, DC. Prod. i. 510-Belotiagrewiaefolia.
Meyeniana, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* (1848) 311—Ins. Philipp.
nucrantha, *Boj. ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 244.—Madag.
nitrococca, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127 = seq.
Microcos, *Linn. Syst.* ed. XII. 602.—As. trop.
"icropetala, *Bertol. Hort. Bonon. PI. Nov.* ii. 12— Ins. Cap. Verd.
""crostemma, *Wall. Cat.* n. 1109—Burma,
wolhs, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 91—Afr. trop.
Mollococca, Ejch.-Ham. in Wall. Cat. p. 237. n. 1086 F - laevigata.
montana, Koen. ex Wight & Arn. Prod. 78 «= hirsuta.
Wonticola, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 20—Afr. austr.
Multiloni, Wall. in Ann. Mus. Par. Mic(1804) 89. t. 47.
*"-Malaya, Austral. Filip. ed. II. 309 = umbellata.
"«"«, Wall. Cat. n. 1102-sapida.
S"'- '» *Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 90—China.
°*«?«o, Blume, ex Steud. Nom. ed. II. i. 706 = Blumei.
°Wiqua, *Juan. in Anttm Mus. Par.* iv. (1804) 92—Ind
obliqua, Roxb. Hort Beng. [93] J Fl. Ind. ii. 590 = «*brophylla.
owongifolia, *Blume, Bijdr.* 114.—Java.
«*«. Wall. Cat. n. 1114 = asiatica.
1103 = bracteata, orientalis, colnmnaris.
Eckl. & Zeyh. Enmn. 53 = ocddentnlis.
Willd. Enum. Hort. Berol. B 6 6 A f. austr.
Linn. Sp. Pl. 964.—Attica.
Blume, Bijdr. 116-scabrida.
Miq. in Ind Bat. Suppl. 204.—Borneo.
Miq. l. c.—Borneo
Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 42; *Fl. Ind.* ii. 583—Reg. Himal.
Lamb. « G. Don, Gen. Syst. i. 550-
G. Don. 1- c 551 = villosa.
Roxb. «« *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* tv. 1803) 205—Ind. or.
Wall. Cat n. 1085 D=praec.J
Mueller ex Benth. Fl. Austral.
Gae «n- Fnict. ii. 112. t. 106=pilosa.
Linn. Sp. PI. 964.—As. et Austral, trop.

GREWIA :-
orientalis, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 79 = emarginata.
orientalis, Vahl, Symb. Bot. i. 34—columnaris.
ovalifolia, Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 90-laevigata.
ovalifolia, Wight, in Wall. Cat. n. 1103 B, C-orientalis.
palembanica, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 405.—Sumatra.
pallida, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 86 = salvifolia.
paniculate, *Roxb. Hort. Beng.* [93]; *Fl. Ind.* ii. 591—Malaya,
parviflora, *Bunge, in Mlm. Sav. Etr. Pitersb.* ii. (1835) 83.—China,
parvifolia, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 91. —Abyssin.
pedicellata, Roxb. Hort. Beng. [93]; Fl. Ind. ii. 585 = umbellata.
persicaefolia, *A. Gray, Bot. U. St.Expl.Exped.* i. 198. Ins. Fiji.
Petitiana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 89.—Ins. Philipp.
pilosa, *Lam. Encyc. Suppl.* iii. 43.—Ind. or.; Afr. trop.
pilosa, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 588 = hirsuta.
pilosa, Wall. Cat. n. 1112 et p. 237—Cf. columnar^, orientalis, scabrophylla, scabrida, humilis.
pinnatifida, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 253— Afr. trop.
piscatorum, *Hance, in Ann. Sc.Nat. Sir.* V. v. (1866) 208.—China.
pleiostigma, *F. Muell. Fragm.* viii. 4.—Austral,
polygama, *Roxb. Hort. Beng.* 42 ; *Fl. Ind.* ii. 688— As. et Austral, trop.
polygama, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 38, nomen.—Hab. ?
polyphylla, *Wall. Cat.* n. 1116.—Ind. or.
polypyrena, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 105.—Madag.
populifolia, *Vahl, Symb. Bot. i.* 88.—Ind. or.; Afr. trop.
prunifolia, A. Gray, Bot U. St Expl. Exped. i. 199-multiflora ?
pubescens, *Beauv. Ft. OJ>.* ii. 76.—Afr. trop.
pumila, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 227 = sapida.
racemosa, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 16 = laevigata.
reticulaia, Hochst. ex Mast in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 246=populifolia.
retusifolia, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) II. 294 = humilis.
rhamnifolia, Roth, Nov. PI. Sp. 244 = orientalis.
ribesiaefolia, Hochst. ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 246 = populifolia.
Richardiana, Hook, in Mitch. Journ. Trap. Austral. 383-latifolia.
Richardiana, Walp. Rep. i. 862 = Amicorum.
rigida, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 1088 D et p. 237 = populifolia.
Ritchiei, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 889.— Ind. or.
robusta, *Burch. Trav.* ii. 183.—Afr. austr.
Rothii, DC. Prod. i. 509 = excelsa.
rotundifolia, Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 92. t. 50-orbiculata.
Roxburghii, G. Don, Gen. Syst. i. 548=hirsuta.
rugosa, G.Don, 1. q. 550 = scabrophylla.
rugosa, Wall. Cat. n. 1098 B=G. Microcos.
saligna, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1885) 544. —Madag.
salutaris, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 176—Timor,
salvifolia, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 239.—Ind. or.
salvifolia, Linn. f. Suppl. 409»Alangium Lamarckii.
salvifolia, Roxb. Hort. Beng. [93]; FL Ind. ii. 587 = excelsa.
salvifolia, Wall. Cat. n. 1091=hirsuta.
sapida, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 590.—Reg. Himal.
saxatilis, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 1091 E et p. 237 = hirsuta.
scabra, *DC. Prod.* i. 512.—Ins. Amboin.
scabrella, *Benth. Fl. Austral,* i. 272.—Austral,
scabrida, Wall. Cat. n. 1113, partim.—Burma; Malaya; Afr. trop.
scabrida, Wall. 1. c. partim = pilosa.

GREWIA :—
scabrophylla, *Roxb. Fl. Ind.* ii. 684.—Reg. Himal.; Burma.
sclerophylla,'Roxb. Hort. Beng.42<-praec
sepiaria, Roxb. 1. c.; Fl. Ind. it 58b = multiflora.
serrata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 444-columnaris.
serrulata, DC. Prod. i. 610-multiflora.
sinuata, *Wall. Cat.* n. 1108.—Burma,
stenophylla, *Boj. in Proc. Soc. Nat. Hist. Maur.* (1842-46) 27—Madag.
subaequalis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 544—Madag.
subinaequalis, DC. Prod. i. 511 -asiatica.
subinaequalis, Wall. Cat. n. 1087 et p. 237 - tiliaefolia.
subcordata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 404.—Sumatra.
suffruticosa, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 1102 et p. 287 = sapida.
sulcata, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 252 —Afr. trop.
sulcata. Wall. Cat n. 1096 = scabrophylla.
Sulcoria, Buch.-Ham. in WalL Cat n. 1090 D et p. 237 = hirsuta.
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 69.—Ins. Tahiti.
tembensis, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 158 = carpinifolia.
terebinthinacea, *DC. Cat. Hort. Monsp.* **114—Hab.** t
tetragastris, *R. Br. ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 252.—Afr. trop.
tiliaefolia, A. Rich. Sert Astrol. p. ix=Amicorum.
tiliaefolia, *Vahl, Symb. Bot.* i. 35—As. et Afr. trop.
tomentosa, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iv. (1804) 89— **Java.**
tomentosa, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 78 = hirsuta.
trichocarpa, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 89. —Abyssin.
triflora, *Walp. Rep.* v. 119—Ins. Maurit.
trifolia, *Roxb. Hort. Beng.* [93], nomen (Quid!)—Ind. or.
trinervata, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 47—Madag.
trinervis, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 188 = occidentalis.
truncate, *Mastl in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 244.—Afr. trop.
turbinata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 504.—Ins. Socotr.
ulmifolia, Boj. Hort Maurit. 44=glandulosa.
ulmifolia, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 591 •• G. Microcos.
ulmifolia, Salisb. Prod. 367=occidentalis.
umbellata, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *Fl. Ind.* ii. 591— Malaya.
umbellifcra, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 37.—Ind. or.
variabilis, Wall. Cat. n. 1087, partim = tiliaefolia.
velutina, *Franch. in Rivoil, Comali,* 21.—Afr. trop.
velutina, *Vahl, Symb. Bot.* i. 85.—Arabia,
venusta, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 159.1.10. —Abyssin.
verrucosa, Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 90-excelsa.
vestita, Wall. Cat. n. 1105-asiatica.
vilhfera, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 71.—Ind. or.
villosa, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp. 248=villifera.
villosa, *Willd. in Ges. Nat. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 206.—Ind. or.
viminea. Wall. Cat. n. 1111-polygama.
viridiflora, *Teijsm.* b* *Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 8!).—Malaya.
xantbopetala, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, i.* 271. —Austral.

GRETIA, Hook. *8c* Harv. in Proc Dubl. Univ. Zool. Bot. Assoc. L (1859) 138. t. 13. *SAPINDACEAE,* Benth. & Hook. f. L 1000.
Sutherland!!, *Hook. If Harv. I. c*—Afr. austr.

GRIAS, linn. Syst ed. X. 1076 (1769). *MYRTACEAE.* Benth. & Hook. f. i. 722.
Aubletiana, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 299.—Guiana.
cauliflora. *Linn. Syst.* ed. X. 1076.—Ind. occ.
Fendlerii, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 126—Panama,
peruviana, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 301—Peruv.

GBIELTJH, Linn. Gen. ed. VI. 678 (1764). *ROSACE AE*, Benth. ft Hook. f. i. 626.
fiagelliforme, E. Mey. in Drège, Zwd. Pfl. Docnm. 188 — huxnifasum.
humifusum, E. Mey. ex HBTT. ft Sond. Fl. Cap. ii. 804-tenuifoIium.
hnmifnsnm, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 112.—Afr. austr.
laciniatum, Gaertn. Frnct. i. 180. t. 86=humifnsum.
obtusifolium, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 188=sinuatum.
sinnatum, *Licht. ex Bunk. Trav.* i. 286.—Afr. anitr.
tenuifolium, *Linn. Gen.eA.* VI. 578.—Afr. austi.

GRIESEBACHIA, Endl. Gen. 752 (18S9) = Griaebachia, Klotzsch (Ericac).

GRIESELINIA, Endl. Gen. 1802, in syn. (1841)- Griselinia, Foist, f. (Comae.).

GBIFFINIA, [Ker-Gawl. in] Bot Reg. sab t. 444 et t. 611 (1820). *AMARYLLIDEAE*, Benth. ft Hook. f. iii. 726.
LIBONIA, Lem. Jaid. Flenr. iii. (1852-58) t. 290.
Blumenavia, C. *Koch V Bouchi, ex Carr. in Rev. Hortic.* (1867) 32.—Bras,
dryades, *M. Roem. Syn. Ensat.* 82.—Bras,
hyacinthina, *[Ker-Gawl. in] Bot. Reg.* snb t. 444. —Bras.
intermedia, *Lindl. in Bat. Reg.* t. 990.—Bras.
Liboniana, *Lem. yard. Fleur.* iii. (1858) t. 290.—Bras,
ornata, *T. Moore, in Gard. Chron.* (1876) I. 266.—Bras,
parviflora, *[Ker-Gawl. in] Bot. Reg.* t. 611.—Bras.

GRIFFITHIA, Wight ft Am. Prod. 399 (1834) = Bandla, Houst (Rubiac.).
acuminata, Korth. in Nederl. Krnidk. Arch, M. II. (1851) 178.—Borneo.
curvata, Kurz, in Journ. B»t. xiii. (1876) 326=R. longiflora.
eucantha, Korth. in Nederl. Krnidk. Arch. ii. II. (1851) 178.—Borneo; Java.
fragrans, Wight ft Am. Prod. 400 - R. malabarica.
Gardneri, Thw. Enum. PI. Zeyl. 158 = R. Gardneri.
latifolia, Teiişm. ft Binn. in Tijdsehr. Nederl. Ind. zxiv. (1864) 32 = R. latifolia.
leucantha, Walp. Ann. iii. 1029, Ind. sphalm.= *eucantha*.
longiflora, Korth. in Nedeil. Krnidk. Arch. ii. II. (1851) 178 = R. longiflora.
oxygyna, Korth. 1. c—Sumatra.
palembanica, Miq. Fl. Ind. Bat Snppl. 541.—Malaya.
Reinwardtiana, Hassk. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 118.—Java.
rugulosa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 159=R. rugulosa.
siamensis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat iv. 130 = R. longiflora.
syeciosa, Bedd. Ic. PI. Ind. Or. i. 8. t. 87=R. speciosa.

GRIFFONIA, Baill. in Adansonia, vi. 188. t. 2 (1865) = Bandeiraea, Welw. (Legumin.).
physocarpa, Baill. 1. c. t. 2. f. 2-5 = B. tenuiflora.
simplici/olia, Baill. 1. c (1866) 197 = B. simplieifolia.

GBIFPONIA, Hook. f. in Benth. ft Hook. f. Gen. i. 608 (1865). *ROSACEAE*, Benth. ft Hook. f. I. c.
Barteri, *Hook. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 873.—Afr. trop.
Bellayana, *Oliver, 1. c.* 371.—Afr. trop.
Icondere, *Oliver, I. c*—Afr. trop.
Mannii, *Oliver, I. c.* 372.—Afr. trop.
pallescens, *Oliver, 1. c.*—Afr. trop.

GRIMALDIA, Schrank, in Allg. · Bot. Biblioth. iv. (1805) 185; et in Denkschr. Akad. Muench. (1808) 103. t. 3 = Cassia, Linn. (Legumin.).
Absus, Link, Handb. ii. 141=C. Absus.
assurgens,Sdmnk, in Denkschr. Akad. Muench. (1808) 110=C.nicti tans.
bifoliata, Schrank, ex Stend. Norn, ed II. i. 707' C. rotundifolia.
Chamaecrista, Schrank, ex Link, Handb. ii. 141=C. Chamaecrista.
decumbens, Schrank, in Denkschr. Akad. Mnench. (1808) 111=C. nictitans.
opifera, Schrank, in Allg. Bot. Biblioth. iv. (1806) 187 -C Absus.

GBINDEMA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 269. *COMPOSITAE*, Benth. ft Hook. f. ii. 260.
AURELIA, Cass. in Bull. Soe. Philom. (1815) 175; et in Diet. Sc. Nat. xxxvii. 468 (1825).
CHRYSOPHTHALMUM, Phil, in Linnaea, xxix. (1858) 9.
DEMETRIA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 30 (1816).
DONIA, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 82 (1818).
DONIANA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268.
acerosa, *Bert, in Merc. Chil.* (1829); *ex Am. Journ. Sc.* xxiii. (1833) 84.—Chill,
andina, *Phil, in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 187.—Chili,
angustifolia, *DC. ex Dunal, in Mlm. Mus. Par.* v. (1819) 51. t. 3.—Mexic.
angustifolia, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. iv. 809-arguta.
anomala, DC. Prod. v. 316-discoidea.
arguta, A. Gray, PI. Wright, ii. 81=squarrosa.
argnta, *Schrad. ex DC. Prod.* v. 815.—Mexic.
arizonica, *A. Gray, in Proc. Am.Acad.* xvii. (1881-82) 208.—Arizona,
brachystephana, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 178.—Reg. Argent.
bnphthalmoides, *DC. Prod.* v. 316.—Bras.
canescens, *Bert, in Merc. Chil.* (1829); *ex Am. Journ. Sc.* xxiii. (1833) 84.—Chili.
caucasica, Spreng. ex Steud. Nom. ed. IL i. 707 = Aster caucasicus.
cllUta, *Spreng. Syst.* iii. 675.—Mexic.
coronopifolia, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1828) 16 = Xanthocephalum centauroides.
costata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 208.—Mexic
cnneifolia, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 815.—Calif,
diffusa, *D. Don, ex Am. in DC. Prod.* vii. 278.—Patagon.
diffusa, Hook, ft Am. in Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1836) 45 = pulchella.
discoidea, *Hook.* to" *Am. I.* c—Bras.
discoidea, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 815 -nana.
Duvalii, Spreng. Syst. iii. 575-angnstifolia.
foliosa, *Hook, if Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 45.—Chili,
frnticosa, *Dunal, in Mém. Mus. Par.* v. (1819) 52 (sp. dub.).—Hab.t
globnlarifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 178. —Reg. Argent.
glutinosa, Bert, in Merc. Chil. (1829) 646; ex DC. Prod. v. 848=Aplopappus Berterii, macrocephalus.
glutinosa, *Dunal, in Mém. Mus. Par.* v. (1819) 49.—Am. bor. occ.
grandiflora, Hook. Bot. Mag. t. 4628-squarrosa.
hirsuta, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1882) II. 140.—Hab.f
hirsutula, *Hook, (f Am. Bot. Beech. Voy.* 147.—Calif,
humilis, *Hook*, b* *Am. I. c*—Calif.
incisa, Spreng. Syst. iii. 576=Aster incisus.
integrifolia, *DC. Prod.* v. 315.—Am. bor, occ.
inuloides, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* i. (1807) 261.—Am. bor. occ.
Lambertii, *G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 350, nomen. —Mexic.
lanceolate, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 73.—Am. bor.
latifolia, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1873) 86 = glutinosa.
microcephala, DC. Prod. v. 315=inuloides.
microcephala, Rothr. in Wheeler, Rep. vi. 141 = arizonica.
nana, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 314.—Am. bor. occ.
nitida, *Bernh. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 298.—Mexic.
nuda, Wood, In Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 50 = squarrosa.
oregana, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 118.—Am. bor. occ.
pacifica, M. E. Jones, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 31=nana.
pectinata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. ill. 4.—Bras.
peruana, Sch. Bip. in Lechl. Berb. Am. Austr. 67 =seq.
peraviana, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856) 54, nomen.—Peruv.

GBLNDELIA:
puberula, *Hook, (f Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* » (1836) 45.—Reg. Argent.
pubescens, Nutt. in Journ. Acad. PhiL vii. (1834) 74 = inuloides.
pulchella, Bert in Merc. Chil. (1829) 643; et in Am. Joura. Sc. xxiii. (1833) 84-Aplopappus glutinosus, pulchellus.
pulchella, *Dunal, in Mim. Mus. Par.* v. (1819) 51. t. 2—Chili.
Tesinosa, *Gill, ex Hook. V Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 45.—Chili,
robusta, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 314.—Calif.
rubricaulis, DC. Prod. v. 816=hirsutula.
scorzonerifolia, *Hook, (f Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 45.—Reg. Argent.
sibirica, Spreng. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 336 Aster sibiricus.
spathulata, Bivona, ex Link, 1. c-inuloides.
speciosa, Gill, ex Hook, ft Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 45=squarrosa.
speciosa, *Lindl. V Paxt. Flow. Gard.* iii. (1852-53) 118. n. 594.—Patagon.
sqnarrosa, *Dunal, in Mém. Mus. Par.* v. (1819) 50.—Am. bor. occ.
stricta, DC. Prod. vii. 278-integrifolia.
subdecurrens, DC. 1. c. v. 315-squarrosa.
texana, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 60-squarrosa.
villosa, *D[ougl.f] ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II- 299.—Am. bor. oca
virgata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 314=oregana.

GRINDELIOPSIS, Sch. Bip. in Bonplandia, vi. (1868) 356=Xanthooeplialum., Willd. (Compos.).
gymnospermoides, Sén. Bip. 1. c. «=X. gymnbspermoides.

GRIPIDEA, Mien, in Trans. Linn. Soc. xxv. (1865) 227-t. 28=Blumenbaehia, Schrad. (Loaseae).
asperata, Miers, 1. c 235.—Bras.
scabra, Miers, 1. c.—Bras.

GRISCHOWIA, Karst. Answ. Neue Gew. 15.15 (1848) = Monoohaetum, Naud. (Melastom.).
hirta, Karst. 1. c. 16. t. &=M. hirtum.
meridensis, Klotzsch ft Karst. 1. c = M. meridense.
osbeckioides, Klotzsch ft Karst. 1. c - M. umbellatum.

GBI8EBACHIA, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 225. *ERICACEAE*, Benth. ft Hook. f. ii 592.
ACROSTEMON, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 227-
COMACEFHALUS, Klotzsch, 1. c. 224 (1838).
FINCKEA, Klotzsch, I. c. 237 (1838).
PILOPUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 102 (1836), nomen prius.
bruniades, *Benth. in DC. Prod.* vii. 702.—Afr. austr.
ciliaris, *Klotssch, in Linnaea*, xii. (1838) 225.—Air-austr.
Dregeana, *Benth. in DC. Prod.* vii. 701.—Afr. austr.
eriocephala, *Benth. 1. c.* 702.—Afr. austr.
hirta, *Klottsch, in Linnaea*, xii. (1838) 226.—A"-austr.
hispida, *Klotesch, I. c*—Afr. austr.
incana, *Klotesch, I. c.* 225.—Afr. austr.
involuta, *Klotesch, I. c.* 227.—Afr. austr.
plumosa, *Klotesch, 1. c.* 226.—Afr. austr.
serrulata, Benth. in DC. Prod. vii. 701 = plumosa.
Thunbergii, *Rack, in Linnaea*, xxvi. (1853) [1855] 78»-—Afr. austr.
velleriflora, *Klotesch, 1. c.* xii. (1838) 227.—Afr. austr-
Zeyheriana, *Klotesch, I. c*—Afr. austr.

GRISEBACHIA, H. Wendl. ft Drude, in Linnaea, ****• (1876) 177=Howea, Becc. (Palm.).
Belmoreana, H. Wendl. ft Drude, 1. c. 202 - H. moreana.
Forsteriana, H. Wendl. & Drude, 1. c. 203 - H. Forsteriana.

GBISEBACHLEIiIiA, Lorentz, in Bot. CentralW-(1880) 1339. *APOCYNACEAE*.
Hieronymi, *Lorentt, I. c.*—Reg. Argent.

GRISELEA, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1227 (1840) - Grid*, Linn. (Lythrar.).

OBISBLINIA, Font. f. Prod. 75 (1786).-Cf. Font Char. Gen. Ind. *COSNACEAS,* Benth. 8c Hook. £ i. 951.
DECOSTEA, Ruiz & Pav. Proa. 130 (1794).
PUKATKRIA, Raonl, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 120.
SCOPOLIA, Forst. Char. Gen. 189. t. 70 (1775).
littoralis, *Raoul, Choix PI. N. ZU.* 22. t. 19.—N. ZeL lncida, *Forst. f. Prod.* 75.—N. Zel.

GRISELINIA,Scop.Introd.802(1777)=PtePooarpus, Linn. (Legum.).

GRISIA, Brongn. in Bull. Soc. BoL Fr. xii. (1866) 404 = Bikkia, Reinw. (Rnbiac).
campanulata, Brongn. 1. c. 406.—N. Caled.
fritillarioides, Brongn. 1. c—N. Caled.
macrophylla, Brongn. 1. c. 405.—N. Caled.
neriifolia, Brongn. 1. c. 406.—N. Caled.
retusiflora, Brongn. 1. c. 407.—N. Caled.
tubiflora, Brongn. 1. c—N. Caled.

OEISUBA, Linn. Gen. 842 (1737). *LYTHRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 777.
micropetala, Hochst. & Stend. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 30-Woodfordia floribnnda.
multiflora, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 284 - Woodfordia floribnnda.
pundata, Bnch.-Ham. ex Sm. in Rees, Cycl. xvii. ft 2 «=Woodfordia floribnnda.
secunda, *Linn. Sp. PI.* 848.—Am. trop.
totnentosa, Rozb. PI. Corom. i. 29. t. 81=WoodfordU floribnnda.
uniflora.A. Rich. Tent Fl. Abyss. i.281=Woodfordia noribunda.

QRISOLLEA, BaiU. Adanaonia, iv. (1683-64) 217. *OLACJNEAB,* Benth. & Hook. £ i. 997.
myriantha, *BaiU. 1. c*—Afr. anstr.

OBOBYA, Lindl. Bot. Reg. 1.1740 (1835). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. £ iil 543.
Amherstiae, *Lindl. I. c*—Bras,
galeata, *Lindl. 1. e.* xxvi. (1840) *Misc.* 83.—Bras.

GROELANDIA, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. 169 (1869)-seq.

GROENLANDIA, J. Gay, in Compt-Rend. Par.xxxvffi. (1854) 703 =Potamogeton,Tourn. (Naiad.).
densa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 169 -P.densus.

GROMOVIA, Regel, GartenfL xiv. (1865) 280 = Belo-Perone, Nees (AcanthacJ.
Pulckella, Regel, 1. c - B. violacea.
violacea, Regel, 1. c. = B. violacea.

GROMPHAENA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127 = Gomphrena, Linn. (Amarant.).

OBOITA, Lonr. Fl. Cochinch. 459 (1790). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. £ i.634.
Daliellii, *Baker, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* ii. 191.—Ind. or.
filicanlis, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliL (1873) «. 232.—Burma.
Grahamii, *Benth. PI. Jungh.* 283.—Burma.
'"tens, Herb. Banks, ex Benth. & Hook. £ Gen. İ. 5S5 • Desmodinm polystachyum.
rePnns, *Lour. Fl. Cochinch.* 469.—Cochinch.

GRONE, Spreng. Syst. iii. 245 (1826)=praec

GROMOPHTIIIIUM, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. ||.(1876) 135, 153. *PALMAE,* Benth. *8c* Hook. £ i. 886
• rnocau m , *Scheff. I. c.* 153.—Malaya.
scuebicum, *Becc. I.e.* ii. (1885) 82.-Ins. Celebes.

GRONOVIA, Blanco, Fl. Filip. 186 (1837) - Illigera, Blurne (Combretac.).
ternata, Blanco, L c. 187-L coryzadema.

GRONOVIA\., Houst. ex Linn. Syst ed. I (1786). *LOASEAE,* Benth. & Hook. £ L 808.
^nboldtiana, Roem. & Schult Syst v. 492 = scandens.
Jacquiana, M. Roem. Syn. Pepon. 108-scandens.
"^Adens, *Linn. Sp. PI.* 202.—Am. anstr.

GROSOWIDYA, Reichb. £ in Bot Zeit. xxii. (1864) 297-Sarcoohllua, R. Br. (Orchid.).
elegant, Reichb. f. 1. c - S . Hystrix.

GROSSOSTYLIS, Pen. Syn. ii. 260 (1807), sphalm.-Crousostylia, Forst. (Rhizoph.).

GROSSULARIA, Town, ex Adans. Fam. U. 243 (1763) =EIbes, Linn. (Saxifrag.).
acicularis, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 173=R. adenlare.
adenophylla, Rnpr. Sert. Tiansch. 47 - R. heterotricnium.
Cynosbati, Mill. Gard. Diet. ed. VIIL n. 6=R. Cynosbati.
diacantha.Min. ex Stend. Nom. ed. II. L 708-R. diacftnthnxn.
divaricata, Stend. 1. c. ii. 457, in syn. = R. divaricatum.
glanduloso-setosa, Opiz, Seznam, 48=R. Grossnlaria.
hirsuta, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 - R. Grossularia.
hirtella, Spach, Hist Vég. Phan. vi. 180 =• R. oxyacanthoides.
intermedia, Opiz, Seznam, 48 - R. Grossnlaria.
irrigua, S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 338= R. divaricatnm.
nigra, Mill, ex Steud. Nom. ed. II. i. 708=R. nigrnm.
nivea, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 179 = R. gracile.
oxyacanthoides, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 «= R. oxyacanthoides.
pubescent, Opiz, Seznam, 48=R. Grossularia.
reclinata, MilL Gard. Diet ed. VIII. n. 1=R. Grossnlaria.
rubra.Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 167=R. rnbrum.
trifiora, Spach, Hist. *Vig.* Phan. vi. 176=R. rotundifolinm.
Uva, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 168=R. Grossnlaria.
Uva-crispa, Mill. Gard. Diet ed. VIIL n. 3=R. Grossularia.
mtlgarU, Spach, Hist Vég. Phan. vi. 174 - R. Grossularia.

GROTEFENDIA, Seem. Toura. Bot. ii. (1864) 247 = Polysoias, Font (Araliac).
cuneata, Seem. 1. c = P . panicnlata.
paniculata, Seem. 1. c = P. panicnlata.
repanda, Seem. 1. c. 248=P. repanda.

GROUTIA, Guill. *8c Vert.* Fl. Seneg. Tent. 100. t 22 (1882)-Opilia, Roxb. (Olacin.).
celtidifolia, GuiU. *8c* Perr. 1. c. 101. t. 22 = O. amentacea.

OBXTBBIA, Btrg.'in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1767) 34; et Desc. PI. Cap. 90. t. 2 (1767). *SANT ALACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 231.
OFHIRA, Linn. Mant ii. 150 (1771).
STROBILOCAKPUS, Klotzsch, in Linnaea, xiii. (1839) 380.
capensis, J. F. Gmel. Syst. 629=ro»marinifolia.
hirsuta, *E. Mey. in Drige, Zwei Pft. Docum.* 188, nomen; *et ex A. DC. Prod.* xiv. 618.—Afr. aostr.
pinifolia, *Sond. in Ham. If Sond. Fl. Cap.* ii. 326.—Afr. austr.
rosmarinifolia, *Berg, in Vet. Akad. Handl. Stockh.* (1767) 36 ; *et Desc. ft. Cap.* 90.—Afr. anstr.
rosmarinifolia, Krauss, ex A. DC. Prod. xiv. 618 = stricta.
stricta, *A. DC. I. c*—Afr. anstr.

GRUENERA, Opiz, Seznam, 48 (1852)~SaIix, Tonrn.
amygdaloides, Opiz, 1. c = S . triandra.

GRUHLMANIA, Neck. Elem. *I* 202 (1790)-Spermacoce, Linn. (Kubiac.).

GRUMELIA, Wight, Ic. iii. 16 (1845)-seq.

GRUMILEA, Gaertn. Frnct. i. 138. t 28. £ 2 (1788) = Fsyohotria, Linn. (.Rubiac).
adenophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 297= P. adenoiila.
affiJs, Thw. Enutn. PL Zeyl. 148=P. Wightiana.
argentata, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 299-P. argentata.
artieulata, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 218.—Aïr. trop.
aurantiaca, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 296-P. malayana.
capensis, Sond. m Harv. *8c* Sond. Fi. Cap. iU. 21 = P. capensis.

GRUMILEA :—
congesta, Wight *8c* Am. Prod. 432 - Psychotria congesta, *Hook./,*
cymosa, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 188 - P. Eckloniana.
divaricata, Thw. Ennm. PI. Zeyl 149 - Gaertnera Koenigii.
divergens, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 299-p. divergent
elongata, Wight, Ic. 1.1036-P. elongata, *Hook.f.*
fimbricalyx, Miq. Fl. Ind. Bat. ij. 297.—Java.
Gardneri, Thw. Enum. PI. Zeyl. 147 = P. Gardneri.
globosa, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 654 = P. capensis.
Junghuhniana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 296 - P. sarmentosa.
Kirkii, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afi. iii. 216.—Afr. trop.
longi/olia, Bedd. in Madr.Joum.Sc. Ser. III. i. (1864) 50, nomen.—Ind. or.
longi/olia, Bedd. in Trans. Linn. Soc. xxv. (1866) 218 =P. anamallayana.
macrocarpa, Hiem, in Oliver, FL Trop. Afr. Hi. 217.—Afr. trop.
micrantha, Hiem, 1. c.—Afr. trop.
Moonii, Thw. Enum. PI. Zeyl. 148=P. Moonii.
morindoides, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 647-P. leucocarpa.
nigra, Gaertn. Fruct. i. 138. t 28-P. Thwaitesii ?
nudiflora, Thw. Ennm. PL Zeyl. 147=P. Thwaitesii.
patens, Schlecht. ex Hook. £ Fl. Brit Ind. iii. 162-P. congesta, *Hook./.*
polycarpa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 295-P. sarmentosa.
psychotrioides, DC. Prod. iv. 495.—Afr. trop.
Reevesii, Hook. *8c* Am. Bot Beech. Voy. 193 = P. elliptica.
sphaerocarpa, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 218.—Afr. trop.
stenophylla, Thw. Enum. PL Zeyl. 147 - P. stenophylla.
subintegra, Wight *8c* Am. Prod. 432= P. snbintegra.
succulenta, Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 218 = P. succulenta.
sulphurea, Hiem, 1. c. 218=P. sulphurea, *Schweinf.*
sylvatica, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 298 = P. sylvatica.
Teysmanniana, Miq. 1. c. Suppl. 647.—Ins. Banca.
umbellata, Miq. 1. c. ii. 296.—Sumatra.
venosa, Hiem, In Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 217.—Afr. trop.
nridiflora, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 298-P. viridiflora.
Wightiana, Thw. Enum. PL Zeyl. 148= P. Wightiana.

GRUNDLEA, Steud. Nom. ed. II. i. 708 (1840), sphalm. —praec.

GRUVELIA, A. DC. in DC. Prod. *x.* 119 (1846) - Peetooarya, DC. (Boragin.).
pusilla, A. DC. 1. c.-P. pusilla.

GRYMANIA, Presl, Epim. Bot 193 (1849) =:Farlnarium, Tuss. (Rosac).
polyandra, Presl, 1. c-Conepia Kunthiana.
salici/olia, Presl, 1. c.=P. salicifolium.

GUACHAMACA, De Gross, in Med. Bot. Criollo, i. 296; ex Ernst, in Trans. Bot. Soc. Edinb. x. (1870) 450=PreBtOHia, R. Br. (Apocyn.).
toxicaria, De Gross, 1. c.—Venezuela.

GUACO, Liebm. in Forhandl. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 203=Aristoloohla, Linn.
mexicana, Liebm. 1. c.—Mexic.

GUADUA, Kunth, Syn. PI. i. 252 (1822). *GRAMINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 1210.
aculeata, *Ruhr, ex Fourn. in Compt.-Rend. Par.* lxxxiv. (1877) 198.—Mexic.
amplexifolia, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 266.—Mexic.
angustifolia, *Kunth, Syn. PI.* i. 253.—N. Granat.
capitata, *Munro, in Traits. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 81.—Bras.
dioica, Steud. Syn. PL Gram. 834=macrostachya.
distorta, J?«^r. *in Mint. Acad. Sc. Pétersb.* Sèr. VI. v. (1889) 181.—Bras.
exalata, Doell, in Mart Fl. Bras. ii. III. 181-Arthrostylidium longiflorum.
fascicularis, *Doell, I. c.* 186.—Guiana,

GTJADT7A:—
ñabellata, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 588.—Mexic.
glomerata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 79.—Bras,
inennis, *Rupr. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. £88.—Mexic.
intermedia, *Rupr. ex Hemsl. 1. c.*—Mexic.
latifolia, *Kunth, Syn. PI.* i. 254.—Am. austr.
macrostachya, *Rupr. in Mém. Acad. Sc. Pitersb.* Sér. VI. v. (1839) 129.—Guiana.
pallescens, Doell, in Mart. Fl. Bras. Ii. III. 186 = Bambusa pallida.
paniculata, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvL (1868) 85.—Bras,
paragnayana. *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 179.—Bras.
parvifiora, J. Sc C. Presl, in Rel. Haenk. i. 257 = Arthrostylidium moculatnm.
polyclados, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 182.—Bras,
refracta, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 84.—Bras.
Tagoara, *Kunth, Enum. PI.* i. 484.—Bras.
Trinii, *Rupr. in Mém. Acad. Sc. Pitersb.* Sér. VI. v. (1839) 130.—Bras.
Venezuelae, *Munro, in Trans. Linn. Soc.* xxvi. (1868) 86.—Venezuela,
virgata, *Rupr. in Mint. Acad. Sc. Pitersb.* Sér. VI. v. (1839) 180.—Bras.

GUAGNEBINA. Veil. Fl. Flum. 45 (1825) j i. t. 115 (1827) -Manettia, Mutis (Rubiac).
axillaris, Veil. 1. c 46; i. t. 119-M. albiflorai
congesta, Veil. 1. c.; i. 1.120 = M. albiflora.
ignita, Veil. 1. c. 45 ; i. 1.115=M. cordifolia.
luteo-rubra. Veil. 1. c. 46; i. t. 121 = M. luteo-rnbra.
lutescens, Veil. 1. c. 45; i. t. 116 = M. ciliata *1*
mitts, Veil. 1. c. 46; i. t. 118 = M. fimbriata.
suavis, Veil. 1. c 45 ; i. 1.117 = M. fimbriata?

GUAIACON, Adans. Fam. ii. 507 (1763) = seq.

GUAIAC171X, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 140 (1787). *ZYGOPHYLLEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 287.
Abilo, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 364-Garuga pinnata.
of rum. Linn. Sp. PI. 382-Schotia speciosa.
angustifolium, Engelm. in Wisliz. Tour N. Mexic. 118 - Porliera angnstifolia.
arboreum, *DC. Prod.* i. 707.—Am. trap.
bijugum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 486-offidnale.
Breynii, *Spreng. Syst.* ii. 322.—Am. austr.
Coulteri, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. Ji. S. v.* (1865) 812.—Mexic.
dubium, *Forst.f. Prod.* 32.—Ins. Amicor.
guatemalense, *Planck, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 159, nomen.—Mexic
microphyllum, *Baill. Adansonia,* x. (1872) 815.—Bolivia.
multijugum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 488 = sanctum.
officinale, *Linn. Sp. PI.* 881.—Ind. oca
parvifolium, *Planch, ex A. Gray, PI. Wright,* i. 29.—Mexic.
sanctum, *Linn. Sp. PI.* 382.—Am. trop.
Sloanei, Shuttl. ex A. Gray, PI. Wright, i. 29 = verticale.
verticale, *Orteg. Hort. Matr. Dec.* 93.—N. Hisp.; Doming.
verticale, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 321-sanctum.

GUAIAVA, Toum. ex Adans. Fam. ii. 88 (1763) - Psidium, Linn. (Myrtac.).
pyriformis, Gaertn. Fruct. i. 185. t. 38=P. Guajava.

GUAJACUM, Plum, ex Linn. Syst. ed. I (1735) = Guaiacum, Plum. (Zygophyll.).

GUALTERIA, Scop. Introd. 194 (1777) -Gaultheria, Linn. (Ericac).
brevipedata, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 127-Gaultheria brevipes.

GUALTHERIA, J. F. Gmel. Syst. 697 (1791)-Gaultheria, Linn. (Ericac.).

GUANDIOLA, Steud. Norn. ed. 1.384 (1821), «phalm.= Guardiola, Humb. ft Bonpl. (Compos.).

GUANIA, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 129 = Gouania, Jacq. (Rhamn.).

GUAPEA, Endl. Ench. 361, in syn. (1841)=seq.

GUAPEBA, Gomez, in Mem. Ac. Lisboa, iii. (1812) Mem. dos Corresp. t. 2=seq.

GUAPEBEIRA, Gomez, in Mem. Ac. Lisboa, iii. (1812) Mem. dos Corresp. 19=liucuma, Juss. (Sapotac).
brasiliensis, Steud. Norn. ed. II. i. 708 = seq.
laurifolia, Gomez, in Mem. Ac Lisboa, iii. (1812) Mem. dos Corresp. 21=L. laiirifolia.

GUAPINA, Steud. Norn. ed. II. i. 708 (1840), Sphalm. = seq.

GUAPIRA, Anbl. PI. Gui. i. 808.1.119 (1775). *INC. SED.,* an Verbenaceae 1—C£ Benth. & Hook. f. ii. 1137.
GYNASTRUM, Neck. Elem i. 224 (1790).
guiancnsis, *Aubl. 1. c.*—Guian.

GUAPURIUM, Juss. Gen. 324 (1789) -Eugenia, Linn. (Myrtac).
fruticosum, Spreng. Syst. ii. 479-E. Guapurium.
herbaceum, Spreng. 1. c. = Klaprothia mentzelioides.
peruvianum, Poir. in Diet. Sc. Nat xx. 11 = E. Guapurium.

GUAPURUM, J. F. Gmel. Syst 793 (1791) = praec.

GUARANIA, Wedd. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 598 (1858)-Rieheria, Vahl (Euphorb.).
Gardneriana, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 348=R. grandis.
laurifolia, Baill. 1. c.-R. grandis.
longi/olia, Baill. 1. c. 349-R. grandis.
purpurascens, Baill. 1. c. 847 — R. grandis.
ramiflora, BailL Etud. Gen. Eoph. 598, nomen = R. grandis.
Spruceana, Baill. Adansonia, v. (1864-65) 348 - R. grandis.

GUARARIBEA, Cav. Diss. ii. App. (1785), err. typ. = Quararibea, Aubl. (Malvac).

GTXARDIOLA, Cerv. ex Humb. & Bonpl. PI. Aequin. i. 143. t. 41 (1808). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 847.
TULOCARPUS, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 298. t. 68 (1841).
atriplicifolia, *A. Gray, PI. Wright,* i. lll.-Mexic.
mexicana, *Humb. (f Bonpl. PI. Aequin.* i. 144. t. 41.—Mexic.
platyphylla, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 91.—N. Mexic.
Tulocarpus, *A. Gray, I. c.* 111.—Mexic.

GUABEA, Allem. ex Linn. Mant. ii. 150 (1771). *MELIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 335.
PLUMEA, Lunan, Hort. Jaraaic. ii. 77 (1814).
RUAGEA, Karst. Fl. Columb. ii. 51.1.126 (1862-69).
acuminata. Wall. Cat. n. 1263 = Dysoxylumprucerum.
affinis, *A. Juss. in Mem. Mus. Par.* xix. (1880) 289.—Guiar..
africana, *Wel-x. ex C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 676.—Afr. trop.
alba, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.189.—Bras.
alliacea, Blume, in Flora, vii. (.1824) 290= Dysoxylum alliaceum.
alliaria, Buch.-Ham. in Mem. Wera. Soc. vi. (1832) 305 = Dysoxylum Hamiltonii.
alternans, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.186__Bras.
Amaris, Buch.-Ham. in Mem. Wem. Soc. vi. (1832) 308- Dysoxylum binectariferum.
Amyris, Steud. Nom. ed. II. i. 709, sphalm.-praec.
apiiodora, *Baill. Adansonia,* x. (1871). 110.—N. Granat.
Aubletii, A. Juss, in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 240-trichilioides.
axillaris, *Blume, in Flora,* vii. (1824) 290, nomen.—Java,
bijuga, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 667.—Am. trop.
binectarifera, Roxb. Hort Beng. [28]; Fl. Ind. ii. 240 = Dysoxylum binectariferum.
Blanchetii, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 187.—Am. trop.
brachystachyi, *[Moç.* to" *Sesse,] ex DC. Prod.* i. 624.—Mexic

GUAREA:—
cauliflora, Reinw. ex Blume, m Flora, vii. (1824) 290; Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 251= Dysoxylum raminorum.
cernua, Veil. Fl. Flum. 149; iv. t. 9 = Lessoniana.
Clausseniana, *C. DC. in Mart. Fl. Bras,* xi I. 198.—Am. trop.
coriacea, *C- DC. I. c.* 197.—Am. trop.
costata, *A. Juss. in Mim. Mus. Par.* xix. (1830) 241.—Guian.
enspidata, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 198.—Am. trop.
demerarana, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 649.—Am. trop.
densiflora, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 40 = Kunthisina.
densiflora, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 251 = Dysoxylum densiflorum.
disyphonia, Griff. Notul, iv. 503 = Dysoxylum procernm.
excelsa,,H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 227=humilis.
filiformis, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 566.—Am. trop.
foetida, *Blume, in Flora,* vii. (1824) 290, nomen.—Java.
Francavillana, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 187.—Am. trop.
fulva, *Triana* b[1] *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xv. (1872) 371.—N. Granat.
Gardneri, C. *DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 193.—Am. trop.
gigantea, *Triana* b[1] *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. xv. (1872> 370.—N. Granat.
glabra, *Vahl, Eclog. Am.* iii. 8.—Am. austr.
glauca, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xv. (1872) 372.—N. Granat.
Glaziovii, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 188.—Am. trop.
Gobara, Buch..Ham. in Mem. Wem. Soc. vi. (1832) 306—Dysoxylum procerum.
Goladhara, Wall. Cat. n. 4884 = Dysoxylum binectariferum.
Gotadhora, Buch.-Ham. in Mem. Wem. Soc. vi. (18S2) 307 = praec.
grandiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 709 = seq.
grandifolia, *DC. Prod.* i. 624.—Ind. occ.
grandis, Wall. Cat. n. 4883 = Dysoxylum grande.
hirsuta, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 578.—Am. trop.
Hoffmanniana, *C. DC. 1. c.* 570.—Am. trop.
humilis, *Bert, ex DC. Prod.* i. 624.—Porto Rico,
japurensis, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 199.—Bras.
Kegelii, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 589=bijuga.
Kunthiana, *A. Juss. in Mim. Mus. Par.* xix. (1830)241.—Guian.
Langsdorffiana, C. *DC. in Mart. Ft. Bras.* xi. I. 192.~ Am. trop.
Lessoniana, *A. Juss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 84.—Bras.
Lindbergii, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.192.—Am. trop.
longifoliola, *C. DC. 1. c.* 197.—Am. trop.
Lophos, *Veil. Fl. Flum.* 149 ; iv. t. 8.—Bras,
macrobotrys, *Poepp. (f Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. [40]-—Peruv.
macrocarpa, Blume, in Flora, vii. (1324) 290=Dysoxylum macrocarpum.
macrophylla, Vahl, Eclog. Am. iii. 8 = grandifolia.
Martiana, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 184.—Am. trop.
Maynasiana, *C. DC. in A. DC. Monog. Phan.* i. &°-—Am. trop.
megantha, A. Juss. in Mem. Mus. Par. xix. (1830) 241 = grandifolia.
microphylla. Hook. Ic PI. t. 129 = Elutheria microphylla.
M&aniana, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 194.—Am. trop.
mollis, Wall, ex Hiem, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. •• 548 = Dysoxylum Hamiltonii.
Muelleri, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 190.—Amtrop.
multiflora,^. *Juss. in Mim. Mus. Par.* xix. (188°) 241,-Bras.
multiiuga, A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. u. 82" trichilioides.
oblonga, Wall. Cat. n. 1262=Dysoxylum procernm.

OTJASEA:—
oblongifalia, Griff. Notul. iv. 503 - Carapa moluccensis.
obtusi/olia, Lam. Encyc. iii. 6=Trichilia pallida.
pallida, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.186.—Am. trop.
paniculata, Roxb. Hort. Beng. [28] ; Fl. Ind. ii. 242= Chisocheton paniculatus.
paniculata. Wall. Cat. n. 4883 = Dysoxylum Hamiltonii.
paraensis, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 187.—Am. trop.
parvifolia, C. *DC. 1. c.* 189.—Am. trop.
pedicellata, *C. DC. I. c.* 196.—Am. trop.
Perrottetiana, *A. Juss. in Mém. Mus. Par.* xix. (1830) 241, 285.—Ind. occ.
Perrottetii, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 181-Perrottetiana.
petiolulata, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.197.—Am. trop.
Poeppigii, C. *DC. in DC. Monog. Pkan.* i. 568.—Am. trop.
Poeppigii, Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc Nat. *Sir.* V. xv. (,1872) 871 = Kunthiana.
Pohlii, C. *DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.195.—Am. trop.
porcata, M. Roem. Syn. Hcsper. 118 = tubercnlata.
procera, Wall. Cat. n. 1261 = Dysoxylum procerum.
pubescens, *A. fuss, in Mint. Mus. Par.* xix. (1830) 241.—Guian.
pubiflora, *A. Juss. I.* c—Bras.
Ptactata, *C. DC. in DC. Monog. Pkan.* i. 576.—Am. trop.
Purgans, A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. «S- Martiana.
purgnns, St. Hil. PI. Us. Bras. n. 71=trichilioides, tuberculata.
Pnrpurea, *C. DC. in DC. Monog. Pkan.* i. 664.—Am. trop.
iflora, *Vent. Choix,* 41—Porto Rico.
Kichardiana, *A. Juss. in Mem. Mus. Par.* xix. (1880) 241, 291.—Ouian.
Riedelii, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 189.—Am. trop.
josea, *C. DC. I. c.* 186. t. 64.—Am. trop.
Ruagea, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 577.—Am. trop.
rabra, *CDC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 191.—Am. trop.
Mlgadensis, *C. DC. I. c.* 198.—Am. trop.
Mabra, *A. Juss. in Mim. Mus. Par.* xix. (1880) 241.—Gnian.
Schomburgkii, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 565. ~Am. trop.
Selloana, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 198.—Am. trop.
**ericea,* Spreng. SysL iv. Cnr. Post. 251 = Dysoxylnm ramiflornm.
Wvatica, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 195. t. 57.—Am trop.
nnuata, M. Roem. Syn. Hesper. 119=trichilioides.
P)eata, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.194.—Am. trop.
Piciflora, *A. Juss. in St. Nil. Fl. Bras. Mer.* ii. 81.—Bras.
Prncei, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 198. t. 58.—Am. trop.
Wberosa, *C. DC. 1. c.* 196.—Am. trop.
inamensis, Miq. ex C. DC. in DC. Monog. Phan. i- 543=trichilioides.
«ar<„;, DC. p,od. i. 624-glabra.
**artBii,* Macfad. Fl. Jamaic. 172 = trichilioide». trop.
nantte, *C. DC. in A. DC. Monog. Phan.* i. 578.—Am.
nchilioides, *Linn. Mant.* ii. 228.—Ind. occ.
nnciflora, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 571.—Am. trop.
t*rcnlata, *Veil. Fl. Flum.* 150 ; iv. 110.—Bras.
«hliana, A. Juss. in Mem. Mus. Par. xix. (1880) 240 =Blabra.
a, *A. Juss. I. c.* 241—Bras.
culosa, *C. DC. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 198.—Am. trop.
anningiana, *C. DC. I. c.* 194.

GUARIA, Dum. Anal. Fam. 48 (1829) = praec

GUARIRUMA, Cass. in Diet. Sc. Nat xxxiii. 468, 472 U824),-Mutlsia, Linn. f. (Compos.).
atum, Cass - »• «- = M- I"**"-
Cas»-11- cc.«M. subulata.
rsutn, Cass. 11. cc. = M. retrorsa.
turn, Cast. 11. cc = M. sinuata.
Pinosum, Cass. 11. cc = M. subspinosa.

GUAROPSIS, Presl, Epim. Bot. 219 (1849) = Clarkia, Pursh (Onagrar.).
lanci/olia, Presl, I. c—Mexic.

GTXATTEBIA, Ruiz & Pav. Prod. 85. t. 17 (1794). *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 28.
CANANGA, Aubl. PI. Gui. i. 607-1. 244 (1775).
Abercmoa, *Dunal, Monog. Anon.* 126.—Guian.
acutiflora, DC. Syst. i. 508-Polyalthia KorintiI
acutiflora, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 21)—Bras.
acutiflora, Wall. Cat. n. 6488-Polyalthia Korinti, Alphonsea zeylanica.
acuti/olia, Dunal, Monog. Anon. 134 = Polyalthia Korii\ti 1
acutifolia, Wight, ex Wall. Cat. n. 6438-Alphonsea zeylanica.
amplifolia, *Triana* b" *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xvii. (1862) S5.-Panama.
anonaefolia, A. DC. in Wall. Cat. n. 6435 (Polyalthiae sp.).—Ind. or.
apodocarpa, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 30.—Bras,
australis, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 37.—Bras.
Badajamba, Roxb. ex Wall. Cat. n. 6443 (Polyalthiae sp.).—Ind. or.
Bembau, Miq. Fl. Ind. Bat. SuppL 377 (Polyalthiae sp.) .—Sumatra.
Bertcriana, *Spreng. Syst.* iL 685.—Porto Rico,
bibracteata, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 1.—Mexic.
iifaria, A. DC. Mém. Anon. 41= Polyalthia bifaria.
biglandulosa, Blume, Fl. Jav. Anon. 102. t. 51 = Polyalthia biglandulosa.
blepharophylla, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 38.—Bras.
Bragma, Blume, Bijdr. 20 (Polyalthiae sp.).—Java,
brevipes, *DC. Syst.* i. 502.—Guian.
brevipetala, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 881 - Polyalthia macrophylla.
caffra, *Sond. in Ham. (f Sond. Fl. Cap.* i. 9.—Afr. austr.
canangioides, Reichb. f. & Zoll. in Linnaea, xxix. (1867-68) 328 (Polyalthiae sp.).—Ind. or.
Candolleana, *Schlecht. I. c.* ix. (1834) 325.—Bras,
caniflora, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 37.—Bras.
Cargadero, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 34.—N. Granat.
caudata, Wall. Cat. n. 8452=Xylopia caudata.
cauliflora, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 85.—Bras.
cerasoides, Dunal, Monog. Anon. 127 = Polyalthia cerasoides.
cestrifolia, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xvii. (1862) 32.—N. Granat.
cinnamomea, Wall. Cat. n. 6444 = Polyalthia cinnamomea.
coffeoides, Thw. Ennm. PL Zeyl. 10 - Polyalthia eoffeoides.
cordata, Dunal, Monog. Anon. 129. t. 30=Uvaria macrophylla.
Corinti, Steud. Norn. ed. I.384-C. *Korinti.*
costata, Hook. f. *Sc* Thorns. Fl. Ind. i. 143 = Polyalthia costata.
cuneiformis, Blume, Bijdr. 19.=Polyalthia cuneiformis.
decandra, *G. Don, Gen. Syst. i.* 100.— Peruv.
densicoma, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 32.—Bras,
diospyroides, *Baill. Adansonia,* vili. (18tf8) 269.—Mexic.
elongata, *Benth. in Hook. Loud. Journ. Bot.* ii. (1843) 859.—Guian.
eriantha, Reichb. f. *Sc* Zoll. in Linnaea, xxix. (1857-68) 323 (Polyalthiae sp.).—Malaya,
eriopoda, *DC. Syst.* i. 506.—Peruv.
eupoda, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 380 (Polyalthiae sp.).—Sumatra.
excelsa, *Poepp. ex Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 38.—Peruv.
fasciculata, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 16 = Polyalthia simiarum.
ferruginea, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 88.—Bras,
flava, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 87.—Bras.
ftavicans, Wall. Cat n. 7295=Diospyros flavicans.
foliosa, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 360.—Guian.
fragrans, Dalz. in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 206 = Polyalthia fragrans.
Galeottiana, *Baill. Adansonia,* viii. (1868) 268.—Mexic
glauca, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 49 (Polyalthiae sp.).—Java.
glauca, *SuiM* to* *Pav. Syst. Veg. i.* 145.—Peruv.
globosa, A. DC. in Mém. Anon. 43 = Miliusa Roxborghiana.

GUATTEHIA:—
Gomeziana, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 36.—Bras.
Goudotiana, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 33.—N. Granat.
grandifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 709»Polyalthia macrophylla 1
gnyanensis, *Klottsch, in Mnomb. Faun, et Fl. Gui.* 1163, nomen.—Guiana.
heteropetala, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 360 = Heteropetalum brasiliense.
Hilariana, *Schlecht. in Linnaea,* ix. (1834) 324.—Bras.
hirsuu, *Ruit (f Pav. Syst. Veg.* i. 146.—Peruv.
Hookeri, *St. Ifil.VJuss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 132.—Bras.
hypoleuca, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 381 (Polyalthiae sp.).—Sumatra.
imbricata, Blume, Fl. Jav. Anon. 94 (Polyalthiae sp.).—Java.
incerta, Blume, 1. c. 100 (Polyalthiae sp.).—Java,
inundata, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 36.—Guiana.
Jenkinsii, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i. 141 = Polyalthia Jenkinsii.
Jurgensenii, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 1.—Mexic.
Klotzschiana, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 32.—Bras.
Korinti, Dunal, Monog. Anon. 133 = Polyalthia Korinti.
laevigata, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 82.—Bras.
lateriflora, Blume, Bijdr. 20; Fl. Jav. Anon. 100 (Polyalthiae sp.).—Java.
laurifolia, Dunal, Monog. Anon. 132. t. 32 *(=Oxandra laurifolia).*—-Ind. occ.
laurifolia, J. Grah. Cat. Bomb. PI. 4 = Bocagea Dalzellii.
laurina, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 82.—N. Granat.
littoralis, Blume, Fl. Jav. Anon. 99 (Polyalthiae sp.).—Java.
longifolia, Wall. Cat. n. 6442 = Polyalthia longifolia.
longipes, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 32.—N. Granat.
lucida, Boj. Hort. Maurit. 6-aUvaria lucida.
lucida, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 78.—Peruv.
lntea, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 87.—Bras.
lutescens, Pohl, ex Mart. Fl. Bras. xiii. I. 24 = Dugnelia Pohliana.
macrantha, A. DC.Mém. Anon. 42 (Polyalthiae sp.).—Ind. or.
macrantha, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 78.—Mexic.
macrophylla, Blume, Bijdr. 19 = Polyalthia macrophylla.
macropus, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 28. t. 8.—Bras,
magnifica, *Ruit* b* *Pav. Fl. Per.* v. t. 480.—Peruv.
malabarica, Dunal, Monog. Anon. 134 = Uvaria zeylanica.
Martiana, *Schlecht. in Linnaea,* ix. (1834) 328.—Bras,
maypurensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 64.—Venezuela.
membranacea, A. DC. *Mm.* Anon. 41.—Ind. or.
micrantha, A. DC. 1. c. 42—Uvaria micrantha.
microuarpa, *Ruit W Pav. Fl. Per.* v. t. 479.—Peruv.
montana, DC. Syst. i. 508-Uvaria zeylanica.
multinervis, Wall. Cat. n. 6445 = Polyalthia cinnamomea.
nigrescens, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 31.—Bras.
nitida, A. DC Mém. Anon. 41 = Polyalthia nitida.
odontopetala, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 83.—Bras,
oligocarpa, *Mart. I. c.* 38.—Bras.
Ouregou, *Dunal, Monog. Anon.* 126.—Guian.
ovalis, *Ruin V Pav. Syst. Veg.* i. 146.—Peruv.
oxycarpa, Miq. Fl. Ind. Bat I. I. 49 (Polyalthiae sp.).—Sumatra.
oxycarpa, Poepp. ex Mart. Fl. Bras. xiii. I. 38 = blepharophylla.
palembanica, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 878.—Sumatra.
pallida, Blume, Bijdr. 20; Fl. Jav. Anon. 97 (Polyalthiae sp.1.—Java.
pallida, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind.L143-Polyalthia argentea.
Parveana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 48 (Polyalthiae sp.).—Sumatra.
Pavonii, *G. Don, Gen. Syst.* i. 100.—Pernv.
pendula, *Rut* b[1] *Pav. Syst. Veg.* i. 146.—Pernv.
persicae/olia. Hook. f. & Thorns. H. Ind. i. 140-Polyalthia persicaefolia.

GUATTERIA:—
peisicifolia, ***Triana tf Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.*** IV. xvii. (1862) 33.—N. Granat.
pilosa, G. Don, Gen. Syst. i. 100=-Uvaria hirsute,
pilosnla, ***Planch. & Linden, ex Triana b" Planch, in*** *Ann. Sc. Nat.* Seŕ. IV. xvii (1862) 31.—N. Granat.
pisocarpa, Blume, Bijdr. 21 — Bocagea pisocarpa.
platyphylla, ***Triana (f Planch, in Ann. Sc. Nat.*** **Sér.** IV. xvii. (1862) 35.—N. Granat.
podocarpa, *DC. Syst.* i. 603.—Guian.
Poeppigiana, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 36.—Bras,
pogonopus, *Mart. 1. c.* 34.—Bias.
Pohliana, *Schlecht. in Linnaea,* ix. (1881) 321.—Bros.
polita. Wall. Cat. n. 6450 (Polyalthiae sp.).—Ind. or.
Poudook, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 880 (Polyalthiae sp.).—Sumatra.
prinoides, *Spreng. Syst.* il. 635.—Ins. S. Doming,
psilopus, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 27.—Bras,
pteropns, ***Benth. in Hook. Kern Journ.*** **v. (1853) 8.—** Bras,
qnindnensis, ***Triana*** **b*** ***Planch, in Ann. Sc. Nat.*** **Sér.** IV. xvii. (1862) 84.—N. Granat.
ramosissima, Wall. Cat. n. 7294, 8006 = Popowia ramosissima.
rufa, Dunal, Monog. Anon. 129. t. 29 (Polyalthiae sp.).—Ind. or.; Malaya.
rufa, Lindl. Bot. Reg. t. 836=Uvaria microcarpa.
rufa, ***Triana (f Planch, in Ann. Sc. Nat.*** **Sér. IV.** xvii. (1862) 35.—N. Granat
Schlechtendaliana, *Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 34.—Bras.
Schomborgkiana, *Mart. I. c.* 38.—Guian.
Sellowiana, *Schlecht. in Linnaea,* ix. (1834) 323.—Bras.
sempervirens, Dunal, Monog. Anon. 133 (Polyalthiae sp.).—Ind. or.
sesquipedalis. Wall. Cat n. 6446 = Goniothalamns sesqnipedalis.
simiarum, Buch.-Ham. in Wall. 1. c. 6440-Polyalthia simiarum,
spatulata, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 420 (Polyalthiae sp.).—Java.
suberosa, Dunal, Monog. Anon. 128 = Polyalthia suberosa.
subsessilis, *Mart. fl. Bras.* xiii. I. 29.^-Bras.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 880 (Polyalthiae sp.).—Sumatra.
Teysmanni, Miq. 1. c. 878 (Polyalthiae sp.).—Sumatra.
Toralah, Blame, Fl. Jav. Anon. 108 (Polyalthiae sp.).—Java,
umbilicata, *Dunal, Monog. Anon.* 135. t 33.—Am. austr. >
imonaefolia, A. DC. Mém. Anon. 41 = Oxymitra unonaefolia.
velutina, A. DC. 1. c. 42=Miliusa velutina.
veneficiorum, *Mart. Reise Bras.* iii. 1237.—Bras,
vestita, ***Klottsch, in Schotnb. Faun, et Fl. Gui.*** **979,** nomen.—Guian.
villosa, G. Don, Gen. Syst. i. 100-Miliusa velutina.
villosissima, *St. Hit. Fl. Bras. Mer.* 38.—Bras.
virgata, Dunal, Monog. Anon. 131. t. 81 *(= Oxandra* ***virgata).*—Ind. occ**
viridiflora, *C. Don, Gen. Syst.* i. 100.—Perav.
WiUemetiana, *DC. Prod.* i. 94.—Hab. 1

GUAYABA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 16=Psidium, Linn. (Myrtac).

GUAZAMAEA, Cassel, Nat Fam. 149 (1810)-seq.

GUAZUMA, Plum, ex Adans. 'Fam. ii. 882 (1768).
STERCULIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 225.
BUBROMA, Schreb. Gen. 513 (1791).
DIUROGLOSSUM, Turci. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxx. (1862) II. 157.
Blumri, G. Don, Gen. Syst. i. 623=tomentosa.
Burbroma, Tussac, Fl. Antill. iv. 69-ulmifolia.
crinita, *Mart, in Flora,* xx. (1837) It. *Beibl.* 95.—Bras.
critina, Steud. Nom. ed. II. i. 710, sphalm. = praec.
grandiflora, *G. Don, Gen. Syst.* i. 523.—Bras.
Juvira, *G. Don, I. c*—Bras,
parvifolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 190.—Cuba,
polybotrya, *Cav. Ic.* iii. 51. t. 299.—Mexlc.
rosea, ***Porpp. (f Endl. Nov. Gen. et Sp.*** **iii. 72.—** Bras.

GUAZUMA:-
tomentosa, *H. B.* to[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 82.—Am. trop.; Java.
ulmifolia, *Lam. Encyc.* iii. 62.—Am. trop.
ulmifolia, Wall. Cat. n. 1141 = tomentosa.
utilis, ***Poepp. (f Endl. Nov. Gen. et Sp.*** **iii. 72.—Bras.**

GUBLERIA, Gandich. Bot. Voy. Bonite, t. 104 (1844-52) = Nolana, Linn. (Convolv.).
toccata, Gandich. i«.—Hab.1

GUEINZIA, Sond. ex Schott, Aroideae, 10 (1853)= Btylochlton, Lepr. (Aroid.).
natalensis, Sond. ex Schott, 1. c.=S. natalense.

GUEIiDENSTAEDTIA, Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc. vi. (1823) 170. *LEGVM1N0SAB,* Benth. & Hook. f. i. 506.
cuneata, Benth. in Royle, Illustr. Bot Himal. 200 = Caragana cuneata.
Delavayi, ***Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.*** **xxxil. (1886)** 5.—China.
diversifolia, ***Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.*** **xxvii.** (1881) 462.—China.
GuiUoni, ***Franch. in Mim. Soc. Sc. Nat. Cherb.*** **xxiv.** (1884) 210.—China,
himalaica, ***Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.*** **ii. 117.—** Reg. riimal.
latifolia, Fisch. ex G. Don. Gen. Syst. il. 273 •= Astragalus latifolius.
maritima, ***Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc.*** **liv. (1879)** I. 7.—China,
mirpourensis, ***Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit.*** *Ind.* ii. 118.—Ind. bor. occ
monophylla, *Fisch. ex DC. Prod.* ii. 807.—Sibir. altaic.
multiflora, ***Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.*** **18.—Reg.** Himal.; China.
Oliveriana, Fisch. ex Jaub. & Spach, Illustr. *I* 94 ***(,—Chesneya Oliverii).*—Mesopot.**
panciflora, *Fisch. ex DC. Prod.* ii. 807.—Sibir. altaic
stenophylla, ***Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.*** **18.—** China.

GUELDENSTAEDTIA, Neck. Elem. ii. 204 (1790)-Eurotla, Adans. (Chenop.).

GUENTHERA, Andrz. ex Bess. Enura. PI. Volh. 83 (1822) ~ Brassiest, Tonrn. (Crncif.).
elongata, Bess. 1. c.=B. elongata.

GUENTHERA, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1867) 42; et Gartenfl. (1858) 44 = **Xanthooephalum,** Willd. (Compos.).
viscosa, Regel, U. cc.=X. gymnospermoides.

GUENTHERIA, Spreng. Syst iii. 356 (1826) = GaiUardia, Fonger. (Compos.).
megapotamica, Spreng. 1. c. 449=G. megapotamiea.

GUEPINIA, Bast Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 35 H812) = TeeadaUa, R. Br. (Crucif.).
Iberis, DC. Fl. Fr. Snppl. 596 ^T. nudit'aoiis.
Lepidium, DC. 1. c.=T. regularis.
nudicaulis, Bast Fl. Maine-et-Loire, Snppl. 35 =T. nudicaulis.

GUERSENTIA, Rafin. Sylva Tellur. 153 (1838) - Chrysophyllum, Linn. fSapot.).
angusti/olia, Rafin. 1. c. = C. angnstifolinm.
microcarpa, Rafin. 1. c.-C. microcarpum.
olivęformis, Rafin. 1. c -C. Cainito!

GUESMELIA, Walp. Ann. i. 841 (1849), sphalm. = Quesnelia, Gaudich. (Bromel.).

GUETTARDA, Linn. Sp. PI. 991 (1753). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 99.
CADAMBA, Sooner. Voy. ii. 228.1128 (1782).
DICROBOTRYUM, Willd. ex Koem. & Schult Syst v. 221 (1819).
DONKELAARIA, Lem. Illustr. Hortic. iL (1855) Misc. 72.
HALESIA, P. Br. Hist. Jamaic. 205 (1756).
HALLESIA, Scop. Introd. 141 (1777).
LAUGERIA, Linn. Syst. ed. XII. 177 (1767).
LAUGIERIA, Jacq. Enum. PI. Carib. 2 (1760).

GUETTARDA:—
MATTHIOLA, Plum, ex Linn. Gen. ed. I. 49 (1787).
SARDINIA, Veil. Fl. Flam. 144 (1826); iii. t. 163 (1827).
TEREBRARIA, Sesse, ex DC. Prod. iv. 458 (1830).
VIVIANIA, Rafin. Specc. i. 117 (1814).
acuminata, Sieber, ex DC. Prod. iv. 460=Antirrhoea borbonica (in Addend.).
acutifiora, Bartl. ex DC. 1. c. 6U6 = Psychotria acntiflora.
ambigua, Chapm. Fl. S. U. St. 178=»cabra.
ambigua, *DC. Prod.* iv. 455.—Ins. Guadaloup.
Angelica, ***Mart, ex Muell. Arg. in Flora,*** **lviii. (1876)** 450.—Bras.
Antirhoea, D. Dietr. Syn. PI. i. 783 - Antirrhoea borbonica (in Addend.),
argentea, *Lam. Encyc.* iii. 54.—Guian.
armata, Bartl. ex DC. Prod. iv. 457 = Chomelia filipes.
Aromatia, ***Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.*** **iii. 27.** t. 232.—Peruv.
Balansaenna, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 238.—N. Caled.
barbinervis, Sieber, ex DC. Prod. iv. 460'Antirrhoea borbonica (in Addend.).
Blanchetiana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 449.—Bras.
Blodgettii, Shnttl. ex Chapm. Fl. S. U. St. 178 =-elliptica.
bracteata, ***Griseb. in Mem. Am. Acad.*** **N. S. viii.** (1863) 506.—Cuba.
Brunonis, Wall. Cat n. 6220 = Timonius Jambosella.
Burchelliana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 450.—Bras.
calyptrata, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 21.—Cuba.
coccinea, Aubl. PI. Gui i. 317 = lsetiia coccinea,
comosa, *Muell. Arg. in flora,* lviii (1875) 450.—Bras.
conferta, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 106.—Ins. Cocos.
cordate, ***H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.*** **iii. 420.—N.** Granat.
coriacea, *Pen. Syn.* i. 200.—Ind. occ.
crispiflora, *Vahl, Eclog. Am.* i 86. t 6.—Am. trop.
dealbata, ***Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.*** **xi. (1844)** 232.—Mexic.
dependens, *DC. Prod.* iv. 458.—Peruv.
dichotoma, ***Mart,*** **b*** ***Gal. in Bull. Acad. Brux.*** **xi.** (1844) 283.—Mexic.
dioica, D. Dietr. Syn. PI. i. 788 ; Baill. Hist. PI. vii. 377-Antirrhoea borbonica (in Addend.).
Echinodendron, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 66.—Cuba.
elliptica, Spreng. Syst. i. 789-^mollis.
elliptica, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 59.—Ind. occ.
eximia, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 241.—N. Caled.
femiginea, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 131.—Cuba.
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 6223=Timonius Finlaysonianus.
Fontanesii, *DC. Prod.* iv. 458.—Hab. I
/rangulacea,SKbtr, ex DC. Prod. iv. 460=Antirrhoea frangulacea.
fusca, ***Panch. ex Baill. Adansonia,*** **xii. (1879) 243.—** N. Caled.
grandiflora, *Steud. in Flora,* xxvi. (1843) 768.—Am. trop.
havanensis, *DC. Prod.* iv. 455.—Cuba,
hermosa, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 499.—Ins. PhilipP-
hirsuta, Desf. Cat. Hort Par. ed. III. 404-Fontanesii.
hirsute, *Pers. Syn.* i. 200.—Am. trop.
Hoffmannseggii, *Muell. Arg. in Flora,* lviii **(1876)** 450.—Bras.
hololeuca, ***Wright, in Sauv. Fl. Cub.*** **65.—Cuba,**
hypolasia, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 240.—N-**Caled.**
inconspicna, *Seem. Fl. Vit.* 181—Ins. Fiji.
ioënsis, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 242.—N. Caled.
jasminiflora, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 722.—I[09]* Philipp.
Lindeniana, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 20.—Cuba,
longiflora, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 832.—Ind. occ
lucida, Pers. Syn. i. 201 = Antirrhoea lucida.
macrantha, ***Benth. in Hook. Journ. Bot.*** **iii. (1841)** 223.—Guian.
macrocarpa, ***Griseb. in Mem. Am. Acad.*** **N. S. ««•** (1863) 507.—Cuba.
Mathiola, *Pers. Syn.* i. 200.—Am. trop.
membranacea, Sieber, ex DC. Prod. iv. 468=cri»P>-flora.

GUETTABDA:—
membianacea, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 59.—Ins. S. Doming.
microphyUa, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 457.—Ins. Philipp.
Missionis, Wall. Cat. n. 6221=Tiraonius Jambosella.
rnollis, *DC. Prod.* iv. 456__Ins. S. Doming.
myrtoidei, *F. Muell. Fragm.* ix. 184.—Austral,
noumeana, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 243.—N. Caled.
ochreata, *Seklecht. in Linnaea,* xxviii. (1858) 496.—Pernv.
odoiata, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 219.—Am. austr.
palndosa, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 450.—Bras.
paniculata, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 457.—Perav.
parviHora, *Vakl, Belog. Am.* ii. 26.—Am. trop.
parvifolia, *Sm. Fl. Ind. Occ.* iii. 1958.—Ind. occ.
peduncularis, Wall. Cat. n. 6222-Timonius Finlaysonianus, T. Jambosella.
Pervilleana, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 319.—Ins. Seychelles,
platyphylla, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 449.—Bios.
platypoda, *DC. Prod.* iv. 456.—Bras.
Pohliana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 450.—Bras.
polyandra, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 600-Symplocos racemosa.
polygama, Baill. Hist. PI. vii. 377 = Timonins Rumphii.
polyphragmoides, F. Mnell. Fragm. ii 184=Timonius Rumphii.
Prostrata, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 42, sphalm. =seq.
protracta, Bartl. ex DC. Prod. iv. 457=Antirrhoea protracta.
putaminosa, F. Mnell. Fragm. ix. 183.—Austral,
ramuliflora, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1851 (1856) 132.—Panama,
resinosa, *Pen. Syn.* ii. 200.—Am. anstr.
reticulata, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 506.—Cuba.
retusa, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 66.-Cuba.
raabdocalyx,#««K. *Arg. in Flora,* lviii. (1875) 450.—Bras,
rhamnoides, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 241.—N. Caled.
rigida, *A. Rich. Ft. Cub. Fanerog.* ii. 20.—Cuba,
rugosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 69=scabra.
scabra, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 218. t 154. t 8.—Am. trop.
sericea, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 460.—Bras.
speciosa, Anbl. PI. Gui. i. 820=argentea.
speciosa, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 499 -Marlea begoniaefolia.
speciosa, *Linn. Sp. PI.* 991.—As. trop.
speciosa, Van Eeden, ex Stend. Norn, ed. IL i. 710 -Heraandia leucomphala.
splendens, *Baill. Adansonia,* xii. (1879) 239.—N. Caled.
Spmceana, *Muell. Arg. in. Flora,* lviii. (1875) 449.—Bras,
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 52.—Ins. Tahiti.
Unuiflora, F. MuelL Census, 75 = Antirrhoea tenuiflora.
tomentosa, Pers. Syn. i. 201 *(=Stenostomum tomentosum).—Jamaic.*
imbelUto, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 48.—Bras,
"ndnlata, *Griseb. Cot. PI. Cub.* 131.—Cuba,
tiruquensis, *Cham, (f Seklecht. in Linnaea,* IT. (1829) 183.—Bras
Valenznelanaj *A. Kiel,. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 20.—Cuba.
mnicularis, Blanco, FL Filip. ed. L 723 = Anneslea crassipes.
vtrticillata, Baill. Hist. PI. vii. 877=Danais Iragrans.
•"Wrnoides, *Cham. V SchUcht. in Linnaea,* iv. (1829) 182.—Bras
^ a , *Duch'ass. tf Walp. in Linnaea,* xxiii. (1850) '84.—Ins. Guadeloup.
Wallichiana, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 552.-Ind. or
zylosteoides, Billb. ex BeurL in Vet. Akad. Handl. Stockh., 1864 (1856) 133=ramnliflora
"vlostioides, *H.B. VK. Nov. Gen. et Sp.* Ui. 420.—Venezuela.
zygopleura, *Wright, in Sam. Ft. Cub.* 66.—Cnba.

GUETTARDELLA, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 197 = Antirrhoea, Comm. (Rubiac).
chinensis. Champ, ex Benth. 1. c.—Ins. Hongkong.
philippinentis, Benth. 1. c.»A. philippinensis.
putaminosa, Benth. Fl. Austral, iii. 419.—Austral.
sandwicensis, H. Mann, in Proc Am. Acad. vii. (1867) 170 • Chomelia sandvicensis*

GUETZLAFFIA, Walp. Ann. iii. 213 (1858) « GUTZLAFFIA, Hance = Strobilanthes, Blume (Acanth.).

GUEVINA, Juss. Gen. 424 (1789)=Gevuina, Molina, (Proteac).

GUEVINIA, Hort. Par. ex Decne. in Rev. Hortlc. Ser. II. iv. (1645-46) 425-CelastrUB, Linn.
Abeliana, Hort. Par. 1. c - C . mollis.

GUIABARA, Adans. Fam. ii. 277 (1763) - Coooloba, Linn. (Polygon.).

GUIBOURTIA, Benn. in Joum. Linn. Soc. i. (1857) 149 =Copaifera, Linn. (Legumin.).
copallifera, Benn. 1. c. 150 = C. Guibonrtiana.

GTTICHENOTIA, J. Gay, in Me>. Mas. Par. vii. (1821) 448. t. 20. *STERCUUACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 227.
DITOMOSTROPHE, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc xix. (1846) II. 498.
SAROTES, Lindl. Swan River App. 19 (1839).
ledifolia, *J. Gay, I. c.* 449. t. 20.—Austral,
macrantha, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xix. (1846) • II. 500.—Austral.
micrantha, *Benth. Fl. Austral,* i. 259.—Austral.
Sarotes, *Benth. I. c.* 258.—Austral
semihastata, *Benth. I. c*—Austral.

GUIDONIA, P. Br. Hist Jamaic 249 (1756) - Iiaetla, Adans. (Bixin.).
Laetia, Loefl. ex Willd. Sp. PI. ii. 1163 - L . apetala.

GUIDONIA, Plum, ex Adans. Fam. ii. 305 (1763)-Casearia, Jacq. (Samyd.).
Cantiala, Kurz, in Journ As. Soc. Beng. xlvi. (1877) H. 92=C. tomentosp.
glomerata, Kurz, 1. c.=C. glomerata.
spinescens, Griseh. Fl. Brit W. Ind. 24 = C. brevipes.
tomentosa, Knrz, in Joum. As. Soc Beng. xlvi. (1877) II. 92 »C. tomentosa.
Vareca, Baill. ex Kurz, 1. c - C . Vareca.

GUIENZIA, Sond. ex Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 969 (188S)-GUEINZ1A, Sond. = Stylochiton, Lepr. (Aroid.).

GTJIBBA, Adans. ex Jnss. Gen. 320 (1789). *COMBRETACEAE,* Benth. *St* Hook. *i.* i. 687.
nudifiora, Reichb. ex DC. Prod. iii. 18 = Combretum acnleatum.
senegalensis, *Lam. Tabl. Encyc.* ii. 486; *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 861.—Afr. trop.

GUIINA, Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 115 sphalm. = Qulina, Aubl. (Guttif.).

GUILANDIA, P. Br. Hilt Jamaic. 228 (1756) -seq.

GUILANDINA, Linn. Gen. ed. L 124 (1737) = Caesalpinia, linn. (Legumin.).
aculeata, Salisb. Prod. 327=C. Bonducella.
axillaris, Lam. Encyc. i. 435=Mezoneuron cucullatum, C. Sappan.
Bonduc, Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 32, partim = C. Bonducella.
Bonduc, Linn. Sp. PI. 881-C. Bonduc.
Bonducella, Linn. 1. c. ed. II. 545 - C . Bonducella.
ciliata, Berg, ex Wikstr. in Vet Akad. Handl. Stockh. (1826) 431.—Ind. occ.
dioica. Linn. Sp. PI. 381 - Gymnodadus canadensis.
echinata, Spreng. Syst. ii. 827 - C . echinata.
gemina, Lour. Fl. Cochinch. 265.—Cochinch.
glabra. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3 - C . Bonduc.
inermis, Salisb. Prod. 327 = Gymnodadus canadensis.
macrocarpa, R. Grah, in Wall. Cat. n. 5804 =* Mezoneurnm cucullatum.
tnicrophylla, DC. Cat Hort. Monsp. 114.—Hab. 1
Moringa, Linn. Sp. H. 381 = Moringa pterygosperma.
Nuga, Linn. 1. c ed. II. 545 = C. Nuga.

GUILANDINA:—
oleosperma, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 281 - Caesalpinia digyna.
paniculata, Lam. Encyc. i. 435=C. Nuga.
parvifolia, Stokes, Bot Mat. Med. ii. 466 - C . Nuga.
psidioides, Pritz. Ic Ind. 516, sphalm. vide *Guildingia psidioides.*
rotunda, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 16 = Caesalpinia Nuga *vel* C. Bonduc
viridiflora, Teijjm. *8c* Binn. in Tijdsch. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 59.—N. Guinea.
Wallichiana, R. Grah. in WalL Cat. n. 5805»Sindora WalUchii.

GUILDINGIA, Hook. Bot. Misc. i. (1880) 122. t. 30 = Mouriria, Juss. (Melastom.).
psidioides. Hook. L c - M . rhizophoraefolia.

GUILELMA, Link, Handb. i. 259 (1829)=GUILIELMA, Mart.=BactriB, Jacq. (Palm.).

GUILFOYLIA, F. Muell. Fragm. viii. 33 (1873) = Cadellla, F. Muell. (Simarub.).
monostylis, F. Muell. 1. c. 84 - C . monostylis.

GUILIELMA, Mart. Palm. Fam. 21 (1824); ex Hist. Nat. Palm. ii. 81. tt. 66. 67=Bactris, Jacq. (Palm.).
caribaea, H. Wendl. in Kerch. Palm. 246 = B. caribaea.
ciliata, H. Wendl. 1. c. 246 = B. ciliata.
granatensis, Karst in Linnaea, xxviii. (1856) 400 = B. granatemis.
insignis, Mart. Palmet Orb. 71. t. 10. f. 3.—Am. austr.
Macana, Mart. 1. c. 74.—Venezuela.
Piritu, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 397 - B . Piritu.
speciosa, Mart Hist Nat. Palm. ii. 82. t. 66, 67 = B. Gaspaë's.
tenera, Karst. in Linnaea, xxviii. (1866) 399 = B. tenera.
utilis, Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 46 - B. utilis.

GTJTLIiAnnA, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. x. (1866) 92. *SCITAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 640.
novo-ebudica, *F. Muell. Phyt. New Hebrid.* 20.—N. Hebrid.
purpurata, *Vieill. in Bull. Soc. Lin. Normand.* x. (1866) 98.—N. Caled.

GUHiLEMINEA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 40. t 618 (1823). *AMARANTACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 86.
australis, *Hook./, in Benth. V Hook. f. Gen.* Ui. 37.—Reg. Argent.
densa, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 838-illecebroides.
illecebroides, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 41. t. 518.—Ecuador.
fllecebrum, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 103'illecebroides.
lanuginosa, *Benth. tf Hook. f. Gen.* iii. 37.—Texas.

GUILLEMINIA, Neck. Elem. ii. 132 (1790) - Votomita, Aubl. (Inc. Sed.).

GUILLEMINIA, Reichb. Consp. 161 (1828)=GulUeminea, H. B. & K. (Amarant).

GUILLIMI A, Reichb. Consp. 193 (1828) - GWILLIMIA, Rottl.=Magnolia, Linn.

GUILLONEA, Cost. Notes Crit. 109 (1851)-Laserpitlum, Linn. (Umbellif.).
canescens, Lange, in Willk. *Be* Lange, Prod. FL Hisp. iii. 31=L. scabrum.
scabra, Coss. Notes Crit 110 ^L. scabrum.

GUINDILIA, Gill, in Hook. Bot. Mire. iii. (1833) 170. Valenzuelia, Bert. (Sapindac).
trinervis, Gill. 1. c. = V. trinervis.

GUIOA, Cav. Ic. iv. 49. t 373 (17»7) = Cupania, Linn. (Sapind.).
acutifolia, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. And. Muench. ix. (1879) 608.—Malaya; N. Guin.
bijuga, Radlk. L c. 611=C. Griffithiana?

GUIOA:—
crenata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 616.—N. Caled.
diplopetala, Radlk. 1. e. 810 = Cupania regularis.
fusca, Radlk. 1. c. 614.—N. Caled.
fuscidula, Kadlk. 1. c. 609-C. fuscidula.
glauea, Radlk. 1. c. 612 = C. glauca.
gracilis, Radlk. 1. c. 609 = C. gracilis ?
lasioneura, Radlk. I. c. 608.—Austral.
lentiscifolia.Cm. Ic. iv. 50-C. lentiscifolia.
leptoneura, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Mnench. ix. (1879) All.—Ins. Celebes.
membranifolia, Radlk. 1. c. 614.—N. Guin.
nicrosepala, Radlk. 1. c. 615.—N. Caled.
*Minjalilen.,*Radlk. 1. c. 609 - C. Minjalilen.
ovalis, Radlic. 1. c. 810.—N. Caled.
patentinervis, Radlk. 1. c—ins. Molucc,
pectinata, Radlk. 1. c. 614.—N. Caled.
Pernttetii, Radlk. 1. c. viii. (1878) 302; et ix. (1879) 614.—Ins, Philipp.
pleuropteris, Kadlk. 1. c. Ix. (1879) 611=C. pleuropteris.
pterepoda, Radlk. 1. c. 615.—N. Guin.
pubescent, Radlk. 1. c. viii. (1878) 302; et iz. (1879) «12=C. pallidula.
regularis, Radlk. in Act. Congr. Dot. Amst. 1877 (1879) 82,112 = C. regularis.
rhoi/olia, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. ix. (1879) 608 «C. rhoifolia.
rigidiuscula, Radlk. 1. c. 614.—N. Gnin.
semiglauca, Radlk. 1. c. 608=C. semiglauca.
squamosa, Radlk. 1. c. viii. (1878) 303; et ix. (1879) 609 =C. Griffithianat
subfalcata, Radlk. 1. c. ix. (1879) 609.—Ins. Navigat.
venusta, Radlk. 1. c. 609__N. Guin.
villosa, Radlk. 1. c. 613.—N. Caled.

GUIBAOA, Coss. Notes Crit. iii. 97 (1851). *CRUCJ. FERAE,* Benth. & Hook. f. i. 100.
arvensis, *Coss. 1. c.* 98.—Hispan.

GUIREA, Steud. Nom. ed. II. i. 710 (1840), sphalm. = Ouiera, Adans. (Combret.).

OXTIZOTIA, Cast, in Boll. Soc Philom. (1827) 127; et in Diet. Sc. Nat. lix. 237, 247'(1829). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 382.
RAMTILLA, DC. in Wight, Contrib. 18 (1834).
VESLINGIA, Vis. in Nuov. Sagg. Ace. Sc. Padov. v. (1840) 269.
WERRINUWA, Heyne, Tracts on India, 49 (1814).
abyssinica, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* lix. 248.—Afr. trop.
bidentoides, *Oliver (f Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 386.—Afr. trop.
discoidea, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. FL Aethiop. 150=Sclerocarpus discoideus.
oleifera, DC. Sept. Not. PI. Rar. Jard. Gentv. 6 = abyuinica.
Schimperi, *Sch. Bip. in Walp. Rep.* vi. 158.—Abyss.
Schultzii, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Ft. Abyss,* i. 407. —Abyss,
villosa, *Sch. Bip. ex A. Rich. 1. c.* 406.—Abyss.

GULDAENSTEDTIA, A. Juss. in Orb. Diet. vii. 270 (1849) = GueldenBtaedtia, Fisch. & Mey. (Legumin.).

GULDENSTAEDTIA, Dnm. Anal. Fam. 40 (1829) - praec

GULIELM A, Sprang. Syst. ii. 141 (1825) - GU1LIELM A, Mart.=Bactrl8, Jacq. (Palm.).

OUIiUBIA, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 131. *PAIMAE.*
costata, *Becc. 1. c.* 134.—Malaya,
moluccana, *Becc. I. c.* 131.—Malaya.

GUMIFERA,Rafin.SylvaTellur. 118 (1888)= Acacia, Willd. (Legumin.).
arabica, nilotica, vtra, Rafin. 1. c = A. arabica.

GUMILLAEA, Roem. & Schnlt. Syst. vi. 297 (1820) = seq.

GUMILLEA, Ruiz & Pav. Prod. 42. t. 7 (1794). *SAX/FRAGEAS,* Benth. & Hook. f. i. 651.
auriculata, *Ruiz* b* *Pav. I. c; et Fl. Per.* iii. 23.—Peruv.

GUMIRA, Rumph. ex Hassle in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 26=Premna, Linn. (Verbenac).
domestica, Hassk. 1. c.=P. foetida, parasitica.
fetida, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 135-P. foetida.
integrifolia, Hassk. 1. c. = P. corymbosa.
parasitica, Hassk. 1. c. = P. parasitica.

GUMSIA, Buch.-Ham. ex Wall. Cat p. 157 (1832) - Eriolaena, DC. (Sterculiac).
chloroxylon, Buch.-Ham. 1. c. n. 1173 E.» E. spectabilis.
hirta, Buch.-Ham. 1. c n. 1174 B = E. spectabilis.
tiliacea, Wall. Cat. n. 1173 D=E. spectabilis.

GUMTEOLIS, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. FL Nep. 87 (1825)-Centranthora, R. Br. (Scrophul.).

GUITDEIJA, [Tourn.] Linn. Gen. ed. I. 242 (1737). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 461.
GUNDELSHEIMERA, Cass. in Diet. Sc Nat. lvii. 844 (1828).
glabra, Mill. Gard.Dict. ed. VIII. n. 2-Touraefortii.
Toumefortii, *Linn. Sp. PI.* i. 814.—Syria; As. Min.; Persia.

GUNDELSHEIMERA, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvii. 344 (182b)=piaec

GTTNDLACHIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 100. *COMPOSITAE.*
domingensis, *A. Cray, I. c.*—Ins. S. Doming.

GUNISANTHUS, A. DC. in DC. Prod. viiL 219 (1844) - Diospyros, Linn. (Ebenac).
•*mollis,* Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. zlii. (1873) II. 88 = D. martabanica.
pilosula, A. DC. in DC. Prod. viii. 220 - D. pilosula.

GUXTNERA, Linn. Mant. i. 16 (1767). *HALORACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 676.
DYSEMONE, Soland. ex Forst. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) 45, nomen.
GuNNERorsis, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 198.
MILLIGANIA, Hook. f. in Hook. Ic. PI. t. 299 (1840).
MISANDRA, Comm. ex Juss. Gen. 805 (1789).
MISANDROPSIS, Oerst in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 192.
PANKE, Molina, Sagg. Chil. 143 (1782).
PERPENSUM, Burm. *F.* Fl. Cap. Prod. 30 (err. typ. 26) (1768).
PSEUDO-GUNNERA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 193.
Berteroi, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 714.—Chili.
bracteata, *Steud. ex Benn. PI. Jan. Rar.* 75.—Chili,
brephogea, *Linden V Andr/, Illustr. Hortic.* xix. (187;!) 367-1. 111.—N. Granat.
calthaefolia, Salisb. Prod. ll = perpensa.
chilensis, *Lam. Encyc.* iii. 61.—Chili,
commutata, *Blunte, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 100.—Chili.
cordifolia, *Hook.f. Fl. Tasman.* 125.—Tasmania,
densiflora, *Hook.f. Handb. N. Zeal. Fl.* 68.—N. ZeL
erosa, Blume, in Verb.. Batav. Gen. x. (1825) 81 = macrophylla.
falklandica, Hook. Ic. PL t. 489, 490=magellanica.
glabra, *Phil, in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 643.—Ins. J. Femand.
Hamiltonii, *T. Kirk, ex W. Ham. in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 292.—N. Zel.
insignis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857) 189 ; *A. DC.in DC. Prod.* xvi. II. 597.—Chili.
insularis, Phil, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 642 = bracteata.
integrifolia, Blnme, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 171" magellanica.
lobata, *Hook.f. Fl. Antarct.* ii. 274.—Reg. Magellan,
macrophylla, *Blume, Bijdr.* 613.—Java,
magellanica, *Lam. Encyc.* iii. 61.—Keg. Magellan,
manicata. *Linden, Illustr. Hortic.* xx. (1873) 156.—Bras,
monoica, *Raoul, in Ann. Sc. Nat.* Se"r. III. ii. (1844) 117.—N. Zel.
peltata. *Phil, in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 643.—Ins. J. Femand.
perpensa, *Linn. Mant. i.* 121.—Afr. anstr.
petaloides, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 512.—Ins. Sandvic.

GTTNNERA:—
pilosa, Knnth, Syn. PL i. 878=chilensis.
plicata, Vahl, Ennm. i. 309-magellanica.
prtrepens,*Hook.f. Fl. N. Zel.* i. 66.—N. Zel.
reniformis, C. Gay, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 103-magellanica.
seabra, Phil, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 643 = bracteata.
scabra, Ruiz & Pav. ,F1. Pernv. i. 29. t 44. *I* a - chilensis.
sonchifolia, Mirb. Hist Nat. PI. ed. II. x. (1806) 141 « Frankea sonchifolia.
strigosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1883) 322—N. Zel.
tinctoria, Mirb. Hist. Nat. PL ed. II. x. (1806) 141 •* chilensis.

GUNNEROPSIS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 193 (1857) = Gunnera, Linn. (Halorag.).
petaloidea, Oerst. 1. c. = G. petaloides.

GUNNIA, Iindl. Bot. Reg. sub 1.1699 (1834) - Barcochilue, R. Br. (Orchid.).
australis, Lindl. 1. C.-S. parviflorus.
picta, Lindl. Bot Reg. (1838) Misc. 45=S. olivaceus.

GUNNIA, F. Muell. Rep. Babb. Exped. 9 (1858). *FICOIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 855.
Drummondii, *Benth. Fl. Austral,* iii. 327.—Austral,
septifraga, *F. Muell. Rep. Babb. Exped.* 9.—Austral.

GUNTHERA, Steud. Nom. ed. II. i. 711 (1840), sphalm. - GUENTHEKA, Andrz. = Brassica, Toum. (Crucif.).

GUNTHERIA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 414 (1873). sphalm. = GUENTHERIA, Spreng. = GaUardia, Fonger. (Compos.).

GUPA, Jaume, St. Hil. Expos, ii. 267 (1606) = Goupi*. Aubl. (Celastr.).

QUHANIA, Cogn. in Bull. Soc. Bot Belg. xiv. (1875) 289. *CUCVRBITACEAE.*
acuminata, *Cogn. Diagn. Cucurb. i.* 31 [in *Mem. Cour. Acad. Belg.* 8vo, xxviL (1877)].—Bras.
Andreana, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sit.* II. *!>•• (1880) 194.—Ecuador.
Arabidae, Cogn. Diagn. Curcurb. i. 17 = multiflora.
Balfoureana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 714-' Peruv.
breviflora, *Cogn. Diagn. Cucurb.* L 40.—Bras.
Candolleana, *Cogn. I. e.* 42.—Bras,
capitata, *Cogn. I. c.* 18.—Peruv.
cissoides, *Cogn. 1. c.*—Bras,
coccinea, *Cogn. 1. c.* 42.—Panama,
costaricensis, *Cogn. 1. c.* 37.—Costa Rica,
diversifolia, *Cogn. 1. c.* 42.—Bras.
Dumortieri, *Cogn. I. c.* 41.—Bras.
Durandii, *Cogn. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xvii. (1878) 293, in nota.—Guian.
eriantha, *Cogn. Diagn. Cucurb.* i. 16.—Mexic.
Francarillana, *Cogn. I. c.* 40.—Bras,
guianensis, *Cogn. 1. c.* 18.—Bras,
inaequalis, *Cogn. I. c.* 32.—Bras.
Kegeliana, *Cogn. 1. c.* 16.—Bras.
Klotzschiana, *Cogn. I. c.* 28.—Bras,
lanata, *Cogn. I. c.* 26.—Peruv.
Levyana, *Cogn. 1. c.*—Nicaragua,
lignosa, *Cogn. I. c.* 27.—Bras.
Linkiana, *Cogn. I. c.* 43.—Bras,
macrophylla, *Cogn. 1. c.* 28.—N. Granat.
Makoyana, *Cogn. 1. e.* 17.—Guatemala.
Martiana, *Cogn. I. c.* 24.—Bras,
multiflora, *Cogn. 1. c.* 16.—Bras.
multiflora, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 49. t. *U* subumbellata.
neo.granatensis, *Cogn. Diagn. Cucurb.* i. 34.—N. Granat.
ovata, *Cogn. I. c.* 26.—Bras,
parviflora, *Cogn. 1. c.* 38.—Peruv.
Paulista, *Cogn. 1. c.* 23.—Bras.
Pseudo-spinulosa, *Cogn. I. c.* 36.—Bras,
reticulata, *Cogn. 1. c.* 33.—Bras,
rufipila, *Cogn, I. c.* 30.—Bras.
Sagotiana, *Cogn. 1. c.* 32.—Guian.
Seemanniana, *Cogn. I. c.* 35.—Panama.
Sellowiana, *Cogn. 1. c.* 39, in obs.—Bras,
sinuata, *Cogn. I. c.* 16.—Bras,
speciosa, *Cogn. I. c*—Peruv.

GURANIA:—
spinulosa, Cogn. Diagn. Cucurb. i. 17.—Bras.
Spruceana, Cogn. I. c. 36.-£cuador.
subumbellata, Cogn. I. c. 17.—fins.
subumbellata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 66 = Durandii.
sylvatica, Cogn. Diagn. Cucurb. i. 25.—Bras,
malata, Cogn. I. e. 29.—Bras,
tuncuspidala, Cogn. I. e. 35—Bras,
tubulosa, Cogn. I.e. SO.—Ecnador.
velntina, Cogn. I. c. 87—Bras.
villosa, Cogn. I. c. 25.—Bras.
Wageneriana, Cogn. I. c. 17—N. Granat.
Wawraei, Cogn. I. c. 39.—Bras.

GURLTIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz U54) 123; et Abh. Akad. Berl. (1855) 56. t 4 A-D Begonia, Linn.
Bouchtana, Klotzsch, in Ann. Sc. Nat Sir. IV. vi (1856) 351 = B. Boucheana.
«gW,Klotzsch,in Monatsb. Berl. Acad. (Mgera 1854) 128 »B. tomentosa.
Trigida, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 57 = Rigida.
trigulosa, Hassk. Hort Bog. Desc. 823 = B. strigulosa.
tomentosa, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 57 = D. tomentosa.

CUROA, Stend. Nom. ed. II. i. 711 (1840) = seq.

OUSFA> Buch-Ham. ex Wight, Contrib. 65 (1834) = finlaysonia. Wall. (Asclepiad.).
"iovata, Buch.-Ham. I. c. - F. obovata.

GUSMANIA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. IT. 12 (1849) = Brigeron, Linn. (Compos.).
e"ilensis, Remy, 1. c = E. Remyanum.

CUSMANNIA, JUSS. in Diet. Sc. Nat. xx. 99 (1820) = Ouzmania, Raiz & Pav. (Bromeliac).

"USSONEA, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 183. t. S3 (1828) = RmbriBtylis, Vahl (Cyperac).
Vperoides, J. & C. Presl, 1. c. = F. cyperoides.
Pauciflora, Brongn. Voy. Coq. Bot. t. 34-F. paudlora.

GUSSONEA, A. Rich. in *Mim* Soc Hijt Nat Par w. U828) 67 - Angraeoum. Bory (Orchid.).
"Phylla, A. Rich. 1. c. 68 = A. aphyllum.
«*»«<«, Ridl. in Joura. Bot. xxiii. (1885) 310 = A. comutnm.
**»«*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 498 - *K-Microcoelia exilis*).—Madag.
Wpinae, Ridl. 1. c. 491-A. Gilpinae.
fobulosa, Ridl. U = A. Guyonianum.
rtyll Ridl. 1. c. 492 = A. physophorum.

GUSSONIA, D. Dietr. Syn. PI. ii. 925 (1840), sphalm.= Cuasonia, Thunb. (Araliac.).

GUSSONIA, Spreng. Gen. ii. 664 (1881) = GUSSONEA, Rich.=Angraecum, Bory (Orchid.).

GUSSONIA, Spreng. Nene Entdeck. ii. 119. t. 2 (1821) *Sebaatiania, Spreng. (Euphorb.).
concolor, Spreng. 1. c. 120-. Actinostemon caribaeus.
*r"»*ata,* Klotzsch, in Schomb. Fannaet Fl. Gui. 1184, nomen.—Guian.
""color, Spreng. Nene Entdeck. ii. 119=Excoecaria discolor.
gradifolia, Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Gui. U84, nomen.—Guian.
serru Gaudichaudii.

GUAVIA> Un. Amoen. Acad. TiiLm *. 5 (1785).
"fRTACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. i. 721.
JA'CA, Aubl. PI. Gui. 487 (1775).
A'ALLANZANIA Nck. Elem. ii. 79 (1790).
, 'MCHMBYERiA, Scop. Introd. 2«7 (1777).
"**** *fP»". in Linnaea,* XT. (1841) 2O4.-Java.
anSll?, sphalm.-augusta.
anS *Bttoh, Bot. Voy, Sulph.* 89.-N. Granat.
anUna, *Miers, iin TTrans/Un.Soc.* (1874) 179. —tad. occ.
augusta, 289-superba.
augusta, Linn. Amoen. Acad. 266.—N. Granat

OUSTAVIA:—
augusta, Kuiz *8c* PaT. Fl. Per. T. 117. t 486 - Ruiziana.
brasiliana. *DC. Prod.* iil. 290.—Bras,
brasiliensis, *Morr. in Belg. Hortic.* xvi. (1866) 201,— Bras,
calycaris, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 185. —Bras.
eonferta, Spruce, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 471 =augusta.
dubia, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 446.—N. Granat.
fastuosa. Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 478=pterocarpus.
fastuosa, Mart.ex DC. Prod. iii. 290-brasiliana.
fastuosa. Spruce, ex Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. I. 471 • augusta.
fastnosa, *Willd. Sp. PI.* iii. 487.—Guian.
globosa, *Span, in Linnaea,* XT. (1841) 204, nomen.—Malaya,
gracillima, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 180.—N. Granat.
hexapetala, Sm. in Rees, Cycl. xvii. n. 2=fastnosa.
insignis, Linden, ex Hook. Bot. Mag. t 6069 *> superba.
insignis, Willd. ex Berg, In Mart Fl. Bras. xiv. I. 471 -augusta.
laciniosa, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 176. —Bras.
latifolia, *Miers, I. c.* 182.—Panama,
longifolia, *Poepp. ex Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 472.—Peruv.
Marcgraaviana, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 183.—Bras.
meitocarpa, Gaertn. Frnct. ii. 264. t 138 = augusta.
Poeppigiana, *Berg, in Mart. Fl. Bras.* xiv. I. 471.—Bras,
pterocarpa, *Poit, in Mim. Mus. Par.* xiii. (1826) 158. t. 6.—Guian.
pubescens, *Suit, ex Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 448.—Ecuador,
pulchra, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 182. —Am. trop.
Ruiziana, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1854) 444.—Peruv.
speciosa, Benth. PI. Hartw. 176=latifolia.
speciosa, *DC. Prod.* iH. 289.—N. Granat.
superba, *Berg, in Linnaea,* xxvii. (1864) 444.—N. Granat.
tetrapetala, Raeusch. Nom. ed. III. 202 - Grias Aubletiana.
tetrapetala, Stokes, Bot Mat. Med. iii. 549-augusta.
Theophrasta, *Linden, Illustr. Hortic.* xx. (1873) 74.—Hab.)
urcnlata, Poit. in Mem. Mm. Par. xiii. (1825) 156. t. 5-augusta.
valida, DC. Prod. iii. 290-Planchonia littoralis.
verticillata, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 181.—N. Granat.

GTJTENBEB.GIA, Seta. Bip. in Gedenkb. iv. Jubelf. Buchdr. (1840) 119. t. 4. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 224.
abyssinica, Sch. Bip. in Walp. Ann. ii. 808 = Rueppellii.
cordifoha, *Benth. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) 89. t. 55.—Afr. trop.
longipes, *Steetm, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 349. —Afr. trop.
macrocephala, *Oliver if Hiern, in Fl. Trop. Afr.* iii. 264.—Afr. trop.
nigritiana, *Oliver (f Hiern, I. c.* 264.—Air. trop.
polycephala, *Oliver (f Hiern, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 95—Afr. trop.
Petersii, *SteetM, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 348. —Afr. trop.
Rneppellii, *Sch. Bip. in Gedenkb.* iv. *Jubelf. Buchdr.* (1840) 120. t. 4.—Abyssin.

GUTENBERGIA, Walp. Ann. i. 374 (1849) - GUTTENBERGIA, Zoll. = Morlnda, Linn. (Rubiac).

GUTHNICKIA, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 179-Achimenes, P. Br. (Gesnerac.).
atrosanguinea, Hon. ex Regel, In Cat Hort. Turic. (1851).—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 198-A. foliosa.
cardinalis, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1863) 218. t. 1. C6 = A. cardinalis.

GUTHNICKIA:—
foliolosa, Hanst. in Linnaea xxvii. (1849) 712 = Achimenes foliosa.
foliosa, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 97'A. foliosa.
mimuliflora, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 179 = A. amoena.

OUTHBIEA, Bolus, in Hook. Ic. PI. t. 1161 (1876). *PASSIFLOREAE.*
capensis. *Bolus, I. c.*—Afr. austr.

QTTTIEBREZIA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 80 (1816). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 210.
BRACHYACHYRIS, Spreng. Syst. iii. 574 (1826).
BRACHYRIS, Nutt. Gen. Am. ii. 163 (1818).
HEMIACHYRIS, DC. Prod. v. 313 (1886).
ODOMTOCARPHA, DC. 1. c. 71 (1836).
Alamani, A. Gray, PL Wright i. 91 = Xanthocephalum Alamani.
baccharoides, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1856) 115. —Reg. Magellan.
Berlandieri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 81—Mexic.
califoraica, *Torr. tf Cray, Fl. N. Am.* ii. 193.—Am. bor. occ.
Coulteri, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 111.—Mexic.
cupressiformis, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 114. —Reg. Magellan.
divaricata, Torr. If Gray, Fl. N. Am. ii. 193 = Euthamiae.
eriocarpa, *A. Gray, PI. Wright,* i. 94.—Am. bor. occ.
Euthamiae, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 193.—Am. bor. occ.
Gilliesii, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 173.—Reg. Argent,
glutinosa, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1866) 115 ; *Benth. &• Hook. f. Gen.* ii. 250.—Mexic.
gymnospermoides, A. Gray, PI. Wright, ii. 79 » Xanthocephalum gymnospermoides.
Haenkei, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1855) 115.—Mexic.
laricilblia, *D. Don, in Hook. Camp. Bot. Mag.* ii. (1836) 51.—Chili,
ledifolia, Gmrf. *in Goett. Abh.* xix. (1874) 173.—Reg. Argent.
Lindheimeriana, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 351 = Amphiachyris dracunculoides.
linearifolia, A. Gray, in Bot. Calif i. 802 - californica.
linearifolia, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 30—Mexic.
microcephala, A. Gray, PI. Fendl. 74, adnot. = Euthamiae.
microphylla, Durand 8c Hilg. in Joum. Acad. Sc. Philad. iii. (1856-68) 40«Euthamiae.
Neaeana, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1866) 115.—Mexic.
panicnlata, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 78.—Am. bor. occ.
repens, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 173.—Reg. Argent,
sphaerocephala, *A. Gray, PI Fendl.* 73.—Am. bor. occ.
texana, *Torr.* to* *Gray, Fl. N. Am.* Ii. 194—Am. bor. occ.
Wrightii, A. Gray, PL Wright, ii. 78 - Xanthocrpbalum Wrightii.

GUTTENBERGIA, Zoll. *Sc* Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. NeeTl. Indie, ii. (1845) 2=Morlnda, Linn. (Rubiac).
umbellata, Zoll. & Mor. 1. c. 8-M. polynenra 1

GUTZLAFFIA, Hance, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 142 -= 8trobilanth.ee, Blume (Acanthac).
aprica, Hance, L c - S. apricus.

GUYONIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 149. *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 745.
ciliata, *Hook.f. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 443—Afr. trop.
tenella, *Naud. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xiv. (1850) 160. t 6.—Afr. trop.

GUZMANTA, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 37.1.261 (1802). *BROMEUACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 669.
comosa, *Bert, ex Steud. Nom.* ed. IL i. 711 (= tricolor ?).—Porto Rico; Jamnic.
Devansayana, *E. Morr. in Belg. Hortic.* xxxiii. (1888) 113. t 8-9.—Ecuador,
erythrolepis, *Brongn. ex Planch, in Fl. des Sevres*, Sér. II. i. (1856) 25.1.1089.—Cuba.
Melinoni, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1883) H. 727; Morr. in Regel, Gartenfl. (1885) 116 (Melinoki) (-Caraguatae sp.).—Guian.
picta, Lem. Jard. Flenr. iv. (1854) Misc. 60-Karatas fulgens.
sympagantkera, Beer, Bromel. 103 = tricolor,
tricolor, *Suit b" Pav. Fl. Per.* iii. 38. t. 261.—Am. trop.

CUZMANNIA, Phil. f. Cat. PI. Vase. Chil. 168 (1881) = GUSMANIA, Remy = Erigeron, Linn. (Compos.).

GWILLIMIA, Rottl. ex DC. Syst. i. 455 (1818) - Magnolia, Linn.
indica, Rottl. 1. c. 458 = M. pumila.

GYAS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 209 = Bletia, Ruiz & Pav. (Orchid.).
florida, Salisb. 1. c. = B. florida.
humilis, Salisb. 1. c. 800 = Ii. hyacinthina.
verecunda, Salisb. 1. c. 299 = B. verecunda.

GYAXIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 131 (1866) = Haemanthus, Linn. (Amaryllid.).
puniceus, Salisb. 1. c. = H. punicens.

GYBIANTHUS, Pritz. Ic. Ind. i. 516 (1855) sphalm.= Cybianthus, Mart. (Myrsin.).

GYMNACANTHUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 444 (1886)-8clerocalyx, Nees (Acanthac).
petiolaris, Nees, 1. c. = S. mexicanus.

GYMNACANTHUS, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 126-Ruellia, Plum. (Acanth.).
campestris, Oerst. 1. c. = R. campestris.
geminiflorus, Oerst. 1. c. 127 = R. geminiflora.
humilis, Oerst. 1. c. = R. humilis.
Scklechtendalianus, Oerst. 1. c 126 = R. Schlechtendaliana.

GYMNACHAENA, Reichb. ex DC. Prod. vi. 264 (1837) = Perrotrichfi, Cass. (Compos.).
bruniades, Reichb. ex DC. 1. c. = P. tortilis.

GYMNACTIS, IPfeiff. Nom. i. n. 1520 (1874) = Glossogyne, Cass. (Compos.).

GYMNADENIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 191 (1813)-Habenaria, Willd. (Orchid.).
acuta, Reichb. f. Otia Bot Hamb. 82.—Cambogia.
affinis, Reichb. f. 1. c. 33 = H. affinis.
albida. Rich, in Mém. Mas. Par. iv. (1818) 57 = H. albida.
angustifolia, Spreng. Syst. iii. 693=Orchis angnstifolia, *Bieb.*
anisoloba, Petenn. Deutschl. Fl. ii. 548 = H. conopsea, *Benth.*
bifolia, Meyer, Chlor. Hannov. 540 = H. bifolia.
Boryana, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 26 = Cynorchis Boryana.
bracteata, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. i. 711 - H. viridis.
chlorantha, Ambros. Fl. Tir. Anstr. i. 705 - H. bifolia.
Chusua, Lindl. in. Wall. Cut n. 7058 = Orchis Chusua.
comigera.Reichb. Fl. Germ. Excurs. 121 — H. conopsea, *Benth.*
Commersoniana, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 26 *(=Peristylus Commersonianus)*. —Ins. Borbon.
conica, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 280.—Am. bor.
conopea, Auct. Gall.—Cf. Gren. Fl. Ch. Jurass. 761; Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 29 =seq.
conopsea, R. Br. in Ait. Hort Kew. ed. II. v. 191 = H. conopsea, *Benth.*
cornigera, Ledeb. Fl. Ross. iv. 65, sphalm. vide *comigera.*

GYMNADENIA:—
cucullata, Rich, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 57.—Podol.; Sibir.
cylindrostachya, Lindl. Wall. Cat. n. 7056 *(=Platantkera Orehidis).—In&.* or.
densiflora, A. Dietr. in Allg. Gartenz. viL (1889) 170 = Habenaria conopsea, *Benth.*
diphylla. Link, Handb. i. 243 = H. cordata.
elata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 277.—Numidia.
fastigiata, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 23 = Cynorchis fastigiata.
fiava, Lindl. Gen. et. Sp. Orch. 279 - H. integra.
fiexuosa. A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 25 *(=Peristylusflexuosus).—las.* Mascar.
Friwaldii, Reichb. Ic. Fl. Germ. xiii. t. 424=seq.
Friwaldsfyana, Hampe, in Flora, xx. (1837) 230.—Rumelia.
Galeandra, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 38 = H. Galeandra.
gracilis, Miq Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 207.—Japon.
gracillima, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 44 = H. conopsea ? *Benth.*
graminifolia, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxxvi. (1878) 75. —Japon.
Helferi, Reichb. f. in Flora, Iv. (1872) 276.—Ind. or.; Burma.
humilis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. i. 276.—Italia.
hybrida, Schur, Enum. PI. Tianss. 644 = H. conopsea, *Benth.*
kyperborea, Link, Handb. i. 242 = H. hyperborea.
intermedia, Peterm. Fl. Bienitz, 80 = H. conopsea, *Benth.*
Keiskei, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 513 = H. Keiskei.
Keiskei, Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) I. 61.—Japon.
lepida, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 51.—Ins. Loo-Choo.
longifolia, Lindl. in Wall. Cat. n. 7060 = H. longifolia.
longispica, Durand, in Joum. Acad. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1856) 101 = Herminium congestum.
Lyallii, Steud. Nom. ed. II. i. 712 = Cynorchis flexuosa.
macrantha, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 279.—Afr. trop.
nigra, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 821 = H. nigra.
nivea, Engelm. *Sc* A. Gray, in Bost Jonm. Nat. Hist. v. (1845) 286 = H. nivea.
nivea, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 280 (=*Platanthera Orehidis).*—Ind. or.
obcordata, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 32 - H. Galeandra.
odoratissima, A. Rich, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 57 = H. odoratissima.
Orehidis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 278 (»*Platanthera Orehidis).*—Reg. Himal.
ornithia, Spreng. Syst. iii. 693 = seq.
ornithis, A. Rich, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 57 = H. conopsea, *Benth.*
paueiflora, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 280.—Dahuria.
Pinguicula, Reichb. f. & S. Moore, in Joum. Bot. xvi. (1878) 185 = H. Pinguicula.
plantaginea, Lindl. in Wall. Cat. n. 7063=H. plantaginea.
Pseudo-conopsea, Gren. ex Nym. Consp. 695 = H. conopsea, *Benth.*
puberula, Lindl. in Wall. Cat. n. 7069 - Orchis Chusua.
purpurascens, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 27-Cynorchis purpurascens.
pyrenaica, Phil, ex Nym. Consp. 695 = H. conopsea, *Benth.*
rosellata, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 25 = H. mascarenensis.
rupestris, Miq. Ann. Mus. BoL Lugd. Bat. ii. 206.—Japon.
Schweinfurthii x, Kern, in Veiñ. Zool.-Bot. Ges. Wien, xv. (1865) 213.—Europ.
secunda, Lindl. in Wall. Cat. n. 7054 *(-Peristylus laricifolius).*—Ind. or.
sibirica, Turcz. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 277.—Sibir. baical.
spathulata, Lindl. 1. c. 280=H. spathulata.
squamata, A. Rich, in Mém. Soc Hist. Nat Par. iv. (1828) 22 = Cynorchis squamosa.

GYMNADENIA :—
Strumpfii x, Aschers. in Oestr. Bot. Zeitschr. xv. (1865) 179.—Europ.
suaveolens, Reicbb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 321 = Habenaria odoratissima.
tenuiflora, Lindl. in Wall. Cat. n. 7055 ~ H. lacertifera.
tenuis, Lindl. 1. c. n. 7057 » H. stenostachya.
transsilvanica, Schur, Ennm. PI. Transs. 644 « H. conopsea, *Benth.*
tridentata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 277 = H. tridentata.
triphylla, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat Par. iv. (1828) 24.—Ins. Maurit.
tryphiaeformis, Reichb. f. in Joum. Bot. xiv. (1876) 209.—China.
uniftora, Steud. Nom. ed. II. i. 712 - Cynorchis uniflora.
Vidalii, Franch. & Sav. Enum. PI. Jap. ii. 512.—Japon.
violacea, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 278 (=*Platanthera Orehidis).*—Ind. or.
viridis, A. Rich, in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 67 = H. viridis.
Wahlenbergii, Afzel. ex Reichb. Ic. Fl. Germ, xiii. 114. t. 423 = H. conopsea, *Benth.*

GYMNAGATHIS, Schau. in Linnaea, xvii. (1848) 2« = lEelaleuca, Linn. (Myrtac).
teretifolia, Schau. 1. c. 243 = M. teretifolia.

GYMNALYPHA, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) *2"* Acalypha, Linn. (Euphorb.).
Jaequinii, Griseb. 1. c.=A. villosa.

GYMNAMBLOSIS, Pfeiff. Nom. i. 1520 (1874). sphalm. =GYNAMBLOSIS, Torr. - Croton, Linn. (Euphorb.).

GYMNANDRA, Pall. Reise, iii. 710 (1776) = Lagotis, Gaertn. (Selagin.).
altaica, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 8U8. t. 4. f. 2 = L. glanca.
armena, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 75 = L. stolonifera.
borealis. Pall. Reise, iii. 710 = L. glauca.
cashmeriana, Royle, ex Benth. Seraph. Ind. 47 = L. glauca.
dentata, Willd. in Ges. Naturf Fr. Berl. Mag. v. (18») 394. t. 9. f 4 = L. glanca.
elongata, Willd. 1. c 895. t. 10. f. 7 - L. glauca.
globosa, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) II. 80. t. 7. f. 1 = L. globosa.
Gmelini, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 5«1 = L. glauca.
gracilis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 394. t. 9. f. 6 = L. glauca.
integrifolia, Willd. 1. c. 892. t. 9. f. i ~ L. glanca.
Karolkoni, Regel *Sc* Schmalh. in Act. Hort. I'etrop. » (1877) 627 = L. Korolkowi.
iunawurensis, Royle, ex Benth. Scropb. Ind. 47 = glauca.
longiflora, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1842) 417 = L. glauca.
Merckii, Cham, ex Choisy, in DC. Prod. xii. 25« glauca.
minor, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 393. t. 9. f. 8 = L. glanca.
ovata, Willd. I. c. S«5. t 10. f. 8 = L. glanca.
Pallasii, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) = L. glauca.
reniformis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. (1811) 896. t. 10. f. 9 = L. glauca.
ru bra, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 108 - Synthyris rubra.
spectabilis, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xxxix. (187*0 II. 80 = L. spectabilis.
Stelleri, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) = L. glauca.
Stelleri, Hook. f. & Thorns, ex Hook. f. Fl. Bnt » iv. 559 = L. glauca.
stolonifera, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 289 stolonifera.

GYMNANDROPOGON, [Munro] Duthie, in Atkins. Gaz. N. W. Ind. 638 (1878 ?) = Andropogon, Linn. (Gramin.).
annulatum, [Munro] Duthie, 1. c.-A. annulatus.
triste, [Munro] Duthie, 1. c.—Ind. or.

GYMNANTHELIA, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 299 (1867), nomen=Andropogon, Linn. (Gramin.).
commutata, Schweinf. & Aschere. 1. c.= A. commutatus.
connata, Schweinf. & Aschers. 1. c. = A. Schoenanthus.
lanigera, Andefss. 1. c.=A. laniger.
Martini, Anderss. 1. c. = A. Schoenanthus.
nervata, Schweinf. & Aschers. 1. c. = A. Schoenanthus
Proximo, Anderss. 1. c. = A. Iwarancusa.
sennaarensis, Schweinf. & Aschers. 1. c. = A. Iwarancusa.

GYMNANTHEMUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 10=Vemonia,Schreb. (Compos.).
abyssinicum, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 948 = V. amygdalina.
"cuminatum, Steetz, in Peters, Keise Mossamb. Bot. 336-V. arborea?
*a*ne,* Steetz, 1. c. 3S8 = V. scandens ?
"mygdalinum, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 948 = V. amygdalina.
angustifolium, Benth. in Hook. Niger Fl. 428-V. Benthamiana.
blandum, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot 389 = V. blanda.
Bolleanum, Steetz, 1. c. 886.—Afr. trop.
congestum, Cass. in Diet. Sc. Nat xx. 110-V. triflosculosa.
cupulare, Cass. 1. c. 109-V. senegalensis.
"jndigulense, Walp. Rep. ii. 948 = V. indica.
a»ergens,* Sch. Bip. ex Walp. 1. c. = V. divergent
"ftensum, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 387 = V. extensa.
fimbrilliferum, Cass. in Diet. Sc. Nat. xx. 109 (- *Decaneurum fimbrilliferum).*—Ins. Borbon.
f'utescens, Sch. Bip. ex Walp. Rep.ii. 948(Centratherae sp.?).-Java.
glabrum, Sch. Bip. ex Walp. 1. c. = Eupatorium glabrum.
g'ande, Sch. Bip. ex Walp. 1. c. (= *Decaneurum grande).*—Madag.
Mttaianum, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 234 *"V. divergent
nolle, Sch. Bip. ex Hook. f. 1. c. 228 = Centratherom Ritchiei.
m°Ue, Sch. Bip. ex Walp, Rep. ii. 948 ^ Centratherum molle.
0J>°vatum, Gaudich. Voy.Uran. Bot. 471 = V. scandens.
?Vllolaenum,Sdi. Bip. ex Walp. Rep. ii. 949 (phyllo-°aeum)=Cent»thenim phyllolaenum.
luercifolium, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. "34 = V. senegalensis.
*r*ttculatum,* Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 948 = Centratherum reticulatum.
Maidens, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 338 **V. scandens.
scarposen, Bip. ex Walp. Rep. ii. 949 - V. scariosa, *Am.*
senegalense, Sch. Bjp. ex Walp. 1. c. 948 = V. senegalensis.
silhetense, Sch. Bip. ex Walp. 1. c. = V. bracteata.
vagans, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 338-••scandens.

GYMNANTHEBA, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 58, *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 742.
CYLIXYLON, Llanos, Fragm. 59 (1851).
U«CEROLEPIS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 145, t. 24 (18 0)
nitid»» *S. Br.5p,'ad.* 464.-Austral.
pedunculata, *Villar, in Blanco, Fl. Pkilipp.* ed. III. *Nov. App.* 182.—Malaya j Ins. Philipp.

GYMNAITHE8, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 95 (1788). *B?pHOllBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 337.
actin8temoides> *Muell. Arg. inLinnaea,* xxxii. (1868)
an*vs—Mexic
f<&ii *'0lia, Muell- Arg.* 1-c "-SebastUniaan6uuti"
«»»»ns, Muell. Arg. 1. c. 102 = Sebastiania bahiensis.
br"rtvrforfa, Muell. Arg. L c. 98-Sebastiania brachyclada.
—iens,„1 Muell> Arg. 1. c. 104 = Sebastiania brasiliensis.
brevifolia, Muell. Arg. 1. c.=Sebastiania brevifolia.
concolor, MneU- Ar S- L c- l»3 = Actinostemon caribaeus.

GYMNANTHE8:—
discolor, Baill. Etud. Gen. Euph. 531 - Sebastiania marginata.
discolor, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 103 = Sebastiania discolor.
elliptica, 5ar. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 96.—Ind. occ.
Gaudichaudii, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 96 = Sebastiania Gaudichaudii.
glandulosa, *Muell. Arg. 1. c.* 106.—Bras.
granatensis, Muell. Arg. 1. c. 107 - Sebastiania granatensis.
guyanensis, Muell. Arg. 1. c. 102 - Sebastiania guyanensis.
hypoleuca,5«»<A. *in Hook. Ken Journ.* vi. (1854) 325.—Brag.
jacobinensis, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1868) 106=Sebastiania jacobinensis.
Klotzschiana, Muell. Arg. 1. c. 98=marginata.
ligustrina, Muell. Arg. 1. c. 96 - Sebastiania ligustrina.
longipes, *Muell. Arg 1. c.* xxxiv. (1865-66) 216.—Mexic.
lucida, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 96.—Ind. occ.
marginata, *Baill. Etud. Gin. Euph.* 531.—Bras.
multiramea, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (.1868) 97—Sebastiania multiramea.
nervosa, Muell. Arg. 1. c. 102 - Sebastiania nervosa.
obtusa, Baill. Etud. Gen. Euph. 530=elliptica.
pachystachys, Baill. 1. c. 681 = Sebastiania pachystachys.
pallens, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxii. (1863) 106.—Cuba.
Pavoniana, Muell. Arg. 1. c. = Sebastiania Pavoniana.
polyandra, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 837.—Ind. occ.
pteroclada, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1663) 107 = Sebastiania pteroclada.
rigida, Muell. Arg. 1. c. 99-Sebastiania rigida.
riparia, *Klottsch, in Wiegm. Arckiv.rb.* (1841) 182.—Mexic.
Schlechtendaliana, Muell. Arg. in Linnaea, zxxii. (1863) 100-riparia.
Schottiana, Muell. Arg. 1. c. 96 - Sebastiania Schottiana.
serrata, Baill. Etud. Gen. Enph. 531 = Sebastiania serrata.
stipulacea, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 96 = Sebastiania stipulacea.
Treculiana, Muell. Arg. 1. c. xxxiv. (1865-66) 216 = Sebastiania Treculiana.
trinervia, Muell. Arg. 1. c. xxxii. (1863) 101 = Sebastiania trinervia.
Widgreni, Muell. Arg. I. c. 97= Sebastiania Widgreni.
ypanemensis, Muell. Arg. 1. c. 100 = Sebastiania ypanemensis.

GYMNANTHUS, Endl. Gen. Suppl. v. 87 (1850) = praec

GYMNANTHUS, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 308=Trochodendron, Sieb. & Zucc. (Magnol.).
paradoxus, Jungh. 1. c.—Japon.

GYMNARRHEA, Steud. Nom. i. 885 (1821), sphalm. = seq.

GYMNARKHENA, Desf. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 1. t 1. *COMPOSITAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 337.
CRYPTADIA, LindL in Endl. Gen. PI. Suppl. i. 1881 (1841).
FRANKIA, Steud. Nom. ed. II. i. 646 (1840).
Balansae, Coss. *Sc* Dur. ex Coss. & Kralik, in Bull. Soc Bot. Fr. iv. (1857) 180 - micrantha.
micrantha, *Desf. in Mém. Mus. Par.* iv. (1818) 2. t. 1.—Afr.bor.; Arab.; Persia.

GYMNELAEA, Spach, Hist. Vég. Phan. viii. 258 (1839) -Olea, Toum.

QYMNEMA, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 83. *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 769.
acuminatum, *Wall. Tent. Fl. Nep.* 60.—Ind. or.; Malaya.
affine, *Decne. in DC. Prod.* viii. 622.—Ind. or.; China,
albidum, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. ix. (1838) 278.—Ins. Timor.

OYMNEMA:-
attenuatum, *Wall. Tent. Fl. Nep.* 50.—Reg. Himal.
aurantiacum, Wall, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 63 - Leptadenia reticulata.
brevifolium, *Benth. Fl. Austral,* iv. 348.—Austral.
columnare, Wall, ex Wight, Contrib. 46; Cat. n. 8193 —(iongronema nepalense.
crenatum, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 278.—Afr. trop.
Decaisneanum, Wight, Ic. t. 1271 = hirsutum.
elegans, *Wight (T Am. in Wight, Contrib.* 46.—Ind. or.
crianthum, *Decne. in DC. Prod.* viii. 622.—N. Caled.
Finlaysonii, Wight, Contrib. 46 = Gongroncma Finlaysonii.
geminatum, R. Br. Prod. 462 = sylvestre.
glabrum, *Wight, Contrib.* 45.—Burma,
glaucum, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 328.—Singapore.
hirsutum, Wall. Tent. Fl. Nep. 50 = Tylophora hirsuta.
hirsutum, *Wight V Am. in Wight, Contrib.* 44.—Ind. or.
humile, *Decne. in DC. Prod.* viii. 621.—Abyssin.
inodornm, *Decne. 1. c.* 651, nomen.—China,
lacliferum, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1800) S3.—Ind. or.; Malaya,
latifolium. *Wall, ex Wight, Contrib.* 45.—Ind. or.; Burma.
Morale, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 149.—Java.
WKenii, Harv. Gen. S. Afr. PI. ed. II. 239-subvolubile.
macranthum, *Hook./, in Hook. Ic. PL* t. 1436.—Reg. Himal.
macrocarpum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 43.—Abyss.
Maingayi, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 81.—Malacca.
malayanum, Griff. Notul. iv. 56 = lactiferum.
melicida, Edgew. in Joum. As. Soc. Beng. xxi. (1852) 174—= sylvestre.
micradenia, *Benth. Fl. Austral,* iv. 344.—Austral,
molle, *Wall, ex Wight, Contrib.* 45.—Burma,
montanum, *Hook.f. Ft. Brit. Ind.* iv. 31.—Ind. or.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* iv. 843.—Austral.
nepalense, Wall. Tent. Fl. Nep. 49 = Gongronema nepalense.
nepaulense, J. Grah. Cat PI. Bomb. 120 = Anodendroa paniculatum.
niiens, Blume, Mus. Bot Lufd. Bat. i. 149-lactiferum.
nitidum, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 466.—Afr. trop.
parviflorum, Decne. in DC. Prod. viii. 621, in syn. sphalm.-seq.
paniifolium, Wall. Tent. Fl. Nep. 50-affine.
pergularioides, *Wight V Gardn. ex Thw. Enutn. PI. Zeyl.* 128, in syn.—Zeylan.
pleiadenium, *F. Muell. Fragm.* xi. 77.—Austral.
pubigerum, Hort. Calc. ex Decne. in DC. Prod. viii. 609-Tylophora exilis.
recurvifolium, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 150.—N. Guinea.
rotundatum, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 197.—Zeylan.
rufescens, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. ix. (1838) 277.—Madag.
sagittatum. Wall. Cat. n. 8194 ; Tent. Fl. Nep. 50 - Gongronema nepalense.
sagittatum, Wall. 1. c. 8194 B-Tylophora Wallichii.
Spartium, Wall. Cat. sub n. 819!) - Leptadenia Spartium.
stenoloba, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 32.—Zeylan.
stenophyllum, *A. Gray, in Proq, Am. Acad.* v. (1862) 335.—Austral.; Ins. Fiji,
subundum, *A. Gray, 1. c.*—Ins. Fiji,
subvolubile, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ix. (1888) 277.—Afr. trop.
sylvestre, *R. Br. in Mem. W'rn. Soc.* i. (1809) 33.—Ind. or.; Afr. trop.; Austral.
tenadssimum, Spreng. Syst. i. 844^Marsdeniatenacissima.
Thomson!, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 32.—Reg. Himal.
tingens, *Spreng. Syst.* i. (144.—Ind. or.
trinerve, *R. Br. Prod.* 462.—Austral.
Wallichii, Wight, Contrib. 46 = Gongronema Wallichii et Tylophora Wallichii.
teylanicum, Decne. in DC. Prod. viii. 622-lactiferum.

GYMNEMA, Endl. Gen. 891, in syn. (1837) = GYNEMA, Rafin.-Pluchea, Cast. (Compos).

GYMNOBALANUS, Nees *Sc* Mart, in Linnaea, viii. (1833) 38<=Ootea, Aubl. (Laurin.).
Catesbyanus, Nees, Syst. Laurin. 483 — Nectandra Willdenoviana.
Vtn&Xen, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 142.—Venezuela.
guianensis, Nees, Syst. Laurin. 482 = 0. gnianensis?
latifolia, Meissn. in DC. Prod. xv. 1.141-Nectandra polita.
minarum, Nees & Mart in Linnaea, viii. (1833) 38 - Nectandra psammophila.
perseoides, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 141 = O. puberula.
punctata, Meissn. 1. c«- Nectandra punctata.
Regnellii, Meissn. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1870) 138—Nectandra grandiflora.
reticulatus, Meissn. 1. c.—Bras.
Sprucei, Meissn. in DC- Prod. xv. 1.140.—Bras.

GYMNOBOTHRYS, Wall, ex Baill. Etad. Gén. Eupb. 526 (1858) = Sapium, P. Br. (Euphorb.).
lucida. Wall, ex Baill. 1. c. 527-S. insigne.

GYMNOCALYCIUM, Pfeiff. Cat. Hort. Schel. ex Pfeiff. *Sc* Otto, Abbild. Cacteen, ti. t. 12 (1844) - Echinooaetus, Link & Otto (Cart.).
denudatum, Pfeiff. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 289 = E. denndatns.
gibbosum, Pfeiff. 1. c. 291 = E. gibbosus.
reductum, Pfeiff. & Otto, Abbild. Cacteen, ii. t. 12= E. gibbosus, Cereus reductus.
villosum, Pfeiff. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 297 = E. polyrhaphis.

GYMNOCAMPUS, Lesch. ex Pfeiff. Nom. i. 1522 (1874) - GYNOCAMPUS, Lesch. = Levenhookia, R. Br. (Stylid.).

GYMNOCARPON, Pers. Syn. i. 262 (1805)=seq.

GYIOTOCABPOS, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 65 (1775). *ILLECEBRACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 17.
decandrum, *Forsk. I. c.*—Afr. trop.
fruticosum, Pen. Syn. i. 262 ^decandrum.
Przewalskii, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 502.—Mongolia.

GYMNOCARPUM.DC. Prod, iii. 369 (1828)«praec

GYMNOCARPUS, Thou, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 595 (1858)-t7apaca, Baill. (Euphorb).

GYMNOCAULIS, Nutt. in Jonm. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 160=Aphyllon, Mitch. (Orobanch.).
biflora, Nutt. 1. c. = A. nniflornm.
fasciculata, Nutt. 1. c.=A. fasciculatum.
uniflora, Nutt. L c. = A. uniflorum.

GYMNOCAULUS, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 705 =Calycera, Cav.
mridiflorus, Phil. 1. c 706=C. viridiflora.

GYMNOCHAETA, Steud. Syn. PL Cyp. 156 (1855) = Schoenus, Linn. (Cyperac.).
Drummondii, Steud. 1. c = S. Drummondii.

GYMNOCHAETE, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1063 (1883), sphalm. -praec.

GYHENTOCHHitrS, Blume, Orch. Archip. Ind. 107-1 32 (1858). *ORCHWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 605.
nndum, *Blume, I. c.* 108.—Ins. Mascar.
recurvum, *Blume, 1. c.* 109. t. 32. £ 2.—Madag.

GYJOTOCXADTXS, Lam. Encyc. i. 733 (1783). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 568.
arabica, Lam. 1. c = Moringa aptera.
canadensis, *Lam. I. c.*—Am. bor.
cbinensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1875) 84. —China.
dioica, C. Koch, Dendrol. i. 5=canadensis.
Williamsii, Hance, in Jonm. Bot. xxii. (1884) 366- Gleditschia sinensis.

GYMNOCLINE, Cass. in Bull. Soc Philom. (1816) 199; et in Diet. Sc. Nat. xx. 119 (1821)=Chrysanthemum, linn, i Compos.).
achilleaefolia, C. Koch, in linnaea, xxiv. (1851) 840- C. achilleacfolium.
argyrophylla, C. Koch, 1. c. *{—Pyretkrum myriophyllum).*—Reg. Caucas..

GYMNOCLINE:—
armenum, C. Koch, .in Linnaea, xxiv. (1851) 840= Chrysanthemum millefoliatum ?
cedretorum, Schott *Sc* Kotschy, ex Tchihat Asie Min. Bot. ii. 278.—As. Min.
chiliophylla, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 339 = C. miUefoliatum.
leucocephala, Cass. in Diet. Sc. Nat. xx. 120 = C. macrophyllum.
macrophylla, Bluff & Fingerh. Fl. Germ. ii. 889- C. macrophyllum.
myriophylla, C. Koch, in. Linnaea, xxiv. (1851) 339 *{-Pyrethrum myriophyUum\—VLtg.* Caucas.
SBovitsii, C. Koch, 1. c 840 (•= *Pyrethrum polyphyllum).*—Armenia.
Vaillantii, Cass. in Diet. Sc. Nat. xx. 121 = C. achilleaefolium.
xanthocephala, Cass. I. c. «C. achilleaefolium.

GYMNOCOCCA, Fisch. *Sc* Mey. ex Fisch. Mey. *Sc* Ave[1]-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. x. 46 (1845) = Pimelea, Banks *Sc* Soland. (Thymel.).
arenaria, Fisch. *Sc* Mey. 1. c. 47=P. arenaria.
drupacea, Fisch. & Mey. 1. c. 46 =P. drupacea.
microcarpa, Fisch. *Sc* Mey. 1. c. 47-P. Urvilleana.

GYJOTOCOBONIS, DC. Prod. v. 106 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 239.
attenuata, DC. 1. c - spilanthoides.
latifolia, *Hook. V Arn. Bot. Beech. Voy.* 296.—Mexic.
spilanthoides, *DC. Prod.* vii. 266.—Reg. Argent.
subcordata, DC. 1. c v. 106=spilanthoides.

GYMNODES, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 172=liuzula, DC. (Juncac).
campestris, Fourr. L c - L . campestris.
multiflora, Fourr. 1. c. 178 = L. erecta.
spicata, Fourr. 1. c. = L. spicata.
sudetica, Fourr. 1. c.=L. nigricans.

GYMNODISCU8, Less, in Linnaea, xiv. (1831) 95 ; et Syn. Comp. 89 (1832). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 452.
capillaris, *less, in Linnaea,* xiv. (1831) 95.—Afr. austr.
linearifolius, *DC. Prod.* vi. 469.—Afr. austr.
orbicularifolius, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 768. —Afr. austr.

GYMNOGYNE, F. Didr. Ind. Sem. Hort. Haun. (1850). —Cf. Linnaea, xxix. (1857-68) 737 - Boehmeria, Jacq. (Urtic).
elongata, F. Didr. 1. c.=B. elongata.

GYMNOGYNE, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 431 (1845) -Cotula, Linn. (Compos.).
cotuloides, Steetz, 1. c 432 = C. Gymnogyne.

CTxTOTOTiATnffA, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 740 (1876). *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. 1. c.
Newii, *Benth. in Hook. Ic. PI.* 1.1186.—Afr. trap.

GYMNOLEIMA, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 122 (1844)-Iiithospennum, Tourn. (Borag.).
fruticulosum, Decne. 1. c.=L. frnticosum.
graminifolium, Decne. 1. c. = L. graminifolium.
oleifolium, Decne. 1. c.=L. oleaefolium.
rosmarinifolium, Decne. 1. *c* =L. rosmarinifolium.

GYMNOLOMA, Ker-Gawl. in Bot Reg. t. 662 (1823) - seq.

GYKOTOLOMIA, H. B. *Sc* K. Nov. Gen et Sp. iv. 217, t. 378, 374 (1820). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 363.
GYMNOPSIS, DC. Prod. v. 661 (1836), partim.
HELIOMERIS, Nutt. in Tourn. Acad. Philad. N. S. i (1847) 171.
MIRASOLIA, Sch. Bip. ex Benth. *Sc* Hook. f. ii. 867 (1873).
calva, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 5, in obs.—Mexic.
clnerascens, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 862.—Mexic.
connata, *Spreng. Syst.* iii. 610.—Bras.
divergens, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 263 = Calea divergens.

GTMNOLOMIA:—
encelioides, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* r.ix. (1883) 4.-Calif.
ensifolia, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 362.—Mexic.
flava, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 161.—Mexic.
Ghiesbreghtii, *Hemsl. 1. c.* 162.—Mexic.
Greggii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 36.— Mexic.
hondensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 218.— N. Granat.
Kunthiana, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 172.— Bras,
latebracteata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 162.— Mexic.
maculata, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 662 - Wulffia stenoglossa.
microcephala, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 153.— Mexic.
multiflora, *Benth.* b* *Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 162.—Mexic.
ovata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 4.— Mexic.
Parkinsonii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 163.- Mexic.
patens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1862) 182.— Mexic
pinnatilobata, *Benth. (f Hook.f. Gen.* ii. 362.—Mexic.
platylepis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 5- —Mexic.
Ported, *A. Gray, 1. c.* xii. (1877) 69.—Am. bor.
quitensis, *Benth.* b* *Hook.f. Gen.* ii. 364.—Ecuador,
rudbeckioides, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 219. t. 374.—Am. centr.
squarrosa, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 362.—Mexic.
snbflexuosa, *Benth. V Hook. I. c.* 364.—Mexic.
tenella, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 218.— N. Granat
tenuifolia, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 364.—Mexic.
triloba, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 217.—Arizona,
triplinervia, *H. B.* &• *K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 219.— N. Granat.
villosa. Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ill. 262 •» Calea villosa.

GYMNOMESIUM, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855) 17=Arum, Linn. (Aroid.).
pictum, Schott, 1. c. = A. pictum.

GYMNONYCHIUM, Bartl. in Linnaea, xvii. (1843) 853. t. ll=AgathoBma, Willd. (Rutac.).
pubescens, Bartl. 1. c. 854. t. 11 = A. pubescens.

GYMNOPENTZIA, Benth. in Benth. *Sc* Hook, *f-* Gen. ii. pars I"[1]* Add. 537; et 1285 (1873). *COM' POSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. c.
bifurcata, *Benth. I. c.; et in Hook. Ic. PI.* t. 1155.— Afr. austr.

GYMNOPETAIJ-DM, Am. in Hook. Joum. Bot. i»-(1841) 278. *CUCURBITACEAE,* Benth. *Sc* Hook-f. i. 822.
SCOTANTHUS, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. »* (1861) 172.
TRIPODANTHERA, M. Roem. Syn. Pepon. 46 (184VJ*
calyculatum, Miq. Fl. Ind. Bat. buppl. 332 = Curcurbita moschata.
ceylonicum, *Arn. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 27»- —Zeylan.
cochinchinense, *Kurz, in Joum. As. Soc. Beng.* (1871) II. 57.—As. trop.
heterophyllum, Kurz, in Joum. Bot. xiii. (1875) 326 * quinquelobum ?
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 680 - Thladiantt* cordifolia.
integrifolium, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xl. (IS II. 58 -Trichosanthes integrifolia.
japonicum, Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat ii. » Trichosantb.es japonica.
leucostictum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* L I. 680.—Java.
piperifolium, Miq. 1. c - Thladiantha cordifolia.
quinquelobatum, Cogn. in A.DC. Monog. Phao. 392, sphalm.-seq.
quinquelobum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 681.—Jav»-
septemlobum, Miq. 1. c. 679 = Benincasa cerifera.
tubiflorum, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. S* ceylonicum.
Weberi, *Cogn. I. c.* 394.—Cochinch.

mnJOPETAI,TJM :-

Wightii, *Am. in Hoot. Journ. Bot.* iii. (1841) 278.—Ind. dr.

Wightii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 811, partim—ceylonicum.

"ylanicum, Walp. Rep. ii. 198, in syn.=ceylonicum.

GYMNOPHYTON, Clos, in C. Gay. Fl. Chil. iii. 102. t. 82 (1847) = Asteriscium, Cham. & Schlecht. (Umbellif.).

Jjfxuosum, Clos, 1. c. 104-A. flexnosum.

fdiosum, Phil. Fl. Atac. 24.—Chili.

Kingi, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 727.—Chili.

polycephalum, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 108. t. 82. f. 1=A. polycephalnm.

°oustum, Clos, 1. c. 104=A. robustum.

spiruscens, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 91.—Chili.

**pinosissimum,* Phil. Fl. Atac. 24.—Chili.

GYlmrOPOGON, Beanv. Agrost. 41.19. £ 3 (1812). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1167.

ANTHOPOGON, Nutt Gen. Am. i. 81 (1818).

BIATHERIUM, Desv. Opusc. 72 (1881).

DICHAETARIA, Nees. in Steud. Sym PL Gram. 14S (1855).

orevifolius, Trin. Gram. Unifl. 238.—Am. bor. et austr.

di ilat gus, Nees, ex Stend. Norn. ed. II. i. 718 = Cynodon elongates.

Qistichophyllns, *Steud. Syn. PI. Gram.* 218.—Texas.

"ongatus, Nees, erSteud.Nom. ed. H. i. 713=Cynodon elongatus.

tetigiutus, Nees, Agrost. Bras. 480=brevifolius.

Uformis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 588.—Ind. occ.

•ouosus, Nees, Agrost. Bros. 426.—Am. trop.

łaevts, Nees, 1. c. 428 = Muehlenbergia spicata.

'onpfolius,Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am.Bot.m. 560.—Mexic.

mc is , Nees, Agrost. Bras. 427.—Bras.

PnUilans, *Doell, in Mart. fl. Bras.* ii. III. 82.—Bras.

'aeemosus, Beam. Agrost. 41. t 9. f. 3.—Am. bor. et

Jeiu us, Doell, in Mart. fl. Bras. ii. III. 80.—Bras.

"Pdus, Thw. Enum. PI. Zeyl. 372.—Zeylan.

"°parius, Trin. Gram. Unifl. 237=racemosus.

*Vilietii " Fourn - ** Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 560 Mexic.

°YMNOPSIS,DC. Prod. T. 661 (1886) - Gymnolomla, «• B. & K. (Compos.).

Uausseni, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. "1.183-Wedeliapnberu U.

c»nnata, Stend. Nom. ed. II. i. 713-Gymnolomia connata.

"stf-ricensis, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 90 - Gymnolomia rndbeckioides.

*y*tat„,* DC. Prod. v. 561 = Sclerocarpns dentatus.

*"*qricata,* Benth. Bot. Voy. Sulph. 116=Sclerocarpns •uvaricatus.

"uwntoirfM, DC. Prod. v. 562.—Bras.

J^hcosa, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. vii. U848) 291 = Aspilia fruticosa.

s'aierrima, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. «i.246=BidensRiedelii.

l^iantkoides, DC. Prod. v. 562.—Reg. Argent

*no**ensis,* DC. 1. c. = Gymnolomia hondensis.

""nthiana, Gardn. in Hook. Lond. Joara. Bot. vii. U848) 292-Gymnolomia Kunthiana.

^"ndonii, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 528, nomen—Bolivia.

mic cephala Garf »- m' Hook. Lond. Joum. Bot vii. (1848) 292 =Elentheranthera ovata.

mi"ocephala, Steud. Nom. ed.II.i. 713=Gymnolomia "ttcrocephala.

^othamna, Sch. Bip. ex Baker, in Mart Fl. Bras. «. Hi. 204 = Aspilia fraticosa.

*£*W, Sch. Bip.ex Baker, 1. c. 201 = Aspilia Pohlii.

r«*re*ioiVfcj, DC. Prod. v. 662 = Gymnolomia rudoeckioides.

•?*•"»<». DC. 1. c 661-Sclerocarpns Schiedeanus.

*Iw DC 562 = Gymnolomia tenella.

?" f W a , DC. 1. c. - GymnolomU triplinervia.

*^ 0 ook- Ic. PL t 145-Sclerocarpns nni-

*iiajja

asmoides, DC. Prod. v. 661.-Ins. Trinit

GYMNOPSIS:—

vulcanica, Steeto, in Seem. Bot. Voy. Herald, 157 = Gymnolomia nidbeckioides.

Weddellii, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 184-Wedelia macrodonta.

**medelioides,* DC. Prod. v. 562.—Ind. occ.

GYMNOPYRENIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 816 (1867) = Cotoneaster, Medic. (Rosac).

Pyracantha, Dulac, 1. c—Crataegns Pyracantha.

tomentosum, Dnlac, 1. c =CoL tomentosa.

vulgare, Dulac, 1. c = Cot. integerrima.

GYMNOREIMA, Endl.Gen. Snppl. iii. 77 (1813), sphalm. = GYMNOLEIMA, Decne. = Iilthoapermum, Tourn. (Boragin.).

GYMNOSCHOENUS, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist Ser. I. vi. (1841) 47 = Mesomelaena, Nees (Cyperac.).

adustus, Nees, 1. c.=M. sphaerocephala.

anceps, Nees, 1. c. = M. anceps.

sphaerocephalus, Nees, 1. c = M. sphaerocephala.

GYMNOSCIADIUM, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 20 - Fimpinella, Riv. (Umbellif.).

pimpinelloides, Hochst. 1. c. = P. Gymnosciadiura.

GYMNOSIPHOU", Blame, Enum. PI. Jav. i. 29 (1827). *BURMANNIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii 458.

BENITZIA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 420.

CVMBOCARPA, Miera, in Proc. Linn. Soc. i. (1840) 61; et in Trans. Linn. Soc. xviii. (1840) 453. t. 88. f. 4.

PTYCHOMEMA, Benth. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 14.

aphyllum, *Blume, Enum. PI. Jav. f.* i. 29.—Java,

comutum, *Benth. &* Nook./. Gen.* iii. 458.—Bras,

cymosum, *Benth. &* Hook./. 1. c.*—Bras,

divaricatum, *Benth. &• Hook.f. I. c*—Bras,

papuanum, *Becc. Malesia,* i. (1878) 241.—N. Guin.

refractum, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 458.—Bras.

GVUNO8FERMA, Less. Syn. Comp. 194 (1832), partim. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 249.

SELLOA, Spreng. Nov. Prov. 36 (1818).

corymbosnm, *DC. Prod.* v. 812.—Mexic.

erioearfa, Walp. Ann. v. 191, sphalm. - Gutierrhiza eriocarpa.

glutinosum, Less. Syn. Comp. 194 = Baccharis glutiaosa.

multiflorum, DC. Prod. v. 812=corymbosnm.

nudatum, DC. 1. c. = Flaveria linearis.

oppositifolium, DC. 1. c = Flaveria longifolia.

scoparium, DC. 1. c—corymbosnm.

GYMNOSPERMIUM.Spach, Hist. Veg. Phan. viii. 66 (1839)-Beontice, Linn. (Berberid.).

altaicum, Spach, 1. c. 67=L. altaica.

QTMNO8POBIA, Benth. ft Hook. f. Gen. i. 365 (1862). *CELASTRINEAE* [Benth. & Hook. f. 1. c 363, 997].

ENCENTRUS, Presl, Bot. Bemerk. 83 (1844).

POLYACANTHUS, Presl, 1. c. (1844).

acuminata, *Hook.f. ex U. LaxosAn Fl. Brit. Ind.* i. 619.—Ind. or.

berberidacea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 120.—Madag.

brachystachya, *Baker, in, Journ. Bot.* xx. (1882) 49.—Madag.

casmoides, *Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 176.-Ins. Canar.

crataegina, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 120.—Madag.

crenata, *Seem.Fl. Vit.* 41, in nota.—Ins. Marques,

divaricata, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 50.—Madag.

diversifolia, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 459.—Ins. Loo-choo.

Dryandri, *Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x.* (1881) 176.—Ins. Canar.

emarginata, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 409.—Ind. or.

europaea, Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat x.(1881) 176=montana.

Falconeri, *M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 620. -Reg.Himal.

fruticosa, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 409.—Zeylan.

GtYMITOSPOBIA :—

Gibsoni, *Kurs, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) II. 202.—Ind. or.

Harlandi, *Hance, in Journ. Bot.* iv. (1866) 171.—Cocbinch.

Heyneana, *M. Laws, in Hook.f. fl. Brit. Ind.* i. 620. -Ind. or.

leptopus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 121. —Madag.

montana, *Benth. Fl. Austral,* i. 400.—Geront. trop.

neglecta, *M. Laws, in Hook.f. Ft. Brit. Ind.* i. 619.—Ind. or.

oblanceolata, *M. Laws. I. c.*—Burma,

ovata, *M. Laws. I. c.*—Ind. or.

paniculata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 121.—Madag.

philippinensis, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 58,1C3. —Ins. Philipp.

puberuU,^. *Laws, in Hook..f.fl.Brit. Ind.* i. 619.—Ind. or.

Rothiana, *M. Laws. I. c.* 620.—Ind.. or.

Royleana, *M. Laws. 1. c.*—Ind. bor. occ.

rufa, *M. Laws. 1. c.*—Ind. or.

rugulosu, *M. Laws. I. c.*—Ind. or..

salicifolia, *M. Laws. 1. c.* 619.—Assam.

Thomsoni, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) II. 202.—Reg. Himal.

trigyna, *Baker, Fl. Maurit.* 50.—Ins. Maurit.

vitiensis, *Seem. Fl. Vit.* 40.—Ins. Fiji.

Wallichiana, *M. Laws, in Hook.f. fl. Brit. lad.* i. 621:—Ind. or.

GYMNOSTACHIUM, Reichb. Handb. 190 (1837) - OymnoBtachyum, Nees (Acanth.).

GYMNOSTACHYS, R. Br. Prod. 337 (1810). *AROIDEAE,* Benth. *He* Hook. f. iii. 1000.

anceps, *R. Br. 1. c.*—Austral.

GYMNOSTACHYXTM, Nees, in Wall. PI. As. Rai. iii. 76 (1832). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 1099.

CRYPTOPHRAGMIUM, Nees, in WalL PI. As. Rar. iii. *76,* 94 (1832).

ODONTOSTIGMA, Zoll. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, ii. (1846) 573.

PETRACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 97 (1847).

SARCANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 64 (1836).

affine, *Nees, in DC. Prod.* xi. 94.—Ins. Philipp.

alatum, Wight, Ic. iv. t. 1494-febrirâgum.

andrograpfiioides, T. Anders, in Joum. Linn. Soc ix. (1867) 604-=Andrographistenuiñora.

canescens, *T. Anders. I. c.* 505.—Ind. oif-

ceylanicnm, *Am.* tr *Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1886) 311.—Zeylan.

Cnmingianum, *Nees, in DC. Prod.* xi. 94.—Ina, Philipp.

febrifugum,ifenM. *in. flora,* xxxii. (1849) 658.—Ind. or.

glabrnm, *T. Anders, in Joum. Linn. Soc.* ix. (1867) 506.-Ind. or.

hirsntum, 7'. *Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl.* 233.—Zeylan.

javanicum, *Nees, in DC. Prod.* xi.. 93.—Java,

latifolinm, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 506.—Ind. or.

leptostachyum, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 106.—Burma.

longifolium, T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook, *t* Fl. Brit Ind. iv. 509-canescens.

ovatum, T. Anders, ex Bedd. Ic. PI. Ind. Or. i. 60 = Andrographis ovata.

paniculatum, *T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl.* 232. —Zeylan.

Parishii, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 604 = Andrographis tenuiflora.

Pearcei, Hort. Veitch, in Gard. Chron. (1867) 458 - Verschaffeltii ?

polyanthum, *Wight, Ic.* iv. 1.1491.—Ind. or.

sanguinolentum, *T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl.* 232.—Zeylan.

serrulatum, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 505-cuaescens.

Thwaitesii, *T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl.* 232. —Zeylan.

tomentosum, 7. *Anders, in Joum. Linn. See.* ix. (1867) 5O5.-Ind. or.

Verscbaffeltii, *Len. Illustr. Horde,* x. (1863) t 372.—Bras,

venustnm, *T. Ande+t. in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 606.—Reg. Himal.

GYMNOSTECHYUM, Spach, Hist. Vėg. Phan. ix. 146 (1S40) - Gymnostachyum, Nees (Acanthac).

GYMNOSTEPHIUM, Less. Syn. Comp. 185 (1882). *COMPOSITAE.* Benth. & Hook. f. ii. 266.
HETERACTIS, DC. Prod. vi. 468 (1837).
angustifolium, *Ham. in Ham.* &• *Sond. Fl. Cap.* iii. 67.—Afr. austr.
ciliare, *Ham. 1. c.* 68.—Afr. austr.
• corymbosum, *Ham. I. c.*—Afr. austr.
fruticosum, *DC. Prod.* v. 300.—Afr. austr.
gracile, *Less. Syn. Comp.* 185. —Afr. austr.
hirsutum. *Less. I. c.*—Afr. austr.

GYMNOSTICHUM, Schreb. Beschr. Graes. ii. 127 t. 47 (1810)=Asperella, Humb. (Gramin.).
californicum, Boland. ex Thurb. in S. Wats. Bot. Calif, ii. 827 = A. californica (in Addend.).
gradlis, Hook. f. H. N. Zel. 812. t. 70.—N. Zel.
Hystrix, Schreb. Beschr. Graes. ii. 127 = A. Hystrix.
majus, Heynh. NQm. i. 371 = A. Hystrix.

GYMNOSTILLINGIA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 89 = Stillingia, Garden (Euphorb.).
acutifolia, Muell. Arg. 1. c. 90 = S. acutifolia.
loranthacea, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 541. —Bras.
macrantha, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 90 = S. macrantha.

GYMNOSTYLES, Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 258. t. 16-Soliva, Ruiz & Pav. (Compos.).
alata, Spreng. Syst. iii. 500 = S. sessilis.
anthemifolia, A. Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 262. t. 61 = S. anthemifolia.
Barcklayana, Steud. Norn. ed. II. i. 713 =S. sessilis.
chilensis, Spreng. Syst. iii. 500 = S. sessilis.
lusitanica, Spreng. 1. c.=S. nasturtiifolia.
minuta, Spreng. 1. c. = Cotula pygmaea.
Mutisii, Spreng. 1. c.=S. Mutisii.
nasturtiifolia, A. Juss. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 262. t. 16. f. 2=S. nasturtiifolia.
parthenifolia, [Mo?. & Sesse,] ex DC. Prod. v. 5S0 (= *Euphrosyne parthenifolia).*—Mexic.
pedunculata, Moç. ex DC. L c. vi. 143 = S. pedicellata.
peruviana, Spreng. Syst. iii. 500=S. pedicellata.
pterosperma, A. Juss. in Aon. Mus. Par. iv. (1804) 262. t. 16. f. 3 = S. sessilis.
stolonifera, A. Juss. 1. c.-S. nasturtiifolia.

GYMNOSTYL1S, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 =Pluchea, Cass. (Compos.).
marilandica, Rafin. 1. c. = P. camphorata.

GYMNOTERPE, Salisb. Gen. PL Fragm. 108 (1866)-TapeinanthUB, Herb. (Amaryllid.).
humile, Salisb. 1. e. = T. humilis.

GYMTTOTHECA, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. Ill iii. (1845) 100. t. 5. *PIPERACEAE,* [Benth. & Hook, f. iii. 128].
chinensis, *Decne. I. c.*—China.

GYMNOTHRIX, Spreng. Anleit ii. 1.154 (1817) =seq.

GYMNOTRIX, Beauv. Agrost. 59. t. 13. f. 6 (1812) = Fennisetum, Pers. (Gramin.).
adotnsis, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. i. 713 = P. adoė'nse.
alopecuros, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 102 = P. alopecuros.
bambusiformis, Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 507 = P. bambusiforme.
caudata, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2073 =P. macrourum.
cenchroides, Roem. *8t* Schult. Syst. ii. 499 = P. compressum.
cenchroides, Wight, ex Steud. Syn. PL Gram. 102=P. alopecuros.
chilensis, Desv. in C. Gay, Fl. Chil. vi. 251. t 74.-Chili.
cladodes, Hochst. ex Stead. Syn. PI. Gram. 104=P. glaucifolium.
complanata, Nees, in Bonplandia, iii. (1855) 83 = P. complanatum.
compressa, Brongn. in Dupeir. Voy. Coq. Bot. 103 = P. compressum.

GYMNOTRIX :—
crinita, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 112 = Pennisetum Humboldtianum.
distachya, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 509 = P. tristachyon.
domingensis, Spreng. ex Schult. Mant. ii. 284 = Setaria Ventenatii.
elegans, Buese, in Miq. PI. Jungh. 368.—Java.
geniculata, Schult. Mant. ii. 284 = P. Sieberi.
gigantea, Walp. Ann. iii. 722 = P. giganteum, *A. Rich,*
glabra, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 19, nomen; et ex Steud. Syn. PI. Gram. 104 •= P. glabrum.
glaudfolia, Walp. Ann. iii. 722=P. glaucifolium.
Grisebachiana, Koura. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 508 = P. mexicanum.
hordeiformis, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 276-P. compressum.
hordeoides, Kunth, Rév. Gram. i. 48 — Panicum hordeoides.
humilis, Walp. Ann. iii. 722= P. humile.
japonica, Kunth, Enum. PI. i. 1S8—P. compressum.
latifolia, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 316 - P. Preslii.
latifolia, Schult. Mant. ii. 601 = P. latifolium.
macrostachys, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 104 = P. macrostachyum.
mexicana, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 508 = P. mexicanum.
nemosa, Nees, Agrost. Bras. 277=P. nervosum.
nigricans, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 315 = P. nigricans.
nitens, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 552.—Afr. trop.
nubica, Hochst. in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 133, nomen; et ex Steud. Syn. PI. Gram. 118-Beckera nubica.
paupera, Nees, ex Steud. L c. 102-P. pauperum.
peruviana, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. II. 302 = P. peruvianum.
Preslii, Kunth, Enum. PI. i. 160 = P. Preslii.
purpurascens, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1621) III. 2072 =P. alopecuroides.
purpurascens, Sw. ex Steud. Nom. ed. II. i. 713 = P. compressum.
Quartiniana, Walp. Ann. iii. 723 = P. Quartioianum.
rigida, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 263.—Reg. Argent.
riparia, Walp. Ann. iii. 722 = P. riparium.
riparioides, Walp. 1. c. 723=P. riparioides.
Schimperi, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) L Intell. 19, nomen; et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 381 = P. Schimperi.
sphacelata, Nees, Fl. Afr. Austr. 68.—Afr. austr.
Thouarsii, Steud. Nom. ed. I. 386=seq.
Thuarii, Beauv. Agrost. 60. t. 13 = P. compressum.
tristachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 113 = P. tristachyon.
uniseta, Nees, Fl. Afr. Austr. 66 = P. unisetum.

GYMNOXIS, Steud. Nom. ed. II. i. 620, in syn. (1840) sphalm.=GYMNOPSIS, DC. = Gymnolomia, H. B. & K. (Compos.).

GYMOSTYLES, Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 141, sphalm. = GYMNOSTYLES, Juss. = Soliva, Ruiz *8c* Pav. (Compos.).

GYNACTIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. Ii. 476 (1827)-Glossogyne, Cass. (Compos.).

GYNAECOCEPHALIUM, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 78 (1844) = GYNOCEPHALUM, Blume = Phytoerene, Wall. (Olacin.).

GYNAECOPACHYS, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 115 (1844)-GYNOPACHIS, Blume - Bandia, Linn. (Rubiac).

GYNAECOTROCHUS, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 213 (1844)-=GynotrooheB, Blume (Rhizoph.).

GYNAECURA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 103 (1844) = Gynura, Cass. (Compos.).

GYNAION, A. DC. in DC. Prod. ix. 468 (1846) = Cordia, Linn. (Borag.).
vestitum, A. DC. 1. c = C. vestita.

GYNAMBLOSIS, Torr. in Rep. Marcy Exped. 295 (1853) = Croton, Linn. (Euphorb.).
maritima, Baill. Etud. peń. Euph. 372 = C. ruaritimus.
monanthogyna, Torr. in Rep. Marcy Exped. 295 = C. monanthogynus.

GYNAMPSIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 5 (1836) =Downingia, Torr. (Campanulac).

GYNANDRIRIS, Part. Nuov. Gen. e Sp. 49 (1854)» Iris, Toum.
monophylla, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 578 = 1. Sisyrinchium.
Sisyrinchium, Parl. Nuov. Gen. e Sp. 52 = I. Sisyrinchium.

GYNAIfDROPSIS, DC. Prod. i. 287 (1824). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. 106.
ROEPERIA, F. Muell. in Hook. Kew Toum. ix. (1857) 15.
SINAFISTRUM, Medic. Phil. Bot. i. 108 (1789).
adenocarpa, *Turcz. in Bull, Sac. Nat Mosc.* xxvii. (1854) II. 316.—Ecuador.
affinis, Blume, Bijdr. 51 - pentaphylla.
anrantiaca, *Turc*. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 315.—Venezuela,
brachycarpa, *DC. Prod.* i. 238.—Peruv.
Candelabrum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 468-Cleome Candelabrum.
coccinea, *Benth. PI. Hartv.* 160.—N. Granat.
densiflora, *Benth. I. c*—N. Granat.
denticulata, DC. Prod. L 238 = pentaphylla.
glandulosa, *Presl, Bot. Bemerk.* 8.—Aegypt.
grandiflora, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 314.—Mexic.
heterotricha, DC. Prod. i. 288-pentaphylla.
hispidula, *DC. 1. c.*—Peruv.
macrophylla, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 314.—Venezuela.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral,* i. 91.—Austral.
muricata, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1824) ; ex Schult. f. Syst. vii. 25 =Cleome muricata.
ophitocarpa, DC. in Mem. Soe. Phys. Genev. v. (1882) 144. t. 2 = Cleome muricata.
palmipes, DC. Prod. i. 238 - pentaphylla.
pentaphylla, *DC. 1. c.*—Cosraop. trop.
phoenicea, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 816.—N. Granat.
pulchella, Lindl. in Trans. Hort. Soc vii. (1830) 65 - Cleome pulchella.
sessilifolia, DC. Prod. i. 237 = Cleome sessilifolia.
sinica, Miq. in Joura. Bot. Néerl. i. (1861) 128 = pentaphylla.
speciosa, *DC. Prod.* i. 238.—Mexic.
trichopus, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 64.—Ecuador.
triphylla, DC. Prod. i. 237=pentaphylla.
visdda, Bunge, Mefn. Sav. Étr. Pe*tersb. ii. (1885) 81 = pentaphylla.
viscosa, Walp. Rep. ii. 764, sphalm. pro *Polantii' viscosa* = Cleome graveolens.

GYNANTHISTROPHE, Poit. ex DC. Prod. ii. <2* (1825) = Swartzia, Schreb. (Legumin.).

GYNAPHANES, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 457 (1864)=Epaltes, Cass. (Compos.).
australis, Steetz, 1. c. 458 = E. Cnnninghamii.

GYNAPTEINA, Spach, Hist Ve"g. Phan. vüi. lU (1839) = Heptapleurum, Gaertn. (Araliac.).

GYNASTRUM, Neck. Elem. i. 224 (1790) = Guapira, AnbL (Incert. sed.).

GYNATRIX, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 34 = FIagianthUS, Forst. (Malvac.).
Pulchella, Alef. 1. c 35-P. pulchellus.

GYNEMA, Rafin. Fl. Ludov. 63 (1817)=Fluerie»' Cass. (Compos.).
argentea, Rafin. L c—Am. bor.
balsamica, Rafin. 1. c. = P. camphorata.
dentata, Rafin. ex DC. Prod. v. 452-P. camphoraU.
taroifiora, Rafin. Fl. Ludov. 64.—Am. bor.
viscida, Rafin. Ann. Nat. (1820) 15-Pluchea camphorata.

GYNERIUM, Humb. & Bonpl. Fl. Aeqnin. ii. 112. t. 115 (1809). *GRAM/NEAE*, Benth. & Hook. f. ill. 1178.
argenteum, *Nees, Agrost. Bras.* 462.—Bras,
atacamensc, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 289. —Chili,
jubatum, *Lemoine, ex Carr. in Rev. HorHc.* (1878) 449.—Ecuador,
niodcstura, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 240.— Bras.
Neesii, Meyen, Reise, i. 380, 407 - G . Quila.
parviflornm, *Nees, in Mart. Agrost. Bras.* ii. 463.— Axn. trop.
proeerum, Beauv. Agrost. 164 = saccharoides.
PVRmaeum, *[Nees, in] Meyen, Reise,* i. 484, nomen.— Perav.
Quila, *Nees V Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 153.—Chili,
saccharoides, *Humb. tf Bonpl. PI. Aequin.* ii. 112. t. 115.—Am. anstr.
sagittatum, Beanv. Agrost. 138=saccharoides.
speciosum, [Nees, inj Meyen, Reise, i. 407; et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 158 = argenteum.
'eelandicum, Steud. Syn. Fl. Gram. 198 ~ Arundo conspicua.

GYNESTUM, Poit. in Mém. Mus. Par. ix. (1822) 387- Geonoma, Willd. (Palm.).
acaule, Poit. 1. c 391. t. 20 = Geon. Poiteanana.
bacziliferum, Poit. 1. c. 389. 1.17 = Geon. baculifera.
deversum, Poit. 1. c. 390 = Geon. deversa.
Maximum, Poit 1. c. 388. t. 16 = Geon. maxima.
strictum, Poit. 1. c. 891.t.19 - Geon. pycnostachys.

GYNETERTA, Spreng. Anleit. ii. H. 899 (1818) = GYNHETER1A, Willd. = TeBBaria, Ruiz *Sc* Pav. (Compos.).

CYNETRA, Rafin. Sylva Tellur. 165 (1888) = Tetra- eera, Linn. (Dilleniac).
•»*oluiil,s,* Rafin. 1. c.=T. volubilis.

GYNHETERIA, Willd. in Ges. Natnrf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140 = Tessaria, Ruiz *&.* Pay. (Compos.).
dentata, Spreng. Syst. iii. 482 = T. integrifolia.
tncana, Spreng. Neue Entdeck. ii. 185 ^T. integri- folia.
'alieifolia, Willd. ex Less. Syn. Comp. 208=T. in- tegrifolia.

GYNIZODON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 40 (1886) - „MUtonia, Lindl. (OrchidA
xusselianum, Rafin. 1. c.=M. Russeliana.

GYNOCAMPUS, Lesch. ex DC. Prod. vii. 838 (1889)- Levenhookia, R. Br. (Stylid.).

GYNOCAILDIA, R. Br. in Roxb. PI. Corom. Hi. 95. t. 299 (1819). *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 129. CHAULMoocRA.Roxb. Hort. Ben*. 105 (1814); Fl. „ Ind. iii. 835 (1832).
CHILMORIA, Buch-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. - (1822)500.
«»orata, *R. Br. in Roxb. PI. Corom.* Hi. 95.-Ind. or.

GYNOCEPHALA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 854 (1862), spnalm.=.seq.

GYNOCEPHALIUM, Endl. Gen. 281 (1837), sphalm. -seq.

GYNOCEPHALUM, Blnmei Bijdr. 483 (1825) - Phyto- «ene, Wall. (Oladn.).
bra<*eatum,* Trfcul, in Ann. Sc. Nat Sér. III. viii. .(1847) 149-P. bracteaU.
fganteum, Trfcul, 1. c. - P. gigantea.
"»oniense, Llanos, ex Baill. Adansonia, x. (1872) 282 "=P. luzoniensis.
"ffrophyllum, Blume, Bijdr. 483 = P, macrophylla.
"ttongum, Trécul, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. viii. (1847) . }4» = P.oblonga.
Palmatum, Trrfcul, L c - P . palmata.

°*WpCHTHODES, Blume, Bijdr. 993 (1826) (Gy- nqchtodes). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. f. n. 119. ^onacea, *Blume, I. c*—Java.
macrophylla, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. ii 187) "• 814.—Ins. Andaman.; Malaya,
b Pcaolata *liiq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 648.-MaIaya.

GYNODON, Rafin. Fl. Tellur. ii. 18 (1886) =- Allium, Tourn. (Liliac.).
cernuum, Rafin. 1. c = A. cemuum.
Ellioti, Rafin. 1. c. = A. cemnum ?
rupestre, Rafin. 1. C.-A. paniculatum.

GYNOISA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 75 (1886)=Ipoxnoea, Linn. (Convolv.).
Carolina, Rafin. 1. c. •> I. commntata.

GYNOMPHIS, Rafin. Sylva Tellur. 98 (1838) = Miconia?, Ruiz & Pav. (Melastom.).
argentea, Rafin. 1. c. = M. argentea !

GYNOON, A. Juss. in Mem. Mus. Par. x. (1823) 335; et Enpb. Tent. 17. t. 3 (1824)^Gloehidion, Font. (Euphorb.).
Heyneanum, Wight & Am. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr. 1833) 800 = Gloch. Heyneannm.
hirsutum, Wight, Ic. 1.1909 = Gloch. Moonii.
Jussieuanum, Wight, 1. c. v. II. 29-Gloch. rigidum.
rigidum, A. Juss. Euph. Tent. 107. t. 8 ~ Gloch. rigidum.
tetandrum, D. Dietr. Syn. PI. v. 888, sphalm. = aeq.
triandrum, Wight & Am. in Edinb. N. Phil. Joum. (Apr. 1833) 800-Gloch. rigidum.

GYNOPACHIS. Blume, Cat. Gew. Buitenz. 48 (1823) =Bandia, Linn. (Rubiac).
abnormis, Korth. in Nederl. Kraidk. Arch. ii. II. (1851) 182.—Borneo.
acuminata, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 48.—Java.
attenuata, Korth. in Nedeil. Kraidk. Arch. ii. II. (1851) 182.—Sumatra.
axilliflora, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 221=R. densiflora.
corymbosa, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 48. —Java.
deflectens, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 222.—Sumatra.
oblongata, Miq. 1. c. 221 = R. densiflora.
rufidula, Miq. 1. c.—Sumatra.
tomentosa, Blume, Bijdr. 984.—Java.
Zippeliana, SchefF. in Ann. Jurd. Buitenz. i. (1876) 28. —N. Guin.

GYNOPACHYS, Blume, Bijdr. 983 (1825)-praec.

GTWOPLEUKA, Cav. Ic. iv. 51 (1791). *PASSI- FLOREAE,* Benth. & Hook. f. i. 810.
angusti/olia, Walp. Rep. v. 775, sphalm. = linearifolia.
caeralea, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 46.—Chili,
coronata, *M. Roem. Syn. Pepon.* 211.—Chili.
dilatata, Walp. Rep. ii. 223, sphalm.-humilis.
fasciculata, *M. Roem. Syn. Pepon.* 210.—Chili,
humilis, *M. Roem. 1. c.* 211.—Chili,
linearifolia, *Cav. Ic.* w. 52.—Chili,
paniculate, *M. Roem. Syn. Pepon.* 211.—Chili,
soianoides, *M. Roem. 1. c.*—Chili.
tenuifolia, M. Roem. 1. c. = Malesherbia tenuifolia.
tubulosa, Cav. Ic. iv. 52 = Malesherbia thyrsiflora.

GYNOPOGON, Forst. Char. Gen. 85. t. 18 (1775) = Alyxia, Banks (1810) (Apocyn.).
Alyxia, Forst. f. Prod. 19—A. Gynopogon.
breviflorum, Knrz, For. Fl. Brit Burma, ii. 177.— Burma.
HunteMi, Roxb. Hort. Beng. 19, nomen.—Ins. Penang.
lanceolatum, Knrz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 177 = Hunteria corymbosa.
pugioniformis, A. Cunn. ex Steud. Norn. ed. II. i. 714 = A. ruscifolia.
scandens, Forst. Char. Gen. 36 - A. scandens.
stellatum, Font. 1. c.=A.stellata.

OTNOSTEMMA, Blume, Bijdr. 23 (1825). *CUCUR- B1TACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 839.
ENKYLIA, Griff. PI. Cantor. 26. t. 4 (1837?); et in Joum. As. Soc. Beng. xxiii. (1864) 645.
PESTALOZZIA, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. SI (1846).
Blumri, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 811=pedatum, simplicifolium.
cissoides, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 839=pedatnm.
hederaefohum, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* iii. 916. —Ins. Timor.
integrifolium, *Cogn. 1. c*— Ins. Fhilipp.
laxum, Cogn. I.e. 914-Wightianum.
pedatum, *Blume, Bijdr.* 28.—As. trop.
simplicifolinm, *Blume, 1. c.* 24.—Java.
Wightianum,5«ntA. b* *Hook./. Gen.* i. 839.—Ind. or.; Malaya.

OYNOTBOCHE8, Blume, Bijdr. 218 (1825). *RHI- ZOPHOREAE,* Benlh. & Hook. f. i. 681.
DRYPTOPETALUM, Am. in Ann. Nat. Hist. i. (1838) 872.
GYNAECOTROCHUS, Hassk. Cat. Hort; Boe. Alt. 213 (1844).
axillaris, *Blume, Bijdr.* 219.—Malaya.
Dryptopetalum, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 127 = axillarit.
membranHblia, *Miq. Anal. Bot. Ind.* iii. 7.—Ind. or.
micrantha, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 127.— Malaya.
reticulata, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 607 = axillaris.

GYNOXIS, Reichb. Consp. 106 (1828) = sei.

GYWOXTS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlviii. 455 (1827). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 450.
SCROHICARIA, Cass. in Diet Sc. Nat. xlviii. 456 (1827).
albiftora, *Wedd. Chlor. And.* i. 78.—N.Granat.
alternifolia, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia,
nsterotricha, *Sch. Bip. h c.* 529.—Bolivia,
auriculata, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1861) II. 86.—Peruv.
baccharoides. *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xlviii. 465.—N. Granat; Ecuador.
Berlandieri, DC. Prod. vi. 326-Senecio Berlandieri.
buxifolia, *Cass. in Did. Sc. Nat.* xlviii. 455.— Ecuador.
cordifolia, *Cass. I. c.* 456.—Peruv.
Cummingii, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 106-Senecio calocephalus, *Hemsl.*
fragrans. Hook. Bot. Mag. t. 4511-Senecio Skinneri.
fuliginosa, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xlviii. 455.—N. Granat.
glabrata, Less. Syn. Comp. 390-Senecio Swartzii.
Haenkei, DC. Prod. vi. 826=Senecio kermesinus.
heterophylla, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) II. 85.—Ecuador.
hirsuta, *Wedd. Chlor. And.* I. 79.—N. Granat.
ilicifolia, *Wedd. I. c.* 80, in obs.—N. Granat.
incana, *Less. Syn. Comp.* 390.—Jamaic.
laciniata, Less. 1. c.-Senecio Swartzianus.
laurifolia, *Cass. in Diet. Sc Nat.* xlviii. 455.— Ecuador.
Lindenii, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 76 - baccharoides.
longifolia, *Wedd. I. c.* 79.—Peruv.
lucida, Less. Syn. Comp. 390 = Senecio lucidus.
Mandonii, *Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 80.—Bolivia.
Moritziana, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i.* 79.— Venezuela.
Oerstedii, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 107.—Am. centr.
pcndula, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* i. 78.—N. Granat.
Poeppigii, *DC. Prod.* vi. 826.—Peruv.
prenanthifolin, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 207.—Perav.
pulchella, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xlviii. 455.— Ecuador.
repanda, *Wedd. Chlor. And. i.* 77.—Bolivia,
scabra, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 121.—Ecuador.
Sindairi, *Benth. I. c.* 120.—N. Granat.
verrucosa, *Wedd. Chlor. And.* i. 77.—N. Granat.
violacea, *Sch. Bip. ex Wedd. I. c*—Venezuela.

GYTSTXTRA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 391 (1825). *COMPOSITAE,* Benth. *St.* Hook. f. ii. 445.
CRASSOCEPHALOM, Moench, Meth. 516 (1794), nomen prins.
CREMOCEPHALUM, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiv. 390 (1825).
GYNAECURA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 103 (1844).
affinis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 201 = >armentosa.
amplexicaulis, *Oliver tf Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 403.—Afr. trop.
angulosa, *DC. Prod.* vi. 298.—Ind. or.; Burma.
angulosa, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1888) 822- bicolor.
aurantiaca, Benth. in Hook. Niger Fl. 437 =vitellina.
aurantiaca, *DC. Prod.* vi. 300.—Java.

GYNURA :—
aurantiaca, Sch. Bip. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 99 = densiflora.
nurienlaU, *Cats. Opusc. Phyt.* iii. 100.—China,
tricolor, *DC. Prod.* vi. 299.—Malaya.
bulbosa, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 194 = anriculata.
carnosula, *Zoll.* b* *Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Netrl. Indie,* ii. (1845) 265.—Java,
cernua, *Benth. in Book. Niger Ft.* 437.—Afr. trop.
crepidioides, *Benth. 1. c.* 438.—Afr.-trap,
densiflora, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 99.—Java,
densifolia, *Miq. I. c.*—Java,
dichotoma, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1861) i. 202.—Java,
divaricate, *DC. Prod.* vi. 301.—China.
diversi/olia, Sch. Bjp. ex Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 156 « crepidioides.
dnbia, *Cass. in Did. Sc. Nat.* xxxiv. 392.—Ind. or.
ecalyculata, DC. Prod. vi. 298 -Emilia sonchifolia.
Finlajrsoniana, DC. 1. c. 299=sarmentosa.
foetens, DC. 1. c. 300=nepalensis.
flabrata. Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 385-anriculata.
haematophylla. *DC. Prod.* vi. 299.—Hab.?
hispida, Thw. Enum. PI. Zeyi 166-G. Psendo-China.
Lobbiana, *Turcz. in Bull. Soe. Nat. Mosc.* xxiv. (1861) I. 202.—Java.
lycopersicitolia, *DC. Prod.* vi. 800.—Ind. or.
lyrata, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. Ind. Archip.* 124, 127.—Java.
mierocephala, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 828-crepidioides.
miniata, *Wel-m. Apont.* 686.—Afr. trop.
mollis, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 124, 127.—Java.
nepalensis, *DC. Prod.* vi. 300.—Reg. Himal.; Burma,
nittda, *DC. in Wight, Contrib.* 24; *et Prod,* vi 299.—Ind. or.
nudicaulis, Am. in Nov. Act. Nat Cur. xviii. (18*6) 851 - G. Pseudo-China.
ovalis, DC. Prod. vi. 300=auriculata.
pinnatifida, *DC. I. e.* 801.—China.
polycephala, Benth. in Hook. Niger Fl. 437 = crepidioides.
Pseudo-China, Benth. Fl. Hongk. 189 = auricnlata.
Pseudo-China, *DC. Prod.* vi. 299.—As. trop.; Austral.
purpurascens, DC. 1. c.-bicdlor?
sagittaria, *DC. 1. c.* 301.—Ind. or.
sarcobasis, *DC. 1. c.* 800.—Madag.
sarmentosa, *DC. I. c.* 298.—Malaya.
scabra, Turcz. in Boll. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 201=sarmentosa.
simplex, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 130 = nitida, angulosa.
sinuata, DC. Prod. vi. 801=G. Pseudo-China,
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl-* 536.—Sumatra,
vitellina, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 438.—Afr. trop.
Walked, Wight, Ic. t. 1122-Notonia Walkeri.
Zollingeriana, *Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 126, nomen.—Java.

OYPOTHAMNIUM, Phil. Fl. Atac. 27. t. 3 (1860). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 486.
pinifolinm, *Phil. I. c*—Chili.

GYPSOCALLIS, Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 898 (1821)-Erica, Tourn.
Actaea, G. Don, Gen. Syst. iii. 802 « E. peltata.
aeutangula, G. Don, 1. c. = E. nigrita.
articularis, G. Don, 1. c. 803 = E. articularis.
Bedfordiana, G. Don, 1. c. = E. turgida.
raesia, G. Don, 1. c. = E. imbricata.
carnea, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 168—E. carnea.
cistifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 804 = E. cistifolia.
concava, G. Don, 1. c 802=E. bicolor.
diotaeflora, G. Don, 1. c. 808 - E . diotaeflora.
dumosa, G. Don, 1. c. 802 = E. dmnosa.
eriocephala, Benth. in DC. Prod. vii. 617, .in syn. sphalm. = E. villosa.
exprompta, G. Don, Gen. Syst. iii. 804=Simocheilus depressns.
fexilis, G. Don, 1. c. 801 - E . racemosa.
flexuosa, G. Don, 1. c. 808 — E. imbricata.
fragrans, G. Don, 1. c. = E. fragrant.
hispida, G. Don, L c. 801-E. racemosa.
horiwontalis, G. Don, 1. c. =E. cumoliflora.
imbricata, G. Don, L c. 802 - E . imbricata.

GYPSOCALLIS :—
intertexta, G. Don, Gen. Syst. iii. 803=Erica empetrifolia.
lanata, G. Don, 1. c. 801=E. Janata.
lasciva, G. Don, 1. c. 808 = E. laseiva.
leucanthera, G. Don, 1. c. 801 = E. leucanthera.
Loddigesii, G. Don, 1. c. 803 = E. bicolor.
longipedunculata, G. Don, 1. c—E. dumosa.
lyrigera, G. Don, 1. c. 804 = E. nigrita.
manipuliflora, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 153=E. verticillata.
mediterranea, D. Don, 1. c -=E. mediterranea.
melanthera, G. Don, Gen.-Syst iii. 802-E. melanthera.
microstoma, G. Don, 1. c. 801=E. nudiflora.
multiflora, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 158=E. multiflora.
nigricans, G. Don, Gen. Syst. iii. 802=E. nigrita.
nigrita, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1884) 158 = E. nigrita.
nudiflora, C Don, L c = E . nudiflora.
paniculata, G. Don, Gen. Syst. iii. 803 = £. paniculate.
patens, G. Don, 1. c. 802 - E . patens.
peltata, G. Don, 1. c 808 = E. peltata.
pilosa, G. Don, 1. c. 801 = E. villosa.
Pohlmannii, G. Don, 1. c. 803 = E. Lachnaea.
procumbens, G. Don, 1. c. 801 = E. procumbens.
purpurascens, D. Don, in 'Edinb, N. Phil. Jonrn. xvii. (1834) 153 =-E. mediterranea.
Rastellum, G. Don, Gen. Syst. iii. 801 - E. penicilliflora.
rostella, G. Don, 1. c. 803 - E . penicilliflora.
squamaeflora, G. Don, 1. c. = E. imbricata.
staminea, G. Don, 1. c-802 = E. staminea.
stylosa, G. Don, 1. c. 803 -= E. imbricate.
thalictrifiora, G. Don, 1. c. 802 =E. staminea.
tiaraeflora, G. Don, 1. C.-E. tiaraeflora.
umbellata, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. xvii. (1834) 158 - E . umbellata.
vagans, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 398 =»E. vagans.
villosa, G. Don, Gen. Syst. iii. 802-E. villosa.

GYPSOPHILA, Linn. Diss. Chen. 41 (1751); Amoen. Acad. iii. 28 (1756). *CARYOPHYLLEAE,* Benth. & Hook. f. i. 146.
ACOSMIA, Benth. in Wall. Cat. n. 644 (1828 ?).
ANKVROPETALUM, Fenzl, in Bot.Zeit. i. (1843) 398.
BANFFVA, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 386 (1816).
DICHOGLOTTIS, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 25 (1835).
GYPSOPHYTUM, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789).
HETEROCHROA, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 181 (1880).
KATARSIS, Medic. Malv. Ill (1787).
LAHARIA, Adans. Fam. ii. 256 (1763).
PETRORHAGIA, Link, Handb. ii. 235 (1881).
PSAMMOPHILA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 845.
ROKEJEKA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 90 (1775).
TIMAEOSIA, Klolzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 138. t. 33(1862).
acerosa, *Boiss. Fl. Orient,* i. 658.—Afghan.
acDtifolia, *Fisch. Cat. Hort. Gorerik.* (1812) 59.—Reg. Caucas.
acutifolia, *Stev. ex Spreng. Nov. Prov.* 21.—Rossia anstr.
adenophora, *Boiss. (f Buhse, in Nouv. Mint. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 35.—Persia.
adscendens, *Jacq. Hort. Vindob.* ii. 65.1.138.—Oriens.
aggregata, linn. Sp. PI. 406—Arenaria tetraquetra.
agrestis, Pen. Syn. i. 492=muralis.
alpestris, Jord. & Fonrr. Brev. Fl. Nov. fasc. i. 9 •= repens.
alpina, Habl. in J. G. Gmel. It. iv. 178 - Tunica stricta.
alsinoides, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga,* i. II. (1847)179.—Persia; Beluchist.
altissima, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 319-acutiflora.
altissima, *Linn. Sp. PI.* 407.—Sibir.
altissima, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 280 = Arrostii.
anatolica, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 57.—As. Min.
aiborea, *Medic. Beobacht.* (1783) 160.—Hab. t
arenaria, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. i. 40. t. 41 = fastigiata.
arenicola, Duf. in Bull. Soe. Bot Fr. vii. (1860) 240 - Tunica Saxifraga.

GrYPSOFHTIiA:-
aretioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 9.—Persia.
armerioides, Set. in DC. Prod. i. 358-Tunica Sibthorpii.
Arrostii, *Guss. PI. Rar.* 160.—Europ. austr.; As. Min.
arvensis, Borckh. ex Steud. Nom. ed. I. 386=mnralis.
ascendens, *Medic. Beobacht.* (1783) 165.—Hab. ?
asperula, Duf. ex Nym. Consp. 100=Tunica Saxifraga.
atropurpurea, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. L viii. 68" frankenioides.
Aucheri, *Boiss. 1. c.* i. 12.—As. Min.; Syria.
australis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 112 = tubulosa.
bellidifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 11.—Arab.; Beluchist.
Boissieri, *Vis. in Mem. 1st. Venet.* xv. (1870) 16.—As. Min.
brachypetela, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ii. (1873) 471.—Armenia.
Bungeana, *D. Dietr. Syn. PI.* ii. 1542.—Sibir. altaic.
campestris, *Pall. Reise,* iii. 682 ; *ex Ledeb. Fl. Ross,* i-300 (Quid«).—Rossia.
capitate, *Bieb. fl. Tauc. Cauc.* i. 321.—Reg. Caucas.
capitata, Ledeb. Fl. Ross. i. 800=globulosa.
capituliflora, *Ruhr. Serf. Tiansch.* 40.—As. med.
cappadodca, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 26* sphaerocephaUT.
caricifolia, *Boiss. 1. c.* Ser. I. i. 14.—Persia,
cerastoides, *D. Don, Prod. Fl. Net.* 213.—Reg. Himal.
callina, Stev. ex Ser. in DC. Prod. i. 352 - fastigiata.
compressa, Desf. Fl. Allant i. 343. L 97=Tunica compressa.
compressa, Nym. Consp. 100=Tunica graminea.
cordifolia, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient, i. 646 = ruscifofia.
cretica, Griseb. Spicil. Fl. Rnmel. i. 184= Tunica illyrica.
cretica, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 280 - Tunica cretica.
curvifolia, *Fend, Pugill. PL Nov. Syr.* 10.—As. Min.
dahurica, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. i. 715" Gmelini.
damascena, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 57.—Syria; Persia,
davurica, *Turcz. ex Fentl, in Ledeb. Fl. Ross.* i. 294.—Sibir. baicaL
desertorum, *Fentl, in Ledeb. Ft. Ross.* i. 292.—Sibir. altaic.
dianthoides, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 280 " Tunica dianthoides.
dichotoma, Bess. Prim. Fl. Gal. i. 872=Gmelini.
diffusa, Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1839) 146=elegans.
dioeca, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 178.—Reg-Argent.
dubia, *Willd. Enum. Hort. Suppl.* 28.—Hungar.
effusa, Tausch, in Flora, xiii. (1830) I. 244 = paniculate,
elate, *Wender. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 715, nomen.—Hab.?
elegans, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. i.* 319.—As. Min.
erectiuscula, Jord. & Fonrr. Brer. PI. Nov. fasc i. 9 * repens.
erinacea, *Boiss. Fl. Orient,* i. 557.—Afghanist.
eriocalyx, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 18.—As. Min.
eubonensis, Sibth. & Boiss. Fl. Orient, i. 518 = Tunic* Saxifraga.
fasciculata, *Margot V Reut. in Mim. Soc. PW' Geniv.* viii. (1839) 281. t. 1.—Graecia.
fastigiata, *Linn. Si. PI.* 407.—Europ.
fastigiata, Willk. Ic. PI. Hisp. i. 84=hispanica.
filiformis, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 199; *et » Linnaea,* xiv. (1840) 569.—Europ.
filipes, Bien, ex Boiss. Fl. Orient i. 544 - G. Rokejeka,
floribunda, *Tun*, ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 775.—Pe«i»-Soongar.
frankenioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 10.—As. Min- > Syria.
fruticulosa, *Boiss. Fl. Orient, i.* 566.—As. Min.
Gasparrini, *Guss. Fl. Sic. Syn.* i. 474.—Sicil.
glandulosa, *Walp. Rep.* ii. 774; *Boiss. Diagn.* Ser. 1-viii. 59, in obs.—Reg. Caucas.
glanca, *Stev. ex Ser. in DC. Prod.* i. 353.—R* Caucas.
globulosa, *Stev. in Flora,* xv. (1832) II. *Beibl.* 34.—Caucas.

OTPSOPHHiA :—
glomerate, Adams, in Web. & Mohr, Beitr. i. 54 « capitata.'
glomerata, *Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 821.—Tauria.
Cmelini, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* ii. 128.—Sibir. altaic.
graminea, Sibth. & Sm. Fl. Graec, Prod. i. 279 = Tunica graminea.
grandiflora, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 874.—Hab. ?
Haynaldiana, Janka, ex Nym. Consp. 100 = Tunica illyrica.
hirnita, *Spreng. Syst.* ii. 373.—Graec.; Syria; Arab,
hispanica, *Willk. in Flora,* xxxv. (1852) 539 ; *et Iber. Halb.* 110.—Hispan.
hispida, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 11.—Cappadoc.
Honigbergeri, *Boiss. FL Orient,* i. 568.—Afghan.
illyrica, Nym. Syll. 287-Tunica illyrica.
illyrica, Sibth. & Sm. FL Grace. Prod. i. 281 = Tunica Sibthorpii.
imbricata, *Rupr. FL Cauc.* 176.—Reg. Caucas.
intricata, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sir. VI. xv. (1888) 288.—Turkestan.
Jaligua, Walp. Rep. ii. 776, sphalm.-saligna.
latifolia, *Fisch. ex Stetid. Norn.* ed. II. i. 715, nomen. —Sibir.
lepidioides, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 14.—Cappadoc.
Ubanotica, *Boiss. L c.* 12.—As. Min.; Syria.
Hnearifolia, *Boiss. Fl. Orient,* i. 650.—As. Min.; Reg. Casp.
melampoda, *Bien. ex Boiss. 1. c.* 561.—Persia.
Meyeri, *Rupr. Fl. Cauc.* 178.—Reg. Caucas.
microphylla, *Fen»l, in Ledeb. Fl. Ross.* i. 291.—Soongar.
minuartioides, *Boiss. fl. Orient,* i. 558.—As. Min.
montana, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 501.—Ins. Socotr.; Arab.
multicautis, Poir. Encyc. Suppl. ii. 876=Tunica Saxifraga.
mnralis. *Linn. Sp. PI.* 408.—Europ.; As. bor.
"»na, *Bory* &" *Chaub. Now. Fl. Pilop.* 26.—Graec.
nebulosa, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 68 = Arrostii.
"'•ellata, Sibth. *Sc* Sm. FL Graec. Brad. i. 281 = hirsuta.
ochroleuca, Sibth. 8c Sm. 1. c.= Tunica ochroleuca.
Oldhamiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 187. —Japon.
olympica. *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 65.—As. Min.
ortegioides, *Boiss. Fl. Orient,* i. 552.—As. Min.
pachygona, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1548 = Tunica pachygonn.
Paniculata, *Linn. Sp. PL* 407.—Europ.; As. bor.
Panriflora, Moench, Meth. 60 = paniculata.
Patrini, Ser. in DC. Prod. i. 358 = Gmelini.
PTfoliata, DC. Prod. i. 352 = trichotoma.
Perfoliata, *Linn. Sp. PL* 408.—Hispan.
Permixta, Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 120 = Tunica Saxifraga.
P'traea, Kenzl, in Ledeb. Fl. Ron. i. 291 = Bungeana.
Petraea, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 801 - transsyl-, vanica.
P|cta, *Boiss. Fl. Orient, i.* 654.—Armenia.
P'lnlifera, *Boiss.* &" *Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 56.—Lycia.
Polydada, *Fenal, ex Boiss. Fl. Orient,* i. 542.—Persia.
Porngens, *Boiss. 1. c.* 657.—As. Min.; Persia.
Prostrata, All. Fl. Pedem. ii. 78=repens.
Prostrata, Boeber, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 261 = Gmelini.
P'ortrata, *Linn. Sp. PL* 1196.—As. Med.
Pubescens, *G. Don, Gen. Syst. i.* 383.—Italia.
P"">escens, *Ledeb. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 715, nomen. --Sibir.
P-lposa, Gilib. Fl. Lituan. ii. 158 = fastigiata.
Pvrpurea, Gilib. 1. c. 154 -muralis.
ra<*nosissima,* Fisch. *Sc* Mey. ex Boiss. Fl. Orient, İ. 5&0 = Szovitsii.
r'pens, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. S18 = Steveni.
"Pens, *Linn. Sp. PL*407.— Europ.; As. bor.
*Tel***culata,* Hochst. in Lorent, Wanderungen, 341 - ."wcifolia.
£«**„ Unn. Sp. PI. 408-Tunica Saxifraga.
K<*ejefca. *Delile, Fl. Egypte,* 281. t. 29. f. 1.—Aegypt.; Mesopot.
V*****. Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 293-Gmelini.
ucicfo}U, *Boiss. Diagn.* Sa_L ,,, 12.—As. Min.; f«sia.
"Aauda, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PL Nov. Fate. i. 9-'epens.
ia*«/<wa,Stev. ex Ser. in DC. Prod. i. 352=trichotoma.

GYP8OPHILA:—
saligna, *Schrad. in Linnaea,* x. (1836) *Litt.* 110.—Europ.
Saxifraga, Linn. Syst. ed. X. 1028=Tunica Saxifraga.
scabra, Schult. ex Steud. Norn. ed. I. 888; ed. II. i. 716 = Tunica Saxifraga.
seariosa, Tausch, in Flora, xiv. (1831) I. 218-altissima.
scormonerifolia. Sec in DC. Prod. L 352-perfoliata.
Scovitsii, Walp. Rep. ii. 774, sphalm. - Szovitsii.
sedifolia, *Kurm, in Flora,* lv. (1872) 285.—Reg. Himal.
serotina, Hayne, in Dreves *Be* Hayne, Bot. Bild. t. 162; et ex Willd. Enutn. Hort. Berol. 464 - muralis.
serpylloides, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 59.—As. Min.
silenoides, *Rupr. Fl. Cauc.* 182, in textu.—Reg. Caucas.
somalensis, Franch. in Rèvoil, Comali, 14=montana.
spathulaefolia, *Fentl, in Ledeb. Fl. Ross.* i. 290.—Reg. Casp.
spergulaefotia, Boiss. Fl. Orient, i. 659 -Boissieri.
spergulifolia, *Griseb. SpiciL Fl. Rumel.* i. 183.—Europ. austr.
sphaerocephala, *Fentl, ex Tchihat. Asie Min. Bot.* i. 205.—As. Min.
squarrosa, Tausch, in Flora, xiv. (1831) I. 214-acutifolia, *Fisch.*
Steveni, *Bess. Cat. Hort. Crem.* (1816) 64; *ex Link, Enutn. Hort. Berol.* L 417.—Reg. Transcauc.
Steveni, *Fisch. ex Schrant, PL Rar. Hort. Monac.* t. 32.—Reg. Caucas.
Steveni, Hohen. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 296 = acutifolia, *Fisch.*
Stewartii, *Thorns, ex Edgew. V Hook. f. in Fl. Brit. Jnd.* i. 216.—Afghan.
stricta, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 129 = Tunica stricta.
Struthium, Asso, Syn. Stirp. Arag. 62 = hispanica.
Struthium, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 295 = fastigiata.
Strothium, *Linn. Syst.* ed. X. 1028.—Hispan.
Struthium, Pall. Reise, ii. 676-Gmelini.
subcapitata, Rupr. Fl. Cauc. 177-tennifolla.
Szovitsii, *Fisch.* &• *Mey. ex Fensl, in Ledeb. Fl. Ross.* i. 289,—Reg. Caucas.
tatarica, Gueldenst. Reise, ii. 205 » paniculata.
tcnella, *Poir. Encyc Suppl.* ii. 874.—Hab. 1
tenuifolia, *Biebl. Fl. Taur. Cauc.* i. 319.—Reg. Caucas.
thesiifolia, Ser. in DC. Prod. i. 354 = Gmelini.
thessala, Nym. Syll. 238 -= Tunica thessala.
thymi/olia, Sibth. 8c Sm. Fl. Graec. Prod. i. 282 = hirsuta.
tibetica, Hook. f. *Sc* Thorns, ex Edgew. *Sc* Hook. f. in Fl. Brit. Ind. L 217=sedifolia.
tomentosa, Linn. Cent. PL i. 11-perfoliata.
transsylvanica, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 179.—Transylv.
trichopoda, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 18 = linearifolia.
trichotoma, *Wender. Ind. Sem. Hort. Marb.* (1835); *ex Linnaea,* xi. (1887) *Litt.* 92.—Reg. Caucas.; Turlcest.
triquetra, Ledeb. Fl. Rosa. i. 293-Gmelini.
tubulosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 11.—As. Min. (Austtal. inqnilin.).
uralensis,*Less, in Linnaea,'n.* (1834) 172.—Sibir.ural.
Vaccaria, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. i. 279 = Saponaria Vaccaria.
velutina, D. Dietr. Syn. PL ii. 1542 -Tunica velutina.
venusta, *Fenml, Pugill. PL Nov. Syr.* 9.—Syria,
violacea, *Fentl, in Ledeb. Fl. Ross.* i. 291.—Mancbur.
virgata, *Jioiss. Diagn.* Ser. L i. 18.—Persia,
viscosa, *Murr. in Comm. Gotting.* (1783) 9. t. 3.—Syria.
Wiedemanni, *Boiss. Fl. Orient, i.* 541.—Galatia.

GYPSOPHYLA, a Juss. ex Juss. Gen. p. lxviii (1789; - praec.

GYPSOPHYTUM, Adans, Fam. ii. 256 (1763) - Arenarlat, Rupp. (Caryophyll.).

GYPSOPHYTUM, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789) = Gypso-pWU, Linn. (Caryophyll.).

GYPTIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 189 ; et in Diet. Sc. Nat. xx. 177 (1821)-Eupatorium, Linn. (Compos.).
iaccharoides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 868-Symphyopappus viacosus.

GYPTIS:—
Commersonii, Cass. in Diet. Sc. Nat. xx. 178 = Eupatorium Bacleanum.
oblongifolia, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 338-E. oblongifolium.
peucedanifolia, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 315 = E. ceratophyllum.
pinnatifida, Cass. in Diet. Sc. Nat. xx. 178 - E. erodiifolium.

GYRANDRA, Griseb. in DC. Prod. ix. 44 (1845)-Erythraea. Rich. (Gentian.).
chironioides, Griseb. 1. c. = E. macrantha.
chironioides, Griseb. in Seem. Bot. Voy. Herald, 818-E. madrensis.
speciosa, Benth. Bot. Voy. Sulph. 127. t. 45 - E. tenuifolia.

GYRANDRA, Moq. in DC. Prod. xiii. u. 40 (1849)-Tersonia, Moq. (Phytolac.).

GYRANDRA, Wall. Cat. n. 8020 (1847 ?) - Daphnlphyllum, Blume (Enphorb.).
laurina, Wall. 1. c. = D. laurinum.

GYRENIA, Knowles *Sc* Westc. ex Loud. Hort Brit. Suppl. ii. 639 (1839)=Milla, Cav. (Liliac.).
biflora, Knowles *Sc* Westc. ex Loud. 1. c. = M. biflora.

OTBINOPS, Gaertn. Fruct. ii. 276. t. 140 (1791). *THYMELAEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 200.
LACHNOLEPIS, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. i. 132 (186!)).
Wal\a, *Gaertn. I. c*—Zeylan.

GYTtlNOPSIS, Decne. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xix. (1843) 41. t. 1. *THYMELAEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 200.
Cumingiana, *Decne. 1. c.*—Ins. Philipp.

GYROCARPU8, Jacq. Select Am. 282.1.178 (1763). *COMBRETACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 689.
aeuminatus, Meissn. in DC Prod. xv. I. 248 = americanus.
americanus, *Jacq. Select. Am.* 282.—Cosmop. trop.
asiaticus, Willd. Sp. PI. iv. 982 - americanus.
Jacquini, Gaertn. Fruct. ii. 92 = americanus.
lobatus, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 64 = americanus.
pendulus, Blanco, 1. e. 65 = Engelhardtia spicata.
rugosus, R. Br. Prod. 405= americanus.
sphenopterus, R. Br. L c = americanus.

GYROCEPHALIUM, Reichb. Norn. 67 (1841). GYNOCEPHALUM, Blume-Phytocrene, Wall. (Olacin.).

GYROMIA, Nutt. Gen. Am. 1. 238 (1818)=Medeola, Linn. (Liliac.).
virginïca, Nutt. 1. c. = M. virginica.

GYROSTACHIS.Pers. Syn. Ii. 611 (1807) - Spiranthes, Rich. (1818) (Orchid.).
aestivalis, Dum. Fl. Belg. 134 = S. aestivalis.
amoena, Blnme, Orch. Archip. Ind. 129—S. australis.
auitralis, Blume, 1. c. 128-â. australis.
autumnalis, Dum. Fl. Belg. 134 = S. autumnalis.
pusilla, Blume, Orch. Archip. Ind. 181=S. pusilla.

OTROSTEIiMA, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 302 (1885). *ASCLEP/ADEAE.*
oxypetaloides, *Foum. 1. c.*—Bras.

GYBOSTEMON.Desf. in *Wim.* Mus. Par. vi. (1820) 16. t 6. *PHYTOLACCACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 86.
CYCLOTHECA, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 37 (1849).
acaciaeformis, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 439 -Codonocarpus cotinlfolia.
angusti/olius, Schnitzl. Ic. Fam. Nat. iii. t. 208-Tersonia brevipes.
attenuates. Hook. Bot. Misc. i. (1830) 243-Codonocarpus australis.
£/anori,Llano3,Fragm.74—Phyllanthusphilippinensis.
brachystigma, *F. Muell. ex Benth. FL Austral,* v. 146. —Anstral.
brevipes. Hook, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. SO, 40-Tersonia brevipes.
cotinifolius, Desf. in Mém. Mus. Par. viii. (1822) 118 —Codonocarpos cotinifolia.

GYBOSTEMON :—
Cyclotheca, *Benth. Fl. Austral,* v. 146.—Austral.
pungens, Lindl. in Mitch. Three Exped. Anstral. ii. 121 -Codonocarpns cotinifolia.
pyramidalis, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 4SS =• Codonocarpns pyramidalis.
ramnlosus, *Desf. in Mém. Mus. Par.* vi. (1820) 17 t. 6.—Austral.
ramulosus, Lehm. PI. Prriss. i. 248»Tersoniabrevipes.
ramulosus, Schlccht. in Linnaea, xx. (1847) 632 = G. Cyclotheca.

GYROSTEPHIUM, Tarcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) n.76 = Chthonooephalus, Steetz (Compos.).
rhitocephalum, Turcz. 1. c. 77-C. pygmaeus.

GYBOTAENTA, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 174. *URTICACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 384.
cephalantha, Wedd. in DC. Prod. xvi. 1.195,in syn.= trinervata.
myriocarpa, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 174.—Cuba.
spicata, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 99.—Jamaica,
trinervata, *Wedd. I. c.* 100.—Ins. S. Doming.

GYROTHECA, Salisb. in Trans. Hoit. Soc. i. (1812) S27 = Lachnanthes, £11. (1817) (Haemodorac).
tinctoria, Salisb. 1. c. = L. tinctoria.

GYTONANTHUS, Rafin. in Ann. *Gin* Sc. Phys. vi. (1820) 88-Fatrinia, Juss. (Valerian.).

H

IIAAGEA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 125 ; et in Abh. Acad. Berl. (1855) 103. t. 9 C = Begonia, Linn.
dipetala, Klotzsch, 11. cc. 125; 104 » B. malabarica.

HA ASIA, Nees, Syst. Lanrin. 872 (1836)-=Dehaasia. Blume (Lanrin.).
barneensis, Meissn. in DC. Prod. xv. 1.61.—Borneo.
caesia, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 931 = D. caesia.
cuneata, Nees, Syst. Laurin. 878 = D.' cuneata.
cyrtopoda, Miq. PI. Jungh. 177.—Java.
elongata, Nees, Syst. Lanrin. 377 = D. elongata.
firma, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.928 = D. firma.
incrassata, Nees, Syst. Laurin. 376 = D. microcarpa *1*
media, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 920, in syn. = Beilschmiedia Madang.
media, Nees, Syst. Laurin. 875 = D. media.
microcarpa, Nees, 1. c. 873 ««D. microcarpa.
nitida, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 61 (Alseodaphnidis sp.).—Borneo.
oppositifolia, Meissn. 1. c.=Beilschmiedia oppositifolia.
paradoxa, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 9S1 = D. paradoxa.
pauciflora, Miq. 1. c. = D. pauciflora.
peduncularis, Nees, Syst. Lanrin. 376 (Alseodaphnidis sp.).—Ind. or.
peduncularis, Teijsm. & Binn. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 920-Beilschmiedia Madang.
spectabilis, Miq. 1. c 930.—Sumatra.
squarrosa, Miq. 1. c. 929 =• D. squarrosa.
subcaesia, Miq. 1. c Suppl. 361.—Sumatra.
undulata, Teijsm. & Binn. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 920 = Beilschmiedia undulata.
Wightii, Nees. Syst. Laurin. 676 = Beilschmiedia Wightii.

HAASLUNDIA, Schom. & Thonn. Beskr. Gnin. PI. 15 (1827)-Hoslundia, Vahl (Labiat.).

HAASTIA, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 155 (1864). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 284.
Loganii, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* xiv. (1882) 850.-N. Zel.
pulvinaris, *Hook./. Handb. N. Zeal. Fl.* 156.—N. Zel.
recurva, *Hook.f. I. c.—N.* Zel.
Sindaiiii, *Hook./. I. c.—N. Zel*

HABENABIA, Willd. Sp. PI. iv. 44 (1805). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 624.
ATE, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 326 (1835).
BARLAEA, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 54.
BENTHAMIA, A. Rich, in Mem. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 87.
BlCCHIA, Parl. Fl. Ital. iii. 396 (1868).
BILABRELLA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 (1834).
BLEPHARIGLOTIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 38 (1838).
BONATEA, Willd. Sp. PI. iv. 43 (1805).
CENTROCHILUS, J. C. Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 435. t. 13.
CHOERADOPLECTRON, J. C. Schau. 1. c. 436.1.18 C (1843).
COELOGLOSSUM, Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. I. 829 (1820).
CONOPSIDIUM, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 147.
DEROEMERIA, Reichb. f. Poll. Orch. Comm. 29 (1852).
DIGOMPHOTIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 37 (1886).
DIFLECTRADEN, Rafin. 1. c. 90 (1836).
DISSORHYNCHIUM, J. C. Schau. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 434. t. 13.
ENTATICUS, S. F. Gray, Nat Air. Brit. PI. ii. 198 (1821).
GALEAEIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 39 (1836).
GENNARIA, Parl. Fl. Ital. iii. 404 (1858).
GYMNADENIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 191 (1813).
LEUCORCHIS, E. H. F. Mey. Preuss. Pfl. Gatt. 50 (1839).
LINDBLOMIA, Fries, in Lindbl. Bot Notiser (1843) 134.
LYSIAS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 288.
MACROCENTRUM, Phil. Serf. Mendoc. ii. 42 (1871).
MECOSA, Blume, Bijdr. 403. t. 1 (1825).
MITOSTIGMA, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. ii. 189 (1856).
MONTOLIVAEA, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 107 (1881).
NEMURANTHES, Rafin. Fl. Tellur. ii. 61 (1836).
NEOTINEA, Reichb. f. Poll. Orch. Comm. 29 (1852).
NIGRITELLA, Rich, in Mem. Mus. Par. iv. (1818) 48.
PECTEILIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 37 (1886).
PERISTYLUS, Blume, Bijdr. 404. t. 30 (1825).
PERULARIA, Lindl. Bot. Reg. sub 1.1701 (1834).
PLATANTHERA, Rich, in Mem. Mus. Par. iv. (1818) 48.
PONERORCHIS, Reichb. f. in Linnaea, xxv. (1852) 227.
ROEPAROCHARIS, Reichb. f. Otia'Bot. Hamb. 104 (1881).
SIEBERIA, Spreng. Anlcit. ii. 282 (1817).
SYNMERIA, Nimmo, in J. Grah. Cat. PI. Bomb. (pag. ult absque numero) (1839).
TINEA, Bivona, in Giorn. Sc. Sicil. (1833) 149.
TULOTIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 37 (1836).
abortiens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 306.—Peruv.
achnantha, *Reichb./. in Linnaea,* xxii. (1849) 812.—Am. trop.
acuifera. *Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 325.—Ind. or.; China.
acuminata, *Thw. ex Trim. Cat. PL Ceyl.* 81.—Zeylan.
aestivalis, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 268.—Bras.
affinis, D. Don, Prod. Fl. Nep. 25 =goodyeroides.
affinis, *Wight, Ic.* t 1707.—Ind. or.
alata, *Hook. Exot. Fl.* t. 169.— Ind. occ.
albida, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 193.—Europ.; As. bor.
Allemanii, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 254.—Bras.
alta, *Ridl. in Joum. Linn. Soc.* xxi. (1885) 509.—Madag.
Amphorchis.Spteng.SysU iii.689 = Cynorchissquamosa.
Anaphysema, *Reichb./. in Flora,* L (1867) 101.—Afr. trop.
anaplectron, *Reichb./.* b* *Warm, in Otia Bot. Hamb.* 81.—Bras.
angulosa, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 268.—Bras,
angustifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 330.—N. Granat
anisoptera, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 101.—Afr. trop.
antennifera, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xiv. (1840) 268.—Abyssin.
aphylla, *R. Br. Prod.* 312, in adnot—Arab,
aphylla, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 158.—Bras,
arachnoides, *Thou. Fl. lies Afr. Austr.* t. 18.—Madag.
araneifiora, Rodrig. Orch. Nov. i. 162 = anaplectron.
aranifera, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 313.—Reg. Argent.

HABENABIA :—
arenaria, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 317.—Afr. austr.
aristata, *Trim. Cat. PI. Ceyl.* 91.—Zeylan.
aristulifera, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1855) 218.—Ins. Philipp.
armata, *Reichb./. 1. c.* ii. (1854) 10.—N. Granat
armaiissima, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* US.—Afr. trop.
arnhemica, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, vi. 395 = graminea.
arvensis, Rodrig. Orch. Nov. i. 163 = hexaptera.
attenuata, *Hoot. /. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 221.—Afr. trop.
autumnalis, *Poepp.* b" *Endl. Nov. Gen. et Sp.* i. 44. - Peruv.
barbata, *Wight, in Wall. Cat.* n. 7034.—Ind. or.
bicornis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 309.—Cuba.
bidentata, Poepp. exSteud. Non. ed. II. i.716-alata.
biflora, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 151.—Bras,
bifolia, *R. Br. in Ait. Hort. Kern.* ed. II. v. 193.—Europ.
bimaculata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1886) 506.—Madag.
Blephariglottis, *Hook. Exot. Fl.* t 87.—Am. bor.
boliviano *Reichb./. in Bonplandia,* iii. (1855J 218.—Bolivia.
Boltoni, *Hani. Thes. Cap.* 1. 65.—Afr. austr.
Bonatea, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 101, in obs.—Afr. austr.
Uongensium, *Reichb./. I. c.* 58.—Afr. trop.
borealis, Cham, in Linnaea, iii. (1828) 28 = dilatata.
brachyceras, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1861) I. .»—Chili.
brachyceras, Spreng. Syst. iii. 692=seq.
brachyceratitis, *Willd. Sp. PI.* iv. 44.—Jamaic.
brachyphylla, *Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 188.—Afghan.
bracteata, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 192-viridis.
bracteosa, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* >» 292.—Abyssin.
bractescens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 308.—Reg-Argent.
brevidens, *Lindl. I. c.* 814.—Bras,
brevifolia, *Greene, in Coult. Bot. Gat.* vi. (1881) 218.—Am. bor.
breviloba, *Trim. Cat. PI. Ceyl.* 91.—Zeylan.
Candida, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 262 =» subpubens.
caraujensis, *Dale. I. c*—Ind. or.
carinata,„S>an. *in Linnaea,* xv. (1841)478.—Ins.Timor-
cassidea, *Reichb. /. in Walp. Ann.* i. 797.—Afr. austr.
cataphysema, *Reichb. /. in Flora,* 1. (1867) 101.—A«-trop.
Cephalotes, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 322.—Ind. or.
ceratopetala, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. »»• (1840) 267.—Abyssin.
chirensis, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 99.—Afr. trop.
chlorantha, Bab. in Trans. Linn. Soc xvii. (1836) «* = bifolia.
chlorantha, *Spreng. Syst.* iii. 691.—Ins. Mascar.
chlorantha, Turcz. in Bull. Soc. Nat Most xxvii. (1854) II. 86-=viridiflora.
chlorina, *Par.* to" *Reichb. /. in Trans. Linn. Soc.* ***• (1874) 140.—Burma.
chloroleuca, Ridl. in Joum. Bot. xxiii. (1885) 219-bifolia.
chlorotica, *Reichb. /. in Flora,* xlviii. (1865) 178.—Afr. trop.
Chorisiana, *Cham, in Linnaea,* iii. (1828) SI.—Unalaschk.
Chusua, Benth. in Joura. Linn. Soc. xviii. (1881) »59 =Orchis Chusua.
ciliaris, *J?. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 194.—A"1-bor.
ciliosa, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (1840) 314.—Afr. austr.
cirrhata,ff«VAA./ IK *Flora,* xlviii. (1865) 180.—M«**
citrina, *Thou. Orch. Isles Afr. Austr.* t 16.—W"' Boibon.
clavata, *Reichb. /. in Flora,* xlviii. (1865) *w»-"* Afr. austr.
clavellata, Spreng. Syst. iii. 689=tridentata.
clypeata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 811.—Mexic.
commelinifolia, *Wall, ex Lindl. 1. c.* 325.—Ind. or.
conopsea, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. P 800) 354.—Europ.; As. Dor.

HABENARIA:—
conopsea, *Reichb. /. in Bonplandia,* ii. (1854) 10.—N. Granat.
Cooperi, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 276.—Am. bor. occ.
coidata, *R. Br. Prod.* 312—Europ.; Am. bor.
cornuta, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (18S6) 208.—Afr. austr.
corauta, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 478.—Ins. Timor.
corydophora, *Reichb./. I. c.* xli. (1877) SO.—Peruv.
corymbosa, *Par. b*[1] *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (18741 141.—Burma.
crassicomis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 31L—Mexic.
crassifolia, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xv. 11841) 72.—Ind. or.
crinifera, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 823.—Ind. or.
cristata, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 194.—Am. bor.
crocea, *Rafin. Atl. Journ.* 119.—Am. bor.
crocea, *Schweinf. ex Reichb. f. in Otia Bot. Hamb.* 67.—Afr. trop.
crucifera, *Reichb. f. V Warm. I. c.* 80.—Bras,
cryptophila, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 164.—Bras,
cryptpstyla, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 50.—In*. Tani.
cubitalis, *R. Br. Prod.* 312, in adnot.—Ind. or.
cucullata, *Hoefft. Cat. PI. Koursk.* 56; *ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 66.—Europ.
culicina, *Reichb. f. b*[1] *Warm, in Otia Bot. Hamb.* 79.—Bras.
cultellifolia, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 155.—Bras,
cultrata, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 297.—Abyssin.
curvilabra, Rodrig. Orch. Nov. i. 162 - leptoceras.
cyclochila. *Franch. tf Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 616.—Japon.
debilis, *Hook. /. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 221.—Afr. trop.
decaptera, *Reichb. f. in Flora,* lxv. (1882) 581.—Afr. trop.
decipiens, *Wight, Ic.* v. I. 14.—Ind. or.
"ecorala, *Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss,* ii. 294.—Abyssin.
densa, *Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 326.—Reg. Himal.
densiflora, *Reichb. f. in Walp. Ann.* i. 797.-Afr. austr.
densiflora, Schnr, Enum. PI. Trams. 645=transsilvanica.
denticulata, *Reichb./. in Linnaea,* xix. (1847) 376.—Ind. or.
depanperata, *Kraenttl. in Bremen, Abh.* vii. (1882) 259.—Madag.
dichopctala, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 309.—Zeylan.
d'ffusa, *A. Rich. If Gal. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. iii. (1845) 28.—Guatemala,
digitata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 807.—Ind. or.
dilatata, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* ed. V. 500.—Am. bor.
dilatata, Hook. Exot. Fl. t. 95 = hyperborea.
dilatata, S. Wats, in Bot. King's Kxped. 340 = leucostachys.
diphylla. *Dal*, in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 262.—Ind. or.
disoides, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 611. -Madag.
"jatans, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 270.—Cuba,
distantiflora, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* I. 291.—Abyssin.
O'^es, *Reichb. /. in Flora,* 1. (1867) 117.—Afr. austr.
dolichosceras, Rodrig. Orch. Nov. i. 168 = bractescens.
dolichostachya, *Thv,7. Enum. PI. Zeyl* S09.-Zeylan.
Dregeana, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (184U) 814. i "~Afr- austr.
Regans, *Boland. Cat. PI. St. Franc.* 29; *ex S. Wats.* »« *Bot. Calif,* ii. 188.—Calif.
BUiottii, Beck, Bot N. & M. St. 348=integra.
e'uptica, *Wight, Ic.* t. 1706.—Ind. or.
"ongata, *R. Br. Prod.* 318.—Anstral.
<*dothrix, *Miq. in Journ. Bot. Nterl.* i. (1861) 92.-China.
ensifolia, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 821 - pectinata.
entomantha, *Lindl. 1. c.* 311.—Mexic.
epipactid ; * S . > . ;» *Flora,* 1. (1867) 100.-Afr. trop.
ePiphylla, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 7?--Brasetrellensis, *Reichb. f. in Linnaea,* xxiu (1849) 813.—Am. trop.

HABENARIA:—
exaltata, *Rodrig. Orch. Nov. i.* 166.—Bras.
/ald/ormis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xix. (18S2) 340-tetrapetala.
falcigera, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 100.—Ins. Philipp.
filicomis, *Lindl. Gen. et Sp. Orth.* 318.—Afr. trop.
filiformis, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxl. (1885) 604.-Madag.
fimbriata, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 193.—Am. bor.
fimbriata, *Wight, Ic.* 1.1712.—Ind. or.
fissa, *R. Br. Prod.* 812, in adnot.—Am. bor.
flava, R. Br. 1. c. =herbiola.
flexuosa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 311.—Mexic.
flexuosa, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 180.—Bras,
floribunda, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 816.—Peruv.
foetida, S. Wats, in Bot. King's Exped. 341 = Herminium congestnm.
foliosa, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 180.—Afr. austr.
foliosa, A. Rica, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. xv. (1841) 71-digitata.
fornicata, Bab. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1836) 463 = bifolia.
fnrcifera, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 319.—Reg. Himal.
gabonensis, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1862) 984.—Afr. trop.
galeandra, *Benth. Fl. Hongk.* 368.—Ind. or.; China.
Uarberi, *Porter, in Coult. Bot. GOB.* V. (1880) 136.—Am. bor.
geniculata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 25.—Reg. Himal.; Burma.
Gerardiana, Lindl. in Wall. Cat. n. 7031 = pectinata.
Germainii, *Phil, in Linnaea,* xxix. (1857-58) 46.—Chili.
Gerrardi, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 97 = tridens.
Ghiesbreghtiana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 805.—Mexic.
gigantea, D. Don, Prod. Fl. Nep. 24 = Susannae.
glabra, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xv. (1841) 75 = Heyneana.
glaucophylla, Rodrig. Orch. Nov. L 160=°epiphylla.
Gnoma, *Rodrig. 1. c.* ii. 250.—Bras.
Godefroyi, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 38.—Camboj.
goodyeroides, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 25.—Ind. or. j Malaya.
goodyeroides, Hook. Bot. Mag. t. 3397 - Wightii.
Gourlieana, *Gill, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 809.—Chili.
gracilis, *Colebr. in Hook. Exot. Fl.* 1.185.—Ind. or.
gracilis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 312.—Bras.
gracilis, Reichb. f. ia Flora, xlviii. (1865) 180 = longecalcarata.
gracilis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 276.—Am. bor.
graciliscapa, Rodrig. Orch. Nov. i. 156=brevidens.
graininea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 818.—Ind. or.
graminea, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 251 = muricata, *Vidal.*
graminea, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sir. II. xv. (1841) 78-viridiflora.
graminea, *Spreng. Syst.* iii. 690.—Madag. fins. Mascar.
grandiflora, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7082.—Ind. or.
grandiflora, *Torr. ex Beck, Bot. N.* &" *M. St.* 849.—Am. bor.
grandis, *Benth. ex Ridl. in H. O. Forbes, Wand. Nat.* 519.—Ins. Timor.
Guillemini, *Reichb. f. in Linnaea,* xix. (1847) 876.—Bras.
Guingangae, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 179.—Afr. trop.
hamata, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 162.—Bras.
hamigera, Grift, in Calc. Journ. Nat Hist. iv. (1844) 380. t. 20^fnrcifera.
helleborina, *Nichols. Diet. Gard.* ii. 107.—Afr. trop.
helodes, *Reichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 818.—Am. trop.
Henscheniana, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 167.—Bras,
heptadactyla, *Reichb. / in Linnaea,* xxii. (1849) 812.—Guian.
herbiola, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 193.—Am. bor.
hexaptera, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 816.—Bras.
Heyneana, *Lindl. I. c.* 320.—Ind. or.
Hildebrandtii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 503.—Madag.
Hilscnbergii, *Ridl. 1. c.* 609.—Madag.

HABENARIA:—
hircina, *Reichb. f. in Flora,* 1. (1867) 100.—Afr. trop.
hirtella, *Spreng. Syst.* iii. 690.—Jamaic.
hispida, Spreng. f. Tent. Suppl. 27 = Holothrix parvifolia.
Hookeri, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 286=seq.
Hookeriana, *Torr. ex A. Gray, in Ann. Lye. N. York,* iii. (1836) 229.—Am. bor.
huillensis, *Reichb./. in Flora,* xlviii. (1865) 179.—Afr. trop.
Humblotii, *Reichb. /. I. c.* lxviii. (1885) 535.—Ins. Connor,
humiliór, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 100.—Abyssin.
huronensis, Spreng. Syst. iii. 688 = hyperborea.
hydrophila, *Rodrig. Orch. Nov. i.* 158.—Bras,
hyperborea, *A. Br. in Aft. Hort. Kew.* ed. II. v. 193.—Europ.; Am. bor.
ichnenmonea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 313.—Afr. trop.
imbricata, *Lindl. 1. c.*—Bras,
imerinensis, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 505.—Madag.
incarnata, *Lyall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 328.—Madag.
incisa, *Spreng. Syst.* iii. 692.—Am. bor.
intacta, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 354.—Europ.; Afr. bor.
integra, *Spreng. Syst.* iii. 689.—Am. bor.
intermedia, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 24.—Reg. Himal.
japonica, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-59) 410.—Japon.
Jerdoniana, Wight, Ic. t. 1715=diphylla.
lohannensis, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 251.—Bras,
josephensis, *Rodrig. I. c.* 257.—Bras.
Kelskei, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 207.—Japon.
Kilimanjarò *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 119.—Afr. trop.
lacera, *R. Br. Prod.* 812.—Am. bor.
lacertifera, *Benth. Fl. Hongk.* 862.—Ind. or.; China.
laciniata, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 261 *m* digitata.
lactiflora, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. iii. (1845) 28.-Mexic.
laevigata, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (1840) 315.—Afr. austr.
lancifolia, *A. Rich, in Mlm. Soc. Hist. Nat. Par.* iv. (1828) 19.—Ins. Maurit.
latifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 381.—N. Granat.
latifolia, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 321 - Lindleyana, *Steud.*
laxiflora, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* i. 46.—Peruv.
Leprieuri, *Reichb. f. in Linnaea,* xix. (1847) 376.—Guian.
leptoceras, *Hook. Bot. Mag.* t. 2726.—Bras,
leptoloba, *Benth. Fl. Hongk.* 862.—China,
leucophaea, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* ed. V. 602.—Am. bor.
leucosantha, *Rodrig. Orch. Nov.* 1.161.—Bras,
leucostachys, *S. Wats, in Bot. Calif,* ii. 184.—Am. bor. occ.
limosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 805.—Mexic.
Lindeni, *Lindl. Orch. Linden.* 25.—Venezuela.
Lindleyana, *Steud. Norn.* ed. IL i. 717.—Malaya.
Lindleyana, *Wight, Ic.* t. 922.—Travancor.
linearifolia, Maxim. Prim. Fl. Amur. 269 = sagittifcra.
Linguella, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 826 = acuifcra.
linguicruris, *Reichb. /. in Bonplandia,* ii. (1854) 10.—N. Granat.
linifolia, *Presl, Rel. Haenk.* i. 91.—Peruv.
Lobbii, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 60.—Ind. or.
longebractcata, *Hochst. ex Seub. Fl. Ator.* 25.—Ins. Azor.
longecalcarata, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xv. (184r 71. t. 8.—Ind. or.
longicauda, *Hook. Bot. Mag.* t. 2957.—Guiana.
longicorniculata, J. Grah. Cat. PL Bomb. 202 - longecalcarata.
longicornis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 322, sphalm.—seg.
longicomu, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7027.—Ind. or.
longifolia, *Buch.-Ham. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 324.—Reg. Himal.

TTAtnSKATtJA .•_
lucida, *Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **319.—Burma.**
luUa, Benth. in Journ. linn. Soc. xviii. (1881) 854 = Perrottetiana.
macilenta, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 180.—Guiana,
macrandra, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* **vi. (1862)** 189.—Afr. trop.
macrantha, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **ii.** 294.—Abyssin.
macroceras, Spreng. Syst. iii. 692—seq.
macroceratilis, *Willd. Sp. PI.* iv. 44.—Costa Rica,
macrophylla, *Goldie, in Breast. Edinb. Phit. Journ.* vi. (1822) 831—Am. bor.
macrostachya, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 807.—Ind. or.
maculosa, *Lindl. 1. c.* 809.—Am. trop.
malacophylla, *Reichb. /. O*a Bot. Hamb.* 97.—Afr. anstr.
Mannii. *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* **vii. (1864) 222.** —Afr. trop.
margaritacea, *Linden, in Illustr. Hortic.* xxix. (1882) 52, nomen.—N. Granat.
marginata, *Colebr. in Hook. Exot. Fl.* t. 186.—Ind. or.
martialis, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 99.—Afr. trop.
mascarenensis, *Spreng. Syst.* iii. 690.—Ins. Masear.
maxillaris, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* **i. (1884) 6.—** Am. trop.
Mechowii, *Reichb./. in Flora,* lxv. (1883) 632.—Afr. trop.
megaceras, Rodrig. Orch. Nov. i. 161-obtasa.
MelvUii, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 170.—Bras,
membranacea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 313.—Afr. trop.
mesodactyla, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 644.—Ind. ore.
mcxicana, *Linden, in Illustr. Hortic.* **xxix. (1882) 52,** nomen.—Mexic.
Michaeli, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* **i. IV. (1885)** 281.—Am. bor. occ.
Michauxii, *Nutt. Gen. Am.* ii. 189.—Am. bor.
micrantha, *Hochst. ex Smb. Fl. Awor.* 25.—Ins. Azor.
micrantha, Reichb. f. in Flora, xlviii. (.1865) 180-arenaria.
micrantha, Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 302-cubitalis.
microceras, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* **vii (1864)** 221.—Afr. trop.
microstylina, *Reichb. /. Xenia Orch.* iii. 17.—Bolivia.
Miereiana, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* **vii.** (1855) 37.—Hongkong.
Milnei, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* **96.—Afr. anstr.**
minutiflora, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 603.—Madag.
misera, *Ridl. 1. e.*—Madag.
modesta, *Dal*, in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 262.—Ind. or.
modestissima, *Reichb./. in Linnaea,* xxii. (1849) 811.—Am. trop.
montana, A. Rich, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 73 = longicornn.
montana, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 154.—Bras.
montana, Wight, Ic t. 1714, partim—decipiens.
montevidensis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 314.—Urug.
montevidensis, *Spreng. Syst.* iii. 692.—Urng.
mnricata, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 255.—Bras,
nraricata, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* **80, 82, 83,** 161.—Ins. Philipp.
mutica, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 477.—Ins. Timor.
mystacina, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 812.—Bras,
nasuta, *Reichb./. (f Warm, in Otia Bot. Hamb.* **80.—** Bras.
natalensis, *Reichb./. 1. c. 97.*—Afr. austr.
nemorosa, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 160.—Bras,
neuropetala, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **ii. 207.** —Japon.
nigra, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* **ed. II. v. 192.—** Europ.
nivea, *Spreng. Syst.* iii. **689.—**Am. bor.
novemfida, *Lindl. in Benth. PI. Hartw.* **94.—Gnatemala.**
Novo-Ebudamm, *F. Muell. Phyt. New Heir.* **22.—** N. Hebr.
nuda, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **312.—Bras,**
nutani, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 507.—Madag.
nyikana, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 100.—Afr. trop.

HABENAEIA :-

obsoleta, *Spreng. Syst.* iii. 689.—Am. bor.
obtusa, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **315.—Bras,**
obtusata, *Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ.* **760.** —Am. bor.
occultans, *Welw. ex Reichb. /. in Flora,* **xlviii. (1865)** 178.—Afr. trop.
ochrolenca, *R. Br. Prod.* 313.—Austral,
odontopetala, *Reichb. f. in Linnaea,* xviii. (1844) 407.—Mexic.
odoratissima, *Franch. Fl. Cher-et-Loire,* 578.—Europ.
Oerstedii, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1856) 213.—Nicaragua,
orangana, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* **101.—Afr.** austr.
orbiculata, Hook. Exot. Fl. t. 145 = Hookeriana.
ornithoides, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 162.—Bras.
ornithopoda, Reichb. f. in Linnaea, xx. (1847) 696= laevigata.
ovalifolia, *Wight, Ic.* t. 1708.—Ind. or.
Paivaeana, *Reichb./. Xenia Orch.* iii. 17.—Bolivia,
palndosa, *Lindl. in Journ. Linn. Sdc.* **vi. (1862) 189.** —Afr. occ.
paludosa, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 178-Protearum.
saludosa, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 153.—Bras,
papillosa, *Ridl. in Journ. Linn. Sec.* xxi. (1885) 504.—Madag.
paranaënsis, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 219.—Bras,
parvidens, *Lindl. Gen. et Sp. Orch-* 317—Pernv.
parviflora, *Lindl. 1. c.* 314.—Bras,
pauciflora, *Reichb./. in Bonplandia,* ii. (1854) 10, sub n. 3.—Bras.
pauciflora, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 157.—Bras,
paucifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 310.—Chili,
pectinata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 24.—Reg. Himal.
pedicellaris, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 100.—Abyss,
pedicellate, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 276.—Am. bor. occ.
pelorioides,*Par. (f Reichb./. in Trans.Linn. Soc.* **xxx.** (1874) 139.—Burma.
peltastes, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 99.—Afr. trop.
pentadactyla, *Lindl. Gen. et Sp.* Orch. 307.—Reg. Argent,
peramoena, *A. Gray, Bot. N. U. St.* ed. V. 503.—Am. bor.
perbella, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* **98.—Abyss,**
peristyloides, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xiv. (1840) 270.—Abyss.
peristyloides, Wight, Ic. v. 13. t. 1702 - stenostachya.
Perrottetiana, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xv. (1841) 74.—Ind. or.
petalodes, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 316.—Bras,
petromedusa, *Webb, in Hook. Niger Fl.* 180.—Ins. Cap. Virid.
physoplectra, *Reichb. /. in Linnaea,* xlii. (1877) 17.—N. Hebrid.
picnostachia, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 250.—Bras.
Pinguicula, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 355.—China.
plantaginea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 323.—Ind. or.
Platanthera, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 55.—Urag.
platyanthera, *Reichb. /. 1. c.* xxii. (1849) 860.—Abyss,
platyphylla, *Spreng. Syst.* iii. 690.—Ind. or.
plectomaniaca, *Reichb. /. V S. Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 136.—Afr. trop.
pleistadenia, *Reichb. /. in Journ. Linn. Soc.* **xxi.** (1885) 404.—Afr. trop.
polypodantha, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* **97.—Afr. austr.**
ponerostachys, *Reichb. /. in Bonplandia,* iii. (1855) 213.—Ins. Philipp.
praealta, *Spreng. Syst.* iii. 691.—Ins. Borbon.
pratensis, *Reichb. /. in Linnaea,* xxii. (1849) 813.—Bras.
procera, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 318.—Afr. trop.
promensis, Lindl. in Wall. Cat. n. 7088 = marginata.
propinquior, Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. 53 - xanthantha.
Protearum, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* **57.—Bras.**
Pseudostylites, *Reichb./.* to[1] *Warm. I. c.* 79.—Bias.
psychodes, Spreng. Syst. iii. 693=fissa I
psycodes, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 602 = fissai
pterocarpa, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 309.—Zeylan.
pnbescens, *Lindl. Gen. etSp. Orch.* 322.—Reg. Himal.
pnmila, *Poepp. Fragm. Syn.* 21.—Chili.

HABEMABIA :—

purpurea, *Thou. Orch. Isles Austr. Afr.* **t. 17.—Madag.**
pusilla, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* **83.—Cocbinch.**
pyramidalis, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. xv. (1845) 386=strictissima.
quadrata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **816.—Bras.**
Quartiniana, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xiv. (1840) 271.-Abys».
racemosa, *Rafin. Ann. Nat.* 16.—Am. bor.
radiata, *Spreng. Syst.* iii. 693.—Japon.
rariflora, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xv. (1841) 70.—Ind. or.
reflexa, *Blume, Bijdr.* 403.—Java.
Reichenbachiana, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 159.—Bras,
repens, *Nutt. Gen. Am.* ii. 190.—Am. bor.
replicata, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **ii. 298.** —Abyss.
replicata, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 250.—Cuba,
retusa, *Riddell, Suppl. Cat. Ohio PI.* **17.—Am. bor.**
retusa, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 253.—Bras,
rhodocheila, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. v. (1856) 243.—China.
rhynchocarpa, *Trim. Cat. PI. Ceyl.* 91.—Zeylan.
Richardiana, *Wight, Ic.* t. 1713.—Ind. or.
robusta, N. E. Br. in Gard. Chron. (1885) II. 307 = H. Bonatea.
robusta, *Welw. ex Reichb./. in Flora,* **1. (1867) 102.—** Afr. trop.
rodeiensis, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 256.—Bras,
rostellifera, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.*34.—Cochinch.
rostrata, *Wall, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **325.—** Burma.
rotundifolia, Lindl. Gen. et. Sp. Orch. 306 = grandiflora, *Lindl.*
rotundifolia, *Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ-*750 ; *Spreng. Syst.* iii. 692.—Am. bor.
Rumphii, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 320.—Ins. Amboina.
ropestris, *Poepp. Endl. Nov. Gen. et Sp.* **i. 45.—** Peruv.
rupicola, Rodrig. in Rev. Engenh. iii. (1881) 144" xnontantv
Rutenbergiana, *Kraenti. in Bremen, Abh.* vii. (1882) 258.—Madag.
sagittifera, *Reichb. /. in Bot. Zeit.* iii. (1845) **884.—** Japon; Manchur.
salaccensis, *Blume, Bijdr.* 403. t. 13.—Malaya,
santensis, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 253.—Bras.
Sartor, *Lindl. in Hook. Land. Journ. Bot.* **ii. (18«)** 662.—Bras.
Saundersiae, *Ham. Thes. Cap.* ii. 29.—Afr. austr.
sceptrodes, *Reichb. /. in Bonplandia,* iv. (1856) 210. - Hab. J
Schimperiana, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* »• 295.—Abyss.
Schischmareffiana, Cham, in Linnaea, iii. (1828) 29 « Herminium congestum.
Schiaochilus, J. Grah. Cat. PI. Bomb. 252 = crinifera-
Schomburgkii, *Lindl. ex Benth. in Hook. Lo**-Journ. Bot.* ii. (1843) 673.—Guiana.
Scbwackii, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 254.—Bras.
Schweinfurthii, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 58.—Abyss-
secunda, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **307.—Bras,**
secundiflora, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 252.—Bras,
setacea, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* **312.—Bras,**
seticanda, *Lindl. ex Benth. in Hook. Land. Jon**-*Bot.* ii. (1848) 673.—Guiana,
setifera, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. (1838) **381.-** Mexic.
Sieboldiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **fl.** —Japon.
Sigillum, *Thou. Orch. Afr.* t. 20.—Ins. Manrit.
simense, *Reichb./. in Linnaea,* xxii.(1849) 859-trop.
simillima, *Reichb./. Xenia Orch.* iii. 18.—Bolivia,
simplex, *Kraenti. in Bremen, Abh.* vii. (1882) 2«-**—Madag.**
sochensis, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 100.—Afr. trop.
socotrana, *Balf./. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* **xii. (**96.—Ins. Socotra.
sparsiflora, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* **xii.** 276.—Am. bor. occ.
spathacea, *A. Rich, (f Gal. in Ann. Sc. Nat.* **Ser. W** iii. (1845) 29.—Mexic.
spathulata, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* **xviii. (1881)** 355.—Reg. Himal.
spatulaefolia. *Par. If Reichb. /. in Trans. Linn-* xxx. (1874) 140.—Burma.

HABENABIA:—
speciosa, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* i. 44.—Perav.
spectabilis, Sprang. SysL iii. 689= Orchis spectabilis.
spiralia, *A. Rich, in Mém. Sot. Hist. Nat. Par.* iv. (1828) 21.—Ins. Borbon.
spinlii, *Trim. Cat. PI. Ceyl.* 91.—Ind. or.; Zeylan.
Splranthes, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1866) 178.—Afr. trap.
Spiranthes, *Reichb. f. (f Warm, in Otia Bot. Hamb.* 81.—Bras.
1auKhiU,Lindl. in Journ. Linn. Set. vi. (1862) 139.—Afr. trap,
stenodon, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 17.—N.Hebrid.
ttenopetala, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 319.—Keg. Himal.
stenopetala, lindl. 1. c S24=rhynchocarpa.
stenostachya, *Benth. Fl. Hongk.* 362.—Ind. or.; China.
Stendneri, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 101.—Nubia,
stricta, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 510.—Madag.
strictissima,^«VA4./. *in Linnaea, xviii.* (1844) 407.-Mexic.
stylites, *Reichb. f.* &• 5. *Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 136.—Afr. trop.
suaveolens, *Dal*, in Hook. Km Journ.* ii. (1850) 263.—Ind. or.
subecalcarata, *Rodrig. Orch. Nov. i.* 159.—Bras,
subpabens, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Sir. II. xv. (1841) 75.—Ind. or.
snperflua, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 298.—Ins. Fiji.
supervacanea, *Reichb. f. in Seem. I. c.—lns.* Fiji.
•Snsannae, *R. Br. Prod.* 312; *Blume, Bijdr.* 402.—Ind. or.; Malaya; China.
Sutteri, Reichb. f. in Linnaea, xxv. (1852) 229-diphylla.
tahitensis, *Nadeaud, Enum. PI. Tahiti,* 38.—Ins. Tahiti,
tenerrima, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 5O5.-Madag.
tentaculata, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 34.—Burma,
tentaculigera, *Reichb. f. in Flora,* 1. (1867) 191.—Afr. trop.
tawior, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1885) H. 807.—Afr. anstr.
t'nuis. Griff, in Calc. Joura. Nat. Hist. iv. (1844) 879 • viridiflora, *R. Br.*
•ernatea, *Reichb. f. in Linnaea,* xli. (1877) 50.—Ins. Teraate.
t'tramera. Bolus, in Town. Linn. Soc. xix. (1882) 840-tetrapetala.
tetnpeuU. £«•<**./. *in Flora,* xlviii. (1865) 180.-Afr. austr.
thomana, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 97.—Afr. trop.
Ihomsuni, *Reichb. f. in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885)
Tl ___.^ G E k *in Proc. Am. Acad.* vii. (1868)389. —Arizona,
tunorensis, *Ridl. in Forbes, Nat. Wand. East. Archxp.* 519.—Ins. Timor.
t'Pnlifera, *Par.* &• *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 139.—Ind. or.
ti pnBdes, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881,
to^nWla.SS!/';, *Flora,* lxviii. (1885) 536.-Ins. Comor.
tradttcantifolia, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 293.-Ins.

tfanssilvanica, *Schur, Enum. PI. Transs.* 645.—Transsylv.
WAocems, *Rodrig. Orch. Nov.* ii. 256.-Bras.
wchosantha. *Wall. Cat.* n. 7O28.-Burma.
neuspis, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* h. 2*9.—Cuba.
^JactyU, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. M T. Abyssin.
•"dacryUtes, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 818—Ins. v,anar.
****&, *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 2O8.-Af,. austr.
!ri«ntata, *Hm>k_ E*°t-* R- «• 81.-Am.bor.
tnhda, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp. u* 830.-N. uranat.
WUora, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 25.-Reg- Himal.
(„7"ff"«. Wight, Ic. t. 1701-digitata.
«nptera, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 814.-Meac.

HABENABIA :-
truncata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 311.—Madag.
uliginosa, *Reichb. f. in Linnaea,* xxii. (1849) 812.—Bras.
umbraticola, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 156.—Bras.
unalaschensis, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 277 = Herminium congestom.
uniflora, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 344-rariflora.
uniflora, D. Don, Prod. Fl. Nep. 25=triflora I
uniflora, Griff". Ic. PI. Asiat. t. 388. f. 2 - Diplomeris pulchella.
vaginata, *A. Rich, in Ann. Sc. Nat.* Set. II. xiv. (1840) 269.—Abyssin.
Vaupellii, *Reichb. f. V Warm, in Otia Bot. Hamb.* 79.—Bras,
vesiculosa, *A. Rich, in Mim. Soc. Hist. Nat. Par.* iv. (1828) 19.—Ins. Borbon.
vidua, *Par. V Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 140.—Burma.
virescens, Spreng. Syst. iii. 688=herbiola.
viridiflora, *R. Br. Prod.* 312, in adnet.—Ind. or.
viridiflora, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 478.—Ins. Timor,
viridis, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. IL v. 192.—Europ.; Am. bor.
viridis, Cham, in Linnaea, iii. (1828) 31-bracteata.
vulcanica, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 306.—Mexic.
Walleri, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 98.—Afr. trop.
Warmingii, *Reichb. f. V Warm. 1. c.* 80.—Bras.
Welwitschii, *Reichb. f. in Flora,* xlviii. (1865) 179.-Afr. trop.
Wightii, *Trim. Cat. PI. Ceyl.* 91.—Ind. or.
xanthantha, *F. Muell. Fragm.* vii. 16 Austral.
zambesina, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 96.—Afr. trop.
Zollingeri, *Reichb. f. in Bonplandia,* v. (1857) 35.—Java.

TTABKRTYEA, Frivald. in Magyar Tnd. Tars. Evkbn. ii. (1835) 249. t. 1. *GESNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1025.
Heldreichii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 141-Ramondia Heldreichii.
rhodopensis, *Frivald. in Magyar Tud. Tars. Evkou.* ii. (1835) 249.—Graecia.

HABERLEA, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. n. 841 (lb7«) = Eupatorium, Toum. (Compos.).
afinis, Pohl, ex Baker, 1. c. 843 » £. klcinioides.
dentata, Pohl, ex Baker, 1. c » E. kleinioide-i.
divaricata, Pohl, ex Baker, 1. c. 344 » E. urticae-folium.
pinnata, Pohl, ex Baker, 1. c. 199 - Lomatozona artemisifolia.
sptrguloides, Pohl, ex Baker, I. c. 341 •= E. capillare.

HABERLIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818) -Odina, Roxb. (Anacard.).
grandis, Dennst. 1. c » O. Wodier.

HABERSHAMIA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825)-Herpe6tia, Gaertn. f. (Scrophul.).
cuneifolia, Rafin. 1. c —H. Monnieria.

HABLANTHERA, Hochst. in Bot. Zeit. ii. (1844) 853 - HAPLANTHERA, Hochst. -- Buttya, Harv. (Acanth.).

HABLITZIA, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc v. (1817) 24. *CHENOPODIA CEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 49.
tamnoides, *Bieb. I. c*—Reg. Caucas.

HABLITZLIA, Reichb. Mom. 164 (1841)-praec.

HABLIZIA, Spreng. Syst. i. 824 (1825)=praec.

HABLIZLIA, Fritz. Ic. Ind. ii. 139 (1865)-praec.

HABBACAMTHU8, Nees, in DC. Prod. xi. 312 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1106.
haematodes, Nees, 1. c = Glookeria haematodes.
sanguineus, *Nees, t. c.*—Mexic.
sylvaticus, *Nees, I. c*—Mexic

HABRANTHUS, Herb, in Bot. Mag. t. 2464 (1824) ; et in Bot. Reg. I. 1346 (1830) = HlppeaBtrum, Herb. (AmarylL).
advenus, Herb, in Bot. Mag. sub t. 2685 — Hipp. advennm.
Andersoni, Herb, ex Lindl. BoL Reg. t. 1345 = Zephyranthes Andersoniana.
andicola, Herb. Amaryll. 168.—Chili.
angustus, Herb, in Bot. Mag. t. 2639 = Hipp, bifidum.
Bagnoldi, Herb, in Bot. Reg. t. 1396 =Hipp. Bagnoldi.
Bagnoldianus, Herb. Amaryll. 162—praec.
Berterii, M. Roem. Syn. Ensat. *Wl-robustum.*
Berteroanus, PhiL in Linnaea, xxix. (1857-58) 66 - Hipp. Berteroanum.
bifidus, Herb, in Bot Mag. t. 2597 = Hipp, bifidum.
Boothianus, Herb. Amaryll. 424 = Zephyranthes gracilifolius.
cearensis, Herb, in Bot. Mag. sub t. 3779.—Bras.
chilensis, Herb. Amaryll. 163 —Hipp, chilense.
concolor, Lindl. in Proc. Hort Soc. (1838) 8 = Zephyranthes concolor.
flavus, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 66.—Chili.
fulgens, Hook. f. Bot Mag. t. 6563.—Hab. t *Gilliesianus,* M. Roem.Syn. Ensat. 98 = Hipp. Bngnoldi.
glabioloides, Hieron. in Bol. Acad. Nac Córdova, iv, (1881) 70.—Reg. Argent.
gracilifolius, Herb, in Bot. Mag. t. 2464 « Zephyranthes gracilifolia.
hesperius, Herb. Amaryll. 161 = Hipp, advenum.
intermedius, Herb. 1. c. 160-Hipp, bifidum.
kermesinus, Herb. 1. c. 159 — Hipp, bifidum.
lineatus, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 642 = Hipp. lineatum.
litoralis, M. Roem. Syn. Ensat. 'J6-=Hipp. bifidum.
lori/olius, Herb. Amaryll. 160, in obs.—Am. austr.
maculatus. Herb. 1. c. 167.—Chili.
mendodnus, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1862) II. 406 - Hipp, advenum.
miniatus, D. Don, ex Sweet, Brit Flow. Gard. Ser. II. vi. t. 213 = Hipp, advenum.
montanus, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) reimp. 66 — Hipp, montanum.
nemoralis. Herb. Amaryll. 159-Hipp, bifidum.
nobilis, Herb, in Lindl. Bot. Reg. U844) Misc. 88-Hipp, bifidum.
pallidus, Lodd. Bot. Cab. t. 1760.—Chili.
parvulus, Pritz. Ic. Ind. 522'Zephyranthes Andersoniana.
pedunculosus, Herb. Amaryll. 161. t. 26. f. 8-Hipp. bifidum.
phycelloides. Herb, in Bot. Reg. t. 1417 = Hipp, phycelloides.
pratensis, Herb, in Bot. Mag. t. 3961 •= Hipp, prateuse.
pulcher, Herb. Amaryll. 161. t. 2ti. f. l^Hipp. bifidum.
pumilus, Lodd. Bot. Cab. t. 1771-Hipp, roseum.
punctatus, Herb. Amaryll. 403. t. 47. f" 1-Hipp. Bagnoldii
robustus. Herb. 1. c. 166.—Bras.
roseus, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 107 =• Hipp. roseum.
spathaceus, Herb, in Bot. Mag. 12597 - Hipp, bifidum.
speciosus. Herb. Amaryll. 158 = Hipp, pratenae.
splendens, Renjifo, in Renjifo & Phil. Desc Alg. PI. Nuev. (1884) reimpr. 6.—Chili.
syhaticus, Herb. Amaryll. 166.—Bras.
texanus, Herb, ex Steud. Norn. ed. II. i. 717 - Zephyranthes texana.
versicolor, Herb, in Bot. Mag. t. 2485 - Zephyranthes veraicolor.

HABRANTUS, Dum. Fam. Anal. 68 (1829)-praec.

HABBOSIA, Fenzl, in Bot. Zeit. i. (1843) 322. *ILLECEBRACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 19.
spinuliflora, *Fen*l, 1. c.* 823.—Syria; Persia.

HABROTHAMNUS.Endl. Gen. 667 (1839)-Centrum. Linn. (Solanac).
aurantiacus, Regel, Ind. Sem. Hort. Turie. (1860) 4.—Cf. linnaea, xxiv. (1851) 231-C. Regelii.
aurantiacus, Seem, in Bonplandia, vii. (1859) 15-C. aurantiacum.
corymbosus, Endl. ex Meissn. Gen. Comm. 186; et ex Walp. Rep. iii. 122-C. Endlicheri.
cyaneus, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 72 <= Iochroma tubulosum.
elegans, Brongn. in Fl. des Series, Sér. I. ii. (Févr. 1846) t. 9 = C. elegans.

HABROTHAMNUS :—
elegans, Scheidw. ex Walp. Rep. iii. 122 = Cestrum fasciculatum.
/asciculatus, Benth. PI. Hartw. 49 = C. Hartwegi.
fasciculatus, Broiign. in Rev. Horde. Sér. II. iv. (1845-46) 26-C. fasciculatum.
Hartwegi, Seem, in Bonplandia, vii. (1859) 15-C. Hartwegi.
Huegelii, Regel, in Bot. Zeit. ix. (1851) 596 = C. elegans.
A'ewelli, Hort. Veitch. ex Gard. Chron. (1877) I. 424.—Hab.?
paniculatus, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brnx. xii. (1845) 148 = C. sylvaticum.
*porphyreus*h Seem, in Bonplandia, vii. (1859) 15 = C. porphyreom.
purpureus, Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 12. t. 43~*C.* fasciculatum!
roseus, Miers, Illustr. S. Am. PI. it 81 = C. roseum.
stellatus, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. ii. (Féw. 1846) snbt. 9.—Hab.?
tomentosus, Benth. PI. Hartw. 49 = C. Bentharai.

HABROZIA, Lindl. Veg. Kingd. 628 (1847)-Ha,brosia, Fenzl (Ulecebr.).

HABSBURGIA, Mart. Syst. Mat Med. Bras. 86, oomen tantnm (1848) = Skytanthus, Meyen (Apocyn.).
comans. Mart. 1. c. *{=Neriandra Mar Hand).*—Bras.

HABSIA, Stend. Nom. ed. II. i. 719 (1840), sphalm. = Ouettarda, Linn. (Rubiac).
arborescens, Stead. 1. c. = G. argentea.

HABZELIA, A. DC. in M<Sm. Soc. Phys. Geniv. v. (1832) 207 (Mém. Anon.)-Xylopia, Linn. (Anonac).
acuta, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 87.—Java.
aethiopica, A. DC. Mém. Anon. 31=X. aethiopica.
aromatica, A. DC. 1. c. 32 — Unona discolor.
cubensis, DC. ex Steud. Nom. ed. II. i. 717 = X. cubensis.
discreta, A. DC. Mém. Anon. 32=Unona discreta.
ferruginea, Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i. 124 = X. ferruginea.
obtusi/olia, A. DC. 1. c. 42 = X. obtnsifblia, *A. Rich,*
oxyantha. Hook. f. & Thorns. Fl. Ind. i. 124 = X. oxyantha.
undulata, A. DC. Mém. Anon 32 =X. undulata.

HACHENBACHIA, D. Dietr. Syn. PI. i. 127 (1839) = Hagenbachla, Nees & Mart. (Haemodor.).

HACHETTEA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1880) 229. *BALANOPHOREAE,* Benth. & Hook, f. iii. 1221.
austro-caledonica, *Baill. I. c.* 280.—N. Caled.

HACKELA, Pohl, ex Flora, viii. (1825) 183 = HACKELIA, PohUCurtia, Cham. & Schlecht. (Gentian.).

HACKELIA, Opiz, in Bercht. Okon. Fl. Boehm. it II. 146 (18S8)-EeMnospermum, Sw. (Borag.).
deflexa, Opiz, 1. c. 147 ; Seznam, 49 = E. deflexum.

HACKELIA, Pohl, ex Griseb. in DC. Prod. ix. 56 (1845) = Curtia, Cham. & Schlecht. (Gentian.).
stellata, Pohl, ex Griseb. 1. c.«C. gentianoides.

HACQUETIA, Neck. Elem. i. 182 (1790). *UMBELLIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 879.
DONDIA, Sprang. PI. Umb. ProU 21 (1818).
DONDISU, Reichb. Consp. 144 (1828).
bracteogama, DC. Prod. iv. 668 *(= Po*oa coriacea).*—Reg. Andin.
Epipactis, *DC. I. c.* 85.—Europ.

HADESTAPHYLUM, Dennst Schluess. Hort. Malab. 30 (1818)=Holigarna, Buch.-Ham. (Anacard.).
causticum, Dennst. 1. c. = H. longifolia.

HAECKERIA, F. Mnell. in Linnaea, xxv. (1852) 406 = Humea, Sm. (Compos.).
cassiniaeformis, F. Muell. 1. c. = Humea cassinacea.
oiothamnoides, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 45 = Humea ozothamnoides.

HAEMADICTION, Steud. Nom. ed. II. i. 718 (1840)-seq.

HAEMADICTYON, Lindl. in Trans. Hort Soc. vi. (1825) 70=Prestonia, R. Br. (Apocynac).
acutifolium, Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 167.—Bras.
amazonicum, Benth. ex Muell. Arg. 1. c. 166.—Bras.
annulate, A. DC. in DC. Prod. viii. 428 = P. annularis.
asperum, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 169.—Bras.
bracteosum, Muell. Arg. 1. c. 168.—Bras.
caliginosumMim, Apocyn. S. Am. 260.—Peruv.
calycinum, Lindl. ex Miers,.1. c. *259 "Gaudichaudii.*
cayennense, A. DC. in DC. Prod. viii. 427.—Gnian.
circinale, G. Don, Gen. Syst. iv. 83=Echites circinalis.
contortuttt, Mart, & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (1844) 380-P. contorta.
denticulatum, Miers, Apocyn. S. Am. *257 = macroneuron.*
exsertum, A. DC. in DC. Prod. viii. 426.—N. Granat.
Gaudichaudii, A. DC. 1. c—Bras.
glabratum, A. DC. 1. c. 427-P. glabrata.
glandulosum, A. DC. 1. c—Peruv.
grandiflorum, A. DC. 1. c 426 = Odontadenia speciosa.
lagoinse, Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 116.—Bras.
macToncuron, Muell. Arg. in Mart Fl. Bras. vi. 1.169.—Bras.
marginatum, Benth. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 250.—Guian.
megalagrion, Muell. Arg. in Mart Fl. Bras. vi. 1.170.—Bras.
membranaceum, Muell. Arg. 1. c. 167.—Bras.
mexicanum. A. DC. in DC. Prod. viii. 428.—Mexic
nolle, A. DC. 1. c. 427=P. mollis.
nutans, A. DC. 1. c. 426 = *venosum.*
ovatum, Miers, Apocyn. S. Am. 258 — *Gaudichaudii.*
pallidum, A. DC. in DC Prod. viii. 428.—Peruv.
papillosum, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 432.—Am. trop.
parviflorum, Benth. PI. Hartw. 855.—N. Granat.
refulgens, Linden & Andrè, IUastr. Hortic. xviii. (1871) 14. t. 49.—Peruv.
Riedelii, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1.170.—Bras.
schieadenium, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 481 = P. schizadenia.
solanifolium, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1.171.—Bras.
suberectum, G. Don, Gen. Syst. iv. 83.—Ind. or.
tomentellum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 126.—Am. trop.
trifidum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 67. t. 275.—Bras.
venosum, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1825) 71.—Ind. occ.
Warmingii, Muell. Arg. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 116.—Bras.

HAEMANTHUS, [Toura.] Linn. Syst. ed. I (1735).
AMARYLLIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 730.
DIACLES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 130 (1866).
GYAXIS, Salisb. 1. c. 131 (1866).
LEUCODESMIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 19 (1836).
MELICHO, Salisb. Gen. PI. Fragm. 130 (1866).
NERISSA, Salisb. 1. c. 131 (1866).
PERIHEMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 20 (1836).
SCADOXUS, Rafin. 1. c. 19 (1836).
SERENA, Rafin. 1. c. 20 (1836).
abysdnicus, Herb. Amaryll. 282-*= multiflorns.
albiflos, *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 31.—Afr. austr.
albo-maculatus, *Baker, in Gard. Chron.* (1878) I. 202.—Afr. austr.
amarylloides, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 6. t. 408.—Afr. austr.
angolensis, *Welw. in Joum. Bot.* xvi. (1878) 194.—Afr. trop.
angustifolius, Salisb. Prod. 217 - pubescens.
arabicus, M. Roem. Syn. Ensat. 42 » multiflorus.
Arnotti, *Baker, in Gard. Chron.* (1878) H. 492.—Afr. austr.
Baurii, *Hort. Kew.—Cf. Gard. Chron.* (1885) II. 818.—Afr. anstr.
brevifolius, Herb. Amaryll. 234. t. SO. f. 3=cameus.
callosus, *Burch. ex M. Roem. Syn. Ensat.* 42.—Afr. austr.
capensis, *linn. Prael. ed. Giseke,* 278.—Afr. austr.

HAEMAKTTHUS :—
carinatus, Linn. Sp. PI. ed. II. 413 « coccineuj.
cameus, *[Ker-Gawl.] in Bot. Reg.* t. 509.—Afr. austr.
causticus, *Molina, Sagg. Chile,* ed. II. 129, 284.—Chili.
cernuiflorus, *J. Bell, ex Drapiet, Herb. Amat.* iv-(1830) t. 227.—Afr. austr.
ciliaris, Linn. Sp. PI. ed. II. 413-Buphane disticha.
cinnabarinus, *Decne. in Fl. des Serres,* Sér. II. ii-U867) 27. t. 1195.—Afr. trop.
coarctatus, Jacq. Hort. Schoenb. i. 30=coccineua.
coccineus, *Linn. Sp. PI.* 825.—Afr. austr.
coerulescens, Steud. Nom. ed. II. i. 71, in syn.-Hypoxis stellatus.
colchicifolius, Salisb. Prod. 217=multiflorus.
concolor, *Herb. Amaryll.* 288.—Afr. austr.
crassipes, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 7. t. 412.—Afr. austr.
cmentatus, *Schum. &• Thonn. Beskr. Guin. PI.* 168.—Afr. trop.
deformis, *Hook./. Bot. Mag.* t 6903.—Afr. austr.
delagolnsis, Herb. Amaryll. 233=multiflonu.
dubius, H. B. Sc K. Nov. Gen. et Sp. i. 281 *{-Collania dubid).*—Ecuador.
falcatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 68 - Ammocharfa falcata.
filiflorus, *Baker, ex Hiem, in Joum. Bot.* xvi. (1878) 194.—Afr. trop.
grandifolius, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 96.—Ins. Socotra.
guttatus, Banks, ex Kunth, Enum. PI. v. 60S' Buphane ciliaris.
hirsutus, *Baker, in Gard. Chron.* (1878) I. 766.—Afr. austr.
Hookerianus, *Herb. Amaryll.* 404. t. 46. f. 7.—Afr-austr.
humilis, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 6. t. 411.—Afr austr.
hyalocarpus, *Jacq. I. c.* 5. t. 409.—Afr. austr.
hydrophilus, Thunb. Mus. Ups. ex Schult. f. Syst. vii-892 = Crinum campanulatnm.
incamatus, *Burch. ex Herb. Amaryll.* 237.—Afr-austr.
insignis, Hook. Bot. Mag. t. 4745-magnificus.
intermedius, M. Roem. Syn. Ensat. 86 = albiflos.
Kalbreyeri, Baker, in Gard. Chron. (1878) II. 202 = multiflorus.
Katherinae, *Baker, I. c.* (1877) I. 656.—Afr. austr.
Lambertianus, *Schult. f. Syst.* vii. 891.—Afr. austr.
lanceaefolius, *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 31. t. 60.—Afr. austr.
latifolius, Salisb. Prod. 216 = coccineus.
leucanthus, *Miq. in Joum. Bot. Nierl.* i. (1861) 33.—Afr. austr.
maculatus, *Jacq. ex Loud. Hort. Brit.* 119.—Afr. austr.
magnificus. *Herb, in Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 71.—Afr-austr.
Mannii, *Baker, in Bot. Mag.* t 6364.—Guian.
moschatus, *Jacq. Hort. Schoenb.* iv. 6. t. 410.—Afr. austr.
multiflnrus, *Martyn, Monog. cum Ic.; et exWilld. Sp. PI.* ii. 25.—Afr. austr.
natalensis, *Hook. Bot. Mag.* t. 5378.—Afr. austr.
obliquus, Donn, Hort. Cantab, ed. II. 38-rotnndifolius.
orbicularis, Donn, 1. c.=iotnndifolius.
orchidifolius, Salisb. Prod. 217 = puniceus.
orientalis, Thunb. Prod. PI. Cap. 69 = Brunsvigia gigantea.
pubescens, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 253 - Crinum asiaticum.
pubescens, *Linn./. Suppl.* 193.—Afr. austr.
Pumilio, *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 32. t 61.—Afr-austr.
puniceus, *Linn. Sp. PI.* 326.—Afr. austr.
quadrivalvis, Jacq. Hoit. Schoenb. i. 30. t. 58" pubescens.
Redouteanus, M. Roem. Syn. Ensat. 38 = puniceus. ,
roseus, Hort. Angl. ex link, Enum. Hort. Berol. i-309-cameus.
rotularis, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) I. 656.-A''-trop.
rotundifolius, *[Ker-Ganl.] in Bot. Mag. t.* 1618.—A"-austr.
Rouperi, Hort.—C£ Flor. Mag. N. S. (1875) 1.1*8* magnificus.
rupestris, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) I. 656.—A'-trop.

HAEMANTHUS :—
sanguireus, *Jacq. Hart. Schoenbr.* iv. 4. t. 407.—Afr. austr.
sarniensis, Thnnb. Prod. PI. Cap. 58 - Nerine saraiensis.
sinuatus, *Thunb. Mus. Ups. ex Schult. f. Syst.* vii. 892.—Afr. austr.
spiralis, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed. I. i. 405 = Carpolyza spiralis.
stellatus, Steud. Norn. ed. II. i. 71, in syn. = Hypoxis
strigosus, Herb. Amaryll. 284. t. 80. f. 2 = careens.
tenellus, Steud. Norn. ed. I. 288, in syn. = Carpolyza spiralis.
tenuiflorus, Herb, in Bot. Mag. t. 3870=multiflorus.
tigrinus, *Jacq. Hort, Schoenbr.* i 29. t. 56.—Afr. anstr.
toxicarius, Linn. f. ex Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 405; Thunb. Prod. PI. Cap. 59 = Buphane distieha.
trispathinus, Hort. ex M. Roem. Syn. Ensat. 37 = pubescens.
undulatus, *Herb. Amaryll.* 233. t. 80. f. 1.—Afr. austr.
undulatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 58 = Nerine undulata.
vaginans, Thunb. Fl. Cap. ii. 254 = seq.
Vginatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 188 =• Strumaria truncata.
"oirescens, Herb. Amaryll. 235 = albiflos.
Wbrinius, *Herb. 1. c.* 287.—Afr. austr.

HAEMARIA, Lindl. Orch. Seel. 9 (1826). *ORCHWEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 601.
DICHROPHYLA, Rafih. Fl. Tellur. iv. 39 C18S6>.
LUDISIA, A. Rich, in Diet. Clas. Hist. Nat. vii. 437 (1825).
MYODA, Lindl. in Wall. Cat. n. 7890 (1832); et Bot. Reg. xix. sub t. 1618 (1833).
ar gyroneura, Miq. Choix, t. 16. f. l=Dossinia marmorata.
discolor, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 490.—China.

HAEMARTHRIA, Munro, in Tourn. Linn. Soc. vi. (1862) 55 = HEMARTHRIA, R. Br.=BottboeUia, Linn. f. (Gramin.).

HAEMATOBANCHE, Presl, Epim. Bot 249 (1849) = Hyobanohe, Linn. (Scrophul.).
'"guinea, Presl, 1. c.-Hyobanche sanguinea.

HAEatATOCAKPTTS, Miers, in Ann. Nat. Hist. *Sir.* III. xix. (1867) 194. *MENISPERMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 964.
Mmptus, Mieis, 1. c. 197 - Thomsoni.
Thomsoni, *Miers, I. c*—Reg. Himal.

1IAEMATOLEPIS, Presl, Epim. Bot. 288 (1849) = Cytiniis, Tourn. (Balanoph.).
**anguinea,* Presl, 1. c.=C. dioiens.

HAEMATORCHIS, Blume, Rumphia, iv. t. 200 B (1848) = Qaleola, Lour. (Orchid.).
iltissima, Blume, 1. c. = G. altissima.

HAEMATOSPERMUM, Wall. Cat. n. 7963 (1832) = Homonoia, Lour. (Euphorb.).
cuneatum, Wall. 1. c. n. 7954 = Horn, retusa.
neriifolium, Wall. 1. c. n. 7853-Horn, riparia.
riparium, Wall. i. c. n. 7956 = Horn, riparia.
stlicinum, Baill. Etud. Gen. Euph. 293-Horn, riparia.

HAEMATOSTAPHIS, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xxiii. (1860) 169. t. 25. *ANACARDIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 422.
^rteri, *Hoot./. I. c*— Afr. trop.

HAEMATOSTROBUS, Endl. Gen. 76, in adnot. (1836) **-Thonningia, Vahl** (Balanoph.).

HAEMATOXYLLUM, Scop. Introd. 225 (1777) = seq.

HAEMATOXYLON, Linn. Syst. ed. I (1735). *t-EGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 567.
wasiletto, *Karst. Fl. Columb.* ii. 27. t. 114.—N. wanat.
campechianum, *Linn. Sp. PI.* 384.—Am. trop.

HAEMATOXYLUM, Linn. Gen. ed. I. 342 (1737) = praec.

HAEMXX, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 223 (1837)-Astephanus, R. Br. (Asclep.).
Dregei, E. Mey. 1. c. = A. Dregei.
Massoni, E. Mey. L c = A. Massoni.

HAEMOCARPUS, Noronha, ex Thou. Gen. Nov. Madag. 15 (1806) = Haronga, Thou. (Hyperic).
axillaris, Spreng. Syst. iii. 838 = Psorospermum axillare.
corymbosus, Spreng. 1. a —Psorospermum citrifoliiim.
cymosus, Spreng 1. c. —• Psorospermum discolor.
' paniculatus, Spreng. 1. c. = Har. madagascariensis.

HAEMOCHARIS, Salisb. Parad. Lond. sub t 56 (1806) -Laplaoea, H. B. & K. (1821) (Temstroem.).
barbinervis, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genèv. xiv. (1855) 146 ='L. barbinervis.
Haematoxylum, Salisb. Parad. Lond. sub t 56 = L. Haematoxylum.
intermedia, Choisy, in Me'm. Soc. Phys. Genèv. xiv. 1,1856) 146 = L. intermedia.
parviflora, Choisy, 1. c.=L. parviflora.
quinoderma, Choisy, 1. c. 147 = L. quinoderma.
semiserrata, Mart & Zucc Nov. Gen. et Sp. i. 107. t 61=L. semiserrata.
speciosa, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genèv. xiv. (1855) 146-Lspeciosa.
tomentosa, Mart. & Zucc. Nov. Gen. et Sp. i. 106.167 =- L. tomentosa.
•*villosa,* Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genèv. xiv. (1855) 146 = L. villosa.

HAEMODORON, Reichb. Consp. 212" (1828) - Cistanohe, Hoffmgg. & Link (Oiobanch.).

HAEMODOKUM, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. (1798) 213. *HAEMODORACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 673.
brasiliense, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 24.—Bras.
brevicaule, *F. Muell. Fragm.* i. 64.—Austral.
brevisepalum, *Benth. Fl. Austral,* vi. 420.—Austral.
coccineum, R. Br. Prod. 800 = corymbosum.
corymbosum, *Vahl, Enum.* ii. 17U.—Austral.
distichophyllum, *Hook. It. PI.* t. 866.—Tasman.
edule, Lehm. Fl. Preiss. ii. 15-spicatum.
ensifulium, *F. Muell. Fragm.* i. 64.—Austral.
laxum, *R. Br. Prod.* 300.—Austral.
leptostachyum, *Benth. Fl. Austral,* vi. 423.—Austral.
paniculatum, *Lindl. Swan River App.* 44.—Austral.
parviflorum, *Benth. Fl. Austral,* vi. 423.—Austral.
planifolium, *R. Br. Prod.* 300.—Austral.
polycephalum, Endl.' in Lehm. PI. Preiss. ii. 16 = simplex.
simplex, *Lindl. Swan River App.* 44.—Austral.
simulnns, *F. Muell. Fragm.* vii. 117.—Austral.
sparsiflorum, *F. Muell. 1. c.*—Austral.
spicatum, *R. Br. Prod.* 300.—Austral.
strictum, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 15 = paniculatum.
subvirens, *F. Muell. Fragm.* i. 63.—Austral.
tenuifolium, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* vi. 423. —Austral.
teretifolium, *R. Br. Prod.* 300.—Austral.

IIAEMOSPERMUM, Reinw. in Blume, Bijdr. 1018 (1825) = Oeniostoma, Forst. (Logan.).
arboreum, Reinw. ex Blume, 1. c. = G. Haemospermum.
moluccanum, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 240 »G. Lasiostemon.

HAENCKEA. Juss. in Diet. Sc. Nat. xx. 204 (1821)-HAENKEA, Ruiz & Pav. = Sohoepfla, Schreb. (Olacin.).

HAENELIA, Walp. Rep. ii. 974 (1843)-Amellus, Tourn. (Compos).
capensis, Walp. 1. c. = A. Lychnitis.

HAENIANTHUS, Griseb. in Mem. Am Acad. N. S viii. (1868) (PI. Wright. Cub. ii.) 518=Llnociera, Sw. (Oleac).
incrassatus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 405.—Ind. occ.
salicifolius, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 518.—Cuba.

HAENKAEA, Usteri, Ann. Bot. vi. (1793) 117 = HAENKEA, F. W. Schmidt = Adenandra, Willd. (Rutac).

HAENKEA, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 8. t. 281 (1802) = Schoepfla, Schreb. (Olacin).
flexuosa, Ruiz & Pav. 1. c.^S. flexnosa.
macrocarpa, Steud. Norn. ed. 1.170, insyn.=Celastrus multiflorus.
multiflora, Ruiz *Sc* Pav. Syst. Veg. 65 =-Celastrus multiflorus.

HAENKEA, Ruiz & Pav. Prod. 36. t. 6 (1794)-Hay. tenUB, Feuill. (Celastr.).

HAENKEA, Salisb. Prod. 174 (1796)-Fortulacaria, Jacq. (Portul.).
crassi/olia, Salisb. 1. c—P. aira.

HAENKEA, F. W. Schmidt, Neue u. Selt. Pfl. 19 (1793) -Adenandra, Willd. [1809] (Rutac).
punctata, ¥. W. Schmidt, 1. c.-A. Schmidtiana.
villosa, F. W. Schmidt, 1. c. 21 - A. calydna.

HAEN8ELERA, Boiss. ex DC. Prod. vii. 83 (1838). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 505.
elatior, Willk. in Linnaea, ix. (1852) 41-granatenu's.
granatensis, *Boiss. ex DC. Prod.* vii. 83.—Hispan.

HAENSELERA, Lag. Gen.et Sp. Nov. 13 (1816) = PhyBospermum, Cusson (Umbell.).
damaecornis, Lag. 1. c. = P. aquilegifolium.

HAENSELERIA, Reichb. Norn. 96 (1841)™ praec.

HAENSLERA, Steud. Norn. ed. II. i. 718 (1810) •= praec.

HAGAEA, Vent. Tabl. iii. 240 (1799)-Polyoarpaea, Lam. (Caryophyll.).
alsinaefolia, Bivona, Stirp. Rar. Sic. Man. iii. 7 = Polycarpon alsinefolium.
aristata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 176-P. corymbou.
diffusa, Sweet, 1. c.-P. Teneriffae.
gnaphalodes. Pen. Syn. i. 262-P. nivea.
latifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 176 = P. latifolia.
poly carpoides, Bivona, Stirp. Rar. Sic Man. ii. [9] = Polycarpon peploides.
Teneriffae, Pens. Syn. i. 262=P. Teneriffae.

HAGEA, Pen. Syn, i. 262 (1805) = praec.

HAGEA, Poir. in Diet. Sc. Nat. xii. 253 (1818)-Brayera, Kunth (Kosac).

HAGENBACHIA, Nees *Sc* Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 18. t. 2. *HAEMODORACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f, iii. 674.
brasiliensis, *Nees* b[1] *Mart. 1. c.* 19. t. 2.—Brai.

HAGENIA, J. F. Gmel. Syst. 613 (1701)=Brayera, Kunth (Rosac).
abyssinica, J. F. Gmel. 1. c. = B. anthelmintica.

HAGENIA, Moench, Meth. 61 (1794) = 8aponarla, Linn. (Caryophyll.).
filifortnis, Moench, 1. c.«=S. porrigrns.

HAGIDRYAS. Griseb. Reise Rumel. i. 311 (1841)-PrunUB, Toum. (Rosac).
prostrata, Griseb. 1. c. = P. prostrata.

HAGIOSERIS, Boiss. Diagn. Ser. L xi. 35 (1849)=. Picrls, Linn. (Compos.).
amalecitana, Boiss. 1. c. 36 -*galilaea.*
galilaea, Boiss. 1. c—Syria.

HAHNIA, Medic. Geschich. 81 (1793)-Pyrus, Linn. (Rosac).
arbutifolia, Medic. 1. c. 82 = P. arbutifolia.
Aria, Medic. 1. c. 81 = P. Aria
Chamaemespilus, Medic. 1. c. 82 = P. Chamaemespilut.
pinnatifida, Medic. L t -F . pinnatifida.
terminal's, Medic. 1. c. 81 = P. torminalis.

HAKEA, Schrad. Sert. Hannov. 27. t. 17 (1797). *PROTEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 181.
CONCHIUM, Sm. in Tram. Linn. Soc. iv. (1798) 216.
MF.RCKI.INIA, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 25; Gartenfl. (1857) 155.
acanthopkylla, Link, Enum. Hort. Berol. i. 118 s ceratopinylla.

HAKEA:—

acicularis, *Knight, Prat.* **107;** *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 181.—Austral,
adnata, *R. Br. Prot. Nov.* 26.—Austral,
unbigua, *Afeissn. in Lehm. PI. Prriss.* **ii. 260.—** Anstral.
•mplexicaulis, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 184.—Anstral.
angusti/olia, Hoit. Angl. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 415—ulicina.
arborescens, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 187. —Anstral.
attenuata, R. Br. 1. c. 188-varia.
attenuata, Meissn. in DC. Prod. xiv. 406=aurieulata.
aoricnlata, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **vii. (1855)** 116.—Anstral.
Baxteri, *R. Br. Prot. Nm>.* 28.—Austral.
bifrons, Meissn. in DC. Prod. xiv. 400=microcarpa.
bipinnatifida, *R. Br. Prot. Nov.* 28.—Anstral.
Boucheana, Knnth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1844) !).—Cf. Linnaea, xviii. (1844) 499-trifurcata.
brachyptera, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **iv. (1852)** •208, nomen; *et in DC. Prod.* xiv. 896.—Austral.
brachyrrhyncha, F. Muell. First Gen. Rep. 17 = acicularis.
Brownii, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* **i. 569.—** Anstral.
Candolleana, *Meissn. L c.* ii. 262.—Anstral.
canescens, Link, Ennm. Hort. Berol. i. 118=cinerea.
carinata, F. Muell. ex Meissn. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 360 = ulicina.
ceratophylla, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* **x. (1810)** 184—Anstral.
cervina, Dum.-Cours. Bot. Cnlt. ed. II. vii. 110 = ceratophylla.
chordophyUa, *F. Muell. in Hook. Kew Journ.* **ix.** (1867) 23.—Austral,
cinerea, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* **x. (1810) 186.—** Austral,
circnmalata, *Meissn. in Hook. Kern Journ.* **vii. (1855)** 114.—Anstral.
clavata, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 31. L 41.—Anstral.
commutata, *F. Muell. Fragm.* v. 26.—Austral.
conchifolia, Hook. Ic. PL t. 482—cucullata.
corymbosa, *R. Br. Prot. Nov.* 28.—Austral,
custata, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* **i. 575.—** Austral.
crassifolia, *Meissn. I. c.* 570.—Anstral.
crassinervia, Meissn. 1. c. 678<=petiolaris.
cristata, *R. Br. Prot. Nov.* 28.—Anstral.
cncullata, *R. Br. I. c.* 30.—Austral.
Cnnninghamii, *R. Br. I. c.* 26.—Austral,
cyclocarpa, *Lindl. Swan River App.* 36.—Austral,
cycloptera, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 182. —Anstral.
dactyloides, *Cav. in AnaL Hist. Nat.* i. (1799) 215.—Austral.
decurrens, R. Br. Prot. Nov. 27-acicularis.
decurrens, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 321 =Conospermum longifolinm.
denticulata, R. Br. Prot. Nov. 28=glabella.
Drummondii, G. Don, ex Meissn. in DC. Prod.-xiv. 409 = cucullata.
drupacea, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 221 ,-Roem. & Schnlt. Syst. iii. 426 = suaveolens?
echinata, *Hort. Mackay, ex Sweet, Hort. Brit.* **ed. I.** 491, nomen (Quid ?).—Austral.
Ednieana, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral, m.* (1885) 70.—Anstral.
elliptica, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 187.—Austral.
Epiglottis, *LaUll. Nov. Holl. PI. i.* 80. t. 40.—Anstral.
eriantha, *R. Br. Prot. Nov.* 29.—Anstral.
erinacea, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i.* **559.—** Austral.
rucalyptoides, Meissn. 1. c. 573 — laurina.
ftlcata, *R.Br. Prot. Nov.* 29.—Auitral.
ferruginea, Lodd. Bot. Cab. t. 1501-dactyloides.
ferruginea, *Sweet, Ft. Austral,* t. 45.—Austral,
flabellifolia, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 116.—Austral.
fltxilis, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 180-nodosa.
flexilis, *F. Muell. in Linnaea,* xxvi. (1853-55) 359.—Austral,
florida, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* **x. (1810) 188.—** Austral.

HAKEA:—

florulenta, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 116-saligna.
Francisiana, F. Mnell. Fragm. i. 20-mnitilineatat
Kraseri, *R. Br. Prot. Nov.* 26.—Austral,
gibbosa, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* i. (1799) 214.—Anstral.
gibbosa, Labill. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 403 = suaveolens.
Gilbertii, Kipp. ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 115-snlcata.
glabella, *R. Br. Prot. Nov..* 28.—Austral.
glabra, Schrad. Sert. Hannov. 27=pngionifonnis.
glauca, Knight, Prot. 106=pugioniformis.
grammatophylla, F. MuelL Fragm. vi. 214-multilineata.
heterophylla, Hook. Ic. PI. t. 437-varia.
Hookeriana, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **iv. (1852)** 208, nomen; *et in DC. Prod.* xiv. 412.—Austral.
ilidfolia, R. Br. in Trans. Xinn. Soc. x. (1810) 184 = varia.
incrassata, *R. Br. Prot. Nov.* 29.—Austral.
intermedia. Hook. Ic Pl.t. 445-varia.
intricata, *R. Br. Prot. Nov.* 27.—Austral.
Kippistiana, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **vii. (1855)** 115.—AustraL
laciniosa, F. Muell. Fragm. iv. 49= ceratophylla.
lanigera, Tenore, Fl. Nap. i. 22. t. 6 = gibbosa.
lasiantha, *R. Br. Prot. Nov.* 29.—Anstral.
lasiocarpha, R. Br. 1. c. 27-varia.
lativalvis.F. Muell. Fragm. vi. 219-adnata.
laurina, *R. Br. Prot. Nov.* 29.—Anstral.
Lehmanniana, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i.* **657.—** Anstral.
Leucadendron, Meissn. 1. c. 872 = incrassata.
leucocephala, D. Dietr. Syn. PI. i. 631-seq.
lencoptera, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 140. —Anstral.
ligustrina, Knight, Prot. 108 - oleifolia.
linearis, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 188.—Anstral.
lissocarpa, *Hort. Petrop. ex Regel, Cartenfl.* **(1857)** 155.—Anstral.
lissocarpa, Regel, 1. c. in obs. sphalm.=seq.
lissocarpha, *R. Br. Prot. Nov.* 27.—Austral.
lissosperma, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 180 = acicularis.
longicuspis, Hook, in Mitch. Joum. Trap. Austràl. 397 = leucoplera.
longifolia, A. Cnnn. ex R. Br. Prot. Nov. 26 = Cunninghsmii.
longifolia, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. II. ii. 423.—Austral,
loranthifolia, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* **i. 574.—** Austral.
lorea, *R. Br. Prot. Nov.* 25.—Anstral.
macrocarpa, *A. Cunn. ex R. Br. 1. c.* 30.—Austral.
macrocarpa, Hort. Belved. ex Roem. & Schult Syst. iii. Mant. 378 - microcarpa ?
marginata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1814) 185. —Austral,
megalosperma, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **vii.** (1855) 117.—Anstral.
Meisneriana, *Kipp. ex Meissn. I. c.* 114.—Austral,
microcarpa, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 182. —Anstral.
Milligani, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 307, nomen; et in DC. Prod. xiv. *95 = H. Epiglottis.
mimosoides, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 416—saligna.
Mitchellii, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 208, nomen; et in DC. Prod. xiv. 898 — microcarpa ?
mixta, Lindl. Swan River App. 36=trifurcata.
multilineata, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* **Ml.—** Anstral.
myricaefolia. Ait. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 768-ceratophylla.
myrtoides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* **i. 577.—** Austral.
nervosa. Knight, Prot. 108-dactylodes,
neurophylla, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* -vii. (1855) 117.—Austral,
nitida, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* **x. (1810) 184.—** Austral.
nodosa, *R. Br. 1. c.* 179.—Anstral.
nodosa, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 555 =* commutata.

HAKEA:—

obliqua, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* **x. (1810) 180.—** Austral.
obliqua, Lodd. Bot Cab. t. 1682-acicularis.
obtusa, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **iv. (1852) 209,** nomen ; *et in DC. Prod.* xiv. 411.—Austral.
Oldfieldii, *Benth. Fl. Austral,* v. 530.—Anstral.
oleifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 185.—Austral.
orthorrhyncha, *F. Muell. Fragm.* vi. 214.—Austral.
pachyphylla, Sieber, ex Spreng. Syst iv. Cur. Post. 46 =propinqna.
Pampliniana, *Kipp. ex Meissn. in Hook. Kew Journ.* vii. (1865) 115.—Austral,
pandanicarpa, *R. Br. Prot. Nov.* 29.—Austral.
parilis, Knight, Prot. 106 - pugioniformis.
patula, R. Br. Prot. Nov. 27 = microcarpa.
pectinata, Dum.-Conrs. Bot Cult. ed. II. ii. 424; Colla, in Mem. Ace. Tor. xxxi. (1827) 320=suaveolens.
pedunculata, *F. Muell. in Melb. Chemist* (July 1883). —Austral,
petiolaris, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* **i. 677.—** Austral.
petrophiloides, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. «8 = lissocarpha.
petrophioides, Mackay, ex Sweet, Hort. Brit. ed. I-491, nomen (= praec. ?).—Austral.
pilulifera, Lindl. Swan River App. 86-Grevillea oxystigma.
pinifolia, Knight, Prot 107=gibbosa.
pinnata, Roem. & Scault. Syst. iii. 444-suaveolens.
piriformis,* Auct. vide *pyriformis.
platysperma, *Hook. Ic. PI.* t 433.—Austral,
plurinervia, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **v. 623.—** Austral.
Preissii, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i.* **657—Austral-propinqna,** *A. Cunn. in Field, N. S. Wales,* **327.--** Austral.
prostrata, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 18** gUbella.
pubescens, .Hort. Cell, ex Schult Mant. iii. 2[91]* Banksia integrifolia.
pubescens, Schrad. Sert. Hannov. 27, in obs. =gib[1]*?!*
pugioniformis, *Cav. in Anal. Hist. Nat. I* (1799) *[1s]- —Austral.
purpurea, *Hook, in Mitch. Journ. Trap. Austral-* —Austral.
pyenobotrys, F. Muell. Fragm. v. 72 = nitida.
pyenoneura, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **vii. (1BW** 117.—Anstral.
Pyriformis, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1799) «« * Xylomelnm pyriforme.
recurva, *Meissn. in Hook. Kew Journ.* **iv. (1852)** nomen; *et in DC. Prod.* xiv. 894.—Austral.
repanda, R. Br. Prot. Nov. 30-ferruginea.
rhombalis, *F. Muell. Fragm.* x. 90.—AustraL
Roei, *Benth. Fl. Austral,* v. 499.—Austral,
rostrata, *F. Muell. First Gen. Rep.* **17;** *et ex Meiss*-in Linnaea,* xxvi. (1853-65) 359.—Austral.
rubricaulis, Cels, ex Colla, Hort. Ripul. 63; API" i. 114—Stenocarpus salignns.
rugosa, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. x.* **(1810) J7»-** Austral.
rusclfolia, *Labill. Nov. Holl. PI.* i. 80. t. 89.—Austral-
rusciformis, 'Stend. Norn. ed. II. i. 403, sphalm. in syn-=praec
salici/olia, Sweet, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 410 saligna.
saligna, *Knight, Prot.* **108;** *R. Br. in Trans. Li*«-Soc.* x. (1810) 185.—Austral.
scoparia, Meissn. in Lehm. PI. Preiss; i. 556-»sulca»-
semiplana, F. Muell. First Gen. Rep. 17; et ex MeW[1'] in Linnaea, xxvi. (1853-55) 359 -nodosa. *Hort.*
sericea, *Hort. Ups. ex Regel, Supfl. Ind. Sem. Petrop.* 1866 (1867) 29.—Austral.
sericea, Schrad. Sert. Hannov. 27, in obs.-acicn'»-[rs,]
smilacifolia, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i-* [e67,] Austral.
stenocarpa, *R. Br. Prot. Nov.* 29.—Austral.
stenocarpoides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral-* 611.—Austral.
stenophylla, Baxt ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 41» nlicina.
stenophyUa, *A. Cunn. ex R. Br. Prot. Nov.* »[a] Austral. (1853-
stricta, F. Mnell. ex Meissn. in Linnaea, xxvi. 66) S60=leucoptera.

HAKEA:-
strumosa, *Meissn. in Hook. Kern Journ.* iv. (1862) 208, nomen; *et in DC. Prod.* xiv. 402.—Austral,
snaveolens, *R. Br. in Trans. Linn. Soe. x.* (1810) 182.—Austral,
subsulcata, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 555.—Austral.
Wbulata, *Hort. Mackay, ex Sweet, Hart. Brit.* ed. I. 491; *A. Cunn. ex Steud. Nom.ed.* II. L 719, nomen.—Anstral.
sulcata, *g. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 180.—Austral.
sulcata, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. ii. 260-Meisneriana.
'enniflora, *Dum-Cours. Bot. Cult.* ed. I. v. 106; *Roem. &• Sehult. Syst.* Hi. 425.—Austral.
t'phrosperma, R. Br. Prot. Nov. 26-leucoptera.
kphrosperma, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 207 = Kippistiana.
tricostata, Hook. Ic PI. t. 435 - cinerea.
trituris, Lindl. Swan River App. 86 - trifurcata.
tr}formis, Lindl. 1. c—amplexicaulis.
trifurcata, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 188.—Austral,
"inervis, *Meissn. in Hoot. Ken Journ.* iv. (1852) 209, nomen; *et in DC. Prod.* xiv. 414.—Austral,
"•neura, *F. Muell. Fragm.* iii. 146.—Austral.
'uberculata, R. Br. Prot. Nov. 28 = varia.
ul«ana, *R. Br. I. c.* 29.—Austral,
"ndulata, *R.Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 185.—Austral.
•"", R. Br. 1. c. 183.—Austral,
verrucosa, *F. Muell. Fragm.* v. 25; vi. 218.—Austral.
"ictorta, Drumm. in Bot. Mae. lxxiv. Comp. 2=eucullata.
v!'gata, R. Br. Prot. Nov. 26 - leucoptera.
w«aU, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. x.* (1810) 182.-Austral.

HAL AKTH1TJM>C Kochi in Ljnnaea, XTa. (1843) «13. *CHENOPODIACEAE,* Bentb, *Sc* Hook. f. ni. 74.
GAMANTHUS, Bunge, Anabas. Rev. 76 (1862).
PHYSOGETON, Jaub. & Spach, Illustr. i. 1.135 (1846).
Abichii, *Bunge, Pi. Abich.* 18.—Reg. Caucas.
TM*heri,* Moq. in DC. Prod. xiii. II. 204-rarifolium.
^nlpianum, *Bunge, Anabas. Rev.* 80.—Armenia.
'««a<««, Bunge, PI. Abich. 18-rarifolium.
lit«cinum, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 982 - ranfolium.
lamamense, *Bunge, Anabas. Rev.* 82.—Persia.
molle, Bunge, ex Boiss. FL Orient, iv. 981 = mamamense.
Pnrpnreum, *Bunge, Anabas. Rev.* 85.—Persia,
""'folium, *C. Koch, in Linnaea,* xvii. (1843) 314.-Persia.
Tf'eidum, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 981 = mamamense.
*T<*ustum,* Bunge, ex Boiss. 1. c 982= rarifolium.
sfrcatum, Bunge, ex Boiss. 1. c. = rarifolium.

HA t ARCHON, Bunge, Anabas. Rev. 76. t. 1 (1862).
CHENOPODIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 76.
T«iculosus, *Bunge, I. c*—Afghan.

HALEA, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 304 (1841) = 2etragonotheca Linn. (Compos.).
"dovlciana, Torr. Sc Gray, 1. c. = T. ludovlciana.
"Panda, Buckl. in Proc. Acad. Sc Philad. 1861 (1862) 458 = TT luddviciana.
'"««, A. Gray, PI. Fendl. 83-T. texana.

HALECUS, Rumph. ex Rafin. Sylva Tellur. 62 (1838) = ^Oton, Linn. (Euphorbiac).
m"uritianus, Rafin. 1. c. = G. mauritianus.
Verus, Rafin. 1. c. = C. Tiglium!

HALENEA, Wight, Ic. iv. II. 8 (1848) err. typ.-seq.

LENIA, Borckh. in Roem. Arch. i. I. 25 (1796) *GENTIANEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 817.
EXADENUS, Griseb. Obs. Gentian. 36 (1836).
IETRAGONANTHUS, S. G. Gmel. Fl. Sibir. iv. 113 (1769).
ala,'a, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* ii. 851.-Mexic.
"Ptculata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. I. (1844) 871-decumbens.
"Mepiadea, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 326 - Pavomana.
B"""toniana, Griseb. 1. c 325-deflexa.

HALENIA:—
brevicomis, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 177.—Ecuador,
decumbens, *Benth. PI. Hart-a.* 67.—Mexic.
deflexa, *Griseb. Gen. et Sp. Cent.* 824.—Am. bor.
Dombeyana, *Wedd. Chlor. And.* ii. 76.—Peruv.
elata, *Wedd. 1. c.* 78.—Venezuela,
elliptica, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837-529.—Reg. Himal.
elongata, *D. Don, ex G. Don, Gen. Syst.* iv. 177.—Mexic.
Fischerii, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June 1830) 174-sibirica.
gentianoides, *Wedd. Chlor. And.* ii. 78.—N. Granat.
gracilis, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 327.—Am. austr.
heterantka, Griseb. 1. c. 325 = deflexa.
hypericoides, *Griseb. 1. c.* 328.—N. Granat.
inaequalis, *Wedd. Chlor. And.* ii. 78.—Venezuela,
longicornu, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 370.—Mexic
major, *Wedd. Chlor. And.* ii. 79.—N. Granat.
Michauxiana, G. Don, Gen. Syst. iv. 177=deflexa.
multiflora, *Benth. PI. Hartw.* 24.—Mexic.
nudicaulis, *Mart, b" Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 371.—Mexic.
nutans, *Mart. & Gal. 1. c.*—Mexic.
parviflora, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 177.—Mexic.
paucifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 352.—Mexic.
Pavoniana, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 177 Am. austr.
Perrottetii, *Griseb. in DC. Prod. vs.*. 129.—Ind. or.
pinifolia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 177.—Peruv.
plantaginea, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 827.—Mexic
Purdieana, *Wedd. Chlor. And.* ii. 76.—N. Granat.
Rothrockii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 84.—Arizona.
Schiedeana, *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 827.—Mexic.
sibirica, *Borckh. in Roem. Arch.* i. I. 25.—Sibir.

HALESIA, P. Br. Hist. Jamaic 206 (1756) = Guettarda, Linn. (Rubiac).

HALESIA, Linn. Syst. ed. X. 1041 (1759). *STYRACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 669.
PTEIIOSTYRAX, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 94. t. 47 (1835).
Carolina, Linn. Syst. ed. X. 1044 = tetraptera.
corymbosa, *Nichols. Diet. Gard.* ii. 109.—Japon.
diptera, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 636.—Am. bor.
hispida, *[Mast, in] Gard. Chron.* (1884) II. 176. f. 34.—Japon.
parviflora, Lindl. in Bot. Reg. t. 952 = Styrax amerU canum?
parviflora, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 40=tetraptera.
reticulata, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861) 444 = diptera.
stenocarpa, *C. Koch, in C. Koch* b* *Fint. Wochenschr.* (1858) 191.—Am. bor.
ternata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 399=Illigera dubia.
tetraptera, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 686.—Am. bor.

HAIiPOKDIA, F. Muell. Fragm. v. 43 (1865). *RUTACEAE,* Benth. & Hook. £ i. 992.
drupifera, *F. Muell. I. c*—Austral,
scleroxyla, *F. Muell. I. c.* vii. 142.—Austral.

HAXGANIA, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 448. t. 59 (1826). *BORAGINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 842.
anagalloides, *Endl. in Ann. Wien.Mus.* ii. (1838) 204.—Austral.
andromedi/olia, Behr. & F. Muell. ex F. Muell. Fragm. i. 209-lavandulacea.
Bebrana, Oldfield 4 F. Muell. ex F. Muell. 1. c.= littoralis.
corymbosa, *Lindl. Swan River App.* 40.—Austral.
cyanea, Lindl. 1. c. = strigosa.
integerrima, *Endl. in Ann. Wien.Mus.* ii. (1838) 205.—Austral.
lavandnlacea, *Endl. I. c.*—Austral.
Lehmanniana, Sond. in Lehm. PI. Preiss. ii. 238 = Preissiana.
littoralis, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 449. t. 69.—Austral.
Preissiana, *Lehm. PI. Preiss. i.* 347.—Austral,
sericiflora, *Benth. Fl. Austral,* iv. 402.—Austral,
solanacea, *F. Muell. in Hook. Ken Journ.* ix. (1857) 21.—Austral,
strigosa, *Schlecht. in Linnaea,* xx. (1847) 614 Austral.
tuberculosa, Schlecht. 1. c. 615-strigosa.

HALIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 175 -Halesia, Linn. (Styrac).

HALIANTHUS, Frits, Fl. Halland. 75 (1817) - Aranaria, Rupp. (Caryophyll.)-
peploides. Fries, 1. c. = A. peploides.

HALIBRKXIA, Phil, in Linnaea. xxxiii. (1864-65) 208 -ALIBREXIA, Miers-Dolia, Lindl. (Convolv.).

HAL.1MIUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér II. vi. (1886; 365 = Helianthemum, Toum. (Cistin.).
alyssoides, Lamotte, Prod. 112 = Helianth. guttatum.
atriplicifolium, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 866 = Helianth. atriplicifolium..
Clusii, Spach, 1. c. 365=Cistus Clusii.
erioeephalum, Willk. Ic. et Desc PI. ii. 62. t. 105 = Helianth. erioeephalum.
formosum, Willk. I. c 59.1.101 = Helianth. formosum.
halimifolium, Willk. in Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 717 = Helianth. halimifolium.
heterophyllum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 866 = Helianth. ocymoides.
hirsutissimum, Willk. Ic. et Desc. PI. ii. 64. t. 106 = = Helianth. hirsutissimum.
lasianthum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 366 = Helianth. alyssoides.
lepidotum, Spach, 1. c.-• Helianth. halimifolium.
Libanotis, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 90 (Pugill. 285) = Helianth. Libanotis.
multiflorum, Willk. Ic. et Desc PI. ii. 67. t. 108-Helianth. halimifolium *1*
occidental, Willk. 1. c. 59. t. 103 - Helianth. occidentale.
ocymoides, W illk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 715 = Helianth. ocymoides.
rosmarini/olium, Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. II. vi. (1836) 866 = Helianth. Libanotis.
umbellatum, Spach, 1. c-Helianth. nmbellatum.

HALIMOCKEMI8, C. A. Mey. in Lcdeb. Fl. Alt. i. 381 (1829). *CHENOPODIACEAE,* BenVh. *Sc* Hook, f. iii. 74.
HALOTIS, Bunge, Anabas. Rev. 73. t. 1 (1862).
alternifolia, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 198-Petrosimonia crassifolia.
Belangeri, Moq. 1. c.= Halianthium rarifolium.
brachiata, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 381 = Petrosimonia brachiata.
caspica, Moq. Chenop. Enum. 156-Nanophytum caspicum.
crassifolia, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 385-Petrosimonia crassifolia.
gamocarpa, Moq. Chenop. Enum. 165 (= *Gamanthus gamocarpus).*—Persia.
glauca,C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 885-Petrosimonia crassifolia.
hirsuta, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 192-malacophylla.
hispida, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. PtHersh. i. (1843) 360 = Halocharis hispida.
Hohenackeri, Presl, Bot. Bemerk. 109 - Petrosimonia brachiata.
juniperina, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 386-Nanophyton caspicum.
Karelini, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 106.—Reg. Casp.; Soongar.
Kirilmaii, Fenzl, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 844 = Salsola affinis.
Kowalenskyi, Stchegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 328. t. 5. f. 8 - Halanthium rarifolium.
Kulpiana, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 313 = Halanthium Kulpianum.
longifolia. *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 643—Turkest.
macrantha, Bunge, in Ledeb. Fl. Ross. iii. 848 = macranthera.
macrantha, Kar. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1839) 168 =Nannphytum caspicum.
macranthera, *Bunge, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1847) 475.—Turkestan.
malacophylla, Kar. *Sc* Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiv. (1841) 732-Salsola affinis.
malacophylla, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* i. 387.—Reg. Caucas.; Sibir.
microphylla, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 816 «= —Salsola gemmascens.
molliisima, *Bunge, Anabas. Rev.* 71.—Persia.

HALIMOCNEMIS :—
monandra, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 384 = Petrosimonia monandra.'
obtusifolia,Schrenk,in Boll. Phys.-Math.Acad. Pétersb. i. (1843) 79 = Halogeton obtusifolius.
occidentalis, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 279, 1!>9-Nitrophila occidentalis.
oppositifolia, Eichw. Casp. 154 <= Petrosimonia crassifolin.
pilifera, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 195 = pilosa.
pilosa, *Moq. Chenop. Enum.* 152.—Persia.
pubescens, Ledeb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 876 (Quid ?\—Sibir.
purpurea, Moq. Chenop. Enum. 153 = Halanthium purpureum.
pycnantha, C. Koch, in Linnaea, xxii. (184!)) 193 = Halanthium Kulpianum.
sclerantha, Schrcnk, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 846 = Karelini.
sclerosperma, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* i. 387.—Tauria; As. med.
sibirica, C. A. Mey. 1. c. 382 = Petrosimonia sibirica.
Smimowii, *£unge,in Act. Hort.Petrop.* v.(1877', 644. —Turkestan.
spicata, Presl, Bot. Beinerk. 109 (Quid ?).—Aegypt.
squarrosa, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 360=Petrosimonia squarrosa.
sulphured, Moq. Chenop. Enum. 152 = Halocharis sulphurea.
tomentosa, Moq. 1. c. 151 = Salsola canescens, Noaea Tonrnefortii.
triandra, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 197 = Petrosimonia Volvox.
villosa, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 474 = pilosa.
villosa, */Car. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Afosc.* xv. (1842)434.— As. med.
Volvox, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 883 = Petrosimonia Volvox.

HALIMOCNEMUM, Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. lv. (1880) II. 182 = Halocnemum, M. Bieb. (Chenop.).

HALIMODEMDBOIT, Fisch. ex DC. Mém. Lég. 283 (1825). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 505.
HALODENDRON, DC. Prod. ii. 269 (1825)
argenteum, *Fisch. in DC. Prod.* ii. 269.—Keg. Caucas.; Persia; As. bor.
cuspidatum, Jaub. & Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xviii. (1842; 239= argenteum.
emarginatum, Jaub. *Sc* Spach, 1. c. = argenteum.
speciosum, Carr. in Rev. Hortic. (1876) SO = argenteum.
subvirescens, G. Don, Gen. Syst. ii. 244 - argenteum.
triflorum. Link, Handb. ii. 201=argenteum.

HALIMOIiOBOS, Tausch, in Flora, xix. (1836) 410. *CRUCIFERAE.*
patula, *Tausch, 1. c.*—Hab. ?
strict a, Tausch, 1. c.=Arabis lasioloba.

HAL1MUS, Linn. Syst. ed. I (1735)=Atriplex, Linn. (Chenop.).
australis, T. Nees, Gen. PI. Monochl. n. 64, in nota = A. portulacoides.
borealis, T. Nees, 1. c. = A. portulacoides.
pedunculatus, Wallr. Sched. Crit. 117 = A. pedunculata.
portulacoides, Dum. Fl. Belg. 20-A. portnlacoides.
portulacoides, Schur, Enum. PI. Transs. 578= A. pedunculata.

HALLACKIA, Harv. The.s. Cap. ii. 2. 1.102 (1863) = Huttonaea, Harv. (Orchid.).
fimbriata, Harv. 1. c. = H. fimbriata.

HALLERA.St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 171 = seq.

HALLERIA, Linn. Coroll. Gen. 10 (1737). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 936.
abyssinica, *Jaub. V Spach, Illustr.* v. 66. L 459, 460. —Abyssin.
elliptica, *Linn. Sp. PI.* 625.—Afr. austr.
elliptica, Thunb. Prod. PI. Cap. 98 = lucida.
lignstrifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 273.—Madag.

HAHiEBIA:—
lucida, *Linn. Sp. PI.* 625.—Afr. austr. et trop.
ovata, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 54. —Afr. austr.
tctragona, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 214. —Madag.

HALLESIA, Scop. Introd. 141 (1777)-HALESIA, P. *hi.* = Quettarda, Linn. (Rubiac).

HALLIA, Jaume St Hil. in Bull. Soc. Philom. (Dec. 1813) 192=Alysicarpu8, Neck. (I.egumin.).
bupleurifolia, Jaume St. Hil. 1. c. = A. bupleurifolius.
glumacea. Wall, ex Wight *Sc* Am. Prod. 234=A. glumaceus.
salidfolia, Jaume St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (Dec. 1813) 192 = A. longifolius?
vaginalis, Jaume St Hil. 1. c.=A. vaginalis.

HALLIA, Thunb. in Schrad. Joum. i. (1799) 818. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 523.
al-ita, *Thunb. 1. c.* 31!).—Afr. austr.
angustifolia, DC. Prod. ii. 123 = virgata.
argentea, Spreng. Syst. iii. 195 — Ammodendrum Sieversii.
Asarina, *Thunb. in Schrad. Joum.* i. (1799) 322.—Afr. austr.
Bojeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1884) 432. —Madag.
coavexa, Burch. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 232 = H. Asarina.
coidala, *Thunb. in Schrad. Journ.* i. (1799) 321.— Afr. austr.
filiformis, *Harv. in Harv. if Sond. Fl. Cap.* ii. 232.— Afr. austr.
flaccida, *Thunb. in Schrad. Journ.* i. (1799) 319.— Afr. austr.
glauca, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 190 = Indigofera albicans.
hirta, Willd. Sp. PI. iii. 1169 = Heylandia latebrosa.
imbricata, *Thunb. in Schrad. Journ.* i. (1799) 322.— Afr. austr.
juncea, Otto, ex Steud. Nom.ed. II. i. 720 = Lespcdeza juncea.
lineata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5762 = Flemmingia lineata.
monophylla, Desv. in DC. Prod. ii. 123 =• Heylandia latebrosa.
ruscifolia, Bot. Mag. ex Steud. Norn. ed. II. i. 720 = imbricata?
sagittata, Desv. in Ann. Sc. Nat Ser. I. ix. (1826) 408 = Desmodium sagittatum.
Sororia, Willd. Sp. PI. iii. 117b = EleiotisSororia.
trifoliata. Roth, Nov. PI. Sp. 852 = Rhynchosia rufescens.
virgata, *Thunb. in Schrad. Journ.* i. (1799) 820.—Afr. austr.

HALMIA, M. Roen. Syn. Rosifl. 101, 334 (1847) = Crataegus, Toura. (Rosac).
cornifolia, M. Roem. 1. c. 135=C. tomentosa.
flabellata, M. Roem. 1. c. 136=C. coccinea.
lobata, M. Roem. 1. c. = C. grandiflora, *C. Koch,*
punctata, M. Roem. 1. c. 134=C. tomentosa.
tomentosa, M. Roem. 1. c. 135=C. tomentosa.

HALMYRA,Herb.Amaryll.202 (1837) - Pancratium, Linn. (Amaryllid.).
stellaris, Parl. Nov. Gen. Monocot. 28= P. illyricum.

HALOCHARIS, Bicb. ex DC. Prod. vi. 665 (1837) = Centaurea, Linn. (Compos.).
altaica, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. 720=Leuzea salina.
carthamoides, Bieb. ex DC. Prod. vi. 666=C. carthamoides.

HALOCHABIS, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 201 (1849). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 73.
Abichii, C Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 92 = Halanthium rarifolium.
clavata, *Bunge, Anabas. Rev.* 64.—Afghan.
gamocarpus, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 201 *(=-Gamanthus gamocarpus).*—Persia ; Afghan,
hispida, *Bunge, Anabas. Rev.* 62.—Oriens.
Kulpiana, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 92, in obs. = Halanthium Kulpianum.

HAIiOCHABIS :—
pycnantha, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 91' Halanthium rarifolium.
sulphura, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 201.—Oriens.
vesiculosa, Moq. 1. c. 202 = Halarchon vesiculosus.
violacea, *Bunge, Anabas. Rev.* 63.—Afghan.

Ef AIIOCHIIOA, Griseb. in Goett Abh. xxiv. (1879) 285. *GRAMINEAE.-4X. benth. Sc* Hook. f. Gen. iii. 1096.
acerosa, *Griseb. 1. c.*—Reg. Argent.

HALOCNEMON, Spreng. Syst. i. 19 (1825) =seq.

HALOCNEMUM, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 8 (1819). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 64.
HALIMOCNEMUM, Lindem. in Bull. Soc Nat. Mosc. lv. (1880) II. 182.
HALOCNEMON, Spreng. Syst. i. 19 (1825).
americanum, Gill, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 150 = Heterostachys Rittcriana.
amplexicaule, Tineo, ex Ung.-Stemb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 326 = Halopeplis amplexicaulis.
arabicum, Spreng. Syst. i. 19 = Kalidium caspicum.
australasicum, Moq. Chenop. Enum. 110 = SalicomU australis.
caspicum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 3«Halostachys caspica.
caspicum, Tausch, in Flora, xv. (1832) 737 = Kalidinm caspicum.
cinereum, F. Muell. Fragm. i. 140-=Salicornia cinerea.
cruciatum, *Tod. Ind. Sent. Hort. Panorm.* (1872J 40; *et in Nuov. Giorn. Bot.* (1873) 159.—Ital. •
foliatum, Spreng. Syst. i. It) = Kalidium foliatum.
fruticosum, *D. Dietr. Sp. PI.* i. 88; *Link, Handb.* "• 414.—Europ. austr.; Afr. bor.
glaucum, Presl, Bot. Bemerk. 109 = Salicornia fruticosa-
monandrum, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iv. 664' Ofaiston paucifolium.
moniliforme, Tausch, in Flora, xv. (1832) 738, in obs. = Halopeplis pygmaea.
nodulosum, Spreng. Syst. i. 19 — Halopeplis ample"1, caulis.
Ritterianum, Moq. Chenop. Enum. 109 - Heterostachys Ritteriana.
strobilaceum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 3.—Ta»[>] Casp.
strobilaceum, Moris, FL Sard. iii. 868= cruciatum.

HALODENDRON, DC. Prod. ii. 269 (1825) - Halim[0]" dendron, Fisch. (Legumin.).

HALODENDRON, Roem. & Schult. Syst. iii- [4.85] (1818)= HALODENDRUM, Thou. = Avieenntf" Linn. (Verben.).
Thouarsii, Roem. *Sc* Schult. 1. c. = A. officinalis.

HALODENDRUM, Thou. Gen. Nov. Madag. 8 (1806) - praec.

HALODULA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 1018 (1883)- sphalm. = seq.

HAIiODTTLE, Endl. Gen. Suppl. i. 1368 (1841). *NAIADACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1019.
australis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 227.—Mare »»• Malaya.
uninervis, Boiss. Fl. Orient, v. 24 = australis.
Wrightii, *Aschers. in Siteb. Ges. Naturf. Fr. W* (1868) 19.—Cuba.

HALOGETON, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i-[s7 f] (1829). *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hoc*. '• iii. 75.
AGATHOPHORA, Bunge, in Mem. Acad. PetersD. VII. iv. (1862) n. 11 (Anabas. Rev.) 92.
MICROPEPUS, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. (1851) 474 (Rel. Lehm. 298).
acutifolius, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pitersb-* (1847) 477.—Sibiria.
alopecuroides, *Moq. Chenop. Enum.* 161.—Aeg/r
arachnoides, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 205.—S^'fe.
articulatus, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (187»P »• —Hisp.; Marocc.; Aegypt.
Baillonis, *Aschers. in Journ. Linn. Soc.* «- ^ 317, nomen.—Bermuda.

HALOGETON:—
cinereus, Moq. Chenop. Enum. 159 - Seidlitzia florida.
georgicus, Moq. ih DC. Prod. xiii. II. 205-Salsola verrucosa.
glomeratus, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* i. 378.—Reg. Casp. 4 As. bor.
Jaubertianus, Bal. ex Boiss. Fl. Orient iv. 954 = Salsola spissa.
malacophyllns, *Bunge, Lehm. Reliq. Bot.* (1847) 302.—Turkestan.
monandrus, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 397° Ofaiston paudfolium.
obtusifolius, *Fenzl, ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 884.—Sibir. alt.
Olivieri, Moq. Chenop. Ennm. 159=Salsola spissa.
oppositiflorus, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* i. 878.—Rossia; Sibir.
oppositifolius, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. iii. 838 = Salsola brachiata.
paronychioides, *Less, in Linnaea,* ix. (1834) 198.—Reg. Casp.
purpureus, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. iii. 838, in nota "Halanthium pnrpureum.
rarifoliiis, Fenzl, 1. c. 884 - Halanthium rarifolinm.
sativus, *Moq. Chenop. Enum.* 158.—Algeria.
spinosissimus, C. A. Mey. Vera. Pfl. Cauc. 159- Noaea spinosissima.
tamariscifolia, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 378 = Salsola tamariscifolia.
tetragonus, Moq. Chenop.Ennm.159 = Salsola tetragons.
tetrandrus, Moq. 1. c. 160 = Salsola tetragona.
tibeticus, Bunge, Anabas. Rev. 94 = glomeratus.
Tournefortii, *Jaub.V Spach, Illustr.* ii. 43. t. 182.—Persia.

HALOLACHNA, Endl. Gen. 1037 (1840) = Hololachna, Ehrenb. (Tamariscin.).

HALOPEPIiIS, Bunge, in Linnaea, xxviii. (1856) 573. *CHENOPODIA CEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 64.
amplexicaulis, *Ung.-Sternb. ex Cesati, Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital.* 271.—Reg. Mediterr.
Gilliesii, *Griseb. in Goett. Abh.* (1879) 38.—Reg. Argent.
nodulosa, Bunge, in Linnaea, xxviii. (1856) 578 = amplexicaulis.
patagonica, Ung.-Stemb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 330 = Spirostachys patagonica.
Perfoliata, *Bunge, ex Schweinf. V Anchors, in Fl. Aethiop.* 289, nomen; *et ex Ung.-Stemb. 1. c.* 329.—Aegypt.; Arab.
Pypnaea, *Bunge, ex Ung.-Sternb. Syst. Salic.* 106.—Ross.; Soongar.
K'tteriana, Bunge, ex Ung.-Stemb. 1. c. 100 = Heterostachys Ritteriana.
songarica, Bunge, ex Ung.-Stemb. 1. c. 105-pygmaea.
'ttabilacea, Cesati, Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. '•l^Halocnemum strobilaceum.

HALOPETALUM, Steud. Nom. ed. II. i. 188, in syn. U840) = Banisteria, Linn. (Malpig.).

HALOPHILA, Thou. Gen. Nov. Madag. 2 (1806). "yDROCHARIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 455.
BARKANIA, Ehrhb. & Hempr. in Abh. Acad. Berl. (1832) 429.
^Honii, *Aschers. in Neumayer, Anleit. Wissensch. Beob.* 367.—Ind· occ.
Be«arii, *Aschers. in Nuov. Giorn. Bot.* Hi. (1871) 802.—Borneo.
mgelmanni, *Aschers. in Neumayer, Anleit. Wissensch. Beob.* 368.-Florida.
K°*tschyana,* Fenzl, ex Aschers. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 173 = ovata.
'•"nnopsis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 230 = ovate.
"rtagascariensis. Steud. Nom. ed. II. *I* 720 = ovata.
"•"7W, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 230-ovate.
™<"«, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 45=seq.
°v«a, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 480. t. 40. f. 1.—As. trop., Austral.
spinulosa, *Aschers. in Neumayer, Anleit. Wissensch. Beob.* 868 ; *Benth. Fl. Austral,* vii. US.-Anstral.
stlPnlacea, *Aschers. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berl.* U867) 3.—Geront. trop.

HALOSAQIS, Forst. Char. Gen. 61. t. 81 (1776). "At-ORAGEAE, Benth. & Hook. f. i. 674.
CERCODIA, Murr. in Comm. Getting, iii. (1780) 1. t. 1.

HALOBAGIS:-
GONATOCARFUS, Schreb. Gen. i. 86 (1789).
GONOCARPUS, Thunb. Nov. Gen. iii. 55 (1783).
LINOCIRIA, Neck. Elem. iii. 366 (1790).
acanthocarpa, *Brongn. in Duperr. Voy. Cog. Bot.* t. 70.—Austral.
aculeolata, *Benth. Fl. Austral,* ii. 477—Austral,
acutangnla, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 125.—Austral,
aggregate, *J. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* iv. (1872) 224.—N. Zel.
alata, *Jacq. Misc.* ii. 332; *Ic. PI. Rar.* i. 7. t. 69.—Austral.; N. Zel.
alternifolia, Walp. Rep. ii. 99 = alata.
aspera, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 306 = ceratophylla.
capensis, *Nois. ex Colla, Hort. Ripul.* 63.—Afr. austr.
ceratophylla, *Zahlbr. ex Endl. Atakta Bot.* 16. t. 15.—Austral.
Cereodia, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 87=alata.
citriodora, Walp. Rep. ii. 99=: micrantha.
confertifolia, *F. Muell. Fragm.* x. 58.—Austral,
cordigera, *Fentl, in Enum. PI. Hueg.* 45.—Austral,
cyathiflora, *Fenzl, 1. c.* 44.—Austral,
depressa, *Walp. Rep.* ii. !>9.—Austral.; N. Zel.
digyna, *Labill. Nov. Noll. PI.* i. 101. t. 129.—Austral.
disticha, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 19 - Anisophyllea disticha.
elata, *A. Cunn. ex Fenzl, in Enum. PI. Hueg.* 45.—Austral.
elata, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 475 = teucroides.
filiformis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 628 = heterophylla.
foliosa, *Benth. Fl. Austral,* ii. 477.—Austral,
glauca, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 91.—Austral.
Gonocarpus, Sprang. Syst. ii. 261 = tetragyna.
Gossei, *F. Muell. Fragm.* viii. 161.—Austral.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. i. 120 = teucroides.
heterophylla, *Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot.* t. 68.—Austral.
hexandra, *F. Muell. Fragm.* iii. 81.—Austral.
incana, Walp. Rep. ii. *M* = tetragyna.
intricata, *Benth. Ft. Austral,* ii. 481.—Austral.
ivae/olia, Salisb. Piod. 276 = alata.
Lamberti, *Montr, in Mem. Acad. Lyon,* x. (1860) 199.—N. Caled.
lanceolate, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 482.—Austral.
leptotheca, F. Muell. Fragm. iii. 32-acanthocarpa.
micrantha, *R. Br. ex Sieb.* b* *Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat.* i. 25.- As. or.; Austral.; N. Zel.
monosperma, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. W.* x. (18S5) 197.—Aubtral.
montana, Hook. f. in Hook. Lond. Joum. Bot. vi. (1847) 475 = depressa.
mucronata, *Benth. Fl. Austral,* ii. 475.—Austral,
nodulosa, *Walp. Rep.* v. 672.—Anslral.
odontocarpa, *F. Muell. Fragm.* i. 108.—Austral.
oligantha, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 336=Serpicula zeylanica.
oligantha, Wight & Am. Prod. 388-Myriophyllum intermedium,
paniculata, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 481.—Austral,
pinnatifida, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 627. -Austral.
pinnatifida, Hook. f. Fl. Tasm. i. 119=ceratophylla.
pithyoides, *Benth. Fl. Austral,* ii. 476.—Austral,
platycarpa, *Benth. I. c.* 478.—Austral,
prostrata, *Forst. Char. Gen.* 62. t. 81.—N. Caled.
pusilla, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 481.—Austral,
racemosa, *Labill. Nov. Holl. PL* i. 100. t. 128.-Austral.
rotundifolia, *Benth. Ft. Austral,* ii. 480.—Austral,
rudis, *Benth. 1. c.* 480.—Austral,
salsoloides, *Benth. 1. c.* 465.—Austral.
scabra, Benth. Fl. Hongk. 189=tetragyna.
scoparia, *Fenzl, in Enum. PI. Hueg.* 45.—Austral,
scoidioides, *Benth. Fl. Austral,* ii. 485.—Austral.
serpyllifolia, Walp. Rep. ii. 99 = depressa.
Serra, *Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot.* t. 69.—Austral,
strict*, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 482.—Austral.

HAIOKAOIS:—
tenella, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 68. f. B = micrantha.
tenuifolia, *Benth. Fl. Austral-* ii. 477.—Austral.
Tetragonia, L'Hirit. Stirp. Nov. 82 = alata.
tetragyna, *Hook.f. Fl. N. Zel. i.* 62.—As. or.; Austral. J N. Zel.
tetrpndra, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *App.* 405.—Bras,
teucroides, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped. i.* 625. Austral.
trichostachya, *Benth. Fl. Austral,* ii. 481.—Austral,
trifida, *Walp. Rep.* v. 672.—Austral,
trigonocarpa, *F. Muell. Fragm.* x. 84.—Austral,
uniflora, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* ix. (1877) 548. - N . Zel.
vernicosa, Walp. Rep. ii. 99 = depressa.

HALOSCHOENUS, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = Bynchospora, Vahl (Cyperac).
albidus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.122 = R. albida.
capillaris, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = R. tenuis.
caracasanus, Liebm. in Videtisk. Sclsk. Skr. V. ii. (1851) 249 = R. tennis.
contractus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 128 - R. micrantha.
elatior, Nees, 1. c. 120 = R. stricta.
emaciatus, Nees, I. c 121 = R. tennis.
kispidulus, Nees, 1. c. 124.—Bras.
nardifolius, Nees, 1. c. 122 ^R. nardifolia.
pygmaeus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 = R. micrantha.
rigidus, Nees, ex Kunth, Enum. PI. ii. 300 = R. polyphylla.
riparius, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 120 - R. tenuis.
sabulosus, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296 » R. tenuis.
sparsus, Nees, 1. c.-=R. micrantha.
stoloniferus, Nees, in Mart. *i*\. Bras. ii. I. 120 - R. stolonifera.
tenellus, Nees, 1. c. 123--R. tenella.

HALOSCIAS, Fries, Summ. Vcg. Scand. 180 (1846) = Iiigusticum, Linn. (Umbellif.).
scoticum, Fries, 1. c. = L. scoticum.

HALOSTACHYS, C. A. Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 361. *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 63.
caspica, *C. A. Mey. 1. c.* (caspia).—Reg. Casp.; Turkestan.
nodulosa, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. i. (1843) 361 - Halopeplis amplexicaulis.
occidentalism S. Wats, in Hot. King's Exped. 293 •= Spirostachys occidentalis.
patagonica, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 148 = Spirostachys patagonica.
perfoliata, Moq. 1. c.= Halopeplis amplexicaulis, Halopeplis perfoliata.
Ritteriana, Moq. 1. c. = Heterostachys Ritteriana.
songarica, Schrenk.in Bull. Miys.-Math. Acad. Petersb. i. (1843) 361 = Halopeplis pygmea.

HALOSTEMMA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1056 (1883), sphalm.=ilapania, Aubl. (Cyperac).

HALOTHAMNUS, Janb. & Spach, Illustr. ii. 50. t. 13(i (1846) = Salsola, Linn. (Chenopod.).
Bottae, Jaub. & Spach, 1. c. = S. Bottae.

HALOTHAMNUS, F. Mnell. PI. Viet. i. 168 (1862)- Plagianthus, Forst. (Malvac).
microphyllus, V. Mue 1.1. c. 159 = P. microphyllus.

HALOTIS. Bunge, Anabas. Rev. 78. t. 1 (1862) = Halimocnemis, C. A. Mey. (Chenopod.).
occulta, Bunge, 1. c. 74.—Persia.

HALiOXYIiON, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. vii (1851) 468. *CHENOPODIACEAE,* Benth. & Hook. *I* iii. 70.
Ammodendron, *Bunge, I. c.* 469.—Turkest.
articulatum, *Bunge, I. c.*—Reg. Meditcrr. occ.; Syria ; Arab.

HALOXYLON:—
floridum, *Fend, in Ledeb. Fl. Ross.* iii. 819.—Reg. Cauc.
Grifrjthii, *Boiss. Fl. Orient,* iv. 950.—Afghan,
mnltiflorum, *Bunge, ex Boiss. I. c.* 949.—Afghan.
persicum, Bnnge, ex Boiss. & Buhse, in Nouv. Mlm. Soc Nat. Mosc xii. (1860) 189 - H. Ammodendron.
ramosissimom, *Benth. (r Hook./. Gen.* iii. 70.—Syria,
iccurvum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 949.—Beluchist.; Ind. or.; China.
Regelii, *Bunge, in Bull. Acad. Pitersb.* zxv. (1879) 368.—Turkestan,
salicornicum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 949.—Persia; Afghan.
Schmittianam, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 334.—Alger.
scoparium, *Pomel, I.* c. 835.—Alger.
Stoetsii, Hook. f. in Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 70-recnrvum.
subulifolium, *Bunge, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 488.—Turkestan.
Thomsoni, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* iv. 950, in obs. —Tibet, occ.

HALYMUS, Wahlenb. Fl. Sncc. ii. 662 (1826) = HALIMUS, Linn.-Atriplex, Tonm. (Chenopod.).

HAMADBYA8, Comm. ex Juss. Gen. 232 (1789). *RANUNCULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 6.
andicola, Hook. Ic. Fl. t. 137 = Anemone integrifolia.
argentea, *Hook.f. Fl. Antarct.* 227.—Ins. Falkland.
Kingii, *Hook.f. I. c.* 228.- Reg. Magellan,
magellanica, *Lam. Encyc.* iii. 67.—Reg. Magellan,
tomentosa, DC. Syst i. 227 = magellanica.
tomentosa, Hook. f. Fl. Antarct. t. 85 (sphalm.) = argentea.

HAMALIUM. Hemsl. BioL Centr. Am. Bot. ii. 187 (1881) sphalm.=HAMULIUM, Cass. - Verbeaina, Linn. (Compos.).

HAMAMELIS, Gronov. ex Linn. Gen. ed. II. 54 (1742). *HAMAMELIDEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 667.
TRILOPUS, Mitch, in Act. Nat. Cur. viii. (1748) App. 219.
afra, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 4 (Quid 1).—Afr. austr.
androgyna, Walt. Fl. Carol. 255= virginiana.
arborea, Ottolander, ex Mast, in Gard. Chron. (1874) I. 187 = japonica.
earoliniana, Walt ex Steud. Norn. ed. I. 388 = virginiana.
chinensis, R. Br. in Abel, Nan. Joum. Chin. 375 = Loropetalum chinense.
corylifolia, Moench, Meth. 273=virginiana.
dentata, Rafin. New Fl. Am. iii. 17 = virginiana.
dioica, Walt. Fl. Carol. 255 - virginiana.
estivalis, Rafin. New Fl. Am. iii. 16 = Fothergilla Gardeni ?
hyemalis, Rafin. 1. c.=virginiana.
japonica, *Sieb. I* Zucc. in Abh. Akad. Afuenek.* iv. II. (1843) 198.—Japon.
macrophylla, Fursh, Fl. Am. Sept. i. 116 =. virginiana.
monoica, Walt. Fl. Carol. 255 - Kothergilla Gardeni!
nigra, Kafin. New Fl. Am. iii. 16 = virginiana.
parvifolia, Rafin. Med. Bot. i. 230=virginiana.
persica, DC. Prod. iv. 268 <=Parrotia persica.
riparia, Rafin. New Fl. Am. iii. 16=virginiana.
rotundifolia, Rafin. 1. c.=virginiana.
virginiana, *Linn. Sp. PI.* 124.—Am. bor.
virginica, Linn. Syst. ed. XII. 129«praec.
Zuccariniana, Ottolander, ex Mast, in Card. Chron. (1874)1. 187 =japonica.

HAMARIA, Four, in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 364= Astragalus, Tourn. (Legumin.).
uncinata, Fourr. 1. c.-A. hamosus.

HAMARIA, Kunze, ex Reichb. Consp. 212[b] (1828) <Rosac.'-(Quid≤).

HAMATOLOBIUM, Fend. Pugill. PI. Nov. Syr. 3 (1842) = Hammatolobium, Fenzl (Legumin.).

HAMATRIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 11 (1866) - Dioscorea, Linn.
triphylla, Salisb. 1. c. 12 - D. triphylla.

HAMBERGERA, Scop.Introd. 106 (1777)=Caeoucia, Aubl. (Combretac).

HAMELIA, Jacq. Enum. PI. Carib. 2 (1760); Select. Am. 71 (1763). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 75.
DUHAMELIA, Pers. Syn. i. 203 (1805).
LONICERA, Adans. Fam. ii. 157 (1763).
TANGARACA, Adans. 1. c 143 (1768^.
TEPESIA, Gaertn. f. Fruct. iii. 72. t. 192 (1805).
appendiculata, Gaertn. f. Fruct. iii. 64-= axillaris.
axillaris, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 46.—Ind. occ.
breviflora, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 17—Cuba.
chrysantha, Jacq. Coll. iii. 204 =lutea.
chrysantha, Sieber, ex Steud. Norn. ed. II. i. 721 =• patens.
chrysantha, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 46.—Ind. occ.
coccinea, Sw. 1. c. =• patens.
connata, Wall, ex DC. Prod. iv. 338 = Leycesteria formosa.
cuprea, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 320.—Jamaic.
erecta, Jacq. Enum. PI. Carib. 16 = patens.
glabra, Lam. Encyc. iii. 65=Amaioua guianensis.
grandiflora, L'Hérit. Sert Angl. 4. t. 7=ventricosa.
Tanoginosa, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 238.—Mexic.
latifolia, Reichb. ex DC. Prod. iv. 442-patens.
lucida, Desf. Tabl. ed. II. 185 •= axillaris.
lutea, *Rohr, ex Sm. in Rees, Cycl.* xvii. n. 4.—Am. trop.
Manglillo, Steud. Norn. ed. 1.388 = Myrsine Manglillo.
nodosa, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. I. (1844) 234.—Mexic.
odorata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 267-= suaveolens.
patens, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 16 ; *Select. Am.* 72.—Am. trop.
paudflora, Willd. ex Sprang. Syst. i. 765-ventricosa.
rostrata, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 442.—Mexic.
sessiliflora, Willd. Sp. PI. i. 981-Amaioua guianensis.
sphaerocarpa, *Ruit b" Pan. Fl. Per.* it. 69. t. 221.—Peruv.
suaveolens, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 414.—Am. austr.
ventricosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 46.—Am. austr.
vertidllata, [Moc, *8c* Sesse,] ex DC. Prod. iv. 442 = patens,
xorullensis, *H. B. b" K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 414.—Mexic.

HAMELINIA, A. Rich. Fl. Nouv. Zél. 158. t. 24 (1832) =Aatelia, Banks (Liliac). _
veratroides, A. Rich. 1. c.=A. veratroides.

HAMELLIA, Linn. Sp. PI. ed. II. 246 (1762) = Hamella, Jacq. (Rubiac).

HAMILTONIA, Harv. Gen. PI. Cap. ed. I. 298 (1888) = Colpoon, Berg (Santalac).
capensis, Harv. 1. c. *{Rhoiocarpus capensis,* A. DC). —Afr. austr.

HAMILTONIA, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iv. J114 (1805) = Pyrularia, Michx. (Sanul.).
oleifera, Muhl. ex Willd. 1. c. 1120 = P. pubera.

HAMILTONIA, Roxb. Hort. Beng. 15 (1814); Fl. Ind. i. 554 (1832). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 135.
SPERMADICTYON, Roxb. Corom. PI. iii. 32. t. 236 (1819).
dulina, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. FL Nep. 137 = suaveolens.
fruticosa, D. Don, 1. c.=Leptodermislanceolata.
inodora, Hassk. Cat. PI. Hort. Bog. Alt. 111 = Lasianthus inodorus.
lanceolata, Baill. Hist. PI. vii. 273 - Leptadenia lanceolata.
mysorensis, Wight & Am. Prod. 423"Suaveolens.
oblonga, Franca. PL Davidian. i. 164=Leptodermis oblonga.
pilosa, *Roxb. Hort. Beng.* 85; *Fl. Ind.* i. 555.—Ins. Molucc
propinqua, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 83. t. 91 = suaveolens.
scabra, D. Don, Prod. Fl. Nep. 137=suaveolens.
spectabilis, Can. in Rev. Hortic. (1872) 191 - suaveolens ?

HAMILTONIA:—
suaveolens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 187=Le,r>todennis lanceolata.
suaveolens, *Roxb. Hort. Beng.* 15; *Fl. Ind.* i. 654.—Ind. or.; China.

HAMILTONIA, Sprang. Syst. i. 831 (1825), partim - Comandra, Nutt. (Santalac).
elegans, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. f. 1162 = C. elegans.
sarmentosa, Sprang. Syst. i. 831 = C. livida.
umbellata, Sprang. 1. c - C. umbellata.

HAMMATOCAULIS, Tausch, in Flora, xviL (1834) 347 = Ferula, Tourn. (Umbellif.).
cretica, Tausch, 1. c. = F. nodosa *1*

HAMMATOLOBIUM, Fenzl, Illustr. PL Syr. 1.1.1 (1843). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. >• 509.
LUDOVICIA, Coss. in Bull. Soc Bot. Fr. iii. 67* (1856).
Kremerianum, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 744.—Alger.
lotoides, *Fenal, Illustr. PI. Syr.* 1.11.—Syria.

HAMOLOCENCHRUS, Scop. Introd. 73 (1777) = HOMALOCENCHRUS, Mieg. = Leersia, Sw. (Gramin.).

HAMOSA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. (1787) 376=Astragalus, Toum. (Legumin.).
Astragalus, Medic 1. c. = A. hamosus.
glyciphylla. Medic. 1. c.=*A. glyciphyllus.
trimestris, Medic. 1. c = A. trimestris.

HAMPEA, Schlecht. in Linnaea, xi. (1887) W[1, *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 211.
integerrima, *Schleckt. I. c.* 372.—Mexic.
thespesioides, *Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 188.—N. Granat.

HAMULIA, Rafin. FL Tellur. iv. 109 (lSSej-UtriO"-laria, Linn. (Lentib.).
alba, Rafin. 1. c. = U. alba.
flava, Rafin. 1. c.-U. flava.

HAMULIUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1820) 178! et in Diet. Sc. Nat. xx. 260 (1821)=VerbesU»»' Linn. (Compos.).
alatum, Cass. in Diet. Sc- Nat. xx. 261 = V. alata.
Wrightii, Sch. Bip. in Bonplandia, ix. (1861) 366 »
Wrightii, *Griseb.*

HANBTJH.IA, Seem, in Bonplandia, vi. (1858) *[9ll>
CUCURBITACEAE, Benth. & Hook. f. i. 836.
NIETOA, Schaffn. in La Naturaleza, iii. (1876) S**"
mexicana, *Seem. I. c.*—Mexic.

HANCEA, Seem. Bot. Voy. Herald, 409. t. 96 (1857)* Mallotus, Lour. (Euphorb.).
Hooieriana, Seem. 1. c. = M. Hookerianns.
muricata, Benth. Fl. Hongk. 30B =M. Furetianuf.

HAITCOBNIA, Gomez, in Mem. Acad. Iisboa, (1812) Mem. Corresp. 51. *APOCYNACEAE,* Ben"'-& Hook. f. ii. 693.
arboresceus, Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. B'*
vi. I. 22 *(-Zschoikia arborescens).—Bns.*
floribunda, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. !"• '''' t. 279 = Lacmellia floribunda.
Gardneri, Miers, Apocyn. S. Am. 12 = specioaa.
gracilis, Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. I. 21 *(=Zschokkia gracilis).*—Bras.
laxa, A. DC. in DC. Prod. viii. 826 = Ambela"'" laxa.
macrophylla, Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. *
vi. 1.18 = Ambelania quadrangularis.
microcarpa, Spruce, ex Muell. Arg. 1. c. 28 *(=ZsC»°kia microcarpa).*—Bras.
monosperma, Spruce, ex Muell. Arg. 1. c. *Zschokkia monosperma).*—Bras.
pubescens, Nees *8c-* Mait. in Nov. Act. Nat. Cm. (1823)86 = speciosa.
ramosissima, Spruce, ex Muell. Arg. in Mart. *»•
vi. i. 21 (= *Zschokkia ramosissima).*—Bras- .,0j2)
Speciosa, *Gomel, in Mem. Acad. Lisboa,* «'• *•
Mem. Corresp. 53.—Bras.

HANDSCHIA, Pohl, in Flora, viii. (182S) I. 183, nomen(Quidf).

HANGUANA, Blume, Enum. PI. Tav. 16 (1827) = Susum, Blume (Flagellar.).
Kassintu, Blnme, 1. c.=S. anthelminticum.

HANHAPOKDIA, F. Mnell. Fragm. ij. 9 (1860). *STERCUUACEAE,* Benth. & Hook, t i. 227.
Bissillii, *P. Muell. 1. c.* x. 95.—Austral,
quadrivalvis, *F. Muell. I. e.* ii. 9,-Austral.
Shanesii, *F. Muell. I. c.* vi. 175.-Austral.

HANITOA, Planch. inHook.Lond.Joum. Bot v.(1846) „668. *S1MARVLEAE,* Benth. & Hook. £ i. 308.
achweinfurthii, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* 1.1266.—Afr. trop.
andufata, *Planch, in Hook. Land. Journ. Sot.* V. (1846) 66?.-Afr. trap.

HANSALIA, Schott, in Oestr. Bot. Zdtschr. (1868) 82 =AmorphophalluB, Blume (Aroid.).
grata, Schott, I. c—Afr. trap.

HANSENIA, Turcz. in BuU. Soc. Nat Moic. rvii. (1814) 754=Ligusricum, linn. (Umbellif.).
nongholica, Tuna. L c.—MongoL

HANSTEINIA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. U8S4) 142. *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. !•• 1107.
enxalis, *Oerst. 1. c.* 143.—Costa Rica,

RAPALANTHUS, Jacq. Enum. PI. Carib. 1 (1760)-Calliaia, Linn. (Commelin.).
"fpens, Jacq. 1. c. 12=C. repens.

HAPALE, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 85=seq.

HAPALmu, Schott, Gen. Aroid. 85 (Hapale); Gen. Aroid. 44 (1858). *AR0WEAE,* Benth. & Hook. f. '".977.
Benthamiana, *Schott, II. cc.* 86; 45.—Reg. HimaL

HAPALOCARPUM, Miq. FL Ind. Bat. ii. I. 617 (1855) . =Ammannia, Houst. (Lythrar.).
™*Aicum,* Miq. 1. c. 618 = A. baccifera.
Vsicatorium, Miq. 1. c^A. baccifera.

HAPALOCHLAMYS, Reiehb. Norn. 80 (1841) - AfALOCHLAMYS, Cass. = Cassinia, R. Br. (Compos.).

HAPALOSA, Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 246 W874) =seq.

HA|ALOSU, WalL Cat. n. 6962; ex Wight & Am. «od. 358 (1884) = Folycarpon, Linn. (Caryophyll.),
L°*eftintfae,* WaU. Cat 1. c~P. Loeflingiae.

^APALOSTEPHIUM, D. Don, ex Sweet, Hort. Brit «S• I. 210 (1827); et in Edinb. N. Phtt. Joum. (Jan-Mar. 1829) 807-Crepia, Vaill. (Compos.).
olpestre, Sweet, Hort. Brit ed. HI. 413-C. alpaaris.
"totriacum, Sweet, 1. c ed. I. 210=C. blattarioides.
"oaticum, Sweet, 1. c. ed. III. 413=C. hieracioide*.
g"mdiflorum, G. Don, in Loud. Hort. Brit 326-.C. grandiflora.
*'f *acioides,* Sweet, Hort. Brit. ed. III. 413 - C. - nieracioides.
'yatum, G. Don, ex Load. Hort. Brit 326 = C. lyrata.
'"fophyllum, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joura. . (Jan-Mar. 1829) S08 = C. macrophylla.
WudosutK, D. Don, 1. c.=C. paludosa.
Mosum, x>. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Bnt 326 . " C. blattarioides.
fynnaicum, D. Don. in' Edinb. N. Phil. Joum. (Jan.-„Mar. 1829) 307=C. blattarioides.
™?"V»m, D. Don, 1. c. 808 =C. sibirica.
ty'nidosum, G. Don, in Loud. Hort. Bnt. 826 - c- blattarioides.

aA|ALUS, Endl. Gen. 400 (18S8)=APALUS, DC.= •"toanoBperma, Less. (Compos.).

HAPLACHNE, Presl, Rel. Haenk. i. 284. t. 38 (1830)= Dimeria, K. Br. (Gramin.).
pilosissima, Presl, 1. c 285. t. 88 «D. piloaissima.

HAPLANTHERA, Hochst. in Flora, xxvi. (1848) 71 = Buttya, Harv. (Acanthac).
speciosa, Hochst 1. c. 72.—Abyssin.

HAPLANTHTJ8, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 77 (1882). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1099.
hygrophiloides, *T. Anders, in Journ. linn. Soc.* ix. (1867) 503.—Burma.
nilghermuis, Wight, Ic iv. t. 1556-tentaculatus.
plumosus, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 604=tenUcnlatos.
tener, Nees, in Wall. PI. As. Rar. .iii. J115=Andrographis tenuiflora.
tentaculatus, *Nees, in DC. Prod.* xi. 513.—Ind. or.
verticillaris, *Nees, I. c*—Ind. or.

HAPLOCAEPHA, Less, in Linnaea, vi. (1831) 90. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 457.
DAMATKis, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 139; et in Diet. Sc. Nat xii. 471 (1818).
lanata, *Less. I. c.*—Afr. austi.
Leichtlinii, *If. E. Br. in Gard. Chron.* (1883) I. 78. —Afr. austr.t
Lessingii, DC. Prod. vi. 494 = lanata.
lyrato, *Harv. in Han. V Smd. fl. Cap.* iii. 465.—Afr. austr.
scaposa, *Harv. I. c.*—Afr. anstr.
Thunbergii, Hort ex N. E. Br. in Gard. Chron. (1883) I. 78-Leichtlinii.
Thunbergii, *Less. Syn. Comp.* 37.—Afr. anstr.

HAPLOCARYA, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 208 =APLOCARYA, LindL =Dolia, Lindl. (Convolv.).

HAPLOCHILUS, Endl. Ench. 113 (1841); Gen. Suppl. ii. 20 (1842)=Zeuxine, Lindl. (Orchid.).
affinis, D. Dietr. Syn. PL v. 178.—Ind. or.
flavus, D. Dietr. 1. c. 172=Z. flava.
longilairis, D. Dietr. 1 c. 173=Z. longilabris.
nen/osus, D. Dietr. 1. c. 172=Z. nervosa.
parmfloms, Blume, Orch. Archip. Ind. 110.—Malaya.
regius, D. Dietr. Syn. PI. v. 172; Blume, 1. c 111.— Malaya.

HAPLOCIiATHBA, Benth. in Journ. Linn. Soc v. (1860] 64. *TEXNSTROEMIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 189.
leiantha, *Benth. I. c*—Am. trop.
paniculata, *Benth. I.* c—Bras.

HAFIiOCOELTJH, Radlk. in Sitzb. Math. Phys. Acad. Mnench. viii. (1878) 336. *SAPINDACEAE.*
inopleum, *Radlk. 1. c.* 337.—Afr. trop.

HAPLODESMIUM, Naud. in Ann. Sc Nat Sér. III. xiv. (1850) 160. t. 5 = Chaetolepis, Miq. (Mela, stom.).
Lindenianum, Naud. I. c - C. Lindeniana.

HAPIiOfiBTHES, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) (PI. Fendl.) 109. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 441.
Gregg", *A. Cray, I. c*—Mexic.

HAPLOLOPHIUM, Endl. Gen. 712 (1839) - Aplolophium, Cham. (Bignon.).

HAPLOPAPPUS, Endl. Gen. 385 (1838) - Aplolopappua, Cass. (Compos.).

ILAPLOPETAIiOKT, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 60S. t 76 (1864). *RHIZOPHORBAE,* Benth. & Hook. £ i. 680.
AGATIA, Rich, ex A. Gray, Bot *V.* St Expl. Exped. i. 609 (1854).
multifiorum, *Baill. Adansonia,* iii. (1862-68) 40.—N. Caled.
Richii, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Bxped.* i. 608. t.76. —Ins. Sandvie.
Seemannii, *A. Gray, in Bonplandia,* x. (1862) 36.— Ins. Fiji

HAPLOPETALUM, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.596 (1855) - praec.

HAPLOPHYLLUM, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 766 (1882)=APLOPHYLLUM, A. Juss.=Buta, Linn.

HAPLOPHTTOW, A. DC. in DC. Prod. viii. 412 (1844). *APOCYNACEAE,* Benth. 8c Hook. f. ii. 722.
timicidum, *A. DC. 1. c.*—Mexic

HAPLOKHTJS, Engl. in Bot Jahrb. i. (1881) 419. *ANACARDIACEAE.*
peruvi-ina, *Engl. 1. c.*—Peruv.

HAPLOSCIADIUM, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 20=Trachydlum, Lindl. (Umbellif.).'
abyssinirum, Hochst 1. c = T. abyssinicum.

HAPLOSTELIS, Reichb. Norn. 56 (1841) -seq.

HAPLOSTELLIS, Endl. Gen. 219 (1837)-APLOSTELLIS, Thou.=Pogonia, Juss. (Orchid.).

HAPLOSTEMMA, Endl. Gen. Suppl. iii. 75 (1848) = Vincetoxicum, Rupp. (Asclep.).
arabicum, Endl. ex Decne. in DC. Prod. viii. 665 = V. fruticulosum.

HAPLOSTEMOM, Endl. Gen. 119 (18S6)~APLOSTKMON, Rafin.=8cirpUB,Liim. (Cyperac).

HAPLOSTEPHITJM, Mart, ex DC. Prod. v. 78 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 234.
Passerina, *Mart, ex DC. I.e.*—Bras,
ramosissimum, *Sch. Bip. in Pollichia,* xx-xxi. (1863) 875.—Bras.

HAPLOSTICHIA, Phil, in Linnaea, xxx. (1869-60) 198 = 8enecio, Toum. (Compos.).
stoloni/era, Phil. 1. c = S. zosteraefolia.

HAPLOSTIGMA, F. Muell. Fragm. viii. 100 (1873) = Loxooarya, R. Br. (Restiac).

HAPLOSTYLIS, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 295= Rynchospora, Vahl (Cyperac).
albiceps, Nees, in Mart.Fl. Bras.ii. 1.129 - R. albiceps.
armeriaefolia, Nees, 1. c. 126 = R. artnerioido.
tahiensis, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 295 - R. pterocarpa.
barbata, Nees, 1. c-Rjiterocarpa.
elatior, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.128-R. elatior.
hirta, Nees, 1. c. = R. hirta.
Humioldtii, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 295 - R. pterocarpa.
mexicana, Iiebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1861) 249 = R. mexicaua.
Meyenii, Nees, in Linnaea, ix. (1884)295=R. Wallichii.
minor, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.129.—Bras.

HAPLOTAXIS, Endl. Gen. 468 (1888,-APLOTAXIS, DC.=8ausBurea, DC. (Compos.).

HAPPIA, Neck. Elem. ii. 126 (17M)-Toooea, Aubl. (Melastom.).

HAPTOPHYLLUM, Vis. & Panë, in Mem. 1st Venet. xv. (1870) 14, spaalm.-APLOPHYLLUM, Juss.u Buttl, Linn.

HAQUETIA, D. Dietr. Syn. Fl. i. 582 (1888)=Haoquetia. Neck. (Umbellif.).

HABDENBEBGIA, Benth. in Enum. PI. Huee. 40 (1887). *LEGUM1NOSAE,* Benth. & Hook. f. ŬSO.
Comptoniana, *Benth. I. c.* 41.—Austral.
cordatu, Benth. 1. c.-raonopliylla.
digitata, Lindl. Bot. Reg. (.1840) Misc. 68=Comptoniaoa.
Huegelii, Benth. in Ennm. PI. Hueg. 41 - Comptoniana.
Lindleyi, Meissn. in Lehm. PI. Pieiss. i. 94«Comp. toniana.
macrophylla, Benth. in Enum. PL Haeg. 41-Comptoniana.
Matoyana, Lem. Illustr. Hortic. v. (1858) t. 179-Comptoniana.
monophylla, *Benth. Enum. PI. Hueg.* 41.—Austral.
ovata, Benth. 1. f·= monophylla.
retusa, *Benth. Fl. Austral,* ii. 247.—Austral.

HABDWICKIA, Roxb. Hort. Beng. S3 (1814); Pl. Corom. iii. 6. t. 209 (1819). *LEGUMINOSAE*, Benth. *Sc.* Hook. f. i. 586.
binata, *Roxb. II. cc.—Ini.* or.
Mannii, *Oliver, Ft. Trap. Afr.* ii. 816.—Afr. trop.
pinnate, *Roxb. Hort. Beng.* 33; *Fl. Ind.* ii. 425.—Ind. or.
traperiformis, R. Grab, in Wall. Cat. n. 5809 = binate.

HARGASSERIA, C. A. Mey. in Bull. Acad. Phys.-Math. P&ersb. i. (1843) 355 = Daphnopais, Mart. (Thymel.).
cestrifilia, Endl. Gen. Pl. Snppl. iv. II. 68=D. cestriiblia.
cubana, A. Rich. Fl. Cnb. Fanerog. ii. 198.—Cuba.
mexicana, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 358 = D. Bonplandii.
occidental, Griseb. in Goett. Abb. vii. (1857) 219 = D. Swartzii.
salicifolia, Endl. Gen. Pl. Suppl. iv. n. 68=D. salicifolia.
Schiedeana, Endl. 1. c. = D. Bonplandii.
tinifolia, Endl. 1. c. = D. tinifolia.

HARINA, Bnch.-Ham. in Mem. Wem. Soc. v. (1826) 317~Walliehia, Roxb. tPalm.).
caryotoides, Buch.-Ham. 1. c. = W. caryotoides.
caryotoides, Griff. Palms Brit. Ind. 175 = W.densiflora.
densiflora, Walp. Ann. iii. 1032, Index, spha!m. = W. densiflora.
nanafiiitl. Palms Brit. Ind. 176. t. 238 a, b - Didymosperma nanum.
oblongifolia, Griff. 1. c. 175.t. 287 a, b, c = W. densiflora.
Rumphiana, Mart, ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 29 = seq.
Rumphii, Mart. Hist. Nat. Palm. (ed. prior, i. 189) ii. 314, subn. 104 = Drymophloeus olivaeformis.
Wallichia, Steud. Nom. ed. II. i.722 = W. caryotoides.

HARIOTA, Adans. Fam. ii. 243 (1763) = Bhipsalis, Gaertn. (Cact.).
alternata, Lem. Hort. Univ. i. t. 50 - R. paradoxa.
Cassytha, Cels, ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 458 = R. Cassutha.
cribrata, Lem. Illnstr. Hortic. iv. (1857) Misc. 12--R. saglionis ?
floccosa, Cels, ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 458 = R. floccosa.
funalis, Cels, 1. c. 457 - R. funalis.
mesembrianthemoides, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc. 89 = R. mesembryanthemoides.
pentaptera, Lem. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 453 = R. pentaptera.
prismatica, Lem. Illnstr. Hortic x. (1868) Misc. 84.—Bras.
saglionis, Lem. Cact. Aliq. Nov. Desc 39 = R. saglionis.
salicornoides, DC. Mém. Cact 23 — R. salicorooides.

HARLANDIA, Hance, in Walp. Ann. ii. 648 (1852) = Melothria, Linn. (Cucurbit.).
bryonioides, Hance, 1. C. = M. heterophytla.

HARM ALA, Toura. ex Adans. Fam. ii. 343 (1763) = Feganum, Linn. (Rutac).
daurica, Crantz, Inst. ii. 468 = Ruta dahurica.
multifida, All. Fl. Pedem. ii. 101 = P. Harmala.
Peganum, Crantz, Inst. it 463 = P. Harmala.

HARMOGIA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = Baeckea, Linn. (Myrtac).
Baueriana, Schau. 1. c. = B. densifolia.
corynophylla, F. Muell. Fragm. ii. 30 «B. corynophylla.
crenulata, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 148 = B. crenatifolia.
crispiflora, F. Muell. Fragm. ii. 81 = B. crispiflora.
Cunninghami, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = B. Cunninghamii.
densifolia, Schau. 1. c.=B. densifolia.
leptophylla, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétereb. x. (1852) 880.—Austral.
ovalifolia, F. Muell. Fragm. ii. 32 = B. ovalifolia.
parviflora, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Pétersb. x. (1852) 380.—Austral.
parvula, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = B. virgata.
pentandra, F. Muell. Fragm. ii. 31 = B. pentandra.

HARMOGIA:—
pinifolia, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238.—Austral.
propinqua, Schau. 1. c. = B. densifolia.
serpyllifotia, Turez. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 330.—Austral.
umbellata, F. Muell. Fragm. ii. 31 - B. virgata.
virgata, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 238 = B. virgata.

HARNIERIA, Solnw, in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berl. (1864) 21 = JuBticia, Houst (Acanthac.).
dimorphoearpa, Solms, 1. c. 110=J. heterocarpa.

HABONGA, Thou. Gen. Nov. Madag. 15 (1806). *HYPERICINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 167.
ARUNGANA, Pers. Syn. ii. 91 (1807).
HAEMOCARPVS, Noronha, ex Thou. Gen. Nov. 'Madag. 15 (1806).
HARONGANA, Choisy, Prod. Mon. Hyper. 33 (1821).
axillaris, G. Don, Gen. Syst i. 614 =Psorospermum axillare.
crenata, Steud. Nom. ed. II. i. 722~Psorospermum coidioefolium.
febrifuga, Steud. I.e. — Psorospermum febrifugum.
lanceolata, Choisy, ex G. Don, Gen. Syst. i. 614 = Psorospermum citrifolinm.
madagascariensis, *Choisy, Prod. Mon. Hyper.* 84.—Madag.
mollusca, Stend. Nom. ed. II. i. 722=Psorospermnm cuspidatum.
paniculata, Lodd. ex Steud. 1. c. = madagajcarienris.
pubescens, Steud. 1. c. = madagascariensis.
revoluta, Choisy, ex DC. Prod. i. 542-Psorospermum discolor, *Spach.*

HARONGANA, Choisy, Prod. Mon. Hyper. 38 (1821) •= praec.

HARPACHAENA, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp. (1845) = Aeanthocephalus, Kar. & Kir. (Compos.).
amplexifolia, Bunge, 1. c. = A. amplexifolins.

HARPACHNE, Hochst.-Cf. Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 20, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 431 (1850)=Eragrostis, Beauv. (Gramin.).
Schimperi, Huchst. 11. cc. = E. Schimperi.

HARPAECARPUS, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. N. S. vii. (1841) 889= Madia, Molina (Compos.).
exiguus, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 101 = M. filipes.
madarioides, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 389 = M. filipes.

HABPAGONEIXA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 88. *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 846.
Palmeri, *A. Gray, I. c*—Calif.

HARPAGONIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2 = Dysoxylum?, Blume (Meliac).

HABPAGOPHYT0M, DC. ex Meissn. Gen. 298 (1840). *PEDALINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1057.
UNCARIA, Burch. Trav. i. 536 (1822).
Burchellii, *DC. in DeUss. Ic. Sel. PI.* v. 89. t. 40.—Afr. austr.
leptocarpum, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. iii. (1865) 329.—Madag.
procumbens, *DC. Prod.* ix. 267.—Afr. austr.
Zeyheri, *Decne. in Ann. St. Nat.* Sér. V. iii. (1865) 329.—Afr. austr.

HARPALIUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 141 = Helianthus, Linn. (Compos.).
aureum, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 438 = Helianthus aureus, incanus.
mexicanum, Walp. in Linnaea, xiv. (18) 306 = Helianthus mexicanus.
rigidum, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 800=Helianthus rigjdus.
sericeum, DC. Prod. v. 584.—Am. trop.
truxillense, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxv. 438 = Helianthus truxillensis.

HARPALYCE. D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (Jan.-Mar. 1829) 308=PrenantheB, Vaill. (Compos.).
alba, D. Don, I. c.=P. alba.
altissima, D. Don, L c.=P. altissima.
cordata, t>. Don, 1. c. = P. altissima.
crepidina, D. Don, 1. c. = P. crepidinea.
racemosa, D. Don, 1. c.=P. racemosa.
rubicunda, D. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 417 ~P. Serpentaria.
Serpentaria, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joura. (Jan.-Mar. 1829) 308 = P. Serpentaria.
simplex, D. Don, 1. c.=P. virgata.
virgata, D. Don, 1. c. = P. virgata.

HARPALYCE, [Moç. & Sesse,] ex DC. Mém. Lég. 496 (1825). *LEGUMINOSAE*, Benth. *St.* Hook. /• i. 494.
arborescens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. Sc.* v. (1861) 178.—Mexic.
brasiliana, *Benth. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 210.—Bras.
cubensis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 7 L - Cuba,
formosa, *DC. Prod.* ii. 528.—Mexic.
Hilariana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 5L—Bras,
minor, *Benth. I. c.* 52.—Bras.

HARPANEMA, Decne. in DC. Prod. viii. 496 (1844). *ASCLEPIADEA&*, Benth. & Hook. f. ii. 748.
acuminatum, *Decne. I. c.*—Madag.

HARPECHLOA, Kunth, Re*v. Gram. i. 92 (1830) (Harpochloa); Enum. PL i. 274 (1888). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1164.
capensis, *Kunth, 1. c.*—Afr. austr.

HARPELEMA, Jacq. f. Eclog. PI. ü. 6.1.129 (1844)-Bothia, Pers. (Legumin.).
Dillwynia, Jacq. f. 1. c.-R. trifoliate.

HARPEPHORA, Endl. Gen. PI. Snppl. i. 1882 (1841)* Aspilia, Thon. (Compos.).
Endlicheriana, Walp. Rep. ii. 622.—rAfr. trop.

HARPEPHYIILTJM:, Bernh. ex Krauss, in Florii xxvii. (1844) 349. *ANACARDIACEAE*, [Benth. * Hook. f. i. 1001].
caffrum, *Bernh. ex Krauss, I. c.*—Afr. austr.
serratum, *Sond. ex Walp. Ann.* ii. 227.—Afr. austr.

HARPOCARPUS, Endl. Gen. PI. Suppl. iii. 70 (1848) = Aeanthocephalus, Kar. & Kir. (Compos.).
amplexifolius, Endl. ex Walp. Rep. ii. 666-A-amplexifolius.

HABPOCHH.US, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 146.f-24 (1847). *ACANTHACEAE*, Benth. *It* Hook. (• "' 1116.
Neesianus, *Mart, ex Nees, 1. c.*—Bras,
phacocarpus, *Nees, I. c.* 147.—Bras.

HARPOCHLOA, Kunth, Rév. Gram. i. 92 (1830)* Harpeohloa, Kunth (Gramin.).

HARPULIA, G. Don, Gen. Syst. i. 669 (1831) = seq.

HABPTJLLIA, Roxb. Hort. Beng. 86 (1814)! \ Ind. i. 646 (1832). *SAPINDACEAE*, Benth. * Hook. f. i. 407.
BLANCOA, Blume, Rumphia, iii. 181 (1847).
DONATOPHORUS, Zipp. in Bijdr. Natuurk. Wetenscn- v. (1880) 181.
OTONYCHIUM, Blume, Rumphia, iii. 180 (1847)-
STREPTOSTIGMA, Thw. in Hook. Kew Journ. (1854) 298. t. 9 A.
THANATOPHORUS, Walp. Ann. ii. 213 (1851).
TINA, Blume, Bijdr. 285 (1825).
alata, *F. Muell. Fragm.* ii. 108.—Austral.
angustifolia, *Radlk. in Siteb. Math.-Phys. Muench.* ix. (1879) 599.—N. Gain.
austro-caledonica, *Baill. Adansonia*, xi. (1874) N. Caled.
Blancoi, F. Villar, in Blanco, Fl. Phllipp. ed. III. App. 58=cupanioides.

HARPULLIA:—
confusa, Blume, Rumphia, iii. 176 -= cupanioides.
cupanioides, *Roxb. Hort. Beng.* 86; *FUklnd.* i. 645.—Ind. or.
fraxinifolia, *Blume, Rumphia,* iii. 177.—Ins. Timor,
fruticosa, *Blume, I. c.* 179.—N. Guin.
Hillii, *F. Muell. in Trans. Phil. InstfVict.* iii. (1869) 26.—Austral.
imbricata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 66 = cupanioides.
juglandifolia, Blume, Rumphia, iii. 177=cupanioides.
Leichhardtii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 470.—Austral,
madagascariensis, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muetuh.* viii. (1878) 273 j ix. (1879) 519, 846—Madag.
pendula,«a»*ch. ex F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Viet.* iii. (1869) 26.—Austral,
ramiflora, *Radlt. in Act. Congr. Bot. Atnst.* 1877 (1879) 124.—Ins. Aru.
rupestris, Blume, Rumphia, iii. 175-cupanioides.
thanatophora, *Blume, 1. c.* 178.—N. Guin.
Wadsworthii, F. Muell. Fragm. iv. 1 •= Cupaniopsis Wadsworthii.

HARRACHIA, Jacq. f. Eclog. PI. i. 33. t. 21 (1816) = Crossandra, Salisb. (Acanthac.).
»u>*crothyrsus,* Mart, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 86 -'•Aphelandra prismatica.
•*nontana.* Mart, ex Nees, 1. c. 87 (= *Lagochilium montanum).*—Bras.
T*epanda,* Mart, ex Nees, 1. c. 86 -• Aphelandxa repanda.
s*peciosa,* Jacq. Eclog. PI. i. 83. t. 21 = Crossandra undulaefolia.
**pinosa,* Hook, ex Nees, in DC. Prod. xi. 281 = Crossandra undulaefolia.

HARRERA, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 60 (1837)-=Tetra-*ygia, Rich. (Melastom.).
Serascanthoides, Macfad. 1. c. 61 = T. angustiflora.
Peaunculata, Macfad. 1. c. 101.—Jamaic.
farsi/olia, Macfad. 1. c. 62.-Jamaic.
trinervis, Macfad. 1. c. 63 -=T. angustiflora.

aARRIsoNIA, R. Br. ex A. Jus*, in *Mim.* Mus. Par. xii. (1825) 517. t. 28. *SIMARUBEAE,* Benth. & Hook. f. i. 314.
f BELINGIA, Reichb. Consp. 199 (1828).
USIOLEPIS, Benn. PI. Jav. Rar. 202 t. 42 (1888).
aoyssinica, *Oliver, Fl. Trop. A/r.* i. 811.—Afr. trop.
Sennetii, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 619 = paucijuga.
Browmana, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 479«=seq.
BrowBii, *A. Juss. in Mem. Mus. Par.* xii. (1825) 540.—In*. Timor.
Pauciflora, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i- 312, in obs.—As. trop.

HARRISONIA, [Hook, in] Sims, Bot. Mag. t. 2699 .U826)-Maradenia, R. Br. iAsclep.).
f'ceroides, [Hook.] 1. c-M. loniceroides.

HARRISONIA, Neck. Elem. L 84 (1790) = Xeranthe-mum, Linn. (Compos.).

HARTIANA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825) = Anemone, Tourn. (Ranunc).
f'mniano, Raffi. 1. &-A. decapetala.
"nella, Rafin. 1. c.=A. decapetala.

HARTIGHAEA, Reichb. Nom. 212 (1841), sphalm.-seq.

HARTIGHSEA, A. JUSS. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) «7. t. 4,=Dy8oxylum, Blume (Meliac.).
ac«»u««/a, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 504 = D. arborescens.
""/aria, Am. ex Wight *Sc* Am. Prod. 121 = D. Hamil-
""*gustifolia,* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 504=Aglaia
Bill; gustifolia.
£*>ri,>A- J«ss- «> Mem. Mus. Par. xix. (1830) 228.—N. Caled•
"i. 4ffora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1853)
co<*-*a, M Cumingianum. at. app.
tum. l FL Ld B S 1 665 D COSto

HARTIGHSEA:—
excelsa, A. Juss. in Mem. Mus. Par. xix. (1880) 228-Dysoxylum excelsum.
Forsteri, A. Juss. 1. c.=D. Forsteri.
Fraserana, A. Juss. 1. c-=D. Fraseranum.
Gobara, Wight *Sc* Am. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 186-D. procerum.
Lessertiana, A. Juss. in Mim. Mus. Par. xix. (1830) 228 = D. Lessertianum.
mollissima, A. Juss. 1. c. = D. mollissimum.
Patersoniana, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 79 = D. Patersoni.
ramiflora, Grif". Notul. iv. 501 = D. Griffithii.
rufa, A. Rich. Sert. Astrol. 29=D. rnfum.
schisochitoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 412-D. schizochitoides.
spectabilis, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xix. (1830) 228-D. spectabile.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 505 = D. arborescens.
trichosiphone, F. Muell. ex C. DC. in DC. Monog. Phan.i. 608 = D. Muelleri.

HARTIGIA, Miq in Linnaea, xviii. (1844) 284. t. 7 = Hiconia, Ruiz & Pav. (Melastom.).
barbigera, Miq. 1. c. 628 - M. racemosa.
milleflora, Miq. 1. c. 286-M. milleflora,
minutiflora, Miq. 1. c = M. milleflora.
oblongifolia, Miq. 1. c. 288 = M. ciliata.
spectabilis, Miq. L c. 286 = M. racemosa.

HARTIGSEA, Steud. Nom. ed. II. i. 722 (1840) = HARTIGHSEA, A. Juss.=Dysoxylum, Blume (Meliac).

HARTMANNIA, DC. Prod. v. 693 (1836) = Hemizonia, DC. (Compos.).
ciliata, DC. 1. c. 694 = Layia chrysanthemoides.
corymbosa, DC. 1. c. = Hemiz. corymbosa.
fasciculata, DC. 1. c. 698=Hemiz. fasciculata.
glomerata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 391 -Heraiz. fasciculata.
pungens, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 857 = Hemiz. pungens.

HARTMANNIA, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 870 (1835)=Oenothera, Linn. (Onagrar.).
affinis, Spach, ex Steud. Nom. ed. II. i. 722 = O. virgata
etilobifolia, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 364=0. epilobiifolia.
gauroides, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 371 = 0. rosea.
Kunthiana, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1886) 362 = 0. pinnatifidk.
macrantha, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 872 = O. tetraptera.
parviflora, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 362 = 0. fissifolia.
rosea, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 236 = 0. rosea.
tarquensis, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 363 = O. tarquensis.
virgata, Spach, 1. c. 861 = 0. virgata.

HARTOGIA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 805 = Cassinopsis, Sond. (Olacin.).
ilicifolia, Hochst. 1. c. = C. capensis.

HARTOGIA, Linn. Syst. ed. X. 939 (1759) = Agathoama, Willd. (Rutac).
betutina, Berg. Desc PI. Cap. 67 = Barosma betulina.
capensis, Linn. Syst. ed. X. !)39 = A. hispida.
ciliaris, Linn. 1. c. ed. XII. 625= A. pubescens, *Willd.*
ciliata, Berg. Desc. PI. Cap. 68 = A. imbricata.
hispida, Walp. Rep. iv. 448 = A. hispida.
imbricata, Linn. Mant. i. 124-= A. imbricata.
lanceolata, Linn. Syst. ed. XII. 626 = A. pubescens, *Willd.*
pulchella, Berg. Desc. PI. Cap.69=Barosma pulchella.
uniflora, Berg. 1. c. 71=Adenandra uniflora.
villosa, Berg. 1. c. 70 = Adenandra cuspidate.

HARTOCHA, Linn. f. Suppl. 16 (1781). *CELASTRINEAE,* Benth. & Hook. *i.* i. 868.
SCHREBERA, Schreb. in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. i. (1778) t 5. f. 1.—Cf. p. 91.
angustifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 601.—Afr. austr.
capensis. *Linn./. Suppl.* 128.—Afr. austr.
multiflora, Eckl. & Zeyh. Enum. 127 - capensis.

HABTOOIA:—
riparia, Eckl. & Zeyh. 1. c.=capensis.
Thea, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 189 (-= *Methyscophyllum glaucum).*—Afr. austr.
trilobocarpa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) U9.-Madag.

HARTWEGIA, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1970 (1887). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 528.
Gemma, *Reichb./. in Gard. Chron.* (1878) II. 8.—Am. centr.
purpurea, *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1970.—Mexic.

HARTWEGIA, Nees, in Nov. Act. Nat Cur. xv. (1881) ii. 372 = ChloPophytum, Ker-Gawl. (Liliac).
comosa, Nees, 1. c. 373 = C. Sternbergianum.
Nimmonii, Dalz. ex Baker, in Joura. Linn. Soc. xv. (1876) 324 = C. glaucum.

HARUNGANA, Lam. Illustr. t. 645 (1806?) = Haronga, Thou. (Hyper.).
crenata, Poir. Encyc. Suppl, iv. 721=Psorospermum cordiaefolium.
madagascariensis, Poir. in Diet. Sc. Nat. xx. 307 = Haronga madagascariensis.
pubescens, Poir. Eneyc. Suppl. iv. 721 = Haronga madagascariensis.

HARVEYA, Hook. Ic. PI. t. 118, 361 (1837). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 967.
AULAYA, Harv. Gen. PI. Afr. Austr. ed. I. 249 (1838).
capensis, *Hook. Ic. PI.* t. 118.—Afr. austr.
comorensis, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 309.—Ins. Comor.
lactea, *Presl, Bot. Bemeri.* 91.—Afr. austr.
lutea, *Steud. Nom.* ed. II. i. 723.—Afr. austr.
obtusifolia, *Vatke, in Bremen, Abh.* ix. (1885) ISO.—Madag.
parviflora, *Hook, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 733; *Reut. in DC. Prod.* xi. 38.—Afr. austr.
pratensis, *Presl, Bot. Bemerk.* 91.—Afr. austr.
purpurea, *Harv. ex Hook. Ic. PI.* t. 851.—Afr. austr.
scarlatina, *Hook, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 728.—Afr. austr.
speciosa, *Bernh. in Flora,* xxvii. (1844) 881.—Afr. austr.
spectabilis, *Hook, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 723; *Reut. in DC. Prod.* i. 88.—Afr. austr.
squamosa, *Steud. I. c.*—Afr. austr.
tubata, Hook, ex Steud. 1. c; KeutinDC. Prod.i. 38. -Cycnium tubatum.
tubulosa, *Harv. Gen. S. Afr. PI.* 249, nomen.—Afr. austr.
tulbaghensis, *Presl, Bot. Bemerk.* 91.—Afr. austr.
varia, *Hook, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 723; *Reut. in DC. Prod.* i. 88—Afr. austr.

HARWAYA, Steud. Nom. ed. II. i. 728 (1840)=praec.

HASSELQUISTIA, Linn. Cent. PI. i. 9 (1765); Amoen. Acad. iv. 270 (1759) = Tordylium, Linn. (Umbellif.).
aegyptiaca. Linn. 11. cc=T. aegyptiacum.
cordata, Jacq. Hort. Vindob. ii. 91->T. cordatum.
cordifolia, Salisb. Prod. 160=T. cordatum.
lanata, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 847 =T. lanatum.
pinnata, Moench, Meth. 78 = T. aegyptiacum.
syriaca, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 846 »= T. syriacum.

HASSELTIA, Blume, Bijdr. 1045 (1826)-K.ickxia, Blume (Apocyn.).
arborea, Blume, 1. c. 1046 - K. arborea.

HABSELTIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 231, t. 661 (1825). *T1UACEAE,* Benth. *Sc* Hook. *{. i.* 238.
floribunda, *H. B. &• K. 1. c.* 282.—N. Granat.
pubescers *Benth. PI. Hartw.* 164.—N Granat.
pyramidalis, Herasl. Diagn. I'l. Nov. 4 = Banara mexicana.

HASSKARLIA, Baill. Adansonia, i. (1860) 5] *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 308.
didymostemon, *Baill. 1. c.* 62.—Afr. trop.

HASSKARLIA, Mcissn. Gen. Comm. 848 (1848) = Turpinia?, Vent. (Sapindac.).

HASSKARLIA, Walp. Aun. i. 753 (1849) = Pandahus, Lion.
globosa, Walp. 1. c. = P. utilis.
leucacantha, Walp. 1. c. = P. odoratissimns.

HASTIFOLIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789) « Seutellaria, Linn. (Labiat.).

HASTINGIA, Koen. ex Sm. Exot. Bot. ii. 41. t. 80 (1806) = Holmskioldia, Retz. (Verben.).
coccinea, Sm. 1. c. = Holmsk. sanguinea.
scandens, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 66 = Holmsk. sanguinea.

HASTINGSIA, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 217, 242. *UUACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 785.
alba, A *Wats. I. e.* 242.—Am. bor. occ.
bracteosa, 5. *Wats. I. c.* xx. (1885) 877.—Am. bor. occ.

HAUSSKNECHTIA, Boiss. Fl. Orient, ii. 960 (1872). *UMBELUFERAE.*
elymaitica, *Boiss. I. c*— Persia.

HAUSSMANNIA, F. Mnell. Fragra. iv. 148 (1864). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1041.
jucunda, *F. Muell. I. c*—Austral.

HAUSTRUM, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2 (Quid?).

HATJYA, [Moç. & Sesse,] ex DC. M£m. Onagr. 2. t. 1 (1828). *ONAGRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 791.
Barcenae, *Hems!. Diagn. PI. Nov.* 13.—Mexic.
californica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 866.—Calif.
comuta, *Hems!. Diagn. PL Nov.* 13.—Guatemala,
elegans, *[Mof. V Sesse,] ex DC. Prod.* iii. 36.—Mexic.

HAVETIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 203. t. 462 (.1821). *GUTTIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 171.
flivida, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 869.—Guian.
flexilis, Spruce, ex Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 246 = Havetiopsis Martii.
laurifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 203. t. 462.—N. Granat.
obovata. *Spruce, ex Planch. V Triana, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xiv. (1660) 250.—Bras.
octandra, *Poepp. (f End!. Nov. Gen. et Sp.* iii. 11__ Peruv.

HAVETIOPSIS, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. xiv. (1860) 246. *GUTTIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 172.
OEDEMATOPUS, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 249.
caryophylloides, *Planch.* &" *Triana, I. c.* 248.—N. Granat
flavida, *Planch. b" Triana, 1. c.* 247.—Guian.
flexilis, *Planch.* (7* *Triana, I. c.* 246.—Bias,
hippocrateoides, *Planck, b" Triana, I, c.* 247.—Peruv.
Martii, *Planch, tf Triana, I. c.* 246.—Bras.

HAWORTHIA, Duval, PI. Succ. Hort. Alenç. 7 (1809). *UUACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 777.
affinis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 213.—Afr. austr.
albicans, *Haw. Syn. PI. Succ.* 91.—Afr. anstr.
altilinea, *Haw. in Phil. Mag.* (1824) 801.—Afr. austr.
angolensis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* i. (1878) 268.—Afr. trop.
angustifolia, *Haw. in Phil. Mag.* (1825) 283.—Afr. austr.
arachnoidea, *Duval, PI. Succ. Hort. Alenç.* 7.—Afr. austr.
arachnoides, Haw. Syn. PI. Succ. 96 = praec.
aristata. Haw. Suppl. PI. Succ. 51 =. altilinea.
aspera. Haw. Syn. PI. Succ. 90 = Apicra aspera.
asperiuscula, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 60.—Afr. austr.
asperula, *Haw. in Phil. Mag.* (1824) 300.—Afr. austr.
atrovirens, *Haw. Revis. PI. Succ.* 57__Afr. austr.
attenuata, *Haw. Syn. PI, Succ.* 92.—Afr. austr.

HA.WOBTHIA:—
bilineata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 213.—Afr. austr.
Bolnsii, *Baker, I. c.* 215.—Afr. austr.
brevis. Haw. Suppl. PI. Succ. 67 = margaritifera.
chloracantha, *Haw. Revis. PI. Succ.* 67.—Afr. austr.
clariperla, Haw. in Phil. Mag. (1828) 186 = at cintae .
coarctata, *Haw. 1. c.* (1824) 301.—Afr. austr.
concava. Haw. Revis. PI. Succ. S8=cymbifonnis.
concinna, Haw. Suppl. PI. Succ. 59= viscosa.
Cooperi, *Baker, in Sound. .Refug. Bot.* t. 238.—Afr. austr.
corallina, Hort. Peacock, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xviiL (1880) 205 = margaritifera.
cordifolia, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 60.—Afr. austr.
curia, Haw. I.e.=tortuosa.
cuspidata, *Haw. 1. c.* 51.—Afr. austr.
cymbiformis, *Duval, PI. Succ. Hort. Alenç.* 7 i *Haw. Syn. PI. Succ.* 93.—Afr. austr.
denticulate, *Haw. Revis. PI. Succ.* 58.—Afr. austr.
distincta, N. E. Br. in Gard. Chron. (1876) n. 130. f. 80=venosa.
erecta, Haw. Revis. PI. Succ. 55 = margaritifera.
expansa, Haw. Syn. PI. Succ. 91-rigida.
fasciata, *Haw. Revis. PI. Succ.* 54.—Afr. austr.
foliolosa, Haw. Syn. PI. Succ. 99 = Apicra foliolosa.
glabrata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 206.—Afr. anstr.
glauca, *Baker, 1. c.* 208.—Afr. austr.
granata, Haw. Suppl. PL Succ. 67 = margaritifera.
Gieenii, *Baker, in journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 202.—Afr. austr.
hybrida, *Haw. Revis. PI. Succ.* 51.—Afr. austr.
icosiphylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 207.—Afr. austr.
imbricata, Haw. Syn. PI. Succ. 98-Apicra spiralis.
indurata, Haw. Revis. PI. Succ. 49 = viscosa.
laetevirens, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 43.—Afr. austr.
laevis. Haw. Revis. PI. Succ. 52=albicans.
limpida, Haw. Suppl. PI. Succ. 51 = altilinea.
major, Duval, PI. Succ. Hort. Alenç. 7 = margaritifera.
margaritifera, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 55.—Afr. austr.
maxima, Dnval, PI. Succ. Hort. Alenc. 7 — margaritifera.
minima, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 215.—Afr. austr.
minima. Haw. Syn. PI. Succ. 29 = Aloë granata.
minor, Duval, PI. Succ. Hort. Alenç. 7 = margaritifera.
mirabilis, *Haw. Syn. PI. Succ.* 95.—Afr. austr.
mucronata, Haw. Suppl. PI. Succ. 50 = altilinea.
multifaria, Haw. in Phil. Mag. (1824) 300 = mirabilis.
multiperlata, Steud. Nom. ed. II. i. 723 = margaritifera.
mutica, Haw. Revis. PI. Succ. 55=retusa.
nigra, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 203.—Afr. anstr.
nigricans, Haw. in Phil. Mag. (1824) 301 - Gasteria decipiens.
nitida, Loud. Hort. Brit. 128 = Gasteria nitida.
obtusa. Haw. in Phil. Mag. (1825) 282-cymbiformis.
pallida, *Haw. Rev. PI. Succ.* 56.—Afr. austr.
papillosa, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 58.—Afr. austr.
parva, Haw. in Phil. Mag. (1824) 801 = tessellata.
Peacockii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 202.—Afr. austr.
pellucens, Haw. Syn. PI. Succ. 96 = translucens.
pentagona, Haw. 1. c. 97 = Apicra pentagona.
pilifera, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* t. 234.—Afr. austr.
plani/olia, Haw. in Phil. Mag. (1825) 282 = cymbiformis.
polyphylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 218__Afr. austr.
polyphylla, Haw. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 12 = Aloë granata.
Pseudo-rigida, Haw. Suppl. PI. Succ. 62 = snbrigida.
Pseudo-tortuosa, Haw. 1. c. 59=viscosa.
pumila, Duval, PI. Succ. Hort. Alenc. 7 ; Haw. Syn. PI. Succ. 95- atrovirens.
Radula, *Howl. c.* 93.—Afr. anstr.
ramifera, Haw. Revis. PI Succ. 52=albicans,
recurva, *Haw. Syn. PI. Succ.* 94.—Afr. austr.
Reinwardti, *Haw. Revis. PI. Succ.* 53.—Afr. austr.
reticulata, *Haw. Syn. PI. Succ.* 94.—Afr. austr.
retusa, *Duval, PI. Succ. Hort. Alenç.* 7; *Haw. I. c.* 95.—Afr. austr.

HAWORTHIA:—
rigida, *Haw. Revis. PI. Succ.* 49.—Afr. austr. .
rugosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 206.—Afr. austr.
scabra, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 58.—Afr. austr.
semiglabrata. *Haw. I. c.* 65.—Afr. austr.
semimargaritifera, Haw. 1. c. 53=margaritifera.
setata, *Haw. I. c.* 52.—Afr. austr.
sordida, *Haw. Sevis. PI. Succ.* 51.—Afr. austr.
spiralis, Duval, PI. Succ. Hort. Alenc. 7 J Haw. Syn. PI. Succ. 97 = Apicra spiralis.
spirella, Haw. 1. c. 97 = Apicra pentagona.
subattenuata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 205.—Afr. austr.
subfasciata, *Baker, 1. c.* 204.—Afr. austr.
subregularis, *Baker, in Sound. Refug. Bot.* t. 232.—Afr. austr.
subrigida, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 201.—Afr. austr.
subtortuosa, Sweet, Hort. Brit ed. II. 520=viscosa.
subulata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 206.—Afr. austr.
tessellata, *Haw. in Phil. Mag.(lSii)* 300.—Afr. austr.
Tisleyi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 208.—Afr. austr.
torquata. Haw. in Phil. Mag. (1827) 123= viscosa.
tortello. Haw. Suppl. PI. Succ. 61»tortuosa.
tortuosa, *Haw. Syn. PI. Succ.* 90.—Afr. austr.
translucens, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 52.—Afr. austr.
trianrularis, *Duval, PI. Succ. Hort. Alenç.* 7.—Afr-austr.!
turgida, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 22.—Afr. austr.
venosa, *Haw. Revis. PI. Succ.* 44.—Afr. austr.
virescens. Haw. 1. c. 52=albicans.
viscosa, *Haw. Syn. PI. Succ.* 90.—Afr. austr.
vittata. *Baker, in Sound. Refug. Bot.* t. 268.—Afr-anstr.

HAXTONIA, A. Cunn in Ann. Nat. Hist. ii. (1839) 127.
argophylla, Caley, ex D. Don, 1. c. = O. argophylla.
foliosa, Hort. Bonn, ex DC. Prod. v. 270 = O. ramulosa.
furfuracea, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. >• (1839) 127 = O. furfuracea.
phlogopappa, D. Don, in Edinb. N. Phil. Joum. (1831) 272 = O. stellulata.
stellulata, D. Don, 1. c. = O. stellulata.
tomentosa, D. Don, 1. c = O. dentata.
viscosa, D. Don, 1. c = O. viscosa.

HAYA, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 408. *PARONYCHIEAE.*
obovata, *Balf.f. 1. c.* 409.—Ins. Socotra.

HAYECKA, Pohl, in Flora, viii. (1825) 183, nomen (Jncertaesedis).

HAYIiOCKIA, Herb, in Bot. Reg. t. 1371 (1830). *AMARYLUDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 728.
mesochloa, M. Roem. Syn. Ensat. 47=Zephyrantnes mesochloa.
pusilla, *Herb, in Bot. Reg.* 1.1371.—Reg. Argent.

HAYMALDIA, Kanitz, in Magyar Novent. Lap<*> >• (1877)8. *CAMPANULACEAE.*
exaltata, *Kanitt, 1. c.* 4.—Bras.
Hilaireana, *Kanitt, in Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 143—Bras.
organensis, *Kanitt, in Magyar Novent. Lapo*t* (1877) 4.—Bras,
thapsioidea, *Kanitt, 1. c.*—Bras,
nranocoma, *Kanite, 1. c.*—Bras.

HAYNALDIA, Schur, Enum. PI. Transs. 807 (186*)* Agropyron, J. Gaertn. (Gramin.).
villosa, Schur, 1. c. = A. villosum.

HAYNEA, Reichb. Consp. 202 (1828) = Modi°l». Moench (Malvac.).

HAYNEA, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. (1827). *URTICACEAE\,* Benth. *Be* Hook. f. iii-ovalifolia, *Schum. b* Thonn. 1. c.*—Afr. trop.

HAYNEA, Willd. Sp. PI. iii. 1787 (1800)=Paeourfn»' Aubl. (Compos.).
edulis, Willd. 1. c. = P. ednlis.
pedunculata, Spreng. Syst. iii. 391 = Vemonia pedunculata.

HEARNIA, F. Muell. Fragm. v. 55 (1865). *MELIACEAE*, Benth. & Hook.? i. 994.
Beccariana, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 629.—Malaya.
Cumingiana, *C. DC. I. c*—Malaya,
elliptica, *C. DC. 1. c.* 628.—Malaya,
glaucescens, *C. DC. I. c.* 631.—Malaya.
lancifolU, *C. DC. 1. c.* 680.—Malaya,
ujacrophylla, *C. DC. I. c.* 681.—Malaya.
"Pindina, *F. Muell. Fragm.* v. 55.—Australl,
sarawalcana, *C. DC. in DC. Monog. Phan.* i. 632.—Borneo,
rtllosa, *C. DC. I.* e.—Malaya.

HEBANTHE, Mart. Nov. Gen.et Sp. ii. 42.' tt. 140-145 (1826). *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 41.
TROMMSDORFFIA, Mart Nov. Gen. et Sp. ii. 40. t 189 (1826).
argenteo-sericea, *Benth. & Hoot./. Gen.* Mi 42.—Bras.
au-rata, *Benth. V Hoot./. I. c*—Bras,
"ecipieas, *Hooi.f. 1. c.* 41.—Persia.
Puanensis, *Klotasch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 988,
nomen.—Guian.
noloserlcea, *Mart, in Flora,* xxi. (1888) II. *Beibl.* 65.—Bras.
"ookeriana, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 19.—Mexic.
m-oll's, *Hemsl. 1. c.* 20.—Mexic
r«meri, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad. Trii.{* 1882-88) 1*».—Am. bor. occ.
Paniculata, *Benth. V Hooi.f. Gen.* iii. 41.—Bras.
Paniculate, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 48.—Bras.
Parviflora, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 168.—Porto Rico.
PBWerulenta, *Benth. V Hooi.f. Gen.* iii. 41.—Mexic
Pnlverulenta, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 46.—Bras.
£"**. *Mart. 1. c.* 44. t. Hl.-Bras.
»onuda, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 20.—Mexic.
*?g». *Benth. (f Hoot./. Gen.* iii. 42.—Bras.
Vlrgata, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 45.—Bras.

HEBE, Comm. ex Juss. Gen. 105 (1789)-VeK*nioa, Tourn. (Scroph.).
magellanica, J. F. Gmel. Syst 27-V. elliptica.

HEBEA, Hedw. f. Gen. 24 (1806) = Gladiolus, Tourn. (Irid.).
alata, Eckl. Top. Verz. 42=G. alatus.
bicolor, Eckl. 1. c-G. bicolor.
formosa, Eckl. 1. c. = G. fonnosus.
galeata, Eckl. 1. c 41 = G. alatus.
V"«><i>Jlora, Eckl. 1. c 48 = G. arenarins.
Ptlklla, Eckl. ex Baker, in Tourn. Linn. Soc. xvi. (1877) 178 = G. pulchellus.
"«, Eckl. Top. Verz. 48-G. montanus.
f"sa, Steud. Norn. ed. II. i. 724=G. speeiosus.
Solaris, Eckl. Top. Verz. 43 = G. montanus.
yheri, Eckl. 1. c. 42-G. penneabilis.

HANDRA, Bonpl. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1808) 40 = Monilaa, Ruiz & Pav. (Polygal.).
"stroides, Bonpl. 1. c 41=M. rupestris.
folia, Bonpl. L c-M. cestrifolia.
*"vssi/oli,*aBonpl. 1. c. 42 = M. crassifolia.
euonymoides, Bonpl. L c-M. xalapensis.
fastigiata, Bonpl. 1. c. 43 -M. parviflora.
hirta, Bonpl. 1. c-M. piloM.
latifolia, a Ipl. c. = M latifolia.
ligustrina, Bonpl. 1. c. 42-M. ligustrifolia ?
mucronata, Bonpl. 1. c. = M. nemorosa.
myrtilloides, Bonpl. l. c. = M. myrtilloides.
padifolia, Bonpl. l. c. = M. phytolaccaefolia.
parviflora, Bonpl. 1. c. 48 = M. parviflora.
phyllireaoides, Bonpl. 1. c. 41 = M. obtusifclia.
prinoides, Bonpl. 1. c. 44-M. ligustrifolia.
pubescens, Bonpl. 1. c. 43 = M. pnbescens.
revoluta, Bonpl. 1. c. 41-M. revoluta.

HEBEAN THE, Reich. b. Norn. 165 (1841) -Hebanthe, Mart. (Amarant.).

HEBECL, Mien in Hook. Londl J. Bot. iv. (1845) 321.—W1. *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f.
KUKOLIS, Rafin. Sylva Tellur. 55 (1888), nomen prius.
ULTICON'A, Rafin. 1. c. (1888).

HEBECLADUS:—
asperus, *Miers, in Hoot. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 822.—N. Granat.
bicolor, *Miers, I. c.*—Peruv.
biflorus, *Miers, 1. c.*—Peruv.
granulosus, *Miers, I. e.* vil. (1848) 852.—N. Granat.
hirtellus, *Miers, 1. c. iv.* (1845) 823.—Bras.
intermedius, Miers, 1. c. = biflorns.
lanceolatus, Miers, 1. c. = viridiflorns.
mollis, *Miers, 1. c.* vii. (1848) 852.—N. Granat.
sinnosus, *Miers, I. e.*—Peruv.
Turneri, Miers, 1. c. iv. (1845) 323 => umbellatus.
nmbellatus, *Miers, I. c.* 822.—Peruv.
ventricosus, *Baker, in Saund. Kefug. Bot.* t. 208.—Penw.
viridiflorus, *Miers, in Hook. Land. Journ. Bot.iv.* (1845) 321.—N. Granat.

HEBECLINIUM, DC. Prod. v. 136 (1836) = Eupatorium, Toum. (Compos.).
atrorubens, Lem. Illustr. Hortic ix. (1862) t. 810.—Mexic.
irevipetiolatum, Sch. Bip. ex Klatt, in Liopoldina, xx. (1884) 90=E. brevipetiolarum.
Ehrenbergii, Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 94 - E. Ehrenbergii.
hecatanthum, DC. Prod. v. 136 = E. hecatanthum.
ianthinum. Hook. Bot. Mag. t. 4574 = E. ianthinum.
Liebmanniae, Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 96*-E. Liebmannii. *Hemsl.*
macroeephalum, Benth. PI. Hartw. 42 - E. Ehrenbergii.
macrophyllum, DC. Prod. v. 136—E. macrophyllum.
megalophyllum, Lem. Illustr. Hortic. ix. (1862) t. 310 = E. megalophyllum.
panamense. Can. in Rev. Hortic (1877) 830 = E. ianthinum f
tepicanum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 434=E. tepieanum.
tetragonum, Benth. PI. Hartw. 198 - E. gnadalnpense.
Urolepis, DC. Prod.v. 136-E. hecatanthum.
viti/olium, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, xx. (1884) 90=E. vitifolium.

HEBECOCCA, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 146 - Omphalea, Linn. (Euphorb.).
pananunsis, Beurl. 1. c.-O. diandra.

HEBECOCCUS, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.viii. (1878) 246. *SAPINDACEAE.*
ferrugineus, *Radlk. I. c.* 809.—Java.

HEBELIA, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 117 (1806) - Tofleldia, Huds. (Liliac).
alletnaniea, C. C. Gmel. 1. c. = T. calyculata.
collina, C. C. Gmel. 1. c. 118 - T. calycnlata.

HEBENSTREITIA, Linn, in Morr. Syst. ed. XIII. 476 (1774)-seq.

HEBENSTBETIA, Linn. Gen. ed. I. 348 (1737). *SELAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1127.
POLYCENIA, Choisy, in M^ro. Soc. Phys. -Genev. ii. II. (1823) 91.
alba, Jacq. Eclog. PI. ii. 1.151 = Dischisma ciliatum.
albiflora, Link, Enntn. Hort. Berol. ii. 124=praec.
augusta, Pritz. Ic. Ind. 526, sphalm.=robusta.
aurea, Andr. Bot. Rep. t. 252-denUta.
capitata, Hort. Berol. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 6, 7 = Dischisma clandestinum.
capitata, Thunb. Prod. PI. Cap. 103 - Dischisma capitatum.
chamaedri/olia, Link, Ennm. Hort. Berol. ii. 125 = Dischisma erinoides.
eiliata, Berg. Desc. PI. Cap. 154; Linn. Mant. ii. 420 = Dischisma ciliatum.
comosa, *Hochst. in Flora,* xxviii. (1845) 70.—Afr. austr.
cordata, *Linn. Mant.* ii. 420.—Afr. austr.
crassifolia, *Choisy, in DC. Prod.* xii. 4.—Afr. austr.
dentata, *Linn. Sp. PI.* .629.—Afr. bor. et austr.
discoidea, *E. Mey. Comm. PI. A/r. Austr.* 249.—Afr. austr.
dnra, *Chtisy, in DC. Prod.* xii. 4.—Afr. austr.
erinoides. Berg, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 125, in obs. = Dischisma ciliatum.
erinoides, Thunb. Prod. PI. Cap. 103 - Dischisma erinoides.

HEBENSTRETIA:—
fastigiata, Steud. Norn. ed. II. i. 724=scq.
fastigiosa, *Jarosx, PI. Nov. Cap.* 14.—Afr. austr.
fruticosa, Hort. Berol. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 4 =dentata.
fruticosa, *Linn. /. Suppl.* 287; *Sims, Bot. Mag.* t. 1970.—Afr. austr.
glabra, Walp. Rep. iv. 161, sphalm. = Selago geniculnta..
hamnlosa, *E. Mey. Comm. PI. A/r. Austr.* 249.—Afr. austr.
hispida, Lam. Encyc. lit. 78-Dischisma ciliatum.
integri/olia, Linn. Sp. PI. 629 ~ dentata.
macra, *E. Mey. Comm. PI. A/r. Austr.* 248.—Afr. austr.
parviflora, *E. Mey. I. c.* 249.—Afr. austr.
polystackya, Herb. Linn, ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 849-Selago polystachya.
pulchella, Salisb. Prod. 93=dentata.
ramosissima, *Jarosz, PI. Nov. Cap.* 14.—Afr. austr.
repens, *Jarosz, I. c.* 15.—Afr. austr.
robusta, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 246.—Afr. austr.
scabra, Hort. Berol. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 5 = dentata.
scabra, Sieber, ex Choisy, I. c. 11» Selago geniculata.
scabra, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 103.—Afr. austr.
scabrida, *Burm./. Fl. Cap. Prod.* 17.—Afr. austr.
spicata, Thunb. Prod. PI. Cap. 103 - Dischisma spicatum.
tenera, *Spreng. ex Walp. Hep.* iv. 148.—Afr. austr.
tenuifolia, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 246 ^ crassifolia.
tenuifolia, Schrad. Cat. Hort. Gotting. ex Reichb. Hort. Bot. ii. 13. t. 133-dentata.
virgata, *E. Mey. Comm. PI. A/r. Austr.* 249.—Afr. austr.

HEBEPETAIiUM, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 244 (1862). *L/NEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
humiriifolia, *Benth. 1. c.* 245.—Guian.
latifolia, *Benth. I.* c—Bras.

HEBERDENIA, Banks, ex Vent. Choix, n. 5, verso (180S)-Kyr8ine, Linn.
excelsa, Banks, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 508 - M. Heberdenia.

HEBOKIA, Rafin. Alsog. Am. 47 (1888)-Euscaphia, Sieb. *8c* Zncc. (Sapindac).
japonica, Rafin. 1. c. = E. staphyl»oides.

HEBRADENDRON, R. Grab., in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) 199. t. 27 = Garoinia, Linn. (GntUfA
cambogioides, R. Grah. 1. c.-G. Morella.
Choisyanum, Choisy, in M^m. Soc. Phys. Genèv. xii. (1861) 419 = G. Choisyana.
ellipticum, R. Grah. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 200 = G. elliptica.
eugenii/olium, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genèv. xii. (1851) 419 = G. eugenifolia.
Wallichii, Choisy, 1. c. = G. heterandra.

HECABE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 44 (1836 =• Fhaius. Lour. (Orchid.).
lutea, Rafin. 1. c.=P. maculatus.

HECALE, Rafin. Fl. Tellur. il. 79 (1836) = Wahlenbergia, Schrad. (Campanulac).
lobelioides, Rafin. 1. c.-W. lobelioidcs.

HECASTE, Soland. ex Schum. in Skr. Naturf. Selsk. iii. (1793) 10 = Bobartia, Linn. (Irid.).
juncea, Soland. 1. c. = B. indica.

HECASTOCIiEIS, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 220. *COMPOSITAE.*
Shockleyi, *A. Gray, 1. c.* 221.—Am. bor. occ.

HECASTOPHYLLUM, H. B. *Be* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 387 (1823)=.EcaBtaphylluin> P. Br. (Legumin.).

HECATANDRA, Rafin. Sylva Tellur. 120 (1888) =» Aoaoia, Toum. (Legumin.).
Oxycedrus, Rafin. 1. c.-A. Oxycednis.
suaveolens, Rafin. 1. c = A. suaveolens.

HECATEA, Thou. Hist. Vég. Isles Fr. 27. t. 5 (1804) = Omphalea, Linn. (Euphorb.).
alternifolia, Willd. Sp. PI. iv. 514 = 0. biglandulosa.
biglandulosa, Pert. Syn. ii. 688 = 0. biglandnlosa.
oppositifolia, Willd. Sp. PI. iv. 513=O. biglandulosa.

HECATERIUM, Kunze, ex Reichb. Handb. 281 (1837) •cpraec.?

HECATONIA, Lour. Fl. Cochinch. 802 (1780); DC. Syst. i. 227 (1818)=Kanunculufl, Toum.
aconitifolia, Schur, Enum. PI. Transs. 13~ R. aconilifolius.
alpestris, Schur, 1. c.=R. alpestris.
crenata, Schur, 1. c.« R. crenatus.
glacialis, Schur, 1. c. 12 = R. glacialis.
palustris, Lour. Fl. Cochinch. 303 = R. sceleratus.
pilosa, Lour. 1. c. *= R. pensylvanicus.
platanifolia, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. II. (.1877) 29 = R. aconitifolius.
scelerata, Kourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325=R. sceleratus.
Traunfellneri, Schur, Enum. PI. Transs. 13 = R. alpestris.

HECATOUNIA, Poir. in Diet. Sc. Nat. xx. 327 (1821) * -praec.

HECATRIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 66 (1866) = Asparagus, Linn. (LJliac).

HECHTIA, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1885) 401. *BROMELIACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 667.
argentea, *Baker, in Bot. Mag.* sub t. 6554, nomen; *et in Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 317.—Mexic.
Besseriana, *Versch. Cat.* n. 18 (1874).—Mexic.
cordylinoides. Baker, in Bot. Mag. t. 6554 - stenopetala.
Gkiesbreghtii, Lem. IUustr. Hortic. x. (1863) t 878 = glomerata.
glomerata, *Zucc. in Abh. Aiad. Muench.* iii. (1843) 240. t. 6.—Mexic.
pitcairniaefolia, Hort. Berol. ex Verlot, in Rev. Hortic. (1868) 211 = Rhodostachys pitcairniaefolia.
Schottii, *Baker, in Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 318.—Mexic.
stenopetala, *Klotesch, in Otto b[1] Dietr. Allg. Garten*.* iii. (1885[1]) 402.—Mexic.
texensis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad. xx.* (1885) 874. —Texas.

HECKERIA, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 564 = Piper, Linn.
peltata, Kunth, 1. c. 565 = P. peltatum.
scut at a, Kunth, 1. c. 567 - P. peltatum.
sidaefolia, Kunth, 1. c. 569=P. subpeltatum.
speciosa, Kunth, 1. c. 568 = P. peltatum.
subpeltata, Kunth, 1. c. 671 = P. subpeltatum.
umbellata, Kunth, 1. c. 569=P. umbellatum.

HECKERIA, Rafin. Sylva Tellur. 165 (1838) = Litsea, Lam. (LaurinO-
glomerata, Rafin. 1. c = L. glomerata.

HECTOREA, DC. Prod. v. 95 (1886) = Chryaopsis, Nutt. (Compos.).
villosissima, DC. 1. c = C. graminifolia ?

HECTOBELLA, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 27 ;1864). *PORTULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 979.
caespitosa, *Hook./. I. c*—N. Zel.
elongaU, *7. Buck, in Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 395.—N. Zel.

HECUBAEA, DC. Prod: v. 665 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 400.
scorzoneraefolia, *DC. I. c.*—Mexic

HEDAROMA, Lindl. Swan River App. 7. t 2 B (1839) = Darwinia, Rudge (Myrtac).
fimbriatum, Baines, in Gard. Chron. (1874) I. 601 = D. fimbriata.
Hookerii, Baines, 1. c. <=D. Hookeriana.
lutifolium, Lindl. Swan River App. 7. t. 2 B = D. citriodora.
pinifolium, Lindl. 1. c. = D. pinifolia.
thymoides, lindl. 1. c. = D. thymoides.
tulipiferum, Lindl. in Gard. Chron. (1854) 823 - D. macrostegia.

HEDEOMA, Pers. Syn. ii. 131 (1807). *LABI ATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1188.
acinoides, *Scheele, in Linnaea,* xxii. (1849) 592.—Texas.
arkansana, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. v. (1837) 186 = Calamintha Nuttallii.
bracteolata, Nutt Gen. Am. ii. Add. = Micromeria bracteolata.
breviflora, *Griseb. in Lechl. Serb. Am. Austr.* 58, nomen.—Peruv.
ciliata, *Benth. in DC. Prod.* xii. 245.—Texas.
ciliata, Nutt. in Jqurn. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 183 = Drummondii.
coerulescens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 245.—N. Granat.
costata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 547.—Mexic.
dentata, *Torr. Bot. Mex. Bound.* ISO.—Am. bor. occ.
Drummondii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 368.—Am. bor. occ.
Gilliesii, *Benth. 1. c.* 367.—Chili.
glabra, Nutt. Gen. Am. i. 16 = Calamintha Nuttallii.
glabra, Pers. Syn. ii. 131 (err. typ. 151)=Calamintha glabella?
graveolens, *Chapm. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1878) 867.—Am. bor.
A»V/a,Nutt. Gen. Am. i. 16=hispida.
hispida, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 414.—Am. bor.
hyssopifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 96.—Arizona.
incana, Torr. Bot. Mex. Bound. 180 = Poliomintha incana.
Itatiaiae, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxi. (1881) 70.—Bras.
Mandoniana, *Wedd. Chlor. And.* ii. 148.—Bolivia.
micrantha, Regei, Gartenfl. (1864) 357 - Mosla ocymoides.
mollis, Torr. Bot. Mex. Bound. 129 = Poliomintha mollis.
multiflora, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 367.—Bras.
napalensis, Benth. 1. c. 366 = Mosla ocymoides.
Palmed, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 548.—Mexic
piperita, *Benth. Lai. Gen. et Sp.* 730.—Mexic.
piperita, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 366 = thymoides.
plicata, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 180.—Texas,
polygalaefolia, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 367.—Bras,
pulegioides, *Pers. Syn.* ii. 131.—Am. bor.
purpurea, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1873) 62 = Micromeria purpurea.
rotundifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 549.—Mexic.
serpylloides, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 123 = Pogogyne serpylloides.
tenella, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 549.—Mexic.
thymoides, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 362.—Am. bor. occ.
thymoides, Pers. Syn. ii. 131 (err. typ. 151)=Thymus Serpyllum.

HEDEKA, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 56 (1737). *ARALIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 946.
CISSODENDRON, F. Muell. Census, 61 (1882).
HELIX, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 224.
IRVINGIA, F. Muell. Fragm. v. 17 (1865).
KISSODENDRON, Seem, in Jonrn. Bot. iii. (1865) 201.
PSEDERA, Neck. Elem. i. 168 (1790).
acerifolia, DC. Prod. iv. 264 = Oreopanax acerifolium.
aculeata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 187 - Brassaiopsis aculeata.
acuminata, Wight, Ic. t. 1062 = Polyscias acuminata.
acutifolia, DC. Prod. iv. 263 (Quid ?).—Am. austr.
aesculifolia, Wall. Cat. n. 4913 - Brassaiopsis aculeata.
alaris, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 605 = Dendropanax alaris.
angularis, DC. Prod. iv. 263=Oreopanax angulare.
Aralia, Jack, in Wall. Cat. n. 4925=Trevesia palmata.
arborea, Sw. Fl. Ind. Occ i. 518 = Dendropanax arboreum.
arborea, Walt Fl. Carol. 102=Vitis arborea.
argentata, DC. Prod. iv. 263 = Oreopanax argentatnm.
argentata, Spreng. Syst. i. 952 - Oreopanax acerifolium.
aromatica, Blume, in Flora, vii. (1824) 291; DC. Prod. iv. 265 (^*Agalma aromaticum*).—Java,
australiana, *F. Muell. Fragm.* iv. 120.—Austral.
avicenniaefolia, DC. Prod. iv. 263 = Oreopanax avicennlaefolium.
canariensis, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 171.—Ins. Canar.

HEDERA.—
capitata, Sm. Ic. Pict. Rar. i. t. 4 = Oreopanax papitatum.
catalpaefolia, DC. Prod. iv. 268 = Oreopanax capitatum.
cheirophylla, DC. 1. c 264 = Oreopanax cheirophyllum-
chrysocarpa, Walsh, in Trans. Hort. Soc' vi. (1826) 42 = H. Helix.
cochleata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 193 = Panax cochleatum.
colchica, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wocbenschr. (1859) 76, 406 = H. Helix.
communis, S. F. Gray, Nat. AIT. Brit. PL ii. 491-H. Helix.
corymbosa, Choisy, in DC. Prod. iv. 262 = Hydnocarpus corymbosus.
crassifolia, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 718 = Pseudopanax crassifolium.
crassinervia, DC. Prod. iv. 263=Oreopanax crassinervium.
cumanensis, DC. 1. c. = Oreopanax cumanense.
cuneata, DC. 1. c. 262 = Gilibertia cuneata.
cuneifolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 117.—Cuba.
discolor, DC. Prod. iv. 263 = Oreopanax discolor.
disperma, DC. 1. c 265 = Macropanax oreophilum.
diversifalia, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 456 = Helix.
donerailensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 680° H. Helix.
Echinops, Cham. & Schlecht. in linnaea, v. (1880) 17* -Oreopanax Echinops.
elata, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 18* Heptapleurum elatum.
emarginata, Moon, Cat. PI. Ceyl. 18»HeptapleurnB> emarginatum.
exaltata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 132 = Heptapleurun> Wallichianum.
ferruginea, DC. Prod. iv. 264=Sciadophylluro «<*' rugineum.
ferruginea, Wall. Cat. n. 4909 = Trevesia palmata.
fioribunda, DC. Prod. iv. 264 = Oreopanax floribnndum.
floribunda,'Wal\. Cat. n. 4912 = Brassaiopsis speciosa.
fragrans, D. Don, Prod. FL Nep. 187 = PentaDS*"* Leschenaultii.
frondosa, Salisb. Prod. 14 4=Oreopanax capitatum.
Gaudichaudi, A. Gray, Bot U. St. Expl. Exped. i. *I* = Panax Gaudichaudii.
glauca, Wall. Cat. n. 4921 = Pentapanax parasiticuin.
glomerulata, DC. Prod. iv. 265 = Brassaiopsis speciosa*
Hainla, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. *ul"* Brassaiopsis Hainla.
Helix, *Linn. Sp. PI.* 202.—Europ.; Afr. bor.; **• temp.
Helix, Lowe, Fl. Mader. 376=canariensis.
heptaphyllum, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I- {=*Agalma rugosum*).—Java.
keterophylla, Wall. Cat. n. 4919 =Heptapleurum heterophyllum.
hypoglauca, Hance, in Walp. Ann. ii. 724 = cantonensis.
Jackiana. G. Don, Gen. Syst. iii. 394-Arthrophyi""" diversifolium.
japonica, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. w- (1840) 307 = Dendropanax japonicum.
jatrophaefolia, *DC. Prod.* iv. -264.—N. Granat.
latifolia, Wight & Am. Prod. 876 = Polyscias pinnata.
Leschenaultii, Wight & Am. 1. c 37 Pentapanax Leschenaultii.
Lessoni, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. Pseudopanax Lessoni.
lobata, Gilib. Fl. Lituan. ii 134 = H. Helix.
lucescens, Seem. Journ. Bot. ii. (1864) 808=seq.
lutescens, DC. Prod. iv. 265 -= Heptapleurum phyllum.
macrophylla, Wall. Cat. n. 4918-Aralia cachemiriana, maynensis, *Spruce, in Journ. Linn. Soc.* v. (Quid?).—Bras.
mollis, Wall. Cat. n. 4924 = Heptapleurum Cephalotes
multiflora, DC. Prod. iv. 262 = Oreopanax capitatum.
Mutisiana, DC. 1. c=Oreopanax Mutisianum-
nodosa, Hassk. in Hoev. *U* De Vriese, Tijds (1843) 131-= Polyscias nodosa.
«»ro»s,Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 61«Dendrop»-, nutans.
obovata, Wight, Ic 1.1011/12=Heptapleuru» latum.
obtusiloba, DC. Prod. iv. 263 = Oreopanax o ovata, Wall. Cat. n. 4911 = Arthrophylln» folium.
Palmata, Wall. 1. c. n. 4910 = Trevesia palm"*

HEDERA:—
parasitica, D. Don, Prod. FL Nep. 188-Pentapanax parasiticum.
parviflora, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv., (1852) 122 = Dendropanax parviflorum.
pendula, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 51 - Dendropanax pendulum.
platanifolia, DC. Prod. iv. 263 = Oreopanax platanifolium.
platypkylla, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 720. t. 91 =. Panax platyphyllutn.
poitarum, Bertol. Fl. Ital. ii. 688 = H. Helix.
po»ica,Sa\isb. Prod. 143 = H. HeUx.
polyacantha, Wall. PI. As. Rar. ii. 82 = Brassaiopsis palmata.
protect, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 122-Dendropanax parviflornm.
quinquefolia, Linn. Sp. PI. 202 = Vitis hederacea.
racemosa, Wight, Ic. t 1015 = Heptapleurnm racesum.
ramiflora, DC. Prod.iv. 262 = Gilibertia cuneata.
resinosa, Spruce, in Joum. Linn. Soc. v. (1861) 9; Benth. ex March, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 249 = Gilibertia resinosa.
reticulata, DC. Prod. iv. 264=Oreopanax reticulatum.
rhombea, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Mnench. iv. n. (1848) 202 - H. Helix.
rhombi/olia, Rnpr. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 1091 = H. Helix.
Roegneriana, Hort. ex Boiss. 1. c - H. Helix.
rostrata, Wight, Ic. t. 1013/14 = Heptaplenrum rostratum.
rugosa, DC. Prod. iv. 265 (= *Agalma rugosum).—J*v*.
**candens,* DC. 1. c. 264 - • Brassaiopsis Hainla.
Sdodaphyllum, Sw. Fl. Ind. Occ i. 619 = Sciadophyllum Brownii.
senticosa, *Rupr. in Bull. Soc. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* xv. (1856) 184.—Hab.»
septemnervia, DC. Prod. iv. 263 = Oreopanax capitatum.
"rrata, Wall. Cat n. 4915 = Macropanax oreophilum.
sesgliflora, Benth. PI. Hartw. 146=Oreopanax sessilinornm.
**imillima,* DC. Prod. iv. 265 (=*Agalma simillimum).* — Java.
**oluen&,* Steud. Norn. ed. II. i. 725=«dadophyllum lerrugineum.
marrosa, Jnngh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 301 (- *Agalma rugosum).*—Java.
s«bcordata, Wall. Cat n. 4917=Pentapanax subcordatum.
t'rebinthinacea, Vahl, Symb. Bot. iii. 42 = Hepta-Pleurum stellatum.
^*ebinthinacea,* WaU. Cat. n. 4920-Heptapleurnm venulosum.
totnentosa, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 187 = Heptaplenrum impressum.
trifoliata, Wight & Am. Prod. 877 = Pentapanax Leschenaultii.
triloba, Gardrfin Hook. Lond. Jonro. Bot. iv. (1845) 105 - Gilibertia triloba.
turbacensis, DC. Prod. iv. 263 = Oreopanax turbacense.
**bellifera,* DC, 1. c, 262 - Osmoxylon amboinense.
orJulifera, Sweet, Hort. Brit ed. 1.193 = Polyscias odosa.
^*ulata,* WalLCatn. 4916=Macropanax *n**?™"*-*ifolia.* Veil. Fl. Flnm. 77; ii. t 75 (Quid?).—Bras.
VaklU, Thw. Enum. PI. Zeyl. 132 = Heptaplenrum ellatum.
venosa, Wall. Cat.n. 4923 = Heptapleurum venulosum.
verticillata, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841; pp. 20 8 = Heptapleurum verticillatum.
Wal-lichiana, Steud. Norn. ed. II. i. 725-Oreopanax fonbundum.
Xalapensis, DC. Prod. iv. 264 = Oreopanax xalapense.

HEDERANTHUM, Steud. Norn. ed. II. iL 330, in syn. <.i841)=p]ytelmiBi Linn, (Campan.).

HEDEROPSIS, C B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 739 (1879). *ARALIACEAE.*
Maingayi, *C. B. Clarke, I.* r.-Malacca.

HEDICHIUM, Ritg. in Marb. Schrift. ii. (1831) 123 = <iyehii, Koen. (Scitaro.).

HEDYSARUM. Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 311 (1768) = Hedysanun, Toum. (Legumin.).

HEDIOSMUM, Poir. in Diet. Sc. Nat. xx. 330 (1821) = Hedyoamum, Sw. (Chloranth.).

HEDONA, Lour. Fl. Cochinch. 286 (1790)= Lychnis, Linn. (Caryophyll.).
sinensis, Lour. 1. c.-L. coronata.

HEDRAEANTHUS, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 292 (1844) = EDRAIANTHUS, A. DC. = Wahlenbergia, Schrad. (Campan.).

HEDRAIANTHEBA, F. Muell. Fragm. v. 58 (1865). *MELIACEAE,* [Benth. & Hook. f. i. 998].
porphyropetala, *F. Muell. 1. c.*—Austral.

HEDRAIOPHYLLUM, Less, ex Steud. Nom. ed. II. i. 697, in syn. (1840) = Ctochnatia, H. B. & K. (Compos.).

HEDRAIOSTYLUS, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 141 = Plukenetia, Linn. (Euphorb.).
corniculatus, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 284 = P. comiculata.
glaberrimus, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 141 = P. comiculata.

HEDRANTHUS, Rupr. in Bull. Acad. Pdtersb. xi. (1867) 203-EDRAIANTHUS, A. DC.-Wahlenbergia, Schrad. (Campan.).
Owerinianus, Rupr. 1. c. *(= E. Owerinianus).—liej>.* Caucas.

HEDUSA, Rafin. Sylva Tellur. 101 (1888) - Diasotis, Benth. (1849) (Melastom.).
grandiflora, Rafin. 1. c.=D. grandiflora.

HEDWIGIA, Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 495 = CommeUna, Linn.
africana, Medic. 1. c. = C. africana.

HEDWIOIA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 4, 62 (1788); Fl. Ind. Occ ii. 670. t. IS (1800). *BURSERACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 326.
CAPROXYLON, TUSS. Fl. Antill. iv. t. 30 (1827).
KNORKEA, [MO?. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 80 (1826).
SCHWAEGRICHENIA, Reichb. Consp. 147 (1828).
TETRAGASTRIS, Gaertn. Fruct ii. 130.1.109 (1791).
bahamifera, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 285. t. 60 =panamensis.
balsamifera, *Sw. -Prod. Veg. Ind. Occ.* 62.—Ins. S. Doming.
Hostmanni, *Engl. in DC. Monog. Phan.* iv. 97.—Guian.
mexicana, *DC. Prod.* ii. 80.—Mexic.
panamensis, *Engl. in Bot. Jahrb.* i. (1881) 42.—Panama.
rhoifolia, Benth. in Hook. Kew Joum. iii. (1852) 17 = Crepidospermum rhoifolium.
simplieifdia, Sprang. Neue Entdeck. iii. 24-TrichiIia simplicifolia.
Tussaccii, Walp. Rep. i. 559 = balsamifera.

HEDYCAPNOS, Planch, in Fl. des Serres, viii. (1852-53) 193. t 820=Dicentra, Berah. (Papav.).
spectabilis, Planch. 1. c.-D. spectabilis.

HEDYCARIA, Murr. Syst. ed. XIV. 894 (1784) - Hedycarya, Forst. (Monim.).

HEDYCARIX,Raoul,Choix, 30 (1846), sphalm. = praec.

HEDYCARPUS, Jack, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1823) 118 = Baooauxea, Lour. (Euphorb.).
javanicus, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 859 = E. javanica.
lanceolatus, Miq. 1. c. = B. lanceolata.
malayanus, Jack, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1823) 118.—Sumatra.

HEDYCAEYA, Korst. Char. Gen. 127. t. 64 (1776). *MONIMIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 141.
CRINONIA, Banks, ex Tul. in Arch. Mus. Par. viii. (1856) 405.
angustifolia, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* Ser. I. i. (1888) 215.—Austral.
arborea, *Forst. Char. Gen.* 128. t. 64.—N. Zel.
australasica, A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 673 = angustifolia.

HEDYCARYA:—
Badaunii, *Bail!. Adansonia, ix.* (1868-7U) 132.—N. Caled.
bengalensis, Roxb. ex Walp. Ann. iv. 113—arborea.
Cunninghami, Tul. in Arch. Mas. Par. viii. (1856-66) 408 = angustifolia.
cupulata, *Baill. Adansonia,* ix. (1868-70) 132.—N. Caled.
dent'ata, Forst. f. Prod. 71 = arborea.
dorsteniioides, *A. Gray, in Journ. Bot.* iv. (1866) 88. -Ins. Fiji.
hirsuta, Spreng. Pugill. ii. 91 = arborea.
macrop/iylla, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 215-angustifolia.
Pseudomorus, F. Muell. in Trans. Phil. Inst Viet. ii. (1868) 68-angustifolia.
racemosa, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. iii. (1855) 45 — Palmeria racemosa.
scabra, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 216-arborea.

HEDYCHION, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 50 (1844) = seq.

HEDYCHIXTII, Koen. in Retz. Obs. iii. 73 (1783>. *SCITAMINEAE,* Benth. & Hook. £ iii. 642.
GAMOCHILUS, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 341.
acuminatum, Rose. Scitam. t. 47 = spicatum.
album, Buch. Ham. ex Wall.-in Hook. Kew Joum. v. (1853) 325 - coronai ium.
angustifolium, Roxb. Hort. Beng. 1; Fl. Ind. L 13 ^ coccineum.
aurantiacum, Rose. Scitam. t. 61 = coccineum.
aurantiacum, Wall. Cat. n. 6551-speciosum.
barbatum, Wall. 1. c. n. 6544 = stenopetalum.
candidum, *Wall, ex Horan. Prod. Scitam.* 26, nomen (sp. dub.).—Ind. or.
cameum, *Carey, ex Herb, in Bot. Mag.* t. 2637 ; *Lodd. Bot. Cab.* t. 698.—Ind. or.
cameum, Rose. Scitam. t. 67=coccineum.
cernuum, Wight, Ic. t. 2011» venustum.
chrysoleueum, Hook. Bot. Mag. t 4516 = coronarium.
coccineum, *Buch.-Ham. ex Sm. in Rees, Cyclop,* xvii. n. 5; *Lodd. Bot. Cab.* t. 705.—Nepal.
coccineum, Wall, in Hook. Kew Joum. v. (1858) 878, partim = stenopetalum.
coronarium, *Koen. in Retz. Obs.* iii. 73.—Ind. or.
densiflorum, *Wall. Cat.* n. 6552.—Ind. or.
elatum, *R. Br. in Bot. Reg.* t. £26.—Nepal.
elatum, Horan. Prod. Scitam. 25, partim=stei.o-pctalum.
ellipticum, *Sm. in Rees, Cyclop,* xvii. n. 2.—Reg. Himal.
fastigiatum, Wall. Cat. n. 6540=ellipticum.
flavescens, Carey, ex Rose. Sciwm. t. 60 = coronarium.
fiavescens, Lodd. Bot. Cab. t. 723; Lindl. in Journ. Hort. Soc. vii. (1852) 281 = spicatum ?
flavum, Roxb. Hort. Beng. 1; Fl. Ind. i. 81 - coronarium.
formosum, *Wall, ex Horan. Prod. Scitam.* 26, nomen (sp. dub.).—Ind. or.
Gandasulium, Buch.-Ham. ex Wall, in Hook. Kew Jonm. v. (1853) 325 = coronarium.
Gardnerianum, *Griff. Notul.* iii. 419.—Ind. or.
Garrinerianum, *Rose. Scitam.* t. 62.—Reg. Himal.
Gardnerianum, WaU. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. *6* — speciosum.
giganteum, *Wall, ex Horan. Prod. Scitam.* 26, nomen (sp. dub.1.—Ind. or.
glaucum. Rose Scitam. t. 5S=gracile.
Uomezianum, *Wall. Cat.* n. 6543.—Ind. or.
gracile, *Roxb. Hort. Beng.* 1; *Fl. Ind.* i. 14.—Ind. or.
grandiflorum, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 68.—Hab.?
gratum, *Wall, ex Horan. Prod. Scitam.* 26, nomen (sp. dub.).—Ind. or.
Griffithianum, *Wall, in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 869.—Ind. or.
Hasscltii, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 56—Java.
heholum, Steud. Nom. ed. II. i. 726, sphalm. — *trilobum.*
heteromallum, Ker-Gawl. Bot. Reg. t. 767 - thyrsiforme.
Horsfieldii, *R. Br. ex Wall, in Hook. Kew Joum.* v. (1853) 376.—Java.
intermedium, *Blume, Enum. PI. Jav.* 57—Java.
javoyanum, Horan. Prod. Scitam. 2R, nomen.sphalm. — tavoyanum.

HEDYCHITTM :—
lanatum, *Scheff. in Ann. yard. Buiten:* i. (1876) 67. —N. Guinea,
lingulatum, *Hassk. in Hon. tf De Vriese, Tijdsehr.* v. (1838-39) 257.—Java.
longifolium. Rose. Scitam. t. 58 = coccineam.
lnteum, *Hort. Angl. ex 'Link, Enum. Hart. Berol.* i. 443.—Hab.?
maximum, Rose. Scitam. t. 52 = coronarium.
palembanicum, *Afiq. Ann. Afus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 101.—Java.
pallidum, Kegel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 23; Gartenfl. (1857) 366 = Gardnerianum.
peregrinum, *N. E. Br. in Card. Chron.* (1883) I. 868. —Madag.
Propketae, Bnch.-Ham. ex Wall, in Hook. Kew Jonin. v. (1853\325 = coronarium.
Roscoei, Wall, ex A. Dietr. Sp. PI. i. 37 (Roscoi) = speciosnm, coccineum.
Koxburgbii, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 57.—Java.
Roxburghii, Siebold, ex Lindl. in Joutn. Hort. Soc. vii. (1852) 281, in syn. = spicatum ?
scaposum, Nimmo, in J. Grah. Cat. PI. Bomb. 205 = Monolophus scaposns.
Sieboldii, Wall, in Hook. Kew Journ. v. (1853) 371 =- spicatum I
simile, *Blume, Enum. PI. Jav.* i. 57.—Java.
Spanogheanura, *Wall, in Hook. Kern Journ.* v. (1853) 3 75.-Java.
speciosum, Wall, in Roxb. Fl. Ind. i. 13 = speciosnm.
spicatum, Lodd. Bot. Cab. t 658 = coronarium.
spicatnm, *Sm. in Sees, Cyclop,* xvii. n. 3.—Reg. Himal.
squarrosum, Buch.-Ham. ex Wall, in Hook. Kew Jonm. v. (1853) 372 = coccineum.
stenopetalum, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1902.—Ind. or.
sulphureum. Wall, in Hook. Kew Joura. v. (1868) 325 =coronarium.
aumatranum, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) n. VII. 1.—Malaya.
sumatranum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 27S=palembanicum.
lavoyanum, *Horan. Prod. Scitam.* 26 (javoyanum), nomen.—Ind. or.
tenuiflorum, Wall. Cat. n. 6546 C=villosum.
thyrsiforme, 5m. *in Rees, Cyclop,* xvii. ri. 4.—Ind. or.
Tocucho, Buch.-Ham. ex Wall, in Hook. Kew Journ. v. (1853) 327 = thyrsiforme.
trilobum. Wall. Cat. n. 6554 — spicatum.
urophyllum, Lodd. Bot. Cab. 1.1785=coronarium.
venustum, *Wight, Ic.* t. 2012.—Ind. or.
villosum, *Wall, in Roxb. Fl. Ind.* i. 12.—Ind. or.

HEDYCHLOA, Rafin. Ann. Nat. 16 (1820)=Kyllinga, Rottb. (Cyperac).
fragrans, Rafin. 1. c. = K. pumila.

HEDYCREA, Schreb. Gen. 160 (1789) = Licania, Aubl. (Rosac).
incana, J. F. Gmel. Syst 428; Willd. Sp. PI. i. 1210 =L. incana.

HEDYOSMON, Spreng. Gen. ii. 696 (1831)=Hedyosmum, Sw. (Chloranth.).

HEDYOSMOS, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 211 = Ziziphora, Linn. (Rubiac).

HEDYOSMUM, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 84 (1788). *CHLORANTHACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 135.
TAFALLA, Ruiz & Pav. Prod. 136. t. 29 (1794).
acutifolium, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862 - 63) 306.—Bras.
angustifolium, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 485.—Peruv.
arborescens, Cordem. ex Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 304=Sprucei.
arborescens, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1860) 176 = Grisebachii.
arborescens, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 84.—Ind. oca
Artocarpus, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 485.—Mexic.
bolivianum, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 306.—Bolivia.
Bonplandianum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* viii. 165. t. 634.—Am. austr.
Bonplandianum, Mart. Syst Mat Med. Bras. 100 — brasiliense.
brasiliense, *Mart. Fl. Bras.* iv. I. 8. —Bras,
calloso-ierratum, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* vl856) 40.—Am. centr.

HEDYOSMTJM:—
cumbalense, *Karst. Fl. Columb.* ii. tt. 128, 129 —N. Granat
Dombeyanum, *Solms, in DC. Prod.* xvi. 1.482.—Peruv.
elegans, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862-68) 305.—Ins. Guadaloup.
glabratum, Cordem. 1. c. 803 = Goudotianum.
glabratum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 164.— Am. austr.
glaucum, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 308.—Peruv.
glaucum, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 485.—Peruv.
Goudotianum, *Solms, 1. c.* 482.—N. Granat.
Grisebachii, *Solms, 1. c.* 479.—Cuba,
hirsutum, *H. B. If K. Nov. Gen. et Sp.* vji. 164.—N. Granat.
integmm, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* ill. (1862-83) 302.—Pernv.
laciniatum, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 485.—Peiuv.
latifolium, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 308.—Peruv.
Lechleri, *Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 484.—Peruv.
Mandoni, *Solms, 1. c.* 480.—Bolivia,
mexicanum, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 3O7.-Mexic.
nutans, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 84.—Ind. occ.
parviiblium, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 308.—N. Granat.
Pseudo-andromeda, *Solms, in DC. Prod.* Xvi. l. 481.— Venezuela.
racemosum, Cordem. ex Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 304 = integrum.
racemosum, *D. Don, in Edinb. Rev.* iii. 432; *ex Solms, in DC. Prod.* xvi. I. 483.—Peruv.
scabrum, *Solms, 1. c.* 480.—Pernv.
Sprucei, *Solms, I. c.* 483.—Pernv.
Weddellianum, *Cordem. ex Baill. Adansonia,* iii. (1862-63) 306.—Bras.

HEDYOTIS, Linn. Diss. Dass. 7 (1747); Amoen. Acad. i. 117 (1749). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 56.
DIMETIA, Mdssn. Gen. 160 (1838).
DIPLOPHRAGMA, Meissn. 1. c. (1838).
DYCTIOSPORA, Reinw. ex Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. li. (1851) 167.
EDRISSA, Endl. Gen. Suppl. ii. 58 (1842) (EDRISIA, Rafin. J).
LEPTOPETALUM, Hook. *8c* Am. Bot Beech. Voy. 295 (1841).
MACRANDRIA, Meissn. Gen. 160 (1838).
METABOLOS, Blume, Bijdr. 990 (1826).
PELTOSPERMUM, Benth. in Hook. Niger Fl. 400 (1849).
SCLEROCOCCUS, Bartl. Ord. 210 (1830).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 368 = Oldenlandia -abyssinica.
accedens, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 853.—Ins. Bangka.
acerosa, A. Gray, PI. Wright, i. 81 = Houstonia acerosa.
acuminata, Steud. Nom. ed. II. i. 726 = Kadua aenminata.
acutangula, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 171.—Hongkong.
Adscensionis, *DC. Prod.* iv. 419.—Ins. Adscens.
affinis, Roem. *8c* Schult. Syst. iii. 194 = Oldenlandia dichotoma.
affinis, Wight & Am. Prod. 411 — Anotis LeschenauUana.
alata, Koen. ex Wall. Cat. n. 6196 - Oldenlandia alata.
albo-nerva, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 1.1.3.—Ind. or.
alsinifolia, K. Br. in Wall. Cat. n. 878 =• Oldenlandia corymbosa.
alsinifolia, Zipp. ex Span, in Tinnnen, xv. (1841) 317 • Oldenlandia paniculata.
amatymbica, Stead. Nom. ed. II. i. 726 (Oldenlandiae sp.).—Afr. austr.
ambrosiaca, *Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn.* i. (1778) 286.—Guian.
americana, Jacq. Enum. PI. Carib. 12 = rupestris.
ampliflora, *Hance, in Journ. Bot.* xvii. (1879) 11.— China,
andamanica, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 311.—Ins. Andaman.
angustifolia, Cham. & Schlecht. in Iinnaea, iv. (1829) 158-tenelliflora.
angustifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat* ii. 182.—Ins. Philipp.
angustifolia, Wall. Cat. n. 6203 = Oldenlandia brachiata.

HEDYOTIS :—
approximata, R. Br. in Wall. Cat n. 852=tenelHflora.
arborea, *Roxb. in Beatson, Tracts St. Helena, App.* 310.—Ins. S. Helena.
arborescens, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 17 = Callicarpa lanata 1
arenarioides, *Steud. Nom.* ed. II. i. 726.—Madag.
argentea. Wall. Cat. n. 858 = congesta.
arguta, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 864.—Burma,
articularis, *R. Br. I. c.* n. 854.—Ind. or.
aspera, Bedd. Ic. PI. Ind. Or. t, 82= Oldenlandi* gracilis.
aspera, Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.94 = Oldenlandia aspera.
asperuloides, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 19.1.13.—Am. trap.
attenuata, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Nene Schr. iv. (1803) 216=Oldenlandia brachiata.
Auricularia, *Linn. Sp. PI.* 101.—As. et Austral, trop.
Auricularia, Walt. Fl. Carol. 85 = Oldenlandia glomerata.
axillaris, Gardn. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 143-nodulosa.
barbata, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1P51) 160.—Borneo.
Beddomei, *Hook./. Fl.Brit. Ind.* iii. 52.—Ind. or.
bicomuta, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 405.—Ins. Socotr.
biflora, Homem. Hort. Hafn. 130; Roth, Nov. PI. Sp. 92±Oldenlandia corymbosa.
biflora. Lam. Tabl. Encyc. i. 272; Spreng. Pugill. U. 31 = Oldenlandia biflora.
Blumeana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 726 - Oldenlandia paniculata.
boerhaayioides, Hance, in Jonm. Bot viii. (1870) 73" Anotis boerhaavioides.
Bojeri, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 232 = Oldenlandia Bojeri.
borneënsis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 184.—Borneo.
borrerioides, Champ, ex Benth. in Hook. Kew Jonm. iy. (1852) 171-uncinella.
Boscii, DC. Prod. iv. 420=Oldenlandia Boscii.
bouvardioides, Seem. Bot. Voy. Herald, 296. t 64 - Houstonia bouvardioides.
brachiata, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 60 - coerulea.
brachiata, Wight, in Wall. Cat. n. 6201= Oldenlandia brachUta.
brachyloba, Sond. in Iinnaea, xxiii. (1850) 50 (Oldenlandiae sp. \—Afr. austr.
brachypoda, R. Br. in Wall. Cat. n. 874 = Oldenlandia diffusa.
bracteosa, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1886) 823.— China.
Burmanniana, R. Br. in Wall. Cat. n. 868, partim » Oldenlandia corymbosa.
Burmanniana, Schult Mant. iii. lS8-Oldenland» panicnlata*
buxifolia..£«U. *in Madr. Journ.* Ser. IU. i. (1664) 4»-—Ind. or.
cachirensis, *Karst. in Linnaen,* xxx. (1859-60) 145." N. Granat.
caerulea, Hook. Fl. tior. Am. i. 286 - Houston" caerulea.
caerulea, Korth. in Nederl. Kruidk'. Arch.ii. II. (1[g W] 160=vestita.
caerulea-, *Wight tf Am. Prod.* 412.—Ind. or.
caerulescens, *F. Muell. Fragm.* iv. 38.—Austral.
caespitosa, Walp. Rep. vi. 56 = Oldenlandia SchimP?[II]-
caffra, Steud. Nom. ed. II. i. 726 = Oldenlandia caffra-
calycina, Wall. Cat. n. 878=Anotis calycina.
calycosa, Shuttl. ex A. Gray, PI. Wright, i. 81, in [not]* = Houstonia purpurea.
campanuliflora. Hook. Bot. Mag. t 2840 - Coccocypselum campanuliflorum.
capensis, Lam. TabL Encyc. i. 271 = Oldenland* cflpensis.
capillipes, Schlecht ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 73* Anotis Rheedii.
capitata, Bedd. Ic. PI. Ind. Or. i. 44. t. I[s'1]* Beddomei.
capitata, Heyne, ex Wall. Cat n. 870 - Oldenlan<"» umbellata.
capitata, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. H. ([18S4] 159 = borneënsis.
capitata, *Lam. Encyc.* iii. 80.—Ind. or.
capitata, Walp. Rep. vi. 66=Hartwegiana.

IEDYOTIS *i*—
capitota, Wight, ex Wall. Cat p. 214, n. 879 = Anotis qnadrilocalaris.
capitellala, *Wall. Cat.* n. 837.—Malaya; China.
capituliflora, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 188-vestita.
capituligera, *Hance, in Jmrn. Bot.* zvil. (1879) 12.—China.
caracasana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 398 — Mallostoma caracasana.
carnosa, Dalz. in Hook. Kew Joura. ii. (1850) 186 — Anotis carnosa.
carnosa, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1851) 161.—Borneo.
caroliniana, Raeusch. Norn. ed. III. 88 = Houstonia pnrpurea.
centranthoides. Stead. Norn. ed. II. i. 727 - Kadua centranthoides.
cephalantha, *Wedd. Chlor. And.* ii. 46.—N. Granat.
cephalophora, R. Br. in Wall. Cat n. 842-uncinella.
Cephalotes, Hochst. in Flora, xxvii. (1841) 558 (Oldenlandiae sp.).—Air. anstr.
Cervantesii, *H. B. &* K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 390.—Mexic.
Chamissoniana, Steud. Norn. ed. II. i. 727 - Gouldia sandwicensis.
chiloënsis. *Phil, in Linnaea,* xxviii. (1856) 697.—Chili.
chlorophylla, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 653 (Oldenlandiae sp.).—Afr. austr.
ciliicaulis, *Miq. FL Ind. Bat.* ii. 179.—Ins. Sumbawa.
ciliolata, Torr. ex Sprang. Syst. iv. Cur. Post. 40 - Houstonia purpurea.
ciliolata, Walp. Ann. ii. 772 = Oldenlandia ciliolata.
cinereo-viridis, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 419.—Zeylan.
coarctata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 527 = Mallostoma thymifolia.
cocdnea, Walp. Rep. ii. 601-Oldenlandia coccinea.
coerulea, Auct vide *caerulta.*
commutata, *Schult. Mant.* iii. 184.—Porto Rico.
conferta, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 67 = Mallostoma conferta.
congesta, *R. Br.in Wall. Cat.* n. 844.—Malava.
tonnata. Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 62, err. typ.= coronata.
conostyla, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot 471. t. 94 = Kadua Menziesiana.
consangninea, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xvm. (1862) 221.—China.
Cookiana, Steud. Nom. ed. II. i 727-Kadua Cookiana.
cordata, Steud. 1. c^Coccocypselum umbellatum.
eordata, *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* iv. HI. (1846) 177.—Tapon.
cordifolia. Sprang. Pugill. ii. 26 = Rondeletia virgata.
coriacea, Sm. in Rees, Cycl. xvii. n. 11 - Kadua Menziesiana.
coronata, *Wall. Cat.* n. 856.—Burma.
'orymbosa, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6202 = pruinosa.
eorymbosa, Lam. Tabl. Encyc. i. 272 = Oldenlandia corymbosa.
^miesa, Spreng. Pugill. ii. 27 = fruticosa..
'ostata, R. Br. in Wall. Cat. n. 849-H. Aunculana.
eostata, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlv. (1876) H. 185 = vestita.
"assifolia, Bartl. ex DC. Prod. iv. 427 - Oldenlandia crassifolia.
"assifolia, *Blume, Bijdr.* 971.—Java.
"assifolia, Rafin. Fl. Ludov. 77 (Houstoniae sp.).—Am. bor.
Crataeogonum, *Spreng. Pugill.* *• 85.-Malaya.
^-rouchiana, *F. Afuell. Fragm.* x. 85.—Austral.
Vanantha, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlv. (1876) n. 136 = caerulea.
cyanescens, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 143.-Zeylan.
Vmosa, R. Br. in Wall. Cat. n. 885 = Anotis Lescnenaultiana.
cymosa, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 142.—Zeylan.
cymosa, lactea.
cynanc) = *Kohautia*
anchica).—Afr. austr.
d f s, Roem. & Schult. Syst. iii. 200 = Oldenlandia debilis.
*«umbens, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 552 - Oldenlandia decumbens.
%'lesiertiana, Steud. Nom. ed. II. *I* ^'^"ft^
teltoidea, Wight & Am. Prod. 410 = Anotis Leschenaultiana.
OensiBora, *Boj. Hart. Maurit.* 167, nomen.—Afr. trop.

HEDYOTIS:—
dentelloides, *Steud. Nom.* ed. II. i. 727.—Bras.
Deppeana, Steud. 1. c. - Oldenlandia Deppeana.
depressa, Roem. & Schult Syst. iii. 200 - Oldenlandia corymbosa I
diantha, Schult. Mant. iii. 186 - Oldenlandia corymbosa.
dichotoma, Cav. Ic vi. 53—racemosa.
dichotomy Koen. ex Roth, Nov. PI. Sp. 98 - Oldenlandia dichotoma.
dichotoma, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 861 — Oldenlandia Héynei.
diffusa, Spreng. Syst. i. 413 - Oldenlandia dichotoma.
diffusa, Willd". Sp. PI. i. 566 = Oldenlandia diffusa.
discolor, Spreng. Syst. i. 411 •= Rondeletia discolor.
efiusa, *Hance, in fount. Bot.* xvii. (1879) 11.—China.
elatinoides, *Benth. Fl. Austral,* iii. 405.—Austral.
elegans, *Wall. Cat.* n. 887.—Burma.
elongata, R. Br. in Wall. 1. c. n. 866 - Oldenlandia aspera.
ericoides, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iii. 627.—Am. austr.
evenia, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 140, 419.—Zeylan.
extensa, R. Br. in Wall. Cat. n. 869=Oldenlandia diffusa.
fasciculata, *Bertol. Misc. Bot.* x. 24.—Am. bor.
filiformis, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 57 - Mallostoma filiformis.
fimbriata. *Wall. Cat.* p. 213, n. 851.—Reg. Himal.
Finlaysoniana, Wall. 1. c. n. 6189 =capitellata, Anotis Wightiana.
flavescens, Thw. Enum. PI. Zeyl. 141=Lessertiana.
floribunda, *Karst. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 146.—N. Granat.
foetida, Dalz. in Hook. Kew Joum. ii. (1850) 134 = Anotis foetida.
foetida, Spreng. Pugill. ii. 28 - Oldenlandia foetida.
Frankii, *Presl, Bot. Bemerk.* 86.—Am. bor.
fruticosa, *Linn. Sp. PI.* 101.—Ind. or.
fruticosa, [Moc. & Sesse,] ex DC. Prod. iv. 865 = Bouvardia triphylla.
fruticosa, Walp. Rep. iv. 450. Ind. sphalm. = Houstonia angustifolia.
fugax, Vatke, in Oestr. Bot. Zeltschr. xxv. (1876) 282 = Oldenlandia decui.ibens.
fulva, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 58.—Reg. Himal.
fusca, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. F). Nep. 134 = Oldenlandia gracilis.
galioides, F. Muell. Fragm: iv. 88 - Oldenlandia galioides.
galioides, Wall. Cat. n. 866 = H. Wallichii.
Gardneri, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 142.—Zeylan.
geminifiora, Sond. in Linnaea, xxiii. (I860) 61 (Oldenlandiae sp.).—Afr. austr.
geniculata, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 21.—Am. bor.
geniculata, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 364-H. Auricularia.
gentianoides, Endl. Iconog. Gen. PI. i. 89 - Houstonia caerulea.
Gerrardi, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 9-Oldenlandia caffra.
glabella, R. Br. in Wall. Cat. n. 886 = nitida.
glabra, *R. Br. 1. c.* n. 848.—Reg. Himal.; -Malaya.
globosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 360 - Oldenlandia globosa.
glomerata, Ell. Sketch, i. 188 = Oldenlandia glomerata.
glomerata, Walp. Rep. ii. 501 = Kadua glomerata.
goreinsis, DC. Prod. iv. 421 = Oldenlandia trincrvia.
gracilis, *DC. I. e.* 419.—N. Caled.
gracilis, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 871 = Oldenlandia gracilis.
graminicola, Kurz, in Journ. Bot. xiii. (1875) 326 = Oldenlandia corymbosa.
graminifolia, linn. f. Suppl. 119=Oldenlandia stricta.
grandiflora, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 868-Oldenlandia noctiflora.
grandiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 727 - Oldenlandia grandiflora.
Grayi, *Hook. f. in Benth. It Hook. f. Gen.* ii. 57.—Ins. Bonin.
Griffithil, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 58.—Reg. Himal.
Halei, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 42 - Oldenlandia Halei.
Hartwegiana, *Wedd. Chlor. And.* Ii. 45.—N. Granat.
Helferi, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 53.—Burma.
herbacea, Bert, ex Schult. Mant. iii. 184=commutata.
herbacea, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cv=Oldenlandia stricta.

HEDYOTIS:—
herbacea, Linn. Sp. PI. 102 = Oldenlandia Heynii 1
herbacea, Osbeck, Voy. ed. Angl. 4= Oldenlandia corymbosa.
Heynii, Bedd. Ic. PI. Ind. Or. t. 83 = Oldenlandia dichotoma.
Heynii, R. Br. in Wall. Cat. n. 867-Oldenlandia Heynii.
hirsuta, Lam. Encyc. iii. 79 - H. Anricularia.
hirsuta, *Spreng. Pugill.* ii. 35.—Reg. Himal.; Java; Japon.
hirsutissima, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1864) 49.—Ind. or.
hirtula, Harv. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 12 (Oldenlandiae sp.).—Afr. austr.
hispida, Heyne, ex Wall. Cat. n. 886-nitida.
hispida, *Retz. Obs.* iv. 28.—Ind. or.; As. trop.; Malaya.
hispida, Roth, Nov. PI. Sp. 95 — Oldenlandia hispida.
Hookeriana, Steud. Nom. ed. II. i. 727 - Kadua glomerata.
Horneriana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 183 = barbata.
Humboldtiana, Steud. Nom. ed. II. i. 727 - Mallostoma nitida.
humifusa, Engelra. ex A. Gray, in Bost Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 216-Houstonia humifusa.
hypnoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 389.—Ecuador.
hyssopifolia, Cav. Ic. vi. 54 - Mallostoma hyssopifolia.
inamoena, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 143, partim.—Zeylan.
inamoena, Thw. 1. c. partim - cinereo-viridis.
indica, Roem. & Schult. Syst. iii. 196 = Oldenlandia umbellata.
ingrata, Wall. Cat. n, 868 = Anotis ingrata.
intermedia, Wight & Am. Prod. 416 -Oldenlandia corymbosa.
iodoneura, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 181.—Java.
juniperifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 67 = Mallostoma juniperifolia.
lactea, Willd. Enum. Hort. Berol. 149 = Oldenlandia lactea.
lacustris, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 30.—Bras,
laevigata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 178.—Ins. l'hilipp.
lancea, *Thunb. ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxix. (1888) 161.—China.
lanceolata, I'oir. Encyc. Suppl. iii. 14 = Uoustonia pur. purea.
lancifolia, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 135-Anotis lancifolia.
lancifolia, Schum. in Schum. ft Thonn. Beskr. Gmn. PI. 72 = Oldenlandia lancifolia.
Lapeyrousii, *DC. Prod.* iv. 420.—Ins. Vanikoro.
lanc'ifolia, Cav. Ic. vi. 54 — Mallostoma lanicifolia.
lasiantha, Nutt. ex A. Gray, PI. Wright, i. 81-Houstonia angnstifolia.
latifolia, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 133-Anotis Rheedii.
latifolia, *Reinw. ex De Vriese.Pl. Ind. Bat. Reims.* 159.—Java.
latifolia, Walp. Rep. vi. 65-Oldenlandia latifolia, *Mart. (* Gal.*
Lawsoniae, Benth. ex Hook. Lond. Joum. Bot i. (1842) 486-acutangula.
Lawsoniae, Wight, Ic. 11026 (Planta dubia).—Ind. or.
Lawsoniae, *Wight V Am. Prod.* 407.—Ind. or.
laxa, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 135 (Spermacoces sp. 1)— Nepal.
laxiflora, Walp. Ann. ii. 772=Oldenlandia macrophylla.
lentiginosa, Bedd. Ic. PI. Ind. Or. i. 2. t. 6»prninosa.
leptopetala, A. Gray, in Mém. Am. Acad. N. S. vi. (1868-69) 394 - Grayi.
leptopetala, *Hook.f. in Benth.* b* *Hook.f. Gen.* ii. 57.—Mexic.
Leschenaultiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 61, sphalm. vide *Leschenaultii..*
Leschenaultiana, Wight & Am. Prod. 411-Anotis Leschenaultiana.
Leschetiaultii, DC. Prod iv. 422-stylosa.
Lessertiana, *Am. in Nov. Act. Nat. Cur.* xvrii. l. (1836) 389.—Zeylan.
leucophylla, Spreng. Syst. i. 411-Rondeletia leucophylla.
linarifolia, R. Br. in Wall. Cat. n. 870 - Oldenlandia umbellata.
Lindleyana, Hook, ex Wight *Sc* Am. Prod. 409 — hirsuta.

HEDYOTIS :—
linearis, Stend. Nom. ed. II. i. 728 = Oldenlandia Heynii ?
lineata, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 365.—Reg. Himal.; Burma.
lineata. Wall. Cat. n. 6198 = H. Anricularia.
linifolia, Willd. ex Roem. *Sc* Schnlt. Syst iii. 526 = Oldenlandia dichotoma.
linoides, Kurz, in Jonm. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) II. 184, sphalm. = Oldenlandia linoides.
loganioides, *Benth. Fl. Hongk.* 149.—Hongkong,
longidens, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 289.—China.
longiflora, Spreng. Fngill. ii. 27 - Rondeletia pilosa.
longiflora, Steud. Nom. ed. II. i. 728 *(-Kohautia longiflora).*—Afr. anstr.
longiflora, Walp. Rep. ii. 487 = Houstonia triflora.
longifolia, Hook. Fl. Bor. Am. i. 286 = Houstonia purpurea.
longifolia, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 70 - Oldenlandia corymbosa.
Macraei, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iii. 50.—Zeylan.
macrocephala, K. Br. in Wall. Cat. n. 846, sphalm. = monocephala, *Wall,*
macrophylla, Lepr. & Perr. ex DC. Prod. iv. 427 = Oldenlandia macrophylla.
macrophylla, Thw. Enum. PI. Zeyl. 142 - Thwaitesii.
macrophylla, *Wall. Cat.* n. 841.—Burma; Malaya,
macrostemon, *Hook,* b" *Am. Bot. Beech. Voy.* 192.—China.
Maingayi, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 49.—Malacca.
marginata, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 58 - Lessertiana.
maritima, Linn. f. Suppl. 119= Peplidium humifusum.
maritima. Wall. Cat. n. 6192=Oldenlandia stricta, Shuteri.
media, Cav. Ic. vi. 5S = racemosa.
membranacea, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 143.—Zeylan.
Menziesiana, Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Kadua Menziesiana.
merguensis, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 57 = coronata.
micrantha, Hochst. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 60-Oldenlandia Heynii.
microphylla, DC. Prod. iv. 433, in syn. = Anotis sergens.
microphylla, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 889.—Peruv.
microtheca, Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Oldenlandia microtheca.
minima, Heyne, ex Wall. Cat. n. 877– Oldenlandia paniculata.
minima, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 38-Houstonia patens, minima.
minuta, Phil, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 58" Oldenlandia uniflora.
mitrasacmoides, *F. Muell. Fragm.* iv. 37.—Austral,
mollis, *Wall. Cat.* n. 869.—Ins. Penang.
numanthos, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 359=Oldenlandia monanthos.
monocephala, *R. Br. in Wall. Cat.* p. 213.—Ind. or.
monocephala, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 225.—Java.
monosperma, Wight *8c* Am. Prod. 410=Anotis monosperma.
mueronata, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 19. t. 13.—Calif.
multicaulis, Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 69 -H. Auriculaiia.
multiflora, Cav. Ic. vi. 53 = Oldenlandia paniculata.
muscosa, *St. Hil. Voy. Distr. Diam.* i. 396.—Bras,
mntica, *Wedd. Chlor. And.* ii. 48.—N. Granat.
mysurensis, Heyne, ex Wall. Cat. n. 882 = Anotis.monosperma.
natalensis, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 552 (Oldenlandiae sp.).—Afr. austr.
Neesiana, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. I. (1836) 341 = nitida.
nervosa, Lam. Encyc. iii. 79 = H. Auriculaiia, hispida.
nitida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 392 = Mallostoma nitida.
nitida, *Wight* b* *Am. Prod.* 412.—Ind. or.; Burma.
nodi flora, Wall. Cat n. 855 = macrophylla.
nodulosa, *Am. in Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. I. (1836) 340.—Zeylan.
nodulosa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 143, partim = Allaeophania decipiens, Amoitii.
nudicaulis, Wight & Am. Prod. 416 = Oldenlandia nudicaulis.

HEDYOTIS :-
nummularia, Am. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. I. (1836) 841 = Anotis nummularia.
nummulariformis, Am. 1. c. = Anotis nummularia.
obscura, *Th-m. Enum. PI. Zeyl.* 141.—Zeylan.
orbiculata, Wall. Cat. n. 6191 = Oldenlandia trinervia.
ovalis, *Walp. Ann.* ii. 769.—Borneo,
ovata, *Thunb. ex Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxix. (1883) 161.—China.
ovata, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 52=obscura.
ovatifolia, Cav. Ic. vi. 52 = Oldenlandia nudicaulis.
oxyphylla, Wall. Cat.n. 6193 = Anotis oxyphylla.
paniculata, Lam. Encyc. iii. 79; Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) II. 184 = Oldenlandia paniculata.
paniculata, Rottl. ex Wight & Am. Prod. 417 = Oldenlandia aspera.
paradoxa, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) II. 135.—Ins. Andaman,
parietarioides, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 225.—Ins. Molucc.
Parryi, *Hance, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 221.—China.
parviflora, Walp. Ann. ii. 772—Oldenlandia virgata, parviflora.
parvifolia, *Presl, Bot. Bemerk.* 86.—Bras,
pauciflora, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 419.—Ins. Philipp.
pentamera, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 552 = Oldenlandia macrophylla.
pentandra, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 71 = Oldenlandia macrophylla.
perpusilla, Hook. & Am. in Hook. Bot Misc. iii. (1833) 859 - Oldenlandia uniflora.
pilosa, Phil, ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 68 = Oldenlandia uniflora.
pilosa, *Poepp. &• Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. SO. t. 235.—Chili.
• pinifolia, *Wall. Cat.* n. 850.—Ind. or.; Malaya.
plantaginea, Walp. Ann. i. S76 = seq.
plantaginifolia, Am. in Nov. Act. Nat Cur. xviii. I. (1836) 340 = verticillaris.
plicata, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 17—Saurauja bracteosa?
polycarpa, R. Br. in Wall. Cat. n. 888=scandens.
polyclada, *F. Muell. Fragm.* viii. 146.—Austral.
polygonoides, Wall. Cat. n. 872 = Oldenlandia diffusa?
procumbens, Wall. 1. c. 861– H. Auricularia.
prostrata, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1851) 160.—Burma; Malaya,
pruinosa, *Wight* b" *Am. Prod.* 408.—Ind. or.
pterita, Blume, Bijdr. 972 = Oldenlandia alata.
pterospora, *F. Muell. Fragm.* iv. 40.—Austral.
puberula, R. Br. in Wall. Cat. n. 884 — Oldenlandia umbellata.
pnlvinata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 405.—Ins. Socotra.
pumila, Linn. f. Suppl. 119 = Oldenlandia crystallina.
pumila, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. 526 = Cervantesii.
purpurascens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 50 = seq.
purpurea, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 1. t. 5.—Ind. or.
purpurea, Ton. Sc Gray, Fl. N. Am. ii. 40 — Houstonia purpurea.
pusilla, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 362 = Oldenlandia corymbosa.
pygmaea, Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. 526=Cervantesii.
pygmaea, Wall. Cat n. 6199=caerulea.
quadrangular is, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 180=tetrangularis.
quadrilocularis, Thw. Enum. PI. Zeyl. 144- Anotis quadrilocularis.
Quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 362 = Oldenlandia grandiflora:
qninquenervia, *Thw. Enum. PI- Zeyl.* 141.—Zeylan.
racemosa, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 36; Wall. Cat n. 875, partim=Anotis Rheedii.
racemosa, Lam. Encyc. iii. 80; Wight *Sc* Am. Prod. 414 - Oldenlandia paniculata.
radicans, Bartl. ex DC. Prod. iv. 424=brachypoda.
radicans, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 181.—Ins. Philipp.
ramosa, Blume, Bijdr. 978 = Oldenlandia corymbosa.
ramosissima, Blume, 1. c. 972 — Oldenlandia paniculata.
ramosissima, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlvi. (18771 II. 183 = Oldenlandia diffusa.
ramosissima, Spreng. Pugill. ii. 31 = Oldenlandia ramosissima.
recurva, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. i. (1842) 486 = macrostemon.

HEDYOTIS:—
recurva, *Walp. Ann.* ii. 769.—Borneo.
repens, Boj. Hort. Maurit. 167 = Oldenlandia Sieberi.
repens, *Clos, in C. Gay, Fl. Chil.* iii. 208.-Chili.
repens, G. Don, Gen. Syst. iii. 526 = Oldenlandii trinervia?
repens, IMO. Tabl. Encyc. i. 271 = DenteIla repens.
Rheedii, Wight *Sc* Am. Prod. 409 = Anotis Rheedii.
rhinophylla, *Thw. ex Trim, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 208.—Zeylan.
Richardiana, Am. in Nov. Act. Nat Cur. xviii. I. (1836) 840 = Anotis Richardiana.
rigida, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 181.—Java.
rigida, Walp. Ann. ii. 772 = Oldenlandia rigida.
riparia, Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Oldenlandia capensis »
Romanzoffiana, Steud. Nom. ed. II. i. 843, in syn. = Gouldia Romanzoffiensis.
rosea, *Rafin. Fl. Ludov.* 77.—Am. bor.
rotundifolia, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6190 = Oldenlandia nudicaulis.
rotundifolia, Spreng. Pugill. ii. 33 - Oldenlandia trinervia.
rotundifolia, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 39 = Houstonia rotundifolia.
rubra, A. Gray, PI. Fendl. 61-Houstonia rubra.
rugosa, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1851) 160.—Java.
rupestris, Sw. Prod. Veg. Ind. Oca 29-Rachicallis rupestris.
rupestris, Walp. Rep. iv. 450, Ind. sphalm. = Houstonio angustifolia.
rupicola, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 12 (Oldenlandiae sp.).—Afr. austr.
sabulosa, Steud. Nom. ed. II. i. 728-Oldenlandia car pensis?
Salzmanni, Steud. 1. c. = Oldenlandia Salzmanni.
sarcophylla, Steud. 1. c = Oldenlandia crassifolia.
scaberula, *Hook.f. Fl. Brit.'Ind.* iii. 60.—Burma,
scabra, *Wall. Cat.* n. 880.—Burma.
scabrida, Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Oldenlandia corymbosa.
scandens, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 864.—Reg. Himal.; Burma.
scapigera, R. Br. in Wall. Cat. n. 881 = Oldenlandia nudicaulis.
Schimperi, Presl, Bot. Bemerk. 85 - Oldenlandia Schimperi.
Schlecktendahliana, Steud. Nom. ed. II. i. 728 - Kadua cordata.
scleranthoides, F. Muell. Fragm. iv. 39= Oldenlandia scleranthoides.
secunda, *Spreng. ex Schult. Mant.* iii. 133.—Porto Rico.
senegalensis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 362 " Oldenlandia abyssinica.
senegalensis, Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Oldenlandia senegalensis.
serpens, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 390 = Anotis serpens.
serpyllacea, *Schlecht. in Linnaea,* ix. (1834) 599.—Mexic.
serpyllifolia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 14 = Oldenlandia triuervia.
serpyllifolia, Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. ii. *39* *> Houstonia serpyllifolia.
setifera, Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Oldenlandia caffra.
setosa, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. i. 57=Mallostoma setosa.
Smithii, Walp. Rep. ii. 501'Kadua Menziesiana.
spergulacea, Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Oldenlandw nudicaulis.
sperguloides, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 861 * Oldenlandia corymbosa ?
spermacocea, Domb. ex DC. Prod. iv. 550=Spennacoee corymbosa.
spermacocoides, *F. Muell. Fragm.* viii. 146.—Austral;
stellarioides, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* *'• (1882) 838.—Ins. Socotra.
stenophylla, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. *' * Houstonia angustifolia.
stipulata.il. Br. in Wall. Cat. n. 6195; n. 863 A-hirsuta.
stipulata, R. Br. 1. c. n. 6195, partim = Anotis ing'?"?
Stocksii, Hook. f. *Sc* Thorns, ex Hook. f. Fl. Brit. W" iii. 67 = Oldenlandia Stocksii.
stricta, Sm. in Rees, Cycl. xvii. n. 21 - Oldenlan"'- Heynii.

HEDYOTIS :—
stricta. Wall, in As. Res. xiii. (1820) 869 - Oldenlandia graciiis.
strigulosa, Bartl. ex DC. Prod. iv. 427-Oldenlandia strigulosa.
strumosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 864-Oldenlandia strumosa.
stylosa, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 868.—Ind. or.
subcarnosa, Wall. 1. c n. 860"prostrata.
snbcordata, *Dentist. Schluess. Hart. Malab.* 86.—Ind. or.
subtilis, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 12 = Anotis foetida.
subulata, Walp. Ann. ii. 772 = Oldenlandia snbnlata.
swertioides, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 51.—Ind. or.
tenella, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 658 (Oldenlandiae sp.).—Afr. austr.
tenella, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 74 = Anotis foetida..
tenelliflora, *Blume, Bijdr.* 971.—Reg. Himal.; Malaya.
tenuiflora, Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 74 = Anotis foetida.
tenuifolia, Sm. in Rees, Cycl. xvii. n. 19; Spreng. Pugill. ii. 80=- Oldenlandia tenuifolia.
tenuifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 729, sphalm.= Oldenlandia corymbosa.
tetrangularis, *Walp. Ann.* ii. 768.—Borneo,
thesiifolia, *A. St. Hil. Voy. Distr. Diam.* i. 897.—Bras.
thesioides, Willd. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i". 391 = Mallostoma thymifolia.
Thomsoni, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 63.—Ind.or.
thuioides, Willd. ex Roem. *ic* Schult. Syst iii. 627 = Mallostoma thymifolia.
Thwaitesiana, Hance, in Joum. Bot. vi. (1868) 298 = Anotis Thwaitesiana.
Thwaitesii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 54.—Zeylan.
thymifolia, Presl, Bot. Bemerk. 85 (Oldenlandiae sp).—Afr. austr.
thymifolia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 56. t 88 = Mallostoma thymifolia.
tillaeacea, *F. Muell. Fragm.* iv. 89.—Austral,
f achymenoides, *F. Muell. I. c.* 40.—Austral,
travancorica, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 2.—Ind,or.
trichoglossa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 4097-Madag.
trickopoda, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 860=Oldenlandia corymbosa ?
triflora. Herb. Madr. ex Wall. Cat p. 214. n. 867 = Oldenlandia Heynii.
trinervia, Roem. & Schult. Syst. iii. 197=Oldenlandia trinervia.
tuberosa, Sw. Obs. Bot. 186. t. 1. f. 2=Lucya tnberosa.
tubularis, R. Br. in Wall. Cat. n. 876-Anotis quadnlocularis, lancifolia.
"*Imifolia,* Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 370 lineata
«»*ibellata,* Lam. Tabl. Encyc. i. 272 - Oldenlandia nmbellata.
"*nbellata,* Walt. Fl. Carol. 85 = Houstonia PJJP"" .
Uwinella, *Hook, tf Am. Bot. Beech. Voy.* 192.-Reg Himal.; China.
«>>*iftora,* DC. Prod. iv. 421 = Oldenlandia uniflora.
"*niflora,* Lam. Tabl. Encyc i. 271 = Oldenlandu glomerate.
**rophyll,,* Wall. Cat. n. 6197=Anotis urophylla.
yachellii, *Benth. Fl. Hongk.* 148.-China.
ginata, Blume, ex DC. Prod. iv. 421.-I?s. Molucc.
«osa, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. u. H. (18511 160
• ^ ' S S j I m e d . II. i. 729 = Houstonia rotundifolia.
erticillaris, *Wall. Cat.* n. 6188; *Wight V Am. Prod.* *.0 9 1 .Th d . or.
*l**ticillata.* Lam. Tabl. Encyc. i.271 - H-0?1"?0""™-
' " M X , , Wa ip. Ann. ii; 772 = Oldenlandia verticillu.
vestita, *R. Br. in Wall. C*... Himal.; Malaya.
villosa, Wight & Am. Prod. 450 - Anotis Leschenaulhiana
virgat«, Willd. Sp. PI. i. 567 = OldenUndU viigata.
virgi c,, s preng. Pug U , ,, ,, = Olde,, landia lo- m(a.
viscida, *Btid. Ic. PI. Ind. Or.* i. l.-InA or.
volsbloss, R, Br in Wall CaLn 840 = scandens. i. (1836)
Walkeri, Arn in NoT Act Nat> CUr,, XV,,I- 389 = n
Wallichiife *oum. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) 11. 186.—Burma; Malaya.

HEDYOTIS :—
Wallichii, Walp. Rep. ii. 498^hispida.
wauensis, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 64=Oldenlandia wauensis.
Wightiana, Wall. Cat. n. 6194 = Anotis Wightiana.
Willdenmviana, Steud. Nom. ed. II. i. 729-Oldenlandia Willdenowiana.
xanthochroa, *Hance, in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 324. —China.
Zta\gue\nxia£,Soem.&Sckult. Syst. iii. 192.—Afr. trop.
HEDYPHYLLA, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 142-Astragalus, Tourn. (Legumin.).
recta, Stev. 1. c.-=A. glycyphylloides.
vulgaris, Stev. 1. C.--A. glycyphylloides.

HEDYPNOIS, [Tonm.] Scop. Fl. Cam. ed. IL ii. 99 (1772)=Iieontodon, Linn. (Compos.;.
arenaria, DC. Prod. vii. 62 - Rhagadiolus arenarius.
autumnalis, Huds. Fl. Angl. ed. II. ii. 341 = Leontodon autumnalis.
biennis, Huds. 1. c. 342-Crepis biennis.
caspica, Homem. Hort. Hafn. Suppl. !)1.—Reg. Casp.
coronopifolia, Tenore, Cat Hort Neap. (1819) 60 = Rhagadiolns Hedypnois, *All.*
crepidifornus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 250 = Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
cretica, Willd. Sp. PI. iii. 1617 - Rhagadiolns Hedypnois, *All.*
furfuracea, Keichb. Fl. Germ. Excnrs. 250.—Europ.
glabra, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. (1795) 279 = Hypochoeris glabra.
globulifera. Lam. Fl. Fr. ii. 107 = Rhagadiolns Hedypnois, *All.*
hieracioides, Huds. Fl. Angl. ed. II. ii. 840=Picris hieracioides.
hirta, Sm. Fl. Brit. ii. 824-=L. hirtus.
hUpida, Huds. Fl. Angl. ed. II. ii. 842 =L. hispidns.
hispida, Sm. Fl. Brit. ii. 823 = L. hastilis.
laciniflora, Viv. Fl. Lib. Spec. 52. t. 17. f. 2=Rhagadolios Hedypnois, *All.*
mauritanicus, Schousb. ex Link, Handb. i. 810= Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
mauritiana, Willd. Sp. PI. iii. 1616-Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
minutissima, Bunge, in Mem. Sav. Eti. Pltersb. vii. (1847) S72 = Rhr2adiolus Hedypnois, *Fisch. V Mey.*
moHspeliensis, WilTd. Sp. PI. iii. 1616 - Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
paludosa, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 100 = Taraxacum palustre.
pehdula, Willd. Sp. PI. iii. 1618; DC. Prod. vii. 82 = Rhagadiolus pendulus.
persica, Fisch. Hort. Gorenk. (1812) 34; Bieb. Fl. Taur. Cauciii. 639=Rhagadiolus Hedypnois, *Fisch. VMey.*
polymorpha, DC. Prod. vii. 81=Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
pygmaea, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 208.—Hispan.
pyrenaica, Vill. Prosp. 38; Hist. PI. Dauph. iii. 78 = L. pyrenaicus.
radiata, Gaertn. Fruct. ii. 873. t. 160. f. 8-Hyoseris radiata.
rkagadioloides, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. (1795) 279=Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
sabulorum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 17.—Algeria.
scabra, F. W Schmidt, Samml. Phys. Aufs. i. (1795) 279-Hyoseris scabra.
Sprengelii, Schult. ex Steud. Nom. ed. II. i. 728 = Amoseris pusilla.
Taraxaci, Huds. Fl. Angl. ed. II. 341=L. autumnalis.
Taraxacum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 99 = Taraxacum officiuale.
tectorum, Huds. Fl. Angl. ed. II. ii. 341 = Crepis tectorum.
Tournefortii, Cass. in Diet. Sc. Nat. xx. 337 = Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
tubaeformis, Tenore, Fl. Neap. ii. 179. t. 78 = Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
HEDYSARUM, [Tonm.] Linn. Syst. ed. I (1736); Gen. ed. I. 225 (1787). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 510.
ECHINOLOBIUM, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 123. t.5
SULLA, Medic, in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 372.

HEDYSARLTM:—
abyssinicum, Hoffmgg. Verz. Pfl. 217=Desmodinm Scalpe.
acnleolatum, *Munby, ex Soiss. Diagn.* Ser. II. v. 92.—Algeria.
acuminatum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 72=Desmodium acuminatum.
adhaerens, Poir. Encyc. Suppl. v. 15=Desmodinm ormocarpoides.
adhaerens, Vahl, Symb. Bot. ii. 82 ^ Desmodium uncinatum.
adscendens, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 106 = Desmodium adscendens.
aequidentatum, Sibth. & Sm. Fl. Grace. Prod. ii. 84 = Onobrychis cretica.
Aikini, Eaton, Man. Bot ed. VI. 166 = Desmodium canescens.
Aikinianum, Steud. Nom. ed. II. i. 729, sphalm. vide *Desmodium Aikinianum.*
Alamani, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 291=Desmodium Alamani.
alatum, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 348-Desmodium triquetrum.
album, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. ii. 115. t. 111-Onobrychis alba.
algeriense, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 196.—Alger.
Alhagi, Lerch. in Nov. Act. Nat. Cur. v. (1778) App. 167; Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 136=Alhagi camelorum.
Alhagi, Linn. Sp. PI. 745=Alhagi maurorum.
Alhagi, Sibth. & Sm. Fl. Graec viii. 15. t. 720 = Alhagi graecoram.
alopecuroid.es, Roxb. Hort Beng. 57 = Uraria Lagopus.
alpinum, Linn. Sp. PI. 760 = obscurum, sibiricum.
alpinum, Richards, in Frankl. Narr. 1st Jonrn. 745 = boreale.
altaicum, Fisch. ex DC. Prod. ii. 842 = polymorphum.
altaicum, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 68 - obscurum.
Ammoxylon, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 298 •= Bremontiera Ammoxylon.
ancistrocarpum,Leitb. Ind. Hort. Dorp. Suppl. (1823) ; ex DC. Prod. ii. 832 = Desmodium ineanum.
angustifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 517-Desmodium angustifolium.
angustifolium, Thorn. Cat. PI. Suiss. (1818) 17, nomen;et in Gaud. Fl. Helv. iv. 570-Onobrychte arenaria.
anomalum, *DC. Prod.* ii. 841.—Hab. *1*
Aparines, Link, Enum. Hort Eerol. ii. 247-Deimodiam uncinatum.
arboreum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 243 = Uraria Lagopus.
arboreum, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 361-Desinodium umbellatum.
Arbuscula, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 465.—Mongolia.
arenarium, Kit. in Schult. Oestr. Fl ed. II. ii. 868 - Onobrychis arenaria.
argentatum, Linn. f. Snppl. 333 = argenteum.
argenteum, Claus, inGoebel, Reise, ii. 270=argyrophyllum, *Ledeb.*
argenteum, Lam. ex Pall. Reise, ii. 748 -<graitdiflorum.
argenteum, *Uurr. Syst.* ed. XIII. 562.—Reg. Caucas.
argenteum, Willd. Sp. PI. iii. 1206 = candidum.
argyrophyllum, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 729, nomen.—Sibir. alt.
argyrophyllum, *Ledeb. Fl. Ross. i.* 699.—Kossia.
armenium, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. i. 99. t. 5-obscurum.
articulation, Roxb. Fl. Ind. iii. 355 » Desmodium difiusum.
asperum, Poir. Encyc. vi. 408 = Desmodium aspenim.
astragaloides, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 146.—Reg. Himal.
atlanticum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 197.—Alger.
atomarium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 111.—Syria,
atropatanum, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 522,—Persia.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 87.—Cappadoc.
aureum, Herb. Madr. ex Wight & Arn. Prod. 239 - Rhynchosia densiflora.
aureum, Rottl. in Gcs. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 218-Rhynchosia aurea.
auriculatum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 249 = Desmodium triquetium.
auriculatum,Koxb. Hort. Beng.67 ; Fl. Ind. iii.355 = Desmodium diftusum.

HELDY8ARUM:—
australe, Willd. Sp. PI. iii. 1183-Desmodium umbellatnm.
axillart, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 107 = Desmodium azillaie.
barbatum. Linn. Syst ed. X. 1170 •= Desmodinm barbatum.
barbatum, Walt. Fl. Carol. 184-Desmodinm dliare?
Basineri, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 521.—Cappadoc.
Bergerianum, Spreng. Pugill. if. 74 = Onobrychis Bergeriana.
biarticulatum, Linn. Sp. PI. 747=Desmodinm biarticulatum.
biarticulatum, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 330-Desmodinm infractum.
4îcoto-,Buoh.-Ham. ex Wall. Cat.n. 6719=Desmodinm laxiflorom.
bicolorum, Poir. Encyc. vi. 448=Adesmia bicolor.
biflorum, Willd. Sp. PI. iii. 1200 - Desmodinm biñorum.
bifiorum, Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1796) 49 = Desmodinm biflorum ?
bifolium. Veil. Fl. Flnm. 318; vii. t. 147-Zomia diphylla.
bijugum, Klein, ex Wight & Am.Prod. 218=Geissaspis cristata.
boreale, *Nutt. Gen. Am.* ii. 110.—Am. bor.
boreale, Richards, in FrankL Narr. 1st Jonrn. 745 = Mackenzii.
Boveanum, *Bunge, ex Bartner, in Afém. Sav. Etr. Pitersb.* vi. (1851) 64.—Alger.
Bovei, Boiss. & Rent. Pugill. PI. Nov. 40=praec.
brachypterum, *Bunge, in Mint. Sav. Etr. Pitersb.* ii. (1835) 92.—China.
brachysemnm, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 801.—Sibir. altaic.
bracteatum, Herb. Madr. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 159 = Alysicarpus longifolius.
bracteatum, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 851 = Flemingia strobilifera.
bracteatum, Sieber, ex Stend. Nora. ed. II. i. 730 = Zornia diphylla.
bracteosum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 73=Desmodinm cuspidatum.
brahuicum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 516.—Afghan.
Branthii, *Trautv.* &[1] *Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot.* 29).—Sibir.
brasilianum, Poir. Encyc. vi. 448-Aeschynomene brasiliana.
bucophyllum, Willd. Enum. Hort. Berol. Snppl. 51, sphalm. = lencophyllum.
Buhseanum, Boiss. in Nonv. Me'm. Soc Nat. Mosc. xii (1860) 74-formosum.
bupleurifolium, Herb. Wight, ex Wall. Cat. n. 5765 = Alysicarpus rugosus.
bupleurifolium, Linn. Sp. PI. 745 = Alysicarpus bnplenrifolius.
bupleurifolium, Sieber, ex DC. Prod. ii. 853 = Alysicarpus vaginalis.
Buxbaumianum, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1181— Onobrychis vaginalis.
Buxbaumianum, Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1797) 316, nomen = Onobrychis Pallasii.
Buxbaumii, Bieb. Fl. Tauf. Cauc. ii. 179= Onobrychis radiata.
cachemirianum, *Benth. ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 146.—Reg. Himal.
caespitosum, Poir. Encyc. vi. 421 = Desmodium adscendens.
cajanifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 525 = Desmodium cajanifolium.
callichroum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 89.—As. Min.
callithrix, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 523.—Persia.
Calverti, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 91=nitidnm.
canadense, Linn. Sp. PI. 748 - Desmodium canadense.
candidum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 176.—Tauria.
canescens, *Aubl. PI. Gut.* ii. 774.—Guiana.
canescens. Linn. Sp. PI. 748 = Desmodium canescens.
canescens, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7 - Desmodium incannm.
canescens, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 357 = Mackenzii.
canescens, Willd. ex DC. Prod. ii. 880-Desmodium rotundifolium, *DC.*
canum, J. F. Gmel. Syst. 1124; Lunan, Hort. Jamaic. i. 805=— Desmodium incanum.
capense, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 22 =- Wiborgia obcordata.

HEDYSABUM:—
capense, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. iv. 527 - Khynchosia pnberula.
capitatum, Burm. f. Fl. Ind. 167 = Desmodium capitatum.
capitatum, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 177.—Reg. Mediterr.
cappadocicnm, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 87.—Cappadoc.
Caput-galii, Linn. Sp. PI. 751 = Onobrychis Caput-galli.
cameum, *Lodd. Bot. Cab.* t. 312.—Reg. Caucas.
carnosum, Desf. Fl. Atlant ii. 177 = pallidum.
carpathicum, Waldst. & Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 779 = Onobrychis carpathica.
caucasicum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 178 = obsenrum.
caudatum, Thunb. Fl. Jap. 286 — Desmodinm labnmifolium.
celtifolium, Salisb. Prod. 341-Flemingia 'Strobilifera.
Cephalotes, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xv. (1883) 264.—Turkestan.
Cephalotes, Roxb. Hort Beng. 57; Fl. Ind. iii. 360 = Desmodium Cephalotes.
cercifolium, Steud. Nom. ed. I. 392 = 0raria cercifolia.
cbaitocarpum, *Regel V Schmalk. ex Reget, PI. Nov. Fedsch.* 22.—Turkestan.
dliare, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1196 = Desmodium ciliare.
dliatum, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 220-Sntithia Bensitiva.
dliatum, Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi (1799) 43 =Rhynchosia puberula.
dnereo-sericeum, Basin, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vi. (1851) 65 = Basineri.
cinereum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 526 = Desmodium cinereum.
drdnatum, Willd. Sp. PI. iii. 1213 = Onobrychis radiata.
cirdnnatum, Hoffm. Hort. Mosq. (1808) n. 1537; ex Ledeb. Fl. Ross. i. 712 = Onobrychis vaginalis.
clandestinum, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 780 = Zornia diphylla.
Clausonis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 197.—Alger.
cocdneum, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 305 = Indigofera hirsuta.
cochinchinensis, *Hort. Par. ex Sckrank, PI. Rar. Hort. Monac.* t. 28.—Cochinch.
coeruleo-violaceum, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 246 = Desmodium barbatum.
collinum, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 349 = Desmodium gangeticum.
collinum, Salisb. Prod. 341 = Onobrychis viciaefolia.
comosum, Vahl, Symb. Bot. ii. 84=Uraria crinita.
condnnum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 292 = Desmodium condnnum.
confertum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 180; iii. 484-- Onobrychis viciaefolia.
confertum, Desf. Fl. Atlant. ii. 178=humile.
congestum, Rottl. ex Wall. Cat. n. 5723 = Desmodium Cephalotes.
conglomeratum, Poir. Encyc. vi. 416 = Lespedeza capitata.
conicum, Poir. 1. c. 419—Desmodium capitatum.
coniugatum, Willd. Sp. PI. iii. 1178 = Zomia diphylla.
conjunctum, Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 175 = Desmodinm incannm.
consanguineum, DC. Prod. ii. 343 = obscurant.
controversum, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 425 = obscurum.
cordatum, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 25 — Hallia cordata.
coriaceum, Poir. Encyc. vi. 418=Desmodium ciliare?
cornutum. Linn. Sp. PI. ed. II. 1060 = Onobrychis cornuta.
coronarium, *Linn. Sp. PI.* 750.—Italia.
coronatum, Poir. Encyc. vi. 439— Onobrychis omata.
corsicum, Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) 39 ; App. i. 12=capitatum.
cretaceum, *Fisch. ex DC. Prod.* ii. 342.—Rossia.
cretaceum, Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1797) 315, nomen; Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1181 = candidum.
creticum, Steud. Nom. ed. I. 392 - Onobrychis cretica.
criniferum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 88.—Persia.
crinitum, Linn Mant. i. 102 ; Burm. f. Fl. Ind. 169. t. 66 = Uraria crinita.

HEDYSABTTM:—
crinitum, Steud. Nom. ed. I. 392=Onobrychis crinita.
Crista-galli, Murr. Syst. ed. XIII. 568 = Onobrychis Crista-galli.
Crista-galli, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed. II. ii. 260.1.12 = Onobrychis Gaertneriana.
cristatnm, *Turra, Farset. Nov. Gen.* 12.—Creta.
cryptapterum, L'Hérit. ex DC. Prod. ii. 847 - Onobrychis Michanxii.
cumanense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 628 = Desmodium caripense.
cuneifolium, Roth, Nov. PI. Sp. 357 = Taverniera nummularia.
cuspidatum, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1198 - Desmodium cuspidatum.
cylindricum, Poir. Encyc. vi. 400 — Alysicarpus vaginalis.
daghestanicum, *Rupr. ex Boiss. Ft. Orient,* ii. 614.—Reg. Cancas.
dasycarpum, Tuicz. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1840) 68-Mackenzii.
davuricum, *Fück. Hort. Gorenk.* ed. II. (1812) 73.—Dahuria.
decumbens, Dennst Nom. Bot. 217-capitatum.
deltoides, Poir. Encyc. Suppl. v. 15 = Desmodinm latifolinm.
deltoideum, Schum. & Thonn. Beskr. Guin.Pl. 361 = Desmodium latifolium.
dentatum, Spreng. Syst. iii. 318-Adesmia dentata.
denticulatum, *Regel, PI. Nov. Fedsch.* 22.—Turkestan.
depressum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 51. nomen = capitatum.
dichotomum, Willd. Sp. PI. iii. 1180=Desmodium diffusum.
diffusum, Roxb. Hort. Beng. 67 ; Fl. Ind. iii. 857-Desmodium laxiflornm.
diffusum, Veil Fl. Finn. 320; vii. t. 153 = Aeschynomene falcata.
diffusum, Willd. Sp. PI. iii. 1180 - Desmodinm diffusum.
dioicum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 244* Desmodium dioicum.
diphyllum. Linn. Sp. PI. 747 = Zomia diphylla.
distortum, *Aubl. PI. Gui.* ii. 774.—Guiana.
divergent, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1196-Lespedeza violacea.
diver gens, Roxb. Hort. Beng. 57, nomen = Desmodivm divergens.
diversifolium, Poir. Encyc. vi. 403 - Desmodinm diversifolium.
dolichoides, *Hort. Link, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 730, nomen (Quid!).—Hab. ?
dnmetorum, *Boiss.* &" *Heldr. Diagn.* Ser. I. ix. lit-" As. Min.
Ebenus, Raeusch. Nom. ed. Ill 215 = Ebenus Sibthorpii.
Ecastaphyllum, Linn. Syst. ed. X. 1169 = Ecastaphyllum BrowneL
echinatum, Gilib. Fl. Utnan. ii. 109 - Onobrychis viciaefolia.
echinatum, *Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825); *ef Linnaea,* iv. (1829) *Litt.* 37.—Ital.
echinatum, *Schweigg. Enum. PI. Hort. Regiom.* 37.-- Corsica,
echinocarpnm, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. M'*-(1841) 410.—Sibir.
Echinus, Poir. Encyc. Suppl. v. 19 = Onobrychis Cap"'' gallif
edule, Steph. ex Glehn, in Act. Hort. Petrop.iv. (1876) 84 = alpinum.
elatum, Steud. Nom. ed. II. i. 730, sphalm. = D*[8], medium asperum.
elegans, *Boiss. V Huet, Diagn.* Ser. II. ii. 37.~" Armenia.
elegans, Lour. Fl. Cochinch. ii. 450 - Desmodium elegans.
ellipticum, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 262-P*' modium nmbellatum.
elongatum, *Fisch. ex Lodd. Bot. Cab.* t. 1W[1], Rossia.
elymaiticum, *Boiss.* b" *Haussk. ex Boiss. Fl. OrH*[*], ii. 517.-Persia.
emarginatum, Poir. Encyc. vi. 412 = Desmoa[TM] emarginatum.
erectum, Patrin, ex DC. Prod. ii. 345 = Onobryd" arenaria.
erectum, VeU. Fl. Flum. 318; vii. 1.149 - DesmoaW leiocarpumt

HEDTSAKUM :—
erinaceum, Poir. Encyc. vi. 398-Indigofera echinata.
eriophorum, Pourr. ex Desv. Journ. Bot. Hi. (1814) 82 = Onobrychis eriophora.
erythrinaefolium, Juss. ex Poir. Encyc. vi. 408=Desmodium erythrynaefolium.
erythroleucum, *Schott V Kotsehy, ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 515.—As. Min.
esculentum, *Ledeb. in Denkschr. Bot. Ges. Segensb.* iii. (1841) 112.—Sibir. or.
exaltatum, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv; (1874) 108=obscurum.
exiguum, Herb. Russ. ex Wall. Cat. n. 5497 - Rhynchosia minima.
falcatum, Poir. Encyc. vi. 448=Aeschynomene falcata.
Falconeri, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 146.—Reg. Himal.
Fedtschenkoanum, *Hegel, PI. Nov. Fedseh.* 28.—Turkestan.
Sacddum, *Weinm. in SyU. Ratisb.* ii. (1828) 174.—Nepal,
navescens, *Regel tf Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedseh.* 21.—Turkestan,
flavum, *Rupr. Sert. Tianseh.* 44.—As. centr.
flexuosum, Balb. ex DC. Prod. ii. S41=anomalum.
nexuosum, *Linn. Sp. PI.* 760.—As. Min.
floribundum,T>. Don, Prod. FL Nep. 244=Desmodium floribundum.
Pontanesii, Boiss. Elench. 66=humile.
formosum, *Fisch. V Mey. ex Basin, in Mim. Sam. Etr. Pitersb.* vi. (1851) 69.—Persia.
frutescens, Linn. Sp. PI. 748 - Lespedeza violacea.
frutescens, Pall. Reise, iii. 821=fruticosum.
frutescens, Willd. Sp. PL iii. 1198 - Lespedeza capitata.
fruticosum, Habl. Taur. 121 j ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 177=tanricum.
fruticosum, *Pall. Reise,* iii. 758.—Sibir.
fruticosum, Veil. Fl. Flnm. 819; vii. t. 162,-Aeschynomene Selloi.
fruticulosum, *Den. in Him. Soe. Linn. Par.* iv. (1826) 819.—Madag.
fruticulosum, Schum. & Thonn. Beskr. Gnin. PL 868 = Desmodium maaritiannm.
gangeticum, linn. Sp. PL 746-Desmodium gangeticum.
gemelium, Willd. ex Vog. in Linnaea, xii. (1888) 61 =Zoraiadiphylla.
geminiflorum, [M09. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 880 = Desmodium Alamani.
Gibsoni, J. Grah. Cat. PI. Bomb. 49 - Taveraiera nummularia.
giganteum, Janme St. Hil. ex Desv. Journ. Bot. 1. (1813) 122 = Desmodinm asperum.
glabellum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 73=Desmodram glabellum.
glabrum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 12 = Desmodium glabrum.
glabrum, Steud. Norn. ed. I. 892 = Onobrychis vusaefolia.
glaucescens, Ledeb. Fl. Ross. i. 704 - iberienm.
g'omeratum, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Iv. 584—capitatnm.
glumaceum, Roxb. Hort. Beng. 56; FL Ind. iii. 847 = Alysicarpus rugosus.
e'«maceum, Vahl, Symb. Bot. ii. 106 = Alysicarpns glumaceua.
S^tincsum, Muhl. ex Willd. Sp. PL ifl. 1198-Des-toodium acuminatnm.
g'utinosum, Rottl. ex DC. Prod. ii. 887 = Rhynchosia "Scosa'
Gt%Hni, Ledeb. in Mem. Acad. Sc Petersb. v. (1812) 851=polymorphum.
«*>nineum,* Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5762 = ysicarpus rngosns.
foU[illegible] ex Wall. Cat. n. 6762 =
ygnifolium, Russ. ex WaU. L c. n. 6761 = Alysiearpus bnpleurifolius.
^"*ndiflorl^* Bess Ennm. PI. Volh. 29=argenteum.
\Z"f}fl<>rum,* DC. Prod. ii. 840-sericenm.
Pall. ReUe, ii. 74S.-Iber.; Caucas.,
^*diflorum,* Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vL 45=Polymorphnm/

HBDYSAETTM :—
grandiflorum, Walt. Fl. Carol. 185 - Desmodium acuminatum.
grandifolium, Hornem. Hort Ham. ii. 700 = Desmodinm grandifolium.
granulatum, Schnm. & Thonn. Beskr. Gain. PL 862-= Desmodium trifloram.
granuliferum, *Spreng. Fl. Hal. ttant.* 48.—Afr. trop.
guianense, AubL PL Gui. ii. 774 = Desmodium guianense.
gyrans, Linn. f. Suppl. 382'Desmodium gyrans.
gyroides, Roxb. Hort. Beng. 67=Desmodium gyroides.
hamatum, Bnrm. f. Fl. Ind. 167 = Stylosanthes mucronata.
hamatum, Heyne, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 157 = Uraria pronellaefolia.
hamatum, Linn. Syst. ed. X. 1170 - Stylosanthes procumbens, viscosa.
Hamiltonii, Spreng. Syst. iii. 816 = Alhagi mauronim,
hamosum, Roxb. Hort. Beng. 57 ; et ex Wight *Sc* Arn. Prod. 222 = Uiaria hamosa.
herbaceum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 426 = Onobrychis supina.
heterocarpon, Forst. f. Prod. 51=Desmodinm heterocarpnm (in Addend.).
heterocarpon, Linn. Sp. PL 747 = Desmodium polycarpum.
heterocarpon, Thunb. Fl. Jap. 287 (err. typ. 289)-Desmodium fhunbergii.
heterophyllum, Willd. Sp. PL iii. 1201-Desmodium heterophyllum, *DC.*
hirsutum, J. F. Gmel. Syst. 1122=canescens.
hirtum, Jacq. ex Steud. Nom. ed. I. 892—Lespedeza capitata.
hirtum, Linn. Sp. PI. 748=Lespedeza hirta.
hirtum, Veil. Fl. Flnm. 819; vii. t. 151=Aeschynomene brasiliana?
hispidulum,-Spieag. Syst. iii. 318-Adesmiahispidula.
hololeucum, Boiss. *8c* Hanssk. ex Boiss. Fl. Orient, ii, 625 = pannosum.
horridum, Steud. Nom. ed. I. 892 - Onobrychis horrida.
Huetii, *Boiss. Ft. Orient,* ii. 521.—Armen.
humicubum, Pall, ex Steud. Nom. ed. I. 892 = candidnm.
humifusum, Muhl. Cat. 69= Desmodium humifusum, ochroleucnm, rotcadifolium, *DC.*
humile, Habl. Taur. 162; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 176=candidum.
humile, *Linn, in Loefl. It.* 293.—Enrop.
ibericum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 177.—Reg. Caucas.
ibericum, Willd. ex Cham, in Linnaea, vi. (1831) 547—polymorphum.
ignescens, Zipp. ex Miq. FL Ind. Bat. i. I. 254-Desmodium Scalpe.
imbricatum, Linn. f. Suppl. 330 = Hallia imbricata.
immacnlatum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 214.—Arab.
inaequale, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790), ed. I. Art. iv. 17-Crotalaria retusa?
incanum, Ledeb. Fl. Ross. i. 708=varium.
incanum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 107-Desmodium incanum.
incanum, Thunb. Fl. Jap. 289=seq.
incamatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1209.—Japon.
incarnum, Desv. in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1827) 811, sphalm. = praec.
incuniatum, Homem. Hort. Ham. ii. 702-Onobrychis incurvata.
infractum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 290 - Desmodinm infractnm.
intactum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* 198.—Alger.
intortum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 11-Desmodium uncinatum.
inundatum,Twcz. in BulL Soc. Nat Most xv. (1842) 781 — obscurum.
iaponicum, *Basin, in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* vi. (1851) 81.—Japon.
junceum, Linn. Sp. PL ed. II. 1058 - Lespedeza juncea.
junceum, Walt. Fl. Carol. 185 = Lespedeza reticulata.
Kolenatii, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 97 = sericenm.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 110.—Assyria,
knmaonense, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* it 145.—Ind. or.
labumifolium, Poir. Encyc. vL 422 = Desmodinm labumifolium.

HEDYSARUM:—
laeve. *Maxim, in Bull. Acad. PStersb.* xxvii. (1881) 464.—Mongolia.
laevigatum, Nutt. Gen. Am. ii. 109 = Desmodium laevigatum.
lagenarium, Roxb. Hort Beng. 57 ; Fl. Ind. iii. 865-Aewhynomene aspera.
lagocephalum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 248 = Desmodium barbatum.
lagopodioides, Forst. f. Prod. 51= Desmodinm lagopodioides (in Addend.).
lagopodioides, Linn. Sp. PL 1198=Uraria lagopoides.
lagopoides, Bnrm. f. FL Ind. 168. t. 53 = Uraria lagopoides.
lanceolatum, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL 360 - Desmodinm gangeticum.
lanseum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790; ed. I. Art. iv. 16"Uraria crinitum.
lanuginosum, *Desf. Tabl.* ed. I. 197, nomen.—Oriens.
lappaceum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 136=Taverniera lappacea.
lasiocarpum, Beauv. Fl. Ow. i. 32. t 18=Desmodium latifolium.
lasiocarpum, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1824; Suppl. 4=neglectum.
latebrosum. Linn. Mant. ii. 270 - Heylandia latebrosa.
latifolium, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 5717 = Desmodium laxiflorum.
latifolium, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 350 = Desmodium latifolium.
latisiliquum, Poir. Encyc. vi. 432 = Chaetocalyx latisiliqua.
laxiflorum, *Benth ex Baker, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 146.—Reg. Himal.
laxum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 66.—Cappadoc
laxum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 199.—Alger.
laxum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 292=Desmodium podocarpum.
Ledebourii, Spreng. Syst. v. 334=neglectum.
Lehmannianum, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1847) 278.—Turkestan.
leiocarpum, Spreng. Syst. iii. 316 — Desmodium leiocarpum.
Lespedeta, Poir. Encyc. vi. 415-Lespedeza repens.
leucocladum, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. I. ix. 112.—As. Min.
leucophyllum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 248, in obs.—Hab.?
lignosum, *Trautv. Cat. PI. Lomon.* 12.—Mongolia.
Lindleyi, *Mart. Ausw.* 25. t. 16.—Bras,
lineare, *Lour. Fl. Cochinch.* 452.—Cochinch.
lineare, Rottl. ex Spreng. Syst. iii. 320 = Desmodium laxiflorum.
lineatum, Linn. Syst. ed. X. 1170 = Flemingia lineata.
lineatum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 72-Desmodium lineatum.
linifolium, Linn. f. Suppl. 331 = Indigofera linifolia.
longifolium, Kottl. ex Spreng. Syst. iii. 319 = Alysicarpus longifolius.
Loureirii, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 292-Lourea obcordata.
lutescens, Poir. Encyc. vi. 417-Desmodium lutetcens.
lydium, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 88-varium.
Mackenzii, *Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ.* 745. —Am. bor.
Mackete, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5721-Desmodium Cephalotes.
macraphyllum, Steud. Nom. ed. I. 893 = Desmodium macrophyllum.
maculatum, Linn. Sp. PL 746 = Desmodium gangcticum.
madagascariense, *Desv. in Mim. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 322.—Madag.
malacophyllum, Link, Ennm. Hort Berol. ii. 247 = Desmodium malacophyllum.
marilandicum, Linn. Sp. PL 748, pro parte — Desmodium marilandicum.
marilandicum, Willd. Sp. PI. iii. 1189 = Desmodium Dillénii.
mauritanlcum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 196.—Afr. bor.
mauritanicum, Willd. Sp. PI. iii. 1185 - Desmodium mauritanicum.
membranacenm, *Coss.VBal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 246.—Afr. bor.
mexicanum, Sweet. Hort. Brit ed. 1.130 - Desmodium nncinatnm.

HBDYSAHT7M:—
micranthon, Foir. Encyc. vi. 446 « Aeschynomene micrantha.
microcalyx, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 147.—Reg. Himal.
microcarpum, Dufour, ex DC. Prod. ii. 345 = Onobryehis saxatilis.
microphyllum, Thunb. Fl. Jap. 284 - Desmodinm parvifolium.
micTophyllam, *Tuna, in Bull. Soc. Not. Mosc.* xv. (1842) 778.—Sibir.
micropterum, *Sunge, ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 623.—Persia.
molle, Vahl, Symb. Bot. ii. 83=Desmodium molle.
molliculum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 619 = DesmodiUm molliculum.
mongolicum, *Turc: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 781, in obs.—Mongolia.
moniliferum; Linn. Mant' i. 102 — Alysicarpus monilifer.
moniliferum, Russ. ex Wall. Cat. n. 6772 - Alysicarpus vaginalis.
moniliforme, *Burm.f. Fl. Ind.* 168.—Ind. or.
montanum, Pers. Syn. ii. 324-Onobryehis viciaefolia.
mucronatum, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 92 = Desmodium cajanifolium.
mucronatum, Siessi,ex DC. Prod. ii. 330 = Desmodium Alamani.
multijngam, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 464.—Mongolia.
muricatum, Jacq. 1c. PI. Rar. iii. 13. t. 568; Coll. Suppl. 147-Adesmia mnricata.
Nalla-kaschina, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 216-Ormocarpum sennoides.
Naudinianum, *Coss. V Dur. in Bull. Soc. Bot. Fir.* iii. (1856) 675.- Algeria.
neglectum, Ledeb. Fl. Alt. iii. 840=obscurum.
Neli-tali, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 365 = Aeschynomene indica.
nigrum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 16 (Quid ?).—Java.
nitidum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1205.—Armenia.
nudiflorum, Linn. Sp. PI. 749 = Desmodium nudiflorum.
nudum, Rottl. ex DC. Prod. ii. 385 - Rhynchosia minima.
nummularifolium, DC. in Ann. Sc. Nat. Sex. I. iv. (1825) 102 = Tavemieranummularia.
nummularifolium, Linn. Sp. PI. 746 = Indigofera echinata, Alysicarpns vaginalis.
nutans, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr-June 1828) 173.—Ind. or.
obcordatum, Poir. Encyc. vi. 425-Lourea obcordata.
oblongifolium,Be>t.ex DC. Prod. ii. 332 = Desmodium axillare?
otscurum, Georgi, Beschr. Russ. Reich. Nachtr. 295 — polymorphum.
obscurum, *Linn. Syst.* ed. X. 1171.—Europ.; As. bor.
obtusum, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1190 = Desmodium ciliare.
obtusum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 482=Desmodium marilandicum.
ochroleueum, Moench, Meth. 118 — Desmodium gangeticum.
Oliverii, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 290 = Taverniera nummularia.
Onobrichis, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 311 = Onobryehis viciaefolia,
onobrychioides, Winkl. Liter. Pfl. Verz. Fl. Bait. 104 = seq.l
Onobryehis, Linn. Sp. PI. 761'Onobryehis viciaefolia.
Onobryehis, [Soland. in] Russell, Aleppo, ed. II. ii. 260. t. 11 = Onobryehis Kotschyana.
orbiculatum, Rottl. ex Wight & Am. Prod. 231 = Desmodium Rottleri.
ormocarpoides, Desv. ex DC. Prod. ii. 327 = Desmodium ormocarpoides.
Ormocarpum, Steud. Nom. ed. II. i. 731, sphalm. = praec.
ornatum, Willd. Sp. PI. iii. 1215 = Onobryehis ornata.
ovalifolium, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 359 - Alysicarpus rugosus.
ovalifolium, Vahl, ex DC. Prod. ii. 353 = Alysicarpus vaginalis.
ovatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 16 » Desmodium umbellatum.
oxalifolium, Buch.-Ham. ex Benn. PI. Jav. Rar. 156 = Desmodium Rottleri.

HEDYSABTTM:•—
oxyphyllum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 292-= Desmodium oxyphyllum.
palavicum, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 347 = varium.
paleaceum, Poir. Encyc. vi. 418 =Desmodium canescens.
Pallasii, Willd. Sp. PI. iii. 1214 = Onobrychis Pallasii.
pallidum, Bivona, Sic. PI. Cent. ii. 29 = Sibthorpii.
pallidum, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 177.—Afr. bor.
Pallidum, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. III. 16 = Onobryehis arenario.
paniculatum, Linn. Sp. PI. 749 - Desmodium paniculatum.
paniculatum, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 74 = Desmodium strictum.
pannosum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 525.—Syria,
papale, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 199.—Alger.
papillosum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 514.—Persia.
papposum, L'Hérit. ex DC. Piod. ii. 319=Adesmia papposa.
parviflorum, Spreng. Syst. iii. 318 = Desmodium parvifolium.
patens, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 362 =-Desmodium polycarpum.
pauciflorum, Nutt. Gen. Am. ii. 109 = Desmodium pauciflorum.
pedunculare, Cav. in Anal. Cienc. Nat iv. (1801) 75 = Onobryehis peduncularis.
pedunculatum, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 17 = Desmodium pedunculatum.
pendulum, Poir. Ent,c vi. 449 = Adesmia bicolor.
pennigerum, Lamb, ex DC. Prod. ii. 319 = Adesn.ia papposa.
Perrauderianum, *Coss. (f Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1856) 739.—Alger.
Pestalozzae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ix. 112.—Lycia.
petraeum, Bieb. ex Willd. Sp. PI. iii. 1217 - Onobryehis petraea.
phrygium, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 66=varium.
pictum, Jacq. Coll. ii. 262 - Uraria picla.
pilosum, Roxb. ex Wight *it* Am. Prod. 223-Desmodium retroflexum.
pilosum, Thunb. Fl. Jap. 288 (err. typ. 290)«Desmodium pilosum.
pimpinellaefolium, Poir. Encyc. vi. 447 = Adesmia murioata.
platyphyllum, *Basin, in Mem. Sav. Etr. Pitersb.* vi. (1851) 75.—Kossia.
plumosum, Boiss. & Hanssk. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 515.—Persia.
podocarpon, Spreng. Syst. iii. 317 - Desmodium podocarpum.
pogonocarpum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 87.—As. Min.; Syria.
poly carport, Poir. Encyc vi. 413 = Desmodium polycarpum.
polymorphum, *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 388.—Sibir.
portoricense, Spreng. Syst. iii. 314 = Desmodium portoricense.
procumbens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 10.—Jamaic.
procumbens, Roxb. Hort. Beng. 66 ; Fl. Ind. iii. 345-Desmodium retroflexum.
procumbens, Schangin, in PalL N. Nord. Beitr. vi. 33= polymorphum.
Procumbens, Veil. FL Flum. 319; vii. t. 150 = Desmodium barbatnm.
prostratum, Iian. Mant. i. 102 ; Burm. f. Fl. Ind. 168. t. 55. f. 1 = Indigofera enneaphylla.
prostratum, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1200 = Lespedeza repens.
prostratum, Pall, ex DC. Prod. ii. 342 = polymorphum.
prostratum, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 209 = Pseudarthria viscida.
Pryoni, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 292 - Desmodium Wigbtii.
PseudAlhagi, Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 174 = Alhagi camelorum.
ptoUmaicum, Delile, Fl. Egypte, 255 « Onobrychis ptolemaica.
pulchellum, Linn. Sp. PI. 747 - Desmodium pulchellum.
pumilum,Lina. Syst.ed. X. 1171-= Onobryehis pumila.
punctatum, Poir. Encyc. vi. 447 —Adesmia punctata.
punctatum, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 2-22 - Rhynchosia densiflora.
pnrpureum, *Gueldenst. Seise,* i. 168 (Quid ?).—Rossia.
purpureum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = Desmodium incanum.

HEDYSARUM:—
purpureum, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. lad. iii. 358 - Desmodium polycarpum.
quinquangulatum, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 356 = Desmodium diflusum.
racemiferum, J. F. Gmel. Syst. 1125 =• Desmodium canescens.
racemosum, Aubl. PL Gui. ii. 774 = Desmodium adscendens.
racemosum, Thunb. Fl. Jap. 285 = Desmodium racemosum.
radiatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 483 - Onobrychis vaginalis.
radiatum, Desf. in Ann. Mus. Par. xii. (1808) 112 * Onobrychis radiata.
ramosum, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. L 731 - Desmodium arenarinm.
Razoumowianum, *Helm. (fFisch. ex DC. Prod.* ii. 342.—Reg. Casp.
recumatum, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 358 • Desmodium laxiflorum.
reflexum, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 128.—Hab. ?
reflexum, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 93 » Desmodium umbellatum.
renifolium. Linn. Syst. ed. X. 1169=seq.
reniforme. Linn. Sp. PL ed. II. 1051 = Desmodidm renifonne.
reniforme, Lour. Fl. Cochinch. 447—Lourea obcordata.
repandum, Vahl, Symb. Bot. ii. 82 - Desmodium Scaipe.
repens, Linn. Sp. PI. 749 = Lespedeza repens.
reptans, Poir. Encyc. vi. 422 - Desmodium axillare.
reptans, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 354-Desmodium heterophyllum, *DC.*
reticulatum, Muhl. ex Willd. Sp. PI. iii. 1194 - Lespedeza reticulata.
retroflexum, Linn. Mant. i. 103 = Desmodium retroflexum.
retrofractum, Linn. Mant. ii. 516, sphalm.=*lineatum-*
retusum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 243 - Desmodium polycarpum.
rhombifolium, Ell. Sketch, ii. 216 - Desmodium laevigatum.
rhombifolium, Roxb. Hort. Beng. 57, *nomen-DeS'* modium rhomboideum.
rigidum, Ell. Sketch, ii. 215 = Desmodium rigidum.
Roezlianum, *Prantl, Ind. Sem. Hort. Wirceb.* (1878} 8.—Calif.
roseum, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 248 Desmodium gangeticum.
roseum, Sims, Bot. Mag. t. 996=tauricum.
roseum, Steph. ex DC. Prod. ii. 342 = polymorphum-
rosmarinifolium, Noronha, in Verh. Batav. Gen. (1790) ed. I. Art. iv. 17 = Alysicarpus vaginalis.
Rottleri, Spreng. Syst. iii. 320 - Desmodium riorum,
rotundifolium, *Beat. V Not,' Diagn.* Ser. II. ii- 87—Armenia.
rotundifolium, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 72 - Desmodiu* rotundifolium, *DC.*
rotundifolium, Vahl, Symb. Bot. ii. 81 - Indigofer* echinata.
Roxburghii, Spreng. Syst iv. Cur. Post 292 " Desmodium laxiflorum.
rubrum, Spreng. Syst. iii. 317=Desmodium rubrum.
rufescens, Spreng. 1. c. iv. Cur. Post. 292 = De»modium rufescens.
rufescens, Willd. ex Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Nene Schr. iv. (1803) 222-Rhynchosia rufescens.
rugosum, Sieber, ex DC. Prod. ii. 352 = AlysicarpO' bupleurifolins.
rugosum, Willd. Sp. PI. iii. 1172 = Alysicarp"* rugosus.
rutidocarpum, DC. Prod. ii. 341 =polymorphum.
sagittatum, Poir. Encyc. vi. 402 = Desmodium s*g" tatum.
salidfolium, Poir. 1. c. 422 - Desmodium folium.
saliens, Salisb. Prod. 341 - Desmodium gyrans.
sambuense, D. Don, Prod. Fl. Nep. 243-Desmodm'' floribundumi
saxatile, Linn. Syst ed. X. 1171 - Onobrychi* *V*** tilis.
saxatile. Pall. Reise, ii. 107 (Quid»).—Sibir. »
scaberrimum, EU. Sketch, ii. 217 - Desmodi"" canescens.

HEDYSARTTM:—
scabrum, Moencb, Meth. 118—Desmodium canadense.
Sculpt, Comm. ex DC. Prod. ii. 334 = Desmodinm Scalpe.
scandens, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 13.—Mexic.
scariosum, Rottl. ex Spreng. Syst. iii. 819 - Alysicarpns rugosus.
icoparium, Fiseh. * Mey. in Schienk, Ennm. PI. Nov. 87—Corethrodendron scoparium.
Scorpiurus, Sw. Prod. Veg. Ind.Occ. 107-Desmodinm Scorpiuius.
Semenowii, *Regel & Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) II. 39.—As. centr.
sennoides, Willd. Sp. PL iii. 1207 - Onnocarpom sennoides.
sericeum, *Bůt. Fl. Tour. Cauc.* ii. 176.—Reg. Caucas.
sericeum, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 8.—Mexic.
"rietum, Thnnb. Fl. Jap. 287 (en. typ. 289) = Lespedeza jnncea.
ficeum, Vahl, Symb. Bot. ii. 83 - Ebenos pinnata.
>erotinum, Willd. Enum. Hort. Berol. 777 = Desmodinm serotioum.
tessiliftorum, Poir. Encyc. vi. 414-Lespedeza reticulata.
sessili/olium, Torr. ex M. A. Cnrt. in Bost. Journ. Nat. Hist. i. (1837) 122=Desmodinm sessilifolium, teouifolium.
setigernm, *Turn, ex Fiseh. V Mey. ltd. Sem. Hort. Petrop.* i. 29.—Dahuria.
Sewerzowi, *Bunge, ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* iii. .(1B7S)116.-Turkestan.
ibiricum, Ledeb. Fl. Ross. i. 707-elongatum.
sibiricnm, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 17.—Sibir.
aibthorpii, *Nym. Const.* 197.—Reg. Mediterr.
akkimense, *Benth. ex Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* > 146.—Reg. HimaL
suiquosum, Burm. f. Fl. Ind. 169•Desmodinm poly-, carpum.
smrgarense, *Boiss. tf Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* .". 522.—Mesopotam.
***pyleum,* Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 89-callichroum.
sonnicum, *Bong. Vert. Saisang-Nor. Pfl.* 30. t. 8.—
sororium, Linn. Mant. ii. 270-Eleiotis sororia.
Spartium, Burm. f. Fl. Ind. 166 = Tavemiera nummularia.
spicata, Boj. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 479 - Desmodinm polycarpnm.
**fr*osissimum,* DC. FL Fr. vi. fiSS-capitatum.
Pu>osissimum, Linn. Sp. PI. 75O.-Reg. Mediterr.
**P*nonssimum,* Sibth. ft Sm. Fl. Graec. viu. 16 - Sibthorpii.
tirale, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 107-De>modinm spirale.
Plendens, *Fiseh. ex DC. Prod.* ii. 34O.-Sibir.
"luarroium, Thnnb. Prod. PI. Cap. 132-Enosema sqnarrosnm.
**le«orki,um,* Dnfour, ex DC. Prod. ii. 346 - Onobrydus stenorhiza.
"'Maceum, Burm. f. FL Ind. 168 - Desmodium tnflorum.
"Waceum, Sesse, ex DC. Prod. iL 380=Desmodium. Ortuosum.
striatum, Thunb. Fl. Jap. 289=Desmodium striatam.
stricta, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 483-Desmodram netnm.
stro Wlifemn,. *Baker, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 146.
"~*eg. Himal,
strobiliferum, Linn. Sp. PI. 746=Fleming« strobfflfera.
subjuncturn, Linn. Syst. ed. X. 1169-Desmodinm wrofiexuni.
sylvaticum, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 826 = Desmodium gang cum
styracifolium, Roxb. ex DC. Prod. Beng. 56, Fl. Ind. iii. 847 = Alysicarpus rugosus
subspinosum, Fisch. ex DC. Prod. ii. 343-Eversmannia hedysaroides
Suambum, Buch.-Ham. ex D. Don. Prod. Fl. Nep. 243 = Desmodium floribundnm.
sulphureum, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 87
supinum, H. B. & K. Desmodium cumi Act. Petrop. x. (1797) S16, nome n=candidnm.

HEDYSAKTJM:-
supinum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 106=Desmodinm incanum.
supinum, Vill. Prosp. 41; Hist. PI. Dauph. ii). 394 ~ Onobrychis supina.
syriacvm, Boiss. Diagn. Ser. I. iL 90>=atomarinm.
tanaicense, *Fiseh. Hort. Gorenk.* ed. II (1812) 73.—Rossia.
tanricam, *Pall, in Nov. Act. Petrop.* x. (1797) 315, nomen; *Bieb. Cent. PI.* ii. t. 88.—Tanria.
tenellum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 243 - Desmodinm parvifolinm.
tenellum, H. B. ft K. NOT. Gen. et Sp. vi. 522= Desmodium spirale.
terminate, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 112 (err. typ. 106)-Desmodium molle.
tetraphyllum, Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) 44-Zornia tetraphylla.
tiliarfolium, D. Don, Prod. Fl. Nep. 244=Desmodinm tiliaefolium.
timoriense. Spreng. Syst. iv. Cur. Post 290 - Desmodinm timoriense.
Thuntergianum, Stend. Norn. ed. II. i. 732 - reftexum.
tomentosutn, Thunb. Fl. Jap. 286-Lespedeza villosa.
tortuosum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 107 - Desmodium tortuosum.
Tmrntfortii, Willd. Sp. PL iii. 1214-Onobrychis To'urnefortii.
triangulare, *Ret*. Obs.* Hi. 40.—Java,
trichocarpum, *Desv. ex DC. Prod.* ii. 341.—Persia.
trichoearpum, Willd. Sp. PI. iii. 1194 - Lespedeza trichocarpa.
triflorum, Linn. Sp. PI. 749-Desmodium triflorom.
trifbliatum, *Noronha, in Verk. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 16 (Quid 1).—Java.
trigonum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 107 •= Desmodium uncinatnm.
trinerve, Buch.-Ham. in Wall. Cat. o. 6720-Desmodinm -podocarpum.
trinervium, Roxb. ex Wall. 1. c. n. 6747 - Flemingla congest a.
trinervinm, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 51, nomen.—Hab. ?
iriphyllum, DC. Proc[1]. ii. 882,' in syn. -Desmodium uncinatura.
triquetrum, Urn,. Sp. PL 746 - Desmodium triquetrum.
tuierculomm, LabiU. Sert. Austr. Caled. 71. t 72« Desmodinm polycarpnm I
tuberosum, Roxb, ex Willd. Sp. PI. iii. 1197-Pueraria tuberosa.
turkestanicum, *Regel V Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 21.—Turkestan.
umtellatum. Linn. Sp. PI. 747-Desmodinm nmbellatum.
umbellatum, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 360 =Desmodium Cephalotes.
umbellatum, Walt. Fl. Carol. 184-Lespedeza capltatat
uneinatum, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 27-Desmodium uncinatum.
uniflorum, Domb. ex DC. Prod. ii. 819-Adesmia hispid ula.
nniflorum, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 426.—Pyren.
vaginale, Linn. Sp. PI. 746-Alyncarpus vaginalis.
variant, Labill. Sert. Austr. Caled. 71. t. 71-Deamodium varians.
variegatum, Portenschl. Enum. PI. Dalm. 15; Host, Fl. Auslr. ii. 350 = capitatnm.
varium, Roth, Nov. PL Sp. 354 - Alysicirpus vaginalis.
varium, *Willd. Sp. PI.* iii. 12O6.-As. Min.
velutinum, Boiss. 8c Noe, Diagn. Ser. II. fi. 88 - pogonocarpum.
minimum, Willd. Sp. PI. iii. 1174 •= Desmodium velutinum.
wnosum, Desf. Fl. Atlant. ii. 179.1201-Onobrychis venosa.
venosum, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. ir. (1803) 220-Rhynchosia suaveolens.
venustulum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 519 - Desmodium barbatum.
vtnustum, Fiseh. ex DC. Prod. it. 342 - polymorphum.
versicohr, Salisb. Prod. S41=Lourea vespertilionis.
verticillatum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 16 (Quid»).—Java.
vespertilionis, Linn, f. SuppL 331-Lourea vesperUlionis.

HEDTSARTTM:—
vicioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 69 = sibirienm.
villosum, Mill. Card. Diet. ed. VIII.n. 9-Desmodium villosum, *DC.*
villosum, Willd. Sp. PI. iii. 1195-Lespedeza villoaa.
m'olaceum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 136 —Alysicarpus glnmaceus.
violaceum, Linn. Sp. PL 749 — Lespedeza violacea, reticulata.
violaceum, Veil. Fl. Flum. 318; vii. 1.148 - Desmodium axillare.
virgatum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5761-= Alysicarpus bupleurifolius.
virgatum, Thunb. Fl. Jap. 288 (err. typ. 290) - Leipedeza virgata, *DC.*
virginianum, Hill, Veg. Syst. xxi. 43-seq.
virginicum. Linn. Sp. PI. 750 - Aeschynomene hispida.
viridiflorum, Burm. f. Fl. Ind. 167 •= Desmodium Wightii.
viridiflorum, Linn. Sp. PL 748-Desmodium viridiflorum.
viridiflorum, Willd. Sp. PL iii. 1192-Desmodium canescens.
viscidum, Linn. Sp. PI. 747-Pseudarthria viscida.
viscosum, DC Prod. ii. 336, in syn. sphalm.—Pseudarthria viscida.
volgense, Fiseh. ex DC. Prod. ii. 343-cretaceum.
volitans, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 221-Lourea vespertilionis.
volubile, Linn. Sp. PI. 750=Galactia mollls.
Wade, Vand. Fasc. PI. 17 = Desmodium Wade.
Wallichianum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post 293 - Desmodium floribundum.
zonulatum, *Noronha, in Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 17 (Quid?).—Java.

HEDTSCEPE, H. Wendl. & Drude, in Unnaea, xxxix. (1875) 178. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 888.
Canterburyana, *H. Wendl. V Drude, I. c.* 204.—Ins. Dom. Howe.

HEDYSTACHYS, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 128-Veronica, Touro. (Scrophul.).
spicata, Fourr. 1. c.=V. spicata.

HEERIA, Meissn. Gen. Comm. 65 (1887)-Anaphrenium, E. Mey. (Anacard.).
argentea, Meissn. 1. c—A. argenteum.
inermis, Meissn. 1. c—Sideroxylon inerme.
longifolia, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 849 -Protorhus longifolia.
melanophleos, Meissn. 1. c.-Myrsine melanophleos.
mucronata, Uerah. ex Kranss, in Flora, xxni. (1844) 849—A. abyssinicum.
mueroni/olia, Engl. in A. DC. Monog. Phan. iv. 358, sphalm.—praec.

HEERIA, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 432.
MELASTOMACEAE, Benth. & Hook. f. i. 740.
HETEROCENTRON, Hook, *tc* Am. Bot. Beech. Voy. 290 (1840).
SCHIZOCENTRON, Meissn. Gen. Comm. 355 (1843).
axillare, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 418, in syn. = macrostachya.
eupheoides, Benth. Bot. Voy. Sulph. 93. t. 38-Ptero-gastra eupheoides.
elegans, *Schlecht. in Linnaea,* xiii. (1839) 432.-Mexic.
macrostachya, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 34.—Mexic.
procumbens, Naud. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. xiv. (1860) 161-elegans.
rosea, *Triana, in Trans. Linn. Sec.* xxviii. (1871) 34. -Mexic.
subtriplinervia, *Triana, 1. c.*—Mexic.
undulata, *Triana, I. c.*—Mexic.

HEGEMONE. Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. 1. 51 (1843) -TrolliUB, Linn. (Rannnc).
lilacina, Bunge, 1. c.-T. lilacinus.

HEGETSCHWE1LERA, Heer ft Regel, Cat. Sem. Hort. Turic. (1842); ex Bot. Zeit. i. (1843) 47 - Alysicarpus, Neck. (Legumin.).
pulchella, Heer ft Regcl, 11. cc. = A. vaginalis.

HEIMIA, Link & Otto, Ic. PI. 63. t. 28 (1822) - Nesaea, Comm. (Lythrar.).
grandiflora, Hook. lc. PI. t. 554 = N. salicifolia.
Unariaefolia, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort Brit. 479 «=N. Unariaefolia.
myrtifolia, Hort. Berol. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 317 = N. myrtifolia.
salicifolia, Link & Otto, Ic. PI. 63. t 28-N. salicifolia.
syphilitica, DC. Prod. iii. 89 - N. syphilitiea.

HEINEKENIA, Webb, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 491 (1865)-Lotus, Linn. (Legumin.).
petiorhyncha, Webb, ex Magf. in Anal. Sot Esp. Hist. Nat. x. (1881) 180 = L. Bertholetii.

HEINSIA, DC. Prod. iv. 390 (1830). *RVBIACEAE,* Benlh. & Hook. f. ii. 77.
bengnelensis, *Welw. ex Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 77. —Afr. trop.
capensis, Buek, ex Harv. Thes. Cap. i. 22 *m* Randia rudis.
densiflora, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 81.— Afr. trop.
jasminiflora, *DC. Prod.* iv. 890.—Afr. trop.
pubescens, *Klottsch, in Abh. Acad. Berl.* (1857) 228. —Afr. trop.

HEINTZIA, Karst. Ausw. Gew. Venez. 34.1.11 (1848); et in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xviL (1849) 33 = Alloplectus, Mart. (Gesnerac).
picta, Karst. en Planch, in Fl. des Serres, vii. (1851-52) 201. tt. 718, 719.—Venezuela.
tigrina, Karst. Ausw. Gew. Venez. 34. t. 11 = A. tigrinus.

HEINTZIA, Steud. Norn. ed. II. i. 732 (1840) = HEINZIA, Scop. = Dipteryx, Schreb. (Legumin.).

HEINZELIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 153 (1847) = Chaetothylax, Nces (Acanthac.).
longiflora, Nees, in DC. Prod. xi. 314-Jacobinia longiflora.
lythroides, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 154 - C. lythroides.
ovalis, Nees, 1. c.—Bras.

HEINZELMANNIA, Neck. Elem. i. 371 (1790) = Spigelia, Linn. (Loganiac.).

HEINZIA, Scop. Introd. 301 (1777) - Dipteryx, Schreb. (1791) (Legumin.).
peregrina, J. F. Gmel. Syst. 609 = D. odorata ?

HEISTERA, Schreb. Gen. i. 291 (1789)-seq.

HEISTERIA, Jacq. Ennm. PI. Carih. 4 (1760) ; Am. Select. 126 (1763). *OLACINEAE,* Benth. & Hook, f. i. 346.
ACROLOBUS, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1856) 236. t 3.
HESIODA, VelL Fl. Flum. 185 (1825); iv. L 140 (1827).
KHAFTOSTYLUM, Humb. & BonpL Fl. Aeqoin. ii. 139. t. 125 (1809).
acute, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 21.—Am. austr.
brasiliensis, *Engl. 1. c.* 19.—Bras,
cauliflora, *Sm. in Sees, Cycl.* xvii. n. 2.—Guiana,
celastrinea, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* V. xv. (1872) 381.-N. Granat.
citrifolia, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 18.—Am. austr.
coccinea, Engl. 1. c. 19=brasiliensis.
cocdnea, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 20; *Select. Am.* 126. —Ins. Martinic.
coccinea, Poepp. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 18 =cvanocarpa.
crassi/olia, Mart, ex Engl. 1. c. 16 = ovata.
cyanocarpa, *Poepp. (f Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 85. t. 240.—Bras,
densifrons, *Engl. in Mart. Fl. Bras,* xii II. 17.—Am. austr.
flexuosa, *Engl. 1. c.*—Am. austr.
guianensis, *Engl. 1. c.* 15.—Am. anstr.
Kappleri, *Sagot, ex Engl. I. c.* 14.—Guian.
laxiflora, *Engl. I. c.* 19.—Am. austr.
longifolia, *Spruce, ex Engl. 1. c.* 14.—Bras.

HEISTERIA:—
macrophylla, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1856) 40.—Am. centr.
maytenoides, *Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 15.—Bras.
microcarpa, *Spruce, ex Engl. 1. c.* 21.—Bras,
nitida, *Engl. I. c.* 18.—Am. austr.
ovata, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 866.— Bras,
pallida, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 16.—Am. anstr.
parvifolia, 5m. *in Rees, Cycl.* xvii. n. 3.—Afr. trop.
pentandra, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 20.—Am. austr.
Raddiana, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 258.—Bras.
Rhaptostylum, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat. Sét.* V. xv. (1872) 881.—N. Granat.
salicifolia, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 20.—Am. austr.
Spruceana, *Engl. 1. c.* 16.—Am. austr.
subsessilis, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 367.—Bras.
tubicina, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 35. t. 241-Aptandra tubicina.

HEISTERIA, Linn. Gen. ed. I. 350 (1787)«Muraltia, Neck. (Polygal.).
mitior, Berg. Desc. PI. Cap. 187=M. stipulacea.
pungens, Berg. 1. c. 185 - M. Heisteria.

HEKATEROSACHNE, Stend. Syn. PI. Gram. 118 (1865)«=Opli8menus, Beauv. (Gramin.).
elatior, Steud. 1. c.=O. setarius.

HEKERIA, Endl. Gen. Suppl. i. 1374, in syn. (1841)-HECKERIA, Kunth=Piper, Linn.

HEKI8T0CARPA, Hook. f. Ic. PI. t. 1151 (1873). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 62.
minutiflora. *Hook./. I. c*—Afr. trop.

HEKORIMA, Knnth, Enum. PI. iv. 203 (1843) = Btreptopus, Michx. (Liliac).
Candida, Kunth, 1. c. 204=S. simplex.
dichotoma, Knnth, 1. c = S. roseus.

HELADENA, A. Juss. in Ann. Sc Nat. Sér. II. xiii. (1840) 321. *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 253.
HELADRAIA, Lindl. Veg. Kingd. 890 (1847).
albiflora, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 349. —Bras.
australis, *A. Juss. 1. c.* 348.—Am. austr.
biglandulosa, *A. Juss. I. c.* 349.—Bras,
bunchosioides, *A. Juss. I. c.* 348.—Bras.

HELADENIA, Rdchb. Norn. 207 (1841)-praec.

HELADRAIA, Lindl. Veg. Kingd. 890 (1847)=praec.

HELANTHIUM, Engelm. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1005 (1883) = Alisma, Dill.

HELCIA, Lindl. Bot. Keg. (1845) Misc. 17-Trlohopilia, Lindl (Orchid.).
picta, linden, in Illustr. Hortic. xxix. (1882) 52.— N. Granat.
sanguinolenta, Lindl. Eot. Reg. (1845) Misc. 17 = T. sanguinolenta.

HEIiDREICHIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 381. *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook, f. i. 91.
ZYGOFELTIS, Fenzl. ex Endl. Gen. Suppl. ii. 107 (1842).
Bourgaei, *Boiss. Fl. Orient,* i. 320.—As. Min.
bupleurifolia, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvi. (1841) 381; xvii. (1842) 186.—As. Min.; Syria.
Kotschyi, *Boiss. II.* cc.-Cilicia.
longifolia, *Boiss. II. cc.* 381; 187.—Persia,
rotundifolia, *Boiss. II. cc.* 381; 185.—Armenia,
silaifolia, *Hook. /. if Thorns, in Journ. Linn. Soc.* V. (1861) 176.—Afghan.

HELEASTRUM, DC. Prod. v. 263 (1836) = Aster, Toum. (Compos.).
album, DC. 1. c 264=A. ptarmicoides.
paludosum, DC. 1. c = A. paludosus.

HELEIOTIS, Hassle Cat. Hort. Bog. Alt. 272, in syn. (1844)-Phylacium, Benn. (Legumin.).
scandens, Hassk. 1. c = P. scandens.

HELEMONIUM, Steud. Norn. ed. II. i. 733 (1840) - HELENOMOIUM, Willd. = Heliopsis, Pers. (Compos.).
canescens, Steud. 1. c. = Heliopsis buphthalmoides.

HELENA, Haw. Monog. Narciss. 13 (1831)-Harcissus, Toum. (Amaryll.).
croceo-cincta, Haw. 1. c. 14 = N. poëtiens.
gracilis. Haw. 1. c. 13=N. gracilis.
planicorona, Haw. 1. c. — N. gracilis.
pumila, Haw. 1. c 14 = N. gracilis 1
purpureo-cincta, Haw. 1. c. 18=N. poëticus.
tenuior, Haw. 1. c N . gracilis.

HELENEUM, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 460 = Helenlum, Linn. (Compos.).

HELENIA, linn. Gen. ed. L 260 (1737)-Helenium, Linn. (Compos.).
autumnalis, Gaertn. Fruct ii. 438. t. 169 = Helenium autumnale.
decurrens, Moench, Meth. 589 = Helenium autumnale.
Douglasii, Hort ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 690=Monolopia major.
linearifolia, Moench, Meth. Suppl. 240 = Helenfam quadridentatum.

HELENIOPSIS, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 278, sphalm.-Heloniopsis, A. Gray (Liliac).

HTiTiTiTTIUJC, Linn. Sp. PI. ed. I. 886 (1753)-*COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 413.
AMBLYOLEPIS, DC. Prod. v. 667 (1886).
BRASSAVOLA, Adans. Fam. ii. 127 (1763).
DUGALDIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. Iv. 270 (1828).
ESPELETIOPSIS, Sch. Bip. ex Benth. & Hook.f. Gen. ii. 414 (1878).
HELENIA, Linn. Gen. ed. I. 260 (1737).
LEPTOCARPHA, Endl. Gen. Suppl. i. 1383, in syn. (1841).
LEPTOPHORA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (X8W) 195.
LEPTOPODA, Nutt. Gen. Am. ii. 174 (1818).
MESODETRA, Rafin. Fl. Ludov. 14 (1817).
OXYLEPIS, Benth. PI. Hartw. 87 (1841).
TETRODUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. Iv. 264, 37^ (1828).
aestivale, *Walt. Fl. Carol.* 210.—Am. bor.
alatum, C. C. Gmel. ex Steud. Norn. ed. I. 394 = quadridentatum.
altissimum, Link, Ind. Sem. Hort. Berol. (18W autumnale.
amphibolum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* ix. (»'*-' 202.—Mexic.
anceps, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 81 (Quid I).-* bor.
atropurpureum, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 12 - nodiflornm.
auctumnale, J. F. Gmel. Syst. 1244— seq.
autumnale. *Linn. Sp. PI.* 886.—Am. bor.
Bigelovii, *A. Gray, in Pact/. Rail. Rep.* iv. 107.— Calif.
Bolanderi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 358.—Calif.
brachypoda, Wood, Am. Bot. *Sc* Flor. 182 •= » florum.
brevifolium, *Wood, I. e.; A. Gray, in Proc. Am- Acmi-* ix. (1874) 204.—Am. bor.
caespitosum, Steud. Nom. ed. II. i. 783 = Eriophyu caespitosum.
cali/ornicum, Link, Ind. Sem. Hort. Berol. (1840) 21 =puberulum.
canaliculatum, Lam. in Journ. Hist. Nat. ii. *ioi)* 213. t. 35 = autumnale.
commutatum. Link, Ind. Sem. Hort. Berol. (18*0) "* = autumnale.
CurtUii, *A. Gray, in Proc. \m. Acad.* ix. (1874) » —Am. bor.
decurrens, Vatke, Ind. Sem. Hort. Berol. (1875) *PP- = puberulum.
dichotomum, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 81 (Quid')- Am. bor.
discovatum, *Rafin. I. c.* (Quid?).—Am. bor.

HELENTUM:—
Douglasii, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit Suppl. iii. 590 = Monolopia major,
elegans, *DC. Prod.* v. 667.—Am. bor. occ.; Mexic.
fimbriatum, *Wood, Am. Bot. & Flor.* **182 ; *A. Gray,*** *in Proc. Am. Acad.* ix. (1874) 204.—Am. bor.
flexuosum, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 81 (Quid I).—Am. bor.
grandiflorum, Gilib. Fl. Lituan. i. 204 - Inula Helenium.
grandiflorum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 384=autumnale.
keterophyllum, DC. Prod. v. 667=microcephalum.
Hoopesii, *A. Gray, in Proe. Acad. Sc. Philad.* **1863** (1864) 65.—Am. bor. occ.
tncisum, Wood, Am. Bot. *Sc* Flor. 182=Nuttallii.
integrifolium, *Benth. (f Hook. /. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 227.—Mexic.
'aciniatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **ix. (1874)** 203—Am. bor. occ.
'anatum, Spreng. Syst. iii. 574 = Eriophyllum caespitosum.
latifolium, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 2 = autumnale.
*L*ptopoda,* Wood, Am. Bot. *Sc* Flor. 182 - Nuttallii ?
ongi/olium, Sm. in Rees, Cyd. xvii. n. 2-autumnale.
"•exicanum, DC. Prod. v. 666=amphibolnm.
nexieanum, A. **Gray,** in Pacif. Rail. Rep. iv. 107 = puberulnm.
mexicanum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **iv. 299.**—Mexic.
»>'cranthum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 885-nudiflorum.
crocephalum, M. A. Curt, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 348 = elegans.
njfcrocephalnm, DC. Prod. v. 667.—Mexic.
*iw*H,* Schult. ex DC. Prod. v. 666-quadridentatum.
^ontanum, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. N. S. vii. (1841) 884= autumnale.
nadiflorum, *Nutt. 1. c*—Am. bor.
«taUii, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* **ix. (1874) 204.** Am. bor.
<:«wum, *A. Gray, 1. c.* 202.—Mexic.
"Ppositi/olium, Spreng. Syst. iii. 673-Bahia oppositifolia.
torviflorum, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841)884=nudiflorum.
POberulum, *DC. Prod.* v. 667.—Calit
Piterulum, Wood, Am. Bot. *Sc* Flor. 182=vemale!
P«iescens, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 227 = autumnale.
* " W « K , Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 855 = Puberulum.
*P*mil*$_{um}$, WiUd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 60 = autumnale.
quadridentatum, Hook. Comp. Bot. Mag. L (1835) 98.—nudiflorum.
quadridentatum, *Labill. in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* **i. (1792) 22**, t. 4.—Am. bor.
quadripartitum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 338-inadridentatum.
Ros. *Turc,* **•«'*Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I.** 186.-Calif.
<u/olia, A. Gmy, in Proc. Am. Acad. vii. 359 = Hecubaea scorzoneraefolia.
Featherm. Louisiana Univ. Rep. IWl^nudiflornm.
"fotinum, *Walt. Fl. Carol.* 210.—Am. bor.
"otchadifoiiun ,Spreng. Syst iii. 674 = Eriophyllum 'taechadifolium.
«urfoHum, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* **vii.** (1834) 66.-Am. bor.
tex ??"*. Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 U862) 460-microcephalam.
"•WJeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xix. (1888) 32.** "—Arizona.
traxil *Rafin* **82 (Quid 1).—Am.** bor.
trolliifolium, Spreng. Syst. iii. 678=Bahia trollifolia.
tubuliflorum, DC. Prod. v. 666 = autumnale.
undulatu **i. 733.** —Ca
""•'*«• Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. U831) vJ? i DC. Prod. v. 666 -mexicanura.
»le, *Walt. Fl. Carol.* 21O.-Am. bor.

HELENIUM, Linn. Syst. ed. I (1736); Adans. Fam. ii. 125 (1768) = **lnula,** Linn. (Compos.).

HELENOMOIUM, Willd. ex DC. Prod. v. 651, in syn. (1836) = Heliopsis, Pers. (Compos.).
canescens, Willd. ex DC. 1. c.=Heliopsis buphthalmoides.

HELEOCHARIS. Lestib. Ess. Cyperac. 41 (1819) = Eleoeharis, R. Br. (Cyperac.).

HELEOCHLOA, Beauv. Agrost. 23 (1812)=Sporobolua, R. Br. (Gramin.).
juncea, Beauv. 1. c. 24 - S . junceus.
phalaroides, Beauv. 1. c.—Hab. I

HEIJEOCHXOA , Host, Gram. Austr. i. 23. t. 29, 30 (1801). *GRAMINEAE,* tenth. *Sc* Hook. f. iii. 1146.
PECHEA, Pourr. Chlor. Narb. ex Kunth, Enum. PI. i. 22, in syn. (1833).
RHIZOCEPHALUS, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 68 (1844); xiii. 43 (1853).
acutiglumis, *Boiss. Fl. Orient,* v. 476.—Syria,
alopecuroides, *Host, Gram. Austr.* 1. 23. t. 29.—Reg. Mediterr.
alpicola, *Boiss. Fl. Orient,* v. 477.—Kurdist
ambigoa, *Benth. V Hoot./. Gen.* iii. 1146.—Lydia.
crucianelloides, *Benth. V Hook./. I. c.*—As. Min.
'diandra, Host, Fl. Austr. i. 77 = Crypsis aculeata.
dura, *Boiss. Fl. Orient,* v. 477.—Beluchist.
pygmaea, *Benth. V Hook./. Gen.* iii. 1146.-As. Min.; Persia,
schoenoides, *Host, Gram. Austr.* i. 23. t. 30.—Reg. Mediterr.; Persia.

HELEOGITON, Schult. Mant. ii. 2 (1821)=Sclrpua, Linn. (Cyperac).
compressa, Peterm. Fl. Bienitz, 22 » S . Caribis.
fluitans, Link, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. viii. t 298° S. fluitans.
glaucum, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1807 » S. lacustris.
Lejeuniit Reichb. Fl. Germ. Excurs. 77 - S. triqueter.
litorale, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1808 = S. littoralis.
pungens, Reichb. 1. c.-= S. pungens.
Jlothii, Schur, Enum. PI. Transs. 693 = S. Rothii.
Tabernaemontani, Peterm. FL Bienitz, 22=S. Tabernaemontani.
trigmum, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. iii. 1807 = S. carinatus.
triquetrum, Reichb. 1. c. 1808=S. triqueter.

HELEONASTES, Ehrb. Beitr. iv. 147 (1789) = **Carex,** Linn. (Cyperac.).

HELEOPHILA, Schult. Mant il. 2 j[1824) = seq.

HELEOPHVLA, Flora, iv. (1821) 26-seq.

HELEOPHYLAX, Beauv. ex Lestib. Ess. Fam. Cyp. 41 (1819)-Sclrpus, Linn. (Cyperac.).

HELEPTA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825) = Heliopaia, Pen. (Compos.).
angusti/olia, Rafin. 1. c-Heliopsis laevist
grandiflora, Rafin. 1. c. = Heliopsis Iaevis.
parvifiora, Rafin. 1. c—Heliopsis Iaevis)

HELU, Benth. *Sc* Hook. £ Gen. i. 306(1862)-HELIX, M. Roem. = Atalantia, Coma (RnUc).

HELIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. U. 122. t. 191 (1827)-Lisianthus, Aubl. (Gentian.).
trevi/olia, Cham, in Iinnaea, viii. (1833) 11 - L. brevifolius.
oblongi/olia, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 123 - L. oblongifolius.
spathulata, Mart. 1. c. 124=L Martii.

HELIAMPHOKA. Benth. in Proc Linn. Soc. i. (1840) 63; et Trans. Linn. Soc. xviii. (1840) 482. t. 29. *SARRACEN1ACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 48.
nutans, *Benth. ll. cc.*—Guiana,

HELIAUTHELLA, Ton. & Gray, Fl. N. Am. ii. 333 1,18*1)- *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 879.
argophylla, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xix. (1884)** 9.—Am. bor. occ.

TIBTTATTTmrTT A ;
califomica, *A. Gray, in Pact/. Rail. Rep.* **iv. 103.—** Cajif.
Douglasii, *Torr. V Gray. Fl. N. Am.* ii. 334.—Am. bor. occ.
grandiflora, *Torr.* b* *Gray, 1. c.* 333.—Am. bor.
lanceolata, Torr. *8c* Gray, 1. c. 334-uniflora.
lati/olia, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 160-Viguiera helianthoides.
mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* **xv. (1880) 87.** —Mexic.
microcephala, *A. Gray, 1. c.* xix. (1884) 10.—Am. bor. occ.
multicaulis,EMoa, in Bot. King's Exped. 170—uniflora.
nevadensis, Greene, in Bull. Calit Acad. i. n. III. (1885) 89-califomica.
nudicaulis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. nix.* **(1884) 9.** —Am. bor. occ.
Parryi, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* **1863** (1864) 65.—Am. bor. occ.
quinquenervis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1884) 10.—Am. bor. occ.
tenuifolia, *Torr.* b" *Gray, fl. N. Am.* ii. 333 Am. bor.
uniflora, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864) 65 = quinquenervis.
uniflora, *Torr. if Gray, Fl. N. Am.* ii. 334.—Am. bor. occ.

HELIANTHEMOIDES. Medic. Phil. Bot. i. 95 (1789) - Talinum, Adans. (Portulac).
patens, Medic. 1. c. = T. patens.

HELIANTHEMON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127-=HelUnthemum, Toura. (Cistin.).
/umanum, St. Lag. 1. c. = Helianthcmum Fumana.
libanotum, St. Lag. 1. c. — Helianthemum Libanotis.
polyanthum,St. Lag. 1. c — Helianthcmum polyanthos.
tuberarium, St. Lag. 1. c. = Helianthemum Tuberaria.

HELIANTHEMUM, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 445 (1821), sphalm. = Helianthus, Linn. (Compos.).

HELIANTHEMUM, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 358 (1742). *CISTINEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. i. 113.
ANTHELIS, Rafin. Chlor. Aetn. 9 (1813).
CROCANTHEMUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. vi. (1836) 370.
FUMANA, Spach, 1. c. 359 (188C).
KUMANOPSIS, Pomel, Mat. Kl. Atl. 9 (1860).
HALIMIUH, Dun. ex Spach, in Ann. Sc Nat. Sè>. II. vi. 365 (1836).
HETEKOMERIS, Spach, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 290.
PSISTINA, Rafin. Sylva Tellur. 138 (1888).
PsisTirs, Neck. Elem. ii. 273 (1790).
RH.ODAX, Spach, in Ann. Sc. Nat Ser. II. vi. (1836) 863.
STECITKIS, Rafin. Sylva Tellur. 132 (1838).
TAENIOSTEMA, Spach, in Hook. Comp. Bot Mag. ii. (1836) 289.
TRICHASTEROPHYLLUM, Willd. ex Link, in Tahrb. Gew. i. in. (1820) 69.
TUBEKARIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. vi. (1836) 364.
XOLANTHA, Rafin. Caratteri, 73 (1810).
XOLANTHES, Rafin. Sylva Tellur. 132 (1838).
acuminatum, Pers. Syn. ii. 79-varirbile.
acutiflorum, Ehrenb. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 98^ kahiricum.
aegyptiacum, Frivald. ex Willk. 1. c. - ledifolium.
aegyptiacum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 23.—Reg. Mediterr.; Persia.
aelandieum, Boiss. Diagn. Ser. II. vi. 23, sphalm.—oelandlcum.
albicans, Ehrenb. ex Willk. PI. Hisp. ii. 101-Lippii.
aigantnse. Dun. in DC. Prod. i. 268 •= ocymoides.
Allionii, Tineo, PI. **Rar.** Sicil. 43-vineale.
alpestre, Dun. in DC. Prod. i. 276 - italicum.
alpestre, Reichb. PI. Crit. i. 3=vineale.
alyssoides, Pesn. ex Nym. Consp. 72-guttatum.
alyssoides, *Vent. Choix,* 20. t. 20.—Hispan.
ambiguum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. AH.* **219 Alger.**
ambiguum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. Iv. (18S3) 66 [bis]=rupifr«gnm.
Andersoniix, Sweet, Cist, t 89.
angustatum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 218.—Alger.

angustifolium, Peis. Syn. ii. 79—variabile.
annuum, Fisch. ex Steud. Norn. ed. II. i. 733 = villosum.
anthjirum, Stend. 1. c. = nmbellatam.
apenninum, Boiss. Fl. Orient, i. 445 = pnlverulentum.
apenninum, DC. Fl. Fr. iv. 824 - polifolium.
apenninum. Mill. Card. Dict.ed. VIII. n. 4=variabile.
apertum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 219.—Alger.
arabicum, *Per*. Syn.* ii. 80.—Arabia.
arcuatum, Presl, Fl. Sicul. i. 128-glaucum.
arenicola, *Chapm. Fl. S. U. St.* 35.—Am. bor.
argenteum, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 20.—Mexic.
artense, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 178.—N.Caled.
aspernm, *Ldg. ex Dun. in DC. Prod.* i. 288.—Hispan.
assurgens, Duf. ex Willk. Ic. PI. Hup. ii. 92 - intermedium,
astylum, *Mof. b[1] Sesse, ex Dun. in DC. Prod.* 1.284.—Mexic.
atriplicifolium, *WUld. Enum. Hort. Berol.* 569—Hispan.
aureum, Thih ex Pen. Syn. ii. 79-hirtum.
baeticum, Hort. Matr. ex Dun. in DC. Prod. i. 281 = hirtum.
barbatum, Pere. Syn. ii. 79 = variabile.
barbatum. Sweet, Cist. t. 73 = vulgare.
Barrelieri, Tenore, Prod. Fl. Neap. 31=thymifolium.
Berterianum, Bertol. Fl. Ital. v. 387-vulgare.
bicolor, Presl, Fl. Sicul. i. 128-glaucum.
biseriale, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 218.—Alger.
Bourgaeanum, Nym. Syll. 223 = Cistus Bourgaeanus.
brasiliense, *Pers. Syn.* ii. 77.—Bras.
brevipes, Boiss. & Kcut. Pugill. Nov. PI. 13=guttatum.
Bremeri, Planch, in Hook. Lond. Toura. Bot. iii. (1844) 618 = guttatum.
Broussonetii, *Dun. in DC. Prod.* i. 279.—Ins. Teneriff.
bupleurifolium, *Dun. I. c.* 270.—Hispan.; Lusitan.
cahiricum. Stead. Norn. ed. II. i. 788-kahiricum.
calcareum, Jord. Gr. Jard. Grenoble (1849), 16 = polifoliam.
calycinum. *Dun. in Mém. Acad. Montp. Sect. Sc.* (1847) 4.—Reg. Mediterr. occ.
calycinum, Willd. Enum. Hort. Berol. 570 - H. Fumana.
canadense, *Michx. Fl. Am.* i. 808.—Am. bor.
canariense, *Pers. Syn.* ii. 78.—Afr. bor. occ.; Ins. Canar.
candidum, Sweet, Cist. t. 25 = ocymoides.
canescens, Moench, Meth. Suppl. 75 — canariense.
canescens. Sweet, Cist. t. 51-variabile.
canum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 444.—Europ.; As. Min.
canum, Dun. in DC. Prod. i. 277-vineale.
capitatum, *Nutt. ex Engelm. (3" Cray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1847) 212.—Am. bor. occ.
Caput-felis, *Boiss. Elench.* 16.—Hispan.
carolinianum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 307.—Am. bor.
Chamaedstus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = vulgare.
cheiranthoides, Pers. Syn. ii. 76=alyssoides.
ciliatum, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 6 = Morisianum.
ciliatum, *Pers. Syn.* ii. 76.—Hispan.
ciliatum, Pourr. ex Nym. Consp. 72=umbellatum.
cinerascens, Pourr. ex Nym. 1. c. -occidentale.
cinerenm, *Pers. Syn.* ii. 76.—Hispan.
cistifolium. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9 = variabile.
clandestinum, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 727=aegyptiacum.
Clansonis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 221.—Alger.
confertum, Dun. in DC. Prod. i. 274-canariense.
«m/«*«m, Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 102.1.131A - Leppii.
confusum, Sweet, Ciit. t. 91 — pulverulentum, *Willk.*
contortum. Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 724-villosum.
contrtnersum, F. SchultZj Fl. Palat. 60 = pulverulentum, *Willk.*
Cordi, *Rupr. Fl. Cauc.* 141.—Reg. Caucas.
coriaceum, Pers. Syn. ii. 76 = Hibbertia coriacea.
corymbosum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 307.—Am. bor.
corymbosum, Pursh, Fl. Am. Sept. 363=canadense.
Coulteri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 323.—Am. bor. occ.
crassifolium, Dun. ex Nym. Consp. 75-H. Sexte.
crassifolium, *Pers. Syn.* ii. 77.—Hispan.
crispatum, Boiss. *Sc* Reut. Diagn. Ser. II. i. 51 - halimifolium.
crispulum, Nym. Consp. 72, sphalm. — praec.
croceum, Pers. Syn. ii. 79=glaucum.
croceum, Tenore, Syll. App. 662-vulgare.

HELIANTHJEMUM :—

cupreum, Sweet, Cist t. 66= variabile.
dagestanicum, *Rupr. Fl. Cauc.* 143.—Reg. Caucas.
deulinatum, *Moench, Meth. Suppl.* 75.—Hab.?
denticulatum, Thib. ex Pen. Syn. ii. 78 «= salicifolinm.
desertorum, *Willk. Ic. PI. Hisp.* ii. 137.—Hispan.
dichotomum, *Pers. Syn.* ii. 77.—Hispan.
dichroum, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 633=vineale.
discolor, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 217.—Alger.
distachyos, *Moench, Meth. Suppl.* 76.—Lusitan.
diversifolium, Sweet, Cist. t. 96 = variabile.
dubium, *Pourr. ex Nym. Consp.* 76.—Hispan.
echioides, *Pers. Syn.* ii. 77.—Hispan.
Ehrenbergii, Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 99. t. 128-Lippii.
ellipticum, Pers. Syn. ii. 78=Lippii.
elongatum, Pers. 1. c. 76 = alyssoides.
eremophilum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 350.—Alger.
ericoides, Dun. in DC. Prod. i. 274 = H. Fumana.
eriocaulon, Dun. 1. c. 271=guttatum.
eriocephalum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 851.—Alger.
eriosepalum, *Sweet, Cist.* t. 76.—Europ. austr.
fasciculatum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 22.—Afr. austr.
floribundum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 223.—Alger.
foetidum, Pers. Syn. ii. 79=variabile.
Fontanesii, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* 15.—Alger.
formosum, *Dun. in DC. Prod.* i. 268.—Lusitan.
fugaceum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 19 = salicifolium.
fugax, Dun. in DC. Prod. i. 284 - salicifolium.
Fumana, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 6.—Reg. Mediterr.
fumanioides, Desf. ex Dnn. in DC. Prod. i. 275=praec.
fumanum, Moench, Meth. 233 - H. Fumana.
germanicum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 - variabile.
getulum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 858.—Alger.
glabellum, Schur, Enum. PI. Transs. 75=italicum.
glabriusculum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 505.—Hungar.
glandulosum, *Presl, in Oken, Isis,* xxi. (1828) 276.—Ins. Creta.
glaucum, *Pers. Syn.* ii. 78.—Reg. Mediterr. occ.
glaucum, Sweet, Cist. t. Ill—canariense.
globuiariaefolium, *Pers. Syn.* ii. 77.—Lusitan.
glomeratum, *Lag. ex DC. Prod.* i. 269.—Mexic.
glutinosum, *Pers. Syn.* ii. 79.—Reg. Mediterr.
gorgoneum, *Webb, in Hoot. Niger Fl.* 102.—Ins. Cap. Virid.
graecum, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. i. 52 = vulgare.
grandiflorum, DC. Fl. Fr. iv. 821-vulgare.
Guiraoi, *Willk. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 86.—Hispan.
guttatum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 18.—Reg. Mediterr.
halimifolium, *Pers. Syn.* ii. 75.—Reg. Mediterr.
halimioides, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 221.—Alger.
Heerii x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 73.—Europ.
heterodoxum, Dun. in DC. Prod, i, 270=guttatum.
heterophyllum, Schur, Enum. PI. Transs. 77-vulgare.
heterophyllum, Steud. Norn. ed. II. i. 734=ocymoides.
hirsutissimum, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 95.—Chili.
hirsutissimum, Willk. Ic. PI. Hisp. 1106 - halimifolium.
hirsutum, Dun. in DC. Prod. i. 284-variabile.
hirtum, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 14; *Pers. Syn.* ii. 79.—Hispan.
hispidum, Dun. in DC. Prod. i. 282=hirtum.
hispidum, Tenore, Syll. 260=polifolium.
hymettium, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. II. i. 52 = rubellum.
hyssopifolium, Tenore, Cat. Hort. Neap. (1819) 48 = polifolium.
ibericum, Desf. ex Steud. Norn. ed. II. i. 734 - arabicum.
imbricatum, Lag. ex Dun. in DC. Prod. i. 270 — guttatum.
incanum, Moench, Meth. Suppl. 76—variabile.
inconspicuum, Thib. ex Pers. Syn. ii. 77=guttatum.
inflatum, Moench, Meth. 283—aegyptiacum.
intermedium, *Thib. ex Pers. Syn.* ii. 78.—Hispan.; Lusitan.
involucratum, Pen 1. c. 76 - alyssoides.

HELIANTHEMUM :—

italicum, Gren. *8c* Godr. Fl. Fr. i. 171-montanom.
italicum, *Pers. Syn.* ii. 76.—Europ. austr.
italicum, Tenore, Fl. Nap. iv. 316 = canum.
Jacquini, Willk. in Ardoino, FL Alp. Mark. 49 » Morisianum t
juniperinum, Lag. ex Dnn. in DC. Prod. i. 275-thymifolium.
juniperinum, Schloss. ex Nym. Consp. 76 — procumbens.
kahiricum, Delile, Fl. Egypte, 237.—Afr. hot.; Arab.
Kotsuhyanum, *Boiss. Diagn.* Ser. IL i 63.—Syria; Mesopot.
Krockeri, Steud. Norn. ed. I. 894=variabile.
latve. Pen. Syn. ii. 78 = glutinosum.
laeve, Reichb. ex Nym. Consp. 76 =thymifolium.
laevigatum, Schur, Enum. PI. Transs. 77-vulgare.
laevipes, *Pers. Syn.* ii. 76.—Reg. Mediterr. occ
taevipes, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1628) 275=glandulosum.
Lagascae, Dnn. in DC. Prod. i. 281 -hirtum.
lanceolatum, Steud. Norn. ed. L 894 = Hibbertia coriacea.
lanceolatum, Sweet, Cist. t. 100=variabile.
Langei, Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 72-globulariaefolium.
lanuginosum, *Spreng. Syst.* ii. 589.—Afr. bor.
lasianthum, Pen. Syn. ii. 76=alyssoides.
lasiocalycinum, Boiss. & Rent. Diagn. Ser. II. i. 60 ** halimifolium.
lasiocarpum, Desf. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II-vi. (1836) 861^-ledifolium.
lavandulaefolium, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 18; *DC. Fl. Fr.* iv. 820.—Reg. Mediterr.
lavandulaefolium, Sieber, ex Presl, in Oken, Ins, xxi. (1828) 274 = Lippii.
lavandulaefolium, Tenore, Fl. Nap. i. 298 - polifolium.
ledifoUum,A/iH. *Gard. Did.* ed. VIIL n. 20; *Moench, Meth.* 233.—Enrop. austr.
ledifolium, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274=retrofractum.
ledifolium, Spach, Hist Veg. Phan. vi. 17-villosum-*Ledon,* Zeyh. ex Steud. Norn. ed. II. i. 784-Cistos glaucus.
leptophyllum, *Dun. in DC. Prod.* i. 279.—Hispan.
leucanthum, *Ehrenb. ex Willk. Ic. PI. Hisp.* ii. 160.—Hispan.
levipes, Moench, Meth. 232, vide laevipes.
Libanotis. Dnf. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 48. - Bourgaeanus.
Libanotis, Guss. Cat. Hort. Boccad. 30 = Cistus Clusii.
Lihanotis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 570.—Lusit.; Afr. bor.
libycum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 852.—Alger.
lignosum, Sweet, Cist. t. 46 = H. Tuberaria.
lineare, Pers. Syn. ii. 78-variabile.
linearifolium, Moench, Meth. Suppl. 75-variabile.
Lippii, *Pers. Syn.* ii. 78.—Reg. Medtterr.
lucidum, Hornem. Hort. Hafn. ii. 498-variabile.
lunnlatum, *DC. Fl. Fr.* iv. 816.—Alp. Pedem.
lusitanicum, Mill: Gard. Diet. ed. VIIL n. 16 ' variabile.
luteum, HelL Fl. Wirceb. i. 350-variabile.
macranthum, Schnr, Enum. PI. Transs. 76= vulgare.
macranthum, Sweet, Cist, t 103-variabile.
macrosepalum, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc xv>-(1877) 346-guttatum.
majoranaefolium, DC. Fl. Fr. vi. 625-hirtum.
marifolium, Bess. Enum. PI. Volh. 22 = oelandicom.
marifolium, Mill. Gard. Diet. ed. VIE n. 24; D*'-Fl. Fr. iv. 817=vineale.
maritimum, *Pomel, Nouv. Mat. FL AIL* *w-~~ Alge
medtanT, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natura.* $• (1852) 85.—Transsyl.
mexicanum, *Steud. Norn.* ed. II. i. 735.—Mexic.
micranthum, Duf. ex Nym. Consp. 73 ~ intermedium-micranthum, *Spreng. Syst.* ii. 588.—Afr. bor.
microcarpum, Coss. ex Boiss. Fl. Orient, i. *" ledifolium.
microphyllum, Sweet, Cist.t. 96-ocymoides.
Milleri, Sweet, L c. t. 101 -variabile.
minutum, Schlecht. *ex* Willk. Ic. PI. Hisp. i>-[91], salicifolium.
molle, *Pers. Syn.* ii. 76.—Hispan.
montanum, *Vis. Fl. Dalmat.* iii. 146.—Dalmatia.
Morisianum, *Bertol. Fl. Ital.* v. 374.—ItaL

HELIAJ5TTHEMTTM :—
mucronatum, Dun. in DC. Prod. i. 274 = canariense.
multifiorum, Salzm. ex Dnn. in Mim. Acad. Montp. (Sect.-Sc.) i. (1847) 2 = halimifolium.
multifiorum, Ziz, in Opiz, NotnraL xi. (1826) 486 = vulgare!
multiplex, Steud. Nom. ed. II. i. 736 - variabile.
mutabile, Moench, Meth. 234-variabile.
mutabile, Willk. Ic PI. Hisp. ii. 115-vulgare.
nebrodense, Heldr. in Guss. FL Sic. Syn. ii. 18 - vineale.
nilotieum, Moench, Meth. 28S=ledifolium.
nitidum, *Clem, in Atti Ten,. Riun. Sc. Ital.* 517.—Dalmat.
nudicaule, Dun. in DC. Prod. i. 279 -glaucum.
"ummulariae/olium, Sprun. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 141 = rabellum.
nummularium, Guss. Cat. Hort. Boccad. 80 - nibellum.
nummularium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 12 - vulgare.
obcordatum, *Mof. V Sesse, ex Dun. in DC. Prod. i.* 284.-Mexic.
obovatum, Dun. 1. c. 277 = montanum.
obovatum, Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 149-Rossmaessleri.
ooscurum, Fere. Syn. ii. 79-vulgare.
obtusatum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 220.—Alger.
obtnsifolium, *Dun. in DC. Prod.* i. 281.—Ins. Cyprns.
occidental, *Nym. Consp.* 72.—Hispan.
onmifolium, Pourr. ex Nym. Consp. 72=seq.
ocymoides, *Pers. Syn.* ii. 76.—Hispan.; Lusitan.
o'landicum, DC. M. Fr. iv. 817 = italicum.
"landicum, Fries, Novit. Fl. Suec. ed. II. 168 = canum.
otlandicum, Pers. Syn. ii. 77 =cinereum!
oelandicum, Sw. in Sv. Bot. vii. t. 499 = vineale.
oelandicum, *Wahlenb. Fl. Suec.* 833.—Europ.
olfae/olium, Hort. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 66 = lepidotum.
oligophyllum, *Dun. in DC. Prod.* i. 284.—Palaest
onganifolium, *Pers. Syn.* ii. 76.—Hispan.
"nganifolium, Pourr. ex Nym. Consp. 72 - ocymoides.
""Uum, Dun. in DC. Prod. i. 280^vulgare.
Pa'lens, *Kit. in Rochel, PI. Banat. Rar. Ind.* nomen. —Bannat.
Paniculatum, Boiss. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 140 - rnbellum.
Piniculatnm, *Dun. in DC. Prod.* i. 278.—Hispan.
pannosum, *Boiss. Elenck.* 15.—Hispan.
Papillare, *.#„•„. Voy.Bot. Espagne.* ii. 63.1.14.—Reg. Mediterr. occ.
topillosum. Walp. Rep. i. 208-praec
P«Pyraceiim, *Saeet, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 735 (Quid!)._Eorop.
Patens, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 20.—Mexic.
PMnlnm, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 364.-Alger.
Pttuiorme, *Pomel, I. c.* 353.—Alger.
fntcillatum, Thib. ex Dun. in DC. Prod. i. 277 - oelandicnm.
tergamaceum, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 850 = T»gatum»
Pftiolatum, *Thib. ex Pers. Syn.* ii. 77.—Hispan.
P? ifernm, *Boiss. Elenck.* 17.—Hispan.
P'loselloides, Billot, ex Nym. Consp. 75=vineale.
Woselloides, Dnn. in DC. Prod. i. 284=cinereum.
P'loseUoides, Pourr. ex Nym. Consp. 75 - paniculatum.
pilosum, Guir. ex Willk. Ic. PL Hisp. ii. 133 -= Guiraoi.
*pilosu**, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 - ledifolium.
pilosum, Pers. Syn. ii. 79-variabile.
plantagineum, Pers. 1. c, 77-gutUtnm.
polifolium, DC. Fl. Fr. v. 828.—Europ.
polifolium, Gren. & Godr. Fl. Kr. i. 170 = pulverulenturn.
polifolium Hook. *Sc* Am. Bot Beech. Voy. 410 = elomeratum.
to'tfolium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 11; Pen. Syn. H.-«0 = variabile.
Polifolium, Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 151 - „ «Pitatum.
S°ollen". *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1868) 5O5.-Hungar.
P°l y»nthum, *Pers. Syn.* ii. 78.-Afr. bor.
P^yealaefolium, *Sweet, Cist.* t. ll.-Bras.
Wymorphum, Pourr. ex Willk. Ic. PI. Hisp. iu 124 - asperum.
PWeridianum, *Dun. in Mem. Acad. Montf. {Sect. Sc-) »•* (1847) e.-Alfier.

HELIANTHEMXTM .—
praecox, Salzm. ex Dun. in DC. Prod. i. 271 = guttatum.
procumbens, *Dun. I. c.* 275.—Tauria.
prostratum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 854.—Alger.
pulchellum, Sweet, Cist. t. 74-cinereum.
pulverulentum, DC. Fl. Fr. iv. 823 - apenninum.
pulverulentum, Pers. Syn. ii. 80 -» variabile.
punctatum, Pen. 1. c. 77—guttatum.
punctatum, Willd. Ennm. Hort. Berol. 570-salicifolium.
racemosum, Dun. in DC. Prod. i. 281 = virgatum.
racemosum, Pers. Syn. ii. 79 = variabile.
ramuliflorum, Michx. Fl. Bor. Am. i. S07=canadense.
refiexum, Moench, Meth. 238 = /ariabile.
refractum, Frivald. ex Hampe, in Flora, xx. (1837) I. 227'Saliiifoli<im.
retrofractum, F'ivald. ex Nym. Consp. 78 — salicifolium.
retrofractum, *Pers. Syn.* ii. 78.—Hispan.
rhodanthum, Dun. in DC. Prod. i. 282* variabile.
Rhodax, Steud. Nom. ed. II. i. 736 - cinereum.
Kochelii, *Kit. in Linnaea,* xxxli. (1863) 504.—Hungar.
roseum, Bare, ex Nym. Consp. 74 - polifolium.
roseum, DC. Fl. Fr. iv. 822 =vulgare.
roseum, Ehrenb. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 106 = vesicarium.
roseum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 17.—As. Min.
rosmarini/olium, Kunth, ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 135 - lavandulaefolium.
rosmarini/olium, Lag. ex DC. Prod. i. 267 — H. Libonotis.
rosmarini/olium, Mart, ex Steud. Nom. ed. II. i. 735 = variabile.
rosmarini/olium, Presl, Symb. Bot. i. 32 = Lippii.
rosmarini/olium, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 364 - canadense.
Rossmaesslerii, *Willk. in Linnaea,* xxx. (1859-60) 87. —Hispan.
rotatum. *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 42, nomen.—Hab. ?
ratundi/olium, Boiss. ex Willk. Ic PI. Hisp. ii. 141 - nibellum.
rotundi/olium, Dun. in DC Prod. i. 277 — paniculatum.
rubellum, Guir. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 148 = paniculatum.
rubellum, Moench, Meth. Suppl. 74-salicifolium.
rubellum, *Presl, Delic. Prog.* 25.—Reg. Mediterr. occ.
ruficomum, *Spreng. Syst.* ii. 689.—Afr. bor.
rugosum, Dun. in DC. Prod. i. 268 - nlyssoides.
rugosum. Sweet, Cist. t. 65 - ocymoides.
rupicolum, Schur, Enum. PI. Transs. 77-vulgare.
rupifrngum, *A. Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr,* xviii. (1868) 18.—Europ. austr.
salicifolium, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 21; *Pers. Syn.* ii. 78.—Europ. austr.; Oriens.
sampsuchi/olium. Mill. 1. c. n. 7 = variabile.
sanguineum. Host, ex Willk. Ic PI. Hisp. ii. 90= salicifolium.
sanguineum, Lag. ex Dun. in DC. Prod. i. 273 - retrofractum.
Savii, Bertol. Amoen. Ital. 78 - arabicum.
scabrosum, Pers. Syn. ii. 76=alyssoides.
scariosum, Duf. ex Willk. Ic. PL Hi.p. ii. 126 = asperum.
scopariura, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am. i.* 152. —Am. bor. occ.
scorpioides. Coss. Notes Crit. ii. 29-echioides.
Seguierii, Pollini, Viagg. Lag. Garda, 98-vulgare.
semiglabrum, *Badaro, in Moretti, Bibl. Ital.* i. 14. — Sardin.
semiglabrum, Moris, Fl. Sard. i. 202 - Morisiannm.
semistipulatum, Lag. ex Dun. in DC. Prod. i. 271 " guttatum.
sericeum, Pourr. ex Nym. Consp. 72 - alyssoides.
serpylli/olium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 - vulgare.
Serrae, Cambess. in Me"m. Mus. Par. xiv. (1827) 216. t. ll = origanifolium.
serratum, Merat, Fl. Par. 206; ed. II. 391 =- guttatum.
sessilifiorum, Pen. Syn. ii. 78-Lippii.
Sexte, *Lag. ex Dun. in DC. Prod. i.* 278.—Hispan.
Sherardi, Steud. Nom. ed. II. i. 786-roseum.
Siberi x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Get, Granb. II. xxiii-xxiv. (1880) 73.—Europ.
sicalnm, *Tineo, PL Rar. Sicil.* 44.—Sicilia.
soongaricum, *Schrent, Enum. PI. Nov.* 94.—Soongaria.
Spachii, Nym. Syll. 226-H. Fumana.
spartioides, *Presl, Rel. Haeni.* ii. 95.—Chili.
splendens, Pourr. ex Nym. Consp. 72 — H. Libanotis.
squamatum, *Pers. Syn.* ii. 78.—Hisp.; Afr. bor.
Stabianum, Heldr. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 114 = vulgare.
Stabianum, Tenore, Fl. Nap. iv. 818-glaucum.
staechadi/olium, Auct. vide *stoechadi/olium.*
stellatum, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 178 = glaucum.
stellulatum, *Link, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 735.—Hnb.1
stipulare, *Ehrenb. ex Willk. Ic. PI. Hisp.* ii. 160.—Hispan.
stoechadi/olium, Pen. Syn. ii. 79—glancum.
stoechadi/olium, Tenore, Fl. Nap. i. 298 - polifolium.
stoechadi/olium, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 505 = lavandulaefolium.
stramineum, Sweet, Cist. t. 93= variabile.
strictum, Pers. Syn. ii. 79—virgatum.
strigosum, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 57 - cincreum.
sulphureum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 89 = variabile.
surrejanum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 16 = variabile.
syriacum, Uoiss. Diagn. Ser. I. viii. 49 - umbellatum.
syriacum, Ehrenb. ex Willk. Ic. PI. Hisp. ii. 164 - arabicum.
syrticum, *Spreng. Syst.* ii. 593.—Afr. bor.
tauricum, *Rupr. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1851); *ex Bull. Phys.-Math. Acad. Pttersb.* xiv. (1866) 236.—Tauria.
tauricum. Sweet, Cist. t. 106-variabile.
Teneriffae, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1866) 561. —Ins. Canar.
tenuicaulis, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ital.* 222.—Alger.
tereti/olium, Thib. ex Willk. Ic. PL Hisp. ii. 123 - hirtum.
terni/otium, Colm. & Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 230 - alyssoides.
thessalum, Uoiss. *Sc* Orph. ex Orph. in Bull. Congr. Bot. Pétersb. 1869 (1870) 186 - oelandicum.
Thibaudi, Pen. Syn. ii. 79 - lavandulaefolium.
thymifolium, *Pers. I. c.*—Hispan.; Lusit.
tomentosum, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 663; Dun. in DC. Prod. i. 279-vulgare.
tomentosum, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 177 = glaucum.
triflorum, Blanco. Fl. Filip. ed. II. 809 - Archytaea Vahlii.
tripetalum, Miegev. in Bull. So?. Bot. Fr. xiv. (1867) 144 = salicifolium.
tripetalum, Moc. *8c* Scsse, ex Dun. in DC. • Prod. i. 284 = LecheaSkinncri.
Tuberaria, Hook. Bot. Mag. t. 4873-globulariaefolia.
Tuberaria, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 10.—Kef. Mediterr.
tunetanum, *Coss. b* Kralik, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 68.—Afr. bor.
umbcllntum, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Reg. Mediterr.
umbellatum, Presl, Fl. Sic. i. 118 = Cistns Clusii.
variabile, *Spach, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IL vi. (1886). 2, 362.—Reg. Mediterr.
variegatum, Sweet, Cist. t. 38 - variabile.
velutinum, Jord. Obs. I'l. Crit. iii. (1846) 85-polifolium.
velutinum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 351.—Alger.
ventosum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 60.—Arab.
venustum, Sweet, Cist. t. 10=variabile.
versicolor, Sweet, I. c. 26 = variabile.
vertieillatum, Link, Mandb. ii. 865 = umbellatum.
vesicarium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 80.—Acgypt.; Palest,
villosissimum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Ail.* 216.—Alger.
villosum, *Thib. ex Pers. Syn.* ii. 78.—Hispan.; Armen.
vinenle, *Pers. 1. c.* 77.—Europ.
violnceum, *Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1865) 91.—Hispan.
violace-im.Pen. Syn. ii. 78-pllosum.
virens, Link, Handb. ii. *Sti-viride.*
virgatum, *Pers. Syn.* ii. 79.—Keg. Mediterr. occ.
virgatum, *Willk. Ic. PI. Hisp.* ii. 106. t. ISS.-' Inn. Balear.
viride, Tenore, Prod. FL Nap. p. xxxi-^H. Fumana.
viscarium, *Boiss. V Reut. Pugill. PL Nov.* 14.- Aiger.
viscidulum, *Boiss. Elench.* 15.—Hispan.

HELIANTHEMUM:—
viscidulum, Stev. ex Dun. in DC. Prod. i. 275 = arabicum.
visddum, Pomel.Nonv. Mat. Fl. Atl. 217 — glntinosnm ?
Vivianii, *Pollini, Fl. Veron.* iii. 799.—Ital.
vulgare, *Gaertn. fruct.* i. 871. t. 76.—Europ.
vulgare, Gnss. ex Nym. Consp. 74=glaucum.

HELIANTHOSTYLI8, Baill. Adansonia. xi. (1875) 299. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 874.
Sprucei, *Baill. 1. c*—Am. trop.

HELIANTHUS, Linn. Syst. ed. I (1785). *COMPOSITAE,* Becth. & Hook. f. ii. 876.
CKRYSIS, Renealm. ex DC. Prod. v. 585 (1886).
DIOMEDEA, Bertol. ex Colla, in Mem. Ace. Torin. xxxviii. (1835) 35. t. 31.
DISCOMELA, Rafin. Neogenyt 3 (1825).
ECHINOMERIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. 356 (1841).
FLOURENSIA, DC. Prod. v. 592 (1836).
HARPALIUM, Cass. in Bull. Soc.Philom. (1818) 141.
LINSECOMIA, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 458.
VOSACAN, Adans. Fam. ii. 130 (1763).
altissimus, DC. Prod. v. 590=strumosus.
altissimus, Linn. Sp. PI. ed. II. 1278=giganteus.
amplexicaulis, *DC. Prod.* v. S89.—Mexic.
angustifolius, *Linn.Sp. PI.* 906.—Am. bor.
annuus, *Linn. 1. c.* 904.—Am. bor.
apetalus, Leconte, ex Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 354 - H. Radula.
argentens, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 221. t. 376.—Ecnador.
argophyllus, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 318.—Texas.
aristatus, Ell. Sketch, ii. 428=Actinomerisnudicaulis.
asper, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 737 = rigidus.
atrorubens, I-am. Encyc. iii. 86-laetiflorus.
atrorubens, *Linn. Sp. PI.* 906.—Am. bor.
atrorubens, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 140, partim=rigidus.
anreus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 224.—Ecnador.
Besseriana, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 376-Flourensia Besseriana.
Bolanderi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 544—scaberrimus.
brasilicus, *Veil. Fl. Flum.* viii. t 146.—Bras.
buddleiaeformis, DC. Prod. v. 688=Viguiera buddleiaeformis.
buphthalmoides, Hort. ex DC. 1. c. 551 = Heliopsis buphthalmoides.
califomicus, *DC. I. c.* 589.—Am. bor. occ.
califomicus, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 325-Nnttallii.
calvus, *Sck. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 528, nomen.—Bolivia.
canescens, Juss. ex DC. Prod. v. 591=incanus.
canescens, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 140 = mollis.
carolinianus. Hill, Veg. Syst. xvi. 56—giganteus!
cernuus, Benth. & Hook, f. Gen. ii. 376 = Flourensia cernua.
ciliaris, *DC. Prod.* v. 587.—Mexic.
cinerens, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 324.—Texas,
cirrhoides, *Lehm. in Hamb. Garten*,* viii. (1862) 458.—Hab. i
cochinchinensis, *Pers. Syn.* ii. 476.—Cochinoh.
colossus, *Kunte, in Otto (f Dielr. Allg. Gartens,* vii. (1839) 43.—Am. bor.
eordatus, Lam. ex DC. Prod. v. 551 = Heliopsis buphthalmoides.
cornifolius, *H.B.tfK. Nov. Gen. et Sp.* iv. 223.—Mexic.
corymbosus, Poepp. ex DC. Prod. v. 592= Viguiera Poeppigii.
crassifolius, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 367 = rigidus.
crinitus, Steud. Nom. ed. II. i. 737-giganteus.
cucumerifolius, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 319 = debilis.
dealbatus, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. H. 280.—Calif,
debilis, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 867.—Am. bor.
decapetalus, Darl. FL Cestr.ed. II. 483 = strumosus.
decapitatus, *Linn. Sp. PI.* 905.—Am. bor.
dentatus, Cav. Ic. iii. 10. t. 220 = Viguiera dentata.
diffusus, *Moench, Meth. SuppL* i59.—Hab. ?
diffusus, Sims, Bot. Mag. t. 2020=rigidus.
divaricatus, *Linn. Sp. PI.* 906.—Am. bor.

HELIANTHUS.—
divaricatus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 141 = parviflorus.
diversifolius, EIL Sketch, ii. 423=hirsutus.
doronicoides, *Lam. Encyc.* iii. 84.—Am. bor.
doronicoides, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 327, partim = tnberosus.
Douglasii, *Torr. V Gray, 1. c.* 382.—Am. bor. occ.
Dvmellianus, M. A. Curt, in Am. Journ. Sc. xliv. (1843) 82 = occidentalis.
erythrocarpus, Bartl. in Linnaea, xiv. (1840) Litt. 125 =annuus.
esculentus, *Rottb. in Act. Litt. Univ. Hafn.* i. (1778) 298.—Guiana,
esculentus, *Wares, in Otto & Dietr. Allg. Garten*,* xx. (1852) 298.—Bolivia.
excelsus, Willd. Sp. PI. iii. 2248=Viguiera excelsa.
exilis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 545.—Calif,
floridanus, *A. Gray, ex Chapm. Fl. S. U. St. Suppl.* 629.—Florida.
frondosus, Linn. Cent. Fl. i. 28; Amoen. Acad. iv. 290=decapetalus.
giganteus, Cav. Ic. iii. 10. t. 219 = Viguiera excelsa.
gigantens, *Linn. Sp. PI.* 905.—Am. bor.
giganteus, Lour. Fl. Cochinch. 509 (sp. ignot.).—China.
Gigas, Michx. Fl. Bor. Am. ii 141=giganteus.
glutinosus, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 38 = thurifer.
gracilentus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 77—Calif.
gracilis, *Bertol. Misc. Bot.* vii. 41.—Am. bor.
grandiflorus, Juss. ex Pers. Syn. ii. 475 = decapetalus.
grandiflorus, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. i. 737 = annuus.
grandiflorus, *Wood, Am. Bot. Flor.* 178.—Am. bor.
grosse-serratus, *Martins, Sel. Sent. Hort. Lav.* (1889) ; *ex Linnaea,* xiv. (1840) *Litt.* 133.—Am. bor. occ.
grosse-serratus, Pohl, ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 174-cWulffia stenoglossa.
herbaceus, *Veil. Fl. Flum.* viii. 145.—Bras.
heteropappus. Gill, ex Hook. *Sc* Am. in Hook. Jonrn. Bot. iii. (1841) 814 = Viguiera Gilliesii.
heterophyllns, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 74.—Am. bor.
keterophyllus, Short, Cat Kentuck. PI. SuppL 8-occidentalis.
hirsutus, *Rafin. Ann. Nat.* (1820) 14.—Am. bor.
hispidulus, Ell. Sketch, ii. 419-hirsutus.
Hookeri, G. Don, in Loud. Hort. Brit 858=doronicoides.
Hookerianus, DC. Prod. v. ,590 -Wyethia angnstifolia.
jncanus, *Pers. Syn.* ii. 475.—Peruv.
indicus, Linn. Mant i. 117= annuus.
integrifolius, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 866 = petiolaris.
laciniatus, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. iv. (1849) 84.—Mexic.
laetifloras, *Pers. Syn.* ii. 476.—Am. bor. occ.
laevigatus, *Torr. If Gray, Fl. N. Am.* ii. 330.—Am. bor.
laevis, *Linn. Sp. PI. 906* = Heliopsis laevis.
laevis, Walt. Fl. Carol. 215=strumosus?
lancedlatus, *Meyen, Seise,* i. 811.—Chili.
lauri/olius, Benth. & Hook, £ Gen. ii. 376 = Flourensia laurifolia.
leiostemon, Rafin. ex DC. Prod. v. 588= divaricatus.
lenticularis, Dougl. in Bot. Reg. t. 1265=annnus.
Lindheimerianus, Scheele, in Linnaea, jcxii. (1849) 159 = debilis.
linearis, Cav. Ic. iii. 9. t. 218-Vigniera Iinearis.
lrfngeradiatus, *Bertol. Fl. Guatim.* 36.—Guatemala.
longi/olius, Hook. Fl. Bor. Am. i. 313=Wyethia angustifolia.
longifolius, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 671.—Am. bor.
macrocarpus, DC. PI. Rar. Jard. Gen. *T"* Not. 8-annuus.
macrophyllus, Willd. Hort. Berol. t. 70-strumosus.
Mandonii, *Sch. Bip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 525, nomen.—Bolivia.
Maximiliani, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1835) ; *ex Ann. Sc. Nat.* Sér. II. vi. (1836) 101.—Am. bor. occ.
membranifolius, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 18.—Gnian.
mexicanns, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 180.—Mexic.
micranthus, *Spreng. Syst.* iii. 618.—Mode.

TI"iaT.TATPPTTTTH;—
microcephalus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 829 = parviflorus.
micropkyllus, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iv. 220-Leighia microphylla.
missouriensis, Schwein. ex Nutt in Trans. Am. Phil-Soc. N. S. vii. (1841) 368=rigidus.
missuricus, Spreng. Nov. Prov. 21-rigidus.
mollis, *Lam. Encyc.* iii. 85.—Am. bor.
mollis, Willd. Sp. PI. iii. 2240-strumosus.
mulHfiorus, Hook. Fl. Bor. Am. i. 313 (excl. syn.) = annuus.
multiflorus, Linn. Sp. PI. 905=decapetalus.
neglectus, Otto, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. H. 279 -strumosns *vel* laevigatus.
Nuttallii, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 824.—Am. bor. occ.
occidentalis, *Riddell, Suppl. Cat. Ohio PI.* 13.—Am. bor.
oleifer, Wall. Cat. n. 3194 - Guizotia abyssinica.
Oliveri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 299.—Calif.
orgyalis, *DC. Prod.* v. 586.—Am. bor. occ.
ovatus, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1828) 16 = annuus.
Parishii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 7—Calif.
parviflorus, *Bernh. ex Spreng. Syst.* iii. 617.—Ambon
Parviflorus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 22* t. 378 = micranthus.
patens, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1821) *o"* petiolaris.
pauciflorus, *Nutt. Gen. Am.* ii. 177.—Louisiana.
pedunculatus, Hort. ex Link, Enum. Hort Berol- 352—rigidus}
peruvianus, *Klotasch, in Otto (f Dietr. Allg. Garten'-* iii. (1835) 369.—Peruv.
petiolaris, Hort. ex DC. Prod. v. 586 =annnns.
petiolaris, *Nutt. in Journ. Acad. Sc. Philad.* (1821) 115.—Am. bor. occ.
pilosus, Tansch, in Flora, xi. (1828) 502 = doronicoides.
platycephalus, Cass. in Diet. Sc. Nat. xx. 353 * annuus.
polycephalus, Cass. 1. c.=decapetalus.
praecox, Engelm. *Sc* Gray, in Bost. Toum. Nat Hi»-v. (1847) 221-debilis.
procumbens, *Pers. Syn.* ii. 475.—Peruv.
procumbens, *Rafin. Fl. Ludov.* 70 (Quid!).—Am. W-
prostratus, Willd. Sp. PI. iii. 2242 = tracheliifolius.
pubescens. Hook. Bot. Mag. t. 2778 = doronicoides.
pubescens, [Ker-Gawl. in] Bot. Reg. t 624=tomen-tosus.
pubescens, Vahl, Symb. Bot ii. 92=mollis.
pumilus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. (1841) 366.—Am. bor. occ.
pumilus, Pers. Syn. ii. 475= annuus.
quinquenervis, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (18* 247 = Helianthella quinquenervis.
quinqueradiatus, *Cav. Ic.* iii. 36. t. 272.—Mexic.
Radula, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* ii. 821.—Am. bor.
ramosissimus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIH. n. 8.—A* austr.
revolutus, *Meyen, Reise,* i. 311.—Chili,
rigidus, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 184.—Am. occ.
rivularis, Poepp. ex DC. Prod. v. 495=Leptocarpi rivularis.
nigosus, *Meyen, Reise,* ii. 45.—Peruv.
rugosus, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 728-Vfc< rogosa.
salicifolius, *A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartens.* ii. (1834) 887.—Am. bor.
sarmentosus, Rich, in Act. Soc. Hist Nat P"' * (1792) 112 (err. typ. 105)-Wulffia stenoglossa.
scoter, Pohl, ex Baker, in Mart Fl. Bras. vL I». =Wulffia stenoglossa.
scaberrimus, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 28.—Calif.
scaberrimus, Ell. Sketch, ii 423 = rigidus.
Schweinitzii, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 330.—* bor.
serotinns, *Tausch, in Flora,* xi. (1828) 504.—*&•*%.
silphioides, Nutt in Trans. Am. Phil. Soc. N. (1841) 366 » atrorubens.
sparsiflorus, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. * typ.)=seq.
sparsifolius, Ell. Sketch, U. 415=atrorubens.

HELIABTTHUS:—
spathiflatus. Ell. Sketch, ii. 421=tomentosus.
spedosus. Hook. Bot. Mag. t 3295-Tithonia speciosa.
squarrosus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 222. t. 877 = Viguiera linearis.
squarrosus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1811) 367-tomentosus.
striatns, *Safin. Atl. Journ.* 17 (Quid ?).—Am. bor.
stromosns, *Linn. Sp. PI.* 905.—Am. bon
strumosus, Willd. Sp. PI. iii. 2242-decapetalus.
subtuberosus, Bourg. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 276=gigantens.
tenellus, *Safin. Atl. Journ.* 17 (Quid!).—Am.bor.
tenuifolius, Ell. Sketch, ii. 420=decapetalus.
tephrodes, A. Gray, in Ton. Bot. Mex. Bound. 90 = Vigniera tephrodes.
tetragonus, Moç. ex DC. Prod. v. 576=Actinomens tetragona.
tetrapterus, Orteg. Hort. Matr. Dec. 74-Actinomeris tetraptera.
thnrifer, *Molina, Sagg. Chile,* 160.—Chili,
tomentosus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 141.—Am. bor.
trachelifolins, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 7 i *Willd. Sp. PI.* iii. 2241.—Am. bor.
tracheliifolius, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 98 = parvifforus.
tricuspis. Ell. Sketch, ii. 422=laetiflorus.
Wlobatus, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 352.—Mexic
hinerms, Hort. Madr. ex DC. Prod. v. 585=Viguiera excelsa.
**rinervis,* Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 18 (Quid ?).—Java.
triqueter, Orteg. Hort. Matr. Dec. 76 = Viguiera helianthoides.
truncates, Schwein. ex Ell. Sketch, ii. 416=divancatns.
tmxillensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 223.—Peruv.
tubaeformis, Nutt. Gen. Am. ii. 177-annuus.
tHoaeformis, Orteg. Hort. Matr. Dec. 181=Tithoma tobaeformis.
tuberosus, *Linn. Sp. PL* 905.—Am. bor..
*t*berosus,* Parry, in Owen, Rep. Minnesot. Surv. 614 = giganteus.
vniflorus, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 37 = Helianthella uniflora.
verbesinoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 221.—Peruv.
Vfcetinus, *Turra, ex Zang. in Atti Soc. Sc. Nat. Milan,* xi. 1868 (1869) 389.—Hab.»
""gatus, Lam. Encyc. iii. 85=giganteus.

HELICANDRA, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 198, » nota (1833 ?) - Farsonsia, R. Br. (Apocyn.).
"nensis, Hook. & Am. 1. c - P. Helicandra.

HELICANTHERA, Roem. & Schnlt. Syst. v. pp. x, 170 £1819) = HELIXANTHERA, Lour. = Loranthus, inn.

HELICHROA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825) - Eohinaoea, Moench (Compos.).
°'*«. *amoena, crocea, elatior, fusca (fwcato, M-* Joum. 150), *Linneana, purpurea, uniflora,* Kann. 1. c.=E. purpurea.

HELICHRTSUMC, Vaill. ex Linn. GSL ed. I. 2«0 (1787); Gaertn. Ftnct. ii. 404 (1791) *COUPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 809.
ACANTHOCLADIUM, F. Muell. Fragm. u. IBS (1860).
APHBLEX^D.Don, in Mem. Wera.Soc. v. (1826) 546.
ARGYROCLOTTIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat Most «xiv. (1851) 11. 84.
ARGYR0PHANES,Schlecht.inLinnaea,xx.(1847)6»B.
CHRYSOCEPHALUM, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 608.
CUDOCHAETA, DC. Prod. vi. 245 (1887).
CONANTHODIOM, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 2
EDMoNDiA^Cass. in Bull. Soc. PMlo"- («18) W; et in Diet. Sc. Nat. xiv. 252 (1819).
ELICHRYSUM, Toum. ex Linn. Gen. ed. I. 250 (1737).
»CHLOKIS, D. Don, in Mem. Wera. Soc. v. (1826) 648.

HEIiICHRYSUM:—
FAUSTULA, Cass. in Bull. Soc. Philotn. (1818) 140; et Diet. Sc. Nat. xvi. 251 (1820).
FREEMANIA, Boj. ex DC. Prod. vi. 218 (1837).
LAWRENCELLA, Lindl. Swan River App. 23 (1839).
LEPICLINB, Less. Syn. Comp. 296 (1832),
LEPISCLINE, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 31.
LEUCOSTEMMA, D. Don, in Mem. Went. Soc. v. (1826) 540.
MANOPAPPUS, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 677.
OZOTHAMNUS, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1816) 125.
PENTATAXIS, D. Don, in Mem. Wem. Soc. v. (1826) 560.
PETALOLEPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 138.
SWAMMKRDAMIA, DC. Prod. vi. 164 (1837).
TRICHANDRUM, Neck. Elem. i. 84 (1790), ex char.
XANTHOCHRYSUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1.199.
abyssinicnm, *Sch. Bip. ex Hochst. in flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 26, nomen; *et in Bot. Zeit.* iii. (1846) 174.—Afr. trop.
aciculare, *Balf.f. in Proc. Soy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 839.—Ins. Socotr.
acuminatum, DC. Prod, vi 188= bracteatum.
acuminatum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 223 = Gnaphalium acuminatum.
acutatum, *DC. Prod.* vi. 186.—Afr. austr.
adenocarpum, *DC. 1. c.* 180.—Afr. austr.
adenophorum, *F. Muell. in Trans. Vict.Inst.i.* (1855) 38.—Austral.
adnatum, *Benth. Fl. Austral,* iii. 628.—Austral.
adscendens, DC. Prod. vi. 185 = psilolepis.
adscendens, *Less. Syn. Comp.* 274.—Afr. austr.
affine, D. Don, ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 640 = Gnaphalium lutec-album.
affine, Less. Syn. Comp. 298 = argenteum.
alatum, Baill. Hist. PI. viii. 302, 314=Ammobium alatum.
aliicans, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 359 = Helipterum incanum.
albicans, Sieber, ex DC. Prod. vi. 198=datum.
algarbiensis, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 65 = H. Stoechas.
allioides, *Less. Syn. Comp.* 299.—Afr. austr.
alsinoides, *DC. Prci.* vi. 169.—Afr. austr.
alveolatum, DC. 1. c. 192=trilineatum.
ambigunm, *Presl, Fl. Sic.* p. xxix (Quid!).—Sicilia.
ambiguum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxiv. (1851) 1.195=Leptorhynchus ambiguus.
amorginum, *Boiss. V Orpk. Diagn.* Ser. II. v. 110.—Ins. Cyclad.
amplexicaule, *Baiter, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 185.—Madag.
anatolicum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 11 *= plicatum.
angustifolium, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 467.—Reg. Mediterr. or.
angustifolium, Pen. Syn. ii. 415=paniculatum.
angustifolium, Plan. Fl. Fan. Gallega, 270 = serotinum.
anomalum, *Less. Syn. Comp.* 303.—Afr. austr.
antennarium, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 632.—Austral.
anthemoides, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 484 - Helipterum anthemoides.
aphelexioides, *DC. Prod.* vi. 206.—Madag.
apiculatum, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 550.—Austral.
appendiculatum, *Less. Syn. Comp.* 308.—Afr. austr.
arachnoides, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 889.—Ins. Socotr.
arboreum, D. Don, in Mem. Wern. Soc. v. (1824) 550 = Anaxeton arboreum.
arenarium, *Moench, Math.* 675; *DC. Fl. Fr.* iv. 182.—Europ.; Reg. Caucas.
aretioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxiv. (1851) II. 79 = Bryomorphe Zeyheri.
argenteum, Andr. ex Steud. Norn. ed. II. i. 738 (740 cum cit. falsa) = paniculatnm.
argenteum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. 1821-22 (1824) 167 = retortum.
argenteum, *Thunb. Fl. Cap.* 662.—Afr. austr.
argyreum, Jord. & Four*. Brev. PI. Nov. fasc ii. 68 - italicum.
argyrocaule, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 612=dealbatum.
Argyroglottis, *Benth. Fl. Austral,* iii. 626.—Austral.

HEIiICHBTSUM:—
argyrophyll'um, *DC. Prod.* vi. 186.— Afr. austr.
argyrbsphaerum, *DC. I. c.* 174 —Afr. austr.
armenium, *DC. 1. c.* 183.—As. Min.; Persia,
arlemisioides, *Boiss.* b[1] *Haussk. in Boiss. Fl. Orient.* iii. 287.—Persia.
asteroides, DC. Prod. vi. 194 = Ixiolaena viscosa.
Aucheri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 28.—As. Min.; Persia.
aurantiacum, Boiss. *Sc* Huet, Diagn. Ser. II. vi. 105 = lavandulaefolium.
auriculatum, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 18!) = stellatum.
auriculatum, *Less. Syn. Comp.* 811.—Afr. austr. et trop.
auronitens, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 680.—Afr. austr.
Ayersii, *F. Muell. Fragm.* viii. 67.—Austral,
baccharoides, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 633.—Austral.
Backhousii, *F. Muell. ex Benth. 1. e.* 632.—Austral.
Banksii, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 188 = bracteatum.
barbellatum, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi = cespitosum.
Barrelieri, Nym. Consp. 381 = H. Stoechas.
Baxteri, *A. Cunn. ex DC. Prod.* vi. 193.—Austral.
Becklerii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 627.—Austral.
Belangerianum, DC. Prod. vi. 184 = leucocephalum.
bellidioides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1911.—N. Zel.
biafranum, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 202.—Afr. trop.
tricolor, Lindl. Bot. Reg. 11814 = bracteatum.
Ucolorum, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 215 = Helipterum incanum.
Bidwillii, *Benth. Ft. Austral,* iii. 627.—Austral.
Billardieri.aojM. *V Blanche, Diagn.* Ser. II. v. 111.—Syria.
Blandowskianum, *Steete, ex Sond. in Linnaea,* xxv. (1852) 512.—Austral.
Boissieri, *Nym. Consp.* 881.—Hispan.
Bojerianum, *DC. Prod.* vi. 208.—Madag.
brachycladum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 68 = H. Stoechas.
bracteatum, *Andr. Bot. Rep.* sub t. 428; *et Willd. Enum. Hort. Berol.* 869.—Austral,
bracteolatum, *Benth. Fl. Austral,* iii. 630.—Austral.
brevieilium, DC. Prod. vi. 196 = semipapposum.
buchtormense, DC. 1. c. 184=arenarium.
buddleioides, *DC. ex Wight, Contrib.* 20.—Ind. or.
Buhseanum, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 237.—Persia,
bullatum. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 181.—Madag.
buphtkalmoides, Sieber, ex DC. Prod. vi. 194 ^ scorpioides.
Burchellii, *DC. Prod.* vi. 196.—Afr. austr.
caespititium.Sonrf. *ex Hani. V Sond. Fl. Cap.* iii. 217.—Afr. austr.
caespitosum, Auct. vide cespitosum.
callichrysum, *DC. Prod.* vi. 183.—As. Min.; Persia,
callicomum, *Han. in Han. V Sond. Fl. Cap.* iii. 247.—Afr. austr.
callunoides, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 677.—Afr. austr.
Calvertianum, *F. Muell. Fragm.* x. 108.—Austral,
candidissimum, *D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 841.—Reg. Caucas.
Candolleanum, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi •= Ixiolaena leptolepis.
canescens, Willd. Sp. PI. iii. 1906 = Helipterum canescens.
capillaceum, *Less. Syn. Comp.* 275.—Afr. austr.
capitellatum, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824; 550 ; *Less. Syn. Comp.* 305.—Afr. anstr.
Cassinianum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 466. t. 87 ^ Schocnia Cassiniana.
cassinioides, *Benth. Fl. Austral,* iii. 630.—Austral.
Catipes, *Ham. in Hart. V Si,nd. Fl. Cap.* iii. 223.—Afr. austr.
cephaloideura, *DC. Prod.* vi. 197.—Afr. austr.
Cephalot-s, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 841 -Metalasia Cephalotes.
cerastoides, *DC. Prod.* vi. 171.—Afr. austr.
cespitosum, *DC. 1. c.* 173. n. 23.—Ins. Maurit.
cespitosum, DC. 1. c. 182. n. 70-conglobatum.
chilense, *Hook. V Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 326.—Chili.
chionophilum, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 103-callichrysum.

HELICHRYSUM :—
chionosphaerum, *DC. Prod.* vi. 174.—Afr. anstr.
chlorochrysum, *DC. I. c.* 179.—Afr. austr.
chloroticum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 68 = serotinum.
chrysanthum, Pers. Syn. ii. 414=bracteatum.
chrysocephalum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845; 174 = cymosum.
Chrysocoma, Scb. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 424 = cymosum.
chrysospkaerum, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 230 - callichrysum.
ciliatum, DC. Prod. vi. 195 • semipapposnm.
cinereum, *F. Muell. ex Bentk. Fl. Austral,* iii. 629.—Austral.
cirrhosunv *Less. Syn. Comp.* 282.—Madag.
citrinum, Less, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 259 = Helipterum citrinum.
citrinum, Nym. Consp. 381 = H. Stoechas.
citrispinum, *Delile, in Ann. Sc. Nat.* Se*r. II. xx. (184S) 9S.-Abyssin.
cladochaetum, *F. Muell. Fragm.* v. 199.—Austral,
cochinchinense, *Spreng. Syst.* iii. 482.—Cochinch.
cochlear iforme, *DC. Prod,* vi 185.—Afr. anstr.
Colensoi, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 781, *Index* (154 sub Gnaphalio).—N. Zel.
collinum, *DC. Prod.* vi. 190.—Austral.
collinum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 62 = H. Stoechas.
commixtum, C. Koch, In Linnaea, xxiv. (1851) 351 = lavandulaefolium ?
commutatum, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 677 = anomalum.
comosum, Sch. Bip. 1. c. 678=ericaefolium.
compactum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 12.—As. Min.
concolorum, DC. Prod. vi. 206 = rosnm.
concretum, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 170.—Madag.
congestum, D. Don, in Mem. Wern. Soc. v. (1824) 650 = felinum.
congestum, *Moench, Mefh. Suppl.* 235.—Hab. ?
conglobatnm, *Steud. Norn.* ed. II. i. 738 ; *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 31.—Reg. Mediterr.
conglomeratum, Moench, Meth. 576 - Gnaphalium luteo-album.
conicum. Sweet, Hort Brit. ed. I. 223 = Gnaphalium conicum.
Cooperi, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 281.—Afr. austr.
cordatnm, *DC. Prod.* vi. 180.—Austral,
cordifolium, *DC. I. c.* 208.—Madag.
coriaceum, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 230 = rotundatnm.
coriaceum, *Sond. in Harv. V Sond. I. c.* 239.—Afr. austr.
corymbosum, Pers. Syn. ii. 416 fulgidom.
Cotula, Benth. in Enum. PI. Hueg. 65 = Helipterum Cotula.
crassifolium, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 550; *Less- Syn. Comp.* 282.—Afr. austr.
crassinerve, DC. Prod. vi. 199 = Krebsianum.
crispum, *D. Don, in Loud. Hort. Brit.* 341; *Less. Syn. Comp.* 310.—Afr. austr.
cryptomerioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 186.—Madag.
cuneifolium, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 638.—Austral.
Cunninghamii, *Benth. 1. c.* 629.—Austral,
cylindricum, *D. Don. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 841; *Less. Syn. Comp.* 281.—Afr. anstr.
cymosum, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 550; *Less. Syn. Comp.* 802.—Afr. austr.
dasyanthum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 223 = maritimum.
Davenportii, F. MuelL Fragm. iii. 32 - H. Lawrencella.
dealbatum, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 45. t. 190.—Tasman.
declinatum, *Less. Syn. Comp.* 278.—Afr. austr.
decorum, *DC. Prod.* vi. 188.—Afr. austr.
decorum, Krauss, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 282 = fulgidnm.
decumbens, *Cambess. in Mim. Afus. Par.* xiv. (1827) 271.—Ins. Balear.
decumbens, Portensch. ex Walp. Rep. vi. 2S3=Waitzia corymbosa.
decurrens, Moench, Meth. 576—Gnaphalium undulatum.
decnnens, *F. Muell. Fragm.* viii. 46.—Austral.

HELICHRYSUM :—
detersum, Steud. Norn. ed. II. i. 738 - leptolepis.
dichoon, F. Muell. ex Sond. in Iinnaea, xxv. (1852) 512 = Blandowskianum.
diffusum, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 216 «= Helipterum polygalifolium.
diffusum, *DC. 1. c.* 175.—Afr. austr.
diosmaefolium, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 223.—Austral.
diosmifolium, Less, ex Steud. Norn. ed. II. i. 738 = praec.
diotoides, *DC. Prod.* vi. 208.—Madag.
diotophyllum, *F. Muell. Fragm.* v. 150.—Austral.
discolor, DC. Prod. vi. 197 -= appendiculatum.
discolor, Steud. Nom. ed. II. i. 738 = seq.
discolorum, D. Don, ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 222 - fclinum.
divaricatum, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 341 = crispum.
divergens, Less, in Linnaea, vi. (1831) 223 = Metalasia divergens.
diversifolium, Sch. Bip. in Flora, .xxvii. (1844) 679 = SQuam osum.
Dockerii, *Benth. Fl. Austral,* iii. 626.—Austral.
Dregeannm, *Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 251.—Afr. austr.
dubium, Cats, in Diet Sc. Nat xx. 453=Leptorhynchns squamatus.
Ecklonis, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. .254.—Afr. anstr.
Eichvialdi, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mow. xii. (1860) 121. t 12. f. 3-arenarium.
elatum, *A. Cunn. in DC. Prod.* vi. 193.—Austral.
elegans, D. Don, Prod. Ft. Nep. 176 = Anaphalis cuneifolia?
elegans, Presl, FL Sic. p. xxix=Gnaphalium pulchrum.
elegantissimum, *DC. Prod.* vi. 179.—Afr. austr.
elongatum, Moench, Meth. 575=orientale.
emirnense, *DC. Prod.* vi. 207.—Madag.
ericaefolium, *Less. Syn. Comp.* 314.—Afr. austr.
ericoides, Boj. ex DC. Prod. vi. 219 = Stenocline ericoides.
ericoides, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit 341 =ericaefolium.
ericoides, *Pers. Syn.* ii. 415.—Afr. austr.
Emestianum, *DC. Prod.* vi. 173.—Afr. anstr.
erosum, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 261 = rosum.
erosum, Schlecht in Linnaea, xx. (1847) 595«rutidolepis.
Errerae, Tineo, PI. Rar. Sicil. 27=saxatile.
Erythropogon, Spreng. Fl. Hal. Mant. 50 = Metalasia uniflora.
excisum, *Less. Syn. Comp.* 282.—Afr. anstr.
eximium, Less. 1. c. 319 - Helipterum eximinm.
expansum, *Less. 1. c.* 276.—Afr. austr.
fasciculatum, Willd. Sp. PI. iii. 1909; Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. 1821-22 (1824) 166 = sesamoides.
fastigiatum, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 219.—Afr. austr.
felinum, *Less. Syn. Comp.* 287.—Afr. austr.
ferrugineum, Less. Syn. Comp. 317«Helipterum citrinum.
ferrugineum, Pers. Syn. ii. 414=squamosum.
filagineom, *DC. Prod.* vi. 170.—Afr. austr.
JUicaule, Hook. f. Fl. N. Zel. 140. t. 36 B=Gnaphalium filicaule.
filifolium, *F. Muell. Fragm.* iii. 134.—Austral.
filiforme. Less. Syn. Comp. 823 = Helipterum filiforme.
flaeddum, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 341 = Achyrocline flaccida.
flagellare, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 183.—Madag.
flavissimum, DC. Prod. vi. 195 - apiculatum.
flexiramum, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 63 = H. Stoechas.
floribundum, A. Cnnn. ex DC. Prod. vi. 217 = Helipterum floribundum.
foetidnm, *Moench, Meth.* 576.—Afr. trop. et austr.
folliculatum, DC. Prod. vi. 197=appendiculatum.
Fontanesii, *Cambess. in Mem. Mus. Par.* xiv. (1827) 270. t 8.—Sicil.
formosissimum, Sch. Bip. in Bot Zeit iii. (1845) 173 a- clcgantissimunit
formosum, Sch. Bip. ex Klatt, in Ann. Sc Nat. Sér. V. xviii. (1873) 372=praec.

HELICHBYSUM :—
fragrans, *Andr. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 739.—Afr. austr.
frigidum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1908.—Ins. Corsica,
fruticans, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 650.—Afr. austr.
fruticosum, Vatke, in linnaea, xxxix. (1875) 491 - cymosum.
fulgidum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1904.—Afr. austr.
fulvellum, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 608 «= rotundatum.
fulvescens, *DC. Prod,* vi 207.—Madag.
galactosphaerum, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 681 =rugulosum.
gariepinum, *DC. Prod.* vi. 174.—Afr. austr.
gerberaefolium, *Sch. Bip. ex Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 26; *ex Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 425.—Abyssin.
Gerrardi, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 244.—Afr. austr.
Gilesii, *F. Muell. Fragm.* x. 85.—Austral.
glabratum, DC. Prod. vi. 189 -bracteatum.
glanduliferum, Sch. Bip. ex Boiss. Fl. Orient iii. 236 = armenium.
glanduliferum, *Sch. Bip. in Bot. Zeit.* iii. (1845) 173.—Kurdistan.
glandulosum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 605=armenium.
globiferum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 29.—Persia,
globosum, *Sch. Bip. in Bot. Zeit.* iii. (1845) 174; *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 425.—Abyssin.
glumaceum, DC. Prod. vi. 197 = Achyrocline glumacea-
glutinosum, *Benth. Fl. Austral,* iii. 621.—Austral.
glutinosum, A. Br. in Flora, xxiv. (1841) I. 277 = foetidum.
glutinosum, Tenore, ex Nym. Consp. 381—rupestre.
gnaphaloides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 87 - Gn&phalium &ntenn&rioide&>
gnaphaloides, Steud. Nom. ed. II. i. 789 = Helipterum gnaphaloides.
gossypinum, *Sch. Bip. in Webb V Berth. Phyt. Catiar.* ii. 313.—Ins. Canar.
gracile, DC. Prod. vi. 181=ramosum.
gracilipes, *Oliver &" Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Ar* iii. 848.—Afr. trop.
grandiceps, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 781, *Index* (154 sub Gnaphalio).—N. Zel.
grandiflorum, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 550.—Afr. austr.
grandiflorum, Eckl. ex DC. Prod. vi. 212=Helipterum speciosissiraum.
graveolens, Boiss. FL Orient, iii. 232 = Ianatum.
graveolens, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 223; *DC. Prod.* *• 184.—Tauria.
Griffithii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 104.—Afghan,
griseum, *Sond. in Linnaea,* xxiä (1850) 65.—AW- austr.
Gunnianum, Hook. Ic. PL t 320=scorpioides.
Gunnii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 680.—Austral.
gymnocomum, *DC. Prod.* vi. 202.—Afr. austr.
namulosum, *DC. 1. c.* 192.—Afr. austr.
hebelepis, *DC. I. c.* 186.—Afr. austr.
Heldreichii, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 229.—Ins. Creta.
helianthemifolium, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hofl- Brit. 342 = serpyllifolium.
heliotropifolium, *DC. Prod.* vi. 209.—Ins. Mascar-
hemisphaericum, *DC. 1. c.* 181.—Afr. austr.
herbaceum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 223 = sqnamosnD>-
hemiarioides, *DC. Prod.* vi. 170.—Afr. austr.
heterophyllum, Steud. Nom. ed. II. i. 739 - ***' moides.
hispanicum, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fasc =serotinum.
Hochstetteri, Hook. f. in Joum. linn. Soc. vi. IS=Achyrocline Hochstetteri.
Hookerianum, Wight *Sc* Am. ex DC. Prod. vi. 201 buddleoides.
horridum, *Sch. Bip. in Bot. Zeit.* iii. (1848) Abyssin.
Humboldtianum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. t. 88 = Helipterum Humboldtianum.
humile, *Less. Syn. Comp.* 322.—Afr. austr.
hypoleucum, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* —Afr. austr.
ignescens, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. I —Europ. austr.
imbricatum, DC. Prod. vi. 191=cylindricum.
imbricatum, *Less. Syn. Comp.* 279.—Afr. austr.

HELICHRYSUM :—
imbricatum, Thunb. FL Cap. ed Schult 683 = Helipterum canescens.
incanum, Hook. Bot. Mag. t. 2881=Helipteram incannm.
incamatum, DC. Prod. vi. 191 = rubellnm.
intermedium, Less. Syn. Comp. 295-panicnlatnm.
intricatam, *DC. Prod.* vi. 204.—Afr. anstr.
inuloides, Boj. ex DC. I. e. 219 = Stenodyne innloides.
involucratnm, *F. Muell. Fragm.* iii. 185.—Austral.
italicum, G. Don, in Loud. Hort. Brit 842»angustifolium.
Kempei, *F. Muell. in Melb. Chemist* (Jan. 1882).—Austral.
Kirkii, *Oliver* b* *Hiern, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1878) 96. t. 61.—Afr. trop.
Kirkii, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 195 = Petereii.
Rotsckyi, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 92 = armenium.
Kraussii, *Sch. Bip. in Flora,* xxvii. (1844) 679.—Afr. anstr.
Krebsianum, *Less. Syn. Comp.* 808.—Afr. austr.
lacteum, *Coss.* &" *Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 365.—Algeria.
Lamarckii, *Cambess. in Mim. Mus. Par.* xiv. (1827) 269. t. 7.—Ins. Balear.
1-ambertianum, *DC. Prod.* vi. 190.—Afr. austr.
*l<*mprosphaerum,* Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 681 = roseum.
Janatum, *DC. Prod.* vii. 298.—As. Min.
lanatum, *Harv. in Han. (f Sond. Fl. Cap.* iii. 238.—Afr. austr.
'anatum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. 1821-22 (1824) 166 = vestitum.
lancifolium, *Willd. Sp. PI.* iii. 1910.—Afr. austr.
lanuginosum, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 193=elatum.
*'a«»5*noi«»,*Dulac, Fl.*Hautes-Pyr.514 = H. Stoechas.
lasiocaulon, Sweet, Hort. Brit. ed. L 228 = Gnaphalium lasiocaulon.
ktifolium, *Less. Syn. Comp.* 297.—Afr. austr.
'avandulaefolium, *D. Don, in Mem. Went. Soc.* v. (1824) 550; *DC. Prod.* vi. 184.—Annen.
la>andulaefolium, H. B.& K. Nov. Gen. et Sp. IV. 86 — Chionolaena lavandulacea.
wvanduloides, *DC. Prod.* vi. 207.—Madag.
'-awrencella, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* in. 616. —Austral.
«»»»», E. Mey. ex DC. Prod. vi. 171-ericaefohum.
'edifolium, *Benth. Fl. Austral,* iii. 680.—Austral.
fwepis, DC. Prod. vi. 187=revolutum.
leiopodium, *DC. 1. c.* 200.—Afr. austr.
"ontonychium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon. vu. (1880) 127 = seq.
Leontonyx, *DC. Prod.* vi. 169.—Afr. austr.
Leontopodium *Hook. f. Fl. N. Zel.* 141. t. 87 B.—N. Zel.
lepidophyllum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 638—Austral.
"PtoUpidium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vu. (1880) 127 = seq.
£Ptolepis, *DC. 1. c.* 170. n. 9.—Madag.
-ptolepis, DC. Prod. vi. 194. n. 186 = Ixiolaena leptolepis.
*leptophyllum*i, DC. in Wight, Contrib. 20-Anaphalis leptophylle.
le.P'ophyl'iumi Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 68 =*erotinum.
i."Ptorhizum, 0C./>«*. vi. 169.-Afr. austr.
leu«cephaluin, *A usfM , «n R tgq t Gartenfl.* (1864) v9,'—Austral.
£*°cephalum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. SO.-Peraa.
'^ocephalum, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. Soc. *«af. Mosc. xii.* (1860) 121 = Buhseanum.
leucophyllum, DC. Prod. vi, 175=crassifolium.
leucopsideum, *DC. I. c'.* 198.—Austral.
leucosphaerum, *Baker< in ^tmn1, Linn, Soc.* xxi. (1885) 17.— da.
^"^Jord^Fo^urr. Brev. PL Nov. fe*. ii. 66 = ""otinum.
lineare, DC. Prod. vi.m.partim-ericaefolium.
linearifolium, *Sch. Bip. in Flora,* xxviu (1844) 678.-Afr. austr.
linifo
*litt*anthemoides.
^"4*^'«cteatum, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. ™>. 1821-22 (1824) 168=humile.

HEIiICHBYSTJM :—
longifolium, *DC. Prod.* vi. 198—Afr. austr.
Lorentii, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 329 = armenium.
lucidum, Henck. Adumb. 6; Homem. Hort. Ham. ii. 804=bracteatum.
lucilioides, *Less. Syn. Comp.* 290.—Afr. austr.
luteo-album, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1460 = Gnaphalium luteo-album.
lutescens, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 66 = H. Stoechas.
Inzulaefolium, *DC. Prod.* vi. 201.—Madag.
lycopodioides, *Benth. Fl. Austral,* iii. 684.—Austral.
Maclvorii, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* iii. (1883) 99.—Austral.
macranthum, Benth. in Enum. PI. Hueg. 66—bracteatum.
macrocephalum, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 188 = bracteatum.
madagascariense, *DC. I. c.* 206.—Madag.
Manglesii, BailL Hist. PI. viii. 314 - Helipterum Manglesii.
Mannii, Hook. f. in Jonrn. Linn. Soc. vi. (1862) 12 = foetidum.
margaritaceum, Moench, Meth. 576 •= Antennaria margaritacea.
marginatum, *DC- Prod.* vi. 180.—Afr. austr.
marifolium, *DC. 1. c.* 186.—Afr. austr.
maritimum, *D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 841; *Less. Syn. Comp.* 304.—Afr. austr.
maritimum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 62 = H. Stoechas.
melaleucum, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 882 = melanophthalmum.
melanacme, *DC. Prod.* vi. 203.—Afr. austr.
melanophthalmum, *DC. 1. c.* 177.—Ins. Madera.
metalasioides, DC. 1. c. 171-ericaefolium.
Meyeri, DC. 1. c. 244, in syn. sphalm. = Zeyheri.
micom'aefolium, *DC. 1. c.* 200.—Afr. austr.
micranthum, *A. Cunn. ex DC. I. c.* 189.—N. Zel.
microcephalum, *DC. 1. c.* 207.—Madag.
microlepis, DC. L c 196—semipapposum.
microphyllum, Cambess. in Mem. Mus. Par. xiv. (1827) 272-angustifolium.
micropoides, *DC. Prod.* vi. 170.—Afr. austr.
Milliganii, *Hook./. Fl. Tasm.* i. 214. t.60.—Tasmania.
nolle, A. Cunn. e-. DC. Prod. vi. 194 = Helipterum incanum.
Monizii, *Lowe, Man. Fl. Mad.* i. 481.—Ins. Madera.
monspeliense, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 64 = H. Stoechas.
montanum, DC. Prod. vi. 186=splendidum.
montevidense, Spreng. Syst. iii. 485 = Ludlia acutifolia.
mucronatum, *Less. Syn. Comp.* 296.—Afr. austr.
multicaule, DC. Prod. vi. 173 = yuccaefolium.
multinerve, DC. 1. c. 199 =quinqnenerve.
Mundtii, *Ham. in Harv. b" Sond. Fl. Cap.* iii. 243.—Afr. austr.
mutisiaefolium, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 224.—Madag.
natalitium, *DC. Prod.* vi. 201.—Afr. austr.
neirodense, Heldr. in Flora, xxvii. (1844) 67-rupestre.
nepalense, Spreng. Syst. iii. 485 = Anaphalis triplinervis.
Newii, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 849.—Afr. trop.
Nimmoanum, *Oliver V Hiern, 1. c.* 347.—Afr. trop.
nitens, *Oliver* b* *Hiern, I. c.* 350.—Afr. trop.
niveum, *Boiss. If Heldr. Diagn.* Ser. I. xi. 30.—As. Min.
niveum, R. Grah. in Bot. Mag. t. 3857 = bracteatum.
niveum, Less. Syn. Comp. 302=paryiflorum.
nodiflorum, *DC. Prod.* vi. 177.—Lusitan.
Noeanum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 104.—Anatolia.
notatum, Steud. Nom. ed. II. i. 695, in syn.—expansum.
Notonianum, DC. in Wight, Contrib. 20 = Anaphalis Notoniana.
nudifolium, *Less. Syn. Comp.* 299.—Afr. austr.
numidicum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 288.—Alger.
obconicum, *DC. Prod.* vi. 181.—Ins. Madera.
obcordatum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 632. —Austral.
obovatum, *DC. Prod.* vi. 180.—Austral
obtusifolium, *F. Muell. V Sond. in Linnaea,* xxv. (1862) 513.—Austral.

HEIiICHSYSTTM:
obvallatum, *DC. Prod.* vi. 174.—Afr. austr.
odoratissimum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 223; *Less. Syn. Comp.* 301.—Afr. austr.
odorum, DC. Prod. vi. 196 = apiculatum.
Oldfieldii, F. Muell. Fragm. iii. 134 = Helipterum Cotula.
oligocephalum, DC. Prod. vi. 184-armenium.
oligochaetum, *F. Muell. Fragm.* vi. 285.—Austral.
olonnense, Jord. & Kourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 65 — H. Stoechas.
oocephalnm, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 236.—Persia,
orientate, *Gaertn. Fruct.* ii. 404.1.166.—Archip.; As. Min.
oxybelium, *DC. Prod.* vi. 171—Afr. austr.
oxylepis, *F. Muell. Fragm. i.* 36.—Austral,
oxyphyllum, *DC. Prod.* vi. 199.—Afr. austr.
pachyrhizum, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 222.—Afr. austr. et trop.
Pallasii, Ledeb. Fl. Ross. ii. 606«=callichrysum.
pallidum, DC. Prod. vi. 199=undatum.
panaetioides, DC. 1. c. 194 = Leptorhynchus panactioides.
panduraefolium, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. 1821-22 (1824) 169.- auriculatum.
paniculatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1911.—Afr. austr.
pannosum, *DC. Prod.* vi. 204.—Afr. austr.
panormitanum, Heldr. in Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 81 — Heldreichii.
panormitanum, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 467 = ru pest re.
papillosum, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 46. t. 192-bracteatum.
paronychioides, *DC. Prod.* vi. 171.—Afr. austr.
parviflorum, *DC. I. c.* 208.—Afr. austr.
parvulum, jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 65-H. Stoechas.
patulum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 185.-Madag.
patulum, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 650.—Afr. austr.
pedunculare, *DC. Prod.* vi. 198.—Afr. austr.
pendulum, Presl, Fl. Sic. p. xxix=rupestre.
pentzioides, *Less. Syn. Comp.* 282.—Afr. austr.
Petersii, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 849.—Afr. trop.
petiolatum, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 560. —Afr. austr.
phlomoides, Spreng. Syst. iii. 482 - Helipterum phlomoides.
pholidotum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 634 —Austral.
phylicaefolium, *DC. Prod.* vi. 207.—Madag.
Picardi, Boiss. *Sc* Reut. Diagn. Ser. II. vi. 108-serotinum.
Pichleri, *W. Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.* xxi. (1885) 96.—Ins. Sardoa.
pilosellum, Less. Syn. Comp. 297 - pedunculare.
pinifolium, Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. 1821-22 (1824) 168 > humile.
plantagineum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127 -seq.
Plantago, *DC. Prod.* vi. 200.—Madag.
platypterum, *DC. 1. c.* 201.—Afr. austr.
plebeium, *DC. 1. c.* 206.—Afr. austr.
plicatnm, *DC. 1. c.* 183.—As. Min.; Persia.
pluriceps, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 348» arenarium.
podolepideum, *F. Muell. Rep. Babb. Bxp.* 13.—Austral.
polycephalum, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 681 = capitellatum.
polygalaefolium, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 216 = Helipterum polygalaefolium.
polyphyllum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 605-plicatum.
populifolium, *DC. Prod.* vi. 180—Afr. austr.
Porcari, *Tin. ex Lojac. in Natural. Sidl.* it (1883) 182.—Sicil.
proli/erum, Willd. Sp. PI. iii. 1905-Phoenocoma prolifero.
prostratum, *Hooi.f. Fl. Antarct.* 80. t. 21.—N. Zel.
proteiforme, *Baker, Fl. Maurit.* 167.—Ins. Mascar.
Pseudo-fasciculatum, *Schrank, in Denkschr. Akad. Muench.* viii. 1821-22 (1824) 167.—Hab. 1
psilolepis, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 236.—Afr. austr.
psychrophilum, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 28-callichrysnm.

HELICHHYSTTM: :—
pterochaetum, F. Muell. Rep. Babb. Exp. 14 = Helipternm pterochaetum.
pulchellum, *DC. Prod.* vi. 190.—Afr. austr.
pumilum. *Hook./. Fl. Tasm. i.* 213. t 60.—Tasmania.
Quartiniannm, *A. Rich. Tent. Ft. Abyss,* i. 427.—Abyss.
quinquenerve, *Less. Syn. Comp.* 800.—Afr. anstr.
radicans, Willd. Sp. PI. iii. 1907=retortnm.
ramosissimum, Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral. 83 = apicnlatum.
ramosum, *DC. Prod.* vi. 181.—Austral,
ramnlosum, *DC. I. e.* 176.—Afr. austr.
recurvatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1906.—Afr. austr.
repandum, DC. Prod. vi. 208 = scabrum.
reticulatvr.il, *Less, ex Steud. Nom.* ed. n. i. 7-40.—Tasmania.
retortum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1907.—Afr. austr.
retrorsum, *DC. Prod.* vi. 207.—Madag.
retusum, *F. Muell. Fragm.* viii. 46.—Austral.
retusum, Spreng. Syst. iii. 484 = Facelis apicnlata.
revolutum, *Less. Syn. Comp.* 30S.—Afr. austr.
Rhinocerotis, Herb. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. i. 652, in syn. = Elytropappus Rhinocerotis.
rigens, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 68 = H. Stoechas.
rigidulum, *DC. Prod.* vi. 193.—Austral.
rigid-urn. Ait. Hort Kew. ed. II. v. 24=striatum.
Rochetii, *Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa,* 342.—Afr. trop.
roseum, Baill. Hist. PI. viii. 314 - Helipterum roseum.
Tosmarinifolium, DC. Prod. vi. 166, in obs. = diosmifolium.
rosulatum, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 847.—Afr. trop.
rosum, *Less. Syn. Comp.* 306__Afr. austr.
rotundatum, *Bare, in Hani. V Send. Fl. Cap.* iii. 230.—Afr. anstr.
rotundifolium, *Less. Syn. Comp. 277.—Ab.* anstr.
rubellum, *Less. 1. c.* 280.—Afr. austr.
rugulosum, *Less. I. c.* 807.—Afr. austr.
rupestre, Boiss. Voy. Bot. Espagne, S25=Boissieri.
rupestre, *DC Prod.* vi. 182.—Reg. Mediterr.
rupestre, Cuss, ex Nym. Consp. 381=saxatile.
rupicolum, *DC. Prod.* vi. 190.—Austral,
rupicolum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. All.* 47.—Algeria,
rutidolepis, *DC. Prod.* vi. 194.—Austral,
rntilans, *D. Don, in Mem. Wern. Soc.* v. (1824) 560; *Less. Syn. Comp.* 275.—Afr. austr.
sabulosum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. £asc. ii. 64 - H. Stoechas.
salicifolium, *Bertol. Fl. Guatimal.* 33.—Guatemala,
sanguineum, *Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl.* ii. 709.—Syria.
saturejaefolium, Moench, Meth. Suppl. 236=Metalasia muricata ?
saxatile, *Moris, Fl. Sard.* 387. t. 82.—Ins. Sard.; Sicil.
scabrum, DC. Prod. vi. 205=Dregeannra.
scabrum, *Less. Syn. Comp.* 312.—Afr. austr.
scandens, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 465 - siculum.
scorpioides, *Labill. Nov. Holl. PI.* ii. 45. t 191.—Austral,
scutellifolium, *Benth. Fl. Austral,* iii. 633.—Austral.
selaginoides, *F. Muell. ex Benth. 1. c.* 634__Austral.
semicalvum, F. Muell. Fragm. ii. 156=Leptorhynchos ambiguus.
semifertile, *F. Muell. Rep. Babb. Exped.* 14.—Austral,
semipapposnm, *DC. Prod.* vi. 196.—Austral,
serotinum, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* ii. 329.—Europ.
serpylliiolium, *Less. Syn. Comp.* 277.—Afr. austr.
serpyllifolium, Pers. Syn. ii. 414 - Helipterum canescens.
sesamoides, *Willd. Sp. PI.* iii. 1908.—Afr. austr.
sessile, *DC. Prod.* vi. 178.—Afr. austr.
setosum, *Ham. in Harv.* &" *Sond. Fl. Cap.* iii. 281.—Afr. austr.
siculum, Boiss. Fl. Orient iii. 229 - cespitosum.
siculum, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc ii. 67 = serotinum.
simillimum, *DC. Prod.* vi. 203.—Afr. anstr.
simulans, *Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* iii. 217.—Afr. anstr.
Sinclairii, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 781, *Index* (153 snb Gnaphalio).—N. Zel.
Sonderi, F. Muell. in Seem. Joora. Bot iv. (1866) 121 slxiolaena tomeiito&a.
sordescens, *DC. Prod.* vi. 178.—Afr. austr.

HELICHRYSUM :—
spathulatum, Moench, Meth. Suppl. 285 = Gnaphalium indicum.
spedosissimum, Willd. Sp. PI. iii. 1904 = Helipterum speciosissimnm.
speciosum, Thunb. FL Cap. ed. Schult 664=vestitum, Helipterum variegatum.
spectabile, *G. Don, ex Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 561 (^seq. ?).—Austral.
spectabile, Lodd. Bot. Cab. t. 69=humile.
sphaerocephalum, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 839.—Ins. Socotr.
Spiceri. *F. Muell. Fragm.* xi. 47.—Austral,
spiciforme, *DC. Prod.* vi. 171.—Afr. austr.
spinosum, Sch. Bip. in Bot. Zeit iii. (1845) 173=citrispinntn.
spinosum, Willd. Sp. PI. iii. 1908 — Dicoma diacanthoides.
spirale, Willd. 1. c. 1908 = Helipterum variegatnm.
splendens, Sims, Bot. Mag. t. 177S°=squamosum.
splendidnm, *Less. Syn. Comp.* 286.—Afr. austr.
squamosum, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult.* 661.—Afr. austr.
squarrosum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 184.-Madag.
squarrulosum, DC. Prod. vi. 195—semipapposum.
Staechas, DC. Fl. Fr. iv. 132 - H. Stoechas.
Staehelina, Thnnb. FL Cap. ex Schult. 664 = Helipterum speciosissimutn.
Staehelina, Willd. Sp. PI. iii. 1910 = argenteum.
staehelinoides, Less. Syn. Comp. 321 = Helipterum gnaphaloidea.
stellatum, *Less. 1. c.* 279.—Afr. anstr.
steñopterum, *DC. Prod.* vi. 201.—Afr. austr.
Steudelii, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 421 = Gnaphalium Stendelii.
stipitatum, F. Muell. Fragm. iii. 133 = Helipternm stipitatum.
stoechadense, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 127=seq.
Stoechas, *DC. Fl. Fr.* iv. 132.—Reg. Mediterr. occ.
stoloniferum, D. Don, Prod. FL Nep. 176«=Anaphalis contorta.
stoloniferum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1907.—Afr. austr.
stramineum, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 467= saxatile.
striatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1910.—Afr. austr.
strictum, Moench, Meth. 576 = Gnaphalium sylvaticum.
subdecurrens, *DC. Prod.* vi. 202.—Afr. austr.
subglomeratum, *Less. Syn. Comp.* 283.—Afr. anstr.
subulifolium, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* iii. 241.—Afr. austr.
subulifolium, *F. Muell. Fragm.* iii. 184.—Austral,
suffruticosum, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 840.—Ins. Socotr.
Sutherlandi, *Harv. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 218.—Afr. anstr.
syncladum, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 62 = H. Stoechas.
tanacetiflornm, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 183.—Madag.
Tardentii, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 29 = annenium.
tchabanicum, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 849.—Armenia.
tenuiculum, *DC. Prod.* vi. 203.—Afr. austr.
tephrodes, Sweet, Hort. Brit ed. I. 228=teretifolium.
Tepperi, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 1.—Austral,
teretifolium, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 223; *Less. Syn. Comp.* 812.—Afr. austr.
thianschanicum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 807.—Turkestan.
Thomsoni, *F. Muell. Fragm.* viii. 45.—Austral,
tricostatum, *Less. Syn. Comp.* 810.—Afr. anstr.
trilineatum, *DC. Prod.* vi. 192.—Afr. austr.
trinervatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 182.—Madag.
triplinerve, *DC. Prod.* vi. 207.—Madag.
tschabanicum, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 849 — tchabanicum.
uliginosum, Moench, Meth. 576 = Gnaphalium nliginosum.
umbellatum, *Hare, in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 280.—Afr. anstr.
umbracnligerum, *Less. Syn. Comp.* 284.—Afr. austr.
undatum, *Less. 1. c.* 298.—Afr. austr.
undulatum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 606=annenium.
variegatum, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult 663 — Helipterum variegatum.

HELICHBYSUM: :—
variegatum, Willd. Sp. PL iii. 1911=canescens.
vermiculatum, Pers. Syn. ii. 415=Metalasia uniflora:.
vestitum, *Schrant, in Denkschr. Akad. Muench.* viu. 1821-22 (1824) 166; *Lea. Syn. Comp.* 811.—Afr-austr.
vestitum, Willd. Sp. PL iii. 1908 = Heliptemm variegatum.
virgatum, Willd. 1. c. 1910 = Helipterum virgatum.
virgineum, DC. Prod. vi. 177 = Billardieri.
virgineum, *Griseb. Spidl. FL Rumel.* ii. 197.—Graecia.
viscosum, Sieber, ex DC. Prod. vi. 189 - bracteatum...
Wickstromii, *Tineo, ex Lojac. in Natural. Sicil.* (1883) 182.—Sicil.
Wightii, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Jnd.* 291.—Ind. or.
xanthinum, DC. Prod. vi. 185 = splendidum.
xeranthemoides, DC. 1. c. 178=lancifolium.
xerochrysum, *DC. 1. c.* 201.—Afr. austr.
xylocladum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (188»; 418.—Madag.
Youngii, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 781, /«** (162 sub Gnaphalio).—N. Zel.
yuccaefolium, *Lam. Illustr.* t. 693. f. 2 J *ex Po^fr, Tabl. Encyc.* iii. 271.—Ins. Maurit
Zeyheri, *Less. Syn. Comp.* 309.—Afr. anstr.

HELICIA, Lour. Fl. Cochinch. i. 83 (1790). *PR^0', TEACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 179.
CASTRONIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. ». (1790) ed. I. Art. IV. 2.
HELITTOPHYLLUM, Blume, Bijdr. 652 (1825).
amboinensis, *Miq.Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i-* 8°*-—Ins. Amboin.
attenuate, *Blume, in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. i. (1834) 216.—Malaya.
anstralasica, *F. Muell. in Hook. Kew Journ.'a.* (1857) 22.—Austral.
Bennettiana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 984—Java.
castaneaefolia, Meissn. in DC. Prod. xiv. 441-robust*
ceylanica, *Cardn. in Calc. Journ. Nat. Hist.,*"-(1847) 458.—Zeylan.
cochinchinensis, *Lour. Fl. Cochinch.* 83.—Cochincn-
conjunctiftora, F. Muell. Fragm. v. 38=glabriflora-
Cumingiana, *Presl, Epim, Bot.* 246.—Ins. Philipp-.
Darlingiana, F. Muell. Fragm. v. 24 - Darling* spectatissima.
excelsa, *Blume, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. i. (W*' 219.—Ind. or.; Burma,
ferrnginea, *F. Muell. Fragm.* iii. 37.—Austral,
glabrata, *Meissn. in DC. Prod.* xiv. 442.—Burma,
glabriflora, *F. Muell. Fragm.* ii. 91.—Austral.
javanica, Blnme, in Ann. Sc. Nat. Se"r. II. i- (217*=robusta.
landfoli, Sieb.tf Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat.* »* Japon.
loranthoides, *Presl, Epim. Bot.* 247.—Ins. PhilipP-
macrophylla, Wall. Cat. n. 3661 = robust a.
moluccana, *Blume, in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. i- 216.—Ins. Molucc.
nilagirica, *Bedd. in Madr. Journ. Sc. Set.* (1864) 56.—Ind. or.
oblongifolia, *Benn. Pl.Jav. Rar.* 83.—Java,
obovata, *Benn. I. c.*—Java.
obtusidens, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* Ins. Amboin.
ovata, *Benn. PI. Jam. Rar.* 84.—Sumatra,
petiolaris, *Benn. I. c*—Singapore.
philippinensis, *Meissn. in DC. Prod.* xrv. PhiUpp.
praealta, *F. Muell. Fragm.* üi. 87.—Austral.
pyrrhobotrya, *Kurt, in Journ. As. Soc. BtnS-* (1873) II. 103.—Burma.
robusta, Villar.in Blanco, Fl.Philip.ed.HI. 182 = philippinensis.
robusta, *Wall. Cat. n.* 2702.—Reg. Himal.; Malaya.
salicifolia, Presl, Epim. Bot 247 = excelsa.
Scottiana, F. Muell. Fragm. iv. m-salicinum.
serrata, *Blume, in Ann. Sc. Nat.* Ser. IL (1884) 216.—Ins. Molucc.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* S^M —Sumatra.
terminalis, *Kurn, For. Fl. Brit. Burma, H-*[31]/<. Burma.
ternifolia, F. MuelL Fragm. ü. 91 = Macadanu» folia.
verticillata, F. Muell. 1. c vi. 191 - Macaoa" ticillata.

HELICIA:—
Youngiana, F. Muell. Fragm. iv. 84=Macadamia Youngiana.
»eylanica, Gardn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 438= ceylanica.

HELICIA, Pen. Syn. i. 214 (1805)=IiorantliUB, Linn.
parasitica, Pers. L c.—China.

HELICUJLA, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 169 (1849). *CHENOPODIACEAE,* Beath. & Hook. f. iii. 71.
altissima, *Moq. 1. c.* 170.—China.

HELICODEA, Lem. Illustr. Hortic. xi. (1864) t. 421 = Billbergia, Thunb. (Bromeliac).
Baraquiana, Lent. 1. c.=-B. decora.
Leopoldii, Hort Versch. ex Lem. 1. c. snb t. 421 = B. Leopoldii.
'ebrina, Hort. ex Nichols. Diet. Gard. i. 128 = B. zebrina.

HELICODICEKOS, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1863) 869. *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 968.
MEGOTIGEA, Rafin. Fl. Tellnr. iii. 64 (1836), nomen prius.
crinitus, *Schott, 1. c; et Gen. Aroid.* t 21.—Ins. Corsica.
muscivorus, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 605 = crinitus.

HELICONIA, Linn. Mant. ii. 147 (1767). *SCITAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 655.
BIHAI, Adans. Fam. ii. 67 (1768).
HELICONIOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 590, 1855 [1858].
acuminata, A. Rich, in Nov. Act. Nat Cur. xv. Suppl. (1831)26. til-H.Ballia.
alia, Linn. f. Suppl. 167 = Strelitzia augusta.
Andrewsii, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 466 = psittacoram.
"ngusta, Veil. Fl. Flnm. 106 ; iii. t. 20 = psittacomm.
angustifolia, *Hook. Bot. Mag.* t 4475.—Bras.
"ugusta, Salisb. Prod. 144 - Strelitzia augusta.
anramiaca, *Ghiesb. in Lem. Illustr. Hortic.* ix. (1862) t. 332.—Mexic.
eureostriata, Hort. ex Bull. Cat. (1881) 18 ; in Lem. Ulustr. Hortic. xxix. (1882) t. 464 - H. Bihai?
a"stro-caledonica, Vieill. in Ann. Sc. Nat Ser. IV. xvi. (1861) 47=H. Bihai.
^^, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 107.—Guian.
fiahy, Veil. Fl.Flum. 106; iii. 119 = H. Bihai.
b"color, Benth. in Maund, Bot. iii. t. 101=Miguslifolia.
kcokr, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 465=hirsuta.
Bihai, *Linn. Mant.* ii. 211.—Am. austr.
Bihai, Linn. f. Suppl. 157 - Strelitzia augusta.
f'*««, J. Mill. Ic. tt. 5, 6=Strelitzia Reginae.
Jrasiliensis, *Hook. Exot. Fl.* 1.190.—Bras.
"•evispatha, Hook. Bot. Mag. t. 5416=aurantMca.
*bucc*inata, Roxb. Hort. Beng. 19 ; Fl. Ind. i. 670-H. Bihai.
cannoidea, A. Rich, in Nov. Act. Nat. Cur. xv. Suppl. ^831)24.t.9=hirsuta.
fnbaea, Urn. Encyc. i. 426 = H. Bihai.
*da*swantha, *C. Koch V Souchi, Ind. Sent. Hort. Berol.* (1854) 12—I.
fensiflora *Hortor. ex Verlot, in Rev,, Hortic.* UM9) 274 ; *Cogn. VMarchal, PI. Ornem.* n. (1874) t 46.—Guian.
d'«olor, Hort ex Koem. in Bull. Soc Nat Mosc. *»v. (1862) 1.186 = Calathea varians.
episcopal!,, *Veil. Fl. Flum.* 107 ; iii. t - J 3 - - ^ 1 s 93
f^nosa, *Raddi> in Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 393. —Bras.
flava, Jac.-q. Hort. Schoenb. i. 25.—Am. trop.
flexuosa, Presl, Rel. Haenk. i. 105.—Ann trop.
TO,/>„,*.'.•; *Xev. Hortic.* (1869) I12.-Am. austr.
*'rs»ta, *Linn./. Suppl.* 158.-Am. austr.
*"«a, Schlecht &Cham. in Linnaea, vi. (1831) 57
*«ta, Schlecht
Schiedeana.
humilis, J acq. Hort. Schoenb. i. 23.-Am. austr.
indica, Lam. si.
latispatha, *B* 170.—Am. trop.
leucogramma, Hort. ex Horan. Prod. Scitam. 40 (Calathea
lingulata, *R^7^e* H: r. iii. 71.—Peruv.
luteo-fusca, J«q. Hort. Schoenb. i. 25 = H. Bihai.

HELICOMTA:—
marantifolia, G. Shaw, Cimel. Phys. 74. t. 38 = psittacorum.
Mariae, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 69. —N. Granat.
meridensis, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 462 = latispatha.
metallica, *Planch. V Linden, in Bot. Mag.* t. 6315.—N. Granat.
nigrescens, Jacq. Hort Schoenb. i. 25 = H. Bihai.
pendula, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1863) 8.—Bras,
psittacoram, *Linn. f. Suppl.* 158; *Andr. Bot. Rep.* t. 124.—Am. austr,
psittacorum, Sw. Obs. Bot. 98=hirsuta.
pulverulenU, *Lindl. Bot. Reg.* 11648.—Am. austr.
Kavenala, Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1796) 22=Ravenala madagascariensis.
Richardiana, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 70=hirsuta.
rostrata, *Ruit V Pav. Fl. Per.* iii. 71. t. 305.—Peruv.
Schiedeana, *KloUsch, in Linnaea,* xx. (1847) 468.—Mexic.
Schomburgiiana, Klotzsch, 1. c 464=psittacorum.
Seemanni, Van Houtte, Cat (1875-76) 183 = H. Bihai?
spedosa, Hort.exHoran.Prod.Scitam. 40=brasiliensis.
Strelinia, J. F. Gmel. Syst 423=Strelitzia Reginae.
striata, Hort. Veitch, ex Fl. des Series, xxiii. (1880) t 2416-17 = H. Bihai?
subulatq, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 70 = psittacorum.
Swartnana, Roem. & Schult. Syst. v. 691=hirsuta.
Thalia, *Veil. Fl. Flum.* 106 ; iii. t. 21.—Bras.
triumpkans, Linden, in Illustr. Hortic. xxix. (1881) t. 448 = H. Bihai?
vaginalis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 171 = hirsuta.
variegata, Jacq. Hort. Schoenb. i. 25 = H. Bihai.
vellerigera, *Poepp. Reise Chili,* ii. 295.—Peruv.
villosa, *Klotasch, in Linnaea,* xx. (1847) 463.—N. Granat.
viridis, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 69 (Quid!).—Hab. ?

HELICONIOPSIS, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 590, 1855 [1858] = Helieonia, linn. (Scitam.).
amboinensis, Miq. 1. c.=Heliconia Bihai.

HEliICOPHYIiLUM, Schott, S>-n. Aroid. i. 22 (1856); Gen. Aroul. 20. t 28-80 (1856). *AROIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 968.
EMINIUM, Schott, Syn. Aroid. 16 (1856).
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 683. —Turkestan.
angustatum, Schott, Syn. Aroid. 22 =crassipes.
Aucheri, Schott, Prod. Aroid. 113 = Rauwo'.ffii.
crassifolium, *Engl. in DC. Monog. Phan.* ii. 597.—Sibir.
crassipes, *Schott, Syn. Aroid.* i. 22.—Palaestin.
Dracunculus, Schott, Prod. Aroid. 115 = crassipes.
Kotschyi, Schott, 1. c 114 - Kauwolmi.
Lehmanni, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vii. (1880) 649.—Turkestan.
Loftusii, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1857) 263 =crassipes.
Luph, Schott, Prod. Aroid. 118 = Rauwolffii *vel* crassipes.
Olivieri, Schott, Syn. Aroid. 22 = Rauwolffii.
Rauwolffii, *Schott, Prod. Aroid.* 118.—Syria; so- potam.; Araen.
Kusselianum, Schott, 1. c. 118= Rauwolffii.
spiculatum, Schott, 1. c. 113 =• crassipes.

HBLICOSrSTIiIS, Tr*e in Ann. Sc. Nat. Se'r. III. viii. (1847) 134. t. 6. *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 372.
MAQUIRA, Aubl. PI. Gui. Suppl. 86. t 389 (1775).
affinis, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. I. 118.—Am. trop.
Poeppigiana, *Trie, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. viii. (1847) 134.—Guiana.

HELICOTRICHUM, Bess, ex Reichb. Fl. Germ. Excure. 140«. n. 852 (1832)=Avena, Linn. (Gramin.).
planiculme, Bess, ex Reichb. 1. c.=A. planiculmis.

HELICTA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 167 = Borrichia, Adans. (Compos.).
sarmentosa, Cass. 1. c—Madag.

HELICTA, Less. Syn. Comp. 221 (1832)=Epallage, DC. (Compos.).
alternifolia. Less. 1. c. = Sphacophyllum madagascariense.
madagascariensis, Less. 1. c. = E. dentata.

HELICTEHES, Pluk. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *STERCULIACEAE,* Benth. & Hook. *f.* i. 220.
ALICTERES, Neck. Elem. ii. 304 (1790).
ANISORA, Rafin. Sylva Tellur. 74 (1838).
CAHAION, Rafin. 1. c. 75 (1888).
ISORA, Adans. Fam. ii. 882 (1763); Schott, Meletem. 31(1832).
METHORIUM, Schott, 1. c. 29. t. 5 (1832).
NISORALIS, Rafin. Sylva Tellur. 74 (1838).
OSOPAEA, Neck. Elem. ii. 305 (1790)."
ORTHOTHECIUM, Schott, Meletem. 81 (1832).
OUDEMANSIA, Miq. PI. jungh. i. 295 (1854).
OZOXETA, Rafin. Sylva Tellur. 75 (1838).
althaeaefolia, Lam. Encyc. iii. 88=guazumaefolia *vel* j ftin&iccn&is*
altheae/olia, Benth. Bot. Voy. Sulph. 70 = baraensis.
angustifolia, *Linn. Sp. PI.* 963.—Malaya; China.
apetala, Jacq. Enum. PI. Carib. 80^Stercnlia Helicteres.
arborescens, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 3=hirsuta.
aspera, *St. Hit. V Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 218.—Bras.
barbadensis, *jacq. Enum. PI. Carib.* SO.—Ind. occ
baruensis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 70=guazumaefolia.
baruensis, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 80.—Am. austr.
bracteosa, Mart, in Flora, xxii. (1839) I. Beibl. 15 = pentandra.
brasiliana, *Zucc. in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 69.—Bras.
brasiliensis, Mikan, Delect. Fl. et Faun. Bras. fasc. iv. t 21=ovata.
brevior, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2»H. Isora.
brevispira, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 274. —Bras.
cana, *Benth. Fl. Austral,* i. 232.—Austral.
carpinifolia, Presl, Rel. Haenk. ii. 138=guazumaefolia.
carthagenensis, Herb. Madr. ex Wall. Cat n. 2687 = spicata ?
carthagenensis, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 30.—Venezuela.
chrysocalyx, Miq. ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 365-H. Isora.
cordifolia, *Hoffmgg. Verm. Pfi. Nachtr.* ii. 131.—Bras,
corylifolia, *Nees tf Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1825) 44.—Bras,
dentata, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 232.—Austral.
dumosa, Salisb. Prod. 388 = jamaicensis.
elongata, *Wall. Cat.* n. 1845; *et ex Boj. Hort. Maurit.* 85.—Reg. Himal.; Burma.
ferruginata, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 199 = ovata.
fetida, Rafin. Sylva Tellur. 76 (Alicteres) - carthagenensis.
frondosa, *Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 111.—Guian.
furfuracea, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 171.—Cuba.
Gardneriana, *St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 212.—Bras.
glabra, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui. 1172, nomen.—Guian.
glabriuscula, *Wall. Cat.* n. 1185.—Burma,
grewiacfolia, *DC. Prod.* i. 477.—Ins. Molucc.
greviaefolia. Wall. Cat. n. 1443 = spicata.
guazumaefolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 304.—Am. austr.
harvensis, Veil. Fl. Flum. ix. t. 101= brevispira.
hirsuta, Buch.-Ham. in Wall. < at. n. 2686 «= spicata.
hirsuta, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 530.—Cochinch.
hispida, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 140.—Ins. Philipp.
integerriira, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848) 808.— Borneo.
involutrata, Moric. PI. Rar. Am. 100. t. 63=corylifolia.
Isora, *Linn. Sp. PI.* 963.—As. et Austral, trop.
Isora, Veil. Fl. Flum. ix. t. 102 = ovata.
jamaicensis, DC. ex Spreng. Syst. iii. 80«ovata.
jamaicensis, *Jacq. Select. Am.* 235. t. 179. f. 99.—Ind. occ

HELICTERES:—
jamaicensis, Lam. Encyc. vi. 87 = H. Isora.
javensis, *Blume, Bijdr.* 80.—Java,
lanata, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma*, i. 148.—Siam.
lanceolata, DC. Prod. i. 476-angustifolia.
lanigera. Wall. Cat. n. 1846 = spicata.
lenta, *Mart, in Flora*, xxii. (1839) I. *Beibl.* 16.—Bras.
longifolia, Wall. Cat. n. 2687= spicata?
macropetala, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 278.—Bras.
macrophylla, Wight, ex Wight *Sc* Am. Prod. 60~H. Isora.
mexicana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 305 = guazumaefolia.
microcarpa, *Span, in Linnaea*, xv. (1841) 173.—Malaya.
mollis, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 189.—Mexic.
muscosa, *Mart, in Flora*, xxii. (1839) I. *Beibl.* 14.—Bras.
oblonga, Wall. Cat. n. 1183, partim =spicata.
obtnsa, *Wall. Cat.* n. 1184.—Burma; China,
ovata, *Lam. Encyc.* iii. 88.—Bras.
paniculata, Lour. Fl. Cochinch. 531 – Stercolia grandiflora.
pentandra, Linn. Mant. 294.—Gnian.
pinnata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 384=Odina speciosa.
plebeja, *Kurs, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1S70) II. 67.—Burma.
proniflora. Rich, in Act. Soc. Hist Nat. Par. i. (1792) 111=pentandra.
pulchella, *Wall, ex Boj. Hort. Maurit.* 35.—Ind. or.
rotundata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 29.—Cuba.
Roxburgh™, G. Don, Gen. Syst. i. 506 = H. Isora.
Sacarolha, *A. Juss. in St. Hil. V Cambess. PI. Us. Bras.* t. 64.—Bras.
salicifolia, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 189.—Ins. Phillpp.
semiglabra, *F. Muell. Fragm.* v. 43.—Austral,
semitriloba, *Bert, ex DC. Prod.* i. 476.—Ins. S. Doming,
spicata, *Colebr. ex Roxb. Hort. Beng.* [97J, nomen.—Reg. Himal.; Malaya.
spinulosa, Wall. Cat. n. 1847-glabriuscula.
sundaica, *G. Don, Gen. Syst.* i. 508.—Malaya,
tiliaefolia, *Dum.-Cours. Bot. Cult.* ed. II. v. 119.—Hab.?
tiliaefolia, Fisch. ex Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 24 (=praec. ?).—Bras.
trapezifolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 170.—Cuba.
undulata, Lour. FL Cochinch. 581=Sterculia lanceolata.
verbascifolia, Hort. Cels, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 200=ovata.
vestita, Wall. Cat n. 1844=spicata.
mrgata, Wall. 1. c. n. 1181=angustiiblia.
viscida, *Blume, Bijdr.* 79.—Java.
Vuardme, Mart, in Flora, xxii. (1839) I. Beibl. 13 = altheaefolia.

HELICTONIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789) - Splranth6B, Rich. (Orchid.).

HELIE, M. Roem. Syn. Hesper. 42 (1846)=Atalantia, Correa (Rutac.)-
atalantioides, M. Roem. 1. c.=A. buxifolia.
lanceolata, M. Roem. 1. c. 43 = Glycosmis simplicifolia.

HELIETTA, Tul. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. vii. (1847) 280. *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 801.
multiflora, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 185.—Bras.
parvifolia, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 1885.-Mexic
Plaeana, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. vii. (1847) 281.-N. Granat.

HELIGMA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 711 (1876)=seq.

HELIGME, Blnme, Fl. Jav. Praef. p. vii (1828) - Parsonsia, R. Br. (Apocyn.).
buruensis, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 405.—Java.
jmaniea, Blume, Bijdr. 1043=P. spiralis.
Korthalsiana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 429.—Sumatra.
Minahassae, Teijsm. *Sc* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 404.—Java.
Rheedii, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. IIL t. 810 = P. Rheedii.
Rheedii, Wight, Ic. iv. 1.1303-P. spiralis.
spiralis, Thw. Enum. PI. Zeyl. 193-P. spiralis.

HELIJTOB, E. Mey. ex Endl. Gen. 1102 (1840). *RHAMNEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 385.
MYSTACINUS, Rafin. Sylva Tellur. 80 (1838) nomen ptius.
arabica, *Jaub. &• Spach, Illustr.* v. 81. t. 472.—Arab,
brevipes, *Radii, in Bremen, Abh.* viii. (1883) 385.—Afr. trop.
lanceolatus, *Brand. For. Fl.* 574.—Reg. Himal.
Mystacinus, *E. Mey. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 742; *Hemsl. in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 385.—Afr. trop.
ovatus, *E. Mey. in Drigt, Zwei Pfi. Docum.* 190, nomen; *ex Harv. &* Sond. Fl. Cap. i.* 479.—Afr. austr.
scandens, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 139 = H. Mystacinus.

HELIOCARPOS, Linn. Gen. ed. 1.157 (1787)-seq.

HELIOCARPUS, Linn. Syst. ed. II. 25 (1740). *TIUACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 284.
MONTIA, Houst. ex Linn. Hort. Cliff. 211 (1737).
americanus, *Linn. Sp. PI.* 448.—Mexic
appendiculatus, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1868) I. 226.—Mexic.
arborescens, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 86.—N. Granat.
oblongifolins, *TUTCB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1868) i. 573.—Bras,
popayanensis, *H. B.V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 341.—N. Granat.
tomentosus, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 226.—Mexic.
trichopodus, *Turct. I. c.* 226.—Venezuel.

HELIOCARYA, Bnnge, Heliocarya, Mosc. (1871) 4. *BORAGINEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 846.
monandra, *Bunge, 1. c.*—Persia.

HELIOCHARIS, Iindl. Syn. 281 (1829) = Eleocharis, R. Br. (Cyperac.).

HELIOCHROA, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 258 (1884) - HELICHROA, Rafin. = Eohinaoea, Moench (Compos.).

HELIOGENES, Benth. PI. Hartw. 42 (1840) = Aganippea, DC. (Compos.).
longifolia, Benth. 1. c. = A. bellidiflora.
Reglae, Benth. 1. c. = A. bellidiflora t

HELIOMERIS, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 171-Oymnolomia, H. B. *Sc* K. (Compos.).
multiflora, Nutt. 1. c.-G. multiflora.
simplex, Dur. in Jonrn. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855)91 = seq.?
tenuifolia, A. Gray, PI. FendL 84 = G. tenuifolia.

HELIONOPSIS, Franch. *Sc* Sav. Enum. PI. Jap. ii. 529 (1879) = Heloniopsis, A. Gray (Liliac).

HELIOPHIIiA, Burm. f. ex Linn. Sp. PI. ed. II. 926 (1763). *CRUCIFERAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 81.
CARPOPODIVM, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 13 (1835).
LEPTORMUS, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 8 (1885).
ORMISCUS, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 9 (1835),
ORTHOSELIS, Spach, Hist. *Vig.* Phan.Vi. 463 (1888).
PACHYSTVLUM, EckL & Zeyh. Enum. 13 (1886).
PRISCIANA, Rafin. Sylva Tellur. 114 (1888).
SELENOCARPAEA, EckL *Sc* ZeyhlEnnm. 10 (1885).
TRENTEPOHLIA, Roth, Catalect.; ex ejusd. Nov. PI. Sp. 325 (1821).
abrotanifolia, *Banks, ex DC. Syst.* ii. 690.—Afr. austr.
acuminata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 742.—Afr. austr.
affinis, *Sond. in Abh. Geb. Naturm. Hamb.* i. (1846) 208.—Afr. austr.
aggregate, *Steud. Norn.* ed. II. i. 742.—Afr. austr.
amplexicaulis, *Linn./. Suppl.* 296.—Afr. austr.
arabioides, Sims, Bot. Mag. t. 496=pilosa.
arenaria, *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* i. (1846) 262.—Afr. austr.
aturea, Willd. ex Sond. 1. c. 202-dissecta.
brachycarpa, *Meissn. in Hook. Land. Journ. Bot.* i. (1842) 465.—Afr. anstr.
brassicaefolia, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 12.—Afr. austr.
bursipastorisfolia, Ponrr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 854 = Brassica oxyrrhina.
caledonica, *Steud. Norn.* ed. II. i. 742 ; *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* i. (1846) 205.—Afr. austr.
callosa, *DC. Syst.* ii. 696.-Afr. anstr.
canescens, Willd. Sp. PI. iii. 528 - Farsetia Jacquemontii.

HELIOPHIIiA:—
carnosa, *Steud. Norn.* ed. II. i. 742.—Afr. austr.
chamaedrifolia, Steud. I. c, sphalm. = seq.
chamaemelifolia, *Burch. Trav.* i. 222, 225.—Afr. austr.
chamaemelifolia, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 11 = abrotanifolia.
drcaeoides, Linn. f. Suppl. 298=Chamira corauta.
cleomoides, DC. Syst. ii. 696=callosa.
cleomoides, Steud. Nom. ed. II. i. 800, sphalm. = glauca.
concatenata, *Sond. in Abh. Geb. Natural. Ham-* i. (1846) 214.—Afr. austr.
corouta, *Sond. I. c.* 246. t. 28.—Afr. austr.
coronopifolia, Lam. Encyc. iii. 90, partim = pendula.
coronopifolia, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 927, partim.—Afr. austr.
coronopifolia, Thunb. Prod. PI. Cap. 108=pilosa.
crithmifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 12=abrotanifolia.
crithmifolia, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 682.—Afr-austr.
dentifera, *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* i. (1846) 219.—Afr. austr.
diffusa, *DC. Syst.* ii. 685.—Afr. austr.
digitata, Linn. f. Suppl. 296=pilosa.
dissecta, Herb. Drège, ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i- 41 =variabilis.
dissecta, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 108.—Afr. austr.
divaricata, *Banks, ex DC. Syst.* ii. 687.—Afr. austr.
divaricata, Eckl. & Zeyh. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (1846) 236-stricta.
Dregeana, *Sond. 1. c.* 260. t. 28. f. 2.—Afr. austr.
Eckloniana, *Sond. I. c.* 206. t. 20.—Afr. austr.
elata, *Sond. I. c.* 247.—Afr. austr.
elongata, DC. Syst. ii. 697=linearifolia.
falcata, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. ll=linearis.
fascicularis, *Banks, ex DC. Syst.* ii. 691.—Afr. anstr.
fascicularis, Eckl. & Zeyh. Enum. 12=linearifolia.
filifolia, Thunb. Prod. PI. Cap. 108=linearifolia.
filifolia, Willd. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (1846) 212-pusilla.
filiformis. Lam. Encyc. iii. 91=longifolia.
filiformis. Linn. f. Suppl. 296 = Carponema filiformis-.
fistulosa, *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* i. (WW 209.—Afr. austr.
flacca, *Sond. 1. c.* 223. t. 22. f. 1.—Afr. austr.
flava, Linn. f. Suppl. 297 = Brachycarpaea varians.
florulenta, Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (~46) 268-camosa.
foeniculacea, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv-—Afr. austr.
foeniculacea, Eckl. & Zeyh. ex Sond. in Abb. *Ceo-* Naturw. Hamb. i. (1846) 282=tenuifolia.
frutescens, Lam. Encyc. iii. fll = incana.
glabra, *Steud. Nom.* ed. II. i. 742.—Afr. austr.
glauca, *Burch. ex DC. Syst.* ii. 690.—Afr. austr.
glauca, Eckl. & Zeyh. Enum. 12 = virgata, lineans.
gracilis, *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* i- (»*°; 230.—Afr. austr.
graminea, *DC. Syst.* ii. 697.—Afr. austr.
heterophylla, Thunb. Prod. PL Cap. 108=abrotani»»»-
hirsuta, E. Mey. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw-Hamb. i. (1846) 208 - pubescens.
incana, Burm. f. Fl. Ind. 140-Farsetia Jacquem-
incana, *[Soland. in) Ait. Hort. Kew.* ed. I. it 397,—Afr. austr.
incana, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 494 = pilos»-
incisa, Banks, ex DC. Syst. ii. 687 -pilosa.
inconspicua, E. Mey. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (1846) 227-pectinata.
integrifolia, Linn. Sp. PI. ed. II. 926=pilosa.
juncea, Vahl, ex DC. Syst. ii. 691-suavissima.
laevis, E. Mey. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. i. (1846) 228 = crithmifolia.
latisiliqua, E. Mey. ex Sond. 1. c. 224 = Thunberg-
lepidioides, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 175 (err- J' 174)-diffusa.
linearifolia, *Burch. ex DC. Syst.* ii. 692.—Afr. a-
linearis, *DC. Syst.* ii. 697.—Afr. austr.
liniflora, *DC. I. c.* 696.—Afr. austr.
liniflora, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 10-longifolia.
longifolia, *DC. Syst.* ii. 681.—Afr. austr.
longifolia, E. Mey. ex Sond. in Abh. Geb. N»- Hamb. i. (1846) 82-= affinis.
lyrata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 108.—Afr. austr.
macrosperma, *Burch. ex DC. Syst.* ii- 696.—Afr. austr.
macrostylis, *E. Mey, ex Sond. in Abh. Natttr*- i.* (1846) 225.—Afr. austr.

HELIOPHILA:—
maritima, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 11.—Afr. austr.
Meyeri; *Sond. in Abh. Geb. Natura. Hamb.* i. (1846) 226.—Afr. austr.
molluginea, *DC. Syst.* ii. 696.—Afr. austr.
monticola, *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* i. (1846) 216.—Afr. austr.
obligua, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 53 = carnosa.
parviflora, Burch. ex DC. Prod. i. 233=crithmifolia.
pectinata, *Burch. Trav.* i. 260.—Afr. austr.
pectinata, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. ll=trirârca.
pectinata, E. Mey. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (1846) 226-Meyeri.
Peltaria, *DC. Syst.* ii. 686.—Afr. austr.
pendula, E. Mey. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (1846) 40 = monticola.
pendula, Pall, ex Sond. L c. 179-Carponema filiformis.
Pendula, *Willd. Sp. PI.* iii. 629.—Afr. austr.
pennata, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 41 = pendula.
P'losa, *Lam. Encyc.* iii. 90.—Afr. austr.
P»tnata, Linn. f. Suppl. 297=trifida.
Pmnata, Vent. Jard. Malm. t. 113=pendula.
Pmnata, Willd. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (1846) 228 = crithmifolia.
PlatysiHqua, [J?. *Br. in] Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 99.—Afr. austr.
Platysiligua, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 12=linearifolia.
Platysiligua, Meissn. in Hook. Lond. Joum. Bot. l. (1842) 462 = stylosa.
PObescens, *Burch. Trav.* i. 259.—Afr. austr.
Pubescent, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. ll=subulata.
Pnsilla, *Linn.f. Suppl.* 297.—Afr. austr.
"tfracta, *Send, in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* i. (1846) 234.—Afr. austr.
r«iculata, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 12.—Afr. austr.
ngidiuscula, *Sond. in Abh. Geb. Natura. Hamb.* i. . (1846) 251. t. 27.—Afr. austr.
nvalis, *Burch. ex DC. Syst.* ii. 682.—Afr. austr.
rostrata, Presl, Bot. Bemerk. 10 - pilosa.
torcophylla, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot l. (1842) 463 = glauca.
scandens, *Harv. Thes. Cap.* ii. 43.—Afr. austr.
8co*paria, Burch. ex DC. Syst.* ii. 492.—Afr. austr.
sco*Paria,* Herb. Drège, ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb. i. (1846) 246 = comuta.
««*lifolia, Burch. ex DC. Syst.* ii. 684.-Afr. austr.
*"*elifolia,* Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 11 = foemculacea, "ithmifolia.
«*chifolia, *DC. Syst.* ii. 681.-Afr. austr.
**P«thulata,* E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. I. 40 - amplexicaulis.
s*P*haerostigma, Kunze, Ind. Sem. Hort. Lips. (1846) = Bstulosa.
'?<«, Sims, Bot. Mag. t. 2526=pilosa.
«n«a, *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* 1. (1846) J M - A f r . austr.
"ylosa, *Burch. ex DC. Syst.* ii. 692.-Afr. austr.
^avissin,^ *Burch. ex DC. I. c.* 691.-A&. austr.
**«»«imo, Diege, ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. BIRE amb- '• (1848) 261 = rigidiuscula.
*Tu*l , ata> *Burch*_ " *DC*_ $**iL 691.-A&. austr.
'"*ftlata,* Drege, ex Sond. in Abh. Geb, Naturw. «amb. i. (1846) 251-rigidiuscula.
" ^ '-•'-H Bula, ei DC. Syst. ii. 692=platysiliqua.
tenella, Banks, ex DC. 1. c. 680=dissecta.
tenuifolia, *Sond. in Abh. Geb. Naturw. Hamb.* l. (1846) 232.-Afr. anstr.
*f?"l"l9««. DC. Syst. ii. 680 = pusilla.
& • * » . *Steud. Norn.* ed. II. f. 743.-Afr. austr.
tri^T"' D c - Sy*l - "• 683 = pinnata.
rifu a> Th "*bProd. PI. Cap.* 108—Afr. austr.
JWurca, *Burch. ex DC. Syst* ii. 688.-A&. austr.
*iTi t*rca,* Herb. Berol. ex Sond. in Abh. Geb. Naturw. tw ?*mb - >- (1846) 232 -tenuifolia.
*fc'Hta - Tl >nnb. Prod. PI. Cap. 108=abrotamv
v^ X *S Burch. ex DC. Syst.* ii. 683.-Afr. austr.
innahs, .E. *Mey. ex Send, in Abh. Geb. Natunv.* vi Hamb - '• (18*«) 231.—Afr. austr.
*iX u f1 *Surch* - o**DC. Syst.* ii. 693.-Afr. awtr-
*viri"i*a> ?*»• & Zeyh. Enum. 12-rigidiuscula.
a, m eissn< in „ook_ Lond_ Jonn1, Bot. i. (1842) 462: = sty'
^ eri, *St* ^S; *Nom.* ed . n. i. 743,-Afr. austr.

HELIOPHTHALMUM, Rafin. Fl. Ludov. 72 (1817) = Budbeckla, Linn. (Compos.).
cicutefolium, Rafin. 1. c 73-R. cicutaefolia.

HELIOPHYLA, Neck. Elem. iii. 79 (1790) = Hello, phila, Bum. f. (Crucif.).

HELIOPHYLAX, Lestib. ex Steud. Norn. ed. II. i. 743 (1840) = HELEOPHYLAX, Beauv. = Solrpus, Linn. (Cyperac.).

HELIOPHYLLA, Scop. Introd. 817 (1777) = HeUophila, Burm. f. (Crucif.).

HELIOPHYTON, Benth. PI. Hartw. 240 (1846) = seq.

HELIOPHYTUM, DC. Prod. ix. 551 (1846)-Hellotroplum, Linn. (Boragin.).
anchusaefolium, DC. 1. c. 554 = Hcliotrop. anchusaefolium.
brachystachyum, DC. 1. c—Peruv.
chenopodiaceum, A. DC. in DC. 1. c. 558 - Heliotrop. chenopodiaceum.
crispulum, Frescn. in Mart. Fl. Bras. viii. 45.—Bras.
elongatum, DC. Prod. ix. 566 = Heliotrop. elongatum.
erosum, DC. 1. c 662 = Heliotrop. erosum.
fleridum, DC. 1. c 553 = Heliotrop. floridum.
foetidum, DC. 1. c. = Heliotrop. foetidum.
glabriusculum. Ton. in Bot. Mex. Bound. 139 = Heliotrop. glabriusculum.
indicum, DC. Prod. ix. 566 « Heliotrop. indicum.
Kotschyi, Bunge, Rel. Bot. Lehm. 404 = Heliotrop. tuberculosum.
lineare, A. DC. in DC. Prod. ix. 655.—Afr. austr.
lithospermifolium, DC. 1. c. 554.—Bras.
longiflorum, A. DC in DC. 1. c. 665 = Heliotrop. longiflorum.
macrostachyum, DC. 1. c. 656 » Heliotrop. macrostachyum.
nolle, Ton. in Bot. Mex. Bound. 138=Tournefortia mollis.
monostachyum, DC. Prod. ix. 556 •= Heliotrop. monostachyum.
nicotianaefolium, DC. 1. c. 554 = Heliotrop. nicotianaefolium.
odorum, Frescn. in Mart. Fl. Bras. viii. 45.—Bras.
parviflorum, DC. Prod. ix. 553 = Heliotrop. parvi. florum.
passerinuides, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Gui. 1152, nomen.—Guian.
persicariaefolium, DC. Prod. ix. 556 - Heliotrop. monostachyum.
Petersii, A. Br. *8c* BoucW, Ind. Sem. Hort. Berol. (1852).—Afr. austr.
phylicoides, DC. Prod. ix. 654 = Heliotrop. phylicoides.
portoricensis, Bello, In Anal. Soc. Esp. Hist. Nat x. (1881) 297.—Ins. Porto Rico.
pterocarpum, DC. Prod. ix. 552 = Heliotrop. pterocarpum.
rosmarinifolium, Bert, ex DC. 1. c. - Heliotrop. rosmarinifolium, *Bert.*
sidaefolium, DC. 1. c. 553 = Heliotrop. sidaefolium.
tiaridieides, DC. 1. c 655 - Heliotrop. tiaridioide
velutinum, DC. I. c. 667 » Heliotrop. indicum.

HELIOPSIS, Pers. Syn. ii. 478 (1807). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 368.
ANDRIEUXIA, DC. Prod. v. 569 (1836).
HELENOMOIUM, Willd. ex DC. 1. c. 551, in syn. (1886).
HELEPTA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).
KALLIAS, et CALLIAS, Casa. in Diet. Sc. Nat xxiv. 827 (1822).
annua, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 166.—Mexic.
Balsamorhiia,'RooV. Fl. Bor. Am. i.SlO = Balsamorhiza terebinthacea.
bnphthalmoldes, *Dun. in Mem. At us. Par.* v. (1819) 57.—Mexic.; Peruv.
bupthalmoides, A. Gray, Bot. Mex. Bound. 88 = parvifolia.
canescens, D. Don, in Bot Reg. t. 592«=scabra.
canescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 212= bupbthalmoides.

HELIOPSIS:—
dubia, Dun. in M^m. Mus. Par. v. (1819) 58 = Spilanthus Mutisii.
gracilis, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 853.— Am. bor.
helianthoides, Sweet. Hort. Brit ed. I. 487=laevis.
laevis, *Pers. Syn.* ii. 473.—Am. bor.
mollis, *Wender. Ind. Sem. Hort. Marb.* (1825); *ex Steud. Norn.* ed. II. i. 748.—Hab. T
padula (patula I], *Wender. I. c.; ex Steud. 1. c*—Hab. 1
parvifolla, *A. Gray, in PI. Wright,* ii. 86.—Mexic.
platyglossa, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxiv. 832»Guizotia abyssinica.
procumbens, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 156.—Mexic.
rugosa, Hort. Berol. ex DC. Prod. v. 551-•bupthalmoides.
scabra, *Dun. in Mint. Mus. Par.* v. (1819) 64.—Am. bor.
stricta, *Wender. Ind. Sem. Hort. Marb.* (1825); *ex Steud. Norn.* ed. II. i. 743.—Hab.?
terebinthacea, Hook. Fl. Bor. Am. i. 310 »Balsamorhiza terebinthacea.

HELIOREOS, Rafin. Ad. Joum. 145 (18S2)-Peotil, Linn. (Compos.).
angustifolius, Rafin. 1. c.-=P. angustifolia.

HELIOSCIADIUM, Bluff & Fing. Comp. Fl. Germ, i. 898 (1825)-HELOSCIADIUM, Koch«Apium, Linn. (Umbellif.).

HELIOSPERMA, Reichb. Nom. 206 (1841); et Ic. Fl. Germ. xvi. 71. t. 277 (1844) - Silene, Linn. (Caryophyll.).
alfestre, Reicbb. Repert. 206 = S. alpestris.
chromodontum, Rohrb. Monog. Silene, 232 > S. chromodonta.
eriophorum, Juratzka, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 37 -=S. colorata t
glutinosum, Reichb. ex Juratzka, 1. c. Sitzb. 80 = S. quadridentata ?
macranthum, Panfi. Elench. Cma-Gora, 11.—Montenegr.
monachorum. Vis. *8c* Pan& in Mem. 1st. Venet. xii. (1864) 463 - S . (juadridentata.
pudibundum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel, i. 182 - S . quadridentata.
pusillum, Vis. Fl. Dalm. iii. 171 - S. quadridentata.
quadrifidum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 182, in obs. - S . quadrifida.
Tommasinii, Vis. Fl. Dalm. iii. 171.—Dalmat.
Veselskyi, Janka, in Bot. Zeit. xvi. (1868) 66.-Syria.

HELIOSPORA, Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 127 (1880)-HELOSPORA, Jack -= TimonlUB, Rumph. (Rubiac).

HELIOTRICHUM, Bess, ex Schur, Enum. PI. Tronss. 762 (1866)=-Avena, Tourn. (Gramin.).
planiculme, Bess, ex Schur, 1. c. = A. planiculmis.

HELIOTROPIUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1736). *BORAGINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 848.
BOURJOTIA, Pomel, Nouv. Mat Fl. Atl. 89 (1874).
BUCANION, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1861) I. 568.
DIALION, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1838).
ELIUVIA, Rafin. 1. c. 90 (1838).
EUPLOCA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 189.
HELIOPHYTUM, DC. Prod. ix. 551 (1845).
HIEXANTHEMUM, Spach, Hist Veg. Phan. ix. 31 (1840).
ORTHOSTACHYS, Spach, 1. c 82 (1840).
PENTACARYA, DC. Prod. ix. 569 (1845).
PERISTIMA, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1838).
PtocTONON, Rafin. 1. c. 88 (1838).
PIPTOCLAINA, G. Don, Gen. byst iv. 364 (1837).
PRESLAEA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 76. t. 164 (182V>.
PRESLEA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 888 (1827).
SARCANTHUS, Anderss. in Vet. Acad. Handl.Stockh. 1853 (1855) 209.
SCHLEIDENIA, Endl. Gen. 646 (1839).
SCHOBERA, Scop. Introd. 168 (1777).
SCORPIANTHES, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1838).
SYNZISTACHIUM, Rafin. 1. c, (1838).
TIARIDIUM, LehL<. Asperif. 18 (.1818).

HELIOTEOPITJM :—
abyssinicum, *Vatke,in Oestr. Bot.Zeitschr.T3M.* (1875) 168.—Abyssin.
acutiflorura, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 406.—Soongaria.
aegyptiacum, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1820) 8-pallens.
aetnicum, Jan, Elench. S ; Presl, ex DC. Prod. ix. 535 = Bocconi.
affghanum, Boiss. Fl. Orient, iv. 143 = undulatum.
africanum, *Schum. (f Thonn. Beskr. Guin. PI.* 87.—Air. trop.
agdense, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 297.—Persia,
aleppicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 88.—Cilicia; Syria. <
ambainense, G. Don, Gen. Syst. iv. 361, sphalm.= arbainense.
ambiguum, *DC. Prod.* ix. 533.—Afr. anstr.
ambainense, DC. 1. c. 537, sphalm. =» arbaineme.
americanum, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 11.—Mexic.
amplexicaule, *Vakl, Symb. Bot.* iii. 21.—Bras,
anchnsaefolium, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 23.—Reg. Argent.
angiospermum, Mnrr. Prod. Stirp. Gotting. 217 = parviflorum.
angustifolium, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 137.—Texas; Mexic.
anisophyllum, Beanv. Fl. Ow. ii. 62 = indicum.
anomalum, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 66.—Ins. Padf.
apiculatum, E. Mey. ex DC. Prod. ix. 541 = ovalifolium.
arbainense, *Fresen. in Mus. Senckenb.* i. (1883) 168.—gyp;
arborescens, Linn. Syst. ed. X. 913 = peruvianum.
arenarium, F. MuelL Fragm. vi. 116-nndulatum.
arenarium, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 319 Afr. trop.
argenteum, Willd. ex Lehm. Asperif. 73=lanatum.
argnzioides, *Kar. b" Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 406.—Soongaria.
asperrimum, *R. Br. Prod.* 493.—Anitral.
assyricum, Auch. ex DC. Prod. ix. 537=ramosissimum.
Aucheri, *DC. 1. c.* 588.—Persia,
bacciferam, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 38.—Arab.
bacci/erum, [Mo;. & Sesse,] ex DC. Prod. ix. S51 = Tournefortia Hemandesii.
Baclei, *DC. I. c* 546.—Afr. trop.
bahiense, DC. 1. c. 544=polyphyllum.
barbatum, *DC. 1. c.* 541.—Bras,
biannulatum, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) 300.—Afghan.
bicolor, Hochst. & Stend. ex DC. Prod. ix. 546 = strigosuin.
Bocconi, *Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825) 6; *Fl. Sic. Prod.* i. 205.—Sicil.; Graec.
Bovei, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 87—As. Min.; Syria,
brachygyne, *Benth. Fl. Austral,* iv. 896.—Austral,
bracteatnm, *R. Br. Prod.* 498.—Ind. or.; Malaya; Austral.
brahuicum. Stocks, in Hook. Kew Joura. iv. (1852) 173=dasycarpum.
brasiliannm, *Roth, Nov. PI. Sp.* 103.—Bras.
brevifolium, Wall. Cat. n. 914=strigosum.
brevilimbe, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 89.—Persia.
Brocckianum, Vis. PI. Aeg. et Nub. 8. t 2. f. 1 =• ovalifolinm.
Burmanni, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 786.—Afr. austr.
bursiferum, Wright, in Griseb. Cat PI. Cub. 211= polyphyllum.
cabulicum, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 328.—Afghan,
calcarenm, *Stocks, in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 174.—Beluchist.
califomicum, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. IV. (1885) 202 = convolvulaceum.
callosum, Sprang. Nov. Prov. 21=.lutenm.
campechianum, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 86.—Mexic
campestre, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 234.—Reg. Argent.
canariense, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5=Bystropogon canariense.
canariense, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 728» crosum.

HELIOTBOPIUM: .—
caneseens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 88-inundatum.
caneseens, *C. Koch, in Linnaea,* xix. (1847) 21.—As. Min.
caneseens, Lehm. Asperif. 38 = barbatum 1
caneseens, Moench, Meth. 415=enropaeum.
caneseens, Willd. ex Lehm. Asperif. 38 - Willdenowii.
capense, *Su. ex Lehm. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle,* iii. II. (1817) 13 ; *Asperif.* 60.—Afr. anstr.
capense, *Thunb. Fl. Cap.* ii. 248.—Afr. austr.
capitatum. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4-Bystropogon canariense.
carduehorum, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 627 — europeum.
carmanicum, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 324.—Persia.
chenopodiacenm, *C. Gay, Fl. Chil.* iv. 458.—Chili.
chenopodioides, Willd. Enum. Hort. Berol. 175 = curassavicum.
chilense, *Bert, in Merc. Chil.6U.—Cf. Bull. FJrussac,* xx. (1880) 112.—Chili,
chorassanicnm, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 801.—Persia,
chrysanthum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 401.—Chili
cinerascens, Aitch. Cat. Punjab PI. 94 = calcarenm.
cinerascens, *Steud. ex DC. Prod.* ix. 584.—Abyssin.
cinereum, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62=ovalifolinm.
cinereum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 89. t. 206 = inundatum.
circinatum, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 78.—As. Min.; Mcsopot.
citrifolium, *Lehm. Asperif.* 32.—Am. austr.
Claussenii, *DC. Prod.* ix. 643 —Bras.
commutatum, Roem. & Scbult. Syst. iv. "!9=europaeum.
compactum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 101=strigosum.
confertiflorum, *Boiss. V Noi, Diagn.* Ser. II. iii. 132.—Persia,
confertifolium, *Torr. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. 1.184.—Mexic
conocarpum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 398.—Austral,
convolvulaceum, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* vi. (1857) 403.—Am. bor. occ
cordifolium, Moench, Meth. 415=indicum.
cordofanum, Hochst. ex DC. Prod. ix. 546 = stngosum.
coriaceum, *Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur.* xiv. II. (1829) 810.—Mexic.
coromandelianum, Koen. ex Retz. Obs. ii. 9 = ovali folinm.
coromandelianum, Raddi, ex DC. Prod. ix. 533 = supinum.
corymbosum, *Rui* 6" Pav. Fl. Per.* ii. 2. t. 107.—Peruv.
crassifolium, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 131.—Persia,
crassifolium, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 515.—Chili.
cressoides, *Franch. in Revoil, Çomali,* 46.—Afr. trop.
crispatum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 895.—Austral.
crispum, Desf. Fl. Atlant. i. 151. t. 41=undulatum.
Cunninghamii, *Benth. Fl. Austral,* iv. 400.—Austral,
curassavicum, *Linn. Sp. PI.* 130.—Cosmop. trop.
eyrtostachyum, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 924 = bracteatum.
dasycarpum, *Ledeb. ex Eichw. PI. Nov. Casp.-Cauc.* 11. t. 5.—As. occ.; Ind. or.
decumbens, *Lehm. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle,* iii. II. (1817) 16.—Venezuela.
demissum, Roem. & Schult. Syst. iv. 38, 733=fruticosum.
dentatum, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 81.—Ins. Socotra.
denticulatum, *Boiss.* b" *Haussk. in Boiss. Fl. Orient.* iv. 145.—Persia.
desertorum, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 150=transoxanum.
dissitiflorum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 88.—Persia.
ditrichum. Stocks, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 145 = H. .Ophioglossum.
diversifolium, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 400.—Austral.
dolosum, De Not.Repert. Ligur. 319-Eichwaldi.
dubium, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 62.—Abyssin.
Eichwaldi, *Steud. Nom.* ed. II. i. 744.—Europ. austr.; As. temp.; Austral.

HELIOTBOPITTM :—
elachanthum, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 424 = Eritrichium australasicum.
ellipticum, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 62.—Abyssin.
ellipticum, Ledeb. in Eichw. PI. Nov. Casp. Cauc. 10= Eichwaldi.
elongatum, *Willd. ex Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 452.—Bras,
epacrideum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 396.—Austral.
erectum, Lam. Fl. Fr. ii. 281=europaenm.
erectum, *Veil. Fl. Flum.* 69 ; ii. t. 42.—Bras,
eremobium, *Bunge, in Bull. Soc. Nat Mosc.* xlii. (1869) I. 321.—Persia.
eriocarpum, Deiile, ex Lehm. Asperi£ 56 = undolatum.
eriocarpum, Schimp. ex DC. Prod. ix. 637 =ramosissimuin,
eritrichioides, *Kotschy, in Sittb. Acad. Wen, Math.-Nat.* Iii. *Abth.* I. (1866) 259.—Oriens.
erosnm, *Lehm. in Neue Sch. Naturf. Ges. Halle,* i«- II. (1817) 15.—Ins. Teneriff.
europaeum, Aitch. in Joum. Linn. Soc. xix. (1882) 178 = Eichwaldi.
europaeum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 38-supinum.
europaeum, *Linn. Sp. PI.* 130.—Europ. austr.; Afr. bor.; Oriens; Austral.
europaeum, Pall. Ind. Taur. 47, nomen=suaveolens.
fasciculatum, *R. Br. Prod.* 494.—Austral,
filaginoides, *Benth. Fl. Austral,* iv. 398.—Austral,
filiforme, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 86. t. 204.—Am. trop.
filosum, Lehm. ex DC. Prod. ix. 550, nomen.—Hab.
floridum, *C. Gay, Fl. Chil.* iv. 457.—Chili.
foetidum, Salisb. Prod. 112 = indicum.
foetidum, 5<rf*». *ex DC. Prod.ix.* 551, 553.—Bras.
foliatum, R. Br. Prod. 498 = bracteatum.
foliatum, Lehm. PI. Preiss. ii. 238 -asperrimum.
foliosum, Willd. ex Roem. & Schult. Systiv. 737 polyphyllum.
fruticosum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. S8=strigosum.
fruticosum, *Linn. Syst.* ed. X. 913.—N. Granat.
glabellum, R. Br. Prod. 494 = paniculatum.
glabriusculum, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* x. (1875) 50.—Mexic.
glandulosum, R. Br. Prod. 493«europaenm.
glaucophyllum, Moench, Meth. Suppl. 147=curassavicum.
glaucum, Salisb. Prod. 113=curassavicum.
glomeratum, A. DC. in DC. Prod. ix. 650=polyphyllum.
glutinosum, *Phil. Fl. Atac.* 38.—Chili.
gnaphalioides, Auct=seq.
gnaphalodes, Linn. Syst. ed. X. 913 = ToumeforM gnaphalodes.
gracile, R. Br. Prod. 493=ovalifolium.
gracile, R. Br. in Salt, Abyss. App. 62-Saltianum.
gracillimum, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* d"-(386!)) I. 294.—Persia.
grandiflorum, *Auch. ex DC. Prod.* ix. 532.—Armenia.
grandiflorum, Donn, Hort. Cantab, ed. VI. 421 Schrank, PI. Rar. Hort. Monac. t 2=corymbosum-
Greggii, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 187.—Mexic.
Griffithii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 131.—Afghan.
gymnocarpum, Borb. in Koezlem. xiv. (1876) *05== europaeum.
Halam, *Boiss. tf Buhse, in Nouv. Mem. Soc. Nat-Mosc.* xii. (1860) 150.-Persia.
Hausknechti, Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc. »»• (1869) I. 310=circinnatum.
helophilum, *Mart, in Flora,* xxi. (1838) H. *BeibU &•* —Bras.
hirsutissimum, *Grauer, Dec.* 1.—Europ. austr.; As. MU
hirsutissimum, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **V- (1875) 167.—Afr. trop.
hirsutnm, *Clarke, Trav.* ii. 451=supinum.
hirtum. Lehm. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle, m- (1817) 10 ^fruticosum.
hispidum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i»- 87 fruticosum.
horminifolium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII- "• S indicum.
Houstoni, E*C. Prod, ix: 549 = procumbens.
Humboldtianum, Roem. & Schult. Syst. iv. 7S7-> datum.
humifusum, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* W- 8S Cuba.
humile, R. Br. Prod. 497=fraticosum.

HBLIOTBOPTDM:-
humile, *Lam. Illustr.* i. 893.—Ind. oec.
humile; Salisb. Prod. 113-europacum.
humile, Scholt. Obs. Bot. 27=suaveolens.
humistratum,CAa».«i» *Linnaea,* iv. (1829) 462.—Bras,
imbricatnm, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 211.—Cuba,
incanescens, *Andn. ex Trautv. in Act. Hart. Petrop.* ix. (1884) 39, nomen.—Rossia.
incanum, *Ruia* 6" *Pav. PI. Per.* U. 2.1108. -Ecuador,
indicom, *Linn. Sp. PI.* 180.—Geront, trop.
intermedium, Andrz. ex DC. Prod. ix. 635 - suaveolens.
i&nndatum, *Sw. Prod. Veg. Ind. Oec.* 40.—Am. calid.
japonicum, *A. Gray, in Mem. Am. Aead.* N. S. ri. (1858-S9) 403.—Japon.
Kotsckyanum, Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlii. (1869) I. S12=Bovei.
Rowalenskyi, Stschég. in BuU. Soc. Nat. Mosc xxvi. (1853) I. 826-Szowitsii.
Kralikii, *Pomel, Norn. Mat. Fl. Atl.* 89.-Alger.
Immense, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 820.—Persia.
Kunrii, Lehm. Ic et Desc. Stirp. I9=ovalifolium.
lacunarium, F. Mnell. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. (1855) 20=europaeum.
lanatum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 89.—N. Granat.
lanceolatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. T. (1790) ed. I. Art. IV. 18-iudicum.
lanceolatum, *Ruh V Pav. fl. Per.* ii. 4. t. 111.—Peruv.
laaocarfum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. IT., 88 = Eichwaldi.
ktifoUum, *Willd. ex Lehm. Asperif.* 83.—Venezuela.
"xiflorum, Roth, Nov. PI. Sp. 102=bracteatum.
leavenworthii. Ton. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. u. 1.185 * polyphyllum.
%osum, *Vatie.in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1875) 167, in obs.—Afr. trop.
limbatum, *Benth. PI. Hartw.* 20.—Mexic.
I'mbatum, Torr. Bot. Mex. Bound. 138=confertt-folram.
unearifolium, *Phil. Fl. Atac.* 88.—Chili.
Weatum, Delile, Fl. Egypt 87-luteum.
Uneatum, *Vahl, Symb. Bot.* i. 18.—Aegypt.
»ifolium, Lehm. Asperif. 36 -paniculatum.
'Mospermoides, WilldT ex Roem. & Schult Syst. iv. 737=Anchusa tuberosa.
Mtorale, Ster. in BuU. Soc. Nat. Most xxiv. (1881) 1. 565 = Eichwaldi.
'ongiflorum, *Hochst. V Steud. ex DC. Prod.* ix. 555.—Arab,
•ongifolinm, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 251 —Afr. trop,
•gtf'olium, Noronha. in Verh. Batav. Gen. v. (1790) [illegible] *Chil.* (1878) 515.—, ChiiL
!»/«<«, Aitch. Cat. PI. Pnnj. 94-dasycarpum.
^Wtn, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 22.-Aegypt.
"•""•wwiurn, Guss. Enum. PL Inanm. 214. t 7-Eichwaldi.
"""ostachyum, *Hemsl. Bid. Centr. Am. Bot.* ii. 876. ~Mexic
™*labaricum,* Retz. Obs. iv. 24 - supinum.
*»n,anense, A$_{sy}$», *in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) i.'808.-Persia.
"""chionicum, ZJ«w. *Bot. Voy. Venus,* 21.-Ins. Marques *I*
•Barifolin,,,,; «•„„.w jf$_{rfil}$. *Obs.* ii. 8.-Ind. or.
marocca»«m, Lehm. Asperif. 66=.undula«m.
marocc»»«, B.jii, ».i«.«t; ex DC. Prod. ix. 537-arbainense.
mendocinum, *Phil, in Anal. Unh. Chil.* (1862) II. 400.—Chili.
mesinanuB„ *Bunge. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlh. (1869) i. 818,-Persia.
micranthos, Boiss. R Orient, IT. ^=*mauO«m.*
micranthum, *Bunge, in Mtm. Sat. Etr. Pltersb. w.* (1847) 399 Turkestan.
micranthum, *W*ria>i4|>(»B<.591.-Afr.to)p.
microcalyx, *Ru U &• Pav. Fl.* Ar. U- »• *• m Peruv.
microphyllum, *Stocks.* (1827) *S*. ex Wikstr. in Vet. Acad. Handl.* ii. 8. t. 110.—
microstachyum, Peruv.
minutiflorum, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 824.—Persia.

HBLIOTHOPrUM :—
monostachynm, *Cham, in Linnaea, to.* (1829) 455.—Bras.
moroccanum, G. Don, Gen. Syst. iv. 860->undulatnm.
myosotoides, Chapm. Fl. S. U. St. 880 = phyllostachynm.
myosotoides, Lehm. in Nene Schr. Naturf. Get. Halle, iii. II. (1817) 18=bicolor.
myosotoides, [Soland. in] Rnssell, Aleppo, ed. II. iL 246=Omphalodej myosotoides.
neglectum, Bnnge, in Bull. Soc. Nat. Mosc xlii. (1869) 1.312=circinnatum.
nicotianaefolium, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 23.—Reg. Argent,
nigricans, *Balf. /• in Pm. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 81.—Ins. Socotr.
niloticum, A. DC. in DC. Prod. ix. 541-ovalifolram.
Noeanum, *Boiss. Diagn.* Ser. IL iii. 182.—Persia.
nubicum, Bunge, in BulL Soc. Nat. Mosc. (1869) I. 830=undnlalnm.
oaxacanum, *DC. Prod.* ix. 543.—Mexic
oblongifolium, Horaem, Hort. Hafn. Suppl. 19=europaenm.
oblongifolinm, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 336.—Mexic.
obovatum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 101-ovalifolium.
ocellatum, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 463.—Bras.
odoratum, Moench, Meth. 416=penivianum.
odomn, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 81.—Ins. Socotr.
odorum, Salisb. Prod. 112open>vlannm.
odorum, Szov. ex Stev. in BuU. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1.567=suaveolens.
Olgae, Bunge, in Act Hort. Petrop. iii. (1875) 114-chorassanicum.
Ophioglossum, *Stocks, ex Aitch. Cat. PI. Punj.* 94.—Beluchist.
oppositifolium, *Ruin V Pav. Fl. Per.* iL 2. t 108.-Pernv.
orientate, *Linn. Sp. PI.* 131; *Houtt. Handleid.* vii. 419 (sp. dub.).—Malaya.
Ottoni, *Lehm. Asperif.* 69.—Venezuela.
OUonianum, Roem. *3c* Schult. Syst. iv. 7S3=praec.
ovalifolium, *Forsi. Fl. Aegypt. Arab.* 38.—Geront. trop.
pallens, *Delile, PL Afr. CaiU.* 69. t. 64.—Afr. trop.
Palmeri, *A. Gray, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvili. (1882-83) I21.-Mexic
paniculatum, *R. Br. Prod.* 494.—As. et Austral, trop.
paniculatum, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 148=zeylanicum.
paniculatum, Roxb. Hort. Beng. [13]; Fl. Ind. i. 465-Roxburghii.
parmlfolium, *Burck. ex Hemsl. Bot. Voy. Challenger,* i. II. 78.—Ins. S. Helena,
paradoxum, *Vatke.in Oestr. Bot.Zeitschr.* xxr. (1875) 167.—Arab,
parciflorom, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 486, 742; *Cat. PI. Cub.* 212.—Cuba,
paronychioides, *DC. Prod.* ix. 665.—Chili.
parviflorum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 80=indicum.
parviSomm, *Linn. Mant.* ii. 201.—Am. trop.
Parviflorum, Stev. ex Boiss. Fl. Orient iv. 131-Eichwaldi.
parnfolium, Edgew. in Joum. As. Soc Beng. xvi. (1847) II. 1216«strigo5um.
patebilcense, *H. B. U K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 87.—Am. austr.
pauciflorum, *R. Br. Prod.* 493.—Austral.
Pearcei, *Phil, in Anal. Unix, Chil.* (1861) I. 65.—Chili.
persicum, Apch.exDC. Prod. ix. 551; x. 72»Moltkia angnstifolia.
persicum, *Burnt, f. Fl. Ind.* 41. t 29.—Ind. or.
persicum, Lam. Encyc Iii. 94=uudulatum.
peruvlinum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 187.—Peruv.
pbylicoides, *Cham, in Linnaea,* iv. (1839) 460.—Bras,
phyllostachyum, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 137.—Am. bor, occ.
nilosum, *Suit tf Pav. Fl. Per. &* 8.1.110.—Peruv.
pinnaium, Vahl, Symb. Bot. iU. 21=Phacelia cirinatii
plebejum, Banks, ex Buch, Besch. Canar. Ins. 144 erosnm.
pleiopterum, *F. Muell. Fragm.* ix. 121.—Austral,
polypbyllura, *Lehm. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle,* iii. it (1817) 9.—Am. trop.
polystockyum, Poir. Encyc Suppl. iii. 23 - ovalL folium.

HEIJIOTKOPIUM :—
procumbens, H. B. *to* K. Nor. Gen. et Sp. iii. 88 = inundatum.
procumbens, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. *a.* 10.—Am. trop.
prostratum, *R. Br. Prod.* 494.—Austral.
prusianum, Bunge, in Bull. Soc. Nat Mosc xlii. (1869) 1.310=Bovei.
pterocarpum, *Hochst. tf Steud. ex DC. Prod.* ix. 552.—Arab.
pycnophyllum, *Phil. Ft. Atac.* 88.—Chili,
pygmaenm, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 252.—Afr. trop.
Radula. *Fisch. V Mey. ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 101.—Turkestan.
ramosissimum, Sieber, ex DC. Prod. ix. 536-unduIatum.
ramosum, Roxb. ex Wall. Cat n. 7015-bracteatum.
miHamm, Stocks, in Hook. Kern Joum. iv. (1852) 174.—Beluchiit.
repens, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 238.—Reg. Argent.
rigidifolium, *A. DC. in DC. Prod.* ix. 543.—Bras,
rigidulom, *DC. I. c.* ix. 640.—Bras.
rosmarinifolium, Bert, ex Steud. Norn. ed. II. L 744s stenophyllum.
rosmarinifolium, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 614.—Chili.
Rottleri, *Lehm. Asperif.* 66.—Ind. or.
rotundifolium, *Sieber, ex Lehm. Ic. et Desc. Stirp.* 18. t. 30.—Syria j Palaestin.
Roxburghiana, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 445-seq.
Roxbnrghii, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 54.—Ind. or.
rugosum, *Mart,* b* *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. It. (1844) 386.—Mexic.
rugosum, *Phil. Fl. Atac.* 38.—Chili.
rupestre, *Mart, b" Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) S35.-Mexic
salicioides,*Cham, in Linnaea.viii.* (1833) 117.—Bras,
salsum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 233.—Keg. Argent.
Saltianum, *Steud. Norn.* ed. II. 1. 744.-Anyssin.
samoliflomm, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii (1869) 1.814.—Persia.
scabrum, Lehm. Asperif. 70-—marifolium.
scabrum, *Ret%. Obs.* ii. 8.—Ind. or.
scandens, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 18-Tournefortia tetrandra.
scandens, *Veil. Fl. Flum.* 69; ii. t. 41.—Bras.
Schrentianum, Ledeb. Fl. Ron. iii. 102 - dasycarpum.
sclerocarpum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) 615.—Chili.
scorpioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 89 - latifolium.
scorpioides, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. ir. 737-Myosotis grandiflora.
senense, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 253.—Afr. trop.
sericocarpum, Bunge, in BulL Soc Nat. Mosc xlii. (1869) I. 322-Aucheri.
serpylloides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 212.-Cuba.
sidaefolium, *Cham, in Linnaea,* iv. (1829) 460.—Bras.
Sienites. DC. Prod. ix. 541=ff. *Syenites.*
simile, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 817.-Afr. trop.
(implex, *Meyen. Reise,* i. 436.—Peruv.
smyrnaeum, Bunge, in BulL Soc. Nat. Mosc. xlii. (1869) t. 311^Bovei.
sogdianum, *Bunge, in Mim. Sav. Sir. Pitersb.* vii. (1847) 402.—Turkestan,
somalense, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 166.—Air. trop.
stenophyllum, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 38.—Chili.
Steudneri, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 167.—Afr. trop.
Stevenianum, Andn. ex Hohen. Enum. PL Talasch. 76=Eichwaldi.
striatum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 876-strictum.
strictlssimum, *Marie. PI. Nouv. Am.* 146. t 87.—Bras,
strictum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iii. 87.—Venezuela.
strictum, Ledeb. Fl. Ron. iii. 100 - Eichwaldi.
strigosum, *Willd. Sp. PI.* 1. 743.—Afr. trop. Beluchist ; AustraL

HELIOTROPITTM :—
styligeium, *Trautv. in Act. Hart. Petrop.* vii. (1880) 481.—Keg. Caucas.
stylosum, French, in Révoil, £omali, 45 = H. Ophioglossum.
stylosum, *Phil, in Bot. Zeit.* xxviii. (1870) 600.—Chili.
suaveolens, *Bieb. Fl. Taur.-Cauc.* iii. 116.—As. Min.; Persia.
subcanescens, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 564=europaeum.
submolle, *Klotzsch, in Otto (f Dietr. Allg. Gartenz.* xx. (1852) 89.—Ecuador.
subulatum, Hochst. ex DC. Prod. ix. 529, 551 = zeylanicum.
suffruticescens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 90.—Alger.
sultanense, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 315.—Persia,
supinum, *Linn. Sp. PL* 13Q.—Europ. anstr.; Afr bor.; Oriens.
supinum, Pall, ex Georgi, Beschr. Russ. Reich, iv. 749 = enropaenm.
supinum, Thunb. Prod. PI. Cap. S3=ambiguum.
Syenites, Spreng. Syst. i. 539-• ovalifolium.
synzystachyum, *Ruiz* to* *Pav. Fl. Per.* ii. 3.—Peruv.
Szowitsii, *Stsch/g. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 828.—Armen.
teheranicum, *Bunge, I. c.* xlii. (1869) I. 309.—Persia,
tenellum, *Torr. in Marty, Rep. Expl. Red River* (1858% 304. t. 14.—Am. bor.
tenue, Wall. Cat. n. 916 = panicnlatum.
tenue, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 737 = filiforme.
tenuiflorum. Cuss. Fl. Sic. Syn. i. 216=europaeum.
tenuifolium, *R. Br. Prod.* 494.—Austral,
ternatum, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 21.-Ind. occ
tetrandrum, *Lour. Fl. Cochinch.* i. 103.—China.
thymeloides, Walp. Ann. v. 543»strigosum.
thymifolium, *Vahl, ex Lehm. in Neue Schr. Naturf. Ges. Halle*, iii. II. (1817) 17 ; *Asperif.* 67.—Hab. ?
thymoides, Jaub. & Spach, Illnstr. iv. 98 — strigosum.
tiaridioides, *Cham, in Linnaea*, iv. (1829) 453.—Bras.
tomentosum, Eurm. f. Fl. Cap. Prod. 4 = Bnrmanni.
tomentosum, Poir. Encyc. Snppl. iii. 23 — ovalifolium.
transalpinum, *Veil. Fl. Flum.* 68 ; ii. t. 40.—Bras,
transoxanum, *Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1847) 402—Persia; Turkest.
trichostomum, *Bunge, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xlii. (1869) I. 319.—Persia.
tuberculosum, *Boiss. Fl. Orient*, iv. 147.—Persia,
tubulosum, *E. Mey. ex DC. Prod.* ix. 637.—Afr. austr.
turcicum, Frivald. in Flora, xix. (1836) 486 = suaveolens.
umbellatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 18 (Quid?).—Java.
undulatum, Krai, ex Pomel, Nouv. Mat. Med. Atl. 89 = Kralikii.
undulatum, *Vahl, Symb. Bot.* i. IS.—As. occ.; Afr. trop.; Austral.
ventricosum, *R. Br. Prod.* 494.—Austral,
veronidfolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 232.—Reg. Argent.
vestitum, *Benth. Fl. Austral*, iv. 395.—Austral.
villosum, Presl, Fl. Sic. p. xxxiy=Bocconi.
villosum, Sieber, ex DC. Prod. ix. 541 = ovalifolium.
villosum, Willd. Sp. PI. i. 741 = hirsutissimum, *Grauer.*
virens, £. Mey. ex DC. Prod. ix. 588 = curassavicum.
viridiflorum, Lehm. Asperif. 30=Toumefortia viridiflora.
vulgare, Rota, Prosp. Fl. Berg. 63=europaeum.
Willdenowii, G. Don, Gen. Syst. iv. 359.—Bras.
zeylanicum, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 151—paniculatum.
zeylanicum, *Lam. Encyc.* iii. 94.—Zeylan.
xeylanicum, Wall. Cat. n. 2091 = bracteatnm.

HELIPTERON, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127-seq.

HELIFTERUM, DC. Prod. vi. 211 (1837). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 308.
ACROCLINIUM, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 270.

HELIPTEBTJH:—
ANAXETON, Gaertn. Fruct. ii. 406 (1791) ; Cass. in Diet. Sc. Nat. xxvi. 52 (1823); xxxir. 37 (1826).
ANISOLEFIS, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 446 (1845).
ARGYRANTHES, Neck. Elem. i. 76 (1790).
ARGYROCUME, Gaertn. Fruct. ii. 410 (1791); Schrank, in Denkschr. Akad. Muench. viii. (1824) 146, 163.
ASTELMA, R. Br. in Bot. Reg. sub t. 632 (1820).
CASSINIOLA, F. Muell. Fragm. iii. 189 (1863).
DAMIRONIA, Cass. Diet. Sc Nat. lvi. 224 (1828).
DIMORPHOLEPIS, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 227.
DUTTONIA, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 409.
HYALOSPERMA, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 476 (1845).
MONENCYANTHES, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 229.
PTEROPOGON, DC. Prod. vi. 245 (1887).
RHODANTHE, Lindl. in Bot. Reg. 1.1703 (1834).
ROCCARDIA, Neck. Elem. i. 74 (1790).
SYNCARPHA, DC. in Ann. Mns. Par. xvi. (1810) 205. t. 6. f. 81.
TRIPTILODISCUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1861) II. 66.
XERANTHEMUM, Neck. Elem. i. 88 (1790).
XYRIDANTHE, Lindl. Swan River App. 23 (1839).
albicans, DC. Prod. vi. 215 •= incanum.
anactinum, F. Muell. Fragm. iii. 187—heteranthum.
anthemoides, *DC. Prod.* vi. 216.—Austral.
argyreum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 127-seq.
argyropsis, *DC, Prod.* vi. 211.—Afr. anstr.
bicolorum, DC. 1. c. 215»incanum.
brachyrrhynchum, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 517 - incanum.
Calvertianum, *F. Muell. Fragm.* x. 108.—Austral,
canescens, *DC. Prod.* vi. 212.—Afr. austr.
Cassinianum, DC. 1. c. 216 •= Schoenia Cassiniana.
Charsleyae, *F. Muell. Fragm.* viii. 168.—Austral.
chionolepis, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 416 = floribnndnm.
chlorocephalum, *Benth. Fl. Austral*, iii. 641.—Austral,
citrinum, *Ham. V Sond. Fl. Cap.* iii. 259.—Afr. austr.
citrinum, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 474- H. Cotula.
condensatum, *F. Muell. Fragm.* iii. 136.—Austral,
corymbifloram, *Schlecht. in Linnaea*, xxi. (1848) 448.—Austral.
corymbosum, *Benth. Fl. Austral*, iii. 649.—Austral.
Cotula, *DC. Prod.* vi. 216.—Austral.
diffusum, DC. 1. c. 216 -polygalifolium.
dimorpholepis, *Benth. Fl. Austral*, iii. 650.—Austral.
discoideum, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1854) 230— heteranthum.
Dregeanum, *DC. Prod*, vi 214.—Afr. austr.
elegantissimum, Stend. Norn. ed. II. i. 481, in syn.= canescens.
exiguum, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 39.—Austral.
eximium, *DC. Prod.* vi. 213.—Afr. austr.
fasciculatum, DC. 1. c. 214 •= Helichrysum sesamoides.
ferrugineum, DC. 1. c. 212 = Helichrysum squamosum.
ferrugineum, *Hart*, to" *Sond. Fl. Cap.* iii. 258.—Afr. austr.
filiforme, *DC. Prod.* vi. 215.—Afr. anstr.
floribundom, *DC. 1. c.* 217.—Austral.
Forrestii,/•'. *Muell. in Wing, South. Sc. Record*, ii. (1882) 273.—Austral.
Frenchii, *F. Muell. I. c.* iii. (1883) 34.—Austral.
fuscescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 80=Podotheca fuscescens.
glabratum, Sond. in Linnaea, xxiii. (1860) 65 = speciosissimum.
glutinosum, Hook, in Mitch. Joum. Trop. Austral. 361 = Helichrysnm glutinosum.
gnaphaloides, *DC. Prod.* vi. 213 —Afr. austr.
gracile, *Benth. Fl. Austfal.* iii. 646.—Austral.
Haigii, *F. Muell. Fragm.* x. 107.—Austral,
heteranthum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 198.—Austral.
heterophyllum, DC. Prod. vi. 214 = Helichrysum sesamoides.
Humboldtiannm, *DC. 1. c.* 216.—Anstral.
humile, DC. 1. c. 214-Helichrysum humile.

HEIiIPTERTJM :—
hyalospermum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iii. 644.—Austral.
incanum, *DC. Prod.* vi. 215.—Austral,
involucratum, *F. Muell. Fragm.* iii. 135.—Austral.
Kendallii, *F. Muell. I. c.* viii. 168.—Austral,
laeve, *Benth. Fl. Austral*, iii. 649.—Austral.
largifiorens, F. Muell. Fragm. iii. 135 - Humboldtianum.
longibracteatum, Stend. Norn. ed. II. i. 739, in syn.** Helichrysum humile.
Manglesii, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iii. 640.—Austral.
Margarethae, *F. Muell. Fragm.* xi. 48.—Afr. austr.
monencyanthoides, F. Muell. 1. c. iii. 137 = spicatum.
moschatum, *Btnth. Fl. Austral*, iii. 648.—Austral.
nheum, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 475 = obtusifolium.
phlomoides, *DC. Prod.* vi. 213.—Afr. austr.
polycephalum, *Benth. Fl. Austral*, iii. 649.—Austral-
polygalaefolium, *DC. Prod.* vi. 216.—Austral,
polyphyllum, *F, Muell. Fragm. i.* 35.—Austral.
praecox, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. i. (1855) S8 = H. Cotnla.
pterochaetuin, *Benth. Fl. Austral*, iii. 648.—Austral-
punctatum, DC. Prod. vi. 216=anthemoides.
pusillum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) II. 80 = H. Cotula.
pygmaeum, *Benth. Fl. Austral*, iii. 647.—Austral.
Pyrethrum, *Benth. 1. c.* 642.—Austral,
roseum, *Benth. I. c.* 640.—Austral,
rubellum, *Benth. I. c.* 641.—Austral.
Sandfordii, Hook. Bot. Mag. t. 5350 - Hnmboldti-sown.
seminudum, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 692 - speciosissimum.
semisterile, F. Muell. Fragm. ii. 157 - H. Cotula.
sesamoides, DC. Prod. vi. 214 - Helichrysum sesamoides.
simplex, Steetz, in Lehm. PI. Preiss. i. 475 = H: Cotulu-
speciosissimum, *DC. Prod.* vi. 211.—Afr. austr.
spicatum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iii. 8*7—Austral.
spinosum, Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 621, Index * Dicoma diacanthoides.
spinulosum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. «"*• (1851) 1.197 = ferrugineum.
sterilescens, /'. *Muell. in Wing, South. Sc. Record*, «• (1882) 274.—Austral,
stipitatum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iii. 6*3-Austral.
strictnm, *Benth. Fl. Austral*, iii. 646.—Austral.
Stuartianum, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 518* floribundum.
tenellum, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 230 = Helichrysum filifolium.
tenellum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 1.198.—Austral.
Tietkensii, *F. Muell. Fragm.* viii. 227.—Austral,
variegatum, *DC. Prod.* vi. 212.—Afr. austr.
virgatum, *DC. I. c* 212.—Afr. anstr.
Zeyheri, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 66.—Afr. a

HELISANTHERA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phy- £ (1820) 87 = HELIXANTHERA, Lour. - I* thus, Linn.

HELITTOPHYLLUM, Blume, Bijdr. 652 (1825) * Helicia, Lour. (Proteac.).
japonicum, Steud. Norn. ed. II. i. 746, gphalm.-sei-
javanicum, Blume, Bijdr. 652 = Helicia robusta.
parviflorum, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I- Helicia serrata.

HELIX, Dum. ex Steud. Nom. ed. II. i. *US* (1840) Saliz, Tourn.

HELIX, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. *Car.* v>"- (1748) App. 224 = Hedera, Toura. (Araliac.)-

HELIXANTHERA, Lour. Fl. Cochinch. 142 (tf!><8" Loranthus, Linn.
parasitica, Lour. 1. c.—China.

HELIXIRA, Steud. Nom. ed. II. i. 745 (1840) =•«*

HELIXYRA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 8°6" Koraea, Linn. (Irid.).
flava, Salisb. 1. c = M. longiflora.

HELLEBORASTER, Moench, Meth. 236 (1794) = Helleborus, Tonm. (Ranunc).
foetidus, Moench, 1. c. = Helleborus foetidus.
viridis, Moench, 1. c. = Helleborus viridis.

HELLEBORINE, Toum. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 274 (1742); Pers. Syn. ii. 512 (1807) = 8erapiaB, Linn. (Orchid.).
<"nerieana. Stead. Norn. ed. I. 398 - Bletia verecunda.
Corallorrhiza, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 79 = Corallorrhiza innata.
cordata, F. W. Schmidt, 1. c. 81 = Listen cordata.
cordigera, Pers. Syn. ii. 512 - S. cordigera.
lati/olia, Moench, Meth. Snppl. 311 - Epipactis palustris.
leucoglottis, Steud. Norn. ea. I. 398 - S. Lingua.
Lingua, Pers. Syn. ii. 512 = S. Lingua.
longifolia, Moench, Meth. 715 = S. longifolia.
longipetala, Tenore, Fl. Neap. Prod. 63 = S. Pseudocordigera.
Nidus-avis, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 78-Neottia Nidus-avis.
<n>ata, F. W. Schmidt, 1. c. 80 = Listera ovata,
"Vglottis, Pers. Syn. ii. 512 - S. Lingua.
Palustris, Schrank, Fl. Monac. ii. 190 - Epipactis palustris.
pseudoeordigera, Sebast.Rom. PI. fasc. i. 11. t. 4. f. 1 = S. Pseudo-cordigera.
rubra, Schrank, Fl. Monac. ii. 119=Cephalanthera rubra.
svcculenta, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 78 - Neottia Nidus-avis.

HELLEBORO1DES, Adans. Fam. ii. 458 (1763) = Eranthis, Salisb. (Ranunculac.).

HELLEBORUS, Gueldenst. Reisen, ii. 196 (1791) - Veratrum, Tourn. (Liliac).
alius, Gueldenst. 1. c. = V. album.

HELLEBOHUS, [Tourn.] Linn. Syst ed. I (1735). *RANUNCULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 7.
HELLEBORASTER, Moench, Meth. 236 (1794).
abchasicus, *A. Br. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) *App.* 24.—Reg. Caucas.
rttifolius, Steud. Nom. ed. II. i. 746=niger.
ongustifolius, Host, Fl. Austr. ii. 90 = viridis.
*a*gustifolius,* Walp. Kep. i. 481, *»phalm. = argutifolius.*
*tiauorum,i4. *Br. Ind. Sent. Hort. Berol.* (1853) *App.* 23—Bithynia.
arSutifolius, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 8=lividus.
"'ropurpureus, Schult. Oestr. Fl. ed. II. ii- 103 = seq.
"trorubens, Waldst & Kit. PI. Rar. Hung. iii. 301. t. 271 = odorus.
^""ngarteni, *Km. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natum.* iv. (1853) 4.—Transsylv.
'""gesiacus, Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N - S. xvi. (1868) 325-foetidus.
*co«»', Schur, Enum. PI. Transs. 27 - Baumgartem.
*<*coni,* Tenore, Prod. Fl. Nap. App. iv. 26; ex ej. Fl. »p. iv. Syll. 79 =viiidis.
'•rnicaulis, Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N - S. xvi. (1868) 325 -viridis.
*ca»casieu8, *A. Br. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1853) *App.* 24.—'Reg. Caucas
"**jcus, *Regel, Ga'rtenfl.* (1866) 292.-Mingrel.
cor«cus, WUld. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = lividus,
tr«u, Host, Fl. Austr. ii. 87-odorus.
£clophyll*us, *Boiss. Fl. Orient,* i. 61.-Graec.
*"eftf*ifolius. *Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, S. xvi. (1868) 325-foetidus.
"££<>"»», Waldst. & Kit. ex Willd. Enum. Hort. 1 592 - viridis.
•fcf!^',Georgi?Beschr. Russ. Reich. 1071-orientalis.
^*"<JM. *Linn. Sp. PI.* 558.-Europ.
wnqrioides, Lam. Encyc. iii. 99-Isopyrnm fumanoideg.
grand,fl0niS) c , K nch, ex Rupr jn. Cauc. 32.-Reg. laucas.
grandiflorus, Salisb. Prod. 374 =niger.
graveolens, Host, Fl. Austr. ii. 89 •—odorus.
guttatus, *A Br Ind Sem Hort BtT* ol.(1853) *App.* 23.—Reg. Caucas.
heterophylus, *Wender. ex Steud. Norn,* ed. II. i- 746.- Hab.?

HEIiZJEBORUS:
Hunfahyanus, Kanitz, in Aschers. & Kanitz, Cat. Cormoph. Serb. 78 = odorus, viridis.
hyemalis, Linn. Sp. PI. 557 = Eranthis hyemalis.
ibericus, *Stev. ex Rupr. Fl. Cauc.* 287.—Reg. Caucas.
intermedius, *Guss. PI. Rar. Sic.* 224. t. 4.—Ital.
intermedius, Host, Fl. Austr. ii. 88 => latifolius.
involucratus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 271 = Eranthis hyemalis.
latifolius, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.—Europ. or.
laxus. Host, Fl. Austr. ii. 89-viridis.
lividus, *[Soland. in] Ait. Hort. Kev.* ed. I. ii. 272.—Corsica.
monanthos, Moench, Meth. 313 = Eranthis hyemalis.
multifidus, Vis. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 13 = viridis.
nemoralis, Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325, nomen - foetidus.
niger, *Linn. Sp. PI.* 558.—Europ.
nivalis, Siev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 735 = Eranthis sibirica.
ocddentalis. Rent. Cat. Grain. ,(1868) ; ex Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) Bibl. 53-viridis.
odorus, *Waldst.* b* *Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 692.—Hungar.
offidnalis, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 305 = orientalis.
olympicus, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 54.—Bithynia.
orientalis, Gars, ex Nym. Consp. 17 - cyclophyllus.
orientalis, *Lam. Encyc.* iii. 96.- Graecia; As. Min.
pallidus, Host, Fl. Austr. ii. 90-viridis.
ponticus, A. Br. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 24-orientalis.
porphyromelas, A. Br. & Bouche, 1. c. (1861) 13 - colchicus.
pumilus, Salisb. Prod. 874 = Coptis trifolia.
purpurascens, Fuss, Fl. Transs. 29, partim - Baumgarteni.
purpurascens, Waldst *8c* Kit. PI. Rar. Hung. ii. 105. t. 101-odorus.
ranunculinus, Sm. Ic. fasc ii. 37 =Trollius patulus.
rhodanicus, Jord. & Fourr. in Ann. Soc. Linn, Lyon, N. S. xvi. (1868) 325, nomen =- foetidus.
sibiricus, Spreng. Syst. ii. 658 = Eranthis sibirica.
thalictroides. Lam. Fl. Fr. iii. 316 - Isopyrum thalictroides.
timtus, Stev. ex Rupr. Fl. Cauc. 287 - colchicus.
trifolius, Linn. Sp. PI. 558-Coptis trifolia.
tri/olius, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 = lividus.
trilobus, Lam. Encyc. iii. 98 - Coptis trifolia.
tripkyllus, Lam. 1. c. 97-lividus.
vaginatus, Kit. ex Steud. Nom. ed. II. i. 746 = viridis.
vernalis, D. Don, ex Loud. Hort. Brit. Snppl. ii. 640 = latifolius?
vesicarins, *Auck. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* II. xvi. (1841) 357.—Syria.
viridifiorus, Stokes, Bot. Mat. Med. jii. 274-viridis.
viridis, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii.SO-caucasieus.
viridis, *Linn. Sp. PL* 658.—Europ.

HELLENIA, Retz. Obs. vi. 18 (1791)-CoBtus, Linn. (Scitamin.).
grandiflora, Retz. 1. c. = C. speciosus.

HELLENIA, Willd. Sp. PI. i. 4 (1797)=Alpinla, Linn. (Scitamin.).
abnormis, Lindl. in Trans. Hort. Soc vii. (1880) 60 - A. chinensisj
alia, Willd. Sp. PI. 5 = A. alba.
Allugkas, Willd. 1. c. 4 - A. Allughas.
aquatica, Willd. 1. c. 5 - A. aquatica.
arctiflara, F. Muell. Fragm. viii. 25 = A. arctiflora.
bracteata, Blume, Enum. PI. Jav. 60 = A. alata.
chinensis, Willd. Sp. PI. i. 5 = A. chinensis.
coerulea, R. Br. Prod. i. 308 = A. caerulea.
gracilis, Hausskn. in Flora, xlvii. (1864) 19 - A. gracilis.
melanocarpa, Teijsm. *8c* Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxiv. (1862) 328.—Sumatra.
hareifiora, Horan. Prod. Scitam. 36 — A. parviflora.
pubiflora, Benth. in Hook. Lond. Joura. Bot. ii. (1843) 236.—N. Cuin.
rubra, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 604 = A. rubra.
rufa, Presl, Rel. Haenk. 114. t. 21.—Ins. Philipp.
scabra, Blume, Enum. PI. Jav. 60.—Java.

HELLERIA, Fourn. ex Benth. *8c* Hook. f. Gen. iii. 1199 (lSSSJ-Peatuoa, Linn. (Gramin.).
livida, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 582 — F. livida.

HELLERIA, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 38. t. 7 - Vantanea, Aubl. iHumiriac).
obovala, Mart. 1. c 39 = V. obovata.
tmalifolia, A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 01 - V. obovata.

HELLMUTHIA, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen j et Syn. PI. Cyp. 90 (1855) = Pioinia, Sclirad. (Cyperac).
restioides, Steud. 1L cc. = F. membranacea ?

HELMENTIA, Jaume St. Hil. Expos, i. 876 (1805) •* HELMINTIA, Juss.=Picris, Linn. (Compos.).

HELMHOLTZIA, F. Muell. Fragm. v. 202 (1866). *PHILYDRACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 841.
acorifolia, *F. Muell. 1. c.* 203.—Austral,
glaberrima, *Caruel, in DC. Afonog. Phan.* iii. 6.—Ins. Padf.

HELMIA, Kunth, Enum. PI. v. 414 (1850)=Diosoorea, Linn.
adenocarpa, Kunth, 1. c. 425 = D. adenocarpa.
anomala, Kunth, I. c. 427 - D. anomala.
aspera, Kunth, 1. c. 429 = 1). aspera.
brachycarpa, Kunth, 1. c. 416-D. brachycarpa.
bulbifera, Kunth, 1. c. 435 = D. sativa.
campestris, Kunth, I.e. 425-D. campestris.
consanguinea, Kunth, 1. c. 428.—Guian.
convolvulacea, Kunth, 1. c. 416 — D. convolvulacea
coriacea, Kunth, 1. c. 422 — D. coriacea.
cuspidata, Kunth, 1. c. 428-D. cuspidata.
daemona, Kunth, 1. c. 439 = D. daemona.
Dregeana, Kunth, 1. c. 487.—Afr. austr.
dumetorum, Kunth, 1. c. 436 ^D. triphylla.
Ehrenbergia, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 360, sphalm. — seq.
Ehrenbergiana, Kunth, Enum. PI. v. 488 = D. reinotiflora.
fracta, Kunth, 1. c. 420 = D. fracta.
furcata, Kunth, 1. c. 419-D. furcata.
galipanensis, Kunth, 1. c. 417 - D. galipanensis.
Grisebachii, Kunth, 1. c. 432.—Bras.
hirsuta, Kunth, 1. c. 438 - D. hiraita, *Blume.*
Lacerdaei, Kunth, 1. c. 427 = D. Lacerdaci.
monodelpha, Kunth, 1. c. 421-D. monodelpha.
Moritziana, Kunth, 1, c. 422.—N. Granat.
multiflora, Kunth, 1. c. 431 --D. multiflora, *Mart,*
pilosiuscula, Kunth, 1. c. 434- D. pilosiuscula.
psilostachya, Kunth, 1. c. 429.—Cuba.
racemosa, Klotzsch, in Otto *8c* Dietr. Allg. Gartciu. xix. (1851) 3U3.—Am. austr.
scabra, Kur.th, Enum. PI. v. 430 = D. scabra.
Schomburgkiana, Kunth, 1. c. 424 - D. Schomburgkiana?
syringaefolia, Kunth, 1. c 423-D. syringaefolia?
tomentosa, Kunth, 1. c. 439-D. tomentosa, *Koen.*
trifoliata, Kunth, 1. c. 417 = D. trifoliaU.

HELMINTA, Willd. Sp. PI. iii. 1607 (1800), sphalm.- seq.

HELMINTHIA, DC. Fl. Fr. iv. 67 (1805) = seq.

HELMINTHIA, Juss. Gen. 170 (1789) (Htlmintia) = Pieris, Linn. (Compos.).
aculeata, DC. Prod. vii. 182 = P. aculeata.
asplenioides, DC. 1. c.=P. asplenioides.
Balansae, Coss. & Dur. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. i. (1854) 232, nomen; et in Bnll. Soc. Bot. Fr. iii. (1866) 744.—Oriens.
callosa, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 14 *(**Dectern callosa).*—Alger.
comosa, Boiss. Klench. 62.—Hispan.
dichotoma, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 496 = P. echioides.
echioides, Gaertn. Fruct. ii. 368. t. 159. *I* 2-P echioides.
glomerata, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 13 *(=Dedtr<: glomerata).*—A\get.
humifusa, Trevir. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826") 195-P. echioides

HELMINTHIA.—
lusitanica, Welw. ex Schlecht. In Linnaea, xxvii. (1854) 515.—Lusitan.
montana, Pomel, Nouv. Mat. FL Atl. It *(•= Decker a montana).*—Alger.
mucronata, Terrac. Fl. Vnlt. Syn. I11; et ex Nouv. Giom. Bot Ital. iii. (1871) 199-P. aculeata.
pratensis, Chev. Kl. Par. iii. 352 = P. echioides.
racemosa, Pomel, Nonv. Mat. Fl. Atl. 18 *{=Deckera racemosa).*—Alger.
rigida, Schult. ex Stend. Nom. ed. 1.398 = P. echioidet.
spinosa, DC. Fl. Fr. iv. 58 = P. ecbioides.
Sprengeriana, Gaertn. ex DC. Prod. vii. 138 - P. Sprengeriana.
tuberculata, Moench, Meth. 689 = P. echloides.

HELMINTHION, St. Lag. In Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 127=praec.

HELMrNTHOCAKPUM, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 200. t. 38 (1847)). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 488.
abyssinicum, *A. Rick. I. c.*—Afr. trop.

HELMINTHOSPERMUM, Thw. in Hook. Kew Joum. vi. (1854) 801. t. 9-Gironniera, Gaudich. (Urtic).
glabrescens, Thw. ex Plqnch, in DC. Prod. xvii. 209 =-G. reticnlaU.
scabridum, Thw. in Hook. Kew Jonrn. vi. (1854) 302 =G. subaequalis.

HELMINTHOTECA, VaUL ex Juss. Gen. 170 (1789)-seq.

HELMINTIA, Juts. Gen. 170 (1789) = HELMINTHIA, Jass.=Picris, Linn. (Compos.).

HEIiMOMTIA, Cogn. in Boll. Soc Bot Belg. xiv. U875) 289. *CUCURBITACEAE.*
leptantha, *Cogn. Diagn. Cucurb.* fasc i. 20.—Bras,
simplidfolla, *Cogn. 1. c.* 44.—Bras.

HELQDEA, Reichb. Nom. 211 (1841) - Elodea, Michx. (Hydrochar.).

HFXODES, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 64 = praec.

HELODIUM, Dum. Fl. Belg. 77" (1827)=Apium, Tourn. (Umbell.).
inundatum, Dum. 1. C.-A. inundatum.
nodiflorum, Dnm. L c = A. nodiflorum.
repens, Dnm. 1. c = A. nodiflornm.

HELOGYNE, Benth. Bot. Voy. Sulph.20.1.14 (1844)-Hofineisterla, Walp. (Compos.).
fasciculata, Benth. 1. c = Hofmeisteria fasciculata.
urenifolia, Walp. Rep. iv. 457, ex Ind.sphalm.-Hofmeisteria urenifolia.

HKLOGYHE, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 449. *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook, f. ii. 239.
apaloidea, *Nutt. I.* c—Peruv.

HELONIAS, Linn. Diss. Chen. 17 (1751); Amoen. Acad. iii. 12 (1756). *LIUACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 827.
ABALUM, Adans. Fam. ii. 47 (1763).
GOMPHOSTYLIS, Rafia. Fl. Tellor. ii. 30 (1836).
angustifolia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 212 - Zygadenus angustifolius.
angustifolia, Nntt in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 154 = Zygadenus Nuttallii.
anthericoides, Hoppe, ex Schnlt. f. Syst. vii. 1575-Tofieldia calyculata.
asphodeloides, Linn. Sp. PI. ed. II. 485 = Xerophyllnm asphodeloides.
borealis, Willd. Sp. PI. ii. 274-Tofieldia calyculata.
bracteata, Sims, in Bot. Mag. t. 1703—Zygadenus bracteatus.
bullata, *Linn. Sp. PI.* 842.—Am. bor.
dioica, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 243 = Chamaelirium carolinianum.
duiia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 213-Schoenocaulon gracile.
erythrosperma, Michx. 1. c. 212 = Zygadenus muscaeloxicus.
glaberrima, Link, Enum. Hort. Berol. i. 348 « Zygadenus glaberrimus.

HELONIAS:—
glaberrima, Sims, Bot. Mag. t 1680 « Zygadenus Fremonti.
graminea, Ell. Sketch, i. 423 — Zygadenus leimanthoides.
graminea, [Ker-Gawl.] in Bot Mag. 1.1599; Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 738 =• Stenanthium angustifolium.
guineënsis, *Thonn. in Schum. (f Thonn Beskr. Guin. PI.* 182.—Afr. trop.
japonica, Schnlt. f. Syst vii. 1567=Chionographis japonica.
laeta, Ker-Gawl. in Bqt. Mag. t 808 -Zygadenus muscaetoxicus.
lanceolata, Sims, Bot. Mag. sub t 747, sphalm.-seq.
lati/olia, Michx. Fl. Bor. Am. i. 212-bullata.
longifolia, *Fisck. ex Schult. f. Syst.* vii. 1567, nomen. —Hab.?
lutea, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. 11062=Chamaelirium carolinianum.
minuta, Linn. Mant. Ii. 225—Hypoxis minuta.
nigra, Ker-Gawl. in [Quart.] Journ. Roy. Inst i. (1816) 184 — Veratrum nigrum.
officinalis, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (1832) 234-Schoenocaulon officinale.
paniculata, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 67 -Zygadenus Nuttallii.
pumila, Jacq. Coll. ii. 260 - Chamaelirium carolinianum.
scapigera, Stokes, Bot Mat. Med. ii. 833-bullata.
striata, *Rafin. Atl. Journ.* 147 (Quid ?).—Am. bor.
tenax, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 248 = Xerophyllum asphodeloides.
tenuifolia, Salisb. Prod. 250 - Xerophyllum asphodeloides.
tomentosa, Mnhl. Cat. 87 ; et ex Schult f. Syst vii. 282 =-Lophiola aurea.
virescens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 267 = Zygadenus mexicanus.
virginica, Sims, Bot Mag. t 986 - Melanthium virginicum.
viridis, [Ker-Gawl.] in Bot Mag. 1.1096-Veratrum viride.

HEIiONIOPSIS, A. Gray, in Mem. Am. Acad. Ser. II. vi. (1858-59) 416. *LIUACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 827.
SUGEROKIA, Miq. in Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii 144 (1867).
brcviscapa, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xi. (1867) 436.—Japon.
grandifiora, Franch. & Sav. Enum. PL Jap. ii. 88,529 -—breviscapa.
japonica, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xi. (1867) 437.—Japon.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. iii. 146, ex parte—breviscapa.
pauciflora, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-59) 416.—Japon.
pauciflora, Maxim, in Boll. Acad. Pftersb. xi. (1867) 486=breviscapa.
umbellata, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 278.—Ins. Formosa.

HELOPHYLLUM, Hook. f. Handb. N. Zeal. FL 167 (1864)=Phyllaehne, Font (Stylid.).
clavigerum, Hook. f. 1. c.=P. clavigera.
Colensoi, Hook. f. 1. c. 168-P. Colensoi.
rubrum, Hook. f. 1. c—N. Zel.

HELOPHYTUM, Eckl. & Zeyh. Enum. 288 (1836) = Tillaea, Mich. (Crassulac).
filiforme, Eckl. & Zeyh. 1. c. 289=T. .capensis.
fluitans, Eckl. & Zeyh. 1. c.-T. capensis.
inane, Eckl. & Zeyh. 1. c = T. capensis.
natans, Eckl. & Zeyh. 1. c. 288 = T. capensis.
reflexum, Eckl. & Zeyh. 1. c. 289 - T. capensis.

HELOPUS, Trin. Fund. Agrost 108 (1820) - Eriochloa, H. B. *8c* K. (Gramin.).
acrotrichus, Steud. Nom. ed. II. i. 747.—Ind. or.; Arab.
aeuminatus, Steud. 1. c. = E. polystachya.
annulatus, Hochst. ex Steud. Syn. PL Gram. 100 = *nubicus.*
annulatus, Nees, Agrost. Bras. 17 = E. annulata.
barbatus, Nees, ex Steud. Nom. ed. 1L i. 747 — *acrotrichus.*
barbatus, Trin. in Sprang. Nene Entdeck. ii. 49.—Ins. Borbon.

HELOPUS:—
bolbodes, Hochst ex Steud. Syn. PI. Gram. 100.—Abyssin.
brackystachys, Trin. Sp. Gram. xxiv. t. 277 = E. distachya.
cognatus, Steud. Syn. PL Gram. 101 s E. polystachya.
globosus, Steud. 1. c 99.—Japon.
gracilis, Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii-484 - E. polystachya.
grandiflorus, Trin. Sp. Gram. xxiv. t. 278 = E. grandiflora.
javanicus, Steud. Syn. PL Gram. 101.—Java.
junceus, C. Muell. in Bot. Zeit xix. (1861) 814.—Ambon
Kunthii, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 7*7 * E. Kunthii.
laevis, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 49 " E. annulata.
Meyeni, Steud. Nom. ed. *It i.* 747.—Peruv.
mollis, C. Muell. in Bot. Zeit. xix. (1861) 3M—Am. bor.
nubicus, Steud. Syn. PI. Gram. 100.—Nubia.
obtusus, Steud. Nom. ed. II. i. 747.—Peruv.
pilesus, Trin. Fund. Agrost. 104 - E. polystachya.
polystachyus, Trin. ex Steud. Nom. ed. IL i. 747 » E. polystachya.
punctatus, Nees, Agrost. Bras. 16=-E. polystachya.
sanguinalis, Nees, 1. c. 17=Digitaria sanguinalis.
sucdnctus, Trin. ex Steud. Syn. PI. Gram. 100.—R* Casp.
trichopus, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Gram. 100" Panicnnn javftnicuni*
tridentatus, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 747 i *$1"'* PI. Gram. 100.—Am. austr.
villosus, Nees, ex Steud. 11. cc-E. villosa.

HELOSCHIADIUM, Marsson, Fl. WennL 88 (1859)-seq.

HELOSCIA, Dum. Anal. Fam. 84 (1829)-seq.

HELOSCIADIUM, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. w (1824) 125-Apitun, Tourn. (Umbellif.).
australe, Bunge, in Lehm. PL Preiss. i. 294 = A. prostratum.
bulbosum, Koch, in Nov. Act Nat. Cur. xii. I. (1824) 126 —Carum inundatum.
californicum. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 1 * Oenanthe sarmentosa.
capense, Walp. Rep. ii. 392=Carum capense.
crassipedatum, St Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, (1880) 127-seq.
crassipes, Koch, in Nov. Act. Nat Cur. xii. I. 125=A. crassipes.
deserticola, Phil. Fl. Atac 26.—Chili.
Falcaria, Hegetschw. Fl. Schw. 262-FaIcarU garis.
grdriU. Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 184. t. 81. A.
HeynfZnum, DC. Prod. iv. 106-PimpinelU neana.
hybridum, Mérat, ex F. Schultz, in Bonplandia, (1854) 236=A. nodiflorum.
intermedium, DC. Prod. iv. 105 = Carum inundatum.
intermedium, Tenore, ex Nym. Consp. 309 - A. florum.
inundatum, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. (1824) 126=A. inundatum.
ladniatum, DC. in Mem. Soc. Phys. Genev. iv. 496.—Peruv.
lateriflorum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. *ranunculifolium.*
lateriflorum, Koch, in Nov. Act Nat Cur. (1824) 126-A. Ammi.
Uptophyllum, DC. in Mim. Soc. Phys. Genev. iv. (» 493-A. leptophyllum.
nodiflorum, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I- 126=A. nodiflorum.
oppositifolium, Reuss. Kvet. SIov. (1858) 176.-Hab.
palatinum, F. Schulti, ex Nym. Consp. 309=A.
prostration, Bunge, in Lehm. PL Preiss. i- prostratum.
pubescens, DC. Prod. iv. 106 = Pimpinella diversifolia.
ranunculifolium, DC. 1. c 105.—Chili.
repens, Koch, in Nov. Act. Nat. Cur. xii. I. (1824) 126 -A. repens.
repens, Syme, ex F. Schultz, in Bonplandia, 287-A. nodiflorum.
Ruta, DC. Prod. iv. 106=A. graveolens.

HELOSCIADIUM :—
rutauum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 127=A. graveolens.
stmense, Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss, i. 324 = rimpinella simensis.
'toloniferum, Nym. Syll. 160-A. nodiflorum.
towum, DC. Prod. iv. 105=PimpinelU tenera.
trifohatum, DC. 1. c. 106 = Pimpinella divereifolia.
Walhchianum, Miq. ex Hohen. in Bot Zdt. vii. (1849) 775 = Pimpinella monoica.

HELOSERIS, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. L 748 (1840) = Seneoio, Toum. (Compos.).
P^lustris, Reichb. ex Nym. ConspVS52=S. palustris.

[a]ELOSIS, Rich, in Mém. Mus. Par. viii (1822) 416. t. 20, 287 BALANOPHOREAE> Ben*- & Hook. f. iii.
CA J-D*S 'A. Mutis, ex Caldas, in Seman. Nuev. Gran. i. (1 10) 26.
LATRAEOPHILA, Leandr. Sacram. ex A. St. Hi], in Ann. Sc Nat Sir. II. vii. (1837) 32.
IJ858) 69-mexicana.
asiliensis, Schott & Endl. Melet. 12-guyannensis.
V>ennensis, Spreng. Syst iii. 765-guyannensis.
Sutanensis, Auct = seq.
tuyannensis, *Rick. {„ Me'm. Mus. Par.* viiL (1822) 416. t. 20.—Am. trop.
aicensis, Rich. 1. c. 432-Scybalium jamaicense.
Videnskab. Stand. Nat. iv. U844) 181.-Mexic

HELOSPORA, Jacq. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1824) 127. 4. f. 3-Tbnonlus, Rumph. (Rnbiac).
flavescens, Jacq. 1. c. = T. Jambosella.

HELM 2 IX > Nees 5n ATM Nat. HistSer. I. vi. (1841) 45 =Sohoeniw. Linn. (Cyperac).
Motr * Decne. in Bull. Acad. Brax. iii. (1836) 170 = iuidfclU.
Spreng- PugUL 89 (non generis).—Ben S

SSL 0!?"' U'flW. *Sp. PI.* iv. 716.-Japon.
Steud. Norn. ed. I. 899-pYaec.

HELXINE, Linn. Sy8t ed> I. (1735) = Polygonum, Tourn.
arifolia, Rafin. Fl TeUor iii. 94 = P. arifolium.
cilinade, Rafin. L c- W-P. cilinode.
Convolvulus, Rafin. 1. c. = P. Convolvulus.
dumetorum, Rafin. I. c. = P.dumetoram.
i o ^ f r Rafin- L c. 10; 95=P. sagittatum.
scalfl «*»s, Rafin. 1. c. 10 = P. scandensT

HELKINE, Ileq. in Ann. Sc. Nat. Sir. I. v. (1825) 2*. *VRTICACEAEtBatih. Sc* Hook. f. iii. 398.
P^ Jl.?l-l*. Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 604
Soleirolii, *Reg. I. c.*—Cors. ; Sardin.

HELY lA R L « Blnme, Bijdr. 1048 (1826)-PaPBonaia, *javanic* c. = P. spiralis.

MAR: MINEA). GRA
LOD iAkiA, Beauv. Agrost. 108. t. 21 (1812).
capensis. Trin. in Mém. Acid. Pdtenb. Se>. VI. Sc. U. (1838) 248 =eompressa.
caud C, B> Stend Svn PI Gram 359-compresBa.
comn S^'^- *' *Pro*- 207.-Reg. calid.
coron na, Steni Svn PL Gram 858 = com„ pressa.
fasciculata Knnth> Re>- Gram. i. 153-compressa.
foliata, JT tend Sy PI - Gram. S59=compressa.
guyane d-1. c-compressa.
Hamiltoniana Steud. 1. c. 368-compressa.

HEMARTHBIA:—
perforata, Kunth, Rèv. Gram. i. 168 = Ophiurus perforatui!
peruviana, Steud. Nom. ed. II. i. 748~compresaa.
protensa, *Steud. Syn. PI. Gram.* 859.—Ind. or.
rugosa, Kunth, ReV. Gram. i. 163 •> Rottbodlia rugoaa.
uncinata, R. Br. Prod. i. 207=compressa.
vaginata, Buese, in Miq. PI. Jungh. 854=protensa.

HEMATODES, Rafin. FL Tellur. Iii. 93 (1836) = Salvla, Toum. (Labiat).
indica, Rafin. 1. c - S . indica.

HEMATOPHYLA, Rafin. Sylva Tellur. 71 (1838) = Besleria, linn. (Gesnerac).
mllosa, Rafin. 1. c—Hab. ?

HEMECYCLIA, Wight & Am. in Edinb. N. Phil. Journ. xir. (Apr. 1888) 297, sphalm. ?—*Cl* Hemicyolla, Wight & Arn.

HEMENAEA, Scop. Introd. 296 (1777), sphalm. - Hymenaea, Linn. (Legomin.).

HEMEROCALIS, Murr. Syst. ed. XIV (1784) 339-seq.

HEMEROCALI.IB, linn. Syst. ed. I (1735).
L1UACEAE, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 778.
alia, Andr. Bot. Rep. t. 194 = Fnnkia subcordata.
albo-marginata, Hort ex Vilm. FL Pi. Terre, ed. I. 366 = Funkia lanceolata.
caerulea, Andr. Bot. Rep. t. 6= Funkia ovata.
chinensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 748 = Funkia Sieboldiana.
cordata, Cav. Desc 124 = Funkia anbeordata.
cordata, Thunb. FL Jap. 143=Lilium cordifolium.
cordifolia, Salisb. in Trans. lino. Soc. viii. (1807) 11 = Lilium cordifolium.
crocea, Lam. FL Fr. iii. 267-fulva.
cucullata, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 748-Sieboldiana.
disticha, Donn, Hort. Cuttab. ed. VI. 93=fnlva.
Dumortierii, *Morr. in Hortic. Beige*, ii. (1834) 195. t 48.—Japon.
flava, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 462.—Europ.; As. temp.
flava, Suter, FL Helv. i. 206 • fulva.
fulva. *Linn. Sp. PI.* ed. II. 462.—Europ.; As. temp.
graminea, Andr. Bot. Rep. t. 244-minor.
graminea, Schlecbt. in Halle, Abh. i. in. (1834) 15= Dumortierii.
graminifolia, Schlecht. 1. c. -minor.
japonica, Thunb. FL Jap. 142-Funkia subcordata.
Kwanso, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1866) 66. t. 600 => fulva.
landfolia, Thunb. in Trans. Linn. Soc it (1794) 335 = Fnnkia lancifolia.
Liliastrum, Linn. Sp. PI. 824 =Paradisia Liliastrum.
Lilioasphodelus, Linn. 1. c.-flava.
longituba, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 152 = fulva.
lutea, Gaertn. Fruct. ii. 15. t. 88 => flava.
Middendorffii, *Trautv. b" Mey. in Middend. Seise (fl. Ochot.* 94).—Reg. Amur.
minor, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—As. bor.
plantaginea, *Lam.* Encyc. iii. 103 = Funkia subcordata.
pumila, Salisb. Gen. PL Fragm. 81=minor.
rutilans, Hort. ex Baker, in Journ. Linn. Soc xi. (1871) 359 = Dumortierii.
Sieboldiana, Lodd. Bot Cab. t. 1869 = Funkia Sieboldiana.
Sieboldii, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc xi. (1871) 359=Dumortierii.
spedosa, Sweet, Hort Brit. ed. II. 616, sphalm. =- Hymenocallis spedosa.
undulata, Siebold, ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1838) 119 = Funkia lancifolia.

HEMESOTRIA, Rafin. in Ann. *Gin.* Sc. Phys. vi. (1820) 88 - Astrephia, Dufr. (Valerian.).

HEMIACHYRIS, DC. Prod. v. 313 (1836) = auttierrezia, Lag. (Compos.).
glutinosa, S. Schau. in Linnaea, xix. (1847) 724-G. glutinosa.
texana, DC. Prod. v. 314-G. texana.

HEMIADELPHIS, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 76 (18S2)-Hygrophila, R. Br. (Acanthac).
polysperma, Nees, L c. 80-Hvgrophila polysperma.

HEMIAGRAPHIS, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. vii. (1864) 118-HemigraphlB, Nees (Acanthac).

HEMIAMBROSIA, Delpino, Studi Sopra Artemis. 57 (1871)=Franseria, Cav. (Coinpos.).
heterocephala, Delpino, 1. C.-Ambrosia pumila.

HEMIANDRA, R.Br. Prod. 502 (1810). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1218.
trevi/olia, Benth. in Enum. PI. Hueg. 79 • pungens.
candidissima, Rich, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 29-Trembleya Lychnitis.[1]
emarginata, Lindl. in Bot. Reg. (1841) Misc. 72= pungens.
glabra, Benth. Lab. Gen. et Sp. 287-pungens.
hirsuta, Benth. in Enum. PL Hueg. 79-pungens.
incana, *Bartl. in Lehm. PI. Pniss.* i. 857—Austral.
juniperina, Bartl. 1. c. 355-pungens.
Ieiamha, *Benth. Ft. Austral*, v. 110.—Austral.
linearis, Benth. in Enum. PL Hueg. 79 = pungens.
longifolia, BartL in Lehm. PL Preiss. i. 366 - pungens.
pungens, *X. Br. Prod.* 602.—Austral.
rupestris, Hueg. Bot. Arch. t. 4-pungens.

HEMIANDRINA, Hook. f. in Trans. Linn. Soc xxiii. (1860) 171. t 28-Agelaea, Soland. (Connarac).
borneensis, Hook. f. 1. c.=A. vestita.

HEMIANTHUS, Nutt. in Journ. Acad. Philad. i. (1817) 119. t. 6. f. 2-Miorantbemum, Michx. (ScrophuL).
adenander, Wright, ex Griseb. Cat. PL Cub. 185.—Cuba.
callitrichoides, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1868) 622-M. callitrichoides.
elatinoides, Griseb. Cat. PL Cub. 185-M.eIatinoidei.
erosus, Griseb. 1. c. 184.—Cuba.
micranthemoides, Nutt. in Joum. Acad. Philad. i. (1817) 119. t. 6. f. 2-M. Nuttallii.
muttiflorus, Wright, ex Griseb. Cat. PL Cub. 185 Cuba.
punctatus, Wright, ex Griseb. 1. c. 184.—Cuba.
reflexus, Wright, ex Griseb. 1. c. 186 = M. reñexnm.
trisetosus, Wright, ex Griseb. 1. c 185.—Cuba.

HEMIARRHENA, Benth. FL Austral, iv. 6)8 (1869). *SCROPHULARJNEAE*, Benlh. & Hook. f. ii. 974.
plantaginea, *Benth. I. c*—Austral.

HEMIBROMUS, Steud. Syn. PL Gram. 317 (1855)-Qlyoerla, R. Br. (Gramin.).
japonicus, Steud. 1. c - G. japonica.

HEMICAREX, Benth. in Joum. Linn. Soc. xviii. (1881) 867=Kobresia, Willd. et Bohoenoxiphlum, Nees (Cyperac.l.
curvirostris, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (18S8) 384 (Kobresiae sp.).—Reg. Himal.
Eckloni, Benth.—Cf. 1. c. xviii. (1881) 367 - Schoenoxiphium Ecklonii.
filicina, C. B. Clarke, 1. c. xx. (1883) 384 (Kobresiae sp.).—Reg. Himal.
Hcokeri, Benth. 1. c. xviii. (1881) 367 = Kobresia Hookeri.
laxa, Benth. 1. c. 367=Kobresia laxa.
linearis, Benth. 1. c.=Carex linearis, Kobresia trinervis.
Meyeriana, Benth.—Cf. 1. c. = Schotnoxiphium capensc.
pygmaea, C. B. Clarke, 1. c xx. (1888) 883 (Kobresiae sp.).—Reg. Himal.
reticularis, Bentb. 1. c. xviii. (1881) 367=Kobresia rcticularis.
Sickmanniana, Benth.—Cf. I. c. - Schoenoxiphium Sickmannianum.
Thunberiii, Benth.—Cf. 1. c-Schoenoxiphium Thunbergii.
trinervis, Benth. & Hook. f. ex C. B. Clarke, 1. c. xx. (1883) 382=Carex linearis, Kobresia trinervis.

HEMICARPHA, Nees & Am. in Edinb. N. Phil. Tonra, xvii. (1834) 268 = 8eirpuB, Toum. (Cyperac).
Drummondii, Nees, in Mart. FL Bras. ii. I. 62 — S. micranthus.

HEMICARPHA:—
Isolepis, Nees, ex Am. in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1884) 263 = Scirpus Isolepis.
nuda, Boeck. in Flora, xli. (.1858) 604 = S. lenticnlaris ?
occidentalis, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1888) 391.—Calif.
Schraderi, Kunth, Ennm. PI. it. 268 = S. Isolepis.
senegalensis, Steud. Syn. PI. Cyp. 180=S. Isolepis.
subsquarrosa, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 61 = S. xnicranthns.

HEMICARPURUS, Nees, Del. Sem. Hort. Vrat. (1839) 4; et Linnaea, xiv. (1840) Litt. 167=PineIlia, Tenore (Aroideae.).
fomicatus, Nees, 1L cc. 4 ; 168 = P. tuberifera.

HEMICARPUS, F. Muell. in Hook. Kew Joum. ix. (1857) 18 = Traehymene, Rudge (Umbellif.).
didiscoides, F. Muell. 1. c = T. Hemicarpus.
villosus, F. Muell. 1. c = T. villosa.

HEMICHAENA Benth. PI. Hartw. 78 (1841). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 943.
fruticosa, *Benth. I. c*—Mexic.

HEMICHARIS, Salisb. ex DC. Prod. vii. 510 (1839) = **Scaevola,** Linn. (Goodeniac).

HEMICHLAENA, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2066. *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. lii. 1053.
angustifolia, *Schrad. 1. c.*—Afr. anstr.
bulbosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 509 -Cyperus blysmoides.
capillifolia, *Schrad. in Goett. Gel. Anz.* (1821) m. 2066.—Afr. austr.
fascicularis, Steud. Syn. PI. Cyp. 2-angustifolia.
longifolia, *Nees, in Linnaea*, ix. (1834) 283.—Afr. austr.

HEMICHORISTE, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 76 (1832) = Juatioia, Linn. (Acanthac).
montana, Nees, 1. c 102 « J. montana.

HEMICHBOA, R. Br. Prod. 409 (1810). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 59.
diandra, *R. Br. Prod.* 409.—Austral,
mesembryanthema, *F. Muell. Fragm.* viii. 38.—Austral,
pentandra, *R. Br. Prod.* 409.—Austral.

HEMICICCA, Baill. Etnd. Gin. Euph. 645 (1858)= Phyllanthus, Linn. (Euphorbiac).
japonica, Baill. 1. c. 646=P. japonicus.

HEMICLIDIA.R. Br. Prot Nov. 40 (1810)=Dryandra, R. Br. (Proteac).
Baxteri, R. Br. 1. c.=D. falcata.

HEMICRAMBE, Webb, in Ann. Sc Nat Sér. III. xvi. (1851) 248. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 99.
fruticnlosa, *Webb, I. c*—Marocc.

HEMICYCLIA, Wight & Am. in Edinb. N. Phil. Joum. xiv. (Apr. 1833) 297 [Hemecyclia]. *EVPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 278.
ANAUA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 410 (1860).
ASTYLIS, Wight, Ic. 1.1992 (1853).
PERIPLEXIS, Wall. Cat. n. 8022 (1831).
andamanica, *Kurz, in Andam. Rep.* (1870) 47; *et Journ. As. Soc. Beng.* xlu. (1878) II. 240.—Ins. Andam.
australasica, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. n. 487.—Austral.
elata, *Bedd. Fl. Sylv.* ii. t. 279.—Ind. or.
Gardneri, *Thw. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 271. —Zeylan.
lanceolata, *Thw. Enum. PL Zeyl.* 287.—Zeylan.
lasiogyna, *F. Muell. Fragm.* iv. 119.—Austral.
rhakodiscos, Hassk. in Versl. en Med. Akad. Wetensch. iv. (1855) 140 = Cyclostemon rhacodiscns.
sepiaria, *Wight (f Am. in Edinb. N. Phil. Journ.* xiv. (1833) 297.—Ind. or.
snmatrana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 488.—Sumatra,
venusta, *Thw. in Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 272. —Ind. or.

HEMIDEMUS, Dum. Anal. Fam. 26 (1829) = **Hemi**desmufl, R. Br. (Asclep.).

HEMIDESMA, Rafin. Sylva Tellur. Index, 741 = seq.

HEMIDESMAS, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838) = Neptunia, Lour. (Legumin.).
***diffusus.R&fm.* I. c.=N. plena.**
plenus, Rafin. 1. c = N. plena.

HEMXDESMUS, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 56. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 740.
cordatus, Schult Syst. vi. 126 = indicus.
indicus, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 56.—Zeylan.
pubescens, *Wight* b* *Am. Contrib.* 63.—Ind. or.
Wallichii, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 5 = indicus.
Wallichii, Wight & Am. Contrib. 63 -- Ataerolepsis Wallichii.

HEMIDIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 191 (Quid?).

HEMIERIUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 27 (1336) = **Lloydia,** Salisb. (Liliac), etc.
grecum, Rafin. 1. c. = L. graeca.
planifolium, Rafin. 1. c. = Simethis bicolor.

HEMIEVA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 70 (1886) = **Saxi**fraga, Tourn.
ranunculifolia, Rafin. 1. c = S. ranunculifolia.
Richardsoni, Rafin. 1. c.—Boykinia Richardsoni.

HEMIGENIA, R. Br. Prod. 502 (1810). *LABIATAB*, Benth. & Hook. f. ii. 1218.
ATELANDRA, Lindl. Swan River App. 40. t. 5 (1839).
COLOBANDRA, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 857 (1845).
argentea, Bartl. in Lehm. PL Preiss. i. 360=sericea.
barbata, *Bartl. I. c*—Austral.
brachyphylla, *F. Muell. Fragm.* x. 19.—Austral.
canescens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 566.—Austral.
cuneifolia, *Benth. Fl. Austral*, v. 118.—Austral.
curvifolia, *F. Muell. Fragm.* i. 210.—Austral.
diplanthera, *F. Muell. 1. c.* vi. 111.—Austral.
Drummondii, *Benth. Fl. Austral*, v. 119,—Austral.
glabrescens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 566.—Austral.
hnmilis, *Benth. I. c.* 567.—Austral.
incana, *Benth. I. c.* 566.—Austral.
lanata, Benth. 1. c 567 = canescens ?
leiantha, *F. Muell. Fragm.* xi. 20.—Austral.
loganiacea, *F. Muell. 1. c.* 19.—Austral.
longifolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 291-Microcoris longifolia.
macrantha, *F. Muell. Fragm.* i. 210.—Austral.
microphylla, *Benth. in DC. Prod.* xii. 565.—Austral.
mollis, Benth. 1. c. 566 = canescens.
obovata, *F. Muell. Fragm.* xi. 19.—Austral.
obtusa, *Benth. in DC. Prod.* xii. 567.—Austral.
parviflora, Bartl. in Lehm. PI. Preiss. i. 859-sericea.
pimelifolia, *F. Muell. Fragm.* vi. 112.—Austral.
platyphylla, *Benth. in DC. Prod.* xii. 566.—Austral.
podalyrina, *F. Muell. Fragm.* vi. 112.—Austral.
polystachya, Benth. in DC. Prod. xii. 566 = incana.
pnngens, *F. Muell. Fragm.* xi. 20.—Austral.
purpurea, *R. Br. Prod.* 502.—Austral.
ramosissima, *Benth. in DC. Prod.* xii. 565.—Austral.
rigida, *Benth. 1. c.*—Austral.
scabra, *Benth. Fl. Austral*, v. 117.—Austral.
sericea, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 80.—Austral.
Sieberi, Benth. Lab. Gen. et Sp. 457 = purpurea.
subvillosa, Benth. in DC. Prod. xii. 566 = platyphylla !
teretiuscula, *F. Muell. Fragm.* vi. 111.—Austral.
westringioides, *Benth. in DC. Prod.* xii. 568.—Austral.

HEMIGHAPHIS, Nees, in DC. Prod. xi. 722 (1847). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1086.
HRMIAGRAPHIS, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 113.
altemata, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 1H.-Ind. or.
confinis, *T. Anders. I.* c. ix. (1867) 463.—Malaya.
crenata, Walp. Ann. iii. 1034, Index, sphalm.-latebrosa.

TTRTWrffR,ATTTTH;
crispa, *T. Anders, in Journ. Linn.Soc.* vii. (1864) US—China.
Cumingiana, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 153.—Ins. Philipp.
Decaisneana, *T. Anders, in Joum. Agr. Hort. Soc-Ind.* N. S. i. (1868) 270.—Malaya,
decipiens, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Not-App.* 153.—Ins. Philipp.
dura, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 46L—Ind. or.
ebracteolata, *C. B. Clarke, in Hoot. f. Fl. Brit. I*>- iv. 424.—Ind. or.
elegans, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 468—latebrosa.
elegans, *Nees, in DC. Prod.* xi. 722.—Burma,
flaccida, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* 424.—Burma,
flava, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) —Ind. or.
glandulosa, T. Anders, in Kurz, Andam. Rep. ApP-B. 13—Strobilanthes glandulosus.
glaucescens, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.* iv. 425.—Burma.
Griffithiana, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. C463.—Burma,
hirsuta, *T. Anders, in Joum. Agr. Hort. Soc.* N. S. i. (1868) 270.—Malaya,
hirta, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1865—Ind. or.
latebrosa, *Nees, in DC. Prod.* xi. 723.—Ind. or.
luzona, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *App.* 153.—Ins. Philipp.
parabolica, *Villar, I. c*—Ins. Philipp.
Pavala, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xxxix. (1 II. 78 = latebrosa.
primulaefolia, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. *Nov. App.* 158.—Ins. Philipp.
quadrifaria, *T. Anders, in Joum. Linn.Soc.J*.[] 468.—Burma.
repens, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *App.* **154.—**Ins. Philipp.
reptans, *T. Anders, ex Hemsl. Bot. Voy. Challe* i. III. 173.—Ins. Arou.
rhytiphylla, *Radlk. in Sitzb. Math. Phys. Acad. Muench.* xlii. (' 1884 ') [1883] 279.—Ins. Philipp.
rhytiphylla, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 153.—Ins. Philipp.
rupestris, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. ix. (462=ebracteolata.
strigosa, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. IH- *App.* 153.—Ins. Philipp.
venosa, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. I*"*- 423.—Ind. or.

HEMIGYMNIA, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. (1843) 363 - Cordia, Linn. (Boragin.).
Macleodii, Griff. 1. c. = C. Macleodii.

HEMIOTROSA, Blume, Rumphia, iii. 165 *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 395.
canescens, *Thn. Enum. PI. Zeyl.* 56, 4 0-8-Zeylan.
deficiens, *Bedd. Fl. Sylv.* t. 231.—Ind. or.
longifolia, *Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i-* Malacca.
Perrottetii, Blume, Rumphia, iii. 165 (***Perrottetii).—las.* Philipp.**
Pervillei, *Blume, 1. c.* 166.—Ins. Amboin.
trickocarpa, Thw. Enum. PI. Zeyl. 56 = • canescens.

HEMILEPIS, Kunze, Ind. Sem. Hort. Lips. ex Schlecht. in Bot. Zeit. x. (1852) 875=**Leon** Linn. (Compos.).
Ehrenbergii, Kunze, ex Schlecht. **1.** c—Hab. ?

HEMIHEBIS, Linn. f. Suppl. 45 (1781) Nov. Gen. 74 (1784). *SCROPHULAK* Benth. & Hook. f. ii. 931.
alsinoides, Lam. Encyc. iii. 105-montana.
diffusa. Linn. f. Suppl. 280-Diasda diffusa, etc.
latlpes, *Harv. ex Benth. in DC. Prod.* x. 256, —Afr. austr.
macrophylta, Thunb. Prod. PI. Cap. 105 - macrophylla, *Benth.*
montana, *Linn.f. Suppl.* 280.—Afr. austr.
peduncularis, Lam. Encyc. iii. 105 - Diasd» giana.
sabulosa, *Linn.f. Suppl.* 280.—Afr. austr.

HEMIMEH.IS:—
sessilifoha, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) I6.a-Afr. austr.
sinuata, Sm. in Rees, Cyclpp. xvii. n. 4~Diascia heterandra ?
unilabiata, Thunb. Prod. PL Cap. 105-Diascia unilabiata.

HEMIMERIS, Pers. Syn. ii. 192 (1807), partim; H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 876 (1817) - Alonsoa, Rn« *SC* Pav. (Scrophul.)/
acuHfolia, Pers. Syn. ii. 162=A. acutifolia.
caulialata, Pers. 1. c.-A. linearis.
coccinea, Willd. Sp. PL iii. 283 = A. linearis.
hirsuta, Spreng. Syst. ii. 809 = A. hitsuta.
incisifolia, Pers. Syn. ii. 162 = A. incisifolia.
\ntermedia, Lodd. Bot. Cab. t. 1466=A. incisifolia.
"neari/olia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 377 = A. hnearifolia.
linearis, Sm. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 97 - A. linearis.
Mutisii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 376 - A. canlialata.
Parviflora, H. B. & K. 1. c.=A. caulialata.
Procumbens, Pers. Syn. ii. 162 =A. procumbent,
"rtieifolia, Willd. Sp. PI. ill. 282-A. indsifolia.

HEMINEMA, Rafin. Fl. Tellur. ii 17 (1836) = Tradeseantia, linn. (Commelin.).
nultiftar Rafin. L. c - T. multiflora.

HEMIORCHIS, Ehrenb. ex Schweint Beitr. Fl. Aethiop. 241 (1867)=Lindenbergia, Lehm. (Scroph.).
"abessenica, Ehrenb. ex Schweinf. L C.-L scutellarioides.

HEMIOBCHIS, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliL (1878) ir. 108. t. 8. *SCITAMINEAE,* Heath. & Hook. £ iii. 841.
bunnanica, *Kurs, I. c*—Burma.

HEMIPAPPUS, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 348 = J-anaoetum, Toura. (Compos.).
'anus, C. Koch, 1. c. S41-T. argenteum.
"abellinus, C. Koch, 1. c - T. argenteum.

BEMCIPHOBA, F. Mnell. Census, 103 (1882). *VER-BENACEAE.*
fen, *F. Afuell. I. c*—AustraL

HEMIPHRACTUM, Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc. «ii. (1859) i. 262=Vateria, Linn. (Dipterocarp.).
""yandrum, Turcz. 1. c. 263 = V. acuminata.

HEMIPHRAGMA, Wall, in Trans. Linn. Soc. xiU. (1822) 611; et Tent. F1 Ne P. 16 1824 (Sch.). *SCROPHULARINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. *n.* 959.
heterophyllum, *Wall. II. cc.* 17; 612.-Reg. Himal.

^PHUES, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. vi. (J847) 469 [bis]=AetinotUS, Labill. (Umbellif.).
?#"«, Hook. f. 1. c. 471 [bis] = A. bellidioides.
%"Hoides, Hook. f. 1. c. 4 7 0 V o - A - belUdioides.
N°»°~Zelandiae,* Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xu. (1880) 365.-N. Zel.
suff»cata. Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. J847) 471 [bis]-A. bellidioides.
"•"*ientata,* Hook. f. 1. c.=A. bellidioides.

HEMI*a.xiA.CVB,* S. Wats, in Proc. Am. Acad. xviii. (1882-88) 164,165. *UUACEAE.*
latifolios, j. *Wats.* u Ct i64.-Mexic.

HEMIPILLIA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 296 (1835). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 628..
calophylla, *Par. &* (1874) 197.—Burma.
cordifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 296 Reg Himal.

HEMIPOGON, Decne. in DC. Prod. viii. 509 (IBM). *ASCLEPIADEAE* Benth & Hook L h 74 ^ igs.—
abietoides, FoUTn •» MaTi Fl Bras TU
Braa.
acerosa, *Decne. in Dc. prod.* viii. 509.-Braa.
luteus, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* Vi. 1V 197.—
Bras.

HEMIPOQON:—
peruvianns, *Fount, in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. xiv, (1882) 368.—Peruv.
setaceus, *Decne. in DC. Prod.* viii. 508.—Bras.
Sprucei, *Fourn. in Mart. Fl. Bras.* vi. IV. 197.—Bras.

HEMIPTELEA, Planch, in Comp. Rend. Par. lxxiv. (1872) 131-ZeLkova, Spach (Urticac.).
Davidii, Planch. 1. c—China.

HfiMIPTILIUM, A. Gray, in Tore. Bot. Mex. Bound. 105 (1858) = Stephanomeria, Nutt. (Compos.).
Bigtlovii, A. Gray, 1. c.=S. exigua.
Schottii, A. Gray, 1. c.= S. Schottii.

HEMISACRIS, Steud. in Flora, xii. (1829) 490 = Schiamua, Beaur. (Gramin.).
gonatodes, Steud. 1, c. =S. marginatus.

HEMISANDRA, Scheidw. in Bull. Acad. Brux. ix. I. (1842) 22 = Aphelandra, R. Br. (Acanthac).
aurantiaca, Scheidw. 1, c. 23=A. aurantiaca.

HEMISCLERIA, Lindl. Fol. Orchid. (1853) = Diothonea, Lindl. (Orchid.).
nutans, Lindl. 1. c—Peruv.

HEMISCOLA, Rafin. Sylva Tellnr. Ill (1838) - Cleome, Linn. (Capparid.).
iculeata, Rafin. 1. c. = C. aculeata.
ornithopoides, Rafin. 1. c = C. brachycarpa *1*

HEMISODON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 88 (1886) -> Leonotis, Pen. (Labiat.).
Leonurus, Rafin. 1. c.-L. Leonnrus.

HEMISPADON, Endl. in Flora, xv. (1832) 385.1.1 = Indigofera, Linn. (Legum.).
pilosus, Endl. 1. c.-I. pilosa.

HEMISPHACE, Opiz, Seznam, 50 (1852) = Salvia, Tourn. (Labiat.).
verticillata, Opiz, 1. c.-=S. verticillata.

HEMISTEGIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 89 (1886) » Salvia, Toum. (Labiat.).
mexicana, Rafin. 1. c. 90 -=S. mexicana,

HEMISTEIRUS, F. Mnell. in Linnaea, xxv. (1852) 434 = Trichinium, R. Br. (Amarantac),
psilotrichodes, F. Mnell. 1. c. 435 = T. corymbosum.

HEMISTEMMA, Juss. ex Thou. Gen. Nov. Madag. 18 (1806)=Hibbertia, Andr. (Dilleniac).
angustifolium, R. *ht.* in DC. Syst i. 414 = Hibbertia angustifolia.
asperifolium, F. Mnell. Fragm. i. 161 - Hibbertia furraracea.
Auberti, DC. Syst i. 418 •= Hibbertia coriacea.
BankHi, R. Br. in DC. Syst. i. 414 = Hibbertia Banksii.
candicans, Hook. f. in Hook. Kew Joum. ix. (1857) 48 = Hibbertia candicans.
Ccmmersonii, DC. Syst. i. 418 = Hibbertia coriacea.
dealbatum, R. Br. ex DC. Syst. i. 413.—Apstral.
ledifolium, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, i. 22 = Hibbertia ledifolia.
Leschenaultii, DC. Syst. 1. 414 =Beyeria opaca.
revolutum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) II. 4=Hibbertia microphylla.

HEMISTEMMA, Reiehb. Consp. 116 (1828)=Leuoas, R. Br. (Labiat).

HEMISTEMON, F. Muell. Fragm. x. 78 (1876) - Chloantheu, R. Br. (Verbenac.).
Bonneyi, F. Muell. 1. c.=C. Bonneyana.

HEMISTEPHIA, Steud. Norn. ed. II. i. 749 (1840), sphalm.-HEMISTEPTA, Bnnge.

HEMISTEPHUS, Drum, ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 51 = Hibbertia, Andr. (Dillen.).
linearis, Drum, ex Harv. I. c 52=Hibbertia spicata.

HEMISTEPTA, Bunge, in Dorp. Jahrb. Iitt. i. (1883) 222-SauflBurea, DC. (Compos.).
lyrata, Bunge, 1. c. = S. affinis.

HEMISTEPTIA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. U. (1835)88=praec.

HEMISTOMA, Ehrenb. ex Benth. in Wall. PL As. Rar. i. 60 (1830)-IieuoaB, R. Br. (Labiat.).
ovatum, Ehrenb. ex Benth. 1. c. = L. urticaefolia.

HEMISTVL1S, Walp. Ann. L 648 (1849) = seq.

HEMISTYIiTJS, Benth. PL Hartw. 123 (1848). *URTICACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f.iii. 398.
Doehmerioides, *Benth. 1. c.*—Ecuador,
brasiliensis, *Wedd. ex Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1873) 51.—Bras,
macrostachya, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. i. (1854) 208.—Venezuela,
odontophylla, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. I. 235".—Venezuela,
velutina, *Wedd. in Arch. Mus. Par.* viii. (1855-56) 526.—N. Granat.

HEHITHBINAX, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 930 (1883). *PALMAE,* Benth. & Hook. f.I.C.
compacta, *Hook./. 1. c.* 981.—Cuba.

HEMITOME, Nees, in DC. Prod. xi. 295 (1847), in obs. -Stenandrium, Nees (Acanth.).
ignea, Nees, 1. c. 292, in uyn. = S. igneom.

HEMITOMES, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. vi. 80. t. 12 (1856) = Newberrya, Torr. iMonotrop.).
congestum, A. Gray, 1. c. 81 = N. congesta.

HEMITOMUS, L'Hérit. ex Desf. Tabl. ed. I. 66 (1804) =.Alonsoa, Ruiz & Pav. (Scroph.).
fruticosus, L'Herit. ex Desf. 1. c.; et ed. II. 79 = A. linearis.
urticaefolius, L'Hérit. ex Desf. 1. c ed. II. 79-A. urticaefolia.

HEMITRIA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phyi. vi. (1820) 79. *LORANTHACEAE.*
uniflora, Rafin. 1. c—Hab. t

HEMIXANTHIDIUM, Delpino, Studi sopra Artemis. 60 (1871)-FranBeria, Cav. (Compos.).
montanum, Delpino, 1. c. - F. Hookeriana.

HEMIZONELLA in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 189. *COMPOSITAE.*
Durandi, *A. Gray, I. c*—Calif.
minima, *A. Gray, I. c*—Calif.
parvula, A. Gray, 1. c.=Durandi.

HEHIZOHTA, DC. Prod. v. 692 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 394.
CALYCABENIA, DC. Prod. v. 695 (1836).
HARTMANNIA, DC. 1. *c* 698 (1836).
OSMADENIA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 391.
angustifolia, Benth. PI. Hartw. 818 » corymbosa.
angustifolia, *DC. Prod.* v. 692.—Calif.
angustifolia, Durand, in Padf. Rail. Rep. v. 10 — mollis.
balsamifera, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1868) 64-corymbou.
Cephalotes, Greene, in fall. Torrey Bot. Club, ix. (1882)110-multiglanduloss.
ciliata, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 898 •= Layia chrysanthemioides.
citriodora, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i.* II. 807.-Calif.
Clevelandi, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club.* Ix. (1882) 109.—Calif,
congesta, *DC. Prod.* v. 692.—Calif.
congesta, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 109 - Lagophylla congesta.
congesta, Hook. *Sc* Am. Bot Beech. Voy. 356 •= angustifolia.
corymbosa, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 898.—Calif.
decumbens, Nutt. in Joum. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 175 = angustifolia.
Douglasii, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 366.—Calif.
DurandU, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 549 = liemizonella Durandi.
fasciculata, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* ii. 397—Calif.
filipes. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 356 - Lagophylla filipes.
Fitchii, *A. Gray, in Pacif. Sail. Rep.* iv. 109.—Calif,
floribunda, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 79. —Calif.

HEHIZ0N1A:—
Fremontii, A. Gray, 1. c ix. (1874) 191 - mulrl-glandnlosa.
frntescens, *A. Gray, I. c.* ad. (1876) 79.—Calif.
glomerata, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 309 •= fascicnlata.
Heennanni, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club,* ix. (1882) 15.—Calif.
hispida, Greene, 1. c. 63=Dcraglasii.
Kelloggii, *Greene, 1. c.* x. (1883) 41.—Calif.
Lobbii, Greene, I. c. ix. (1882) 109 - fasciculate,
lozulaefolia, *DC. Prod.* v. 692.—Calif,
macradenia, *DC. 1. c.* 693.—Calif.
macrocephala, Nutt. in Jonm. Acad. Ph'ilad. N. S. i. (1847) 175 = corymbosa.
minima, *A, Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-65) 549.—Calif,
mollis, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 365.—Calif.
multicaulis, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 355 = angustifolia ?
multiglandulosa, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 866.—Calif.
oppositifolia, Greene, in Ball. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 110=multiglandulosa.
paniculata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 17—Calif.
Parryi, *Greene, in Butt. Torrey Bot. Club,* ix. (1882) 16.—Calif.
parvifolia, Greene, 1. a = Heennanni.
parvula, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 549=Hemizonella Dnrandl.
panciflora, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 865.—Calif.
plumosa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 192 » Blepharizonia plumosa (in Addend.),
pungens, *Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* ii. 899.—Calif.
ramosissima, Benth. Bot Voy. Sulpb. 30=fascicnlata.
rudis, Benth. 1. c. 81=luzulaefolia.
sericea, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 356 = luznlaefolia.
spicata, Greene, in Bull. Torrey Bot Club, ix. (18S3) 16=Douglasii.
squalida, *Book. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 208.—Ins. Galapag.
Streetsii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 162.—Calif.
tenella, *A. Gray, t. c.* ix. (1874) 191.—Calif,
truncata, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 365.—Calif,
virgata, *A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound.* 100.—Calif.
Wheeled, *A. Gray, in Bot. Calif,* i. 617.—Calif.
Wrightii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 17.—Calif.

HEMOLEPIS, Hort. ex Vilm. Fl. PL Terre, ed. IL 396 (1866) = HeHopsiB, Pers. (Compos.).
canescens, Hort. ex Vilm. 1. c. - Heliopsis buphthalmoides.

HEMONACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xL 725 (1847) sphalm. -STEMONACANTHUS, Nees - Buellia, linn. (Acanth.).

HEMPRICHIA, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 896 = Commiphora, Jacq. (Burserac).
erythraea, Ehrenb. 1. c.-C. crythraea.

HEMYPHYES, Endl. Gen. Suppl. v. 3 (1850)=HEMIPHUES, Hook. f.-Aotinotus, LabilL (Umbellif.).

HENANTHUS, Less. Syn. Comp. 196 (1832) = Pteronia, Linn. (Compos.).
fasciculatus. Less. 1. c. = P. fascicnlata.

HENCKELIA, Spreng. Anleit. iL 402 (1817) = Didymoeatpua, Wall. (Gesnerac).
alata, A. Dietr. Sp. PI. i.57S=Bonnaya alata.
aromatica, Spreng. Syst. i7. Cur. Post 13 = D. subaltemans.
barbata, Spreng. 1. c -Chirita Horsfieldii.
hifolia, A. Dietr. Sp. PI. i. 574=Chirita bifolia.
capensis, A. Br. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 151 = Streptocarprjs Rexii.
dnerea, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 14 = D. cinerea.
corniculata, Spreng. 1. c. 13 = D. comiculata.
crinita, Spreng. 1. c.=D. crinita.
elongata, Spreng. 1. c. = Didissandra elongata.
frutescens, Spreng. 1. c.-Didymocarpus frutescens.
grandiflora, A. Dietr. Sp. PI. i. 57S=Bonnaya veronicaefolia.
grandifolia, A. Dietr. 1. c. 578 = Chirita macrophylla.

HENCKELIA:—
incana, Spreng. Syst. i. 88=Didymocarpns Rottleriana.
macrophylla, Spreng. 1. c. iv. Cur. Post 14 = Chirita macrophylla.
oblonga, Spreng. 1. c. 18=D. oblonga.
oppositifolia, A. Dietr. Sp. PI. i. 572=Bonnaya oppositifolia.
plicata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 14 - D. macrophylla.
primulaefolia, Spreng. 1. c 14 » D. aromatica.
pumila, A. Dietr. Sp. PI. i. 574 = Chirita pnmila.
racemosa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 18=D. racemosa.
reptans, Spreng. 1. c. 14=D. reptans.
Rexii, Heynh. Nom. L 890; ii. 708 = Streptocarpus Rexii.
Roxburghiana, A. Dietr. Sp. PI. i. 572 = Bonnaya reptans.
urticaefolia, A. Dietr. 1. c. B74 = Chirita nrticaeiblia.
villosa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 13-D. villosa.
Wallichiana, A. Dietr. Sp. PI. i. 574=Cbirita uiticaefolia.

HENDECANDRAS, Eschsch. in Mém. Acad. Pftersb. x. (1826) 287=Croton, Linn. (Euphorb.).
divaricatus, Klotzsch, in Wiegm. Aichiv, vii. (1841) 193-C. nitrariaefolius.
glahrescens, Klotzsch, 1. c.=C. nitrariaefolius.
longifolia, Klotzsch, 1. c.=C. montevidensis.
maritima, Klotzsch, 1. c. 252 «=C. maritimns.
montevidensis, Klotzsch, 1. c 193-C. montevidensis.
multifiora, Torr. in Frém. First Rep. 96 = C. texensis.
polymorpha, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 193=C. nitrariaefolins.
procumbens, Eschsch. in Mém. Acad. Pétersb. x. (1826) 287-C. califomicus.
texensis, Klotzsch, in Wiegm. Archiv, vii. (1841) 252 = C. texensis.
vellerifiora, Klotzsch, 1. c 198=C. nitrariaefolius.

HENFREYA, Lindl. Bot. Reg. (1847) 131 - Aeystasia, Blnme (Acanthac).
scandens, Lindl. 1. c.=A. scandens.

HENICOSTEMMA, Endl. Gen. 605 (1838) - Enico-Btema, Blume (Gentian.).

HENISIA, Walp. Rep. ii. 617 (1848) = Heinaia, DC. (Rubiac).

HENKELIA, Reichb. Consp. 124 (1828)-HENCKELIA, Spreng.=DldymooarpuB, Wall. (Gesner.).

HENIiEA, Griseb. in Abh, *Ges.* Goett. ix. (1860) 37. *MALP1GHIACEAE* [Benth. *Sc* Hook. f. i. 256].
HENLBOPHYTUM, Karst FL Colomb. i. 158 (1861).
echinata, *Griseb. in Abh. Ges. Goett.* ix. (I860) 37.—Cuba.

HENLEA, Karst. FL Columb. 88, in textn (1858) j 157. t 78 (1861) =Eufltla, Klotzsch (Rnbiac).
muwmensis, Klotzsch & Karst. ex Walp. Ann. ii. 788 sCascarilla muzonensis.
rosea, Klotzsch *Sc* Karst. ex Walp. I. c. -Cascarilla muzonensis.
splendens, Karst. Fl. Columb. i. 157. t 78.—N. Granat
thibaudioides, Kant in Linnaea, xxx. (1859-60) 151.—N. Granat.

HENLEOPHYTUM, Karst. *Fl.* Columb. i. 168 (1861) =Henle», Griseb. (Malpig.).
plumigerum, Sauv. Fl. Cub. 16-Henlea echinata.

HENTTBCABTIA, Poisson, in Bull. Soc Bot. Fr. xxxii. (1885) 40; Etude Nouv. Gen. Hennec. 5. *MON1M1ACEAE.*
omphalandra, *Poisson, II. cc.* 41; 6.—Paraguay.

HENNINGIA, Kar. ft Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc xv. (1842) 516-Eremnrua, Bieb. (Liliac.).
angustifolia, J. Gay, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xv. (1876) 282=E. anwtifoUus.
anisoptera, Kar. ft Kif'ln Bull. Soc. Nat Mosc. xv. (1842) 517 =E. anisopterus.
Aucheriana, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 98=E. Aucherianus.
persica, Regel, in BuU. Soc. Nat. Mosc. xlL (1868) I. 455 = E. persicus.
robusta, Regel, 1. c. 457=E.robnstns.

HENONIA, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 246=Henophyton, Coss. *Sc* Dur. (Crucifer.).
deserti, Coss. *8c* Dur.l. c 247-Henophyton deserti.

HEXTONIA, Moq.inDC. Prod. xiii. II. 237 (1849). *AMARANTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iiL 24.
acoparia, *Moq. I. c*—Madag.

HENONIX, Rafin. FJ. Tellor. ii. 13 (1886)-Baffl*. Linn. (Liliac).
japonica, Rafin. 1. C.-S. japonica.

HENOONIA. Griseb. Cat PI. Cnb. 186 (1866). *SAPOTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 662.
myrtifolia, *Griseb. I. c.* 167.—Cuba.

HENOPHYTON, Coss. *Sc* Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 625; iv. (1857) 469. *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 85.
HENONIA, COSS. *SC* Dur. in Bull. Soc Bot Fr. « (1855) 246.
deserti, *Coss. &" Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1867; 469.—Alger.

HENRICEA, Lem. Lis. in Bull. Soc. Philom. (1824) 171 =8wertia, Linn. (Gentian.).
pharmacearcka, Lem. Lis. 1. c =S. Chirayta.
spicata, Lem. lis. (sp. ignot.).—Hab.]

HECTBICIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) I[1]-*COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 277.
agathaeoides, *Cass. I. c*—Madag.

HENRIETIA, Reichb. Consp. 174 (1828)=seq.

HENRIETTA, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 76 (1837*1*)-**

HENKIETTEA, DC. Prod. iiL 178 (1828). *#*' *LASTOMACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 768.
PHYLLOPUS, DC. Prod. iii. 177 (1828).
angustifolia, *Berg, ex Triana, in Trans. Linn.* xxviii. (1871) 145.—Bras.
brasiliensis, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 85=sqceo».
flavescens, Baill. Hist. PI. vii. 34 = Hennette"* flavescens.
grandifolia, Macfad. Fl. Jamaic iL 76=ramiflora.
granulata, *Berg, ex Triana, in Trans. Linn. Soc.* W*[1] (1871) 144.-Bras.
maroniensis, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xv. (W[ggs]) 380.—Guian.
Marrii, *Naud. I. c.* in. xviii. (1852) 105.—Guian.
multifiora, *Naud. I. c*—Guian.
oblmgifolia, Naud. 1. c. iv. (1845) 58=MartU.
orinocensis, Naud. 1. c. 57 -Martii.
parvifiora, Griseb. Cat. PL Cub. 95=Hennette» parviflora.
Patrisiana, *DC. Prod.* iii. 178.—Guian.
racemosa, *Macfad. Fl. Jamaic.* ii. 76.—Jamaic.
ramiflora, *DC. Prod.* iii. 178.—Jamaic
Sagotiana, *Naud. ex Sagot, in Ann. Sc. Nat.* &»• xv. (1883) 83O.-Gnian.
Sagotiana, Naud. ex Triana, in Trans. Lvn»-xxviii. (1871) 142«Loreya mespiloides.
stellaris, *Berg, ex Triana, I. c.* 145.—Bras.
succosa, Benti. in Hook. Joum. Eot iL (184«; multiflora.
succosa, *DC. Prod.* iii. 178.—Guian.
succosa, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 246-ranuflo"
surinamensis, Miq. Stirp. Snrin. Select. « - £ ? ,rfi.
trinervia, Naud. in Ann. Sc. Nat. Ser. « - * (1852) 105 =ramiflora.

HENBTETTELLA, Naud. In Ann. Sc. Nat Sfn xviiL (1852) 107. *MELASTOMACEAE,* ** Hook. f.i. 769.
aggregata. *Triana, in Trans. Linn. Soc.* x** 143—Peruv.
fascicnlaris, *Triana, I. c*—Ind. occ.
flavescens, *Triana, I. c.*—Guiana.
Goudotiana, *Naud. in Ann. Sc. Nat-* Ser. «* (1852) 108.—N. Granat.
lateriBora, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* x** 144.—Ind. occ.; VenezueL
Macfadyenii, *Triana, 1. c.* 148__Jamaic.
parviflora, *Triana, I. c*—Cuba.
Patrisiana, Naud. in Ann. Sc. Nat Ser. (1852) 107 = Henrietta Patrisiana.

HENHIETTEIiIiA:—
punctate, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 148.—Cuba.
Seemannii, *Naud. in Ann. Sc. Nat. Sét.* III. xvffi. (1852) 108.—Panama.
aeasilifolia, *Triana. in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 148.—Ind. occ.; Veneznel.
traehyphylla, *Triana, I. c.* 144.—N. Granat
Wflora, *Triana, I. c.* 148.—Ind. occ.
umbelluliflora, *Triana, I. c.*—Bras,
verrncosa, *Triana, I. c.* 144.—Pernv.

HENRINCQUIA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 1006 (1876), sphalm. ?-HERINCQUIA, Decne.-Fentarhaphia, Iindl. (Gesnerac.).

HENBIQTJEZIA, Spruce, ex Benth. in Hook. Kew Joum. vL (1854) 838. *RUBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 44.
nitida, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xrii. (1859) 297.—Bras.
oblonga, *Spruce, ex Benth. I. c*—Bras,
obovata, *Spruce, ex Benth. I. c.* 296.—Bras,
verticillata, *Benth. in Hook. Kew Joum.* vi. (1864) 888—Bras.

HENRYA, Nees, in Benth. Bot. Voy. Snlph. 148. L 49 (1844)-Tetramerium, Nees (Acanthac.).
Mayana, Nees, 1. c. 149. t. 49 = T. scorpioides.
tsularis, Nees, 1. c.-=T. scorpioides.
scorfiioides, Nees, 1. c. 148. t. 49 - T. scorpioides.

HENSCHELIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 81. t. 68 (1881) Ullgera, Blnme (Combretac.).
onensis, Presl, 1. c = I. Meyeniana.

HENSLERA, Endl. Gen. 791 (1839)=HAENSELERA, Lag. = Physospermum, Cuss. (Umbellif.).

HENSLERA, Reichb. Norn. 96 (1841) - Haenslera, Boiss. (Compos.).

HENSLOVIA, A. Juss. in Orb. Diet. vi. 586 (1849) = HENSLOWIA, Wall. - Crypteronia, Blume (Lythrar.).

HENSLOWIA, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. L 242, t. ^(1860). *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. 111.
DENDROTROPHE, Miq. Fl. Ind. Bat i. i. 779 (1855).
^UFRENOYA, Chatin?in Compt-Rend. Par. h. (I860) 657.
TUPEIA, Blume, Fl. Jav. Loranth. tt. 27,28 (1828 ?).
buxifolia, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* L 244.-Malaya.
cassiaefolia, *Blum,, I.* f.-Bomeo.
ovarpa, *Kun\in Joum. Bot.* xiii. (1876) 329—Ins. Nicobar.
fn>tescen„ *Benth. in Hook. K*m Journ.* v. (1853) 194—Honekone
^ulata, *Holk.f.V Thorns, ex A. DC. in DC. Prod.* xw. 682.—Reg. Himal.
"«ttantha. *Hook./. V Thorns, ex A. DC. I. c*—Keg. lJS"»"-; Burma.
Lobiana, *A. DC. I. c.* 681.—Malaya.
Pedrata, *Miq. El. Ind. Bat. i. L* "B:Sumatra.
Banicuiata, *Miq. El. Ind. Bat. i. L* ***—*J*™"
Pauciflora, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* ***—*J*™"
whippensis, A. DC. in DC. Prod. «»• «8[1]=
^wardtiana, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 244.-Sumatra.
£*"». *Blume, I. c.* 248,-Java.
ttSS.W *Blumu*>>- '• 244.-Malaya.
""L^laU, *Blume, 1. c.* 243.,-Malaya.
Tanans. *Blume, I. c.* 244. t. 48.—Burma; Malaya.

HESLOWIA, Lowe, ex DC. Prod. via. 288 (1844)-«otelaea, Vent. (Oleac.).

HENSLOWIA, Wall. PI. As. Rar. Hi. 18 (1832) = Jj'ypteronia, Blume (Lythrar.).
Mau, Plan.h. m Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1846) C *<7 "=C. pubescens.
Wtt, Planch. 1. c. 478 = C. CummgU.
Wall. PI. As. Rar. iii. 14=C. gUbra.
Wall. Cat. n. 8566=C. pubescens.
(1848) 47^c.pnbescens.
, Wall. PL As. Rar. iii. 14-C. pubescens.

HEOCARPHUS, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1861) 51, sphalm. - PLEOCARPHUS, D. Don - Jungia, Linn. f. (Compos.).

HEPATIC A, Dill, ex Linn. Syst ed. I (1735)-Anemone, Linn. (Ranunc).
aculiloba, DC. Prod. i. 22 - A. acutiloba.
americana, Ker-Gawl. in Bot Reg. t. 887-A. Hepatica.
anemonoides, Vest, Man. Bot. 806-A. Hepatic*.
angulosa, DC. Syst. i. 217—A. angulosa.
integrifolia, DC. L c.=A. integrifolia.
multiloba, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1860) 116-A. angnlosa.
nobilis, Schreb. Spicil. Fl. Lips. 89=A. Hepatica.
transsilvanica, Fuss, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1860) 83=A. angulosa.
triloba, Choix, in Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 886-A. Hepatica.

HEPETIS, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 56 (1788)-Fitcairnia, L'Htat (Bromeliac.).
angustifolia, Raeusch. Norn. ed. III. 91=P. angustiiolia.
angustifolia, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 66-P. bromefiaefolia.
bromeliaefolia, Salisb. Prod. 247-P. bromeliaefolia.
latifolia, Raeusch. Norn. ed. III. 91-P. latifolia.

HEPETOSPERMUM, Spach, Hist *Wig.* Phan. vi. 188 (1838), sphalm. - Herpetospenmim, Wall. (Cucurb.).

HEPHESTIONIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. xiii (1860) 86-Tlbouchiiia, Anbl. (Melastom.).
Chamatdstus, Naud. 1. c. *(—Pleroma Chamaecistus).*—Ins. Martinic.
strigosa, Nand. 1. *s.(~Pleroma strigosum).*—Ind. occ.

HEPFIKTITIA, Regel, Gartenfl. ii. (1853) 353. t. 70. *GESNERACEAE*, Benth. & Hook.f. ii. 999.
CHKIRISANTHERA, Hort. ex Regel, Gartenfl. ii. (1853) 353.
ampla, *Hanst. in Linnaea*, xxix. (1857-58) 514.—Ecuador,
atrosanguinea, *Regel, in Gartenfl.* (1868) 863.—N. Granat.
cordate, *Klottsch V Hanst. in Linnaea*, xxix. (1857-68) 612.—Venezuela.
naegelioidesx, Lam. Illustr. Hortic. iv. (1867) 1.129.
ovau, *Klottsch V Hanst. in Linnaea*, xxix. (1867-58) 612.—Venezuela.,
pauciflora, *Hanst. 1. c.* 514.—N. Granat
repens, *Hanst. 1. c.*—Ecuador,
stenocalyx, *Hanst. 1. c.* 612.—N. Granat
nlmifolia, *Hanst. I. c.*—Ecuador.
Warszewiczii, *Hanst. I. c.* 514.—Am. austr.

HEPTACA, Lour. Fl. Cochinch. 657 (1790)-Onooba, Forsk. (Bixin.).
africana, Lour. 1. c.—Afr. trop.
latifolia, Gardn. & Champ, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 243-Actinidia ChampionL

HEPTALLON, Rafin. Neogenyt. 1 (1825) - Croton, Linn. (Euphorb.).
aromaticum, Rafin. I. c.-C. aromaticus, *Linn,*
capitatum, Rafin. 1. c.«=C. capitatus.
ellipticum, Rafin. L c.-C. ellipticus.
gravedens, Rafin. 1. c—Hab.1

HBPTAHTHTJB, Griseb. Cat PI. Cub. 148 (1866). *COMPOSITAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 842.
brevipes, *Griseb. I. c*—Cuba,
cochlearifolius, *Griseb. I. c*—Cuba,
ranoncoloidcs, *Griseb. 1. c.*—Cuba.

HEPTAFIiEtTKTTM:, Gaertn. Fruct. ii. 472. t. 178. (1791). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 942.
ACTINOMORPHE, Miq. Comm. Phyt. 102 (1840).
AGALMA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 761.1.11 (1855).
ASTROPANAX, Seem, in Joum. Bot. iii. (1865) 176.
GYNAPTEINA, Spach, Hist. Veg. Phan. viii. 113 (1889), partim.
PARATROPIA, DC. Prod. iv. 265 (1830).
SciADOPHYLLUM, Blume, Bijdr. 875 (1826).
UNJALA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 66 (1828).

HEPTAPIiETJETTM:—
abyssinicum, *Benth.* b* *Hook.f. Gen.* i. 942 i *Vatke, in Linnaea*, xl. (1876) 191.—Afr. trop.
acutangulum,Gttrtn. Fruct ii. 1.178. £ 8=stellatum.
acutissimum, *Seem, in Joum. Bot.* iii. (1865) 79.—Borneo.
apiculatum, *Seem. I. c.* 78.—Java,
avene, *Seem. I. c.* 79.—Sumatra.
Baikiei, *Hiem, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* iii. SO.—Afr. trop.
Barteri, *Hiem, 1. c.*—Afr. trop.
bitematum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 731.—Malacca.
capitatum, Seem, in Journ. Bot. iii. (1865) 81 - Brassaia capita ta.
eaudatum, Vidal, Phan. Cuming. Pbilipp. 175-H. Cephalotes.
Cephalotes, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 731.—Malacca,
confine, *Seem, in Joum. Bot.* iii. (1865) 79.—Ins. Celebes.
Coronae-sylvae, *Seem. 1. c.* 78.—Java.
Cumingii, *Seem. I. c.* 81.—Ins. Philipp.
dipyrennm, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 168.—Ins. Sandvic.
divaricatum, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 78.—Java,
elatum, *C. B. Clarke, in Hook.f. Ft. Brit.Ind.il* 728.—Reg. Himal.
elatum, *Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. SO.—Afr. trop.
ellipticum, Seem, in Journ. Bot. ill. (1865) 78 = vennlosum.
emarginatum, *Seem. I. c.* 80.—Zeylan.
enrhynchum, *Seem. 1. c.* 78.—Java.
exaltatum, Seem. 1. c. 80 - WalUchiaoum.
fastigiatnm, *Seem. I. c.* 78.—Java,
fimbriatum, *F. Muell. Papuan PI.* 89.—N. Guin.
glaucum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 728.—Reg. Himal.
glaucum, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, i. 588 = elatum.
gracile, *Blume, ex Seem, in Journ. Bot.* iii. (1866) 78.—Borneo.
heterophyllum, *Seem. I. c.* 77.—Malaya,
hypoleucum, *Kurt, For. Fl. Brit. Burma*, i. 639.—Reg. Himal.; Burma,
impressum, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 728.—Reg. Himal.
insularum, *Seem, in Joum. Bot.* iU. (1865) 80.—Ins. Philipp.
Junghuhnianum, *Seem. 1. c.* 77.—Java,
kavaiense, *H. Mann, in Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 168.—Ins. Sandvic.
khasianum, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 730.—Reg. Himal.
longifolium, *Seem, in Joum. Bot.* iii. (1865) 79.—Java.
macrophyllum, Wall. Cat. n. 4918=venulosnm.
Mannii, *Benth.* b* *Hook.f. Gen.* i. 942.—Afr. trop.
micranthum, *Seem, in Joum. Bot.* iii. (1865) 78.—Sumatra.
octophyllum, *Benth. (f Hook.f. Gen. i.* 942.—China,
oxyphyllum, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 80.—Sumatra.
parasiticum, *Seem. 1. e.* 79.—Malaya,
pergamaceum, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 165.—Java,
petiolosum, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 78.—Borneo.
politum, *Seem. I. c*—Borneo,
polybotryum, *Seem. I.* c—Java,
polyphyllum, *Seem. 1. c.* 7».—Java,
racemosum, *Bedd. Fl. Sylv.* t. 214.—Ind. or.
rigidum, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 165-longi. folium.
rigidum, *Seem, in Joum. Bot.* iii. (1885) 79.—Java,
rostratum, *Bedd. Ft. Sylv.* ii. 122.—Ind. or.
scandens, *Hiem, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 30.—Afr. trop.
scandens, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 79.—Malaya.
schizopHyllum, *Hance, I. c.* xv. (1877) 334.—China,
serratum, *Seem. 1. c.* iii. (1865) 79.—Java,
singalangense. *Seem. I. c.* 78.—Sumatra.
steUatum, *Gaertn. Fructt.* ii. t 178. f. 3 (= acntangulum in textn, p. 472).—Zeylan.
subavene, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 166.—Java,
subulatum, *Stem, in Joum. Bot.* ill. (1865) 78.—Malaya.

HEPTAPLETJB.UM :—
tomentosnm, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 165; *Buch.-Ham. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 151.—Malaya,
vennlosum, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 80.—As. et Austral, trap.
verticillatum, *Seem. I. c.* 80.—Ins. Timor.
Waimeae, *Wawra, in Flora,* lvi. (1878) 169.—Ins. Sandvic.
"WallichUnum, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl.Brit. Ind.* ii. 780.—Ind. or.
Wallichianum, Seem, in Journ. Bot. iii. (1866) 80 = kh&siftanm.

HEPTAPTERA, Marg. *Sc* Rent, in Mim. Soc. Phys. Genev. viif. (1888) 802. tj = Frangos, Lindl. (Umbellif.).
collodonioides, Marg. & Rent. 1. c - P. colladonioidei.

HEPTARINA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 15 (1886)- Polygonum, Tonm.
orientalis, Rafin. 1. c = P. orientale.

HEPTARINIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 48 (1886) - Polygonum, Tourn.
longifolia, Rafin. 1. a—Am. bor.

HEPTAS, Meissn. Gen. 298; Comm.202 (1840) - Herpestiß, Gaertn. (Scrophnlarin.).
repens, Meissn. Comm. 202 - Herpestis Monnieria.

HEPTEIRECA, Rafin. Sylva Tellnr. 126 (1888) = Cassia, Tonm. (Legumin.).
glandulosa, Rafin. 1. c 127-C. virgata.

HEPTRILIS, Rafin. Fl. Tellnr. 89 (1836)=Iieucas, R. Br. (Labiat.).
glabrata, Rafin. 1. c.-L. glabrata.

HERACANTHA, Hoflmgg. *Sc* Link, Fl. Port. ii. 205 (1820) = Caithamus, Toum. (Compos.).
armenia, G. Don, ex Loud. Hort. Brit 382 = C. flavescens.
cretica, Hoffmgg. *Sc* Link, Fl. Port. ii. 207 = C. lencocaolos.
glauca. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 216 = C. glaucns.
lanata, Hoffmgg. *Sc* Link, Fl. Port, it 206 = C. lanatus.
taurica, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 304 = C. lanatus.

HERACLEA, Hill, Veg. Syst. iv. 87 (1762)-Centaurea, Linn. (Compos.).

HBBACIiEUM, Linn. Syst. ed. I (1735). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 921.
BARYSOMA, Bunge, Del. Sem. Hort Dorp. (1839) 7.
SPHONDYLIUM, [Tonm.] Adans. Fam. ii. 100 (1763).
STENOTAENIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sèr. III. i. (1844) 839.
SYMPHYOLOMA, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 127 (1881).
TORDYLIOPSIS, DC. Prod. iv. 199 (1830).
TRIGONOSCIADIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat Sér. III. i. (1844) 344.
WENDIA, Hoffm. PI. Umbell. Gen. 136 (1814).
absinthifolium, Vent. Choix, 7 =Zosima onentalis.
acuminatum, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 19 = H. Sphondylium.
aestivum, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 316 - H. Sphondylium.
alpinum, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iv. 849 - ligusticifolium.
alpinnm, *Linn. Sp. PI.* 250.—Europ.
alpinum, Pollini, Fl. Veron. i. 389 = palmatnm.
alpinum, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 847 (Quid ?). —Sibir.
amanum, *Boiss.* b* *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient,* ii 1045.—Syria.
amplifolium, Lapeyr. Hist Abr. PL Pyr. 153 - pyren&icum.
amplissimum, *Wender. Ind. Sem. Hort. Mart.* (1840). —*Cf. Linnaea,* xv. (1841) *Lift.* 101.—Hab. J
angustatum, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. HI. ii. 768,inobs. = H. Sphondylinm.
angustifolium, Bieb. Fl. Tear. Caac. i. 222-chored&Dtro.

HEBACIiEUM :—
angustifolium, Jacq. Enum. Vindob. 45, 217 « H. Sphondylium.
angustifolium. Linn. Mant. i. 67 =sibiricum.
anisactis, *Boiss. b" Hohen. Diagn.* Ser. I. x. 41.—Persia,
apiifolium, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. L (1844) 332.—Armenia,
aquilegifolium, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl.Brit. Ind.* ii. 715.—Ind. or.
arcticum, *Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich,* ii. 87, in texts.—Ross, arct
argaeum, *Boiss. (f Bal. Diagn.* Ser. H. vi. 87.—As. Min.
armoricum, Bor. ex Nym. Consp. 290 - H. Sphondylium.
asperum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl.* 224.—Reg. Caucas.
asperum, Mert. *Sc* Koch, Deutschl. Fl. iii. 274 = palmatnm.
aureum, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. t 282-MaIabaila anrea.
auritum, Büchoff, in Linnaea, xiv. (1840) Litt. 131-lanatum.
australe, Hartm. Svensk Excnrs. Fl. 89 = H. Sphondylium.
austriacum, Habl. Taur. 162—sibiricum.
austriacnm, *Linn. Si. PI.* 249.—Anstr.; Hangar.
barbatum, Ledeb. Fl. Alt. i. 300=lanatum.
basvicum, *Fisch. Hort. Gorenk.* (1812) 46, nomen (Quid ?).—Sibir.
bifarium, Fisch. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 458= flavescens.
bipinnatum, Guss. ex DC. Prod. iv. 195=minimum.
Branca, Steud. Nom. ed. I. 400—seq.
Branca- Ursina, All. FL Pedem. ii. 4-H. Sphondylium.
brevivittatnm, *Ledeb. Fl. /loss.* ii. 824.—Reg. Caucas.
brignoliaefolia, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (1883) 297.—Turkestan.
Brunoms, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 713.—Reg. Himal.
burmanicuin, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) H. 309; et (1877) II. 116.—Reg. Himal.; Burma,
cachemiricnm, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 712.—Reg. Himal.
canariense, Choisy, ex DC. Prod. iv. 190 = Astydamia canariensis.
candicans, *Wall. Cat.* n. 573.—Reg. Himal.
canescens, *Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 232. —Reg. Himal.
Carmeli, Hort. ex Wender. in Linnaea, xv. (1841) Litt. 101-amplissimum.
Carmeli, *Labill. Ic. PI. Syr. Dec.* v. 3.—Syria,
caspicum, *Hort. Berol. ex DC. Prod.* iv. 192.—Reg. Casp.
caucasicum, Stev. in *Him.* Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 259-pubescens.
ceylanicum, *Gardn. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 716.—Zeylan.
chorodanum, *DC. Prod.* iv. 194.—Reg. Caucas.
dnereum, IindL in Royle, Illustr. Bot. HimaL 232 = canescens.
Clausii, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 823.—Rossia,
concanense, *Dal: in Hook. Kern Journ. ii.* (1850) 260. —Ind. or.
cordatum, *Presl, Delic. Prog.* 135.—Sicilia.
crenatifolium, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 1045.—As. Min.
cuneiforme, *DC. Prod.* iv. 194.—Sibir.
cyclocarpum, C. *Koch, in Linnaea,* xvi. (1842) 361.— Reg. Caucas.
decipiens, Fisch. ex Hoffm. Umbellif. 134=yiUosmn.
delphinense, Jord. Pngill. 75 = H. Sphondylium.
dichotoma, *Benth. & Hook.f. Gen.* ii. 922.—Oriens.
dissectum, Ledeb. Fl. Alt. i. 801=lanatum.
diversifolium, Wall. Cat n. 674 = Wallichii.
Douglasii, DC. Prod. iv. 183=Una turn.
dubium, Tenore, Fl. Nap. t. 221 =setosum.
dulce, Fisch. ex Fisch. Mey. & Ave-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. it Snppl. 23=lanatum.
elegans, Jacq. Fl. Austr. t. 175 = H. Sphondylium.
eminens, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1861) 29 = platytaenium.
fastuosum, Salisb. Prod. 164 - H. Sphondylium.
flavescens, *Baumg. Enum. Stirp. Transs.* i. 214.— Rossia; As. bor.
flavescens, Bess. Enum. PL Volh. 12 = sibiricum.
flavescens, Willd. Sp. PL i. 1421 = H. Panaces.

HERACIiEUM:—
giganteum, Fisch. Hort Gorenk. (1812) 46 = villosum.
glabrescens, Boiss. *Sc* Hohen. Diagn. Ser. I. x. 41-persicum.
granatense, *Boiss. Elench.* 49.—Hispan.
grandiflorum, Dak. & Gibs. Bomb. Fl. 108-concanense.
grandiflorum, *Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 227. —Reg. Caucas.
graveolens, Spreng. Umbellif. Prod. 12 - Pastinaca graveolens.
gummiferum, Willd. Enum. Hort Berol. i. 53, 54-pubescens, asperum.
hirsutum, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 57 =canescens.
Hookerianum, *Wight V Am. Prod.* 373.—Ind. or.
hnmile, *Sibth. V Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 193.—As. Min.; Syria,
hypoleucom, *Vis. in Linnaea,* xviii. (1844) 512.— Ind. or.
incanum, *Boiss. & Huet, Diagn.* Ser. II. ii. 98.— Armen.
intermedium, Gaud. Fl. Helv. ii. 819 = pyrenaienm.
intermedium, Ledeb. Fl. Ross. ii. 828-apiifolium.
Jacquemontii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 712.—Reg. Himal.
jugatum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 1048.—Reg. Caucas.
laciniatum, Desf. Tabl. ed. L 119 - H. Sphondylinm.
laciniatum, Horaem. Hort. Hafi. i. 279 = villosum.
lanatum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 166.—Am. bor.; As. occ.
lasiopetalum, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. (1844) 332.—Persia.
latifolium, Gilib. Fl. Litnan. ii. 7 = H. Sphondylium.
Lecokii, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 695 = sibiricum.
Lecoquii, Martr. Fl. Tarn, 285-praec.
Lehmannianum, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp.* (1849) 2.—Turkestan.
Leichtlini, *Hort. ex Vatke, in Ind. Sem. Hort. Berol. {\W)App.* 2.—Hab.t
leucocarpum, *Aitch. I? Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 165.—Afghan,
ligusticifolinm, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 224; *Supfi*-227.—Reg. Caucas.
longifolium, Bieb. 1. c. 223 = chorodanum.
longifolium, Jacq. Fl. Austr. ii. 46 = H. Sphondylium-
longifolium, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 259=grandiflorum.
marginatum, Fisch. ex Hoffm. Umbellif. 134 "• villosum.
microcarpum, *Franch. PI. Davidian.* i. (1844) 144-China.
minimum, *Lam. Fl. Fr.* iii. 413.—Alp. Delphin.
Moellendorffii, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 12 = lanatum.
montanum, Georgi, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 327" ligusticifolinm.
montanum, Schleich. Cat. PL Helv. ed. IV. 19[s] pyrenaicum.
nepalense, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 185.—R* Himal.
nubigenum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind-* "• 713.—Reg. Himal.
obtnsifolium, *Wall. Cat.* n. 577.—Reg. Himal.
occidentale, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 287 = Sphondylium.
Olgae, *Regel V Schmalh. ex Regel, PI. Nov. FedscH-*88.—Kokan.
Orphanidis, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 1041.—Macedon.
Orsinii, Guss. PL Rar. Sic. 183. t 27 -palmatum.
palmaHfidum, Fisch. *Sc* Avé-LaU. in Ledeb. FL R[085], ii. 327=cyclocarpum.
palmatilobum, *DC. Prod.* iv. 192.—Hab. ?
palmatnm, *Baumg. Enum. Stirp. Transs.* i. [1Bi] — Oriens.
Panaces, DC. ex Nym. Consp. 289 = setosum. ...
Panaces, Gueldenst. Reisen, I. 425 (Quid ?).—Imer«w-
Panaces, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. IL 338 * palmatum.
Panaces, *Linn. Sp. PI.* 249.—Europ. austr.
Panaces, Pall, ex Habl. Taur. 149 = villosum.
Panaces, Steph. Fl. Moso. n. 179 = H. Sphondylw*
Panaces, Stev. in Mém. Soc Nat. Most iii. (1812) = pubescens.
Pastinaca, *Feud, in Russegg. Reis.* ii. 965.—As Min.

payinadfolium, *C. Koch, in Linnaea,* xvi. (1813) 860.—Armenia.
pedatnm, *Wight, Ic.* t 842.—Ind. or.
persicum, *Detf. Cat. Hart. Par.* ed. III. 452.—Oriens.
pimpinellifoliam, *Rupr. Serf. Tiansch.* 49.—Turke*tan.
pimpinellifolium, Spreng. Umb. Prod. 12-Malabaila pimpineilifolia.
Pinda, *Dolt. V Gibs. Bomb. Fl.* 107.—Ind. or.
pinnatum, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 712.—Reg. Himal.
platyphyllum, Ram. ex DC. Prod. iv. 198 - pyrenaicum.
platyphyllum, Schloss. & Vukot. ex Nym. Consp. 289—palmatum.
platytaenium, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sir. III. i. (1844) 831.—As. Min.
Pollinianum, Bertol. FL Ital. iii. 438-palmatnni.
pratense, lord, ex F. Schultz, Arch. FL Fr. et Allem. 816 = H. Sphondyliom.
propinqnnm, *Aitch. (f Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 165.—Afghan.
prothe&orme, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 111 ed. II. 155 = H, Panaces, H. Sphondylium.
pubescens, *Bieb. Fl. Taur. Cane. Suppl.* 225.—As. Min.
pulchellum, Pall, ex Ledeb. FL Ross. ii. 327 -bgnsticifolinm.
pulchrnm, *Zumag. Fl. Pedem.* ii". 8 (Qnid »)•—Italia.
pumilum, Vffl. Prosp. 26; Hist. PI. Daoph. H. 640 - minimum.
pumilum, Viv. ex DC. Prod. W. 190 = Malabaila pumila.
pusillum, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 827=ligustici folium.
pyrenaicum, Bieb. Fl. Taur. Cane, i. 224=villosum.
pyrenaicum, *Lam. Encyc.* i. 408.—Europ.
redolent, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 818—setosum.
rigens, *Wall. Cat.* n. 675; *DC. Prod.* iv. 191.—Ind.
nseumjster. in Mem. Soc. Nat. Mostiii. (1812) 260 *• chorodannm.
setosum, *Lapeyr. Hist. Ahr. PI. Pyr.* 153.—Europ. austr.
sibiricum, *Linn. Sp. PI.* 249.—Europ.; As. bor.
siifolium, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 456 - austnacum.
simplirifolium, Herb, ex Nym. Consp. 289 - palmatum.
sisianense, Boiss. & Bnhse, in Nouv. Mem. Soc. Wat. More. xii. (1860) 101-paslinacifolium.
spathiphyllum, *C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient, u.* 1042.—As. Min.
speciosum, Hoffm. ex Link, Handb. L 856 = seq. ?
speciosum, Ledeb. Hort. Dorpat. 77=P«be«a»-
speciosum, Rudolph, in Cat Hort. Gorenk. (1812) 46 •"villosum.
Sphondylium, Bourg. ex Reut in Bull. Soc. Bot Fr. xt (1864) 46 = granatense.
Sphondylium, CUus, in Goebel, Reise, u. 276 - Clausii.
Sphondylium, *Linn. Sp. PI.* 249.—Europ.; As. bor.
Sphondylium, Pall. Reise, ii. 528; Cham. & Schlecht. »n Linnaea, i. (1826) 894=lanatum.
Sphondylium, Ucria, ex Guss. Fl. Sic. Prod, L 864-cordatnm.
sprengelianum, DaU. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. 108 = rigens.
Sfrengelianum, Thm. Enum. PI. Zeyl. 181=ceylanicum.
Sprengelianum, *Wight tf Am. Prod.* 372.-Ind..or.
Sphondylium, Jord! Grain. Jard. Gren. (1849) 16-H. Sphondylium.
tauricum, Stev. ex Reichb. Fl. Germ, ixcura. 457-H. Sphondylium.
Tkomsoni, C; B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 711—Reg. Himal.

HEBACIiEUM :—
tomentosum, Dak. & Gibs. Bomb. Fl. 108, 818 = Pimpinella tomentosa.
tomentosum, Sibth. & Sm. FL Graec. Prod. i. 192 = Zosima orientalis.
Tordylium, Sprang. Umbellif. Sp. 49 = Tordylium maximum.
trachyloma, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 29=pubescens.
tragoides, Benth. ft Hook. £ Gen. i. 924=Zosima tragioides.
transsilvanicum, Schur, Ennm. PL Transs. 267 = palmatum.
tuberosum, *Molina, ex Willd. Sp. PI.* i. 1423.—Chili,
nmbellatum, *Gueldenst. Reisen, i.* 422.—Imeretia.
nmbonatum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 1048.—Reg. Caucas.
ursinum, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 190-H. Sphondylinm?
verrucosum, Stev. ex Stend. Nom. ed. II. i. 750 (Quid 1).—Tauria.
vescens, Willd. ex Stend. 1. c. ed. I. 4OO.-Hab. ?
villosum, *Fisch. ex Steud. I. c; et ex Spreng. in Schult. Syst.* vi. 679.—Reg. Caucas.
Walliehii, *DC. Prod.* iv. 195.—Reg. Himal.
Wilhelmsii, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort Petrop. vii. 61" pube&ens.
zozimioides, *Benth. If Hook. f. Gen.* i. 922.—As. Min.

HEBBERTIA, Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 222 (1827).
IRIDEAE, [Benth. & Hook. f. iii. 691].
ALOPHIA, Herb, in Bot. Mag. sub t. 3779 (1838).
CIPURA, Klotzsch, ex Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle', xii. 362 (1882).
LARENTIA, Klatt, 1. c (1882).
TRIFURCIA, Herb, in Bot. Mag. sub t. 8779 (1838).
amoena, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 325.—Reg. Argent,
brasiliensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 184.—Bras.
caerulea. *Herb, in Bot. Mag.* t. 3862.—Texas t
caerulea, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 554 a pnlchella.
Drummondiana, *Herb, in Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 65.—Texas.
Drummondiana, Klatt, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 556 • brasiliensis.
euryandra, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 270.—Keg. Argent,
lineata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 368.—Chili.
pulchella, *Sveet, Brit. Flow. Gard.* t. 222.—Chili,
pusilla, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 497.—Bras,
stricta, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 324.—Reg. Argent,
nmbellata, *Klatt, in Linnaea,* xxxi. (1861-62) 656.—Bras,
unguiculata, *Baker, in fount. Linn. Soc.* xvi. (1877) 184, nomen.—Bras.

HERBICHIA, Zawadski, in Guill. Arch. Bot i. (1882) 450; et Enum. PL Galic. 198 (18S5>'-8enecio, Touro. (Compos.).
abrotanifolia, Zawadski, 11. cc. 451,198=S. abrotanifolius.
carpatica, Stend. Nom. ed. IL i. 760 =>S. abrotanifolius.

HERBERIA, Cass. in Dict, Sc Nat. lx. 599 (1830).
COMPOSITAB, Benth. *8t* Hook. f. ii. 232.
stellulifera, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 425.—Afr. trap,
truncata, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* lx. 586.—Air. trop.

HERETIERA, G. Don, Gen. Syst. i. 518 (1881)-Herltiera, Dryand. (Stercul.).

HERICINIA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325«BanUnoulufl, Toum.
arvensis, Fourr. 1. c-R. arvensis.

HERINCQUIA, Decne. ex Jacques *Sc* Herincq, Man. PI. ii. 662 [1850]=Pentftrhaphia, Lindl. (Gesnerac).
floribunda, Decne. 1. c.=P. floribunda.

HERISSANTHIA, Stend. Nom. ed. II. i. 750 (1840)-seq.

HERISSANTIA, Medic. Phil. Bot. i. 90 (1789)-AbutUon, Tourn. (Malvac).
crispa, Medic. 1. c. •= A. crispum.

HERITERA, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 665 (1812) = Herttiera, Dryand. (Stercul.).

HERITERI A, Dnm. Anal. Fun. 46 (1829) - Heritiera, Dryand. (Stercul.).

HERITERIA, Dum. Anal. Fam. 58 (1829)-HERITIERA, J. F. GmeL-Lachnanthus, Ell. (Haemodorac). (Stercul.).

HERITERIA, Schrank, Baier. Fl. i. 133, 629 (1789) = Tofleldia, Huds. (Liliac).
anthericoides, Schrank, 1. c. 629-T. calyculata.

HBBITIEKA, [Dryand. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 546 (1789). *STERCULIACEAE,* Benth. & Hook. t. i. 219.
ATUNA, Rafin. Sylva Tellur. 158 (1838).
BALANOPTERIS, Gaertn. Fruct. ii. 94. tt. 98, 0!) (1791).
FOMETICA, Rafin.' Sylva Tellur. 76 (1838).
acuminata, *Wall- ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 103, nomen; *etexKur;in Journ.Bot.* xii. (1874) 65.—Ind. or.
attenuata, Wall. Cat. n. 1140=Brownlowia lanceolate
dubia, *Wall. exKurm, in Journ. Bot.* xii. (1874) 65.—Ind. or.
Fischeri, *Regel V Rack, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1858) 45,-As. trop.
Fomes, *\Buch.-Ham. in) Syme, Embassy,* ed. II. iii. 819.—Ind. or.; Malaya.
Fomes, Wall. Cat. n. 1189, partim = littoralis.
grandis, Fiach. ex Steud. Nom. ed. L 400 (Quid!).—Hab. 9
lanceolata, A. Gray, Bot. U. St Expl. Exped. i. 184, lapsu=Niotaesp.
littoralis, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 646.—Gcront. trop.
macrophylla, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 103, nomen; *et ex Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 61.—Ind. or.; Burma,
minor, *Lam. Encyc.* iii. 229.—Ins. Maurit.
minor, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii, 142 = H. Fomes.
Papilio, *Bedd. Fl. Sylvat.* t. 218.—Ind. or.
spectabilis, Bail). Hist. PI. iv. 62-Octolobus spectabilis.
tinctoria, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 653.—Ins. Philipp.
Tothila, Knrz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 118-littoralis.
Vespertiiio, Bedd. ex Kurz, in Journ. Bot. xii. (1874) 66=H. Papilio.

HERITIERA, T. F. Gmel. Syst 118 (1791)-loohmanthes, Ell. (Haemodorac.).
Gmelini, Michx. Fl. Am. Bor. i. 21-L. tinctorium.
tinctorium, J. F. Gmel. Syst. 113=L. tinctorium.

HERITIERA, Reti. Obi. vi. 17.1.1 (17»l)-Alpinia, Linn. (Scitamin.).
alba, Retz. 1. c 18-A. alba.
Allughas, Retz. 1. c 17-A. Allnghas.
aquatica, Retz. 1. c 18=A. aquatica.
chinmsis, Retz. 1. c-A. chinensis.

HEBMANNIA, Linn. Syst. ed. I (1735). *STERCULIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 223.
EURYNEMA, Endl. Gen. Suppl. ii. 93 (1842).
GILESIA, F. Muell. Fragm. ix. 41 (1876).
TRICHANTHERA, Ehrenb. in Linnaea, iv. (1829) 401.
abrotanoides, *Schrad. Ho*i Getting.* 17. t. 11—Afr. austr.
alnifolta, Drege, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 189 -> cuneifolia.
alnifvlia, *Linn. St. PI.* 674.—Afr. austr.
alnifolia, Wall. Cat. n. 1196 K-Sida Schimperiana.
althaeifolia, *Linn. Sp. PI.* 673; ed. II. 941.—Afr. austr.
althaeoides, Eckl. & Zeyh. Enum. 42, partim-eandicans.
althaeoides, Hort. ex Link, Ennm. Hort. BeroL ii. 179—incaua.

HEBJIAITNTA:—
angularis, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 45 = hyssopifolia.
*ngularis, *Jacq. Hort. Sehoenb.* i. 68. t. 126.—Afr. austr.
angustifolia. *Otto tf Dietr. Attg. Garten:* viii. (1840) 832.—Hab,?
anthemidifolia, *Presl, Bot. Bemerk.* 22.—Afr. austr.
arabica, *Hochst. tf Steud. ex Fisch. Mey. tf Avè-Lall. Ind. Sent. Hort. Petrop.* vi. 61.—Arab.
argentea, Eckl. & Zeyh. Ennm. 47 = pnlverata.
argentea, *Sm. in Rees, Cycl.* xvii.—Afr. austr.
argyrata, Presl, Bot. Bemerk. 20=decnmbens.
aspera, Wendl. Bot. Beobacht. 52-scabra.
aurea, Jacq. Hort. Schoeob. ii. 46-althaeifolia.
betonicaefolia, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 40.—Afr. austr.
bicornis, Eckl. & Zeyh. 1. c. 49-trifurca.
bifaria, *Lindb. in Act. Soc. Sc. Fenn.* x. (1871) 121.—Hab.»
bifiora, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 44 = scabra.
bipinnata, Burch. Trav. i. 310=abrotanoides.
biserrata, Linn. f. Suppl. 802 = Mahernia biserrata.
boraginiflora, *Hook. Ic. PI.* t 597.—Afr. austr.
brachyfetala, Harv. in Harr. & Sond. Fl. Cap. i. 202 — Mahernia tomentosa.
bracteosa, *Presl, Bot. Bemerk.* 21.—Afr. austr.
bryoniaefolia, *Burch. Trav.* ii. 258.—Afr. austr.
bryonifolia, Eckl. *tf* Zeyh. Enum. 42~ disermaefolia.
caerulea, Bunn. f. Fl. Cap. Prod. 18 - trifurcata.
candicans. *Ait. Hort. Ken.* ed. I. ii. 412.—Afr. austr.
Candida, Salisb. Prod. 865-praec
candidissima, *Spreng.f. Tent. Suppl.* 18.—Afr. austr.
capensis, *J. F. Gmel. Syst.* 1011.—Afr. austr.
Cavanillesiana, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 46.—Afr. austr.
cemua, *Thunb. Diss. Herm.* 11.—Afr. austr.
chrysanthemifolia, *E. Mey. in Drlge, Zwei Pft. Docum.* 191, nomen; *et ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. 204.—Afr. austr.
chrysophylla, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 44.—Afr. austr.
ciliaris, Linn. f. Suppl. 802-Mahernia verticillata.
cluytiaefolia, *Otto tf Dietr. Allg. Garten:* viii. (1840) 832.—Afr. austr.
collina, Eckl. & Zeyh. Enum. 41 > decumbens.
comosa, *Burch. ex DC. Prod.* i. 493.—Afr. austr.
conglomerata, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 44.—Afr. austr.
cordifolia, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap. i.* 198.—Afr. austr.
coronopifolia, Eckl. & Zeyh. Ennm. 47 =tennifolia.
coranopifolia, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 181.—Afr. austr.
cnneifolia, *Jacq. Hort. Sehoenb.* i. 66. t. 124.—Afr. austr.
decipiens, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfi. Docum.* 191, nomen ; *et ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. 192.—Afr. austr.
decumbens, Drège, ex Piesl, Bot. Bemerk. 21 - Mahemia grandistipula.
decumbens, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 46, nomen; *Spreng. Neue Entdeck.* i. 299.—Afr. austr.
denudata, Eckl. & Zeyh. Ennm. 43-Presliana.
denudata, *Linn. f. Suppl.* 301.—Afr. austr.
desertorum, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 48.—Afr. austr.
diffusa, Linn. f. Suppl. 80*2=Mahernia diffnsa.
diffusa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 191-Mahernia parviflora.
discolor, *Otto tf Dietr. Allg. Garten:* viii. (1840) 814.—Afr. austr.
disermaefolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 41-althaeifolia.
disermaefolia, *Jacq. Hort. Sehoenb.* i. 65. t. 121.—Afr. austr.
dissecta, Harr. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 204-cbrysanthemifolia.
disticha, *Schrad. Serf. Hannov.* 26. t. 16.—Afr. austr.
diversifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 41-althaeifolia.
diversistipula, *Presl, Bot. Bemerk.* 21.—Afr. austr.
Dregeana, *Presl, I. c.* 20.—Afr. austr.
dryadifolia, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. 191.—Afr. austr.
Eckloniana, Presl, Bot. Bemerk. 20 - candicans.
erosa, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfi. Docum.* 191, nomen.—Afr. austr.
exstipulata, *E. Mey. I. c,* nomen; *et ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. 202.—Afr. austr.
falcata, Eckl. & Zeyh. Enum. 46-flammea.
fasciculata. Baker, in Saund. Refag. Bot. t. 289-linearifolia.
ferruginea, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 179 = incana.

HERMANNIA :—
filifolia, Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 195-scoparia.
filifolia, *Linn. f. Suppl.* 302.—Afr. austr.
filipes, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* i. 206.—Afr. austr.
fistulosa, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 42 = candicans;
flammea, *Jacq. Hort. Sehoenb.* i. 69. t. 129.—Afr. austr.
Flammula, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap. 1*196.—Afr. austr.
floribunda, *Harv. I. c.* 201.—Afr. austr.
fragrans, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 179 - althaeifolia.
gariepina, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 49.—Afr. austr.
geniculata, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c 40 = Mahernia chrysantha.
Gerardii, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 588.—Afr. austr.
Gilesii, *F. Muett. Fragm.* ix. 42, in obs.—Austral.
glabrata, Linn. f. Suppl. 301 = Mahemia glabrata.
glandulosa, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 179.—Afr. austr.
glauca, *Hort. Herrenh. ex Otto tf Dietr. Allg. Gartens.* viii. (1840) 380.—Afr. austr.
glauca, Salisb. Prod. 366=denudata.
glomerata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 191 * conglomerata.
gracilis, *Eckl. if Zeyh. Enum.* 45.—Afr. austr.
grandiftora,Mt. Hort. Kew. ed. II. iv. 141—Mahernia grandiñora.
grossularifolia, Linn. Sp. PI. 673 — Mahernia heterophylla.
halicacaba, DC. Prod. i. 493=abrotanoides.
heterophylla, *Thunb. Diss. Herm.* 14.—Afr. austr.
hirsuta, Drège, ex Harr. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 189 - alnifolia.
hirsuta, Eckl. & Zeyh. Enum. 43-prismatocarpa.
hirsuta, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 8.—Afr. austr.
hirsuta, *Schrad. Sert. Hannov.* 10. t. 4.—Afr. austr.
hirta, Sparm. ex Steud. Nom. ed. II. L 761-scabra.
hispida, *Thunb. Diss. Herm.* 8.—Afr. austr.
hispidula, *Heichb. Ic. PI. Cult.* 1.1 69.—Afr. austr.
holosericea, *Jacq. Hort. Sehoenb.* iii. 23. t 292.—Afr. austr.
humilis, E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum. 191 = Mahernia oblongifolia.
humilis, *Thunb. Diss. Herm.* 14.—Afr. austr.
hyssopifolia, *Linn. Sp. PI.* 674.—Afr. austr.
ignescens, *Presl, Bot. Bemerk.* 21.—Afr. austr.
imbricata, Eckl. & Zeyh. Enum. 48-trifoliate,
incana, *Cav. Diss.* 328.—Afr. austr.
incana, Eckl. & Zeyh. Enum. 42-candicans.
incana, Thunb. FL Cap. ed. Schult. 605 - holosericea.
incisa, *Willd. Sp. PI.* iii. 599.—Hab. ?
inflata, *Link tf Otto, Ic. PI. Rar.* 55. t. 28.—Mexic
involucrata, Cav. Diss. 328-salvifolia.
Joubertiana, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* i. 196.—Afr. austr.
Xirkii, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 283.—Afr. trop.
latifolia, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 44.—Afr. austr.
latifolia, Jacq. Hort. Sehoenb. i. 64-salvifolia.
lavandulifolia, *Linn. Sp. PI.* 674.—Afr. austr.
lepidota, Buch. ex Krauss, in Flora, xxvii.(1844) 294-pallens.
leucanthemifolia, *Otto tf Dietr. Allg. Garten*,* viii. (1840) 330.—Afr. austr.
leucanthemoides, *Presl, Bot. Bemerk.* 22.—Afr. austr.
leucophylla, *Presl, I. c.* 20.—Afr. austr.
linearifolia, *Harv. in Harv. If Sond. Fl. Cap.* i. 205.—Afr. austr.
linifolia, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 18.—Afr. austr.
lini/olia, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 206 = linearifolia.
macrophylla, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1858) I. 216.—Afr. austr.
melochioides, *Burch. ex DC. Prod.* i. 494.—Afr. austr.
micans, Schrad. Sert. Hannov. 11. t. 5=salvifolia.
micropetala, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* i. 201.—Afr. austr.
modesta, *Planch, in Ann. Sc. Wat. Sit.* IV. iii. (1855) 292.—Afr. trop.
mollis, Willd. Enum. Hort Berol. 692 = candicans.
mucronulata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 217.—Afr. austr.
multicaulis, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 191 = Mahernia erodioides.
multifida, DC. Prod. i. 493-abrotanoides.

HEBMANMTA :—
multiftora, Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 190= pallens.
multifiora, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 46=alnifolia.
multifiora, Jacq. Hort. Sehoenb. i. 69. t. 128 = cuneifolia.
muricata, Eckl. & Zeyh. Enum. 48 = hirsute, *Schrad.*
myrrhifolia, *Thunb. Diss. Herm.* 16.—Afr. austr.
nemorosa, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 42 = candicans.
odorata, Ait. Hort. Kew ed. I. ii. 412-lavandulaefolia.
orophila, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 47.—Afr. austr.
pallens, *Eckl. (f Zeyh. I. c.* 48.—Afr. austr.
paniculate, *Franck. in Rivoil, Comali,* 19.—Afr. trop.
paniculata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 191 = scordifolia.
parviflora, E. Mey. 1. c. 192 = Mahernia parviflora.
passerinaeformis, Eckl. & Zeyh. Enum. 47=filifolia.
passerinoides, Harv. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 195, sphalm.^praec.
patula, Harv. 1. c 187 - Presliana.
pauciflora, £. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 368.—Arizona.
paucifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1868) I. 218-chrysanthemifolia.
pinnata, Linn. Sp. PI. 674-Mahernia pinnate.
plicata, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 411 = althaeifolia.
plicata, Eckl. & Zeyh. Enum. 43 = candicans.
plicata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 192 » leucophylla.
polymorpha, Eckl. & Zeyh. Enum. 46-flammea.
praemorsa, Eckl. *Sc Zeyh.* 1. c. 48—cuneifolia.
praemorsa, Wendl. Bot. Beobacht. 61-candicans.
pratensis, Eckl. & Zeyh. Enum. 41 = decumbens.
Presliana, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxii. (1859) I. 269.—Afr. austr.
prismatocarpa, *E. Mey. in Drige, Zwei Pft. Docutn.* 192, nomen; *et ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. 186.—Afr. austr.
procumbens, Cav. *Diss.* 329.—Afr. austr.
procumbens, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 210, 211 = Mahernia humifusa, vesicaria.
prostrate, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfi. Docum.* 192, nomen.—Afr. austr.
pulchella, Linn. £ Suppl. 802 = Mahemia pulchella.
pulverata, *Andr. Bot. Rep.* iii. t. 161.—Afr. austr.
pulverulenta, DC. Prod. i. 496=praec.
punctate, *Presl, Bot. Bemerk.* 21.—Afr. austr.
purpurea, Hort. ex Otto *Sc* Dietr. Allg. Gartenz. vi». (1840) S13=disennaefolia.
Quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 76 ** Mahernia abyssinica.
quercifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 49= denudata.
racemosa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 192 = gariepina.
rigida, *Harv. in Harv. (f Sond. Fl. Cap.* i. 188.—Afr. austr.
rigida, Nocca, ex Steud. Nom. ed. II. i. 751=disticha.
rotundata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 192" Mahemia linnaeoides.
rotundifolia, Jacq. Hort. Sehoenb. i. 68-disticha.
salicifolia, Harv. in Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 199 * mucronulata.
salvifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 45 = mucronulata.
salvifolia, *Linn.f. Suppl.* 802.—Afr. austr.
Sandersoni, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap. i-* 200.—Afr. austr.
scabra, *Cav. Diss.* 331.1.182. f. 2.—Afr. austr.
scabra, Jacq. Hort. Sehoenb. i. 68. L 127-ni»nt*' *Schrad.*
scoparia, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. l9*.-~ Afr. austr.
scordifolia, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 48 - Presliana.
scordifolia, *Jacq. Hort. Sehoenb.* i. 64. t. 120.—AW-austr.
secundiflora, Eckl. & Zeyh. Enum. 48 = pallens.
spinosa, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 193, nomen; *et ex Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 205.—Afr. austr.
stipulacea, *Lehm. ex Eckl. V Zeyh. Enum.* 44.—Aff austr.
stricte, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. 206.—A"-austr.
suavis, *Presl, Bot. Bemerk.* 21.—Afr. austr.
sulcate, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* i. 200.—Afr. austr.
tenuifolia, *Sims, Bot. Mag.* 1.1348.—Air. austr.
temifolia, *Presl, Bot. Bemerk.* 22.—Afr. austr.
texana, *A. Gray, Gen. Illustr.* ii. 88.1.185.—Tex»*

HERMANNIA :—
tigrensis, *Hochst. ex A. Rich, Tent. Fl. Abyss,* i. 7-4.—Abyss.
trifoliau. *Linn. Mant.* ii. 481.—Afr. austr.
tri/urca, Eckl. ft Zeyh. Enum. 47-H. Flammula, angularis.
trifurca, *Linn. PI. Rar. A/r.* 18 ; *Amoen. Acad.* vi. 90., —Afr. austr.
tri/urcata, linn. Sp. PL ed. II. 942-praec.
tripartite Presl, Bot. Bemerk. 21-Mahemia grand!-stipula.
triphylla. *Cm, Diss.* 338.—Afr. austr.
triphylla, Drege, ex Harv. ft Sond. Fl. Cap. i. 198 = temifolia.
triphylla. Linn. PI. Afr. Rar. IS; Amoen. Acad. vL 91 -Lotononis polycephala f
velutina, *DC. Prod.* i. 495.—Afr. anstr.
venosa, *Hort. Getting, ex Otto V Dietr. Allg. Garten*.* vui. (1840) 316.—Afr. austr.
venosa, *Thunb. Diss. Herm.* 12.—Afr. anstr.
•*oerrucosa,* Eckl. ft Zeyh. Enum. 43-hirsnta, *Schrad.*
vertidllata, Berg. Desc. PI. Cap. 169 - Maheraia pinnata.
vesicaria, Cav. Diss. 331-Maheraia vesicaria.
vestita, E. Mey. in Drege, Zwd Pfl. Docnm. 182 = candidissima.
vestiu, *Thunb. Diss. Herm.* 12.—Afr. austr.
Zeyheri, Walp. Ann. i. 108, sphalm. ~ seq.
Zeyheriana, *Presl, Bot. Bemerk.* 22.—Afr. austr.

HERMAS, Linn. Mant ii. 163 (1771). *UMBELLI*>ERAE,* Benth. & Hook. f. i. 878.
australis, Spreng. ex SchnlL Syst vi. 880 = Panax australis.
•apiUta, *Linn./. Sufpl.* 435.—Afr. austr.
"liata, *Linn./. 1. c.* 436.—Afr. anstr.
depaapenu. *Linn. Mant.* ii. 299.—Afr. austr.
gigantea, *Linn./. Sufpl.* 486.—Afr. anstr.
***ininut,* Eckl. ft Zeyh. Enum. 854 = capitata-*Verci/olia,* Eckl. ft Zeyh. 1. c. 355 = quinquedentata.
quinquedentata, *Linn./. Suppl.* 486.—Afr. austr.
''dissima, Reichb. in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 118 . = Lichtensteinia Iacera.
"tenhagensis; Eckl. ft Zeyh. Enum. 864-dliata.
•*"Uosa,* Thunb. in Nov. Act. Petrop. xiv. (1805) 581 - aepauperata.

HERMBSTAEDTIA, Reichb. Consp. 164 (1828).
AMARANTACEAE, Benth. & Hook. f. iii- 25.
BEKZKLIA, Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 292.
HYPARETE, Rafin. FL Tellur. iii. 43 (1886).
LANCIA, Endl. Gen. 304 (1837).
PKUANTHUS, E. Mey. ex Moq. in DC. Prod. xiii. H. 246 (1849).
,»», *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 246.—Afr. anstr.
««gans. *Moq. 1. c.* 247.—Afr. austr.
Elauca, *Reichb. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 752.—Afr. austr.

HER^MESIA, Humb,.& Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 809 U805) _Alehornea, Sw. (EuphorbJ.
ca:Janeaefolia, Humb. ft Bonpl. ex. Willd. Sp. PI. iv. 809 =. A. castaneaefolia.
**>cana,* Hook, ft Am. Bot Beech. Voy. 309=. «niardia mexicana.
salicifolia>, Baill. Etud. Gèn. Enph. 447 = A. castaneaefolia.

HERMESIAS, Loefl. It. 278 (1758)-Brownoa, Jacq. (Legumin.).

HERMIDIXJM, S. Wats, in Bot. King's Exped• 286. t. 32 (1871). *NYCTAGINEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 4
alipes, I, *Wats. 1. c*—Am. bor. occ

^HaONIBBA, Guill. * Perr. Fl. Seneg. Tent. 201. ^61 (1832). *LEGUMINOSAE,* Benth. * Hook. 515.
AEDEMONE, Kotschy, in Oeiterr. Bot Zeitschr. viii. el, i.(1868> 11B- *•'-
"'Phroxylon, *Guill. &• Perr. I. c*—Afr. trop.

HERMIIIDM, Linn. Syst. ed. I (1786). *ORCHIDEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 822.
AOPLA, Lindl. Bot Reg. sub t 1701 (1885).

HTJ-VM~Tis.iu.nl:—
CHAMAEREFES, Spreng. Syst. iii. 702 (1826).
CHAIIORCHIS, Rich, in Mem. Mus. Par. iv. (1818) 49.
CVBELE, Falc in Lindl. Veg. Kingd. 183c (1847).
MONORCHIS, Ehrh. Beitr. iv. (1789) 117.
THISBE, Falc. in Lindl. Veg. Kingd. 188 (1847).
alpinum, *Lindl. Bot. Reg.* snb t. 1499.—Europ.
angustifolium, *Benth. V Hook. /. Gen.* iii. 622.—Reg. Himal.
ctandesfinum, Gren. 8c Godr. Fl. Fr. iii. 299 = is.
congestum, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7068.—Reg. Himal.
constrictum, Lindl. Bot Reg. snb t *UW-(Peristylus constrictus).*—Reg. Himal.
cordatum, Lindl. 1. c.—'Habenaria cordata.
fallax, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7412.—Reg. Himal.
goodyeroides, Lindl. 1. c n. 7066 - Habenaria goodyeroldes.
gramineum, *Lindl. I. c. a.* 7413.—Reg. Himal.
Hamiltonianum, Lindl. L c. n. 7069 *(-.Peristylus Hamtttonianus).*—Reg. Himal.
Josepbi, *Reichb. /. in Flora,* Iv. (1872) 276.—Reg. HimaL
latifolium, Lindl. Bot. Reg. sub 1.1499 = Habenaria chlorantina.
Lefebreanum, *Reichb. /. in Linnaea,* xxv. (1852) 232. —Abyssin.
longicmre, *Benth.* b* *Hook./. Gen.* iii. 622.—Japon.
Monorchis, *X. Br. in Ait. Hort. Kern.* ed. II. v. 191.—Europ.; As. bor.
natalense, *Reichb. /. Otia Bot. Hamb.* 108.—Afr. austr.
plantagineum, Lindl. in Bot Reg. sub t. 1499 - Habenaria WightiL
reniforme, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7067.—Reg. Himal.
spirate, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1865) 218 - Habenaria spiralis, *A. Rich.*
Stendneri, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 109.—Abyssin.
unalaschkense, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xiii. et xvi. 107. t. 65 — congestum.

HERMIONE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 357 = Narcissus, Toum. (Amaryll.).
aequilimba, Herh. Amaryll. 404 = N. TazetU.
alba, Haw. Monog. Narciss. 8—N. intermedius.
ambigena, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 361 - N. Tazetta.
amoena, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 117 - N. TazetU.
anceps, M. Roem. Syn. Ensat. 229 -=N. papyraceus.
angusti/olia, M. Roem. 1. c 234 = N. angustifolius.
antipolensis, Jord. ft Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. Ill = N. Tazetta.
aperticorona, Haw. Monog. Narciss. 9 — N. TazetU.
auranticorona, Haw. 1. c. 11 = N. Tazetta.
aurea, Jati. ft Fourr. Ic. PL Eur. i. 65 - N. aureus.
autumnalis, M. Roem. Syn. Ensat. 281 —N. elegans.
Bertolonii, Jord. ft Fourr. Ic. PL Eur. L 64. t. 1»2=N. Tazetta.
Biancae, Tod. ex Rent in Linnaea, xxix. (1857-58) 746 = N. Tazetta.
bifrons, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 859 ; Haw. Revis. PL Succ 13B^N, intermedius.
bremjlora, Haw. Monog. Narciss. 11 - N. Tazetta.
brevistyla.-H.eA. Amaryll. 324 = M. Tazettat
callichroa, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 119 - N. TazetU.
calliopsis, Jord. ft Fourr. L c. 117 = N. Tazetta.
Candida, M. Roem. Syn. Ensat. 218 - Ni moschatus.
candidissima, M. Roem. Lc 228 - N. papyraceus.
cerina, Haw. Syn. PI. Succ. 828 - N. Tazetta.
cheiranthea, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 117 - N. Tazetta.
cklorotica, Jord. ft Eourr. 1. c. 116 ^ N. Tazetta.
chrysantha. Haw. Monog. Narciss. 12. n. 41 = N. TazetU.
citrina. Haw. Revis. PL Suec. 14J.-N, Tazetta.
comiressa, Haw. 1. c 139 = N. intermedius.
concolor, M. Roem. Syn. Ensat. 214 - N. homochroos.
contorta, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 118 - N. Tazetta.
cercyrensis. Herb. Amaryll. 828. t. 87. f. 2 - N. Tazetta.
corrugata, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 115 - N . Tazetta.

HERMIONE :—
crenularis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 363 - Narcissus Trewianns.
crenulata, Haw. Monog. Narciis. 10. n. 23 - N. Tazetta.
crispicorona. Haw. 1. c. 11 —N. Tazetta.
croceo-dncta, M. Roem. Syn. Ensat. 234 = N. croceo-cinctus.
cupularis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 361 - N. Tazetta.
Cypri, Haw. in Phil. Mag. (1881) 184 - N. Tazetta.
debilis, Jord. ft Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 114 — N. Tazetta.
decora, Haw. Monog. NarcUs. 9 = N. Tazetta.
deficiens, Knnth, Enum. PI. v. 750 = N. serorinus.
deflexicaulis, Haw. Monog. Narciss. 9 - N. Tazetta.
discolor, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 111 = N. Tasetta.
discreta, Jord. ft Fonrr. 1. c. 118 — N. Tazetta.
dubia. Haw. Monog. Narciss. 12 = N. Tazetta.
elegans. Haw. I. c. 18 —N. elegans.
erodora, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 120 = N. Tazetta.
fistulosa. Haw. Syn. PI. Succ. 380 - N. Tazetta.
Jlava, M. Roem. Syn. Ensat 220 = N. JonquiUa.
flaveola, Haw. Monog. Narciss. 8 = N. Tazetta.
flexiflara, Haw. I. c. 10 = N. Tazetta.
floribunda, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 362 ; Haw. Revis. PI. Succ. 141 - N. Tazetta.
floslactis. Haw. Monog. Narciss. 8 = N. Tazetta ?
/ornwsa, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 115 - N. Tazetta.
/ormosissima, • Tod. Nonv. Gen. e Spec 29 - N. Tazetta?
/ulgida, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. 0.120 - N. Tazetta.
ganymedoides, Jord. ft Fourr. L c. 113 -= N. Tazetta.
gracilis, M. Roem. Syn. Ensat. 232—N. gracilis.
grandicrenata, Bianca, ex ParL Fl. Ital. iii. 164 - N. TazetU.
grandiflora. Haw. Syn. PI. Succ. 830 - N. Trewianns.
hololeuca, Jord. & Fourr. Brev. PL Novi fasc. ii. 109 - N. Tazetta.
homochroa, M. Roem. Syn. Ensat 229 - N. jonquilloides.
insolita, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 114 - N. Tazetta.
intermedia. Haw. Monog. Narciss. 7 - N. Tazetta.
italica, Haw. Revis. Fl. Succ 144 - N. Tazetta.
italica. Herb. Amaryll. 326 - N. TazetU.
jasminea, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 360 - N. Tazetta.
JonquiUa, Haw. Revis. PI. Succ. 187 - N. JonquiUa.
jucunda, jord. ft Fourr. Brev. PI. Nouv. fasc. ii. 116 = N. Tazetta.
junci/olia, Salisb. in Trans. Hort. Soe. i. (1812) 857 - N. JonquiUa.
lati/olias Haw. Revis. PI. Succ. 146 - Nv TazetU.
Uucaifolia, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 359 - N. tereticauUs.
littoralis, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc ii. 112 - N. Tazetta.
lobata, Jord. ft Fourr. 1. c. = N. Tazetta.
longiflora, M. Roem. Syn. Ensat. 218 = N. longiflorus.
Luna, Haw. Revis. PI. Succ. 143 = N. Tazetta.
lutea, Haw. Monog. Narciss. 10 - N. TazetU.
luteola, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc Ii. 118 - N. TazetU.
mediterranea, Jord. ft Fourr. 1. c. 110 - N. Tazetta.
micrantha, Jord. & Fourr. 1. c. 108 - N. Tazetta.
modesta, Jord. ft Fourr. 1. c. 112 =-N. Tazetta.
monspeliensis, Jord. ft Fourr. 1. c. 110— N. TazetU.
multiflora, Haw. Monog. Narciss. 8 = N. Tazetta.
neapolitana, M. Roem. Syn. Ensat. 230 = N. Tazetta.
neglecta, Jord. ft Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. Ill = N. TazetU.
nivea, M. Roem. Syn. Ensat 280 - N. papyraceus.
nobilis, Jord. ft Fourr. Brev. PL Nov. fasc. ii. 118 = N. Tazrtta.
nutans, M. Roem. Syn. Ensat. 215 - N. nutans.
obliterata. Haw. Monog. Naroiss. 18 - N. Broussonnetii.
obsoleta. Haw. Revis. PI. Succ. 147 - N. elegans.
ochroleuca, M. Roem. Syn. Ensat 219 = N. Tazetta.
pallida, M. Roem. 1. c.217 - N. TazetU.
papyracea, Schult. f. Syst. vii. 1788, in obs. = seq.
papyratia. Haw. Revis. PI. Succ. 143 - N. papyraceus.

HERMIONE :—
patula, Haw. Monog. Narciss. ll=Narcissns Tazetta.
perlutea, Haw. 1. c. 8=N. Tazetta.
ptanicorona, M. Roem. Syn. Ensat. 233=N. gracilis.
polyantha. Haw. Monog. Narciss. 11; Jord. & Fonrr. Ic. PI. Ear. i. 62 = N. Tazetta.
praecox,Hvn. L c. 12. n. 43 = N. Tazetta.
pratensis, Jord. & Fonrr. Brer. PI. Nov. fasc. ii. 109 = N. Tazetta.
primulina, Haw. Syn. PI. Succ. 329 = N. intermedius.
pulchella, M. Roem. Syn. Ensat. 216=N. polchellus.
pumila, M. Roem. 1. c. 234-N. pumilus.
purpuro-cincta, M. Roem. 1. c. 234 = N. purpuro-cinctus.
radiata, M. Roem. 1. c. 217 = N. intermedius.
rotularis, Haw. Monog. Narciss. 8=N. rotularis.
sequentis, Tod. Ind. Sem. Hort. Pamonn. (1858) 27 ; et in° Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xi. (1859) 379 = N. Tazetta.
seroiina, Haw. Monog. Narciss. 13=N. serotinus.
sertulosa, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 118 = N. Tazetta.
sexlobata, M. Roem. Syn. Ermat. 223-N. Tazetta.
similis, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 358 = N. Jonquilla.
Solaris, Haw. Monog. Narciss. 9 = N. Tazetta.
splendent, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 119 = N. Tazetta.
stellaris, Salisb. in Trans. Hort. Soc. L (1812) 359 = N. bifrons.
straminea, Haw. Monog. Narciss. 12—N. Tazetta.
stylosa, Salisb. in Trans. Hort. Soc. L (1812) 360 = N. Tazetta.
subalbida, Haw. Monog. Narciss. 12=N. Tazetta.
subcrenata, Haw. 1. c 10=N. Tazetta.
sublutea, Haw. 1. c. 8 = N. Tazetta.
sulcicaulis, Haw. 1. c. 11=N. Tazetta.
sulphurea, Haw. 1. a 10 = N. Tazetta.
syraeusana, Tod. Ind. Sem. Hort. Panorm. (1858) 27 ; et in Ann. Sc. Nat. Se>. IV. xi. (1859) 379.—Sicilia.
Tangieri, Pritz. Ic. Ind. 542 = N. Broussonnetii ?
Tametta, Haw. Revis. PI. Succ. 142 = N. Tazetta.
tegulaeflora, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 363—N. gracilis.
tenuiflora, Haw. in Phil. Mag. (1830) 133 = N. Tazetta.
toiui0r,Haw. Revis. P1. Succ. 145 = N. gracilis.
tennis, M. Roem. Syn. Ensat. 233-N. gracilis.
tereticaulis, Haw. Revis. PI. Succ. 140-N. Tazetta.
Trewiana, Sweet, Brit Flow.Gard. Ser. II. 1.118=N. Tazetta.
trifida, Haw. Monog. Narciss. 9 = N. Tazetta.
triparliita, M. Roem. Syn. Ensat. 217 = N. tripartite.
tubulosa, Tod. Ind. Sem. Hort. Panorm. (1858) 27; et in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xi. (1859) 880 = N. Tazetta t
unicolor, Haw. Monog. Narciss. 12-N. Tazetta.
venusta, Tod. Nuov. Gen. e Spec. 15=N. Tazetta?
virginea, Jord. *8c* Fourr. Brev. PI. Nor. fasc. ii. 109 = N. Tazetta.
viridiftora, Haw. Revis. PI. Sacc. 147=N. viridiflorus.
Weinmanni, M. Roem. Syn. Ensat. 233=N. triandrus.
xanthea, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 118 = N. Tazetta.

HERMODACTYLOS, Reichb. Consp. 64 (1828)=seq.

HERMODACTYLUM, Bartl. Ord. 52 (1830)-seq.

HERMODACTYLUS, Reichb. Nom. 47 (1841) - Colchicum, Tourn. (Liliac.).
Ritschii, R. Br. ex Stend. Nom. ed. II. i. 752-C. montanom.

HEBMODACTYLUS, Tonm. ex Mill. Card. Diet ed. VI. (1752). *IRIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 687.
bispathaceus, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. sub t. 146 = tuberosus.
longifolius, Sweet, 1. c. t. 146=tuberosus.
ripens, Sweet, 1. c. sub t. 146 = tuberosus.
tuberosus, *Mill. Card. Did.* ed. VIII.—Reg. Mediterr.

HERMSTAEDTIA, Stend. Nom. ed. II. i. 752 (1840) • Hermbstaedtia, Reichb. (Amarant.).

HERMUPOA, Loefl. It. 307 (1768) = Steriphoma, Spreng. (Capparid.).
Loeflingiana, DC. Prod. i. 254-S. paradoxnm.

HERNANDEZIA, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 319 (1824) ^Hernandia., Plum. (Laurin.).
leucomphala, Hoffmgg. 1. c. Nachtr. iii. 41 = Hernandia lencomphala.
sonora, Hoffmgg. 1. c. Nachtr. i. 219 - Hernandia sonora.

HERNANDIA, Plum, ex Linn. Gen. ed. 1.874 (1787). *LAURINEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 164.
HERNANDEZIA, Hoffmgg. Verz. Pfl Nachtr. i. 219 (1824).
HERNANDIOPSIS, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 264 (1864).
HERTELIA, Neck. Elem. ii. 845 (1790).
bivalvis, *Benth. Fl. Austral,* v. 314.—Austral,
cordigera, *Virill. in Ann. Sc. Nat.* Sén IV. xvi. (1861) 62.—N. Caled.
cubensis, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 188.—Ind. occ.
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 848.—Guian.
leucomphala, *Stend. Nom.* ed. II. i. 752.—Hab. ?
Moerenhoutiana, *Guill. in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. vii. (1837) 189.—Ins. Tahiti.
ovigera, Lam. Encyc. iii. 123=gnianensis.
ovigera, *Linn. Diss. Herb. Amboin. in Amoen. Acad.* iv. 125.—Ind. occ.
peltata, *Meissn. in DC. Prod.* xv. I. 263.—Geront. trop.
sonora, *Linn. Sp. PI.* 981.—Ind. or.
sonora, Miq. FI. Ind. Bat. i. I. 887=peltata.
sonora, Zoll. Syst. Verz. Arch. Pfl. 117 « ovigera.

HERNANDIOPSIS, Meissn. in DC. Prod. xv. I. 264 (1864) = Hernandia, Linn. (Laurin.).
Vieillardi, Meissn. 1. c.-• Hernandia cordigera.

HEMTIARIA, [Tonm.] Linn. Syst. ed. I (1735). *ILLECEBRACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 16.
alpestris, Aubry, ex DC. Prod. iii. 367 =glabra.
alpestris. Lam. Encyc. iii. 125=alpina.
alpina, Loisel.exDC. Prod. iii. 368= incana.
alpina, *Vill. Hist. PI. Dauph.* ii. 666.—Europ.
alsines-folia, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 3=Polycarpon tetraphyllum.
americana, Nutt. in Am. Journ. Sc. v. (1822) 291 = Siphonychia americana.
annua, Lag. Gen. et Sp. Nov. 12 =cinerea.
arenaria, Kuntze, Taschen-Fl. Leipz. 224 = glabra.
argaea, *Boiss. Fl. Orient, i.* 741.—Cappadoc.
baetica, *Boiss.* &• *Reut. Diagn.* Ser. II. i. 95.—Hispan.
Besseri, Fisch. ex Hornem. Hort. Ham. Suppl. 127 = incana.
Boisseri, J. Gay, in Duch. Rev. Bot. ii. (1846-47) 370 =alpina.
cachemiriana, *J. Gay, I. c.*—Cachemir.
capensis, Stend. Nom. ed. I. 401; Bartl. in Iinnaea, vii. (1832) 624=lenticulata.
caucasica, *Rupr. Fl. Cauc.* 241.—Reg. Caucas.
ciliata, Bab. in Trans. Linn. Soc xvii. (1837) 453-glabra.
ciliata, [Clairv.] Man. Herb. 71=alpina.
cinerea, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 375.—Europ. austr.
diandra, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pe"terab. vii. (1847) 296 — cinerea.
dicbotoma, *DC. Prod.* iii. 868.—Hab. ?
erecta, Desf. Fl. Atlant. i. 214 = Paronychia suffruticosa.
enstachya, *Reichb. f. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iii. (1885) 274.—Ins. Porto Rico.
flavescens, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) reimpr. 21 -cinerea.
Fontanesii, *J. Gay, in Duch. Rev. Bot.* ii. (1846-47) 371.—Afr. bor.occ.
frigida, J. Gay, ex Kunze, in Flora, xxix. (1846) 650 = alpina.
fruticosa, Delile, Fl. Egypt. Illustr. 57 = hemistemon.
fruticosa, Desf. Fl. Atlant. i. 213 - Fontanesii.
fruticosa, Falk, Beitr. ii. 139 =» polygama.
fruticosa, Gonan, Fl. Monsp. 898=glabra.
fruticosa, *Linn. Cent. PI.* L 8 ; *Amoen. Acad.* iv. 269. Reg. Mediterr. occ.
glabra, *Linn. Sp. PI.* 218__Europ.; As. bor.
hemistemon, *J. Gay, in Duch. Rev. Bot.* ii. (1846-47) 871.—Afr. tor. j Arab.
hirsuta, Bieb. Fl. Taur. Cane. i. 179-incana.
hirsuta, *Linn. Sp. PI.* 218.—Europ.; As. Min.; Ind. or.
hirsuta, Urv. in M<*m. Soc. Linn. Par. i. (1822) 284= incana.

HEKNTARIA :—
hirsuta, Viv. Fl. Lib. Spec. 15=cinerea.
illecebroides, *C. Sm. in Tuckey, Congo,* 250; *et ex DC. Prod.* iii. 369.—Ins. Cap. Verd.
incana, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 218=baetica.
incana, *Lam. Encyc.* iii. 124.—Europ.; Oriens.
Joanneana, SchulL Syst. vi. 297=Paronychia suffruticosa.
latifolia, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 127.—Mont. Pyren.
lenticularis, Hill, Veg. Syst xxvi. *9=lenticulata,* Linn.?
lenticulata, AIL Fl. Pedem. ii. 209= alpina.
lenticulata, Huds. Fl. Angl. 94 - Polygonum Raii.
lenticulata, Linn. Sp. PI. 218 = incana, Cressa cretica.
lenticnlata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 48.—Afr. austr.
macrocarpa, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 167 ; Fl-Graec. t. 252—incana.
maritima, Link, ex Nym. Consp. 256 Add.=glabra.
microcarpa, Presl, Delic Prag. 65=glabra.
Millegrana, Bess. Cat. Hort Crem. (1816) 68 ; Link, Enum. Hort. Berol. i. 247; Pall, ex Spreng. f. Tent. Suppl. 173-incana.
monorrhiza, *Reichb. f. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* (1885) 274.—Ins. Porto Rico,
multicaulis, *Kit. ex Kan. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien,* xiii. (1863) 540.—Hungar.
nebrodensis, Jan, ex Nym. Consp. 256 Add.=glabra.
odorata, Andrz. ex J. Gay, in Dnch. Rev. Bot ii. (1846-47) 871-polygama.
olympica, *J. Gay, I. c.* 370.—Bithyn.
paniculata, Webb, Iter Hisp. 49 = Paronychia panicnlata.
pamassica, *Heldr. (f Sart. in Boiss. Diagn.* Ser. II-i. 95.—Graec.
Payco, Molina, Sagg. Chile, 150 •= Roubieva multifida.
permixta, Jan, ex Nym. Consp. 256 = pamassica.
polygama, *J. Gay, in Duch. Rev. Bot.* Ii. (1846-47) 871.—Soongaria.
polygonoides, Cav. Ic. ii. 27.1187 = Paronychia suffruticosa.
pyrenaica,J. Gay, in Ann. Sc.Nat. Se"r. I. xxvi. (1832) 224 = latifolia.
scabrida, *Boiss. Elench.* 42.—Hispan.
setigera, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 337.—Chili.
sphacelata, Hochst. ex Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 86 =hemistemon.
suffruticosa, Desf. Tabl. ed I. 45=Paronychia suffruticosa.
vertidllata, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. FL Hisp. iii 151=fraticosa.
•*oirescens,* Salzm. ex DC. Prod. iii. 367 = cinerea.
vulgaris, Spreng. Syst. i. 92» = cinerea, glabra, hirsuta.

HERODIUM, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 21 nn. 4864-4870 (1841)=Erodium, L'Hérit. (Geraniac).

HEROION, Rafin. Fl. Tellur. iv. 12 (1836)=ABphO-deline, Reichb. (Liliac.).
filiformis, Rafin. 1. c.=A. tenuior.

HEROTIUM, Steud. Nom. ed. II. i. 638, in syn. (1840) sphalm. = XEROTIUM, Bluff *8c* Fingerh.=FilagO, Linn. (Compos.).

HERPESTES, Kunth, Syn. PI. ii. 124 (1828), sphalm. =seq.

HERPESTIS, Gaertn. f. Frnct. iii. 186. t. 214 (1805)-*SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 961.
ANISOCALYX, Hance, in Walp. Ann. iii. 195 (18*I
APOZIA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 114 (18«>)-
BRAMI, Adans. Fam. ii. 208 (1763).
CACONAPBA, Cham, in Linnaea, viii. (1833) 28.
CALYTRIPLEX, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 96 (179*>
CARDIOLOPHUS, Griff. Notul. iv. 105 (1854).
HABERSHAMIA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
HEPTAS, Meissn. Gen. 393; Comm. 202 (1840).
HYDROTRIDA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. >• (1840).
MACUIIXAMIA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).
MECARDONIA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 95 (l</*>-
MELLA, Vand. Fl. Lusit. & Bras. Spec. 43. (1788).
MONNIERA, P. Br. Hist Jamaic. 269 (1756).
RANAPALVS, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. *»• (1877) 118.
RANARIA, Cham, in Linnaea, viii. (1838) 80.

HERPESTIS:—
SEPTAS, Lour. Fl. Cochinch. 892 (1790).
SEETILIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 68 (1836).
africana, Steud. Norn. ed. II. i. 753 = H. Monnieria.
amara, Benth. Scroph. Ind. 30-Curanga amara.
amara, Span, in Linnaea, xv. (1841) 882 = floribunda.
amplexicaulis, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 418.—Am. bor.
amplexifolia, *Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1156, nomen.—Guian.
andicola, Gill, ex Benth. in DC. Prod. x. 874-Melosperma andicola.
angulata, *Benth. I. c.* 396.—Bras,
arenaria, *J. A. Schmidt, in Mart. FL Bras.* viii. 813.—Bras.
axillaris, *Benth. in DC. Prod.* x. 896.—N. Granat.
bacopoides, *Benth. 1. c.* 899.—Bras.
Beccabunga, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 182.—Cuba.
Brownei, Steud. Nem. ed. I. 402; II. i 753 = H. Monnieria.
Caconapaea, Steud. 1. c. ed.II. i. 768-gratioloides.
caespitosa, *Cham, in Linnaea,* viii. (1838) 38.—Bras.
callitrichoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 567 - llysanthes gratioloides.
calycina, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 67.—Afr. trop.
Calytriplex, Steud. Nom. ed. II. 1.758-H. Monnieria.
caprarioides, *H. B.* 6" *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 368•—N. Granat.
chamaedrifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 584, in syn.« seq.
chamaedryoides, *H. B. UK. Nov. Gen. et Sp.* ii. 369.—Am. trop.
chrysantha, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 577 = chamaedryoides.
colubrina, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii 368= chamaedryoides.
connata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 234=Limnophila hypericifolia.
crenata, Beauv. Fl. Owar. 1112 = H. Monnieria.
cubensis, Poepp. in Spreng. Syst ii. 802-chamaedryoides.
cuneifolia, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 418 - H. Monniena.
oepressa, *Benth. in DC. Prod.* x. 395.—Bras,
diffusa, *J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Brds.* viu. 315.—Bras.
diffusa, Willd. ex Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, m. (1828)7-Stemodiaparviflora.
wvaricata, *J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras.* VIII. SOB.—Bras.
doningensis, Spreng. Neue Entdeck. iii. 25-stricta.
»bia, *Steud. Nom.* ed. II. i. 758; *D. Dietr. Syn. PI.* iii. 519.—Reg. Argent.
elongata, Benth. in DC. Prod. x. S96 = stncta.
«•«*,, Spreng. Syst. ii. 801 = Beyrichia villosa.
flagellaris, *Cham. V Schlecht. in Linnaea, u.* (1827) 575.—Bras.
«Uis, *KUtzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* U6«. nomen.—Guian.
nonbunda, *R. Br. Prod.* 442.-Geront. trop.
glechomoides, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 284-Geochorda cuneata.
6'acilis, *Benth. in DC. Prod.* x. 395.-Bras.
Erandiflora, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. u.* (1886) 56.—Am. austr.
«oloides, *Benth. 1. c.* 57.—Am. trop.
Hamihoniana, *Benth. Scroph. Ind.* 3O.-As. et Afr. trop.
«niarioides, *Cham, in Linnaea,* viii. (1838) 34.-Bras.
Gristb • Cat • pl Cub. i8S.-Cuba.
Ifvich. Blume, Hidr. 748 = Adenosma oyatum.
tata, Wight, in Benth. Scroph. Ind. 30 = florlda'
h a m . VSchlecht. inLinnaea, ii (1827) 578.
»«*ginosa,* Blume, Bijdr. 747-Adenosma caeruleum.
J^iflora, *Benth. in DC. Prod.* x. S96.-Bras.
'"'''is, Spreng. Syst. ii. 802 = floribunda.
^agascanensis, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* (1836) 58.—Madajr.
^"•*ginata,* Benth. toDC. Prod. x. 398-l«mg"-
H'tourea, Steud. Nom. ed. IL i. 753 = Stemodia Pusilla.
" «, EIL Sketch, ii. 105 = Micranthemum Nuttalii
""•<»<»»«„ Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 418-praec.

HEBPESTI8:-
micromonnieria, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 188.—Cuba.
Monnieria, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 366.—Cosmop.
monosticta, *Schlecht. in Linnaea,* xxiv. (1851) 694.—Bras.
montevidensis, *Spreng. Syst.* ii. 802.—Reg. Argent.
moranensis, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii 867 - H. Monnieria.
myriophylloides, *Benth. in DC. Prod.* x. 898.—Bras,
nigrescens, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 56.—Am. bor.
obovata, *Poepp. ex Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 107.—Cuba.
ovata, Benth, Scroph. Ind. 30—Adenosma ovatum.
peduncularis, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 66.—Texas.
pedunculosa, Steud. Nom. ed. II. i. 753=H. Monnieria.
pilosa, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) 57 — Mimulus pilosus.
pilosa, *Mart.* b" *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 21.—Mexic
polyadena, *Miq. in Linnaea,* xxii. (1849) 474.—Guian.
polyantha, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) 57 = stricta.
polygonoides, Benth. in Wall. Cat. n. 3897-Torenia polygonoides.
pratensis, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 67.—Bras.
procumbens, Hort. Berol. ex Spreng. Nov. Prov. 22 - H. Monnieria.
pulcherrima, Griff. Notul. iv. 104 = Limnophila pulcherrima.
pusilla, Meissn. ex D. Dietr. Syn. PI. iii. 519. n. 86 - serpylloides.
pygmaea,G-nS. Notul. iv. 104<• Limnophila micrantha, pygmaea.
radicaU, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 56.—Patagonia.
Ranaria, *Benth. I. c.* 67.—Bras.
reflexa, Benth. in DC. Prod. x. 899= Myriophyllum proserpinacoides.
repens, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* v. (1880) 107.—Am. bor. et trop.
reptans, *Benth. in DC. Prod. x.* 396.—Bras,
lotundifolia, *Pufsh, Fl. Am. Sept.* ii. 418.—Am. bor.
rugosa, Roth, Nov. PI. Sp. 290 =• Limnophila Roxburghii.
Salzmannii, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 68.—Bras.
scabra, Benth. 1. c. 67=laxiflora.
selaginoides, Steud. Nom. ed. II. i. 685, in syn.= Zaluzianskya selaginoides.
semiserrata, Steud. 1. c 758-gratioloides.
serpyllifolia, *Benth. in DC. Prod. x.* 898.—Brag,
serpylloides, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 574.—Bras,
sessiliflora, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii. (1836) 68.—Mexic.
sessUiflora, *Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 502 (Quid?).—Ind. or.
spathulata, Blume, Bijdr. 748 = H. Monnieria.
stellarioides, *Cham, in Linnaea,* viii. (1833) 82.—Bras,
stricta, *Schrad. in Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 142.—Bras,
tenella, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 576.—Bras.
Thonningii, *Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag.* ii (1836) 58.—Afr. trop.
tomentosa, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 806^ Stemodia lanata.
Tweediei, *Benth. in DC. Prod.* x. 397.—Reg. Argent.
vandeUioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 367.—Mexic

HEBPETACAKTHTJS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 98.1.12 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1102.
SCHULTZIA, Nees, in Nov. Act. Nat. Cor. xi (1823) 63.
decipiens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 367.—Bras,
longiflorus, *Moric. PI. Nouv. Am.* 159. t. 98—Bras,
macahensis, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 95.—Bras,
macrophyllus, *Nees, 1. c.*—Bras,
melancholias, *Nees, I. c.* 96.—Bras,
rubiginosus. *Nets, 1. c.* 94.—Bras.
Schultzii, *Nees, I. c.* 96.—Bras.

HERPETICA, Rafin. Sylva Tellur. 123 (1888) - Cassia, Tourn. (Legumin.).
alata, Rafin. 1. c.-C. alata.

HERPETOSPERMUM. Wall. Cat. n. 6761 (1831 ?) *CUCURBITACEAE,* Benth. & Hook. I. i. 834.
RAMPINIA, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Sod. xv. (1876) 129.
caudigerum, *Wall. Cat.* n. 6761.—Reg. Himal.
pedunculosum, C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc. xv. (1876) 116 ^caudigerum.

HERPOLIRION, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 258 (1858). *ULIACEAE,* Benth. & Hook, *t* iii. 793.
capense. Bolus, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 896' Nanolirion capense.
Novae-Zelandiae, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 268.—N. Zel.; Tasman.
Tasmaniae, Hook. f. 1. c.; et FL Tasm. ii. 54-Novae-Zelandiae.

HERPYSMA, Liridl. in Wall. Cat. n. 7889 (1831); et Bot. Reg. sub t. 1618 (1833). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 699.
longicaulis, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7389.—Reg. Himal.

HERPYZA, Sauv. Fl. Cab. 29 (1873). *LEGUMINOSAE.*
grandiflora, *Sauv. 1. c.*—Cuba.

HERBARIA, Goudot, in Ann. Sc. Nat. Sir. III. ii. (1844) 280. t. 6. *STERCULIACEAE,* Benth. ft Hook. f. i. 225.
LIGHTIA, Schomb. in Rep. Brit. Assoc. (1844) n. 71.
albiflora, *Goudot, I. c*—N. Granat.
aspera, *Karst. in Linnaea,* xxviii (1866) 446.—Am. (rop.
laciniifolia, *Goudot, ex Triana tf Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xvii. (1862) 337.—N. Granat.
Mariae, *Goudot, in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. ii. (1844) 233.—Bras,
pulcherrima, *Goudot, 1. c.* 232.—N. Granat.

HERRARIA, Ritg. in Marb. Schr. ii (1831) 132 = HerrerU, Ruiz & Pav. (Liliac).

HERRERA, Adans. Fam. ii. 158 (1763)-Erithalis, Linn. (Compos.).

HERRERIA, Ruiz & Pav. Trod. 48. t. 35 (1794). *LILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 766.
CLARA, Kunth, in Abh. Akad. Berl. (1848) 44.
brasiliensis, Hort. Berol. ex Kunth, Enum. PI. v. 294 > H. Salsaparilha.
grandiflora, *Griseb. in Xjòeb. Vidensk. Meddel.* (1876) 162.—Bras.
interrupts Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. I. 24 = H. Salsaparilha.
montevidensis, *Klottsch, ex Griseb. I. c.*—Reg. Argent.
parviflora, Lindl. Bot Reg. t. 1042 ^H. Salsaparilha.
Salsaparilha, *Mart. Reise Bras.* i. 645.—Bras,
stellata, *Rui* V Pav. Fl. Per.* iii 69. t. 303.—Chili
vertidllata, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 136-stellata.

HERRMANNIA, Link *Sc* Otto, Ic. PI. Rar. 65. t 28 (,1828) = Hermanjnia, Linn. (Stercul.).

IIERSCHELIA, Bowdich, Excurs. Mader. 159 (1825) = PhyBollB, Linn. (Solanac).
edulis, Bowdich, 1. c.-P. ednlis.

HERSCHEUA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 862 (1838)-Bisa, Berg. (Orchid.).
barbata, Bolus, in Joum. Linn. Soc. xix. (1882) 236, 844-D. barbata.
coelestis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 363 = D. graminifolia.
graminifolia, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 651=D. graminifolia.

HERSCHELLIA, Bartl. Ord. 194 (1830) - *Herschelia,* Bowdich. = Physalis, Linn. (Solanac).

HERSILEA, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 75 (1862)-Aster, Toum. (Compos.).
ramosa, Klotzsch, 1. c 76 - A. altaicns.
simplex, Klotzsch. 1. c 76 = A. molliusculus.

HERSILIA, Rafin. Fl. Tellnr. Hi 88 (1886)-Phlomis, Lion. (Lnbiat.).
Kioto, Rafin. L c.»P. crinita.

HERTELIA, Neck. Elem.it. 345 (1790)-Heraandia, linn. (Lanrin.).

HERTIA, Neck. Elem. i. 8 (1790); Less, in Linnaea, vi. (1831) 94 = Othonnopsis, Jaub. & Spach (Compos.;.
crassifolia, Less. I. c. »=O. cbeirifolia.

HESIODA, Veil. Fl. Flnm. 185 (1825); iv. t 140 (1827)=HelBterla, Jacq. (Oladn.).
perianthomega, VeU. Fl. Flnm. 185; iv. t. 140.—Bns.

HESIODIA, Stead. Norn. ed. II. i. 753 (1840), sphalm. =price.

HESIODIA, Moench, Meth. 891 (1794)-Sideritta, Tourn. (Labiat.).
bieolor, Moench, L c. 392 = S. montana.
montana, Dnm. Fl. Belg. 44—S. montana.

HESPEBAIOE, Engelm. in S. Wats. Bot King's Ezped. 497 (1871). *UUACEAE,* Benth. & Hook. £ i£778.
Engelmanni, Kranskopf, ex Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xviii. (1880) 231-yuccaefolia.
ynccaefolia, *Engelm. in S. Wats. Bet. King's Exptd.* 497.—Am. bor. oec.

HESPEHANTHA, Ker-Gawl. in Kon. et Sims, Ann Bot. i. (1805) 224. *IRIDEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 702.
aeuta, Ker-Gawl. Irid. Gen. 91-longituba.
angnsta, *Ker-Gawl. in Kon. b" Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 225.—Afr. austr.
Banni, *Baker, in fourn. Bot.* xiv. (1876) 182.—Afr. trop
bolbifera, *Baker, I. c*—Afr. austr.
caricina, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 395 = radiata.
dliata, E. Mey. ex Klatt, 1. c. S»4 = Geissorhiza ciliaris.
cinnamomea, *Ker-Gawl. in Kon. (f Sims, Ann. Bot.* i. (1806) 225.—Afr. austr.
crispa, *Eckl. Top. Verm.* 22.—Afr. anstr.
cucnllata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 393.—Afr. austr.
disticha, *Klatt, I. c*—Afr. anstr.
fclcata, *Ker-Gaml. in Kon. &• Sims, Ann. Soc.* i. (1805) 225.—Afr. austr.
flexuosa, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* iii (1882) 394.—Afr. austr.
graminifolia. *Sweet, Hort. Brit.* ed. 11.503.—Afr. austr.
humilis, *Baker, in Journ. Bat.* xiv. (1876) 239.—Afr. anstr.
kermesina, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 395.—Afr. austr.
latifolia, *Spreng. ex Steud. Notn.* ed. II. i. 753, nomen. —Afr. austr.
longituba, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) I. 652; *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 98.-Afr. austr.
maritima, *Eckl. Top. Vert.* 23.—Afr. austr.
montana, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 393.—Afr. austr.
pallida, *Eckl. Top. VerM.* 23.—Afr. austr.
pentandra, Drège, ex Baker, in Jonm. Linn. Soc xvi. (1877) 163-Tritonia scUlaris.
Petitiana, *Baker, I. c.* 96.—Abyssin.
pilosa, *Ker-Gawl. in Kon. VSims, Ann. Bot.* i. (1805) 225.—Afr. austr.
quinquangularis, Eckl. Top. Verz. 23 = Geissorhiza ciliaris.
radiata, *Ker-Gaml. in Kon. V Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 226.—Afr. austr.
ramosa, *Eckl. Top. Vert.* 23.—Afr. austr.
rosea, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 895.—Afr. anstr.
rubella, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 239.—Afr. anstr.
setacea, Eckl. Top. Verz. 23=radiata.
unifiora, Hocbst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 309 -Petitiana.
virginea, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 225 -angusta.

HESPERANTHES, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 241-Anthericum, Linn. (Lfflac).
leptophylla, S. Wats. 1. a - A. leptophyllum.
scabrella, S. Wats. 1. c.-A. scabrellum.
stenocarpa, S. Wats. 1. c.-A. stenocarpum.
Torreyi, S. Wals. 1. c.=A. Torreyi.

HESPERANTHUS, Salisb. in Trans. Hort. Soc i. (1812) 321-Hesperantha, Ker-Gawl. (Irid.).
tenuifolius, Salisb. 1. c. - Hesperantha radiata.

HESPEBEIiAEA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 83. *OLEACEAE,* Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1240.
Palmeri, *A. Gray, I. c*—Am. bor. occ.

HESPERETHUSA, M. Roem. Syn. Hesper. 31, 38 (1846) - Xlmonla, Linn. (Rntac).
acidissima, M. Roem. 1. c. 38 = L. acidissima.
ambigua, M. Roem. 1. c—L. acidissima.
crtnulata, M. Roem. L c - L. acidissima.
manritiana, M. Roem. 1. c. = L. manritiana.

HESPEREVAX, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 356, in obs.=Evax, Gaertn. (Compos.).
caulescens, A. Gray, 1. C.—E. canlescens.

HESPEHI8, Linn. Syst. ed. I (1735). *CSUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 76.
CHALCANTHUS, Boiss. Fl. Orient. L 156 (1867).
CLAUSIA, Trotsky, Ind. Sem. Hort. Casan. (1839).
DEILOSMA, Andrz. ex DC. Prod. ii. 450, 451, in syn. (1821); Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 397 (1838).
KLADNIA, Schur, Ennm. PI. Transs. 53 (1866).
PLAGIOLOBA, Reichh. Norn. 182 (1841).
acris, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 118 - Diplotaxis Sieberi.
aeruginea, Jord. Diagn. i. 136—laciniata.
aestiva, Lam. Encyc. iii. 324 = Matthiola incana.
africana. Linn. Sp. PI. 663—Malcolmia africana.
alba, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = matronalis.
albifiora, Schur, in Verb.. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 66 = matronalis.
Alliaria, Lam. FL Fr. ii. 508=Sisymbrium AlUaria.
alpina, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 66.—Hungar.
alyssifolia, DC. Syst. ii. 447 = Matthiola albicaulis.
alyssoides, Pen. Syn. ii. 203i = Malcolmia littorea.
angustifolia, DC. Syst. ii. 457 = Malcolmia tornlosa.
angustifolia, Lam. Encyc iii. 322 = Matthiola tristis.
angustifolia, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 807 = Erysimum liniifolium.
aprica, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 194.—Sibir.
arabidiflora, DC. Syst ii. 464-Parrya Iinnaeana.
arcuata, Nocca, PI. Sel. Hort. Ticin. i. 3. t 2-Chorispora tenella.
arenaria, Desf. Fl. Atlant. ii. 91 = Malcolmia arenaria.
arenaria, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20 = Malcolmia patula.
armena, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 63.—As. Min.
arvensis, Cav. Desc. 481-Moricandia arvensis.
Aucheri, Bal. ex Fonm. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 388-Balansae.
Aucheri, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 66 = pendula.
Balansae, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 338.—Anatolia,
bicuspidata, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 195.—As. Min.
bituminosa, Willd. Ennm. Hort Berol. Suppl. 45 - matronalis.
breviscapa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 67.—Armenia,
campicarpa, *Boiss. I. c.* 66.—Cilicia.
cappadocica, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 351.—Cappadoc.
earnosa, Poir. Encyc. Snppl. iii. 197 = Heliophila platysiliqua.
caucasica, *Rupr. Fl. Cauc.* 91.—Reg. Caucas.
cheiranthoid.es, Patrin, ex DC. Syst. ii 453 - aprica.
Cheiranthus, Pen. Syn. ii. 203 = aprica.
chia. Lam. Encyc iii. 325=Malcolmia chia.
cinerea, Poir. Encyc. SnppL iii. 196 = Cheiranthss scoparius.
eontortuplicata, Bieb. Fl. Taur. Cue. it 114 = Malcolmia eontortuplicata.

HESPEB.I8:—
coronopifolia, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. i. 754* Matthiola tristis.
crenulata, DC. Syst. ii. 466 - Malcolmia crenulata.
crenulata, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 187-Malcolmia Meyeri.
cratacea, *Adam, in Web. V Mohr, Beitr.* i. 62.—Rossiu
Cupaniana, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii 186.—Sicilia.
cuspidata, DC. Syst. ii. 453 - bicuspidata.
dalmatica, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) 335-secundiflora.
dauriensis, *Ante, Fl. lber.* vi. 495.—Hispan.
dentata. Linn. Sp. PI. 664-Sisymbrinm bursifolium.
diffusa, Banks, ex DC. Syst. ii. 623 = Brassies frntescens.
diffusa, Decne. in Ann. Sc Nat. Sér. II. iii. (1835) 271 —Malcolmia aegyptiaca.
diffusa, Lam. Fl. Fr. ii 504=Malcolmia afrieana.
elata, Homem. Hort. Hafn. Suppl. 74 — matronalis.
elongata, Poir. Encyc. Snppl. iii. 197 - Heliophila linearifolia.
erosa. Lag. Gen. et Sp. Nov. 20-Malcolmia lacera.
euganea, Marsigli, ex Tenore, Prod. Fl. Nap. p. x«vtu —matronalis.
exigua, *MM. Gard. Diet.* ed. VIIL n. 6 (Quid?).-Euiop.
Farsetia, Poir. Encye. Snppl. iii. 196 = Farseti* aegyptia.
fasdculata, Rafin. Speech, ii. 7 - Matthiola facisco-lata.
fenestralis, Lam. Encyc. iii 324 - Matthiola fenestralis.
flava, Georgi, Reise, i 225 = Erysimnm altaicum.
flava, *Kotschy V Boiss. in Bolss. Fl. Orient,* i. 237.—Knrdist.
fragrans, *Fisch. ex Sweet, Brit. Flow. Gard.* t 61.—Sibiria.
frutescens, Poir. Encyc Snppl. iii. 195 = Cheiranthus semperflorens.
glabra, *Boiss. V Noi, Diagn.* Ser. II. *r.* 22.—Armenia.
glabra, *Royle, Illustr. Bot. HimaU* 72.—Reg. Himal-
glabra, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. *V-* (1853) 65-alpina.
glandulosa, Pen. Syn. ii. 203 = Dontostemon integn-folius.
glutinosa,Via. in Flora,sdi.(1829)I. Erg. 16-secona«-flora.
graminea, Poir. Encyc. Snppl. iii. 197-HeliopW* graminea.
grandiflora, *Sims, Bot. Mag.* t. 2683.—Hab. ?
heterophylla, Tenore, Fl. Nap. Prod. p. "xxix * matronalis.
hieradfolia, Vill. Hist. PI. Danph. iii. 317 - laciniata.
hispida, Schreb. ex Roth, in (Jsteri, Ann. Bot. *r, (1796) 29 = Malcolmia africana.
Hookeri, Ledeb. Fl. Ross. i. 174 - CbeuantnO* pygmaeus.
hortensis, Pen. ex Steud. Nom. ed. I. 402 - "»"" nalis.
humilis, *Boiss. Fl. Orient, i.* 231.—As. Min.
hyrcanica, Spreng. Syst. ii. 900.—Persia.
incana, Patrin, «x DC. Syst ii. 210 - Arabu » cantata. ...M)
incrassata, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i- C"58" 338—Malcolmia flexuosa.
inodora, Asso, Syn. PI. Arag. 87 - MalcoO" africana.
inodora, Gouan, Fl. Monsp. 167-Arabis cebenneW
inodora, Linn. Sp. PI. 727 - matronalis.
Jasa, Hort. ex Fisch. Mey. *Sc* AvcS-Lall- loo- Hort Petrop. xi. 75 -Malcolmia africana.
Kladnii, Schur. in Verh. Siebenb. Ver. Natt"*' (1853) 65-alpina.
Kotschyana, *Fenal, Pugill. PI. Nov. Syr.* Syria.
Kotschyi, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 21 =humil«-
kunawarensis, Royle, ex Hook. f. *8c* Thorns. U> Linn. Soc v. (1861) 135=Parrya macrocarp*-
Ucera, *Georgi, Beschr. Russ. Reich,* iv. 113»— anstr.
lacera, Lam. Encyc. iii. 322-Malcolmia la
lacera, Sibth. ex DC. Syst. ii. 177 - bicomis.
Udniata, *AU. Fl. Pedem.* i. 271. t. 82. f anstr.
laciniata, Vis. FL Dalmat 130-secnndiflora-

HEBPEBI8:—
laxa. Lam. Encyc. iii. 825 = Malcolmia airicana.
leuca&tha, Schnr, Ennm. PI. Transs. 52 = matronalis.
leucoclada, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1812) 69.—Persia.
linearis, Poir. Encyc Suppl. iii. 197 - Heliophila linearis.
linifolia, Pourr. ex Desf. Tabl. ed. I. 129—Erysimum linifoHum.
littorea, Lam. Encyc. iii. 322 = Malcolmia littorea.
longifolia, Poir. Encyc. Snppl. iii. 195-Cheiranthus mutabilis.
lutea, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. (1873) 282.—Japon.
lyrata, *Lam. Encyc.* iii. 825.—Sibir.
majnscula, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 389.—Syria?
maritima, Lam. Fl. Fr. ii. 504 = Malcolmia maritima.
matronalis, *Linn. Sp. PI.* 663.—Europ.; As. bor.
Menwiesii, Hook. Fl. Am. Bor. i. 60 - Cheiranthus Menziesii.
microcalyx, *Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 851.—Armenia.
minima, Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 90 = Cheiranthus pygmaeus.
**°*niliformis,* Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1858) 22 = alpina.
muhicaulis, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 10.—Persia.
nitens, Viv. Fl. Lib. Spec. 38. t. 5. t 3 - Moricandia suffruticosa.
nivea, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 278 - matronalis.
oolongifolia, Schur, Enum. PI. Transs. 52-alpina.
ottusa, Moench, Meth. Suppl. 86 = matronalis.
odoratissima, Poir. Encyc. Suppl. iii. 195 = Matthiola odoratissima.
"reiniana, *Tenore, Viag.* 78.—Europ. austr.
P<*uhypodium,* Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. nil. (1866) 385 = Malcolmia africana.
Pachyrhiza, *Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxm. (I860) i. 112.—SoongarU.
Pallasii, Porter & Coulter, Fl. Colored. 9= Erysimum Pnmilum ?
P«tt«uii. Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 667 - Cheiranthus Pygmaeus.
Paniculata, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot.* i. 331, nomen.—As. Min.
Porviflora, DC. Fl. Fr. iv. 654=Malcolmia pamflora.
P"rviflora, Poir. Encyc. Suppl. iii. 194 - Matthiola Parviflora.
torviflora, Schur, Enum. PI. Transs. 52 = alpina.
PWvula, *RetB , iH' Hoffm Pkyiog. Blaett.* i. (1803) 43. 1—Europ.
£*"'«. Lag. ex DC. Syst, ii. 444 = Malcolmia patula.
P^ula, *DC. Syst.* ii. 457.-A& Min.; Syria.
P-nuui a, Murr.in Nov. Comm. Gotting. vi. (1776) 38. t. 6 = pendula.
persica, 3 64 — *in Ann. Sc.* »<«• *•n_ xvii. (1842)
petioi a t a, ^. *pi. TauT. Cauc.* ii. 126.-Reg. Caucas.
n/°sa, Poi,. En,™ suppl. iii. 197 - Dontostemon Pectinatus.
frnnata, Pers. Syn. ii. 208=Dontostemon pectinatus.
™*n<>tifida,* Desf. Choix, 63 = Malcolmia lacera.
wwifida, Michx. FL Bor. Am. ii. Sl-Thelypodium P'nnatifidum.
Podocarpa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (^42) 65.-Syria.
Provifnálu; linn. Sp. PI. 664-Matthiola tristis.
pulcnell«. DC. Syst. ii. 455 = Malcolmia pulchella.
pulmonarioi *Boiss.* Sér. II. xvii. (1842) 68.
pumil«. PoiT^cy'ç. Suppl. iK- 194 - Malcolmia parviflora.
punctata, Poir. 1. c. 195=Dontostemon pectinatus.
purpurascen 4 = laciniata.
pygmaea, DC. Syst. ii. 454 = Malcolmia pulchella.
pygmaea, Ddile.Fl. Aegypt. Illustr. 67 = Malcolmia Pygmaea.
pygmaea, Hook. Fl. Bor. Am. i. 60-Cheiranthus Pygmaeus.
*U>?f:A?*ula,* Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. 1L *vh. ro^84 2.)67=pulmonarioides.
^nwfwa, DC. Syst. ii. 456-Malcolmia parvi-
ramosissim'> ^erf- ex Boiss. Fl. Orient, i. 222 = Malcolmia nana.

HESPEB.IS:—
ramosissima, *Desf. Fl. Atlant.* it 91. t. 161.—Afr. bor.; Sicil.
renifolia, *Boiss. V Hohen. Diagn.* Sér. I. viii. 22.—Persu.
repanda, Lag. Gen. et Sp. Nov. 20-Erysimum linifolium.
Reuteriana, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 20 = bicuspidata.
rhampicarpa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 66.—Taurus.
rigida, Sibth. ex DC. Syst ii. 448 - Malcolmia chia.
rigida, Stev. in [Fisch.] Hort. Gorenk. ed. 1. (1808) 82-Malcolmia torulosa.
rundnata, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hung. ii. 220. L 200-matronalis.
rupestris, Boiss. *Sc* Noè, Diagn. Ser. II. i. 22 = pendula.
rupestris, Rafin. Speech, ii. 46 = Matthiola incana.
salina, Lam. Encyc. iii. 324 = Arabis incarnata.
salina, Pall, ex DC. Syst. ii. 486 - Chorispora tenella.
scabrida, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. in. xvii. (1842) 64.—Mesopotam.
scapigera, DC. Syst. ii. 454 = Parrya macrocarpa.
secundiflora, *Boiss. V Sprun. Diagn.* Ser. I. i. 70.—Graecia; As. Min.
semperflorens, Poir. Encyc. Suppl. iii. 196-Cheiranthus semperflorens.
sibirica, Hohen. ex Boiss. Fl. Orient, i. 238 = matronalis.
sibirica, *Linn. Sp. PI.* 663.—As. bor.
sinuata, Lam. Encyc. iii. 823 - Matthiola sinuate.
speciosa, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 135 = Parrya integerrima.
spectabilis, Jord. Diagn. i. 185-ladniata.
Steveniana, *DC. Syst.* ii. 452.—Graecia ; As. Min.
suaveolens, Bess, ex Steud. Norn. ed. II. i. 754-laciniata.
sylvestris, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 34; ed. II. 82-matronalis.
tatarica, Pall. Reise, i. 497 - Matthiola tatarica.
tauricola, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i. 232 - Kotschynna.
tenella, Hort. ex DC. Syst. ii. 436 = Chorispora tenella.
thyrsoidea, *Boiss. Fl. Orient,* I. 284.—Armen.
trickosepala, Turcz. in Boll. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) II. 182-aprica.
tricuspidata. Lam. Encyc. iii. 823 - Matthiola tricuspidata.
rr»Voifl,Lam. 1. c.=M«lc°lniia littorea.
tristis, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 927.—Europ. austr.
umbrosa, Herbich, Stirp. Rar. Bucov. 48=matronalis.
uneinata, Steud. Nom. ed. II. i. 754, in syn., sphalrn. = matronalis.
unguicularis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 21.—Armenia.
unguinosa, Schrank, PI. Rar. Hort. Monae. t. 77 = matronalis.
verna. Linn. Sp. PL 664-Arabis verna.
£Z, Pall, ex Ledeb. Fl. Ross. i. 172 - n&tronalis.
millosa, DC. Syst. ii. 449 = laciniata.
ZllZa, Poir. Encyc. Suppl. iii. 197 - Matthiola tricuspida
violacet'5«. *Diagn.* Ser. I. v. 80.—As. Min.
Maria, Lam. Encyc. iii. 323 = Matthiola incana-
nsianii, Fourn. in Bull. Soc. Bot Fr. xui. (1866) 338-secundiflora.

HESFBBOCALLIS, A. Gray, in Proc. Am· Acad. Wi. (1868) 390. *LILIACEAE,* Benth. ft Hook. f. in. 777.
undulate, *A. Gray, I c.* 891.-Mexic.

TTBBPEBOCHIBOIT, S. Wats. Bot. King's Exped. 281. t 3 0 (1871). *HYDROPHYLLACEAE,* Benth.. *gc* Hook. f. ii. 829.
&Jh£Zk^Acad., (1873) 44.-
X *Porter, in Hayden, Geol. Rep.* (1872) 768.-Am. bor. occ.

HPSPEROCLES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 85 (1866) - Notoo8.»rd\im, Kunlh (Liliac).
S, Salisb. 1. c.=N. fmgrans.

HE8PEKOCNTDE, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 139 (1856). *URTICACEAE,* Benth. & Hook, if iii. 881.
sandwicensis, *Wedd. in DC. Prod.* xvi. 68.—Ins. Sandvic.
tenella, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 139.—Calif.

HESPEROMANNTA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 554. *COMPQSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 489.
arborescens, *A. Gray, 1. c.*—Ins. Sandvic.

HESPEROMELES, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1956 (1837) -OBteomeles, Lindl. (Rosac).
cordata, Lindl. 1. c.-O. latifolia.
cuneata, Lindl. 1. c.—Peruv.
ferruginea, Lindl. in Benth. PI. Hartw. 129 =O. ferruginea.
glabrata, M. Roem. Syn. Rosifl. 225 = 0. glabrata.
heterophylla, Hook. Ic. PI. t. 846.—N. Granat.
latifolia, M. Roem Syn Rosifl. 225= O. latifolia.
oblonga, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1»56.—N. Granat.
obtusifolia, Lindl. 1. c. = 0. glabrata.
pernettyoides, Wedd. Chlor. And. ii. 280 - O. pernettyoides.

HESPEROSCORDIUM, Baker, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 378-seq.

HESPEROSCORDON, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 185 (1839)-seq.

HESPEROSCORDUM, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1298 (1829) = Brodlaoa, Sm. (Liliac).
hyacinthium, Lindl. 1. c. = B. lactea.
lacteum, Lindl. 1. c. t. 1689 = B. lactea.
Lewisii, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 185 - B. lactea.
maritimum, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 148-MuilIa maritima.

HESPEROXIPHION, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 127-CypeUa, Herb. (Irid.).
peruvianum, Baker, 1. c.-C. peruviana.
pusillum, Baker, 1. c.-C. pusilla.

HESSEA, Berg, ex Schlecht. in Linnaea, L (1828) 352-Carpolyza, Salisb. (Amaryll.).
spiralis, Berg, ex Schlecht. 1. c.-C. spiralis.

HESSEA, Herb. Amaryll. 289. t. 29 (1837). *AMARYLLIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 720.
GEMMMUA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 127 (1866).
IMHOFIA, Herb. App. 18 (1821).
PERIPHANES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 118 (1866).
breviflora, *Herb. Amaryll.* 289. t. 29. f. 6.—Afr. austr.
Burchelliau, *Benth. V Hook. f. Gen.* iii. 721.—Afr. austr.
crispa, *Kunth, Enum. PI.* v. 632.—Afr. austr.
Dregeana, *Kunth, 1. c.* 683.—Afr. austr.
filifolia, *Benth. V Hooi.f. Gen.* iii. 721.—Afr. anstr.
gemmata, *Benth. (f Hook.f. 1. c.*—Afr. austr.
stellaris. *Herb. Amaryll.* 289.—Afr. austr.
vaginata, Herb. 1. c-Strnmaria truncata.

HETAERIA, Blume, Bijdr. 409.1.14 (1825) (Etaeria); Fl. Jav. Praef. p. vii (1828). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 603.
AETHERIA, Endl. Gen. 214 (18 7).
CEROCHILVS, Lindl. in Gard. Chron. (1854) 87.
RHAMPHIDIA, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 181.
RHOMBODA, Lindl. 1. c (1857) 181.
SALACISTIS, Keichb. f. Xenia Orch. i. 214. t 87 (1857).
abbreviata, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7385; *Gen. et Sp. Orch.* 481.—Reg. Himal.
affinis, Lindl. in Wall. Cat. n. 7383 (Zenxbes sp.).—Ind. or.
albida, Blume, Bijdr. i. 410-Vrydagzynia albida.
anomala, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 185.—Reg. Himal.
caespitosa, *Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bet.* i. (1842) 189.—Bras,
cordata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* 1. (1857) 185.—Ins. Banda.
cristata, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 103.—Java,
elongate, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7384.—Malaya.

HETAERIA:—
clongata, Miq. FI. Ind. Bat. iii. 726 = Vrydagzynia elongata.
flaw, Lindl. in Wall. Cat n. 7380-Zeuxine flava.
forcipata, *Reichb. /. in Linnaea,* xli. (1877) 62.—Ins. Fiji.
fusca, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 491.—Reg. Himal.
Gaidneri, *Smth. tf Hook./. Gen.* iii. 604.—Zeylan.
graeilis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 726=Vrydagzynia gracilis.
javanica, Blume, Bijdr. 410=Cystorchis javanica.
lamellata, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 106.—Java,
lanceolata, *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 142.-Reg. Himal.
longifolia, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 846.—Reg. Himal.
micrantha, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 108.—Java.
mollis, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 184 (Zeuxines sp.).—Ind. or.
moulmeinensis, *Par. b" Reichb./. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 142.-Burma.
nervosa, Lindl. in Wall. Cat n. 7381 - Zenxine nervosa.
nuda, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 726-Vrydagzynia nnda.
obliqna, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 104.—Borneo,
oblongifolia, *Blume, Bijdr.* 410. t. 14; *Orch. Archip. Ind.* 102.—Java.
obscura, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 726 - Cystorchis obscura.
occulta, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 94=Platylepis goodyeroides.
ovalifolia, *Benth. & Nook./. Gen.* iii. 604.—Ind. or.
polyphylla, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 62.—Ins. Fiji,
parpuratcens, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 105.—Java.
purpurea, Miq. Fl. Ind. Bat iii. 726 = Vrydagzynia purpurea.
roseans, *Reichb./. in Bonplandia.v.* (1857) 85.—Java,
rubens, *Benth. V Hook./. Gen.* iii. 604.—Reg. Himal.; Burma.
rubicunda, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 214 = Goodyera rubicnnda.
tennis, *F. Muell. Census,* 111; *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 81, 151.—Ins. Philipp.; Austral.
uncinata, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 727-Vrydagzynia uncinata.
vaginalis, *Reichb./. in Flora,* lxviii. (1885) 537.—Ins. Comor.
variegata, Miq. Fl. Ind. Bat iii. 726 - Cystorchis variegata.
Whitmeei, *Reichb./. in fount. Bot.* xv. (1877) 138.—Ins. Samoa.

HETAERIA, Endl. Gen. 133 (1837) = Pritzelia, F. Muell. (Philyd.).
pygmaea, Endl. 1. c.» P. pygmaea.

HETERACANTHA, Link, ex Stend. Nom. ed. II. i. 755 (1840) = Carthamus, Tonrn. (Compos.).
lanata, Link, ex Steud. 1. c. = C. lanatus.

HETERACEA, Steud. Nom. ed. II. i. 755 (1840)-Heteraoia, Fisch. & Mey. (Compos.).

HETERACHAETTA, Fresen. in Mus. Senckenb. iii. (1839) 74. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 526.
massauensis, *Fresen. I. c.*—Abyssin.

HETERACHAENA, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Ihd. n. (1845) 577 = Pimpinella, Riv. (Umbellif.).
alpina, Zoll. & Mor. 1. c. = P. javana.
javanica, Walp. Ann. i. 846, in syn.-P. javana.

HETERACHNE, Benth. in Hook. Ic. PI. xiii. 40 t. 1250 (1877); Fl. Austral, vii. 634 (1878). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1188.
Brownii, *Benth. II. cc.* 40; 686.—Austral.
Uulliveri, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 1250.—Austral.

HETERACHTHIA, Kunze, in Bot Zeit. viii. (1850) 1—Tradcscantia, Linn. (Commelin.).
Gaudichaudiana, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 303 = T. elongata.
pulchella, Hassk. ex C. B. Clarke, 1. c 304 = T. amplexicaulis.
pulchella, Kunze, in Bot Zeit. viii. (1860) 1 - T. pulcheUa.

HETEEACIA, Fisch. *8c* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. (1885) 29. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 610.
Szovitsii, *Fisch. tf Mey. 1. c.* 30.—Armenia.

HETERACTIS, DC. Prod. vi. 468 (1837) = Gymnoetephlum, Less. (Compos.).
/alcata, DC. 1. c.=G. ciliare.

HETERANDRA, Beauv. in Trans. Am. Phil. Soc. iv. (1799) 175 = Heteranthera, Ruiz & Pav. (Pontederiac).
reni/ormis, Beauv. 1. c. 177 - Heteranthera reniformis.

HETERANTHELIUM, Hochst. ex Jaub. *Sc* Spach, Illustr. iv. 24 (1860) = Agropyron, J. Gaertn. (Gramin.).
pili/erum, Hochst. ex Jaub. *Sc* Spach, L c. <=A. orientale.

HETERANTHEMIS, Schott, in Oken, Isis (1818), 821 - Chrysanthemum, Linn. (Compos.).
hirta, Spreng. Nov. Prov. 9 *• C. viscosum.
viscidi-hirta, Schott, in Oken, Isis (1818), 821. f. 6 = C. viscosum.

HETERANTHERA, Ruiz & Pav. Prod. 9. t. 2 (1794). *PONTEDERIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 838.
BVCHOSIA, Veil. FL Flum. 83 (1825).
HETERANDRA, Beauv. in Trans. Am. PhiL Soc. iv. (1799) 175.
LEPTANTHUS, Michx. Fl. Bor. Am. i. 24. t. 5 (1803).
LUNANIA, Rafin. Med. Fl. ii. 106 (1830).
SCHOLLERA, Schreb. Gen. 785 (1791).
TRIEXASTIMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 121 (1836).
acuta, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 488; Vahl, Enum. ii. 42 - reniformis.
alismoides, H. B. *Sc* K. ex Link, Jahrb. i. III. 73—limosa.
alismoides, *Willd. ex Kunth, Enum. PL* iv. 122—Venezuela.
callaefolia, *Reichb. ex Kunth, I. c.* 123.—Afr. trop.
cordate, *Vahl, Enum.* ii. 44.—Am. austr.
diversifolia, *Vahl, I. c.*—Guiana.
/ormosa, Miq. in Linnaea, xvii. (1843) 60 - Eichhomia speciosa.
graminea, *Vahl, Enum.* ii. 45.—Am. bor.
grandiflora, Klotzsch, in Schomh. Fauna et Fl. Brit. Gui. 1118=Eichhomia pauciflora.
hydrocleifolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 253.—Cuba.
Kotschyana, Fenzl, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 294, nomen —callaefolia.
limosa, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 439; *Vahl, Enum.* ii. 44.—Am. calid.
mexicana,.?. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-83) 168.—Mexic
oblongifolia, *Mart, in Schult. /. Syst.* vii. 1148.—Bras.
pedunculatis, *Benth. PI. Hartxt.* 26.—Mexic.
Fotamogeton, *Solms, in DC. Monog. Phan.* iv. 621.—Afr. trop.
pubescens, Vahl, Enum. ii. 48=reniformis.
reniformis, *Ruie & Pav. Fl. Per.* i. 43. t. 71.—Am. calid.
rotundi/olia, Griseb. Cat. PI. Cub. 252-limosa.
Seubertiana, *Solms, in DC. Monog. Phan.* iv. 618.—Bras.
spicata, *Presl, Symb. Bot.* t. Iff.—Cuba,
zosteraefolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* i. 7. t. 3.—Bras.

EETERANTHIA, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. i. (1823) 41. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 926.
VROLIKIA, Spreng. Syst. iii. 149 (1826).
decipiens, *Nets* to" *Mart. I. c*—Bras.

HETERANTHUS, Bonpl. ex C.iss. in Diet Sc Nat. xxi. 110 (1821)«Pere«ia, Lag. (Compos.).

HETERANTHUS, Dum. ex FOUR, in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 183-Ventenata, Koel. (Gramin.).
tenuis, Fourr. 1. c - V. avenacea.

HETERAPITHMOS, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxii. (1859) 1.265. Gen. dub. *OLACIN.—Cf.* Benth. *8c* Hook. f. Gen. i. 995.
floribunda, *Turci. I.* c—Bras.

HETERELYTRON, Jungh. in Hoev. *Sc* De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 294 - Anthistirta, Linn. (Gramin.).
scabrum, Jungh. 1. c. 295 -- A. gigantea.

HETERISIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 69 (1836) = Saxifraga, Tourn.

HETEROCANSCORA, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 431-Canscora, Lam. (Gentian.).
Schultesii, C. B. Clarke, 1. c - C. Schultesii.

HETEROCARPAEA, Sdjeele, in Linnaea, xxi. (1848) 467-Oalactia, p. Br. (Legumin.).
texana, Scheele, 1. c 469 = G. canescens.

HETEROCARPUS, Phil, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 641-Cardamine, Toum. (Crucif.).
/ernandeiianus, Phil. 1. c. - C. chenopodiifolia.

HETEROCARPUS, Wight, Ic vi. 29. t. 2067 (1853)-Commolina, Linn.
glaber, Wight, 1. c. t. 2067 = C. glabra.
hirsutus, Wight, 1. c = C. hirsuta.
obliquus, Hassk. Commel. Ind. 7 = C. obliqna.
oligotrichus, Hassk. 1. c. 7=C. oligotricha.

HETEROCARYUM, A. DC. in DC. Prod. x. *U** (1846j-Echinospennum, Sw. (Borag.).
condylophorum, A. DC. 1. c.=E. condylophorum.
divaricatum, Stocks, ex Boiss. *VI.* Orient, iv. 253 - E. sessiliflorum.
laevigatum, A. DC. in DC. Prod. x. 145-E. laevigatum.
minimum, A. DC. 1. c. 144 = E. minimum.
pachypodum, A. DC. 1. c - E. Szovitsianum.
rigidum, A. DC. 1. c. 146-E. Szovitsianum.
SiovitBiana, A. DC. 1. c.=E. Szovitsiannm.

HETEROCENTRON, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 290 (1840) = Heerla, Schlecht. (Melastom.).
alpestre, Naud. in Ann. Sc. Nat Sér. III. xiv. (1850) 156 - Heeria macrostachya.
Arstedii, O. Berg, ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. »'• 297, sphalm. = Tibouchina Oerstedii.
axillare, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IIL xiv. (1850) 155 = Heeria macrostachya.
dicranantherum, Naud. 1. c 156 - Monochaettu» dichranantherum.
glandulosum, Schrenk, in Regel, Gartenfl. (1856) 2»''" 1.169 - Heeria macrostachya.
Humboldtianum.tiaxii. in Ann. Sc. Nat. Sér. IIL*IV- (1850) 156 —Mocochaetum Humboldtianum.
macrostachyum, Naud. 1. c. 155 = Heeria macrostacny*-
mexicanum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 29" Heeria subtriplinervia.
mexicanum, Naud. in Bot Mag. t. 5166 = Heeria rosea.
Oerstedii, O. Berg, ex Triana, in Trans. Linn. S*"" xxviiu (1871) 40=Tibouchina Oerstedii.
roseum, A. Br. *Sc* Bouché, in Linnaea, xxv. (1852) = Heeria rosea.
subtriplinervium, A. Br. *8c* Bouché, 1. c.-Hee" subtriplinervia.
undulatum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. HI- *IV, (1850) 155 = Heeria undnlata.

HETEROCENTRUM, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. '• 416 (1880)-praec.

HETEBOCHAEITIA, A. DC. in DC. Prod, vii-J (1839). *CAMPANULACEAE,* Benth. & HooK. »• 656.
ensifolia, *A. DC. I. c.* 442.—Ins. Mascar.

HETEROCHAETA, DC. Prod. v. 282 (1836) = Aster, Toum. &c. (Compos.).
asteroides, DC. 1. c. •= A. Heterochaeta.
diplostephioides, DC. 1. c. = A. diplostephioides.
erigeroides, DC. 1. c=Erigeron alpinus.
gnaphalioides, DC. 1. c. = Erigeron gnaphaliowe-jasionoides.
hispida, DC. 1. c *- Hysterionica jasionoides.

HETEROCHAETA :—
leueophylla, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1847) 326=Erigeron leucophyllua,
Pseudo-Erigeron, Bunge, 1. c. 826.—Sibiria.
pubescens, DC. Prod. v. 283-Erigeron pubescens.
stricta, Benth. PL Hartw. 206 •* Erigeron strictus J

HETEROCHLAMYS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Most xvi. (1848) 61 = Julooroton, Mart. (Enphorb.).
quinquenervia, Tnrcz. 1. c. 62-J. argenteus.

HETEROCHLOA, Desv. Opusc. 66 (1831)-Andre-Pogon, Linn. (Gramin.).
Alopecurus, Desv. 1. c-A. pednncularis, *Baker.*

HETEROCHLOA, EndL Gen. Snppl. iii. 92 (1843) = leq..

HETEROCHROA, Bunge, in Ledeb. FL Alt. ii. 181 (1880)-OypBophila, Linn. (Caryoph.).
desertorum, Bunge, Verz. Snppl. FL Alt. 29 = G. desertorom.
glandulosa, Boiss, Diagn. Ser. I. i. 15=G. glandulosa.
"ticrophylla, Schrenk„ Ennm. PI. Nov. i. 92 = G. microphylla.
minuartioides, Jaub. & Spach, IUuslr. i. 26 •= G. minuartioides.
petraea, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 131 = G. Bungeana.
'pergulaefolia, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. i. 28 = G. spergulifolia.
violacea, Walp. Rep. v. 81-G. violacea.

HKTEROCLADUS, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. C1847) i. 152 = Corlaria, Linn.
caracasanus, Turcz. 1. c. 158 = C. thymifolia.

HETEROCLITA, Rafin. Fl. Tellur. Ui. 27 (1886) = Qentlana, Tonm.
dtchotoma, Rafin. 1. c.~G. tenella.

HETEROCODON, Nult. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. U. viii. (1848) 255° Campanula, Tourn.
""nimum, Kellogg, in Proc. Calif. Aead. vii. (1877) Hi» Alchemilla arvensis.
rtriflorum, Nntt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 255 = Calif.

HETEROCOMA, DC. In Ann. Mns. Par. xvi. (1810) 191. 7. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 224.
jjjbida, *DC. I. c*—Bras.
<"frons, DC. 1. c.=Chronopappus bifron».
Pedunculate, Steud. Norn. ed. I. 408 - Vemonia pedunculata.

^ETEROCRAMBE, Coss. *Sc* Dor. Ind. Sem. Hort. Burdig. (1867) 26-Bra8Bica, Toum. (Crucit).
Anstidis, Coss. *tc* Dnr. 1. c. *{=Sinapis pubescent).*—Hab.

^ETERODENDRON, Spreng. Syst. ii. 866 (1825) = «eq.

HETERODENDBOTI, Desf, in Mem. Mns. Par. 2- d818) 8. t. 3. *SAPINDACEAE,* Benth. *8c* .!look. f. i. 407.
Oiversifolium, *F. Muell. Fragm.* i. 46.—Austral.
**crocalyx, Radlk. in Act. Cangr. Bot. Amst.* 1877 .(1879) 119.—Austral,
"jicrocalyx, *Radlk. I. c*—Austral,
oleaefolinm, *Desf. in Mint. Mus. Par.* iv. (1818) 8. t. 3. —Austral.

HETERODERIS, Boiss. Fl. Orient, iii. 798 (1875) = Crepis, Vaill. (Compos.).
pusilla, Boiss. I. c. 794,-Persia.
Stocksiana, Boiss. 1. c—Belnchist

HETERODON, Meissn. Gen. 72 (1837) = Beraelia, Brongn. (Bruniac.).
wgarioides, Mei3sn. Gen. Comm. 52 *("Berardta f «garioides)*—*Mt.* austr.
**«perbus,* Meissn. 1. c. = Berzelia superba.

HETERODONTA, Nutt. ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 3«5 (1878) = Coreopsis, Linn. (Compos.).

KETEBODBABA, Greene, in Bull. Calif. Acad. i„ A. in. (1886) 71. *CRUCIFERAE.*
unilateral^, *Greene, 1. c.* 72.—Calif.

HBTEROGATJBA, Rothr. in Proc Am. Acad. vi. (1864) 854. *ONAGRARIEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. 1. 793.
califomica, *Rothr. I. c*—Calif.

HETEROLAENA, C. A. Mey. ex Fisch. Mey. *Sc* Avé-LalLInd. Sem. Hort. Petrop. x. 47 (1845)-=Pimelea, Banks (Thymel.).
decussata, C. A. Mey. in Bull. Phys. Math. Acad. Pétersb. iv. (1845) 73-P. ferruginea.
Hendersonii, C. A. Mey. 1. c. 74 = P. rosea.
kispida, C. A. Mey. 1. c 73 = P. hispida.
incana, C. A. Mey. 1. c. = P. nivea.
nivea, C. A. Mey. 1. c.=P. nivea.
rosea, C. A. Mey. 1. a-P. rosea.
spectabilis, C. A. Mey. ex Fisch. Mey. *Sc* Avé-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop. x. 48 = P. spectabilis.

HETEROLAENA, Sch. Bip. ex Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 246 (1878)=Eupatorium, Tourn. (Compos.).
alpestris, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. II. 328 -E. serratnm.
anethifolia, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 380 - E. anethifolium.
conferta, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 828 = £. serratum.
Gaudichaudiana, Sch. Bip. ex Baker, 1. c 329 - E. Gaudichaudianum.
intermedia, Sch. Bip. ex Baker, 1. c.-E. intermedium.
involucrata, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 331 = E. coriaceum.
itapingensis, Sch. Bip. ex Baker, 1. c 329 = E. intermedium.
leucodon, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 830 = E. Gaudichaudianum.
moUissima, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 331 - E. mollissimum.
nitida, Scb. Bip. ex Baker, 1. c. 370-Kanimia erythralina.
orgyalis, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. 328—E. serratum.
serrata, Sch. Bip. ex Baker, 1. c. = £. serratum.

HETEROLATHUS, Presl.Bot. Bemerk. 181 (1844); in Abh. Boehm. Grs. Wiss. V. iii. (1846) 561 = Aspalathus, Linn. (Legumin.).
involucrata, Presl, Bot. Bemerk. 132 = A. undulata.
polycephala, Presl, 1. c. = A. polycephala.
suaveolens, Presl, 1. c.~A. suaveolens.

HETEROLEPIB, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1820) 26. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 328.
HETEROMORPHA Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 12.
conymoides, Bert, ex DC. Prod. vi. 416«=Senecio adenotrichius.
decipiens, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxi. 120.—Afr. austr.
mitis, *DC. Prod.* vi. 497.—Afr. austr.
orywoides, Stend. Nom. ed. II. i. 755, sphalm. = *<:orymoides.*
peduncularis, *DC. Prod.* vi. 497.—Afr. austr.

HETEROLEPIS, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient, v. 554 (1881)-Chloris, Sw. (Gramin.).
elegans, Ehrenb. 1. c. = C. meccana.

HETEROLOMA.Desv. ex Reichb. Consp. 162 (1828)-Adesmia, DC. (Ltgnmin.).
onobrychoides, Desv. ex DC. Prod. ii. 819 - A. pappa posa.

HETEROLOPHUS, Cass, in Diet Sc. Nat. 1.260 (1827) —Centaurea, Linn. (Compos.).
siUricus, Cass. 1. c. = C. Marschalliana.

HETEROMELES, M. Roem. Syn. Rosifl. 105 (1847)-Fhotinia, LindL (Rosac).
arbutifolia, M. Roem. 1. c. = P. arbntifolia.
Fremontiana, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. Sir. I. x. (1874) 144-P. arbutifolia.

HETEROMERA, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 60 (1874) = Chrysanthemum, Toum. (Compos.).
fuscata, Pomel, 1. c. = Matricaria fuscata.
macroearfa, Pomel, 1. c—Alger.

HETEROMERIS, Spach, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1886) 290-Hellanthemum, Toum. (Cistin.).
canadensis, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1830) 370 *=Helianth. canadense.
cymosa, Spach, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. C1836) 291 = Helianth. canadense.
mexicana, Spach, in Ann. Sc. Nat. Se>. II. vi. (1886) 370 — Helianthemum glomeratum.
Michauxii, Spach,in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 291-cHelianth. canadense.
polifolia, Spach, 1. c. 291 = Helianth. capitatum.

HETEROMMA, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 286 (1873). *COMPOSITAE.*
decurrens, *Benth. (in Herb. Kew.).*—*A(r.* austr.

HETEROMORPHA, Cass. in Bull. Soc. Ph lorn. (1817) 12 = Heterolepis, Cass. (Compos.).
decipiens, Cass. 1. c. = Heterolepis decipiens.

HETEROMORPHA, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaca, i. (1826) 3t>6. t. 5. *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 887.
abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 28 = arborescens.
arborescens, *Cham. & Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 385.—Afr. austr.
eollina, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 342-arborescens.
trifoliata, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. - arborescens.

HETEROMORPHA, Viv. ex Coss. in Bull Soc. Bot. Fr. xii. (1866) 278 = Hypoohoerla, Linn. (Compos.).
crinita, Viv. ex Coss. 1. c. - Hypoch. aethnensis.

HETEROMYRTUS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 76 (1849), in obs. - Myrtua, Toum.
umbilicata, Blume, I. c. = M. umbilicata.

HETERONEMA, Reichb. Consp. 173 (1828) - HETERONOMA, DC.-Arthrostema, Ruiz *8c* Fav. (Melastom.).

HETERONEURON, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. i. 768 (1867) =Loreya, DC. (Melastom.).
nigricans, Hook. f. 1. c. = L. nigricans.

HETERONOMA, DC. Prod. Hi. 122 (1828) - Arthrostema, Ruiz *8c* Pav. (Melastom.).
campanulas, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 158 = A. campanulaie.
ciliatum, Naud. 1. c. 154 = A. ciliatom.
coriaceum, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 140.—Bras.
cubense, Naud. in Ann. Sc. Nat. Se>. III. xiv. (1850) 162-A. fragile.
diversifolium, Benth. Bot. Voy. Sulph. 93-A. campanulare.
diversifolium, DC. Prod. iii. 123 - A. ciliatum.
diversifolium. Link *Sc* Otto, Ic PI. Rar. 73. t. 37-A. fragile.
Galeottianum, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiv. (1850) 158-A. fragile.
Goudotianum, Naud. 1. c 162-A. volubile.
latifolium, Nand. 1. c. 153-A. latifolium.
mexicanum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 94 - Heeria subtriplinervia.
Pachyloma, Mart. Nov .Gen. et Sp. iii. 140. t. 273 - Pachyloma coriaceum.
subtriplinervium, DC. 5— Notice PI. Geniev. 12 - Heeria subtriplinervia.
volubile, Naud. in Ann. Sc Nat. *Sit.* III. xiv. (1850) 153 = A. volubile.

HETEROPANAX.Scem. Journ. Bot. iv. 297 (1866); Fl. Vit. 114. *ARAL1ACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 945.
fragrans, *Seem. Fl. Vit.* 114.—Ins. Fiji.

HETEROPAPPTTS, Less. Syn. Comp. 189 (1832). *COMPOSITAE,* lienth. *Sc* Hook. f. ii. 269.
decipiert, Maxim. Prim. Fl. Amur. 148 - hispiduv
hispidus, *Less. Syn. Comp.* 189.—Tapon.
incisus, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. in, (1846) 182 = hispidus.
ringens, Sieb. *8c* Zucc. 1. c. 184 =hispidus.
Sampsoni, *Hance, in Journ. Bot.* v. (1867) 370.— China.
subserratus, Sieb. *Sc* Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv, 111.(1846) lhS-hispidu».

HETEBOPETALTJM, Benth. in Journ. Linn. Sac. v. (1861) 69. *ANONACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 27.
brasiliense, *Benth. I. c*—Bras.

HETEROPHBAGMA, DC. Prod. ix. 210 (1845). *B1GNONIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1046.
FERDINAKDIA, Welw. ex Seem. Jonm. Bot. iii. (1865) 330. t 38.
adenophyllum, *Seem, ex Benth. (f Hook. f. Gen.* ii. 1047.—Ind. or.
chelonoides, Dalz. *8c* Gibs. Bomb. Fl. 160 = Stereospermnm chelonoides.
Roxburghii, *DC. Prod.* ix. 210.—Ind. or.
maveolens, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 161 - Stereospcrmum suaveolens.
sulfureum,/Turn, *in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1878) II. 90.—Burma.

HETEBOPHTLLAEA, Hook. f. Ic PI. t. 1134 (1873). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 37.
lanceolata, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 154.—Keg. Argent,
postnlata, *Hool.f. Ic. PI.* t. 1134.—Bolivia.

HETEROPHYLLEIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 591-Coriaria, Linn.
caracasana, Turcz. 1. c.—Cf. eund. 1. c. xx. (1847) I. 153 = C. thymifolia.

HETEROPHYLLUM, Boj. ex Hook. Bot. Misc. i. (1830) 291-Buettneria, Loefl.
ramosum, Boj. ex Hook. 1. c = B. beterophylla.

HETEROPLEURA, Sch. Bip. in Flora, xlv. (1862) 434 = Hieracium, Linn. (Compos.).
ambigua, Sch. Bip. 1. c. 435 = H. Fendleri.
crepidisperma, Sch. Bip. 1. c.-=H. Crepidispermum.

HETEBOPOGON", Pers. Syn. ii. 533 (1807). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1133.
acuminatus, *Trin. in Mim. Acad. PHersb.* Sér. VI. ii. (1833) 254.—Reg. trop.
Allionii, Roem. & Schult. Syst ii. 835=glaber.
arrhenobasis, *Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 310.—Abyss.
besukiensis, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 494=hirtus.
concinnus, Thw. Enum. PI. Zeyl. 368= Andropogon caricosus.
contortus, Beauv. ex Roem. & Schult Syst. ii. 836 = hiitus.
filifolius, Nees, Fl. Afr. Austr. 102 = Andropogon filifolius.
firmus, *J. (f C. Presl, Rel. Haenk.* i. 331.—Reg. trop. et subtrop.
glaber, *Pers. Syn.* ii. 533.—Reg. temp, et trop.
hirsutus, Beauv. Agrost. 134 = hirtus.
hirtus, Anderss. in Schweinf. Beitr. 1L Aethiop. 310 = pubescens.
hirtus, *Pers. Syn*, ii. 583.—Reg. trop.
hispidissimus, Hochst ex Steud. Syn. PI. Gram. 367 = hiitus.
Hochstetteri, Andras. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 310-Aadroppgon fastiiiiatus.
Hohenackeri, Hochst ex "Miq. Anal. Bot. Indiii. 24 = hirtus.
insignis, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 437.—As. trop.
ischyranthus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 493 = insignis.
lianantherus, Miq. 1. c = insignis.
megapotamicus, Schult. Mant. ii. 668=Trachypogon polymorphus.
meknocarpon, *Duthie, in Atkins. Gas. N. W. Ind.* 638, nomen.—Ind. or.
melanocarpus, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 71-acuminatus.
messanetisis, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 164 = glaber.
pilosus, *Spreng. Nov. Prov.* 22.—Ind. or.
polystachyus, Nees. Agroit. Bras. 964 = hirtus.
polystachyus, Schult. Mant. ii. 460=firmus?
polystictus, Hochst in Flora, xxxix. (1856) 28 = acuminatus.
pnbescens, *Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 310.—Keg. Mediterr.
Roxburghii, Am. ex Nees, in Nov. Act Nat Cur. xix. Suppl. i. (1843) 183 = hirtus.
Roylei, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 367-acuminatus.

HETEBOPOGON:—
scrobiculatus, Fount, ex Hack, in Mart. FL Bras. ii. III. 268=acuminatus.
secundus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 335=Trachypogon polymorphus.
stipoides, J. *8c* C. Presl, 1. c. - Trachypogon polymorphus.
tenellus, Schult. Mant. ii. 460=Andropogon teneUus..
tenuiculus. Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 494 - Andropogon sericeus.
truncatus, Nees, Fl. Afr. Austr. 102 = Trachypogon polymorphuis.
villosus, Nees, Agrost. Bras! 862=Andropogon Nei=i.

HETEBOP8I8, Kunth, Enum. PI. iii. 59 (1841). *AROIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 991.
obliqua, Miq. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. iii. II. 112 - Monstera obliqua.
oblongifolia, *Kunth, Enum. PI.* iii. 60.—Bras.
ovata, Miq. Del. Sem. Hon. Amstel. (1853) ; ex Walp. Ann. v. 896 = Monstera pertusa.
Kiedeliana, *Schott, in Oestr. Bot. Zeiischr.* ix. (1859) 99.—Bras.
calicifolia. *Kunth, Enum. PI.* iii. 60.—Bras.
Spruceana, *Schott, Aroid.* L 27. t. 60.—Bras.
surinamensis, Miq. Del. Sem. Hort. Amstel. (1853); ex Walp. Ann. v. 895 = Monstera pertusa.

HETEROPTERA, Steud. Nom. ed. II. i. 756 (1840), sphalm. = HEPTAPTERA, Marg. & Reut.=Prangos, Lindl. (Umbellif.).

HETEBOPTEBIS, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 163(1821). *MALPIGHIACEAE*, Benth. *8c* Hook, f. i. 256.
aceroides, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 228:—Bras,
acutifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 469. —Am. austr.
aenea, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 257.—Bras,
affinis, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 465.—Am. austr.
africana, *A. Juss. I. c.* 456.—Afr. austr.
albida, *Blume, Bijdr.* 226.—Java,
angustifolia, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 223.—Bras,
anomala, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 435. —Bras.
anoptera, *A. Ju±s. I. c.* 459.—Bras,
apiculata, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 81.—Guian.
appendiculata, *DC. Prod.* i. 592.—Ins. S. Vincent.
argentea, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 164 = Banisteria argentea.
argyrophaea, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 447—Bras,
aureo-nitens, *Planch, (f Linden, in Linden, Cat.* n. 8. (1853) 3.—N. Granat.
australis, A. Juss. ex Walp. Rep. v. 278 - syringaefolia.
banksiaefolia, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 219.—Bras.
Beecheyana, *A. Juss. in Arch, Mus. Par.* Ui. (1843) 475.—Mexic.
Berteroana, *A. Juss. I. c.* 476.—Ind. occ.
bicolor, *A. Juss. in St. Nil. Fl. Bras. Mer.* iii. 23.—Bras,
biglandulosa, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 454.—Guiana,
brachiata, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* v. 163, in obs. —Am. austr.
brasiliensis, *Regel* 6* *Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1858) 47.—Bras.
byrsonimaefolia, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 464=xanthophylla.
caerulea, *H. B. tor K. Nov. Gen. et Sp.* v. 163, in obs. —Ind. occ.
caerulea, A. Juss. in St Hil. FL Bras. Mer. iii. 27 = anoptera.
campestris, *A. Juss. 1. c.* 33.—Bras.
Candolleana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 463 = suberosa.
carinata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 133.—Guian.
catingarum, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 443.—Bras,
chrysophylla. *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 168, in obs.—Am. austr.
cinerascens, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1846) 131.—Guiana.

HETEBOPTEBIS.—
cochleosperma, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* i& (1843) 437.—Bras.
coerulea, Auct. = caerulea.
coleoptera, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843)448-aeaea.
confertiflora, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii-34.—Bras.
cordifolia, *Moric. PI. Nouv. Am.* 108. t. 66.—Bras.
coriacea, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 467—Bras,
cornifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 165.—N-Granat.
cotinifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 488.—Mexic.
crenulata, *Mart, ex Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. >• 62.—Bras,
crimgera, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 136.—Bras,
cristate, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 181.—Guiana,
cynanchoides, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel-* (1876) 141.—Bras,
discolor, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 32.—Bras.
diversifolia, A. Juss. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. »•• I. 63=aceroides.
Duarteana, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii- 28. —Bras.
eglandulosa, *A. Juss. 1. c.* 27.—Bras,
escatloniaefolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* '"• (1843) 468.—Bras.
falcifera, *A. Juss. 1. c.* 440.—Bolivia,
floribunda, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 166.—Mexic.
fulgens, R. Grah. in Edinb. N. PhiL Journ. (Jan.-Mar-1828)391^nitida!
Gayana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 489.—Mexic.
glabra, Hook. *8c* Are. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 157 = umbellata.
grandiflora, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 461.-Bras.
helicina, *Griseb. in Mart. FL Bras.* xii. I. 67.—Bra*.
hiraeoides, A. Juss. ex Griseb. 1. c. 63 = venosa.
hiraeoides, Mart. Herb. Fl. Bras. n. .1178= Hiraea chlorocarpa.
hypericifolia, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* >» 24.—Bras.
ilicifolia, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 220.—Bras-
intermedia, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I- " venosa.
Jussieui, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 246 - africana.
Laurentii, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) »< Am. austr
laurifolia, Gardn. in Hook. Lond. Joura. Bot. (1843) 336=venosa.
laurifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (18*8) «•• -Mexic.
Leschenaultiana, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras.* *"* iii. 26'.—Bras.
Lessertiana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (18«) *° = suberosa.
Lessertiana, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = flonbuB.
Lindeniana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii- l* 457.—Mexic.
Lindleyana, *A. Juss. 1. c.* 446.—Bras.
longifolia, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp. y-* Mexic.
loniceraefolia, *Triana V Planch, in Ann. Sc.* Sér. IV. xviii. (1862) 824.—N. Granat.
macrostachya, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* !«• *V* 450.—Afr. trop.
Martiana, *A. Juss. 1. c.* 474.—Bias.
Mathewsana, *A. Juss. I. c.* 454.—Pernv.
megaptera, *A. Juss. 1. c.* 468.—Bras.
metallochroa, A. Jus.«. L c. 449 = aenea.
nervosa, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer-* »"• * Bras.
nitida,/f. *B. VK. Nov. Gen. etSp.* v.l6S,inobs.—Bras.
obtusata, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 22?.'. n(><3)
ochnaefolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* «<• ^ 464.—Bras.
oleaefolia, Griseb. in Linnaea, xxii. *(W** Tetiapteris oleifolia.
orinocensis, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* '"• (1843) 462.—Venez
pannosa, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. t 70.—Bras.

HETEBOPTEBIS:—
parvifolia, *DC. Prod.* i. 591.—Ind. occ.
parvi/blia. Mart, ex A. Jugs, in Arch. Mus. Par. iii. (1813) 465=escalloniaefolia.
patens, *A. fuss. 1. c.* 437.—Bras,
pauciflora, *A. Juss. I. c.* 472.—Bras,
platyptera, *DC. Prod.* i. 592.—Am. trap,
pteropetala, *A. Juss. in St. Hit. Ft. Bras. Mer.* iii. 81. t. 167.—Bras,
purpurea, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp. r.* 183, ta obs. —Ind. occ.
racemosaM. *Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 445. —Bras.
Regnellii, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 548 =nmbellata
reticulata, *Griseb. in Mart. FL Bras,* xii. I. 71.—Bras,
inopalaefolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 441.—Bras.
rubiginosa, *A. Juss. I. c.* 477.—Bras,
mfula, *Mart, ex A. Juss. 1. c.* 476.—Bras,
saligna, *Mart, ex A. Juss. 1. c.* 466.—Bras,
scandens, *Regel if Koern. Ind. Sent. Hort. Petrofi.* (1858)46.-Hab.J
sericea, *A. Juss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* iii. 29.—Bias.
MtsilifolU, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 480. —Bras.
Smeathmanni, DC. Prod. i. 692 - Acridocarpns Smeathmanni.
spectabilis, *Mart, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 442.—Bras.
Spiraeae, Mart, ex A. Jnss. in Walp. Rep. v. 283 = discolor.
stannea, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1853) 46. —Am. centi.
suberosa, *Griseb. in Linnaea,* xiii. (1839) 229.—Bras,
sylvatica, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 469. —Bolivia.
*yringaefolia, *Griseb. in Linnaea,yan.* (18S9) 224.—Bras,
'ernstroemiaefolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 448.-Bras.
"lyrsoidea, *A. Juss. I. c.* 486.—Bras.
tomentosa. Hook. ft Am. Bot. Beech. Voy. 281 = «echeyana.
'ofnentosa, A. Juss. in St. Hit. Fl. Bra*. Mer. iii. 81 = .'pectabilis.
'nchanthera, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 438:—Bras,
wifiomaefolia, *A. Juss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* iii. 83.—Bras.
*b'f'ata, *A. Juss. I. c.* 25.—Bras.
*u*dulata,* Tenore, Hort. Bot. Neap. (1840); et ex - Koch, Wochenschr. iii. (lf>60) 111 - umbeUata.
*wosa, *Griseb. in Linnaea,* xiii. (1839) 230.—Bras.
WibascifoKa, *Griseb. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 138.—Bras.
wanningiana, *Griseb. 1. c.* 135.—Bras.
W»deana, A. Juss. in Arch. Mus. Far. iii. (1843) 470
*to~L;*Leschenanltiana.
"ydleriana, *A. Juss. 1. e.* 452.—Ind. occ.
««Othophylla, *A. Juss. I. c.* 453.—Bias.

HET-EROPTIUS. E. Mey. ex Meissn. in Hook. Lond. £°arn. Bot. ii. ;1843) 534 - **Selinum,** Linn. (Umellif.).
*ar*naria.* E. Mey. ex Meissn. 1. c.=S. suffruticosnm.

HETEROPYXIS, Griff. Notnl. iv. 524; Ic. (1854) t. 594 l,Hetropyxis) = **Boschia,** Korth. (Malvac.).

HETEROPTXIS, Harv. Thes. Cap. ii. 18. t. 128 (1868). *LYTHRARIEAE,* Benth. ft Hook. £ i. 785.
*na*wlensis, *Harv. I. c.—Ah.* anstr.

HE£TERORACHIS, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 775, r? *y>-=Berkhoya, Ehrh. (Compos.).
*r'*osissima,* Sch. Bip. 1. c. = B. palmata.

HETEROSCIADIUM, DC. Prod. iv. 83, in syn. (1830) *-P«tagnia, Guis. (Umbellif.).

HETEROSICYOS Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) I 83-**Trochomeria,** Hook. f. (Cucurb.).
Aol"'?*«. Welw. 1. c 34 = T. polymorpha.
"noloba, Welw. 1. c.=T. stenoloba.

HETEROSMILAX. Knnth, Enum. PI. v. 270 (1850). *LILIACEAE,* Benth. ft Hook. f. iU. 763.
°UG<>SMILAX, Seem. Joum. Bot.fi. (1868) 258. t. 83.
*bon*ensis, *A. DC. Monig. Phan.* i. 42.-Bomec,

HETEBOSMHiAX:—
Gaudichaudiana, *A. DC. Monog. Phan.* i. 44.—China,
indica, *A. DC. I. c.* 4S.-Malaya.
japonica, *Kunth, Enum. PI.* v. 270.—Japon.
sumatrensis,^4. *DC. Monog. Phan.* i. 42.—Malaya.

HETEROSOMA, Guill. Arch. Bot. i. (1833) 550 = Heterotoma, Zucc. (Campanul.).

HETEBOSPATHE, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 141, 162. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii, 906.
data, *Scheff. 1. c.* 162.—Ins. Amboin.

HETEROSPERMA. Cav. Ic. iii. 34. t. 267 (1794) = Heterospermum, Cav. (Compos.).

HETEROSPERMA, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 1.357, *nomen* - Heteromorpha, Cham. & Schlecht. (Compos.).

BETEBO8PEB1CXTM, Cav. Ic. iii. 34. t. 267 (1784) (Heterosperma). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 388.
MICRODONTA, Nutt. in Trans. Am. Phil Soc. N. S. vii. (1841) 369.
depressum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 188.—Reg. Argent.
dicranocarpum, A. Gray, PI. Wright, i. 109 - Dicranocarpus parviflorus.
diversifolium, *H. B. *f K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 226.—Ecuador.
maritimum, H. B. & K. 1. c. 245 = ovatum.
ovatifolium, Cav. Desc. 204=ovatum.
ovatum, *Willd. Sp. PI.* iii. 2129.—Am. austr.
pinnatum, *Cav. Ic.* iii. 34. t. 267 ; *Willd. Sp. PI.* iii. 2129.—Mexic.
rhombifolium, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 187. —Am. austr.
tagetinnm, *A. Gray, PI. Fendl.* 87—N. Mexic.
Xanti, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 162.—Calif.

HETEBOSTACHYB, Ung.-Stemb. in Atti, Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 331, 273. *CHENOPODJACEAE,* Benth. ft Hook. f. iii. 64.
SmosTACHVS, Ung.-Sternb. Vers. Syst Salicoro. 100 (1866).
Ritteriana, *Ung.-Sternb. in Atti, Congr. Bot. Firenie,* 1874 (1876) 382.—Am. trop.

HETEROSTALIS, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. (1867) 261 = Typhcnium, Schott (Aroid.).
dvoersifolia, Schott, 1. c = T. diversifolium.
flagelliformis, Schott, L c - T . cuspidatum.
foliolosa, Schott, 1. c - T . diversifolium.
Huegeliana, Schott, 1. c = T . diversifolium.
pedata, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 278 = T. fallax.

HETEROSTECA, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 188; Joum. Bot. iii. (1813) 68 - Bouteloua, Lag. (Gramin.).
americana, Desv. Joum. Bot. iii. (1813) 68 - B. bromoides.
junci/olia, Desv. in Nouv. BulL Soc. Philom. ii. (1810) 188 - B. bromoides.

HETEROSTEGA, Kunth, in Mlm. Mus. Par. ii. (1815) 73 =prace.

HETEROSTEGON, Schwein. ex Hook, *f.*- in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 175, in nou= Bouteloua, Lag. (Gramin.).
curtipendulus, Schwein. ex Hook. f. 1. c.=B. racemosa.

HETEBOSTEMMA, Wight ft Am. Contrib. 42 (1834). *ASCLEPIADEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 774.
SYMPHYSICARFUS, Hassk. in Flora, xl. (1857) 101.
acuminatum, *Decne. in Ann. Set Nat.* Ser. II. ix. (1838) 268.—Java.
alatum, *Wight V Am. Contra.* 42.—Ind. or.
cuspidatum, *Decne. in DC. Prod.* viii. 630.—Ins. Philipp.
Dalzellii, *Hoot./. Fl. Brit. Ind.* iv. 48.—Ind. or.
jaranicum, *Hassk. in Flora,* xl. (1857) 101.—Malaya,
manillense, *Schau. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 865.—Ins. Philipp.

HETEBO8TEMMA:
stellatum,^«»*././iV. *Brit. Ind.* iv. 47.—Reg. Ilimal.
tanjorensis, *Wight* b" *Am. Contrib.* 42.—Ind. or.
urceolatum, *Dolt, in Hoot. Kern Journ.iv.* (1852) 295. —Ind. or.
Wallichii, Dalz. ft Gibs. Bomb. Fl. 152 = Dalzellii.
Wallichii, *Wight* (T *Arn. Contrib.* 42.—Ind. or.

HETEBO8TEMOM", Desf. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 241. t. 12. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 678.
conjugatus, *Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. II. 216.—Bras.
ellipticus, *Mart, ex Benth. I. c.* 215.—Bras,
impar. *Spruce, ex Benth. I. c*—Bras,
mimosoides, *Desf. in Mim. Mus. Par.* iv: (1818) 248, 1.12.—Bras.
simplicifolia, Spruce, ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. II. 216-ellipticus.

HETEROSTEMUM, Steud. Norn. ed. II. i. 756 (1840) -praec

HETEROSTIGMA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 26 11844-52)" Pandanus, Linn.
Heudelotianum, Gaudich. 1. c. t. 26=P. Heudelotianus.

HETEROSTYLUS, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 171.1.185 (1840)-Liliaea, Humb. (Naiad.).
gramineus, Hook. 1. c. =L. subulata.

HETEROTAENIA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 267. t 80 A. (1840) = Conopodium, Koch (Umbellif.).
arvensis, Coss. Notes Crit. 111.—Iiispan.
Bourgaei, Coss. 1. c. 110 = C. Bourgaci.
glaberrima, Boiss. Vny. Bot. Espagne, ii. 270-Ma*lictrifolia.*
thalictrifolia, Boiss. 1. c. Ii. 269. t.80.— Hispan.

HETEROTAXIS, Lindl. Bot. Reg. t 1028 (1826) = KaziUaria, Ruiz ft Pav. (Orchid.).
crassi/olia, Lindl. 1. c. = M. crassifolia.

HETEBOTHALAMU8, Less, in Linnaea, y. (1830) 145. *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 2H7.
boliviensis, *Wedd. Chlor. And. i.* 179.—Bolivia,
brunioides, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 504.—Bras,
nivalis, *Wedd. Chlor. And.* i. 179. t. 31 B.—Chili,
psiadioides, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 504.—Bras,
spartioides, *Hook. V Arn. ex DC. Prod.* vii. 271.— Patagon.
trinervis, *Hook, tf Arn. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 43.—Reg. Argent

HETEBOTHECA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 137. *COMPOSITAE,* Benth. ft Hook, f ii. 251.
CALYCIUM, Ell. Sketch, ii. 339 (1824).
DIPLOCOMA, D. Don, in Sweet, Brit Flow. Gard. t 246 (1828).
STELMANIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 47 (1836).
Chrysopsidis, DC. Prod. v. 317 = Lamarckii.
fioribunda, Benth. Bot. Voy. Sulph. 24 - grandiflorn.
grandiflora, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 315.—Am. bor. occ.
inuloides, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* Ii. 460.—Mexic.
Lamarckii, *Cass. 1. c.* xxi. 130.—Am. bor.
Lamarckii, DC. Prod. v. 817—Aplopappus divaricatus.
lati/olia, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 458 ^Lamarckii.
leptogtossa, DC. Prod. v. 817 •* Lamarckii.
scabra, DC. 1. c. - grandiflora.

HETEROTHRIX, Muell. Arg. in Mart Fl. Bras. vi. 133. t. 40 (1860)^Echltea, Linn. (Apocyn.).
pyenantha, Muell. Arg. 1. c.-=E. pyenantha.
Vanheurckii, Muell. Arg. in He urck, Obs. Bot. 164.— Bras.

HETEROTIS, Benth. in Hook. Niger Fl. 347 (1849) = DisBOtxs, Benth. (Mclastom.).
ar.tennina, Benth. 1. c. 349 =• D. antennina.
capitata, Benth. 1. c. 852 = Tristcmma capitatum.
corni/olia, Benth. 1. c. 851=Tristemma ncglcctum.
laevis, Benth. 1. c. 848 = D. decumbens.
plumosa, Benth. 1. c. - D . plumosa.
prostrata, Benth. 1. c. 349 = D. prostrata.
segregata, Benth. 1. c. 850 = Tristemina segregatum.

HETEROTIS:—
theae/olia, Benth. in Hook. Niger FL 851 - Tristemma theaefolinm.
triplinervia, Klotzsch, ex Triana, in Trans. Linn. Soc xxviii. (1871) 58 - Dissotis prostrate.
Vogelii, Benth. in Hook. Niger Fl. 862 - Tristemma capitatnm.

HETEBOTOMA, Zocc. in Flora, xv. (1832) n. Beibl. 100. *CAMPANULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 553.
MVOPSIA, Presl, Prod. Mon. Lobel. 8 (1836).
arabidoides, *Benth. tf Hook. f. Gen.* ii. 653.—Mexic.
intermedia. *Hems!. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 269.—Mexic.
lobelioides, *Zucc. in Flora,* xv. (1882) II. *Beibl.* 101. Mexic.
macrocentron, *Benth. in Hoot. Ic. PI.* t. 1177.—Mexic.
tenella, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Hose.* zxv. (1852) II. 176.-Mexic.

HETEROTRICHUM, Bieb. Fl. Taur. Cane. iii. 551 (1819) = Saus8urea, DC. (Compos.).
alpinum. Link, Enum. Hort. Berol. ii. 298=S. alpina.
arctic-urn, Bieb. ex Herd, in Bull. Soc. Nat Mosc. xli. (1869) II. 43 = S. alpina.
atriplicifolium, Bieb. ex Herd. 1. c. 19 = S. serrata.
dissectum, Bieb. ex Herd. 1. c 46 = S. japonica.
glabellum, Bieb. ex Mey. in DC. Prod. vi. 534 - S. serrata.
leptophyllum, Bieb. ex DC. 1. c. 688 = S. salicifolium.
pulckellum, Fisch. in M£m. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 71 = S. japonica.
salsum, Bieb. Fl. Taor. Cauc. iii. 551 = S. crassifolia.
Schangini, Bieb. ex DC. Prod. vi. 532 = S. pygmaea.
squalidum, Bieb. in Ledeb. FL Ross. ii. 666 = S. japonica.
Stelleri, Bieb. 1. c. = S. elongata.

HETBEOTRICHTTBE, DC. Prod. iii. 173 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 765.
DIPLODONTA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 439.
OCTOMEKIS, Naud. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* III. xvii. (1845) 378, partim.
angustifolium, *DC. Prod.* iii. 173.—Ins. S. Doming.
dubium, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 65 = octonnm.
hispidum, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 52= octandrum.
lucidum, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 134.—Venezuela,
macrodon, *Planch, in Hook. Bot. Mag.* t. 4421.—Venezuela.
niveum, DC. Prod. iii. 178 = patens.
novemnervium, DC. 1. c.=Clidemianovemnervia.
octandrum, *Macfad. Fl. Jamaic.* ii. 66.—Ind. occ.
octonnm, *DC. Prod.* iii. 178.—Am. trop.
patens, *DC. I. c.*—Ins. S. Doming.
Schlimii, *Triana, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1871) 134.—Venezuela.
strigosum, *Triana, I. c.* 134.—Bras.
viscosum, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 65 = octonnm.

HETEROTROPA, Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Se>. · II. ii. (.1834) 314. t. 10 = Asarum, Linn. (Aristoloch.).
arifolia, A. Gray, in Hook. Lond. Joura. Bot. i. (1842) 225 = A. arifolium.
asaroides, Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sir. II. ii. (1834) 314 = A. albivenium.
parriflora, Hook. f. Bot. Mag. t. 6380=A. elegans.
virginica, A. Gray, in Hook. Lond. Joura. Bot. i. (1842) 225 = A. virginicum.

HETEROZYGIS, Bunge, Snppl. Fl. Alt. 82 (1836) (Heterozygia)=Tribulus, linn. (Zygophyll.).

HETERYTA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352=Fhacelia,Jus». (Hydrophyll.).
polemonioides, Rafin. 1. c.—Am. bor.

HETREPTA, Rafin. Fl. Tellur. Hi. 88 (1836) = Leuoas, R. Br. (Labiat.).
lavandulifelia, Rafin. 1. c = L. linifolia.

HETTLINGERIA, Neck. Elem. ii. 124 (1790) = Rhamnua ?, Linn.

HEUCHEBA, Linn. Syat. ed. I (1735). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 638.
HOLOCHLOA, Nutt ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 580 (1840).
LEPTAXIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 76 (1836).
OREANTHUS, Rafin. ex Ser. Bull. Bot. i. (1830) 216.
OREOTRYS, Rafin. Atl. Joura. 146 (1832); Fl. Tellur. ii. 74 (1836).
YAMALA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 75 (1836).
acerifolia, Rafin. Med. Fl. i. 211. t. 49=villosa.
americana, Georgi, Beschr. Ross. Reich, iv. 830 (Quid?).—Rossia.
americana, *Linn. Sp. PI.* 226.—Am. bor.
Barbarossa, Presl, Rel. Haenk. ii. 56 " micrantha.
bracteata, *Ser. in DC. Prod.* iv. 62.—Am. bor. occ.
californica, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1873) 53=Tiarella unifoliata.
caulescens, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 188-villosa.
Cortusa, Michx. Fl. Bor. Am. i. 171—americana.
Curtisii, *Torr. & Gray, ex A. Gray, in Am. Journ. Sc.* Ser. I. xlii. (1842) 15.—Am. bor.
cylindrica, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 236.—Am. bor. occ.
dichotoma, Murr. in Comm. Gotting. (1772) 64.1.1 = Vahlia Oldenlandia.
divaricata, Fisch. ex DC. Prod. iv. 51=glabra.
erubescens, A. Br. & Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol. (1871) App. 2=miaantha.
foliosa, Rafin. Med. Fl. i. 244 = villosa.
glabella, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 581 = cylindrica.
glabra, *Willd. ex Roem.* b* *Schult. Syst.* vi. 216.—Am. bor. occ.
glauca, Rafin. Med. Fl. i. 244 = Rugelii.
grandifiora, Rafin. 1. c. = pubescens.
Hallii, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 62.—Am. bor. occ.
hirtiflara, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 582 = pilosissima.
hispida. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. S47 = pilosissima.
hispida, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 188.—Am. bor.
longipetala, *Mof. ex Ser. in DC. Prod.* iv. 62.—Mexic.
lucida, Schlecht. Ind. Sem. Hort HaL (1848) 8.—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 186= americana.
macrophylla, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort: Brit. 99 (Quid ?).—Am. bor.
Mensiesii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 237 - Tolmiea Menziesii.
micrantha, *Dougl. in Lindl. Bot. Reg.* t 1302.—Am. bor. occ.
minutiflora, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 50.—Mexic.
obtusissima, *Regel t?" Rack, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 31.—Am. bor.
orizabensis, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 50.—Mexic.
ovalifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 581 = cylindrica.
parmflora, Bart I. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1888).—Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 96=villosa.
parvifolia, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 581.—Am. bor. occ.
pilosissima, Benth. PI. Hartw. 811 = micrantha?
pilosissima, *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* v. 86.—Calif.
Portula, Michx. Fl. Bor. Am. i. 171 = americana.
pubescens, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 187.—Am. bor.
pulverulenta, Rafin. Med. Fl. i. 248 = pubescens.
racemosa, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 365.—Am. bor. occ.
reniformis, Rafin. Med. Fl. i. 244=pubescens.
ribifolia, Fisch. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Fetrop. viii. 62=pubescens.
Richardsoni, R. Br. in Frankl. Narr. 1st Voy. 766. t. 29= hispida.
rubescens, *Torr. in Stansb. Exped. Utah,* 388.—Am. bor. occ.
Rugelii, *Skuttl. ex Kunae, in Linnaea,* zx. (1847) 43.—Florida,
sanguinea, *Engelm. in Wislie. Tour N. Mexico,* 107.—N. Mexic.
scapifera, Moench, Meth. 674= americana.
squamosa, Rafin. Med. Fl. i. 244-villosa.
undulata, *Regel b" Rack, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 32.—Am. bor.
villosa, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 172.—Am. bor.
viscida, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 187™ americana.

HEUDELOTIA, A. Rich, in Gnill. & Perr. Fl. Seneg. Tent 150. t 39 (1832)= Commiphora, Jacq. (Burner.).
africana, A. Rich. 1. c.-C. africanum.

HEUDUSA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 158 (1815) =Iiathriogyne, Eckl. *8c* Zeyh. (Legumin.).
candicans, Presl, Bot. Bemerk. 45 » L. candican*.
dedpiens, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 158- L- parvifolia.

HEUFFELIA, Schur, Enum. PI. Trans. 760 (1866)' Avena, Linn. (Gramin.).
australis, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. *M- (1869) 183-A. pratensis.
bromoides, Schur, Enum. PI. Transs. 762 = A. bromoides.
compressa, Schur, 1. c.=A. compressa.
convoluta, Schur, 1. c. 763 = A. convoluta.
laevigata, Schur, 1. c. 761 = A. pubesceng.
lucida, Schur, 1. c = A. pubescens.
montana, Fourr. in Ann. Soc. linn. Lyon, N. S. x™- (1869) 183 = A. montana.
planiculmis, Schur, Enum. PI. Transs. 762= A. pla"1, culmis.
praeusta, Schur, 1. c. = A. pratensis.
pratensis, Schur, 1. c. = A. pratensis.
pubescens, Schur, 1. c. 760 = A. pubescens.
Scheuchteri, Schur, 1. c. 768 = A. Scheuchzeri.
sempervirens, Schur, 1. c. = A. sempervirens.
setacea, Schur, 1. c.=A. setacea.

HEURCKIA, Muell. Arg. in Flora, liii. (1870) 1«8 - Bauwolfla, Linn. (Apocyn.).
semperflorens, Muell. Arg. 1. c. 169.—N. Caled.
viridis, Muell. Arg.'in Heurck, Obs. Bot. 205.—*• Caled.

HEURLINIA, Rafin. Sylva Tellur. 166 (1838) - Myr- Bine, linn.
variabilis, Rafin. 1. c. = M. variabilis.

HEURNIA, Spreng. Anleit. ii. I. 488 (1817) = Huer- nia, R. Br. (Asclepiad.).

HEVEA, Aubl. PI. Gui. ii. 871. t. 835 (1775). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 290.
MICRANDRA, R. Br. in Benn. PL Jav. Rar. *" (1844).
SiPHONANTHUS,Schreb. ex Baill. Etud. Gén. E»P- 324 (1858).
SIPHONIA, Rich, in Schreb. Gen. 656 (1791)-
apiculata, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 285=W.«t
Venthamiana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (I- 66) 204.—Bras.
brasiliensis, *Muell. Arg. 1. c*—Bras. -ir —
discolor, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 7«- Bras.
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 871.—Guian.
janeirensis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. »• '" —Bras.
\vten, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 20*-" Bras.
membranacea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* *>• 299.—Bras.
nitida, *Muell. Arg. I. c.* SOL—Bras.
paraensis, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 284, » "discolor,
pauciflora, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 203.—Bras.
peruviana, Aubl. PI. Gui. iv. t. 835 - guianensis.
rigidifolia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (18«»- 203.—Bras.
Spruceana, *Muell. Arg. I. c.* 204.—Bras.

HEWARDIA, Hook. Ic. PI. t. 858 (1852). *LILIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 827.
ISOPHYSIS, T. Moore, in Proc. linn. Soc. »• 212.
tasmanica, *Hook. I. c*—Tasmania.

HEWETIA, Pritz. Ic. Ind. i. 544 (1855) = »eq-

HEWITTIA, Wight & Am. in Madr. Journ. I. v. (1837) 22. *CONVOLVULACEAE,* Benth. Hook. f. ii. 873.
KETHOSIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 78 (183«;> prius.
PALMIA, Endl. Gen. 653 (1838). nomen

HEWITTIA :—
SANUCM, Rafin. FI. Tellnr. iv. 70 (1836), nomen pnns.
SHUTEREIA, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Geniv. vi. (1833) 486 (Conv. or. 103).
asarifolia, Klotzsch, in Peter*, Reise Mossamb. Bot. 242-bicolor.
bicolor, *Wight (f Am. in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1837)22.—Geront. trop.
caespitosa, Steud. Nom. ed. II. i. 767 = Ipomaea linifolia.
hirta, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 243 = bicolor.

HEXABOLUS.Stend. Nom. ed. II. i. 757 (1840),sphalm. -Hexalobuu, A. DC. (Anonac).

HEXACADICA, Rafin. Sylva Tellnr. 158 (1838) - Hexadlea, Lour. (Inc. sed.).
corymbosa, Rafin. 1. *c^Hexadica cochinchinensis* (nom. delend.)

HEXACENTRIS, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 78 (1832,=T.hunbergia, Linn. f. (Acanth.).
ocuminata, Nees, I. c.=T. coccinea.
coccinea, Nees, 1. c 78 = T. coccinea.
dentata, Nees, 1. c « T. coccinea.
lutea, Lindl. in Gard. Chron. (1854) 151 = T. lutea.
nysorensis, Wight, Ic L 871 = T. mysorensis.

HEXACHLAMYS, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 345 -Eugenia, linn. (Myrtac).
hutnilis, Berg, 1. c—Reg. Argent.

HEXACTINA, Willd. ex Schlecht. in Schnlt t Syst. vii. 91 (1829)=Amaioua, Aubl. (Rubiac).
corymbosa, Willd. 1. c. = A. corymbosa.

HEXADENA, Rafin. Sylva Tellur. 92 (1888) - Phyl-«athU8, Linn. (Euphorb.).
ongustifolia, Rafin. 1. c.-P. angustifolinm.

HEXADENIA, Klotesch *Sc* Garclce, in Monatsb. Akad. Berl. (1859) 258; et in Abh. Akad. Berl. (1860) 106 = PedilanthUB, Neck. (Euphorb.).
nacrocarpa, Klotzsch & Garcke, 11. cc. 25S ; 107 - P. niacrocarpus.

HEXADESMIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xyii. (1842) 44. *ORCHIDEAE,* Benth. *Be* Hook. f. »'. 525.
HEXOPIA, Batem. ex Lindl. in Bot. Reg. (1840) .. Misc. 46, nomen; et (1844) Misc. 2.
"'cornis, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 41.—N. Granat.
"nda, *Reichb. f. in Sound. Refug. Bot.* ii. snb t. 113. Mexic.
l"ah.yphylla, *Reichb. f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 89. —Costa kica.
""'gera, *Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 2.—Guatemala.
fesciculata, *A. Br. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 45.-Mexic.
•naformis, *Griseb. Fl. Brit. W.Ind.* 623.—Ind. occ.
LVdeniana, A. Rich. *Sc* Gal. in Ann. Sc. Nat. Ser. HI. >« (1«45) 23-fascicnlata.
luria *Sat"»- Syn. Orch. in Orch. Mex. et Guat.*—Mexic.
""wantha, *Lindl. in Bot. Reg.* (1844) *Misc. %.*—Manama.
monophylla, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 80.—Bras,
^ ' i , *Reichb. f. in Sound. Refug. Bot.* t. 118.—Hras.
rtiodoglossa, *Reichb. f. in Bonplandia,* iv. (1856) 328. —Mexic.
••BUis, *Reichb. f. in Saund. Refug. Bot.* ii. snb 1.113; " *in Linnaea,* xlii. (1877) 84.—Mexic.
!t«opeula, *Redhb.f.in Bonplandia,* iii. (1855) 221. """"Am austr.

HH? ADICA, *LoaT*- *L Cochinch. 662 (1790), nomen oelendum.—Cf. Benth. *Sc* Hook, £ Gen. i. 881 i >». 256.
"EXACADICA, Rafin. Sylva Tellnr. 158 (1838).
*ce<*tnchinemis,* Lour. 1. c—Cochinch.

HEXAGLOTTTS, Vent. Dec. Gen. NOT. 6 (1808). *IR1DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 692.
PLANTIA, Herb, in Bot. Reg. (1844) Misc. 89.
fltxuosa, Sweet, Hort. Brit ed. II. 408 - longifolia.
longifolia, *Vent. Dec. Gen. Nov.* 6.—Afr. austr.
virgata, *Svieet, Hort. Brit.* ed. IL 498.—Afr. austr.

HEXAGONOTHECA, Turct in Bnll. Soc. Nat. Mosc. xix. (1846) H. 505=Berrya, Roxb. (Liliac.).
cordata, Turcz. 1. c.—B. Amomella.

HEXALECTBIS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc,* Hook. f. iii. 498.
aphylla, *Rafin. I. e.*—Mexic.
squamosa, Rafin. Fl. Tellur. iv. 48=aphylla.

HEXALEPIS, Boeck. in Flora, Iviii. (1875) 118 = Gahnia, Forst. (Cyperac.).
scairifolia, Boeck. 1. c. = G. aspera.

HEXALEPIS, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 24 (1886)-TUlandsia, Linn. (Bromeliac).
psittacina, Rafin. 1. c = T. psittadna.

HEXALOBUS, A. DC. in Mem. Soc. Phys. Genev. v. (1832) 212 (Mem. Anon. 36. t.5 A). *ANONACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 24.
brasiliensis, *St. Hit. V Tul. in Ann. Sc Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 138.—Bras.
callicarpus, Baill. in Bull. Soc. Par. i. (1882) 338-Uvaria callicarpa.
crispiflorus, *A. Rich. Fl. Cub.* i. 43.—Afr. trop.
grandiflorus, *Benth. in Tram. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 468.—Afr. trop.
Tussiaeanus, *Baill. Adansonia,* viii. (1867-68) 348.—Hab.t
madagascariensis, *A. DC. in Him. Soc. Phys. Geniv.* v. (1882) 213.—Madag.
senegalensis, *A. DC. I.e.*—Afr. trap.

HEXAMERIA, R. Br. in Benn. PI. Jav. Rar. 26. t. 7 (1838) = PodochilU8, Blame (Orchid.).
disticha.R. Br. 1. C.-P. serpyllifolia.

HEXAMERIA, Torr. *Sc* Gray, in Ton. Rep. PI. N. York, 137 (1839) [GeoL Surv.]=Echinocyatis, Torr. *Sc* Gray (Cucurb.).
echinata, Torr. *Sc* Gray, 1. c - E. Iobata.

HEXANTHUS, Lonr. Fl. Cochinch. 195 (1790) = Iiiteea, Lam. (Laurin.).
umbellatus. Lour. 1. c. = L. Hexanthns.

HEXAPHOMA, Rafin. FI. Tellnr. ii. 66 (1836)-Saxifraga, Tourn.
ferruginea, Rafin. 1. c.-S. lencanthemifolia.
petiolaris, Rafin. 1. c. 67 = S. rivularis.
pyrenaica, Rafin. 1. c - S. muscoides ?
viscida, Rafin. I. C-S. viscosa!

HEXAPLECTRIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 97 (1836)-AriBtoloehia, Tonra.
bicolor, Rafin. 1. c—Hah. ?
fuscata, Rafin. 1. c—Hab. ?

HEXAFTERA, Hook. Bot. Misc. i. (1830) 350. t. 72, 74. *CRUCIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 90.
cicalricosa, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1862) ii. 442. -Chili,
enneata, *Gill. V Hoot, in Hook. Bot. Misc.* i. (1830) 852. t. 74.—Chili,
frigida, *Phil. Fl. Atac.* 8.—Chili.
Jussiaei, *Barn, in C. Gay, Fl. Chil.* i. 179.15.—Chili.
linearis, *Bam. 1. c.* 176. t. 5.—Chili,
littoralis, *Barn. I. c.* 177.—Chili,
pinnatifida, *Gill. & Hook, in Hoot. Bot. Misc.* i. (1830) 850. t. 72.-Chili.
pusilla, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 674.—Chili.
scapigera, *Phil. 1. c.* (1862) II. S89.—Chili.
spathnlatft, *Gill, (f Hook, in Hoot. Bot. Misc.* i. (1830) 351.t.78.-ChiU.
violacea, *Phil, in Anal. Unit. Chil.* (1872) 673.-Chili.

HEXARRHENAjJ. *Sc* C. Presl, Rel. Haenk. i. 826. t. 46 (1830) =Hilaria, H. B. & K. (Gramin.).
cenchroides, J. Sc C. Presl, 1. c —Mexic.

HEXASEPALUM, Bartl. ex DC. Prod.iv.661 (1825). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 145.
angnstifolinm, *Bartl. ex DC. I. c*— Mexic.

HEXASTEMON, Klotzscb, in Linnaea, xii. (1838) 220 = Eremia, D. Don (Ericac).
lanatus, Klotzsch, 1. c. = E.lanata.

HEXASTYLIS, Rafin. FI. Tellur. lit 73 (1836) - Caylusea, St. Hil. (Resedac.).
arabica, Rafin. I. c.-C. canescens.
canescens, Rafin. I. c. = C. canescens.

HEXASTYLIS, Rafin. Neogenyt. 8 (1825) = Aearum, Toum. (Aristoloch.).
arifolum, Rafin. 1. c. - A. arifolium.

HEXATHECA, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 198 (1883). *GESNERACEAE.*
fulva, C. *B. Clarke, 1. c.* 191.—Borneo.

HEXATHECA, Sond. ex F. Muell. Fragm. viii. 217 (1874)-IiepUaena, Drumm. (Naiad.).
australis, Sond. ex Benth. Fl. Austral, vii. 180 - L. australis.
Preissii, Sond. ex F. Muell. Fragm. viii 217 - I.. Preissii.

HEXEPTA, Rafin. Sylva Tellur. 164 (1838) = Coffea, Linn. (Rubiac.).
axillaris, Rafin. 1. c. = C. Zangnebariae.
racemosa, Rafin. 1. c = C. raccmosa, *Lour.*

HEXISEA, Lindl. In Hook. Journ. Bot i. (1884) 7. *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 524.
ENOTHONAEA, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 772.
bidentata, *Lindl. in Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 8.—Panama,
imbricata, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 470.—Mexic.
oppositifolia, *Reichb. f. I. c*—Mexic.
reflexa, *Reichb. f. in Linnaea,* xii. (1877) 131.—Guiana.

HEXODONTOCARPUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 407 (1867) = 8herardia, Linn. (Rubiac).
arvensis, Dulac, 1. c. = S. arvensis.

HEXONYCHIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 88 (1866) - Allinm, Toum. (Liliac).
stellatum, Salisb. 1. c. 89 = A. stellatum.

HEXOPEA, Steud. Nom. ed. II. i. 757 (1840) -seq.

HEXOPIA, Batem. ex Lindl. in Bot. Reg. (1840), Misc. 46, nomen; et (1844), Misc. 2 = Hexadesmia, Brongn. (Orchid.).
crurigera, Uatem. ex lindl. 1. c^Hexad. crnrigera.

HEXORIMA, Rafin. in Med. Rep. N. York, v. (1808) 351.—Cf. Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 168-Stroptopus, Michx. (Liliac).
dichotoma, Rafin. 1. c. =-S. roseus.

HEXORINA, Steud. Nom. ed. II. i. 757 (1840) » praec

HEXOSTEMON, Rafin. Cat. 14 (1824)-Lythruin, Linn.
virgatum, Rafin. 1. c. = L. virgatum.

HEXOTRIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. iv. (1818) 265-Ilex, Tourn.
lanceolate, Rafin. 1. c. = 1. lanceolate? *Chapm.*

HEXURIS, Miers, in Proa Lirn. Soc. ii. (1850) 72; et in Trans. Linn. Soc *xxi.* (1852) 44 = Triurie, Miers.
Gardneri, Mien, 11. cc.=T. lntea.

HEYDERIA, C. Koch, Dendrol. ii. II. 177 (1873) a IiibocedruB, Endl. (Conif.).
decurrens, C. Koch, 1. c. 179—L. decurrens.

HEYDIA, Dennst Schlness. Hort. Malab. 30(1818)-Bcleropyrum, Am. (Santalac).
horrida, Dennst. 1. c. = S. Wallichianum.

HEYDUSA, Walp. Ann. i. 204 (1848-49) - HEUDUSA, Presl-Iiathriogyne, Eckl. & Zeyh. (Legamin.).

HEYFELDERA, Sch. Bip. in Flora, xxxvi. (1853) 55 = Chrysopsia, Nutt. (Compos.).
sericea, Sch. Bip. 1. c. 86=C. granrinifolia.

HETTLANDIA, DC. Mém. Lég. vi. 198. t. 84; Prod, ii. 128 (1825). *LEGUMINOSAE,* Berth. & Hook, f. i. 479.
GONIOGYNA, DC. in Ann. Sc Nat Sir. I. iy. (1825) 91.
cordifolia, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5843-Indigofera coidifolia.
kebecarpa, DC. Me'm. Leg. vi. 200. t. 34-Iatebrosa.
latebrosa, *DC. I. c.* 201__Ind. or.
leiocarpa, DC. 1. c. 200 — latebrosa.
Perrottetii, Sprang. Syst. iv. Car. Post. 267 - Crotelaria Perrottetii.

HEYLYGIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 79 (1837)-HELYGIA, Blnme=Parsonsia, R. Br. (Apocyn.).

HEYMASSOLI, Anbl. PI. GaL i. 824. L 125 (1735) = Ximenia, Plum. (.Olacin.).
inermis, Anbl. 1. c. 325 = X. inermis.
spinosa, Aubl. 1. c. 824=X. araericana.

HEYMIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 35 (1818) = Dontella, Forst. (Rubiac).
rigida, Dennst. L c »= D. repens.

HEYNEA, Roxb. Hurt. Beng. S3 (1814) ; et in Bot. Mag. 1.1738 (1815). *MELIACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 836.
affinis, A. Jnss. in MAn. Mus. Par. xix. (1830) 235, 275=trijuga.
cochinchinensis, *Baill. Adansonia,* xi. (1873-76) 265. —Coh inh .
connaroides, Wight, ex Voigt, Hort Snburb. Calc. 136-trijuga.
fruticosa, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. XXT. (1863) 423-sumatrana.
multijuga, Blume, Bijdr. 168—Dysoxylon Blumei.
pubescens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 718-trijuga.
quioquejnga, *A. Juss. in Mini. Mus. Par.* xix. (1830) 285.—Java.
quinquijuga, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 391 =trijuga.
somatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 505.—Sumatra.
trifoliata, A. Juss. in Me*m. Mus. Par. xix. (1830) 235, 274-Walsurapiscidia.
trijnga, *Roxb. Hort. Beng.* 33; *et in Sims, Bot. Mag.* t 1738.—Ind. or.

HEYNICHIA, Knnth, Ind: Sem. Hort. Berol. (1844) Adnot.».—Cf. Linnaea, xviii. (1844) 503 = Trichilia, Linn. (Meliac.).
maOeoides, Kunth, 1. c.=-T. elegans.

HEYNICKIA, CDC. in DC.Monog. Phan. i. 680 (1878) = praec.

HIBANTHUS, D. Dietr. Syn. PL i. 575 (1839) - HYBANTHUS, Jacq. = Ionidium, Vent. (Violac.).

HIBBERTIA, Andr. Bot. Rep. t. 128, 472 (1800). *DILLENIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 14.
BURTONIA, Salisb. ex DC. Syst. i. 425 (1818).
HEMISTEMMA, Jnss. ex Thou. Gen. Nov. Modag. 18 (1806).
HEMISTEPHUS, Drum. *Sc* Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 51.
OCHROLASIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc xxii. (1843) II. 3.
PLEURANURA, Labill. Nov. Holl. PL u. 5. t. 143 (1806).
TRIMORPHANDRA, Brongn. *Sc* Gris, in Ann. Sc. Nat. Sir. V. ii. (Ic64) 148.
WARBURTONIA, F. Muell. Fragm. i. 229 (1858-59).
acerosa, *Benth. Fl. Austral,* i. 24.—AustraL
acicularis, *F. Muell. PI. Viet.* i. 17.—Austral,
amplexicaulis, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 266.—Austral.
angustifolia, *Benth. Fl. Austral,* i. 21.—Austral.
angustifolia, F. Muell. PI. Viet. i. 18 partim = fasciculate.

HIBBERTIA:—
angustifolia, Salisb. Parad. Lond. sub t. 78 = procumbent
argentea, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 268.—Anstral.
aspera, DC. Syst i. 430 = Billardieri.
aspera, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 270-=hypericoides.
astrophylla, Steud. 1. c—furfnracea.
aurea, *Steud. 1. c.* 272.—Anstral.
Banksii, *Benth. Fl. Austral,* i. 20.—Anstral.
basitricka, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 268 - Candollia pachyrrhiza.
Baudouinii, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 191.—N. Caled.
Benthami, F. Muell. Census, 1 = angustifolia.
Billardieri, *F. Muell. Viet. PI.* i. 14.—Austral,
bracteata, *Benth. Fl. Austral,* i. 25.—Austral,
bracteata, *Turn, in Bull. Soc Nat. Mosc.* xxv. (1852) II. 140.—Austral.
Brownei, *Benth. Fl. Austral,* i. 21.—Anstral.
bupleurifolia, Lehm. Nov. Hort. Hamb. (1851) 7 = amplexicaulis.
camphorosma, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 21 • fascicnlata.
candicans, *Benth. FL Austral,* i. 21.—Austral.
canescens, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 211 = linearis.
cinerascens, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 271-hypericoides.
dstifolia, *R. Br. in DC. Syst.* i. 431.—Austral.
commutata, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 267 = montana.
confertifolia, Steud. 1. c.=montana.
conacea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1882) 382. —Madag.
cori/olia, Sims, Bot. Mag. t 2672=pedunculatn.
crassifolia. *Benth. Fl. Austral,* i. 25.—Austral.
crenata, Andr. Bot. Rep. t. 472 -= grossulariaefolia.
cuneiformis, Sm. in Rees, Cycl. xvii. n. 2 = Candollea cuneiformis.
Cnnninghamii, *Ait. ex Hook. Bot. Mag.* t. 3188.—Austral.
dealbata, *Benth. Fl. Austral,* i. 21.—Austral.
densiflora, F. Muell. PI. Viet. i. 15 =• sericea.
dentata, *R. Br. in DC. Syst.* i. 426.—Austral.
depressa, Steud. in Lehm. PI. Preiss. i. 268-Candollea fasciculata.
desmophylla, *F. Muell. Fragm.* xi. 95.—Anstral.
diffusa, *R. Br. in DC. Syst.* i. 429.—Austral.
dilatata, A. Cnnn. ex Benth. Fl. Austral, i. 37-diflusa.
discolor, Steud. I. c. 267 —montana.
disticha, Lehm. Nov. Hort Hamb. (1851).—Cf. Linnaea, xxv. (1852) 809 = amplexicaulis.
echiifolia, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 81.—Austral.
ericaefolia, Hook. *I.* Fl. Tasman. i. 14. t 3 = serpyllifolia.
fasciculata, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 428.—Anstral.
furfuracea, *Benth. Fl. Austral,* i. 23.—Austral,
glaberrima, *F. Muell. Fragm.* iii. 1.—Austral.
glandulosa, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 626 = fasciculata.
glomerata, *Benth. Fl. Austral,* i. 34.—Austral,
glomerosa, *F. Muell. Census,* 2.—Austral.
Goyderi, *F. Muell. Fragm.* vii. 123.—Austral,
gracilipes, *Benth. Fl. Austral,* i. 28.—Anstral.
grossulariaefolia, *Salisb. Parad. Lond.* n. 73. t. 73.—Anstral.
hastata, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 266 = Cunninghamii.
heliamhemoides, *F. Muell. Census,* 2.—Austral.
hermanniaefolia, *DC. Syst.* i. 481.—Austral.
hirsnta, *Benth. Fl. Austral,* i. 26.—Tasman.
Holtzei, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record* (Nov. 1885).—Anstral.
Hnegelii, *F. Muell. Fragm.* xi. 95.—Austral.
humifusa, *F. MuelL Viet. PI.* i. 16. t. 1.—Austral.
Huttii, *F. Muell. \agm.* vii. 123.—Austral.
hypericoides, *Benth. Fl. Austral,* i. 23.—AustraL
inclnsa, *Benth. I. c.* 34.—Austral.
laetucaefolia, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 267 = Cunninghamii.
lasiopus, *Benth. Fl. Austral,* i. 40.—Austral.
latifolia, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 269 - grossulariaefolia.
ledifolia, *Benth. Fl. Austral,* i. 22.—Austral.
lepidophylla, F. Muell. Fragm. i. 217 •= raicrophylla.
lepidota, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 432.—Austral.

HIBBERTIA:—
leptopus, *Benth. Fl. Austral,* i. 41.—Austral,
limosa, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 266.—Austral,
linearis, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 428.—Austral,
lineata, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 272.—Austral.
longifolia, *F. Muell. Fragm.* iv. 115.—Austral.
lucens, Brongn. *Sc* Gris, in Bull. Soc Bot. Fr. xi. (1864) 191 = salicifolia.
melhanoides, *F. Muell. Fragm.* iv. 116.—Austral,
microphylla, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 273—Austral.
monogyna, R. Br. ex DC. Syst. i. 429 = diffusa.
montana, *Steud. in Lehm. PI. Preiss* i. 270.—Austral,
mucronata, *Benth. Fl. Austral,* i. 29.—Austral.
Muelleri, *Benth. 1. c.* 21.—AustraL
Mylnei, *Benth. 1. c.* 39.—Austral,
nitida, *Benth. I. c.* 25.—Austral,
nutans, *Benth. I. c.* 40.—AustraL
obcuneata, Salisb. Parad. Lond. sub n. 73 - Candollea cuneiformis.
oblongata, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 431.—AustraL
obtusifolia, DC. 1. c. 429-linearis.
Ochrolasia,£enM. *Fl. Austral,* i. 32; *TUTCB. in Bull-Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 549.—Austral,
oenotheroides, *F. Muell. Fragm.* vii. 37.—Austral.
ovata, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 270=montana.
pachyrrhima, Steud. L c. 269 = Candollea pacbyrrhiza.
pallida, Steud. 1. c 272 = aurea.
pedunculata, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 430.—Austral,
perfoliata, *Hueg. ex Endl. Enum. PI. Hueg.* &~~ Austral.
pilosa, *Steud. in Lehm. PI. Preiss.* i. 272.—Austral,
polystachya, *Benth. Fl. Austral,* i. 22.—Austral,
potentillaeflora, *F. Muell. ex Benth. I. c.* 40.—Austral.
procumbens, *DC. Syst.* i. 427.—Austral.
prostrata, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 846 = fascicnlata.
proximo, Steud. in Lehm. PL Preiss. L 271-hyp*"' coides.
pungens, *Benth. Fl. Austral,* i. 40.—Austral,
fceadii, *Hort. ex Baill. Hist: PI.* i. 99.—Hab. ?-
recurvifolia, *Benth. Fl. Austral,* i. 24.—Austral.
rhadinopoda, *F. Muell. Fragm.* xi. 91__Anstral.
rostellata, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. C[184J]; II. 8—AustraL
salici/olia, F. Muell. Fragm. i. 161=Adrastaea salicifolia.
salicifolia, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc* «"""• (1868) I. 549.—N. Caled.
saligna, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 427.—Austral.
scabra, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Sot. Fr-* »• (1864) 191.—N. Caled.
scabra, *. *Br. ex Benth. Fl. Austral,* i. 31.—Austral;
scandens, Dryand. in Kon. *Sc* Sims, Ann. I** (1807) 525-volubilis.
sericea, *Benth. Fl. Austral,* i. 26.—Austral,
serpyllifolia, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 430.—Austral,
spicata, *F. Muell. Fragm.* ii. 1.—AustraL MR49)
squamosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxlL (."* II. 9 = Candollea exasperata.
stellaris, *Endl. in Enum. PI. Hueg.* 3.—Austral,
stricta, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 422.—AustraL
subexcisa, Steud. in Lehm. PL Preiss. i. 289-dollea pedunculata.
subraginata, *F. Muell. Fragm.* xi. 95.—Austral,
synandra, *F. Muell. I. c.* iv. 151.—Austral.
tasmanica, *Baill. Adansonia,* vi. 11865-66) -» Tasmania. • *agg,*<*
tenuiramea, Steud. in Lehm. PI. Preiss. >• *° stellaris.
teretifolia, *F. Muell. Fragm.* iv. 117.—Austral-
tomentosa, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 432.—Austral-
trachyphylla, Steud. in Lehm. PL Preiss. ». Z'' pericoides.
uncinata, *F. Muell. Census,* 2.—AnstraL
vaginata, *F. Muell. Fragm.* xi. 98.—Austral.
vefutina, *. *Br. ex Benth. Fl. Austral.* «• Austral.
vcrracosa, *Benth. I. c.* 22.—AnstraL
vestita, *A. Cunn. ex Benth. I. c.* 31.—Austral,
virgata, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 428.—Austral.
virgata, Hook. It PL t. 267 = fascicnlata.
volubilis, *Andr. Bot. Rep.* t. 126.—Austral.

HIBISCOS, St. Lag. in Ann. Soe. Bot. Lyon, vii. (1880) 127=seq.

HIBI8CUS, Linn. Gen. ed. I. 207 (1737). *MAC. VACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 207.
ABISLMOSCHUS, Medic. Malv. 45 (1787).
AIANZA, [Moc. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 453 (1824).
BAMIA, [Linn.] R. Br. ex Wall. PL As. Rar. i. 89 (1880).
BOMBYCODENDRON, Zoll. ex. Hassk. in Flora, xxx. (1847) 660.
COTYLOPLECTA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 14.
EREBENNUS, Alef. 1. c. (1863).
FURCARIA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. v. 1856 (1836).
HYMENOCALYX, Zenk. PI. Ind. 8.1.10 (1885).
KETMIA, Toum. ex Bnrm. Thes. Zeyl. 128 (1787).
LACUNA, Cav. Diss. 178. t. 71. f. 1 (1787).
LAOUNARIA, Reichb. Consp. 202 (1828).
MUNCHUSIA, Heist, ex Rafin. Sylva Tellur. 115 (1838).
PARITI, Adans. Fam. ii. 401 (1768).
PARITIUM, St. Hil. FL Bras. Mer. i. 255 (1827).
PENTASPERMUM, DC. ex Steud. Norn. ed. II. i. 758, in syn. (1840).
PETITIA, Neck. Elem. ii. 407 (1790).
POLYCHLAENA, Garcke, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 56 (1867).
SABDARIFFA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. v. „ W57 (1836).
30LANDRA, Mnrr. in Comm. Gotting. 1788-84 _ (1785)21.1.1.
TRIGUERA, Cav. Diss. 41, nee 107 (1786).
TRIONAEA, M«UC. Malv. 45 (1787).
TRIONOM, Linn. Syst. ed. I (1735).
TRIPLOCHITON, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. .,,(1868)13.

Abelmoschus, *Linn. Sp. PI.* 696.—Geront. trap,
"unloides, *Willd. Enum. Hart. Berol.* 736.-Am. ausir.
abyssinicus, *Steud. Norn.* ed. IL i. 758.—Abyssin.
acerifolius, DC. Prod. i. 448=collinns.
acerifolius, *Salisb. Parad. Land.* t. S3.—China,
acetosaefolius, *DC. Prod.* i. 455.—Mexic.
"cetosus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. 1- Art. i v. 17 _ H. Sabdariffa.
achanioides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* l. 121—Mexic.
"culeatus, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. «i. 678=heterophyllus.
"culeatus, G. Don, Gen. Syst. i. 430 = surattensis, cannabinus.
aculeatus, Roxb. Fl.Ind. iii. 206-iiircatus.
aculeatus, *Walt. Fl. Carol.* 177.—Am. bor.
<x*minatus, Cav. Diss. iii. 144. t. 50. f. 2 - Kosteletzkya acuminata.
adoensis, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 29. "-Abyssin.
<"*scendens, G. Don, Gen. Syst. i. 482 - physaloides.
Quarts, Rottl. ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 345=mntabilis.
««'«»*, Wall. Cat. n. 1908 E-collinus.
aethiopicus, *linn. At ant.* ii. 258.—Afr. austr.
affinis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 289.-Am. austr.
"fricanus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 20; Roth, ?eitr.i.43-H.Trionnm.
"e'oxillos, *V,U. Fl. Flum.* 283; vii. t 35.—Bras.
"*«*, WalL Cat. n. 1876 E-H. Solandra.
alH'aefniiUSi Shuttlew.ex A. Gray, PL Wright. I. 23-Kosteletzkya virginica.
""flyocarpus, Hochst. in Webb, Fiagm. FL.Aethiop. *5=obtusilobus.
ambongoens^ *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 518.—Madae.
an>oeims, *Link &• otto, Ic. PI. Select.* L 119.—Reg. Argent.
Qnf»>oKiJIorus, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) .„ 18? = virgatns. „ ,
an6"losu», *steud. Norn.* ed. II. i. 758 ; *Mast, in Hoot. /• Fl' Brit. Ind.* i. 341.—Ind. or. ...
^eustifoliu,, *Hoglo, v Arn. in Hook. Bot. Misc. w.* U833) 152._Reg. Argent. „ .
»" anosaarum, *Baill. in Bull. Soc- Linn. Par. u* U885) 517__Ma<W
'PPendiculat'us, Stokes, Bot Mat Med. iii. 542 = a| •uattensis.
Veil. Fl. Flum. 284 ; vii. t 4O.-Bras.
i u , DC. FL Fr. Suppl. 627 -roseus.

HIBISCUS :—
arboreus, *Desv. in Ham. Prod. PI. Ind. Occ.* 49.—Ind„ occ.
arenarius, Mnrr. in Comm. Gotting. vii. (1785) t. 3 = Pavonia arenaria.
arenarius, Scop. Delic. Insub. iii. 8—Pavonia zeylanica.
aristaevalvis, Garcke, in Bot. Zeit. vii. (1849) 84!) = intermedius.
aristatus, Hort. ex Poir. Encyc v. 103 - Pavonia spinifera.
armeniacus, *Bouchi, in Otto If Dietr. Allg. Gartenn.* viii. (1840) 403.—Armenia.
Arnottianus, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 176. —Ins. Sandvic.
Arnottii, Griff, ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit Ind. i. 844 - H . Rosa-slnensis.
articulatus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 60. —Abyssin.
arvensis, *Veil. Fl. Flum.* 284; vii. t. 38.—Bras.
ascendens, Walp. Rep. i. 810 *"adscendens.*
aspera, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 228 = cannabinus.
asperatus, Wall. Cat. n. 1908 B=collinus.
asperifolius, Eckl. & Zeyh. Enum. 38 = aethiopicus.
atromarginatus, *Eckl. (f Zeyh. 1. c.*—Afr. austr.
atroviolaceus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 518.—Madag.
attennatus, *Bosse, in Verh. Ver. Bef. Gartenb.* iv. t. 1. —Am. bor.
axillaris, *Veil. Fl. Flum.* 2R8; vii. t. 37.—Bras.
Azanzae, *DC. Prod.* i. 464.—Mexic.
anureus, Boj. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xx. (1883) 98 = Pavonia macrotis.
bacciferus, Forst. f. Prod. 48-Thespesia populnea.
bahamensis, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 14.—Ins. Baham.
Bammia, *ToMtetti, in Mus. Firent.* ii. 67. t. 7.—Aegypt
Bancroftianus, Ham. ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 85 -phoeniceus.
Bancroftianus, *Macfad. Fl. Jamaic.* i. 70.—Ind. occ.
bantamensis, *Miq. PI. Jungh.* 282.—Java.
barbatus, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 17»vulpinus.
Bartlingianus, *Steud. Horn.* ed. II. i. 768.—Ind. or.
batacensis, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 644.—Ins. Philipp.
BecUeri, F. Mud.. Fragm. ii. 117 = diversifolius.
berberidifolius, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 56 = diversifolius.
Berlandierianus, *Moric. PI. Nom. Am.* 22. t. 15.—Mexic.
Bernieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 510. —Madag.
betulifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 292-phoenicens.
betulinus, DC. Prod. i. 452-phoenicens.
bicornis, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 281.—Guiana.
biflorus, *Spring, f. Tent. Suppl.* 19.—Afr. anstr.
bifurcatus, Blanco, FL Filip. ed. I. 645 ^surattensis.
bifurcatus, *Cav. Diss.* iii. 146. t 51. f. 1.—Am. austr.
bifurcatus, Roxb. Hort. Beng. 61-fnrcatns.
Boivini, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 510. —Madag.
Boivini, *Belanger, Voy. Ind. Or.* (absque num.).—Ind. or.
Bojerianus, *Baill. in Bull. Soc. linn. Par.* i. (1885) 611.—Madag.
borbonicus, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 216*=calycinus.
borbonicus, Wight, in Wall. Cat. n. 2694-canescens.
Boryanus, *DC. Prod.* i. 446.—Ins. Borbon.
Boryanus, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 79 = Arnottianus.
brachychlaenus, F. Muell. Fragm. iii. 5-microchlaenus.
brachysiphonius, *F. Muell. 1. c.* i. 67.—Austral.
Brackenridgei, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 175.—Ins. Sandvic.
bracteatus, *Veil. Fl. Flum.* 282 ; vii. t. 38.—Bras,
bracteosus, *[Mot. V Sesse,] ex DC. Prod.* i. 455.—Mexic.
brasiliensis. *Linn. Sp. PI.* ed. IL 977.—Bras.
brevipes, Garcke, in Bot. Zeit. vii. (1849) 853-crassinervis.
Burcktlli, D. Dietr. Syn. PL iv. 839 = urens.

HIBISCUS :—
caerulescenci, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Per.* i. (1886) 516.—Madag.
caesius, Garcke, in Bot. Zeit vii. (1849) 850; ct Peters, Reise Mossamb. Bot. 125^physaloides.
califomicus, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* iv. (1878) 292.—Calif.
callosus, Blame, Bijdr. 67*°Thespesia Lampas.
calycinns, *Willd. Sp. Pi.* iii. 817.—Ins. Borbon.
calycosus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 62-calydnus.
calycularis, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 171 —Ludwigii.
calyphyllus, Cav. Diss. 283=calycinns.
Cameroni, *Knmles V Westc. Fl. Cab.* il. (1838) 149. —Madag.
campylosiphon, Turd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1868) I. 193 = Thespesia campylosiphon.
canaranus, Miq. ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 341-tetraphyllus.
cancellatus, Linn. f. Suppl. 311-Pavonia cancellata.
cancellatus, *Roxb. Hort. Beng.* 61; *Fl. Ind.* iii. 201.—Reg. Himal.
canescens, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 2698.—Ind. or.
cannabinus, *Linn. Syst.* ed. X. 1149.—Geront. trap,
cardiophyllus, *A. Gray, PI. Wright,* i. 22.—Texas.
cardiophyllns,£<ri//. *in Bull. Soc. Linn. Par.* i.(188S) 609.—Madag.
carolinianus, *Muhl. Cat.* 65.—Am. bor.
Cavahillesianus, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 289.—Am. austr.
chinensis, DC. Prod. i. 465--syriacus.
chinensis, Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 342, in syn. sphalm. pro *Bamia chineusis-seq.*
chinensis, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 212 - H. Abelmoschus?
Chittle-Benda. Roxb. ex Wight & Am. Prod. 47 - Pavonia odorata.
ciliaris, Presl, Rel. Haenk. ii. 133-H. Abelmoscfaus.
dliatus, Boj. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 641 -Kosteletzkya velutina.
circinnatus. Willd. Enum. Hort. Berol. 736; DC. Prod. i. 454 — tiliaceus.
dsplatinus, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 250.—Bras.
clandestine, Cav. Ic. i. 1.1. 2-micranthus.
clypeatns, *Linn. Syst.* ed. X. 1149.—Jamaic.
clypeatus, Walt Fl. Carol. 177 - Kosteletzkya virginica.
Coatesii, *F. Muell. Fragm.* iii. 5.—Austral..
coccineus, *Walt. Fl. Carol,* i. 177.—Am. bor.
coelestis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 17 (Quid ?).—Java.
Collerii, *Hort. ex Floral Mag.* N. S. (1876) t. 214.—Polynesia.
Collinsianus, Nutt. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 237 -=H. Trionum, Manihot, esculentus.
collinus, *Roxb. Hort. Beng.* 51; *Fl. Ind.* iii. 198.—Ind. or.
collinus, Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 54 - praec. 7
columbinus, [Mo;, ft Sesse,] ex DC. Prod. i. 462-spiralis. ,
columnaris, Cav. *Diss.* iii. 166. t. 69. f. 2.—Ins. Mascar.
comorensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1885) 615.—Ins. Comor.
congener, Schum. & Tbonn. Beskr. Guin. PI. 319« cannabinus.
convolvuliflorus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 616.—Madag.
Cooperi, Hort. ex Fl. des Serres, *Sir.* II. v. (1862-65) 109. t. 1556 = H. Rosa-sinensis.
cordatus, D. Dietr. Syn. PL iv. 829-Kosteletzkya cordata.
cordatus, *Harv. in Harv.* b* *Sond. Fl. Cap.* i. 172—Afr. austr.
cordatus, Hochst ex Webb. Fragm. Fl. Aethiop. 45 - rhabdotospermuE.
cordifolius, Linn. f. Suppl. 309-Pavonia Mutisii.
cordifolius, *Mill. Gard. Pict.* ed. VIII. n. IS.—Cuba,
cordofanus, *Tura. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) 1. 193.—Afr. trop.
coriace:;s, Heyne, ex Wight & Am. Prod. S3 - Decaschistia crotonifolia.
coronopifolius, Miq. in Lehm. PL Preiss. i. 239 - Fugosia hakeaefolia.
corylifolins, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 133.—Ecuador,
corymbosus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. 1.*67 —Abyssin.
costatus, *A. Rich Ess. Fl. Cub.* 138.—Cobs.

HIBISCUS:—

Conlteri, *Han. ex A. Gray, PI. Wright.* **L 28.—** Mexic.
crassinervius, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* **i.** 61.—Afr. trap,
crenatus, *Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1818) 336.—Guiana,
crenatus, *Veil. Fl. Flum.* 282 ; vii. t 82.—Bras,
crinitus, *Wall, ex G. Don, Gen. Syst.* i. 480.—Ind. or.
crotonifolius, Wall. Cat. n. 1901=Decaschista crotonifolia,
cruentatus, *Schrank, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 758.—Hab.?
crnentus, *Bertol. Fl. Guatimal.* 28. t. 10.—Guatemala.
cryptocarpos, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 142 - H. Abelmoschua.
cubensis, A. Rich. 1. e. 140 - H. Abelmoschus.
cucurbitaceus, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 244 - H. Abelmoschus.
cucurbiiinus, Bnrch. Trav. i. 278 = urens.
cuneifolius, Garcke, in Bot. Zeit. vii. (1849) 852 = H. Trionum.
cuneifolius, Hort ex Poir. Encyc. v. 108 « Pavonia praemorsa.
cuneiformis, DC. Prod. i. 454 = Fugosia cuneiformis.
cuspidatus, Edgew. in Joum. As. Soc Beng. xxi. (1853) ie8--vitifolius.
cyanogynus, *[Mof. &" Sessei] ex DC. Prod.* **i. 455.—Mexic.**
cymosa, *Walt. Fl. Carol.* 179.—Am. bor.
D'Albertisii, *F. Muell. Papuan PI.* i. 58.—N. Gum.
decandrus. Medic, ex Steud. Norn. ed. II. i. 758 = Pavonia praemorsa.
decipiens, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 247.—Bras.
Denisoni, *Hort. ex Flor. Mag.* N. S. (1876; t. 282.—Hab.t
denudatus, *Benth. Bot. Voy. Sulph. 1.* **t 3.—Am. bor. occ**
dictyocarpus, *Webb, Fragm. Fl.Aethiop.* 46.—Afr. trop.
digitatus, *Cay. Diss.* iii. 151. t. 70. f. 2.—Bras.
digitatus, Poir. Encyc. Suppl. iii. 220—digitiformis,
digitiformis, *DC. Prod.* i. 454.—Hab. 1
dimidiatus, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 61.—Bras.
Diodon, *DC. Prod.* i. 449.—Guian.
dissectus, Wall. Cat. n. 2696 = H. Trionnm.
divaricatus, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* **(July-**Sept. 1830) 367.—Austral,
diversifolius, *Jacq. lc. PI. Rar.* t. 551 j *Coll.* ii. 807.—Geront. trop.
domingensis, *Jacq. I. c.* iii. 550; *Coll.* iii 213.—Ins. S. Doming.
dongolensis, Caill. ex Delile, Voy. Meroë Bot. 59 = lunariifolius.
Donii, Walp. Rep. i. 304 = Melocbla corchorifolia.
Drummondii, *Tuna, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* **xxxi.** (1858) I. 192.—Austral.
Drummondii, Young, Fl. Texas, 186; ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot. 139 = Malvaviscus Drummondii
ebracteatus, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **i 206.—** Afr. trop.
elatus, DC. Prod. i. 454 = tiliacens.
elatus, *Sw. Fl. Ind. Occ.* ii. 1218.—Ind. occ.
Kllliottiae, *Ham. in Han. V Sond. Fl. Cap.* **Ii. 587.—** Afr. auitr.
Elliottii, F. Muell. Fragm. i. 220=Drummondii
ellipticus, E. Mey. in Drègr, Zwei PA. Docum. 192 = aethiopicus.
Ellisii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xx. (1883) 100.—** Madag.
Elsworthii, *F. Muell. Fragm.* viii. 241.—Austral.
Endlicheri, Walp. Rep. i. 304 = Melochia corchorifolia.
erianthus, R. Br. in Salt, Abyss. A pp. 66-crassinervis.
eriocarpus, DC. Prod. i. 452 = coUinus.
eriospermus, Hochst. ex A. Br. in Flora, xxiv. (1841) I. 279 = crassinervis.
esculentus, *Linn. Sp. PI.* 696.—Cosmop. trop.
Farragei, *F. Muell. Fragm.* viii. 241.—Austral,
fasciculatus, *[Mof. (f Sesse,'] ex DC. Prod.* **i. 454.—** Mexic
ferax, *Hook. Bot. Mag.* t. 4401.—N. Granat
ferrugineus, Boj. ex Baill. in Bull. Soc Linn. Par. i. (1885) 611 = Bojerianus.
ferrugineus, *Cav. Diss.* iii. 162. t. 60. f. 1.—Madag.
ferruginosus, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. Index, 471 = ferrugineus.

HIBISCUS:—

festalis, Salisb. Prod. 383 - H. Rosa-sinensia.
ficarius, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i 170 - calycinus.
fidfolius, MiU. Gard. Diet. ed. VIII. n. 15-esculentus.
ficulneoides, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 938.—As. et Austral. trop.
fiailneus, Cav. Diss. iii. t 51. f. 2=diversifolius.
ficulneus, *Linn. Sp. PI.* 695.—As. et Austral, trop.
Fitzgeraldi, *F. Muell. Fragm,* viii. 242.—Austral.
fiabellatus, Des£ Tabl. ed. I. 147 ; Poir. Encyc. Suppl. iii. 220 = heterophyllus, *Vent,*
flagellaris, Walp. Rep. i. 305=seq.
flagelliformis, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 243.-Bras.
fiavescens, Cav. Diss. iii 164. t. 70. £ 8 = H. Abelmoschus.
fiavus, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 126 = Pavonia arabica.
floccosus, *Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **i. 848.—** Malacca.
floridanus, Shuttlew. ex A. Gray, PI. Wright, i. 22 = Bancroftianus.
fioridus, Salisb. Prod. 383=syriacus.
fluininensis, *Veil. Ft. Flum.* 282 ; vii. t. 34.—Bras.
fragilis, DC. Prod. i. 446=liliiflorus.
fragrans, *Roxb. Hort. Beng.* [97] ; *Fl. Ind.* iii. 196.—Reg. Himal.
fraternus, *Linn. PI. Surin.* **n. 90;** *Amoen. Acad.* **viii.** 260.—Guian.
fugax, *Mart, ex Spreng. Syst.* iv. Cur. Post 258.—Bras.
fulgens, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 663 = H. Rosa-sinensis.
fulvus, *Kit. in Rachel, PI. Banat. Rar. Ind.***—Bannat.**
furcatus, Wall. Cat. n. 1986 C = surattensis,
furcatus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* **786;** *Roxb. Hort. Beng.* 51; *Fl. Ind.* iii. 204.—Geront. trop.
furccllatus. *Lam. Encyc.* iii. 858.—Am. trop.
fuscus, Garcke, in Bot. Zeit vii (1849) 854 = gossypinus, *Thunb.*
fusiformis, Steud. Nom. ed. II. i. 759-cancellatus.
gangeticus, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 49 = Thespesia Lampas.
gangeticus, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* **49,** nomen.—Ind. or.
Genevii, Boj. Hort. Maurit. 28; et ex Hook. Bot Mag. t. 3144-liliiflorns.
geranifolius, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxi. (1868) i. 195-Huegelil.
geranioides, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* **i. 215.—** Austral.
Gibsoni, *Stocks, ex Han. V Sond. Fl. Cap.* **ii. 587 i** *et ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **i. 389.—Geront** trop.
glabrifolius, *A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat.* Se>. II. xviii. (1842) 40.—Bras.
Goldsworthii, *F. Muell. Fragm.* xi. 30.—Austral.
gossypifolius, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 10 = H. **Sabdariffa.**
gossypinus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 118.—Afr. austr.
gossypinus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. I* **(1885)** 618.-Madag.
gossypinus, EckL & Zeyh. Enum. 38 •= pusillus.
Grandidieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1885)** 515.—Madag.
grandiAorus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 46.—Am. bor.
grandiflorus, Salisb. Parad. Lond. t. 22,=heterophyllus, ***Vent,***
grandifolius, Hochst ex A. Rich. Tent. FL Abyss, i. 61=calycinus.
Graotii, *Mast, in Oliver, FL Trop. Afr.* **i. 203.—Afr.** trop.
Greveanus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i (1885)** 515.—Madag.
grewiaefolius, *Hassi. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr.* • xii. (1855) 83.—Malaya.
grewiaefolius, F. Villar, in Blanco, Fl. Pbilipp. ed. III. iv. 24=Thespesia campylosiphon.
grossulariaefolius, Miq. in Lehm. PI. Preisfc. i. 240—Hnegelii.
guianensis, *Aubl. PI. Gui.* ii. 708—Guiana.
guinelnsis, DC. Prod. i. 464 = tiliaceus.
guineinsis, G. Don, Gen. Syst. ii 481 •= lunariifolius.
hakeaefolius, Giordano, Mem. Nov-Ibii, 6 - Fugosia hakeaefolia.
Hamabo, *Sieb. (f Zucc. Fl. Jap.* i. 176.—Japon.

HIBISCUS:—

hamatus, *E. Mey. ex Han. V Sond. Fl. Cap. i. Ill"* furcatus.
Harrisii, *Basse, Handb. Blum.* **ix. 344 ;** *ex Garcke, in Bot. Zeit.* viii. (1860) 669.—Hab. *1*
hastaefolius, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. *I* 176=H. Trionum.
hastatus, Cav. Diss. iii. 144. t. 50. f. 1= Kosteletzkya hastata, *Garcke.*
hastatus. Linn. f. Suppl. 301=tricuspis.
hastatus, Michx. ex DC. Prod. i. 451 - militaris.
Haynaldi, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record, 'm.* (March 1883).—Austral.
helvolus, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 174-aethiopicus.
heptaphyllus, Dalz. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. 20-radiatus.
herbaceus, *Veil. fl. Flum.* 284; vii. t. 89.—Bras.
heterophyllus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2691' variifolius.
heterophyllus, *Griff. Notul.* iv. 520.—Burma,
heterophyllus, *Vent. Jard. Malm.* 108. t. 108.—Austral.
heterotrichus, *DC. Prod.* i. 450.—Hab. J
heterotrichus, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i 172=physaloides.
hirtus, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort Beng. 61; Fl. Ind. iii. 208 = mgO8us.
hirtus, *Linn. Sp. PI.* 694.—Ind. or.; Malaya.
hispidissimus, Griff. Notul. iv. 621 - furcatus.
hispidulus, *Spreng. Pugill.* ii. 73.—Hab. ?
hispidus, D. Dietr. Syn. PI. iv. 829 = Kosteletzkya hispida, *Presl.*
hispidus, MiU. Gard. Diet. ed. VIII. n. 21 = H. Trionum.
hispidus, Spreng. Syst. iii. 99 = Kosteletzkya hispidula.
Hornei, *Baker, Fl. Maurit.* 23.—Ins. Seychelles,
hostilis, *Wall, ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* >• 342.—Burma.
Huegelii, *Endl. Enum. PI. Hueg.* 10.—Austral.
Humblotii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1886)** 617.—Madag.
Humboldtii, Hort ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 62 •= hispidus ?
Humboldtii, Schrank, ex Colla, Hort Ripul. 349, 35° = H. Trionum I
hybridus, *F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn.* »• *Nachtr.iv.* 423.—Hab.t
hypoglossus, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i «7 =surattensig.
immutabilis, *Dehn. Mentor. Sopr. Ale. Piant. I* **i '*** *Walp. Rep.* i. 307—Hab. t
incanus, *Wendl. Bot. Beobacht.* **64;** *Schrad. Serf. Hannm.* t 24 ; *Willd. Sp. PI.* iii 807.—Am. bor.
ingralns, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 143.—Guiana-insularis, *Endl. Prod. Fl. Norfolk.* 132.—Ins. Norfolc.
intermedius, *Belanger, Voy. Ind. Or. Ic.* (absque num.; —Ind. or.
intermedius, Hochst. ex T. Anders, in Joum. Lu>n-Soc. v. Suppl. i. (1860) 8 =micranthus.
intermedius, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i 58.—Ind. of- Afr. trop,
involucratus, Salisb. Prod. 884=sumttensis.
Jacquini, *Colla, Hort. Ripul. App.* iv. 24. t 12 (»• *Mem. Ace. Torin.* xxxv. (1831) 170).—Hab. 1
japonicus, *Mia. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. V-"* Japon.
jairophaefolius, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 68-« folius.
javanicus. Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 7 = H. Bo»' sinensis.
javanicus, *Weinm. in Syll. Ratisb.* ii (1828) 1/2-Java.
Jerroldianus, *Paxt. Flor. Mag.* xiii (1847) t 1-" Bras.
katguhriensis, *Hoffmgg. Verm. Pfl. Nachtr.* **ii. 13**[OB]**5-** Ind. or.
Kirkii, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **i 199.—A*** trop.
kitaibelifolius, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i 248.—»n.*
Kokia, *Hilleb. ex Wamra, in Flora,* **lvi. (1873) I'*** Ins. Sandvic
Kraussianus, Buch. ex Hochst. 1. c. axvii. C[184]*' =peduncnlatus. 7 --
Krichauffianus, *F. Muell. Rep. Babb. Expti-* '• Austral. ago**
laevigatus, Targ. ex Colla, Hort. Ripul. 349, »» roseusl

HIBISCUS:—
laevis, Scop. Pelie. Insob. iii. 36 = militaris.
laguneoides, Edgew. in Jonrn. Lian. Soc. vi. (1862) 199 = punctatus.
Larabertianus, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 891. t. 478.—Am. austr.
lampadius, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 127 = seq.
Lampas, Cav. Diss. iii. 154. t. 68. f. 2-Thespesia Lampas.
lanceolatus, *Gaudieh. in Freyc. Voy. Bot.* 478.—Austral.
lasiocarpos, *Cm. Diss.* iiL 159. t 70. f. 1.—Hab. t
lasiococcus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1885) 611.—Madag.
lasiospermus, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.!. 175 — atiomarginatus.
laurinus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 512. —Madag.
lavateroides, *Moric. PL Norn. Am.* 88.116 Mexic.
laxiflorus, St. Hil. FI. Bras. Mer. i. 246 = H. Abelmoschus.
leiospennus, *Harv. in Han.* 6* *Sond. Fl. Cap.* i. 17S. —Afr. aostr.
lepidospermns, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 197. —Afr. trop.
Iepidospermus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 159.—Java.
leptocalyx, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 17 = Pavonia odorata.
leptocladus, *Bentk. Fl. Austral*, i. 214.—Austral.
lilacinus, Llndl. BoL Reg. t. 2009 = Fugosia hakiaefolia.
liliiflorus, *Cm. Diss.* iii. 154. t. 67. f. 1.—Ins. Mascar.
liliifloms. Griff, ex Mast, in Hook. f. FL Brit. Ind. i. 844 - H. Kosa-sinensis.
Lindleyi.V/M. PL As. Rar. i. 4. t. 4 *(Lindlei)* - raojatus.
linearis, *A. St. Hil. & Naud. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xviii. (1842) 40.—Bras.
longifolius, Roxb. Hort. Beng. 53; FI. Ind. iii. 210 - esculentus.
longifolius, Willd. Sp. Pl. iii. 827 = H. Abelmoschus.
Ludwigii, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 89.—Afr. austr.
lunariifolius, *Willd. Sp. Pl.* iii. 811.—As. et Afr. trop.
MacUeyanus, Walp. Rep. i. 806, sphaltn. = seo,.
MacLeayanus, Bancroft, ex Macfad. FL Jamaic. i. 71 - Bancroftianus.
"wcranthus, Hochst in Flora, xxiv. (1841) L Intell. 29 *° lunariifolius.
nacrocalyx, Garcke, in Bot. Zeit. vii. (1849) 838 - atromarginatus.
"nacrogonus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* L (1885) 51O.-Madag.
macrophyllus, *Roxb. Hort. Beng.* 61; *ex Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 149.—Ind. or.; Burma; Malaya.
nacularis, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. FL Cap. i. 171 =diversifolius.
"ucutatus, Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1837) = Bartlingianus.
maculatus, *Lam. Encyc.* ffl. 849.—Ins. S. Doming.
""gnificus, F. Muell. Fragm. ii. 118=divancatus.
•nalacophyllus, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edint.* xi. (1882) 503.—Ins. Socotr.
""alacospermus, E. Mey. ex Harv. V Sond. Ft. Cap. I. 174—Afr. austr.
"udvarosa, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) *d-1. Art. IV. 17 = mutabilis.
Malvamscus, Linn. Sp. PI. 694 = Malvaviscus arboreus.
Manihot, *Linn. I. c.* «96.-Geront. trop.
Manhallianus, Hort. ex Fisch. *St.* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop, ix. 76 = hispidus.
*M*rgeriae*, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral, i. 213 = netcrophyllus, *Vent.*
•aannoratus, *Lent. Illustr. Hortic.* (1866) t. 82.—Mexic.
towtianus, *Zucc. in Linnaea*, xxlv. (1861) 193.-Mexic <
nouritianus, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 2J8 - ficulneoides.
Mechowii, *a Hoffm. in Linnaea.* xliii. (1880-82) 121 —Afr. tr<
toeisn\ri, Miq^'in Lehm. PL Preiss. 1. 240 - Hoegelii.
"»«nbranaceus, Co.. *Diss.* iii. 154. t. 68. f. 2-- Mexic.
*M*7eri, Harv. in Harv. V Stnd. Fl. Cap.* i- 178.- Afr. austr.

HIBISCUS:—
micans, *Cm. Diss.* iii. 167. t. 60. f. 2.—Java,
micranthus, *Linn. f. Suppl.* 808, 810.—Ind. or.; Afr. trop.
microcarpus, Garcke, in Bot. Zeit vii. (1849) 886 - malacospermus.
microchlaenus, *F. Muell. Fragm.* ii. 118.—Austral.
mieropkyllus, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 178=Meyeri.
mieropkyllus, Vahl, Symb. Bot. i. 60 - Pavonia arabica.
microsiphon, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 511.—Madag.
militaris, *Cm. Diss.* vi. 352. t. 198. f. 2.—Am. bor.
modaticus, Hochst ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 56 =vitifolius.
mollis, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 169 = panduriformis.
morifolius, Rottl. ex Wight & Am. Prod. 47 = Pavonia odorata.
moschatus, Roxb. ex Wight & Am. 1. c. 53 = rugosus.
moschatus, Salisb. Prod. 384 - H. Abelmoschus.
Moscheutos, *Linn. Sp. PI.* 693.—Am. bor.
Muhamedis, *Webb, Fragm. Fl. Aethiop.* 46.—Afr. trop.
multifidus, Paxt. Flow. Card. vii. (1840) 103 - Fugosia bakeaefolia.
multiformis, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 246.—Bras.
multiformis, Steud. Norn. ed. II. i. 789 - H. Abelmoschus.
multistiptdatus, Garcke, in Bot. Zeit. vii. (1849) 849 - panduriformis.
mntabilis, *Linn. Sp. PI.* 694.—China,
natalitus, *Hart, in Harv. V Sond. FL Cap.* ii. 567.—Afr. austr.
neglectus, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 13.—Cuba.
Normani, *F. Muell. Fragm.* iii. 4.— Austral.
Notho-Monihot, *F. Muell. I. c.* v. 57.—Austral.
obscurus, A. Rich. Tent. FI. Abyss, i. 57 =vitifolliii8.
obtusatus, Schum. in Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 821—cannabinus.
obtusifolius, Willd. Sp. PI. iii. 829-vitifolius.
obtusilobns, *Garcke, in Bot. Zeit.* vii. (1849) 887.—Afr. trop.; Belnchist
ochroleucus, *Bater, in Journ. Bot.* xx. (1882) 46.—Madag.
odoratus, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 47 «Pavonia odorata.
oenotheroides, Webb, Fragm. FL Aethiop. 47 - articulates,
orbicularis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 516.—Madag.
ovalifolius, Vahl, Symb. Bot. i. 50 = micranthus.
ovatus, Cav. Diss. iii. 143. t 50. f. 3-aethiopicus.
ovariensis, Beauv. Fl. Ow. ii. 88. t 117-calycinus.
oxalidiflorns, *Boj. Hort. Maurit.* 28, nomen; *et ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 99.—Ins. Maurit.
oxyphyllns, *[Moç. V Sesse,] ex DC. Prod. L* 455.—Mexic.
pallidus, Rafin. ex S. Wats. Ind. N. Am, Bot. 135 •= H. Trionum.
palmatihdus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 824.—Madag.
palmalilobus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1885) 609.—Madag.
palmatus, Cav. Diss. 168-H. Manihot
palmatus, *Forst. Fl. Aegypt. Arab.* 126.—Arab,
palmatus, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 50, nomen.—Ind. or.
patustris, Linn. Sp. FL 693 = H. Moscheutos.
palustris, Thore, Chlor. Land. 295=roseus.
pamanzianus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* L (1886) 617.—Madag.
panduraeformis, *Burm. f. FL Ind.* 151. t. 47. f. *i.*— Geront. trop.
paniculatus, Domb. ex Poir. Encyc. v. 105 = Pavonia paniculata.
papilionaceus, Banks, ex Poir. 1. c. 109 - Pavonia papilionacea.
tapyriferus, SaUsb. Prod. »84 = H. Manihot.
Parkeri, *Baker, in Journ. Bot* xx. (1882) 46.- Madag.
parviflorus, R. Br. to Salt, Abyss. App. 65-abyssinicus.
parvifloms, *Weinm. in Flora*, lii. (1820) 610.—' Am.'

HIBISCUS:—
parvifolius, Hochst ex T. Anders. In Joum. Linn. Soc. v. Suppl. i. (I860) 8-micranthus.
Patersonii, [R. Br. in] Ait. Hort Kew. ed. II. iv. 224 -Lagunaria Patersonii.
Patersonius, Andr. Bot. Rep. t. 286 = Lagunari.i Patersonii.
pavoniformi^ *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 615.—Madag.
pedunculatus, *Linn. f. Suppl.* 809; *Thunb. Prod. PI. Cap.* 118; *Cm. Diss.* iii. 163. t. 66. f. 2—Afr' austr.
pentacarpos, Linn. Sp. PL 697 - Kosteletekya pentacarpa.
pentaphyllus, F. Muell. Fragm. ii. 13 = Gibsoni.
pentaphyllus, Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 212 - H. Manihot
pentaspermus, Bert, ex DC. Prod. L 447-Kosteletzkya pentiftiperma.
pentaspermus, Nutt. in Am. Journ. Sc. v. (1822) 298-= Kosteletekya virginica.
pernambucensis, *Arruda, in Koster, Trav. Brat.* 487.— Bras,
pernambucensis, *Bertol. in Opusc. Scient.* iv. (1823) 229 (=praec.I).—Bras.
Perrottetii, Steud. Nom. ed.II.i. 759-quinquelobut.
persicifolius, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 88.—Afr. austr.
petioliflorus, Stokes, Bot. Mat. Med. iii 643-H. Mosuheutos.
petiolosus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 159.—Java,
phoemcens, *Linn.f. Suppl.* 810.—Ind. or.
phoeniceus, Willd. Sp. PI. iii. 813-hirtus.
phyllochlanas, *F. Muell. Fragm. ix.* 128.—Austral,
physaloides, *Guill. V Pen. Fl. Seneg. Tent.* i. 62.— Afr. trop.
physodes,E. Mey. ex Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. i. 176 - H. Trionum.
pilosus, Roxb. ex Wall. Cat n. 1902-panduraeformis.
Pinonianus, *Gaudieh. in Freyc. Voy. Bot.* 476. t. 100. —Austral.
Pinonianus, Miq. in Lehm. PL Preiss. i. 240 - Huegelii.
platanifolius,8weet, Hort Brit.ed. I. 61-coUuras.
platycalyx, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 202.— Afr. trop.
platystcgius, *Turn, in Bull. Sec. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 194.—Java.
Poeppigii, *Garcke, in Eichl. Jahrb. I* (1881) 228, in syn.—Cnba.
Poeppigii, Garcke, in Jahresb. Nat Ver. Halle (I860), 138 - Bancroftianns.
polygama, *Walt. FL Carol.* 179.—Carolin.
polymorphus, *Boj. in Desj. 6me Rapp. Soc. Hist. Nat.* *6.—Ins. Maurit.
ponticus, *Rupr. Fl. Cauc.* 261, in obs.—Reg. Caucas.
populifolius. Salisb. Prod. 383 - Thespesia populnea.
populneoides, Roxb. Hort Beng. 51; Fl. Ind. iii. 191 =Thespesia populnea.
populneus. Linn. Sp. PI. 694 - Thespesia populnea.
porophyllus, *Veil. Fl. Flum.* 280 ; vii. t 28.—Bras.
praecox, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 125 •-eseulentui.
praemorsus, Linn. f. Suppl. 309 — Pavonia praemorsa.
Preslii, D. Dietr. Syn. PI. iv. 829 - Kosteletzkya hastata I
prooerus, *Roxb. ex Wall. Cat.* n. 2692.—Burma.
propinquus, E. Mey. ex Harv, *Sc* Sond. FL Cap. i. 174 ••aethiopicos.
prostratus, Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 208 > ficulneus.
prunifolius, *F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr* iii. 68O.-Guian.
pruriens, Jacq. ex Stead. Nom.ed.~I. 450-Jacquinii.
pruriens, Roxb. Hort. Beng. 61; Fl. Ind. iii. 196 •= lunariifolius.
Pstud-Abelmoschus, Blume, Bijdr.7O •> H. Abelmoschus.
Pseudo-Manihot, *DC. Prod.* i. 448.—Ins. Borbon.
Pseudo-palmatus, *Span, in Hook. Comp. Bot. Mag.* L (1835) 844, nomen.—Ins. Timor.
pterospermoides, Wight, ex Wight & Am. Prod. 63 - Decaschislia crotonifolia.
pulchtirimus, *Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent*, xv. (1883) 99.—Reg. Argent,
pulvernlentus, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 40. —Reg. Argent.
pumilus, Roxb. Hort. Beng. [97] ; Fl. Ind. lii. 203 - H. Solandra.
punctatus, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. I. 221 = Fugosia puncUta.

HIBISCUS :—

pnnctatns, *Dalz. in Dal*. V Gibs. Bomb. Fl.* 20.— Ind. or.
pungens, *Roxb. Hart. Btng.* 52; *Fl. Ind.* iii. 218.— Reg. Himal.
puniceus, *Hart, ex Regel, Cat. PI. Hart. Aksakov.* 71.— Hab.?
purpureus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 126.—Arab.
pusillus, Eckl. & Zeyh. Enum. 88 - H. Trionnm.
pusillus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* lib.—Afr. austr.
pyramidatos, *Garde, in Bat. Zeit.* vii. (1849) 851.—Hab.?
quinquelobatus, *Veil. Fl. Flum.* 283; vii. t. 36.—Bras.
quinquelobus, *G. Don, Gen. Syst.* i. 482.—Afr. tiop.
racemosus, Herb. Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 760 •s Malvaviscus concinnus.
racemosus, Lindl. in Bot. Keg. t. 917 -lonariifolius.
radiatus, *Cav. Diss.* iii. 150. t. 54. f. 2__As. et Austral. trap.
radiaius, Sieber, ex Stend. Norn. ed. II. i. 760=cannabinus.
radiatus, *Willd. ex Roxb. Fl. Ind.* iii. 209.—Ind. or.; Malaya.
Rainerianus, *Vis. Ind. Sem. Hart. Patav.* (1841) 3.— Afr. bor.
ramosus, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 838.—Afr. trop.
rhabdotospermus, *Garde, in Bot. Zeit.* vii. (1849) 839.—Afr. trop.
rhodopetalos, *F. Muell. ex Bettth. Fl. Austral,* i. 209. —Austral.
rhombifolius, Cav. Diss. iii. 156.. t. 69. f. 8-syriacus.
ribesifolia, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 53 = physaloides.
ribesioides, Stend: Nom. ed. II. i. 760a»praec.
hbifolius, *A. Gray.'in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 164. —Calif.
Richardsonii, Lindl. in Bot. Reg. t. 876 = H. Trionnm.
licinifolius, £. *Mey. ex Hare. V Sand. Fl. Cap.* i. 171- —Afr. austr.
ricimfolius, Wall.-Cat. n. 1915 - H . Abelmoschus.
ricinoides, Garcke, in Bot. Zeit. vii. (1849) 884—ricinifbiki
ricinoides, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 170 " timorensis.
rigidus. Linn. f. Suppl. 810-micranthus.
riparius, Pen. Syn. ii. 264 = militaiis.
Kosa-malabarica, Ker-Gawl. in Bot. **Reg.** t. 337 = birtns.
Kosa-sinensis, *Linn. Sp. PL* 694.—Geront. trop.
roseus, *Thore, in Loisel. Fl. Gall.* ed. I. ii. 434.— Gall.; Hispan.
rosiflorus, Stokes, Bot Mat. Med. iii. 643 - H . Rosa-sinensis.
Rossii, Knowles & Westc Flor. Cab. ii. (1838) t. 82= Cameroni.
rostellatus, *Guill. VPerr. Fl. Seneg. Tent A.* 55.—Afr. trop.
Raxburghii, Stead. Nom. ed. II. i. 760 = H. Abel-moschus?
rugosus, *Roxb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 760; *Mast. in Hooi.f. Fl. Brit. Ind.* i. 842.—Ind. or.
rugosus, Seidel, ex Steud. Nom. ed. II. i. 760 = acnleatus.
Kutenbergii, *Garde, in Bremen, Abh.* vii. (1881) 199.—Madag.
Sabdarifia, *Linn. Sp. PI.* 695.—Geront. trop.
sagittatus, D. Dietr. Syn. PI. ir. 829=Kosteletzkya sagittata.
sagittifolius, A. Korz, in Journ. As. Soc Beng. xl. (1871) II. 46 = H. Abelmoschus.
Sagraeanus, *Mercier, in Ser. Bull. Bot.* i. (1830) 169.—Cnba.
salicifolius, Linn. PI. Suna. n. »2; Amoen. Acad. viii. 260-Pavonia Typhalaea.
salviadfolius, *St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 249.—Bras,
sangnineus, *Franch. in Révoil, Çomali,* 15.—Afr. trop.
sanguineus, GriffT. Notul. iv. 620 = H. SabdaritTa.
scaber. Lam. Encyc. iii. 350—diversifolius.
scaber, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 45 - aculeatus.
scandens, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 20-intermedius.
scandens, *Roxb. Hart. Beng.* 51; *Fl. Ind.* iii. 200.— Reg. Himal.
schizopetalus, *Hooi.f. Bot. Mag.* t. 6524.—Afr. trop.
scindicus, *Stocks, in Hook. Ic. PL* t. 80'2.—Ind. or.
Scotti, *Balf. f. in Proc. Roy. Sac. Edinb.* xi. (1882) 503. —las. Socotr.

HIBISCUS:—

senegalensis, Cav. Diss. iii. 160. t. 68. f. l = Pavonia zeylanica.
senegalensis, Guill. & Pen. Fl. Seneg. Tent i. 63 - panduriformis.
septemnervosus, Wight, in Wall. Cat. n. 2693 = canescens.
serratus, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. 175 = pusillus.
serratus, Wall. Cat. n. 1900=vitifolius.
setifer, *Presl, Rel. Haeni.* ii. 133.—Am. trop.
setosus, Roxb. Hort. Beng. [97]; Fl. Ind. iii. 194 - macrophyllus.
setosus, Wall. Cat n. 1902 •= panduraeformis.
setulosus, *F. Muell. Fragm.* i. 221.—Austral,
sidaeformis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 518.—Madag.
sideides, Wight & Am. Prod. 49-lunariifolius.
similis, Blume, Bijdr. 78=elntBS.
simplex, *D. Dietr. Syn. PL* iv. 838.—Afr. trop.
simplex, Linn. Sp. PI. ed. II. 977 -Sterculia platanifolia.
simplex, Roxb. Hort. Beng. 61 = collinus.
sinensis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = mutabilis.
sinuatus, Cav. Diss. iii. 147 t. 62. f. 2—ficulneus.
smilacifolius, Shuttlew. ex A. Gray, PL Wright, i. 23 = Kosteletzkya virginica.
Solandra, *L'Hérit. Stirp. Nov.* 103. t. 49.—As. et Afr. trop.
solanifolius, F. Muell. Fragm. ii. 116=Pinonianus.
somalensis, *Franch. in Révoil, Çomali,* 17.—Afr. trop.
Sororius, *Linn. PL Surin.* n. 91; *Amoen. Acad.* viii. 260.—Guian.
spathaceus, *Blume, Bijdr.* 72.—Java.
spathaceus, Bacb.-Ham. in Wall. Cat. n. 1915 = H. Abelmoschus.
spathulatus, *Garcke, in Bot. Zeit.* vii. (1S49) 840.—Am. austr.
spathulatus, *Gaudich. in Freyc. Vay. Bot.* 476.— Austral.
speciosus, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 466 = coccineus.
sphaerocarpus, *Bouchl, in Otto £" Dietr. Allg. Garten*. viii. (1840)402.—Hab. t
spicatus, *Cav. Diss.* iii. 163. t. 59. f. 1.—Hab.?
spinifera, Crantz, Inst. ii. 170=seq.
spinifex, Linn. Syst. ed. X. 1149-Pavonia spinifex.
spiralis, *Cav. Ic.* il 47.1162.—Mexic.
splendens, *Fras. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ.* (Apr.-Jnne, 1830) 175.—Austral,
stenanthus, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 503—Ins. Socotr.
stenophyllus, *Baker, in Journ. "Bat.* xx. (1882) 47.—Madag.
sterculiaefolius, Steud. Nom. ed. II. i. 760=quinquelobus.
stipularis, Salisb. Prod. 884»tubulosus.
Siorckii, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 254.—Ins. Fiji.
striatus, Cav. Diss. iii. 146. t. 64. £ l=-domingensis.
strictus, Roxb. Hort Beng. 52; FL Ind. iii. 206-= ficulneus.
strigosus, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 860__Am. austr.
strigosus, Schum. *Sc* Thonn. Beskr. Guin. PI. 314 = vitifolius.
Stnrtii, *Hoot, in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 363.— Austral,
suaresensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1885) 514.—Madag.
Subdariffa, Rottl. in Act. Lit. Univ. Hafii. i. (1778) 297, sphalm. = H. Sabdarifla.
suborbiculatus. Wall. Cat. n. 1906=micranthus.
subtrilobatus, Hochst. ex Mast in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 203=calycinns.
sulphureus, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* v. 289.— Venezuela,
sulphureus, *Wall, ex Veigt, Hort. Suburb. Cole.* 120. —Ind. or.
suranensis, *Linn. Sp. PI.* 696.—Geront. trop.
sylvaticus, *Benth. PI. Harts,.* 114.—Mexic.
syriacus, *Linn. Sp. PL* 695.—Geront. calid.
tampicensis, *Moric. PL Nouv. Am.* 20.1.14.—Mexic
Tel/airiaex, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. II. 586; Maund. & Hensl. The Botanist, v. t. 212.—**Maurit.**
ternatus, Cav. Diss. iii. 172. t. 64. f. 8 = H. Trionum.
tematns, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 206.—Afr. trop.

HIBISCUS :—

ternifiorus, Garcke, in Bot. Zeit. vii (1849) 838 - Kosteletzkya adoensis.
tetralocutaris, Roxb. Hort. Beng. [97]; FL Ind. iii. 198=Thespesia Lampas.
tetraphyllus, *Roxb. II. cc.* 52, 211.—Ind. or.
thespesianus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1885) 611.—Madag.
thespesiaides, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, i. 220 - Fugosia thespesioides.
tiliaceus, *Linn. Sp. PL* 694.—Amphig. trop.
tiliaefolius, Salisb. Prod. 883 - tiliaceus.
timorensis, *DC. Prod.* i. 448.—Ins. Timor,
tomentosus, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Ind. occ.
tomentosus, *Stahl, Estud. Fl. Puerto-rico,* Foil. ii. 92 (= praec. ?).—Ins. Porto Rico.
tortuosus, Roxb. Hort. Beng. 51; Fl. Ind. iii. 192 tiliaceus.
torulosus, Salisb. Prod. 383 = H. Solandra.
tricolor, *Dehnh. Cat. PL Hart. Camald.* ed. II. 20.— Austral,
tricuspis, *Banks, ex Cav. Diss.* iii. 162. t. 55. f. 2.—&»• Pacif.
tridactylites, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austral, i. 85 - H. Trionum.
tridentatus, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. «• 174—malacospermus.
trilineatus, *A. St. Hil. &" Naud. in Ann. Sc. Net-* Sér. II. xviii. (1842) 39.—Bras,
trilobatus, *Veil. FL Flum.* 281; vii. t. 29.—Bras,
trilobus, *Aubl. PI. Gut.* ii. 708.—Guian.; Dominic.
trinitarius, Noronha, in Verh. Batav. Gen.,v. (1790) ed. I. Art. iv. 17 = surattensis.
trimicus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127 = H. Trionum.
trionioides, G. Don, Gen. Syst. i. 483<-seq.
Trionum, *Linn. Sp.PL* 697.—Geront. trop.
tripartite, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 126.—Arab.
trisectus, Bertol. Misc. Bot. xv. 19=Jatropha urens.
triumfettaefolius, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PL 312 = calycinus.
truncatus, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 144 - Bancroftianus.
truncatus, Roxb. Hoit. Beng. 51; Fl. Ind. iii. 200 <= vitifolius.
tubiflorus, [Moç. & Sesse] ex DC. Prod. i. 447.—Mexic.
tubulosus, Cav. Diss. iii. 161. t 68. f. 2-panduraeformis.
tulipaeflorus, *Hook. Ic. PL* tt. 707, 708.—Ind. occ.
tulipiferus, Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov. 71 - pr«-
uncinellus, _Moc. &• Sesse] ex DC. Prod. i. 44».— Mexic.
unicanlis, *DC. ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 268.— Hab.!
unidens, *Lindl. in Bot. Reg.* 878.—Bras.
unifiorus, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. i. l = H. Trionum.
unilateral, Cav. Diss. iii. 158. t. 67. f. F. e = spiral*
urens, *Linn.f. Suppl.* 809.—Afr. austr.
urticaefolius, *A. St. Hil. if Naud. in Ann. Sc. Nat-* Sér. II. xviii. (1842) 39.—Bras.
variabilis, Garcke, in Bot. Zeit. vii. (1849) 841 - physaloides.
varians, *Splitg. ex De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arc*- i. (1848) 338.—Guian.
variifolius, *Steud. Nom.* ed. II. L 760.—Hort Calcutt.
velutinus, DC. Prod. i. 452 - panduraeformis.
venustus, Blume, Bijdr. 71-mutabilis.
verrucosus, Guill. ft Perr. Fl. Seneg. Tent. i. »' cannabinus.
versicolor, *Schum. (f Thonn. Beskr. Guin. PI-* Afr. trop.
vesicarius, Cav. Diss. iii. 171. t. 64. f. 2 = H. TrionW»-
vestitus, Griff. Notul. iv. 619 - macrophyllus.
vestitus, Wall Cat. n. 1924, partim=pungens.
Vidalianus, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed- 833; *Nov. App.* 24-Thespesia campylosiphon.
vixgatus, *Blume, Bijdr.* 71.—Malaya.
Virginian, Linn. Sp. PL 697 - Kosteletzkya virgin"*"
virginicus, Walt. Fl. Carol. 177-militans.
vitifolius, *Linn. Sp. PL* 696.—Geront. trop.
vitifolius, Mill. Gard. Dieted. VIII.n. 8 =cannabin»
Vriesianus, *Hassk. in Hoev. V De Vriese, TijdscM-* (1838-89) 263.—Java.
vulpinus, *Reinv. ex Blume, Cat. Gev. Bviten*- nomen—Java.
Welshii, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. v. Supp- **(1860) 8 (= *Cienfuegosia Welshii*).—Arab.**
Wightianus, Wall. Cat. n. 2695 A, 1898=cannabHW

HIBISCUS:—
Wrayae, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 69 = Huegelii.
Xanihium.SteuA. Nom.ed.II. i. 760-Urena Xanthium.
Youngianus, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* **91.—Ins. Sandvic.**
zeylanieus, Linn. Sp. PI. 697 = Pavonia zeylanica.
zonatus, *F. Muell. Fragm. t* 221.—Austral.

HICKSBEACHIA, F. Muell. in Wing, South Sc Record, iii. (1883) 33. *PROTEACEAE.*
pinnatifolia, *F. Muell. I. c*—Austral.

HICORIA, Rafin. Alsog. Am. 66 (1888) =seq.

HlCORIUS, Rafin. Fl.Ludov. 109 (1817) = **Carya,** Nutt. (Jugland.).
alba, Ra6n. Alsog. Am. 66=C. alba.
amara, Ra6n. Fl. Ludov. 109=C . amara.
aquatica, Rafin. Alsog. Am.66=C. aquatica.
integrifolia, Rafin. Fl. Ludov. 109-C. integrifolia.
maxima, Rafin. Alsog. Am. 66, 67 = C. tomentosa I
microcarpa, Rafin. 1. c. 66-C. microcarpa.
Myristica, Rafin. 1. c. = C. myristicaeformis.
oliveformis, Rafin. Fl. Ludov. 109-C. olivaeformis.
porcina, Kafin. 1. c—C. porcioa.
scabra, Rafin. 1. c—Am. bor.
sulcata, Rafin. 1. c.=C. sulcata.
tomentosa, Rafin. L c-C . tomentosa.

HIDALGOA, La Llave, in La Llave *Sc* Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 15 (1824). *COMPOS1TAE,* Benth. & Hook. f. ii. 386.
lessingii, DC. Prod. v. 511 = teraata.
ternata, *La Llave, in La Llave V Lex. Nov. Veg. Desc.* fasc. i. 16.—Mexic.

H1DROCOTILE, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 186 (1768) =Hydroeotyle, Tourn. (.Umbellif.).

HIDROSIA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 89 (1835) =BJiynohosia, Lour. (Legumin.).
bullata, E. Mey. 1. c. = R. bullata.

HIERACEUM, Hoppe, Bot. Taschenb.. (1791) 278 = **Hieraoium, Tonm. (Compos.).**

HlERACHIUM, Hill, Hort. Kew. 43 (1769)=HypochoerlB, Linn. (Compos.).
laevigatum, Hill, I.e.-H. Achyrophorus.

HlERACIOIDES, [Vaill.] Moench, Meth. 547 (1794) = Hieraoium, Tourn. (Compos.).
fiexuosa, Moench, L c. = Hieracium sabaudum.
staticefolia, Moench. Meth. Suppl. 223 = Hieracium staticefolium.
«mbellatum, Moench, Meth. 647 = Hieraanm umbellatum.

HIERACION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)113,127 =-seq.

HIEKACIUar [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 616.
APATANTHUS, Viv. Fl. Lib. Spec 54. t. 7- f- 8 (18Z4).
ARACIUM, Neck. Elem.i. 49 (1790).
CHLOROCREPIS, Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) 155, (Comm. Hierac Gen. 75).
CREPIDISPERMUM, Fries, Epicris. Hierac 163 (1862).
HETEROPLEURA, Sch. Bip. in Flora, xlv. (1862) 434.
HIERACIODES, [Vaill.1 Moench, Meth. 547 (1794).
MANDONIA, Sch. Bip. in Linnaea, xxxm. (1864-65) 767.
MIECIA, Neck. Elem. i. 49 (1790).
[illegible] **Sch. Bip. in Flora, xlv. (1862) 117, partim.**
^HLAGINTWEITIA, Griseb.in UOen. *nuu.* ». 156 (Comm. Hierac. Gen. 76).
STENOTHECA, Monn. Ess. Hierac. 71 (1829)-
"Hitum, Jord. ex Nym. Consp. **443 - vDlearam.**
"ixtieolunt, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. HI. «• <« [illegible]
[illegible]rt.»nJ^lUReut. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 872-vulgatum.
^PHfolium. Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb. **xxiv. (1878) l«» sabaudum.**
^«ssum, *Less, in Linnaea,* **v**. (1830) « " £ • « * £ ,
[illegible]«=*ondi***tum**x, Hutef, ex Dalla Torre, Atl. Alpenn. I50.-Hmop.

HIERACIUBt :—
accipitrinnm, *Uspensky, in Bull. Soc. Kat. Mosc.* **vii.** (1834) 878, nomen.—Rossia.
acrocomum, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 709.—Europ.
acrothyrsum, *Naeg.* to" *Peter, 1. c.* 714.—Europ.
actinotum, *Naeg. tf Peter, 1. c.* 477.—Europ.
acuminatum, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 17 = vulgatom.
acuminatum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (.1869) 72 = Crepis paludosa.
acutatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 405 = vulgatum.
acutifolium, Hall. f. ex Stead. Norn. ed. II. i. 761-villosum.
acutifolium, Vill. Precis Voy. Bot. 59. t. 3«piloselloides, dentatum.
adenophorum, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1868) 682-cerinthoides.
adriaticum, *Naeg. ex Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xxvii. (1878) 870.—Europ.
adsdtum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. IIL ii. 410-murorum.
adullerinum, *Naeg.* 6* *Peter, Hierac.* 427.—Europ.
aestivale, *Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr.* ed. III. ii. 891.—Europ.
aestivum, Bill, ex Nym. Consp. 441-tridentatum.
aestivum, *Fries, Symb. Hierac.* 176.—Norveg.
aestivum, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 887 = umbellatnm.
offine, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 70=rigidum.
affine, *Zutnag. Fl. Pedem.* i. 374.—Ital.
ageratoides, *Fries, Epicris. Hierac.* 108.—Ital.
aggregatum, Backh. Mon. Hierac. 62 — argenteum.
agrarium, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 610-angIicum.
agrestis, Berah. Syst. Verz. Erf. 137=Crepia tectorum.
alatum, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* **478.—Mont.** Pyren.
albereanum, *Timb. in Mem. Acad. Toulouse, Sir.* **VIII.** i. II. (1879) 194.—Europ.
albidum, Vill. Prosp. 36 ; Hist. PI. Dauph. iii. 138 = intybaceum.
albiflorum, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 298.—Am. bor. occ.
albinum, Fries, Epicris. Hierac. 103 =juranum.
albipedunculatum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 726.—Europ.
albulum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 419 = pallidum.
alfacftrensis, *Amo, Desc. PI. Gran.* 2.—Hispan.
Allionii, HalL f. in Roem. Arch. i. II. 2-Crepia alpestris.
Allionii, Mer-at, ex Steud. Norn. ed. II. i. 761 = glaucum.
Allionii, Monn. Ess. Hierac 15 *= saxatile.
Allionii, Tausch, in Hora, xi. (1828) I. Erg. 68 = cymosum.
alpestre, Jacq. Fl. Austr. ii. 54 = Crepis alpestris.
alpicolum, *Schlrich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 19, nomen ; ***et ex Froel. in DC. Prod.* vii. 201.—Helvet**
alpicolum,Sda\T, Enum. PI. Transs. 382-H. Auricula.
alpicolum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 55 = sphaerocephalum.
alpinum, All. Fl. Pedem. i. 212-glandulilerum.
alpinum, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 87 = piliferum, H. Pilosella.
alpinum, *Linn. Sp. PI.* 800.—Europ.; As. bor.; Greenl.
alpinum, Luce[1], Fl. Osil. 262 = Leontodon hastilis.
alpinum, Pall. Reice, iii. 445 = Crepis chrysantha.
alpinum, VilL ex Fries, Symb. Hierac. 49 - piliferum.
altissimum, *Krock. Fl. Sties. Suppl.* ii. 259.—Europ.
altissimum, *Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Pyr.* **125.—Mont.** Pyren.
amaurocephalum, *Naeg. tf Peter, Hierac.* 355.—Europ.
amaurophyllum, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toulouse, iii. (1876-76) 601 = hirsutum.
ambiguum, Ehrh. Beitr. v. 178, nomen—dgbium.
ambiguum, Hort. Landsh. ex Froel. in DC. Prod. vii. 222'politum.
ambiguum, Lapeyr. ex Froel. 1. c. 212 = Candollei.
ambiguum, Schleich. ex Pers. Syn. ii. 376 = rigidum.
ambiguum, *Schult. Obs. Bot.* 165.—Hab. t
ambiguum, Schur, Enum. PI. Transs. 386=subfuscum.
ambiguum, Spenn. Fl. Friburg. ii. 565 = piloselloides.
amblylepis, *Boiss. Fl. Orient.* Ui. 874.—As. Min.
amphibolum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 392-nmbellatum.

HIEB. ACITTM:
amplexicaule, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 254 = cydoniaefolium.
amplexicaule, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1213-sabaudum.
amplexicaule. *Linn. Sp. PI.* 803.—Europ. austr.
ampliflorum, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. 19-cerinthoides.
analogum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 394—tridentatum.
anceps, *Jord. ex Martr. Fl. Tarn,* **447.—Gallia.**
anchusaefolium, BertoL Amoen. Ital. 402—dentatum.
anchusaefolium, Spreng. Syst. iii. 642-LtottardL
andinum, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 126.—Chili,
andryaloides, *Vill. Prosp.* **86;** *Hist. PL Dauph.* **iii.** 121. t. 29.—Europ.
aneimenum, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 687.—Europ.
anfractum, *Fries, in Oefver. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh.* (1856) 148.—Scandinav.
anglicum, *Fries, Symb. Hierac.* 93.—Europ.
anglicum, Wimm. Fl. Schles. ed. III. 308«pallescens.
angulare, Fries, in Oefver. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. (1856) 148=caesium.
angustatum, Fries, ex Nym. Consp. 440 =crocatum.
angustatum, Linden, in Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. XI. 44 = caesium.
angustatum, Tansch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 57-cymosum.
angustifolium, DC. Fl. Fr. vi. 438 = glaciale.
angustifolium, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 823-vulgatum.
angustifolium, Hoppe, Bot. Taschenb. (1799) 130-sphaerocephalum.
angustifolium, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 761 —cerinthoides.
4ngustifolium, Ledeb. ea Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 67 = LedebouriL
angustifolium, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 761 — prenanthoides.
angustifolium, Schnr, Enum. PL Transs. 390 - vulgatum.
angustum, Lindeb. in Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. XI. 56*crocatum.
anisocladum, Joid. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 403—vulgatum.
anisophyllum, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 876.—Bithyn.
anisotrichum, Griseb. in Goett. Abh. v. (1863) 85-Vahlii.
antarcticum, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1873) **488.—** Reg. Magtll.
antarcticum, *Urn. in If rm. Soc. Linn. Par.* **iv. (12)** 608.—Reg. Magell.
anthurum, *Fries, Symb. Hierac.* 153.—Mexic
apatelium, *Naeg. V Peter, Hierac.* 706.—Europ.
apiculatum, Tansch, in Flora, xx. (1837) I. Beibl. 70 — nigrescens.
approximatum, Jord. Cat Gr. Jard. Dijon (1848) 20-vulgatum.
arachnoideum, *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* i. (1872-73) 95.—Europ.
arbascense, Timb. 1. c. ii. (1874) 462 -alatum.
anticum, Froel. in DC. Prod. vii. 209 = gracile.
arcticum, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. **(1861)** 22 —transsilvannicum, rotundatnm.
arenarium, Sch. Bip. in Pollichia, xiii. (1856) 23-caesium.
arenicola, *Gremli, Neue Beitr.* iii. 14.—Helvet.
argenteum, *Fries, Symb. Hierac.* 99.—Norveg.
argillaceum, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 17-vulgatnm.
argutidens, Fries, ex Nym. Consp. **443** = fasciculate,
argutum, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* **N. S. vii.** (1841) 447.—Calif.
aridum, *Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxvi. (1876)** 369.—Europ.
aristatum, Vitm. Summa PI. iv. **411** - Crepis blatta. rioides.
armerihefolium, *Reichb. in Moessl. Handb.* ed. II. ii. 1387.—Helvet.
armerioides, *An. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 288 Europ.
arnicoides, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 871= murorum.
amoserioides, *Naeg. V Peter, Hierac.* 597.—Europ.
arragonense, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1863) 667 » cerinthoides.

HQERACITJH :—
arrectarium, Joid. in Bor. Fl. Cent. FT. ed. III. ii. 402—vulgaium.
arrectum, Gren. tf Godr. Fl. Fr. ii. 879=cydoniaefolium.
arrectnm, *Jord. in Bor. Fl. Cent. FT.* ed. III. ii. 394. —Gallia.
arrhieophyllum, Vukot in Rod Jagos. Akad. Zagreb. TO. (1869) 79-sabaudum.
artefactum x, Naeg. & Peter, Hierac. 678.—Europ.
aroense, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii 110 = Sonchus arvensis.
arveraense, *Arv. in Lamotte, Prod.* ii. 488.—Gallia.
Arvetii, *Vrrlot, Cat. yard. Grenoble* (1879), 12.—Europ.
arvicola, *Naeg.* to[1] *Peter, Hiérac* 6tttt.—Enrop.
Aschersonianum, Uechtrit'z, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872)° 78-olympicum.
asperatunt, Jord. in Bor. H. Cent. Fr.' ed. III. ii. 406 = vulgatum.
aspericaule, Jord. in Bor. 1. c. 884, in obs. =tridentatum.
asperifolium, Schnr, Ennm. Fl. Transs. 883 = brachiatnrn.
aspernatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 400 — vnlgatnm.
asperrimum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 165-Lactuca Dnbyaea 7
asperrimum, Schur, Ennm. PI. Transs. 400-umbellatum.
aspernlum, *Freyn, in Flora,* lxiv. (1881) 217.—Enrop.
asperum, Bemh. Syst. Verz. Erf. 136=Sonchusaspera.
asperum, Bieb. ex Fries, Symb. 'Hierac 44.= incanum.
asperum, Fries, 1. c. 172 = tridentatum.
asperum, Schleich. ex Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 267 •••ramosum.
asperum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 58=praealtnm.
asplenioides, Breit. Hort. Breit. 193 •= Picrisasplenioides.
aspreticolum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 418=murorum.
asyngamicum, *Kern, ex Dalla-Torre, Atl. Alpenfl.* 1SS.—Enrop.
atactum x, Naeg. & Peter, Hierac 856.—Europ.
athoum, Griseb. ex Pant, in Verh. Vat. Natur. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 52=chalcidicnm.
atlanticnm, *Fries, Epicris. Hierac.* 58.—Alger.
atratum, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 196 = nigrescent
atratnm, *Fries, Symb. Hierac.* 105.—Enrop.
atricapillum, Hoppe, in Flora, xiv. (1881) I. 184 = alpinum.
atrovirens, Froel. in DC. Prod. vii. 281 =murorum.
atrovirens, Guss. Kl.Sic. Syn. ii. 408 = Bourgaei.
attenuatum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 56 = dubinm.
atticum, Nym. Consp. 452=sabinum.
aurantellum, *Naeg. &" Peter, Hierac.* S47.—Enrop.
aurantiacum, *Linn. Sp. PI.* 801.—Europ.
auratum. Fries, Symb. Hierac. 181>=canadense.
aurelianense, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 406 = vulgatum.
aureum, Hort. Genev. ex Schlecht. in Linnaea, xxv. (1852) 806 = Leontodon hastilis.
aureum, Kit. ex Nym. Consp. 456 - Crepis Kitaibelii.
aureum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 104 = Crepis anrea.
Auricula, Leers, Fl. Herbom. ed. II. 174 = pratente.
Auricula, *Linn. Sp. PI.* 800.—Enrop.; Reg. Cauc.
Auricula, ViU.Hist. PI. Danph. iii. *W0 = bifurcum.*
Auricula, Willd. Sp. PI. iii. 1564 = praealtum.
Auricula, Willie, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 258-VaWii.
auriculaefolium, Gremli, Excnrs. Fl. Schw. ed. IL 261 = H. Pilosella.
auriculaefolium, Tausch, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. *I. lib = bifurcum.*
auriculaefolium, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 165 = Crepis incamata.
auriculaeforme, Fries, Symb. Hierac. *1=bifurcum.*
auriculatum, *Hornem. Hort. Hafn.* 768.—Hab. 1
auriculatum, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 127, 113 = H. Auricula.
auriculatum, Willd. ex Spreng.Syst. iii. 644 = boreale.
auriculiforme, Panë *Be* Vis. in Mem. 1st. Venet xxi. (1830-82) 534 = NaegeIianum.
auriculoid.es, Lang, in Syll. Ratisb. i. (1824) 183 = praealtum.
aurigeranum, Loret, ex Nym. Consp, 445 = pallidutn.
aurigeranum, Timb. in Bull. Soc Bot. Fr. v. (1858) 615 = lactucaceum.

HIEBACIUM :—
aurimontanum, Schrank, Baier. Fl. ii. 882 =villosum.
auristylon, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 393 —tridentatum.
aurosicum, *Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (1856) 277.—Gallia.
aurulentum, Jord. in Bor. Fl.Cent. Fr. ed. III. ii. 899 -vnlgatum.
Ausserdorferi, Hansm. ex Nym. Consp. 441—lapponicnm f
australe, *Fries, Symb. Hierac* 120.—Europ. austr.
austriacum, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. *u.* 119 = Crepis blattaroides.
autumnale, Griseb. in Goett Abh. y. (1853) 133 = sabaudnm.
aviicolum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. IIL ii. 401 = vulgatum.
Avilae, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 3.—Venezuela,
badense, *Dichtl. in Deutsche Bot. Monatsschr.* ii. (1884) 66.—Europ.
Balansae, *Boiss. Diagn.* Ser. II. vi. 119.—As. Min.; Syria,
balkanum, *Uechtr. ex Pan/. Elem. Fl. Bulg.* 46.—Europ.
balsameum, Asso, Syn. Stirp. Arag. I1l = amplexicaule.
banaticum, Henri, ex Nym. Consp. 463 = brachiatum.
barbatum, Loisel. Fl. Gall. ii. 523; et ed. II. ii. 192 =saxatile.
barbatum, Nutt. in Joum. Acad. Philad. vii. (1834) 70-longipilnm.
barbatum, *Tausch, in Flora,* xL (1828) I. *Erg.* 72.—Europ.
barbicaule, *Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm.* iv. (1881) 759.—Europ.
Bartlingii, Scheele, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 656 = compositum.
basifurcum, *Naeg. b" Peter, Hierac.* 251.—Europ.
basiphyllum, Vukot. in Rad Jngos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 68=racemosum.
Bastardianum, Bor. FL Cent. Fr. ed. III. it 402 = vulgatum.
Bauhini, Bess. Prim. Fl. Gal. ii. 149; Schult. Obs. Bot 164 = praealtum.
Banhini, *Sckwaeg. ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 66.—Hab. ?
Baumgartenianum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858)) 45 = porphyritieum ?
Bellidiastrum, *Jeanb.* b" *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. etNat. Toulouse,* iii. (1875-76) 615, nomen.—Europ.
bellidifolium, *Froel. in DC. Prod.* vii. 2O9.-Carinth.
bellidifolium, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1863) 666 = compositum.
bellum, Jord. ex Nym. Consp. 448—vulgatum.
bernensis, Christ, in Mittheil. Bern. Naturf. Ges. (1860) (Hierac. Schw. 12) = villosum.
Besserianum, Host, Fl. Austr. ii. 406 = H. Auricula.
Besserianum, Spreng. Syst. iii. 639 = praealtum.
bicolor, Fries, ex Nym. Consp. 453=aurantiacum.
bicolor, Scheele, in Linnaea, xxvi. (1861-62) 654 = olivacenm.
bidentatum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 74 = prenanthoides.
bienne, Blytt, ex Lange, Snppl. Fl. Dan. t/94=murorurn.
bienne, Hornem. Hort. Ham. 767—Crepis biennis.
bifidum. Kit. ex Hornem. Hort. Hafn. ii. 761-caesium.
bifidum, Koch, Syn. FL Germ. ed. II. 523^znpicoluiiu
bifidum, Schleich. ex Fries, Symb, Hierac. I1l-mnrorum.
bifidum, Ser. ex Froel. in DC. Prod. vii. 230=la*iophyllum, pallidum.
bifolium, *Art,, in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 288—Europ.
biforme, *Fries, Epicris. Hierac.* 118.—Europ. austr.
bifurcatum, Hort. ex Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 54»dubium.
bifurcum x, Bieb. Fl.Taur. Cauc. ii. 251.—Reg. Caucas.
bifurcum, Fries, ex Nym. Consp. 454=cerauum.
bifurcum, Froel. in DC. Prod. vii. 200 = stoloniflorum.
bifurcum, Schur, Ennm. PL Transs. 381 = brachiatnm.
bifurcum, Tenore, Syll. Fl. Neap. 400 = H. Pilosella.
bihariense, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (18«3) 246.—Europ.
Intense, F. Schultz, Fl. Pfalz, *V6 = bifurcum.*
iiturigense, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 386 — boreale.
Blanci.Senes, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 225-Pseudo-Cerinthe.

HXEBACXtTM :—
blattarioides, Linn. Sp. PL 804-Crepis blattarioides.
blattarioideum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (18J 0) 289 —juranum.
Blyttianum, *Fries, Cat. Hort. Up*.* (1853); *ex ej-Epicris. Hierac.* 21.—Norveg.
Bocconei, *Griseb. in Goett. Abh.* v. (1858) 115.—Helv.; Tyrol.
bohemicnm, *Fries, Epicris. Hierac.* 47.—Silesia.
Boisseri, Huet, ex Nym. Consp. 450=villosum.
Bolanderi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 365.—Calif.
totiviense, Sch. Bip. in Bonplandia, Ix. (1861) 174" Crepis boliviensis.
bombycinum, *Boiss. tf Rent, ex Fries, Epicris. Hierac.* 50.—Hispan.
Borderi, Sen. Bip. ex Nym. Consp. 448=mixtnm.
boreale, Costa, Fl. Catal. 169=sabandum.
boreale, *Fries, Nov. Fl. Suec.* ed. L 77; ed. II. 261.—Europ.; Oriens; As. bor.
boreale, Kittel, ex Walp. Ann.ii. 1012 = lycopsifolnim.
boreale, Laestad. ex Fries, Symb. Hierac. 184 crocatum.
boreale, E. Mey. ex Fries, L c 186 - canadense.
Boreanum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 392-tridentatum.
Borreri, *Syme, Engl. Bot* ed. HI. v. 212.—Brit.
bounophilum, Jord. in Bor. Fl. Centr. Fr. ed. Ill-412 •= murorum.
Bonrgaei, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 102.—Europ.
brachiatum, *Bert, ex DC. Fl. Fr.* vi. 442.—Europ.
brachycomum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 255.—Europ.
brackyphyllum, Nym. Consp. 453 = floribundum.
bracteatum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) *It* -Crepis blattarioides.
bracteolatum, Fries, Epicris. Hierac. 71 = Crepis athoa.
bracteolatum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 288* umbellatum.
bracteolatum, *Sibtk. (f Sm. Fl. Grace. Prod.* ii. 135.—Sieil.; Graec.
bracteosum, Timb. in BulL Soc Sc Phys. Nat-Toulouse, iii. (1875-76) 604 = scapigerum.
Brondegei, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 194.—Calif.
Braunii, F. Schultz, in Arch. FL Fr. et Allem. 13" prenanthoides.
brevidentatum, Jord. in Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. 897 = vulgatum.
brevifolium, Froel. in DC. Prod. vii. 225 = umbellatum.
brevifolium, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 71 " latifolium.
brevipes, Jord. in Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. *1[2]-* murorum.
brevipilum, Greene, in BulL Torrey Bot. Club, «• (1882) 64-Fendleri.
ireviscapum, DC. Fl. Fr. vi. 439^gladale.
breviscapum, Griseb. SpiciL Fl. Rumel. ii. 271 " petraeum.
Breveri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1864-65) 5» —horridum.
brigantiacum, Jord. ex Nym. Consp. 450 = glancum.
Broteri, *Froel. in DC. Prod.* vii. 235.—Lusitan.
bructerum. Fries, Symb. Hierac. 72=-alpinum.
Bueckiix, Thuem. in Bonplandia, vi. (1858) —Europ.
buglossoides, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 286.—Europ.
bulbosum, Willd. Sp. PL iii. 1562 - Crepis bnlbosS-
bupleurifolium, Lapeyr. <tx Stend. Nom. ed. II. i. '** =-cerinthoides.
bupleurifolium, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. =prenanthoides.
bupleuroides, Bellard. ex Willd. Sp. PL iii. I[581]-
flexuosum, *Waldst. (f Kit.*
bupleuroides, C. *C. Gmel. Fl. Bad.* iii. 817.—Enrop.
bupleuroides, Lapeyr. ex Stend. Nom. ed. I. dubium.
bursaefolium, Fries, Symb. Hierac 115=ramosu0i-
bursaefolium, Froel. ex Nym. Consp. 448-fasc[1]^[1].
caemleum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) Europ.
caesariatum x, Naeg. & Peter, Hierac. 768.—Europ.
caesium, *Fries, Symb. Hierac,* 112.—Europ.
caespitosum, Dum. Fl. Belg. Prod. 62^pratense.
calabricum, Huet, ex Nym. Consp. 447=Sartonanun
calabrum, *Naeg. (f Peter, Hierac.* 682.—Europ.
calantkes'x, Naeg. *Sc* Peter, 1. c. 359.—Europ.

HXBBACIU1E:—
calcareum, Bemh. ex Homem. Hort. Hafn. ii. 762 - saretanum.
calcareum, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 216 « rupestre.
calngenum, Rehm. in Oestr. Bot. Zcitschr. xxiii. (1873) 212=vulgalum.
caledon, Steud. Nom. ed. II. i. 763, sphalm. In «yn.. dnbium.
calenduliflorum, Backh. Mon. Hierac. 23=eximium.
cali/ornicum, Froel. in DC. Prod. vii. 235 = Malacothrix saxatilis.
caUianthum, Arv. in BulLSoc. Danph. (1880) 282 - amplexicaule.
callicomum x, Naeg. & Peter, Hierac. 761.—Europ.
callimorphnm, *Naeg. & Peter, I. e.* 896.—Europ.
calocephalum, Scheele, ex Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 263=neo-ccrinthe.
calodon, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 68 = dubium.
calomastixx, Naeg. & Peter, Hierac. 657.—Enrop.
calophyllum, Uechtritz, in Oesir. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 106 -lanatum.
calophyton, *Naeg.* V *Peter, Hierac* 422.—Europ.
calosdasx, Naeg. & Peter, 1. c. 762.—Enrop.
calycinum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 282.—Enrop.
calycinum, Homem. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 261 = H. Pilosella.
calyculatum, Homem. Hort. Hafn. ii. 775=saxetanum.
Camerarii, Collay, in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 796 - H. Pilosella.
canadense, Froel. in DC. Prod. vii. 213=vulgatum.
canadense, Hort Goett. ex Froel. 1. c. 220 -sabaudum.
canadense, *Michx. Fl. Bor. Am.* it. 86 — Am.bor.
canicans, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 65 - pallidum.
candidissimum, Pourr. ex Nym, Consp. 446=rnpicolnm.
candidum, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1863) 673 = saxatile.
Candollei, *Froel. in DC. Prod.* vii. 212.—Enrop.
Candollii, Monn. Ess. Hierac. 2S=glaciale.
ouiesceng, *Lint, Enum. Hort. Berol.* ii. 288.—Europ.
coneseens, Schleich. Cat. PL Helv. ed. III. 17=vulgatutn.
cntalicum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 289 = cydoniaefolium.
cannm, *Naeg. V Peter, Hierac.* 428.—Europ.
•apense, *Linn. PI. Afr. Rar.* 17; *Amoen. Acad.* vu 96—Afr. austr.
cpillaceum. Ail. Fl. Pedem. i. 214=glaucum.
capitatum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 782~cennthoides.
Wpsiiiense, *Jeanb. V Timi. in Bull. Soe. Sc. Phys. „ <>t- Toulouse,* vi. (1883-84) 184.—Europ.
Corio„-,-, Bor. Fl. Cent. Fr.ed, III. ii. 382-sabaudum.
"araeum, *Greene, in Coult. Bot. Ga:* vi. (1881) 184. —Am. bor. occ
"•olinianum, Fries, Symb. Hierac. 145 - mananum.
'"rpathicum, *Bess. Prim. Fl. Galic.* ii. 154.-Europ.
<,"-Paticum, Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) 114 = oohemicum.
*carP.<*anum,* Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. U- 266 = macilentum.
o s t dnlu Boiss. & ReuL Diagn. PL Nov. Hisp. 20 *»/»rc«iB.
*e<"*casicum,* Fries, Epicris. Hierac. 46-hispidum.
^nlophyllum, *Bertol. Misc. Bot.* iv. "•-A™-..'"'-
celncaule, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. n. 402= vulgatum.
g J . . , - » Bull. Soc. Dauph. (1880) 287.- irop.
cerate phyllum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 145 - oabellatum.
cfnntkoides, Backh. Mon. Hierac. 36 - anglicum.
c»>nthoides, Boeb. in Pall. N. Nord. Beitr. vu 259 (9uid?)._Ross.med.
*cer*nthoides,* Gaud. Fl. Helv. v. 112-compositum
*"?*tkoides,* Gouan, Illustr. 58. t. 22 = NeoCerinthe.
^nnthoides, *Linn. Sp. PI.* 803.—Europ.
"'Hthoides, Monn. Ess. Hierac. 49 = prenanthoides.
*c"}*thoides,* Vill. Fl. Delphin. 86; Hist. PL Dauph. "i. 110 -Pseudo- cerinthe.
*™<»«"n, *Fries, Symb. Hierac.* lO.-Norveg.
fw «a«m, Frivald. ex Boiss. Fl. Orient, m. 873 = *sP>«um.*

HEBRACIUM:—
cernuum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii, (1888) 68 -Crepis neglecta.
chalcidicnm, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. II. iii. 104. —Graecia.
chalicopkilum, Jord. ex Billot, Annot. 119 = saxatile.
charadreum, Jord. ex Billot, 1. c=caesium.
cheiranthifolium, Baill. Hist PI. viii. 394 = Andryala varium
cheirifoliam, *Boiss. VHaussi. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 866.—Persia.
chenocaule, Vukot. ex Nym. Consp. 438 = sabaudum.
chtriense, jord. in Bor. Fl. Cent. Fl. ed. III. ii. 897- tum.
chidense, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 47. —Peruv.
chilense, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 100.—Chili.
chloraefolium, Arv. in Bull. Sec. Dauph. (1S80) 282= saxetanum.
chlorocephalum, Wiam. ex Nym. Consp. 447 - bohemicum.
chlorophyllum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 399 * vulgatum.
Moropsis, Gren. *8c* Godr. Fl. Fr. ii. 368-= saxetanum.
chlorospermum, Froe\. in DC. Prod. vii. 222 = crinitum.
cUoroticum, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. S86, in obs.-boreale.
chondrillaefolium, Fries, Epicris. Hierac. 67 = chondrilloides.
chondrilloides, Linn. Sp. PI. 801-Crepis Jacquini.
chondriUoides, *Vill. Hist. PI. Dauph.* iii. 114.—Enrop.
chrysanthum, Backh. Monog. Hierac. 34-nigrescens.
chrysanthum, Ledeb. Fl. Alt. iv. 129-Crepis chrysantha.
chrysocephaloides, *Norrl. ex Wainio, in Meddel. Soc. Faun, et Fl. Fenn.* iii. 65.—Kennia.
cibinense, Schur, Enum. PL Transs. 899-boreale.
cichoriifolium, Hoit. Bern, ex Kroel. in DC. Prod, viU 203-pratense.
ddoniae/olium, Vill. Prosp. 34-cydoniaefolinm.
ciliatum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869)77=andryaloides.
ciliatum, Willd. Sp. PL iii. 1585 -Picris Sprengeriana.
ciliolatum, *Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iii. (18S6) 276. —Gallia.
ciliosum, Pang, ex Nym.- Consp. 442—crinitum.
cincinnatutn, Fn.-s, Epicris. Hierac. 131-boreale.
Cineraria, *Naeg. V Peter, Hierac.* 664.—Europ.
cinerascens, Jord. Gr. Rec. Jard. Gren. (1849) 17 - lasiephyllum.
cinereum, Doell, Rhein. R 524 - H. Pilosella.
cinereum, Tausch, in Flora, ii. (1819) II. 463 = setigerum, *Tausch*; echioides.
cinerum, Schur, Enum. PL Transs. 881=brachiatnm.
cirritum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 287.—Europ.
cladophorum x, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxxiv. (1876) 18.—Enrop.
cl/zdophyllum, Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874), Rev. BibL 227, sphalm., vide *calophyllum.*
cochleare, *Huter, ex Dalla Torre, Atl. Alpehfl.* 149.—Enrop.
coeruleum, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 111 — Sonchus alpinus.
collinum, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. *UB-bifureum.*
collinum, Boh m. ex Fries, Symb. Hierac. 16—suecicum.
collinum, Bot. Norveg. ex Fries, 1. c. 17 = floribundum.
collinum, Froel, in DC. Prod. vii. 203, partim = glomeratum.
collinum, Gochn. Tent. Med. Bot. Cich. 17.1.1 - praealtum.
collinum, Kostel. ex Froel. in DC. Prod. vii. 200 = H. Pilosella.
collinum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 58; Fries, Symb. Hierac. 29-dubium.
collinum, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 203 - pretense.
Columnae, Tenore, Syll. Fl. Nap. 898 - Crepi* Columnae.
comatulum, Jord. in Bar. Fl. Cent Fr.ed. III. ii. 410 =murorum.
comatnm, *Fries, Symb. Hierac.* 148.—Mexic
Commersonii, *Monn. Ess. Hierac.* 42.—Reg. Argent.
commixtum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 20 = vulgatum.
commutatum, *Beet, ex Lindeb. in Blytt, Ntrges Fl.* ii. 677.—Europ.

HIERACITrM:—
commutatum, J. Gay, ex Monn. Ess. Hierac. 48 - pulmonarioides.
commutatum, Lindeb. in Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. X. 24 = nigrescens.
Comperianum, *Andrm. Rys Botan.* it (1830) 27.—Ross, austr. occ
compositnm, *Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr.* 478.^Mont. Pyren.
concinnum, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 17 - boreale.
confertum, Jord. ex Nym. Consp. 443 = vulgatum.
confusum, Jord. 1. c. 440, 443 - virosum, vulgatum.
conieum, Arv.- in Bull. Soc. Dauph. (1880) 290 = lycopsifolium.
conjugatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 413 —murnrum.
consociatum, Jord. in Bor. 1. c 400=vulf;atum.
conspicuum, Jord. in Bor. 1. c. 893-boreale.
constrictum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 289—Europ.
contiguum, Juratz. ex Nym. Consp. 445 = canescens.
contrmersum, Timb. in Mem. Acad. Toulouse, Sér. IV. vi. (1856) 128 = sabaudum.
convenarum, *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* ii. (1874) 463.—Europ.
conycaefolium, Roth, Tent Fl. Germ. ii. II. 269 - Crepis blattarioides t
conymaefolium, Gouan, Illustr. 59 - Crepis grandiflora.
conygoideum, Lam. Fl. Fr. ii. 97 - Crepis grandiflora.
corconticum, *K. Knaf, ex Čelak. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiii. (1883) 79.—Europ.
cordatum, Scheele, ex Costa, Fl. Catal. 158-Pseudo-Cerinthe.
cordifolium, Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Pyr. 128 - compositum.
cordifolium, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 73-Crepis pygmaea.
coriaceum, *Martr. Fl. Tarn,* 428.—Europ.
coriaceum, *Scheele, ex Willk.* b* *Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 269.—Hispan.
coronopifolium, Bemh. ex Homem. Hort. Hafn. 970 — umbellatum.
corrjigatum, *Jeanb. V Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* vi. (1888-84) 194.—Europ.
corruscans, *Fries, Symb. Hierac.* 62.—Mont. Pyren.
corsicum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 762 - cerinthoides.
corymbosum, Fries, Symb. Hiercc. 186 - H. Eupatorium.
corymbosum, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 680 - • boreale.
corymbosum, Pen. Syn. ii. 874-virosura.
corymbuliferum, Vukot. in Rad J-ugos. Akad. Zagreb. xxxiv. (1876) 16=sabaudum.
corymbulosum, Gremli, Excurs. Fl. Schw. ed. II. 264 = praealtum.
Costae, Scheele, in Linnaea, m i l (1863) 686 - pyrenaicum.
cotoneifolium, Froel. in DC. Prod. vii. 210 - vallisiacum.
cotoneifolium, Gerh. ex Froel. 1. c. 226 - sabaudnm.
cotoneifolium, *Hurt. Par. ex Lam. Encyc.* ii. 367.—Europ.
crassicaule, Steud. Nom. ed. II. i. 7«2-sabnudum.
crassifolium, *Bernh. ex Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 155—Hah I
crassifolium, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. i. 762 = vilfosum.
crassifolium, Schult. Obs. Bot. 165 - graminifolium.
crassisetumx.Nteg. 8c Peter, Hierac. 502.—Europ.
crepidineum, Froel. ex DC. Prod. vii. 242 - Nabalus crepidineus.
Crepidispermum, *Fries, Symb. Hierac.* 146.—Mexic.
crinigerum, Fries, 1. c. 94=pallidum.
crinigerum, *Jeanb. V Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Math. Toulouse,* iii. (1875-78) 610.—Europ.
crinitum, Frits, ex Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 266 — pyrenaicum.
crinitum, Jan, ex Froel. in DC. Prod. vii. 232 - symphitiiolium.
crinitum, *Sibth.* b* *Sm. Fl. Grate. Prod.* ii. 134.—Sicil.; As.Min.
crinitum, Tenore, ex Monn. Ess. Hierac. 42—compositum.
crispatum, Jord. in Billot, Annot 129 - andryaloides.
crispum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 488-mixtum.

HIERACIUM :—
crissaloHnse, Boiss. *Be* Rent, ex Nym. Consp. 440 = prenanthoides.
croatieum, LapeyT. Hist. Abr. PI. Pyr. 475=cerinthoidcs.
croaHcum, Rostk. & Schmidt, Fl. Sedin. 322 = saxetanum.
croatieum, Schloss. ex Nym. Consp. 489 «> boreale.
croatieum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 78=racemosum.
croatieum, Waldst. *Sc* Kit. PI. Rar. Hnng. iii. 242. t. 218-Crepis succisaefolia.
crocatum, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 825 = Crepis Pallasii.
crocatum, *Fries, Symb. Hierac.* 188.—Europ.; Reg. Himal.
crocatum, Wimm. Fl. Schles. ed. III. (1857) 315 = gothicum.
croceum, Lam. Encyc. ii. 860 = Crepis Pallasii.
cruentum, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 18=vulgatum.
Csereianum, Banmg. Enum. Stirp. Transs. iii. 20 = glabratum.
eurvidens, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 18 = boreale.
cuspidatum, Jord. in Bor. fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 896 =tridentatum.
enspidatum, *Lindeb. in Bot. Notiser* (1878), 184.—Europ.
cuspidatum, Scheele, ex Costa, Fl. Catal. 158 = Pseudo-Cerinthe.
cyclophyllum, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Tonlouse, iii. (.1875-76) 602=alatnm.
cydonaefolium. Fries, Summa Veg. Scand. 7=dovrense.
cydoniaefolium, Froel. in DC. Prod. vii. 212 = juranum.
cydoniaefolium, Tauscb, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 75 • bohemicum.
cydoniaefolium, *Vill. Hist. PI. Dauph.* iii. 107.—Europ.; Reg. Caucas.
cydoniaefolium, Willd. Enum. Hort. Berol. 821 = strictum.
cymiflorum, *Naeg.* &" *Peter, Hierac.* 424.—Enrop.
cymigerum, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1384 = cytnosutn.
cymosiforme, *Froel. in DC. Prod.* vii. 207.—Palatinat.
cymosum, Leers, Fl. Herboro. ed. II. 175=praealtum.
cymosnm, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1126.—Europ. med.
cymosum, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 810=-glomentum.
cymosum, Vill. Voy. 62. t. 4. f. 2=sabinum.
cymosum, Willd. Sp. PI. iii. 1566 = pratense.
cynoglossi/olium, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 611 = lasiophyllum.
cynoglossoides, *An. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 68.—Am. bor. oca
Csereianum, Nym. Consp. 450, sphalm., vide *Csereianum.*
dacicum, *Uechtrits, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1876) 214.—Transsylv.
danubiale,¥om<&, Hist. PI. Palat. ii. 885=Leontodon hastilis.
dasycepkalum, Froel. in DC. Prod. vii. 284=Liottardi.
dasypodum, Jord. ex Nym. Consp. 448 = amplexicaule.
dasytrichum, *Am. in Bull. Soc. Dauph.* (1880; 283.—Europt
deUle, *Fries, Epicris. Hierac.* 146.—Ecuador.
debile, Rehm. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 184 —alpinum.
decipiens, *Monn ex Froel. in DC. Prod.* vii. 230.—Europ.
decipiens, Nym. Consp. 449-anglicum.
decipiens, Tauscb, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 66 = nigrescen6.
' decolorans, *Fries, Symb. Hierac.* 21.—Europ.; Sibir.
decrescens, Knaf, ex Nym. Consp. 441 = gothicum.
Delasorii, Lagg. ex Nym. 1. c. 450 = saxetanum.
densicapillnm, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 446.—Europ.
densiflorum, Tauscb., in Flora, xi. (1828) I. Erg. 59 = H. Auricula ?
dentatum, *Hoppe, in Sturm, Deutsck. Fl.* Heft 89.—Enrop.
dentatum, Lagg. in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 72-= scorzoneraefolium. *La Soie.*
denticulatum, Sm. Engl. Bot. t. 2122 = strictum.
denudatum, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyr. 473 = pyrenaicum.
denudatum, Rochel, ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. ii. 437=bupleuroides.

HrEHACIUM :—
depauperatum, Jord. Obs. PI. Crit vii. (1849) 38 = boreale.
depilatum, Almq. in Bot. Notiser (1867), 68-lingulatum.
Deseglisei.JmAM Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 892 = umbellatum.
Dewari, *Boswell, [Syme] in Trans. Soc. Bot. Edinb.* xiii. (1879) 211.—Brit.
diaphanoides, Lindeb. in Bot. Notiser (1882), 127 = murorum.
diaphanum, Arv. in Soc. Dauph. Exch. PI. iv. (1877) 105 — vulgatum.
diaphanum, *Fries, Nov. Fl. Suec.* ed. I. 75; *ex ej. Afant.* ii. 45.—Scandinav.
dichotomum, Fries, ex Nym. Consp. 454-=cemuum.
dichotomum, *Y. F. Gmel. Syst.* 1179.—Sibir.
dichotomum, Roxb. ex DC. Prod. vii. 181—= Launaea asplenifolia.
dicranocaule, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. Ii. (1880) 42 = vulgatum.
diffusum, Froel. in DC. Prod. vii. 222 = politum.
dimorphoides, *Norrl. ex Wainio, in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* iii. 65.—Fennia.
dimorphum, *Norrl. in Notis. Sällsk. Faun, et Fl. Fenn.* II. viii. 132.—Fennia.
dinaricum, *Fries, Epicris. Hierac.* 106.—Enrop.
dinothum x , Naeg. & Peter, Hierac. 508.—Europ.
discolor, Kit in Linnaea, xxxii. (1863) 417-=stoloniflorum, *Waldst. (f Kit.*
dissidens, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 408 = vulgatum.
dissitum, Verlot, ex Nym. Consp. 438 = borenle.
divarieatum, Fries, Epicris. Hierac. 78 = pilosissimum.
divaricatum, Scheele, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 269 = prenanthoides.
divergens, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 411 = murorum.
divisum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 21 = vulgatum.
djimilense, *Boiss. b" Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 877. —As. Min.
Dollinerii, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 443 = fasciculare.
dovrense, Engl. ex Nym. 1. c.» silesiacum.
dovrense, *Fries, Symb. Hierac.* 128.—Scandinav.
dovrense, Lindeb. ex Nym. Consp. 439 = truncatum.
dryadeum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 890 =• umbellatum.
dryophilum, Jord. 1. c.=umbellatum.
dubium, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. i. 867; iii. 99; Leers, FL Herborn. ed. II. 174 = H. Auricula.
dubium, Hartra. Handb. Skand. Fl. ed. III. 185 = pratense.
dubium, Hoppe, ex Froel. in DC. Prod. vii. 201 = sphaerocepnalum.
dubium, *Linn. Sp. PI.* 800.—Enrop. bor.
dubium, Tausch, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 261-H. Pilosella.
dubium, Vahl. ex Steud. Norn. ed. II. i. 762 = praealtum.
dubium, Woodw. in With. Arr. Brit. PI. ed. III. iii. 684 = stoloniflorum, *Waldst. & Kit.*
dnmosum, *Jord. Gr. Jard. Gren.* (1849) 18.—Gallia.
dunense, Reyn. ex Hall, Fl. Belg. i. 566=.umbellatum.
duplex x, Naeg. & Peter, Hierac. 386.—Europ.
dyscolum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 891 = umbellatum.
echioides, *Lumnits. Fl. Poson.* 848.—Europ.; As. bor.
editum, jord. ex Nym. Consp. 488=boreale.
elatum. *Fries, Symb. Hierac.* 167.—Europ. med.
elatum, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 880 =juranum.
elatum, Lindeb. in Bot. Notiser (1878), 182 = decolorans.
elegans, *Lindeb. I. c.* (1872) 121.—Europ.
elegans, Reichb. ex Nym. Consp. 451 = praealtum.
elisum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 287° alpinum.
ellipticum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1843), 21 = vulgatum.
elongatum, Bot. Helv. ex Fries, Symb. Hierac. 61 = valdepilosum.
elongatum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 476-Neo-Ceiinthe.
elongatum, Thorn, ex Fries, Symb. Hierac. 62 = Candollei.
elongatum, Un. Itin. Essling. (1830); ex Froel. in DC. Prod. vii. 216—compositum.

HIEEACITJM :—
elongatum, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 229-villosum.
emarginatum, *Scheele, in Linnaea,* xxxii. (1863) 660.—Enrop.
eminensx, Naeg. & Peter, Hierac. 320.—Europ.
Engleri, Uechtritz, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 293=silesiacum.
epimedium, *Fries, Epicris. Hierac.* 103.—Europ.
erianthum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 4.—Am. austr.
erioeaule, Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 46 = transsilvanicum.
eriocephalnm, *Wedd. Chlor. And.* i. 226.—Ecuador.
eriocerinthe, Fries, ex Nym. Consp. 448=compositum.
eriopheion, Schur, Enum. PI. Transs. 396=rotundatum.
eriophorum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 47* •* sabaudum.
eriophorum, Schur, Enum. PI. Transs. 395=rotundatum,
eriophorum, *St. Amans, in Bull. Soc. Philom.* (1809) 26. t. 2. f. 1.—Gallia.
eriophyllum, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 286.—Hab.?
eriophyllum, Schur, Enum. PI. Transs. 395-rotundatum.
eriophyllum, Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869)77=lanatum.
eriophyllum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 64-villosum.
eriopsilon, Jord. in Billot, Annot. 128=andryaloides.
eriopus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 106" crinitum.
erubescens, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 398 •* vulgatum.
erythropodum, *Uechtr. ex Velen. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiii. (1883) 391.—Europ.
erythrospermum, Greene, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Ami. n. 429 = Fendleri.
etichaetium, *Naeg.* &" *Peter, Hierac.* 764.—Europ.
Eupatorium, *Griseb. in Goett. Abh.* v. (1853) 131 —Enrop. bor.
eurylepium, *Naeg. & Peter, Hierac.* 247.—Enrop.
eurypus, *Knaf, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1876) w —Europ.
exclusum, *Rehm. I. c.* xxiii. (1873) 109.—Europ.
eximium, *Bacih. Monog. Hierac.* 20.—Europ.
exoterieum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. »» =• murorum.
extensum, Luebeck, ex Lindeb. in Hartm. HandB-Skand. Fl. ed. XI. 42 - pallidum.
fagicolum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. murorum.
falcatum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 282 = bupleuroides.
falcidens, Arv. ex Lamotte, Prod. ii. 481 - cerinthe.
falUrinum, F. W. Schultz, Fl. Pfalz, 277 - H. Pilosella.
fallax, Froel. in DC. Prod. vii. 205 = praealtum.
fallax, Willd. Enum. Hort. Berol. 822=dubium.
fallens, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. rourorum.
fariniferum, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 865.—Armenia.
farinosum, Lam. Fl. Fr. ii. 94 = glaucum.
farinuleutum, Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) 1** lasiophyllum.
farinulentum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (18*8) pictum.
fasciculare, *Fries, Epicris. Hierac.* 100.—Enrop-
fasciculatum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 504*ca> dense.
fasciculatum, Torr. ex Froel. in DC. Prod. vii. •»' scabrum.
fastigiatum, Fries, Symb. Hierac. 119 = vulgat
fastigiatum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg- praealtum.
fastigiosum, Gremli, Excurs. Fl. Schw. ed. U- praealtum.
Favrati, Muret, ex Gremli, 1. c. 273 - folium.
Favrei, Wolf, in Bull. Soc. Murith. x. (1881) 21> = race.?
Fendferi, *Sch. Bip. in Bonplandia,* ix. (18«1) Am. bor. occ.
fennicum, Norrl. ex Wainio, in Meddel. Soc. Fenn. lit. (1878; 65—suecicum.

HEBRACTTTM :-
festinum, Joid. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 899= vulgatum.
fictum, Jord. in Bor. 1. c. 408=vnlgatum.
filiferum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 59 = praealtum.
filiformе, ***Lindeb. in Hartm. Handb. Stand. Fl.*** **«d. X.** 31.—Europ.
filifonne, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 560.—Ins. Manrit.
finalense, *Naeg. V Peter, Hierac.* 269.—Europ.
finitimum, Jowl, in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 898- vulgatum.
firmatum, Jord. 1. c. 894-tridentatum.
firmum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 22= tridentatum.
fissifolium, Jord. in Bor. Fl.Cent. Fr. ed. III. ii. **414** = murornm.
fistulosum, ***Lindeb. in Hartm. Handb. Stand. Fl.*** ed. XI. 57.—Kurop.
flaccidum, ***Fries, in Oefver. Vet. Akad. Foerhandl.*** *Stockh.* (1856) 145.—Bras.
flagellare, Reichb. Fl. Saxon. 178 - stolonifloram, ***Waldst. V Kit.***
flagellare, Schur, Ennm. PI. Transs. 881-brachiatntn.
flagellare, Willd. Ennm. Hort. Berol. Snppl. 54 = H. Pilosella.
flagelliferum, Ravand, in Soc. Dauph. Exch. PL «v. (1877) 117= boreale.
flagelliflorumx, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 787.—Enrop.
flagellosum, *Jord. ex Martr. Fl. Tarn,* 452.—Europ.
flammeum, ***Lindeb. in Hartm. Handb. Skand. Fl-ed.*** X. 20.—Europ.
flexicauU, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 66 = murorum.
flexuosum, Balb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 768-dentatum.
flexuosum, DC. Fl. Fr. vi. 486=glabratum.
flexuosum, Gaud. Fl. Helv. v. 95=cerinthoides.
flexuosum, J. F. Gmel. Syst. 1179 = incertum.
flexuosum, Hort. Taur. ex Froel. in DC. Prod, VIL 212 "=speciosnm.
flexuosum, Lapeyr. Hist. Abr. PL Pyren. 475 - Perusianum.
flexuosum, *Martr. Fl. Tarn,* 483.—Gallia.
flexuosum, Schleich. ex Steud. Nom. ed. 1. *Wl* = villosum? *Waldst. & Kit. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1881. "—Europ.
floccosum, Bab. Man. Brit. Bot. ed. V. 205=flocculosum.
floccosum, Schur, Enum. PI. Transs. 888 = flexuosum, ***Waldst. if Kit.***
flocculosum, *Backh. Mon. Hierac.* 60.—Europ.
florentinum, All. Fl. Pedem. i. 218-piloselloides.
florenHnum, Laseh. ex Nym. Consp. 453=«H. Auricula.
florentinum. Sprang. Fl. Hal. 222. t. 10. f. 1 "= altorn
flo scuu£um? *Hornem. Hort. Hafn.* 760.-Hab.?
"minensc, *Kern, in Oestr. Bat. Zeitschr.* xxiv. (1874) 171.—Eu
foecundum l^oA. ex Steud. Nom. ed. II. i. 76S=radicans.
foecundum, Jord. ex Nym. Consp. *« vol « at um
foeniculaceum, Wulf. ex Steud. Nom. ed. II. i. 7SS
Crepis S & Sm. Graec viii. 74. t 799
Crepis Sibthor R a d Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) = Crepis foetida..
foetidum, Willd. Sp. PI. iii. 1575 = Crepis foetens.
foliosum, Steud. Nom. ed. I. 407= Gronovii.
foliosum, *Waldst. (f Kit. ex Willd. Sp. PI.* *Bar. Hung.* ii. 155. t. 145.-Europ. or.; Reg. Caucas.
Forskolii W, Froel. in DC. Prod. vii. 228=boreale,
fragile, ***Banks V Soland. ex Hook.f. Fl. N. Zel.*** **1.153.** —N. Zel.
fragile, *Obs. PI. Crit.* vii. (1849) S4.-Gallia; Hispan.
C?*"*. Sch. Bip. Cich. 34 = H. Pilosella.
*Kvnianum, Krf». *in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiu. /.1883)889.-Europ.
*"•«•. Fries, ex Nym. Consp. **440** = crocatum.

HIBRACITJM :—
Friesii, Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. IV. 257 = rigidmn.
Friesii, Sch. Bip. in Bonplandia, ix. (1861) 326 = Schultzii.
frigidarium, *Naeg. V Peter, Hierac.* 656.—Europ.
frigidum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) II. 112 = Crepis chrysantha.
frigidum, *WedcL Cklor. And.* i. 225. t. 42.—Venezuela ; N. Granat.
Fritzei, *F. Schultt, in Flora,* Iv. (1872) 281.—Enrop.
Friwaldii, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 94 =pannosum.
Froelichianum, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi = macilentum.
Froelickii, Fries, Epicris. Hierac. 146-macilentum.
Froelichii, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 592=cerinthoides.
fruticetorum, Jord. in Bor. Fl.Cent. Fr. ed. III. ii. 384 = boreale.
fruticosum, Willd. Sp. PI. iii. 1691=Tolpis fruticosa.
fulgens, *Naeg. V Peter, Hierac.* 849.—Europ.
fulgidum, ***Heynh. ex Reichb. f. lc.Fl. Germ.*** **xix. 65.—** Hab.1
fulgidum, *Krock, Fl. Sties. Suppl.* ii. 258.—Europ.
fuliginatum, Wallr. ex Nym. Consp. 441=gothicum.
fuliginatum, Huter, ex Nym. Consp. 452 - subnivale.
fuliginosum, Anderss. ex Fries, Symb. Hierac. 105 = stratum.
fulmcapillum, Link, Handb. i. 801 = H. Pilosella.
fulvipes, *Wedd. Chlor. And.* i. 224.—Bolivia.
furcatum, Hoppe, in Flora, xiv. (1831) I. 181- sphaerocephalum.
furcellatum. Fries, Symb. Hierac 102-onosraoides.
Furcellum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 656.—Europ.
furdllatum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 418 = murorum.
furruricollum, *Jord. ex Matr. Fl. Tarn,* 439.—Enrop.
fuscidulum, Jord. ex Nym. Consp. 439=boreale.
fnscoatrum, *Naeg. & Peter, Hierac.* 815.—Europ.
fuscum. Fries, ex Nym. Consp. 453 = Blyttianum.
fuscum, Vill. Voy. 19. t. 1 = aurantiacum.
Fussianum, Schur, Enum. PI. Transs. 384 - piloselloides.
galacturam, ***Norrl. ex Wainio, in Meddel. Soc. Faun.*** *et Fl. Fenn.* iii. 65.—Fennia.
gallicum, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 19= boreale.
Ganderi, Hausm. ex Nym. Consp. 443 = fasciculare.
Ganderi, Huter, ex Nym. 1. c 440 = cydoniaefolium.
Garckeanum, Aschers. Ind. Sem. Hort. Berol. (1869) 24; et (1872) App. 8 = tridentatum.
Garibaldianum, *Fries, Epicris. Hierac.* 111.—Italia.
Gaudini, Christen. Hierac. Schweiz. 10 = dentalum.
Gaudryi, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. iii. 105 = pannosum.
Gautierianum, ***Jeanb. V Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys.*** *Nat. Toulouse,* vi. (1883-84) 201.—Europ.
gentile, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 415 = murorum.
georgicum, Fries, Epicris. Hierac. 106 = Crepis glabra
germanicum, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 728.—Europ,
Gibsoni, Backh. Mon. Hierac. 47 = caesium.
glaberrimum, Spreng. Syst. iii. 643-gTaminifolium.
glabratnm, *Hoppe, ex Willd. Sp. PI.* iii. 1562.—Europ.
glabratum, Schleich. ex Koch, Syn. Fl. *Qam.* ed. I. 454 =glanduliferum.
glabratum, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 228- villosum.
glabrum, Hoppe, ex Steud. Nom. ed. II. i. 763 = villosum.
glabrum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 423.—Europ.
glabrum, *Krock. Fl. Sites,* ii. II. **316.—**Europ.
glabrum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1888) 96 ; xxi. (1848) H. 103=Taraxacum glabrum.
glaciate,C. Koch,in Linnaea, xxiii. (1850) 677 - sphaerocephalum.
glaciale, ***Reyn. ex Lachen. in Nov. Act. Helv.*** **i. (1787)** 305.—Europ.
gladellum, *Naeg. tf Peter, Hierac.* 269.—Europ.
gladiatum, *Martr. Fl. Tarn,* 435.—Europ.
glanduliferum, ***Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl.*** **Heft** 39.—Europ.
glandulosum, Schult. Obs. Bot. 166- Crepis grandiflora.
glareosum. Series, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1865) 224 • rigidum, tridentatum.
glasHfolium, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 768 = viliosum.
glaucellum, Lindeb. in Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. X. 27=vulgatnm.

HrEBACIUM:—
glaucescens.Btss. Prim. Fl. Gall. ii. 150-H. Auricula.
glaucescens, Froel. in DC. Prod. vii. 202 = praealtum.
glaucescens, Hort. Landsh. ex Froel. 1. c. 203—pratense.
glaucifoliura, *Poepp. ex Froel. 1. c.* 807.—Chili.
glaucinum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 22 = fragile, *Jord.*
glaucophyllum, Huet, ex Nym. Consp. 450 = glabratum.
glaucophyllum, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1863) 659 = Pseudo-Cerinthe.
glaucophyllum, Schur, Enum. PI. Transs. 386= subfuscum.
glaucopsis, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 855 = saxctanum.
glaucovirens, ***Jeanb. tr~ Timb. in Bull. Soc. Phys. Nat.*** *Toulouse,* vi. (1883-84) 191.—Europ.
glaucum, *All. Fl. Pedem.* i. 214.—Europ. austr.
glaucum, Alsch. Fl. Jadr. 202 ; ex DC. Prod. vii. 169 = Crepis heterogyna.
glaucum, Lej. FI. Spa, ii. 189=prasinnm.
glaucum, Schleich. ex Monn. Ess. Hierac. 14 = graminifolium.
glaucum, Vill. Hist. PI. Dauph. lit 116 - politum.
glaucum, Wahlenb. Fl. Carp. 241=bupleuroidcs.
globosum, Backh. Mon. Hierac. 25 = nigrescens.
globosum, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 398.—Hab. >
globuliferum, Tausch, ex Steud. Nom. ed. II. i. 763 = piloselloides.
glomeratum, Fries, Summ. Veg. Scand. 5S3=dubium.
glomeratum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 207.—Europ.
glumaceum, *Fries, Epicris. Hierac.* 141.—Ind. or.
glutinosum, *Linn. Sp. PI.* 804.—Gallia.
Gmelini, Linn. 1. c. 802 = Crepis Gmelini.
Gmelini, Schreb. ex Froel. in DC. Prod. vii. 168 = Crepis Setueberi.
Gmelini, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 687 = Pterotheca biftda.
gnaphaloides, *Art. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 286. —Europ.
Gochnati, C. A. Mey. Vera. PH. Cane. 59 -pratense.
Gochnati, Spreng. Syst. iii. 639 - praealtum.
Godeti, Christen, ex Gremli, Beitr. 94-Jacquini.
Godronianum, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 588 -cerinthoides.
gombense, Lagg. ex Christen. Hierac Schweiz. 19 *(gombesne)* - anglicum.
gothicum, *Fries, Symb. Hierac.* 121.—Scandinav.
Gouani, *Hegetschw. Fl. Schm.* '/si6.—Europ.
Gougetianum, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 368-iinglicum.
gracile, Froel. in DC. Prod. vii. 231-macilentum.
gracile, *Hook. Fl. Bor. Am.* 1. 298.—Am. bor. occ.
gracilentum, Backh. Mon. Hierac. 24 = nigrescens.
gradliscapum, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 446=tomentosum.
graecum, *Boiss.* 6* *Heldr. Diagn.* Ser. II. iii. 101.— Graecia.
graminifolium, ***Gaud, in Nat. An*. Schw. Ges.*** **iv.** (1820) 43.—Europ.
graminifolium, Vukot. in Rad Jngos. Akad. Zagreb. vii. (1869) 74 = porrifolium.
grandidentatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 383 = sabaudum.
grandiflorum, All. Fl. Pedem. i. 217 = Crepis grandi. flora.
grandifolium, Arr. in Soe. Dauph.Exch.PI. iv. (1877) 106=hemiplecum.
grandifolium, ***Sch. Bip. in Bull.Soc. Bot.Fr.*** **ix. (1862) 440.—**Algeria.
graniticum, Sch. Bip. Cich. 23-lasiophyllum.
graveolens, Froel. in DC. Prod. vii. •21!) = saxetanum.
Greenei, ***A. Gray, in Proc. Am. Acad.*** **xix. (1883) 69.** —Calif.
Grenierl, *Scheele, in Linna'a,* xxxii. (1863) 688.— Europ.
Grenieri, Timb. & Jeanb. in Bull. Soc Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxiii-cerinthoides.
Griseba hii, ***A. Kern. Sched. Fl. Exsicc.*** **i. 63.—** Europ.
Gronovii, *Linn. Sp. PI.* 802.—Am. bor.
Gronovii, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 217 = venosum.
Guthnikianum, *Hegetschw. Fl. Schw.* **781.—**Europ.
gymnocephalum, ***Griseb. ex Pant, in Oestr. Bot.*** *Zeitschr.* xxiii. '1873) 266.—Montenegro.

HXER&dlTTM:—
hadrocaulon x, Naeg. & Peter, Hierac 680.—Europ.
halimifolium, Froel. ex Fries, Epicrii. Hierac 186—umbellatum.
Halleri, Hook, in Cut. FL Lond. v. 208. t. 215 = anglicum.
Halleri, Vill. Hist PI. Dauph. iii. 104-alpinum.
hamadanense, *Heimerl, in Denkscкr. Acad. Wien,* I. (1885) 68.—Persia.
Hartwegii, Sch. Bip. ex Fries. Epicris. Hierac. 147 = erianthum.
Hausmanni, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xU. 53=stoloniflorum, *Waldst. V Kit.*
Hausmanni, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 489—rigidum.
bedypnoidcs, *Linn. Sp. PI.* 800.—Europ.
Heldreichii, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 102.—Graecia.
Helenium, *Dichtl. V Wiesb. in Deutsche Bot. Monatsschr.* ii. (1884) 66.—Austria.
helianthifclium, Froel. in DC. Prod. vii. 225 = canadense.
helveticum, *Bruegg. ex Dalla Torre, Atl. Alpenfi.* 149.—Europ.
helveticum, Suter, Fl. Helv. ii. 151 = glabratnm.
hemiplecnm, *Am. in Soc. Dauph. Exch. PL* iv. (1877) 105; *Bull. Soc. Dauph.* (1880) 288.—Europ.
Herculis, Borb. ex Nym. Consp. 452 = sabinum.
heteranthum, Wall. Cat. n. 3258-Lactuca Dubyaea.
heterodon, Alt. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 285 «• humile.
heterodoxum, Steud. Nom. ed. II. i. 763=setigerum, *Tausch.*
heterogynum, Froel. ex Nym. Consp. 450=stupposnm.
heterophyllum, Bladon, in Phytol. ii. (1847) 961-boreale.
heterophyllum, Retz. Obs. ii. 24 = Lactuca repens.
heterophyllum, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. vii. (.1869) 69-Crepis biennis.
heterosp'rmum, *Are. in Bull. Sac. Dauph.* (1880) 290.—Europ.
Heuffelii, Janka, ex Nym. Consp. 452 = sabinum, petraeum.
Hinterhuberi, Sch. Bip. ex Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) 88 = aurantiacum.
hirsutissimum, *Krock. Fl. Sites,* ii. II. 306.—Europ.
hirsutnlum, *Jord. ex Bar. in Mlm. Soc. Acad. Maine-et-Loire,* vi. (1859) 110.—Europ.
hirsutnm, *Bernh. ex Steud. Nom.* ed. I. 407, nomen; *Tausch, in Flora,* xi. (1828) I. *Erg.* 72.—Am. bor.; Pyren.
hirsutum, Lapeyr. ex Fries, Symb. Hierac. 65 = phlomoides.
hirsutum, Schur, Ennm. PI. Transs. 399= boreale.
hirsutum, Sesse & Moç. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 175 = strigosum.
hirtellum, *Lindeb. in Hartm. Handb. Siand. Fl.* ed. XI. 56.—Europ.
hirtnm, *Froel. in DC. Prod.* vii. 213.—Europ.
hirtum, Poir. Encyc. Soppl.ii. 564=scabrum.
hispidum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 165 = Lactuca Dubyaea.
hispidum, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 216=boreale.
hispidum, Fries, Symb. Hierac. 168 = Bocconei.
hispidum, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 69 = Crepis setosa.
hololeion, *Maxim. Prim. Fl.Amur.* 182.—Reg. Amor.
holosericeum, Backh. Mon. Hierac. 19 = alpinum.
Hookeri, Steud. Nom. ed. II. i. 763=gracile.
Hoppeanum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 232.—Europ.
Hoppeanum, Schult. Oesterr. Fl. el. II. ii. 428 = H. Pilosella.
Hoppeanum, Wallr. ex Nym. Consp. 444 - murorum.
horrensx, Naeg. & Peter, Hierac. 760.—Europ.
horridulumx, Naeg. & Peter, 1. c. 761.—Europ.
borridum, *Fries, Epicris. Hierac.* 154.—Calif,
hortulanum, *Naeg.* b" *Peter, Hierac.* 596.—Europ.
humi/usum, Spreng. Fugill. ii. 76-glaucum.
humile, *Jacq. Hort. Vindob.* iii. 2, in obs.; *Host, Syn. Fl. Austr.* 432.—Europ.
Aumifc, Lapeyr. Hist. Abr.Pl. Pyr. 471 = amplexicaule.
Huteri, Hausm. ex Nym. Consp. 441 = picroides.
hybridum, *Chaix, in ViU. Hist. PL Dauph.* iii. 100.—Europ. med.
hybridum, Gaud. Fl. Helv. v. 74 = brachiatum.
hybridum, Griseb. in Goett Abh. v. (1853) 87 - sphaerocephalum.
hyoseridifolium, Vill. ex Pen. Syn. ii. 370-Crepis hyosendifolia.

HIBRACrrjM:—
hyperboreum, *Fries, Symb. Hierac.* 28.—Norveg.
hypeuryum, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 178.—Europ.
hypochaerideum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 287 = alpinum.
Hypochaeridis, Fries, Symb. Hierac. 113=caesium,
ignatianum, *Baker, in Mart. Fl. Brat.* vi. III. 387.—Bras.
ilicetorum, Jord. ex Nym. Consp. 439 =umbellatum.
illegitimum x, Naeg. & Peter, Hierac 734.—Europ.
illyricum, *Fries, Epicris. Hierac.* 71.—Europ.
imbricatum, *Lindeb. in Bot. Notiser* (1878), 188.—Enrop.
inapertum, Koel. ex Steud. Nom. ed. II. i. 764-alpinnm.
incanum, *Bieb. Fl. Tour. Cauc.* ii. 258.—Reg. Caucas.
incanum, Linn. Sp. PI. 799 =Leontodon incanus.
incanum, Poll. Hist. PI. Palat ii. 383=Leontodon hispidus.
incanum, Steph. Fl. Mosq. n. 523; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 780 = Leontodon hastilis.
incamatum, Jacq. Coll. ii. 127=Crepis incamata.
incertum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 236.—Sibiria.
incertum, Urv. in Mém. Soc. linn. Par. iv. (1826) 608 =Erigeron Sulivani.
incisifalium, Jord. in Bor. FL Cent. Fr.ed. III. ii. 409 — vulgatum.
incisum, *Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl.* Heft 39.—Europ.
incisum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 457 = muroram.
incrassatum, Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 72 = Crepis montana.
indolatum, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 385 = boreale.
ineptum x, Naeg. & Peter, Hierac. 897.—Europ.
inops x, Naeg. *8c* Peter, 1. c. 674.—Europ.
inquinatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 404 — vulgatum.
insidiasum, Jord. ex Nym. Consp. 440 = cydoniaefolium.
insuetum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 396 = tridentatum.
integrifolium, Hoppe, ex Willd. Sp. PI. iii. 1568-Crepis succisaefolia.
integrifolium, Lange, in Fl. Dan. t. 2661—murorum.
intermedium, Hoppe, ex DC. Prod. vii. 150=alpinum.
intermedium, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 471 = humile.
intermedium, Rehm. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 149 -pratense.
intermedium, *Vest, in Flora,* iii. (1820) 5.—Styria.
intermedium, *Zumag. Fl. Pedem.* i. 873.—Europ.
intersitum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 409 = vulgatum.
intybaceum, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 39 -amplexicaule.
intybaceum, *Jacq. Fl. Austr.* v. 52.—Europ.
Intybus, *Scheele, ex Willk. V Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 263=Neo-Cerinthe.
inuloides, Sch. Bip. Cich. Suppl. ii. 146 = H. Enpatorium.
inuloides, Tausch, in Flora, xx. (1837) I. Beibl. 71 = boreale, crocatum.
irasuense, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Videntk. Meddel. (1852) 113 = H. Lagopus.
iricum, *Fries, Symb. Hierac.* 60.—Europ.
irriguum, Griseb. ex Nym. Consp. 439=rigidum.
italicum, Fries, Symb. Hierac. 124 — crinitum.
Jaborneggii, *Packer, in Jahrb. Landesm. Kaernt.* xv. (1882) 179.—Europ.
jacobaeaefolium, Froel. in DC. Prod, vii 223 = tridentatum.
Jacquini, ViU. Hist. PI. Dauph. iii. 123=humile.
Jankae, Boiss. ex Nym. Consp. 441 = olympicum.
Jankae, *Ueckirite, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. ^1873) 239.—Europ.
Janus, Gren. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 373 = murorum.
japonicura, *Franch. & Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 41/.—Japon.
Jaubertianum, Bill, ex Nym. Consp. 444-bifidum.
Jaubertianum, Timb. & Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 507-caesium.
javanicum, Burm. f. Fl. Ind. 174 -Prenanthes javanica.
Jeanbernati, Timb. in Bull. Soc. Sc Pfays. Nat Toulouse, iii. (1875-76) 613 = incisum.
jubatum. *Fries, in Oefver. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh.* (1856) 146.—N. Granat

HIBSACIUH:—
junceum, Bernh. Syst. Verz. Erf. 187 - Chondrilla juncea.
junceum, *Fries, Symb. Hierac.* 144.—Mexic.
juranum, *Fries, 1. c.* 129.—Europ. austr.
juranum, Rapin, Guide Bot. Canton du Vaud, 212 - decipiens.
jurassicum, Griseo. in Goett. Abh. v. (1858) 112" juranum.
kajanense, *Malmgr. in Notis. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. Förh.* Ser. II. *Haeft.* iii. (1861) 19, '» nota.—Fennia.
kalksburgense, *Dichtl. in Deutsche Bot. Monats.* «• (1884) 65.—Europ.
Kalmii, Linn. Sp. PI. 804 *(=Pachylepis Kalmii).*—Am. bor.
Kalmii, Spreng. Syst iii. 646=canadense.
Kalmii, Symons, Syn. PI. 173=preuanthoides.
Kalsianum, Huter, ex Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 153-valdepilosum.
Kladnianum, Schur, Ennm. PI. Transs. 390=vulgatum.
Knafianum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 284.—Europ.
kobrinense, Gorski, ex Fries, Epicris. Hierac. 23 •» pratense.
Kochianum, *Jord. Gr. Jard. Gren.* (1849) 19.—Europ.
Kochii, *Dalla Torre, Atl. Alpenfl.* 148.—Europ.
Kokeilii, *Packer, in Jahrb. Landesm. Kaernt.* >v-(1882) 174.—Europ.
Kotschyanum, *Heuff. in Flora,* xxxvi. (1853) 618.—Transsylv.
Krameri, *Franch.* b* *Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 418.—Japon.
kravarskense, *Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb-*lviii. (1881) 164.—Europ.
laceratum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. IIL ii. 406 = vulgatum.
lacerum, *Reut. ex Fries, Epicris. Hierac.* 86.—Helvetia.
Zachenalii, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 822=vulgatum.
Lachenalii, Hort. Landsh. ex Froel. in DC. Prod, vu-221=strictum.
ladniatum, Monn. Ess. Hierac. 63=Andryala ragusin».
ladniatum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vu. (1869) 72 = Crepis hyoseridifolia.
ladniosum, Jord. Cat Gr. Jard. Dijon (1848), **' -fragile, Jord.*
Lactaris, Bertol. Amoec. Ital. 64 = umbellatum.
lactucaceum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 222.—ItaL
lactucaceum, Schrank, Baier. FL ii. 321 = Crepis praemorsa.
lactucaefolium, Arv. in BulL Soc Dauph. I(1880) 289 = lycopsifolium.
LactuceUa, Wallr. Sched. Crit. 408 = H. Auricula.
laevicaule, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848), 23* fragile, *Jard.*
laevigatum, Froel. in DC. Prod. vii. 220=boreale.
laevigatum, Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) *W* canescens.
laevigatum, Reichb. FL Germ. Excurs. 267-rigi<I<UD-
laevigatum, Sch. Bip. Cich. 27 = fasciculare.
laevigatum, Willd. Sp. PL iii. 1590=saxetanuD>.
Laggeri, Jord. ex Nym. Consp. 446 = tomentosum.
Luggeri, Sch. Bip. ex Nym. l.c 452 = sabinum.
Lagopus, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (» 176.—Mexic.
Lamotteanum, *Arv. in Lamotte, Prod. Cent-* 490.—Europ.
lamprophyllum, Scheele, in Iinnaea, xxxi. (1861-653-Neo-Cerinthe.
lampsanoides, Gouan, Illustr. 57 = Crepis sanoides.
lampsanoides, Hort ex DC. Prod. vii. 77 = grandiflora.
Lamyi, F. SchulU, in Bor. Fl. Cent Fr. ed. IB- »• -boreale.
lanatellumx, Arv. in Bull. Soc Dauph. (18B0) —Europ.
lanatum, Brat FL Lusit. i. 819-Broteri.
lanatum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 271 - P suin-
lanatum, Vill. Prosp. 85; Hist. PL Dauph. W- tomentosum.
lanatum, *Waldst. V Kit. ex Willd. Sp.Pl-* Europ.
lanceolatum, FroeL in DC. Prod. vu. 221*» us
Ianceolatum, Lapeyr. Hist. Abr. PL P>- *'

HEEHACItTM:—
lanceolatum, Koyle, ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 400 = umbellatum.
lanceolatum, Schleich. Cat. Fl. Helv. ed. III. (1815) 17 — cydoniaefolium.
lanceolatum, Tausch, ex Friei, Symb. Hierac 174 = rigidum.
lanceolatum, VilL Hist PI. Danph. iii. 128. t 33 = stnctum.
lancifolium, Jord. ex Nytn. Consp. 438 = boreale.
lancifolium, *Vukot. in Rod Jugos. Akad. Zagreb.* lviii. (1881) 167.—Europ.
Langei, *Fries, Epicris. Hierac.* 67.—Mont. Pyren.
laniferum, *Cav. Ic.* iii. 18. t. 234.—Hispan.
'anigerum, Schnr, Ennm. PI. Transs. 891 »=mororum.
Lapeyrousii, Bab. in Snppl. Engl. Bot t. 2916 - iricum.
Lapeyrousii, *Froel. in DC. Prod.* vii. 232.—Mont Pyren.
lapponicum. *Fries, Symb. Hierac.* 170.—Lappon.
largum. *Fries, Epicris. Hierac.* 127.—Hnngar.
Laschianum x, Thnem. in Bonplandia, vi. (1858) 157. —Enrop.
lasiophyllum, Bab. Man. Brit. Bot. ed. IV. 202 - pallidnm.
lasiophyllum, Hillebr. ex Nellr. Diagn. Gefaesspfl. 79 = murornm.
lasiophyllum, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 522.—Europ.
latebrosum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 400 - vulgatum.
lathraeum, *Naeg.* to" *Peter, Hierac.* 262.—Europ,
latibracteumx, Peter, in Flora, Ixiv. (1881) 124.—Europ.
latifolium, *Froel. ex Link, En-urn. Hort. Berol.* ii. 287. —Rossia; Pyren.
latifolium, Ledeb. Fl. Ross. ii. 854-foliosum.
latisqnamum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 212.—Europ.
taurinum, Arv. in Ball. Soc. Dauph. (1880) 291 = lycopsifolinm.
Lavernellei x, Timb. in Mém. Acad. Sc Toulouse, Ser. VII. ix. (1877) 136.—Europ.
Znami, Bab. Man. Brit. Bot. ed. II. 196 = anglicum.
Lansonii. Blytt, ex Fries, Symb. Hierac 88 = pallescens.
Lawsonii, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1389" lanatum.
Lawsonii, Sm. Engl. Bot t. 2083 = glabratum.
Lawsonii, Vill. Prosp. 36; Hist PI. Dauph. iii. 118 = saxatile.
laxiflorum, *Wallr. Beitr. Fl. Hereyn-* 283; *et in Linnaea,* xiv. (1840) 653.—Enrop.
JMum, *[Claim.-] Man. Herb.* 281.-Europ.
Lasergei, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat Toulouse, iii. (1875-76) 600 = hircntum...
'""com, *Boiss. &• Bal. ex Boiss. Fl. Orient,* in. 878. —As. Min.
*-"o*ianum,* AIT. in Lamotte, Prod. ii. 485 - volgatum•
Ledebourii, Gerh. ex FroeL in DC. Prod. vii. 224 = unibellatuin, lapponicum.
^*ebourii,* Mus.¥etrop. ex Fries, Symb. Hierac. 1/8 y umbellatum.
Ledebonrii, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* (1822) 67.—Rossia.
let.onense, Coss. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. u. 267 = Bourgaei.
^*frandianum,* Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxi. 1884) 186-Neo-Cerinthe.
ietocephalum, Bartl. ex Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) f«ple«roides.
*ieiP<*phalum,* Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. 3v-(1853)45-porphyriticum?
*l*opogon,* Gren. « Verlot, in Bull. Soc Stat. Isere, xiv. (1872) 396-saxetanum.
*-eniinoni, *A. Cray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1884) Arizona.
Linn. Faun. Suec ii. App. 558-Leon-
a c i .
m, *Benth. PI. Hartw.* 187.-P«OT.
m, Fries, ex Nym. Consp. 442 =juranum.
alum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. 1 »-(1876) 19-rotundatum.
S & P<*er, Hierac.* 675-Enrop.
J'Ptophyton, *Naeg. V. Peter, I. c* 642.-t«op.
Fries< Epicris
f'"•«««^/Wall.!Cat n. 3254-LactucaLessertiana.
»<»nthemum, *Wedd. Chlar. And.* i. 225.-N. Granat.

HrEBACrtTM:—
leucocephalum, *Rupr. ex Kauffm. Ind. Sem. Hort. Mosg.* (1868) 9.—Hab.!
leucocephalum, Scbnr, Enum. PI. Transs. 925, Index, sphalm., vide *leucophyllum.*
leucocephalum, Vukot ex Nym. Consp. 454 = H. Pilosella.
leucopappum, Steud. Nom. ed. I. 407 •= Crepis grandiflora.
leucophaeum, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 354 = glaucum.
leucophyllum, Schur, Enum. PI. Transs. S7S = H. Pifosella.
leucopogon, Gren. ex Bull. Soc Bot Fr. xix. (1872), Bibl. 87 —saxetanum.
leucotrichum, *Fries, in Oefoer. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh.* (1856) 144.—Bras,
libanoticum, *Boiss. V Bal. ex Boiss. Ft. Orient,* iii. 870.—Syria.
ligusticum, DeNot. ex Nym. Consp. 442 = crinltum.
Iigusticum, *Fries, Symb. Hierac.* 74.—Europ.
Lindebergii, Nym. Consp. 445 = canescens.
lineare. Stead. Nom. ed. L 407=umbellatum.
linearíae/olium, Froel. ex Steud. Nom. ed. II. i. 764 = gramtnifolium.
lineari/olium, Monn. Ess. Hierac. 64 = Andryala ragusina.
Lingenfeldii, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 444 — murornm.
lingulatum, *Backk. Man. Hierac.* 30.—Brit.
linifolium, Saelan, ex Lindeb. in Blytt, Norges Fl. ii. 662 = lapponicum.
Linnaeanum, Jord. ex Nym. Consp. 444*-murormn.
Liottardi, Koch, Syn. FL Germ. ed. I. 458 = Kochiana.
Liottardi, *Vill. Prosp.* 36; *Hist. PI. Dauph.* iii. 121. —Gallia.
lividum, Arv. in Boll. Soc. Dauph. (1880) 283- Neo-Cerinthe.
lixonense, Teanh. *Sc* Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 688 - cerinthoides.
• longifolium, *Hornem. Hort. Hafn.Suppl.* 15S.—Hab. ?
longifolium, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. III. (1816) 17 — cerinthoides.
longipes, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 680 = praealtum.
longipetiolatum, Vukot. in Rad Jngos. Akad. Zagreb. vli. (1869) 72-Crepis grandiflora.
longipilum, *Torr. ex Hook. Fl. Bor. Am.* i. 298.—Am. bor.
longiscapum, Boiss. Fl. Orient, iii. 864 = sabinum.
Lorrti, Fries, ex Nym. Consp. 450=villosum.
Lortetiae, *Bali. Fl. Lyonn.* i. I. 450.—Mons Pilatus.
Loscosianum, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1863) 608- cerinthoides.
loxense, *Benth. PI. Hartw.* 187.—Ecuador,
luddum, *Cuss. Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825) 6; *Fl. Sic. Syn.* ii. 405.—Sicilia.
lucorum, Schur, Ennm. PI. Transs. 399»horeale.
luridum, Jord. ex Nym. Conap. 438 » boreale.
lutescens, Huter, ex Favre, in Bull. Soc Murith. v. (1875) 134-picroides.
lychnioides, Arv. in Bull. Soc. Bauph. (1880) 286 = tomentosD HI .
Lychnitis, *Scheele, in Linnaea,* xxxi. (1861-62) 658.— Hispan.
lycopsifolium, *Froel. in DC. Prod.* vii. 224.—German.
lyrato-acutum, Vill. Hist. Pl. Dauph. t. 28 = humile.
lyratum, Linn. Sp. Pl. 803 = Crepis lyrata.
lyratum, Schleich. ex Froel. in DC. Prod. vii. 170 = Crepis lampsanoides.
jnacedonicum, *Boiss. V Orph. ex Boiss. Fl. Orient,* in. 872.—Macedon.
macilentum, *Fries, in Oefver. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh.* (1866) 147.-Helvetia.
macranthelum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 4(3.—Europ.
ZTcranthum, Lindeb. in Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. X. 29-norvegicum.
macranthum, Nutt. in TranB. Am. Phil. Soc. N. S. vn. 1841') 446 — umbellatam.
macranthum, Tenore. Fl. Nap. v. 190-H. Klosella'
macrocephalum, Huter, ex Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 157 — picroides.
macrolepis, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 878.—Reg. Caucas.
maWophyllum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 604 - canadense.
macrophyUum, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1863) 674 Neo-C nthe.
mTcrothyllTm, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 69=Crepis sibirica.

HIEBACITJM:—
macrothyrsum x, Naeg. ft Peter, Hierac 763.—Europ.
maciotrichum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 29.—As. Min.
maculatum, Blan. ex Nym. Consp. 444 = murorum.
maculatum, *Schrank, Baier. Fl.* ii. 319.—Europ.
maculatum, Tausch, in Flora, xL (1828) I. Erg. 70 - rigidum.
maculatum, Teesdnle, ex Tnrner & Dillwyn, Bot. Guide, 707 — vulgatum.
maculisparsum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 403 — vulgatnra.
madagascariense, *DC. ex Froel. in DC. Prod.* vii. 218. —Madag.
magellanicum, *Sch. Bip. in Flora,* xxxviii. (1856) 122. —Reg. Magell.
magistri, Godr. ex Nym. Consp. 441«ttridentatum.
magyaricum, *Naeg. W Peter, Hierac.* 666.—Europ.
Mairanum, Manuel, ex Nym. Consp. 462 = subnivale.
majellense, Huet, ex Nym. 1. c. 449— scorzoneraefolium, *Vill.*
marginatum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 220.—Hab. *1*
marianum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1672.—Am. bor.
mariolense, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxix. (1882) 122.—Hispan.
murmoreum, Janka, ex Nym. Consp. 446 = Jankae.
marmoreum, PanS. *Sc* Vis. in Mem. 1st. Venet. xii. (1864) 468 = tomentosum.
Manchallianum, *Andri. Rys. Bot.* ii. (1830) 27.—Podol.; Ucrania.
mauritianum, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 104 =Crepis mauritiana.
medelingense, *Dichtl. in Deutsche Bot. Monatsschr.* ii. (1884) 68.—Europ.
medioximum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 401~vulgatum.
medium, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 19=mnromm.
Medusae, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xx. (1862) 81.— Rumelia.
melachaetum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 58 = praeallum.
melanistum x, Naeg. & Peter, Hierac. 664.—Europ.
melanoadenum, Vukot. in Rad Jugos, Akad. Zagreb. vii. (1869) 75 = murornm.
melanocephalum, Lindeb. in Bot. Notiser (1878) 184, nomen ; et in Hartm. Handb. Skand. Fl. ed. XI. 48 — rigidum.
melanocephalum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 63 = alpinum.
melanotrichum, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiv. (1874) 170.—Europ.
melanotrychum, *Reut. in Compt.-Rend. Soc. Hallir.* (1862-53) 5 ; (1853-54) 25.—Europ.
mendax x , Naeg. *Sc* Peter, Hierac. 679.—Europ.
Mertini, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 6»l=vulgatum.
mespilifolium, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* vl880) 282. —Europ.
mexicantim, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 138—Mexic.
Michelii, Tausch, in Flora, xi. (1828) 1. Erg. 60 = piloselloides.
micradenum, *Fries, Epicris. Hierac.* 142.—N. Grannt.
micranthum, Huet, ex Nym. Consp. 458=serpyllifolium.
microcephalnm. Fries, Symb. Hierac. 174= rigidnm.
microcephalum, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 55. nomen.—Peruv.
micromrgas. Fries, Epicris. Hierac. 25 =• petraeum.
microtum, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 873.—As. Min.
Milleri, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 287.—Hab. 1
minutiflomm, *Jeanb. &* Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* iii. (1875-76) 615, nomen.—Europ.
minutum, Jeanb. & Timb. 1. c 609 -anglicum.
mirabile, *Naeg. &" Peter, Hierac.* 361.—Europ.
mixtum, *Lapeyr. ex Froel. in DC. Prod.* vii. 216.— Mont. Pyren.
mnoophorum, *Naeg.* G* *Peter, Hierac.* 767.—Europ.
Motanum, Lindeb. in Bot. Notiser (1872) 118=- murorum.
moesiacum, Kem. ex Nym. Consp. 441 — olympicum.
molle, Jacq. Fl. Austr. ii. 12 = Crepis snccisaefolia.
molle, Lachenal, in Nov. Act. Helv. i. (1787) 298 — juranum.
molle, Pall. Tabl. Taur. 57 - echioides.
molle, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 503-vulgatum.
mollitum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 282 — Kurop.
monacense X, F. Schultz, Arch. Fl. 5.—Europ.

HIERACITJM:—
tnonasterialex, Naeg. & Peter, Hierac. 601.—Europ.
montanum, Jacq. Fl. Austr. ii. 54 = Crepis montana.
montanum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 106 = Crepis incarnata,
montenegrinum, Panf. ex Nym. Consp. 446 =• lanatum.
monticola, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 20 = nmbellatum.
montolearense, *Timb.* b* *Jeanb. in Bull. Soc. Sc. Pkys. Nat. Toulouse,* ii. (1874) 247.—Enrop.
moravicum, *Freyn, ex Oborny, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn,* xxii. II. (1884) 590.—Enrop.
Morisianom, *Reichb.f. Ic. Fl. Germ.* xix. 67.—Italia.
Moritzianum, *Hegetschw. Fl. Schw.* 781.—Helvetia.
mosanum, Crép. Man. Fl. Belg. 138 = pallidum.
Mougeoti, Froel. ex Koch, Syn. Fl. Germ.ed. 1.453-cerinthoides.
Mougeoti, Godr. Fl. Lorr. ed. I. ii. 77 = decipiens.
mncronulatum, *Timb. in Bull. Soc. Sc. Pkys. Nat. Toulouse,* ii. (1874) 256.—Europ.
multicaule, Schaffn. ex Fries, Epicris. Hierac. 149 = mexicanum.
multiflorum, Gilib. Fl. Litnan. i. 236 - sabandum.
multiflorum, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 421 = H. Auricula.
multiflorum, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. III. 17-sabinum.
murale, Salitb. Prod. 181 = murorum.
lnuricellum, *Fries, Epicris. Hierac.117.*—Keg. Cancas.
Murithianum, *Favre, ex Payot, in Bull. Soc. Bet. Fr.* xxix. (1882) *Bibl.* 43.—Enrop.
murorum, C. B. Clarke, Comp. Ind. 256=vulgatum.
murorum, Froel. in DC. Prod. vii. 215"Caesium,
murorum. *Linn. Sp. PI.* 802.—Reg. bor. temp,
myosotidifolium, *Sch. Bip. in Bonplandia,* iv. (1856) 55, nomen.—Chili,
myriadenum, *Boiss.* &" *Reut. ex Reichb. lc. Fl. Germ.* xix. 53.—Hispan.
myrianthum, Scheele, ex Nym. Consp. 438 = hinntum.
myriaphorum, Scheele, ex Nym. 1. c. 448-Pseudo-Cerinthe.
myriocephalnm, *Pan/. Elench. Crna-Gora,* 61.—Europ.
myriophyllum, *Scheele, in Linnara,* xxxii. (1863) 660.—Hispan.
NaegeUanum, *Pant. Elench. Crna-oora,* 57.—Europ.
naevuliferum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 404—vulgatum.
nanum, Scheele, in Linnaea, xxxi. (1861-62) 648 = H. Auricula.
nanum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 70-Crepis chrysanthns.
neapolitanum, Hnet, ex Nym. Consp. 450-villosum.
neglectnm, *Norrl. ex Wainio, in Meddel. Soc. Faun, et Fl. Fenn.* iii. (1878) 65.—Fennia.
nemogeton, *Jord. ex Pirard, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. (1870) 121.—Europ.
nemopkilum, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 898 = vulgatum.
nemorale, Jord. ex Nym. Consp. 443=vulgatum.
nemorense, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 23-murorum.
ntmorivagum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 385, in obs. = boreale.
nemorosum, Bess. Enum. PI. Volb. 81=vulgatum.
nemorosum, Dierb. Fl. Heidelb. ii. 252 = boreale.
nemorosum, Lapeyr. ex Froel. in DC. Prod. vii. 223 = tridentatum.
nemorosum, Steud. Nom. ed. I. 408 -ramosum.
nemorum, Jord. ex Nym. Consp. 449=decipiens.
nemorum, Nym. 1. c. 444, in syn. = caesium.
Neo-Cerinthe, *Fries, Symb. Hierac.* 67.—Mont. Pyren.
Kestleri, *Koch, Syn. FL Germ.* ed. I. 449.—Europ. centr.
Nestleri, Ledeb. Fl. Ross. ii. 849 = sabinurn.
Nestleri, Vill. Voy. 62. t. 4. f. 1 = cymosum.
nigrescens, *Willd. Sp. PI.* iii. 1574.-Silesia.
nigrescens, Wimm. & Grab. FL Siles. ii. II. 182-atratnm.
nigricans, *Meinsh. Fl. Ingr.* 198.—Ingria.
nigricans, Schur, Enum. PL Transs. 397 = atratum.
nigricarinum, *Naeg. (f Peter, Hierac.* 263.—Europ.
nigriceps, *Lindeb. in Bot. Notiser* (1882),127.—Norveg.
nigroglandulosum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 175-murorum.
niphobiom, *Naeg. & Peter, Hierac.* 204.—Europ.
nitens, *Lindeb. in Bot. Notiser* (1872), 119.—Norveg. occ.

HIERACITTM :—
nitidum, Backh. Mon. Hierac. 50 = pallidum.
nitidum, Scheele, in Linnaea, xxxii. (1863) 655 - amplexicaule.
nivale, *Froel. in DC. Prod.* vii. 221.—Tyrol,
niveopappum, *Fries, Symb. Hierac.* 139.—Mexic.
nobile, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 876 = pyrenaicum.
Norrlini, *Naeg. V Peter, Hierac.* 472.—Europ.
norvegicum, *Fries, Symb. Hierac.* 169.—Norveg.
Notarisii, Reichb, f. Ic. Fl. Germ. xix. 89—crinitum.
notkagenes x, Naeg. & Peter, Hierac 633.—Europ.
nudicaule, Steud. Nom. ed. I. 408 =Gronovii.
Oberleitneri, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 447 — humile.
obliquum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 23-boreale.
oblongifolium, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xi. (1861) 22=iotnndatnm.
oblongifolium, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 54 — dubium.
oblongum, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 20-caesium.
Obomyanum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 711.—Enrop.
obovatum, Lapeyr. Suppl. Hist. PL Pyr. 129-Neo-Cerinthe.
ebscurum, Lang, in SylL Ratisb. i. (1824) 184 = brachiatum.
obscurum, Reichb. PI. Crit. i. 92 = praealtom.
obscurum, Zollik. ex Gaud. Fl. Helv. v. 98=villosum.
obtusifolium, Backh. Monog. Hierac. 58=caesium.
obtusi/olium, Steud. Nom. ed. II. i. 764 = murorum.
occitanicum, Jord. Obs. PI. Crit. vii. (1849) 36 = boreale.
ochroleucum, Pand. ex Nym. Consp. 455 = Crepis viscidula.
ochroleucum, Schleich. Cat. PI. Helv. ed. IV. (1821) 19 ■« cydociaefolium.
ecnodes x, Naeg. *Ic* Peter, Hierac. 734.—Europ.
officinale, Bernh. Syst. Verz. Erf. 138 - Taraxacum officinale.
oigocladum, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 414 =rouroruni*
oleomrens, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 287--olivaceum.
oleraceum, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 110-Sonchus oleraceus.
oligocephaium, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 286.—Europ.
olivaceum, *Gren. V Godr. Fl. Fr.* ii. 361.—Mont. Pyren.
olympicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 30.—Graecia; Bithyn.
onosmoides, *Fries, Symb. Hierac.* 102.—Norveg.
oporinoides, Sch. Bip. ex Nym, Consp. 451-bnplenroides.
oppositifolium, Vukot. ex Nym. 1. c 439 — racemosnm.
orarium, lindeb. in Bot. Notiser (1872) 121=• dovrense.
oreades, *Fries, Symb. Hierac.* 100.—Suecia.
oreades, Heuff. in Flora, xxxvi. (1853) 617 — petraeum.
oreades, Wimm. ex Uechtr. in Oestr. Bot Zeitschr. xxii. (1872) 277 = pallescens.
oreophilum, Heuff. ex Nym. Consp. 452=petraeum.
Orient, Kent, in Oestr. Bot Zeitschr. xxiv. (1874) 170 =lanatum.
orientate, Fries, Epicris. Hierac 74-pannosnm.
origanifolium, Froel. in DC. Prod. vii. 233 = laniferum.
Orphanidis, Boiss. Fl. Orient iii. 869 - pannosum.
orthotrichum, *Fries, Epicris. Hierac.* 144.—Chili.
ovali/olium, Jord. Obs. PL Crit vii. (1849) 88-murorum.
ovalifolium, Froel. in DC. Prod. vii. 224, in syn.—umbellatum.
ovalifolium, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869)76 = saxatile.
ovatum, Hort. Vind. ex Froel. in DC. Prod. vii. 230; Schleich. ex Steud. Nom. ed. I. 408=lasiophyllum, pallidum.
ovatum, Hull. Brit Fl. 175-villosum.
oxydon, *Fries, Epicris. Hierac.* 90.—Helvetia,
oxyphyllum, *Rehm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 110.—Enrop.
Otanonis, F. Schultz, Arch. Fl. 282 — scorzoneraefolium, *Vill.*
Pacheri, *Sch. Bip. ex Packer, in Jakrb. landesm. Kaemt.* xv. (18821 183.—Europ.
pachylodes, *Naeg. & Peter, Hierac.* 180.—Europ.
pallescens, Pan& in Abh. Zool.-Bot. Ver. Wien, vi. (1856) 561-Scbultzianum.
pallescens, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 444=murorum.

HIERACIUM :—
pallescens, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* iii. 241. t 217.—Europ. centr.
pallescens, Wirtg.ex Nym. Consp. 445-saxifragum.
pallidiflorum, Jord. ex Nym. L c. 441 = picroides.
pallidiflorum, Reichb. Ic. FL Germ,xix. 74 -vulgatum.
pallidifolium, Jord. in Bor. FL Centr. Fr. ed. III. 407= vulgatum.
pallidifolium, Knaf, in Oestr. Bot Zeitschr. xxii. (1872) 77-bohenucum.
pallidiforme, Arv. Suppl. Mon. Hierac. 20=pallidum.
pallidulum, Jord. in Bor. FL Cent Fr. ed. III. it 419 — murorum.
pallidum, *Bit. ex Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 404.—Norveg.
pallidum, Fries, ex Nym. Consp. 444 = bifidum.
pallidum. Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861) 104 = rupicolum.
pallidum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 67* murorum.
pallidum, Willd. ex FroeL in DC. Prod. vii. 231-pallescens.
paludosum, Linn. Sp. PL 803-Crepis paludosa.
Pamphilii, Arv. in Bull. Soc Dauph. (1880) 282-= scorzoneraefolium, *Vill.*
Pancicii, Sch. Bip. ex Vis. in Mem. 1st Venet. xv. (1870) 9-Sartorianum.
panduriforme, Dulac, FL Hautes-Pyr. 486-prenanthoides.
panduriforme, Timb. in Bull. Soc Bot. Fr. xviu. (1871) 315-neo-cerinthe.
paniculatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 236-Crepis paindosa.
paniculatum, Gueldenst. Reisen, i. 68 (Quid ?).—Ro88-austr.
paniculatum, Hort. Hafn. ex Froel. in DC. Prod. vii. 220—saxetanum.
paniculatum, Jacq. Coll. Suppl. 148-Crepis rigida.
paniculatum, *Linn. Sp. PI.* 862.—Am. bor.
pannonicum, Jacq. Coll. v. 148 - Crepis rigida.
pannonicum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 749.—Europ.
pannosum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 32.—Graecia; A* Min.
panteblaston, *Naeg. V Peter, Hierac.* 662.—Europ.
Papperitni, Reichb. f. Ic Fl. Germ. xix. 99 = stuposum.
pappoleucum,Vm. Prosp. 86; Hist PL Dauph. »»• 134 -Crepis grandiflora.
papyraceum, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 440-p«' nanthoides.
paradoxum, Nees, in Flora, v. (1822) 189 =dubium.
paradoxum, Schult. Obs. Bot. 164-pratense.
paragogum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 653.—Europ.
paraguense, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 337.-Paraguay.
Parickl, Heuff. inFlora,xxxvi. (1853)618 - piloselloides-
Parishii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) *'• —Calif.
Parnassi, *Fries, Symb. Hierac.* 86.—Graecia.
partitum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. *07 " vulgatnm.
parriflorum, Schleich. Cat PI. Helv. ed. III. «* Crepis incamata.
parviflorum, Steud. Nom. ed. IL i. >!65 = sphaerocephalum.
Aww/oKam, link, Enum. Hort. Berol. ii. 285,sphaW>--porrifolium.
^ofn»/«m,Tenore,ex Froel. in DC. Prod. vii. »' Crepis Columnae.
patagonicnm, *Hook.f. Fl. Antarct.* ii. 324.—Patago"^ *t*
patens, Bartl. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1850) *• Cf. Linnaea, xxiv.(1851) 207-australe?
patulipes, Jord. in Bor.Fl. Cent Fr. ed. III. murornm.
patulum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Ergr prostratum.
pauciflorum, Bemh. Syst Verz. Erf. 138 ==La« muralis.
paucifoliatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. !»• 400—vulgatum.
*paudnaevum,*Jord. in Bor. 1. c. 403-vulgatum.
Panchii, Heuff. ex Nym. Consp. 451 = piloseUo»
pedunculare, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. sndctictim*
pedunculare, Wallr. ex Nym. Consp. 454 = H.
pedunculatum, Wallr. Sched. Crit. 406-H.
Peleterianum, Mérat, Nouv. FL Par. 805 = H.
peliophyllum, *Sckur, Enum. PI. Transs.* Transsylv.

HIERACIUM:—
pellitum, *Fries, Epicris. Hierac.* 79.— Europ.
pelluiidum, Wahlenb. Fl. Suec. ii. 514=vulgatum.
pennsilvanicum, Fries, Symb. Hierac. 150= Gronovii.
pentagenesx, Naeg. & Peter, Hierac. 858.—Europ.
pentaphylum x, Naeg. & Peter, 1. c. 734.—Europ.
perdssum, Jord. in Boi. Fl. Cent.Kr.ed. III. ii. 400 = vulgatnm.
perfoliatum, Froel. in DC. Prod. vii. 211=prenanthoides.
permutatnm, *Naeg. & Peter, Hierac.* 266.—Europ.
ftsrreymondi, *Jord. Obs. PI. Crit.* vii. (1849) 42, in obs.—Gallia.
persicifolium, Fries, Symb. Hierac. 95=pallidum.
persicum, Boiss. Diagn. Ser. I. xl. 60-sabinum.
personatum, Fries, Epicris. Hierac. 45=sudeticum.
Jieruannm, *Fries, Symb. Hierac.* 186.—Peruv.
Perusianum, *Timi. in Bull. Soc. Bot.Fr.* xviii. (1871) 818.—Mont. Pyren.
pervagum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 388 = umbellatum.
pestinensex, Simk. in Tennesz. FUzetek, ii. (1878) 31.—Europ.
petiolare, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 20 - fragile, *Jord.*
petraeum, *Frivald. in Flora,* xix. (1886) 436.—Macedon; Serv.
Petraeum, Hoppe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ii. 296—amplexicaule.
tetrogenes, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 418 -muronun.
petrophilum, Godet, ex Nym.Consp. 449 = scorzoneraefolium, *Vill.*
Petrophilum, *Jeanb.&Timb.inBull.Soc.Sc.Phys.Nat. Toulouse,* vi. (1883-84) 214.—Europ.
fetropkilum, Schur, Enum. PI. Transs. 392 = bifidum.
Petrosum, Hoppe, ex Nym. Consp. 448 - pulmonarioides.
P^trosum, Schar, Enum. PI. Transs. 925-atratum.
Phlomoides, *Froel. in DC. Prod.* vii. 283.—Mont. Pyren.
P'ckleri, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 170=lanatum.
Picridifolium, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. IV. 19, nomen. -Helvet.
picroides, Gaud. Fl. Helv. v. 115 = cydoniaefolium.
Picroides, *Vill. Voy.* 22. t. 1. f. 8.—Helv.; Gall.
P'ctaviense, Sauz* *St.* MaiU. in F. Schnltz, Arch. Fl. Fr. « Allem. 885 = australe.
Pictum, Jord. ex Nym. Consp. 444=caesium.
Pictum, *Pers. Syn.* ii. 374 = saxatUe.
Pictum, Schleich. ex Hoinem. Hort. Ham. 763 - hnmile.
picturatum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. HI. ii. 405 = vul
Pieniake^.™ A«. *in Oestr. Bot. Zeitsckr.* xxiii. (1873) 110.—Euro
P'latense, JOT§! in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 407 - vulgatnm.
PiWernm, *Hoppe, ex Fries, Symb.* " ' " ^ T ^
P'l'Pes, *Saelan, in Medd. Soc. Faun, et Fl. Fenn.* „'(1881) 183.—Europ.
Mocephalum, Link, Enum. Hort. Berol. Ii. 286 = villosum.
P!}osella, *Linn. Sp. PI.* 800.-Enrop.; Aft.bor.
*P«°*ellaeforme,* Hoppe, in Sturm, Deutschl. M. Heft 8?=tf.Pilosella.
P'loselliflorum, *Naeg. V Peter, Hierac. W--f*™%,*
frlosellinum, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 454 = H. 'ilosella
*Vkl*e, alb*rtm. Handb.Skand. Fl. ed. III. 186 = hyperboreum.
piloselloides, *Vill. Prosp.U; Hist. PI. Dauph.* Ui. 100. t. 27.—Europ
piloselloides, Wallr. Sched. Crit 410=P»«|'"»- _
pilos Ksimum, *Frivald. in Flora,* »x. (1836) 436. R nmel.
pilosissimum, Schrank, Baier. FL ii. 318-JJ"™™?[1]:
pilosulum, Jord. in Bor Fl. Cent. Fr. ed. HI. n. 416 = ""•rorum.
pi, ««», Schleich. Cat PL Helv.ed. I *W = dentatum.
pi, «««««, Willd. ex Sleud. Norn. ed. II. »• 765 = Crepis olattarioides.
pinetorum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. ML ii. «* = Oiuronm.
pinnatifidum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. W. (1869) 69-Crepis chondrilloides.
*pinnat*dum,* Willd. SP- P1- Ui- I*60"0*!"8pm natifida.

HrEBACIUM:—
pistoriense, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 601.—Europ.
Planchonianum, Timb. *8c* Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 608=bifidum.
pleicephalum, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* ii. (1851) 171.—Transsylv.
pleiocephalum, Ambr. Fl. Tir. Mer. ii. 614 = brachiatum.
pleiophyllum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 46=rotundatum.
pleistocephalum, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 338. —Bras.
plicatum, Lindeb.in Bot Notiser (1872) 121 = dovrense.
plumbeum, Fries, Symb. Hierac.]11 = bifidum.
plumosum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 172=villosum.
plumulosum, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 170=lanatum.
poliocephalum, *Naeg. tf Peter, Hierac.* 277.—Europ.
poliotrichum, Wimm. ex Nym. Consp. 452 = cymosum.
politum, *Fries, Symb. Hierac.* 84.—Europ. austr.
pollaplasium x, Naeg. *8c* Peter, Hierac. 768.—Enrop.
Pollichiae, Sch. Bip. *8c* G. F. Koch, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1858) 247=murorum.
polyanthemum, Vill. ex Steud. Norn. ed. II. i. 765 - alpinum.
polycephalum, *Velen-in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiii. (1883) 890.—Europ.
polychaetumx, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 786.—Europ.
polycladon, Schur, Enum. PL Transs. *Si\=bifurcum.*
polycladum, Juratz. in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1867) 63 = australe.
polynothum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 281.—Europ.
polyodon, *Fries, Epicris. Hierac.* 67.—Afr. austr.
polyphyllum, *Bernh. ex Hornem. Hort. Hafn.* 765.—Hab. ?
polyphyllum, Hort. Pesth. ex Froel. in DC. Prod. vii. 212-speciosum.
polyphyllum, Schleich. Cat. PL Helv. ed. III. 17 = graminifolium.
polyphyllum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 54 = bupleuroides.
polyschistum x, Naeg. *8c* Peter, Hierac. 685.—Europ.
polytrichum, Ledeb. Fl. Alt. iv. 130 - Crepis polytricha.
polytrichum x, Naeg. & Peter, Hierac 705.—Europ.
polytrichum,Sitau, Enum. PI. Transs. 894 - rotundatum.
pontanum, J. F. <-imel. Syst. 1177 = Crepis montana.
porphyritae, *F. W. SchulH, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxii. (1872) 830.—Europ.
porphyriticum, *Kern. 1. c.* xiii. (1863) 247.—Europ.
porrectum, Christ, ex Nym. Consp. 450 •= dentatum.
porrectum, *Fries, Symb. Hierac.* 106.—Europ. austr.
porrifolium, Balb. ex Froel. in DC. Prod. vii. 220 - marginatnm.
porrifolium, *Linn. Sp. PI.* 802.—Austr.; Ital.
porrifolium, Vill. Hist. PL Dauph. iii. 115 -= glaucum.
Pourretianum, *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* ii. (1874) 66.—Europ.
praealtum, *Gochn. Tent. Med.-Bot. Cich.* 17; *Vill. Voy.* 62. t. 2. f. 1.—Europ.; Oriens.
praealtum, Reichb. PL Crit. i. 45=setigerum, *Tausch.*
praecelsum, *Rav. in Soc. Dauph. Exch. PI.* iv. (1877) 118.—Europ.
praecox, Sch. Bip. in Pollichia, ix. (1851) 36, 44 -murorum.
praecox, Tausch, ex Nym. Consp. 451 - praealtum.
praecurrens, *Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb.* Iviii. (1881) 164.—Europ.
praelongum, *Lindeb. in Bot. Notiser* (1868) 78.—Europ.
praemorsiforme, *Sch. Bip. in Bonplandia,* ix. (1861) 174, 327.-Mexic.
praemorsum, All. Fl. Pedem. i. 213=cymosum.
praemorsum. Linn. Sp. PL 801-Crepis praemorsa.
praeruptorum, Gren. *8c* Godr. ex Nym. Cnnsp. 440 - H. Eupatorium.
prasinifolium, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 413 = muroruin.
prasinum, *Dum. Fl. Belg. Prod.* 62.—Belgium,
pretense, *Tausch, in Flora,* xi. (1828) I. *Erg.* 56.—Europ.; As. bor.
prenanthoides, Doell, Rhein. Fl. 628-lycopsifolium.
prenanthoides, Hook. FL Bor. Am. i. 299 = canadense.
prenanthoides, Ltj. Rev. FL Spa, 168 = sabaudnm.
prenanthoides. Sin. Fl. Brit. 885; Engl. Fl. iii. 368; Iiebm. in Fl. Dan. t 2425 =strictum.
prenanthoides, *Vill. Prosp.* 35; *Hist. PI. Dauph.* iii. 108.—Europ.; Reg. Caucas. et HimaL

HIERACITTM:—
primulaefolium, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 68.—Sardinia.
Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 69. —Arizona.
procerum, *Fries, Symb. Hierac.* 43.—Reg. Caucas.
proliferum, Hartm. Svensk Excurs. FL 113 = vulgatum.
prostratum, DC. Rapp. Voy. 78; ex ej. Fl. Fr. vi. 437=eriophorum.
prostratum, Panz. ex Froel. in DC. Prod. vii. 225 = boreale.
prostratum, *Pair. Encyc. Suppl.* ii. 560.—Enrop.
protractum, Fries, ex Nym. Consp. 442-dovrense.
provinciate, Jord. Obs. PI. Crit. vii. (1849) 41 = australe.
provinciate, F. Schulti, ex Nym. Consp. 442—crinitum.
prunellaefolium, Gouan, Illustr. 67 - Crepis pygmaea.
prussicum x, Naeg. & Peter, Hierac 87St.—Europ.
Pseud-albinum, *Uechtr.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxv. (1885) 866, nomen.—Europ.
Pseud-effusum x, Naeg. *8c* Peter, Hierac. 595.—Europ.
Pseud-eriophorum, Loret & Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 618 = hirsutum.
Pseudo-Auricula, Schur, Enum. PL Transs. 382 = praealtum.
Pseudo-Auricula, Tausch, in Flora, vi. (1828) I. Erg. 63 = brachiatum, pratense.
Pseudo-bifidum, Schnr, Enum. PI. Transs. 882-peliophyllum.
Pseudo-bifnrcum, *Pore, in Magyar Nivint. Lapoi,* ix. (1885) 129, nomen.—Europ.
Pseudo-Blyttii, Norrl. in Notis. Sällsk. Faun, et Fl. Fenn. (1874) 427 - flammeum.
Pseudo-calodon x ,Naeg. & Peter, Hierac. 748.—Europ.
I'seudo-Cerinthe, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 625.—Helvetia.
Pseudo-dentatum, Bill, ex Nym. Consp. 450 - villosum:
Pseudo-gothicum, Arv. Suppl. Monog. Hierac 29-tridentatum.
Pseudo-lasiophyllum, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 46 = rotundatum.
Pseudo-murum, Schur, 1. c. x. (1859) 409 - rotundatum.
Pseudo-Pilosella, Tenore, Prod. p. Ixxi = Tenoreanum.
Pseudo-Prenanthes, Series, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 223 - strictum.
Pseudopsis, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 390 =umbellatum.
Pseudo-ramosum, Schur, Enum. PI. Transs. 391-vulgatum.
Pseudo-Schmidtii, *Schur, 1. c.* 898.—Transsylv.
Pseudo-sciadium, Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 389-umbellatum.
pubescens, *Kit. in Linuaea,* xxxii. (1863) 421.—H nungar.
pubescens, Walp. Ann. ii. 1019 (- *Aracium pubescens).* —As.Min.!
pulchellum, Godr. in Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 867, in obs.-Liottardi.
pulchellum, *Lindeb. in Bet. Notiser* (1872), 120.—Europ.
pulchrum, Froel. ex Steud. Nora. ed. II. i. 765 = Crepis virens.
Pulmonaria, Wallr. Sched. Crit. 423, in obs.-vulgatum.
pulmonarioides, J. & C. Presl, Fl. Cech. 159-bohcmicum.
pulmonarioides.Spteag. Syst. iii. 640 - amplexicaule.
pulmonarioides, *Vill. Prosp.* 36; *Hist. PI. Dauph.* iii. 133.—Europ.
pulmonarium, Sm. Engl. Fl. iii. 362=saratile.
pumilum, Hoppe, ex Willd. Sp. PL iii. 1662-alpinum.
pumilum, Jacq. Fl. Austr. ii. 68. t 189-humile.
pumilum, Lapeyr. Hist. Abr. PL I'yr. 496-glaciale.
pumilum, Linn. Mant. ii. 279-Crepis pygmaea.
pumilum, Tenore, Viagg. Calab. 128 = Crepis Columnae.
purpurascens, Scheelc, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 262-saxatile.
purpureum, Willd. Sp. PL iii. 1660 = Pterotheca bifida..
pusillum, Hoppe, in Flora, xiv. (1881) 182-sphaerocephalum.
pusillum, Pursh, Fl. Am. Sept ii. 602 - Erigeron uniflorn?
pustulatum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 46=muroruin.
pygmaeum, Lam. FL Fr. ii. 100-Crepis pygmaea.
pyrenaearum, Jeanb. *8c* Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 617 = prenanthoides.
pyrenaicum, *Jord. Obs. PI. Crit.* vii. (1849) 37.—Mont Pyren.
pyrenaicum, Linn. Sp. PI. 804 -Crepis blattarioides.

HIERACrtTM :—
pyrenaicum, Rochel, PI. Banat. Rar. 69. t. 29. f. 69 = Crepis viscidula.
pyrrhanthes, *Naeg. b" Peter, Hierae.* 880.—Enrop.
querceticolum, Jotd. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 397-vulgatum.
quercetorum, Jord. in Bor.l. c 886=boreale.
qnercetornm, *Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb.* lviii. (1881) 169.—Europ.
quincuplexx, Naeg. & Peter, Hierae. 385.—Enrop.
racemosnm, *Waldst. V Kit. ex Willd. Sp. PL* iii. 1588; *etPl. Rar. Hung.* ii. 211. t 193.—Europ. or.; Reg. Caucus.
Racskii, *Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb,* xxxix. (1877) 204.—Europ.
radicans, *Steud. Norn.* ed. II. i. 763, in syn. (Quid ?).—Hab.?
radicaule, Hort. Berol. ex Froel. in DC. Prod. vii. 202 — H. Auricula.
radiocaule, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 55 = praealtnm.
Radula, Fries, Epicris. Hierae. 40 = Balansae.
ramiferum, *Dalla Torre, AH. Alpenfl.* 151.—Europ.
Ramondi, Griseb. in Goett. Abb., v. (1853) 100 = Neo-Cerinthe.
ramosissimntn, *Gremli, Neue Beitr.* iii. 18.—Helvet.
ramosum, Vill. ex Steud. Nom. ed. I. 409 = alpinnm.
ramosum, Wahlenb. Fl. Carp. 245=gothicum.
ramosum, *Waldst. V Kit. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1579. —Enrop.
rapaefolium, *Gilib. Exere. Sehol. Univ. Viln.* (1772) 13; *ex Trautv. in Act. Hort.Petrop.* viij. (1888) 550. —Enrop.
rapunculoides, *An. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 289. —Europ.
rarinaevum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 413 = murorntn.
recensitutn, Jord. in Bor. 1. c. 415 =mnrorum.
reconditum, Jord. in Bor. 1. c. 402=vulgatQm.
rectiflorum, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 591=*ceriathoides.
Reichenbachii, Verlot, Cat. Jard. Grenoble (1879), 11 = pulmonarioides.
Reinholdii, Heldr. *Sc* Sart. in Boise. Diagn. Ser. II. v. 117 = bracteolatnm.
relicinum, *Fries, Epieris. Hierae.* 153.—Calif.
remotum, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 419 - cerinthoides.
repandum, *Sckrank, in Denkschr. Akad. Muench.* 1818(1814)819.—Hab.?
repens, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI. *H.* 421 = H. Pilosella.
repens, Willd. Sp. Fl. iii. 1664=aarantiacum.
repens-uniflorum,Gilib. Fl. Lituan. i. 240 = H- Pilosella.
reptans.Vrxkol. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 74 = staticifolia.
reticulatum, Lindeb. in Bot. Notiser (1878), 185 = strfetum.
retrodentatum, Jord. in BOT. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 411 = muroram.
Retzii, Fries, NOT. (1819) ; ex ej. Summ. Veg. Scaad. 535=pallidum.
Rettii, Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) 138, partim = bifidum.
Reuteri, Jeanb. & Timb. in Ball. Soc Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 463, £17 = jnranum.
Reuteri, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 66.1]498 = pulmonarioides.
Reuterianum, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 81—sparsum.
rhaetieum, Fries, Epicris. Hierae. 46=alpinum.
rhaeticum, Froel. ex Steud. Nom. ed. II. L 765 = Crepis Jacquinii.
rhodanthum, *Fries, Epieris. Hierae.* 21.—Sibir.
rhodopum, Griseb. in Goett Abh. v. 1,1853) 91 - petraeum.
rhoeadifolium, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. L 765- Crepis foetida.
rhoeadifolium, *Kern, ex Dalla Torre, Atl. Alpenfl.* 149.—Enrop.
rhomboidale, Lapeyr. in Mém. Acad. Toul. i. (1782) 216. t. 18-neo-cerinthe.
rigens, Jord. Gr. Jard. Gren. (1849) 20-boreale.
rigidatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 394 =tridentatum.
rigidulum, Jord. in Bor. 1. c. 886 = boreale.
rigidum, Fries, Epicris. Hierac. lSS-umbellatum*.
rigidum, Griseb. in Goett. Abh. v. (1853) 126-tri-**dentatum.**

HIERACIUK:—
rigidum, *Hartm. Handb. Skand. Fl.* ed. I. 300.— Enrop.
Rionii, Gremli, Nene Beitr. iii. 16 = caesium.
riphatum, Uechtritz, in Oestr. Bot. ZeiUchr. xxii. (1872) 41=prenanthoides.
rivulare, *Krock. Fl. Sites. Suppl.* ii. 249.—Enrop.
robustum, Fries, Symb. Hierac. 198—foliosnm.
robustum, *Martr. Fl. Tarn*, 438.—Gallia.
rodnense, *Pore, in Magyar Nifae'nt. Lapok,* ix. (1885) 129.—Enrop.
rohacsense, *Kit. in Linnaea*, xxxii (1868) *iii.*— Hungar.
roseum, *Sch. Bip. in Bonplandia*, ix. (1861) 173,174. —N. Granat.
rosulatum, Lindeb. in Bot Notiser (1878) 182= saxifr&grm*
Rotae x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 112.—Europ.
Xothianum, Guerh. ex Froel. in DC. Prod. vii. 203 = praealtum,
Rothianum, Wallr. Sched. Crit. 417 - setigerum.
rotundatum, *Kit. in Sehult. Oestr. Fl.* ed. II. ii. 439.— Europ.
rotundellum, *Jeanb. ex Timb. in Bull. Soe. Sc. Phys.* *Nat. Toulouse*, iii. (1875-76) 696.—Europ.
rotundifolium, Monn. ex Steud. Nom. ed. II. i. 765 = mnrorum.
rotundifolium, Willd. ex Sprang. Syit iii. 641 = pallescens.
rotundum, Dnlac, Fl. Hautes-Pyr. 486-muroram.
rnxolanicum, *Rehm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 151.—Enrop.
rubellum x, Naeg. *Sc* Peter, Hierac. 360.—Enrop.
rubellum, Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 68^Crepis rubra.
rubescens, *Gilib. Exerc. Bot. Schol. Univ. Viln.* (1772) 18 ; *ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 561. —Europ.
rubescens, Jord. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 268=caesium.
rnbricatum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 219.—Enrop.
rubricaule, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc Sc Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 602-alatum.
rubricaule, Dum. H. Belg. Prod. 62=sabaudum.
rubri/ormex, Naeg. & Peter, Hierac. 343.—Europ.
rubrostrium, Vukot in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 68-Crepis taraxadfolia.
rubrum, *Peter, in Mora*, lxiv. (1881) 126.—Europ.
ruficulumx, Naeg. *Sc* Peter, Hierac. 360.—Enrop.
rufisetum, Bess, ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) I. 202=pratense.
Rugelii, Arv. Spicil. Hierac. (1881) 11-mariannm.
rundnatum, Hablitz, ex Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) II. 412, in textn - Crepis Marschallii.
rundnatum, James, ex Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 209 = Crepis mncinaU.
rundnatum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross, it 827 = Crepis polytricha.
rundnatum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869)77-Kochianum.
rupestre, *All. Auct. Pedem.* 12. t. 1. f. 2.—Europ.
rupestre, Auct. ex Fries, Symb. Hierac. 96—rupicolum.
rupestre, F. W. Schmidt, in Nene Abh. Boehm. Ges. i. (1791) 58-pallidum.
rupicarpum, Schrank, ex Steud. Nom. ed. II. i. 765 = alpinnm.
rupicolum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 24 - amplexicaule.
rupicolum, *Fries, Symb. Hierac.* 96.—Europ.
Ruprechti, *Boiss. Ft. Orient* iii. 861.—Reg. Caucas.
Rnsbyi, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club,* ix. (1882) 64.—N. Merit
rutilum x, Naeg. *8c* Peter, Hierac. 660.—Europ.
sabaudum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 854 = boreale.
sabaudum, Ledeb. 1. c. ii. 852, 5phalm.= mnrorum.
sabaudum, *Linn. Sp. PI.* 804.—Europ.
sabaudum, Linn. Fl. Suec. ed. II. 274=rigidum.
sabaudum, O. F. Mnell. in Fl. Dan. t. 872-umbellatum.
sabaudum, Pall. Reise, ii. 197 - vircosnm.
sabaudum, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 226 = latifolium.
sabinum, *Sebast.* b* *Mauri, Fl. Rom. Prod.* 270.-- Eurpp. or.; Oriens.
Saelani, Norrl. in Notis. Sällsk. Faun, et Fl. Fenn. (1874) 426 = flammeum.

HH3RACITTM;—
sagittae/olium, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. vii. (1869) 89-Crepis nicaeensis.
sagtttatnm, *Hoffmgg.* to" *Link, Fl. Port.* ii. 146.— Lnsitan.
Sagoti, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. il. 893' tridentatnm.
salebrosum, Jord. ex Nym. Consp. 445 - pallidum.
salidfolium, Fries, ex Nym. 1. c. 440 = H. Eupatorium.
salicifolium, *Lindeb. in Hartm. Handb. Skand. Fl.* ed. XI. 56.—Euiop.
sanctum, Georgi, Beschr. Ross. Reich. III. iv. 1212" Pterotheca binda.
sanctum, Linn. Cent PI. ii. 30; Amoen. Acad. iv. 328 =Pterotheca nemansensis.
sarmentaceum, Schnr, Enum. PI. Transs. 381 - *" ***furcum.***
sarmentosum, Froel. in DC. Prod. vii. 202-praealtum.
sarmerttosum, Salisb. Prod. 181-H. Pilosella.
Sartorianum, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. vii. 15.— Graecia; As. Mia.
saudum, jord. ex Nym. Consp. 446 = pallidum.
Sauteri, Sch. Bip. ex Nym. 1. c 464-stoloniflorum, ***Waldst, V Kit.***
saxatile, Balb. ex Fries, Symb. Hierac 88-=Liottardi.
saxatile, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 392=phlomoides.
saxatile, Eichw. Skizze, 150 = vnlgatnm.
saxatile, Jacq. Ob*. BoL ii 30 = glancum, saxetannni.
saxatile, Schleich. ex Fries, Symb. Hierac 101 saufragum.
saxatile, Thomas, ex Monn. Ess. Hierac. 14-graminifolinm.
saxatile, *Vill. Prosp.* 35 j *Hist. PI. Dauph.* iii. ^•" Europ.
saxetanum, *Fries, Epicris. Hierac.* 69.—Europ.
saxetorum, Jord. ex Nym. Consp. 448=amplexicaule.
saxifragum, Bab. ex Syme, Engl. Bot ed. HI- = lingulatnm.
saxifragum, *Fries, Symb. Hierac.* 100.—Suecia.
scabricaule, *Bisch. Del. Sem. Hort. Bot. HeidelH-* (1847); *ex Walp. Ann.* i **465.—**Persia.
scabripes, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. < muroram.
scabriusculum, Schwein. in Long, Exped. Winnepii. 394-canadense.
scabrum. Gaud, in Nat **Anz.** Schw. Ges. iv. (1820) « **• ramosum.**
scabrom, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 86.—Am. bor.
scabrum, Willd. ex Froel. in DC. Prod. vii. 21»- incanum.
scapigerum, *Boiss. ex Orph.* to" *Heldr. in Diagn-* II. iii. 103.-Graecia.
scapigerum, Fries, Symb. Hierac. 96 - pallidum.
Scheelii, Willk. ex Fries, in Ofvers. Vet. Akad. Stockn. xxiiL (1866) 161 - prenanthoides.
Schlosseri, Reichb. *f.* Ic FL Germ. xix. 94. t l» lanatum.
Schmidtii, Sond. ex Fries, Symb. Hierac. murorum.
Schmidtii, Tansch, in Rora, xi. (1828) I. &K- lasiophyllum, pallidum.
Schraderi, Gand. Fl. Helvet. v. 70=villosnm, flexuosn" ***Waldst. VKit.***
Schraderi, Hort. ex Fries, Symb. Hierac. H» elatum.
Schraderi, Schleich. ex DC. Fl. Fr. iv. 20 = pil Tj.
Schultesii, F. Schultz, in Arch. Fl. Fr.et Alkw- > **Arch. Fl. 254=*bi/urcum.***
Schnltzianum, *Paul, (f Vis. in Mem. 1st. Vent'-* (1870) 9.—Europ.
Schnltzii, *Fries, Epicris. Hierac.* 150.—Mexic
sciadophorum, *Naeg. V Peter, Hierac.* 440.—*-"*J*'a.
scUphilnm, *Dichtl. in Deutsche Bot. Monatso-* (1884) 68.—Enrop.
sdaphilum, Jord. ex Nym. Consp. 443=vule»
scoparium, *Frits, Epicris. Hierac.* 137.—I» i x
scopulorum, Lapeyr. Suppl. Hist. PI. Py-

scorpioidenm, *Arv. in Bull. Soc. Dauph. (™w>* —Europ.
scorzoneraefolium, *La Soie, in Bull. Soc.* « (1873) 72.-Helvet.
scorzoneraefolium, *Vill. Prosp.* 35; *Hist-* iii 111.—Europ.
Scouleri, Hook, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am- « -cynoglossoides.
Scouleri, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 298.—Am. bor. w

H: ı UM:—
s^gfao^atum, Vanl, ex Froel. in DC. Prod. vii. 213 —Oommersonii.
«m,'wrf«»», Sch. Bip. ex Nym. Consp' 446=lanatum.
semivillosum, Sendtn. ex Nym. 1, c. *5»=f lan TM m-.,.
sempronianum, WWf. ** *Favrat, m Ball. !>oc. Muntn.*
s^ *T l X t t* Ja^b. Natuf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 112.—Europ.
Sendtneri, Fries, Epicris. Hierac. 17 =brachiatum.
senescent, Backh. Mon. Hierac. 32=nigrescent.
*»:«»«; Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 360 = pWomoides..
sericeum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyt. 477 = Lapeyrousu.
sericeum, Reichb. Ic. Fl. Germ. xix. 65-saxatile.
Seridis, Fries, ex Nym. Consp. 439 = lactucaceum.
serotinum. Host, Fl. Anstr. ii. 419 = umbellatum.
serpyllifolium, *Fries, Epicris. Hierac.* 19.—Italy.
serratifoUum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 417 = tnuiorum.
serratifoUum, *Vukot. in Rod Jugos. Akad. Zagreb,* lviu. (1881) 164.—Europ.
sertifiorum. Urn. Fl. Fr. ii. 93-Crepis PI«m.orsa»g8—
serum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. u. 888-b real.
sessliflolum, Friv. Evk. iv. t 11; ex Boiss. FL Orient. iii. 875 = racemosum.
sessilifolinm, *Timb. in Mini. Acad. Toulouse,* Sir. vii. vii. (1875) 467—Enrop.
setigerum, *Tausch, in Flora,* xi. (1828) i. *Erg.* w. Europ.
setigeram, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) H. 120 (sp. dub).—Sibir.
setosum, *Schur, in Verh. Siebenb. Vir. Naturw.* iv. (1853) 45.—Transsylv.
srfasam, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vu. (low; 68=Crepis graveolens.
«•*a-C«», im. Encyc. ii. 368 j Willd. Sp. PLm. 1689
MV«/»™, Guss'! FLSic. Syn. ii. 404 = crinitum.
•W,', Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg- 75 "
•Cifc* *im Mis. Schultz. T. et Fl. Fenn. Fl. N. S. H. iii. 135; in " ^ ^ f (1850)
silesiacum, *KraJe, in Jahresb. Schles. Ges.*
- f t ^ D C « Froel. in DC. Prod. vii. 218=Crepis
-SSSr-ueh. ex Nym. Consp. "\"ff^C^
nlvestre, Tausch, in Flora, xi. (1»28) I. **%•
i & C T r ; Fl. Cent F, ed. III. 1 «1-
- K K . ex Steud. Nom. ed. IIL 766=villosum.
«>*plex,* Tausch, ex Koch, Syn. FL Germ. ed. 1.
si^ *T l m b . V Jeanb. in Bull. Soc. BoU F,* xi. (1864) ^ X X V E U a l 3 . f4-P*ontodon
simplex, Fl Lib.
Salzmann
sinuosum, *Akad. Foerhandl. Stockh.* (1856) 147.-Enrop.
solidagine
So« £ * * , Lindeb. in Bot Notiser (1872), 1» -
sonch ...olium *Bieb. ft. Tour. Cauc.* u. 252. *eg
so"'"S^Ss*, Fisch. ex Froel. in DC. Prod. vii. 223 Mdentatum.
»~*./<.K«ro,.Sch«eld, in Linnaea, xxxii. (1863)
aSaSSS^L Monog. Hierac 8; et Addit. 10
"SdlSSwB. « *Hook. V Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1885) 32.—Reg. Argent
sP grifolium. £i»«fei. *in Bot. Notiser* (1868), /»
s^ um, Vukot. in Rad jugos. Akad. Zagreb, vii. 77 = vulgatum.
sparsiforme x, Naeg. & Peter, Hierac. 767.—Europ.
sparsum, Frivaid. in Flora, xix. (1836) 436.—Rumelia.
sparsum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 415 = murorum.
spathophyllum, Na^f. V Peter, Hierac. »J«—Europ.
spathulaefolium Vukot ex Nym. Consp. 454 = stoloni-
florum, Woidjr. & Kit. (1863) 666 =
spathulatum, Scheele, in Linnaea, XXXII. compositum.

HIERACITJ11:—
speciosissimum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. £4 >=dentatum.
speciosum, Gren. & Godi. Fl. Fr. ii. 359 *-saxetanum.
speciosum, Harnem. Hort. Hafn. 764.—Europ.
speciosum, Salisb. Prod. 181 - aurantiacum.
spectandrum, *Jeanb. V Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* vi. (1883-84) 185.—Europ.
sphaerocephalum, Blytt, ex Fries, Symb. Hierac. 10 - cemuum.
sphaerocephalum, *Froel. ex Reichb. in Moessl. Handb.* ed. IL ii. 1386.—Enrop.; As. Min.
sphaerophyllum, Vukot. ex Nym. Consp. 444 = fragile, ford.
sphagnophilum, Ehrenb. ex Boisa. Fl. Orient, iii. 862 = praealtum.
spicatum, All. Fl. Pedem. i- 218 = cydoniaefolium.
spicatum, Gilib. Fl. Lituan. i. 238-Crepis praemorsa.
spilophaeum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. IIL ii. 404 -vulgatum.
spinosum, *Gilib. Exerc. Sckol. Univ. Viln.* (1772) 13; *ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1683) 553.—Europ.
spinulosum, Spreng. Syst. iii. 645-Sonchus arvensis.
spontaneum x, Naeg. & Peter, Hierac. 439.—Enrop.
Sprengerianum, linn. Sp. PI. £04«Picris Sprengeriana.
spurcatum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 404 =^ vulgatum.
spurium, Chaix, in Vill. Hist. PI. Danph. iii. 102; ex Froel. in DC. Prod. vii. 204 = hybridum.
squamosum, 5. *G. Gmel. Itin.* i. 9 j *ex J. F. Gmel. Syst.* 1179.—Sibiria.
squarrasum, Ledeb. Fl. Ross. ii. 857 =piaec
staticifolium, *Vill. Prosp.* 35; *All. Ft. Pedem.* i. 214. —Europ.
stellatum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 59 = praealtum.
stelligerum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 214.—Gallia.
stellipilum, *Naeg. &• Peter, Hierac.* 276.—Europ.
stenocladum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 398 -tridentatum.
stenolepis, Lindeb. in Hartm, Handb. Skand. Fl. ed. XL 45-murorum.
stenophyllum, Schur, Enum. PL Transs. 399-boreale.
stenophyllum, Vukot, In Rad Jugos. Akad. Zagreb. vii. (1869) 70=Crepis alpestris.
Sternbergii, Froel. in DC. Prod. vii. 214 =pallidum.
Sternbergii, Hoppe, ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 90 = Crepis succisaefolia.
sterrochaetium, *Naeg. V Peter, Hierac.* 498.—Europ.
stipitatum, Jacq. Fl. Austr. iii. 61 = Chondrilla Feltidium.
stoloni-angustifolium, Gilib. FL Lituan. i. 239 »H. Auricula.
stoloniferum, Bess. Enum. PI. Volh. 75 = praealtum.
stoloniferum, Desf. Cat Hort Far. ed. IIL 146 = spaerocephalum.
stoloniferum, Viv. Fl. Ital. Fragm. 17. t. 20-Crepis bulbosa,
stoloniflorum, Thuem. in Bonplandia, vi. (1858) 163-H. Pilosella.
stolonimorum. *Waldst. *f Kit. PU.Kar. Hung.* iii. 808. t. 273.—Europ.
stoloniflorum, Wimm. fl. Schles. ed. II. (1844) 460.—German.
stoloni-latifolium, Gilib. Fl. Lituan. i. 240-dubium.
stolonosum, *Hegetschw. fl. Schw.* 779.—Helvet.
striatum, *Rofin- »» Am. Monthly Mag.* (1811) 356, nomen.—Am. bor.
stricticaule, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 395 ctridentatum.
strictissimum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 211.—Enrop. centi.
strictum, *fries, Symb. Hierac.* 164.—Scandinav.
strictum, Ledeb. Fl. Alt iv. 182 = Ciepis Bungei.
strictum, Opiz, Ackerm. ex Steud. Nom. ed. II. i. 766 (Quid t).—Europ.
strictum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii. (1869) 65 = Crepis leontodon.
strigosum. *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 175.—Mexic.
Fries, in Oefver. Vet. Akad. Foerhandl. 856) 146.—Mexic.
Fries, Epicris. Hierac. 68 = seq.
Reichb. Fl. Germ. Excurs. 265.—Europ.
Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 288.—Europ.

HIERACIUM:—
subaudum. Pall. Fl. Ross. Index Tomi ii. pars 1 =
subauratum, Schur, Enum. PL Transs. 386 ~ subfuscuxn,
subcaesium. Fries, ex Nym. Consp. 444 - murorum.
subcaudatum, *Luce, ex Sass. Phaner. Fl. Oesel's,* 59.—Ins. Osilia.
subdolum, Jord. ex Nym. Consp. 444 - murorum.
subfuscum, *Schur, Enum. PI. Transs.* 386.-Tran.sylv.
subhirsutum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. n. 384 ™ boreale.
subluridum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi (1879) *sufml^^oxd.* in Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 406-murorum.
snbmurorum, *Lindeb. in Blytt, Norges Ft.* u. 643.—
a S m x , Simk. in Termesz. FUzetek, v. (1881) 62 —Pyren.
subnivde^n. *V Godr. Fl. Fr.* ii. S56.-Mont.
J w » m , Froel. in DC. Prod. vii. 218-venosiim.
subnudum. Gilib. Fl. Lituan. i. Coll. ill. 287 = ^rr.'Schleich.Cat.PL Helv. ed. IV. 19-den-
JSSLm, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 416
subprZtuZ'l^A- " Bot Notiser (1868) 78 = p»e-
suta^mosum, Schur, Enum. PL Transs. 400-um-
JSSZ Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii 387
subtr ruiw."f *Bull. Soc. Dauph.* (1880) 286.-E
subs^sl'm, Jord. ex Nym. Consp. 439 = boreale.
substoloniflorum, *Naeg. tf Peter, Hierac* 316.-E r .
subuiifSum, *Naeg. V Peter, I.* *• Mil—Btaop. ^^
subumbellaium, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iU(W62)87 ; iv. (1853) 46.-Euiop centr.
subvestitum, *Jeanb. V Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* vi. (1883-84) 190.-Europ.
^W>K»rAll.Fl.Pedem:i.215 = Crepis»ucc,sae-
.uSdes.^™. *in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 287.-E
sudeS., *Sternb. in Denkschr. Bot. Ges.* **Regensb.** i. ntr.
sudeticum, Tausch, ex Fries, bymb. Hierac. 70 -
JeltcZ. Tausch, ex Link, Handb. i. 808-carpathi-
sulphureum, *Doell, Rhein.* ^-5.21--J"roP'pnm^
a_s s » i r i ^ Dc 68 ^ ^ 2B2
Yylvaticum, Gouan, Illustr. 56; Rett. Ob,,. I. 27-
JStoL. Jan, ex Froel. in DC. Prod. vii. 221 =
J 3 2 5 E - . n. FTH ''- *ff% 42 -
sylvaticum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 4/^
sabaudum. Sal P od 181-umbellatnm.
S S S Watnb: F l W 197 , *L Suec 515-
JSZkL, Wallr Sched Crit. 422-«esium.
= murorum-
sym^MifoUnm, *Froel. in DC. Prod.* vii. 232.-Su
syng^s Jord. ta Bor. Fl. Cent Fr. ed. III. ii. 417-
raTM"£TLinn. Sp. PL ed. II. 1125 = Leontodon Taraxaci.

HrERACIUM :—

Taraxaci, Tim. ex Reichb. FL Germ. Ezcnrs. 253 = Leontodon antnmnalis.
taraxacifolium, Froel. ex Stead. Nom. ed. II. i. 766 - Crepis Jacquini.
taraxaciforme, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 287. —Enrop.
taraxacoides, Ehrenb. ex Fnes, Epicris. Hierac. 158 = Taraxacum Assemani.
Taraxaconis, Georgi, Beschr. Ross. Reich. Ili.iv. 1211 = Leontodon autumnalis.
tardans, *Peter, in Engl. Bat. Jahrb.* v. (1884) 256.—Helvet.
lardiusculum, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 256.—Europ.
Tatrae, Griseb. in Goett. Abh. v. (185S) 158-bupleuroides.
tanrinense, *Jord. Obs. PI. Crit.* vii. (1849) 40.—Europ.
taygeteum, Boiss. *Sc* Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 15 — pannosnm.
taygetum, *Frits, Symb. Hierac.* 91.—Taygeti.
tectorum, Horoem. Hort. Hafn. 766 = Crepis tectorum.
tendinnm, *Naeg.* b[1] *Peter, Hierac.* 453.—Europ.
Tenoreanum, *Froel. in DC. Prod.* vii. 200.—Ital.
tenue, Freyn, ex Velen. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 389 = Freynianum.
ttnuifolium, Host, Fl. Austr. ii. 411-barbatum.
tephrocephalum, Vukot. ex Nym. Consp. 454 — *bifurcum.*
tephrodes, *Naeg.* b* *Peter, Hierac.* 641.—Europ.
tephroglaucum, *Naeg. b" Peter, I. c.* 513.—Europ.
tetradymum x, Naeg. *Sc* Peter, 1. c. 872.—Europ.
tetragenes x, Naeg. & Peter, 1. c. 633.—Europ.
thapsiforme, Uechtr. ex Asch. & Kan. Cat. Serb. 48 - thapsoides.
thapsoides, *Panč. Elench. Crna Gora.* 59.—Montenegro.
Thevenii, *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* vi. (1883-84) 185.—Europ.
thlaspifolium, *Froel. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 766, nomen.—Europ.
Thomasinii, Steud. 1. c. sphalm. vide *Tomasinii.*
thuringiacum, *Bernh. Syst. fere. Erf.* 137.—Europ.
thyrsoidenm, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. I. 409, nomen. —Sibir.
thyrsoideum, Fries, Symb. Hierac. 141—abscissum ?
tinctum, Jord. in Bor. FI. Cent. Fr. ed. III. ii. 405 « vulgatum.
tingitanum, Salzm. ex DC. Prod. vii. 153 = Crepis tingitana.
Tomasinii, Host, Fl. Austr. ii. 414=lanatum.
tomentosum, *All. Fl. Pedem.* i. 216.—Europ.
tomentosum, Linn. Cent PI. i. 26=andryaloides.
Tommasinii, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 100. t. 1569 = stupposum.
tortifolium, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 396 «=vulgatum.
tovarense, *Fries, Epicris. Hierac.* 152.—Venezuela.
Trachselianum, Christen. ioMittheil. Bern. Naturf. Ges. (1860) ; ex ej. Hierac. Schweiz. 15-oxydon.
trachycaulon, Vukot. ex Nym. Consp. 438 = sabaudum.
translucens, Arv. Suppl. Monog. Hier. 17 = vulgatum.
transsilvanicum, *Schur, ex Fries, Epicris. Hierac.* 97. —Transsyl.
transylvanicum, Heuff. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 27 =rotnndatum.
Triasii, Cambess. in Mem. Mns. Par. xiv. (1827) 263 —Crepis Triasii.
triehoeephalum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 55, nomen=glabratum.
trichodes, Griseb. ex Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 88 -= crocatum.
trichodes, *Naeg.* b" *Peter, Hierac.* 452.—Europ.
trichophylhim, Schur, Enum. PI. Transs. 926, Index, sphalm. vide *triehoeephalum.*
tricolor, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 417 = stolonifloTum, *Waldst. V Kit.*
tridentatum, *Fries, Mant.* ii. 48, in syn.; *et Symb. Hierac.* 171.—Europ.; As. bor.
trigenesx, Naeg. & Peter, Hierac. 659.—Enrop.
trinothum x, Naeg. & -Peter, 1- c. 768.—Enrop.
triplex, *Naeg.* to" *Peter, I. c.* 280.—Europ.
trisquamatum, *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 416.—Hungar.
triste, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. «40.—Unalaschk. j Am. bor.
tnincatnm, *Lindeb. in Bot. Notiser,* (18681 69.—Europ.
tuberosum. Balb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 766=Leontodon tuberosus, *Linn.*

HIERACIT7M :—

tuberosum, Brot. Fl. Lusit. i. 318-Crepis bulbosa.
tubulosum, Lam. Encyc. ii. 867 - intybaceum.
tubulosum, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 766=; alpinum.
turbinatum, Spreng. Syst. iii. 647 = Crepis blattarioides.
nliginosum, *G. F. Koch, in Pollichia,* x. (1852) 29, 30. —Europ.
uliginosum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 96 = Crepis Bungei.
Umbella, *Naeg.* b" *Peter, Hierac.* 462.—Europ.
nmbellatum, *Linn. Sp. PI.* 804.—Reg. bor. temp,
umbelliferum, *Naeg.* b" *Petèr, Hierac.* 785.—Europ.
umbelliforme, Jord. in Bor. Fl. Cent Fr. ed. HI. ii. 389 = umbellatum.
umbraticolum, Jord. 1. c. 399= vulgar,'nm.
umbrosum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon, (1848) 24 = vulgatnm.
umbrosum, Schur, Enum. PI. Transs. 392-caesium,
uncinatum. *Kit. in Linnaea,* xxxii. (1863) 424.—Hangar.
undulatum, *Ail. Hort. Kew.* ed. I. iii. 124.—Hispan.
undulatum, *Boiss. Fl. Orient,* iii 867.—Thessalia.
uniflorum, Hoppe, in Flora, xiv. (1831) 182-sphaerocephalum.
nrens, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. I. 409, nomen.—Hab. ?
urticaseum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 285.—Europ.
Urvillei, *Sch. Bip. in Bonplandia,* ix. (1861) 174.—Bras.
ustulatum, Arv. in Bull. Soc. Dauph. (1880) 283 - glanduliferum.
vagans, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 858 - glabratum.
vaginatum, Jeanb. *Be* Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. & Nat. Tonlouse, iii. (1875-76) 603 = alarum.
vagum, Jord. Gr. Jard. Gren. (IS49) 21 -boreale.
Vahlii, *Froel. in DC. Prod.* vii. 204.—Hispan.
Vaillantii, Tansch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 57 = cymosum.
valdepilosum, Fries, Symb. Hierac. 60—pyrenaienm.
valdepilosum, *Vill. Prosp.* 34; *Hist. PI. Dauph.* iii. 106.—Europ.
valderamosum, Schleich. ex Steud. Nom. ed. II. i. 766 =boreale.
valletrianum, *Boutigny, ex Jeanb.* b[1] *Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* vi. (.1883-84) 191, nomen.—Enrop.
vallicolum, Jord. ex Nym. Consp. 439—boreale.
vallisiacam, *Fries, Epicris. Hierac.* 122.—Helvetia.
Vancouverianum, Arv. Spicil. Hierac. 10—albiflorum.
variegatum, Lam. Encyc. ii. 362 — Hypochoeris variegata.
vasconicum, *Jord. ex Martr. Fl. Tarn,* 452.—Gallia.
Vayredae, Arv. ex Vayr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xL (1882) 108-saxatile.
vellereum, Scheele, ex Fries, in Ofvers. Vet. Alcad. Stockh. xxiii. (1866) 160=phlomoides.
velutellum, *Naeg.* b" *Peter, Hierac.* 272.—Europ.
velutinum, Hegetschw. ex Froel. in DC. Prod. vii. 199 = H.Pilosella.
vendeanum, Jord. in Bor. FL Cent. Fr. ed. III. ii. 390 = umbellatum.
venetianum, *Naeg.* b[1] *Peter, Hierac.* 636.—Europ.
venosum. *Linn. Sp. PI.* 803.—Am. bor.
ventricosum, *Norrl. ex Wainio, in Meddel. Soc. Fauna et Fl. Fenn.* iii. (1878) 65.—Fennia.
verbasci/olium, Pers. Syn. ii. 874 = tomentosum.
verbascifolium, Vis. ex Nym. Consp. 446 — lanatum.
verbenacum, Arv. in Lamotte, Prod. Cent Fr. ii. 492 = umbellatum.
Verloti, Jord. ex Nym. Consp. 444,445—caesium, lasiophyllum.
vernale, Schur, Enum. PI. Transs. 393-lasiophyllum.
vernum, Sauze, ex Nym. Consp. 444 — bifidum.
verruculatum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 287 = scabrum.
versicolor, Fries, in Oefver. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. (1856) 149 = stolonifloium, *Waldst.* b[1] *Kit.*
versicolor, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 283 - floribundum.
versutum. Frivald. ex Griseb. in Goett. Abh. v. (1858) 143 — chalcidicum.
versutum, Frivald. ex Nym. Consp. 446 = pannosum.
vestitum, Fisch. ex Herd, in Bull. Soc. Nat Mosc. xliii. (1870)1. 204= triste.
vestitum, Gren. *Sc* Godr. Fl. Fr. ii. 369-rupicolum.
vicinum, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc Phys. Nat Toulouse, iii. (1875-76) 606 = anglicum.

HIEBACrpiE:—

m'ctum, Fries, ex Nym. Consp. 445 — pallidum.
Villarii, *Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse,* iii. (1875-76) 594.—Europ.
Villarsii, F. Schultz, in Flora, xliv. (1861) 35 = *bifurcum.*
Villarsii, Serres, in Ball. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 225 -Pseudo-Cerinthe.
Villarsii, Vill. ex Steud. Nom. ed. L 58, 409-Leontodon hirtus.
villosum, Dicks, in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 288= sudetfcnm ?
villosum, Griseb. Spicil. FL Rumel. ii. 271=chalcidicum.
villosum, *Jacq. Enum. Vindob.* 142, 271; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1130.—Europ.
villosum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 476 = cerinthoides.
villosum, Lepech. Reise, i. 237 (Quid ?).—Ross.
villosum, Monn. Ess. Hierac. 59 = piliferum.
villosum, Sm. Engl. Bot. t. 2879 = eximium.
vindobonense, *Wiesb. ex Dichtl. in Deutsche Bot. Monatsb.* ii. (1884) 66.—Austria.
Violletianum, *Jeanb. tf Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat. Toulouse, iii.* (1875-76) 586.—Europ.
-virescens, *Schleich. Cat. PI. Helv.* ed. III. 17 (Quid !)• -Helvet.
virescens, Sond. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. IL 1027 -tridentatum.
viretorum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 895 " tridentatum.
Virga-aurea, Coss. in Ann. Sc Nat. Sér. III. vii. (1847) 209. t. 12-crinitum.
virgatum, Gerh. ex Fries, Symb. Hierac. 119 * vulgatum.
virgatum, Hort. ex Froel. In DC. Prod. vii. 226 =sabaudum.
virgatum, Lamb, ex Pursh, Fl. Am. Sept ii. 503 canadense,
virgultorum, Jord. Cat. Gr. Jard. Dijon (1848) 24 = boreale.
viride, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) 287.- Kurop.
viridicollum, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. Ill- « 416 = muromm.
viridissimum, *Jeanb.* b" *Timb. in Bull. Soc. Sc P«3>- Nat. Toulouse,* iii. (1875-76) 618.—Europ.
virosum, Froel. in DC. Prod. vii. 226, partim - foliosum.
virosum, Gren. & Godr.-Fl. Fr. ii. 887 = lactncaceum-
virosum, *Pall. Reise,* i. 501.—Europ.; As. bor.
viscidulum, Tausch, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. * 447-praealtum.
viscidulum, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, vii- (1869) 74 = intybaceum.
viscosum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* (1880) S8J.— Europ.
vittatopetalum, Vukot. ex Nym. Consp. 454 = stow floram, *Waldst.* b[1] *Kit.*
vivariense, Jord. in Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 8 boreale.
vogesiacum, Mongeot, ex Fries, Symb. Hierac *v*- decipiens.
vulcanicum, Griseb. .in Bot. Zeit. viii. (1850) 638" pallidum.
vulgare, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg- duDimn*
vulgatum, *Fries, Nov. Fl. Suec.* ed. II. 258.—Reg- temp.
vulgatum, Spreng. Syst. iii. 644 = hnmile.
Waldsteinii, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg. 6° lanatum.
Warmingii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. I"- Bras.
Willdenowii, Monn. Ess. Hierac. 14=graminifolinm
Willkommii, Scheele, in Linnaea, xxxi. (1861-62) » ^olivaceum.
Wimmeri, Uechtritz, in Oestr. Bot. Zeitschr. » (1872) 277 = pallescens.
Wolfgangianum, Bess. «x Eichw. Skizze, 150=V tense?
Wolfianum, Favre, ex Favrat, in Bull. Soc. Muritn- (1880) 67-rupicolum.
xanthoporphyrumx, Naeg. & Peter, Hierac. *sv*>- Europ.
xystolepium, *Naeg.* b" *Peter, I. c.* 221.—Europ.
Ziaianum, Tausch, in Flora, xi. (1828) I. Erg- praealtum.

HIERANTHEMUM, Spach, Hist. Vég. Phan. U. 81 (1840) = Heliotropium, Tonm. (Boragin.).

HIERANTHES, Rafin. Sylva Tellnr. 79 (1888) - Stereospermum, Cham. (Bignoniac).
fragrans, Rafin. 1. c = S. chelonoides.

HIERICONTIS, Adans. Fam. ii. 421 (1768) - Anaatatica, Linn. (Crudf.).

HIERNIA, S Moore, in Joum. Bot. xviii. (1880) 196.
ACANTHACEAE.
angolensis, J. *Moore, I. c*—Afr. trop.

HIEROCHLOA, Beauv. Agrost 62 (1812)-seq.

HlEROCHLOË, S. G. Gmel. Fl. Sibir. *I.* 100 (1747). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1139.
ATAXIA, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 198 (1824).
DIMERIA, Endl. Gen. 81, in syn. (1686).
DIMESIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175.
DISSARRENUM, Labill. Nov. Holl. PI. ii. 82. t. 282 (1806).
SAVASTANA, Schrank, Baier. Fl. i. 100, 887 (1789).
TORRESIA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 125 (1794).
alpina, *Roem. &• Schult. Syst.* ii. 515.—Reg. bor. et arct.; N. Zel.
altissima, Steud. Syn. PI. Gram. 13 = utriculata.
antarctica, R. Br. Prod. 209 = redolens.
arctica, *Presl, Rel. Haenk.* i. 252.—Sinus Nootka.
arenaria, *Steud. Syn. PI. Gram.* 416.—Reg. Magellan,
australis, *Roem. &• Schult. Syst.* ii. 614.—Europ.
borealis, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 300 = alpina.
borealis, *Roem. V Schult. Syst.* ii. 513.—Reg. bor.
"ranonis, *Hook./. Fl. Antarct.* 98.—Ins. D. Auckland.
Bungeana, *Trin. in Mem. Acad. Petersb. Sir.* V. vi. II. (1839) 82.-China.
dahurica, Trin. 1. c 80-glabra.
Ofgei, *Nees, Fl. Afr. Austr. i.* 9.—Afr. austr.
Ecklonii, *Nees, I. c.* 7.—Afr. austr.
fragrans, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 614=borealis.
t'raseri, Hook. £ Fl. Tasm. ii. 108 = redolens.
Slab™, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 66.—Davuria.
Blauca, Gliem. ex Bab. in Joum. Linn. Soc xi. (1870), 341-borealis?
latifolia, Kunth, Rév. Gram. i. 21 - Centotheca lappacea.
*laa*a, R. Br. in Wall. Cat.* n. 3796.—Reg. Himal.
""wrophylla, *Thurb. ex Boland. in Trans. Calif. Agr. Soc.* (1864) 65.—Calif.
maellanica, Hook. f. Fl. Antarc*. ii. 375-redolens.
mexicana, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* xix. (1881) 77.
—M
ortdenlatis, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1868), 100 = borealis.
°*orata,* Beauv. Agrost. 1.12. f. 5-australis.
°*»o<o, Wahlenb. Fl. Ups. 82 = borealis.
"^fmtilis, Hries *Sc* Hieff. in Veth. Zool.*-Bot Ges. W[len>] viii. (1868) 224 = borealis.
*«™*iftora,* Presl, Cyp. et Gram. Sic. 27 = Holcus tennis.
Pauciflora, *R. Br. in Parry, 1st Voy.Suppl.* 198.-Am. arct.
r«*mosa,* Trin. in Mem. Acad. Petersb. Se>. V. vi. II. (1839)79=.pauciflora.
?yj°'a, *Hook./. Fl. Antarct.* 93.—Austral.
[re]ns, *R. Br.Prod.* 209 ; *Roem.* b* *Schult. Syst.* u. 514—Reg. austr. temp.
repens, Beauv. Agrost. 62-borealis.
*submu*ftni, F. Mnell. in Trans. Viet. Inst. i. (1855) 48 = redolens.
tereti, *Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr.* 62.-T[c]«li.
˜°?6°. *Nees, Fl. Afr. Austr.* i. 7.—Afr. austr.
2[ncn]J««, *Kunth, Rev. Gram.* i. 198. t. S.-Chdi.
"»«««, Schur, iil Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1859) 12-°°realis.

HlEROCHONTIS, Medic. Pflanzeng. 51 (1792) - [An]Mtatica, Linn. (Cradf.).

HlEROCONTIS, Steud. Nom. ed. 1.409 (1821)-praec

Hl[R]i0NlA, Veil. Fl. Flnm. 234; v. t. 116 (1825)-[AV]U». Vand. (Dilleniac).
scabra, Veil. H. cc'.D. rugosa.

HIERONIMA, Allem. Diss. Rio Janeiro (1848), t-Hyeronlma, Allem. (Euphorb.).

HIERONYMA, Bull. Etud. Gén. Euph. 662 (1868)-praec.

HIESINGERA, Endl. Gen. Suppl. v. 47 (1850) = HISINGERA, Hellen.-Xyloama, Hoist. (Bixin.).

HIGGENSIA, Steud. Nom. ed. II. i. 767 (1840)-HIGGINSIA, Pers.-Hoffmannia, Sw. (Rubiac).

HIGGINSIA, Blume, Bijdr. 988 (1826) =»Petunga, DC. (Rubiac.).
glomerata, Blume, l! c. 989-P. glomerata.
longifolia, Blume, ex DC. Prod. iv. 399 = P. longifolia.
microcarpa, Blume, Bijdr. 988 = P. Roxburghii.

HIGGINSIA, Pers. Syn. i. 183 (1805) = Hoffinannia, Sw. (Rubiac).
aggregata, Pers. 1. c {=*Etwsmia aggregata).*—Peruv.
angustifolia, Bartl. ex DC. Prod. iv. 899.—Peruv.
discolor. Planch, in Fl. des Serres, v. (1849) 482 d-Hoffmannia discolor.
Ghiesbreghtii, Hook. Bot. Mag. t 5883 *(fiheisbechtii)* = Hoffmannia Ghiesbreghtii.
latifolia, Bartl. ex DC. Prod. iv. 399.—Peruv.
macropkylla. Planch, in Fl. des Series, v. (1849) 482 d — Hoffmannia macrophylla.
mexicana, Link, Klotzsch & Otto, Ic. PI. Rar. i. 58 - Hoffmannia mexicana.
obovata, Pers. Syn. i. 138—Peruv.
psychotriaefolia, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 50 = Hoffmannia psychotriaefolia.
refulgens, Hook. Bot. Mag. t. 6346 = Hoffmannia refulgens.
regalis, Hook. 1. c. t. 6280-Hoffmannia regalis.
vertidllata, Pers. Syn. i. 133.—Peruv.

HILACIUM, Steud. Nom. ed. II. i. 767 (1840), sphalm. = HYLACIUM, Beauv. - Psychotria, Linn. (Rubiac).

HILAIRIA, DC. P-od. vii. 83 (1888) = OnOBeris, DC. (Compos.).
paniculata, DC. 1. c - O. Isotypus.

HHiABIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 116. t 87 (1815). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1121.
HEXARRHENA, T. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 326. t. 45 (1830).
PLEURAPHIS, Ton. in Ann. Lye. N. York, i. (1824) 148.1.10.
SYMBASIANDRA, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 767 (1840).
cenqhroides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp. i.* 117.—Mexic.
Jamesii, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* xix.<1881) 62.—Am. bor. occ.
mutica, *Benth. 1. c.*—Am. bor. occ.
rigida, *Vasey, Grass. U. St.* 16.—Am. bor. occ.
sericea, *Benth. in Joum. Linn. Soc.* xix. (1881) 62.—Am. bor. occ.

HILBERTIA, Thouin, ex Reichb. Consp. 212° (1828) (Quid?).

HIIiDEBBAMDTIA, Vatke, In Joum. Bot. xlv. (1876) 313; et in Monatsb. Akad. Berl. (1876) 864. *CONVOLVULACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii 1243.
africana, *Vatke, II. cc.* 313; 865.—Afr. trop.

HILDEGARDIA, Schott ft Endl. Melet 33 (1832)-Steroulla, Linn.
Candolleana, Steud. Nom. ed. II. i. 767 = seq.
Candollei, Schott & Endl. Melet. 33-S. populifolia.
macrophylla, Schott & Endl. 1. C.-S. macrophylla.
populifolia, Schott *Sc* Endl. 1. C.-S. populifolia.

HILLEBRANDIA, Oliver, in Trans. linn. Soc. xxv. (1866) 861. t. 46. *BEGONIACEAE,* Benth. & Hook, t i. 843.
sandwicensis, *Oliver, I. c*—Ins. Sandvic.

HILLERIA, Veil. FL Ftum. 47 i *I* t. 122 (1825) - Mohlana, Mart. (PhytoL).
elastica, VclL 11. cc.-M. nemoralis.

HHJ.IA, Jacq. Enurn. PI. Carib. 8 (1760). *RVBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 39.
FEREIRIA, Veil, ex Vand. Fl. Lusit. 21. t. 1. *f.* 8 (1788); et in Roem. Script. 98. t. 6.
SALDANHA, Veil. Fl. Flum. 141; iii. t 167, 158 (1825).
brasiliensis, *Cham,* b[1] *Schlecht. in Linnaea,* iv. (1829) 201.—Bras.
longiflora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 235 = Loranthus ampullaceus.
longiflora, Hort. ex Lem. in Fl. des Series, *Sir.* I. iii. (1847) 188 -prasiantha.
longiflora, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 58 = parasitica.
parasitica, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 18.—Am. trop.
prasiantha, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iii. (1847) t. 188-Fagraea zeylanica.
tetrandra, *Sn. Prod- Veg. Ind. Occ.* 58.—Jamaica,
tubaeflora, *Cham, in Linnaea,* ix. (1884) 260.—Bras
tuxtlensis, [Moç. & Sessc,] ex DC. Prod. iv. 351 - tetrandra?

HILSENBERGIA, Boj. Hort. Maurit. 42 (1837) - Dombeya; Cav. (Malvac).
cannabina, Boj. 1. c. = D. cannabina.

HILSENBERGIA, Tausch, ex Reichb. Consp. 117 (1828) = Ehrotia, Linn. (Borag.1.
Ehretia, Tausch, ex Dunal, in DC. Prod. xiii. 478 = E. petiolaris.
rugosa, Dunal, 1. c. = E. petiolaiis.

HIMANTHOGLOSSUM, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 689 (18371 = HIMANTOGLOSSUM, Spreng. - Orchla, Tourn.

HIMANTHOPHYLLUM, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1045, 1186 (1840) = HIMANTOPHYLLUM, Spreng.-Cllvia, Lindl. (Amaryll.).

HIMANTOCHTLTT8, T. Anders, in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1117 (1876). *ACANTHACEAE,* Benth. &Hook. f. 1. c.
sessiliflorus, *T. Anders. 1. c.*—Afr. trop.

HIMANTOGLOSSUM, Spreng. Syst. iii. 675, 694 (1826) = Orohis, Toum.
anthropophorum, Spreng. 1. c 694-Aceras antbropophora.
caprinum, Spreng. 1. c. = 0. hircina.
cucullatum, Reichb. Fl. Germ. Excun. 120 (- *Gymnadenia eucullata).*—*Podol.;* Sibir.
formosum, C. Koch, in Linnaea, xxli. (1849) 287-O. formosa.
hircinum, Spreng. Syst. iii. 694-0. hircina.
parviflorum, Spreng. 1. c. = Habenaria intacta.
satyrioides, Spreng. 1. c. = O. satyrioides.
secundiflorum, Reichb. Fl. Germ. Excun. 120 - Habenaria intacta.
viride, Reichb. 1. c- Habenaria viridis.

HIMANTOPHYLLUM, Spreng. Gen. 1. 278 (1880) = Cllvia, Lindl. (Amaryllid.).
Aitoni, Duch. in Joum. Soc Imp. Hortic. v. (1859) 626 = C. nobilis.
cyrtanthiflorumx, Groenl. in Rev. Hortic (1859) 258.
miniatum, Groenl. 1. c. 126 - C. miniata.

HIMAHTO8TEMMA, A. Gray, in Proc Am. Acad. xx. (1886) 294. *ASCLEPIADACEAE.*
Pringlei, *A. Gray, 1. c.*—Am. bor. occ.

HIMAS, Salisb. Gen. PL Fragm. 21 (1866)=Laohenalia, Jacq. (Liliac).
angustifolia, Salisb. 1. c.-L. contaminata.
hyacini'ioides, Salisb. 1. c°=L. contaminata.

HIMATANTHUS, Willd. ex Roem. *Sc* Schult Syst. v. p. xiii. 221 (1819)-Plumerla, Linn. (Apocyn.).
rigida, Hoffingg. ex Willd. 1. c—Bras.

HIMENANTHUS, Steud. Nom. ed. II. i. 768 (1840) sphalm.=seq.

HUIERANTHUS, Endl. Gen. 666 (1839). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 898.
erosus, *Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 846.—Reg. Argent.
Linkii, Steud. Norn. ed. II. i. 768-runcinatus.
magellanicns, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 128.—Reg. Magellan.
runcinatus, *Endl. Gen.* 666.—Reg. Argent,
tridentatus, *Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 346.—Reg. Argent.

HINDSIA, Benth. in Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 40. t. 40. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 37.
MACROSIPHON, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 442.
longifloia, *Benth. in Lindl. Bot. Reg.* (1844) t. 40.—Bras.
ramosissima, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 106.—Bras.
violacea, *Benth. in Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 40. t. 40.—Bras.

HINGCHA,Roxb.Hort.Beng.62(1814)=HINGTSHA, Roxb.-=Enhydra, Lour. (Compos.).

HINGHSTONIA, Steud. Nom. ed. II. i. 768 (1840) sphalm.=HINGSTONIA, Rafin.=Verbesina, Linn. (Compos.).

HINGSTONIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352=Verbesina, Linn. (Compos.).
exaltata, Rafin. 1. c - V. ocddentalis.

HINGTSHA, Roxb. Fl. Ind. iii. 448 (1832) - Enhydra, *IJOUT.* (Compos.).
repent, Roxb. 1. c. = E. fluctuant.

HINTERHUBERA, Reichb. ex Nym. Consp. 66 (1878) = Hutchlnsia, R. Br. (Crndf.).
Berengariana, Reichb. ex Nym. 1. c. = Capsella procumbens.
pauciflora, Reichb. ex Nym. 1. c. •= Hutchinsia paociflora.

HINTERHUBERA, Sch. Bip. in Flor», xxiv. (1841) I. Intell. 42; xxv. (1842) 419 = Chrysanthellum, Rich. (Compos.).
abyssinica, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 160, nomen = Microlecane abyssinica.
Kotschyi, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 42=C. indicum.

HINTEBHTTBEBA, Sch. Bip. in Wedd. Chlor. And. i. 185.139 (1856). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. tii.275.
SCHAETZELIA, Sch. Bip. in Otto & Dietr. AUg. Gartenz. xvii. (1849) 192.
columbica, *Sch. Bip. in Wedd. Chlor. And.* i. 188.—Venezuela.
ericoides, *Wedd. 1. c.* 166.—Venezuela.
Lasegnei, *Wedd. 1. c*—N. Granat.

HIORTHIA, Neck. Elem. i. 97 (1790) = AnaoyclUB, Linn. (Compos.).
alexandrina, Lets. §yn. Comp. 258 •= Anacjclus alexandrinus.
aurea, Less. 1. c=Anthemis anrea.
orientalis, Less. 1. c — Anthemis montana.
Valentino, Less. L c.—Anacydus valentinus.

HIORTIA, Juts, in Diet. Sc. Nat. xxL 170 (1821)-praec.

HIOSCIAMUS, Neck. Delie. Gallo-Belg. i. 122 (1768)-HyoBoyamus, Tourn. (Solan.).

HIPECOUM, Vill. Hist. PI. Danph. ii. S43 (1787)-Hypecoum, Linn. (Papav.).

HIPERICUM, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii 818 (1768)-Hypericum, Tourn.

HIPOCHAERIS, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. v. (1798) 43=Hypoehoerfe, Vaill. (Compos.).

HIPOCHOERIS, Neck. Delic. GaUo-Belg. ii. 832 (1768) = praec.

HIPOCREPIS, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 809 (1768) = Hippocrepis, Linn. (Legnm.).

HIPPEA8TBTJM, Herb. App. 31 (1821). *AMARYLLIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 724.
ASCHAMIA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 134 (1866).
AULICA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 10 (1886).
CHONAIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 135 (1866).
EUSARCOPS, Rafin. Fl. Tellur. Tv. 11 (1836).
HABRANTHUS, Herb. Amaryll. 156 (1837), partim.
LAIS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 134 (1866).
LEOPOLDIA, Herb, in Bot. Mag. sub t 2113, in nota (1819).
MVOSTEMMA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 136 (1866).
OMFHALISSA, Salisb. 1. c. 134 (1866).
PHYCELLA, Lindl. in Bot. Reg. sub t. 928 (1825).
RHODOLIRION, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 66.
RHODOPHIALA, PresL Bot. Bemerk. 116 (1844).
TRISACARPIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 11 (1836).
acuminatum, M. Roem. Syn. Ensat. 141—rutilum.
advenum, *Herb. App.* 31.—Chili.
ambiguum. Hook. Bot Mag. t. 3542=solandrifolium.
Andersoni, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 82.—Uruguay.
andicolum, *Baker, I. c*—Chili.
andinum. Baker, 1. c. 84 = Herbertianum.
Andreanum, *Baker, in Gard. Chron.* (1880) II. 424.—Am. trop.
anomalum, Lindl. ex Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. v. (1849) sub t. 465, 456 = H. CybUter.
aulicum, *Herb. App.* 31; *Amaryll.* 135.—Bras.
Bagnoldi, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 83.—Am. austr.
bahiense, M. Roem. Syn. Ensat. 138-= rutilnm.
barbatum, Herb. Amaryll. 138, 409. t. 21. f. 1 = equestre.
Batemanni x, Herb. 1. c. 143.
Benthami, *Herb. I. c*—Hab. ?
Berteroanum, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 83.—Chili.
bicolor, *Baker, I. c*—Chili.
bifidum, *Baker, 1. c.*—Reg. Argent.
brasiliense, M. Roem. Syn. Ensat. 138«rutilum?
breviflorum, *Herb. Amaryll.* 137. t 21. f. 4.—Reg. Argent.
Brookesii, *Herb. 1. c.* 143.—Hab. *1*
bulbulosum. Herb. 1. c 139 - rutilnm.
calyptratum, *Herb. App.* 31.—Bras,
cearense, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 82.—Bras.
chilense, *Baker, 1. c*—Chili; Peniv.
concolor, Baker, 1. c.=Zephyranthes concolor.
crocatum, Herb. App. 31 = rutilum.
Cybiter, *Benth. V Hook./. Gen.* iii. 725.—Bolivia,
decoratum, *Lem. Jard. Fleur.* iv. (1854) t. 388.—Bras.
equestre, *Herb. App.* 81.—Mexic
formosissimum, Loud. Encyc. PL 1542 = Sprekelia formosissima.
franciscanum, *Baler, in Journ. Bot.* xvi (1878) 82.—Reg. Argent.
fulgidum, Herb. App. 31=rutilum.
glaucescens, Herb. AmaryIL 139=rutilum.
gracilifolium, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 82.—Uruguay.
Grahami, *Herb. Amaryll.* 148.—Hab. I
Gravianae x, M. Roem. Syn. Ensat. 137.
Herbertianum, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 83.—Chili.
Heuserianum, Karst. Fl. Colnmb. ii. 8. t. 102-auliCum.
ignèscens, *Regel, Gartenfl.* (1874) 147.—N. Granat.
Jamesoni, Baier, in *Journ. Bot.* xvi (1878) 88.—Reg. Argent.
latifolium, M. Roem. Syn. Ensat 140-rutilum.
Leopold!, *Hort. ex Gard. Chron.* (1870) 733; *et Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 84.—Peruv.
lineatum, *Baker, I. c.* 82.—Chili.
Martianum, M. Koem. Syn. Ensat. 134 = rutilum.
miniatum, *Herb. App.* 31.—Peruv.
modestum, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 83.—Chili.
montannm, *Baker, 1. c.* 84.—Chili.
occidentale, M. Roem. Syn. Ensat 182= equestre.
organense, *Herb, in Bot. Mag.* sub t 3803.—Bras,
pardinum, *Lent. Illustr. Hortic.* xiv. (1867) Misc. 46.—Peruv.
phycelloides, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 83.—Chili,
pratense, *Baker, I. c.* 84.—Chili.

HIPPEASTBUM :—
procerum, *Lem. Illustr. Hortic.* xi. (1864) t. 408.—Bras.
proliferum. Herb, in Bot. Mag. sub t. 2475-rutilum.
pronum, *C. Koch, in Wochenschr.* vi!. (1864) 37.—Venezuela.
psittacinum, *Herb. App.* 31.—Bras.
pulverulentum, Herb, in Bot. Mag. t. 2273-rutilum.
pyrrockroum, Lem. Illustr. Hortic. xi. (1864) p. 420. t. 408=equestre.
Reginae, *Herb. App.* 81.—Mexic
regium, Herb. Amaryll. 189=praec
reticulatum, *Herb, in Bot. Mag.* sub *i.* 2475.—Bras.
Rhodolirion, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 84.—Chili.
robustum, A. Dieb. in Walp. Ann. iii. 616-aulicum.
Roezli, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 85.—Bolivia.
roseum, *Baker, 1. c.* 82.—Chili; Peruv.
rutilum, *Herb. App.* 41.—Bras.
Simsianum, Herb. 1. c. 140=rutilum.
solandriflorom, *Herb. 1. c.* 31.—Bras.
spathaceum, Sims, Bot Mag. t. 2815= equestre.
spectabile, M. Roem. Syn. Ensat. 136 = Reginae.
splendensx, Herb. App. 52. t. 4.
stenopetalum, *A. Dietr. in Otto V Dietr. AUg. Garten*,* xxiv. (1856) 129.—Peruv.
striatifoliutn, Herb, in Bot Mag. t. 2476 - reticulatum.
stylosum, *Herb. I. c.* t. 2278.—Guian.
subbarbatum. Herb. 1. c. t. 2475 = rutilum.
sylvaticum, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 81—Bras.
texanum, *Baker, I. c.* 82.—Am. bor. occ.
tubispathum, *Baker, I. c.*—Reg. Argent.
unguiculatum, M. Roem. Syn. Ensat 183 = rutilum-
uniflorum, *Baker, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 88.—Chili.
versicolor, *Baker, 1. c.* 82.—Reg. Argent,
vittatum, *Herb. App.* 81.—Peruv.
Warscewiczianum, *A. Dietr. in Otto V Dietr. AUg-Garten*,* xxiii. (1855) 1.—Bolivia.

HIPPIA, Linn. Mant ii. 158 (1767). *COMPOSITAE>* Benth. & Hook. f. ii. 484.
bicolor, Sm. in Rees, Cycl. xviii. n. 2-Dichrocepbal* latifolia.
frutescens, *Linn. Mant.* ii. 261.—Afr. austr.
gracihs, *Lets, in Linnaea,* vi. (1831) 218.—Afr-austr.
hirsute, *DC. Prod.* vi. 144.—Afr. austr.
integrifolia, *Less. Syn. Comp.* 268.—Afr. austr.
integrifolia, *Linn./. Suppl.* 389 (Quid J).—'India.[1]
odora, Salisb. Prod. 211—frutescens.
repens, DC. Prod. vi. 144 =gracilis.
Vahliana, Steud. Nom. ed. IL i. 768-integrifolia. *Less.*

HIPPIA, Linn. f. Suppl. 389 (1781) partim; H. B. & K-Nov. Gen. et Sp. iv. 801 (1820)-Plagiocheil«a» Am. (Compos.).
bogotensis, H. B. & K. 1. C.-P. bogotensis.
minuta, Linn. f. Suppl. 889 -Cotula pygmaea.
minuta, Mutis, ex DC. Prod. vi. 14S=Soliva M«" tisii.
peduncularis, H. B. k K. Nov. Gen. et Sp. iv. 301" P. peduncularis.
stolonifera, Brot. Fl. Lusit i. S73=-Soliva nastnrtufolia.

HIPPION, F. W.Schmidt, Fl. Boëm. a. 18 (1793); et in Roem. Arch. i. I. 9. t. •>. ad 5 (1796) =Oentia»»> Toum.
aestivum, F. W. Schmidt, FL Boëm. ü. 20-=GentW»» vema.
alpinum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. I. =Gentiana acaulis.
altaicum, F. W. Schmidt, 1. c. = G. altaica.
Amarella, F. W. Schmidt, Fl. Böem. ii. 28-G. gmanica.
aphyllum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch, i- I- Voyria aphylla.
aquaticum, F. W. Schmidt, 1. c. 10 = G. aqnatica.
aureum, F. W. Schmidt, 1. c. 10,17 = G. aurea. -
auriculatum.Y. W. Schmidt, Fl. Boëm. ii. *1***"'* campestris.
auriculatum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. =G. auriculata.

HIPPION :—
axillare, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. ii. 29 = Gentiana Amarella.
bavarieum, F. W. Schmidt, 1. c. 21 = G. bavarica.
Cachalahuan, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. I. 11 = Erythraea chilensis.
campestre, F. W. Schmidt, FL Boëm. ii. 26-G. campestris.
ciliatum, F. W. Schmidt. 1. c. 28= G. ciliata.
cruciatum, V. W. Schmidt, 1. c 14=G. cruciata,
dentosum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. 19=G. ciliata.
dichotomum, F. W. Schmidt, 1. c 11 = G. tenella.
diffusum, Spreng. Syst. iv. Cnr. Post 840=Curtia diffusa.
elongatum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. 1.11,19 = G. verna.
exacoides, F. W. Schmidt, 1. c. ll=Belmontia cordata.
filiforme, F. W. Schmidt, 1. c. = Microcala filiformis.
Gentianella, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. ii. 29 = G. Amarella,
heteroclita, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. I. 11 = Canscora sessiliflora.
imbricatum, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 18 = G. prostrata.
imolucratum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. 1.11 = G. aurea.
islandicum, F. W. Schmidt, 1. c. = G. tenella.
lancifolium, Pers. Syn. i. 286 = G. Amarella.
longepedunculatum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. I. 11, 21-G. tenella.
macrothyllum, F. W. Schmidt, 1. c. 10 = G. macrophylla.
nanum, F. W. Schmidt, 1. c. 11,19 = G. tenella.
nivale, F. W. Schmidt, 1. c. 10, 18 = G. nivalis.
obtusifolium, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. ii. 27 - G. obtnsifolia.
patulum, Spreng. Syst iv. Cnr. Post 340 *(=-Schuebleria patula).—Bma.*
Porphyris, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. I. 11 = G. angnstifolia.
pTostratum, F. W. Schmidt, 1. c. - G. prostrata.
pulchellum, F. W. Schmidt, 1. c. 10, nomen = Erythraea ramosissima ?
pumilum, F. W. Schmidt, 1. c. 10, 17=G. proitraU.
pusillum, F. W. Schmidt, 1. c. - G. imbricata.
Pyrenaicum, F. W. Schmidt, 1. c. 10, 14 - I*-pyrenaica.
quinquefolium, F. W. Schmidt, L c. 11 •= G. quroqneflora.
seilloides, F. W. Schmidt, L c.«Erythraea Massom.
sessile, F. W. Schmidt, 1. c. (- *Chlora sessilis).*—Reg. Argent.
sexfidum, F. W. Schmidt, 1. c. 10, 15=G. vera.
spicatum, F. W. Schmidt, 1. c. ll = Erythraea spicata.
tenellum, F.W.Schmidt, 1. c - G. tenella.
utriculosum, F. W. Schmidt, Fl. Boem. n. 25 - G. utriculosa.
•oernurn, F. W. Schmidt, 1. c. 19-G. verna.
viscosum, Spreng. Syst. i. 589 -Ixanthus viscosus.

HIPPION, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. i. »• (1798) 8. parthr,; Spreng. Syk L 505 (1825), partim-Enieostema, Blume (1826) (Gentian.).
contraversum, Spreng. Syst. iv. Cnr. Post 840-E. littorale.
hyssopi/olium, Spreng. 1. c. i. 589=-E. littorale.
I'ttorale, Miq. Fl. InS. Bat. ii. 659 - E. Uttorale-
"writimum, F. W. Schmidt, in Roem. Arch. 1.1. i u-E. littorale.
liz. & Gibs. Bomb. Fl. « 7 - E. littorale.
verticillare, F. W. Schmidt, in Roem. Arcn. 1. 1. 11= E. littorale.
idllatum, F. W. Schmidt, 1. c; Spreng. syst I. 689-E. littorale.

HIPPOBROMA, G. Don, Gen. Syrt. iii. 717 (1834) - £ L. M. S I X K & . B \. «d III. 7 7 = L. brevifiora. longiflora, G. Don, Gen. Sy,t. iiL 717 = 1. longiflora.

HIPPOBROMA, Ltodl. Veg. Kingd. 385 (1847) = seq.

BUPOBBOMtrS, Eckl. & Zeyh. Enum. 161 (1886).
S*PINDACEAE,* Benth. & Hook. f. I. 402.
•ktna, *Eckl. V Zeyh. I.* ff.—Afr. »»»»r-

HIPPOCASTANUM, Tonm. ex Rupp. Fl. Jen. ed. HaU. 291 (1746)=Aesculus, Linn. (Sapind.).
Atsculus, Cav. Desc. 458 = Ae. Hippocastunum.
barbatum, Rafin. Alsog. Am. 70=Ae. barbata.
earneum, Rafin. 1. c.—Ae. glabra.
lem'gatum, Rafin. 1. c = Ae. levigata.
rubicundum, Rafin. 1. c-=Ae. glabra.
vulgare, Gaertn. Frnct.ii. 185. 18 = Ae. Hippocaatamrra.

HIPPOCENTAUREA, Schnlt. Oesterr. Fl. ed. II. i. 388 (1814)=Erythraea, Rich. (Gentian.).
Centaurium, Schnlt. 1. c. = E. Centaurium.
emarginata, Schult. 1. c. 890 = E. ramosissima.
inaperta, Schult. 1. c — E. ramosissima ?
pulchella, Schult. 1. c. 889 = E. ramosissima.
uliginosa, Schult. 1. c.=E. linarifolia.

HIPPC-CRATEA, Linn. Gen. ed. I. 363 (1787).
CELASTRINEAE, Benth. & Hook. f. i. 369.
CUERVEA, Triana, ex Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 870.
PERESKIA, Veil. Fl. Flum. 34 (1825); i.t.81 (1827).
PRESTIMERA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 360.
ROMUALDEA, Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat Sér. V. xvi. (1872) 370.
TVLODERMA, Miers, in Trans. Lion. Soc. xxviii. (1872) 418.
acapulcensis. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 280-Tontelca Hookeriana.
acapulcensis, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sfi.* v. 186.—N. Granat
acuminata, Hoffmgg. ex Link, in Jahrb. i. III. (1820) 68 ** malpighiaefolia.
acutiflora,[^of. *V Sesse,] ex DC. Prod.* i. 568.—Mexic
affinis, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 103 = ovata.
aggregata, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.137.—Bras,
ambigua, *Peyr. I. c.* 188.—Guian.
andongensis, *Welw. ex Oliver, Fl. Trap. Afr.* i. 870.—Afr. trop.
angulata. Grift". Notul. iv. 473 .= Euonymus Griffithii.
Anthodon, Pers. Syn. i. 41«decussata.
apiculata, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 369.—Afr. trop.
apocynoides, *Welw. ex Oliver, I. c.* 368.—Afr. trop.
arborea, *Roxb. Hart. Beng.* 5 ; *PI. Carom,* iii. 3. t.206.—Reg. Himal.
Amottiana, *Wight, Illustr.* i. 183.—Ind. or.
aspera, *Lam. Illustr.* i. 101.—Guian.
Anbletiana, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 838.—Am. trop.
barbata, F. Muell. m Trans. Phil. lust. Viet. iii. (1869) 23-obtnsifolia.
bilobicarpa, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 849.—Bras.
Bojeri, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1857) 92.—Malacc.
Bonplandiana, *Peyr. in Sittb. Wien. Acad.* lxx. *Abth.* I. (1875) 407.—Am. austr.
campestris, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.188.—Bras,
cassinoides, *DC. Prod.* i. 569.—Ins. Timor.
cearensis, Mien, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 845 = ovata.
celastroides,*H.B.ItK.Nov. Gen.etSp.v.*186.—Mexic.
cotnosa, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. I. 18S=flaccida.
comosa, *Sv. Prod. Veg. Ind. Occ.* 17.—Ins. S. Doming,
copiosiflora, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 341.—Am. trop.
coriacea, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 288.—Cuba.
Cumingii, *M. Laws, in Hoak.f. Fl. Brit. Ind.* i. 624.—Ind. or.
decussata, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 188.—Bras.
diBvSK, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 346.—Bras.
discolor, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 19-ovaU.
discolor. Seem. Bot. Voy. Herald, 90=versicolor.
disperma, Vahl, Enum. ii. 28 = indica.
disperma, Wall. Cat. n. 4212 B=arborea.
divaricata, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 846.—Bras,
elliptica, *H. B. &• K. Nov. Gin. et Sp.* v. 138.—Mexic.
emarginata, Rudge, PI. Guian. 10. t. 8 = Salacia multiflora, *DC.*
euonymoides, Vahl, Enum. ii. 28 = indica.
evonymoides, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1857) 91.—Madag.

HIPPOCKATEA :—
excelsa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 138.—Mexic.
festiva, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 348.—Brag.
flaccida, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 132.—Bras,
fioribunda, *Benth. Bot Voy. Sulph.* 78—Ins. Gorgona.
fiiscescens, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 300.—Burma.
glaga, *Korth. in Flora,* xxxi. (1848) 580.-Bomeo.
graciliflora, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 371.—Afr. trop.
Grahamii, *Wight, Illustr.* i. 134.—Ind. or.
granatensis, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.187, inobs.—N. Granat.
grandiflora, Payen, Organogr. 163. t Sfi. f. 34-44 - Prionostemma scabrldula.
qrandiflora, Wall. Cat. n. 4213=obtusifolia.
Hasseltiana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 154.—N. Guinea.
Hilariana, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 845.—Bras.
indica, *Willd. Sp. PI.* 1. 193.—Geront. trop.
infttscata, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 852.-Bras.
integrifolia, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 262.—Ins. Cuba,
integrifolia, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 90.—Panama,
inundata, *Mart, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.186.—Bras.
Kirkii, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 370.—Afr. trop.
Klapperiana, *Miq. in Linnaea,* xxvi. (1858) 220.—Guian.
laevigata. Rich, in Vahl, Enum. ii. 27 = ovata.
lanceolata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4214 =» Grahamii.
Lobbii, *M. Laws, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* L 624.—Burma,
lonchophylla, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 348.—Peruv.
longipes, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 367.—Afr. trop.
longipetiolata, *Oliver, I. c.* 872.—Air. trop.
macrantha, Korth. in Verh. Nat. Gesch. Bot. 187. t. 89 = obtusifolia.
macrophylla, *Vahl, Enum.* ii. 28.—Afr. trop.
madagascariensis, Boj. ex Tul. in Ann. Sc Nat. *Sir* IV. viii. (1857) 92 = Bojeri.
madagascariensis, Lam. Illustr. i. 101-Salacia madagascariensis.
Maingayi, *M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 625.—Malacc.
malpighiaefolia, *Rudge, PI. Guian.* 10. t. 8.—Guian.; Ind. occ.
megacarpa, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 187.—Bras.
mexicana, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 852=uniflora.
micrantha, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 108.—Bras.
multiftora, Lam. Illustr. i. 101 •= Salacia mnltiflora, *DC.*
myriantha, *Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 369.—Afr. trop.
nicobarica, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) ii. 208.—Ins. Nicobar.
obcordata, *Lam. Illustr.* i. 100. t. 28. f. 1.—Am. anstr.
oblongata,*Soland. exMiers,in Trans. Linn Soc.* xxviii. (1872) 862.—Ind. occ.
obovata, Rich, in Act. Soc. Hut Nat. Par. i. (1792) 105 = Salacia mnltiflora, *DC.*
obtusifolia, R. Grab, ex Wight, Illustr. i. 134 - Grahamii.
obtusifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 6; *Fl. Ind.* i. 166—Geront. trop.
obtusifolia, Wall. Cat. n. 4211 = indica.
ovalifolia, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 852.—Cuba.
ovata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 148 = pallidula.
ovata, Griseb. in Mem. Am Acad. N. S. viii. (I860) 172 = ovalifolia.
ovata, *Lam. Illustr.* i. 100. t. 28. f. 2.—Am. austr.
pallens. *Planch, ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 367.—Afi. trop.
pallidula, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 348.—Ind. occ.
paniculata, *Vahl, Enum.* ii. 28.—Afr. trop.
parvifolia, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 368.—Afr. trop.
pauciflora, *DC. Prod.* i. 569.—Ins. Timor,
pentandra. *Griff. Notul.* iv. 472.—Burma.
Pereskia, *Steui. Norn.* ed. II. i. 769.—Bras.

HIPPOCRATEA, :—
perspicoa, *Afters, in Trans. Linn. Soc.* xzviii. (1872) 842.—Pernv.
Plumieri, *Miers, I. c.* 336.—Ind. occ.
Plumicri, Rich, ex Peyr. in Matt. Fl. Bras. xi. 1.130 = ovata.
Richardia, Steud. Norn. ed. II. i. 768 = seq.
Richardiana, Cambess. in St. Hi[1] Fl. Bras. Mer. ii. 102, in adnot—obtusifolia.
Riedeliana, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 132.—Bras.
rigida, Hamp. ex M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 824 = obtusifolU.
rigida, *Span.inLinnaea,* xv. (1841) 178.—Ins. Timor.
rotundifolia, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 279 = macrophylla.
salaciioides,. *Korth. in Flora,* xxxi. (1848) 680.—Sumatra.
seandens, Griseb. Cat PL Cub. 56 = Vahliana, *Peyr.*
scandens, Jacq. Select. Am. 9. t 9 = obcordata.
seandens, Turp. Atlas, t. 162 = ovata.
Schimperiana, Hochsti & Steud. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 28 = oblusifolia.
Schomburgkii, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Gui. 1188, nomen; et ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. 1.136 = aspera.
scutellata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 148 = Vahliana, ***Peyr.***
senegalensis. Lam. Illnstr. i. 101 = Salacia senegalensis.
serrata, *Griff. Notul.* iv. 473.—Burma,
serrulata, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 344.—Am. trap.
serritlata,Y6h\, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. 1.130 = ovata.
Swartziana, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 888.—Ind. occ.
tenuiflorn, *Mart, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.132.—Bras,
timorensis, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 178.—Ins. Timor.
tortuosa, WalL Cat. n. 4216-obtusifolia.
uniflora, *[Maç.* to" *Seae] ex DC. Prod.* i. 567.—Mexic.
Urceolus, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. viii. (1857) 91.—Madag.
Vahliana, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 337.—Am. trop.
Vahliana, *Peyr. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 136.—Bras,
velutina, *A/eel, ex Spreng. Neue Entdeck.* iii. 284.— Afr. trop.
vermcosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 84.—Reg. Argent,
verrucosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 136—N. Graoat.
versicolor, *Miers, in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872) 350.—Panama.
verticillata, Steud. Nom. ed. I. 410 = Salacia senegalensis.
viridis, *Rui» tf Pav. Fl. Per.* i. 44. t. 74. f. a.—Am. trop.
volubilis, Aubl. PI. Gui. i. 30 = Aubletiana.
volubilis, Heyne, in Wall. Cat. n. 4215 = obtusifolia.
volubilis, Linn. Sp. PI. 1191 = ovata.
volubilis, Sw. Obs. Bot. 28 •- Swartziana.
Welwitschii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 867.—Afr. trop.
Zippeliana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 153.— N. Guinea.

HIPPOCRATIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. 175 (1881)=praec.

HIPPOCREPANDRA, Muell. Arg. in Linnaea, xixiv. (1865-66) 61-=Monotaxis, Brongn. (Euphorb.).
gracilis, Muell. Arg. 1. c. 62 = M. gracilis.
ericoides, Muell. Arg. 1. c. = M. grandiflora.
lurida, Muell. Arg. 1. c. 61 = M. lurida.
Neesiana, Muell. Arg. 1. c. 62 - M. grandiflora.

HIFPOCBEFIB, Linn. Syst ed. I (1735). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 510.
FERRUM-EQUINUM, Tourn. ex Medic, in Vorle*. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 370.
HIPPOCRIS, Rafin. Princ Somiol. 27 (1814).
annua, Lag. Gen. et Sp. Nov. 23 = ciliata.
annularis, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) I. 163 - biflora.
arenaria, *Scheele, in Linnaea,* xxi. (1848) 573.—Arab.
areolata, Desv. in Mém. 9oc. Linn. Par. iv. (1827) 329—ciliata.
atlantica, *Ball, injourn. Bet.* xi. (1873) 807.—Marocc

HIPPOCREPIS :—
atlantica, Dur. ex Munby, Cat. PI. Algér. 10 = comosa.
balearica, Cav. ex Nym. Consp. 186 — valentina.
balearica, *Jacq. Misc.* ii. 305.—Ins. Balear.
barbata. Lour. Fl. Cochinch. 453 = Desmodium polycarpum.
bicontorta, Loisel. in Mém. Soc Linn. Par. vi. (1827) 424 = cornigera, *Boiss.*
biflora, Jacq. ex Walp. Ann. ii. 407 — arenaria.
biflora, *Spreng. Pugill.* ii. 73.—Graec ; As. occ.
Bourgaei, Nym. Consp. 186=glauca.
ciliata, Del Campo, ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 256= scabra.
ciliata, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* ii. (1808) 173.—Reg. Mediterr.
comosa, Asso, Syn. PI. Arag. 101 = glauca.
comosa, *Linn. Sp. PI.* 744.—Europ.
comosa, Lucé, Fl. Osil. 248-Ornithopus perpusillus.
comosa, Willk. ex Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 674 =scabra.
constructs, *Kunee, Pugill. PI. Prim.* 12.—Hab. ?
cornigera, *Boiss. Diagn.* Ser. I. ii. 102.—Afr. bor. occ.
cornigera, *Part. Giorn. Bot. Hal.* i. I. (1844) 307.—Arab.
dicarpa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 480=ciliata.
divaricata, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient, ii. 185 = cornigera, *Boiss.*
eriocarpa, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 34-sqnamata.
flexuosa, Zahlb. ex Host, Fl. Austr. ii. 348 = biflora.
Fontanesii, *Boiss. Eleneh.* 38.—Hispan.
glandulosa, *Presl, Fl. Sic. i.* p. xxiii.—Sicilia.
glauca, *Tenore, Fl. Nap.* ii. 165. t. 69.—Europ. austr.
helvetica, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 308=comosa.
humilis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 585 = Desmodium trifiorum.
mimulosa, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 18 = Aeschynomene indica.
minor, Munby, Fl. Algér. 80=multisiliquosa.
monocarpa, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 480—unisiliquosa.
multisiliquosa, *Linn. Sp. PI.* 744.—Reg. Mediterr.
multisiliquosa, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 400=ciliata.
perennis, Lam. Fl. Fr. ii. 657 = comosa.
prostrata, Boiss. Eleneh. 88 = comosa.
pusilla, *Fisch. &" Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1888) 347.-Sibir.
rhomboidea, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 585 = Desmodium spirale.
Salzmanni, *Boiss. (f Reut. Diagn.* Ser. I. ii. 101.—Reg. Medit. occ.
scabra, *DC. Prod.* ii. 812.—Reg. Medit. occ.
scabra, Salzm. ex Coss. Notes Crit. 106=Salzmanni.
squamata, *Coss. 1. c.* 105.—Hispan.
unisiliquosa, *Linn. Sp. PI.* 744.—Reg. Mediterr.
univahis, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 1178 = unisiliquosa.
valentina, *Boiss. Eleneh.* 88.—Hispan.
Willkommiana.. Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 574 = scabra.

HIPPOCRIS, Rafin. Princ. Somiol. 27 (1814)-praec.

HIPPODAMIA, Decne. in Rev. Hortic. Sér. III. ii. (1848) 464 - **Solenophora,** Benth. (Gesner.).
insignis, Decne. 1. c. = S. insignia.

HIPPOGLOSSUM, Breda, Orch. Kuhl. & Hass. [t 14] (1827)=Cirrhopetalum, Lindl. (Orchid.).
umbellatum, Breda, 1. c. = C. maculosum?

HIPPOGLOSSUM, Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. II. (1832); ed. IV. 66 (1843) = **Mertensia,** Roth (Borag.).
maritimum, Hartm. 1. c. = M. maritima.

HIPPOS1ANE, Linn. Gen. ed. L 868 (1737). *EUPHORBJACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 333.
MANCINELLA, TUSS. Fl. Antill. iii. 21. t. 5 (1824).
MARCANILLA, Plum, ex Adans. Fam. ii. 354 (1763).
aucuparia, Crantz, Inst. i. 169—Sapium aucuparium.
biglandulosa, Linn. Sp. PI. ed. II. 1431 = Sapium aucuparium.
biglandulosa, Sw. Obs. Bot. 370 — Sapium Laurocerasus.
dioica, Rottb. in Act. Lit Univ. Ham. i. (1778) 301 = H. Mancinella?
glandulosa. Linn. Sp. PI. 1191-Sapium ancuparium.
Mançanilla, Jacq. Select. Am. 250 - seq.
Mancinella, *Linn. Sp. PI.* 1191.—Ind. occ.
spinosa, *Linn. I. c.* (sp. dub,).—Ind. occ.

HIPPOMANES, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)88=praec.

HIPPOMANICA, Molina, Sagg. Chil. 126 (1782^ genus fabulosum—Ph&cae spp.-tPernettyafuriens, *Phil./-incana,* Molina, 1. c.—Chili.
sessilifolia,* J. F. Gmel. Syst. *6H-incana.

HIPPOMARATHRUM, Hall, in Rupp. FL Jen. ed. II. 280 U745) = SeBeli, Linn. (Umbellif.).
buchtormense. Link, Handb. i. 349=S. buchtormense.
dichotomum, Link. 1. c. = S. dichotomum.
leucospermum, Link, 1. c.=S. leucospermum.
pelviforme, Gaeitn. Mey. *Sc* Scheib. Fl. Wett i. 418 •= S. Hippomarathrum.
petraeum, Link, Handb. i. 349 = S. petraeum.
peucedanifolium, Link, 1. c - S. rigidnm.
vulgare, Roehl. ex DC. Prod. iv. 144 = S. Hippomarathrum.

HIPPOMARATHRITM:, Hoffmgg. *Sc* Link, FL Port. ii. 411 (1820). *UMBELUFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 883.
LOPHOCACHKYS, Koch, ex D':. Prod. iv. 288 (1830); Bertol. Fl. Ital. iii. 455 (1837).
SCHRENKIA, Fisch. & Mey. in Schrenk, Enum. PL Nov. 63 (1841).
TKACHYMARATHRUM, Tausch, in Flora, xvii. (1831) 344.
amplifolium, Ledeb. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane. 131—crispum.
Bocconi, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. ii. (1844) 74.—Sicilia.
Boissieri, *Reut. &" Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* U-933.—Syria
crassilobnm, *Boiss. (f Heldr. Diagn.* Ser. I. x. 56.—Graecia.
crispatum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 151.—Alger.
crispum, *Koch, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1824) 136-—As. Min.; Reg. Casp.
cristatum, *Boat, in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. ii. (18") 75.—Europ. austr.
Fedtschenkoi, *Regel If Schmalh. in Act. Hort. Petrop-*v. (1877) 603.—Turkestan.
Libanotis, *Koch, ex DC. Prod.* iv. 287.—Afr. bor.
pterochlaenum, Boiss. Fl. Orient, ii. 982=- cristatum.
pterochlaenum, Boiss. in Ann. Sc Nat. Ser. III. »• (1844)74=siculum?
pungens, *Boiss. ex Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 152.— Afr. bor.
sarawschanicum, *Regel V Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 60S.—Turkestan,
scabrum, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 938.—Syria,
siculum, *Hoffmgg. (f Link, Ft. Port.* ii. 411.—Reg-Mediterr.
vaginatum, *Benth. V Hook. f. Gen.* i. 883.—Sibir. altaic

HIPPOPHAE, Linn. Syst. ed. I (1735). *ELAEAGNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii 204.
OLEASTER, Heist. Syst. 11,16 (1748).
RHAMNOIDES, Tonm. ex Moench, Meth. 343 (17W-
argentea, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 115=Shepherd* argentea.
canadensis, Linn. Sp. P].1024 = Shepherdiacanadensis-
conferta, Wall. Cat. n. 4032=salicifolia.
fasciculata, *Wall, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 769.—Nepal.
littoralis, Salisb. Prod. 71=rhamnoides.
nepalensis, Hort. Angl. ex Steud. Nom. ed. II. i- = salicifolia t
rhamnoides, *Linn. Sp. PI.* 1023.—Europ.; As. temp-
salicifolia, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 68.—Nepal.
sibirica, Hort. ex Steud. Nom. ed. IL i. 77O=*araноides.
tibetana, Schlecht in Linnaea, xxxii. (1863) 2 9e * rhamnoides.
HIPPOPHAËS, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, * (1880) 88=Hippophaë, Linn. (Elaeagn.).
rhamnoideum, St. Lag. L c. 127 - Hippophae roam noides.

HIPPOPHAESTUM, S. F. Gray, Nat Arr. Britfl-"1-443 (1821) = **Centeurea,** Linn. (Compos.).
vulgare, S. ¥. Gray, 1. c - C. Calcitrapa.

HIPPOSERIS, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiii. 464 (1824) - **OnoserlB,** DC. (Compos.).
acerifolia, Cass. 1. c = O. acerifolia.
salicifolia, Cass. 1. c = O. salicifolia.

HIPPOTHRONIA. Benth. Lab. Gen. et Sp. 130, in syn. (1833) - HYPOTHROMA, Schrank = Hyptis, Jac<p (Labiat.).

BIPPOTIS, Ruiz *Sc* Pay. Prod. FL Per. 33 (1791). *RUBIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 70.
albiflora, *Karst. Fl. Columb.* i. t. 17.—N. Granat.
multiflora, Benth. ex Hook. f. in Ic. PL t. 1098-Phitopis multiflora.
pyrifolia, Bert, ex Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 360 = Psychotria pyrifolia.
triflora, Bert, in Ann. Sc. Nat *Sit.* I. xxi. (1830) 817 = Coprosraa triflora.
triflora, *RuiM V Pav. Prod.* S3; *Fl. Per.* ii. 66.—Peruv.

HIPPOXYLON, Rafin. Sylva Tellur. 78 (1838)=Oroxylum, Vent (Bignon.).
indica, Rafin. 1. c. = O. indicum.

HIPPTJBIS, Linn. Syst. ed. I (1735). *HALORAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 675.
LIMNAPEUCE, Adans. Fam. ii. 80 (1763).
Alopecuros, Bousch. ex Brouss. Elench. PI. Hort. Monsp. 1801 (1805) 80, nomen = vulgaris.
Eschscholtzii, Cham, ex Ledeb. FL Ross. ii. 120 = vulgaris.
fluitans, Liljebl. ex Hising. Fl. Fagervik, 32-vulgaris.
fluviatilis, Hoffm. Dentsehl. Fl. ed. II. i. 1-vulgans.
indica, Una. FL Cochinch. 16=Eleocharis plantaginea.
lanceolata, Retz. Obs. iii. 7. t 1=vulgaris.
maritima, Hellen. in Usteri, Delect. Opnsc Bot. I. (1790) 11-vulgaris.
montana, Ledeb. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. I. 71. t. 86. f. 181-vulgaris.
palustris, Gorter, Fl. Ingr. 1 = vulgaris.
Polyphylla, Rafin. Fl. Ludov. IS-vulgaris.
tetraphylla. Linn. f. Suppl. 81 = vulgaris.
verticillata, Gilib. Exercit. ii. 118 (err. typ. 518) = vulgaris.
Vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 1.—Europ.: As. bor.: Am. bor. et austr.

HIPTAOB, Gaertn. Fruct. ii. 69. t. 116 (1791)-*MALPIGHIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 258.
GAERTNERA, Schreb. Gen. i. 290 (1789).
MOLINA, Cav. Diss. ix. 185. t. 263 (1790).
SUCCONIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 32 (1818).
acuminata, *Wall. Cat.* n. 1065.—Reg. Himal.
arborea, *Kurt, in Journ.As.Soc. Beng.* xlu. (1873) II. 228—Burma.
benghalensis, *Kurm, I. c.* xliii. (1871) H. 136.—Burma,
wndicans, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 119.—Burma,
javanica, *Blume, Bijdr.* 221.—Java.
hurifolia, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1813) 502 . = parvifolia J
Madablota, *Gaertn. Fruct.* ii. 169. t 116.-A*. trop.
myrtifolia, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 267.—, Ins. Fiji,
obtusifolia, *DC. Prod.* i. 588.-China.
Paniflora, Wight, ex Hook. f. FL Bnt. Ind. 1.119 = sericea.
ParvifoUa, *Wight V Am. Prod.* 107.-Ind. or.
Wncea. *Hook./. Fl. Brit. Ind. i.* I19.-Malaya.
»wnatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. S}*-*TM^
, *batata*, Span*in Linnaea, xv. (1811) 179 - H. Madablota.

[a]I&AI!A.Jacq. Ennm. PI. Carib. 1 (1760). *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f.i. 260.
MASCAGNIA, Bert, ex Colla. Hort Ripul. 86 (1824).
^rninata, [Moc. & Sesse,] ex DC. Prod. i. 686-Gaudichaudia acuminata.
"wtifelia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 169.-VenezneL
a«"«, *Miq. in Linnaea*, xix. (1817) ^T^SSgu
[ai]»Wg, *Miq. in Linnaea*, xix. (1817) 665.
anisc la, *A_ f**_in s t _ m _ n Bras, Mer,* iii. 16.
•'gentea, *A. Juss. I. c.* 17.1163.—Bras,
se, *Moric. PI.* N W . Am. 107-Salzmanniana.
Barclayan
Barredae, *BArcena, Not. Cient. Estad. Htdalg.* 36.-Mexic.

HIRAEA:—
bierosa, *if one. ex A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 552.—Bras.
Blanchetiana, *Moric. PI. Notm. Am.* 101.—Gnian.
brachyptera, *Triana tf Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 382.—N. Granat.
bunchosioides, A. Juss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer. iii. 13 -Heladena bunchosioides.
candicans, A. Rich, in Arch. Mus. Par. iii. (1813) 155 ^psilophylla.
Cephalotes, Triana *Sc* Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir. IV. xviii. (1862) 331.—N. Granat.
chlorocarpa, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 560.—Bras.
chrysophylla, *A. Juss. I. c.* 572.—Guian.
cinerea, *Bunb. in Proc. Linn. Soc.* L (1811) 109.—Bras,
complicata, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 169.—Venezuela.
concava, Wall. PL As. Rar. i. 13 = Aspidopterys concava.
cordata, Heyne, ex Wall. 1. c. <= Aspidopterys cordata.
cordifolia, *A. Juss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* iii. IB. t. 161.—Bras.
cornifolia, Willd. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 95, sphalm.=praec.
crassipes, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 668.—Peruv.
crispa, A. Rich. 1. c. 522-Tetrapterys crispa.
cujabensis, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 100.—Bras.
cuneata, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1889) 246.—Bras.
cyclocarpa, Poepp. ex Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 95—elegans.
cycloptera. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 280 = Gaudichaudia Amottiana.
cycloptera, *[Moc. & Sesse,] ex DC. Prod.* i. 586.—Mexic.
dentulata, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 665.—Bras.
divaricate, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* v. 169.—Venezuela,
elegans, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 519.—Peruv.
elliptica, Blume, Bijdr. 226 - Aspidopterys elliptica.
fagifolia, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1818) 567.—Gnian.
Finlaysoniana, Wall. Cat n. 7263 = Decaspermum paniculatum.
floribunda, A. Juss. in St. Hil. FL Bras. Mer. iii. 22 = Heteroptcrys aceroides.
fluminensis, *Griseb. in Linnaea*, xiii. (1839) 213.—Bras,
fulgens, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 672.—Bras.
galphimioides, Griseb. ex Schomb. Faun, et Fl. Brit Gui. 1096 = Tetrapterys maranhamensis.
Gaudichaudiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 571.—Bras.
glabra, Spreng. Neue Entdeck. ii. 161 = Tetrapterys punctulata.
glabriuscula, Wall. Cat. n. 6626. p. 260=Aspidopterys Roxburghiana.
glauceseens, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 188 (Quid t).—Ind. or.
gracilis, Benth. in Hook. Lond. Joura. Bot vii. (1848) 136-Tetrapterys maranhamensis.
Greggii, £. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 833.—Mexic.
heteropetala, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1848) 657 -Tetrapterys heteropetala.
hippocrateoides, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 328.—N. Granat.
hirsuta, Wall. PL As. Rar. i. 13. 1.13 - Aspidopterys hirsuta.
Hookeriana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 570.—Ind. occ.
Houlletiana, A. Juss. 1. c 576 - Wiedeana.
hypericoides, Burch. ex DC. Prod. i. 585=Triaspis hypericoides.
indica, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. iL 118-Aspidopterys Roxburghiana.
indica. Wall. Cat n. 1057, partim=Aspidopterys nntans,
intermedia, A. Toss, in St. HiL Fl. Bras. Mer. iii. 21-Heteropterys intermedia.
Jnssieuana, *Miq. in Linnaea*, xix. (1847) 112.—Goian.

HIKAEA:—
Kunthiana, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 671.—N. Granat
lanuginosa, Wall. PI. As. Rar. i. 13-Aspidopterys nutans.
lasiandra, A. Juss. in Arch. Mas. Par. iii. (1818) 557—Tetrapterys mogoriifolia.
laurifolia, A. Juss. L c. 556=Tetrapterys laurifolia.
laurifolia, Willd. ex Griseb. in Mart Fl. Bras. xii. I. 80 = Tetrapterys mucronata.
leucosepala, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 240 - Tetrapterys leucosepala.
lilacina, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 833.—Mexic.
longifolia, Rich, ex A. Rich, in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 824-DiplopterysParalias.
macradina, *DC. Prod.* i. 585.—Am. austr.
macrodisca, *Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sit.* IV. xviii. (1862) 326.—Am. austr.
macroptera, [Mo;. *Sc* Sesse,] ex DC. Prod. i. 586 = septentrionalist
manzinellensis, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1851 (1856) 117.—Panama,
maritima, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1813) 662.—Bras.
merguensis, Wight, Illustr. i. 139 *(merguiensis)* - Aspidopterys concava.
microphylla, *A. Juss. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* iii. 16.—Bras.
Moricandiana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii (1813) 561=cuneata.
mucronata, [Moc. *Sc* Sesse,] ex DC. Prod. i. 586-Gaudichaudia filipendula.
mucronata, Rich, ex A. Rich, in Arch. Mus. Par. iii. (1818) 324-Diplopterys Paralias.
multiflora, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 239-Tetrapterys mogoriifolia.
multiflora, *Miq. Stirp. Sunn. Sel.* 88.—Guian.
mnltiradiata, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 675.—Guian.
nepalensis, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 170, nomen.—Nepal.
nitida, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.v.* 169.—VenezueL
nutans, Roxb. Hort. Beng. 34; Fl. Ind. ii. 447 - Aspidopterys nutans.
nutans, Wall. PL As. Rar. i. 18 = Aspidopterys WaU lichii.
oblongifolia, *DC. Prod.* i. 585.—Am. austr.
obscura, Blume, Bijdr. 226 = Ryssoplerys timorensis.
odorata, Willd. Sp. PL ii. 743=-Triaspis odorata.
oleaefolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot vil. (1848) 136=Tetrapterys oleifolia.
orbiculata, Roxb. ex G. Don, Gen. Syst. i. 611 «• Aspidopterys nutans.
ovata, Blume, Bijdr. 226 - Ryssopteris timorensis.
ovatifolia, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 169.—Venezuela.
oxyota, [Moc. *Ic* Sesse,] ex DC. Prod. i. 586-Gaudichaudia oxyota.
oxyphylla, Wall. Cat n. 7264 = Aspidopterys Roxburghiana.
panamensis, Griseb. in Mart. Fl. Bras. xii. I. 100 - Barclayana.
paniculata, Raeusch. Norn. ed. III. 131-Flabellaria paniculata.
Pauciflora, A. Juss. in St Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 22 - Heteropteris pauciflora.
pinnata, Willd. Sp. PL ii. 718-Flabellaria paniculata.
platyptera, Griseb. in Linnaea, xiii. (1839) 244 - psilophylla.
platyrachis, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat. Sir.* IV. xviii. (1862) 328.—N. Granat.
Podocarpa, [Mqc. *Sc* Sesse,] ex DC. Prod. i. 686 - Gaudichaudia podocarpa.
Poeppigiana, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 656—Tetrapterys Poeppigiana.
polybotrya, *A. Juss. 1. c.* 663. —Mexic.
prunifolia, *H. B. V X. Nov. Gen. et Sp.* v. 169.—Venezuela,
psilophylla, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 20.—liras.
pnbiflora, *A. Juss. I. c.* 11.—Bras.
reclinata, Blanco, Fl. Filip. ed.I. 378 (Hiptages sp,). —Ins. Philip.
reclinata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 21.—N. Granat
renidens, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1813) 558-Tetrapterys renidens.
Riedleyana, *A. Jaw. I. e.* 569.—Guian.

HIRAEA:—
rigida, *A. fuss, in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 14.—Bias,
rosea, *Miq. Stirp. Surin. Set.* 84.—Guian.
rotundi/olia, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. iL 448 -Aspidopterys nutans.
salicifolia, *A. fuss, in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 18. —Bras.
Salzmanniana, *A. fuss,* in *Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 666.—Bras,
schizoptera, *Turcz. in Bull. Soc. Wat. Afosc.* xxxvi. (1863) I. 584.—Ins. S. Vincent
sepium, *A. fuss, in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* iii. 19. t. 166.—Bras,
septentrionalis, *A. fuss, in Ann. Sc. Wat.* Sér. II. xiii. (1840) 259.—Mexic.
sericea, *Engelm. ex A. Gray, PL Wright.* i. 87.- Mexic.
sericea, A. Juss. in St Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 16= Tetrapterys sericea.
sericifolia, A. Juss. ex Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 104=cujabensis.
Simsiana, *A. fuss, in Arch. Mus. Par.* iii. (1848) 560. —lad. occ; Guian.
spicigera, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 584.—Mexic
Swartziana, *A. fuss, in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 571.—N. Granat.
temifolia, *A. fuss. I. c.* 575.—N. Granat.
tomentosa, Blame, Bijdr. 225=Aspidopterys tomentosa.
violacea, *Triana tf Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 327.—N. Granat.
Wiedeana, *A. fuss, in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 574.—Bras.

HIRCULUS.Haw.Saxifr. Enum. 40 (1821) = Saxifraga, Linn.
flagellaris, Haw. 1. c.-»S. flagellaris.
propinquus. Haw. I. c. = S. Hirculus.
punctatus, Rafin. Fl. Tellur.ii. 69=S. Hirculus.
ranunculoides, Haw. Saxifr. Enum. 40=S. Hircnlus.

HIRNELLIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1820) 57 = Myriocephalus, Benth. (Compos.).
cotuloides, Cass. in Diet. Sc. Nat. vii. 229 (=Angianthus tomentosus ?).—Austral.

HTKPICIUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1820) 27. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 460.
echinulatum, *Cass. I. c.*—Afr. austr.
Echinus, *Less. Syn. Comp.* 55.—Air. austr.
integrifolium, *Less. I. c.* 53.—Afr. austr. .

HIRSCHFELDIA, Moench, Meth. 264 (1724)- Brassica, Tourn. (Crucif.).
adpressa, Moench, 1. c.—B. adpressa.
cansobrina, Pomel, Mat. Fl. Atl. 12 = B. adpressa.
geniculata, Pomel, 1. c = B. adpressa.
heterophylla, Amo, Fl. Iber. vi. 484 = B. adpressa.
incana, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 686 = B. adpressa.
inflexa, Presl, Fl. Sicil. i. 97 - B. incana.
integrifolia, Presl, 1. c — B. incana !
varians, Pomel, Mat Fl. Atl. 12 = B. variat

HIHTELIiA, Linn. Hort. Cliff. 17 (1787). *ROSACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 608.
CAUSEA, Scop. Introd. 210 (1777).
COSMIBUENA, Ruiz *Sc* Pav. Prod. Fl. Per. 10. t. 2 (1794).
SPHENISTA, Rafin. Sylva Tellur. 90 (1838).
ZANZELA, Rafin. 1. c. (1838).
acayacensis, *[Mof. tf Sesse,] ex DC. Prod.* ii. 529.—Mexic.
aggregata, Poir. Encyc. Soppl. ii. 53=hirsuta.
americana, Jacq. Select. Am. 8. t. 8 = triandra.
americana, *Linn. Sp. PI.* 34.—Am. trop.
angustifolia, *Schott, in Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 341.—Bras.
apetala, E. Mey. in Nov. Act. Nat Cur. xii. (1825) 803 = Moquilea floribunda.
bicomis, *Mart. tf Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1832) 877.—Bras,
brachystachys, *Spruce, ex Hook. /. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 34.—Bras,
bracteata, *Mart. tf Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1832) 384.—Bras.
bracteosa, *Steud. in Flora,* xxvi. (1843) 761.—Guian.
bullata, *Benth. in Hook, fourn. Bot.* ii. (1840) 216.—Guian.

HIRTELLA:—
canomenris, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 841=Couepia canomensis.
castanea, *[Mof. tf Sesse,] ex DC. Prod.* ii. 528.—Mexic.
ciliata, *Mart, tf Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1832) 378—Bras.
Cliffortia, *Veil. Fl. Flum.* 91; ii. 186.—Bras,
cognata, *Steud. in Flora,* xxvi. (1843) 761.—Guian.
coriacea, Mart. *Sc* Zncc. in Abh. Akad. Muench. i. (1832) 383=americana.
corymbosa, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 545.—Bras.
Cosmibuena, *Lam. Illustr.* ii. 114.—Persv.
dodecandra, *[Mof. tf Sesse,] ex DC. Prod.* ii. 529.—Mexic
ettiptica, Presl, Symb. Bot. ii. 11 = triandra.
elongata, *Mart, tf Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1832) 384.—Bras,
eriandra, *Benth. in Hook, fourn. Bot.* ii. (1840) 217.—Am* trop.
filiformis, Presl, Symb. Bot. ii. 28 = americana.
floribunda, *Cham, tf Schlecht. in Linnaea,* ii. (1827) 548.—Bras.
Gardnerii, Benth. in Hook. Joura. Bot. ii. (1840) 216 =hebeclada.
glaberrima, Stead, in Flora, xxvi. (1843) 761 = Crudia obliqna.
glandulosa, Spreng. Neue Entdeck. i. 303.—Bras.
Guainiae, *Spruce, ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 81.—Bras.
hebeclada, *Moric. in DC. Prod.* ii. 529.—Bras.
hexandra, Willd. ex Roem. & Schult Syst. v. 274 = americana.
hirsuta, *Lam. Illustr.* ii. 114.—Guian.
hispidula, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 27.—Guian.
indecora, Schott, ex Spreng. Syst iv. App. 404 = triandra.
longiiolia, *Benth. ex Hook. f. in Mart. Ft. Bras.* xiv. II. 31.—Bras.
macrophylla, *Benth. ex Hook./. 1. c.* 36.—Bras.
Martiana, *Hook. f. I. c.* 29.—Bras,
mollicoma, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 268.—N. Granat.
mollissima, HemsL Biol. Centr. Am. Bot. i. 866 = praec.
nemorosa, *Hoffmgg. ex Roem. tf Schult. Syst. v.* 274. -Bras.
nitida, Humb. *Sc* Bonpl. ex Roem. *Sc* Schult. 1. c.= americana.
oblongifolia, DC. Prod. ii. 529=americana.
octandra, Hoffmgg. ex Roem. *Sc* Schult Syst v. 274 = Moquilea Turiuva.
olivaeformis, Poir. Encyc Suppl. iii. 53 = Icacina senegalensis.
paniculata, Lam. Encyc. iii. 33=triandra.
paniculata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 51 = hirsuta.
pendula, *Soland. ex Lam. Encyc.* iii. 134.—Am. austr.
peruviana, Pers. Syn. i. 250=H. Cosmibuena.
physophora, *Mart, tf Zucc. in Abh. Akad. Muench. L* (1832) 374.—Bras.
pilosissima, *Mart, tf Zucc. t. c.* 373.—Bras.
Pohlii, *Hook./, in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 33.—Bras.
polyandra, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 246 = Couepia Kunthiana.
portoricensis, Hnmb. *Sc* Bonpl. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. v. 274=rugosa.
praealta, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xv. (1883) 304.—Guian.
punctulata, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 439 = triandra.
racemosa, Lam. Encyc. iii. 133 = americana.
racemosa, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iii. 5 = H. Cosmibuena.
Roraimae, *Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Brit. Gui.* 1103, nomen.—Guian.
rosea, [Moe. *Sc* Sesse,] ex DC. Prod. ii. 528-americana.
rubra, Benth. in Hook. Joura. Bot. ii. (1840) 217 = ciliata.
rugosa, *Thuill. ex Pers. Syn.* i. 250.—Ind. occ.
scaberula, *Spruce, ex Hook. /. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 33.—Bias,
scabra, *Benth. in Hook, fourn. Bot.* ii. (1840) 218.—Guian.
scandens, Hoffmgg. ex Roem. & Schult. Syst. v. 274 = americana.
Selloana, *Hook. f. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 29.—Bras.

HIRTELLA:—
silicia, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 229.—Ins. Trinitat.
Sprucei, *Benth. ex Hook./, in Mart. Fl. Bras.'* xiv. II-31.—Bras.
strigulosa, *Steud. in Flora,* xxvi. (1848) 761.—Guian.
subscandens, *Spruce, ex Hook. /. in Mart. Fl. Bras.* xiv. II. 32.—Bras,
tentaculata, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 75.—Bras.
tomentella,S<:Ao«, *ex Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 341. —Bras.
triandra, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 51.—Ind. occ.
violacea, *Steud. in Flora,* xxvi. (1843) 761.—Guian.
zanzibarica, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1193.—Afr. trop.

HIRTELLIA, Dam. Anal. Fam. 40 (1829)=praec

HIRTELLINA, Cass. in Diet Sc Nat xlvii. 499, 511 (1827) 1. 441 = Stachelina, Linn. (Compos.).
lanceolata, Cass. 1. c 441=S. fruticosa.

HISBANCHE, Sparrm. ex Meissn. Gen. Comm. 275 (1843)c=Cytinua? Linn. (Legum.).

HISINGERA, Hellen. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1792) 32. t. 2=Xyloama, Forst. (Bixin.).
Benthami, Clos, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. viä. (1857) 221,223, 225=X. Benthami.
celastrinea, Clos, 1. c. 224-X. nitidum.
ciliati/olia, Clos, 1. c. 228=X. ciliatifolium.
cinerea, Clos, 1. c.=X. cinereum.
elegans, Clos, *I* c. 224 = X. elegans.
elliptica, Clos, 1. c. = X. ellipticum, *Hemsl.*
flexuosa, Clos, 1. c. 225=X. flexuosum.
grandi/olia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxvii-(1854) II. 832.—Ins. Philipp.
intermedia, Seem. Bot. Voy. Herald. 249 = X. intermedium.
japonica, Sieb. & Zucc. FL Jap. Fam. Nat. i. 60=X. racemosum.
lucens, Clos, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. viii. (1857) 22» =X. Benthami.
mexicana, Planch, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. !• 67=X. ellipticum.
nitida, Hellen. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1792) 32. t 2 = X. nitidnm.
nitida, Seem. Bot. Voy. Herald, 249 =X. Seemanni.
obmata, Clos, in Ann. Sc Nat. Sér. IV. viii. (1857) 273-X. obovatum.
Paliurus, Clos, 1. c. 227.—Hab. ?
Prockia, Turcz. in Bull. Soc Nat Mo«c xxvii. (1854) II. 332.—Bras.
pruni/olia, Clos, in Ann. Sc. Nat Sér. IV. viii. (1857) 227=X. prunifolhm.
puberula, Schlecht. ex Griseb. Fl. Brit W. Ind. 21 = X. nitidum.
racemosa, Sieb. *Sc* Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat L W» X. racemosum.
Rumea, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 223 = X. nitidum.
Salzmannii, Clos, 1. c. 224=X. Salzmanni.
spiculi/era, Clos, 1. c. 223 *(spicli/era)* «= Flaconrtw spiculifera.
Tulasnei, Clos, 1. c. 224=Flacourtia elegans, velum
Tweediana, Clos, I. c. 226.—Bras.

HISPIDEIiIiA, Bamad. ex Lam. Encyc t iii- (1789). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. *t.* it
SOLDEVILLA, Lag. Varied, de Cienc ii. *V-* (1857) 37.
Barnardesii, Cass. in Diet Sc. Nat. xri. 248 = hispanica.
hispanica, *Bamad. ex Lam. Encyc.* iii. 13 —Hispan.
Welvritschi, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xiv. (1856) 236=bispanicat

HISSOPUS, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. v. (1793) 62* Hyssopus, Tourn. (Labiat).

HISUTSUA, DC. Prod. vi. 44 (1837) •= Boltonia, L'Hérit. (Compos.).
eantoniensis, DC. 1. c - B. indica.
serrata, Hook. *Sc* Am. Bot Beech. Voy. 289 = B. indica.

HITCHENIA, Wall, in Trans. Med. Phys. Soc Calc. vii. (1834) 216. *SCITAMINEAE,* Benth. & Hook, f. nil. 648.
DISCHEMA, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 566 (1845).
Careyana, *Benth. &• Hook.f. Gen.* iii. 643.—Ind. or.
glaoca, *Wall, in Trans. Med. Phys. Soc. Calc.* vii. (1884) 215—Burma.
Roscoeana, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 643=Curcuma Roscoeana.

HITCHINIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 78 (1885), lapsu = HUTCHINIA, Wight & Am. = Boucerouia, Wight & Am. (Asdep.).
indica, Hook. *i.* 1. c. = R Hutchinia.

HITCHINIA, Horan. Prod. Monog. Scit 24 (1862) = Hitchenia, WalL (Scitam.).

HITZERA, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 89 (1861) •=Coinmiphora, Jacq. (Anacard.).
edulte, Klotzsch, 1. c - C . eilulis.

HLADNICKIA, Meissn. Gen. 143 (1888) = HLADNIKIA, Reichb.-Carum, Linn. (Umbellif.).

HLADNICKIA, Steud. Nom. ed. II. i. 771 (1840) = seq.

HLADNIKIA, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 320 (1835) •PleuroBpennum, Hofim. (Umbellif).
Cicutaria, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 71 —Elcutherospermum grandifolium.
folaeensis, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 820.—Europ.
Golaka, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xxi. *95-golaeensis.*

HLADNIKIA, Reichb. Ic PI. Crit. ix. 9. t. 825 (1881); « Fl. Germ. Excnrs. 476 (1832) = Carum, Linn. (Umbell.).
Pastinacifolia. Reichb. 11. cc. = C. latifolium.

HoOAREA, s weet G eran. t. lg (1820)-Pelargonium, L'Hérit. (Gerai.).
amoena. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76 = P. amoenum.
a*gustifolia,* Eckl. & Zeyh. Enum. 61=P. astragalifolium.
"*Ppendiculatum,* Eckl. *Sc* Zeyh. L c. 65=P. appendicmatum.
"*stragalifolia,* Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 64 = P. astragalifolium.
at*ra.* Sweet, Geran. t. 72=P. atram.
"*trofusca,* Steud. Nom. ed. II. i. 771 = P. atrofuscum.
air*osanguinea.* Sweet. Geran. t. 151 = P. atrosangnineum.
"*"riculata,* Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76 = P. auriculatum.
°Ur*ita,* Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 60 = P. anritum.
*;«'*a<a, Eckl. & Zeyh. L c. 62-P. barbatum.
"*color,* Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76-P. pilosum.
fi»ga, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 65 = P. bijugum.
"*PjHtatifida,* Edd. *Sc* Zeyh. 1. c. 62 = P. bipinnaU- fidum.
?'<»'*», Sweet. Hort. Brit. ed. I. 76 = P. pilosum.
"*tonifolia,* Sweet, 1. c 75 =P. bubonifolium.
c<"*pestris, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 63=P. campestre.
I'Pitata, Sweet, Hort Brit ed. I. 76=P. capitatum.
SP"'"'' Sweet, Geran. t. 185 = P. nutans.
•*%*« . Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76; Eckl. *8c* Zeyh. ,1~non». 61-P. longifolium.
^ " ' « . Sweet, Geran. t. 898=P. hybridum.
^*utgaefolia.* Sweet, *I* c. t 311-P. coluteaefohum.
*Sweet, 1. c. t. 260.
corydalis Sweet, 1. c. t 302 = P. congestum.
depressa, flora, Sweet, I. c. t.18 = P. rapaceuzn. longifo- lunm.
*dilutd, Sweet> !• =• =P- dilutum.
dioica > Swe,t,l.c. = P.atrum.
*ele y W , Sweet, Geran , t, 132=P. Sweetianum.
*«*o/o, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 61 = P. ensatum.
*eryth- bro- phyllum
eupat 'olia, Eckl. & Zeyh. l. c. 64 "R eup8toriae, fo\i^
%fjf°Ha, Eckl. & Zeyh. 1. c. 62-P. fissifolium.
*full°V"'Eckl - * Ze/h-1- c. 64 = P. astragalifolium.
^^^Colville, ex Sweet, Hort Brit. ed. I. 76-P. rum
gale giMiax Sweet, 1. c nomen

HOAREA :-
gracilis, Eckl. & Zeyh. Enum. 64 = Pelargonium gracile.
hedysarifolia, Sweet, Geran. t. 355=P. hedysarifolium.
heterophylla, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 63 = P. variifolium.
hirsuta, Sweet, Hort Brit, ed L 76; Eckl. *Sc* Zeyh. Lc.=P. atrum.
incrassata. Sweet, L c 76=P. incrassatum.
intermixta, Sweet, 1. c. 76=P. intermixtum.
intertexta, Steud. Nom. ed. II. i. 771 = P. intertextum.
Jenkinsoni, Colville, ex Sweet, Hort. Brit ed. I. 76 = P. Jenkinsoni.
labyrinthica, Sweet, Geran. t. 276=P. labyrinthicum.
ladniata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 75 ; Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 62=P. laciniatum.
lancifolia, Eckl. & Zeyh. 1. c 61 = P. lancifolium.
Leeana, Sweet, Geran. t 323=P. Leeanum.
lessertiaefolium, Eckl. & Zeyh. Enum. 64=P. astragalifolium.
Marina, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76=P. lilacinum.
linearis, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 62=P. lineare.
literata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 91, nomen.—Hab. ?
longiflora, Sweet, 1. c. 76 = P. longifolium.
langifolia. Sweet, I. c.=P. longifolium.
lutea, Sweet, 1. c = P. luteum.
magica, Colville, ex Sweet, 1. c. nomen.—Hab. *1*
marginata, Sweet, 1. c. nomen=P. marginatum.
melanantha, Sweet, Geran. t. 78=P. atram.
nervi/olia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76 — P. nervifohum.
nigricans, Colville, ex Sweet, 1. c. nomen •= P. nigrescens.
nivea. Sweet, Geran. t. 182 = P. niveum.
nummularifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76 = P. nnmmularifolinm.
nutans. Sweet, Geran. t. 136 = P. nutans.
ornithopifolia, Eckl. *Sc* Zeyh. Ennm. 64 = P. omithopifolinm.
orobifolia, Sweet, Geran. t. 804 = P. orobifolium.
*ovali/olia,*i Sweet, 1. c t. 106 = P. ovalifolium.
parnassioides, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 60 — P. parnassioides.
patens. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76-P. patens.
pectinata, Eckl. & Zeyh. Enum. 61=P. reticulatum.
penni/ormis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 75; Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 62-P. penniforme.
pilosa, Sweet, 1. c 76-P. pilosum.
pilosellaefotia, Eckl. & Zeyh. Enum. 61=P.pilosellaefolium.
pinnata, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 64-P. pinnatum.
prolifera, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. 62 = P. barbatum.
pulchella, Sweet, Hon. Brit. ed. I. 76 = P. pulchellum.
purpurascens. Sweet, 1. c. 75; Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 62 =P. longifolium.
radiata, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c. = P. radiatum.
radicata, Sweet, Geran. t. 174 =P. radicatum.
rapacea, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 75; Eckl. & Zeyh. Enum. 65 = P. rapnceum.
reticulata, Sweet, Geran. t. 81=P. reticulatum.
retusa, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 110 - P. retusum.
revoluta, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 60 - P. reyolutum.
rhoeadifolia, Eckl. & Zeyh. 1. c. 63 = P. rnoeadifolium.
rosea, Sweet, Geran. t. 262=P. condensatum.
rubescens, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76 = P. rubescens.
selinifolia, Sweet, Geran. t. 169= P. selinifolium.
setosa, Sweet, 1. c. t. 88 ; Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 63 = P. setosum.
sisymbriifolia. Sweet, 1. c t. 292 = P. sisymbriifolium.
strigosa, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 61-P. strigosum.
superba, Sweet, Hort Brit. ed. I. 76-P. superbum.
tenuifolia, Sweet, 1. c =P. tenuifolium.
theiantha, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 68=P. ochroleucum.
trifoliolata, Eckl. & Zeyh. 1. c 64 = P. astragalifolium.
triphylla, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76 = P. triphyllum.
undulaeflora, Sweet, Geran. t. 263—P. undnlaeflorum.
unguiculata, Sweet, Hort. Brit ed. I. 76=P. unguiculatonl.
varia, Sweet, Geran. t 166 = P. varinm.
venosa, Sweet, 1. c. t. 209 = P. venosum.
•*villosa.* Sweet, Hort. Brit. ed. I. 76 = P. villosum.
violaeflora, Sweet, Geran. 1.128 = P. violaeflonim.
virginea, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 61 = P. longifolium.

HOCHENWARTIA, Crantz, Inst. ii. 468 (1766) = Bhododendron, Linn. (Ericac).
canadensis, Crantz, 1. c. 469-R.Rhodora.

HOCHSTETTERA, Spach, Hist Veg. Phan. x. 28 (1841)-seq.

HOCH8TETTEBIA, DC. Prod. vii. 287 (1888). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 492.
Schimperi, *DC. I.* c—Arab.

HOCKEA, Lindl. Veg. Kingd. 626 (1847), err. typ.= Poekea, Endl. (Aidep.).

HOCKHTIA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 12. *GENTIANEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 808.
montana, *Gardn. 1. c.*—Bras.

HOCQUARTIA, Dnm. Comm. Bot. 30 (1822)-Ariatoloohla, Linn.
macrophylla, Dnm. 1. c = A. Sipho.
tomentosa, Dum. 1. c— A. tomentosa.

HODGKINSONIA, F. Muell. Fragm. ii. 132(1861). *RUB1ACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 106.
ovatiflora, *F. Muell. I. c*—Austral.

HODGSONIA, Hook. f. *Sc* Thorns, in Proc. Linn. Soc. ii. (1853) 257. *CUCURBITACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 820.
heteroclita, *Hook.f. IS Thorns. I. c*—Reg. Himal.; Burma; Malaya.
macrocarpa, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 849-heteroclita.

HODGSONIA, F. Muell. Fragm. ii. 95 (1860) = Hodgsoniola, F. Muell. (Liliac).
junciformis, F. Muell. 1. c. 96 - Hodgsoniola junciformis.

HODGBONIOIiA, F. Mnell. Fragm. ii. 176 (1861). *ULIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 791.
HODGSONIA, F. Muell. Fragm. ii. 95 (1860).
junciformis, *F. Muell. Fragm.* ii. 176.—Austral.

HOEFFNAGELIA, Neck. Elem. iii. 68 (1790) = Trlgonla, Aubl. (Vochysiac).

HOELSELIA, Juss. in Diet. Sc Nat. xxl. 269 (1821)-seq.

HOELZELIA, Neck. Elem. iii. 62 (1790)-Swartaia, Schreb. (Legumin.).

HOEPFNERIA, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 222. *LEGUMWOSAE.*
africana, *Vatke, 1. c.—Ait.* trap.

HOFERIA, Scop. Introd. 194 (1777)=Ternstroemia, Unn. f.

HOFFMANNIA, Loefl. It. 194 (1758) =Duranta, Linn. (Verben.).

HOPFBLANITIA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 30 (1788). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 76.
CAMPYLOBOTRYS, Lem. in Fl. des Serres, *Sit.* I. iii. (1847) sub t. 260.
HIGGINSIA, Pers. Syn. i. 133 (1805).
OHIGGINSIA, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. i. 65. t. 85 (1798).
affinis, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 81.—Costa Rica.
amicoTUm, Spreng. Syst. i. 416 = Bikkia grandiflora.
cauliflora, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 30.—Guatemala,
discolor, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 86.—Mexic.
Ghiesbreghtii, *Hemsl. I. c*—Mexic.
jamaicensis, Spreng. Syst. i. 416=pcdunculata.
lanccolata, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viil. (1868) 504.—Ind. occ.
lenticellata, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 80.—Mexic.
longepetiolata, *Polak. in Linnaea,* xli. (1877) 667.—Am. centr.
macrophylla, *Hemsl. Biol. Cey.tr. Am. Bot.* ii. 37.—Guatemala.
mexicana, *Hemsl. 1. c.*—Mexic.
pcduncultta, *Sw. Prod. Veg. Ind. Oec.* 30.—Jamaic.
psychotriatfolia, *Griseb. fl. Brit. W. Ind.* 321.—Ind. occ.; Mexic.
Tefulgens, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 87.—Mexic.
regalis, *Hemsl. 1. c.*—Mexic.
strigillosa, *Hemsl. Diagn. Nm.* 31.—Mexic.
tubiflora, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 321.—Ind. occ.

HOFFMANNSEGGIA, Willd. Ennm. Hort Berol. 445 (1809) =seq.

HOFFMANNSEGIA, Bronn, Diss. Legnm. 180 (1822) - seq..

EOFFMANSEQOIA, Cav. Ic. iv. 63. t. 892 (1797). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 567.
MELANOSTICTA, DC. Mem. Leg. 474. t. 69; Prod. ii. 485 (1825).
alpina, Gill, ex Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1888) 209 =falcaria.
andina, *Miers, Trav. Chil.* ii. 582.—Chili,
brachycarpa, *A. Gray, PL Wright,* i. 55.—Mexie.
Burchellii, *Benth. V Hook./. Gen.* i. 567; *et ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 268.—Air. trop.
candata, *A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 179.—Texas.
chinensis, Mieis, ex Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 209=falcaria.
demissa, Benth. ex A. Gray, PI. Wright, i. 56=stricta.
densiflora, *Benth. ex A. Gray, 1. c.* 55.—Texas.
Doelli, *Phil, in Anal. Univ. Chil.* (1872) 710.—Chili,
drepanocarpa, *A. Gray, I. c.* 58.—N. Mexic
Drummondii, *Torr. b" Gray, Ft. N. Am.* i. 393__Texas.
falcaria, *Cav. Ic.* iv. 63.—Chili; Pernv.
gladiata, *Benth. in A. Gray, PL Wright,* i. 57.—Mexic.
glandulosa, *Willd. ex Vog. in Linnaea.xi.* (1837)404.—Bras,
gracilis, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1888) 209.—Chili,
gracilis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xvil. (1881-82) 847.—N. Mexic.
hnmilis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 326.—Mexic.
Jamesii, *Torr. (f Gray, Fl. N. Am.* i. 393.—Am. bor. occ
melanosticta, *A. Gray, PL Wright,* i. 54.—Mexic.
microphylla, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 58.—Calif,
oxycarpa, *Benth. ex A. Gray, PL Wright,* i. 55.—N. Mexic.
pilosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 434.—Peruv.
platycarpa, *Benth. ex A. Gray, PI. Wright,* i. 57.—Mexic.
prostrata, *Lag. ex DC. Prod.* ii. 485.—Pernv.
stricta, *Benth. ex A. Gray, PL Wright,* i. 56.—Mexic.
striola,C.Mae\l. in Walp. Ann. iv. 593, sphalm.=praec.
trifoliata, *Cav. Ic.* iv. 63.—Patagon.
viscosa, *Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc.* iii (1833) 209.—Peruv.

HOFMANNIA, Spreng. Anleit. ii. II. 605 (1819) = Hoffmannia, Sw. (Rubiac).

HOFMEISTERA, Reichb. f. Poll. Orchid. 80 (1852) = HoftneistereJla, Reichb. f. (Orchid.).
eumicroscopica, Reichb. £ 1. c—Hofmeisterella eumicroscopica.

HOFMEISTEREUiA, Reichb. f. in Walp. Ann. iii. 568 (1852). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii 570.
HOFMEISTERA, Reichb. £ Poll. Orchid. 30 (1862).
eumicroscopica, *Reichb. f. in Walp. Ann.* iii. 663—Pernv.

HOFBEEI8TEHIA, Walp. Rep. vi. 106 (1847). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. £ ii. 248.
HELOGYNE, Benth. Bot. Voy. Sulph. 20, t. 14 (1844).
fasciculata, *Walp. Rep.* vi. 106.—Calif,
pluriseta, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* iv. 96. t. 6.—Calif,
nrenifolia, *Walp. Rep.* vi. 106.—Calif.

HOHENACKERIA, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 38 (1835). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. £ i. 886.
bnpleurifolia, *Fisch.* b* *Mey. I.* c—Reg. Caucas.
polyodon, *Coss. V Dur. in Bull. Soc. Hot. Fr.* ii. (1855) 183.—Algeria.

HOHENBERGIA, Schnlt. f. Syst viL 71,1251 (1830) = Aechmea, Rniz & Pav. (Bromeliac).
angustifolia. Baker, in Sannd. Refug. Bot. post t 284 = A. spicata.
avgusta, E. Morr. Cat. (1873) 9 = A. augusta.
biUbergioides, Schnlt. f. Syst. vii. 1253.—Bras.
iracteata, Baker, in Saund. Refug. Bot post t. 284- A. bracteata.

HOHENBERGIA:—
iracteata, Beer, Bromel. 78.—Bras.
caelestis, Baker, in Sannd. Refug. Bot t. 281 -Aechmea coelestis.
calyculata. Baker, 1. c. t. 286-A. calycnUta.
capitata, Schnlt. f. Syst. vii. 1252-A. exsndans.
eomata, Baker, in Sannd. Refug. Bot. post t. 284.—Hab. t
cyathiformis, Beer, Bromel. 73 *(cyanthiformis).*—Bras.
distans, Baker, in Saund. Refug. Bot. post t. 284 = A. distans.
distichacantha, Baker, 1. c.-A. distichantha.
erytkrostachya, Brongn. in Rev. Hortic. Sér. IV. iv. (1855) 244 = A. glomerata.
exsudans, E. Morr. in Belg. Hortic. xxix. (1879) 352. t. 18=A. exsudans.
fasciata, Schult. £ Syst. vii. 1253 = A. fascista.
ferruginta, Carr. in Rev. Hortic. (1881) 487. f. 104 - A. augusta.
glomerata. Baker, in Saund. Refug. Bot. post t. 284 - A. glomerata.
laxiflora, Baker, 1. c. = A. laxiflora.
Legrelliana, Baker, 1. c t. 285=A. Legrelliana.
Martii, Baker, 1. c. post t. 284 = A. spicata.
Melinonii, Baker, 1. c.-=A. Melinonii.
Mertensii, Baker, 1. c = A. Mertensii.
mucroniflora, Baker, L c.=A. mucroniflora.
nudicauiis, Baker, 1. c. = A. nudicauiis.
odora. Baker, 1. c. = A. odora.
paniculigera, Baker, 1. c. excl. syn.=A. paniculigera.
platynema, Baker, 1. c. = A. platynema.
pyramidalis, Baker, 1. c = A. pyramidalis.
spicata, Baker, 1. c. = A. spicata.
stellata, Schult. f. Syst. vii. 1251-A. glomerata.
strobilacea, Schult. f. 1. c. 1252 = Acauthostachys strobilacea.
terminalis, Beer, Bromel. 78.—Bras.

HOHENWARTHA, Vest, in Flora, iii. (1820) 1 = Carthamus, Linn. (Compos.).
gymnogyna, Vest, 1. c.=C. lanatus.

HOHERIA, A. Cunn. in Ann. Nat Hist. Sér. I. iii. (1889) 319. *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 202.
angustifolia, Raoul, in Ann. Sc Nat. *Sir.* IIL ii. (1844) 122 = populnea-
Lyallii, Hook. f. FL N. Zel. i. 31. t ll=Plagianthus Lyallii.
popnlnea, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* Ser. I. iii. (1839) 319.—N. Zel.
sexstylosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 238.—N. Zel.
Sinclairii, *Hook.f. Handb. N. Zeal. FL* 81.—N. Zel.

HOITZIA, Juss. Gen. 136 (1789) =Loeselia, Linn. (Polemon.).
amplectens, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. Suppl. 441 =L. amplectens.
aristata,H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. iii.164 = L. ciliata.
capitata, Willd. ex Roem. *Sc* Schnlt. Syst. iv. 870 - L. glandulosa.
Cervantesii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 164 = L. glandulosa.
coccinea, Cav. Ic. iv. 44 = L. cocdnea.
coerulea, Cav. I. c t. 356-L. coerulea.
conglomerate H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 165 = L. glandulosa.
elata, Hook. & Am. Bot Beech. Voy. Suppl. 441 = L. glandulosa.
fioribunda, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 275=L.rupestris.
glandulosa, Cav. Ic. iv. 45-L. glandulosa.
linearis, Spreng. Syst. i. 625=Collomia linearis.
Loeselia, Spreng. 1. c.=L. ciliata.
lupulina. Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. Snppl. 441 = L. involucrata.
mexicana, Lam. Encyc. iii. 134=L. coccinea.
nepetaefolia, Cham. & Schlecht in Linnaea, vi. (1831) 385 - L. glandulosa.
pumila, Mart. *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 275 = L. pumila.
ramosissima, Mart. & Gal. 1. c. 273=L. nmosisslma.
scabra, Mart. *Sc* Gal. 1. c. 274=L. scabra.
scariosa, Mart *Sc* Gal. 1. c.=L. scariosa.
spicata, Willd. in Roem. *Sc* Schnlt. Syst. iv. 370=L. glandulosa.
squarrosa, Eschsch. ex Benth. in DC. Prod. ix. 820- Gilia squarrosa.

HOLACAKTHA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. Ser. II. v. (1856) (PL Nov. Thurb.) 310. t. 8. *SIMARUBEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 810.
Emoryi, *A. Gray, I. c*—Mexic.

HOLARGES, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789) -Drabft, Linn. (Cradf.).

HOLARGIDIUM, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1838) 87; et xv. (1842) 265=Draba, Linn. (Crncif.).
Kutnetsowii, Turcz. 1. c. 266.—Sibir.

HOIiABBHENA, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i- (1809) 62. *APOCYNACEAE,* Benth. *Sc* Hook. (• ii. 708.
PHYSETOBASIS, Hassle, in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. v. (1857) 99; et Flora, xl. (1857) 104.
affinis, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 198.—China,
africana, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 414.—Afr. trop.
antidysenterica, *Wall. Cat.* n. 1672.—As. trop.
Codaga, G. Don, Gen. Syst. iv. 78-antidysenterica.
febrifuga, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot-* 277.—Afr. trop.
glabra, *Klottsch, I. c.* 279.—Afr. trop.
landolphioides, A. DC. in DC. Prod. viii. 414=Alana landolphioides (in Addend.),
macrocarpa, *F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. Hi- *Nov. App.* ISO.—Java I; Ins. Philipp.
madagascariensis, *Baker, in Yourn. Linn. Soc.* **'• (1885) 424.—Madag.
malaccensis, Wight, Ic. t. 1298--antidysenterica.
mitis, *R. Br. in Mem. Wem. Soc.* i. (1809) 62.—Zeylan.
ovata, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 414.—Afr. trop.
pubescens, Wall. Cat. n. 1673 = antidysenterica.
tettensis, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 278.—Afr. trop.
villosa, Ait. ex Loud. Hort. Brit. Snppl. ii. 641[s] antidysenterica t

HOLBOELLIA, Wall, in Hook. Bot. Misc. ii. (lM[1]) 144. t. 76=Lopholepia, Decne. (Gramin.).
ornithocephala. Hook. 1. c.—Ind. or.

HOLBOELLIA, Wall. Tent Fl. Nep. 28. tt 16.17 (1824). *BERBERIDEAE,* Benth. & Hook. f. i. <*,
acuminata, Lindl. in Joura. Hort. Soc. ii. (1847) »" = latifolU.
angustifolia, Wall. Tent. Fl. Nep. 25. t. 17=l»[ti-folia.
latifolia, *Wall. 1. c.* 24.1.16.—Reg. Hirnal.

HOLCUS, linn. Syst ed. I (1735). *GRAMINEAE,* Benth. *Sc* Hook. £ iii. 1159.
acicularis, *Rasp, in Ann. Obs.* iv. t. 10 ; *ex Frit*- "• *Ind.* i. 955.—Hab.?
aciculatus, Griff. Ic. PI. Asiat. t. 141 = Chrysopog"" aciculatus.
aestivalis, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. »B lanatus.
albus, Steud. Nom. ed. I. 411 = Sorghum vulgare.
alpinus, Sw. ex Willd. Sp. PL iv. 937 = HierochU* alpina.
annuus, Salan. exTrin. in M<hn. Acad. P£tersb.Ser. »• vi. II. (1840) 87=setosus.
arcticus, Sommerf. in Mag. Naturvid. Ser. II. i. (1883) 236 = Hierochloë borealis?
Arduini, J. F. Gmel.Syst. 174.- Sorghum *vd* gare. Koeleria
arenarius, All. Auct. Fl. Pedem. 46 = villosa.
argenteus, Agardh, ex Roem. *Sc* Schult. Syst. u. •»" lanatus.
asper, Thunb. Prod. PI. Cap.20=Danthonia P[a]B illosa. 187
atropurpureus, Wahlenb. in Svensk Bot t. Descnampsia atropurpurea.
australis, Schrad. Fl. Germ. i. 253 - Hierochloë australis.
avenaceus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii 276-Arrne» therum avenaceum.
avenaceus, Thunb. Prod. PI. Cap. 20 - Danthonia curvifolia.
biaristatus, [Web. in] Wigg. Prim. Fl. Hols, *i** Gaudinia tennis.
bicolor, Linn. Mant ii. 301-Sorghum vulgare-
borealis, Schrad. Fl. Ger.n. i. 252 - Hiero[0]" borealis.
bulbosa, Schrad. 1. c. 248 - Arrhenatheram avenace

HOLCUS:—
caerulescens, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 411. t. 27= Chjysopogon violascens.
caespitosus, *Baits. Voy. Bot. Espagne,* 636. t. 173; *Blench.* 86—Hispan.
cafer, Ardnini, in Saggi Padov.i. (1786) 119-Sorghum vulgare. •
Caffrorum, Thunb. Prod. PI. Cap. 20 - Sorghum vnlgare.
capillaris, Thunb. 1. c.=Andropogon capillaris.
cernuus, Arduini, in Saggi Padov. i. (1786) 128 ; Willd. Sp. PI. iv. 931 = Sorghum vnlgare.
ciliatns, *Roxb. Hort. Beng.* 82; *Fl. Ind.* i. 318.—Ind. or
coerulescens, Auct. vide *caerulescens.*
compactus, Lam. Encyc. iii. 140 = Sorghum vulgare.
cubanicus, Gledilsch, ex Schult. Mant. ii. 462 (Quid?). •^-Cuba.
cylindricus, *Brouss. Stench. PI. Hort. Monsp.* 1804 (1805), 30, nomen; *ex Roem. V Schult. Syst.* ii. 657 (Quid ?).—Hab.J
decolorant, Willd. Sp. PI. iv. 931=Sorghum halepense.
densus, Petenn. in Flora, xxvii. (1844) 2S8=molIis.
distachyos, Cat. Hort. Dorpat. (1814) ; ex Roem. & Schult Syst ii. 657 (Quid ?).—Hab.!
Dochna, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 174 = Sorghum vnlgare.
Dora, Mieg, in Act. Helv. viii. (1777) 126. t 4. f. 3 = Sorghum vulgare.
Ouna, J. F. Gmel. Syst. 178, sphalm.=/f. *Durra.*
Durieui, Stead. Syn. PI. Gram. 15 = Gayanus.
Ourra, Forsk. Fl. Aegypt Arab. 174 - Sorghum vulgare.
elongatus, R. Br. Prod. 200 = Chrysopogon elongatus.
"iguus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 174 = Sorghum halepense.
f'rrugineus, Schrad. ex Cat. Hort. Dorpat (1814) ; ex Roem. *8c* Schult Syst. ii. 657 = Sorghum vnlgare.
fragrans, Willd. Sp. PI. iv. 986 = Hierochloe fragrans.
fulvus, R. Br. Prod. 199 = Andropogon serratus.
t'ayanus, *Boiss. Voy. Bot. Espagne,* 637. t. 173 C—Hispan.
glaucus, Willk. in Willie & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 307-lanatus.
grandiflorus, *Boiss. &• Reut. Pugitt. PI. Nov.* 119.—Hispan.
Gryllus, R. Br. Prod. 119-Chrysopogon Gryllus.
"alepensis, Linn. Sp. PI. 1047 = Sorghum halepense.
\ntermedius, Krock. Fl. Siles. Suppl. i. 137-lanatus?
•anatus, *Linn. Sp. PI.* 1048.—Europ.
'atifoliut. Linn. Syst. ed. X. 1808 = Centotheca lappacea.
'"xus, Bosc, ex Trin. in Mem. Acad. P<Stersb. Sir. VI, ˅- II. (1840) 57 = Sporoboluscentrifugus.
*f1*us,* Linn. Sp. PI. 1048 = Uniola gracilis.
"lurnicus, Scop. Fl. Cam. ed. II. ii. 276 = Andro-Pogon distachyos.
""ollis, *Linn. Syst.* ed. X. 1805.—Europ.
"nonticola, *Bigel. in New Engl. Med. Journ.* v. (1816) 334.—Am. bor.
tuticus, Kunze, ex Willk. Pugill. Pi Nov. 142 = Poa oulbosa.
"ervostis, R$_{ox}$b. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. i. 818^ anicum sernialatum,
">>«-, Arduini, in Saggi Padov. i. (1786) 184; J. F. Gmel. Syst. 174-Sorghum vnlgare.
"'gfrrimus, Arduini, 1. c t. 5. f. I; ex Roem. *8c* Schult. aystii. 887 = Sorghum vnlgare.
*>f*icans,* Hort. ex Steud. Norn. ed. II. *t.* 772-^°ghum vulgare.
*n*tidus,* Vahl, Symb. Bot ii. 102 = Andropogon serratus.
«≤«arisii, *Nym. Svll.* 441; *Ces. Comp.* 65.-Italia.
o«°ratus, Linn. Sp. PI. 1048 - Hierochloe anstralis, borealis,
"tfatus, Michx. Fl Bor. Am. i. 56 = Hierochloe fragrans.
£»'"<i*s, R. Br. Prod. 199 - Chrysopogon Gryllus.
*P***iflorus,* R. Br. 1. c. = Chrysopogon violascens.
*?•**sis, Linn. Mant. ii. 801 = Andropogon pertiisus.
piumosus, R. Br. Prod. 200 = Andropogon anstralis.
pyramidalis, Hort. ex Stend. Norn. ed. II. i. 772 = Sorghum vnlgare.
racemosus, Forsk. fi. Aegypt. Arab. 175.-Arab.'»-
redolens, Forst. *I.* Prod. 92 j Vahl, Symb. Bot. n. 102 * Hierochloe redolens.
*Rt£j"> Host, Gram. iii. 8. t. 3=Hierochloe boreahs.
Rc...ei, Boiss. Pugill. PI. Nov. 119.-Hispan.

HOIiCTTS:—
rigidus, *Hochst. ex Seub. Fl. Azor.* 17.—Ins. Azoric
rubens, Gaertn. Fruct ii. 8=Sorghum vulgare.
saccharatus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 560, in obs.= Oplismenus undulatifolius.
saccharatus, Linn. Sp. PI. 1047=Sorghum vnlgare.
Savii, Spreng. Pugill. i. 8=Trisetum paniceum.
serratus, Thunb. Prod. PI. Cap. 20 = Panicnm serratum.
seti/olius, Thunb. in Hoffmgg. Phytogr. Blaett. i. (1803) 6 = Andropogon setifolins.
setiger, De Not. ex Parl. Fl. Ital. i. 66 = Notarisii.
setiger, *Nees, in Linnaea,* vii. (1832) 278.—Afr. austr.
setiglumis, Boiss. *8c* Keut. Diagn. PI. Nov. Hisp. 27 - setosus.
setosus, *Trin. in Mim. Acad. Pttersb. Sel.* V. vi. II. (1840) 87.—Hispan.; Afr. bor.
Sorghum, Linn. Sp. PI. 1047 = Sorghum vulgare.
spicatus, Linn. Syst. ed. X. 1306 = Pennisetum typhoidenm.
striatus, *Linn. Sp. PI.* 1048.—Am. bor.
tenuis, J. Gay, in Ann. Sc Nat. Ser. II. vi. (1836) 136 — Gayanus.
tenuis, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 75.—Sicilia.
tuberosus, Salzm. ex Trin. in Mem. Acad. Petersb. Ser. V. vi. II. (1840) 86=lanatus.
ventricosus, Fisch. ex Trin. 1. c. 88 = selosns.
virginicus, Steud. Nom. ed. II. i. 778 = Andropogon virginicus.

HOLDERLINIA.Neck. Elem. i. 106 (1790) = Serruria, Salisb. (Proteac).

HOLIGABNA, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 22 (1814); et PI. Corom. iii. 79. t. 282 (1819). *ANACARDIACEAE,* Benin. *Sc* Hook. f. i. 425.
HADESTAPHYLUM, Dennst Schluess. Hort Malab. 30 (1818).
albicans, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 38.—Burma.
Amottiana, *Hook.f. 1. c.* 36.—Ind. or.
Beddomei, *Hook.f. I. c*—Ind. or.
ferruginea, *March. Rev. Anacard.* 171.—Ind. or.
Grahamii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 37.—Ind. or.
Grahamii, Kurz, in Joura. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 805=albicans.
Helferi, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 87.—Burma.
longifolia, *Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng.* 22; *PI. Corom.* iii. 79. *. 82.—Ind. or.
longifolia, Span, in Linnaea, xv. (1841) 188-Semc-carpus longifolia.
longifolia, Wight *8c* Am. Prod. 169= Amottiana.
racemosa, Hohen. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 488 = Amottiana..
racemosa, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. ii. 82-Drimycarpus racemosus.

HOLLBOELLIA, Meissn. Gen. 418 [820] (1843) = HOLBOELLIA, Wall = LopholepiB, Decne. (Gramin.).

HOLLBOELLIA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 342 (1827) = Holboellia, Wall. (Berberid.).

HOLLIA, Heynh. Nom. i. 8i0 (1840) ; et \\. 308 (1846) -Noltea, Reichb. (Rhamn.).
africana, Heynh. U. cc.-N. africana.

HOLLIA, Heynh. Nom. ii. 803 (1846) = Chlorophytum, Ker-GawL (Liliac).
comosa, Heynh. 1. c=-C. Stembergianum.

HOLIiISTEBIA, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 296. *POLYGONACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 94.
lanata, 5. *Wats. 1. c*—Am. bor. occ.

HOLMSKIDIA, Dum. Anal. Fam. 22 (1829), sphalm. - seq.

HOIiMBKIOLDIA, Retz. Obs. vi. 81 (1791). *VERBENACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 1166.
HASTINGIA, Koen. ex Sm. Exot. Bot ii. 41. t. 60 (1806).
PLATUNIUM, JUSS. in Ann. Mus. Par. vil. (1806) 76.
rubra, Pers. Syn. ii. 144 =sanguinea.
saneuinea, *Ret*. Obs.* vi. 81.—Ind. or.
scandens, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 828=sanguinea.

HOLOCAIiYX, Micheli, in Mem. Soc. Phys. Genev. »viiL (1883) n. VII. 41. *LEGVMINOSAE.*
Balansae, *Micheli, I. c*—Paraguay.

HOLOCARPA, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 414. *RUBIAC*
veronicoides, *Baker, I. c*—Madag.

HOLOCHEILUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 73 = Trixis, P. Br. (Compos.).
ochroleucus, Cass. 1. c. = T. ochroleuca.

HOLOCHILOMA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 371-Premna, Linn. (Verbenac).
resinosum, Hochst. 1. c.—Afr. trop.

HOLOCHILUS, Dalz. in Hook. Kew Jonra. iv. (1852^ 290=Maba, Forst. (Ebenac).
micranthus, Dalz. 1. c. 291 —M. micrantha.

HOLOCHLAM7S, Engl. in Becc Malesia, i. (1883) 265. *AROIDEAE.*
Beccarii, *Engl. I. c*—Malaya.

HOLOCHLOA, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 580 (1840) = Heuchera, Linn. (Saxifr.).
cylindrica, Nult. ex Torr. *8c* Gray, 1. c.-Heuch. cylindrica.
elata, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, I. c.-Heuch cylindrica.
glabra, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, 1. c. 581-Heuch. cylindrica.
ovalifolia, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, I. c. -Heuch. cyliridnca.

HOLODISCUS, Maxim, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 253 = Spiraea, Linn. (Rosac).
argenteus, Maxim. 1. c. 254 = S. argentca.
discolor, Maxim. 1. c.—S. discolor.

HOLOGAMIUM, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xviii. (Jan. 1835) 185=IsehaemiUJl, Linn. (Gramin.).
nervosUm, Nees, 1. c.-I. laxnm.

HOIiOOBAPHIS, Nees, in DC. Prod. xi. 728 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 1104.
Ehrenbergiana, *Nees, I. c.*—Mexic.

HOLOGYMNE, Bartl. Ind. Scm. Hort. Gotting.; ex Linnaea, xii. (1838) Litt. 81 = Xiaathenia, Cass. (Compos.).
californica, Bartl.—Cf. Linnaea, xii. (1838) Litt. 82 = L. glabrata.
Douglasii, C. A. Mey. Ind. Scm. Hort. Petrop. viii. 64 = Monolepia major.
glabrata, Bartl.—Cf. Unnaea, xii. (1838) Litt. 81 ; et xiv. (1840) Litt. 125-L. glabrata.

HOLOIiACHNA, Ehrenb. in Linnaea, ii. (1827) 273. *TAMARISCINEAE,* Benth. *8c* Hook, t i. 161.
Shawiana, *Hook. f. ex Hend. V Hume, Yarkand,* 313. —As. temp.
songarica, *Ehrenb. in Linnaea,* ii. (1827) 273.—Sibiria.

HOLOLACHNE, Reichb. Consp. 166 (1828) = praec.

HOLOLEPIS, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 155, 189. t. 6 = Vernonia, Schreb. (Compos.).
involucrata, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1868) 880 «=V. peduncnlata.
pedunculata, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 1UO = V. pedunculate.

HOLOPEIRA, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 42 = CoccuhiB, DC. (Menisp.).
auriculata, Miers, 1. c Ser. III. xix. (1867) 29-C. villosus.
australis, Miers, I. c.»C. laurifolius.
fecunda, Miers, 1. c - C . hexagynus?
fusiformis, Miers, 1. c. = C. laurifolius.
laeviusrula, Miers, 1. c. 28-C. villosus.
laurifolia, Miers, 1. c. 29 =C. laurifolius.
lonckophylla, Miers, 1. c. 29 = C. Ferrandianus ?
torrida, Miers, 1. c. = C. villosus.
viUosa, Miers, 1. c. Ser. II. vii. (1851) 42=C. villosub.

HOLOPETALA, Wight, Ic. vi. t 1968 (1868), sphalm. -Holoptelea, Planch. (Urticac.).

HOLOPETALON, Reichb. Nom. 207 (1841) - **Banlsteria,** Linn. (Malpig.).

HOLOPETALUM, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 51-Oligomeris, Cambess. (Resed.).
Burchelli, Muell. Arg. in Bot. Zeit. ziv. (18561 89 ; et Monog. Resed. 212. t. 9. f. 127 = 0. Burchelli.
pumilum, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xvi. (1843) 51=O. capensis.
spathulatum, Turcz. 1. c. xxvii. (1854) Ik 380 = 0. spathulatum.

HOLOPHYLLUM, Less. Syn. Comp. 262 (1832) = **Athanaaia,** Linn. (Compos.).
capitatum, Less. 1. c. = A. capitata.
capitatum, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 676-A. dimorpha.
lanuginosum, DC. Prod. vi. 86=A. canescens.
icabrum, DC. 1. c. = A. capitata.

HOLOPLEURA, Regel & Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch. 28 (1882). *UMBELUFERAE.*
carioides, *Regel* 6* *Schmalh. I. c*—Turkestan.

HOLOPTELEA, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. IIL x. (1848) 259. *URTICACEAE,* Benth. & Hook, f. iii. 352.
integrifolia, *Planch. I. c*—Ind. or.

HOLOPTOLAEA, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 266=praec.

HOLOREGMIA, Nees, in Flora, iv. (1821) 800 = **Martynia,** Linn. (Pedalin.).
viscida, Nees, 1. c. - M. spathacea.

HOLOSCHOENUS. Link, Hort. Berol. Desc. i. 293 (1827) = SeirpuB, Linn. (Cyperac.).
albo-vittatus, Reichb. ex Nym. Consp. 765 = S. Holoschoenus.
atrovirens, link, Hort. Berol. Desc. i. 293 = S. atrovirens.
australis, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 499 = S. Holoschoenus.
brunneus, Steud. Nom. ed. II. i. 773 = S. brunneus.
elafior, Nees, in Hook. Joum. Bot. ii. (1840) 894 (Rynchosporae sp. ?).—Am. anstr.
exserens, Reichb. in Flora, xiii. (1880) 501 = S. Holoschoenus.
filiformis, Reichb. 1. c 601-S. Holoschoenus.
globi/erus, A. Dietr. Sp. PL ii. 164 = S. Holoschoenus.
incurvatus, A. Dietr. 1. c. 165 = S. incurvatus.
laxus, Opiz, Seznam, 23 = S. Holoschoenus.
Linnaei, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 76 « S. Holoschoenus.
melanocarpus, Boeck. in Flora, xl. (1857) 87 (Quid?). —Mexic.
nodosus, A. Dietr. Sp. PI. ii. 165 - S . nodosus.
panormitanus, Nym. Consp. 765 = S. Holoschoenus.
**ubarticulatus,* A. Dietr. Sp. PI. ii. 166 = S. articulates.
Thunbergii, A. Dietr. 1. c. 164 - S . Holoschoenus.
tuberculatus, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 498 = S. Holoschoenus.
vulgaris, Link, Hort. Berol. Desc. i. 293=S. Holoschoenus.

HOLOSEPALUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 852 = Hypericum, Toum.
dubium, Fourr. 1. c. = Hyp. dubium.
kumifusum, Fourr. 1. c. = Hyp. humKnsum.
quadrangulum, Fourr. 1. c. = Hyp. quadrangulum.

HOLOSETUM, Steud. in Flora, xxxiii. (1850), 228, nomen; et Syn. PI. Gram. 118 (1855)=Panioum, Linn. (Gramin.).
philippicum, Steud. II. cc. = P. semialatum.

HOLOSTEMM A, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 42. *ASCLEPIADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 760.
Ada-Kodien, Schult. Syst. vi. 95 = Rheedianum.
Brunonianum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 276. t. 66-Rheedianum.
Candolleanum, Spreng. Syst. i. 851 = Fischeria scandens.

HOLOSTEMMA :—
chilense, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. ^1864-65) 174.—Chili.
fragrant, Wall. PI. As. Rar. ii. 51 - Rheedianum.
laeve, Blume, Bijdr. 1055 = Cynanchum ovalifolium.
muricatum, Blume, Bijdr. 1054 (=> *Cynoctonum muricatum).*—**Java.**
pic turn, Benth. in Hook. Kew Joum. v. (1858) 53s Graphistemma pictum.
Rheedei, Wall. I'l. As. Rar. ii. 51; et Cat. n. 4409-seq.
Rheedianum, *Spreng. Syst,* i. 851.—Ind. or.
***tuberculatum,* Blume, Bijdr. 1055** *(Cynodonum tuber culatum,* Blume, in' Addend.).—Java.

HOLOSTEUM, Dill, ex Linn. Gen. ed. I. 376 (1737). *CARYOPHYLLEAE,* Benth. & Hook. f. i. 148.
MEYERA, Adans. Fam. ii. 257 (1763).
Alsine, Sw. Obs. 118=Stellaria media.
ciliatum, Opiz, Natural, ix. (1825) 128=umbeUatum!
cordatum, Linn. Sp. PI. 88 = Drymaria cordata.
diandrum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 27 = Drymaria cordata.
dichotomum, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 708 = Cerastium anomalom.
filiforme, Risso, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 629-Cerastium quatemellum.
glandulosum, Bertol. Misc. Bot. i. ll = liniflorum.
glutinosum, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi. 52 = umbellatum.
Heuffelii, Wierzbicki, in Flora, xxv. (1842). 264 = umbellatum.
hirsutum, *Linn. Sp. PI.* 88 (Quid 1).—Ind. or.
imberbe, J. Gay, Monog. Holost. 87-= liniflorum.
liniflorum, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 89 = umbellatum.
liniflorum, *Stey. ex Fisch.* 6* *Mey. 1. c.* iv. 10.—As. Min.; Persia,
marginatum, *C. A. Mey. ex Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1888) 402.—As. Min.; Persia.
montanum, Wight, ex Wall. Cat. n. 647 —Drymaria cordata.
mucronatum, Moc. *Sc* Sesse, ex DC. Prod. i. 393 = Drymaria pauciflora.
polygamum, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 708 = liniflorum.
Sibthorpii, Boiss. FL Orient, i. 7]0=tenerrimum.
sperguloides, *Lehm. Pugill. PI. Hort. Hamb.* **i. 10.—** Aegypt.
succulentum, Linn. Sp. PI. 88 = Arenaria peploides.
tenerrimum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 63.—As. Min.
tetraphyllum, Thunb. Prod. Fl. Cap. 24-Polycarpon tetraphyllum.
umbellatum, *Linn. Sp. PI.* 88.—Europ.

HOLOSTIGMA, G. Don, Gen. Syst. iii. 716 (1834) = Lobelia, Linn. (Campan.).
dioicum, G. Don, 1. c. = L. dioica.

HOLOSTIGMA, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 322 = Oenothera, Linn. (Onograr.).
alyssoides, Hook. lc. PI. t. 389 = Oe. alyssoides.
argutum, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 168=Oe. dentata.
Bottae, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 336 = Oe. Bottae.
cheiranthi/olium, Spach, 1. c. = Oe. cheiranthifolia.
heterophyllum, Spach, 1. c. 334 = Oe. heteropbylla, ***Steud.***
micrantkum, Spach, I. c 335 = Oe. micrantha, *Presl.*
minutiflorum, Steud. Nom. ed. II. i. 774 = Oe. minutiflora.
paradoxum, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 334=Oe. micrantha, *Presl.*
spirale, Spach, 1. c. 335 =Oe. cheiranthifolia.
tenuifolium, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 168 = 0e. stenophylla.
virgatum, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 883=Oe. dentata.

HOLOSTIGMATEIA, Reichb. Nom. 102(1841) =praec.

HOLOSTYLA, Endl. Gen. 646 (1838) - **Olostyla,** DC. (Rubiac).

HOLO8TYI.I8, Dnch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 33. t. 5. *ARISTOLOCHIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 123.
reniformis, *Duck. 1. c.*—**Bras.**

HOLOSTYLIS, Reichh. Nom. 77 (1841)= **Olostyla,** DC. (Rubiac.).

HOIiOTHBtS, Rich, in Mem. Mus. Par. iv. (1818) 55. *ORCH1DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 623.
BUCCULINA, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 209.
MONOTRIS, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 (1834).
SACCIDIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 3,01 (1835).
SCOPULARIA, Lindl. Bot. Reg. sub 1.1701 (1834).
TKYPHIA, Lindl. I. c. (1884).
aphylla, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 119.—Afr. austr.
arachnoidea, *Reichb. /. 1. c.* 107.—Afr. austr.
aspera, *Reichb. f. 1. c.* 119.—Afr. austr.
brachylabris, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 78.—Afr. anstr.
Brongniartiana, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 107.—Afr. austr.
Burchellii, *Reichb. f. 1. c.* 119.—Afr. austr.
condensata, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 76.—Afr. austr.
exilis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 283.—Afr. austr.
gracilis, ***Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.*** **ii. (1836)** 207.—Afr. austr.
grandiflora, ***Reichb. f. Otia Bot. Hamb.*** **119.—Afr.** austr.
Harveiana, ***Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.*** **ii. (1886)** 206.—Afr. austr.
incurra, *Lindl. I. c.* 207.—Afr. austr.
Iindleyana, ***Reichb. f. Otia Bot. Hamb.*** **119.—Afr.** austr.
Mac-Owaniana, *Reichb. f. I. c.* 108.—Afr. austr.
Monotris,*Reichb./. 1. c.* 119.—Afr. austr.
Mundii, *Sond. in Linnaea,* xix. (1847) 77.—Afr. austr.
orthoceras, *Reichb./. Otia Bot. Hamb.* 119.—Afr. austr.
parviflora, *Reichb./. 1. c.*—Afr. austr.
parvifolia, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 283.—Afr. anstr.
pilosa, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* 119.—Afr. austr.
praecox, *Reichb./. I. c.* 108.—Afr. austr.
Schimperi, *Reichb./. I. c*—Abyssin.
Scopularia, *Reichb./. 1. c.* 119.—Afr. austr.
secunda, *Reichb./. I. c*—Afr. austr.
squamata, *Reichb./. 1. c.*—Afr. austr.
squamulosa, ***Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.*** "• (1836) 206.—Afr. anstr.
tridentata, ***Reichb. /. Otia Bot. Hamb.*** **119.—Afr.** austr.
unifolia, *Reichb./. I. c*—Afr. anstr.
Vatkeana, *Reichb./. in Joum. Bot.* xiv. (1876) 346.—Afr. trop.
villosa, ***Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.*** **ii. (1836)** 207.—Afr. austr.

HOLOTOME, Endl. Gen. 766 (1839; = Actinotufl, Labill. (Umbellif.).
leucocepkala, Walp. Rep. ii. 389 = A. leucocephalus.
omni/ertilis, F. Muell. Fragm. ii. 129-A. omnifertills.

HOLOZONIA, Greene, in Bull. Torrey Bot. Clnb, ix-(1882) 122 = Lagophylla, Nutt. (Compos.).
filipes, Greene, 1. c. = L. filipes.

HOLTZENDORFFIA, Klotzsch & Karst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 727 (1847) = BuelUa, Linn. (Acanth.).
caracasana, Klotzsch & Karst. ex Nees, 1. c. 728.—, Venezuela.

HOLUBIA, Oliver, in Hook. Ic. PI. t. 1475 (1880- ***PEDALINEAE.***
saccata, *Oliver, 1. c.*—Afr. austr.

HOMAID, Adans. Fam. ii. 470 (1763)=Biarufl>, Schott (Aroid.).

HOMAIDA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 63 (1886)=**Arisarum,** Tourn. (Aroid.).
probosddea, Rafin. 1. c.~A. proboscideum.

HOMALADENIA, Miers, Apocyn. S. Am. 163 (1878) - Dipladenia, A. DC. (Apocyn.).
brevi/olia, Miers, 1. c. 165 = D. polymorpha.
linariaefolia, Miers, 1. c. 164 = D. polymorpha.
pastorum, Miers, 1. c. 164 - D . polymorpha.
peduncularis, Miers, I.e. 165—D. polymorpha.
puberula, Miers, 1. c. = D. tenuifolia.
tenui/olia, Mien, 1. c. 164=D. tenuifolia.
vincaeflora, Miers, L c 165=D. vincaeflora.

HOMAI1ANTHTJ8, A. Juss. Tent. Enph. 50. t. 16 (1824) (Omalanthus). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Be* Hook, f. iii. 331.
CARUMBIUM, Reinw. in Syll. RatUb. ii. (1828) 6.
DIBRACHION, Regel, Gaitenfl. IT. (1866) 100. t. SOI.
DUANIA, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2; ed. II. 65 (1827).
GARUMBIUM, Flora, viii. (1826) 1.103, err. typ.
WARTMANNIA, Mnell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1861-62) 218.
fastuosus, *Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 196.—Ins. Philipp.
giganteus, *Zoll.* b" *Mor. in Nat. en Geneesi. Arch. Nelrl. Indie,* ii. (1845) 584.—Java.
Leschenaultianus, *A. Juss. Tent. Euph.* 50. 1.16.—Ind. or.; Malaya.
nutans, *Guill. Zeph. Tahit.* 35.—N. Caled.
pedicellatus, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 232.—Ins. Amicor.
populifolius, R. Grab, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr. -Jane 1827) 175=Leschenaultianns.
stillingifolius, *F. Muelt. Fragm.* i. 32.—Austral.

HOMAIiIlTM, Jacq. Enum. PI. Carib. S (1760). *SAMYDACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 800.
ACOMA, Adans. Fam. ii. 510 (1763).
ASTRANTHUS, Lour. Fl. Cochinch. 221 (1790).
BLAKWELLIA, Comm. ex Joss. Gen. 348 (1789).
CORDYLANTHUS, Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 27. t. 8 (1852).
LAGUNEZIA, Scop. Introd. 216 (1777).
LINSCHOTTIA, Comm. ex Juss. Gen. 348, in obs. (17S9).
MARSHALLIA, J. F. Gmel. Syst. 836 (1791).
MYRIANTHEIA, Thou. Nov. Gen. Madag. 21 (1806).
NAPIMOGA, Aubl. PI. Gui. i. 592 (1775).
NISA, Noronha, ex Thou. Nov. Gen. Madag. 24 (1806).
ODODECA, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).
PYTHAGOREA, Lour. Fl. Cochinch. 248 (1775).
RACOUBEA, Aubl. PI. Gut. i. 589. t. 236 (1776).
TATTIA, Scop. Introd. 104 (1777).
VERMONETA, Comm. ex Juss. Gen. 343, in obs. (1789).
Abdessammadii, *Aschers. & Schweinf. in Sittb. Ges. Naturf. Fr. Berl.* (1S80) 130.—Afr. trop.
africanum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 35.—Afr. occ.
albiflorum, *O. Hofftn. Sert. Madag.* 18.—Madag.
"*Inifolium,* F. Muell, Fragm. ii. 127-vitiense.
angustifolium, 5m. *in Rees, Cycl.* xviii. n. 3.—Afr. trop.
austro-caledonicum, *Seem. Fl. Vit.* 96.—N. Calcd.
axillare, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 34.—Madag.
Uarandae, *Vidal, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp.* ed. III. *Nov. App.* 94.—Ins. Philipp.
brachybotrys, *F. Muell. Fragm.* ii. 127.—Austral.
bracteatum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 3/.—Ins. Philipp.
uuyophyllaeeum, *Benth. 1. c.* 88.—Java.
"*ylanicum,* Bedd. Fl. Sylv. t. 210=zeylanicum.
tonfertum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 341.—Madag.
Cordylanthus, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) S8.-Java.
tuneifolium, *Willd. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* iiu. '• 508.—Bras.
depsiflorum, *Spruce, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* , >v. (1860) 36.—Bras,
fagifolium, *Benth. 1. c.* 35.—China,
foetidum, *Benth. 1. c.* 37.—Malaya.
foetidum, Benth. 1. c. partim = Grimthianum.
foetidum, *Kun, For. Fl. Brit. Burma,* i. 582.—Burma'
k'randiflorum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 87—Malaya.
Srandiflorum, Naves, in Blanco, FL Philipp. ed. III. t. 443 = pana)annm.
Griffithianum, *KurB, in Journ. As. Soc. Seng.* xl. . (1871) H. 57.—Burma.
!»«"««, Pers. Syn. ii. 82 = Banara incana.
Wvolucratum, *O. Hoffm. Sert. Madag.* ": -***£•*
•ongtfolium, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 35., -Malaya.
\ongifolium, Benth. 1. c. partim - propmquum,
longistylum, *Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 497.—Af ɴ
lMonUse?>. *Villar, in Blanco, Fl. Philipp-* «>• ™. *Nov. App.* 94.—Ins. Philipp.

HOKAIiITTM:-
micranthnm, *O. Hoffm. Sert. Madag.* 18.—Madag.
microphyllum, *O. Hoffm. 1. c.*—Madag.
minutiflorum, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 808.—Burma.
Napimoga, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 210.—Guian.
nepalense, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 84.—Reg. Himal.
obovale, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 334.—Sumatra,
obtusatum, *Tung, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 465.—Cuba,
panayanum, *F. Villar, in Blanco, Ft. Philipp.* ed. III. *Nov. App. 9i*—Ins. Philipp.
panicnlatum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 34.—Ins. Maurit.
paniculatnm, *O. Hoffm. Sert. Madag.* 18.—Madag.
Parkeri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 150.—Madag.
panrifolium, *Hook. f. ex Benth. I. c.* iv. (1860) 37.—Borneo.
pedicellatum, *Spruce, ex Benth. 1. c.* 36.—Urns,
propinquum, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 597.—Burma,
pnberulum, *Klotzseh, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras.* xiii. I. 507—Guian.
racemosa, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 24.—Jamaic.
Racoubea, *Sv>. Prod. Veg. Ind. Occ.* 86.—Guian.
rnfescens, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 34.—Afr. austr.
Schlichii, *Kun, For. Fl. Brit. Burma,* i. 532.—Burma,
senarium, *[Mof. V Sesse,] ex DC. Prod.* ii. 64.—Mexic.
spicatum, Lam. Encyc. i. 32—H. Racoubea.
stipulacenm, *Welm. ex Mast, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 498.—Afr. trop.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 834.—Sumatra.
surinamensis, Stead, in Flora, xxvi (184S) 75« = H. Racoubea.
tetrameram, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 110.—Madag.
tomentosum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 34.—Burma; Malaya.
travancoricum, *Bedd. Fl. Sylv.* t. 211.—Ind. or.
Vatkeanum, *O- Hoffm. Sert. Madag.* 19.—Madag.
vitiense, *Benth. in Jmrn. Linn. Soc.* iv. (1860) 36.—Ins. Fiji,
zeylanicum, *Benth. I. c.* 85.—Zeylan.

HOMALOBUS, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 358 (1840)-Astragalus, Tourn. (Legumin.).
brachycarpus, Nutt. 1. c. 352 = A. caespitosus.
caespitosus, Nutt. 1. c. = A. caespitosus.
campestris, Nutt. 1. c. 361 = A. campestris.
canescens, Nutt. 1. c. 352 -» A. caespitosus.
decumbens, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. (1868) 60-A. campestris.
decumbens, Nutt. ex Torr. *ic* Gray, Fl. N. Am. i. 351 — A. decumbens.
dispar, Nutt. 1. c. 350 = A. multiflorus.
y«««c««,Nutt. 1. c. 361 = A. junceus.
multiflorus, Nutt 1. c. = A. multiflorus.
multiflorus, Torr. in Padf. RaiL Rep. vii. 10-A. Antiselli.
nigrescens, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 351 = A. multiflorus.
orthocarpus, Nutt. L c = A. junceus.
tenuifolius, Nutt. 1. c. 352-A. campestris.

gQTWTAT.nCAI.YX. F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1867) 809. *MYRTACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 699.
ericaeus,# *Muell. t. c*—Austral,
polyandrus, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 56; *et Fragm.* iv. 77.—Austral.

HOMALOCARPUS. Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii, (1883) 348=Bowlesia, Ruiz & Pav. (Umbellif.).
bovlesioides, Hook. & Am. 1. c = B. nigripetala.

HOMALOCARPUS, Schur, Enum. PI. Transs. 8 (1868) •Anemone, Linn. (Ranunculac.).
narcissiflorus, Sehur, 1. c.-=A. narcissiflora.

HOMALOCENCHRUS, Mieg, ex Hall. Stirp. Helv. ii. 201 (1768) =Loerala, Soland. (1788) (Gramin.).
oryzoides, Mieg, ex Pollich. Hisl. PI. Paht. i. 62-L. oryioides.

HOMALOCLAUOS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 122 (1873)-Faramea, Aubl. (Rubiac).
colorata, Hook. f. 1. c.-K calycillora.
Selloaiana, Hook. f. 1. c. = F. Sellowiana.

HOMALOCLINE, Reichb. Consp. 97 (1828)=OMA1.O-CLINE, Cass.-Crepls, Linn. (Compos.).

HOMALODISCUS, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient, i. 422 (1867) = OchradenuB, Delile (Kesed.).
Aucheri, Boiss. 1. c.=O. Aucherii.
majòr, Bunge, ex Boiss. I. c. 423-0. Aucherii.
minor, Bunge, ex Boiss. 1. c. — O. Aucherii.
Ochradcni, Boiss. 1. c. 422.—Persia.

HOMALOLEPIS, Turcz. in Bull. Soc. Na:. Mosc. xxi. (1848) i.575<=Simaba. Aubl.
Blanchetii. Turcz. 1. c. =S. Blahchetii.

HOMALOMENA, Schott, Melet.i. 20 (1832). *AROI-DEAE;* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 983.
ADELONEMA, Schott, Prod. Aroid. 316 (1860).
CURMERIA, Linden & Andre, in IUustr. Hortic. xx. (1873) 45.1.121.
CYRTOCLADON, Griff. Notul. iii. 147 (1851)
HOMALONEMA, Endl. Gen. 238 (1837).
SPIROSPATIIA, Rafin. Fl. Tellnr. iv 8 (1886).
ZANTEDESCHIA, Spreng. Syst. iii. 765 (1826), partim.
alba, *Hassk. in Hon. V De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 161.—Java.
aromatica, *Schott, Melet.* i. 20.—Ind. or.; Malaya.
Beccariana, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1879) 296.—Borneo,
bellula, *Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 126.—Java,
caerulescens, *Jungh. ex Schott, Prod. Aroid,* 310.—Java.
calyptrata, Kunth, Enum. PI. iii. 57 = Schismatoglottis calyptrata.
cordata, Schott, Melet i. 20-aromatica.
cordata, Zoll. Syst. Verz. Pfl. 83. n. 559-alba,
elegans, *Engl. in Bot. Jahrb.* i. (1881) 183.—Sumatra.
Gaudichaudii, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot Lugd. Bat. i. 280-aromatica.
insignis, A'. *E. Br. in IUustr. Hortic.* xxxii. (1885) 93. t. 560.—Borneo.
major, Griff. Notul. iii. 153 = minor,
minor, *Griff. I. c.* 152.—Malaya.
Miqueliana, *Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 126.-Borneo.
occulta, Scholt, Melet. i. 20-aromatica.
ovata, *Engl. in Bull. Soc. Tote. Ortic.* iv. (1879) 296.—Borneo,
peltata, *Mast, in Gard. Chron.* (1877) 278. f. 46.—Peruv.; N. Granat.
picturata, *Regel, in Gartenfl.* (1877) 83; *Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 269.—N. Granat.
Portei, Hort. Par. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 385-propinqua.
propinqua, *Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 280.—Borneo,
punctulata, *Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.* iv. (1870) 296.—Borneo.
Roezelii, *Regel, Gartenfl.* (1877) 33 ; *Act. Hort. Petrofr.* v. (1877) 27".—N. Granat.
rostratum, *Griff. Notul.* iii. 154 (roshalnm'j.—MalayR.
rubescens, *Kunth, Enum. PI.* iii. 57.—Ind. or.
rubescens, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 212 = mbra.
rubra, *Hassk. in Hon. V De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 162.—Java,
saeiltifolia, *Jungh. ex Schott, Prod. Aroid.* 311.—Java,
singaporense, *Regel, in Ind. Sent. Hort. Petrop.* (186!^ 18.—Malaya,
subcordata, *Engl. in Bot. Jahrb.* i. (1881) 183.—Borneo.
Vallichii, *Schott, in Bonpiandia,* vii. (1869) 80.—Penang.
Wallisi, *Regel, in Gartenfl.* (1877) 33.-N. Granat.
Wendliindii, *Schott, Prod. Aroid.* 308.—Costa Rica.
Zollingeri, *Schott, in Bonpiandia,* vii. (1859) 30.—Java.

HOMALONEMA, Endl. Gen. 288 (1837) = praec.

HOMALOSPERMUM, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 242 - Iieptoapermum, Font. (Myrtac).
firmum, Schau. i. c = Lfirmum.

HOMALOSTOMA, Stschégl. in Bull. Soc. Nat Mow. xxxii. (1859) I. 21=Anderaonia, R. Bi. (Epacrid.).
simplex, Stschégl. 1. c—A. Homalostoma.

HOMALOTES; Endl. Gen. 437 (18S8)=Tanacetum, Tourn. (Compos.).

HOMALOTHECA, Reichb. Norn. 89 (1841) = OMALOTHECA, Cass. = Gnaphalium. Linn. (Compos.).
supina, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. LyoD, N. S. xvii. (1869) 93 = G. supinnm.

HOMANTHIS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 12 (1820)=Perezia, Lag. (Compos.).
multiflorus, H. B. & K. 1. c. 14 = P. multiflora.
pinnatifidus, H. B. & K. 1. c. 808-P. pinnatifida.
pungens, H. B. & K. 1. c. 13= P. pnngens.

HOMBAK, Adans. Fam. ii. 408 (1763) = Capparis, Linn.

HOMBRONIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t 22 (1844-52) = Pandanus, Linn.
calathiphora, Gaudich. in Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astiol. et Zél. 83 = P. calathiphorns.
edulis, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 22. f. 17 = P. dubius.

HOMEOPLITIS, Endl. Gen. 107, in syn. (1836) = HOMOPLITIS, Trin. =. Pogonatherum, R. Br. (Gramin.).

HOMEKIA, Vent. Dec Gen. Nov. 5 (1808). *1RIDEAB,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 692.
aurantiaca, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 498 = collina.
collina, *Vent. Dec. Gen. Nov.* 6.— Afr. austr.
elegans, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 395.—Afr. austr.
exaltata. Sweet, 1. e» — collina.
flaccida. Sweet, 1. c. = collina.
flexuosa. Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 24 = Hexaglottis longifolia.
flexuosa, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 395 - Sisyrinchium cuspidatum.
lineata, *Sweet, Brit. Flow. Gard.* t. 178.—Afr. austr.
maculata, *Klatt, in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 627.—Afr. austr.
miniata, Sweet, Brit Flow. Gard. t. 152=collina.
ochroleuca, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 308 = collina.
porrifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 498 = lineata.
spicata, Sweet, 1. c ed. I. 395 = elegans.
virgata, Sweet, 1. c. = Hexaglottis virgata.

HOMOCENTRIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 308 - Oxyspora, DC. (Melastom.).
vagans, Naud. 1. c. 1.15. f. 4 - O. vagans.

HOMOCHAETE, Benth. in Hook. Ic PI. t. 1110 (1872). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 881.
conferta, *Benth. I. c.*—Afr. an&tr.

HOHOCHROMA, DC. Prod. v. 824 (1836). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 258.
Ecklonis, *DC. I. c*—Afr. austr.

HOMOCNEMIA, Miers, in Ann. & Mag. Nat Hist. Ser. II. vii. (1851) 40 = 8tephania, Lour. (Menisperm.).
Meyeriana, Miers, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 10 - S. Meyeriana.
umbellata, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 40 = S. Meyeriana.

HOMOEANTHERUM, Stend. Nom. ed. II. i. 774 (1840) - HOMOEATHERUM, Nees = Andropogon, Linn. (Gramin.).

HOMOEANTHUS, Spreng. Syst. iii. 503 (1826) = HOMO1ANTHUS, Bonpl.=Perezia, Lag. (Compos.).

HOMOEATHERUM, Nees, in Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 239 (1886). = Andropogon, Linn. (Gramin.).
chinense, Nees, 1. c. = A. apricus.

HOMOGLOSSUM, Salisb. in Trans. Hort Soc i. (1812) 326-Antholyza, Linn. (Irid.).
lucidior, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 161 — A. lucidior.
Merianella, Baker, 1. c. = A. Merianella.
praecox, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 325-A. revolnta.
revolutum, Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 161 = A. revolnta.

HOMOGYNE, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 198; et Diet. Sc. Nat xxi. 412 (1821). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 439.
alpina, *Cass. I. c.* 412.—Europ.
discolor, *Cass. 1. c.* 413.—Europ.
montana, C. Froel. Alpenfl. v. t. 5 = alpina?
sylvestris, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxi. 413.—Austral.

HOMOIANTHUS, Bonpl. ex DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 66-=Perezia, Lag. (Compos.).
ambiguus, Cass. Opusc. ii. 167 = P. squarrosa.
cubatainsis. Less, ex DC. Prod. vii. 64 = P. cubatansis.
Donianus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 422 = P. recurvata.
eckinulatus, Cass. in Diet. Sc Nat. xxxviii. 458-P. recurvata.
Gayanus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 419 = P. lyrata.
inermis, Meyen, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 290 = P. inermis.
laevis, DC. Prod. vii. 64 = P. laevis.
linearis, DC. 1. c. = P. linearis.
lyratus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 418 ~ P. lyrata.
magellanicus, DC. Prod. vii. 65 = P. lactucoides.
multiflorus, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1830) 211 = P. multiflora.
palustris, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1865) II. 816.—Chili.
pectinatus, Phil. 1. c. (1862) II. 836; et in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 124.—Chili.
pinnatifidus, D. Don, in Trans. Linn. Soc xvi. (1830) 209-P. pinnatifida.
pristiphyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 419=P. pristiphylla.
pungens, DC. Mém. Labiatifl. t. 3. f. 5—P. pungens.
rigidus, Phil, in Linnaea, xxviii. (1856) 719.—Chili.
scaier, Benth. Fl. Hartw. 186 = P. pungens.
squarrosus, DC. Prod. vii. 64 = P. squarrosa.
tomentosus, Poepp. ex DC. 1. c. 60 = Leucheria Bridgesii.
viscosus, DC. L c. 64 — P. viscosa.

HOMOIOCELTIS, Blume, Mus. Bot. Lngd. Bat. ii. 64. 134,1852 [1856J = Aphananthe, Planch. (Urticac).
aspera, Blume, 1. c. = A. aspera.

HOMOLOSTYLES, Wall, ex Wight, Contrib. 50 (1834) = Tylophora, R. Br. (Asclep.).
tenerrima. Wall, ex Wight, 1. c 51=T. tenenima.

HOMONOIA, Lour. Fl. Cochinch. 686 (1790). *EVPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 822.
HAEMATOSPERMUM, Wall Cat. nn. 7963-55 **(18321).**
LUMANAJA, Blanco, Fl. Filip. 821 (1837).
SPATHIOSTEMON, Blume, Bijdr. 621 (1825).
javensis, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 200. **—Java.**
retusa, *Muell. Arg. I. c.*—Ind. or.
riparia. *Lour. Fl. Cochinch.* 687.— Cochinch.
symphylliaefolia, Ar««, *in Flora,* lviii. (1875) 82.—Reg. Himal.

HOMONOMA, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist Nat. x. (1881) 269. *MELASTOMACEAE.*
aridum, *Bello, I. c.*—Ins. Porto Rico.

HOMOPAPPUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc N. S. vii. (1841) 3S0=AplopappU8, Cass. (Compos.).
argutus, Nutt. 1. c. 331 = A. racemosus.
glomeratus, Nutt. 1. c. = A. racemosus.
inuloides, Nutt. 1. c. 333 = A. uniflorus.
multiflorus, Nutt 1. c. = A. lanceolatns.
paniculatus, Nutt. 1. c 381 = A. racemosns.
racemosus, Nutt. 1. c 882 = A. racemosns.
spathulatus, Nutt. 1. c—Solidago spathulata.
squarrosus, Nutt. 1. c - A. squarrosus.
uniflorus, Nutt 1. c. = A. uniflorus.

HOMOPLITIS, Trin. Fund. Agrost 166 (1820) = Pogonatherum, Beauv. (Gramin.).
crinita, Trin. 1. c. =P. saccharoidenm.

HOMORANTHT78, A. Cunn. ex Schau. in Linnaea, x. (1836) 310. *MYRTACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 697.
ENOSANTHES, A. Cunn. ex Schau. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1841) 191.
flavescens, A. Cunn. ex Schau. in Nov. Act Nat. Cur. xix. Suppl. ii. (1842) 192 =virgatus.
virgatus, *A. Cunn. ex Schau. I. c.* 193.—Austral.

HOMOSTYLES, Wall, ex Hook. *f.* Fl. Brit. Ind. iv. 44 (1855)=Tylophora, R. Br. (Asclep.).
tenerrima, Wall, ex Hook. f. 1. c - T. tenerrima.

HOMOSTYLIUM, Nees, in Linnaea, xviii. (1844) 513 = Microglossa, DC. (Compos.).
cabulicum, Nees, 1. c. « M. albescens.

HOMOTROPIUM, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 47. t. 2 (1847) = Buellia, Linn. (Acanthac).
erythrorhiBum, Nees, 1. c 48.—Bras.

HONCKENEJA, Maxim, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ix-(1858) 56 = HONKENYA, Ehrh. - Arenaria, Rupp-(Caryoph.).

HONCKENEYA, Steud. Nom. ed. II. L 771 (1840) - Honckenya, Willd. (Tiliac).

HONCKENEYA, Steud. Nom. ed. II. i. 771 (1840) = HONKENYA, Ehrh.=Arenaria, Rupp.(Caryoph.)-

HONCKENIA, Pers. Syn. 1. 416 (1805) = Honckenya. Willd. (Tiliac).

HONCKENIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 2«6 = seq.

HONCKENYA, Bartl. Ord. 305 (1830) = HONKENYA, Ehrh.=Arenaria, Rupp. (Caryoph.).

HONCKENTA, Willd. in Usteri, Delect. Opusc Bot. ii. (1793) 200. t. 4. *TILIACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. i. 235.
CLAPFERTONIA, Meissn. Gen. 36 (1837).
HONKENYA, Willd. ex Cothen. Meth. PI. Disp. **(1790).**
ficifolia, *Willd. in Usteri, Delect. Opusc. Bot.* ii. **(17»S)** 201. t. 4.—Afr. trop.
minor, *Baill. Adansonia,* x. (1872) 153.—Afr. trop.

HONCKNEYA, Spach, Hist. Vég. Phan. iv. 3 (1835) - **Honckenya,** Willd. (Tiliac).

HONDBESSEN, Adans.Fam.ii. 158 (1763) =Paederi». Rupp. (Rubiac).

HONKENEJA, Endl. Gen. 966 (1840) = seq.

HONKENYA, Ehrh. Beitr. ii. 180 (1788) = Arenari*' Rupp. (Caryophyll.).
oblongifolia, Torr. *Sc* Gray, FL N. Am. i. I? A. peploides.
peploides, Ehrh. Beitr. ii. 181=A. peploides.

HONKENYA, Willd. ex Cothen. Meth. PI. Disp- I (1790) -- Honckenya, Willd. (Tiliac.).
Willdenovii, J. F. Gmel. Syst. 609 = Honckenya n« folia?

HONORIUS.S. F. Gray, Nat Arr. Brit PI. ii. 177 (1821) = Ornithogalum, Tourn. (Liliac).
nutans, S. F. Gray, 1. c. = O. nutans.

HONOTTIA, Reichb. Consp. 172 (1828) - Limno-phila, R. Br. (Scrophul.).

HOODIA, Sweet, Hort Brit. ed. II. 869 (1830)-*ASCLEP1ADEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 783.
MONOTHYLACIUM, G. Don, Gen. Syst i»- (1ee.)
SCYTANT'HUS, Hook. Ic. PI. tt. 605, 625 (1844).
Bainii, *Dyer, in Bot. Mag.* t. 6348.—Afr. austr.
Barklyi, *Dyer, in Joum. Linn. Soc.* xv. (lf>76) 2S-Afr. austr.
Currori, *Decne. in DC. Prod.* viii. 666.—Afr. trop-
Gordoni, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II 359.—Afr. »

HOOKERA, Salisb. Paiad. Lond. t. 98 (1808) = Brodiaea, Sm. (1811) (Liliac).
coroneria, Salisb. 1. c.=B. grandiflora.
pulchella, Salisb. 1. c. sub t. 98; t. 117=B. congesta.

HOOKIA, Neck. Elem. i. 70 (1790) = Ceutaurea, Linn. (Compos.).

HOOPESIA, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 453 = Cercidium, Tnl. *etc.* (Legum.).
arborea, Budd. 1. c.-C. texanum, Acacia flexicaulis, amentacea.

HOOREBECKIA, Steud. Nom. ed. II. i. 774 (1840) = seq.

HOOREBEKIA, Comeliss. in Mussch. Hort. Gand. 120 (1817) ; ex DC. Prod. v. 846 (1836)=AplopappuB, Cass. (Compos.).
chilensis, Comeliss. 1. c = A. Hoorebekia.

HOPEA, Linn. Mant i. 14 (1767) = SymplocoB, Linn. (Styrac.).
racemosa, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 140=S. Beddomei.
spicata, Dal*. & Gibs. 1. c.=»S. spicata.
ternifiora, Orteg. Hort. Matr. Dec. 181. t. 17.—N. Granat.
tinctoria, Linn. Mant. i. 105=S. tinctoria.

HOPEA, Roxb. Hort. Beng. 42 (1814); PI. Corom.iii. 7. t. 210 (1819). *DIPTEROCARPEAE*, Benth. & Hook. f. i. 198.
NEISANDRA, Rafin. Sylva Tellnr. 163 (1888).
FETALANDRA, Hassk. Hort. Bogor. 104 (1858).
aspera, *De Vriese, Minjak Tangkawang*, 28__Borneo.
tialangeran.Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 74. t. 7 = (Shoreae sp.).—Malaya,
cernna, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Ifederl. Ind.* xxix. (1867) 2S2.—Sumatra,
dealbata, *Hance, in Journ. Bot.* xv. (1877) 829.—Cambodia.
decandra, Buch.-Ham. ex Wight, Illustr. 88 = odoraU.
discolor, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 86.—Zeylan.
aiversifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 491.—Sumatra,
dryobalanoides, *Miq. 1. c.* 492.—Sumatra.
Vlandulosa, Roxb. Hort. Beng. 42; Fl. Ind. ii. 611 =Cyclostemon eglandnlosum.
wgifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 490.—Ins. Banca.
faginea, Hort. Calc. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. II. 682—odorata.
faginea, Wall. Cat. n. 968 = Vatica faginea.
floribunda, Wall. Cat. n. 964 = Shorea floribunda.
glabra, *Wight V Am. Prod.* 85.— Ind. or.
gradlis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 490.—Sumatra.
grandiflora, Wall. Cat. n. 958 = Vatica grandiflora.
eratissima, Wall. 1. c. n. 960 = Sborea gratissima.
Griffithii, *Kurg, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 60.—Burma.
jucunda, *Thw. Enum. PI. Zeyh.* 408.—Zeylan.
anceolata, De Vriese, Minjak Tangkawang, 32 = Vateria bomeensis.
»gifolia, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 309 = Balanocarpus Mills,
lucida, *Thunb. Ic. Jap.* t. 14.—Japon.
maerophylla, De Vriese, Minjak Tangkawang, 28 = Shorea maritima.
lalabarica, *Bedd. 1c. PI. Ind. Or.* i. 42.—Ind. or.
Maranti, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 489.—Sumatra.
Mengarawan, *Miq. I. c.* 491.—Sumatra.
**icrantha*, Hance, in Joum. Bot. xiv. (1876) 242 = Pierrei.
nu'erantha, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 161.—Malaya,
modesta, *Thw. ex A. DC. in DC. Prod.* xvi. II. 638.—Zeylan.
"nyrtifolia, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 493.—Sumatra.
oblongifolU, *Dyer, in Hooi.f. Fl. Brit. Ind.* i. 309.-Burma.
odorata, *Roxb. Hort. Beng.* 42; *PI. Corom.* Hi. 7. t. 210; *Fl. Ind.* ii. 609.—Burma.
Parviflora, *Bedd. Fl. Syh.* L t 7.—Ind. or.
Pnihppinensis, *ZW. in Journ. Bot.* xvi. (1878) 100.—Ins. Philipn.
PI'enei, *Hance, in Joum. Bot.* xv. (1877) 329, in nota.—Cambodia.
"Kophloea, *Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 310.-••nd. or.

HOPEA.-
Sangal, *Korth. in Verh. Nat. Gesch. Bot.* 75.—Borneo.
Scaphula, Roxb. Hort. Beng. [98]; FL Ind. ii. 611 = Vatica Scaphula.
selanica, Wight & Am. Prod. 85 = Shorea selanica.
seminis, *De Vriese, Minjak Tangkawang*, 32.—Ins. Celebes,
sericea, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 85.—Borneo.
Singkawang, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 489.—Sumatra.
Siranda, *Miq. I. c.* 491.—Sumatra.
speciosa, Pritz. Ic. Ind. 555, sphalm. vide *Hoppea spedosa.*
splendida, *De Vriese, Minjak Tangkawang*, 28.—Borneo.
squamata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 239 = Shorea squamata.
suavis, Wall. Cat. n. 959=Shorea siamensis.
Tangili, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 35.—Malaya.
•*vasta*, Wall. Cat. n. 962=odorata.
Wightiana, Miq. ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 308 = odorata.
Wightiana, *Wall. Cat.* n. 6295.—Ind. or.

HOPEA, Vahl, Enum. i. S (1805)=Hoppea, Willd. (Gentian.).
dichotoma, Vahl, 1. c.=Hoppea dichotoma.

HOPKIRKIA, DC. Prod, v. 660 (1836) = Sohkuhria, Roth (Compos.).
anthemoidea, DC. 1. c.-S. Hopkirkia.

HOPKIRKIA, Spreng. Nov. Prov. 23 (1818)=Salmea, DC. (Compos.).
Eupatoria, Spreng. 1. c.=S. Eupatoria.
fruticulosa, Spreng. Syst. iii. 144 *(-Armenia frutescens).—Am.* austr.
hirsuta, Spreng. 1. c. = S. hirsuta.
scandens, Spreng. 1. c. 443=S. Eupatoria.

HOPLISMENUS, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 16 (1844) » Opliemenus, Beauv. (Gramin.).

HOPIIOPHYIIIIUM, DC. Prod. v. 73 (1836). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 231.
ferox, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 54__Afr. austr.
spinosum, *DC. Prod.* v. 74.—Afr. austr.

HOPLOPHYTUM, Beer, in Flora, xxxvii. (1854) 348 ; et Bromel. 129 (1857)-=Aechmea, Ruiz & Pav. (Bromel.).
angustifolium, Beer, Bromel. 132 = A. spicata.
augustum, Beer, 1. c. 136 = A. augusta.
aureo-roseum, Ant. in Illustr. Wien. Gart. Zeit. (1881) 97. t. l = Billbergia atro-rosea?
bracteatum, C Koch, Wochenschr. iii. (1860) 306 = A. bracteata.
calyculatum, Morr. in Belg. Hortic. xv. (1865) 162^ A. calyculata.
coeleste, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1856) 6-A. coelestis.
coerulescens. E. Morr. Cat. (1873) 9 » A. caerulescens.
comatum, Beer, Bromel, 150=A. comata.
cyaneum, Beer, 1. c. 181 *(=Nidularium eyaneum).*—Bras.
distichanthum, Beer, 1. c. 136 = A. distichantha.
fasciatum, Beer, 1. c. 129 a A. fasciata.
giganteum, E. Morr. in Belg. Hortic. xxiv. (1874) 174. -Hab.?
lanuginosum, Beer, Bromel. 188 = A. nudicaulis.
Lindeni, E. Morr. in Belg. Hortiu. xv. (1865) 164 = A. Lindeni.
lingulatum. Beer, Bromel. 189 = A. lingulata.
Mertensii, Beer, 1. c. 134 -= A. Mertensii.
mucroniflora, Beer, 1. c. = A. mucroniflora.
nudicaule, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1656) 6 = A. nudicaulis.
paniculatum, Beer, Bromel. 130 = A. paniculata.
platynema, Beer, I. c. 139 = A. platynema.
Platamanni, Ii. Morr. in Belg. Hortic. xxv. (1875) 862, nomen=A. floribunda.
polystachium. Beer, Bromel. 137 = A. brasiliensis ?
purpureo-roseum, Beer, 1. c. 135 = A. suaveolens.

HOPLOPHYTUM :—
spicatum. Beer, Bromel. 134 = Aechmea spicata.
spicatum, Beer, 1. c. 140= A. nudicaulis.
suaveolens, Beer, 1. c. 135 = A. suaveolens.
tetrastachyum, Beer, 1. c. 137.—Bras.
unispicatum, Beer, 1. c. 138 = A. nudicaulis.

HOPLOTHECA, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 52 (1827) = OPLOTHECA, Nutt. = Proelichia, Moench (Amarant.).

HOPPEA, Endl. Gen. 744, in syn. (1839) = HOPEA. Linn. = SymplocoB, Linn. (Styrac).

HOPPEA, Endl. Gen. 1014 (1840) = Hopoa, Roxb. (Dipterocarp.).

HOPPEA, Reichb. in Flora, vii. (1824) 245-8enecio, Tourn. (Compos.).
şibirica, Reichb. 1. c. = S. Ligularia.
speciosa, Reichb. 1. c.=S. Ligularia.

HOPPEA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Ncue Schr. iii. (1801) 434. *GENTIANEAB*, Benth. & Hook. f. ii. 805.
HOPE*, Vahl, Enum. i. 3 (1806).
HOPPIA, Spreng. Anleit. ii. II. 889 (1818).
dichotoma, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii. (1801) 435.—Ind. or.
fastigiata, C. *B. Clarke, in Hook. f. fl. Brit. Ind.* iv. 100.—Ind. or.

HOPPIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 199. t. 80 (1842). *CYPERACEAE*, Benth. *it* Hook. f. Iii. 1069.
angustifolia, *Boeck. in Flora*, liv. (1871) 37.—Guian.
irrigua, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 199.—Bras,
microcephala, *Boeck. in Mora*, liv. (1671) 37.—Guian.

HOPPIA, Spreng. Anleit. ii. u. 889 (1818) = Hoppea, Willd. (Gentian.).

HORANINOVTA, Fisch. & Mey. in Schrenk, Enum. PI. Song. 10 (1841). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 70.
anomala, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 170 ^juniperinn.
juniperina, Bunge, in *Him.* Sav. Etr. P&ersb. vii. (1847) 468 = ulicina.
juniperina, *C. A. Mey. in Schrenk, Enum. PI. Sotiq.* 11.—Turkest.; Sibir.
minor, *Schrenk, 1. c.*—Sibir.
ulicina, *Fisch. & Mey. in Schrenk. 1. c.* 10.—Turkest.; Sibir.

HORANTHES, Rafin. New Fl. Am. iii. SO (1836) = Lechea, Linn. (Cistin.).
arenaria, Rafin. Sylva Tellnr. 133 *{^Anthclis arenaria).*—-Am. bor.
podanisia, Rafin. 1. c. *(=Anthetis podanisia).*—An, bor.
tripetala, Rafin. New Fl. Am. iii. 30 = L. Skinncri.

HORANTHUS, Rafin. Sylva Tellur. 132 (1838) = praec

HORAU, Adans. Fam. ii. 80 (1768) "Laguncularia, Gaertn. (Combret.).

HOBDETTM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1206.
CRITESION, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 103.
CRITHO, E. Mey. Ind. Sem. Hort. Regiom. (1848) 5 ; et in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (18411) 253.
CUVIEKA, Koel. Gram. 32a (1802).
ZEOCRITON, Beauv. Agrost. 114. t. 21. f. 2 (1812).
adpressum, Moench, Meth. 199 = Elytnns sibiricus.
adscend'-ns, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* i. 180.—Mexic.
Aegiceras, Royle, ex Walp. Ann. iii. 787-vulgare.
ambiguum, *Doelt, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 232.__Reg. Argent, (e Creta ?).
andicola, *Griseb. in Goctt. Abh.* xxiv. (1879) 285.-Reg. Argent.
andinum, *Trin. in Linnaea*, x. (1835-36) 304.—Res. Andin.

HOBDETJU :—
arenarium, Aschers. Fl. Brandenb. 874=Elymus arenarius.
avenaceum, Steud. Norn. ed. I. 413 = Arrhenatheram avenacenm.
Berteroanum, *E. Desv. ex C. Gay, Fl. Chil.* **vi. 460.** —Chili.
bifarium, *Rath, Nov. PI. Sp.* 59.—Sicilia.
brevicomum, Presl, Bot. Bemerk. 120 - bulbosum.
brevisubulatum, Link, in Linnaea, xvii. (1848) 891 = secalinum.
bulbosum. *Linn. Cent. PI.* ii. 8.—Reg. Mediterr.; Orieng.
bulbosum, Sieber, ex Kunth, Enum. Fl. i. 449 = Sccale creticum.
cadncnm, *Munro, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc.* **xviii.** (1880) 110, nomen.—Afghan,
capense, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 23—Afr. austr.
Caput-Medusae, Loret & Ban. Fl. Monsp. 766 = Elymus Caput-Medusae.
cartilagineum, Moench, Meth. 199 = Elymus virginicus.
chilense, *Brongn. in Duperr. Voy. Cog. Bot.* **54.—** Chili.
chilense, Roem. & Schult. Syst. ii. 796 = maritimum.
ciliatum, Gilib. Exerdt. ii. 520 = murinum.
ciliatum, Lam. Encyc. iv. 604 = bulbosum.
coeleste, Viborg, ex Kunth, Enum. PI. i. 455-vulgare.
comosum, *J. & C. Presl, Rel. Haenk.* i. 827.—Chili,
complanatum, *Beauv. Agrost.* 115.—Europ. austr.
compressum, Bois>. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient, v. 681=Lolium rigidum.
compressum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 249.—Reg. Argent.
crinitum, Desf. Fl. Atlant. i. 113 = Elymus Caput-Medusae.
cylindricum, Murr. Prod. Gotting. 48 = Elymus europaeus.
cylindricum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 853.—Chili.
Deeaisnei, Hort. Par. ex Boiss. Fl. Orient, v. 686 = ithaburense.
deficiens, *Steud. ex A. Br. Del. Sent. Hort. Frib.* (1848) 2.—Abyssin.
depauperatum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 358.—Chili,
distichon, *Linn. Sp. PI.* 85.—(Stirps cult.),
divergens, *Nees V Meyen, ex Steud. Norn.* **ed. II. i.** 775.—Chili.
elymoides. Vest, ex Kunth, Enum. PI. i. 442 = Elymus' europaeus.
euclaston, *Steud. Syn. PI. Gram-* 858.—Am. bor.
europaeum, All. H. Pedem. ii. 60 = Elymus europaeus.
flexnosum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 353.—Chili ?
fragile, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 128.—As. Min.; Persia,
fragile, *Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Medic).* i.(1858)455.—Hab.?
geniculatum. All. Fl. I'edem. ii. 259 = maritimum.
geniculatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 83 = secalinum, maritimum.
glaucum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 852.—Arab.
Gussoneanum, *Parl. PI. Palerm.* 244, in obs.—Sidl.
halophilum, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 249.—Reg. Argent.
heterostychyon, Beauv. Agrost. 114 = hexastichon.
hexastichon, *Linn. Sp. PI.* 85.—(Stirps cult.).
hexastichum, Auct.=praec.
himalayense, *Schult. Mant.* ii. 481.—Reg. Himal.
hirsutum, *Bertol. Misc. Bot.* i. 11.—Mesopot.
Hystrix, Roth, Catalect. i. 23 = maritimum.
imberbe, Arduini, ex Roem. & Schult. Syst. ii 793 = distichon.
imrinum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. xix.—Aegypt.
incrinum, Poir. in Lam. Encyc. iv. 605, sphalm. = praec
ithaburense, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xiii. 70.—As. Min.; Oriens.
jubatitm, DC. Fl. Fr. vi. 286 - Elymus Caput-Medusae.
jubatum, *Linn. Sp. PI.* 85.—Am. bor. et austr.
Kaufmanni, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* **vii. (1S80)** 678.—As. centr.
leporinum, Link, in Linnaea, ix. (1835) 133 = murinum.
leptostachys, *Griff, /tin. Notes,* 270.—Afghan.
lycium, Boiss. ex Fl. Orient, v. 688 = bulbosum.
macilentum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 352.—Dahuria.
jnacrolepis, *A. Br. Del.Sem. Hort. Frib.* (1848) 2, adn. —Abyssin.

HOBDETJM:—
marinum, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 57-maritimum.
maritimum. Roth, Tent. Fl. Germ. ii. I. ISO - secalinum.
maritimum, *With. Arr. Brit. PI.* 172.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
maximum, Vill. Fl. Delphin. 10=secalinnm.
montanum, Schrank, Baier. Fl. i. 886 - Elymus europaeus.
murinum, *Linn. Sp. PI.* 85.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.
muticum, *J. V C. Presl, Rel. Haenk.* i. 327.—Peruv.
nepalense. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 444-vulgare.
nigrum, Willd. Enum. Hort. Berol. 1037 = vulgare.
nodosum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. 72=violaceum.
nodosum, Linn. Sp. PI. ed. II. 126=secalinum.
nodosum, Ucria, Hort. R. Panorm. 64; Savi, Due Cent. ii. 37"bulbosum.
nudum, *Arduini, exSchult. Mant.* ii. 437 (Stirps cult.).
patulum, Moench, Meth. 199 = Elymus canadensis.
perversum, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. xix.—Arab,
pilosum, *Steud. Syn. PI. Gram.* 353.—Chili.
plumosum, Gilib. Exercit. 520 = vulgare.
polystichon, Hall. f. in Nov. Comm. Gotting. vi. (1776) 5 = vulgare.
pratense, Huds. Fl. Angl. ed. II. 56 = secalinum.
Pseudo-murinum, Tapp. ex Koch, Syn. .Fl. Germ. ed. II. 955 = murinum.
pubescens, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 144 = maritimum.
pubiflorum, *Hook./. Fl. Antarct.* 388.—Reg. Magellan.
pusillum, Nutt. Gen. Am. i. 87 = secalinum.
Kichlii, *Steud. Syn. PI. Gram.* 853.—Am. bor.
rigidum, Roth, Catalect. fasc. i. 24 = maritimum.
Rothii, *Link, in Linnaea,* xvii. (1843) 392.—German.
rubens, Willk. in Oestr. Bot Zeitschr. xxv. (1875) 109 =murinum.
sativum, Pers. Syn. i. 108 = vnlgare.
secalinum, Guss. PI. Rar. 57, 58. L 11 = Gussoneanum.
secalinum, Savi, Fl. Pis. i. 145 = maritimum.
secalinum, *Schreb. Spicil. Fl. Lips.* 148.—Reg. bor. temp.
sibiricum. Link, ex Steud. Norn. ed. II. i. 775 = secalinum.
Sieberianum, Bess, ex Schult. Mant. ii. 662—Secale creticum.
spontanum, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 430 = ithaburense.
stenostachys, *Godr. in Mém. Acad. Montp. {Sect. Médic),* i. (1853) 455.—Hab. ?
strictum, Desf. Fl. Atlant. i. 113. t. 87 = bulbosum.
subfastigiatum, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. III. 234.—Reg. Argent.
sylvaticum, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 57 = Elymus europaeus.
tetrastichum, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 166 = vulgare.
trifurcatum, *Jacq. ex Baill. in Bull. Soc. Bot. Fr.* **i.** (1854) 187.—Hab.»
utriculatum, *Bert, in Merc. Chil.* **1829;** *ex Am. Journ. Sc.* xxiii. (1833) 86.—Chili.
vaginatum, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 433 = murinum.
villosum, Moench, Meth. 199 = Elymus arcnarius.
viliosum, Steud. Syn. PI. Gram. 352 = hirsutum.
violaceum, *Boiss.* 6* *Hohen. Diagn.* Ser. I. xiii. 70.—As. Min.
vulgare, *Linn. Sp. PI.* 84 (Stirps cult.).
Winkleri, Hack, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 49=Gussoneanum.
Zeocriton, *Linn. Sp. PI.* 85 (Stirps cult.).

HORKELIA, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 26^PotentUla, Linn. (Rosac).
Bolanderi, A. Gray, in Proc Am. Acad. vii. (1868) 838. —Calif.
californica, Cham. *8c* Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 26 = P. multijuga.
capitata, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1997.—Am. bor. occ.
capitata, Regel, Gartenfl. (1872) t. 711 - P. Haematochrus.
capitata, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 84 = P. multijuga.
***congesta, Dougl. in Hook. Bot. Mag.* t. 2880-P.** congesta.
congesta, Newbeny, in Pacif. Rail. Rep. vi. 73 - P. congesta?
cuneata, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1997 s P. multijuga.

HORKELIA:—
cuneata, Newberry, in Pacif. Rail. Rep. vi. 73 = Potentilla Haematochrus.
Douglasiana, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 435=P. multijuga.
fusca, Lindl. Bot. Reg. t. 1997-P. Haematochrus?
Gordoni, Hook. Kew Journ. v. (1853) 341 = Ivesia Gordoni.
grandis, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 339 = P. multijuga.
hirsuta, Lindl. Bot. Reg. sub L 1997 «= P. congesta.
multi/oliolata, Torr. in Sitgreaves, Rep. 169 - Ivesia Gordoni.
parriflora, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 435 = P. Haematochrus ?
pilosa, Nutt. ex Torr. *8c* Gray, 1. c. 484-= P. congesta.
purpurascens, S. Wats, in Proc Am. Acad. xi. (1876) 148.—Calif.
sericata, S. Wats. I. c. xx. (1885) 364.—Am. bor. occ.
tenuiloba, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1866) 529. —Calif.
Tilingi, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 153 = P. tridentata.
tridentata, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 84. i. 6- P. tridentata.

HORKELIA, Reichb. ex Bartl. Ord. 76 (1880) - **Wolffla,** Horkel (Lemnac).

HOKMIDrUM, Lindl. ex Heynh. Norn. i. 880 (1840). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 52*.
leiocheilum, *Benth. & Hooi.f. Gen.* iii. 624.—Cuba,
miserum, *Benth. &• Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 218.—Mexic.
pulchellum, *Benth.* 6* *Hook.f. Gen.* iii. 524.—Mexic.
pygmaeum, Benth. & Hook. f. 1. c. = uniflorum.
serpens, *Benth. (f Hook.f. I.* **r.-Hab. i**
Sophronitis, *Benth. b" Hook.f. I. c*—N. Granat.
uniflorum, *Heynh. Nom.* i. 880, nomen.—Mèxic

HOBMINTTM, [Toum.] Linn. Coroll. Gen. 9 (1787) 730. *LAB/ATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1198.
PASINA, Adans. Fam. ii. 189 (1763).
pyrenaicum, *Linn. Sp. PI.* 596.—Europ. austr.
virginicum, Linn. 1. c. = Sal via lyrata.

HORMINUM, Mill. Gaid. Diet. ed. VIII. (1768) - Salvia, Toum. (Labiat.;.
caulescens, Orteg. Hort. Matr. Dec. 68 = Lepechima spicata.
***clinopodiifolium,?m.Syn.* ii. 132-Menthadab.uncn.**
coccineum, Moench, Meth. 377 = S. coccinea.
coloratum, Moench, 1. c - S. Horminum.
disermas, Moench, 1. c - S . disermas.
foliosum, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 16.—Afr. austr.
frutescens, Gueldenst. Reise, i. 260.—Reg. Cauc.
lyratum. Mill Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 - S. lyrata.
napifolium, Mill. 1. c. n. 4 = S. napifolium.
niloticum, Moench, Meth. 377 = S. nilotica.
parvifiorum, Moench, Meth. 878-S. byzantina.
pyrenaicum, Georgi, Be»chr. Russ. Reich. HI. v. 10J° —Calamintha umbrosa.
sativum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5=S. Horminum.
suaveolens, Moench, Meth. 877 = S. spinosa.
sylvestre, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. St» S. Verbenaca.
verbenaceum, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 " S. Verbenaca.
verticillatum, Mill. 1. c. n. 3 = S. vertic-illata.
viride, Moench, Meth. 377-S. viridis.

HORMOCARPUS, Sprang. Gen. ii. 594 (1831) = Orm°-carpum, Beauv. (Legumin.).

HOBMOOYtfE, .A. DC. in DC. Prod. viii. 1[* (1844). *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook. f. « 6t>0 -
cotinifolia, *A. DC. I. c*—Austral.

HORMOSCIADIUM, Endl. Gen. Suppl. v. 16 (185°) " **Ormoaciadium,** Boiss. (Umbelhf").

HOKNEA, Baker, Fl. Maurit. 59 (1877). *SAPINDA-CEAE.*
mauritiana, *Baker, 1. c.*—Ins. Maurit.

HORNEMANNIA, Benth. in DC. Prod. x. 428 **(1846)** Sibthorpia, Linn. (Scrophular.)
pinnata, Benth. 1. c - S . pinnata.

HORNEMANNIA, Link & Otto. It PI. Sel. 9. t. 3 (1820?)=Vandellia, Linn. (Scrophular.).
mats. Link *Sc* Otto, 1. c- V. Crustacea.
prostrata, Jacq. f. Eclog. PI. t. 160=V. hirsuta.

HORNEMAOTSriA, Vahl, in Skrivt Nat. Selsk. Kiobenh. vi. (1810) 120. *VACCtNIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. II. 667.
ANDRECSIA, Dnnal, in DC. Prod. vii. 660 (1839).
PEYRUSA, Rich, ex Dnnal, in DC. 1. c in syn. (1839).
SYMPHYSIA, Presl, Epist. ad Jacq. (1827).
TAUSCHIA, Preissler, in Flora, xi. (1828) 43.
martiniccnsis, *Hook. f. in Benth. V Hook. f. Gen.* h. 567—Ins. Martinia
racemosa. *Vahl, in Skrivt. Nat. Selsk. Kiobenh.* vi. (1810) 121.—' Ins. Carib.'
smiladfolia, *Hooi.f. in Benth. tf Hook./. Gen-* ii. 667. —Ins. Dominic.

HORNEMANNIA, Willd. Enum. Hort. Berol. 653 (1809) = Mazus, Lour. (Scrophular.).
bicolor, Willd. 1. c. = M. rugosus.
goodeniaefolia, Hoffmgg. ex Steud. Nom. ed. II. i. 776 «=M. rngosns.
mscosa, Willd. Ennm. Hort. Berol. 653 - Vandellia hirsuta.

HOBNEBA, Jnngh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 814. Gen. dub. *THYMELEARUM.—Cl.* Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 188.
glomerata, *Jungh. I. c.* 816.—Japon.
umbellate, *Jungh. 1. c.* 814.—Japon.

HORNERA, Neck. Elem. iii. 43 (1790) = Mucuna, Adans. (Legumin.).

HORNSCHUCHIA, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 15 (1828; = Cratozylon, Blume (Hypericin.).
hyperieina, Blume, 1. c. 16=C. Hornsehuchii.

HORNSCHUCHIA, Nees, in Flora, iv. (1821) 302 ; et in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 160. *ANONACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 663 (Cf. i. 392).
Bryotrophe, *Nees, II. cc.* 802; 161. t. 11.—Bras.
Myrtillus, *Nees, II. cc.* 302 ; 162. 1.12.—Bras.

HORNSCHUCHIA, Spreng. Neue Entdeck. iii. 64 (1822) (Quid?).
orasiliensis, Spreng. 1. c—Bras.

HORNSTEDIA, Juss. in Diet Sc. Nat. ii. Suppl. 20 (1816) -seq.

HORNSTEDTIA, Retz. Obs. vi. 18 (1791) - Amomum, Linn. (Scitamin.).
Leonurus, Retz. 1. c.=A. Leonurua.
scyphifera, Steud. Nom. ed. II. i. 776=seq.
Scyphus, Retz. Obs. vi. 18=A. scyphiferum.

HORNUNGIA, Bernh. in Flora, xxiii. (1840) 392-Qagea, Salisb. (Lilkc).

HORNUNGIA, Reichb. Ic. Fl. Germ. xii. t. 6. f. 4190 (1887) = Hutohinsia, R. Br. (Crucif.).
petraea, Reichb. L c. » Hutchinsia petraea.

HORREOLA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2=ElatoBtemma, Forst. (Urtic).

HORSFIELDA, Pers. Syn. ii. 635 (1807)-HORSFIELDIA, Willd.=Myristica, Linn.

HORSFIELDIA, Blume, ex DC. Prod. iv. 87 (1830).
ARALIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 987.
SCHOBKRTIA, Blume, Bijdr. 884 (1826).
JWleata. *Blume, ex DC. Prod.* iv. 87.—Java.
"orrida. Seem , in Joum. Bot. v. (1867) 237 = Fatsia horrida.

HORSFIELDIA, Willd. Sp. PI. iv. 872 (1805) = Myristica, Linn.
odorata, Willd. 1. c - M. HorsfieldiL

HORSTIA, Heist. Syst. 15 (1748) (Quid?).

ORTA, Thunb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 776 (1840)-HOSTA, Tratt. = Funkia, Spreng. (Liliac).

HORT A, Veil. Fl. Flum. 48; i. t. 124 (1825) = Clavtfa, Ruiz *Bt* Pav. (Myrsin.).
spinosa, Veil. II. cc.-C. omata.

HORTENSIA, Comm. ex Juss. Gen. 214 (1789) - Hydrangea, Linn. (Saxifrag.).
japonica, J. F. Gmel. Syst 722-Hydrangea hortensis.
mutabilis, Schneev. Ic. PI. Rar. 86 = Hydrangea hortensis.
opuloides, Lam. Encyc. iii. 186 - Hydrangea hortensis.
rosea, Desf. Tabl. ed. I. 115 - Hydrangea hortensis.
spedosa, Pers. Syn. L 505 = Hydrangea hortensis.

HORTIA, Vand. Fl. Lusit 14 (1788); et in Roem. Script 88 (1796). *RUTACEAE,* Benth. *ic* Hook. f. i. 301.
arborea, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 183 Bras.
brasiliana, *Vand. ex DC. Prod.* i. 732.—Bras,
coccinea, *Benth. ex Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. II. 188.—Bras,
longifolia, *Benth. ex Engl. I. c.* 184.—Bras.

HOBTONIA, Wight, ex Am. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 645. *MON1MIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 142.
acuminata, Wight, Ic. t. 1998 - floribunda.
floribunda, *Wight, ex Am. in Mag. Zool. tf Bot.* ii. (1838) 646.—Zeylan.
ovalifolia, Wight, Ic. 1.1998 = floribunda.

HORTSMANIA, Miq. in Nat. Verh. Wet. Haarl. vii. (1851) (Stirp. Surin. Sel.) 167-CondyIocarpon, Desf. (Apocyn.).
dliata, Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 66 = C. ciliatum.
myrtifolia, Miq. Stirp. Surin. Sel. 168=C. myrtifolium.
pubiflora, Benth. ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. I. 67 — C. pubiflorum.

HORTSMANNIA, Pfeiff. Nom. i. 1670 (1874) = praec.

HOSACKIA, Dougl. ex Benth. in Bot. Reg. t 1267 (1829). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 4!>1.
ACMISFON, Rafin. Atl. Joum. 144 (1832).
ANISOLOTVS, Bemh. Sem. Hort. Erf. (1637); Linnaea, xii. (1838; Litt. 75.
DREFAJTOLOBUS, Null, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 824 (1840).
FLUNDULA, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 96 (1836).
SYRMATIUM, Vog. in Linnaea, x. (1886) 590.
angustifolia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 200.—Am. hor. occ.
argentea, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. iii. (1863) 38 = argophylla.
argophylla, *A. Gray, in Mem. Acad. Am.* N. S. v. (1855) 316.—Calif,
argyraea, *Greene, in Bull. Calif. Acad. i.* IV. (1885) 184.—Calif.
balsamifera, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 125 = stipularis.
bicolor, *Dougl. ex Benth. in Lindl. Bot. Reg.* t. 1257. —Am. bor. occ.
brachycarpa, *Benth. PI. Hartw.* 806.—Calif,
crassifolia, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 365. —Am. bor. occ.
crassifolia, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 325 -glabra.
cytisoides, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 866.-Calif.
decumbens, *Benth. 1. c.*—Am. bor. occ.
disticha, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 186— Calif.
data, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 826 = Purshiana.
flexuosa, *Greene.in Bull. Calif. Acad.* i. III. (1885) 82. -Calif.
floribunda, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 827 = Purshiana.
glabra, *Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped.* ii. 274.— Am. bor. occ.
gracilis, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 365. —Am. bor. occ.
grandiflora, *Benth. I. c.* 866.—Calif.

HOSACKIA:—
Heermanni,C. L.Anders. PI.Nevada,119 = decumbens.
Heermanni, *Durand V Hilg. in joum. Acad. Sc. Philad.* Ser. II. iii. (1855) 39.—Am. bor. occ.
incana, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 79.—Calif.
indica, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5940 - Rothia trifoliata.
juncea, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 866.— Calit
lathyraides, Durand & Hilg. in Pacif. Rail. Rep. v. (1855)6 = oblongifolia.
Macraei, *Benth. ex A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 400.—Chili,
macrantha, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. III. (1885) 81.—Calif.
macrophylla, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 128=stipnlaris.
maritima, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 327. —Calif.
maritima, Torr. Bot. Mex. Bound. 55 — strigosa.
mexicana, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvii. (183/) 365 =angustifolia.
micrantha, *Nutt. ex Torr.* fa* *Gray, Fl. N. Am.* i. 324. —Calif.
microphylla, Nutt. ex Torr. & Gray, 1. c. 326 = strigosa.
mollis, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. IV. (1885) 165. -N.Mexic.
mollis, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 827-Purshiana.
nana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 359.— Mexic.
nudiflora, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 826-strigosa.
oblongifolia, *Benth. PI. Hartw.* 305.—Calif.
ochroleuca, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 823 =grandiflora.
Ornithopus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 186-argophylla?
parviflora, *Benth. in Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1257.— Am. bor. occ.
pilosa, Nutt. ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 327 - Purshiana.
platycarpa, Nult. ex Torr. *it* Gray, 1. c. 323-crassifolia.
procumbens, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. III. (1885) 82.—Am. bor. occ.
prostrata, *Nutt. ex Torr. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 825. -Calif.
pnberula, *Benth. PI. Hartw.* 805.—N. Mextc.
puberula, A. Gray, PI. Wright, ii. 42 = rigida.
Purshiana, *Benth. in Lindl. Bot. Reg.* sub t 1257. —Am. bor.
repens, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 200.—Mexic.
rigida, *Benth. PI. Hartw.* 306.—Am. bor. occ.
rubella, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 326-strigoaa.
scoparia, Torr. *Sc* Gray, 1. c. 825=glabra.
sericca, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1837) 367. -Calif.
slipularis, *Benth. 1. c.* 365.—Calif.
stolonifera, Lindl. Bot. Reg. t. 1977 = crassifolia.
strigosa, *Nutt. ex Torr. V Gray, Fl. N. Am.* i. 326.— Calif.
snbpinnata, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 165; *Torr.* b* *Gray, Fl. N. Am.* i. 326.—Am. bor. oca ; Chili,
tomentosa, *Hook,* b* *Am. Bot. Beech. Voy.* 187.— Calif.
Torreyi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 625.—Am. bor.
unifoliolata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 185=Purshiana.
Veatchii, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* i. in. (1885) 83—Calif.
Wrangeliana, G. Don, in Sweet, Hort Brit ed. III. 165; Torr. *ic* Gray, Fl. N. Am. i. 826-sub-pinnata.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 42.-N. Mexic.
HOSAKIA, Stead. Nom. ed. II. i. 776 (1840)«pnec.
HOSANGIA, Neck. Elem. i. 225 (1790) = Maieta, Aubl. (Melastomac).

HOSEA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (18181-(Qnidt).
malaiarica, Dencat. L c—Ind. or.

HOSLUNDA, Roem. & Schnlt. Syst. 1. 57, 207 (1817) — seq.

HOSLTTNDIA, Vahl, Enum. i. 212 (1806). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1174.
HAASLUNDIA, Schum. & Thonn. Beskr. Gnin. Pl. 16 (1827).
decumbens, *Benth. in DC. Prod.* xii. 64.—Afr. trop.
opposite, *Vahl, Enum.* i. 212.—Afr. trop.
oppositifolia, Beauv. Fl. Owar. i. 63 - opposrita.
verticilfata, *Vahl, Enum. i.* 213.—Afr. trop.

HOSTA, Jacq. Hort. Schoenb. i. 60, 114 (1797) = Cornutia, Lion. (Verbenac).
caerulea, Jacq. 1. c. = C pnnctata.
coerulea, Walp. Rep. iv. 80-C. pyramidata.
grandiflora, A. Dietr. Sp. PI. i. 252 = C. grandifoliu.
grandlfolia, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, v. (1880) 97=C.grandifolia.
latifolia, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 248 = C. pyramidata.
longifolia, H. B. & K. 1. c. 247 = C. longifolia.
odorata, Poepp. & Endl. I. c. iii. 68. t. 269 - C. longifolia.
pyramidata, A. Dietr. Sp. PI. i. 258-C. pyramidata.

HOSTA, Tratt. Arch. Gewaechs. i. (1812)55=PunMa, Spreng. (Liliac).
coerulea, Tratt. 1. c. in obs.-F. ovata.
japonica, Tratt. L c. t. 89 = F. subcordata.
lancifolia, Tratt. 1. c. in obs. - F. lancifolia.
plantaginea, Aschers. Fl. Brandenb. 728 = F. subcordata.

HOSTA, Veil, ex Pfeiff. Norn. i. 1670 (1874) = HORTA, VelL-Clavtja, Rniz *Sc* Pav. (Myrsin.).

HOST ANA, Pers. Syn. i 143 (1805)-HOSTA, Jacq. = Cornutia, Linn. (Verbenac. 1.
coerulea, Pers. 1. c. = C. pyramidata.

HOSTEA, Willd. Sp. PI. i. 1274 (1797)-Matelea, Aubl. (Asclepiad.).
viridifiora, Willd. 1. c. = M. latifolia, palustris.

HOSTIA, Moench, Meth. Suppl. 221 (1802)-Crepis, Linn. (Compos.).
foetida, Moench, 1 c = C. foetida.
rubra, Cass. in Diet Sc. Nat. xxi. 443 = C. rubra.

HOSTMANNIA, Planch, in Hook. Ic. PI. t. 709 (1848) = Elvaeia, DC. (Ochnac).
elvasioides, Planch. 1. c. = E. Hostmannia.

HOSTMANNIA, Stend. ex Nand. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 25 = Comolia, DC. (Melastomac).
lythrarioides, Stend. ex Nand. 1. c. 27 = C. lythrarioides.

HOTEIA, C. Morr. *Sc* Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 316. t. 11 = Astilbe, Bach.-Ham. (Saxifrag.).
barbata, Hook. Bot. Mag. t. 3821-A. japonica.
biternata, C. Morr. *Sc* Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. 1L ii. (1834) 318, in obs.-TiarelIa biternata.
chinensis, Maxim. Prim. Fl. Amur. 120 = A. chinensis.
japonica, C. Morr. *Sc* Decne. in Ann. Sc. Nat. Sèr. II. ii. (1834) 317=A. japonica.
Thunbergii, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 191=A. Thunbergii.

HOTTONTA, Boerh. ex Linn. Syst. ed. I (1736). *PRIMULACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 631.
BREVIGLANUIUM, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 423 (1867).
indica, Linn. Syst. ed. X. 919—Limnophila gratioloides.
inflata, *Ell. Sketch*, i. 231.—Am. bor.
littoralis, LOOT. Fl. Cochinch. 105—Erythraea cochinchinensis.
milefolium, Gilib. Fl. Lituan. i. 33-palustris.
palnstris, *Linn. Sp. PI.* 145.—Europ.
palustris, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 138-inflata.
serrata, Willd. Sp. PI. i. 814-Hydrilla ovalifolia?
sessilifiora, Vahl, Symb. Bot. ii. 36 = Limnophila sessiliflora.

HOTTONIA, Burm. Thes. Zeyl. 121. t. 56. f. 1 (1737)-Iiimnophila, R. Br. (Scrophular.).

HOTTUYNIA, Cram. Disp. 141 (1803) - Houttuynia, Thnnb. (Piperac.).

HOTXLLETIA, Brongn. In Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 37. *ORCHIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 550.
Brocklehurstiana, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) *Misc.* 47.—Bras.
chrysantha, Linden *Sc* André, Illustr. Hortic xviii. (1871)138. t. 71 = Wallirii.
Landsbergi, *Linden* b* *Reichb.f. in Regel, Gartenft.* (1855) 2.—Bras.
Lowiana, *Reichb.f. in Gard. Chron.* (1874) II. 484.—N. Granat.
odoratissima, *Linden, ex Lindl. If Paxt. flow. Gard.* iii. (1852-53) 172.—N. Granat.
picta, *Linden V Reichb. f. in Regel, Gartenfl.* (1855) 2.—N. Granat.
stapeliaefiora, Brongn. ex Lem. in Illustr. Hortic. (1869) t. 612, in syn.=seq.
stapelioides, *Brongn. ex Reichb. f. in Regel, Gartenft.* (1855)2.—Bras. ≤
tigrina, *Linden, ex Lindl. in Paxt. Flo*. Gard.* iii. (1862-53) 171,172.—N. Granat.
vittata, Lindl. Bot. Reg. (1841), Misc. 47-Polycycnis vittata.
Wallisii, *Linden V Reichb.f. in Gard. Chron.* (1869) 611.—N. Granat

HOUMIRI, Aubl. PI. Gni. i. 564 (1776)-Humiria, Janme St Hil. (1805).
balsamifera, Aubl. 1. c. — Humiria balsamifera.
gaionensis, Baill. Hist. PI. v. 52.—Afr. trop.
guianensis, Baill. 1. c. 54 — Humiria guianensis.

HOUMIRIA, Juss. Gen. 435 (1789)=praec.

HOUTTEA, Baill. in Bull. Soc. linn. Par. i. (1881) 801. *PASSIFLORACEAE*.
madagascariensis, *Baill. 1. c.*—Madag.

HOUSTONTA, Gronov. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 60.
CHAMISME, Rafin. ex Steud. Norn. ed. II. i. 776, in syn. (1840).
PANETOS, Rafin. in Ann. Gen. Sc. Phys. v. (1820) 227; vi. 81.
POIRETIA, J. F. Gmel. Syst 263 (1791).
acerosa, *Benth. &" Hook. f. Gen.* ii. 60; *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 203.—Mexic.
angustifolia, *Michx. Fl. Bor. Am* i. 85.—Am. bor.
angustifolia, Pursh, Fl. Am. Sept i. 106=purpurea.
bouvardioides, *Benth. &* Nook./. Gen.* ii. 60.—Mexic.
bryotdes, Willd. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iii. 627 = Hedyotis hypnoides.
caerulea. *Linn. Sp. PI.* 105.—Am. bor.
canadensis, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst.* iii. 527.—Canada.
chlorantha, Bertol. Elench. 5 - Bouvardia chlorantha.
ciliolata, Tort. Fl. N. Am. i. 173 = purpnrea.
coccinea, Andr. Bot. Rep. t. 106 — .Bouvardia triphylla.
coerulea, Auct. vide caerulea.
crocea, *Schuebl. PI. Nov. Hort. Tubing.* (1825) 20; *ex Steud. Norn.* ed. II. i. 777.—Hab. i
fasciculata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 208.—Mexic.
fruticesa, Rafin. ex A. Gray, Syn. Fl. Am. ii. I. 26 = angustifolia.
fruticosa, Willd. ex Roem. *Sc* Schult Syst. iii. 527 = Declieuxia chiococcoides.
geniculata, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 102.—Am. bor.
grandiflora, Rafin. in Ann. Gen. Sc. Phys. v. (1820) 225 =caerulea.
heteropbylla, *Rafin. I. c.* 227.—Am. bor.
humifusa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1868) 314.—Texas.
humifusa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 80 = Wrightii.
latifolia, *Willd. ex Roem.* b" *Schult. Syst.* iii. 527.—Am. bor.
Linnaei, Michx. Fl. Bor. Am. i. 85=caerulea, patens,
longiflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 314.—Mexic.
longifolia, Gaertn. Frnct. i. 226. t. 49. f. 8-pnrpurea.
longipes, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-88) 97.-N. Mexic.

HOTJSTONIA:—
macrosepala, Nutt. ex Ton. 8c Gray, Fl. N. Am. ii. 40—purpurea.
microphylla, Willd. ex Roem. & Schult. Syst iii. 627—Anotis serpens.
minima, *Beck, in Am. Journ. Sc.* x. (1826) 262.—Am. bor. occ.
oblongifolia, *Rafin. in Ann. Gen. Sc. Phys.* v. (1820) 226.—Am. bor.
obtusifolia, *Rafin. I. c.*—Am. bor.
Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 20-2.—Mexic.
patens, *Ell. Sketch*, i. 191.—Am. bor.
pubescens, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 361-purpurea.
purpurea, *Linn. Sp. PI.* 105.—Am. bor.
pusilla, J. F. Gmel. Syst. 286=caerulea?
reticulata, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 102.—Am. bor.
rotundifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 85.—Am. bor.
rubra, *Cav. Ic.* v. 48. t. 474. f. 1.—Mexic
rupestris, Rafin, in Ann. Gen. Sc. Phys. v. (1820) 226 =angustifolia.
serpyllifolia, *R.Gtah.* in. Hook. Bot. Mag. t. 2822-caerulea ?
serpyllifolia, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 85.—Am. bor.
subviscosa, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. iy.* (1858-59) 314.—Texas.
tenella, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 106 = serpyllifolia.
tenuifolia, Nutt. Gen. Am. i. 287 = purpurea.
triflora, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1858-59) 314.—Mexic.
umbellata, Walp. Rep. i. 496, in syn.-purpurea.
varians, Michx. Fl. Bor. Am. i. 86-purpurea.
Wrightii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 202.—Am. bor. occ.

HOUTOUYNIA, Pers. Syst. 556 (1797)=Houttuynia, Thunb. (Piperac).

HOUTTEA, Decne. in Rev. Hortic. Sér. III. ii. (1848) 462. *GESNERACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. ii. 1002-VANHOUTTEA, Lem. in Bull Soc. Hort. Orléans, i-(1845) 346.
Gardneri, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. III. ii. (1848) 462.—Bras.
Leptopus, Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 893 = Gardneri.
pardina, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. III. ii. (1848) 462.—Bras,
salviifolia, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 395.—Bras.

HOUTTEA, Heynh. Nom. ii. 306 (1846)=Achimenee, P. Br. (Gesnerac).
tubiflora, Heynh. 1. c. (= *Dolichodeira tubiflora).*—Bras.

HOUTTINIA, Neck. Elem. iii. 291 (1790) (Hoottinia) -Calla, Linn. (Aroid.).

HOUTTOUYNIA, Batsch, Tab. 159 (1802)=seq.

HOTJTTTXYinA, Thunb. Fl. Jap. 12 (1784). *PIPERACEAE*, Benth. *Sc* Hook. £ iii. 128.
ANEMIA, Nutt in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1888) 136.
ANEHOFSIS, [Hook.] in Ann. Nat. Hist. Ser. J. (1838) 136, in nota; Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 390. t. 92.
POLYPAKA, Lour. Fl. Cochinch. 61 (1790).
Bolanderi, Benth. 8c Hook. f. Gen. iii. 128 = California-californiča, *Benth. V Hook. f. ex Bot. Calif*, ii. * Am. bor. occ.
cordata, *Thunb. Fl. Jap.* 234. t. 26.—Reg. Him China; Japon.
foetida, Hort. ex Loud. Hort.Brit 37-cordata?

HOUTTUYNIA, Houtt. Handleid. xii. 448. t. 85 (1773) =Acidanthera, Hochst. (Irid.).
capensis, Houtt. L c—Afr. austr.

HOUTUYNIA, Thunb. Fl. Jap. 231. t. 26 (1784) -pratf-

HOUTUYNIA, Thunb. in Vet. Acad. Handb. Stockh. iv-(1783) 149. t. 5 = Houttuynia, Thunb. (Piperac).

HOVEA, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. v. *Mf* (1812). *LEGUMINOSAE*, Benth. *Sc* Hook, f- 474.
PLAGIOLOBIUM, Sweet, Fl. Austral, t. 2 (1827).
PLATYCHILUM, Don. Hort. Brit. 187 (1830).
POIRETIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 80*-

HOVEA:—
acanthodada, *F. Muell. Fragm.* iv. 16.—Austral.
acutifdia, *A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 126.—Austral.
apiculata, A. Cunn. ex G. Don, 1. c.=longifolia.
Beckeri, F. Muell. in Linnaea, xxv. (18S2) 891-longifolia.
Ceki, *Bonpl. yard. Malm.* t. 51.—Austral.
chorizemaefolia, *DC. Prod.* ii. 116.—Austral.
crispa, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 19 =• trisperma.
elliptica. DC. Prod. ji. 115-Celsi.
elliptica, Meissn. Lehm. PI. Preiss. i. 79 - trisperma.
heterophylla, *A. Cunn. ex Hook. f. Fl. Tasm.* i. 95. 1.15.—Austral.
Uici/olia, A. Cunn. ex Lindl. Bot. Reg. (1844) t. 68 = chorizemaefolia.
lanceolata, Sims, Bot. Mag. t. 1624= longifolia.
lanigera, Lodd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 777-longifolia.
latifolia, Lodd. Bot. Cab. t.30=-Celsi.
leiocarpa, Benth. in Mitch Joum. Trop. Anstral. 289 - longipes.
linearis, *[R. Br..k] Ait. Hort. Kem.* ed. II. iv. 275.—Austral.
longifolia, *[Jt. Br. in] Ait. I. c*—Austral.
longipes, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 37.—Austral.
Manglesii.Uadl Bot. Reg. (1838) t. 62-trisperma.
mucronata, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 126-longifolia.
pannosa, A. Cunn. ex Hook. Bot. Mag. t. S06S=longifolia.
pungens, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 87.—AustraL
purpurea, Sweet, Fl. Australe. 1.13 - longifolia.
racemulosa, Benth. in Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 39 -longifolia.
ramulosa, A. Cunn. ex Lindl. 1. c. (1843) sub t. 4-longifolia.
ros°mfrinifolia, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 348-longifolia.
splendent, Paxt. Mag. Bot x. (1843) 103-trisperma.
stricta, *Moan, in Lehm. PI. Preiss.* i. 79.—Austral,
trisperma, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 8[illegible].—Austral.
ulicina, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 30 = pungens.
villosa, Lindl. Bot. Reg. t 1512=longifolia.

HOVENIA, Thunb. Nov. Gen. 7 (1781). *RHAMNEAE,* Benth. & Hook. f. i. 378.
acerba, Lindl. in Bot Reg. t. 501-dulcis.
dulcis, *Thunb. Nov. Gen.* 8.-Reg. Himal-i China, Japon.
inaequalis, DC. Prod. ii. 40=dulcis.
pubescens, Sweet, Hort. Brit ed. I. 91=dulcis.

HOVERDENIA, Nees, in DC. Prod. xi. 380 (1847). *ACANTHACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. *Mi.*
speciosa, *Nees, I. c.* 881.—Mexic.

HOWARDIA, Klotzsch. in Monatsb. Acad. Berl. (1859) [illegible]

caudata, Chamissonis, cordtgera, [illegible] cynanchifolia, deltoidea, Ehrenbergxana,emarginata,erianiha,fimbriata,foetida,fragranhssima, giganiea, glaucescens, grandiflora,h,ans, infiata, macroura, maxima, obtusata, pandurata, pelUUa,

[illegible] 1. c. 607-622 = homonyma *omnia* Aristotochiae.
fonthamii, Klotzsch, 1. c. 620-A. P«*«»: <"«siliensis,* Klotzsch, 1. c.«08 = A. cymbifera.
"»./<./:«, Klotesch, 1. c. 616-A. angustifoha.
Vmbifera, Klotzsch, 1. c. 609 =-A. galeata.
fttminensis, Klotzseh, 1. c 612-A. qdora.
foetens, Klotzsch, 1. c. 609=A. grandiflora.
g«leata, Klotzsch, 1. c. 608-A. brasiliensis.
gtminiflora, Klotzsch, 1. c. 619-A. maxima.
G'lmerii, Klotzsch, 1. c 621 = A. maxima.
Hoffma$_{Hni}$, Klotzsch, 1. c. = A. maxima.
L'nsbergii, Klotzsch, 1. c. 612 = A. eurystoma.
'ongifolia, Klotzsch, 1. c. 616-A. angustifol*
feradenia, Klotzsch, 1. c. 618 = A. glandulosa.
Schomburgkii, Klotzsch, I. c. 613 = A. dictyantha.
s'll»wiana, Klotzsch, L c. 616 = A. triangulans.
"tigera, Klotzsch, 1. c. 617 - A. cbilensis.

HOWARDIA:—
surinamensis, Klotzsch, in Monatsb. Acad. Berl. (1850) 618 — Aristolochia macrota.
trifida, Klotzsch, 1. c 617-A. trilobate.
Warsiemtrii, Klotzsch, ex Dnch. in DC. Prod. xvi. 476-A. pandurata.

HOWARDIA, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. i. (1854) 66. t. 10-Pogonopus, Klotzsch (Rubiac).
caracasensis, Wedd. 1. c. 71 = P. exsertus.
febrifuga, Wedd. 1. c. 67.-Bolivia.
grandifiora, Wedd. 1. c. 70.—N. Granat.
Richardii, Wedd. 1. c. 69.—Bras.

HOVTEA, Becc. Malesia, i. (1877) 41, 66. *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 904.
GKISBBACHIA, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 177.
Belmoreana, *Becc Malesia, i.* (1877) 66.—Ins. Dom. Howe.
Forsteriana, *Becc. 1. c.*—Ins. Dom. Howe.

HOWBLIiIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 43. *CAMPANULACEAE.*
aquatilis, *A. Gray, I. c.*—Am. bor. occ.

HOWIEA, Becc. Malesia, i. (1877) 66-Howea, Becc. (Palm.).

HOWITTIA, F. Muell. in Trans. Viet Inst. i. (1855) 116; et in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 9. *MALVACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 203.
trilocularis, *F. Muell. II.* cc—Austral.

HOYA, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 26. *ASCLEPIADEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 776.
ACANTHOSTEMMA, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 57. t. 10 (1849).
CATHETOSTEMMA, Blume, 1. c. 59. 113 (1849).
CENTROSTEMMA, Decne. in Ana. Sc. Nat. Ser. II. ix. (1838) 271. t. 12.
CYRTOCERAS, Benn. PL Jav. Rar. 90. t. 21 (1838).
OTOSTEMMA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 69. 1.11 (1849).
PLOCOSTEMMA, Blume, Rnmphia, iv. 30 (1848); et 1. c. t. 14 (1849).
PTEROSTELMA, Wight, Contrib. 89 (1834).
SCKOIXIA, Jacq. f. Kclog. PI. i. 5. t. 2 (1811).
SPERLINGIA, Vahl, in Skrivt. Nat. Selsk. Kiobenh. vi. (1810). 113.
TKIACMA, Van Hass. ex Miq. FL Ind. Bat ii. 528 (1857).
•cuminata, *Benth. ex Hook. f. fl. Brit. Ind.* iv. 63.—Reg. Himal.
acuta, Haw. Rev. PI. Succ. 4 - parasitica.
africana, Decne. in DC. Prod. viii. 639 *{"Pterygocarpus abyssinicus).*—Afr. trop.
alba, Kostel, Allg. Med.-Pharm. Fl. Ui. 1084 - Rumphii?
albens, Millers, ex Stead. Norn. ed. II. i. 777 = pansitica.
albiflora, *Zipp. ex Blume, Rumphia,* iv. 33.—Java,
angastifolia, *Traill, in Trans. Hort. Sot.* vil. (1830) 29 (sp. dub.).—China,
apiculata, *Scheff. in Ann. Jard. Buitent.* i. (1876) 87.—N. Guinea.
Ariadna, *Decne. in DC. Prod.* viii. 635.—Ins. Amboin.
Amottiana, *Wight, Contrib.* 87.—Reg. Himal.
australis, *R. Br. ex Traill, in Trans. Hort. Soc.* vii. (1830) 28.—Austral.
barbata, Spreng. Syst. 1. 843-Tylophora barbata.
Barracki, Home, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xx. (1883) 369 =» australis.
bella, *Hook. Bot. Mag.* t. 4402.—Burma.
bicarinata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861-62) 335 - australis.
Billardieri, Decne. in DC. Prod. viii. 636 = australis.
Brunoniana, Wight, Contrib. 87-coriacea.
buruensis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 141.—Ins. Burn.
campanulata, Blume, Bijdr. 1064 - Physostelma Wallichii.
camosa, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 27.—As. et Austral, trop.
camosa, R. Br. Prod. 460=australis.
caudata, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 60.—Malacca.
chinensis, Traill, in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 27-carnosa.

HOTA:-
ciliata, *Teijsm. V Binn. Cat. Hort. Bog.* 129.—Ins. Bum.
cinnamomifolia, *Hook. Bot. Mag.* t. 4847.— Java,
clandestina, *Blume, Rumphia,* iv. 32.—Java.
cocdnea, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. iv. (1848) 810-cinnamomifolia.
cochinchinensis, *Schult. Syst.* vi. 52.—Cochinch.
collyrioides, *Teijsm.* b* *Binn. Cat. Hort. Bog.* >130, nomen.—Ins. Celebes,
coriacea, *Blume, Bijdr.* 1061.—Malaya.
cariacea, Lindl. Bot. Reg. (1839) t. 18 = multiflora.
coriacea, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. ,619-Zollingeriana.
Corona-Ariadnes, Blume, Rumphia, iv. 31 =H. Ariadna.
coronaria, *Blume, Bijdr.* 1063.—Malaya.
crassifolia, Haw. Suppl. PI. Succ. 8-camosa.
crassipes, *TurcM. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) 1. 261.—Java.
Cumingiana, *Decne. in DC. Prod.* viii. 636.—Ins. Philipp.
Dalrympliana, F. Muell. Rep. Burdek. Exped. 16 = australis.
densifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxi. (1848) I. 281 = Cumingiana.
diptera, *Seem, in Bonplandia,* ix. (1861) 257; *Fl. Vit.* 16S.-Ins. Fiji.
divenifolia, *Blume, Bijdr.* 1064.—Burma; Malaya.
Edeni, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 63.—Reg. HimaL
elegans, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 1084-Rumphii?
elliptica, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 58.—Malacca,
excavate, *Teijsm. (3" Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 406.—Malaya.
Finlaysonii, *Wight, Contrib.* 88.—Singapore.
ftexuosa, Spreng. Syst. L 848 = Tylophora flexuosa.
fratema, *Blume, Rumphia,* iv. 32.—Java,
fusca, *Wall. PI. As. Rar.* i. 68.—Reg. Himal.
globulifera, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 44.— N. Guinea,
globulosn, *Hook. f. in Gard. Chron.* (1882) I. 732.—Reg. Himal.
gonoloboides, *Regel, in Act. Hort: Petrop.* viii. (1884) 642.—Hab.t
graridiflora, *Blume, ex Decne. in DC. ProdMM.* 636.—Java.
grandifiora, Spreng. Syst i. 843-Tylophora grandiflora.
Griffithiana, Decne. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 58 - acuminata.
Giiflithii, *Hook./. 1. c.* 59.—Reg. Himal.
gymnanthera, *Wight, Contrib.* 37.—Ind. or.
Hasseltii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 524.—Java.
Hookeriana, Wight, Contrib. 37 - parasitica.
imbricata, *Decne. in DC. Prod.* viii. 637.—Ins. Philipp.
imperialis, *Lindl. Bot. Reg.* (1846) sub t. 68.—Malaya.
Keysii, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* i. (1884) 87.—Austral.
Lacuna, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8169-Dregea volubilis.
lacunosa, *Blume, Bijdr.* 1063.—Malaya.
lanceolata, Lindl. in Donn,Cat Hort. Cantab, ed. XI. 92—parasitica.
lanceolate, *Wall, ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* ISO.—Reg. Himal.
lasiantha, *Korth. ex Blume, Rumphia,* iv. 30.—Borneo.
latifolia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 127.—Malaya,
laurifolia, *Decne. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. ix. (1838) 272.—Ins. Timor.
laurifolia, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 129 = camosa.
linearis, *Wall, in Wight, Contrib.* 86.—Reg. Himal.
Lobbii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* Iv. 64.—Reg. Himal.
longifolia, *Wall, in Wight, Contrib.* 36.—Reg. Himal.
lutea, *Dtcne. in DC. Prod.* viii. 635.—Ins. Amboin.
lutea, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. iii. 1083-coronaria T
macrophylla, *Blume, Bijdr.* 1063.—Java.
macrophylla, Wight, Contrib. 38-latifolia.
Maingayi, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 62.—Malacca,
maxima, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 406.—Ins. Celebes.

HOYA:—
micrantha, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 55.—Burma.
Motoskei, Teijsm. *8c* Binn. in Nederl. Krnidk. Arch. iii. (1866) 393 = carnosa.
mullition, Blume, Cat. Gew. Buitent. 49*; Bijdr.* 10 4. —Malaya.
Nicholsoniae, *F. Afuell. Fragm.* v. 159.—Austral,
nicobarica, *R. Br. ex Traill, in Trans. Hart. Soc.* vii. (1830) 28.—Ins. Nicobar.
nutamaiuia, Decne. ex Hook.f. Fl. Brit. Ind. iv. 55.— Reg. Himal.
obcordata, *Hook.f. 1. c.* 56.—Reg. Himal.
obcordata, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog.* 285, nomen.—Siam.
oblanceolau. *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 57.—Reg. Himal.
obovata, *Deene. in DC. Prod.* viii. 635.—Ins. Molncc.
obtusifolia, *Wight, Contrib.* 38.—Burma; Malaya,
odoratissima, *Linden, ex Regel, Cat. Hort. Aisaiov.* 78.—Hab.?
opposita, G. Don, Gen. Syst iv. 128 = Rnmphii.
orbiculata. Wall, ex Wight, Contrib. 36=diversifolia.
ovali/olia, Wall. Cat n. 8160 B=revoluta.
ovalifolia, *Wight (f Arn. in Wight, Contrib.* 37.— Ind. of.
pallida, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 152 = Wightii.
pallida, Lindl. Bot. Reg. t. 951 = parasitica.
paniculata, Spreng. Syst. i. 843=Tylophora paniculate,
parasitica, *Wall, ex Traill, in Trans. Hort. Soc.* vii. (1830) 23.—Reg. Himal.; Malaya,
parviflora, *Wight, Contrib.* 37.—Buima.
pauciflora, Wight, Ic. t. 1269= parviflora.
Paxtoni, Nichols. Diet. Card. ii. 155 = bella.
pendula, Wight & Arn. in Wight, Contrib. 36 = Wightii.
pendnla, *Wight, Ic.* t. 474.—Ind. or.
picta, Hort. in Rev. Horde. (1853) 277, partim = carnosa.
picta, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 524.—Java,
pilosa, *Seem, in Bonplandia,* is. (1861) 257 ; *Fl. Vit.* 168— Ins. Fiji.
planiflora. Wall, ex Hook. £ Fl. Brit. Ind. iv. 45 = Tylophora asthmatica.
polynenra, *Hook.f. I. c.* 54.—Reg. Himal.
polystachya, Blnme, Mas. Bot Lugd. Bat. i. 45 - latifolia.
Pottsii, *Traill, in Trans. Hort. Soc.* vii. (1830) 25.— China.
Fraetorii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 526.—Sumatra,
pruinosa, *Miq. 1. c.* 525.—N. Guinea,
pubera, *Blume, Bijdr.* 1065.—Java,
purpuiascens, *Teijsm. b" Binn. Cat. Hort. Bog.* 385, nomen.—Sumatra.
purpurea, *Blume, Rumphia,* iv. SO.—N. Guinea,
purpureo-fusca, *Hook. Bot. Mag.* t. 4520.—Java.
recurvifolia, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 150 = Gymnema recurvifolia.
retusa, *Dale, in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 294.— Ind. or.
revoluta, *Wight, ex Decne. in DC. Prod.* viii. 636.— Malaya.
rotundifolia, Siebold, Cat. PI. Jap. (1840)=caraosa.
Rumphii, *Blume, Bijdr.* 1065.—Ins. Molucc.
ruscifolia,*Decne.in DC. Prod.* viii. 639.—Ins. PhUipp.
samoe'nsis, *Seem. Fl. Vit.* 163.—Ins. Samoa,
serpens, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 55.—Reg. Himal.
Shepherdi, Short, ex Hook. Bot. Mag. t. 5269=longifolia.
speciosa. Decne. in DC. Prod. viii. 634 =imperialis *1*
suaveolens, Hort. Amst ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 625 - lacunosa.
subquatema, *Miq. 1. c.*—Java,
subquintuplinervis, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 141.— Siam.
teretifolia, *Griff, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 54.— Reg. Himal.
Teysmanniana, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 522 - obtusifolia.
Thomsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 61.—Reg. Himal.
trinervia, *Hort. Mack, ex Regel, Gartenfl.* (1865) 806. —As. trop.
trinervis, Traill, in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 26 = Pottsii.
uncinata, *Teijsm. if Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1863) 408.—Malaya,
vaccinioides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 56.—Reg. Himal.

HOYA:—
variegata, Siebold, ex Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, ii. (1846) 401. t. 90=carnosa
velutina. Griff. Notul. iv. 40 = coronaria!
velutina, Wight, Contrib. 35 = coronaria.
verticillata, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 128.—Ind. or.
viridiflora, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 26 = Dregea volubilis.
viridiflora, Griff. Notul. iv. 37; Ic. PI. Asiat. t. 888 = praec. ?
vitellina, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 46.—Java.
volubilis, Griff. Notul. iv. 39 = Dregea volubilis.
Wallichiana, Decne. in DC. Prod. viii. 685=coronaria.
Wightiana, Thw. Enum. PI. Zeyl. 199 = pauciflora.
Wightii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 69.—Ind. or.
Zollingeriana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 518.—Java.

HUALANIA, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 18 - Bredemeyera, Willd. (Polygal.).
colletioides, PhiL L c. 19.—Am. anstr.

HTTANACA, Cav. Ic. vi. 18. t. 528 (1801). *UMBELLIFERAE,* Benth. *8c* Hook, *i.* i. 876.
DIPLASPIS, Hook. f. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. vi. (1847) 469.
LECHLBKIA, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 93, 94.
POZOPSIS, Hook. Ic PI. t. 859 (1852).
TRISCIADIUM, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1861) I. 61.
acaulis, Cav. Ic. vi. 18. t. 528 - Cavanillesii.
andina, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-651 93.— Chili.
Bergii, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cirdova,* iii. (1879) 360.—Reg. Argent.
Cavanillesii, *DC. Prod.* iv. 81.—Reg. Magellan,
cordifolia, *F. Muell. Census,* 63.—Tasman.
geraniifolU, *DC. Prod.* iv. 81.—Mexic.
hydrocotylea, *F. Muell. Census,* 68.—Austral.

HUANUCA, Rafin. Sylva Tellur. 54 (1838)=Aenistus, Schott (Solanac).
spathulata, Rafin. 1. c.-A. spathulatus.

HUBERIA, DC. Prod. iii. 167 (1828). *MELASTOMACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 748.
annulata, DC. 1. c. = Marumia annulata.
argentea, DC. 1. c. 168 = Miconia squamulosa.
laurina, *DC. I. c.* 167.—Bras,
ovalifolia, *DC. I. c*—Bras.
resinosa, Presl, Symb. Bot. i. 58. t. 87-- ovalifolia.
semiserrata, *DC. Prod.* iii. 167.—Bras.

HUBERTIA, Bory, Voy. i. 834.1.14 (1804) = Senecio, Toum. (Compos.).
Ambavilla, Bory, I. c.=S. Ambavilla.
conyzoides, Bory, 1. c. ii. 388 = S. Hubertia.
pinifolia, Juss. ex Pers. Syn. ii. 436; Sieber, ex DC. Prod. vi. 293-Faujasia pinifolia.
salicifolia, Juss. ex Pers. 1. c.=S. salicifolius.
tomentosa, Bory, Voy. i. 835.1.14 = S. Hubertia.

HTTDSONTA, Linn. Mant. i. 11 (1767). *CISTINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 114.
australis, Spreng. Syst. ii. 452 = Helianthemum brasiliense.
ericoides, *Linn. Mant.* i. 74.—Am. bor.
ericoides, Richards, in Frankl. Nan. 1st Joum. App. 739 = tomentosa.
maritima, Torr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 778 —tomentosa.
montana, *Nutt. Gen. Am.* ii. 5.—Am. bor.
Nuttallii, Sweet, Cist, t 19=ericoides.
tomentosa, *Nutt. Gen. Am.* ii. 5.—Am. bor.

HUDSONIA, Robins, ex Lunan, Hort. Jamaic. ii. 310 (1814) ^TerminaJia, Linn. (Combret).
arborea, Lonan, 1. c. = T. Hilarlana.

HUEGELIA, Benth. in Bot. Reg. sub 1.1622 (1838) = Gilia, Ruiz & Pav. (Polem.).
densifolia, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622 = G. densifolia.
elongata, Benth. 1. c.; et in Journ. Hort. Soc. ii. (1847) 311 = G. densifolia.
lanata, Lindl. 1. c. iii. (1848) 74 - G . lanata.
lutea, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1622-G. lntescens.
virgata, Benth. 1. c.-G. virgata.

HUEGELIA, R. Br. ex Endl. Gen. 1156 (1840). < Genus ignotum,' Benth. *8c* Hook. f. i. 288.

HUEGELIA, Reichb. Consp. 144 (1828) - Traehymene, Rudge (Umbellif.).
cyanea, Reichb. Ic. Exot. t. 201 = T. caerulea.

HUEGUENINIA, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 20 (1837)- HUGUENINIA, Reichb. = Sisymbrium, Toum. (Crucit).

HUENEFELDIA, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 307 - Calotte, R. Br. (Compos.).
angustifolia, Walp. 1. c. 506.—Austral.
coronopifolia, Walp. 1. c. 307-C. glandulosa.

HUEKNIA, R. Br. in Mem. Wen. Soc. i. (1809) 22. *ASCLEPIADEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 784.
DECODONTIA, Haw. Syn. PI. Succ. 28, in obs. (1812).
barbata, *Haw. Syn. PI. Succ.* 31.—Afr. austr.
brevirostris, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1877) I. 780. —Afr. austr.
campanulas, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 22. —Afr. austr.
clavigera, *Haw. Suppl. PI. Succ.* 10.—Afr. austr.
crispa, *Haw. Syn. PI. Succ.* 81.—Afr. austr.
duodedmfida. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 359-tubata.
guttata, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 22.—Afr. austr.
humilis, *Haw. Syn. PI. Succ.* 80.—Afr. austr.
Hystrix, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1876) I. 795.— Afr. austr.
lentiginosa, *Haw. Syn. PI. Succ.* 29.—Afr. austr.
occellata, *Sckutt. Syst.* vi. 9.—Afr. austr.
oculata, *Hook.f. Bot. Mag.* t 6658.—Afr. austr.
reticulata, *Haw. Syn. PI. Succ.* 28.—Afr. austr.
Thureti, *Cels, ex Hérincq, L'Horticult. Franç.* (1866) 78.—Afr. austr. 1
tubata, *Ham. Syn. PI. Succ.* 80.—Afr. austr.
venusta, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 22.— Afr. austr.

HUEBNTOPSIS, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xvii- (1878) 171. *ASCLEPIADEAE.*
decipiens, *N. E. Br. I. c.*—Afr. austr.

HUERTA, Jaume St. HiL Expos, ii. 357 (1805) = seq.

HTJEETEA, Ruiz & Pav. Prod. 34. t. 6 (1794). *ANACARDIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 428.
cubensis, *Griseb. Cat. PL Cub.* 66.—Cuba,
glandulosa, *Ruit tf Pav. Fl. Per.* iii. 4. t. 227.— Peruv.

HUERTIA, G. Don, Gen. Syst.ii. 77 (1832)-praec.

HUETIA, Boiss.Diagn. Ser. II. ii. 103 (1856) - CaTUH>> Rupp.
pumila, Boiss. 1. c. 104 = C. alpinum.

HUFELANDIA, Nees, Progr. Gratul. 11 (1833); Laurin. Expos. (1836) 187, 674 = Beilflchmiedifti Nees (Laurin.).
caracasana, Klotzsch *8c* Karst ex Meissn. in Mart, r'- Bras. v. II. 206.—N. Granat
latifolia, Nees, Syst. Laurin. 674.—Peruv.
pendula, Nees, Disp. Laurin. 22 = B. pendula.
sulcata, Nees, in Linnaea, xxi. (1848) 494.—N. Granat
tkomaea, Nees, Disp. Laurin. 23 = B. thomaea.
thyrsiflora, Nees, Syst. Laurin. 190.—Madag.
tovariensis, Klotzsch *8c* Karst. ex Meissn. in DC. *rroa*- xv. 65.—Am. austr.

HUGELIA, DC. Prod. iv. 72 (1880)-HUEGELIA. Reichb. = Trachymane, Rudge (Umbellif.).

HUGELROEA, Steud. Nom. ed. II. i. 778 (1840) = Spbaerolobium, Sm. (Legumin.).
linophylla, Steud. 1. c.=S. linophyllum.

HUGOMTA, Linn. Gen. ed. T. 134 (1737). *LINEA&* Benth. & Hook. f. i. 243, 987.
PENICILLANTHKMUM, Vieill. in Bull. Soc. Normand. x. (1666) 94.
UGONA, Adans. Fam. ii. (22) (1763).
Afzelii, *R. Br. ex Planch, in Hook. Lond. Jeurti- D*< vii. (1848) 525.—Afr. trop.

HTJGONIA:—
angolensis, *Welw. ex Oliver, Fl: Trop. Afr.* i. 271 - Afa trop.
costata, *Miq. Illustr. ft. Ind. Arch.* 67.—Sumatra,
ferruginea, *Wight V Am. Prod.* 72.—Zeylan.
foliosa, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 271.—Afr. trop.
integerrima} Stokes, bot Mat. Med. iii. 520 = H. Mystax.
Jenkinsii, *F. Muell. Fragm.* v. 7.—Austral,
macrocarpa, *Welw. Apont.* 585. n. 21.—Afr. trop.
macrophylla, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 271.—Afr. trop.
mystacina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127-seq.
Mystax, Cav. Diss. iii. 177. t. 23. f. l=serrata.
Mystax, *Linn. Sp. PI.* 675.—Ind. or.
obovata, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1824) 206 - H. Mystax.
Planchoni, *Hook.f. in Hook. Ic. PL* t. 777.—Afr. trop.
platysepria, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 272.—Afr. trop.
serrata, *Lam. Encyc.* iii. 149.—Ins. Mascar.
spicata, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 270.—Afr. trop.
snmatrana, *Miq. Illustr. Fl. Ind. Arch.* 68.—Sumatra,
tomentosa,' *Cav. Diss.* iii. 178. t. 23. f. 2.—Ins. Manrit.

HUGUENINIA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 691 (1832) =8isymbrrum, Tourn. (Crncif.).
tanacetifolia, Reichb. 1. c.»S. tanacetifolium.

HUIDOBRIA, C. Gay, Fl. CM. ii. 438. t. 26 (1846) = Eoasa, Joss.
chilensis, C. Gay, 1. c ii. 440.—Chili.
fruticosa, Phil. Fl. Atac. 19.—Chili.

HULSEA, Ton. & Gray, in Pacif. Rail. Rep- vi. 76, 77 (1857). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 401.
algida, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vi. (1864-66) 547.—Calif.
brevifolia, *A. Gray, 1. c.* vii. (1868) 359.—Calif,
californica, *A. Gray, in Pacif. Rail. Rep.* vi. 77.—Calif.
callicarpa, S. Wats, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I. 342=vestita.
heterochroma, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 359.—Calif,
nana, *A. Gray, in Pacif. Rail, Rep.il* 76.113.—Am. bor. occ
Parryi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 59 = vestita.
vestita, 4. *Gray, 1. c.* vi. (1864-65) 547.—Calif.

HULTEMIA, Reichb. Norn. 168 (1841)-seq.

HULTENIA, Reichb. Handb. 243 (1837) = HULTHEMIA, Dum.-Rosa, Toum.

HULTHEMIA, Blnme, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.160 (1855)=Abrus, Linn. (Legumin.).
javanica, Blume, L c. =A. pulchellus.

HULTHEMIA, Dum. Not. Hnlth. 18 (1824)-BOB*, Tourn.
b<>roerifolia, Dum. L c - R. berberifolia.

HULTHENIA, Brongn. Ennm. Gen. 125 (184S)=praec.

HUMBjjRTIA, Lam. Encyc. ii. 356 (1786). *CONVOLVULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 869.
ENDRACHIUM, JUSS. Gen. 183 (1789).
SMITHIA, J. F. Gmel. Syst ii. 388 (1791).
THOUINIA, Sm. Ic. Ined. t. 7 (1789).
"tviternia, Comm. ex Lam. Encyc. it 856=madagascariensis.
""dagascariensis, *Urn. I. c; et Illustr.* 449. t. 105.-Madag.

HUMBOLDIA, Reichb. Consp. 156 (1828) = Humboldtia, Vahl (Legnmin.).

HUMBOLDTL\, Neck. Elem.ii. 16 (1790)=Voyria, AubL (Gentian.).

HUMBOLDTIA, Ruiz *8c* Pav. Prod. 121. t 27 (1794) = «eurothaUlB, R. Br. (Orchid.
«*tiflora,* Ruiz& Pav. Syst. Veg. 286»Stelis acutinora.
aspera, R$_n$i$_z$ & p$_a$v. 1. c. =Stelis aspera.
tonlorta, Ruiz & Pav. 1. c 235-Stelis contorta.
'"*data,* Ruiz & Pav. L c. 234 = P. cordata.

HUMBOLDTIA:—
emarginata, Pav. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 6 = Physosiphon emarginatus.
lanceolata, Ruiz* Pav. Syst. Veg. 237 = Stelis lanceolate.
oblonga, Ruiz & Pav. 1. c. 286-Stelis oblonga.
oblonga, Willd. ex LindL Fol. Orch. Stelis, 9-Stelis ascendens.
parviflora, Ruizft Pav. Syst. Veg. 236 = Stelismicrantha.
polystachya, Ruiz *8c* Pav. 1. c. 284 = Stelis polystachya.
purpurea, Ruiz *8c* Pav. 1. c. 235=Pleurothallis linearis.
revoluta, Ruiz & Pav. 1. c.=Stelis revoluta.
spiralis, Ruiz & Pav. 1. c. 237=P. spiralis.
succosa, Pav. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 5-P„ rnscifolia.

HUMBOLDTIA, Vahl, Symb. Bot. iii. 106 (1764).. *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook.f. i. 579.
BATSCHIA, Vahl, Symb. Bot. iii. 39. t. 56 (1794).
HUMBOLDIA, Reichb. Consp. 156 (1828).
africana, *Baill. Hist. PI.* ii. 99.—Afr. trop.
Brunonis, *Wall. PI. As. Rar.* iii. 17. t. 233.—Ind. or.
laurifolia, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 106.—Ind. or.
pentapetala, *R. Br. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 778 (Quid?).—Zeylan.
tripetala, Heyne, ex Wight *8c* Am. Prod. 285 » Brunonis.
nniiuga, *Sedd. Fl. Sylv. i.* t. 183.—Ind. or.
Vahliana, *Wight,* /e.iv.t 1607.—Ind. or.

HUMEA, Roxb. Hort. Beng. 42 (1814); Fl. Ind. ii. 640 (1832) = Brownlowla, Roxb. (Tiliac).
elata, Roxb. 11. cc = B. elata.

HUMBA.Sm. Exot. Bot. i. 1.1 (1804). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 317.
AGATHOMERIS, Delaun. in Bon Jardin. (180S); ex DC. Prod. vi. 157.
CALOMERIA, Vent. Jard. Malm. t. 73 (1804).
HAECKERIA, F. Muell. in Linnaea, xxv. (18S2) 406.
OXIPHOERIA, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iv. 205 (1811).
KAZUMOVIA, Spreng. ex Jnss. in Diet. Sc. Nat. xliv. 626 (1826).
cassiniacea, *F. Muell. Fragm.* i. 17.—Austral,
elegans, *Sm. Exot. Bot.* i. 1.1.—Austral,
ozothamnoides, *F. Muell. Fragm.* i. 17.—Austral,
punctulata, *F. MurlL I. c.* iii. 187.—Austral,
squamata, *F. Muell. 1. c.* xi. 86.—Austral

HTTMIBIA (HOUMIKI, Aubl. PI. Gui. i. 564. t. 225) (1775); Jaume St. Hil. Expos, ii. 374 (1805); Pers. Syn. ii. 70 (1807). *HUMIRIACEAE.* Benth. *8c* Hook. f. i. 247.
HOUMIRIA, Juss. Gen. 435 (1789).
HUMIRIUM, Rich, ex Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 142 (1846).
MYRODENDRUM, Schreb. Gen. 358 (1789).
WERNISEKIA, Scop. Introd. 278 (1777).
amplexicaulis. Mart, ex Urban, in Mart. Fl. Bras. xii. II. 440=balsamifera.
arenaria, Guill. in Baill. Adansonia, i. (1860-61) 208-floribnnda.
balsamifera, *Jaume St. Hil. Expos,* ii. 374.—Guian.
contracta, Moric. ex Urban, in Mart. Fl. Bras. xii. II. 461—Vantanea paniculata.
crassifolia, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 143.—Bras,
enspidata, *Benth. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 101.—Bras,
densiflora, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 374.—Guian.
dentata, *Casar. Decad. Nm.Stirp. Bras.* iv. 39.—Bras.
elliptica, Klotzsch, ex Urban, in Mart Fl. Bras. xii. II. 438 = floribunda.
floribunda, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* ii. 145.—Bras,
guianensis, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 874.—Guian.
laurina, Klotzsch, ex Urban, in Mart. Fl. Bras. xii. II. 43t> = floribunda.
macrophylla, *Benth. in Hook. Ken Journ.* v. (1863) 102.—Bras,
montana, *A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 89.—Bras.
multiflora, Pritz. Ic. Ind. 561« floribunda.
oblongifolia, *Benth. in Hook. Kew Journ.* v. (1853) 103.—Bras.
obovata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.ii.* (1843) 373.—Guian.

HTJMTRIA:—
parviflora, A. Juss. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 63 = floribunda.
parvifolia, A. Juss. 1. c. 89 — floribunda.
subcrenata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot* ii (1843) 374.—Guian.
surinamensis, Miq. Stirp. Surin. Sel. 86-floribunda.

HUMIRIUM, Rich, ex Mart. Nov. Gen. et Sp. ii, 14" (1826)-praec

HTJHTJIiTJS, Linn. Syst. ed. I (1735). *URTICACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 356.
LUPULUS, Tourn. ex Mill. Gard. Diet, cd, VI, (1752).
aculeatus, Nott in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 182 =japonicus.
americanus, Nutt. 1. c. 181 = H. Lupnlus.
cordifolius, *Miq. Anni Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 133.—Japon.
japonicus, 5>>4. b* *Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat.* ii. 89.—Japon.
Lupulus, *Linn. Sp. PI.* 1028.—Europ.; Am. bor.
Lupulus, Thunb. Fl. Jap. 113 = japonicus.
volubtiis, Salisb. Prod. 176 = H. Lupulus.
vulgaris, Gilib. Hist. PI. Europ. ii. 348-H. Lupulus.

HUNEFELDIA, Lindl. Veg. Kingd. 710 (1847)-HUENEFELDIA, Walp.-Calotis, R. Br. (Compos.).

HUNEMANNIA, A. Juss. in Orb. Diet. ix. 455 (1849) - seq.

HUNNEMANIA, G. Don, Gen. Syst. i. 129, 135 (1831) = seq. .

HTJNUEMANNIA, Sweet, Brit. Flow. Gard. iii. 54. t. 276 (1828). *PAPAVERACEAE,* Benth. *8c* Hook, f. i. 54.
fumariaefolia, *Sweet, I. c.*—Mexic

HUNTERIA, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. v. 649 (1836) ^Porophyllum, Vaill. (Compos.).
columbina, [Moç. *8c* Sesse,] ex DC. 1. c.-P. Linaria.

HUNTERIA, Roxb. Hort. Beng. 84 (1814); Fl. Ind. i. 695 (1832). *APOCYNACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 698.
atrovirens, G. Don, Gen. Syst iv. 105-Chilocarpus atroviridis.
atroviridis. Wall. Cat. n. 1614 - Chilocarpus atio. viridis.
coriacea, Wall. Cat. n. 1610-Alyxia coriacea.
corymbosa, *Roxb. Hort. Beng. Hi; Fl. Ind.* i. 695 Ind. or.; Penang.
cuspidata. Wall. Cat. n. 1609 - Melodinus orientalis.
eugeniaefolia, Wall. 1. c. n. 1615 = Wrightia tomentosa.
fasdcularis, Wall. 1. c. n. 1612- Alyxia fascicularis.
gracilis. Wall. 1. c. n. 1613=Alyxia gracilis.
lanceolata, Wall. 1. en. 1611—corymbosa.
Roxburghiana, Wight, Ic. iv. 1.1294-corymbosa.
sundana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 409.—Ins. Sunda.
zeylanica, Gardn. ex Thw. Enum. PI. Zeyl. 191 = corymbosa.

HUNTLEYA, Batem. ex Lindl. in Bot Reg. sub t. IDiil (1837); et (1839) t. 14 - Zygopetalum, Hook. (Orchid.).
albido-fulva, Lem. Illnstr. Hortic. xv. (1868) t. 566.—Bras.
Candida, Hort. ex Walp. Ann. iii. 543 ^Z. candidnm.
cerina, Lindl. & Paxt. How. Gard. iii. (1862-53) 62. f. 263 = Z. ccrinum.
fimbriata, Hort. Hamb. ex Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 634 = Z. giamineum.
grandiflora, Lam. Illustr. Hortic. xv. (1868) Misc. 5V —N. Granat.
imbricata, Hort. Hamb. ex Reichb. f. in Bot. Zeit, x, (1862) 714 = Z. cochleare.
marginnta, Hort. ex Reichb. f. 1. c 636 = Z. marginatum.
Meleagris, Lindl. Bot. Reg. snb t. 1991-Z. Meleagris.
radicans, Hort. Hamb. ex Linden, Pescatorea, i. (U60) snbt. 15 = Z. candidum.
sessiliftora, Batem. in Lindl. Bot. Reg. sub 1.1991.—Guian.
violacea, Lindl. Scrt. Orchid, t. 26—Z. violaceum.

HUONIA, Montr, in *M6m.* Acad. Lyon, x. (1860) 186-Aoronychia, Forst. (Rutac).
laevis, Montr. 1. c. 186.—N. Caled.

HURA, Kocn. ex Reto. Obi. Hi. 19 (1788)-01obba, Unn. (Scitamin.).
Koenigii, Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 20, in obs.=-G. versicolor.
siamensium, Koen. ex Retz. Ob». iii. 49-G. versicolor.

HURA, Linn. Gen. ed. I. 877 (1787). *EVPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 839.
brasilitnsis, Willd. Enum. Hoit. Berol. 997=crepitans.
crepitans, *Linn. Sp. PI.* 1008.—Am. auitr.
polyandra, *Baill. Ettid. Gin. Eupk.* 543.—Mexic.
senegalensis, Baill. Adansonia, i. (1660-61) 77-= crepitans.
strepens, Willd. Enum. Hort. Berol. 997-crepitans.

HUSANGIA, TUBS, in Diet. Sc. Nat. xxii. 59 (1821) = HOSANGIA, Neck.-Maieta, Anbl. (Melastom.).

HTTSEMANNIA, F. Muell. in Wing, South Sc. Record, iii. (1883) 127. *MEN1SPERMACEAE.*
protense, *F. Muell. I. c*—Austral.

HU8NOTIA, Fourn. in Mart. Fl. Brai. vi. iv. 211 **(1886).** ***ASCLEPIADEAE.***
rotandifolia, *Fourn. 1. c.*—Bras.

HUSSONIA, Boiss. Diagn. Ser. I. viiL 46 (1849)-Enarthrocarpua, Labill. (Crncif.).
Aegiceras, Coss. & Dnr. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857)58, 469 = **seq.**
uncata, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 46.—Arab.; Afr. bor.

HUSZIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz 1854) 121; et Abh. Akad. Berl. (1854) 17. t. 1 A = Begonia, Linn.
octopetala, Klotzsch, 11. cc 121; 18 = B. octopetala.
rubricaulis, KloUsch, Abb. Akad. Berl. (1864) 19 = B. rubricaulis.

HUTCHINIA, Wight & Am. Contrib. 34 (1834) = Boucerosla, Wight & Am. (Asclep.).
indica, Wight *Sc* Am. 1. c.-R Hntchinia.

HUTCHIN8IA, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 82 (1812). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 92.
ASTYLUS, Dnlac, Fl. Hantes-Pyr. 188 (1867).
HINTERHUBERA, Reichb. ex Nym. Consp. 66 (1878).
HORNUNGIA, Reichb. Ic. FL Germ. ii. t. 6 (1832).
NASTURTIOI.UM, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 692 (1821).
affinis, Gren. ex Schnltz, Arch. Fl. Fr. Allem. 274-alpina.
alba, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp. (1839); et in Linnaea, xiv. (1840) Litt. 119-Smelowskia cinerea.
alpina, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. II. iv. 82,—** Europ.
alpina, Coss. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 779 = Noccaea Auerswaldii.
aragonensis, *Lose, in Lose. V Pard. Ser. Inconf.* **ed. I.** 10, in nota.—Hispan.
Auerswaldii, Willk. Sert. Fl. **Hup.** 14=alpina.
aurea, Fenzl, Pugill. PI. Nor. Syr. 14 *{-Chtysochamea velutina).*—**Syria.**
australis, Hook. f. Fl. Tasman. i. 28. t 4-Capsella australis.
bifurcata, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorp. (1839).—Cf. Linnaea, xiv. (1840) Litt. 119 = Smelowskia cinerea.
brevicaulis, Hoppe, ex Stnrm, Deutschl. Fl. Heft 66= alpina.
brevistyla, DC. Syst il. 887-Thlaspi rivale.
calycina, Desv. Joura. Bot. iii. (1814) 168 = Smelowskia calycina.
eauli/era, Schur, Ennm. PI. Transs. 71—alpina.
cepeaefolia, DC. Syst ii. 886 = Thlaspi cepeaefolium
chinensis, Steud. Norn. ed. II. i. 779-Nasturtium. sinense.
***chrysantha,* Jaub.** *8c* **Spach, IUnitr.** *I* **108** *(-Chrysochamea velutina).*—**Syria.** •
corymbosa, J. Gay, in Syll. Ratisb. i. (1824) 169-Thlaipi rotondifolium.

HTTTCHIKrSIA :—
diffusa, Jord. Diagn. i. 836 -Capsella procumbens.
flavissima, Ledeb. Fl. Rons. i. 764 - SmelowskU flavissima.
foliosa, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. i. (1864) 284. —Bolivia.
grandifiora, Soleir. ex Nym. Consp. 65-Lepidium humifasum.
kasiulata. DC. Syst. ii. 388-Thlaspi hastulatum.
Loreti, Jord. ex Nym. Consp. 6tt = Capsella procumbens.
maritima, Jord. Diagn. i. 834= Capsella procumbens.
paucifiora, Loret, Herb Lozère, 10-Prostii.
pancidora, *Nym. Syll.* 207.—Europ. anstr.
pectinata, *Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 201.—Sibir. altaic.
petraea, *[R. Br. in] Ait. Hort. Kew.* **ed. II. iv. 82.—** Europ.
***procumbens.Vav. Jaarn.Bot.* iii. (1814) 168=Capsella** procumbens.
procumbens, Lee. *Sc* Lamotte, Cat. PI. Cent. Fr. 76 = Prostii.
Prostii, *J. Gay, ex Loret, Herb. Loiire,* **10.—Gallia.**
pumila, DC. Syst. ii. 386-Thlaspi pumilum.
pusillima, *Wedd. in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. i. (1864) 284.—Bolivia.
pygmaea, Viv. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post 240 = Thlaspi rivale.
reticulata, *Griseb. in Goett. Abh.* vi. (1854) 116.—Reg. Magellan.
rotundifolia, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 82 = Thlaspi rotundifolium.
sinensis, Desv. Joura. Bot. iii. (1814) 168 = Nasturtium sinense.
sisymbrioides, *Regel* **b*** *Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxix. (1866) II. 99.—As. centr.
speluncarum, Jord. Diagn. i 837 - Capsella procumbens.
stylosa, DC. Syst. ii. 387-Noccaea stylosa.
tasmanica, Hook. Ic. PI. t 848-Thlaspi tasmanicum.
tibetica, *T. Thorns, in Hook. 1. c.* t. 900.—Reg. Hirnal.
trinenia, DC. Syst. ii. 387 - Iberidella trinervia.

HUTSCHINIA, D. Dietr. Syn. PI. i. 579 (1839) = HUTCHINIA, Wight *Sc* Am.-Bowserosia, Wight *Sc* Am. (Asclep.).

HUTTIA, Dromm. ex Harv. in Hook. Kew Joura. vii. (1865) 51 = Paohynema, R. Br. (Dilleniac).
conspicua, Drumm. ex Harv. 1. c.=P. conspicuum.

HUTTIA, Preiss, ex Hook. Bot. Mag. t. 3834 (1840)-Caleotasia, R. Br. (Liliac).
elegans, Preiss, ex Hook. 1. c.-C. cyanea.

HUTTONAEA, Harv. Thes. Cap. il. 1.1. 101 (1863). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 623.
HALLACKIA, Harv. Thes. Cap. t. 102 (1863).
fimbriata, *Reichb. f. in Flora,* 1. (1867) 116.-Afr. austr.
Hallackii, Bolus, in Joum. Linn. Soc. xix. (1882; 339 -fimbriata.
pulchra, *Harv. Thes. Cap.* ii. 1.—Arr. austr.

HUTTONIA, Bolus, in Joum. linn. Soc. xix. (1882) 339-praec.

HUTTUM, Adans. Fam. ii. 88 (1763)=Barringtonla, Font. (Myrtac).

HYAC1NTHELLA, Schur, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1856) 227 = Hyaelnthus, Toum. (Liliac.).
leucophaea, Schur, 1. c. — H. leucophaeus.
fallens, Schur, 1. c (1857) 285 = H. leucophaeus.

HYACINTHOIDES,. Heist. Syst. 6 (1748). Qnid?

HYACINTHOIDES, Medic, in Usteri, Ann. Bot. ii. (1791) 9-Seilla, Linn. (Liliac).
racemosa, Medic. 1. c. = C. hispanica.

HYACINTHORCHIS, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 48. t 16 (1849)-Crema8tra, Lindl. (Orchid.).
variabilis, Blume, 1. c = C. Wallichiana.

HTACINTHUS, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735). *UUACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 812.
BABOTERFE, Salisb. Gen. PI. Kragm. 17 (1866).
BILLEVALIA, Lapeyr. in Joum. Phys. lxv i. (1808) 425.
BORBOYA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 52 (1836).
BRIMEURA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 25 (1866).
BUSBEQUIA, Salisb. 1. c. 2A (1866).
FOXIA, Parl. Nuov. Gen. Monocot 17 (1854).
HYACINTHELLA, Schur, in Oestr. Bot. Wochlepbl. (1856) 227.
PERIBOEA, Kunth, Enum. PI. iv. 292 (1848\
RHYTIDOLOBUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr, 113 (1867).
SARCOMPHALIUM, Dulac, 1. c. (1867).
STRANGWEJA, Bertol. in Mem. Soc. Ital. Mod. xxi. (1836) 2. t. 1.
abortivus, CavaL Deux Nouv. Esp. (1848) 14 - trifoliatus.
albulus, Jord. Pugill. 140=orientalis.
amethystinus, Lam. Encyc. iii. 190—Scilla hispanica.
amelhystinus, *Linn. Sp. PI.* 317.—Hisp.; Pyren. i Croat.
amethystinus. Pall. Reise, iii. 689=Pallasianus.
amoenus, C. Muell. in W'alp. Ann. vi. 110, sphalm.= ***albulus.***
angustifolius. Medic, in Usteri, Ann. Bot. ii. (1791) 18 = amethystinus.
aporus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* **p. ex (Quidt).** —Arab.
Aucheri, *Baker, in Journ. Unn. Soc.* **xi. (1871) 431.** —Persia.
aaureus. Baker, 1. c. 427 - ciliatus.
belgicus, Hoit. ex Steud. Norn. ed. II. L 779-Scilla lestalis.
bifolius, *Boutel. ex Cat. Anal. Cienc.* **v. (1802) 14-**—Afr. austr.
bifolius, Gouan, ex Schult. f. Syst vii. 594-Muscari commutatum.
botryoides. All. FL Pedem. i. 118 = Muscari racemosum.
botryoides, Linn. Sp. PI. 818 = Muscari botryoides.
brachypodus, *Borb.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxxiii-**(1883) **2u2.—**Europ.
brevifoUus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 63.—Afr. austr.
brumalis, Haw. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl-i. 691—orientalist
campanulatus, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3-Scilla festalis.
candieans, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 174 - Galtonia candieans.
capitatus, Baker, in Joum. Bot. xii. (1874) 8 = sessil>-florus.
carnosus, Salisb. Gen. PL Fragm. 25, sphalm. = ***comosus.***
cernuus, Linn. Sp. PI. 817-Scilla festalis.
chilensis, Molina, Sagg. Chil. ed. II. 285 = Leucocoryne ixioides.
ciliaris, Poir. Encyc. Suppl. iii. 120-Drimia ciliaris-
ciliatus, *Cyrill. PI. Rar. Neap. Fasc.* **ii. 23. t. 10.—** Europ. or.; Afr. bor.; Oriens.
ciliatus, Fleischer, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. *• (1871) 429-lineatus.
colchicoides, *Delile, in Laborde, Voy. Arab. Prtr-* **8Z-**—Arab.
commutatus, Tenore, Syll. 176 = Muscari commutatum.
comosus, Herb. Unio Itin. ex Steud. Nom. ed. U- '* 879-fastigiatus.
comosus, Linn. Sp. PI. 318 — Muscari comosum. „ _
convallarioides, Drège, ex Baker, in Joum. Linn. *Soc.* xv. (1876) 264 = Eriospennum parvifolium.
convallarioides, Linn. f. Suppl. 204 = RhadamantnW convallarioides.
corymbosus, *Linn. Mant.* ii. 223.—Afr. austr.
creticus, Nym. Syll. Suppl. 64 = Chionodoxa we'"*;^
cryptopodus, *Baker, in fourn. Linn. Soc.* **xx. (1»«W** 274.-Madag.
curvifolius, Jord. *Sc* Fourr. Brev. PL Nov. fasc. n. •»*" — amethystinus.
cumulus, Jord. ex Nym. Consp. 731-amethystinus.
dalmaticus, Ave-Lall. in Ind. Sem. Hort Petrop. *'• (1846) 71 = Muscari pallens.
dalmaticus, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* **xu (1871)** 428.—Dalmat.
densiflorus, *Baker, 1. c.* 432.—Syria. , „ .
dubius, *Guss. Adnot. Cat. PI. Boccad.* **(1821) 32, 7»>** *Fl. Sic. Prod.* i. 425.—Reg. Mediterr. or.
elatus, Poir. Encyc Suppl. iiL 120-Drimia elata.

HYACINTHTJ8:—
*exsculptus,B*ka,* in Joum. Bot xii. (1874) 7 - nervosus.
fastigiatus, *Bertol. Ann. Stor. Nat.* iv. 62—Corsica,
flexuosus, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 8.—Syria.
flexuosus, Thunb. Prod. Fl. Cap. 68-Scilla flexuosa.
fuliginosus. Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1797)809 = Muscari cbmosum.
fulvus, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 47 = Dipcadi serotinum.
glaucus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 433 = Scilla Hohenackeri.
griseus, *Brouss. Elenck. PI. Hort. Monsp.* 1804 (1805) 80, nomen; *ex Schult. f. Syst.* vii. 688 (Quid?).—Hab.?
Haynei, *Baker, in Journ. Bot.* xii. (1874) 7.—Palaestin.
hispanicus, Lam. Encyc. iii. 191-amethystinus.
hispidus, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xi. (1871) 429.—Cilicia.
jundfolius, Lam. Fl. Fr. iii. 271 = Muscari racemosum.
lanatus. Linn. Sp. PL 318 = Lanaria plumosa.
ledebourioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 427.—Afr. trop.
leucophaeus, *Stev. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 156.—Ross. austr.
lineatus, *Steud. ex Schult. f. Syst.* vii. 684.—As. Min.
lividus, Pers. Syn. i. 875 = Dipcadi serotinum.
macrobotrys, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 433.—Palaestin.
maritimus, Pers. Syn. L 875-Muscari maritimum.
medius, Poir. Encyc. Suppl. iii. 120-Drimia media,
micranthus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 43O.-As. Min.
modestus, Jord. *tc* Fourr. Ic PL Enrop. u. 7 - orientalis.
monomotapensis, Desf. ex Poir. Encyc. iii. 119 = Dipcadi serotinum.
monstrosus, Linn. Sp. PL 818-Muscari comosum.
montanus, Jord. & Fourr. Brev. PL Nov. fast 11. 125 =amethystinus.
Muscari, Linn. Sp. PL 817-Muscari moschatum.
nanus, Schult. f. Syst vii. 681 = Chionodoxa nana.
nervosus, *Bertol. Misc. Bot.* i. 20,-Mesopot.
nivalis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 430.—
NoZTcriptus, Habl. Taur. 118; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 283 » Muscari racemosum.
Non-scriptus, Linn. Sp. PI. 316-Scilla fcstahs.
Non-scri)tus, Thuill. FL Par. ed. II. i. 178-Scilla
nutlnTTv. Gray, Nat. Air. Brit PL ii. 177-Scilla festalis
Olivieri, "Baker, in Joum. Bot. xii. (1874) 8=ciliatus.
orchioides, Linn Sp. PI. 318 = Lachenalia orchioides.

P^BIT^^C^m^^ **palus**
«««««, Vis. Fl. Dalmat. i. 150 = dalmaticus.
PoUidifiorus, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fast ii. 12?
paradoxus, Baker, in Joum. Bot
flexuosu,
paradoxus *Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hart. Petrop.* i. —Per a.
^ j w T p e r s . Syn. i. 376~Muscari P"^"TM"1- rf.
P'tentissimus, Pall, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 433=Pallasianus.
Patulus, Bertol. Misc. Bot i. 21-«l»t^us- so.sdlla
Patulus, Desf. Tabl. ed. 1. 26; ed. II. 50-&cma bispanica.
P«sicus, *Boiss. V Buhse, in Nouv. Mint. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 213.—Persia.
Peruvians, Hort ex Vilm. Fl. Fl. Terre, ed. I. 795-
P8 8% 6 v % o Loisel. in Men, Soc. Li-». ?«. vi. (1829) 407-fastigiatus.
#"««<>*, Jord. Pugill. 141 -orientahs-
Pratensis, Lam. A Fr. iii. 271-ScilUfotate.
Princeps. Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 175 - Galtonia Princepi.
Provincialis, Jord!PugilL 139-orientalis.
Pseudo-Muscari, *Baker, in Jaurn. Linn. Soc.* xi. (1871) 428.—Persia. Scilla
PurpurJus, Griff. Notnl. ii. 242; *Ic* t. 276- Hohenackeri.

HYACINTHUS:—
pusillus.Thaab. ex Lam. Encyc.iii. 194 ; Poir. Encyc. Suppl. iii. 1-20 - Drimia pnsilla.
pycnanthus, *Baier, in Journ. Linn. Sac. xi.* (1871) 480.—Armenia.
pyrenaeus, Jord. *ic* Fourr. PI. Nov. Brev. fasc. ii. 125 = amethystinus.
racemosus, Linn. Sp. PI. 318-Muscari racemosuai.
revolutus, Linn. f. Suppl. 204 = Scilla revoluta.
rigidulus, Jord. b" Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 7-orientalis.
romanus, Desf. Fl. Atlant. i. 308-dubius.
romanus, *Linn. Mant.* ii. 224.—Reg. Mediterr.
sarmaticus. Pall, in Nov. Act. Petrop. x. (1797) 809 - dliatus.
sdlloides, *Bonato, ex Steud. Norn.* ed. II. i. (Qnldl).—Italia.
serotinus. Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 209 = Dipcadi erythraeum.
serotinus, Linn. Sp. PI. 317-Dipcadi serotinum.
sessiliflorus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1670) 429, partim—nervosus.
sessiliflorus, *Viv. Ft. Lib. Spec.* 21. t. viii. f. 2.—Afr. bor.
spicatus, Moench, Mcth. 632-Scilla bispanica.
spicatus, *Sibth. 0- Sm. Fl. Graec. Prod.* i. 287.—Graecia.
suaveolens, Steud. Norn. ed. II. i. 779 - Muscari suaveolens.
sulpkureus, Poir. Encyc. Suppl. iii. 119 = Dipcadi serotinum.
syriacus, Bakar, in Joum. Bot xii. (1874) 8^trifoliatus.
trifoliatus, *Tenore, Fl. Nap.* iii. 376.—Reg. Mediterr.
viridis. Linn. Syst. ed. X. 984-Dipcadi viride.
Webbianus, *Nym. Syll. Suppl.* 84.—Italia.

HYAENACNE, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 280 (1880) = seq.

HYAENANCHE, Lamb. Desc. Cinch. (1797) 62. t. 10 = Toxicodeudrum, Thunb. (Euphorb.).
eapensis, Pen. Syn. ii. 627 =>T. capense.
globosa, Lamb. Descr. Cinch. 62. t. 10=.'T. capense.

HYALA, L'Hérit ex DC. Prod. iii. 373 (1828)-Polyoarpaea, Lam. (Carjophyll.).

HYALAEA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 482 (1873)-HYALEA, Jaub. & Spach - Centaurea, Linn. (Compos.).

HYALAENA, C. Muell. in Walp. Ann. v. 70 (1858) = HYALOLAENA, Bunge - Selinum, Linn. (Umbellif.).

HYALEA, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 19. t 214-217, 292 (1847)-Centaurea, Linn. (Compos.).
leumeoides, Jaub. & Spach, 1. c. 21. t 216 = C. pergamacea.
mucronifera, Jaub. & Spach, 1. c. 19. t. 214 - C. mucronifera.
Olimeri, Jaub. ft Spach, 1. c 138. t 292 - C. Olivieriana.
pergamacea, Jaob. & Spach, 1. c. 20. t 216 - C . pergamacea.
persica, Jaub. & Spach, 1. c 23. t. 217-C. Candolleana.
pulchella, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 422 - C. pulchella.
stenopkylla, Jaub. *to* Spach, Illustr. iti. 22. t. 217 = C. Candolleana.'

HTAIiIS, D. Don, ex Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1886) 108. *COMPOSITAE,* Benth. *V* Hook. f. ii. 486.
APHYLLOCLADUS, Wedd. Color. And. i. 11. t. 3 (1855).
JOBAPHES, PhU. FL Atac. 27. t. 4 (1860).
argentea, *D. Don, ex Hook. V Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. I* (1885) 108.-Chili.

HYALIS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 317-Ixia, Linn. (Irid.).
aulica, Salisb. 1. c. 318-1. scariosa.
gracilis, Salisb. 1. c. 817-1. capillaris, linearis.
lancifolia. Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 868.—Bras.
latifolia, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 817 =• I. capillaris,

HYALIS:—
longifora, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 818 - Tntonia longiflora.
Lortntuii, Hieron. Ic PI. Argent. 82.—Reg. Argent.
marginifolia, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (.1812) 818 = Tritonia scariosa.

HYALISMA, Champ, in Calc. Joum. Nat. Hist. vii. (1847) 466 = Seiaphila, Blume (Triurid.).
janthina, Champ. 1. c. 467.—Ind. or.

HTAIIOCAIIYX, Rolfe, in Joum. Linn. Soc. xxi (1884)257. *TURNEttACEAE*
setiferus, *Rolfe, I. c.* 258.—Madag.

HYALOCHLAMYS, A. Gray, in Hook. Kew Joum. iii. (1851) 101-AngianthuB, Wendl. (Compos.).
globifera, A. Gray, 1. c.-A. globifer.

HYALOLAENA, Bunge, in *TAim.* Sav. Etr. Pétenb. vii. (1847) 304 (Lehm. Rel. Uot. 128) - Selinum, Linn. (Umbellif.).
jaxartica, Bunge, 11. cc.—As. temp.
SeverBowii, Regel & Herd, in Bull. Soc. Nat Mosc. xxxix. (1866) II. 114.—As. centr.

HYALOLEPIS, DC. Prod. vi. 149 (1837)=Myrtocephalus, Benth. (Compos.).
occidental, ¥. Muell. Fragm. iii. 155-M. rhiiocephalus.
rhiMocephala, DC. Prod. vl. 149-M. rhizocephalus.

HYAX.OSEB.I8, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 212. *COMPOSITAE.*
cinerea, *Griseb. 1. c.* 218.—Reg. Argent,
rubicunda, *Griseb. I. c.* 212.—Keg. Argent,
salicifolia, *Hieron. Ic. PI. Argent.* 85.—Keg. Argent,
tomcntella, *Hieron. I. c.* 38.—Reg. Argent.

HYALOSPERMA, Steetz, in Lehm. PI. Prelss. i. 476 (1845)-Helipterum, DC. (Compos).
glutinosum, Steetz, 1. c 477 = Helipt. hyalospetnuim.
strictum, Steetz, 1. c—Helipt. byalospermum.
variabile, Sond. in Linnaea, xxv. (1862) 619-Helipt. hyalospermum.

HYALOSPERMUM, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 809 (1878)-praec.

HYALOSTEMMA, Wall. Cat. n. 6484 (1881) - Miliusa, Leschen. (Anonac).
Roxburgkianum, Wall. 1. c.-M. Roxburghiana.

HYBANTHERA, Endl. Prod. Fl. Norf. 69 (1888)-Tylophora, K. Br. (Asclcpiad.).
bigiandulosa, Endl. L c - T . biglandulosa.
cordifolia, Link, Klotzsch & Otto, Ic. PL Hort: Berol. 109. t. 44.—China.
javanica, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 309.—Java.
viltosa, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 4«0-T. villona.

HYBANTHUS, Jacq. Enum. PI. Carib. 2 (1760)-Ionldlum, Vent. (1808) (Violar.).
calycinus, K. Muell. Fragm. x. 81 — 1. calycinum.
concolor, Spreng. Sybt. i. 805 - 1 . concolor.
debilissitnus, ¥. Muell. Fragm. xi. 4 - 1 . debilissimum.
enneaspermus, F. Muell. 1. c. x. 81-1. suffruticosum.
filiformis, F. Muell. Nat. PI. Viet. i. 44-1. filiforme.
floribundus, F. Muell. 1. c. 46 — 1. floribundum.
havanensis, Jacq. Ennm. Fl. Carib. 17 - I. Jacquinianum.
mexicanus, Ging. ex DC. Prod. i. 813.—Mexic.
strictus, Spreng. ex Stead. Nom. ed. II. i. 780 - I. strictum.
Tatei, V. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral, iv. (1882) 102.—Austral.
Vernonii. V. Muell. Nat. l'l. Viet. i. 46-1. Vcrnonii.

HYBEKICUM.Schrank, Baier. Fl. ii. 299 (1789), sphalm. -Hyiwloum, Town.

HYB1DI0M. Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 899-Centranthue, DC. (Valerian.).
Caldtrapa, Fourr. 1. c - C . Calcitrapa.

HYBISCUS, Dum. Anal. Fam. 46 (1829) - Hlbiseus, Linn. (Malvac).

HYBOTROPIS, E. Mey. ex Steud. Norn. ed. II. i. 780 **(1840)=Baftlia,** Thunb. (Legnmin.).

HYBRIDELLA, Cass. in Boll. Soc Philom. (1817) 12; et in Diet Sc. **Nat.** xxii. 86 (1821)=**Zalusania,** Pers. (Compos.). >
globosa, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxii. 86=Z. globosa.

HYDASTYLIS, Stend. Nom. ed. II. 1. 780 (1840)=seq.

HYDASTYLUS, Dryand. ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) S10 = 8isyrinchiuin, Linn. (Irid.).
cali/ornicus, Salisb. I. c. = S. califoidicum.

HYDATICA, Neck. Elem. ii. 887 (1790) = **Saxifraga,** Tonm.
cuneifotia. Rafin. Fl. Tellnr. ii. 65-S. cuneifolia.
foliolosa, Rafin. 1. c.«S. stellaris.
Geum, Rafin. I. c = S. Geum.
hirsuta, Rafin. 1. c.=S. umbrosa.
stellaris. S. F. Gray, Nat AIT. Brit. PI. ii. 530 - S. stellaris.
umbrosa, Rafin. Fl. Tellnr. ii. 65»S. umbrosa.

HYD1TOCABPUS, Gaertn. Fract. i. 288. t 60 (1788). *BIXINEAE,* Bentfa. & Hook. f. i. 129.
MAROTTIA, Rafin. Sylva Tellnr. 155 (1838).
alpina, *Wight, Ic.* t. 942.—Ind. or.
castanea, *Hoot./. V Thorns, in Fl. Brit. Ind.* **i. 197.—** Ins. Andaman; Malacc.
corymbosa, *Seem, in Journ. Bot.* iii. (1865) 203.—Ins. **Canar.**
glaucescens, *Blume, Rumphia,* iv. 22.—Sumatra.
heteroclita, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 94 = Alsodeia Roxburghil.
heterophylla, *Blume, Rumphia,* iv. 22.—Java.
inebrians, Vahl, Symb. Bot. iii. 100=venenata.
inebrians, Wall. Cat. n. 6670 = Wightiana.
laevis, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* **888.—Sumatra.**
lanceolata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 93 = Alsodeia lanceolata.
molnccana, *Spreng. 1. c*—Ins. Molucc.
obtusa, Presl, Epim. Bot. 213 = Aberia abyssinica.
octandra. *Thm. in Hook. Ken Journ.* vii. (1855) 197-—Zeylan.
polyandra, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 545.—Ins. Philipp.
venenata, *Gaertn. Fruct.* i. 288. t. 60. f. 3.—Zeylan.
Wightiana, *Blume, Rumphia,* iv. 22.—Ind. or.

HYDNOPHYTTTM, Jack, in Trans. Dnn. Soc xiv. (1823) 124. *RUBIACEAE,* Benin. & Hook. f. ii. 132.
LASIOSTOMA, Spreng. Syst. i. 422 (1825).
Albertisii, £<>«. Jlfa/«»a,ii. (1884) 124; (1885) 136.—N. Guinea.
amboinense, *Beec. 1. c.* 138.—Ins. Amboin.
andamanense, *Becc. 1. c.* ii. (1885) 155, 156.—Ins. Andaman.
Blumei, *Becc. I. c.* (1884) 125.—Malaya,
bomeannm, *Becc. 1. c.* ii. (1885) 168.—Borneo,
borneense, *Becc. 1. c.* 125.—Borneo,
coriaceum, *Becc. I. c.*; (1885) 156, 158.—Borneo,
crassifolium, *Becc. I. c.* 124; (1885) 148.—N. Guinea,
formicarum, *Jack, in Trans. Linn. Soc.* ziv. (1823) 124.—Malaya.
formicarum, Kurz, For. Fl. Brit Burma, ii. 8 = andamanense.
Gaudichaudii, *Becc. Malesia,* ii (1884) 124; (1885) 139.—Ins. Molucc.
grandiflorum, *Becc. I. c.* 126; (1885) 171.—Ins. Fiji.
Gnppyanum, *Becc. 1. c.* ii. (1886) 129, 133.—Ins. Salom.
Homeanum, *Becc. 1. c.* ii. (1884) 125; (1885) 168.—Ins. **Fiji.**
keiense, Becc. 1. c ii. (1886) 131 -seq.
kejense, *Becc. 1. c.* ii. (1884) 123. t. SL—Malaya,
lanceolatnm, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iv. 257.**—N. Guinea,
longiflorum, *A. Gray, in Prec. Am. Acad.* **iv. (1860)** 42.—Ins. Pacif.
longistylum, *Becc. Malesia,* ii. (1885) 152.—Ins. **Salom.**
loranthifoUum, *Becc. 1. c.* ii. (1884) 124; (.1886) 146.—N. Guinea.
microphyllum, *Becc. I. c.* 126; (1885) 174.—N. Guinea.
montanum, Blume, Bijdr. 956=formicarum.
montanum, Scheff. in Ann. Jard. Bnitenz. i. (1876) 31 **= seq.**

HYDXTOPHVTUM:—
Moseleyanum. *Becc. Malesia,* ii. 125; (1885) 150.—Ins. Admiralty,
nonnale, *Becc. 1. c.* (1884) 123; (1885) 130.—N. Guin.
oblongum, *Becc. 1. c.* 124; (1885) 140.—N. Hibem.
***oyatum, Afiq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iv. 257.—** Ins. Ternate.
papuanum.^rf. *Malesia,* ii. (1884) 124; (1885) 147.—N. Guin.
petiolatum, *Becc. I. c.* 124; (1885) 144.—N. Guinea,
philippinense,*Becc. l.'c.* 125 ;.(1885) 149.—Ins. Philipp.
radicans, *Becc. I. c.* 123; (1886) 182.—N. Guinea,
selebicum, *Becc. 1. c.* 125; (1885) 155, 157.—Ins. Celebes.
simplex, *Becc. I. c.* 128; (1885) 129.—Ins. Aru.
sumatranum, *Becc. 1. c.* 124; (1885) 137.—Sumatra,
tenuiflorum, *Becc. 1. c.* 125 ; (1885) 169.—Ins. Fiji,
tetrapterum, *Becc. 1. c.* ii. (1884) 126; (1885) 173.—N. Guinea.
tortuosum, *Becc. I. c.* 124; (1885) 141.—N. Guin.
Wilkinsoni, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xx.** (1883) 365.—Ins. Fiji
WiUoni, *Home, ex Baker, I. c.*—Ins. Fiji.
Zippelianum,5erc. *Malesia,* ii. (1885) 174.—N. Guinea.

HYDNOBA, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1775) 69. *CYTINACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 120.
APHYTEIA, Linn. Diss. resp. Achar. Aphyt. 7 (1776); Amoen. Acad. viii. 310. t. 7 (1785).
abyssinica, *A. Br. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 217, nomen.—Abyssin.
Acharii, Thunb. ex Hook. f. in DC. Prod. xvii. 109 = africana.
aethiopica, *Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr.* **xx. (1873) 77.**—Afr. trop.
africana, *Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* **(1775)** 69.—Afr. austr.
americana, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xix. (1846) 245 = Prosopanche Burmeisteri.
angolensis, *Decne. in Bull. Soc. Bot. Fr.* **xx. (1873) 77.**—Afr. trop.
bogotensis, *Becc. in Nouv. Giorn. Bot.* iii. (1871) 6.—Abyss.
Johannis, *Becc 1. c.* 5.—Abyss.
longicollis, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) t 21 = africana.
triceps, *Drige &• E. Mey. in Nov. Act. Nat. Cur.* **xvi.** II. (1833) 779.—Afr. austr.

HYDNOSTACHYON, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1849) 23 - Spathiphyllum, Schott (Aroid.).
brevirostre, Liebm. 1. c. 25 = S. brevirostrc
cochlearispathum, Liebm. 1. c. 24=S. cochlearispathum.
longirostre, Liebm. 1. c.=S. cochlearispathum.

HYDORA, Bess, in Flora, xv. (1832) II. Beibl. 13, sphalra.-UDORA, Nutt. - Elodea, Michx. (Hydrochar.).
canadensis, Bess. 1. c. = E. canadensis.
lithuanica,* Bets. 1. c. (= *Udora lithu'anica).—Eraop.

HYDRANGEA, Gronov. ex Linn. Coroll. Gen. 7 (1737). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. £ L 640.
CORNIDIA, Ruiz & Pav. Prod. 53. t. 85 (1794).
HORTENSIA, Comm. ex Juss. Gen. 214 (1739).
SARCOSTVLBS, Presl, ex Ser. in DC. Prod. iv. 15 (1880).
acuminata, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 110 = H. Hortensia.
acuta, Rafin. New FL Am. iii. 77 •= arborescens.
alba, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 721 = oblongifolia.
alternifolia, *Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur.* **xiv. II.** (1829) 692.—Japon.
altissima, *Wall. Tent. Fl. Nep.* 2. t. 60.—Reg. Himal.
amplifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 78=arborescens.
angulata, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 494 - quercifolia.
anomala, D. Don, Prod. Fl. Nep. 211 - Dichroa febrifuga.
arborescens. *Linn. Sp. PI.* 397.—Am. bor.
aspera. *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* **211.—** Reg. Himal.
Ansai, Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur. xiv. II. (1829) 689 - H. Hortensia.

HYDRANGEA :-
BelBonii, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i: 109-H. Hortensia.
bracteata, Sieb. & Zucc 1. c. 176 » scandens, *Maxim.*
Buergeri, Sieb. *Sc* Zucc. 1. c. 111 = H. Hortensia.
chinensis, *Maxim, in Mém. Acad. Pitersb.* **Sér. VII. x.** (1867) n. xvi. 7.—China.
cordata, Pursh, Fl. Bor. Sept. i. 809=arborescens.
cordifolia, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 113 = scandens, ***Maxim.***
cuspidata, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* **iii. 98.—** Japon.
cyanema, Nutt. in Hook. Bot. Mag. t. 5088=robusta.
discolor, Rafin. New Fl. Am. iii. 79= radiata.
florida, Salisb. Prod. 284 = H. Hortensia.
frutescens, Moench, Meth. 106 = arborescens.
glauca, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vii. 269; Link, Enum. Hort. Berol. i. 411=radiata.
glauca, Rafin. New Fl. Am. iii. 77 = arborescens.
heteromalla, D. Don, Prod. Fl. Nep. 211 = aspera.
heterophylla, Hort. Cels, ex Steud. Nom. ed. I. 416= seq.?
heterophylla, Rafin. New Fl. Am. iii. 78=arborescens.
hirta, *Siebold, in Flora,* xi. (1828) 757.—Japon.
Hortensia, *Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur.* **xiv. M.** (1829) 688.—As. or.
hortensis, Sm. Ic. Pict. 12=-H. Hortensia.
tovolucrata, *Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur.* **xiv. "·** (1829) 691.—Japon.
japonica, Siebold, 1. c 689 - H. Hortensia.
khasiana. Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc. ii- (1858) 75 - aspera.
laevigata, Hort. Angl. ex. Steud. Nom. ed. I. 416 = arborescens?
Lobbii, *Maxim, in Mlm. Acad. Pitersb.* **Se>. VII. x-** (1867) n. xvi. 15.—Archip. Ind.
macrophylla, *Ser. in DC. Prod.* iv. 15.—Japon.
Moellendorffii, *Hance, in Journ. Bot.* xii. (1874) 177 __China.
mutabilis, Steud. Nom. ed. I. 416 = H. Hortensia.
Neesiana, *Steud. 1. c.* ed. II. i. 780=radiata.
nivea, Michx. Fl. Bor. Am. i. 268 = radiata.
oblongifolia, *Blume, Bijdr.* 920.—Java.
opuloides, Steud. Nom. ed. I. 416 = H. Hortensia.
Otaisa, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 105 - H . Hortensia.
paniculata, Rafin. New Fl. Am. iii. 77= arborescens?
paniculata, *Sieb. in Nov. Act. Nat. Cur.* xiv. II. (1829) 691.—Japon.
peruviana, *Moric. in DC. Prod.* iv. 14.—Peru".
petiolaris, Sieb. & Zucc. FL Jap. i. 106=scandens, ***Maxim.***
pubescens, *Court.inSyll. Ratisb.ii.* (1828) 45.—Japon-
pubescens, Decne. in Fl. des Serres, iv. (1848) t. 878[s] aspera.
pubescens, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 780= radiata.
pubescens, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 722" Dichroa pubescens.
quercifolia, *Bartram, Trav.* 382. t. 7; ed. II- 380. cum tab. 6.—Am. bor.
quinque/olia, D. Dietr. Syn. PI. 1526=praec.
radiata, Sm. Ic. Pict 12 pag. aversa=quercifolia.
radiata, *Walt. Fl. Carol.* 251.—Am. bor.
robusta, *Hook. /. V Thorns, in Joum. Linn. Soc-* >» (1858) 76.—Reg. Himal.
rotundifolia, Rafin. New Fl. Am. iii. 78 " arborescens.
scandens, *Maxim, in Mlm. Acad. Pitersb.* **Sér. VU-** x. (1867) n. XVI. 16.—Japon.
scandens, *Poepp. ex DC. Prod.* iv. 666.—Chili.
scandens, Ser. in DC. Prod. iv. 15=virens.
serrata, *Ser. I. c.*—Japon.
serratifolia, *Phil./. PI. Vase. Chil.* 97.—Chili.
Sitsitan, Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur. xiv. »·· (1829) 692 = H. Hortensia.
stellata, Sieb. *St.* Zncc. Fl. Jap. i. 112 = H. Hortensia..
stylosa, *Hook. f. (f Thorns, in Journ. Linn. Soc.* «• (1858) 75—Reg.Himal.
Thunbergii, *Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur.* **xiv. «•** (1829) 690.—Japon.
vestita, Wall. Tent. Fl. Nep. 2. t. 50-aspera.
viburni/olia, Salisb. Prod. 284 - arborescens.
virens, *Siebold, in Nov. Act. Nat. Cur.* **xiv. II. (18W** 690.—Japon.
vulgaris, Michx. Fl. Bor. Am. i. 268=arborescens.
Warszewiczii, *Vatke, in Ind. Sent. Hort. Berol.* **(1872)** *App.* 5.—Hab. 1

HYDRANGIA, Linn. Gen. ed. VI. 222 (1764) = praec

HYDRANTHELIUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 202. t. 646 (182f<). *SCROPHULARINEAE*, Berth. *Sc* Hook. f. ii. 957.
Braunii, *Ernst, in Vargasia,* i. (1870) 189.—Venezuel.
callitiichoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 203. t. 646.—N. Granat.
egense, *Povpp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 76. t. 287.—Bras,
humifusum, *Wright, in Sauv. Ft. Cub.* 100.—Cuba.

HYDRASTIS, Ellis, ex Linn. Syst. ed. X. 1088 (1759). *RANUNCULACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 7.
WARNERA, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. (1768).
canadensis, *Linn. Syst.* ed. X. 1088.—Am. bor.
canadensis, Poir. Encyc. Suppl. iii. 71 = Trautvetteria palmate.
carolinensis, Walt. Fl. Carol. 166 = Trautvetteria palmata.
jezoënsis, *Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* iii. 205.—Japon.
trifolia, Rafin. New Fl. Am. ii. 84 = canadensis?

HYDRASTYLIS, Steud. Norn. cd. II. i. 780(1840) = HYDASTYLUS, Salhb. = Sisyrinehiuin, Linn. (Irid.).

HYDRIASTELE, H. Wendl. & Drade, in Linnaea, xxxix. <1875) 208. *PALMAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 885.
Wendlandiana, *H. Wendl. (f Drude, 1. c.* 209.—Austral.

HYDRILLA, Rich, in Mém. Inst. Par. xii. (1811) II. 9, 61. *HYDROCHARIDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 450.
EPIGYNANTHUS, Blume, in Flora, viii. (1825) 679.
HYDROSPONDYLUS, Hassk. in Flora, xxv. (1842) Beibl. 38.
LEPTANTHES, Wight, ex Wall. Cat. sub n. 5048 (1831).
SERPICULA, Linn. f. Suppl. 416 (1781) partim.
alternifolia, Miq. Illustr. Fl. Ind. Arch. 52=verticillata.
angustifolia, Hassk. PI. Jav. Rar. 117 ; Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 82 = verticillata.
dentata, Casp. in Bot. Zeit. xii. (1854) 56=verticillata.
Dregeana, Presl, Bot. Bemerk. 112 = verticillata.
japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ». 271= verticillata.
muscoides. Planch, in Ann. Sc. Nat. Ser. 111. «• (1849)79=verticillate.
najadifolia, Zoll. & Moritei, Syst. Vera. Zoll. 91 - verticillata.
ovalifolia, Rich, in Mem. Inst. Par. xu. (1811) H. 7o.
Roxbu~ghii!%t£d. Norn. ed. II. i. 780 -verticillata.
verticillata, *Presl, Bot.Bemerk.* 112.—Ind-•or.
Wightii, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. «. (1849) 79-verticillata.

HYDROBRYTnkT, Endl. Gen. 1375, partim (1841). *PODOSTEMACEAE*, Benth & H * * ^ ' ' ^ ' ^)
Griffithii, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xi. (18*»; 104 — I mal.
griseu'm^i. j!'c 104 = Podostemon flivaceus.
Uchenoides, Kurz, in Jow^As. Soc Beng. xlu. (18/3) II. 103 = Podostemon
nutans, Bisch. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844) 426 mis.
ol Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 104=Podostemon olivaceus.

HYDROCALYX, Triana, in Ann. Sc. Nat.Sér, IV. ix. (1858) 43=JtianuHoa, Ruiz *Sc* P»v- (Solan.).
9"indiuensis, Triana, 1. c = J. speciosa.

HYDROCARPUS, D. Dietr. Syn. PI. i. 674 (1839), sphalm. = Hydnocarpus, Gaertn. (B.xin.).

SYDHOCEBA, Blume, Bijdr. 241 (1825). *GERANIACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. l. 278.
TYTONIA/G. Don, Gen. Syst. i. 749 (1831).
angu.tifolia>W, *Bijdr. Ul*-*&- or ; Malay-
madagascariensis, *Endl. ex Vralp. Rep-*
^fo^Wight & Arn.Prod. 140 - angustifolia.

HYDROCERAS, Hook. *t. Sc* Thorns, in Joum. Linn. Soc. iv. (I860) 156, lapsu=praec.

HYDROCHAERIS, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett iii. 400, 432 (1801) - Hydrocharis, Linn.

HYDROCHARELLA, Spruce, ex Benth. & Hook. f. iii. 452, in note (1883)=Iiimnobium, Rich. (Hydrocharid.).
echinospora, Spruce, 1. c. -=L. Sinclairi 1

HYDROCHARIS, Linn. Syst ed. I (1736). *HYDROCHARIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 452.
asarifolia, S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 220 « H. Morsus-ranae.
asiatica, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 239 = H. Morsus-ranae.
batrachyodegma, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) 71 = H. Morsus-ranae.
eellulosa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6042 - H. Morsus-ranae.
cordifolia, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 70 = H. Morsus-ranae.
Morsus-ranae, *Linn. Sp. PL* 1036.—Europ.; As. temp.
rotundifolia, Gilib. Fl. Lituan. ii. 221-H. Morsus-ranae.
Spongia, Bosc, in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 396. t. 30 s Lixnnobium Bosci.

HYDROCHLOA, Beauv. Agrost. 135. t. 24. f. 4 (1812). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1116.
carolinensis, *Beauv. I. c.*—Am. bor.

HYDROCHLOA, Hartm. Gram. Skand. 8 (1819)- Glyoeria, R. Br. (Gramin.).
airoides, Hartm. 1. c. = G. aquatica.
aquatica, Hartm. 1. c. —G. aqnatica.
arundinacea, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.453 = G. rcmota.
coerulea, Hartm. Gram. Skand. 6 = Molinia caerulea.
distant, Hartm. 1. c. = G. distans.
fluitans, Hartm. 1. c. = G. fluitans.
maritima, Hartm. L c. = G. maritima.

HYDROCLEIS, Reichb. Consp. 45 (1828) -seq.

HYDKOCTiEYS, Rich, in Mém. Mus. Par. i. (1815) 368. t. 18. *AUSMACEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 1009.
VESPUCCIA, Parl. Nuov. Gen. e Sp. Monocot. 65 (18541.
asurea, Schult. l. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 118 = Commersonii.
Commersonii, *Rich, in Mint. Mus. Par. i.* (1815) 868. 1.18.—Bras.
Humboldtii, Endl. Gen. 129= Commersonii.
Martii, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.116.1.16. f. 1.—Bras.
nymphoides, Buchen. in Bremen, Abh. ii. (1871) 2 - Commersonii.
parviflora, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* iii. 1.117.1.13. f. 1. —Bras.

HYDROCOTILE, Crantz, Inst ii. 140 (1766) = seq.

HYDBOCOTYIiE, [Tourn.] Linn. Syst ed. I (1735). *UMBELUFERAE*, Benth. &-Hook. *f.* i. 872.
CENIELLA, Linn. PI. Rar. Afr. 28 (1760).
CHONDROCARPUS,Nutt. Gen. Am. Corrigend. (1818).
GLYCERIA, Nutt. Gen. Am. i. 177 (1818).
TRISANTHUS, Lour. Fl. Cochinch. 175 (1790).
abbreviates, A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 183. t. 58. f. 19-asiatica.
aconitifolia, *A. Rich. 1. c.* 175. t 53. f. 6.—N. Granat.
acuminate, *Urban, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 273.—Bras.
acutifolia, *Ruit If Pav. Ft. Per.* iii. 25. t. 248.—Peruy.
adofnsis, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 28 = ranunculoides.
affinis, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 836 = H. Centella.
alata, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. 11820) 218. t 61. f. 28.—Austral.
alchemilloides, *A. Rich. 1. c.* 193. t 68. f. 31.—Peruv.
alpestris, *Gardn. in Hook. Land, Journ. Bot.* iv. (1845). 105—Bras.
alpina, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 834.—Afr. austr.
alpina. Veil. Fl. Flum. 123; iii. t. 89=quinqueloba.
ambigua, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 732-Erigenia bulbosa.
amcricana, *Linn. Sp. PI.* 234.—Am. bor.

HYDKOCOTYTiE :—
americana, Walt. Fl. Carol. 113—ranunculoides.
apiifolia, A. Cunn. ex Hook. f. Fl. Tasman. i. 155 = Aanthosia dissecta.
artensis, *Montr, in Mlm. Acad. Lyon*, x. (1860) 212.—N. Caled.
asiatica, Bert, ex Urban, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 273 = modesta.
asiatica, *Linn. Sp. PL* 234.—Reg. trop. et subtrop.
asiatica, Thunb. Fl. Cap. 252=eriantha.
Asterias, *Cham. V Schlecht. in Linnaea, i.* (1826) 861 (err. typ. 261).—Bras.
Barbarotsa, *Cham, (f Schlecht. 1. c.* 360 (err. typ. 260). —Bras.
batrachioides, DC. Prod. iv. 667= ranunculoides.
Batrachium, Hance, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. xviii. (1862) 220 =rotundifolia.
bidentata, J. F. Gmel. Syst. 1563, sphalm. = tridentata.
biflora, Veil. Fl. Flum. 124; iii. t. 93 = asiatica.
bipinnata, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 353, nomen; Muhl. Cat. ed. II. 29 - Erigenia bulbosa.
blepharocarpa, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* (July 1883).—Austral.
bonariensis, Lam. Encyc iii. 147 - umbellate.
Bonplandi, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 192. t. 64. f. 7.—N. Granat.
brachystachya, DC. Prod. iv. 68-hirsute,
bracteata, *DC. I. c.* 668.—Afr. trop.
brasiliensis, Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 286 = asiatica.
brevipedata, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 128-seq.
brevipes, DC. Prod. iv. 63 = asiatica.
bulbosa, Eaton *Sc* Wright, N. Am. Bot. 277-Erigenia bulbosa.
bupleurifolia, A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 218. t. 67. f- 89 = H. Centella.
burmanica, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xl. (1871) II. 60; (1877) II. 118.—Burma.
caffra, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 629 -umbellate,
callicarpa, *Bunge, in Lehm. PI. Preiss.* i. 283.—Austral,
callicephala, *Cham, in Linnaea*, viii. (1833) 829.—Bras,
calliodus, *Cham. V Schlecht. 1. c.* i. (1826) 371.—Afr. austr.
capillaris, *F. Muell. Fragm.* iv. 178.—Austral.
capitata, Banks & Soland. ex A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 201-compacta.
capitata, *Thou. Pi. Tristan d'Acugn.* 43. t. 12.—Ins. Trist. da Cunha.
capitata, Willd. in Schult. Syst. vi. 356 - Bonplandi.
Centella, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea*, i. (1826) 375 (err. typ. 276).—Afr. austr.
Chamaemorus, *Cham*, b* *Schlecht. 1. c.* 868 (err. typ. 269).—Chili.
chilensis, Phil. f. Cat. PI. Vase. Chil. 106 - Bonplandi.
chinensis, Linn. Sp. PI. 234 =Crantzia lineate.
citriodora, *Rui» tf Pav. Fl. Per.* iii. 26.—Chili j Peruv.
communis, DC. Prod. iv. 69-interrupte.
compacta, A. Rich, in Ann. Sc Phys. iv. (1820) 201 - moschate.
compostta, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 190-Erigenia bulbosa.
concinna, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 289.—N. Zel.
conferta, *Wight. Ic.* t. 1002.—Ind. or.
cordata, Walt. Fl. Carol. 113 - Limnanthemum trachy. spennum.
cordifolia, Hook. f. in Hook. Ic. PI. t. 303-asiatica.
crassiuscula, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral*, vii. (1886) 69.—Austral.
crinita, Thou, ex DC. Prod. Iv. 66-capitate,
cryptocarpa, *Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent,* xv. (1883) 106.—Reg. Argent.
cuspidata, Willd. in Schult. Syst. vi. 896-erlantha.
Cusson), *Montr, in Mlm. Acad. Lyon*, x. (1860) 211. - N . Caled.
Cymbalaria, Benth. in Enum. PI. Hueg. 53=alata.
cymbalarifolia, Muhl. Cat. 30-ranunculoides.
debilis, *Eckl.* b* *Zeyh. Enum.* 336.—Afr. austr.
densiflora, DC. Prod. iv. 67*=laxiflora.
dentata, A. Rich, in Ann. Sc. Phya, iv. (1820) 182. tCO. f. 22-auatica.

HYDHOCOTYLE :—
diantba, *DC. Prod.* iv. 63.—Austral.
dickondraefolia, A. Cuon. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 211«Novae-Zeelandiae.
difformis, Eckl. & Zeyh. Enum. 3S3=montana.
dissecta, *Hoot./. Fl. N. Zeal.* 84.—N. Zel.
dissecta, Rafin in Med. Repos. N. York, v. (1808) 363 (Quid?).—Am. bor.
Dregeana, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 580.—Afr. austr.
Dux, Veil. Fl. Flum. 125 ; iii. t. 96 = lencocephala.
elegans, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 198. t. 68. f. 32.—Austral,
elongata, *A. Cunn. ex Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 84.—N. Zel.
emarginata,VA\. Fl. Flttm. 125; iii. t. 95 = leucocephala.
erecta. Linn. f. Suppl. 177 ™ repanda *1*
eriantha, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 183. t. 56. f. 13.—Afr. austr.
falcata, Eckh *Sc* Zeyh. Enum. 835=H. Centella.
ficarifolia, Stokes, Bot. Mat Mcd. ii. 57 = asiatica.
ficarioides, Lam. Encyc. iii. 153 = repanda.
ñlicaulis, *Baker, in Journ. Lin*. Soc.* xxi. (1884) 848.—Madag.
filicaulis, Eckl. & Zeyh. Enum. 338 - virgata.
ftaccida, R. Br. ex A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 200-heteromeria.
flexuosa, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 831.—Afr. austr.
fiuitans, DC. Prod. iv. 69=umbellata.
fluminensis, Veil. Fl. Flum. 124 ; iii. t. 90=quinqneloba.
fusca, Eckl. & Zeyh. Enum. 336 = H. Centella.
Gaudickaudiana, DC. Prod. iv. 67=hirta i
geraniifolia, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 126 —Austral,
geranioides, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 197. t 59. f. 21.—Peruv.
glabra, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 49.—Afr. anstr.
glabrata. Linn. f. SnppL 176 i Lam. Encyc. iii. 155 = H. Centella.
glechomoides, A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 180. t. SB. f. 17-Dysopsis Gayana.
globata, *Blume, Bijdr.* 883.—Java.
globifera, Urban, in Mart. Fl. Bras. xi. I. 281 = seq.
globiflora, *Ruim V Pav. Fl. Per.* iii. 25. t. 247.—Am. austr.
glochidiata, *Benth. Fl. Austral,* iii. 346.—Austral.
gracilenta, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 467=peduncularis.
gracilis, *Rui** b[1] *Pav. Fl. Per.* iii. 26. t. 247.—Peruv.
grammatocarpa, *F. Muell. Fragm.* ii. 128.—Austral,
grossularioides, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1620) 207. t. 62. f. 30.—Ins. Borbon.
grumosa, [Moç. *Sc* Sesse] ex DC. Prod. iv. 70= Micropleura renifolia.
gummifera, Lam. Encyc. iii. 166=Azorella caespitosa.
gunnerifolia, *Wedd. Chlor. Andin.* ii. 189.—N. Granat.
hebecarpa, DC. Prod. iv. 63=asiatica.
hederaefolia, *Burch. Trav.* i. 46.—Afr. austr.
hermanniaefolia, *Eckl. V Zeyh. in S. Afr. Quart. Journ.* (1830) 375.—Afr. austr.
heteromeria, *A. Rick, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 200.—N. Zel.
Heyneana, Wall. Cat n. 563 = javanica.
hirsuta, Blume, Bijdr. 884 = javanica.
hirsuta, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 54 ; *Fl. Ind. Occ.* i. 56<*.—Ins. S. Doming,
hirta, *R. Br. ex A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 204.—Austral.
hispida, D. Don, Prod. Fl. Nep. 183 = javanica.
hispidula, *Bunge, in Lehm. PI. Preiss. i.* 283.—Austral.
hotnalocarpa, F. Muell. Fragm. ii. 129=verticillata.
Humboldtii, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 173. t. 53. f. 6.—Ecuador.
Humboldtii, Willd. ex DC. Prod. iv. 61 = Bonplandi.
humifusa, *Pohl, ex DC. Prod.* iv. 62.—Bras.
inaequipes, DC. Prod. iv. 63=asiatica.
incrassata, Rafin. Fl. Ludov. 81 =umbellata.
incrassata, *Ruiz &• Pav. Fl. Per.* iii. 26.—Peruv.
indecora, *DC. Prod.* iv. 668.—Chili.
indivisa. Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 83 = asatica.
intermixla, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 240.—N. Zel.

HTDROCOTYIiE :—
interrupta, *Muhl. Cat.* 10.—Am. bor.
intertexta, R. Br. ex A. Rich, in Ann. Sc Phys. iv. (1820) 208=hirta.
inundata, Sm. Fl. Brit. i. 290 = Apium inundatum.
isoloba, *Wedd. Chlor. Andin.* ii. 189.—Ecuador,
javanica, *Thunb. Diss. Hydroc.* n. 17. t. 2; *ed. Pers.* ii. 415. t 2.—Java.
javanica, Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 41=sundaica.
Langsdorffii, *DC. Prod.* iv. 60.—Bras.
lanuginosa, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 337=virgata.
latisecta, *Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 139, 140.—Java.
laxiflora, *DC. Prod.* iv. 61.—Austral,
lemnoides, *Benth. Fl. Austral,* iii. 345.—Austral.
leptostachya, A. Rich, in Ann. Sc Phys. iv. (1820) 191. t. 57. f. 16=hirsuta.
leptostachys, Spreng. Syst. i. 876=asiatica.
leucocephala, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 864.—Bras.
ligulata, Bosc, ex DC. Prod. iv. 71 = Crantzia lineata.
linearis, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. FL Cap. ii. 532 = H. Centella.
lineata, Michx. Fl. Bor. Am. i. 162=Crantzia lineata.
linifolia, Linn. f. Suppl. 176 = H. Centella.
lit tor âlts, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 384=hermanniaefolia.
lobocarpa, F. Muell. Fragm. iv. 178 = medicaginoides.
lunata. Lam. Encyc. iii. 152=asiatica.
lurida, Hance, in Walp. Ann. ii. 690 = asiatica.
macrocarpa, A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 220. t. 67. f. 40-virgata.
macrodonta, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 127 = seq
macrodus, Spreng. Neue Entdeck. ii. 292; Syst. i. 877 = hederaefolia,
macrophylla, Pohl, ex DC. Prod. iv. 61 = qninqueloba.
Mannii, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 194 =hirta.
marchantioides, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iii. 67 = hirta.
medicaginoides, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 27.—Austral,
mexicana, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 208.—Mexic.
microphylla, *A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.* Ser. I. ii. (1839) 211.—N. Zel.
minima, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 319.—Abyssin.
minuta, Pohl, in DC. Prod. iv. 66=leucocephala.
modesta, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* i. (1826) 358 (err. typ. 2581.—Reg. Argent.
mollissima, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 529 =villosa.
monopetala, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 213 = Epithema triandrum.
montana, *Cham.* b" *Schlecht.in Linnaea,* i. (1826) 374 (err. typ. 274).—Afr. austr.
montana, E. Mey. ex Harv. *Sc* Sond. Fl. Cap. ii. 532 = H. Centella.
monticola, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 194.—Afr. trop.
moschata, *Forst. f. Prod.* 22.—N. Zel.
moschata, Spreng. in Schult. Syst. vi. 361=hederaefolia.
multicaulis, Pohl, ex DC. Prod. iv. 64 - leucocephala.
multifida, *A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 208.—N. Granat.
multiflora, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iii. 24 =nmbellata.
muriculata, *Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 28.—Austral.
muscosa, R. Br. ex A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 208. t. 61. f. 27 = tripartite
natans, Cyrilli, PI. Rar. Neap. Fasc i. 20. t. 6 B= ranunculoides.
natans, *Thunb. Diss. Hydroc.* 8.—Reg. temp.
natans, Torrey, Bot. Mex. Bound. 69-prolifera.
nepalensis, Hook. Exot. Bot. i. t. SO - javanica.
nitidula, A. Rich, in Ann. Sc Phys. iv. (1820) 200. t 63. f. 33-rotundifolia.
Novae-Zeelandiae, *DC. Prod.* iv. 67.—N. Zel.
nummularioides, A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 176.1.155. f. 9-asiatica.
nutans, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 106, sphalm. = natans.
pallida, DC. Prod. iv. 63 = asiatica.
pallida, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 331=eriantha.

HYDROCOTYIiE :—
paratyensis, *Veil. Fl. Flum.* 124; iii. t. 92. f. 11.—Bras,
pedicellosa, *F. Muell. Fragm.* iv. 182.—AustrsJ.
peduncularis, *R. Br. ex A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 202. t. 61. f. 26.—Austral.
peltata, Salisb. Prod. 159 = vnlgaris.
perexigua, Hance, in Walp. Ann. ii.' 691=rotundifolia.
petiolaris, DC. Prod. iv. 60=umbellata.
pilifera, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxii. (1849) II. 26.—Austral.
pinnatifida, *Spreng. Pugill.* ii. 49.—Hab. ?
plantaginea, Spreng. Neue Entdeck. i. 284 = H. Centella.
plebeia, *. *Br. ex A. Rich, in Ann. Sc.Phys.* iv. (1820) 186. t. 60. f. 23.—Austral.
pleiantha, Cesati, in Linnaea, xi. (1837) 313=vnlgaris.
podantha, Molk. in Miq. PI. Jungh. 89 = javanica.
Poeppigii, *DC. Prod.* iv. 667.—Chili.
polycephala, Wight & Am. Prod. 366= javanica.
polyrhita, DC. Prod. iv. 65=leucocephala.
polystachya, A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 171 =umbellata.
prolifera, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* i. (1854) 15.—Am. bor. occ.
prolifera, *Otto, ex Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 295, nomen.—Bras,
pterocarpa, *F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 126.—Austral.
pulchella, R. Br. ex A. Rich, in Ann. Sc Phys. iv. (1820) 199=hirta.
puncticulata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 782 rotundífolia.
pusilla, R. Br. ex Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 21S =alata.
pusilla, *A. Rich. 1. c.* 167. t. 62. f. 2.—Reg. Argent,
pygmaea, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 57.—Cuba,
quinqueloba, *Ruiz V Pav. Fl. Per.* iii. 25. t. 248.—Peruv.
quinqueradiata, Thou, ex DC. Prod. iv. 60 = ambellata.
racemosa, [Mon. *Sc* Sesse], ex DC. 1. c. 7 0= interrupts-
ranunculoides, Blume, Bijdr. 884 = rotundifolia.
ranunculoides, Heyne, ex Wall. Cat. n. 563 = j»' vanica.
ranunculoides, *Linn.f. Suppl.* 177.—Am. bor.
reniformis, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 382 = eriantha.
reniformis, Walt. Fl. Carol. 113-repanda.
repanda, *Pers. Syn.* i. 802.—Am. bor.
rhombifolia, *F. Muell. Fragm.* vii. 147.—Austral.
rigescens, Eckl. & Zeyh. Enum. 337 = H. Centella.
rotundifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 21; *Fl. Ind.* ii. 88.—As. et Afr. trop.
rotundifolia, Wall. Cat. n. 562=asiatica.
rugulosa, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* »"• (1849) H. 27.—Austral.
rupestris, Eckl. *Sc* Zeyh. Enum. 334 = H. Centella.
saniculaefolia. Lam. Encyc. iii. 154 =Diposissanicnlaefolia.
sarmentosa, Salisb. Prod. 159=asiatica.
scaposa, Steud. in Flora, xxvi. (1853-55) 76S •" umbellata.
Schiuhriana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 482~vulgaris.
scutellifera, *Benth. Fl. Austral,* iii. 843.—Ansrral.
sibthorpioides, Lam. Encyc. iii. 153 = rotundifolia.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 468 = Crantzia lineata.
Solandra, *Linn.f. Suppl.* 176.—Afr. austr.
Spananthe, Sm. ex DC. Prod. iv. 70=Apium mw datum.
Spananthe, Willd. Sp. PL i. 1363 - Spananthe paniculata.
sphenoloba, *Wedd. Chlor. Andin.* iL 189.—N. Granat.
spicata, Lam. Encyc. iii. 153 = hirsuta.
splendens, *Blume, Bijdr.* 884.—Java.
splendens, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I- *1[3S]"* rotundifolia.
Stella, Pohl, ex DC. Prod. iv. 61 = quinqueloba.
stellata, St Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. *(* 1880) 128-H. Asterias.
striata, *Benth. Enum. PI. Hueg.* 53.—Austral.
strigosa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 7219 = javanica.
sundaica, *Blume, Bijdr.* 883.—Malaya.
superposita, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 848.—Madag.
tabularis, Steud. Norn. ed. II. i. 782-alpina.
tasmanica, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. »*• vi, (1847) 467 =• hirta.

HYDBOCOTY1.E:—
tenella, D. Don, Prod. Fl. Nep. 183-rotundifolia.
tetragrnocarpa, *Bunge, in Lehm. PI. Preiss.* i. 284.—Austral.
Thunbergiana, Spreng. Nene Entdeck. i. 283 - asiatica.
tomentosa, Thunb. Prod. PL Cap. 49 = H. Solandra.
trachycarpa, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 894.—Austral.
tribotrys, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 24=umbellata.
trichophylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 838=virgata.
tridentata, *Linn./. Suppl.* 176 ; *Thunb. Prod. PL Cap.* 49.—Afr. anstr.
iriftora, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 24 -asiatica.
triflora, *Veil. Fl. Flum.* 125; iii. t. 94.—Bras,
triloba, *Thunb. Diss. Hydroc.* 6.—Afr. austr.
tripartita, *R. Br. ex A. Rich, in Ann. Sc. Phys.* iv. (1820) 209. t. 61. f. 25.—Austral.
tripartita, Hook. f. in Hook. Ic PI. t. 312=callicarpa.
tussilaginifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 151.—Madag.
umbellata, *Linn. Sp. PI.* 234.—Reg. trop.
umbellulata, Michx. FL Bor. Am. i. 161=umbellata.
undnata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) I. 169=villosa.
uniflora, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xvii. (1885) 239.—N. Zel.
vagans, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 468 = hirta.
valdiviana, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-85) 88.—Chili.
"tartans, Pohl, in DC. Prod. iv. 61 - quinqueloba.
verticillata, Thunb. Diss. Hydroc. 6«vulgaris.
verticillata, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxn. (1849) II. 28.—Austral,
villosa, *Linn./. Suppl.* 175.—Afr. austr.
villosa, Thunb. ex Harv. & Sond. Fl, Cap. fl. 682-H. Centella.
virgata, *Linn.f. Suppl.* 176.—Afr. austr.
Volkmanni, *Phil, in Linnaea,* xxxiii (1864-65) 88.—Chili.
vulgaris, Bory, ex A. Rich, in Ann. Sc. Phys. iv. (1820) 172=umbellata.
•*aulgaris,* Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, L (1826) 856 (en. typ. 256), partim-interrupt!
vulgaris, *Linn. Sp. PI.* 234.—Europ.
• *vulgaris,* Michx. Fl. Bor. Am. i. 257 - interrupta.
vulgaris, Thunb. Fl. Cap. 252=verticillata.
Wightiana, Wall. Cat. n. 7220 = asiatica.
'eylanica, DC. Prod. iv. 67 = javanica.
Zollingeri, Molk. in Miq. PI. Jungh. 91=rotundifolia.

HYDROGETON, Lour. Fl. Cochinch. 244 (1790) - Potamogeton, Toum. (Naiad.).
beterophyllum, Lour. 1. c. = P. octandrom.

HYDROGETON, Pen. Syn. L 400 (1805) - Apono-Beton, Thunb. (Naiad.).
fenestralis, Ten. 1. c - A. fenestrale.

HYDROLAEA, Dum. Anal. Fam. 25 (1829) =seq.

HYDROUSA, Linn. Sp. PL ed. II. 328 .(1763). *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. & Hook. f. u. 881.
REICHELIA, Schreb. Gen. 200 (1789).
SAGONEA, Aubl. PL Gui. i. 285. t. Ill (1776).
STEMS, Linn.'Mant. i. 8 (1767).
affiuis, *A. Gray, Man. Bot. N. V. St.* ed. V. 370.-An, bor, 1 •
"•rayatensis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 2".-zeylanica.
*«*Ticul*ta,Mof.* ex Choisy, in DC. Prod. x. 181,184
Ba; *Z%?%T£t* Brit, ex Choisy. Desc Hydrol. 1
ca *rolinana.*
ina, Steud. Nom. ed. I. 417-Wigandia eracassann.
Wroliniana, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 177.-Am. bor.
<*ilonica, F. Muell. Fragm. v. 192=zeylanica.
"ngesta, Willd. ex Choisy, in DC. Prod. x. 181, 11U
*• Nama undulata.
^Trmbosa, *Ell. Sketch, i.* 336-Am. bor.
7 « M Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 22 = Wigandia crop
""ens,* Mo5. ex Choisy, in DC. Prod. x. 181-Namajamaicensis.
depauperata, KloUsch, in Schomb. Faun, et Ft. Gm- 1154, nomen.—Guian.

HYDBOIiEA:—
dichotomy Ruiz Ac Pav. Fl. Per. iii. 22. t. 244=Nama dichotomft.
diflusa, *Raeusch. Nom.* ed. III. 76 j *et ex Choisy, in DC. Prod.* x. 181.—Afr. austr.
elatior, Schott, in Spreng. Syst iv. Cur. Post. 404 = multiflora.
elegans, *A. W. Benn. in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 271.—Bras.
exaltata, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. i. 782-multiflora,
extra-axillaris, *Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand,* ii. (1846)321. t. 79.—Hab.1
floribunda, *Klotisch tf Peyr. PI. Tinn.* 22. t. ix B.—Afr. trop.
glabra, *Choisy, Desc. Hydrol.* 16.—Venezuela,
glabra, *Schum. V Thonn. Besir. Guin. PI.* 161.—Afr. trop.
glabra, Sm. in Rees, Cyclop, xxi. Art. Lycium = elegans.
graminifolia, *A. W. Benn. in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 277.—Afr. trop.
guineinsis, Choisy, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* II. i. (1834) 180=glabra.
inermis, Lour. Fl. Cochinch i. 172=zeylanica.
jamaicensis, Raeusch. Nom. ed. III. 76 — Nama jamaicensis.
javanica, Blume, Bijdr. 725 - zeylanica.
latifolia, *Rafin. AH. Journ.* 146.—Am. bor.
leptocaulis, Featherman, Louisiana Univ. Rep. (1871) =affinis.
ludoviciana, Featherman, 1. c-ovata.
macrosepala, *A. W. Benn. in Journ. Linn. Soc.* xi. (1871) 277.—Afr. trop.
madagascariensis, *Choisy, Desc. Hydrol.* 17.—Madag.
megapotamica, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 114.—Bras.
moUis, Willd. ex Spreng. Syst. i. 866 - Wigandia caracassana.
montevidensis, *Choisy, in DC. Prod.* x. 181.—Reg. Argent.
multiflora, *Choisy, 1. c.* 180.—Bras,
nigricaulis, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 207.—Cuba,
ovata, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. v. (1837) 196.—Am. bor. et austr.
ovatifolia, Rafin. New Fl. Am. iv. 64 = ovata.
paludosa, *A. W. Benn. in Journ. Linn. Soc.* xl. (1871) 270.—Bras.
palustris, Raeusch. Nom. ed. III. 76 - caroliniana.
paniculata, Rafin. New FL Am. iv. 64-caroliniana.
quadrivalvis, Walt. Fl. Carol, i. 109,110=caroliniana.
radians, Mof. ex Choisy, in DC. Prod. x. 181,182 = Nama undulata.
rupincola, Moc. ex Choisy, 1. c. 181= Nama undulata.
scorpioides, M05. ex Choisy, 1. c. 182, 184 - Wigandia scorpioides.
spinosa, *Linn. Sp. PI.* 828.—Am. trop.
tenella, Moc. ex Choisy, in DC. Prod. x. 182, 183-Nama origanifolia.
trigyna, Sw. Prod. Veg. Ind. Oca 54—spinosa.
urens, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 21-Wigandia urens.
verticillata, *Rafin. Fl. Ludov.* 51.—Am. bor.
violacea, Moc. ex Choisy, in DC. Prod. x. 182 = Nama sericea.
zeylanica, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 46.—Reg. trop.

HYDROLIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 9 (1806) - praec

HTDBOIiVTUKUM, Hook. f. in Benth. *Be* Hook. f. Gen. i. 777 (1867). *LYTHRARIEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 777.
Wallichii, *Hook./. l.c.\et in Hook. Ic. PI.* 1.1007.—Ind. or.

HYDROMESTES, Benth. & Hook. f. Gen. iL 1103 (1876) = seq.

HYDROMESTUS, Scheidw. in Otto & Dletr. Allg, Gartenz.x.(1842) 28S=Aphelandra, R. Br.(Acantuac.).
maculatus, Scheidw. 1. c - A. Hydromestus.

HYDROMISTRIA, BartL Ord. 74 (1830)-seq.

HYDROMYSTRIA, G. F. W.Mey. Prim. Fl. Esseq. 152 (1818)=Iiimiiobium, Rich. (Hydrocharid.).
stohni/era, G. F. W. Mey. 1. c. 153 = L. Boscii.

HYDROPELTIS, Michx. Fl. Bor. Am. i. 823. t. 2» (1808) = Brasenia, Schreb. (Nymphaeac.).
pulla, Salisb. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1807) 74 = B. Schreberi.
purpurea, Michx. FL Bor. Am. i. 324. t. 29 - B. Schreberi.

HYDROPHACA, Steud. Nom. ed. II. i. 783 (1840) = seq.

HYDROPHACE, Hall. Enum. Stiip. Helv. iii. 68 (1768) =Iiemna, Linn.

HTDKOPHYIiAX, Linn. f. Suppl. 126 (1781). *RUBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 142.
SARISSUS, Gaertn. Fruct. i. 118. t. 25 (lf88).
carnosa, *Sond. in Harv. V Sond. Fl. Cap.* iii. 25.—Afr. austr.
madagascariensis, *Willd. ex Roem. tf Schult. Syst.* iii. 527.—Madag.
maritima, *Linn./. Suppl.* 126.—Ind.or.
pusilla, Pohl, ex DC. Prod. iv. 550 (=*Borreria eupatorioides).*—Bras.

HYDROPHYLLAX, Rafin. in Ann. Gén. Sc Phys. vi. (1820) 87=praec.

HYDROPHYIiLTTM:, Linn. Syst. ed. I (1735,. *HYDROPHYLLACEAE,* Benth. & Hook. *i.* ii. 826.
DECEMIUM, Rafin. Fl. Ludov. 34, in obs. (1817).
VITICELLA, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 220.
aceri/olium, Salisb. Prod. 120 = canadense.
Aldea, Roem. & Schult. Syst. iv. 114 - Phacelia circinnata.
appendiculatum, *Michx. Fl. Bor. Am. i.* 134.—Am. bor.
canadense, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 208.—Am. bor.
capitatum, *Dougl. ex Benth. in Tt ins. Linn. Soc.* xvii. (1836) 273.—Am. bor. occ.
cochinchinense. Lour, ex Steud. Nom. ed. II. i. 783 (Quid 7).—Cochinch.
hispidum, *Riddell, Syn. Fl. W. St. Am.* 84.—Am. bor.
lineare, Pursh, FL Am. Sept. i. 134 - Phacelia Menziesii.
lobatum, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 302 = canadense.
macrophyllum, *Nutt. in Journ. Acad. Phitad.* vii. (1834) 111.—Am. bor.
magellanicum, *Lam. in Journ. Hist. Nat. Par. i.* (1792) 378.—Reg. Magellan,
occidentale, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 314.—Am. bor. occ.
paniculatum, Poepp. ex A. DC. in DC. Prod. ix. 298. 289 - Phacelia circinata.
pinnatifidum, Moench, Meth. 428«virginicum.
pusillum, Muhl. ex A. DC. in DC. Prod. ix. 289, 292 =• Nemophila microcalyx.
spiraeaefolium, Salisb. Prod. 120=virginicum.
trilobum, Rafin. Fl. Ludov. 33 - appendiculatum.
virginianum, Linn. Sp. PL 146 = seq.
virginicum, *Linn. Syst.* ed. XII. 152.—Am. bor.

HYDROPHYTUM, Flora, vi. (1823) Beibl. 96, sphalm. - Hydnophytum, Jack (Rubiac).

HYDROPIPER, Buxb. ex FOUR, in Ann. Soc. linn. Lyon. N. S. xvi. (1868) 349-Elatine, Linn.
Fabri, Fourr. I. c. = E. macropoda.
hexandrum, Fourr. 1. c. - E. hexandra.
majus, Fourr. 1. c—E. hexandra.

HYDROPITYON, Gaertn. f. Fruct. iii. 19. 1.188(1806; cLimnophila, R. Br. (Scrophularin.).
peduncula tum, Ser. in DC. Prod. i. 422 = L. gratioloides.
seylanica, Gaertn. f. Fruct. iii. 18. t. 183. f. 2-L. gratioloides.

HYDROPITYUM, Steud. Nom. ed. II. i. 788 (1840)-praec.

HYDROPYRUM, Unk, Hort. Berol. i. 252 (1827)-Zizanla, Gronov. (Gramin.).
esculentum, Link, 1. c. =Z. aquatica,
fiuitans, Kunth, Rev. Gram. i. 7 =Z. aquatica.
latifolium, Griseb. in Ledeb. Fl. Ron. iv. 466 = Z. AQUftuJCfti

HYDROPYXIS, Rafin. Fl. Ludov. 94 (1817); DC. Prod. iii. 864 (Gen. delendom). Benth. & Hook. f. i. 156.
palustris, Rafin. 1. c.

HYDROSCHOENUS, Zoll. & Mor. Syst. Vere. Zoll. 95 (1846) - Cyperus, Michx.
iyllingioides, Zoll. & Mor. 1. c. = C. Cephalotes.

HYDROSIA, A. Juss. in Orb. Diet vii. 270 (1849) = HIDROSIA, E. Mey. = Bhynehoaia, Lour. (Legumin.).

HYDROSME, Schott, in Oestr. Bot Wochenbl. (1857) 389=Amorphophallus, Blame (Aroid.).
angolensis, Schott, in Joum. Bot. iii. (1865) 85.—Afr. trop.
consimilis, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 825-A. consimilis.
Eichleri, Engl. in Eichl. Jahrb. Berl. ii. (1883) 285.—Afr. trop.
Fontanesii, Schott, Prod. Aroid. 188 =- A. Fontanesii.
grata, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 823.—Afr. trop.
Hildebrandtii, Engl. in Bot. Jahrb. i. (1881) 187.—Afr. trop.
leonensis, Engl. I. c. = A. leonensis.
maxima, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 323.—Afr. trop.
mossambicensis, Schott, Gen. Aroid. 33-A. mossambicensis.
Prieuriana, Schott, in Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat. i. 279 = A. consimilis.
Rivieri, Engl. in Bot. Jahrb. i. (1881) 188 = A. Konjac.
Schweinfurthii, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 322.—Afr. trop.
Teusrii, Engl, in Regel, Gartenfl. (1884) 2; et Bot. Jahrb. v. (1884) Beibl. n. 6.—Afr. trop.

HYDROSPONDYLUS, Hassk. in Flora (1842). Beibl. 33=Hydrilla, Rich. (Hydrochar.).
submenus, Hassk. 1. c. = Hydrilla verticillata.

HYDBOSTACHYS, Thou. Gen. Nov. Madag. 2 (1806). *PODOSTEMACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 115.
cristulata, *Wedd. in DC. Prod.* xvii. 89.—Afr. trop.
distichophylla, *A. Juss. in Deless. Ic. Sel.* iii. t 94.—Madag.
Goudotiana, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. xi. (1849) 92.—Madag.
imbricata, *A. fuss, in Deless. Ic. Sel.* iii. t. 92.—Madag.
madagascariensis, Stead. Nom. ed. II. i. 788 = Goudotiana, imbricata, verruculosa.
multifida, *A. Juss. in Deless, Ic. Sel.* t 98.—Madag.
natalensis, *Wedd. in DC. Prod.* xvii. 88.—Afr. anstr.
plumosa, *A. Juss. ex Tul. in Arch. Mus. Par.* vi. (1852) 57.—Madag.
polymorpha, *Klotasch, in Peters, Seise Mossamb. Bot.* 506. t. 52.—Afr. trop.
stolonifera, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 435.—Madag.
verruculosa, *A. Juss. in Deless. Ic. Sel.* iii. t. 91.—Madag.

HYDROSTIS, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. i. p. lx (1827) = Hydrastis, Ellis (Ranunc).

HYDHOTAENIA, Lindl. Bot. Reg. (1888) Misc. 69. *IRIDEAE* [Benth. & Hook. f. iii. 690].
PARDINIA, Herb, in Lindl. Bot. Reg. (1844) Misc. 66, in obs. partim.
Ehrenbergii.&AferAl. *in Linnaea,* xriii. (1844) 666.—Mexic.
lobata, *Herb, in Lindl. Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 66.—Peruv.
Meleagris, *Lindl. 1. c.* (1838) *Misc.* 69.—Mexic.

HYDROTICHE, A. Juss. in Orb. Diet. xi. (1849) 459 = seq.

HYDHOTHICHE, Zucc. in Abb. Acad. Mnench. (1832) 808. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 951.
hottoniaeflora, *Zucc. 1. c.* 80^.—Madag.

HYDROTRIDA, Willd. ex Schlecht. & Cham, in Linnaea, v. (1830) 107 = Herpestis, Gaertn. f. (Scropholar.).
Beccabunga, Willd. 1. c = Herpestis obovata.

HYDROTROPHUS, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc xiv. (1878) 8. t. 1-Blyxa, Noronha (Hydrochar.).
echinospermus, C. B. Clarke, 1. c.—Ind. or.

HYEBONIMA, Allem. Diss. in Trab. Veil. Rio Janeiro (1848). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 284.
SECRETANIA, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. u. 227 (1866!.
STILAGINELLA, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 240.
alchomeoides, *Allem. Diss. in Trab. Veil. Rio Janeiro* (1848).—Bras.
Blanchetiana, *Tul. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 833.—Bras,
clusioides, *Griseb. in item. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 157.—Porto Rico.
cubana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 270.—Cuba,
ferroginea, *Tul. in Mart. Fl. Bras.* iv. I. 884. t 91.—Bras,
laxiflora, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 67.—Guian.
macrocarpa, *Muell. Arg. I. c.* 66.—Venezuela,
mollis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 269.—Bras,
oblonga, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 66.—Oui&n*
pallida, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. n. 270.—Cuba,
scabra, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 66.—N. Granat.

HYOEA, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Brit. Gui. 1147, nomen (1848). *ASCLEPIADEAE.*
mhvXatz, Motnsch, 1. c. nomen.—Guian.

HYOEA, Hanst in Linnaea, xxvi. (1858) 183, 209. *GESNERIACEAE1*
barbigera, *Hanst. I. c*—Chili.

HYGROCHARIS, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 77 (1851) = Nephrophyllum, A. Rich. (Convolv.).
abyssinica, Hochst. ex A. Rich. 1. c - N. abyssinienm.

HYGROCHARIS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 147, adnot. (1842) = Bynchospora, Vahl (Cyperac).

HYGBOFHIIiA, K. Br. Prod. 479 (1810). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1075.
ASTERACANTHA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 75 (1832).
BAHEL, Adans. Fam. ii. 210 (1763).
EBERLEA, RiddeJL ex Nees, in DC. Prod. xi. 85 (1847).
HEMIADELPHIS, Nees, in WalL PI. As. Rar. iii. 75 (1832).
PHVSICHILUS, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 310.
POLYECHMA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) S76.
TENORIA, Dehnh. & Giord. Cat. PI. Hort. Camald. ed. II. (1829) 124.
abyssinica, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 22.—Abyssin.
acutangula, Nees, ex Mart, in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 25-costata.
angustifolia, *R. Br. Prod.* 479.—Geront trop.
assurgens, Nees, in DC. Prod. xi. 90 = angustifolia.
balsamica, Rafin. Fl. Tellor. iv. 66 = Cardanthera balsamica.
barbata, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 22.—Afr. trop.
barbata, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 783 — quadrivalyis.
brasiliensis, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 237—Bras,
caerulea, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 22.—Afr. trop.
ciliaris, Nees, in DC. Prod. xi. 166, in syn. = angustifolia.
conferta, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 21.—Bras,
costata, *Sinning, in Nees ff Sinning, Amoen. Bot. Bonn.* ii. (1824) 7. t. 3.—Am. trop.
difformis. Blame, Bijdr. 804 = Raellia difformis.
dimidiata.Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 81=angustifolia.
formosa, Spreng. Syst ii. 828=Aphelandra formosa.

HYGBOPHILA:—
glandulifera, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 22.—Bras,
guianensis, *Nees, ex Benth. in Hook. Land.,Journ. Bot.* iv. (1845) 634.—Guian.
Helodes, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 23.—Bras,
hirsuta, *Nees, I. c.* 24.—Bras,
hispida, *Nees, in DC. Prod.* xi. 87.—Cul>a.
illinoiensis, Wood, in Bull. Torrey Bot. Club, v. 41; ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1.327 - Ruelliastrepens.
incana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 91.—Ind. or.
lacustris, *Nees, 1. c.* 86.—Am. centr.
lancea, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 123.—Japon.
latifolia, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 24.—Bras.
longifolia, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) II. 78 = spinosa.
longifolia, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 21.—Mexic.
lutea, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 22.—Afr. trop.
malabarica, Rafin. Fl. Tellur. iv. 66-- angustifolia.
micrantha, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 22.—Afr. trop.
oblongifolia, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 21 = costata.
oblongifolia, Rafin. Fl. Tellur. iv. 66 = Ruellia ciliosa?
obovata, Griff. Notul. iv. 184 = phlomoides.
obovata, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 81=angustifolia.
obovata, Wight, Ic. t. 1489 = quadrivalvis.
odora, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 22.—Afr. trop.
ovata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 89.—Bras.
Pavala, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) II. 78 = Hemigraphis latebrosa.
phlomoides, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 80.—Ind. or.; Burma,
polyspenna, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 456.—Ind. or.; Malaya.
portoricensis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 92.—Porto Rico,
pubescens, *Nees, I. c.* 88.—Bras,
pusilla, *Blume, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 783.—Ins. Molucc.
quadrivalvis, *Nees, in Wall. PI. As. Rar.* iii. 80.—Ind. or.; Malaya.
radicans, Nees, 1. c. 81 = angustifolia.
ringens, R. Br. ex Steud. Nom. ed. II. i. 788=angustifolia.
rivularis, *Nees, in DC. Prod.* xi. 87.—Mexic.
salicifolia, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 81-angushfolia.
Schottiana, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 22.—Bras,
senegalensis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 22.—Afr. trop.
Serpyllum, *T. Anders. 1. c.* ix. (1867) 456.—Ind. or.
spinosa, *T. Anders. I. c.* vii. (1864) 22.—Ind. or.J Malaya.
Stocksii, *T. Anders, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Brit. Ind.* iv. 407.—Ind. or.
stricta, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt 148 > angustifolia.
uliginosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 197.—Afr. trop.
undulata, Blume, Bijdr. 803 = angustifolia.
undulata, Nees, in WaU. PL As. Rar. iii. 80, in syn.-quadrivalvis.

HYGRORHIZA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 55=seq.

HYGBOBYZA, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-Oct. 1883) 880. *GRAMINEAE,* Benth. * Hook. f. iii. 1116.
POTAMOCHLOA, Griff, in Joum. As. Soc. Beng. (18361 571. t 22.
aristata, *Nees, in Edinb. N. Phil. Journ.* xv. (Apr.-Oct. 1833) 880.—Ind. or.
ciliata, Steud. Nom. ed. II. i. 783=Zizania ciliwta.

HYLACIUM, Beauv. Fl. Owar. ii. 83.1.113 '(1807)* Fsychotria, Linn. (Rubiac).
owariense, Beauv. 1. c. = P. owariensis.

HYLAS, Bigel. ex DC. Prod. iii. 69, in obs. (1828) Myriophyllum. Linn. (Halorag.).

HYLEBIA, Fotur. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. (1868) 347 = SteIlaria, Linn. (Caryophyll-).
nemorum, Fourr. 1. c = S. nemorum.

HYLENAEA, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 886 = Hippooratea, Linn. (Celastr.).
capillieflora, Mien, 1. c. 868 = Hippocratea comosa.
comosa, Miers, 1. c. 367 = Hippocratea comosa.
jamaicensis, Miers, 1. c 369 = Hippocratea ovata.
multiflora, Miers, 1. c. 868=Salacia mnltiflora, *DC.*

HYLETHALE, Link, Handb. i. 788 (1829) = Prenanthes, Linn. (Compos.).
purpurea, Link, 1. c. = P. purpnrea.

HYLINE, Herb, in Bot. Mag. snb t. 8779 (1840). *AMARYLLIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 780.
Gardneriana, *Herb. I. c.*—Bras.

HYLOCHARIS, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 819 (1860) = Oxyspora, DC. (Melastom.).
macrophylla, Miq. 1. C = O. macrophylla.

HYLOCHARIS, Tiling, ex Regel *Sc* Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 123 = Cltntonia, Rafin. (Lfflac.1.
cyanocarpa. Tiling, 1. c. = C. udensis.

HYLOCOCCUS, R. Br. ex Benth. Fl. Austral, vi. 92 (187S)=PetalOBtigma, F. Mnell. (Euphorb.).
sericeus, R. Br. ex Benth. 1. c. = P. qnadriloculare.

HYLOGETON, Salisb. Gen. PI. Fragm. 91 (1866) = Allium, Toum. (Liliac).
ursinum, Salisb. 1. c. = A. ursinum.

HYLOGYNE, Salisb. in Knight, Prot. 126 (1809) = Telopea, R. Br. (Proteac).
australis, Salisb. 1. c. 127 = T. truncatum.
speciosa, Salisb. 1. c 126 = T. speciosissimnm.

HYLOMECON, Maxim, in Mém. Sav. Etr. Acad. P&ersb. ix. (1858); (Prim. Fl. Amur.) 86. t. 3 = Stylophorum, Nutt. (Papaverac).
vernalis, Maxim. 1. c.-S. japonicum.

HYLOMENES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 26 (1866) = Scilla, Linn. (Liliac.).
campanulata, Salisb. 1. c-^S. campannlata.
nonscripta, Salisb. 1. c. = S. festalis.

HYLONOME, Webb *Sc* Berth. Phyt Canar. iii. 820 (1850), partim; Baker, in Toum. Linn. Soc.xiv. (1875) 561 = Bohnia, Didr. (Liliac).
reticulata, Webb & Berth. 1. c.; Baker, 1. c. = ». reticulata.

H n. 7896 (1831); *ORCHIDEAE*,
Benth. & Hook. f. iii. 602.
DICEROSTYLIS, Blume, Orch. Arehip. Ind. l. 116 (1858)
lanceolata/Ww. *Fl. Ind. Bat.* iii. 746.—Malaya.
mollis, *Lindl. in Wall. Cat.* n. 7396 ; *et Bot. Reg.* sub t. 161
purpurascens. FL Ind. Bat. iii. 746-Zeuxine purpurascens.

HYMANTHOGLOSSUM, Tod. Orch. Sic. 67 (1842) = HIMANTOGLOSSUM, Spreng. - Orchis, Linn.

HYMENACHNE, Beauv. Agrost. 48. t. 10. f. 8 (1812) = I*anicum, Linn. (Gramin.).
mpiexicaulis, Nees, Agrost Bras. 276-P. Myurus.
Boiviniana, Steud. 1. c. 419.—Madag.
mpestris. Nees, Agrost. Bras. 273, 274-P. eamporum.
Porum, Kunth, Enum. PI. i. 88-P. vilvoides.
viatilis, Nees, Agrost. Bras. 273 - P. vilvoides.
Condescends, Fouro.ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 496 = P. stoloniferum.
«i, Fonm. ex Hemsl. 1. c 492 (Quid?).—Mexic.
indica. Buese, in Miq. PI. Jungh. 377 = P. indicum.
Werrupta, Buese, 1. c. = P. Myurus.
nterrupta, Steud. Syn. PI. Gram. 101 (an praec. !).—Java.
*P*ostachya*, Foum. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot ui-490-P. leptostachyum.
Mauritiana, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 307.
Myosurus &, Agrost. Bras. 276 = P. Myosurus.

HYMENACHNE:—
Myurus, Beauv. Agrost. 49 = Panicum Myurus.
Myurus, Steud. Syn. PL Gram. 101 = Sporobolus ciliatus?
patula, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 492 (Quid J).—Mexic.
phalarioides, Nees, Agrost. Bras. 276 — P. phalarioides.
phleiformis, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Centr. Am. Bot. iii. 494 = P. phleiforme.
Pseudo-interrupta, C. Mnell. in Bot. Zeit. xix. (1861) 833 = P. Myurus.
striata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 564 — P. striatum.

HTUENABi, Linn. Gen. ed. I. 366 (1737). *LEGVMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 683.
COURBARI, Adans. Fam. ii. 317 (1763).
COURBARIL, Plum, ex Endl. Gen. 1317 (1841).
TANROUJOU, JUSS. Gen. 361, in adnot (1789).
animifera, Stokes, Bot Mat. Med, ii. 449 - H. Courbaril.
Candolliana, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 323. t. S66.—Mexic.
chrysophylla, Willd. ex Vog. in Linnaea, xiii. (1839) 313 = Bauhinia splendens.
confertifolia, *Mart, ex Hayne, Arsneigew.* xi. t. 8.—Bras.
confertifolia, Hayne, 1. c. t. 9 = stilbocarpa.
copalifera, Mart, ex Hayne, 1. c. sub t, 15 = Martiana.
Courbaril, *Linn. Sp. PI.* 1192.—Am. austr.
eriogyne, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. it. 237.—Bras.
floribnnda, *H. B. f* K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 823. t. 667.—Guian.
Gaertneriana, D. Dietr. Syn. PI. ii. 1473 - Trachylobium Homemannianum.
Hayneana, D. Dietr. 1. c—verrucosa.
Hornemanniana, D. Dietr. 1. c. =» Trachylobium Homemannianum.
Lamarckiana, D. Dietr. 1. c. = verrncosa.
latifalia, Hayne, Arzneigew. xi. t. 7 — Peltogyne lalifolia.
Martiana, *Hayne, I. c.* t. 16.—Bras.
obtusifolia, Willd. ex Hayne, 1. c. xi. sub t. 7 = Peltogyne latifolia.
Olfeniana, *Hayne, 1. c.* t. 14.—Bras.
pubescens, Mart, ex Hayne, 1. c. sub 1.16 = Sellowiana.
resinifera, Salisb. "rod. 827 = H. Courbaril.
retusa, Willd. ex Hayne, Arzneigew. xi. subt. 12 — Candolliana.
rotundata, *Hayne, 1. c.* t. 13.—Am. austr.
Sellowiana, *Hayne, 1. c.* t. 16.—Bras.
splendida, *Vog. in Linnaea*, xi. (1837) 409.—Bras.
stigonocarpa. *Mart, ex Hayne, Arsneigevt.* xi. t. 13.—Bras.
stilbocarpa, *Hayne, I. e.* t 11.—Bras.
venoaa, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 31.—Guian.
verrucosa, *Gaertn. Fruct.* ii. 806. t. 139. f. 7.—Madag.
verrucosa, Hornem. ex Hayne, Arzneigew. xi. sub t 18 «= Trachylobium Homemannianum.

HYMENAUTDHA, A. DC. ex Spach, Hist. Veg. Phan. ix. 374 (1840). *MYRSINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 647.
Wallichii,.*. *DC. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvi. (1841) 84.—Reg. Himal.

HYMEN'AJNtUjSHA, R. Br. in Tuckcy, Congo, 442 (1818). *V1OLAR1EAE*, Benth. *Sc* Hook. f. i. 120.
SOLENANTHA, G. Don, Gen. Syst. ii. 39 (1832).
angustifolia, R. Br. ex DC. Prod. i. 815 - dentata.
Banksii. F. Muell. First Gen. Report, 9 = dentata.
crassifolia, *Hook.f. Fl. N. Zel.* t. 7.—N. Zel.
dentata, *R. Br. ex DC. Prod.* i. 815.—Austial.
latifolia, *Endl. Prod. Fl. Norfolk.* 127.—Ins. Norfolc.
oblongifolia, A. Cunn. in Hook. Loud. Joum. Bot. i. (1842) 124 = dentata.
Traversii, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* xv. (1888) 839.—N. Zel.

HYMENANTHES, Blume. Bijdr. 862 (1826) - Rhododendron, Linn. (Ericac).
japonica, Blume, 1. c. = R. Mettemichii.

HYMENANTHUS, D. Dietr. Syn. PI. iii. 21 (1848)=pracc.

HTniENATHEEUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 12. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 410.
AciPHVLLAEA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) (PI. I-endl.) 91.
GNAFHALOFSIS, DC. Prod. vii. 258 (18381.
acerosum, *A. Gray, PI. Wright*, i. 115.—Mexic.
aureum, *A. Gray, in Proc. Aip. Acad.* xlx. (1883) 42. —Am. bor. occ.
Belenidium. DC. Prod. vii. 292 =tenuifolium.
Berlandieri. Benth. PL Hartw. 18-Hartwegi.
Berlandieri, DC. Prod. v. 642 = pentachaetum.
boeberoidcs, *A. Gray, PI. Wright*, i. 115.—Mexic.
Candolleanum, Hook. *8c* Am. in Hook. Joum. Bot. iii. (1841) 820 = tenuifolium.
concinnum, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. 446, 463. —Arizona.
diffusum, *A. Gray, PI. Wright*, i. 116.—Mexic.
gnaphalodes, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 90 = H. Gnaphalopsis.
Gnaphalopsis, *A. Gray, I. c.* 116.—Mexic.
Greggii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 42. —Mexic.
Hartwegi, *A. Gray, PI. Wright*, i. 116,117.—Mexic.
Kunthii, *Less. Syn. Comp.* 236.—Chili.
Neaei, *DC. Prod.* iv. 642.—Chili,
neo-mexicanum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 40.—Mexic.
pentachaetum, *DC. Prod.* v. 642.—Mexic.
polychaetum, *A. Gray, PI. Wright*, i. 116.—Mexic.
serratifolium, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 221.—Mexic.
setifolium, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (188.1) 42.—Mexic.
tagetoides, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. iv. (1849) 88.—Texas,
tenuifolium, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxii. 814.—Chili *I* Mexic.
tenuilobum, DC. Prod. v. 642 = tenuifolium.
Thurberi,/4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 41. —Mexic.
Treculii, *A. Gray, 1. c.* 42.—Texas.
Wrightii.ii. *Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. iv. (1840) 89.—Texas.

HYMENELI.A, [Moc, *Sc* Scsse,] ex DC. Prod. i. 38:i (1824). *CAKYOPHYLLEAE*, [Benth. *Sc* Hook. f. i. 150].
TRIPLATEIA, Bartl. in Prcsl, Rel. Haenk. ii. 11. t. 50 (1830).
moehringioides, *[Afof. (TSesse.Jex DC. Prod.* i. 390.-Mexic.

HYMENESTHES, Miers, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1875) 26. t. 6-Bourreria, P. Br. (Boragin.).
nitida, Miers, 1. c. — B. aucculema.

IIYMENETRON, Salisb. Gen. PI. Fragm. 128 (1866) »= Strumaria, Jacq. (Amaiyllid.).
linguaeflora, Salisb. 1. c. = S. truncata.
truncata, Salisb. 1. c. ~ S. truncata.

HYMENIA, Griff. Notul. iv. 449 (1854) = Hymenaoa, Linn. (Legumin.).

HYMENIDIUM, Lindl. in Royle, Illustr. Hot. Himal. 233 (18S5)=Pleuro8permum, Hoffm. (Umbellif.;.
Brunonis, Lindl. 1. c. = P. Brunonis.
densiflarum, Lindl. 1. c. = P. densiAorum.
suaveolens, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reisi:, 148—P. densiflorum.

HTMENOCALLI8, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 338. *AMARYLUDEAE*, Benth. *Sc* Hook. f. iii. 784.
CHORETIS, Herb. Amaryll. 219. f. 35 (1837).
ISMKNE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 842.
HTMENOCALYX, Houll. in Kev. Hortic. (1869) 418.
NEMEPIODON, Rafin. Kl. lellur. iv. 22 (1836).
SIFHOTOMA, Rafin. 1. c. (1836).
TOMUDON, Rafin. 1. c. (1836).
acutifolxa, M. Koem. Syn. Ensat. 174 - littoralU.
adnata, Herb. Amaryll. 215 =littoralis.
Amancaes, *Nichols. Diet. Gard.* ii. 165.—Pcruv.
americana, M. Roem. Syn. Knt>at. 176=littoralis.
amoena, Herb. App. 44 •* ovata.
Andreana, *Nichols. Diet. Gard.* ii. 165.—Ecuador.
angusta, Herb. App. 44 - caribaea.
arenaria, M. Roe n. Syn. Ensat. 176-litloralia.

HYMENOCALLIS:—
biflora, *C. Koch* b"*Bouchi, in C.Koch, Wochenschr.* ix. (1866) 370.—Bias,
bistubata, *Herb, in Bot. Reg.* (1844) *Misc.* 48.—Mexic.
Bonplandii, *Kuntk, Enum. PL* v. 666.—N. Granat.
Borskiana, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1846) 156-seq.
Boschiana, Knnth, Enum. PI. v. 854=undulata.
calathina, *Nichols. Diet. Gard.* ii. 165.—Pemv.
caribaea, *Herb. App.* 44.—Ind. occ.
caroliniana, Herb. 1. c.~ Pancratium maritimum.
caymanensis, *Herb. Amaryll.* 614.—Florida.
Choretis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iit 335=. glauca.
cinerascen's, M. Roem. Syn. Ensat. 171 = caribaea.
coronaria, Knnth, Enum. PI. v. 855-crassifolia.
crassiflora, Kunth, 1. c. 677, sphalm.=seq.
crassifolia, *Herb. App.* 44.—Am. bor.
declinata, M. Roem. Syn. Ensat. 171 = caribaea.
Dillenii, M. Roem. 1. c. 174-lacera.
disciformis, M. Roem. 1. c. 173-lacera.
disticha, Herb. App. 44 = littoralis.
Dryandri, M. Roem. Syn. Ensat. 175-littoralis.
eucharidifolia, *Baker, in Gard. Chron.* (1884) I. 700. —Am. trop.
expansa, *Herb. App.* 44.—Ind. occ.
formosa, M. Roem. Syn. Ensat. 171 = speciosa.
fragrans, Salisb. in Trans. Hort. Sec. i. (1812) 840 = caribaea.
galvestonensis, *Baker, (in Herb. Kew.).*—Am. bor.
glauca, *M. Roem. Syn. Ensat.* 173.—Mexic.
guianensis, Herb. App. 44 = tubiflora.
Harrisiana, *Herb, in Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 85.—Mexic.
humilis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 801. —Florida.
insignis, Kunth, Enum. PI. v. 675 - littoralis.
lacera, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 888.—Am. bor.
latifolia,~b&. Roem. Syn. Ensat. 168=Urceolina latifolia.
littoralis, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 338.—Am. anstr.
lobata, *Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Garten:* xi. (1843) 124.—Venezuela.
Macleana, *Nichols. Diet. Gard.* ii. 165.—Peruv.
tnacrostephana, *Baker, in Gard. Chron.* (1879) I. 430.—Hab.t
maritima, M. Roem. Syn. Ensat. 176»Pancratium maritimum.
mexicana, Herb. App. 44 -lacera.
Milleri, M. Roem. Syn. Ensat. 177=lacera.
Moritziana, *Kunth, Enum. PI.* v. 668.—Venezuela.
obtusata, Griseb. ex Walp. Ann. iii. 618 = caribaea ?
Occidentalis, Kunth, Enum. PI. v. 856 - crassifolia.
ornata, M. Roem. Syn. Ensat. 166 = ovata?
ovalifolia, Herb. Amaryll. 212 = ovata.
ovata, *M. Roem. Syn. Ensat.* 169.—Ind. occ.
Palmeri, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 801. —Florida.
paludosa, Salisb. in Trans. Hort Soc i. (1812) 388-lacera.
panamensis. Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 67 = littoralis.
patens, Herb. App. 44 •= caribaea ?
pedalis, *Herb. I. c*—Bras.
peruviana, M. Roem. Syn. Ensat. 176•littoralis.
petiolata, M. Roem. 1. c. 168~ tubiflora.
quitensis, Steud. Nom. ed. II. i. 784-**seq.**
quitoensis, *Herb. App.* 44.—Ecuador,
repanda, *Otto &• Dietr. Allg. Gartenz.* xi. (1848) 123. —Mexic.
rotata, Herb. App. 44 = lacera.
Ruizii, M. Roem. Syn. Ensat. 177 = Pancratium maritimum.
senegambica, *Kunth If Bouchi, Ind. Sem.Hort. Berol.* (1848) 12.—Afr. trop.
sessilis, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 339 = caribaea.
Skinneriana, *Herb, in Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 45.—Guatemala.
Sloanei, M. Roem. Syn. Ensat. 171=caribaea.
speciosa, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* L (1812) 340.—Ind. occ.
spiraiis, Lee, ex Herb. App. 48 —ovata.
Staplesi, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 513=littoralis.
Staplesiana, M. Roem. Syn. Ensat 175—praec.
tenui/lon, *Herb. App.* **44.—**N. **Granat**

HYMENOCALLIS:—
tubiflora, *Salisb. in Trans. Hort. Soc.* i. (1812) 341.—Guian.
undulata, *Herb. App.* 44.—Venezuela.
•*rirescens,* Nichoia. Diet. Gard. ii. 165=**Macleana.**

HYMENOCALYX, Houll. in Rev. Hortic. (1869) 418 —praec.

HYMENOCALYX, Zenk. PI. Ind. 8. t. 10 (1835) = Hibiscus, Linn. (Malvac).
variabilis, Zenk. 1. c. 9.110—H. angulosus.

HYMENOCARDIA, Wall. Cat. n. 8549 (1831). *EUPHORBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 285.
SAMAKUFVXIS, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.464 (1860).
acida. *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. III. xv. (1851) 256. —Afr. trop,
Hendelotii, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 518.—Afr. trop.
lyrata, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IIL xv. (1851) 256. —Afr. trop.
plicata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) II. 239-Coccoceras plicatum.
punctata, *Wall. Cat.* n. 3549.—Burma,
ulmoides, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1131.—Afr. trop.
Wallichii, Tul. in Ann. Sc Nat. Ser. III. xv. (1851) 256-punctata.

HYMENOCARPOS, Savi, Fl. Pis. ii. 205 (1796). *LEGUMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 489.
CIRCINNUS, Medic in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 384.
circinnata, *Savi, Fl. Pis.* ii. 205.—Hispan.
nummularius, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 52, nomen; *G. Don, Gen. Syst.* ii. 173.—Reg. Mediterr.
radiatus, Link, Enum. Hoit. Berol. ii. 267 -Trigonella radiata.

HYMENOCARPUS, Reichb. Consp. 148 (1828) - praec

HYMENOCENTRON, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliv. 37 (18261-**Centaurea,** Linn. (Compos.).
dilutum, Cass. 1. c. = C. diluta.

HYMENOCEPHALUS, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. iii. 12. t 209 (1847) = Centaurea, Linn. (Compos.).
rigidus, Jaub. *Sc* Spach, 1. c—Persia.

HYMENOCHAETA, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 43 (1819) = 8cirpus, Tonrn. (Cyperac).
grossa, Nees, in Wight, Contrib. 110=S. grossus.
haematodes, Nees *Sc* Meyen, in Linnaea, ix. (1834) 293 —S. grossus.
maxima, Nees, 1. c.=S. grossus.

HYMENOCHARIS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 276-IschnoBiphon, Koem. (Scitamin.).
obliqua, Salisb. 1. c. = 1. obliqua.

HYMENOCLEA, Torr. & Gray, ex Torn in Emory, Mil. Reconnois. 142 (1848); et in Mem; Am. Acad. N. S. iv. (1849) 79. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 354.
monogyra, *Torr. (f Gray, II. cc.* 148, 79.—Am. bor. occ
Salsola, *Torr. tf Gray, II. cc.* 142,79.—Calif.

HYMETTOCTTEMIS, Hook. f. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 132 (1873). *RUBJACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. 1. c.
madagascariensis, *Hook./. I. c.* 133.—Madag.

HYMENOCRATEB, Fisch. *Sc* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 39 (1835). *LABIATAE,* Benth. *Sc* Hook, f. ii. 1201.
SESTINIA, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 40 (1844).
Aucheri, Janb. *Sc* Spach, Illustr. v. 61. t 466 = bituminosus.
bituminosus, Boiss. *Sc* Buhse, in Nouv. Mem. Soc Nat Mosc. xii. (.1860) 177 = calycinus.
bituminosus, *Fisch. tf Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ii. 39.—Persia.
calycinus, *Benth. in DC. Prod.* xii. 406.—Persia,
elegans, *Bunge, Lab. Pers.* 63.—Persia.
Haussknechtii, Boiss. *Sc* Rent, ex Boiss. Fl. Orient, iv. 677=longiflorus.

HYMENOCRATEH:
incanus, *Bunge, Lab. Pers.* 63.—Persia,
longiflorus, *Benth. in DC. Prod.* xii.. 407.—Kiirdist.
macrophyllus, *Bunge, Lab. Pers.* 62.—Persia,
pallens, *Bunge, 1. c.* 61.—Persia,
paniculatus, *Bunge, 1. c.* 62.—Persia.
secundiflorus, Jaub. *Sc* Spach, Illustr. v. 68=bituminosus.
sessilifolius, *Benth. in DC. Prod.* xii. 406.—Afghan.

HYMENODICTYON, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 148 (1824). *RVBIACEAE,* Benth. *Sc* Hook, f. ii. 35.
KURRIA, Hocbst. in Flora, xxv. (1842) 233.
biafranum, *Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* iii. 42.—Afr. trop.
excelsum, *WaU. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. **149.—**Ind. or.; Malaya.
flaccidum, *Wall. I. c.* 152.—Reg. Himal.
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. ü. 154-excelsum.
Kurria, *Hochst. in Flora,* xxvi. (1843) 71.—Afr. trap,
madagascaricum, *Baill. Hist. PI.* vii. 482.—Madag.
obovatum, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. **168-**—Ind. or.
obovatum, Wight, Ic. t 80 •= excelsum.
parvifolium, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1488.—Afr. trop.
thyrsiflorum, WaU. in Roxb. FL Ind. ed. Carey, ii. 151 = cxcelsum*
timoriense, *Klotzsch, ex Walp. Rep.* vi. 68.—Ins-Timor.
utile, Wight, Ic. t. 1159-excelsum.

HYMENODYCTION, DC. Prod. iv. 358 (1880)- praec.

HYMENOGYNE, Haw. Rev. PI. Succ 74, 192 (1821) -MeBembrianthemum, Dill. (Ficoid.).
glabra, Haw. 1. c. 192 = M. glabrum.

HYMENOLAENA, DC. Prod. iv. 244 (1830) = Fleurospermum, Hoffm. (Umbellif.).
angelicoides, DC. L c. 245 = P. angelicoides.
Benthami, DC. I. c 246=P. Benthami.
Brunonis, DC. 1. c. 245 = P. Brunonis.
Candollei, DC. 1. c. = P. Candollii.
dentata, DC. 1. c. = P. dentatum.
erosa, Steud. Nom. ed. II. i. 784 = P. dentatum.
Govaniana, DC. Prod. iv. 246 = P. Govanianum.
latifolia, Lindl. in Royle, Illustr. Bot Himal. 288-P. Candollii.
Lindleyana, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise 150 = P. stellatum.
nana, Osten-Sacken & Rupr. Sert. Tiansch. 49-r. stellatum.
obtusiuscula, DC. Prod. iv. 246 = Trachydium obtusiBS' culum.
pimpinellifolia, Osten-Sacken *Sc* Rupr. Sert. Tianscn. 50-P. Candollii.
pumila, DC. Prod. iv. 245-P. pumilum.
rotundata, DC. 1. c = P. rotundatum.
stellata, Lindl. in Royle, Illustr. Bot Himal. 233-P. stellatum.

HYMENOLEPIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 138;etinDict.Sc.Nat.xxii.315(1821)=AthanaBi»t Linn. (Compos.).
canariensis, Sch. Bip. in Webb *Sc* Berth. W-Canar. ii. 294. tt. 97, 98 = Gonospermum canariense-
Dregeana, DC. Prod. vi. 85 = A. Dregeana.
elegans, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxxiii. 61 = Gospermum canariense.
incisa, DC. Prod. vi. 85 - A. incisa.
indivisa, Drege, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii- I90" A. indivisa.
leptocephala, Cass. in Diet. Sc Nat. xxii. 315-*• parviflora, *Thunb.*
leucoclada, DC. Prod. vi. 86 = A. leucoclada.
parviflora, DC. 1. c 85 = A. parviflora, *Thunb.*
pinnata, Less. Syn. Comp. 263 = A. parviflora, *Thunopunctata,* DC. Prod. vi. 85 = A. punctata.

HYMENOLOBIUM, Benth. **ex** Mart, in Flora, (1837) II. Beibl. 122 - **Platymiscium,** (Legumin.).
luteum, **Benth.** 1. c = P . floribundum.

HYMENOLOBIUM, Bentb. in Joum. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 84. *LEGUMINOSAE,* Benth.& Hook, f. i.648.
nitidum, *Benth. I. c*—Bras.

HYMENOLOBUS, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 117 (1838) = Capsella, Moench (Crudf.).
divaricatus, Nutt. 1. c. = C. divaricata.
erectus, Nutt. 1. c. =C. divaricata.
procumbens, Nutt. 1. c. in nota=C. procumbens.
Pubens, A. Gray, PI. Wright, i. 9; if. U - C . pubens.

HYMENOLYTRUM, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I.174. t. 22 (1842) - Scleria, Berg. (Cyperac.).
cotnosum, Nees, 1. e. 175 - S . comosa.
cyperinum, Nees, 1. c. = S. cyperina.
Martii, Nees, 1. c. 176=S. Martii.
Poeppigii, Nees, 1. c 175 - S . Poeppigii.
silvestris, Schrad. ex Nees, 1. c. 176 =S. stipularis.

HYMENOMENA, Less. Syn. Comp, 133 (1882)=seq.

HYMENONEMA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 34. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 505.
asperum, DC. Prod. vii. 117 -Toumefortii.
Bergeri, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 472=Toumefortii.
Fontanesii, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxii. 317-Toumefortii.
glauca. Hook. Fl. Bor. Am. i. 300 — Microseris laciniata ?
graecum, DC. Prod. vii. 116=Touraeforti..
laciniata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 301 = Microseris laciniata.
laconicum, *Bain. V Heldr. ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 715.—Graeeia.
Toumefortii, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxii. 316.—Graeeia.

HYMEITOPAPPTJ8, UHe'rit. Diss. (1788). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc,* Hook. f. ii. 402.
ROTHIA, Lam. Joum. Hist Nat. Par. i. (1792) 16. t 1.
anthemoides, Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 426-Hymenoxys anthemoides.
artemisiaefolius, *DC. Prod.* v. 658.—Texas,
corymbosus, *Torr. V Gray, Fl. N. Am.* ii. 872.—Texas.
Douglasii, Hook. Fl. Bor. Am. i. 316 = Chaenactis Douglasii.
Engelmannianus, *Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1848) 16; *et in Ann. Sc. Nat.* Se'r. III. xi. (1846) 229.—Texas.
filifolius, *Hook. Fl. Bor. Am. i.* 817.—Am. bor. occ.
flavescens, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. jv. (1849) 97.—Am. bor. occ.
glaucus, Spreng. Syst.iii. 449=Cephalaphora aromatica, glauca.
tntegrifolius, Spreng. 1. c.=Palafoxia fastigiata.
laxiflorus, L'He'rit. ex DC. Prod. v. 658 -scabiosaeus,
luteus, Nutt. in Trans. Am. PhiL Soc. N. S. mi. U841) 374=filifolius.
matricarioides, Spreng. Syst iii. 450 = Ageratum matricarioides.
mexicanus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 28.—Mexic.
nevadensis, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. v. (1873) 46=Chaenactis nevadensis.
pedatus, Cav. ex Lag. Gen. et Sp. Nov. 28 - Florestina pedata.
robustus, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 63»flavescens.
"cabioneus, Steud. Nom.ed. JI. i. 784, sphalm.-seq.
scabiasaeus, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. l. 316 = Chaenactis Douglasii.
scabiosaeus, *VHirit. Diss.* (1788); *Cass.* >n *Diet. Sc. Mat.* lv. 266.—Am. bor.
tenuifolius, DougL ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 817-nlifolius
ifuifolius, Nutt. ex Torr. & Gray, FL N. Am. ii. 372
«*nniSl!?W, *Fl. Am. Sept.* ii. *Suppl.* 742.-Am. bor.

HYMENOPHOLIS, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot. .vii. (1848) 88 = OUgandra,Less. (Compc*.).
"nbricata, Gardn. 1. c. - O. lycopodioidei.

HYMENOPHORA, Viv. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 281=Pituranthos, Viv. (Umbellif.).
denudata, Viv. ex Coss. 1. c - P. denudatus.

HYMEITOPHYSA, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 180 (1831). *CRUCIFERAE,* Bentb. & Hook. f. i.88.
fenestrata, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Se'r. II. xvii. (1842) 197.—Persia,
macrocarpa, *Franch. 1. c.* Se'r. VI. xv. (1883) 238.—Turkestan.
pubescens, *C. A. Mey. in ledeb. Fl. Alt.* iii. 181.—Sibir.

HYMENOFOGON, Wall, in Roxb. FL Ind. ed. Carey, ii. 166 (1824). *RVBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 84.
assamicus, *Hoot./. Fl. Brit. Ind.* iii. 34.—Reg. Himal.
parasiticus, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 157.—Reg. Himal.

HTMENOPYBAMI8, Wall. Cat. n. 774 (1831). *VERBENACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1168.
brachiata, *Wall. I. c*—Burma.

HYMENOSPERMUM, Benth. in Wall. Cat. n. 3963 (1831)-Alectra, Thunb. (Scrophular.).
dentatum, Benth. 1. c - A . indica.

HYMENOSPOKITM;, R. Br. ex F. Muell. Fragm. ii. 77 (1860). *PITTOSPOREAE,* Benth. & Hook. f. i. 131.
flavum, *F. Muell. I. c*—Austral.

HYMENOSPRON, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 282 (1827) =Dioclea, H. B.& K. (Legumin.).
apurense, Spreng. L c - D . apurensis.
„„;[,, Heynh. Nom. i. 408-D. mollis.
rubrum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 288 = D. Jacquiniana.
sericeum, Spreng. 1. c. - D. sericea.

HYMENOSTEMMA, Kunze, ex Willk. in Bot. Zeit. xxii. (1864) 253 = Chrysanthemum, Tourn. (Compos.).
Fontanesii, Willk. 1. c.=C. glabrum.
paludosum, Pomil, Nouv. Mat. Fl. Atl. 292 - C. paludosum.
paludosum, Willk. in Bot. Zeit xxii. (1864) 258 - C. glabrum.
Pseudanthemis, Kunze, ex Willk. 1. c.=C.*paludosum.

HYMENOSTEPHItTM, Benth. in Benth. *Sc* Hook, f. Gen. ii. 382 (1873). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
angustifolium, *Benth. in Hook. Ic. PI.* sub 1.1154.—N. Granat.
mexicanum, *Benth. I. c.*—Mexic.

HYMENOSTIGMA, Hochst in Flora, xxvii. (1844) 24 =Moraea, Linn. (Irid.).
Sckimperi, Hochst. 1. c. - M. diversifolia.
tridentatum, Hochst. 1. c. 25 = M. diversifolia.

HYMENOTHECA, F. Muell. Fragm. i. 201 (1868-69) -Codonocarpus.A. Cunn. (Phytolac).
pyramidalis, F. Muell. 1. c =C. pyramidalis.

HYMENOTHECA, Salisb. in Trans. Hort.Soe. i. (1812) 268 - Ottella, Pers. (Hydrochar.).
latifolia, Salisb. 1. c = O. alismoides.

HYMENOTHECIUM, Ug. Gen. et Sp. Nov. 4 (1816) = Aegopogon, Willd. (Gramin.).
quinquesetum, Lag. Lc.=A. cenchroidei.
tenellum, Lag. 1. c. ^ A. geminiflorus.
trisetum. Lag. 1. c.-A. cenchroides.
unisetum, Lag. L c A. geminiflorus.

HYMENOTHEIX, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S, iv. (1849) (PL Fendl.) 102. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 408.
Wislizenii, *A. Gray, 1. c*—N. Mexic.
Wrightii, *A. Gray, PI. Wright,* ii. 97.-N. Mexic.

HYMENOXIS, Endl. Ench. 240 (1841) >teq.

HYMENOXYS, Cass. in Diet. Sc Nat. lv. 278 (1828). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 416.
anthemoides, *Cass. I. c.*—Reg. Argent.
californica, Hook. Bot Mag. t. 8828 - Baeria coronaria.
calva, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 381-Baeria snthemoides.
chrysanthemoides, DC. Prod. v. 661 = Helenium integrifolium.
Haenkeana, *DC. Prod.* v. 661.—Peruv.
linearifolia, Hook. Ic. PI. t. 146«Actinella linearifolia.
mutica, Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. ii. 381 - Baeria mutica.
odorata, DC. in Deless. Ic. Sel. iv. t. 42-Actinella odorata.
Tweediei, *Hook, (f Am. in Hook. Joum. Bot.* iii. (1841) 323.—Reg. Argent.

HYOBANCHB, Linn. Mant. ii. 155 (1771). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 968.
HAEMATOBANCHE, Presl, Epim. Bot. 249 (1850).
atropurpurea, *Bolus, in Hook. Ic. PI.* t 1486.—Afr. austr.
coccinea, Steud. Nom. ed. I. 418=sanguinea.
sanguinaa. *Linn. Mant.* ii. 253.—Afr. austr.

HYOCYAMUS, G. Don, Gen. Syst. iv. 471 (1837), sphalm.=Hyo8oyamua, Tourn. (Solanac).

HYOGETON, Steud. Nom. ed. II. i. 785 (1840), sphalm.-ILYOGETON, Endl.-Vandellia, Linn. (Scroph.).
alsinoides, Steud. 1. c - V . alsinoides.
scapiger, Steud. 1. c.-V. scapigera.
subulatus, Steud. 1. c. = V. subulata.

HYOPHOKBE, Gaertn. Fruct. ii. 186. t. 120 (1791). *SOLANAPALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 912.
SUBUMIA, Comm. ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 164(1886?).
amaricaulU, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 809.—Ins. Maurit.
Commersoniana, Mart. 1. c. 164. t. 143. f. 1; 1.164-Chrysalidocarpus lutescens.
indica, *Gaertn. Fruct.* ii. 186.1.120.—Ins. Mascar.
VerscharTelti, *H. Wendl. in Lem. Illustr. Hortic.* xiii. (1866) I. t. 462.—Ins. Mascar.

HYOSCARPUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 444 (1367)-Hyoscyainus, Tourn. (Solanac.).
niger, Dulac, 1. c. — Hyoscyamus niger.

HYOSCHYAMUS, Zumag. FL Pedem. i. 280 (1849)-seq.

HYOSCIAMUS, Neck. Delic. GalloBelg. L 122 (1768) -»eq.

HYOSCYAMUS, [Toum.] Unn. Syst. ed. I (1785). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 903.
HYOSCARPUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 444 (1867).
agrestis, Kit. in Schult Oestr. Fl. ed. II. i. 888-niger.
albus, *Linn. Sp. PI.* 180.—Europ.; Oriens.
angulatus, Griff. Notul. iv. 96; Ic. PI. As. t 412 = muticus.
arenarius, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 650.—Ins. Azor.
aureus, All. FL Pedem. i. 104-albus.
aureus, *Linn. Sp* PI.* 180.—As. Min.; Mesopot.; Syria.
auriculatus, Tenore, Fl. Nap. iii. 222 *= niger.
betaefolius, Lam. Encyc. iii. 329-muticus.
bipinnatisectus, Boiss. Diagn. Ser. L vii. 36 - Senecionis.
bohemicus, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 31-niger.
Cornerarii, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 88-reticulatus.
canariensis, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 180=albus.
ceratophyHus, *Fisch. ex Steud. Nom.* ed. I. 418.—Hab.t
chloranthus, Wender. ex Steud. 1. c. ed. II. i. 785-Scopolina Hladnikiana?
Clusii, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. II. 882-albus.
Datora, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 45 = mutica.
eminens, *Kunze Del. Sem. Hort. Lips.* (1847).—*Cf. Linnata,* xxiv. (1851) 176.—Rossia.

HYOSCYAMUS :-

Falezlez, *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) 186. t. 5.—Afr. bor.
gnndiflorus, *Franch. in Rivoil. Somali,* 48.—Afr. trop.
insanus. Stocks, in Hook. Kew Jonrn. iv. (1852) 178—muticus.
lethalis, Salisb. Prod. 181=niger.
luridus, Salisb. 1. c.—albus.
major, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 - albus.
micranthus, Ledeb. ex G. Don, Gen. Syst. iv. 472 = pusillns.
minor, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4=albus.
muticus, *Linn. Mant.* i. 45.—Aegypt.; As. occ.
niger, *Linn. Sp. PI.* 179.—Europ.j As. occ; Reg. Himal.
officinarum, Crantz, Inst. ii. 325=niger.
orientate, Bieb. Fl. Tanr-Cauc. i. 164 = Physochlaina orientalis.
pallidus, Waldst. & Kit. ex Willd. Enum. Hort. Berol. i. 228=niger.
persicus, Boiss. & Bnhse, in Nonv. M&n. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 158=niger.
pbysaloides, *Linn. Sp. PI.* 180.—Sibir.
pictus, Roth, Nov. PI. Sp. 119=niger.
pinnatifidus, Schlecht. in Linnaea, xvii. (1843) 127 = reticulatus.
praealtus, Walp. Rep. iii. 21 = Physochlaina praealta.
Pseudophysaloides, *Roth, Nov. PI. Sp.* 119.—Sibir.
pungens, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 52=pusillus.
purpureus, Griseb. 1. c. in nota=reticnlatus.
pusillus, *Linn. Sp. PI.* 180.—Aegypt.; As. bor. et occ.
reticulatus, *Linn. I. c.* ed. II. 257.—As. Min.; Aegypt.
Scopolia, Linn. Mant. i. 46=Scopola camiolica.
Senecionis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* i. 228.—Oriens.
squarrosus, Griff. Notul. iv. 95; Ic. PI. Asiat. t. 413 = reticulatus.
syspirensis, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 736 = niger.
variant, Vis. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 7 = albus.
veniensis, Lej. Fl. Spa, i. 116= niger.
mtlgaris, Neck. Delia Gallo-Belg. i. 122=niger.

HYOSEBIS, Linn. Gen. ed. I. 239 (1737) partim.
COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 507.
ACHYRASTRUM, Neck. Elem. i. 57 (1790).
APOSERIS, Neck. 1. c. (1790).
THLIFSOCARPUS, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 695.
TRINCIATELLA, Adans. Kam. ii. 112 (1763).
aculeata, Pens. Syn. ii. 869=I-eontodon hastilii.
adspersa, Moench, Meth. 541=scabra.
amplexicaulis, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 87 = Krigia amplexicanlis.
angustifolia, Michx. 1. c = Krigia Dandelion.
arenaria, Schousb. Vextr. Marokko, 197=Rhagadiolus arenarius.
aspera, Desf. Tabl. ed. I. 89 = scabra.
taetica, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 474-radiata.
bifiora, Walt. Fl. Carol. 194 = Krigia amplexicaulis.
blechnoides, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 271.—Alger.
calyculata, Jan, ex Guss. Fl. Sic Syn. ii. I. 417 = radiata.
calyculata, Poir. Voy. Barb. iL 229=lucida.
canadensis, Fisch. ex Stend. Nom. ed. I. 418 (Quid ?).—Am. bor.
capensis, Less. Syn. Comp. 180-Hypochoeris glabra.
caroliniana, Walt. Fl. Carol. 194=Krigia virginica.
cickorioides, Steud. Nom. ed. 1.418—Leontodon hirtns.
crepoides, Presl. Fl. Sic. p. xxxi = Rhagadiolus pendulus ?
cretica, Linn. Sp. PI. 810-Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
txifua, Salisb. Prod. 182 = Amoseris pusilla.
foetida, *Linn. Sp. PI.* 808,-Enrop.
glauca, Zeyh. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat Cur. xx. I. (1845) 161 = Hypocnoeris Achyrophorus.
grumosa, Poir. Encyc. Snppl. iii. 82 = Leontodon tuberosns.
Hedypnois, Linn/Sp. PI. 809 - Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
hirta, Balb. ex Willd. Sp. PI. iii. 1614-Crepis bursifolia.
hirta, Gaertn. Fruct. ii. 875=Leontodon hirtus.
hispida, Schousb. Vextr. Marokko, 197=-Leontodon maroccanus.

HYOSEEIS :—

incrassata, Moench, Meth. Snppl. 218=Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
integrifolia. *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 80.—Am. bor.
lucida, Auct. Europ. ex Nym. Consp. 474—radiata.
lucida, *Linn. Want.* i. 103.—Aegypt.
major, Walt. Fl. Carol. 194 = Krigia Dandelion.
maroccana, Pers. Syn. ii. 368, in syn. = Leontodon maroccanus.
mauritanica, Pen. 1. c. 369 - Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
microcephala, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxii. 338=scabra.
minima, Linn. Sp. PI. 809 = Amoseris pusilla.
minor, J. F. Gmel. Syst. 1182-Krigia amplexicaulis.
monspeliensis, Pers. Syn. ii. 869 = Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
montana, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 87-Krigia montana.
muricata, *Spreng. in Schrad. Journ.* (1800) II. 198.—Hab. ?
nana, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 82.—Ins. Majorca.
parviflora, Pers. Syn. ii. 869=scabra.
pendula, Balb. in Pers. Syn. ii. 369-Rhagadiolus pendulus.
prenanthoides, Willd. Sp. PI. iii. 1615=Krigia amplexicaulis.
pusilla, Regel, in Linnaea, xvi. (1842) 51, in syn.= Hypochoeris glabra.
pygmaea. Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 180=Leontodon nudicaulis.
radiata, Gaertn. ex Steud. Nom. ed. I. 419 »scabra.
radiata, *Linn. Sp. PI.* 808.—Reg. Mediterr.
radiata, Luce", Fl. Osil. 264 = Leontodon hastilis.
ramosissima, Barton, Prod. Fl. Philad. 75=Krigia virginica.
rhagadioloides, Linn. Sp. PI. 809 = Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
scabra, *Linn. 1. c.*—Reg. Mediterr.
scabra, Moench, Meth. 541 = Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
scabra, Pourr. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 209 = radiata.
setulosa, Guss. ex DC. Prod. vii. 80=lucida.
simplex, Merat, Fl. Par. 810=Hypochoeris glabra.
Sprengelii, Steud. Nom. ed. I. 419=Amoseris pusilla.
taraxacoides, Lam. Encyc. iii. 159 = Leontodon hirtns.
taraxacoides, Vill. Prosp. 33; Hist. PI. Dauph. iii. 166 =Leontodon hispidus.
tenella, Poepp. ex Sch. Bip. in Linnaea, x. (1835) 255 *(-Fichtea Poeppigii).—CtA\i.*
tenella, Thunb. Prod. PI. Cap. 139 = Hypochoeris glabra.
tubaeformis, Tenore, Fl. Nap. ii. 173. t. 73 = Rhagadiolus Hedypnois, *All.*
tuberosa, Sayi, Fl. Pis. ii. 231 = Leontodon tnberosus.
virginica, Linn. Sp. Fl. 809=Krigia virginica.

HYOSICAMUS, Hill, Veg. Syst. vii. 51 (1765) spalm. - Hyoscyamus, Tonrn. (Solanac).

HYOSPATHE, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 1.1. 1, 2 (1823). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 898.
antioqnensis, *Hort. Linden, ex H. Wendl. in Kerch. Palm.* 247, nomen.—N. Granat.
chiriquensis, *Hort. Linden, ex H. Wendl. I. c*—Costa Rica.
elegans, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 1.1.1, 2.—Bras,
filiformis. *H. Wendl. ex Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 528.—Bras.
gracilis, H. Wendl. ex Drude, 1. c.-filiformis.
montana, Mart. Palmet. Orb. t. 6. f. 1 = Chamaedorea conocarpa.
pubigera, Griseb. & H. Wendl. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 516-Prestoëa pubigera.

HYPAELYPTUM, Vahl, Enum. ii. 288 (1806)=seq.

HYPAELYTRUM, Poir. in Diet. Sc. Nat. xxii. 840 (1821)-Hypolytrum, Rich. (Cyperac).

HYPANTHERA, Silva Manso, Cathart. Bras. 87 (1886) =Fevilleo, Linn. (Cucurb.).
Guapeva, Silva Manso, 1. c. 38 = F. trilobata.

HYPAPHORUS, Hassk. Hort. Bogor. Desc. 197 (1858) =Erythrina, Linn. (Legnmin.).
subumbrans, Hassk. 1. c 198 = E. lithosperma.

HYPARETE, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48 (1836) = Hermbstaedtia, Reichb. (Amarant.).
glauca, Rafin. L c. 44=Hennbstaedtia glauca.

HYPARGYRIUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 371-FotentiUa, Linn. (Rosac).
argentatum, argenteum, canum, confine, dicipiens, decumbens, demissum, Fourr. 1. c. = P. argentea.
hirtum, Fourr. 1. c. 372=P. hirta.
recline, Fourr. 1. c. 871—Gallia. „
rectum, Fourr. 1. c. 872 = P. recta.
suberectum, Fourr. 1. c. 371=P. inclinata.
tenuilobum, Fourr. 1. a - P. argentea.

HYPARRHENIA, Anderss. in Nov. Act. Soc. Sc Upsal. Ser. III. ii. (1855) 254 = Andropogon, Linn. (Gramin.).
anthistirioides, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 800-A. anthistirioides.
coleotricha, Anderss. 1. c. - A. coleotrichus.
comosa, Anderss. 1. c.=A. coleotrichus.
confinis, Anderss. 1. c.=A. confinis.
dissolutaj Anderss. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. III. ii. (1855) 254=Trachypogon polymorphus.
finitima, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 800 =A. finitimus.
foliosa, Anderss. iu Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. III. ii. (1855) 254-A. bracteatus.
fulmcoma, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 300 = A. rufus.
Genniamia, Anderss. 1. c.—Afr. trop.
glabriuscula, Anderss. 1. c.=A. glabriusculus.
monathera, Anderss. 1. c = A. mortatherus.
multiplex, Anderss. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. III. ii. (1855) 254.—Abyss.
papillipes, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 800 = A. papillipes.
podotricha, Anderss. 1. c. = Heteropogon hirtus.
Pseudo-Cymbaria, Anderss. in Nov. Act. Soc St. Upsal. Ser. III. ii. (1855) 254=A. cymbarius.
quinqueplex, Anderss. 1. c.=A. cymbarius.
reflexa, Anderss. 1. c.-A. bracteatus.
Ruprechti, Foum. ex HemsL Biol. Centr. Am. Bot. ii-529 = A. Ruprechtii.
Schimperi, Anderss. in Schweinf. Beitr. FL Aethiop. 300=A. Schimperi.
Tamba, Anderss. 1. c.=A. lepidus.
umbrosa, Anderss. 1. c = A. lepidus.

HYPECHUSA, Alef. in Bot. Zeit. xviii. (1860) 165-Vicia, Touro. (Legumin.).
hircania, Alef. 1. c. 166 -=V. hyrcanica.
hybrida, Alef. 1. c.=V. hybrida.
lutea, Alef. 1. c.=V. lutea.
pannonica, Alef. 1. c.=V. pannonica.
purpurascens, Alef. 1. c. = V. pannonica.
seriocarpa, Alef. 1. c. = V. seriocarpa.
tricolor, Alef. 1. c = V. Melanops.

HYPECOON, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735) =seq.

HYPECOUM, Tonm. ex Linn. Gen. ed. I. 82 (1737)-*PAPA VESACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 54.
CHIAZOSFERHUM, Bemh. in Linnaea, viii. (18SS) 465.
MNEMOSILLA, Forst. Fl. Aegypt. Arab. 122 (1776).
aeqnilobum, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 7. t. 3. f. 8.—Cyrenaic
arcuatum, Moench, Meth. 217 =procumbens.
armatum, Steud. Nom. ed. II. i. 786, sphalm. -praec.
caucasicum, Koch, ex Ledeb. Fl. Ross, i- 94 " pendulum.
chinense, *Franch. PI. Davidian.* i. 27.—China.
dimidiatum, Delile, in Laborde, Voy. Arab. Pitr. 84 - procumbens.
Duriaei, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 246.—Alger.
erectum, *Linn. Sp. PI.* 124.—Sibir.
Geslini, Coss. & Krai, in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 522, nomen = procumbens.
glaucescens; Guss. PI. Rar. 79.1.15-procumbens.
gracile, Benth. Cat. PI. Pyr. 91=procumbens.
grandiflorum, *Benth. I. c*—Reg. Mediterr. et Caucas.
imberbe, *Sibth.VSm. Fl. Grate. Prod.* i. 107.—R* Mediterr. or.
leptocarpum, *Hook.f. V Thorns. Fl. Ind.* i. 276.—R'8' Himal.
littorale, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 205-procumbens.
nodosum. Lam. Fl. Fr. ii. 670-procumbens.
parviflorum, *C.* b* *W. Barb. Herbor. au Levant,* 1ID-t. 2.—Syria,
parviflorum, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* *>• (1842) 141.—Songaria.
patens, Willd. Enum. Hort. Berol. t. 5- imberbe.

HYPECOTTM:—
pendulum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 76 = grandiflorum.
pendulnm, *Linn. Sp. PI.* 124.—Europ.; Oriens.
procumbent, S. G. Gmel. It. ii. 197 = pendulum, procumbens. *Linn. Sp. PI.* 124.—Reg. Medit.; Arab.
tetragonum, Bertol. Misc. Bot. i. 12 = procumbens.
trilobum, *Trautv. in Act. Hort.Petrop.* ix. (1884) 366.—Turcomania.

HYPELATE, P. Br. Hist. Jamaic 280 (1766). *SAP1NDACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 408.
EXOTHEA, Macfad. Fl. Jamaic. i. 232 (1837).
cochinchinensis, DC. Prod. ii. 480, in syn. sphalm. (= *Hyperanthera cochinchinensis}.*—Cochinch.
dent at a, Cambess. in M£m. Mas. Par. xviii. (1829) S2 =Melicocca dentata.
diversifolia, Cambess. 1. c. - Doratoxylon diversifolium.
geniculata, G. Don, Gen. Syst. i. 672 = Melicocca geniculata.
obtongifolia, Hook. Lond. Journ. Bot iii. (1844) 7 - paniculata.
paniculata, *Cambess. I. c*—Ind. occ.
trifoliate, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 188 = paniculata.
trifoliata, *Sm. Prod. Veg. Ind. Occ.* 61.—Ind. occ.

HYPELYTHRUM, D. Dietr. Syn. PI. i 13.0 (lS89) = seq.

HYPELYTRUM, Poir. in Diet ScNat xxxii. 340 (1821) -Hypolytrum, Rich. (Cyperac).

HYPENANTHE, Blnme, Mus. Bot Lngd. Bat i. 21 (1849) =MediniUa, Gaodich. (Melastom.).
venosum, Blnme, 1. c - M. venosa.

HYPENIA, Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 186 (1883) = Hyptis, Jacq. (LabiaO.
ocymoides, Mart, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 137 = Hyptis communis.
SaUmanni, Mart, ex J. A. Schmidt, L c- Hyptis Salzmanni.

HYPERACANTHUS, E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum. 193 (1843) = Gardenia, Ellis (Rubiac).
floridus, E. Mey. 1. c. = G. Nenberia.

HYPERANTHERA, Forsk. Ft Aegypt. Arab. 67 (1775) =Moringa, Jusi.
aptera, Steud. Nom. ed. II. i. 786 = M. aptera.
arborea, J. F. Gmel. Syst. 408 = M. pterygosperma.
cochinchinensis, Willd. Sp. PI. ii. 637 (Caesalpiniae sp. ?).—Cochinch.
decandra, Willd. 1. c. 635=M. pterygosperma.
dioica, Vahl, Symb. Bot i. 81 = Gymnodadns canadensis.
nonodynama, Vitm. Snmma PI. ii. 848 = Moringa aptera.
Moringa, Vahl, Symb. Bot i. 80 -=M. pterygosperma.
Piregrina, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cvii = M. aptera.
stmidecandra, Vahl, Symb. Bot i. 80-M. aptera.

HYPERA.NTHUS, Harv. *8c* Sond. Fl. Cap. iii. 6, in sp. (1864)=HYPERACANTHUS, E. Mey.

HYPERBAENA, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist Ser. H. Tii. (1851) 44=Paehygone, Miers (Menisp.).
tanisteriaefolia, Miers, 1. c. Sei. III. xix. (1867) 95 - P. oblongifolia.
columbica, Miers, 1. c. = P. columbica.
creiriflora, Miers, 1. c—Cuba.
cuneifolia, Miers, 1. c—Cuba.
domíngensis, Benth. in Joura. Linn. Sop. v. Suppl. u. (1861) 50 = P. domingensis.
graciliftora, Miers, in Ann. & Mag. Nat, Hist. Ser. III. xix. (1867) 94 - P. domingensis.
Hostmanni,, Mien, 1. c. Ser. EL vu. (1851) 44 - *• domingensisa
longiuscuU, Miers, 1. c. Ser. III. xix. (1867) 95.- Cuba·
***xicana,* Miers, 1. c. Ser. II. vii. (1851) *ii* - P- oroingensis.
Moricandi, Miers, 1. c = P. domingensis.
Wnoralis, Miers, 1. c. = P. domingensis.
fHoil, Miii\. c Ser. III. xix. (1867) 95.-Ind. occ
reUculata, Benth. in Joum. Linn. Sot v. SuppL "• (1861) 50 = P. domingensis.

HYPERBAENA:—
retinervis, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat Hist. Ser. III. xix. (1867) 95.—Ind. occ.
rotundiuscula, Miers, 1. c.—Cuba.
Tmeediei, Miers, I. c. Ser. II. vii. (1851) 44 = Pachygone domingensis.
valida, Miers, 1. c. Ser. III. xix. (1867) 95 - P. domingensis.

HYPERICINEA, Wall. Cat. n. 4827, etc. (1831) ; Steud. Nom. ed. II. i. 786 (1840).
angustata, Wall. Cat. n. 4830 - Buchanania florida.
dentata. Wall. 1. c. n. 4832 = Ixonanthes icosandra.
lucida, Wall. 1. c. n. 4827=Buchanania acuminata.
macrocarpa, Wall. 1. c. n. 4833 = Ixonanthes reticulata.
micrantha, Wall. 1. c. n. 4829 - Tristania burmannica.
pedunculosa, Wall. 1. en. 4826 - Ixonanthes khasiana.
pimentifolia, Wall. 1. c. n. 4828 = Tristania Wightiana.

HYPERICOIDES, Plum, ex Adans. Fam. ii. 443 (1768) =AsoyTum, Toum. (Hyperac).
Crux-Andreae, Poir. TabL Encyc iii. 201 = A. Crux-Andreae.
perforata, Poir. 1. c = A. Hypericoides ?

HYPERICON, J. F. Gmel. Syst. 1156 (1791)=Hypericum, Toum.

HYPERICOPHYLLUM, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 498. t. 50 (1862) = Jaumea, Pers. (Compos.).
compositarum, Steetz, 1. c. 499 -»J. compositarum.

HYPERICOPS1S, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 25 (1845) = Frankenia, Linn.
persica, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 26 = F. persica.

HYPERICOPSIS, Opir, Seznam, 53 (1862) - Hyperi-own, Tourn.
elegans, Opiz,l. c - H. elegans.
hirsuta, Opiz, 1. c = H. hirsutum.
Montana, Opiz, 1. c—H. montanom.
pulchra, Optt, in Lotos, ii. (1852) 230 - H. pulchrum.

HYPEB.ICUM, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 231 (1737). *HYPER1CINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 165.
ADENOSEPALUM, Fourr. in Ana Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 352.
ADENOTRIAS, Jaub. & Spach, Illustr. i. 76 (1842).
ANCISTROLOBUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Se'r. II. v. (1836) 362.
ANDROSAEMUM, Toum. ex Adans. Fam. ii. 444 (1763).
ASCYREIA, Choisy, Prod. Hyp. 38 (1821).
BRATHYDIUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. IL v. (1836) 365.
BRATHYS, Mutis, ex Linn. f. Suppl. 43 (1781).
CAMFYLOPUS, Spach, in Ann. Sc Nat. Se'r. II. v. (1836) 360.
CAMPYLOSPORUS, Spach, 1. c. 363 (1836).
DROSANTHE, Spacb, 1. c 365 (1836).
DROSOCARPIUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 853.
ELODEA, JUSS. Gen. 256, in obs. (1789); Vent. Tabl. iii. 144 (1799).
ELODES, Adans. Fam. ii. 444 (1763); Spach, in Ann. Sc Nat. Sér. II. v. (1836) 353.
EPISIPHIS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 78 (1836).
EREMANTHE, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 421 (1836); et in Ann. Sc. Nat. Sir. II. v. (1836) 363.
EREMOSPORUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Se'r. II. v. (1836) 855.
HOLOSEPALUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 852.
HYPERICOPSIS, Opiz, Seznam, 58 (1852).
ISOPHYLLUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 367.
KNIFA, Adans. Fam. ii. 444 (1763).
KOMANA, Adans. L c. (1768).
MARTIA, Spreng. Anlcit ii. II. 788 (1818).
MYRIANDRA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. v. (1836) 364.
NORYSCA, Spach, 1. c 863 (1836).
OLYMPIA, Spach, 1. c. 359 (1886).
PANCALDM, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).
PERFORARIA, Choisy, Prod. Hyp. 44 (1821).
PETALANISIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1836).
PLEURENODON, Rafin. 1. c. (1836).

HYPEBICUM:—
PSOROPHYTUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Ser. II. v. (1836) 360.
RECKVEURA, Veil. Fl. Flum. v. t 119,120 (1827).
ROSCYNA, Spach, in Ann. Sc Nat. Se'r. II. v. (1886) 366.
SAROTHRA, Linn. Diss. Chen. 14 (1751); Amoen. Acad. iii. 11 (1787).
STREPTALON, Rafin. Fl. Tellur. iii. 80 (1836).
THYMOPSIS, Jaub. & Spach, Illustr. *i.* 72 (1843).
TRIADENIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 864.
TRIADENUM, Rafin. in Med. Repot. N. York, v. (1808) 352.
TRIDIA, Korth. in Hoev. *8c* De Vriese, Tijdschr. iii. (1836) 17. t 1.
TRIPENTAS, Casp. in Monatsb. Berl. Acad. 1867 ,(1858) 43 j et in Pringsh. Jahrb. i. (1868) 497, in obs.
WEBBIA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 366.
acerosum, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 187. t. 457 olaricifolium.
acicnlare, *H. B. V K. I. c.* 190.—Pernv.
acuminatum, Lam. Encyc. i. 160 = Vismia acuminata.
acutifolium, Ell. Sketch, ii. 26 » angulosum.
acutum, Moench, Meth. 128=tetrapterum.
acutum, Wall. Cat. n. 4807=cordifolium.
adenocarpum, Montbr. ex Spach, Hist Veg. Phan. V. 395 = Montbretii.
adenocladum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 802.—Europ.; As. Min.
adenophorum, Wall. Cat. n. 4812 =elodeoides.
adenophyllum, Ledeb. Fl. Ross. i. 445=olympicnm.
adenotrichum, *Spach,Hist. V4g.Phan.yAdb.*—As.Min.
adpressum, *Barton, Comp. Fl. Philad.* ii. 15.—Am. bor.
aegiptium, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 616-Cratoxylon foimosanum.
aegypticum, *Linn. Sp. PI.* 784.—Aegypt.
aethiopicum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 138.—Afr. austr.
affine, Steud. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 156 = Quar. tiniannm.
afrum, *Lam. Encyc.* iv. 166.—Reg. Mediterr.
A/Mtlii, Purdie, ex Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxxvi. (1868) I. 579 = Psorospermum febriragum?
alatum, *Ret*. Pugill.* 18.—Am. bor.
albens, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 136.—Ins. Teneriffe.
alpestre, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 461 = repens.
alpigenum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 550 - Richeri
o/i»tn»m,'Waldst. & Kit PI. Rar. Hung. iii. 294-Richer!.
alternifolium, Labill. Ic. PI. Syr. Dec. ii. 17 - Reaumuria Billardieri.
alternifolium, Vahl, Symb. Bot. ii. 85. t. 42 - Archytaea Vahlii.
amanum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 804.—Syria.
amarisdnum, Steud. Nom. ed. II. i. 786, sphalm. = *tamariscinum.*
ambiguum. Ell. Sketch, ii. 30=galioides.
ambiguum, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 549 = quadrangulum.
amblysepalum, Hochst. in Lorent, Wnndernngen, 841 = retusum.
amoenum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 375-aureum.
amplexicaule, Gilib. Fl. Lituan. ii. 204—pulchrum.
amplexicaule, Lam. Encyc. iv. 147 = pyramidatum.
anagallidifolium, Boiss. Fl. Orient, i. 806-tetrapterum.
anagallidifolium, Presl, Delic Prag. 22 - elegans.
anagallidioides, Jaub. *8c* Spach, Illustr. i. 47=tetrapterum.
anagalloides, *Cham. V Schlecht.in Linnaea,* iii. (1828) 127.—Am. bor. occ,
androsaemifolium, Vill. Prosp. 44-Richeri.
androsaemoides, Vill. Hist. PI. Danph. t. 44 = praec.
androsaemoides, *Wender. Ind. Hart. Marb.* (1856) 3.—*Cf. Linnaea,* xxix. (1857-68) 727.—Hab.t Androsaemum, *Linn. Sp. PI.* 784.—Europ.; As. Min.
anglicum, Bertol. Fl. Ital. viii. 810 - H. Androsaemum
angulosum, *Michx. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1454.—Am. bor.
angustatum, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 787 = Buchanania florida.
angustifolium, Lam. Encyc. iv. 145 *= lanceolatum.
angustifolium, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1833) 35-pcrforatum.

HYPEHICTJM:—
amralatum, *Moris, Stirp. Sard. Elenck.* 9.—Ins. Sardin.
Apollinis, *Boiss. & Heldr. Diagn.* II. i. 106.—Graecia.
appressum, Stead, Norn. ed. II. i. 786 — adpressum.
apricnm, *Kar.* b[1] *Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* IT. (1842) 176.—Songaria.
arborescens, Vahl, Symb. Bot. ii. 86. t. 43 = Cratoxylon Blancoi.
arboreum, J. F. Gmel. Syst. 1156-Vismia laurifolia.
arenarioides, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 238.—Cuba,
armenum, *jaub.* b* *Spach, Illustr.* i. 66. t. S3.—Armenia.
articulatum. Lam. Encyc. iv. 169 = Eliaea articnlata.
ascyroides, Willd. Sp. Fl. iii. 1443 = pyramidatum.
Ascyron, *Linn. Sp. PI.* 783.—Sibir.; Japon.
Ascyron, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 7 = calyrinum.
Ascyron, Siebold, ex Blnme, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 21 = japonicum.
aspalathoides, Willd. Sp. PI. Iii. 1451 = fasciculatum.
asperuloides, *Caern. &* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 385.—Persia
asperulum, *Jaub. &* Spach, Illustr.* i. 60.—Persia.
asperum, Ledeb. Ic. PI. t. 17 = scabrnin.
asperum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 366—montanum.
assyriacnm, *Boiss. Diagn.* Ser. *i.* nil. 116.—Mesopot.
athonm, *Boiss.* b" *Orph. in Boiss. Fl. Orient,* i. 794.—Macedon.
atlanticum, Coss. in BulL Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 56 — coadnnatum.
atomarium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 114.—Graecia; As. Min.
attennatum, *Choisy, Prod. Hyp.* 47. t. 6.—Sibir.; Dahur.
attenuatnm, *Link, Enum. Hart. Berol.* ii. 276.—Hab.7
Aucheri. *Jaub. (? Spach, Illustr. 1.*161. .i. 61. t. 81.—Phrygia.
aureum, *Bartram, Trav.* 883; *ex Torr.* b" *Gray, Fl. N. Am.* i. 76.—Am. bor.
aureum. Lour. Fl. Cochinch. ii. 472 = chinense.
anstrale, *Tenure, Fl. Nap. Prod. App.* v. 25.—Reg. Mediterr.
avicnlariaefolium, *Jaub.* to" *Spach, Illustr.* i. 69. t. 30.—As. Min.
axillare, Lam. Encyc. iv. 160 = galioides.
axillare, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 81 = paludosum.
baedferum, Lam. Fl. Fr. iii. 151 — H. Androsaemum.
bacciferum, Linn. Mant. ii. 277 = Vismia baccifera.
baedferum, Moc, & Sesse, ex DC. Prod. i. 642 = Vismia guianensis.
baeticum, vide boetienm.
balearicum. *Linn. Sp. PI.* 783.—Ins. Majorca.
barbatum, All. Fl. Pedem. ii. 46 = Richeri.
barbatum, *Jacq. PI. Austr.* iii. 83.—Oriens.
barbatum, *Linn. Amven. Acad.* viii. 323.—Europ. or.
Bartramianum, Pursh, FL Am. Sept. ii. 374 = seq.
Bartramium, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 10 = Kalmianum
Baumgurtenianum, Schur, Enum. PI. Transs. 133 = pnlchmm.
biflorum, Choisy, Prod. Hyp. 38 = Tridesmis.
biftorum. Lam. Encyc. iv. 170 = Cratoxylon polyanthum.
bithynicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 112.—Bithynia.
blentinense, Bertol. Fl. Ital. viii. B40 = mutilum.
blontinense, Walp. Rep. i. 384, sphalm. — praec.
Bocconi, Tenore, ex Nym. Consp. 132 = perfoliatnm.
boeticum, Boiss. Voy. Bot. Espagne, i. 114. t. 34 = undulatnm.
Bonaparteae, Barton, Fl. N. Am. iii. !)5-»adpressnm.
bonariense, *Griseb. in Goett: Abh.* xxiv. (1879) 41.—Reg. Argent.
Bourgaei, Boiss. FL Orient, i. 796 — scabrnm.
Bourgaei, Boiss. 1. c 811 = leprosum.
brachyphyllum. Stead. Nom. ed. II. i. 787 = fasieulatnm.
bracteatum, Bnch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 217; Wall. Cat. *a-* 4804-*cordifolinm.
bracteatum, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1878) 67 = concinnum.
brasiliense, *Choisy, in DC. Prod.* L 647.—Bras.
Brathydium, Stend. Nom. ed. II. i. 786 = canadense.
Brathys, *Sm. Ic. Ined. Fasc.* ii. 41; *Lam. Encyc.* iv. 162.—N. Granat.
breviflorom, *Wall. Cat.* n. 4876.—Reg. Himal.

HYFERICTTM :—
brevistylum, *Choisy, Prod. Hyp.* 51. t. 71.—Am. bor.
Bnckleii, *M. A Curt, in Am. Journ. Sc.* xliv. (1843) 80.—Am. bor.
Buckleyi, S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot. 125 = praec.
bnplenroides, *Griseb. in Wiegm. Archiv,* xviii. (1852) 299, in obs.—As. Min.
Burseri, DC. ex Choisy, in DC. Prod. i. 652, in syn.= fimbriatum.
Burseri, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 897 = Ricberi.
caespitosnm, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 126.—Chili.
cajennense, Steud. Nom. ed. I. 420=*cay'ennense.*
calabricum, Spreng. Neue Entdeck. iii. 300 = barbatnm.
eallianthum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 800.—Persia.
callithyrsum, Coss. Notes Crit. 152 = hyssopifolinm.
calycatum, Jacqnem. ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 256 = japonicum.
calydnum, *Linn. Mant.* i. 106.—Bithyn.; Reg. Caucas.
Cambessedesii, *Coss. ex Marls V Vigin. Cat. PI. Baliar,* 380. t. 3.—Ins. Balear.
campanulatum, Walt. FL Carol. 191—virginicum.
campestre, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 122.—Bras.
Campylopus, Steud. Nom. ed. II. i. 787 = rhodopeum.
camtschaticum, Steud. L c—kamtschaticum.
canadense, *Linn. Sp. PI.* 785.—Am. bor.
canariense, Brouss. ex Webb & Berth. Phyt Canar. i. 51 —grandifloruin.
canariense, Cambess. ex Mares & Vigin. Cat. PI. Balear. 830 = Cambessedesii.
canariense, Hort. Par. ex Webb & Berth. 1. c. 49 = platypctalum.
canariense, *Linn. Sp. PI.* 784.—Ins. Canar.
canescens, Trey. Hyp. Animad. 10—lusitanicnm ?
capitatum, Choisy, Prod. Hyp. 67. t. 9— helianthemoides.
caprifoliatnm, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 125.—Bras.
caprifolium, *Boiss. Blench.* 26.—Hispan.
caracasanum, *Willd. Sp. PI.* iii. 1458.—Venezuela,
cardiophyllum, *Boiss. Fl. Orient,* i. 791.—Syria,
carinatum, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 41.—Reg. Argent.
carneum, Wall. Cat. n. 4820 = Cratoxylonpolyanthum.
cassium, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 111.—Syria.
cayanense. Linn. Mant ii. 277 = seq.
cayennense, Jacq. Enum. PL Carib. 28=Vismia cayennensis.
cernuum, *Roxb. Hort. Beng.* 69; *Fl. Ind.* iii. 400.—Reg. Himal.
Cervantesii, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 347.—Mexic.
Chamaemyrtus, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 298.—N. Granat.
Chamaenerium, Steud. Nom. ed. II. i. 787 = sphaerocarpura.
chilense, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 355.—Chili.
chinense, Linn. Syst. ed. X. ii. 1184,-^China.
chinense, Retz. Obs. v. 27 = Cratoxylon polyanthum.
chloraefolium, St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 829 = connatum.
Choisianum, Wall. Cat. n. 4805 = Hookerianum.
chrysostictum, *Webb, Fragm. Fl. Aethiop.* 54.—Afr. trop.
ciliatum, Lam. Encyc. iv. 170 = perfoliatum.
cistifolium, *Lam. I. c.* 158.—Am. bor.
coadunatum, *C. Sm. ex Link, in Buch, Besckr. Canar. Ins.* 153.—Reg. Mediterr. or.; Ins. Canar.
coccineum. Wall. Cat. n. 4823 = Cratoxylon Blancoi.
cochinchinense, Lour. Fl. Cochinch. ii. 472 — Cratoxylon polyanthum.
collinum, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. !183O) 219.—Mexic.
commutatum, *Nolte, Novit. Fl. Holsat.* 68.—Europ.
concinnum, *Benth. PI. Hartw.* 300.—Calif,
confertum, *Choisy, Prod. Hyp.* 55. t. 8.—A* Min.; Syria.
confertum, Moench, Meth. 129 = montannm.
connatum. *Lam. Eucyc.* iv. 168.—Reg. Argent,
cordifolium, *Choisy, in DC. Prod.* i. 646.—Reg. Himal.
cordiforme, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* i. 880.—Bras.
coriaceum, *Blume, Bijdr.* 142.—Java.
coriaceum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 131 = lysimachioides.
corifolium, Salisb. Prod. 369-H. Cons.
Coris, Bieb. Desc. Prov. Casp. App. 210 = hyssopifolinm.

HYFEBICTTM::—
Coris, *Linn. Sp. PI.* 787.—Europ. austr.; Oriens.
Coris, Sibth. & Sm. Fl. Graec. t. 777 = empetrifolium.
Coris, Walt. Fl. Carol. 190 ^ fasticulatum !
corsicum, Steud. Nom. ed. IL i. 787 = tetrapterum.
corymbosum, Moench, Meth. Suppl. 41 = canariense.
corymbosum, *Muhl. ex Willd. Sp. PI.* Si. 1457.—Am. bor.
crenulatum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 69.—Cilicia.
creticum, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 276 — maritimum.
crispum. *Linn. Mant.* i. 106.—Reg. Mediterr.
Crux-Andreae, Crantz, Inst. ii. 520 — Ascyrom Crux-Andreae.
cryptopetalum, B. Vog. in Trew, PL Rar. Dec iii. 1. t. 21. f. l = prolincum.
cubense, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1868) I. 384.—Cuba.
Cuisini, *W. Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.* xxi. (1885) 94—Europ.
cuneatum, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 699.—As. Min.; Syria.
cuspidatum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 351 = Vismia ferruginea.
cymbiferum, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 89°° avicularіaefolium.
cymosum, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 342 •* scabrum.
debile, Salisb. Prod. 369 = canariense.
decandrum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. [1] (1858) I. 389.—Ecuador.
deeipiens, H. Wats, in Hook. Lond. Joum. Bot. Hi- (1844) 588=undulatum.
decorticans. Planch, ex Wedd. Chlor. And. ii. 272" stenopetalum.
decumbens, *Peterm. Fl. Lips. Excurs.* 666.—Europ.
decussatum, Kunze. Del. Sem. Hort. Lips. i. 848.—Cf. Linnaea, xxiv. (1861) 192-orientale.
deidesheimense, Sch. Bip. ex Trev. Hyp. Animad. 10 ^perforatum.
delphicum, *Boiss. tf Heldr. Diagn.* Ser. II. i. 106.—Graecia.
delphinense, Vill. Prosp. 44 = quadrangulum.
densiflorum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 376.—Am. bor.
dentatum, Loisel. Fl. Gall. 499. t. 17 = perfoliatum.
denticulatum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 191, t-458.—Mexic.
denticulatum. Walt. Fl. Carol. 190 =angulosum.
dentiferum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 787.—Ind. or.
denudatum, St. HiL Fl. Bras. Mer. i. 336 = rigidum ?
Desetangsii, Lamotte, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) 121 — quadrangnlum ?
dichotomum, *Lam. JSncyc.* iv. 167.—Ins. S. Doming*
dichotomum, *Phil. Fl. Atac.* 12.—Chili,
dichotomum, *Zumag. Fl. Pedem.* it 388.—Ital.
diosmoides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 40.—Cuba.
diversifolium, DC. FL Fr. Suppl. 631 = hyssopifolium.
dolabriforme, Steud. Nom. ed. II. i. 787 = sphaerocarpum.
dolabriforme, *Vent. Jard. Cels,* 45.—Am. bor.
Dodonaei, • *Vill. RV ex Steud. Nom.* ed. II. i. 787—Italia.
Drummondii, Steud. Nom. ed. II. i. 787—virginicum.
Drummondii, *Torr.* b" *Gray, Fl. N. Am.* i. 165.—Am-bor.
dubium, Leers, Fl. Herborn. 165 —quadrangnluu.
dubium, Mauri, Rom. PL Cent. xiii. 27=austiale.
datum, *[Dryand.* ih] *Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 104.— Am. bor.
electrocarpum, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. « (1868) 62-Sampsoni.
elegans, Bertol. Fl. Ital. viii. 322 = perfoliatum.
elegans, *Steph. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1469.—Europ-As. bor.
elegantissimum, Baumg. Enum. Stirp. Trans. in syn. = pulchrum.
elegantissimum, Crantz, Stirp. Austriac ed. I- fasc. » 63 =montanum.
ellipticum, *Hook. Fl. Bor. Mm. i.* 110.—Am. bor.
elodeoides, *Choisy, in DC. Prod. i.* 551.—Reg. Him*-- Burma.
Elodes, *Huds. Fl. Angl.* ed. I. 292.—Europ.
elongatum, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. hyssopifolium.
emarginatum, Lam. Encyc iv. 154 — virginicnm.
empetrifolium, Kotschy, ex Jaub. 8c Spach, Bin- 77 *{ = Triadenia Russeggerfj.*—Syria.

HYPERICTTM :—
empetrifolium, *Willd.Sp. PI.* iii. 1452.—Graecia; As. Mittf
enneandrum, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 97-virginicum.
modes. Neck. Delic. Gallo-Belg. U. 319, sphaIm.=H. Elodes.
erectum, Mass. ex Webb ft Berth. Phyt Canar. i. 51= grandifoliom.
erectum, *Thunb. Fl. Jap.* 296.—Japon.
ericoides, *Linn. Sp. PI.* 785.—Europ. occ
Erythraeae, Steud. Nom. ed. II. i. 787-angulosam.
eugeniaefolium, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 350= Vismia acuminata, glabnu
euphorbiaefolium, Spach, Hist Veg. Phan. v. 396 = Montbretii.
euphorbioides, A. St. Hil. Fl. Bias. Mer. i. 332.169-mutilum.
fallax, Grimm, in Nov. Act. Nat Cnr. iU. (1767) App. 362 = quadrangulum.
fasdculatum, *Lam. Encyc.* iv. 160.—Am. bor.
fasciculatum, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 450= hyssopiiblium.
fasciculatum, Michx. ex Willd. Sp. PI. iii. 1462-galioides.
fastigiatum, £11. Sketch, ii. 31=adpressum.
fastigiatnm, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 195.—Mexic.
ferrugineum, Banks, ex Pnrsh, Fl. Am. Sept. ii. 379 = hiisntum.
ferrugineum, Boiss. ft Heldr. Diagn. Ser. II. i. li>4 =Spruneri.
filicaule. Hook. f. ft Thorns, ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Iud.i. 252-Ascyrum filicaule.
fimbriatum, Lam. Encyc. iv. 148=Richeri.
floribnndnm, *[Dryand. in) Ait. Hart. Km.* ed. I. IU. 104.—Ins. Canar.
floribundum, Reichb. Ic. Exot. ii. 64. t 95=. canariense.
floridum, Salisb. Prod. S«9=H. Androsaemnm.
foetidum. Hook. f. ft Thorns, ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 257 -Lalandii.
Mown, Brouss. ex Webb ft Berth. Phyt Canar. I. 4fi =reflexnm.
foliosum, *[Dryand. in] Ait. Hot*. Km.* ed. I. m. 104. —Ins. Azores.
foliosum, Tacq. Hort. Schoenb. iU. 27 =probficum.
formosanum, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvu. (1881) 428.—Ins. Formosa.
formosum, A. Gray, PI. Wright, ii. W-Scojte"; fonHosBm,*HKB.N K. Nov Gen Spt Sp.* v196 t. 460. —Mexic.
fragile.'ffeWr. ft- *Sart.in Boiss.Diagn.* Ser. II. i. 108. —Graecia.
Frasrri, Steud. Nom. ed. II. i. 788-virguucum.
frondosum, Michx. FL Bor. Am. ii. 81-aureum.
fulgidum, Rafin. Fl. Ludov. 88-fasciculatum)
galiifolium, *Supr. Fl. Cauc.* 245.-Reg. Cauca*
galioides, *Lam. Encyc.* iv. 161-—™: "" • .„„„„„
galioides, Pnrsh, FL Am. Sept. ii. 376 ->dendflor«m.
Gebleri, *C. A. Mty. in Ledeb. fl. Alt.* iii. 864.-Sibir.
gheiwense, *Boiss. Fl. Orient,* i. 810.—Anatolia.
glandulosum, *[Dryand..»] Ait. Hort. Kew.* ed. I. m. 1
gla montanum.
gla ucum, Miix. Fl. Bor. Am. U-J8=» rtifoliu™8-
gu idiaefoiinm, *A. Rich. Tent. Ft. Abyss, u* 98-Abyssin.
guidioides *Seem. Bot. V&. Herald, IS.-MM'.*
Govanianum, Wall. Cat. n. «15=cemuun.
grac ./«, Boiss. Diagn. Ser. II. v.rO=» to medium.
gramineum, *Forst.f. Prod.* 53.-N. Caled.
grandifiorum, Salisb. Prod. 369-calycnuum. 3.—Ins.
bor.
Oriffithii", ff»*. /. 6- *Thorns, ex Dyer, in Hook.* /• *Ft.* *rtf. /«A i. S53.-Re^. Himal.
Grisebachii, Boiss. Fl. Onent. i. »16 „Rf ch^
guianen«, Aubl. PL Gui. ii. 784-V»m»J- pensis.
Guinecnse, Una. Amoen. Acad. vui. 32 = Vismia le
gym S « », Engelm. ft Gray, to Bost Joum. Nat. Hut. v. (1847) 212=motilum.
Xfopodioides, rn'a»a &" ««« *• '" ?"" • *' «r- IV. xviii. (1862) 296.—N. Granat.

HTPBHICTJM :—
hakonense, *Franch. V Son. Enum. PL Jap.* ii. 298.—Tapon.
Hartwegi". *Benth. PI. Hartw.* 127.—Pernv.
hecatophyllnm, *Wright, in Sav. Fl. Cub.* 8.—Cuba.
htdyotifolium, Poir. Encyc Suppl. iii. 700-anguIosum*
Heldreichii, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. Ill = perfoliatum.
helianthemoides, *Boiss. 1. c.* 116.—As. Min.; Persia.
Helodts, St. Lag. in Ann. Sot Bot. Lyon, vii. (1880) 128 = H.Elooes.
helodeum, St. Lag. 1. c.«H. Elodes.
heterophyllum, *Vent. Jard. Cels,* t. 68.-Persia.
heterostylum, Parl. Fl. Ital. v. 660-aegypticnm.
hircinui, *Lin*. Sp. PI.* «4., Reg. Mediterr.
hirdnum, Sieber, ex Presl, in Oken, Isís, xxi. (1828) 275 = inoderum.
hirsutum, Asso, Syn. Stirp. Arag. 107-caprifolium.
hinntum, *Linn. Sp. PI.* 786.-Europ.; As. bor.
hirtellnm, *Boiss. Diagn.* Ser. I. Till. I16.-Peraa.
Hookerianum, *Wight V Am. Prod.* 99.-Ind. or.
horridum, WalL Cat. n. 4822 - Cratoxylon polyanthum.
Hnmboldtianum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 788.—Am. anstr.
Humboldtii, Schlecht. ex Steud. 1. c. = formosum.
humifasum, *Linn. Sp. PI.* 788.-Europ.; As. bor.
humifusum, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. v. 25; ex ei.Syll. 385 = australe.
Hypericoides, Cranti, Inst ii. S20 = Ascymm Hyperic id s.
hyssopi?Slium, *VUI. Hist. PI. Dauph.* iii. 505. t. 44.-Europ.; As. bor.
imbricatum, HMhst. ex Steud. Nom. ed. II. i. 788 V mutiluni •
iraertum, Steud. 1. c."angnlosnm.
iTm, H. B. ft K/Nov. Gen. et Sp. v. 193 = fo um.
incSmIAKW. *Card. Did.* ed. VHL n. 6; *Willd. Si ,PI.* iii. 1449.—Graecia; As. Min.
intermedium, Bellynck, Fl. Namur. (1855) SI = quadrangulum!
intermedium x, Ret*, ex Nym. Consp. 133.—Europ.
intermedium, *SWA. ex Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 95. ssin.
«^S«, Choisy, Prod. Hm 60=gramu«nm.
Isophyllum, Stend. Nom. ed. II. i. 788 - Drumin on (iii.
japonicum, *Thunb. Fl. Jap.* 295. t. 81.-As. temp. or. i Australas.
Jauberti, Spach, in Jaub. ft Spach, IUustr. i. 38.1118 M orient±Δ.
javanicum, Blume, Bijdr. 141 = patulum.
juniperinum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. T. 189= Ju *ch. & Linden, ex Triana & Planch. in Nat. Sér.* IV. xviii. (1862) 297.—N.

Kalmttnum, Duroi, Harbk. Banmi. i. S10=densifloxunia
Kalmianum, *Linn. Sp. PI.* 783.—Am. bor.
Kalmianum, Vahl, Syn-b. Bot i. 66=seq.
Kalmii, Forsk. Fl. Aegypt Arab. p. cxvm - revolutuni,
kamtschaticum,£«i»i.»nZJ«i*aAr. *Bot, Get. Regensb.* iii, (1841) 131.—Kamtschat
Kohlianum, Spreng. FL HaL 214. t. ••**£.
Kotschyanum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 56.—As. Min.;
IJ$°Boiss. V Haussk. in Boiss. Fl. Orient, i. 796.-
lae%atm", fcd. in] Ait Hort. Kew. ed. L Hi. 106 gulos
Laland ^*Cho&X DC. Prod. i.* 650,-Ind. or.; Afr. trop.
lanatum, *Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn.* i. (1778) 298.—Guian.
lanceolatum, *Lam. Encyc.* iv. 145.—Ins. Mascar.
lanceolatum, Steud. Nom. ed. I. 420, 888 = Vismia glabra.
lanuginosum, *Lam. Encyc.* iv. 171.—As. Min.; Syria.
laricifolium, *Juss. in Ann. Mus. Par.* iii. (1804) 160. t. 16. f. 1.—Peruv,
Lasianthus, Linn. *Sf.* PL 783-GordonU Usianthns.
-W«m Aubl. PI. Gui. ii. 787=Vismia latifolU.
j S Willd. Sp. P L iii- 1440=Visnua Innfolli.

HYPEBICUM :—
lauriforme. Lam. Encyc. iv. 152=Vismia laorifolia.
laurocerasifolium, Jacq. Obs. Bot. iii. 4 =Symplocos tinctoria.
laxiusculmn, ^4. *St. Hil. PI. Us. Bras. t.* 62.—Bras.
Leconieanum, Steud. Nom. ed. II. i.788 = paludosum.
ledifolium, Steud. L c 789 = nndiflorum.
Lerrsii, C. C. Gmel. FL Bad. iii. 352 = quadrangnlum.
leprosnm, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 58.—As. Min.
leptocladum, *Boiss. ft. Orient,* i. 803. — Mesopotam.
leptophyllum, *Hochst. in Lorent, Wanderungen,* 342. —Oriens.
Leschenaultii, Choisy, in DC. Prod. i. 545 = Hookerianum.
leucoptychodes, Steud. ex A. Rich. Tent. FL Abyss. i. 96-=lanceolatum.
Lhotskyannm, *Steud. Nom.* ed. II. i. 788.—Bras.
ligustrinum, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept ii. 375-nudiflorum.
limosum, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 89.—Cuba.
linarifolium, Bertol. Fl. Ital. viii. 323 = australe.
linariiolium, *Vahl, Symb. Bot.* i. 65.—Europ. occ.
linearifolium, Willd. Sp. PL iii. 1470 -linarifolium.
linearuiides, Bosse, in Otto ft Dietr. Allg. Gartens, iii. (1835)99»repens.
lineolatum, Jord. in F. Schultz, Arch. FL Fr. et Allem. 343=perforatum.
liuoides, *A. St. Hil. Fl. Bras. tier.* i. 838.—Bras.
Lutiardii, Vill. Prosp. 44 = humifusum.
Lorentii, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 342 - asperulum.
loxense, *Benth. PI. Hartw.* 126.—Am. austr.
luddum, Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 788 - Ixonanthes icosandrai
Lungusum, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 218-cordifolium.
lusitanicum, *Poir. Encyc Suppl.* iii. 702.—Lnsiun.
Iycopodioides, *Triana* b* *Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xviii. (1862) 296.—N. Granat
lydium, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 57=hyssopifolium.
lysimachioides, Boiss. ft Noé, 1. c. Ser. II. i. 106-callianthnm.
lysimachioides, *Wall. Cat.* n. 4817.—Reg. Himal.
fythrifotium, Boiss. Fl. Orient i. 800 - hyssopifolium.
macedonicum, Boiss. ft Orph. Diagn. Ser. II. vi. 88 - barbatnm.
macrocarpum, Michx. FL Bor. Am. ii. 82-pyramidatum.
macrocarpum. Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 788 = Ixonanthes reticulata.
maculatum, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fast ii. 98-quadrangulum.
maculatum, Michx. Fl. Bor. Am. Ii. 80 - corymbosura.
maculatum, Orsin. ex Nym. Consp. 182=Richeri.
macuktnm, *Walt. Fl. Carol.* 189.—Am. bor.
maculatum, Willd. ex Stend. Nom. ed. II. i. 788= formosum.
madagascariense, *Steud. I. c.*—Madag.
maesicum, G. Don, Gen. Syst. i. *610 "moesicum.*
maritimum, *Sieber, Reise Kreta,* ii. 322. — Ins. Creta.
medium, Petenn. Fl. Lips. Excurs. 663-perforatnm.
mexicanum, *Linn.f. Suppl.* 346.—Am. austr.
Michauxii, Poir. Encyc. Suppl. iii. 696=galioides.
micranthum, Choisy, Prod. Hyp. 44. t. 6 - corymbosom.
micranthum, Wall, ex Stend. Nom. ed. II. i. 788-Tristania bnrmanica.
microcalycinum, Boiss. ft Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 115=nyssopifolinm.
microphyllum, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 841 - perforatum.
microsepalum, *A. Gray, in S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* i- 456.—Am. bor.
milleporum, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii 843.—Ins. Tenerif.
maesicum, Spreng. 1. c-avicalariaefolinm.
raonanthemum, *Nook. f. V Thorns, ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 266.—Reg. Himal.
mmogynum, Linn. Sp. PL ed. IL 1107 i Thunb. Fl. Jap. 297-chinense.
montanum, *Linn. Fl. Suec.* ed. IL 266.—Europ.
mmtanum, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 526 = perfoliatum.
Montbretii, *Spach, Hist. Vig. Phan.* v. 395.—Graecia.

HYPEEICUM:—
moranense, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* v. 193.—Mexic.
multicaule, Lam. Encyc. iv. 178=empetrifolium.
multifiorum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 194-thesiifolium.
muscoides, *Phil, in Linnaea,* xxxiii. (1864-65) 81.—Chili.
mutilnm, *Linn. Sp. PI.* 787.—Am. bor.
mutilum, Maxim, in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 436=japonicum.
Mutisianum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 185 = mexicanum.
myrianthum, *Cham. &* Schlecht. in Linnaea,* iii. (1828) 123.—Bras.
myriotrichum, Boiss. Fl. Orient, i. 795-- adenotrichum.
myrtifolium, *Lam. Encyc.* iv. 180.—Am. bor.
myrtifolium, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 399 = perfoliatum.
myrtilloidei, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. 7 = cuneatum.
mysorense, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 4808.—Ind. or.
nanum, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 699.—Syria,
napaulense, *Choisy, in DC. Prod.* i. 552.—Ind. or.
Nandinianum, *Coss. & Dur. in Bull. Sec. Bot. Fr.* ii. (1855) 308.—Algeria.
neapolitanum, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 19= tetrapterum.
nepalense, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 497 = patulum.
neriifolium, Wall. Cat. n. 4824 = Cratoxylon neriifolinm.
nervatum, Hance, in Walp. Ann. ii. 188=japonicum.
nervosum, *Choisy, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 151, 152.—Java.
nervosum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 219=elodeoides.
neurocalycinum, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 114.—As. Min.
nigricans, *Zucc. ex G. Don, Gen. Syst.* i. 612.—Hab. ?
nitidum. Lam. Encyc. iv. 160=fasciculatum.
Nordmanni, *Boiss. Fl. Orient,* i. 815.—Reg. Caucas.
Norysca, Steud. Nom. ed. II. i. 789 = mysorense.
nubigenum, Lowe, in Hook. Joura. Bot. i. (1834) 43 = linari folium.
nudicaule, Walt. Fl. Carol. 190 = H. Sarothra.
nudiflorum, Hook. & Am. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 199=cistifolium.
nudiflorum, *Michx. ex Willd. Sp. PI.* iii. 1456.—Am. bor.
nummularioides, *Trautv. in Bull. Acad. Pitenb.* x. (1866) 894.—Reg. Caucas.
nummularium, *Linn. Sp. PI.* 787.—Mont. Pyien.
Nuttallii, G. Don, Gen. Syst. i. 607 = setosum.
oblongifolium, Choisy, Prod. Hyp. 42. t. 4 = cernuum.
oblongifolium. Hook. Bot. Mag. t 4949 = Hookerianum.
oblongifolium, Wall. PI. As. Rar. t. 244- patulum.
obovatum, Wall, ex Stend. Nom. ed. II. i. 789 (Quid»).—Singapore,
obtusatum, *Fisch. V LeveilU, in Demid. Voy. Suss. Mir.* ii. 207.—Tauria.
obtusum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 235 = Richeri.
obtusum, Moench, Meth. 129=quadrangolum.
officinale, Gater. ex Stend. Nom. ed. 1.421 =perforatum.
officinarum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc ii. 66; ed. II. 99 = perforatum.
oliganthum, *Franch. V Sav. Enunu PI. Jap.* ii. 299.—Japon.
Olivieri, *Boiss. Fl. Orient,* i. 803.—Mesopotam.
olympicum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 613-cistifolium.
olympicum, *Linn. Sp. PI.* 784.—Graecia; As. Min.
olympicum, Sm. Fl. Graec Prod. ii. 115-adenotrichum.
opacum, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 168, 673 = cistifolimn.
orientale, *Linn. Sp. PI.* 785.—As. Min.
origanifolium, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 614-rhodopeum.
origanifolium, *Willd. Sp. PI.* iii. 1467.—As. Min.
pollens, D. Don, Prod. Fl. Nep. 219 - napaulense.
pallens, *[Soland. in] Russell, Aleppo,* ed. II. ii. 270.—As. Min.
paludosum, *Choisy, Prod. Hyp.* 43.—Am. bor.
palustre, Salisb. Prod. 869 = H. Elodes.
panicnlatum, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* v. 195. t 459.—Mexic.
paniculamm, *Lam. Encyc.* iv. 181.—Hab. ?
papillare, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 110 = leprosum.

HYPEBICUM:—
parviflorum, Salisb. Prod. 869 — Ascyrum Crux-Andreae.
parviflorum, *A. St. Hit. Fl. Bras. Mer.* i. 388.—Bras.
parviflorum, Willd. Sp. PI. iii. 1456 = mutilum.
patulum, *Thunb. Fl. Jap.* 295.—Reg. Himal.; China; Japon.
pauciflorum, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 192.—Mexic.
pedicellare, Endl. in Enum. PI. Hueg. 12=gramineum.
peduncutosum. Wall, ex Stead. Nom. ed. II. i. 789 = Ixonanthes khasiana.
Pelleterianum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer.* L 384. t. 70.—Bras,
pentandrum, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 614.—Ins. Philipp.
Penticosia, Comm. ex Lam. Encyc. iv. 145-lanceolatum.
peplidifolium, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 95.—Abyssin.
per/oliatum, Ledeb. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. ii. (.1837) 814-bupleuroides.
perfoliatum, *Linn. Syst.* ed. XII. 510.—Graecia; As. Min.
perfoliatum, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 283 = Naudinianum.
perforatnm, *Linn. Sp. PI.* 785.—Europ.; As. bor.; Am. bor.
Pestalozzae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 113.—As. Min.
petiolatum. Linn. Sp. PI. ed. II. 1102 - Vismia petiolata.
petiolatum, Linn. f. Suppl. 345 = Vismia laorifolia.
petiolatum. Lour. Fl. Cochinch. 472 - Cratoxylon polyanthum.
petiolatum, Walt. Fl. Carol. 191=paludosum.
petiolulatum, *Hook. f. &" Thorns, ex Dyer, in Hook./. Ft. Brit. Ind.* i. 255.—Reg. Himal.
philonotis, *Cham, (f Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 219.—Mexic.
pilosum, Walt. Fl. Carol. 190-setosum.
pimeleoides, *Planch. V Linden, ex Triana V Planch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. xviii. (1862) 299.—N. Granat.
pimentifolium. Wall, ex Steud. Nom. ed. II. i. 789 = Tristania Wightiana.
platypetalum, Steud. 1. c.=canariense.
platypetalum, *TurcB. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 388.—Ecuador.
platysepalum, Walp. Rep. i. 886= *platypetalum.*
polyanthemum, *Klotzsch, ex H. Reich, in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 189.—Bras.
polygonifolium, *Rupr. Fl. Caur.* 247.—Reg. Caucas.
polyphyllum, *Boiss. &" Bal. Diagn.* Ser. 1I. v. 68.—Cilicia.
pratense, *Cham,* b* *Schlecht. in Linnaea,v.* (1880) 218.—Mexic.
procumbens, Desf. ex Willd. Sp. PL iii. 1450 = dolabriforme.
prolificum, *Linn. Mant.* i. 106.—Am. bor.
prunifolium, Wall. Cat. n. 7276=Cratoxylon pruniflorum.
Przewalskii, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvii. (1881) 431.—As. centr.
Pseudo-Brathys, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xxxi, (1858) I. 887-struthiolaefolium.
Pseudo-patulum, Hort.--Cf. Gard. Chron. (1882) u. 149=patulum.
Pseudo-perforatum, Bcrtol. Misc. Bot. iii. 14=perforatum.
ptarmicaefolium, Spach, Hist. Veg. Phan. v. 404 = orientale.
pubescens, Boiss. Elench. 26=tomentosnm.
pulchellum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 53-; Wall. Cat. n. 4821 = Cratoxylon polyanthum.
pulchrum, Aubry, ex Stead. Nom. ed. I. 421 = linarifolium.
pulchrum, *Linn. Sp. PI.* 786.—Europ.
pulchrum, Pall. Ind. Taur.; ex Bieb. Fl. Tanr. Cauc. ii. 230—elegans.
pulverulentum, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. 7 = origanifolium.
punctatum, Lam. Encyc. iv. 164 = maculatum.
punctatum, Reichb. Ic. Exot. Bot 61. t. 88=corymbosum.
punctatum, Willd. Sp. PI. iii. 1464=avicularia-efolium.
punctulatum. A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 334 = brasiliense.

HYPEHICUM:—
punctulosum, Bertol. Misc. Bot. xiii. 18=cistifolium.
pusillum, Choisy, Prod. Hyp. 60 = japonicnnt!
pyramidatum, *[Dryand. in] Ait. Hort. Ken.* ed. I. iii-103.—Am. bor.
quadrangulare, Sm. Engl. Bot. t 370; O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 640=tetrapterum.
quadrangulare, Willd. Sp. PI. iii. 1459=quadrangulnm.
quadrangulum, Colm. Rec. Bot. Galic. 10 = undulatum.
quadrangulum, *Linn. Sp. PI.* 785.—Europ.
quadratum, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 99-quadrangulum.
quadrialatum, Wahlberg, Fl. Gothob. 75-tetrapterum.
quadrifarium, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 228 (Quid »)•—Siles.
Quartinianum, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 97.—Abyssin.
quinquenervium, Walt. Fl. Carol. 190 —mutilum.
racemulosum, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxjcvl. (1863) I. 580.—Peruv.
ramosissimum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 497" patulum.
ramosissimum, Ledeb. Fl. Ross. i. 449=inodorum.
rariflorum, *Stev. ex Rupr. 'Fl. Cauc.* 298.—R*fr Caucas.
recognitum, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Ser. IV. >• (1854) 36. t. l = rhodopeum.
reflexum, *Linn./. Suppl.* 346.—Ins. Teneriffa.
repandum, *Kit. & Rochel, PI. Banat. Rar.* 26, nomen.—Banat.
repens, *Duby, ex Nym. Const.* 133 = tetrapterum.
repens, Georgi, Beschr. Russ. Reich, iv. 1200-humifusnm.
repens, *Linn. Cent.* i. 26 (sp. dub.).—Europ.; Orieos.
repens, Poir. Voy. Barb. ii. 224=australe.
repens, Sibth. Fl. Graec. t. 775=trichocaulon.
reptans, *Hook.f. &• Thorns, ex Dyer, in Hook. f. f-Brit. Ind.* i. 255.—Reg. Himal.
resinosum, Benth. PI. Hartw. 165 = mexicanum.
reticulatum, Poir. Encyc. Suppl. iii. 694-Vism» latifolia.
retusum, *Auch. in Jaub. (f Spach, Illustr.* i. 53. t. «'•—Syria.
rcvolutum, *Vahl, Symb. Bot.* i. 66.—Arabia,
rhodopeum, *Frivald. in Flora,* xix. (1836) 486.^ Rumel.; As. Min.
Richeri, Ledeb. Fl. Ross. i. 449 = Nordmanni.
Richeri, Rochel, PI. Rar. Banat. 49. t. 12. *i-* *< barbatum.
Richeri, *Vill. Prosp.* 44 j *Hist. PI. Dauph.* iii. 501.—Europ. med.
rigidum, *A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i.* 886.—Bras.
Rochelii, Griseb. & Schenk, in Wiegm. Archiv, x (1862) I. 299 = Richeri.
Roeperianum, Schimp. ex A. Rich. Tent. Fl. Any*- 96—Quartinianum.
rosmarinifolium, Choisy, in DC. Prod. i. 547 - m folium.
rosmarinifolium, Kinn. ex Walp. Rep. fasciculatum.
rosmarinifolium. Lain. Encyc. iv. lSg-cistifoln
rotundatum, Schur, in Verb. Naturf. Ver. Bruenn, » II. (1877) 159 = tetrapterum.
rostratum, Rafin. Fl. Ludov. 88=densiflorum.
rubrum, Hochst. in Lorent, Wanderungen, S43,
rubrum, Wight, ex Dyer, in Hook. f. Fl. Bnt Jno. 255-humifusum.
rufescens, *Klotzsch, ex H. Reich, in Mart. &•* xii. I. 194—Bras.
rufescens, Lam. Encyc. iv. 150-Vismia
Rugelianum, Kunze, Del. Sem. Hort. Lips. (!»*'•" Linnaea, xxiv. (1851) 177=aureum.
rumelicum, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 11S,—M-
rupestre, *Jaub. V Spach, Illustr.* i. **--- »
rutilum, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1235, «P mutilum.
sabinaeforme, *Trev. Hyper. Animad.* 15.—
Salicaria, Reichb. PI. Crit. v. 58. t. 490. f. Ascyron.
salicifolium, Sieb. & Zucc in Abh. Akad. M u w II. (1843) 162=chinense.
Sampsoni, *Hance, in Journ. Bot.* Hi. China.
Sarothra, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 79.—*Am.*
saturejaefolium. Jaub. *Sc* Spach, Illustr. J. »°- " confcrtDin.
scabrellum, *Boiss. Diagn.* Ser. II. v. 69.—As.

HTPEKICUM:—
scabridum, *Stmd. Norn.* ed. II. i. 789.—Graecia.
•eabrurn, £.„». *Cent.* i. 25; *Amoen. Aead.* iv. 287.—As. Mm.; Persia; Songar.
scaturiginum, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 4871 = Japonicum.
Scheffneri. S. ' WaU_ •''' Prot_Am_Aettd_XTiL 0.. (1881-82) 880.—Mexic.
Schimperi, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 29; *et ex A. Rich. Tent. fl. Abyss,* i. 97.—Afr. trop.
Schlosseri, Heuff. in Flora, xxxvi. (1858) 626 - perforatum.
scopulorum, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 502—ins. Socotra.
Sconleri, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 111.—Am. bor. occ.
sebasteum, Boiss. & Noe, Diagn. Ser. II. L 107 - hyssopifolinm.
Sellawianum, Klotzsch, ex H. Reich, in Mart. Fl. Bras. xii. M89=rigidnm.
Sepiawini, *Maxim, in Bull. Aead. Pitersb.* xxvii. (1881) 484.—China.
septinenvium, Krock. Fl. SHes. Snppl. ii. 220 (Quid J). —Sites.
serpyllifolium, *Lam. Encyc.* iv. 176.—Syria.
sessiliflorum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 346 - myrtifolium.
sessilifolium, Aubl. PI. Gui. H. 787-Vismia rufescens.
setosum, *Linn. Sp. PI.* 787.—Am. bor.
setosum, Wall. Cat. n. 4814=napaulense.
silenoides. H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 191 = thesiifolium.
•flenoides, *Just, in Ann. Mus. Par.* iii. (1804) 162. t. 16. f. 8.—Peruv.; N. Granat.
Simplex, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 80=setosum.
staaicum, *Hochst. ex Boiss. Fl. Orient,* i. 808.—Arabia.
sinense, J. F. Gmel. Syst. 1157 =*chinense.*
zkouleri, Walp. Rep. i. 387, sphalm. = Scouleri.
"ngaricum, Ledeb. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 297 "perforatum.
Spachianum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 789.—Hab. T
•pareiflorum, *Schur. in Verh. Naturf. Ver. Bruenn,* xv. "• (1*77) 158.—Transsylv.
spathulatum, Steud. Nom. ed. II. i. 789-prolificum.
speciosum, Wall. Cat. n. 4808 - cerauum.
spectabile, *Jaub. V Spach, Illustr.* i. 67. t 29.—Syria.
sphaerocarpum, Barton, Comp. Fl. Philad. iL 14 - ellipticum.
jphaerocarpum, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 78.—Am. bor.
opmneri, *Boiss. Diagn.* Ser. I. viii. 112.—Graecia.
stellarioides, H. B?& K. NOV. Gen. et Sp. v. 196 = mntilum.
stenobotrys, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 115-confertum.
stenopetalum, *Tune, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 386.—Venezuela.
stenophyllum, Opii, NaturaL n. ix. (1825) 168- Perforatum.
stridum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 190- struthiolaefolium.
s'ruthiolaefolium, *Juss. in Ann. Mus. Par.* Hi (1804) J61.t.J6. f.2.—Peruv.
struihiolaefolium, Trev. Hyper. Animad. 15-Hnmboldtiannm.
"yphelioides, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 2S7.-Ind. occ.
SHberosum, Salzm. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. Us =* tomentosum.
«unatranum, *Miq. PI. Jungh.* 895.—Sumatra.
'"*narisdnum,* Cham. & Schlecht. in Linnaea, in. (1828) 124-Pelleterianum.
ttr .iuense, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 193-thesnol: ium.
*«»nV*m,* Hort. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 460-monbnum.
'en e"nin 1 *. *Janka, in Oestr. Bot. Zritschr.* xxii. (1872)
ttnellum, Kotschy, ex Boiss. FL Orient, i. 794 - . «weatum.
'yilum, [Soland. ex] Clarke, Trav. ii. 644-serpylh-•ohum.
'«««««««, Tausch, in Flora, xiv. (1831) 211-tetraPerum.
tenuicanle, *Hook./. It Thorns, ex Dyer, in Hooh.f. Fl.* *"'/»<*.i. 254.—Reg.Himal.
*te**ifotium,* Pursh, Fl. Am. Sept. ii. S77=fc*a»- . «tum.
te"»«blium, *A. St. Hit. Fl. Bras. Mer.* I. 887-Bras.
«retiusculum, *A. St. Hit. 1. c.* S31.—Bras.

HYPEBICTTM:—
ternum, *A. St. Hit. Fl. Bras. Mer.* i. 830.—Bras.
tetrapetalum, Lam. Encyc. iv. 163 = Ascyrum amplexicaule.
tetrapterum, *Fries, Nov. fl. Suec.* 286.—Europ.; As. bor.
thasium, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 227.—Macedon.
theEiifolium, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 192.—Mexic.
Thunbergii, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 300. —Japon.
thuyoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 187. t. 456__N. Granat.
thymbraefolium, *Boiss. & Noi, Diagn. Str.* II. i. 107.—Anatolia.
thymifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 186. t. 466 - Humboldtiannm.
thymifolium, *[Soland. in] Russell, Aleppo,* ed. II. ii. 270.—Cilicia.
thymopsis, *Boiss.'Diagn.* Ser. II. i. 109.—Mesopotam.
tinctorum, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 845-laricifolium.
tomentosum, Durand, ex Steud. Nom. ed. I. 421-H. Elodes.
tomentosum, *Linn. Sp. PI.* 786.—Reg. Sfediterr.
tomentosum, Moris, Fl. Sardoa, i. 822. t 21-annulatum.
tortuokum, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 602.—Ins. Socotr.
Tournefortii, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 404 - orientate.
trachyphyllum, Griseb. Spidl. Fl. Rumel. i. 222 = leprosum.
transsilvanicum, Celak, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 188 -Richeri.
trichanthum, Uoiss. & Sprun. Diagn. Ser. II. i. 105- barbatum.
trichocaulon, *Boiss. V Heldr. 1. c.* Ser. I. viii. 110. —Ins. Creta.
Tridesmis, *Steud. Nom.* ed. II. i. 790.—Ins. Bouton.
trifiorum, Blume, Bijdr. 142 = Hookerianum.
triplinerve, *Vent. Jard. Cels,* 68. t. 68.—Am. bor.
triqtutrifolium, Turra, Farset. Nov. Gen. 12 = crispum.
tubulosum, Walt. Fl. Carol. 191-virginicum.
tymphresteum, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. i. 67 - hyssopifolium.
uliginosum, H. B. *k* K. Nov. Gen. et Sp. v. 194^ thesiifolium.
umbellatum, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1863) 141.—Europ.
undulatura, *Schiusl. ex Willd. Enum. Hort. Berol.* 810.—Hispan.
uniflorum, *Boiss. V Heldr. Diagn.* Ser. I. viii. 109.— As. Min.
uralum, Buch.-Ham. ex D. Don, in Bot. Mag. t. 2375 —patulum.
velutinum, Boiss. Fl. Orient, i. 801 = Kotschyanum.
venosum, Lam. Encyc. iv. 14A=calycinum *1*
vennstum, *Fentl, Pugill. PI. Nov. Syr. 7.*—As. Min.
veronense, Schrank, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 276 — perforatum.
verrucosum, Salisb. Prod. 369-baleariciym.
verticillatum, Lam. Fl. Fr. iii. 149 = H. Coris.
verticillatum, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 138.—Afr. austr.
vesiculosum, *Griseb. Spirit. Fl. Rumel.* i. 226.— Graecia.
villosum, Crantz, Inst. ii. 620 = setosum.
villosum, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. *tone.* ii. 62; ed. II. 96-hirsutum.
virgatum, Lam. Encyc. iv. 158 =angnlosum.
virgatum, *[Soland. ex] Clarke, Trav.* il. 262.—As. Min.
virginicum, *Linn. Syst.* ed. X. 1184.—Am. bor.
vi'ginirum, Walt. Fl. Carol. 189-corymbosum.
vulgare, Lam. Fl. Fr. iii. 161 = perforatum.
Walteri, J. F. Gmel. Syst. 1159 -= paludosum.
Webbii, Nym. Syll. 222-aegypticum.
Webbii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 790.—Malta; Oriens.
Wightianum, Wall. Cat. n. 4818-napaulense.

HYPEROGYNE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 81 (1866)- Faradlaia, Mazz. (Liliac).

HYPERTELIS, E. Mey. ex Fenzl, in Ann. Wlen. Mns. ii. (1839) 261-Pharnaceum, Linn. (FicoM.).
arenieola, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 146.— Afr. anstr.

HYPERTELIS *!*—
Bowkeriana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 146.— Afr. austr.
spergulacea, E. Mey. ex Fenzl, in Ann. Wien. Mas. ii. (1839) 268.—Afr. austr.
verrucosa, Fenzl, 1. c. 262-P. verrucosum.

HYPERUM, PresI, Epim. Bot. 211 (1849)-Wendtia, Meyen (Geraniac.).
tnfldum, PresI, 1. c-W. gracilis.

HTPHAENE, Gaertn. Fract. ii. 13. t. 82 (1788;.
PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 940.
CUCIFERA, Delile, FL Egypte, 145 (1813).
DOMA, Lam. Illustr. t. 900 (1823).
Don MA, [Poir.] in Nouv.Duham. iv. 47 (1809).
Argun, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 227.—Nubia,
benguelensis, *Wei*, ex H. Wendl. in Bot. Zeit.* xxxix. (1881)'J2.-Afr. trop.
compressa, *H. Wendl. I. c.* xxxvi. (1878) 116.—Afr. trop.
coriacea, *Gaertn. Fruct.* i. 28. t. 10. f. 2.—Afr. trop.
crinita, *Gaertn. 1. c.* ii. 13.—Afr. austr.
Cuciphera, *Pers. Syn.* ii. 623.—Afr. trop.
guineensis, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 445- thebaica.
macrosperma, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xxxix. (1881) 92.—Afr. austr.
natalensis, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 15 •> crinita.
Petersiana, Klotzsch, ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 227= crinita.
Schatan, *Boj. Hort. Maurit.* 808.—Hab. 1
thebnica, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 226. tt. 131-133. —Afr. trop.
turbinata, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xxxix. (1881) 92.— Afr. trop.
ventricou, *Kirk, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 285. —Afr. trop.

HYPHIPUS, Rafin. Sylva Tellur. 125 (1838)-Loranthus, Linn.
bracteata, Rafin. L c. »L. cupulifer.
trigona, Rafin. I. c.-L. americanus.

HYPHYDRA, Schreb. Gen. 666 (1791) - Tonina, Aubl. (Eriocauloneae).
amplexicaulis, Vahl, Symb. Bot iii. 99 - T. fluviatills.

HYPNOTICON, Rdchb. Nom. 122 (1841)-seq.

HYPNOTICUM, Rod. ex Meissn. Gen. Comm. 184 (1840)»Withanio, Pauq. (Solanac.).
frutescens. Rod. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 437 » W. frutescens.
somniferum. Rod. ex Boiss. 1. c. 434-W. Bomnifera.

HYPOBATHBXTM, Blume, Bijdr. 1007 (1826).
RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 92.
albicaule, *Baill. Adansonia,* xii. (1878) 209.—Madag.
angolense, Baill. Hist. PI. vii. 315 - Tricalysia angolensis.
Boivinlanum, *Baill. Adansonia,* xii. (1878) 208.— Madag.
canthioides, Baill. I.e. 211-Feretla canthloides.
Commersonianum, *Baill. 1. c.* 204.—Madag.
comorense, *Baill. I. c.* 210.—Ins. Comor.
ellipticum, Baill. 1. c. 211-Feretia apodanthera.
frutescuns, *Blume, Bijdr.* 1007.—Java.
graveolens, Baill. Adansonia, xii. (1878) 206-Zygoon graveolens.
Kirkti, Baill. 1. c. 20B = Empo$_K$ona Kirkii.
lagoense, *Baill. I. c.* 210.—Afr. trop.
lanceolatum, Baill. 1. c. 206 = Kraussia lanceolata.
leucocarpnm, *Baill. I. c.* 225.—Madag.
myrtifolium, Baill. 1. c. 204 = Nescidia myrtifolia
parviAorum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 236.—Java.
racemosum, Kurz, in Journ. A->. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 185 = Petunga Roxburgb.ii.
strictum, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, Ii. 50-Hyptianthera stricta.
viridifto, urn, Baill. Adansonia, xii. (1878) 212 - Diplospora viridiflora.

HYPOBRICHIA, M. A. Curt, ex Torr. *8c* Gray, Fl. N. Am. i. 479 (1o40)-Dldipll8, Rafin. (Lythrar.).
Nuttallii, Torr. *Be* Gray, 1. c. 480 - D. linearls.
Spruceana, Benth. ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 777, in obs. = Rotala verticillaris.

HYPOCALYMMA, Endl. Gen. 1230 (1840). *MYRTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 702.
angustifolium, *Schau. in Linnaea*, xvii. (1848) 241.—Anstral.
asperum, Schau. 1. c. — gtrictum.
boroniaceum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, iii. 95.—Austral.
ciliatum, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc (1862) II. 325 =xaathopetalum.
cordifolinm, *Schau. in Linnaea*, xvii. (1848) 241; *et in Lehm. PI. Preiss.* **i. 112.—Austral.**
cuneatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1862) II. 325—xanthopetalum.
Cunninghamii, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 241 = strictum.
ericifolium, *Benth. Fl. Austral*, iii. 94.—Austral,
hypericifolium, *Benth. 1. c.* 95.—Austral,
liiiifolium, *Tuns, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1862) II. 325.—Austral.
longifolium, *F. Muell. Fragm.* ii. 28.—Austral,
myrtifolium, *Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 333.—Austral.
Phillipsii, *Ham. in Nat. Hist. Rev.* v. II. (1858) 296. t. 22.—Austral,
robustum, *Schau. in Linnaea*, xvii. (1843) 241.—Austral.
scariosum, Schau. 1. c.=angustifolium.
speciosum, *Turcs. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* x. (1852) 332.—Anstral.
strictum, *Schau. in Linnaea*, xvii. (1843) 241.—Austral.
suave, Lindl. Bot. Keg. (1844) Misc. 27=angustifolinm.
tetraptemm, *Turce. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1862) II. 825.—Anstral.
xanthopetalum, *F. Muell. Fragm.* ii. 29.—Austral.

HYPOCALYMNA, Meissn. Gen. Comm. 354 (1843)-praec

HYPOCAIiYPTUS, Thnnb. Prod. PI. Cap. ii. 124 (1800); Nov. Gen. xi. 151 (1800), partim. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 484.
DUVALIA, Bonpl. Desc PI. Rar. Malm. 130. t. 53 (1813).
calyptratus, Thnnb. Prod. PI. Cap. 192; Nov. Gen. 151—Podalyria calyptrata.
canescens, *Thunb. II. cc.* 124 ; 158.—Afr. austr.
capensis, Thunb. 11. cc. 192; 154-VirgiIia capensis.
cordatus, Thunb. 11. cc. 192; 154 = Podalyria Burchellii.
glaucus, *Thunb. Nov. Gen.* 152.—Afr. austr.
obcordatus, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 124.—Afr. austr.
oxalidifolius, Baill. Hist. PI. .ii. 336 = Loddigesia oxalidifolia.
pedunculatus, Thunb. Prod. PI. Cap. 192; Nov. Gen. 152—Podalyria argentea.
serieeus, Thunb. 11. cc. 124; 152 = Podalyria sericea.

HYPOCARPUS, A. DC. in DC. Prod. viii. 245, 673 (1844)=Liriosma, Poepp. (Olacin.).
Gardnerianus, A. DC. 1. c. 246 = L. Gardneriana.
pauciflorus, A. DC. 1. c.-L. pauciflora.

HYPOCHAERIS, Linn. Hort. Cliff. 885 (1737) =seq.

HTPOCHOEKIS, Linn. Gen. ed. I. 238 (1737). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 519.
ACHYROPHORUS, Adans. Fam. ii. 112 (1763).
AGENORA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (1828-29) 310.
AMBLACHAENIUM, Turcz. ex DC. Prod. vii. 94 (1888).
ARACHNOFOGON, Berg, ex Haberle, Cat. Pesth.; ex Steud. Norn. ed. II. i. 118 (1840).
ARACHNOSPERMUM, Berg, ex Steud. 1. c. (1840).
CYCNOSERIS, Endl. in Bot. Zeit. i. (1843) 458.
FABERA, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 129.
HETEROMORPHA, Viv. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 278.
HIERACHIUM, HiU, Hort. Kew. 48 (1769).
METABASIS, DC. Prod. vii. 97, 807 (1838).
ORZOPHILA, D. Don, in PhiL Mag. xi. (1832) 388.
PIPTOPOGON, Cass. in Diet. Sc. Nat. lxviii. 607 (1827).
PORALLITES, Cass. *I* c xliii. 42 (1826), partim.
ROBERTIA, DC. FL Fr. SuppL **458** (1816).

HYPOCHOEKI8:-
SERIOLA, Linn. Sp. PI. ed. II. 1139 (1763).
TROMMSDORFIA, Bemh. Syst. Verz. Erf. 102 (1800).
Achyrophorus, *Linn. Sp. PI.* 810.—Afr. bor.; Sicilia.
adscendens, Brot. Phytog. Luait. i. 65. t. 26 = glabra.
aethnensis, BaU, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 542 = serioloides.
aetnensis, *Benth. V Hoot./. Gen.* ii. 520; *Ces. Passer. &• Gib. Comp. Fl. Hal.* 465.—Europ.
albicans, Ucria, in Roem. Arch. i. I. 70 = H. Achyrophorus.
alpicola, Schur, Enum. PI. Transs. 927, Index=macnlata.
alpino, Nym. Consp. 470, in syn.— maculata.
andina, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 198.—Reg. Andin.
apargioides, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 28.—Chili.
Arachnites, Link, Handb. i. 792 =seq.
arachnoidea, DC. Prod. vii. 90=seq.
arachnoides, Poir. Encyc. v. 572=glabra.
arenaria, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. v. (1825) 103.-Chili.
ascendens, Walp. Rep. vi. 340-glabra.
aurantiaca, Turcz. ex DC. Prod. vii. 94 — grandiflora.
Balbisii, Mauri, Cent PI. Rom. xiii. 38; Loisel. Not. 124-glabra.
Balbisii, Reichb. Fl. Germ. Excors. 268-radicatn.
Bartholdii, Willd. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat Cur. xxi. 1.(1846) 142-glabra.
Berterii, Colla, in Mem. Ace. Tor. xxxviii. (1835) 40. t. 33-apargioides.
brasiliensis, *Griseb. in Goett Abh.* xxiv. (1879) 217.—Bras.
Candollei, Regel, in Linnaea, xvi. (1842) 64 = glabra.
canescens, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1818) 60=Picrislaevis.
capensis, *Less. Syn. Comp.* 130.—Afr. austr.
chrysantha, *Poepp. ex DC. Prod.* vii. 94.—Chili.
contexts, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 663; et Beitr. Fl. Hercyn. 293-glabra.
Corsica, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 86 = pinnatifida.
cretensis, *Benth.* b* *Hook. f. Gen.* ii. 520; *Boiss. Fl. Orient.* iii. 784.—Graeda; Sicilia.
davurica. Pall, ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870)1. 99-grandiflora.
dimorpha, Brot. Fl. Lnsit. i. 832=glabra.
dimorpha, Tenore, Fl. Nap. v. ?01 = radicata.
dubia, *Mart. Cat. Hort. Erlang.* (1812).—Hab. t
Echegarayi, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cfrdova,* iv. (1881) 61.—Keg. Argent,
elata, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 198.—Reg. Andin.
Facchiniana, Ambr. Fl. Tyr. Austr. it 558 = uniflora.
foliosa, Vill. Fl. Delph. 88 = uniflora.
Gardneri, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. m. 331.—Bras.
glabra, *Linn. Sp. PI.* 810.—Europ.; Reg. Mediterr.
glabra, E. Mey. ex DC. Prod. vii. 91-capensis.
glauca, Presl, Delic. Prag. 114—H. Achyrophorus.
grandiflora, Gilib. Fl. Lituan. i. 226 = maculata.
grandiflora, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 164—Sibir. altaic
helvetica, Wulf. in Jacq. Misc. ii. 25-uniflora.
keterosperma, Schult. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 142-glabra.
hirsuta, DC. Prod. vii. 90 = glabra.
hirta, *Ucria, in Roem. Arch.* i. I. 70.—Sicilia.
hispida, Roth, in Usteri, Ann. Bot. xiv. (1796) 30-glabra.
hispida, Willd. Hort. Berol. i. 46 = cretensis.
infesta, Salisb. Prod. 182=radicata.
intermedia, Richt. ex Reichb. Fl Germ. Excurs. 268 -radicata.
intertexta, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 481 = glabra.
laevigata, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 520; Ces. Passer. 8c Gib. Comp. Fl. Ital. 465 = H. Achyrophorus.
lasiophylla, C. Koch, ex Nym. Consp. 470 = radicata.
leontodontoides, Aztf, *in Journ. Bot.* xi. (1873) 371.-Marocc.
linearifolia, *Moris, in Mem. Ace. Tor. Set.* II. ii. (1840) 803.—Europ.
macrorhisa,Guenth. ex Spreng. Syst. iii. 669-pinnatifida.

HYPOCHOEBIS:-
maculata, *Linn. Sp. PI.* 810.—Europ.; As. bor.
Meyeniana, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (187*) 198.—Peruv.; Bolivia.
minima, Cyrilli, PI. Rar. Neap. Fasc. i. 29. t. 10; Desf. Fl. Atlant. ii. 238-glabra.
montana, Hill, Veg. Syst. iii. 153 = glabra
neapolitana, DC. Vrod. vii. 91-radicata.
odorata, *Benth. & Hook./. Gen.* ii. 519.—Chili,
petiolaris, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 218.—Keg. Argent
picroides, *Griseb. 1. c.* 217.—Reg. Argent.
pinnatifida, Aucher, ex DC. Prod. vii. 97 = cretensis.
pinnatihda, *Cyrilli, ex Tenore, Syll.* 406.—Italia.
platylepis, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 376= radicata.
pontana, Linn. Sp. PI. 81(J=Crepis montana.
pusilla, Poir. Encyc. Suppl. iv. 530—glabra.
radiata, Falk, Beitr. ii. 234, sphalm.-seq.
radicata, *Linn. Sp. PI.* 810.—Europ.; Atr. bor.
runcinata, Gilib. Fl. Lituan. i. 226=radicata.
rupestris, Poepp. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 124-apargioides.
salina, Gren. Fl. Chaine Jurass. 456, in nota = radicata.
SaUmanniana, DC. Prod. vii. 91— glabra.
Scoraonerae, *F. Muell. Set. PI. Indust. Cult.* 107.—Chili.
serioloides, *Bertol. Misc. Bot.* ii. 236.—Reg. Mediterr.
sessiliflora, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 2.—Ecuador.
'.sicula, *Ucria, in Roem. Arch.* i. I. 70.—Sicilia.
simplex, *Mint*, Fl. Par. ed. I. 310-glabra.
sonchoides, Bert, ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 117=Scorzonerae.
sonchoides, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 2. t. 801.—Ecuador.
stellata, Gater. Fl. Montanb. 140-glabra.
strigosa, *Soland. ex Love, Man. Fl. Mad.* i. 637.—Ins. Mader.
subalpina, Schur, Enum. PI. Transs. 365-radicata.
taraxacifolia, *Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par.* vi. (1827) 425.—Corsica.
taraxacifolia, Moench, Meth. Suppl. 224 - Crepis albida.
taraxacoides, *Benth.* 6* *Hook.f. Gen.* ii. 519.—Peruv.
taraxacoides, Pourr. ex Steud. Norn. ed. I. 422, 618 » Crepis albida.
Tenorii, Guss. Fl. Sicul. Syn. ii. 423-radicata.
tenuiflora, *Boiss. Fl. Orient*, iii. 785.—Ins. Crete,
tenuifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 218.—Chili.
tenuifolia, Trev. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. I. (1845) 102=taraxacifolia.
thracica, Stev. ex DC. Prod. vii. 90-glabra.
tyrolensis, Schiw. ex DC. 1. c. 93-maculata.
uniflora, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 128-maculata.
nniflora, *Vill. Prosp.* 37.—Europ.
wrens. Linn. Sp. PI. 810—serioloides.
variegata, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 388.—Reg. Argent.

HYPOCISTIS, [Toura.] Adans. Fam. ii. 76 (1763) =» Cytinus, Linn.
lutea, Fourr. in Ann. Soc linn. Lyon, N. S. *vu. (1869) 148 = C. Hypocistis.
rubra, Fourr. 1. c—C. Hypocistis.

HYPOCYKTA, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. (1829). *GESNERA CEAE*, Benth. & Hook. *I.* ii. 101«-
aggregata, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 51. t. 201 - Codonanthe aggregata.
barbata, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. S.—Perov.
brevicalyx, Hort. Veitch.—Cf. Gard. Chron. (1867) 46» = Isoloma hypocyrtiflornm.
calycodonta, Lem. in Fl. des Series, Ser. I. ii (AoOt, 1846) - Alloplectus dichrous.
carnosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot i. (1842; 178—Codonanthe carnosa.
ciliosa, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 53-Episcia c>lio/f'
crassifolia, *Focke, in Tijdschr. Nat. Wetens.* v. C185«J 199.—Guian.
discolor, LindLBot. Reg. (1845) Misc. 19-AUoplectu» dichrous.
epidendra, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii- Peruv.
fenuginea, *Poepp. (f Endl. I. c*—Peruv.
gibbosa, *Poepp. V Endl. 1. c.* t. 202.—Bras.

HYPOCYKTA:—
glabra, *Hook. Bot. Mag.* t. 4346.—Am. austr.
graciliS, *Hook. I. c.* t. 4581.—Bras.
gracilis. Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 50. t. 220 - Codonanthe giacilis.
hirsuta, *Mart. I. c.* 62. t. 222.—Bias.
leucostoma, Hook. Bot. Mag. t. 4810=Beslena leucostoma.
macrocalyx, *Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 410.—Bras,
roacrophylla, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* in. 3.—Peruv.
Nummularia, *Hanst. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 381.—Costa Rica,
perianthomega, *Ttnore, in Parl. Giorn. Bot. ItaL* n. (1847) fasc. vii-vm. 200, 201.—Bras,
radicans, *Klotssch V Hanst. in Mart. Fl. Bras.* vni. 409.—Brag,
scabrida, *Lem. in Rev. Hortic.* Ser. III. i. (1847) 364.—Bras.
Selloana, *Klottsch V Hanst. in Mart. Fl. Bras.* viii. 409.—Bras.
sericea, *Hanst. 1. c.* 412.—Bras,
strigillosa, *Mart. Nov. Gen. et Sp.* iii. 52.—Bras,
villosa, *Hook. V Am. in Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 280.—Bras.
villosa, Klotzsch & Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 407 = Alloplectus villosus.

HYPODAEURUS, Hochst. in Flora, xxyii. (1844) 101- Anthephora, Schreb. (Gramin.).
cenchroides, Hochst. 1. c - A. HochstetterL

HYPODEMA, Reichb. Nom. 56 (1841) - Cypripedium, Linn. (Orchid.).

HYPODEMATIUM, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 848 (•1847) = Spormacoee, Linn. (Rubiac).
ampliatum, A. Rich. 1. c. 349 = S. ampliata.
sphaerostigma, A. Rich. 1. c = S. ampliata.

HYPODEMATIUM, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 286. t. 83 (1850)=IiisBOchilufl, R. Br. (Orchid.).
abyssinicum, A. Rich. 1. c—Abyssin.

HYPODTSCUS, Necs, in Lindl. Introd. ed. II. 450 (1836). *RESTJACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1035.
BOECKHIA, Kunth, Ennm. PI. iii. 448 (1841).
LEPIDANTHUS, Nees, in Linnaea, v. (1830) 665.
LEUCOPLOEUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. &ysi. ed. II. 450 (1836).
albo-aristatus, Mast, in Joum. Linn. Soc. viii. (1865) 255 -= duplicntus.
argenteus, *Mast. I. c.* x. (1869) 261.-Afr. anstr.
aristatus, *Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst.* ed. II. 450.
binTtus'Xrf?.n *Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 258.-Afr. au.
duplicatu? *Hochst. in Flora,* xxviii. (1845) 3S8.-Afr. austr.
N^ *t. in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 260-Afr. ust.
nit'dus'ivw, *ex Mast. I. c.* 259.-A&. anstr.
Oliverianus, *Mast. 1. c.* 254.—Afr. austr.
rugosus, *Mast. I. c* 255.—Afr. anstr.
striatns, *Mast. I. c.* 268.—Afr. austr.
synchroolepis, *Mast. I. c.* viii. (1865) 12[86]—Afr. austr.
Willdenovia, *Mast. I. c.* x. (1869) 259,-Afr. anstr.

HYPOELYTRUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 218 (1815), sphalm. = Hypolytrum, Rich. (Cyperac.).

HYPOfiSTBS, Soland. ex. R. Br. Prod. 454 (1810). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f.
ocuminata, Hochst. ex T. Anders, in Joum. Linn. a° vii. (1864) 50=triflora.
adoensis, *Hochst. in* **+**'&}[M]}+ nomen; *et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* 34, 162.-
• £ *& Nees, in DC. Prod.* »• 602,-Madag.
Alsine, Nees, I.e. = serpens.
anisophylla, *Nees, I. c.* ^S.-^*£-
annui, *Hochst. V Steud. ex Steud. Nom.* ed. U. 791.
—Ai
antenni^ *Moore, in Joum. Bot.* xviii. (1880) 41.
—Ai
aristata[j?"i?r. *Prod.* 474, in obs.-Afr. austr.

HYPOESTES:—
Bakeri, *Vatke, in Bremen, Abh.* ix. (1885) 183.—Madag.
Barteri, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 49.—Afr. trop.
Bojeriana, *Nees, in DC. Prod.* xi. 506.—Madag.
braehiata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 224.—Madag.
calaminthoides, *Baker, I. c.* 222.—Madag.
cancellata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 605.—Afr. trop.
Cephalotes, *Link, Jahrb.* L m. 48.—Ind. or.
ceraua, *Nees, in DC. Prod.* xi. 502.—Madag.
clinopodia, E. Mey. ex Nees, 1. c. 508-verticillaris.
comorensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 223.—Madag.
contorta, Nees, in DC. Prod. xL 156=Peristrophe contorta.
corymbosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 228.—Madag.
Cnmingiana, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 1122.—Ins. Philipp.
Decaisneana, Nees, in DC. Prod. xi. 608 =-malaccensis.
diclipteroidei, *Nees, I.* c. 510.—Madag.
elegans, *Nees, 1. c.* 502.—Madag.
fascicularis, *Nees, I. c.* 604.—Madag.
fastuosa, *R. Br. Prod.* 474, in obs.—Ind. or. t
fimbriata, E. Mey. in Diege, Zwei Pfl. Docum. 193 = Ruttya ovata.
flcxibilis. *Nets, in DC. Prod.* xi. 505.—Madag.
floribunda, *R. Br. Prod.* 474.—Austral.
Forskalei, *R. Br. I. c,* in obs.—Arab.
glabraU, *Presl, Bot. Bcmcrk.* 96.—Afr. austr.
glandulosa, *Hochst. in Mora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 24, nomen; *etex Nees, in DC. Prod.* xi. 373.—Abyssin.
gracilis, *Nees, 1. c.* 506.—Madag.
hirsnta, *Nees, 1. c.* 604.—Madag.
inconsplcua, *Balf.f. in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 18.—Ins. Mascar.
insularis, *T. Anders. I.* r.vii. (1862) 49.—Afr. hop.
jnvoluciata, *Roem. If Schult. Syst.* L 141.—Ind. or.
jasminoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 432.—Madag.
lanata, *Dal: in Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 843.—Ind. or.
lasioclada, *Nees, in DC. Prod.* xi. 503.—Madag.
lasiostegia, *Nees, 1. c.* 504.—Madag.
latifolia, *Hochst. in flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 43; *et ex Nees, 1. c.* 509.—Afr. trop.
laxifiora, Nees, 1. c. 508 = malaccensis.
longifolia, *Hort. Bogor. ex T. Anders, in Journ. Agr. Hort. Soc. Ind.* N. S. i. (1888) 283.—Hab. t
loniceroides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 225.—Madag.
maculosa, *Nees, in DC. Prod.* xi. 603.—Madag.
malaccensis, *Wight, Ic.* iv. 1.1665.—Malaya,
menthaefolia, *E. Mey. in Drlge, Zwei Pfl. Docum.* 193.—Afr. austr.
microphylla, *Nees, in DC. Prod.* xi. 504.—Abyisin.
mollis, *T.Anders.in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 49.—Afr. trop.
mollissima, *Nees, in DC. Prod.* xi. 605.—Madag.
oxystegia, *Nees, 1. c.*—Madag.
plumosa, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 193 = aristata,
polymorpha, E. Mey. 1. c-verticillaria,
polythyrsa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* Ii. 862—Java,
populifolia, *Miq. 1. c.*—Java.
pubescens, *Balf.f. in Proc. Hoy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 89.—Ins. Socotr.
pnlchra, *Nees, in DC. Prod.* xi. 606.—Madag.
purpnrea, *R. Br. Prod.* i. 474, in obs.—Malaya; China.
Richardi, *Nees, in DC. Prod. xi.* 602—Madng.
rodriguesiana, *fal/./. in Journ. Linn. Soc* xvi. (1877) 18.—Ins. Mascar.
rosea, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1884) 381.—Ins. Timor.
rosea, *Nees, in DC. Prod. xi.* 506.—Afr. trop.
sanguinolenta. *Hook. Bot. Mag.* t. 6511.—Madag.
saxicola, *Nees, in DC. Prod.* xi. 60S.—Madag.
scrpens, *R. Br. Prod.* 474, in obs.—Ins. Maurit.
simensis, *Hochst. ex Sckweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 111.—Afr. trop.
sinica, *Miq. in Journ. Bot. Nterl.* i. (1861) 117.—China,
spicata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 604.—Madag.
stachyoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 431.—Madag.

HYPOB8TBS:—
strobilifera, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 40.—Afr. trop.
tencrioides, *Nees, in DC. Prod.* xi. 60S.—Madag.
Teysmanniana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 853—Java.
Thomsoniana, *Nees, in DC. Prod.* xi. §04.—Madag.
tomeotosa, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 862.—Java,
trichochlamys, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 432.—Madag.
triflora, *Roem. & Schult. Syst.* i. 141—Reg. Himal.; Abyssin.
umbellata, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr. iv. 57 = Dicliptcra micranthes.
uniflora, *Hochst. in Flora,* xxiv. (1841) I. *Intell.* 24, nomen.—Abyssin.
unilateralis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 431.—Madag.
verticillaris, *R. Br. Prod.* 474, in obs.—Afr. austr.
Wallichii, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 114 - triflora.
Zollingeriana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 862.—Malaya.

HYPOGLOTTIS, Four. In Ann. Soc. Linn. Lyon, N. & xvi. (1868) 864=Astragalus, Tontn. (Legumln.).
Glaux, Fourr. 1. c.- A. Glaux.
purpurea, Fourr. 1. c =A. Hypoglottis.

HYPOQOMPHIA, Bunge, in Bull. Acad. P^tersb. xviii. (1873) 30. *LAB1ATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1201.
nana, *Benth. V Hook.f. I. c*—Afghan,
turkestana, *Bunge, in Bull. Acad. Pttersb.* xviii. (1878) 80.—Turkestan.

HYPOGON, Rafin. Fl. Ludov. 148 (1817) - Colllnsonia, Linn. (Labiat.).
anisatum, Rafin. 1. c.- C. anisata.

HYPOGYNIUM, Nees, Agrost. Bras. 864 (1829) - Andropogon, Linn. (Gramin.).
campestre, Nees, 1. c. 306 - A. hypogynus.
spathiflorum, Nees,). e. 349-A. spathillorns.

HYPOLABNA, R. Br. Prod. 251 (1810). *REST1-ACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1035.
CALOROPHUS, Ubill. Nov. Holl. PI. U. 78. t. 228 (1808).
CALOSTROI'HUS, F. Muell. Fragm. viii. (1873) 86, 88.
anceps, *Mast, in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 267.—Afr. austr.
aspera, Mast, in DC. Monog. Phan. i. 379 =• Restio Loxocarya.
aspera, *Mast, in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 264—Afr. austr.
Benthamii, *Mast.inDC. Monog. Phan.* i. 367.—Austral.
Burchellii, *Mast, in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 268.—Afr. austr.
crispata, Mast, in DC. Monog. Phan. i. 879 -Restio crispatus.
densa, *Mast. I. c.* 366.—Austral.
Eckloniana, *Nees, ex Mast, in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 268. t. 7.—Afr. austr.
elongata, *Mast, in DC. Monog. Phan.* i. 379.—Austral.
Esenbeckii, F. Muell. Fragm. viii. 86*-exsulca.
exsulca, *R. Br. Prod.* 261.—Austral,
fasuiculata, *Mast, in DC. Monog. Phan.* i. 368.—Austral,
fastigiata, *R. Br. Prod.* 251.—Austral.
fastigiata, Nees, in Lehm. PI. Prciss. ii. 69 = exsulca.
filiforuiis, *Mast, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 267.—Afr. austr.
flexuosa, *Mast, in DC. Monog. Phan.* i. 866.—Austral,
gracilis, *Nees, ex Mast, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 266.—Afr. austr.
giacillima, *Benth. Fl. Austral,* vii. 239.—Austral.
grandiuscula, V. Muell. Fragm. viii. 85 = exsulca.
impolita, *Mast, in Joum. Linn. Soc. X.* (1869) 264.—Afr. austr.
lnteriflora, *Benth. Fl. Austral,* vii. 238.—Austral,
laxlflora, *Nees, in Linnaea,* v. (1830) 668.—Afr. anbtr.
longissima, Benth. Fl. Austral, vii. 238 - elongata.
pubescens, *Mast, in DC. Monog. Phan.* i. 865.—Austral.
pubescens, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 69 = Restio Loxocarya.
tenuis, *Mast, in Journ. Linn. Soc. x.* (1869) 265.—Afr. anstr.
vestita, *Mast, in DC Monog. Phan. i.* 867.—Austral,
virgata. *Mast, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 268.—Afr. austr.

HYPOLEPIS, Beanv. ex Lestib. Essai Cyp.83 (1819) - ricinia, Schrad. (Cyperac.).
atrata, Nees, in Linnaea, viii. (1833) 93 « F. setiformis.
Capitellum, Nees, I.e. vii. (1882) 622-F. Mtiformis.
composita, Nees, 1. c. 525 = F. composita.
nigrescens, Nees, 1. c. 522 = F. bracteata.
scariosa, Nees, 1. c. 621 = F. bracteata.

HYPOLEPIS, Peis. Syn. U. 598 (1807) = Cytlnus, Linn.
sanguinea. Pens. 1. c—Afr. anstc

HYPOLOBUS, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 311 (1885). *ASCLEPIADEAE.*
infractus, *Foum. I. c.*—Bras.

HYPOLYTHRUM, Walp. Ann. i. 90S (1849)-seq.

HYFOLTTRTTJU, Rich, in Pen. Syn. i. 70 (1805). *CYPERACEAE,* Benth. & Hook, f.iii. 1054.
ALBIKIA, J. *8C* C. Presl.Rel. Haenk. i. 184. tt. 84, 35 (1828).
BRERA, Beauv. in Lestib. Essai Fam. Cyp. 43 (1819).
TRINGA, Koxb. Hort. Beiig. [81] (1814), nomen.
TUNG A, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 187 (1820), partim.
africannm, *Nees, in Linnaea,* is. (1834) 288, nomen; *Steud. Syn. PI. Cyp.* 132.—Afr. trop.
albidum, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 266 - Lipocarpha argentea.
amplum, *Kunth, I. c.* 373.—Bras,
anomalum, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 183.—Ins. Borbon.
argenteum, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. i. 218-Lipocarpha Humboldtiana.
argenteum, Vahl, Enum. PI. ii. 283 — Iipocarpha argentea.
Aschersonianum, Boeck. in Flora, lxv. (1882) 26 (Mapaniae sp.).—Afr. bor.
Berterianum, Schult. Mant. ii. 133 -seq.
Bertcrii, Spreng. Neue Eatdeck. i. *2il(= Dichromena pusilla).*—Ind. occ.
borneense, Kurz, in Joum. Soc. Beng. xxxviii. (1869) II. 74 = Mapania bancana.
caespitosum, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 68 ≻ longifolium.
capillare, Schrad. ex Nees, 1. c. 61 = Scirpus micranthus.
cariciforme, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 288, nomen ; *Steud. Syn. PI. Cyp.* 132.—Guiana.
ceylanicum, Heync, ex Nees, 1. c. — Lipocarpha sphacelata.
compactum, Zoll. *8c* Mor. Syst. Verz. Zoll. 98 (Mapaniae sp.).—Java,
compactum, *Nees tf Mey. in Linnaea,* ix. (1834) 288. —Ins. Philipp.
corymbosum, Rich, ex Boeck. 1. c. xxxvii. (1871-73) 125 = sylvaticum.
costatum, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 183 = amplum.
iostatum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 846—Scirpodendron costatum.
diandrum, A. Dietr. Sp. PI. ii. 865 - latifolium.
dissitiflorum, Seem. Fl. Vit 317, in nota-Schraderiannm.
dissitiflorum, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 182.—Ins. Carolin.
ensifolium, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 271, 272 = latifolium, mauritianum.
filiforme, Heyne, in Wall. Cat. n. 8444 C -Lipocarpha sphacelata.
filiforme, Vahl, Enum. ii. 284-= Lipocarpha filiformis.
fioribundum, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 288 (Mapaniae sp.).—Ins. Marian,
fuscum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 67.—Bras.
giganteum, Nees, in Wight, Contrib. 93, partim = Wight ianum.
giganteum, Wall. Cat. n. 3404 = latifolium.
Glaziovii, *Boeck. in Flora,* Ixiii. (1880) 438.—Bras.
glomeratum, Rich, ex Kunth, Enum. PI. ii. 270 = pungens.
glomeratum, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 64 - Lipocarpha Sellowiana.
gracile, Rich, ex Pers. Syn. i. 70 = Lipocarpha sphacelata.
humile, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 128 (Mapaniae sp.).—Java.
iridifolium, Link, Jahrb. i. III. 91 = Diplasia karataefolia.
iridifolium, Willd. ex Kunth, Enum. PI. ii. 272-mauritianum.

HYPOLYTRUM:—
irriguum, *Nees, in Mart. fl. Bras.* ii. I. 68.—Bras.
laevigatum, Spreng. Syst. i. 233 = Lipocarpha argentea.
latifolium, Baker, Fl. Maurit. 423 - mauntianum.
latifolium, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (Ib71) 129 — nemorum.
latifolium, *Rich, ex Pers. Syn.* i. 70.—As. et Austral. trop.
latifolium, *Seem. Fl. Vit.* 817.—Ins. Fiji.
laxum, Kunth, Knum. PI. ii. 270 - longifolium.
Leprieurii, Nees, ex Steud. Syn. PI. Cyp. 133 — Mapania africana.
longifolium, *Nees, in Linnaea,* ix. (1834) 288.—Guiana.
longifolium, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I„ 69 ≻ scapigerum.
longirostre, Thw. Enum. PI. Zeyl. 846 (Mapaniae. •p.).—Zcylan.
maculatum, Steud. Norn. ed. II. i. 791 = Lipocarpha Humboldtiana.
macranthum, *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 507.—Afr. trop.
macrocephalum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 416 (Mapaniae sp.).—Ins. Molncc.)
macrophyllum, *Boeck. in Flora,* lxi. (1878) 142.—Ins. S. Doming.
macrophyllum, Miq. Fl. Ind. Bat iiL 834, in obs. (Mapaniae sp.).—Ins. Molucc.
mauritianum, *Nees, in Linnaea,* ix. (1884) 288.— Ins. Maurit.
micranthum, Boeck. in Kjoeb. Videnslc Meddel. (1871) 164 (Mapaniae sp.).—Bras.
microcephalum, R. Br. Prod. 220 - Lipocarpha microcephala.
multinerve, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 188 = Calyptrucarya longifolia.
myrianthum, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 338-latifolium.
nemorum, *Beauv. Fl. Omar.* ii. 12, 13. t 67.—Afr. trop.
nemorum, Boj. Hort. Maurit. 886—mauritianum.
nicaraguense, *Liebm. in Vidensk. Selst. Sir.* V. ii. (1851) 236.—Nicarag.
pallidum, *Willd. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 793.—Am. austr.
pandanophyllum, *F. Muell. Fragm.* ix. 16.—Austral,
proliferum, *Boeck. in Linnaea,* xxxvii. (1871-73) 126. —Hab.l
punctatum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 66-sylvaticum.
pungens, *Vahl, Enum.* ii. 283.—Am. austr.
pycnocephalum, Benth. Dot. Voy. Sulph. 177 = Mapania pycnocephala.
pyenostachyum, Benth. in Joum.' Linn. Soc. xv. (1877) 612, lapsu-praeo.
rigens, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 67-pungens.
scaberrimum, Boeck. in Flora, lxv. (1882) 36 (Mapaniae sp.).—Afr. bor.
scapigerum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* il. I. 69.—Bras.
schoenoides, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 288= latifolium.
Schraderianum, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ii. I. 66.—Bras.
Selloianum, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 134 = amplum.
Sellowianum, Steud. Norn. ed. II. i. 792-Lipocarpha Sellowiana.
senegalense, Rich, ex Pen. Syn. i. 70-Lipocarpha argentea.
silvaticum, *Poepp. ex Kunth, Enum. PI.* ii. 270.—Bras.
Soyauxii, Boeck. in Flora, lxv. (1882) 26 (Mapaniae sp.).—Afr. trop.
sphacelatum, Vahl, Enum. ii. 288 - Lipocarpha sphacelata.
sphaerostachyum, *Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1871) 155.—Bras.
strictum, Poepp. ex Kunth, Enum. PI. ii. 270 (Mapaniae sp.).—Bras,
sylvaticum, *Poepp. ex Kunth, I. c.*—Bras.
triceps, A. Dietr. Sp. PI. ii. 368-Lipocarpha sphacelata.
trinervium, Kunth, Enum. PI. ii. 272-latifolium.
umbellatum, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. 91 = pungens.
Wightiaium, *Boeck. in Linnaea,* xzxvii. (1871-73) 130.—Ind. or.

HYPOPHAË, Medic. Pfl. Anat. 95 (1799) - Hippophaë, Linn. (Elaeag.).

HYPOPHIALIUM, Nees, in Linnaea. vii. (1882) 680, in syn. = Ficinia, Schrad. (Cyperac).
capillifolium, Nees, 1. c. = F. ramosissima.

HYPOPHYlifcANTHTTS, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 61. *RVTACEAE.*
Lindeni, *Regel, I. c*—N. Granat "

HYPOPITHIS, Rafin. in Med. Rep. N. York, Ser. III. i- (1810) 297 = seq.

HYPOPITHYS, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 285 (1772)-seq.

HTPOPITYS, Dill, ex Adans. Fam. ii. 443 (1763;. *MONOTROPEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 607.
MONOTROPA, Linn. Gen. ed. I. Ill (1737), partim.
dentata, Rafin. in Med. Rep. N. York, Scr. III. i. (1810) 297 = multiflora.
europaea, Nutt. Gen. Am. i. 271-multiflora.
glabra, DC. Prod. vii. 780 - multiflora.
kypophegea, G. Don, Gen. Syst. iii. 866-multiflora.
lanuginosa, Rafin. in Med. Rep. N. York, Ser. III. i- (1810) 297 ; Nutt. Gen. Am. i. 271 = multiflora.
lutea, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI. ii. 404 = multiflora.
Monotropa, Crantz, Inst. ii. 467-multiflora.
multiflora. *Scop. Fl. Carn.* ed. II. i. 285.—Reg. bor. temp.
racemosa, Rafin. in Med. Rep. N. York, Ser. III. i. (1810) 297 = multiflora.
secunda, Rafin. 1. c. - multiflora.
stricta, Rafin. 1. c. = multiflora.
uniftora, Crantz, Inst. ii. 467 - Monotropa uniflora.

HYPOPOGON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 246 = 8ympl0CO8, Linn. (Styrac).
brevipes, Turcz. 1. c. = S. coccinea.

HYPOPORUM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 80S-Solerla, Berg. (Cyperac.).
annulare, Nees, 1. c. - S. annularis.
Balduinii, Torr. in Ann. Lye N. York, iii. (1828-86) 382 = S. Baldwinii.
capillare, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 803 - S. lithosperma.
capitatum, Nees, 1. c. - S. Neesii.
compositum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 171-S. composita.
diffusum, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303 = S. verticillata.
gracile, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1828-36) 881-S. gracilis.
hirtellum, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303-S. hirtella.
humile, Nees, 1. c.-S. hirtella.
interruption, Nees, I. c - S. interrupta.
interruptum, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1828-36) 882=S. hirtella.
leptostachyum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 172 = S. leptostachya.
lithospermum, Nees, in Wight, Contrib. 117 - S. lithosperma.
micrococcum, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 256 = S. micrococca.
nutans, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 170-S. hirtella.
pergradle, Nees. in Edinb. N. Phil. Joum. (1834) 267 = S. pergracilis.
pleostachyum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 170-S. pleostachya.
purpurascens, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 256 -S.Liebmanni.
purpurascens, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 803=S. lithosperma.
pygmaeum, Nees, 1. c.-S. pygmaea.
Sieberi, Nees, 1. c - S. lithosperma.
tenellum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 171 — S. tenella.
variegatum, Nees, 1. c. 173 = S. variegata. -
verticillatum, Nees, in Bonplandia, iii. (1856) 87 "S. Liebmanni.
verticillatum, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303-S. verticillata.
virgatum, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 172=S. virgata.

HYPOPTERON, Hassk. Cat. Hort Bog. Alt. 154 (1844) -Chirita, Uuch.-Ham. (Gcsnerac.).

HYPOPTERYGIUM, SchlechL in Linnaea, xvii. (1843) 635 « Juliania, Schlecht (Anacard.).
adstringens, Schlecht. 1. c - J. adstringens.

HYPOPYTHIS, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352-Hypopitys, Dill. (Monotr.).

HYPOTHRONJA, Schrank, in Syll Ratub.1 (18S4) 85 = Hyptis, Jacq. (Labiat.).
undata, Schrank, 1. c. = H. faiciculata.

HYPOXANTHUS, Rich, ex DC. Prod. iii. 180 (1828)- Miconia, Ruii & Pav. (Melastom.).

HYPOXIDOPSIS, Stend. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1679) 450 = Iphigenia, Kunth (Liliac).
pumila, Steud. ex Baker, L c. = I. indica.

HYPOXIS, Forsk. Fl. Acgypt. Arab. 74 - Scillft?, Linn. (Liliac).

HYPOXIS, Linn. Syst. ed. X. 98A (1759). *AMARYL-L/DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 717.
FRANQUKVILLEA, Zoll.ex Miq. Fl, Ind. Bat. iii. 686 (1855).
IANTHE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 44 (1886).
NIOBEA, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 762 (1830).
SFILOXENE, Salisb. Gen. PI. Fragm. 44 (1866).
abyssinica, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 21 -villosa.
acuminata, *Eckl. Top. Vert.* 9.—Afr. austr.
affinis. Schult. f. Syst. vii. 774=alba.
alba, Z.inn./. *Suppl.* 198.—Afr. austr.
Andrewsii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 104.—Afr. austr.
angolensis, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* i. (1878) 266.—Afr. trop.
angustifolia, *Lam. Encyc.* iii. 182.—Ins. Borbon.
aquatica, *Linn./. Suppl.* 197.—Afr. austr.
argentea, *Harv. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 110.—Afr. austr.
Amottii, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) II. 552—Afr. austr.
aurea, Eckl, Top. Verz. 10-stellata.
aurea, *Lour. Fl. Cochinch.* 200.—Cochinch.
Baurii, *Baker, in Joum. Bot.* xiv. (1876) 181.—Afr. austr.
biflora. Baker, 1. c. » angustifolia.
brachystachya, Wight, Ic. t 2046-Curculigo Finlay-soniana.
breviscapa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 287 = decumbens.
caerulescens, [DC. in] Red. Lil. sub t. 169 = stcllata.
canaliculata, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* i. (1878) 265.—Afr. austr.
canescens, Fisch. *ii* Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. x. 50=villosa.
carici/olia, Salisb. Prod. 248-decumbens.
carolinensis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 188 ~ erecta.
colchicifolia, *Baker, in Gard. Chron.* (1884) II. 649.—Afr. austr.
costata, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xvii. (1878) 119. —Afr. austr.
crassi/olia, Pappe, ex Baker, 1. e. 102-alba,
cuanzensis, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* i. (1878) 265.—Afr. trop.
curculigoides, Wall. Cat. n. 5164-aurea.
decumbens, Auhl. PI. Gui. 804 -Curculigo scorzonerae-folia.
decumbens, Lam. Encyc. iii. 172=villosa.
decumbens, Unit. *PI. Jam. Pugill.* 11 i *Syst.* ed. X. 9b6.—Am. trop.
duhia, Schult. f. Syst. vii. 775 = alba.
dulcis, Steud. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (187B) 124 = Curculigo orchioides.
Eckloniana, *Schult. /. Syst.* vii. 1775, *Index.*—Afr. »«»tr.
elaia, Hook. f. Bot. Mag. t. 5690=hemerocallidea.
data, Schult. f. Syst. vii. 778-«tellata.
'legans, Poir. Encyc. Suppl. iii. 112-stellata.
elangata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 287-decumbens.
«ecta, *Linn. Syst.* ed. X. 986.—Am. bor.
Fabrida, Gaertn. Fruct. i. S3. t. 11-villosa.
/arinosa, Thunb. FL jap. S3 - Aletris japonica.
fascicularis, Linn. Syst. ed. X. 986 - Colchicum tnontanum.
filifolia, *Eckl. Top. Vert.* 10.—Afr. austr.
fili/olia. Ell. Sketch, 397~juncea.

HYPOXIS:—
filif rmis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 109. —Afr. ftustft
flavescens, *Eckl. Top. Ven.* 9.-Afr. awtr'
586 = aurea
Gavleri, Baker, in Journ. Linn. S xvii. (1876) 101 =
geniculaU, *Eckl. Top. Vtn.* 9,-Afr. anitr,
Gerrardi, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvn. (1878) 110. —Afr. austr.
glabelu, ». *R„ Prod.iW.*—Austral.
gracilis, Lehm. ex&hult. f. Syst. vii. 784 -decumbens.
graminea, 768.—
graminea, Madag.
hemerocallidea, *Fisck. Mey. V A^-Latl. Ind. Sem. Hort. Petro* a. et Sp. i. 286 =
kumilis, H. decumbens.
hygrometrica, *Ubill. No, Holl. PL* I- 18- 1.108.- Austral.
iridifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 117.—Afr.
Jacquini, W S & *Gard. Chron.* (1877) ... 652-Af, austr.
juncea, Eckl. Top. Verz. 10-stellata.
junca, *Sm. S*
Krausiana, *ZSreiTk^ss, in Flora,* xxvii, (1646) 311.-
Krebeii, *Fisch* Afr. austr.
lanata, Eckl. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xvii. (1878) 118 =
latifolia, *Hook.* g. t. 4617.—Afr. austr.
latifolia, Wigh 044 = Curculigo Finlaysoniana.
laxa, *Eckl. Top. Verz.* 9.—Afr. austr.
leptantha, Benth. Fl. Austral. vi. 451 = occidentalis.
leptostachya, Wight, Ic. t. 2045 = Curculigo Finlay-soniana.
linearis, Andr. Bot. Rep. t. 171 = stellata.
longifolia, *Baker, in Bot. Mag.* t. 6035.—Afr. austr.
longifolia, *Eckl. Top. Verz.* 9.—Afr. austr.
Ludwigii, *Baker, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 181.—Afr. austr.
*lusulaefol*M, [I>C k] Red. Lil. t 260-Curculigo plicata.
lusulaefolia, Eckl. Top. Verz. 10 = serrata.
marginata, *R. Br. Prod.* 289.—Austral.
membranacea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 106.—Afr. austr.
mexicana, Schult. f. Syst. vii. 761 = decumbens.
microsperma, *Avd-Latl. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* x. 50.—Afr. austr.
milloides, *Baker, i* Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 105.—Afr. austr.
minor, D. Don, Prod. Fl, Nep. 58 = aurea.
minor, *Eckl. Top. Verz.* 10.—Afr. austr.
minor, Seem. Bot. Voy. Herald, 419 = Curculigo orchi-oides.
«,Wa,Eckl. ex Schult. f. Syst. vii. 774-P.uridla hypc c d
mtoM?L£n a f. Suppl. M.-M'.£'=
monanthos, *Baker, in Trans. Linn. ioc.* Ser. U. *Bot.* i. iir.
auiticeps, *Bucking, ex Krauss, in Flora,* xxviii, (1845) 311.—Afr. austr.
nana, E. Mey. ex Baker, in Journ. Linn. Sac. xvii. (1878) 126-Pauridia hypoxidoides.
natalensis, *Ktottsch, in Otto (f Dietr. Allg. Gartent.* xxiv. (1856) 164.—Afr. austr.
obliqua, Amir. Bot. Rep. 1.195 « Andrewsii.
obliqua, Eckl. & Zcyh. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 102 - alba.
obliqua, Jacq. Coll. Suppl. 54-villosa.
obtusa, *llurch. [ex Ker-Gawl. in] Bot. Keg. 1.*169.— Afr. austr.
occidentalis, *Benth. Fl. Austral,* vi. 461.—Austral.
orchioides, Kurz, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lujjd. Uat.iv. 177 " Curculigo orchioides.
ovata, *Linn./. Suppl.* 197.—Afr. auttr.
pallida, Salish. Prod. 2J8-erecta.
pannosa, Baker, in Gard. Chron. (1874) H. 130» villosa.
parvula, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 113. —Afr. austr.
pauciflora, Wight, Ic. t. 2046 - Curculigo Finlay* ttnn'tnna.

HYPOXIS:—
Pavonina, Salisb. Gen. PI. Fragm. 44-stellala.
Petitiana, A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 316" villosa.
platypetala, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 105.—Afr. austr.
plicata, Jacq. Coll. Suppl. 55 — Curculigo veratrifolia.
plicata. Linn. f. Suppl. 19? - Curculigo plicata.
polystachya, *Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot. i.* (1878) 2«6.—Afr. austr.
pratensis, K. Dr. Prod. 289 - hygrometrica.
pumila, Lam. Encyc. iii. 184 - minuta.
pusilla, *Hook./. Fl. Tasm.* ii. 36.1.130 B.—Austral.
puritla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 286-decum-bens.
pusilla, *Presl, Bot. Bemerk.* 116.—Afr. austr.
nmosa, Lodd. Bot. Cab. t. 1936 (Komuliae sp.).— Afr. austr.
rhitophylla, Baker, Fl. Maurlt 369 (- *Molineria rkito phylla).*—Ins. Mascar.
rigidula. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) lit. —Afr. austr.
Rooperii, *T. Moore, Gard. Comp.* (1862) «6.—Afr. austr.
scabra, Lodd. Bot. Cab. t. 970-villosa.
scabra, *Presl, Bot. Bemerk.* 116.—Afr. austr.
Sehimperi, *Baker, in Journ. Linn. Six.* xvii. (1878) 110.—Afr. austr.
Schnittleinia, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 31- (Velloziae sp.).—Abyssin.
scortonerae/olia. Lam. Encyc. Iii, 183 — Curculigo leorzoncraefolia.
sericea, *Baker, in Joum. Linn. Soc.* xvii. (1878) 111. —Afr. austr.
serrate, *Linn./. Suppl.* 197.—Afr. austr.
stssilis, Linn. Sp. PI. ed. II. 489 -erecta.
bctosa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1878) 118.— Afr. austr.
simensis, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 32-villosa.
sobtilifera, Jacq. Coll. Suppl. 58—vUlosa.
spatkacea, Eckl.Top. Verz. 11-alba.
spicata, Thunb. Fl. Jap. 186 ~ Aletris japonica.
stcllata, *Linn./. Suppl.* 197.—Afr. austr.
stellipilis, *IKer-Gawl.] in Bot. Keg.* t. 668.—Afr. austr.
subtrigyna, *Willd. ex Schult. /. Syst.* vii. 779.-Am. austr.
tabularis, Eckl. Top. Veri. 10 -stellita.
tenuifolw, *Eckl. I. c*—Afr. austr.
tomentosa, Lam. Encyc. iii. 112 -» villosa.
triandra, Pappe, ex linker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) Mll-Pauridiahypoxidoldei.
trichocarpa, Wight, Ic t. 2046-Curcullgo Finlay-soniana.
tridentata, [DC.in] Red. Lil. subt. 169-stellata.
triflora, Harv. ex Baker, in Journ. Linn. Soc xvii. (1878) 102 - minuta.
trumata, Thunb. ex Schult. f. Syst. vii. 773-Pturidla hypoxidoides.
vaginata, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 668- gUbella.
veratri/olia, Willd. Sp. PI. ii. 109 -Curculigo veralri-folia.
villosa, Jacq. Coll. Suppl. 51-Jacquini.
villosa, *Linn./. Suppl.* 198.—Afr. austr
violacea, *Schult./. Syst.* vii. 779.—Arabia
Zcyheri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvu. ^io/»; 112. —Afr. austr.

HYPPOCHAKRIS, Bivona, Cent. PI. ii. 81 (1806)- Hypoohoeris, Linn. (Compos.).

HYPSELA, Presl, Prod. Monog. Lobel. 46 (1836).
CAMPANVLACEAE, Benth. Ac Hook. f. Ii. 650.
PRATIA, Wcdd. Chlor. And. ii. 9. t. 45 (1857), partim.
atacamensis, Y\a'.l Cat PI. Vase. Chi). 188-Pratia longi Dora.
lonRifloro, *Benth. V Hook. /. Gen.* ii. 650.—Reg. Maxell.
longifioru, Phil. f. Cat. PI. Vase. Chil, 188-Protia longiRora.
reniformis, *Presl, Prod. Monog. Lobel.* 45.—Reg. Andin.

HYPBBOCHABIB, Remy, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. viii. (1847) 238. *GERANIACEAE,* Benth. & Hook, f. i. 276.
pimpincllifolia, *Rtmy, 1. c.* 239.—Peruv.

HYPSERPA, Mien, in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 40=Iiimaoia, Lour. (Menlsp.).
bomeensis, Becc. Malesia, i. (1877) 149-L. bomeensis.
cuspidata, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1861) 40 ; et Ser. III. xiv. (1884) 36S = L. cuspidata.
funifera, Miers, 1. c. 865.—Afr. trap.
heteromera, Miers, 1. c.=L. bomeensis.
nitida, Miers, ex Benth. in Hook. Kew Town, iii. (1851) 258 - L. cuspidata.
paucifiora, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 366=L. cuspidata?
polyandra, Becc. Malesia, i. (1877) 148.—N. Guinea.
pnuvarieata, Miers, in Ann. *8c* Mag. Nat. Hist Ser. III. xiv. (1864) 365=L. cuspidata.
propensa$_K$*Mitrs,* 1. c.—Borneo.
selebica, Becc. Malesia, i. (1877) 148.—Ins. Celebes.
Selwyni, F. Muell. Fragm. ix. 82°>Selwynia laurina.
triflora, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 865 - L. microphylla.
uniflora, Miers, 1. c. = L. cuspidata.

HYP8IPODE8, Miq. Ann. Mns. Bot. Lugd. Bat iv. 82 (1868-69). *MEN1SPERMACEAE.*
subcordatus, *Miq. I. c* Java.

HYPTIANDHA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 293 (1862). *SIMARUBEAE,* Benth. & Hook. f. L 293, 990.
Bidwillii, *Hoot./. I. c.* 294.—Austral.

HYPTIANTHEHA, Wight & Am. Prod. 899 (1884). *RUBIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 94.
macrocarpa, Thw. Enum. PL Zeyh. 167=Nargedia macrocarpa.
rhamnoides, Zoll. *8c* Mor. Syst. Verz. Zoll. 60 = Plectronia horrida.
stricta, Wall. Cat. n. 8313 L=Lasianthus inconspicuus.
stricta, *Wight (f Am. Prod.*399.—Ind. or.; Burma.

HYPTIS, Jacq. Coll. i. 101 (1786). *LABIATAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 1178.
BROTERA, Spreng. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 151.112.
GNOTERIS, Rafin. Sylva Tellur. 76 (1888).
HIPPOTHRONIA, Benth. Lab. Gen. et Sp. 130, in syn. (1833).
HYPOTHRONIA, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1624) 85.
MESOSPHAERUM, P. Br. Hist. Jamaic. 257 (1756).
RHAPHIODON, Schau. in Flora, xxvii. (1844) 345.
SCHAUERIA, Hassk. 1. c. xxv. (1842) II. Beibl. 25.
SIAGONARRHEN, Mart, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 146 (1858).
actinocephala, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 212.—Cuba.
acuta, Benth. inlinnaea, vi. (1831) 82 = brevipes.
adamantium, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 91.—Bras.
adpressa, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 84.—Bras,
affinis, *Benth. I. c.* 109.—Ecuador,
albida, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 319.—Mexic.
albipes, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 88.—Bras.
alpestris, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 92.—Bras,
althaeaefolia, *Pahl, ex Benth. 1. c.* 115.—Bras,
altissima, *A. St. Hit. ex Benth. 1. c.* 135.—Bras,
alutacea, *Pohl, ex Benth. I. c.* 112.«—Bras,
amethystoides, *Benth. in DC. Prod.* xii. 180.—Bras,
ammotropha, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 218.—Cuba,
angulosa, *Schott, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 102.—Bras.
angustifolia, *Pohl, ex Benth. I. c.* 89.—Bras.
anomala, Benth. 1. c. 113=conferta.
aquatica, Pohl, ex Benth. 1. c. 116=carpinifolia.
araripensis, *Benth. in DC. Prod.* xri. 93.—Bras,
arborea, *Benth. I. c.* 182.—Guian.
arenaria, Benth. 1. c. 104 = Hnarioides.
arguta, Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 86=rugosa.
arida, A. St. Hil. ex Benth. 1. c. 116 =violacea.
aristata, *Benth. in DC. Prod.* xii. 111.—Bros.
arvensia, Poepp. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 712 = canescens.
aspera, Mart. *8c* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 189-spicata.
asteroides, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 93.—Bras.
atrorubens, *Poit. in Ann. Afus. Par.* vii. (1806) 466. t. 27. f. 3.—Am. trop.

HYPTIS:—
barbata, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 52.—Bras.
Besckeana, *Kunse, in Linnaea,* xx. (1847) 29.—Bras.
bisdentata, Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 87 = longipes.
Blancheti, *Benth. I. c.* 712.—Bras,
brachyphylla, *Mart, ex Benth. I. e.* 96.—Bras,
brachystachys, *Pohl, ex Benth. I. c.* 187.—Bras,
brevipes, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 465.—Am. austr.
brunnescens, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 83.—Bras.
caespitosa, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 113.—Bras.
calida, *Mart, ex Benth. 1. c.* 181.—Bras,
calophylla, *A. St. Hit. ex Benth. 1. c.* 138.—Bras,
calycina, *Pohl, ex Benth. I. c.* 140.—Bras,
campanulata, *Benth. in DC. Prod.* xii. 187.—Bras,
campornm, *Benth. 1. c.* 92.—Bras,
cana, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. etSp.* 135.—Bras.
Candida, Pohl, ex Benth. 1. c. 85 = nervosa.
canescens, Benth. 1. c. 120, partim=polystachya.
canescens, *H. B.* b* *K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 321.—Am. austr.
capitata, *Jacq. Coll.* i. 102; *Ic. Rar. I.* t 114.—Am. austr.
caprariaefolia, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 83.—Bras.
cardiophylla, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 84.—Bras,
carpinifolia, *Benth. 1. c.* 115.—Bras.
Chamaedrys, Willd. Sp. PI. iii. 85-Marsypianthes hyptoides.
Chamissonis, *Benth. in Linnaea, yi.* (1831) 570.—Bras.
Clausseni, *Benth. in DC. Prod.* xii. 131.—Bras,
clavellifera, *Benth. 1. c.* 91.—Bras,
cocdnea, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 139.—Bras.
coerulea, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 91.—Bras,
communis, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 128.—Bras,
complicata, *A. St. Hil. ex Benth. 1. c.* 111.—Bras,
concinna, *Benth. in DC. Prod.* xii. 136.—Bras,
conferta, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 112.—Bras,
conspersa, *Benth. in DC. Prod.* xii. 1S4.—Bras.
cordata, Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 110 - rcmota.
coriacea, *Benth. in DC. Prod.* xii. 95.—Bras,
corymbosa, *Benth. 1. c.* 112.—Bras,
crassifolia, *Mart, ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 94—Bras.
ccenata, *Pohl, ex Benth. I. c.* 93.—Bras,
crinita, *Benth. I. c-* 95.—Bras.
criocauloides, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 157, sphalm. »= eriocauloides.
crispata, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 139.—Bras,
enneata, *Pohl, ex Benth. I. c.* 86.—Bros,
cymulosa, *Benth. in DC. Prod.* xiii. II. 459.—Bras,
densiflora, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 137.—Bras.
densifolia, *Pohl, ex Benth. I. c.* 100.—Bras.
desertorum, Pohl, ex Benth. 1. c 88=brunnescens.
dictiocalyx, *Benth. in DC. Prod.* xii. 13L—Bras,
dictyodea, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 91.—Bras,
dilatata, *Benth. in DC. Prod.* xii. 108.—Guian.
discolor, Hort. Berol. ex Lehm. Ind. Sem. Hort Hamb. (1830) 5 (Quid ?).—Hab. t
ditassoides, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 99.—Bras.
divaricata, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 82.—Bras,
diversifolia, *Benth. PI. Hartw.* 144.—Pemv.
dnbia, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 122.—Bras.
duplicatodentata, Pohl, ex Benth. 1. c. 114=vestita.
dyctiodea, Benth.-in DC. Prod. xii. 101 = dictyodea.
ebracteata, R. Br. in Ait. Hort Kew. ed. II. iii. 391 = snaveolens.
elongata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 88.—Peruv.
Emoryi, *Torr. in Ives, Rep. Colorado River, Bot.* 20.—Calif,
eriocalyx, *A. St. Hil. ex Benth. Lab, Gen. et Sp.* 131.—Bras,
eriocauloides, *A. Rich. fl. Cub. Fanerog.* ii. 157 (err. typ. criocauloides).—Ins. Pinet
eriocephala, *Benth. in DC. Prod.* xii. 121.—Peruv.
eriophylla, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 86.—Bras,
excelsa. *Mart, (f Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 188.—Mexic.
expansa, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 122.—Bras,
fascicnlata, *Benth. 1. c.* 130.—Bras.

HYPTIS:—
fastigiata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 180—fasciculata.
ferruginea, *Benth. 1. c.* 113.—Mexic.
ferruginosa, *Pohl, ex Benth. I. c.* 109.—Bras.
fiabellata, Pohl, ex Benth. 1. c. 123 = communis.
florida, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 150.—Ecuador,
foliosa, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 117.—Bras.
fragilifolia, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 85.—Bras,
fruticosa, *Saltm. ex Benth. I. c.* 123.—Bras.
Gaudichaudii, *Benth. in Linnaea,* vi. (1831) 77.—Bras,
glechomoides, *Weinm. Hort. Pawl.* 270 (Quid!).—Bras.
glandulosa, Sieber, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 244 = Salvia occidentalis.
glauca, *A. St. Hil. ex Benth. 1. c.* 141.—Bras.
globi/era, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 207 = brevipes.
glomerata, Hort. ex PresI, Bot. Bemerk. 101 = Marsypianthes glomerata.
glomerata, *Mart, ex Schrank, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 55.—Bras.
glutinosa, *Benth. in DC. Prod.* xii. ISO.—Bras,
gonocephala, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 212.—Cnba.
goyazensis, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 92.—Bras.
gratiolaeiblia, *A. St. Hil. ex Benth. I.* c—Bras.
graveolens, Mart, ex Benth. in DC. Prod. xii. 126 « i. snaveolens.
graveolens, *Salem, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 125.—Bras.
graveolens, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensk. ii. (1822) 62=umbrosa.
halimifolia, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 94.—Bias.
heterantha, *Benth. in DC. Prod.* xii. 134.—Bras,
heterophylla, *Benth. I. c.* 101.—Bras.
Hilarii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 90.—Bras,
hirsute, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 318. t 161.—Am. austr.
hispida, *Benth. in DC. Prod.* xii. 118.—Bras.
hispida, Poepp.'ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras, viii. £s = spicigera.
homalophylla,/•«*/, *ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 107.—Bras.
humilis, *Benth. in DC. Prod.* xii. 118.—Bras,
hypolenca, *Benth. I. c.* 135.—Bras,
imbricata, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 98.—Bras.
inamoena, *Benth. I. c.* 104.—Bras.
incana, Willd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 794-tomentosa.
incisa, *A. St. Hil.* b" *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp-* 87.-Bras.
inflata, Spreng. Syst ii. 781-= Marsypianthes hyptoides-
inodora, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 56 - muricata.
interrupts *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 77.—Bras,
involucrata, *Benth. I. c.* 103.—Mexic.
involucrata, Mart, ex J. A. Schmidt, in Mart. Kl. Bras- viii. 120=alutacea.
irregularis, *Benth. in DC. Prod.* xii. 137.—Bras.
Itatiaiae, *Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxi. (1881) 70.—Bras.
Jaciniata, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 49.—Guian.
lacunosa, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 94.—Bras.
Ucustris, *A. St. Hil. ex Benth. 1. c.* 107.—Bras,
lagenaria, *A. St. Hil. ex Benth. 1. c.* 98.—Bras,
lamiifolia, *Weinm. in Syll. Ratisb.* i. ^1824) 226, 226.—Bras.
lanata, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 84.—Bras,
lanceifolia, *Thonn. in Schum.* £T *Thonn. Beskr. Gutn-PI.* 261.—Afr. trop.
lanceolata, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 114.—Bras,
laniflora, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 42. t. 20.—Calif.
lantanaefolU, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 468-*t.* 29. f. 1.—Am. austr.
lappacea, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 103.—Bras,
lappulacea, *Mart, ex Benth. I. c.* 104.—Bras,
latifolia, *Mart, ex Benth. 1. c.* 135.—Bras.
lati/olia, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. H*" hnarioides.
lanrifolia, *A. St. Hil. ex Benth. 1. c.* 184.—Bras,
lavandulacea, *Pohl, ex Benth. I. c.* 82.—Bras.
lavandulaefoliu, Steud. Norn. ed. II. i. 794=praec.

HYPTIB:-

laxiflora, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 189.—Bras.
leptoclada, *Bentk. in DC. Prod.* xii. 100.—Bras,
leucocephala, *Mart, ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 89.—Bras.
leucophylla, *•Pohl, ex Benth. I. e.* 184—Bm.
lilacina, *Cham. &• Schleckt. in Linnaea,* v.(1880) 101.—Mexic.
linarioides, *Pohl, ex Benth. Lai. Gen. et St.* 99,—Bras.
lippioides, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 86.—Bras,
obata, *A. St. Nil. ex Benth. I. c.* 97.-Bras.
longiflora, Pohl, ex Benth. 1. c. 140-reticulata.
longifoha, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 106.—Bras.
Jongipes, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 88.—Bras,
lophantha, *Mart, ex Benth. 1. c.* 78,-Bras.
Lorentaana, *O. Hoffm. in Linnaea,* xliii. (1880-82) 137.—Reg. Argent.
lucida; *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* lOO.-Bras.
Lnndn, *Benth. in DC. Prod.* xii. 111.—Bras.
lurida. Sprang. Syst. il. 781 = Marsypianthes hyptoides.
lutescens, *Pohl, ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 109.—Bras.
lythtoides, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 118.—Bras,
macrantha, *A. St. Hil. ex Benth. I. e.* 140,-Bras.
macrocephala, *Mart, tr Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 186.—Mexic
macrochlla, *Mart, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 794.—Bras.
macrostachys, *Benth. in DC. Prod.* xii. 130.—Bras.
madagascariensis, Boj. Hort. Maurit. 251 - spicigera.
malaeophyll., *Benth. in DC. Prod.* xii. 86.—Bras.
marathrosma, Benth. 1. c. 140 « Lophanthns anisatos.
marifolia, *Benth. in DC. Prod.* xii. 186.-Bras.
marrubiaea, Benth. 1. c. 105-sinuata.
marrubiastra, Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 102-sinnata.
Martiusi, *Benth. I. e.* 95.—Bras,
melanosticta, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 488.—Ind. occ.
melissoides, *H. 3. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 820.—N. Granat.
mclochioides, *A. St. Nil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 187.—Bras.
•nembranacea, *Benth. 1. c.* 182.—Bras.
nenthodora, Schrank, ex T. A. Schmidt, In Mart. Fl. Bras. viii. 84 - lophantha.
mierantha, Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 120 ~ spicata.
iHcroeephala, Bert ex Benth. 1. e. 81 - recunrata.
microphylla, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 82.—Bras.
Mitanii, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 188-umbrosa.
fflinntifolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 218.«-Cuba.
Močiniana, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 129.—Mexic.
mollis, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 102.—Bras,
mollissima, *Benth. 1. e.* 85.—Bras,
monticola. *Mart, ex Benth. I. c.* 111.—Bras.
"Ultibracteata, *Benth. I. c.* 100.—Bras,
muttiflora, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 96.—Bras.
nultiseta, Benth. in DC. Prod. xii. 122-spicata.
muricata, *Schott, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 119.—Bras.
"palensis, Lehm. ex Stend. Nom. ed. II. i. 794 (»p. ignot.).—Nepal.
'"petoides, Fisch. ex Schrank, in Denksehr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 52 = pectinata.
nervosa, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 85.-Bras.
•HCMagaensis, *Oerst. in Kjoeb. Videnst. Meddel.* (1853) 34.—Nicaragua.
"•Srescens, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 111.—Bras.
"'tida, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. il. (1844) 188-Salvianitida.
""tidnla, *Benth. in DC. Prod.* xii. 91.—Bras,
•"•dicaulis, *Bentk. Lab. Gen. et Sp.* 79.—Bras.
oMongifolia, *Benth. in DC. Prod.* xii. 126.—Mexic.
obtecu, *Benth. 1. c.* 99.—Bras.
°«Mata. *Benth. PI. Hart*. 241.—Am. austr.
obtMiflora, *Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 107.—Pernv.
"Musifolia, *R. Br. in Tuetey, Voy. Congo App.* 478.-Afr. trop.
'^Jiuto *Spreng. ex Bentk. Lab. Gen. et Sp.* 115.-

HTPTIS:—

odorata, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 81.—Peruv.
opposiiiflora, Schrank, in Denksehr. Bot Ges. Regensb. ii. (1822) 62-glomerata.
oppositifolia, J. A. Schmidt, In Mart. Fl. Bras. viii. lSS^glomerata.
orbiculata, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 111.—Bras.
origanoides, Pohl, ex Benth. I. c. 91 =velntina.
ovalifolia, *Benth. in DC. Prod.* xii. 87.—Bras,
ovata, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 92.—Bras,
paludosa, *A. St. Hil. ex Benth. 1. c.* 82.—Bras,
paniculata, *Benth. I. c.* 189.—Bras.
Parkeri, *Benth. 1. e.* 108.—Am. austr.
parvifiora, Mart *Sc* Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. II. (1844) 186-verticillata.
parvifolia, Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 118 - subrotunda.
pascuorum, Mart ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 118=atrorabens.
Passerina, *Mart, ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 80.—Bras.
pauciflora, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 117.—Bras,
pectinata, *Poit, in Ann. Mus. Par.* vii. (1806; 474. t. 80.—Cosmop. trop.
pedallpes, *Griseb. Cat. PI. Cut.* 213.—Cuba,
peduncularis, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 87.—Bras.
persica, Poit. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 471; Roth, Catalect. fasc. iii. 48 - pectinata.
petiolaris, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 101,—Bras,
petraea, *A. St. Hil. ex Bentk. I. c.* 117.—Bras,
pilosa, *Benth. I. c.* 124.—Bras,
platanifolia, *Mart, ex Benth. I. e.* 77.—Bras,
plectranthoides, *Benth. 1. c.* 122.—Bras.
Plumieri, Poit. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 473 - suaveolens.
plumose, *Benth. in DC. Prod.* xii. 94.—Bras.
Pohliana, *Jacq. ex Bentk. I. c.* 140.—Bras,
polyantha, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 470.—Peruv.
polystachya, *H. B. V K. Nm. Gen. et Sp.* ii. 821.—Am. trop.
procumbens, Schlecht. & Cham, in Linnaea, v. (1880) 101 ^atroru bens,
proteoides./l. *St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. etSp.* 110.—Bras.
proinosa, *Pohl, ex Benth. I. c.* 187.—Bras.
Pseudochamaedrys, Poit. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 469 — Marsypianthes hyptoides.
pubescens, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 12!).—Mexic.
pulegioides, *Pohl, ex Benth. I. e.* 128.—Bras.
pumila, Pohl, ex Benth. 1. c 122 - communis.
pnnctata, *Mart,* b* *Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. II. (1844) 186.—Mexic.
Purdiei, *Benth. in DC. Prod.* xii. 125.—N. Granat.
pycnocephala, *Benth. I. c.* 102.—Bras.
racemosa, Willd. ex Benth. 1. c 122-spicata.
racemosa, Zuccagni, in Roem. Collect. 143-pectinata.
racemulosa, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 126.—Bras.
radiata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 318-brevipes.
radiata, *Willd. Sp. PI.* iii. 84.—Am. trop.
Radula, Mart, ex J. A. Schmidt, In Mart. Fl. Bras. viii. 121-conferta.
ramosa, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 104.—Bras,
recurvata, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 467. t 28. f. 2.—Am. trop.
reflexa, *A. St. Hil. ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 83.—Bras.
remota, *Pohl, en Bentk. 1. c.* 110.—Bras,
reticulata, *Mart, ex Benth. 1. c.* 141.—Brat,
rhabdocalyx, *Mart, ex Benth. I. c.* 133.—Bras,
rhomboidea, *Mart. V Gat. in Bull. Acad. Brux.* xl. II. (1844) 188.—Mexic.
rhytidea, *Benth. PI. Hartv.* 21.—Mexic.
rigida, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 85.—Bras.
rostrata, Salzm. ex Benth. 1. c 121 = spicata.
rotundifolia, *Benth. 1. c.* 111.—Bras,
rubicunda, *Pohl, ex Benth. I. c.* 118.—Bras,
rubiginosa, *Bentk. I. c.* 108.—Bras.
rufula. Mart, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 128-lutescens.
rugosa, *Bentk. Lab. Gen. et Sp.* 88.—Bras,
saflcina, *J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras.* viii. 124.—Bras.
salviaefoIU, *Pohl, ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 130.—Bras.

HYPTIB:-

Salimanni, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 138.-Bras,
saxatilis, *A. St. Hil. ex Benth. I. c.* 90.—Bras,
scabra, *Benth. I. c.* 184.—Bras,
scoparia, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 475. t. 31. f. 2.—Ind. occ.
selnginifolia, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 87.—Bras.
Selloi, *Benth. I.e.* 89.—Bras,
sericea, *Benth. I. c.* 79.—Bras.
Sideritis, *Mart, ex Benth. I. c.* 97.—Bras,
simplex, *A. St. Hil. ex Benth. 1. c.* 138.—Bras,
sinuata, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 108.—Bras.
sordida, Pohl, ex Benth. 1. c 186 - scabra.
spicata, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 474. t. 28. f. 2.—Am. austr.
spicigera, *Lam. Encyc.* iii. 185.—Am. et Afr. trop.
spinulosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 129.—Mexic.
spiraeaefolia, *Mart, ex Benth. I. c.* 95.—Bras.
stachyodes. Link, Enum, Hort. Berol. ii. 106 - Elsholtzia incisa.
stellulaU, *Benth. Lai. Gen. et Sp.* 129.—Mexic.
stricta, *Benth. 1. c.* 79.—Bras.
strictissima, Pohl, ex Benth. 1. e. 99 - linarioides.
snaveolens, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 472. t. 29. f. 2.—Am. austr.
subrotunda, *Pohl, ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 118.—Bras.
subsessilis, Benth. in DC. Prod. xii. 92=longipe».
subvertidllata, Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 197.—Ins. Galap.
sylvulanim,X.A. *Hil.exBenth. Lab. Gen. et Sp.* 11U.—Bras.
Tafallae, *Benth. 1. c.* 182.—Peruv.
tenuiflora, *Benth. 1. c.* 121.—Bras,
tephrodes,^. *Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 164.—Mexic.
tetragona, *Pohl, ex Benth. Lai. Gen. et Sp.* 100.—Bras,
tomentosa, *Poit. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 469.—Mexic.
tricephala, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 112.—Bras.
turneraefolia, *Marl, ex Benth. I. c.* 98.—Bras.
Tweediei, *Benth. in DC. Prod.* xii. 110 (Tweedii).—Bras,
uliginosa, *A. St. Hil. ex Benth. Ub. Gen. et Sp.* 81.—Bras.
umbrosa, *Salzm. ex Bentk. 1.* r. 125.—Bras,
uncinata, *Benth. I. c.* 80.—Peruv.
undulata, Schrank, ex Denksehr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) f>l-f«sciculatat
urticoides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 820.—Am. austr.
velutina, *Pohl, ex Bentk. Lab. Gen. et Sp.* 90.—Bras,
vepretorum, *Mart, ex Benth. 1. c.* 181.—Bras,
vcrbenaefolia, *Mart, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras.* viii. 110.—Bras,
veronicacfolia,/>»*{, *ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 100.—Bras,
verticiUata.Jar?. *ic.Rar.M.* 1.118; *Coll.* 1. lOl.—Inri. occ
vesicnlosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 181.—Am. austr.
vestiU, *Benth. 1. c.* 114.—Bras,
viejensis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (185S) 84.—Nicaragua,
vilis, *Kunth V BaucM, Ind. Stm. Hort. Berol.* (1848) 13.-Vencznela.
villosa, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 110.—Bras.
vlolacea, *Pohl, ex Benth. 1. c.* 116.—Bras,
virgata, *Benth. 1. c.* 77.—Bras,
viscidula, *Benth. in DC. Prod.* xii. 92.-Bras.
vitlfolia, *Pohl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 138—Bras.
vnlcanica, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 188.—Panama,
xanthioccphala, *Mart, ex Benth. Lab. Gen. et Sfi.* 113.—Bras.

HYPTISSA, Salisb. Gen. PI. Fragm. 142 (1«6«)-Gladiolus, Toam. (Irld.).
rosea, Salisb. I. c. 143.—Hab.t

HYPUDAEURUS, Reichb. Nom. 37 (1841)-HYPODAEURUS, Hochst - Anthephora, Schreb. (Gramin.).
cenchroides, Hochst ex A. Br. in Flora, xxiv. (1841) 276 = A. Hochstetteri.

HYRTANANDRA, Miq. PI. Jnngh. 25 (1851) = Pouzolzia, Gaudich. (Urtic).
raudata, Miq. ex Redd, in Trans. Linn. Soc. xxv. (1865) 224 = P. caudata.
ciliaris, Miq. ex Bedd. 1. c.—Ind. or.
gracilis, M iq. Anal. Hot. Ind. iii. 20.—Ind. or.
hirta, Miq. PI. Jangh. 26-P. hirta.
javaniea, Miq. 1. c. 25 = P. pentandra.
lythroides, F. Muell. Fragm. vi. 253-P. hirta.
macrophylla, Bedd. in Madr. Joum. Sc. Ser. III. i. (1864) 57.—Ind. or.
pentandra, Miq. PI. jnngh. 25 ; et Fl. Ind. Bat. i. II. 261 = P. pentandra.
PouBoltia, F. Muell. Fragm. v. 194 - P. hirta.
nabra, Miq. ex Bedd. in Trans. Linn. Soc. xxv. (1865) 224-P. scabra.
ternata, Miq. ex Bedd. 1. c. = P. Wightii.
triandra, Miq. Fl. Ind. Bat. i. II. 262 = P. parvifolia.
Walkeriana, Thw. Enum. PI. Zeyl. 261 " P. pentandra.

HYSSOPIKOLIA,Opiz,Seznam,63 (1852) = Lythrum, Linn.
parvifiora, Opiz, 1. c. = L. Hyssopifolia.

HY8BOFTTB, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1785). *LABI ATEAE,* Bcnth. & Hook. f. ii. 1187.
alopecuroides, Fisch. ex Benth. in DC. Prod. xii. 252 - officinalis.
altissimus, Mill Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = officinalis.
angustifolius, Uieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 38 = officinalis.
anisatus, Nutt. (Jen. Am. ii. 27—Lophanthus anisatus.
aristatus, Godr. in Mém. Acad. Stanislas, Sér. III. (18501 108= officinalis.
beugesiacus, Jord. & Fonrr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 91 — officinalis.
bract eat us, C. C. Gmel. ex Stead. Nom. ed. I. 296, 423 - Elsholtzia cristata.
canescens, DC. ex Nym. Consp. 687 = officinalis.
eatariaefolius, Hort. Par. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 468 = Lophantbus scrophulariacfolius.
caucasicus, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 423-officinalis.
cinerascens, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 92 — officinalis.
cristatus, Lam. Encyc. iii. 187 - Pogostemon paniculatus.
decumbens, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. i. 46 - officinalis.
discolor, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 97 - Lophanthns anisatus.
h'ischeri, H ort. ex Steud. Nom. ed. II. *i.* 795 - officinalis.
Foeniculum, Spreng. Nov. Prov. 24 » Lophanthus anisatus.
hirsutus, Hill, Veg. Syst. xvi. 66 - officinalis *1*
lophanthoides, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Ncp. 110 = Plectranthus Gerardianusi
Lophanthus, Linn. Sp. PI. 56U - Lophanthns chinensis.
montanus, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 90 = officinalis.
myrti/olius, Desf. Tabl. ed. I. 68 *[myrthi/olius)* - officinalis.
nepetoides, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 1630 = Pogostemon plcctranthoides.
nepetoides. Linn. Sp. PI. 569 = Lophanthus nepetoides.
ocymi/olius, Lam. Encyc. iii. 187 - Elsholtzia cristata.
officinalis, *Linn. Sp. PI.* 569.—Europ.; As. temp.
orientalis, Adam, ex Willd. Enum. Hort. Berol. 699 - officinalis.
polycladus, Jord. & Fourr. Brev. PI. Nov. fasc. ii. 90 - officinalis.
pubescens, Jord. & Fourr. 1. c. 91 — officinalis.
recticaulis, Jord. & Fourr. 1. c. 90 - officinalis.
resupinatus, Moench, Meth. Suppl. 184'Lophanthus chinensis.
ruber, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = officinalis.
Schleicheri, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 288=officindnalis.
scrophulariaefolius, Willd. Sp. PI. iii. 48 - Lophanthus scrophulariaefolius.
septemcrenatus, Ehrcnb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 402-seq. ?
septemfidus, Ehrenb. ex Sweet, 1. c, nomen (Quid ?).—Aegjpt.

HYSTERIA, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 99 (1828), nomen, cCorymbis, Thou. (Orchid.).
veratrifolia, Reinw. 1. c.-C. corymbosa.

HYSTER1CINA, Steud. Syn. PI. Gram. 85 (1855; = Echinopogon, Beauv. (Gramin.).
alopecuroides, Steud. 1. c. = E. ovatus.

HYSTERIONICA, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f. ii. 252.
NEJA, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 78 (1831).
gracilis, *Benth. V Hoot./. Gen.* ii. 253.—Reg. Argent,
jasionoides, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* i. (1807) 140.—Reg. Argent,
linearifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 18.—Bras.
montevidensis, *Baker, 1. c.*—Reg. Argent,
nidorelloides, *Baker, 1. c.* 12.—Bras,
pinifolia, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 253; *Baker, in Mart. I.* c—Bras.
scaposa, Benth. & Hook. f. 1. c. = Leucopsis scaposa.
squarrosa, Baill. Hist. PL viii. 38 = Grindeliasquarrosa.
suhvillosa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 170.—Reg. Argent.

HYSTERONICA, Endl. Ench. 251 (1841)-praec.

HYSTEROPHORUS, Adans. Fam. ii. 128 (1763) - Parthenium, Linn. (.Compos.).

HYSTRIX, Moench, Meth. 294 (1794) = Aaperella, Humb. (Gramin.).
patula, Moench, 1. c. 295 = A. Hystrix.

I

IACARANDA, Nees, in R. Br. Verm. Schrift. v. 325 (1843)- Jacaranda, Juss. (Bignon.).

IALAPA, Crantz, Inst. ii. 265 (1786)-JALAPA, Toum. -Mlrabilia, Linn. (Nyctag.).

IANTHA, Hook. Exot. Fl.t. 113 (1826)-Ionopsls, Thunb. (Orchid.).
pallidiflora, Hook. 1. c^Ionopsis pallidiflora.

IANTHE, Salisb. Gen. PI. Fragm.44 (1866) - Hypoxis, Linn.
linearis, Salisb. 1. c = H. stellata.
ovata, Salisb. 1. c. = II. ovata.
serrata, Salisb. 1. c = H. serrata.

IAKAVAEA, Scop. Introd. 215 (1777)-Miorollcla, D. Don (Melastom.J.

IASIONE, Moench, Meth. 518 (1794)- Jasione, Linn. (Campan.).

IATROPIIA, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 447 (1812)- Jatropha, Linn. (Euphorb.).

IBATIA, Dccne. in DC. Prod. viii. 699, 605 (1844) = LachnOBtoma, H. B. & K. (Asclep.).
albiflora, Karat. Fl. Colnmb. ii. 113. t 160. f. 1.—N. Granat.
eiliata, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 809.—Bras.
diversifolia, Fourn. 1. c.—Bras.
fimbriata, Karst. Fl. Columb. ii. 118. t. 160. f. 2.—N. Granat.
lanosa, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 309.—Bras.
maritima, Decne. in DC. Prod. viii. 699-L. maritimum.
maritima, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 744, sphalm. - *muricata.*
mollis, Griseb. Cat. PI. Cub. 177.—Cuba.
muricata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 421 = Gonolobus maritimus.
quinquelobata, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. IV. 308.—Bras.
Selloana, Fourn. 1. c 309.—Bras.

IBBERTSONIA, Steud. Nom. ed. II. i. 800 (1840)- seq.

IBBETSONIA, Sims, Bot Mag. t. 1259 (1810)" Cyolopla, Vent. (Legumin.).
genistoides, Sims, L c — C. genistoides.

IBEBXDEIIIIA, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvii. (1842) 188. *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 92.
SYKENOPSIS, Jaub. & Spach, Illustr. i. t. 3 (1842).
Andersoni, *Hook./. V Thorns, in Joum. Linn. Soc.* v. (1861) 177.—Reg. Himal.
caespitosa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 190.—Armenia,
heterophylla, *Boiss. VBuhse, in Nouv. Mtm. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 25.—Reg. Caucas.
ovali/olia, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 189-trinervia.
rotundifolia, *Hook./. Bot. Mag.* t. 5749.—Europ.
sagittata, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Six.* II. xvii. (1842) 188.—Persia,
tenuis, *Boiss. if.Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 25.—Persia,
trinervia, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 188.—Armenia.

IBERIS, Adans. Fam. ii. 422 (1768) = LepidiUBl, Toum. (Crucif.).

IBERIS, Dill, ex Linn. Syst. I (1735). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 92.
ARABIS, Adan». Fam. ii. 422 (1763).
acutiloba, Bertol. Misc. Bot. ii. 12. t. 9. f. l = odorata.
affinis, Jord. Adnot. Gr. Jard. Bot Dijon (1848) 25 = panduraeformis.
amara. *Linn. Sp. PI.* 649.—Europ.
amara, Pall. Ind. Taur.; ex Uieb. Fl. Taur. Cauc. ii-102-tAurica.
amoena, Jord. Obs. PI. Crit. vi. (1847) 46-umbellala.
apricorum, *Giraudias, in Feuilles Jeun. Natural,* vi. (1876) 103.—Gallia.
arabica, Linn. Cent. I'l. i. 17 ; Amoen. Acad. iv. 278 = Aethioncma cappadocicum.
Arbuscula, Spacli, Hist Vćg. Phan. vi. 562—semper-virens.
arvatica, Jord. Diagn. i. 288"amara.
attica, Jord. Obs. PI. Crit. vi. (1847) 42=Jordani.
aurosica, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. i. 349; iii. 289-nana.
aurosica, Coss. ex Willk. *8c* Lange, Prod. Fl. Hisp-iii. 771-Lagascana.
badensis, Linn. Cent. I'l. i. 17 =Thlaspi montanum.
lialansae, *Jord. Diagn.* i. 274.—Algeria.
bellidi/olia, Presl, Delic. Prag. 13 = Pruiti.
Benthamiana, Boiss. & Keul. I'ugill. PI. Nov. (1852) 12 = Bernardiana.
Bernardiana, *Gren. V Godr. Fl. Fr.* i. 188.—Mont. Pyren.
bicolor, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 659.—Europ.
bicorymbi/era, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 141 = panduraeformis.
boppardensis, Jord. Obs. PI. Crit. vi. (1847) 62 = intermedia.
Bourgaei, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 39 = pectinata.
Bourgaei, Jord. Diagn. i. 276 = contracta.
Bouteloui, Willk. in Bot Zeit. v. (1847) 236 ~ pectinata.
brachystyla, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. 14-Aetbionema ibendeum.
Bubani, Deville, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 69 - Bernardiana.
Bursa-pastoris, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. i. 21 ; ed. II. 20-Capsella Bursa-pastoris.
bursi/olia, Berger. ex DC. Syst. ii. 392 - Teesdalia Iberis.
calycina, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 18 (Quid f).—Java.
campestris, Wallr. Sched. Crit. 341=Lepidlum campestre.
candicans, Hafin. Atl. Joum. 146 (Quid ?).—Am. bor.
Candolleana, Jord. Obs. PI. Crit. vi. 1847) 37 = nans.
cappadocica, Willd. Sp. PI. iii. 462 (= *Ptilotrichum cappadocicum).*—Cappadoc.
camosa, *Willd. I. c.* 45ft.—Europ.
cepaeae/olia, Pourr. in Mem. Acad. Toul. iii. (1788) 821 = camosa.
cepeae/olia,T<:noK, Prod. Fl. Nap. p. xxxvii = Tenorii-
cepeaefolia, Wulf. in Jacq. Misc. ii. 28 = Thlaspi cepeae-folium.

IBERIS:—
ceratophylla, Reut. in Compt.-Rend. Soc. Haller. (18,53-54) 18 = panduraeformis.
chloraefolia, Sibth. & Sm. Fl. Grace. Prod. iL 10= Aethionema chloraefolium.
ciliata, *All. Fl. Pedem.* 15.—Eorop.
titiata, Willd. Sp. PL iii. 455 ; Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 102-taurica.
cinerea, *Pair. Encye. Sufpl.* iii. 133.— Hispan.
collina, Jord. Obs. PI. Crit. vi. (1847) 57 - intermedia.
commutata, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i. 383 — sempervirens.
conferta, *Lag. in Varied. Ciene.* ii. IV. (1805) 218.—Hispan.
Centejeani, Billot, Annot. 95—intermedia,
contracta, *Pen. Syn.* ii. 186.—Hispan.
corifolia, *Sweet, Hart. Brit.* ed. I. 22.—Europ. austr.
coronaria,T>. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 359-umbellata.
corymbosa, Moench, Metb. 269*=nmbellata.
crassifolia, Ponrr. ex Willie. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 770«=camosa.
crenata, Lam. Encyc. iii. 213 = pinnata.
eretica, Linn. Sp. PI. 619 = linifolia ?
cuneata, Moench, Meth. 269=seraperflorcns.
decipiens, Jord. Diagn. i. 289=amara.
deflexifolia, Jord. Pngill. 13 = Prostii.
delphinensis, Jord. Diagn. i. 286 = Prostii.
dentata, Moench, Meth. Snppl. 88 = gibraltarica.
divaricata, Tausch, in Flora, xiv. (1831) 213 - intermedia. -
Durandii, Lorey & Duret, Fl. C&te d'Or, i. 68. t. 1 - Prostii.
florida, Salisb. Prod. 267 - sempcrflorens.
Forestieri, Jord. Gr. Recol. (1849) 21 = amara.
Carrexiana, All. Fl. Pedem. i. 260. t. 40. f. 8 it t. 54. f. 2 = sempervirens.
Garrexiana, Scop. Delia Insub. i. 16. t. 7—saxatilis.
Gastoni, Delacroix, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1856) 456 — sempervirens.
gibraltarica, *Linn. Sp. PI. 649.*—Hispan. ; Marocc.
glauca, Lag. ex Willie. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 773=conferta.
glauccscens, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. IV. ii. (18(4) 243.—Cilicia.
granatensis, Boiss. & Reut. Pupil. PI. Nov. 11 = Tenoreana.
He$_B$clmaieri, *Willk. in Willk. (f Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 770.—Hispan.
hirsuta, Hab.? Hort. Par. ex Willd. Ennm. Hort. Berol. Suppl. 44 = pubescens.
hispidnla, *Tenure, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1833) 14.—
horten'sis, Jord. Obs. PI. Crit. vl. (1847) 46, 74.1.1 = nmbellata.
humifusa, *Lag. ex Link, Handb.* ii. 290 (Quid?).—Hispan.
humilis, Presl, Delic. Prag. 12 «= semperflorens.
integerrima, Moris, Stirp. Sard. Elench. i. 4-Pruiti.
integrifolia, Ledeb. Fl. Ross. i. 165-taurica.
intermedia, *Guersent, in Bull. Soc. Philom.* iii. (1811) 169. t. 21.—Gallia.
Jordani, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 38.—As. Min.
jucunda, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i. 347 — Aethionema coridifolium.
Lagascana, *DC. Syst.* ii. 400.—Hispan.
Lamottii,joi6. Pugill. PI. Nov. (1862) 13 =intermedia.
leptophylla, Jord. Diagn. i. 277 = linifolia.
linear,folia, DC. Syst. ii. 405 - Lepidium linifolinm.
linifolia, *Linn. Syst.* ed. X. 1129.—Europ. centr.
linifolia, Lorey St. Duret, Fl. Cote d'Or, i. 69, in »yn. = Prostii.
linifolia, Nym. CoDsp. 60=uinbellata.
linifolia, Schknhr, ex Steud. Norn. ed. II. i. 800 - amara.
Loreyi, J. Gay, ex Lorey & Duret, Fl. C&te d'Or, i. 89, in syn. — Prostii.
luiitanica, Hort. ex Fisch. Mey. ft Ave-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 78 - amara t
lusitanica, Jord. Diagn. i. 276 - contracta.
maialis, Jord. Obs. PI. Crit. vi. (1847) 53-wter-media.
Martinii, Timb.—Cf. Boll. Soc. Bot Fr. xxx.' (1888) Bibl. 186 " panduraeformis.
Molinerii, Balb. Cat. Hort. Taur. (1813) 43-ciliata.
numtolearensis, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. ft Nat. Toul. ii. (1874) 266=seq.
montolivensis, *Timb. 1. e. i.* (1872-73) 375.—Pallia.

IBEB.IS:—
nana, *All. Auct. Fl. Pedem.* 15. t. 2. f. 1.—Europ.
nana, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 64=Tenoreana.
neglecta, *Tenore, Cat. Orto Nap.* (1846) 101.—Hab. ?
nudicaulis, Linn. Sp. PI. 650=Teesdalia nndicaulis.
numidica, Jord. Diagn. i. 290 - parriflora.
odorata, Boiss. Voy. Bot. Espagne, 56 - pectinata.
odorata, *Linn. Sp. PI.* 649.—Graecia; Syria,
olympica, *Boiss. Diagn.* Ser. II. i. 37.—As. Min.
olymica, Sibth. ex DC. Syst ii. 666 - Aethionema chloraefoliiim.
oppositifolia, Pen. Syn. ii. 186 = Aethionema oppositifolium.
panduraeformis, *Paurr. in Mem. Acad. Toul.* iii. (1788) 320.—Europ. austr.
parvifiora. Lam. Encyc iii. 221—Aethionema saxatile.
parviflora, *Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr.* iL (1856) 282.—Afr. bor. occ.
pectinata, *Boiss. Diagn.* Ser. I. i. 75.—Hispan.
Petiti.Link, Handb. ii. 291, spbalm.-Pruirj.
petraea, Jord. Obs. PI. Crit. vi. (1847) 69-Tenoreana.
pilosa, Desv. Journ. Bot iii. (1814) 187=Tenoreana.
Pinardi, Jord. Fragm. vi. 42*taurica.
pinnata, *Linn. Cent. PL* i. 18; *Amoen. Acad.* iv. 278. —Europ. austr.
polita. Jord. Obs. PI. Crit. vi. (1847) 51-Prostii.
procumbens, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.* (1861) 29; *PI. Nov. Hisp.* fasc. i. 6. t. 6.—Hispan.
Prostii, *Soyer-Willem. ex Godr. Fl. Lorr.* ed. I. i. 73.—Gallia.
Praiti, *Tineo, Pugill. PI. Sic. i.* 11. n. 9.—Sicilia.
pubescens, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 43.—Hab.?
pulchra, Salisb. Prod. 267 =umbellata.
pumila, Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 269 -Thlaspi pumilum.
pyrenaica, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 370^Aethionema saxatile.
radicans. Lag. ex Nym. Consp. 60 ~ conferta.
Kaynevalil, *Boiss. V Reut. Diagn. PI. Nov. Hisp.* 6. —Hispan.
Raynevalii, Torrep. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 769 -umbellata.
repens, Lam. Fl. Fr. ii. 674 - Iberidella rotundifoiia.
rhodocarpa, Willk. in Bot. Zcit. v. (1847) 235 - Tenoreana.
rotundifolia, Lam. Eacyc. iii. 821 -camosa.
rotundifolia, Linn. Sp. PI. 649 - Iberidella rotundifolia.
ruderalis, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fate. i. 21 - Lepidium ruderale.
ruficaulis, Lej. Fl. Spa, ii. 68-amara.
saiauda, Puget, in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866) p. elxxv— amara.
saxatilis, Asso, Syn. PL Arag. 84-ciliata.
saxatilis, *Linn. Cent. PI.* ii. 28; *Amoen. Acad.* iv. 321.—Europ. austr.
semperflorens, Burm. f. Prod. Fl. Cap. 17-Alyssum spinosum.
semperAorens, *Linn. Sp. PI.* 648.—Europ. austr.
sempervirens, Burm. f. Prod. Fl. C«p. 17-Clypeola Jonthlaspi.
sempervirens, Lag. Gen. et Sp. Nov. 19 •-- subvelutina.
sempervirens, *Linn. Sp. PI.* 648.—Europ. austr.; As. Min.
sempervirens, Pall. Ind. Taur.; ex Ledeb, Fl. Ross. i. 186-saxatilis.
serrulata, Duf. ex Nym. Consp. 61 - Lagascana.
serrulata, *Vis. Fl. Dalmat.* iii. 111.—Dalmat
simplex, DC. Fl. Fr. Suppl. 6»7 -tanrica.
spathutata, Berger. Phytonomat.; ex DC. Fl. Fr. iv. 710-camosa.
spathulata, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hiip. iii. 771-Lagascana.
speciosa, Salisb. Prod. 267 = gibraltarica.
Sprunerl, *ford. Obs. PI. Crit.* vi. (1847) 48.—Graecia.
stricta, Jord. 1. c 60 - linifolia.
siylosa, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxxvii-Noccaea stylosa.
subvelutina, *DC. Syst.* ii. 397.—Hispan.
taurica, *DC. I. c.* 402.—As. Min.; Keg. Caucas.
Tenoreana, *DC. 1. c.* 404. (Cf. Pruiti).—Italia.
Tenorii, *Presl, Delie. Prag.* 14.—Italia.
Tenorii, Spreng. Syst. ii. 864-Tenoreana.
tenuifolia, Presl, Dclic. Prag. 14 -- linifolia.
Timeroyi, Jord. Obs. PL Crit. vi. (1847) 54-Intermedia.

IBERIS:—
umbellata, Georgi, Bescnr. Russ. Reich, iv. 1124-tanrica.
umbellata, *Linn. Sp. PI.* 649.—Eorop. austr.
umbellata, Webb, It. Hisp. 77; Boiss. Voy. Bot. Espagne, 64—contracta.
vermiculata, Willd. Sp. PL iii. 454-saxatilis.
Villarsii, Jord. Gr. Recolt. (1849) 22-Proi.tii.
violacea, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iv. 86.-Hab.f
Violetti, Soyer-Willem. ex Godr. Fl. Lorr. ed. I. i. 73 -Prostii.
virginica, Fisch. & Mcy. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 13 - Lepidium virginicum.
Welwitschii, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 39 ^ contracta.
Zanardinii, *Vis. Fl. Dalmat. Suppl.* 119.—Dalmat.

IBETTSONIA, Stend. Norn. ed. II. i. 459, in syn. fl84O) = IBBETSONIA, Sims - Cyolopia, Vent. (Legumin.).

IBIDIUM, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 291 = Bpiranthea, Rich. (Orchid.).
crystalligerum, Salisb, 1. c. 2!)2 =-S. orchioldes.
datum, Salisb. 1. c. 291-S. data.
spedosum, Salisb. 1. c - S . colorans.
spirale, Salisb. 1. c. - S. autumnalis.

IBINA, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) cd. I. Art. IV. 2-Sauropuol, Blume (Euphorb.).

IBISCUS, Linn. Syst. ed. I (1785) - Hibiscus, Linn. (Malvac).

ICAÇINA, A. Juss. Desc. Nouv. Gen. (1821); et in Mem. Soc. Nat. Hist. Par. i. (1828) 174. t. 9. *OLACINEAS,* Benth. & Hook. f. i. 362.
dubia, Macfad. Fl. Jamaic. i. 122 — Mappia racemosa.
grandifolia, *Miers, Contrib.* i. 66. t. 4.— Madag.
macrocarpa, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 357.—Afr. trop.
Mannii, *Oliver, 1. c.*—Afr. trop.
mauritiana. Mien, Contrib. i. 66. t. 4 — Apodyles mauritiana.
scnegalensis, *Juss. in Mim. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1828; 174. t. 9.—Afr. tiop.
trkhantha, *Oliver, Ft. Trop. Afr.* i. 858.—Afr. trop.

ICACO, Adans. Fam. ii. 805 (1763)-ChryBobalanuB. Linn. (Rosac).

ICACOREA, Aubl. PL Gul. il. Suppl. i. L 368 (1776) - Ardisia, Sw. (Myrsin.).
bahamenis, Lam. Illustr. t. 136; ex Rocin. & Schult. Syst. iv. 608-A. excelia.
dentata, A. DC. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvi. (1841) 94 - A. semicrenata.
guianensis, Aubl. PL Gal. ii. Suppl. i. t. 368 - A. acuminata.
Humboldtii, A. DC. in DC. Trod. viil. 14U -. A tetrandra.
principis, A. DC. 1. c. 120 •« A. semicrenata.
semicrenata, A. DC. in Ann. Sc. NaU Ser. 11. xvi. (1841) 94-A. semicrenata.
teylanica, Lam. ex Roem. *Sc* Schnlt. Syst. Iv. 616-A. humilis.

ICARANDA, Pen. Syn. ii. 178 (180?)-Jaoaronda, Juss. (Bignon.).

ICHNANTHUS, Bcauv. Agrost. 56.1.12. f. 1 (1812).
GRAM1NEAE, Bcnth. & Hook. f. ill. 1103.
NAVICULARIA, Raddi, Agrost. Bras. 38 (1823).
nffinis, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. II. 277.—Bras.
almadensis, Kunlh, Enum. PL i. 186 - Panicum nemorale.
alsinoides, *Munro, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bol.* iii. 600.—Nicaragua,
bambusiflorus, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. II. 288.—Bras.
breviscrobs, *Doell, I. c.* 294.—Bras,
calvcsccns, *Doell, I. e.* 285.—Bras,
eanilicaiu, *Doell, I. c.* 291.—Kras.
Cynotis, *Doell. I. r.* 284.—Bras,
fastigiatus, *Brongn. in Duperr. Voy. Coa. Hot.* 118. *i.* 18.—Bras.
HoffinannsrgKii, *Doell, in Mart. Fl. Rrai.* ii. M. 287. —Am. trop.
inconstans, *Doell, I. c.* 284.—Am. trop.
leptophyllus, *Dotll, 1. c* 287.—Am. trop.

ICHNANTHUB:-
leiocarpus, *Kunth, Rev. Gram.* ii. t. 168.—Bra*,
longiflonu, *Benth. in Journ. linn. Soc.* xix. (1881) 45. —Bras.
Martiunu, *Doell, in Mart. Ft. Bras.* ii. II. 280.—Am. trap,
niexicamu, *Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. BOO.—Mexic.
Minarum, *Doell, 1. c.* 294.—Am. trop.
nemorosus, *Doell, I. c.* 289.—Am. trap,
oplismenoides, *Doell, I. c.* 288.—Am. trop.
oplismenoides, *Munro, ex Benth. V Hook. f. Gen.* iii. U04.-Bns.
pallens, *Munro, ex Benth. Fl. Hongh.* 414.—Am. trop.
panicoides,. *Beauv. Agrost.* 56.1.12.—Am. austr.
petiolatus, *Doell, in Mart. Ft. Bras,* ii, Ii. 278.—Bra*.
Pluotis, *Trin. in Mem. Acad. Pétersb. Sit.* VI. i. (1885) 822.—Am. trop.
Riedelii, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. II. 278.—Bras.
Kuprechti, *Doell, 1. c.* 288.—Bns.

ICHNOCABPUS, R. Br. in Mem. Wem. Soc. i. (1809) 61. *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 717.
AGANOSMA, G. Don, Gen. Syst. iv. 77 (1887).
QUIRIVBLIA, Poir. Encyc vi. 42 (1804), nomen prius.
SPAINGIA, Muell. Arg. in Heurck, Ob*. Fl. Nov. 142 (1871).
affinis, Hook. f. & Thorns. « Benth. & Hook, f. Gen. ii. 717 - ovatifolius.
Afzeli, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 899.—Afr. trop.
bantamensis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 449.—Malaya.
dasycalyx, Miq. 1. c.=frutescens.
fragrans. Wall. Cat. n. 1676 = Trachelospennum fragrans.
frutescens, *R. Br. in Mem. Wern. Soc.* i. (1809) 62.—Zcylan.
frutescens, Naves, in Blanco, Fl. Phiiipp. ed. III. t. 97 =Navesii.
frutescens, Vidal, Sinops. t. 67- f. E=ovatifolius.
inflatus, Boch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 1876 » Trachelosperma fragrans.
latifolius, Buch.-Ham. ex Wall. 1. c. n. 1652-ovatifoliua.
leptodicfyus, F. Muell. Fragm. vi. 118 - frutescens.
I-oureirl, *Spreng. Syst.* I. 686.—Afr. trop.
inoluccanus, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 448.—Ins. Molucc.
Navesii, *Rolfe, in Joum. Linn. Soc.* xxi. (1884) 818. —Ins. Philipp.
ovatifolius, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 486.—Ins. Philipp.
ovatifolius, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 181 - Navesii.
jwbiflorus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 670.—Reg. HimaL
radicans. Wall. Cat. a, 1676-frattscens.

ICHTHYOSMA, Schlecht. in Linnaea, ii, (1827) 671. . t. 8; iii. (1828) 194 = Saroophyte, Sparnn. (Balanoph.).
Wehdamanni, Steud. Norn. ed. II. i. 801-seq.
Wehdemanni, Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 674" S. sanguinea.
Weinmanni, Harr. Gen. S. Afr. PL 300-praec.
Wiedemanni, Griff, in Trans. Linn. Soc. xix. (1846) 389 = praec.

ICHTHYOTHERA, [Klotzsch, ex] Bot. Zeit. U. (1844) 600-seq.

ICHTHYOTHEBE, Mart, in Buchn. Rep. Pharro. xxxv. (1830) 195. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f. ii. 346.
LATREILLEA, DC. Prod. v. 604 (1886).
TORRENTIA, Veil. Fl. Flum. viii. t. 149 (1827).
agiestis, *Baker, in Mart. Ft. Bras.* vi. III. 167.—Bras.
cearainsis, Gardn. in Field. & Gardn. Sert. PI. tub t. 9 -LCunabi.
Cunabi, *Mart, in Buchn. Rep. Pharm.* xxxv. (1830) 196.-Bras.
curvifolia, Moric PI. Nonv. Am. 150. t. 89 = 1. Cnnabi.
birsuta, *Gardn. in Field, to[1] Gardn. Sert. PI.* sob t. 9. —Bras.

ICHTHYOTHEBE:—
integrifolia, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 157.—Bras.
latifolia, *Baker, 1. c.* 166.—Bras.
latifolia, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn.Bot. vii.(1848) 424-1. Cunabi.
linearis, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. Ill, 164.—Bras,
mollis, *Baker, 1. c.* 156.—Bras,
peruviana, *Baker, I. c.* 163.—Bras,
rufa, *Gardn. in Field (f Gardn. Sert. PI.* t. 9.—Bra*,
snffruticou, *Gardn. 1. c.* t. 8.—Bras,
teraifolia, *Baker, in Mart. Jt. Bras.* vi. in. 166.—Bras.

ICHTYOTHERE, DC. Prod, v.,504 (1836) ~ Ichthyothere. Mart. (Compos.).

ICHTYOSMA, Stead. Nom. ed. II. i. 801 (1840)-ICHTHYOSMA, Schlecht. = Sarcophyte, Sparnn. (Balanoph.).

ICICA, AubL PL Gui. 837. tt. 130-186 (1776) = Protlum, Burm. f. (Burserac).
Abilo, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 266-Gamga floribnnda.
Acuchini, J. F. GmeL Syst. 619, sphalm. = P. Aracouchini.
acuminata, Poir. Encyc. Suppl. iii. 186; DC. Prod. ii. 78.—Guian.
altissima, Aubl. PI. Gui. i. 842.1.182=P. altissimum.
ambrosiaca, Mart. Reise, i. 651; et in Linnaea, v. (1830) Lilt. 42-P. heptaphyllum, gnianense,
Aracouchili, March, in Adansonia, viii. (1867) 51° seq.
Aracouchini, Aubl. PI. Gui. i. 843-P. Aracouchini.
bengalensis, Vpigt. Hort. Suburb. Calc 149 = P. serratum.
Carana, H. B. & K. Nov. Gep. et Sp. vii. 84 = P. Carana.
Copal, A. Rich. Ess. FL Cnb. 386-P. guianense.
Copal, Schlecht. & Cham, in Linnaea, v. (1830) 601 - P. Copal.
crassifolia, Engl. in DC. Monog, Phan. iv. 81'P. crassifolium.
cuspidata, H. B. *tt* K. Nov. Gen. et Sp. vii. 84- P. altissimnm.
decandra, Aubl. PI. Gui. i. 346 = P. decandrum.
decandra, Sagot, ex Engl. in DC. Monog, Phan. iv. 78 =»P. Sagotianum.
dentata, DC. Prod. ii. 78 = Clausena Willdenowii.
enneandra, Aubl. PI. Gui. i. 346. t. 184 = P. decandrum.
Goudotiana.Jul. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* III. vii. (1847) 872-Crepidospermnm Goudotianum.
guianensis, Aubl. PL Goi. i. 840. t. 131-P. gnianense.
guianensis, Trlana & Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1872) 297, partlm-P. heptaphyllum.
Hedwigia, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 388.—Cuba.
heptaphylla, Anbl. PL Gui. i. 337. t. ISO--P. heptaphyllum.
heptaphylla, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 173 = P. guianense*
heterophylla, DC. Prod, ii, 77=P. Aracouchini.
Hostmanni', Miq. Stirp. Surin. Sel. 66 = P. Hostmanni.
Icicariba, DC. Prod. ii. 77=P. Idcariba.
indica, Wight & Am. Prod. 177=P. serratum.
inrifm's, Triina *Sc* Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1872)299-P.insigne.
leptophloeos, Mart, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 44 = Bursera leptophloeos.
leptostachya, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1868) I. 473.- Mexic.
macrophylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 33-P. maerophyllnm.
maritima, Casar. ex Engl in DC. Monog. Phan, iv. 70 = P. brasiliense.
obovata, Engl. in DC. 1. c. 83, in syn.~P. Copal,
parnfolia. Spruce, ex Engl. 1, c. 74 = P. Aracouchini.
pentandra, Aubl. PL Gui. t. 135-P. decandrum.
polybotrya, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxxi. (1868) I. 478 = P. polybotryum.
pubescent, Benth. in Hook. Kew Joura. iv. (1852) 16 -P. pubescent
rufa. Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. L (1792) 108. —Guian.
Saltmanni, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxi. (1858) I. 478-P. heptaphyllum.

ICICA:—
Schomburgkii, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui. 1188, nomen.—Guian.
Sellowii, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 69, in syn. =• Protinm Icicariba.
serrata, DC. Prod. ii. 77.-"-Mexic.
simplicifolia, Mart, ex Engl. in DC Monog. Phan. iv. 63—r. unifoliolatum.
Spruceana, Benth. in Hook. Kew Jonm. iv. (1862) 16 «=P. Spruceanum.
surinamensis, Miq. Stirp. Surin. Sel. 66-P. heptaphyllum.
Tacamahaca, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 33-P. heptaphyllum.
timoriensis, DC. Prod. ii. 78.—Ins. Timor.
trianensis, March, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 74 = P. Aracouchini.
unifoliolata, Spruce, ex Engl. 1. c 68-P. unifoliolatum.
miridiflora, Lam. Encyc. iii. 225= P. guianense.

ICICOPSIS, Engl. in Mart. FL Bras. xii. II. 255 (1874) -Protium, Burm. f. (Burserac).
brasiliensis, Engl. 1. c. 257 =P. Blanchetii.
caudata, Engl. 1. c =P. Sagolianum.
ferruginea, Engl. 1. c. 258-P. ferrugineum.
insignis, Engl. 1. c. 266 = P. insigne,
reticulata, Engl. 1. c. 258-P. reticulatum.
subserrata, Engl. 1. c. 259 = P. subserratum.
tenuifolia, Engl. 1. c. 265—P. tenuifolium.

ICHA, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1872) 740; Desc. Nuev. PL (1872) 8. *COMPOSITAE,* Benth. » Hook. f. ii. 1237.
involucrata, *Phil. II. cc.* 7.41; 83.—Chili.

ICO8ANDBA, Phil, in Linnaea, xxix. (1857) 39. *LAURINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 161.
rnfescens, *Phil. I. c.* 40.—Chili.

ICOSINIA, Rafin. Sylva Tellur. 75 (1838) = Btoroulifl. Linn.
paniculata, Rafin-. 1. c - S. grandiflora.

ICOSTEGIA, Rafin. Sylva Tellur. 163 (1838) - Clusia. linn. (Guttif.).
flava, Rafin. 1. c - C. flava.

ICOTORUS, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 216 - Heillia, D. Don (Rosac).
montanus, Rafin. 1. c. = N. Torreyi.

ICTHYOCTONUM, Boiv. ex Baill. in BulL Soc. Linn. Par. i. (1884) «0=Londhocarpus, H. & & K. (Legumin.).
madagascariensis, Boiv. ex Baill. 1. c = L. ichthyoctonus.

ICTHYOTHERE, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. HI. 168 (1884) - Ichthyothere, Mart. (Compos.).

ICTINUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 142; et in Diet Sc Nat. xix. 234; xxii. 659 (1821) = Gorterift, Linn. (Compos.).
gorterioides, Steud. Nom. ed. II. L 801 = G. diffosa.
piloselloides, Cass. in Bull. Soc Philom. (1818) 142 = G. diffusa.

ICTODES, Bigel. Med. Bot. ii. 41. t. 24 (1818) - Symplooarpus, Salisb. (Aroid.).
foetidus, Bigel. 1. c.-S. foetidus.

IDALIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 76 (1886)-Convol-TUlus, Toum.
albifiora, Rafin. 1. c. 77=C. elongatus.

IDELERIA, Kunth, Enum. PL ii. 810 (1837) - Tetraria, Beauv. (Cyperac).
capensis, Kunth, L c. 811.—Afr. austr.
Neesii, Kunth, 1. c. *(-Ely nan thus Krausii).~M-* auslr.

IDESIA, Maxim, in Bull. Acad. P&ersb. x. (1866) 485. *BIXINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 972.
POLYCARPA, Linden, ex Can. in Rev. Hortic. (1868) 330.
polycarpa, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* x. (1866) 486.—Japon.

IDESIA, Scop. Introd. 199 (1777)«Bopourea, Aubl,. (Verbenac. ?).

IDIANtfHES. Desv. Fl. Anj. 199 (1827) =Phaecasium, Cass. (Compos.).
puUhra, Desv. 1. c,«P. lampsanoides.

IDICIUM, Neck. Elem. i. 28(1790) - Qerbera, Gronov.. (Compos.).

IDOTHEA, Kunth, Enum. PI. iv. 841 (1848) - Drimia, Jacq. (Liliac.).
ciliaris, Kunth, I. c. 843-D. ciliaris.
drimioides, Kunth, 1. c. 846=-Urginea pusilla.
data, Kunth, 1. c. 348 - D . elata.
humilis, Kunth, I. c. 844 = D. pusilla.
Ltutwigii, Kuntli. 1. c. 681-Sdlla Ludwigii.
marginata, Kouth, 1. c. 846 = Urginea marginata.
media, Knnth, 1. c. 342-D. medla.
physodes, Kunth, 1. c. S45=Urginea physodes.
purpurascens, Kunth, 1. c. 342=D. purpurascens.
pusilla, Kunth, 1. c. 344-D. pusilla.
villosa, Kunth, 1. c 343 = D. villosa.

IDOTHEARIA, Presl, Bot. Bemerk. 114 (1844) - Drirnia. Jacq. (Liliac.).
ciliaris, elata, media, purpurascens, pusilla, villosa, Presl, 1. c-omnes *Drimiae* specierum homonymae.
kunMis, Presl, 1. c - D. pusilla.

IDRIA, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1868) 34 - Fouqulera, H. B. & *K.* (Tamarisc.).
columnaria, Kellogg, 1. c - F . spinosa?

IEBINE, Ra6n. FL Tellur. iv. 39 (1886)-Iiipari», Rich. (Orchid.).
nervom, Rafin. 1. c. = L. nervoaa.

IKDREGEA, Steud. Nom. ed. II. i. 801 (1840) = Peuoedanum, Toum. (Umbellif.).
rapensis, Steud. 1. c - P . capense.
• ollina, Steud. 1. c. - P. collinum.
montana, Steud. 1. a - P . Ecklonianum.
•uirgata, Steud. 1. c - P . capense.

IFLOOA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1819) 142; et in Diet. Sc. Nat. xxiii. 13 (1822). *COMPQSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 299.
TRICHOGVNE, Less, in Linnaea, vi. (1831) 231.
rauliflora, C. B. Clarke, Comp. Ind. 99 - Foutanesii.
Fontanesii, *Cass. in Did. Sc. Nat.* xxiii. 14 Afr. bor.; Ind. or.
obovata, C, *Bolle, in Bmplandia,* vii. (1859) 297.—Ins. Canar.
paronychioides, *fend, in Flora,* xxii. (1849) 748.—Afr. austr.
polycnemoides, *Fsntl, I. c*—Afr. austr.
Sibthorpii, Nym. Syll. 15 - Fontanesii.
spicata, Sch. Dip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 310-Fontanesii.
vertidllata, Fenzl, m Flora, xxii. (1849) 748 - polycnemoides.

H'UON, Ra6n. Fl. Tellur. iv. 12 (1836)-Ornithogalum, Toum. (Liliac).
nutans, Rafin. 1. c. — O. nutans.

IGNATIA, Linn. f. Suppl. 20 (1781) = Btryohnos, Linn. (Loganiac.).
amara, Linn. f. I. c. 14!) =S. Ignatii.

IGNATIANA, Lour. Fl. Cochinch. 128 (1790) - Stryohnos, Linn. (Log.nniac).
philippica. Lour. 1. c.-S. Ignatii.

IGUANARA, Reichb. Nom. 68 (1841)-seq.

IOUAMTTHA, Blume, in Bull. Ne'erl. 66 (1838); et Rumphia, ii. 105. t. 117 (1848). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 907.
SLACKIA, Griff. Notul. iii. 162 (1851).
bomeensis, *Scheff. in Ann. Jard. Buiten:* i. (1876) I61.-Bomeo.
geonomaeformis, *Mart. Hist. Nat. Palm.* iii. 229. t. 178.-Malaya.
leucocarpa, *Blume, in Bull. Nierl.* (1888) 66.—Sumatra,
remotiflora, *H. Wendl. in Bot. Zeit.* xvii. (1869) 68.-Borneo.
Wallichiana, *[Hook./, in] Benth. V Hook. f. Gen.* iii. 908—MaUVa.

ILDEFON8IA, Gardn. in Hook. Lond. Joum. Bot.. i. (1842) 184. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. *i.* ii. 953.
bibracteata, *Gardn. I. c*— Bras.

ILDEFONSIA, Mart, ex Steud. Nom. ed. II. i. 802 (1840) - Urtioa, Toum.

ILEOCARPUS, Mien, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser.. II. vii. (1851) 40=8tephania, Lour. (Menisperm.),. *Schimperi,* Miers, 1. C.=S. bernandifolia.

ILEX, [Toum.] Linn. Syst. ed. I (1735). *1UC1NEAE,* Benth. & Hook. f. i. 856.
AGERIA, Rafin. Sylva Tellur. 46 (1838).
AQUIFOLIUM, [Toura.] Adans. Fam. ii. 166 (1763).
ARINEHIA, Rafin. Sylva Tellur. 49 (1838).
BRAXYLIS, Rafin. 1. c. 51 (18881.
CHOMELIA, Veil. Fl. Flum. L t. 106 (182-7).
liNNKPTA, Rafin. Sylva Tellur. 52 (1838).
HEXOTRIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. iv. (1818) 265.
LABATIA, Scop. Introd. 197 (1777).
LEUCODERMIS, Planch, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 867 (1862).
MACOUCOUA, Aubl. PI. Gui. i. 88. t. 84 (1776).
OTHERA, Thunb. Nov. Gen. 56 (1783).
PALTORIA, Ruiz & Pav. Prod. 13 (1794); Fl. Peruv. i. 54. t. 84 (1798).
PILEOSTEGIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 276.
PRINODIA, Griscb. in Goett. Abh. vii. (1867) 224, in obs.
PRINOS, Gronov. ex Linn. Coroll. Gen. 6 (1737).
PSEUDEHRETIA, Turcz. in Bull. Sou. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 607.
SYNSTIMA, Rafin. Sylva Tellur. 48 (1838).
WINTERLIA, Moench, Meth. 74 (1794).
acrodonta, *Keiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 61.—Bras.
acuminata, Willd. Sp. PI. i. 711-1. Macoucoua.
acutangula, Nces, in Flora, iv. (1821) 801 -Maytcnus. acutangula.
acutangula, Nees, 1. c 829=Elaeodcndron quadrongulatum.
aestivalis. Lam. Encyc. Iii. 147; et in Joum. Hist. Nat. Par. i. (1792) 416-deddua.
affinii, *Gardn. in Hook. Ic. PI.* t. 405.—Bras.
amara, Bonpl. ex N.icrs, in Ann. *Sc* M«[. Nat. Hist. Scr. III. viii. (1861) 395 = Symplocos lanccolata.
ambigua. *Chapm. Fl. S. U. St.* 269.—Am. bor.
ambigua, Ell. Sketch, ii. 705-decidua.
ambigua, Torr. Fl. N. York.ii. 2-monticola, *A. Gray.*
Amelanchier, *M. A. 'Curt, ex Chapm. fl. S. U. SI.* 270.—Am. bor.
americana, Lam. in Journ. Hist. Nat. Par. i. (1792) 416-quercifoliai
Andersonii, *Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap.* 65.—Hab.?
angustifolia, Salisb. Prod. 70-1. Canine.
ungustifolia, Wllld. Enum. Hort. Berol. I. 172-1. Dahoon.
angnstissima, *Keiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 74.—Bras.
anomala, Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 111-Byronia sandwicensis.
Apollinis, *Keiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 69.—Bras.
Aquifolium, *Linn. Sp. PI.* 126.— Knrop.; As. occ.
Aquifolium, Lour. Fl. Cochinch. !)1 —Loureirei.
Aquifolium, Marsh. Arbust. Am. 63 = quercilolia.
ardisiaefrons, *Keiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 58.—Bras.
argutidens, Miq. in Versl. Mcd. Akad. Welensch. II. il. (1868) 84-serrata.
asiatica, *Linn. Sp. PI.* 125 (sp. dub.).—Ind. or.
asperula, *Mart, ex Rriss. in Mart. Ft. Bras.* xi. I. 48. -Bras,
asprella, *Champ, ex Benth. in Hook. Km Journ.* iv. (1852) 829.—China.
balearica, Desf Hist. Arb. Ii. 262-1. Aquifolium.
Iielschleriana, *Gotpp. Del. Scm. Hort. Vratisl.* (1862). —*Cf. Linnaea,* xxvi. (1858-56) 746.-Mexic.
Bonplandiana, Muenter, in Mitt. Naturw. Ver. Ncu-Vorp. xlv. (1883) 183-paraguensis.
brevicuspis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 66.—Bras.
brevifolia, Muenter, in Mitt. Naturf. Ver. Ncu-Vorp. xiv. (1883) 195-ovaIifulia, 6'. *F. W. Mey.*
brexinefolia, *Houit. ex Goepp. Del. Sem. Hort. Vratisl.* (1852).—*Cf. Linnaea,* xxvi. (1868-66) 740.—Hab. t

ILEX:—
Buergcri, *Miq. in Versl. Med. Akad. Wetensch.* II. ii. (1868) 84.—Japon.
bumelioidcs, *H. JS. V K. Nov. Geu. et Sp.* vii. 71.—Ecuador,
buxifolia, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 132.—Bras.
buxifolia, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) 364 s» Hanceana.
canadensis, Hort. ex Decne. in Fl. des Series, Se'r. I. ix. (1863-64) 184=1. Ainiifolium.
canadensis, Marsh. Arbust. Am. 64 - quercifolia.
canadensis, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 229 =• Nemopanthes canadensis.
canariensis, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 87.—Ins. Canar.
capensis, *Han. (f Sond. fl. Cap.* i. 473.—Afr. austr.
caroliniana. *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 3>1. Cassine.
Caisena, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 220-1. Cassine.
Cassine, Linn. Sp. PI. 125-1. Cassine, I. Dahoon.
Cassine, *Walt. Fl. Carol.* 241.—Am. bor.
Cassine, Willd. Hort. Berol. t. 31 "I. Dahoon.
cassinoides, Dum.-Coun. Bot. Colt. ed. 11. vi. 261-1. Cassine.
cassinoides. Link, Enum. Hort. Berol. i. 148-T. Dahoon.
castanearfolia, Hort. ex Decne. in Fl. des Serrei, Ser. I. ix. (1853-64) 186 = 1. Cassine.
celastroides, Klotzsch, ex Garcke, in Linuaca, xxii. (184!)) 68, parlimol. Macoucoua.
ceraufolia, *Reiss. in Mart. fl. Bras.* xi. I. 66.—Bra*,
chamacdryfolia, *Reiss. I. c.* 73.—Bras,
chinensis, *Sims, Bot. Mag.* t. 204;).—China,
uhrysocarpa, *Wender. Sem. Hort. Marb.* (1826) ; *ex Steud. Nom.* ed. I. i. 802.—Hab. 1
cinerea. *Champ, ex Benth. in Hook. Ken Journ.* iv. (1852) 827.—Hongkong.
cognata, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 68 —Bras,
condensata, *Turn, in Hull. Soc. Nat. Mosc.* xxxii. (1859) I. 277.-Mexic
congesta, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. i. 60.—Guiana.
conocarpa, *Reiss. I. c.* 65.—Bras.
coriacea, Chapm. Fl. S. U. St. 270-Iucida.
cornuta, *Lindt. V Paxt. Flow. Card.* i. (1850-61) 43.—China.
coronaria, *Rriss. 'in Mart. Ft. Bras.* xl.]. 61.—Bras.
costqta, lilumc, ex Maxim, in Mem. Acad. IVtcrsb. Sir. VII. xxii. n. in. (1881) 51 - macropodn.
rrassifalia, Ait. ex Steud. Nom. ed. II. i. 802-1. Aquifolium.
crassifolia, *Hook. lc. PI.* t. 149.—Peruv.
crassifotia, Mcerb. PI. Select. Ic. t. 4 - I. l'erado.
irassifolia, Willd. ex Scbult. Mant. iii. 837-scopulorum.
crennta, *Thunb. Fl. Jap.* 78.—Japon.
crepitans, llonul. ex Miens, in Ann. *Sc* Mag. Nat. flist. Ser. III. viii. (1861) SU6 - Humboldtiana.
crispa, Sicbold, Aardr. & Volk. Toelicht. Ontdekk. vrics, 166, nomen ruuota.
crocea, Drcge, ex Presl, Bot. Bemerk. 37-Elaeodendron capense.
crocea, Hort. ex Tenorc, in Atti Tctiu Riun. Sc. Ital. (1841) 604-Elaculendron ilicifolium.
crocea, Thunb. i'rod. PI. Cap. 32 - Elieodendron croccum.
cuiabensis, *Reiss. in Mart. fl. Bras.* xi. I. 71.—Bras,
cumaneuris, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1868) I. 45(1.—Venezuela.
Cumingiana, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 308.- Ins. Philipp.
cuneifolia, *Hook. lc. PI.* t. 294.—Jamaic.
cuneifolia, Linn. Sp. PI. 126-Iodlna cuneifolia.
Cunninghami, Hort. ex Loud. Encyc PI. Suppl. ii. iail'2=clipyri'na.
curitibensis, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. HI. viii. (1861) 803- pami:uciisi».
cymoan, */Hume, Bijdr.* 1149 -Malaya.
Dahoon, *Walt. Fl. Carol.* 241.—Am. bor.
daphnrphylloidrs, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix (1870) II. 72-NyBbascusilillorn.
daphtiogcnca, *Keiss. in Mart. Fl. Jiras.* xi. I. 46.—Guiana.
daphnoides, *Reiss. I. c.* 58.—Bras,
decidua, *Walt. Fl. Carol.* 241. -Am. bor.
delicatula, Barton, Fl. Vlrg. 87 - Ncmopanthcs cana. densis.
densifolia, *Miq. PI. Jungh.* 896.—Java.

ILEX:—
denticulata, *Wall. Cat.* n. 4333.—Ind. or.
Dentoni, Hort. ex Loud. Encyc. PI. Suppl. ii. 1302 = dipyrena.
dichotoma, Bernh. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 306 = Cassinopsis capensis.
diminuta, *Reiss. ex Maxim, in Mint. Acad. Pitersb.* Sér. VII. xxix. n. m. (1881) 21.—Bras,
dioica, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 171. -Ind. oce.
diospyroides, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 47.—Bras,
dipyrena, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* i. 473.——Reg. Himal.
discolor, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 5.—Mexic.
diuretica, *Mart, ex Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 61.—Bras.
divaricata, *Mart, ex Reiss. 1. c.* 67.—Bras.
Dodonaea, Linn. Sp. PI. 225 = Comocladia ilicifolia.
domestica, Keiss. in Mart. FL Bras. xi. I. 67 = paraguensis.
Doniana, *DC. Prod.* ii. 644.—Reg. Himal.
dnmosa, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 64.—Bras,
cbenacea, *Reiss. I. c.* 44.—Bras.
echinata, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 2 = 1. Acinifolium.
elliptica, I). Don, Prod. Fl. Nep. 189 = Doniana.
elliptica, H. B. *ic* K. Nov. Gen. et Sp. vii. 70 = 1. Paltoria.
emarginata, *Thunb. Fl. Jap.* 78.—Japon.
emarginella, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 606 = Walkeri.
embelioides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 601.—Reg. Himal.
euryaeformis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 61.—Bras,
exandra, *Bello, in Anal. Soc. Hist. Nat. Esp.* x. (1881) 251.—Ins. Porto Rico.
excelsa, Wall. Cat. n. 4321 (errore *exsulca)* = Doniana.
exsulca, Wall, vide praec.
ïasciculata, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 456.—Hab.»
ferox. Ait. ex Steud. Nom. ed. II. i. 802-1. Aqnifolium.
fertilis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 42.—bras.
flexuosa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 194 = Celastrus pednncularis.
floribunda, *Reiss. ex Maxim, in Mem. Acad. Pitersb.* Se>. VII. xxix. n. in. (1881) 26.—Bras.
floridana, Lam. Illustr. i. 356. n. 1731 = I. Cassine.
formosana, *Maxim, in Mem. Acad. Pitersb.* Sér. VII. xxix. n. in. (1881) 46.—Ins. Formosa.
Fortunei, *Lindl. in Gard. Chron.* (1857) 868 (Fortuni). —China.
fragilis, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 602.—Reg. Himal.
furcata, *Lindl. ex Goepp. in Regel, Gartenfl.* iii. (1854) 822.—Hab. ?
Gale, *Triana (f Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 377.—N. Granat.
Gardneriana, *Wight, Ic.* t. 1217.—Ind. or.
gaultheriaefolia, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) II. ag'J-theaefolia.
geniculata, *Maxim, in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VII. xxix. n. III. (1881) 60.—Japon.
gigantea, Bonpl. ex Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. viii. (1861) 394 = fertilis.
glabra, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* ed. II. 264.—Am. bor.
Glaziovii, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1880) 369.—Bras.
Godajam, *Colebr. ex Wall. Cat.* n. 4329.—Reg. Himal.
Gongonha, Mart. Reise, ed. AngL ii. 100-Villaresia mucronata.
graciliflora, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 328.—Hongkong.
grandis, Hort. Hannov. ex Decne. in Fl. des Series, Sér. I. ix. (1853-54) 186 = Betscheriana.
grandis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 47.—Bras.
Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 601.—Ind. or.; Malaya.
Grisebachii, *Maxim, in Mim. Acad. Pitersb.* Se"r. VII. xxix. n. 111.(1881) 27.—Ind. occ.
Hanceana, *Maxim. 1. c.* 33.—Hongkong.
heteropkylla, G. Don, Gen. Syst. ii. 17 = 1. Aquifolium.
hippocrateoides, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 71.—Am. austr.
Horsfieldii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. II. 594.—Java.

ILEX:—
Humboldtiana, *Bonpl. ex Miers, in Ann. V Mag. Nat. Hist.* Ser. III. viii. (1861) 396.-Bras,
hnmirioides, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 52.—Bras.
insignis, *Hoot./. Fl. Brit. Ind.* i. 599.—Reg. Himal.
integerrima, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 45.—Bras.
Integra, Miq. Ann. Mas. Bot. Lugd. Bat. iii. 105 = Symplocos japonica.
integra, *Thunb. Fl. Jap.* 77.—Japon.
intricala, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 602.—Reg. Himal.
inundata, *Poepp. ex Reiss. in.Mart. Fl. Bras.* xi. I. 43.—Bras.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 79 - Berberis nepalensis.
laevigata, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* 307.—Am. bor.
lagoënsis, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1880) 368.—Bras.
lanceolata, *Chapm. Fl. S. V. St.* 270.—Am. bor.
lanceolata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 56.—Cuba.
lanceolata, Klotzsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui. 1183 = 1. Martiniana.
latifolia, *Thunb. Fl. Jap.* 70.—Japon.
Laureola, *Triana (f Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 877.—N. Granat.
lauri/olia, Nutt. in Am. Joum. Sc. v. (1822) 289^1. Dahoon.
laurina, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 71.—Am. austr.
laurina, Klotzsch, in Schomb. Fann. et Fl. Gui. 1183 = daphnogenea.
laxiflora, Lam. Encyc. iii. 147 =quereifolia.
Lepta, Spreng. Syst. i. 496=Evodia triphylla.
leptacantha, *Lindl.tf Paxt. Flow. Gard.* iii. (1852-53) 72.— China.
leucantha, Hassk. Hort. Bog. Desc 864 = Celastrus articulatus.
ligustri/olia, G. Don, Gen. Syst. ii. 19 = 1. Dahoon.
ligustrina, Ell. Sketch, ii. 208=1. Dahoon.
ligustrina, Jacq. Coll. iv. 105-1. Cassine.
livida, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 194 - Celastrus acuminatus.
Lobbiana, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 309.—Ins. Philipp.
longi/olia, Nees, in Flora, iv. (1821) 301 = Pachystroma llicifolinm.
loranthoides, *Mart, ex Reiss. iu Mart. Fl. Bras.* xi. I. 47.-Bras.
Lonreirei, *Steud. Nom.* ed. II. i. 802.—China.
ludda, E. Mey. ex Presl, Bot. Bemerk. 87-Celastrus acuminatus.
lucida, *Torr. V Gray, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* i. 159.—Am. bor.
lucumaefolia, *Reiss. ex Maxim, in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VII. xxix. n. ill. (1881) 28.—Bras.
Lundii, *Warm, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1880) 869.—Bras,
luzonica, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1884) 809.—Ins. Philipp.
Macoucoua, *Pers. Syn.* i. 152.—Guian.
macrophylla, Blume, Bijdr. 1150 = latifolia.
macrophylla, *Wall. Cat.* n. 4331.—Malaya,
macropoda, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 106.—Japon.
madagascariensis, *Lam. Encyc.* iii 148.—Madag.
maderensis, Lam. I.e. 146-1. Perado.
maderensis, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 8 = 1. Aquifolium.
Maingayi, *Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 605.—Ins. Penang.
malabarica, *Bedd. Fl. Sylv.* i. t 143.—Ind. or.
Martiana, Walp. Rep. i. 540=seq.
Martiniana, *Lamb. Pin.* ii. *App.* 8.—Guian.
Mate, A. St. Hil. PI. Rem. L p. xli = paraguensis.
medica, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.69.—Bras,
memecylifolia, *Champ, ex Benth. in Hook. Ken Journ.* iv. (1852) 328.—Hongkong.
Mertensii, *Maxim, in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VII. xxix. n. in. (1881) 42.—Ins. Loochoo.
mexicana, *Black, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* i. 187.—Mexic.
mexicana', *Hort. Versch. ex Decne. in Fl. des Serres,* Sér. I. ix. (1853-54) 186.—Mexic.
micrantha, *Triana & Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sir. V. xvi. (1872) 376.—N. Granat
mierocarpa, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1860-61) 43 = rotunda.
mierocarpa, Lindl. & Paxt. 1. c.=rotunda.

HEX:—
micrococca, *Maxim, in Mtm. Acad. Pitersb.* Sir. VII. xxix. n. in. (1881) 39.—Japon.
microdonta, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 41.—Bras.
microphylla, *Hook. Ic. PI.* t. 139.—Peruv.
microphylla, Spreng. ex DC. Prod. ii. 12-*Myginda microphylla.
minutiflora, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 352.—Cuba,
mollis, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* 806.—Am. bor.
montana, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 171.—Ind. occ.
monticola, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* 306.—Am. bor.
monticola, *Tul. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. viii. (1857) 111.—Malaya,
myriadenia, *Hance, in Journ. Boi.* xxi. (1883) 296.—China,
myricoides, *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 71.—N-Granat
Myrsinites, VxiTsh, Fl. Am. Sept. i. 119-Pachystima Myrsinites.
myrtifolia, *Lam. Illustr. i.* 856. n. 1732.—Ind. occ.
myrti/olia, Walt. Fl. Carol. 241 = 1. Dahoon.
neocaledonica, *Maxim, in Mim. Acad. Pitersb.* Sir. VII. xxix. n. ill. (1881) 28.—N. Caled.
nepalensis, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 48 = excelsa.
nervosa, *Triana tf Planch, in Ann. Sc. Nat.* Ser. V. xvi. (1872) 377.—N. Granat.
nigro-punctata, *Miers, in Ann. £r Mag. Nat. Hist.* Ser. III. viii. (1861) 897.—Bras.
nilagirica, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 600-denticulata.
nitida, *Maxim, in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VII-xxix. n. HI. (1881) 27.—Ind. occ.
nummularia, *Franck. b" Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 311—Japon.
nummularia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 49.—Bras.
obcordata, *Sw. Fl. Ind. Occ.* i. 888.—Jamaic.
obtusata, *Triana &* Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 878.—N. Granat.
occidentalis, *Mac/ad. Fl. Jamaic. i.* 204.—Ind. occ.
odorata, *Buck-Ham, in D. Don, Prod. Fl. Nep.* 189.—Reg. Himal.
Oldhami, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 105.—Japon.
opaca, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. 1. i. 169* quercifolia.
orbicularis, Willd. ex Schult. Mant. iii. 838 = rupicola.
Orixa, Spreng. Syst. i. 496 = Celastrus Orixa.
Othera, *Spreng. 1. c.*—Japon.
ovalifolia, *Bonpl. ex Miers, in Ann. V Mag. Nat-Hist.* Ser. III. viii. (1861) 896.—Bras,
ovalifolia, *G. F. W. Mey. Prim. Esseq.* 91.—Guian.
ovata, *Goepp. Del. Sem. Hort. Vratisl.* (1852).—*Cf-Linnaea,* xxvi. (1853-55) 745.—Hab. ?
oxyphylla,.J«?.»» *Journ. Bot. Nierl.* i. (1861) 124.—China.
pachypoda, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 71.—Bras.
Paltoria, *Pers. Syn.* i. 152.—Am. trop.
paltorioides, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 60." Bras.
panicnlata, *Tures. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) 456.—Guian.
paraguayensis. Hook. Bot. Mag. t 3992 = Elaeodendron quadrangulatnm.
paragnensU, *A. St. Hil. in Mim. Mus. Par.* ix. (1822) 351 (paraguariensis); *D. Don, in Lamb. Pin.* "• *Apt.* 49. t 11.—Paraguay. c
parviflora, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) H—Bras.
peduncularis, *F. Muell. Fragm.* vii. 105.—Austral,
peduncularis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 50." Bras,
pedunculosa, *Miq. in Versl. Med. Akad. Wetensch.* "• ii. (1868) 83.—Japon.
Perado, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 167* canariensis.
Perado, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 169." Ins. Madera.
Perado, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 136 = pUty-phylla.
Pemyi, *Franck. PI. Davidian.* i. (1884) 69.—Mongol-
petiolaris, *Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1862) —Bras.
philippinensis, *Rolfe, in Journ. Linn. See.* xxt (188*; 308.—Ins. Philipp.

IIiBX:—
phillyreaefolia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 60.—Bras,
phyflobolos, *Maxim, in Mlm. Acad. Pitersb.* Sér. VII. xxix. n. HI. (1881) 50.—Japon.
phyllyreaefolia, Hort. ex Decne. in Fl. des Serres, Ser. I. ix.. (1853-54) 186-1. Dahoon.
platyphylla, Hort. ex Booth, 1. c. 184 = 1. Aquifolinm.
platyphylla, *Webb V Berth. Pkyt. Canar.* ii. 135. t. 68.—Ins. Canar.
pleurostachys, *Turcx. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 456.—Bras.
polyphylla, *Benth. PL Hartw.* 167.—N. Granat.
prinoides, [Soland. in] Ait. Hort. *Kew.* ed. I. i. 169 = decidua.
prionites, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 8 - decidua.
psammophila, *Mart, ex Keiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1. 42.—Bras.
Fseudobuxus, *Reiss. I. c.* 40.—Bras.
Pseudothea, *Reiss. 1. c.* 64.—Bras.
Pseudo-vftccinlum, *Reiss. ex Maxim, in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VII, xxix. n. III. (1881) 22.—Bras.
pubescens,//e»*. fa[1] *Am. Bat. Beech. Voy.* 176. t. 85.—China.
pubiflora, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 68.—Bras,
purpurea, *Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.* 230.—Java,
pustulosa, *Triana V Planch, in Ann.Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 878.—N. Granat.
quadripetala, *Medic. Beobacht.* (1782) 208.—Hab. ?
quercifolia, *Meerb. PI. Select. 1c.* t. 5.—Am. DOT.
ramulosa, Rafin. Sylva Tellur. 44-1. Cassine.
recurva, *Lint, Enum. Hort. Berol.* i. 147.—Hab. *1*
Seevesiana, Fortune, in Gard. Chron. (1651) 5 •= Fortunei.
Regnelliana, *Maxim, in Mlm. Acad. Pltersb.* Sér. VII. xxix. n. Hi. (1881) 25.—Bras.
religiosa, Barton, Fl. Virg. 66-1. Cassine.
repanda, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1861) 172.—Ind. occ.
retusa, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1097, nomen.—Guian.
riparia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 43.—Bras.
rivularis, Gardn. in Hook. Ic. PI. t. 465-ammis.
rosmarinifolia, Lam. Illuslr. i. 256 = 1. Dahoon.
rotunda, Colcbr. ex Wall. PI. As. Rar. iiL 38=1. Godajam.
rotunda, *Thunb. Fl. Jap.* 77.—Japon.
rugosa, *F. Schmidt, Reisen Amurl.* 122.—Ins. Sachalin.
rupicola, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vii. 70.—Ecuador.
salicifolia, Jacq. ColL v. 86. t. 2. f. 2 = Gymnosporia trigyna.
sapiiformis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 45.—Bras.
sapotifolia, *Reiss. I. c.* 44.—Bras.
Schombnrgkii, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl Gui.* 1097, nomen.—Guian.
sclerophylla, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 606.—Malacca,
scopulorum, *Humb. V Bonpl. ex Schult. Matit.* m-337.—Ecuador.
scutiaeformis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. 1.50.—Bras.
Sebertii, *Panch. in Punch. V Sebert. Not. Bois Nouv. Calld.* 235.—N. Caled.
sempervirens, Salisb. Prod. 70 - 1. Aquifolium.
senate, Thunb. Fl. yap. 78.—Japon.
sessiliflora, *Triana V Planch, in Ann. Sc. Nat.* Sér. V. xvi. (1872) 878.—N. Granat.
sideroxyloides, *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 224. —Ins. Dominic.
Sieboldi, *Miq. in Versl. Med. Akad. Wetensch.* II. ii. (1868) 64.—Japon.
sikkimensis, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xliv. (1875) II. 202.—Reg. Himal.
singapuriana, Wall. Cat n. 6526 -cymósá.
Skimmia, Spreng. Syst. i. 495=Skimmia japonica.
sorbitis, Reiss. in W. Fl. Bras. xi. I. 66-paraguensis.
spicata, *Blume, Bijdr.* 1H9.-Malaya.
Spruceana, *Keiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I 69.-Bras.
subcordata, *Xeiss. I. c.* 49.—Bras,
sabpuberulk, *Miq. in Versl. Med. Acad. Wetensch.* II. ii. (1868) 84.—Japon.
subtilis, *Miq. I.* c—Japon.
Sugeroki, *Maxim, in Mim. Acad. Pitersb.* Ser. VII. xxix. n. III. (1881) 85.—Japon.
sulcata, *Wall. Cat.* n. 48S0.-Burma.
symplociformis, *Reiss. in Mart. Fl. Bras. XL* I. 65.-Bras.

LLEX:—
Tarajo, *Goepp. Del. Sem. Hort. Vratisl.* (1852)—*Cf. Linnaea,* xxvi. (1853-55) 749.—Hab. t
tenuifolia, Salisb. Prod. 70-decidua.
theaefolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 601.—Reg. Himal.; Burma.
theaetans, Bonpl. ex Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. viii. (1861) 389, 391 = paraguensis.
theezans, *Mart. Syst. Mat. Med. Veg. Bras.* 61.—Bras.
Thomsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* L 602.—Reg. Himal.
thyrslflora, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1097, nomen.—Guiana,
tolucana, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 6.—Mexic.
triflora, *Blume, Bijdr.* 1150.—Japon.
truncata, Nees, in Flora, iv. (1821) 301 - Maytenus truncata.
truxillensis, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) I. 465.—Venezuela,
umbellata, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1183, nomen.—Guian.
uniflora, *Benth. PI. Hartw.* 217.—N. Granat.
vacciniiiblia, *Klottsch, in Schomb. Faun, et Fl. Gui.* 1097, nomen.—Guian.
velutina, *Mart, ex Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 53. —Bras.
venulosa, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 602.—Reg. Himal.
verticillata, *A. Gray, Man. Bot. N. U. St.* 307.—Am. bur.
vestita, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. 1.54-paraguensis.
viridis, *Champ, ex Benth. in Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 829.—Hongkong.
vismiaefolia, *Reiss. in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 59.—Bras,
vitiensis, *A. Gray, Bot. V. St. Expl. Exped.* i. 295. t. 25.-Ins. Fiji.
vomitoria, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed. I. i. 170 - I. Cassine.
vulgaris, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 491 = 1. Aquifolium.
Walteri, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) I. 603 = scq.t
Walkeri, *Wight V Gardn. ex Thv>. Enum. PI. Zeyl.* 184.—Zeyian.
Waljichii, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 605.—Burma.
Wallichii, Steud. Norn. cd. II. i. 803 = macropliylla.
Watsoniana, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 429 = I. Dahoon.
Wightiana, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 143 = malabarica.
Wightiana, *Wall. Cat.* n. 4382.—Ind. or.
zeylanica, *Maxim, in Mém. Acad. Pitersb.* Sér. VII. xxix. n. HI. (1881) 24.—Zeyian.

ILICIOIDES, Dum.-Conrs. Bot. Cult. ed. I. iv. 127 (1804)-XTeinopanthes, Rafin. (Ilicin.).

ILIOGETON, Benth. in DC. Prod. x. 412, in syn.. (1846) = ILYOGETON, Endl. = Vandellia, Linn. (Scrophul.).

1LLA, Adans. Fam. ii. 446 (1768)= Callicarpa, Linn. (Verbenac).

ILLAIREA, Lennl & C. Koch, in Verh. Berl. Gartenb. Ver. II. i. (1853) 397 = Loaua, TUBS.
canarinoides, Lenn^ 5c C. Koch, I. c.—Am. austr.

ILIiECEBRUM, Rupp. ex Linn. Coroll. Gen. 4 (1737), partim. *ILLECEBRACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 13.
Achyrantha, Linn. Sp. PI. ed. II. 299 = Alternanthera Achyrantha.
alpinum, Vill. Hist. PI. Dauph. i. 379 = Paronychia polygon ifolia.
alsinaefolium, Pav. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 389 = Guilleminea illecebroides.
alsinefolium, Scop. Delic. Iusub. iii. 27 = Telanthera frutescens.
alsinifolium, Comm. ex Poir. Encyc. v, 25 - Polycarpon tetraphyllum.
alsinifolium, Linn. Mant. i. 61 = Paronychia alsinefolia.
angustifolium, Spreng. Syst. i. 818-Alternanthera angustifolia.
arabicum, Bertol. Fl. Ital. ii. 734, in obs. •= Paronychia desertorum.
arabicum, Linn. Mant. i. 51 = Paronychia arabica.
aretioides, Pourr. ex DC. Prod. iii. 371 = Paroaychia aretioides.

ILLECEBETJM:—
argenteum, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 321 = Paronychia argentea.
aristatum, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 200= Polycarpaea aristata.
arragonicum, Vest, ex Roem. & Schult. Syst. v. 620 = Paronychia arragonica.
atrorubens, Thuill. ex Steud. Norn. ed. II. i. 803 ^ verticillatum.
atrovirens, Thuill. ex Steud. 1. c., in syn. — praec.
bengalense, Linn. Mant. ii. 213 = Achyranthes bengalensis.
brachiatum, Linn. 1. c — Nothosaerua brachiata.
brasilianum, Steud. Norn. ed. I. 428 = Paronychia bonariensis.
canariense, Linn. f. Suppl. 426 = Paronychia canariensis.
canescens, Spreng. Syst. i. 820 - Alternanthera cinescens.
capitatum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 174- Paronychia Cephalotes.
capitatum, Clem, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 167"= Paronychia aretioides.
capitatum. Linn. Sp. PI. 207 •= Paronychia capitata.
capitatum, Sibth. Fl. Graec. t. 247 = Paronychia macroscpala.
Cephalotes, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 169 - Paronychia kurdica.
congestum, *Rud. ex Roem. V Schult. Syst.* v. 617.—Am. trop.
cucculatum, Moench, Meth. Suppl. 118 - Paronychia canariensis.
cymosum, Linn. Sp. PI. 206 = Paronychia cymosa.
cymosum, Sm. Fl. Graec. Prod. i. 163-Paronychia echinata.
densum, Willd. in Roem. & Schult. Syst. v. 517=Guilleminea illecebroides.
denticulatum, Spreng. Syst. i. 820 = Alternanthera nodi flora.
dichotomum. Pen. Syn. i. 261= Paronychia dichotoma.
diffusum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 516-Alternanthera pulchella.
divaricatum, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 201 = Polycarpaea Tenerilfae.
dubium, Spreng. Syst. i. 818 = Iresine canescens.
echinatum, Desf. Fl. Atlant. i. 204 = Paronychia echinata.
ficoideum, Linn.Sp. PI. ed. II. 800 = Telanthera ficoides.
flavescens, Spreng. Syst. i. 819 - Telanthera flavescens.
frutescens, Comm. ex Roem. & Schult. Syst. v. 523 = Paronychia alsinefolia.
frutescens, L'Herit. Stirp. Nov. 75. t. 84 = Telantheta frutescens.
glabrum, Spreng. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 361 = Alternanthera glabra.
glomeratum, *Hoffmgg. ex Roem. (f Schult. Syst.* v. 516.—Bras.
gnaphalodes, Schousb. Vextr. Marok. 117 — Polycarpaea nivea.
gomphrenoides, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 616=Telanthera gomphrenoides.
herniarioides, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 821 = Paronychia capitata.
Humboldtianum, Roem. & Schult. Syst. v. 517 = Telanthera canescens.
incanum. Rich, ex Moq. in DC. Prod. xiii. 11. 362 a Telanthera Crucis.
iresinoides, Spreng. Syst. i. 818—Gomphrenaircsinoides.
italicum, Vill. in Schrad. Joum. (,1801) 411 -Paronychia argentea.
javanicum, Murr. Syst. ed. XIII. 206 = Aerva tomentosa.
Kapela, Hacq. PI. Alp. Cam. 8. t 2. f. 1 - Paronychia imbricata.
lanatum, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 299s Aerva tomentosa.
lanatum, Hort. Par. ex Moq. I.e. 837«Guilleminea lanuginosa.
lanatum, Murr. Syst. ed. XIII. 206; Linn. Mant. ii. 344 - Aerva lanata.
lanugiuosum, Poir. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 887 - Guilleminea lanuginosa.
latifolium, Steud. Norn. ed. I. 428 = Aerva tomentosa.
leucurum, Hort. Berol. ex Moq. in DC. Prod, xiii, II. 302 - Aerva leuenra.
limense Hort. Par. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. i. 646 * Telanlhera frutescens.

HiLECEBRTJM:—
lineare, Thanh. Diss. Mus. Acad. Ups. xvii. App. 6-= Iresine lincaris.
linearifolium,Vea. Syn.i.S61 - Polycarpaealinearifolia.
lugdunense, Vill. in Schrad. Joum. (1801) 412. t. 4 = Paronychia imbricata.
lupulinum, Sprang. Syst. i. 820 = Telanthera lnpnlina.
maritimum, Spreng. Syst. iv. Cm. Pott. 103=Telanthera maritima.
maritimum, Vill. in Schrad. Joum. (1801) 412 = Paronychia eapitata, aigentea.
maritimum, WiUd. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 368, 371 = Telanthera canescens.
mauritanicum, Brouss. ex Roem. & Scbnlt. Syst. v. 616 = Paronychia argentea.
Monsoniae. Linn. f. Suppl. 161—Aerva Monsonia.
nanum, Spreng. Syst. i. 819 — Alteraanthera nana.
narbonnense, Vill. in Schrad. Journ. (1801) 411 = Paronychia argentea.
niveum, Pers. Syn. i. 261—Paronychia eapitata.
obcordatum, Vahl, ex Steud. Nom. ed. I. 428 > Aerva tomentosa.
obliquum, Schnm. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 142 (Quid?).—Afr.trop.
Orva, Vahl, ex Koem. & Schult. Syst. v. 516 (Quid ?). —Aegypt.
paniculatum, Spreng. Syst. i. 819 = Telanthera panicnlata.
Paronychia, Habl. Taur. 150 ; exBieb.Fl.TauT. Cane. i. 175-Paronychia Cephalotes.
Paronychia, Linn. Sp. PL 206 = Paronychia argentea.
peploides, Humb. & Bonpl. ex Roem. *St.* Schnlt. Syst. v. 617 (Quid?).—Ins. S. Doming.
polygonifolium, Vill. Fl. Delph. 21; Hist. PI. Dauph. ii. 557. t 16 = Paronychia polygonifolia.
polygonoides. Linn. Sp. PI. ed. II. 300 = Telanthera polygonoides.
pubescens.Steud. Nom. ed. 1.429 = Paronychia eapitata.
pubescens, WiUd. Enum. Hort. Berol. 271 = Aerva pubescens.
pulverulentum, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 108 — Alternanthera pulverulenta.
pungens, Spreng. Syst. i. 820—Altemanthera Achyrantha.
ramosum, Hort. ex M09. in DC. Prod. xiii. 11. 359 = Alternanthera Achyrantha.
sanguinolentum, Linn. Mast. ii. 344 = Aerva sanguinolenta.
sedifolium, Stead. Nom. ed. II. i. 803 = Paronychia sedifolia.
sericeum, Spreng. Syst. i. 819 = Gomphrena sericea.
serpyllifolium, Vill. Hist. PI. Dauph. i. 323 (err. typ. 228) -Paronychia eapitata.
sessile, Linn. Sp. PI. ed.II. 300=Alternanthera sessilis.
sessile, Pall, ex Moq. in DC. Prod. xiii. 11. 360-Alternanthera sibirica.
sibiricum, Vent, ex Roem. *8c* Schult. Syst. v. 516 = Alternanthera sibirica.
sinense, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 359 = Alternanthera Achyrantha.
spinosum, Spreng. Syst. i. 819 = Alternanthera spinosa.
spurium, Loefl. It. 118 = Loeflingia hispanica.
striatum, Pers. Syn. i. 261 — Polycarpon tetraphyllum.
subulatum, Pers. I. c. - Polycarpaea corymbosa.
suffruticosum, Ljnn. Sp. PI. 206 - Paronychia sufliruticosa.
tenellum, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. u. 355 = Alternanthera tenella.
tenuifolium, WiUd. Enum. Hort. BeroL Suppl. 12 = Paronychia tennifolia.
thymifolium, Ponrr. ex Willie. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 155 — Paronychia cymosa.
tomentosum, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 299 -Aerva tomentosa.
triandrum, Buch.-Ham. ex Moq. 1. c. 360=Alternanthera sessilis.
lrianrfr«m,Llanos,Fragm.61 = Altemantheranodiflora.
truxillense, Spreng. Syst i. 819 = Telanthera truxillensis.
vermiculatum, Linn. Sp. PI. ed. II. 300=Philoxems vermicnlaris.
verticillatum, Bnrm. f. Fl. Ind. 66 = Portulaca quadrifida.
verticillatum, *Linn. Sp. PI.* 206.—Europ. occ.; Reg. Mediterr.
villosum, Steud. Nom. ed. 1.429 - Paronychia eapitata.
villosum, WiUd. ex Roem. & Schult. v. 516-Telanthera villosa.

ILLICIUM, Linn. Syst. ed. X. 1050 (1760). *MAGNOLIACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. i. 18.
CYMBOSTEMON, Spach, Hist *Wig.* Phan. vii. 444 (1839).
anisatum, Bartr. ex Miehx. Fl. Bor. Am. i. 32 (err. typ. 626)—parviflorum.
anisatum, *Gaertn. Fruct.* i. 838. t. 69 (non Linn.). —China.
anisatum, *Linn. Syst.* ed. X. 1050.—Japon.
cambodianum, *Nance, in Journ. Bot.* xiv. (1876) 240. —Cambodia.
eambogianum, Pierre, Fl. Forest Cochinch. t 4 - praec.
floridannm,£««, *in Phil. Trans,* lx. (1770) 524. t. 12. —Am. bor.
Griffithii, *Hoot. f. V Thorns. Fl. Ind.* i. 74.—Reg. Himal.
japonicum, Siebold, in Verb. Batav. Gen. xii. (1880) 50=anisatum.
majus, *Hook./,* to" *Thorns, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* i. 40.—Burma,
parviflorum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 826 (err. typ. 626). —Florida.
religiosum, Sieb. & Zucc Fl. Jap. i. 5—anisatum, *Linn.*!
San-ii, Pen. in Mlm. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 121 = anisatum, *Linn.* ?
variegatum, Hort. ex Gard. Chron. (1861) 735 = anisatum, *Linn.*

UiIJGERA, Blume, Bijdr. 1163 (1826). *COMBRETACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 689.
CORYSADENIA, Griff, in Proc Linn. Soc. i. (1846) 281.
GRONOVIA, Blarso, Fl. Filip. ed. 1.186 (1837).
HENSCHELIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 81. t 68 (1831).
appendiculata, Blume, Bijdr. 1163-coryzadeuia.
appendiculata, Vidal, Sinops. t. 48. f. F = Meyeniana.
celebica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 215.—Ins. Celebes.
coryzadenia, *Meissn.in DC. Prod.* xv. 1. 251.—Burma,
dasyphylla, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 1094.—Sumatra,
dnbia, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 187.—Ins. Timor,
khasiana, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* ii. 461.—Reg. Himal.
Kurzii, *C. B. Clarke, 1. c.* 460.—Burma; Malaya,
lucida, *Teijsm. b" Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 29.—Java,
obtusa, *lieissn. in DC. Prod.* xv. I. 251 (sp. dub.).—Ind. or.
Meyeniana, *Kunth, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 410.—Ins. Philipp.
pentaphylla, *Welw. in Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 26.—Afr. trop.
pulchra, *Blume, Bijdr.* 1154.—Java,
rhodanthe, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 821.—China.

ILLIPE, F. Muell. Extra-trop. PI. ed. Am. (1884) 181 = Bassia, Koenig (Sapotac).
latifolia, F. Muell. L c.- B. latifolU.

ILLUS, Haw. Monog. Narciss. 4 (1831) = Narcissus, Tourn. (Amaryll.).
cernuus, Haw. 1. c.=N. cemuus.
triandrus, Haw. 1. c - N. triandrus.

ILMU, Adans. Fam. ii. 497 (176S)-Romiilea, Maratti (Irid.).

ILOGETON, A. Juss. in Orb. Diet. xi. 459 (1848) = seq.

ILYOGETHOS, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 146(1844) = seq.

ILYOGETON, Endl. Gen. 684 (1889) = VaadsUla, Linn. (Scrophul.).
alsinoides, Endl. in Walp. Rep. iii. 297-V. alsinoides.
nervosum, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 146 - V. nervosa.
scapigerum, Endl. in Walp. Rep. iii. 297 = V. scapigera.
sphaerocarpum, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 146 =-V. sphaerocarpa.
subulatum, Endl. in Walp. Rep. iii. 297=V. snbulata.

HiY8AUTHES, Rafin. Ann. Nat. 13 (1820). *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 955.
alterniflora, Urban, in Berl. Deutsch. Bot Ges. ii. (1884) 436 = Bonnaya altemifolia.
attenuata, Rafin. ex Benth. in DC. Prod. x. 419 = riparia.

HJTSAUTHES :—
capensis, *Benth. in DC. Prod.* x. 419.—Afr. austr.
clause. Urban, in Berl. Deutsch. Bot. Ges. ii,- (1884) 436 = Bonnaya clausa.
dilatata, Rafin. ex Benth. in DC. Prod. x. 419 «• riparia.
grandiflora, *Benth. I. c.* 418.—Am. bor;-
gratioloides, Benth. I. c. 419= riparia.
gratioloides, Regel, Fl. Ussur. 120. n. 869 = Vandellia erecta.
hyssopioides, *Benth. in DC. Prod.* x. 419.—Ind. or.; China.
lobelioides, *Benth. Fl. Austral,* iv. 498.—Austral,
minima, *Benth. in DC. Prod-* x. 420.—Ind. or.
oblongifolia, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 221.—Madag.
oppositifdlia, Urban, in Berl. Peutsch. Bot. Ges. ii. (1884) 435 = Bonnaya oppositifolia.
parviflora,.£«sM. *in DC. Prod.* x. 419.—Ind. or.; Afr. trop.
pusilla, Urban, in Berl. Deutsch. Bot. Ges. ii. (1884) 485 = Bonnaya pusilla.
refracta, *Benth. in DC. Prod. x.* 419.—Am. bor.
reptans, Urban, in Berl. Deutsch. Bot Ges. ii. (1884) 436 = Bonnaya reptans.
riparia, *Safin. Ann. Nat.* 13.—Am. bor. et trop.
rotundifolia, *Benth. in DC. Prod.* x. 420.—Ind. or.; Ins. Mascar.
saginoides, *French,* 6* *Sam. Enum. PI. Jap.* i. 846.— Japon.
raxicola, Chapm. Fl. S. U. St. 294 - refracta.
serrata, Urban, in Berl. Deutsch. Bot. Ges. ii. (1884) 436—Bonnaya brachiata.
tenuifolia, Urban, 1. c. 435 = Bonnaya tenuifolia.
trichotoma, Urban, 1. c.-Bonnaya trichotoma.
mronicifolia, Urban, 1. c 436-• Bonnaya veronicaefolia.

ILYSANTHOS, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880) 56=praec.

ILYTHURIA, Rafin. Fl. Teller, iv. 51 (1836)-Clinogyne, SalUb. (Scitam.).
cannaeformis, Rafin. 1. c.=C. dichotoma.

IMANTINA, Hook. f. in Benth. 8c Hook. f. Gen. ii. 120 (1878). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
Deplanchei, *Hook.fi I. c*—N. Caled.

IMANTOPHYLLUM, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 729 (1883)=seq.

IMATOPHYLLUM, Hook. Bot. Mag. t. 2856 (1828) = Olivia, Lindl. (Amaryll.).
Aitoni, Hook. Bot. Mag. t. 2856 - C. nobilis.
cyrtanthiflorum, Van Houtte, in Fl. des Serres, Sir. H-viii. (1869-70) 87. t. 1877-C. miniata.
maximum,, GoiUop, in Rev. Hortic. (1881) 140 - C. nobilis?
miniatum, Hook. Bot. Mag. t. 4783 = C. miniata.

IMBRICARIA, Comm. ex Juss. Gen. 152 (1789)-*SAPOTACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 661.
BINECTARIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 82 (1776).
Binectaria, A. DC. in DC. Prod. viii. 201=maxima ?
borbonica, Gaertn. f. Fruct. iii. 138. t. 206=maxima.
Commersonii, G. Don, Gen. Syst. iv. 85 =• Labramw Bojerif
coriacea, A. DC. in DC. Prod. viii. 200 = Labrami* Bojeri.
fragrans, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 509.—Afr. trop.
macrocarpa, *Gaertn. f. Fruct.* iii. 134. t. 206.—Hab.'
malabarica, *Pair. lincyc.* iv. 434.—Ind. or.
maxima, *Poir. 1. c.* 438.—Ins. Mascar.
media, *Boj. ex Baker, Fl. Maurit.* 195.—Ins. Maurit.
obovata, Nees, ex Harv. Thes. Cap. i. 28 = Mimusop* obovata.
Perroudi, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 230. —N. Caled.
petiolaris, *A. DC.in DC. Prod.* viii. 200.—Ins. Mannt-

IMBRICARIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) *&l* -Baeckea, Linn. (Myrtac.).
ciliata, Sm. 1. c. - Micromyrtus microphylla.
crenulata, Sm. 1. c. 269—B. crenulata.
tenella, Dryand. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1807) 616 = a crenulata.

IMHOFIA, Herb. App. 18 (1821) - Hessea, Herb. (Amaryll.).
Bergiana, Knnth, Ennm. PI. v. 627 = H. gemmate.
Burchelliana, Herb. Amaryll. 290. t. 29.16 - H. gemmata.
cinnamomta, M. Roem. Syn. Ensat. 28 - H. crispa.
corusca, Sa'.isb. Gen. PI. Fragm. 118 = Nerine cuivifolia.
crispa. Herb. Amaryll. 290=H. crispa.
fili/olia, Herb. 1. c. 290. t. 29. f. 8.-H. filifolia.
gemmata, Herb. 1. c. 291 = H. gemmate.
flauca, Salisb. Gen. PI. Fragm. 118 = Nerine curvifolia.
marginata, Herb. App. 18=Nerine maiginata.
rosea, Salisb. Gen. PI. Fragm. 118 = Amaryllis Belladonna.
sarniensis, Salisb. I. c- Nerine sarniensis.
tenella, M. Roem. Syn. Ensat. 28-Strumaria filifolia.
venusta, Salisb. Gen. PI. Fragm. 118=-Nerine sarniensis.

IICPATIENS, Riv. ex Linn. Syst. ed. I (1785). *GERANIACEAE,* Bentb.. & Hook. f. i. 277.
BALSAJHNA, Gaertn. Fruct. ii. 151.1.118 (1791).
abyssinica, *Hook.f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 802. - Afr. trop.
acaalis, *Am. in Hook. Comp. Bot. Mag* i. (18S6) 826. —Ind. or.
acuminate, *Benth. in Wall. Cat.* n. 4754.—Reg. Himal.
Aika, Bedd. in Madr. Jonrn. Sc. Ser. II. xx. (1859) 69. f. 11—crenata.
alba, *Houllet, in Rev. Horde.* (1884) 148.—Hab. ?
albida, Wight, In Madr. Jonrn. Sc Ser. I. v. (1887) 7 -Henslowiana.
albo-flava, *Miq. fl. Ind. Bat. Suppl.* 396.—Sumatra,
amphorata. *Edge™, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 39. —Reg. Himal.
amplexicanlis, *Edgew. I. e.* 87.—Reg. Himal.
anamallayensis, Bedd. in Madr. Town. Sc. Ser. II. xx. (1859)68 = Goughii.
angnstiflora, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 480.—Reg. Himal.
angustifolia, Blnme, Cat Gew. Buitenz. 49 = Hydrocera triflora.
angustifolia.Slmd. Horn. ed. II. i.804 = 1. Balsamina.
appendiculata, *Arn.in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 828.—Zeylan.
arcuata, Benth. in Wall. Cat. n. 4735'I. Balsamina.
argute, *Hook. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* tv. (1860) 187.—Reg. Himal.; China.
Arnottiana, Miq. ex Hook. f. & Thorns. 1. c. 122 = divenifolia.
Arnottii, *Thm. Enum. PI. Zeyl.* 67.—Zeylan.
assamensis, *Griff. Ifotul.* iv. 459. t 576.—Assam,
anrea, *Muhl. Cat.* 26.—Am. bor.
anriculata, *Wight, in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1837) 8.—Ind. or.
baccifera, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 141 - Hydrocera angustifolia.
Ballardi, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or. I ii.* t192.-Ind. or.
Balsamina, *Linn. Sfi. PI.* 938—As. trop.
Baroni, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 49.—Madag.
Beddomei, *Hook.}. Fl. Brit. Ind.* i. 442-Malabar,.
bella, *Hook. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 138.—Reg. Himal.
tricolor, *Hook./. I. c.* vi. (1862) 7.—Afr. trop.
bicdor, Royle, lllustr. Bot. Himal. 151. t. 28 = amphorata.
bicomuta, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* u. 460.—Reg. Himal.
bifida, Thunb. Prod. PI. Cap. 41-flaccida.
biflora, *Walt. Ft. Carol.* 219.—Am. bor.
biglandulosa, Moon, Cat. Ceyl. PI. 18 =Hookenana.
bipartite Am. in Hook. Comp. Bot Mag. i. (1885) 322 = flaccida.
Blumei, *Zoll. tf MOT. Syst. Verz. Zoll.* 13.—Reg. Himal. * Sonirar.
borealis, Sweet, Hort Brit. ed. II. 688 = 1. Noli-tangere.
bomeensis, *Miq. /llusir. Fl. Ind. Archip.* 96.—Borneo,
brachycentra, *Kar. tf Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 179.—As. centr.
bracteata, Colebr. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, iL 459
brnicZn™, Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 821 = leptopoda.
buccinalis, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 187.—Afr. trop.
bulbosa, Moon, Cat Ceyl. PL 18=acanlu.

IMPATIEN'S :—
Burtoni, *Hook./, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 187. —Afr. trop.
calycina, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 463 = scabrida.
eampannlata, *Wight, in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1887) 11.—Ind. or.
Candida, Lindl. Bot. Reg. (1840), Misc. 85=Roylei.
capensis, Boj. ex Baker, in Journ. linn. Soc. xx. (1883) 116—fimrala.
capensis, *Meerb. Afbeel. Gem.* 1.10; *Thunb. Prod. Fl. Cat.* 41.—Afr. anstr.
capillipes, *Hook.f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1660) 135.—Burma.
Cathcartii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 473.—Reg. Himal.
caucasica, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) II. 276 - I. Noli-tangere.
celebica, *Miq. lllustr. Fl. Ind. Archip.* 94.—Ins. Celebes.
chinensis, *Linn. Sp. PI.* 937.—Reg. Himal.; Malaya,
choneceras, *Hassk. Hort. Bog. Desc.* 146.—Java.
circaeoides, Turcz. in BulL Soc. Nat. Mosc xxxri. (1868) I. 594-Goughii.
circaeoides, *Wall. Cat.* n. 4772 —Burma,
clavicorau, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxii. (1859) I. 271<-Ind. or.
cocdnea, Wall. Cat. n. 4732=1. Balsamina.
cochleata, *Lour. Fl. Cochinch.* ii. 512.—China,
comorensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 114.—Madag.
condnna, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 449.- Malabar.
cordata, Wight, in Madr. Joum. Sc. Ser. I. v. (1837) 10=viscida.
cordifolia, Herb. Madr. ex Wall. Cat n. 4758-scapiflora.
comigera, *Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 325.—Zeylan.
cornigera, Hook. Bot Mag. t 4623 = glandulifera.
cornuta, Linn. Sp. PI. 937 = I. Balsamina.
ciraata, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xx. (1859) 69. t. 7. f. 10.—Ind. or.
eristata. Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 456 = scabrida.
cristigera, Edgew. ex Hook. f. ft Thorns, in Joum. Linn. Soc. iv. (1860) 148-bicornuta.
cucullata, Gilib. Fl. Lituan. ii. 121 = 1. Noli-tangere.
cuspidata, Wight *Sc* Am. in Hook. Comp. Bot Mag. i. (l«S5)321-latifolia.
cyclocoma, *Miq. lllustr. Fl. Ind. Archip.* 92.—Java,
cymbifcra, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 474.-Reg. Himal.
Dalzellii, *Hook. f. If Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 123.—Ind. or.
dasysperma, *Wight, in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1837) 7.—Ind. or.
Davidi, *Franch. PI. Davidian.* i. (1884) 85.—Mongol.
debilis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 271-tenella»
Denisonii, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1864) 41.—Ind. or.
depauperate, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 481.—Reg. Himal.
Diepenhorstii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 297.—Sumatra.
discolor, DC. Prod. i. 687=scabrida.
discolor, *Wall. Cat.* n. 4767.—Reg. Himal.
diversifolia, *Heyne, in Wall. 1. c.* 4749.—Ind. or.
Edgeworthii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 476.—Reg. Himal.
elata, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 41 = micranthemum.
eleganl, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xx. (1859) 67.—Ind. or.
elongate, *Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 324.—Zeylan.
emiraensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 115.—Madag.
eriantha, Tnrcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 270-Munronii.
eubotrya, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 297.—Sumatra.
fasciculata, Lam. Encyc. i. 859=chinensis..
filicomn, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 6.—Afr. trop.
filiformis, Wight *Sc* Am. Prod. 140=inconspicua.
fimbriata, *Hook. Exot. Fl.* ii. 1.146.—Reg. Himal.
firmola, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 114. —Madag.
flaccida, *Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 322. -Ind. or.

IMPATIENS :-
flagellifera, Hochst ex A. Rich. Tent. FL Abyss i. 120-tinctoria.
flavida, *Hook. f. If Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 127.—Reg. Himal.
floribunda, Wight, in Madr. Journ. Sc. Ser. I. v. (1837) 7=flaccida.
fmticosa, *Leschen. ex DC. Prod.* i. 687.—Ind. or.
fuha, Nutt. Gen. Am. i. 146=biflora.
Gardneriana, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 4S0 —concinna.
Gardneriana, *Wight, Ic.* 1.1050.—Ind. or.
gibbosa, Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1885) 821 = leptopoda.
gigantea, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 38 = snlcata.
glandnlifera, *Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1885) 322.—Zeylan.
glandulifera, Royle, Illnstr. Bot Himal. 151. t. 28, f. 2-Royiei.
glanduligera, LindL Bot. Reg. (1840) t. 22-Roylei.
glauca, *Hook. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 155.-Reg. Himal.
Gordon!, *Home, in Baker, Fl. Maurit.* 38.—Ins. Mascar.
Goughii, *Wight, lllustr. Ind. Bot.* i. 160.—Ind. or.
gracilis, Bedd. in Madr. Joum. Sc. Ser. IL xx. (1859) 69=acaulis.
grandiftora, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 4759 = grandis.
grandis, *Heyne, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 465.— Ind. or.
Griffithii, *Hook. f. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 120.—Malaya.
Hamiltoniana, D. Don, Prod. Fl. Nep. 204 = scabrida.
Henslowiana, *Am. in Hook. Comp. Bot. Mag.* 1. (1835 322.—Ind. or.
heterophylla, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 468-chinensis.
hians, *Hook. f. in Joum. Linn. Soc.* vi. (1862) 7.— Afr. trop.
hirsute, *Blume, Cat. Gew. Bmienm.* 60, nomen.— Java.
hispidula, Benth. in Wall. Cat n. 4740-pubernla.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot Ergeb. Woldem. Reise, 121=discolor.
- Hookeriana, *Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 324.—Zeylan.
Humblotiana, BaiH. *in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1881) 286.—Madag.
inconspicua, *Benth. in Wall. Cat.* n. 4741.—Ind. or
insignis, *DC. Prod.* i. 688.—Reg. Himal.
Irvingii, *Hoot. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 300.— Afr. trop.
janthina, *Thm. Enum. PI. Zeyl.* 68.—Zeylan.
japonica, *Franch. tf Sav. Enum. PI. Jap.* Ii. 310.— Japon.
javensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 804.—Java.
Jerdoniae, *Wight, Ic. 1*1602—Ind. or.
Junghuhnii, *Miq. lllustr. Fl. Ind. Archip.* 99.— Sumatra.
Jurpia, *Buch.-Ham. in Wall. Cat.* n. 4761.—Reg. Himal.
Kilimanjaro *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* xxl. (1885) 898.—Afr. trop.
Kirkii, *Hook.f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i.* 300.—Afr. trop.
Kleinii, *Wight V Am. Prod.* 140.—Ind. or.
Korthalsii, *Miq. lllustr. Fl. Ind. Archip.* 100.— Sumatra.
lacvigata, *Wall. Cat.* n. 4753.—Reg. Himal.
Iatiflora, *Hook. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 139.—Reg. Himal.
latifolia, Hook. Bot. Mag. t. 6625-flaccida.
latifolia, *Linn. Sp. PI.* 937.-Ind. or.
latifolia, Wall. Cat n. 4787 - leptopoda.
latifolia, Wight & Am. Pto.l. 138=locida.
Lawii, *Hook. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Sec.* iv. (1860) 122.—Ind. or.
lax'iflora, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 40.— Reg. Himal.
Lechenaultii, Walp. Rep. i. 467-Leschenaultii.
Lemanni, *Hoot. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 164.—Afghan,
leptoceras, *DC. Prod.* i. 688.—Reg. Himal.
leptoceratia, St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, yii. (1880) 128 -praee.

IMPATIENS:—
leptopoda, *Arn. in Hook. Camp. Bot. Mag.* i. (1836) 821.-Zeylan.
leprura, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 467.—Ind. or.
Leschenaultii, *Wall. Cat.* n. 4739.—Ind. or.
lencantha, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 67.—Zeylan.
ligulata, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xx. (1859) 67.—Ind. or.
linearis, *Arn. in Hook. Comp. Sot. Mag.* i. (1835) 328. —Zeylan.
lineata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moic. xxxii. (1859) I. 271—tavoyana.
Lobbiana, Turcz. 1. c. 270 = 1. Balsamioa.
longicornu, Strach. & Wint. ex Hook. f. & Thorns, in Jonm. Linn. Soc. iv. (1860) 147 =• bicoranta.
longicornu, Wall. Cat n. 4729 = amphorata, bicomuta.
longicornu, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 462 s> leptoceras.
longiflora, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 447 - tenella.
longifolia, Wight, in Wall. Cat. n. 4784 - I. Balsamina.
longipes, *Hook./,* f *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 151.—Reg. Himal.
lucida, *Hryne, in Wall. Cat.* n. 4738.—Ind. or.
lutea. Lam. Fl. Fr. ii. 666=1. Noli-tangere.
Lyallii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 113. —Madag.
Mackeyana, *Hook.f. 1. e.* vii. (1864) 188.—Afr. trop.
macrochila, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 8-• Roylei.
macrophylla, *Gardn. ex Hook. Bot. Mag.* t. 4662.—Zeylan.
macroptera, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 186.—Afr. trop.
ntaculata, Mnbl. Cat 26-biflora,
maculata, *Wight, in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1837) 12.—Ind. or.
madagascariensis, *Wight b" Am. Prod.* 140.—Madag.
malabariea, Klein, ex Wight & Am. 1. c. 139 =• diversifolia.
malayensis, Griff. Notul. iv. 457. t. 576. f. 2 = 1. Balsamina ?
manillensis, *Walp. in Nov. Act. Nat: Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 317.—Ins. Philipp.
Mannii, *Hook. /. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 7—Afr. trop.
Mastersiana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 804.—Ind. or.
micrantha, D. Don, Prod. Fl. Nep. 208 = racemosa.
micrantha, *Hockst. ex A. Rich. Tent. Ft. Abyss,* i. 121. —Abyssin.
micranthemnm, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 40.—Reg. Himal.
minntiflora, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 185.—Ins. Timor,
mishmiensu, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 476.—Reg. Himal.
modesta, *Wight in Madr. Journ. Se.* Ser. I. v. (1887) 13.—Ind. or.
mollis, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 461 = pnbernla.
montana. *Rafin. AH. Journ.* 158 (Quid ?).—Am. bor.
moschata, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 88 -Roylei.
multiflora, Wall. Cat. n. 4742 - tripetala.
Munronii, *Wight, Illustr. Ind. Bot.* i. 160.—Ind. or.
mntila, *Lour. Fl. Cochinch.* 512.—Cochinch.
mysorensis, Roth, ex Wall. Cat. n. 4748 - inconspicna.
mysorensis, *Roth, Nov. PI. Sp.* 164.—Ind. or.
natans, Willd. Sp. PL i. 1175 = Hydrocera triflora.
nematoceras, *Miq. Illustr. Fl. Ind. Archip.* 97.—Java.
Noli-me-tangere, Crantz, Inst. ii. 430 = 1. Noli-tangere.
Noli-tangere, D. Don, Prod. Fl. Nep. 204 - scabrida.
Noli-tangere, *Linn. Sp. PI.* 938.—Europ.; Sibir.
Noli-tangere, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 149, partim = aurea.
odorata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 203 = leptoceras.
oppositifolia, *Linn. Sp. PI.* 937.—Ind. or.
oppositifolia, Rottl. ex Wight & Am. Prod. 188 = chinensis.
orchioides, *Bedd. in Madr. Journ.* Ser. III. i. (1864) 41.—Ind. or.
pachycentra, *Rupr. Fl. Cauc.* i. 265.—Reg. Caucas.
pollens, Edgew. in Trans. linn. Soc. xx. (1846) 89 - amphorata.
pallida, Nutt. Gen. Am. i. 146 - aurea.

IMPATIENS:—
palpebrata, *Hook. /. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 186.—Afr. trop.
paludosa, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 480.—Reg. Himal.
palustris, Pers. Syn. i. 257 = I. Noli-tangere.
parasitica, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. II. xx. (1859)66-Jerdoniae.
Parishii, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 456.—Burma.
parviSora, *DC. Prod. i.* 687.—Turkestan.; Sibir.
parvifolia, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xx. (1859) 66.—Ind. or.
pendula, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 4744.—Ind. or.
penduliflora, St Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128, 70=1. Noli-tangere.
Perezii, *Teysm. ex Miq, Choix PI. Buitent.* t. 5.—Sumatra.
Perrottetii, Turcz. in Bull Soc. Nat. Mosc xxxvi. (1863) I. 594-inconspicna.
phoenicea, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xix. (1868) 175.—Ind. or.
picta, Knowl. & Westc Flor. Cab. iii. (1849) 149. t. 128-amphorata.
platypetala, *Lindl. Bot. Reg.* (1846) t. 68.—Java,
porrecta, *Wall. Cat.* n. 7276.—Reg. Himal.
puberula, *DC. Prod.* i. 687.—Reg. Himal.
pulcherrima, *Dalzell, in Hook. Krm Journ.* ii. (1850) 87.—Ind. or.
pulchra. *Hook. /.* b* *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 139.—Reg. Himal.
pulniensis, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xix. (1858) 176-Goughii.
punctata, Wall, ex Hook. f. & Thorns, in Journ. linn. Soc. iv (1860) 186-scabrida.
pusilla, Heyne, in Wall. Cat. n. 4745 = inconspicna.
pyrhotricha, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 897.—Sumatra,
racemosa, *DC. Prod.* i. 688.—Reg. Himal.
racemosa, D. -Don, Prod. Fl. Nep. 203—insignis.
racemosa, Hook. f. & Thorns, in Joum. Linn. Soc. iv. (1860) 147-radiata.
racemosa, Wall. Cat. n. 4730—racemosa, leptoceras.
racemulosa, *Wall. I. c.* n. 7274.—Reg. Himal.
radiata, *Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 476.—Reg. Himal.
radicans, *Benth. in Wall. Cat.* u. 4763.—Reg. Himal.
radicans, *Zoll. V Mor. Syst. Verx. Zoll.* 14.—Java.
ramosissima, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 281 = inconspicua.
repens, *Moon, Cat. Ceyl. PI.* 18; *et in Wight, Illustr. Ind. Bot.* i. 160.—Ind. or.
reticulata, *Wall. PI. As. Rar.* i. 19. t. 19.—Burma.
Rheedii. Wight & Arn. Prod. 188 = tripetala?
rivalis, *Wight, in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1837) 18. t. 8.—Ind. or.
rosea, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 6. t. 27-1. Balsamina.
rosmarini/olia, Retz. Obs.v. 29=oppositifolia, tenella.
Rothii, *Hoot. /. in Oliver, Fl. Trop. A/r.* i. 802.—Afr. trop.
Royleana, Payer, Organog. Comp. 84 = Roylei.
Roylei, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise Bot. 121 -amphorata.
Roylei, *Walp. Rep.* i. 476.—Reg. HimaL
ru/escens, Benth. in Wall. Cat. n. 4747=tomentosa.
Rutenbergii, *O. Hoffm. in Bremen, Abh.* vii. (1882) 835.—Madag.
Sakeriana, *Hook. /. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 185.—Afr. trop.
salicifolia, *Baker, 1. c.* xx. (1883) 115.—Madag.
salicifolia, *Hook. /. (f Thorns. 1. e.* iv. (1860) 124.—Reg. Himal.
salicifolia, Turcz. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxxii. (1859) I. 271 = 1. Balsamina.
scabrida, *DC. Prod.* i. 687.—Reg. Himal.
scabriuscula, *Heyne, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 464.—Ind. or.
scapiflora, *Heyne, in Roxb. I. c.* 464.—Ind. or.
scapiflora, Hook. Bot. Mag. t. 8587-=-acaulis.
scapiflora, Wight & Am. Prod. 137, partim = Beddomei.
semiverticillata, *Turcz. in Bull. Soc. 'Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 594.—Ind. or.
serrata, *Benth. in Wall. Cat.* n. 4771.—Reg. Himal.
setacea, Colebr. in Hook. Exot. Fl. ii. t. 137-chinensis.
setosa, *Hook. f. tf Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 128.—Ind. or.
sinensis, Buch.-Ham. ex Benth. in Wall. Cat. n. 4735 = arcuata.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 415 = chinensis.

IMPATIENS:—
spirifer, *Hook. /.* to" *Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 185.—Reg. Himal.
sfenantha. *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 478.—Reg. Himal.
Stocksii, *Hook./. & Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 119.—Ind. or.
subcordata, *Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 823.—Zeylan.
snlcata, *Wall, in Roxb. Ft. Ind. ed. Carey,* ii. 458.—Reg. Himal.
Sultani, *Hook./. Bot. Mag.* t. 6643.—Afr. trop.
sumatrana, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 396.—Sumatra.
Tangachee, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xx. (1859) 66.—Ind. or.
tavagua, Steud. Nom. ed. II. i. 805, sphalm. =seq.
tavoyana, *Benth. in Wall. Cat.* n. 4773.—Burma,
tenella, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64, nomen.—Abyssin.
tenella, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 4746 A.—Ind. or.
tenella, Wall. 1. c. 4746 B.-Kleinii.
tenuicula, Stend. Nom. ed. II. i. 805 = tenella.
tenuis, Bedd. in Madr. Joum. Sc Ser. II. xx. (1859) 69. t. 7. f. 12 = modesta.
terni/alia, Buch.-Hant. ex Hook. f. & Thorns, in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 126 = tripetala.
Textori, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 76.—Japon.
Teysmannii, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 396.—Sumatra.
Thomsoni, *Hook. /. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 128.—Reg. Himal.
Tnomsoni, *Oliver, 1. c.* xxi. (1886) 398.—Afr. trop.
tinctoria, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 120.—Abyss.
tingens, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 41 = racemosa.
tomentosa, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 4751.—Ind. or.
travancorica, *Bedd. Ic. PI. Ind. Or.* i. 29.—Ind. or.
trichoceras, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 116.—Madag.
tricornis, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 9 = scabrida.
triflora. Linn. Sp. PI. 988 - Hydrocera triflora.
trilobata, *Colebr. in Hook. Exot. Fl.* ii. t. 141.—Reg. Himal.
tripetala, *Roxb. Hort. Beng.* 18; *Fl. Ind.* i. 658.—Reg. Himal.
tropaeolifolia. *Griff, ex Hook./. Fl. Brit. Ind.* i. 472.—Reg. Himal.
truncata, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 66.—Zeylan.
tuberculata, *Hook./. V Thorns, in Journ. Linn. Soc.* iv.' (1860) 155.—Reg. Himal.
umbellate, *Heyne, ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 464. —Ind. or.
umbrosa, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 39 = amphorata.
uncinata, *Wight, in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1837) 11.—Ind. or.
urticifolia. *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 457. —Reg. Himal.
verrucosa, Bedd. in Madr. Joum. Sc. Ser. II. xx. (1859)69. t. 7. f. 9-rivalis.
verticillate, *Wight, 1. c.* Ser. I. v. (1837) 15.—Ind. or.
violaeflora, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* i. 457.—Burma,
viridiflora, *Wight, in Madr. Journ. Sc.* Ser. I. v. (1837) 9.—Ind. or.
viscida, *Wight, 1. c.* 12.—Ind. or.
viscosa, *Bedd. 1. c.* Ser. II. xx. (1859) 68. t. 7. f. 7.—Ind. or.
Walkeri, *Hook, ex Arn. in Hook. Comp. Bot. Maf.* • (1835) 824.—Zeylan.
Walleriana, *Hoti.f. in Oliver, Fl. Trop. A/r.* i. 302.—Afr. trop.
Wightiana, *Bedd. in Madr. Journ. Sc.* Ser. II. xx. (1859) 67.—Ind. or.
Zippelii, *Miq. lUustr. Ind. Archip.* 94.—N. Grân.

IMPERATA, Cyrilli, PI. Rar. Ic. ii. 26. t 11 (1792)'
GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1125.
SYLLEPIS, Foura. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1125 (1883).
Allang, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 295-arundinacea.
arundinacea, *Cyrilli, PI. Rar. Ic.* ii. 26. t. 11.—Reg. calid.
brasiliensis, *Trin. in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. ii-(1838) 331.—Am. trop.
brevi/olia, Vasey, Cat. Grass. U. St. 24 = Hookeri.
caudata, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 86 = Hookeri.

IMPEBATA:—
caudata, Trin. in Me'm. Acad. Pétersb. Se>. VI. ii. (1833) 331-exaltata.
condensata, Steud. Syn. PI. Gram. 431=arundinacea.
cylindrica, Beauv. Agrost. 165-arundinacea.
eutalioides, Miq. Ann. Mas. Bot Lugd. Bat. ii. 289 = Miscantrms sacchariflorus. 1
exaltata, *Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot.* 101.— Malaya; N. Hebrid.; Am. trop.
filifolia, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 405-=-arundinacea.
Hookeri, *Rupr. ex Anderss. in Oefvers. Vet. Acad. Stockh.* (1856) ISO.—Am. bor.; Mexic.
jaculatoria, Roem. *8c* Schult. Syst. ii. 289 = exaltata.
Klaga, Jungh. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 296-Saccharum Bpontaneum.
Koenigii, Beaav. Agrost 165 = arundinacea.
ovata, Tratt. Tabnl. t. 669 ; ex Roem. & Schult. Syst. ii. 401=Lagurus ovatus.
pedicellata, Steud. in Flora, xxix. (1848) 22-=arundinacea.
ranwsa, Anderss. in Oefrers. Vet. Akad. Stockh. (1856) 158= exaltata.
saccharifera, Andens. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 65 = Miscanthns sacchariflorus.
sacchariflora, Maxim. Prim. Fl. Amur. 331 « Miscanthus sacchariflorns.
Sap/, Anderss. in Oefvers. Vet. **Akad.** Stockh. (1855) 159 = brasiliensis.
Sara, Schult Mant. ii. 166=Saccharom Sara.
Sieberi, Opiz, Natural, n. x. (1825) 190 = arandinacea.
Sisca, Beauv. ex Steud. Nom. ed. II. i. 805-arundiuacea.
spontanea, Beauv. Agrost. 8-Saccharum spontaneam.
Tkunbergii, Beauv. 1. c. 165 •= arundinacea.
tinctoria, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat ii. 289 (Miscanthi sp.).—Japon.

IMPERATIA, Moench, Meth. 60 (1794)=Tunioa, Scop. (CaryophylU.
filiformis, Moench, 1. c.»T. Saxifraga.

IMPERATORIA, [Toum.] Linn. Syst ed. I (1735) - Peucodanum, Tonm. (Umbellif.).
Angelica, Borck. ex Gaertn. Mey. *Sc* Scherb. Fl. Wett. i. 378 = Angelica sylvestris.
angustifolia, Bell, in Me'm. Acad. Turin, x, xi. (1802-3) 449 = P. angostifolium.
aragonica, Pourr. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 44 = P. hispanicum.
aromatica, Salisb. Prod. 167 -P Ostruthium.
caucasica, Spreng. Prod. Umbellif. 17?= P. caucasicnm.
Chatraei, Bess, ex DC. Prod. iv. 178 = P. Schottii.
Chabraei, Spreng. Sp. Umbellif. 64 = P. carvifolium.
dahurica, D. Dietr. Syn. PI. ii. 969 = P. terebinthaceum.
decursiva, C. A. Mey. ex Glehn. in Ind. Sem. Hort. **Petrop. (1868) 87 *(**Tommasinia Stomtsii).*—** Oriens.
decursiva, Szow. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat *Sir.* III. i. **(1842) 302 (= *Tommasinia purpurascens).*—Oriens.**
fiavescens, Bess. Prim. Fl. Galic i. 213=Angelica sylvestris.
glauca. Bartl. in Bartl. *Sc* Wendl. f. Beitr. 93=P. Schottii.
hispanica, Boiss. Elench. 48 = P. hispanicum.
taevigata, Boiss. in Ann. Sc Nat. Sér. III. i. (1844) 328 ^ P. latifolinm.
Lowei, Coss. in Bull. Soc. Bot Fr. xv. (1868) 99.—Ins. Mader.
major, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 619 = P. Ostruthium.
mexicana, Hort. Chels. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 336. —Mexic.
montana, DC. Fl. Fr. v. 504=Angelica sylvestris.
nodifiora, Lam. Fl. Fr. 417=Trochiscanthes nodifloras.
ostkrutkia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot Lyon, vii. (1880) M8=seq.
Ostruthium, Linn. Sp. PI. 259-P. Ostrnthium.
palustris, Bess. Fl. Galic. i. 214= Angelica palustns.
pimpincltoides, Sehlm. ex Boenn. Prod. Fl. Monast 91 =P. carvifolium.
Razouli, Hort. Vindob. ex Sennit. Syst. vi. 602 = Aopclicfl RAZQIU.
Seguieri, Spreng. Sp. Umbellif. 65 = Ligusticnm **Seguieri.**
***sylvestris,* Lam.** Fl. Fr. iii. 417=Angelica sylvestris.

IMPERATORIA:—
trilobata, Gilib. FL Lituan. ii. 34-Peucedanum Ostruthium.
triternata, Viv. ex DC. Prod. iv. 183=P. Ostruthium.
verticillaris, DC. FL Fr. iv. 287 = P. verticillare.
verticillata, Lam. Encyc iii. 243-praec.t

IMPERIALIS, Adans. Fam. ii. 48 (]763)=Fritillaria, Tonrn. (Liliac).
comosa, Moench, Meth. 305 = F. Imperialis.
coronata, Dum.-Conrs. Bot. Cult. ed. II. ii. 196 = F. Imperialis.
dagana, Turez. in Bull. Soc. Nat Mosc. (1837) n. 1.62 = F. dagana.
leucantka, Fisch. ex R. Grab., in Edinb. N. Phil. Joum. (Apr.-June 1831) 190=F. verticillata.
superba, Mirb. Hist. PI. ed. II. (1804) viii. 274 - F. Imperialis.

IMPIA, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ii. 342 (1825) =Pilago, Toum. (Compos.).
germanica, Bluff & Fingerh. 1. c. - F. germanica.
pyramidata, Bluff & Fingerh. 1. c 343 - F . germanica.

INCARVILLAEA, Orb. Diet. vii. 28 (1849)=scq.

Dr C A HLMEA Juss. Gen. 138 (1789). *BIGNONIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1049.
arguta, Royle, Illnstr. Bot. Himal. 296-Amphicome arguta.
Mnensis, Poir. in Diet. Sc. Nat. xxiii. 62-sinensis.
chinensis, Spreng. ex DC. Prod. ix. 237=Tecoma grandiflora.
compacta, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxviL (1881) 621.-China.
diffusa, Royle, Illustr. Bot. Himal. t. 72=Amphicome arguta.
dubia, Wall. Cat. n. 487=Lysionotns serrata.
Emodi, Wall. 1. c n. 487 = Amphicome arguta, A. Emodi.
foliosa, Steud. Nom. ed. II. i. 805-Crotalaria medica-nea.
grfnO/lora, Poir. in Diet. Sc. Nat. xxiii, 53=Tecoma grandiflora.
grandiflora, Spreng. Syst. ii. 836 = Aeschynanthus grandiflora.
Koopmanni, Hort. Germ.—Cf. Gard. Chron. (1880) II. 7£5=Olgae.
oblongifalia, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 113 =Chirita acuminata.
Olgae, *Regel, Gartenfl.* (1880) 3; *PL Nm. Fedsch.* 62. —Kokania.
parasitica, Roxb. Hort. Beng. 47; Fl. Ind. iii. 112 = Aeschynanthus grandiflora.
ainensis, *Lam. Encyc.* iii. 243.—China.
tomentosa, Roxb. ex DC. Prod. ix. 237=Fanlownia imperialis.
tomentosa, Spreng, Syst. ii. 886 - Bignonia mollis.

INDIGASTRUM, Jaub. & Spach, Illnstr. v. 101. t. 492 (1857)=lndi«ofera, Linn. (Legumin.).
defiexum, Jaub. & Spach, 1. c. = Indigofera parviflora.
macrostachyum, Jaub. & Spach, 1. c—Oriens.

INDIGOFERA, Linn. Hort. Cliff. 4B7 (1737). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 494.
ACANTHONOTUS, Benth. in Hook. Niger Fl. 293 (1849).
AMECARFUS, Benth. in Lindl. Veg. Kingd. 554 (1847).
BRISSONIA, Desv. (Jonm. Bot. i. (1814) 78] in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 411.
EILEMANTHUS, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 693.
HEHISPADON, Endl. 1. c, xv. (1832) n. 385.
INDIGASTRUM, Jaub. *8c* Spach, Illustr. v. 101. t. 492 (1857).
OUSTROPIS, G. Don, Gen. Syst. ii. 214 (1832).
SPHAERIDIOPHORUM, Desv. Joum. Bot. iii. (1813) 125. t. 6.
TRICOILENDUS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 97 (1836).
abyssinica, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 97=amorphoides.
acantkocatpa, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 17 -* Glycyrrlma psoraleoides.
acutifolia, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 282 •— Mexic
adenocarpa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 105.—Afr. austr.

ENDIC'rOFEBA.—
adenophylla, R. Grab, in Wall. Cat. n. 5468» trifoliata.
adesmiaefolia, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 405.—Austral.
adonensis, E. Mey. Comm. PI. **Afr.** Austr. 89-poliotes.
adscendens, *EM. V Zeyk. Enum.* 236.—Afr. austr.
aeruginis, Scbweinf. Beitr. Fl. Aethiop. ll = trigonelloides.
affinis, *Harv. in Han. V Sond. Fl. Cap.* ii. 184.—Afr. austr.
agownris, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 81=vicioides.
alata, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. ll=amorphoides.
alba, *A. Gouault, in Rev. Hortic.* Sér. IV. iii. (1854) 361. t 19.—China,
albicans, *R. Br. in Salt. Abyss. App.* 65, nomen.— Abyss,
albicans, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 190.—Ins. Timor.
alopecuroides, DC. Prod. ii. 231-coriacea.
alpina, Eckl. & Zeyh. Enum. 236 - stipularis.
alta, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 11.—Abyss,
alternans, *DC. Prod.* ii. 229.—Afr. austr.
amoena, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kev.* ed. I. iii. 68.— Afr. austr.
amoena, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 106=intermedia,
amorphoides, *Jaub. V Spach, Illustr.* v. 93.—Afr. trop.; As. occ.
anabaptista, *Steud. Nom.* ed. II. i. 805.—Afr. bor.-; As. occ
anceps, Vahl, ex Poir. Encyc. Snppl. iii. 147-endecaphylla.
angolensis, *D. Dietr. Syn. PI.* iv. 1036.—Afr. trop.
angulata, Lindl. Bot. Keg. t. 991-australis.
angulata, *Rottl. ex Spreng. Syst.* iii. 277.—Ind. or.
angulosa, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 168.—Ind. or.
angustata, E. Mey. Comm. Fl. Afr. Au>tr. 94 = stenophylla.
angustifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 596-hirsuta.
angustifolia, Curt Bot. Mag. t. 466-stricta.
angustifolia, *Linn. Mant.* ii. 272.—Afr. anstr.
angustifolia, Perr. ex DC. Prod. ii. 254 -Tcphrosia Unearis.
angustifolia, Thnnb. Fl. Cap. ed. Schult. 699 = brachystachya.
Anil, *Linn. Mant.* ii. 372.—Am. austr.
Anil, Sm. ex Wight *Sc* Am. Prod. 202=paucifolia.
aphylla, Breit. Hort. Breit. 2U9; ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 251 -filifolia.
arabica, *Jaub. V Spaclf, Illustr.* v. 89. t. 470.— Arab.
arborea, Roxb. Hort. Beng. 67; Fl. Ind. iii. 881 = pulchella.
arborescens, *Zuccagni, in Roem. Collect.* 151.—Hab. ?
arcuata, Willd. Sp. PI. iii. 1228=trita.
arenaria, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 107 = altemans.
arenaria, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* i. 183.—Abyss.
argentea, Blanco, Fl. Kilip. ed. II. 415-tinctoria.
argentea, Buch.-Ham. ex Roxb. Hoit Beng. 67; Fl. Ind. iii. 374-pancifolia.
argentea, Bunn. f. Fl. Ind. 171 = semitrijuga.
argentea, *Linn. Mant.* ii. 273.—Afr. bor.; As. occ.
argentea, Wall. Cat. n. 5455, partim-trita.
argyraea, *Eckl. V Zeyk. Enum.* 239.—Afr. austr.
argyroides, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 106.— Afr. austr.
ariitata, *Spreng. Syst.* iii. 273.—Afr. austr.
armata, Wall. Cat n. 5458-trita.
arrecta, *Benth. ex Harv. V Sond. Fl. Cap.* ii. 183.— Afr. anstr.
arrecta, *Hochst. ex A. Rick. TeiU. Fl. Abyss,* i. 184 Abyss.
articulate, Gouan, Illustr. 4G-argentea.
ascendent, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 520-adscendens.
aspalathifolia, Roxb. Hort Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 371-aspaiathoides.
aspalathoides, *Vahl, ex DC. Prod.* ii. 231.—Ind. or.
aspera, *Perr. ex DC. 1. c.* 229.—Afr. trop.
aiperifolia, *Bong, ex Benth. in Ann. Nat. Hist.* Ser. I. iii. (1839) 431.—Am. austr.
asperifolia, Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 79 -trigonelloides.

INDIGOFERA.—
astragalina, *DC. Prod.* ii. 228.—Afr. trop.
athrophylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 232-denudata.
atriceps, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1861) 190. —Afr. trop.
atropurpurea, *Buch.-Ham. ex Soxb. Hort. Beng.* 57; *Fl. Ind.* iii. 881.—Reg. Himal.; China,
anricoma, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 107.— Afr. anstr.
australis, *Willd. Sp. PI.* iii. 1235.—Austral.
axillaris, E. Mey. in Linnaea, vil. (1882) 188 = Ampbithalea virgata.
Baileyi, *F. Muell. Fragm.* ix. 43.—Austral.
Bainesii, *Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 71—Afr. trop.
barbata, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sêr. I. iz. (1826) 410 =hirsuta.
Baukeana, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 220 —Afr. trop.
benguellensis, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 87.— Afr. trop.
Benthamiana, *Nance, in Ann. Sc. Nat.* Sêr. IV. xviii. (1862) 219.—China.
Bernieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1888) 399. —Madag.
Berteriana, *Spreng. Syst.* iii. 277 Ins. Guadalup.
Bertolonii, Stend. Nom. ed. II. i. 807 =lateritia, *Beriol.* biflora, *Roth, Nov. PI. Sp.* 358.—Ind. or.
bifrons, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 97.—Afr. anstr.
bijnga, *Vog. ex Walp. in Linnaea*, xiii. (1889) 523.— Afr. austr.
bilabiata, *Loiset, ex DrapieB, Herb. Amat. Fl.* vi. (1838) t. 401—Hab. 1
Binderi, *Kotschy, in Sitzb. Acad. Wien, Math.-Nat.* Ii. *Abth.* II. (1865) 364. t. 6 B.—Afr. trop.
Blanchetiana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 40.— Bras.
Boiviniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 398.—Madag.
Bojeri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 266. —Madag.
Bojeri, *Vatke, in Bremen, Abh.* vii. (1882) 245.— Madag.
bongensi, *Kotschy tfPeyr.Pl.Tinn.* 8.n. 11.t.4.-Afr. trop.
brachycarpa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5470 = argentea.
brachypoda, Stead, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 179 —stenophylla.
brachystachya, *E. Mey. in Linnaea*, vii. (1832) 168.— Afr. austr.
bracteata, *R. Grah. in Wall. Cat. a.* 5477 Reg. Himal.
bracteola, *DC. Prod.* ii. 223.—Afr. trop.
Brassii, *Baiter, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 76.—Afr. trop.
brevidens, *Benth. in Mitch. Journ. Trap. Austral.* 885.—Austral.
Brunoniana, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5491; *et in PI. As. Rar.* iii. 48.—Burma,
bufalina, *Lour. Fl. Cochinch.* 458.—Cochinch.
Bungeana, *Walp. in Linnaea*, xiii. (1839) 525.—China.
Burchellii. *DC. Prod.* ii. 231.—Afr. austr.
Burchellii, K. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 106 - argyraea
Burkeana, *Benth. ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 197. —Afr. austr.
Burmanni, Boiss. Fl. Orient, ii. 187=semitrijuga.
caerulea, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 377 = argentea.
caesia, Zipp. ex Span, in linnaea, xv. (1841) 190 = timorensis.
caespitosa, Wight, in Wall. Cat. n. 5447 =enneaphylla.
caloneura, *Kurs, in Journ. As. Soc. Beng.* xiii. (1873) p. 229.—Burma.
calva, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 104-humifusa.
Cameroni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 93. —Afr. trop.
campestris, *Bong, ex Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 88—Bras,
candicans, *[Dryand. in] Ait. Hort. JCni.* ed. I. iii. 67. —Afr. anstr.
candicans, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 95=heterophylla.
candicans, Sieber, ex DC. Prod. ii. 231 = filiformis.
Candolleana, *Meissn. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 85.—Afr. austr.
canescens. Lam. Encyc. iii. 251 = trita.
canescens, Spreng. Syst. iii. 274 = trifoliata.

INDIOOPEBA:—
capillaris, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 133.—Afr. anstr.
capitata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5490 - Crotalaria medicaginea.
capitata, *Kotschy, in Sittb. Acad. Wien, Math.-Nat.* Ii. *Abth.* II. (1865) 865.—Afr. trop.
cardiophylla, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 175. —Afr. austr.
caroliniana, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 3 (Quid?). —Am. bor.
caroliniana, *Walt. Fl. Carol.* 187.—Am. bor.
cassioides, RottL ex DC. Prod. ii. 225-pulchella.
celebica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 311.—Ins. Celebes
centrota, Eckl. & Zeyh. Enum. 233=denudata.
Chamissoniana, D. Dietr. Syn. PI. iv. 1041-1. Anil,
chinensis, *Vog. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 14.—China.
cinerascens, DC. Prod. ii. 226-argentea.
cinerascens, Eckl. & Zeyh. Enum. 241 =Zeyheri.
cinerea, Buckl. in. Proc. Acad. Sc Philad. 1861 (1862) 451-leptosepaIa.
cinerea, Willd. Sp. PI. iii. 1225=trita.
cinericolor, *F. Muell. Fragm.* v. 183.—Austral,
circinnata, *Benth. ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 202. —Afr. austr.
circinnata, *Roxb. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 806 (Quid ?). —Ind. or.
clitorioides, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 206.—Afr. trop.
coccinea, Broegelm. Beschr. Vorznegl. Pfl. 116 = Swainsonia galegifolia.
coccinea, Lour. Fl. Cochinch. 457 - trite.
collina, Eckl. & Zeyh. Enum. 239 »argyraea.
colorata, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 202 = paucifolia.
colutei/olia, Janb. & Spach, Illnstr. v. 96. t. 487, 488 —emaiginella.
***complanaXa., Reichb. ex Spreng. Syst. iy. Cur. Post.* 285.** —Afr. austr.
complicata, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 235.—Afr. austr.
compressa, *Lam. Encyc.* iii. 248.—Ins. Mascar.
concava, *Harv. in Han. If Sond. fl. Cap.* ii. 186.— Afr. austr.
concinna, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 80.—Afr. trop.
congesta, R. Grah. in WalL Cat. n. 6471=trifoliata.
congesta, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 70.—Afr. trop.
conjugata, *Baker, I. c.* 75.—Afr. trop.
consanguinea, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 60-viscosa.
cordifolia, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 357.—Geront. trop.
coriacea, *[Dryand. in] Ait. Hort. Kev.* ed. I. iii. 68.— Afr. austr.
Cornemuelo, [Mo?. & Sesse] ex DC. Prod. ii. 225-1. Anil,
corniculata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 101.— Afr. austr.
coronillaefolia, *A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 201. —Austral,
coronilloides, *Jaub. tf Spach, Illustr.* v. 95. t. 487, 488.—Abyssin.
coronilloides. *Mart. If Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1843) 45.—Mexic
costata, *Guill. (f Pen. Fl. Seneg. Tent.* i. 187.—Afr. trop.
costaricensis, *Benth. in Kjoeb. Vidensk. Meddrl.* (1853) 5.—Costa Rica.
crassisiliqua, *Steud. Nom.* ed. II. i 806.—Arab.
crotaUrioides, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 85. —Afr. trop.
cryptantha, *Benth. ex Harv. (f Sond. Fl. Cap.* ii. 195. —Afr. austr.
cuneata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 92.— Afr. trop.
enneifolia, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 284.—Afr. austr.
cylindracea, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5482.—Reg. Himal.
cylindrical, *DC. Prod.* ii. 225.—Afr. austr.
cytisoides, *Linn. Mant.* ii. 271, in nota; *Thunb. Prod. PI. Cap.* 183.—Afr. austr.
daleoides, *Benth. ex Harv. <f Sond. Fl. Cap.* ii. 200. —Afr. austr.
dealbata, *Harv. I. c.* 170.—Afr. austr.
debilis. R. Grah. in Wall. **Cat** n. 5466-endecaphylla.
declinata, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 104.— Afr. anstr.

INDIGOPERA:-
decora, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* i. (1846) 68.— China.
decumbens, *Hill, Hort. Kev.* 295.—China.
dtflexa, Hochst ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 178 = parviflora.
dendroides, *Jacq. Ic. Rar.* iii. t. 571; *Coll.* ii. 357.— Afr. trop.
densiflora, *Mart, tf Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1848) 44.—Mexic.
denudata, *Linn. f. Suppl.* 335; *Jacq. Hort. Schoenb.* ii. 67. L 233.—Afr. austr.
denudata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 132.—Afr. austr.
depress*, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 175.— Afr. austr.
depressa, *Thunb. Prod. Fl. Cap.* 132.—Afr. austr.
desmodioides, Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 153=Pycnospora hedysaroides.
diffusa, R. Br. in Salt, Abyss. App. 66, nomen = Saltiana.
diffusa, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 79.—Ins. Afr.
digitata, Eckl. & Zeyh. Enum. 239-=>strigosa.
digitata, *Linn.f. Suppl.* 335; *Lam. Encyc.* iii. 251; ***Thunb. Prod. Fl. Cap.* 183.—Afr. austr.**
dillwynioides, *Benth, ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 178.—Afr. austr.
dimidiate, *Vog. ex Walp. in Linnaea*, xiii. (1839) 521.—Afr. austr.
diphylla, *Vent. Choix*, 300. t. 30; *Pers.Syn.* ii. 326.— **Afr.** occ.
discolor, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 97 = procumbens.
disperma, *Linn. Syst. Nat.* ed. XII. iii. 232.—Ind. or.
dissitiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 93. —Afr. trop.
disticha, *Eckl. (f Zeyh. Enum.* 245—Afr. austr.
divaricata, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 61. t. 365.—**Hab.** *1*
diversifolia, *DC. Prod.* ii. 223.—Ins. Mascar.
dodecaphylla, *Ficalho tf Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1881) 18.—Afr. trop.
domingensis, Spreng. ex DC. Prod. ii. 227-mlcrocarpa.
Dorycnium, Fenzl, in Flora, xxvii. **(1844)** 312 - pulchra.
Dosua, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 244.— Reg. Himal.
Dosua, WalL Cat n. 5481 - Gerardiana.
Dregeana, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 100.—Afr., austr.
dubia, Steud. Nom. ed. II. i. 806 = elliptica.
dumosa, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 93-denudata.
echinata, *Willd. Sp. PI.* iii. 1222.—Ind. or.
effusa, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 707 = alternans.
efoliata, *F. Muell. in Melb. Chemist*, iii. (Nov. 1883) —Austral.
Ehrenbergiana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 806.—Mexic.
elatior, *Can. in Rev. Hortic.* (1866) 279.—Am. trop. ?
elegans, *Schum. tf Thonn. Beskr. Gain. PI.* 368.— Afr. trop.
elliptica, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 99.—Afr. austr.
elliptica, Roxb. Hort Beng. 67; Fl. Ind. iii. 380-pulehella.
elongata, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 206.—Afr. trop.
elongata, *Micheli, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1875) 64.—Bras.
emarginata, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 209.—Afr. trop.
emarginata, Perr. in Ann. Mant (1830); ex Guill. *Sc* Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 178 tinctoria.
emarginella, *Steud. ex A. Rich. Tent.Fl. Abyss,* i. 184. —Abyss.
endecapoylla, *Jacq. Ic. Rar.* t. 570.—Geront. trop.
enneaphylla, Eckl. & Zeyh. Enum. 244=altemans.
enneaphylla, *Linn. Mant.* ii. 272.—As. et Austral. trop.
enonensis, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 105 = disticha.
erecta, Eckl. & Zeyh. Enum. 238>gracilis.
erecta, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 133.—Afr. austr.
erecta, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. i. 806=filiformis.
eriocarpa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 103.—Afr. austr.
ervoides, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 88 australis.
ervoides, *A. Rich. Tent. fl. Abyss*, i. 179.— Abyss.
erythrantka, Hochst. ex Baker, in Oliver, FL Trop. Afr. ii. 88 = paucdfolia.

INDIGOFEBA:-

erythrogramma, *Welm. ex Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ü. 73.—Afr. trop.
excelsa, *Mart, If Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. (1843) 45.—Mexic.
exigua, Eckl. ft Zeyh. Enum. 211-altemans.
exigua, *E.' Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 108.—Afr. anstr.
fidcata, *E. Mey. 1. c.* 98.—Afr. anitr.
frstigiata, £. *Mey. 1. c.* 102.—Afr. anstr.
ferruginea, Schum. ft Thonn. Beskr. Guin. PI. 870-hireuta,
filicaulis, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 289.—Aft. austr.
filifolia, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 182.—Aft. austr.
filiformis, *Thunb. 1. c.* 138.—Afr. anstr.
filipes, *Benth. ex Han. tf Stmd. Fl. Cap.* ii. 198.—Afr. austi.
Finlaysoniana, Wall. Cat. n. 5488=galegoides.
flabellata, *Harp, in Ham. tf Send. Ft. Cap.* ii. 180.—Afr. anstr.
flaccida, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 375-subulate,
flavicana, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 73.—Afr. trop.
flexuosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 232-denudata.
flexuosa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6478 •= Tephrosia purpurea.
floribunda, Hort—Cf. Gard. Chron. (1881) 11. 386 = Gerrardiana.
florida, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 96 — cuneifolia.
foliolosa, R. Grah. in Wall. Cat. n, 5485 =Wightii.
foUosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 102.-Afr. anstr.
, *foliosa,* Willd. in Ges. Naturt Fr. Nene Schr. iv. (1803) 217=Crotalaria foliosa.
fragrans, Retz. Obs. iv. 29 = pentaphylla.
frumentacea, Roxb. ex Wight ft Am. Prod. 199 s glandnlosa.
frutescens, *Linn.f. Suppl.* 884 ; *Thunb. Prod. PI. Cap.* 133.—Afr. anstr.
fruticosa, Harv. ft Sond. Fl. Cap. ii. 611 (in Ind.) = coriacea,
fruticulosa, Walp. in Linnaea, xiii. (1889) 626 ~ exigna.
fnlcrata, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 192.—Afr. austr.
fulgens, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 101.—Afr. trop.
fusca, G. Don, Gen. Syst ii 211-hirsute,
galegoides, *DC. Prod.* ii. 225.—As. trop.; Malaya.
Garckeana, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxix. (1879) 221.—Afr. trop.
geminata, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 81.—Afr. trop.
Gerardiana, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5486.—Reg. HimaL
Gerrardiana, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 595.—Afr. austr.
Gibsonii, J. Grah. Cat. Bomb. Fl. 46-pulchella.
glabra. Linn. Sp. PI. 751=pentaphylla.
glandulifera, *Page, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 807 (Quid t).—Afr. anstr.
glandulosa, Roxb. Hort Beng. 57; Fl.Ind. iii. 372-trifoliate.
glandulosa, Wendl. Bot. Beobacht. G5 = scq.t
glandulosa, *Willd. Sp. PI.* iii. 1227.—As. et Austral. trop.
glauca, Lam. Encyc iii. 246-argentea.
glauca, Perr. ex DC. Prod. ii. 223 -diphylla.
glaucescens, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 212.—Afr. austr.
glaueescens, R. Grab, in WaU. Cat. n. 5181 = pulehella.
glomerate, *E. Mey. in Linnaea,* vii. (1832) 166.—Afr. anstr.
glutinasa, Pen. ex DC. Prod. Ii. 227=viscosa.
glutinosa, Vahl, ex DC. 1. t-secundiflora.
goniodes, *Hockst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 85.—Afr. trop.
gracilis, *Bong, ex Benth. in Ann. Nat. Hist,* w. (1889) 481.—Bras,
gracilis, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 285.—Afr. anstr.
Grahamiana, Steud. Nom. ed. II. i. 807=1. Do*"- ,
Grandidieri, *BaiU. in Bull. Soc. Linn. Par. i.* (1888) 397.—Madag.
grandifoliola, *Carr. in Rev. Hortic. Sit.* IV. viii. (1869) 649.—Ind. or.

INDIQOFEBA:—

grata, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* 103.—Afr. austr.
graveolens, Schrad. Sert Hannov. 20-viscosa.
grisea, *Baker, in Oliver, Fl Trop. Afr.* ii. 80.—Afr. trop,
grisea, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sir. I. ix. (1826) 410-lespedezioides.
Guatimala, Lunan, Hort Jamaic. i. 420 = brachycarpa.
guineensis, Schum. ft Thonn. Beskr. Gnin. PI. 367 = piloaa.
haitensis, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. ix. (1826) 410.—Ins. S. Doming.
Hamiltonii, R. Grab, in Wall. Cat. n. 5465-atropurpurea.
haplophylla, *F. Muell. Fragm.* iii. 102.—Austral,
hebepetala, *Benth. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 101.—Reg. Himal.
hedranophylla, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 232.—Afr. anstr.
hedyantha, *Eckl. tf Zeyh. I. c.* 243.—Afr. austr.
hedysaroides. Lam. Encyc. iii. 250-trite.
hendecaphylla, Jacq. Coll. ii. 858 - endecaphylla.
heterantha. Wall. Cat n. 5480 A, B, C, partim-Gerardiana.
heterantha. Wall. 1. c. n. 5480 C, partim-I. Dosua.
heterocarpa, *Welv). ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 90.—Afr. trop.
heterophylla, *Presl, Bot. Bemerk.* 55.—Mexic.
heterophylla, Roxbi ex Wight ft Am. Prod. 200, 201 -paucifolia, pentaphylla.
heterophylla, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 138.—Afr. austr.
heterotricha, *DC. Prod,* it 227.—Afr. austr.
Huidelotii, *Benth. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 85.—Afr. trop.
hilaris, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 241.—Afr. anstr.
hippocrepoides, Scblecht. in Linnaea, xii. (1838) 283-Hos&ckift ftDgustifolift.
hirsute, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 194.—Afr. austr.
hirsute, Jacq. Ic Rar. t 359=latentia.
hirsute, *Linn. Sp. PI.* 751.—Gerorit. trop.
hirta, *Boj. Hort. Maurit.* 91.—Madag.
hirta, *E. Mey. Comm. PL Afr. Austr.* 101.—Afr. ftustr*
hispida, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 240.—Afr. austr.
Hochstetteri, Baker, in Oliver, FL Trop. Afr. ii. 101 = anabaptista.
hololeuca, Benth. ex Harv. ft Sond. FL Cap. it 200-altemans.
Hookeiiana, *Meissn. in Hook. Land. Journ. Bot.* ii. (1843) 85.—Afr. anstr.
Hover, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 137-lateritia.
Humboldtiana, *Spreng. Syst.* iii. 276.—Mexic
humifnsa, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 244.—Afr. austr.
humilis, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 454.—Perav.
humilis, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 190, nomen.—Ins. Timor.
inamoena, Thw. Enum. PL Zeyl. 83-WightiL
incana, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 132.—Afr. anstr.
indica. Lam. Encyc. iii. 245-tinctoria.
indica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 » hirsute,
inhambanensis, *Klotuch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 48.—Afr. trop.
inquinans, *Willd. Sp. PL* iii. 1236.—Ins. S. Doming,
intermedia, *Harv. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 190.—Afr. austr.
intrlcata, *Boiss. Fl. Orient.* U. 190.—Persia,
jamaicensis, *Spreng. Syst.* iii. 277.—Jamaic.
•*Tirahulia,* Buck-Ham, in WaU. Cat. n. 5464 - pulchella.
juncea, Dec. Herb. Amat. t 227 - filifolia.
Kirkii, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t 1416.—Afr. trop.
Kleinii, Wight & Am. Prod. 204 - endecaphylla.
Knoblecheri, *Kotscky, in Sittb. Acad. Wien, Math-Nat.* 1. *Abth.* I. (1866) S6».-Afr. trop.
Kranssiana, *Meissn. in Hook. Lend. Journ. Bot.* il. (1843) 83.—Afr. anstr.
Lagascana, *DC. Prod.* ii. 229.—Mexic.
losuntha, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. ix. (1826) 410.—Afr. anstr.
lasiantha, F. Muell. in Rep. Gregory's Exped. 6« brevideni.
lateritia, 5w<oZ. *in Nov. Comm. Bonon.* ii. (1886) 216.—Afr. trop.
lateritia, WiUd. Sp. PL iii. 1238-viscou.

INDIGrOFEBA:—

latifolia, *Micheli, in Mim. Soc. Phys. Gtnhv.* xxviii. (1883) n. vii. 13.—Paraguay,
leptocarpa, *Eckl. tf Zeyh. Enum.* 236.—Afr. austr.
leptocarpa, *Hochst. tf Steud. ex Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 510.—Arab.; Afr. trop.
leptocaulis, Eckl. & Zeyh. Enum. 248 = anguttifolia.
leptophylla, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 99 - Zeyheri.
leptosepala, *Ifutt. in Ton. tf Gray, Fl. N. Am.* i. 298.—Texas.
leptostachya, *DC. Prod.* ii. 225.—Reg. Himal.
Leschenaultii, DC. 1. c. 223 = trite,
lespedezioides, *H. B.tfK. Nov. Gen. et Sp.* vi 157.—Mexic.
leucoclada. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 267.—Madag.
Lindheimeriana, *Scheele; in Linnaea,* xxi. (1848) 464.—Am. bor. oce.
Lindleyana, *Spreng. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 807.—Austral.
linearis, *DC. Prod.* ii. 228—Afr. trop.
linearis, Guill. ft Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 184-parviflora.
linifolia, *Ret*. Obs.* iv. 29 ; vi. S3. t. 2.—Geront. trop.
lougeracemosa, *Boiv. ex BaiU. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 399.—Madag.
lotoides, *Lam. Encyc.* iii. 247.—Afr. austr.
lotoides, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 168-hispida.
lotoides, Schlecht. 1. c. xii. (1888) 282 - Ehrenbergiana.
Lyallii *Baker in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 128.—Madag.
machaerocarpa, Fenri* ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Aft. ii. 88-parviflora.
macra, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 105.'—Afr. anstr.
macrocalyx, *Guill. tf Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 176.146.—Afr. trop.
macrocarpa, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sit.* I. ix. (1826) 109.—Perav.
macrocarpa, *Lepr. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 72.—Afr. trop.
macrophylla, *Schum. ff Thonn. Beskr. Guin. PI. %1i.*—Afr. trop.
macrostachya, Willd. ex Spreng. Syst iii. 327-Dalea Mutisii.
macrostachys, *Vent. Jard. Malm.* t. et p. 44.—China,
madagascariensis,. *Schrank, ex Colla, Hort. Ripul. App.* ii. 350.—Madag.
madagascariensis, *Vatke, in Bremen, Abh.* vii. (1882) 245.—Madag.
malacostachys, *Benth. in Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 184.—Afr. austr.
marginata, Walp. Rep. i. 661, sphalm.-*emarginata.*
inarginulata, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5467.—Ind. or.
maritima, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 89.—Afr. trop.
marmorate, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xl. (1882) 610.—Ius. Socotr.
mauritanica, Thunb. Prod.Pl. Cap. 13S - alopecuroides, coriacea.
medicaginea, *Welvi. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 86.—Afr. trop.
inelanadenia, *Benth. ex Harv. tf Sond. Fl. Cap.* ii. 195.—Afr. anstr.
melanotricha, Steud, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 181 • secundiflora.
melilotoides, Hance, in Joum. Bot xvi. (1869) 163-Astragalus tennis.
melolobioides, Benth. ex Harv. ft Sond. Fl. Cap. ii. 201—patens.
mexicana, *Benth. PI. Hartw.* 286.—Mexic.
mexicana, Linn. f. Suppl. 835 - Psoralea Mutisii.
Meyeriana, Eckl. ft Zeyh. Enum. 235 = bifrons.
micrantha, Bunge, Enum. Pi. Chin. Bor. 16-Bungeana.
micrantha, Desv. in Ann. Sc Nat. Ser. I. ix. (18261 410.1. Anil,
micrantha, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 104.—Afr. austr.
microcarpa, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 79.—Bras.
microphylla. Lam. Encyc. iii. 250-sannentosa.
micropus, *BaiU. in Bull. Sac. Linn. Par.* i. (1883) 400.—Madag.
microstachya, *Presl, Bot. Bemerk.* 54.—Ind. or.
Mimosella, *BaiU. in Bull. Sac. Linn. Par. I* (1888) 408.—Madag.

HTDIGOFERA :—
mimosoides, *Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* **ii. 98.—** Afr. tiop.
miniata, *Orteg. Uort. Madr. Dec.* **98.—Cuba,**
minutiflora, *Walp. Rep.* i. 666.—Afr. austr.
mollis, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 287.—Aft. anstr.
moluccana, DC. Prod. ii. 282 = trifoliata.
monophylla, *DC. I. e.* 222.—Austral,
monostachya, *Eckl. b" Zeyh. Enum.* 237.—Afr. austr.
mouroundavensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i.** (188S) 897.—Madag.
mucronata, Lam. Encyc. iii. 247 = cytisoides.
mucronata, Spreng. ex DC. Prod. ii. 227=subulata.
mucronata, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 276 = Hnmbold tiana.
multicaulis, DC. Prod. ii. 223=trifoliata.
multijuga, *Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* **ii. 83.—** Afr. trop.
Mundiana, *Eckl. b" Zeyh. Enum.* 213.—Afr. austr.
Mutisii, Spreng. Syst. iii. 274=Psoralea Mutisii.
mysorensis, *Rottl. ex DC. Prod.* ii. 222.—Ind. or.
nana, Eckl. & Zeyh. Enum. 242 = Zeyheri.
nephrocarpa, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.xi.* **(1882)** 509.—Ins. Socotr.
nigricans, *Vahl, ex Pen. Syn.* ii. 327.—Afr. trop.
aigritana, *Hook. f. in Hoot. Niger Fl.* **294.—Afr.** trop.
nigromontana, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 2S8=denudata.
nivea, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 90 = glomerata.
nivea, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii. 273.—Afr. austr.
nuda, G. Don, in Loud. Hon. Brit 301; et Gen. Syst. ii. 209 = filifoliat
nudicaulis, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **92.—Afr.** austr.
nummularia, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 74.—Afr. trop.
obcordata, *Eckl. b" Zeyh. Enum.* 232.—Afr. austr.
oblongifolia, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 137.—Arab,
obrajillensis, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* **i. 404.** —Peruv.
oligophylla, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 49.—Afr. trop.
oligophylla, Lam. ex Baker, Fl. Maurit. 70=tinctoria.
oligosperma, DC. Prod. ii. 228=>secundiflora.
onobrychioides, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i.** (1883) 398.—Madag.
orixensis, Roxb. ex Wight *8c* Am. Prod. 201 = trifoliata.
omithopodioides, *Cham.* **!r** *Schlecht. in Linnaea,* **v.** (1880) 577.—Mexic.
omithopodioides, Hochst. *Jfc* Steud. ex Jaub. & Spach, Illustr. v. t. 480=ana.baplista.
omithopodioides, Russ. ex Wall. Cat. sub n. 5455 = trita.
omithopodioides, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. PI. 872=tinctoria.
oroboides, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 94 = monostachya.
orthocaipa, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **ii. 99.—** Afr. trop.
orthocarpa, *Berg* **b"** *Vatie, Ind. Sent. Hart. Berol.* (1876) *App.* 8.—Hab. ?
orthocarpa, *Presl, Bot. Bemerk.* 56.—Am. centr.
ovata, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 132.—Afr. austr.
ovina, *Ham. in Han. tf Sond. Fl. Cap.* **ii. 189.—Afr.** austr.
oialidea, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **ii.** 86.—Afr. trop.
oxycarpa, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 79.—Ind. occ.
oxycarpa, F. Muell. Fragm. iii. 103=pamflora.
Oxytropis, *Benth. ex Harv.* **b*** *Sond. Fl. Cap.* **ii. 193.** —Afr. austr.
paludosa, Lepr. ex Guill. *8t* Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 186 =endecapnylla.
palustris, *Vatie, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxviii. (1878)** 201.—Afr. trap.
paniculata, *Pers. Syn.* ii. 825.—Afr. trop.
Parkeri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* **xx. (1883) 126.—** Madag.
parviflora, *Heyne, in Wall. Cat.* n. 5457.—Geront. trop.
parrula, *Delile, in Caill. Voy. Meroe,* **2. t. 64.—Afr.** trop.
pascuorum, *Benth. in Ann. Nat. Hist.* **Ser. I. iii.** (1889) **431.—**Am. occ.
patens, *Eckl.* b" *Zeyh. Enum.* 286.—Afr. austr.
pauciflora, *Eckl. V Zeyh. 1. c.* 244.—Afr. anstr.

INDIGOFERA:—
pauciflora, Heyne, ex Wight & Am. Prod. Index, sphalm. = parviflora.
pauciflora, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 99=.-stricta.
paucifolia, *Delile, Fl. Egypte*, 251.—As. et Afr. trop.
paucifolia, Wight, in Wall. Cat. n. 5454 = praec.
pectinata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (18b3) 127. —Madag.
pedicellata, *Wight* b[1] *Am. Prod.* 200.—Ind. or.
pednnculata, *Hilsenb.* **to"** *Boj. ex Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 67.— Madag.
pentaphylla, *Burch. ex Harv. b" Sand. Fl. Cap.* **ii. 178.** —Afr. austr.
pentaphylla, *Murr. Syst. Veg.* ed. XIII. 664.—As. et Afr. trop.
peregrina, DC. Prod. ii. 224 = trifoliata.
Perriniana, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 161.—Am. austr.
Perrottetii, *DC. Prod.* ii. 228.—Afr. trop.
phyllanthoides, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **ii. 96.** —Afr. trop.
pilosa, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 151.—Afr. trop.
pinifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 127. —Madag.
platyphylla, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 292 *(=Kiesera* ***gracilis).*** **—Java.**
platypoda, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 95 = complicata.
plumosa, *Spreng. Syst.* iii. 278.—Hab.!
podophylla, *Benth. ex Harv. V Sond. Fl. Cap.* **ii. 168.** —Afr. austr.
Pohliana, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1889) 431 = lespedezioides.
poliotes, *Eckl. b[1] Zeyh. Enum*, 242.—Afr. austr.
polycarpa, *Benth. ex Harv. b[1] Sond. Fl. Cap.* **ii. 191.** —Afr. austr.
polycarpa, *Willd. ex Spreng. Syst.* iii 276.—Am. aastr.
polygonoides, *Wendl. Bot. Beobacht.* 56.—Hab. ?
polyphylla, DC. Prod. ii. 227 = Gerardiana.
polyphylla, Heyne, ex Wight & Am. Prod. 202 = mysorensis.
polyphylla, Rottl. ex Wight *8c* Am. 1. c.=Wightii.
porrecta, *Eckl.* b" *Zeyh. Enum.* 234 Afr. austr.
pratensis, *F. Muell. Rep. Burdek. Exp.* **10.—Austral.**
Prieureana, *Guill. (f Perr. Fl. Seneg. Tent.* **i. 187.—** Afr. trop.
procera, *Schum.* **b*** *Thonn. Beskr. Guin. PI.* **365.—** Afr. trop.
procumbens, Hort. ex Krausa, in Flora, xxvii. (1844) 855=incana.
procumbens, *Linn. Mant.* ii. 271.—Afr. austr.
prostrata, Klein, ex Wight & Am. Prod. 204 = Kleinil
prostrata, Perr. ex DC. Prod. ii. 228 = Perrottetii.
prostrata, Roxb. Hort. Beng. [98] ; Fl. Ind. iii. 378 = echinata.
prostrata, Willd. Sp. PL iii. 1226 = trifoliata.
pruinosa, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **ii.** 93.—Afr. trop
psilostachya, *Welw. ex Baker, 1. c.* 84.—Afrl trop.
psoraloides, *Linn. Mant.* ii. 271.—Afr. austr.
pulchella, *Roxb. Hort. Bengal; Fl. Ind.* **iii. 882.—** Reg. Himal.
pulchra, *Willd. Sp. PI.* iii. 1239.—Afr. trop.
punctata, Boiv. ex Baill. in BulL Soc. Linn. Par. i. (1888) 898 = Boiviniana.
punctata, Eckl. *8c* Zeyh. Enum. 241 = poliotes.
punctata, Thunb. Prod. PL Cap. 188 = Zeyheri.
pungens, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **93.—Afr.** austr.
purpurascens, Roxb. Hort. Beng. 57; FL Ind. iii. 883 =pulchella.
purpurea, *Page, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 808 (Quid?). —Afr. austr.
pusilla, Lam. Encyc. ii. 248=endecaphylUu
quadrangularis, R. Grah. in Wall. Cat n. 6488 = Gerardiana.
Quartiniana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, i. **183.—**Abyss,
quinquefolia, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **98.—** Afr. austr.
racemosa, linn. PI. Rar. Afr. n. 37; Amoen. Acad. vi. 94=psoraloides.
rarifolia, Steud. Norn. ed. II. i. 808= paucifolia.
rechodes, Eckl. & Zeyb. Enum. 233-denudata.
reflexa, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 100 = glaucescens.

INDIGOFERA :—
retroflexa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* **i. (1883)** 899.—Madag.
retusa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6476 = argentea.
rhechodes, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 519 = ***rechodes.***
rhodosantka, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 305 = hirsuta.
rhynchocarpa, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 92.—Afr. trop.
rhytidocarpa, *Benth. ex Harv. b" Sond. Fl. Cap.* **ii.** 202.—Afr. austr.
Richardiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. I* **(1883)** 398.—Madag.
rigescens, E. Mey. Comm. PI. Afr. Anstr. 94*-denudata.
rigida, Willd. Enum. Hort. Berol. 780-trita.
Rothii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **ii. 77.—Afr.** trop.
rotundifolia, *Lour. Fl. Cochinch.* 456.—China.
Roxburghii, *Jaume St. Hil. Mem. Indig.* **9. t. 2** (Quid ?).—Ind. or.
Roxburghii, Tausch, in Flora, xiv. (1831) 671 = linifolia.
rufescens, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* **103.—** Afr. austr.
rufescens, Poir. Encyc. Suppl. iii. 148 = pulchra.
rugosa, *Benth. Fl. Austral*, ii. 199.—Austral.
rupestris, Eckl. & Zeyh. Enum. 241=poliotes.
sabulicola, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* **xv. I. 40.—** Bras.
Saltiana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 808.—Abyssin.
sarmentosa, Herb. Holm, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 77 = Dichilus gracilis.
sarmentosa, *Linn. f. Suppl.* **334;** *Thunb. Prod. PI. Cap.* 132.—Afr. austr.
saxicola, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* **ii. 199.—** Austral.
scabra, Roth, Nov. PI. Sp. 859^subulata.
Schimperi, *Jaub. b" Spach, Illustr.* v. 94. t. 484.—Afr. trop.
Schimperiana, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 31 = endecaphylla.
Schultziana, *F. Muell. Fragm.* vii. 105.—Austral.
scoparia, Vahl, ex DC. Prod. ii. 222=senegalensis.
secunda, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 102 = hedyantha.
secundiflora, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 148.—Afr. trop.
Sedgewickiana, *Vatie* **b*** *Hildebr. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 202.—Afr. trop.
semitrijuga, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 137.—Afr. bor.; As. oce.
senegalensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 412=Tephrosia luzoniensis.
senegalensis, *Lam. Encyc.* ii. 248.—Afr. trop.
sericea, *Benth. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **H.** 76.—Afr. trop.
sericea, Linn. Mant ii. 271-Amphithalea densa.
sericea, Thunb. ex Harv. *8c* Sond. FL Cap. ii. 22 = Amphithalia ericaefolia.
sessiliflora, *DC. Prod.* ii. 228.—Afr. trop.
sessilifolia, *DC. 1. c.* 231.—Afr. austr.
setacea, E. Mey. Comm. PL Afr. Austr. 95 = gracilis.
seticulosa, *Harv. in Harv.* **b[1]** *Sond. Fl. Cap.* **ii. 196.—** Afr. austr.
setiflora, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **ii. 80.—Afr.** trop.
setulosa, *BertoL in Nan. Comm. Bonon.* **ii. (1836) 214.** t. 8.—Afr. austr.
Sieberiana, *Scheele, in Linnaea*, xvii. (1843) 387.—Afr. austr.
simplicifolia, *Dennst. ScUuess. Hort. Malab. So* (Quid?).—Ind. or.
simplicifolia, Guill. *8c* Perr. Fl. Seneg. Tent. i. 178-macrocarpa.
simplicifolia, Heyne, in Wall. Cat. n. 5455=argentea.
simplicifolia, *Lam. Encyc.* iii. 251.—Afr. trop.
somalensis, *Vatie, in Oestr. Bot. Zeitschr.* **xxviii-** (1878) 201.—Afr. trop.
sordida, *Benth. ex Harv. (f Sond. Fl. Cap.* **ii. 190.—** Afr. austr.
Spachii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* **ii. 92.—** Afr. trop.
sparsa, *Baker, I. c.* 79.—Afr. trop.
sparsiflora, Hochst. ex Baker, 1. c. 80-suaveolens.
sphaerocarpa, *A. Gray, PI. Wright*, ii. 37.—N. Mexic.
spicata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* **138.—Arab.**

INDIGOFERA:—

spinescens, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 93.—A.T. austr.
spiniflora, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. i. 808-spinosa.
spinosa, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 187.-Arab.
splendens, *hicalho b- Hiern, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. H. (1881) 19.—Afr. trop.
spoliata, Hoffmgg. Vert Pfl. Nachtr. ii. 138 - filifolia.
stachyodes, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 14 = 1. Dosua.
stenophylla, *Eckl.* to" *Zeyh. Enum.* 234.—Afr. austr.
stenophylla, *Guill. V Perr. Fl. Snug. Tent.* i. 188. t. 48.—Afr. trop.
stenosepala, *Baker, in Journ. Bot.* xx. (1882) 68.—Madag.
stipularis, Eckl. & Zeyh. Enum. 937 = dimidiate,
stipularis, *Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 250.—Afr. austr.
stricta, *Linn. f. Suppl.* 334; *Jacq. Hort. Schoenbr.* t. 236—Afr. austr.
stricta, Thunb. Prod. PI. Cap. 133 - Tephrosia stricta.
strigosa, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 64.—Afr. austr.
strobilifera, *Hochst. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 75.-*-Afr. trop.
suaveolens, *Jaub. &• Spach, Illustr.* v. 98. t. 489.—Abyss,
subcorymbosa, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 91.—Afr. trop.
subtilis, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 98 = filicaulis.
subulata, *Vahl, in Pair. Encyc. Suppl.* iii. 150.—Reg. trop.
subulifera, *Welw. ex Baker, in Oliver, fl. Trop. Afr.* ii. 96.-Afr. trop.
suffruticosa, Mill. Card. Diet. ed. VIII. n. 2 = 1. Anil,
sulcata, *DC. Prod.* ii. 231.—Afr. anstr.
sumatrana, Gaertn. Fract. ii 817. t. 14 8-tinctoria.
sutherlandioides, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 101.—Afr. trop.
sylvatica, Sieber, ex Spreng. Syst. iii. 278 = australis.
tenella, Schum, & Thonn. Beskr. Guin. PI. 367 « senegalensis.
tenella, *Vahl, ex DC. Prod.* ii. 229=pusilla.
tenuicaulis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bol. , 60 = vicioides.
tenuifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 248=angustifolia.
tenuifolia, Lam. Encyc. iii. 249 - angustifolia, capillaris.
tenuifolia, *Rottl. ex Wight If Am. Prod.* 200.—Ind. or.
lenuissima, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 94.—Afr. austr.
tephrosioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 455.—Ecuador,
tepbrosiopsis, *Baill. in Bull. Sec. Linn. Par. i.* (1883) 399.—Madag.
terminals, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 70.—Afr. trop.
ternata, Roxb. ex Wight *Sc* Am. Prod. 204-trita.
tetragonoloba, L'Herit. ex Steud. Nom. ed. L 431 = Cyamopsis psoraloides.
tetragonoloba, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 106.—Afr. austr.
tetrasperma, *Schum. V Thonn. Beskr. Guin. PI.* 865.—Air. trop.
tetrasperma, Vahl, ex Pers. Syn. ii. 325 = senegalensis.
tettensis, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 61 = Schimperi.
texana, Buckl. in Proc Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 4Sl=Ieptosepala.
Teysmanni, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 1083.—Malaya.
Theuschu, *0. Hoffm.in Linnaea,* xliii. (1880-825126.—Afr. trop.
Thibaudiana, *DC. Prod.* ii. 225.-Mexic.
Thonningii, Schum. & Thonn. Beskr. Gum. PI. 366-subulata.
thymoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 126.—Madag.
Kmoriensis, DC. Prod. ii. 22S=trita.
tinctoria, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 691-1. Ami.
tinctoria, Chapm. Fl. S. U. St. 96-sphaerocarpa.
tinctoria, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 138 - argentea.
tinctoria, Hook. Comp. Bot. Mag. l. (1835) *1i*= leptosepala.
tinctoria, *Linn. Sp. PL* 7«1 —Reg- «»P- (cult.),
tomentosa, *Eckl. V Zeyh. Enum.* 237.—Afr. austr.
tomentosa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6487-1. Dosua.

INTtfGOFERA:—

toralosa, *Baker, in Oliver, fl. Trop. Afr.* ii. 91.—Afr., trop.
torulosa, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 286 - snbulata.
torulosa, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 105.—Afr., austr.
trachyphylla, *Benth. in Hook. Ic. PI.* t. 1354.—Afr, trop.
tribuloides, *Boiss. Fl. Orient,* ii. 189.—Afr. trop.; As. oca
trichopoda, *Lepr. ex Guill. &" Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 177.—Afr. trop.
trifoliata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 246 •» multicaulis.
trifoliate, *Linn. Cent. PI.* ii. 29; *Amoen. Acad.* iv, 327.—As. et Austral, trop.
trigonelloides, *Jaub. V Spach, Illustr.* v. 92. t. 482.—Afr. trop.; As. occ.
triquetra, *Dal*, in Hook. Kev Journ.* ii. (I860) 36.—Ind. or.
triquetra, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 96.—Afr., austr.
tristis, *E. Mey. I. c.* 101.—Afr. austr.
trita, *Linn.f. Suppl.* 835.—As. et Austral, trop.
truxillensis, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* v. 466.—Peruv.
umbonata, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trap. Afr.* ii. 98—Afr. trop.
umbraticoia, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 202.—Afr. trop.
uneinata, G. Don, Gen. Syst. ii. 208 = 1. Anil.
uncinata, Roxb. Hort." Beng. 67; Fl. Ind. iii. 882 = galegoides.
uniflora, *Buch.-Ham. ex Roxb. II. cc.* 57; 374.—Ind. or.
uniflora, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 6444=ennca-phylla.
urostachya, Fenzl, ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 94 = secundiflora.
varia, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 104.—Afr. austr.
velutina, *E. Mey. I. c.* 104.—Afr. austr.
venulosa, *Champ, ex Benth. in Hook. Ken Journ. Bot.* iv. (1862) 44.—China.
venusta, *Wight V Zeyh. Enum.* 235.—Afr. austr.
verrucosa, Eckl. *Sc* Zeyh. 1. c 242=Zeyheri.
verrucosa, R. Grah. in WalL Cat. n. 5469 ~ pulchella.
vestita, *Baker, in Siook.f. Fl. Brit. Ind.* ii. 96.—Ind. or.
vestita, *Hart, in Han. V Sond. Ft. Cap.* ii. 182.—Afr. austr.
vicioides, 3 W . *V Spach, Illustr.* v. 91. t. 481.—Afr. trop.
villosa. Berg, ex Walp. Rep. i. 663=glomerata.
viminea, *E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr.* 102 Afr. austr.
violacea, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 380-pulchella.
virgata, DC. Prod. ii. 224 = trita.
virgata, Roxb. Hort. Beng. 57; Fl. Ind. iii. 888 = *I.* Gerardiana, I. Dosua.
viscidissima, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 100.—Afr. trop.
viscosa, *Lam. Encyc. Hi.* 247.—Geront. trop.
vivax, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 64.—Bras,
vohem.irensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 400.—Madag.
volubiiis, Wendl. Bot Beobacht. 55 •= Rhynchosia phaseoloides.
Welwitschii, *Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 84.—Afr. trop.
Wightii, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 5458.—Ind. or.
wynbergensis, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 181.—Afr. austr.
Zeyheri, *Spreng. ex Eckl. V Zeyh. Enum.* 241.—Afr. austr.
Zollingeriana, Uiq. Fl. Ind. Bat. i. I. SlO^galegoide's.

INFANTEA, Remy, ir. C. Gay, Fl. Chil. ST. 257. t. 48 (1849)«Amblyopappua, Hook. (Compos.).
chilensis, Remy, 1. c. 259-A. pusillus.

HTGA, Scop. Introd. 298 (1777). *LEGUMIJVOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 599.
INGARIA, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838).
acrocephala, *Steud.in Flora,xxri.* (1843) 759.—Guian.

Isra A:—

acuminata, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 600.—Ind. or.
Acus, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 189.—Hab. t
acutangula, K. Grah. in Wall. Cat n. 6271=Pithecolobium angulatnm.
acutifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1846) 614-affinis.
adiantifolia, Kunth, Mimos. 66. t. 21=Pithecolobium adiantifolium.
affinis, *DC. Prod.* ii. 438.—Bras.
affinis, Steud. in Flora, xxvi. (1848) 758*setifcra.
afulioides, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 405 = Calliandra hymenaeoides.
aggregate, C. *Don, Gen. Syst.* ii. 891.—Am. austr.
alba, *Willd. Sp. PI.* iv. 1013.—Guian.
albicans, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 298-capitata.
alternifolia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 895.—Mexic.
angulata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6271 - Pithecolobium angulatnm.
angustifolia, *Willd. Sp. PI.* iv. 1012.—Venezuela.
annularis, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6269-Pithecolobium bigeminum.
anomala, Kunth, Mimos. 70. t 22-Calliandragrandiflora.
Arrabidae, Steud. Nom. ed. II. i. 809-affinis.
asplenioides, Steud. 1. c. = Calliandra mertensioides.
assimilis, Miq. in Linnaea, xix. (1847) ISO - Buorgoni.
attenuata, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5276-Pithecolobium lobatum.
bahiensis, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 618,-Bras.
barbata, *Benth. 1. c.* 605.—Bras.
bauhiniaefolia, Poepp. & Eiidl. Nov. Gen. et Sp. iii. 80—Calliandra amazonica.
Benthamiana, *Meissn. in Linnaea,* xxi. (1848) 258.—Guian.
Berteriana, DC. Mta. Leg. xii; Prod. ii. 434-vera.
Berterii, *Spreng. Syst.* iii. 127.—Am. austr.
bigemina, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 18'2= Pithecolobium lucidum.
bigemina, Willd. Sp. PI. iv. 1007 - Pithecolouinm bigcminuni,
biglobosa, Willd. 1. c 1026 = Parkia africana.
Billbergiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 686.—N. Granat.
Blanchetiana, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 624.—Am. trop.
Bonplandiana, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 288.—N. Granat.
borbonica, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 54 = Albizzia Lebbek.
brachyptera, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1645) 610.—N. Grwat.
brachystachya, DC. Prod. ii. 440 - Pithecolobium lusorium.
bracteosa, *Benth. in Book. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 609.—Guian.
brevipes, *Benth. in Hook. Journ. Bet.* ii. (1840) 144.—Guian.
bubalina, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) VII. 77 - Pithecolobium bubalinum.
bubalina. Wall. Cat. n. 6272 - Pithecolobium microcarpum.
bullata, *Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* iv. (1846) 607.—Bras.
Buorgoni, *DC. Prod.* ii. 434 (Burgoni).—Am. trop.
byrsinocarpa, Hochst. in Flora, xxix. (1846) 697-Millettia ferruginea.
caffra, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 102.—Afr. austr.
calocephala, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 78-macrophylla.
calycina, Benth. in Honk. Journ. Bot iii. (1841)612-sessilis.
calycina, Salzni. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 611 -capitatn.
Camatchili, *Perr. in Mim. Soc. Linn. Par.* iii. (1826) 122.—Ins. Philipp.
campanulata, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 807 -Bras.
Candida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 299-Pithecolobium excelsum.
canescens, Cham. *Sc* Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 592 — Calliandra canescens.
capitata, *Desy. Journ. Bot.* iii. (1811) 71.—Guian.
capitata, Miq. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 682 = Pithecolobium laeturo.

IROA:—
caripensis, Hntnb. ft Bonpl. ex WMd. Sp. PI. ir. 1009 =Calliandra teigemina.
camosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 391.—Pernr.
Cataractae, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ri. 397 - Pithecolobium glomeratum.
Catkarinae, Benth. in Hook. Lond. Joura. Bot. ir. (1845) 606-striata.
cauliflora, WiUd. Sp. PI. iv. 1021 = Pithecolobium cauliflorum,
cayennensis, *Sagot, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1876) 626.—Guiana,
chaitacea, *Poepp. tf Endl. Nov. Gen. et Sp.* iv. 79.—Bras.
ciliata, Poepp. ft Endl. 1. c. 78=Poeppigiana.
ciliaU, *Prest, Symb. Bot.* it 11. t. 58.—Bras.
cinerea, Humb. ft Bonpl. ex "WiUd. Sp. PI. iv. 1024 = Pithecolobinm Saman.
cinnamomea, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soe.* xxx. (1875) 606.—Bras.
cirdnalis, WiUd Sp. PI. ir. 1023 = Pithecolobium circinale.
clam'gera, Moritz, ex Benth. in Trans. Linn. Soc xxx. (1875) 680 -Oerstediana.
Clypearia, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) VII. 78 = Pithecolobium Clypearia.
Clypearia, Wall. Cat. n. 6270 B-Pithecolobium fasciculatum.
cocdnea, G. Don, Gen. Syst ii. 890-Pithecolobium coccineum.
eochleata, WiUd. Sp.Pl. iv. 1020 = Pithecolobium cochleatom.
cochlocarpa, Mart. Reise Bras, i 649 = Pithecolobium Auaremotemo.
eoerulescens, Walp. in Linnaea, xiv. (1840) 298 ~-ciliata.
cognata, Schlecht. 1. c. xii. (1838) 560 = Pithecolobinm cognatum.
comewynensis, *Miq. Stirp.Surin. Sel.* 1.—Gnian.
comosa, WiUd. Sp. PI. iv. 1026-Calliandra comosa.
conferta, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 620.—Peruv.
contorta, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5283-Pitheclobium contortum.
corcondiana, DC. Prod. ii. 441=Pithecolobinm umbellatum.
cordUtipula, *Mart, in Flora,* xx. (1837) II. *Beibl.* 111.—Bras.
coriacea, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 71=sertulifera.
coriacea, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 390.—Merit
coriacea, Humb. ft Bonpl. ex WiUd. Sp. PI. iv. 1010 = Calliandra emarginata.
cornigera, Kostel. Allg. Med.-Pb.arm. Flora, iv. 1355 • Acacia sphaerocephala, spadicigera.
coroscans, *Humb. V BonpUex Willd. Sp. PI.* iv. 1017.—N. Granat.
corymbifera, Benth. in Hook. Jonrn. Bot. ii. (1840) 144=nobilis.
crassi/olia, Klotzsch, ex Benlh. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 582=Pithecolobium filamentosnm.
Crerauxii, *Sagot, in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xiii. (1882) 831.—Guiana.
Cumingiana, Benth. in Hook. Lond. Joura. Bot. ir. (1845) 616-Feuillei.
cycUcarpa, Willd. Sp. PI. iv. 1026 - Enterolobium cyclocarpum.
cylindrica, *Mart, in Flora,* xx. (1837) II. *Beibl.* 114.—Bras,
cynometroides, *Bedd. ex Baker, in Hook. f. Ft. Brit. Ind.* ii. 306.—Ind. or.
dariensis, *Seem. Bot. Voy. herald,* 117. t 28.—Panama,
densiflora, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 617.—Am. trop.
diadema, *Mart, in Flora,-* xx. (1837) II. *Beibl.* 114.—Bras.
dichotoma, *Mart. I. c*— Brat
dimidiata, Hook. ft Am. Bot Beech. Voy. 181 = Pithecolobium Clypearia.
dimidiata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 28-Albizzia stipulata.
discolor, Humb. ft Bonpl. ex WiUd. Sp. PL iv. 1023 = Pithecolobium adiantifolium.
disticha, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 143.—Guian.
divaricata, Bong, ex Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. II. 448 = Pithecolobium divaricatnm.
dolabriformis, R. Grah. in Wall. Cat. n. 6279 = Xylia dolabriformis.

INGA:—
dominicensls, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1876) 612.—Ind. occ.
dubia, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6274.—Ind. or.
dulcis, Mart, in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 113« affinis.
dulcis, Willd. Sp. PI. iv. 1006 = Pithecolobinm dulce.
dumosa, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 612.—Bras.
dysantha, *Benth. 1. c.* 626.—Bras,
edulis, *Mart, in Flora,* xx. (1887) II. *Beibl.* 118.—Bras.
elegans, *Mart, (f Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. 11. (1848) 821.—Mexic.
elliptica, *Blume, Cat. Gew. Buitenz.* 88.—Java.
emarginata, Humb. ft Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1009 — Calliandra emarginata.
eriantha, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 614 -Lushnathiana.
eriocarpa, *Benth. 1. c.* 615.—Mexic.
excelsa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ri. 299.—N. Granat.
excelsa, Kunth, Mimos. 57. t. 18 •= Pithecolobium excelsum.
excelsa, Poepp. ft Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 78 - marginata.
excelsa, Wight, ex Wall. Cat. n. 6286-Pithecolobium gcmiD&tum.
faeculifera, Desv. in Ham. Prod. PL Ind. Occ. 61 = Parkia africana.
fagaraefolia, Mart, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 619 = ciliata.
fagifolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 891 = Ruiziana.
fagifolia, *Willd. ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 607.—Am. trop.
faldfolia, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 291-Pithecolobium montannm.
falciformis, DC. Prod. ii. 438-Pithecolobium Vahlianum.
falciformis, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 64 = Pithecolobium montanum.
fasdculata, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 79.—Peruv.
fasdculata, Willd. Sp. PI. iv. 1022 = Calliandra surinamensis.
fasdformis, Hassk. in Hoev. ft De Vriese, Tijdscbr. x. (1843) 149-falciformis.
fastigiata, Steud. Nom. ed. II. i. 809 - Albizzia fastigiata.
fastuosa, *Willd. Sp. PI.* iv. 1014.—Venezuela.
felina, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 622 - Pithecolobium Unguis-cati.
Fendleriana, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 680.— N. Granat.
ferruginea, Guill. ft Pen. Fl. Seneg. Tent. i. 236-Albizzia ferruginea.
ferruginea. Planch, in Fl. des Serres, Sér. I. viii. (1862-53) t 773=rulpina.
ferrugineo-hirta, *Mart, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 625.—Bras.
Feuillei, *DC. Prod.* ii. 433.—Peruv.
filidna, Willd. Sp. PL ir. 1026-Parkia filicina.
filipes. Vent. Choix, 38-Pithecolobium filipes.
Finlaysoniana, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5284 = Pithecolobium contortum.
flageMformis, JMzf. *in Flora,* xx. (1837) II. *Beibl.* 112.—Bras.
fiexuosa, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5286 - Pithecolobium geminatum.
fiexuosa, Schlecht. in linnaea, xii. (1838) 559 = xalapensis.
floribunda, Benth. in Hook. Joum. Bot ii. (1840) 143 -splendens.
foetida, WiUd. Sp. PI. ir. 1008 - Piptadenia foetida.
foliosa, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot. ir. (1845) 597 = Ruiziana.
Forfex, Kunth, Mimos. 52.116 -Pithecolobinm Unguis-cati.
forficata, *Hoffmgg. Vert. Pft. Nachtr.* ii. 139.—Bras.
fragrans, Macfad. Fl. Jamalc. i 809— Pithecolobinm nagrans.
fraxinea, Willd. Sp. PL ir. 1019-alba.
fulgens, Kunth, Mimos. 86. t. 11-spectabilis.
galibica, Duchass. ft Walp. in Linnaea, xxiii. (1850) 747 = ingoides.
geminata, Wight ft Am. Prod. 269 = Pithecolobinm geminatum.

INGA:—
gladiata, Desr. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 427—Thibandiana.
glandulosa, *Steud. Nom.* ed. I. 431.—Gnian.
globosa, *Blume, Cat. Gen. Buitent.* 88.—Jara.
globulifera, *Benth. in Hoot. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 585.—Am. centr.
glomerata, DC. Prod. ii. 438 = Pithecolobium glomeratum.
graciliflora, *Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot.* iv. (1845) 582.—Guian.
gradlis, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 22 - Albizzia procera.
grandiflora, Wall. Cat n. 5285=Serianthes grandiflora.
guadalupensis, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 70 *m*> Pithecolobium Unguis-cati.
guatemalensis, Hook, ft Am. Bot. Beech. Voy. 419 = Mimosa guatemalensis.
guayaquilensis, G. Don, Gen. Syst. ii. 391 - marginata.
Guilleminiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 605.—Bras.
Haematoxylon, Hort. Calc. ex Hassk. Retzia, 217 = Calliandra haematocephala.
Harrisii, LindL Bot. Reg. (1839) t. 41 - Calliandra Harrisii.
Hayesii, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 617.—Panama.
heterophylla,Wt/W. *Sp. PI.* iv. 1020.—Bras,
heteroptera, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. *c* (1845) 610.—N. Granat.
hirsuta, G. Don, Gen. Syst. ii. 395-Calliandra hirsuta.
hispida, *Schott, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 625.—Bras.
Histrix, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 471-Pithecolobium Hystrix.
Houstoni, DC. Prod. ii. 442 - Calliandra Houstoni.
Humboldtiana, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vi. 285 = nobilis.
hymenaeaefolia, Humb. ft Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1008-Pithecolobium hymeneaefolium.
hymenaendes, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 70-Calliandra hymenaeoides.
inequalis, Humb. ft Bonpl.,ex Willd. Sp. PI. iv. 1019 -Pithecolobinm inaequale.
ingoides, *Willd. I. c.* 1032.—Guian.
Inicnil, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* v. (1830) 592.—Mexic.
insignia, *Kunth, Mimos.* 43. t 13.—Ecuador.
Isembergiana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 236 - Albizzia Julibrissin.
javana, DC. Prod. ii. 436-Pithecolobium dulce.
Jinicuil, Schlecht in Linnaea, xii. (1838) 569 = I. Inicuil.
Jiringa, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) VH. n. 78 = Pithecolobium lobatnm.
Jiringa, Wall. Cat. n. 5268 - Pithecolobium fasciculft tun.
juglandifolia, *Willd. Sp. PL* iv. 1018.—Venezuela.
Kaeringa, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 258 = Pithecolobium lobatnm.
Kamahurunee, Voigt, 1. c = Pithecolobium angnlatum.
Kihian, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 22-Albizzia procera.
Koenigii, Wight ft Am. Prod. 269 - Pithecolobium geminatum.
Koeringa, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora, iv. 1364 = Pithecolobium lobatnm.
laeta, Poepp. ft Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 80 - Pithecolobium laetum.
laevigata, *Mart, if Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 320.—Mexic.
lallensis, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 603.—Perav.
lamprophylla, C. Wright, ex Benth. 1. c 627=vera !
lanceaefolia, *Benth. 1. c.* 606.—Bras.
lanceolata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 870 = Pithecolobinm dulce.
lanceolata, Humb. ft Bonpl. ex WiUd. Sp. PI. iv. 1005—Pithecolobium ligustrinum.
lateriflora, *Miq. in Linnaea,* xix. (1847) 131.—Guian.
latifolia, Willd. Sp. PL iv. 1020 = Pithecolobium latifolium.
laurifolia, *Bong, ex Benth. in Hook. Journ. Bot.* »• (1840) 94.—Bras.
lamina, *Willd. Sp. PI.* iv. 1018.—Am. austr.
laxiflora, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ir. (1845) 617.—Peruv.

OTGA:-

leiocalycina, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 598.—Guian.
lenticellata, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* ux, (1875) 813.—Bras,
lentiscifolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1815) 492.—Bras,
leptantha, *Benth. 1. c.* 60S.—Bras,
leptoloba, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 660.—Mexic.
leptophylla, *Lag. Gen. et Sp. Nov.* 16.—Am. trop.
leptopus, Benth. in Hook. Lond. Jonm. Bot. ir. (1845) 58O = sertulifera.
leptostackya, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 608 = marginata.
leucantha, Fresl, Bot. Bemerk. 65 = Pithecolobinm dulce.
leucoxylon, Hassk. in Flora, m. (1842) II. Beibl. 64 = Albizzia Lebbek.
lignosa, R. Grab, in Wall. Cat. n. 5278=-Xylia dolabriformis.
ligustrina, Willd. Sp. Fl. iv. 1007=Pithecolobinm lignstriimm.
Lindeniana, *Benth. in Hook. Lond. fount. Sot.* iv. (1845) 808.—Am. trop.
lineata, *Benth. 1. c.* 694.—Pernv.
lobata, K. Grah. in Wall. Cat. n. 6280-Pithecolobium lobatnm.
longiflora, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 62O.-Am. trop.
longifolia, Hnmb. *Be* Bonpl. ex Willd. Sp. PI. ir. 1010 •-Pithecolobinm Vahlianum. *
longipes, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 617-—Peruv.
lucida, H. B. & K. NOT. Gen. et Sp. vi. 287 = spectabilis.
lucida, Wall. Cat. n. 5367=Albizzia lncida.
lucidior, Steud. Nom. ed. II. i. 810=AIbizzia lucida.
Lushnathiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 618.-Bras.
maeradenia, Mart, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 615--, Thibandiana.
macrophylla, Billb. ex Heurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 123 = portobellensis.
macrophylla, Hook. Bot. Mag. t. 6075=setifera.
macrophylla, *Humb.* b* *Bonpl. ex Willd. Sp. PI.* iv. 1015.—Venezuela.
macrostachya, DC. Prod. ii. 437 - Pithecolobiuro macros tachyum.
macrostacbys, *Steud. Nom.* ed. I. 431.—Guian.
Magdalenae.Spieng. ex DC. Prod. ii. 472 - Desmanthus brachylobus.
malacophylla, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 235 = Albizzia pallida, ferruginea.
marginata,//. *B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 285.—Am. trop.
marginata, *Willd. Sp. PI.* ir. 1015.—Am. trop.
marginata, Willd. 1. c. (quoad syn.) =fagifolia-
maritima, *Benth. in Hook. Lond. Journ, Bat.* iv. (1845) 601.—Bras.
Marthae, Spreng. ex DC. Prod. ii. 441 -Pithecolobinm parvifolium.
martinicensis, *Presl, Symb. Bot.* i. 65. t 42.—Ins. Martinic.
Mathewsiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 594.—Feruv.
maynensis, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 613.—Am. trop.
Meissneriana, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 2.— Guian.
melli/era, Willd. Sp. PI. iv. 1006- Acacia mellifera.•
membranacea, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 606.—Am. trop.
Meriana, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) H8=ingoides.
mertensioides, Nees& Martin Nov. Act. Nat. Cur. xii. (1824) 85=Calliandra mertensioides.
micradenia, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 620 —Am. trop.
microealyx, *Spruce, ex Benth. 1. c.* 611.—Bras.
microphylla, Humb. *Sc* Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1004~Fithecolobium Unguis-cati.
microphylla, Salzm. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 619 = ciliata.
Mociniana, G. Don, Gen. Syst. ii. S88=vera.
mollis, *R. Grah. in Wall. Cat.* n. 6275.-Ind. or.
mollissima, Humb. *Sc* Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1023 >=Calliandra mollissima.
molliuscula, Desv. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* I. «. (1828) 427 (Calliandrae sp. ?).—Hab. 1

INGA :—

moniliformis, DC. Prod, ii 440 = Pithecolobium moniliferum.
montana, Jungh. Reise Topog. 288 - Albizzia montana*
montana, Span, ex Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 36 * Pithecolobium moutanum.
Mucuna, Walp. Ann. ii. 469=Lindeniana.
multicaulis, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 624.—Ecuador.
multiflora, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot iv. (1845) 598 = lciocalycina.
multijuga, *Benth. in Trans. Linn. Sac.* xxx. (1876) 615.—Am. trop.
myriantha, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 77. t. 289.—Am. trop.
nandinoefolia, DC. Prod. ii. 440 = Pithecolobium Auaremotemo.
Nefasia, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 237 - Acacia abyssinica.
negrensis, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 621.—Bras.
Niopo, Humb. *Sc* Bonpl. ex Willd. Sp. PI. ir. 1027 - Piptadenia peregrina.
nitens, *Mart, (f Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 319.—Mexic.
nitida, *Willd. Sp. PI.* iv. 1018.—Bras,
nobilis, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 1047.—Bras.
nodosa, Willd. Sp. PI. iv. 1016-Cassia bacillaris.
nuda, *Salzm. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 607.—Am. trop.
nutans, *Mart, in flora,* xx. (1837) II. *Beibl.* 114.—Bras.
obovalis, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 472 = Pithecolobium obovale.
obtusa, *Spruce, ex Benth. in Mart. Ft. Bras.* xv. 11. 489.—Bras,
obtusata, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 621.—Bras.
obtusjfolia,Hwnb. Sc Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1022 =Calliandra purpurea.
odorata, G. Don, Gen. Syst. ii. 388 = marginata.
Oerstediana, *Benth. in Seem. Bot. Voy. Herald,* 117.—Costa Rica.
ornata, Kunth, Mimos. 46. t. 14=ingoides.
omifolia, *H. B. V K. iiov. Gen. et Sp.* vi. 291.—Ecuador.
pachycarpa, Benth. *A.* Hartw. 172=insignis.
panamensis, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 117.—Panama.
paniculata, Spreng. ex DC. Prod. ii. 437 = Pithecolobium pubescens.
panurensis, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 602.—Bras,
parviflora, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 139.—Bras.
parviflora, Sagot, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 610-alba.
parviflora, Spruce, ex Benth. 1. c. 602 = lateri flora.
panifolia, Hook. *Sc* Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 202-Calliandra bicolor.
patens. Hook. *Sc* Am. Bot. Beech. Voy. 419 - Piptadenia patens.
pauciflora, Duchass. ex Walp. in Linnaea, xxiii. (1860) 746-vera.
Pavoniana, Benth. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. iv. (1845) 595 =nobilis.
Pavoniana, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 388.—Am. trop.
pectinata, Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1027 »Parkia pectinata.
pedicellaris, DC. Prod. ii. 441 -Pithecolobium pedicel lare.
peduncularis, Benth. in Hook. Lond. Joum. Bot iv. (1846) 599-stenoptera.
peduncularis, Mart, ex Benth. in Trans. Linn. Soc xxx. (1875) 611-capitata.
pendula, Willd. Sp. PI. iv. 1025 - Parkia pendula.
pennatula, Cham. *Sc* Schlecht in Linnaea, v. (1830) 593=Acacia pennatula.
Perrottetii, *Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. xiii. (1882)335—Guian.
pezizUera, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 687.-Gnian.
pilosiuscula, *Desv. Journ. Bot.* iii. (1814) 71.—Guian.
Pisana, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 388.—Peruv.
pistaciaefolia, Spreng. Syst. iii. 131 = Mimosa pistaciaefolia.

INGA: —

planisitiaua, Mart, in Flora, xx. (1887) ir. Beibl. 111 —cordistipula.
platycarpa, Benth. in Hook. Journ. Bot ii. (1846) 142 =setifera.
platyptera, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv.* (1845) 602.—Bras,
plumifera, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 621.—Bras.
Poeppigiana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 602.—Bras.
polystachya, Benth. 1. c. 587 '• cylindrica.
portobellensis, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1«66) 122.—Panama.
Prieurei, *Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sit.* VI. xiii. (1882) 382.—Guian.
protract a, Steud. in Flora, xxvi. (1843) 758 - heterophylla.
pruriens, *Poepp.* to" *Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 78.—Peruv.
pterocarpa, DC. Prod. ii. 441 - Peltophornm ferru gineum.
puberula, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bol. iv. (1845) 689=marginata.
pubescens, Bert, ex DC. Prod. ii. 437 - Pithecolobium pnbescens.
pubigera, *Zipp. ex Span, in Linnaea,* xv. (1841) 198, nomen.—Ins. Timor.
pubiramea, *Steud. in flora,* xxvi. (1843) 769.—Guian.
pulcherrima, Cerv. ex Sweet, Hart Brit. ed. I. 483 •= Calliandra Tweedii.
punctata, *Willd. Sp. PI.* iv. 1016 (excl. syn.).—Venezuela.
pungens, Hnmb. *Sc* Bonpl. ex Willd. Sp. PI. iv. 1004 >- Pithecolobium dulce.
purpurascens, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 103 = Albizzia stipnlnta.
purpurea, Willd. Sp. PI. iv. 1021=Calliandra purpurea.
pyenostachya, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ir. (1845) 589"= marginata.
pyriformis, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 52 => Parkia Roxburghii.
Quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 235 = • Albizzia Quartiniana.
auassiaefolia, Willd. Sp. PI. iv. 1013 - nitida.
quaternata, *Peefp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 79.—Bras.
quinogemina, Hoffmgjj. ex Mart, in Flora, xx. (1887) II. 116 = Pithecolobinm caulirlorum.
ramiflora, Bong, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1876) 596-=l'ithecolobium ramiflorum.
ramiflora, G. Don, Gen. Syst. ii. 392 = Pithecolobium glomeratnm. *
ramiflora, Steud. in Flora, xxvi. (1848) 759 - Pithecolobium cauliflorum.
reticulala, Spreng. Syst. iii. 130=Feuillei.
rhoifolia, Hort. ex Planch, in Fl. des Series, *Sit.* I. viii. (1862-531 sub t. 775 = rulpina.
rhoifolia, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 1046.—Bras.
Siedeliana, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 696 = nobilis.
rosea, Steud. Nom. ed. I. 431 - Pithecolobium Unguis-cati.
rubiginosa, *DC. Prod.* ii. 434.—Guian.
rufescens, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 585.—Am. anstr.
rnfinervis, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 612.—Bras.
runseta, *Benth. 1. c.* 621.—Am. trap.
Ruiziana, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 391.—Am. trop.
rutilans, Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc xxx. (1876) 602-nmbellifera.
salutaris, H. Ii. & K. Nor. Gen. et Sp. vi. 304 = Pithecolobium Saman.
Salzmanniana, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ir. (1845) 608.—Bras.
Saman, Willd. Sp. PI. ir. 1024 - Pithecolobinm Saman.
sanguined, Burch. ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875, 594 J Pithecolobium sanguineum.
sapida, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 690«=agg"-egata.
sapida, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. vi. 280 ~ marginata.
saplndoides, *Willd. Sp. PI* iv. 1012.—Am. trop.
saponaria, Willd. 1. c 1008 = Albizzia saponiiria.
Sassa, Willd. 1. c. 1027-Albizzia fastigiata.

INGA:—
scabriuscula, *Benth. in Hook. Loud. Journ. Bot.* iv. (1845) 60ti.—Bras.
Schiedcana, Stend. Norn. ed. II. i. 810=xalapensis.
schinifolia,S*«tft. *in Hook. Loud. Journ. Bot.iv.* (1845) 684.—Bras.
Sciadion, *Steud. in Flora,* xxvi. (1843) 758.—Gnian.
Sellowiana, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 583.—Bias.
semialata. Mart, in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 111 = marginata.
semicordata, Bertol. Fl. Gnatim. 41 = Calliandra Seemanoi.
senegalensis, DC. Prod. ii. 442=Parkia africana.
sericantha, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 132 = nobilis.
sericca, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 318.—Mexic.
seriococepkala, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 236- Albizzia amara.
seitulifera, *DC. Prod.* ii. 436.—Gnian.
sessilis, *Mart, in Flora,* xx. (1837) II- *Beibl.* 114.—Bras.
setifera, *DC. Prod.* ii. 432.—Gnian.
setigera, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 79 •> rufiseta.
setosa, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 388.—Am. trop.
sinemariensis, G. Don, 1. c. = laurina?
speciosa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 320=Calliandra Cumingii.
speciosa, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 620.—Bras.
spectabilis, *Willd. Sp. PI.* iv. 1017.—Am. trop.
spinaefolia, Desv. in Journ. Bot. iii. (1814) 72 = Pithecolobium circinale.
spinifolia, Ham. Prod. PI. Ind. Occ. 61 = praec. ?
iplendens, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 612—dumosa.
splendens, *Willd. Sp. PI.* iv. 1017.-Bras.
Sprengelii, *G. Don, Gen. Syst.* it 392.—Am. anstr.
Spruceana, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1860) 239 = alba.
spuria, *Numb. &• Bonpl. ex Willd. Sp. PL* iv. 1011.—Venezuela,
stenocalyx, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 611.—Ecuador.
stenocarpa, Spruce, ex Benth. 1. c. 608-heterophylla.
stenoptera, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 143.—Guiana.
stenostachya, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sèr. I. ix. (1826) 427 = Piptadenia psilostachya.
stipulacea, G. Don, Gen. Syst. ii. 891=rufiseta.
stipularis, *DC. Mint. Lig.* 440.—Guian.
striata, *Benth. in Hook. Land. Journ. Bot.* iv. (1845) 608.—Bras. *
strigillosa. *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 612.—Bras.
subfalcata, Zoll. *Sc* Mor. in Na't. Geneesk. Arch. Neêrl. Ind. iii. (1846) 81 = Pithecolobium montanum.
subnuda, *SaUm. ex Benth. in Hook. Lend. Journ. Bot.* iv. (1845) 613.—Bras.
superbiens, Lem. Jard. Fleur. iii. (1853) t. 299-300; Misc. 84 = vulpina.
Tapinhuana, *Jacq. ex Heynh. Norn.* i. 417 (Quid !).—Am. austr.
tarapotensis, *Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. U875) 609.—Peruv.
taxifolia, Kunth, Mimos. 64. t. 20 = Calliandra taxifolia.
tenerrima, Jungh. ex Benth. in Miq. PI. Jungh. 270 — Acacia pennata.
tengerensis, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neêrl. Indie, iii. (1846) 73, 81 = Pithecolobium Junghuhnianum.
tenuifiora, Salzm. ex Benth. in "Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1846) 596 = Thibaudiana.
tcnuifolia, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 687—Bras,
tenuis, *Mart, in Flora,* xx. (1837) II. *Beibl.* 114.—Bras.
tergemina, Willd. Sp. PI. iv. 1008 = Calliandra tergenuina.
tetraphylla, G. Don, Gen. Syst. ii. 892=Calliandra tetraphylla.
tetraphylla, Mart, in Flora, xx. (1837) II. Beibl. 112 = **fagifolia.**
ThibauJiana, *DC. Prod.* ii. 484.—Guion.
thyrsoidea, Desv. Journ. Bot iii. (1814) 71=alba.

INGA:—
timoriana, DC. Prod. ii. 442-Parkia Koxbnrghii.
tomentosa, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) ' 609.—Am. trop.
trapenfolia, DC. Prod. ii. 441= Pithecolobium trapezifolium.
trapeiiformis, Steud. in Flora, xxvi. (1843) 759 = Pithecolobium corymbosum.
triflora, G. Don, Gen. Syst. ii. 394 = Pithecolobium triflorum.
tubulifera, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 584.—Am. austr.
umbellata, G. Don, Gen. Syst. ii. 391 =heterophylla.
umbellata, Willd. Sp. PI. iv. 1027 - Pithecolobium umbell&tum.
umbellata, Zoll. in Flora, xxx. (1847) 706= Pithecolobium monilifernm.
umbellifera, *Steud. ex DC. Prod.* ii. 432.—Am. austr.
umbraculiformis, Jungh. in Flora, xxx. (1847)508 = Albizzia stipulata.
tmbratica, *Poepp. V Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 77.—Bras.
umbrosa, Wall. PI. As. Rar. ii. 23. t. 124 = Calliandra umbrosa.
undnata. Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 630-scabriuscula.
Unguis-cati, Willd. Sp. PI. iv. 1006 = Pithecolobium Unguis-cati.
unijuga, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 79 = Macrolobium limbatum.
uraguensis, *Hork. b* Am. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 202.- Uraguay.
Vahliana, BC. Prod. ii. 438 - Pithecolobium Vahlianum,
Vellniana, Mnrt. in Flora, xx. (.1837) II. Beibl. 114, 118=maritima.
velutina, *Willd Sp. PI.* iv. 1014.—Bras,
venosa, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 711, nomen.—Ind. occ.
ventricosa, K. Grah. in Wall. Cat. n. 5266, partim = Serianthes grandiflora.
vera, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 289-edulis.
vera, *Willd. Sp. PI.* iv. 1010.-Am. tiop.
verrucosa, *Presl, Bot. Bemerk.* 66.—Bras.
versicolor, Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 616=setifera.
vestita, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 604.—Am. trop.
villosa, *Mart, b* Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. II. (1843) 319.—Mexic.
villosissima, *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 624.—Venezuela,
virescens, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 605.—Bras.
virgultosa, *Desv. in Ann. Sc. Nat.* Sér. I. ix. (1826) 426.—Guian.
vismiaefolia, *Poepp.* to[1] *Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 79.—Bras.
vouapaefolia, Spruce, ex Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 603=heterophylla.
vulpina, *Mart, ex Benth. 1. c.* 625.—Am. trop.
Wightiana, R. Grah. in Wall. Cat n. 5-281 =Pithecolobium bigeminum.
xalapensis, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1846) 616.—Mexic.
xylocarpa, DC. Prod. ii. 439 - Xylia dolabriformis.
Zygia, DC. Mém. Lég. xii. 440. t. 65 = Albizzia Brownei.

ING ARIA, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838)=praec.

INGENHOUSIA, Endl. Gen. 1415, in syn. (1841) = = INGENHOUSSIA, Dennst. = Vitis, Tourn. (Ampelid.).

INGENHOUSIA, Spach, Hist Vég. Phan. iii. 343 (1834) - Ingenhouzia, Moc, & Sesse iMalvac).

INGENHOUSIA, Steud. Norn. ed. II. i. 810 (1840)=. INGENHOUZIA, Bert. = Bhetinodendron, Meissu. (Compos.).

INGENHOUSIA, Steud. Norn. ed. II. i. 810 (1840) = INGENHOUSSIA, E. Mey.=Amphithalea, Eckl. & Zeyh. (Legumin.).

INGENHOUSSIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 33 (1818)-Vitis, Tourn. (Ampelid.).
umbellata, Dennst. 1. c.—Ind. or.

INGENHOUSSIA, E. Mey. Comm. PI. Afr. Austr. 20 (183S)=Amphithalea, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
ericaefolia, E. Mey. 1. c. 21 = A. ericaefolia.
micrantha, E. Mey. 1. c. = A. micrantha.
rosea, K. Mey. 1. c. 163 = A. densa.
rugosa, E. Mey. 1. c. 22=Coelidium ciliare.
spinosa, E. Mey. 1. c. = Coelidium spinosum (in Addend.).
tortilis, E. Mey. 1. c.=Coelidium Vogelii.
verticillata, E. Mey. 1. c. 21 = Priestleya elliptica.
violacea, E. Mey. 1. c 12 = A. ericaefolia.

INGENHOUSSIA, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. p. lxiii. (1827) = Ingenhouzia, Mo;. *Sc* Sesse (Maivac).

INGENHOUSZIA, Meissn. Gen. 27 (1837)=praec.

INGENHOUZIA, Bert, ex DC. Prod.vi. 447 (1837) = Bhetinodendron, Meissn. (Compos.).
thurifera, Bert. 1. c. = K. Berteroi.

INGENHOUZIA, [Moc, & Sesse] ex DC. Prod. i. 474 (1824). *MALVACEAE* [Benth. & Hook. f. i. 209, 982].
triloba, *[A/of, tf Sesse] I. c*—Mexic.

INGENHOUZIA, Veil. Fl. Flum. Ic. viii. t 93 (1827) =Trichocline, Cass. (Compos.).
radiata, Veil. 1. c.=T. polymorpha.

INGENHUSIA, Veil. Fl. Flum. 351 (1826) = Trieho-oline, Cass. (Compos.).
radiata, Veil. 1. c. = T. polymorpha.

INOCARPUS, Forst. Char. Gen. 65. t. S3 (1776)./ *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 552.
BOCOA, Aubl. PI. Gui. Suppl. 38. t. 391 (1775).
ETABALLIA, Benth. in Hook. Jouin. Bot. ii. (1840) 99.
INODAPHNIS, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 357 (1860).
'edulis, *Forst. Char. Gen. 66.*—Ins. Pacif.

INODAPHNIS, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 357 (1860) = lnocarpus, Forst. •(Legumin.).
lanceolata, Miq. 1. c = lnocarpus edulis.

INOPSIDIUM, Walp. Rep. i. 175 (1842) = IONOPSIDIUM, Reichb.=Cochlearia, Toum. (Crucif.),

INOPSIS, Steud. Norn. ed. I. 432 (1821)=Ionopsis, H. B. *Sc* K. (Orchid.).

INTHYBUS, Herd, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) 1.195 = INTYBUS, Fries - Crepis, Vaill. (Compos.).

INTRUSARIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 66 (1836) = Asystosia, Blume (Acanthac).
bicolor, Rafin. 1. c = A. intrusa.

INTSIA, Thou. Gen. Nov. Madag.22 (1806)=A&elia, Sm. (Legumin.).
amboinensis, DC. Prod. ii. 509 = A. bijuga.
coriacea, Maingay, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 275 = A. coriacea.
madagascariensis, DC. Prod. ii. 609 = A. bijuga.
Moeleri, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1865) 839.—N. Caled.
palembanica, Miq. FL Ind. Bat. Suppl. 289 = A. palercbanica.
puberula, Miq. 1. c. 288 —Sumatra. *c*

INTUTIS, Rafin. Sylva Tellur. 108 (1838) = Capparis. Linn.
amygdalina, Rafin. 1. c. = C. odoratissima.
ferruginea, Rafin. 1. c. = C. odoratissima.

INTYBELLIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1821) 124 « Fterotheca, Cass. (Compos.).
glareosa, Schott *Sc* Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, iii-883 = Lagoseris frigida.
purpurea, DC. Prod.vii. 180 = P. bifida.
rosea, Cass. in Diet. Sc. Nat xxiii. 548 = P. bifida.
taurica, Less. Syn. Comp. 144 = P. bifida.

INTYBELLIA, Monn. Ess. Hierac. 78 (1829) = Crepift Vaill. (Compos.).
incarnata, Monn. I. c. 79 »C. incamata.
praemorsa, Monn. 1. c. =C. praemorsa.
pulchra, Monn. 1. c. = Phaecasium hmpsanoides.

INTYBUS, Fries, Novit. Fl. Suec. ed. II. 241 (1828) = Crepis, Vaill. (Compos.).
bulbtitus, Fries, 1. c. 245=C. bnlbosa.
incarnatus, Fries, 1. c. in obs.=C. incamata.
multicaulis. Fries, in Cat. Sem. Hort. Upsal. (1855) ; et in Bot. Notiser (1857), 181=C. multicaulis.
praemorsus, Fries, Novit FL Soec ed. II. 215, in obs. =C. praemorsa.

INTTLA, Linn. Diss. Dass. 26 (1717) ; Amoen. Acad. i. 409 (1719). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 830.
AMPHIRAWS, DC. Prod. v. 813 (1836).
CORVISARTIA, *Mint,* Fl. Par. ed. I. 328 (1812) ; ed. II. ii. 261 (1818).
CUPULAMA, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 180 (1850).
DIPLOGON, Rafin. Cat. 18 (1824).
DUHALDEA, DC. Prod. v. 366 (1836).
ENULA, Neck. Elem. i. 4 (1790).
ERITHEIS, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. ii. 161 (1821).
HELENIUM, Linn. Syst. ed. I (1735); Adam. Fam. ii. 125 (1763).
INULASTER, Sch. Bip. in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 134,147, nomen; et in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 399(1847).
LIMBARDA, Adans. Fam. it 125 (1763).
PANIOPSIS, Rafin. Fl. Tellur. ii. 49 (1836).
ScmzoGYNK, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvi. 23 (1828).
ULINA, Opiz, Seznam, 100 (1852).
ncanlis, *Schott &" Kotschy, ex Tckihai. Asie Min. Hot.* ii. 243,-As. Min.
acris, Bernh. Syst. Verz. Erf. 149 = Erigeron acris.
acuminata, *DC. Prod.* v. 471.—Reg. Himal.
adriatica X, Borb.in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 187=squarrosa.
aestuansXinn. Sp. PI. ed. II. 1236 = Verbesina aesluans.
africana, *Lam. Encyc.* iii. 256.—Afr. austr.
alpina, Adam, in Web. & Mohr, Beitr. i. 68=grandiflora.
ammophila, *Bunge,-ex DC. Prod.* v. 470.—China,
anatolica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. xi. 6.—As. Min.
angustifolia, *DC. Prod.* v. 285.—Persia.
angustifolia, Wender. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 26 =ensifolia.
anthelmintica, Salisb. Prod. 201-1. Helenium.
appendiculata, Wall. Cat. n. 2966 = Vicoa auriculata.
apula, Crantz, Inst. i. 327 = Pulicaria odora.
araUca, Bove, ex DC. Prod. v. 478-Pnlicaria desertorum.
arabica, Linn. Mant. i. 111 =-Pnlicaria arabica.
Arbuscula, *Delile, in Ann.Sc. Nat.* Ser. II. xx. (1843) 98.—Abyss.
argentea, Pers. Syn. ii. 462=Chry»opsis graminifolia.
aromalica, Linn. PI." Afr. Rar. 22; Amoen. Acad. vi. 103 = Printzia aromatica.
Aschersoniana, *Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr.* mi. (1872) 179.—Balkan.
aspera, Poir. Encyc. Suppl. iii. 164=salicina.
asperrima, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 69 = nervosa.
Aucheriana, *DC. Prod.* vii. 281.—As. Min.
o-urontiaea, Sprang. Syst. iii. 524 = Dysodia appendiculata.
aurea, *Hassk. in Flora,* Ii. (1868) 27.-Malaya.
auricnlata, *Boiss. V Bal. Diagn.* Ser. II. m. 13.—As. Min.
auriculata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. x. (1859) 68=salicina.
auriculata. Wall. Cat. n. 2965-Vicoa auriculata.
axillaris, Hanssk. ex Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat. xliv. (1882) 325=Candida,
barbata. *Watt. Cat.* n. 2961.-Reg. Himal.
Barthiana, Schnr, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 10S=5tricta.
Wfrons, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1286.—Europ. anstr.
orahuica, Boiss. Fl. Orient, iii. 199=.graveolens.
britannica, Bieb. Kl. Taur. Cauc. ii. 317, partim = dysenterica.
britannica, *Linn. Sp. PI.* 882.—Europ.; As. bor.
Bubonium, Eichw. Skizze, 147=ensifolia.
Bubonium, Hort. Prag. ex Tansch, in Syll. Ratisb. II. (1828) 253 = stricta.
Bubonium, Jacq. Fl. Austr. v. 36 -squarrosa.
'aerulea, Linn. Mant. ii. 171=Printtia Bergii. ...
calycina, Presl, Fl. Sic. p. xxix; Spreng. Syst *m. 621* •smontana.

IKTJIiA:—
campestris, Bess. Enum. PI. Volh. 108 = 1. Oculus-Christi.
canadensis, Bemh. Syst. Verz. Erf. 150 = Erigeron canadensis.
canariensis, *Mill. Card. Diet.* ed. VIII. n. 12.—Ins. Canar.
Candida, *Cass. Diet. Sc. Nat.* xxiii. (1826) 554.—Europ. austr.; As. Min.
Candida, Ledeb. Fl. Ross. ii. 502=heterolepis.
capensis, Spreng. Ncue Entdeck. iii. 43 = Pulicaria capensis.
Cappa, *DC. Prod.* v. 469.—Reg. Himal.; Java; China,
caspica, *Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dor pat.* (1822) 10.—Reg. Casp.
caucasica, Pers. Syn. il. 150=Buphthalmum speciosum.
cernua, Berg. Desc. PI. Cap. 288 = Printzia Bergii.
chinensis, Rupr. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 149 = britannica.
chrysocomoides, Poir. Voy. Barb. ii. 239 - Pulicaria sicula.
cinerea, Lam. Encyc. iii. 269=Vaillantii.
comosa, Lam. Fl. Fr. ii. 117 = britannica.
conrertiflora, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* L 399.—Abyss.
Conyza, *DC. Prod.* v. 464.—Europ.; As. occ.
conyzaea, Lam. Fl. Fr. ii. 149 = Pulicaria dysenterica.
conyzoides, DC. Prod. vii. 283 (= *Varthemia montana).* —Syria.
conyioides, Desf. Choix, 49 ^ Pulicaria calycina.
cordala, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 8.—Banat.; As. Min.
cordata, Freyn, ex Nym. Consp. 8Sl=salicina.
cordatofolia, Gilib. Fl. Litnan. i. 207 - Pulicaria dysenterica.
cordato-germanica, Schnr, Verh. Siebenb. Ver.Natnrw. x. (1859) 64-germanica.
coriacea, Schur, 1. c. iv. (1853) 38-salicina.
crassifolia, Salisb. Prod. 201 = crithmoides.
cretica, Sch. Bip. ex. Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat. xliv. (1882) 825=Candida.
crispa, Pers. Syn. ii. 460 = Pulicaria crisp.
erispa, Sieber, ex DC. Prod. v. 479-Pulicaria undulate,
crithmiiblia, *Linn. Syst.* ed. X. 1219.—Enrop.; Reg. Caucas.
crithmifolia, Willd. Sp. PI. iii. 2101 = crithmoides.
crithmoides, *Linn. Sp. PI.* 883.—Europ.; Reg. Mediterr.
crithmoides, Sprang. Syst. iii. 250 «• multicaulis.
crocea, Krock, Fl. Sites. Suppl. ii. 313 = 1. Helenium ?
Csatoi, *Borb. in Magyar Növenyt. Lapoh,* vii. (1883) 11.—Hungar.
cospidata, *C. B.-Clarke, Comp. Ind.* 125.—Reg. Himal.
cutchica, C. B. Clarke, 1. c. 126 -grantioides.
cylindrica, With, ex DC. Prod. v. 178= Pulicaria vulgaris.
dentata, Sibth. & Sm. Fl. Grace, t. 874 - Pulicaria dysenterica.
dichotoma, Zuccagni, inRoem. Collect. 154 —britannica.
discoidea, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bof.* ii. 239. t. 29.—As. Min.
disenterica. Neck. Delic Gallo-Belg. ii. 856 = Pulicaria dysenterica.
divaricata, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 200.—Persia; Scind.
divaricata, Nutt. Gen. Am. ii. 152 — Aplopappns divaricatus.
dubia, Pourr. ex Timb. Précis Herbor. (1870) 176 - helenioides.
dubia, Thunb. Fl. Jap. 318 ^ Aster japonicus.
dumetorum, Salzm. ex "_)C. Trod. v. 47U-• Pulicaria odora.
dysenterica, Georgi, Reise, i. 230 - britannica.
dysenterica, Linn. Sp. I'l. 882 = Pulicaria dysenterica.
encelioides, Homem. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 606 = britannica.
ensifolia, *Linn. Sp. PI.* 883.—Europ. austr.; Reg. Cauc
ericoides, Torr. in Ann. Lye. N. York, ii. (1828) 212 = Aster ericaefolins.
eriophora, DC. Prod. v. 170-= I. Capp».
etrusca, Nym. Consp. 391, sphalm.» *hetrusca.*
enpatorioides, *DC. Prod.* v. 169.—Reg. Himal.; Burma.
falcata, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 632 = Chrysopsis villosa.
Falconeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* Hi. 291.—Reg. Himal.
fasciculata, Gilib. Fl. Lituan. i. 209-germ.inica.

INULA:—
flexuosa, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient* . iii. 200.—Persia; Scind.
foetida, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 516 = 1. Conyza.
foetida, Linn. Syst. ed. X. 1218=Nidorella foliosa.
foliosa, Schrad. ex Nym. Consp. 392 =• squarrosa.
fragilis, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 197.—As. Min.
fruticosa, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 15.—Venezuela.
fruticosa, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 398-Arbuscula.
germanica, *Linn. Sp. PI.* 883.—Europ.; As. Min.
germanica, Vill. Hist. PI. Dauph. iii. 219; Lam. Encyc. iii. 258 = squarrosa.
glabra, Bess. Hort. Crem.; ex DC. Prod. v. 165 -- bifrons.
glabra, Gilib. Fl. Lituan. i. 205-salicina.
glandulosa. Lam. Encyc. iii. 259=Chrysopsis Rossypina ?
glandulosa, *Puschk. ex Willd. Sp. PI.* iii. 2097.—Ke_K. Caucas.
glomerata, *Oliver V Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 359.—Afr. trop.
glomeri/lora, Lam. Fl. Fr. ii. lSO-hifrons.
glutinosa, Pers. Syn. ii. 450 = Grindelia glutinosn.
gnaphalodes, Vent. Jard. Cels, t. 75 = Pulicaria gnaphalodcs.
gossypina, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 122=Chrysopsis gossypina.
graminifolia, Michx. 1. c.» Chrysnpsis grnminifolia.
grandifiora, S. F. Gray, Nat. An. Brit. Fl. ii. 463 - I. Helenium.
grandiflora, *Willd. Sp. PI.* iii. 2096.—Reg. Himal. et Caucas.
grandis, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 50.—Soongaria.
grantioides, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 14.—Ind. bor. occ.
gravcolens, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 275.—Reg. Mediterr.
Uriffilhii, C. *B. Clarke, Comp. Ind.* 120.—Reg. Himal.
Halleri.mck. ex Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math. Nat. xliv. (1882) 295 = Vaillantii.
Haussmanni, Huter, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii (1863) 136-hirta.
helenia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128=1. Helenium.
helenioides, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 470.—Gall, austr.
Helenium, Asso, Syn. Stirp. Arag. 122 — helenioides.
Helenium, Hook. f. & Thorns, ex Fl. Brit. Ind. iii. 292 = raccmosa.
Helenium, *Linn. Sp. PI.* 881.—Europ.; As. bor.
helvetica, *Grauer, Dec.* 17.—Helvet.
heterolepis, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 12.—Euro}. austr.
hetrusca, Moretti, PI. Brafi. Dec. iv. 14-salicina.
hirsuta, Gueldenst. Reise, ii. 72-hirta.
hirsuta, Vitm. Summa, v. 84 = britannica.
hirta, *Linn. Sp. PI.* 888.—Europ.; As bor.
hirta, Poll. Hist. PI. Palat. ii. 467 britannica.
hispida, Schur, Enum. PI. Transs. 314-.squarrosn.
Hookeri, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 122.—Reg. Himal.
hybrida, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 132-ensifolia.
incisa, Lam. Encyc. iii. 256 = Pulicaria undulata.
indica. Linn. Sp. PI. ed. II. 1286 = Vicoa auriculata.
indica, Russ. ex DC. Prod. v. 44'l = Laggera ptcro. donta.
intermedia, Steud. Nom. ed. I. 432 "= Chrysopsis gossypina ?
intcrmixta, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 882.—Europ.
involucrata, Kalenic. in Bull. Soc. Nat Mosc. xviii. (1846) I. 234 = hirta.
involucrata, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 171 -« salicina.
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 318.—Japon.
Kalapani, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 123 Re_K Himal.
laciniata, Lam. Fl. Fr. ii. 15'2 » Senecio uniflorus.
lanata, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 532=. Chrysopsis gossypina.
lancifo'ia, Wender. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 2(i = ensifolia.
Langeana, Beck, in Denkschr. Acad Wien, Math.-Nat xliv. (1882) 329-snaveolens.
lanuginosa, Gilib. Fl. Lituan. i. 200 = I. Oculus-Chrish
latifolia, *DC. Prod.* v. 468.—Ind. or.
leptoclada, Webb, in Hook. Niger Fl. 137-Vice* auriculata.

INULA:—
limonifolia, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 198.—Graec.
linariaefolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. VII. 151 = britannica.
Hnifolia, Wender. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 26 = ensifolia.
UtoraUs, *Barb, ex Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat.* xliv. (1882)311.—Europ.
lucens, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 516-salicina.
macrocephala, BOIES. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 186-Royleana?
macrolepis, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. 1.1847) 330-britannica.
macrophylla. Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 438-grandis.
macrophylla, *Sch. Bip. in Schweinf.* b* *Aschers. Au/zaehl.* 286, 307.—Abyss,
macrosperma, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 292.—Keg. Himal.
Mannii, *Benth. V Hoot./. Gen.* ii. 381.—Afr. trop.
Mariana, Linn. Sp. Fl. ed. II. 1240 - Cbrysopsis Mariana.
media, Bieb. Fl. Tanr. Cane. Snppl. 676—germanica.
melanolepidea, Kalenic in Bull. Soc. Nat Mosc. xviii. (1845)1. 285 = hirta.
micrantha, Foir. Encyc Suppl. iii. 153= germanica.
micranthos, DC. Prod. v. 467 -britannica.
mollis, Bemh. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 335 — suaveolens.
montana, Bal. & Bourg. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 192 — Montbretiana.
montana, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 817-I. Oculus-Christi.
montana, Bivona, PI. Rar. Cent. i. 34 = Pulicaria calycina.
montana, *Linn. Sp. PI.* 884.—Europ. aostr.
montana. Luce, Fl. Osil. 279 - salicina.
montana, Poll. Hist. Fl. Palat. ii. 469 = hirta.
Montbretiana, *DC. Prod.* vii. 284.—As. Min.
multicaulis, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 3-anatolica.
mnlticaulis, *Fisch.* Cr *Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 30.—Reg. Casp.
myrtifolia. Linn. Syst. cd. X. 1219 = squarrosa.
Neilreichii, A. Kem. Sched. Fl. Exsicc. i. 91; Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat. xliv. (1882) 315-stricta.
nervosa, *Wall. Cat.* n. 2960.—Reg. Himal.
nitida, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 68 - nervosa.
oblonga, DC. Prod. v. 469-1. Cappa.
obovata, Nutt. ex Spreng. Syst. iii. 544 » Aster reticnlatus.
obtosifolia, *Kern, in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, i.* (1870) 111.—Reg. HiriVal.
obvallata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 377 = hirta.
Oculus, Schrank, Baier. Fl. ii. 394 = I. Oculus-Christi.
Oculus-Christi, C. B. Clarke, Comp. Ind. 120 - obtusifolia.
Oculus-Christi, Lam. Encyc. iii. 254; Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 522 « helenioides.
Oculus-Christi, *Linn. Sp. PI.* 881.—Enron.; Orieni.
odora, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 150 = Pulicaria undulata.
odora. Linn. Sp. Fl. 881 = Pulicaria odora.
odora, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 367 = montana.
Oetteliana, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1506
orientalis. Lam. Encyc. iii. 255 — glandulosa.
orientalis, Urv. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 193 = britannica.
orientalis, Willd. Sp. PI. iii. 2100=gertnanica.
oxylepis, Sch. Bip. ex Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat. xliv. (1882) 325 = Candida.
paludosa, DC. Prod. v. 480-seq.
palustris. Link, Handb. i. 738 —Pulicaria paludosa.
parnassica, Boiss. & Heldr. Diag. Ser. II. iii. 11 = Candida.
parviiora, Salisb. Prod. 201 = Pulicaria vulgaris.
phylicoides, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 626 - Tetramolopium phylicoides.
pinifolia. Linn. PI. Afr. Rar. 22; Amoen. Acad. vi. 102 = Senecio pinifolius.
planifolia. Link, ex DC. Prod. v. 479 - Pulicaria planifolia.
polycephala, Klatt, in Sitzb. Akad. Moench. (1878) 85 = cuspidata.
polygonata, *DC. Prod.* v. 566.—Burma.

INTJIiA:—
Fortenschlagii, *Deck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat.* xliv. (1882) 326.—liurop.
praealta, Dum. Fl. Belg. 68 = germanica.
primulaefolia. *Lam. Encyc.* iii. 261.—Ins. S. Doming.
prostata, Gilib. Fl. Lituan. i. 205 = Pulicaria vulgaris.
provincialis. Linn. Sp. PI. 884 — Senedo uniflorus.
Pseudo-Bubonium, Schur, Enum. PI. Transs. 813-salicina.
Pseudocappa, DC. Prod. v. 409 = 1. Cappa.
Pseudogermanica, *Bed, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat.* xliv. (1882) 299.—Europ.
Pseudosalicina, Simkov. ex Beck, 1. c. 303 - salicina.
Pulicaria, Brot. ex DC. Prod. v. 480 - Pulicarh paludosa.
Pulicaria, Linn. Sp. PI. 882 « Pulicaria vulgaris.
Pulicaria, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 367 — Pulicaria dysenterica.
pulicariaeformis, *DC. Prod.* vii. 284.—Persia.
punctata, Less. Syn. Comp. 198 -africana.
punctata, Muhl. Cat. 76 = Heterotheca grandiflora.
quadridentata. Lag. Nov. Gen. et Sp. 80=graveolens.
quadrifida, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 2963 = Pulicaria crispa.
racemosa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 292.—Reg. Himal.
ramosissima, [Clairv.] Man. Herb. 244 = Vaillantii.
repanda, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n.vn. 164 = britannica.
repens, Fisch. ex Treviran. Ind. Sem. Hort. Wratisl. (1819); Stev. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 336-Pulfcaria dysenterica.
revoluta, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 290 -Pulicaria revoluta.
rhizantha, *Tatarin. in Boer,* b* *Helm. Beitr. Kenntn. Russ. Reich,* xx. 251.—Soongaria.
rhizocephala, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* 61.—Persia; Soongaria.
rhizocephaloides, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 124.—Reg. Himal.
rhodostemma, Boiss. Fl. Orient, iii. 172 = Lachnophyllum Noëanum.
rigida, Doell, Fl. Baden, iii. 1865 = hirta.
rigida, *Vill. Prosp.* 32 (Quid ?).—Gallia.
Royleana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 118 - racemosa.
Royleana, *DC. Prod.* v. 464.—Reg. Himal.
rubricaulis, *Benth.* to" *Hoot. f. Gen.* ii. 831.—Reg. Himal.
rupestris, *Aitch.* to" *Hemsl. in yourn. Linn. Soc.* xix. (1882) 169.—Afghan,
salicifolia, *Gueldenst. Reise ftussl.* ii. 78,' 144, 146, 207, 287.—Rossia.
salicina, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. 39. n. 214 = britannica.
salicina, C. B. Clarke, Comp. Ind. 123 = acuminata.
salicina, *Linn. Sp. PI.* 882.—Europ.; As. bor.
salicina, Pall. Ind. Taur. [67]; ex Bieb. Fl. Taur.-Cauc. ii. 320 = squarrosa.
salviodora, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Vert. ind. Archip. 122 = 1. Cappa.
sarana, *Boiss. Ft. Orient,* iii. 199.—Cilicia.
Saturejae, Spreng. Syst. iii. 620 = Pectis satnreioides.
saturejaoides. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 13 - Pectis satureioides.
Savii, *Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat.* xliv. (1882) 806.—Europ.
saxatilis. Lam. Fl. Fr. ii. 153 = viscosa.
scabra, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 631; Nutt. Gen, Am. ii. 531 -Heterotheca Lamarckii.
scabra, Wall, ex DC. Prod. v. 474-Vicoa appendiculata.
schizogyne, *Mas/, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 199.—Ins. Canar.
Seidlitzli, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 189.—Persia-
semiatnplexicaulis, Rent in Menu Soc. Phys. Genèv. vii. (1886) 169 -salicina.
semicordata, Borb.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 410-rigida.
semihirta, Borb.—Cf. 1. c. -rigida.
sericea. Kit ex Kanitz, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xiii. (1863) 523; St. Lag. in Ann. Soc Bot. Lyon, vii. (1880i 128 = 1. Oculus-Christi.
serrata, Gilib. F'l. Lituan. i. 207 - britannica.
serrata, Pcrs. Syn. ii. 450=Grindelia inuloides.

INULA:—
setigera, *Beck, in Denkschr. Acad. Wien, Math.-Nat.* xliv. 11882) 831.—Europ.
shirensis, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1399.—Afr. trop.
Simonsii, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 121.—Reg. Himal.
somalensis, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* (1875) 326. —Afr. trop.
spathulata, Hort. Par. ex Poir. Encyc. Suppl. iii. 154 = aspera.
spiraevfolia, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient, iii. 188 = cordata.
spiraei/olia. Linn. Syst. ed. X. 1219 = squarrosa.
spuria. Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. (1871) 60-= rigida.
squarrosa, Bernh. ex DC. Prod, v, 464 — Conyza squarrosa.
squarrosa, Griseb. in Wiegm. Archiv, xviii. (1852) 337 = salicina.
squarrosa, Krock. Fl. Siles. ii. II. 442 — britannica.
squarrosa, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1240.—Europ.; Reg. Caucas.
Stolictkai, C. B. Clarke, Comp. Ind. 118 = Royleana.
stoloni/era, J. Gay, ex DC. Prod. v. 849-Aplopappus stoloniferus.
stricta, *Tausch, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 253.—Hab.!
suaveolens, *Jacq. Hort. Vindob.* iii. 29. t. 61.—Europ'. austr.
suaveolens. Pall, ex Bieb. Fl. Taur. Cauc ii. 817-I. Oculus Christi.
subaxillaris, Lam. Encyc. iii. 259 = Heterotheca Lamarckii.
thapsoides, *Boiss. Ft. Orient,* iii. 190.—As. Min.; Persia.
thapsoides, *Spreng. Pugill.* i. 58.—Reg. Caucas.
Thomsoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 120»obtusifolia.
transsilvanica, Schur, Ennm. PI. Transs. 312 = germanica.
trichophylla, Nutt. Gen. Am. ii. 160 = Chrysopsis trichophylla.
Trixis, Linn. Syst. ed. X. 1219 = Trixis frutescenB.
tuberosa, Lam. Encyc. iii. 260 —Jasonia tuberosa.
uliginosa, Sibth. ex Sm. Fl. Brit. 892 - Pulicaria vulgaris.
undulata, Linn. Mant. i. 115 = Pulicaria undulata.
uniflora, *Gilib. Hist. PI. Europ.* ii. 247.—Europ.
Vaillantii, Schur, ex Nym. Consp. 398-britannica.
Vaillantii, *Vill.Hist.Pl.Dauph.* iii. 216.—Europ. austr.
valiensis, Tausch, ex Beck, DenkscUr. Acad. Wier., Math.-Nat. xliv. (1882) 313-hybrida.
verbasci/olia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 154 - thapsoides.
verrucosa, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 86 = nervosa.
vestita, Wall. Cat. n. 2962 = Viooa vestita.
villosa, Linn. Syst. ed. X. 1219 = montana.
villosa, Spreng. Syst. iii. 523 = Chrysopsis villosa.
villosa, Vahl, ex Horaem. Hort. Ham. ii. 822 - Pulicaria arabica.
viscidula, *Boiss. tf Kotschy, in Boiss. Fl. Orient,* iii. 188.—Armenia,
viscosa, *[Dryand.* in] *Ait. Hort. Ken.* ed. I. iii. 223.—Reg. Mediterr.
Vrabelyiana, Kem. in Oestr. Bot. Zeitachr. xviii. (1868) 297 = stricta.
vulgaris, Trevis. Prosp. Fl. Eugan. (1842) 29-- Pulicaria vulgaris.

INULASTER, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 42; in Flora, xxv. (1842) I. Beibl. 184, 147, nomen; at in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, i. 399 (1847) = Inula, Linn. (Compos.).
Kotschyi, Sch. Bip. 11. cc. 42; 134; 147 - Vicoa auricnlatfl™
macrophyllus, Sch. Bip. in A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 399 = 1. macrophylla.

INVOLUCRARIA, Ser. in Mém. Soc. Phys. Genèv. iii. I. (1825) 26. t. 5-Trichosanthes, Linn. (Cucnrb.).
Anguina, M. Roem. Syn. Pepon. 97=*-T. Anguina.
cordata, M. Roem. 1. c.-T. cordata.
cucumerina, M. Roem. 1. c. 98 =T. pubera.
globosa, M. Roem. 1. c. 99 = T. globosa.
javanica, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 678=Thladiantha cordifolia.
Lepiniana, Naud. in Huber, Cat. (1868) 11 = T. Leb in ana.
Modecca, M. Roem. Syn. Pepon. 98 = T. pubera.
palmata, M. Roem. 1. c. 98 = T. pubera.
tri/oliata, M. Roem. L c 99 ~T. trifoliata.

INVOLUCRARIA :—
Wallichiana, Ser. in Mem. Soc. Phys. Genev. iii. 1. (1825) 25=Trichosantli«i Wallichiana.
Wightiana, M. Roem. Syn. Pepon. 98 - T. pubera.

IOCASTE, E, Mey. ex DC. Prod. vii. 298 (Io38) = Phymaspermum, Less. (Compos.).

1OCAULON, Rafin. New Fl. Am. ii. 53 (1886) ••• Crotalaria, Tourn. (Legumin.).
cuneifolia. Ratio. 1. c. 55=-C. cuneifolia,
linearis, Rafin. 1. c. 54=C. linearis.
longipes, Rafin. I. c.-C. longipes, *Rafin.*
lunulata, Kafin. 1. c. 55 -C. lunulata.
wsalis, Rafin. 1. c.=C. ovalis.
pilosa, Rafin, 1. c. 54 -=C. pilosa, *Rafin.*
pumila, Rafin. 1. c. 56-C. pumila, *Kafin.*
sagittalis, Kafin. L c. =C. sagittalis.

IOCHBOMA, Benth. in Bot. Reg. xxx. (1845) t. 20.
SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 895.
CHAENESTHBS, Miers, in Hook. Lond. Joum. Bot. iv. (1845) 336.
&EOCKROMA, Miers, 1. c vii. 349 (1848).
DIPLURKION et VALTETA, Rafin. Sylva Tellur. 58 (1838) nomina, priota.
aiborea, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 219.-Reg. Argent.
australe, *Griseb. I. c.* 218.—Reg. Argent.
Benthamiana, *Heurck tf Muell. Arg. in Heurci, Qbs. Bot.* 133.—Peruv.
calycina, *Benth. in Bot. Reg.* (1845) Bnbt.20.—Guian.
coccinea, *Scheid. in Fl. des Serves,* Se>. II. ii. (1857) 161.1.1261.—Mexic.,
comifolia, *Miers, in Hock. Lond. Journ. Bot.* vih (1848) 847.
fuchsioides, *Miers. I. c.* 845.—Peruv.
gesnerioides, *Miers, I. c.* 346.—Peruv.
grandiflora, *Benth. in Bot. Reg.* (1845) sab t. 20.—Peruv.
lanceolata, *Miers, In Hook. Lond. Joum. Bot.* vii. (1848) 347.—Ecuador,
longipes, *Miers, I. c.* 344.—Ecuador,
loxensis, *Miers, I. c.* 347.—Ecuador,
macrocalyx, *Miers, 1. c.* iv. (1845) 389.—Peruv.
Schlechtendaliana, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 673.—Am. trop.
tetradynama, *Dun. I. c.* 490.—Am. austr.
tubulosa, *Benth. in Bot. Reg.* (1845) t. 20•—N. Granat,
umbrosa, *Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 346.-N. Granat.
Warscewiczii, *Regel, Gartenfi.* (1855) 245. t. 180.—Pernv.

IODANTHTTS, Torr. & Gray, Fl. N. Am. L 72 (1838).
CRUCIFERAE, Benth.. & Hook. f. i. 70.
hesperidoides, Torr. & Gray, in A. Gray, Man. U. St. • Bot. ed. 1.33 = pinnatifidus.
pinnalifidos, *Steud. Norn.* ed. II. i. 812.—Am. bor.

IODEB, Blnme, Bijdr. 29 (1825) (Ioedes.). *OLACINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 365.
EHYTHROSTAI-HYLE, Hance.injoum. Bot.xi. (1873) 266.
africana, *Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Aft.* L 858.—Afr. trop.
Brandisii, */Curt, in Journ. As. Soc. Beng.* xU. (1872) II. 298.—Burma.
cirrhosa, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 281.—Java.
Hookeriana, *Baill. Adansmia,* x. (1871-72) 268.—Ind. or.
Horsfieldii, *Baill. 1. c.* 267.—Java,
madagascariensis, *Baill. I. c.* ix. (1868-70) 146.—Madag.
oblonga. *Planch, ex Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 597.—Penang.
ovalis, *Blurne, Bijdr.* 80.—Java.
Thomnoniana,*Baill. Adansonia,* x. (1871-72.) 270.-Ind. or.
tonenUUa, Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 796 = ovalis.

lODIXTA, Hook. & Am. in Hook. Bot Misc. iii. (1883) 172. *SANTALACEAE,* Benth. & Hook. f.
cuneifolia, *Miers, in Journ. Linn. Soc.* xvu. (1878) »*• —Reg. Argent.

IODIMA:-
rhombifolia, *Hook, tf Am. ex Reissek, in Mart. Fl. Bras.* xi. I. 78.—Bras.
ruscifolia, Walp. Rep. i. 641 — rhombifolia.

ION, Medic. Malv. 102 (1787)=Viola, Toum.
tricolor, Medic 1. c. = V. tricolor.

IONCOMELOS, Rafin. Fl. Tellur. iii. 62 (1886) - Scilla, Linn. (Liliac.).
purpureus, Rafin. 1. c.=S. Cnpani.

IONDRABA. Reichb. Consp. 183 (1828) - JONDKABA, Medic.=BiBCUtella, Linn. (Crucif.).

IONE, Lindl. Fol. Orch. (1853) = Bulbophyllum, Thou. (Orchid.).
bicolor, Lindl. 1. c 3 = B. bicolor!
Candida, Lindl. 1. c.—Keg. HimaL
cirrhata, Lindl. L c. 1.—Reg. Himal.
fusco~purpurea, Lindl. 1. c. 2—B. fusco-purporeum.
khasiana, Lindl. 1. c = B. repens?
paleacea, Lindl. 1. c.=B. paleaceum.
virens, Lindl. 1. c. 1.—Reg. Himal.

IONIA, Pens, ex Steud. Nom.ed. I. 488 (1821) - Ionldlum, Vent. (Violar.).

IONIDIOPSIS, Walp. Ann. i. 69 (1848) - JONIDIOPSIS, PresUMoiaettfa, H. B. & K. (Violar.).

IONIDIUM, Vent. Jard. Malm. t. 27 (1808).
VfOLARIEAE, Benth. & Hook. f. i. 117.
CALCEOLARIA, Loefl. It. 483 (1758) nomen, prills.
CUBELIUM, Rafin. Cat. 13 (1824).
HYBANTHUS, Jacq. Enum. PI. Carib. 2 (1760).
PiCEA, DC. Prod. i. 307 (1824).
POMBALIA, Vand. Fasc. PI. 7 (1771).
SOLEA, Spreng. in Schrad. Journ. Bot. iv. (1800) 192.
VLAHINGIA, De Vriese, in Lehm. PI. Preiss. i. 31/8 (1845).
aethiopicum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1S54) II. 339.—Afr. trop.
album, *A. St. Hil. in Mem. Mus. Par.* xi. (1824) 477.—Bras.
angustifolium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 377 - oppositifolium.
anomalum, *H. B. V K... c.* 881. t. 600.—N. Granat.
atropurpureum, *A. St. Hil. in Mem. Mus. Par.* xi. (1824) 490.—Bras.
attenuatum, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 402 - opposilifolium.
Aubletii, Roem. & Schult 1. c 895=Corynostylis Hybanthus.
aurnntiacum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* i. 102.—Austral.
Australasiae, Behr, in Linnaea, xx. (1847) 629-floribundum.
anstro-caledonicum, *Vieill. in Bull. Sac. Linn. Normand.* ix. (1865) 381—N. Caled.
Balbisii, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc,* xxxvi. (1863) I. 556.—N. Granat
Banksianum, Steud. Norn. ad. II. i. 818 « heterophyllum.
bartelonense, Kant. Fl. Columb. i. 189- = oppositifolium.
bicolor, *A. St. Hil. in Mem. Mus. Par.* xi. (1824) 475.—Bras.
bigibbosum, *A. St. Hil. 1. c.* 488.—Bras.
Botterii, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 666.-rMexic.
brevicaule, *Mart. Spec. Mat. Med. Bras.* 15; *Reise Bras.* i. 553.—Bras.
brevilabre, *Benth. Fl. Austral,* i. 102.—Austral,
buxifolium, *Vent. Jard. Malm.* 27 *in adn.*—Madag.
coffrnm, *Send, in Linnaea,* xxiii. (1850) 13.—Afr. austr.
Calceolaria, Vent. Jard. Malm, sub 27 = 1. Ipecacuanha,
calceolarium, *Ging. in DC. Prod.* i. 311.—Mexic.
calycinum, *Steud. Nom.* ed. II. i. 813.—Austral,
capense, *Roem. V Schult. Syst.* v. 393.—Afr. austr.
chamaedrifolium, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 96.—Chili.
chamaedtyfolium, Poepp. ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 800 = glutinosum.
circaeoides, *H. B.&K. Nov. Gen. et Sp.* v. 879. t. 498.—Am. austr.
claytonioides, *Roem. b[1] Schult. Syst.* v. 402.—Hab. *1*
commune, *A. St. Hil.* in *Mem. Mus. Par.* xi. (1824) 469.—Bras.
concolor, *Benth. tf Hook./, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* 81.—Am. bor.

IONIDIUM :-
debilissimum, *F. Muell. Fragm.* xi. 4.—Austral.
diandrum, Ro-:m. *Si* Schult Syst. v. 899 -Corynostylis diandra.
diffusum, Gill, ex Hook. Bot. Misc. HI. (1833) 145 - Cynanchum diffusum.
datum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) I. 556.—Mexic
enneaspermum, Vent Jard. Malm, sub 27; Ging. in DC. Prod. i. 308-heterophyllum.
erectum, Ging. 1. c. 311»heterophyUum.
ericaeoides, Pritz. Ic. Ind. 686, sphalm. = circaeoides.
filiforme, *F. Muell. Viet. PI.* i. 66, 224.—Austral,
floribundum, *Walp. Rep.* ii. 767.—Austral.
frutescens, Blume, Bijdr. 58 = heterophyllum.
frutescens, *Ging. in DC. Prod.* i. 311.—Ind. or.
fruticulosum, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 7. t 2.—Calif.
Galeottii, *Tun*, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 339.—Mexic.
glaucum, Steud. Nom. ed. II. i. 818=calycinum.
glutinosum, *Vent. Jard. Malm,* sub 27.—Reg. Argent,
gracile, *Mof. V Sesse, in DC. Prod. i.* 809.—Mexic
grandiflorum, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 338.—Venezuela.
guaraniticum, A. St. Hil. in Mem. Mus. Par. xi. (1824) 474-commune,
heterophyllum, *Vent. Jard. Malm.* 27, in adn.—Geront. trop.
heterosepalum, *Eichl. in Mart. Ft. Bras.* xiii. I. 367.—Bras.
hexaspermum, Doll, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 342 = suffruticosum.
Hieronymi, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 21.—Reg. Argent.
hirtum, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 148 = heterophyllum.
hispidulum, *Presl, Bot. Bemerk.* 13.—Hab. 1
Hybanthus, Roem. & Schult. Syst. v. 396-Corynostylis Loeflingii.
iliclfolium, *Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand.* ix. (1865) 884.—N. Caled.
indecorum, *A. St. Hil. in Mem. Mus. Par.* ix. (1822) 829.—Bras.
Ipecacuanha, *Vent. Jard. Malm,* sub t. 27.—Bras.
Itoubou, Steud. Nom. ed. II. i. 813=seq.
Itubu, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 880 - I. Ipecacuanha.
Jacquinianun, *Roem. tf Schult. Syst.* v. 887.—Cuba,
lanatum, *A. St. Hil. in Mem. Mus. Par.* xi. (1824) 482.—Bras.
lasiocarpum, *Presl, Rel. Haenk.* v. 96.—Chili.
leptorhimm, DC. ex Ging. in DC. Prod. i. 508 - heterophyllum.
linarifolium, Ging. 1. c. SJ9-strictum.
linarioides, Presl, Bot. Bemerk. 12-> filiforme.
lineare, *Torr. in Ann. Lye. N. York,* ii. (1828) 168.—Am. bor.
lineatum, *Ging. in DC. Prod.* i. 811.—Cuba,
linifolium, *DC. 1. c.* 809.—Madag.
lobelioides, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1888) 208.—Mexic.
Loefflingianum, Roem. & Schult. Syst v. 896-1. Ipecacuanha.
longifolium, *Moç. V Sesse, ex DC. Prod.* i. 811.—Mexic.
longifolium, Roem. & Schult Syst. v. 898>Noisettia longifolia.
Lorentzianum, *Eichl. ex Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 74.—Reg. Argent.
Maximiliani,£>VA/. *inMart.Fl.Bras.* xiii.1.869.- Bras.
microphyllum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 874. t. 495-glutinosum.
molle, *Turn, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 338.—Java.
vionopetalum, Roem. & Schult. Syst. i. 400 = filiforme.
multifiorum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1864)11. 840 = floribundum.
nanum, A. St. Hil. in Mem Mas. Par. xi. (1824) 484 — album,
natalense, *Harv. in Hare, (f Sond. Fl. Cap-* it 685.—Afr. .iiutr.
occulatum, *Polak. in Linnaea,* xll. (1877) 648.—Costa Rica.
oppositifolium, *Roem. V Schult. Syst.* v. 895.—Venezuela.
orchidiflorum, Roem. & Schult. 1. c. 400-Noisettla longifolia.
parietariaefoliwit, DC. Prod. i. 808-oppositifolium.

IONIDIUM :—
parviflorum. Vent. Jard. Malm. 27, in Adn. = glutinosum.
phyllanthoides, *Planch, b" Linden, ex Triana (f Planck. in Ann. Sc. Nat.* Sér. IV. xvii. (1862) 125.—N. Granat.
Poaya, *A. St. Hil. in Mém. Mus. Par.* xi. (1824) 482.—Bras,
polygalaefolium, *Vent. Jard. Malm.* 27. t. 27.—Mexic.
procumbens, *Griseb, Cat. PI. Cub.* 11.—Cuba,
racemosum, *Nees* b[1] *Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xii. (1825) 49.—Bras.
ramosissimum, *This. Enum. PI. Zeyl.* 21.—Zeylan.
rhabdospermum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 4S=heterophyllum?
riparium, A. Gray, PI. Wright, ii. 16^1ineare.
riparium, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 878-oppositifolium.
scariosum, A. St. Hil. in M6m. Mus. Par. xi. (1824) 47S = brevicaule.
setigerum, *A. St. Hil. I. c.* 470.—Bras.
Sprengelianum, Roem. & Schult. Syst. v. 401 = concolor.
Sprucei, *Etc hi. in Mart. Fl. Bras.* xiii. 1.878.—Bras.
stipulaceum, Nutt ex Ton. & Gray, Fl. N. Am. i. 144 = lineare.
stipulate, Roem. & Schult. Syst. v. 392 = Viola slipularis.
strictum, *Vent. Jard. Malm.* 27, in Adn.—Ing. S. Doming.
suffruticosum, Ging. in DC. Prod. i. 811 = heterophyllum.
sylvaticum, A. St. Hil. in M£m. Mus. Par. xi. (1824) 472 = commune,
tencriifolium, *Tierce, in Bull.Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) II. 387.—Bras.
tkesiifolium, Roem. *8c* Schult. Syst. v. 898=heterophyllum.
thymifolium, *Presl, Rel. Haeni.* ii. 91.—Afr. austr.
travancoricum. *Bedd. la, PI. lnd. Or.* i. 55.—Ind. or.
urticaefolium. Mart. Spec. Mat. Med. Bras. 16 ; Reise Bras. i. 553 =circaeoides.
verbenaceum, *H. B. b" K.Nov. Gen. et Sp.* v. 379 t. 497.—Mexic.
Vemonii, *F. Muell. PI. Viet.* i. 223.—Austral.
verticillatum, Roem. & Schult. Syst. y. 899-polygalaefolium.
villosissimum, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 480.—Bras.
msddulum, H. B. *8c* K. Nov. Gen. et Sp. v. 877 = oppositifolium.
Wightiana, Wall. Cat. n. 4020=heterophyllum.
Zippelii, *Oudem. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii.73.—Ins. Timor. [a]

IONIRIS, Baker, in Gard. Chron. N. S. vi. (1876) 148, in obs.=JONIRIS, Klatt-Irifl, Toum.

IONOPSIDIUM, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 26. t. 649 (1829) = Cochlearia, Toum. (Cracif.).
acaule, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 26 = C. acaulis.
aliifiorum, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1846) 433.—Algeria.
' *Savianum,* Ball, ex Camel, in Atti Soc. Sc. Nat', viii. (1865) 439 -Bivonaea Sariana.

IONOPSIS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 348. t. 83 (18151. *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 567.
CYBELION, Spreng. Syst. iii. 679, 721 (1826).
IANTHA, Hook. Exot. Fl. t. 113 (1825).
brevifolia, *Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. iii. (1845) 26.—Mexic.
Burchcllii, *Reichb. f. in Liwnaea,* xli. (1877) 68.—Bras.
Gardneri, *Lindl. in Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-52) 13, in obs.—Ind. occ.
pallidiflora, *Lindl. Bot. Reg.* aub I. 1904.—Ins. Trinit.
paniculata, *Lindl. I. c*—Bras,
pulchella, *H. B.* &[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 848. t. 83.—N. Granat.
satyrioides, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 683 = testiculata.
tenera, Lindl. Bot. Reg. t. 1904 = utricularioides.
teres, *Lindl. I. c.* (1888) *Misc.* 95.—Gnian.
testiculata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 193.—Jamaic.
utricularioides, *Lindl. Coll. Bot.* t. 39 A.—Jamaic.
tonalis, Lindl. in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 13. in obs.-utricularioides.

IONOSMANTHUS, Jord. & Fourr. Ic.Pl. Europ. ii. 13 (1870)= Ranunculus, Tourn.
plantagineus, Jord. & Fourr. 1. c 14 = R. bupleurifolius?
rhombifolius, Jord. & Fourr. 1. c. = R. bullatus.
semicalvus, Jord. *8c* Fourr. I. c. -R'. bullatus.

IONTHLASPI, Adans. Fam. ii. 423 (1763) = dypeola, Linn. (Cracif.).
clypeolatum, Link, Handb. ii. 296-C. Jonthlaspi.
eriophorum, Link, 1. c.—C. eriocarpa.

IOSOTOMA, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 388 (1864), err. typ. = Isotoma, Lindl. (Campan.).

IO8TEPHANE, Benth. in Benth. *Sc* Hook. f. Gen. ii. 368 (1878). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. 1. c.
heterophylla, *Benth. I. c*—Mexic.
trilobata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 169.—Mexic.

IOXYLON, Rafin. in Am. Monthly Mag. iv. (1818) 195 =TOXYLON, Rafin.-Madura, Nutt. (Urtic).

IOZOSMENE, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 202 (1836) = IOZOSTE, Nees-Actinodaphne, Nees (Laurin.).

IOZOSTE, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 63 (1881) = Actinodaphne, Nees (Lanrin.).
acuminata, Plume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 364 = A. acuminata.
chinensis, Blume, 1. c. = A. chinensis.
lancifolia, Blume, 1. c. = A. lanciiblia.
pedunculata, Blume, 1. c. = A. pednnculata.
rotundifolia, Nees, in Wall. PI. As. Rar. ii. 63 -= A. chinensis.

IPECACUANA, Rafin. Sylva Tellur. 147 (1838) = seq.

IPECACUANHA, Arrada, Diss. 44 (1810); ex A. St. Hil. PI. U. St. Bras. t. 6 (1824)-Paychotria, Linn. (Rubiac).
Branca, Arrada, Diss. ex Koster, Trav. Braz. 497 = Ionidium Ipecacuanha.
fusca, Rafin. Sylva Tellur. 147 = P. Ipecacuanha.
qfficinalis, Arruda, Diss. ex Koster, Trav. Braz. 497 = " P. Ipecacuanha.
Preta, Arruda, 1. c.=P. Ipecacuanha.

IPHEION, Rafin. Fl. Tellur. ii. 12 (1886)-MiUa, Cav. (Liliac).
uniflorum, Rafin. 1. c.=«M. aniflora.

IPHICłENIA, Kunth, Enum. PL iv. 212 (1843). *LILIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 824.
APHOMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 31 (1836}.
NOTOCLES, Salisb. Gen. PI. Fragm. 54 (1866).
caricina, Kunth, Enum. PI. iv. 214-indica.
guineensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 451.—Afr. trop.
indica, *A. Gray, in Kunth, Enum. PL* iv. 218.—Ind. or.
Novae-Zelandiae, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 451.—N. Zel.
pallida, *Baker, 1. c.*—Ind. or.
racemosa, A. Gray, in Kunth, Ennm. PI. iv. 218 = indica.
robusta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 275.—Madag.

IPHIONA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1817) 153 ; et in Diet. Sc. Nat. xxiii. 609 (1822). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 338.
BLANCHEA, Boiss. Fl. Orient iii. 212, in syn. (1875).
CARPHOPAPPUS, Sch. Bip. in Walp. Rep. ii. 954 (1848).
KARTHEMIA, Sch. Bip. 1. c. 953 (1843), sphalm.
VAKTHEMIA, DC. Prod. v. 473 (1836).
acuminata, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 333.—Afr. austr.
arabica, *Benth. V Hook.f. I. c*—Arab,
baccharidifolia, *Benth.* to" *Hook.f. I. c*—Afr. austr.
dubia, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817) 153 = juniperifolia.
horrida, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 80.—Arab.

IPHIONA :—
ilicifolia, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 833.—Madag.
iphionoides, *Benth. (f Hook. f. I. c*—Syria,
juniperifolia, *Cass. in Did. Sc. Nat.* xxiii. 610.—Aegypt.; Arab,
microphylla, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvii. (1877) 196. -Afr. trop.
persica, *Benth.* &* *Hook.f. Gen.* ii. 883.—Persia,
polygalifolia, *Benth. V Hook.f. I. c*—Afr. austr.
punctata, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxiii. 609=Inula africana.
radiata, *Benth. in Henders. V Hume, Lahore,* 323.—Reg. Himal.
rotundifolia, *Benth.* b* *Hook. f. Gen.* ii. 383; *Oliver* &• *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 36O.-Afr. trop.
scabra, *DC. ex Decne. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. ii. (1884) 263.—Arab.; Aegypt.
spinosa, DC. ex Stead. Nom. ed. II. i. 815 «• juniperifolia.

IPHISIA, Wight *8c* Am. Contrib. 62 (1834) = Tylophora, R. Br. (Asclep.).
Govani, Wight, 1. c = T. Govanii.
multiflora, Wight *8c* Am. U = T . Iphisia.

IPNTTM, Phil. Sert. Mendoc. ii. 53 (1871). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1187.
mendocinum, *Phil. I.* c—Chili.

IPO, Pers. Syn. ii. 566 (1807) - Antiaris, Lesch. (Urtic).
toxicaria, Pers. 1. c. = A. toxicaria.

IPOMAEA, Burm. f. Fl. Ind. 50 (1768)=Ipomoea, Linn. (Convolv.).

IPOMEA, All. Misc. Taur. v. 62 (1778) - praec.

IPOMERIA, Nutt. Gen. Am. i. 124 (1818)-Gilia, Ruiz & Pav. (Polem.).
aggregata, Nutt. 1. c«=G. aggregata.
albida, Nutt. 1. c. = G. ladniata.
coronopifolia, Nutt. 1. c. = G. coronopifolia.
inconspicua, Nutt. 1. c = G. parviflora.

IPOMOEA, Linn. Syst. ed. I (1735). *CONVOLVULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 870.
ANISEIA, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genèv. vi. (1838) 481 (Conv. Or. 99).
AFOFLEUMON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 72 (1836).
BATATAS, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 434 (Conv. Or. 62.)
BOMBYCOSPERMUM, Presl, Rel. Haenk. ii. 137. t. 71 (1831).
BONANOX, Rafin. Fl. Tellur. iv. 77 (1836).
CALBOA, Cav. Ic. v. 51. t. 476 (1799).
CALONYCTION, Choisy, in M<Sm. Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 441 (Conv. Or. 59).
CALYCANTHEMUM, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 243. t. 40 (1861).
CAMONEA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 81 (1836).
CAULOTULIS, Rafin. 1. c. 75 (1886).
CLEIEMERA, Rafin. 1. c. 77 (1836).
CLITOCYAMOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128, 133.
COILADENA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 12 (1836).
CONVOLVULOIDES, Moench, Meth. 451 (1794).
DECALOBA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 75 (1836).
DIATREMA, Rafin. L c. 72 (1886).
DISTIMAKE, Rafin. 1. c. 82 (1836).
DOXEMA, Rafin. 1. c. 75 (1836).
ELYTHROSTAMNA, Boj. Hort. Maurit. 230 (1837).
EURYLOMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 75 (1836).
EXOGONIUM, Choisy, in Mem. Soc Phys. Genèv. vi. (1833) 443 (Conv. Or. 61).
FRAXIMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 83 (1836).
GYNOISA, Rafin. 1. c. 75 (1836).
GOMFHIFUS, Rafin. 1. c. (1836).
KOLOFONIA, Rafin. 1. c. 78 (1836).
LEFTOCALLIS, G. Don, Gen. Syst. iv. 260 (1837).
LOBAKE, Rafin. Fl. Tellur. iv. 81 (1836).
MACROSTEMA, Pers. Syn. i. 185 (1805).
MARCELLIA, Mart ex Choisy, in Mlm. Soc. Phys. Genèv. x. (1844) 443.
MELASCUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 80 (1836).
MINA, Cerv. in La Llave & Lex. Nov. Veg. Deic fasc. i. 3 (1824).

IPOMOEA:—
MODESTA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 75 (1836).
MORENOA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 6 (1824).
NEMANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 80 (1836).
NEORTHOSIS, Kafin. 1. c. 125 (1886).
NIL, Medi'c. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys. Oek. Ges. i. (1791) 210.
UPERCULINA, Silva Manso, Enum. Subst. Bras. 16 (1886).
ORNITHOSPERMA, Rafin. Fl. Ludov. 149 (1817).
PHARBITIS, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. vi. (1833) 438 (Conv. Or. 56).
PIPTOSTEGIA, Keichb. Nona. 113 (1841).
QUAMOCUT, Moench, Meth. 453 (1794).
.SKINNERIA. Choisy, in *Him.* Soc. Phys. Genev. vi. (1833) 487 (Conv. Or. 105. t. 6).
SPIRANTHERA, Boj. Hort. Maurit. 226 (1837).
STOMADENA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 12 (1886).
TEREIETRA, Rafin. 1. c. iv. (1836).
TIRTALIA, Rafin. 1. c. 71 (1836).
TREMASPERMA, Rafin. 1. c. 124 (1836).
TRIVOLVULUS, MOC. & Sesse, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 368 (1846).
TURBINA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 81 (1836).
TURPITHUM, Rafin. 1. c 71 (1836).
abrupta, *R. Br. Prod.* 485.—Austral.
abscissa, Boj. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 438, 892 = Breweria abscissa.
abutiloides, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 273.—Ecuador,
abyssinica, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 94.—Abyjs.
acanthocarpa, *Hochst. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 346, 892.—Afr. trop.
acetosaefolia, Roem. & Schnlt. Syst. iv. 246 - camosa.
acetosellaefolia, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 388.—Ins. Maurit.
aculeata, Blume, Bijdr. 716'I. Bona-nox.
aciiminala, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 228.—Ind. occ.
acuminata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. t. 120. f. b = coccinea.
acutangula, Ruiz & Pav. 1. c. 11=coccinea.
acutiflora, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 71.—Abyss.
adspersa, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 252 = polymorpha.
aegopoda, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vir. (1880) 70 = biloba.
aegyptia, Linn. Sp. PI. 162=pentaphylla.
amnis, *Mart, b- Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 263.—Mexic
affinis, Poepp. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 392, 433= Calystegia Soldanella.
afra, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 380—Afr. trop.
Afzelii, *Choisy, 1. c.* 373.—Afr. trop.
aggregate, *Pair. Encyc. Suppl.* iv. 633.—Cochinch.
Aitoni, *Lindl. Bot. Reg.* 1.1794.—Afr. austr.
alata, *R. Br. Prod.* 484.—Austral,
alatipes, *Hook. Bot. Mag.* t. 5380.—Veneznela.
alba, Garclce, in Linnaea, xxii. (1849) 67=fastigiata.
alba. Linn. Sp. PI. 161 = 1. Bona-nox.
albiflora, *Marie. PI. Nouv. Am.* 114. t. 70.—Bras,
albivenia, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 872.—Afr. austr.
alterniflora, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 202.—Cuba.
altissima, Bert, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 273 " racemosa.
altissima, *Mart, ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 853.—Bras,
alulata, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 599.—Guian.
ambigua, Endl. Prod. H. Norf. 53 = 1. Boua-nox.
amoena, Blume, Bijdr. 718-Argyreia Roxburghii.
ainoena, *Choisy, in DC. Prod-* ix. 365.—Afr. trop.
ampelopsifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 279 ~ quinquefolia ?
ampliata, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 361.—Mexic.
anceps, Roem. & Schnlt. Syst. iv. 231 = 1. Turpetnum.
angularis, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. vi. (1883) 454-vitifolia.
angularis, Willd. iu Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 197 •= hederifolia.
angularis, Willd. in Nov. Act. Nat. Cur. iv. (1770) 197=coccinea?
augulata, *Mart, ex Choisy, in DC. Prod.* u. 871.—Hru•
angultfa, Orteg. Hort. Matr. Dec. 88; Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 11=coccinea.
angustifolia, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 895.—Bras,
angnstifolia, *Jacq. Coll.* ii. 367.—Geront. trop.
angustifolia, *Parodi, Contrib.* 21.-Paraguay.
apiculata, *Mart,* tr *Gal. in Bull. Acad. Brux.* X". «• (1845) 262.—Mexic

IPOMOEA :-
aquatica, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 44.—Geront trop.
arachnoidea, *Boj. Hort. Maurit.* 228.—Afr. trop.
arachnosperma, *Welw. Apont.* 588.—Afr. trop.
arborescens, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 878, somen; *G. Don, Gen. Syst.* iv. 267.—Mexic.
arenaria, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 247.—Ind. occ.
arenaria, *Steud. Norn.* ed. II. i. 815.—Ins. occ.
argentea, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 247.—Am. trop.
argentifolia, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* ii. 131.—Ind. occ.
Argyreia, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 246.—Am. trop.
argyreioides, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 367 Afr. austr.
argyrophylla, *Vatke, in Linnaea,* xliii. ^880-82) S10 —Afr. trop.
aristolochiaefolia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 277.—Venezuela,
aristulata, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. 11. (1845) 263.—Mexic
armata, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 214.—Mexic
Arnottiana, Steud. Norn. ed. II. i. 815=dissecta.
asarifolia, *Poem. V Schult. Syst.* iv. 251.—Afr. trop.
asclepiadea, Choisy, ex Steud. Norn. ed. II. i. 815 = Argyreia Guichenotii.
aspera, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880-82) 508 - grandiflora,
aspersa. *Mart, ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 368.—Bras.
atropurpurea, Choisy, in Mem. Soc Phys. Genev. vi. (18.13) 457=*Lettsomia atropurpurea.
atrosanguinea, Hook. Bot. Mag. t 2170 = Argyreia cuneata.
aturensis, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 266.—Venezuela,
auricoma, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss,* ii. 65.—Abyss.
aurita, G. Don, Gen. Syst iv. 282 - Convolvulus auritus.
avicularis, Rafin. Fl. Ludov. 47 - hederacea.
Baalan, *Montr, in Mem. Acad. Lyon,* x. (1860) 238.—N. Caled.
baccifera, Ross, ex Steud. Norn. ed. II. i. 815 = Evolvulus gangeticus, Argyreia tiliacfolia.
Baclii, *Choisy, in Mint. Soc. Phys. Genev.* viii. 1. (1838) 60.—Afr. trof.
bahiensis, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 789.—Am. trop.
barbata, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. vi. (1833) 458=Lettsomia barbata.
barbata, Roth, Catalect. i. 37-hederacea.
barbatisepala, *A. Gray, Syn.fl. N. Am.* ii. I. 212.—Texas,
barbigera, *Sweet, Brit. Flow: Gard.* i. t. 86.—Am. bor.
barlerioides, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 872.—Ind. or.
Batatas, *Poir. Encyc. vi.* 14.—Reg. trop. (cult).
Batatilla, *G- Don, Gen. Syst.* iv. 276.—Venezuela.
batatoides, Benth. PI. Hartw. 46=mestitlanica.
batatoides, *Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev.* viii. I. (1838) 58.-Bras.
Beladamboe, *Roem. (f Schult. Syst.* iv. 238.—Ind. or.
benghalensis, Roth, ex Roem. *Be* Schulu 1. c. 229 = Rivea tiliaefolia.
beraviensis, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 514.—Madag.
bicolor, *Lam. Tail. Encyc.* i. 465.—Am. trop.
bicolor, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 289-Hewittia bicolor.
bidentata, G. Don, Gen. Syst. iv. 266=angustifolia, *Jacq.*
bifida, Roem. *Sc* Schult Syst. iv. 241; Roth, Nov. PL Sp. 118=cymosa.
bifida, Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 17=holosericea.
biflora, R. Br. Prod. 487=erecla.
biflora,/*Vrs. Syn.i* 183.—China,
bignonioides, *Sims, Bot. Mag.* t. 2645.—Guian.
bilota,'Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 44.—Amphig. trop.
bilobata, G. Don, in Sweet, Hort Brit. ed. III. 483 = biloba.
bipeduncuiata, *C. B. Clarke, in hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 215.-Reg. Himal.
Blanchetii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 387.—Bras.
Blancoi, *Choisy, I. c.* 389.—Ins. Philipp.
blanda, Sweet, Hort. Brit. ed. I. *J88=cymosa.
blepharosepala, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 72,-Abyss.

IPOMOEA.—
- *Blumii,* Stend. Norn. ed. II. i. 815 = angustifolia,
bogotensis, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 273.—N. Granat.
bombycina, *Benth.* to" *Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 884.—Mexic
Bona-nox, Heyne, ex Steud. Nora. ed. II. i. 815 = grandiflora.
Bona-nox, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 228.—Am. trop. (alibi cult.).
bonariensis. *Hook. Bot. Mag. t.* 3665.—Reg. Argent.
Bouvetii, *Duchass. V Walp. in Linnaea,* xxiii. (1850) 752.—Guadeloup.
brachypoda, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 136.—Mexic
bracteata, *Cav. Ic.* v. 51. t. 447.—Mexic
bracteata, J. Grab. Cat. PI. Bomb. 131 = Argyreia sericea.
bracteata, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1419=Argyreia bracteata.
bracteata, Roem. & Schult. Syst. iv. 227; Blume, Bijdr. 711 = Hewittia bicolor.
bracteata, Rudolph, ex Lcdeb. in Schrad. Neues Journ. ii. (1807) 292 = Rudolphii.
bracteata, *Wight, Ic.* 1.1374.—Ind. or.
brasiliana, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 281.—Bras.
brasiliensis, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 97 = biloba.
brevifiora, G. F. W. Mey. I. c. 100=setifera.
brevipes, *Mac. (f Sesse, ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 349.—Mexic
Brownei, Roem. & Schult. Syst. iv. 25'2 - obscura, *Ker-Gawl.*
Buaralap, *Montr, in Mem. Acad. Lyon,* x. (1860) 238.—N. Caled.
Buchananii, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. vi. (1833) 474=salicifolia.
bufulina, *Choisy, I. c.* 452.-€ochinch.
oulbocastana, Mo;. *Sc* Sesse, ex Choisy, in DC. Prod. ix. S44«=heterophylla, *Orteg.*
Burchellia, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 271.—Bras.
Burmanni, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 350.—Am. austr.
Burmanni, Koen. ex Choisy, 1. c. 830, 392= Argyreia Roxburghii.
caerulea, *Bella, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 296.—l'orto Rico.
caerulea, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 91 = hederacea.
caerulescens, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. S00 = hederacea.
caesia, *Hoffmgg. Vert. Pit. Nachtr.* ii. 140.—Bras.
cairica, Sweet, Hort. Brit ed. I. 287 "palmata.
calantha, *Griseb. Cat. Plt'Cub.* 202.—Cuba.
caliginosa, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. vi. (1888) 4«1=cyroosa.
Calobra, *HillVF. Muell. Fragm.* xi. 78.—Austral,
caloneura, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 281.—Bras,
calophylla, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 204.—Cuba,
calycina, *Benth. ex C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 201.—Ind. or.; Afr. trop.
calycina, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 260.—Bras.
calystegioides, E. Mey. in Dregc, Zwei I'll. Docum. 195-crassipes.
campanulata, Am. ex Steud. Norn. ed. II. i. 815 = Argyreia tiliaefolia.
campanulata, *Linn. Sp. PI.* 160.—Ind. or.; Malaya,
campestris, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 254.—Bras.
cana, E. Mey. in Dregc, Zwei Pfl. Docum. 195^ argyreioides.
candicans. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 289 =fastigiata.
canescens, G. Don, Gen. Syst iv. 273-Jacquemontia violacea.
capillacea, G. Don, I. c 267 — armata.
eapillata, Span, in Linnaea, xv. (1841) 840=palmata?
capilli/olia, Bert ex Choisy, in DC. Prod. ix. 388=1. Carolina.
capitata, Choisy, 1. c. 365-gulneensis.
capitata, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 238 = Lettsomia stri^osa.
capitellata, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. vi. (1883)446 = 1. Pcs-tigridb.
capparoides, *Choisy, 1. c.* viii. I. (1838) 69.—Bras,
cardiophylla, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 213.—Texas.
cardiosepala, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 42D, 398=calycina, *Benth.*

TPOMOEA:—
cardiosepala, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 265.—Bras.
carinata, Endl. Prod. Fl. Norf. 53 = 1. Bon& nox.
cariosepala, Klotzsch, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 201 = calycina, *Benth.*
carnea, Forst. f. Prod. 15 — denticnlata.
carnea, *Jacq. Enum. PL Carib.* 13 ; *Select. Stirp. Am.* 26.—Am. austr.
carnosa, *R. Br. Prod.* 485.—Keg. trop.
Carolina, *Linn. Sp. PI.* 160.—Ind. occ.
Carolina, Fursh, Fl. Am. Sept. i. 145 = commutata.
earoliniana, Foir. Encyc. vi. 11 = 1. Carolina,
cataractae, *Endl. Prod. Fl. Norf.* S3.—Ins. Norfolc.
Catesbaei, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 118 = I. Batatas.
cathartics, *Pair. Encyc. Suppl.* iv. 633.—Am. trop.
Cavanillesii, *Roem.* b* *Schult. Syst.* iv. 214 — Hab. *1*
chenopodifolia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 386.—Mexic.
chilensis, *A. Br. tf Boucht, Ind. Sent. /fort. Berol.* (1857) 1.—Chili.
Choisyi, *Montr, in Mem. Acad. Lyon,* x. (1360) 237.—N. Caled.
cholulensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 112-coccinea.
chryseides, *\Ker-Gawl.~\ in Bot. Reg.* t. 270.—As. et Austral, trop.
chrysorrhiza, *Hoot./. Handb. N. Zeal. Ft.* 760.—N. Zel.
chrysotricha, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 243.—Am. trop.
ciliolata, *Pers. Syn. i.* 183.—Am. bor.
ciliosa, Pnrsh, Fl. Am. Sept. i. 146-praec.
cincta, Roem. & Schult. Syst. iv. 254 — bracteata, *Cav.*
cinerascens, R. Br. Prod. 486=incisa.
cissoides, *Griseb. Ft. Brit. W. Ind.* 473.—Mexic.
Clappcrtoni, *R. Br. in Denh. V Clapp. Trav. App.* 240.—Afr. trop.
Clarkei, *Hoot.f. Ft. Brit. Ind.* iv. 734.—Ind. or.
clausa, Rudolph, ex Ledeb. Diss. PI. Dom. Dec. n. 5 ; ex Schrad. Neues Joum. ii. (1807) 292 = triloba.
coccinea. *Linn. Sp. PL* 160.—Am. calid. (alibi cnlt.).
eoccinea, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 197-hederifolia.
codonantha, *Benth. PL Hartw.* 120.—Ecuador.
coelestis, Boj. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 439, 393 = Breweria spectabilis.
commatophylla, *A. Rick. Tent. Fl. Abyss,* ii. 65.—Abyssin.
commutata, *Roem. b" Schult. Syst.* iv. 228.—Am. bor.
compressa, *Gttss. Ind. Sem. Hurt. Boccad.* (1825) 7.—Ind. or.
conferta, G. Don, Gen. Syst. iv. 267 = eriocarpa 7
congests, *R. Br. Prod.* 485.—Austral,
conica, *F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddei.* (1854) 224.—Afr. trop.
conlorquens, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 885.—Bras,
contorta, *Choisy, 1. c.* 350.—Afr. austr.
coptica, Roth, Nov. Pl.Sp. 11Q-dissecta.
cordifolia, *Carey, ex Voigt, Hort. Suburb. Cole.* 868.—Ind. occ *1*
cordifolia, *Tenore, Hort. Nap.* 63; *ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 390, nomen.—Hab. ?
cordigera, *Mart, ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1860)39.—Hab. I
cordofana, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 850.—Afr. trop.
coriacea, *Choisy, 1. c.* 358.—Bras,
corralinensis, *Choisy, 1. c.* 361.—Mexic.
eorymbosa, Roth, Nov. PI. Sp. 109 = sidaefolia.
coscinosperma, *Hochst. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 354.—Afr. trop.
costata, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 419.—Austral.
costellata, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 149.—N. Mexic.
erassifolia, Cav. Desc. 100 —biloba.
crassipes. *Hook. Bot. Mag.* t. 4068.—Afr. austr.
crotonifolia, *Gardn. in Hook. Land. Joum. Bot.* i. (1842) 180.—Bras.
Cruckshanksii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 389.—Ecuador.
cumanensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 278 - ferruginea.
cuneifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 90.—Arizona,
cuneifolia, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 246.—Bras.
curassavica, Balb. in Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 237 = sibirica I
cuspidata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 98.—Reg. Himal.

IPOMOEA:—
cuspidata, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. ll = bicolor.
cyamoclita, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128 = 1. Quamoclit.
cyanantha, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 469.—Ind. occ.
Cymbalaria, Fcnzl, in Flora, xxvii. (1844) 812-reniformis.
cymosa, Baker, Fl. Maurit. 208-denticulata.
cymosa, Lindl. Bot. Reg. (1843) t 24-sidaefolia.
cymosa, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 99 - fastigiata.
cymosa, *Roem.* b* *Schult. Syst.* iv. 241.—As. et Austral. trop.
cynanchifolia, *C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind.* iv. 208.—Reg. Himal.
cynanchifolia, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 274.—Bras.
dactylophylla, *Griseb. Cat. PL Cub.* 208.—Cuba,
dasysperma, *jacq. Eclog.* i. 182. t. 89.—Ind. or.
daturaclflora, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 273.—Bras.
Davenporti, *F. Muell. Fragm.* vi. 97.—Austral,
dealbata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 380.—Mexic.
debilis, Boj. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 853-desmophylla.
declinata, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 252 = polymorpha.
decora, *Meissn. in Mart. 1. c.* 272.—Bras,
decora, *Vatke V Hildeb. in Monatsschr. Ver. Gartenb. Preuss. Stat.* (1879) t. 2.—Afr. trop.
delphinifolia, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 265.—Mexic.
delphinioides, Choisy, in M^m. Soc. Phys. Genèv. viii. I. (1838) 68 = polymorpha.
demerariana, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 361.—Guian.
dendroidea, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* viii. I. (1838) 55.—Afr. trop.
dentata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 789 = chryseides.
denticulata, R. Br. Prod. 485 - angustifolia, *Jacq.*
denlicnlata, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1833) 447.—As. et Austral, trop.
Deppeana, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 276.—Mexic.
desmophylla, *Boj. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 353.—Madag.
Desrousseauxii, *Steud. Nom.* ed. II. i. 816.—Am. austr.
diantha, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 254 — erecta.
dichotoma, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 383.—Bras.
dichotoma, H. B. *Be* K. Nov. Gen. et Sp. iii. 112-coccinea.
dichroa, Choisy, in DC. Prod. ix. 364 = pilosa.
digitata, *Linn. Syst.* ed. X. 924.—Amphig. trop.
digitata, *Parodi, Contrib.* 26.—Prraguay.
digitifuiia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 372 = palmata.
Dillenii, Roem. & Schult Syst. iv. 227 =hederacea.
discolor, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 270.—Bras.
discolor, Hort. ex Sims, Bot Mag. t. 2645 = bignonioides.
discolor, Jacq. Hoit. Schoenb. iii. 6 — purpurea.
dissecta, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 145 = sinuata.
dissecta, *Willd. Phytogr.* 5. t. 2.—Geront. trop.
distans, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 878.—Am. trop.
diversi/olia, Am. ex Steud. Nom. ed. II. i. 816—dissecta.
diversifolia, *X. Br. Prod.* 487.—Austral.
diversi/olia, F.Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddei. (1864) 221 = sagittata.
dubia, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 386.—Mexic.
duiia, Roem. 8c Schult. Syst. iv. 216 = coccinea.
dnmetorum, *Willd. ex Roem. V Schult. 1. c.* 789.—N. Granat.
ebracteata, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 377.—Am. trop.
echinocalyx, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 223.—Bras,
echioides, *Choisy, in Mém. Soc. Phys. Geniv.* viii. I. (1838) 64.—Bras.
Edwardsii, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 28.—Ins. Cap. Virid.
elegans, *A. Dietr. in Otto V Dietr. Allg. Gartenz.* iv. (1886) SIS.—Bras.
elegans, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 243.—Bras.
elliptica. Roth, Nov. PI. Sp. 113 - Lettsomia elliptica.
elongata, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 356.—Mexic.
emetica, *Choisy, I. c.* 376.—Mexic.
ennealoba, *Beauv. Fl. Ov>.* ii. 68. t. 101.—Afr. trop.
erecta, *R. Br. Prod.* 487.—Austral,
ericoides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 251.—Bras,
eriocalyx, *Meissn. 1. c.* 226.—Bras,
eriocarpa, *R. Br. Prod.* 484.—Geront. trop.

IPOMOEA:—
eriocephala, Moric. *VI.* Nouv. Am. 43. t. 29=Jacqnemontia eriocephala.
eriosperma, Beauv. Fl. Ow. ii. 73 = digitata.
eriosperma, *Bert, ex Spreng. Syst.* i. 598; *et Choisy, in DC. Prod.* ix. 388.—Guadalup.
eriosperma, Rafin. Fl. Tellur. iv. 74 = t)esrousseauxii?
erythraea, Moc. *8c* Sesse, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 335, 393= coccinea.
eustachiana, Jacq. Obs. 2. t. 36 =triloba.
evolvuloides, Moric. PI. Nouv. Am. 47. t. 82 = Jacquemontia evolvuloides.
falkioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 208.—Cuba.
fastigiata, Chapm. Fl. S. U. St. 433 = cathartics.
fastigiata, Choisy, in DC. Prod. ix. 8sO = Argyieia populifolia.
fastigiata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 288 ; ed. II. 372.—Am. trop.
ferruginea, *Roem. & Schult. Syst.* iv. 240.—Am. anstr.
ficifolia, *Lindl. in Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 90.—Reg. Argent.
filicaulis, Blume, Bijdr. 721 = angustifolia, *Jacq.*
filifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 268 - Cruckshanksii.
filiformis, *Jacq. Enum. PL Carib.* 13.—Ind. QCC.
flliformis, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 856 = angustifolia.
filipes, *Benth. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 274.—Bras.
fimbriosepala, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 359.—Madag.
fistulosa, *Mart, ex Choisy, in DC. 1. c.* 349.—Bras.
flagellaris, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genèv. viii. I. (1838)60 = albiflora.
flagelli/ormis, Steud. Nom. ed. II. i. 818 = 1. Beladamboë.
flammea, *Nets, in Flora,* iv. (1821) 801.—Bras,
flava, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 421.—Austral.
flavescens, *Steud. Nom.* ed. II. L 816.—Java,
floccosa, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 612.—Afr. trop.
floribunda, G. Don, Gen. Syst. iv. 267 = Convolvulus floribundus.
floribunda, *Moric. PI. Nouv. Am.* 46. t. 31.—Bras.
Forskolei, Stend. Nom. ed. II. i. 816-verticillata.
fragilis, Choisy, in DC. Prod. ix. 372=obscura.
fragrans, *Boj. ex Choisy I. c.* 393, 341.—Afr. trop.
frandscana, *Choisy, 1. c.* 357.—Bras.
frondosa, G. Don, Gen. Syst. iv. 282 = Convolvulus havanensis.
frutescens, Hort. Par. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 386 = palmata.
fuchsioides, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 205—Cuba,
fulva, *Bertol. Hort. Bonnn. PI. Rar.* i. 6. t. 1.—Am. trop.; Bras,
fulvicoma, *Hance, in Hook. Kew Journ.* L (1849) 176.—China.
Funis, *Cham.b[1] Schlecht. in Linnaea,* v. (1880)118.—Mexic.
fusca, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 247.—Am. trop.
Gabrieli, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 378.—Am. trop.
galapagensis, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 213.—Ins. Galapag.
gangetica, Sweet, Hort Brit ed. I. 288-Argyreia t&aefolia.
gangetica, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 356 = reniformis.
Garckeana, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 512.—Afr. trop.
gemella, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genèv. vi. (1838) 469-obscnra, *Ker-Gawl.*
gemella. *Roth, Nov. PI. Sp.* 110.—Ind. or.; Java,
geminiflora, *VVelw. Apont.* 590.—Afr. trop.
geranioides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 276.—Bras.
Gerrardi, *Hook./. Bot. Mag. t.* 5651.—Natal.
gigantea, Choisy, in DC. Prod. ix. 862 = palmato-pinnata.
gigantea, *Reinm. ex Steud. Nom.* ed. II. i. 816 nomen.—Java.
githaginea, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 65 = purpurea.
glaberrima, Boj. ex Hook. Joum. Bot i. (1834) 857 = grandiflon.
glabra, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 362.—Am. trop.
glanduli/era, Ruiz *8c* Pav. Fl. Per. ii. 12— purpurea.

IPOMOEA:—
glaueescens, G. Don, Gen. Syst. iv. 275 = dumetorum.
glaucifolia. *Linn. Sp. PI.* 161.—Am. trop.
Glenieii, *Thw. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit, Ind.* iv. 208—Zeylan.
globosa, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 219=pedunculares.
gnaphalosperma, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 351 — rumicifolia.
Gomezii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 211—Burma.
gossipifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 816=seq.
gossypiifolia, Willd. Enum. Hort. Berol. 208=digitate,
gossypioides, *Parodi, Contrib.* 15.—Paraguay,
goyazensis, *Gardn. in Hook. Ic. PI.* t. 479—Bras,
gracilis, *R. Br. Prod.* 484—Austral,
graminea, *R. Br. I. c.* 485.—Austral,
graminiformis, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 250.—Bras.
graminoides, Meissn. 1. c. 417, Index-praec
grandiflora, Jacq. Hort. Vind. iii. t. 69-latiflora.
grandiflora, *Lam. Tabl. Encyc*, i. 467; *Roem. V Schult. Syst.* iv. 240.—Geront. trop.
grandiflora, *Parodi, Contrib.* 21.—Paraguay.
grandiflora, Roxb. Hort. Bcng. 14; Fl. Ind. i. 497-I. Bona-nox.
Grantii, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 116.—Afr. trop.
granulate, *Parodi, Contrib.* 17—Paraguay,
guineënsis, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 269.—Afr. trop.
goyanensis, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 366.—Guian.
Habeliana, *Oliver, in Hook. Ic. PI.* t. 1099.—Ins. Galapag.
Haenkeana, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 358.—Am. trop.
halophila, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 598 = camosa.
halophyla, Foepp. ex Steud. Nom. ed. II. i. 817-biloba.
Hamiltonii, G. Don, Gen. Syst. iv. 268-=triquetra.
Hamiltonii, Steud. Nom. ed. IL i. 817=cuspidata.
Hardingiix, Paxt. Mag. Bot. xi. (1844) 217.
Hartmanni, *Vatke V Rensch, in Linnata*, xliii. (1880-82) 614—Afr. trop..
Hartwegi, *Benth. PI. Hartw.* 15.—Mexic.
Hartwegi, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 220=pednncularis.
hastata, *Linn. Mant.* ii. 204—Java.
hastigera, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 111-hederifolia.
havanensis.Cboisy, in DC. Prod. ix. 368=Convolvulus havanensis.
Haylocki, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 77, nomen.—Hab.!
hederacea, *Jacq. Coll.* i. 124.—Amphig. trop.
hederifolia, *Linn. Syst.* ed. X. 926.—Ind. occ.
hepaticaefolia, Linn. Sp. PI. 161-L Pes-tigridis.
hepaticifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 72^angustifolia.
heptaphylla, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 627—Ind. occ.
heptaphylla, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 360 = palmata.
Hermanniae, G. Don, Gen. Syst. iv. 276"Convolvulus Hermanniae.
heterophylla, *R. Br. Prod.* 487—Anstral.
heterophylla, G. Don, Gen. Syst iv. 274-sagittate,
heterophylla, *Orteg. Hort. Matr. Dec.* 9; *Willd. Enum. Hort. Berol.* 207.—Mexic.; Cuba,
heterophylla, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 31.—Bras.
heterophylla, Torr. Bot. Mex. Bound. 149 = Lindhcimeri.
heterotricha, *F. Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 220.—Afr. trop.
heterotricha, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 280—Bras.
Heynei, Roem. & Schnlt. Syst iv. 287-cymosa.
Heynei, Wall. Cat. n. 1387 - sepiaria.
hirsuta, R. Br. Prod. 486 = qoinata.
hirsuta, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822)80 = Martiusiana.
hirsntissima, *Gardn. in Hook. Ic. PI.* snb t. 471.-Bras.
hinutula, Hort. Vindob. ex Horaem. Hort Ham. Suppl. 22-hederacea.
hirsuffia, *Jacq./. Eclog. PI.* 65. t. 44—Am. anstr.
hirta, *tilt. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 264.—Mexic.
hirtiflora, *Mart. V Gal. 1. c.* 267.-Meac.

IPOMOEA:-
Hispaniolae, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 280.—Ins. S. Doming.
hispida, *Parodi, Contrib.* 18.—Paraguay.
hispida, Roem. & Schult. Syst. iv. 238 =eriocarpa.
hispida, Zuccagni, in Roem. Collect 127-purpurea.
hispidula, *Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat.* (1822) 11 (Quid?).-Hab.».
holosericea, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 195, nomen.—Afr. austr.
holosericea, *Weinm. in Sy(t. Ratisb.* ii. (1828) 17.—Bras.
Hookeri, G. Don, Gen. Syst. iv. 274 = rubro-caerulea.
Homei. *Baker, Fl. Maurit.* 207.—Ins. Seychell.
Horsfalliae, *Hook. Bot. Mag.* t. 3315.—Ind. or.
Horsfalliat, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1885) I. 666 = temata.
Horsfieldiana, Miq. Fl. Ind. Bat ii. 611=eriocarpa.
Hostmanni, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* vii. 290.—Am. trop.
Humboldtiana, Roem. & Schult. Syst. iv. 789 = hederifolia.
humilis, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 267.—Afr. trop.
humilis, *Rafin. New Fl. Am.* iv. 57 (Quid I).—Am. bor.
hypargyraea, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 204.—Ind. occ.
igatimiana, *Parodi, Contrib.* 17.—Paraguay,
imbricata, *Parodi, 1. c.* 16.—Paraguay.
imbricata, Roth, Nov. PI. Sp. 112 - Lettsomia aggregate.
incarnata, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 360.—Venezuela,
incisa, *R. Br. Prod.* 486.—Austral.
incurva, G. Don, Gen. Syst. iv. 266 » Clappertoni.
insignis, Andr. Bot. Rep. t. 636 = digitata.
insignis, *Ker-Gawl. Bot. Reg.* 76; *Sims, Bot. Mag.* 11790.—Reg. trop.
insuavis, Blume, Bijdr. 716-obscura.
insularis, Stend. Nom. ed. II. i. 817=congesta.
intermedia, Schult. Obs. Bot. 37-purpurea.
involucrata, Beauv. Fl. Owar. ii. 62. t. 89=pileata.
imolucrata, F. G. Dietr. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 394, 344 =villosa.
involucrata, Hance, in Joura. Linn. Soc. xiii. (1872) 113 = pileata.
Jacquini. *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1856) 27—Hab.!
Jalapa, *Coxe, in Journ. Am. Med. Sc.* v. 1829 (1880) 300; *Hay at, Artneigew.* xiii. t. 87.—Mexic.
Jalapa, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 146-macrorrhiza, *Michx.*
Jalapa, Schiede & Deppe, ex G. Don, Gen. Syst. iv. 271=J. Purga.
jalapoida, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 202.—Cuba,
iamaicensis, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 278.—Mexic.
Jamesonii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 367.—Ecuador.
japonica, Roem. & Schult. Syst. iv. 245 - angustifolia, *Jacq.*?
jucunda, Thw. Enum. PL Zeyl. 211 » grandiflora, *Lam.*
juncea, Choisy, in DC. Prod. ix. 356 = aturensis.
Kadsurn, *Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genhi.* vi. (1833) 476.—Japon.
Karwinskianum, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1857) 46.—Mexic.
katgurhiensis, *Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr.* ii. 141.—Ind. or.
kentrocarpa, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss*, ii. 70.—Abyss,
kentrocaulos, *C. B. Clarke, in Hook./. Ft. Brit. Ind.* iv. 218.—Geront. trop.
Kinbergi, *Anderss. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1858 (1855) 212.—Ins. Galapag.
kituiensis, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 511.—Afr. trop.
Kleiniana, Roem. & Schult. Syst. ix. 789 = Argyreia bracteata.
Kotschyana, *Hochst. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 354.—Abyss.
Kruscnsternii, Ledeb. in M6n. Acid. Petersb. Iv. (1811) 401 » I. Bona-nox.
Kunthiana, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 253.—Am. trop.
lachnaea, *Spreng. Neue Entdeck.* iii. 29.—Ins. S. Doming,
lachnosperma, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 856.—Afr. trop.
laciniata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 32.—Ins. Socotra.

IPOMOEA :-
laeiniata, C. *B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv 200.—Ind. or.
lactea, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 361.—Ind. or.
lactescens, *Benth. PI. Hartw.* 120.—Ecuador,
hcunosa, *Linn. Sp. PI.* 161.—Am. bor
laevigata, Soland. ex Benth. Fl. Austral, iv. 422-denticulata.
laevigata, *Steud. Nom.* ed. II. i. 817.-Ins. Societ: Austral.
lanceolata, *G.* Don, Gen. Syst. iv. 282 = nniflora.
Langsdorfni, *Choisy, in DC. Pred.* ix. 368.—Am. trop.
lapidosa, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 507.—Afr. trop.
lasioclada, Choisy, in DC. Prod. ix. 357<=Jacqnemontia Choisyana.
latiflora, Lindl. Bot. Reg. t. 889** I. Bona-nox.
latiflora, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 240.-Ind. or. etocc.
latifolia, *Mart. V Gal. in Bull. Acaii. Brux.* xii. II. (1846) 266—Mexic.
laurifolia. Sweet, Horl. lirit. ed. I. 288 - Lettsomia elliptica.
Lean, *Paxt. Mag. Bot.* vi. (1839) 267.—Am. trop.
Ledebourii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 388.—Am. bor.
Lemmoni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 90.—Arizona,
leptopbylla, *Torr. in Frtm. 1st Rep.* 94.—Am. bor. occ.
Ieptotoma, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 150.—Arizona,
leucantha, *Jacq. Coll.* ii. 280.—Am. austr.
ligulata, Boj. Hort. Maurit. 229=eriocarpa.
iilacina, Blume, Bijdr. 716 = Argyreu tiliaefolial
lilacina, Kunze, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 890-Schlechtendahlii.
lilacina, *Schlecht. in Linnaea*, xx. (1847) 81.—Mexic.
lilacina, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 31.—Bras.
Lindenii, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. 11. (1846) 264.—Mexic.
Lindheimeri, *A. Gray, Syn. Fl. JV. Am.* ii. I. 210.—Mexic.
Lindleyi, Choisy, in DC. Prod. ix. 371-fragrans.
linearifolia, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 204.—Ins. Cap. Virid.
linifolia, *Blume, Bijdr.* 721.—Malaya; Austral.
linoides, Choisy, in DC. Prod. ix. 364-Jacqoemontia linoides.
littoralis, *Blume, Bijdr.* 718.—Java.
littoralis, Boiss. Fl. Orient, iv. H2=carnosa.
littoralis, Thw. Enum. PI. Zeyl. 811 - denticulate,
livescens, *Meissn. in Matt. Fl. Bras.* vii. 224.—Am. trop.
Uaveana, Meissn. 1. c. 219-1. Funis.
longepedunculata, *Htmsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 389.—Mexic.
longeramosa, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 884.—Am. trop.
longicuspis, Meissn. in Mart. Fl. Brat. vii. 227 - bicolor.
longiflora, R. Br. Prod. i. 484—grandiflora.
longiflora, Humb. *Sc* Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 207-1. Bona-nox.
longifolia, Benth. PI. Hartw. 16 »camosa.
longipes, *Garcke, in Linnaea*, xxii. (1849) 66.—Guian.
Lundii, *Choisy, in Mlm. Soc. Phys. Genev.* viii. i. (1838) 56.—Bras.
lntea, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 34.—Guatemala.
luteola, R. Br. Prod. 485-obscura, *Ker-Gawl.*
luteola, Jacq. Coll. ii. 266-coccinea.
luxorians, *Moric. PI. JVouv. Am.* 68. t. 39.—Bras.
macrantha, G. Don, Gen. Syst. iv. 267—murucoides.
macrantha, Roem. & Schult. Syst. iv. 251—grandiflora, *Lam.*
macrocalyx, Choisy, in DC. Trod. ix. 362-glabra.
macrophylla, Choisy, 1. c. 374.—Am. trop.
maenpoda, Boj. Hort. Maurit. 229=capitata.
macrorrhiza, *Michx. Fl. Bor. Am.* L 141.—Am. bor.
macrorrhizos, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 211.—Ins. S. Doming,
madagascariensis, *Choisy, in DC. Prod. ix.* 367.—Madag.
Maireti, *Choisy, 1. c.* 374.—Mexic.
malabarica, Roem. & Schult Syst. iv. 285-Argyreia

IPOMOEA:—
malvaeoides, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* vii. 251.—Am. trop.
malvaviscoides, *Afeissn. 1. c.* 284.—Am. trop.
mammosa, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (183S) 475.—Cochinch.; Polynes. t
maraginensis, Choisy, in DC. Prod. ix. 351*=contorqnens.
Marcellia, *Mrissn. in Mart. Ft. Bras.* vii. 257.—Am. trop.
mariannensis, *Choisy, in Mém. Soc. Phys. Geniv.* vi. 1.1833) 468.—Ins. Marian.
maritima, R. Br. Prod. 486 = biloba.
Martii, *Mrissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 825.—Am. trop.
martinicensis, *G. F. W. Mey. Prim. Ft. Esseq.* 98.—Amphig. trop.
Martiusiana, *Steud. Norn.* ed. II. i. 817.—Brat.
mataxocarpa, G. Don, Gen. Syit. iv. 282=Convolvnlus mataxocarpus.
Matthioli, *Tausch, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 817, nomen.—Hab. ?
maurandioides, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* vii. 275.—Am. trop.
mauritiana, Jacq. Coll. iv. 216—digitate.
maxima, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. cd. II. 372 - sepiaria.
Maximiliani, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* vii. 285.—Am. trop.
Mechoacan, Nutt. in Am. Journ. Sc (1822) 289 = 1. Jalapa.
megapotamica, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 375.—Bras,
melaena, *Lindl. in Journ. Hort. Soc.* ii. (1847) 810.—Hab. ?
melanosticta, G. Don, Gen. Syst. iv. 271 = Argyreia tiliaefblia.
Mendesii. *Welw. Apont.* 584.—Afr. trop.
mestitlanica, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 389.—Mexic
mexicana, *A. Gray, Syn. Ft. N. Am.* ii. I. 210.—N. Mexic.
mexicana, Moç. *Sc* Sesse, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 894, 336 = coccinea.
Meyerifi. Don, Gen. Syst. iv. 275 = Convolvulus Meyeri.
micans, *Garcke, in Linnaea*, xxii. (1849) 66.—Bras.
Michauxii, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 288-1. Jalapa.
microdactyla, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 2O4.-rCnba.
microphylla, Roth, Nov. PI. Sp. 112 *> Convolvulus pluricaulis.
microsepala, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 136.—Mexic.
modesta, *Choisy, in Zoll. Syst. Vert. find. Archip.* 129,131.—Malaya.
modesta, F. Muell. Fragm. iL 22 - Porana sericea.
mojangensis, *Vatie, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 515.—Afr. trop.
mollicoma, Miq. Stirp. Su£n. Sel. 132-umbellate,
mollia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 275.—Am. trop.
mombassana, *Vatie, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 615.—Afr. trop.
monosperma, *Spreng. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 382.—Venezuela.
montana, Mode. PI. Nouv. Am. 44. t 80—Jacquemontia montana.
montevidensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 276 « Convolvulus montevidensis.
monticola, Mart, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 240-patula.
Morelli, *Duchass. V Walp. in Linnaea*, xxiii. (1850) 752.—Panama.
Muelleri, *Benth. Fl. Austral*, iv. 423.—Austral.
multiflora, Mill, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 377-umbellata.
multiflora, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 234.—Jamaie.
multiflora, *Roxb. Hort. Beng.* 84; *Fl. Ind.* i. 499.—Ind. or.
multisecta, *Welw. Apont.* 589.—Afr. trop.
muricata, Cav. Ic. v. 62. t. 478 >armata.
muricata, *Jacq. Hort. Schoenb.* ih. 40. t 828.—Reg. Himal.; Japon.
muricata, Koxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. 499 = grandiflora, *Lam.*
murucoides, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 248.—Mexic
mutabilis, [Ker-Gawl.] Bot Reg. t. 89 = acuminata.
Nationis, *Nichols. Did. Gard.* ii. 191.—Peruv.
nemorosa, G. Don, Gen. Syst. iv. 282=pentaphylla.
nephrophylla, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 219.—Am. trop.
nerifqlia, *Gardn. in Hook. Ic. PI.* t. 471.—Bras.
nevisiensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 282—Jacquemontia hiisuta.

IPOMOEA:-
Newmannii, *Lodd. Cat.* (1826) 12.—Hab. ?
nicobarica, Kurz, in Joum. As. Soc. Beng. xlv. (1876) II. 141-denticulate.
nigricans, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 180=sinuata.
Nil, Meissn. in Fl. Bras. vii. 228. t. 79. f. 1 = mexicana, *A. Gray.*
Nil, Roth, Catalect. fasc i. 36-hederacea.
nitida, *Griseb. ex LorentB, Veget. Nord.* 84, nomen; *et in Goeti. Abh.* xxiv. (1879) 264.—Reg. Argent.
noctifiora. Griff. Notul. iv. 286 = I. Bona-nox.
noctiluca, Herb, in Bot. Reg. t. 917, in nota-I. Bona-nox.
nutans, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 368.—Mexic.
nycteginea, *Choisy, I. c.* 369.—Am. trop.
Nyctelea, Linn. Sp. PI. 160 = Ellisia Nyctelea.
Nyctylea, Hill, Veg. Syst. vii. 56=praec.
nymphaeaefolia, Blume, Bijdr. 719 = peltata.
nymphaeaefolia, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 203.—Cuba,
oblonga, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 133.—Mexic.
oblongata, £. *Mey. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 868.—Afr. austr.
obscure, *Hassk. PI. Jav. Rar.* 519.—Java,
obscura, *[Ker-Gawl.] Bot. Reg.* t. 239.—Ind. or. ; Austral.
obtusata, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 202.—Cuba,
obtusiloba, *Meissn. in Mart. FL Bras.* vii. 283.—Am. trop.
ochracea, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 270.—Afr. trop.
ochroleuca, Span, in Linnaea, xv. (1841) 340-obscura.
ocularis, Bartl. 1. c. xiv. (1840) 126 = obscura.
oenotheroides, Rafin. Fl. Tellur. iv. 74 = argyreioides ?
oenotheroides, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 77, nomen.—Hab. ?
officinalis, Poit. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 342 = cathartica.
olanda, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 211, err. typ. = *blanda.*
olefacea, *Welw. Apont.* 589.—Afr. trop.
oligantha, Choisy, in DC. Prod. ix. 380 - fastigiata.
oocarpa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 136.—Ecuador,
operculata, *Mart. Reise Bras.* i. 547.—Bras.
orbicularis, til. Sketch, 267 = biloba.
orlzabensis, *Ledenois. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 818.—Mexic.
Ortegae, Poir. Encyc Suppl. iv. 633 - heterophylla, *Orteg.*
osyrensis, Roth, Nov. PI. Sp. 117=Lettsomia aggregate.
Ottoinsis, Choisy, in DC. Prod. ix. 378 = Convolvulus Ottonis.
ovali/olia, Choisy, in *Mim.* Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 449=Jacquemontia' sandwicensis, et Breweriae sp. (= *Bonamia Mensiesii*).
ovata, *E. Mey. in Drlge, Zwei Pfl. Docum.* 195.—Afr. austr.
owariensis, *Beauv. Ft. Omar.* ii. 40.—Afr. trop.
palmata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 43.—Amphig. trop.; Aegypt.
palmatisecta, *Boj. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 352.—Afr. trop.
palmato-partita, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 874, sphalm. -seq.
palmato-pinnata, *Benth. V Hook./. I.* c—Bras.
panduraefolia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 195 •= Hewittia bicolor.
panduraeformis, *Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genèv.* vi. (1833) 476.—Cochinch.
pandurata, G. F. \V. Mey. Prim. Fl. Esseq. 100= fastigiata.
paniculata, R. Br. Prod. 486=digitate.
paniculata, Burm. £ Fl. Ind. 50 — Convolvulus roicranthus.
pannosa, R. Br. Prod. 487—erecta.
Papirin, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. ll=pubescens.
paposana, *Phil. Fl. Atac.* 86.—Chili,
parasitica, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 275.—Venezuela,
pareiraefolia, *G. Don, I. c.* 273.—N. Granat.
Parkeri, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 881.—Guian.
parviflora, Pen. Syn. i. 183 = Convolvulus parviflorus.
parviflora, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 34.—Ind. occ.
patula, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 368.—Bras,
pauciflora, *Mart. V Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 266.—Mexic.
Pavonii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 390.—Ecuador.
Peckoltii, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* vii. 268.—Am. trop.

IPOMOEA:—
pedata, G. Don, Gen. Syst. iv. 281 = Pavonii.
pedata, *Poit. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 894, 347.—Am. austr.
pedata, Steud. *Sc* Hochst. ex Choisy, 1. c. 384 = psilophylla.
pedata, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 366 = dasysperma.
pedatisecta, *Mart, & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 265.—Mexic
pedicellaris, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 135.—Am. centr.
peduncularis, *Bertol. Fl. Guatim.* 8. t. 2.—Mexic.
peltata, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1833) 452 *{Com. Or.* 70).—Ins. Malay, et Pacif.
peltata, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 1876=pileata.
pendula, R. Br. Prod. 486 = palmata.
pentadactylis, Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 471 = quinata.
pentagona, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 372 = cymosa.
pentaloba, Roem. & Schult Syst. iv. Index, 828 = digitata.
pentaphylla, Cav. Ic. iii. 29 = Cavanillesii.
pentaphylla, *Jacq. Coll.* ii. 297 ; *Ic. PI. Rar.* ii. 10. t. 819.—Amphig. trop.
perfoliata, G. Don, Gen. S}Jt. iv. 269-involucrata.
Perrottetii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 373.—Afr. trop.
Perryana, *Duchass. V Walp. in Linnaea*, xxiii. (1860) 751.—Panama.
Pes-caprae, Roth, Nov. PL Sp. 109 = biloba.
Pes-tigridis, *Linn. Sp. PI.* 162.—Geront. trop.
petaloidea, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1833) 451.—Ind. or.; Ins. Timor.
Petersiana, *Klottsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 239.—Afr. trop.
petiolaris, G. Don, Gen. Syst. iv. 275=1. Bona-nox.
Philadelphia, Hort. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 236 = leucantha.
philippinensis, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1833) 475.—Ins. Philipp.; China.
phoenicea, Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. 502 » coccinea.
phylloneura, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 426.—Madag.
phymatodes, Spreng. Nov. Prov. 24 = hederacea.
physianthifolia, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 77, nomen.—Hab. ?
pileata, *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 94.—Ind. or.; China.
pilosa, Cav. Ic. iv. 11 = pentaphylla.
pilosa, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 289.—Ind. or.; Afr. trop.
pilosissima, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. II. (1845) 264.—Mexic.
pinifolia, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 260.—Am. trop.
pinnata, *Hochst. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 353.—Abyss.
pinnatifida, G. Don, Gen. Syst. iv. 280=Convolvulus pinnatifidus.
platanifolia, Roem. & Schult. Syst iv. 220 - fastigiata.
platensis, [Ker-Gawl.] Bot. Reg. t. 383-digitate,
plebeia, *R. Br. Prod.* 484.—Austral.
Pohlii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 355.—Bras,
polyantha, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 613.—Ind. or.; Java.
polyantha, Roem. & Schult. Syst. iv. 234 - umbellate, *G. F. W. Mey.*
polycarpa, G. Don, Gen. Syst. iv. 270 = Convolvulus micranthus.
polygonoides, *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 95.—Afr. trap,
polymorpha, *Riedel, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 252.—Bras.
polymorpha, Roem. *Sc* Schult. Syst. iv. 254-heterophylla.
polyrrhizos, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 356.—Am. trop.
polytricha. Sweet, Hort. Brit. ed. II. 372 - pentaphylla.
pomacea, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. i. 818 - Argyreia bracteata.
poranoides, *C. B. Clarke, in Hook f. Fl. Brit. Ind.* iv. 208.—Reg. Himal.
portobellensis, *Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockk.* 1854 (1856) 189.—Panama.
portoricensis, G. Don, Gen. Syst. iv. 278-cathartica.
potentilloides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 230.—Am, trop.
praecox, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 107.—Cuba,
primulaeflora, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 270.—Afr. trop.

IPOMOEA :—
Prismatosyphon, *Wtlw. Apont.* 585. n. 18.—Afr. trap,
procumbens, *Mart. &" Choisv, in DC. Prod.* ix. SSL-Bras,
procurrens, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 254.—Am,, trop.
pxottiatt,. M£ssn. /. c—Am. trop.
proximum, *Hcmsl. Biol. Centr. Am. Bat.* ii. 892.—Mexic.
PruneHi, Par. ex Steud. Nora. ed. II. i. 818 *{Brunetii,* p 816, in syn.)-dissecta.
Pseudomuricata, Bemh. ex Link, Ennm. Hort. Berol. i. 200«=grandiflora.
psilophylla, *Steud. Norn.* ed. II. i. 818.—Arab.
pterocarpa, G. Don, Gen. Syst. iv. 282 - martinicensis.
pterodes, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 861.—Guiana.
pterodes. Seem. Bot. Voy. Herald, 171-alatipes.
pterygocanlis, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 881.—Abyss,
pubescent, *Hornem. Hort. Hdfn.* i. 195.—Ind. occ.
pubescens, *Lam. Illustr.* i. 465. n. 2128.—Mexic.
pudibunda, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 489 ; G. Don, Gen. Syst. iv. 276=cathartics.
pulehella, G. Don, 1. c«fastigiata.
pulchella, Roth, Nov. PI. Sp. 115 = palmata.
pulchra, *Blume, Bijdr.* 716.—Ins. Timor.; Molucc.
pulneyensis, *Bedd. in Trans. Linn. Soc.* xxv. (1865) 222.—Ind. or.
prnnila, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 341.—Ins. Timor,
punctata, *Mac/ad, in Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) U6.—Ind. oco.
punctata, Pers. Syn. i. 184 — hederacea.
punctata, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 105.—Cuba,
puncticulata, *Benth. Bot. Vqy. Sulph.* 136.—Mexic.
punicea, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 355.—Bras.
Purga, *Hayne. Araneigew.* xii. tt. 33, 34.—Mexic.
purpurea, *Roth, Bot. Abh.* 27.—Am. calici.
Purshii, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 484 = macrorrhiza.
quadrangularis, *Boj. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 387.—Madag.
Qnamoclit, *Linn. Sp. PI.* 159.—Amphig. trop.
qoisata, *S. Br. Prod.* 486.—As. et Austral, trop.
quinquefolia, *Linn. Sp. PI.* 162; *Griseb'. in Mem. Am. Acad.* N. S. viii. (1863) 526.—Am. trop.
quinqueloba, Desf. Tabl. ed. I. 74=palmata.
quinqueloba, *Roem. If Schult. Syst.* iv. 208.—Ins. St. Crucis.
quinqueloba, Willd. ex Choisy, Conv. Or. 54-paniculatsi.
quinquepartita, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 247.—Ind. occ.
racemosa, *Pair. Encyc. Suppl.* iv. 633.—Ins. S. Doming.
racemosa, Roth, Nov. PI. Sp. 115-staphylina.
radiatifolia, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* vii. (1877) 168.—Calif.
radieans, Bert, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 387, parnm — I. Carolina.
radieans, Blnme, Bijdr. 712-cymosa.
radieans, Choisy, in DC. Prod. ix. 387, partirn - tenera.
Ramoni, *Choisy, 1. e.* 880.—Cuba,
mnosissima, *Choisy, 1. e.* 377.—Pernv.
reflexa, *Span, in Linnaea,* xv. (1841) 841.-Ins. Timor.
Regnellii, *Meissn. in Mart. FL Bras. ni.* 266.—Am. ſ p.
ReZwardtiana, Blume, Bijdr. 720-ArgyreU Guichenuſii.
renifonnis, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1883) 446.—As. et Afr. trop.
repanda, *Jacq. Enum. PI- Carib.* IS.—Ind. or.
ripens, Lam. IUnstr. i. 467. n. 2184; Encyc vi. 18-1. BeUdamboë.
repens, Roth, Nov. PI. Sp. 110 - aquatica.
reptans, PoiA Encyc. Suppl. Hi. 460-aquatica.
rhyncorniza, *Dal,, in Hook. Kern Joum.* ui. (1851) 179.—
Ried lian^ Lr, «« *Hook Ic. PI.* t 1424-Arch. Ind.
Riedelii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 285.—Am. t ıp.
ripZria, G. Don, Gen. Syst. iv. 265=Baelei.
Rbgeri, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 381—Afr. trop.
rosea, *Choisy, I- e.* 384.—Bras. /rt_.j «
rosea; *Marin. Cat. PI.* 6 j *ex Choisy, 1. c.* 390 (Quid ?).—HaD.J

IPOMOEA:-
Rothii, Roem. & Schult. Syst. iv. 241-cymosa.
rotundifolia, G. Don, Gen. Syst. iv. 265 = biloba.
Roxburghii, Stead. Nom. ed. II. i. 819-1. Bona-nox.
Roxburghii. Sweet, Hort. Brit ed. I. 289-Argyreia Koxburghii.
rubens, Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv. vi. (1833) 463 = Lettsomia rubens.
rubra, Murr. Syst Veg.ed. XIII. 171 = Gilia coronopifolia.
rubro-caerulea, *Hook. Bot. Mag.* t. 3297.—Mexic.
ruderaria, G. Don, Gen. Syst. iv. 267—Convolvulus havanensis.
Rudolphii. *Roem. V Schult. Syst.* iv. 227.—Ins. S. Doming.
rufescens, Walp. Ann. iii. 110, sphalm. = *racemosa,* Roth.
rugosa, Choisy, in M<<m Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 446=I. Bcladamboë.
mmicifolia, *Choisy, 1. c.* 447.—Ind. or.; Afr. trop.
Rumphii, *Miq- Fl. Ind. Bat.* ii. 60S.—Ins. Molucc.
sagittaefolia, *Burm.f. Fl. Ind.* 50.—Java.
sagittaefolia, Hook. & Arn. Bot Beech. Voy. 151-Convolvulus luteolus.
sagittaefolia, Ker-Gawl. Bot. Reg. t 487-sagittate.
sagittata, Moc. & Sesse, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 876-emetica.
sagittata, *Pair. Voy. Barb.* ii. 122; *Cm. Ic.* ii. 4.1.107.—Am. bor.; Ind. occ
sagittata, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 201 = calycina, *Benth.*
sagittifera, G. Don, Gen. Syst. iv. 278=umbellata.
salicifolia, Desr. ex Steud. Nom. ed. II. i. 819 = martinicensis.
salicifolia, Herb. Madr. ex Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genèv. vi. (1838) 407-Argyreia tiliaefolia.
salicifolia, *Roxb. Hort. Beng.* 14; *Fl. Ind.* i. 498.—Ind. or.
Salimanni, Choisy, in Me'm. Soc. Phys. Genèv. viii. i. (1838) 59=bahiensi9.
sanguined, Vahl, Symb. Bot. iii. SS-hederifolia.
scabra, *Forsk.Fl. Aegypt. Arab.* 44.—Arabia.
scabra, J. F.Gmel. Syst. 845 - hederacea.
scabrida, Roem. & Schult. Syst iv. 223-hederacea.
Schaffneri, & *Wats, in Proc. Am. Acad.* xviii. (1882-88) 123.—Mexic.
Schiedeana. *Ham. in Lindl. Bot. Reg.* (1888) *Misc.* 19.—Mexic.
Schiedeana, Zucc. in Flora, xiv. (1831) 801 - I. Purga,
schiioloma, *Kunac, Del. Sem. Hort. Lips.* (1845) 2.—Reg. Argent .
Schlechtendalii, *Vis. Hort. Patav.* (1842) 141; *ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 89O.£-Mexic.
Schomburgkii, *Choisy, 1. c.* 854.—Bras.
Schrankii, Steud. Nom. ed. II. i. 819 = lilacina, *Schrank.*
Schuttesii, Weinm. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 395, 435 = Hewittia bicolor.
scrobiculata, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 281.—Ins. Trinit.
secunda, *G. Don, I. c.* 282.—Afr. trop.
Selloi, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 271.—Bras.
Sellomi, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort Brit Suppl. i. 691=bonariensis.
semidigyna, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. i. 819 = Breweria cordate.
senegalensis, Lam. Illustr. i. 464=palmata.
Senegambiae, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 361.—Afr. trop.
sepiaria, *Koen. ex Roxb. Hort. Beng.* 14 ; *fl. Ind.* i. 499.—As. et Austral, trop.
septenata, Choisy, in DC. Prod. ix. 862 = glabra.
sericantha, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 471.—Am. trop.
sericantha, *Miq. Stirp. Surin. Sel.* 181.—Guian.
sericea, Benth. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 247 - argentea.
sericea, *Parodi, Contrib.* 18 Paraguay.
sericea, Rafin. Fl. Tellur. iv. 74; Blume, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 895, 381-Argyreia mollis.
sericea, Spreng. ex Choisy, 1. c. 868 = sericantha, *Griseb.*
sericophylla, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 260.—Am. trop.
serotina, *Roem. tf Schult. Syst.* iv. 215.—Mexic.
serpens, *Meissn. in Marl. Fl. Bras.* vii. 275.—Bras,
serpyllifolia, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 267.—Mexic
serrata, Choisy, in Me'm. Soc. Phys. Genèv. viii. I. (1838) 57 - Jacquemontia serrata.

IPOMOEA :—
Sescossiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (18831 885.—Mexic.
sessiliflora, Roth, Nov. PI. Sp. 116=eriocarpa.
setifera, *Pair. Encyc.* vi. 17.—Guian.
setosa, Blume, Bijdr. 714-trichocalyx.
setosa, *l/Cer.Gawl.l Bot. Reg.* t. 385 — Bras.
setulosa, Zoll. & Mor. Syst Verz. Zoll. 51-linifolia.
shitensis, *Oliver, in Hook. Ic. PL* t. 1474.—Afr. trop.
Shumardi, Torr. in Marcy, Rep. 191-seq.
Shumardiana, Torr. Bot. Mex. Bound. 149 - lonnfolia.
sibirica, *Pers. Syn.* i. 188.—Reg. Himal.; As. bor.
sidaefolia, *Choisy, in Mlm. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1838j 459.—Mexic.
sidaefolia, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 719 = tubata.
Silvana, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 874.—Am. trop.
simplex, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 86.—Afr. austr.
simnlans, *Hanbury, in Joum. Linn. Soc.* xi. (1871) 281. t 2.—Mexic.
sinensis, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1833 459.—China,
sinensis, *Fisch. Hort. Gorenk.* ed. II. 28; *(sp. dub. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 890).—China,
sinuata, *Orteg. Hort. Matr. Dec.* 84.—Am. calid.
solaniflom, *Thunb. Mus. Ifat. Ups.* 168 (sp. dub.).—Hab.?
solanifolia, Burm. f. Fl. Ind. 49 — obscura.
solanifolia, *Linn. Sp. PI.* 161.—Ind. occ.
soldanellaefolia, *Schrank, in Sytt. Ratisb.* i. (1824) 198.—Bras.
speciosa, Pers. Syn. i. 183 — Argyreia speciosa, *Sweet,*
spectabilis, Boj. ex Choisy, in Me'm. Soc. Phys. Genir. viii. I. (1888) 68 (Conv. Rar. 146) - Breweria spectabilis.
sphaerica, Hort. Calc. ex Choisy, 1. c. vi. (1833) 465 >= sepiaria.
sphaerocephala, D. Don, Prod. Fl. Nep. 98 - Lettsomia atropurpurea.
sphaerocephala, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 288; ed. II. 372-eriocarpa.
sphaerostigma, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. i. 819 = Jacquemontia hirsnta.
spicactlora, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* viii. i. (1838) 54.—Bras.
spicata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 112 - bracteata.
splendens, Sims, Bot. Mag. t. 2628 - Argyreia splendens.
Spruceana, *Benth. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 224.—Bras.
squamosa, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 376.—Am. trop.
stachyoides, *Meissn. in Mtrt. Fl. Bras.* vii. 240.—Am trop.
stans, *Cam. Ic.* iii. 26. t 26.—Mexic.
staphylina, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 249.—Ind. or.; Malaya.
stellata, *Parodi, Contrib.* 18 Paraguay.
ttenocolpa, Garcke, in Linnaea, xxii. (1849) 67-fastigiata.
stenophylla, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 249.—Am. trop.
stipulacea, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 3». t. 129 — palmata.
stipulacea, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.289 ; ed. II. 372 - sepiaria.
sHpulata, Jacq. Hort. Schoenb. t. 199-cairica.
St. Nicolai, *C. Belle, in Bonplandia,* ix. (1861) 53.—Ins. Ca'nar.
Stocksil, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 204.—Ind. or.
Stocksii, C. B. Clarke, 1. c. 207 = Clarkei.
stolonifera, J. F. Gmel. Syst. 345 - camoso.
striata, *Pers. Syn.* i. 188.—Ind. or.
striata, Roth, Nov. PI. Sp. Ill-sepiaria.
strigosa, Roth, 1. c. 118 - Lettsomia setosa.
stylosa, Hort. Madr. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 395, 389 = coccinea.
suaveolens, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 394.—Mexic.
subdentata, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 614=aquatica. denticulata.
subincana, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 259.—Am. trop.
subpedata, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 397 - dissects,
snbrevoluta, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 856.—Guian.
subtriftora, Zoll. & Mor. Syst. Vera. ZolL 61 - chryseides.

IPOMOEA :—
subtriloba, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 12 = pubescens.
subtrilobans, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 615-sepiaria.
suffniticosa, *Burch. Trav. A/r.* ii. 226.—Aft. austr.
suffulta, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 276.—Mexic.
sulcata, *Parodi, Contrib.* 19.—Paraguay.
sulphurea, G. Don, Gen. Syst. iv. 268 -corralinensis.
sulphurea, *Hochst. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 356.—Afr. trop.
superba, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 27S.—Mexic
superba, *Ledeb. Ind. Sent. Hart. Dor pat.* (1822) 11 ; *ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 390 (Quid;).—Hab. 1
superba, *Schrant, ex Colla, Hort. Ripul. App.* ii. 3S0, 361 (Quid!).—Am.
surinamensis, *Miq. in Uinnaea,* xviii. (1844) 600.—Guian. .
sylvana, Buek, Ind. ad DC. Prod. iii. 238-Silvana.
syringaefolia, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 270.—Am. trop.
tamnifolia, Bunn. f. Fl. lad. SO «= I. Pes-tigridis.
tamni/olia. Linn. Sp. Pl. 161—Jacquemontia tamnifolia.
tenera, *Meissn. in Mart. Ft. Bras.* vii. 289.—Am. trop.
tenuiloba, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 148.—Texas,
tenuirostris, *Choisy, in DC. Prod. ix.* 379.—Abyss,
tenuissima, *Choisy, I. c.* 876.—Ins. S. Doming,
teretistigma, *Choisy, I. c.* 373.—Aft. trop.
terminalis, *Choisy, in Mint. Sac. Phys. Genhv.* viii. I. (1838) 54.—Bras.
teraata. *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 16. t. 87.—Hab. 1
lemifolia, *Cav. 1c.* v. 52. t 478. f. 1.—Mexic.
Thomsoniana, Mast, in Gard. Chron. (1883) II. 818 = ternata.
Thonningii, G. Don, Gen. Syst. iv. 280 = dissecta.
Thurberi, *A. Gray, Syn.Fl.N.Am.* ii.1.212.—Arizona.
tigrina, Pers. Syn. i. 188 = I. Pes-tigridis.
tigripes. Stokes, Bot. Mat. Med. i. 330 = 1. Pes-tigridis.
tilacea, Cboisy, in DC. Prod. ix. 375 = fcstigiata.
tiliaefolia, Roem. & Schult. Syst. iv. 229-Argyreia tiliaefolia.
timorensis, Blnroe, Bijdr. 711 - Hewittia bicolor.
tomentosa, *Choisy, in Mem. Soc. Phys. Genev.* viii. I. (18381 55.—Bras.
trematosperma, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 367 —sessihflora.
triantha, Roem. & Schnlt. Syst. iv. 243 = sepiaria!
trichocalyx, G. Don, Gen. Syst. iv. 275 = ochracea.
trichocalyx, *Steud. Norn.* ed. II. i. 819.—Java.
trichocarpa, Ell. Sketch, ii. 260-commutata.
trichocephala, G. Don, Gen. Syst. iv. 269-Jacquemontia tamnifolia.
trichosperma, *Blume, Bijdr.* 710.—Ind. or.; Burma; Malaya.
trichotosa, *Blume, I. c.* 71/'.—Java,
tricolor. *Cm. Ic.* iii. 5. t. 208.—Hab. 1
tridentata. *Roth, in Roem. Archiv,* L II. 38.—Ind. or.; Malaya.
triñdu, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 280.—Am. trop.
triflora, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 44.—Arab,
triflora, *Maria* V *Velasco, in La Naturale*a* (1870), 338.—Mexic.
trifurcata, Cboisy, in Mem. Soc. Phys. Genev. viii. I. (1838) 68 — polyroorpha.
triloba, *Linn. Sp. Pl.* 161.—Am. trop.
triloba, Thunb. Fl. Jap. 86 = hederacea.
triquetra, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 231 — 1. Turpethum.
Tuba, G. Don, Gen. Syst. iv. 271 -grandiflora.
tubata, *JVees, in Flora,* iv. (1821) 301.—Bras,
luberculata, *Desr. ex Regel, Ind. Sent. Hort. Petrop.* (1856) 27.—Ins. Borbon.
tuherculata, [Ker-Gawl.] in Bot. Reg. t. 86 = dasyspenna.
tuberculata, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 208-palmata.
tuberculosa, Desf. Tabl. ed. I. 74 = palmata.
tuberosa, *Linn. Sp Pl.* 160.—Reg. trop.
iuberosa. Lour. Fl. Cochinch. 138 = palmata.
tuberosa, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 113 -digitata.
tuberosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 67 = kentrocaulos.
tubiflora, *Hoot./, in Trans. Linn. Soc.* XX. (1847) 204.—Ins. Galapag.
tubnlosa, *Willd. ex Roem. V Schult. Syst.* iv. 789.—Am. austr.
turbinata, Lag. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 396, 845 = muricata.
Turpethum, *R. Br. Prod.* 485.—As. et Austral, trop.
Tweediei, *Hook. Bot. Mag.* t. 8978.—Reg. Argent,
tyrianthina, *Lindl. in Bot. Keg.* (1838) *Misc.* 87.—Mexic.

IPOMOEA :—
ukambensis, *Vatke.in Linnaea,* xliii. (1880-82) 510.—Afr. trop.
umbellata, *Linn. Syst.* ed. X. 924.—Am. austr.
umbellata, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 99.—Mexic.
umbellifera, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 389.—Am. trop.
uniftora, Roem. *8c* Schult. Syst. iv. 247 — martinicensis.
urbica, Choisy, in DC. Prod. ix. 349—asarifolia.
urceolata, *R. Br. Prod.* 486.—Austral,
uruguayensis, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 272.—Am. trop.
utilu, *Choisy, in DC. Prod-* ix. 376.—Am. trop.
varia. Roth, Catal. fasc. ii. 17 — pubescens, *Hornem.*
variabilis, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 383.—Mexic.
variifolia, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 276.—Am. trop.
Velloziana, Mart, in Flora, xxi. (1838) II. Beibl. 64 = Jacquemontia grandiflora.
velutina, *R. Br. Prod.* 485.—Austral,
vcnosa, *Roem. b" Schult. Syst.* iv. 212.—Ins. Mascar.
ventricosa, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 274 ; *Choisy, in DC. Prod. ix.* 360.—Ind. occ
venustum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 395.—Mexic.
vcrbascoidea, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Genev.* viii. I. (1888) 56.—Afr. trop.
verniciflua, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 287 = pentaphylla.
vemicifolia. *Am. in Madr. Journ. Sc.Set.* I. v. (1837) 19.—Ind. or.
verrucipes, *C. A. Mey. in Fisch. Mey.* V *Avi Loll. Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. 76 j *Choisy, in DC. Prod.* ix. 377.—Bras,
verrucosa, *Blume, Bijdr.* 718.—Java.
verrucosa, Orteg. Hort. Matr. Dec. 10— dissecta.
verruculosa, Mart, ex Choisy, in DC. Prod. ix. 378 = verrucipes.
versicolor, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 220.—Am. trop.
verticillata, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 44.—Arabia.
verticillata, Steud. Nom. ed. II. i. 820 — Jacquemontia hirsuta.
vesiculosa, Beauv. Fl. Owar. ii. 73. t 106 — palmata !
vespertina, *Colla, Hort. Rippul App.* iii. 40.—Bras. ?
villosa, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 244.—Bras,
villosa, *RuU V Pav. Fl. Per.* ii. 12.—Peruv.
villosula, *Blume, ex Steud. Nom.* ed. II. i. 820.—Java.
violacea, *Linn. Sp. Pl.* 161.—Ins. St. Cmcis.
virgata, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 241.—Am. trop.
viridis, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 974.—Am. trop.
vitifolia, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 289.—Ind.or.; Malaya.
Waldecki, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisakov.* 77.—Hab. »
Wallichii, Stend. Nom. ed. II. i. 820 - Lepistemnn Wallichii.
Wallii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 896.—Mexic.
Warmingii, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 272.—Am. trop.
Weinmanni, Roem. & Schult. Syst. iv. 248 -Hewittia bicolor.
Wightii, *Choisy, in Mem. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1838) 470.—Ind. or.
Willdenmvii, Roem. & Schult. Syst. iv. 211-neterophylla.
Wrightii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. I. 213.—Texas.
xanthantha, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 219 = petaloidea.
Yetira, *Parodi, Contrib.* 17.—Paraguay.
Yomae, Kurz, For. Fl. Brit Burma, ii. 218-trichosperma.
zebrina, *Perr. ex Choisy, in DC. Prod.* ix. 382.—Afr. trop.
meylanica, Gaertn. Fruct. ii. 482—Argyreia populifolia.
Zuccagnii, Roem. *8c* Schult Syst iv. 230-purpurea.

IPOMOPSIS, Micbx. Fl. Bor. Am. i. 141 (1808)-CMia. Ruiz & Pav. (Pqlemoniac).
elegans, Lindl. Bot. Reg. t. 1281 - G. aggregata.
elegans, Michx. Fl. Bor. Am. i. 142 - G. coronopifolia.
inconspieua, Sm. Exot. Bot. i. 25 — G. inconspicua.
picta, Hort. Gall, ex G. Don, Gen. Syst iv. 244-G. coronopifolia.
tuberosa, Willd. ex Stend. Nom. ed. H.i. 820-Ipomaea mnricata.
verticillata, Willd. ex Roem. & Schult Syst iv. 793 - IponioftB [illegible].

IPSEA, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 124 (1831)-Pachy-Btoma, Blume (Orchid.).
speciosa, Lindl. 1. c. = P. sessile.

IRASEKTA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 299 (1821) -JIRASEKIA, F. W. Schmidt ^Anagallis, Linn. (Primul.).

IRAUPALOS, Rafin. in Ann. Gin. Sc. Phys.vi. (1820) 87 —Viburnum, Linn. (Caprifol.).

IRENEIS, Moq. in DC. Prod. xiii. n. 349 (1849) = Iresine, Linn. (Amarant.).
interrupta, Moq. 1. c. -Iresine interrupta.

IREON, Burm. f. Prod. Fl. Cap. 6 (1768)-Boridula, Linn. (Droserac).
verticillatum, Burm. f. 1. c - R. dentata.

IREON, Scop. Introd. 229 (1777) = PriamatooarpuB, L'H^rit. (Campanul.).
cilia turn, Rafin. Sylva Tellur. 138-P. subulatus.

IHESINE, P. Br. Hist. Jamaic. 358 (1756). *AMARANTACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 42.
CRUCITA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 179 (J762).
CRUZETA, Loefl. It. Hisp. 203 (1758).
IRENEIS, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 349 (1849).
ROSEA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 58 (1826).
XERANDRA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48 (1836).
acuminata, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 345.—Mexic.
"hcutifolia, Sw. ex Moq. 1. c. 343 = elatior.
aggregata, Moq. 1. c 340 — Philoxerns vermicularis.
amarantoides, *Moq. 1. c.* 348.—Malaya,
angustifolia, *Euphrasin, Beskr. St. Barthel.* 165.—Ind. occ.
angustifolia, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 343 -elatior.
angustifolia, Rich, ex Moq. 1. c. 348, 353 — interrupta.
argentata, D. Dietr. Syn. Pl. i. 870-Hebanthe rariflora!
aurata, D. Dietr. 1. c. — Altemanthera aurata
bonariensis, Miers, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 227-celosioides.
Brownii, Moq. in DC. Prod. xiii. n. 341 — Gomphrena diffusa.
canescens, Bonpl. ex Moq. I. c. 349, 362 = Hebanthe parviflora ?
canescens, *Numb,* b* *Bonpl. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 766.—Mexic.
cassiniaeformis, *Schau. in Linnaea,* xix. (1847) 709.—* Mexic.
Celosia, Linn. Syst. ed. X. 1291 = seq.
celosioides, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 1456.—Am. bor.
celosioides, Sw. Obs. Bot. 376 = elatior.
conica, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 842 - Gomphrena conica.
crassifolia, *Moq. I. c.* 340.—Ind. occ
Cunninghamii, Moq. 1. c. 342 = Gomphrena Maitlandi.
diffusa, Humb. *8c* Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 705 = celosioides.
dysdicta, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 104 - Alternanthera aurata.
Edmonstonci, *Hook./, in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847 190.—Ins. Galapag.
elatior, *Rich, ex Willd. Sp. Pl.* iv. 766.—Am. trop.
elatior, Sieber, ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 849, 853 = Altemanthera aurata.
elongata. Hook. *8c* Am. Bot. Beech. Voy. 308 == r I. HookerL
elongata, *Humb. V Bonpl. in Willd. Sp. Pl.* iv. 765.—N. Granat
erianthos, Poir. Encyc SuppL iii. 180 = Hebanthe virgata.
eriophora, *Peyr. in Linnaea,* xxx. (185S-60) 21.—Mexic.
eriophylla, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 847 = celosioides.
jlavescens, Humb. *8c* Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 766 = Altemanthera flavescens.
fteribunda, Mart *8c* Gal. in Bnll. Acad. Brux. x. (1843) 347 —celosioides.
(rntescens, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 344.—Mexic
glabra, *Klot*sch, in Schomb. Faun. V Fl. Gui.* 933, nomen.—Gnian.
glomerata, Sprang. New Entdeck. ii. 110 = Pfaflia glauca.
gossypiantha, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog.* it 177.—Cuba.

IBESDTE:-

gossypina, *Nees, in Linnaea,* xix. (1847) 709.—Mecic.
gradlis, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* **x. (1848)** 847.—Mexic.
grandiflora, Hook. Ic. PI. t. 102-Hebanthededpiens.
havanensis, *H. B. tt K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. .'99.—** Cuba.
herbacea, Desf. Tabl. ed. II. 53=celosioides.
Herbstii, *Hook, in Gard. Chron.* (1864) 654, 1206.-Bras.
Hookeri, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 844.—Mexic.
interrupta, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 158.—Mexic.
javaniea, Burm. f. Fl. Ind. 212 (err. typ. 312)=Aerva tomentosa.
lanceolata, *Moq. in DC. Prod.* xiii. H. 347.—Hab. 1
latifolia, *Benth. If Hook.f. Gen.* iii. 42.—Mexic.
latifolia, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 351=Alternanthera pulveruleuta.
Lindeni, *Van Houtte, in Fl. des Serres,* **Se>. II. vii** (1867-68)41.—Hab.?
Hnearis, *Moq. in DC. Prod.* xiii. IJ. 839.—Ind. occ.
luznliflora, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 66.—Am. trop. Reg. Argent.
macrocephala, Moq. in DC. Prod. xiii. II. 342=Gomphrena conferta.
Mntisii, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 200.—** N. Granat.
obtusifolia, H. B. & K. 1. c. 198 = Alternanthera flavescens.
paniculata, Poir. Encyc. SuppL iii. 181=elatior.
paniculata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 103 = Hebanthe paniculata, *Mart.*
paraguayensis, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent.* v. (18/8) 319; *Contrib.* 88.—Reg. Argent,
parvifolia, *H. B. tf K. Nov. Gen. et Sp.* **ii. 198.—** Cuba.
persica, Burm. f. Fl. Ind. 212 (err. typ.'312)-Aerva tomentosa.
polymorpha, Mart. Nov. Gen. et Sp. Bras. ii. 56. t. 153 -celosioides.
portulacoides, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 341.—Braa.
puherulenta, D. Dietr. Syn. PI. i. 870 = Alternanthera pulverulenta.
racemosa, Poir. Encyc. Suppl. iii. 180=elatior.
reticulata, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1874) I. 415 = Herbstii.
[1] **scandens,** *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* **vi.** (1878) 87; *Contrib.* 89.—Paraguay,
serpyllifolia, *Moq. in DC. Prod.* xiii. H. 841.—Ins. S. Doming,
silvatica, *Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent,* **v.** (1878) 820; *Contrib.* 88.—Reg. Argent.
spicata, Spreng. Syst iv. Cur. Post. 104-Hebanthe spicata.
spiculigera, *Seub. in Mart. Fl. Bras.* v. I. 228.—Brai.
surinamensis, *Moq. in DC. Prod.* xiii. II. 389.—Guian.
tenella, Moq. 1. c. 848=Gomphrena tenella.
vermicularis, Moq. 1. c. 340 - Philoxerus vermicularis.
Verschaffelti, *Lent, ex Van Houtte, Fl. des Serres,* **xv.** (1862-65) 191.1.1601.—Bras.
verticillata, Spreng. Syst. i. 821 =celosioides.
virgata, Poepp. ex Moq. in DC. Prod. xiii. u. 343 = elatior.
virgata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 104-Hebanthe virgata.
Wallisii, *Ortg. in Regel, Gartenfl.* **(1878) 50.—** N. Granat. I

IREUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 465, in syn. (1840) = IREON, Burm. {.-Boridulft, linn. (Droserac.).

IRIA, Hedw. *I* Gen. 360 (1806)«Kmbristylis, Vahl (Cyperac).
caribea, Steud. Nom. ed. I. 487 - F . monostachya.
indica, Schult. Mant ii. 94 = F. monostachya.

IBIAKTEA, Ruiz *8c* Pav. Prod. Fl. Per. 149. t. 3S (1794). *PALMAE,* Benth. & Hook. '• >»• ^ ° -
DKCKEWA, Karst. in Linnaea, xxviu. (1856) 258.
affinis,Aro«t. *ex Linden, Illustr. Hortic.* xxvui.(188I) 31.—N. Granat.
altissima, *Klottsch, ex Linden, I. c.* 31.—Venezuela.
andicola, Spreng. Syst. ii. M[3] - [0] " [0] [1] * [1] [2] ™ ^ [1] "•
cornuta, *H. Wendl. in Bmplandia,* **v** [illegible] Bras.

IKIABTKA.:—

costata, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31.— N. Granat.
deltoidea, *Ruiz & Pav. Syst.* 298.—Peruv.
durissima, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 80=Socratea durissima.
exorrhiua, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 36. t. 33, 34 = Socratca exorrhiza.
gigantea, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* **(1878) 262,** t. 155.—Hab.?
glaucescens, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31. —N. Granat.
Lamarckiana, Mart. Hist. Nat Palm. iii. 190-Dictyocaryum Liamarckianum.
leprosa, Zipp. in Bijdr. Wetensch. v. 178 - Drymophloeus olivaeformis.
monogyna, Zipp. 1. c 178 = Drymophloeus appendiculatus.
Orbigniana, Mart. Hist. Nat Palm. iii. 187=Socratea Orbignyana.
phaeocarpa, *Mart. 1. c.* 196.—Bolivia.
philonotta, Barb-Rodr. Enum. Palm. Nov. 13=Socratea exorrhiza.
praemorsa, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 448 = Catoblastus praemorsus.
pruriens, Spruce, in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 136 = liiartella setigera.
pubeseens, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 262 = Catoblastus pubeseens.
pygmaea, *Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 31.— Bras.
robusta, Hort. Versch. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 247 = deltoidea.
setigera, Mart Hist. Nat. Palm. ii. 39. t. 37 - Iriartella setigera.
Sprudana, Barb-Rodr. Enum. Palm. Nov. 13 = Iriartella setigera.
ventriuosa, *Mart. Hist. Nat. Palm.* ii. 87. t. 35, 36.— Bras,
xanthorhiza, *Klottsch, ex Linden, Illustr. Hortic.* xxviii. (1881) 81.—Venezuela,
zamorensis, *Linden, I. c.*—Ecuador.

IKIAKTBLIiA, H. Wendl. in Bonplandia, viii. (1860) 103. *PALMAE, Ben\h.fr* Hook. f. iii. 901.
setigera, *H. Wendl. I. c.* 104.—Bras.

IKIDION, Roem. & Schult. Syst. v. 436, in syn. (1819) = IREON, Burm. f. = Horidula, Linn. (Droserac).

IRIDOPSIS, Welw. ex Baker, in Tran*. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 270-Moraea, Linn. (Irid.).
textilis, Welw. ex Baker, 1. c.=M. textilis.

IRIDORCHIS, Blume, Orch. Archip. Ind. 90. t. 26 (1868) = Cymbidium, Sw. (Orchid.).
gigantea, Blume, 1. c 91 - C. giganteum.

IRIDROGALVIA, Pers. Syn. i. 899, in syn. (1805), sphalm. = ISIDROGALVIA, Kuiz & Pav. = Tofleldia, Huds. (Liliac.).

IRILLIUM, Kunth, Enum. PI. v. 121 (I860), sphalm.~ Trillium, Mill. (Liliac).

IRINA, Noronhs, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 2; Blume, Bijdr. 230 (1826)=Pometia, Forst. (Sapindac).
alnifolia, Blume, Rumphia, iii. 117.—Borneo.
Diplocardia, Blume, 1. c. 113.—N. Guinea.
glabra, Blume, Bijdr.*280 = P. tomentosa.
integerrima, Blumc, 1. c. 281 = Meliosma sumatrana.
tomentosa, Blume, 1. c - P . tomentosa.

IRINE, Hassk. PI. Jav. Rar. 283 (1848) -praec.

IRIO, Linn. Syst. ed. I (17S5)»8isymbrium, Toum. (Crucif.).
ruderalis, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 331 = S.Irio.

IR1PA, Adans. Kam. ii. 508 (1763) = Cynometra, Linn. (Lcgumin.).

IBIS, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1785). *IRIDBAE,* Bentb. & Hook. f. iii. 686.
BEVERNA, Adans. Fam. ii. (20) (1783).
BIRIS, Medic, in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. L (1791[1]* 257; Phil. Bot. ii. 97 (1791).

IKIS:-

' CHAMOLETTA, Adans. Fam. ii. 60 (1763).
CORESANTHE, Alef. in Bot. Zeit. xxi. (1863) 298.
COSTIA, Willk. 1. c. xvit. (1860) 131.
DIAFHANE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 305.
EVANSIA, Salisb. 1. c. bO3 (1812).
GATTENHOFIA, Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 418.
GYNANUKIRIS, Parl. Nuov. Gen. e Sp. 4!) (1854).
HERMODACTYLUS, Adans. Fam. ii. 60 (1768).
IONIRIS, Baker, in Gard. Chron. (1876) n. 143, in obs.
Isis, Tratt. Arch. Gew. 668 (1812).
JONIRIS, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 502.
JUNO, Tratt. in Roem. *Be* Schult. Syst i. 471, 474 (1817).
LIMNIRION, Opiz, Seznam, 69 (1852).
LIMNIRIS, Fuss. Fl. Transs. 686 (1866).
NEUBECKIA, Alef. in Bot. Zeit. xxi. (1863) 290, 2!)7.
ONCOCYCLUS, Siemss. in Bot. Zeit. iv. (1846) 706.
PSEUDO-IRIS, Medic, in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 417.
SISYRINCHIUM, Adans. Fam. ii. 60 (1763).
SFATHULA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 163.
THELYSIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 303.
XERIS, Medic, in Staatsw. Vorles. Churpf. PhyvOek. Ues. i. (1791) 256.
XIPHION, Tourn. ex Medic. Phil. Bot. i. 173 (1789).
XURIS, Adans. Fam. ii. (20) (1768).
XYRIDION, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 163; Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 499.
acaulis, Pall. Reise, iii. 213-tennifolia.
acoriformis, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 635 = 1. Pseudacorus.
acoroides, Spach, Hist. Vég. Phan. xiii. 44 = 1. Pseudacorus.
acuta, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 4-sibirica.
acutifolia, *C. A. Mey. ex Regel, Gartenfl.* **(1874) 323.** t 872.—Reg. Caucas.
acutiloba, *C. A. Mey. Vert. Pfl. Cauc.* **32.—Reg.** Caucas.; Persia.
Adami, Willd. ex Link, Jahrb. i. m. 72-giaminea.
aegyptia, Delile, in Laborde, Voy. Arab. Pe'tr. 82 = I. Sisyrinchium.
aequiloba, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorp. (1823) 4 = pumila.
Aitchisoni, *Baker, in fourn. Bot.* xiii. (1876) 108.— Afghan.
alata, *Poir. Voy. Barb.* il.«86.—Reg. Mediterr.
alba, Savi, Fl. Pis. i. 82 = florentina.
Alberti, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* **v. (1877) 260.—** Turkestan.
albicans, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 76 ••florentina.
alpina, Pall, ex Roem. *3c* Schult. Syst. i. 476 - humilis.
amoena, [DC. in] Red. Liliac. t. 336=hybrida.
anglica, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 487 ^xiphioides.
angusta, Thunb. Diss. Irid. 19 = Moraea angusta.
angustifolia, Gilib. Exercit. Bot. ii. 498-sibirica.
angustifolia, Mill. Gard. Diet ed. VIII. n. 12-pumila.
aphylla. *Linn. Sp. PI.* 38.—Europ.; Reg. Caucas.
arenaria, *Waldst. V Kit. PI. Rar. Hung.* **i. 57. t. 57.** —Hungar.
atroviolacea, *Lange, in Bot. Tidsst.* xiii. (1882) 18.— Hab.?
attica, Boiss. *tc* Heldr. in Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 91 " pumila.
aurea, *Lindl. Bot. Reg.* (1847) t. 59.—Reg. Himal.
aurea. Link, Enum. Hort. Berol. i. 69 - Gueldenstaedtiana.
australis. Tod. Nuov. Gen. e Sp. 49-pallida.
autumnalis, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 522 -= ensata ?
beltana, Janka, in Magyar Tud. Akad. Math. Term. xii. (1874) 173. t. 14-1. Chamaeiris.
Bartoni, *Foster, in Gard. Chron.* (1883) I. 276.— Afghan.
Bastardi, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 635 = 1. Pseudacorus.
bayonnensis, Darrach. ex Grcn. & Godr. Fl. Fr. iii. 248-graminea.

ISIS:—

Beecheyana, Herb, in Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. S95 — Douglasiann.
bicolor, Lindl. Bot. Reg. *t.* 1404 = Moraea bieolor.
tricolor, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 13 = sibirica.
biflora, Falk, Beitr. ii. n. 59-glaucescens.
biflora, *Linn. Sp. PI.* 38.—Lusitan.; Tauria.
biflora, Pall. Reise, i. 171-aphylla.
bifurca, Stcv. ex Baker, in Joura. Linn. Soc. xvi. (1877) 145 = aphylla.
biglumis, Vahl, Enum. ii. 149-ensata.
binaia, Schnr, in Oestr. Bot. Zeit. (1860; 354 - virescens.
bisflorens, Host, Fl. Austr. L 46-aphylla.
bispathacea, Spach, Hist. Vég. Phan. xiii. 15=tuberosa.
bituminosa, Linn. f. Snppl. 98 = Moraea bitnminosa.
Bloudowii, *Ledeb. Fl. Alt.* iv. 331.—Sibir. alt.
bohemica, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iv. 5-aphylla.
Boissieri, *Henriq. in Bot. Soc. Broter*. iii. (1885) 183. —Hispan.
Boltoniana, Hort. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860)31 = pulchella.
Boltoniana, Schult. Mant. i. 808 = prismatica.
brackycarpa, Lodd. ex Steud. Norn. ed. II. i. 821 = seq.?
brachycuspis, Fisch. ex Sims, Bot. Mag. t. 2326 = setosa.
brachystigma, *Scheele, in Linnaea*, xxii. (1849) 848.—Texas,
bracteata, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xx. (1885) 376.—Am. bor. occ.
brevicaulis, *Rafin. Fl. Ludov.* 20 (Quid?).—Am. bor.
brnicuspis, Fisch. ex Schult. Mant. i. 306 = setosa.
breviscapa, *Opi; Natural*, x. (1826) 191 (Quid?). —Europ.
Bnngei, *Maxim, in Bull. Acad. Pilersb.* xxvi. (1880) 609.—Mongol.
caesia x, E. Berg, in Flora, xviii. (1835) 563.
caespitosa, *Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviii. (1878) 364, nomen.—Europ.
caespitosa, Pall, ex Link, Jahrb. i. m. 71=>ruthenica.
capensis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 2 = Moraea edulis.
caricifolia, Pall, ex Link, Jahrb. i. III. 72=ensata.
Carolina, *Radius, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 821.—Carolina.
catenulata. Baker, in Jonm. Linn. Soc. xvi. (1877) 147 = Moraea catenulata.
caucasica, *Hoffm. in Comm. Soc. Phys. Mosq.* i. (1808) 40.—Reg. Caucas.
caurina. Herb, ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 206=versicolor.
Cengialti, Ambrosi, Fl. Tirol. Austr. i. **613**-pallida.
cepifolia, Stokes, Bot. Comment, i. 283 = xipbioides.
Chamaeiris, *Bertol. Fl. Hal.* iii. 609 — Europ. austr.
chinensis. Curt. Bot. Mag. t. 373 -japonica.
ciliata. Linn. f. Suppl. 98 = Moraea ciliata.
clandestine, *Lehm. Sem. Hort. Hamb.* (1828) 16.—Bras.
Clusiana, Reichb. Ic. Fl. Germ, t 328=pumila.
Clusiana, Tausch, in Flora, xii. (1829) I. Erg. 49 = aphylla.
coelestina, *Sweet, Mori. Brit.* ed. I. 394, nomen.—Am. bor.
coerulea, Spach, Hist. Vég. Phan. xiii. 50=pumila.
collina, Salisb. Prod. 45-1. Sisyrinchinm.
Comitissae, *Andrt. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 240, nomen.—Rossia.
compressa, Linn. f. Suppl. 98 -Moraea iridioides.
compressa, Moench, Meth. 529—graminea.
compressa, Thunb. Diss. lrid. 12 - moraeoides.
concolor, Baker, in Gard. Chron. (1876) II. 774 • u m - bucina.
convoluta, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 92.—Am. bor.
coronaria, Salisb. Prod. 45 — I. Xiphium.
crassifolia, Lodd. Bot. Cab. t. 1861 = Moraea iridioides.
cretensis, *Janka, in Oestr. Sot. Zeitschr.* (1867) 376. —Graecia; Syria.
erispa, Linn. f. Suppl. 98=Moraea crispa.
cristata, *[Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 70.— Am. bor.
crocea, Jacq. ex Baker, in Jonm. Linn. Soc. xvi. (1877) 141-aurea.
cucullata, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Natnrw. iv. (1853) 74 = pallida.
cuprea, Pursh, Fl. Am. Sept. i. SO^fiilva.

IBIS:—

curtopetala, [Delar. in] Red. Lil. t. 840-1. Pseudacorus.
daenensis, Kotschy, ex Baker, in Jonrn. Linn. Soc. xvi. (1877) 140=spuria.
dahurica, *Herb, ex Klatt, in Bot. Zeit.* xxx. (1872) 614.—Dahuria.
Danfordiae, *Boiss. Fl. Orient*, v. 124.—Cilicia.
darwasica, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 67».—Bokhara.
decora, Wall. PI. As. Rar. i. 77. t. 86-nepaIensis.
deflexa, Knowles *8c* Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 19. t. 61=germanica.
desertorum, Balb. Cat. Hort. Taur. App. i. 12 - Swertii.
desertorum, Gueldenst. Reise, i. 80—spuria.
desertorum, Moench, Meth. 529 — Gueidenstaedtiana.
diantha, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 637 - aphylla.
diantha, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 354 =virescens.
dichotomy *Pall. Reise*, iii. 712.—Dahuria.
Dierinciii, Hort. Berol. ex C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1858) 17-spuria.
diluta, Bieb. Cent. PI. Ross. t. 81 - Gueidenstaedtiana.
ditersifolia, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 305 - Moraea diversifoliu.
Doniana, Spach, Hist Vég. Phan. xiii. 34—ensata.
Douglasiana, *Herb, in Hook. If Am. Bot. Beech. Voy.* 395.—Am. bor. occ.
Douglasiana, Ton. Bot. Whipple Exped. 144 = macrosiphon.
dubia, Poit. Encyc Suppl. iii. 184—Gueidenstaedtiana.
Duerinckii, *Buchl. in Am. Journ. Sc.* xlv. (1843) 176. —Am. bor.
edulis, Linn. f. Snppl. 98 - Moraea ednlis.
elegans, *Pers. ex Steud. Norn.* ed. II. i. 82.—Hab.?
elongata, Fisch. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 144 -glaucescens.
ensata, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 328.— Reg. Himal.; As. bor.
erratica, Tod. Nuovi Gen. e Sp. 10=lutescens.
Eulefeldi, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v. (1877) 633. —Turkestan.
extrafoliacea, Mikan, f. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 466-aphylla.
falcata, Tausch, in Flora, vii. (1824) 83 - aphylla.
falcifolia, *Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pitersb.* vii. (1847) 605.—Afghan.; Turkest.
Falconeriana, Penny, ex Loud. Gard. Mag. v. (1829) 471 = germanica?
Fieberi, Seidl, in Opiz, Natnral. n. ix. (1825) 128 ; et in Oek. Tech. Fl. Bohem. i. 48-aphylla.
filifolia, *Boiss. Voy. Bot. Espagne*, 602. t. 170.— Hispan.
filifolia, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Petersb. vii. (1847) 506 = longiscapa.
fimbriata, Vent. lard. Cels, t. 9 = japonica.
flaccida, Spach, Hist. Vég. Phan. xiii. 41 = versicolor.
flavescens, *\Delile, in] Red. Lil.* t. 876.—Bosn.; Keg. Caucas.
flavissima, Bess. Enum. PI. Volb. 40—arenaria.
flavissima, *Pall. Reise*, iii. 715.—Sibiria.
flexuosa, Murr. in Nov. Comm. Gotting. vii. (1776) 30. t 4=sibirica.
florentina, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 693 = albicans.
floreotina, *Linn. Syst.* ed. X. 868.—Europ. austr.
florentina, Savi, Mat. Med. Tosc. 40. t. 46 - germanica.
floridana, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 92 (Quid?).—Am. bor.
foetida, Thunb. Diss. lrid. 16=foetidissima.
foetidissima, *Linn. Sp. PI.* 39.—Europ.; Oriens.
Fontanesii, *Godr. in Gren.* b* *Godr. Fl. Fr.* iii. 846, adnot.—Algeria.
fragrans, Lindl. Bot. Reg. (1840) 1.1-ensata.
fragrans, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 308- **biflora.**
frigida, *Bunge, ex Bess, in Flora,* xvii. (1834) I. *Beibl.* 25, nomen.—Sibir. baical.
fugax, *Pers. Syn.* i. 64.—Afr. austr.
fugax, Tenore, Fl. Nap. i. 15 = I. Sisyrinchinm.
fulgida, E. Berg, in Flora, xviii. (1836) 568 = pallida.
fulva, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 1496.—Am. bor.
fumosa, *Boiss. if Haussk. ex Baker, in Journ. Linn. Soc.-n.-n.* (1877) 124.—Syria.

IBIS:-

furcata, Bieb. Cent. PI. Ross. ii. t. 51-aphylla.
Gawleri, [Delar. in] Red. Lil. sub t. 310= Gueidenstaedtiana.
geminiflora, *Bess, in Flora*, xv. (1832) II. *Beibl.* 11.—Ross, austr.
georgica, Gueldenst. Reise, i. 420 = ibeiica.
germanica, Falk, Beitr. ii. 101—glaucescens.
germanica, Forsk. ex Steud. Norn. ed. II. L 821=sumbncina.
germanica, *Linn. Sp. PI.* 88.—Europ.; Oriens.
germanica, Sibth. Fl. Graec. t 40 = pallida.
gigantea, Carr. in Rev. Hortic (1875) 856—ochroleuca.
glauca, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 302 - pallida.
glaucescens, *Bunge, ex Ledeb. Fl. Alt.* i. 68.—Sibir. alt.
gloriosa, Reider, ex E. Berg, in Flora, xvi. (1833) 17 = Swertii.
glumacea, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 98 (Quid 1).—Am. bor.
Gmelini, Ledeb. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. iii. (1841) 48-laevigata.
goniocarpa, *Baker, in Gard. Chron.* (1876) II. 710.—Reg. Himal.
gracilipes, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. vi. (1858-69) 412.—Japon.
gracilis, E. Berg, in Flora, xviii. (1836) 568=pnmila.
granlis", Bigel. Fl. Bost. 12-prismatica.
gracilis, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. i. 477 = « Moraea tennis,
gracilis, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxvi. (1880) 627.—China.
graminea, Georgi, Reise, i. 196-ruthenica.
graminea, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 370 = Sintenisii.
graminea, Heuff. ex Nym. Consp. 702 = 1. Pseudocyperus.'
graminea, *'Linn. Sp. PI.* 39.—Europ. austr.
graminea, Thunb. Fl. Jap. 34 = ensata.
graminiflora, Ledeb. Fl. Ross. iv. 106-geminiflora.
graminifolia, *Pall. Reise Prov. Russ. Reich,* iii. 584, 658 (Quid?).—Rossia.
grandiflora, Salisb. Prod. 43 -1 . Susiana.
Grijsi, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxvi. (1880) 515.—China.
Gueidenstaedtiana, *Lepech. in Act. Acad. Petrop.* i- 1781 (1784) 292. t. 8.—Oriens.
Guldenstaedia, J. F. Gmel. Syst. 115-praec.
Gyldenstaedtii, Hoflmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 141-praec.
haematophylla, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 60 = ensata.
haematophylla, Fisch. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 118 = sibirica.
halophila. Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 875-spuria.
halophila,Pa\\. Reise, ii. 733 - Gueidenstaedtiana.
halophyllo, Georgi, Beschr. Russ. Reich. HI. iv. 671 = praec.
Hartwegii, *Baker, in Gard. Chron.* (1876) II. 328. —Calif.
Haynei, *Baker, I. c.* 710.—Palaestin.
Helena, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 689-acntiloba.
Helenae, *Barbey, ex Boiss. Fl. Orient,* v. 132.— Aegypt.
heterophylla, Hort. Par. ex Spreng. Syst. iv. Car. Post. 24 — Gueidenstaedtiana ?
hexagona, *Walt. Fl. Carol.* 66.—Am. bor.
Heylandiana, Boiss. *8c* Reut. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 142=iberica.
hirsuta, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. i. 478-Moraea papilionacea.
hispanica, Hort. ex Stend. Norn. ed. I. 438 * I. Xiphium.
Histrio, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xxx. (1872) 488.—Palaest.
Hookeri, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl- i. 691-tridentata.
hortensis, Tausch, in Flora, xi. (1828) 235-pallida.
Humei, G. Don, in Loud. Encyc. PI. Suppl. i. 1150-germanica.
humihs, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 83.—Transsylv.; Reg. Caucas.
humilis, Georgi, Bemerk. Reise Russ. Reich, i. 196-arenaria.
humilis, Schur, Enum. PI. Transs. 657-ruthenica.
humilis, Sieber, ex -Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 138-cretensis.

IBIS:—

hungarica, Waldst. & Kit. PI. Rar. Hung. iii. 251 - aphylla.
hybrida, *Retz. Fasc. Obs. Bot.* (1774) 6—Hab. J
iberica, *Hoffm. in Comm. Soc. Phys. Mosq.* i. (1803) 41. —Onena.
iberica, *Stev.'ex Bieb. Fl. Tour. Cauc.* i. 80.—Reg. Caucus.
illyrica, Tomm. ex Vis. Fl. Dalm. Suppl. ii. 63 = germanica.
imberbis, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 671, in syn.-juncea.
imberbis, Van Hazen, Cat. Arb. et PI. 67; ex Ker, Gawl. in Bot. Mag. 1.1238 (- *Vieusseuxia fugax* . —Aft. austr.
imbricata, Lindl. Bot. Reg. (1845) t. 35=flavescens.
involute, Garaia, in Effem. Sc Sicilia (1834), 286 I. bisyrinchium.
italica, Parl. NUOT. Gen. e Sp. 37-I. Chamaeiris.
Itsihatsi, Hassle. Cat. Hort. Bog. Alt S5=laevigata.
japomca, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 827 . -Japon.
juncea, Brot. Fl. Lusit. i. 51 = filifolia.
juncea. *Pair. Voy. Barb.* ii. 85 ; *Desf. FL Atlant.* i. 39 —Mauritan.
juncifolia, *Pall. Seise Suss. Reich,* i. 94.—Rossia.
Junonia, Schott & Kotschy, ex Schott, in Oestr. Wochenbl. (1854) 209=--pallida.
Kaemp/eri, Siebold, ex Lem. Illustr. Hortic. v. (1858) t. 157-laevigata.
kamaonensis, *Wall. Cat.* n. 5052.—Reg. Himal.
kashminana, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) II. 744.— Reg. Himal.
Kerneriana, [Aschers. & Sint.] ex Baker, in Gard Chron. (1884) I. 795-ochroleuca?
Kolpakowskiana, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* v, (1877) 263, 634.—Turkestan.
Korolkowi, *Regel, I. c.* ii. (1873) 482.—Tarkestan.
kumaonensis, Auct. = kamaonensis.
lacera. Lam. Encyc. iii. 304 = Moraea polystachya.
laciniata, Hort. Hamb. ex E. Berg, in Flora, xvi. (1838) I. Beibl. 28-lnrida?
lactea, Pall. Reise, iii. 718-ensata ?
Jacustris, *Nutt. Gen. Am. i.* 23.—Am. bor.
laevigata, *Fisch. ex Fisck.* &• *Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop.* v. 86.—Sibir.j Japon.
lamprophylla, Lange, in Bot. Tidssk. xiii. (1882) 17 = grammes.
latifolia, Gilib. Exercit.ii. 497-germanica.
Leichtlini, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 680.—Bokhar.
lepida, Heuff. in Flora, xxxvi. (1858) 621=squalens.
leucographa, *Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1863) 213.—Enrop.
Libani, Reut. ex Baker, in Gard. Chron. (1876) I. 559 - I. Histrio.
liladna, Borb. ex Nym. Consp. 702 = Guelden-staedtiana.
limbata, Bess, ex Steud. Nom. ed. I. 438-variegata.
lmda, *Booth, ex E. Berg, in Flora,* xvi (1833) 1. *Bail* 30.—Hab.?
tividu, Tratt. Arch. Pict. L 129 (nigr. 176)=susiana.
longiflora, Herb, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1677) 144-glaucescens.
longiflora, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat (1822) 11 » pumila.
lo-.gijlora, Vest, ex Schult. ManL i. 804-biflora.
longifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc xvi. (1877) 140, in syn. = I. Pseudacorns.
longifolia, Royle, Illustr. Bot Himal. 872. t. 91. £ 2 - ensata.
longifolia, Schneev. 1c. t. 20; Andr. Bot. Rep. i. t. 45 - Moraea edulis.
longifolia, Spach, Hist. Ve"g. Phan. xiii. 14-tuberosus.
longipetala, *Herb, in Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 395.—Am. bor. occ.
'ongiscapa, *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 08.—As. bor.
longhpatha, Fisch. ex Sims, Bot. Mag. t. 2528 - ensata.
lorea, Janka, in Termesz. Fiizetek, i. (1877) 245 - foetidissima.
Lortelii, *Barbey, ex Boiss. Fl. Orient,* v. 181.—Syria.
Ludwigi, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 508—Mont. Altai.
lurida, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t 669-squalens.
lurida, Reichb. ex Nym. Consp. 700-germanica, squalens.
lurida, *[Soland. in] Ait. Hort. Kern.* ed. I. i. 68.— Euiop.

IBIS :-

lusitanica, Ker-Gawl. in Bot. Mog.t. 679= juncea.
lutea, Lam. Fl. Fr. iii. 496 = 1 Pseudacorus.
lutescens, [Delar. in] Red. Lil. t. 263 = 1. Chamaeiris.
lutescens, Guss. Cat. Hort. Bocc. (1821) 108 - L Pseudopumila.
lutescens, *Lam. Encyc.* iii. 297,—Europ.: As. Min.
lutescens, Reichb. Ic Crit x. t. 917 = virescens.
lutescens, Sprun. ex Nym. Consp. 701-pumila.
Maacki, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 542.—Mandchuria.
macrosiphon, *Torr. in Pacif. Rail. Rep.* iv. 144.— Calif,
maculata, *Baker, in Gard. Chron.* (1876) II. 517.— Mesopot.
Mandraliscae, Tod. Nnov. Gen. e Sp. 42-pallida.
mandshurica, *Meissn. in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 630.—Manchuria,
maricoides, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 676.—Bokhara.
maritima, Lam. Fl. Fr. iii. 497 = spuria.
maritima, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 11-sibirica.
martinicensis, Jacq. Enum. PI. Carib. 12-Trimezia lurida.
Matthioli, *Tausch, in Flora,* xii. (1829) I. *Erg.* 48.— Bohem.
mauritanica, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 244-juncea.
meda, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 20. —Persia,
mellita, *Janka, in Magyar. Tud. Akad. Math. Term.* xii. (1874) 172.—Thracia.
microftera, Vahl, Enum. ii. 142-alata.
Milesii, *Baker, ex Foster, in Gard. Chron.* (1883) II. 281.—Keg. Himal.
minima, *Johann, ex Vest, in Schult. Mant. i.* 818.— Hab.!
minuta, *Franch. V Sat. Enum. PI. Jap.* ii. 42.— Japon.
minuta. Linn. f. Snppl. 98 = Moraea minuta.
missouriensis, *Nutt. in Journ. Acad. Philad.* vii. I. (1834) 68 '—Am. bor.
Monnieri, [DC. in] Red. Lil. v. t. 236.—Crete; Rhodos.
monophylla, Boiss. & Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenz. 1874 (1876) 234 = 1. Sisyrinchium.
Moorcroftiana, Wall. Cat. n. 6021=ensata.
moraeoides, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1407 = Moraea iridioides.
mutila, *Licht. ex Roem. V Schult. Syst.* i. 477.— Afr. austr.
Myleri, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. (1859) 206 = virescens.
nana, Pers. Syn. i. 63 = verna.
neglecta x, Hornem. Hort. Haftx i. 55.
neglecta, *Parl. Num. Gen. e Sp.* 41.—Hab. 1
nepalensis, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 54 Reg. Himal.
nepalensis, Wall, ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 310 (sp. dub.).—Nepal.
nepalensis, Wall, in Lindl. Bot. Reg. t. 818-germanica.
Nertchinskia, Lodd. Bot. Cab. 1.1848=sibirica.
nikitensis, Lange, in Bot. Tidssk. xiii. (1882) 17= graminea.
Northiana, Pen. Syn. i. 62-Marica Northiana.
notha, Bieb. Cent. PI. Ross. t. 77 = spuria.
nudicaulis, Hook. f. in Bot. Mag. t. 5806 - biflora.
nudicaulis, Lam. Encyc. iii. 296 = aphylla.
ochroleuca, Ker-Gawl. Irid. Gen. 48, ex parte - Monnieri.
ochroleuca, *Linn. Mant.* 175.—As. Min.
odorata, Pers. Syn. i. 53 = cristata.
odoratissima, Jacq. Hort. Schoenb. i. 5. t. 9-pallida.
officinalis, Salisb. Prod. 48 - florentina.
olbiensis, Henon, in Ann. Soc. Agric. Lyon, viii. (1845) 462; ex Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 240 = 1. Chamaeiris.
orchioides, *Carr. in Jtev. Hortic.* (1880) 387.—Turkestan.
orientalis, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9-ochroleuca.
orientalis, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 328 -sibirica.
oxypetala, C. A. Mey. in Ind. PI. Mus. Acad. Petrop. ii. (1834) 8 ; ex Ledeb. R Ross. iv. 99 = ensata.
palaestina, *Boiss. Fl. Orient,* v. 120.—Syria; Mesopotam.
Pallasii, Fisch. ex Trev. Ind. Sem. Hort. Vrat (1821) — ensata.

IBIS:—

pallida, *Lam. Encyc.* iii. 294.—Enrop. austr.; Syria.
pallida, Salisb. Prod. 44 - Gueldenstaedtiana.
pallida, Tenore, Fl. Nap. iii. 86 = florentina.
pallide-taerulaea. Pen. Syn. i. 51-pallida.
paludosa, Pers. I. c. 52 = 1. Pseudacorus.
palustris, Moench, Meth. 528-1. Pseudacorus.
pandurata, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 529.—China.
panormitana, Tod. Nuov. Gen. e Sp. 8 - I. Pseudo-pumila.
papilionacea, Linn. *i.* SuppL 98 - Moraea papiliontcea.
paradoxa, *Stev. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* v. (1814) 355.—Reg. Caucas.
Pavonia, Curt. Bot Mag. 1.168-Moraea fricuspis.
Pavonia, Linn. f. Suppl. 98—Moraea Pavonia,
peduncuta, *Medic, in Act. Acad. Theod. Palat.* vi. *Phys.* (1790) 417 (Quid ?).—Europ. T
persica, *Linn. Sp. PI.* 40.—Cappadoc.; Persia.
picta, Mill. Gard. Diet. cd. VIII. n. 16 = versicolor.
picta. [Spreng.] Bot. Gart. Halle, 50=Swertii ?
plicata, *Lam. Encyc.* iii. 296.—Hab. I
plumaria, Thunb. Diss. Irid. 15 = Moraea plumaria.
Polakii, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien,* 1. (1885) 20.—Persia.
polystachya, Thunb. Diss. Irid. 25 = Moraea polystachya.
pomeridiana, Fisch. ex Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 612=dichotoma.
Potanini, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xxvi. (1880) 528.—Dabnria.
praecox, Salisb. Prod. 46=persica.
pratensis. Lam. Fl. Fr. iii. 498-sibirica.
prismatica, *Pursh, Fl. Am. Sept. i.* 80.—Am. bor.
Pseudacorus, *Linn. Sp. PI.* 38.—Europ.; As. or.
Pseudo-cyperus, *Schur, Enum. PI. Transs.* 657 Hungar.
Pseudo-graminea, Schur, 1. c. 928, Index -gramineaf
Pseudopulcherrima, E. Berg, in Flora, xviii. (1835) 57 Sipumila.
Pseudo-pumila, *Tineo, Cat. Hort. Panorm.* (1827) 283.
Pseudo-sibirica, Schur, Enum. PL Transs. 667 - sibirica.
pulchella, *Regel, Gartenfl.* (1859) 310.—Hab. ?
pulcherrima, E. Berg, in Flora, xvi. (1888) I. Beibl. 84=pumila,
pumila, Bivona, Sic. PI. ii. 82-1. Pseudo-pumila.
pumila, Griseb. Spicil. FL Rumel. ii. 870, parting rubromarginata.
pumila, *Linn. Sp. PI.* 38.—Europ.; As. bor.
pumila, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 27-attica.
pumila, Viii. Hist. PI. Dauoh. ii. 224-L Chamaeiris.
punctata, Moench, Meth. 627 >- susiana.
purpurascens, E. Berg, in Flora, xviii. (1835) 569 = pumila.
pyrenaica, Bubani, Sched. Crit. 8-xiphioide>.
pyrenaica. *Linn. Cent. PI.* i. 4; *Amoen. Acad.* iv. 204. —Mont Pyren.
ramose, Thunb. Diss. Irid. 18 — Moraea ramosa.
ramosissima, Linn. f. Suppl. 99 — Moraea ramosa.
Redouteana, Spach, Hist Ve"g. Phan. xiii. 66 - lurida.
refiexa, E. Berg, in Flora, xvi. (1888) I. Beibl. 83 - aphylla.
Regeli, *Maxim, ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 495.—Turkestan.
Reichenbachiana, Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1866-66) 618 = spuria.
Reichenbachii, *Heuff. in Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. (1858) 28.—Servia.
repanda, E. Berg, in Flora, xviii. (1885) 565-japonica.
reticulata, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 34.—As. Min.; Persia.
rigida, Sieber, ex Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 698-aphyIla.
Robinsoniana, F. Muell. Fragm. vii. 163 = Moraea Robinsoniana.
RosenbaJiiana, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 675.—Turkestan.
Rossii, *Baker, in Gard. Chron.* (1877) II. 809.— Mandchuria.
rubeseens, *Rafin. Fl. Ludov.* 20 (Quid?).—Am. bor.
rubro-marginata, *Baker, in Gard. Chron.* (1875) 624.—Anatolia.
rupestris, Salisb. Prod. 43-biflora.

IBIS:—
rothenica, *[Dryand.* î«] *Ait. Hort. Kea.* ed. II. i. 117. —Sibir.
ruthenica, Ker-Gawl. Irid. Gen. 64, partim—humilis.
Saarii, Schott, ex Baker, in Gard. Chron. (1876) I. 788 =Sari.
salsa, Pall. Reise, ii. 481 «= Gueldenstaedtiana.
Samaritanii, Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 234 = 1. Sisyrinchium.
sambncina, *Linn. Syst.* ed. X. 863.—Europ. anstr.
sanguined, Donn, Hort. Cant. ed. VI. 17 ; Hornem. Hort. Hafn. i. 58 = sibirica.
Sari, *Schott, ex Baker, in Gard. Chron.* (1876) 788 (Saarii); *et ex Boiss. Fl. Orient*, v. 181.—Cilicia.
sativa, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 15 = veraicolor.
scariosa, .Willd. ex Link, Jahrb. i. III. 71=aphylla.
Schmidtii, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 145-aphylla.
scorpioides, Desf. Fl. Atlant. i. 40. t. 6 = alata.
serbica, PanS. ex Nym. Consp. 701=virescens.
serotina, *Willk. in Willk. tf Lange, Prod. Fl. HUp.* i. 141.—Hispan.
setacea. Thunb. Diss. Irid. 20—Moraea setacea.
setifolia. Linn. f. Suppl. 99 = Moraea setacea.
setosa, *Pall, ex Lint, Jahrb.* i. III. 71.—Sibir.
sibirica, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 117-setosa.
sibirica, *Linn. Sp. PI.* 89.—Europ. i As. bor.
simla, Tod. Nuov. Gen. e Sp. 7-palIida.
silvestris, *Veil. Fl. Flutn.* 34; i. t. 82.—Bras,
sindjarensis, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* v. 122.—Mesopot.
Sintenisii, Ja*j*tia, *in Termist. Fiizetek, i.* (1877)244.—As. Min.
Sisyrinchium, *Linn. Sp. PI.* 40.—Keg. Mediterr.; Oriens; Afghan.
sogdiana, Bnnge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1847) 507—spuria.
songarica, *Schrenk, Enum. PI. Nov.* i. 3.—Persia; Afghan.
sordida, Retz. Fasc. Obs. Bot. (1774) 6-spuria ?
sordida, Soland. ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 303 -juncea.
sordida, *Willd. Enum. Hort. Berol. Sufipl.* 4.—Hab. »
spathacea, Jaume St. Hil. '19. t. 27'; ex Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 468-spuria.
spathacea, Thunb. Diss. Irid. 17 = Moraea spathacea.
spathulata, Cav. Desc 298, in obs. = sibirica.
spathulata, Lam. Encyc. iii. 300 = spuria.
spathulata, Linn. f. Suppl. 99 = Moraea spathacea.
spathulata, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 4 = Gueldenstaedtiana.
spectabilis, Salisb. Prod. 43 = germanica.
spectabilis, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 93 - 1 . Xiphium. C
speculatrix, *Hance, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 196.—Hongkong.
spuria, Bertol. Fl. Ital. ii. 776 = foetidissima.
spuria, *Linn. Sp. PI.* 89.—Europ.
spuria, Pall. Reise, iii. 713-ensata.
spuria, Reichb. Ic. PI. Crit. x. 5. f. 1286 = Gueldenstaedtiana.
squalens, E. Berg, in Flora, xvi. (1883) I. Beibl. 14 —variegata.
squalens, Georgi, Beschr. Rnss. Reich, iv. 668 = germanica.
squalens, *Linn. Syst.* ed. X. 868.—Europ.; Caucas.; Persia.
squalens, Petagna, Inst. Bot. ii. 88 - sambucina.
squalens, Thunb. Fl. Jap. SS = japonica.
Statellae, Tod. Nuov. Gen. e Sp. 6-lutescens.
stenogyna, [Delar. in] Red. Lil. TÛ t. 810 = Gueldenstaedtiana.
stenoloba, A. DC. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 143 = pumila.
Stoeksii, *Boiss. Fl. Orient*, v. 133.—Afghan,
stolonifera, *Maxim, in Bull. Acad. Pétersb.* xxvi. (1880) 535.—Kokan.
stricta, Moench, Meth. 628 = sibirica.
stylosa, Desf. Fl. Atlant. i. 40. t. 5—unguicularis.
suaveolens, *Boiss. (f Reut. Diagn.* Ser. I. xiii. 15.—Orient.
suavis, Salisb. Prod. 44-graminea.
subbarbata, Joo, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 98 «• Gueldenstaedtiana.
subbiflora, Brot. Fl. Lusit. i. 50. t. 96-= biflora.
subtriflora, Fieber, ex Klatt, in Linnaea, xxxiv. (1865-66)599 = aphylla.
sulcata, Wall. Cat. n. 5049 =nepalensis.

IBIS:—
sulphurea, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) **687—** flavescens.
superba, E. Berg, in Flora, xviii. (1835) 567 = squalens.
susiana, *Linn. Sp. PI.* 38.—Persia.
Swertii, *Hort. ex Urn. Encyc.* iii. 296.—Hab.»
sylvatica, Balb. ex Roem. *Sc* Schult. Syst. i. 476 = graminea.
syrtica, Viv. Fl. Lib. Spec. 3. t. 1. f. 1 = 1. Sisyrinchium.
tangerica, *Hort. Ch"'s. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 19 (Quid ?).—Marocc.
tardiflora, E. Berg, in Flora, xviii. (1835) 566 = squalens.
taurica, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1506.—Tauria.
tectorum, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xv. (1871) 380.—Japon.
tenax, *Dougl. in Bot. Reg.* t. 1218.—Am. bor. occ.
Tenoreana, Nym. Consp. 962, Index -seq.
Tenorii, *Part. Fl. Ital.* iii. 278.—Europ.
tenuifolia, *Pall. Reise*, iii. 714.—Rossia.
tennis, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 380.—Am. bor. occ
Tigridia, *Bunge, in Ledeb. Fl. Alt.* i. 60.—Mont. Altai.
tigrina, Jacquem. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 144 = kamaonensis.
Tinaei, Tod. Nuov. Gen. e Sp. 46 = pallida.
tingitana, *Boiss. (f Reut. Pugill. PI. Nov.* 113 - Mauritania.
Tolmieana, Herb, in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 396 = missouriensis.
tomiolopha, Hance, in Joum. Bot. x. (1872) 229 = tectorum.
torta, *Tausch, in Flora*, xvii. (1834) 523.—Hab. ?
transsilvanica, Schnr, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1863) 73=pumila.
transtagana, Brot. Fl. Lusit. i. 52 = alata.
trialata, Brot. Phyt. ii. 44. t. 95«alata.
tricuspidata, Linn. f. Suppl. 98-Moraea tricuspis?
tricuspis, Thunb. Diss. Irid. 14 — Moraea edulis.
tricuspis, Willd. Sp. PI. i. 231 = Moraea tricuspis.
tridentata, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 30.—Am. bor.
tridentata, Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 274 - tripetala.
trifiora, Balb. Misc. Bot. 6. t. l=ensata.
trigonocarpa, A. Br. & Bouchi, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 17 = sibirica.
tripetala. Hook. Bot. Mag. t. 2886=tridentata.
tripetala, Linn. f. Suppl. 92-Moraea tripetala.
tripelala, *Walt. Fl. Carol.* 66.—Am. bor.
tristis, Linn. f. Suppl. 97 = Moraea tristis.
tristis, Reichb. Ic. Fl. Germ. xix. 3=>pumila.
tuberosa, *Linn. Sp:-Pl.* 40.—Europ. anstr.
unguicularis, *Poir. Voy. Barb.* ii. 86.—Mauritan.
uniflora, *Pall, ex Link, Jahrb.* i. HI. 71.—Sibir.
unifolia, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 173 (Quid?).—Afr. austr.
variabilis, Jacq. Coll. ii. 321 = 1. Xiphium.
variegata, *Linn. Sp. PI.* 38.—Europ.
Vartani, *Foster, in Gard. Chron.* (1885) I. 488.—Syria.
ventricoaa. *Pall. Reise*, iii. 712.—Dahnria.
venusta, Booth, ex E. Berg, in Flora, xvi. (.1883) I. Beibl. 31 = lurida?
vema, *Linn. Sp. PI.* 39.—Am. bor.
verna, Pall. Reise, iii. 213 = ruthenica.
vernalis, Salisb. Prod. 44=verna.
versicolor, *Linn. Sp. PI.* 39.—Am. bor.
versicolor, Thunb. Fl. Jap. 84 = laevigata.
villosa, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 571 - Moraea Pavonia.
violacea, Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867-68) 884-laevigata.
violacea, Savi, Bot. Etrusc. ii 9—germanica.
violacea, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 393.—Europ. austr.
virescens, *[Delar. in] Red. Lil.* I 295.—Europ.
virgata, *Rafin. New Fl. Am.* ii. 92 (Quid!).—Am. bor.
virginica, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 516 = prismatica.
virginica, *Linn. Sp. PI.* 39.—Am. bor.
virginica, Michx. Fl. Bor. Am. i. 22, partim = hexagona.
viscaria. Linn. f. Snppl. 98 — Moraea viscaria.
vulgaris, Pohl, Tent. Fl. Boh.; ex Schult. Mant. i. 304-germanica.
Winkleri, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* viii. (1884) 677.—Turkestan.

IBIS:—
xiphia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128 = 1. Xiphium.
xiphioides, *Ehrh. Beitr.* vii. 140.—Europ. austr.
Xiphium, Desf. Fl. Atlant i. 87 = Fontanesii.
Xiphium, Ceorgi, Reise, i. 196 (Quid ?).—Rossia.
Xiphium, Jacq. Coll. ii. 320-xiphioidjs.
Xiphium, *Linn. Sp. PI.* 40.—Hispan.
yedoënsis, *Franch. V Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 522.— Japon.
Belantea, Vigo, ex Parl. Nuov. Gen. e Spec. 68 = I. Sisyrinchium.

IRIUM, Steud. Nom. ed. I 440 (1821) = IRION, Burm. f. -Boridula, Linn. (Droserac).

IRLBACHIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 101. t. 179 : 1827) = Li8ianthus, Aubl. (Gentian.).
Bonplandiana, Fenzl, Nov. Stirp. Dec. (1689) 12; ex Griseb. in DC. Prod. ix. 72.—N. Granat.
coerulescens, Griseb. Gen. et Sp. Gentian. 195 = L. coerulescens.
elegans, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 102. t. 179-L. paniculatus.
recurva. Prog, in Mart. Fl. Bras. vi. I. 229 «> L. recurvus.
subcordata. Prog. 1. c. = L. subcordatus.

IRMA, Bouton, ex A. DC. Prod. xv. I. 406 (1864) = Begonia, Town.

IRMISCHIA, Schlecht. in Linnaea, xix. (1847) 738-Metastelma, R. Br. (Asclep.).
floribunda, Schlecht. 1. c. 789.—Mexic.

IRON, P. Br. Hist. Jamaic. 179. t. 12. f. 3 (1765)-SauTagesia, Linn. (Violar.).

IROUCANA, Aubl. PI. Gui. i. 328. t 127 (1775) = Casearia, Jacq. (Samydac).
guianensis, Aubl. 1. c. 329. t. 127 = C. ramiflora.

IRSIOLA, P. Br. Hist. Jamaic. 147. t. 4. f. 2 (1756)-VitiB, Toum. (Ampelid.).
sicyoides, Rafin. Sylva Tellur. 86 -* V. sicyoides.

IRULIA, Bedd. Forest. Man. Bot. 235 (1873)=Melpcanna, Trin. (Gramin.).
travancorica, Bedd. 1. c. = M. travancorica.

IBVHTOIA, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 167. *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. *(•* i. 314.
Barteri, *Hook./. 1. c*—Afr. trop.
malayana, *Oliver, ex A. Benn. in Hook. f. Fl. Brit-Ind.* i. 522.—Malacca.
Smithii, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 167.—Afr. trop.
tenuifolia, *Hook.f. I. c*—Afr. trop.

IRVINGIA, F. Muell. Fragm. v. 17 (1865) = **Hederft.** Toum. (Araliac).
australiana, F. Muell. 1. c. 18 = H. australiana.

ISABELIA, Rodrig. Orch. Nov. i. 75 (1877). *ORCHIDEAE.*
virginalis, *Rodrig. I. c.* 76.—Bras.

ISACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 278 (1847) * Sclerochiton, Harv. (Acanthac).
Vogelii, Nees, 1. c. 279-S. Vogelii.

ISACHNE, R. Br. Prod. 196 (1810). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1100.
GRAYA, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 119 (1854;. SFHAZROCAKYUM, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ⊳-620 (1841).
adstans, *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 461.—Malacca,
albens, *Trin. Ic. Gram.* 8. t. 85.—Ind. or.; Java,
altissima, *Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord.* xxx- (1875) 122.—China.
angusta, Nees, ex Steud. Syn. PL Gram. 96 = Panicu"> stenanthum.
arundinacea, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 653 = panlcea.
atrovirens, Trin. Gram. Panic. 251 —australis.
australis, *R. Br. Prod.* i. 196.—Austral,
dispar, *Trin. Ic. Gram.* 8. t. 86.—Reg. Himal.

ISACHNE :—

disperma, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. 11. 274 = pagicea.
dubia, Kunth, Rev. Gram. 1. 42; Enum. PI. i. 137 =panicea.
firmula, *Buese, in. Miq. PI. Jungh.* 379.—Java.
Gardneri, *Benth. V Hook.f. Gen.* iii. 1100.—Zeylan.
geniculaU, *Griff. Notul.* iii. 41.—Ind. or.
hispidula, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 96 = Coelachne pulchella.
javana. *Wees, ex Steud I. c.* in syn.—Java.
Kunthiana, *Nees, ex Steud. 1. c.* 96.—Java.
Lamarckii, Konth, Rev. Gram. i. 42=manritiana.
leersioides, *Griseb. in Mem. Am. Acad.* N. S. vili. (1863) 533.—Cuba.
lepidota, Walp. Ann. i. 924 = australis.
mauritiana, *Kunth, Rev. Gram.* i. 213. t. 38.—Ins. Mascar.
Meneritana, R. Br. Prod. 196.-australis.
miliacea, *Roth, Nov. PI. Sp.* 68.—Ind. or.
minutula, *Kunth, Rev. Gram.* ii. t. 117.—Ins. Mariae-Annae.
monticola, *Buese, in Miq. PI. Jungh.* 879.—Java.
muricata, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 823 = Panicum muricatnm.
Myosotis, *Nees, in Hoot. Kew Journ.* ii. (1850) 98.—Ins. Pbilipp.
Neesiana, Am. ex Stend. Syn. PI. Gram. 96-Kunthiana.
nilagirica, Hochst. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1100=Gardneri.
pangerangensii, *Zoll.* to" *MOT. Syst. Vert. Zoll.* 102.—Java.
panicea, *Trin. Gram. Panic.* 263.—Am. trop.
perpusitla,Am. ex Steud. Syn. PI. Gram. 96=Panicum perpusillum.
polygonoides, Doell, in Mart. Fl. Bras. ii. II. 273 "Panicum polygonoides.
prostrata, Hort. Berol. ex Stend. Syn. PI. Gram. 95-Panicum horticolom.
pulchella, *Roth, Nov. PI. Sp.* 68.—Ind. or.
pygmaea, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 563.—Ind. occ.
refracta, *Hook.f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 227.—Afr. occ.
rigens, *Trin. Gram. Panic.* 252.—Ind. occ.
rigida, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 95.—Java.
simpliciuscula, Wight & Am. exThw. Enum. PI. Zeyl. 373, in syn. = Coelachne brachiata.
Btigmatosa, *Griff. Notul.* iii. 42.—Ind. or.
Streptostachys, Nees, ex Stend. Syn. PI. Gram. 79 = Panicum Streptostachys.
trachysperma, *Nees, ex 'Seem. Sot. Voy. Herald,* 224.—Panama.
tricarinata. *Roth, Nov. PI. Sp.* 57.—Ind. or.
ventricosa, *Doell, in Mart. Fl. Bras.* ii. II. 274.—Am. trop.
virgata, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 96, in syn.—Ind. or.; Malaya.
Walkeri, *Am. ex Steud. 1. c.* 97.—Zeylan.

ISANDKA, F. Muell. Census, 140 (1882), nomen. *SOLANACEAE.*
Bancroftii, *F. Muell. I. c.; et in Wing, South. Sc. Record,* iii. (1883) 2.—Austral.

ISANDRA. Salisb. Gen. PL Fragm. 67 (1866) = Thysanotua, R. Br. (Liliac).

1SANDRINA, Rafin. Sylva Tellur. 186 (1888) - Caasift, Tonrn. (Legumin.).
arborescent, Ra&a. 1. C - C. emarginata.

ISANTHERA, N«s, in Trans. Linn. Soc. xvii. (1834) 82. *GBSNERACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1016.
crenata, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 193-discolor.
discolor, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xix. (1874) 588.—Ins. Formosa,
eximia, *C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan.* v. 198.—
florilunda, Gardn. in Calc. Joum. Nat Hist. vi. (1846) 483 = permollis.
pennollis, *Nees, in Trans. Linn. Soc.* xvii. (1884) 82.—Ind. or.

ISANTHINA, Reichb. ex Stend. Nom. ed. II. *I* 400 (1840) = CommeUna, Linn.

ISANTHUS, DC. Prod. vii. 68, in syn. (1888)-Perezla, Lag. (Compos.).

ISANTHUS, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 3. t 30 (1808), *LABI ATAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1220.
coeruleus, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 4. t. 30.—Am. bor.
multiflorus, Rafin. New Fl. Am. ii. 85 = coeruleus.
pubescens, Rafin. 1. c.=coeruleus.
pumilus, Rafin. 1. c. 84-coeruleus.

ISARTIA, Dmn. Anal. Fam. 82 (1829)-Isertia, Schreb. (Rnbiac.).

ISATIS, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1785). *CRUCIFERAE,* Benth. & Hook. f. i. 94.
CHARTOLOMA, Bunge, in Bot. Zeit. ii. (1844) 249.
GLASTOM, Rnpp. FL Jen. ed. Hall. 68 (1746).
SAMEXARIA, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 161.
aegyptiaca, Cranti, Inst. ii. 94-seq.
aegyptica, Linn. Sp. PI. 671=-Cakile maritima.
agyptia, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 121-praec.
aleppica, *Scop. Delic. Insub.* ii. 81. t. 16.—As. Mb.; Syria.
alpina, *All. Fl. Pedem.* i. 259.—Italia.
alpina, Vill. Prosp. 38; Hist. PL Dauph. iii. 308 = tinctoria.
alyssifolia, *Boiss. Fl. Orient,* i. 878.—As. Min.
apiculata, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. xvii. (1842) 199=latisiliqua.
apiculata, Jord. ex Nym. Consp. 67 = tinctoria.
araratica, *Rupr. Fl. Cauc.* 182, in textu.—Armen.
armena, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 91 = latisiliqua.
armena, *Linn. Sp^Pl.* 67.0.—Oriens.
Aucheri, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 202.—As. Min.
bannatica, Hort. Cremcn. 74; ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 149 = tinctoria.
Besseri, *Trautv. in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* iv. (1846) 313. t. 11.—As. Min.; Persia,
biscutellaefolia, *Boiss.* b* *Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. tfosc.* xii. (1860) 28.—Persia.
Boissieriana, *Reichb. f. in Journ. Bot.* xiv. (1876) 46.—Samarkand,
brachycarpa, *C. A. Mey. in Eichw. Casp. Cauc.* 17.—Armen.
Bnngeana, *Seidl. Bot. Reise, Transkauk.* 37, 83.—Armenia,
callifera, *Boiss. V Bal. Diagn.* Ser. II. v. 46.—Cilicia.
campestris, Stev. in DC. Syst. ii. 571 = tinctoria.
campylocarpa, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sit.* II. xvii. (1842) 203.—Persia.
Candolleana, Boiss. 1. c. 199 -latisiliqua.
canescens, DC. Fl. Fr. Suppl. 598=tinctoria.
cappadocica, Desv. Joum. Bot. iii. (1814) 174=latisiliqua.
caucasica, Kolenatl, ex Rupr. Fl. Cauc. 132 = rcticulata.
cochlearis, *Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Ser. II. xvii. (1842) 202.—Syria.
cordigera, Boiss. 1. c. 198-Besseri.
coiymbosa, *Boiss. 1. c.* 200—As. Min.
costata, *C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt.* iii. 204.—Reg. Himal. et Altai
dalmatica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2-tinctoria.
dasyearpa, Ledeb. Ind. Sem. Hort Dorpat. (1824) 4-praecox.
dentata, Pers. Syn. ii. 193=aleppica.
Djnrjaedae, *Coss. V Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1867) 523.—Algeria,
emarginata, *Kar.V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. (1842) 158.—Soongaria.
frigida, *Boiss. V Kotschy, Diagn.* Ser. II. ii. 547.—As. Min.
frotescens, *Kar. V Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xiv. (1841) 886.—Soongaria.
Garcini, DC. Syst. ii. 565 - Fortuynia Garcini.
glanca, *Auch. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat.* SeY. II. xvii. (1842) 201,-As. Min.; Persia.
glauca, Gilib. Fl. Lituan. ii. 66-tinctoria.
glauca, Willd. ex DC. Prod. i. 210 - lusitanica.
hebecarpa, DC. Syst. ii. 669 - littoralis.
hebecarpa, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 205-lasiocarpa.
heterocarpa, Andrz. ex Bess. Enum. PL Volh. 82-tinctoria.

ISATIS:—

i heterocarpa, *Regel* to[1] *Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 11.—Turkestan.
hirsuta, Pen. Syn. ii. 193; Link, Handb. ii. 284-tinctoria.
hirtocalyx, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Ser. VI. xv. (1883) 234.—Turkestan,
iberica, *Strv. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 267.—Reg. Caucas.
iconia, *Boiss.* &" *Heldr. Diagn.* Ser. I. viiL 48.—As. Min.
indigotica, *Fortune, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. i.* (1846) 270.—China.
intermedia, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 313 - oblongata.
iaponica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 75.—Japon.
Kotschyana, *Boiss. tf Hohen. Diagn.* Ser. I. viii. 48.—Persia,
laevigata, *Trautv. Del. Sem. Hort. Kim.* (1840) «.—Siblr.
lasiocarpa, *Fitch, ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 10.—Turkestan.
lasiocarpa, Ledeb. Fl. Ross. i. 211 - tinctoria.
latisiliqua, *Stev. in Mim. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 267.—As. Min.; Persia.
leiocarpa, DC. Syst. ii. 567-latisiliqua.
lenconeura, *Boiss.* b* *Buhse, in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 28.—Reg. Cancas.
littoralis, Bess. Enum. PL Volh. 71 = praecox.
littoralis, *Stev. in MM. Sac. Nat. Mosc.* iii. (1812) 267.—Tauria.
Lockmanniana, *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient.* L 381.—Cilicia.
Lunaria, Crantz, ex DC. Syst. ii. 286-Ricotia Lunaria.
lusitanica, *Brot. Fl. Lusit.* i. 660.—Lusitan.
lusitanica, S. G. Gmel. It. iii. 808-orientalis.
lusitanica, Linn. Sp. PL 670 - aleppica.
lusitanica, Moris, Fl. Sard. 1. 114-tinctoria.
maeotica, DC. Syst. ii. 571 - tinctoria.
maritima, Rupr. Kl. Cauc 183, in textu=tinctoria.
megacarpa, Fisch. ex Steud. Nom. ed. II. i. 824-tinctoria.
membrancea, *Trautv. in Mim. Sav. Etr. Pitersb.* iv. (1846)316.—Hab.?
microcarpa, *J. Gay, ex Boiss. inAnn.Sc. Nat. Sir.* II. xvii. (1642) 201.—Arab.
minima, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat. (1848) 7-iberica.
minor, Moench, Meth. 222=alrppica.
nummularia, Trautv. in *Mim.* San Etr. Pitersb. tv. (1845) 312 -latisiliqua.
oblongata, *DC. Syst.* ii. 4S1.—Sibir.
orientals, Willd. Enum. Hort. Berol. U. 668 = aleppica.
pilosa, Schur, Enum. PL Trains. 73=tinctoria.
pinnata, *Forsk. Ft. Aegypt. Arab.* 121.—Arab,
platycarpa, *Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat.* (1843) 7.—Persia.
platycarpa, Jaub. *Be* Spach, Illnstr. iii. 81. t. 22 = latisiliqua.
platylooa, Link, ex Stead. Nom. ed. L 440 - lusitanica.
praecox, *Kit. ex Trait. Arch.* ii. 40. t. 68; *DC. Syst.* ii. 568.—Europ.
psilocarpa, Ledeb. Fl. Ross. i. 210=latisiliqua.
raphanifolia, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 19.—Persia,
reticulata, *C. A. Mey. in Beitr. Pfi. Rust. Reich,* vi. 62.—Reg. Cancas.
rostellata, Bertol. Fl. Ital. vi. 615-tinctoria.
rugulosa, *Bunge, ex Boiss. Fl. Orient,* i. 384.—Persia,
sabulosa, *Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i.* 212.—Transcanc.
sibirica, Trautv. in *tiim.* Sav. Etr. Petersb. iv. (1846) 805=lasiocarpa.
songarica, Schrenk, In Bull. Phys.-Math. Acad. Peterab. iii. (1845) 309=iberica.
spartioides, Edgew. ex Honk. f. *Sc* Thorns, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 179 = Dipterygium glancum.
Steveniana, Trautv. in Mem. Sav. Etr. Pitersb. iv. (18i5) 309-psilocarpa.
Stocksii, *Boiss. Fl. Orient, i.* 376.—Belnchist.
suberosa, *Caern. ex Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) n. 810.—Bessarab.
subradiata, *Rupr. Fl. Cauc.* 131, in textu.—Rec. Caucas.
suffrutescens, Boiss. in Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient, i. 379-frigida.

ISATIB:-
taurica, Bieb. Fl. Taur. Cane iil. 422 -ttoctoiia. *a* tinctoria. *Linn. Sp. PI.* 670.—Enrop.; Oriens.
tomentella, Boiss. & Bal. Diagn. Sir. II. v. 46 •= tinctoria.
trachycarpa, *Trautv. in Act. Wort. Petrop.* ix. (1884) 870.—Turkest.
undulata, *Auck. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. II. xvii. (1842) 200.—As. Min.
velleri/era, Boiss. & Noė, Diagn. Ser. II. i. 46 - Aucheri.
velutina, *Boiss. V Huet, I. c.* v. 45.—As. Min.
Villarsii, *Gaud. Syn. Fl. Helv.* 626.—Helvet.
violascens, *Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga,* i. (1847) 166.—Turkest.; Persia.
virens, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xzii. (1875) 54, nomeir=tinctoria.

ISAURA, Comm. ex Foir. Encyc. Suppl. iii. 185 (1818) -Stephanotis, Thou. (Asclep.).
alliacea, Steud. Nom. ed. II. i. 824 ^S. Isaura.
allicia, Comm. ex I'oir. Encyc. Suppl. iii. 186 = S. floribunda.

ISAUXIS, Reichb. Nom. 210 (1841)=Vatioa, Linn. (Dipterocarp.).
cordifolia. Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 722 - V. cordifolia.
Roxburghiana, Thw. Ennm. Fl. Zeyl. 37 = V. affinis.

ISCHAEMOPOGON, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 560 (1864) -Ischaemum, Linn. (Gramin.).
arcuatus, Griseb. 1. c. (Spodiopogonis sp.).—Ind. occ.
latifolius, Griseb. 1. c. = Ischaemum latifolium.

ISCHAEMUM, Linn. Gen. ed. II. 625(1742). *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 1132.
COLLADOA, Cav. Ic. v. 37. t. 480 (1799).
HOLOGAMIUM, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. viii. (Jan. 1835) 185.
ISCHAEMOPOGON, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 560 (1864).
MEOSCHIUM, Beauv. Agrost. iii. t. 21 (1812).
SCHOUNANTHUS, Adans. Fam. ii. 38 (1763).
SEHIMA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 (1775).
aculeatum, Herb. Linn, ex Munro, in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 64-Crypsis aculeata.
antephoroides, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 193.—Japon.
aristatum, *Linn. Sp. PL* 1049.—Ind. or.; China.
aristatum, Thunb. Prod. PI. Cap. 21-filiforme.
aristatum, W'illd. Sp. PI. iv. 939; Roxb. Hort. Beng. 8; Fl.Ind. i.S19=ciliare.
arundinaceum, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 619.—Austral.
auritum, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 361 = Rottboellia aurita.
australe, *X. Br. Prod.* 206.—Austral.
barbatum. Baker, Fl. Manrit. 447 = fasciculatuim.
barbatum, Miq. in Ann. Mug. Bot. Lugd. Bat. iii. 193 = antephoroides.
barbatum, Retz. Obs. vi. 85 = aristatum.
binatnm, *Buese, ex De Vriese, PI. Ind. Bat. Reinm.* 103.—Ins. Solor.
ciliare, *Ret; Obs.* vi. 86.—As. et Austral, trop.
Colladoa, Spreng. Syst. i. 298=rngosum.
commntatum, *Hack, ex Trimen, Cat. PI. Ceyl.* 107.—Zeyl.
conjugatnm, *Roxb. Hort. Beng.* 8; *Fl. Ind.* i. 321.—Ind. or.
corollatum, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 869.—Reg. ,Himal.
crinitum, Trin. in Mdm. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 298 = Pogonatherum saccharoideum.
cuspidatum, Roxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 824 = Vossia procera.
decumbens, *Benth. Fl. Austral,* vii. 521.—Austral,
digitatum, *Brongn. in Duperr. Voy. Cog. Bot.* 70. t. IS.—Ins. Molucc.
falcatum, *Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram.* 369.—China,
fasciculatum, *Brongn. in Duperr. Voy. Cog. Bot.* 78.—Ins. Maurit.
filiforme, *Willd. Sp. PI.* iv. 940.—Afr. austr.
fragile, *R. Br. Prod.* 206.—Austral.
geniculatum, Roxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 322 = aristatum.
gibbum, Trin. in Mém. Acad. P&ersb. Sér. VI. ii. (1833) 295 = aristatum.

ISCHAEMUM :—
glabratum, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 328 - muticum.
glabrum, Walt. Fl. Carol. 249 - Tripsacum dactyloides.
guianense, *Kunth, Rév. Gram.* i. 168.—Guian.
hirsutum, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 361 = Rottboellia hirsuta.
hirsutum, *Spreng. Syst.* i. 298.—Bras,
birtinodes, *Munro, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 111, nomen.—Afghan.
hispidum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 194- Arundinella brasiliensis.
imberbe, Retz. Obs. vi. 35 = aristatum.
importunum, *Lour. Fl. Cochinch.* 646.—Cochinch.
inscalptum, HochsL ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 472 = laxum.
intermedium, *Brongn. in Duperr. Voy. Cog. Sot.* 73.—Ins. Carolin.
involutum, Forst. f. Prod. 78 = Thuarea involuta.
involutum, Labill. ex Kunth, Enum. PI. i. 512 = muticum.
Kotschyi, Hochst. in Flora, xxyii. (1844) 247•'laxum.
latifolium, *Kunth, Rév. Gram.* i. 168.—Am. trop.
latifolium, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 291 = Rottboellia latifolia.
laxum, *R. Br. Prod.* 205.—Geront. trop.
leersioides, *Munro, in Proc. Am. Acad.* iv. (1864-65) 363.—China; Calif.
macrostachyum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 472 = laxum.
mustrucatum, Trin. in Mém. Acad. P&ersb. Sér. VI. ii. (1883) 298 = Rottboellia hirsuta.
melicoides, Koen. ex Willd. Sp. PI. iv. 941-Enteropogon melicoides.
Meyenianum, Steud. Nom. ed. II. i. 824 = aristatum.
minus, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 329 = Urvilleanum.
murinum, *Forst. f. Prod.* 73.—Ind. or.; Ins. Tanna.
muticum, *Linn. Sp. PI.* 1049.—Ind. or.; Austral.; Ins. Pacif.
Myurus, Linn, ex Munro, in Journ. Linn. Soc. vi (1862) 54 = Manisuris Myurus.
nervosum, Thw. Enum. PI. Zeyl. 865=laxum.
ophiuroides, *Munro, in Proc. Am. Acad.* iv. (1864) 863.—China.
paleaceum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 293 = Apocopis Royleana.
pallidum, Kunth, Enum. PI. L 515=ArundinelIa pallida.
paniceutn, Chauv. ex Steud. Syn. PI. Gram. 375 = intermedium,
pectinatum, *Trin. in Mém. Acdd. Pitersb.* Sér. VI. ii. (1833) 696.—Ind., or.; Austral.
peruvianum, Kunth, Enum. PI. i. S15(Arundinellae sp.).—Peruv.
pilosum, *Trimen, Cat. PI. Ceyl.* 107.—Zeylan.
polystachyum, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 328 = digitatum.
repens, Roxb. Hort Beng. 82; Fl. Ind. i. 823 = muticum.
rottboellioides, R. Br. Prod. 206 - Rottboellia ophiuroides.
Royleanum, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 498 = rugosum.
rugosum, *Salisb. Ic. Stirp. Rar.* 1.1. 1.—As. trop.
rugosum, Trin. in Spreng. Neue Entdetk. ii. 79; et in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 294- segetum.
scariosum, Walt. Fl. Carol. 249 (Planta dubia).—Am. bor.
scrobiculatum, Wight & Am. ex Steud. Syn. PI. Gram. 873 = ciliare.
secundatum, Walt. Fl. Carol. 249 = Stenotaphrum glabrum.
segetum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1838) 294=rugosum.
Sehima, Spreng. Syst. i. 298 = laxum.
semisagittatum, *Roxb. Hort. Beng.* 8; *Fl. Ind.* i. 320.—Ind. or.
Sieboldii, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 291.—China; Japon.
speciosum, Nees, ex Steud. Syn. PI. Gram. 876 (Rottboelliae sp.).—Ind. or.
tenellum, Roxb. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. i. 823- riliare.
timorense, Kunth, Rév. Gram. i. 369. t 98-Spodiopogon Byronis.
triticeum, *R. Br. Prod.* 205.—Austral.

ISCHAEMUM :—
truncatiglume, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* vii. 518.—Austral.
Urvilleanum, *Kunth, Rh. Gram.* i. 167.—Bras'.
villosum, R. Br. Prod. 205=australe.
zeylanicum, *Hack, ex Trimen, Cat. PI. Ceyl.* 107.—Zeylan.
Zollingeri, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 499-Andropogon Zollingeri.

ISCH ALEON, Ehrh. Beitr. IT. 147 (1789) -Miorocala, Hoffmgg. & Link (Gentian.).

ISCH ARUM, Blnme, Rumphia, i. 144. t. 29 (1835) = Biarum, Schott (Aroid.).
alexandrinum, Schott, Syn. Aroid. 8 = B. Olivieri.
angustatum, Hook. f. Bot. Mag. t. 6355 = B. angustatum.
Bovei, Schott, Syn. Aroid. 7 = B. Bovei.
Carsaami, Schott, Prod. Aroid. 67 = B. Bovei.
crispulum, Schott, 1. c. 68-B. Bovei.
dispar, Schott, Syn. Aroid. i. 7-B. Bovei.
eximium, Schott *Sc* Kotschy, in Oestr. Bot Wochenbl. (1854) 81 = B. eximium.
Fraasianum, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1809) 98 = B. Fraasianum.
Haenseleri, Schott, Syn. Aroid. 8 = B. Haenseleri.
Homaid, Schott, 1. c. = B. Russellianum.
Kotschyi, Schott, 1. c. 7 = B. Bovei.
Lehmanni, Schott, 1. c. — Helicophyllum Lehmanni.
robile, Schott, Prod. Aroid. 66 = B. Pyrami.
Olivieri, Schott, Syn. Aroid. 8 = B. Olivieri.
Pyrami, Schott, Prod. Aroid. 66 = B. PyramL
Spruneri, Schott, Syn. Aroid. 7 = B. Spruneri.

ISCHINA, Walp. Rep. vi. 620 (1847)=ISCHNIA, DC. =Tamonea, Aubl. (Verbenac).

ISCHNANTHUS. Roem. & Schult. Syst iL 28, 497 (1817)=IetananthUB, Beauv. (Gramin.).

ISCHNIA, DC. ex Meissn. Gen. 298 [206] (1840); et Prod. ix. 257 (1845)=Tamonea, Aubl. (Verbenac).
verbenacea, DC. Prod. ix. 257.—Mexic.

ISCHNOSIPHON, Koem. in Nouv. Mta. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 316. t. 10, 11. *SCITAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 649.
HYMENOCHAMS, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 276, nomen prius.
affinis, Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxxv. (1862) I. 82 = 1. Parkeri.
Arouma, *Koern. in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xi. (1859) 848.—Am. trop.
'bambusacea, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) I. 94; *Horan. Prod. Scitam.* 11.—Peruv.
densiflorus, *Koern. 1. c.* 89.—Bras,
gracilis, *Koern. 1. c.* 94.—Am. trop.
guianensis, *Koern. 1. c.* 87.—Guian.
laxus, *Koern. I. c.* 85.—Bras,
leucophoeus, *Koern. in Nouv. Mim. Soc. Nat. Mosc.* xi. (1859) 1.10,11.—Bras,
obliquus, *Koern. 1. c.* 341.—Guian.
orbiculatus, *Koern. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv. (1862) I. 95.—Bras,
ovatus, *Koern. 1. c.* 90.—Bras.
Parkeri, *Koern. 1. c.* 81.—N. Granat.
plurispicatus, *Koern. I. c.* 83.—Bras,
polyphyllus, *Koern. I. c.* 93; *Horan. Prod. Scitam.* 11. , —Bras.
rotundifolius, *Koern. 1. e.* 95; *Horan. I. c.*—Peruv.
Seubertianuus, Koern. 1. c. 86—laxus.
spicatus, *Koern. 1. c.* 83.—Guian.
surinamensis, *Koern. 1. c.* 93.—Guian.

ISCHNURUS, Balf. f. in Proc Koy. Soc. Edinb. xii. (1884) 98. *GRAMINEAE.*
pulchellus, *Balf.f. I. c*—Ins. Socotr.

ISCHUROCHLOA, Buese, in Miq. PI. Jungh. 389 (1851-56) = Bambusa, Schreb. (Gramin.).
floribunda, Buese, 1. c. 890 =B. nana.
spinosa, Buese, 1. c = B. Blumeana.

ISCHYRANTHERA, Steud. ex Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xvi. (1851) 102 = Belluoia, Neck. (Melast).
laevigata, Steud. ex Naud. 1. c.=B. Aubletii.

ISCHYROLEPIS, Steud. in Flora, xxiii. (1850) 229, nomen ; Syn. Fl. Cyp. 349 (1855) - Restio, Lion.
subvtrtidllata, Steud. 11. cc.=R. subverticiUatus.

ISEILEMA, Anders». in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser. III. ii. (1866) 250=Anthlsttria, Linn. (Gramin.).
arguta, Andnss. I. c. 2A2 = A. argnta.
Mitckellii, Andeiss. 1. c. - A. membranacea.
prostrata, Anderss. 1. c. 261=A. prostrata.
Wightii, Andeiss. 1. c. = A. prostrata.

ISERTA, Batsch, Tabul. 285 (1802)-seq.

ISERTIA, Schreb. Gen. 284 (1789). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 66.
BRIGNOLIA, DC. Prod. iv. 444 (18S0).
BRUINSMANIA, Miq. in Linnaea, xvii. (1888) 72.
PHOSANTHUS, Rafin. in Ann. Sc Gen. vi. (1820) 82.
brevifiora, *Mart, ex Steud. Norn.* ed. IL i. 828 (Qnid!). —Bras.
coccinea, Bartl. ex DC. Prod. iv. 437 = Haenkeana.
coccinea, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 27.—Guian.
eommutata, Miq. Stirp. Snrin. Sel. 172=spicaeformis.
flava, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 613.—Guian.
Haenkeana, *DC. Prod.* iv. 437.—Mexic.
hypoleuca. *Benth. in Hook. Journ. Bot.* Ui. (1841) 220. —Guian.
parviflora, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 28. t. 16.—Ins. Trinit.
spicaefonnis, *DC. Prod.* iv. 437.—Guian.

ISEXINA, Rafin. Sylva Tellur. 112 (1838) = Cleome, Linn. (Capparid.).
aurea, Rafin. 1. c.=C. lntea, *E. Mey.*

ISGARUM, Rafin. Fl. TeUur. iii. 46 (J8S8)-=SalSola? Linn. (' eerie non Salsolacea' Moq. in DC. Prod. xiii. 1.192).
didymum, Rafin. 1. c.—Hab. t

ISI AS, De Not. in Mem. Ace. Sc. Torin. Set! II. vi. (1844) 413 = Serapias, Linn. (Orchid.).
triloba, De Not. L c.=S. neglecta.

ISICA, Moench, Meth. 604 (1794) - EIKA, Adans.= Iionicera, Linn. (Caprifol.).

ISIDOKEA, A. Rich, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 284. t 25. *RUBIACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 46.
amoena, *A. Rich. I. c*—Ind. occ.

ISIDROGALVIA, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. iii. 69. t. 302 (1802)-Tofleldia, Huds. (Liliac.).
borealis, Steud. Nom. ed. L 839, in syn. =T. palustns.
calyculata, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 69, in obs.= T. calyeulata.
falcata, Ruiz *Sc* Pav. 1. e. =T. falcata.
guyanensis, Klotzsch, in Schomb. Faun. *Sc* Fl. Gui. 1065, nomen.—Guian.
Moritaiana, Klotrach, ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvii. (1879) 189 - T. falcata.

ISIKA, Adans. Fam. U. 601 (1763)=Lonfcera, Linn.
JS^Borck. Forst Bot. ii. II. 1682-L alpigena.
coerulea, Media Phil. Bot i. 126=L. caerulea.
lucida, Moench, Meth. 804 = L. alpigena.

ISIPHIA, Rafin. Med. Fl. ii. 232 (1830) ~ Artetoloehia, Linn.
glatra, Rafin. 1. c. = A. Sipho.
tomentosa, Rafin. 1. t - A. tomentosa.
tripteris, Rafin. 1. c.=A. triptens.

ISIS, Tratt. Arch. Gew. n. 668 (1812)=Iris, Toum.
nmbriata, Tratt. 1. c = Iris japoniea.
Julva, Tratt. 1. c. n. 669 - Iris fulva.
ruthenica, Tratt. 1. c. 670 = Ins rutheniea.

ISMARIA, Rafin. Sylva Tellur. 117 (1838) - Brickellia, Ell. (Compos.).
glandulosa, Rafin. 1. c.—Hab. J

ISMELIA, Cass. in Diet. Sc. Nat. xlL 40 (1826) = ^S^^Tp-TrWeb.&Phyt Canar. ii. 274 = C. Broossonetii.
carinata, Sch. Bip. 1. c. 271 = C. cannatun^
coronopifolia, Seh. Bip. 1. c. 272. t. 92-C. coronopifolium, *Mas/.*

ISMELIA.—
frutescens, Less. Syn. Comp. 255 = Phymaspermnm carnosulum.
madtrensis, D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. N. S. t. 842 = Chrysanthemum pinnatifidum.
nodosa, Less. Syn. Comp. 255 = C. nodosum.
versicolor, Cass. in Diet. Sc. Nat. xli. 40=C. carinatum.

ISMENE, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 342 = Hymenocallia, Salisb. (Amaryll.).
Amancaes, Herb. App. 48 = H. Amancaes.
Andreana. Baker, in Gard. Chron. (1884) I. 11 = II. Andreana.
calathi/ormis, M. Roem. Syn. Ensat. 186 = H. calathina.
calathina, Herb. App. 46 = H. calathina.
crinifolia, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 342 = H. Amancaes.
deflexa. Herb, in Bot. Reg. (1839) Misc. 88.—Peruv.
integra, M. Roem. Syn. Ensat. 186 = H. Amancaes.
Knightii, Knowles & Westc. Flor. Cab. ii. (1838) 51 = H. lacera.
Macleana, Herb, ex Hook, in Bot. Mag. t 3675 = H. Macleana.
narcissiflora, M. Roem. Syn. Ensat. 186 = H. lacera.
nutans, Herb. App. 46 » Pancratium nutans.
pedunculatum, Herb. Amaryll. 222. t. 35. f. 2 •= H. Macleana.
Tagliabuei, M. Roem. Syn. Ensat 186 = H. calathina.
tenuifolia. Baker, in Hook. Bot. Mag. t. 6397 = H. qnitoënsis.
viresams, Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 12 = H. Macleana.

ISNARDA, St. Lag. in Ann. Soe. Bot. Lyon, viii. (1881) 176=seq.

ISNARDIA, Linn. Gen. ed. I. 387 (1737) = Ludwigia, Linn. (Onagrar.).
alata, DC. Prod. iii. 61=L. alata.
alternifotia, DC. 1. c. 60 «=L. alternifolia.
ascendent. Hall, ex Eaton & Wright, Man. ed. VIII. 283 = L. palustris.
aurantiaca, DC. Prod. iii. 61 - L. alternifolia.
capitata, DC. 1. c. 60 = L. capitata.
cylindrica, DC. 1. c.-L. cylindrica.
discolor, Klotzsch, in Peters, Kcise Mossamb. Bot 70. —Afr. trop.
hastata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 66. t. 85. f. 6 = Ammania latifolia.
hirsuta, DC. Prod. iii. 60 = L. pilosa.
hirsuta. Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 26-L. hirtella.
hirsuta, Roem. & Schult. Syt iii. 477 = L. pilosa, hirtella.
lanceolata, DC. Prod. iii. 61=L. microcarpa.
linearis, DC. 1. c 60 = L. lincaris.
microcarpa, Hook. & Am. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 26-L. alata.
microcarpa, Poir. Encyc. Suppl. iii. 188= L. microcarpa.
mollis, Poir. 1. c.; DC. Prod. iii. 60 - L. pilosa.
multifiora, Guill. & Perr, Fl. Seneg. Tent. i. 296 = L. parviflora.
nitida, Poir. Encyc. Suppl. iii. 188 = L. palustris.
palustris. Linn. Sp. PI. 120 - L. palustris.
palustris, Luce, Fl. Osil. 38=Hippuris vulgaris.
pedunculosa, DC. Prod. iii. 60 = L. arcuata.
ramosa, DC. I.e. 61 = L. ramosa.
repens, DC. 1. c. 60-L. repens.
sphaerocarpa, DC. L c. 61 = L. sphaeroearpa.
stricta, Griseb. Cat. PI. Cub. 107.—Cuba.
subhastata, Ruiz *Sc* Fav. Fl. Per. i. 68-Ammannia latifolia.
trifolia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 188-trifolia.
virgata, DC. Prod. iii. 60=L. virgata.

ISOCABPHA, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1816) 110. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. *I* ii. 366.
DUNANTIA, DC. Prod. v. 626 (1836).
alternifolia, Cass. in Diet. Sc. Nat xxiv. 18=striplicifolia.
Amellus, Spreng. ex DC. Prod. v. 493=Salmia Eupatoria.
angustata, *Griseb. ft. Brit. IV. Ind.* 370.—Ind. occ.
atriplicifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1816) 110.—Am. austr.
Berterii, Balb. ex DC. Prod. v. 140 « Eupatorium Dalea.

ISOCABPHA:—
Bilbergiana, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 405.—Am. auslr.
divaricate, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 110. t 41.—Ecuador.
tchioides, Less, in Linnaea, v. (1830) 141. t 2 = Ageratum echiciides.
eupatoriaides, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. v. (1846) 456 - Trichogonia salviaefolia.
fastigiata, Gardn. 1. c. 455 = Alomia fastigiata.
foliosa, Gardn. 1. c. 457 = Alomia foliosa.
Kunthii, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxiv. 19=Spilanthes leucantha.
oppositifolia, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* xii. (1816) 110.—Ind. occ.
Pyrethraria, Cass. in Diet. Sc. Nat xxvi. 280=Cotuia Pyrethraria.
tricephalm, Cass. I. c. in nota = oppositifolia.

ISOCHILOS, Spreng. Syst. iii. 734 (1826)= seq.

ISOCHHiTTS, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 209 (1813). *ORCHIDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. S27.
LEPTOTHRIUM, Kunth, in ft. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 340 (1815).
camobiflorus, *Lindl. in Gard. Chron.* (1846); *ex Reichb. /. in Walp. Ann.* vi. 448.—Mexic.
cernuus, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. x. (1842) 184 = Epidcndrum Kaiwinskii.
crassiflorus, *Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat. Sit.* HI. iii. (1845) 22.—Mexic.
dubius, A. Rich. & Gal. 1. c. 23=Scaphyglottis dubia.
elegans, Focke, in Tijdschr. Natuurk. Welensch. iv. (1851) 68 -= Epidendrum stenopetalum.
fusiformis, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 113.—Ins. Trinit.
globosus, Lindl. I. c. 112 = Epidendrum globosum.
graminifolius, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* i. 340. t. 78.—N. Granat
graminoides, Hook. Exot. Fl. t. 196=Dichaea graminoides.
grandiflorum, *Lindl. Bot. Reg.* (1841) sub t. 1.—Peruv.
lancifolius, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 113.—Ecuador,
latibracteatus, *A. Rich. V Gal. in Ann. Sc. Nat. Sir.* III. iii. (1845) 22.-Mexic.
leucanthus, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 47.—Bras,
linearis, *R. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. v. 209.—Ind. occ.
linifolius, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 113.—Pcruv.
lividus, Lindl. Bot. Keg. (1639) Misc. 36 = Scaphyglottis dubia.
major, *Cham. V Schlecht. in Linnaea,* vi. (1831) 60.—Mexic.
proli/erum, R. Br. in AitvHort. Kcw. ed. II. v. 209 a Ponera prolifera.
ramosus, *focke, in Tijdschr. Natuurk. Wetensch.* iv. (1851) 69.—Guian.
ramosus, Spreng. Syst. iii. 734 - Epidendrum ramosum.
teretifolius, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 112 =- Epidendrum teretifolium.

ISOCHORI8TE, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 822 (1856). *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1102.
africana, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 30'J.—Afr. trop.
javanica, *Miq. Fl. Ind. Bat.* il. 822.—Java.

ISOCOMA, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 320~Bigelovia, Nutt. (Compos.).
vernonioidrs, Nutt. 1. c. = B. veneta.

ISODECA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 88 (18S8)=Iieuoas, Burm. (Labiat.).
flaccida, Rafin. 1. c ° L , flaedda.

I80DENDRI0N, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ii. (185'2) 324. *VIOLARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 118.
lanrifolium, *A. Gray, 1. e.*—Ins. Sandvic.
longifolium, *A. Gray, I. c.*—Ins. Sandvic.
pyrifclium, *A. Gray, 1. c.*—Ins. Sandvic.

ISODESMIA, Gardn. in Hook. Lond. Jonrn. Bot. ii. (1843) 389. *LEGVMINOSAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 614.
Blanchetiana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. I. 71.—Bras.
tomentosa, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1643) 339.-Bras.

ISODON, Schrad. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 40 (1832) -PleotranthuB, L'Hérit. (Labiat.).
plectranthoides, Schrad. ex Benth. 1. c. 43-P. rugosus.

JSOETES *lacustris,* Weig. Obs. Bot. (1772) 36. t. 2. f. 7 -Juncus bufonius.

ISOfiTOPSIS, Tnrcz. in Ball. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) I. 171. *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 432.
graminifolia, *Turce. I. c.* 176.—Austral.

ISOaiiOSSA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 155. *ACANTHACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1111.
ECTEINANTHUS, T. Anders, in Tonm. Linn. Soc. vii. (1863) 45.
ugusta, *Benth. (f Hoot. f. Gen.* ii. 1111; *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. 1.1885) 480.—Madag.
barlerioides, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xv. (1877) 70.—Afr. trop.
ciliata, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 165. t. 5.—Afr. austr.
gracillima, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 430.—Madag.
justicioides, *Baker, I. c.* xx. (1883) 221.—Madag.
MeUeri, *Baker, I. (.* xxi. (1885) 431.—Madag.
Rutenbergiana, *Vatke, in Bremen, Abk.* ix. (1885) 133.—Madag.

ISOLEPIS, K. Br. Prod. 221 (1810) - Scirpus, Linn. (Cyperac.).
acaulis, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral, vii. 324 = S. humillimus.
acaulis, Phil, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 440=S. acaulis.
acicularis, Schlecht Fl. Berol. i. 86 = Eleocharis acicularis.
acrostachya, A. Dietr. Sp. PI. ii. 116 = Kicinia composita.
acugnana, Schnlt. Mant. ii. 532 =S. Thouarsianus.
acuminata, A. Dietr. Sp. PL ii. 103 = Ficinia acuminala.
albescens, E. Desv. in C. Gay, Fl. Chi), vi. 188 = S. inundatus.
albescens, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 226 (Rynchosporae sp.).—Bras.
allochroa, Steud. Syn. PI. Cyp. 81 = Eleocharis atropurpurea.
alpina, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 86. t. 148 =S. Gunnii.
ambigua, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 (Bulbostylidis sp.).—Am. trop.
ambigua, Steud. Syn. PI. (Cyp. 61 = Eleocharis Chaetaria.
ambigua, Zoll. Syst. Verz. Ind. Aich.ii. 62 = S. snpinus.
anaachillensis, Stead. Syn. PI. Cyp. 94=S. inundatus.
anceps, A. Dietr. Sp. PI. ii. 125 = Fimbristylis complanata.
angularis. Schrad. ex Schult. Mant. ii. 69 = Fimbristylis qninquangularis.
antarctica, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 505; viii. (1883) 88; x. (1836) 162 = S. diabolicus.
antarctica, Roem. & Schnlt. Syst. ii. 112 = S. antarcticus.
aphylla, Boeck. in Flora, xli. (1858) 417 - Eleocharis Jbida.
aquatilis, Knnth, Enum. PI. ii. 216—S. tenuissimus.
arcuata, Eckl. ex Knnth, 1. c. 254 = Ficinia lateralis.
arenaria, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 (Bnlbostylidis sp.).—Am. trop.
aristata, Presl, Delic. Prag. 144=S. pangens.
armerioidfs, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 310 (Fimbristylidis sp.).—Ins. Banca.
articulate, Nees, in Wight, Contrib. 108 =S. articulatus.
Ascolepis, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 501 = Ascolepis eriocanloides.
asperiuscula, Kunth, Ennm. PI. ii. 212=seq.
asperula, H. R & K. Nov. Gen. et Sp. i. 221 (Bulbostylidis sp.).—Am. trop.
atacamensis, Phil. Fl. Atac. 53=S. atacamensis.
atropurpurea, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 495 .= S. tenuis.
atropurpurea, Roem. & Schult. Syst. ii. 106 = Eleocharis atropurpurea.
aucklandica, Hook. f. Fl. Antarct 88. t. 50 - S. aucklandicus.

ISOLEPIS:—
australis, Roem. & Schult. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 21-= S. Holoschoenus.
autumnalis, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 189-Fimbristylis autumnalis,
barbata, R. Br. Prod. 222 (Bulbostylidis sp.).—Geront. trop,
basilaris. Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 802 - S. basilaris.
bellula, Steud. Syn. PI. Cyp. 318 = S. Isolepis.
Bergiana, Schult. Mant. ii. 532-S. antarcticus.
Berlandieri, Steud. Syn. PI. Cyp. 103 (Bulbostylidis sp.).—Mexic.
Beyrichii, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 88 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
bicolor, Carmich. in Trans. Linn. SocxiL (1819) 503 = S. Thouarsianus.
bicolor, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291; x. (1836) 148 =»S. venustulus.
bispicata, Schult. Mant. ii. 61= Fimbristylis schoenoides.
bivalvis, Steud. Syn. PI. Cyp. 101 (Fimbristylidis sp.). —Bras.
Boeckeleri, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1876) 167 -Mariscuscoloratus.
brachyphylla, J. & C. Presl, Rel. Haenk. L 187=S. cernuus.
brachyphylla, Schult. Mant. ii. 64 - Fimbristylis capillaris.
breviculmis, Kunth, Enum. PI. ii. 207 (Bulbostylidis sp.).—Afr. austr.
brevifolia, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 351 = S. cernuus.
brevis, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 180 = S. cernuus.
bu/onia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 222-Fimbristylis capillaris.
bulbosa, Nees, in Linnaea, vii. (1834) 607-Ficinia bulbosa.
caespitula, Licbm. in Vidensk. Skr. V. ii. (1851) 237 = S. micranthus.
capillaris, Roem. & Schult Syst. ii. 118 - Fimbristylis barbata.
carinata, Hook. & Am. ex Ton. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 349 - S. carinatus.
Carmichaelii, A. Dietr. Sp. PI. ii. 107-S. snlcatus.
cartiliginea, R. Br. Prod. 222 =S. antarcticus.
cernua, Roem. & Schult. Syst. ii. 106 - S. cemuus.
chaetodes. Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 138 = S. cemuus.
Morostachya, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 = S. cernuus.
chrysocarpa, Nees, 1. c. vii. (1882) 499 =S. antarcticus.
ciliata, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 188 (Bulbostylidis sp.).—Am. trop.
ciliatifolia, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 350 . {Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
ciliifolia, Steud. Syn. PI. Cyp. 99 (Bulbostylidis sp.).— Guiana.
cinnamometorum, Roem. & Schult. Syst. ii. 119-Fimbristylis cyperoides.
circinnata, Kunth, Enum. PL ii. 214 (Bulbostylidis sp.). —Bras.
coarctata, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 102 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
cochleata, Steud. Syn. PI. Cyp. 100 - Fimbiistylis setacea.
collina, Kunth, Enum. PL ii. 208 (Bulbostylidis sp.).— Afr. austr.
commutata, Nees, in Linnaea, x. (1836) 161 = Ficinia commntata.
complanata, Roem. & Schult Syst. ii. 119 = Fimbristylis complanata.
compressa, Nees, in Linnaea, x. (1836) 157=S. Neesii.
Conceptions, Steud. Syn. PL Cyp. 94 = S. inundatus.
congesta, Schrad. ex Schult Mant ii. 70 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
congrua, Nees, inLehm. PL Preiss. ii. 75 = S. cemuus.
conifera, Kunth, Enum. PL ii. 206 (Bulbostylidis sp.). —Guian.
conostachya, Boeck. in Flora, xli. (1868) 697 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
consanguinea, Kunth, Enum. PL ii. 211 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
consodalis, Steud. Syn. PL Cyp. 818=Fimbristylis exilis.

ISOLEPIS:—
conspera, Nees, in Endl. Prod. FL Norf. 23=Scirpus inundatus.
controversa, Steud. Syn. PI. Cyp. 92=S. cernuus.
coronaria, Roem. & Schult. Syst ii. 113 = Cyperos leucocephalus.
corymbosa, J. & C. Presl, Reliq. Haenk. i. 188 (Rhyncosporae sp.).—Panama.
corymbosa, Roem. *Si* Schult. Syst ii. 110-S. corymbosus.
costata, Hochst. ex A. Rich. Tent. FL Abyss, ii. 499 - S. costatus.
crassiuscula, Hook. f. FL Tasm. ii. 86. t. 143=S. crassiuscuhis.
crinita, Schrad. ex Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 82 (Bulbostylidis sp.).—Am. trop.
Cumingii, Steud. Syn. PL Cyp. 101=Carex setifolia.
curvata, Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. ii. 62 = S. fluitans.
curvifolia, Schrad. in Schult. Mant. ii. 70 - Fimbristylis diphylla.
curvula, Kunth, Enum. PL ii 189 - S. fluitans.
cuspidata, A. Dietr. Sp. PL ii. 120-Fuirena Wallicniana.
cyperoides, R. Br. Prod. 222 - S. cyperoides.
decipiens, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291-S. paludicola.
densa, Schult. Mant. ii. 70 (Bulbostylidis sp.).—Reg. Himal.
depauperate, Link, Jahrb. i. III. 80 = Fimbristylis , diphylla.
deserticola, Phil. Fl. Atac. 68-S. semisubterraneus.
diabolica, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 21; A. Dietr. Sp. PLii. 116=S. diabolicus.
dichotoma, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 223-Fimbristylis diphylla.
dichroa, Steud. Syn. PL Cyp. 91= Eleocharis atropurpurea. »
digitata, Nees, ex Schrad. Anal. Cap. Cyp. 20 •= S. flaccifolius.
dioeca, Kunth, Enum. PI. ii. 199-S. dioecus.
dipsacea, Roem. & Schult Syst ii. 119 = Fimbristylis dipsacea.
dissoluta, Kunth, Enum. PL ii. 219-S. flaccifolius.
disticha, Boeck. in Flora, xU. (1858) 416.—Ins. S. Thomas.
divaricata, A. Dietr. Sp. PI. ii. 131-S. divaricatus.
Dregeana, Kunth, Enum. PL ii. 204 = S. Hystrix. ,
Drummondii, Torr. & Hook, ex Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 850 = Fimbrislylis anomala.
dubia, Kunth, Enum. PL ii. 216-S. flaccifolius.
dura, Zoll. & MOT. Syst. Verz. Zoll. 97 = Fimbristylis asperrima.
Echinidium, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 = S. incomtulus.
echinocephala, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1876) 167- S. cubensis.
echinulata, Kunth, Enum. PL ii. 205 - Cyperas aristatus.
Eckltmiana, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 506 = Ficinia paradoxa.
Eckloniana, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 16. t. 1. f. 3 =» S. verrucosulus.
Ecklonii, A. Dietr. Sp. PL ii. 116 = Ficinia Ecklonea.
Ehrenbergii, Otto, ex Sweet, Hort. Brit ed. II. 550 (Quid?).—Aegypt.
elachista, Schult. Mant. ii 61 =S. dipsacea ?
Elliotii, A. Dietr. Sp. PL ii. 131 = Fimbristylis diphylla.
elongata, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt i. 64 =S. pumilus.
erubescens, Steud. in Flora, xxv. (1842) 604 = S. cemuus.
erythronegma, Steud. Syn. PL Cyp. 96 = S. prolifer.
exigua. Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. S12 = Eleocharts acicularis.
exilis, H. B. &. K. Nov. Gen. et Sp. i. 224-Fimbristylis exilis.
exilis, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 = S. incomtulus.
expallescens, Kunth, Enum. PL ii. 196 - S. expallescens.
falcata, Roem. & Schult. Syst. ii. 118 - Fimbristylis junciformis.
fascicularis, Kunth, Enum. PL ii. 188 - S. Ludvigii.
fascicularis, Sieber, ex Kunth, 1. c. 209 (Bulbostylidis sp.).—Afr. trop.
ferruginea, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 27 - Fimbristylis ferruginea, *Hook. W Am.*

ISOLEPIS :—
festucoides, Kunth, Enum. PI. ii. 207 (Bnlbostylidis sp.).—Madag.
fibrosa, Nees, in Linnaea, ix. (1884) 292 - Fidnia tenuifolia.
ficinioides, Stend. Syn. PI. Cyp. 98 = Ficinia tenuifolia.
filamentosa, ,Roem. & Schult. Syst. ii. 118 (Bulbostylidis sp.).—Guinea.
filiformis, Roem. & Schult. 1. c. 106 = Eleocbaris lenuis.
fimbriaia, Schrad. ex Nees, in Mart. FL Bras. ii. I. 88 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
fisiulosa, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 50 = Sdrpns articulates.
fluitans, R. Br. Prod. 221 =&, fluitans.
foenicularis, Schrad. ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1869-70) 752 (Bulbostylidis sp.).—Abyss.
fontana, Steud. Syn. PI. Cyp. 97 - S. Holoschoenus.
funckii, Steud. 1. c. 91 (Bulbostylidis sp.).—Venezuela.
furcata, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 88 - S. cemuus.
fusca, Link, Jahrb. i. III. 79 (Bulbostylidis sp.).—Am. austr.
fuscata, Meyen, Seise, i. 447, nomen.—Peruv.
fuscata, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291=S. cemuus.
fuscescens, Steud. Syn. PI. Cyp. 92=S. nervosus.
fuscopurpurea, Steud. 1. c. 99-Eleocharis maculosa.
Gardneriana, Steud. 1. c 99 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
Gaudichaudiana, Kunth, Enum. PI. ii. 201 - S. inundatus.
Giraudyi, Steud. Syn. PL Cyp. 91 - S. fluitans.
glaucescens, Schrad. & Schult. Mant. ii. 68-Fimbnstylis squanosa.
globosa, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst iii. (1871) 211 = S. prolifer.
globulifera, Steud. Syn. PI. Cyp. 97 - S. Holoschoenus.
globulosa, Schult. Mant ii. 68 - Fimbrist;'lis globulosa.
glomerate, Schrad. ex Schult. Mant ii. 67 = Fimbnstylis spathacea.
gracilis, Nees, in Linnaea, x. (1886-36) 161-Ficinia Poiretii.
gracilis. Nees, in Wight, Contrib. 109 (Bulbostylidis sp.).—lnd. or.
gracilis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 438 = S. nodosus.
grandispica, Steud. Syn. PI. Cyp. 818 = S. maritimus.
Gunnii, Steud. 1. c. 94=S. Giinnii, inundatus.
Haenkei, J. & C. Presl, Rel. Haenk. 187 - Fimbnstylis spathacea.
hamulosa, Kunth, Enum. PI. ii. 204-S. bamulosus.
Hartmanni, Steud. Syn. PL Cyp. 100-Fimbnstyhs Vahlii.
hemisphaerica, A. Dietr. Sp. PL ii. 109=S. Isolepis.
heterolepis, Steud. Syn. PL Cyp. 93 - Carex Berteroana.
heteromorpha. Steud. 1. c. 100 - Eleocharis nodulosa.
heterophylla, Steud. in Flora, xxv. (1842) 603; et 1. e. 93=S. cernnus.
hirta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. I. 224-Fimbnstylis squarrosa.
hirtella, Schrad. ex Schult. Mant. n. 70 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
hispida, Steud. Syn. PI. Cyp. 104 (Bulbostylidis sp.).—Am• austr*
Holoschoenus, Melliss, St. Hel. 343-S. nodose.
Holoschoenus, Roem. & Schult Syst. u. 115 = S. Holoschoen s.
Hookeri, Nra,"ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 498=S. carinatus.
Hookeriana, Boeck. in Flora, xli. (1858) 418 .= &. ! ta ta.
*Hu*mbVldtii,* Roem. & Sehult. Syst >L 112 - S. mic thus.
kumil^ Kun, Euum. PI. ii. 207 (Bulbostylidis sp.).—Afr. austr.
Hystrix, Kunth, I.e. 204=S. Hystiw.
»W,Wa,Deme,FL Aeg}TtJltotr.50 = S , coiymbosus.
incomtula, Nees, in Linnaea. ». (1834) 291 = S. incomtuli
incurvata^ Ntn, in Wight, Contiib. 108-S. articnlatns.
intricate, Steud. Syn. PL Cyp. 318 = S. fluitans.
inundata, R. Br. Prod. 222-S. inundatus.
involuceliata, Steud. Syn. PL Cyp. 101 (Bulbostylid.s 232 (BulbostylidU sp.).—Am. austr.
juncoides, Miq. FL lnd. Bat. iii. 312-S. supinus.
JCochii, Steud. Syn. PI. Cyp. 98=S. cemuus.

ISOLEPIS :—
koilolepes, Steud. Syn. PL Cyp. 318-Sdrpus carinatus„
Krausei, Phil, in Linnaea, xxx. (1869-60) 203 = Sehoenus nitens.
Kunthiana, Steud. Syn. PL Cyp. 95 = S. incomtulus.
kyllingioides, A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 602 = S. kyllingioides.
Labillardieri, Steud. Syn. PI. Cyp. 96 (Bulbostylidis sp.).-N. Caled.
ladniata, Eckl. ex Kunth, Enum. PL ii. 256-Ficinia Ecklonea.
lanata, II. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 220. t. 68 (Bulbostylidis sp.).—Am. austr.
Langsdorffiana, Kunth, Enum. PL ii. 214 (Bulbostylidis sp.).—Bras.; Peruv.
latifolia, A. Dietr. Sp. PL ii. 182 - Pleurostachys elegans.
lenticularis, R. Br. Prod. 222 = S. lenticularis.
lepida, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291, nomen.—Hab. ?
leptalea, Schult. Mant. ii. 62 = S. cernnus.
leptocaulis, Torr. in Faci£ RaiL Rep. iv. 153 = S. cemuus.
leptos, Steud. Syn. PL Cyp. 91^S. nanus.
leptostachya, Kunth, Enum. PI. ii. 190 - S. leptostachyus.
Lereschii, Shuttlw. ex Parl. FL Ital. ii. 68-Eleocharis atropurpurea.
leucostachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 220 (Bulbostylidis sp.).—Am. trop.
Lichtensteiniana, Kunth, Enum. PL ii. 207 (Bulbostylidis sp.).—Ins. S. Helena.
lituata, Nees, in Linnaea, x. (1886) 160 = Ficinia gracilis.
lineata, Roem. & Schult. Syst. ii. 117=S. lineatus.
longifolia, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291, nomen.—Hab. I
longifolia, Steud. Syn. PL Cyp. 90 = Eleocharis acicularis.
longispica, Steud. I. c. 104 (Fimbristylidis sp.).—Hab. t
Ludmigii, Kunth, Enum. PL ii. 189 = S. Ladwigii.
lupulina, Nees, in Wight, Contrib. 107=S. quinquefarius.
magellanica, Gaudicb. in Freyc. Voy. Bot. 414 - S. cemuus.
margaritifera, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 46 = Sehoenus apogon.
marginata, A. Eietr. Sp.Pl. ii 110 = Ficinia filiformis.
Martiana, Schrad. ex Nees, in Mart Fl. Bras. ii. I. 84 (Bulbostylidis rp.).—Bras.
Martii, Roem. & Schult Syst. ii. 117 - Cladium germanicum.
maxima, A. Dietr. Sp. PL ii. 180 = S. grossus.
megapotamica, A. Dietr. 1. r> 132^Pycreus raegapotamicus.
membranacea, Nees, in Linnaea, x. (1836) 159 = S. membranaceus.
me'.uniha, Nees, 1. c. ix. (1834) 2'Jl-S. supinus.
Meyeniana, Nees, 1. c. xi. (1637) 2!il-S. cemuus.
Micheliana, Roem. & Schult. Syst ii. Ill - S. Michelianus.
micrantha, Roem. & Schult. 1. c 110 = S. micranthus.
microcarpa, Nees, in Linnaea, x. (1886) 150 - S. cernuus.
miliaceg, J. *St.* C. Presl, Rel. Haenk. L 188-Fimbri. stylis miliacea.
Minaae, Parl. Giorn. Bot. Ital. ii. I. (1846) 146 - S. cernuus.
minima, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2068 =S. Isolepis.
modesta, Phil, in Linnaea, xxix. (1867-58) 79 - S. eemuus.
monandra. Link, Jahrb. i. HI. 78, innota=-S. setaceus.
mmocephala, Steud. Syn. PL Cyp. 97 - Ficinia brevifolia.
monostachya, Spreng. Neue Entdeck. iii. ll = Fimbristylis schoenoides.
mucronata, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 173-S. mucronatus.
Muehlenbergii, A. Dietr. Sp. PL ii. 106 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
multicaulis, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 562-S. cernuus.
mullinervosa, Boeck. in Flora, xli. (1858) 418-S. inundatus.
nana, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 79=S. inuudfttus,
natans, A. DieU. Sp. PL ii. 106 - S. livularls.

ISOLEPIS:—
nervosa, Hochst. ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 499 • Scirpus nervosus.
nigrescens, Steud. Syn. PL Cyp. 91 - Eleocharis nigrescens.
nigricans, H. B. *It* K. Nov. Gen. et Sp. i. 220 - S. inundatus.
nitens, Roem. & Schult. Syst. ii. 117 = Rynchospora nitens.
nodosa, R. Br. Prod. 221 - S. nodosus.
notata, Nees, in Lehm. PL Preiss. it 74 ->S. antarcticus.
nudipes, Kunth, Enum. PL ii. 206= Eleocbaris grandis.
numidiana, Roem. & Schult. Syst ii. 110 - S. cernuus.
ebtusi/olia, Roem. & Schult 1. c. 118-Fimbrtatylis obtusifolia.
oligantha, A. Dietr. Sp. PL ii. 108 - Ficinia filiformis.
oligantha, C. A. Mey. in Mem. Sav. Etr. Pttersb. i. (1881) 197 » S. pumilus.
oryietorum, Steud. Syn. PI. Cyp. 96 - S. supinus.
Ottonis, Boeck. in Flora, xli. (1868) 418 (Fimbristylidis sp.\—Bras.
pallesctns, A. Dietr. Sp. PL ii. 121 » Fimbristylis dichotoma.
paUida, Nees, in Linnaea, viii. (1888) 81. t. 8. f. 2 = S. cernuus.
paludicola, Kunth, Enum. PL ii. 198 - S. paludicolus.
palustris, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 17. t 1. f. 7 = S. rivularis.
panamensis,]. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 851 (Ryncosporae sp. 1).—Panama.
paniculate, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. 78 = £ Holoschoenus.
panormitana, Parl. Giorn. Bot. Ital. ii. I. (1846) 146 =S. Holoschoonus.
paradoxa, Kunth, Enum. PL ii. 206 (Bulbostylidis sp.).—Venezuela.
paradoxa, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2068 = Ficinia paradoxa.
parainsis, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 86 (Bulbostylidis sp.).—Bias.
pauciflora, Steud. Syn. PL Cyp. 104 (Bulbostylidis sp.).—Mexic.
pentagona, Schult. Mant. ii. 69 = Fimbiistyli» quinquangularis.
pentasticha, Boeck. in Flora, xlii. (1859) 446 - S. supinus.
perpusilla, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 555-S. pcrpusillus.
Perrottetii.StcvA. Syn. PL Cyp.318 ^ Fimbristylisexilis.
phaeocarpa, Nees, in Linnaea, x. (1836) 163 - S. antarcticus.
pholiodes, Steud. Syn. PL Cyp. 93-S. cernuus.
pilosa, Steud. 1. C.U7 (Bulbostylidis sp.).—Austral.
planifolia, Spreng. Neue Fitdeck. iii. 10=S.planifo)ius.
plebeia, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 18. t. 1. ff. 1, 6-S. setaceus.
pleurocarpa, Hochst. ex. Bolss. Fl. Orient, v. 379-S. setaceus.
podocarpa, Boeck. in Flora, xliiL (1860) 179 (Fimbristylidis sp. 1).—Hab. t
Pohliana, Boeck. 1. c xli. (1868) 598 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
Poiretii, Roem. & Schult. Syst ii. 116-S. Holoschoenus.
Pairetii, Steud. Syn. PL Cyp. 98 ~ Ficinia Poiretii.
polycolea, Da Not. lnd. Sem. Hort. Genev. (1847)-S. supinus.
polyphylla, A. Rich. Tent FL Abyss, ii. 508 •= S. Steudneri.
praelongata, Nees, in Wight, Contrib. 108-S. articulatns.
Preslii, A. Dietr. Sp. PL ii. 129.—Panama.
prolifcra, R. Ur. Prod. 223 - S. prolifer.
prolifera, Carmich. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 508 =—S. Thouarsianus.
pnlifera, Hook. f. FL N. Zel. i. 371; et Fl. Tasm. ii. 87.1.144 = S. inundatus, sulcatus, costatus.
pnlifera, Melliss, St Hel. 344-S. cernuus.
prolongata, Nees, in Wight, Contrib. 108-S. articulatus.
propinqua, R. Br. Prod. 222 - S. innndatus.
propinqua, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 46-S. antarcticus.
proximo, Steud. Syn. PL Cyp. 95 - S. supinus.
Pseudo-jttnciformis, Boeck. in Flora, xl. (1867) 35 (Bulbostylidis sp.).—Mexic.
Pseudeschoenus, A. Dietr. Sp. PI. ii. 103 = Ficinia triatacbya.

ISOLEFIS :—
psilocarpa, Knnth, Ennm. PI. ii. 198 » S . inundatus.
ptycholeptos, Steud. Syn. PI. Cyp. 98=Scirpus verrucosnlus.
puberula, Knnth, Ennm. PI. 21S (Bulbostylidis sp.).—Mad.ig.
pubescens, Roem. & Schult. Syst. ii. 118-=Fuirena pubescens.
pubiculmis, Boeck. in Linnaea, xxxviL (1871-73) 28 = Fimbristylis exilis.
puiigera, Keichb. ex Kunth, Ennm. PI. ii. 227 = Fimbristylis exilis.
pubigera, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. fasc. 1; ex Schult. Mant. ii. 476 = Fimbristylis dichotoma.
pulchella, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 350 (Fimbristylidis sp.).—Zeylan.
pumila, Link, Hort. Berol. i. 286 = S. cernuus.
pumila, Koem. & Schult. Syst. ii. 106 - S . pumilus.
punctutata, Steud. Syn. PI. Cyp. 92=S. cernuus.
purpurascens, Steud. 1. c.-=S. cernuus.
pusilla, Kunth, Enum. PI. ii. 190 = S. tenuis.
pygmaea, Kunth, Enum. PI. ii. 191 = S. cernuus.
racemosa, Schult. Mant. ii. 532=S. racemosus.
radiata, Roem. & Schult. Syst. ii. 113 = Ficinia radiata.
radicifiora, Steud. Syn. PI. Cyp. 318 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
ramulosa, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 50= S. inundatus.
rariflora, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 61 = Fimbristylis schoenoides.
repens, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 - Ficinia repens.
rigescens, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 (Fimbristylidis sp.).—Ins. Maurit.
rigida, Steud. in Lcchl. Berb. Am. Austr. 56 = S. rigidus.
riparia, K. Br. Prod. 222 = S. cemuus.
rivularis, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 19. t. 1. f. 5 = S. rivularis.
robustula, Steud. Syn. PI. Cyp. 90 = S. capillifolius.
romana, Roem. & Schult. ex G. Don, in Loud. Hort Brit. 21 = S. Holoschoenus ?
Roylei, Nees, in Wight, Contrib. 107 - S . quinquefarius.
rubescens, Presl, Delic. Prag. 157.—Bras.
rubicunda, Kunth, Enum. PI. ii. 188 = !?. Ludwigii.
rugosa, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 702 = S. articulatus.
rupestris, Kunth, Enum. PI. ii. 193-*S. eemuus.
Saviana, Schult. Mant ii. 63 * S. cemuus.
Savii. Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 174 = S. cernuus.
scabra, J. & C. Presl. Rel. Haenk. 188 (Bulbostylidis sp.).—Peruv.
scariosa, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 501= Ficinia scariosa.
Sckimperiana, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) I. Intell. 21 (Bulbostylidis sp.).—Abyssin.
schoenoides,Kunth,Enum. PI. ii.208(Bulbostylidis sp.).—Afr. austr.
Sehomburghii, Steud. Syn. PI. Cyp. 102 = Fimbristylis aestivalis.
Sckraderi, A. Dietr. Sp. PI. ii. 120 = Fimbristylis spathacea.
Schraderiana, Steud. Syn. PI. Cyp. 103 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
Schwrinturthiana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 167(Bulbostylidis sp.).—Afr. trop.
Sellowiana, Kunth, Enum. PI. ii. 208 (Fimbristylidis sp.).—Bras.
semipedunculata, Boeck. in Flora, xli. (1858) 417 = S. antarctieus.
senegalensis, Hochst ex A. Rich. Tent Fl. Abyss, ii. 500 - S . articulatus.
sepulcralis, Steud. Syn. PI. Cyp. 94=S. cernuus.
sesslerioides, Kunth, Enum PI. ii. 195=S. antarctieus.
setacea, R. Br. Prod. 222 = S. setaceus.
sttifolia. A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 498 = Eleocharis atropurpurea.
setosa, Raoul, ex A. Rich. Voy. Astrol. Bot 104 = S. cemuus.
sicula, Presl, Cyp. Gram. Sicul. 13 = S. cemuus.
Sieberi, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 23, nota (Bulbostylidis sp.).—Afr. austr.
simillima, Steud. Syn. PI. Cyp. 95 = S. supinus.
saroria, Kunth, Enum. PI. ii. 192.—Afr. austr.
sphaerocarpa, Nees, in Linnaea, x. (1836) 153 = S. antarctieus.
sphaerophora, Ehrcnb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 721 - S . Holoschoenus.

ISOLEPIS:—
spiralis, A. Rich. Voy. Astrol. Bot t. 19=S. frondosus.
squarrosa, Carmich. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 603 = Scirpus Thouarsianus.
squarrosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 221 = S. micranthus.
squarrosa, Roem. *Sc* Schult. Syst. ii. 111 = S. squarrosus.
stenophylla, Torr. in Ann. Lye. N. York, iil. (1836) 353 (Bulbostylidis sp.).—Am. bor.
Steudelii,Sc\aad. Anal. Cap. Cyp. 19 = Ficinia Ecklonea.
striata. Kunth, Enum. PI. ii. 189 = S. capillifolius.
striatella, Steud. Syn. PI. Cyp. 92 = S. cemuus.
stricta.A. Dietr. Sp. PI. ii. 121 = Fimbristylis spathacea.
striolata, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) TOO = S. supinus.
subacaulis, Steud. Syn. PI. Cyp. 318 •= Fimbristylis Vahlii.
subcucullata, Bergg. in Minneskr. Fisiog. Sallks. Lund, (1877) 22.—N. Zel.
subsquarrosa, Schrad. ex Schult Mant. ii. 64 — S. micranthus.
subtilis, Kunth, Enum. PI. ii. 191 = S. cernuus.
subtilissima, Boeck. in Flora, xli. (1858) 416 = S. cernuus.
subtristaehya, Hochst. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 752 (Bulbostylidis sp.).—Abyss.
sulcata, Carmich. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 503 = S. snlcatus.
supina, R. Br. Prod. 221 =-S. supinus.
ienella, Kunth, Enum. PI. ii. 218 (Fimbristylidis sp.).—Am. trop.
tenerrima, Fisch. & Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 258 (Bulbostylidis sp.).—As. centr.
tenuifolia, A. Dietr. Sp. PI. ii. 1S1 (Bull)ostylidis sp.).—Am. trop.
tenuior, Steud. Syn. PI. Cyp. 91=S. Ludwigii.
tenuis, Presl, Delic. Prag. 144 = S. cemuus.
tenuis, Schrad. Anal. Cap. Cyp. 15 = S. tenuis.
tenuissima, D. Don, Prod. Fl. Nep. 40 (Bulbostylidis sp) —Nepal.
tenuissima, Nees, in Linnaea; ix. (1834) 291 = S. tenuissimus.
tetragona, Schult. Mont. ii. 69 = Fimbristylis miliacea.
Thouarsii, Nees, in Linnaea, ix. (1S34) 291 (Bulbostylidis sp.).—Hab. ?
Thuarsii, A. Dietr. Sp. PI. ii. 109 = S. Thouarsianus.
Thunbergii, Schrad. in Goett. Gel. An*. (1821) III. 2068 = S. Thunbergii.
trachycarpa, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 501, in obs. = S. cemuus.
trachysperma, Nees, I. c. x. (1836) 152 = S. cemuus.
trichoides, Schrad. in Schult. Mant. ii. 64 (Bulbostylidis sp.).—Bra;.
trichokolea, Steud. Syn. PI. Cyp. 96 (Bulbostylidis sp.).—Java.
trifida, Nees, in Wight, Contrib. 108 (Bulbostylidis sp.).—Nepal.
trigyna, Kunze, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 502 = S. cemuus.
tristachya, Phil, in Linnaea, xxx. (1859-60) 203.—Chili.
tristachya, Roem. & Schult. Syst. ii. 110 = Ficinia tristachya.
truncata, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 508 = Ficinia truncata,
truncata, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 83 (Bulbostylidis sp.).—Bras.
turkestanica, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. (1880) 561 = Fimbristylis diphylla.
uliginosa, Steud. Syn. PI. Cyp. 91 = Eleocharis acicularis.
undnata, Roem. & Schult. Syst. ii. 111 = Fnirena uncinata.
uninodis, Delile, Fl. Egypt. 152 = S. supinus.
Urvillei, Steud. Syn. PI. Cyp. 94 = S. inundatus.
vaginata, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 828 = FimbrU stylis'bulbosa'(Quid?).
Vahlii, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 221 - Fimbristylis Vahlii.
Valdiviae, Steud. Syn. PI. Cyp. 94 = S. inundatus.
•oaria, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. I. 75 = Fimbristylis diphylla.
varians, Steud. Syn. PI. Cyp. 94 = S. inundatus.
variegata, Steud. 1. c. 93 = Carex setifolia.
venustula, Kunth, Enum. PI. ii. 192 = S. venustulus.
verrucifera, Maxim. Prim. Fl. Amur. 300 (Fimbristylidis dipsacea).

ISOLEPIS:—
verrucosula, Steud. Syn. PI. Cyp. 93 • Scirpus verrucosulus.
vestita, Kunth, Enum. PI. ii. 210 (Bulbostylidis sp.).—Am. trop.
Vincentii, Steud. Syn. PL Cyp. 102 ^ Fimbristylis **Vahlii.**
vivipara, Schrad. ex E. Desv. in C. Gay, FL Chil. vi. 189-S. inundatus.
Wallichiana, Schult. Mant ii. 533 (Bulbostylidis sp.).—Reg. Himal.
Warei, Torr. in Ann. Lye. N. York, iii. (1836) 354 (Bulbostylidis sp.).—Florida.
Willdenovii, Kunth, Enum. PI. ii. 210 (Bulbostylidis sp.).—Afr. trop.
Willderumii, Roem. & Schult. Syst. ii. 120-Fimbristylis complanata.

ISOLOBA.Rafin. Fl. Tellur.iv. 58 (1886) - Pinguieula, Tourn. (Lentib.).
elatior, Rafin. 1. c. 59 = P. elatior.
lusitanica, Rafin. 1. c.=P. lusitanica.
iutea, Rafin. 1. c. = P. lutea.
pumila, Rafin. 1. c. = P. pumila.
recurva, Rafin. I. c.=P. lutea.

ISOLOBUS, A. DC. in DC. Prod. vii. 352 (1839)=. Lobelia, Linn. (Campanulac).
caespitosus, Hassk. in Bonplandia, vii. (1859) 180 = L. radicans.
campanuloides, A. DC. in DC. Prod. vii. 353 = L. radicans.
concolor, A. DC. 1. c. 354 = Pratia erecta.
corymbosus, A. DC. I. c. 352 = L. corymbosa.
Cunninghamii, A. DC. 1. c. 354 = Pratia erecta.
Ecklonianus, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 536 = L. Eckloniana.
jasionoider, A. DC. in DC. Prod. vii. 353 = L. corymbosa.
Kerii, A. DC. 1. c.«=L. radicans.
radicans, A. DC. 1. c. = L. radicans.
Roxburgkianus, A. DC. 1. c. = L. radicans.
sparsiflorus, A. DC. 1. c—Afr. austr.

ISOLOMA, Decne. in Rev. Hortic. Sér. III. ii. (1848) 465. *GESNERACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. ii. 1001.
BRACHVLOMA, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 203.
CALYCOSTZMMA, Hanst. 1. c. xxix. (1857-58) 506.,
CRYPTOLOMA, Hanst. 1. c. (1857-58).
GIESLERIA, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 181.
KOHLERIA, Regel, 1. c. xxxi. (1848) 250.
MOUSSONIA, Regel, 1. c. 248 (1848).
PEARCEA, Regel, Gartenfl. xvi. (1867) 888.
SCIADOCALYX, Regel, 1. c. ii. (1853) 257. t. 61, partim.
TYDAEA, Decne. in Rev. Hortic. Se>. III. ii. (1848) 468.
breviflorun., *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* i. (1850-61) 63.—Panama,
cordifolium, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 478.—' Costa Rica.
costaricense, *Hemsl. I. c*—Costa Rica.
Deppeanum, *Hemsl. 1. c.*—Mexic.
elatius, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. IIL ii. (1848) 465.—Mexic.
elegans, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 478.—Guatemala,
erianthum,*Decne. in Rev. Hortic.Sti. HIM.* (1848) 465.—N. Granat.
hirsutnm, *Regel, in Bot. Zeit.* ix. (1851) 898.—Ind., occ.
hondense, *Decne. in Rev. Hortic.Sir.* III. ii. (1848) 465.—N. Granat
hypocyrtiflomm, *Benth. (f Hoot. f. Gen.* ii. 1002.—Ecuador,
ignoratum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 478.—Mexic.
inaequale, *Benth. If Hoot. f. Gen.* ii. 1002.—N. Granat
incanum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 478.—Costa Rica.
incurvum, *Hemsl. I. e.*—Panama.
Kramcrianum, *Lehm. in Hamb. Garten*,* x. (1854) 458.—Am. centr.
lasianthum, *Decne. in Rev. Hortic.* Sér. III. ii. (1848) 465.—Mexic.
Linkianum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii **478.**—Guatemala.

ISOLOMA:—
loagifolium, *Decne. in Rev. Hortic,* Sér. III. ii. (1848) 465.—Guatemala,
longipes, *Decne. I.* c—N. Granat.
molle, *Decne. I. e.*—Venezuela,
ocellatum, *Bentk.* b" *Hook./. Gen.* fi. 1002.—Panama,
petiolare, *Diem, in Rev. Hortic. Sit.* III. ii. (1818) 465.—Panama,
pictom, *Planch, in Fl. des Serres, Sit.* I. vi. (1850-61) 165.— N. Granat.
pictum, *Jtegel, Gartenfl.* iii. (1854) 110.—Panama,
pilosnm, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 479.—Costa Rica.
purpureum, *Benth.* b" *Hoot./. Gen.* ii. 1002.—Peruv.
ihynchocarpum, *Decne. in Rev. Sortie. Sit.* III. ii. (1848) 465.-N. Granat.
rabricaule, *Regel, in Bot. Zeit.* ii. (1851) 898.—Venezula.
rupestre, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 479.—Nicaragua.
Schiedeanum, *Hemsl. I. c*—Mexic.
Seemannii, *Benth.* fa[1] *Hoot./. Gen.* ii 1002.—Panama,
spicatnm, *Decne. in Rev. Hortic. Sit.* III. ii. (1848) 465.—Mexic.
strictum, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* U. 479.—Costa Rica.
tetragonum, *Hemsl. I. c,* 480.—Costa Rica.
Triansei, *Regel, Gartenfl.* (1854) 107.—N. Granat.
triflornm, *Decne. in Rev. Hortic. Sit.* III. ii. (1848) 465.—N. Granat.
tubiflorum, *Decne. I. c.*—Panama,
verticillatum, *Decne. 1. c.*—Peruv.
vestitnm, *Decne. I. c.*—N. Granat.

ISOLOPHUS, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 112 (1889) - PolygaJa, Linn.
saxatilis, Spach, 1. c. 114=P. rupestris,

ISOMERIA, D. Don, ex DC. Prod, v. 24 (1836) = Vemonia, Schreb. (Compos.).
chinensis, Wight, ex DC. 1. c. = V. cinerea.
cinerea, Wight, ex DC. 1. c. = V. cinerea.

ISOMEBIS, Nutt. ex Torr. *Sc* Gray, Fl. N. Am. i. 124 (1838). *CAPPARIDEAE,* Benth. & Hook. £ i. 106. f. ii. 657.
arborea, *Nutt. ex Torr.* &[1] *Gray, I. c*—Am. bor. occ.

X8ONANDBA, Wight, Ic. ii. 4. tt. 859, 360 (1840); et tt 1219, 1220. *SAPOTACEAE,* Benth. & Hook, f. ii. 657.
aeuminata, Dnrfy, Useful PI. Ind. 260=Dichopsis elliptic!.
aeuminata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 681.-Sumatra.
argentata, *Teijsm. V Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxv. (1868) 415.—Java.
Benjamins, *De Vriese, ex Miq. in Journ. Bot. Nterl.* i. (1861) 258.—Borneo.
caloneura, Kurz, For. Fl. Brit Burma, ii. 119-Bassia calo[illegible]
cal[illegible] Kurz in Joum. As. Soc Beng. xlii. (1873) II. 88 = Bassia caloneura.
calophylla, *Teijsm. br Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xx [illegible] PI. Zeyl. 177-Dichopsis canaliculate.
Candolkana, *Wight, Ic.* t. 1220--Ind. or.
dasvphylla, *Miq. PI. Jungh.* 201 (gen. du[illegible].)-Java.
diplostemon, *C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Bnt. Ind.* iii. 540—Ind, or.
grandis, Thw. Enum. PI. Zeyl. IW-Metap-*»*•.
Gutta, Hook. Lond. Jonm. Bot. «. (1847) 463 = Dichopsis Gutta.
hexandra, Griff. Notul, iv. 292 = Dichopsis hexandra.
laevi/olia, Thw. Enum. PI. Zeyl. 177 = Dichopsis laevifoli
lampoon, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 581.—Sumatra.
lanJeolaVa, Thw. Enum. PL Zeyl. 442 = Dichops.s lanceolata..
lanceolata, *Wight, Ic* tt. 359, S60.—Ind. or'
macrophylla, & Kr»V», *tx M'l-»»* J^"*- 5«'-*NirrL* i. (1S61) 258.—Borneo.
microphylla, Of ^W«*, *ex Mtq. I. c.* 260.—Borneo.
Mottleyana, Miq. 1. c. 257 = Bassia Mottleyana.
obovata, Griff. Notul. iv. 293 - Dichopsis obovata.
Pauciflora, Thw. Enum. PL Zeyl. 177 = Dichopsis pauciflora.
Perrottetiana, A. DC. in DC. Prod. viii.188.-Ind. or.
polyandra, Wight, Ic. t. 1589 = Payena lucida.

ISONANDBA:-
polyantha, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 119 = Dichopsis polyantha.
puberula, *Miq. PI. Jungh.* 201 (gen. dub.).—Sumatra,
pulchra, *Burct. in Ann. Jard. Buiten*.* v. (1885) 21.—Sumatra,
quercifolia, *De Vriese, ex Miq. in Joum. Bot. Nierl.* i. (1861) 260.—Borneo.
Richii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) 327.—Ins. Amicor.
rostrata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 581.—Ins. Banca.
rubiginosa, Thw. Enum. PI. ZeyL 177-Dichopsis rubiginosa.
Stocksii, *C. B. Clarke, in Hoot./. Fl. Brit. Ind.* iU. 539.—Ind. or.
sumatrana, *Burct. in Ann. Jard. Buiten*.* v. (1885) 21.—Sumatra.
villosa, *Wight, Ic.* t. 860.—Ind. or.
Wightiana, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 187.—Zeylan.
xanthochyma, *De Vriese, ex Miq. in Joum. Bot. Neerl.* i. (1861) 259.—Borneo.

IBONEMA, R. Br. in Mem. Went. Soc. i. (1809) 63. *APOCYNACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 712.
Smeathmanni, *Roem. V Schult. Syst.* iv. 401.—Afr. trap.

ISONEMA, Cass. in Bull. Soc Philom. (1817) 152-Vemonia, Schreb. (Compos.),
ovate, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxiv. 25=V. chinensis.

ISOPAPPUS, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 329 (1840)-Aplopappua, Cass. (Compos.).
divaricatus, Torr. & Gray, 1. c.»A. divaricates.
Hooterianus, Torr. & Gray, 1. c.-A. Hookerianus.

ISOPARA, Rafin. Atl. Jonm. 144 (1832) >••• Oleomella, DC. (Cappar.).
mexicana, Rafin. 1. c.-C. mexicana.

ISOPETALUM, Sweet, Geran. t. 126 (1820) = Pelargonium, L'Hérit. (Geraniac).
alchemilloides, Eckl. & Zeyh. Ennm. 76 = P. alchemilloides.'
aphanoides, Eckl. & Zeyh. 1. c. = P. aphanoides.
articulatum, Eckl. & Zeyh. 1. c. = P. articulatum.
Cotyledonis, Sweet, Geran. t. 126=P. Cotyledonis.
dimidiatum, Eckl. & Zeyh. Enum: 76=P. alchemilloides.
disdpes, Colv. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 85 = P. discipes.
elongatum, Eckl. & Zeyh. Enum. 76 - P. tabulare.
geranioides, Eckl. (c Zeyh. 1. c.-P. alchemilloides.
ranunculophyllum, Eckl. & Zeyh. 1. e. = P. alchemilloides.

ISOPHYLLUM, Hoffm. Gen. Umbellir. 115 (1814) = Bupleurum, Tourn. (UmbellifA
affine, Schur, Enum. PI. Transs. 251=B. affine.
australe, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 391 = B. Gerardi.
baldense, Hoffm. Gen. Umbellif. 116 - B. baldense.
/aleatum, Hoffm. 1. c. = B. falcatum.
Gerardi, Hoffm. 1. c. - B. Gerardi.
glaucum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 391 = B. glaucum.
Jacquinianum, Fourr. 1. c. = B. Gerardi.
junceum, Hoffm. Gen. Umbellif. 116 — B. joncenm.
petraeum, Hoffm. 1. c.-B. petraeum.
tenuissimum, J. & C. Presl, Fl. tech. 66 = B. tenuissimum.

ISOPHYLLUM, Spach, Hist. Vég. Phan. v. 432 (1836); et in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 367 - ABoyrum, Linn. (Hypericin.).
Drummondii, Spach, in Ann. Sc Nat Sei. II. v. (1836) 387 — Hypericum Isophyllum.

ISOPHYSIS, T. Moore, in Proc. Linn. Soc. ii. (1858) 212 = Hewardia, Hook. (Liliac.).
tasmanica, T. Moore, 1. c. = H. tasmanica.

ISOPLESION, Rafin. Fl. Tc'lur. iv. 86 (1836) - Echium, Toum. (Borag.).
giganteum, Rafin. 1. c. = E. giganteum,
italicum, Rafin. 1. C.-E. italicum.
pyrenaicum, Kafin. 1. c.-E. italicum.
ruhrum, Rafin. 1. c. = E. rubrum.

ISOPLBXIS, Lindl. ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1770 (1835). *SCROPHULARINEAE,* Benth. ft Hook. f. ii. 961.
CALLIANASSA, Webb & Berth. Phyt Canar. ill. 148. 1.183 (1836-50).
canariensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 829.—Ins. Canar.
Sceptrum, *Steud. 1. c.*—Ins. Mader.

ISOPOaON, R. Br. ex Knight, Prot 93 (1809); et R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 71. *PROTEACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 172.
ATYLVS, Salisb. Parad. Lond. sub t. 67 (1807), partim.
adenanthoides, *Meissn. in Hook. Km Joum.* vii. (1855) 69.—Austral.
anemonefolius, *Knight, Prot.* 93.—Austral,
anethifolius. *Knight, 1. c.* 94.—Austral,
asper, *R. Br. Prot. Nov.* 8.—Austral
attenuatus, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 73.—Austral.
axillaris, *R. Br. I. c.* 74.—Austral.
Baxteri, *R. Br. Prot. Nov.* 9.—Austral,
buxifolius, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 73.—Austral.
ccratophyllus, *R. Br. I. c.* 72.—Austral.
cornigerus, Lindl. Swan River App. 34=teretifolius.
crithmifolius, *F. Muell. Fragm.* vi. 239.—Austral,
cuneatus, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 73.—Austral.
divaricatus, Sweet, Hort. Brit ed. II. 443=anethifolius.
divergens, *R. Br. Prot. Nov.* 7.—Austral.
Drummondii, *Benth. Fl. Austral,* v. 344.—Austral,
formosus, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 72.—Austral,
heterophyllus, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 504.—Austral.
horridus, F. Muell. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 280-ceratophyllus.
lanceolatus, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 508 = cuneatus.
latifolius, *R. Br. Prot. Nov.* 8.—Austral,
linearis, *Meissn. in Hook. Ken Joum.* vii. (1855) 69.—Austral,
longifolius, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 73.—Austral.
Loudoni, Baxter, ex K. Br. Prot Nov. 8=coneatus.
pedunculatus, R. Br. 1. c. 7 = Pctrophila scminuda I
petiolaris, *A. Cunn. ex R. Br. I. c.* 8.—Austral.
petrophiloides, R. Br. Prot. Nov. 7 = teretifolius.
pettophiloides, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 503 = Drummondii.
polycephalus, *R. Br. in Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 73.—Austral,
propinquus, *A. Cunn. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit,* 37 > nomen.—Austral.
Protea, Meissn. in Hook. Kew Joum. iv. (1852) 183 = latifolius.
roseus, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 89.—Austral.
scaber, Lindl. Swan River App. 84 = asper.
scaber, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 506 = roseus.
scabriusculus, *Meissn. in Hook. Kev Journ.* iv. (1852) 182.—Austral.
spathulatus, R. Br. Prot. Nov. 8 »buxifolius.
sphaerocephalus, *Lindl. Swan River App.* 84.—Austral,
teretifolius, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 71.—Austral.
tridens, *F. Muell. Fragm.* vi. 289.—Austral,
trilobus, *R. Br. in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 72.—Austral.
trilobus, Meissn. in Lehm. PI. Preiss. i. 507 = tripartitus.
tripartite, *R. Br. Prot. Nov.* 8.—Austral,
uncinatus, *R. Br. I. c.* -Austral,
villosus, *Meissn. in Hook. Ken Journ.* iv. (1852) 183.—Austral.

ISOPTERIS, Klotzsch, in Monatsb. Bcrl. Acad. (Maerz 1854> 127; et Abh. Acad. Berl. (1855) 131. t. 12]) (Isopteryx in textu) - Begonia, Tourn.
longirostris. Klotzsch, 11. cc = B. longirostris.
umiellata, Klotzsch, in Monatsb. 1. c. = B. umbellata.

ISOPTERIS, Wall. Cat. n. 7261 (1881) . Trigoniastrum, Miq. (PolygaL).
penangiana, Wall 1. a = T. hypoleucum.

ISOPTERYX, Klotasch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 131.1.12 B = Begonia, Town.
umbellata, Klotzsch, 1. c. 182 = B. umbellata.

ISOPYRUM, Adans. Fam. ii. 460 (1763) = Anemone, Linn. (Ranunc).

I8OPTRUM, Linn. Gen. ed. II. 245 (1742). *RANUNCULACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 8.
ENEMION, Rafiir. in Journ. Phys. xci. (1820) 70.
FONTANELLA, Kluk, ex Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 363 (1808).
GONTARELLA, Gilib. ex Stead. Norn. ed. I. 380 (1821).
LEPTOFYRUM, Reichb. Consp. 192 (1828).
OLFA, Adans. Fam. iL 458 (1763).
adiantifolium, *Hook.f. V Thorns. Ft. Ind.* i. 42.—Reg. Himal.
adoxoides, *DC. Syst.* i. 324.—Japon.; China.
adoxoides, French. & Sav. Enum. PI. Jap. i. 11 = nipponicum.
album, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 221 "thalictroides.
anemonoides, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 135 = thalictroides.
aquilegioides, Bory & Chaab. Fl. Pilop. 85 •= Thalictrum orientale.
aquilegioides, *Linn. Sp. PI.* 657.—Enrop. austr.
biternatum, *Torr. & Cray, Fl. IV. Am. i. Suppl.* 660.—Am. bor.
caespitosum, *Boiss. (f Hohen. Diagn.* Ser. I. viii. 7.—Persia.
eapnoides, Fisch. ex DC. Prod. i. 48 = adoxoides.
Clarkii, *Kellogg,* in *Proc. Calif. Acad.vii.* (.1877) 181.—Calif.
dicarpon, French. & Sav. Enum. PI. Jap. i. 11; ii. 271 = stoloniferum.
dicarpon, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugi. Bat.* iii. 7.—Japon.
dicarpon, S. Moore, in Joura. Bot. xvi. (1878) 123 = trachyspermum.
fumariaefolium, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 806 = seq.
fumarioides, *Linn. Sp. PI.* 557.—Europ.; As. bor.
grandiflomm, *Fisch. ex DC. Prod.* i. 48.—Sibir. altaic.; Reg. Himal.
Hallii.A *Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 874.—Am. bor. occ.
japtmicum, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Mnench. iv. II. (1843) 181=adoxoides.
microphyllum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 54. t. 11. f. 4—grandiflorum.
nipponicum, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 83.—Japon.
occidentale, *Hook, tf A?n. Bot. Beech. Voy.* 816.—Calif.
Raddeanum, *C. Muell. in Walp. Ann.* viL28; *Maxim. in Bull. Acad. Petersb.* xxix. (1884) 61.—Mandshur.
gtipitatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xii. (1877) 54.-Calif.
stipnlaceum, *Franch.* b[1] *Sav. Enum. PI. Jap.,* ii. 270.—Japon.
stoloniferum, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxix. (1883) 60.—Japon.
thalictrifolium, Gilib. Fl. Lituan. ii. 281; Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 306=thalictroides.
thalictroides. *Linn. Sp. PI.* 557.—Enrop. austr.
thalictroides, Short, Cat. PI. Kentnck. i. 8-bitematum.
trachyspermum, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xxix. (1883)60—Japon.
uniflorum, *Aitch. V Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xix. (1882) 140.—Afghan.

ISORA, Adans. Fam. ii. 382 (1768); Schott & Endl. Melet. 31 (1832) = Helicteres, Linn. (Stercul.),
corylifolia, Schott & Endl. 1. c. = H. Isora.
grewiae/olia, Schott *Sc* Endl. 1. c. = H. spicata.

ISORIUM, Rafin. Fl. Tellur. ii. 61 (1836) - Lobo-Btemon, Lehm. (Borag.).
formosum, Rafin. 1. c =L. formosa.

ISOSCHOENUS, Nets, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 49 = Schoenue, Linn. (Cyperac).
acuminatus, Nees, 1. c.=S. acuminntus.
Armeria, Nees, I. c.=S. Armeria.
barbatus, Nees, in Lehm. PI. Preiss. ii. 80 - S. barbatus.
Drummondii, Steud. Syn. PI. Cyp. 167=S. flavus.
fiavus, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 49 - S. flavus.

IBOSTIQMA, Less, in Linnaea.vi. (1831) 513. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 889.
brasiliense, *Benth. V Hook.f. Gen.* ii. 389.—Bras,
crithmifolium, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 515.—Bras.
crithmifolium, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 889-brasiliense.
dissitifolium, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 239—Bras.
microcephalum. Baker, I.e.—brasiliense.
peucedanifolium, *Less, in Linnaea,* vi. (1831) 514.—Bras.
Riedelii, Sch. Bip. ex Baker, in.Mart. Fl. Bras. vi. HI. 240=speciosum.
simplicifolium, *Less, in Linnaea,* vi. (1891) 613.—Bras,
speciosum, *Less. 1. c.* 615.—Bras.

ISOSTOMA, D. Dletr. Syn. PI. i. 569, 737 (1839), sphalm. olsotoma, Lindl. (Carapan.).

ISOSTYLIS, Spaeh, Hist. Vég. Phan. x. 402 (1840) = Banksia, Gaertn. (Proteac.).

ISOTOMA, Lindl. Bot. Reg. t. 964 (1826). *CAMPAN ULACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 588.
HIPFUBROMA, G. Don, Gen. Syst. iii. 717 (1834).
axillaris, *Lindl. Bot. Reg.* t. 964.—Australal.
Baneri, *Presl, Prod. Lobel.* 42.—Australal,
breviflora, *Steud. Norn.* ed. II. i. 829.—Am. austr.
brevifolia, Presl, Prod. Lobel. 43 = Brownii.
Brownii, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 716.—Australal.
fasciculata, Schlecht. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58 = Rhizocephalum Candollei.
fluvutilis, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* iv. 186.—Australal.
Gulliverii, *F. Muell. Fragm.* x. 89.—Australal
longiflora, *Presl, Prod. Lobel.* 42.—Ind. occ
petraea, *F. Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 420.—Australal.
pusilla, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 75.—Australal.
rhytidosperma, F. Muell. Fragm. x. 40 = Lobelia rhytidosperma.
runcinata, *Hassk. in Bonplandia,* vii. (1859) 181.—HabJ
scapigera, *G. Don, Gen. Syst.* iii. 716.—Australal.
senedoides, A. DC in DC. Prod. vii. 412 - axillaris.

ISOTREMA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 195 = Ariatolochia, Linn.
Sipho, Rafin. 1. c = A. Sipho.

ISOTRIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 357 = Pogonia, Juss. (Orchid.).
medeoloides, Rafin. *p.* Tellur. iv. 47 "P. verticillata.
verticillata, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 857= P. verticillata.

iaOTKOPIS, Benth. in Enum. PI. Hueg. 28 (1837). *LEGUMINOSAE,* Benth. & Hook. f. i. 468.
atropurpurea, *F. Muell. Fragm.* iii. 16.—Australal.
biloba, Benth. in Enum. PI. Hueg. 29 = striata.
canescens, *F. Muell. Fragm.* x. 51.—Australal,
cuneifolia, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 29, in note.—Australal.
Drummondii, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 31.—Australal,
filicaulis, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 71.—Australal.
Forrestii, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii.—(1882) 252.—Australal,
joncea, *Tun: in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 251.—Australal,
parviflora, *Benth. in Ann. Wien. Mus.* ii. (1888) 71.—Australal.
striata, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 28.—Australal.
Wheeleri, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral,* ii. 40.-Austrai.
Winneckeana, *F. Muell. Census, Suppl.* i. 3.—Australal.

ISOTYPUS, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 11. t. 307 (1820) = Onoseris, DC. (Compos.).
onoseroides, H. B. *Sc* K. 1. c.=O. Isotypus.
rosiflarus, Triana, ex Hérincq, L'Hortic. Franç. (1864) 137.—N. Granat

ISQUIERDA, Willd. Sp. PI. iv. 115 (1805) = IZQUIERDIA, Ruiz 8c Pav. =Myrsine ?, Linn.

ISQUIERDIA, Poir. Eneyc. Suppl. iii. 190=pnec.

ISYPUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 73 (18S6)-Ae8C*dus, Linn. (Sapindac).
ochraceus, Rafin. 1. c = A e . glabra.

ITEA, Gronov. ex Linn. Gen. ed. II. 85 (1742). *SAXIFRAGEAE,* Benth. & Hook. f. i. 647.
DICONANGIA, Mitch, in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 208.
caroliniana, Lam. Encyc. iii. 315-=Cyrilla racemiflora.
chinensis, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 189. t 39.—Reg. Himal.; China.
Cyrilla. Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 50=Cyrilla racemiflora.
floribunda, Salisb. Prod. 143 = Cyrilla racemiflora.
fragrans, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 420 = Polyosma fragrans.
japonica, Hort. ex Presl, Symb. Bot. i. 40=Sloanea monosperma.
japonica, *Oliver, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 164.—Japon.
javanica, *Blume, Bijdr.* 160.—Java,
macrophylla, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 419.—Reg. Himal.
nutans, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 226.—Reg. Himal.
padifolia, Salisb. Prod. 143 = virginica.
rosmarinifolia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 190=seq.
Rosmarinus, Roein. *Sc* Schult. Syst. v. 408=Baeckea cochinchinensis.
spinosa, Andr. Bot. Rep. t. S14=Bursaria spinosa.
umbellata, *Roxb. Hort. Beng.* 86; *Fl. Ind.* i. 632.—Ins. Malay,
virginica, *Linn. Sp. PI.* 188.—Am. bor.

ITEADAPHNB, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 865 (1851). *LA URINEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 162.
confusa, *Blume, 1. c.*—Malaya.

ITIA, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 281 (1810); ex Roem. & Schnlt. Syst. v. 259, in obs. (1819)-Iionicera, Linn. (Caprifol.).

ITICANIA, Rafin. Sylva Tellur. 125 (1838) = Loranthus, Linn.
loniceroides, Rafin. 1. c.=L. loniceroides.

ITTNERA, C. C. Groel. Fl. Bad. iii. 590. t. 4 (1808) - Rajas, Linn.
major, C. C. Gmel. 1. c.=N. major.
minor, C. C. Gmel. 1. c. 592 = N. minor.
Najas, C. C. Gmel. 1. c. 560=N. major.

ITUTERION, Rafin. Sylva Tellur. 86 (1838) = VitiB, Tourn. (Ampelid.).
arbarea, Rafin. L c. =V. arborea.

IUGA, Reichb. Consp. 167 (1828), sphalm.=Inga, Scop. (Legumin.).

IULOCROTON, Baill. Adansonia, iv. (1863) 367 •= Julocroton, Mart. (Euphorb.).

IULUS, Salisb. Gen. PI. Fragm. 92 (1866)= AUium, Toum. (Liliac).
niveum, Salisb. 1. c- = A. suhhirsntnm.
subhirsutum, Salisb. 1. C.-A. subhirsutum.

IVA, Linn. Hort. Upsal. 285 (1748); Amoen. Acad. iii. 25 (1757). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook, f/ ii. 352.
CYCLACKAENA, Fresen. Ind. Sem. Hort. Frankf. (1836) 4; et in Linnaea, xii. (1838) Litt. 78.
DENIRA, Adans. Fam. ii. 118 (1763).
EUPHROSYNE, DC. Prod. v. 530 (1886).
ambrosiaefolia, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. III.* 246.—Am. bor.
angustifolia, *Nutt. ex DC. Prod.* v. 529.—Am. bor.
aunua, *Linn. Sp. PI.* 988.—Am. austr.
annua, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 184 = ciliata.
asperifolia, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 151.—Mexic.
axillaris, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 743.—Am. bor.
cheiranthifolia,*#. B. V X. Nov. Gen. et Sp.* iv. 276.—Cuba.
ciliata, *Willd. Sp. PI.* iii. 2386.—Am. bor.
dealbata, *A. Gray, PI. Wright, i.* 104.— N. Mexic. *
foliolosa, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii-(1841) 346-axillaris.

IVA:—
frutescens, *Linn. Sp. PI.* 989.—Am. bor.
Hayesiana, *A. Gray, in Proe. Am. Acad.* xi. (1876) 78, -^Calif.
imbticaU, *Walt. Fl. Carol.* 232.—Am. bor.
integrifolia. Banks, ex Push, FL Am. Sept. ii. S80 = imbncaU?
microcephala, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc.* N. S. vii. (1841) 346.—Am. bor.
monopkylla, Walt. Fl. Carol. 282=Ambrosia artemisifolia.
nevadensis, *M. E. Junes, in Am. Natural,* xvil. (1883) 978.—Am. bor. occ.
paniculata, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 347 = xanthifolia.
zanthifolia, *Nutt. Gen. Am.* ii. 185.—Am. bor.

IVESIA, Ton. ft Gray, ex Torr. in Pacif. Rail. Rep. vi, 72 (1857) = Potentilla, Linn. (Rosac).
Baileyi, S. Wats, in Bot. King's Exped. 90, 449.—Am. bor. occ
depauperata, A. Gray, in Bot Calif, i. 184=P. depauperata.
Gordoni, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. vi. 72=P. Gordoni.
gracilis, Torr. ftGray, 1. c. 72.111=P. Newberryi.
Kingii, S. Wats, in Bot. King's Exped. 91, 448.—Am. bor. occ.
Lemmoni, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 865.—Arizona.
lycopodioides, A. Gray, 1. c. vi. (1864-65) 68? = P. Gordoni.
Muirii, A. Gray, 1. c. viii. (1878) 627.—Calif.
Pickeringii, Torr. in Bot. U. St Expl. Exped. 288. t. 4 = P. Pickeringii.
pinnatifida, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xx. (1886) 364.—Am. bor. occ.
Pygmaea, A. Gray, 1. c. vi. (1864-65)-681 = P. Gordoni.
santolinoides, A. Gray, 1. c.=P. santolinoides.
tridentata, A. Gray, 1. c. vii. (1868) 838.—Am. bor. occ.
unguiculata, A. Gray, 1. c. 389.—Calif.
utahensis, S. Wats, li cxvii. (1881-82)-871—Am. bor. occ.
Webberi, A. Gray, 1. c. x. (1874) 71.-Calif.

IVIRA. Aubl. PI. Gui. ii. 694. t. 279 (1775) = Stereulia, Linn.
pruriens, Aubl. 1. c. 695=S. Ivira.

IVONIA, Veil. Fl. Flum. 100 (1825); iii. t. 4 (1827) (Qoid?).
amplexicaulis, Veil. 11. cc.—Bras.

IXALUM, Forst. f. Prod. 92 (1786) = Splnifcx, Linn. (Gramin.).
inerme. Font. f. 1. c.=S. hirsutns.

tSANTHUS, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 129 (1839). *GENTIANEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 810.
Tiscosus, *Griseb. 1. c*—Ins. Canar.

IXAUCHENUS, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvi. 176 (1828) = Iia«enophora, Cass. (Compofc).
lyratus, Less. Syn. Comp.- 1M -L M w t,a i.
sublyratus, Cass. in Diet. Sc. Nat. lvi. 176 = L. Billardierl.

IXERBA, Cnnn. in Ann. Nat. Hist Ser. I. iii. (183U) 249. *SAXIFRAGEAB,* Benth. *Sc* Hook. .. 645.
brexioides, *A. Cunn. I-* ft—N. &'•

DCERIS, Cass. in Ball. Soc. Philom. (1821) 178 j et Diet. Sc. Nat xxiv. 49 (1822) = I*Ctuca, Tourn.
« S X A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. & vi. (1858-59) 897 = L. albiflora.
debilis, A. Gray, 1. c - L. dehhs.
fontin'alis, DC. Prod. ^ ^ ^ J ^ S ^ M
Gregorii, Hance, in Ann. Sc Nat. Ser. V. v. 1866) 223
ii. Mem. Am. Acad. N. S. vi.
(1856-59) 398.—Ins. Bonin.
brata, Miq. Ann. Mm. Bot. Lngd. Bat. n. 190.-
mo^p'hala, Cass. in Diet. Sc. Nat. xxix. 389 {=Jficrorrkynchuspumilus).-In- Falkland.

CCERIS*t*—
polycephala, Cass. in Diet Sc Nat. xxiv. 60 = Lactuca polycephala.
ramosissima, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1868-59) 397 = L. denticulata.
repens, A. Gray, 1. c - L. repens.
sonchtfolia, Hance, in Jonrn. Linn. Soc. xiii. (1873) 108=L. denticulata?
stoloni/era, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1868-69) 896=L. stolonifera.
Thunbergii, A. Gray, 1. c. 397-L. Thunbergii.
versicolor, DC. Prod. vii. 161 = L. Fischeriana.

IXERRA, Pritz. Ie. Ind. i. 602 (1865), sphalm. = Ixerba, Cunn. (Saxifr.).

TTTA, Linn. CorolL Gen. 1 (1737). *IR1DEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 704.
FREESEA, Eckl. Top. Verz. 80 (1827).
HYALIS, Salisb. in Trans. Hort Soc. i. (1812) 317.
MORPHIXIA, Ker-Gawl. Irid. Gen. 105 (1827).
WUEKTHIA, Regel, in Bot Zeit. ix. (1851) 6U5.
abbreviate Houtt Handleid. xil. 41. t. 78. f. 3= maculata.
acuta, Bartr. Fl. N. Am. i. 76=Nemastylis geminiflora.
acuta, Licht. ex Roem. & Schnlt Syst i. 383 - Hesperantha longitnba.
afrieana, Horaem. Cat. Hort. Havn. 68; ex Roem. *Sc* Schnlt. Syst. i. 424 = Babiana rubrocyanea.
afrieana. Linn. Sp. PI. 36—Aristaea cyanea.
alba, *Eckl. Top. Verm.* 27.—Aft. austr.
alia, Linn. Syst. ed. X. 882 = Sparaxis bulbifera!
alboflavens, Eckl. Top. Verz. 27=maculata.
alopecuroides, Linn. f. Suppl. 92 = Watsonia spicata.
ambigua, *Salisb. Prod.* 39.—Afr. austr.?
americana, Anbl. PI. Gui. i. 88 - Eleutherine plicata.
amoena, *Lint, Enum. Hort. Berol.* i. 52.—Afr. austr.
amoena, Salisb. Prod. 85 = maculata.
anemmaeflora, [DC. in] Red. Lil. t. 85-Sparaxis bulbifera.
anemonaeflora, *Jacq. Coll. Suppl.* 9.—Afr. austr.
angusta, Jacq. Ic Rar. ii. 7. t. 279 - Hesperantha angusta.
angustifolia, *Ectl. Top. Vert.* 25.—Afr. austr.
antholyzaeformis, *Lam. Encyc.* iii. 384.—Afr. austr.
arcuata, *Burnt, f. Fl. Cap. Prod.* 2.—Afr. austr.
aristata, *Ker-Gawl. in Bot. Mag.* t. 589.—Afr. austr.
aristata, Schneer. Ic. t. 87=patens.
aristata, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed. I. i. 57 = Sparaxis grandiflora.
aristata, Thunb. Diss. Ixia, 14 - leucantha.
aulica, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 67 - scariosa.
aurantiaca, Klatt, in Abh. IJaturf. Ges. Halle, xii. (1882) 397 -lutea.
autumnalis, Salisb. Prod. S3-Crocus autumnalis.
aturea, Banks, ex Ker-Gawl. In Bot. Mag. t. 598 = Geissorhiza Rochensis.
tricolor, Ker-Gawl. 1. c. t. 548-Synnottia bicolor.
bicolor, *Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaett.* i. (1803) 3. —Afr. austr.
bicolorata, Klatt, in Abh. Natnrf. Ges Halle, xii. (1882) 396=polystachya.
bifaria, *Moench, Meth. Suppl.* 213.—Afr. austr.
bimaculata, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 182.-Afr. austr.
bulbifera, Linn. Cent. PI. ii. 4; Amoen. Acad. iv. 800 = Sparaxis bulbifera.
bulbifera, Thunb. Diss. Ixia, n. 16, partim =Sparaxis grandiflora.
bulbocodioides, D. Delar. Desc. PI. Nov. 19-Romnlea bulbocodioides.
Bulbocodium, Lam. Encyc. iii. 885-Romulea roaea.
Bulbocodium, Linn. Sp. PI. ed. II. 61-Romulea Bulbocodium.
Bulbocodium, Sibth. ft Sm. Fl. Graec i. 26. t. 36 = Romnlea Linaresii.
Bulbocodium, Thunb. Diss. Ixia, 6 = Romnlea cruciate,
bulbocoides, *D. Delar. Desc. PI. Nov.* 19; *Burm.f. Fl. Cap. Prod.* 1*.—Afr. austr.
Bnrmanni, *F. G. Dietr. Vollst. Ltxih. Gaertn. Nachtr.* iv. 408.—Afr. austr.
caerulcscens, *Eckl. Top. Vert.* 26.—Afr. anstr.
campanulata. Banks, ex Roem. & Schnlt. Syst. i. 391 - speciou.
campanulata, *Houtt. Handleid.* xii. 42. t. 78. f. 4.—Afr. austr.
campanulata, Lam. Illustr. i. 109 - Romulea hirsuta.

IXIA:—
campannloides, *Bckl. Top. Vert.* 26, nomen.—Afr. austr.
cana, Eckl. 1. c.-=viridiflora.
Candida, [Delile, in] Red. Lil. viii. t. 426=leucantha.
capillaris, *Thunb. Diss. Ixia,* 12. t. 2. f. 2.—Afr. anstr.
capitata, Andr. Bot. Rep. t. 50=maculata.
cannosina, *Hart, ex Hoeven &• De Vriese, Tijdschr.* viii. (1841) 164.—Hab. ?
cartilaginea, Lam. Encyc. iii 840 = Watsonia marginata.
caryophyllacea, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 1*.—Afr. austr.
cepacea, [DC. in] Red. Lil. ii. *t.* 98 = Micranthos fistulosus.
chinensis, Linn. Sp. PI. 86 = Belamcanda punctata.
ckloroleuca, Jacq. Coll. iv. 180 = Romulea chloroleuca.
ciliaris, Salisb. ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 549 = Geissorhiza ciliaris.
cinnamomea, Andr. Bot. Rep. t. 44 — Hesperantha falcata.
cinnamomea, Thunb. Diss. Ixia, 10 - Hesperantha cinnamomea.
coccinea, *Eckl. Top. Vert.* 24.—Afr. austr.
coccinea, Thunb. Fl. Cap. i. 241 =speciosa, patens.
coelestina, Bartr. Trav. ed. Germ. 152. t. 3=Nemastylis coelestina.
coerulescens, Pers. Syn. I. 48 = Babiana villosa.
columellaris, *[Ker-GaTtl. in] Bot. Mag.* t. 680.—Afr. anstr.
Columnae, Schnlt. Mant i. 278—Romulea Coluranae.
columnaris, Salisb. Prod. 86-monadelpha.
concinna, *Salisb. 1. c.*—Afr. austr.
concolor, Salisb. 1. c.=patens.
conica, Salisb. 1. c.=maculata.
conspicua, *Salisb. I. c.*—Afr. austr.
corymbosa. Linn. Cent. PI. ii. 4; Amoen. Acad. iv. 300 — Lapeyrousia corymbosa.
crateroides, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 594-speciosa.
crispa. Linn. f. Suppl. 91 -Tritonia undnlata.
crispifolia, Andr. Bot. Rep. t. 85 - Lapeyrousia coiyrabosa.
crocata, [Delar. in] Red. Lil. t. 336-Tritonia miniata.
crocata. Linn. Sp. PI. ed. II. 52-Tritonia crocata.
crocea, Thunb. Fl. Cap. i. 218 -Romulea sublutea.
cruciata, Jacq. Coll. Suppl. 16 — Romulea cruciata.
curia, Andr. Bot. Rep. t. 664 = monndelpha.
cyanea, Pers. Syn. i. 49-Babiana stricta.
densiflora, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii (1882) 897 - patens.
deusta, [Soland. in] Ait Hort. Kew. ed. I. i. 60 - Tritonia deusta.
disticha, Lam. Encyc. iii. 388 - Witscnia maura.
dubia, Vent Choix, 10 = lutea.
elliptica, *Thunb. Fl. Cap.* 1. 244.—Afr. austr.
elongata, Vahl, Enum. PI. ii. 51 — Romulea elongata.
emarginata, Lam. Encyc. iii. 342 - Lapeyrousia juncea.
ensifolia, Noronha, in Verb. Batav. Gen.v. (1790) ed. I. Art. iv. 18 = Panlanthus chinensis.
erecta, Berg. Desc. PI. Cap. 6-polystachya.
erect a, Jacq. Hort. Schoenb. t. 18 - lutea.
erosa, *Salisb. Prod.* 36.—Afr. austr.
europaea, Pers. Syn. i. 46 ^ Trichonema Bulbocodium.
excisa, Linn. f. Suppl. 92 = Lapeyronsia juncea.
excisa, Thunb. Diss. Ixia, 19 - Geissorhiza excisa.
Fabricii, D. Delar. Desc. PI. Nov. 18-Lapeyrousia anceps.
falcata, Thunb. Diss. Ixia, 19 - Hesperantha falcata.
fallax, *Salisb. Prod.* 84.—Afr. austr.
fastigiata, Lam. Encyc. iii. 387 - Lapeyrousia corymbosa.
fenestrata, Jacq. Coll. iii. 270=Tritonia hyalina.
filifolia, [Delar. in] Red. Lil. t. 251. f. 2-Romulea sublutea.
filiformis. Vent. Jard. Cels, t. 48-patens.
fimbriata. Lam. Encyc. iii. 839-Sparaxis grandiflora.
fistulosa, Andr. Bot. Rep. t. 59 - Hesperantha radiata.
fistulosa, [Ker-Gawl. in] Bot. Mag. t. 623-Micranthus fistulosus.
flabellffolia, D. Delar. Desc. PI. Nov. 24 = Babiana plicata.
flabelliformis, Salisb. Prod. 37-Babiana stricta.
flabellularis, Vahl, Enum. ii. 67-Tritonia flava.
fiaccida, Salisb. Prod. 35 — patens.
flava, Homem. Hort. Hafn. Suppl. 5 = maculata.
flava. Lam. Illustr. i. 109=Romulea bnlbocodioides.

IXIA:—
flavescens, Eckl. Top. Verz. 26— polystachya.
flavovirens, *Eckl. I. c.*—Afr. austr.
flexuosa, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. t. 127-hybrida.
flexnosa, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 81.—Afr. austr.
fragrans, *Jacq. Coll. Suppl.* 9.—Afr. austr.
fruticosa. Linn. f. Suppl. 93— Witsenia ramosa.
fruticosa, Thunb. Diss. Ixia, n. 1.1. 1. f. 8 = Aristea fruticosa.
fucata, Ker-Gawl. in Bot Mag. t. 1379 =scariosa.
fugacissima, Linn. f. Suppl. 94-=Galaxia graminea.
fugax, Homem. Hort. Hafn. i. 50 — Romulea rosea.
fugax, *Salisb. Prod.* 34.—Air. anstr.
furva, Banks, ex Ker-Gawl. in Kon. *8c* Sims, Ann. Bot. i. (1805) 224-Geissorhiza fuiva.
fuscocitrina, [DC. in] Red. Lil. t. 86 = maculata.
Galaxia, Linn. f. Suppl. 98 = Galaxia ovata.
Gawleri, Schrad. Neues Jonrn. iv. (1810) 67 = Lapeyrousia juncea.
geminata, Vahl, Enum. ii. 68 = Geissorhiza obtusata.
geminiflora, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 188.—Afr. austr.
gibba, Salisb. Prod. 38-Tritonia deusta.
gladiata. Linn. f. Suppl. 93 — Bobartia gladiata.
gladiolaris. Lam. Encyc. iii. 341=Tritonia securigera.
gracilis, Salisb. Prod. 37 = capillaris.
grandiflora, D. Delar. Desc. PI. Nov. 23 - Sparaxis grandiflora.
grandiflora, Pers. Syn. i. 48— monadelpha.
heterophylla, Willd. Sp. PI. i. 199 =Lapeyronsia fasciculata.
hexandra, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 186.—Afr. anstr.
hirsuta, Linn. Mant. i. 27 = Dilatris corymbosa.
hirta, Thunb. Diss. Ixia, 9= Geissorhiza hirta.
Hochstetteriana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 309 = Hesperantha Petitiana.
holosericea, Jacq. Hort. Schoenb. i. 9 — Sparaxis grandiflora.
humilis, Thunb. Diss. Ixia, 8 — Geissorhiza humilis.
hyalina, [DC. in] Red. Lil. t. 87-Tritonia squalida.
hyalina, Linn. f. Snppl. 91 — Tritonia hyalina.
hyalina, Salisb. Prod. 38; Willd. Enum. Hort. Berol. 57 -< Tritonia crocata.
hybrida, *Ker-Gawl. in Kon. &• Sims, Ann. Bot.* i. (1805) 227.—Afr. austr.
imtricata, D. Delar. Desc. PI. NOT. 17 = Geissorhiza imbricata.
incarnata, Jacq. Coll. Snppl. 12--scariosa.
inflexa, D. Delar. Desc. PI. Nor. 15 - Geissorhiza inflcxa.
iridifolia, D. Delar. 1. c. 24 =Tritonia crocata.
iridifolid, Link, Enum. Hort. Berol. i. 62-Watsonia **Meriana.** *"
juncea, Link, 1. c. 50=Geissorhiza juncea.
lacera. Herb. Linn, ex Roem. & Schult. Syst. i. 398 == Sparaxis grandiflora.
lancea, Jacq. Ic. t. 281; Thunb. Diss. Ixia, 18 = Tritonia scariosa.
Lapeirousia, J. F. Gmel. Syst. 108—Lapeyrouviacompressa.
Larochei, Roem. & Schult. Syst. i. 379 = Geissorhiza Rochensis.
latifolia, D. Delar. PI. NOT. 22 = Geissorhiza latifolia.
laurea, Steud. Norn. ed. II. i. 779, 811, sphalm.-***lancea.***
leucantha, *Jacq. Coll. Suppl.* 11.—Afr. austr.
lilacina, *Eckl. Top. Vert.* 27, nomen.—Afr. austr.
Liliago, [DC. in] Red. Lil. 1.109 — Sparaxis grandiflora.
timearis, Jacq. Coll. iv. 183 = Hesperantha angusta.
linearis,' *Linn./, Suppl.* 92; *Thunb. Diss. Ixia,* 12.— Afr. austr.
lineata, *Salisb. Prod.* 35.—Afr. austr.
longiflora. Berg. Desc. PI. Cap. 7 -Tritonia Rochensis.
longiflora, Lam. Encyc. iii. 312 (Watsoniae sp. ?).—Afr. austr
longiflora, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 58 = paniculata.
longifolia, Jacq. Hort. Vindob. iii. 47 = Hexaglottis longifolia.
lutea. *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877; 91.— Afr. austr.
lutea, Eckl. Top. Verz. 24 = curta.
maculata. *Linn. Sp. PI.* ed. II. 1664; Mant. ii. 320. —Afr. anstr.
magellanica, Lam. Illustr. i. 109; Encyc. iii. 334 = Tapeinia magellanica.

IXIA:—
marginata, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 69 = Watsonia marginata.
Meriana, Link, Enum. Hort. Berol. i. 62 = Watsonia Meriana.
micrandra, *Baker, in Journ. Bot.* JUT. (1876) 237.— Afr. austr.
Milleri, Berg. Desc. PI. Cap. 8 — maculata.
miniata, [DC. in] Red. Lil. i. t 89 = Tritonia deusta.
miniata, Jacq. Hort. Schoenb. i. 10. t. 24-Tritonia miniata.
minima, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* ii. (1822) 179.—Afr. austr.
minima, Tenore, Fl. Nap. i. 13, in obs.; Syll. 24 = Romulea Columnae.
minuta. Linn. f. Suppl. 92 —Pauridia hypoxidoides.
monadelpha, *D. Delar. Desc. PI. Nov.* 22.—Afr. austr.
monadelphia, Burm*, f. Fl. Cap. Prod. 1* = praec. ?
monanthos, D. Delar. Desc. PI. NOT. 21 = Sparaxis grandiflora.
monanthos, Thunb. Fl. **Cap.** i. 226 = Geissorhiza Rochensis.
mutabilis, *Salisb. Prod.* 34.—Afr. anstr.
neglecta, Schult. Mant. i. 279 =-Romulea speciosa.
nervosa. Vent. Choix, sub 1.10— maculata, polystachya.
nigro-albida, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 396= maculata.
obtusata, Soland. ex [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. t. 672 - Geissorhiza obtusata.
ochracea, *Eckl. Top. Verm.* 25.—Afr. austr.
ochroleuca. Sweet, Hort Brit. ed. II. 502= maculata.
ochroleuca, Vahl, Enum. ii. 50 = Romulea ochroleuca.
odorata, *Ker-Gawl. /rid. Gen.* 101.—Afr. austr.
ornithogaloides, Lichtst. ex Roem. & Schult. Syst. i. 876 — Trichonema ornithogaloides.
ovata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 1*—Geissorhiza excisa.
ovata, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 899; *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 396.—Afr. austr.
pollens, Steud. Nom. ed. I. 458-patens.
pallideflavens, Eckl. Top. Verz. 2S=cnrta.
pallide-rosea, Eckl. 1. c. 24= flexnosa.
paniculata, *D. Delar. Desc. PI. Nov.* 26.1.1.—Afr. austr.
parviflora, Salisb. Prod. 34 — Romulea Columnae.
patens, *{Soland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 59.— Afr. austr.
patens, Willd. Enum. Hort. Berol. 56 = flexuosa.
pectinata, Vahl, Enum. ii. 62 = Tritonia pectinata.
pendula, Thunb. Diss. Ixia, 15 = Dierama ensifolium.
pentandra, Linn. f. Suppl. 92 = Tritonia scillaris.
Petitiana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 309 - Hesperantha Petitiana.
phalangioides, Roem. & Schnlt. Syst. i. 385 - Geissorhiza scillaris.
phlogiflora, [Delile, if.l Red. Lil. viii. t 432-scariosa.
pigmaea, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 1* =*pygmaea.*
pilosa. Linn. f. Snppl. 92 = Hesperantha pilosa.
planifolia. Mill. Ic. 160. t. 239. f. 2; ex Roem. *8c* Schult. Syst. i. 400 = Tritonia crocata.
plantaginea, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 69 = Mlcranthus plantagineus.
plicata, Linn. Cent PI. ii. 4; Amoen. Acad. iv. 300 — Babiana stricta.
polystachya, [DC. in] Red. Lil. t. 126-flexuosa.
polystachya, Jacq. Coll. iii. 269—Tritonia scillaris.
polystachya, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 629 - Watsonia retusa.
polystachya, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 51.—Afr. austr.
prasina, Soland. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 92 = viridiflora.
propinqua, *Salisb. Prod.* 38.—Afr. austr.
pudica, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 575 = Romulea pudica.
pulcherrima, Eckl. Top. Verz. 24 = speciosa.
pulchra, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 320 = viridiflora.
pumila, Forst. f. in Comm. Gotting. ix. (1789) t. 2 — Tapeinia magellanica.
punctata, Andr. Bot. Rep. t. 177 = Watsonia punctata.
punicea, *Eckl. Top. Vert.* 24.—Afr. austr.
punicea, Jacq. Coll. Suppl. 12 ; Ic. PI. Rar. t 287 — Babiana stricta.
punicea, Spreng. Neue Entdeck. i. 254 = patens.
purpurascens, Tenore, Fl. Nap. i. 13. t. 8 — Romulea purpurascens.
purpurea, Jacq. Coll. iii. 268 = Babiana stricta.
purpurea. Lam. Encyc. iii. 341 = Tritonia crocata.
pusilla, Andr. Bot. Rep. t. 245 — Geissorhiza secunda.
pygmaea, Roem. & Schult Syst. i. 403 = Babiana nana.

IXIA:—
pyramidalis, Lam. Encyc. iii. 334 = Lapeyrousia anceps.
quadrangula, D. Delar. Desc. PI. Nov. 16 = Geissorhiza quadrangula.
quadrangularis, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 1* — praec.
Quartiniana, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 310 = Acidanthera bicolor. ».
radians, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blaett i. (1803) 3 —Geissorhiza Kochensis.
radiata, Jacq. Coll. Suppl. 15 — Hesperantha radiata.
ramiflora, Tenore, Syll. 25 = Romulea ramiflora.
ramosa, [Ker-Gawl. in] Bot Mag. sub t. 649 - Geissorhiza secunda.
rapunculoides, [Delile in] Red. Lit. viii. t. 431 = scariosa.
recurva, [DC. in] 1. c. t 251. f. 1 = Romulea bulbocodioides.
recurva, Vahl, Enum. ii. 58 —Hesperantha radiata.
recurvifolia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 201 —Trichonema recurvifolium.
reflexa, Andr. Bot Rep. 1.1. 14 —Tritonia scillaris.
reflexa, Thunb. Fl. Cap. ed. II. 66 —Romulea bulbocodioides.
reticularis, *Salisb. Prod.* 37.—Afr. austr.
reticulata, Thunb. Fl. Cap. ed Schult. 60-Tritonia lineata.
retusa, Salisb. Prod. 35 = Tritonia scillaris.
Rochensis, [Ker-Gawl.] in Bot Mag. t. 598 — Geissorhiza Rochensis.
rosea, Linn. Syst. ed. XII. 75 = Romulea rosea.
rq\ata, [Ker-Gawl.] Andr. Recens. PI. Bot. Rep. 3 - Tritonia scillaris.
Tubrocyanea, Jacq. Coll. iii. 268 = Babiana stricta.
scariosa, *Thunb. Fl. Cap.* i. 243.—Afr. austr.
Sceptrum, Hort. ex Baker, in Joum. Linn. Soc. xvi. (1877) 158 —Watsonia marginata.
scillaris, Linn. Sp. PI. ed. II. 52-Tritonia scillaris.
scillaris, Mi'l. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3-Babiana stricta.
scillaris, Thunb. Diss. Ixia, 13 —Geissorhiza secunda.
secunda, *Berg. Desc. PI. Cap.* 6.—/ fr. austr.
secunda, D. Delar. Desc. PL NOT. 17 = Geissorhiza secunda.
serotina, [Masson] Salisb. Prod. 34 -polystachya.
setacea, Thunb. Diss. Ixia, 18 = Geissorhiza setacea.
similis, Salisb. Prod. 88 = Tritonia squalida.
socialis, *Salisb. I. c.* 35.—Afr. austr.
sordida, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl.* 6.—Afr. austr. , *Sparrmanni,* Schult Mant i. 285 *{—Meristostigma Sparmanni).*—Afr. austr.
sparsa. Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7 = Sparaxis grandiflora.
spathacea, [Soland.] ex Ker-Gawl. in Bot Mag. sub t. 1483 = Gladiolus trichonemifolius.
speciosa, *Andr. Bot. Rep.* t. 186.—Afr. austr.
spectabilis, Salisb. Prod. 35-viridiflora.
spicata, Andr. Bot. Rep. i. t. 29 «= maculata.
spicata, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 1* — Lapeyrousia juncea.
spicata, Willd. Sp. PI. i. 200-Watsonia spicata
Sprengeliana, Schult. Mant i. 282 = patens.
squalida, [Soland. in] Ait Hort Kew. ed. I. i. 61 -Tritonia squalida.
squalida, Thunb. in Hoffm. Fhytogr. Blaett. i. (1803) 4 = Tritonia lineata.
stellaris. *Hill, Veg. Syst.* x. 8.—Afr. austr.
stellata, Hort ex Koem. *8c* Schult. Syst i. 401-Sparaxis tricolor,
stellata, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xii. (1882) 396.—Afr. austr.
striata, Vahl, Enum. ii. 65 = scariosa.
sublutea, Lain. Kncyc. iii. 335 •= Romulea sublutea.
tardiflora, *Salisb. Prod.* 38.—Afr. austr.
tenella, Klatt, in Abh. Natnrf. Ges. Halle, xii. (1882) 896 — flexuosa.
tenuiflora, Vahl, Enum. ii. 66 =Tritonia langiHora.
tenuifolia, Vahl, 1. c. 62 = linearis.
teretifolia, Banks, ex [Ker-Gawl. in] Bot. Mag. t. 523 —Watsonia spicata.
thrysiflora, D. Delar. Desc PI.Nov. 20-flexuosa.
Thunbergii, Roem. & Schult Syst. i. 891= Tritonia lineata.
tortuosa, Licht ex Roem. *8c* Schult. 1. c. 375 = Romulea tortuosa.
tricolor, Schneev. Ic. t. 39 = Sparaxis tricolor.
triticea, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 1* = Micranthus plantagineus.
tubulosa, Burm. f. 1. c. — Babiana tubiflora.

IXIA:-
umbellata, Burm. f. Fl. Ctp. Prod. 2-Dilatris corymbosa.
undulata, Bonn. f. 1. c. 1*-Tritonia undulata.
undulata, Salisb. Prod. S7 = crispa.
uniflora, Linn. Mant. i. 27 =Sparaxis grandiflora.
variegata, Banks, ex Schnlt Mant i. 825=mouadelpha.
venosa. *Link, Enum. Hart. Berol.* i. 51.—Afr. austr.
vernalis, Salisb. Prod. 33=Crocus vemni.
verrucosa, B. Vog. in Trew, PL Rar. t. 24. f. 2 = Geissorhiza excisa.
villosa, [Soland. in] Ait Hort Kew. ed. I. i. 58 = Babiana stricta.
villosula,]. F. Gmel. Syst. 110-Babiana stricta.
molacea, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot Mag. t 598 = Geissorhiza Rochensis.
•*rirgata,* Willd. Sp. PI. i 202 = Hexaglottis virgata.
virginea, Soland. ex Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 225-Hesperantha angusta.
viridiflora. *Lam. Encyc.* iii. 340.—Afr. austr.
viridis, Thunb. Fl. Cap. i. 242 = viridiflora.
vitellina, Eckl. Top. Verz. 25-curia.
Xipkidium, Loefl. ex Roem. & Schnlt. Syst. i. 487 = Xiphidium floribnndnm.

IXIA, Mnhl. ex Spreng. Syst. i. 171 (1825)=HjrdriUa, Rich. (Hydroch.).
aquatica, Mnhl. 1. c.-H. verticillata.

IXIANTHES, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (18S6) 53. *SCROPHULARINEAE,* Benth. & Hook f. ii. 937.
retzioides, *Benth. I. c*—Afr. anstr.

IXIANTHUS, Reichb. Norn. 116 (1841)-praec.

IXIAUCHENUS, Less. Syn. Comp. 193 (1882) -IXAUCHENOS, Cass.^Lagenophora, Cass. (Compos.).

IXIDIUM, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. H. ISO. t. 31 (1868)=Eremolepi8, Griseb. (Loranthac).
Schotti, Eichl. 1. c. 131.—Am. trop.
Wrightii, Eichl. 1. c 182.—Am. trop.

IXINA, Rafin. AtL Joura. 144 (1832) = Krameria, Linn. (Polygal.).

KINE, Hill, Veg. Syst. iv. 17 (1762) = Cnieus, Tourn. (Compos.).
arvensis, Hill, Herb. Brit. i. 74=C. arvensis.
Casabonae, Hill, Hort. Kew. 61=C. Casabonae.
tuberosa, Hill, 1. c. = C. tuberosns.

IXIOCHLAMYS, F. Mnell. & Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 466=PodOOOma, Cass. (Compos).
cuneifolia, F. Muell. & Sond. 1. c. = P. cuneifolia.

IXIOLAE1TA, Benth. in Ennm. PI. Hueg. 66 (1837). *COMPOSITAE,* Benth. *St* Hook. f. ii. 815.
brevicompta, *F. Muell. Fragm.* i. 58.—Austral.
chrysantha, Steetz, in Lehm. Preiss. i. 459=Podotheca chrysantha.
leptolepis, *Benth. Fl. Austral.* Hi. 597.-AnstraI.
supina,*F. Muell. in Trans. Viet. Inst.* i. (1855) 37.-Austral.
tomentosa, *Sond. V Muell. in Linnaea,* xxv. (1852) 504.—Austral.
viscosa, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 66.—Austral.

IXIOLIRION, Fisch. ex Herb. App...37 (1821). *AMARYLUDEAE,* Benth. & Hook. f. in. *If*-
KOLPAKOWSKIA, Regel, in Gartenfl. xxvii. (18/8) 95'.
Kolp^ow'skiailum, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi.

ffi&W^ Bong * May. Soppl Fl.

Alt. n. 298 = montanum.
montanum, *Herb. App.* 37—Syria; Persia.
montanum, Kunth, Enum. PI. v. 817-Pallasii.
Pallasii, *Fisch. V Mey. ex Udeb. Fl. Ross. iv.* 116.-Reg. Casp.; Afghan.
tataricum, Herb. App. S7=montonum.
tataricum, Schult. f. Syst. vi!. 752-Pallasii.

IXIONANTHES, Endl. Gen. 1055 (1840)=Ixonanthes, Jack (Lineae).

IXIOSPORUM, F. Muell. Fragm. ii. 76 (1860) - Citriobatua, A. Cunn. (Pittosp.).
spinescens, F. Muell. 1. c. = C. panciflorus.

IXODIA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 517 (1812); Bot. Mag. 1.1534 (1813). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 318.
achilleoides, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iv.517.—Austral.
atata, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 593 = achilleoides.
Ammobipm, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 300=Amniobium alatnm.
ptarmicoides, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 405= achilleoides.

IXODIA, Soland. ex DC. Syst. ii. 37 (1821) - Brasenla, Schreb. (Nymph.).

IXONANTHES, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) vn. 51. *LINEAE,* Benth. & Hook. f. i. 245.
BREWSTERA, M. Roem. Syn. i. Hesper. 132, 141 (1846).
EMMENANTHUS, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 217 (1836).
PIEROTIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 179 (1850).
chinensis, *Champ, in Proc. Linn. Soc.* ii. (1850) 100.—Hongkong.
cuneata, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 484.—Sumatra.
dodecandra, Griff. PI. Cantor. 12 = icosandra.
icosandra, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 68.—Malaya.
khasiana, *Hoot./. Fl. Brit. Ind.* i. 416.—Reg. Himal.
lucida, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 896 = icosandra.
obovaU, *Hmk.f. Fl. Brit. Ind.* i. 417.—Malaya,
petiolaris, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 396.—Malaya.
reticulata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 51 — Malaya.

IXOPHORUS, Schlecht in Linnaea, xxxi. (1861-62) 420-Setaria, Beauv. (Gramin.).
Schiedeanus, Schlecht. 1. c421 = S. Schiedeana.
uniseius, Schlecht. L c = S. uniseta.

IXOHA, Linn. Syst ed. I (1735). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 113.
BEMSETIA, Rafin. Eyhra Tellur. 12 (1838).
EUMACHIA, DC. Prod. iv. 478 (1830).
PANCHEZIA, Montr, in Mem. Acad. Lyon, x. (1860) 223.
SCHETTi,.Adans. Fam. ii. 146 (1763).
SIDERODENDRUM, Schieb. Gen. 71 ;1789).
SIDEROXYLOIDES, Jacq. Select. Am. 19. t 175. f. 9 (1763).
abyssinica, Oliver, in Trans. (Linn. Soc. xxix. (1873) 87-Pavetta abyssinica, Oliveriana.
acuminata, *Roxb. Hort. Btng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 883.—Reg. Himal.
acuminata, Thw. Enum. PI. Zeyl. 165 = Thwaitesii.
acuminatissima, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 454.—Bras.
acutifolia, Reinw. ex Mlq. Fl. Ind. Bat. ii. 272-Pavetta nigricans.
affinis, Wall. Cat. n. 6144=nigricans.
africana, *Beauv. ex A. Rich, in Mlm. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 117.—Afr. trop.
alba, *Linn. Sp. PI.* 110.—Ind. or.
alba, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 379-stricta.
alba, Sm. ex Wight & Am. Prod. 401 - Stylocoryne Webera.
alternifolia, Jacq. Enum. Fl. Carib. 12 - Cestrum vespertinum.
amabilis, *Hart, ex Flor. Mag.* x. (1871) tt. 649, 550.—Hab.?
amara, Steud. Nom. ed. II. i. 84*2, sphalm. = amocna.
amboinica, *DC. Prod.* iv. 487.—Ins. Amboin.
americana, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 4. t. 257 = Bonvardia triphylla.
americana. Linn. Syst. ed. X. 898 = Bouvardia chlorantha, Famarea odoratissima.
amoena, *Wall. Cat.* n. 6121.—Burma; Malaya,
amplifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 40.—Ins. Samoa.
angulata, Benth. ex Benth. & Hook. Gen. ii. 114-Appunia angulata.
angusti/olia,LMm. Encyc. iii. 45 = Pavetta angustifolia.
arborea, Lodd. Bot. Cab. t. 609 = coccinca.

IXORA.—
arborea, Roxb. ex Sm. in Rets, CycL xix. n. 5-parviflora.
arborescens, Hassk. in Retria, i. 22 = grandifolia.
arenosa, Poir. Encyc. Suppl. iii. 209=Pavetta arenosa.
arguta, R. Br. in Wall. Cat. n. 6157-nigricans.
Arnottiana, Miq. ex Hook. *I* Fl. Brit. Ind. iii. 142 = brachiata.
attenuata. Wall. Cat n. 6164-Chasalia enrviflora.
bahiensis, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (18K0) 447.—Bras.
Bandhuca, Roxb. Hort. Beng. [10] ; Fl. Ind. i. 376 = coccinea.
barbata, *Roxb. II. cc.* [10]; 384.—Ins. Andam.
Becklerii, *Benth. Fl. Austral,* iii. 415.—Austral.
Benthamiana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 455.—Bras.
Berneriana, *Baill. Adansonia,* xii. (1876-79) 218.-Madag.
blanda, Ker-Gawl. in Bot. Reg. 1100-chinensis.
Blumei, *Zoll. (3- Afar. Syst. Vert. Zoll.* 65.—Java,
brachiata, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 381 Ind. or.
brathypoda, DC. Prod. iv. 488=lajdflora.
brachysiphon, *Hiern, in Oliver, Ft. Trop. Afr.* iii. 165.—Afr. trop.
bracteolaris, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 453.—Bras.
Brandisiana, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 316.—Burma,
breviflora, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 165.—Afr. trop.
brevifolia, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 448.—Bras,
brnnnescens, *Kurt, in Journ. As. Soc. Seng.* xli. (1872) H. 317.—Ins. Andam.
Brunonis, *Wall. Cat.* n. 6136.—Burma ; Malaya.
Burbidgei, *Hort. Veitch.—Cf. Gard. Chron.* (1881) II. 281.—Hab. ?
Burehelliana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 454.—Bras.
buxifolia, Spreng. Syst. i. 409 = Rondeletia buxifolia.
buxina, *Baill. Adansonia,* xii. (1876-79) 294.—N. Caled.
caffra, Poir. Encyc. Suppl. iii. 209 = Pavetta caffra.
caffra, Sond. in Linnaea, xxvL (1850) 50 Oxyanthus natalensis.
calycina, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 156.—Zeylan.
Canjia, Wall. Cat. n. 6130 = undulata.
Carewi, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 364.—Ins. Fiji.
camea, *Benth. V Hook.f. Ge.i.W.* 114.—Ins. Amicor.
Casei, *Hance, in Walp. Ann.* ii. 754.—China,
cauliflora, *Montr, in Mim. Acad. Lyon,* x. (1860) 224.—N. Caled.
chinensis, *Lam. Encyc.* iii. 344.—China.
coccinea, Comm. ex Lam. Encyc. ii. 355 *-Embothrium coccineum.
coccinea, Curt. Bot. Mag. t 169 = chinensis.
coccinea, *Linn. Sp. PI.* 110.—As. trop.
Colebrooiii, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 891-lanceolaria.
compactiflora, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) II. 315.—Burma.
concinna, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 6149.—Malaya,
congesta, *Roxb. Hort. Beng.* 88; *Fl. Ind.* i. 387.—Burma; Malaya.
Conjia, Buch.-Ham. ex Steud. Nom. ed. II. i. 842 - *Canjia.*
cordifolia,- [Moc. & Sesse,] ex DC. Prod. iv. 306 - Bouvardia cordifolia.
coriacea, K. Br. in Wall. Cat. n. 6161 - Webera grandifolia.
corymbosa, Heyne, in Wall. 1. c. n. 6155 = polyantha.
corymbosa, Mirb. in Hut. Nat. PI. ed. II. xiv. 57-Lonicera corymbosa.
crecata, Lindl. Bot. Reg. t 782-chinensis.
Cumingiana, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 183.—Ins. Philipp.
cuneifolia, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 380.—Ind. or.; Burma.
cyatl'osperma, Wall. Cat. sub n. 6121-amoena.
Cypheri x.—Cf. Gard. Chron. (1874) II. 49.
Dallachyana, F. Muell. Census,' 75-Webera Dallachiana.
decipiens, DC. Prod. iv. 488 = parviflora.
densa, R. Br. in Wall. Cat. n. 6150=nigricans?
densiflora, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 455.—Bros.

IXORA :-
dimorphophylla, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1876) 454.—Bras.
diversifolia, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 6146.—Burma.
dubia, Schult. Mant. iii. 121=ehinensis.
> *Duffii,T.* Moore, Flor. & Pomel. (1878) 76=macrothyrsa.
tlliptica, R. Br. in WalL Cat. n. 6153=grandifolia.
elongata, *Heyne, ex Wall. Cat.* n. 6131.—Ind. or.
emimensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 412.—Madag.
eriantha, *A. Gray, in Prec. Am. Acad.* iv. (1860) 40.—Bras.
erubescent, *Wall. Cat.* n. 6143.—Burma,
erythrostylis, *Wall, ex Voigt, Hurt. Suburb. Cole.* 391.—Hab. 1
expandens, F. Muell. Census, 75=Webera expandens.
fasciculata. Sw. Prod. Veg. Ind. Occ 30=Chomelia fasciculata.
ferrea, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 447.—Ind. occ.
Finlaysoniana, *Wall. Cat.* n. 6166.—Siam T
flammea, Salisb. Prod. 62 – stricta.
fltva, *Lodd. ex G. Don, in Loud. Hart. Brit.* 49, nomen.—Ind, or.
floribuoda, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 184.—Cuba,
foliosa, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 166.—Afr. trop.
formosax.—C(.Gaid. Chron. (1878) 1.10; (1881) II. 836.
fragrant, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 39-Cephaëlis fragrans.
Francavillana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 454.—Bras,
ftlgens, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* L 378.—Burma; Malaya.
fulgens, Wall. Cat. n. 6512 B.-congests.
Gardneriana, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 448.—Bras.
glandulosa, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 61 {^*Canthium confertum).*—Ins. Philipp.
glaucina, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlri. (1877) II. 148.—Burma.
Glaziovi, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 460.—Bras,
gradliflora, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 448.—Guiana,
gracilis, *R. Br. ex Fawe. in Forbes, Nat. Wand. East. Arehip.* 508.—Ins. Timor.
grandiflora, [Ker-Gawl.] in Bot. Reg. t. 154-coccinea.
grandiflora, Schlecht. ex Hook. f. FLBrit Ind. iii. 139 = Notoniana.
grandifolia, R. Br. in Wall. Cat. n. 6184=Webera grandifolia. <
grandifolia, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 454.—Bras,
grandifolia, *Zoll. (f MOT. Syst. Vert. Zoll.* 65.—Malaya.
grandis, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 140 = polyantha.
Griffithii, Hook. Bot. Mag. t. 4325-congesta.
guianensis, Spreng. Syst. i. 409 = Cofiea guianensis.
guineensis, *Benth. in Hoot. Niger Fl.* 414.—Afr. trop.
Helferi, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 816-WeberaHelferi.
heterodoxa, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 454.—Bra*,
heterophylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 68.—Bras.
incarnata, DC. Prod. iv. 486=coccinea.
inearnata, Roxb. ex Sm. in Rees, Cycl. xix. n. 4 = chinensis.
indica, Baill. Hist. PI. vii. 278 = Pavetta indica.
inundata, *Hiern, in Oliver^ Fl. Trop.. Afr.* iii. 166.—Afr. trop.
javanica, *DC. Prod.* iv. 487—Java.
Johnsoni, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 139—Ind. or.
Toskei, *Home, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 363.—Ins. Fiji.
jucunda, *Thw. Enum. PI. Zeyl.* 155.—Zeylan.
Kingstoni, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 140.—Malacca.
Klanderiana, F. Muell. Fragm. v. 18=timorensis.
Korthalsiana, *Kurt, in Journ. As. Soc, Beng.* xlvi. (1877) II. 149.—Malaya.
Kurteana, Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. NederL Ind. xxvii. (1864) 100 = grandifolia.
lanceolaria, *Cotebr. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* i. 897.—Ind. or.

IXORA :—
lanceolata, Lam. Encyc. iii. 343 = fulgens.
laxiflora, *Sm. in Rees, Cycl.* xix. n. 8.—Afr. trop.
leucantha, Heyne, in Wall. Cat. n. 6148 = lanceolaria.
Lobbii, *Loud. Encyc. PI. Suppl.* ii. 1543.—Hab. ?
longiflora. Hook. Bot. Mag. t. 4482, in syn. sphalm.= laxiflora.
longiflora, Poir. Encyc. Suppl. iii. 208-= Pavetta longiflora.
longifolia, G. Don, Gen. Syst. iii. 573 = Webera longifolia.
longifolia, Sm. in Rees, CycL xix. n. 3=fulgens.
longifolia, Walp. Ann. ii. 756, sphalm.=Pavetta longiflora.
longipes, *Zoll. ff Mor. Syst. Vert. Zoll.* 65.—Java.
Loureiri, G. Don, Gen. Syst. iii. 678 - alba J
lncida, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 6135.—Penang.
macrophylla, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 487.—Ins. Philipp.
macrophylla, R. Br. in Wall. Cat. n. 6165-Webera longifolia.
macrosiphon, Kurz, in Journ. Bot. xiii. (1875) 827 = grandifolia.
. macrotbyrsa, *[Teijsm. V Binn."].—Cf. Gard. Chron.* (1884) II. 267.—Malaya.
manila, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 60-Scyphiphora hydrophyllacea.
mauritiana, Boj. Hort. Maurit 169 —Myonima multiflora.
maxima, *Seem. Fl. Vit.* 184.—Ins. Fiji,
membranacea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 458.—Bras.
memecylifolia, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) II. 316-erubescens.
merguensis, *Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iii. 140.—Burma.
micrantha, Heyne, ex Wall. Cat. sub n. 6112 = bracbiata.
micrantha, Roem. & Schult. Syst. iii. 179=Myonima multiflora.
minutiflora, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 167.—Afr. trop.
modesta, *Hiern, I. e.* 167.—Afr. trop.
montana, *Lour. Fl. Cochinch.* 76.—Cochinch.
montana, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 40 = Wendlandia Notoniana.
multiflora, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 30=Myonima multiflora.
mutabilis, Reinw. ex Miq. FL Ind. Bat. ii. 268 = Pavetta javanica.
naucleiflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlvi. (1877) H. 147 = Pavetta naucleiflora.
neriifolia, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) VII. 82.—Sumatra,
nigricans, *R. Br. in > Wall. Cat.* n. 6154.—Ind. or.; Malaya.
nigricans, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat ii. 271 - Pavetta paludosa.
nitida, Schum. & Thonn. Beskr. Gain. PL 77 = Pavetta Baconia.
Notoniana, *Wall. Cat.* n. 6132.—Ind. or.
novemnervia, *Lour. Fl. Cochinch.* 76.—Cochinch.
Nunypapata, Roxb. ex Wight & Am. Prod. 481=-Pavetta indica.
oblonga, *R. Br. in Wall. Cat. a.* 6147'A.—Burma; Malaya.
obovata, Heyne, in Roth, Nov. PI. Sp. 90 = coccinea.
obscura, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 465.—Bras.
obtusata, Miq. ex Hook. f. FL Brit. Ind. iii. 142 = brachiata.
occidental, Forsk. Fl. Aegypt Arab. p. cv=Pavetta. longiflora.
occidentalis, *Linn. Syst.* ed. X. 893.—Ind. occ
odorata, *Hook. Bot. Mag.* t. 4191.—Madag.
odorata, Spreng. Syst. i. 409=Coffea odorata.
odoratissima, Klotzsch, in Abh. Acad. BerL (1857) 227=laxiflora.
opaca, *R. Br. in Wall. Cat.* n. 6141.—Burma; Malaya.
owariensis, Poir. Encyc. Suppl. iii. 207 = Pavetta owariensis.
oxyphylla, Wall. Cat. n. 6159=subsessilis.
pallida, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 269-stricta.
paludosa, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlvi. (1877) II. 149.—Malaya.
paniculata, Lam. Encyc. iii. 844-Pavetta indica.
paniculata, Rottl. in Wall. Cat. n. 6163 = oblonga ?
panurensis, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 464.—Bras.

IXORA.—
farasitica, Poir. Encyc. Suppl. iii. 209 - Pavetta parasitica.
parviflora, Lam. Illustr. n. 1473. t. 66. f. 2-Myonima multiflora.
parviflora, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 11. t. 62.—Ind. or.
pauciflora, DC. Prod. iv. 487 - Pavetta pauciflora.
Pavetta, Andr. Bot. Rep. t. 78=parviflora.
Pavetta, Roxb. Hort. Beng. [10]; FL Ind. i. 385-Pavetta indica.
pedunculata, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 121= elongata.
pelagica, *Seem. Fl. Vit.* 134.—Ins. Fiji,
pcndula, *Jack, in Malay. Misc.* i. (1820) v. 11.—Malaya.
pentamera, *Benth. Fl. Austral,* iii. 416.—Austral.
pentandra, West, ex DC. Prod. iv. 456 = Guettarda parviflora.
podocarpa, *Benth. ex Benth. V Hook. Gen.* ii. 113.—Bras.
polyantha,. *Wight, Ic.* t. 1066.—Ind. or.
propinqua, R. Br. in Wall. Cat. n. 6118 = coccinea.
pruinosa, *Baill. Adansonia,* xii. (1876-79) 217.—Ins. Mascar.
puberula, Wall. Cat. n. 6145=cuneifolia.
pubescens, *Willd. ex Schult. Mant.* iii. 126.—Bras,
pubiflora, *DC. Prod.* iv. 489.—Ind. or.
pudica, *Baker, Fl. Maurit.* 161.—Ins. Seychelles.
purpurea, Fisch. ex Loud. Hort Brit. 49=coccinea.
quinquefida, *R. Br. ex Fame, in Forbes, Nat. Wand. East. Arehip.* 508.—Ins. Timor,
radiata, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 163.—Afr. trop.
recurva, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlvi. (1877) II. 146.—Burma.
Richardiana, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 454.—Bras.
Riedeliana, *Muell. Arg. I. c.* 455.—Bras,
riparia, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 164.—Afr. trop.
rosacea, *Perr. in Mem. Soc. Linn. Par.* iii. (1825) 128.—Java.
rosea, Sims, in Bot. Mag. t. 2428—chinensis.
rosea, Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 398 =• cuneifolia.
rosella, Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xli. (1872) II. 317=grandifolia.
rufa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 62.—Bras,
rugosula, *Wall. Cat.* n. 6168.—Burma.
rugulosa, Steud. Nom. ed. II. i. 843=praec.
salicifolia, DC. Prod. iv. 487-fulgens.
samoënsis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. (1860) 40.—Ins. Samoa.
Sandankwa, Hort. Bogor. ex Hassk. Retzia, i. 37 = Viburnum Sandankwa.
Schomburgkiana, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 448.—Guian.
Schottiana, *Muell. Arg. in Flora,* lvUi. (1876) 455.—Bras.
sericea, *Baker, Fl. Maurit.* 151.—Ins. Seychelles,
sessiliflora, *Baill. Adansonia,* xii. (1876-79) 219.—Ins. Nossi-W.
sessiliflora, Kurz, in Journ. As. Soc Beng. xli. (1872) II. 316—rugosula.
sessilifolia, Spreng. Syst. i. 409 = Faramea sessilifolia.
sessilis, Heynh. Nom. i. 427, sphalm.-subsessilis.
siamensis, *Wall.* Cat. ii. 6162.—Siam.
Soyauxii, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 166.—Afr. trop.
speciosa, Willd. Enum. Hort. Berol. 167-stricta.
spectabilis, *Wall. Cat.* n. 6133.—Burma.
spinosa, Lam. Encyc. iii. 344-Chomelia spinosa.
splendida, *Andre", in Illustr. Hortic.* xxix. (1882) t 463.—Hab. 1
Spruceana, *Muell. Arg. in Flora,* lviiL (1875) 464.—Bras.
stipulaU, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 65.—Bras.
Storckii, *Seem. Fl. Vit.* 134.—Ins. Fiji,
stricta, *Roxb. Hort. Beng. [\0]; Fl. Ind.* i. 379.—Ind. or.: Malaya.
stricta, Wight, ex Wall. Cat. subn. 6161 = Notoniana.
subcapitata, *Wall. I. c.* n. 6160.—Ind. or.
subsessilis, *Wall. 1. c.* n. 6189.—Reg. Hitnal.
sumatrensis, *Zoll. tf Mor. Syst. Vert. Zoll.* 65.—Sumatra,
syringaeflora, *Muell. Arg. in Flora,* lviii. (1875) 455.—Bras.

IXOBA:-
tenuiflora, *Roxb. Hart. Beng.* 88; *Fl. Ind.* i. 387.—Ins. Molucc
ternifolia, Car. Ic iv. 8. t. 805 = Bonvardia triphylla.
ternifolia. Hook. f. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1878) 86=Pavetta ternifolia.
Thomsoni, *Hiern, in Oliver, Fl. Trap. Aft.* iii. 164.—Afr. trop.
Thonetiana, F. Mnell. Fragm. ii. 182 - Randia densdflora.
Thwaitesii, *Hoot./. FL Brit. Ind.* iii. 138—Zeylan.
thyrsifolia, Poir. Encyc. Suppl. iii. 208 = Pavetta caffra.
thyrsoides,.Ww.«. *Arg. in Flora,* lviii. (1876) 455.—Bras,
timorensis, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1831) 418__Ins. Timor.
tinifolia, *Benth. in Linnaea,* xxiiL (1850) 447.—Ind. occ.?
tomentosa, Roxb. Hott Beng. [10] ; Fl. Ind. i. 886 = Pavetta indica.
tomentosa, Thw. Ennm. PI. Zeyl. 156 - Pavetta Gleniei.
triflora, *R. Br. ex Benth. Fl. Austral,* iii. 416.—Austral.
triflora, Seem. Fl. Vit 18S=Pavetta triflora.
trnncata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 459.—Bras,
undulata, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 885.—Ind. or.
velutina, Wall. Cat. n. 6174 = Pavetta indica.
venulosa, *Benth. in Linnaea,* xxiii. (1850) 446.—Bias.
versicolor, Hassle, in Hoev. & De Vriese, Tidjdschr. x. (1848) 135 = HelicteresIsora.
verticillata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vl. V. 59.—Bras.
villosa, Poir. Encyc. Snppl. iii. 208=Pavetta villosa.
villosa, *Roxb. Hort. Beng.* [10]; *Fl. Ind.* i. 883.—Ind. or.; Malaya.
violacea, *Lour. Fl. Cochinch.* 76.—Cochinch.
vitiensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* iv. {I860) 40.—Ins. Fiji.
Wallichii, Wight, ex Hook. f. FL Brit. Ind. iii. 188= lanceolaria.
Wallichii, *Wight V Am. Prod.* 428 -cuneifolia ?
Warmingii, *Muell. Arg. in Flora,* lviil (1876) 456.—Bras.
veberaefolia, Knrz, in Joura. As. Soc. Beng. xlv. (1876) H. 183-Webera Korzii.
Wightiana, Wall. Cat. n. ei61=Notoniana.

IZQUIERDIA, Ruiz *Be* Pav. Prod. 140 (1794) = Hyrsine ?, Linn.
aggregata, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 278 (•= *Samarta Itquierdia).*—Pernv.

J

JABOHOSA, Juss. Gen. 125 (1789). *SOLANACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 898.
DORYSTJGMA, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 347.
LONCHKWGMA, Dun. in DC. Prod. xiii. I. 476

B J K L *in Sol. Acad. Nac. Cirdava,* iii (1879) 866.—Reg. Argent.
bonariensif.]. FTGmel. Syst. 880 •=•J"teS.
caulescens, *Gill. V Hook, in Hook. Bot. Misc.* i. (1880) crisp^;lSItt!V *Hooi./. Gen.* ii. 898.-Bolivia.
decSrrens, *Miers, Trav. Chil.* ii. 531.-Chili.
integrifolia, *Lam. Encyc.* iii. 189,-Reg. Argent,
laciniata, *Miers, Trav. Chil.* ii. 531.-Peniv.
longiflora, *Mof. V Sesse, ex Dun. in DC Prod.* an. I. 481 —Mexic.
magelianica, *Benth.* 6" *Hook. f. Gen.* ii. 898.—Reg. Magell.
montevidensis, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* 78.-J. Argent.
, Lam. Encyc. Hi. 189-HimeranthM runcinatus.

JABOTAPITA, Adans. Fam. ii. 364 (1768) «= Crom-Pbia, Schreb. (Ochnac.).

JABROSA, Stend. Norn. ed. II. i. 796 (1840) - Jaborosa, Juss. (Solan.).

JACARANDA, Juss. Gerf. 188 (1789). *B1GN0NIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1060.
ETORLOBA, Rafin. Sylva Tellur. 79 (1838).
KOKDELESTRIS, Amida, in Koster, Trav. Braz. i. 500 (1816).
PTEROPODIUM, DC. in Meissn. Gen. 300; Comm. 209 (1840).
RAFINESQUIA, Rafin. Sylva Tellur. 79 (1838).
acutifolia, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* i. 59.1.17.—Perav.
alba, Spreng. Syst. ii. 854-Spathodiabracteosa.
Arrabidae, *Steud. Norn.* ed. II. i. 796.—Bras,
arvensis, *Steud. I. c*—Bras.
bahamensis, R. Br.'in Bot. Mag. t. 2327 =caerulea.
brasiliana, *Pers. Syn.* ii. 174.—Bras,
caerulea, *fuss. Gen.* 188; *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 446.—Ind. occ.
Caroba, *DC. Prod.* ix. 282.—Bras.
Caroba, Hort. ex Lem. Illustr. Horde, xi. (1864) sub t 393 "digitaliflora, gloxiniaeflora.
caroliniana, Pers. Syn. ii. 174=caerulea.
Chelonia, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 223.—Reg. Argent.
Clausseniana, *Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec.* vi. 63.—Bras.
coerulea, Auct-caerulea.
Copaia, *D. Don, in Edinb. Phil, fount.* (1893) 264 = Panama.
curialis, *DC. Prod.* ix. 282.—Bras,
enspidifolia, *Mart, in Flora,* xxiv. (1841) II. *Beibl.* 61.—Bras,
decurrens, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 644.—Bras,
densicoma, *Mart, ex A. DC. in DC. Prod.* ix. 282.—Bras,
digitaliflora, *Lem. Illustr. Hortie.* xL (1864) t. 898.—Bras.
echinata, *Spreng. Syst.* ii. 834.—Am. austr.
elegans. Mart, ex DC. Prod. ix. 231~oxyphylla.
elliptica, *Steud. Norn.* ed. II. i. 795; *Mart, ex DC. I. c.* 232.—Bras.
endotricha,.£C. *Prod.* ix. 281.—Bras,
filicifolia, *D. Don, in Edinb. Phil. Journ.* (1823) 266.—Panama.
gloxiniaeflora, Hurt, ex Lem. Illustr. Hortie. xi. (1864) sub t. 898=digitaliflora.
gloxiniaeflora, *Lem. 1. c.* iii. (1856) *Misc.* 44__Bras.
hebephora, *DC. Prod.* ix. 231__Bras.
intermedia, *Sond. ,»» Linnaea,* xxii. (1849) 563.—Bras.
macrantha, *Cham. 1. c.* vii. (181-2) 652.—Bras,
micrantha, *Cham. I. e.* 664.—Bras.
mimosae/olia, D. Don, in Bot. Reg. t. 681 •= ovalifolia.
nitida, *DC. Prod.* ix. 280.—Bras,
obovata, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 549.—Bras.
obovata, Mart, ex DC. Prod. ix. 230~ subrhombea.
obtusifolia, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* i. 62. t. 18.—Venezuela.
orbiculata, Spreng. Syst. ii. 884 « Anemopaegma orbiculatum.
ovalifolia, *R. Br. in Bot. Mag.* t. 2327.—Am. austr.
oxyphylla, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 546.—Bias.
paucifoliata, *Mart, ex DC. Prod.* ix. 280.—Bras,
paulistana, *Silva Manso, Enum. Subst. Bras.* 40.—Bras.
procera, *Spreng. Syst.* iii. 834.—Guiana,
pteroides, *Silva Manso, Enum. Subst. Bras.* 40.—Bras.
puberula, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 550.—Bras.
pubescent, Guill. in A. DC. in DC. Prod. ix. 281 = tomentosa.
pubescens, Lodd. ex G. Don, in Lond. Hort. Brit. 243 -praec. f
quinquefolia, Steud. ex A. DC. in DC. Prod. ix. 238=Zeyhera montana.
racemosa, *Cham, in Linnaea,* vii. (1882) 547.—Bras,
rhombifolia, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 213.—Guian.
rufa, *Silva Manso, Enum. Subst. Bras.* 40.—Bras.
Sagreana, *DC. Prod.* ix. 22'J.—Ind. occ.
semiserrata, *Cham, in Linnaea,* vii. (1832) 561.—Bras.
spectabilis, *Mart, ex DC. Prod. ix.* 229.—Bras,
subrhombea, *DC. I. c.* 280.—Bras.

JACAKANDA:—
subvelutina, Mart, ex DC. Prod. ix. 281=tomentosa.
tomentosa, *R. Br. in Bot. Mag.* t. 2327.—Bras,
tuberculosa, *Steud. Norn.* ed. II. i. 796.—Bras,
undulata, *Steud. I. c.*—Bras.

JACARATIA, A. DC. Prod. xv. I. 419 (1864)=Jaracatia, Marg. (Passifl.).

JACEA, [Tonrn.1 Linn. Syst. ed. I (1785); Juss. Gen. 173 (1789) = Centaurea, Linn. (Compos.).
alata, Lam. FL Fr. ii. 63 - C. montana.
alba, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 202=C. amara.
barbata, Delarb. 1. c = C. phrygia?
Cineraria, Delarb. L c. 200 - C. Cineraria.
communis, Delarb. 1. c 201-C. Jacea.
decumbens, Delarb. 1. c.=C. amara.
graminifolia, Lam. Fl. Fr. iii. 638 = C. trinervia.
involucrata, Lam. 1. c. ii. 54 = C. pullata.
nigra,S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI.ii. 442=C. Jacea.
nigra, Hill, Herb. Brit. i. 83; Lam. Fl. Fr. ii. 62; Moench, Metb. 565 - C. nigra.
paniculata, Lam. 1. c. 50=C. paniculata.
plumosa. Lam. 1. c. 61=C. phrygia.
pratensis, Lam. 1. c. 54; Cass. in Diet. Sc Nat xxiv. 89 «=C. Jacea.
ragusina. Lam. ex Steud. Nom. ed. II. i. 796 = C. ragusina.
Scabiosa, Lam. Fl. Fr. ii. 61 « C. Scabiosa.
segetalis, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. i. 796 =-seq.
segetum, Lam. Fl. Fr. ii. 54 - C Cyanus.
supina, Lam. 1. c. 63 - C. amara.
tomentosa, Gilib. FL Lituan. i. 193=C. Jacea.
vulgaris, Bernh. Syst. Verz. Erf. 168-C. nigra.

JACKIA, Blume, Bijdr. 60 (1826)-Xanthophyllum, Roxb. (Polygal.).
excelsa, Blume, 1. c 62—X. excelsum.
tongi/olia, Blume, 1. c 61-X. longifolium.
vitellina, Blume, 1. c—X. vitellinum.

JACKIA, Spreng. Syst iii. 85 (1826) =Erfolaena, DC. (Sterculiac).
spectabilis, Spreng. L c. = E. spectabilis.

JACKIA, WalL in Roxb. FL Ind. ed. Carey, ii. 821 (1824). *RUBIACEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 99.
ZUCCARINA, Spreng. Syst. iv. Car. Post. 60 (1827).
omata, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey,* ii. 321.—Malaya.

JACK8ONIA, R. Br. in Ait Hort Kew. ed. II. iii. 12 (1811). *LEGUMINOSAE,* Benth.& Hook. f. i. J69.
PIPTOMERIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 2S7.
alata, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 80.-Austral,
angulata, *Benth. Fl. Austral,* ii. 62.—Austral.
capitata, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 74 - umbellata.
capitata, *Meissn. in Lehtn. PI. Pniss.* i. 46.—Austral,
carduacea, *Meissn.* in *Bot. leit.* xiii. (1866) 26.—Austral,
compressa, *Turcm. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1853) I. 260.—Austral.
cupulifera, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 27« scoparia.
densiflora, *Benth. in Lindl. Swan River Abb.* 18.—Austral,
dilatata, *Benth. in Ann. Wien- Mus.* ii. (1838) 74.—Austral.
dumosa, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 44=furcellata.
fasciculata, Meissn. 1. c. ii. 212 = hakeoides.
floribunda, *Endl. Nov. Stirp. Dec.* 87.—Austral.
floribunda, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 43 - densiflora.
foliosa, *Turci. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1863) I. 260.—Austral.
furcellata, *DC. Prod.* ii. 107.—Austral.
gracilis, Meissn. in Lehm. PL Preiss. i. 44-sericea.
grevilleoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (18S3) I. 259 - floribunda.
hakeoides, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 46.—Austral.
horrida, *DC. Prod.* ii. 107.—Austral.
juncea, Turcx. in Bull. Soc Nat. Mosc. xxvi. (1853) I. 261-umbellata.
Lehmanni, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 46.—Austral.

JACKSONIA.—
macrocalyx, *Meissn. in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 26.-' Austral.
macrocarpa, Benth. In Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 74 = scoparia.
nematoclada, *F. Muell. Fragm.* x. 50.—Austral,
odontoclada, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, ii. 55.—Austral.
Piptomeris, *Benth. I. c.* 62.—Austral,
pteroclada, *F. Muell. Fragm.* x. 37.—Austral,
purpurascens, *F. Muell. 1. c.* iv. 161.—Austral,
racemosa, *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 212.—Austr4.
ramosissima, *Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 258.—Austral,
restioides,. *Meissn. in Lehm. PI. Preiss.* i. 46.—Austral.
reticulata, DC. Prod. ii. 107 =Pultenaea reticulata.
rhadinoclada, *F. Muell. Fragm.* x. 38.—Austral,
scoparia, *S. Br. in Ait. Hort. Kew.* ed. II. iii. 13.—Austral.
sericea, *Benth. in Enum. PI. Hueg.* 31.—Austral,
spinosa, *R. Br. in Ait. Hort. Kern.* ed. II. iii. 13.—Austral.
Stackhousii, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. W.* vi. (1881) 791.—Austral.
Sterabergiana, *Hueg. Bot. Arch.* t. 3.—Austral.
itricta, *Meissn. in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 27.—Austral,
thesioides, *A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus.* Ii. (1838) 74.—Austral.
ulicina, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. (1855) 26=hakeoides.
nmbellata, *Turct. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvi. (1858) I. 261.—Austral,
velutina, *Benth. Fl. Austral*, ii. 60.—Austral,
vemicosa, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral*, ii. 58.—Anstral.
viminalis, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 76=MirbelU oxyelada.

JACKSONIA, Hort. ex Schlecht in Linnaea, xxvii. (1854) 512 = Jasminum, Toum. (Oleac).
nitida, Hort. ex Schlecht. I. c.=Jasm. heterophyllum.

JACKSONIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = Cleome, Linn. (Cappar.).
tri/oliata, Rafin. 1. c = C. graveolens.

JACOBAEA, [Toura.] Linn. Syst. ed. I (1785); Thunb. Fl. Cap. Prod. Praet (1800) - Senecio, Tourn. (Compos.).
abrotani/olia, Moench,'Meth. 587 =&, abrotanifolius.
alpina, Moench, 1. c = S. alpinns.
angusti/olia, Thunb. Prod. PI. Cap. 166 =»S. angustifolius. c
anthoraefotia, Presl, Delic. Prag. 92 = S. delphinifolius.
aquatica, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 210 = S. aquatiens.
aurea, Moench, Meth. Suppl. 239 = S. aureus.,
auriculata, Schrank, in Denkschr. Akad. Mnench. (1816-17) 194 = S. auriculatus.
Balsamita, Rafin. FL Ludov. 140=S. aureus.
bidentata, Thunb. Prod. PL Cap. 166 = S. paniculatus.
camiolica, Schrank, in Denkschr. Acad. Muench. 1813 (1814) 316=S. caniiolicus.
carnosa, Presl, Delic. Prag. 93=S. aethnensis.
cordata, Opiz, Seznam, 54=S. alpinus.
crassi/olia, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354, nomen (Quid 1).—Am. bor.
denticulata, Gilib. Fl. Lituan. i. 200 - S. sylvaticus.
Doria, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 214 - £' S. Doria.
elegans, Moench, Meth. 586=S. elegans.
erratica, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404=S. Jacobaea.
eruci/olia, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 208 = S. erucifolius.
flosculosa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404=S. Jacobaea.
/rondosa, Opiz, Seznam, 54=S. nemorensis.
Fuchsii, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 81 =S. nemorensis.
glasti/olia, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 45 = S. glastifolius, *Linn./.*
gracilis, Rafin. ex DC. Prod. vi. 482=S. gracilis.
incana, Gilib. Fl. Lituan. i. 202 =S. vemalis.
incana, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354, nomen (Quid ?).—Am. bor.

JACOBAEA:—
incisa, Presl, Delic. Prag. 94 - Senecio aethnensis.
Kosteleckii, Opiz, Seznam, 54 = S. paludosus.
lanuginosa, Presl, Delic: Prag. 90=S. nebrodensis.
macrophylla, Clans, in Goebel, Reise, ii. 288=S. Dona.
macrophylla, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 81 = S. macrophyllus.
mucronata, Thunb. Prod. PI. Cap. 156 - S. mucronatus.
nebrodensis, Rafin. Chlor. Aetn. 6=-S. nebrodensis.
nemorensis, Moench, Meth. 587 - S. nemorensis.
nemarosa, Fonrr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404 = S. Jacobaea.
nivea, Thunb. Prod. PI. Cap. 156; NOT. Gen. 171 = S. niveus.
opuntifolia, Rafin. Fl. Ludov. 67 = S. opuntiaefolius.
Othonnae, C. A. Mey. Verz.' Pfl. Cauc. 81 - S. Othonnae.
mala, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. iii. 212 = S. Fuchsii.
paludosa, Gaertn. Mey. & Scherb. 1. c. 211 =S. paludosus.
paniculata, Thunb. Prod. PI. Cap. 156-S. paniculatus.
persidfolia, Thunb. 1. c. «=S. persicifolins.
peucedani/olia, Thunb. 1. c. 157 = S. paniculatus.
purpurta, Thunb. 1. c. = S. purpnreus.
reclinata, Thnnb. 1. c.-=S. paniculatus.
rosmarinifolia, Moench, Meth. Suppl. 239 - S. rosmarini'dlius.
rubella, Moench, Meth. 686=S. erucifolius.
saracenica, Moench, 1. c 588-S. saracenicus.
scabra, Thunb. NOT. Gen. 178 - S. rigidus.
scabra, Thunb. Prod. PI. Cap. 156=S. ernbescens, rigidus.
sicca, Gilib. Fl. Lituan. i. 199 = S. Jacobaea.
sinuata, Gilib. 1. c. 201 «=S. Temalis.
sinuata, Moench, Meth. Suppl. 239=S. aegypticus.
squalida, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 81 = S. vemalis.
suaveolens, Gilib. Fl. Lituan. i. 201 = S. erucifolius.
syhatica, Moench, Meth. 586=S. sylvaticus.
tenuifolia, J. & C. Presl, Fl. Cech. 175=S. erucifolius.
tomentosa, Moench, Meth. 587 «-S. Cineraria.
tomentosa, Thunb. Nov. Gen. 175; Prod. PL Cap. 157 —S. cineraacens.
verna, Rafin. Chlor. Aetn. 6 = S. Temalis?
vernalis, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cane 81 »S. vemalis.
vestita, Thnnb. Prod. PI. Cap. 156=S. vestitus.
viscosa, Gilib. FL Lituan. i. 200=S. viscosus.
vulgaris, Claus, in Goebel, Reise, ii. 283 = S. vulgaris.
vulgaris, Gaertn. Fruct. ii. 445—S. Jacobaea.

JACOBANTHUS, Fourr. in Ann. S"oc Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 403-Bcnecio, Toum. (Compos.).
crassifolius, Fourr. 1. c.-=S. crassifolius.
gallicus, Fourr. 1. c. 404 - S. gallicus.

JACOBEA, Thunb. Nov. Gen. xiii. 169 (1801) -= JACOBAEA, Toum.-Seneoio, Toum. (Compos.).

JACOBUJXA, Moric. PL Nouv. Am. 156. t. 92 (1846).
ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1114.
CARDIACANTHUS, Nees, in. DC. Prod. xi. 331 (1847).
CYRTANTHERA, Nees, in Mart. FL Bras. ix. 99. t. 14 (1847).
CYRTANTHERELLA,Oerst.in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 148. t. 3. ft*. 10,11.
DREJERA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 112. t. 17 (1847).
ETHESIA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 63 (1836), nomen prius.
LIBONIA, C. Koch, in Linden, Prix-Cour. (1863) 2, cum. tab.
PACHYSTACHYS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 99 (1847).
SERICOBONIA, Linden & Andre[1], IUustr. Hortic. xxii. (1875) t. 198.
SERICOGRAPHIS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 107 (1847).
Aschenborniana, *Henal. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 620.—Mexic.
aurea, *Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 85.—Mexic.
aurea, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 85.—Bras.
barlerioides, *Nees, in DC. Prod.* xi. 332.—Ecuador,
caducifolia, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 261.—Reg. Argent.

JACOBTJTIA:—
califomica, *Nees, in DC. Prod.* xi. 729.—Calif.
candicans, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1115=Dianthera candicans.
chrysostephana, *Benth. V Hook./. I. c*—Mexic.
ciliata, Nees, in DC. Prod. xi. 333 - Dianthera ciliata.
coccinea, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. MeMel.* (1877-78) 84.—Bras.
Ghiesbrechtiana, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 1115.—Mexic.
Glaziovii, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 85.—Bras,
harpochiloides, *Benth. V Hook./. Gen.* ii. 1114, in obs., 1116.—Cuba,
heterophylla, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 520.—Mexic.
incana, *Hemsl. 1. c.* 521.—Mexic.
lepida, *Moric. PI. Nouv. Am.* 157. t. 92.—Bras.
Liboniana, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 115.—Bras.
Lindeni, *Nichols. Did. Gard.* ii. 206.—Mexic.
longiflora, *Benth.* b* *Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 521.—Mexic.
macrantha, *Benth.* to* *Hook. f. Gen.* ii. 1116.—Guatemala.
macrophylla, *Benth.* b[1] *Hoot./. 1. c.* 1115.—Mexic.
mexicana, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 325. t. 66.—Mexic.
Mohintli, *Benth. tf Hook. /. Gen.* ii. 1115; *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 521.—Mexic.
monticola, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-«. 78) 84.—Bras.
Neesiana, *Benth.* b* *Hook. /. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 521.—Mexic.
neglecta, *A. Gray, Syn. Fl. Am.* ii. I. 395.—Mexic.
nutans, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 52).—Mexic.
paniculata, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 153.—Mexic.
paudflora, *Denth.* b* *Hook./. Gen.* ii. 1115.—Bras.
Pohliana, *Benth.* b* *Hook. /. I. c*—Bras,
polita, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 84.—Bras.
pubescens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 332.—Peruv.
Selloviana, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 85.—Bras.
sericea, *Nees, in DC. Prod.* xi. 332.—Peruv.
sericeotomentosa, Nees, I. c 431 = pubescens.
sulcata, *Nees, I. c.* 333.—Bras,
tinctoria, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 622.—Guatemala,
virgata, *Hemsl. I. c*—Mexic.

JACOSTA, DC. Prod. vi. 76 (1837) - PhymaBpermum, Less. (Compos.).
adcularis, E. Mey. ex Steud. Norn. ed. II. i. 796 = P. aciculare.

JACQUEMONTIA, Bélang. Voy. Ic. [t. 10] (1836; = Qamolepis, Less. (Compos.).
ericaefolia, I. c.=G. ericoides.

JACQUEMONTIA, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Geniv. vi. (1833) 476 (Conv. or. 94). *CONVOLVULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 874.
abutiloides, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 84.—Calif,
acrocephala, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 306.—Bras.
agrestis, *Meissn. 1. c.*—Bras.
aturea, Choisy, in Win. Soc. Phys. Genèv. vi. (1833) 476; viii. I. (1838) 62=hirsuta.
Blanchetii, Choisy, 11. cc 476; 64=glaucescens.
Blanchetii, *Moric. PI. Nouv. Am.* 41. t. 27.—Bras,
bracteosa, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 304.—Bras,
caerulea, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* vi. (1883) 476.—Hab. *1*
canescens, Benth. in Lindl. Bot Reg. (1847) t 27-violacea.
canescens, *Benth. PI. Hartm.* 226.—Mexic.
capitata, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 283.—Aft. trop.
capitellata, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 396.—Bras.
Choisyana, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 302.—Bras,
coelestis, *Hort. Van Houtt. ex Planch, in Fl. des Serres*, Sér. II. i. (1856) 121.—Am. trop.
coerulea, Auct. vide caerulea.
confusa, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 294.—Bras,
corymbulosa, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 137.—Ecuador,
crassifolia, *Scheele.in Linnaea*, xxi. (1848)761.—Bras.

JACQUEMONTIA:—
erecta, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 896.—Bras, ..
eriocephala, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vu. 308.—Bras.
evolvuloides, *Meissn. I. c.* 807.—Bras.
ferruginea, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* viii. I. (1838) 61—Bras.
glancescens, *Choisy, I. c.* 64.—Bras,
glomerata, *Parodi, Contrib.* 27.—Paraguay.
Iracilis, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 399.—Bras..
gYandiflora, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vu. 300.—Bras.
guyanensis, *Meissn. I. c.* 801.—Am. trop. 229 =
hastigera, Boj. Rapp. Desj. 38; Hort. Maunt. Ipomoea denticulata.
hirsuta, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Ceniv.* viii. i. (1838) 6S.-Mexic.
hispida, *Scheele, in Linnaea,* xxi. (1848) 751.—B ı ı.
lacte's^ens. *Seem. Bot. Voy. Herald,* W1--Pa?. ama.
Unarioides, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vu. 308.—Bras.
linoides, *Meissn. 1. c.*—Bras.
Martii, *Choisy, in DC. Prod.* ix. 398.—Bras,
menispermoides, *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* Syst. iv. 283 = Convolvulus micranthus. .. „„. ,,_-
montana, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vu. 3O4.-Bras.
n viii. i.
(1838) 62.—Am. centr.
ovata, *Cmerin, ex Regel, Gartenfl.* (1860) 271. t. 300. —Chili
parviflora; *Choisy, in Mim. Soc. Phys. Geniv.* viii. I. ic.
neffla!5^'n, ft.. *Syst.* *•»*-*- trop.
Fringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.^ni.* (1881-82) 228.—Texas.
prostrata, *Choisy, in DC. Prod.* ix. Bras.
pycnocephala, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* WJjT Mexic.
racemosJ., *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* m. 3O8. —Bras.
rufo-velutina, JtoisK. *I. e.* 305.—Bras.
sandwicensU^. Cray,:* *Proc.Am. Acad.* v. (1861-

J S f t S WL *Soc. Pky, Genè,,* vii, ,
(1838) 62.—Peruv.
scrrata, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 304.—Bras.
sphaerocephala, *Meissn. l. c.* 306.—Bras,
subsessilis, *Moric. Pl. Nouv. Am.* 42. t. 28.—Bras.
tamnifolia, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 474.—Am. bor. tro
unfbe>U?a, *Boj. Hort. Maurit.* 229 (Quid ?).—Ins.
rod. ix. 398.—Bras.
violacea, *Chotsy, m Mi . Soc. Phys. Genèv.* viii. I. (1838) 61.—Am. trop.

JACQUINA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 172 = seq.

JASSaapa Fl. Jam. App. (1759); (Jaquinia); Jacq. Enum. LINEAE, Benth. & Hook.

' £ £ £ u . Bert, in Colla, Hort. RipuL App. *. 21

angoSa, *Oerst. in KJoèo. Videnskab. Meddel.* (186.) 119.—Mexic.
arborea, *Vahl, Eclog. Am* .- 2«« ge. A»-*»•
aristata, ?*<*. f«tf»- " þ r ^ * 15.-Ind. occ •
annillaris, *Jacq. Enum.Pl.* -Cur*. &- ^ ^^
aurantiaca, X«. *Bort.Kew.%* DC Prod. viii. 151-
aurantiaca, Bert, ex A. u^.
JSgSrst. in Kjoeb. Videnskab. Meddel. (1861) 121. —Mexic.
Berterii, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* -Cuba.
Berterii *Syst.* i. 668 S. Doming.
caracas *& K. No* 1.—Venezuela.
ferruginea, *Spreng. Syst.* i. 668.—Ins, S. Doming.
indica, Wight, ex DC. Prod. vii = Erycibe paniculata.
linearis, *Jacq. Enum. Pl. Carib.* 15.—Ind. occ.
macrocarpa, *Cav. Ic.* v. 55. t. 483.—Am. trop.
macrocarpa, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 394 = racemosa.

JACQTJIiriA:-
macrocarpa, Spreng. Syst. i. 668 = aurantiaca.
mexicana, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 48.—Mexic.
mucronata, Willd. ex Spreng. Syst. i. 668 =pnbescens.
pubescens, *H.B. V K. Nov. Gen.etSp.* iii. 251. t. 244. —Am. austr.
pungens, *A. Gray, in Mem. Am. Acad.* N. S. v. (1855) 325.—Bras.
racemosa, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 150.—Mexic.
revoluta, *Jacq. Fragm.* 64.—Venezuela.
ruscifolia, Hort. Tur. ex Steud. Norn. ed. IL i. 796-Bontia daphnoides.
rnscifolia, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 15; *Linn. Sp. PI.* ed. II. 272.—Ind. occ.; Mexic.
ruscifolia, Spreng. Syst. i. 668 = linearis.
smaragdina, *Planch, ex Linden, PI. Nouv.* (1859) 8. —Mexic
umbellata, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 150.—Mexic.
venosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 47=Chione glabra.

JACQUINIA, Mutis, ex linn. Mant. ii. 247 (1771) = Prockia, Linn. (Tiliac).

TACQUINOTIA, Homb. & Jacquinot, ex Decne. Voy. Bot. Astrol. & Zèl. Bot. Phan. Dicot. L 32 (1853)-Iiebetanthus, Endl. (Epacrid.).
Myrsinites, Homb. & Jacquin. ex Decne. 1. c - L. americanns.
prostrata, Hom'i. & Jacquin. 1. c. = L. ameiicanas.
volubilis, Homb. *Be* Jacquin. 1. c.=L. americanas.

JACUANGA, Lestib. in Ann. Sc. Nat. Sèr. II. xv. (1841) 841 = CoBtUB, Linn. (Scitamin.).

JACULARIA, Rafin. in Lond. Card. Mag. viii. (1832) 247-Cunninghainia, R. Br. (Conif.).

JAEGERA, Giseke, Prael. Linn. 203, 236 (17»2) - Zingiber, Adans. (Scitamin.).
montana, Giseke, L c.—Z. montanum.

JAEGEBIA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 277. t 400. *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 860. MACELLA, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1856) App.lS.
abvssinica, Spreng. Syst. iii. 690 «• Guizotia abyssinica.
bcllidioides, *Spreng. I. c.* 591.—Keg. Argent.
calendulacea, Spreng. 1. c. 600 = Wedelia calendnlacea.
gracilis, *Hook./, in Trans. Linn. Soc. xx.* (1847) 213. —Ins. Galap.
hirta, *less. Syn. Comp.* 223.—Am. austr.
macrocephala, *Less. I. c.; et in Linnaea,* ix. (1834) 270. —Am. austr.
innioides, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 277-1. 400. -Mexic.
parviflora, DC. Prod. v. 544=hirta.
pedunculata, *Hooi. tf An. Bot. Beech. Voy.* 299.—Mexic.
prorepens, *Hook.f. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 214. —Ins. Galap.
repent, DC. Prod. v. 644-hirta.
uliginosa, Spreng. Syst. iii. 590 = Spilanthes Acmella.
urticaefolia, Spreng. 1. c.-Sabazia urticaefolia.

JAESCHKEA, Kurz, in Joum. As. Soc Beng. xxxix. II. (1870) 230. t. IS. *GENTIANEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 816.
gentianoides, *Kurt, 1. c.*—Reg. Himal.
latisepala, *C. B. Clarke, in Joum. Linn. Soc.* xiv. (1875) 441.—Reg. Himal.
microsperma, *C. B. Clarke, in Hooi. f. Ft. Brit. Ind.* iv. 119.—Reg. Himal.

JAGERA, Blume, Rumphia, iii. 165 (1847). *SAP1N-DACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 403.
glabra, *Hassk. Hort. Bog. Desc.* 157.—Java.
javanica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 227 - speciosa.
madagascariensis, Blume, Rumphia, iii. 165-Garuga niadagascariensis.
Pseudorhus,R&dlk. in Sitib.Math.-Phys.Acad.Muench. ix. (1879) 621-Cupania I'seudorhns.
Roxbnrghii, *Blume, Rumphia,* iii. 155.—Ins. Molucc.
serrata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. viii. (1878) 303 •= Roxbnrghii.
speciosa, *Blume, Rumphia,* iii. 165.—Mabya; N. Gain.

JALAMBICA, Rafin. New Fl. Am. iv. 71 (1836).—Cf. NEURELMIS, Rafin. (Compos.).
pumila, Rafin. 1. c. 72.—' Cuba vel Florida.'

JALAMBICEA, Cerv. in La Llave *Sc* Lex. Nov. Vee. Desc. fasc. ii. 12 (1825) = Limnobium, Rich. (Hydrocharid.).
repens, Cerv. 1. c > L stoloniferum.

JALAPA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 266 (1763) - Mirabiliß, Linn. (Nyctagin.).
congesta, Moench, Meth. 508 = M. Jalapa.
dichotoma, Crantz, Inst ii. 266 - M. dichotoma.
longiflora, Crantz, 1. C.=M. longiflon.
offidnalis, Crantz, 1. c. = M. Jalapa.
officinarum, Martyn, Cent. i. t. 1—M. dichotoma.
undulata, Moench, Meth. Suppl. 196'- M. dichotoma.

JALAPPA, Barm. Thes. Zeyl. 124 (1737)-praec.

JALOMBICEA, Steud.Nom. ed.II. i. 796 (1840), sphalm. = JALAMBICEA, Cerv. « Limnobium, Rich. (Hydroch.).

JALTOMATA, Schlecht. Ind.-Sem. Hort Hal. (1838) n. 7 ; ex Linnaea, xiii. (1839) Litt 98-Saracha, Rniz & Pav. (Solanac).
edulis, Schlecht. 11. cc. •- S. Jaltomata.

JALTONIA, Stead. Nom. ed. IL i. 796 (1840) - praec.

JAMBOLANA, Adans. Fam. ii. 608 (1763)-Acronychia, Font (Rutac).

JAMBOLIFERA, Houtt. Handleid. ii. 272 (1774) - Eugenia, Mich. (Myrtac).
coromandelica, Houtt. 1. c 276.—Ind. or.
pedunculata, Houtt. 1. *c* 273; Gaertn. Fruct. i. 178 = E. Jambolifera.

JAMBOLIFERA, Linn. Piss. Dass. 15 (1747); Amoen. Acad. i. 398 (1749)=Acronychia, Font. (Rutac).
arborea.Zoll. Sc Mor. Syst. Vcrz. Zoll. 14-A, arborea.
chinensis, Spreng. Syst. ii. 216-A. laurifolia.
oblongifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 7'J6=-A. laevis.
odorata. Lour. Fl. Cochinch. 231.—Cochinch.
pedunculata, Linn. Sp. PI. 349 - A. laurifolia.
resinosa, Lour. Fl. Cochinch. 231 - A. laurifolia.

JAMBOS, Adans. Fam. il. 88 (1763) = seq.

JAMBOSA, DC. Prod. iii. 286 (1828)-Eugenia, Mich. (Myrtac).
acida, Hort.-Cf. Gard. Chron. (1876) I. 736.—Hab. 1
acuminata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 212 - E. acuminata.
acuminatissima, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 362-E. acuminatissima.
acutata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 432 = E. acutata.
aemula, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 99 - E. polypetala.
alba, G. Don, Gen. Syst. ii. 868=E. javanica.
ambigua, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 96 = E. javanica.
amplexicaulis, DC. Prod. iii. 287 •* E. amplexicaulis.
anastomosans, Miq. FL Ind. Bat. Suppl. 809.—Sumatra.
appendiculata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 861 -= Mcmecylon appendiculatum.
aquea, DC. Prod. iii. 288 = E. aquea.
aromatica, Miq. Fl. Ind. Bat. L I. 436.—Java.
attenuata, Miq. 1. c. 437.—Java.
auriculata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 104.—Javal
australis, DC. Prod. iii. 287 -* E. myrtifolia, *Sims,*
bifaria, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 422-12. bifaria.
bisulca, Miq. 1. c. Suppl. 810.—Ins. Banca.
borneensis, Miq. 1. c. i. I. 434.—Malaya.
Brackenridgei, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1866) 181.—N. Caled.
bracteata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 437-E. zeylanica.
buxi/olia, Miq. 1. c. 1086.—Ins. Banca.
calophylla, Miq. 1. c. 423.—Java.
cauliflora, DC. Prod. iii. 287 = E. polycephala.
celebica, Blame, Mas. Bot. Lugd. Bat i. 107.—Ins. Celebes.

JAMBOSA:—
cerasiformis, Husk. Cat. Hort. Bog. Alt. 262.—**Java.**
elavata, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 201 = Eugenia rhododendrifolia.
toorctata, Blnme, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 99 - E. macrocarpa.
Commersonii, Blnme, 1. c 105.—Java.
condensata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 119.—Java.
conferta, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 202 = E. mangifolia?
confusa, Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 101.—Snmatra.
cornifolia, Blame, 1. c. 92.—Ins. Celebes.
corymbosa, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 420.—Java.
costata, Miq. 1. c 415.—Java.
tuneata, Blnme, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 105.—Java.
cuspidata, Blnme, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 435.—**Java.**
cylindrica, Thw. Enum. PI. Zeyl. 115 - E. cylindrica.
cymifera, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 194.—Afr. austr.
cyminifera, Presl, Bot. Bemerk. 70, sphalm. = praec.
densiflora, DC. Prod. iii. 287 = E. densiflora.
domestica, DC. 1. c. 288 = E. malaccensis.
eucalyptoides, F. Mueli. Fragm. i. 226=E. eucalyptoides.
firma, Blame, Mas. Bot Lugd. Bat. i. 108 = E. grandis.
firma, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 429.—Java.
formosa, G. Don, Gen. Syst. ii. 868 - E. formosa.
glabrata, DC. Prod. iii. 287 = E. ramosissima.
glandulifera, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 438 = E. zeylanica.
glandulosa, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 201.—Borneo.
gracilipes, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 849 = E. gracilipes.
gracilis, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 202.—Java.
grandis, Blume, Mas. Bot. Lagd. Bat. i. 108 = E. grandis.
Hardwickia, G. Don, Gen. Syst. ii. 869.—Ins. Maurit.
hemispherica, Wight, Illnstr. Ind. Bot. ii. 14 = E. hemispherica.
hirta, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 200.—Borneo.
Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 42O.-Java.
hypericifolia, DC. Prod. iii. 287.—Java.
hypericifolia, Korth. ex Blame, Mus. Bot. Lagd. Bat. i. 100 = E. macrocarpa, *Roxb.*
inophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 438 = E. inophylla.
insignis, Blnme, Mus. Bot Lagd. Bat i. 100.—Borneo.
Kigurrung, Blume, 1. c. 107.—Java.
Klampok, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 421.—Java.
Koenigii, Blume, Mus. Bot. Lagd. Bat. i. 100=E. zeylanica.
Korthalsii, Blame, 1. c 101.—Malaya.
laeta, Blume, 1. c. 104 = E. laeta.
laevis, Montr, in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 208.—N. Caled.
lanceolaria, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 101 = E. lanceolaria.
lanceolata, Korth. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 426.—Java.
lancifolia, Miq. 1. c. 427.—Borneo.
latifolia, Miq. 1. c. 429.—Borneo.
laurifolia, DC. Prod. iii. 287 - E. bifaria.
leptos'tachya, Blame, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 99 = E. leptostemon.
leptostemon, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 201 - E. leptostemon.
linearis, Korth. 1. c. 199=E. laeta.
lineata, DC Prod. iii. 287 = E. lineata, *Dutkie.*
litoralis, Blume, Mus. Bot. Lagd. Bat. i. 102.—Java.
longifolia, Brongn. & Gris, iu Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 381.—N. Caled.
macrocarpa, Sweet, Hort Brit. ed. II. 212 - E. macrocarpa.
macrophylla, Boj. Hort. Maurit 143 = E. Bojeri.
macrophylla, DC. Prod. iii. 286=E. malaccensis.
macrophylla. Llanos, in Mem. Acad. Cieoc. Madr. ii. (1859) 500.—Hab.?
macrophylla, Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 415 - *polyneura.*
madagascariensis, Blame, Mus. Bot. Lagd. Bat. i. 103 *= E. aquea.

JAMBOSA:—
malaccensis, DC. Prod. iii. 286=Eugenia malaccensis.
mappacea, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 200 =-E. formosa, *Wall.*
marginata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 428.—Java.
tnaritima, Miq. 1. c. 435.—Java.
media, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 199.—Borneo.
melanocarpa, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 430.—Java.
melanosticta, Miq. 1. c. 482.—Java.
melastomaefolia, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat i. 102.—Malaya.
mtmecyloides, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 894, nomen.—Ins. Banca.
Munronii, Walp. Rep. ii. 191=E. Munronii.
myrtifolia, Heynh. Nom. i. 428.= E. myrtifolia, *Sims*,
neriifolia, Brongn. & Gris, in Ball. Soc. Bot Fr. xti. (1865) 181.—N. Caled.
neurocalyx, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 849=E. neurocalyx.
nitida, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 202 = E. nervosa.
obtusissima, DC. Prod. iii. 287 = E. javanica.
ovalifolia, Blame, Mas. Bot. Lugd. Bat. i. 98.—N. Guinea.
onariensis, DC. Prod. iii. 287 = E. owariensis.
palembanica, Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 93 = E. Jambos.
paucifiora, Walp. Rep. ii. 192 = E. laeta.
peregrina, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 92.—**Malaya.**
perforata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 309.—Ins. Banca.
polyctphala, Miq. 1. c. i. 1.439 =• E. polycephila.
polyneura, Miq. 1. c. 415.—Java.
pelypetala, Walp. Rep. ii. 192 = E. polypetala.
Pseudo-malaccensis, Vieill. ex Brongn. & Gris, in Ball. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 182.—N. Caled.
pterocaulis, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 200.—Borneo.
pulchella, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 422 = E. oblata.
puncticulata, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 310.—Sumatra.
purpurascens, DC. Prod. ii. 286 - E. malaccensis.
purpurea, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 201.—Sumatra.
purpurea, Wight & Am. Prod. 333 - E. malaccensis.
quadrangulata, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 849 = E. quadrangulata.
reticulata, Blume, Mas. Bot Lugd. Bat. i. 92, in obs. = E. mangifolia.
rhyncophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 430.—Java.
rhytidocarpa, Zoll. in Miq. Choix PI. Buitenz. t. 4.—Malaya.
Richii, C. Muell. in Walp. Ann. iv. 849=E. Richii.
rostrata, Miq. Fl. *YB&>* Bat. i. I. 436.—Sumatra.
rotundifolia, G. Don, Gen. Syst. ii. 869 = E. rotundifolia.
rubens, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 106=E. rubens.
rubrieaule, Miq. FL Ind. Bat. i. I. 432=E. rubricaulis.
saligna, Miq. 1. c— Java.
samarangensis, DC. Prod. iii. 286 - E. javanica.
sexangulata, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 428.—Java.
splendens, Miq. 1. e. 435.—Java.
suisessilis, Miq. 1. c. Snppl. 309.—Sumatra.
sulcata, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 54.—Malaya.
sumatrana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 419.—Sumatra.
symphytocarpa, Korth. ex Miq. 1. c 430.—Sumatra.
syzygioides, Miq. 1. c. 431.—Java.
tawaktnsis, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1847) 202.—Borneo.
tenuicuspis, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 431 = E. cymosa.
tenuifolia, Sweet, Horfc Brit. ed. II. 212 = E. formosa, *Wall.*
tenuiramis, Miq. Fl. Ind. Bat i. I. 437.—Java.
tetraedra, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 310 = E. tetraedra.
tetragona, Blame, Mas. Bot Lagd. Bat. i. 106.—**Java.**
tetraptera, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 311.—Ins. Banca.
tetraquetra, Miq. 1. c i. I. 483.—Java.
Teysmanni, Miq. 1. c. 429 = E. ramosissima.
TkoBetiana, F. Muell. Fragm. i. 225 = E. myrtifolia, *Sims*,
timorensis, Blame, Mai. Bot. Lagd. Bat. i. 97 - E.javanica.
trifida, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 436.—Sumatra.

JAMBOSA :—
urceolata, Korth. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1.418, partim = Eugenia grandis.
venosa, *DC.* Prod. iii. 286=E. venosa.
virens, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 428.—Java.
Vrieseano, Miq. L c. 424.—Java.
vulgaris, DC. Prod. iii. 286 = E. Jamboo.
Wightiana, Blame, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 106 = E. rubens.
Zollingeriana, Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 418.—Java.

JAMBUS, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 18= JAMBOSA, DC.=Eugenia, Mich. (Myrtac).
acidus, Noronha, 1. c. *(=Jambosa hypericifolia).*—Java.
calycinus, Noronha, 1. c. (Quid ?).—Java.
rosatus, Noronha, 1. c. - E. Jambos.
ruber, Noronna, 1. c.=E. aquea.

JAMESIA, Nees, in Neuwied, Reise N. Am. ii. 442 (1844) = 8tephanomeria, Nutt. (Compos.).
pauciflora, Nees, 1. c. =S. minor.

JAMESIA, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832)=Dalea, Linn. (Legumin.).
obovata, Rafin. 1. c.-D. Jamesii.

JAMESIA, Ton-. & Gray, Fl. N. Am. i. 593 (1840). *SAX1FRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 643.
aiuericana, *Torr.* b* *Gray*, *I. c*—N. Mexic.

JANASIA, Rafin. Fl. Tellnr. iv. 68 (1886)=Phlogaoaathus, Nees (Acanthac.).
rosea, Rafin. 1. c. = P. asperulns.
rubra, Rafin. 1. c.=P. asperulus.

JANCAEA, Boiss. 1>1. Orient. Nov. Dec i. 4 (1875) = Bamondla, Rich. (Gesnerac).
Heldreichii, Boiss. 1. c 5 = R. Heldreichii.

JANDINEA, Stend. in Flora, xxxiii. (1850) 229, sphalm. = JARDINEA, Steud.-Thelepogon, Roth (Gramin.).

JANGARACA, Rafin. in Ann. Sc. Gén. Phys. vi. (1S20) 82, sphalm. = TANGARACA, Adams. = Homelia, Jacq. (Rubiac).

JANIA, Schult. f. Syst. vii. p. xcviii, 1528 (1880) = Baeometra, Salisb. (Liliac).
Breyniana, Schult. f. 1. c. 1528 = B. columellaris.

JANIPHA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 106. t. 109 (1817)=Manihot, Adans. (Euphorb.).
aesculi/olia, H. B. & K. 1. c 107. t. 109=M. aesculifolia.
angustifolia, Pohl, ex Heynh. Nom. i. 428.—Bras.
amsophylla, Griseb. in Goatt Abh. xlx. (1874) 95.—Reg. Argent.
arborea, Mart ex Pohl, PI. Bras. i. 62 = Jatropha obtnsifolia.
foetida, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 106 = M. foetida.
Juquilla, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1073, in syn. = y. *Yuquilla.*
Loeflingii, H. B. *Sc* K. Nov. Gen. et Sp. ii. 107 =• M. carthagenensis.
Manihot, H. B. & K. I. c. 108 - M. utilissima.
obtusifolia, Mart, ex Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 275=Jatropha obtusifolia.
phyllacantha, Mart, ex Pohl, Ic. PI. Bras. i. 62 = Jatropha phyllacantha.
urens, Poir. ex Pohl, 1. c. 63=Jatropha urens.
violacea, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 52.—Reg. Argent.
Yuquilla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 107 = M. carthageuensis.

JANKAEA, Boiss. Fl. Orient, ix. 82 (1879)= Bamondla, Rich. (Gesnerac).
Heldreichii, Boiss. 1. c. 83 = R. Heldreichii.

JANRAIA, Adams. Fam. ii. 76 (1763) - **Rajania,** Linn. (Dioscor.).

JANSOMZA., Kipp. in Proc. Linn. Soc i. (1847) 830; et in Trans. Linn. Soc. xx. (1851) 884.116. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 467.
CRVTTOSEMA, Meissn. in Lehm. PL Preiss. ii. 207 (1847).
fonnosa, *Ki£p. II. cc.*—Austral.

JANTHA.Steud. Nom.ed.II. i. 797(1840)-IANTHA, . Hook.-IonopslB, H. B. & K. (Orchid.).

JANTHE, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 40 (1844) = Celsia, Linn. (Scrophulac).
bugulifolia, Griseb. 1. c - C . bugulifolia.

JANTT8IA, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Se>. II. xiii. (1840) 250; et in Arch. Mus. Par. üi. (1843) 60S. t. 2 (Monog. 349). *MALPIGHIACEAE*, Benth. *St.* Hook. f. i. 262.
amazonica, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.108.—Bras,
anisandra, *Griseb. I. c.*—Bras,
argentea, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 68—Reg. Argent.
califomica, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 8—Calif,
caudata, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. 103—Bras.
discolor, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 604-Camarea discolor.
gracilis, *A. Gray, PI. Wright*, i. 37,-Texas,,
guarantica, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* ill. (1843) 604. t. 21—Bras.
linearifolia,, A. Juss. 1. c. 60S -Camarga juncea.
muricata, *Griseb. in Mart. Fl. Bras.* xii. 1.103—Pras.
sericea, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 604-Camarea pulchella.

JAPOTAPITA, Endl. Geu. 1142, in syn. (1841) = JABOTAPITA, Adans. = Oomphia, Schreb. (Ochnac).

JAQUINIA,Unn.Diss.Fl. JamaicApp.(1759); Amoen. Acad. v. 388 (1760) = Jacquinia, Linn. (Myran.).

JAQUINOTIA, Walp. Ann. i. 481 ("48-49) -; JACQUINOTIA, Hombr.=LebetanthUB, EndL (Epacrid.).

JAHACATIA, Marcg. ex Endl. Gen. 933 (1840). *PASSIFLOREAE*. Benth. *Sz* Hook. * i: 815.
conica, *Kerber, in Eichl. Jahrb. Berl.* iL (1883) 282—M ic.
dodeSphylla, *A. DC. in DC. Prod.* xv. I. 420.—Bras,
heptaphylla, *A. DC. I.* c—Bras,
mexicana, *A. DC. I. c*—Mexic.
spinosa, *A. DC. 1. c.* 419.—Am. trop.

JARAPHA, Stend. Nom. ed. II. i. 797 (1840) -JARAVA, Ruiz & Pav. = 8tipa, Linn. (Gramin.).

JARAPHAEA, Steud. Nom. ed. *TL* i. I796iP8tt)-TARAVAEA, Scop.=Miorollcia, D. Don (Melastom.).

JARAVA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 2. t 1 (17»4) = Stipa, Linn. (Gramin.).
arundinacea, Willd. ex Steud. Nom. ed. U. t 799 - S. Jarava.
Ichia, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 5=S. Jarava.
usitata, Pens. Syn. i. 6=S. Jarava.

JARAVAEA, Neck. Elem.ii. 118 (1790)-IARAVAEA, Scop.-Microlieia, D. Don (Melastom.).

JARDINEA, Steud. in Flora, xxdii. (1850) dinea); Syn. Pl. Gram. 360 (1855)—The Roth (Gramin.).
abyssinica, Steud. Syn. PL.. *gabonensis*, Steud. in Flora, xxxm. (1850) 229-Afr. trop.

JARDINIA, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1181 (1888)-praec.

JARDINIA, Sch. Bip. in Flora, xxxvi. (1858) 34, in syn. =Erlangea, Sch. Bip. (Compos.).
plumosa, Sch. Bip. 1. c.-E. plumosa.

JASIOKE, Linn. Syst. ed. I .(1785). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook, t «. 564.
OVILLA, Adans. Fam. li. 134 (1763).
amethystina, Boiss. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 283 = humilis.
amethystina, *Lag. & Rodr. in Anal. Cienc. Nat.* v. (1802) 271.—Hispan.
arnethystina, Reut. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. FL ~Hisp."ii."284=perennis.

JASIONE :-
arenaria, Salzm. ex Ball, in Joum. Linn. Soc. xn. (1878) 552-corymbosa.
atlantica, *Ball, in Joum. Sot.* xi. (1873) 878.—Marocc
Ausfeldii, *Regel, Gartenfl.* (1861) 366.—Austral.
baetica, Rodr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 281—blepharodon.
blepharodon, *Boiss.* b* *Rent. Pugill. PI. Nov.* (1852) 72.—Lusit.
Bovei, *Boiss. V Rent. 1. c.* 74.—Afr. bor.
caespitosa, *Koch, ex Roth, Enum. PI. Phan. Germ.* i. 774.—Europ.
capensis, Berg, in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. iii. (1780) 187. t. 10-Astrantiaciliaris.
Carioni, Bor. Fl. Cent. Fr. ii. 287 =montana.
carpetana, Boiss. & Kent ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 745=perennis.
coespitans, *Pome!, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 258.—Alger.
cornuta, *Ball, in Joum. Bot.* xi. (1873) 373.—Marocc.
corymbosa, *Pair. Encyc. Suppl.* iii. 131.—Hispan.
depressa, Hurt, ex Nym. Consp. 487=supina.
eehinata, Boiss. & Rent. Pugill PL Nov. (1862) 78-montana.
fallax, Willk. in Flora, xxxv. (1852) 198=humilis.
foliosa, *Cav. Ic. Rar.* ii. 38.1.148. f. 1.—Hispan.
foliosa, Willk. Enum. PL Nov. 44-mariana.
glabra, Dur. ex Boiss. & Reut. Pugill. PI. Nov. (1852) 72=corymbosa.
glabra, *Velen. in Oestr. Bot. Zeitsckr-* xxxiv. (1884) 4-24.—Europ.
glabrata, Dum. Fl. Belg. 69-montana.
Heldreichii, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. vi. 120 = montana.
Heldreichii, Janka, ex Nym. Consp. 486-Jankae.
humilis, Costa, Fl. CataL 161 = amethystina.
humilis, Cut. Fl. Madrit. 456-humilis.
humilis, Jan, Elench. 3=montana.
humilis, *Loisel, Not. PI. Fr.* 42.—Europ.
Jankae, *Neilr. Nachtr. Vng. Slav.* 43.—Banat.
latvis. Lam. El. Fr. ii. S = perennis.
litoralis, Fries, Summa Veg. 11=montana.
lusitanica, *A. Dt. Monog. Camp.* 105.—Lusitan.
mariana, *Willk. in Willk. V lange, Prod. fl. Hisp.* ii. 284.—Hispan.
maritima, Duf. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 415-m on tana,
megalocalyx, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 258.—Alger.
montana, *Linn. Sp. PI.* 928.—Europ.; Afr. bor.
montana, Schousb. Gew. Marok. 70 - corymbosa.
montana, Stend. Kora. ed. II. i. 797=Alepideaciliaris.
orbiculata, Griseb. Spicil. Fl. Beimel, ii. 293-supina.
Pavenni, Carion, Fl. Cent. Fr. ii. 287 = montana.
penicillata, *Boiss. in DC. Prod.* vii. 416.—Hispan.
perennis, Bertol. Lucubr. 22. n. 118 = montana.
perennis, *Lam. Encyc.* iii. 216.—Enrop. nustr.
pygmaea, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. Nat Tool. vi. (1883-84) 149-perennis.
rosularis, *Boiss. V Reut. Pugill. PI. Nov.* (1852) 74.—Gibraltar.
scabiosae-capitata, Gilib. Fl. Lituan. i. 67=montana.
sessiliflora, Boiss. & Reut. Diagn. PL Nov. Hisp. 21 = hurailis.
stricta, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 1.—Alger.
supina, *Sieber, ex Spreng. Syst.* i. 810.—Bosnia; As. Min.t
tristis, Bory, in Ann. G4n. Sc. Phys. iii. (1820) 3-amethystina.
umbellata, Gilib. Fl. Lituan. i. 68=montana.
undulata, Lam. FL Fr. ii. 8—humilis, montana.

JASMINANTHES, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 148. t. 28 U850)-8tephanotiB, Thou. (Asclepiad.).
suaveolens, Blume, 1. c. 149.—Borneo.

JASMINARIA, Heist. Syst. 10 (1748) (Quid ?).

JASMINIUM,Dum.Anal.Fam.26 (1829) - Jaeminum, Toum. (Oleac).

JASMINOIDES, Medic in Phil. Bot. i. 134 (1789) = Iiyoium, Linn. (Solanac).
a/rum, Medic 1. c.-L.afrnm.
fiaccidum, Moench, Meth. 470 - L . barbarum.
linearifolium, Moench, Meth. Suppl. 177 = L. afrum.
rhombi/olium, Moench, Meth. 470 - L . europeuo.

JASMINUM, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1786).
OLEACEAE, Benth. *Sc* Hook.f. ii. 674.
JACKSONIA, Hort. ex Schlecht. in Linnaea, xxvii. (1864) 612.
MOGORIUM, Juss. Gen. 106 (1789).
abyssinicum. *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 63; *Hochst. ex DC. Prod.* viii. 311.—Abyssin.
acuminatissimum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i.* 276.—Java.
acuminatum, R. Br. Prod. 521=simplicifoUum.
acuminatum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2881-flexile.
acuminatum, Pen. Syn. i. 7=trinerve.
adenophyllum. *Wall. Cat.* n. 2876.—Reg. Himal.
adiantifolium, *Planch. Hort. Donat.* 64.—Hab. 1
aemulum, *R. Br. Prod.* 621.—Austral,
affine, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 2/...—Malaya.
affine, Royle, in Bot. Reg. (1845) t. 26 = officinole.
affine, Wight, Ic. t. 1255-auriculatum.
ambiguum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 278.—Malaya.
amoenum, *Blume, 1. c.* 270.—Ins. Celebes.
amplexicaule, Buch.-Ham. in Wall. Cat n. 2875-ondulatum.
anastomosans, *Wall. Cat.* n. 2863.—Reg. Himal.
angulare, Buuge, Enum, PI. Chin. Bor. 42=nudiflorum.
angulare, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 1.—Afr. austr.
angustifolium, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 521 = laurifolium.
angustifolium, Wall. Cat. n. 2873, pro parte-sessiliorutn.
angustifolium, *Willd. Sp. PI.* i. 36; *Vahl, Enum.* i. 29.—Ind. or.
arborescens, Boj. Hort. Maurit. 203-tubiflorum ?
arborescens, *Roxb. Hort. Beng.* 3; *Fl. Ind.* i. 95.—Ind.or.
arboreum, Buch.-Ham. ex Loud. Arboret. ii. 1249-heterophyllnm.
arboreum, Schult. Mant i. 90=arborescent.
aristatum, Wall. Cat. n. 2853 = undulatum.
aristatum, Zipp. ex Span, in Linnaea, xv. (1841) 336 - lancifolium.
artense, *Montr, in Mém. Acad. Lyon*, x. (1860) 231.—N. Caled.
attenuatum, *Roxb. Hort. Beng.* 8, nomen; *DC. Prpd.* viii. 309.—Reg. Himal.; Burma.
attenuatum, Wall. Cat. n. 2865 B=flexile.
aureum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 106 = erandiflorum.
auriculatnm, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 1.—Ind. or.
australe, Pers. Syn. i. 8-simplicifolium.
atoricum, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2881-flexile.
amricum, Hook. & Am. Bot. Beech. Voy. 66 = didymum.
azoricum, *Linn. Sp. PI.* 7.—Ins. Fortunat
bahiense, *DC. Prod. viii.* 411.—Bras.
Barrelieri, Webb *Be* Berth. Phyt. Canar. iii. 165 - odoratissimum.
bicorollatum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 19 = J. Sambac
Bidmllii, Vis. in Act. 1st Venet Sc. Ser. III. v. (1868-69) 136-lineare.
bifanum, *Wall. Cat.* n. 2866.—Malaya.
bignoniaceum, Wall.1. c n. 2888^-humile.
Blancoi, Hassk. in Flora,xlvii. (1864) 49 =J. Sambac.
bracteatum, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.iiL598-Rottlerianum.
bracteatum, Roxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 94 - pubescens.
bracteatum, Wall. Cat. n. 2867-bifarium.
brevilobum, *A. DC. in DC. Prod.* viii. 307.—Ind. or.
Burmannianum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bot.* L 27».—Zeylan.
calcareum, *F. Muell. Fragm.* i. 212.—Austral,
calophyllnm. *Wall. Cat.* n. 2889.—Ind. or.
calycinum, *Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc.* 552, nomen.—Hab. ?
campanulatum, Link, Jahrb. i. III. 80=tortuosum.
capense, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7-Gardenia florida.
capense, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 2__Afr. austr.
carinatum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 278.—Ins. Celebes.
ra/a/onuum,HoTt.exDC.Prod.viii.313-rnmdifloTum .
caudatum, *Wall. Cat.* n. 2884—Reg. Hjmal.
choense, *Delile, in Rochet, Sec. Voy. Choa*, 343.—Afr. trop.
chrysanthemum, Roxb. Hort. Beng. 3; FL Ind. i. 99—humile.
coarctatum, *Roxb. II. cc.* 3; 92.—Burma.
collinum, Salisb. Prod. 12-fruticans.

JASMINUM:—
confusum, DC. Prod. viii. 809 = simplicifolinm.
congestum, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 2874 = pubesccns.
cordifolium, *Wall. Cat.* n. 2858.—Ind. or.
courtallense, Wight. Ic. 11252-calophylltim.
crassifolium, *Blume, Bijdr.* 679.—Java.
cuspidatum, Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Nene Schr. iv. (1803) 192=rigidum.
Dallachii, F. Mnell. Fragm. iv. 150-didyraum.
decussatum, *Wall. Cat.* n. 2860.—Burma.
dianthifolium, Vis. in Act. 1st. Venet. Sc. Ser. III. (1858-59) 137=suavissimum.
dichotomum, D. Don, Prod. Fl. Nep. 105-glandulosum.
dichotomum, *Vahl, Symi. Bot.* L 26.—Afr. trop.
didymum, *Forst.f. Prod.* 3__Austral.; Ins. Pacif.
dispermuni, *Wall, in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, i. 99.—Keg. Himal.
distichnm, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 275.—Sumatra.
divaricatum, R. Br. Prod. 521 = didymum.
elongatum, *Blume, Bijdr.* 678.—Java.
elongatum, Willd. Sp. PI. i. 37 ; Roxb. ex DC. Prod. viii. 314-RoxburghL.num.
ensatum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 277.—Ins. Celebes.
erectiflorum, A. DC. in DC. Prod. viii. 308-cordifolium.
exsertum, Buch.-Ham. ex WalL Cat. sub n. 2852 = Kottlerianum.
extensum, *Wall. Cat.* n. 2862.—Burma.
Kinlaysonianum, *Wall. 1. c.* n. 7126.—Malaya.
flavum, Sieber, ex DC. Prod. viii. 812 = revolutum.
flexile, Desf. ex DC. 1. c. 310-auriculatum.
flexile, Jacq. Hort. Schoenb. iv. 46. t 490-tortuosum.
flexile, *Vohl, Symb. Bot.* iii. 1.—Ind. or.
floribundum, *R. Br. ex Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. (1837) 168.—Abyssin.
floridum, *Bunge, Enum. PI. Chin. Bar.* 42.—China.
fluminense, Veil. Fl. Flum. 10; i. t. 23-bahiense.
Forstenii, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 277.—Malaya.
Forstenii, F. Muell. Fragm. vi. 86-aeimnlum.
fragrans, Salisb. Prod. 12 = J. Sambac.
fra'temum, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 535.—Malaya.
frutescens, Gueldenst. Reisen, i. 428 = fruticans.
fruticans, *Linn. Sp. PI. 7.*—Reg. Mediterr.; Oriens.
fruticosum, Willd. in Mem. Acad. Berl. 1790-91 (1796) t. 2, sphalm. = praec.
fnlvum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 275.—Sumatra.
funale, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 405-simplicifolinm.
fnrcatum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 279.—Java.
Gardnerianum, Wight, Illustr. Ind. Bot. ii. 169-trichotomum.
geniculatum, Vent. Choix, t. 8 « simplicifolinm.
glabellum, Herb. Madr. ex WalL Cat. n. 2857 = malabaricum, arborescens.
glabriusculum, *Blume, Bijdr.* 679.—Java.
glabrum, Willd. ex Link, Jahrb. i. m. 31=bifarium?
glandulosum, *Wall. Cat.* u. 2849.—Keg. Himal.
glaucum, *ISoland. in] Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 9.—Afr. austr.
gracile, Andr. Bot Rep. t. 127=simplicifolium.
gracillimum, *Hook. f. in Gard. Chron.* (1881) I. 9.—Borneo.
grandiflorum, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 9__Reg. Himal.
Griffithii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 593.—Malacca.
guineense, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 61.—Afr. trop.
Hamiltonii, G. Don, 1. c.=glandulosum.
Hasseltianum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I* 278.—Java.
heterophyllum, Moench. Meth. 467 » fruticans.
heterophyllum, *Roxb. Hort. Beng.* 8; *Fl. Ind.* i. 100.—Reg. Himal.
heteropleurum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 272.—Ind. or.
Heyneanum, Wall. Cat. n. 2871; G. Don, Gen. Syst. iv. 62 = J. Sambac.
hirsutum, Hoffmgg. Vert Pfl. 69 = molle.
kirsutum, Wall. Cat. n. 2852 C = Rottleriannm.
hirsutum, Willd. Sp. PI. i. 36-pubescens, Gueltarda speciosa.
kispanicum, Hort. ex DC. Prod. viii. 313-grandiflonixn.

JASMINUM:—
Horsfieldii, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 634__Ins. Banca.
humile, Gueldenst. Reisen, i. 421= fruticans.
humile, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2887-revolutum.
humile, *Linn. Sp. PI. 7.*—As. trop.
inodorum, Jacquem. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 139 = humile.
insigne, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I* 278.—Sumatra.
intermedium, Wight, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 599=trichotomum.
Jacquemontii, Jacquem. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot. t. 148=humile.
Kitchingii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 272.—Madag.
laetum, Wall. Cat. n. 2859=scan lens.
lancefolium, Roxb. Hort. Beng. 3—lanceolaria.
lanceolaria, *Roxb. I. e.; Fl. Ind.* i. 98.—Reg. Himal.
lanceolatum, Hort. Berol. ex Steud. Nom. el II. i. 798—laurifolium.
lanceolatum, *Ruie (f Pav. Fl. Per.* i. 6. t 7. £ a.—Peruv.
lancifolium, *Decne. *in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 404.—Ins. Timor.
latifolium, Buch.-Ham. ex Wall. Cat sub n. 2852 = Kottlerianum.
latifolium, Roxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 95 = arborescens.
latipetalum, *C. B. Clarke, in Hoot. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 599.—Burma.
laurifolium, Gamble, Darjeel. list, 55=glandulosum.
laurifolium, *Roxb. Hort. Beng.* 3; *Fl. Ind.* i. 92.—Reg. Himal.; Burma.
laurifolium, Wall. Cat n. 2847 A-anastomosans.
Lessertianum, A. DC. in DC. Prod. viii. 304 = bifarium.
ligustrifolium. Lam. Encyc. iii. 209 =• glaucum.
ligustrifolium, Wall, ex Boj. Hort. Maurit. 204 = rigidum.
ligustrinum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 276.—Malaya.
Lindleyanum, Blume, 1. c. 272=anagtomosans?
lineare, *R. Br. Prod.* 521.—Austral.
lonchophyllum, Voigt, Hort Suburb. Calc. 551 = lanceolaria.
Loudonianum, *Hoffmgg. Vert. Pfl. Nachtr.* ii. 148.—Hab. *%*
lucidum, Banks, ex DC. Prod. viii. 308=siir.plicifolium.
luteum, Gueldenst Reisen, i. 422 - fruticans.
luzoniense, *Vidal, Phan. Cuming. Philipp.* 185.—Ins. Philipp.
macrophyllum, Hort ex DC. Prod. viii. 312-heterophyllum.
Maingayi, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 694.—Penang.
malabaricnm, *Wight, Ic.* 1.1250.—Ind. or.
marianum, *DC. Prod.* viii. 307.—Ins. Marian.
mauritianum, Boj. Hort. Maurit 204 = auriculatum.
Mesnyi, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1882) 37.—China,
micranthum, *R. Br. in Sturt, Exptd. Centr. Austral.* ii. App. 83.—Austral,
microcalyx, *Hance, in Journ. Bot.* xxi. (1883) 323—China.
Mitchellii, Lindl. in Mitch. Trop. AustraL 365 = lineare.
mixtinervium, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 273.—Java.
molle, R. Br. Prod. 621=rin>plicifolium.
molle, Buch.-Ham. ex WalL Cat. sub n. 2856 = arborescens.
mollissimum, Wall, ex DC. Prod. viii. 807-brevilobum.
montanum, Roth, Nov. PI. Sp. 5=arborescens.
mucronatum, Reichb. ex Baker, Fl. Maurit 220-anriculatum.
mucronatum, Roth, Nov. PL Sp. 6-tortuosum.
multiflorum, Andr. Bot Rep. t. 496=pubescens i
multiflorum. Roth, Nov. PI. Sp. 6-pubescens.
multipartitam, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 825.—Afr. austr.
myrtifolium, DC. Prod. viii. 305-glaucum.
myrtophyllum, Zenk. PL Ind. 6. t. 7-rigidum.
Navamulica, Buch.-Ham. in Wall. Cat. sub n. 2856 = arborescens.
nefalense, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 12-glandulosum.
nervosum, *Lour. Ft. Cochinch.* 20.—Cochinch.

JASMINUM:—
nilagiricum, Hohen. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 600=brevilobum.
nobile, *C. B. Clarke, 1. c.* 687.—Burma.
noctiflorum, *Aftel. Rented. Guin.* 25__Afr. trop.
nudiflorum, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.*. i. (1846) 153.—China.
nummularoides, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. L 275 — bifarium.
oblongum, *Burnt, f. Fl. Ind.* 6. t. 3. f. 2.—Ind. or.
odoratissimum, *Linn. Sp. PI.* 7.—Ins. Fortunat
odoratum, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 19=J. Sambac.
odorum, Salisb. Prod. 12=odoratissimum.
officinale, *Linn. Sp. PI.* 7.—Ind. bor. oca; China.
ovalifolium, Wight, Ic. t. 1256=auriculatum.
ovatum, WalL Cat. n. 2882 = flexile, caudatum.
paniculatnm, *Roxb. Hort. Beng.* 3; *Fl. Ind. I* 99.—China.
parm'florum, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 405-didymum.
pauciflorum, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 448.—Afr. trop.
pedale, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 274.—Java,
pendulum, *Blume, 1. c.* 275.—Java.
Perrottetianum, A. DC. in DC. Prod. viii. 304 = rigidum t
populifolium, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 270.—Ins. Phillip,
puberulum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 203.—Madag.
pubescens, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. aub n. 2880 - J. Sambac.
pubescens, DC. Prod. viii. 312-pubigernm.
pubescens, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 693=Rottlerianum.
pubescens, *Willd. Sp. PI.* i. 37.—As. trop.
pubigerum, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 106.—Reg. Himal.
punctatutn, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 2877 = arborescens.
purpureum, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. iii. 598 = J. Ritchiei.
quadrifolium, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2868 =- J. Sambac.
quinqueflorum, Heyne, ex Wall. 1. c. n. 2878=J. Sambac.
quinqueneroe, Lamb, ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 106 =dispermum.
quinquenervium, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 273.—Java.
racemosum, *F. Muell. Fragm.* i. 19.—Austral.
reiiculatum, WalL Cat. n. 2869=coarctatum.
revolutum, Sims, Bot. Mag. t. 1731-humile.
rigidum, Thw. Enum. Fl. Zeyl. 190 = Rottlerianum.
rigidum, *Zenk. PI. Ind.* 5. t 6.—Ind. or.
Ritchiei, *C. B. Clarke, in Hook. /. Fl. Brit. Ind.* iii. 598.—Ind. or.
rivulare, Salisb. Ic. 15. t. 8-glaucum.
Kottlerianum, *Wall. Cat.* n. 2865.—Ind. or.
rotundifolium, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinl.* xii. (1884) 77.—Ins. Socotr.
Roxburghianum, *Wall. Cat.* n. 2870.—Ind. or.
rnpestre, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 280.—N. Guinea.
Sambac, *[Soland. in] Ait. Hort. Km.* ed. I. i. 8.—As. trop.
Sanjurium, Buch.-Ham. ex DC. Prod. viii. 302 - quinqueflorum.
scandens, Griff. Itin. Notes, 102 = undulatum.
scandens, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 2.—Ind. or.
Schimperi, *Vatke, in Linnaea*, xl. (1876) 210.—Abyssin.
sessiliflorum, *Vahl, Enum.* i. 29.—Ind. or.
Sieboldianum, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 280 = nudiflorum.
silhetense, Blume, I. c. 271=anaitomosans.
simplicifolium, *Font. f. Prod.* 3.—Austral.; Ins. Pacif.
smilacifolium, *Griff, ex C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind.* iii. 600.—Malacca.
solenanthum, DC. Prod. viii. 306-tubiflorum?
stenopetalum, Lindl. Bot. Reg. sub t. 918-anastomosans.
streptopus, £. *Mey. ex DC. Prod.* viii. 307.—Afr. austr.
suaveolens, Salisb. Prod. 12=azoricum.
suavissimum, *Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral.* 365.—AustraL
subelongatum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i- 274.—Malaya.

JASMINUM:—
subglandulosum, *Kurt, in Journ. Bet.* xiii. (1876) 829.—Bunna.
subpubescens, *Blume, Mus. Bet. Lugd. Bat.* i. 274.—Java.
subtriplinerve, *Blume, I. c.* 272.—Reg. Himal.
subulatum, •Lindl. Bot Reg. (1842) Misc. 57 = floridnm.
.sylvestre, *Noronha, in Verh. Baton. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. IV. 19 (Quid ?).—Java.
syriacum, Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II. vi. 120 = fruticans,
syringaefolium, *Wall. Cat.* n. 2861.—Burma; Assam,
tenuifolium, *Regel, Gartenfl.* (1856) 330.—Hab. t
tetraphis, Wight & Gardn. in Calc. Joura. Nat. Hist. vi. (1846) 52=rigidura.
tetraquetrnm,<4. *Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861-62) 332.—Ins. Fiji.
tettense, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot 284 = auriculatum.
tortuosum, *Willd. Enum. Hart. Berol.* 10.—Afr. anstr.
travancorense, H,eyne, ex Wall. Cat. sub n. 2881 = flexile.
trichotomum, *Heyne, ex Roth, Nov. PI. Sp.* 6.—Ind. or.
triflorum, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iii. 598 = rigidum.
triflorum, Pers. Syn. i. 7—angustifolinm.
trifoliatum, Moench, Meth. 467 = azoricom.
trifoliatum, Pers. Syn. i. 7 •= auriculatum.
trinerve, Roxb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 93-ans. stomosans.
• trinerve, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 2.—Java.
trinerve. Wall. Cat. n. 2848, partim = subtriplinerve.
tubiflorum, *Roxb. Hort. Beng.* [80]; *Fl. Ind.* i. 97.—Malaya.
undulatum, Hort. Heyne, ex Wall. C£t. n. 2871-J. Sambac.
undulatum, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 436.—Reg. Himal. j China.
undulatum, *Willd. Sp. PI.* i. 36.—Malaya,
venustum, *Regel, Cat. PI. Hort. Aksakov.* 75.—Hab. *1*
villosum, Stokes, Bot. Comment, i. 13 = Roxburghianum.
viminale, Salisb. Prod. 12 = officinnle.
vimineum, Willd. Sp. PI. i. 86 = angustifohum.
volubile, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 39.—Afr. austr.
vulcanicum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* I. 276.—Malaya.
•*vulgaHus,* Lam. Fl. Fr. ii. 306 = officinale.
Waitaanum, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* I. 27r.—Sumatra.
Wallichianum, Lindl. Bot. Reg. t. 1409=humile.
Wightii, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IU. 598.—Ind. or.
Zambac, Roxb. Hort. Beng. S=J. Sambac.
zan.ibariense, Boj. ex DC. Prod. viu. 310 = auncu-latum,
zeylanicum, Bum. f. Fl. Ind. t. 89 = Tabernaemontana coronaria.
Zip elliptnum *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 27*.—Ins. Amboin.

JASONIA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1815) 175; et in Dict. Sc. Nat. xxiv. 200 (1822). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 332.
CHILIADENUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxiv. 34 (1
MYRSNUS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1817)
138> ORSINA. Bertol. in Ann. Stor. Nat. Bologn. I. ii. (1829)8 62.
dichotoma: DC. Prod. v. 477-Allagopappus dichotus.
discZdea, Cass. in Diet Sc Nat xxiv. 201; xxxix. 407 -Pnlicariasicula.
foetida, Cass. in BulL Soc. Philom. (1815) 176-Nidorella foliosa.
glutinosa, DC. Prod. v. 476 - Innla'yiscosa.
kevigata, *DC. I. c.* 477.-IM- TeneirT.
lonsifolia, *Cass. in Bull. Sec. Pktlom.* (1815) 175.-radiata.'cLs. *in Did. Sc. Nat.* xxiv. 201,-Europ. ftustr
rupestris, *Pomel, Neuv. Mat. Ft. Atl.* 87.—Alger.
saxatilis, Guss.Fl. Sic. Syn. ii. 452=glutinosa.
««/a,DC.exDecne.inAnn.Sc.Nat. Ser. II. Ii.(1834) 261-Pulicariasicula.
tuberosa, *DC. Prod.* v. 47«.—Europ. anstr.

JATEOBHIZA, Miers, in.Hook. Niger Fl. 212 (1849).
MENISPERMACEAE, Benth. & Hook. f. i. 34.
DISCIFHANIA, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. I. 168. t. 36(1864).
Calumba, Mien, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiii. (1864) 134-seq.
Columba, *Miers, in Hook. Niger Fl.* 214, in nota.—Afr. trop.
lobata, Herb. Monac. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1.169 = Disciphania lobata.
Miersii, *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 42.—Afr. trop.
palmata, Miers, in Hook. Niger Fl. 214. t. 18, in nota • J. Columba.
strigosa, *Miers, I. c.* 213.—Afr. trop.

JATROPA, Scop. Introd. 243 (1777)-seq.

JATROPHA, Linn. Syst ed. I (1735). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 290.
ADENOROPIUM, Pohl, Ic. PI. Bras. i. 12. t. 9 (1827).
CASTIGLIONIA, Ruiz & Pav. Prod. 139. t. 37 (1794).
CNIDOSCOLUS, Pohl, Ic. PI. Bras. i. 66. t. 49 (1827).
CURCAS, Adans. Fam. ii. 356 (1763).
JUSSIEVIA, Houst. Reliq. 6.1.15 (1781).
LOUREIRA, Cav. Ic. v. 17. t. 429 (179»).
MAZINNA, Spach, Hist. V<<g. Phan. ii. 487 (1884).
MOZINNA, Orteg. Hort. Matr. Dec. 1U1. 1.13 (17»7).
acerifolia, Salisb. Prod. 889-J. Curcas.
aconitifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.—Am. trop.
aculeata, *F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. Nachtr.* iv. 76.—Arab.
acuminata, Desr. in Lam. Encyc. iv. 8=hastata.
aesculifolia, Steud. Norn. ed. II. i. 79;) - Manihot aesculifolia.
aethiopica, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 485.—Afr. trop.
Alamani, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 207.—Mexic.
Andrieuxii, *Muell. Arg. 1. c.* 208.—Mexic
angustidens, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. u. 1102.—Mexic.
angustifolia, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 171.—Cuba.
angustifolia, Steud Norn. ed. II. i. 799 (nom. delend.).—Cuba.
anomaha. Stem'.. I. c. — Manihot anomala.
antjsiphilitica, *Speg. in Anal. Soc. dent. Argent,* xvi. (Ib88) 91.—Reg. Argent.
arcuata, Steud. Nom. ed. II. i. 799 - Mnnihot violacea.
australis, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 891 = Sterculia diversif&lia, *G. Don.*
Berlandieri, *Torr. Bot. Mex. Bopnd.* 198.—Mexic.
Berterii, *Spreng. Syst.* iii. 76.—N. Granat.
cajaniformis,^\.*ea&.* Nom. ed. II. i. 799 = Manihot tripartita.
calyculata, Vahl, ex Steud. 1. c. (nom. fals.).
canescens, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1079,—Calif,
capensis, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 118.—Afr. austr.
cardiophylla, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1079.—Mexic.
caricaefolia, Steud. Nom. ed. II. i. 799-Manihot caricaefolia.
carthagenensis, Jacq. Enum. PI. Carib. 32 — Manihot carthagenensis.
cecropiaefolia, Steod. Nom. ed. II. i. 799-Manihot violacea.
ciliata, *Cero. in Supl. Gam. Lit. Mexico* (Jul. 2, 1794) 4.—Mexio.
ciliata, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 209.—Peruv.
cinerea, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. n. 1079.—Mexic.
clavuligera, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv.. (1865-66) 209.—Bolivia.
eleomaefolia, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras, xi. II. 476 — Manihot tripartita.
coccinea, *Hort. Cels, ex Link, Enum. Hort. Berol.* ii. 406.—Hab. I
coerulea, Stead. Nom. ed. II. i. 799 = Manihot cocrulescens.
coerulescens, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 469 = Manihot coerulescens.
Condor, Wall. Cat. n. 7799=J. Curcas.
cordata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. H. 1078.—Mexic.

JATROPHA:—
crinita, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 207.—Afr. trop.
cretolariaeformis, Steud. Nom. ed. II. i. 799 =» Manihot crotolariaeformis.
Curcas, *Linn. Sp. PI.* 1006.—Amphig. trop.
Curcas, Wall. Cat. n. 7799 D = Wightiana.
dalechampiaeformis, Steud. Nom. ed. IL i. 799 = Manihot tripartita.
diffusa, Steud. 1. c. -= Manihot palmata.
digitiformis, Steud. I. c = Manihot digitiformis.
dioica, *Cerv. in Supl. Gas. Lit. Mexico* (JuL 2, 1794) 4.—Mexic.
divaricata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 98.—Ind. occ.
divergens, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 268 - Pohliana.
divergens, Steud. Nom. ed. II. i. 799 - Manihot violacea.
diversifolia, *A. Rich, in Sagra, Fl. Cub. Fanerog.* ii. 207.—Cuba.
diversifolia, Steud. Nom. ed. II. i 799 (nom. delend.).
dulcis, [J. F. Gmel.] Onomat. Bot. v. 7 - Manihot palmata.
edulis, *Cerv. in Supl. Gat. Lit. Mexico* (Jul. 2, 1794) 3.—Mexic.
elastica, l.inn. f. Suppl. 422 =" Hevea guyanensis.
elegant, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 102 » gossypilblia.
elliptica, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 489 = opifera.
excisa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 94.—Reg. Argent.
{am,Muell.Arg. inMart. Fl.Bras.xi. II. 497.—Bras.
Fischeri, Steud. Nom. ed. II. i. 79!) (nom. delend.).
flabellifolia, Steud. 1. c. = Manihot palmata.
foetida, Steud. 1. c. = Manihot foetida.
fragrans, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 105.—Cuba.
frutescens, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. i. 79a - J. Janipha.
gallabatensis, *Schmeinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 661.—Afr. trop.
glandulifera, *Roxb. Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind.* iii. 6SS.—As. et Afr. trop.
glandulosa, *Vahl, Symb. Bot.* i. 80.—Arab.
glauca, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 170 — angustifolia.
glauca, A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 250-lobata.
glauca, Salisb. Prod. 889-J. Manihot.
glauca, Vnhl, Symb. Bot. i. 78 -glandulifera.
globosa, Gaertn. Kruct. ii. 122 -- Toxicodendrum capense.
gosiypifolia, *Linn. Sp. PI.* 1006.—Am. et Afr. liup.
gracilis, Steud. Nom. ed. II. i. 799 x Manihot gracilis.
guaranitica, *Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent,* xvi. (1883) !)3.—Reg. Argent.
hamosd, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1097.—Bras.
hastata, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (I860) 158 = Manihot diversifolia.
hastata, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 32.—Cuba.
herbacea, Linn. Sp. PI. 1007; Dear, in Lam. Encyc. iv. 16 - urens.
hemandiacfolia, *Vent. Yard. Malm.* 62.—Am. trop.
heierophylla, Steud. Nom. ed. II. i. 799-Manihot heterophylla.
Heudelotii, Baill. Adansonia, i. (1860) 64 = Ricinodcndron africanum.
hirsuta,/YorAsr. *in Flora,* xxviii. (1845) 82.—Afr. austr.
horrida, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 21u.—Bras.
integerrima, Jacq. Enum. PI. Carib. 82 —Manihot diversifolia.
Isabelli, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 489.—Lras.
Jacquini, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 268 - gossypifolia.
Janipha, Blanco, Fl. Filip.ed. I. 768=mn!uñda.
Janipha, Linn. Mant. i. 126—Manihot carthagenensis.
Janipha, Lour. FL Cochinch. 585 = Manihot Lourei.
Kunthiana, *Muell. Arg. in Linnaea',* xxxiv. (1885-661 211.—Mexic.
Lact-rti, *Siha Manso, Enum. Subst. Bras.* 8.—Bras.
laciniosa, Mart Fl. Bras. xi. II. 483 - Manihot laciniosa.
lagarinthoides, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 118.—Afr. austr.
lanriniosa, Steud. Nom. ed. II. i. 79!)-Manihot laciniosa.
Liebmanni, *Muell. Arf. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 212.—Mexic

JATROPHA:—
lobata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1085.—Arab.
longepetiolata. Stead. Norn. ed. II. i. 799 = Manihot longepetiolatu.
Loureirii, Steud. 1. c. = Manihot Loureirii.
luxuriant, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 268 = Pohliana.
nacrantha, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 209.—Peruv.
macrocarpa, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 94.—Reg. Argent.
macrorhiza, *Benth. PI. Hartv.* 8.—Mexic.
Manihot, Linn. Sp. PI.'1007=Manihot utilissima.
Manihot, Veil. Fl. Flam. r.. t. 80-Manihot palmata.
Martiusii, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 268.—Bras.
mitis, Rottb. in Act Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 301 = Manihot palmata.
mollissima, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 268 = Pohliana.
moluccana, Linn. Sp. PI. 1006 = Aleurites triloba.
moluccana, Wall. Cat. n. 7799 = J. Curcas.
montana, Willd. Sp. PI. iv. 663 -= Baliospermnm axillarc.
mnltifida, *Linn. Sp. PI.* 1006.—Amphig. trop.
mutabilis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 267.—Bras,
nana, *Dale. (J Gibs. Bomb. Fl.* 229.—Ind. or.
napaeifolia, Desr. in Lam. Encyc. iv. 15 = aconitifolia.
natalensis, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 485.—Afr. aastr.
neglecta, Houst. ex Baill. Etnd. Gen. Enph. 304, nomen^ urens.
neriifolia, *Muell. Arg. in Flora,* xlvii. (1864) 486.—Afr. trop.
nudicaulis, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 165.—Am. trop.
obtusifolia, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1097.—Bras,
octandra, *Cera, in Supl. Gas. Lit. Mexico* Qnl. 2, 1794) 4.—Mexic.
officinalis, Mart, ex Pohl, Ic. PI. Bras. i. 13. t. 9 = opifera.
officinalis, *Pohl, I. c.* 13.—Bras,
oligandra, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 502.—Bras,
olivacea, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 207.—Mexic.
opifera, *Mart. Reise Bras.* i. 548.—Am. trop.
orbicularis, Steud. Nom. ed. II. i. 799 = Manihot orbicularis.
osteocarpa, Schott, ex Pohl, Ic. PI. Bras. i. 63 = urens.
palmata. Veil. Fl. Flum. x. t 81 = Manihot palmata.
palmata, Willd. Sp. PI. iV. 562 « aconitifolia.
panduraefolia, Andr. Bot. Rep. t. 267 =hastata.
Papaya, Medic. Beobacht. (1782) 194 = aconitifolia.
pauciflora, *Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr.* (1865) 170.—Cuba.
paviaefolia, Stead. Nom. ed. II. i. 799 = Manihot paviaefolia.
pelargoniifolia, Courb. in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. xviii. (1862) 150=glandulosa.
peltata, *Cera, in Supl. Gas. Lit. Mexico* (Jul. 2,1794) 3; *H. B. (f K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 104.—Am. trop.
peltata, Stend. Nom. ed. II. i. 800=Manihot peltata.
peltata, Wight, Ic. 1.1169 = Wighliana.
pentaphylla, Steud. Nom. ed. II. i. 800-Manihot pentaphylla.
peruviana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 210.—Peruv.
phyllacantha, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1098.—Bras.
pilosa, Steud. Nom. ed. II. i. 800=Manihot pilosa.
platyphylla, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1077.—Mexic.
podagrica, *Hook. Bot. Mag.* t. 4376.—Panama.
Pohliana, *Muell. Arg. in Mlm. Soc. Phys. Genhi.* xvii. II. (1864) 448.—Bras.
porrecta, Steud. Nom. ed. IL i. 800—Manihot tripartita.
pronifolia, Steud. 1. c - Manihot pronifolia.
pruinosa, Steuc?.1. c.= Manihot pruinosa.
Fseudo-curcas, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 208.—Mexic.
pubescens, Steud. Nom. ed. II. i. 800=Manihot pubescens.
pungens, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 163 = Tragia cordifolia.

JATHOPHA:-
purpureo-costata, Steud. Nom. ed. IL i. 800 = Manihot purpureo-costata.
pusilla, Steud. 1. c-Manihot pusilla.
quinquefolia, Steud. 1. c.=-Manihot quinquefolia.
quinqueformis, Steud. 1. c = praec T
quinqueloba, *Cent, in Supl. GOB. Lit. Mexico* (Jul. 2, 1794) 4.—Mexic.
quinqueloba, Steud. Nom. ed. II. i. 800 = Manihot quinqueloba.
qninquelobata. *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 2.—Cuba.
reniformis, Steud. Nom. ed. II. i. 800 - Manihot reniformis.
ribifolia, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 268=ROSsypifolia.
ricinifolia, Fenzl,ex Baill. 1. c. i. (1860) 68 = lobata.
rotundil'olia, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 211.—Mexic.
Sabdariffa, *Sckveinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 37.—Afr. trop.
sagittato-partita, Steud. Nom. ed. II. i. 800-Manihot sagittato-partita.
salicifolia, Steud. 1. c.=Manihot salicifolia.
sihestris. Veil. Fl. Flum. x. t 83«Manihot palmata.
sinuata, Steud. Nom. ed. IL i. 800 = Manihot sinnata.
sparsifolia, Steud. 1. c. — Manihot sparsifolia.
spathulata, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1081.—Mexic.
spinosa, *Vahl, Symb. Bot.* i. 79.—Arab.
staphysagrifolia, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9 = gossypifolia.
stimulosa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 216=urens.
stipulata, Veil. Fl. Flum. x. t. 82 - Manihot utilissima.
stipulosa, Steud. Nom. ed. II. i. *&00-stimulosa.*
sylvestris, Auct. = *sihestris.*
tenerrima, Steud. Nom. ed. II. i. 800 = Manihot gracilis.
tenuifolia, Steud. 1. c—Manihot gracilis.
texana, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 211.—Texas.
tomentella, Steud. Nom. ed. II. i. 800 = Manihot tripartita.
tomentosa, Sprang. Syst. iii. 77-Vitex cymosa.
tomentosa, Steud. Nom. ed. II. i. 800 •= Manihot tomentosa.
triloba, *Cerv. in Supl. Gas. Lit. Mexico* (Jul. 2, 1794) 4.—Mexic.
tripartita, Spreng. Syst. iii. 76 = Manihot tripartita.
triphylla, Steud. Nom. ed. II. i. 800 =• Manihot triphylla.
tubulosa, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 212.—Mexic.
tupifolia, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1B65) 170.—Cuba,
unicostata, *Balf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 94.—Ins. Socotr.
urens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 106 - Kunthiana.
urens, *Linn. Sp. PI.* 1007.—Am. trop.
varians, Steud. Nom. ed. II. i. 800=Manihot varians.
variegata, *Vahl, Symb. Bot.* i. 79.—Arab.
viflosa, Baill. Adansonia, iv. (1863-64) 268=Pohliana.
villosa, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 1085 - glandulosa.
villosa, Wight, Ic. t. 1159-Wightiana.
viminea, *Rets, ex Steud. Nom.* ed. I. 426.—Hab. *%*
violacea, Steud. 1. c. ed. II. i. 800 = Manihot violacea.
vitifolia, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 5.—Bras.
Weddeliana, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 267.—Paraguay.
Wightiana, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 1080.—Ind. or.
Zeyheri, *Sond. in Linnaea,* xxiii. (1850) 117.—Afr. austr.

JATROPS, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 93 -ICarcgravla?, Plum. (Terastroem.).
myristicoides, Rottb. 1. c. (Quid ?).—Guian.
•umbellata, Rottb. 1. c - M. umbeUatat

JAUBERTIA, Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 60 = Gaillonia, A. Rich. (Rubiac).
Aucheri, Guill. 1. c«=G. Aucheri.

JAUBERTIA, Spach, ex Jaub. & Spach, Illustr. iii. 131. t. 289 (1849)=Dipterocome, Fisch. (Compos.).
kotlpiniodes, Spach, 1. c. 132=pusilla.

JAUMEA, Pers. Syn. ii. 397 (1807). *COMPOSITAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 397.
CHAETHYMENIA, Hook. *Sc* Arn. Bot. Beech. Voy. 298. t. 62 (1841).
COINOGYNE, Less, in Linnaea, vi. (1831) 520.
ESPEJOA, DC. Prod. v. 660 (1836).
HYPERICOPHVLLUM, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 498. t. 50 (1863).
KLEINIA, JOSS, in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 424. t. 61. f. 1.
carnosa, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* 360.—Calif,
compoiitarum, *Benth. & Hooh.f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 395.—Afr. trop.
linearifolia, DC. Prod.v. 663 = seq.
linearis, *Pers. Syn.* ii. 897.—Bras,
mexicana, *Benth. if Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 209.—Mexic.
peduncularis, *Benth. V Hook. f. ex Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii 395, in nota.—Mexic.

JEANNERETIA, Gaudich. Bot Voy. Bonite, t. 25 (1844-52)-Pandanus, Linn.
littoralis, Gaudich. 1. c.-=P. littoralis.

JEFFERSONIA, Bart, in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 334. *BERBER1DEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 44.
PLAGIORHEGMA, Maxim. Prim. Fl. Amur. 34. t. 1 (1859).
- VINDICTA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 51 (1836).
Bartonis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 237 =binata.
binata, *Bart, in Trans. Am. Phil. Soc.* iii. (1793) 334.—Am. bor.
diphylla, Pers. Syn. i. 418-binata.
dubia, *Benth. & Hook.f. ex Baker & Moore, in Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 377.—Manchur.
lobata, Nuft. in Journ. Acad. Phil. vii. (1834) 99-binata.
manchuriensis, Hance, in Journ. BoL xviii. (1880) 25S =dubia.
odorata, Rafin. Med. Fl. ii. ll=binata.

JEFFERSONIA, Brickell, in Med. Repos. N. York, i. (1800) 555-OeIsemium, Juss. (Logan.).
sempervirens, Brickell, 1. c. — G. sempervirens.

JEHLIA, Hort. Germ, ex Planch, in Fl. des Series. Sir. I. vii. (1851-52) 177 = Lopezia, Cav. (Onagrar.).
fuchsioides, Hort. Germ, ex Planch. 1. c. = L. macrophylla.

JEILIUM, Hort. ex Regel, Gartenfl. (1869) 102 * Telanthera, R. Br. (Amarant.).
tricolor, Hort. ex Regel, 1. c. = T. Bettzichiana.

JENKINSIA, Griff, in Calc. Joum. Nat. Hist. iv. (1843) 231. t. 12-Miquelia, Meissn. (Olacin.).
qssamica, Griff. 1. c. = M. Kleinii.

JENKINSIA, Wall, ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 544 (1845)=Myriopteron, Griff. (Asclepiad.).
cristata, Wall. 1. c.=M. paniculatum.

JENKINSONIA, Sweet, Geran. t. 79 (1820) =Polargonium, L'Hérit. (Geraniac).
anemonefolia, Sweet, Hort. Brit. ed. 1.84 = P. myrrhifolium.
antidysenterica, Eckl. & Zeyh. Enum. 70 = P. antidysentericum.
bullata, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 84-P. myrrhifolium.
canariensis, Sweet, 1. c.-P. canariense.
caucalifolia, Sweet, 1. c. = P. caucalifolium.
coriandrifolia, Sweet, Geran. sub t. 99 = P. myrrhifolium.
dichotoma, Eckl. & Zeyh. Enum. 70 = P. dichotomum.
lacera. Sweet, Geran. sub t. 342 ; Hort. Brit. ed. I. 84 =P. myrrhifolium.
longicaulis, Hoffmgg. Vera. Pfl. Nachtr. iii. 44 = P. longicaule.
multicaulis, Hoffmgg. Verz. Pfl. 69-P. multicanle.
myrrhifolia, Sweet, Hort. Brit ed. I. 84 = P. myrrhifolium.
pendula, Sweet, Geran. 1.188=P. pendulum.
quinata. Sweet, 1. c t 79 = P. quinatom.
Synnoti, Sweet, 1. c. t. 342" P. Synnotii.
tetragona, Sweet, 1. c. t. 99 = P. tetragonum.
tripartita, Hoffmgg. Verz. Pfl. 69=P. tripartitum.

JENSOA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 88 (1886)-Cymbidium, Sw. (Orchid.).
ensatp, Rafin. 1. c.=C. ensifolium.

JEBDONTA, Wight, Ic. t. 1352 (1848). *GESNERACBAE,* Benin. & Hook. f. ii. 1020.
indica, *Wight, I. c*—Ind. or.

JERONIA, Pritz. Ic. Ind. i. 579 (1855), sphalm. - Peronia, Correa (RnUc).

JESSENIA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 887. *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 897.
amazoaum, *Drude, in Mart. Fl. Bras.* iii. II. 474.—Bras,
oligocarpa, *Griset. (f H. Wendl. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 516—Ind. occ.
polycarpa, *Karst. in Linnaea,* xxviu. (1868) 388.—
repa^d'a, *Engl. I. c.* xxxiii. (1864-65) 691.-N. Granat

JESSIANA, II. Wendl. in Kerch. Palm. 247 (1878) = praec.

JEZABEL, Banks, ex Salisb. Gen. PI. Fragm. 5 (1866) - Freycinetia, Gaudich. (Pandan.).

JIMENSIA. Rafin. Fl. Tellur. iv. 38 (18S6)=Bletia, Ruiz & Pav. (Orchid.).
nervosa, Rafin. 1. c - B . hyacinthina.

JIRASECKIA, Dnm. Fl. Belg. 29 (1827) = »eq.

JIRASEKIA. F. W. Schmidt, Neue u. Sell. PH. 49 a793)=AnagallIB, Linn. (Primulac.).
alpina, F.W.Schmidt, l . c - A. tenella...
aUernifolia, Reichb. ex Steud. Norn. ed. II. L *Wi*- A. alteraifolia.
crassi/olia, Reichb. ex Stend. 1. c.-A. crassifolia.
tenella, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 408 = A. tenella.

JOACHIMEA, Benth. *Sc* Hook. f. Gen. iii. 1100 (1883), sphalm. = seq.

JOACHIMIA, Tenore, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 695 , (l«17)=Beokmannia,HostiGram.n0.
phalaroides, Tenore, ex Roem. *Sc* Schult. 1. c. - B. erucaefonnis.

JOANNEA, Spreng. Anleit ii. H. 635 (1818) = Ieck. ii. 132 = C. glabra.
insignis, Spreng. Syst. iii. 882 = C. Jussieui.
inpunerns, opreng. ex Less. in Linnaea, v. (1830) 251 - C . paniculata.

JOANNESIA, Pers. Syn. ii. 383 (1807) = Chuquiraga, Juss. (Compos.).
insignis. Pers. 1. c - C . Jussieui.

JOANNESIA, Veil. Alograf. 199 (1798). *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook..?. »»•«««*.
ANDA, A. JUSS. in Diet. Sc. Nat. n. 113 (1804) , et Euph. Tent. 39. t. 12 (IM*)-
ANDICUS, Veil. Fl. Flum. 80 (1825).
Princeps. *Veil. Alograf.* 199.—Bras.

JOBAPHES.Phil. Fl. Atac. 27. t. 4 (1860) - Hyalis, D. Don (Compos.).
virgatus, Phil. 1. c. 28.—Chili.

JOBINIA, Foum. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 327 (1886). *ASCLEPIADEAE.*
hemandifolia, *Fourn. I. c*—Bras.
Lindbergii, *Foum. I.* e.—Bras.

JOCASTE, Kunth, Enum. PL v. 154 (1850) = Smilacinia, Desf. (Liliac).
purpurea, Kunth, 1. c =S. purpurea.

JOCASTE, Meissn. Gen. 211; Comm. 135 a[889] IOCASTE, E. Mey. - Phymaspermum, Less. (Compos.).

JOCAYENA, Rafin. in Ann. Gén. &. Phys. vi. (1820) 82, sphalm.-Toeoyena, Aubl. (Rubiac.).

TOHANNESIA, Endl. Gen. 1114 (1840) = Joannesia, VeU. (Euphorb.).

JOHANNIA, Willd. Sp. PL iU. 1705 (1803)=Chuquiraga, Juss. (Compos.).
brasiliensis, Steud. Nom. ed. II. i. 818 = C. glabra.
elegans, Willd. ex DC. Prod. vii. 9-=C. lancifolia.
insignis, Willd. Sp. PI. iii 1706 = C. Jussieui.
lancifolia, Steud. Nom. ed. II. i. 813 - C . lancifolia.
microphylla, Steud. 1. c. ed. I. 433 = C. Jussieui.

JOHNIA, Roxb. Hort. Beng. 5 (1814); Fl. Ind. i. 168 (1832) « Salacia, Linn. (Ceiastr.).
coromandelina, Roxb. 11. cc. 6; 169 = S. prinoides.
salacioides, Roxb. 11. cc. 5 ; 168=S. Roxburghii.
serrata, Buch.-Ham. in Wall. Cat. sub n. 4219 - S. prinoides.

JOHNIA, Wight & Am. Prod. 449 (1834)-Olycine, Linn. (Legumin.).
congests, Dalz. *Sc* Gibs. Bomb. Fl. Suppl. 28 = Dolichos biflorns.
Petitiana, A. Rich. Tent Fl. Abyss, i. 210. t. 40 - G. Petitiana.
Wightii, Wight *Sc* Am. Prod. 449 - G . javanica.
Willdenowia, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 805 = G. hedysaroides.

JOHNSONIA, Adans. Fam. ii. 343 (1768) - Cedrela, P. Br. (Meliac.).

JOHNSONIA,R. Br. Prod. 287 (1810). *LIUACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 795.
acaulis, *Endl. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 41.—Austral.
hirta, Lindl. Swan River App. 57 - pubescens.
hirta, F. Muell. Fragm. vii. 87, partim=pubescens.
longifolia, Endl. in Lehm. Fl. Preiss. ii. 40 = pubescens.
lupulina, *R. Br. Prod.* 287—Austral.
mucronata, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 40 = pubescens.
pubescens, *Lindl. Swan River App.* 57.—Anstral.
Stawelli, F. Muell. Fragm. vii. 85-Stawellia dimorphantha.
teretifolia, Endl. in Lehm. PI. Preiss. ii. 40=lupulina.

JOHNSONIA, T. Dale, ex Mill. Gard. Diet. ed. VI. Aft). 75 (1752) = Callioarpa, Linn. (Verbenac).
americana, Mill. L c. ed. VIII. = C. americana.

JOHNSONIA, Neck.»Elem. ii. 49 (1790)=Iiyoium, linn. (Solanac.).

JOHBENIA, DC. Coll. Mém. v. 64 (1829); Prod. iv. 196 (1830). *UMBELLIFERAE,* Benth. *Sc* Hook. f. i. 925.
DICHOROPETALUM, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syr. 17 (1842).
PHLOIODICARI'US, Turcz. ex Bess, in Flora, xvii. (1834) I. BeibL 14.
alpina, *Fenzl, in Russegg. Reise,* ii. 961. t. 17.—Cillcia.
aurea, *Boiss. (f Bal. Diagn.* Ser. II. vi. 81.—Cappadoc
berytea, *Boiss. (f Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* ii. 1012.—As. Min.
Candollei, *Boiss. in Ann. Sc. NaU* Sér. III. i. (1844) 806.—Persia.
dichotoma, Boiss. 1. c. 304-fungosa.
dichotomy *DC. Coll. Mfm.* v. 54. t. 1.—Syria.
Engleri, *Dingl. in Flora,* Ixvi. (1883) 212.—Bithynia.
fongosa, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 33.—As. Min.
graeca, *Boiss. V Sprun. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat.* Sér. III. i. (1844) 305.—Graecia.
juncea, *Boiss. Diagn.* Ser. I. x. 83.—Syria.
Meyeri, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 307 — Peucedanum paucifoliom.
persica, Boiss. 1. c. 306 = Candollei.
platycarpa, *Boiss. 1. c.* 808.—Persia.
scoparia, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 61«Peucedanum scoparium.
selinoides, *Boiss. (f Bal. 1. c.* Ser. II. v. 99.—Cilicia.
tenuissima, Boiss. 1. c. ii. 90 =» Peucedanum scoparium.
Tordylium, Fenzl, Pugill. PI. Nov. Syt. 18=Coriandrum tordylioides.

JOINVHiIiEA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 89-40 (1844-^52). *FLAGELLAREAE,* Benth. & Hook. *I.* iii. 861.
ascendens, *Gaudich. 1. c.*—Ins. Sandvic
elegans, *Gaudich. I. c.*—N. Caled.
Gaudichaudiana, *Brongn. V Gris, in Bull. Soc. Bot. FT.* viii. (1861) 269.—Ins. Sandvic.

JOIRA, Steud. Nom. ed. II. ii. 639, in syn. (1841)- IVIRA, Aubl. = Storoulia, Linn.

JOLIFFIA, Boj. ex Delile.'in M<ta. Sue. Hist. Nat. Par. iii. (1827) 314, 818. t. 6 - Telfairia, Hook. (Cucurb.).
africana, Delile, 1. c.«T. pedata.

JONCQUETIA, Schreb. Gen. 308 (1789) - Tapiria, Juss. (Anacard.).
paniculata, Willd. Sp. PI. ii. 750 - T . guianensis.

JONDRABA, Medic. Pflanzeng. 27 (1792) - BiscuteOla, Linn. (Crucif.).
auriculata, Webb & Berth. Fhyt. Canar. i. 94, in obs. E*B. auriculata.
cichoriifolia, Webb & Berth. V c. = B. cichoriifolia.
sulphurea, Medic, l'flanzeng. 29 » B . auriculata.

JONESIA, Roxb. in As. Res. iv. (1795) 856-Saraca, Linn. (Legumin.).
Asoca, Roxb. 1. c. = S. indica.
confusa, Hassk. Retzia, i. 194.—Java.
declinata, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) VII. 74 = S. declinata.
javanica, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. I. 85=S. declinata.
macroptera, Miq. 1. c. 1080 - S . macroptera.
minor, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Ncêrl. Indie, iii. (1846) 80 = S. indica.
monopetala, Hassk. Ketzia, i. 199.—Java.
palembanica, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 291 = S. palembanica.
pinnata, Willd. Sp. PI. ii. 287 - S . indica.
scandens, Roxb. Hort. Beng. [27]; FL Ind. ii. 220 = S. triandra.
triandra, Roxb. Fl. Ind. ii. 220-S. triandra.

JONGHEA, Lem. Jard. Fleur. ii. sub t. 180,181 (1852) = BiUbergia, Thunb. (Bromeliac).
splendida, Lcm. 1. c.-B. thyrsoidea.

JONIA, Steud. Nom. ed. II. i. 813 (1840)-Ionidium, Vent. (Violar.).

JONIDIOPSIS, Presl, in Abh. Hoehm. Ges. V. Folge, iii. (1845) 448 (Bot. Bemerk. 13)=Noisettia, H. B. *Sc* K. (Violar.).
fruticuiosa, Presl, 11. cc. = N. longifolia.

JONIRIS, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 502 = Iris, Toum.
biglumis, Doniana, fragrans, longifolia, longispatha, Pallasii, trifiora, Klatt, 1. c. -= I. ensata.
humilis, Klatt, 1. c. - 1 . humilis.
ruthenica, Klatt, 1. c.-=I. ruthenica.
songarica, Klatt, 1. C.-I. songarica.
stylosa, Klatt, 1. c. = I. uuguicularis.
tenax, Klatt, 1. C. = I. tenax.
tenuifalia, Klatt, 1. C.-I. tenuifolia.

JONQUILLA, Haw. Monog. Narciss. (1881) 7 - Narcissus, Toum. (Amaryll.).
bicolor, Rafin. Fl. Tellur. iv. 21 = N. Pseudo-narcissus.
incomparabilis, Rafin. 1. c.=-N. incomparabilis.
juncifolia, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 164 - N . juncifolia.
major, Haw. Monog. Narciss. 7 ™ N. Jonquilla.
media, Haw. 1. c. ^ N. Joiitiuilla.
minor, Haw. 1. c. = N. Jonquilla.
parvirorona. Haw. 1. c. •• N. Jonquilla ?
Taeeita, Rafin. Fl. Tellur. iv. 21 = N. Tazetta.
trilobus, Rafin. 1. c. = N. odorus.
viridifiora, Kafin. L c. = N. viridifloras.

JONQUILLIA, Endl. Encb. 103 (1841)- praec.

JONTANEA, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 82 =TONTANEA, Aubl. =Coococyp$_B$elum, R. Br. (Rubiac.).

JONTHLASPI, DC. Sjrst. ii. 326 (1821) - IONTHLASPI, Adans. = Clypeola, Linn. (Crucif.).

JOOSIA, Kant. Fl. Columb. i. 9. t. 5 (18S8) = Ladenbergia, Klotzsch (Rubiac).
umbellifera, KaisL 1. c.—N. Granat

JORDANIA, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 93 (1849) = Acanthophyllum, C. A. Mey. (Caryophyll.).
minuartoides, Boiss. *Sc* Heldr. 1. c. 94 *{=*Gypsophila minuartioides).*—As. Mia.
•spergulaefolia, Boiss. 1. c. *("Gyps, spergulaefolia).*—As. Min.

JORENA, Adans. Fairi. ii. 249 (1763) (Quid?).

JOSEPHA, Benth. & Hook. f. Gen. Hi. 616 (1883), sphalm.=Josephla, Wight (Orchid.).

JOSEPHA, Veil. FI. Flum. 154 (1825); iv. 1.16 (1827) = Bougainvillaea, Comm. (Nyctagin.).
augusta, Veil. 11. cc-B. spectabilis.

JOSEPHIA, Salisb. in Knight, Prot. 110 (1809) = Dryandra, R. Br. (Proteac).
armata, Poir. Encyc. Suppl. iii. 176—D. annata.
blechnifolia, Poir. 1. c. 176=D. pteridifolia.
euneata, Poir. 1. c. 176 = D. cuneata.
falcata, Poir. 1. c-D. falcata.
floribunda, Poir. 1. c. = D. floribnnda.
formosa, Poir. 1. a —D. fonnosa.
longifolia, Poir. 1. c. = D. longifolia.
mucronulata, Poir. 1. c.=D. mucronulata.
nivea, Poir. 1. c—D. nivea.
obtusa, Poir. 1. c.-D. obtnsa.
p'.umosa, Poir. 1. c—D. plnmosa.
pteridifolia, Poir. 1. c 176 = D. pteridifolia.
rachidi/olia, Knight, Prot. 111=D. nivea.
sessilis, Knight, 1. c 110 = D. floribunda.
tenui/olia, Poii. Encyc. Sappl. iii. 176 = D. tennifolia.

JOSEPHIA.Steud.Nom.ed.II.i. 814(1840)=JOSEPHA, Veil.=Bougainvillaea, Comm. (Nyctagin.).

JOSEPHIA, Wight, Ic. PI. v. 19. t 1742, 1743 (1861). *ORCHIDEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 616.
lanceolata, *Wight, I. e.* t. 1742.—Ind. or.
latifolia, *Wight, 1. c.* t. 1743.—Ind. or.

JOSEPHINA, Pen. Syn. ii. 174 (1807)=seq.

JOSEPHINTA, Vent Jr.-d. Malm. 67. t. 67 (1804). *PEDALINEAE,* Benth. & Hook. f. ii. 1060.
africana, *Vatke, in Linnaea,* xliii. (1880-82) 541.—Afr. trop.
celebica, Blnme, Bijdr. 779 = imperatricis.
Eugenia, *F. Muell. in Hook. Km Journ.* ix. (1857) 870.1.11.—Austral,
grandiflora, *R. Br. Prod.* 520.—Anstral.
imperatricis, *Vent. Jard. Malm.* 67. t. 67.—Anstral.; Ins. Celebes.

JOSSINIA, Comm. ex DC. Prod. iii. 237 (err. typ. 387) (1828)-Eugenia, Linn. (Myrtac.).
buxifolia, DC. 1. c. 238 = E. coriacea.
cassinoides, DC. 1. c, = E. cassinoides, *Lam.*
celebica, Blume, Mus. Bot Lugd. Bat. i. 124.—Ins. Celebes.
cordifolia, Boj. Hort. Maurit 141 - E. cotinifolia.
eotinifolia, DC. Prod. iii. 238=E. cotinifolia.
elliptica, DC. 1. c. 287 = E. cotinifolia.
ferruginea, Boj. Hort. Maurit 141 - E. cotinifolia.
glomerata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 122.—Ins, Mascar.
hastilis, Blnme, 1. c.—Ins. Mascar.
indica, Wight, Ic. t (23; Illnstr. ii. 12. t 122 = E. Jossinia.
Lamarciii, Blume, Mas. Bot. Lugd. Bat i. 121.—Ins. Maurit.
lanceolata, Boj. Hort. Manrit 141-E. cotinifolia.
litoralis, Blume. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 124.—N. Guinea.
ludda, DC. Prod, iii 237-E. cotinifolia.
mespiloides, DC. 1. c.=E. cotinifolia.
orbiculata, DC. 1. c-E. cotinifolia.
pinnata, Heynh. Nom. i. 431.—Bras.
Reinwardtiana, Blnme, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 120-E. Reinwardtiana.

JOSSINIA:—
revoluta, Boj. Hort. Maurit. 140-= Eugenia mespiloides.
Richardii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat i. 123.—Madag.
Sieberiana, Blume, 1. c. 121.—Ins. Manrit
tahitensis, Nadeaud, Enum. PL Tahiti, 79.—Ins. Tahiti.
terminalis, Boj. Hort. Maurit. 141.—Ins. Mascar.
tinifolia, DC. Prod. iii. 238-E. cotinifolia.

JOTTVEA, Fonrn. in Bull. Soc. Bot Belg. xv. (1876) 475. *GRAMINEAE,* Benth. & Hook. f. iii 1173
straminea, *Fourn. I. c.*—Mexic.

JOVELLANA, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 12 (1798) = Calceolaria, Linn. (Scrophul.).
peHolaris, Cav. Ic. v. 80. t. 445=C. petioalaris.
punctata, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. i. IS. t. 18. f. a = C. punctata.
scapiflora, Ruiz *Sc* Pav. 1. c. t. 18. f. b-C. plantaginea.
triandra, Cav. Ic. v. 32. t. 453 "C. triandra.
violacea, G. Don, Gen. Syst iv. 608 = C. violacea.

JOVIBARBA, Opiz. Seznam, 54 (1852) - Sempervivum, Rupp. (Crassul.).
arenaria, Opiz, 1. c. 55=S. arenarium.
hirta, Opiz, 1. c. 54=S. hirtum.
sobolifera, Opiz, 1. c.=S. globiferum.

JOXOCARPUS, Pritz. Ic. Ind. i. 586 (1855), sphalm.= Tozocarpus, Wight *Sc* Am. (Asclep.).

JOXYLON.Steud. Nom. ed. II. i. 814 (1840), sphalm. = TOXYLON, Rafin.-Machera, Nutt. (Urtic).

JRILLIUM, Rafin. in Joum. Phys. ici. 72 (1820), sphalm. =Trillium, Mill. (Liliac).
sessile, Rafin. 1. c-T. sessile.

JUANIA, Drude, in Goett. Nachr. (1878) 40. *PALMAE,* Benth. *Sc* Hook. f. iii. 905.
australis, *Drude, ex Hook. f. Rep. Kent Gard.* (1884) *App.* 57.—Ins. J. Feraand.

JTJANTJLLOA, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 27. t. 4 (1794). *SOLANACEAE,* Benth. *Sc* Hook. f. ii. 903.
ECTOZOMA, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat. Hist. Ser. II. iii. (1849) 166; et iv, (1849) 191.
HYDROCALYX, Triana, in Ann. Sc. Nat. *Sir.* IV. ix. (1858) 43.
LAURERIA, Schlecht. in Linnaea, viii. (1833) 513.
PORTAEA, Tenore, in Atti 7ma Riun. Sc. Ital. 902 (1846).
SARCOPHYSA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. iii. (1849) 166; et iv. (1849) 190.
ULLOA, Pers. Syn. i. 218 (1805).
aurantiaca, *Otto V Dietr. Allg. Garten:* xii. (1844) 266.—Mexic.
elliptica, *Suit tf Pav. ex Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 530.—Mexic.
eximia. Hook. Bot. Mag. t. 5092 = Dyssochroma eximia.
grandiflora, *Dun. 1. c.* 531.—Peruv.
Hookeriana, Miers, in Ann. *Sc* Mag. Nat Hist. Ser. II. iv. (1849) 188=aurantiaca.
mexicana, *Miers, I. c.*—Mexic.
microphylla, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 531.—Pernv.
panamensis, *Miers, in Ann.(f Mag. Nat. Hist.* Ser. II. iv. (1849) 190.—Panama.
parasitica, Hook. Bot Mag. t. 4118=aurantiaca.
parasitica, *Ruit V Pav. Fl. Per.* ii. 47. t. 185.—Peruv.
tpeciosa, *Dun. in DC. Prod.* xiii. I. 582.—N. Granat.
umbellata. Dun. L c 530 «= Iochroma calycina.

JUBAEA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 808. t. 96 (1815). *PALMAE,* Benth. & Hook. f. iii. 948.
MICROCOCOS, Phil, in Bot. Zeit. xvii. (1859) 362.
MOLINAEA, Bert, in Merc Chil. (1829); ex Am. Jonm. Sc. xx. (1831) 152.
spectabilis, *H. B.* to[1] *K. Nov. Gen. et Sp.* i.808.196.—Chili.
Torallii, *H. Wendl. in Kerch. Palm.* 347.—Ecuador.
ToraUyi, Linden, in Illustr. Hortic. xxviii. (1881) 31-praec.

JUBELINA, A. Juss. in Deless. Ic Sel. iii. 19. t 32 (1837). *MALPIGHIACEAE,* Benth. & Hook. f. i. 260.
nicaragnensis, *Griseb. V Oerst. in Kjoeb. Vidtnsk. Meddel.* (1853) 48.—Nicaragua,
riparia, *A. Juss. in Deless. Ic. Sel.* iji. 19. t 82.—Guian.

JUBELINIA, Endl. Gen. Suppl. v. 76 (1850)-praec. *

JUCHIA, Neck. Elem. i. 132 (1790)-Lobelia, Linn. (Campan.).

JUCHIA, M. Roem. Syn. Pepon. 11, 48 (1846)=Melothria, Linn. (Cucurbit).
hastata, M. Roem. 1. c. 48-M. heterophylla.

JUCUNDA, Cham, in Linnaea, ix. (1834) 456 - Miconia, Ruiz *Sc* Pav. (Melastom.).
Bredemeyriana, Cham. 1. c. 458-M. laevigata.
Lhotakyana, Cham. 1. c. 457 =M. staminea.
Martiana, Cham. I. c. 456 = M. staminea.
Olfersiana, Cham. 1. c. 457 - M. jucunda.
Rudolphiana, Cham. 1. c. 458 -M. laevigata.
Sellowiana, Cham. 1. c. 456 = M. jucunda.
tomentosa, Benth. in Hook. Joum. Bot ii. (1840) 302 = M. tomentosa.

JUDEOLA, Heist Syst 9 (1748). (Legnm. gen. in-•iesc).

JUERGENSENIA, Schlecht. in Bot. Zeit. vi. (1848) 435 - JURGENSENIA, Turcz. = Befaria, Mutis (Ericac).

JUERGENSIA, Spreng. Syst. iii. 50 (1826)-Alaodeia, Thon. (Violar.).
anguifera, Spreng. 1. c.=A. echmocarpa.

JUGA, Griseb. FL Brit. W. Ind. 711 (1864), err. typ.. Inga, Scop. (Legumin.).

JUGASTRUM, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 275=Lecythis, Linn. (Myrtac).
coriaceum, Miers, 1. c. = L. coriacea.
depressum, Miers, 1. c. 278.—Bras.
obtectum, Miers, 1. c. 276.—Bras.
platyspermum, Miers, 1. c. 277.—Bras.
Poiteaui, Miers, 1. c 279 =- L. Poiteaui.
subcinctum, Miers, 1. c. 278.—Bras.

JTJCHiANS, Linn. Gen. ed. I. 291 (1737). *?UGIANDEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 398.
REGIA, Loud, ex CDC. in Prod. xvi. II. 136 (1864).
WALLIA, Alef. in Bonplandia, ix. (1861) 835.
ailantifo'.ia, Carr. io Rev. Hortic (1878) 414 - Sieboldiana.
alba, Linn. Sp. PI. 997—Carya tomentosa.
alba, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 = Carya alba.
albo-ovata, Marsh. Arbnst. 69-Carya alba.
amara, Michx. Hist Arb. Am. Sept. i. 177. t. 18 — Carya amara.
amara, Muhl. Cat. 88=Carya snlcata.
ambigua, Michx. 1. c. 203-Carya sulcata.
angustifolia, Ait Hort. Kew. iii. 361 = Carya olivaeformis.
aquatica, Michx. Hist. Arb. Am. Sept i. 182. t. 5-Carya aquatica.
arguta, Wall. Cat. n. 4944; ex C. DC. in DC. Prod. xvi. II. 138-regia.
australis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 97.—Reg. Argent
baccate, *Linn. Syst.* ed. X. 1272 (Quid 1).—Ind. occ.
califomica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* x. (1875) 849.—Calif.
Camirum, Lour. Fl. Cochinch. 678 >• Aleurites triloba.
Catappa, Lour. 1. c='Terminalia Catappa.
cathartica, Michx. Hist. Arb. Am. Sept. i. 165-cinerea.
cinerea, *Linn. Syst.* ed. X. 1272.—Am. bor.
compressa, Gaertn. Frnct. it 91. t. 89 = Carya alba.
compressa, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Neue Schr. iii. (1801) 390; Willd. Sp. PI. iv. 468 = Carya snlcata.
cordiformis, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xviii. (1873) 62.—Japon.

JTOLAira.—
coreensis, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 27 — Pterocarya rhoifolia.
cyli'ndrica. Lam. Encyc. iv. 505= Carya olivaeformis.
equatoriensis, Linden, Cat. n. 23 (1869) 26 - granatensis ?
filicifolia, Ijodd. Cab. 1886: ex Loud. Arboret. iii. 1424 - regia.
yfraxinifolia, Lam. Encyc. iv. 502-Pterocarya fraxinifolia.
glabra, J. F. Gmel. Syst. 755-Carya alba.
glabra, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6; Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Neue Schr. iii. (1801) 391-Carya porcina.
granatensis, *Linden, Cat.* n. 23 (1869) 26.—N. Granat.
heterophylla, Hort. ex Loud. Arboret. iii. 1424 = regia.
illinoinsis, Wangenh. Beitr. Forstw. Nord-Am. Holz. 54. t. 18-Carya olivaeformis.
insularis, *Griseb. Cat. PI. Cub.* 68.—Cuba.
intermedia, Can. in Rev. Hortic. (1870-71) 494 = regia.
jamaicensis, *C. DC. in DC. Prod.* xvi. II. 188.—Jamaic.
japonica, Hort. ex Lavall. Arbor. Segrez. l = Sieboldiana.
japonica, *Siebold, ex Mia. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat:* iii. 108.—Japon.
Kurumi, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1880) 27 — Platycarya strobilacea.
laciniosa, Michx. Hist Arbr. Am. Sept. i. 199-Carya sulcata.
longirostris, Carr. in Rev. Hortic. (1878) 53-regia.
macrophylla, Carr. 1. c. 415=Sieboldiana.
mandshurica, *Maxim, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* xv. (1856) 127.—Manchuria.
mandshurica, Miq. in Ann. Mus. Bot.*Lugd. Bat. iii. 104-Sieboldiana.
mollis, *Engelm. in Hemsl. Diagn. PI. Nov.* 54.—Mexic
mucronata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 192 - Carya sulcata.
myristicaeformis, Michx. Hist. Arb. Am. Sept. i. 211 = Carya myristicaeformis.
nigra, *Linn. Sp. PI.* 997.—Am. bor.
nigra, Thunb. Fl. Jap. 195 = Sieboldiana.
oTcordata, Lam. Encyc. iv. 504-Carya porcina.
oblonga, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 3-cinerea.
olivaeformis, Michx. Hist. Arb. Am. Sept. i. 178 = Carya olivaeformis.
mata, MilL Gard. Diet. ed. VIII. n. 6-Carya alba.
Pecan, Walt. Fl. Carol. 236-Carya olivaeformis.
Pitteursii, Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, iv. (1,848) 179. t. 197 = nigra.
porcina, Michx. Hist. Arbr. Am. Sept. i. 206-Carya porcina.
^-ocera, Salisb. Prod. 392 = Carya alba.
pterocarpa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 4940-Engelhardtia spicata.
pterocarpa, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 192; Willd. Sp. PI iv, 455 = Pterocarya fraxmifolia.
*pteVo'cZca,*Roxb' H^rt Beng. 68 ; FL Ind. iii. 631 = Engelhardtia spicata.
Puiescens, Willd. Enum. Hort. BeroL Snppl. 64 = pyK i K ^ L . *in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1850) 79.—Mexic.
Pyriformis, Mnhl. Cat. 92-Carya porcina.
regia, *Linn Sp. PI.* 997.-As. occ.; Reg. Himal.
rubra, Gaer^Fruct ii. 51. t. 89 = Carya olivaeformis.
rupestris, *Engelm. in Torr. Sot. Sitgr. Rep.* 171.t15. —Am. bor. occ.
Sieboldiana, *Maxim, in Bull. Acad. Pitersb.* xvui. (1873) a«0-!P{Tr{mLam. Encyc. iv. 504; Michx. Hist Arbr. Am. Sept. i. 190-Carya alba,
stenocarpa, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 78.-Reg. Amur.
sulcata, Willd. Berl. Baumz. 164 - Carya snlcata.
tomentosa, Lam. Encyc. iv. 604 = Caxya albt
tomentosa, Michx. Hist Arbr. Am. Sept 1.184=Carya
villosa, Wall. Cat. n. 4945 - Engelhardtia Colebrookiana.

JUJUBA, Burm. Thes. Zeyl. 181. t 61 (1787) - Ziziphua, Tourn. (Rhamn.).

JULIA, Steud. Norn. ed. II. i. 383, in syn. (1840) - . JUNIA, Adans. - Clethra, Linn. (Vaccin.).

JULIANA, Reichb. Norn. 198 (1841) - seq.

JULIANIA, La Llave, in La Llave & Lex. Veg. Desc. fasc. ii. 4 (1825) - Choisya, Knnth (Rutac).
caryophillata, La Llave, 1. c. = C. ternata.

JULIAUTA, Schlecht. in Linnaea, xvii. (184S) 746.
ANACARDIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 428.
HYFOPTERVCIUM, Schlecht. 1. c. (1843) 685.
udstringens, *Schlecht. I. c.* 636.—Mexic
Huaucui, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 871.—Pernv.

JULIETA, Lescbeni ex DC. Prod. vii. 764 (1839) = Iiysinema, R. Br. (Epacrid.).
unguiculata, Leschen. ex DC. 1. c. 765=L. ciliatum.

JTTLOCBOTON, Mart, in Flora, xx. (1887) n. Beibl. 119. *EUPHORBIACEAE,* Benth. & Hook. f. iii. 296.
CENTRANDRA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1866) 440; et Fl. Columb. i. 117. t. 88 (1859).
CIECA, Adans. Fam. ii. 355 (1763).
HETEROCHLAMYS, Turcz. in Bull. Soc. Nat Mosc. xvi. (1843) 61.
Ackermannianus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 283.—Bras,
argenteus, *Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1857) 134.—Am. centr.
conspurcatus, *Klotasch, in Wiegm. Arc/tit;* vii. (1841) 193.—Mexic.
decalobus, *Benth. &" Hook. f. Gen.* iii. 296.—Guatemala,
doratophyllus, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 702.—Reg. Argent
fuscescens, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 867.—Bras.
Gardneri, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 276. —Reg. Argent,
geraënsis, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 870.—Bras,
hondensis, *Muell. Arg. in DC. Prod.* xv. II. 704.—Am. trop.
humilis, *Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1867) 132. —Bras.
lanatus, Klotzscb, ex Baill. Etud. Gén. Enph. 376 = fuscesceris.
lanceolatus, *Klotesch, in Wiegm. Archh,* vii. (1841) 193.—Bras,
microcalyx, *Muell. Arg. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 142.—Bras.
montevidensis, *Klotnsch, ex Baill. Etud. Gin. Euph.* 376.—Reg. Argent,
nervosus, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 369.—Bras,
nigricans, *Mart, ex Schlecht. in Linnaea,* xix. (1847) 245.—Bras,
peruvianns, *Muell. Arg. 1. c.* xxxiv. (1865-66) 142.—Am. trop.
phagadaenicus, Schlecht. 1. c. xix. (1847) 245-seq.
phagedaenicus, *Mart, in Flora,* xx. (1837) II. *Beibl.* 119.—Bras,
pycnophyllus, *Scklecnt. in Linnaea,* xix. (1847) 245. —Bras.
quinquenermius, Baill. Etud. Gén. Euph. 376 - argenteus.
Riedelianus, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 278. —Bras.
rufescens, *Klotisch, ex Baill. Etud. Gin. Euph.* 376, nomen.—Bras.
Salzmanni, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 869 Bras,
serratus, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 227.—Reg. Argent,
solanacens, *Klottsch, ex Baill. Etud. Gin. Euph.* 876 ; *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 279.—Bras,
stipularis, *Muell. Arg. 1. c.* 277.—Bras,
subpannosus, *Muell. Arg. in Journ. Bot.* xii. (1874) 208.—Reg. Argent
triqueter, *Baill. Adansonia,* iv. (1863-64) 868.—Bras.
triqueter, Didr. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 184 — phagedaeniens.
verbascifolius, *Klotusch, ex Baill. Etud. Gin. Euph.* 376.—Bras.

JULOSTYLES, Benth. & Hook. f. Gen. i. 207 (1862) - seq.

JTJIiOSTYIiIS, Thw. Enum. PI. Zeyl. 30 (1858).
MALVACEAE, Benth. & Hook. f. i.207.
angustifolia, *Thw. I. c.* 30.—Zeylan.

JUNAGO, Tourn. ex Moench, Meth. 644 (1794) - Triglochin, Linn. (Naiad.).
palustris, Moench, 1. c. = T. palnstre.

JUNCASTRUM, Heist Syst 12 (1748) = JunouB, Tourn.
acutum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 171 - J. acntus.
maritimum, Fourr. I.e.- J. maritimus.

JUNCELLA, F. Muell. 2nd Gen. Rep. 16 (1854) ~ Trithurifl, Hook. f. (Centrolepid.).
tasmanica, F. Muell. 1. c. = T. submersa.

JUNCINELLA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 171—Juncufl, Tourn.
capitata, Fourr. 1. c.=J. capitatus.
pygmaea, Fourr. 1. c - J. pygmaens.

JUNCOIDES, [Dill.] Adans. Fam. ii. 47 (1763) = IiUZUla, DC. (Juncac).

JUUCTJS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *7UNCACEAE,* Benth. *8c* Hook. f. iii. 87.
CEPHALOXYS, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 821. t. 11.
JUNCASTRUM, Heist. Syst. 12 (1748).
JUNCINELLA, Fourr. in Ann. Soc Linn. Lyon, N. S, xvii. (1869) 171.
MARSIPFOSPERMUM, Desv. Joum. Bot. i. (1808) 828. t. 12. f. 1.
PHYLLOSCHOENUS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 171.
TENAGEIA, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).
abortivus, Chapm. Fl. S. U. St. 495 - pelocarpus.
acuminatus, Balb. Elench. 87 = arcticus.
acuminatus, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 192.—Mexic •
acuminatus, Salzm. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 299-Elliottii.
acutangulus, *Buchen. in Bremen, Abh.* iv. (1875) 480. —Afr. austr.
acutiflorus, Benth. PI. Hartw. 841-oxymeris.
acutiflorus, *Ehrh. Beitr.* vi. 82.—Europ.; As. bor.
acutiflorus, Griseb. Sjjiril. Fl. Rumel. ii. 407 - atratns.
acutiflorus, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 434 ™ Gussonii.
acutiflorus, Spreng. Neue Entdeck. ii. 107 — pnnctorius.
acutiflorus, Ten ore, Fl. Nap. iii. 381 - lampocarpus.
acutus, *Linn. Sp. PI.* 825.—Reg. temp.
acutus, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. fi. 79 (auetus) = maritimus.
acutus, Thuill. Fl. Par. 175=glaucns.
acutus, Torr. in Comp. Fl. N. Midd. Stat. (1826) 156 = Roemerianus.
adscendens, Host, Gram. Austr. iii. 68. t. 87'lampocarpus.
aemulans, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1850) 38=effusus.
affinis, R. Br. in Richards. App. Frankl. Joum. 11 - alpinns.
affinis. Gaud. Agrost. Helvet. ii. 224-supinns.
agrostophyllus, F. Muell. in Linnaea, xxvi. (1853-55) 245-felcatus.
alatus, *Franch. tf San. Enum. PI. Jap.* ii. 584.—Japon.
albidus, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. I. 126. t 6-Luznla angustifolia.
albidus, Willd. Sp. PI. ii. 219 - Luzula nemorosa.
albus, *Rafin. Fl. Ludov.* 17.—Am. bor.
alprttris, Gliem. ex Bab. in Joum. Linn. Soc. xi. (1871) 832 = lampocarpus.
alpestris, Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. I. 141 - alpinus.
alpigenus, *C. Koch, in Linnaea,* xxi. (1848) 627.—Reg. Caucas.
alpinopilosus, Vffl. Hist PI. Danph. i. 818-Luzuia spadicea.
alpinus, Pert. Syn. i. 884-snpinut.

JTJNCU8 :—
alpinus, *Vill. Hist. PL Dauph.* ii. 283.—Europ.; Am. bor.
altus, *Buchen. in Bremen, Abh.* iv. (1875) 457.—Afr. austr.
ambiguus, Gnss. Fl. Sic. Prod. i. 435 = J. Tenaanceps, *Laharpe, in Mlm. Soc. Hist. Nat. Par.* iii. (1827) 126.—Europ.; Afr. bor.
andicolns, *Hook. Ic. PI.* t. 714.—Reg. Andin.
Angelisii, Tenore, Viag. Abrnz. 61; Syll. 178 = glancus.
angustifolius, Wulf. in Jacq. Coll. iii. 56 - Luznla albida.
annuus, Krock, Fl. Siles. i. S66 = snpinns.
anonymus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 804.—Afr. austr.
antarcticus, *Hook. Fl. Antarct.* 79. t. 46.- N. Zel.
Antonianus, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56 = andicolus.
aquaticus, All. Fl. Pedem. ii. 217 = lampocarpus.
aquaticus, Brot. Fl. Lusit i. 617 = acutiflorus ?
aquaticus, Sebast & Mauri, Prod. Fl. Rom. (1818) 132 -- obtusiflorus.
arcticus, Hook. Fl. Scot. 104 = balticus.
arcticus, Lapeyr. Hist. Abr. PI. Pyr. 193—filiformis.
arcticus, *Willd. Sp. P'.* ii. 206.—Reg. bor. et arct.
arcuatus, Hook, in Scoresb. Jonrn. Greenl. 410 — Luzula hyperborea.
arcuatus, Wahlenb. Fl. Lapp. 87 = Luznla arctica.
aristatus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 306—tenuis.
aristatus, Pcrs. Syn. i. 385 = marginatus.
aristiflorus, [Clairv.] Man. Herb. 104=lampocarpus.
aristulatus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 192 = marginatus.
articulatus, DC. Fl. Fr. iii. 169 - obtusiflorus.
articulatus, Desf. Fl. Atlant. i. 813 = Fontanesii.
articulatus, Linn. Sp. PI. 327 = lampocarpus.
asper, *Engelm. in Trans.Acad. Sc.St.Louis,'A.* (1868) 478.—Am. bor.
asper, Sauze'-Maill. Cat. PI. Deux-Sèvres, 52=striatus.
atlanticus, Laharpe, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iii. (1827) 128=heterophyllus.
atratus, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 241 = acutiflorus.
at rat us. Fries, Nov. Fl. Suec. Mam. iii. 23-anceps.
atratus, *Krock. Fl. Siles.* i. 662.—Europ.; Reg. Caucas.
atratus. Lam. Encyc. iii. 271 = biglnmis.
atricapillus, Drejer, in Krõyers, Tidsskrift, ii. (1838) ' 182-anceps.
atn/uscus, Rupr. Beitr. Pfl. Russl. ii. 59 = Gerardi.
attenuatus, Viv. Fl. Core. Sp. Nov. 5 =Gerardi.
auctus, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. II. 79, sphalm. — maritimus.
aureus, Poun. in Mém. Acad. TouL iii. (1788) 321 = Luzula lutea.
austerus, *Buchen. in Bre.lien, Abh.* vi. (1879) S89. t. 3.—Chili.
australis, Desf. ex Steud. Norn. ed. I. 448 (Quid?).—Hab.?
australis, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 66. t 134-pauciflorus.
Bachiti, *Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp.* 305.—Abyssin.
balticus, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag.* iii. (1809) 298.—Amphig. bor.
bengkalensis, Kuntb, Enum. PI. iii. 360 = concinnus.
bicephalus, *Barcelo, Fl. Ins. Balear.* 472.—Ins. Majorc.
bicephalus, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 5=pygmaeus.
bicornis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 191-tenuis.
biflorus, Ell. Sketch, i. 407-marginatus.
biflorus, Phil, in Anal. Univ. Chil. (1873) 552 = stipolatus.
bifolius, Hoppe, Taschenb. (1810) 163-obtusiflorus.
biglumis, Jacq. Enum. Vind. 61, 237—Jacquini.
biglumis, Krock. Fl. Siles. i. 567=triglumis.
biglnmis, *Linn. Sp. PI.* 328.—Reg. bor. et arct
bogotensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 235 = effusus.
Bolanderi, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 470.—Calif.
bottnicus, Wahlenb. Fl. Lapp. 82. t. 5-Gerardi.
brachycarpus, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 467—Am. bor.
brachyspathus, Maxim. Prim. Fl. Amor. 288-filiformis.
bracteatns, *Buchen. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 220.—Reg. Himal.
bracteatus. Stokes, Bot. Mat Med. ii. 289=Scirpus capsularis.
bracteosus, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 332-Luzula' parviflora.

JTCVCUS :—
brevifolius, T. Kirk, in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 286 = antarcticus.
brevifolius, *Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1850) 4O.-Mexic.
brevifolius, Pers. Syn. i. 386 = Luznla nivea.
brevifolius, Rostk. Diss. June. (1801) 35 = Luznla lactea.
brevirostris, Nees, in Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 432 - acutiflorns.
brevistylus, *Buchen. in Bremen, Abh,* iv. (1875) 433.—Afr. austr.
Breweri, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 440.—Calif.
Broteri, Steud. Syn. PI. Cyp. 297-maritimus.
Brownii, F. Mncll. in Linnaea, 'xxvi. (1853-65) 245 ; First Gen. Report, 19 = revolutus.
brnnneus, *Buchen. in Bremen, Abh.* vi. (1879) 408.—Reg. Andin.
Buckleyi, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, ii. (1868) 469 = lcptocaulis.
bufonius, *Linn. Sp. PI.* 328.—Amphig.
bulbosus, Ehrh. Beitr. vi. 81 = Gerardi.
bulbosus. Linn. Sp. PI. ed. I. S27=supinus.
bulbosus, Linn. 1. c ed. II. 466=compressus.
bulbosus, Lour. Fl. Cochinch. 218 » Loureiroanus.
bupleuroides, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 185 = pygmaeus.
caespitidus, *E. Mey. in Lehm. PI. Preiss.* ii. 47.—Austral.
coffer, Bertol. f. in Mem. Ace. Sc. Bolog. iii. (1851) 253 — maritimus.
campestris, Linn. Sp. PI. 829 = Luzula campestris.
canadensis, *J. Gay, ex Laharpe, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* iii. (1827) 134.—Am. bor.
canaliculatus, *Engelm. in Coult. Bot. Gat.* vii. (1882) 6.-Calif.
canaliculatus, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1850) 43 - marginatus.
canariensis, Willd. ex E. Mey. Syn. Luz. 29=effusus.
candidus, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 288=triglumis.
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 66.—Afr. austr.
capillaceus, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 264 = pusillus.
capillaceus, *Lam. Encyc.* iii. 266.—Am. austr.
capitatus, Schk. Handb. i. 302 = supinns.
capitatns, *Weigel, Obs. Bot.* 28 (1772).—Europ.; Afr. bor.
capsularis, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 809.—Cochinch.
caridnus, Dur. Expl. Sc. Alger. t. 43.f. 1—valvatus.
castaneus, [Clairv.] Man. Herb. 104=Jacquinii.
castaneus, *Sm. Fl. Brit.* i. 383.—Reg. bor. et arct.
Castelli, Tiaeo, ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 816 = Gussonii.
caudatus, Chapm. Fl. S. U. St. 495 = trigonocarpus.
Cephalotes, Hochst. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 342-capensis.
Cephalotes, Thunb. Prod. PI. Cap. 66-lomatophyllus.
Chamaeschoenus, Wolff, ex Schult. f. Syst. vii. 210-supinus.
Chamissonis, *Kunth, Enum. PI.* iii. 348.—Reg. Andin.
chilensis, *C. Gay, Fl. Chil.* vi. 146.—Chili.
chinensis, Hort. ex Buchen. Kritisch. Verz. June. 13 — prismatocarpns.
chlorocephalus, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 486.—Calif.
chloroticus, Schult f. Syst vii. 240=tenuis.
chrysocarpus, *Buchen. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1886) 201.—Keg. Himal.
Clarkei, *Buchen. I. c.* 210.—Reg. Himal.
coarctatus, Hoppe, ex Schult. f. Syst vii. 182 = glancus.
coarctatus, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 109 = tennis.
coenosus, Bicheno, in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 309 -Gerardi.
cognatus, Kunth, Enum. PI. iii. 849=tennis ?
collinus, Steud. Syn. PI. Cyp. 306=Chamissonis.
commixtus, Stend. 1. c. 300 = Dombeyanus.
communis, E. Mey. June. \1= *conglomerates,* effuses.
commutatus, Steud. Syn. PI. Cyp. 301 - prismatocarpns.
compactus, Neet, ex Buchen. Kritisch. Verz. June. 14 = obtusiflorus.
complanatus, Schult. f. Syst. vii. 185 — mexicanus. '
compressus, H. B. *Be* K. Nov. Gen. et Sp. i. 235 = mexicanus.

JUNCUS:—
compressus, *Jacq. Enum. Stirp. Vind.* 60; 235.—Reg. temp.
compressus, Lindsay, ex Bab. in Jonm. Linn. Soc. xi. (1870) 882 = Gerardi.
compressus, E. Mey. June. 16 ; et in Linnaea, iii. (1828) 368 = Lesneurii.
compressus, Relh. Fl. Cantab. (1785) 142 = acutiflorus.
Conceptionis, Steud. Syn. PI. Cyp. 296 - Lesncurii.
concinnus, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 44.—Reg. Himal.
confervaceus, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon (1882) 749 = supinns.
congestus, Nees, in Heller, Suppl. Fl. Wirceb. (1815) 29 = obtusiflorus.
congestus, Schousb. ex Buchen. Kritisch. Verz. Jane. 15 = bufonius.
congestus, Thuill. Fl. Par. ed. II. (1799) 179-Luzula campestris.
conglomeratus, Linn. Sp. PI. S26=effusus.
Conradi, Tuckenn. ex Torr. Fl. N. York, ii. 328 = pilocarpus.
consanguineus. Ziz, in Koch & Ziz, Cat 8, 19-Gerardi.
contractus, Hoppe, ex Schult. f. Syst vii. 182 = glaucus.
Cooperi, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 586.-Caljf.
corralensis, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 269 = stipulatus.
•lorrectus, Steud. Syn. PI. Cyp. 296 = pallidus.
crassifolius, Bosc, ex Laharpe, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iii. (1827) 140-scirpoides.
cryptocarpus, Bebb, ex Engelm. in Trans. Acad. Sc St. Louis, ii. (1868) 467 = brachycarpus.
cylindricus, M. A. Curt, in Am. Journ. Sc. xliv. (1843) 83—marginatus.
cymosus, Lam. Encyc iii. 267=Iomatophyllus.
cymosus, Schrank, Baier. Fl. i. 622 = Luznla vernalis.
cymosus, Spreng. Neue Entdeck. ii. 105—capensis.
cyperinus, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 106=densiflorus.
cyperoides, *Laharpe, in Mlm. Soc. Hist. Nat. Par.* iii. (1827) 145.—Am. austr.
Cietrii, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 111 -castaneus.
Deangelisii, Tenore, Fl. Nap. iii. 380=glancus..
debilis, A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. IL 480 * acuminatus.
delicatulus, Steud. Cyp. PI. Cyp. 804= capensis.
demissus, Steud. 1. c. 303 = planifolius.
densiflorus, *H. B.* b" *K. Nov. Gen. et Sp.* i. 288.—Am. austr.
depauperatus, Tenore, Viag. Abrnz. 62; Phil. Fl. Atac. 63 = glaucus.
deserticola. *Phil. 1. e.* 52.—Chili,
diaphanns, *Buchen. in Bremen, Abh.* iv. (1875) 442.—Afr. austr.
diaphragmarius, Hochst. ex Nym. Consp. 747=acnti- floras.
diaphragmaticus, Steud. Nom. ed. II. i. 881, sphalm. —*diaphramarius.*
diaphramarius, Brot. Fl. Lusit. i. 611 = glaucus.
dichotomus, *Ell. Sketch,* i. 406.—Am. bor. et austr.
dichotomus, Willd. ex Spreng. Syst ii. 108=microcephalus.
diffusissimus, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1868) 9-acuminatus.
diffusus, Hoppe, in Flora, i. (1819) 186=effnsns.
digeneusx, Borb. in Magyar Növenyt. Lapok, ix/ (1885) 59.—Europ.
dioicus, Steud. Syn. PI. Cyp. 309 (an Junci sp.!).—Austral.
diphyllus, Hoppe, Bot. Taschenb. (1810) 170, 183 = obtusiflorns.
divaricatus, Gilib. Exercit. ii. 506-bufonius.
divaricatus, Wolff, Fl. Wirceb. 28-obtusiflorns.
divergens, Koch, in Koch & Ziz, Cat. 8, 19-obtusiflorus.
Dombeyanns, *J. Gay, ex Laharpe, in Mint. Soc. Hist. Nat. Par.* iii. (1827) 132.—Am. austr.
Dregeanns, *Kunth, Enum. PI.* iii. 344.—Afr. austr.
Dregeanus, Presl, Bot Bemerk. 117 = bufonius.
Drummondi, *E. Mey. in Ledeb. Fl. Ross.* iv. 235.—Ins. Koraginsk.
Drummondii, Stend. Syn. PI. Cyp. 296 = pallidus.
dubius, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* » (1868) 459.—Calif.

IUMCUS:—
dubius, Wolff, ex Schult f. Syst vii. 197= alpinus.
Duvalii, Loret, in Loret & Barr. Fl. Monsp. 686, 848 —Fontanesii.
ebracteatus, E. Mey. Syn. June. 28 - trinervis.
echinatus, Ell. Sketch, i. 410=sdrpoides.
echinuloides, Brot. Fl. Lusit. i. 518 - valvatus.
echinuloides, Webb, It. Hisp. 6 - Fontanesii.
effusus, Auct. Am. ex Schult. f. Syst. vii. 247-marl-timus.
effusus, *Linn. Sp. PI.* 326.—Amphig.
effusus, Pollich, Hist. PL Palat. i. 346-glaucus.
effusus, Schum. ex Schult. f. Syst. vii. 185 = balticus.
elatior, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1860) 67 - Gerardi.
elatus, Steud. Syn. PL Cyp. 295-glaucus.
tlegans, Ehrenb. ex Boiss. FL Orient, v. 359-pyramidatus.
elegans, Royle, ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1840) 321 = concinnus.
Elliottii, *Chapm. Fl. S. U. St.* 494.—Am. bor.
elongatus, Vasey, ex Engelm. in Trans. Acad. Sc St. Louis, ii. (1868) 459 = alpinus.
Engelmanni, *Buchen. Kritisch. Verz. June.* 18.—Am. bor.
ensifolins, *Wikstr. in Vet.Akad. Handl. S/ockh.* (1823) II. 274.—Am. bor. occ
equisetosus, Dum. in Bull. Soc Bot Belg. vii. (1868) 365-glaucus.
erectus, Bess. Prim. Fl. Galic 1. 241-alpinus.
erectus, Pers. Syn. i. 386-Luzula campestris.
ericetorum, Krock. Fl. Sites, i. 565. t. 50-supinus.
ericetorum, Pollich, Hist. PL Palat. i. 861-capitatus.
erythrocarpus, Chapm. ex Engelm. in Trans. Acad. Sc St. Louis, ii. (1868) 478=trigonocarpus.
exaltatus, Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. ii. (1834) 16-punctorius.
expansus, Jan, Catal. ex Schult. £ Syst. vii. 179' effusus.
exsertus, *Buchen. in Bremen, Abh.* iv. (1875) 436.—Afr. austr.
fnlcatus, *E. Mey. Syn. Lumil.* 34.—Calif.
fasdcularis, Schrank, ex Steud. Nom. ed. 1.444,445 = Luzula pilosa.
fasciculatus, Bertol. Fl. Ital. ir. 190-bufonius.
Suciculatus, *Schousb. in E. Mey. Syn. June.* 28.-Tiarocc.
fasciculatus, Schrank, Baier. Fl. i. 616 - supinus.
femandezianus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 302.—Ins. J. Femand.
filiformis. *Linn. Sp. PI.* 326.—Reg. bor. temp.
filiformis, Walt. Fl. Carol. 124-setaceus.
fUipendulus, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 8 = leptocaulis.
Fischeri, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc xxvm. (1855)1. 303-alpinus.
fisiulosus, Guss. FL Sic Prod. 431 -effusus.
flaeddus, Steud. Syn. PL Cyp. 808=capensis.
fiavescens. Host, Gram. Austr. ill. 62-i.uzula Hostii.
flexilis, *Turcs. ex Bess, in Flora,* xvii. (1834) I. *Besbl.* 26.—Sibir. baical.
floribundus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 237-Trans. Acad. Sc. St. Louis, ii. (1866W51 = Gerardi.
fiuitans Lam. Encyc. iii. 271 - supinus. = pelocarpos. vii. 201 = lampocarpus.
foliosus, Desf. Fl. Atlant. i. 315. t. 92 = bufonius.
foliosus, Hoppe, Bot. Taschenb. (1810) 159 = lampocarpos.
Fontanesii, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 25 = striatus.
Fontanesii, *J. Gay, ex Laharpe, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* iii. (1827) 130.—Europ. austr.; Oriens.
Forsteri, Sm. Fl. Brit. iii. 1295 = Luzula Forsteri.
fraternus, i
fuscatus, T
fuscoater, Schreb. in Schireigg. *Sc* Koerte, FL Erlang.

« £ £ & £ . Syn. «-.CyP-«00=chi lensis.
gekiculatus, Schrank, Baler. Fl. « » f alpinus.
Gerardi, *Loisel. in Desv. Joum. Bot.* u. (1809) 284.—
£ . PL 305 = tenuis.
Gesneri. Snu Eng. Fl. ii. 167-tennis.

JUNCUS:—
gibraltaricus, Salzm. ex Buchen. Krit. Verz. June. 21 - striatus.
glabratus, Hoppe, ex Rostk. June. (1801) 27 = Luzula Desvauxii.
glabrescens, Schrank, Baier. Fl. L 622 - Lnznla vemalis.
glaucescens, Laharpe. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iii. (1827) 115=glaucus.
glaucus, *Sibth. Ft. Oxon.* 113—Amphig.
glaucus, Wahlenb. Fl. Lapp. 79 =-balticus.
glomeratus, Thunb. Fl. Jap. 145-effusus.
gracilis, *R. Br. Prod.* 259.—Austral.
gracilis, Lej. Fl. Spa, 166=compressus.
gradlis. Roth, Tent. Fl. Germ. i. 155=capitatu».
gracilis, Sm. Engl. Bot. t. 2174 = tennis.
gracilis, Walp. Ann. i. 8 78 = Kostkovia gracilis, *Hook. f.*
graecus, Bory & Chaub. Nouv. Fl. PiSlop. 23. t. 12. *f.* 1 —Luzula graeca.
gramineus, Dum. Fl. Belg. 142-supinus.
graminifolius, E. Mey. in Presl, Rel. Haenk. i. 144° cyperoides.
grandiflorus, Linn. f. Snppl. 209 - Rostkovia grandiflora, *Hook.f.*
Greenei, *Oakes* b* *Tuckerm. in Am. Joum. Sc.* Ser. I. xlv. (1843) 37.—Am. bor.
Grisebachii, *Buchen. in Bremen, Abh.* iii. (1873) 295. —Reg. Himal.
Gunnii, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 67—pauciflora.
Gussoneanus, Tod. exl'arl. Fl. Ital. ii. 342-seq.
Gussonii, *Part. Fl. Ital.* ii. 341.—Sicil.
Haenkri, E. Mey. Syn. June. 10 =compressus.
Hallii, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1866) 446.—Am. bor. occ.
Hancockii, *Hance, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 111.—China.
Haussknechtii x, Ruhm. in Eichl. Jahrb. Berl. i. (1881) 257.—Europ.
Heldreichianus, Marss. ex Parl. Fl. Ital. ii. 315-acutus.
helodes, Link, Enum. Hort. Berol. i. 306-balticus.
heptangulus, Peterm. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 842=atratus.
heteranthus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 153 = marginatus.
heterophyllus, *Duf. in Ann. Sc. Nat.* Ser. I. v. (1825) 88.—Europ. austr.
himalensis, *Khttsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise,* 60.—Reg. Himal.
Jtichstetteri, Steud.Syn. PI. Cyp. 299-striatus.
Hoffmeisteri, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 60 *= membranaceus.
Holoichoenus, *S. Sr. Prod.* 259.—Austral.; N. Zel.
horoalocaulis, *F. Muell. First Gen. Report,* 19 ; *et in Benth. Fl. Austral,* vii. 128;—Austral.
homalophyllus, Steud. Syn. PI. Cyp. 308 = planifolius.
Hookeridis, Steud. 1. c. 807 •= Rostkovia gracilis, *Hook.f.*
Hoppii, Noi, ex Nym. Consp. 746 = acutus.
Hostii, Tausch, in Flora, xvii. (1834) II. 518-trinodus.
hybridus, Brot. Fl. Lusit. i. 513 = pygmaeus.
imbricatus, Laharpe, in Mem. Soc Hist. Nat Par. iii. (1827) 149-Chamissonis.
inaequalis, *Buchen. in Bremen, Abh.* iv. (1875) 455.—Afr. austr.
inaequalis, Willd. ex Kunth, Enum. PL iii. 354 = bufonius.
inconspicuus, Urv. in Mém. Soc. linn. Par. iv. (1826) 603=scheuchterioides.
indescriptus, *Steud. Syn. PI. Cyt.* 804.—Afr. austr.
indicus, [Royle, ex] D. Don, in Proc Linn. Soc. i. (1889) 10; et in Trans. Linn. Soc. xviii. (1840) 323 - prismatocarpus.
inflexus, Linn. Sp. PI. 826=glaucus T
inflexus, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. II. 79 -balticus.
inflexus, With. Bot. Arr.ed. I. i. 211 -glaucus.
insulanus, Viv. Fl. Core. Sp. Nov. 5 = bufonius.
intermedius, Host, Gram. Austr. iii. 65. t. 99 = Luzula Desvauxii.
intermedium, Poir. Encyc Suppl. iii. 158-alpinus.
intermedius, Rohde, ex Buchen. Krit. Verz. June 24 = acutifolius.
intermedius, Thnlll. Fl. Par. ed. II. 178-Luzula c&mpestnt.
inundatus, Drejer, in Kroeyera, Nat. Tidssk. ii. (1888-39) 181-balticus.
involucratus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst ix. (1877) 550=ensifolius.
involneratus, *Steud. in Lechl. Beit. Am. Austr.* 66.—Peruv.

JRJNCU8:—
iridifolius, Willd. ex Kunth, Enum. PI. iii. 387 = ensUfolius.
isolepoides, Nees, in Linnaea, xx. (1847) 144 - inaeqnalis.
isthmiacus. Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 168=lampocarpus.
Jacquini, *Linn. Mant.* i. 63.—Europ.
Jacquini, Sm. in Linn. Fl. Lapp. ed. II. 91 -arcticus.
Jacquini, Symons, Syn. Fl. Brit. 87 - castaneus.
Karelini, Steud. Syn. PI. Cyp. 397 = acutus.
Kelloggii, *Engelm. in Trans. Acad. Sc St. Louis,* ii. (186U) 494.—Calif.
Kochii, F. Schultz, in Pollichia, xiii. (1856) 32 = supinus.
Kotschyi, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vii. 102.—Persia.
Krameri, *Franch.* b* *Sm. Enum. PI. Jap.* ii. 99.—Japon.
Kraussii, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) S42=spretits.
lacteus, Link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 316 = Luzula lactea.
lanis, Wallr. Sched. Crit. 142 = effusa.
lagenarius, J. Gay, ex Laharpe, in Mém. Soc. Hist. Nat Par. iii. (1827) 130 - Fontanesii.
lampadocarpus, Davies, Welsh Botanol. 34 = lampocarpus.
lampocarpus, Banmg. Enum. Stirp. Truss, iii. 839 - Thomasii.
lampocarpus, *Ehrh. Calam.* n. 126; *ex Davies, in Trans. Linn. Soc.* x. (1810) 18.—Reg. bor. et anstr.
lamprocarpus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. OS - praec.
lapponicus, Auct. ex Schult. f. Syst. vii. 177 = effusus.
latifolius, Wulf. in Jacq. Coll. iii. 59 <* Luzula sylvatica.
Lechleri, Steud. Syn. PI. Cyp. 806 = Chamissonis.
Leersii, Marss. Fl. Neu-Vorpom. 461 -effusus.
Lehmanni, E. Mey. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 192 ^ castaneus.
Uopoldii, Parl. In Giora. Bot. Ital. ii. I. (1846) 324 a acntos.
leptocarpus, Buchen. in Goett. Nachr. (1869) 244 = glaucus.
leptocaulis, *Torr. V Gray, ex Engelm. in Trans. Acad. Sc.St. Louis,* ii. (1866) 454.—Am. bor. occ
leptospermus, *Buchen. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1886) 203.—Reg. Himal.
Leschenaultii, J. Gay, ex Laharpe, in *Uim.* Soc Hist. Nat. Par. iii. (1827) 137-prismatocarpus.
Lesueurii.Bo/and. *in Proc. Calif. Acad.* ii. (1863)179 Calif,
leucanthns, *Royle, ex D. Don, in Proc. Linn. Soc.* i (1839) 10.—Reg. Himal.
leucomelas, *Royle, 1. c.*—Reg. Himal.
liniger, Purt. Fl. Midi. Count. Engl. Suppl. 862. f. 9 - Luzula campestris.
Linkium, Siebold, in Verb. Bat Gen. xii.(1830) 11 - effusus I
littoralis, C. A. Mey. Enum. PI. Cauc 34-acutus.
leucophobus, Ehrh. Ueitr. vi. 141 = Luzula albida.
lomatophyllus, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 108.—Afr. austr.
longicapsularis, Chev. Fl. Par. ii. 279 = lampocarpns.
longicornis, Bast in Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 21 *• glaucus.
longifolius, Steud. Syn. PI. Cyp. 299 - Dombeyanus.
longistyles, *Torr. in Bot. Mex. Bound.* 223 Am. bor. occ
Lonreiranus, *Schult. f. Syst.* vii. 238.—Cochinch.
lucens, Bnrnham, in Trans. Linn. Soc. xix. (1846) 492 —effusus I
lucidus, Hochst. in Seub. FL Azor. 24. t. 4. f. 1 - tenuis.
Luetkei, Buchen. in Goett. Nachr. (1869) 243 - glaucus.
luteus, All. Fl. Pedem. ii. 216-Lurula lutea.
luteolus, Chaix, in Vill. Hist. PL Dauph. *i.* 379 •-- Luzula lutea.
Lutoloxiphium, Griseb. In Goett. Abh. xix. (1874) 268 —microcephalus.
Lumula, Krock. Fl. Siles. i. 66!) - L'uzula pilosa.
lusulaeformis, Gennari, Sp. Sard. (1867) 22 = bufonius.
luzulinus, Vill. Hist PL Dauph. ii. 23B-Luzula flavescens.
luftloides, Lam. Encyc. iii. 272 -Luzula nemorosa.
lutuloides, Steud. ex Schult. f. Syst. vii. 242 - capensis.
macer, S. F. Gray, Nat Arr. Brit. PI. ii. 164-tenui».
macrocarpus, Nees, in Linnaea, xx. (1847) 243«acutus
macrocephalus, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 6 = lampocarpun.
macrostemon, *J. Gay, ex Laharpe, in M/m.Soc. Hist. Nat. Par.* iii. (1827) 140=scirpoides.
macrostigma. Colenso, in Trans. N. Z. Inst'xvii. (1885) 253 = palli(ius.

JUNCUB:—
magellanicus,1»m. Encyc. iii. 266 - Rostkovia sphaerocarpa.
Mandoni, Bnchen. in Bremen, Abh. iv. (1874) 121-glaucus.
marginatus, *Rostk. Diss. June.* 38.—Am. bor.
maritimns, *Lam. Encyc.* iii. 264.—Reg. temp.
maritimtu, £. Mey, in Linnaea, vu. (1832) 180 = spretus.
maritimus. Mode. Fl. Venet. i. 172=-acutus.
mauritianus, Boj. Hort. Maurit. 360=effusus.
maximus, Reichard, Fl. Moeno-Francof. ii. 182 - Luzula sylvatica.
maximus, Retz, Prod. Fl. Scand. ed. II. 82; Brot Fl. Lnsit. i. 615 = Luzula sylvatica.
maximus. Roth, Tent. Fl. Germ. i. 157, partim-Luzula aibida.
megacephalus, M. A. Cnrt. in Bost. Joorn. Nat Hist i. (1837) 182-scirpoides.
megacephalus, Wood, Class-Book (1861)724=nodosus.
megakoleos, Steud. Syn. Fl. Cyp. 299=Dombeyanus.
melananthus, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 96=atratas.
melanocarpus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 190»Luzula parviflora.
melanocarpus, Phil, ex Bochen. Krit. Verz. June. 29 =stipulatus.
melanocephalus, Boiss. Fl. Orient, v. 360 = alpigenns.
melanocephalus, Frivald. in Flora, xix. (1836) II. 437 =Thomasii.
membranacens, *Royle, ex D. Don, in Proc. Linn. Soc.* i. (1839)10; *et in Trans. Linn. Soc.* xviii. (1840) 820.—Reg. Himal.
Memiesii, R. Br. ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 192-falcatus.
Mertensianus, *Bong, in Mim. Acad. Pitersb.* Sér. VI. ii. (1833) 167.—Am. bor. occ.
Metzleri, F. Schultz, in FollichU, xiii. (1855) 34 =compressus.
mexicanus, *Willd. ex Schult. f. Syst.* vii. 178.—Mexic
micranthus, Desv. Obs. PI. Ang. 82 = acutiflorus.
micranthus, Schrad. in E. Mey. Syn. Luz. 31 •=• scirpoides.
microcarpus, Nolte, ex Gaud. Fl. Helv., iL 653 — alpinns.
microcephalus, *H. B. &• K. Nov. Gen. et Sp. i.* 237.—Am. austr.
uiilitaris, *Bigel. Fl. Bost.* ed. II. 139.—Am. bor.
Mimizani, Guill. ex Bnchen. Krit Verz. Jane. 80 — heterophyllus.
Minae, Strobl, ex Nym. Consp. 749 » pygmaeus.
minimus, *Buchen. in Bat. Zeit.* xxv. (1867) 145.—Reg. Himal.
minimus, E. Font in Symons, Syn. PI. Brit 197 = capitatus.
monanthos, Schrank, Naturh. Brief, ii. 208; ex ej. Baier. Fl. i. 620-scq.t
monanthus, Jacq. Enum. Stirp. Vind. 61, 236 = trifidus.
montanus, Lam. Encyc. iii. 273-Luzula sylvatica.
monticola, Steud. Syn. PI. Cyp. 301—prismatocarpus.
mucroniflorus, [Clairv.] Man. Herb. 104=alpinus.
Muehlenbergii, Spreng. Syst. ii. 106=pelocarpus.
Muelleri. Trautv. in Act Hort Petrop. v. (1877) 119-balticus.
multibracteatus, Tineo, in Guss. Suppl. Fl. Sic Prod. 96-acutus.
multicapitatus, Schult f. Syst vii. 198-supinus.
ihnlticeps, *Kunte, ex Kunth, Enum. PI.* iii. 337.—Chili.
multiflorus, Bert, erf Buchen. in Bremen, Abh. vi. (1879) 379. t 4-Chamissonis.
multiflorus, Desf. Fl. Atlant i. 313. t 91-snbuIatns.
multiflorus, Ehrh. [Calam]. 127; ex Hoffm. Fl. Deutschl. i. 189 = Luzula campestris.
multiflorus, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. II. 82 - capensu.
mutabilis, Cav. Ic iii. t. 296. f. 2 = capitatns.
mutabilis. Lam. Encyc. iii. 270 —supinus, pygmaeus, capitatus.
mutabilis, Savi, Fl. Pis. i. 364 - bufonius.
nanus, Dubois, Méthod Eprouv. PL Fr. 276-pygmaeus.
nebrodensis, Tod. ex Parl. Fl. Ital. ii. 344 = FonUnesii.
Neesii, Heller, Fl. Wirceb. Suppl. 27=obtusiflorus.
nemorosus. Host, Gram. Austr. iii. t. 97. f. 2 = Luzula campestris.
nemorosus. Lam. Encyc. iii. 272—Luzula vernalis.
nemorosus, Moench, Hass. 169—Luzula sylvatica.
nemorosus, Pollich, Hist PI. Palat i. 352 = Luzula albida.

JUNCUS:—
nemorosus, Sibth. Fl. Oxon. 114-acutiflorns.
nevadensis, 5. *Wats, in Proc. Am. Acad.* xiv. (1879) 303.—Am. bor. occ
niger, Wolff, ex Sehult f. Syst. vii. 203 = acutiflorus.
nigrescens, Schrank, ex Schult f. 1. c. 256 —Luzula spadicea.
nigricans, Drejer, ex Reichb. Ic Fl. Germ. ix. 20 -anccps.
nigricans, Willd. Sp. PI. ii. 216~Jacquini.
nigricans, Wolff, ex Sohreb. in Schweigg. *Sc* Koerte, Fl. Erlang. 148-acutiflorus.
nigritellus, D. Don, in Engl. Bot Suppl. t. 2643 = lampocarpns.
nigritellus, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 780 = supinus.
nitidiflorus. Duf. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. fl825) 86 = Gerardi.
nitidus, *Phil. Fl. Atac.* 62 —Chili.
nivalis, Kunth, Enum. PL iii. 310 -= Luzula hyperborea.
niveus, Leers, Fl. Herbom. 91-Luz'ula aibida.
niveus, Linn. Syst. ed. X. 987; Sp. PI. ed. II. 468 — Luzula nivea.
nodosus, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 466.—Am. bor.
nodosus, Schreb. ex Schult. f. Syst. vii. 215—acuminatus, Dombeyanus.
nodulosus, Bory & Chaub. Exp. Sc. Morée, 105 •- Luzula graeca.
nodulosus, Wahlenb. Fl. Upsal. 114»alpinu».
Novae-Zelandiae, *Hook./. Fl. N. Zel.* i. 264.—N. Zel.
nutans, Vill. Fl. Delph. 34—Luzula pediformis.
obtusatus, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 495.—Calif.
obtusatus, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 381 - obtusifloms.
obtusiflorns, *Ehrh. Beitr.* vi. 83.—Europ.; As. bor.
obtusiflorus, Eichw. Skizze, 122 = alpinus.
obtusiflorus, Moench, Meth. 240 = lampocarpns.
ochraceus, *Buchen. in Bremen, Abh.* iii. (1873) 292.—Reg. Himal.
odoratus, Stead. Syn. PI. Cyp. 804 = marginatus.
oliganthus, Phil, in Linnaea, xxix. (1857-58) 75= stipulatus.
olympicus, Schott, Nyman & Kotschy, Analect. Bot 3 = lampocarpus.
Orizabae, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1850) 89 «= mexicanus.
oxycarpus, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. fW4 = punctorius.
oxymeris, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 483.-Calif.
pacificus, Engelm. 1. c. 442, 490 - Lesueurii.
pollens, Pers. Syn. i. t>84 = pygmaeus.
pallescens, Gieseck. ex Lange, Consp. Fl. Groenl. i. 126 —Luzula campestris.
•*pallescens,* Lam. Encyc. iii. 268 — acuminatus, Dombeyanus.
pallescens, E. Mey. ex Buchen. Krit. Verz. June. 84 = acuminatus.
pallescens, Schlecht ex Buchen. in Bremen, Abh. vi. (1879) 402-Sellowianus.
pallescens, Schrank, in Flora, ii. (1819).'446 - Luzula Hostii.
pallescens, Wahlenb. FL Lapp. 87 = Luzula campestris.
pallidiflorus. Beck, ex Bnchen. Krit. Verz. June. 34; 64—acutiflorus.
pallidus, *R. Br. Prod.* 258.—Austral.; N. Zel.
pallidus, Hoppe, ex E. Mey. Syn. June 14-glaucus.
pallidus, Willd. ex Kunth, Ennm. PI. iii. 848 = tenuis.
palustris, Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 288, nomen (Quid»).—Rossia.
paniculatus, Hoppe, ex Mert. *Sc* Koch, Deutschl. Fl. ii. 675, in obs.—glaucus.
paniculatus, Lad, Topog. Nachr. Oesel, 107—lampocarpus.
pannonicus, *Lang, Kurt, Phys. Fl. Ung. Nat.* (1846) 818.—Hungar.
papillosus, *Franch. b* Sav. Enum. PI. Jap.* ii. 98.—Japon.
paradoxus, Anct. ex Buchen. Krit. Verz. June. 34 •= canadensis.
paradoxus, E. Mey. Syn. June. 80=acuminatus.
Parryi, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1866) 446.—Am. bor. occ.
parviflorus, Ehrh. Beitr. vi. 189 = Luzula parviflora.
parviflorus, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 882 — compresMU.

JUNCUS:—
parviflorus, Poir. Encyc. Suppl. iii. 160-tenuis.
parviflorus, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. II. 81 - Lnzula spadicea.
parvulus, *E. Mey. V Buchen. in Bremen, Abh.* iv. (1875) 447.—Afr. austr.
patens, *E. Mey. Syn. LUBUI.* 28.—Am. bar. occ.
pauciflorus, *R. Br. Prod.* 259.—As. or.; Austral.; N. Zel.
pauciflorus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 651-antarcticus.
pauciflorus, Moench, ex Schleich. Cat. PI. Helv. 67 - arcticus.
pedatus, Jacq. ex Schult f. Syst. vii. 264, in obs.-Luzula Hostii.
pediformis, Chaix, in Vill. Hist. PI. Dauph. i. 818; ii. 238 = Luzula pediformis.
pelocarpus, A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. I. 507 - alpinus.
pelocarpus, *E. Mey. Syn. LUBUI.* 30.—Am. bor.
persicus, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 101 = Gerardi.
phaeocephalus, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 484.—Calif.
physcomitroides, Baenitz, Prosp. Herb. (1878) 4 - capitatus.
pictus, Phil, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 268 - Lesueurii.
pictus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 805.—Afr. austr.
pilosus, Linn. Sp. PL 329 = Luzula vemalig.
pilosus, Schousb. Vextr. Marok. 181-Luzula Forsteri.
p^tiilarius, Jan, Cat. 883; ex Schult. f. Syst vii. 268-Luzula lutea.
planifolius, *R. Br. Prod.* 269.—Austral.; N. Zel.
platycaulis, C. Gay, Fl. Chil. vi. 145=capillaceus.
platycaulis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 286-Chamissonis.
plebejus, R. Br. Prod. 869=bufonius.
plumosus, Wall, ex Walp. Ann. iii. 652 - Luzula plumosa.
Pohlii, Steud. Syn. PI. Cyp. 802=densiflorus.
polycephalus, J. Gay, ex Laharpe, in Me'm. Soc. Linn. Par. iii. (1828) 140-densiflorus.
polycephalus, Hook. FL Bor. Am. ii. 190 = xiphioides.
polycephalus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 192 » scirpoides.
polycephalus, Sm. Engl. Fl. iL 177 - lampocarpus, supinus.
polytrichos, *E. Mey. b* Buchen. in Bremen, Abh* iv. (1875) 448.—Afr. austr.
Pondii, Wood, Class-Book (1861) 724-acuminatus.
ponticus, Stev. in Bull. Soc Nat Mosc xxx. (1867) n. HI. 94 = maritimus.
pratensis, Hoppe, ex Nym. Consp. 748 - lampocarpus.
prqtensis, Wolff, ex Schult. f. Syst. vii. 203=acutiflorus.
prismatocarpus, *R. Br. Prod.* 259.—As. or.; Austral,
procerus, £. *•Mey. in Linnaea,* iii. (1828) 367.—Chili.
proli/er, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 236 - bufonius.
prcU/erus, Vahl, ex E. Mey. Syn. June. 27 = striatus.
proximus, Steud. Syn. PI. Cyp. 800 = Dombeyanus.
punctorius, Lam. Encyc. iii. 269 — Dombeyanus.
punctorius, *Linn. f. Suppl.* 208; *Thunb. Prod. PL Cap.* 66.—Afr. austr.; As. occ.
pungens, Moris, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 93 - acutus.
purpureus, Buch, in Abh. Akad. Beri. (1816) 862-Luzula purpurea.
pusillus, *Buchen. in Bremen, Abh.* vi. (1879) 395.—Austral.; N. Zel.
pygmaeus, *Rich, in Thuill. Fl. Par.* ed. II. 178.—Europ.
pygmaeus, Savi, Bot. Etrusc. ii. 69 = bufonius.
Pylaei, Laharpe, in Mém. Soc. Hist Nat. Par. iii. (1827) 119-effusus.
pyramidatus, *Laharpe, 1. c.* 128.—Syria; Aegypt
pyrenaeus, *Jeanb. b* Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Tout.* vi. (1883-84) 232.—Mont. Pyren.
Quartinianus, A. Rich. Tent. FL Abyss, ii. 339-Fontanesii.
querioides, Pourr. ex Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 181-bufonius.
radicans, Schlecht in Linnaea, xviii. (1844) 442 — acuminatus.
radicans, Schur, Enum. PL Transs. 686 — lampocarpus.
Radula, *Buchen. Krit. Vera. June.* 38.—Austral.
ranarius, Nees, in Linnaea, xx. (1847) 243 - bufonius.

JUNCUS:—
rariflorus, Hartm. Scand. Fl. ed. 1.141-alpinus.
reftixus, Wender. ex Schnlt. *I* Syst. vii. 188 = glancus.
repens, J. Gay, ex Laharpe, in Mem. Sot Hist Nat. Par. iii. (1827) 128 =acutiflorus.
repens, Maerkl. « Schult. f. Syst. vii. 1660-snpinus.
, repens, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 191.—Am. bor.
repens, Nolte, Nov. Fl. Holsat. 38 = lampocarpus.
repens, Req. in Guer. Desc. Vaucl. ed. II. 268-Fontanesii.
Requienii, Parl. Fl. Ital. ii. 846 = alpinus.
retroflexus. Rafn, in Fl. Dan. 1.1872 = obtusifloms.
revolufus, *R. Br. Prod.* 259.—Austral.
Richardsonianus, Schult. f. Syst. vii. 201 = alpinus.
rigidus, Desf. Fl. Atlant. i. 812-maritimus.
n^i<i«j, Wulf. ex Schult. f. Syst. vii. 273 = Luzula campestris.
rivularis, Poepp. ex Kunth, Enum. PI. iii. 843 - cyperoides.
robustus, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 802 =acutus.
Rochelianus, Schult. f. Syst. vii. 1658=Thomasii.
Roemerianus, *Scheele, in Linnaea*, xxii. (1849) 348.—Am. bor. occ.
Rostkovii, E. Mey. in Presl, ReL Haenk. i. 142 = phaeocephalus.
Rostkovii, E. Mey. Syn. June. 26 = nodosus.
rostratus, *Buehen. in Bremen, Abh.* iv. (1875) 437.—Afr austr.
rB4ri/'iL^ Hoppe, ex Schalt. f. Syst. vii. 265 = Luzjla nemorosa.
ruiens, Lam. Encyc iii. 266=microcephalus.
rudis, Knnth, Enum. PI. iii. 38?=mlcf f?C^halus ! -839) 490 =
ru/us, Mielich. ex Huebn. in Flora, xxu. acutiflorus.
rugosus, Steud. Syn. PI. Cyp. 298 - "n**?™.
rugulosus, Engelm. in Couft. Bot. Ges. \i. (1881) 224 dubius.
rupestris, *Kunth, Enum. PI.* iii. **}•—"?'••„ ::**
saginoides, Engelm. in Tran.. Acad. Sc. St Louis, n. (1866) 436 = triformis.
sa/ina, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. J S ^ T l U . » Bull. Soc m. Mosc xxviii. (1855) 1.804 = Gerardi.
scaEriusculus, AT»«M, £«««»• «• '»• ^^ Afr MSt, f v
scSeuchzerioides, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat.* Ser. 1. v. (1825) 100.—Chili; Ins. Antarct.
Sc fo* Hochst. in Flora, xuv. (1841) I. Intell. 21 **= punctorius.**
Schlagintweitii = himalensis. Buehen. in Goett. Nachr. (1869) 255
schoenoides, Mera t, Nouv. FL Par. ed. II. ii. 7* = **acutiflorus.**
Schrankius, Moll, in Schrank & Moll, Naturh. Briefe, i. 5
scirpo^s^^. 267.—Am. bor. . iii. 160 = tenuis.
secundus,Poir. Encyc. Suppl. **pl. iii. 336.—Bras. flora, xxvii. (1844) 361 =**
ser Schnr, ex Buehen. KriL Ver, June. 40 = atratus.
serratus, Linn. f. Suppl. 208 »Prionium Palmita.
setaceus, Gerard, ex Buchen. «* V« **June.** « = Gerardi.
setaceus, *Rostk. Junc.* 18. t. L f. 2; *Rafn. in Med. Repos. N. York*, v. (1808) 362.—Am. bor.
setaceus, Tenore, Fl. Neap. Prod. Suppl. 9 = capitatus.
setaceus, Van Hall, App. n. 12; ex ej. Fl. Belg. i. 288 = supinus.
setifolius, Ehrh. Beitr. vi. 83 = supinus.
siculus, Jan, Elench. i. 5.—Cf. Schult. f. Syst. vii. 205 **anesii.**
sic Tineo, in Guss. Fl. Sie. Syn. ii. 888 = snbulatus.
sihaticus, Auct. vide *sylvaticus*.
Krit. Verz. Junc 41 — caesp icins.
ex Laharpe, in Mém. Nat Pi? M. (1827) **137 = prismatocarp** Afr, austr.
singularis, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 302.—
Smithii, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St.* is, ii. 444.—Am. bor.
S Kunth, Enum. Pl. tenuis.
Sonderianus, ***Buchen. in Brem*** *Abh.* **iv. (1875) 476.**—Afr. austr.

JUNCUS:—
soranthus, Becker, in Bull. Soc Nat. Mosc. **xxxi.** (1858) I. 75 = compressus.
sffranMuj, Schrenk, in Bull. Phys.-Malh. Acad. Peten,b. *ft.* (1843) 193-Gerardi.
Sorrentonii, Parl. Fl. Ital. ii. 356 - pygmaeus.
spadiceus, All. Fl. Pedem. ii. 216; Vill. Hist. PL Danph. ii. 286-Luiula spadicea.
spadiceus, Schreb. in Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. 148=acutiflorus.
spadiceus, Vill. Prosp. 18 = Luzula lutea.
spanianthut, Stead. Syn. PI. Cyp. 306 = capillaceus.
spaiganiifolius, *Boiss.* b* *Kotschy,ex Boiss. Fl. Orient.* v. 856.—Syria,
sphacelatus, *Decne. in Jacquem. Voy. Bot.* 172. t 172.—Reg. Himal.
sphaerocarpus, *Nees, ex Funk, in Flora, i.* (1818) 521.—Europ.; Oriens.
sphaerocephalus, Salzm. ex Pouz. in Mem. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 561=lampocarpus.
spbenostemon, *Buehen. in Engl. Bot. Jahrb.* vi. (1885) 223.—Reg. Himal.
spicatus, Lam. Encyc. iii. 274; Krock. Fl. Siles. i. 572. t. 52 = Luznla campestris.
spicatus, Linn. Sp. PI. 829 = Luzula spicata.
spicatus, Walt. Fl. Carol. 124 = Luzula racemosa.
spinosus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 75 – marilimus.
Spreneelii, *Nees, in Linnaea*, xx. (1847) 244 (excl. syni).—Afr. anstr.
Sprengelii, Willd. Prod. Fl. Berl. 125 ~ squarrosus.
spretus, *Sckult.f. Syst.* vii. 1666, in obs.—Afr. austr.
squ'amosus. Link, Enum. Hort. Berol. i. 306, sphalm. =squarrosus.
squarrosus, All. Fl. Pedem. ii. 216=acutiflorns.
squarrosus, *Linn. Sp. PI.* 327.—Europ.
stellatus, Desv. ex Sprang. Syst. ii. 106=striatus.
stellatus, Soland. ex Schult. £ Syst. vii. 222 -- capitatus.
stellatus, Willd. ex Kunth, Enum. Fl. iii. 329 = Fontanesii.
stenopkyllus, Steud. Syn. PI. Cyp. 80S«capensis.
stipulatus, *Nees if Mey en, in Nov. Act. Nat.* C'ur.xix. *Suppl.* i. (1843) 126.—Chili.
stoechadanthus, Brat Fl. Lusit. i. 516 - Luzula lactea.
stolonifer, Wohlleb. Suppl. Fl. Hal. 13 - lampocarpus.
strictus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii, 407 - Thomasii,
stnatus, *Schousb. ex E. Mey. Syn. June.* 27.—Europ.; Afr. bor.
strictus, Luce, Topog. Nachr. Oesel, 107-squarrosns.
stygius, *Linn. Sjst.* ed. X. 987.—Europ.; Am. bor.
subglandulosus. Stead. Syn. PL Cyp. 803-scabriusculus.
subincunms, Steud. 1. c. = repens.
submonocephalus, Steud. 1. c.-Dregeanns.
subnodulosus, Schrank, Baier. Fl. i. 616 = obtusiflorus.
subpilosus, Gilib. Excrcit. ii. 507 - Luzula campestris.
subtilis, E. Mey. Syn. Luzul. 31-pelocarpug.
subulatas, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 75.—Reg. Mediterr.
subuliflorus, Drejer, Fl. Excurs. Hafn. 127 effusus.
subverticillatus, Muhl. Desc. Uber. 209 ^pelocarpus.
subvertidllatus, Wulf. in Jacq. Coll. iii. 61 = BUpinns.
sudeticus, Krock. FL Siles. Suppl. II. 84 = Luzula spicata.
sudeticus, Willd. Sp. PI. 221 = Luzula campestris.
sulcatus, Hochst. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 842-capensis.
supiniformis, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 461.—Am. bor. occ.
supinus, Bicheno, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 817 - capitatus.
supinus, *Moench, Enum. PI. Hass.* 167.—Europ.; Am. bor.
sylvaticus, Brot. Fl. Lusit. i. 517=Thomasii.
sylvaticus, Desv. ex Schult. f. Syst. vii. 200=lampocarpus.
sylvaticus, Host, Gram. Austr. iii. 57 = oblnsiflorus.
sylvaticus, Huds. Fl. Angl. ed. I. 132 = Luzula sylvatica.
sylvaticus. Muhl. Cat. 86=acnminatus, Dombeyanus.
sylvaticus, Parl. Fl. Palerm. i. 852 - Gussonii.
sylvaticus, Keichard, Fl. Moeno-Francof. ii. 181 « acutiflorus.
sylvaticus, Wahlenb. Fl. Lapp. 81-alpinus.

JUNCUS:—
sylvaticus, Willk. *Sc* Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 184 - Fontanesii, acutiflorus.
tasmanicus, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Loois, ii. (1868) 453 - falcatus.
Tenageia, *Ehrh. ex Linn. f. Suppl.* 208; *et Beitr.* i. 181.—Reg. Mediterr.
Tenageia, Host, Gram. Austr. iii. 60. t. 91=sphaerocarpus.
tenageius, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 108 (err. typ. 105) = praec.
tenax, *Buck, Beschr. Canar. Ins.* 191.—Ins. Canar.
tenax, Forst. f. Prod. 90 = pauciflorus ?
tenax, [Soland. in] Russell, Nat. Hist. Aleppo, ii. 251; Poir. Encyc. Suppl. iii. 156=glaucus.
Tenegeia, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 409 = *j.* Tenageia.
tenellus, Geuns, PI. Belg. Confed. Indig. Spicil. 25 = capitatus.
tenuifolius, Steud. Syn. PI. Cyp. ii. 308 = Chamissonis.
tenuis, Sw. ex Schult. f. Syst. vii. 236 » conipressus.
tenuis, *Willd. Sp. PI.* ii. 214.—Europ.; Ind. occ.; Austral.
Thomasii, *Tenure, lnd. Sent. Hort. Neap.* (1827) 8.—
Europ. austr.
Thomsoni, *Buehen. in BoU,Zeit.* xxv. (1867) 148.—Reg. Himal.
thyrsiflorus, Vest, ex Schult. f. Syst. vii. 277 = Luzula spicata.
Tommasinii, Parl. Fl. Ital. ii. 315->acutus.
transsilvanicus, Schur, in Verb, Siebesh. Ver, Naturw. iv. (1853) 77-filifonnis.
triandrus, Bosc, ex Schalt. f. Syst. vii. 830 - marginatus.
triandrus, Gouan, Herbor. 25 = capitatus,
triandrus, Keichb. Ic. Fl. Germ. ix. t. 391 — pygmaeus.
triandrus, Vill. Cat. Jard. Strasb. 81; ex E. Mey. Syn. June. 30 • supinus.
tricephalos, J. Gay, ex Laharpe, in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iii. (1827) 132 = lampocarpus.
tricephalus, Welw. ex Nym. Consp. 748 » supinus.
triceps, Rostk. June. 48 - castaneua.
trichocephalus, Cf. Bull. Férussac, xiil. (1828) 79 - lampocarpus.
trichodes, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 803.—Rossia.
triftdus. *Linn. Sp. PI.* 326.—Reg. bor. et arct.
triformis, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1868) 492.—Am. bor. occ.
triglumis,Z.«n». *Sp. PI.* 328.—Reg. bor. et arct.
triglumis, Walt. Fl. Carol. 124 = marginatus.
tiigonocarpus, *Steud. Syn. PI. Cyp.* 808.—Am. bor.
trinervis, *LUbm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1850) 41. -Mexic.
tristanianus, Hemsl. Bot. Voy. Challenger, i. n. 154 = tenuis.
uliginosus, Kunth, Enum. PI. iii. 834-heterophyllus.
uliginosus, Roth, in Roetn. & Usteri, Mag. i. 2tes St. (1787) 16 - supinus.
unibracteatus, Griff. Notul. 232 =» prismatocarpus.
uniglumis, Forst. ex Kunth, Enum. PI. iii. 860-= Rostkovia grandiHora, *Hook.f.*
uruguensis, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 317.—Reg. Argent.
Urvitlei, Steud. Syn. Fl. Cyp. 806 - capillacens.
ustulatus, *Buehen. in Bremen, Abh.* vi. (1879) 401.—Bras.
ustulatus, Hoppe, Anleit. Graes. 30 = a1plnns.
utriculosus, Auct. ex Schult. f. Syst. vii. 200 = lampocarpus.
vadllans, Steud. Syn. PI. Cyp. 305 = tennis.
vaginatus, R. Br. Prod. 268-pallidus.
vaginatus, Sieber, ex Schult. f. Syst. vii. 188-panciflorns.
Vaillantii, Thuill. Fl. Par. i. 177 = J. Tenageia.
Valdiviae, Steud. Syn. PI. Cyp. 296=proc«us.
valvatus, *Link, in Schrad. journ.* ii. (1799) 316.—Lusit.; Alger.
variegatus, Caruel, in Nuov. Giorn. Bot. it. (1870) 276-acntus.
Vase)i, *Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis,* ii. (1866) 448.—Am. bor. occ.
vernalis, Brot. Fl. Lusit. i. 515-=-Luzula Fonteri.
vernalis, Reichard, Fl. Moeno-Francof. ii. 182 *m* Luzula vernalis.
verticillatus, Pen. Syn. L 384 = supinus.
viviparus, S. W. Conrad, in Journ. Acad. Philad. vi. (1828) 105 = pelocarpus.
viviparus, Relh. Fl. Cantab. 123= supinus.

JTJNCTJS :—
vulgaris, Gueldenst. Reisen, i. 296 (Quid ?).—Reg. Caucas.
Wallichianus, Laharpe, in Mém. Soc. Hist. NaL Par. iii. (1827) 189-prismatocarpos.
WelwitsMi, Hochst. ex Steud. Syn. PI. Cyp. 304 = supinus.
Wulfeni, Mielich. ex Sauter, in Flora, xxxii. (1849) 666=acutiflorus.
xantholepis, Steud. Syn. PI. Cyp. SOS = planifolins.
xiphioides, *E. Mey. Syn. June.* 50.—Am. bor. occ.; Mexic
zebrinus, Hort. Angl. ex Andre', Illnstr. Hortic xxvii. (1880) t. 393-effosus.
zeylanicus, *E. Mey. Syn. June.* 66 (Quid >).—Zeylan.

JUNDZILUA, Andre, ex DC. Syst. ii. 629 (1821) - Lepidium, Toum. (Crucif.).
Draba, Andre. L C.—L. Draba.

JUNGHANSIA, J. F. Gmel. Syst. 259 (1791) = Curtiaia, Ait. (Cornac).
faginea, J. F. Gmel. 1. c.=C. faginea.

JUNGHUHNIA, Miq. FL Ind. Bat. i. H. 412 (1859) = Codiaeum, Rnmph! (Euphorb.;.
glabra, Miq. 1. c.-C. variegatum.

JUNGIA, Gaertn. Fmct. i. 175. t. 36 (1788)=Baeokea, Linn. (Myrtac).
imbricata, Gaertn. 1. c—B. crenulata.
tenella, Gaertn. 1. c 176 = Micromyrtus microphylla.

JUNGIA, Heist, ex Moench, Meth. 378 (1794)=Salvia, Toura. (Labiat.).
altissima, Moench, 1. c. 379 = S. mexicana.
formosa, Moench, Meth. Suppl. 140=S. leonuroides.
micrantha, Moench, 1. c 141=S. tenella.

JUNGIA, Linn. f. Snppl. 58 (1781). *COMPOSITAE,* Benth. & Hook. f. ii. 502.
DUMERILIA, Lag. ex DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 71. t. 6 (15) et 7 (16).
MARTRASIA, Lag. Amen. Nat. i. 86 (1811).
FLEOCARPHUS, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 228.
RHINACTINA, Willd. in Ges. Natnrf. Fr. Berl. Mag. I (1807) 1S9.
TRINACTE, Gaertn. Fraet. ii. 415 (1791).
affinis, Gardn. in Hook. Lond. Jonra. Bot. vi. (1847) 460-floribunda.
auriculata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 834.—Hab. ?
axillaris, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.301.—Reg.* Andin.
bullata, *Turcz. in Bull. Stic. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) I. 213.—Peruv.
crenata, *Steud. Norn.* ed. II. i. 884.—Hab. ?
ferruginea, *Linn./. Suppl.* 890.—Reg. Andin.
floribunda, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 88.—Bras,
floribunda, *Spruce, ex Benth. (S Hook. f. Gen.* ii. 502. —Bras.
Mandonii, *Sch. Sip. in Linnaea,* xxxiv. (1865-66) 527.—Bolivia,
paniculata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 145.—Peruv.
polita, *GHseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 215.—Reg. Argent.
pyramidalis, D. Don, in Trans. Linn. Soc, xvi. (1833) 299-floribunda.
rngosa, *Less, in Linnaea,* v. (1830) 86.—Am. trap.
Sellowii, *Less. Syn. Comp.* 416.—Bras,
scricea, *Steud. Nom.* ed. II. i. 884.—Hab. ?
spectabilis, *D. Don, in Trans. Linn. Soc.* xvi. (1833) 227.—Pernv.
tomentosa, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 398 = floribunda.

JUNGIA, Loafl. It. 199 (1758)-Ayenia, Linn. (Sterculiac).

JUNIA, Adans. Fain. ii. 165 (1768)=Clethra, Linn. (Vaccin.).

JUTTIPERTJ8, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (17S5). *CON/FERAE,* Benth. & Hook. f. iii. 427.
ARCEUTHOS, Ant. & Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. (1854) 249.
OXYCEDRUS, Hort. ex Can. Conif. ed. II. 18 (1867).
SABINA, Hall, in Rupp. Fl. Jen. ed. II. 336 (1745).
THUI AECARPUS, Trautv. Imag. PI. Ross. 11. t. 6 (1844)

JUWIPEBXJB :—
abyssinica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 132 = procera.
aegaea, Griseb. Veg. Erde, S78, 572 =excelsa.
alba, Knight, ex Can. Conif. ed. I. 58—virginiana.
alpina.S. F. Gray, Nat. An. Brit. PI. ii. 226=communis.
alpina, Lodd. Cat. (1836) 48 = J. Sabina.
andina, Nutt. N. Am. Sylv. iii. 95.1.110 - virginiana.
aquatica, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 888 = Taxodium heterophyllum.
arborea, *Budischt. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1884) 214.—Manchur.
arborescens, Moench, Meth. 699=virginiana.
argaea, Bal. ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 480 •= communis.
argentea, Hort. ex Gord. Pinet. 118=virginiana.
aromatica, Hort. ex Carr. Conif. ed. 1.127 = Cupresras Goveniana.
attica,Orph. in Heldr. Nutzpfl. Griech. IS=macrocarpa.
australis, Endl. Syn. Conif. 26 = virginiana.
bacciformis, Can. Conif. ed. I. 56—phoenicea.
barbadensis, Linn. Sp. PI. 1039 = bermudiana.
barbadensis, Thunb. Fl. Jap. 264=chinensis.
Bedfordiana, Hort. ex Loud. Encyc. Trees, 1090 = virginiana.
bermudiana, *Linn. Sp. PI.* 1039.—Ins. Bermnd.
Biasoletti, Link, in Atti 7 ma. Riun. Scienz. Ital. Napoli, (1846) 878 = macrocarpa.
Bieberstieniana, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 112 = J. Oxycedrus.
Bonatiana, Vis. in Mem. 1st. Venet vi. (1856) 245 = thurifera.
borealis, Salisb. Prod. 897 =communis.
Bregeoni, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1858) 28.—As. bor.
brevifolia, *Antoine, Cupress. Gatt.* 16. tt. 20-22.—Ins. Azor.
butanensis, Wender. Pfl. Bot. Gaert. Marb. 36 - recurva.
Cabiancae, Vis. in Mem. 1st. Venet. vi. (1856) 246 - chinensis.
caesia, Carr. Conif. ed. I. 65—Callitris arborea,
caesia, *Regel, Gartenfi.* (1857) 846.—Calif,
califomica, *Carr. in Rev. Hortic. Sir.* IV. iii. (1854) 352.—Am. bor. occ.
canadensis, Lodd. Cat. (1836) 47=communis.
canariensis, Knight, ex Gord. Pinet. 114=J. Cedrus.
canescens, Wall, ex Gord. Pinet. 106»recurva.
Cannartiv, Hort ex C. Koch, Dendrol'.' ii. II. 140 = virginiana.
capensis, Lam. Encyc. ii. 626=Callitris arborea.
caroliana. Mill. GarH. Diet. ed. VIII. n. 4=virginiana.
caroliniana, Duroi, Harbk. ed Pott, i. 497 = praec
caucasica, Fisch. ex Gord. Pinet. 98 = communis.
Cedrus, *Webb If Berth. Phyt. Canar.* iii. 277 t. 2. ft 1-3.— Ins. Canar.
cernua,. Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 839 = chinensis.
cerrosianus, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 37 = californira.
Chamberlaynii, Carr. Man. PI. iv. 818=virginiana.
chinensis, Hort. ex Endl. Syn. Conif. 22^ J. Sabina.
chinensis, *Linn. Afant.* i. 127.—China.
chinensis, Roxb. Hort. Beng. 78; Fl. Ind. iii. 840 - Podocarpus macrophylla.
dnerascens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 141 = virginiana.
cinerea^Caji. Conif. ed. II. 35=thurifera.
communis. *Linn. Sp. PI.* 1040.—Reg. bor. temp, et arcL
communis, Thunb. Fl. Jap. 264 = rigida.
comfiressa, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 22 = communis.
conferta, *Parl. Nov. Conif.* 1.—Japon.
Cracovia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 115 = communis.
Cunninghamii, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 71 = Callitris quadrivalvis 1
davurica, Hort. ex Lindl. *Sc* Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 200=communis.
davurica, *Pall. Fl. Ross.* i. II. 18. t. 55.—Sibir.
dealbata, Hort. ex Knight, Syn. Conif. 12 = occidentalis.
dealbata, Lond. Encycl. Trees, 1090 = communis.
densa, Gord. Suppl. Pinet. 32 = recurva.
Deppeana, Steud. Nom. ed. II. i. 835=mexicana.
depressa; Rafin. Med. Fl. ii. 18=-communis!
difformis, Gilib. Exercit. ii. 416 = communis.
dimarpha, Roxb. Hort. Beng. 73; FL Ind. iii. 889 = chinensit.

JTJNIPEBUS:—
dioica, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 45 = virginiana.
divaricata, Hort. ex Carr. 1. c. 61 = phoenicea.
drupacea, *Labill. PI. Syr. Decad.* ii. 14. t. 8.—Graecia ; As. Min.; Syria.
dumosa, Hort. ex Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 201 - J. Pseudo-sabina ?
duplicata, Goepp. Ind. Hort. Vratislav. (1871) - drupacea ?
echinoformis, Hort. ex Can. Conif. ed. II. 18 = J. Oxycedrus.
echinoformis, Rinz, ex Boise, in C. Koch, Wochenschr. xi. (1868) 284-communis.
elata, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 838-Dacrydium elatum.
elliptka, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 11= macrocarpa.
elliptica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. n. 118 = communis.
ericoides, Hort. ex Can. Conif. ed. II. 140=Thuja orientalis.
ericoides, Hort. ex Mast, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 495=Thuja occidentalis.
ericoides, Nois. ex Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 355- Callitris calcarata.
excelsa, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 245.—As. Min.
exceisa. Griff. Notul. iv. 26 = macropoda.
excelsa, Madden, ex Gord. Pinet. 107 = recurva.
excelsa, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 647 = occidentalis.
excelsa, Wall. Cat. n. 6041-J. Pseudo-sabina.
excelsa, Webb, ex Parl. in DC. Prod. xvi. II. 488 = chinensis.
excelsa, Willd. Sp. PI. iv. 852- J. Sabina.
fastigiata, Hort. ex Knight, Syn. Conif. ll=communis.
flaccida, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 496.—Mexic.
nagelliformig, *Hort. ex Loud. Encyc. Trees,* 1090» chinensis.
foetida, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. 314-foetidissim.i, virginiana.
foetidissima, Hort. ex Endl. Syn. Conif. 80 — communis.
foetidissima, *Willd. Sp. Pi.* iv. 863.—Graecia; As. Min.
formosa, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 51 = phoenicea.
Fortunei, Hort. ex Carr. 1. c. ed. I. 11=macrocarpa.
Fortunti, Hort. ex Can. 1. c ed. II. 32 = sphaericr.
fragrans, Knight, Syn. Conif. 13; Salisb. Prod. 397 = virginiana.
fragrans, Panl, ex Gord. Pinet. Suppl. 37= caesia.
gigantea, Roezl, Cat. 8=mexicana.
glauca, Salisb. Prod. 397 = J. Oxycedrus.
glauca, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 67, nomen;. .Cels, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 485 = virginiana.
gossainthanea, Lodd. ex Lindl. & Gord. in Joum. Hort. Soc. v. (1850) 202=virginiana.
gracilis, Endl Syn. Conif 31 =• virginiana.
gracilis, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 66-Cupressus Comeyana.
gr'andifoltus, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 169- J. Oxycedrus.
Hartwissiana, *Stev. ex Koeppen, Ueb. Pfl. Acclimat. i* Russl.* 6.—Hab. ?
hemisphaerica, Presl, Delic. Prag. 142 = communis.
Henryana, *R. Br. Camst. in Gard. Chron.* (1873') 8.—Am. bor. occ.
Hermanni, Pers. Syn. ii. 632= virginiana.
heterocarpa, Timb. ex Nym. Consp. 676 = J. Oxycedrus.
hibernica, Lodd. ex Loud. Arboret. iv. 2490-communis.
himalayalnsis, Hort. ex Carr. Man. PL iv. 314 «= macropoda.
hispanica, Booth, ex Endl. Syn. Conif. 15= communis.
kispanica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 13 - thurifera.
Hochstetteri, *Antoine, Cupress. Gatt.* t. 33.—Abyssin.
horitontalis, Moench, Meth. 699.
hudsonica, Forb. Pinet. W'obura. 208-J. Sabina.
humilis, Salisb. Prod. 397-J. Sabina.
incurva, Buch.-Ham. ex Endl. Syn. Conif. 18 = recurva.
indica, Bertol. Misc. Bot. xxiii. 16-J. Pseudo-sabina.
intermedia, Schur, in Verh. Siebenh. Ver. Naturw. "• (1850) 169= communis.
interrupts, WendL ex Endl. Syn. Conif. 16 = communis.
isophyUos, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 304 = excelsa.
japonica, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 33 - chinensis.
Lambertiana, Wall, ex Endl. Syn. Conif. 19-recurva.

JTmTPEB/US:—
Langoldiana, Hort. ex Gord. Finet. Snppl. 38 = phoenicea.
Lasdeliana, Laws, ex Gord. Pinet. 105 = excelsa.
litoralis, Maxim, in BulL Acad. Petersb.xii. (1868) 230—conferta.
LebelU, Gifts. Fl. Sic. Syn. ii. 635-macrocarpa.
Lorulasi, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 135 = religiosa.
Lorulati, Hort. ex Can. Conif. ed. II. 86—excels*.
lusitanica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 11 - J. Sabina.
lycia, Linn. Sp. PI. 1089 = phoenicea.
lycia, Pall. Fl. Ross. ii. 14. t. 56-J. Sabina.
lycia, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 280=J. Psendosabina.
Macnabiana,, Laws, ex Gord. Pinet. 64=Cupressus Macnabiana.
macrocarpa, *Sibth. V Sm. Fl. Grate. Prod.* ii. 268.—Graec.; As. Min.
macrocarpa, Tenore, Syll. Fl. Neap. 483, partim = J. Oxycedrus.
macropoda, *Baits. Fl. Orient,* v. 709.—Persia; Reg. Himal.
malacocarpa, Cair. Conif. ed. II. 50=phoenicea.
Marschalliana, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) I. 244; et xxx. (1857) I. 397 = J. Oxycedrus.
meldensis, Hort. ex Mast, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) '495 -Thuya orientalis.
mexicana, *Schiede, in Linnaea,* v. (1830) 77.—Mexic.
mexicana, Spreng. Syst iii. 909-tetragona.
microphylla, *Antoine, Cupress. Gatt.* t 81,32.—Hab. T
montana, Hort. ex Lindl. & Gord. in Joum. Hort. Soc. v. (1850) 200 = communij.
myosuroi, Hort. ex Senéd. Cat. (1854) 85 - phoenicea.
nanq, Willd. Berl. Baumz. 159 - communis.
neaboriensis. Laws, ex Gord. Pinet. 96=macrocarDa.
nepaleniis, Hort. ex Endl. Syn. Conit.21 = chinensis.
tupalensis, Hort. ex Loud. Arboret. iv. 2499-bennudiana.
nepalensis, Rinz. ex Gord. Pinet. 106=recurva.
nipponica, *Maxim, in Bull. Acad. Petersb.* xii. (1868; 230.—Japon.
oblonga, Bieb. Fl. Taur. Cane. ii. 426 = communis.
oblongata, Guss. FL Sic. Syn. ii. 635, in textu=macrocarpa,' phoenicea.
occidentalis, *Hook. Fl. Bar. Am.*ii. 166—Am. bor.occ.
ccidentalis, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 54=communis.
Olivierii, Carr. 1. c. 57 - excelsa.
oophora, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 637 = phoenicea.
oppositifolia, Moench, Meth. 699 = bermudiana.
oxycedrina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 128 = 1. Oxycedrus.
Oxycedrus, Herb. Linn, ex Parl. in DC. Prod. x i. H. 477 = macrocarpa.
Oxycedrus, Hochst. Fl. Aa.r. 26-J. Cedrns.
Oxycedrus, *Linn. Sp. PI.* 103«.-Europ. austr.; Caucas.
pachyphlaea, *Tort, in Pad/. Kail. Hep.* iv. "2.-Mexic.
patens, *Roxb. Hort. Beng.* 73. nomen.—China.
pendula, Hort. ex Part, in DC. Prod. xvi. II. 470= Cupressus torulosa.
Perkinsii, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 144 =excelsa.
PhiUpp'siana, Wall, ex Carr. Conif. ed. I. 488 = **p b S & . 1040-Reg Medien; Arab**
phoenicea, ML Ff. Ross, i p 16. t. *V.*=<*"*<*.
Polycarpos, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 303 = *pZAochst. ex Endl, Syn Conif* 2«.-Afr. tro£
procunlbens, Siebold, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. *pSlSVSF** An, Soc. Hort. Pays-Bas , S ^ S 632-J. Sabina
prostrata, *Risso, Hist. Nat. Europ. Mend-,* n. 459.-Pseudo-Sabi *Fisch. & Mey.* *Hort. Petrop.* viii. 65.—Soongar.; Reg. Himal. *pygmaea,* C. Koch, in Linnaea, (1849) 302 = communis.
pyramidalis Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 22-com-

pyramidalis, Hort. ex Carr. 1. c. ed. II. 4S=virana.
pyfainMis, Hort. ex C.rr. I. c. ed. I. 51 = phoenicea.
Pyramidalis, Salisb. Prod. 397 - bermudiana.

JUNIPEBTJ8:—
pyriformis, A. Murr. in Gard. Chron. (1855) 420 = occidentalis.
quatemata, Miq. Cat Hort. Bot Amstel. 20 = Cupressus funebris.
racemosa, *Risso, Hist. Nat. Europ. Merid.* ii. 459.—Europ. austr.
recurva, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 55.—Reg. Himal.
Reevesiana, Hort ex Endl. Syn. Conif. 31 - chinensis.
reflexa, Hort ex Gord. Pinet. 98=communis.
religiosa, Hort. ex Endl. Syn. Conif. 26 -excelsa.
religiosa, Royle, Illustr. Bot. Himal. 351=recurva.
repanda, Hort. ex Carr. Conif. ed. I. 27-recurva.
repens, Nutt. Gen. Am. ii. 246-J. Sabina.
rhodocarpa, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) I. 397, in textu.—Reg. Caucas.
rigida, Gord. Pinet. 99-taxifolia.
rigida, Nois. ex Desf. Cat. Hort. Paris, ed. III. 355 *(=Frenela rigida).*—Austral.
rigida, Pav. ex Carr. Conif. ed. I. 447 = Podocarpus glomeratus.
rigida, *Sieb. V Zucc. Fl. Jap.* ii. 109.1.125.—Japon.
rigida, Wall, ex Carr. Conif. ed. II. 692 = Dacrydium datum.
rigida, Wall, ex Endl. Syn. Conif. 19-recurva.
rufescens. Link, in Flora, xxiv. (1846) 579-J. Oxycedrus.
Sabina, Gueldenst. Reisen, i. 98=excelsa.
Sabina, *Linn. Sp. PI.* 1039.—Europ.; As. bor.
Sabina, Pall. Reise, iii. 273-J. Pseudo-Sabina.
Sabina, Sibth. *Sc* Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 264=foetidissima.
sabinoides, Endl. Syn. Conif. 24=thurifera.
sabinoides, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 352 = foetidissima.
sabinoides, Humb. ex lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. T. (1850) 202=mexicana.
saxatilis, Hort. ex Lindl. *Sc* Gord. L c. 200=communis.
Schotti, Hort ex Gord. Pinet. Suppl. 36-virginiana.
semiglobosa, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 487.—Turkestan.
Sheppardii, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 426 = sphaerica.
sibiricai Burgsd. Apleit. n. 272 = communis.
sinensis, J. F. GmeL Syst. 1005 - chineniis.
sinensis, Hort ex Carr. Conif. ed. II. 83=sphaerica.
aphaerica, *Lindl. in Paxt. Flow. Gard.* i. (1850-51) 68. f. 85.—China.
sphaerotatpa, Antoine, Cnpress. Gatt. 11. t. 10 = macrocarpa.
squamata, Buch.-Ham. in Lamb. Pin. ed. I. ii. 17 = recurva.
squamata, Gord. Pinet. 110, ex parte « J. Pseudo-Sabina.
squamosa, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6043—recurva.
stricta, Hort ex Gord. 1. c. ed. II. 144 = excelsa.
struthiacea; Knight, Syn. Conif. 13 = chinensis.
suecica, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = communis.
tamariscifolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. II. 125 - J. Sabina.
taurica, Hort. ex Lindl. & Gord. in Joum. Hort. Soc. v. (1850) 200=communis.
taurica, Strangways, ex Gord. Pinet. 100=J. Oxycedrus.
taxifolia, *Hook. V Am. Bot. Beech. Voy.* 271. -China; Japon.
tenella, Antoin. Cupress. Gatt. 20, 27-29-J. Oxycedrus.
terminaliSy Salisb. Prod. S97 -phoenicea.
tetragona,. Moench, Meth. 699 •= phoenicea.
tetragona, *Schlecht. in Linnaea,* xii. (1838) 495.—Mexic.
Tkunbergii, Hook. & *tm.* Bot. Beech. Voy. 271 = chinensis.
thurifera, Bonpl. ex Endl. Syn. Conif. 68=Cupressns thurifera.
thurifera, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 50 = phoenicea.
thurifera, Hon. Par. ex Endl. Syn. Conif. 25-foetidissima.
thurifera, *Linn. Sp. PI.* 1039.—Hispan.; Lusit.
turbinata, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 631 = phoenicea.
Uhdeana,Goti. in Joum. Hort. Soc. v. (1860) 206 = Cupressus Lindleyi.
umbilicota,.GpAi. in Gran. & Godr. Fl. Fr. iii. 168, adnot. = macrocarpa.
uvifera, D. Don, ex Lamb. Pin. ed. II. ii. 116-Libocedros tetragona.

JTJNTPEH.TT8:—
uvifera, Loud. Encyc. Trees, 1088=recurva.
venusta.'Hott. ex Gord. Pinet. ed. II. 144^excelsa.
virginiaua, Endl. Syn. Conif. 27 = bermudiana.
virginiana, *Linn. Sp. PI.* 1039.—Am. bor.
virginica, Thunb. Fl. Jap. 264-chinensis.
Wallichiana, Hook. f. ex Part, in DC. Prod. xvi. 11. 482 = J. Pseudo-Sabina.
WMii, Carr. Conif. ed. L 13 = J. Cedrus.
Whitleyana, Miq. Cat. Hort. Bot. Amstel. 21-Cupressus sempervirens.
Willkommii, Antoine, Cupress. Gatt. 9. t. 7-macrocarpa.
Withmanniana, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 18 *> communis.
Wittmanniana, Fisch. ex Lindl. in Journ. Hort Soc v. (1850) 200-J. Oxycedrus.
Wittmanniana, Stev. ex Pad. in DC. Prod. xvi. li. 479 =communis.

JUNKIA, Ritg. in Marb. Schrift. ii. (1830) 128, sphalm. oFunkia, Spreng. (Liliac.).

JUNO, Trait. Ausw. Gartenpfl. i. 135 (1817 ?)-Iris, Linn.
Aitchisoni, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882)862 = 1. Aitchisoni.
Aucheri, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 498 - I. fumosa.
caucasica, Tratt. Ausw. Gartenpfl. L 136 = 1. caucasica.
Danfordiae, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 362 = 1. Danfordiae.
palaestina, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 498 = I. palaestina.
persica, Tratt. Ausw. Gartenpfl. i. 186-1. persica.
planifolia, Aschers. in Bot. Zeit. xxii. (1864) 114 - I. alata.
scorpioides, Tratt Ausw. Gartenpfl. i. 1S5 = I. alata.
Stocksii, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 862-1. Stocksii.

JUNQUILLA, Fonrn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 164=JONQUILLA, Haw.=Naroi«-sus, Toum. (Amaryll.).

JUPICA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 15 (1836) -Xyria, Linn.
caerulea, Rafin. 1, c. = X. americana.

JURGENSENIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) 1.151-Befaria, Mutis (Ericac).
mexicana, Turcz. L c-B. discolor.

JURGENSIA, Benth. & Hook. f. Gen. i. 970 (1867) = JUERGENSIA,Spren£:=--Al80deta,Thou.(Violar.).

JURGENSIA, Rafin. Sylva Tellur. 146 (1838) - Bpermaoooe, Linn. (Kubiac.).
psylloides, Rafin. 1. c. 147 =S. tenella.

JUBINEA, Cass. in Bull. Soc. 1'hilom. (1821) 140 = *COMPOSJTAE,* Benth. & Hook. f. ii. 473.
AEGOPORDON, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 112 (1846).
DERDERIA, Jaub. & Spach, Illustr. i. 129. t. 67 (1848).
DOLOMIAEA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 330.
JURINELLA, Jaub. & S|nch, Illustr. ii. 101. 1.188-185 (1846).
OUTREYA, Jaub. & Spach, 1. c. i. 131. t 68 (1843).
POLTTAXIS, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat. (1843).
STECHMANNIA, DC. Prod. vi. 643 (1837).
TULAKENIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 120 (1836).
Abramovi, *Regel V Herd, ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 58.—Turkest.
adenocarfa, Schrenk, Enum. PI. Nov. 46 — Saussurea Candolleana.
alata, *Cass. in Diet. Sc. Nat.* xxiv. 288.—Reg. Caucas.
albicaulis, *Bunge, in Flora,* xxiv. (1841) 156.—Sibir.
alpigena, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 414.—As,. Min.
ami>igua, *DC. Prod,* vi 676.—Rossia.
anatolica, *Boiss. Diagn.* Ser. I. iv. 21.—As. Min.
angustifolia, *Bunge, in Flora,* xxiv. (1841) 156.—Sibir.
arachnoidea, *Bunge, I. c.* lft7.—Rossia; Reg. Caucas.
Aucheriana, *DC. Prod.* vi. 674.—As. Mm.
bellidioides, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 683.—Reg. Caucas.
blanda, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 67-mollis.
Bocconi, J. Cay, ex Nym. Consp. 410=humilis.
Bocconi, *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 448.—Sicil.; Hisp.mer.

JTJBHTEA:—
bracteata, *Regel V Schmalh. in Act. Hart. Petrop.* vi.' (1879) 323.—Turkest.
brevicaulis, *Boiss. in Tchihat. Asie Mitt. Bot.* ii. 847. —Armen.
Bungei, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 578.—Persia,
cadmea, *Boiss. Diagn. Set.* I. iv. 22.—As. Min.
Capusi, *Franch. in Ann. Sc. Nat.* Sér. VI. xvi. (1883) 828.—Turkestan,
carduiformis, *Boiss. Diagn. Set.* I. vi. 111.—Persia; Afghan,
cataonica, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Ft. Orient,* iii. 580.—As. Min.
ceratocarpa, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 474.—Reg. Himal.
chaelocarpa, *Ledeb. ex DC. Prod.* vi. 676.—Sibir.
chaetolepis, Eoiss. Diagn. Ser. IL iii. 60 - Tricholepk spartoides.
chia, Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient, iii. 574 = anatolica.
consanguinea, DC. Prod. vi. 676 =anatolica.
cordata, *Boiss. W Haussk. ex Boiss. Fl. Orient,* iii. 681.—Persia,
cretacea, *Bunge, in Flora,* xxir. (1841) 158.—Ross. austr.
cyanoides, *DC. Prod.* vi. 676.—Reg. Caucas.; Sibir.
depressa, *C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc.* 67.—As. Min.
dumnlosa, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 669.—Persia.
dura, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat Sér. IV. i. (1854) 82 = anatolica.
elegans, *Stev. in DC. Prod.* vi. 675.—Reg. Caucus,
eriobasis, *DC. 1. c.*—Persia.
erythrolepis, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 98 — heterophylla.
Eversmanni, *Bunge, in Flora,* xxiv. (1841) 165.—Rossis.
filicifolia, *Boiss. Fl. Orient.* iU. 682.—Reg. Cancas.
frigida, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 112.—Persia,
glycacantha, *DC. Prod.* vi. 677.—Graecia.
Gmelini, *C. A. Mey. ex Claus, Ind. Goebel, Reise,* ii. 280.—Ross. med.
gnaphalioides, *Klatt, in Sittb. Akad. Muench.* (1878) 96.—Reg. Himal.
heterophylla, *Jaub. (S Spach, Illustr.* ii. t 181.—Persia.
heterophylla, Schur, Enum. PI. Transs. 412 = mollis.
horrida, *Rupr. Sert. Tiansch.* 57.—Turkestan,
humilis, *DC. Prod.* vi. 677.—Reg. Mediterr.
integri/olia, Schur, Enum. PI. Transs. 412-mollis.
inuloides, *Boiss. V Haussk. ex Boiss. FL Orient,* iii. 681.—Persia.
Korolkowi, *Regel* b* *Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 322.—As. med.
lanipes, *Rupr. Sert. Tiansch.* 58.—Turkest.
lasiopoda, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 610.—Turkest.
Ledebourii, Bunge, in Flora, xxiv. (1841) 157-arachnoidea.
leptoloba, *DC. Prod.* <vi. 675.—Persia,
linearifolia, *DC. I. c*—Reg; Caucas.; Sibir.
longifolia, DC. I. c. 674 -albicuulis.
lyrata, Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 37 = depressa.
macrocalathia, *C. Koch, in Linnaea,* xxiv. (1851) 415. —Banat.
macrocephala, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 878.—Reg. Himal.
macrocephala, *DC. Prod.* vi. 074.—Persia,
microcepliala, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 584.—Persia,
modesta, *Boiss. Diagn.* Ser. II. iii. 60.—Afghan
mollis, *Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 290.—Europ. austr.
Monardi, *DC. Prod.* vi. 677.—Hispan.
mongolica, *Maxim, in Bull. Acad Pitersb.* xix. (1874) 619.—Mongol.
monoclona, Aschers. Fl. Brandenb. 852-cyanoides.
moschata, DC. Prod. vi. 677=mollis.
multicaulis, *DC. I. c.* 674.—Persia.
Neumayriana, Vis. Ic. Fl. Dalm. t. 10. f. 2 - Amphoricarpus Neumayeri.
oblongifolia, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient iii. 578"Aucheriana.
Olgae, *Regel V Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 51.—Turkest.
pinnata, *DC. Prod.* vi. 676.—Hispan.
pluriceps, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 413-arachnoidea.
Pollichii, Nym. Syll. 28, in syn. •= cyanoides.
polyclonos, *DC. Prod.* vi. 675.—Ross.; As. med.

JURINEA:—
proteoides, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 579.—Persia.
pulchella, *DC. Prod.* vi. 676.—Persia,
pungens, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 669.—Persia.
pyrenaica, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 270=humilis.
radian;, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 577.—Persia,
ramosissima, *DC. Prod.* vi. 677.—Persia; Afghan,
ramulosa, *Boiss.* b* *Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 680.—Syria.
rhitantha, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 677 = depressa.
robusta, *Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pitersb.* iii. (1844) 109.—Soongaria.
Roegneri, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1861) 414 = arachnoidea.
rosulata, *Klatt, in Sittb. Akad. Muench.* (1878) 96.—Reg. Himal.
Ruprechti, *Boiss. Fl. Orient,* iii. 673.—Reg. Caucas.
sahdfolia, *Boiss. 1. c.* 580.—As. Min.
salicifolia, *Gruner, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xli. (1868) H. 481.—Tauria.
sclerophylla, Boiss. & Heldr. ex eor. Diagn. Ser. I. x. 97—Leuzea serratuloides.
sophiana, *Kalenica. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xviii. (1845) I. 239..—Reg. Caucas.
sordida, Stev. 1. c. xxix. (1856) n. 401 = cyanoides.
spectabilis, *Fisch.* b[1] *Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 39.—Reg. Caucas.
squarrosa, *Fisch.* b* *Mey. 1. c.* xi. 73.—Reg. Caucas.
staechadifolia, *DC. Prod.* vi. 674.—Ross, austr.
Staehelinae, *Boiss. Diagn.* Ser. I. vi. 111.—Syria.
subacaulis, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 89=depressa.
suffruticosa, *Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xl. (1867) II. 166.—Orieos.
tenuiloba,Bxmge, in Flora, xxiv. (1841) 156=cyanoides.
tenuis, Bunge, 1. c. 158-Serratula tenuifolia.
thianschanica, *Regel* b* *Schmalh. in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 322.—Turkestan.
tomentosa, Cass. in Diet.Sc. Nat.xxiv.289 -cyanoides.
transsilvania, Schur, Enum. PI. Transs. 412 = mollis.
Trautvetteriana, *Regel If Schmalh. ex Regel, PI. Nov. Fedsch.* 52.—Tnrkestan.
Tricholepis, DC. Prod. vi. 678 (Tricholepidis sp.).—Reg. Himal.

JURINELLA, Jaub. & Spach. Illustr. ii. 101. t 183-185 (1846) = Jurinea, Cass. (Compos.).
absinthi/olia, Jaub. & Spach, 1. c 103. *V*185 = Jurinea frigida.
Aucheri, Jaub. & Spach, 1. c 101. t. 183 - Jnrinea depressa.
Chamaecynara, Jaub.' *Sc* Spach, 1. c. 102. t. 184 - Jurinea depressa.

JUSSIA, Adans. Fam. ii. 85 (1768) =seq.

JUSSIAEA, Linn. Fl. Zeyl. 75 (1747) -seq.

JUSSIAEIA, Hill.Veg. Syst. xiii. 28(1768)=Juasleua, Linn. (Onagrar.).

JUSSIEA, Linn, ex Sm. Laches. Lapp. 1. 284 (1811) - Potentilla, Tourn. (Rosac).

JUSSIENA, Reichb. Handb. 246 (1887) sphalm. = seq.

JUSSIEUA Gen. ed. I . 126 (1737). *ONAGRARIEAE,* Benth. & Hook. f. i. 788.
CORYNOSTIGMA, Presl, Epim. Bot 218 (I860).
CUBOSPKRMUM, Lour. Fl. Cochinch. 275 (1790).
OLDENLANDIA, P. Br. Hist. Jamaic. 208 (1756).
acuminata, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 746=linifolia.
adscendens, Linn. Mant i. 69 = repens.
affinis, *DC. Prod.* iii. 58.—Guian.
alata, *G. Don, Gen. Syst.* it 693.—Bras,
alata, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 84.—Mexic.
albiflora, Triana, ex Micheli, in Mart Fl. Bras. xiii. H. 166 = lithospermifolia.
alternifolia, E. Mey. ex Peters, Reise Mossamb. Bot 69—repens.
altissima, Perr. ex DC. Prod. iii. 55-erecta.
aluligera, Miq. Stirp. Surin. Sel. 60 - decurrens.
anuuonica, Spruce, ex Micheli, in Mart. FL Bras, xiii. II. 159=inclinata.
anastomosans, *DC. Prod.* iii. 66.—Bras.
angusti/olia, Blume, Bijdr. 1132 - Blumeana.

jTrssiE.trA:—
angusti/olia, Lam. Encyc. iii. 331 - suffruticosa.
Berteriana, Steud. Noro. ed. II. i. 886-repens.
Blumeana, *DC. Prod.* iii. 55.—Java.
bonariensls, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 803.—Am. trop.
Boydiana, Featherm. Rep. Louisian. *Vnir.* (1870) 78 = repens.
brachycarpa, Lam. Encyc. iii. 331 - Ludwigia cylindricr.
brachycarpa, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 302.—Am. trop.
brachyphylla, *Micheli, I. c.* 300.—Am. trop.
bracteata, Hook. & Am. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 813 — elegans.
Burchellii, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 801.—Am. trop.
Burmanni, DC. Prod. iii. 67- iufTruticosa.
calycina, Presl, Rel. Haenk. ii 84=octonervia.
Caparosa, *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 258. —Bras.
earo'phyllaea, Lam. Encyc. iii. 831 = Ludwigia parviflora.
Commersoni, Pohl, ex Micheli, in. Mart. Fl. Bras. xiii. II. 155=nervosa.
costata, Pohl, ex Micheli, 1. c. 161-elegans.
costata, *Ptesl, Epim. Bot.* 217.—Ins. Philipp.
decumbens, Benth. ex Wall. Cat. n. 6832-suffruticosa.
decurrens. *DC. Prod.* iii. 56.—Am. bor.
densiflora, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 301.—Am. trop.
difusa, Forsk. Fl. Aegypt/>>-ab. 210=repens.
distans, Pohl, ex Micheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 165 = afnnis.
dodecandra, *DC. Prod.* iii. 53.—Guian.
edulis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 210 - Corchorus Antichorus.
elegans. *Cambess. in St. Hit. Fl. Bras. Mer.* ii. 257.—Bras.
elevata, Pohl, ex Micheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. H. 150 = Laruotteana.
elongate, Bnrch. ex Micheli, 1. c. 158 •= Burchellii.
•*erecta,* Blanco, Fl. Filip. ed. I. 365 = suffruticosa.
erecta, Dnn. Amoen. Acad. viii. 256 = inclinala.
«recta, *Linn. Sp. PI.* 388.—Am. trop.
erecta, Nutt. Gen. Am. i. 279—decurrens.
erythrocaulis, Mart, ex Micheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 170 = suiTruticosa.
exaltata, Roxb. Hort. Beng. 33; FL Ind. ii. 401 = suffmticosa.
filiformis, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 300.—Am. trop.
floribunda. Griff. Notul. iv. 688-repens.
fluitaas, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 692.—Bras.
Jltfitans, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 425-repens.
fluviatilis, Blume, Bijdr. 1132 = repens.
foliosa, *Wright, ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 107.—Cuba,
frutescens, *Jauq. f. Sem. Hort. Vind.* (1821) ; *ex DC. Prod.* iii. 5P.-Hab. ?
fruticosa, DC. I. c. 57-suffruticosa.
grendiflora, Michx. Fl. Bor. Am. i. 267 = repens.
grandiflora, *Rui** b" *Pav. Fl. Per.* iv. 382.—Peruv.
Haenkeana, *Steud. Nom.* ed. II. i. 836.—Mexic.
helminthorrhiMa, Mart, in Flora, xxii. (1839) I. Beibl. 61=natans.
heterophylla, Salzm. ex Micheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 164 = pilosa.
hexamera, Miq. in Ann. Sc. Nat. Ser. IŁL i. (1844) 36 - affinis.
hexapetala, Hook. & An. in Hook. Bot. Misc. i«-(1833) 312= repens.
hirsuta, *Mill. Gard. Diet.* ed. VIII. n. 6.--Am. centr.
hirsuta, Presl, Rel. Haenk. ii. 34 = Haenkeana.
hirsuta. Veil. Fl. Hum. 186; iv. t 144= mollis.
hirta, Lam. Encyc. iii. 331 - pubescens, scabra.
hirta, Vahl, Eclog. Am. ii. 81=peruviana.
Hookeri, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 302.—Am. trop.
hyssopifolia, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 698.—Afr. trop.
inclinata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 366 •= repens.
inclinata, *Linn./. Suppl.* 577.—Am. trop.
inflata, *Wright, in Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 478.—Cuba.
Junghuhniana, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. I. 627.—Sumatra.
lanceolata, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 2S» — myrtifolia.
lanceolata, Pohl, ex Micheli, in Mart. FL Bras. xiii. I'. 155 = nervosa.
Laruotteana, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* •• 256.—Bras.

jTTSSlEtTA:—
Iatifolia, *Benth. in Hook. Journ. Bot.* ii. (1840) 817.—Guian.
leptocarpa, Nutt. Gen. Am. i. 279—pilosa.
ligustrifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 100-suffruticosa.
linearis, *Hochst. in Flora,* xxvii. (1844) 425.—Afr. anstr.
linearls, *Willd. Sp. PI.* ii. 675.—Afr. trop.
linifolia, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 82.—Am. et Afr. trop.
lithospermifolia, *Mieheli, in Flora,* lvii. (1874) 300.—Am. trop.
Iongifolia, *DC. in Mlm. Soc. Phys. Geniv.* ii. (1824) II. 141.—Bras.
Iongifolia, Reichb. Hort. Bot. i. 60. t. 67=frutescens?
longipts, Griff. Notnl. iv. 689-suffruticosa.
macrocarpa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 102-peruviana.
macropoda, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 36.—Pernv.
maderaspatana, Steud. Norn. ed. I. 447=Ludwigia parviflota.
Marcgravii, DC. Prod. iii. 58-pilosa.
Martii, *Mieheli, in Flora,* lvii. (1874) 300.—Am. trop.
mauritiana, Presl, Bot. Bemerlc. 70-repens.
maypurensis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 100 = nervosa.
mendocinensis, Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1888) 312 ~ repens.
micrantha, Kunze, Del. Son. Hort. Lips. (1847) i ex Linnaea, xxiv. (1851) 177 = linifolia.
micropetala, Mart, in Flora, xxii. (1889) I. BeibL 81 « affinis.
Miguelii, Sagot, ex Mieheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. H. 164 -pilosa.
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 102 = peruviana.
montevidensis, Spreng. Syst. ii. 232-rkpens.
multinervia, *Hook. V Am. in Hook. Bot. Misc. va.* (1833) 312.—Reg. Argent,
myrtifolia. *Cambess. in St. Hit. Fl.Bras.Mer.* ii.2«0.—Bras,
natans, *Humb. V Bonpl. PI. Aequin.* i. 16. t. 3 B.—N. Granat.
nervosa, *Poir. Encyc. Suppl.* iii 1»9.—Guian.
nubica, Hochst ex Oliver, Fl. Trop! Afr. ii. 490-linifolia.
otionga. Gill, ex Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 812 = Fcpcns.
occidentalism Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 621 — octonervia.
octofila, DC. Prod. iii. 57 - suffrnticosa.
octonervia, *Lam. Encyc.* iii. 382.—Am. trop.
octovalvis, Sw. Obs. Bot. 142; Sieber, ex Presl, in Oken. Isis, xxi. (1828) 272 =• suffrnticosa.
Onagra, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 - erecta.
oocarpa, Wright, ex Griseb. Cat. PL Cnb. 108 - Oocarpon jussiaeoides.
ovalifolia, *Sims, Bot. Mag.* t 2580.—Madag.
palmitensis, Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer. n. 261-nervosa.
palustris, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 173 - suffruticosa.
palustiis, *Veil. Fl. Flum.* 188 ; iv. t. 143.-Bras.
paniculata, Poepp. ex Mieheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. £ £ £ % £ St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 268 ^ X s a n m . ex Micheli.in Mart Fl. Bnu. xiii.«. 165 ~linifolia.
patibilcensis, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vi. 97- Pohl, ex Mieheli, in Mart. FL Bras. xiii. II, 1 pedunc K W*U. *ex Griseb. Cat. PI. Cub.* 108.- Cuba.
Mdes, H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp.vi.97-repens. W/W»,Schlecht in Linnaea, xii. (1888) 271 = An if HI tjcoffjr peraviana, *Linn. Sp.Pl.m.-Am.* trop'
pilosa, *H. B. V K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 101.—Afr. trop.
pihsa, Pohl, ex Micheli, in Mart. Fl. Bras. xm. II. 166 pl u m S f t t *in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. (1881) 267.—Ins. Porto Rico.
polygonifolia, Willd. ex Stead. Nom. ed. II. i. 886 = *po^g'onoides,* H. B. ft K. Nov. Gen. et Sp. vi. 97-repens.

JTXS8EBUA:—
Potamogelon, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 301.—Am. trop.
Prienrea, *Guill. tf Perr. Fl. Sentg. Tent. i.* 294.—Afr. trop.
Pseudo-heterophylla, Salzm. ex Micheli, in Mart. FL Bras. xiii. II. 164=pilosa.
pterophora, Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xi. (1843) 13-decurrens.
pubescens, *Linn. Sp. PI.* ed. II. 665.—Am. calid.
pumila, GilL ex Hook. Bot Misc. iii. (1833) 312 = repens.
quadrangularis, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 802.—Am. trop.
racemosa, RottL ex DC. Prod. iii. 22-Lumnitzera racemosa.
ramosa, *Jacq. f. ex Reichb. Ic. Bot. Exot.* 64. n. 76 (1827).—Bras.
ramulosa, DC. Prod. iii. 64-repens.
repens, *Linn. Sp. PI.* 888.—Amphig. trop.
rigida, Miq. Stirp. Surin. Sel. 58-nervosa.
rigida, Poepp. ex Micheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 165 — affinis.
sagittata, Poir. Encyc. Suppl. iii. 198—Ammannia Tatifolia.
Sagraeana, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 634.—Cuba.
salicifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 99 = suffrnticosa.
scabra, Willd. Enum. Hort Berol. i. 449 •* suffruticosa
Schottii, *Micheli, in Flora,* lvii. (1874) 302.—Bras,
sedoides, *Humb. b* Bonpl. PI. Aequin.* i. 13. t. 8 A.—Am. trop.
sericea, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 260.—Bras.
sessi{li~\flora, [Moc. & Sesse], ex DC. Prod. iii. 65 - erecta.
stenophylla, *Gill, in Hook. Bot. Misc.* Iii. U833) 312.—Am. austr.
stolonifera, Guill. & *Ten.* Fl. Seneg. Tent. i. 292-repens.
subacaulis, Pursh, Fl. Am. Sept. L 304 - Oenothera heterantha.
suffruticosa, Griseb. ex Wright, in Jonm. Linn. Soc. x. (1869) 479-salicifolia.
suffruticosa, *Linn. Sy. PI.* 388.—Amphig. trop.
surinamensis, *Miq. in Linnaea,* xviii. (1844) 870.—Guian.
SliartMiana, DC. Prod. iii. 54-repens.
tenella, *Butm.f. Fl. Ind.* 103. t. 35. f. 5; *Linn. Mant.* ii. 288.—Java.
tenuifolia, Nutt ;n Am. Journ. Sc. v. (1822) 294 - deenrrens.
terminalis. Veil. Fl. Flam.'186; iv. t. 142 = anastomosans.
tetragona, Spreng. Syst. ii. 231 - suffruticosa.
tomentosa, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 254.—Bras.
torulosa, Am. in Ann. Sc. Nat. *Sit.* II. iii. (1835) 251, in textn = Oocarpon jussiaeoides.
nruguayensis, *Cambess. in St. Hil. Fl. Bras. Mer.* ii. 264.—Bras.
variabUis, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esscq. 174 = pilosa.
vclntina, *G. Don, Gen. Syst.* ii. 6US.—Afr. trop.
velntina, *Kunte, in Linnaea,* xx. (1847) 56.—Bras,
venosa, *Presl, Rel. Haenk.* ii. S3.—Mexic
veniiliginum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6383 - villosa.
verticillata, Bnrch. ex Micheli, in Mart Fl. Bras. xiii. II. 169-inclinata.
villosa. Lam. Encyc. iii. 831 = suffruticosa.
villosissima, PohJ, ex Micheli, in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 154-sericea.
Weddelii, *M heli, in Flora,* ML (1874) 801.—Am. trop.

JUSSIEUAEA, [Rottl. ex] DC. Prod. iii. 22 (1828)-praec

JUSSIEUIA, Houst. Reliq. 6. 1.15(1781)=. Jatropha, Linn. (Euphorb.).
herbacea, Honst. I. c.—J. urens.

JUSSIEUIA, Thunb. FL Jap. 180 (1784)-Juasieua, Linn. (Onagrar.).

JUSSIEVA, Glediuch, in Mem. Aead. Berol. v. (1751) 124-praec.

JUSSIEVIA, Linn. Syst. ed. II. 28 (174O)-preec.

JUSTICA, Neck. Elem. i. 830 (1790)-seq.

JTJ8TICIA, Honst. ex Linn. Gen. ed. I. 4 (1787).
ACANTHACEAE, Benth. & Hook. *t.* ii. 1108.
ADELODA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 61 (1836).
ADHATODA, Nees, in DC. Prod. xi. 884 (1847), partim.
AMPHISCOPIA, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 77, 112 (18321.
ANISOSTACHVA, Nees, in DC. Prod. xi. 868, 730 (1847).
ATHLIANTHUS, Endl. Gen. Suppl. ii. 63 (1842).
CAMPYLOSTEMON, E. Mey. ui Drege, Zwei FA. Docum. 170 (1843), nomen.
DIPLANTHERA, Schrank, PI. Rar. Hort. Monac. t. 62 (1819).
ECBOUUM, Riv. ex Linn. Syst. ed. I (1735).
EMULARIA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 68 (1836).
ETHESIA, Rafin. 1. c. (1886).
GENDARUSSA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 76, 108 (1832).
GEUNSIA, Neck. Elem. i. 331 (1790).
HARNIERIA, Solms, in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berl. (1864) 21.
HEMICHORISTB, Nets, in' Wall. PL As. Rar. iii. 76, 102 (1882).
LEPTOSTACHYA, Nees, in DC. Prod. xi. 376 (1847).
MEIOSFERMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 64 (1836).
MONECHMA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841; 374.
PETALANTHERA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 100 (1836).
RHAFIIIDOSPERMA, G. Don, in Sweet, Hort. Brit ed. III. 659 (18891.
RHAPHIDOSPORA, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 116 (1832).
ROSLINIA, Neck. Elem. i. 357 (1790).
ROSTEIXARIA, Nees, in Wall. PL As. Rar. iii. 76, 100 (1832).
ROSTELLUI.ARIA, Reichb. Handb. 190 (1837).
SAROTHECA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 113. 1.18 (1847).
SENKEBERGIA, Neck. Elem. i. 366 (1790).
TYLOGLOSSA, Hochst. in Flora, xxv. (1842), I. Beibl. 144.
abnormis, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 429, 482-Dicliptera Pohliana.
acanthi/olia, Willd. ex Nees, 1. c. 302-Aphelrndra Acanthus.
acanthoides, Willd. 1. c. = Barleria acanthoides.
acaulis, Linn. f. Suppl. 84 - Elytraria crenata.
acicularis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18 = Anthacanthus jamaicensis.
acinoides, Hort Kew. ex Nees, in DC. Prod. xi. 429, 498" Peristrophe caulopsila.
Ackermanni, Mart, ex Nees, I. c 429, 862-Rhytiglossa caracasana.
acuminata, Vahl, Knum. i. 151-Dicliplera acuminata.
acuminata, Wall. Cat. n. 2425 - Peristrophe acuminata, fera.
Adhatoda, Linn. Sp. PL 16 -Adhatoda Vasica.
Adhatoda, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 427 = Ecbolium Linneanum.
adscendens, R. Br. Prod. 476 = procumbens.
ajugoides, Buch.-Ham. ex Nees, in DC. Prod. xi. 66 - Nelsonia tomentosa.
alata, Heyne, ex Steud. Nom. ed. II. i. 887 -diffusa.
alata, Vahl, Enmm. i. 139 = Andrographis alata.
alia, Hort. Berol. ex Nees, in DC. Prod. xi. 731 = debilis.
alba, Roxb. Hort Beng. 3; FL Ind. i. 116 -= Eranthemum album.
albiflora. Illume, Bijdr. 787-Peristrophe albiflora.
amabilis, Wall. Cat Suppl. n. 71, 111 - Gymnostachyum venustum.
americana, Vahl, Symb. Bot. ii. 16 - Dianthera americana.
amaena, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 420-Beloperone plumliaginifolia.
amygdalina, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 196 — Adhatoda capensis.
Ana,eallis, Mart, ex Nees, in Mart. Fl. Brat. ix. 119 - Dianthera Anagallis.
anagalloides, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 42.—Afr. auslr.
andrographioides, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 584.—Burma.
androsaemi/olia.SitbcT, ex Nees, in DC.Prod. xi. 352 -Dianthera androsaemifolia.
angustifoUa, Pohl, ex Nees, 1. c. 839 - Dianthera angnstifolia.

JUSTICIA :—

anisacanthus, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xviii. (1868) 678.—Afr. trop.
annua, Steud. Nom. ed. I. 274, 447 - Dicliptera sexangularis.
Anselliana, T. Anden. in Jonm. Linn. Soc. vii. (1864) 44 = Dianthera Anselliana.
antidota, *Sm. ex T. Anders. 1. c.* 118 - J. Betonica.
antirrhina, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* xi (1823) 69.—Bras.
appendiculata, Vahl, Enum. i. 159 - Beloperone appendiculata.
appressa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 6 = Barleria Prionitis.
arborea, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7=Aphelandra tetngona.
argyrostacbya, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 510.—Burma.
aristata, Vahl, Symb. Bot. ii. 20 - Hypoëstes aristata.
aristata, Wall. Cat. n. 2481 = Monothecium aristatum.
armata, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 13 = Anthacanthus armatus.
Arrabidae, *Steud. Nom.* ed. II. i. 887.—Bras,
arvensis, *Steud. I. c.*—Bras.
aspera, Pen. ex Nees, ip DC. Prod. xi. 267 = Blepharis asperrima.
asperula, Lodd. Bot. Cab. t. 1681; Wall. Cat. n. 7171 — Phlogacanthus asperulus.
assamica, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 537.—Reg. Himal.
assurgens, Linn. Syst. ed. X. 850 = Dicliptera assnrgens.
Atheratonei, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 42.—Afr. austr.
Atkinsoni, *T. Anders. 1. c.* ix. (1S67) 509.—Reg. Himal.
atramentaria, Benth. PL Hartw. 69 = Jacobinia Mohintli.
atropnrpurea, *Dennst. Schluess. Hort. Matab.* 35.—Ind. or.
atrosanguinea, *Regel, Cat. PI. Hort. Aisaiov.* 78.—Hab.?
aurea, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 893 = Jacobinia aurea.
auriculata, Wall, ex Nees, in DC. Prod. xi. 191 - Sttobilanthes auriculatns.
ausiralis, Gill, ex Nees, 1. c. 395 = Adhatoda Gilliesii.
baphica, Spreng. Neue Kntdeck. iii. 82—Peristrophe tinctoria.
barbata, Bertol. in NOT. Comm. Acad. Bonon. iv. ^1840) 405 *(=A'hytiglossa barbata*—Guatemala.
barbata, Forst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 475 - Dicliptera Forsteriana.
barlerioides, Schott, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 97 -Thyrsacanthus barlericgles.
Barteri, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 39.—Afr. trop.
bengalensis, Spreng. Syst. i. 82 — Nelsonia campestris.
Betonica, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 509—trinervia.
Betonica, *Linn. Sp. PI.* 16.—As. et Afr. trop.
betonicaefolia, Hort. Berol. ex Nees, in DC. Prod. xi. 430= J- Betonica.
bibracteata, Wall. Cat. Suppl. n. 157 — Peristrophe tinctoria.
bicalyculata, Vahl, Symb. Bot. ii. 13 - Peristrophe bicalyculata.
bieolor, Sims, Bot. Mag. t. 1423 = Eranthemum bicolor.
bifiora, Hort. ex Nees, in DC. Prod. xi. 430=furcata.
kiflora, Lam. Encyc. i. 629 - Anisotes trisulcus.
biflora, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 9.—Ind. or.
bispinosa, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 6 — Barleria bispinosa.
bivalvis, Linn. Syst. ed. X. 850=Dicliptera bivalvis.
bivalvis, Roxb. Hort. Beng. [80]; Fl. Ind. iii. 124» Beristrophe commutata.
blepharopkylla. Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 459 - Chameranthemum Beyrichii.
blepharostegia,E. Mey. in Drège, Zwei Pfl.Docnm. 195 -debilis.
Blnmeana, *Klottsch, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 374.—Java,
boerhaaviaefolia, 7'. *Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 517.—Burma.
bonariensis, Gill, ex Nees, in DC. Prod. xi. 395 - Adhatoda Tweediana.
Bonneyana, *F. Muell. in Wing, South Sc. Record,* ii. (1882) 74.—Anstral.
brachiata, Hook, ex Nees, in DC. Prod. xi. 475 - Dicliptera ciliaris.

JUSTICIA :—

brachiata, Pursh, Fl. Am. Sept. i. IS = Dicliptera brachiata.
brachiata, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 105 = Thyrsacanthus nitidus.
irocAiara.Roth.exRoem.&Schult. Syst. i. 167 =glauca.
brachiata, Salzm. ex 'Nees, in DC. Prod. xi. 478 = Dicliptera mucronifolia.
braehiata,Yaung, ex Nees, 1. c. 346 = Gatesia laetevirens.
braehiides, Roem. ft Schnlt Syst. i. 167=glauca.
brachionodes, Spreng. Syst. i. 82=glauca.
brachystachya, *Thou, ex Schult. Mant.* i. 146.—Ins. Maurit.
bracteata, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 367 - Herpetacanthus melancholicus.
bracteolata, Jacq. Coll. iii. 25.3 - Thyrsacanthus bracteolatus.
bracteolata, Willd. Enum. Hort. Berol. 26-Thyrsacanthus nitidus.
Brandisii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 514 — Burma.
brasiliana, Roth, Sp. PI. Nov. 17 = Dianthera nodosa.
brasiliensis, Veil, ex Nees, in DC. Prod. xi. 480 = Amphiscopia Beyrichii.
brevicaulis, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 341. —Afr. trop.
brunelloides, Lam. Tabl. Encyc. i. 40 — Nelsonia campestris.
Burchellii, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 80.-Bras,
bnrmanica, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ir. 527.—Burma.
caerulea, Aoct. vide *coerulea.*
caerulea, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 5.—Arrb.
calcarata, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 73 — neglecta.
calcarata. Wall. PI. As. Rar. ii. 9. t 113-Rhinacanthus calcaratus.
callistachya, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 370 = Thyrsacanthus callistachyus.
callitricha, *Lodd. Bot. Cab.* 1.1921.—Bras.?
caloneura, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 96.—Burma.
calycotricha. Link & Otto, Ic. PI. Sel. 113 t. 53 = Schaueria calycotricha.
calytricha, Hook. Exot Fl. t 218 = Schaueria calycotricha.
campestris, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 225.—Reg. Argent.
campylostemon, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 44.—Afr. austr.
cancellata, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 506 - Hypoëstes cancellata.
canescens, Lam. Tribl. Encyc. L 41 - Nelsonia campestris.
canescens, Wall. Cat n. 2423 - Dicliptera Roxburghiana.
capensis, Kckl. ex Nees, in DC. Prod. xi. 498 = Peristrophe caulopsila.
capensis, E. Mey. ex Nees, 1. c. 393 = Adhatoda incana.
capensis, *Thunb. Prod. PI. Cap.* 104.—Afr. austr.
caracasana, Jacq. ColL iv. 116 - Beloperone caracasana.
caracasana, Sieber, ex Nees, in DC. Prod. xi. 388 - Adhatoda Vasica.
caracasana, Willd. ex Nees, 1. c 340 •= Dianthera secunda.
Carayana, Newm. ex Nees, 1. c. 328 -= Graptophyllum hortense.
Carcyana, *Roxb. Hort. Beng.* 4, nomen.—Ind. or.
Carey ana. Wall. Cat. n. 2456=glabra.
caripensis, H. B. & K. Nov. Gin. et Sp. ii. 233 - Dianthera secunda.
cornea. Hook. Bot. Mag. t. 3383 *{-Cyrtanthera magnifica).*—Bras.
carnea, Hook, ex Nees, in DC. Prod. xi. 320 *{-Pachystachys asperula).*—Ins. Trinit
carthagenensis, Benth. ex Nees, 1. c. 409-Adhatoda sphaerosperma.
carthagenensis, Nees *Sc* Mart in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 56 *(-Adhatoda felisbertiana).*—Bras.
carthagenensis, Willd. ex Nees, in DC. Prod, xl 466 — Blechum Linnaei.
carthaginensis, Jacq. Enum. PI. Carib. 11 = Beloperone violacea.
carthaginensis, Vahl, Enum. i. 136 — Beloperone Lamarckiana.
caulopsila, E. Mey. in Drège, Zwei PA. Docum. 195 • Peristrophe caulopsila.

JUSTICIA :—

cavernarnm, *F. MueH. Fragm.* vi. 91.—Austral.
Cephalotes, Herb. Berol. ex Link, Jahrb. i. III. 48 - Lepidagathis hyalina.
ceylanica, *T. Anders, in Thw. Enum. PI. Zeyl.* 233.—Zeylan.
Champibni, *T. Anders, ex Benth. Fl. ftongk.* 264.—China.
charthaginensis, Linn. Sp. PI. ed. II. 1668, App. = Beloperone violacea ?
chelionida, *Rafin. Fl. Ludov.* 39 (Quid?).—Am. bor.
chinensis, Burm. f. Fl. Ind. 8. t. 4. f. 1 = Dicliptera Leonotis.
chinensis, Linn. Sp. PI. 16-Dicliptera chinensis.
chinensis, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 509 - Hypoëstes purpurea.
chinensis, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 124 - Dicliptera Roxburghiana.
chinensis, Vahl, Symb. Bot. i. 4 - Dicliptera micranthes.
chinensis, Wall. Cat. n. 2466 = Dicliptera Leonotis. Roxburghiana, Hypoëstes triflora.
chloroptera, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883 222.—Madag.
chrysotricha, *Benth. V Hook. f. Gen.* ii. 1109.—Am. trop.
chrysotrichoma, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 408 = Adhatoda chrysotrichoma.
ciliaris. Linn. f. Suppl. 84 = Schwabea ciliaris.
ciliaris, Russ. ex Nees, in DC. Prod. xi. 470-Rsngia iwrvinora.
ciliata, Jacq. Hort. Vindob. ii. 47 = Schwabea ciliaris.
ciliata, Pers. Syn. i. 23 - Beloperone ciliata.
dnerascens, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 332 = Jacobinia pubescens.
clandestina, Russ. ex Wall. Cat. n. 2482 - Andrographis elo^gata.
clavata, Vahl, Enum. i. 146—Dicliptera clavata.
deomoides, *S:Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 313. —Afr. trop.
clinopodia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 195 = Dicliptera clinopodia.
coccinea, Aubl. PI. Gui. i. 10=Jacobinia coccinea.
coccinea, Cav. Ic. ii. 77 = Anisacanthus virgnlaris.
coccinea, Forsyte, ex Nees, in DC. Prod. xi. 341 = Dianthera secunda.
coccinea, Gouan, ex Nees, 1. c. 398-Adhatoda l&iospennifolia.
coccinea, Hort. Berol. ex Nees, 1. c. 431,729 *{-Pachystachys latior).*—Guian.
coccinea, Hort. Monsp. ex Nees, 1. c 415— Adhatoda tetramera.
coccinea, Luschn. ex Nees, 1. c. 420 - Beloperone plumbaginifolia.
coccinea, Willd. ex Nees, 1. c. 320 (= *Pachystachyi asperula).*—Ind. occ.
coerulea, Poirt Encyc. Suppl. ii. 106 = Dicliptera pubescens.
coerulea, Steud. Nom. ed. II. i. 837 = Rungia parviflora.
coltlna, T. Anders, in Joum. Linn. Soc. ix. (1867) 515 =• Dianthera collina.
colorata, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 446 - Eranthemum nervosum.
comata, Lam. Encyc. iii. 632 ; Vahl, Symb. Bot. ii. 15 — Dianthera comata.
comata, Veil, ex Nees, in DC. Prod xi. 432-Adhatoda enneata.
comosa, DC. ex Nees, 1. c. 415 • Beloperone Rohrii.
comosa, *Vahl, Enum.* i. 155.—Am. austr.
confertiflora, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 817 - Schaueria lachnostachya.
consanguinea, Nees, 1. c. 432 - Strobilanthesexareolatus.
conspicua. Wall. Cat. n. 3460 - Barleria conspicua.
convexa, K. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 195 - Adhatoda protracta.
cordata, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 44.—Afr. trop.
cordifolia, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2482 = Andrographis elongata.
corymbosa, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 600 = glabm.
corymbulosa, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. iv. (184O)4O4(- *Rhytiglossa corymbulosa)* — Guatemala.
costata. Mart, ex Nces, in DC. Prod. xL 87, 432 - Hygrophila longifolia.
crenata, 1'ohl, ex Nees, 1. c. 419-Dianthera nodosa.
crenulata, Polil, ex Nees, 1. c. 313-Chdetothylax tocantinus.
crinita, DC. ex Nees, 1. c. 444 = Sericospora crinita.

JUSTICIA:—
crinita, Thunb. Fl. Jap. 20-Dicliptera Roxburghiana.
crispata, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 356 = nummularia.
cristata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 88 = Aphelandra tetragona.
cristata, *Pohlfex Nees, in DC. Prod.* xi. 358.—Bros,
cuneata, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 10.—Afr. anstr.
cuneata, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 392 = Adhatoda thymifolia.
cuneifolia, Hook, ex Nees, 1. c. 461=Anthacanthus cuneatus.
cnneifolia, *Nees V Mart, in Nov. Act. Nat. Cur.* i. (1823) 58.—Bras.
cuneiformis, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 898= Adhatoda cuneata.
cuneiformis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. ISO=cuneifolia.
curviflora, Wall. PI. As. Rar. ii. 9. t 112 = Phlogacanthus curviflorus.
cuspidata, Pers. Syn. i. 23 = Dicliptera peruviana.
cuspidata, Vahl, Symb. Bot. ii. 9 = Dicliptera micranthes.
cydoniifolia, *Griseb. Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1878) 8—Hab.?
cymosa, Herb. Madr. ex Nees, in DC. Prod. xi. 482 = glabra.
eynanchilblia, *R. Br. ex Nees, 1. c.* 442.—Abyss.
Dahona, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 2442 = J. Gendarussa.
Dalaora, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 14 = Peristrophe Dalaora.
dasycarpa, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 96.—Burma.
dasyclados, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 351-Dianthera dasyclados.
debilis, *Lam. Encyc.* iii. 638; *Vahl, Symb. Bot.* ii. 16.—Arabia.
decussata, *Roxb. Hort. Beng.* 4; *Ft. Ind.* i. 127.—Burma.
dentata, Klein, ex Link, Jahrb. i. III. *8-Ecbolium Iinneannm.
denticulata, Klein, ex Nees, in DC. Prod. xi. 428-dentata.
depauperafa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 40.—Afr. trop.
dianthera, Veil. Fl. Flum. IS ; i. t. 82-Beloperone plumbaginifolia.
dic&toma, Blume, Bijdr. 788-Dianthera dichotoma.
dichotoma, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2455=glabra.
dichotoma, Rottl. in Ges. Naturf. Fr, Neue Schr. iv. (1803) 221-Rhinacanthus communis.
diffusa, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2443-quinque-angularis.
diffusa, Sm. ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 117-Lepidagathishyalina.
diffusa, *Willd. Sp. PI.* i- 87.—Geront- t">P-
divaricata, Herk Madr. ex Wall. Cat. n. 2492= Daedalacanthus montanus.
divaricata, Roein. & Schult. Syst. >. 16S=capensis.
divaricata, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 391, 482 ^Adhatoda divaricata.
divaricata, Zcyh. ex Nees, 1. c. 386=Dianthera ciliata.
Dohana, Buch.-Ham.-Cf. Wall. Cat. n. 2442. f. = T. Gendarussa.
dubia, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p, cu—Arab. Fel.
dubia, Rafin. All. Joum. 146 (Quid?).-Am. bor.
Ecbolia, St. Lae. in Ann. Soc. Bot. Lyon. vu. (1880) 128 boli n Linneanum.
&W.CJ^m.n1o, Fl. Filip. ed.* 13=Graptophyllum hortense.
Ecbolium, Linn. Sp. PL 15=Ecbolium Linneanum.
Bcbolium, Wall. Cat. n. 2432-denial...
Kchegarayi, *Hieron. in Bol. Acad. Nac. Cirdova,* lv. (1881) 61.—Reg. Argent.
reA.Bo.Vfcs, Crantz, Inst. 1.642 = seq.
echioides, Linn. Sp. PI. 16 = Andrographis echioides.
Bdgeworthii, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. *a.* (1867) 516=pubigera.
*clegans,b<x*u.* Fl. Owar. 88-Eranthemum <£g™>-
elegans, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 382 = Sarotheca clepiins,
elegaSs, *Poir. Encyc. Suppl.* ii. 112.-A&. trop.
'longata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. sub n. 2494 = Daedalacanthus strictus.
'longata, Vahl. Enum. i. 130-Andrographu elongata.
emarginata, Nees, in DC. Prod. xi. 427-Ecbohum Linneanum.
ensiformis, Ell. Sketch, i. 11 = Dianthera americana.
eranthemoides, *F. Muell. Fragm.* vi. 90.—Austral.

JTJ8TICIA:—
eriandra, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 287-Geissomeria nltida.
eustachiana, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 11.—Ind. occ.
eustachiana, Ker-GawL in Bot Reg. t. 309-Keriana.
eustachiana, Sims, Bot. Mag. t. 2076-Chaetothylax eustachyana (in addend.).
eustachiana, Vahl, Symb. Bot ii. 16-Dicliptera Vahliana.
extensa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 44.—Afr. trop.
falcata, Lam. Encyc. i. 629 = Dicliptera laevigata.
fasciata, *E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* 196.—Afr. austr.
fasciculata, Nees, in DC. Prod. xi. 467 = Eranthemum Haenkeanum.
fasciculata, Russ. ex Wall. Cat. n. 2482 - Ecbolium Linneanum.
fastigiata, Lam. Illustr.i. 41 = Daedalacanthus montanus.
fastuosa. Linn. Mant. ii. 172; Vahl, Symb. Bot. i. 2 = Hypoëstes fastuosa.
filiformis, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 483, 211 = Ruellia pedonculosa.
fittonioides, S. *Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 184.—Afr. trop.
flaccida, *Kun, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. (1870) II. 80.—Burma,
flagelliformis, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 535.—Burma,
flava, *Kurt, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) II. 97.—Burma.
flava, Vahl, Symb. Bot. ii. 15-Barleria flava.
flavicoma, Lindl. Bot. Reg. t. 1027-Schaueria calycotricha.
flexibilis, Boj: ex Nees, in DC. Prod. xi. 505 = Hypoestes flexibilis.
fluminensis, *Steud. Norn.* ed. II. i. 888.—Bras.
foetida, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 5 = Dicliptera bivalvis.
foliolosa, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 196-Adhatoda csneata.
foliolosa, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 432 = Adhatoda cuneata.
foliosa, Jacq. ex Steud. Norn. ed. II. i. 888 = furcata.
formosa, Donn, Hort. Cantab, ed. III. 6 — Beloperone formosa.
formosa, Willd. Enum. Hort. Berol. i. 28-Adhatoda tetramera.
FonskUei, Vahl, Symb. Bot. i. 2; ii. IS «= Hypoëstes Fbrskalei.
Forskohlii, R*. Br. ex Steud. Norn. ed. II. i. 838 = pracc.
Forskohlii, Yii\li. ex Nees, in DC. Prod. xi. 50» = Hypoëstes purpurea.
fragilis, *Dennst. Schluess. Hort. ttalab.* 32.—Ind. or.
fragilis, *Wall. Cat.* n. 7174.—Burma.
frondosa, Vahl, Symb. Bot. ii. 8 = Dicliptera frondosa.
fruticosa, *Mill. Gard. Did.* ed. VIII. n. 3.—Am. centr.
fulgida, Blume, Bijdr. 784=Clinacanthus Burmanni.
fuhicoma, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 860 = Beloperone comosa.
furcata, *Jacq. Hort. Schoenb.* i. 2. t. 8.—Mexic.
furcata, Lam. Encyc.i. 631-Ruellia paniculata.
Gandarussa, Linn. f. Suppl. 85-J. Gendarussa.
gangetica, Linn. Cent. PI. ii. 8; Amoen. Acad. iv. 299 — Asystasia coromandeliana.
Gendarusa, Blanco, Fl. Filip. t. 11 = Eranthemum bicolor.
Gendarussa, *Burm.f. Fl. Ind.* 10,—As. trop.
Gendarussa, Macrae, ex Nees, in DC. Prod. xi. 443 = Rhinacanthus communis.
geniculata, Sims, Bot. Mag. t 2487 = Dianthera secunda.
geniculata. Veil. FE Flum. 18; i. t. 31-Beloperone longipetiolata.
geniculata, Wall. Cat. n. 2448-peploides.
genuflexa, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xi. (1823) 57 (- *Rhytiglossa genuflexa).*—Bras.
Ghiesbreghtiana, Lem. in Fl. des Serres, Ser. I. iii. (1847) 242 verso—Jacobinia Ghiesbreghtiana.
Ghiesbreghtii, Hort. ex Lem. 1. c. iv. (1848) 889 -praec.
Gilliesii, *Benth. V Hook. f. Gen.* il. 1109.—Reg. Argent,
glabra. *Keen, ex Roxb. Hort. Beng.* 4; *Fl. Ind. ed. Carey,* i. 132.—Ind. or.; Malaya.
glabrata, Rottl. ex Wall. Cat. n. 2455 C-glabra.
glandulifera, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 336 (=*Rhytiglossa origanoides).*—Afr. anstr.
glandulosa, Pohl, ex Nees, 1. c. 405 = Adhatoda glandulosa.

JTTSTICIA. :—
glandulosa. Roth, Nov. PI. Sp. 13 = AndrographU Rothii.
glandulosa. Wall. Cat. n.2485=Aadrographis elanaulosa.
glauca, Heyne, ex Wall. 1. c. sub n. 2424-tranquebariensis.
glauca, *Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1802) 219.—Ind. or.
glomerata, *Blume, Bijdr.* 786.—Java.
glomerata, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 418-Beloperone glomerata.
gonystachya, Nees' & Mart in Nov. Act. Nat Cur. xi. (1823) 52 -Schaueria gonyostachya.
graciliflora, Wall. Cat. n. 2427 - Eranthemum graciliflorum.
gracilis, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867 • 612 = Rungia linifolia.
gracilis, Lyall, ex Nees, in DC. Prod. xi. 606 = Hypoëstes gracilis.
graminea, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 134 -• Kostellaria qninqueangularis.
graminea, Russ. ex Nees, in DC. Prod. xi. 376-diffusa.
grandiflora, Dum.-Cours. Bot Cult ed. II. ii. 569 -= Adhatoda tetramera.
grandifolia, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 510.—Burma.
Griffithii, T. Anders. I.e. 516 = Dianthera Griffithii.
grossa, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 535.—Burma.
guttata. Wall. PI. As. Rar. i. 24. t. 28 - Phlogacanthus guttatus, asperulus.
gymnostachya, Nees, in DC. Prod. xi. 426 — Ecbolium Linneanum.
haematodes, Schlecht. in Linnaea, vii. (1882) 394 = Glockeria haematodes.
haplostachya, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 40.—Madag.
hedyotidifolia, Wall. Cat. n. 2450-diffusa.
Helferi, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 533.—Burma,
heterocarpa, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 41.—Ind. occ.; Abyss.
heterophylla, Schlecht in Linnaea, v. (1880) 95-Jacobinia heterophylla.
heterostcgia, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 195-Dicliptera heterostegia.
hexangularis, Roem. & Schult. Syst. i. 168 in syn.-Dicliptera chinensis.
hirsuta, Homem. ex Nees, in DC. Prod. xi. 183 ^ Strobilanthes hirta.
hirsuta, Jacq. Enum. PI. Ciirih. ll.=Gonzalea spicata.
hirsuta, Pers. Syn. i. 23 -inficiens.
hirsuta, *Span, in Linnaea,xv.* (1841) 327.—Ins. Timor.
hirsuta, Vahl, Symb. Bot. ii. 8 - Nelsonia campestris.
hirtella, Wall. Cat. n. 2448=procumbent.
hispida, Heyne, ex Wall 1. c. sub n. 2449 - simplex.
hispida, Willd. Sp. PI. i. 84 = Eranthemum hispidnm.
honamoriensis, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2491 A = Eranthemum malabaricum.
Hookeriana, *T. Anders, in Thu. Enum. PI. Zeyl.* 238.—Zeylan.
humifusa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 14 - Dianthern comata.
humilis, Green, ex Nees, in DC. Prod. xi. 344-Dianthera comata.
humilis, Michx. M. Bor. Am. i. 8-Dianthera ovata.
humuliflora, Nees & Mart, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 53 = Schaueria humuliflora.
hygrophiloides, *F. Muell. Fragm.* vi. 89.—Austral.
hyiocrateriformis, Vahl, Enum. i. 165 =• Eranthemum hypocrateriforme.
hyssopifolia, Gouan, ex Nees, in DC. Prod. xi. 445^ Anisacanthus virgularis.
hyssopifolia, *Linn. Sp. PI.* If..—Ins. Canar.
Hystrix, Lam. ex Nees, in DC. Prod. xi. 248 - Barleriola solanifolia.
imbricJta, Pohl, ex Nees, 1. c. 294 (- *Strobilorhachh prismatica).*—Bras.
imbricata, Vahl, Kclog. Am. i. 1 - Elytraria tridentata.
inaequalis, Benth. PI. Hartw. 80 = Dianthera inoequalU.
incana, 7'. *Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 42.—Afr. austr.
inconspicua, *Wall. Cat. n.* 2475.—Penang.
inficiens, *Vahl, Fnum.* i. 161.—Peruv.
infracta, Vahl, 1. c. 155=Rungia parviflora.

JXTSTICIA:—
infundibuliformis, Linn. Syst. ed. X. 850=Crossandra undulaefolia.
insnlaris, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1861) 40.—Afr. trop.
intercepta, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 195 (— *Rhytiglossa ciliata).*— Afr. austr.
interrupts, Blanco, ex Nees, in DC. Prod. xi. 434 - Dicliptera interrapta.
interrupta, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 232 - Thyrsacanthus interruptus.
involucrata, Koxb. ex Koem. & Schult. Syst. ii. 141 - Hypoëstes involucrata, Peristrophe tinctoria.
jalappaefolia, Vahl, Enum. i. 160=Peristrophe jalappaefolia.
japonica, Thunb. Fl. Jap. 20-procumbens.
javanica. Lam. Encyc h. 633 = Peristrophe undulata.
juncea, R. Br. Prod. 476 = procumbens.
juncea, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. ed Carey, i. 184 = quinqueangnlaris.
juncea, Rnss. ex Nees, in DC. Prod. xi. 876-diffusa.
Kempcana, *F. Muell. Fragm.* xi. 101.—Austral.
Keriana, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 328.—Ind. or.
khasiana, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 587.—Reg. Himal.
Kirkiana, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 39.—Afr. trop.
Klotischiana, Hoffm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 328 - Graptophyllnm hortense.
Knrzii, *C. B. Clarke, in Hook.f.Fl. Brit. Ind.* iv. 627. —Burma.
ladanoides, DC. ex Nees, in DC. Prod. xi. 434 - Dicliptera Vahliana.
ladanoides. Lam. Tabl. Encyc. i. 42=Adhatoda lithospermifolia.
laeta, Mart, ex Nees, in DC. Prod. xi. 350 = Dianthera laeta.
laeta, £. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 311 Afr. trop.
laetevirens, Buckl. in Am. Journ. Sc. xlv. (1843) 176 - Gatesia laetevirens.
laetevirens, Vahl, Enum. i. 118— Ecbolium Linneanum.
laevigata, Vahl, Symb. Bot. ii. 9 = Dicliptera javanica.
lamifolia, Koen. ex Roxb.- Hort. Beng. 4; Fl. Tnd. i. 134 - Nelsonia campestris.
lancea, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 838.— Japon.
lanceata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 6 - Barleria noctiflora.
lanceolaria, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 121 = Peristrophe lanceolaria.
lanceolata,yiees,m DC. Prod.xi. 240 - Barlerianoctiflora.
lapathifolia, Vahl, Enum. i. 126-Eranthemum lapathifolium.
latebrosa, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 80; Fl. Ind. i. 125—Dicliptera parvibracteata.
latebrosa, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit Ind. iv. 551-Dicliptera cuneata.
latebrosa, Rnss. ex Wall. Cat. n. 2454=Andrographis paniculata.
lateritia, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 420" Beloperone plnmbaginifolia.
latifolia, Vahl, Symb. Bot. ii. 4 = Eranthemum malabaricum.
lavandulaefolia, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 348 (= *Rhytiglossa lavandulaefolia).*—Bras,
laxa. *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 43.— Afr. trop.
laxiflora, *Blume, ex Steud. Norn.* ed. II. i. 838 (Quid ?). —Java
Lazarus, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 313.— Afr. trop.
leptantha, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 44.-Madag.
leflospermifolia, DC. ex Nees, in DC. Frod. xi. 485 = Dicliptera Vahliana.
leptostachya, Wall, ex Nees, 1. c. = Gymnostachyum leptostachyrm.
leucantha, Blanch, ex Nees, 1. c. 435, 452 = Eranthemnm albiflorum.
lencantha, *Schrank.in Syll. Xatisb.* i. (1824) 228.—Bras.
leucophloea, Nees, in Mart Fl. Bras. ix. 129 *{-Rhytiglossa leucophloea).*—Bras.
ligularis, Salisb. ex Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 86 - quadrifida.
ligulata, DC. ex Nees, in DC. Prod. xi. 435 = Dicliptera resupinata.
ligulata, Lam. Encyc. i. 632 - Peristrophe bicalyculata.
ligustrina, Vahl, Enum. i. 118—Ecbolium Linneanum.

•TTJBTICIA :—
Linaria, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 42.—Afr. austr.
linarifolia, Vahl.ex Nees, in DC. Prod. xi. 876 - difiusa.
Lindeni, T. Anders, in Joum. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 280 = Beloperone violacea.
Lindeni, Houllet, in Rev. Hortic. (1870-71) 250 - Jacobinia Lindeni.
linearifolia. Lam. Encyc. iii. 632; Tabl. Encyc. L 41 — Dianthera americana.
lineata, Pers. Syn. i. 18-lineolata.
lineata, Wight, ex Wall. Cat. n. 2486-wynaadensis, Andrographis viscosula, A. lineata.
lineolata, *Ruia & Pan. Fl. Per.* i. 9. t. 13. f. a.—Peruv.
Kn»y««a, Heyne, in Wall. Cat. n. 2447 - Rungialinifolia.
lithospermifolia, Hort. Par. exoNees, in DC. Prod. xi. 485 = Dicliptera resupinata.
lithospermifolia, Jaeq. ex Nees, in DC. Prod xi. 474 • Dicliptera resupinata.
lithospermifolia, Jacq. Hort. Schoenb. i. 3. t. 4=Adhatoda lithospermifolia.
lithospermifolia, *Roth, Catalect. fasc.* iii. 1.—Hab.?
lithospermifolia, Vahl, Enum. i. 151 - Hygrophila guianensis.
livida, Nees, in DC. Prod. xi. 427=Ecbolium Linneanura.
lobelioides.WM. Cat.n.2484 - Andrographis lobelioides.
lolioides, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 310. —Afr. trop.
Itngepetiolata, Schott, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 187-Beloperone longepetiolata.
longiflora, Heyne, ex Walk. Cat. n. 2468 - Peristrophe montana.
longiflora, Vis. Sem. Hort. Patav. (18391.—Cf. Linnaea, xiv. (1840) Litt. 136=Jacobinia longiflora.
longifolia, Balb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 898 - Adhatoda reflexiflora.
longifolia, Forst f. Prod. 13-Anthacanthus repandus.
longifolia, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2437 = montana.
longifolia, Vahl, Symb. Bot. ii. 4=Adhatoda longifolia.
longiracemosa, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, Se>. I. iii. (1847) 240 - Eranthemum coccineum.
longistaminea, Poepp. ex Nees, in DC. Prod. xi. 211 — Ruellia pedunculosa.
longistaminea, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 8-Thyrsacanthus longistaminens.
longistylus, Gill, ex Nees, in DC. Prod. xi. 395 - Adhatoda Gilliesii.
Lonreiriana, *Nees, I. c.* 428.—Cochinch.
lucens, *Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 80.—Bras.
lucida, Andr. Bot. Rep. t. 813 - Dianthera secunda.
lucida, Hort. BeroWx Nees, in DC. Prod. xi. 435, 729 = Thyrsacanthus nitidns.
lupulina, Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 111, in syn.= Blechum Brownei.
lupulina, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docnm. 195 = Adhatoda lupulina.
lutea, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 104 - Schaueria snlfurea.
lutea, Ruiz & Pav. ex Schult Mant i. 146 *(—Pachystachys lutea).—Him.*
lythroides.Tohl, ex Nees, in DC. Prod/xi. 814, 485 - Chaetothylax lythroides.
Macdonaldi, Hort. ex Regel, Cat PI. Hort Aksakov. 78=Jacobinia aurea,
macilenta, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docuzn. 196 - Rhinacanthns communis.
macrantha, Benth. PI. Hartw. 78 - Jacobinia macrantha.
nuurophylla, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 105 — Schaueria macrophylla.
nuurophylla, Spreng. Syst. i. 79 =• Aphelandra sqnarrosa.
maculata, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 88.—Afr. trop.
maculata, *Lodd. Bot. Cab.* t. 626.—Hab. t
maculata, *Perr. in Mlm. Soc. Linn. Par.* iii. (1825) 123.—Java.
maculosa, Boj. ex Nees, In DC. Prod. xi. 604 - Hypoëstes maculosa.
madurensis, Burm. f. Fl. Ind.9-Calophaneslittoralis.
magnified, Pohl,. ex Nees, in DC. Prod. xi. 329 (= *Cyrtanthera magnified).*—Bras.
Maingayi, *C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.* iv. 684.—Ins. Penang.
major, 7. *Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 39. —Abyss.
malabarica, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 27 - Peristrophe bicalyculata.

JXTSTICIA:—
Mannii, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 44. —Afr. trop.
Marrubiastrum, Blanch, ex Nees, in Mart Fl. Bras. ix. 22 = Hygrophila costata.
martinicensis, Jacq. Enum. PI. Carib. 11--Dicliptera martinicensis.
martinicensis, Sieber, ex Nees, in DC. Prod. xi. 466 " Blechum Brownei.
masuta, Steud. Nom. ed. II. i. 888, sphalm. - *nasuta.*
matammensis, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 130 —Afr. trop.
mauritiana, Thou, ex Schult. Mant. i. 146=glabra.
media, R. Br. Prod. 476 = procumbens.
megaphylla, Pohl, ex Sees, in Mart. Fl. Bras. ix. 14 = Clistax speciosus.
melgariensis, Humb. & Bonpl. ex Schult. Mant. i. 146 —Aphelandra melgariensis.
membranacea, Rich, in Act. Soc Hist. Nat. Par. i- (1792) 105-polystachya.
meysorensis, Klein, ex Nees, in DC. Prod. xi. 106= Calophanes Nagchana.
micrantha, *Heyne, ex Wall. Cat.* n. 2449.—Ind. or.
micrantha, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 408 - Adhatoda adenostachya.
micranth'u, Wall. Cat. n. 2449, partim=procumbens.
microphylla, Lam. Illustr. i. 37 - Anthacanthus microphyllus.
micrpphylla, Pohl, ex NeeF in DC. Prod. xi. 424* Beloperone involucrata.
minor, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 39. —Abyss.
mirabiloides, Lam. Tabl. Encyc. i. 39 = Beloperone Lamarckiana.
misera, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 354 = Dianthera longiflora.
Moctli, Setie, ex Nees, 1. c. 486—Jacobinia Mohintli.
Mohintli, Moc, & Sesse, ex Nees, 1. c. 361-Jacobinia Mohintli.
mollis, *E. Mey. in Drlge, Zwei Pfl. Docum.* 196.—Afr. austr.
mollis, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 486 « Dianthera rigida.
mollissima. Wall. Cat. n. 2445-simplex,
monechmoides, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 311.—Afr. trop.
montana, Roxb. Corom. PI. ii. 41. t. 176-DaOflalacanthus montanus.
montana. *Wall. Cat.* n. 2471.—Ind. or.
Moretiana, *Burm.f. Fl. Ind.* 10; *Vahl, Enum.* i. 162. —Zeylan.
mossamedea, 5, *Moore, m Journ. Bot.* xviii. (1880) 312.—Afr. trop.
xiucronata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 8.,t. 10. f. b = Aphelandra mucronata.'
multiflora, Vahl, Enum. i. 160 = Dicliptera multiflora.
mysorensis, klein, ex Schult. Mant. i. 146 = Calophanes Nagchana.
nasuta, Linn. Sp. Fl. 16—Rhinacanthus communis.
natalensis, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii; (1864) 88.—Afr. austr.
Neesiana, Mart, ex Nees, in DC. Prod., xi. 883 - Harpochilus Neesianns.
Neesiana, *Wall. Cat.n.* 7175.—Reg. Himal.
neglecta, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 40.—Afr. trop.
neilgherrensis, Auct. vide nilgherrensis.'
nemorosa, Bert, ex Nees, in DC. Prod. xi. 468 = Tetramerium nervosum.
nemorosa, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 14 - Beloperone nemorosa.
Nepeta, 5. *Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 812.— Afr. trop.
nervosa, Vahl, Enum. i. 164=Daedalacanthus nervosns.
nigricaus, *Lour. Fl. Cochinch.* 24.—Cochinch.
nilgherrensis, *Wall. Cat.* n. 2435.—Ind. or.
nitida, Nees, in DC. Prod. xi. S28=Graptophyllum hortense.
nitida, Jacq. Enum. PI. Carib. 11-ThyrsacanthnS nitidus.
nitida,Hees & Mart, in Nov. Act. Nat Cur. xi. (1823) 56—Schaueria Maximiliani.
nodicaulis, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 4.20* Beloperone nodicaulis.
Kodosa, Hook. Bot. Mag. t. 2914-Dianthera nodosa.
notha, *C. B. Clarke, in Hook.f. fl. Brit. Ind.* iv. 53?. —Ind. or.
nummularia, *Mart, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 356.—Bras-

JUSTICIA:—

nummularifolia, Vahl, Enum. . 122=Nelsonia c[a]pestris.
nummularifolia, Wall. Cat. . 2461-Andrograj[is] serpyllifolia.
nutans, Burm. t FLInd. 10.: 6. f. 1-Clinacanl[a]
"RwrapaMiiMB
oblongata, Link&Ottb, PI.$e 115.154-BelopeH plmnbaginifoUa.
achroleuca, Blume, Bijdr. 78* J. Betonica.
^cymMet Lam. Encyc. L 63=lMcliptera micranii X ! », Lam. Encyc. i. 629=dhatoda odo*,
odora, *Vahl, Symb* Bot. h.:.—Anb.
odoratissima, *Ho)*, ex Nee in DC. Prod. xi. 44. Rhinacanthus osmospermi
olearfolia, Schlecht. ex les, 1. c. 391=Adhat,; capensis.
ongylantha, Pohl, ex Nees c. 389=Adhatoda cyi niaefolia.
opaca, Vahl, Enum. L 18SBarleria opaca. (18
or[illegible], T. Anders, intura. Linn. $oc. ix. 612, partim-simplex.-
orbiculata, Wall. Cat. J^489 -diflusa, Eranthemu[m] malaccense.
orchidea, E. Mey. ex is, in DC. Prod. xi. 894, Adhatoda orchioides.
orchiunaes, [illegible] Clarke, in Hook. f. Fl. Bs[r] Ind. iv, 644=Sphinc«iithusGrilnthii.
orcMoides, *Linn. f. SU.* 85.—Afr. austr.
oreophil[a] *T.C. B. Clarjn Hook./. Fl. Brit. Ind.* i 526.—Ind. or.
origanoides, Griseb. t. Pl. Cub. 197 = Adhatod origanoides.
origanoides, Vahl, Eh. i.'122 = Nelsonia tomato*
orixensis, Koen. ex Rb. Hort. Beng. 80: FL Ind>. 132 = glanca.
ovata, Dietr. ex Stu Nom. ed. II. i. 838 = Diclipte peruviana.
ovata, E. Mey. in Dr[illegible]e, Zwei Pfl. Docum. 1[illegible] (= *Rh[illegible]tiglossa ovata*) t. austr.
oxyphylla, DC. Nees, in DC. Prod. xi. 221 Barleria micas
packyrrhiza, Mitk Nees, l. c. 456 = Eranthemu modestum.
pacifica, *Hemsl. Centr. Am. Bot.* ii. 515.—Mexi
palatifera, Wa. As. Rar. i. 80. t. 92 = Eranthemu palatiferum.
palustris, *T. Anders in Journ. Linn. Soc.* vi[illegible] 38.—Abyss
paniculata, Br[illegible]l. Ind. 9 = Andrographis paniculata
paniculata, [illegible] Fl. Aegypt. Arab. 4 = Hypoeste Forskalei.
parasitica, Lin[illegible]i. Encyc. i. 42 = Agalmyla staminea
parviflora, Pr[illegible] Hort. Matr. Dec. 1 = Hemigraphis elegans?
parviflora, [illegible]x. v. 9 = Rungia parviflora.
parvifolia, H[illegible] Nees, in DC. Prod. xi. 461 = Anthacanthus[illegible]ularis.
parvifolia, La[illegible]ncyc. i. 627 = tranquebariensis.
patula, Ic[illegible] Roem. & Schult. Syst. i. 164 = Adhatoda [illegible]
patula, [illegible] ex Nees, in DC. Prod. xi. 392 = Adhatoda [illegible]pifolia.
pauciflora, *Gr[illegible]in Gott. Abh.* xxiv. (1879) 262.—Reg. Arge[illegible]
pauciflora, [illegible]in West, Bidr. Ste Croix, 267; Edog. Am. i 2-[illegible]
pectinata, L[illegible]cent. PL ii. 3; Amoen. Acad.' iv. 299 = Rungia [illegible]., ex Nees, in DC. Prod. xi. 386-
pectinata, [illegible] nilgherr[illegible] Enum. PL Carib. 11 - Diantheta
pectoralis, [illegible] Pectic[illegible]ichx. Fl. Bor! Am. i. 7 - Diantheia!
pedunculata, [illegible] amicis[illegible]uch.-Ham. ex Wall. Cat n. 2370 >
pentagonia, [illegible] Nelson[illegible]entosa.
peplidifolia, [illegible]anders. in [illegible]fount. Linn. Soc. ix. (1867) 5U[illegible]
peplis, [illegible]s. Fl. Orient, iv. 525-diffnsa.
perpusilla, [illegible]. Jacq. Coll. Suppl. 5. t. 7. f. 2 - Adh»-[illegible]bjifclia.
[illegible], [illegible]fort. BeroL ex Nees, in DC. Prod. xi. [illegible]Cardia reflexiflora.
[illegible], [illegible] Ic i. 17. t 28-furcata.
[illegible], [illegible] Encyc. iii. 633 - Dicliptera peruviana.
[illegible], *[illegible] Hey. in Drige, Zwei Pfl. Docum.* A: si.

JUSTICIA:—

phenicea, Hort. Mas. Par. ex Dum. Cours. Bot Cult. ed. II. ii. 666 = Beloperone plnmbaginifolia.
picta, Linn. Sp. PL ed. II. 21 = Graptophyllum hortense.
picta, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 18-Peristrophe salidfolia.
plicata, Vahl, Enum. i. 156-Adhatoda plicata.
plumbaginea, Wall. Cat n. 2487—Asystasia coromandeliana.
plumbaginifolia, Jacq. Edog. Am. 20. t. 2 = Beloperone plumbaginifolia.
polygonoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 282 (= *Rhytiglossa polygonoides).*—N. **Granat**
[illegible]perma, Roxb. Hort Beng. 8; Fl. Ind. i. 119 = Hygrophila polyspenna.
polystachia, Vahl, Symb. Bot. ii. 7-=s«i.
polystachya, *Lam. Tail. Encyc.* i. 40.—Guian.
procumbens, T. Anders, ex Nees, in DC. Prod. xi. 853 = Dianthera pectoralis.
procumbens, Blume, Bijdr. 788-Blumei.
procumbens, *Linn. Sp. PI.* 16.—Ind. or.
procumbens, linn. 1. c partim=micrantha, diflusa.
procumbens, Thib. ex Nees, in DC. Prod. xi. 263 = LepidagatMs alopecuroidea.
procumbens, Wall. Cat. n. 2441 — quinqueangularis, simplex.
prolifera, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 837 (—*Rhytiglossa prolixa).*—Afr. austr.
prolixa, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 196 *{—Rhytiglossa prolixa).*—Afr. austr.
prostrata, Schlecht. ex Nees, in DC. Prod. xi. 390 - Adhatoda leptantha.
protracts, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii, (1864) 41.—Afr. austr.
prunellaefolia, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 180 =nummolaria.
Pseudo-betonica, Roth, Nov. Sp. PL 17=J. Betonica.
psychotrioides, *Thou, ex Schult. Mant*, i. 146.—Ins. Maurit.
ptychostoma, Nees, in Wall. PI. As. Rar. iii. 108 (sp. dub).—Ind. or.
ptychostoma, *Wall. Gat.* n. 2478.—Malaya.
pubescens, Lam. Tabl. Encyc i. 40-Gymnostachyum canescens.'
pubescent, Rniz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 332-Jacobinia pubescens.
pubescent, Schult. Obs. Bot. 6-fnrcata.
pubescens, Vahl, Symb. Bot. ii. 9 •> Dicliptera pubescens.
pnblgera, *WalUf.ati* p. 2490.—Reg: Himal.
pulchella, Carey, ex Voig., Hort. Suburb. Calc. 492 - Peristrophe pulchella.
pulchella, Roxb. PL Corom. ii. 41. t 177 - Daedalacanthus pnrpurascent.
pulchella, Wight, ex WalL Cat. n. 2495 - Eranthemnm pulcherrima, *Jacq. Enum. PI. Carib.* 11.—Ind. occ.
pulcherrima, Linn.' f. Suppl. 84 - Aphelandra pulcherrima.
pu'ehra, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 362-Jacobinia polita.
pulegioides, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 196 = seq.
Pulegium, E. Mey. ex Nees, in DC. Prod. xi. 390-Adhatoda protracta.
pumila, F. G. Dietr. Vollst Lexilt. Gaertn. Nachtr. iv. 197 •» AnisacantUus pumilus.
punctaia, Vahl, Symb. Bot. ii. 15-- Dianthera punctata.
punduana, *Wall. Cat.* n. 2453.—Reg. Himal.
purpurascens, Buch.-Ham.ex Wall. PI. As. Rar. iii. 106 =-Dacdalacan*tus purpurascens.
purpurea, Forsyth, ex Nees, in DC. Prod. xi. 415-Beloperone nemorosa.
purpurea, Linn. Sp. PI. 16^-diflusa.
purpurea, Lour. Fl. Cochinch. 25=Peristrophe tinctoria.
purpurea, Poit ex Nees, in DC. Prod. xi. 490 -Dicliptera Vahliana.
purpurea, Vahl, Symb. Bot. ii. 13 •= Hypoestes purpurea.
pusilla, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. **Bras.** ix. 16-Nelsonia campestris.
quadrangularis. Hook. Bot. Mag. t. 2846 - Phlogacanthus-asperulns.
quadrifaria, T. Anders, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 514. partim-Zollingeriana.
quadrifaria, *Wall. Cat.* n. 2479.—Reg. Himal.; China.
auadrifida, Stend. Nom.ed. II. i. 889-quadrifaria.
quadrifida, Vahl, Enum. i. 124 — Anisacanthus virgularis.

JUSTICIA:—

quadrigona, Vahl, ex Link, Handb. i. 601 =» Aphelandra cristata.
quinqueangnlaris, *Keen, ex Roxb. Hort. Beng.* 80; *Fl. Ind.* i. 138.—Ind. or.
quinqueangularis. Wall. Cat. n. 2443=diflusa.
racemosa, *RUIM V Pav. Fl. Per. i.* 9. t. 9. f. b.—Peruv.
racemulosa, Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1826) 426-Tetramerium racemulosum.
radicans, Vahl, Enum. i. 137 — Beloperone ciliata.
ramosa, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 834 (=*Drejera ramosa).*—Bras.
ramosissima, Roxb. Hort. Beng 4; Fl. Ind. i. 129 = J. Betonica.
reflexiflora, Vahl, Enum. i. 157—Adhatoda reflexiflora.
repanda. Font. f. Prod. 8 =• Anthacanthus repandus.
repent, Deless. ex Nees, in DC. Prod. xi. 373 - Royeninna.
repens, Linn. Sp. PI. 15 = Rungia rcpens.
repens, Neraud, ex T. Anders, in Joum. Linn. Soc. vii. (1864) 23 - Hypoëstes serpens.
repens, Pers. Syn. i. 23=Dicliplera tomentosa.
repens, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 470 - Rungia parviflora.
repens, Wall. Cat. n. 2469, B. partim » Rungia elegans.
reptans, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 13 = Dianthera reptans.
resupinata, Hegewisch, ex Nees, in DC. Prod. xi. 298 = Aphelandra Haenkeana.
resupinata, Vahl, Enum. i. 114 = Dicliptera resupinata.
reticulata, *Vahl, 1. c.* 157.—Hab.!
retorta, Vahl, 1. c. 150=Dicliptera parvibracteata.
retusa, *Vahl, I. c.* ii. 8.—Ins. S. Crux,
rhodoptera, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 221. —Madag.
rigida, *Bajf.f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. **(1884)** 87. —Ins. Socotr.
riviniaefolia, Vis. Sem. Hort. Patav. (1889).— Cf. Linnaea, xiv. (1840) Litt. 137—Peristrophe speciosa.
rivinoides. Wall. Cat. n. 2488; et ex Nees, in DC. Prod. xi. 489=Glossostirma spathulatum.
Rohrii, Vahl, Symb. Bot. iii. 6 = Beloperone Rohrii.
rosea, Vahl, Enum. i. 165 — Daedalacanthus roseus.
rostrata, *Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon.* iv. (1840) 406.—Guatemala.
Rottleriana, Wall. Cat. n. 2477-Rhinacanthus communis.
rotundifolia, *E. Mey. in Drige, Zvei* ***Pfl. Docum.*** **196.** —Afr. austr.
rotundifolia, Nees, in WalL PL As. Rar. iii. 108-Ecbolium Linneannm.
rotundifolia, Wall, Cat n. 2489 - Di-'jptera Roxburghiana, Rostellaria rotundifolia.
Roxburghiana, Blume, Bijdr. 786 — Peristrophe Dlumeana.
Roxburghiana, Hort. Berol. ex Nees, in DC. Prod. xi. 722-Nomaphila corymbosa.
Roxburghiana, Schult. Mant. i. 140 •= Peristrophe tinctoria.
Koyeniana, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 637.—Zcylan.
rubicunda, Buch.-Ham. in WalL Cat. n. 2480 = Eranthemum palatiferum.
rubra, Vahl, Edog. Am. ii. 1-Thyrsacanthus ruber.
rubra, Wight, ex Wall. Cat. n. 2468 - Peristrophe montana.
ruderalis, Ross, ex Stead. Nom. ed. II. i. 839 = Peristrophe bicalyculata.
rupestris.Hachst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 439 - debilis.
Ryani, Vahl, Edog. Am. i. 1 = Beloperone eustachyana.
salicaria, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 350 = Dianthora laeta.
salicifolia, *T. Anders, in Joum. Linn. Soc.* ix. (1867) 514.—Keg. Himal.
salicifolia, *Blume, ex Steud. Nom.* cd. II. i. 889.—Java.
salidna, Vahl, Enum. i. 132; Jacq. ex Nees, in DC. Prod. xi. 489 •= Jacobinia sercea.
salicina, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 410=J. Gendarussa.
Salsola, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) **340.—** Afr. *tup.*
salsoloides, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.ix.* (1867) 514.—Ind. or.
salviaeflora, *//. B. &K. Nov.Cen.etSp.n.'2S».—Mtx\c.*
salviaefotia, Kunth, Syn.Pl. Aequin. ii. 81 -salviaeflora.
sanguinea, Humb. & Bonpl. ex Schult. Mant. i. 146 — Habracanthus sanguineus.
sanguinolenta, Vahl, Symb. Bot. ii. 10 - Gymnostachyum sanguinolentum.

JXT8TTCIA:—
scabra, Vahl, el Nets, in DC. Prod. zi. 298 = Aphel&ndra pectinata.
scabruU, 5. *Moore,..:* ·•*Tourn. Bot.* zviil. (1880) 810.—Afr. trap.
scandens, Michx. ex Nees, in DC. Prod. zi. 490- Didiptera Vahliana.
scandens, Vahl, Symb. Bot ii. 7 - Rhinacanthas communis.
Schimperiana, *T. Anders, in Journ. Linn. See.* TJi. (1864) 88.—Abyss.
Schottii, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. iz. 107 = Scbaueria Schottii.
scorpioides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 262.—Reg. Argent.
scorpioides, Linn. Sp. PL ed. IL 21-Tetminerinm scorpioides.
secunda, Sieber, ex Stend. Norn. ed. II. i. 8S9 - Gonzalea Coccocypselum.
secunda, Vahl, Symb. Bot ii. 7 — Dianthera secunda.
secundiflora, Poepp. ex Nees, in DC. Prod. xi. 378 *{=* Leptostachya Poeppigiana).*—PeniT.
secundiflora, Ruiz & Pav. ex Nees, 1. c 410 *{—Leptostachya lecundiflora).*—Perav.
secundiflora, *Vahl, Enum.* i. 158.—Peruv.
sericea, Ruiz *Sc* Pav. Fl. Per. i. 9. t 9. f. b-Jacobinia sericea.
serpens, Vahl, Symb. Bot. ii. 2 = Hypoëstes serpens.
serpyllifolia, Rottl. ex Vahl, Enum. i. 169 = Andrographis serpyUifolia.
serrata Humb. ex Nee*, in DC. Prod. xL 224 = Barleria micana,
serrata. *Steud. Norn.* ed. II. L 889; *ettx Nees, I. c.* 440. —Bras.
serrulata, Heyne, ez Wall. Cat n. 2452 - Gyranostachyum canescens.
sesamoides. Herb. Madr. ex Watt. L c. a. 2408 = Strobilanthes consanguineus.
sessiliflora, *Humb. tf Bonpl. ex Sckult. Mant.* i. 146. —Am. austr.
sestilis, Jacq. Enum. PI. Carib. llr= Dianthera sessilis.
setibracteă, Pohl, ex Nees, in Matt. Fl. Bras. ix. 129 *{"Rhytiglossa leucopkloeaX*—Bras.
sexangularis, Cav. Ic iii. 2. t.203 - Didiptera chinensis, resupinata.
sexangularis, Forsk. FL Aegypt Arab. *5* - Dicliptera chinensis.
sexangularis, Gueldenst ex Nees, in DC. Prod. xi. 490 -Dicliptera Vahliana.
sexangularit Hort. Berol. ex Nees, in DC. Prod. xi. 440 = Diclij..era assurgens.
sexangularis, Linn. Sp. PL 16 = Dicliptera sexangularis.
sexangulata, Nees, in DC. Prod. zi. 474 - Dicliptera resupinata.
silvatica, Nees, I. c 443 —Rhinacanthus communis.
silvestris, Nees, I. c. 494 — Peristrophe montana.
simplex, *D. Don, Prod. Ft. Nep.* 118.—As. et Afr.trop.
sinensis, J. F. Gmel. Syst. 34 =. Dicliptera Leonotis.
sinuata, Vahl,Symb.Bot. ii. 11 = Anthacanthus sinuatus.
somalensis, *Franch. in Révoil, Comali,* 53.—Afr. trop.
sparsiflora, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 488 = Dicliptera sparsiflora.
spartioides, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 43.—Afr. trop.
spathulata, Klotzsch, ex Nees, in DC. Prod. xL403 = Beloperone violacea.
spathulata, Nees *St.* Mart, in Nor. Act Nat. Cor. xi. (1823) 55 = Beloperone spathulata.
spathulata, *Thunb. Ft. Jap.* 22.—Japon.
speciosa, Roxb. Hort. Seng. 4; Fl. Ind. i. 122 - Peristrophe speciosa.
spergulaefolia, *T. Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 43.—Afr. austr.
sphaerospenna, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 8.—Ind. occ.
spicata, Noronha, in Verh. Batar. Gen. T. (1790) ed. I. Art IV. 18 (Eranthemi sp. ?).—Java,
spicata, *Ruim V Pav. fl. Per.* i. 8. t 9. £ a.—Peruv.
spicata. Veil, ex Nees, in DC. Prod. xi. 440 *(=Packystachys Riedeliana).—Sn».*
spidgera, Schlecht. is Linnaea, rii. (1832) 395 = Jacobinia Mohintli.
sfinosa, Jacq. Enum. PI. Carib. 11; Linn. Sp. PL ed. II. 1663 — Anthacanthus spinosns.-
spinulosa, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 440 - Dicliptera micrutha.

JUSTICIA:—
squamosa, Soland. ex Roem. & Schult. Syst. 1. 1S9 - Elytrana virgata.
squamosa, Thou, ez Schult. Mant i. 146-tenella.
squarrosa. *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 226.—Reg. Argent.
staminea,\ah\, Enum. i. 148 - Thyrsacanthus longistaminens.
straminea, *Humb. V Bonpl. ex Schult. Mant. I* 146, nomen.—Am. austr.
stricta, Lam. ex Steud. Nom. ed. II. L 889 = Andrographis paniculata.
stricta, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 440, 860- Dianthera rigida.
stricta, Vahl. Svrnb. Bert. ii. 6-Nomapbila corymbosa.
strobilifera, *Uim. Tabl. Encyc.* i. 36.—Madag.
suaveolens, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 440, 853 (= *Rhytiglosza polygonoides).*—Ind. or.
subsessilis, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 129.—Afr. trop.
suffruticosa, E. Mey. in Drige, Zwei Pfl. Docum. 196 — Adhatoda tubulosa.
sulcata, Vahl, Symb. Bot. ii. 18 = ..dhatoda sulcata.
sulfurea, Pohl, ex Nees, in Mart Fl. Bras. ix. 104 = Schaueria sulfurea.
sulphurea, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 316 = praec.
sumatrana, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (,l(!7jV II. 142.—Ins. Nicobar.
superba, Hort. ex Nees, in DC. Prod. xi. 445 = Anisacanthus virgularis.
sylvatica,Vahl, Enum. i. 145 = Rhinacanthus communis.
sylvestris, Wall. Cat. n. 2468 = Peristrophe montana.
syringaefolia, *Vahl, Enum. i.* 117.—Madag.-
temulenta, Hort. Liverp. ex Nees, in DC. Prod. xi. 419—Dianthera nodosa.
tenella, *T.Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 40. —Afr. trop.
tenniflora, *Ruiz V Pav. Ft. Per.* i. 9.1.12. f. a.—Peruv.
tenuiflora. Wall. PL As. Rar. iii. 116 - Andrographis tenuiflora.
tenuifolia, Spreng. Syst. i. 78^tenniflora,
tennispica,' *Steud. Nom.* ed. II. i. 839.—Bras.
tetragona. Hook, ex Nees, in DC. Prod, xi 454- Eranthemnm tetragonum.
tetragona, Vahl, Symb. Bot iii. 5 = Aphelandra tetragona.
thyrsiflora, Rozb. Hort. Beng. 3; Fl. Ind. i. 114 = Phlogacanthus thyrsiflorus.
thyrsoidea, Pohl, ex Nees, in DC. *Prod.* xi. 416-Beloperone monticola.
thyrsoides, Roxb. er. Nees, 1. c. 821 = Phlogacanthus thyrsiflorus. >
tincto^a, Hoffm. ex Nees, 1. c. 378 =• Dianthera dichotoma.
tinctoria, Hort Calc. ex Nees, 1. c. 495 - Peristrophe speciosa.
tinctoria, *Lour. Ft. Cochinch.* 26.'—Cochinch.
tinctoria, Roxb. Hort. Beng. 4 ; Fl. Ind. i. 128 — Peristrophe tinctoria.
tomentosa, Roxb. II. cc. 4 ; 181 = NeUonia campestris.
tomentosa, Vahl, Enum. i. 160 = Dicliptera tomentosa.
tranqnebariensis, *Linn.f. Suppl.* 85.—Ind. or.
tranquebariensis, Roxb. Hort. Beng. 4 j'Fl. Ind. i. 133 — glanca.
triangularis, Heyne, ex Nees, in DC. Prod. xi. 399 - glanca.
tribracteata, Spreng. ex Nees, 1. c. 731 -= Beloperone longipetiolata.
trichantha, Pohl, ex Nees, L c 424 - Beloperone involncrata.
trichophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xzi. (1885) 429.—Madag.
tridenta, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Doenm. 196 - *{ — Ramusia trident at a).*—Afr. austr.
trifasciata, E. Mey. ez Nees, in DC. Prod. xL 441 - Adhatoda fasciata.
triflora, Fotsk. Fl. Aegypt. Arab. 4. n. 10 = Hjpoëstes triflora.
trifoliata, Roem. & Schult. Syst. i. 166 - Beloperone trifoliata.
trifolioides, *T. Anders, in Journ. LiAn. Soc.* rii. (1864) 40.—Madag.
trinervia, *Vahl, Enum. 1*156.—Ind. or.
trispinosa, Forsk-. Fl. Aegypt. Arab. 6 — Barleria trispinosa-

JtSTICIA:—
ristis,^[1] *Anders, in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 88. —*A* \ *.op.
risulca, Vahl, Syml. Bot. ii. 10-Anùotes trisdeus.
riticea, *Baker, in Jnrn. Linn. Soc.* xzi. (1885) 420. —Madag.
ubaeformis, Bertol. in Nov. Comtn. At*a. Bonon. iv. (1840) 405 = Thnsaranthus tubaeformis.
ubiflora, Buch.-Ham.ex Wall. Cat. n. 2428 - Phlogacanthus tubinorus.
* Ubdlo a, *E. Mey. in Orige, Zwei Pfl. Docum.* 196.— Afr. austr.
(jnicau, *Aft. Remed.* (»s. iii. 17.—Afr. trop.
fweediana, *Benth. V /«,*./. Gen.* ii. 1109.—Bras.
imbellata, Hort. Mad. e-: Nees, in DC. Prod. xi. ! 500 = glabra.
fmbellata, Vahl, Enum.i. 111 = Dicliptera micranthes.
;mbellata, WalL Cat. n 2467 - Dicliptera cuneata.
fmbellata, Wight, ex tees, in DC. Prod. xi. 488- Dicliptera parvibracteJta.
umbrosa, Benth. r'l. HarW. 73 = Jacobinia anrea.
ondnulata, *Oliver, in Tnns. Linn. Soc.* xxix. (1875) , 180.—Afr. trop.
bndulata, Vahl, Symb. Bo. ii. 8 - Peristrophe undulata.
[Vahliana, Schult. Mant. i.138 = difiusa.
•*Vahlii,* Dletr. ex Nees, in X. Prod. xi. 441-comosa.
Vahiii, Roth, Nov. PL Sp.U = diffusa.
;Vandelli, *Roem. V Schult.Syst.* i. 166— Bras.
;*variabilis,* Zuccagni, in Rotn. Collect, llti-furcata.
'varicgata, *Aubl. PI. Gui.* i. 2. t. 4.—Uuian.
vasculosa, *Wall.-Zat.* n. 246!.—Rer. Himal; Burma.
Velasquezii, *Bertol. in Nov Com. Acad. Bonon.* iv. (1840) 406.—Guatemala.
. *Vellomi,* Roem. & Schult. *ifit.* i. 166 = Beloperone hirsuta.
'venosa, Pohl, ex Nees, in DC.Prod. xi. 358 = cristata.
'venosa, Wight, ex Nees, 1. c. 104 - Strobilantbes consanguineus.
veniric/rip *Wall. Cat.* n. 24SS.—Burma; China.
venusta. Wall. PL Aa. Rar. L 53. t. 66^Gymnostachyum veLustum.
xerHcillaris, Linn. f. Suppl. 85 = Hjpoëstes verticillaris.
verticillaris, Stend. Nom. ed. i.U9; *ed. A.* i. 840 = Hypoëstes aristata.
verricillato, Roxb. Hort Beng. 8 ; Fl. Ind. i.\35 = HapIantLns verticillaris.
vertieillata, Steud. Nom. ed. I. (A; ed. II. L 8«0 = Dicliptera micranthes.
testita, Schult. Mant. i. 145 = Nekaiii tomentosa.
villosa. Mart ex Nees, in DC. Prod.xi. 200 «= Ruellia villosa.
villosa, Pohl, ex Nees, 1. c. 417 = Bebperone hirsuta.
vincoides, Lam.-Encyc. i. 628 — Antbasiuthus vincoides.
violacea, NorotJia, in Verh. Barar. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 18 = Graptophylluir iortense.
violacea, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 15.—Aab.
virgataff. Anders, in Joum. Linn. SDC. ix. (1867) 6IS = Dianthera virgata.
virgularis, Salisb. Parad. Loud. t. S - Anisacanthus virgularis.
viridiflora, Buckl. ex Nees, in DC.Prod. xL 346 = Gatesia laetevirens.
viridis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 16 - hcliptera viridis.
viridis, Forsk. FL Aegypt. Arab. 5 «Scholium Linneanum.
viridis. Gill, ex Nees, in DC. Ptod. xiB95- Adhatoda Tweediana. T,
vitellina, Roxb. Hort Beng.3; FL Ind.. 115-Phlogacanthus asperulus.
volubilis, *Vand. ex Roem. (f Schult. 'yst.* i. 166.— < Bras. »
vulgaris, Bert ez Schult. Mant. i. 15 = .\dhatoda sphaerospenna.
Wallichii, T. Anders, in Journ. Linn. Sc J. (1867) 516-Dianthera Wallichii.
Wanningii, *Hiern, inKjoeb. Vidensk.* J^Arri. (1877-78) 80.—Bras.
Wightiana, Wall. Cat n. 2472-Rungia VightUna.
Wiightii, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i.* 1.329.—Am. bor. occ.
wynaadensis, *Heyne, in Wall. Cat.* s. M74.—Ind. or.
xylosteoides, *Griseb in Goett. Abh.* xix. (1)74) 235.— Reg. Argent.
Zollingeriana, C. *B. Clarke, in Hook. f. HI. Br!',. Ind.* iv. 530.—Burma; Java.

FINIS TOMI PRIMI.